




《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社



# 九八四·子部·醫家類

- 古本難經闡注四卷〔清〕丁錦撰……………一
- 金匱玉函經八卷〔漢〕張機撰〔宋〕林億等校正……………六七
- 仲景傷寒補亡論二十卷（存卷一至卷十五、卷十七至卷二十）題〔宋〕郭雍撰……………一七三
- 活人書二十卷〔宋〕朱肱撰……………三四九
- 傷寒百問六卷〔宋〕朱肱撰……………五〇五
- 新鑄注解張仲景傷寒發微論四卷〔宋〕許叔微撰……………五五一
- 張仲景注解傷寒百證歌五卷〔宋〕許叔微撰……………六〇七
- 傷寒九十論一卷〔宋〕許叔微撰校論一卷〔清〕胡珽撰……………六五五

雲間丁適廬闡註

# 古本難經

體仁堂



序



丁子

丁子履中。素好難經。歲癸丑。得古本於武昌。為之註。越六年。始成。成廼請序於余。余自顧非所知。謝不能。丁子瞿然曰。惟不知而自以為知。此醫之所以多敗也。而先生獨曰不知。是真可以序我書矣。不得已。為之序。序曰。

夫醫之繫於民生也大矣。捩生而之死者。病為樞。捩死而之生者。醫為政。而世之醫者。顧往往輕自任也。間嘗思醫之為道。由弦鈎毛石之隱見。而徐按其浮沉。長短滑濇之異形。以察夫血脉經絡。非骨髓陰陽表裏之病本。吁其微矣。其得之也。豈不難哉。既



得之矣。而乃量淺深之分。權子母之情。決補瀉之方。致齊和之宜。以通閉解結而反之於平。而豪髮悞則全局隨之。嗚呼。又其難也。其難如此。其繫如彼。而世率輕心應之。以瘡爲劇。以生爲死。豈足怪哉。此昔之人所以有病不治。常得中醫之歎也。雖然而

序

一

豈得已哉。於是乎有志者。必推本於內經。而難經者。內經之羽翼也。於是乎難經爲醫者所必讀。然而指趣宏深。文辭雅奧。通之爲難。旣通之矣。而年祀之悠。道里之隔。賦稟之懸。其名實真似之間。母亦有未容意揣而臆決者乎。嗚呼。信矣其難也。丁子心遊

目想。動止與俱。儼乎茫乎。日惟本義之未明。是懼。而果得古本。殆所謂物必聚於所好者邪。於是校釐繆誤。剖析微芒。采掇前脩。補苴昔遁。瀝數年之精志。櫛絲緒於棼如。其爲力也。不亦勤乎。其爲心也。不亦懇乎。然而丁子猶不以自慰。而皇皇焉。是正四方

序

三

以爲務。余於是抑有感也。夫用藥猶用兵也。兵必識其道之所宜。而後可以動。不然則戲爾。故曰兵者不祥器。不得已而用之。治病猶治民也。治民者必唯恐傷之。而後可以無傷。不然則與爲市而已矣。故曰治大國若烹小鮮。蓋丁子之意念則遠矣。夫惟若

丁子之剗心積歲。而猶不敢嘗試而爲。以致萬有一蹶。則庶其投無不利矣乎。是則余所尤望於當世者也。丁子蕭然高寄。雅不以醫自名。而親串間邀之。輒應手霍愈如所欲。并書之以爲讀是書者告。

時

序

四

乾隆三年夏五甲子侍江焦以敬誤



敘

難經者。扁鵲之所著也。何爲乎而名經。本於內經故名也。內經。黃帝之靈樞素問也。其闡發天地陰陽五行之理。動植飛潛之性。合於五臟六腑聲色臭味之微。未病而知其病之來。已病而知其病之源。不定法。故法無不神。不立方。故方無不備。猶夫六經之

古本難經闡註

一

垂於萬世也。扁鵲去古未遠。能徹其源委。合靈素之一十八卷。各八十一篇。披卻道窾。條分縷析。共列八十一難。亦述而不作之意也。其辭雖出於靈素。而晦者明之。繁者省之。缺者補之。複者略之。無微不徹。無義不該。故靈素而下。首推難經。雖有繼起名賢。安能出其範圍哉。數千年來。尚有人



知靈素之義者。獨賴此書之存。歷世久遠。傳寫失真。前後舛錯。以致文氣失貫。精義不彰。近代註家。因訛就訛。愈解愈晦。沿至今日。徒知難經之名。而不明難經之蘊者。蓋不少矣。予自庚戌之秋。遊武昌。客參政朱公所。公素好醫。出篋中古本難經。乃晉王叔和醫範三經之一也。開卷觀之。異

古今難經闡註

序

二

於坊本。如古之三難。誤列十八難。古之十二難。誤列七十五難。共誤三十餘條。而式亦不類於坊本。其問詞升一字。經也。其對詞降一字。引經以釋經也。以今本對校。心目之間。恍若有見。由是而推其論脈論症論治。莫不曲暢旁通。此誠濟世之津梁。醫林之至寶也。余留楚三載。深有得於此書。

癸丑冬歸里。親族故交。凋零殆半。問其故。或曰。卒於病也。或曰。卒於藥也。余不禁愀然思。惕然懼。因憶昔人云。為人臣者。不可不知醫。為人子者。不可不知醫。信哉言乎。遂以是書命子姪於舉業之暇。讀之。其原文對詞。乃扁鵲引經以釋經之旨。是即扁鵲之註也。註有未詳。疏以通之。六經成例

古今難經闡註

序

三

具見於前。是以據所偶得。并採滑氏諸家之切當者。句解字釋。贅於各條之末。名之曰古本難經闡註。芻蕘一得。敢附前賢。以其嘗苦心於斯也。倘讀者藉此以洞難經之源。未必無小補於斯道云爾。

乾隆丙辰春仲雲間適廬老人丁錦

書





凡例

一是經相傳既久。錯簡頗多。如三難誤列十八難。十難誤列四十八難。凡誤三十餘條。今悉依古本釐正。一復越人之舊。恐其久而又差。故復撰某難發明。何義目次一篇。證誤目次一篇。冠於首。

一傳世之書。繕寫多訛。獨難經歷三千年來。所誤不過數字。開列證誤目次。蓋因是書以數冠篇。不致遺失。然其數則存。而文已不隨其數。如三難之誤列十八難而不覺也。沿訛踵謬。讀者難明。余就古本原文闡發。并採前人之說。附於其下。遂覺本義

凡例

卷一

復明。即不業醫者。似亦可展卷瞭然矣。

一是經越人悉本內經。或字句間。與內經小有異同。其義寔無相悖。後人執此一二字以議其非。亦已妄矣。至於脉位。以大小腸分配兩寸。確有至理。余於三難註明。李士材喻嘉言輩。欲駁其誤。恐後人不服。而云高陽生之偽訣。今人不明難經。惑於偽訣一語。反以難經為不足憑。豈其然乎。

一是經越人取經義之深微者。設為問難。雖止八十一條。而內經之全旨已具。其發明脉理。證治針刺。率以一語該千百言之蘊。學者若致心研討。自能

悟千百言於一語之下。欲臻其境者。先讀難經。再讀內經可也。

一是經四明張靜齋本。各條俱有繪圖。夫難經所言。皆闡明脉理陰陽榮衛虛實五行交互補瀉變通。難以繪圖。今其圖。不過即以其文或方或圓。或顛或倒。重寫一過而已。學者一泥其圖。真義反晦。故去之。

一是書余與 參政中峰朱公。互相商榷。裨助實多。間加一二評語。亦錄於左。

凡例

卷一

二

之見者。不及備載。

一是註原為家學衛生而設。每用淺近通俗之語。欲使子姪易明易熟。余又氣血既衰之年。不能過用心思。故字句間。多有不檢之處。讀者諒之。

適廬老人又書





古本難經闡註目次

卷之一

一難<sup>三節</sup>發明十二經一日夜五十周於寸口榮衛一日夜一周於寸口之義

二難<sup>二節</sup>發明寸關尺三部共長一寸九分之義

三難<sup>三節</sup>發明分配十二經脉位於兩手寸關尺之義 附論

四難<sup>三節</sup>發明浮中沉三按別五藏陰陽之義

五難<sup>一節</sup>發明按脉分輕重候五藏之義

六難<sup>一節</sup>發明脉有陰盛陽虛陽盛陰虛之義

目次

卷一

七難<sup>一節</sup>發明六甲子旺脉之義

八難<sup>一節</sup>發明寸口脉平而死腎間命門之生氣獨絕於內之義

九難<sup>一節</sup>發明脉遲脉數別藏病府病之義

十難<sup>四節</sup>發明脉病診三虛三實之義

十一難<sup>一節</sup>發明脉不滿五十動一止腎氣已盡之義

十二難<sup>一節</sup>發明瀉南方補北方之義 附論一條

十三難<sup>六節</sup>發明脉與聲色臭味生剋相應之義

十四難<sup>十二節</sup>發明損至脉該括虛寔表裏生死

之義 附論

十五難<sup>五節</sup>發明四時平脉病脉死脉之義

十六難<sup>六節</sup>分別五藏脉色病之義

十七難<sup>六節</sup>發明五藏脉證相尅則死之義

十八難<sup>二節</sup>發明關格覆溢死脉之義 附論一條

十九難<sup>二節</sup>發明男脉寸盛為順女脉尺盛為順之義

二十難<sup>二節</sup>發明脉有陰陽相乘陰陽伏匿重陽重陰之義

二十一難<sup>一節</sup>發明病人息數不應脉數之義

目次

卷一

二十二難<sup>二節</sup>發明一脉輒變二病有氣先病血後病之義

卷之二

二十三難<sup>三節</sup>發明經脉長短總數榮衛行藏府終始之義

二十四難<sup>七節</sup>發明手足三陰三陽脉絕形各不同之義

二十五難<sup>一節</sup>發明心胞絡與三焦為表裏俱有名無形之義 附論

二十六難<sup>二節</sup>發明十五絡不拘制於十二經之

義

二十七難節二發明奇經八脉之名亦不拘制於

十二經之義

二十八難節七發明奇經八脉之穴

二十九難節十發明奇經八脉之病

三十難節一發明心主榮肺主衛二藏當居膈上之義

三十一難節一發明榮衛受氣周行之義

三十二難節二發明上中下三焦所屬之穴

三十三難節二發明藏府各有五行交合推乙庚

目次

卷一

三

丙辛之義

三十四難節一發明三焦屬手少陽名外府之義

三十五難節二發明腎為兩藏之義

三十六難節二發明命門之義附論

三十七難節三發明九竅陽脉陰脉關格之義附論

三十八難節一發明五藏各有聲色臭味之義

三十九難節二發明鼻知臭耳聞聲五藏有七神

所舍之義

四十難節二發明心肺府藏相遠胆名清淨府之

義

古本難經闡注 目次

四十一難節一發明老少臥寐不同之義

四十二難節一發明人面獨能耐寒之義

卷之三

四十三難節一發明肝性近土親水象木葉初萌

兩葉之義

四十四難節一發明七衝門之所

四十五難節一發明八會之穴

四十六難節一發明狂癲脉證之義

四十七難節一發明厥頭痛厥心痛之義

四十八難節一發明五邪剛柔相乘五傳十變之

目次

卷一

四

義

四十九難節八發明五邪正經自病及風寒暑濕

食乘虛所集之義

五十難節二發明虛寔賊微正五邪生尅之義

五十一難節一發明七傳死間藏生之義

五十二難節一發明府藏七傳間藏死生同法之

義

五十三難節一發明上工治未病之義附總論

五十四難節一發明藏為積府為聚之義

五十五難節二發明積陰聚陽之義

七



五十六難	節六發明五積之起五積之形
五十七難	節七發明五泄之義
五十八難	節四發明傷寒脉證治法之義
五十九難	節十六發明藏府輕重長短盛水穀多寡之數
六十難	節一發明不食飲七日死之義
六十一難	節二發明神聖工巧之義
卷之四	
六十二難	節一發明藏有并榮膈經合五穴府多原穴之義
目次	
卷一	
五	
六十三難	節一發明五藏六府榮合穴始於井之義
六十四難	節一發明并榮膈經合各有五行配剛柔之義
六十五難	節一發明所出為井所入為合之義
六十六難	節一發明三焦之原所過皆可名原之義
六十七難	節一發明五藏募膈陰陽之義
六十八難	節一發明藏府并榮膈經合主病之義
六十九難	節一發明針刺經穴補瀉大法

七十難	節二發明四時針法不同之義
七十一難	節一發明針榮無傷衛針衛無傷榮之義
七十二難	節一發明候氣內針之法
七十三難	節一發明當補不可瀉當瀉不可補之義
七十四難	節一發明五藏病合四時一藏病合五藏之義
七十五難	節一發明察病在藏在府不同之義
七十六難	節一發明用針不應可決死生之義
目次	
卷一	
六	
七十七難	節一發明用針取氣補陰瀉陽補陽瀉陰之法
七十八難	節一發明補瀉一誤足以殺人之義
七十九難	節一發明瀉子補母之義
八十難	節一發明用針隨逆順調氣察表裏虛寔之義
八十一難	節一發明寔寔虛虛損不足而益有餘戒醫者誤治之義 附論
難經本無目錄傳寫倒置今照古本錄正恐日久復差故列之。	

證誤目次

三難誤列十八難

十難誤列四十八難

十二難誤列七十五難

十八難誤列三難

二十六難次節誤列二十七難末節

二十七難次節誤列二十八難末節

三十難誤列三十二難

三十一難誤列三十難

三十二難誤列三十一難

證誤目次

卷一

七

三十四難誤列三十八難

三十五難誤列三十九難

三十六難次節誤列三十七難末節

三十八難誤列三十四難

三十九難次節誤列三十四難末節

四十難誤列三十五難

四十一難誤列四十六難

四十二難誤列四十七難

四十三難誤列四十一難

四十六難誤列五十九難

四十七難誤列六十難

四十八難誤列十難

五十一難誤列五十三難

五十二難誤列五十四難

五十三難誤列七十七難

五十四難誤列三十二難

五十五難末節誤列十八難後

五十九難誤列四十一難

六十難誤列四十三難

七十二難誤列八十難

證誤目次

卷一

八

七十五難誤列五十一難

七十六難誤列七十八難

七十七難誤列七十六難

七十八難誤列十二難

八十難誤列七十二難

十四難二節之脉二字誤于收

十四難四節呼吸不至不字誤再字

十八難末節下部法地句誤尺爲下部法而應

乎地

三十七難關格二字誤格關

七十難春夏必致一陰秋冬必致一陽必字俱  
誤各字  
難經錯簡已久。幸得古本較正。晦而復明。存之並  
垂不朽云。

證誤目次

卷一

九

註解難經諸家姓氏

呂 廣	楊玄操	龐安時
陳瑞孫	虞 庶	丁德用
宋廷臣	謝晉翁	王宗正
張元素	滑伯仁	熊宗立
紀大錫	周與權	張世賢
馬 蒔	吳鶴臯	

註解難經姓氏

卷一

一



古本難經闡註卷之一

春秋盧國秦越人扁鵲著及門

陸汝炎駕恩氏

邢江中峰居士朱潘參

虞勳濬川氏

雲間適廬老人丁錦註

男學海朝宗氏全較

一難曰。十二經中皆有動脈。獨取寸口。以決五藏六府死生吉凶之法。何謂也。然寸口者。脈之大會。手太陰之脈動也。

此章總冒五藏六府十二經動脈。俱會於寸口。下

古本難經闡註

卷一

文分晰十二經脈。一日夜五十會於寸口。榮衛血氣。一日夜一會於寸口也。十二經者。手太陽。手陽明。手少陽。足太陽。足陽明。足少陽。為陽六經。從手走頭。從頭走足。手太陰。手少陰。手厥陰。足太陰。足少陰。足厥陰。為陰六經。從足走胸。從胸走手。此十二經脈所行之直路也。手太陰者。肺也。肺朝百脈。所以十二經統會於此。故曰。寸口脈之大會也。人一呼。脈行三寸。一吸。脈行三寸。呼吸定息。脈行六寸。人一日夜。凡一萬三千五百息。脈行五十度周於身。

二刻為一度。二百七十息。脈行十六丈二尺。為一

周。一日夜五十周於寸口。下文言榮衛一周於寸口。

漏水下百刻。榮衛行陽二十五度。從寅至申。行陰亦二十

五度。從申至寅。為一周也。故五十度復會於手太陰寸口

者。二刻一度。百刻五十度。行畢而復會。五藏六府之終始。故取法於寸

口也。

凡人之通身血脈。無處不周。無刻不運。謂呼吸定息。脈行六寸者。指手太陰肺脈。為首而言也。譬如念佛數珠。有首有尾。轉動一粒。則粒粒俱轉。然自

古本難經闡註

卷一

始至終。必以首粒為主。而定其數。猶肺脈為首行六寸。而通身之脈。莫不盡行六寸也。但十二經。因各行其道。所以較榮衛速。一日夜五十周於身。而於寸口亦五十會也。至於榮衛血氣。從中焦注手太陰肺。從肺注手陽明大腸。大腸注足陽明胃。從胃注足太陰脾。從脾注手少陰心。從心注手太陽小腸。小腸注足太陽膀胱。膀胱注足少陰腎。從腎注手心主胞絡。胞絡注手少陽三焦。三焦注足少陽胆。從胆注足厥陰肝。從肝復注於肺。此一日夜。遍行於十二經。所以遲。故止行一周。而於寅時在



寸口亦一會也。

二難曰。脉有尺寸。何謂也。然。尺寸者。脉之大要會也。從關至尺。是尺內陰之所治也。從關至魚際。是寸口內陽之所治也。故分寸為尺。分尺為寸。

此章明寸陽尺陰。定三部脉之分寸也。寸脉名曰一寸。寔在九分。陽數九也。尺脉名曰一尺。寔在一尺中之一寸。分於脉位。陰數十也。合陰陽之數。共長一寸九分。分寸為尺者。分寸內之三分為關部。分尺為寸者。分尺內之四分為關部。則寸關尺每部。應各得六分。三六一寸八分。餘一分配在關

古本難經闡註 卷一 三

前。即左名人迎。右名氣口也。經但言尺寸而不言關者。關居尺寸之中。而受尺寸所分之地。故不言關而關在其中矣。

故陰得尺中一寸。陽得寸內九分。尺寸終始一寸九分。故曰尺寸也。

此申明上文之義。以起下章定十二經之脉位於寸關尺也。

三難曰。脉有三部。寸關尺部有四經。每部四經共十二經手有太陽肺陽明。大腸足有太陽膀胱少陰。腎為上下部。何謂也。

此章誤列十八難。此以肺與大腸。膀胱與腎。上下之藏府發問者。以起下文定十二經之脉位於兩手六部也。

然。手太陰。肺陽明。大腸金也。足少陰。腎太陽。膀胱水也。金生水。水流下行而不能上。故在下部也。足厥陰。肝少陽。胆木也。生手太陽。小腸少陰。心火。火炎上行而不能下。故為上部。手心主。胞絡少陽。三焦火也。生足太陰。脾陽明。胃土。土主中宮。故在中部也。此皆五行子母更相生養者也。

古本難經闡註 卷一 四

兩手寸口。統屬太陰。所以脉位從太陰起。手太陰。肺經也。手陽明。大腸經也。肺與大腸相為表裏。俱屬金。金位居西。肺位在上。所以當在右寸也。足少陰。腎經也。足太陽。膀胱經也。腎與膀胱相為表裏。俱屬水。水位居北。腎位在下。肺金生之。水流下而不能上。所以當在左尺也。足厥陰。肝經也。足少陽。胆經也。肝與胆相為表裏。俱屬木。木位居東。肝位在左。腎水生之。木不能遠水。所以當在左關也。手太陽。小腸經也。手少陰。心經也。心與小腸相為表裏。俱屬火。火位居南。心位在上。肝木生之。火炎上而不能下。所以當在左寸也。手心主。即手厥陰



包絡也。手少陽三焦也。一經相為表裏。同命門俱屬相火。君火在上。臣火在下。所以當在右尺也。足太陰脾經也。足陽明胃經也。脾與胃相為表裏。俱屬土。相火代君行令生之。土位居中。所以當在右關也。此皆五行子母相生者也。以藏府分配脉位。是天造地設。後人各執偏見。持論紛紛。使學者難憑。如喻嘉言李士材張介賓。相因而言大小腸配兩寸為非。改配兩尺為是。又云此非出於難經。乃高陽生偽訣。又云二腸不潔之府。不應配心肺清高之藏。又云按內經上竟上者。胸喉中事也。下竟下者。少腹腰股膝脛足中事也。殊不知素問云。尺內兩旁。則季脇也。尺外以候腎。尺裏以候腹。中附上。左外以候肝。內以候高。右外以候胃。內以候脾。上附上。右外以候肺。內以候胸中。左外以候心。內以候膻中等句。此候脉位之說也。亦並無二腸膀胱之定位。此內經專主五藏以定脉位。而略於府者。正見府必隨藏。藏必通府也。至上竟上。下竟下二句。是審病之所也。下文三部主疾。即見其義。何可借此牽扯。且人之藏府。俱應五行。如大腸屬庚金。肺屬辛金。庚辛一氣也。小腸屬丙火。心屬丁

古本難經闡註

卷一

五

火。丙丁一氣也。故越人定十二經之脉位。遵內經之手配手。足配足。皆應五行一氣之理。今以一藏府分拆於兩手。豈非錯亂五行乎。以右寸手陽明大腸。改配左尺。足少陰腎位。豈非混雜手足乎。若云二腸不潔之府。不應配心肺清高之藏。則手太陽小腸之經。手陽明大腸之經。亦不應上至於頭矣。余意三子之見。不過就藏府高下而論。孰意越人已揭高下及不淨之義。於四十難剖晰極明。豈諸公未見難經之全文耶。抑見之而不解耶。抑好奇而故為之駁耶。抑駁之而慮後人不服。而云高陽生之偽訣耶。

古本難經闡註

卷一

六

部位  
針病

脉有三部九候。各何所主之。然三部者。寸關尺也。九候者。浮中沉也。此段以上部法天。主胸已上至頭之有疾也。中部法人。主膈已下至臍之有疾也。下部法地。主臍已下至足之有疾也。審而刺之者也。此段按上中下此言寸關尺三部。俱有浮中沉之三候。每部各三候。合而為九候也。此則用藥主治也。上中下三部。言人身上中下三停也。九候。言每停分天地人三部。此則用針主治也。故曰審而刺之者也。坊本



誤尺為下部法而應乎地

四難曰。脉有陰陽之法。何謂也。然呼出心與肺。吸入腎與肝。呼吸之間。脾受穀味也。其脉在中。別刻云受亦贅辭。余謂最緊要。蓋中州有穀味。能主乎呼吸也。浮者陽也。沉者陰也。故曰陰陽也。

此章言脉之陰陽。雖在於尺寸。然陰陽之氣。又在於浮沉。如心肺居上。陽也。呼出必由之。腎肝居下。陰也。吸入必歸之。脾受穀味而在中。則呼出吸入無不因之。故診脉之法。浮取乎心肺之陽。沉取乎腎肝之陰。而中應乎脾胃也。曰陰陽。則脾土居中。

古本難經闡註

卷一

七

兼乎陰陽矣。前章以藏府定於脉位。此下言藏府應乎脉位。乃見經文先後層次。向因誤列而晦也。

心肺俱浮。何以別之。然浮而大散者。心也。浮而短澹者。肺也。

肝腎俱沉。何以別之。然牢而長者。肝也。按之濡。舉指來寔者。腎也。脾主中州。故其脉在中。是陰陽之法也。此言浮中沉按。取陰陽之法。下文復明六脉陰陽之義。

脉有一陰一陽。一陰二陽。一陰三陽。有一陽一陰。一

陽二陰。一陽三陰。如此之言。寸口有六脉俱動耶。然此言者。非有六脉俱動也。謂浮沉長短滑澹也。浮滑長。陽也。沉短澹。陰也。所謂一陰一陽者。謂脉來沉而滑也。左尺為順。一陰二陽者。謂脉來沉滑而長也。左尺為逆。一陰三陽者。謂脉來浮滑而長。時一沉也。左尺為順。所謂一陽一陰者。謂脉來浮而澹也。右寸為逆。一陽二陰者。謂脉來長而沉澹也。左關為順。一陽三陰者。謂脉來沉澹而短。時一浮也。左尺為順。各以其經所在。名病逆順也。

古本難經闡註

卷一

八

此一節言陰陽之脉。合心肺腎肝之逆順。經所在。即十二經之所在也。假如一陰一陽之脉。沉而滑也。見於左尺。腎與膀胱之經。為順。見於左寸。心與小腸之經。為逆。亦相剋之意也。六部倣此。左三部。沉滑居多。陽中之陰也。右三部。浮澹居多。陰中之陽也。

五難曰。脉有輕重。何謂也。然初持脉如三菽之重。與皮毛相得者。肺部也。如六菽之重。與血脉相得者。心部也。如九菽之重。與肌骨相得者。脾部也。如十二菽之重。與筋平者。肝部也。按之至骨。舉指來疾者。腎部也。故曰輕重也。



此承上章言浮中沉之按法。候肺心脾肝腎之部也。

六難曰。脉有陰盛陽虛。陽盛陰虛。何謂也。然浮之損小。沉之寔大。故曰陰盛陽虛。沉之損小。浮之寔大。故曰陽盛陰虛。是陰陽虛寔之意也。

此章亦承上章以浮中沉之按法。察陰陽虛盛之義也。損小寔大者。虛脉盛脉之綱領。學者自當會意而推廣之。

七難曰。經言少陽之至。乍大乍小。乍短乍長。陽明之至。浮大而短。太陽之至。洪大而長。太陰之至。緊大而

古本難經闡註

卷一

九

長。少陰之至。緊細而微。厥陰之至。沉短而敦。敦迫也。陽將動也。

此六者是平脉也。將病脉即自明。然皆王脉也。

其氣以何月各王幾日。然冬至後復得甲子。少陽王

十一月甲子。復得甲子。陽明王。正月甲子。復得甲子。太

陽王。三月甲子。復得甲子。太陰王。五月甲子。復得甲

子。少陰王。七月甲子。復得甲子。厥陰王。九月甲子。王

各六十日。六六三百六十日。以成一歲。此三陰三陽

之王時日大要也。

此章詳言六氣之旺脉。然三陽三陰經之旺脉。亦可以此類推。

八難曰。寸口脉平而死者。何謂也。然諸十二經脉者。皆係于生氣之原。所謂生氣之原者。謂十二經之根本也。謂腎間動氣也。此五藏六府之本。十二經之根。呼吸之門。三焦之原。一名守邪之神。故氣者。人之根本也。根絕。則莖葉枯矣。寸口脉平而死者。生氣獨絕於內也。

此章首明命門三焦一氣同原之義。所謂生氣之原者。即兩腎中間命門原也。呼出氣起於此。吸入氣納於此。故十二經脉之氣。皆係於此。所以為五藏六府之本。十二經之根。呼吸之門。三焦之原也。

古本難經闡註

卷一

十

人有此原氣。邪氣不能傷其身。守於內而充於外。故曰守邪之神。若此氣絕。猶草木之根絕。莖葉即枯。雖寸口脉平必死。若此氣未絕。雖寸口脉無。亦不死也。是即十四難之上部無脉。下部有脉。雖困無能為害也。

九難曰。何以別知藏府之病。然數者。府也。遲者。藏也。數則為熱。遲則為寒。諸陽為熱。諸陰為寒。故以別知藏府之病也。

此章專重分別藏府之病。言數脉。府也。遲脉。藏也。數則府病為熱。遲則藏病為寒。諸陽皆屬於府為



熱諸陰皆屬於藏為寒。以此分別藏府之病。無遺也。後人議數則為熱句。似有未妥。每見陽虛之病。脈亦急數。投桂附而即平。殊不知數則為熱數字。即府字也。遲則為寒遲字。即藏字也。甚矣讀古人書。未經苦心體會。豈可輕議哉。此章但言藏府不同。不言病與虛實。故下章申明脈病診虛寔之義。

十難曰。人有三虛三寔。何謂也。然有脈之虛寔。有病之虛寔。有診之虛寔也。本文自明。

此章誤列四十八難

古本難經闡註

卷一

十一

脈之虛實者。濡者為虛。緊牢者為寔。本文自明。

病之虛寔者。出者為虛。入者為寔。言者為虛。不言者為寔。緩者為虛。急者為寔。

此節言出入所包者廣。凡諸吐諸泄。皆為出。諸飲食諸觸氣。皆為入。緩急者。筋有緩急。脈有緩急。痛有緩急。舉動有緩急之類。虛指正虛。實指邪寔。

診之虛寔者。濡者為虛。牢者為寔。痒者為虛。痛者為寔。外痛內快。為外寔內虛。內痛外快。為內寔外虛。

濡。軟也。牢。鞭也。此按病所之軟鞭。非言脈之濡牢也。餘義本文自明。

故曰。虛實也。

此結上文脈病診三虛三寔也。然虛之一字。最重在腎。故下章詳言腎氣盡之脈。

十一難曰。經言脈不滿五十動而一止。一藏無氣者。何藏也。然人吸者。隨陰入。呼者。因陽出。今吸不能至腎。至肝而還。故知一藏無氣者。腎氣先盡也。

吸者。陽隨陰入。呼者。陰因陽出。陽不能榮于下。惟至肝而還者。因腎氣先盡而不能受吸入之氣也。故有下章汲汲乎補腎之法。或四十三動一止。又當以肝脾之氣類推也。

古本難經闡註

卷一

十二

十二難曰。經言東方寔。西方虛。瀉南方。補北方。何謂也。然。金木水火土當更相平。東方木也。西方金也。木欲寔。金當平之。火欲寔。水當平之。土欲寔。木當平之。金欲寔。火當平之。水欲寔。土當平之。東方者。肝也。則知肝寔。西方者。肺也。則知肺虛。瀉南方火。補北方水。南方火。火者。木之子也。此句伏子能令母寔。北方水。水者。木之母也。此句伏母能令子虛。水勝火。此謂水能令火子能令母寔。謂火能令子虛。故瀉火補水。此是補法。欲令金不得平木也。謂木已平不得復令金平木也。經曰。不能治其虛。何問其餘。此之謂也。謂不知補肺之法。



此章誤列七十五難。此論專補先天之法。從來講解難明者有三焉。其一誤列在七十五難針刺之門。將謂用針補瀉之法。其二因子能令母寔。母能令子虛二句。將謂子是水。母是金。補水能令金寔。母能令子虛。將謂母是土。子是金。則無講解矣。只得牽引致病治病而言。謂土受木尅而致病也。本文並不言及而忽及之。自是全文俱晦矣。其三欲令金不得平木一句。將謂補水瀉火。不過欲金能平木。反云不得平木。又不能解矣。所以馬註云。當刪去不字。有此三者之見。使經義千古難明。若

古本難經闡註

卷一

三

能熟玩本文。其理自見。余故曰難經之八十一難。卽越人之註也。如此章之對詞。專言水火而已。謂金木水火土更相平者。凡人五藏有相生。卽有相制。故無偏勝。亦無虛寔。是其常也。若此藏虛。必彼藏寔。如問詞之肺虛肝寔也。然五藏之中。惟水易虧。虧必求助其母。所以肺金亦易虧也。水虧既不能制火。火炎能令肝寔。故曰子能令母寔也。瀉南方火。補北方水。瀉火卽是補水。補水卽是瀉火。本是一法。水者肝之母也。水勝火。則火爲肝子。不能令母寔。而水爲肝母。反能令肝子虛。故曰母能令

子虛也。故瀉火補水者。不過欲令金不得再平木。因火退而木已平也。蓋肝寔。則瀉其子。人能知之。肺虛補其子。人不能知矣。經曰。不能治其虛。何問其餘。此明補水之法。便是治肺虛之法。若不明補水之法。安可問其治肝之有餘哉。讀此章。乃見補腎之法。出自越人。蓋因腎水足。則金不耗而肺不虛。腎水足。則木得養而肝不躁。肝不躁。則木不侮脾而脾足。脾既足。土又可生金。金又生水。自此接續相生。莫不均藉。補水之力。此天一生水之義也。若不明乎此。卽經所謂不能治其虛。何問其餘。

古本難經闡註

卷一

四

十三難曰。經言見其色而不得其脉。反得相勝之脉者。卽死。得相生之脉者。病卽自已。色與脉當參相應。爲之奈何。

此以色脉爲問。下文詳言色脉皮膚聲音臭味相應之義。

然五藏有五色。皆見於面。亦當與寸口尺內相應。假令色青。肝其脉當弦而急。肝色赤。心其脉浮大而散。心色黃。脾其脉中緩而大。脾色白。肺其脉浮濇而短。肺色黑。腎其脉沉濡而滑。腎此所謂五色之與脉。當參相應也。



此槩舉五藏之色脉也。下文明相應吉凶之義。此節精熟則色脉生勝之理自然了了。

脉數。尺之皮膚亦數。脉急。尺之皮膚亦急。脉緩。尺之皮膚亦緩。脉濇。尺之皮膚亦濇。脉滑。尺之皮膚亦滑。

此言脉與寸關尺皮膚相應之理。脉數數字。當作熱字解。急字。當作緊字解。緩字。當作和字解。濇即

乾濇之謂。滑即滑潤之謂。此但言尺者。統乎手臂也。

臂也。

五藏各有聲色臭味。當與寸口尺內相應。其不相應者。病也。

古本難經闡註

卷一

五

此言五藏各有相生相勝。當以聲色臭味參之。如

聲呼色青。臭臊味酸者。肝也。聲笑色赤。臭焦味苦

者。心也。聲歌色黃。臭香味甘者。脾也。聲哭色白。臭

腥味辛者。肺也。聲呻色黑。臭腐味鹹者。腎也。察其

聲色臭味。參合其脉之相生相勝。則知其病之生

死矣。假令色白多哭。好辛臭腥。其脉弦而急者。是

肺之聲色臭味。而見肝脉。此為相勝則死。若見脾

脉。此為相生。病即自己。若見肝之聲色臭味。而得

肺脉。亦死也。

假令色青。肝其脉浮濇而短。脾若大而緩。脾為相勝

浮大而散。脉若小而滑。腎為相生也。

此申明相生相勝之義。以肝藏為例而言也。假如

青者。肝木之色也。浮濇短。肺金之脉也。為脉勝色

大而緩。脾土之脉也。為色勝脉。浮大散。心火之脉

也。為色生脉。小而滑。腎水之脉也。為脉生色。餘藏

倣此。

經言知一為下工。知二為中工。知三為上工。上工者

十全九。中工者十全八。下工者十全六。此之謂也。

此總結上文色脉生勝之理。缺一不可。知一者。知

其色也。知二者。知其脉也。知三者。知其脉與聲色

古本難經闡註

卷一

六

臭味之相生相勝也。

十四難曰。脉有損至。何謂也。然。至之脉。一呼再至曰

平。一息三至曰離經。一息四至曰奪精。一息五至曰

死。一息六至曰命絕。一息十此至之脉也。何謂損

一呼一至曰離經。一息二呼一至曰奪精。一息三呼

一至曰死。一息四呼一至曰命絕。一息此損之脉

也。至脉從下上。損脉從上下。

診損至脉。以醫者之息數。定病者之至數。至脉從

下上者。從腎而上也。損脉從上下者。從肺而下也。

此言損至脉大綱。



損脈之為病奈何。然一損損于皮毛。皮聚而毛落。二損損於血脈。血脈虛少。不能榮於五藏六府也。三損損於肌肉。肌肉消瘦。飲食不能為肌膚。四損損於筋。筋緩不能自收持。五損損於骨。骨痿不能起於床。反此者。至之脈病也。至之脈向誤至于收從上下者。骨痿不能起於床者死。病損脈從下上者。皮聚而毛落者死。至脈病

此一節指損至脈本原之久病。蓋一損皮毛。病尚淺。五損于骨。病已深。然有由骨而復返皮毛。必死。所以虛勞脈數不治。

治損之法奈何。然損其肺者。益其氣。損其心者。調其榮衛。損其脾者。調其飲食。適其寒溫。損其肝者。緩其中。損其腎者。益其精。此治損之法也。

曰益曰調。曰適曰緩。此四法包括已盡。不立方而方在其中。此但言治損。不言治至者。若到至脈。已無治矣。可不慎歟。

脈有一呼再至。一吸再至。有一呼三至。一吸三至。有一呼四至。一吸四至。有一呼五至。一吸五至。有一呼六至。一吸六至。有一呼一至。一吸一至。有再呼一至。再吸一至。有呼吸不至。脈來如此。何以別知其病也。不至不字誤。再字今改正。

古本難經闡註

卷一

七

此復舉至損之脈為問。是指近病而言。以起下文也。

然脈來一呼再至。一吸再至。不大不小曰平。此指一息四至之平脈。不大不小者。言不洪大。不沉細也。

一呼三至。一吸三至。為適得病前大後小。即頭痛目眩。前小後大。即胸滿短氣。

此指一息六至之脈也。適初也。言初得病也。前謂寸脈。後謂尺脈。寸大尺小者。邪在表也。寸小尺大者。邪在裏也。

古本難經闡註 卷一 六

一呼四至。一吸四至。病欲甚。脈洪大者。苦煩滿。沉細者。腹中痛。滑者。傷熱。濇者。中霧露。

此指一息八至之數脈也。欲甚將甚也。洪大而數者。邪在胸膈。沉細而數者。邪在腹中。滑數傷熱。濇。濇數中濕邪也。

一呼五至。一吸五至。其人當困。沉細夜加。浮大晝加。不大不小。雖困可治。其有大小者。為難治。

此指一息十至之危脈也。困。病重也。沉細陰將竭。而夜重。浮大陽將竭。而晝重。所以不浮大。不沉細。雖重而可治也。



一呼六至。一吸六至。為死脉也。沉細夜死。浮大晝死。此一息十二至之死脉也。以上四節。俱指近病而言也。

一呼一至。一吸一至。名曰損。人雖能行。猶當着床。所以然者。血氣皆不足故也。

此一息二至之脉也。人雖能行者。言初損肺。人必能行。因其能行而失治。則必漸及于心肝脾腎。血氣俱損而着床也。

再呼一至。再吸一至。名曰無魂。無魂者。當死也。人雖能行。名曰行屍。

古本難經闡註

卷一

九

此一息一至之脉也。魂屬真陽之氣。陽氣敗絕。雖能行必死。故曰行屍。此二節。復言損脉者。明損脉非起於一朝一夕。或有初起病得似損非損之脉。恐人誤認。故以下文結之。

上部有脉。下部無脉。其人當吐。不吐者死。上部無脉。下部有脉。雖困無能為害。所以然者。譬如人之有足。猶樹之有根。枝葉雖枯槁。根本將自生。脉有根本。人有原氣。故知不死。

此呼吸不至之脉也。上有下無。謂寸有尺無。因是邪一時閉塞。阻遏生氣。吐則越其邪而升其氣。不

吐者死。謂不用吐法者死也。此條越人恐誤認損脉。故諄諄晰之。夫損脉者。遲脉也。至脉者。數脉也。不言遲數。而言損至者。蓋以遲數之脉。統攝虛症寔症。表症裏症。無所不包。無法不備之總名也。如首節言至脉始於一息四至。終於十二至。損脉始於一息二至。終於二息一至。此為本原症提綱而論也。至脉從下上。損脉從上下。明至脉從腎陰虛竭而及於肺氣盡。損脉從肺氣虛寒而及於腎陽竭也。二節明損脉之本原症。起於肺。若失治。必遞及於心脾肝腎。其損脉必反而為至脉。因腎虛火燥。復由腎而遞及肝脾心肺而死。故曰反此者。至之脉病也。三節明調治本原諸法。言損於肺者。益其氣。蓋損肺。即損氣也。氣即命門之真氣。真氣損。則皮皴而毛髮枯。故曰皮聚而毛落。治之當益其氣。益則補益之謂也。氣虛即陽虛。補其陽氣。則皮毛可以充寔。若非理中桂附等類。何以補其陽。輕則補中益氣等湯。庶可取用。若不明損脉之義。又何能明治損之法。及至脉數氣喘。發咳喘熱。方云肺虛。然後補肺保肺。終無成效矣。殊不知此是損脉失治。轉到至脉不治之候也。又曰損其心者

古本難經闡註

卷一

三



調其榮衛。蓋損心卽損血也。心爲榮血之源。肺爲衛氣之本。旣損肺而復損心。其氣血不能榮養五藏六府。當調而治之。調者取和調之義。有顧此兼彼之法。非比益之徑行直遂也。如歸脾湯。異功散。八珍湯。十全大補等湯。或六味八味等丸。消息病情。隨宜投服。無不效也。若不明治損之義。必待脈數。心煩。咽乾。口燥。驚惕不寐。方謂心虛。投之溫補。必不受也。滋補必碍脾也。此亦損脈失治。轉到至脈不治之候也。又曰損其脾者。調其飲食。適其寒溫。蓋脾主中州。又主肌肉。肌肉消瘦。則廢理不密。不任寒溫。感邪最易。故曰適其寒溫。中州失職。則運化無權。易泄易滯。不特參苓藥石。溫補健脾。而於飲食亦必節其饑飽。察其所宜。故曰調其飲食也。若不明治損之義。必待饑不能食。氣急脹滿。脈數。雙弦。方謂脾虛。用參芪而脹滿愈加。投桂附而虛煩轉甚。此亦因損脈失治。轉到至脈不治之候也。又曰損其肝者。緩其中。肝主筋。筋藉血。血虛則肝燥而筋縱。必大補心脾。使心能生血。脾能統血。歸脾養榮補血等湯。宜早投也。若不明治損之義。必待血枯。脈數。手足難運。方謂肝虛。然後議用前

古本難經闡註

卷一

三

方已無及也。又曰損其腎者。益其精。骨屬腎。精虧則髓枯。骨痿。必益其精。而髓自充。經曰。精不足者。補之以味。味乃血肉厚味也。如鹿茸等類。兼地黃。枸杞。人參之屬。俱能補精。若不明治損之義。必待真陰竭絕。虛火炎蒸。脈數。心煩。不能起床。及投之以養陰。必泄。進之以養陽。必躁。此皆不能會悟。此篇治損之精義也。至第四節。另以至損之脈爲問者。別出五邪表裏之症。不混於本原之症也。第五節。言不洪大。不沉細。不病之平脈也。第六節。言寸脈洪大。尺脈沉細。表症裏症也。第七節。言尺寸俱洪大。尺寸俱沉細。表熱裏熱之症也。而又舉洪大而滑者。必是傷熱。沉細而濇者。必是中濕熱也。第八節。言尺寸沉細。必是裏熱而夜重。尺寸浮大。必是表熱而晝重。又言不大不小。雖困可治者。此有邪退之機。重必轉輕。而可治也。若愈浮大。愈沉細。此病進之機。而難治矣。是卽第九節之沉細夜死。浮大晝死也。自四節至九節。專以至脈提綱。明表裏寔邪之義也。第十節。復叮嚀損脈不可失治。如一息二至之脈。雖其人能行。必當早治。苟因其能行而不治。必至着床不起。其所以不起者。因血氣

古本難經闡註

卷一

三



皆不足故也。第十一節言一息二至失治。必至一息一至而不可治。或有能行。亦不過行屍耳。末節明急症無脈之義。恐其混於損脈也。蓋言下部無尺脈。必因驟中有形之寔邪。壅塞而可吐也。若上部無寸脈。或因偶中無形之虛邪。雖因無能為害也。而復歸重於腎。歸重於原氣。總結全章之義也。中峰云。閱此論。悟古人之治本原。大異於今人。古人治可治之損脈。今人治不可治之至脈。可慨也夫。

十五難曰。經言春脈弦。夏脈鉤。秋脈毛。冬脈石。是王古本難經闡註 卷一 三

脈耶。將病脈也。然弦鉤毛石者。四時之脈也。春脈弦者。肝。東方木也。萬物始生。未有枝葉。故其脈之來濡弱而長。故曰弦。夏脈鉤者。心。南方火也。萬物之所茂。垂枝布葉。皆下曲如鉤。故其脈之來。來疾去遲。故曰鉤。秋脈毛者。肺。西方金也。萬物之所終。草木華葉。皆秋而落。其枝獨在。若毫毛也。故其脈之來。輕虛以浮。故曰毛。冬脈石者。腎。北方水也。萬物之所藏也。極冬之時。水凝如石。故其脈之來。沉濡而滑。故曰石。此四時之脈也。

此章言四時之脈象。以起下文平脈病脈死脈之

義。

如有變奈何。然春脈弦。反者為病。何謂反。然其氣來寔強。是謂太過。病在外。氣來虛微。是謂不及。病在內。氣脈厭厭聶聶。如循榆葉曰平。益寔而滑。如循長竿曰病。急而勁益強。如張弓弦曰死。春脈微弦曰平。弦多胃氣少曰病。但弦無胃氣曰死。春以胃氣為本。自此節以下。俱形容脈神。全在會悟自得。此即脈法中千手千眼。後人著訣盈千萬言。恐未能道破一二也。脈因氣行。氣來即脈來。下倣此。

夏脈鉤。反者為病。何謂反。然氣來寔強。是謂太過。古本難經闡註 卷一 四

病在外。氣來虛微。是謂不及。病在內。其脈來累累如環。如循琅玕曰平。來而益數。如雞舉足者曰病。前曲後居。居直也如操帶鉤曰死。夏脈微鉤曰平。鉤多胃氣少曰病。但鉤無胃氣曰死。夏以胃氣為本。秋脈毛。反者為病。何謂反。然其氣來寔強。是謂太過。病在外。氣來虛微。是謂不及。病在內。其脈來藹藹如車蓋。按之益大曰平。不上不下。如循雞羽曰病。按之蕭索。如風吹毛曰死。秋脈微毛曰平。毛多胃氣少曰病。但毛無胃氣曰死。秋以胃氣為本。冬脈石。反者為病。何謂反。然氣來寔強。是謂太過。



病在外氣來虛微。是謂不及。病在內。脈來上大下兌兌當作銳。濡滑如雀之喙曰平。啄啄連續。其中微曲曰病。來如解索。去如彈石曰死。冬脈微石曰平。石多胃氣少曰病。但石無胃氣曰死。冬以胃氣爲本。

以上四時之平脈。卽有胃氣之脈也。病脈。卽少胃氣之脈也。死脈。卽無胃氣之脈也。欲明脈神精義。當於平脈中參悟。

胃者水穀之海。主稟四時。皆以胃氣爲本。是謂四時之變病。死生之要會也。

此言四時病變死生。皆藉胃脈爲主。

古本難經闡註

卷一

五

脾者中州也。其平和不可得見。衰乃見耳。來如雀之啄。如水之下漏。是脾衰之見也。

此總結上文四時之脈。合五藏之義也。脾屬土而分旺於四季。則四時之平脈皆屬於脾。故不能另求脾土之平脈也。然脾之衰也。則有雀啄下漏之可見矣。

十六難曰。脈有三部九候。有陰陽。有輕重。有六十首。一脈變爲四時。離聖久遠。各自是其法。何以別之。然是其病有內外證。

此越人謂去古軒岐既久。醫者各執已見。各立成

法。將何以別其是非耶。脈有三部至變爲四時。俱各立之成法也。謂不必別其孰是孰非。但以下文病之內外症。辨別脈之是非。則軒岐之旨。言言可據矣。卽此可見軒岐而下。中流砥柱之書。惟此爲最也。六十首。古經名。

其病爲之奈何。然假令得肝脈。其外證善濡。面青善怒。其內證臍左有動氣。按之牢。若痛。其病四肢滿閉。淋洩。便難。轉筋。有是者。肝也。無是者。非也。

此診得肝之病脈也。肝藏清淨。故善濡。面青。肝之色也。善怒。肝之志也。肝屬木而左。故臍左有動氣。

古本難經闡註

卷一

五

牢。堅韌也。肝病肝氣不行。故四肢滿閉。淋洩。小便淋瀝而不快也。便難。大便難也。轉筋。筋急也。有肝之色。辨肝之症。是肝之脈也。下倣此。

假令得心脈。其外證面赤口乾喜笑。其內證臍上有動氣。按之牢。若痛。其病煩心。心痛。掌中熱而嘔。有是者。心也。無是者。非也。

此心色心病心脈也。心在上。故動氣在上。嘔音噎。張註有聲無物。心中熱。故發嘔。則當於決切爲是。俟考正。

假令得脾脈。其外證面黃善噫善思善味。其內證當



臍上有動氣。按之牢。若痛。其病腹脹滿。食不消。體重節痛。怠惰嗜臥。四肢不收。有是者。脾也。無是者。非也。

此脾色脾病脾脉也。脾位居中。故動氣當臍。

假令得肺脉。其外證面白善嚏。悲愁不樂。欲哭。其內證臍右有動氣。按之牢。若痛。其病喘咳。洒淅寒熱。有是者。肺也。無是者。非也。

此肺色肺病肺脉也。右屬肺。故動氣在右。肺主皮毛。故寒熱。

假令得腎脉。其外證面黑善恐。欠。其內證臍下有動氣。按之牢。若痛。其病逆氣。小腹急痛。泄如下重。足脛

古本難經闡註

卷一

三

寒而逆。有是者。腎也。無是者。非也。泄如下重。即泄而下重。而如古通用。

此腎色腎病腎脉也。腎在下。故動氣在下。欠者。氣相引也。泄如下重者。大便時腰下沉而窘也。以上五條。言五藏脉色病之定體。證字病字。俱有內外之義。

十七難曰。經言病或有死。或有不治自愈。或連年月不已。其生死存亡。可切脉而知之耶。然可盡知也。

此言或有死。即下文之相剋脉。不治自愈。即十三難之相生脉。或連年月。即五十五難積聚病之相應脉。故曰可盡知也。

診病若閉目不欲見人者。脉當得肝脉弦急而長。而反得肺脉浮短而濇者。死也。

此節論金剋木之脉。下四節兼參症寔脉虛。脉寔症虛之義。

病若開目而渴。心下牢者。脉當得緊寔而數。而反得沉濇而微者。死也。症寔脉虛。

此肝心二經之病。應得緊寔數之肝心脉。反得沉濇微之腎肺脉。則金水來剋木火。故當死也。

病若吐血。復衄血者。脉當沉細。而反浮大而牢者。死也。症虛脉寔。

古本難經闡註

卷一

三

肺主氣。血為氣配。凡吐衄必由於肺。必傷於氣。則脉當沉細為順。反得浮大牢之火脉。則火來剋金。故死也。

病若譫言妄語。身當有熱。脉當洪大。而反手足厥冷。脉沉細而微者。死也。症寔脉虛。

症屬陽。應得洪大屬火之脉順。若反得沉細屬水之脉。則水來剋火。故死也。是即陽病見陰脉死者。其理同也。

病若大腹泄者。脉當微細而濇。反緊大而滑者。死也。症虛脉寔。



脾病則土虛。應得微細濇脉。微細濇。心肺之脉也。火生土。土生金。則吉。反得緊大滑脉。緊大滑。肝腎之脉也。木剋土。水剋火。故死也。以上言剋制則死。以起下章關格剋制之義。

十八難曰。脉有太過。有不及。有陰陽相乘。有覆有溢。有關有格。何謂也。然。關之前者。陽之動也。脉當九分。而浮過者。法曰太過。減者。法曰不及。遂上魚為溢。為外關內格。此陰乘之脉也。關以後者。陰之動也。脉當一寸。而沉過者。法曰太過。減者。法曰不及。遂入尺為覆。為內關外格。此陽乘之脉也。三十七難亦有發明。當參看。

古本難經闡註

卷一

三

此章誤列三難。全章之義。只重關格二字。曰太過。曰不及。曰陰陽相乘。曰覆溢。俱是關格之註脚。故先論脉位之陰陽。寸為陽。尺為陰。次論脉體之陰陽。浮為陽。沉為陰。如寸部得浮大之脉。覆下而至尺部。即為陽太過。直浮至尺之盡頭處。為格陽脉。即陽乘陰也。如尺部而得沉寔之脉。溢上而至寸部。即為陰太過。直沉至寸之盡頭處。為關陰脉。即陰乘陽也。減者。謂寸部而得沉脉。為陽不及。尺部而得浮脉。為陰不及。故法曰不及。又關者。陰太盛。陽氣不能交。故曰關陰。格者。陽太盛。陰氣不能

通。故曰格陽。此純陰純陽無和氣之脈也。若一手得之。浮大名格。沉寔名關。若兩手俱得之。則名關格。即下文之真藏脉不病而死也。浮脉為陽。浮過者。自寸而下。浮過關部一二分也。若浮而和。不得為病脉。不和。則為陽盛。曰太過者。陽太過也。減者。關前九分當浮而反沉之謂也。曰不及者。陽不及也。若沉過關部而直至魚際。為外關內格。此即尺陰之脉。乘於寸陽之位也。沉脉為陰。沉過者。自尺而上。沉過關部一二分也。若沉而和。不得為病脉。不和則為陰盛。曰太過者。陰太過也。減者。關後一寸當沉而反浮之謂也。曰不及者。陰不及也。若浮過關部而直至尺內。為內關外格。此即寸陽之脉。乘尺陰之位也。總之關格之義。不外乎陰陽相乘之為害也。

古本難經闡註

卷一

三

故曰覆溢。是其真藏之脉。人不病而死也。覆則內關外格。如水從上流下。溢則外關內格。如水由下溢上。此孤陰獨陽。乃真藏之脉。無胃氣以和者也。人不病而死者。言不待久病而速死也。兩手脉俱極浮極大為覆。兩手脉俱極沉極寔為溢。是即關格並見。必死之脉也。



覆卽格陽。溢卽關陰。此以尺寸之陰陽論也。若以  
兩手論之。又當分左右爲陰陽。則格陽在右。便是  
陽乘陰。關陰在左。便是陰乘陽。故兩手得之。方可  
謂關格脉也。

十九難曰。脉有逆順。男女有恒而反者。何謂也。然。男  
子生於寅。寅爲木。陽也。女子生於申。申爲金。陰也。故  
男脉在關上。女脉在關下。是以男子尺脉恒弱。女子  
尺脉恒盛。是其常也。反者。男得女脉。女得男脉也。

此章言男女之脉。合陰陽之理。以別弱盛之常道。  
木數三。陽也。故男子陽生於寅。金數四。陰也。故女

古本難經闡註

卷一

三

子陰生於申。男當陽旺者。旺於寸陽之位。故曰在  
關上。女當陰旺者。旺於尺陰之位。故曰在關下。若  
男寸弱。女寸盛。則病矣。義在下文。後人解男生於  
寅。女生於申。從胎元而論。皆因看版生字故也。

其爲病何如。然。男得女脉爲不足。病在內。左得之。病  
在左。右得之。病在右。隨脉言之也。女得男脉爲太過。  
病在四肢。左得之。病在左。右得之。病在右。隨脉言之。  
此之謂也。

此言陰陽反常之脉。謂男得女脉爲不足者。寸脉  
弱。陽氣不足於內。故病在內也。左寸脉弱。病在左。

右寸脉弱。病在右。若女得男脉爲太過者。寸脉盛。  
陽氣有餘於外。故病在四肢也。左寸脉盛。病在左。  
右寸脉盛。病在右矣。此章論病。只論寸脉。不論  
尺脉者。何也。蓋人之有尺。猶樹之有根。欲其盛而  
不可得也。若男得女脉。指尺盛。豈可謂之不足乎。  
女得男脉。指尺弱。豈可謂之太過乎。舊註以男脉  
爲春夏。女脉爲秋冬。與本文毫無干涉矣。

二十難曰。經言脉有伏匿。伏匿於何藏而言伏匿耶。  
然。謂陰陽更相乘。更相伏也。脉居陰部而反陽脉見  
者。爲陽乘陰也。脉雖時沉澹而短。此爲陽中伏陰也。

古本難經闡註

卷一

三

脉居陽部而反陰脉見者。爲陰乘陽也。脉雖時浮滑  
而長。此謂陰中伏陽也。

此章言陰陽相乘之中。又有相伏之義。如尺部而  
見浮滑長之脉。乃陽乘於陰也。於浮滑長脉之中。  
偶雜沉澹短之脉。此謂陽中伏陰也。寸部而見沉  
澹短之脉。乃陰乘陽。偶雜浮滑長之脉。謂陰中伏  
陽也。此脉法之最細者。註中言其大綱。讀者當會  
悟而推廣之。

重陽者狂。重陰者癲。脫陽者見鬼。脫陰者目盲。

此承上文而言。若陽部而見陽脉。宜也。設陰部亦



見陽脉。則謂重陽。陰部見陰脉。宜也。設陽部亦見陰脉。則謂重陰。重陽。則陰部失滋燥之權。陽邪飛越而狂矣。重陰。則陽部失宣和之令。陰邪鬱結而癩矣。人身之陰陽。偏勝則病。偏極而至於純陰純陽。并無伏匿之機。必至脫陽則見鬼。脫陰則目盲也。

二十一難曰。經言人形病脉不病曰生。脉病形不病曰死。何謂也。然。人形病脉不病。非有不病者也。謂息數不應脉數也。此大法也。

此章發明氣血先後受病之義。以起下章之意也。

古本難經闡註

卷一

誦

言形病脉不病者。非脉不病也。蓋病人之息數不與其脉數相符也。假令邪入於氣。氣屬陽而應於表。則形先病而息先亂。脉必隨後應之。非脉能不病也。謂形先病而息數不應脉數也。假令邪入於血。血屬陰而隱於裏。則形後病而息後亂。然脉已病也。非形能不病。謂脉先病而脉數不應息數也。此卽氣血先後受病之大法也。曰生者。病在表。府也。曰死者。病在裏。藏也。坊本云醫者不能調息以應病者之脉數。真不經語也。

二十二難曰。經言脉有是動。有所生病。一脉輒變爲

二病者。何也。然。經言是動者。氣也。所生病者。血也。邪在氣。氣爲是動。邪在血。血爲所生病。

此章言血病必由於氣病。氣者。血之帥也。脉者。氣之充也。氣先病。脉卽應之。故經言是動者。氣也。血後病。病可驗之。故曰所生病者。血也。邪在氣。已見於脉。邪在血。又見於病。故有一脉輒變爲二病之問也。下文詳言所以氣先病。血後病之故。

氣主响之。血主濡之。氣留而不行者。謂氣先病也。血滯而不濡者。謂血後病也。故先爲是動。後所生也。

响。煦也。猶蒸也。濡。猶潤也。氣先留而不行。然後血滯而不濡。故氣先爲是動於脉。而血後所生於病也。

古本難經闡註

卷一

誦

古本難經闡註卷之一 終



古本難經闡註卷之二

春秋盧國秦越人扁鵲著 及門

陸汝炎 駕恩氏

邗江中峰居士朱 潘叅

虞勳 濟川氏

雲間適廬老人丁 錦註

男學海朝宗氏全較

二十三難曰。手足三陰三陽脉之度數。可曉以不然。手三陽之脉。從手至頭。合三丈。手三陰之脉。從手至胸中。合二丈一尺。足三陽之脉。從足至頭。合四丈八尺。足三陰之脉。從足至胸。合三丈九尺。人兩足躡脉。從足至目。合一丈五尺。督任脉。各長四尺五寸。合九尺。凡脉共長一十六丈二尺。此所謂經脉長短之數也。

古本難經闡註

卷二

一

此章言脉起長短之數。卽一難之二百七十息。脉行一度。共長十六丈二尺。爲一周。一日夜一萬三千五百息。脉行五十周。義同。

經脉十二。絡脉十五。何始何窮也。然。經脉者。行血氣。通陰陽。以榮於身者也。其始從中焦。注手太陰陽明。陽明注足陽明太陰。太陰注手少陰太陽。太陽注足太陽少陰。少陰注手心主少陽。少陽注足少陽厥陰。

厥陰復還。注手太陰。別絡十五。皆因其原。如環無端。轉相灌溉。朝于寸口。人迎。以處百病。而決死生也。

此節卽一難之榮衛行陽二十五度。行陰亦二十五度。其注始於肺而終於肝。一日夜一周之義也。其絡脉十五。不與十二經直行而注藏府。乃各因十二經之原穴。傍行於十二經脉之外。流注於諸穴。循環不已。朝於寸口。人迎之脉。以處百病之吉凶也。手足二字。俱貫下。如手太陰陽明。卽手太陰。手陽明也。足陽明太陰。卽足陽明。足太陰也。諸穴之所。詳六十六難。

古本難經闡註

卷二

二

經云。明知終始。陰陽定矣。何謂也。然。終始者。脉之紀也。寸口人迎。陰陽之氣。通於朝使。喻朝使之臣。如環無端。故曰始也。終者。三陰三陽之脉。絕。絕則死。死各有形。故曰終也。

此一節承上決死生之義。而問脉之終始。以起下章脉絕之形。蓋常言終始者。不過謂脉之紀也。今言死生之終始者。謂左右人迎寸口脉陰陽之氣。循環不已。人之生機皆始於此。故曰始也。三陰三陽之脉。絕。人之生機皆終於此。故曰終也。但三陰三陽脉。絕。形各不同。義在下章。



二十四難曰。手足三陰三陽氣已絕。何以爲候。可知其吉凶不然。足少陰氣絕。氣絕。卽脈絕。下做此。則骨枯。少陰者。冬脈也。伏行而溫於骨髓。故骨髓不溫。卽肉不着骨。骨肉不相親。卽肉濡而却。濡滯也。却。不親也。肉濡而却。故齒長而枯。髮無潤澤。無潤澤者。骨先死。戊日篤。巳日死。此章言脈絕之義。足少陰屬北方腎。腎主冬。氣當歛藏。故脈當着骨伏行。伏行者。如潛伏而行也。所以診腎脈按之至骨。腎者。水也。戊巳。土也。土尅水。故死也。

足太陰氣絕。則脈不榮於口唇。口唇者。肌肉之本也。  
古本難經問註 卷二 三

脈不榮。則肌肉不滑澤。肌肉不滑澤。則肉滿。滿。滿。滿。同。敗也。肉滿則唇反。唇反則肉先死。甲日篤。乙日死。

足太陰。脾也。脾主肌肉。所以診脾脈與肌骨相等。脾屬土。甲乙屬木。木尅土。故死也。

足厥陰氣絕。則筋縮。引卵與舌卷。厥陰者。肝脈也。肝者。筋之合也。筋者聚於陰氣。而絡於舌本。陰氣。小便也。故脈不榮。卽筋縮急。筋縮急。卽引卵與舌。故舌卷卵縮。此筋先死。庚日篤。辛日死。

足厥陰。肝也。肝應乎筋。所以診肝脈與筋平。肝屬木。庚辛屬金。木受尅。故死也。

手太陰氣絕。則皮毛焦。太陰者。肺也。行氣溫於皮毛者。氣弗榮。則皮毛焦。皮毛焦。則津液去。津液去。則皮節傷。皮節傷。則皮枯毛折。毛折者。則毛先死。丙日篤。丁日死。

手太陰。肺也。肺主皮毛。所以診肺脈與皮毛相得。肺屬金。丙丁屬火。金受尅。故死也。

手少陰氣絕。則脈不通。脈不通。則血不流。血不流。則色澤去。故面黑如鰲。此血先死。壬日篤。癸日死。

手少陰。心也。心在上而主血。所以診心脈與血脈相得。心屬火。壬癸屬水。水受尅。故死也。五行之中。

古本難經問註

卷二

四

必陽日篤。而陰日死。乃見人之生機係乎陽。而命門真陽之義。不可不明也。手厥陰。卽手心主胞絡。與手少陰氣絕同。故不另載。

三陰氣俱絕。則目眩。轉。目瞑。目瞑者。爲失志。失志者。則志先死。死卽目瞑也。此三陰。因手厥陰同於心藏。故不言六陰。而六陰在內矣。

前言五藏之氣絕。則以五行日干相尅之期應之。此言三陰絕。死不待日矣。目眩者。目眩亂而見不

真也。轉者。瞳反也。目瞑。則無所見矣。志死。則不知喜怒之類也。

六陽氣俱絕。則陰與陽相離。陰陽相離。則腠理泄。絕



汗乃出。大如貫珠。轉出不流。即氣先死。旦占夕死。夕占旦死。

前言三陰絕。死不待日。此言六陽絕。死不待時。乃見陽重於陰。氣先死者。即命門真陽之氣先死也。

二十五難曰。有十二經。五藏六府十一耳。其一經。何等經也。然。一經者。手少陰與心主別脈也。心主。即手別脈者。不同於心經脈也。心主與三焦為表裏。俱有名而無形。故

言經有十二也。胞絡配一藏。成十二經也。

此章言心主與三焦為表裏。俱有名而無形。後人因無形二字。不參經義。持論紛紜。不特議越人之

百五難經闡註 卷二 五

錯謬。而并議叔和附會之非。三千年來。未有定論。

余每思難經去古未遠。出諸家之最先。且字字必本內經。豈獨於胞絡三焦大關鍵處。反創空言而

惑世耶。不得不即以內經。合難經之義。而明辨之。如內經之言五藏。俱載形色。五府亦載丈尺。所盛

水穀。亦載升斗。若胞絡三焦有形。何獨不明載其色。并尺寸升斗之數。乃見內經所言胞絡者。以包

字取義也。言三焦者。以三字取義也。如靈樞本輸篇曰。三焦者。中瀆之府。水道出焉。屬膀胱。是孤

之府。本藏篇曰。密理厚皮。三焦膀胱厚。決氣

篇曰。上焦開發。宣五穀味。若霧露之溉。是謂氣。中焦受氣取汁。變化而赤。是謂血。營衛生衛篇曰。

營出於中焦。衛出於下焦。又曰。上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。五癰津液別論曰。三焦出氣以溫

肌肉。充皮膚。靈樞邪客篇曰。心者。五藏六府之大主。其藏堅固。邪勿能容。容之。則心傷。心傷。則神

去而死矣。故諸邪之在於心者。皆在於心之包絡。以上靈素諸條。俱形容三焦統包五藏六府。胞

絡獨包於心之義。夫所謂中瀆之府。是孤之府。豈非因三焦能包乎外。而得此獨尊之稱乎。又謂密

百五難經闡註 卷二 六

理厚皮。三焦厚。若周身皮肉之內。非三焦所托。何

能厚薄相應乎。又謂上焦宣穀味。中焦受氣取汁。變化而赤。豈非三焦能包各藏府。而各藏府俱藉

三焦之氣以宣化乎。又謂榮出中焦。衛出下焦。榮因穀味之精為血。衛因穀味之氣為氣。皆因於胃

者也。然能使胃之變化者。豈非三焦統包乎外。而運其氣乎。又謂如霧如漚如瀆。能上主開發之令。

中主變化之權。下主水道之職。豈非三焦包各藏府之外。而盡為其統持乎。又謂出氣以溫肌肉。充

皮膚。則明指三焦托在皮膚肌肉裏面之一層也。



又謂諸邪之在於心者皆在心之胞絡則明指胞絡是護於心外之一層也。後人看書執着將謂三焦若無形何以水道出何以有厚薄何以若霧露何以如霧如漚如瀆何以出氣溫肌肉若胞絡無形何以諸邪皆在心之胞絡何獨不悟夫何以不載其色何以不載其丈尺乎。殊不知胞絡者絡於內而包於外之一小囊也。既已名之曰胞絡不必又以大小尺寸狀其形也。三焦者托於外而護於內之一大囊也。不過以三字極狀其護之徧以焦字極狀其氣之周既已名之曰三焦亦不必又以大小丈尺狀其形也。而向之所疑者從此可頓釋矣。且以似藏別藏之小囊配似府外府之大囊亦天造地設之理。越人謂無形二字一見於此再見於三十四難自必考之至當究之至確。何後人僅得內經之皮毛。卽妄議前賢多見其不知量也。四難稱三焦口外府

二十六難曰經有十二。絡有十五。餘三絡者。是何等絡也。然有陽絡。有陰絡。有脾之大絡。陽絡者。陽蹻之絡也。陰絡者。陰蹻之絡也。故絡有十五焉。

此章總論經絡以起下文之義。直行謂經。旁支曰

絡。絡有十五。本文自明。

經有十二。絡有十五。凡二十七氣。相隨上下。何獨不拘於經也。然聖人圖設溝渠。通利水道。以備不然。天雨降下。溝渠溢滿。當此之時。霧霈妄行。聖人不能復圖也。此絡脉滿溢。諸經不能復拘也。

此節誤列二十七難之後。文理何由貫通。今錄正便覺絲絲入扣。上文言十五絡。此言十二經。不能拘十五絡。故以圖設溝渠喻十二經。聖人不能復圖。言十二經之氣血滿溢。歸於絡脉。而不能復令絡脉之氣血。反於十二經也。

古本難經闡註 卷二 八  
二十七難曰。脉有奇經八脉者。不拘於十二經。何謂也。然有陽維。有陰維。有陽蹻。有陰蹻。有衝。有督。有任。有帶之脉。凡此八脉者。皆不拘於經。故曰奇經八脉也。

凡此八脉不受十二經之拘制。與絡脉之義同。且十二經俱有藏府配偶。獨此八脉無偶。故曰奇經。比於聖人圖設溝渠。溝渠滿溢。流於深湖。故聖人不能拘通也。而人脉隆盛。入於八脉。而不還周。故十二經亦不能拘之。其受邪氣。畜則腫熱。砭射之也。砭。平聲。針石也。



此節誤列二十八難後。此言十二經亦不能拘八脉。故復以圖設溝渠喻十二經。深湖喻八脉。聖人之不能拘通者。言十二經脉之氣血隆盛。入於八脉。而不能復令八脉之氣血。反於十二經也。故其受邪。亦不能通於諸經。所以畜而為腫熱也。砭射之。出其所畜之血也。

二十八難曰。其奇經八脉者。既不拘於十二經。皆何起何繼也。然督脉者。起於下極之俞。並於脊裏。上至風府。入屬於腦。

此章明八脉起止之義。下極。長強穴也。在脊骶骨端。風府穴在腦後髮上三寸。蓋督者。都也。能統諸

古本難經闡註

卷二

九

陽脉行於背。為陽脉之都綱也。

任脉者。起於中極之下。以上至毛際。循腹裏。上關元。至咽喉。上頤循面。入目絡舌。

臍下三寸關元穴。任者。妊也。能統諸陰脉行於腹。為陰脉之妊養也。

衝脉者。起於氣衝。並足陽明之經。俠臍上行。至胸中而散。

氣衝。一名氣街。穴在毛際兩旁。督任脉始於氣衝。一原而分三岐。督脉行於背。任脉行於腹。衝則直

上。總領諸經之脉。故曰氣海。並於胃之經。俠臍而上行。

帶脉者。起於季脇。迴身一周。

季脇。章門穴也。在小肋。迴身一周。如束帶也。

陽蹻脉者。起於跟中。循外踝上行。入風池。

起自足跟。循足外踝上行。入風池穴。其穴在後項

髮際陷中。

陰蹻脉者。亦起於跟中。循內踝上行。至咽喉。交貫衝脉。

交貫衝脉者。與衝脉交接貫通也。

古本難經闡註

卷二

十

陽維陰維者。維絡於身。溢畜不能環流。灌溢諸經者也。故陽維起於諸陽會。陰維起於諸陰交也。

溢畜不能環流。灌溢諸經。即上章入於八脉不還周之義。諸陽會。在足外踝骨下陷中。穴名金門。諸

陰交。在足內踝上除踝三寸骨陷中。穴名築賓。

二十九難曰。奇經之為病何如。然陽維維於陽。陰維維於陰。陰陽不能自相維。則悵然失志。溶溶不能自收持。

此章明八脉病情之義。陽維維於陽。謂陽維脉能維絡一身之陽脉。陰維維於陰。謂陰維脉能維絡



一身之陰脉。若病在二脉。則一身之陽脉陰脉。不能自相維。覺神思不快。如悵然失志。四肢溶溶懈怠。如不能收持也。此言二脉合病。末節言二脉分病。

陰躄為病。陽緩而陰急。

陰躄脉受邪。則陽躄緩縱。陰躄緊急也。陰躄起跟中。循內踝上行。

陽躄為病。陰緩而陽急。

陽躄脉受邪。則陰躄脉緩縱。陽躄脉緊急也。陽躄起跟中。循外踝上行。

古本難經闡註

卷二

十一

衝之為病。逆氣而裏急。

衝脉起於氣衝穴。又名氣海。其受邪。則氣必逆。脉必裏急而作痛也。其所以受邪。亦因腎氣不足而邪能干之也。

督之為病。脊強而厥。

脊。督脉所過之處也。督脉受邪。病必脊痛而厥逆也。

任之為病。其內苦結。男子七疝。女子瘦聚。

任脉起於中極小腹之下。故其受邪為病。俱在腹內也。

帶之為病。腹滿腰溶溶。若坐水中。

帶脉起於季脇。廻身如束帶。故其受邪為病。在腰腹。若坐水中。句。解溶溶二字之神理。

陽維為病。苦寒熱。

陽維之脉。維絡於陽。陽為衛而主表。故其受邪為病。必苦寒熱也。

陰維為病。苦心痛。

陰維之脉。維絡於陰。陰為榮而主裏。榮屬血而主心也。其受邪為病。必苦心痛也。然亦有因寒。亦有因熱。

古本難經闡註

卷二

十二

此奇經八脉之為病也。

總結上文之意也。以上八脉之邪。大抵風寒濕乘虛集入而為病者居多。不可不察。八脉另列病。因經脉不能拘故也。

三十難曰。五藏俱等。而心肺獨在膈上者。何也。然心者血。肺者氣。血為榮。氣為衛。相隨上下。血氣相隨。周謂之榮衛。通行經絡。榮行中。榮周於外。衛行外。故令心肺在膈上也。

此章誤列三十二難。此謂心肺乃氣血之主。故居膈上。以別氣血為榮衛。周於一身者也。下章詳



言榮衛之源。

三十一難曰。榮氣之行。常與衛氣相隨。不然。經言人受氣於穀。穀入於胃。乃傳於五藏六府。五藏六府皆受於氣。其清者為榮。濁者為衛。榮行脉中。衛行脉外。營周不息。五十而復大會。陰陽利貫。利貫流利。如環之無端。故知榮衛相隨也。

此章誤列三十難。此言榮衛相隨不息之源。起於胃之穀氣。其清者為榮。即穀味之精。乃陽中之陰。化血為榮。行於脉中。其濁者為衛。即穀味之氣。乃陰中之陽。化氣為衛。行於脉外。榮衛相隨。周行

古本難經闡註

卷二

三

藏府之經脉。一日夜行五十度。復會於手太陰寸

口。榮衛生衛篇曰。榮出中焦。衛出下焦。

三十二難曰。三焦者。何稟何生。何始何終。其治常在何許。可曉以不然。三焦者。水穀之道路。氣之所終始也。

此章誤列三十一難。此言三焦稟於胃之水穀。生於下文各屬之穴。終始不息也。

上焦者。在心下下膈。在胃上口。主內而不出。其治在膻中。玉堂下一寸六分。直兩乳間陷下者是。中焦者。在胃中脘。不上不下。主腐熟水穀。其治在臍傍。下焦

者。在臍下當膀胱上口。主分別清濁。主出而不內。以傳導也。其治在臍下一寸。故名曰三焦。其府在氣街。府。猶根也。氣街。即氣街。此即三焦之原也。

此一節本文自明。胆中玉堂等穴。經穴篇詳載。治屬也。

三十三難曰。肝青象木。肺白象金。肝得水而沉。木得水而浮。肺得水而浮。金得水而沉。其意何也。然肝者。非為純木也。乙角也。庚之柔。大言陰與陽。小言夫與婦。釋其微陽。而吸其微陰之氣。其意樂。金又行陰道多。庚金居陰道。故令肝得水而沉也。肺者。非為純金也。辛

古本難經闡註

卷二

四

商也。丙之柔。大言陰與陽。小言夫與婦。釋其微陰。婚而就火。其意樂。火又行陽道多。丙火居陽道。故肺得水而浮也。

此章言陰陽互根。五行交合之理。凡人身不外乎陰陽。交則生。不交則病。離則死。越人特舉肝肺而言者。肝主血而肺主氣。此又以氣血為一身陰陽之主也。學者能透徹此章之義。則前後八十一難之經義。無不可以神會而貫通也。即據五行之理。無在非陰陽交合。如天干甲乙丙丁戊。為陽道。已庚辛壬癸。為陰道。此十干對分而為交合之陰陽



也。又甲乙木。丙丁火。戊己土。庚辛金。壬癸水。上一字屬陽。下一字屬陰。此五行各分而為交合之陰陽也。又五音附五行。如宮土商金角木徵火羽水。各因十干之陰陽而分太少。此五音附十干而為交合之陰陽也。又人之五藏屬陰五行。而其中之交合必寓陽五行。六腑屬陽五行。而其中之交合又寓陰五行。此藏府各有交合之陰陽也。明乎陰陽交合之義。然後可以暢達此章之理矣。如經云。肝非純木。乙角也。庚之柔。言肝乃乙角之陰木也。然又非純木。乙與庚合。故其中寓庚金。庚屬陽而乙屬陰。故乙木乃庚金之柔也。大而言之。即陰與陽。小而言之。如夫與婦也。又云釋其微陽。而吸其微陰之氣。其意樂。釋。猶開也。吸。猶收也。乙木。二月之木也。二月陽氣未盛。故曰微陽。庚金。七月之金也。七月陰氣未盛。故曰微陰。開乙木之微陽。收庚金微陰之氣。則木不燥而樂矣。又云金又行陰道多。故令肝得水而沉也。言庚雖陽金。而其所居之位。在十干中之陰道。故肝亦隨陰道而沉。如婦之隨夫也。又云肺者非純金。辛商也。丙之柔。言肺乃辛商之陰金也。然又非純金。丙與辛合。其中寓丙

古本難經闡註

卷二

五

火。丙屬陽而辛屬陰。故辛金。乃丙火之柔也。大而言之。即陰與陽。小而言之。如夫與婦也。又云釋其微陰。婚而就火。其意樂。言辛金。八月之金也。八月陰氣尚微。故曰微陰。開辛金之微陰。婚而就火。如就婚於丙火也。辛金之陰。得丙火之陽。則不寒而樂矣。又云火又行陽道多。故肺得水而浮也。言丙火所居之位。在十干中之陽道。故肺亦隨陽道而浮。亦如婦之隨夫也。舉肺肝二藏而推。則五藏六腑之陰陽交合。無不可以會悟矣。肺熟而復沉。肝熟而復浮者。何也。故知辛當歸庚。乙當歸甲也。

古本難經闡註

卷二

六

此言陰陽之離也。熟。猶純也。辛歸庚。則純金。丙與辛。不合而離矣。甲歸乙。則純木。乙與庚。不合而離矣。離則亢。亢則死矣。

中峰云。此章歷來註釋不明。皆因點讀多訛。如張註點庚之柔大言。陰與陽小言。馬註點其意樂金。其意樂火。使一篇精義。處處茫然。今則首明陰陽互根五行交合之理。便覺通篇一貫。不解自明。千古難明之義。一旦恍然。不亦快哉。

三十四難曰。藏惟有五。府獨有六者。何也。然。所以府



有六者。謂三焦也。有原氣之別焉。主持諸氣。有名而無形。其經屬手少陽。此外府也。故言府有六焉。

此章誤列三十八難。此言三焦與諸府不同。有原氣之別。所以能主持諸氣也。有名而無形。所以能統攝乎外。故曰外府也。二十五難。予註三焦。乃護於諸藏府外之一大囊。與此章之義合之。可以恍然矣。奈後之人。謂三焦有形。而議難經之非。蓋亦未會難經之全體歟。

三十五難曰。經言府有五。藏有六者。何也。然六府者。止有五府也。五藏亦有六藏者。謂腎有兩藏也。其左

古本難經闡註

卷二

七

為腎。右為命門。命門者。謂精神之所舍也。男子以藏精。女子以系胞。其氣與腎通。故言藏有六也。  
此章誤列三十九難。前章發明六府。此章復發明六藏之義。謂前云六府者。有外府在內。今經言六藏者。謂腎有兩枚。其左為腎。右為命門。又曰命門者。謂精神之所舍。男子藏精。女子系胞。其氣與腎通。乃見越人以命門之名配於右腎。而命門之處。寔指兩腎中間。不爾。何以言藏精系胞。何以言氣與腎通。然又恐命門之名。混於手心主胞絡之藏。故有下文言三焦一府。不屬於五藏者。是即指

明屬於胞絡之藏也。其氣與腎通。是指命門與右腎一氣相通。玩讀自見。

府有五者。何也。然五藏各一府。三焦亦是一府。然不屬於五藏。故言府有五焉。

此言三焦不屬於五藏者。乃屬於心胞絡也。舉三焦亦是一府。以見不配五藏。而配亦是一藏之心胞絡。最為切當者也。二十五難三焦論中。余謂似府外府之大囊。配似藏另藏之小囊。與此節義同。三十六難曰。藏各有一耳。腎獨有兩者。何也。然腎兩者。非皆腎也。其左者為腎。右者為命門。命門者。謂精神之所舍。原氣之所繫也。故男子以藏精。女子以系胞。故知腎有兩也。

古本難經闡註

卷二

六

此章承上章復發明命門在於兩腎中間之義。所以又補出原氣之所繫也。蓋所謂原者。即三焦之原。六十六難云。臍下腎間動氣者。人之生命也。故名曰原。觀此亦可以無疑矣。但後人不明此義。將謂三焦與胞絡為表裏。出自內經一陰一陽之定。耦初無命門三焦表裏之說。惟靈樞根結。及素問陰陽離合等篇。有太陽根於至陰。結於命門。命門者。目也。此指太陽經穴。終於睛明。睛明所夾之處。



是腦心。乃至命之處。故曰命門。此外並無命門之說。而右腎為命門。寔見於此。但難經皆出於內經。必有確據。誠如滑氏之註七難云。篇首有經言二字。考之靈素並無。或越人時別有上古之本。是未可知也。惟是右腎為命門。男子藏精。女子繫胞。則左腎將藏何物。此又無怪乎其疑也。觀經脈篇。有左為腎。右為子戶。夫所謂子戶者。即子宮也。即俗名子腸也。子腸居直腸之前。膀胱之後。當關元氣海穴之間。男精女血。皆存乎此。曰丹田。曰氣海。寔則一子宮耳。子宮之下有一門。女子曰產門。男子曰本難經闡註 卷二 二

即泄精之道。男之施。由此門而出。女之攝。由此門而入。胎元既足。復由此門而出。即如十四難七衝門者。皆指出入之處。乃見凡出入。皆謂之門。而此係先天立命之本。焉得不謂之命門乎。是則男子藏精。女子繫胞。皆有歸着。正合六十六難臍下腎間動氣之說。而千古之疑。可頓釋矣。至于十二經之陰陽表裏。固已天然配就。若以命門再配一經。是腎藏惟一。而經居其兩。必無是理。且內經有督脈十椎中。是命門原屬於腎之句。當以原字讀斷。則知命門在原。并知兩腎俱非繫胞藏精之

古本難經闡注 卷二

所其天一之真陰。藏於兩腎中間命門之原。而氣通於左。坎中之真陽。藏於兩腎中間命門之原。而氣通於右。故左腎為水。右腎為火。越人以命門之真陽。分配右尺臣火之位。理宜然也。予亦悉揣經義而評之。以俟將來之裁正焉。

中峰云。論命門之原。確切有理。如八難云。腎間動氣。五藏六府之本。十二經之根。呼吸之門。三焦之原。豈非指此命門乎。

經言氣獨行於五藏。不榮於六府者。何也。然氣之行。如水之流。不得息也。故陰脈榮於五藏。陽脈榮於六府。如環無端。莫知其紀。終而復始。而不覆溢。人氣內溫於藏府。外濡於腠理。

此條誤列三十七難末節。此節言人身命門之氣。無不流通。但陰脈獨榮五藏。陽脈獨榮六府耳。陰脈者。三陰脈也。陽脈者。三陽脈也。循環無已。行於五藏六府。而不覆溢者。謂不傾而不滿也。又曰。人氣內溫於藏府。外濡於腠理者。言人命門一陽之氣。內則溫養藏府。外則濡潤腠理。無微不至。無處不周。而所問之不榮於六府者。惟陰脈耳。非氣也。故下章詳言陰脈陽脈之病。覆溢二字。並非寸

古本難經闡註 卷二



口脉之覆溢。舊註指十八難之覆溢脉。大誤。

三十七難曰。五藏之氣。於何發起。通於何許。可曉以不然。五藏者。當上關於九竅也。故肺氣通於鼻。鼻和則知香臭矣。肝氣通於目。目和則知黑白矣。脾氣通於口。口和則知穀味矣。心氣通於舌。舌和則知五味矣。腎氣通於耳。耳和則知五音矣。三焦之氣通於喉。喉和則聲鳴矣。

此章承上而言陰脉榮於五藏之義。九竅者。目二耳二鼻二。口一舌一喉一也。

五藏不和。則九竅不通。六府不和。則留結為聚。

古本難經闡註

卷二

三

此亦承上章陽脉榮於六府之義。言六府屬陽。邪在陽。則六府不和。不和則氣滯而為聚為癰矣。下文又以藏府并言之。以明其所以不和之故也。聚字。靈樞作癰字。

邪在六府。則陽脉不和。陽脉不和。則氣留之。氣留之。則陽脉盛矣。邪在五藏。則陰脉不和。陰脉不和。則血留之。血留之。則陰脉盛矣。陰氣太盛。則陽氣不得相榮也。故曰關。陽氣太盛。則陰氣不得相榮也。故曰格。關格。關格不得盡其命而死矣。

陽邪中於六府。則陽脉不和。不和則氣壅而邪寔。邪寔則不和之脉。轉而盛矣。陰邪中於五藏。則陰脉不和。不和則血滯而邪寔。邪寔則不和之脉。轉而盛矣。陰陽之脉俱盛。則必至於關格而死矣。

此章即靈樞脉度篇所載。但靈樞云五藏常內關於上七竅。此云當上關於九竅。靈樞鼻為一竅而無喉。此則鼻為二竅而添喉。要知越人補內經之缺。因三焦係統五藏六府之大府。喉係統出納之節。與內經無異。但其中關格二字。與內經相反。今

古本難經闡註

卷二

三

閱古本。與內經相同。乃知錯簡。今錄正。故記之。關格之脉。從來議論最多。或云脉。或云病。使後學難憑。今錄素問及仲景之文。並存參考。蓋關陰陽之脉。專論脉理。陰陽並非論病。如內經之帝問。藏象如何。岐伯曰。心者生之本云云。凡十一藏取決於胆也。故人迎一盛。病在少陽。二盛病在太陽。三盛病在陽明。四盛已上為格陽。張介賓指喉間動脉為人迎。兩手之脉俱為寸口。恐未合經旨。觀十一藏取決於胆。故人迎一盛病在少陽句。知胆經正在左關。當以左人迎。右寸口為是。人迎一盛

續修四庫全書 子部 醫家類



二盛三盛。則三陽俱盛矣。然陽極必陰。四盛已上者。左人迎之陽位。勢必越於右寸口之陰位也。故曰格陽。即十八難陽乘陰也。又曰寸口一盛。病在厥陰。二盛病在少陰。三盛病在太陰。四盛已上爲關陰。夫寸口一盛二盛三盛。則三陰俱盛矣。然陰極必陽。四盛已上者。右寸口之陰位。勢必越於左人迎之陽位也。故曰關陰。即十八難陰乘陽也。又曰人迎與寸口俱盛四倍已上。爲關格。關格之脈。不能極於天地之精氣。則死矣。人迎與寸口俱盛。即兩手之脈俱盛四倍已上也。方可合稱關格之

古本難經闡註

卷二

三

死脈也。若一手或格陽或關陰。則未必列於死脈明矣。曰盛者。即仲景所謂浮而大也。此以左右脈主陰陽之論也。帝曰脈反四時。陰陽不相應奈何。岐伯曰。反四時者。有餘爲精。不足爲消。應太過不足爲精。應不足。有餘爲消。陰陽不相應。病名爲關格。精者。奪精也。消者。形消也。四時以春夏爲陽。秋冬爲陰。言春夏陽當太過之時。得不足之陰脈。則精奪矣。秋冬陽當不足之時。得有餘之陽脈。則形消矣。此之謂陰陽不相應。病名曰關格。此又以四時之陰陽。合脈之有餘不足而論也。又仲景

曰寸口脈浮而大。浮爲虛。大爲寔。虛指正虛。寔指邪寔。又曰在尺曰關。在寸曰格。申明在尺沉至寸爲關。在寸浮至尺爲格。此又以尺寸脈。主關陰格陽而論也。又曰關則不得小便。格則吐逆。此無非註明關陰之脈。病在下。格陽之脈。病在上。乃見關與格。分而言之。不過病耳。非死脈也。今難經以五藏爲陰。六府爲陽。血爲陰。氣爲陽。尺爲陰。寸爲陽。沉爲陰。浮爲陽。陰陽之義。無所不包。關格之義。無微不顯。後人云關格是病。又以霍亂症。強名關格。不過偶見仲景有吐逆不得小便二語。不悟全文。隔靴搔癢。殊不知仲景以二病。申明關陰格陽之義。未嘗以二症立關格之名也。

古本難經闡註

卷二

三

三十八難曰。五藏各有聲色臭味。皆可曉之以不。然十變言肝色青。其臭臊。其味酸。其聲呼。其液泣。心色赤。其臭焦。其味苦。其聲言。其液汗。脾色黃。其臭香。其味甘。其聲歌。其液涎。肺色白。其臭腥。其味辛。其聲哭。其液涕。腎色黑。其臭腐。其味鹹。其聲呻。其液唾。是五藏聲色臭味也。

此章誤列三十四難。此以聲色臭味起下章之意。本文義自明。



三十九難曰。經言肝主色。心主臭。脾主味。肺主聲。腎主液。鼻者。肺之候。而反知香臭。耳者。腎之候。而反聞聲。其意何也。然。肺者。西方金也。金生於巳。巳者。南方火。火者心。心主臭。故令鼻知香臭。腎者。北方水也。水生於申。申者。西方金。金者肺。肺主聲。故令耳聞聲。

此章誤列四十難。此發明五行長生之義。比生尅之生不同。如金生於巳者。金長生在巳也。水生於申者。水土長生在申也。此言神氣相應之理。以起下文七神含藏之義。

五藏有七神。各何所藏耶。然。藏者。人之神氣所舍藏也。故肝藏魂。肺藏魄。心藏神。脾藏意與智。腎藏精與志也。

古本難經闡註

卷二

三

此節誤列三十四難。其義本文自明。

四十難曰。五藏各有所府。皆相近。而心肺獨去大腸小腸遠者。何謂也。然。經言心榮肺衛。通行陽氣。故居在上。大腸小腸。傳陰氣而下。故居在下。所以相去而遠也。

此章誤列三十五難。後人議大小腸與心肺高下相殊。不應配兩寸。與此章之問辭同。而越人引經早已晰其所以遠之之理。言心主榮而肺主衛。

皆有通行清陽之職。理當居上。大小腸。皆有傳瀉濁陰之職。故在下。其相去雖遠。而藏府陰陽之氣。無分遠近也。故下文復明小腸者。心之府。大腸者。肺之府。而又明藏府同色之理。以足其義也。

又諸府者。皆陽也。清淨之處。今大腸小腸。胃與膀胱。皆受不淨。其意何也。然。諸府者。謂是名。坊本脫非也。經言小腸者。受盛之府也。大腸者。傳瀉行道之府也。

胆者。清淨之府也。胃者。水穀之府也。膀胱者。津液之府也。一府猶無兩名。故知非也。小腸者。心之府。大腸者。肺之府。胆者。肝之府。胃者。脾之府。膀胱者。腎之府。

古本難經闡註

卷二

三

小腸謂赤腸。大腸謂白腸。胆者謂青腸。胃者謂黃腸。膀胱謂黑腸。下焦所治也。

後人議大小腸不潔之府。不應配心肺清高之藏。與此節問辭同。而越人亦早已晰其義矣。謂諸府皆陽。是也。謂諸府名清淨。非也。故內經惟言胆者。清淨之府也。其四府亦各有名。猶無兩名之可混。乃知清淨獨指胆。且四府俱下焦所屬。各有受盛傳道之職。烏可以清淨名之哉。然府藏之相配。不因清濁。故復言小腸者。心之府云云。以明其一定不可移也。



四十一難曰。老人卧而不寐。少壯寐而不卧者。何也。然。經言少壯者。血氣盛。肌肉滑。氣道通。榮衛之行。不失於常。故晝日精。夜不卧也。老人血氣衰。肌肉不滑。榮衛之道滯。故晝日不精。夜不寐也。故知老人不得寐也。

此章誤列四十六難 榮衛者。即氣血也。日行陽二十五度。夜行陰二十五度。少壯氣血盛。故不失其常度。而夜得寐也。老人氣血衰。失其常度。故夜不寐也。

四十二難曰。人面獨能耐寒者。何也。然。人頭者。諸陽之會也。諸陰脉皆至頸胸中而還。獨諸陽脉皆上至頭耳。故令面耐寒也。

此章誤列四十七難 諸陰脉者。手三陰足三陰也。諸陽脉者。手三陽足三陽也。餘義本文自明。以上二章。選結此卷首篇之手三陽。從手至頭。足三陽。從足至頭。及經脉行血氣。通陰陽。以榮於身之義也。可見古本之分卷。前後俱有呼應之妙。

古本難經闡註卷之二 終

古本難經闡註卷之三

春秋盧國秦越人扁鵲著 及門 祁廷楷經國氏

邗江中峰居士朱 潘叅 陸汝炎駕恩氏

雲間適廬老人丁 錦註 姪 虞勳濬川氏

四十三難曰。肝獨有兩葉。以何應也。然。肝者東方木也。木者春也。萬物之始生。其尚幼小。意無所親。去太

陰尚近。離太陽不遠。猶有兩心。故令有兩葉。亦應木葉也。

古本難經闡註 卷三 一

此章誤列四十一難 此發明五藏合五行之情。而舉肝木為言也。肝位在太陰脾土之左。故曰尚近。在太陽膀胱水之上。故曰不遠。木非土不植。非水不生。其與水土天然有依此戀彼之情。故云猶有兩心。兩葉者。肝本兩大葉也。

四十四難曰。七衝門何在。然。唇為飛門。齒為戶門。會厭為吸門。胃為賁門。胃之上口。太倉下口為幽門。胃之下口。大腸小腸會為闌門。下極為魄門。即肛門。故曰七衝門也。此章言人一身之內。凡出凡入共七處。皆為要衝。故曰衝門。



四十五難曰。經言八會者。何也。然。府會太倉。藏會季脇。筋會陽陵泉。髓會絕骨。血會膈俞。骨會大椎。脉會太淵。氣會三焦。外一筋直兩乳內也。熱病在內者。取其會之氣穴也。

此章言人身藏府筋骨血氣脉髓入者。俱有交會之穴。故曰八會。太倉。任脉穴。中腕也。六府取稟於胃。故曰府會。季脇。足厥陰章門穴。脾募也。五藏取稟於脾。故曰藏會。陽陵泉。足少陽穴。筋結於此。肝主筋。胆為之合。故曰筋會。絕骨。足少陽懸鐘穴。諸髓皆屬於骨。故曰髓會。膈俞。足太陽穴。穀氣由膈

古本難經圖註

卷三

二

達於上焦。化精微為血之處。故曰血會。大椎。督脉穴。肩脊之骨會於此。故曰骨會。太淵。手太陰穴。平旦脉會於此。故曰寸口脉之大會也。而三焦者。任脉臚中穴。此三焦宗氣所居。為上氣海。故曰氣會。其外有一筋直兩乳內者。是另一筋直入兩乳也。熱病在內者。取其會之氣穴。針而治之。此即期門穴也。仲景治少陽熱入血室。刺期門。本於此。

四十六難曰。狂癲之病。何以別之。然。狂之始發。少卧而不饑。自高賢也。自辨智也。自貴倨也。妄笑。好歌樂。妄行不休是也。癲病始發。意不樂。直視。僵仆。其脉三

部陰陽俱盛是也。

此章誤列五十九難。此與二十難同義。然二十難。但言脉。此則并言病狀。欲人知所治也。謂狂之始發。少卧而不饑者。是六府陽邪寔於胃。胃寔而不和。則少卧而不饑矣。陽性動而揚。故自居高賢。辨智貴倨也。陽火熾甚而衝於心。故妄笑歌。妄行不休也。治當瀉陽明之火。而調其氣。癲病始發。意不樂者。是七情之陰邪結於心。陰性靜而鬱。故意不樂矣。鬱火內燔而不得泄。故直視而僵仆也。治當瀉少陰之火。而調其血。其脉三部陰陽俱盛者。

古本難經圖註

卷三

三

謂狂則兩手寸關尺陽脉俱盛。病屬府也。癲則兩手寸關尺陰脉俱盛。病屬藏也。陽脉者。浮滑長也。陰脉者。沉濇短也。盛者。俱帶數寔之意也。

四十七難曰。頭心之病。有厥痛。有真痛。何謂也。然。手三陽之脉。受風寒伏留而不去者。則名厥頭痛。入連在腦者。名真頭痛。其五藏氣相干。名厥心痛。其痛甚。但在心。手足青者。即名真心痛。其真心痛者。旦發夕死。夕發旦死。

此章誤列六十難。此章之義。明明說藏病重於府病。藏氣相干。重於風寒伏留。故心痛言立死。頭



痛不言立死也。如風寒伏留六府。則三陽之真氣逆。故邪得直上而頭痛。腦為髓海。諸邪難犯。必大損精髓者。邪能犯之。犯之難治。如五藏氣相干於心。則陰氣逆上而痛甚。然心為君主。諸邪難犯。必七情大傷其真氣者。邪能犯之。犯之但在心痛而立死。手足青者。肝之色也。是心之母氣絕而現真藏色也。五邪之病發。惟狂癲頭心痛特異。故先揭而出之。以起下章諸邪之發病也。後人註頭痛不言死。總結在後者。非也。

四十八難曰。一脈十變者。何謂也。然五邪剛柔相逢

古本難經闡註

卷三

四

之意也。假令心脈急甚者。肝邪干心也。藏乘心脈微

急者。胆邪干小腸也。府乘心脈大甚者。心邪自干心

也。邪干本藏心脈微大者。小腸邪自干小腸也。邪干心脈

緩甚者。脾邪干心也。藏乘心脈微緩者。胃邪干小腸

也。府乘心脈瀦甚者。肺邪干心也。藏乘心脈微瀦者。

大腸邪干小腸也。府乘心脈沉甚者。腎邪干心也。藏乘

心脈微沉者。膀胱邪干小腸也。府乘五藏各有剛

柔邪。故令一脈輒變為十也。

此章誤列十難。五邪者。五藏自病之邪也。相逢者。互相乘也。藏乘藏則甚。剛也。府乘府則微。柔也。

一脈舉一心脈也。十變者。五藏五變。五府五變。合而為十也。舉心藏而推。則五藏五府。共五十變可知矣。下章詳言五邪之病。

四十九難曰。有正經自病。有五邪所傷。何以別之。然言憂愁思慮則傷心。形寒飲冷則傷肺。恚怒氣逆。上而不下。則傷肝。飲食勞倦則傷脾。久坐濕地。強力入房。則傷腎。是正經自病也。

此言內傷七情大異於外感五邪之病。故首揭之以明治法之不得混也。

何謂五邪。然有中風。有傷暑。有飲食勞倦。有傷寒。有

古本難經闡註

卷三

五

中濕。此之謂五邪。

此言外感五邪之病也。然五者之病。亦因前節正經自病之傷。故邪得湊之而舉發也。五邪者。木火土金水之邪也。肝屬木。木生風而中風。心屬火。火旺夏而傷暑。脾胃屬土。勞倦傷脾。飲食傷胃。肺屬金。肺主皮毛而傷寒。腎屬水。水就下而中濕。下文即發明肝中風。心傷暑。脾傷飲食勞倦。肺傷寒。腎中濕之病。

假令心病。何以知中風得之。然其色當赤。何以言之。肝主色。自入為青。入心為赤。入脾為黃。入肺為白。



入腎為黑。肝為心邪。故知當赤色也。其病身熱。心也  
脇下滿痛。肝也其脉浮大。心也而弦。肝也

假令心病者。舉心藏為例。此言心病因肝邪而入  
肝主色。故專以色推。其病與脉。皆兼心肝二經而  
言也。肝邪入肝。謂之自入。

何以知傷暑得之。然當惡臭。何以言之。心主臭自  
入為焦臭。入脾為香臭。入肝為臊臭。入腎為腐臭。入  
肺為腥臭。故知心病傷暑得之當惡臭也。其病身熱  
而煩。心痛。其脉浮大而散。

首句亦當有假令心病四字。去之者。省文也。下倣  
古本難經闡註 卷三 六

此。此言暑邪入心。謂之自入。心主臭。故專以臭推。  
其病與脉俱在心經而言也。

何以知飲食勞倦得之。然當喜苦味也。虛為不欲食。  
寔為欲食。何以言之。脾主味。入肝為酸。入心為苦。  
入肺為辛。入腎為鹹。自入為甘。故知脾邪入心當喜  
苦味也。其病身熱。心也而體重。嗜臥。四肢不收。脾也  
其脉浮大。心也而緩。脾也

此言心病因脾邪而入。脾主味。故專以味推。其病  
與脉。皆兼心脾二經也。脾邪入脾。謂之自入。此條  
有勞倦傷脾。故有虛不欲食之分。

何以知傷寒得之。然當謔言妄語。何以言之。肺主  
聲。入肝為呼。入心為言。入脾為歌。入腎為呻。自入為  
哭。故知肺邪入心為謔言妄語也。其病身熱。心也酒  
酒惡寒。甚則喘咳。肺也其脉浮大。心也而瀉。肺也

此言心病因肺邪而入。肺主聲。故專以聲推。其病  
與脉。皆兼肺心二經也。肺邪入肺。謂之自入。此傷  
仲景傷寒。此謔妄。非  
陽明謔妄。玩讀自明。

何以知中濕得之。然當喜汗出不可止。何以言之。  
腎主液。入肝為泣。入心為汗。入脾為涎。入肺為涕。自  
入為唾。故知腎邪入心為汗不可止也。其病身熱。心  
也

古本難經闡註 卷三 七  
也。小腹痛。足脛寒而逆。腎也其脉沉濡。腎也而大。心  
也

此言心病因腎邪而入。腎主液。故專以液推。其病  
與脉。皆兼心腎二經也。腎邪入腎。謂之自入。  
此五邪之法也。

法者。舉一為例之法也。五邪者。木火土金水之邪。  
欲審五邪之症。必合肝色心臭脾味肺聲腎液。以  
此心藏互推。則五藏各五。五五二十五症。了然明  
白。而五府二十五症。不另載而可知也。至於虛寔  
表裏種種之病。莫不可推。此真一語而能該千百



言之文也。

五十難曰。病有虛邪。有寔邪。有賊邪。有微邪。有正邪。何以別之。然。從後來者為虛邪。從前來者為寔邪。從所不勝來者為賊邪。從所勝來者為微邪。自病為正邪。

此章詳言五邪生尅之義。病有虛邪者。如心藏屬火。其病邪從肝木傳來。木生火。則木位居火之後。故曰從後來。病有寔邪者。如心藏屬火。其病邪從脾土傳來。火生土。則土位居火之前。故曰從前來。病有賊邪者。如心藏屬火。其病邪從腎水傳來。水尅火。心受尅而不能勝。故曰從所不勝來。病有微邪者。如心藏屬火。其病邪從肺金傳來。火尅金。金受尅而火能勝。故曰從所勝來。正邪者。如心藏止有本經之病也。此以五邪互傳之理。起下文舉一心病而推也。

何以言之。假令心病中風得之為虛邪。木生火傷暑得之為正邪。火傳火飲食勞倦得之為寔邪。火生土傷寒得之為微邪。火尅金中濕得之為賊邪。水尅火此足上文病傳五藏之生尅。以起下章五藏傳變之生尅也。

古本難經闡註

卷三

八

五十一難曰。經言七傳者死。間藏者生。何謂也。然。七傳者。傳其所勝也。間藏者。傳其子也。何以言之。假令心病傳肺。肺傳肝。肝傳脾。脾傳腎。腎傳心。一藏不再傷。故言七傳者死也。間藏者。傳其所生也。假令心病傳脾。脾傳肺。肺傳腎。腎傳肝。肝傳心。是子母相傳。周而復始。如環無端。故言生也。

此章誤列五十三難。此言五藏傳變生尅之義。如傳其所勝者。謂傳於所受尅之藏。如心病傳肺。是火尅金。肺又傳肝。是金尅木。肝又傳脾。是木尅土。脾又傳腎。是土尅水。腎復傳心。是水尅火。心又

古本難經闡註

卷三

九

欲傳肺。是七傳矣。然肺藏不能再傷。故曰七傳者死也。間藏者。間一藏而傳。如心病傳脾而間腎。是火生土。脾病傳肺而間肝。是土生金。肺病傳腎而間心。是金生水。腎病傳肝而間脾。是水生木。肝病傳心而間肺。是木生火。心又復傳於脾而病自己。此謂子母相傳而生也。下章又明六府同法之義。七傳者。心肺肝脾腎也。間藏者。心脾肺腎肝也。此與傷寒三陽三陰傳經不同。當悟此義。五十二難曰。藏病難治。府病易治。何謂也。然。藏所以難治者。傳其所勝也。府病易治者。傳其子也。與七傳



間藏同法也。

此章誤列五十四難 此復明七傳間藏藏府同法。謂藏所以難治者。傳其所勝也。若傳其子。亦易治也。府所以易治者。傳其子也。若傳其所勝。亦難治也。故曰與七傳間藏同法也。云難治。非不治也。故有下章之法。張註云藏病深難治。府病淺易治。如此講。則七傳間藏同法。竟成落空語矣。

五十三難曰。經言上工治未病。中工治已病者。何謂也。然所謂治未病者。見肝之病。則知肝當傳之於脾。故先寔其脾氣。無令得受肝之邪也。故曰治未病焉。

古本難經闡註

卷三

十

中工治已病者。見肝之病。不曉相傳。但一心治肝。故曰治已病也。

此章誤列七十七難 此總結上章七傳間藏之治也。凡一切類傷寒時症。誤治而死者。皆因未明七傳間藏之義。傷哉。此從四十八難起。俱發明五邪之精義。如四十八難言五邪剛柔相逢。藏乘藏。府乘府。十變之理者。示人類推五十變之義也。而又於四十九難言五邪之傷者。即五藏之受傷。是本原症之所由來也。而又因五藏本來之傷。發明中風傷暑。飲食勞倦。傷寒中濕五條之病。又以

聲色臭味液。合其脉症之理。推出藏有三十五症。雖不言府而府在其中。以足五十變之義。然必因五藏之所傷在前。所以五邪乘虛而集。此即經所謂邪之所湊。其氣必虛者是也。若人先有憂愁思慮傷於心者。則邪必乘心矣。如中風乃肝邪乘心也。以色推之當赤。以病推之當身熱而脇下滿痛。以脉推之當浮大而弦。如傷暑。乃心邪自入心也。以臭推之當焦臭。以病推之當身熱而心煩痛。以脉推之當浮大而散。如傷飲食勞倦。乃脾邪乘心也。以味推之當惡甘喜苦。以病推之當身熱體

古本難經闡註

卷三

二

重而嗜臥。以脉推之當浮大而緩。如傷寒。乃肺邪乘心也。以聲推之當謔言妄語。以病推之當身熱而惡寒喘咳。以脉推之當浮大而澹。如中濕。乃腎邪乘心也。以液推之當多汗。以病推之當身熱而小腹痛。足脛寒逆。以脉推之當大而沉。若先有形寒飲冷傷於肺者。則邪必乘肺矣。如中風。肝邪乘肺也。以色推之當白。以病推之當喘咳洒淅惡寒而脇痛。以脉推之當澹而浮大。如傷暑。心邪乘肺也。以臭推之當腥臭。以病推之當喘咳寒熱而心煩。以脉推之當浮瀄而大。如傷飲食勞倦。脾邪



乘肺也。以味推之當辛。以病推之當酒。浙寒熱。體重嗜臥。以脉推之當濇而緩。如傷寒。肺邪自入肺也。以聲推之當哭。以病推之當喘咳而惡寒。以脉推之當浮而濇。如中濕。腎邪乘肺也。以液推之當滂。以病推之當寒熱小腹痛。喘咳而足脛寒。以脉推之當濇而沉。若先有恚怒氣逆傷於肝者。則邪必乘肝矣。如中風。肝邪自入肝也。以色推之當青。以病推之當往來寒熱。脇下滿痛。以脉推之當弦急而浮。如傷暑。心邪入肝也。以臭推之當臊臭。以病推之當脇下痛而心煩身熱。以脉推之當弦。

古本難經闡註

卷三

三

細而散。如傷飲食勞倦。脾邪乘肝也。以味推之當酸。以病推之當脇痛體重。四肢不收。以脉推之當弦而緩。如傷寒。肺邪乘肝也。以聲推之當呼。以病推之當脇痛寒熱而喘咳。以脉推之當濇而弦。如中濕。腎邪乘肝也。以液推之當泣。以病推之當脇滿痛而足脛寒逆。以脉推之當弦濡而沉。若先有飲食勞倦傷於脾者。則邪必乘脾矣。如中風。肝邪乘脾也。以色推之當黃。以病推之當體重而脇下痛。以脉推之當緩而弦。如傷暑。心邪乘脾也。以臭推之當香臭。以病推之當體重不收。煩熱心痛。

古本難經闡註 卷三

以脉推之當緩而大。如傷飲食勞倦。脾邪自入脾也。以味推之當甘。以病推之當體重嗜臥。四肢不收。以脉推之當緩而滑。如傷寒。肺邪乘脾也。以聲推之當歌。以病推之當體重而酒浙寒熱。以脉推之當緩而濇。如中濕。腎邪乘脾也。以液推之當吐涎。以病推之當體重而足脛寒逆。以脉推之當緩而沉濡。若先有久坐濕地。強力入房傷於腎者。則邪必乘腎矣。如中風。肝邪乘腎也。以色推之當黑。以病推之當小腹痛。足脛寒。脇下滿痛。以脉推之當沉而弦。如傷暑。心邪乘腎也。以臭推之當腐。

古本難經闡註

卷三

三

臭。以病推之當小腹痛。足脛寒而身熱。以脉推之當沉而大。如傷飲食勞倦。脾邪乘腎也。以味推之當鹹。以病推之當足脛寒。小腹痛而體重。以脉推之當沉而緩。如傷寒。肺邪乘腎也。以聲推之當呻。以病推之當小腹痛。足脛寒而喘咳。以脉推之當沉而濇。如中濕。腎邪自入腎也。以液推之當唾多。以病推之當小腹痛。足脛寒而逆。以脉推之當沉而遲。此卽五藏類推二十五證之法也。而五府之二十五難。當以首章之言脉微脉甚推之可也。至五十難。復言虛寔賊微正五邪者。欲審其邪之所

四七



來。知其或生或尅。可以辨七傳間藏之理。而猶恐後人遺其府。故又以五十二難之府病與藏病同法明之。以足首章藏府十變之意也。至五十三難。是總結前五章五邪之精義。而又貫通已病未病用法施治之周。蓋因五邪之病。皆發於本原之虛。故其傳變莫測。必察其邪之所由來而審其七傳間藏之病。如間藏之傳其所生。易愈而易治也。七傳之傳其所勝。難愈而難治也。然治之之法。在兼顧其將傳之藏。使其不至於七傳而死。此大異於傷寒傳經之法。故另列而不混也。乃見越人立法濟世。至深切矣。

古本難經闡註

卷三

四

凡人之心腎二藏。最易受傷。而冬夏二氣。又最易感病。余特表而出之。以俟後之賢者採擇而裁政焉。如憂愁思慮傷於心者。富貴貧賤皆不能免。傷則心火常動。火動必尅於肺金。心不受外感之邪則已。若一受外感之邪。必傳其所勝之肺矣。肺又傳於所勝之肝。肝又傳於所勝之脾。脾又傳於所勝之腎。腎又傳於所勝之心。心又傳於所勝之肺。故云七傳。然肺不能兩次受傷。故死。此卽一藏不再傷之義也。若其人平日素傷於心者。適犯暑邪。

必乘虛而入於心。心受邪而病。勢必乘虛而入於肺。醫能識此。卽於清暑之中。兼保其肺。如東垣之清暑益氣湯。雖治已病之心。而寔兼治未病之肺也。孫真人之生脉散。是預防其邪而專治未病之劑也。至若暑邪大甚。類於傷寒者。人參敗毒散。亦驅邪保正之劑。最宜者也。若專任苦寒。以爲清暑。此卽中工之治已病耳。如久坐濕地。強力入房。而傷腎者。理更深微。蓋爲腎有兩藏。一水一火。其傷有別。如久處濕地而受病者。常人有之。富貴者少。然其所傷在右腎居多。何也。濕就下而傷右腎之

古本難經闡註

卷三

五

火。右腎之火。乃水中之火也。卽坎中之真陽也。伏而不發。受邪則發矣。發則便爲邪火。邪火能撼動心君之火。而心亦受傷矣。故其人平日素傷於濕者。適犯濕邪。必乘虛而入於右腎。右腎受邪而病。勢必乘虛而傳於心。其見證也。必現假熱之象。或格陽而面赤者有之。煩躁而舌黑者有之。神昏而目定者有之。醫能識此。卽於驅邪之中。兼扶其陽。如仲景麻黃附子細辛湯。附子理中湯。雖治已病之右腎。而寔兼扶未病之心陽也。金匱入味丸。是預防其邪而專治未病之劑也。如強力入房而受



病者。常人鮮有之。然其所傷在左腎居多。何也。精氣泄而傷於左腎之水。左腎真陰之藏也。精竭則陰虧。陰虧則血虧。心爲離。而離中之真陰。血也。故陰虧而血必枯。血枯則心亦受傷矣。若其人平日素傷於左腎者。適犯寒邪。必乘其虛而入於左腎。左腎受邪而病。勢必乘虛而傳於心。其見證也。必現假寒之象。或格陰而面黑者有之。外寒而內躁者有之。四逆而目赤者有之。醫能識此。卽於驅邪之中。兼救其離中之陰。如仲景之通脈四逆湯。犀角地黃湯。人參白虎黃連阿膠湯之類。雖治已病。

古本難經闡註

卷三

六

之左腎。而寔兼治未病之心也。六味地黃湯丸。龜鹿人參等膠。是預防其邪。卽所謂損其腎者益其精。亦專治未病之劑也。當此真假疑似之際。若非細心求脈。投藥一誤。害如反掌。故云憑脈而不憑症可也。又如飲食勞倦傷脾者。飲食之傷。傷於胃而爲寔。勞倦之傷。傷於脾而爲虛。治寔當兼顧膀胱。治虛當兼顧右腎。恚怒氣逆傷肝者。治當兼顧其脾。形寒飲冷傷肺者。治當兼顧其肝。以此研求類推。細心體會。庶不負越人之深意也。至於間藏而傳其子者。蓋因所傷未甚。因其未甚。故平日亦

未尅其所勝之藏府。當其受邪而病。亦不傳其所勝之藏府。而傳其所生之藏府也。余故曰。若府病傳其所勝。亦與藏病之難治同也。於斯益明矣。五十四難曰。府藏發病根本等不。然。不等也。其不等奈何。然。藏病者。止而不移。其病不離其處。府病者。彷彿賁嚮。上下行流。居處無常。故以此知藏府根本不同也。

古本難經闡註

卷三

七

此章誤列五十二難。此問藏府發病根本等否者。乃言發積聚之源。以起下章之意也。根本者。積有根本也。不等者。聚無根本也。止而不移。不離其處者。言積有根本。故不離而不移也。彷彿賁嚮。上下行流者。言聚無根本。故賁嚮而行流也。

五十五難曰。病有積有聚。何以別之。然。積者陰氣也。聚者陽氣也。故陰沉而伏。積脈沉伏陽浮而動。聚脈浮動氣之所積。名曰積。氣之所聚。名曰聚。故積者五藏所生。聚者六府所成。積者陰氣也。其始發有常處。其痛不離其部。上下有所終始。左右有所窮處。謂之積。聚者陽氣也。其始發無根本。上下無所留止。其痛無常處。謂之聚。故以是別知積聚也。

此章言積聚之源。上下有所終始。左右有所窮處。



此發明積有常處也。上下無所留止。其痛無常處。此發明聚無根本也。經謂氣之所積曰積。氣之所聚曰聚。愚又補其意曰。兼乎血而陰氣凝積為積。純乎氣而陽氣結聚為聚。

人病有沉滯久積聚。可切脉而知之耶。然診病在右脇有積氣。得肺脉結脉。結甚則積甚。結微則積微。診不得肺脉而右脇有積氣者。何也。然肺脉雖不見。

右手脉沉伏。其外痼疾同法耶。將異也。然結者。脉來去時一止。無常數。名曰結也。伏者。脉行筋下也。浮者。脉在肉上行也。左右表裏。法皆如此。假令脉結伏。

者。內無積聚。脉浮結者。外無痼疾。有積聚。脉不結伏。有痼疾。脉不浮結。為脉不應病。病不應脉。是為死病也。

古本難經闡註 卷三 二八

此條誤列十八難後。此承上文言積聚之脉。如右脇有積聚。應當右寸肺部得結脉。結之微甚。可以推積之微甚也。肺脉雖不見者。言肺部之結脉雖不見。然肺部必見沉伏之脉也。若外有痼疾。脉必浮結。內有積聚。脉必伏結。至論積疾。五藏俱有。

則肝心脾腎之脉。亦此法推之。故曰左右表裏。法皆如此。至脉不應病。病不應脉。此藏敗而氣不應也。所以必死。痼疾者。如瘦癯瘡癘皆是也。五十六難曰。五藏之積。各有名乎。以何月何日得之。然肝之積。名曰肥氣。在左脇下。如覆杯。有頭足。久不愈。令人發咳逆痞瘕。連歲不已。以季夏戊巳日得之。何以言之。肺病傳肝。肝當傳脾。脾季夏適王。王者不受邪。肝復欲還肺。肺不肯受。故留結為積。故知肥氣以季夏戊巳日得之。

此章言五藏積之所起。亦由五邪相傳而成也。積有常處。故有定名。聚無常處。故無名可定也。此言肺病傳肝。肝當傳脾。脾土適旺於季夏之土令。故力能拒而不受。則邪當復返於肺。但脾土得令而旺。肺金亦得土之生氣而亦能拒邪。故曰不肯受也。邪因無道可行。故仍結於肝而成積矣。越人形容成積之理。可謂曲盡。乃見虛處受邪。旺處不容。今人治積以攻為務。大失經旨。良可歎也。

古本難經闡註 卷三 二九

心之積。名曰伏梁。起臍上。大如臂。上至心下。久不愈。令人病煩心。以秋庚辛日得之。何以言之。腎傳心。心當傳肺。肺秋適王。王者不受邪。心復欲還腎。腎不肯受。故留結為積。故知伏梁以秋庚辛日得之。

肺金得秋金之旺。令而能拒邪。腎水亦得秋金之



生氣而亦能拒也。

脾之積名曰痞氣。在胃脘。覆大如盤。久不愈。令人四肢不收。發黃疸。飲食不為肌膚。以冬壬癸日得之。

何以言之。肝病傳脾。脾當傳腎。腎以冬適王。王者不受邪。脾復欲還肝。肝不肯受。故留結為積。故知痞氣以冬壬癸日得之。

腎水旺於冬水之令而能拒邪。肝木亦得水之生氣而亦能拒也。

肺之積名曰息賁。在右脇下。覆大如杯。久不已。令人洒淅寒熱。喘咳發肺壅。以春甲乙日得之。何以言

古本難經闡註

卷三

三

之。心病傳肺。肺當傳肝。肝以春適王。王者不受邪。肺復欲還心。心不肯受。故留結為積。故知息賁以春甲乙日得之。

肝木旺於春木之令而能拒邪。心火亦得木之生氣而亦能拒也。

腎之積名曰賁豚。發於少腹。上至心下。若豕狀。或上或下無時。久不已。令人喘逆。骨痠少氣。以夏丙丁日得之。何以言之。脾病傳腎。腎當傳心。心以夏適王。王者不受邪。腎復欲還脾。脾不肯受。故留結為積。故知賁豚以夏丙丁日得之。

心火旺於夏火之令而能拒邪。脾土亦得火之生氣而亦能拒也。

此是五積之要法也。

此總結上文推其積之所自。而可以會通治之之法矣。其法維何。經曰治病必求於本也。不列六府之聚。無定名故也。

五十七難曰。泄凡有幾。皆有名。不然。泄凡有五。其名不同。有胃泄。有脾泄。有大腸泄。有小腸泄。有大瘕泄。名曰後重。

五泄名雖不同。然必由胃及脾。叔和云。濕多成五

古本難經闡註

卷三

三

泄。此之謂也。五泄俱後重。故以名曰後重。該之。下文各具其病狀也。

胃泄者。飲食不化。色黃。

胃受邪。則不能運化飲食。黃者。胃土之色。邪乃或濕或寒之邪也。

脾泄者。腹脹滿泄注。食即嘔吐逆。

凡六府稟氣於胃。五藏稟氣於脾。脾胃受邪。則諸氣滯而不化。故脹滿驟注也。氣不化。必逆。故食即嘔吐也。

大腸泄者。食已窘迫。大便色白。腸鳴切痛。



肺與大腸為表裏。因邪從脾來。脾氣不化。則肺與大腸之氣亦不化。飲食入腹。迫氣下行。故窘迫也。氣不化。則攻衝。故鳴而痛也。白者。肺色也。

小腸泄者。溲而便膿血。少腹痛。

小腸有泌別清濁之職。因氣不化。則清濁不分。欲溲小便。而大便必同至。覺小腹窘痛而下膿血也。

大瘕泄者。裏急後重。數至圜而不能便。莖中痛。瘕。假也。圓。廁也。莖。小便也。此邪傳於腎。腎乃開竅於二陰。腎氣不化。二便失常。大便欲便而不得。便。似乎假便之狀。故曰瘕。因裏急。則數至圜。因後重。

古本難經闡註

卷三

三

則不能便。前陰不利。則必莖中痛也。

此五泄之要法也。

此總結上文。言當審其在府在藏。淺深久暴。推源而治。故曰要法也。

五十八難曰。傷寒有幾。其脉有變。不然。傷寒有五。有中風。有傷寒。有濕溫。有熱病。有溫病。其所苦各不同。傷寒有五者。指五病俱統於傷寒一門。而分其所苦之不同也。風為陽邪。寒為陰邪。故先列中風。次列傷寒。二者皆冬月之正病也。濕溫發於濕土之令居多。熱病發於盛夏。溫病。即仲景傷寒經中春

溫病也。乃見前之五邪從本原來。非此之傷寒熱病。故各立其法也。註家以疫症指此溫病。非也。

中風之脉。陽浮而滑。陰濡而弱。陰陽。即尺寸脉。下同。濕溫之脉。

陽濡而弱。陰小而急。傷寒之脉。陰陽俱盛而緊。瀉。熱病之脉。陰陽俱浮。浮之而滑。沉之散。瀉。溫病之脉。行在諸經。不知何經之動也。各隨其經所在而取之。

此發明上文五病之脉。上四病之脉。本文自明。此獨論溫病之脉。行在諸經者。言病溫脉必行於諸陽。然不知在諸陽何一經動。動者。脉盛也。諸陽。三陽也。各隨其經取之者。刺之也。如仲景云。太陽病

古本難經闡註

卷三

三

至七日以上。若欲再作經者。針足陽明。太陽病初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池。風府。即此義也。

傷寒有汗出而愈。下之而死者。有汗出而死。下之而愈者。何也。然。陽虛陰盛。汗出而愈。下之即死。陽盛陰虛。汗出而死。下之而愈。

陽虛者。邪寔於表。而表之陽氣虛也。陰虛者。邪寔於裏。而裏之陰氣虛也。此即邪寔正虛也。在表汗。在裏下。此定法也。

寒熱之病。候之如何也。然。皮寒熱者。皮不可近。席。毛髮焦。鼻稿。不得汗。肌寒熱者。皮膚痛。唇舌稿。無汗。骨



發寒熱者。病無所安。汗注不休。齒本槁痛。

傷寒一門。最為關係。故首節先定其名。示後人不得紊亂。次節明風濕寒熱溫五症之脈。三節言傷寒表裏自有一定。汗下之法。不可悞行。此節明當汗當下之義。寒熱病者。即中風傷寒之總名也。皮寒熱者。即仲景所謂太陽之表。風用桂枝湯。寒用麻黃湯。汗之而愈。肌寒熱者。即仲景所謂邪在半表半裏。用小柴胡湯和解而愈。骨發寒熱者。裏發寒熱也。即仲景謂正陽陽明裏症。用承氣等湯下之而愈也。乃見先聖後聖。其揆一也。中峰云。苟

古本難經闡註

卷三

三

非明達仲景者。未能明達此義。

五十九難曰。人腸胃長短。受水穀多少。各幾何。然。胃大一尺五寸。徑五寸。長二尺六寸。橫屈受水穀三斗五升。其中常留穀二斗。水一斗五升。小腸大二寸半。徑八分分之少半。長三丈二尺。受穀二斗四升。水六升三合合之大半。迴腸大四寸。迴腸即大腸徑一寸半。長二丈一尺。受穀一斗。水七升半。廣腸大八寸。徑二寸半。長二尺八寸。受穀九升三合八分合之一。故腸胃凡長五丈八尺四寸。受水穀八斗七升六合八分合之一。此腸胃長短受水穀之數也。

此章誤列四十二難 廣腸一名臄腸。一名肛門。

肝重四觔四兩。左三葉。右四葉。凡七葉。主藏魂。

肝本兩大葉。左三右四者。小葉也。

心重十二兩。中有七孔三毛。盛精汁三合。主藏神。

脾重二觔三兩。扁廣三寸。長五寸。有散膏半觔。主裹血。溫五藏。主藏意。

肺重三觔三兩。六葉兩耳。凡八葉。主藏魄。

腎有兩枚。重一觔二兩。主藏志。

胆在肝之短葉間。重三兩三銖。盛精汁三合。

胃重二觔十四兩。其長廣容水穀之數。與首節同。故不錄。

古本難經闡註

卷三

三

小腸重二觔十四兩。左迴疊積十六曲。其長廣容水穀之數與首節同。故不錄。

大腸重三觔十二兩。當臍右迴疊積十六曲。其長廣容水穀之數與首節同。故不錄。

膀胱重九兩二銖。縱廣九寸。盛溺九升九合。

口廣二寸半。唇至齒長九分。齒已後至會厭。深三寸半。大容五合。

舌重十兩。長七寸。廣二寸半。

咽門重十兩。廣二寸半。至胃長一尺六寸。

喉嚨重十二兩。廣二寸。長一尺二寸。九節。



肛門重十二兩。其長廣容水穀之數。與首節同。故不錄。

此章備細發明藏府之形者。是發明內照之法也。其所以知之者。聖人之全知全能也。內經雖有岐伯曰。可剖而視之之句。此不過釋疑問之意耳。

六十難曰。人不食飲七日而死者。何也。然。人胃中常存留穀二斗。水一斗五升。故平人日再至。圓一行二升半。日行五升。七日五七三斗五升。而水穀盡矣。故平人不食飲七日而死者。水穀津液俱盡。即死矣。

此章誤列四十三難。此與前章統結三卷始終之義。凡人所藉以生者。水穀也。能承運水穀者。胃

古本難經闡註

卷三

五

也。自首卷至此。俱發明脈證。無不以胃氣為重。故曰四時之脈。胃氣為本。百病死生。胃脈為本。前章首舉胃而遞及肛門。此章復舉胃存水穀。而及於水穀津液盡而死。余謂越人之著難經。真首尾相應。一氣貫通。學者讀是經而不悟全文。究不能得其心傳也。

六十一難曰。經言望而知之謂之神。聞而知之謂之聖。問而知之謂之工。切脈而知之謂之巧。何謂也。然。望而知之者。望見其五色以知其病。聞而知之者。聞其五音以別其病。問而知之者。問其所欲五味。以知

其病所起所在。切脈而知之者。診其寸口。視其虛寔。以知其病在何藏府也。

此章發明望聞問切四者之要。五色者。青黃赤白黑也。五音者。邪入肺為哭。入肝為呼。入心為言。入脾為歌。入腎為呻也。五味者。酸甘苦辛鹹也。所起者。察其所欲五味中之何味。而知病起何府何藏也。所在者。知其病起何府何藏。而又現傳何府何藏也。二者俱知。然後診其寸口。再視其虛寔。則在府在藏之病。無不明矣。

經言以外知之曰聖。以內知之曰神。此之謂也。

古本難經闡註

卷三

五

此章統包三卷全文之意而結也。外者。望其色。聞其聲。病未見而知之也。內者。問其所欲五味。切其脈而察其所病。知其虛寔也。越人望後世醫者。必臻此境。方合軒岐之道。否則未免為粗工而已矣。

古本難經闡註卷之三 終



古本難經闡註卷之四

春秋盧國秦越人扁鵲著

及門

邢廷楷經國氏

唐其綸龍章氏

邢江中峰居士朱 潘參

姪 虞勳濟川氏

雲間適廬老人丁 錦註

夏陞肅堂氏

男學海朝宗氏全較

六十二難曰。藏井榮有五。府獨有六者。何謂也。然。府者陽也。三焦行於諸陽。故置一膈。名曰原。所以府有六者。亦與三焦共一氣也。

井榮膈經合。此五者配五藏。井榮膈原經合。此六

古本難經闡註

卷四

一

者配六府。六府多一原。所以藏五而府六也。所出為井。所溜為榮。所注為膈。所行為經。所入為合。所過為原也。

六十三難曰。十變言五藏六府榮合。皆以井為始者。何謂也。然。井者東方春也。萬物之始生。諸蚊行喘息。蛭飛蠕動。當生之物。莫不以春生。故歲數始於春。月數始於甲。故以井為始也。

人身之穴。以井為始。井者東方春也。萬物之始生。如歲始於春者。東方木也。月始於甲者。亦應東方木也。諸蚊蛭蠕。皆入蟄之諸小蟲也。得春氣。則能

行能喘息。能飛能動矣。十變。古經名也。

六十四難曰。十變又言陰井木。陽井金。陰榮火。陽榮水。陰膈土。陽膈木。陰經金。陽經火。陰合水。陽合土。陰陽皆不同。其意何也。然是剛柔之事也。陰井乙木。陽井庚金。陽井庚。庚者乙之剛也。陰井乙。乙者庚之柔也。乙為木。故言陰井木也。庚為金。故言陽井金也。餘皆倣此。

此舉古經十變言井榮膈經合。俱以五行陰陽為配偶。但一陰一陽俱有相尅。是何意也。言陽與陰配合。取剛柔之義耳。如陰井木。陽井金。是乙與庚

古本難經闡註

卷四

二

合也。乙為陰木。合庚之陽金。故曰庚乃乙之剛。乙乃庚之柔也。又如陰榮火。陽榮水。是丁與壬合也。丁為陰火。壬為陽水。陽膈木。陰膈土。是甲與己合也。甲為陽木。己為陰土。陰經金。陽經火。是丙與辛合也。辛為陰金。丙為陽火。陰合水。陽合土。是戊與癸合也。癸為陰水。戊為陽土也。如此配合。則剛柔相濟。然後氣血流通而不息。乃見人身經穴藏府。俱有五行配合。無時不交也。中峰云。觀此。則三十三難之庚之柔。丙之柔之義益明矣。可見近來註家。不過逐章敷衍。未能通體貫徹也。



六十五難曰。經言所出為井。所入為合。其法奈何。然所出為井。井者。東方春也。萬物始生。故言所出為井也。所入為合。合者。北方冬也。陽氣入藏。故言所入為合也。

此言并榮輸經合。如春夏秋冬之周而復始。東南西北之循環無端。自井而生發。至合而入藏。如天地一歲而有四時。一日亦有四時。人身隨其氣而運行。所以一呼一吸。陰陽無不周徧也。

六十六難曰。經言肺之原出於太淵。心之原出於大陵。肝之原出於太衝。脾之原出於太白。腎之原出於太谿。少陰之原出於兌骨。胆之原出於曲墟。胃之原出於衝陽。三焦之原出於陽池。膀胱之原出於京骨。大腸之原出於合谷。小腸之原出於腕骨。十二經皆以輸為原者。何也。然五藏輸者。三焦之所行。氣之所留止也。三焦所行之輸為原者。何也。然臍下腎間動氣者。人之生命也。十二經之根本也。故名曰原。三焦者。原氣之別使也。主通行三氣。經歷於五藏六府。原者。三焦之尊號也。故所止輒為原。五藏六府之有病者。皆取其原也。

太淵。在手掌後陷中。手太陰所注。此即脉之大會

古本難經闡註

卷四

三

也。大陵。在掌後骨下橫紋中兩筋間陷中。手厥陰所注。太衝。在足大指本節後二寸。足厥陰所注。太白。在足大指後內側橫骨下。足太陰所注。太谿。在足內踝後跟骨上動脉陷中。足少陰所注。兌骨。一名神門。在掌後銳骨端陷中。當小指後。手少陰所注。曲墟。在足外踝下如前陷中。足少陽所過。衝陽。在足上五寸高骨間動脉去陷各二寸。足陽明所過。仲景所謂跌陽也。陽池。在手外腕上陷中。自本節後骨直對腕中。手少陽所過。京骨。在足小指外側本節後大骨下赤白肉際陷中。足太陽所過。合

古本難經闡註

卷四

四

谷。一名虎口。在手大指次指岐骨陷中。手陽明所過。腕骨。在手外側腕前起骨下陷中。手太陽所過。三焦之原。在臍下腎間動氣之所。人之生命。十二經之根本。皆係乎此。三焦任此原氣。分別致使。通行上中下三氣。經歷於五藏六府之輸穴。因其經歷。故輸亦可名原也。而所謂原者。豈非三焦尊重之號乎。五藏六府之病。皆取十二經之原穴。豈非三焦能統攝諸藏府之一大府乎。

六十七難曰。五藏募皆在陰。輸皆在陽者。何謂也。然陰病行陽。陽病行陰。故令募在陰。輸在陽也。



此章發明募腧所以在陰在陽之義。陰者屬於腹。募居於腹。陽者屬於背。腧居於背。募者結募也。爲經氣之所聚。腧者輸也。由此而輸彼也。故募腧爲氣血陰陽周行頓節之所。而病邪亦無不從此而出入。如病在陰分。有腧方可以行陽。病在陽分。有募方可以行陰。否則間隔不通矣。故令募在陰。腧在陽也。此義以瘧症喻之。最爲確切。凡瘧必由外感暑濕之邪。內傷生冷之氣。其邪漸積。隱於募原。邪氣行陽則熱。行陰則寒。邪入淺則道近。故曰作。邪入深則道遠。故間日作。愈深則愈遠。故有間

古本難經闡註 卷四 五

二日三日者。此非陰病行陽。陽病行陰之明驗乎。五藏之募穴。肺募中府穴。心募巨闕穴。脾募章門穴。肝募期門穴。腎募京門穴。六十八難曰。五藏六府各有井榮腧經合。皆何所主。然經言所出爲井。所流爲榮。所注爲腧。所行爲經。所入爲合。井主心下滿。榮主身熱。腧主體重節痛。經主喘咳寒熱。合主逆氣而泄。此五藏六府井榮腧經合所主病也。自六十二難至此。俱發明井榮腧原經合之穴。以下俱發明針刺之法也。紀氏曰。井者若水之源。

水始出源。流之尚微。故謂之榮。水上而注下。下復承而流之。故謂之腧。水行經歷而過。故謂之經。經過於此。乃入於藏府。與衆經相會。故謂之合。素問曰。六經爲川。腸胃爲海也。晞范曰。井法木以應肝。脾之位在心下。今邪在肝。肝侵脾。故心下滿。今治之於井。不令木乘土也。榮法火以應心。肺屬金。外主皮毛。心火灼於肺金。故身熱。謂邪在心也。故治之於榮。不使火來乘金。則身熱自愈矣。腧法土應脾。今邪在土。土必尅水。水者腎也。腎主骨。故病則節痛。邪在土。土自病則體重。故治之於腧。經法金而應肺。今邪在肺。得寒則咳。得熱則喘。金必尅木。木者肝。肝在志爲怒。怒則氣逆而作喘。故治之於經。合應水而主腎。腎氣不足。傷於衝脈。則氣逆。腎開竅於二陰。氣逆則不禁而下泄。故宜治合也。五藏六府各有井榮腧經合之穴。其原穴獨在六府。故六府多一原穴。並列於後。

古本難經闡註 卷四 六

肝 井 大敦 榮 行間 腧 太衝 經 中封 合 曲泉  
肺 井 少商 榮 魚際 腧 太淵 經 經渠 合 尺澤  
心 井 少衝 榮 少府 腧 神門 經 靈道 合 少海  
腎 井 湧泉 榮 然谷 腧 太谿 經 復溜 合 陰谷



脾	井 隱白 榮 大都 膺 太白 經 商業 合 陰陵泉
心胞絡井	中衝 榮 勞宮 膺 大陵 經 間使 合 曲澤
胆	井 竅陰 榮 俠谿 膺 臨泣 原 止墟 經 陽輔 合
陽陵泉	
大腸	井 商陽 榮 二間 膺 三間 原 合谷 經 陽谿 合
曲池	
小腸	井 少澤 榮 前谷 膺 後谿 原 腕骨 經 陽谷 合
小海	
胃	井 厲兌 榮 內庭 膺 陷谷 原 衝陽 經 解谿 合
三里	
古本難經問註	卷四 七
膀胱	井 至陰 榮 通谷 膺 束骨 原 京骨 經 崑崙 合
委中	
三焦	井 關衝 榮 收門 膺 中渚 原 陽池 經 支溝 合
井天	

六十九難曰。經言虛者補之。實者瀉之。不虛不實。以經取之。何謂也。然。虛者補其母。實者瀉其子。當先補之。然後瀉之。不實不虛。以經取之者。是正經自生病。不中他邪也。當自取其經。故言以經取之。

此章言針刺經穴補瀉之大法。而亦可推之於用藥也。子母。以五行配藏府而推之。先補之。然後瀉

之者。言欲瀉其子而必先補其母也。可見古人必以固本為要明矣。

七十難曰。經言春夏刺淺。秋冬刺深者。何謂也。然。春夏者。陽氣在上。人氣亦在上。故當淺取之。秋冬者。陽氣在下。人氣亦在下。故當深取之。

此言針法以得氣為主。故氣淺針亦淺。氣深針亦深也。

春夏必致一陰。秋冬必致一陽者。何也。然。春夏溫必致一陰者。初下針沉之。至腎肝之部。得氣引持之。陰也。秋冬寒必致一陽者。初內針淺而浮之。至心肺之部。得氣推而內之。陽也。是謂春夏必致一陰。秋冬必致一陽也。必致必字坊。

古本難經問註 卷四 八

上文言用針得氣之理。此言用針致氣之法。以順四時陰陽之義。謂春夏初內鍼深至腎肝之部。得其一陰之氣。即持鍼引至心肺之部而留之。秋冬初內鍼淺至心肺之部。得其一陽之氣。然後推鍼至腎肝之部而留之也。

七十一難曰。經言刺榮無傷衛。刺衛無傷榮。何謂也。然。針陽者。臥鍼而刺之。刺陰者。先以左手攝按所針榮。膺之處。氣散乃內針。是謂刺榮無傷衛。刺衛無傷

榮。膺之處。氣散乃內針。是謂刺榮無傷衛。刺衛無傷



榮也。

此言用針淺深之法。臥針者。臥其針而刺之。則淺而不傷榮血也。以左手攝按者。令衛氣散而內針。則深而不傷衛氣也。

七十二難曰。經言有見如入。有見如出者。何謂也。然所謂有見如入者。謂左手見氣來至。乃內針。針入。見氣盡。乃出針。是謂有見如入。有見如出也。

此章誤列八十難。此言候氣到而內針。候氣盡而出針之義。如入如出如字。同而字。古通用。

七十三難曰。諸井者。肌肉淺薄。氣少不足使也。刺之

古本難經闡註

卷四

九

奈何。然諸井者。木也。榮者。火也。火者。木之子。當刺井者。以榮瀉之。故經云。補者不可以為瀉。瀉者不可以為補。此之謂也。

井屬木。是火之母。榮屬火。是木之子。比如腎寔。當瀉井木。而井木之穴。在手足指稍。肉薄氣少。不足施治。於是刺榮。所謂瀉子令母虛。若舍榮而刺脛。則土虛不能制水。腎邪更實矣。若刺經。則金生水。腎邪必反甚矣。故曰。當刺井者。以榮瀉之。故經言補者不可以為瀉。瀉者不可以為補也。

七十四難曰。經言春刺井。夏刺榮。季夏刺膺。秋刺經。

冬刺合者。何也。然春刺井者。邪在肝。夏刺榮者。邪在心。季夏刺膺者。邪在脾。秋刺經者。邪在肺。冬刺合者。邪在腎。其肝心脾肺腎而繫於春夏秋冬者。何也。然五藏一病。輒有五也。假令肝病。色青者肝也。臊臭者肝也。喜酸者肝也。喜呼者肝也。喜泣者肝也。其病衆多。不可盡言也。四時有數。而並繫于春夏秋冬者。也。針之要妙。在於秋毫者也。

此章言春夏秋冬之刺井榮膺經合。非必春刺井。其邪在肝者。刺井也。井屬木。春也。故云春刺井也。餘藏皆然。又問肝心脾肺腎。何故繫於春夏秋冬。

古本難經闡註

卷四

一

故復舉肝木之青臊酸呼泣。以明五藏六府之病衆多。而並統於金木水火土之所屬。如四時之日數。而並繫於春夏秋冬之所屬也。然其要妙在於分別藏府之病。如察秋毫。故下章又明藏府陰陽之義也。

七十五難曰。病有欲得溫者。有欲得寒者。有欲見人者。有不欲見人者。而各不同。病在何藏府也。然病欲得寒而欲見人者。病在府也。病欲得溫而不欲見人者。病在藏也。何以言之。府者陽也。陽病欲得寒。又欲見人。藏者陰也。陰病欲得溫。又欲閉戶獨處。惡聞



人聲。故以別知藏府之病也。

此章誤列五十一難 前三卷以脈別藏府。切脈而治病也。此以所欲別藏府。問情而針病也。

七十六難曰。針有補瀉。何謂也。然。補瀉之法。非必呼吸出內針也。何以言之。坊本脫此四字

此章誤列七十八難 呼內。吸出為補。吸內呼出為瀉。此章言不但此也。必以得氣為主。義在下文。

然。知為針者。信其左。不知為針者。信其右。當刺之時。必先以左手厭按所針榮膺之處。彈而努之。爪而下之。其氣之來。如動脈之狀。順針而刺之。得氣。推而內之。是謂補。動而伸之。是謂瀉。不得氣。乃與男外女內。又不得氣。是謂十死不治也。厭與壓通

古本難經闡註 卷四 十一

知為針者。善針之人也。左手厭按榮膺。知肌肉厚薄。筋骨韌會。取穴分明於左手指下。然後以右手內鍼。不知為針者。反是。凡用針之時。必先以左手厭按。以右手彈之。使氣脈努聚。若動脈之狀。爪按真穴刺之。待氣應於針。因而推至當止之分。此謂補。若得氣。即搖動伸提。此謂瀉。若久留針而氣不至。則浮針於衛分。左轉以待其氣不至。又沉內於榮分。右轉以待其氣。若又不至。為陰陽俱絕。不治

也。言男女。即左右。

七十七難曰。何謂補瀉。當補之時。何所取氣。當瀉之時。何所置氣。然。當補之時。從衛取氣。當瀉之時。從榮置氣。其陽氣不足。陰氣有餘。當先補其陽。而後瀉其陰。陰氣不足。陽氣有餘。當先補其陰。而後瀉其陽。榮衛通行。此其要也。陽氣即衛氣 陰氣即榮氣

此章誤列七十六難 此言補瀉用針之法也。欲補。從衛取氣。淺針之。俟得氣。乃推內針於所虛之處。欲瀉。從榮置氣。深針之於所實之處。俟得氣。引針泄之。此補瀉大要也。

古本難經闡註 卷四 十二

七十八難曰。經言五藏脈已絕於內。用針者反實其外。五藏脈已絕於外。用針者反實其內。內外之絕。何以別之。然。五藏脈已絕於內者。腎肝脈絕於內也。而醫反補其心肺。五藏脈已絕於外者。心肺脈絕於外也。而醫反補其腎肝。陽絕補陰。陰絕補陽。是謂實實虛虛。損不足而益有餘。如此死者。醫殺之耳。

此章誤列十二難 此言脈者。謂針刺脈絡之脈。非寸關尺之脈也。絕者。氣不至也。曰外內者。即榮衛陰陽上下也。此言不知補瀉之法。足以殺人。下文詳言其法也。



七十九難曰。經言迎而奪之。安得無虛。隨而濟之。安得無寔。虛之與寔。若得若失。寔之與虛。若有若無。何謂也。義在下文

然。迎而奪之者。瀉其子也。隨而濟之者。補其母也。假令心病瀉手心主腧。胞絡之。是謂迎而奪之者也。補手心主井。胞絡之。是謂隨而濟之者也。所謂寔之與虛者。濡牢之意也。氣來寔牢者為得。濡虛者為失。故曰若得若失也。

腧屬土。心病瀉之。是瀉子也。井屬木。心病補之。是補母也。濡猶軟也。牢猶鞭也。得失。即有無也。心病。即胞絡病也。

古本難經闡註

卷四

三

八十難曰。經言能知迎隨之氣。可令調之。調氣之方。必在陰陽。何謂也。然。所謂迎隨者。知榮衛之流行。經脈之往來也。隨其逆順而取之。故曰迎隨。調氣之方。必在陰陽者。知其內外表裏隨其陰陽而調之。故曰調氣之方。必在乎陰陽。

此章誤列七十二難。此言迎隨之氣。隨其逆順而針之。調氣之方。審其陰陽表裏。用藥而調之也。八十一難曰。經言無寔寔。無虛虛。損不足而益有餘。是寸口脈耶。將病自有虛寔也。其損益奈何。然是病。

非謂寸口脈也。謂病自有虛寔也。假令肝寔而肺虛。肝者木也。肺者金也。金木當更相平。當知金平木。假令肺寔。故知肝虛微少氣。用針不補其肝。而反重寔其肺。故曰寔寔虛虛。損不足而益有餘。此者。中工之所害也。

此章雖承上而言鍼刺之補瀉。其寔為總結全部大法而寓反覆丁寧之意也。然特舉經言無寔寔虛虛。損不足而益有餘為問者。具見醫理最嚴虛虛之戒。虛寔稍誤。害如反掌。故設此諄諄垂訓之辭也。如上卷之言動脈會於寸口。以十二經之藏

古本難經闡註

卷四

十四

府。定寸關尺之脈位。以弦鈎毛石之象。合四時之盛衰。而又推廣命門三焦。竒經絡脈。陰乘陽乘。覆溢關格。六甲王脈。損至脈症。五邪五泄。傷寒積聚。厥痛狂癲。無一不極詳且備。而猶慮後人不知五藏自有生剋。以平為度之法。故云此非寸口脈也。謂病自有虛寔也。即此自有虛寔一句。乃示人以法外之法也。得乎此。則經所謂不治已病治未病之法亦得矣。凡人脈之虛寔。必因病而見。未有病見虛寔。而脈不見虛寔者也。今言自有虛寔。乃五藏自有相制之虛寔。不同於脈之虛寔論也。如肝



寔而肺虛。肝木受制於肺金者也。因肺虛不能制肝。所以爲之肝寔。若治肝之寔。非矣。醫當補肺金之虛。則肝木之寔。肺自能制之也。如肺寔肝虛。肺乃制肝者也。肺既寔。則制肝太過。若徒補肝之虛。而不治其致虛之源。亦非矣。醫當瀉肺金之寔。則肝木自能條達也。若不能治其致虛之源。苟能知虛知寔。猶不至於大謬。更有不知相制之虛寔。反補其寔而瀉其虛。損不足而益有餘。使輕症必重。重症必死。所以謂中工之害也。舉肝肺。則他藏俱可類推。學者能不惕然知警乎。或問難經至八

古本難經闡註

卷四

五

十一難而止。取何義耶。余曰。此越人悉體軒岐之旨。而寓尊經之義也。如素問九卷而分八十一篇。靈樞九卷亦分八十一篇。共一十八卷。後人各析爲十二卷。共二十四卷。此皆變亂古聖之旨。大失尊經之義。今卽以靈素証之。可明矣。攷素問離合真邪論。黃帝問曰。余聞九針九篇。夫子乃因而九之。九九八十一篇。余盡通其意矣。又靈樞九針論。岐伯曰。夫聖人之起天地之數也。一而九之。故以立九野。九九八十一。以起黃鐘之數焉。若此者。乃知天地大德曰生。重陽九之數也。故軒岐作內經。

亦體天地陽生之道。而符此九九之數也。今難經之八十一難。乃合內經而一貫之。首尾相應。全體通靈。豈非越人悉體軒岐之旨。而寓尊經之義乎。中峰云。余見難經各家之註多矣。皆不能探作者之心。不過隨文敷衍。並無一語道及全體通靈之妙。今閱是註。知越人引靈素一十八卷之義。遵其序而該其要。會通一貫。作此八十一條之大文。學者能玩索研求。則一十八卷之靈素。莫不頭頭是道矣。乃近世張介賓以內經分類各門。名曰類經。以備醫者易於查對。猶夫吾儒之五經。時下亦

古本難經闡註

卷四

六

有分門類叙。以供便覽。無非欲開淺學摘用之寶。殊不知氣脈不貫。頭緒全無。臨文之際。究無益也。因悟難經之妙。不易內經之次序。能運內經之全神。必軒岐假手於越人。而作此合璧之書也。然三千年來。寔無人道。乃得是註而始明。亦何莫非越人之假手於先生乎。

古本難經闡註卷之四 終



古今註難經者。自呂廣楊玄掾而下。僅傳十有七家。是難經一書。義精辭奧。非洞見五臟之癥結者。不容妄下一語也。適廬先生隱於醫。晚年鍵戶。手註是書。越六寒暑而始成。一日余過潭西書屋。出以示余。余曰。此誠扁盧之功臣矣。夫難經者。霧素之菁華。三部九候八脉十二經之綱領也。不明斯旨。殆導河而昧其源。窺末而忘其本。其於術也。踈矣。余習

跋

見親故之家。猝遇一症。醫先後踵集。人持一說。說創一方。甚至陰陽虛實。其論相反。不可以道里計。爲人子者。當此惑於紛岐。終晝夜不敢進一劑。使平日於讀書之暇。稍究心三部九候八脉十二經之旨。奚至束手若此。余未嘗不慨然歎難經一書。當與孝經曲禮並垂。凡事親者。不可不家置一編。人挾一冊也。向患鈎章棘句。讀者往往眯目橋舌。不終卷

而輒厭棄之。今得先生註釋。千年宿翳。一旦豁然。俾習是書者。正羣訛而歸一是。卽未嘗習是書。茫然如余者。亦且開卷了了。若有所會。然則是書也。謂之爲儒宗必讀可也。敢以告諸當世。旁通是書於孝之道。不無少助云。同里取齋李進拜手跋



跋

二



余少學醫。從雲間嗣宗何夫子遊。近僑寓金閭。常與上洋王修沈子。究論醫典。農軒之訓。猶之六經。扁鵲仲景。猶私淑尼父之孟氏。是以內難傷寒。實醫門鼎足之三經也。自漢而下。名賢繼出者。惟本此而已。後代作者。非不各有發明。然日就偏淺。致今之學者。樂淺而畏深。趨

古本難經闡註 跋

末而忘本。嗚呼。經義不明。醫術奚恃。安得有好奇古之士。尚論三經。引宗仁宗朝嘉祐故事。上請

聖

天子詔儒臣。及精通其事者。參古酌今。編纂全書。頒行宇內。為萬世蒼生計乎。適有客告余曰。向之所謂難其人者。今得之矣。姓丁氏。號遠廬。從葺城携古本

難經。加以闡注。來吳就梓。余聞之。始則異。既則疑。因憶先師曾述宋時丁德用。難經補注。言華元化得越人書。被執乃燼。今之流傳者。皆吳太醫令呂廣重編。文多簡錯。辭意難明。十七家之注。如滑氏等。僅存疑義。莫從考證。或有古本。惜不顯于世耳。今子所闕。莫非吳氏之古

古本難經闡註 跋

本。款客曰否。因偕沈子訪之。見其人飄然鶴髮。非世俗之流。讀其書。非素見之書。方知難經本來辭明理貫。並無一字衍文。故東坡楞伽跋云。如醫之難經。句句皆理。字字皆法。必有見而云然。益徵師言有自矣。噫。二千餘年若晦若滅之書。一旦復顯。使天下人知八十一難。乃



越人之註內經也。而先生之父。又疏越人之註義也。一若中天之日。纖微畢照。將見此本一出。則十七家之本。可盡廢矣。先生已成不朽之功。豈常人所能及哉。丁子避席曰。河圖洛書。因聖人而出。世秘之書。俟

聖朝而顯。此亦理數之使然也。我何人斯。

古本難經闡註

跋

三

而敢與其功焉。余因樂其遇而紀其事。敬述於簡末。昔

乾隆三年戊午陽月洞達菊坡居士嚴茂源

書于閻亭客館









何義門先生鑒定

漢仲景張先生著

# 金匱玉函經真本

本衙藏板

重刻張仲景金匱玉函經序

金匱玉函經八卷漢張仲景論著晉王叔

和所撰次也其標題蓋亦後人所加取珍

秘之意仲景當漢季年篤好方術以拯天

橫其用心仁矣故自素難本草湯液諸書

咸挾根得髓其為傷寒雜病論實為萬世

羣方之祖自叔和尊尚以後年歲久遠錯

亂放失者屢矣宋治平初命諸臣校定其

金匱玉函經

目有三曰傷寒論金匱方論一名金匱玉函要畧以

及此經是也雖未必盡復仲景本書之舊

然一家之學粗完余幼讀二論精微簡要

務令上口以通思索徧求是經獨不可得

後檢鄱陽馬氏經籍考雖列其目而所引

晁序則實金匱玉函要畧也則此經蓋自

元時而不行于世矣歲壬辰義門何內翰

以予粗習張書句讀手抄宋本見授拜受



卒業喜忘寢食惜其訛脫者多甚或不能以句既無他本可校乃博考衆籍以相證佐補亡滅誤十得八九稿凡數易而始可讀則掩卷而歎曰是可報命于內翰矣內翰嘗以古明醫多以醫案示人見愛過實囑刻其平生醫藥病狀之驗者予瞿然不敢當語云三折肱為良醫予雖老是然處方設劑吾斯未信因念是經世久未見而

全匱玉函經

序

二

內翰既得禁方不自秘匿雖古人尤難之開以傳後其弘濟豈但一師之說哉夫岐黃之書經也仲景之經律也臨證療疾引經案律十不失一二論所述畧具矣是書則兼綜兩者而整齊形證附類方藥各有門部次第不可淆亂則知經又論之自出尤醫門之金科玉條也八卷之中上順天和以療人患非通三才之道而得往聖之

心者不能觀者苟能潛心玩索而知其所以則因病發藥應如桴鼓順之則能起死畔之則立殺人先儒以孫思邈尚為粗曉其旨得其書者未可謂不過與傷寒論及要畧相出入而鹵莽治之也不揆淺陋願與同志者熟讀而精思之


皆

康熙丙申陽月上海陳世傑書

全匱玉函經

序

三





重刻金匱玉函經序

吾宗懷三先生自幼學儒以多病廢遂篤嗜方書壯年由上海流寓吳門坐臥一閣近十年所手不釋卷帙精通諸禁方然未嘗以醫自夸所治輒效益務實不近名名久大震性高亮疎豁無軟熟態兩遊京師貴人爭迎之皆翩然謝歸出入里中乘壞肩輿有謁必往切脉診病其可藥與否常直言以對不爲挾要欺倖富貴人或

金匱玉函經

序

一

爲藥所誤垂死乃相招或投藥有起勢遽以庸醫問之先生益厭苦常謾語來者曰吾不能醫富貴人也儒門單戶有急相告卽毒熱嚴凍隨早晚必赴愈不計其所酬薄厚其學長于仲景嘗謂綱要精微實軒岐之繼別而自晉唐以還名家撰論悉衍其緒故讀傷寒論及要略不但誦數悉能心知其意惟恨未見金匱玉函經市中見杜光庭所撰書標題恰同喜極購歸旣啟

乃知非是于是求之益亟義門何先生知先生最深得宋抄本授之窮日夜校閱卽有脫誤以他書是正歷三四寒溫而後可句尋考本序爲宋館閣秘本元明以來相沿以要畧爲此經雖丹溪之精通安道之淹貫蓋皆未見先生于是刻而傳之間嘗語余黃岐之經義深以遠仲景之書理切而要深其書而求以通經如討源而未有楫也然年久散失晦蝕于諸家之說多

金匱玉函經

序

二

矣故吾讀是書自成無已外注凡七十有二家皆皮而不觀懼文多而益昧其經爾今吾刻是幸其久未見不爲注所厯學者潛心刻意庶幾得之雖然其間條緒同于傷寒論者幾什之七懼或者之又畧而弗觀不知發凡起例仲景別有精義存焉讀論與畧者不可闕也余曰經潛之顯晦存乎其人仲景憫宗人之彫喪拯後世之天橫其利溥矣是經不絕如綫而今章之其



用心既與古密契來者難誣其實而傳之決也  
則仲景一家之書自此大昭矣丙申長至後長  
洲弟汝楫書



金匱玉函經

序

三

漢書藝文志載成帝之世詔李柱國技方  
技劉氏七略有醫經七家二百一十六卷  
經方十一家二百七十四卷其存於今獨  
黃帝內經而已素問難經本草之屬皆見  
於鄭荀經簿王阮志錄要之最為古書比  
于六經繼出者東漢張仲景傷寒論西晉  
王叔和撰次玉函經二書寔相表裏評病  
處方具有條理各詣其極乃方技中之論

後

一

語孟子書不得其門者末由語於生生也  
隨書經籍志與唐宋藝文志卷目時有不  
同然行於世者猶出宋治平間三館技定  
可以据信吾友陳先生懷三研精覃思於  
張王二書有年所矣遇疾危急羣疑共却  
必予全濟於是同術驚詫目為神奇不知  
惟能熟復古賢方劑視證所宜不肯妄行  
旬臆以人之寄命為戲劇俞以書考之一



一可覆也先生深閔其道之晦昧務思援古正今謂傷寒論世多有而金匱玉函經發無傳乃從藏書家訪求善本與葺中本再三勘校重開以通流之蓋仁人之用心也博與愛其禁而戒勿洩者殊絕矣昔東垣李明之著傷寒會要書遺山元裕之為之作序余無遺山之文辭而此書為醫學之論語孟子其已試之效亦不假予言而

後

二

始張特重先生之用心可與進於孔孟之道也輒書其後蓋先生本儒者去康熙丁酉正月義門何焯

校正金匱玉函經疏

金匱玉函經與傷寒論同體而別名欲人互相檢閱而為表裏以防後世之亡逸其濟人之心不已深乎細考前後乃王叔和撰次之書緣仲景有金匱錄故以金匱玉函名取寶而藏之之義也王叔和西晉人為太醫令雖博好經方其學專于仲景是以獨出於諸家之右仲景之書及今八百餘年不墜于地者皆其力也但此經

金匱玉函經

疏

一

自晉以來傳之既久方證訛謬辨論不倫歷代名醫雖學之皆不得彷彿惟孫思邈龔曉其旨亦不能修正之况其下者乎 國家詔儒臣校正醫書臣等先校定傷寒論次校成此經其文理或有與傷寒論不同者然其意義皆通聖賢之法不敢臆斷故並兩存之凡八卷依次舊目總二十九篇一百一十五方恭惟主上大明撫運視民如傷廣頒其書為天下生



生之具直欲躋斯民於壽域者矣治平三年正月十八日太子右贊善大夫臣高保衡尚書員外郎臣孫奇尚書司封郎中秘閣校理臣林億等謹上

金匱玉函經

疏

二

金匱玉函經目錄

卷一

疏序

證治總例

卷二

辨瘧溼暍第一

辨脉第二

辨太陽病形證治上第三

金匱玉函經

目錄

一

卷三

辨太陽病形證治下第四

辨陽明病形證治第五

辨少陽病形證治第六

卷四

辨太陰病形證治第七

辨少陰病形證治第八

辨厥陰病形證治第九



辨厥利嘔噦病形證治第十

辨霍亂病形證治第十一

辨陰陽易差後勞復病形證治第十二

卷五

辨不可發汗病形證治第十三

辨可發汗病形證治第十四

辨不可吐病形證治第十五

辨可吐病形證治第十六

金匱玉函經

目錄

二

辨不可下病形證治第十七

辨可下病形證治第十八

卷六

辨發汗吐下後病形脉證第十九

辨可温病形證治第二十

辨不可火病形證治第二十一

辨可火病形證治第二十二

辨不可灸病形證治第二十三

辨可灸病形證治第二十四

辨不可刺病形證治第二十五

辨可刺病形證治第二十六

辨不可水病形證治第二十七

辨可水病形證治第二十八

論熱病陰陽交併生死證第二十九

卷七

方藥炮製

金匱玉函經

目錄

三

桂枝湯方第一

桂枝麻黃各半湯方第二

桂枝二麻黃一湯方第三

桂枝二越婢一湯方第四

桂枝加桂湯方第五

桂枝加附子湯方第六

桂枝去芍藥湯方第七

桂枝去芍藥加附子湯方第八



桂枝去桂加茯苓白朮湯方第九

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方

第十

桂枝加芍藥生薑人參新加湯方第十一

桂枝倍加芍藥湯方第十二

桂枝加大黃湯方第十三

桂枝人參湯方第十四

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方第十五

金匱玉函經

目錄

四

桂枝甘草湯方第十六

桂枝加葛根湯方第十七

葛根湯方第十八

葛根加半夏湯方第十九

葛根黃芩黃連湯方第二十

麻黃湯方第二十一

麻黃杏子甘草石膏湯方第二十二

麻黃附子甘草湯方第二十三

麻黃附子細辛湯方第二十四

麻黃連軹赤小豆湯方第二十五

麻黃升麻湯方第二十六

大青龍湯方第二十七

小青龍湯方第二十八

小建中湯方第二十九

小柴胡湯方第三十

柴胡桂枝乾薑湯方第三十一

金匱玉函經

目錄

五

柴胡桂枝湯方第三十二

柴胡加龍骨牡蠣湯方第三十三

大柴胡湯方第三十四

柴胡加芒硝湯方第三十五

柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯方第三十六

茯苓桂枝甘草大棗湯方第三十七

茯苓桂枝白朮甘草湯方第三十八

茯苓甘草湯方第三十九



五苓散方第四十

甘草乾薑湯方第四十一

芍藥甘草湯方第四十二

炙甘草湯方第四十三

甘草湯方第四十四

厚朴生薑半夏甘草人參湯方第四十五

梔子豉湯方第四十六

梔子甘草豉湯方第四十七

金匱玉函經

目錄

六

梔子生薑豉湯方第四十八

梔子厚朴湯方第四十九

梔子乾薑湯方第五十

梔子黃蘗湯方第五十一

卷八

小陷胸湯方第五十二

大陷胸湯方第五十三

大陷胸圓方第五十四

又大陷胸湯方第五十五

文蛤散方第五十六

白散方第五十七

大黃瀉心湯方第五十八

附子瀉心湯方第五十九

半夏瀉心湯方第六十

甘草瀉心湯方第六十一

生薑瀉心湯方第六十二

金匱玉函經

目錄

七

禹餘糧圓方 缺

赤石脂禹餘糧湯方第六十三

旋覆代赭石湯方第六十四

瓜蒂散方第六十五

白虎湯方第六十六

白虎加人參湯方第六十七

桂枝附子湯方第六十八

朮附湯方第六十九



甘草附子湯方第七十

芍藥甘草附子湯方第七十一

乾薑附子湯方第七十二

十棗湯方第七十三

附子湯方第七十四

大承氣湯方第七十五

小承氣湯方第七十六

調胃承氣湯方第七十七

金匱玉函經

目錄

八

桃仁承氣湯方第七十八

豬苓湯方第七十九

蜜煎導方第八十

麻子仁圓方第八十一

抵當圓方第八十二

抵當湯方第八十三

茵陳蒿湯方第八十四

黃連阿膠湯方第八十五

黃連湯方第八十六

桃花湯方第八十七

吳茱萸湯方第八十八

豬膚湯方第八十九

桔梗湯方第九十

苦酒湯方第九十一

半夏散方第九十二

白通湯方第九十三

金匱玉函經

目錄

九

白通加豬膽汁湯方第九十四

真武湯方第九十五

烏梅圓方第九十六

乾薑黃芩黃連人參湯方第九十七

白頭翁湯方第九十八

黃芩人參湯方第九十九

黃芩湯方第一百

黃芩加半夏生薑湯方第一百一



理中圓及湯方第一百二

四逆散方第一百三

四逆湯方第一百四

通脉四逆湯方第一百五

人參四逆湯方第一百六

茯苓四逆湯方第一百七

通脉四逆加猪膽汁湯方第一百八

當歸四逆湯方第一百九

金匱玉函經

目錄

十

當歸四逆加吳茱萸生薑湯方第一百十

燒裩散方第一百十一

枳實梔子豉湯方第一百十二

牡蠣澤瀉散方第一百十三

竹葉石膏湯方第一百十四

麥門冬湯方第一百十五

附遺

金匱玉函經目錄終

金匱玉函經卷第一

漢仲景張機著

上海陳世傑懷三重校

晉王叔和撰次

門人張邵煥有文叅

宋林億等校正

平江余謙牧心恭重校

門人張嵩峻天閱

證治總例

夫二儀之內惟人最靈稟天地精英之氣故與天地相參天一生水剛柔漸形是以人之始生

金匱玉函經

卷一

一

先成其精腦髓既足筋骨斯成皮堅毛長神舍於心頭圓法天足方象地兩目應日月九竅應九州四肢應四時十二節應十二月五藏應五音六府應六律手十指應十干足十指莖垂應十二支三百六十節以應一歲天有風雨人有喜怒天有雷電人有音聲天有陰陽人有男女月有大小人有虛實萬物皆備乃名爲人服食五味以養其生味有所偏藏有所勝氣增而久



疾病乃成諸經藏中金木水火土自相尅賊地水火風復加相乘水行滅火土救其母迭為勝負藏氣不精此為害道不知經脉妄治諸經使氣血錯亂正氣受刑陰陽不和十死一生經云地水火風合和成人凡人火氣不調舉身蒸熱風氣不調全身強直諸毛孔閉塞水氣不調身體浮腫脹滿喘麤土氣不調四肢不舉言無音聲火去則身冷風止則氣絕水竭則無血土敗則身裂愚醫不思脉道反治其病使藏中金木水火土互相攻尅如火熾然重加以油不可不慎又使經脉者如流水迅急能斷其源者此為上也

凡四氣合德四神安和人一氣不調百一病生四神動作四百四病同時俱起其有一百一病不治自愈一百一病須治而愈一百一病難治難愈一百一病真死不治

金匱玉函經

卷一

二

問曰人隨土地得合陰陽稟食五穀隨時相將冬得溫室夏遂清涼消診調寒暑四季不遭傷恐懼畏無時忽然致不祥肺魄不能靜肝魂欲飛揚心神失所養脾腎亦乖方六府彷徨亂何以致安康非鍼藥不定盍自究精詳答曰肝虛則目暗其魂自飛揚肺衰則氣上其魄自掩藏心虛則不定諸藏受遮殃脾腎虛衰至內結作癰瘡六府病蝟集諸脉失經常及時加鍼藥勿使及淪亡

金匱玉函經

卷一

三

古者上醫相色中醫聽聲下醫診脉診候之法固是不易又云問而知之別病深淺命曰巧焉上醫相色知病者色脉與身形不得相失黑乘赤者死赤乘青者生之類中醫聽聲知病者聲合五音火聞水聲煩悶驚悸木得金聲恐畏相刑脾者土也生育萬物回助四傍善者不見惡則歸之太過則四肢不舉不及則九竅不通六



識閉塞。猶如醉人。四季運轉終而復始。下醫診脉知病者。源流移轉。四時逆順。相害相生。審知藏府之微。此爲妙也。

夫診法。常以平旦。陰氣未動。陽氣未散。飲食未進。經脉未盛。絡脉調勻。氣血未亂。精取其脉。知其逆順。必察四難而明告之。然愚醫不能如斯。逆四難而生亂階者。此爲誤也。

肝病治肺。心病折腎。其次取俞募。不令流轉。藏

金匱玉函經

卷一

四

府見肝之病。當瀉肺。金補肝。木子火爲父。報仇。故火尅金子。病以母補之。母病以子瀉之。蓋云王者不受其邪。而爲邪傳。以得姦賊之侵。病及於一藏之中。五賊相害於彼前路。當先斷之一藏。不可再傷精神。不中數勞。次取俞募。其令五邪氣當散去之。

凡婦人之病。比之男子。十倍難治。攷諸經言病本一體。所以難治者。婦人衆陰所集。常與濕居。

十五以上。陰氣浮溢。百想經心。內傷五藏。外損姿容。月水去留。前後交互。瘀血停凝。中路斷絕。其中傷壞。不可具論。生熟二藏。虛實交錯。惡血內漏。氣脉損竭。或飲食無度。損傷非一。或胎瘡未愈。而合陰陽。或出行風來。便利穴廁之上。風從下入。便成十二痼疾。男子病者。衆陽所歸。常居于燥陽氣游動。強力施泄。便成勞損。損傷之病亦衆多矣。食草者力。食穀者智。食肉者勇。以

金匱玉函經

卷一

五

金治金。真得其真。以人治人。真得入神。凡欲和湯。合藥。灸刺之法。宜應精思。必通十二經脉。三百六十孔穴。營衛氣行。知病所在。宜治之法。不可不通。湯散丸藥。鍼灸膏摩。一如其法。然愚醫不通十二經脉。不知四時之經。或用湯藥。倒錯鍼灸。失度順方。治病更增他疾。惟致滅亡。故張仲景曰。哀哉。烝民。枉死者半。可謂世無良醫。爲其解釋。



吾常見愚人疾病有三不治重財輕命一不治服食不節二不治信邪賊藥三不治若主候常存形色未病未入腠理鍼藥及時服將調節委以良醫病無不愈咸共思之又自非究明醫術素識明堂流注者則身中榮俞尙不能知其所

在安能用鍼藥以治疾哉今列次第以示後賢使得傳之萬世  
張仲景曰若欲治疾當先以湯洗滌五藏六府

金匱玉函經

卷一

六

開通經脉理導陰陽破散邪氣潤澤枯槁悅人皮膚益人氣血水能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次當用散散能逐邪風濕痺表裏移走居無常處者散當平之次當用丸丸能逐沉冷破積聚消諸堅癥進飲食調營衛能參合而行之者可謂上工醫者意也聖道非不妙愚醫不能尋聖意之要妙怨嗟藥石不治者此為謬也非聖人之過也又能尋膏煎摩之者亦

古之例也虛則補之實則瀉之寒則散之熱則去之不虛不實以經取之虛者十補勿一瀉之實者瀉之虛實等者瀉勿太泄膏煎摩之勿使復也若虛者重瀉真氣絕實者補之重其疾大熱之氣寒以取之盛熱之氣以寒發之又不須汗下而與汗下之者此為逆也仲景曰不須汗而強與汗之者奪其津液令人枯竭而死又須汗而不與汗之者使諸毛孔閉塞令人悶絕而

金匱玉函經

卷一

七

死又不須下而強與下之者令人開腸洞泄便溺不禁而死又須下而不與下之者令人心內懊懣脹滿煩亂浮腫而死又不須灸而強與灸之者令人火邪入腹干錯五藏重加其煩而死又須灸而不與灸之者使冷結重冰久而彌固氣上衝心無地消散病篤而死又須珍貴之藥非貧家野居所能立辦由是怨嗟以為藥石無驗者此弗之思也



問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升合消滅之法則云何答曰凡草木有根莖枝葉皮毛花實諸石有軟鞭消走諸蟲有毛羽甲角頭尾骨足之屬有須燒煉炮炙生熟有定一如後法順方是福逆之者殃又或須皮去肉或去皮須肉或須根去莖又須花須實依方揀採治削極令淨潔然後升合秤兩勿令叅差藥有相生相殺相惡相反相畏相得氣力有強有弱有君臣

金匱玉函經

卷一

八

相理佐使相持若不廣通諸經焉知草木好惡或醫自以意加減更不依方分配使諸草石強弱相欺勝負不順入人腹內不能治病自相鬪爭使人逆亂力勝刀劍若調和得宜雖未去病猶得利安五藏令病無至增劇若合治湯藥當取井花水極令潔淨并斗勿令多少煮之調和一如其法若合蜜丸當須看第七卷令童子杵之極令細熟杵數千百下可至于萬過多益佳

依經文和合調勻當以四時王相日造合則所求皆得穰災滅惡病者得瘥死者更生表鍼內藥與之令服可謂千金之藥內消無價之病

夫用鍼刺者先明其孔穴補虛瀉實送堅付濡以急隨緩營衛常行勿失其理行其鍼者不亂乎心口如銜索目欲內視消息氣血不得妄行鍼入一分知天地之氣鍼入二分知呼吸之氣鍼入三分知逆順之氣鍼皮毛者勿傷血脉鍼

金匱玉函經

卷一

九

血脉者勿傷肌肉鍼肌肉者勿傷筋膜鍼筋膜者勿傷骨髓經曰東方甲乙木主人筋膜魂南方丙丁火主人血脉神西方庚辛金主人皮毛魄北方壬癸水主人骨髓志中央戊己土主人肌肉智鍼傷筋膜者令人愕視失魂鍼傷血脉者令人煩亂失神鍼傷皮毛者令人上氣失魄鍼傷骨髓者令人呻吟失志鍼傷肌肉者令人四肢不舉失智鍼能殺生人亦能起死人



凡用鍼之法補瀉爲先呼吸應江漢補瀉應星斗經緯有法則陰陽不相干震爲陽氣始兌爲陰氣終坎爲太玄華坤爲太陰精欲補從卯南欲瀉從酉北鍼入因日明鍼出隨月光夫治陰陽風邪身熱脉大者以烽鍼刺之治諸邪風鬼疰痛處少氣以毛鍼去之凡用烽鍼者除疾速也先補五呼刺入五分留入十呼刺入一寸留二十呼隨師而將息之刺急者深內而久留之

金匱玉函經

卷一

十

刺緩者淺內而疾發鍼刺大者微出其血刺滑者淺內而久留之刺澁者必得其脉隨其逆順久留之疾出之撮穴勿出其血刺諸小弱者勿用大鍼然氣不足宜調以甘藥餘三鍼者止中破癰堅痛結息肉也非治人疾也

夫用灸之法頭身腹背肩臂手足偃仰側其上中諸部皆是陰陽榮衛經絡俞募孔穴各有所主相病正形隨五藏之脉當取四時相害之脉

如浮沉滑澁與灸之人身有大小長短骨節豐狹不可以情取之宜各以其部分尺寸量之乃必得其正諸度孔穴取病人手大拇指第一節橫度爲一寸四指爲一部亦言一夫又以文理縫縱會言者亦宜審詳

凡點灸法皆取平正身體不得傾側寬縱縮狹也若坐點則坐灸之臥點則臥灸之立點則立灸之反此者不得其穴

金匱玉函經

卷一

十一

凡諸言壯數者皆以中平論也若其人丁壯病重者可復一倍其人老弱病微者可復減半然灸數可至二三百也可復倍加火治之不然則氣不下沉雖焦而病不愈又新生小兒滿一朞以還者不過一七止其壯數多少隨病大小也凡灸須合陰陽九部諸府各有孔穴而有多少故頭背爲陽部參陰而少臂脚爲陽部亦參陰而少胸爲陰部參陽而少腹爲陰部亦參陽而



少。此爲陰陽營衛經脈事也行壯多少在數人病隨陰陽而灼灸之若不知孔穴勿妄灸之使病增重又人體腰以上爲上部腰以下爲下部外爲陽部內爲陰部營衛藏府周流名曰經絡是故丈夫四十以上氣在腰婦人四十以上氣在乳以丈夫先衰于下婦人先衰于上灸之生熟亦宜搏節之法當隨病遷轉大法外氣務生內氣務熟其餘隨宜耳頭者身之元首人神之

金匱玉函經

卷一

三

所注氣血精明三百六十五絡皆歸于頭頭者諸陽之會也故頭病必宜審之灸其穴不得亂灸過多傷神或陽精玄精陰魄再卒是以灸頭止得滿百背者是體之橫梁五藏之繫着太陽之會合陰陽動發冷熱成病灸大過熱大害人也臂脚手足者人之枝幹其神繫於五藏六腑隨血脈出能遠近採物臨深履薄養於諸經其地狹淺故灸宜少過多則內神不得入精神閉

塞否滯不仁卽手臂不舉故四肢之灸不宜太熟也然腹藏之內性貪五味無厭成疾風寒固結水穀不消灸當宜熟若大杼脊中腎俞膀胱八竅可至二百壯心主手足太陰可至六七十八壯三里太谿太衝陰陽二泉上下二廉可至百壯腹上上管下管太倉關元可至一百壯若病重者三復之乃愈耳若治諸沉結寒冷必灸之宜熟量病輕重而攻治之表鍼內藥隨宜用之

金匱玉函經

卷一

三

消息將之與天同心百年永安終無橫死此要畧說之非賢勿傳請秘而用之今以察色診脈辨病救疾可行合宜之法并方藥共成八卷號爲金匱玉函經其篇目次第列于卷首

金匱玉函經卷第一 終



金匱玉函經卷第二

辨瘧溼暍第一

太陽病瘧溼暍三種宜應別論以為與傷寒相似故此見之

太陽病發熱無汗而反惡寒是為剛瘧

太陽病發熱汗出而不惡寒是為柔瘧

太陽病發熱其脉沉細是為瘧

太陽病發其汗因致瘧

金匱玉函經

卷二

一

病者身熱足寒頭項強惡寒時頭熱面赤目脉

赤獨頭動搖卒口噤背反張者為瘧

脊强者五瘧之總名其證卒口噤背反張而瘧

瘧諸藥不已可灸身柱大椎陶道

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得

語欲作剛瘧葛根湯主之

剛瘧為病胸滿口噤臥不著席脚攣急其人必

齟齬可與大承氣湯

瘧病發其汗已其脉洽洽如蛇暴腹脹大者為

欲解脉如故反復弦者必瘧

瘧脉來按之築築而弦直上下行

瘧家其脉伏堅直上下

夫風病下之則瘧復發其汗必拘急

太陽病其症備身體強几几然脉沉遲此為瘧

括樓桂枝湯主之

瘧病有灸瘡難療

金匱玉函經

卷二

二

瘡家雖身疼痛不可發其汗汗出則瘧

太陽病而關節疼痛其脉沉緩為中溼

病者一身盡疼煩日晡即劇此為風溼汗出當

風所致也

溼家之為病一身盡疼發熱而身色似熏黃也

溼家之為病其人但頭汗出而背強欲得被覆

向火若下之蚤則噦或胃滿小便不利舌上如

胎此為丹田有熱胸上有寒渴欲飲而不能飲



則口燥煩也

溼家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死

問曰病風溼相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨溜不止師云此可發汗汗之而其病不愈者何故答曰發其汗汗大出者但風氣去溼氣仍在是故不愈若治風溼者發其汗微微似欲出汗者則風溼俱去也

金匱玉函經

卷二

三

病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒溼故鼻塞內藥鼻中即愈

溼家身煩疼可與麻黃湯加朮四兩發其汗為宜慎不可以火攻之

風溼脉浮身汗出惡風者防已湯主之

太陽中熱暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也

白虎湯主之

太陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行膚中所致也瓜蒂湯主之

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細花遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發其汗惡寒則甚加溫鍼發熱益甚數下之則淋甚

辨脉第二

問曰脉有陰陽何謂也答曰脉大為陽浮為陽

金匱玉函經

卷二

四

數為陽動為陽滑為陽沉為陰澁為陰弱為陰弦為陰微為陰陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死

問曰脉有陽結陰結者何以別之答曰其脉自浮而數能食不大便名曰陽結期十七日當劇其脉自沉而遲不能食身體重大便反堅名曰陰結期十四日當劇

問曰病有灑淅惡寒而復發熱者何也答曰陰



脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之何謂陽不足答曰假令寸口脉微為陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒何謂陰不足答曰尺脉弱為陰不足陽氣下陷入陰中則發熱  
陽脉浮陰脉弱者則血虛血虛則筋急  
其脉沉者營氣微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也營氣微加燒鍼血留不行更發熱而燥煩也

金匱玉函經

卷二

五

脉藹藹如車蓋者名曰陽結也  
脉纍纍如循長竿者名曰陰結也  
脉聶聶如吹榆莢者名曰散也  
脉瞥瞥如羹上肥者陽氣脫也  
脉縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也  
脉綿綿如瀉漆之絕者亡其血也  
脉來緩時一止復來名曰結脉來數時一止復來名曰促脉陽盛則促陰盛則結此皆病脉

陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也若數脉見于關上上下下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動也  
陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰與陽同等者名曰緩也

脉浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脉緊者如轉索無常也

脉弦而大弦即為減大即為芤減即為寒芤即

金匱玉函經

卷二

六

為虛寒虛相搏脉即為革婦人即半產漏下男子即亡血失精

問曰病有戰而汗出自得解者何也答曰其脉浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脉浮故當汗出而解若脉浮而數按之不芤此本不虛若欲自解但汗出耳即不發戰也

問曰病有不戰而汗出解者何也答曰其脉大



而浮數故不戰汗出而解也

問曰病有不戰復不汗而解者何也答曰其脉自微此以曾發汗若吐若下若亡血內無津液陰陽自和必自愈故不戰不汗而解也

問曰傷寒三日其脉浮數而微病人身自涼和者何也答曰此為欲解也解以夜半脉浮而解者澱然汗出也脉數而解者必能食也脉微而解者必大汗出也

金匱玉函經

卷二

七

問曰脉病欲知愈未愈何以別之答曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脉陰陽為和平雖劇當愈

師曰立夏得洪大脉是其本位其人病身體苦疼重者須發其汗若明日身不疼不重者不須發汗若汗澱澱然自出者明日便解矣何以言之立夏脉洪大一本作浮大是其時脉故使然也四時倣此

問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令夜半得病者日中愈日中得病者夜半愈何以言之日中得病夜半愈者以陽得陰則解也夜半得病日中愈者以陰得陽則解也

夫寸口脉浮在表沉在裏數在府遲在藏假令脉遲此為在藏

跌陽脉浮而濇少陰脉如經其病在脾法當下利何以知之脉浮而大者氣實血虛也今跌陽

金匱玉函經

卷二

八

脉浮而澁故知脾氣不足胃氣虛也以少陰脉弦而浮纔見此為調脉故稱如經而反滑數者故知當溺膿也

寸口脉浮而緊浮即為風緊即為寒風即傷衛寒即傷營營衛俱病骨節煩疼當發其汗也

跌陽脉遲而緩胃氣如經也跌陽脉浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所為也營衛內陷其數先微脉反但浮其人必大便堅



氣噫而除。何以言之。脾脉本緩。今數脉動脾。其數先微。故知脾氣不治。大便堅氣噫而除。今脉反浮。其數改微。邪氣獨留心中。則饑邪熱不殺。穀潮熱發渴。數脉當遲緩。脉因前後度數如法。病者則饑數脉不時則生惡瘡也。

師曰。病人脉微而澁者。此為醫所病也。大發其汗。又數大下之。其人亡血。病當惡寒而發熱無休止。時夏月盛熱。而欲着複衣。冬月盛寒。而欲

金匱玉函經

卷二

九

裸其體。所以然者。陽微即惡寒。陰弱即發熱。醫發其汗。使陽氣微。又大下之。令陰氣弱。五月之時。陽氣在表。胃中虛冷。內以陽微不能勝冷。故欲着複衣。十一月之時。陽氣在裏。胃中煩熱。內以陰弱不能勝熱。故欲裸其體。又陰脉遲澁。故知亡血也。

脉浮而大。心下反堅。有熱屬藏者。攻之不令發汗。屬府者。不令溲數。溲數則便堅。汗多則熱愈。

汗少即便難。脉遲尚未可攻。

跌陽脉數微濇。少陰反堅微。即下逆濇。即躁煩。少陰堅者。便即為難。汗出在頭。穀氣為下。便難者。令微溲。不令汗出。甚者。遂不得便。煩逆鼻鳴。上竭下虛。不得復還。

脉浮而洪。軀汗如油。喘而不休。水漿不下。形體不仁。乍靜乍亂。此為命絕。未知何藏先受其災。若汗出髮潤。喘而不休。此為肺絕。陽反獨留。形

金匱玉函經

卷二

十

體如烟熏。直視搖頭。此為心絕。唇吻反青。四肢縶。習此為肝絕。環口黧黑。柔汗發黃。此為脾絕。溲便遺失。狂語目反。直視此為腎絕。又未知何藏陰陽先絕。若陽氣先絕。陰氣後竭。其人死。身色必青。肉必冷。陰氣先絕。陽氣後竭。其人死。身色必赤。腋下温。心下熱也。

寸口脉浮大。醫反下之。此為大逆。浮即無血。大即為寒。寒氣相搏。即為腸鳴。醫乃不知而反飲。



之水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人即餽  
跌陽脉浮浮即爲虛浮虛相搏故令氣餽言胃  
氣虛竭也脉滑則爲噦此爲醫咎責虛取實守  
空迫血脉浮鼻口燥者必衄

諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處食飲  
如常者畜積有膿也

脉浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而  
解反發熱者差遲遲爲無陽不能作汗其身必

金匱玉函經

卷二

十一

癢也

脉虛者不可吐下發汗其面反有熱色爲欲解  
不能汗出其身必癢

寸口脉陰陽俱緊法當清邪中上濁邪中下清  
邪中上名曰潔濁邪中下名曰渾陰中于邪必  
內慄表氣微虛裏氣失守故使邪中於陰也陽  
中於邪必發熱頭痛項強腰痛脛痠所謂陽中  
霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣爲慄

足膝逆冷。溲便妄出。表氣微虛裏氣微急。三焦

相溷內外不通。若上焦怫鬱藏氣相熏。口爛食

斷。若中焦不治。胃氣上衝脾氣不轉。胃中爲濁。

營衛不通。血凝不流。衛氣前通。小便赤黃。與熱

相搏。因熱作使。游于經絡。出入藏府。熱氣所過

即爲癰膿。陰氣前通。陽氣厥微。陰無所使。客氣

內入。噓而出之。聲嗚咽。寒厥相迫。爲熱所擁。

血凝自下。狀如豚肝。陰陽俱厥。脾氣孤弱。五液

金匱玉函經

卷二

十二

注下若下焦不闔。清便下重。令便數難。臍築湫  
痛。命將難全

脉陰陽俱緊。口中氣出。唇口乾燥。蹠臥足冷。鼻

中涕出。舌上胎滑。勿妄治也。到七日以來。其人

微發熱。手足溫。此爲欲解。或到八日以上。反大

發熱。此爲難治。設惡寒者。必欲嘔。腹痛者。必欲

利也

脉陰陽俱緊。至於吐利。其脉獨不解。緊去人安



此為欲解。若脉遲。至六七日不欲食。此為晚發。水停故也。為未解。食自可者。為欲解。

病六七日。手足三部脉皆至。大煩口噤不能言。其人躁擾。此為欲解。若脉和。其人大煩目重。臉內際黃。亦為欲解。

脉浮而數。浮即為風。數即為虛。風即發熱。虛即惡寒。風虛相搏。則灑淅惡寒而發熱也。

跌陽脉浮而微。浮即為虛。微即汗出。

金匱玉函經

卷二

三

脉浮而滑。浮即為陽。滑即為實。陽實相搏。其脉數疾。衛氣失度。浮滑之脉。數疾發熱。汗出者。此為不治。

脉散其人形損。傷寒而欬。上氣者死。

脉微而弱。微即為寒。弱即發熱。當骨節疼痛。煩而極出汗。

寸口脉濡而弱。濡即惡寒。弱即發熱。濡弱相搏。藏氣衰微。胃中苦煩。此非結熱。而反劫之。居水

漬布冷。鈹貼之。陽氣遂微。諸府無所依。陰脉凝。聚結在心下。而不肯移。胃中虛冷。水穀不化。小便便縱通。復不能多。微則可救。聚寒在心下。當奈何。

辨太陽病形證治第三

夫病有發熱而惡寒者。發於陽也。不熱而惡寒者。發於陰也。發於陽者。七日愈。發於陰者。六日愈。以陽數七。陰數六故也。

金匱玉函經

卷二

四

太陽之為病。頭項強痛而惡寒。

太陽病其脉浮。

太陽病發熱汗出而惡風。其脉緩為中風。

太陽中風發熱而惡寒。

太陽病或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。

其脉陰陽俱緊為傷寒。

傷寒一日。太陽脉弱。至四日。太陰脉大。

傷寒一日。太陽受之。脉若靜者。為不傳。煩欲吐。



躁煩脉數急者乃為傳

傷寒其二陽證不見此為不傳

傷寒三日陽明脉大者為欲傳

傷寒三日少陽脉小者為欲已

太陽病發熱而渴不惡寒為溫病若發汗已身

體灼熱者為風溫風溫之為病脉陰陽俱浮汗

出體重多眠鼻息必鼾語聲難出若下之小便

不利直視失溲若被火微發黃劇則如驚癇時

金匱玉函經

卷二

五

掣縱發作復以火熏之一逆尚引日再逆促命  
期

太陽病三四日不吐下見衄乃汗之

太陽病頭痛至七日有當愈者其經竟故也若

欲作再經者當鍼足陽明使經不傳則愈

太陽病欲解時從巳盡未

風家表解而不了了者十二日愈

夫病身大熱反欲得衣者寒在骨髓熱在皮膚

金匱玉函經 卷二

身大寒反不欲近衣者熱在骨髓寒在皮膚也

太陽中風陽浮而陰濡弱陽浮者熱自發濡弱

者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翁翁發熱鼻鳴

乾嘔桂枝湯主之

太陽病發熱汗出此為營弱衛強故使汗出欲

解邪風桂枝湯主之

太陽病頭痛發熱汗出惡風桂枝湯主之

太陽病項背強几几而反汗出惡風桂枝湯主

金匱玉函經

卷二

六

之論云桂枝加葛根湯主之

太陽病下之其氣上衝者可與桂枝湯不衝者

不可與之

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼而不解

此為壞病桂枝不復中與也觀其脉證知犯何

逆隨證而治之

桂枝湯本為解肌其人脉浮緊發熱無汗不可

與也常須識此勿令誤也



酒客不可與桂枝湯。得之則嘔。酒客不喜甘故也。

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳。

服桂枝湯吐者其後必吐膿血。

太陽病發其汗遂漏而不止其人惡風小便難。

四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯主之。

太陽病下之其脉促胸滿桂枝去芍藥湯主之。

若微惡寒者桂枝去芍藥加附子湯主之。

金匱玉函經

卷二

七

太陽病得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多。

而寒少其人不嘔清便自調日二三發脉微緩。

者為欲愈脉微而惡寒此陰陽俱虛不可復吐。

下發汗也面反有熱色者為未欲解以其不能。

得小汗出身必當瘥桂枝麻黃各半湯主之。

太陽病初服桂枝湯反煩不解者當先刺風池。

風府却與桂枝湯即愈。

服桂枝湯大汗出若脉但洪大與桂枝湯若其

形如瘧。一日再發汗出便解。宜桂枝二麻黃一湯。

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解若脉洪大者。

白虎加人參湯主之。

太陽病發熱而惡寒熱多寒少脉微弱者此無。

陽也不可復發其汗宜桂枝二越婢一湯。

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗。

心下滿而微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓。

金匱玉函經

卷二

六

白朮湯主之。

傷寒脉浮自汗小便數頗微惡寒論曰心煩微。

惡寒兩脚攣急反與桂枝湯欲攻其表得之便。

厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾薑湯以復其陽。

厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若。

胃氣不和讞語少與調胃承氣湯若重發汗復。

加燒鍼者四逆湯主之。

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾。



兩脛拘急而讖語。師言夜半手足當溫，兩腳當伸。後如師言。何以知之。答曰：寸口脈浮而大，浮即爲風，大即爲虛。風則生微熱，虛則兩脛攣其形象。桂枝因加附子於其間，增桂令汗出，附子溫經，亡陽故也。厥逆咽中乾，煩躁陽明內結，讖語煩亂，更飲甘草乾薑湯。夜半陽氣還，兩足當熱。脛尚微拘急，與芍藥甘草湯，爾乃脛伸。與承氣湯，微溏，止其讖語，故知其病可愈。

金匱玉函經

卷二

九

太陽病項背強几几無汗惡風者，葛根湯主之。  
太陽與陽明合病必自利，葛根湯主之。不下利但嘔者，葛根加半夏湯主之。

太陽病桂枝證醫反下之，遂利不止，其脈促表未解，喘而汗出，葛根黃連黃芩湯主之。

太陽病頭痛發熱，身體疼，腰痛骨節疼痛，惡風無汗而喘，麻黃湯主之。

太陽與陽明合病，喘而胸滿者，不可下，宜麻黃

湯主之。

病十日已去，其脈浮細嗜臥，此爲外解，設胸滿脅痛，與小柴胡湯。脈浮者與麻黃湯。

太陽中風，脈浮緊發熱惡寒，身體疼痛不汗出而煩躁頭痛，大青龍湯主之。若脈微弱汗出惡風，不可服，服則厥，筋惕肉瞤，此爲逆也。

傷寒脈浮緩，其身不疼，但重乍有輕時，無少陰證者，可與大青龍湯發之。

金匱玉函經

卷二

十

傷寒表不解，心下有水氣，欬而發熱，或渴或利，或噎或小便不利，小腹滿或微喘，小青龍湯主之。

傷寒心下有水氣，欬而微喘發熱，不渴服湯已而渴者，此爲寒去欲解，小青龍湯主之。

太陽病外證未解，其脈浮弱，當以汗解，宜桂枝湯主之。

太陽病下之微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴



杏仁湯主之

太陽病外證未解者不可下下之為逆解外者宜桂枝湯主之

太陽病先發汗不解而下之其脈浮不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當解其外則愈宜桂枝湯

太陽病脈浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表候仍在此當發其汗服藥已微除其

金匱玉函經

卷二

三

人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

太陽病脈浮緊發熱其身無汗自衄者愈

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹

因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷不可下下之為逆如此者可小發其汗設

面色緣緣正赤者陽氣怫鬱不得越當解之熏之當汗而不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中

乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發其汗即愈何以知汗出不徹以脈澁故知之

脈浮數法當汗出而愈若下之身體重心悸者不可發汗當自汗出而解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津液自和即自汗出愈

脈浮而緊法當身疼頭痛宜以汗解之假令尺中脈遲者不可發其汗何以故此為營氣不足

金匱玉函經

卷二

三

血氣微少故也

脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯一云桂枝湯脈浮而數者可發汗宜麻黃湯

病常自汗出者此為營氣和衛氣不和故也營

行脈中為陰主內衛行脈外為陽主外復發其汗衛和則愈宜桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和也先其時發汗即愈宜桂枝湯



傷寒。脉浮緊。不發汗。因致嘔者。宜麻黃湯。

傷寒。不大便。六七日。頭痛。有熱。未可與承氣湯。

其小便反清。此為不在裏而在表也。當發其汗。

頭痛者。必衄。宜桂枝湯。

傷寒。發汗已。解。半日許。復煩。其脉浮數。可與復

發汗。宜桂枝湯。

凡病。若發汗。若吐。若下。若亡血。無津液。而陰陽

自和者。必自愈。

金匱玉函經

卷二

三

大下後。發汗。其人小便不利。此亡津液。勿治之。

其小便利。必自愈。

下之後。發其汗。必振寒。脉微細。所以然者。內外

俱虛故也。

下之後。復發其汗。晝日煩躁。不得眠。夜而安靜。

不嘔。不渴。而無表證。脉沉微。身無大熱者。乾薑

附子湯主之。

發汗後。身體疼痛。其脉沉遲。桂枝加芍藥生薑

人參湯主之。

發汗後。不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。

可與麻黃杏子甘草石膏湯。

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。

桂枝甘草湯主之。

發汗後。其人臍下悸者。欲作賁。脉茯苓桂枝甘

草大棗湯主之。

發汗後。腹脹滿。厚朴生薑甘草半夏人參湯主

之。

金匱玉函經

卷二

之

傷寒。若吐。若下。若發汗後。心下逆滿。氣上衝。胃

起。即頭眩。其脉沉緊。發汗。即動經。身為振振搖。

茯苓桂枝白朮甘草湯主之。

發其汗不解。而反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附

子湯主之。不惡寒。但熱者。實也。當和胃氣。宜小

承氣湯。

發汗。若下病仍不解。煩躁。茯苓四逆湯主之。



太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠其人欲引水當稍飲之令胃中和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之

發汗後脉浮而數煩渴者五苓散主之

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲

水水入即吐此為水逆五苓散主之

金匱玉函經

卷二

五

未持脉時病人叉手自冒心師因教試令欬而不即欬者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發其汗虛故也

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口為逆

發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中

懊憹梔子豉湯主之若少氣梔子甘草豉湯主

之若嘔梔子生薑豉湯主之

發汗若下之煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛此

為未解梔子豉湯主之

傷寒下後煩而腹滿臥起不安梔子厚朴湯主

之

傷寒醫以圓藥大下之身熱不去微煩梔子乾

薑湯主之

凡用梔子湯證其人微溇者不可與服之

金匱玉函經

卷二

五

太陽病發其汗而不解其人仍發熱心下悸頭眩身暈而動振振欲擗地者真武湯主之

咽喉乾燥者不可發其汗

淋家不可發汗發其汗必便血

瘡家雖身疼痛不可攻其表汗出則瘡

衄家不可攻其表汗出必額上促急而緊直視

不能眴不得眠

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振



汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹  
餘糧圓

病人有寒復發其汗胃中冷必吐衄

本發汗而復下之爲逆先發汗者治不爲逆本  
先下之而反汗之爲逆先下之者治不爲逆

傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急  
當救裏後身疼痛清便自調急當救表救裏宜  
四逆湯救表宜桂枝湯

金匱玉函經

卷二

三

病發熱頭痛脈反沉若不瘥身體更疼痛當救  
其裏宜四逆湯

太陽病先下之而不愈因復發其汗表裏俱虛  
其人因致冒冒家當汗出自愈所以然者汗出  
表和故也裏未和然後復下之

太陽病未解脈陰陽俱停必先振汗而解但陽  
微者先汗之而解陰微者先下之而解汗之宜  
桂枝湯下之宜承氣湯

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於  
脇下正邪分爭往來寒熱休作有時嘿嘿不欲  
食飲藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也  
小柴胡湯主之

服柴胡湯已渴者此爲屬陽明以法治之

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三  
下之不能食其人脇下滿痛面目及身黃頸項  
強小便難與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔

金匱玉函經

卷二

三

柴胡湯不復中與也食穀者噦

中風五六日傷寒往來寒熱胸脇苦滿嘿嘿不  
欲飲食心煩喜嘔或胃中煩而不嘔或渴或腹  
中痛或脅下痞堅或心中悸小便不利或不渴  
外有微熱或欬小柴胡湯主之

傷寒四五日身熱惡風頸項強脅下滿手足溫  
而渴小柴胡湯主之

傷寒陽脈澁陰脈弦法當腹中急痛先與小建



中湯不差即與小柴胡湯主之

傷寒中風有小柴胡證但見一證便是不必悉具

凡柴胡湯證而下之柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解

傷寒二三日心中悸而煩小建中湯主之

太陽病過經十餘日及二三下之後四五日柴

胡證仍在先與小柴胡湯嘔止小安其人鬱鬱

金匱玉函經

卷二

三

微煩者為未解與大柴胡湯下之愈

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡發潮熱而

微利此本柴胡證下之不得利今反利者知醫

以圓藥下之非其治也潮熱者實也先再服小

柴胡湯解其外後以柴胡加芒硝湯主之

傷寒十三日過經而譫語內有熱也當以湯下

之小便利者大便當堅而反下利其脈調和者

知醫以圓藥下之非其治也自利者其脈當微

厥今反和者此為內實也調胃承氣湯主之

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者

即愈其外不解尚末可攻當先解其外外解小

腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一

身盡重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯主之

傷寒腹滿而譫語寸口脈浮而緊者此為肝乘

脾名曰縱當刺期門

金匱玉函經

卷二

三

傷寒發熱嗇嗇惡寒其人大渴欲飲酢漿者其

腹必滿而自汗出小便利其病欲解此為肝乘

肺名曰橫當刺期門

太陽病二日而反燒瓦熨其背而大汗出火熱

入胃胃中水竭躁煩必當譫語十餘日振而反

汗出者此為欲解也其汗從腰以下不得汗欲

小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便堅者小

便當數而反不數及不多大便已頭卓然而痛



其人足心必熱穀氣下流故也

太陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛即欲衄陰虛小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾尋衣摸牀小便利者其人可治

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽驚狂臥起不安

金匱玉函經

卷二

三

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

傷寒其脉不弦緊而弱者必渴被火必譫語弱者發熱脉浮解之當汗出愈

太陽病以火熏之不得汗者其人必燥到經不解必清血名火邪

脉浮熱盛而灸之此為實實以虛治因火而動咽燥必吐血

微數之脉慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛

逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

脉浮當以汗解而反灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺此為火逆

欲自解者必當先煩乃有汗隨汗而解何以知之脉浮故知汗出而解

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發黃脉氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝

金匱玉函經

卷二

三

加桂湯

火逆下之因燒鍼煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

太陽傷寒加溫鍼必驚

太陽病當惡寒而發熱今自汗出反不惡寒而發熱關上脉細而數此醫吐之故也一日二日吐之者腹中饑口不能食三日四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食夕吐以醫吐之所致也



此為小逆

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也

病人脉數數為熱當消穀引食而反吐者以醫發其汗陽氣微膈氣虛脉則為數數為客熱不能消穀胃中虛冷故吐也

太陽病過經十餘日心下噎噎欲吐而又胸中痛大便反溇其腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐

金匱玉函經

卷二

三

下者與調胃承氣湯不爾者不可與反欲嘔胸中痛微溇此非湯證以嘔故知極吐下也

太陽病七八日表證仍在其脉微沉反不結胸其人發狂此熱在下焦少腹當堅而滿小便自利者下血乃愈所以然者太陽隨經瘀熱在裏故也

太陽病身黃其脉沉結少腹堅小便不利為無血也小便自利其人如狂者血證諦也

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當圓  
太陽病小便利者為多飲水心下必悸小便少者必苦裏急也

金匱玉函經卷第二 終

金匱玉函經

卷二

三



金匱玉函經卷第三

辨太陽病形證治下第四

問曰病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛其脉寸口浮關上自沉為結胃

問曰何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時小

便不利陽脉浮關上細沉而緊為藏結舌上白

胎滑者為難治

藏結者無陽證不往來寒熱一云寒而不熱其

金匱玉函經

卷三

一

人反靜舌上胎滑者不可攻也

夫病發於陽而反下之熱入因作結胸發於陰

而反下之因作痞結胸者下之早故令結胸

結胸者其項亦強如柔痙狀下之即和宜大陷

胸圓

結胸證其脉浮大不可下下之即死

結胸證悉具而躁者死

太陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱動則

為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒

者其表未解也醫反下之動數變遲頭痛則眩

胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊懣陽氣

內陷心下因堅則為結胸大陷胸湯主之若不

結胸但頭汗出其餘無汗劑頸而還小便不利

身必發黃

傷寒六七日結胸熱實其脉浮緊心下痛按之

如石堅大陷胸湯主之

金匱玉函經

卷三

二

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱當與大柴

胡湯但結胸無大熱此為水結在胸脇頭微汗

出大陷胸湯主之

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌

上燥而渴日晡小有潮熱從心下至少腹堅滿

而痛不可近大陷胸湯主之

小結胸者正在心下按之即痛其脉浮滑小陷

胸湯主之



太陽病二三日不能臥但欲起者心下必結其脉微弱者此本寒也而反下之利止者必結胸未止者四五日復重下之此挾熱利也

太陽病下之其脉促不結胸者此為欲解其脉浮者必結胸其脉緊者必咽痛其脉弦者必兩脅拘急其脉細而數者頭痛未止其脉沉而緊者必欲嘔其脉沉而滑者挾熱利其脉浮而滑者必下血

金匱玉函經

卷三

三

病在陽當以汗解而反以水溼之若灌之其熱被劫不得去益煩皮上粟起意欲飲水反不渴服文蛤散若不差與五苓散若寒實結胸無熱證者與三物小白散

太陽與少陽併病頭項強痛或眩時如結胸心下痞而堅當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗即譫語譫語則脉弦譫語五六日不止當刺期門

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脉遲身凉胸脅下滿如結胸狀其人譫語此為熱入血室當刺期門隨其虛實而取之婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

金匱玉函經

卷三

四

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必當自愈

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解也柴胡桂枝乾姜湯主之

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便堅其脉細此為陽微結必有表復



有裏沉亦爲病在裏汗出爲陽微假令純陰結不得有外證悉入在于裏此爲半在外半在裏脉雖沉緊不得爲少陰所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得尿而解

傷寒五六日嘔而發熱柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖以下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下

金匱玉函經

卷三

五

滿而堅痛者此爲結胸大陷胸湯主之若但滿而不痛者此爲痞柴胡不復中與也半夏瀉心湯主之

太陽少陽併病而反下之結胸心下堅利復不止水漿不肯下其人必心煩

脉浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人熱

汗出發作有時頭痛心下痞堅滿引脅下痛嘔即短氣此爲表解裏未和十棗湯主之

太陽病醫發其汗遂發熱惡寒復下之則心下痞表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加燒鍼因胸煩面色青黃膚暍如此者爲難治今色微黃手足溫者易愈

心下痞按之濡其脉關上自浮大黃黃連瀉心湯主之

金匱玉函經

卷三

六

若心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之一方云忍之一日乃愈

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噎食臭脅下有水氣腹中雷鳴而利生姜瀉心湯主之

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不



化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔而煩不得安  
醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非  
結熱但胃中虛客氣上逆故使之堅甘草瀉心  
湯主之

傷寒服湯藥下利不止心下痞堅服瀉心湯已  
復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚  
理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯  
主之若不止者當利其小便

金匱玉函經

卷三

七

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞  
堅脇下痛氣上衝咽喉眩胃經脉動惕者久而  
成痿

傷寒汗出若吐若下解後心下痞堅噫氣不除  
者旋覆代赭石湯主之

太陽病外證未除而數下之遂挾熱而利不止  
心下痞堅表裏不解者桂枝人參湯主之

大下以後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大

熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者表未解  
也不可攻痞當先解表解乃可攻其痞解表宜

桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

傷寒發熱汗出不解心下痞堅嘔吐下利者大  
柴胡湯主之

病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞  
堅氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐

金匱玉函經

卷三

八

之宜瓜蒂散

病者若脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰  
俠陰筋者此為藏結死

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏  
俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數  
升者白虎加人參湯主之

傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎  
湯渴欲飲水無表證者白虎湯主之



凡用白虎湯。立夏後至立秋前得用之。立秋後不可服也。

春三月病常苦裏冷。白虎湯亦不可與與之。則嘔利而腹痛。

諸亡血虛家。亦不可與白虎湯。得之腹痛而利者。急當溫之。

太陽與少陽併病。心下痞堅。頭項強而眩。當刺大椎第一間。肺俞。肝俞。慎勿下之。

金匱玉函經

卷三

九

傷寒無大熱。口渴渴而煩。其背微惡寒者。白虎加人參湯主之。

太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。

傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐。黃連湯主之。

傷寒八九日。風溼相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而澁者。桂枝附子湯主之。若不嘔不渴。脈浮虛而澁者。桂枝附子湯主之。若不嘔不渴。脈浮虛而澁者。桂枝附子湯主之。

其人大便堅。小便自利。木附子湯主之。

風溼相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫。甘草附子湯主之。

傷寒脈浮滑。而表熱裏寒者。白通湯主之。舊云。

白通湯。一云白虎者。恐非。舊云以下出叔和。

傷寒脈結代。心中驚悸。炙甘草湯主之。

辨陽明病形證治第五

金匱玉函經

卷三

一

陽明之為病。胃家實是也。

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有微陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。脾約。一作脾結是也。正陽陽明者。胃家實是也。微陽陽明者。發其汗。

若利其小便。胃中燥。大便難是也。

問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病發其汗。若下之。亡其津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實。大便難者。為陽明病也。



問曰陽明病外證云何答曰身熱汗出而不惡寒但反惡熱也

問曰病有得之一日不惡熱而惡寒者云何答曰然雖一日惡寒自罷即汗出惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬

金匱玉函經

卷三

十一

陽明也

病發熱無汗嘔不能食而反汗出濇濇然是為轉屬陽明

傷寒脉浮而緩手足自溫是為繫在太陰太陰身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日便堅為屬陽明

傷寒轉繫陽明者其人濇濇然微汗出也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮

緊若下之則腹滿小便難也

陽明病能食為中風不能食為中寒

陽明病中寒不能食而小便不利手足濇然汗出此欲作堅瘕必大便初堅後溏所以然者胃中冷水穀不別故也

陽明病初欲食食之小便反不數大便自調其人骨節疼翁翁如有熱狀奄然發狂濇然汗出而解此為水不勝穀氣與汗共併脉緊即愈

金匱玉函經

卷三

十二

陽明病欲解時從申盡戌

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也其人本虛故攻其熱必噦

陽明病脉遲食難用飽飽即發煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

陽明病久而堅者陽明當多汗而反無汗其身如蟲行皮中之狀此以久虛故也



各陽明病。反無汗而但小便二三日嘔而欬手足若厥者。其人頭必痛若不嘔不欬手足不厥者其頭不痛

各陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人咽必痛若不欬者其咽不痛

陽明病脉浮而緊其熱必潮發作有時但浮者必盜汗出

陽明病無汗小便不利心中懊懣者必發黃

金匱玉函經

卷三

三

陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者必衄

陽明病本自汗出醫復重發汗病已瘥其人微煩不了了者此大便堅也以亡精液胃中燥故

令其堅當問其小便日幾行若本日三四行今

日再行者知必大便不久出今為小便數少津液當還入胃中故知必當大便也

夫病陽多者熱下之則堅汗出多極發其汗亦

堅

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

陽明病心下堅滿不可攻之攻之遂利不止者死止者愈

陽明病面合赤色不可攻之攻之必發熱色黃小便不利也

陽明病不吐下而煩者可與調胃承氣湯

陽明病其脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短

金匱玉函經

卷三

四

氣腹滿而喘有潮熱如此者其外為欲解可攻其裏也手足濇然汗出此為已堅大承氣湯主之若汗出多微發熱惡寒者外為未解其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和其胃氣勿令至大下

陽明病潮熱大便微堅者可與大承氣湯不堅者勿與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯湯入腹中轉矢氣者為有燥

尿乃可攻之。若不轉矢氣者，此但頭堅後溏，不可攻之。攻之必脹滿不能食也。欲飲水者，與水即噦，其後發潮熱必復堅而少也。以小承氣湯和之，若不轉矢氣者，慎不可攻也。

夫實則讞語，虛則鄭聲，鄭聲者重語是也。

直視讞語喘滿者死，若下利者亦死。

發汗多，重發其汗，若已下復發其汗，亡其陽，讞語脉短者死，脉自和者不死。

金匱玉函經

卷三

五

傷寒吐下後不解，不大便五六日，上至十餘日，

日晡時發潮熱，不惡寒，獨語如見鬼狀，若劇者，

發則不識人，循衣撮空，怵惕不安，微喘，直視，脉

弦者生，澁者死，微者但發熱，讞語者大承氣湯

主之，若一服利止後服。

陽明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必

堅，堅則讞語，小承氣湯主之。一服讞語止，莫復

服。

陽明病，讞語發潮熱，其脉滑而疾者，小承氣湯主之。因與承氣湯一升，腹中轉矢氣者，復與一升。若不轉矢氣，勿更與之。明日不大便，脉反微澁者，裏虛也，為難治，不可更與承氣湯也。

陽明病，讞語有潮熱，而反不能食者，必有燥屎

五六枚也。若能食者，但堅耳。大承氣湯主之。

陽明病，下血，讞語者，此為熱入血室，但頭汗出

者，當刺期門，隨其實而瀉之，濺然汗出則愈。

金匱玉函經

卷三

六

汗出，讞語者，以有燥屎在胃中，此為風也，須下

之，過經乃可下之。下之若早，語言必亂，以表虛

裏實故也。下之則愈，宜大承氣湯。

傷寒四五日，脉沉而喘滿，沉為在裏，而反發其

汗，津液越出，大便為難，表虛裏實，久則讞語。

三陽合病，腹滿身重，難以轉側，口不仁而面垢

讞語遺溺，發汗則讞語甚，下之則額上生汗，手

足厥冷，若自汗出者，白虎湯主之。



二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足漖漖汗出。大便難而讞語者。下之即愈。宜大承氣湯。

陽明病。其脉浮緊。咽乾口苦。腹滿而喘。發熱汗出不惡寒。反惡熱。身重。發其汗即躁。心憤憤反讞語。加溫鍼必怵惕煩躁。不得眠。下之即胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上胎者。梔子豉湯主之。若渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎湯主之。若脉浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。豬苓湯主之。

金匱玉函經

卷三

七

陽明病。汗出多而渴者。不可與豬苓湯。以汗多胃中燥。豬苓湯復利其小便故也。

脉浮而遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。若胃中虛冷。其人不能食。飲水即噦。脉浮發熱。口乾鼻燥。能食者。即衄。

陽明病。下之。其外有熱。手足溫。不結胸。心中懊憹。饑不能食。但頭汗出。梔子豉湯主之。

陽明病。發潮熱。大便溇。小便自可。而胸脅滿不

去者。小柴胡湯主之。

陽明病。脅下堅滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與小柴胡湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濈然汗出而解。

陽明中風。脉弦浮大。而短氣。腹都滿。脅下及心痛。久按之氣不通。鼻乾不得汗。其人嗜臥。一身及面目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。其外不解。病過十日。脉續浮者。與小

金匱玉函經

卷三

六

柴胡湯。但浮無餘證者。與麻黃湯。不渴。腹滿加喘者。不治。

陽明病。自汗出。若發其汗。小便自利。此為津液內竭。雖堅不可攻之。當須自欲大便。宜密煎導而通之。若土瓜根。豬膽汁。皆可為導。

陽明病。其脉遲。汗出多。而微惡寒者。表為未解。可發其汗。宜桂枝湯。

陽明病。脉浮。無汗。其人必喘。發其汗即愈。宜麻



黃湯主之。

陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗齊頸而還小便不利渴引水漿此為瘧熱在裏身必發黃茵陳湯主之  
陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘尿雖堅大便反易其色必黑抵當湯主之

金匱玉函經

卷三

五

攻其人腹微滿頭堅後溇者不可攻之若有燥尿者宜大承氣湯

病者五六日不大便繞臍痛躁煩發作有時此為有燥屎故使不大便也

病人煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者當下之脉浮虛者當發汗下之宜大承氣湯發汗宜桂枝湯

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有

燥屎所以然者本有宿食故也大承氣湯主之病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘胃不能臥者有燥屎故也大承氣湯主之  
食穀欲嘔者屬陽明吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦

金匱玉函經

卷三

三

便即堅不更衣十日無所苦也渴欲飲水者少少與之但以法救之渴者宜五苓散

脉陽微而汗出少者為自和汗出多者為太過陽脉實因發其汗出多者亦為太過太過者陽絕於內亡津液大便因堅

脉浮而芤浮則為陽芤則為陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕

跌陽脉浮而澁浮則胃氣強澁則小便數浮澁



相搏。大便則堅。其脾為約。麻子仁圓主之。

太陽病。三日。發其汗。不解。蒸蒸然發熱者。屬胃也。調胃承氣湯主之。

傷寒吐後。腹脹滿者。與調胃承氣湯。

太陽病。吐下發汗後。微煩。小便數。大便堅。可與小承氣湯和之愈。

得病二三日。脈弱。無太陽柴胡證。煩躁。心下堅。至四五日。雖能食。以小承氣湯少少與微和之。

金匱玉函經

卷三

三

令小安。至六日。與承氣湯一升。若不大便。六七日。小便少者。雖不能食。但頭堅。後澇未定。成堅攻之。必澇。須小便利。尿定。堅乃可攻之。宜大承氣湯。

傷寒。六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此為實。急下之。宜大承氣湯。

陽明病。發熱汗多者。急下之。宜大承氣湯。發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。

腹滿不減。減不足言。當下之。宜大承氣湯。

傷寒腹滿。按之不痛者為虛。痛者為實。當下之。舌黃未下者。下之黃自去。宜大承氣湯。

陽明與少陽合病。必下利。其脈不負者為順。負者為失。互相尅賊。名為負。若滑而數者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。

病人無表裏證。發熱七八日。脈雖浮數者。可下之。假令下已。脈數不解。合熱則消穀善饑。至六

金匱玉函經

卷三

三

七日。不大便者。有瘀血。宜抵當湯。若脈數不解而下不止。必挾熱便膿血。

傷寒。七八日。身黃如橘子色。小便不利。少腹微滿。茵陳蒿湯主之。

傷寒。身黃發熱。梔子檨皮湯主之。

傷寒。癉熱在裏。身必發黃。宜麻黃連軹赤小豆湯主之。

傷寒。發其汗已。身目為黃。所以然者。以寒溼相

搏在裏不解故也。以為非痧熱而不可下。當于寒溼中求之。

辨少陽病形證治第六

少陽之為病。口苦咽乾目眩也。

少陽中風。兩耳無聞。目赤胸中滿而煩。不可吐下。吐下即悸而驚。

傷寒。脉弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發

汗。發汗則譫語。此屬胃。胃和即愈。胃不和則煩

而悸。

金匱玉函經 卷三

三

而悸。

太陽病不解。轉入少陽者。脅下堅滿。乾嘔不能

食飲。往來寒熱。尚未吐下。其脉沉緊。與小柴胡

湯若已吐下。發汗溫鍼譫語。柴胡證罷。此為壞

病。知犯何逆。以法治之。

三陽合病。脉浮大。上關上。但欲寐。口合則汗

傷寒六七日。無大熱。其人躁煩。此為陽去入陰

也。

傷寒三日。三陽為盡。三陰當受邪。其人反能食而不嘔。此為三陰不受邪也。

少陽病欲解時。從寅盡辰。

金匱玉函經卷第三 終

金匱玉函經

卷三

三



金匱玉函經卷第四

辨太陰病形證治第七

太陰之為病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之。必胸下痞堅。

太陰病。脈浮者。可發其汗。宜桂枝湯。

太陰中風。四肢煩疼。陽微陰澁而長者。為欲愈。

太陰病欲解時。從亥盡丑。

自利不渴者。屬太陰。以其藏有寒故也。當溫之。

金匱玉函經

卷四

一

宜四逆輩。

傷寒脈浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。太陰當發身黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。雖暴煩。下利日十餘行。必自止。所以然者。此脾家實。腐穢當去也。

太陽病醫反下之。因爾腹滿時痛者。屬太陰也。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃湯主之。

主之。

太陰為病。脈弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。宜減之。其人胃氣弱。易動故也。下利先煎芍藥三沸。

辨少陰病形證治第八

少陰之為病。脈微細。但欲寐。

少陰病欲吐不吐。心煩但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰也。虛故引水自救。若其人小便色白者。為少陰病形悉具。所以然者。以下焦虛有寒。不能制溲。故白也。

少陰病。欲吐不吐。心煩但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰也。虛故引水自救。若其人小便色白者。為少陰病形悉具。所以然者。以下焦虛有寒。不能制溲。故白也。

金匱玉函經

卷四

二

病人脈陰陽俱緊。而反汗出。為亡陽。此屬少陰。法當咽痛。而復吐利。

少陰病。欬而下利。譫語者。被火氣劫故也。小便必難。為強責少陰汗也。

少陰病。脈細沉數。病為在裏。不可發其汗。

少陰病。脈微不可發汗。亡陽故也。陽已虛。尺中弱澁者。復不可下之。

少陰病。脈微不可發汗。亡陽故也。陽已虛。尺中弱澁者。復不可下之。

少陰病。脈緊至七八日。自下利。其脈暴微。手足

反溫脉緊去此為欲解雖煩下利必自愈

少陰病下利若利自止惡寒而蹠手足溫者可治

少陰病惡寒而蹠時自煩欲去衣被者可治

少陰中風脉陽微陰浮為欲愈

少陰病欲解時從子盡寅

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者灸少陰七壯

三

三

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治

少陰病惡寒身蹠而利手足逆冷者不治

少陰病下利止而頭眩時時自胃者死

少陰病吐利煩躁四逆者死

少陰病四逆惡寒而身蹠脉不至不煩而躁者死

死

少陰病六七日息高者死

少陰病脉微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐五六日自利復煩躁不得臥寐者死

少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯主之

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗

少陰病得之二三日已上心中煩不得臥黃連

阿膠湯主之

金匱玉函經 卷四

四

以二三日無裏證故微發汗

少陰病得之二三日已上心中煩不得臥黃連

阿膠湯主之

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸

之附子湯主之

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉一作微者附

子湯主之

少陰病下利便膿血桃花湯主之



少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止而使膿血桃花湯主之

少陰病下利便膿血者可刺

少陰病吐利而手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

少陰病下利咽痛胸滿心煩豬膚湯主之

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯

金匱玉函經

卷四

五

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

少陰病下利白通湯主之

少陰病下利脉微服白通湯利不止厥逆無脉

乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服湯脉暴出者死微續者生

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利

四肢沉重疼痛而利此為有水氣其人或欬或小便自利或下利或嘔者真武湯主之

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或

咽痛或利止而脉不出通脉四逆湯主之

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者

金匱玉函經

卷四

六

豬苓湯主之

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

少陰病下利清水色純青心下必痛口乾燥者

急下之宜大承氣湯

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

少陰病脉沉者急温之宜四逆湯

少陰病。飲食入口即吐。心下噎噎欲吐復不能吐。始得之手足寒。脉弦遲者。此胸中實不可下也。當吐之。若膈上有寒飲乾嘔者不可吐。急温之。宜四逆湯。

少陰病。下利。脉微澁。嘔而汗出。必數更衣反少者。當温其上灸之。脉經云。灸厥陰五十壯。

辨厥陰病形證治第九

厥陰之為病消渴。氣上撞心。心中疼熱。饑不欲

食。甚者食則吐衄。下之不肯止。

金匱玉函經

卷四 七

厥陰中風。其脉微浮。為欲愈。不浮為未愈。

厥陰病欲解時。從丑盡卯。

厥陰病。渴欲飲水者。少少與之即愈。

辨厥利嘔噦病形證治第十

諸四逆厥者。不可下之。虛家亦然。

傷寒。先厥後發熱而利者。必自止。見厥復利。

傷寒。始發熱。六日厥反。九日而利。凡厥利者。當

不能食。今反能食。恐為除中。食以索餅。不發熱者。知胃氣尚在。必愈。恐暴熱來出而復去也。後三日脉之。其熱續在。期之。旦日夜半愈。後三日脉之而數。其熱不罷。此為熱氣有餘。必發癰膿。傷寒脉遲。六七日而反與黃芩湯。徹其熱。脉遲為寒。而與黃芩湯。復除其熱。腹中應冷。當不能食。今反能食。此為除中。必死。

傷寒。先厥後發熱。下利必自止。而反汗出。咽中

金匱玉函經

卷四

八

痛者。其喉為痺。發熱無汗。而利必自止。不止者。必便膿血。便膿血者。其喉不痺。

傷寒。一二日至四五日而厥者。必發熱。前熱者

後必厥。厥深者熱亦深。厥微者熱亦微。厥應下

之。而反發其汗。必口傷爛赤。

凡厥者。陰陽氣不相順接。便為厥。厥者手足逆冷是也。

傷寒病。厥五日。熱亦五日。設六日當復厥。不厥



者自愈。厥終不過五日以熱五日故知自愈。  
傷寒脉微而厥。至七八日膚冷其人躁無暫安  
時者。此爲藏厥。非虵厥也。虵厥者其人當吐虵  
今病者靜而復時煩。此爲藏寒。虵上入膈故煩。  
須臾復止。得食而嘔。又煩者。虵聞食臭。出其人  
當自吐虵。虵厥者。烏梅圓主之。

傷寒熱少厥微。指頭寒。嘿嘿不欲食。煩躁數日  
小便利。色白者。此熱除也。欲得食其病爲愈。若

金匱玉函經

卷四

九

厥而嘔。胃脅煩滿者。其後必便血。

病者手足厥冷。言我不結胸。小腹滿。按之痛者。  
此冷結在膀胱關元也。

傷寒發熱四日。厥反三日。復熱四日。厥少熱多。  
其病當愈。四日至七日熱不除。必清膿血。

傷寒厥四日。熱反三日。復厥五日。其病爲進。寒  
多熱少。陽氣退。故爲進。

傷寒六七日。其脉微。手足厥冷。煩躁灸厥陰。厥

不還者死。

傷寒發熱。下利厥逆。躁不得臥者死。

傷寒六七日。不便利。忽發熱而利。其人汗出不  
止者死。有陰無陽故也。

傷寒五六月。不結胸。腹濡。脉虛。復厥者。不可下。  
此爲亡血。下之死。

傷寒發熱而厥。七日下利者。爲難治。

傷寒脉促。手足厥逆者。可灸之。

金匱玉函經

卷四

十

傷寒脉滑而厥者。裏有熱也。白虎湯主之。

手足厥寒。脉爲之細絕。當歸四逆湯主之。若其  
人內有久寒。當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。  
大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利。厥逆而  
惡寒者。四逆湯主之。

大汗出。若大下利而厥冷者。四逆湯主之。

表熱裏寒者。脉雖沉而遲。手足微厥。下利清穀。  
此裏寒也。所以陰證亦有發熱者。此表熱也。

表寒裏熱者脉必滑身厥舌乾也所以少陰惡寒而倦此表寒也時時自煩不欲厚衣此裏熱也

病者手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散傷寒厥而心下悸者宜先治水當與茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

傷寒六七日大下後寸脉沉遲手足厥逆下部

金匱玉函經

卷四

十一

脉不至咽喉不利唾膿血洩利不止者為難治麻黃升麻湯主之

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者為欲自利也

傷寒本自寒下醫復吐之寒格更逆吐下食入即出者乾薑黃芩黃連湯主之

下利有微熱而渴脉弱者自愈

下利脉數有微熱汗出者自愈設復緊為未解

下利手足厥冷無脉者灸之不温而脉不還反微喘者死

少陰負跌陽者為順也

下利寸脉反浮數尺中自澁者必清膿血

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

下利脉沉弦者下重脉大者為未止脉微弱數者為欲自止雖發熱不死

下利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清

金匱玉函經

卷四

十二

穀必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其而戴陽下虛故也

下利脉反數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也

下利後其脉絕手足厥時脉還手足温者生不還不温者死

傷寒下利日十餘行脉反實者死

下利清穀裏寒外熱汗出而厥通脉四逆湯主



之。

熱利下重白頭翁湯主之

下利腹脹滿身體疼痛先溫其裏乃攻其表溫

裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

下利欲飲水為有熱也白頭翁湯主之

下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯

下利後更煩按之心下濡者為虛煩也梔子豉湯主之

金匱玉函經

卷四

五

嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

嘔而發熱者小柴胡湯主之

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四

逆湯主之

乾嘔吐涎沫而復頭痛吳茱萸湯主之

傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外

氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者

胃中寒冷故也

傷寒噦而腹滿問其前後知何部不利利之即愈

辨霍亂病形證治第十一

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂

問曰病發熱頭痛身疼惡寒不復吐利當屬何

病答曰當為霍亂吐下利止復更發熱也

傷寒其脈微澁本是霍亂今是傷寒却四五日

至陰經上轉入陰當利本素嘔下利者不治若

金匱玉函經

卷四

六

其人似欲大便但反失氣而仍不利是為屬陽

明便秘堅十三日愈所以然者經盡故也

下利後便當堅堅則能食者愈今反不能食至

後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈

若不愈不屬陽明也

惡寒脈微而復利利止亡血也四逆加人參湯

主之

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水五苓散主

之寒多不用水者理中湯主之

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂

枝湯小和之

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四

逆湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀裏寒

外熱脉微欲絕者四逆湯主之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕

金匱玉函經

卷四

五

者通脉四逆加豬膽汁湯主之

辨陰陽易差後勞復病形證治第十二

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏

急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中

生花眼胞赤膝脛拘急燒視散主之

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食

者加大黃如博碁子大五六枚

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脉浮者

以汗解之脉沉實者以下解之

大病差後從腰以下有水氣牡蠣澤瀉散主之

大病差後其人喜唾久不了了者胃上有寒當

温之宜理中圓

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主

之

傷寒脉已解而日暮微煩者以病新差人強與

穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀即愈

金匱玉函經

卷四

六

吐下發汗後其人脉平而小煩者此新虛不勝

穀氣故也

病後勞復發熱者麥門冬湯主之

金匱玉函經卷第四

終



金匱玉函經卷第五

漢仲景張機著

上海陳世傑懷三重校

晉王叔和撰次

門人張邵有文參

宋林億等校正

平江余謙牧心恭重校

門人張嵩峻天閱

辨不可發汗病形證治第十三

夫以為疾病至急，倉猝尋按要者，難得故重集諸可與不可方治。比之三陰三陽篇中，此易見

金匱玉函經

卷五

一

也。又時有不止，是三陰三陽出在諸可與不可中也。

少陰病，脉細沉數，病為在裏，不可發其汗。

脉浮而緊，法當身體疼痛，當以汗解，假令尺中

脉遲者，不可發其汗，何以故此為榮氣不足，血

氣微少故也。

少陰病，脉微不可發其汗，亡陽故也。

脉濡而弱，弱反在關，濡反在巔，微反在上，澁反

在下。微則陽氣不足，澁則無血，陽氣反微，中風

汗出而反躁煩，澁則無血，厥而且寒，陽微發汗

躁不得眠。

動氣在右，不可發汗，發汗則衄而渴，心苦煩，飲

即吐水。

動氣在左，不可發汗，發汗則頭眩，汗不止，筋惕

肉瞤。

動氣在上，不可發汗，發汗則氣上衝心。

金匱玉函經

卷五

二

動氣在下，不可發汗，發汗則無汗，心中大煩，骨

節苦疼，目運惡寒，食則反吐，穀不得前。一云穀不消化

咽中閉塞，不可發汗，發汗則吐血，氣微絕，手足

逆冷，雖欲蹠臥，不能自溫。

諸脉數動微弱，並不可發汗，發汗則小便反難。

胞中反乾，胃燥而煩，其形相象，根本異源。

脉濡而弱，弱反在關，濡反在巔，弦反在上，微反

在下，弦為陽運，微為陰寒，上實下虛，意欲得溫。

微弦為虛不可發汗發汗則寒慄不能自還

欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中

飢煩晬時而發其形似瘡有寒無熱虛而寒慄

欬而發汗蹇而苦滿腹中復堅

厥而脉緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎其

聲不能出

諸逆發汗微者難愈劇者言亂睛眩者死命將

難治

金匱玉函經

卷五

三

太陽病得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多

寒少其人不嘔清便續自可一日再三發其脉

微而惡寒者此為陰陽俱虛不可復發其汗

太陽病發熱惡寒寒多熱少脉微弱則無陽也

不可復發其汗

咽喉乾燥者不可發其汗

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振

衄家不可攻其表汗出則額陷脉上促急而緊

直視而不能眴不得眠

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼可與

禹餘糧圓

淋家不可發汗發汗必便血

瘡家雖身疼痛不可攻其表汗出則瘡

冬溫發其汗必吐利口中爛生瘡

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

欬而小便利若失小便者不可攻其表汗出則

金匱玉函經

卷五

四

厥逆冷

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後

必熱厥深熱亦深厥微熱亦微熱應下之而發

其汗者必口傷爛赤

傷寒頭痛翁翁發熱形象中風常微汗出又自

嘔者下之益煩懊懣如飢發汗即致瘥身強難

以屈伸熏之即發黃不得小便灸即發欬唾

傷寒其脉弦細頭痛發熱此為屬少陽少陽不



可發其汗

中風往來寒熱傷寒五六日已後胸脇苦滿嘿  
嘿不欲食飲煩心喜嘔或胸中煩而不嘔或渴  
或腹中痛或脇下痞堅或心中悸小便不利或  
不渴外有微熱或欬屬小柴胡湯證

傷寒四五日身體熱惡風頸項強脇下滿手足  
溫而渴屬小柴胡湯

傷寒六七日發熱微惡風支節煩疼微嘔心下

金匱玉函經

卷五

五

支結外證未去者屬柴胡桂枝湯證

太陽病發其汗因致瘥

太陽與少陽併病頭項強痛或眩時如結胸心  
下痞而堅不可發其汗

少陰病欬而下利譏語是為被火氣劫故也小  
便必難以強責少陰汗也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從  
何道出或從口鼻或從耳目出是為下厥上竭

為難治

傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脈異經  
病雖俱傷于風其人自有固疾則不得同法其  
人素傷風因復傷于熱風熱相薄則發風溫四  
肢不收頭痛身熱常汗出不解治在少陰厥陰  
不可發汗汗出譫語獨語內煩燥擾不得臥善  
驚目亂無精治之復發其汗如此者醫殺之也  
傷寒溼溫其人常傷于溼因而中暍溼熱相薄

金匱玉函經

卷五

六

則發溼溫病若兩脛逆冷腹滿又胸頭目痛苦  
妄言治在足太陰不可發汗汗出必不能言耳  
聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此者  
醫殺之也

辨可發汗病形證治第十四

凡發汗欲令手足俱周熱然一時間許益佳  
不可令如水流漓若病不解當重發汗汗多必  
亡陽陽虛不得重發汗也

凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也

凡云可發汗無湯者圓散亦可要以汗出為解然不如湯隨證良驗

大法春夏宜發汗

太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯

太陽病脉浮而數者可發汗宜桂枝湯一云麻黃湯

金匱玉函經

卷五

七

陽明病其脉遲汗出多而微惡寒表為未解可發其汗宜桂枝湯

夫病脉浮大問病者言但堅耳設利者為虛大逆堅為實汗出而解何以故脉浮當以汗解

傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脉浮解之當汗出愈

病者煩熱汗出則解復如瘧狀日晡發熱者屬

陽明脉浮虛者當發其汗宜桂枝湯

病常自汗出此為營氣與衛氣不和也營行脉中為陰主內衛行脉外為陽主外復發其汗衛和則愈宜桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出不愈此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯

脉浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷營營衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

金匱玉函經

卷五

八

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血必自下下者即愈其外未解尚未可攻當先解其外宜桂枝湯

太陽病下之微喘者表未解故也宜麻黃湯又云桂枝加厚朴杏子湯

傷寒脉浮緊不發其汗因衄宜麻黃湯

陽明病脉浮無汗其人必喘發其汗即愈宜麻黃湯

太陽病脉浮者可發其汗宜桂枝湯



太陽脉浮緊。無汗而發熱。其身疼痛。八九日不解。其表候續在。此當發其汗。服湯藥微除發煩。目眩。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。宜麻黃湯。

傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。不可與承氣湯。其小便清者。此為不在裏。仍在表也。當發其汗。頭痛者必衄。宜桂枝湯。

下利腹脹滿。身體疼痛。先溫其裏。乃攻其表。宜

金匱玉函經

卷五

九

桂枝湯

下利後。身體疼痛。清便自調。急當救表。宜桂枝湯。

太陽病。頭痛發熱。汗出惡風。屬桂枝湯證。

太陽中風。脉陽浮而陰濡弱。浮者熱自發。濡弱者汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翁翁發熱。鼻鳴乾嘔。屬桂枝湯。

太陽病。發熱汗出。此為營弱衛強。故使汗出欲

救邪風。屬桂枝湯證。

太陽病。下之其氣上撞。屬桂枝湯證。

太陽病。初服桂枝湯而反煩不解者。當先刺風池風府。乃與桂枝湯則愈。

燒針令其汗。針處被寒核起而赤者。必發背。氣從小腹上撞心者。灸其核上各一壯。却與桂枝加桂湯。

太陽病。項背強几几。反汗出惡風者。屬桂枝加

金匱玉函經

卷五

十

葛根湯

太陽病。項背強几几。無汗惡風。屬葛根湯。

太陽與陽明合病。而自利。屬葛根湯證。不利但嘔者。屬葛根加半夏湯證。

太陽病。桂枝證。而反下之。遂利不止。其脉促。表未解。喘而汗出。屬葛根黃芩黃連湯證。

太陽病。頭痛發熱。身體疼。腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗而喘。屬麻黃湯證。

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下也屬麻黃湯證

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁頭痛屬大青龍湯證脉微弱汗出惡風不可服之服之則厥筋惕肉瞤此為逆也

陽明中風脉弦浮大而短氣腹滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗其人嗜臥一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之

金匱玉函經

卷五

七

小差其外不解病過十日脉續浮與柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯不溺腹滿加噦者不治

太陽病十日已去其脉浮細嗜臥此為外解設胸滿脇痛與小柴胡湯脉浮麻黃湯

傷寒脉浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰證者可與大青龍湯發之

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴者此為寒去為欲解屬小青龍湯證

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗脉浮小便不利微熱消渴可與五苓散利小便發汗

辨不可吐病形證治第十五

太陽病當惡寒而發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脉細而數者此醫吐之故也若得病一日二日吐之者腹中飢口不能食三日四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐此醫吐之

金匱玉函經

卷五

七

所致也此為小逆

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也

少陰病其人飲食入口即吐心中噉噉欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當溫之

諸四逆厥者不可吐之虛家亦然

辨可吐病形證治第十六



凡服湯吐。中病便止。不必盡劑也。

大法春宜吐。

病如桂枝證其頭不痛項不强寸口脉微浮胸中痞堅氣上撞咽喉不得息此為胸有寒當吐之

病胃上諸實胸中鬱鬱而痛不能食欲使人按之。而反有涎沫唾下利日十餘行其脉反遲寸口微滑。此可吐之吐之利則止

金匱玉函經

卷五

三

少陰病其人飲食入則吐心中噓噓欲吐復不能吐當遂吐之

宿食在上脘當吐之

病者手足逆冷脉乍緊邪結在胸中心下滿而煩飢不能食病在胸中當吐之

辨不可下病形證治第十七

脉濡而弱濡反在關弱反在巔微反在上澁反在下微則陽氣不足澁則無血陽氣反微中風

汗出而反躁煩澁則無血厥而且寒陽微不可

下下之則心下痞堅

動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸

動氣在左不可下下之則腹裏拘急食不下動氣反劇身雖有熱臥反欲蹠

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲水自灌

金匱玉函經

卷五

四

動氣在下不可下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞堅

咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下

臥則欲蹠身體急痛復下利日數十行

諸外實者不可下下之則發微熱亡脉則厥當臍握熱

諸虛者不可下下之則渴引水者易愈惡水者劇

脉濡而弱。弱反在關。濡反在巔。弦反在上。微反在下。弦為陽運。微為陰寒。上實下虛。意欲得溫。微弦為虛。虛者不可下。微則為欬。欬則吐涎沫。下之欬則止而利。不休胸中如蟲齧。粥入則出。小便不利。兩脇拘急。喘息為難。脛背相牽。臂則不仁。極寒反汗出。軀冷若冰。眼睛不慧。語言不休。穀氣多入。則為除中。口雖欲言。舌不得前。脉濡而弱。弱反在關。濡反在巔。浮反在上。數反

金匱玉函經

卷五

五

在下。浮則為陽虛。數則為無血。浮則為虛。數則生熱。浮則為虛。自汗而惡寒。數則為痛。振而寒。慄微弱。在關。心下為急。喘汗不得呼吸。呼吸之中。痛在於脇。振寒相搏。其形如癰。醫反下之。令脉急。數發熱狂走。見鬼。心下為痞。小便淋漓。小腹甚堅。小便血也。

脉濡而緊。濡則陽氣微。緊則營中寒。陽微衛中風。發熱而惡寒。營緊胃氣冷。微嘔。心內煩。醫以

為大熱。解肌發其汗。亡陽虛煩躁。心下苦痞堅。表裏俱虛竭。卒起而頭眩。客熱在皮膚。悵快不得眠。不知胃氣冷。緊寒在關。元技巧無所施。汲水灌其身。客熱應時罷。慄慄而振寒。重被而覆之。汗出而胃巔體惕。而又振小便。為微難。寒氣因水發。清穀不容。間嘔吐反腸。出顛倒不得安。手足為微逆。身冷而內煩。遲欲從後救。安可復追還。

金匱玉函經

卷五

六

脉浮而大。浮為氣實。大為血虛。血虛為無陰。孤陽獨下。陰部小便難。胞中虛。今反小便利。而大汗出。法應衛家當微。今反更實。津液四射。營竭血盡。乾煩不得眠。血薄肉消。而成暴液。醫復以毒藥攻其胃。此為重虛。客陽去。有期必下。如汚泥而死。

跌陽脉遲而緩。胃氣如經也。跌陽脉浮而數。浮則傷胃。數則動脾。此非本病。醫特下之所為也。



營衛內陷。其數先微。脉反但浮。其人必大便堅。氣噫而除。何以言之。脾脉本緩。今數。脉動脾。其數先微。故知脾氣不治。大便堅。氣噫而除。今脉反浮。其數改微。邪氣獨留心中。則飢邪熱不殺。穀潮熱發渴。數脉當遲緩。脉因前後度數如法。病者則飢數。脉不時則生惡瘡也。脉數者久數不止。止則邪結。血氣不能復正。氣却結於藏。故邪氣浮之。與皮毛相得。脉數者不

金匱玉函經

卷五

七

可下下之必煩利不止

少陰病。脉微不可發其汗。無陽故也。陽已虛。尺中弱澁者。復不可下之。

脉浮大宜發汗。醫反下之。此爲大逆。

脉浮而大。心下反堅。有熱屬藏者。攻之不令發汗。屬府者。不令洩數。洩數則大便堅。汗多卽熱愈。汗少則便難。脉遲尙未可攻。

二陽併病。太陽初得病時發其汗。汗先出復不

微。因轉屬陽明。欲自汗。不惡寒。若太陽證不罷。不可下。下之爲逆。

結胃證。其脉浮大。不可下。下之卽死。

太陽與陽明合病。喘而胸滿。不可下。下之卽死。太陽與少陽合病。心下痞堅。頭項強而眩。勿下之。

諸四逆厥者。不可下之。虛家亦然。

病欲吐者。不可下之。

金匱玉函經

卷五

六

太陽病有外證未解。不可下。下之爲逆。

夫病發于陽而反下之。熱入因作結胸。發于陰而反下之。因作痞。

脉浮緊而下之。緊反入裏。則作痞。

夫病陽多者。熱下之則堅。

本虛攻其熱。必噦。

無陽陰強而堅。下之必清穀而腹滿。

太陰之爲病。腹滿而吐。食不下。下之益甚。腹時

自痛胸下痞堅

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼痛熱飢而不欲食甚者則欲吐下之不肯止

少陰病其人飲食入則吐心中噎噎欲吐復不能吐始得之手足寒脉遲此胸中實不可下之

傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下下之亡血死

傷寒發熱但頭痛微汗出發其汗則不識人熏

金匱玉函經

卷五

九

之則喘不得小便心腹滿下之短氣而腹脹小便難頭痛背強加溫針則必衄

傷寒其脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥厥者

脉初來大漸漸小更來漸大是其候也惡寒甚

者翕翕汗出喉中痛熱多者目赤睛不慧醫復

發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多清殺

熱多便膿血熏之則發黃熨之則咽燥小便利

者可救難者危殆

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制

貪水者必嘔惡水者厥下之咽中生瘡假令手

足溫者下重便膿血頭痛目黃者下之目閉貪

水者下之其脉必厥其聲嚶咽喉塞發其汗則

戰慄陰陽俱虛惡水者下之裏冷不嗜食大便

完穀出發其汗口中傷舌上胎滑煩躁脉數實

不大便六七日後必便血發其汗小便即自利

得病六七日小便少者雖不大便但頭堅後溏

金匱玉函經

卷五

十

未必其成堅攻之必溏當須小便利定堅乃可攻之

藏結者無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎

滑者不可攻也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之若

不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承

氣湯若腹中轉矢氣者為有燥屎乃可攻之若



不轉矢氣者此為但頭堅後溏不可攻之攻之必腹滿不能食欲飲水者必噦其後發熱者必復堅以小承氣湯和之若不轉矢氣者慎不可攻之

陽明病面合赤色者不可攻之必發熱色黃者小便不利也

陽明病當心下堅滿不可攻之攻之利遂不止者死止者生

金匱玉函經

卷五

三

陽明病自汗出若發其汗小便自利此為津液內竭雖堅不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根猪膽汁皆可以導

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔而煩不能得安醫見心下痞為病不盡復重下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使之堅屬甘草瀉心湯證

下利其脉浮大此為虛以強下之故也設脉浮革因爾腸鳴屬當歸四逆湯證

辨可下病形證治第十八

凡服下藥用湯勝圓中病即止不必盡劑大法秋宜下

陽明病發熱汗多者急下之宜承氣湯一云大柴胡湯少陰病得之二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯

金匱玉函經

卷五

三

少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯

少陰病下利清水色青者心下必痛口乾燥者可下之宜大柴胡湯承氣湯

下利三部脉皆平一云浮按其心下堅者可下之宜承氣湯

下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜承氣湯

陽明與少陽合病而利不負者為順負者失也  
互相尅賊為負

脈滑而數者有宿食也當下之宜大柴胡湯承  
氣湯

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脈浮大  
按之反澁尺中亦微而澁故知有宿食當下之  
宜承氣湯

下利不欲食者有宿食也當下之宜承氣湯

全書三函經

卷五

三

下利已瘥至其年月日時復發者此為病不盡  
故也復當下之宜承氣湯

下利脈反滑當有所去下之乃愈宜承氣湯

病腹中滿痛者為實當下之宜大柴胡湯

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡湯承氣

湯

傷寒後脈沉實沉實者下之解宜大柴胡湯

傷寒六七日日不了了睛不和無表裏證大便

難微熱者此為實急下之宜大柴胡湯承氣湯  
太陽病未解其脈陰陽俱停必先振汗出而解  
但陽脈微者先汗之而解陰脈微者先下之而  
解宜承氣湯一云大柴胡湯

脈雙弦而遲心下堅脈大而堅者陽中有陰也  
可下之宜承氣湯

結胃者項亦強如柔痙狀下之即和宜陷胸圓  
病者無表裏證發熱七八日脈雖浮數可下之

全書玉函經

卷五

舌

宜大柴胡湯

太陽病六七日表證續在其脈微沉反不結胸

其人發狂此熱在下焦小腹當堅而滿小便自

利者下血乃愈所以然者太陽隨經瘀熱在裏

故也屬抵當湯證

太陽病身黃其脈沉結小腹堅小便不利為無

血也小便自利其人如狂者血證諦也屬抵當

湯

一三〇〇〇 子部醫家類 卷五 三



傷寒有熱而小腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之宜抵當圓

陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出其身無有齊頸而還小便不利渴飲水漿此爲瘀熱在裏身必發黃屬茵陳蒿湯證

陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘尿雖堅大便必黑屬抵當證

汗出而譫語者有燥屎在胃中此爲風也過經

金匱玉函經

卷五

五

乃可下之下之若早譫語而亂以表虛裏實故也下之則愈宜大柴胡湯承氣湯

病者煩熱得汗出卽解復如瘧狀日晡所發熱者屬陽明脉實者當下之宜大柴胡湯承氣湯陽明病譫語有潮熱而反不能食者必有燥屎五六枚若能食者但堅耳屬承氣湯

下利而譫語者爲有燥屎也屬承氣湯

得病二三日脉弱無太陽柴胡證而煩心下堅

至四日雖能食以承氣湯少與微和之令小安至六日與承氣湯一升不大便六七日小便少者雖不能食但頭堅後溇未定其成堅攻之必溇當須小便利定堅乃可攻之宜大柴胡湯承氣湯

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人藜藜汗出發作有時頭痛心下痞堅滿引脇下痛嘔卽短氣不惡寒此爲表解裏未和屬十棗湯證

金匱玉函經

卷五

五

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者卽愈其外不解尙未可攻當先解其外外解小腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利小腹微滿屬茵陳湯證

傷寒發熱汗出不解後心中痞堅嘔而利者屬大柴胡湯證

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱屬大柴胡

湯證但結胸無大熱此為水結在胸脇頭微汗出屬大陷胸湯證

傷寒六七日結胸熱實其脉沉緊心下痛按之如石堅屬大陷胸湯證

陽明病其人汗多津液外出胃中燥大便必堅堅者則讞語屬承氣湯證

陽明病不吐下而心煩者屬承氣湯證

陽明病其脉遲雖汗出而不惡寒其體必重短

金匱玉函經

卷五

七

氣腹滿而喘有潮熱如此者其外為解可攻其裏若手足濇然汗出此大便已堅承氣湯主之其熱不潮腹大滿而不大便者屬小承氣湯微和其胃氣勿令至大下

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之言不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中轉矢氣者為有燥屎乃可攻之

陽明病讞語妄言發潮熱其脉滑疾如此者承

氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉矢氣者復

與一升如不轉矢氣者勿與之明日又不大便

脉反微濇此為裏虛為難治不可復與承氣湯

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛此有燥

屎所以然者本有宿食故也屬承氣湯證

病者小便不利大便乍難乍易時有微熱怫鬱

不能臥有燥屎故也屬承氣湯證

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳絳汗出

金匱玉函經

卷五

七

大便難而讞語者下之即愈宜承氣湯

金匱玉函經卷第五

終



金匱玉函經卷第六

辨發汗吐下後病形證治第十九

發汗後水藥不得入口為逆

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

未持脉時病人叉手自冒心師因教試令欬而

不即欬者此必兩耳無所聞也所以然者重發

汗虛故也

發汗後身熱又重發其汗胸中虛冷必反吐也

金匱玉函經

卷六

一

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不

徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證

不罷者不可下之下之為逆如此者可小發其

汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之

熏之若發汗不大徹不足言陽氣怫鬱不得越

當汗而不汗其人燥煩不知痛處乍在腹中乍

在四肢按之不可得其人短氣但坐汗出而不

徹故也更發其汗即愈何以知其汗出不徹以

脉澁故知之

陽明病本自汗出醫復重發其汗病已瘥其人

微煩不了了此大便堅也以亡津液胃中燥故

令其堅當問小便日幾行若本日三兩行今日

再行者故知大便不久出今為小便數少津液

當還入胃中故知必當大便也

大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治之

其小便利必自愈

金匱玉函經

卷六

二

病人脉數數為熱當消穀引食而反吐者以醫

發其汗陽氣微膈氣虛脉則為數數為客熱不

能消穀胃中虛冷故吐也

病者有寒復發其汗胃中冷必吐衄

傷寒發其汗身目為黃所以然者寒濕相搏在

裏不解故也

發汗後重發其汗亡陽譫語其脉反和者不死

傷寒發汗已解半日許復煩其脉浮數可復發

其汗宜桂枝湯

傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者表未解

也不可攻其痞當先解表表解乃可攻其痞解

表宜桂枝湯攻痞宜大黃瀉心湯

發其汗反躁無表證者宜大柴胡湯

服桂枝湯大汗出若脈但洪大者與桂枝湯若

其形如瘧狀一日再發汗出便解與桂枝二麻

黃一湯

金匱玉函經

卷六

三

服桂枝湯大汗出大煩渴不解若脈洪大屬白

虎湯證

太陽病發其汗遂漏不止其人惡風小便難四

肢微急難以屈伸屬桂枝加附子湯證

發汗不解腹滿痛者急下之宜承氣湯一云大

柴胡湯

發汗後身體疼痛其脈沉遲屬桂枝加芍藥生

薑人參湯證

太陽病發其汗而不解其人發熱心下悸頭眩

身瞤而動振振欲僻地者屬玄武湯證

發汗後其人臍下悸欲作賁脈屬茯苓桂枝甘

草大棗湯證

發汗過多以後其人叉手自冒心心下悸而欲

得按之屬桂枝甘草湯證

發汗後腹脹滿屬厚朴生姜半夏甘草人參湯

發其汗不解而反惡寒者虛故也屬甘草附子

金匱玉函經

卷六

四

湯證

不惡寒但熱者實也當和其胃氣屬小承氣湯

太陽病發汗後大汗出胃中乾燥煩不得眠其

人欲飲水當稍飲之令胃中和即愈

太陽病三日發其汗不解蒸蒸發熱者屬調胃

承氣湯

傷寒脈浮自汗出小便數煩復微惡寒而脚攣

急反與桂枝湯欲攻其表得之便厥咽燥乾煩



吐逆作甘草乾薑湯以復其陽厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸而胃氣不和譏語可與承氣湯重發汗復加燒針者屬四逆湯傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴而利屬生薑瀉心湯傷寒五六日其人已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱而煩此爲未解柴胡桂枝乾薑湯證

金匱玉函經

卷六

五

陽明病汗出若復發其汗小便自利此爲津液內竭雖堅不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根猪膽汁皆可以導凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者必自愈傷寒大吐下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上撞胸起則頭眩其脉沉緊發汗卽動經身爲振搖屬茯苓桂枝白朮甘草湯證

發汗吐下以後不解煩躁屬茯苓四逆湯證發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹屬梔子湯若少氣梔子甘草湯若嘔者梔子生姜湯證

傷寒下後煩而腹滿臥起不安屬梔子厚朴湯

金匱玉函經

卷六

六

傷寒吐下發汗虛煩脉甚微八九日心下痞堅脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿

傷寒發汗吐下解後心下痞堅噫氣不除者屬旋覆代赭湯證

太陽病吐下發汗後而微煩小便數大便因堅可與小承氣湯和之則愈

太陽病不解轉入少陽脇下堅滿乾嘔不能食

往來寒熱尚未吐下其脉沉緊可與小柴胡湯  
若已吐下發汗溫針柴胡湯證罷此為壞病知  
犯何逆以法治之

吐利發汗其人脉平而小煩此新虛不勝穀氣  
故也

下已後發其汗必振寒又其脉微細所以然者  
內外俱虛故也

發汗若下之煩熱胸中塞者屬梔子湯證

金匱玉函經

卷六

七

下以後復發其汗者則晝日煩躁不眠夜而安  
靜不嘔不渴而無表證其脉沉微身無大熱屬  
附子乾薑湯證

大汗出若大下利厥者屬四逆湯證

太陽病先下而不愈因復發其汗表裏俱虛其  
人因冒冒家當汗出愈所以然者汗出表和故  
也表和故下之

太陽病先發汗不解而下之其脉浮不愈浮為

在外而反下之故不愈今脉浮故在外當解其  
外則愈宜桂枝湯

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下  
支結外證未去者屬柴胡桂枝湯證

發汗多亡陽狂語者不可下可與柴胡桂枝湯  
和其營衛以通津液後自愈

太陽病醫發其汗遂發熱惡寒復下之則心下  
痞堅表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加

金匱玉函經

卷六

八

火針因而煩面色青黃膚暍如此者為難治今  
色微黃手足溫者易愈

夫病陽多熱下之則堅汗出多極發其汗亦堅  
太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上  
燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹堅滿  
而痛不可近屬大陷胸湯證

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而垢譫  
語遺溺發汗則譫語下之則額上生汗手足厥



冷自汗屬白虎湯證

傷寒服湯藥而下利不止心下痞服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦與赤石脂禹餘糧湯若不止者當利其小便

傷寒醫以圓藥下之身熱不去微煩屬梔子乾姜湯證

傷寒中風柴胡湯證具而以他藥下之若柴胡

金匱玉函經

卷六

九

湯證不罷復與柴胡湯必蒸蒸而振却發汗出而解此雖已下不為逆也若心下滿而堅痛者此為結胸屬大陷胸湯證若但滿而不痛者此為痞柴胡不復中與也屬半夏瀉心湯證得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫醫再三下之不能多其人脇下滿面目及身黃頭項強小便難與柴胡湯後必下重渴飲水而嘔柴胡不復中與也食穀則噦

病者無表裏證發熱七八日脉雖浮數者可下

之假令已下脉數不解而合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血屬抵當湯證若脉數不解而下不止必挾熱便膿血

脉浮數法當汗出而愈而下之則體重心悸者不可發其汗當自汗出而解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液和自汗出愈

陽明病其脉浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗

金匱玉函經

卷六

十

出而不惡寒反偏惡熱其身體重發其汗即燥心憤憤而反譏語加溫針必怵惕煩躁不得眠下之即胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者屬梔子湯證若渴欲飲水口乾舌燥者與白虎湯若脉浮發熱渴欲飲水小便不利與猪苓湯

發汗已後不可更與桂枝湯汗出而喘無大熱屬麻黃杏子石膏甘草湯證



病人脉微而濇者。此為醫所病也。大發其汗。又數大下之。其人亡血。病當惡寒。而發熱無休止。時夏月盛熱而欲着複衣。冬月盛寒而欲裸其體。所以然者。陽微即惡寒。陰弱即發熱。此醫發其汗。使陽氣微。又大下之。令陰氣弱。五月之時。陽氣在表。胃中虛冷。陽氣內微。不能勝冷。故欲着複衣。十一月之時。陽氣在裏。胃中煩熱。陰氣內弱。不能勝熱。故欲裸其體。又陰脉遲澁。故知

金匱玉函經

卷六

十一

亡血也

傷寒吐後腹滿者。屬承氣湯證

傷寒本自寒下。醫復吐下之。寒格更逆。吐食入

即出。屬乾薑黃芩黃連人參湯證

傷寒吐下七八日。不解。熱結在裏。表裏俱熱。時

時惡風。大渴。舌上乾燥。而煩。欲飲水。數升。屬白

虎湯證

傷寒吐下後未解。不大便五六日至十餘日。其

人日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼神之狀。若劇者。發則不識人。循衣妄撮。怵惕不安。微喘直視。脉弦者生。濇者死。微者但發熱。譫語屬承氣湯證。若下者勿復服。

太陽病過經十餘日。心下噎噎欲吐。而胸中痛。大便反溇。其腹微滿。鬱鬱微煩。先時自極吐下者。可與承氣湯。不爾者不可與。欲嘔胸中痛微溇者。此非柴胡湯證。以嘔故知。極吐下也。

金匱玉函經

卷六

十一

太陽病下之微喘者。表未解故也。屬桂枝湯證。一云麻黃湯證。

太陽病脉浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為痛。數則為虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒。其表未解。醫反下之。動數則遲。頭痛則眩。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因堅。則為結胸。屬大陷胸湯證。若不結胸。但頭汗出。其餘無有。齊頸而還。小便不利。身必



發黃

太陽病下之脉促不結胸者此為欲解其脉浮者必結胸其脉緊者必咽痛其脉絃者必兩脇拘急其脉細而數者頭痛未止其脉沉而緊者必欲嘔脉沉而滑者挾熱利其脉浮而滑者必下血

太陽病下之其脉促胸滿者屬桂枝去芍藥湯若微惡寒桂枝去芍藥加附子湯證

金匱玉函經

卷六

三

太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脉促表未解喘而汗出屬葛根黃芩黃連湯證

太陽病醫反下之因腹滿時痛為屬太陰屬桂枝加芍藥湯證其大實痛屬桂枝加大黃湯證太陽病下之其氣上衝可與桂枝湯不上衝者不可與之也

太陽病二三日終不能臥但欲起者心下必結其脉微弱者此本寒也而反下之利止者必結

胸未止者四五日復重下之此挾熱利也

太陽病外證未除而數下之遂挾熱利而止心下痞堅表裏不解屬桂枝人參湯證

大下以後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱屬麻黃杏仁石膏甘草湯證

太陽病五日下之六七日不大便而堅者屬柴胡湯證

太陽病過經十餘日反再三下之後四五日柴

金匱玉函經

卷六

四

胡湯證續在先與柴胡湯嘔止小安其人鬱鬱微煩者為未解屬大柴胡湯證

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身不可轉側屬柴胡加龍骨牡蠣湯證

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱而微利此證當柴胡湯下之不得利今反利者

故知醫以圓藥下之非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後屬柴胡加芒硝湯

傷寒十三日過經而譫語內有熱也當以湯下之小便利者大便當堅而反利其脉調和者故知醫以圓藥下之非其治也自利者其脉當微厥今反和者此為內實屬承氣湯證

傷寒五六日嘔而發熱柴胡湯證具而以他藥下之心下滿而堅痛者此為結胸屬大陷胸湯陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣者飢不能食但頭汗出屬梔子湯證

金匱玉函經

卷六

五

陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微滿頭堅後溇者不可下之有燥屎者宜承氣湯

陽明病不能食下之不解其人不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也

陽明病脉遲食難用飽飽即發煩頭眩者必小便難此欲作穀疸雖下之其腹滿即如故耳所以然者脉遲故也

跌陽脉微弦而如此為強下之

下利其脉浮大此為虛以強下之故也設脉浮革故爾腸鳴屬當歸四逆湯證

傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急當救裏後身體疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

大下後五七日不大便煩不解腹痛而滿有燥屎者本有宿食故也

金匱玉函經

卷六

六

大下後口燥者裏虛故也

火逆下之因燒針煩躁屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯

辨可溫病形證治第二十

大法冬宜服溫熱藥及灸

師曰病發熱頭痛脉反沉若不差身體更疼痛當救其裏宜溫藥四逆湯

下利腹滿身體疼痛先溫其裏宜四逆湯



自利不渴者屬太陰其藏有寒故也當溫之宜四逆輩

少陰病其人飲食入則吐心中噓噓欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當溫之宜四逆湯

少陰病其脉沉者急當溫之宜四逆湯

下利飲食者就當溫之

下利脉遲緊爲痛未欲止者當溫之得冷者滿

金匱玉函經

卷六

七

而便腸垢

下利其脉浮大此爲虛以強下之故也設脉浮

革因爾腸鳴當溫之與水者噦宜當歸四逆湯

少陰病下利脉微澁者卽嘔汗出必數更衣反

少當溫之

傷寒醫下之而續得下利清穀不止身體疼痛

急當救裏宜溫之以四逆湯

諸溫之屬可與理中四逆附子湯熱藥治之

辨不可火病形證治第二十一

太陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛卽欲衄陰虛小便難陰陽俱虛竭身體卽枯燥但頭汗出齊頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾循衣摸牀小便利者其人可治

太陽病醫發其汗遂發熱惡寒復下之則心下

金匱玉函經

卷六

六

痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加大火針因而煩面色青黃膚濇者難治今色微黃手足溫者愈

傷寒加溫鍼必驚

陽脉浮陰脉弱者則血虛血虛則筋惕其脉沉者營氣微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也營氣微者加燒針血留不行更發熱而煩躁也



傷寒脉浮。醫以火迫之。亡陽驚狂。臥起不安。屬桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯。

問曰得病十五六日。身體黃。下利。狂欲走。師脉之言當清血。如脉肝乃愈。後如師言何以知之。師曰寸口脉陽浮陰濡而弱。陽浮則為風。陰濡弱為少血。浮虛受風。少血發熱。風則微寒。灑淅項強。頭眩。醫加火熏鬱令汗出。惡寒遂甚。客熱因火而發。怫鬱蒸肌膚。身目為黃。小便微難。短

金匱玉函經

卷六

九

氣從鼻出血而復下之。胃無津液。泄利遂不止。熱瘀在膀胱。畜結成積。聚狀如豚肝。當下未下。心亂迷憤。狂走赴水。不能自制。畜血若去。目明心了。此皆醫為無他禍患。微難得愈。劇者不治。傷寒其脉不弦緊而弱。弱者必渴。被火必譏語。太陽病以火熏之。不得汗。其人必躁。到經不解。必清血。

陽明病被火。額上微汗出。而小便不利。必發黃。

陽明病其脉浮緊。咽乾口苦。腹滿而喘。發熱汗出而不惡寒。反惡熱。其身體重。發其汗即躁心憤憤。而反譏語。加溫針者必怵惕。又煩躁不得眠。

少陰病。欬而下利。譏語。是為被火氣劫。故也。小便必難。為強責少陰汗也。

太陽病二日。而反燒瓦熨其背。大汗出。火熱入胃。胃中水竭。燥煩。必發譏語。十餘日振而反汗

金匱玉函經

卷六

十

出者。此為欲解。其汗從腰以下不得汗。其人欲小便不得。反嘔欲失。溲足下惡風。大便堅者。小便當數。而反不數。及多便。已其頭必卓然而痛。其人足心必熱。穀氣從下流故也。

風溫為病。脉陰陽俱浮。自汗出身重。多眠鼻息必鼾。語言難出。若被火者。微發黃色。劇則如驚癇。時瘵。癰。若火熏之一逆。尚引日。再逆促命。期火逆下之。因燒針煩躁者。桂枝甘草龍骨牡蠣



湯主之

傷寒頭痛翁翁發熱形象中風常微汗出自嘔者熏之則發黃不得小便

傷寒發熱頭痛微汗出熏之則喘加溫鍼則必

衄

傷寒脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥厥者脉初來大漸漸小更來漸漸大是其候也若熏之則發黃熨之則咽燥小便利者可救難者危殆

金匱玉函經

卷六

三

辨可火病形證治第二十二

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下可小發其汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表不得越當解之熏之當汗而不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發其汗則愈何以知汗出不徹以脉澁故知

之

下利穀道中痛當溫之以為宜火熬末鹽熨之一方炙枳實熨之

辨不可灸病形證治第二十三

微數之脉慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

脉浮當以汗解而反灸之邪無從出因火而盛

金匱玉函經

卷六

三

病從腰以下必重而痺此為火逆若欲自解當須汗出

脉浮熱甚反灸之此為實實以虛治因火而盛必咽燥唾血

辨可灸病形證治第二十四

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發貴脉氣從小腹上衝者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之

少陰病其人吐利手足不逆反發熱者不死脉不至者灸其少陰七壯

少陰病下利脉微澁者即嘔汗出必數更衣反少當温其上灸之

諸下利皆可灸足大都五壯一云七壯商丘陰陵泉皆三壯

金匱玉函經

卷六

三

下利手足厥冷無脉灸之主足厥陰是也灸不温反微喘者死

傷寒五六日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死

傷寒脉促手足厥逆可灸之灸少陰厥陰

辨不可刺病形證治第二十五

大怒無刺大一作新後同已刺無怒已一作新下同

新內無刺 已刺無內

大勞無刺 已刺無勞

大醉無刺 已刺無醉

大飽無刺 已刺無飽

大饑無刺 已刺無饑

大渴無刺 已刺無渴

大驚無刺

無刺熇熇之熱無刺漉漉之汗無刺渾渾之脉身熱甚陰陽皆爭者勿刺也其可刺者急取之

金匱玉函經

卷六

三

不汗則洩所謂勿刺者有死徵也

無刺病與脉相逆者上工刺未生其次刺未盛

其次刺已衰麤工逆此謂之伐形

辨可刺病形證治第二十六

太陽病頭痛至七日自當愈其經竟故也若欲作再經者當鍼足陽明使經不傳則愈

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風

池風府却再與桂枝湯則愈



傷寒腹滿而譏語寸口脉浮而緊者此為肝乘脾名曰縱當刺期門

傷寒發熱啗啗惡寒其人大渴欲飲酢漿者其腹必滿而自汗出小便利其病欲解此為肝乘肺名曰橫當刺期門

陽明病下血而譏語此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之澱然汗出則愈

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱

金匱玉函經

卷六

五

除脉遲身凉胸脇下滿如結胸狀其人譏語此為熱入血室當刺期門隨其實而取之平病云熱入血室無犯胃氣及上二焦與此相反豈謂藥不謂鍼

太陽與少陽併病心下痞堅頸項強而眩當刺大椎第一間肺俞肝俞勿下之

婦人傷寒懷娠腹滿不得大便從腰以下重如有水氣狀懷娠七月太陰當養不養此心氣實

當刺瀉勞宮及關元小便利則愈

傷寒喉痺刺手少陰少陰在腕當小指後動脉是也鍼入三分補之

少陰病下利便膿血者可刺

辨不可水病形證治第二十七

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

傷寒吐下之極虛復極汗出者其人外氣怫鬱

復與之水以發其汗因得噦者胃中寒冷故也

金匱玉函經

卷六

五

脉浮而遲表熱裏寒下利清穀胃中虛冷其人不能食飲水即噦

下利其脉浮大此為虛以強下之故也設脉浮

革因爾腸鳴當溫之與水者噦

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之若

不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承

氣湯若腹中轉矢氣者此為但頭堅後溏不可

攻之攻之必腹滿不能食飲水者即噦



病在陽當以汗解而反以水瀉之若灌之其熱却不得去須臾益煩皮上粟起意欲飲水反不渴服文蛤散不差與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小白散

身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水灌之洗之其熱被劫益不得去當汗而不汗即煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

寸口脉浮大醫反下之此為大逆浮即無血大

金匱玉函經

卷六

三

則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人必餒

寸口脉濡而弱濡即惡寒弱則發熱濡弱相搏藏氣衰微胸中苦煩此非結熱而反搏之居水漬布冷鈹貼之陽氣遂微諸府無依陰脉凝閉結在心下而不肯移胃中虛冷水漿不化小便縱通復不能多微則可救劇則寒在心下當奈何

辨可水病形證治第二十八

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不能眠其人欲飲水當稍飲之令胃中和則愈

厥陰病渴欲飲水者與水飲之即愈

太陽病寸口緩關上小浮尺中弱其人發熱而汗出復惡寒欲嘔但苦心下痞者此為下之故也若不下其人復不惡寒而渴者為轉屬陽明病小便數者大便必堅不更衣十日無所苦也

金匱玉函經

卷六

三

欲飲水者與之但當如法救之宜五苓散

寸口脉洪而大數而滑洪大則營氣長滑數則胃氣實營長則陽盛怫鬱不得出胃實則堅難大便則乾燥三焦閉塞津液不通醫發其汗陽盛不周復重下之胃燥熱蓄大便遂攢小便不利營衛相搏心煩發熱兩眼如火鼻乾面赤舌燥齒黃焦故大渴過經成壞病鍼藥所不能制與水灌枯槁陽氣微散身寒溫衣覆汗出表裏



通利其病即除形脉多不同此愈非法治但醫所當慎妄犯傷營衛

霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲水屬五苓散證

嘔吐而病在膈上後必思水者急與豬苓湯飲之。水亦得也

論熱病陰陽交併生死證二十九

問曰温病汗出輒復熱而脉躁疾不為汗衰狂

金匱玉函經

卷六

无

言不能食病名為何對曰病名陰陽交交者死人所以汗出者生于穀穀生于精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者邪勝也不能食者精無俾也汗出而熱留者壽可立而傾也夫汗出而脉尚躁盛者死今脉不與汗相應此不能勝其病也狂言者是失志失志者死此有三死不見一

生雖愈必死

熱病已得汗而脉尚躁盛此陰脉之極也死其得汗而脉靜者生

熱病脉尚躁盛而不得汗者此陽脉之極也死脉躁盛得汗者生

熱病已得汗而脉尚躁喘且復熱勿膚刺喘甚者死熱病陰陽交者死

熱病陽進陰退頭獨汗出死陰進陽退腰以下

金匱玉函經

卷六

三

至足汗出亦死陰陽俱進汗出已熱如故亦死

陰陽俱退汗出已寒慄不止鼻口氣冷亦死

熱病所謂并陰者熱病已得汗因得泄是謂并

陰故治一作活

熱病所謂并陽者熱病已得汗脉尚躁盛大熱汗出雖不汗出若衄是謂并陽故治

金匱玉函經卷第六 終

金匱玉函經卷第七

方藥炮製

凡野葛不入湯入湯則殺人不謂今葛根也凡半夏不咬咀以湯洗十數度令水清滑盡洗不熟有毒也茱萸椒之類不咬咀生薑一筋出汁三合半生薑皆薄切之乃擣絞取汁湯成乃熟煮如升數無生者用乾者一兩當二兩附子大黃之類皆破解不咬咀或炮或生皆去黑皮刀

金匱玉函經

卷七

一

剗取裏白者故曰中白用木芍藥刮去皮大棗擘去核厚朴即斜削如脯法桂削去皮用裏黑潤有味者為佳細辛斬折之麻黃亦折之皆先煮數沸生則令人煩汗出不可止折節益佳用桃核杏核皆須泡去皮乃熬勿取兩人者作湯不熬巴豆去皮心復熬變色瞿麥小草斬折不咬咀石葦手撲速吹去毛盡曝令燥復撲之不盡令人淋藜蘆去頭毛葶藶皆熬黃黑色巴豆

桃仁杏仁皆不可從藥別擣令如膏乃稍納藥末中更下麤羅凡咬咀藥欲如大豆麤則藥力不盡凡煎藥皆去沫沫濁難飲令人煩膠乃成下去滓乃納之飴亦然凡圓藥膠炙之乃可搗用膠炙令盡沸凡搗圓藥欲各異搗藥有難易搗耳凡煮藥用遲火火駛藥力不出盡當以布絞之綿不盡汁也凡篩藥欲細篩篩訖更合治之和調蜜圓者益杵數為佳凡散石藥以藥計

金匱玉函經

卷七

二

分之下絹篩佳散藥麤篩佳凡作膏欲生熟則力少

桂枝湯方第一

桂枝 三兩

芍藥 三兩

甘草 二兩 炙

生薑 三兩 切

大棗 十二枚 擘

右五味咬咀三物水七升微火煮取三升去滓溫服一升須臾飲熱粥一升餘以助藥力溫覆令汗出一時許益佳若不汗再服如前



又不汗後服當小促其間令半日許三服盡病重者一日一夜服晬時觀之服一劑盡病證猶在當復作服若汗不出者服之二三劑乃解

桂枝麻黃各半湯方第二

桂枝 一兩十  
六銖 芍藥 生薑

甘草 炙 麻黃 各一  
兩 大棗 四枚

杏仁 二十  
四枚

金匱玉函經

卷七

三

右七味咬咀以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合本方二湯各三合併為六合頓服今裁為一方

桂枝二麻黃一湯方第三

桂枝 一兩十  
七銖 芍藥 一兩  
六銖 麻黃 十六  
銖

生薑 一兩  
六銖 杏仁 十六  
枚 甘草 一兩  
二銖

大棗 五枚

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升本方桂枝湯二分麻黃湯一分合為二升分再服今合為一方

桂枝二越婢一湯方第四

桂枝 芍藥 甘草

麻黃 各十  
八銖 生薑 一兩  
三銖 大棗 四枚

石膏 二十  
四銖

金匱玉函經

卷七

四

右七味咬咀以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去渣溫服一升本方當裁為越婢湯桂枝湯合之飲一升今合為一方桂枝湯二分越婢湯一分

桂枝加桂湯方第五

桂枝 五兩 芍藥 三兩 甘草 二兩  
炙

生薑 二兩 大棗 十二枚

右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升

本方桂枝湯今加桂

桂枝加附子湯方第六

桂枝

芍藥 各三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

附子 一枚炮去皮破八片

右六味咬咀以水七升煮取三升去滓

溫服一升本方桂枝湯今加附子

桂枝去芍藥湯方第七

桂枝 三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

金匱玉函經

卷七

五

大棗 十二枚

右四味咬咀以水七升煮取三升去渣溫服

一升本方桂枝湯今去芍藥

桂枝去芍藥加附子湯方第八

桂枝 三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

附子 一枚

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓溫服

一升本方桂枝湯今去芍藥加附子

桂枝去桂加茯苓白朮湯方第九

芍藥 三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

茯苓

白朮 各三兩

右六味咬咀以水七升煮取三升去滓溫服

一升小便利即愈本方桂枝湯今去桂加茯苓

苓朮

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方第十

桂枝 三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

金匱玉函經

卷七

六

蜀漆 三兩洗去腥

大棗 十二枚

牡蠣 五兩熬

龍骨 四兩

右七味咬咀以水八升先煮蜀漆減二升納

諸藥取三升去渣溫服一升本方桂枝湯今

去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣一法以水一斗二

升煮取五升

桂枝加芍藥生薑人參湯方第十一

桂枝 三兩

芍藥

生薑 各四兩



甘草 二兩 炙 人參 三兩 大棗 十二枚

右六味咬咀四味以水一斗一升煮取三升去滓温服一升本方桂枝湯今加芍藥生姜人參

桂枝倍加芍藥湯方第十二

桂枝 三兩 芍藥 六兩 生薑 二兩

甘草 二兩 炙 大棗 十二枚

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓温服

金匱玉函經 卷七 七

一升本方桂枝湯今加用芍藥

桂枝加大黃湯方第十三

桂枝 三兩 芍藥 六兩 生薑 三兩

甘草 二兩 炙 大棗 十二枚 大黃 三兩

右六味咬咀以水七升煮取三升去滓温服

一升

桂枝人參湯方第十四

桂枝 甘草 炙各四兩 人參

白朮 乾薑 各三兩

右五味以水九升煮四味取五升去滓內桂更煮取三升去滓温服一升日再夜一服

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方第十五

桂枝 一兩 甘草 龍骨

牡蠣 熬各三兩

右為末以水五升煮取二升去滓温服八合日三服

金匱玉函經 卷七 八

桂枝甘草湯方第十六

桂枝 四兩 甘草 二兩 炙

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

桂枝加葛根湯方第十七

桂枝 三兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 炙

生薑 三兩 大棗 十二枚 葛根 四兩

右六味以水九升先煮葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓温服一升覆取微似

汗不須啜粥餘如桂枝法

葛根湯方第十八

葛根 四兩

麻黃

生薑 各三兩

桂枝

芍藥

甘草 各二兩

大棗 十二枚

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去上沫內諸藥煮取一升去滓溫服一升取汗不須啜粥

金匱玉函經

卷七

九

葛根加半夏湯方第十九

葛根 四兩

麻黃

生薑

桂枝

芍藥

甘草 各二兩

大棗 十二枚

半夏 半升 洗

右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取汗

葛根黃芩黃連湯方第二十

葛根 半觔

甘草 二兩 炙

黃芩

黃連 各三兩

右四味咬咀以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓溫分服

麻黃湯方第二十一

麻黃 三兩

桂枝 二兩

甘草 一兩 炙

杏仁 七十枚

右四味咬咀以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合溫覆出汗不須啜粥餘如桂枝法

金匱玉函經

卷七

十

麻黃杏子甘草石膏湯方第二十二

麻黃 四兩

杏子 五十枚

石膏 半觔 碎 綿裹

甘草 一兩 炙

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

麻黃附子甘草湯方第二十三

麻黃 二兩

附子 一枚 炮去皮 破八片



甘草二兩  
炙

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫

內諸藥煮取二升半去滓溫服八合

麻黃附子細辛湯方第二十四

麻黃二兩  
附子一枚去皮破

細辛二兩  
作八片炮

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升

金匱玉函經

卷七

十一

麻黃連軹赤小豆湯方第二十五

麻黃  
連軹  
生薑各二兩

赤小豆一升  
杏仁三十枚  
去皮尖  
甘草一兩  
炙

大棗十二枚  
生梓白皮一升

右八味以潦水一斗先煮麻黃一二沸去上

沫內諸藥煮取三升去渣溫服一升

麻黃升麻湯方第二十六

麻黃二兩  
升麻  
當歸各一兩  
六銖

金匱玉函經 卷七

黃芩  
萎蕤  
知母各十

石膏碎綿  
甘草炙  
桂枝

芍藥  
乾薑  
白朮

茯苓  
麥門冬去心各六銖

右十四味以水一斗先煮麻黃一二沸

去上沫內諸藥煮取三升去渣分溫三服一

飯間當出汗愈

大青龍湯方第二十七

金匱玉函經

卷七

十二

麻黃六兩  
桂枝二兩  
甘草二兩  
炙

石膏雞子大  
碎綿裹  
杏仁四十枚  
生薑三兩

大棗十二枚

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆令汗出

多者溫粉撲之一服汗者停後服若復服汗

多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠

小青龍湯方第二十八

麻黃 芍藥 細辛

桂枝 乾薑 甘草

五味子碎 半夏各半

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升 渴者去

半夏加栝樓根三兩 微利去麻黃加薤花

如雞子熬令赤色 噎者去麻黃加附子一

枚炮 小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓

金匱玉函經 卷七 三

四兩 喘者去麻黃加杏仁半升 薤花不

治利麻黃定喘今反之者疑非仲景意

小建中湯方第二十九

桂枝 甘草炙 生薑各三

芍藥六兩 大棗十二 膠飴一升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更

上火消解溫服一升嘔家不可服以甘故也

小柴胡湯方第三十

柴胡半觔 黃芩 人參

甘草 生薑各三 半夏半升

大棗十二

右七味以水一斗二升煮取六升去滓

再煮取三升溫服一升日三 若胸中煩不

嘔者去半夏人參加栝樓實一枚 若渴者

去半夏加人參合前成四兩半栝樓根四兩

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩 若脅下

金匱玉函經 卷七 古

痞堅者去大棗加牡蠣四兩 若心下悸小

便不利者去黃芩加茯苓四兩 若不渴外

有微熱者去人參加桂三兩溫覆微發其汗

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾

薑二兩

柴胡桂枝乾薑湯方第三十一

柴胡半觔 桂枝三兩 乾薑二兩

甘草二兩 牡蠣二兩 栝樓根四兩



黃芩 三兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎  
取三升溫服一升初服微煩復服汗出愈

柴胡桂枝湯方第三十二

柴胡 四兩

黃芩

人參 各一兩半

半夏 二合

甘草 一兩

桂枝

芍藥

生薑 各一兩半

大棗 六枚

右九味以水七升煮取三升去滓溫服一升

金匱玉函經

卷七

五

柴胡加龍骨牡蠣湯方第三十三

柴胡 四兩

黃芩

生薑

龍骨

人參

桂枝

牡蠣 熬

黃芩

茯苓 各一兩半

半夏 二合

大棗 六枚

大黃 二兩

右十二味以水八升煮取四升內大黃更煮

取二升去滓溫服一升本方柴胡湯內加龍

骨牡蠣黃丹桂茯苓大黃也今分作半劑

大柴胡湯方第三十四

柴胡 半觔

黃芩 三兩

芍藥 三兩

半夏 半升

生薑 三兩

枳實 四枚

大棗 十二枚

大黃 二兩

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎

取三升溫服一升一方無大黃然不加不

得名大柴胡湯也

柴胡加芒硝湯方第三十五

金匱玉函經

卷七

六

柴胡 二兩十銖

黃芩 一兩

人參 一兩

甘草 一兩

生薑 一兩

半夏 五枚

大棗 四枚

芒硝 二兩

右七味以水四升煮取二升去滓分二服以

解為差不解更作服

柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯方第三十六

柴胡 二兩

黃芩

人參

甘草 炙

生薑 各十銖

半夏 五枚

大棗 四枚 芒硝 三合 大黃 四兩

桑螵蛸 五枚

右前七味以水四升煮取二升去滓下芒硝

大黃桑螵蛸煮取一升半去滓溫服五合微

下即愈本方柴胡湯再服以解其外餘一服

加芒硝大黃桑螵蛸

茯苓桂枝甘草大棗湯方第三十七

茯苓 半觔 桂枝 四兩 甘草 二兩

金匱玉函經

卷七

七

大棗 十五枚

右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減二升內

諸藥煮取三升去滓溫服一升日三

茯苓桂枝白朮甘草湯方第三十八

茯苓 四兩 桂枝 白朮 各三兩

甘草 二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便

即利

茯苓甘草湯方第三十九

茯苓 三兩 甘草 一兩 桂枝 二兩

生薑 三兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

五苓散方第四十

豬苓 十八銖 澤瀉 一兩 茯苓 十八銖

桂 半兩 白朮 十八銖

右五味為末以白飲和服方寸七日三服多

金匱玉函經

卷七

六

飲煖水汗出愈

甘草乾薑湯方第四十一

甘草 二兩 乾薑 二兩

右二味咬咀以水三升煮取一升五合去滓

分溫再服

芍藥甘草湯方第四十二

芍藥 四兩 甘草 四兩

右二味咬咀以水三升煮取一升五合去滓



分温再服。

炙甘草湯方第四十三

甘草 四兩 生薑 三兩 人參 二兩

生地黄 一觔 桂枝 三兩 阿膠

麥門冬 半升 麻子仁 半升 大棗 三十枚

右九味酒七升水八升煮取三升去滓內膠

烱盡温服一升日三服

甘草湯方第四十四

金匱玉函經

卷七

九

甘草 二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓温服七

合日二服

厚朴生薑半夏甘草人參湯方第四十五

厚朴 生薑 半夏 各半

甘草 二兩 人參 一兩

右五味咬咀以水一斗煮取三升去滓温服

一升日三服

梔子豉湯方第四十六

梔子 十四枚 香豉 四合

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉

煮取一升半去滓分二服温進一服得快吐

止後服

梔子甘草豉湯方第四十七

梔子 十四枚 甘草 二兩 香豉 四合

右三味以水四升先煮梔子甘草得二升半

金匱玉函經

卷七

十

內豉煮取一升半去滓分爲二服温進一服

得快吐止後服

梔子生薑豉湯方第四十八

梔子 十四枚 生薑 五兩 香豉 四合

右三味以水四升先煮梔子生薑得二升半

內豉煮取一升半去滓分爲二服温進一服

得快吐止後服

梔子厚朴湯方第四十九

梔子十四枚擘 厚朴四兩 枳實四枚去穢炒

右三味以水三升煮取一升半去滓分爲二

服溫進一服得吐止後服

梔子乾薑湯方第五十

梔子十四枚擘 乾薑二兩

右二味以水三升煮取一升去滓分爲三服

溫進一服得快吐止後服

梔子黃檗湯方第五十一

金匱玉函經 卷七 主

梔子十四枚擘 黃檗二兩十 甘草一兩炙

右三味咬咀以水四升煮取一升半去滓分

溫再服

金匱玉函經卷第七 終

金匱玉函經卷第八

小陷胸湯方第五十二

栝樓實一枚 黃連二兩 半夏半升

右三味以水六升先煮栝樓取三升去渣內

諸藥煮取二升去滓分溫三服

大陷胸湯方第五十三

大黃六兩去皮 芒硝一升 甘遂一錢

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內

金匱玉函經 卷八 一

芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利

止後服

大陷胸圓方第五十四

大黃半觔 葶藶 芒硝

杏仁各半升

右四味搗和取如彈圓一枚甘遂末一錢七

白蜜一兩水二升煮取一升頓服一宿乃下

又大陷胸湯方第五十五



桂枝 四兩  
甘遂 四兩  
大棗 十二枚

栝樓實 一枚  
人參 四兩  
去皮

右五味以水七升煮取三升去滓温服一升

胸中無堅勿服之

文蛤散方第五十六

文蛤 五兩

右一味為散沸湯和服一方寸七

白散方第五十七

金匱玉函經

卷八

二

桔梗

貝母

各十  
八銖

芭豆

六銖  
去皮  
心熬黑

右三味為散白飲和服強人半錢羸人減之

病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一

杯利過不止進冷粥一盃

大黃瀉心湯方第五十八

大黃 二兩

黃連 一兩

右二味咬咀以麻沸湯二升漬之須臾絞去

滓分温再服

附子瀉心湯方第五十九

大黃 二兩

黃連 三

黃芩 各一兩

附子 一枚  
炮去皮  
破別煮取汁

右四味咬咀三味以麻沸湯二升漬之須臾

絞去滓內附子汁分温再服

半夏瀉心湯方第六十

半夏 半升

黃芩

乾薑

甘草 炙

人參 各三兩

黃連 一兩

金匱玉函經

卷八

三

大棗 十六枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三

升温服一升日三服

甘草瀉心湯方第六十一

甘草 四兩

黃芩 三兩

乾薑 三兩

半夏 半升

黃連 一兩

大棗 十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三

升温服一升日三服

生薑瀉心湯方第六十二

生薑 四兩 人參 甘草

黃芩 各三兩 半夏 半升 乾薑

黃連 各一兩 大棗 十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

禹餘糧圓方

闕

金匱玉函經

卷八

四

赤石脂禹餘糧湯方第六十三

赤石脂 一觔 禹餘糧 一觔

右二味以水六升煮二升去滓分溫三服

旋覆代赭石湯第六十四

旋覆花 三兩 代赭石 一兩 人參 二兩

大棗 十二枚 生薑 五兩 半夏 半升

甘草 二兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

瓜蒂散方第六十五

瓜蒂 熬黃 赤小豆 各六銖

右二味各別搗篩為散合治之取一錢七以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

白虎湯方第六十六

金匱玉函經

卷八

五

石膏 一觔 知母 六兩 甘草 二兩

粳米 六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

白虎加人參湯方第六十七

人參 三兩 石膏 一觔 知母 六兩

甘草 二兩 粳米 六合

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一



升日三服

桂枝附子湯方第六十八

桂枝 四兩

附子 三枚

甘草 二兩

大棗 十五枚

生薑 三兩

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

木附湯方第六十九

白朮 四兩

附子 三枚

甘草 三兩

生薑 二兩

大棗 十五枚

金匱玉函經

卷八

六

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

一服覺身痺半日許再服如冒狀勿怪也即

是附子與朮並走皮中逐水氣未得除故使

之耳法當加桂四兩其人大便堅小便自利

故不加桂也

甘草附子湯方第七十

甘草 三兩

附子 二枚

白朮 三兩

桂枝 四兩

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升

日三服汗出即解能食汗止復煩者服五合

恐一升多者宜服六七合為始

芍藥甘草附子湯方第七十一

芍藥

甘草 各一兩

附子 一枚

右三味咬咀以水三升煮取一升三合去滓

分溫三服

乾薑附子湯方七十二

金匱玉函經

卷八

七

乾薑 一兩 附子 一枚

右二味以水三升煮一升頓服之

十棗湯方第七十三

芫花 熬

甘遂

大戟

右三味等分為散以水一升半先煮棗十枚

取八合去滓內藥末強人一錢羸人半錢若

下少病不除明日加半錢

附子湯方第七十四

附子 二枚 炮 茯苓 三兩 人參 二兩

白朮 四兩 芍藥 三兩

右五味咬咀以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

大承氣湯方第七十五

大黃 四兩 酒洗 厚朴 半觔 炙 去皮 枳實 五枚 炙

芒硝 三合

右四味以水一斗先煮二味取五升去滓內

金匱玉函經

卷八

八

大黃煮取二升去滓內芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服

小承氣湯方第七十六

大黃 四兩 厚朴 二兩 炙 去皮 枳實 三枚 大者 炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫三服初服當更衣不爾盡飲之若更衣勿復服

調胃承氣湯方第七十七

大黃 四兩 清 酒浸 甘草 二兩 炙 芒硝 半升

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸少少溫服

桃仁承氣湯方第七十八

桃仁 五十枚 去皮尖 大黃 四兩 桂枝 二兩

甘草 二兩 炙 芒硝 二兩

右五味以水七升先煮四味取二升半去滓內硝更煮微沸溫服五合日三服微利

金匱玉函經

卷八

九

豬苓湯方第七十九

豬苓 茯苓 阿膠

澤瀉 滑石 碎各 一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠消盡溫服七合日三服

蜜煎導方第八十

蜜 七合

右一味內銅器中微火煎如飴勿令焦俟可



丸捻作挺如指許長二寸當熟作令頭銳內

穀道中以手急抱欲大便時乃去之

又大豬膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中

如一食頃當大便出宿食惡物

麻子仁圓方第八十一

麻子仁 二升 芍藥 半觔 大黃 一觔

厚朴 炙 一觔 枳實 炙 半觔 杏仁 一觔

右六味為末煉蜜為圓桐子大飲服十圓日

金匱玉函經

卷八

十

三服漸加以和為度

抵當圓方第八十二

水蛭 二十箇 蟪蟲 二十箇 桃仁 三十箇 去皮尖

大黃 三兩

右四味杵分為四圓以水一升煮一圓取七

合服之暍時當下血若不下更服

抵當湯方第八十三

水蛭 三十箇 蟪蟲 三十箇 去翅足

桃仁 二十箇 大黃 三兩 酒浸 去皮尖

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服

一升不下再服

茵陳蒿湯第八十四

茵陳蒿 六兩 梔子 十四枚 大黃 二兩 去皮

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味

煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂

角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

金匱玉函經

卷八

七

黃連阿膠湯方第八十五

黃連 四兩 黃芩 一兩 芍藥 二兩

雞子黃 二枚 阿膠 三兩

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內

膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合

日三服

黃連湯方第八十六

黃連 二兩 甘草 炙 一兩 乾薑 一兩

桂枝 二兩 人參 二兩 半夏 五合

大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓分五服日三服夜二服

桃花湯方第八十七

赤石脂 一觔 一半全 乾薑 一兩

粳米 一升

右三味以水七升煮米令熟去滓温服七合

全量正同至

卷八

三

內赤石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿服

吳茱萸湯方第八十八

吳茱萸 一升 洗 人參 三兩 生薑 六兩

大棗 十二枚

右四味以水七升煮取二升去滓温服七合日三服

豬膚湯方第八十九

豬膚 一觔

右以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和相得温分六服

桔梗湯方第九十

桔梗 一兩 甘草 二兩

右二味以水三升煮取一升去滓分温再服

苦酒湯方第九十一

雞子 一枚 去黃內 半夏 洗破如棗核 大十四

全量正同至

卷八

三

枚內苦酒中

右以雞子殼置刀環中安火上三沸去滓細含嚥之不差更作

半夏散方第九十二

半夏 桂枝 甘草 炙各 等分

右三味各別搗篩合治之白飲和服方寸七日三服若不能散服以水一升煎七沸內散

一二方寸匕更煎三沸下火令小冷少少嚥



之

白通湯方第九十三

蔥白 四莖

乾薑 一兩

附子 一枚生用 去皮破

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

白通加豬膽汁湯方第九十四

蔥白 四莖

乾薑 一兩

附子 一枚生

人尿 五合

豬膽汁 一合

右以水三升煮一升去滓內人尿膽汁和相

金匱玉函經

卷八

古

得分温再服無膽亦可

真武湯方第九十五

茯苓

芍藥

生薑 各三兩

白朮 二兩

附子 一枚炮

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合

日三服 若欬者加五味子半升細辛乾薑

各一兩 若小便利者去茯苓 若下利者

去芍藥加乾薑二兩 若嘔者去附子加生

薑足前成半觔

烏梅圓方第九十六

烏梅 三百箇

細辛 六兩

乾薑 十兩

黃連 一觔

當歸 四兩

附子 六兩炮

蜀椒 四兩去子

桂枝 六兩

人參 六兩

黃櫨 六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿

去核蒸之五升米下飯熟取擣成泥和藥令

金匱玉函經

卷八

五

相得內臼中與蜜杵二千圓如梧桐子大先

食飲服十圓日三服稍加至二十圓禁生冷

滑物食臭等

乾薑黃芩黃連人參湯方第九十七

乾薑

黃芩

黃連

人參 各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分温再服

白頭翁湯方第九十八

白頭翁 黃連 黃檗

秦皮 各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓温服一升  
不愈更服一升

黃芩人參湯方九十九

黃芩 人參 桂枝

乾薑 各二兩 半夏 半升 大棗 十二枚

右六味以水七升煮取二升去滓分温再服

金匱玉函經 卷八 共

黃芩湯方第一百 芍藥 二兩

黃芩 甘草 二兩 大棗 十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓温服一升

日再服夜一服

黃芩加半夏生薑湯方第一百一

黃芩 三兩 芍藥 甘草 各二兩

大棗 十二枚 半夏 半升 生薑 一兩半

右六味以水一斗煮取三升去滓温服一升

日再服夜一服

理中圓及湯方第一百二

人參 甘草 炙 白朮

乾薑 各三兩

右四味搗篩為末蜜和圓如雞黃大以沸湯  
數合和一圓研碎温服之日三服夜二服腹  
中未熱益至三四圓然不及湯湯法以四物  
依兩數切用水八升煮取三升去滓温服一

金匱玉函經 卷八 共

升日三服

加減法

若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩

吐多者去朮加生薑三兩下多者還用朮

悸者加茯苓二兩

渴欲得水者加朮足前成四兩半

腹中痛者加人參足前成四兩半

寒者加乾薑足前成四兩半



腹滿者去朮加附子一枚

服湯後如食頃飲熱粥一升許微自温勿發  
揭衣被

四逆散方第一百三

甘草炙 柴胡 芍藥

枳實炙各十分

右四味為散白飲服方寸匕日三服 欬者  
加五味子乾薑各五分并主久痢 悸者加

金匱玉函經

卷八

六

桂枝五分 小便不利者加茯苓五分 腹

痛者加附子一枚炮 泄利下重者先以水

五升煮薤白三升取三升去滓以散三方寸

匕內湯中煮取一升半分温再服

四逆湯方第一百四

甘草二兩炙 乾薑一兩半 附子一枚生去皮破

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温  
再服強人可大附子一枚乾薑三兩

通脉四逆湯方第一百五

乾薑三兩強人四兩 甘草二兩炙 附子大者一枚生用破

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温  
再服其脉即出者愈

面色赤者加蔥九莖 腹中痛者加芍藥二

兩 嘔者加生薑二兩 咽痛者加桔梗二

兩 利止脉不出者加人參二兩

人參四逆湯方第一百六

金匱玉函經

卷八

七

人參一兩 甘草二兩炙 乾薑一兩半

附子一枚生

右四味以水三升煮取一升二合去滓分温  
再服

茯苓四逆湯方第一百七

茯苓四兩 甘草二兩炙 乾薑一兩半

附子一枚生 人參二兩

右五味咬咀以水五升煮取一升二合去滓

分温再服

通脉四逆加猪膽汁湯方一百八

乾薑 三兩 甘草 二兩 附子 大者一枚生

猪膽汁 四合

右三味以水三升煮取一升二合去滓內猪膽汁分温再服

當歸四逆湯方一百九

當歸 桂枝 芍藥 各二兩

金匱玉函經

卷八

辛

細辛 一兩 大棗 二十枚 甘草 炙

通草 各二兩

右七味咬咀以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

當歸四逆加吳茱萸生薑湯方第一百十

當歸 桂枝 芍藥

細辛 甘草 炙 通草 各三兩

大棗 二十枚 吳茱萸 二兩 生薑 半觔

右九味咬咀以水四升清酒四升煮取三升去滓温服一升日三

燒裨散方第一百十一

右取婦人中裨近隱處剪燒灰以水和服方寸七日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裨當燒灰

枳實梔子豉湯方第一百十二

枳實 三枚 梔子 十四枚擘 豉 一升綿裹

金匱玉函經

卷八

主

右以清漿水七升空煎減三升內枳實梔子煮取二升內豉更煮五六沸去滓分温再服取汗出若有宿食加大黃如博棊子大五六枚

牡蠣澤瀉散方第一百十三

牡蠣 熬 澤瀉 栝蒌根

蜀漆 洗去腥 葶藶 熬 商陸根 熬

海藻 洗去鹹 各等分



右七味爲散白飲和服方寸匕小便利卽止  
竹葉石膏湯方第一百十四

竹葉 二把 石膏 一觔 半夏 半升

人參 三兩 甘草 二兩 粳米 半升

麥門冬 一升 去心

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮  
米熟湯成去米溫服一升日三服

麥門冬湯方第一百十五

金匱玉函經

卷八

三

麥門冬 七升 半夏 一升 人參 二兩

甘草 二兩 粳米 三合 大棗 十二枚

右六味以水一斗六升煮取六升溫服一升

日三夜一服

附遺

調氣飲 治赤白痢小腹痛不可忍下重或面

青手足俱變者用黃蠟三錢阿膠三錢同溶

化入黃連末五錢攪勻分三次熱服神妙

猪肚黃連丸 治消渴飲水用雄猪肚一枚入

黃連末五兩枯樓根白梁米各四兩知母三

兩麥門冬三兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每

服三十九米飲下

青木香丸 主陽衰諸不足用崑崙青木香六

路訶子皮各二十兩擣篩糖和丸梧子大每

空腹酒下三十九日再其效尤速

治五噎吐逆心膈氣滯煩悶不下用蘆根五兩

金匱玉函經

卷八

三

對以水三大盞煮取二盞去渣溫服

治小兒羸瘦用甘草三兩炙焦爲末蜜丸綠豆

大每溫水下五九日二服

治小兒撮口發噤用生甘草二錢半水一盞煎

六分溫服令吐痰涎後以乳汁點兒口中

治小兒中蠱欲死者用甘草五錢水二盞煎五

分服當吐出

金匱玉函經卷第八 終





宋河南郭雍撰次

# 傷寒補亡論

道光元年重刊心太平軒藏板

明重刊補亡論序

夫人稟陰陽五行而有生乃以寒暑七情  
 卒不免於天殤以至不能保夫造物之所界也聖人  
 出而憫焉為之嘗百草而設其治著靈素諸經而闡  
 其理既而有倉公華陀扁鵲仲景諸君相繼著論以  
 晰其治於此道益明而術益精人民之有疾者可賴  
 以保其生矣無如歲久人湮書帙淪喪讀者每慨其  
 文理未貫精義不彰前宋代中州有郭白雲者兄弟  
 名醫窮經探索洞徹病情每三復仲景之書而嘆其  
 亡失乃更闡其奧而發其微作補亡論一書以全其  
 義其於兩感陰陽交陰陽易及痙瘓等論尤為詳切  
 精博真可謂發前人之所未發令讀者心目一清足  
 補仲景之殘缺惟是宋時刻本傳至元紀兵火之間  
 又復亡其第十六卷中數十條其間妙義精論盡皆  
 湮沒不可復聞良可惜哉其所存十九卷有餘若不  
 壽之梓安知其不再亡失耶俾生民之有疾痛者何  
 所賴以獲免夫天殤保全其造物所畀乎茲刻也亦  
 同於神農黃岐之用心也矣是為序

仲景傷寒補亡論序

大明萬曆甲戌仲春嗣開國翊運守正文臣資善大夫前奉

敕提督操江歷掌南京前後左右督府事侍衛護軍誠意伯芝田劉世延題

仲翼傷寒補下論

序

二

余幼習醫凡足以羽翼仲聖傷寒論者無弗究心即知宋有常器之龐安常郭白雲三先生常氏之書世無傳本龐氏刻本已渺家藏鈔本亦多缺誤原本藏江村袁氏後歸顧抱沖抱沖歿歸員嶠黃氏近將梓而壽世也至郭氏補亡論予家舊藏鈔本熟讀尋繹有年所矣是書重刻於明之季世觀青田劉公序文知是時已將失傳苟非重刊至今泯沒久矣余年踰六十崦嵫晚景身世匆匆爰屬及門暨兒輩詳為校覈付之棗梨亟為流傳將使古人羽翼仲聖之苦心不湮於今日亦斯道之幸也夫一切詳於凡例劄劄告竣因徇及門之請復弁數語於簡端願與同志者質之是為序

道光元年歲在辛巳長至日長洲後學徐錦識



宋史本傳 隱逸

郭雍字子和其先洛陽人父忠孝官至大中大夫師事程頤著易說號兼山先生自有傳雍傳其父學通世務隱居峽州放浪長楊山谷間號白雲先生乾道中以峽守任清臣湖北帥張孝祥薦於朝旌召不起賜號冲晦處士孝宗稔知其賢每對輔臣稱道之命所在州郡歲時致禮存問後更封頤正先生令部使者遣官就問雍所欲言備錄繳進於是雍年八十有三矣淳熙初學者哀集程顥程頤張載游酢楊時及

郭傳

忠孝雍凡七家為大易粹言行於世

朱子跋郭長陽醫書

紹熙甲寅夏子赴長沙道過新喻謁見故煥章學士謝公昌國於其家公為留飲語及長陽冲晦郭公先生言行甚悉因出醫書歷書數帙曰此先生所著也子於二家之學皆所未習不能有以測其說之淺深則請以歸將以暇日熟讀而精求之而公私倥傯水陸奔馳終歲不得休復未暇也明年夏大病幾死適會故人子王漢伯紀自金華來訪而親友方士繇伯謨亦自籍溪來同視子疾數日間乃若粗有生意問

仲景傷寒補亡論

朱子跋

及謝公所授長陽醫書二君亟請觀焉乃出以視之則皆驚喜曰此奇書也蓋其說雖若一出古經而無所益損然古經之深遠浩博難尋而此書之分別部居易見也安得廣其流布使世之學為方者家藏而人誦之以知古昔聖賢醫道之源委而不病其難耶子念蔡忠惠公之守長樂疾巫覡主病蠱毒殺人之姦既禁絕之而又擇民之聰明者教以醫藥使治疾病此仁人之心也今聞帥詹卿元善實補蔡公之處而政以慈惠為先試以語之儻有意耶亟以扣之而



元善報曰敬諾乃屬二君讎正刊補而書其本末如此以寄之抑予嘗謂古人之於脈其察之固非一道然今世通行唯寸關尺之法為最要且其說具於難經之首篇則亦非下俚俗說也故郭公此書備載其語而并取丁德用密排三指之法以釋之夫難經則至矣至於德用之法則予竊意診者之指有肥瘠病者之臂有長短以是相求或未得為定論也蓋嘗細考經之所以分寸尺者皆自關而前卻以距乎魚際尺澤是則所謂關者必有一定之處亦若魚際尺澤

仲景傷寒補亡論 朱子跋

二

之可以外見而先識也然今諸書皆無的然之論唯千金以為寸口之處其骨自高而關尺皆由是而却取焉則其言之先後位之進退若與經文不合獨俗間所傳脈訣五七言韻語者詞最鄙淺非叔和本書明甚乃能直指高骨為關而分其前後以為寸尺陰陽之位似得難經本指然世之高醫以其贗也遂委棄而羞言之予非精於道者不能有以正也姑附見其說於此以俟明者而折中焉慶元元年乙卯歲五月丙午鴻慶外史新安朱熹書

仲景傷寒補亡論自序

素問曰病為本工為標標本不得邪氣不服又曰標本已得邪氣乃服夫所謂標本者一體本末之事今病與工自非一體何其言標本也蓋謂某病為本則以治某病者為標因其本而治其標則工與病自成一家矣且如病傷寒者以傷寒為本則亦以能治傷寒之工為標此所謂標本已得邪氣乃服也如以傷寒為本而以能治痺疝之工為標則標本不相得邪氣何緣可服哉素問論此乃以得不得為言聖哲之意可見況病有輕重工有高下重病須高工亦謂其標本相得也扁鵲曰人之所患患疾多醫之所患患道少道少疾多此標本之所難相得也凡病固皆難惟傷寒為特甚蓋人之疾痛或在皮膚或肌肉或骨髓或五藏六腑著則久而不去未有入經與經氣流通者惟傷寒之毒能入大經與經氣相搏經氣不能勝反藉經隧恣意攻人人為之拱手待斃昔之所謂流注血氣生養人命之經今化為寒溫熱毒毒人生命之經矣是豈他疾之比哉故自古以為難治之疾

仲景傷寒補亡論 序

一

命之經矣是豈他疾之比哉故自古以為難治之疾



方其疾作之始日傳一經初傳之際證或難辨用藥尚疑當是之時其工在明及傳證之始急於用藥猶豫則差其工在斷一經既過又將別傳新故相亂其工在審爲之工者自非六日之傳昭然豫判於胸中亦未易酬對三陰三陽之變彼如疾風駿馬過不暫停而欲逐其後而攻之謬矣況有異氣間襲變動隨出或表或裏超然若神不可以常拘者將何應之故仲景曰陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速信斯言也自非心精學博機運無窮未

仲景傷寒補亡論

序

二

有不觸途面牆倒行逆施者此所謂貴於標本相得而後邪氣乃服也惟其最爲難治故自張長沙以來特爲注意辨析毫釐動輒十數萬言以訓後世今醫方論說復無詳於傷寒者昔云難治之病今反爲曉然易見之疾患在常人苟且不誦其書耳則書之爲後人利豈不溥哉是以陶隱居稱仲景之書爲衆方之祖孫真人嘆其特有神功良有以也雍之仲兄字子言嘗通守夷陵秭歸二郡幼以多疾喜方遍訪名醫時尙及見常器之康醇道輩遂悟醫師氏之學既

久深得於仲景之論每嘆此學大難窮盡今則其道將絕時爲雍言之雍初得聞仲景之書未甚領略漸磨日久及老後篤好之嘆已晚矣昔仲景感往昔之淪喪傷橫天之莫救乃撰傷寒雜病論雍之用心亦復爲此雖學識踈略無高人之見而一言一事上必有所本中必得於心而後敢筆之於書盡去世俗妄論欺惑之術常如天地父母臨其上庶幾後世復有揚子雲始知雍言之不謬也今所論次自岐黃以及近代諸書凡論辨問答證治合一千五百餘條總五

仲景傷寒補亡論

序

三

萬言分七十餘門集成論說二十卷方藥五卷雍聞醫家有好事或三十年而著論或二十載而成書其用心精專故足以垂世如雍行年八十日暮途遠志在速成安能久於斯道是以不踰年而略舉大綱亦由前人之述已備繼踵有作不過書札之力而已未能免踈略牴牾也後之君子或憐其衰晚昏謬疏其失而正之以成其美此誠有望焉嗟乎子生不辰上不得見張長沙孫真人北面握衣而請下不得進於龐朱二氏之前獨抱遺書呻吟於深山窮谷之間噉



菽飲水而不厭焉者樂在其中矣昔孔子多能鄙事子夏雖小道必觀聖賢尙且不廢況後人乎幸不以猥吝見黜也淳熙八年歲在辛丑暮春之月河南郭雍謹敘

近世諸家傷寒書如高文莊傷寒類要未得本龐朱二氏傳世已久常器之補治論雖略有傳而不得善本今有文闕者補之譌舛者正之疑不敢用者去之庶不累其名後來者惟王仲弓監丞一書頗有發明遇前人闕則取之自此而下非所當錄雖有傳於世者未足爲後世不刊之說也

仲景傷寒補亡論

四

凡例

一此書悉以仲景本論爲主然仲景之書殘缺已久其傷寒中所有之證及他證之類傷寒者本論未備則取千金活人及龐氏常氏之說合於仲景者補之故曰補亡

一此書久無刊本其第十六卷明時已缺見於劉氏序文抄錄相沿更多魚豕茲搜集諸本校勘確審其謬誤者則改正之其無從考訂者則書下原文缺四字間有上下文義全不連屬留之適以滋惑

仲景傷寒補亡論

凡例

一者竟割愛一二語意在傳信非敢妄易前人也

一此書分條別類欲便初學觀覽故有仲景一論而數門重出者不厭繁瑣誠嘉惠後學之心今概從其舊不敢因其複而刪之

一原序中本有方藥五卷今傳寫已失然論列諸方出於傷寒論者固屬家喻戶曉此外亦多見於千金方活人書易於查考故不復補入恐轉失其真也

一傷寒論原文多有大同小異其一論而分載數門



者互有詳略更有叔和之言稱為仲景之論者以叔和編次附入已說難於一一辨別今俱仍之一原序言分七十餘門一千五百餘條今共得六十四門內缺一卷故也其餘數多寡有校核不符者悉為更定共得一千四百餘條與原序之數少百條左右合所缺一卷揣之大致亦不相懸

一宋時士大夫多留心於醫郭氏本以理學名家而所述醫書皆歷代相傳之正法其有裨斯道不淺自前明劉氏鈔板後流傳日少懼其湮沒急為付梓倘有博古君子家藏善本更出而訂其訛補其缺幸甚幸甚

仲景傷寒補亡論

凡例

二

後學徐錦謹識

仲景傷寒補亡論目錄

卷第一

傷寒名例十問

敘論五問

治法大要九問

脈法刺法六問

仲景元化五問

卷第二

仲景辨脈法三十八條

卷第三

仲景平脈法四十五條

仲景傷寒補亡論

目錄

卷第四

六經統論二十二問

太陽經證治上九十五條

卷第五

太陽經證治下九十一條

卷第六

陽明經證治八十七條

少陽經證治十一條

卷第七

太陰經證治十條 少陰經證治四十七條

厥陰經證治六十三條

卷第八

不可發汗四十條 可發汗五十八條

卷第九

汗後四十四條 不可吐五條

可吐十條

卷第十

不可下四十七條 可下四十八條

仲景傷寒補亡論 目錄

二

卷第十一

發汗吐下後七十三條

卷第十二

病可溫十三條 病不可灸七條

病可灸八條 病不可刺八條

病可刺二十九條 病不可水十條

病可水八條 病不可火十一條

病可火二條 火邪三條

卷第十三

兩感證五條 陰陽交十一條

三陽合病十五條 結胸二十二條

心下痞二十五條

卷第十四

陽毒五條 陰毒七條

發斑十三條 發黃三十條

卷第十五

瘀血暈血便血證十一條

衄血吐血證十條 傷寒狐惑蠱病十條

仲景傷寒補亡論 目錄

三

傷寒百合病十四條 傷寒勞復三十二條

傷寒陰陽易病六條

卷第十六

缺

卷第十七

痙濕暈敘論一條 痙瘓證二十六條

濕病十八條 中暈證六條

霍亂證二十六條 虛煩證七條

卷第十八



傷寒温疫論一條 温病論六條

風温温毒論四條 傷寒相似證論十四條

卷第十九

婦人傷寒證十八條 妊娠傷寒證三十三條

小兒傷寒證十九條 小兒瘡疹上四十七條

卷第二十

小兒瘡疹下十八條 斑瘡癰疹辨一條

仲景傷寒補亡論

目錄

四

仲景傷寒補亡論目錄終

仲景傷寒補亡論卷第一

河南郭雍撰次

傷寒名例十問 敘論五問

治法大要九問 脈法刺法六問

仲景元化五問

傷寒名例十問

問曰傷寒之名何也王叔和撰次張仲景之言曰冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為

仲景傷寒補亡論卷一名例

毒者以其最成殺厲之氣也

問曰傷寒亦名熱病何也素問三十一篇曰熱病者皆傷寒之類也又曰人之傷於寒則為病熱故素問皆謂之熱病而三十二篇有肝熱病心熱病脾熱病肺熱病腎熱病之名及其病證刺法也

問曰傷寒有五何也難經五十八難曰傷寒有五有中風有傷寒有濕温有熱病有温病是也何以一病而有五名也雍曰其病皆傷於寒其為病皆熱則一也然而有五名者因四時之變氣而言也冬有風寒



一證故冬為中風為傷寒春為溫病夏為暑病亦曰熱病秋為濕溫此皆重感於四時之氣故異其名也總而言之則皆曰傷寒曰熱病故王冰言論其發病皆為傷寒致之是也謂之熱者其證皆熱也

問曰何以謂之溫病素問三篇曰冬傷於寒春必溫病故王叔和述仲景之言曰中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也素問所

仲景傷寒補論 卷一 名例

謂熱病謂四時之病其病皆熱也後世以暑病為熱病者謂夏時之氣熱最重於四時之熱也

問曰時行之氣何如叔和述仲景之言曰陰陽大論曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰冽此則四時正氣之序也如春時應暖而反大寒夏時應大熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣也人感非時之氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也問曰素問言四時之氣更傷五藏何也仲景叔和曰

氣候有應至而不至或有未應至而至者或有至而太過者皆成病氣亦時行之一也雍曰巢元方病源以傷寒時氣溫病熱病分為四種傷寒冬也時氣疫也溫病春也熱病夏也雖各具數十候究其證治皆不相遠

問曰古書言歲之所以皆同病者亦時行乎雍曰此則上古謂之歲露也時行者失時之和而中病者也何以謂之歲露靈樞七十九篇曰冬至之日風雨從南方來者為虛風賊傷人者其以夜半至者萬民

仲景傷寒補論 卷一 名例

皆臥而弗犯也故其歲民少病其以晝至者萬民懈怠而皆中於虛風故萬民多病此黃帝所謂歲之所露以皆同病者又非失時之和而中病也故特謂之歲露

問曰傷寒之與歲露何如雍曰歲露者賊風虛邪也因歲露而成傷寒者其病重而多死四時傷寒者因寒溫不和而感也其病輕而少死上古之書論歲露自越人仲景之下皆不言及之今雖有遇歲露而死者世亦莫之辨皆謂之傷寒時行也



問曰有以傷寒溫疫為不異者何如孫真人曰小品云古人相傳傷寒為難治之疾時行溫疫是毒氣之病而論治者不判傷寒與時行溫疫為異氣耳云傷寒是雅士辭天行溫疫是田舍間號不說病之異同也考之眾經其實殊矣所病不同方說宜辨是以略述其要云

問曰傷寒何以謂之卒病雍曰無是說也仲景敘論曰為傷寒雜病論合十六卷而標其目者誤書為卒病後學因之乃謂六七日生死人故謂之卒病此說

仲景傷寒補亡論 卷一 名例

四

非也古之傳書怠墮者因於字畫多省偏旁書字或合二字為一故書雜為奈或再省為卒今書卒病則雜病字也漢劉向校中秘書有以趙為肖以齊為立之說皆從省文而至於此與雜病之書卒病無以異今存傷寒論十卷雜病論亡矣

敘論五問

問曰或謂傷寒為橫病何也孫真人云俗人謂之橫病多不解治皆云日滿自差以此致天枉者天下大半凡始覺不佳即須救療迄至於病愈湯飲競進折

其毒勢自然而差必不可令病氣自在恣意攻人拱手待斃也

問曰凡有疾不時治何如仲景曰凡人有疾不時即治隱忍冀差以成痼疾小兒女子益以滋甚時氣不和便當早言尋其邪由及在腠理以時治之罕有不愈者患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制止此為家有患備慮之要外臺作千金論云難可制止雖其為急此自養之要也和緩亦無能為也癰疽疔腫尤

仲景傷寒補亡論

卷一 敘論

五

問曰治湯藥何如仲景曰凡作湯藥不可避晨夜覺病須臾即宜便治不等早晚則易愈矣如或差遲病即傳變雖欲除治必難為力服藥正如方法縱意違師不須治之

問曰服湯節度何如仲景曰凡發汗用溫煖湯藥其方雖言日三服若病劇不解當促其間可半日盡三服若與病相阻即便有所覺病重者一日一夜當晬時觀之如服一劑病證猶在當復作本湯治之至有不肯汗出服三劑乃解若汗不出者死病也後有陳廩邱蒸法



問曰服藥四方異宜何如叔和云地土溫涼高下不同物性剛柔冷居亦異是故黃帝興四方之間岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟臨病之工宜兩審之

治法大要九問

問曰傷寒治法之大要何如仲景曰凡傷寒之病皆從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣未有溫覆而當不消散者不在證治擬欲攻之猶當先解表乃可下之若表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病

仲景傷寒補亡論

卷一

治法

六

不除若表已解而內不消大滿大實堅有燥屎自可除下之雖四五日不能為禍也若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利煩躁諸變不可勝數輕者困篤重者必死矣華元化曰傷寒六日入胃入胃乃可下也若熱毒在外未入於胃而先下之其熱乘虛入胃則爛胃也其熱微者則赤斑出劇則黑斑出雍曰此論汗下之宜即治法之大要也

問曰汗下失其宜何如仲景曰陽盛陰虛汗之則死下之則愈陰盛陽虛汗之則愈下之則死夫如是則

神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治相背千里吉凶之機應若影響豈容易哉況桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡死生之要在乎須臾視身之盡不暇計日此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速也

問曰表裏或至於俱感汗下不可以並行乎仲景曰凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷妄意者乃云神丹甘遂合而飲之且解其表又除其裏言巧似是其理實違夫智者之舉措也常審以

仲景傷寒補亡論

卷一

治法

七

慎患者之動作也必果而速安危之變豈可詭哉問曰傷寒日滿自差之說果何如雍曰雖古名人亦有是論惟張孫不取也許仁則言自心不全甄別他醫難得精妙與其誤療也寧得任之但能薄滋味適寒溫將理中冷暖守過七日此最為得計其中事須服藥不可徒然者惟多日不大便暫須一轉洩耳雍謂此說固善然人感疾輕重難同幸而所感不重證循常理則有是說假令感疾深重變證不常日滿則死矣所以仲景言時氣不和便當早言及在腠理以



時治之孫真人言勿令病氣自在恣意攻人拱手待斃也豈許氏之言與有病不治常得中醫之說皆有激而云乎

問曰傷寒之初不當用峻藥何如雍曰此可謂之良醫之言常聞常器之爲初學淺識者有是說矣仲景之法有是證則用是藥今日桂枝證麻黃證是常用桂枝麻黃二湯也然常人才學明識不逮仲景則有誤在其中安敢盡用其藥遇桂枝證則必思桂枝之輕者而用之遇麻黃證則必思麻黃之輕者而用之

仲景傷寒補亡論

卷一 治法

八

蓋慮脈證有悞須預爲之防得不失仲景大意可也如因仲景之言必盡用仲景之劑不自量力周思斷然無疑所謂愚者動作果而速也鮮不失矣至如青龍承氣十棗陷胸等湯學淺者尤宜絕口如其人醫道果精深當一從仲景之言尙有承氣之戒可不審哉

問曰或言傷寒只當看證治之何如雍曰經絡爲先證脈爲次朱氏活人書曰治傷寒不識經絡如觸途冥行不知邪氣之所在往往病在太陽反攻少陰證

是厥陰乃和少陽寒邪未除真氣受斃又況傷寒看外證爲多未診先問最爲有準孫真人云問而知之別病淺深名爲巧醫既得其經然後切脈以辨在表在裏若虛若實以汗下之古人所以云問而知之爲中工切而知之爲下工也雍曰傷寒之疾其來甚暴尙爲易見故問外證切寸口足以知病之所在如雜病有難知者當如古人揆度奇恒之道未易以一二言也

問曰人病傷寒或無湯藥則何如華元化曰若無丸

仲景傷寒補亡論

卷一 治法

九

散及煎者但單煮柴胡數兩傷寒時行皆可服以發汗至再三發汗不解當與湯實者轉下之但當少與勿令大下耳雍曰此須能辨證者偶在道途間乏藥乃可用之蓋柴胡亦與陰病不相宜也

問曰傷寒數種庸人不能分別者用藥如何葛稚川曰若初覺頭疼肉熱脈洪起一二日便作加減蔥豉湯蔥白虎口一握豉一升綿裹以水三升煮取一升頓服取汗若不汗更作加葛根三兩水五升煮取二升分再服不汗更作加麻黃三兩去根節諸名醫方



皆用此更有加減法甚多江南人多服之雍嘗見北方乏醫藥處遇傷寒時氣秦人即飲蔥茶晉人即飲蜜茶雖甚苟且亦有應者後少見損人蔥茶似有理蜜殊不曉所謂

問曰汗不出有蒸法何如陳廩邱云醫經云連發汗汗不出者死病也吾思之可蒸也如蒸中風法蒸濕之氣於外迎之不得不汗也後以問張苗苗云曾有人作事疲極汗出臥單簟中冷得病但苦寒蹠諸醫與丸散湯四日之內凡八過發汗汗不出苗令燒地

仲景傷寒補亡論

卷一 治法

十

布桃葉蒸之即得大汗於被中就粉傅之使身極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性有難汗者非惟病使之然也蒸之則無不汗出范汪云諸病發熱惡寒脈浮洪便宜發汗溫粉撲之勿令遇風當發汗而其人適失血及大下利則不可大汗數少與桂枝湯使體潤藜藜汗出連日當自解

右治法大要不拘於經故傷寒總目載之敘論之中今依論次於敘論之後其餘治法並各詳見於逐經逐證之中

傷寒脈法及刺法六問

問曰傷寒有五其脈何如難經五十八難曰中風之脈陽浮而滑陰濡而弱濕溫之脈陽濡而弱陰小而急傷寒之脈陰陽俱盛而緊瀉熱病之脈陰陽俱浮浮之而滑沈之散瀉溫病之脈行在諸經不知何經之動各隨其經之所在而取之

問曰脈之辨寒暑何如仲景曰脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑

問曰欲愈之脈何如仲景曰凡得病厥脈動數服湯

仲景傷寒補亡論

卷一 脈法刺法

十一

藥更遲脈浮大減小初躁後靜者此皆愈證也

問曰病有損脈何如雍曰傷寒至脈多損脈少故仲景曰四損三日死五損一日死六損一時死凡四息而一至曰四損五息一至曰五損六息一至曰六損也

問曰死生之脈何如仲景曰脈陰陽俱盛大汗出不解者死脈陰陽俱虛熱不止者死脈至乍數乍疎者死脈至如轉索者死讖言妄語身微熱脈浮大手足溫者生逆冷脈沈細者不過一日死此以前是皆傷



寒證候也

問曰温病刺五十九穴何穴也素問三十二篇曰病甚者為五十九刺是也靈樞二十三篇曰所謂五十九刺者兩手足內各三凡十二痛五指間各一凡八痛足亦如是亦八痛頭入髮一寸傍三分各三痛凡六痛更入髮三寸邊五凡十痛耳前後口下一作各一項中一凡六痛巔上一顛會一髮際一廉泉一風池二天柱二此五十九穴也

右傷寒脈法鍼術不止於此此則論其敘論所載

仲景傷寒補亡論

卷一

脈法刺法

十三

其餘各見逐經逐證之下

張仲景華元化五問

問曰華陀治傷寒法與仲景少異何謂千金方載華陀之言曰夫傷寒始得一日在皮膚摩膏火灸之則愈若不解者二日在膚可依法鍼服解肌散發汗汗出則愈若不解者三日在肌復一發汗則愈若不解者止勿復發汗也至四日在胸宜服藜蘆丸微吐之則愈若病用藜蘆丸不能吐者服小豆瓜蒂散吐之則愈也視病若未惺惺者復一法鍼之五日在腹六

日入胃入胃乃可下也若熱毒在外未入於胃而先下之者其熱乘虛入胃則爛胃也然熱入胃要須下去之不可留於胸中也雍曰元化之術指日期為候仲景雖指日而要察陰陽六經之證此其所以若少異也要之仲景規矩準繩明備足為百世之師元化自得神術惟可自用故外臺言元化藜蘆丸近用損人不錄則知後人不能學也

問曰仲景元化之術孰優雍曰未易優劣大抵仲景之術得於學識元化之術得於心悟心悟則變化無

仲景傷寒補亡論

卷一

張華五問

十三

常自用多奇而學者鮮能從必欲從上聖之精微為百世之模楷非仲景而誰歟故仲景之於醫道守其常也元化之醫道從其變也

問曰元化臨終之日焚書於獄中曰此書可以活人後世謂所焚之書為仲景之書是耶非耶雍曰非也仲景之書出於元化之後也曰異哉仲景漢人元化魏人安得書出其後曰仲景元化同為漢末人仲景不仕魏故世稱曰漢仲景元化仕曹氏故世稱曰魏陀也考之於史元化死於呂布陳登之際計其時在



建安之初是時陀已百餘歲矣仲景敘論曰余宗族素多向餘二百建安紀年以來曾未十稔其死亡者三分有二傷寒十居其七感往昔之淪喪傷橫天之莫救乃勤求古訓博採衆方爲傷寒雜病論合十六卷則是書作於建安十年之後故知二公聲跡相接而仲景猶爲後進也

問曰世獨重仲景之書何也雍曰陶隱居孫真人可謂古之名醫矣陶論醫方曰惟張仲景一部最爲衆方之祖孫真人曰傷寒熱病自古有之名醫睿哲多

仲景傷寒補亡論 卷一 張華五問 十四

所防禦至於仲景特有神功尋思旨趣莫測其致所以醫人未能鑽仰以二者之言推之宜其特重於世也又孫真人曰尋方之大意不過三種一則桂枝二則麻黃三則青龍凡療傷寒不出之也而說者謂如太陽中暍當用白虎不可誤服桂枝麻黃此古人所未至何也雍曰傷寒之初惟有桂枝麻黃青龍三證故不出用此三藥若言中暍則中暍非傷寒自是別病當用白虎何緣用此三藥非古人所未至蓋論者誤以中暍爲傷寒也

問曰元化之書有傳否雍曰未之見也載於千金者亦雜以孫真人之言近世蘄水龐安常論中所載其言少異曰龐氏所載何如曰龐氏曰華陀治法云傷寒病起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛否隔周行不通病一日至二日邪氣在孔竅皮膚之間故病者頭疼惡寒身熱腰脊強直此邪氣在表隨證發汗則愈病三日以上氣浮上部填塞心胸故頭痛胸中滿或多痰涎當吐之則愈病五六日以上氣結在臧府故腹滿身重骨節煩疼當下則愈其言與千金又

仲景傷寒補亡論 卷一 張華五問 十五

異

仲景傷寒補亡論卷第一終



仲景傷寒補亡論卷第二

河南郭雍撰次

仲景辨脈法三十八條

雍曰辨脈者辨傷寒之脈也平脈者平衆脈也今辨脈法中雖有意相槎枒者世以仲景之法止此二篇垂百世之師範雖王叔和撰次一字不敢妄易仍舊次第錄之其問答皆仲景本文也

仲景問曰脈有陰陽何謂也答曰凡脈大浮數動滑此名陽也脈沈瀟弱伏一作微此名陰也凡陰病見

仲景傷寒補亡論

卷二 辨脈法

陽脈者生陽病見陰脈者死雍曰此謂陰脈陽脈非謂脈之陰陽也

又問曰脈有陽結陰結者何以別之答曰其脈浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脈沈而遲不能食身體重大便反鞭者名曰陰結也期十四日當劇

又問曰病有洒淅惡寒而復發熱者何答曰陰脈不足陽往從之陽脈不足陰往乘之曰何謂陽不足答曰假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒

淅惡寒也曰何謂陰不足答曰尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也陽脈浮陰脈弱一作微則血虛血虛則筋急也其脈沈者榮氣微也其脈浮而汗出如流珠者衛氣衰也榮氣微者加燒針則血流不行更發熱而躁煩也

又曰脈藹藹如車蓋者名曰陽結也

秋脈

又曰脈纍纍如循長竿者名曰陰結也

夏脈

又曰脈瞢瞢如羹上肥者陽氣微也

又曰脈縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也

陰氣

仲景傷寒補亡論

卷二 辨脈法

又曰脈綿綿如瀉漆之絕者亡其血也

又曰脈來緩時一止復來者名曰結脈來數時一止

復來者名曰促

一作縱

脈陽盛則促陰盛則結此皆病脈

又曰陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也若數脈見於關上上下下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動也

又曰陽脈浮大而濡陰脈浮大而濡陰脈與陽脈同等者名曰緩也



又曰脈浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不  
移也脈緊者如轉索無常也

又曰脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則  
為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則  
亡血失精

又問曰病有戰而汗出因得解者何也答曰脈浮而  
緊按之反芤此為本虛是以發戰以脈浮故當汗出  
而解也若脈浮而數按之不芤此人本不虛若欲自  
解但汗出耳不發戰也

仲景傷寒補亡論 卷二 辨脈法 三

又問曰病有不戰而汗出解者何也答曰脈大而浮  
數故知不戰汗出而解也雍曰即前問不芤之證  
又問曰病有不戰不汗出而解者何也答曰其脈自  
微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液此  
陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也  
又問曰傷寒三日脈浮數而微病人身涼和者何也  
答曰此為欲解也解以夜半脈浮而解者濺然汗出  
也脈數而解者必能食也脈微而解者必大汗出也  
又問曰脈病欲知愈未愈者何以別之答曰寸口關

上尺中三處大小浮沈遲數同等雖有寒熱不解者  
此脈陰陽為和平雖劇當愈

又曰立夏得洪大脈洪一作浮是其本位其人病身體苦  
疼重者須發其汗若明日身不疼不重者不須發汗  
若汗濺然自出者明日便解矣何以言之立夏脈洪  
大是其時脈故使然也四時倣此

又問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令夜半得  
病明日日中愈日中得病夜半愈何以言之日中得  
病夜半愈者以陽得陰則解也夜半得病明日日中

仲景傷寒補亡論 卷二 辨脈法 四

愈者以陰得陽則解也  
又曰寸口脈浮為在表沈為在裏數為在府遲為在  
藏假令脈遲此為在藏也  
又曰跌陽脈浮而濇少陰脈如經者其病在脾法當  
下利何以知之若脈浮大者氣實血虛也今跌陽脈  
浮而濇故知脾氣不足胃氣虛也以少陰脈弦而浮  
一作沈纔見此為調脈故稱如經也若反滑而數者故  
知當屎膿也  
又曰寸口脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛



寒則傷榮衛俱病骨節煩疼可發其汗

又曰跌陽脈遲而緩胃氣如經也跌陽脈浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所為也榮衛內陷其數先微脈反但浮其人必大便鞭氣噫而除何以言之本以數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便鞭氣噫而除今脈反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脈當遲緩脈因前後度數如法病者則飢數脈不時則生惡瘡也

又師曰病人脈微而濇此為醫所病也大發其汗又

仲景傷寒補亡論

卷二

辨脈法

五

數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濇故知亡血也

又曰脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令洩數洩數則大便鞭汗多則熱愈汗

少則便難脈遲尙未可攻

又曰脈浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂此命絕也又未知何藏先受其災若汗出髮潤喘不休者此為肺先絕也陽反獨留形體如烟熏直視搖頭者此為心絕也唇吻反青四肢厥習者此為肝絕也環口黧黑柔汗發黃者此為脾絕也洩便遺失狂言目反直視者此為腎絕也又未知何藏陰陽先絕若陽氣前絕陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭者其人死身色必赤

仲景傷寒補亡論

卷二

辨脈法

六

下溫心下熱也

又曰寸口脈浮大而醫反下之此為大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人即餉音壹又曰跌陽脈浮浮則為虛浮虛相搏故令氣餉言胃氣虛竭也脈滑則為臑此為醫咎責虛取實守空迫血脈浮鼻中燥者必衄也

又曰諸脈浮數當發熱而洒淅惡寒若有痛處飲食如常者畜積有膿也



又曰脈浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱者差遲遲為無陽不能作汗其身必痒也又曰寸口脈陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下焦清邪中上名曰潔也濁邪中下名曰渾也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛脛酸所謂陽中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣為慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微結三焦相溷內外不通上焦怫鬱藏氣相熏口爛食斷也中

仲景傷寒補亡論 卷二 辨脈法 七

焦不治胃氣上衝脾氣不轉胃中為濁榮衛不通血凝不流若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作使遊於經絡出入藏府熱氣所過則為癰膿若陰氣前通者陽氣厥微陰無所使客氣內入噓而出之聲嗝咽塞寒厥相迫為熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不闔清便下重令便數難臍築湫痛命將難全

又曰脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥蹇臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微

發熱手足溫者此為欲解或到八日以上反大發熱者此為難治設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也

又曰脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此為欲解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食自可者為欲解病六七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁擾者必欲解也若脈和其人煩目重臉內際黃者此欲解也又曰脈浮而數浮為風數為虛風為熱虛為寒風虛相搏

仲景傷寒補亡論 卷二 辨脈法 八

則洒淅惡寒也 又曰脈浮而滑浮為陽滑為實陽實相搏其脈數疾衛氣失度浮滑之脈數疾發熱汗出者此為不治又曰傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也

仲景傷寒補亡論卷第二終



仲景傷寒補亡論卷第三

河南郭雍撰次

仲景平脈法四十五條

仲景問曰脈有三部陰陽相乘榮衛血氣在人體躬呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作效象形容春弦秋浮冬沈夏洪察色觀脈大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輒改易進退低昂心迷意惑動失紀綱願為具陳令得分明師曰子之所問道之根源脈有

仲景傷寒補亡論

卷三

平脈法

一

三部尺寸及關榮衛流行不失銜銓腎沈心洪肺浮肝弦此自經常不失銖分出入升降漏刻周旋水下二刻一周循環當復寸口虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沈潛水瀦支飲急弦動則為痛數則熱煩設有不應知變所緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然邪不空見中必有奸審察表裏三焦別焉知其所舍消息診看料度府藏獨見若神為子條記傳與賢人  
又師曰呼吸者脈之頭也初持脈來疾去遲此出疾

仲景傷寒補亡論 卷三

入遲名曰內虛外實也初持脈來遲去疾此出遲入疾名曰內實外虛也

又問曰上工望而知之中工問而知之下工脈而知之願聞其說師曰病家人請云病人苦發熱身體疼病人自臥師到診其脈沈而遲者知其差也何以知之表有病者脈當浮大今脈反沈遲故知愈也假令病人云腹內卒痛病人自坐師到脈之浮而大者知其差也何以知之若裏有病者脈當沈而細今脈浮大故知愈也

仲景傷寒補亡論

卷三

平脈法

二

又師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向壁臥此熱已去也設令脈不和處言自愈設令向壁臥聞師到不驚起而盼視若三言三止脈之嚙唾者此詐病也設令脈自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈  
又曰師持脈病人欠者無病也脈之呻者病也言遲者風也搖頭言者裏痛也行遲者表強也坐而伏者短氣也坐而下一脚者腰痛也裏實護腹如懷卵物者心痛也



又師曰伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有伏氣當須脈之若脈微弱者當喉中痛似傷非喉痺也病人云實咽中痛雖爾今復欲下利

又問曰人病恐怖者其脈何狀師曰脈形如循絲纍纍然其面白脫色也

又問曰人不飲其脈何類師曰脈自濇唇口乾燥也又問曰人愧者其脈何類師曰脈浮而面色乍白乍赤

又曰經說脈有三菽六菽重者何謂也師曰脈人以

仲景傷寒補亡論 卷三 平脈法 三

指按之如三菽之重者肺氣也菽小豆也如六菽之重者

心氣也如九菽之重者脾氣也如十二菽之重者肝氣也按之至骨者腎氣也

又曰假令下利寸口關上尺中悉不見脈然尺中時一小見脈再舉頭者腎氣也若見損脈來至為難治

此上當有北方腎脈其形何似云云問答起語此乃其下文轉語一節也錯簡在此

又問曰脈有相乘有縱有橫有逆有順何謂也師曰水行乘火金行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘

火名曰順也

又問曰脈有殘賊何謂也師曰脈有弦緊浮滑沈瀆此六者名曰殘賊能為諸脈作病也

又問曰脈有災怪何謂也師曰假令人病脈得太陽與形證相應因為作湯比還送湯如食頃病人乃大吐若下利腹中痛師曰我前來不見此證今乃變異是名災怪又問曰何緣作此吐利答曰或有舊時服藥今乃發作故名災怪耳

仲景傷寒補亡論 卷三 平脈法 四

又問曰東方肝脈其形何似師曰肝者木也名厥陰其脈微弦濡弱而長是肝脈也肝病自得濡弱者愈也假令得純弦脈者死何以知之以其脈如弦直是肝藏傷故知死也

又問曰南方心脈其形何似師曰心者火也名少陰其脈洪大而長是心脈也心病自得洪大者愈也假令脈來微去大故名反病在裏也脈來頭小本大者故名覆病在表也上微頭小者則汗出下微本大者則為關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死又問曰西方肺脈其形何似師曰肺者金也名太陰



其脈毛浮者是肺脈也肺病自得此脈若得緩遲者皆愈若得數者則劇何以知之數者南方火火尅西方金法當癰腫為難治也

又曰二月得毛浮脈何以處言至秋當死師曰二月之時脈當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝屬木脈應濡弱反得毛浮者是肺脈也肺屬金金來尅木故知至秋死他做此

又問曰脈肥人責浮瘦人責沈肥人當沈今反浮瘦人當浮今反沈故責之師曰寸脈下不至關為陽絕

仲景傷寒補亡論

卷三

平脈法

五

尺脈上不至關為陰絕此皆不治決死也若計其餘命死生之期期以月節尅之也

又曰脈病人不病名曰行尸以無王氣卒眩仆不識人者短命則死人病脈不病名曰內虛以無穀神雖困無苦

又問曰翁奄沈名曰滑何謂也師曰沈為純陰翁為正陽陰陽和合故令脈滑關尺自平陽明脈微沈飲食自可少陰脈微滑滑者緊之浮名也此為陰實其人必股內汗出陰下濕也

又問曰曾為人所難緊脈從何而來師曰假令亡汗若吐以肺裏寒故令脈緊也假令欬者坐飲冷水故令脈緊也假令下利以胃中虛冷故令脈緊也

又曰寸口衛氣盛名曰高高者暴榮氣盛名曰章章者

暴澤而光高章相搏名曰綱綱者身筋急衛氣弱名曰牒牒者心中

牒牒者心中榮氣弱名曰卑卑者心中牒卑相搏名曰損五藏六府俱乏

損氣虛故也衛氣和名曰緩緩者四肢榮氣和名曰遲遲者身體俱

名曰遲遲者身體俱緩遲相搏名曰沈沈者腹中急痛但

欲臥不欲行

仲景傷寒補亡論

卷三

平脈法

六

又曰寸口脈緩而遲緩則陽氣長其色鮮其顏光其聲商毛髮長遲則陰氣盛骨髓生血滿肌肉緊薄鮮鞭陰陽相抱榮衛俱行剛柔相得名曰強也

又曰跌陽脈滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊強痛還自傷以手把刃坐作瘡也

又曰寸口脈浮而大浮為虛大為實在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆

又曰跌陽脈伏而澀伏則吐逆水穀不化澀則食不得入名曰關格



又曰脈浮而大浮為風虛大為氣強風氣相搏必成癰疹身體為痒痒者名泄風久久為痂癩肩少髮稀而腥身有乾瘡

又曰寸口脈弱而遲弱者衛氣微遲者營中寒營為血血寒則發熱衛為氣氣微者心內飢飢而虛滿不能食也

又曰跌陽脈大而緊者當即下利為難治

又曰寸口脈弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞酸食卒不下氣填於膈上也上亦作下

仲景傷寒補亡論 卷三 平脈法 七

又曰跌陽脈緊而浮浮為氣緊為寒浮為腹滿緊為絞痛浮緊相搏腸鳴而轉轉則氣動膈氣乃下少陰脈不出其陰腫大而虛也

又曰寸口脈微而濇微者衛氣不行濇者榮氣不逮榮衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁營氣不足則煩疼口難言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢吞中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺洩

又曰跌陽脈沈而數沈為實數消穀緊者病難治

又曰寸口脈微而濇微者微氣衰濇者榮氣不足衛氣衰面色黃營氣不足面色青榮為根衛為葉榮衛俱微則根葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫也

又曰跌陽脈浮而芤浮者衛氣衰芤者榮氣傷其身體瘦肌肉甲錯浮芤相搏宗氣衰微四屬斷絕四屬謂皮肉脂髓俱竭則宗氣衰矣

又曰寸口脈微而緩微者微氣疎疎則其膚空緩者衛氣實實則穀消而水化也穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成營盛則其膚必疎三焦絕經名曰血崩

仲景傷寒補亡論 卷三 平脈法 八

又曰跌陽脈微而緊緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣

又曰少陰脈弱而濇弱者微煩濇者厥逆

又曰跌陽脈不出脾不上下身冷膚鞭

又曰少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸

膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門巨闕宗氣者三焦歸氣也

無形氣之神使也下榮玉莖故宗筋聚稀也



又曰寸口脈微尺脈緊其人虛損多汗知陰常在絕不見陽也

又曰寸口諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊為寒諸乘寒者則為厥鬱冒不仁以胃無穀氣脾滯不通口急不能言戰而慄也

又曰濡弱何以反適十一頭師曰五藏六府相乘故令十一

又問曰何以知乘府何以知乘藏師曰諸陽浮數為乘府諸陰遲澹為乘藏也

仲景傷寒補亡論

卷三 平脈法

九

仲景傷寒補亡論卷第三終

仲景傷寒補亡論卷第四

河南郭雍撰次

六經統論二十二問 太陽經證治上九十五條

六經統論二十二問

問曰傷寒三陽受病傳經何如素問三十一篇曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得臥也三日少陽受之少陽主膽其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病未入於藏可汗而已

仲景傷寒補亡論

卷四

六經統論

一

問曰三陰受病傳經如何素問曰四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗑故腹滿而嗑乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮問曰三陰可下何如仲景曰三陰皆受病已入於府可下而已

問曰汗下繫乎經或繫之日何也雍曰日猶經也大抵受病皆有常變其經與日不相應者則變也循常



則易治既變則難通然變當從證常可從日故素問又曰若其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已此言常道也

問曰經言其死皆以六七日之間何也雍曰六七日傳經皆徧陰陽俱受病已故重者死也素問曰三陰三陽五藏六府皆受病營衛不行五藏不通則死是也故經又言治之法各通其藏脈病日衰已如是則五藏不通則死通其藏脈則病衰也

問曰經言其愈皆以十日已上者何也雍曰此謂傷

仲景傷寒補亡論 卷四 六經統論 二

寒循常無變者故素問曰其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噦十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣此所以愈者皆十日以上也

仲景十一日渴止下無不滿十二日大氣皆去下有病人精神爽

問曰十二日以上不愈者何也仲景曰若過十三日以上不問尺寸陷者大危若更感異氣變為他病者

當依後壞病證而治之若脈陰陽俱盛重感於寒變成溫瘧陽脈浮滑陰脈濡弱者更遇於風變為風溫陽脈洪數陰脈實大更遇溫熱變為溫毒為病最重也陽脈濡弱陰脈弦緊更遇溫氣變為溫疫以此冬傷於寒發為溫病脈之變證方治如說龐氏溫疫作問曰傷寒一日巨陽受之王氏曰何也素問曰巨陽者諸陽之屬也皆有其脈連於風府故為諸陽主氣也又評熱論曰巨陽主氣故先受邪也

問曰兩感於寒者何如素問曰人之傷於寒也則為

仲景傷寒補亡論 卷四 六經統論 三

病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死一日太陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩滿二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食讖語三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六日死

問曰素問又言三日乃死何也雍曰即前所謂六日死也何以言之兩感之病陰陽表裏兩經俱傳至三日則六經陰陽已傳盡水漿不入口不知人是時五藏已盡傷六府已不通榮衛已不仁如是之後三日



乃死帝疑之故再舉問岐伯謂是時陽明之氣獨未盡故又三日而後死是以其言曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故不知人三日其氣乃盡故死矣夫不知人者則兩感陰陽俱傳三日之證也陽明爲諸經之長其血氣盛所以滋養諸經其血氣已散入諸經者各隨其經絕矣其在陽明未散入諸經者又須三日而後乃盡以是知六日者三日傳陰陽諸經又三日陽明之氣方盡是爲六日而世之讀經者以六日爲陰陽再傳經而死若陰陽尙能再傳則不死

仲景傷寒補亡論

卷四

六經統論

四

矣其曰三日死者又別爲陽明氣血隨邪而盡之說與六日不相通其誤甚矣

問曰傷寒獨傳足陰陽六經何也孫真人云人有五藏心肺二藏經絡所起在手十指肝腎與脾三藏經絡所起在足十指夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之所以中人必中於足雍曰此孫真人感風毒之論傷寒之感亦無以異也問曰傷寒三陽受病傳不傳可見否仲景曰傷寒一日太陽受之脈若靜者爲不傳煩欲吐若躁煩脈數

急者爲傳也又曰傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也

問曰三陰經傳不傳可見否仲景曰傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪也不受邪則不傳矣

問曰六經於藏府何屬也雍曰足太陽膀胱經也足陽明胃經也足少陽膽經也此三府者皆爲陽也足太陰脾之經也足少陰腎之經也足厥陰肝之經也此三藏皆爲陰也陽爲表陰爲裏故足太陽與足少

仲景傷寒補亡論

卷四

六經統論

五

陰爲表裏腎與膀胱也足陽明與足太陰爲表裏脾與胃也足少陽與足厥陰爲表裏肝與膽也

問曰願聞六經之所起雍曰本於靈樞之言未可遽詳也朱氏活人書可見其略云足太陽膀胱起於目內眥上頭連於風府分爲四道下項并正別脈上下六道以行於背與身爲經太陽之經爲諸陽主氣或中寒邪必發熱而惡寒緣頭項腰脊足太陽經所過處今頭項痛腰脊強身體疼其尺寸脈俱浮者故知太陽經受病此其大略也



問曰陽明經何如朱氏曰足陽明胃之經從鼻起俠於鼻絡於目下咽分為四道并正別脈六道上下行腹綱維於身蓋諸陽在表陽明主肌肉絡於鼻故病人身熱目疼鼻乾不得臥其脈尺寸俱長者故知陽明經受病

問曰少陽經何如朱氏曰足少陽膽之經起目外眦外當作鏡絡於耳分為四道下缺盆循於脇并正別脈六道上下主經營百節流氣三部故病人胸脇痛而耳聾或口苦咽乾或往來寒熱而嘔其脈尺寸俱弦者

仲景傷寒補亡論 卷四 六經統論 六  
知少陽經受病也

問曰太陰經何如朱氏曰足太陰脾之經為三陰之首其脈布於脾胃絡於嗑喉故病人腹滿而嗑乾其脈尺寸俱沈細者知太陰經受病也

問曰少陰經何如朱氏曰足少陰腎之經其脈起於足小指之下斜趣心別行者入跟中上至股內後廉貫腎絡膀胱直行從腎上貫肝膈入肺中繫舌本傷寒熱氣入於藏流入於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲又經發汗吐下以後藏府空虛津液

枯竭腎有餘熱亦渴故病人口燥舌乾而渴其脈尺寸俱沈者少陰受病也

問曰厥陰何如朱氏曰足厥陰肝之經厥者盡也靈樞經亥為左足之厥陰戌為右足之厥陰兩陰俱盡故曰厥陰夫陰盡為晦陰出為朔厥陰者以陰盡為義也其脈循陰器而絡於舌本脈弗營則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌卷而囊縮凡病人煩滿而囊縮其脈尺寸俱微緩者知厥陰經受病也

問曰六經之脈狀何如仲景曰尺寸俱浮者太陽受仲景傷寒補亡論 卷四 六經統論 七

病也尺寸俱長者陽明受病也尺寸俱弦者少陽受病也尺寸俱沈細者太陰受病也尺寸俱沈者少陰受病也尺寸俱微緩者厥陰受病也

問曰陽明厥陰之義何也素問七十四篇曰陽明何謂也岐伯曰兩陽合明也厥陰何謂也岐伯曰兩陰交盡也

太陽經證治上九十五條

雍曰自此以下皆仲景本論更不設問恐滋繁言第曰仲景曰繼則又曰而已其他書所



言及有疑者方設問以答之本論有仲景原  
答問者則首曰仲景問曰是也其次並依仲  
景本論先後不復易云

仲景曰脈尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以  
其上連風府故頭項痛腰脊強

又曰太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒

又曰太陽病發熱汗出惡風脈緩謂浮而緩者名曰中風

又曰太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆  
脈陰陽俱緊者名曰傷寒王叔和曰太陽病脈浮而

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 八

數可發其汗屬桂枝湯又曰太陽病未解其脈浮弱  
當以汗解宜桂枝湯又曰太陽病頭痛發熱汗出惡  
風若惡寒屬桂枝證汗出惡寒亦屬桂枝常類士器  
之補治論曰汗出惡風宜桂枝湯無汗惡寒宜麻黃  
湯雍曰中風傷寒二證本以有汗無汗而分桂枝麻  
黃二湯亦分有汗無汗而用故汗出亦有惡寒者亦  
屬中風王叔和亦用桂枝不以惡寒而改用麻黃者  
謂其有汗也

問曰太陽一經何其或有汗或無汗也雍曰繫乎營

衛之氣也營行脈中衛行脈外亦以內外和諧而後  
可行也風邪之氣中淺則中衛中衛則衛強衛強不  
與營相屬其慄悍之氣隨空隙而外出則為汗矣故  
有汗者衛氣遇毛孔而出者也寒邪中深則涉衛中  
營二氣俱受病無一強一弱之證寒邪營衛相結而  
不行則衛氣無自而出必用藥發其汗然後邪去而  
營衛復通故雖一經有汗無汗二證亦有桂枝解  
表麻黃發汗之治法不同也仲景論營衛和不和俱  
見于後

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 九

千金曰傷寒一日太陽脈弱至四日太陰脈大

仲景曰傷寒一日太陽受之脈若靜者為不傳頗欲  
吐若躁煩脈數急者為傳也常器之曰宜辨中風傷  
寒有汗無汗用麻黃桂枝二湯孫真人曰太陽病三  
四日不吐下見芤乃汗之

又曰太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病若發汗已  
身灼熱者名風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗出身  
重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利  
直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘕癰



若火熏之一逆尚引日再逆促命期常器之補治論  
曰轉下火熏皆為逆也可白虎加人參湯桂枝柴胡  
各半湯桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯雍曰  
救逆湯治被火熏則無疑桂枝柴胡各半湯即柴胡  
桂枝湯也然有三證汗多亡陽外證未去雖譏語亦  
不可下當和營衛通津液用柴胡桂枝湯此未被下  
時可用也若已發汗又復下之小便不利渴而不嘔  
此為未解宜柴胡桂枝乾薑湯此被下後小便不利  
而渴者可用也若傷寒八九日下之胸滿煩驚小便

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 十

不利用柴胡加龍骨牡蠣湯此被下後小便不利有  
煩驚證者可用也惟白虎加人參湯治大渴飲水口  
乾舌燥無表證者可服脈浮表未解者不可服今溫  
病風溫表未解者皆脈浮則不可服明矣白虎加人  
參本治裏熱太陽發熱而渴非裏熱不可服故今去  
之  
又曰病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於  
陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七  
陰數六故也龐氏曰發於陽者隨證用汗藥攻其表

發於陰者用四逆輩溫其內  
又曰太陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡  
故也若欲作再經者鍼足陽明龐云補三里穴使經不傳則  
愈問曰經言其死皆以六七日之間而論言七日以  
上自愈何也雍曰感之重而證有變異者死感之輕  
而證無變異者自愈也

又曰風家表解而不了了者十二日愈龐注云方言或謂之差或謂之了  
又曰病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 十一

隨也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也  
朱氏曰熱在皮膚者表熱裏寒宜先與陰旦湯寒已  
次以小柴胡加桂以溫其表寒在皮膚者表寒裏熱  
宜先以白虎加參湯除熱次以麻桂各半湯解其表  
大抵病有標本治有先後表熱裏寒脈必沈而遲手  
足微厥下利清穀也所以陰證亦有發熱者四逆湯  
通脈四逆湯主之表寒裏熱者脈必滑而厥口燥舌  
乾也所以少陰惡寒而踰時時自煩不欲厚衣用大  
柴胡湯下之而愈雍曰皮膚固為表而骨髓為裏有



二說所以仲景不直言表裏而曰皮膚骨髓也夫表裏者人身之陰陽也靈樞六篇曰內有陰陽外亦有陰陽在內者五藏爲陰六府爲陽在外者筋骨爲陰皮膚爲陽今朱氏雖從表裏法治之然是以在內治裏之法而治在外之裏也常器之只用桂枝麻黃各半湯雖亦有理又疑麻黃雖能和營衛而不至骨髓朱氏似失之深常氏似失之淺宜於二者之間消息用藥或用朱氏之藥則少與之用常氏之藥則多與之可也

仲景傷寒補亡論

卷四

太陽經上

三

又曰太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之千金翼曰太陽中風發熱而惡寒又曰太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之又曰太陽病項背強九九反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之又曰太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯若不衝者不可與之又曰太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解

者此爲壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之

又曰桂枝本爲解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可與之常須識此勿令悞也常器之云可麻黃湯又曰若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也

又曰喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

又曰凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也常氏曰可服類要芍藥地黃湯雍曰見膿血而後可服

仲景傷寒補亡論

卷四

太陽經上

三

又曰太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之千金云桂枝湯加附子一箇炮卽是龐氏曰若小便數切不可行此湯宜用芍藥甘草湯若誤行桂枝加附子湯攻表則咽乾煩躁厥逆嘔吐者作甘草乾薑湯與之以復陽氣若厥愈足溫更與芍藥甘草湯其脚卽伸若胃氣不和讖語者少與調胃承氣湯微溏則讖語止雍曰此仲景治自汗小便數之法龐氏以治發汗漏不止小便數其證實一也



又曰太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者桂枝去芍藥方中加附子湯主之

又曰太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者

為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能

得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

又曰太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈仲景云太陽受病上連風

仲景傷寒補亡論

卷四

太陽經上

古

府故治傷寒以風府為要穴風池次之然風府近腦

戶或疑不敢刺在法又禁灸風池則灸刺皆無禁也

又曰服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法

若形似瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯

又曰服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之

又曰太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽

也不可發汗宜桂枝二越婢一湯千金云不可發汗

又曰服桂枝湯或下之仍頭項強痛翁翁發熱無汗

心下滿微痛小便不利者桂枝去芍藥加茯苓白木湯主之

又曰傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急

反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩

躁吐逆者作甘草薑湯與之以復其陽若厥愈足

溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和

譏語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四

逆湯主之見九卷

仲景問曰證象陽旦陽旦即桂枝異名按法治之而增劇厥

逆咽中乾兩脛拘急而譏語師言夜半手足當溫兩

脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮

則為風大則為虛風則生微熱虛則兩脛攣病證象

桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子溫經亡陽

故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譏語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脛伸以承氣湯微溏則止其譏語故知病可愈雍曰此一段問答重解釋前段誤用桂枝加附子之證按法治之謂令服桂枝湯也以此推

仲景傷寒補亡論

卷四

太陽經上

古



之則證象陽且者小便不利則用桂枝加附子湯小便數則用甘草乾薑湯芍藥甘草湯惟以小便爲準耳雁氏曰兩脛攣小便數仍汗出爲津液少不可誤行桂枝湯宜補虛退熱用芍藥甘草湯通治

又曰太陽病項背強九九無汗惡風葛根湯主之

又曰太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之用葛根茯苓黃連湯方未見疑卽葛根黃芩黃連湯

又曰太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半升湯主之千金云葛根湯中加半夏半升

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 六

又曰太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之

又曰太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

又曰太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯主之

又曰太陽病十日已去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯

問曰太陽病論有言至七日以上有言十日已去若

此之類未知傳經與不傳經也雍曰究其意義雖可見又當以脈證辨之且如七日以上自愈者謂六日傳經已遍而無變異也十日已去設有胸滿脇痛者是傳陽明也其脈浮而無他證者只在太陽不傳故仲景猶用麻黃也所以朱氏言寒邪中人不必皆始於太陽兼有首尾止在一經或間傳一二經不可以一理推但據脈與外證治之若過日多脈大浮數按之不足者尙責太陽發汗而愈此卽仲景十日已去脈但浮者服麻黃湯之意也有汗者何如曰詳證於

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 七

諸桂枝湯中選用之朱又云不必皆始於太陽者何如曰雍雖未之見在理應有之須證脈可辨如感疾頭不甚痛卽非太陽也蓋感病之變異者如巨陽先受邪則世俗謂之正傷寒也

仲景曰太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服用之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也雍曰中風而脈浮緊是中風見寒脈也故可服若脈微弱則非寒脈又汗出惡風亦皆中風證故不可服設服之則汗



漏不止筋惕肉瞤而死筋惕肉瞤者以亡陽故也其詳別見可汗門中

又曰傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之雍曰傷寒而脈浮緩是傷寒見風脈也少陰裏證大青龍發表藥故無少陰證者可服少陰口燥舌乾而渴是也龐氏云當作無太陰證且仲景於不可發汗證中已言少陰病不可發汗況用大青龍湯尤為不可則此用少陰字為無疑而龐氏因脈證相似乃云當作太陰證雖龐氏之誤然大陰仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 六 病亦不可發汗三陰皆不可服特少陰最為緊急耳仲景大青龍湯惟此兩證以其汗出亡陽太暴善醫者復不敢用往往臨時審證以他藥代之若用桂枝麻黃各半湯亦好惟是力緩宜多服和解之

又曰傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

又曰傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒氣欲解也小青龍湯主之

又曰太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯

又曰太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏子湯主之千金云宜桂枝湯一云麻黃湯

又曰太陽病外證未解者不可下也下之為逆欲解外者宜桂枝湯主之

又曰太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 九

又曰太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

又曰太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈

又曰二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足



言陽氣拂鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗不徹以脈濇故知之龐氏云宜麻黃湯雍曰龐氏在陽明以古本差誤仍改本

又曰脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津液自知便自汗出愈常器之云汗不出者可與小柴胡湯雍曰若心下悸而煩宜小建中

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 于

湯表裏俱虛宜桂枝麻黃各半湯設若用柴胡和解亦宜用柴胡桂枝和其營衛以通津液此證是下後裏虛故仲景待其氣復津液自和而汗出不必更用藥此一證非有證無治其不用藥便是治法也常氏必欲和解之疑其用藥太重故雍以柔劑少殺其力庶幾得中要之能少忍待其自和從仲景不用藥法為上也

又曰脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之謂發汗也假令尺中遲者不可發汗何以知其然以營氣不足血少

故也雍曰此一證與前證略相似宜小建中湯次則柴胡桂枝湯又不若待其別見證而治之蓋前證是下後證當無別證出故仲景不用藥此證是汗前證須別有證出故不若少待之既知血少不可使用小柴胡湯也

又曰脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯

又曰脈浮而數者可發汗宜麻黃湯

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 于

又曰脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

又曰病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故耳以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯  
問曰榮氣既和何為自汗出也雍曰平人榮衛之氣常自和也設衛中於風而榮不中於寒是衛有邪氣而榮無邪氣也有邪氣者強無邪氣者弱一強一弱故榮不得與衛氣諧和而獨和則衛氣無所依以慄悍無所依之氣又以邪氣濟之兩氣盈溢谿谷不能容榮深而衛淺故衛氣於皮膚間不得內合於榮而



外見隙穴則出為自汗也用桂枝解其肌則衛之邪氣去衛無邪氣則其氣自衰自然還內與榮和而汗止矣

仲景曰病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之

又曰傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

又曰傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也不可與之當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯常器之云或疑其誤也設

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 三

須發汗當用麻黃湯不然用桂枝麻黃各半湯取其小小汗出而已雍曰仲景書桂枝無治衄法麻黃有治衄法故此一證常氏疑其有誤而改用麻黃也設若頭不痛則不衄不衄則不可用麻黃故宜桂枝麻黃各半湯取小汗而已更宜以有汗無汗決之仲景書安得無傳寫之誤也

又曰傷寒發汗解半日許復煩其脈浮數者可更發汗宜桂枝湯主之雍曰須言半日許者以過此而復煩即屬勞復不用桂枝湯也

又曰凡病若發汗若吐若下若亡血亡津液陰陽自和者必自愈雍曰言凡者不止謂傷寒也若傷寒未和者少待其和或須藥可柴胡桂枝湯少與之不必用小柴胡也

又曰大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利者必自愈雍曰不必更以藥利其小便自待其通則愈

又曰下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也常氏曰素無熱人可與芍藥附子湯有

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 三

熱人可與黃芪建中湯

又曰下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沈微身無大熱者乾薑附子湯主之

又曰發汗後身疼痛脈沈遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之

又曰發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯主之

又曰發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘



草大棗湯主之

又曰發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主之

又曰發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯主之

又曰傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之

又曰發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子

仲景傷寒補亡論

卷四

太陽經上

五

湯主之

又曰發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

又曰發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當

和胃氣與調胃承氣湯雍曰虛者芍藥甘草附子湯

又曰太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲

得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便

不利微熱消渴者五苓散主之

又曰發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之

又曰傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

又曰中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

又曰未持脈時病人叉手自冒心師因教試令欬而不欬者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此常器之云素無熱人可與芍藥附子湯素有熱人可與黃芪建中湯

又曰發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘常云可與

仲景傷寒補亡論

卷四

太陽經上

五

麻黃杏子甘草石膏湯

又曰發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止常云可與半夏茯苓湯

又曰發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒

心中懊憹梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯

主之若嘔者梔子生薑豉湯主之

又曰發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

又曰傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者

未欲解也梔子豉湯主之

又曰傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之

又曰凡用梔子湯病人舊微溏者不可與服之

又曰太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之

又曰咽喉乾燥者不可發汗常氏云可與小柴胡湯又曰瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痊常氏云可小柴胡湯

又曰淋家不可發汗發汗必便血

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 五

又曰衄家不可發汗汗出必額上陷脈急緊直視不能胸不得眠常氏云可犀角地黃湯

又曰亡血家不可發汗發汗則寒慄而振常氏云可與芍藥地黃湯

又曰汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧丸方本闕常氏云禹餘糧石一味火煨散服亦可雍曰用禹餘糧不用石石乃殼也

又曰病人有寒復發汗胃中冷必吐衄常氏云可服烏梅丸雍曰宜服理中丸

又曰本發汗而復下之此為逆也若先發汗治不為逆本先下之而反汗之為逆若先下之治不為逆雍曰此為病當先汗而反先下之故為逆也若已汗而復下之者不為逆也或病當先下而反先汗之故為逆也若已下而後汗之者不為逆也如太陽證當汗而反下之少陰證當下而反汗之皆為逆也

仲景傷寒補亡論 卷四 太陽經上 五

仲景傷寒補亡論卷第四終



仲景傷寒補亡論卷第五

河南郭雍撰次

太陽經證治下九十一條

仲景曰傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯雍曰此謂太陽證誤下之者又曰病發熱頭痛脈反沈若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯雍曰此太陽病而得少陰脈故急當救裏

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

又曰太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏未和然後復下之常氏云和表用小柴胡湯復下用調胃承氣湯雍曰汗出表和則不必復下又曰太陽病未解脈陰陽俱停一作微必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解千金云宜桂枝湯但陰脈微一有而尺脈實四字者下之而解若欲下之宜調胃承氣湯柴胡湯一云宜大柴胡湯又曰太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出

欲救邪風者宜桂枝湯雍曰邪風在衛之風也

又曰傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者與小柴胡湯主之

又曰血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也一云藏府必脇膈相連其病中痛小柴胡湯主之服柴胡湯已渴者屬陽明也

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

以法治之常器之云亦與小柴胡湯待其便堅方可用調胃承氣湯

又曰得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡不中與也食穀者噦常氏云可五苓散小半夏橘皮湯雍曰出千金十八卷痰飲門若證象陽旦小便難者屬桂枝加附子湯見前卷

又曰傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫



而渴者小柴胡湯主之

又曰傷寒陽脈澀陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者小柴胡湯主之

又曰傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解雍曰柴胡湯證誤以他藥下之者也

又曰傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

又曰太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

三

胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈雍曰嘔止小安者勿服大柴胡也

又曰傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日哺所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之千金曰柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯也

又曰傷寒十三日不解過經讖語者以內有熱也當

以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利其脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為內實也調胃承氣湯主之

又曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯雍曰外不解者未可攻先解其外千金用桂枝湯

又曰傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

四

又曰傷寒腹滿讖語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門傷寒發熱晝晝惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門

又曰太陽病二日反躁反熨其背而大汗出火氣入胃胃中水竭躁煩必發讖語十餘日振慄自下利者此為欲解也後不可火證中日振而反汗出為欲解故其汗從腰以下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便鞭小便當數而反不數及多大便已頭卓然而痛其人



足心必熱穀氣下流故也常云可與白虎加人參湯  
五苓散調胃承氣湯雍曰常氏之意謂火氣入胃胃  
中枯燥故用白虎加人參湯解之然須無表證渴飲  
水者可服有表證者不可服以白虎解裏熱故也小  
便不利者固當用五苓散然渴飲水者宜服其大便  
鞭者用調胃承氣湯亦小便不利則可服小便利者  
反不可服振慄反汗出者若自下利皆不宜服若無  
上諸證而大便鞭或不通讖語仍在者然後可服此  
一論證多宜審之若欲解諸證未生時勢須先去火

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

五

邪宜救逆湯

又曰太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流  
溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰  
虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑  
頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讖語甚  
者至噦手足躁擾捻衣摸床小便利者其人可治常  
氏云可桂枝去芍藥加龍骨牡蠣救逆湯五苓散大  
承氣湯雍曰救逆則可陰陽俱虛身體枯燥大承氣  
不敢用小便不利與五苓散發黃者茵陳蒿湯

又曰傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不  
安者桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之  
又曰形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火者  
必讖語弱者發熱脈浮解之當汗出愈常氏云可依  
前救逆湯

又曰太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解  
必圜血名爲火邪常氏云可依前救逆湯黃芩芍藥  
湯

又曰脈浮熱甚而反灸之此爲實實以虛治因火而

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

六

動必咽燥唾血常氏云可依前救逆湯

又曰微數之脈慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛  
逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難  
復也常氏云可依前救逆湯欲其有汗宜柴胡桂枝  
湯

又曰脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛  
病從腰以下必重而痺名火逆也欲自解者必當先  
煩乃有汗而解何以知之脈浮故知汗出解也雍曰  
宜少與救逆湯

活人書  
第十方



又曰燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯更加桂二兩

又曰火逆下之因燒鍼煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

又曰太陽傷寒者加溫鍼必驚也常氏曰可依前救逆湯

又曰太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中

仲景傷寒補亡論 卷五 太陽經下 七

飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此為小逆常氏曰可與小半夏湯小溫中湯亦可與半夏乾薑湯出金匱方雍曰活人書大半夏湯小半夏加茯苓湯半夏生薑湯皆可選用

又曰太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也常氏曰可與竹葉石膏湯又曰病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微膈氣虛脈乃數也數為客熱不能消

穀以胃中虛冷故吐也常氏云可與小半夏湯小溫中湯

又曰太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微澹者此非柴胡證以嘔故知極吐下也雍曰與調胃承氣湯者謂前證也後證但欲嘔以下非柴胡證宜橘皮湯大半夏加橘皮湯

又曰太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之

仲景傷寒補亡論 卷五 太陽經下 八

又曰太陽病身黃脈沈結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之常氏云小便不利無血者與五苓散

又曰傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸  
又曰太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少



者必苦裏急也常氏曰可茯苓桂枝甘草生薑湯猪苓湯雍曰小便利用茯苓桂枝白朮甘草湯小便少應用猪苓湯

仲景問曰病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關脈沈名曰結胸也

又曰何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸口脈浮關脈小細沈緊名曰藏結舌上白胎滑者難治常氏曰可刺關元穴

又曰藏結無陽證不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜舌

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

九

上胎滑者不可攻也常氏云可刺關元穴雍曰宜灸又曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之一作汗之千金方同因作痞所以成結胸者以下之大早故也

又曰結胸者項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷胸丸

又曰結胸證其脈浮大者不可下下之則死常氏云可與增損理中丸并蜜丸服如未效用黃連七寸巴豆七粒二味搗如泥封臍上灼艾灸熱漸效

又曰結胸證悉具煩躁者亦死

又曰太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛一云頭痛則眩千金方同

胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷

心下因鞭則為結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃也常

氏云發黃者與茵陳蒿湯煎茵陳濃汁調五苓散亦可

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

十

又曰傷寒六七日結胸熱實脈沈而緊心下痛按之石鞭者大陷胸湯主之

又曰傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之

又曰太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱一云日晡所發心胸大煩從心下至少

腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之

又曰小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑者小陷



胸湯主之

又曰太陽病二三日不能臥但欲起心下必結其脈微弱者此本有寒分也常云可增損理中丸反下之若利止必作結胸常云可大小陷胸湯主之利未止者四日復下之此作協熱利也常云白頭翁湯

又曰太陽病下之其脈促一作縱不結胸者此為欲解也脈浮者必結胸常云可增損理中丸脈緊者必咽

痛常云可桔梗甘草湯脈弦者必兩脇拘急常云小柴胡湯脈細數者頭痛未止常云可蔥鬚湯脈沈緊

仲景傷寒補亡論 卷五 太陽經下 十一

者必欲嘔常云可七物黃連湯脈沈滑者協熱利常云可白頭翁湯脈浮滑者必下血常云可與類要藥

皮湯

又曰病在陽應以汗解之反以冷水暎之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

又曰太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發

汗發汗則譫語脈弦五六日譫語不止當刺期門

又曰婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱

入血室也當刺期門隨其實而瀉之常氏云隨其實而瀉謂鍼家當行瀉法也亦可用小柴胡湯

又曰婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

又曰婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語

仲景傷寒補亡論 卷五 太陽經下 十二

如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈雍曰上焦中焦榮衛所出也如不自愈者服小柴

胡湯

又曰傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

又曰傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者為未

解也柴胡桂枝乾薑湯主之

又曰傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口



不欲食大便鞭脈細者此為陽微結必有表復有裏也脈沈亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在裏半在外也脈雖沈緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

又曰傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不得為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

三

痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

又曰太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞭下利不止水漿不下其人心煩常氏曰可半夏生薑二瀉心湯

又曰脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳常氏曰可小陷胸湯生薑瀉心湯雍曰宜半夏瀉心湯枳實理中丸

又曰太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱

熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

又曰太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加燒鍼因胸煩面色青黃膚暍者難治今色微黃手足溫者易愈常氏曰可生薑瀉心湯小柴胡湯桂枝去芍藥加龍骨牡蠣救逆湯雍曰此難治之證一言不可盡臨時更詳輕重痞甚則先瀉心發熱惡寒甚則先柴胡火

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

古

逆甚則先救逆從所重治之

又曰心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之

又曰心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

又曰本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之一方云忍之一日乃愈

又曰傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之



又曰傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之

又曰傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便常氏云可五苓散

又曰傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

五

鞭脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿常氏云可茯苓甘草白朮生薑湯成痿者振痿湯雍曰當作茯苓桂枝白朮甘草湯

又曰傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭湯主之

又曰下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

又曰太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

又曰傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

又曰傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之

又曰病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂散

又曰病人脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

六

者此名藏結死常氏云可刺大赫在腹部第二行

又曰傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

又曰傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

又曰傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

又曰太陽少陽併病心下鞭頸項強而眩者當刺大

1500 子部 醫家類 5 頁下



椎肺俞肝俞慎勿下之

又曰太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

又曰傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

又曰風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

又曰傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之雍

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

七

曰此一證傳寫之誤校正者謂熱結在裏表裏俱熱此即仲景吐下後欲飲水數升白虎加人參湯之證又非此也仲景別條云傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎表不解者尚不可服況裏有寒者乎詳此證當作傷寒脈浮滑此表裏有熱白虎湯主之是亦仲景之言故仲景厥陰論中脈滑而厥亦為裏有熱亦用白虎也

又曰傷寒脈結代心動悸炙甘草湯主之

又曰脈按之來緩時一止復來者名曰結又脈來動

而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脈來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脈

者必難治雍曰宜炙甘草湯難治者謂代陰脈也金

匱要略云脈結心悸炙甘草湯是也仲景曰傷寒八

九日風溫相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈

浮虛而濇者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便

自利者去桂枝加白朮湯主之雍曰桂枝附子湯非

桂枝加附子湯也朱氏名曰桂附湯者是也所主不

同而世多誤用故朱氏少辨其名今桂枝加附子湯

仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

六

係桂枝第六方桂枝附子湯係桂枝第十七方去桂加白朮者謂自桂枝附子湯中去桂枝加白朮非謂桂枝加附子湯中加減也宜詳之

又曰病欲吐者不可下常氏云可小半夏加橘皮湯

又曰太陽病有外證未解不可下下之為逆常氏云

可桂枝麻黃各半湯雍曰依可汗證中用桂枝二麻

黃一湯

又曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰

而反下之官本及脈經汗因作痞脈浮而緊而復下



之緊反入裏則作痞常氏云可小陷胸湯瀉心湯雍  
曰宜用半夏瀉心湯


仲景傷寒補亡論

卷五

太陽經下

九

仲景傷寒補亡論卷第五終



仲景傷寒補亡論卷第六

河南郭雍撰

陽明經證治八十七條 少陽經證治十一條

陽明經證治八十七條

仲景曰尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其  
脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥龐氏曰此  
證惡寒可發汗若惡寒罷反自汗惡熱者為胃家實  
屬正陽陽明宜調胃承氣湯

仲景問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明

仲景傷寒補亡論 卷六 陽明經

何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃  
家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實  
大便難是也龐氏曰本太陽病若發汗若下若利小  
便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明名曰太陽陽明  
也本傳到少陽因發汗利小便胃中燥大便難者名  
曰少陽陽明也病人本風盛氣實津液消燥或始惡  
寒汗出後惡寒既罷而反發熱或始得病便發熱狂  
言者名曰正陽陽明也凡陽明證俱宜下唯中寒惡  
寒為病在經與太陽合病屬表可發其汗



又曰陽明之為病胃家實是也千金作胃中寒者非  
又問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若  
利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內  
實大便難者此名陽明也

又問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒  
反惡熱也

又問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰  
雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

又問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所  
仲景傷寒補亡論 卷六 陽明經 二

歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

又曰日本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬  
陽明也

又曰傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濇濇然者  
是轉屬陽明也

又曰傷寒三日陽明脈大

又曰傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太  
陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日  
大便鞭者為陽明病也

又曰傷寒轉繫陽明者其人濇然微汗出也

又曰陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮  
而緊若下之則腹滿小便難也常氏云可桂枝麻黃  
各半湯小柴胡湯

又曰陽明病若能食名中風不能食名中寒

又曰陽明病若中寒者不能食小便不利手足濇然  
汗出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃  
中冷水穀不別故也常氏云可理中湯猪苓湯

又曰陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨  
仲景傷寒補亡論 卷六 陽明經 三

節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濇然汗出而解者此  
水不勝穀氣與汗共并脈緊則愈常氏云疑關麻黃  
湯一法又一本云脈去則愈雍曰千金翼作堅者則  
愈無脈字證既有誤未可使用麻黃湯也若脈浮而  
緊無汗者則可用三書之誤是誤以緊為堅者為去  
或漏脈字或漏者字當云脈緊者則愈

又曰陽明病欲解時從申至戌上

又曰陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛  
冷故也以其人本虛故攻其熱必噦常云可溫中湯



金匱方小半夏湯亦可

又曰陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀瘴雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也常氏云茯苓湯五苓散雍曰已發黃者茵陳蒿湯又曰陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也常氏云可桂枝加黃耆湯雍曰以無汗故如蟲行皮中狀須小汗乃解宜桂枝麻黃各半湯此湯解身痒能小汗故也

又曰陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足

仲景傳集補亡論

卷六 陽明經

四

厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛常氏云類要用小建中湯誤也可小柴胡湯雍曰手足厥者宜小建中湯

又曰陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛常氏云可服茯苓甘草白朮生薑湯未見方咽痛者宜桔梗湯

又曰陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃常氏云可茵陳蒿湯調五苓散

又曰陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發

黃常氏云可與茵陳蒿湯調五苓散

又曰陽明病脈浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出常氏云可與柴胡桂枝湯

又曰陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄常氏云可黃芩芍藥地黃湯當作黃芩芍藥甘草湯此句後增非郭氏語

又曰陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尙微煩不了了者此大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液

仲景傳集補亡論

卷六 陽明經

五

當還入胃中故知不久必大便也

又曰傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之常云可小柴胡湯

又曰陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈常氏云未攻者可與生薑瀉心湯利不止者四逆湯

又曰陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也常氏云可五苓散雍曰既不可攻則調胃承氣不可用但煎茵陳蒿湯調五苓散服之



又曰陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯  
又曰陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣  
腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然  
汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多微發  
熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹  
大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下  
又曰陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭  
者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法  
少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃  
仲景傷寒補亡論 卷六 陽明經 六  
可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必溏不可攻  
之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後  
發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉  
失氣者慎不可攻也  
又曰夫實則讖語虛則鄭聲鄭聲者重語也直視讖  
語喘滿者死下利者亦死  
又曰發汗多若重發汗者亡其陽讖語脈短者死脈  
自和者不死  
又曰傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十

餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者  
發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視脈弦者  
生瀆者死微者但發熱讖語者大承氣湯主之若一  
服利止後服  
又曰陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必  
鞭鞭則讖語小承氣湯主之若一服讖語止者更莫  
復服  
又曰陽明病讖語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主  
之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不  
仲景傷寒補亡論 卷六 陽明經 七  
轉失氣者勿更與之明日又不大便脈反微濇者裏  
虛也為難治不可更與承氣湯也常氏云可用黃耆  
人參建中湯  
又曰陽明病讖語有潮熱反不能食者胃中必有燥  
屎五六枚也若能食者但鞭耳宜大承氣湯下之  
又曰陽明病下血讖語者此為熱入血室但頭汗出  
者刺期門隨其實而瀉之濇然汗出則愈雍曰此是  
婦人證  
又曰汗出讖語者以有燥屎在胃中此為風也須下



之過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之則愈宜大承氣湯

又曰傷寒四五日脈沈而喘滿沈為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則讖語常氏云喘滿無大熱者可麻黃杏仁甘草石膏湯裏實讖語者調胃承氣湯

又曰三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢讖語遺尿發汗則讖語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之龐氏在少陽證

仲景傷寒補亡論 卷六 陽明經 八

又曰二陽併病太陽證罷但發潮熱手足熱汗出大便難而讖語者下之則愈宜大承氣湯

又曰陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讖語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之龐氏云脈浮緊當無汗反有汗咽燥腹滿惡熱法當下之而反脈浮緊不可下此恐變風濕宜細詳之

又曰若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之又曰若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主

之

又曰陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也常氏云可與白虎加人參湯雍曰宜柴胡桂枝湯和榮衛通津液也

又曰脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之又曰若胃中虛冷不能食者飲水則噦常氏云可溫中湯金匱方二物

又曰脈浮發熱口乾鼻燥能食者則芎常氏云可黃芩湯

仲景傷寒補亡論 卷六 陽明經 九

又曰陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

又曰陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者與小柴胡湯主之

又曰陽明病脇下鞅滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解也

又曰陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉



黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯

又曰脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治雍曰千金通續前證為一證似當理

又曰陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可為導

又曰陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

仲景傷寒補亡論

卷六 陽明經

十

又曰陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

又曰陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗刺頸而還小便不利渴飲水漿者此為瘵熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之

又曰陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘尿雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之

又曰陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜

大承氣湯

又曰病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也常氏云可小承氣湯

又曰病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯

又曰大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯

又曰病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣湯

又曰食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也常氏云可橘皮湯類要云橘皮一兩兩入參三兩為末水煎服

又曰太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲水者少少與之但以法救之渴者宜五苓散

仲景傷寒補亡論

卷六 陽明經

十一



又曰陽脈微而汗出少者為自和也汗出多者為太過陽脈實因發其汗出多者亦為太過太過為陽絕於裏亡津液大便因鞭也常氏云可與小柴胡湯和其津液如便益堅可調胃承氣湯雍曰通津液用柴胡桂枝湯尤穩如不得已至用承氣湯防下後變作狐惑宜小小通之

又曰脈浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕常氏云可柴胡湯

又曰跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇

仲景傷寒論

卷之六 陽明經

十一

相搏大便則鞭其脾為約麻仁丸主之

又曰太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

又曰傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

又曰太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈

又曰得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少

者雖不能食但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹須小便利尿定鞭乃可攻之宜大承氣湯

又曰傷寒六七日千金作七八日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯

又曰陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯一云大柴胡湯

又曰發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯

又曰腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

仲景傷寒論

卷之六 陽明經

十三

又曰陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相剋賊名為負也

又曰脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯雍曰此本文與前證相連恐是合病脈滑數者更詳之

又曰病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血也宜抵當湯

又曰若脈數不解而下不止必協熱而便膿血也常氏云可白頭翁湯千金方通前證合為一證



又曰傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之常氏云可五苓散

又曰傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

又曰傷寒身黃發熱梔子蘗皮湯主之

又曰傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軀赤小豆湯主之

少陽經證治十一條

仲景傷寒補亡論

卷六

少陽經

古

仲景曰脈尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾三陽皆受病未入於府者可汗而已

又曰少陽之為病口苦咽乾目眩也

又曰少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚龐氏云可小柴胡湯常氏云吐下驚而悸者可桂枝去芍藥加龍骨牡蠣湯雍曰此證當服柴胡加龍骨牡蠣湯用桂枝非也

又曰傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發

汗發汗則讖語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸一作龐氏云多少陽者宜調胃承氣湯此屬少陽陽明證少陽宜和表鮮有汗證仲景少陽和表宜小柴胡湯

又曰日本太陽病不解轉入少陽脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沈緊者與小柴胡湯龐氏云脈緊者與小柴胡加牡蠣湯

又曰若已吐下發汗溫鍼讖語柴胡湯諸罷此為壞病知犯何逆以法治之龐氏曰犯何逆犯四溫病壞

仲景傷寒補亡論

卷六

少陽經

古

病也雍曰千金方通前合為一證則小柴胡首尾備見為當溫鍼讖語亦宜桂枝甘草龍骨牡蠣湯

又曰三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗常氏云可柴胡桂枝湯龐氏云不言弦者隱於長大也

又曰傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰故也常氏云可八石散茯苓湯龐氏云四五日或七八日

又云傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食

而不嘔此為三陰不受邪也龐氏云病到陰必吐利也

又曰傷寒三日少陽脈小者欲已也龐氏云謂小而平勻也

又曰少陽病欲解時從寅至辰上

仲景傷寒補亡論卷第六終

仲景傷寒補亡論

卷六 少陽經

十六

仲景傷寒補亡論卷第七

河南郭雍撰次

太陰經證治十條 少陰經證治四十七條

厥陰經證治六十三條

太陰經證治十條

仲景曰脈尺寸俱沈細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡於噎故腹滿而噎乾龐氏云宜大承氣湯下之雍謂更當詳證而後可下此即仲景辨太陰之說也未可遽下

仲景傷寒補亡論

卷七 太陰經

一

又曰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞭雍曰若太陰本證藏寒自利不渴當依仲景溫之以四逆輩若本太陽病因誤下腹痛轉屬太陰者依仲景用桂枝加芍藥湯以太陽誤下表證未解也

又曰太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者為欲愈

又曰太陰病欲解時從亥至丑上

又曰太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

又曰自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之



宜服四逆輩

又曰傷寒三日太陽脈弱至四日太陰脈大龐氏云脈大而胸滿多痰者可吐之無此證者宜汗之雍曰吐用瓜蒂散汗用桂枝湯仍須脈浮則可汗也

又曰傷寒脈浮而緩龐氏云亦大之類手足自溫者繫在太

陰太陰當發身黃龐氏云小便不利者必發黃以五苓散加茵陳主之若小便

自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也龐氏云可類要四味橘皮湯

仲景傷寒補亡論

卷七 太陰證

二

又曰本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之

又曰太陰為病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也校正云下利者先煎芍藥二沸雍曰以脈弱故知胃氣弱也

少陰經證治四十七條

仲景曰脈尺寸俱沈者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴龐氏云

宜大承氣湯雍曰未可也更宜詳餘證可下則下之

又曰少陰之為病脈微細但欲寐也

又曰少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也常氏云可四逆湯甘草乾薑湯金匱方

又曰病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利常氏云可猪膚湯雍曰少陰有伏氣病亦如傷寒法先咽痛次必下利與前證相似

仲景傷寒補亡論

卷七 少陰經

三

古人謂之腎傷寒其病輕不傳經治法不可同咽痛則半夏桂枝甘草湯下利用四逆湯二三日即愈

又曰少陰病欬而下利譏語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也常氏云桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯以救火逆猪苓湯五苓散以通小便

又曰少陰病脈細沈數病為在裏不可發汗

又曰少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱瀉者復不可下之雍曰可附子湯



又曰少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者為欲解也雖煩下利必自愈

又曰少陰病下利若利自止惡寒而蹇臥手足溫者可治常氏云可當歸四逆湯

又曰少陰病惡寒而蹇時自煩欲去衣被者可治常氏云吳茱萸湯雍曰凡少陰病煩躁者不可下先服

吳茱萸湯以煩躁非實熱且手足多逆冷也

又曰少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈

又曰少陰病欲解時從子至寅上

仲景傷寒補亡論 卷七 少陰經 四

又曰少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯常氏云少陰太谿穴也龐氏云言

發熱者謂其身發熱也太谿穴在內踝後跟骨上動脈陷中

又曰少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也常氏云可桃仁承氣湯芍藥地黃湯

又曰少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治

常氏云可芍藥地黃湯雍曰仍灸太谿三陰交及湧

泉穴

又曰少陰病惡寒身蹇而利手足逆冷者不治雍曰灸太谿等穴仍服四逆湯

又曰少陰病吐利躁煩四逆者死龐氏云煩躁者內煩躁也與吳茱萸湯正宜細審其生死也又曰凡少

陰四逆者宜溫之雍曰此正仲景吳茱萸湯證不當不治仍灸太谿

泉穴

又曰少陰病惡寒身蹇而利手足逆冷者不治雍曰灸太谿等穴仍服四逆湯

又曰少陰病吐利躁煩四逆者死龐氏云煩躁者內

煩躁也與吳茱萸湯正宜細審其生死也又曰凡少

陰四逆者宜溫之雍曰此正仲景吳茱萸湯證不當

不治仍灸太谿

又曰少陰病下利止而頭眩時時自冒者死龐氏云

此當是少陽冒昧汗濺然出脈勻小浮者少陰無眩

仲景傷寒補亡論 卷七 少陰經 五

冒之證雍曰千金翼作少陰

又曰少陰病四逆惡寒而身蹇脈不至不煩而躁者

死千金翼同一作吐龐氏詳定云吐利煩躁者死雍

曰吐利煩躁四逆者死已見前證不應重出此正謂

不煩而躁屬利證也更宜吳茱萸湯當歸四逆加吳

茱萸湯仍灸太谿穴

又曰少陰病六七日息高者死

又曰少陰病脈微細沈但欲臥汗出不煩自欲吐至

五六日自利復煩躁不得臥寐者死



又曰少陰病始得之反發熱脈沈者麻黃附子細辛湯主之龐氏曰少陰病脈沈不知何沈也且沈緊發汗則動經沈數為病在裏不可發汗此脈或沈而濡或沈而微是表中寒而裏不消脈應裏而發在表故以細辛之藥溫散而取汗也

又曰少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也龐氏曰謂初得病二三日常見少陰證無陽者須發小汗也

又曰少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連仲景傷寒補亡論卷七 少陰經 六

阿膠湯主之

又曰少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之常氏云當灸膈俞關元穴背俞第三行雍曰此有漏字當是灸膈俞及關元穴也膈俞是背俞第二行穴

又曰少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沈者附子湯主之

又曰少陰病下利便膿血者桃花湯主之

又曰少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利

不止便膿血者桃花湯主之

又曰少陰病下利便膿血者可刺常云刺幽門交信雍曰宜灸

又曰少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之雍曰凡少陰病四逆而煩躁者未問其餘證先宜服吳茱萸湯四逆而無煩躁證者先宜服四逆湯四逆下利脈不出者先宜服通脈四逆湯此三者治少陰證大要藥也

又曰少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之仲景傷寒補亡論卷七 少陰經 七

又曰少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯龐氏云半夏散亦主之

又曰少陰病咽中痛半夏散及湯主之

又曰少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

又曰少陰病下利白通湯主之

又曰少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生



又曰少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沈重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者真武湯主之雍曰真武湯不愈者小青龍湯

又曰少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之

又曰少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

仲景傷寒補亡論 卷七 少陰經 八

又曰少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

又曰少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

又曰少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯一法用大柴胡雍曰惟口乾燥一證見

熱更當細詳其餘證方敢用

又曰少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

又曰少陰病脈沈者急溫之宜四逆湯

又曰少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯

又曰少陰病下利脈微瀋嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸之脈經云灸厥陰可五十壯常氏云可灸大衝穴雍曰仍灸太谿

問曰自利者三陰證也仲景以自利不渴者屬太陰仲景傷寒補亡論 卷七 少陰經 九

渴者屬少陰何也雍曰太陰脾之經也其脈布胃中與胃為表裏脾本惡濕加以胃中寒故不渴也少陰腎之經也腎屬水故惡燥經中有邪則腎當大燥於是引飲自救故渴也是以太陰無渴證少陰有渴證也

厥陰證六十三條

仲景曰脈尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮龐氏曰脈微緩者囊不縮若外證發熱惡寒似瘧為欲愈宜桂枝



麻黃各半湯若尺寸俱沈短者囊必縮宜承氣湯下之雍曰厥陰見沈短短命脈下證未具更宜詳下證中下證全則可下

又曰三陰皆受病已入於府可下而已雍曰三陰可下三陽可汗此言其大略也陽之中自有可汗不可汗證陰之中自有可下不可下證故陰陽之中又當各詳其可汗可下而施行之

又曰厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食食則吐衄下之利不止龐氏云可烏梅丸常氏

仲景傷寒補亡論

卷七

厥陰經

十

以有餘證故曰可烏梅丸四逆湯雍曰無厥證者不用四逆消渴下利飢不欲食宜理中湯下利甚者去白朮加附子氣上如奔豚者茯苓桂枝甘草大棗湯吐衄服烏梅丸兼理中丸

又曰厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈

又曰厥陰病欲解時從丑至卯上

又曰厥陰病渴欲飲水者少與之愈

又曰諸四逆厥者不可下之虛家亦然常氏曰可當歸四逆湯

又曰傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利常氏云可白頭翁湯雍曰白頭翁治熱利此當更審證冷熱用之

又曰傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食者恐為除中消中食以索餅不發

熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日脈之其熱續在者期之且日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日并前六日亦為九日與厥相應故期之且日夜半愈後三日脈之而脈

仲景傷寒補亡論

卷七

厥陰經

十一

數其熱不罷者此為熱氣有愈必發癰膿也常氏曰可服千金漏蘆湯

又曰傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死

又曰傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者其喉不痺常氏云喉痺可桔梗湯便膿血可桃花湯



又曰傷寒一二日至四五日而厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤雍曰仲景言厥應下之者謂有當下之厥而誤汗也非謂皆可下也故仲景又曰諸四逆厥者不可下然厥病至於發癰疽便膿血應下者不必拘此

又曰傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈龐氏續云若六日厥者必發熱愈甚仍下利也雍曰此恐論

仲景傷寒補亡論 卷七 厥陰經 十一

中語而諸書皆不見若六日厥則知陽氣有餘故知熱愈甚也

又曰凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷者是也龐氏曰凡厥通用四逆湯謂其脈浮遲或微或細或沈皆屬裏有寒也雍曰世之論厥者皆不達其源厥者逆也凡逆皆為厥傷寒所論蓋手足厥逆之一證也凡陰陽正氣偏勝而厥者一寒不復可熱一熱不復可寒傷寒之厥非本陰陽偏勝暫為毒氣所苦而然毒氣併於陰則陰盛而陽衰陰經不能

容其毒必溢於陽故為寒厥毒氣併於陽則陽盛而陰衰陽經不能容其毒必溢於陰故為熱厥其手足逆冷或有溫時手足雖逆冷而手足掌心必暖龐氏謂非正厥皆寒氣之輕者也故可消息汗下或者以此便為熱厥非也熱厥之熱與寒厥之寒一也傷寒厥陰止論寒厥唯有輕重之異無熱厥也其謂寒熱相勝復五日六日之言謂發熱五日復寒厥深重者後發熱亦深重其寒厥輕微者其後發熱亦輕微此仲景論文本意誤讀者謂手足寒厥深者其內蓄熱

仲景傷寒補亡論 卷七 厥陰經 十二

亦深寒厥微者其內蓄熱亦微大非也然則熱厥之證何如曰手足如炭火炮烙或如入湯中是也曰傷寒有此證乎曰雖未之見以理推之陽毒恐有此證人見之未悟其為熱厥也曰寒熱二厥之論始於何時曰始於素問岐伯曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥故陽氣勝則足下熱陰氣勝則從五指至膝上寒也曰經又言足如履冰時如入湯中一證豈寒熱併厥乎曰此為風痺淫燥陰陽二經俱不足邪氣乘虛而入舍於二經之間往來寒熱正氣



不能與之爭邪氣日進正氣日衰所以不出三年死非厥也

又問曰厥病發癱膿便膿血何也雍曰毒氣隨三陰經走下不復可止非發膿癱便膿血則無自而出故其毒下於表者則發癱膿下於裏者則便膿血以是知厥亦有可下逐之理免發癱膿便膿血也便膿血則喉不痺者以毒下也應下之而反汗則口傷爛赤者以毒下而復上也曰厥陰論寒厥而此皆熱厥何也素問曰人之傷於寒者則為病熱寒極則生熱是仲景傷寒補亡論 卷七 厥陰經 古

為熱厥也

龐氏曰手足厥冷皆屬厥陰不可下亦不可汗有須下證者謂手足雖厥冷或有溫時手足雖逆冷而手足掌心必暖非正厥也故可消息汗下

龐氏又曰寒熱而厥面色不澤冒昧者當用綿衣包手足令暖溫必大汗而解

龐氏曰有不因大汗下而兩手忽無脈謂之雙伏或一手無脈謂之單伏或利止如此必有正汗急用四逆輩溫之得有汗便安脈終不出者死

仲景曰傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為藏厥非蚘厥也龐氏曰四逆輩冷服之常氏云可當歸四逆湯

又曰蚘厥者其人當吐蚘今病者靜而復時煩此為藏寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘蚘厥者烏梅丸主之又主久利

又曰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也龐氏曰宜乾薑甘草湯欲得食其病

仲景傷寒補亡論 卷七 厥陰經 古

為愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便血雍曰熱不除而便血可犀角地黃湯

又曰病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也龐云宜灸關元

又曰傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病當愈四日至七日熱不除者必便膿血常氏云可桃花湯

又曰傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故為進也常氏云可四逆湯待其熱



退寒存厥不復熱始可用之雍曰寒多熱少便宜四逆湯少與之

又曰傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死常氏云可灸太衝穴

又曰傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死

又曰傷寒發熱下利至甚厥不止者死

又曰傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也雍曰汗出不止者死先服防風牡蠣湯以止汗次服甘草乾薑湯以復其陽得厥愈

仲景傷寒補亡論

卷七

厥陰經

七

足溫更作芍藥甘草湯以和之

又曰傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此亡血下之死常氏云可當歸四逆湯四逆加人參湯

又曰發熱而厥七日下利者為難治常氏云四逆散

又曰傷寒脈促手足厥逆可灸之常氏云灸太衝穴

又曰傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

又曰手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯

又曰大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

又曰大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之

又曰病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中心下滿而煩飢不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散

又曰傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也雍曰治厥四逆湯

又曰傷寒六七日大下後寸脈沈而遲手足厥逆下

仲景傷寒補亡論

卷七

厥陰經

七

部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者為難治麻黃升麻湯主之雍曰服湯已脈終不至泄利不止宜服通脈四逆湯

又曰傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也常氏云可四逆湯散

又曰傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃芩黃連人參湯主之雍曰竊疑此湯性寒又乾薑黃連相反若更嘔吐者當服當歸四逆加茱萸生薑湯及吳茱萸湯



又曰下利有微熱而渴脈弱者令自愈

又曰下利脈數有微熱汗出令自愈設復緊為未解  
雍曰緊為有寒須溫之宜四逆湯

又曰下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反

微喘者死少陰負跌陽者為順也常氏云當灸氣海

關元二穴龐氏云凡厥通用四逆湯謂其脈浮遲或

微或細或沈皆裏有寒也

又曰下利寸脈反浮數尺中自濇者必圍膿血常氏  
云可桃花湯

仲景傷寒補亡論

卷七

厥陰經

六

又曰下利清穀不可攻表汗出必脹滿雍曰宜通脈

四逆湯

又曰下利脈沈弦者下重也脈大者為未止脈微弱

數者為欲自止雖發熱不死

又曰下利脈沈而遲其人面少赤身有微熱下利清

穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面

戴陽下虛故也雍曰不解宜通脈四逆湯少與之其

人下利清穀裏寒外熱正通脈四逆證也

又曰下利脈數而渴者令自愈設不差必圍膿血以

有熱故也常氏云可黃芩湯

又曰下利後脈絕手足厥冷晬時脈還手足溫者生  
脈不還者死雍曰宜通脈四逆湯

又曰傷寒下利日十餘行脈反實者死

又曰下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯  
主之

又曰熱利下重者白頭翁湯主之

又曰下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之

又曰下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表

仲景傷寒補亡論

卷七

厥陰經

九

溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

又曰下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯

又曰下利後更煩按之心下濡者為虛煩也宜梔子

豉湯

又曰嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈

又曰嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四

逆湯主之

又曰乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

又曰嘔而發熱者小柴胡湯主之



又曰傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也常氏云可吳茱萸湯

又曰傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈常氏云前部不利猪苓湯後部不利調胃承氣湯雍曰噦者胃中有寒不宜更服調胃承氣湯先宜服半夏生薑湯腹滿如故後部不利者小承氣湯微和之

龐氏曰三陽皆有合病凡十四證唯三陰無合病

仲景傷寒補亡論

卷七

厥陰經

二十

仲景傷寒補亡論卷第七終

仲景傷寒補亡論卷第八

河南郭雍撰次

不可發汗四十條

可發汗五十八條

不可發汗四十條

傷寒本論曰夫以為疾病至急倉卒尋按要者難得故重集諸可與不可方治比之三陰三陽篇中此易見也又時有不止是三陰三陽出在諸可與不可中也

仲景曰少陰病脈細沈數病為在裏不可發汗

仲景傷寒補亡論

卷八

不可發汗

一

又曰太陽病脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之以榮氣不足血少故也龐氏云前陽明病脈遲汗出多微惡寒宜桂枝湯不責榮不足蓋尺脈長大而遲此必軟緊而遲不可汗宜小建中湯雍曰桂枝本為解肌不動經故前陽明證中用之麻黃則發汗動經也常氏云可小柴胡湯雍曰傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差與小柴胡湯二藥可相須用也故龐氏又曰凡脈緊病必無汗唯濡而緊必有汗勿誤行



桂枝宜建中湯也

又曰少陰病脈微不可發汗亡陽故也一作濡龐氏

曰汗則厥而煩躁不得眠常氏云可附子湯

又曰脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反

在下微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出

而反躁煩濇則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠

雍曰宜與小建中湯

又曰動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲

則吐水龐氏曰動氣者謂心腹中虛氣動若誤汗者

仲景傷寒補亡論 卷八 不可發汗 二

先服五苓散一服次服竹葉湯朱氏曰凡脈濡弱不

可發汗諸動氣在心腹上下左右不可發汗諸脈動

數微弱不可發汗皆宜小建中湯煩躁者宜竹葉湯

雍曰諸動氣不可發汗者皆宜茯苓桂枝甘草大棗

湯

又曰動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕

肉瞤龐氏曰此為逆難治先服茯苓白朮散汗止續

與小建中湯朱氏同雍曰汗不止筋惕肉瞤者皆亡

失津液證不可茯苓湯也

又曰動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端

龐氏云李根湯主之朱氏同常氏云可奔豚湯

又曰動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨

節苦疼目運惡寒食則反吐穀不得前一云穀不消化龐氏

云先服大橘皮湯得吐止服小建中湯朱氏同常氏

云可柴胡桂枝湯茯苓湯小半夏湯雍曰大橘皮湯

茯苓湯小半夏湯皆可用以止吐吐止而心中煩骨

節疼惡寒證不去者服柴胡桂枝湯後服小建中湯

又曰咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足

仲景傷寒補亡論 卷八 不可發汗 三

厥冷欲得蹠臥不能自溫龐氏云甘草乾薑湯主之

常氏曰咽中閉塞可小柴胡湯設經發汗吐血者柏

葉艾葉湯金匱方氣微厥逆蹠臥者可當歸四逆湯

又曰諸脈得數動微弱者不可發汗發汗則大便難

腹中乾一云大便難胃燥而煩其形相象根本異源雍

曰宜小建中湯

又曰脈濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反

在下弦為陽運微為陰寒上實下虛意欲得溫微弦

為虛不可發汗發汗則寒慄不能自還常氏云可當



歸四逆湯

又曰欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中  
飢煩晬時而發其形似瘡有寒無熱虛而寒慄欬而  
發汗踈而苦滿腹中復堅一作踈而心痛常氏云可柴胡乾  
薑桂枝湯小青龍湯理中丸雍曰脈經以上二證合  
而為一雍謂白欬者之下為欬者劇證欬者之上為  
不欬未劇之證二證之脈皆濡而弱也欬證裏寒多  
宜小建中湯理中丸附子湯微溫之

又曰厥脈緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎聲不  
仲景傷寒補亡論卷八 不可發汗 四

得前雍曰厥陰經緊則引舌與卵故舌卷而囊縮若  
緩則舌萎聲不得前故厥脈緊者不可發汗恐其脈  
緩也厥脈緊者宜四逆湯緩者宜小建中湯或言宜  
白虎小柴胡皆不可用

又曰諸逆發汗病微者難差劇者言亂目眩者死一云  
識語目眩命將難全

又曰太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒  
少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者  
為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗

也常氏云可小柴胡湯雍曰亦宜先服小建中湯  
又曰太陽病發熱惡寒熱多寒少千金翼云脈微弱  
者此無陽也不可發汗常氏云可小柴胡湯雍曰亦  
宜甘草乾薑湯

又曰咽喉乾燥者不可發汗常氏云可小柴胡湯

又曰亡血家不可發汗發汗則寒慄而振常氏云可  
小柴胡加芍藥地黃湯

又曰衄家不可發汗汗出必額上陷脈緊急目直視  
不能眴不得眠常氏云可犀角地黃湯

仲景傷寒補亡論卷八 不可發汗 五

又曰汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼宜禹餘  
糧丸本問常氏云只取一味禹餘糧石火煨末服之

亦可雍曰禹餘糧不用石殼此火煨末服則是殼也  
又曰淋家不可發汗發汗必便血常氏云可猪苓湯  
芍藥地黃湯

又曰瘧家雖身疼痛不可發汗汗出則瘧常氏云可  
小柴胡湯瘧者葛根桂枝湯雍曰更詳治瘧門中

又曰下利清穀不可發汗汗出必脹滿雍曰宜溫其  
裏後隨證治之



又曰欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥而逆雍曰設誤發汗宜甘草乾薑湯當歸四逆湯

又曰傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗必口傷爛赤雍曰已見厥陰卷中厥論并問  
又曰傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗常氏云可小柴胡湯

又曰傷寒頭痛翁翁發熱形象中風常微汗出自嘔  
仲景傷寒補亡論 卷八 不可發汗 六

者下之益煩心中懊憹如飢發汗則致瘥身強難以屈伸熏之則發黃不得小便灸則發欬唾常氏云可小柴胡湯桂枝加葛根湯茵陳蒿湯小青龍湯雍曰各隨證用之頭痛發熱汗出即小柴胡湯心煩喜嘔亦柴胡瘥而身強用桂枝加葛根湯不得小便而欬唾則小青龍湯熏之發黃則茵陳蒿湯也  
又曰太陽與少陽併病頭項強痛或眩暈時如結胸心下痞鞭者不可發汗當刺大椎第一間肺俞肝俞發汗則譫語脈弦五六日譫語不止當刺期門

又曰太陽發汗因致瘥雍曰前本病云太陽病發汗太多因致瘥

又曰少陰病欬而下利譫語者此被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也常氏云可桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯小便難者五苓散

又曰少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出者是名下厥上竭為難治常氏云可芍藥地黃湯雍曰仍灸三陰交湧泉二穴三陰交難取湧泉尤奇

仲景傷寒補亡論 卷八 不可發汗 七

王叔和曰冬時發其汗必吐利口中爛生瘡千金翼同

又曰汗出多熱發其汗亦堅雍曰堅字宜作瘥前有云發汗太多因致瘥也

又曰病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者以醫發其汗令陽氣微膈氣虛脈乃數也數為客熱不能消穀胃中虛冷故令吐也常氏云可與小半夏湯溫中湯

又曰傷寒四五日其脈沈煩而喘滿脈沈者病為在裏不可發汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫



語常氏云可麻黃杏仁甘草石膏湯脈沈裏實讖語者調胃承氣湯

又曰傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脈異經雖俱傷於風其人自有痼疾則不得同法其人素傷於風因復傷於熱風熱相搏則發風溫四肢不收頭痛身熱常汗出不解治在少陰厥陰不可發汗汗出讖語獨語內煩躁擾不得臥善驚目亂無精治之復發其汗如此死者醫殺之耳出醫律朱氏曰風溫不可發汗宜萎蕤湯雍曰仲景以風溫濕溫為傷寒四種

仲景傷寒補亡論 卷八 不可發汗 八

壞病難經以濕溫為五種傷寒皆屬傷寒也餘見風溫本門

又曰傷寒濕溫其人常傷於濕因而中暍濕熱相薄則發濕溫病苦兩脛逆冷腹滿又胸頭目痛苦妄言治在足太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此死者醫殺之耳出醫律朱氏曰白虎加蒼朮湯

又曰濕溫多汗其脈陽濡而弱陰小而熱  
龐氏曰不當汗而強汗之則津液枯槁而死

可發汗五十八條

仲景曰大法春夏宜發汗龐氏作春宜汗

又曰凡發汗欲令手足俱周時出以藜藜然一時間許益佳不可令如水流漓若病不解當重發汗汗多必亡陽陽虛不得重發汗也

又曰凡服湯發汗中病便止不必盡劑也

又曰凡云可發汗無湯者丸散亦可用要以汗出為解然不如湯隨證良驗

又曰太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝

仲景傷寒補亡論 卷八 可發汗 九

湯

又曰太陽病脈浮而數者可發汗屬桂枝證一法用麻黃湯

雍曰麻黃桂枝二湯分惡風惡寒有汗無汗用之如

太陽本證龐氏曰惡寒者不當風而憎寒惡風者當風而憎寒皆屬表證

龐氏論桂枝證曰凡桂枝湯證病有常自汗出小便不數手足溫和或手足指稍露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而又憎寒始可行桂枝湯若病者身無汗小便數或手足厥冷不惡寒反惡熱或飲酒後切



不可桂枝湯也此則中風自汗用桂枝湯證又論麻黃證曰傷寒之脈緊盛而按之澀是也脈浮而緊浮爲風緊爲寒風傷衛寒傷榮榮衛俱病骨節煩疼外證必發熱無汗或喘其人但憎寒手足指末必微厥厥久而復溫掌心不厥此傷寒無汗用麻黃證也又曰脈緊必無汗設有汗不可誤作桂枝證仲景曰陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗屬桂枝湯

又曰病人脈浮大問病者言但便鞭爾設利者爲逆

仲景傷寒補亡論

卷八

可發汗

十

大便鞭爲實汗出而解何以故脈浮當以汗解

又曰傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火者必譫

語弱者發熱脈浮解之當汗出愈常氏云可柴胡桂

枝湯渴者五苓散被火譫語者龍骨牡蠣救逆湯

又曰病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發潮熱

者屬陽明也脈浮虛者當發汗屬桂枝湯

又曰病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧

以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脈中衛行脈外

復發其汗榮衛和則愈屬桂枝湯脈經云病常自汗

出此爲榮氣和榮氣和而外不解此外衛不和也榮

行脈中爲陰主內衛行脈外爲陽主外復發其汗衛

和則愈雍曰二者語小異而理皆通脈經尤明恐本

論爲後人筆削蓋榮氣獨和而衛氣未和也故其病

外不解榮衛二氣本相和其循脈內外而行也今寒

不傷榮而榮氣獨和風反傷衛而衛氣不和則榮衛

不相通不得諧循脈內外而並行是以其外不解也

必復發去衛中所中之邪風然後榮衛諧和而病解

矣所以用桂枝者以桂枝能和衛而不能至榮也所

仲景傷寒補亡論

卷八

可發汗

十一

以不用麻黃者以麻黃俱入榮衛反復動已和無疾

之榮氣使榮衛俱虛俱出而爲汗遂令汗漏不止則

人殆矣此古人解表精微之意因世人疑榮氣和而

外不解之語故詳明之

又曰病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛

氣不和也先其時發汗則愈屬桂枝湯證雍曰前證

言榮氣和而反不及衛此證言衛氣不和而不及榮

其實一證也但前證謂常發熱而汗出者此證謂發

熱汗出有時者故論言先其時發汗則愈其用桂枝



則二證皆同

又曰脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯雍曰此榮衛俱傷之證所以不用桂枝

又曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外屬桂枝湯外解已血未下少腹急結乃可攻之宜桃核承氣湯

又曰太陽病微喘者表未解也宜桂枝加厚朴杏子湯

仲景傷寒補亡論

卷八

可發汗

十一

又曰傷寒脈浮緊不發汗因致衄者屬麻黃湯證

又曰陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈屬麻黃湯證

又曰太陽病脈浮者可發汗屬桂枝湯證

又曰太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在當復發汗服湯已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也屬麻黃湯證雍曰服湯已者謂服麻黃湯已也衄家不可發汗而此用麻黃湯蓋久衄之家既已亡血故不可汗今緣

夫發其汗致衄故當泄其毒氣也

又曰脈浮者病在表可發汗屬麻黃湯一云用桂枝湯雍曰亦分中風傷寒有汗無汗二證而用桂枝麻黃二湯也

又曰傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄屬桂枝湯常氏云疑其誤也設須發汗當用麻黃湯不然用桂枝麻黃各半湯取小小汗出而已雍曰亦當分有汗無汗二證而用湯也其小便清者知

仲景傷寒補亡論

卷八

可發汗

十二

不在裏故不用承氣湯而用二湯也

又曰下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯雍曰下利裏證身疼痛表證也

又曰下利後身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯雍曰可與前證相續

又曰太陽病頭痛發熱汗出惡風者屬桂枝湯

又曰太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出啻啻惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者



屬桂枝湯證

又曰太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯證雍曰榮弱者自和也衛強者風邪乘之也欲逐風邪須令桂枝入衛則不動榮也又曰太陽病下之後其氣上衝者屬桂枝湯脈經云氣不上衝者不可與服

又曰太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈龐氏曰風池足少陽之經陽維之會不鍼天柱而取風池者陽維維諸陽巨陽為諸

仲景傷寒補亡論

卷八

可發汗

古

陽主氣故也

又曰燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從小腹上搶心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯

又曰太陽病項背強九九無汗惡風者葛根湯主之

又曰太陽與陽明合病必自下利不嘔者屬葛根湯

又曰太陽與陽明合病不下利但嘔者宜葛根加半

夏湯

又曰太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表

未解也喘而汗出者宜葛根黃芩黃連湯

又曰太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者屬麻黃證龐氏云身疼痛骨節煩疼凡脈浮數或脈浮緊無汗小便不數病雖十餘日尚宜麻黃湯也

又曰太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下也屬麻黃湯證

又曰太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁或頭痛者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風

仲景傷寒補亡論

卷八

可發汗

古

者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也

又曰傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者可與大青龍湯發之雍曰大青龍湯惟有此二證最為難識故世醫多不能辨用之亦多誤也前曰太

陽中風脈浮緊者此即中風見寒脈也後曰太陽傷寒脈浮緩者此則傷寒見風脈也龐氏曰似桂枝證

反無汗而脈緊似麻黃湯證反身不疼而脈緩此為大青龍證其言皆不難知其要則在太陽中風脈浮

緊太陽傷寒脈浮緩而已然大青龍發汗過於麻黃



湯遠甚如中風見寒脈汗不出者尚可用設或中風見寒脈自汗出者安敢更用青龍湯發表故仲景又曰若脈微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也蓋謂服之則汗漏不已至於亡陽之極則必厥逆而生筋惕肉瞤之證不可治也世醫所以多誤用者正謂此如是則大青龍之證又當於中風見寒脈之中再分有汗無汗作為兩證則大青龍當有三證其兩證無汗者可服大青龍其一證有汗者不可服也有汗一證既不可服大青龍湯則有

仲景傷寒補亡論

卷八

可發汗

七

證無藥矣自仲景之後古今未嘗議此一證所以後人多誤雍謂此一證當用桂枝麻黃各半湯仲景本以此湯治發熱惡寒形如瘧者且瘧之發寒本因傷於寒瘧之發熱本因傷於風惟瘧具風寒二證故與大青龍其源相似但恐病重藥輕雍又妄意大青龍三證皆可代用惟無汗者微加麻黃有汗者微減麻黃用之則尤善雖曰藥輕其實對證又無誤用之失不猶愈乎龐氏云桂枝石膏湯夏至後可代桂枝證用之更加麻黃去節半兩代麻黃湯青龍湯用之然

言無少陰證可用者三陰俱不可發汗獨少陰為甚也

又曰傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者宜小青龍湯又曰傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也屬小青龍湯證

又曰陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解

仲景傷寒補亡論

卷八

可發汗

七

病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不溺腹滿加噦者不治雍曰發黃不溺而噦者宜多服茵陳五苓散大通小便若無表證脈不浮則十棗湯下之

又曰太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯又曰中風往來寒熱傷寒五六日以後胸脇苦滿默不飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有



微熱或欬者屬小柴胡湯

又曰傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者屬小柴胡湯證

又曰傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

又曰少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也雍曰少陰病不可汗惟此一證可微發也

又曰脈浮小便不利微熱消渴者與五苓散利小便

仲景傷寒補亡論

卷八

可發汗

七

發汗

又曰太陽病下後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之  
龐氏曰芍藥味酸脈促胸滿成結胸故去芍藥全用甘辛發散毒氣也

又曰服桂枝湯或下之仍頭痛項強翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

龐氏曰傷寒三日後與諸湯不差脈勢如故陽氣猶在經絡未入藏府宜桂枝石膏湯此湯可夏至後代

桂枝湯證用之若加麻黃半兩可代麻黃青龍用之

又曰傷寒療治四五日不差身體毒熱面赤者葛根龍膽湯主之兼治陽毒風溫

又曰凡發散以辛甘為主復用此苦藥何也辛甘者折陰氣而助陽氣也今熱盛於表故加苦以發之素問云熱淫于內以苦發之是也

又曰時行熱病六七日未得汗脈洪大或數面目赤身體大熱煩躁狂語欲走大渴甚又五六日以上不解熱在胃中口噤不能言為壞傷寒醫所不能治如

仲景傷寒補亡論

卷八

可發汗

九

已死人或精魄已竭心下纔暖發開其口灌藥下咽即活兼治陽毒麥奴丸活人書名黑奴丸

又蒸法曰傷寒連服發汗湯七八劑汗不出者死如中風法蒸之使溫熱之氣外迎無不得汗也古今用效薪火燒地良久去火掃地以水洒之取蠶沙柏桃

荊葉糠及麥麩皆可用和鋪燒地上可側手厚鋪席令人臥席上溫覆之熱月只可夾被覆其汗立出候周身至脚心皆濕乃用溫粉撲止移之上床即愈如無蠶沙則用麥麩之類亦得雍曰此即千金所載



陳廩邱法已見首篇敘論之後不厭重出也

又曰傷寒差後有不了了證者謂至十日或半月二十日終不惺惺常昏沈似失精神言語錯繆或無寒熱有似鬼祟或朝夕潮熱頰赤或有寒熱如瘧狀此乃發汗不盡餘毒氣在心胞絡間可致也宜知母麻黃湯

又曰太陽病下之後氣上衝其脈必浮可依證發汗不與發汗則成結胸也凡發汗脈浮大雖大便秘小便少者可發汗而解也

仲景傷寒補亡論

卷八 可發汗

三

又曰當汗不汗諸毛孔閉塞悶絕而死

仲景傷寒補亡論卷第八終

仲景傷寒補亡論卷第九

河南郭雍撰次

汗後四十四條 不可吐五條

可吐十條

汗後四十四條

仲景曰二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不

仲景傷寒補亡論

卷九 汗後

一

足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人煩躁不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知之常氏云可柴胡桂枝湯龐氏云用麻黃湯

又曰未持脈時叉手冒心師因教試令欬而不欬者此兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此常氏云可小柴胡湯雍曰先宜小建中湯

又曰發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘常氏云治



喘可麻黃杏子石膏湯雍曰傷水者五苓散鈞崖曰宜小青

又曰發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止常氏云可小半夏加橘皮湯雍曰可類要四味橘皮湯

又曰陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尙微煩不了了者此必大便鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液

仲景傷寒補亡論

卷九 汗後

二

當還入胃中故知不久必大便也常氏云可小柴胡湯雍曰小便少者津液還入胃則不須服藥也

又曰發汗多若重發汗者亡其陽讖語脈短者死脈自和者不死常氏云可小柴胡湯

又曰傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之常氏云可五苓散雍曰黃芪加茵陳湯

又曰病人有寒復發汗胃中冷必吐衄常氏云可理中丸烏梅丸

又曰太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢

微急難以屈伸者屬桂枝加附子湯龐氏曰小便難為有津液可作汗若小便數不可誤認為桂枝證也

又曰服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法謂刺風若形似瘧一日再三發者汗出必解屬桂枝二麻黃一湯

又曰服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者屬白虎加人參湯

又曰傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急仲景傷寒補亡論

卷九 汗後

三

反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和讖語者少與調胃承氣湯

又曰若重發汗復加燒鍼者與四逆湯雍曰此證首尾都無四逆證恐是字誤今詳重發汗復加燒鍼恐是火劫亡陽驚狂者則當與桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯若止是火逆因燒鍼煩躁則當與桂枝甘草龍骨牡蠣湯亦救逆也故恐四逆本是救逆



湯字校正日誤書入四逆一方也

又曰傷寒發汗已解半日許復煩脈浮數與桂枝湯

又曰發汗後身疼痛脈沈遲者屬桂枝加芍藥生薑

各一兩人參三兩新加湯

又曰發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者

可與麻黃杏子甘草石膏湯

又曰發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者

屬桂枝甘草湯

又曰發汗後其人臍下悸者欲作奔豚屬茯苓桂枝

仲景傷寒補亡論 卷九 汗後 四

甘草大棗湯

又曰發汗後腹脹滿者屬厚朴生薑半夏甘草人參

湯

又曰發汗後病不解反惡寒者虛故也屬芍藥甘草

附子湯

又曰發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當

和胃氣屬調胃承氣湯脈經作小承氣湯仍二證通

為一

又曰太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲

得飲水者少少與飲之令胃中和自愈若脈浮小便

不利微熱消渴者屬五苓散

又曰發汗已脈浮數煩渴者屬五苓散

又曰傷寒汗出而渴者宜五苓散不渴者屬茯苓甘

草湯

又曰太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭

眩身暈動振振欲擗地屬真武湯

又曰傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食

臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者屬生薑瀉心湯

仲景傷寒補亡論 卷九 汗後 五

又曰傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者

屬大柴胡湯

又曰陽明病自汗出若發汗後小便自利者此為津

液內竭雖鞭不可攻之須自欲大便宜蜜煎導而通

之若土瓜根大豬膽汁皆可為導

又曰太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也宜

調胃承氣湯

又曰大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而

惡寒者屬四逆湯也



又曰發汗後不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯  
又曰發汗多亡陽譏語者不可下與柴胡桂枝湯和  
其榮衛以通津液後自愈

問曰古所謂陰陽交者何也素問三十三篇曰有病  
溫者汗出輒復熱而脈躁疾不爲汗衰狂言不能食  
病名陰陽交交者死也岐伯曰人所以汗出者皆生  
於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪  
却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣  
也汗出者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不

仲景傷寒補亡論

卷九

汗後

六

能食者精無俾也汗而熱留者其壽可立而傾也

問曰素問言汗出而脈尚躁盛者死何也雍曰此則  
陰陽交也靈樞二十三篇曰熱病已得汗而脈尚躁  
盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病脈盛  
躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗靜者  
生

又問曰何以謂之交也雍曰陰極則交陽極則交  
陰交則爭而亂矣故不可極也有生者何如曰靜則  
生交則死也陰脈脈靜陽脈人靜皆生之證也

問曰何以謂之盛躁雍曰靈樞九篇所謂人迎一盛  
二盛三盛脈口一盛二盛三盛者此之謂盛也一盛  
而躁二盛而躁三盛而躁此之謂躁也極者何也人  
迎脈口四盛皆爲極矣人迎四盛名曰溢陽爲外格  
脈口四盛名曰溢陰爲內關內關外格死不治卽陰  
陽交也人迎不爲衰陽交也脈口不爲衰陰交也脈  
口卽氣口也

問曰有躁而不盛者何如雍曰靈樞二十三篇曰熱  
病已得汗出而脈尚躁喘且復熱勿膚刺喘甚者死

仲景傷寒補亡論

卷九

汗後

七

是也此雖不盛而喘亦非其宜故喘甚則死也

問曰有煩滿不爲汗解者何也雍曰素問三十三篇  
曰有熱病身熱汗出煩滿不爲汗解岐伯曰汗出而  
身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥  
巨陽主氣故先受邪少陰與其爲表裏也得熱則上  
從之從之則厥也治之者表裏刺之飲之湯劑雍曰  
仲景言傷寒感異氣變爲壞病如風溫溫毒之類則  
此風厥亦其類也宜刺太谿崑崙胛荻苓桂枝甘草  
大棗湯



問曰汗後脈洪者何也雍曰洪大者非不為汗衰衰而未得盡去非若躁盛全不為汗衰也故仲景以為可治之疾然洪大亦有輕重如一盛二盛之說若洪大而無他證者刺風池風府却與桂枝湯是也洪大而大煩渴不解者白虎加人參湯除其裏熱也其餘逐證不同者皆依仲景之法治之

問曰汗後飲水多者必喘而治熱病飲之寒水何也雍曰素問三十二篇曰諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也此謂治五藏熱

仲景傷寒補亡論 卷九 汗後

病各刺手足諸經證治與傷寒有異詳刺熱終篇可見故傷寒不可多飲水

問曰素問言熱病已愈時有所遺何也雍曰此謂勞復非汗後證勞復本證詳之

問曰汗後之證或治或不治何也雍曰汗後之證多矣動於脈者重見於證者輕如汗後脈盛躁是邪之會不退也脈洪大者刺之如汗後尚發熱心下痞喘滿吐利小便或利或不利之類皆正病已衰餘毒未退依仲景隨證治之則愈

千金翼曰發汗後身熱又重發其汗胃中虛冷必反吐也雍曰宜小建中湯四味橘皮湯

又曰發汗後重發其汗亡陽譫語其脈反和者不死服桂枝湯汗出大煩渴不解若脈洪大者與白虎湯不可吐五條

仲景曰太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也若得病一二日吐之腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲飲冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此為小逆常氏云

仲景傷寒補亡論 卷九 不可吐 九

可小半夏加橘皮湯溫中湯

又曰太陽病吐之者但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣者此為吐之內煩也常氏云可金匱竹皮湯竹葉石膏湯雍曰大橘皮湯四味橘皮湯皆可服又曰少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之常氏云可小半夏加橘皮湯溫中湯

又曰諸四逆厥者不可吐之虛家亦然龐氏曰諸四



逆脈微弱細或弦遲雖中滿悶不可吐宜橘皮湯枳實散又曰虛家當吐而不敢吐者宜以枳實散壓氣毒痰水過日毒氣入胃乃可微下之

龐氏曰不可吐而強之吐氣築心則死矣

可吐十條

仲景曰大法春宜吐

又曰凡用吐湯中病則止不必盡劑也

又曰病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒當吐之一云此以

仲景傷寒補亡論

卷九

可吐

十

內有久痰常氏云可瓜蒂散

又曰病胸上諸實一作寒胸中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾一作濁唾下利日十餘行其脈反遲寸口脈微滑此可吐之吐之利則止常氏云可瓜蒂散

又曰宿食在上脘者當吐之常氏云可瓜蒂散

又曰少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐者宜吐之常氏云宜瓜蒂散

又曰病人手足厥冷脈乍結一作緊以客氣一作邪結在胸

中心下滿而煩飲食不能食者病在胸中當吐之常氏云可瓜蒂散

龐氏曰胸膈痞悶痰壅塞礙脈得浮滑並宜瓜蒂散吐之產後六七日內下瀉諸藥不效得此脈者吐之瀉立止

千金傷寒論曰得病無熱但狂言煩躁不安精采言語不與人相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匙服之當通與新水一升若二升強飲之令以物刺喉中吐之病隨吐愈若不能吐者勿強與之水水

仲景傷寒補亡論

卷九

可吐

十一

停則結心下也當更以餘藥吐之若此病證不將猪苓散吐解之者其死殆速有水飲瀉實者皆難治此三死一生也雍曰心下停水難治之疾須早吐也病源曰寒多熱少可吐者此謂痰多也治瘧亦如之

仲景傷寒補亡論卷第九終



仲景傷寒補亡論卷第十

河南郭雍撰次

不可下四十七條 可下四十八條

不可下四十七條

仲景曰脈濡而弱弱反在關龐云關下三分也濡反在巔關上三分也

也微反在上寸脈也濇反在下尺部也微則陽氣不足

濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血

厥而且寒陽微不可下下之則心下痞鞭龐氏以氣

血俱不足用小建中湯常氏云下後心下痞鞭用增

仲景傷寒補亡論 卷十 不可下 一

損理中丸

又曰動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾

頭眩心悸也龐氏以咽燥鼻乾宜竹葉湯

又曰動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動

氣更劇雖有身熱臥則欲蹠龐常皆云先服乾薑甘

草湯後服小建中湯

又曰動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷

熱汗自泄欲得水自灌常氏云宜小建中湯

又曰動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食

則下清穀心下痞也龐氏云心下痞宜半夏瀉心湯

又曰咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下

臥則欲蹠身急痛下利日數十行常氏云咽中閉塞

可烏扇煎下利宜四逆散

又曰諸外實者不可下下之則發微熱亡脈厥者當

濟握熱雍曰宜服去白朮理中湯以朮利腰臍間血

故也

又曰諸虛者不可下下之則大渴求一作引水者易愈

惡水者劇雍曰宜小建中湯

仲景傷寒補亡論 卷十 不可下 二

又曰脈濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反

在下弦為陽運微為陰寒上實下虛意欲得溫微弦

為虛虛者不可下也微則為欬欬則吐涎下之則欬

止而利因不休利不休則胸中如蟲齧粥入則出小

便不利兩脇拘急喘息為難頸背相引臂則不仁極

寒反汗出身冷若冰眼睛不慧語言不休而穀氣多

入此名除中消中口雖欲言舌不得前雍曰此不治

之證故諸家無治法龐氏云諸脈濡弱微虛細而搏

俱不可下



又曰脈濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上數反在下浮為陽虛數為亡血浮為虛數為熱浮為虛自汗出而惡寒數為痛振寒而慄微弱在關胸下為急喘汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相搏形如瘡狀醫反下之故令脈數發熱狂走見鬼心下為痞小便淋瀝小腹甚硬小便則尿血也常氏云可小柴胡湯鵲石散延胡索散

又曰脈濡而緊濡則微氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩醫為有大

仲景傷寒補亡論

卷十

不可下

三

熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚悵快不得眠不知胃氣冷緊寒在關元技巧無所施汲水灌其身客熱應時罷慄慄而振寒重被而覆之汗出而身熱體惕而又振小便為微難寒氣因水發清穀不容聞嘔變反腸出顛倒不得安手足為微逆身冷而內煩遲欲從後救安可復追還常氏云可灸關元雍曰仍服通脈四逆湯

又曰脈浮而大浮為氣實大為血虛血虛為無陰孤

陽獨下陰部者小便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反更實津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠血暴肉消而成暴液暴液一作黑液醫復以毒藥攻其胃此為重虛客陽去有期必下如汚泥而死常氏云可小建中湯已經下者不治

又曰脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗而不可下也常氏云可桂枝麻黃各半湯雍曰仲景可汗證中只用麻黃湯

仲景傷寒補亡論

卷十

不可下

四

又曰跌陽脈遲而緩胃氣如經也跌陽脈浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所為也榮衛內陷其數先微脈反但浮其人必大便鞭氣噫而除何以言之本以數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便鞭氣噫而除今脈反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脈當遲緩脈因前後度數如法病者則飢數脈不時則生惡瘡也常氏云可小柴胡湯惡瘡瀉蘆湯

又曰脈數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣



却結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脈數者不可下之必煩利不止常氏云可柴胡桂枝湯

又曰少陰病脈浮不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱濇者復不可下之雍曰宜建中湯

又曰脈浮大應發汗醫反下之此為大逆雍曰誤下宜四味理中丸誤下則中氣受傷故用是湯

又曰脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令洩數洩數則大便鞭汗多則熱愈汗少則便難脈遲尙未可攻常氏云可小柴胡湯雍曰

仲景傷寒補亡論

卷一 不可下

五

此一證中有誤字脈經云攻之不令微汗屬府洩數則堅汗多則愈汗出小便難文皆有誤不能通

又曰二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不微因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷者

不可下下之為逆常氏以太陽證不罷宜柴胡桂枝湯

又曰結胸證脈浮大者不可下下之則死常氏云可小陷胸湯增損理中丸聖餅灸法

又曰太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下常氏云

可麻黃杏子甘草石膏湯

又曰太陽與少陽併病心下鞭頸項強而眩者不可下常氏云可小柴胡湯雍曰仲景刺大椎肺俞肝俞見太陽證中

又曰諸四逆厥者不可下之虛家亦然常氏云可當歸四逆湯龐氏云若下證悉見四逆者是失下後氣血不通使然但手足微厥掌心常溫時復指稍溫即可下之勿拘忌也

又曰病欲吐者不可下常氏云可半夏加橘皮湯

仲景傷寒補亡論

卷一 不可下

六

又曰太陽病有外證未解不可下下之為逆常氏云可桂枝麻黃各半湯雍曰依可汗證中用桂枝二麻黃一湯

又曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之一作汗之官本及脈經皆作下之因作痞常氏云結胸可

大陷胸湯痞可半夏瀉心湯

又曰病脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞常氏云可小陷胸湯瀉心湯雍曰宜半夏瀉心湯

又曰夫病陽多者熱下之則鞭常氏云可小柴胡湯



又曰其人本虛攻其熱必噦雍曰宜半夏生薑湯類要四味橘皮湯

又曰無陽陰強大便鞭者下之必清穀腹滿常氏云可蜜煎導之

又曰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞭常氏云可桂枝加芍藥湯胸下結鞭者增損理中丸

又曰厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢不欲食食則吐衄下之利不止常氏云下之利不止宜四

仲景傷寒補亡論 卷十 不可下 七

逆湯餘見厥陰本證

又曰少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也常氏云飲食入口則吐可瓜蒂散餘見少陰本證

又曰傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此亡血下之死常氏云可小建中湯已下不治

又曰傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不識人熏之則喘不得小便下之則短氣小便難頭痛背強加溫針則刺常氏云可小柴胡湯已汗者桂枝加附子湯汗

出而喘者麻黃甘草杏子石膏湯已下者五苓散加溫針者芍藥地黃湯

又曰傷寒脈陰陽俱緊惡寒發熱則脈欲厥厥者脈初來大漸漸小更來漸大是其候也如此者惡寒甚者翕翕汗出喉中痛若熱多者目赤脈多睛不慧醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多便清穀熱多便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽燥若小便利者可救之若小便難者為危殆常氏云初證宜桂枝麻黃各半湯喉中痛桔梗湯熱多小柴胡湯便

仲景傷寒補亡論 卷十 不可下 八

清穀理中丸便膿血桃花湯身發黃茵陳蒿湯小便難者猪苓湯

又曰傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃不可制食水者必嘔惡水者厥若下之咽中生瘡假令手足溫者必下重便膿血頭痛目黃者若下之則兩目閉食水者若下之其脈必厥其聲嚶咽喉塞若發汗則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩躁脈數實不大便六七日後必便血若發汗則小便自利也常氏



曰若熱不可制者芍藥地黃湯水逆者五苓散便  
膿血桃花湯咽中主瘡白礬甘草散陰陽俱虛小建  
中湯裏冷不嗜食理中湯發熱身黃梔子蘗皮湯餘  
證小柴胡湯汗出小便數甘草乾薑湯

又曰得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭  
至四五日雖能食以小承氣湯少少和之令小安至  
六日與大承氣一升若不大便六七日小便少者雖  
不能食但初頭鞭後必溏未定成鞭攻之必溏須小  
便利尿定鞭乃可攻之龐氏曰尺下弱小便不利或  
仲景傷寒補論 卷十 不可下 九  
尚少皆未可攻

又曰藏結無陽證不往來寒熱或寒而不熱其人反  
靜舌上胎滑者不可攻也常氏云可刺關元穴在臍  
下又曰可刺大赫在腹部第二行雍曰灸尤奇  
又曰傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之雍曰不可攻  
之恐厥逆也可小半夏加茯苓湯生薑橘皮湯  
又曰陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭  
者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法  
少與小承氣湯入腹中轉矢氣者此有燥屎也乃

可攻之若不轉矢氣者此但初頭鞭後必溏不可攻  
之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後  
發熱者大便復鞭而少宜小承氣湯和之不轉矢氣  
者慎不可攻也

又曰傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不  
化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見  
心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以  
胃中虛客氣上逆故使鞭也屬甘草瀉心湯

又曰下利脈大或浮大者虛也以強下之故也設脈  
仲景傷寒補論 卷十 不可下 十  
浮革因爾腸鳴屬當歸四逆湯

又曰陽明病面合色赤不可攻之攻之必發熱色黃  
小便不利也常氏云可五苓散

又曰陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止  
者死利止者愈常氏云心下鞭滿者可半夏瀉心湯  
已攻而利者四逆湯

又曰陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液  
內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜導而通之  
若土瓜根及豬膽汁皆可為導



龐氏曰不當下而強下之令人腸胃洞泄不禁而死  
可下四十八條

仲景曰大法秋宜下

又曰凡服下藥宜用湯勝丸散中病便止不必盡劑也

又曰陽明病發熱汗多者急下之宜大柴胡湯龐氏云發熱不惡寒汗多

又曰少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

仲景傷寒補亡論

卷十 不可下

十一

又曰陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相尅賊名爲負也龐氏曰陽明土其脈大小陽木其脈弦若合病土被木賊加之以利則胃已困矣若脈不弦爲土不負弦者爲土負必死雍曰此合病一證下至名爲負也而終按本論原誤錄宿食一證相連非也脈經以宿食別作一證爲當蓋脈滑數有宿食故仲景可用承氣湯若胃爲木尅困而下利安有用承氣之理今依脈經離而爲二宿食證依仲景用承氣湯惟合病下利闕治法今以負爲不治不

負宜理中丸厥者宜四逆湯仍瀉邱虛陽陵泉補三里穴龐朱二氏依舊本合爲一證疑其非大抵讀仲景論仍須以脈經參校之

又曰少陰病下利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之宜大柴胡湯大承氣湯餘見少陰本證更詳之

又曰下利三部脈皆平按之心下鞭者急下之宜大承氣湯龐氏曰凡脈沈細數爲熱在裏又兼腹滿咽乾或口燥舌乾而渴者或六七日不大便小便自如

仲景傷寒補亡論

卷十 可下

十二

或目中瞳子不明無外證者或汗後脈沈實者或下利三部脈皆平按之心下堅者或連發汗不惡寒者或已經下其脈浮沈按之有力者皆宜大承氣湯又曰下利脈浮而滑者內實也利未欲止當下之宜大承氣湯

雍曰常氏疑本論之誤故欲以葛根黃芩治下利殊不知仲景以承氣下宿食而合病下利原無治法也葛根黃芩湯以太陽表未解誤下之利不止者既有協熱下利之表證未退故可用今合病下利胃氣傷



困只當救胃宜用溫藥故雍以四逆理中補其法胃氣已負而又加以寒藥則胃穀絕矣仲景於此一證特論脈負不負蓋欲後人當思陽明少陽土木尅賊之理而治之可謂盡善矣以是知合併病之論雖二陽俱受病邪氣俱當去又須審二經五行之氣毋令相尅賊抑強扶衰以致和氣不使復生一秦助桀為虐也如是則胡越可同舟而共濟矣此證和二經退邪氣與人事不少異非天下至精孰能與於此然生胃氣制少陽木亦用金石藥嘗見名醫治少陰自汗

仲景傷寒補亡論

卷十 可下

三

自利不止用金液丹取大效既非古藥不敢以為然必不得已而用亦須七鍊九煉火力重者用之其一煉火力輕者復可下宿食以虛人老人不敢用承氣

仲景問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脈浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食當下之宜大承氣湯

又曰下利不欲食者以有宿食故也當下之宜大承氣湯

又曰下利差至其年月日時復發者以病不盡故也當下之宜大承氣湯

又曰病腹中滿痛者此為實也當下之宜大承氣湯大柴胡湯

又曰下利脈反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯

又曰腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡湯大承

氣湯雍曰減不足言者言不甚減也論言太陽發汗不微不足言與此同意俗語所謂不濟事者是也

又曰傷寒後脈沈沈者內實也下之解宜大柴胡湯

仲景傷寒補亡論

卷十 可下

四

雍曰須沈數有力可下之雖沈而微弱遲皆不可下也

又曰傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大

便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯大柴

胡湯

又曰太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解

但陰脈微一作尺脈實者下之而解宜大柴胡湯一法用調胃承

湯脈經云但陰微者先下之而解龐作陰實雍曰文當從

脈經及龐氏當作但陰脈微而尺脈實者先下之而



解

又曰脈雙弦而遲者必心下鞅脈大而緊者陽中有陰也可下之宜大承氣湯

又曰結胸者項亦強如柔瘕狀下之則和龐氏云宜大陷胸丸

又曰病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之宜大柴胡湯

又曰太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞅滿而小便自利

仲景傷寒補亡論 卷一 可下

五

者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也宜下之以抵當湯

又曰太陽病身黃脈沈結少腹鞅滿小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也屬抵當湯

又曰傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之宜抵當丸

又曰陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗刺頸而還小便不利渴飲將水者以瘀熱在裏身必發黃宜下之以茵陳蒿湯雍日先服

茵陳五苓散黃退則不須更下

又曰陽明證其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞅大便反易其色必黑宜抵當湯

又曰汗出而譫語者以有燥屎在胃中此為風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈宜大柴胡湯大承氣湯

又曰病人煩熱汗出則解復如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者可下之宜大柴胡湯大承氣湯

仲景傷寒補亡論

卷一 可下

六

又曰陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞅耳屬大承氣證

又曰下利譫語者有燥屎也屬小承氣湯初一服譫語止若更衣者停後服不爾盡與之

又曰得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞅至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小

安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞅後必澹此未成鞅也攻之必澹須小便利屎定鞅乃攻之宜大承氣湯



又曰太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱  
 熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔  
 短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也屬十棗湯  
 又曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈  
 其外未解尚未可攻當先解其外外解已但少腹急  
 結者乃可攻之宜桃核承氣湯麗云不惡寒為外解  
 又曰傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿  
 者屬茵陳蒿湯

又曰傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而利者屬  
 仲景傷寒論 卷十 可下 七

大柴胡湯

又曰傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者屬大柴  
 胡湯

又曰但結胸無大熱者以水結在胸脇也但強微汗  
 出者屬大陷胸湯

又曰傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按之  
 石鞭者屬大陷胸湯

又曰陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必  
 鞭鞭則譫語屬小承氣湯

又曰陽明病不吐不下心煩者屬調胃承氣湯  
 又曰陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣  
 腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然  
 汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗出多微  
 發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若  
 腹大滿不通者與小承氣湯微和其胃氣勿令大泄  
 下

又曰陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭  
 者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法  
 仲景傷寒論 卷十 可下 六

少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃  
 可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必溏不可攻  
 之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後  
 發熱者大便必復鞭而少也宜小承氣湯和之不轉  
 失氣者慎不可攻之雍曰不轉失氣者勿服藥待一  
 晝夜熱氣不發泄定成鞭屎然後可攻

又曰陽明病譫語發熱脈滑而疾者小承氣湯主之  
 因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉  
 失氣者勿更與之明日又不大便脈反微濇者裏虛



也為難治不可更與承氣湯常氏云可人參黃芪建中湯

又曰二陽併病大陽證罷但發潮熱手足熱熱汗出大便難而譏語者下之則愈宜大承氣湯

又曰病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也屬大承氣湯

又曰大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也屬大承氣湯

龐氏曰脈朝夕駛者實癖也可下之朝平夕駛者非仲景傷寒補亡論卷一可下九

癖也不可下駛謂數脈六七至者也若脈數一息八九至切不可下若下之則煩躁下利不止而死脈數與皮毛相得亦不可下也雖數為虛客熱

又曰合下不下令人腹脹滿通身浮腫而死雍曰凡汗下皆不宜大過故汗下後易將理若汗下太過則

病人虛難將理易勞復凡用大承氣亦宜消息用調胃承氣代之蓋仲景自有承氣之戒故也

仲景傷寒補亡論卷第十終

仲景傷寒補亡論卷第十一

河南郭雍譏

發汗吐下後七十三條

仲景曰脈微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛暑欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陰氣在裏胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在

仲景傷寒補亡論

卷一一 汗吐下後 一

內胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濇故知亡血也龐氏曰陽微宜四逆湯陰弱宜苦酒艾之類常氏云宜小建中湯雍曰陽微陰弱之症其候至微亦未易言仲景初謂亡血之人病當先寒後乃發熱則一病之內陽微陰弱之症先後俱見也故言醫發汗使陽氣微又大下之使陰氣弱則知一病是二證也夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身謂暑月猶有寒不必重言其熱寒月猶有熱不必重言其寒也若如是則暑月有寒熱寒月亦有



寒熱非五月病者獨見寒十月病者獨見熱也故常氏用小建中湯似得其意令陰陽兩建之雖藥證相得第恐力微此外亦無藥矣龐氏分寒熱為兩證則陽微用四逆陰弱用酸苦然疾證初不分用藥又難分也夫然則當見寒時用四逆又恐後乃發熱時熱大甚不可制若龐氏藥用之于表熱裏寒表寒裏熱之證則相宜蓋表熱裏寒表寒裏熱是自兩病非陽微陰弱同病之證也粗工以表熱裏寒表寒裏熱便為陽微陰弱者尤非是此證雖甚希有而前人論說

仲景傷寒補亡論 卷十一 汗吐下後 二

尚多失仲景之意則後人用藥宜審矣

又曰寸口脈浮大而醫反下之此為大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏則為腹鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人則餽常氏云宜甘草豆蔻散

又曰太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之

又曰脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者

不可發汗當自汗出而解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津液自和即自汗出愈常氏云疑缺雍曰宜柴胡桂枝湯

又曰凡病若發汗若吐若下若亡血若亡津液陰陽自和者必自愈

又曰大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈

又曰下之後復發汗必振寒脈微細所以然者內外俱虛故也常氏云可芪參建中湯

仲景傷寒補亡論 卷十一 汗吐下後 三

又曰本發汗而反下之此為逆也若先發汗治不為逆本先下之而反汗之為逆若先下之治不為逆雍曰此謂病當先汗而反先下之者故為逆若已汗而後下之不為逆也若病當先下而反先汗之故為逆若已下而後汗之不為逆也

又曰太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒家當汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏未和然後復下之常氏云可桂枝大柴胡湯雍曰大字候當是兩藥先用柴胡桂枝湯和其



表復下之者用大柴胡湯

又曰得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難者與小柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔者柴胡不中與也食穀者噦常氏曰可柴胡桂枝 乾薑湯飲水嘔者五苓散噦者小半夏湯

又曰太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者四五日復下之此作協熱利也常氏云可理中湯

仲景傷寒補亡論

卷十一

汗吐下後

四

結胸者大陷胸湯協熱利表不解者桂枝人參湯

又曰太陽病下之其脈促 一作緩 不結胸者此為欲

解也脈浮者必結胸脈緊者必咽痛脈弦者必兩脇拘急脈細數者頭痛未止脈沈緊者必欲嘔脈沈滑

者必協熱利脈浮滑者必下血常氏云結胸陷胸湯咽痛猪膚湯兩脇拘急小建中湯頭痛未止小柴胡湯嘔者小半夏湯協熱利者白頭翁湯下血者蘘皮湯

湯雍曰蘘皮湯用梔子蘘皮湯

又曰太陽少陽併病而反下之成結胸心下硬下利

不止水漿不下其人心煩常氏云可陷胸湯雍曰太

少二陽水木無負因下傷胃三陽俱病輕者不成結胸宜理中湯或無效者宜枳實理中丸

又曰脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳常氏曰宜小陷胸湯增損理中丸雍曰先枳實理中湯不解用半夏瀉心湯

又曰傷寒吐下發汗後虛煩脈甚微八九日心下痞硬脇下痛氣上衝咽嗑眩冒經脈動惕者久而成痙常氏云可茯苓桂枝五味甘草湯成痙者振痿湯

仲景傷寒補亡論

卷十一

汗吐下後

五

湯未見方疑用茯苓桂枝白朮甘草湯

又曰陽明病不能食若攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛攻其熱必噦常氏云可溫中湯小半夏湯雍曰宜理中湯

又曰陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也常氏云可茵陳湯五苓散雍曰此當煎茵陳湯一

物調五苓散作茵陳湯也

又曰夫病陽多者熱下之則鞭汗多極發其汗亦鞭



常氏云可小柴胡湯

又曰太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也常氏云可生薑半夏二瀉心湯

又曰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結硬常氏云可桂枝加芍藥湯桂枝加大黃湯雍曰本太陽病反下之因腹滿痛轉屬太陰者桂枝加芍藥湯主之大實痛者用桂枝加大黃湯今證吐而食不下自利腹滿自痛皆無實證

仲景傷寒補亡論 卷十一 汗吐下後 六

不可便用桂枝加大黃湯有微寒者當宜桂枝加附子湯存芍藥而不去也

又曰傷寒大吐大下之極虛復極出汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也常氏云可小溫中湯雍曰胃寒甚者理中湯噦者小半夏湯五苓散

又曰吐利發汗後脈平小煩者以新虛不勝穀氣故也常氏曰可調胃承氣湯雍曰勿服藥奪其食則愈以脈平不可再損也

又曰太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因胸煩面色青黃膚暍者難治今色微黃手足溫者易愈常氏云可小柴胡湯桂枝龍骨牡蠣湯雍曰心下痞者枳實理中丸燒針胸煩桂枝加龍骨牡蠣湯外證未除者桂枝加人參湯

又曰太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微一作緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更

仲景傷寒補亡論 卷十一 汗吐下後 七

發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必癢屬桂枝麻黃各半湯

又曰服桂枝湯或下之仍頭項強痛翁翁發熱無汗心下滿微痛小便不利者屬桂枝去桂加茯苓白朮湯

又曰太陽病先發汗不解而下之脈浮者為不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯雍曰此證本當先汗所謂若先發汗治不為逆也



又曰下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沈遲身無大熱者屬乾薑附子湯

又曰傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊發汗則動經身為振振搖者屬茯苓桂枝白朮甘草湯

又曰發汗若下之後病仍不解煩躁者茯苓四逆湯又曰發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹屬梔子豉湯若少氣者梔子甘草豉湯若

仲景傷寒補亡論

卷十一

汗吐下後

八

吐者梔子生薑豉湯

又曰發汗若下之而煩熱胸中窒者屬梔子豉湯證又曰太陽證過經十餘日心下溫溫欲吐胸中痛大便反澀腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者當調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微澀者此非柴胡證以嘔故知極吐下也雍曰雁氏云屬調胃承氣湯誤也本論原無屬字不可妄加此一論當分作二證所以本論繼之以承氣方者謂前證當用之方非後證所屬也自若不爾之下非柴胡湯證為

後證本論門治法宜生薑橘皮湯大半夏加橘皮湯又曰太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱一云日晡所發心胸大煩從心下至少腹鞭滿而痛不可近者屬大陷胸湯

又曰傷寒五六日已發汗而後下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也屬柴胡桂枝乾薑湯

又曰傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者屬旋覆代赭石湯

仲景傷寒補亡論

卷十一

汗吐下後

九

又曰傷寒大下之後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

又曰傷寒若吐下後七八日不解結熱在裏表裡俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯

又曰傷寒若吐若下後不解不大便五六日至十餘日其人日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安一作循衣妄撮怵惕不安



微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發熱譫語者屬大承氣湯

又曰三陽合病腹重身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者屬白虎湯

又曰陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出而不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤而反譫語若加溫針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心下懊懣舌上胎者屬梔子豉湯麗

仲景傷寒補論 卷十一 汗吐下後 十

氏依論云凡用梔子湯得效即止後服病人舊微溲者不可與之

又曰陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微滿初頭鞭後必溲者不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

又曰陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣飢不能食但頭汗出者屬梔子豉湯

又曰太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈

又曰大汗若大下利而厥冷者屬四逆湯

又曰太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯若不  
上衝不得與之雍曰不上衝者依後三證用桂枝去芍藥加附子湯桂枝加厚朴杏子湯葛根黃芩黃連湯

又曰太陽病下之後脈促胸滿者促一作縱屬桂枝去芍藥湯若微惡寒者桂枝去芍藥加附子湯本論二證脈經合為

又曰太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促一作縱

仲景傷寒補論 卷十一 汗吐下後 十一

者表未解也喘而汗出者屬葛根黃芩黃連湯

又曰太陽病下之微喘表未解也屬桂枝加厚朴杏子湯

又曰傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯常氏云疑其悞當用麻黃湯及各半湯取大汗雍曰有汗當用桂枝無汗當用麻黃也詳見衄血門中

又曰傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者



未欲解也屬梔子豉湯

又曰傷寒下後心煩腹滿臥起不安者屬梔子厚朴湯

又曰傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者屬梔子乾薑湯

又曰傷寒下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

又曰太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴

仲景傷寒補亡論 卷十一 汗吐下後 三

胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急其人鬱鬱微煩者為未解可與大柴胡湯下之愈雍曰與小柴胡湯嘔止小安者勿服大柴胡也

又曰傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜服小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之

又曰傷寒十三日過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫

以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為內實也屬調胃承氣湯

又曰傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不得轉側者屬柴胡加龍骨牡蠣湯

又曰火逆下之因燒針煩躁者屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯

又曰太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而更惡寒表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛一作頭眩胃中空

仲景傷寒補亡論 卷十一 汗吐下後 三

虛客氣動膈短氣煩躁心中懊憹陽氣內陷心下因鞭則為結胸屬大陷胸證若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃常氏云可茵陳蒿湯調五苓散

又曰傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯主之若但滿而不痛此為痞柴胡不中與之屬半夏瀉心湯



又曰日本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者屬五苓散

脈經云一方言忍之一日乃愈

又曰傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也屬甘草瀉心湯

又曰傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦服赤石脂禹餘糧湯復利不

仲景傷寒補亡論 卷十一 汗吐下後 古

止者當利其小便龐氏云可五苓散

又曰太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者屬桂枝人參湯

又曰下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者屬麻黃杏子甘草石膏湯

又曰病人無表裏證發熱七八日脈雖浮數者可下之假令已下脈數不解台熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血也屬抵當湯

又曰若脈數不解而下不止必協熱便膿血

又曰日本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者屬桂枝加大黃湯

又曰傷寒六七日大下後寸脈沈而遲手足厥冷下部脈不至咽喉不利吐膿血泄利不止者為難治屬麻黃升麻湯

又曰傷寒本是自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即出屬乾薑黃芩黃連人參湯此證依脈經定

仲景傷寒補亡論 卷十一 汗吐下後 古

千金翼曰大下後口燥者裏虛故也  
龐氏曰因發汗時汗出如水漏下還復汗少喘促不止脈促而按之濡者今當汗而解脈促而按之實者死者脈浮手足微厥面垢唇青昏憤而喘者陰陽未和氣阻升降宜服順陰湯五味子湯

又曰發汗或下後痞滿或成結胸氣塞不通宜檳榔散

仲景傷寒補亡論卷第十一終



仲景傷寒補亡論卷第十二

河南郭雍撰次

病可溫十三條 病不可灸七條

病可灸八條 病不可刺八條

病可刺二十九條 病不可水十條

病可水八條 病不可火十一條

病可火二條 火邪三條

病可溫十三條

雍曰仲景本論門自三陰三陽至發汗吐下以後證

仲景傷寒補亡論 卷十二 病可溫 一

而終自病可溫以下本論原無門目其論說皆仲景

之言其見于三陽三陰諸門者王叔和重出于脈經

以備倉猝尋按今依脈經所撰錄諸後

仲景曰大法冬宜服熱藥及灸

又師曰病發熱頭痛脈反沈若不差身體疼痛當救

其裏宜溫藥四逆湯雍曰凡溫藥皆用四逆湯厥脈

細者宜當歸四逆湯凡脈微欲絕及脈不出者通脈

四逆湯內有久寒者當歸四逆加吳茱萸生薑湯主

之

又曰下利腹脹滿身體痛先溫其裏宜四逆湯

又曰自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之

宜四逆輩

又曰少陰病其人飲食入口則吐心中溫溫欲吐復

不能吐始得之手足寒脈弦遲若膈上有寒飲乾嘔

者不可吐當溫之宜四逆湯

又曰少陰病脈沈者急溫之宜四逆湯

又曰下利欲食者就當溫之

又曰下利脈遲緊為痛未欲止當溫之得冷者滿而

仲景傷寒補亡論 卷十二 病可溫 二

便腸垢

又曰下利其脈浮大此為虛以強下之故也設脈浮

革因爾腸鳴當溫之宜當歸四逆湯

又曰少陰病下利脈浮濇者必嘔汗出必數更衣反

少當溫之

又曰傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急

當救裏宜溫之以四逆湯

龐氏以凡病發熱頭疼脈反沈若不差身體疼痛者

脈浮遲表熱裏寒下利清穀者汗出熱不去內拘急



支節疼四逆者下利厥逆惡寒者下利腹痛脹滿身疼痛脈浮者凡五證先用四逆湯溫其裏得利止乃可隨證用藥攻表也

病不可灸七條

仲景曰微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也常氏云宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯欲其有汗宜柴胡桂枝湯

又曰脈浮當以汗解而反灸之邪無從出因火而盛

仲景傷寒補上論

卷一二 病不可灸 三

病從腰以下必重而痺名為火逆若欲自解當先煩乃有汗隨汗而解何以知之脈浮故知汗出當解又曰火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

又曰脈浮熱甚而灸之此為實實以虛治因火而動必咽燥吐血

又曰傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽驚狂臥起不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯  
龐氏口灸及燒針之後證以火劫者並宜火劫法治

之煩躁驚及狂用六石風引湯九良柴胡加龍骨牡蠣湯亦通用

又曰不當灸而誤灸令火邪入腹干錯五臟重加煩死雍曰凡火邪逆證者宜桂枝甘草龍骨牡蠣湯

病可灸八條

仲景曰燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上一壯與桂枝加桂湯更加桂

又曰少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸

仲景傷寒補上論

卷一二 病可灸 四

之

又曰少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯雍曰凡灸少陰下利諸證皆兼服四逆湯

又曰少陰病下利脈微瀉嘔而汗出必數更衣反少當溫其上灸之一云灸厥陰五十壯當灸百會

又曰諸下利皆可灸足大都五壯一云七壯商邱陰陵泉

又曰下利手足厥無脈灸之不溫脈不還反微喘者死少陰負趺陽者為順也



又曰傷寒脈促手足厥逆可灸之爲灸少陰厥陰主逆  
龐氏曰當灸不灸令病人冷結久而彌固氣衝心必死

病不可刺八條

雍曰脈經與可刺不可刺二門所載素問靈樞經語又有異者今改從本經字有當者卽從脈經仍據所出之處以別非仲景之言

靈樞經曰九刺之禁 新內勿刺已刺勿內 大怒

仲景傷寒補亡論 卷十二 病不可刺 五

勿刺已刺勿怒 方醉勿刺已刺勿醉 大勞勿刺已刺勿勞 大飢勿刺已刺勿飢 大渴勿刺已刺勿渴 大驚大恐必定其氣乃刺之又曰粗工勿察是謂伐身

靈樞又曰毋刺熇熇之熱毋刺漉漉之汗毋刺渾渾之脈此刺病與脈相逆者

又曰五藏之腧出于背者灸之則可刺之則不可 靈樞又曰熱病身熱甚陰陽皆靜脈經作爭者勿刺之其可刺者急取之不汗出則泄所謂勿刺者有死徵也

靈樞又曰上工刺其未生者也其次刺其未盛者也其次刺其已衰者也脈經云粗工逆此謂之伐形 靈樞又曰熱病不可刺者有九一曰汗不出大顛發赤噦者死二曰泄而腹滿甚者死三曰目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱而腹滿甚者死五日汗不出吐下血者死六曰舌本爛熱不已者死七日咳而衄汗不出出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而瘕者死凡此九者不可刺也脈經無此素問靈樞禁不刺者甚多詳見補亡禁刺門

仲景傷寒補亡論 卷十二 病不可刺 六

仲景曰太陽傷寒者加溫針必驚也常氏云宜服逆救湯

病可刺二十九條

仲景曰太陽病頭疼至七日自愈者其經竟故也仲景作盡若欲再作經者針足陽明使經不傳則愈 龐氏云補三里

又曰太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風池風府却與桂枝湯則愈

又曰傷寒腹滿而譫語寸口脈浮而緊者此爲肝乘



脾名曰縱刺期門

又曰傷寒發熱蓄蓄惡寒其人大渴欲飲水漿者其腹必滿若自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門

又曰陽明病下血譫語此為熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而瀉之澌然汗出則愈

又曰婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語此為熱入血室當刺期門隨其實而瀉之叔和曰平病云熱入血

仲景傷寒補亡論 卷十二 病可刺 七

室無犯胃氣及上二焦雍曰與此相反豈謂藥不謂針耶

又曰太陽與少陽併病頭痛項強而眩時如結胸心下痞鞭當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語脈弦五日不止當刺期門

又曰少陰病下利便膿血可刺

又曰婦人懷身傷寒腹滿不得小便從腰以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺寫勞宮及關元小便利則愈

又曰傷寒喉痺刺手少陰在腕當小指後動脈是也針入三分補之素問曰有病身熱汗出煩滿不為汗解此為何病岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥巨陽主氣故先受邪少陰與其為表裏也得熱則上從之從之則厥也表裏刺之飲之湯劑雍曰此傷寒感異氣變而為風厥也宜刺太谿崑崙服茯苓桂枝甘草大棗湯

靈樞經曰熱病三日氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺以瀉其熱而出其汗實其陰以補其不足素

仲景傷寒補亡論 卷十二 病可刺 八

問曰病甚者為五十九刺靈樞曰所以五十九刺者兩手內外側各三凡十二痛五指間各一凡八痛足亦如之亦八痛也頭入髮一寸傍三分各三凡六痛更入髮三寸邊各五凡十痛耳前後口一作耳下項中各一凡六痛巔上一顛會一髮際一廉泉一風池二天柱二此五十九穴也

雍曰五十九刺出于二經見于仲景叔和二書然未聞有善用之者古人第存之而不敢廢上古之法後有靈樞十一症亦多不能解者亦不能廢法耳



靈樞經曰熱病先膚痛壅鼻充面取之皮以第一針

五十九苛軫一云苛軫鼻索皮于肺不得索之火火心也

軫車上前後兩端橫木也言鼻塞之甚內外不通亦猶軫之橫塞也

又曰熱病噎乾多飲善驚臥不得安一作臥取之膚

肉以第六針五十九目皆青索肉于脾不得索之木

本肝也

又曰熱病面青腦痛手足煩取之筋間以第四針針

于四逆一作筋辟目浸索筋于肝不得索之金

金肺也

仲景傷寒補亡論 卷十二 病可刺 九

又曰熱病數驚癡癡而狂取之脈以第四針急瀉有

餘者癩疾毛髮去索血一作脈于心不得索之水水腎

也

又曰熱病而身重骨痛耳聾而好瞑取之骨以第四

針五十九刺骨病食一作不食齧牙齒耳青一作清索骨于

腎不得索之土土脾也

又曰熱病先身傍教太素作倚本經煩悶乾唇口噎

取之脈以第一針五十九膚脹口乾寒熱本經作寒汗出索

脈于心不得索之于水水者腎也

又曰熱病頭痛顛顛目瘳脈痛善衄厥熱病也取之

以第三針視有餘不足寒熱痔

又曰熱病體中病重腸中熱取之以第四針于其膈

及下諸指間索氣于胃絡得氣也

又曰熱病俠臍急痛胸脇支滿取之湧泉與太陰陽

明經作陰以第四針針噎裏

又曰熱病而汗且出之經作及脈順可汗者取之魚際

太淵大都太白寫之則熱去補之則汗出汗出太甚

者取內踝上橫文一作脈以止之

仲景傷寒補亡論 卷十二 病可刺 十

又曰熱病七八日脈口動喘而短者兼刺之汗且自

出淺刺手大指間

素問曰熱病先胸脇痛手足躁刺足少陽補足一作手

太陰病甚者為五十九刺王冰云足少陽邱虛取之

又曰熱病始于手臂痛者刺手陽明太陽而汗出止王

云臂痛列缺主之取汗商邱主之

又曰熱病始于頭首者刺項太陽而汗出止王云足

太陽天柱主之

又曰熱病先身重骨痛耳聾好瞑刺足少陰病甚為



五十九刺

又曰熱病先眩胃而熱胸脇滿刺足少陰少陽

又曰熱病始于足脛者刺足陽明而汗出止此出甲乙經

病不可水十條

仲景曰發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘常氏云微喘宜麻黃杏子甘草石膏湯雍曰飲水多者五苓散

又曰傷寒大吐大下之極虛復極汗出者其人外氣

仲景傷寒補亡論

卷十二

病不可水

十一

拂鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也常氏曰可小溫中湯小半夏湯雍曰胃寒理中湯噦者半夏湯五苓散

又曰陽明病潮熱大便微鞭可與承氣湯不堅勿與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食飲水者與水則噦雍曰可溫中湯噦者小半夏湯

又曰下利其脈浮大此為虛以強下之故也設脈浮

革因爾腸鳴當溫之與水噦雍曰宜溫中湯

又曰病在陽當以汗解而反以冷水噴之若灌之其熱被却不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水反不渴宜文蛤散若不差與五苓散若寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水灌之洗之益令熱却不得出當汗而不汗即煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

又曰寸口脈浮大醫反下之此為大逆浮則無血大

仲景傷寒補亡論

卷十二

病不可水

十二

則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人則餉常氏云宜草豆蔻散

又曰寸口脈濡而弱濡則惡寒弱則發熱濡弱相搏藏氣衰微胸中苦煩此非結熱而反薄居水漬布冷銚貼之陽氣遂微諸府無所依陰脈凝聚結在心下而不肯移胃中虛冷水穀不化小便縱通復不能多微則可救聚寒心下當奈何也

千金翼曰太陽病小便利者為水多心下悸雍曰宜



小半夏加茯苓湯

仲景曰凡得時氣病至五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也何者以腹中熱尚少不能消之便更與人作病也至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之常令不足勿極意也言能飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之也飲而忽然大汗出是為自愈也

又曰凡得病反能飲水者此為欲愈之病其不曉病者但聞病人飲水自愈小渴者乃縱與之飲因成其

仲景傷寒補亡論

卷十二

病不可水

七

禍不可復救也龐氏曰凡病非大渴不可與飲冷水若小渴口燥咽乾少少呷水滋潤之若不與水則乾燥無由作汗煩喘而死者多已但勿令足意飲也若不汗將來燥渴甚者但足意飲之勿疑若小渴強飲者致停飲心下滿結喘而死者多矣其有熱脈數尚可作汗而解出者干幸之幸也

病可水八條

仲景曰太陽病發汗後若大汗出胃中乾煩躁不眠其人欲得飲水者當稍飲之令胃中和則愈

又曰厥陰病渴欲飲水者少少與之愈

又曰太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡風寒不嘔但心下痞者此為醫下之也若其不下病人不惡寒而渴者為轉屬陽明小便數者大便則堅不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散

又曰寸口脈洪而大數而滑洪大則營氣長滑數則胃氣實營氣長則陽盛佛鬱不得出身胃實則堅難大便則乾燥三焦閉塞津液不通醫發其汗陽氣不

仲景傷寒補亡論

卷十二

病可水

七

週復重下之胃燥畜熱大便遂燥小便不利營衛相搏心煩發熱兩眼如火鼻乾面赤舌燥齒黃焦故大渴過經成壞病針藥所不能制與水灌枯槁陽氣微散身寒溫衣覆令汗出表裏通然其病即除形軀都不同此愈非治法但醫所當慎妄犯傷營衛

又曰嘔吐而病在膈上後思水者解急與猪苓散飲水亦得也千金亦曰必思煮餅急思水者與五苓散飲之

餘同

又曰霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多飲水者屬五



苓散

龐氏曰病人水藥入口則吐或渴而嘔者或汗後脈尚浮而煩渴者或下利渴而小便不利者或嘔而小便不利者五苓散皆主之或因渴停水心下短息者難治

又曰若頭痛無熱但狂言煩躁不安精神不與人相當勿以火導之但以猪苓散方寸匕服之當連飲新水三升即令指刺喉中吐去之病隨手愈若不能吐者而強與水水停則結心下也當以藥吐之不爾更

仲景傷寒補亡論

卷十二

病可水

五

致危病若當吐不時以猪苓散吐之其死殆速矣亦

可針之佳水飲膈實難治此三死一生也千金之文

病不可火十一條

仲景曰太陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾循衣摸床小便利者可治雍曰宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯五苓散

又曰太陽病醫發汗遂發熱惡寒復下之則心下痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加燒針因胸煩面色青黃膚潤者難治今色微黃手足溫者易愈雍曰發熱惡寒宜小柴胡湯心下痞者生薑瀉心湯火逆宜救逆湯

又曰陽脈浮陰脈弱則血虛虛則筋急其脈沈者營氣微也其脈浮而汗出如流珠者衛氣衰也營氣微者加燒針則血流不行更發熱而煩躁也雍曰和營衛宜柴胡桂枝湯因燒針煩躁者宜桂枝甘草龍骨

仲景傷寒補亡論

卷十二

病不可火

六

牡蠣湯也

又曰傷寒脈浮醫以火劫迫之亡陽必驚狂臥起不安者屬桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

又問曰得病十五六日身體黃下利狂欲走師脈之言當下清血如豚肝乃已後如師言何以知此師曰寸口脈陽浮而陰濡陽浮為風陰濡為弱為少血一作虛浮虛受風少血發熱惡寒洒淅項強頭眩醫加以火熏等令汗出惡寒遂罷客熱因火而發佛鬱蒸肌膚身目為黃小便微難短氣從鼻中出血而復下之



胃無津液泄利遂不止熱痰在於膀胱蓄結成積聚  
狀如豚肝當下不下心亂迷憤奔走赴水不能自制  
畜血若去目明心之此皆醫所爲他無禍患微輕者  
得愈重極者不治雍曰宜犀角地黃湯有熱如狂者  
加黃芩

又曰形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火者  
譫語弱者發熱脈浮解之當汗出愈雍曰宜救逆湯  
又曰太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解  
必圍血雍曰宜犀角地黃湯

仲景傷寒補亡論

卷一一 病不可火

七

又曰陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃  
常氏云可茵陳湯五苓散

又曰陽明病其脈浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗  
出不惡寒反惡熱身體重發汗則躁心憤憤而反譫  
語加溫針必怵惕煩躁不得眠雍曰宜桂枝甘草龍  
骨牡蠣湯若悞下者梔子豉湯龐氏曰脈浮緊不可  
下恐變風溫宜詳之

又曰少陰病欬而下利譫語是謂被火氣劫也故小  
便必難爲強責少陰汗也常氏云宜用救逆湯解其

火氣五苓散通其小便

又曰太陽病二日反躁反熨其背大汗出火氣入胃  
胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄自下利者此  
爲欲解也故其汗從腰以下不得汗其人欲小便不  
得反嘔欲失溲足下惡風大便鞭小便常數而反不  
數及多大便已其頭卓然而痛其人足心必熱穀氣  
下流故也雍曰大便堅及煩躁譫語者宜調胃承氣  
湯以和其胃不得小便者宜五苓散

病可火二條

仲景傷寒補亡論

卷十二

病可火

六

仲景曰下利穀道中痛當溫之當以熬鹽末熨之一  
方炙枳實熨之千金翼云宜炙枳實若熬鹽等如炒  
蠶沙之類皆可熨龐氏言枳實末與鹽相兼用益佳  
或單用枳實末非枳實須逐片炙用卽枳殼也

龐氏曰臍中冷結不可便熨冷氣攻心腹必死須先  
用藥溫之久而可熨之又曰臍下冷結或關陽去者  
大小便不通服藥雖多不見效炒鹽熨臍下須與卽  
通若病人已服巴豆甘遂大黃輕粉之類過多者略  
通則大利而損人宜詳之



火邪三條

龐氏曰傷寒醫以火置臥床下或周身用火迫劫汗或熨或悞灸皆火邪也仲景曰傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂或臥起不安者宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯又曰火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草湯主之雍曰可代救逆湯用之  
龐氏曰灸及燒針後證似火劫者並宜以火劫治之煩躁驚及狂用金匱風引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣亦通用

仲景傷寒補亡論

卷十二

火邪

九

千金方曰其病形不可灸因火為邪散走血脈傷脈尚可傷藏則劇并俞冗腫黃汗自出經絡外爛肉腐為癰膿此為火疽醫所傷也雍曰千金翼有火疽一證錯簡在狐惑後又併微數之脈不可灸證合為一又云應用瀉心湯其言舛謬不可續微數之脈不可灸已見本門獨留火疽一證似屬火邪故錄于此外臺以瀉心湯治蝕于上部屬狐惑亦係火疽微數脈于後其悞久已  
仲景傷寒補亡論卷第十二終

仲景傷寒補亡論卷第十三

河南郭雍撰次

兩感症五條

陰陽交十一條

三陽合病十五條

結胸二十二條

心下痞二十五條

兩感症五條

素問曰人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死

又曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭

仲景傷寒補亡論

卷十三

兩感

痛口乾煩滿而渴二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六日死病源曰水漿不入不知人則六日而死其義甚明

問曰素問言不知人六日死又言三日其氣乃盡何也雍曰兩感之病表裏俱傳三日而六經竟雖竟而氣未絕故經竟之後又三日其氣乃絕其言三日者謂三日而陽明之氣方盡故也言六日者通傳經之日也傳經三日氣盡故言六日何以明之三日經竟



之時五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後又三日氣盡乃死帝以疑而問之而岐伯告以陽明氣血盛不知人三日而後死也經既曰如是之後則是傳六經竟之後也又曰不知人三日則是陽明未絕之時也經竟甚明而或者謂其傳六經而後死夫能再傳則不死矣本以邪氣傳至少陽欲傳太陰之間而太陰已先與陽明同受邪氣不能更受後來再傳之邪雖太陰復欲以邪傳之三陽而三陽邪氣亦皆滿亦不更爾容受兩邪相拒六經皆滿俱不能流注傳

仲景傷寒補亡論

卷十三

兩感

二

泄是以六府不通營衛不行水漿不入不知人以待陽明之氣盡而後死矣陽明胃經也胃為血氣之海朝夕灌注營衛六府十二經者皆胃之氣血也諸經雖絕獨陽明氣血未盡故又三日而後死也六日死三日死只是兩感一證或者謂再傳為六日死邪氣直入陽明為三日死遂分兩證此說甚悞未通經意又不當改經血氣盛為邪氣盛仍有血氣隨邪而盡之說皆失也反覆讀經當自得之龐氏曰兩感之疾素問無脈候今詳之凡脈沈者皆屬陰也一日脈當

沈而六沈者少陰也大者太陽也二日脈當沈而長三日脈當沈而弦乃以合表裏之脈沈長弦皆隱於沈大也凡三陰無合病惟三陽有合病今三陽與三陰合病故其脈似沈緊而大似沈實而長亦類革至之死脈也

王仲弓曰監丞曰本論言兩感俱作治有先後發表攻裏本自不同近時張翊云論有傷寒醫下之利不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表今可依倣而治既云治有先後則宜先救裏內

仲景傷寒補亡論

卷十三

兩感

三

纔溫則可醫然救表亦不可緩也朱氏曰內尤為急也雍曰救裏藥用四逆救表藥用桂枝湯此法出於不得已猶愈於束手待斃矣仲景曰救裏藥用四逆救表藥用桂枝湯更看臨時寒熱多少參訂之幸有表裏一輕者則急治其重者也然其治大宜速過三日則水漿不入雖有藥不納已張亦未悟此也兩感論曰病人有不治之證古人不復論方藥者立論固可如此醫家亦可如此而人有父兄弟至親不幸遇疾如此能坐視不思拯援萬死一生之術哉



孫真人論精神困者病久不差欲死者但與藥救之  
十人中或差三四以是言則人雖有不治之病其氣  
未絕之間亦無不服藥待盡之理今觀兩感之證以  
陰陽之經邪氣皆滿不相來往傳注故爲必死之候  
乘其三日內邪氣未滿榮衛可通之時早爲療治尙  
或不死若六經邪氣三日既滿則水漿不入湯藥何  
緣可納勢須於初覺之時急治之然初感之日誰能  
斷然不疑知其爲兩感擬議之間已不及矣是以必  
至於死也雍謂湯藥至此不如針灸湯藥雖可內攻

仲景傷寒補亡論 卷十三 兩感 四

而內攻未必至雖至而藥病方有勝負針艾可以外  
泄隨其輕重必有泄而出者昔號太子之死扁鵲治  
之蓋外泄之術也方其厥氣上行絕陽破陰有甚於  
兩感不知人之證扁鵲以爲陽脈下墜陰脈上爭令  
氣閉而不通夫厥氣亦邪氣也陽脈陰脈者卽陽經  
陰經也陽脈下墜猶傳之陽也陰脈上爭相搏而不  
能受也氣閉不通以陰陽俱邪實故不通不通則水  
漿不入矣越人於是不施湯劑而遽用針石外取三  
陽五會有間太子蘇是知湯不能達於外而針尙可

泄於外也既蘇而得爲五分之熨以逐餘邪邪去然  
後得服湯藥二旬而復故倘使湯先必不能得入何  
緣有復蘇之理今兩感之邪與尸厥之邪其暴殺人  
一也誠能做越人先針後湯之術取之三陽使三陽  
氣緩然後灼三陰之會以泄其邪邪氣未盡方以湯  
攻使無所逃既盡則以湯養之雖生死未可必而其  
爲治有所據而不謬矣故愚意欲先取崑崙委中乃  
去其血以泄太陽次取三里以泄陽明後取邱墟陽  
陵泉以泄少陽三陽氣既緩急灸三陰交穴以泄三

仲景傷寒補亡論 卷十三 兩感 五

陰之邪此穴亦難取或上下左右少差卽能中一陰  
二陰不中必三陰俱中仍須審度再分灸之上陰陵  
泉可泄太陰太谿可泄少陰大敦可泄厥陰炷如麥  
粒緩緩灸之徐泄其氣不必以多爲貴也雖其如此  
亦不可以不灸三陰交先併泄之然後分得陰陽得  
陰陽緩乃可服湯泄不患多治不厭速蓋有三日之  
期不可待也所以不敢用熨者必爲火邪故惟用湯  
二者皆陰氣閉不通之疾大略相似而其爲寒熱則  
異也以是思之則三陰合病之中脈有負者亦宜灸



刺以治之且如陽明少陽合病其脈負者少陽木氣盛也瀉邱墟陽陵泉則少陽木氣不得不平補三里則陽明之土不得不旺或不精補瀉者第以刺為瀉灸為補古人皆有是法如是則雖死亦有可生理所謂十中三四愈者未必不如孫氏之言也雖然天下之事固有大小同異而其理一也昔洪水橫流汎濫於中國禹決九州然後人得平土而居之愚因誦此而得通病有外泄之理使早得而熟之則越人氏之學何難至之顏淵曰舜何人也子何人也有為者亦

仲景傷寒補亡論

卷十三

兩感

六

若是沉盧扁乎惜余得之暮年所用之小也然亦不敢不告諸來者故備言之

陰陽交十一條

素問三十三篇曰有溫病者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食岐伯曰病名陰陽交交者死也人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復發熱者是邪勝也不能食者精無俾也汗而熱留

者其壽可立而傾也

又曰熱論口汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也雍曰汗出輒復熱一死脈尚盛二死狂言失志三死也

靈樞二十三篇曰熱病已得汗而脈尚躁盛者此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生雍曰此二證脈經皆以為陰陽交疑以得汗者為交不得汗者非交也又曰熱病已得汗而脈尚躁且復熱勿膚刺喘甚者

仲景傷寒補亡論

卷十三

陰陽交

七

死

脈經口熱病陰陽交者死又曰熱病煩已而汗脈當靜

又曰太陽病已得汗脈反躁盛者是陰陽交死復得汗脈靜者生

又曰熱病陰陽交者熱煩心躁太陰寸口脈兩部尚躁盛是陰陽交死得汗脈靜者生雍曰已上二證與前同靈樞不言陰陽交此言陰陽交為異脈經所載皆古書此二證莫知所出也



又曰熱病陽進陰退頭獨汗出者死陰進陽退腰已下至足汗出者死陰陽俱進汗出已熱如故亦死陰陽俱退汗出已寒慄不止鼻口氣冷亦死已上十證並見脈經陰陽交部

又曰熱病所謂併陰者熱病已汗因得泄是謂并陰故治一作活

又曰熱病所謂并陽者熱病已得汗脈尚躁盛火熱汗出雖不汗出若衄龐氏云和而衄者是謂并陽故治雍曰

并陰陽二證諸書無所見亦類陰陽交故脈經繼之仲景傷寒補亡論 卷十三 陰陽交 八

於其後

陰陽交論曰傷寒兩感陰陽交二證皆出於素問仲景發明兩感而不及陰陽交王叔和載陰陽交而不及兩感後世因仲景而明兩感之證獨陰陽交多所未解予考陰陽交之證大抵傷寒脈不為汗解者皆陰陽交也何以不為汗解曰獨陰獨陽之病一汗則解陰兼陽陽兼陰之病一汗不能解蓋汗解其陰陽脈不得退汗解其陽陰脈不得退此所以不為汗衰也然則陰兼陽陽兼陰者何病也余悉索之則兩感

之證似之一曰太陽與少陰俱病二曰陽明與太陰俱病皆陰兼陽陽兼陰也陰陽相兼而病故其病名曰交是以太陽汗解而少陰未得解陽明汗解而太陰未得解者豈非因其相交而不為汗衰乎觀二證之言初若不相同合二證陰陽之理則無異也故素問言兩感本非病名至陰陽交則曰病名陰陽交蓋兩感言其始感陰陽交者著其名也故陰陽交之證有曰復得汗脈靜者生是邪氣再出而復生也仲景亦曰發表攻裏本自不同豈非再乎故遇斯病者當

仲景傷寒補亡論 卷十三 陰陽交 九

參二證而治之然則仲景發明兩感而不及陰陽交叔和載陰陽交而不言兩感意豈異乎更俟賢哲明之

三陽合病十五條

龐氏曰凡三陰無合病惟三陽有合病十四證其三陰三陽相并而病者即兩感是也雍曰合病十四證已見三陽經今重列於下非惟便於檢按亦相附參考易明庶無差矣

仲景曰太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之



又曰太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

又曰太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯

仲景問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若利小便亡其津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣大便難者此陽明病也雍曰無太陽證者宜調胃承氣湯凡轉屬之法與合病微不同且如太陽陽明合病必須解兩經之邪故仲景不捨葛根麻黃二湯若

仲景傷寒補亡論 卷十三 三陽合病 十

轉屬陽明可以少俟太陽證衰即以調胃承氣湯專攻陽明一舉而兩得之蓋太陽為既往則當日衰陽明為方來則當日盛故也

又曰二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳絳汗出大便難而譫語者下之則愈宜大承氣湯朱氏曰若太陽證不罷不可下宜桂枝麻黃各半湯小發其汗雍曰若太陽不罷者宜少俟一日又不罷則依朱氏法

又曰二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不微

因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之薰之一一作蒸若發汗不微不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不微故也更發汗則愈何以知汗出不微以脈濇故知之雍曰宜桂枝麻黃各半湯

問曰太陽陽明合病併病二者之證何以別之朱氏曰脈浮大而長頭疼腰痛肌熱鼻乾目疼者合病也

仲景傷寒補亡論 卷十三 三陽合病 十一

太陽初得病時發其汗汗先出不微因轉屬陽明續自微汗出不惡寒者併病也雍曰合病脈浮大而長者未必惡寒其脈浮緊而長無汗者當惡寒也皆宜桂枝麻黃各半湯有下症者自宜前法

仲景曰太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語脈弦五六日譫語不止刺期門雍曰仲景言少陽不可發汗故併病亦不可汗也

又曰太陽少陽併病心下鞭項強而眩者當刺大



惟肺俞肝俞慎勿下之雍曰仲景曰太陽病轉入少陽脈沈遲者與小柴胡湯龐氏曰脈緊者小柴胡湯少加牡蠣大抵少陽多宜和解故宜小柴胡湯太陽和解亦宜用之

又曰太陽少陽併病太陽病不解轉入少陽者脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未可吐下脈沈緊者與小柴胡湯龐氏曰脈緊者小柴胡加桂枝脇下鞭滿加牡蠣

又曰陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者

仲景傷寒補亡論 卷十三 三陽合病 十一

失也互相剋賊名為負也雍曰宜理中湯下利而厥者宜四逆湯其脈不弦者為順脈弦者陽明土負也急瀉邱墟陽陵泉以泄少陽木急灸三里以補陽明土也

仲景曰三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語下之則額上生汗手足厥冷若自汗出者白虎湯主之

又曰三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗龐氏曰不言弦者隱於長大也常氏云可桂枝柴胡

各半湯雍曰即柴胡桂枝湯也

問曰仲景言本太陽病因醫下之腹滿時痛轉屬太陰者此為兩感乎為合病乎雍曰非也合病雖亦有轉屬者要之兩陽俱作也兩感則表裏陰陽俱病矣難經曰人之有尺猶木之有根枝葉雖枯槁根本將自生兩感則根葉皆將枯無自而生矣合病太陽太陰雖名一陰一陽而實非相為表裏之經互相有生救謂如太陽雖病而少陰不受病太陰雖病而陽明不受病正類枝葉雖枯槁根本自生之象是以不為

仲景傷寒補亡論 卷十三 三陽合病 十二

兩感況本非邪氣傳注醫誤下之移太陽之疾入於太陰非兩經俱作之證甚明是以仲景用桂枝加芍藥湯桂枝加大黃湯也

結胸二十二條

雍曰結胸痞氣陽毒陰毒狐惑百合六證雖有見於前證中者而龐氏皆以其異證故別列於後今依龐氏之法益以斑黃血衄證為十證

仲景曰問病有結胸有藏結其狀何如曰按之痛寸脈浮關脈沈名曰結胸龐氏曰寸口脈浮關上尺中



皆沈或沈緊

又曰何為藏結答曰如結胸狀飲食如故時時下利

寸脈浮關脈小細沈緊名曰藏結舌上白胎滑者難

治常氏云可刺關元在臍下

又曰藏結無陽證不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜舌

上胎滑者不可攻也常氏云可刺關元穴

又曰病人脇下素有痞連在臍旁痛引小腹入陰筋

者此名藏結死常氏云可刺大赫在腹部第二行

又曰發病於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰

仲景傷寒補亡論

卷十三

結胸

古

而反下之因作痞也所以成結胸者此下之太早故

也朱氏曰傷寒本無結胸以其熱下之早熱氣乘虛

而入痞結不散變成結胸王仲弓曰杜壬云傷寒在

表悞下者宜急頻與理中湯丸更加人參多得解不

作結胸若大腹轉損發厥者愚與四逆湯便安若胃

中雖和而病不退候再有裡證再下之朱氏云以前

來下湯未是故也

又曰若心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯主

之但滿而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯

又曰結胸證其脈浮大者不可下下之則死朱氏云

尚宜發汗也脈浮是表證兼以小柴胡湯等先發表

表證罷後以結胸藥下之常氏云用巴豆黃連餅子

封臍中灸之即諸方中所謂聖餅子灸法也

又曰結胸證悉具煩躁者亦死

又曰太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則

為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表

未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客

氣動膈短氣煩躁心中懊憹陽氣內陷心下因鞭則

仲景傷寒補亡論

卷十三

結胸

五

為結胸大陷胸湯主之雍曰此即病發於陽而反下

之之證也若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還

小便不利身必發黃者可茵陳蒿湯雍曰若單服茵

陳濃汁調五苓散亦可

又曰傷寒六七日結胸熱實脈沈而緊心下痛按之

石鞭者大陷胸湯主之

又曰傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與大柴胡

湯但結胸無大熱者此為水結在胸膈也但頭微汗

出者大陷胸湯主之雍曰可下證中自但結胸下分



別為二證故用二藥不同

又曰太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上

燥而渴日晡所小有潮熱一云日晡所發心胸大煩從心下至少

腹鞭滿而痛者大陷胸湯或以大陷胸丸下之

又曰小結胸證正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之

又曰太陽病二三日不得臥但欲起心下必結脈微

弱者此本有寒分反下之若利止必作結胸未止者

四日復下之此作協熱利也常氏云脈微弱有寒者

仲景傷寒補亡論

卷十三

結胸

六

可增損理中丸作結胸者大小陷胸湯協熱利者白

頭翁湯

又曰太陽病下之後其脈數促一作縱不結胸者此為

欲解也脈浮者必結胸常氏云可增損理中丸脈緊者必咽痛

常氏云可枯梗甘草湯脈弦者必兩脇拘急常氏云可小柴胡湯脈細數

者頭痛未止常氏云可蔥鬚湯脈沈緊者必欲嘔常氏云可七物黃連湯

脈沈滑者協熱利常氏云可白頭翁湯脈浮滑者必下血常氏云可藥皮湯

又曰病在陽應以汗解之反以冷水灌之濕之其熱

被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴

者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證

者與三物小陷胸湯白散亦可服龐氏云無熱證者

與三物白散小陷胸湯非也愚以為熱者小陷胸湯寒者三

物白散

又曰結胸者項亦強如柔痙狀下之則和龐氏云宜

服大陷胸湯

又曰太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞭下利

不止水漿不下其人心煩常氏云可半夏生薑二瀉

仲景傷寒補亡論

卷十三

結胸

七

心湯

活人書云西晉崔行功云傷寒結胸欲絕心膈高起

手不得近大小陷胸皆不差者此是下後虛逆氣已

不理而毒復上攻氣毒相搏結於胸中當用枳實理

中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神應手而愈

今常氏謂增損理中丸即是也龐氏曰近世治結胸

多用針頭丸用硫黃陽起石者若病熱毒甚者必死

惟治冷結寒實耳

活人書云結胸三種有大結胸不按而胸痛連腹堅



鞭大陷胸湯主之有小結胸按之心下痛小陷胸湯主之有水結胸在膈間亦名結胸小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡蠣湯主之又有寒熱二證有熱實結胸者胸中煩躁心內懊憹舌上燥渴脈沈滑者皆熱證也大陷胸湯主之有寒實結胸無熱證者三物白散枳實理中丸主之

王仲弓曰治結胸當用小陷胸湯甚佳大陷胸湯太峻如不得已則用大陷胸湯丸脈浮者不得用大陷胸丸宜用小陷胸枳實理中丸結胸用黃連巴豆灸

仲景傷寒補亡論

卷十三

結胸

六

法得解心下痞宜旋覆代赭湯若外尙未解胸滿脇痛者宜小柴胡湯雍曰凡用仲景藥皆當準此爲式蓋今古不同病人血氣不能勝藥力醫工不能精於診視非古人比故用藥可不及不可大過如脈浮者尤宜從朱氏用發表藥表證罷以結胸藥治之

心下痞二十五條

仲景曰病發於陰而反下之因作痞也龐氏曰發熱惡寒爲發於陽悞下則爲結胸無熱惡寒爲發於陰悞下則爲痞朱氏曰傷寒本無痞因身冷醫反下之

遂成痞枳實理中丸最良

又曰心下滿而鞭痛者爲結胸但滿而不痛名爲痞宜半夏瀉心湯朱氏曰此湯藥蓋本理中又參黃芩湯也審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙緣桔梗枳殼行氣下膈故先之龐氏曰設使下後津液入裏胃虛上逆寒結在心下故宜用辛甘發散之今用半夏以下氣用苦以去濕兼通心氣又甘草力大使乾薑黃連不能相惡此用半夏瀉心湯之意也

仲景傷寒補亡論

卷十三

心下痞

九

濡但氣痞耳常氏云可小陷胸湯生薑瀉心湯雍曰宜半夏瀉心湯

又曰心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之龐氏曰寒濕迫心氣不行欲作熱也朱氏曰結胸與痞關脈皆須沈若關浮則熱結故以三黃瀉心也

又曰心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之大黃黃連瀉心湯內加附子

又曰本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴



而口燥煩小便不利者五苓散主之一云忍之一日乃愈

又曰傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食

臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

龐氏云胃中不和為少陽本氣所制故用生薑之辛

味也本字當作木字

又曰傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不

化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見

心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以

胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之龐氏

仲景傷寒補亡論 卷十三 心下痞 主

云胃虛故加甘味

又曰傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已

復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中

者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利

不止當利其小便龐氏云五苓散主之

又曰傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也

不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯

攻痞宜大黃黃連瀉心湯龐氏曰前加附子是汗出

多而惡寒表將解而裏結未除也此證是發汗無汗

而惡寒故先須解表也朱氏曰結胸與痞表未解者不可攻也

又曰傷寒發熱汗出不解心下痞硬嘔吐而下利者

大柴胡湯主之龐氏云汗出嘔吐下利是胃中津液

燥裏有結實非胃虛也故大柴胡湯下之

又曰傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除

者旋覆代赭石湯主之朱氏曰有旋覆代赭湯證其

人或欬逆氣虛先服四逆湯胃寒先服理中丸次服

服此湯良

仲景傷寒補亡論 卷十三 心下痞 主

又曰太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下

不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

又曰傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞

鞭脇下痛氣上沖咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿

常氏云可服茯苓甘草白朮生薑湯振痿湯此湯未

見方恐是悞寫

又曰太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人禁

禁汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔

短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

續修四庫全書 子部 醫家類



朱氏曰此湯尤難用須是表證罷身涼不惡寒者乃可用若表未解者切不可用也雍曰十棗湯乃攻裏大峻藥也非和裏藥也設或誤用殺人過于承氣常氏言此證傳寫之悞故朱氏亦畏而戒之宜代用檳榔散

又曰太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加燒針因胸煩面色青黃膚暈者難治今色微黃手足溫者易愈常氏云痞者可生薑瀉心湯發熱惡寒可小柴胡湯

仲景傷寒補亡論

卷十三

心下痞

三

火逆可桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

又曰病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞鞭氣上冲咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂散

又曰太陽少陽併病心下鞭頸項强而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之雍曰其詳見併病中

又曰太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔吐但心下痞者此以醫下之也常氏云可生薑半夏瀉心湯雍曰此證汗出發熱惡寒表證不罷

宜先服柴胡桂枝湯次服枳實理中丸  
又曰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必心下結鞭常氏云可增損理中丸桂枝加芍藥湯

又曰陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之遂利不止者死常氏云可半夏瀉心湯也已攻而利者四逆湯又曰脈雙弦而遲者必心下硬脈大而緊者陽中有陰也可下之宜大承氣湯

活人書曰已痞服瀉心湯不愈然後可用陷胸湯下  
仲景傷寒補亡論

卷十三

心下痞

三

又曰外證未解而心下妨悶者非痞也謂之支結柴胡桂枝湯主之脇胸滿微結小柴胡加乾薑牡蠣湯主之

王仲弓曰生薑瀉心半夏瀉心二湯和平宜常用之

仲景傷寒補亡論卷第十三終



仲景傷寒補亡論卷十四

河南郭雍撰次

陽毒五條 陰毒七條

發斑十三條 發黃三十條

陽毒五條

雍曰傷寒陰陽二毒最為疾勢重者張仲景有升麻甘草二湯今竟不見于仲景書中惟脈經載其論證二篇千金方中略言之今二湯用藥加減與仲景異同金匱要略復合為一曰陰毒陽毒升麻鼈甲湯主

仲景傷寒補亡論卷十四 陽毒

之前後諸方書皆無是說然二疾冰炭也用藥正相反諸書之間雖有升麻甘草二湯方味皆同又與要略異以此不能無疑惟活人書二方用藥不同最為當理第不見活人書升麻湯所出方書想朱氏必有所據今從活人書用二藥士弱曰二方載外臺秘要云出古今錄驗方王叔和脈經曰陽毒為病身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐下利其脈浮動大數面赤斑斑如錦文咽喉痛吐膿血五日可治至七日不可治有傷寒二三月便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒升

麻湯主之龐氏云又宜葛根龍膽湯雍曰此疾常有之不知治多大吐下血而死雖用助陰去熱藥亦須有解毒在其中則可用

活人書曰陽毒病陽氣獨盛陰氣暴絕必發躁狂言妄走面赤斑斑如錦文咽痛或下利赤黃脈洪實滑促宜用酸苦之藥令陰氣復而大汗解矣葶藶苦酒湯升麻湯大黃散梔子仁湯黑奴丸可選而用之雍曰表裏皆大熱證者宜黑奴丸審知熱在裏不在表以朴硝大黃桃仁藥下之其物則多服升麻也蓋陽

仲景傷寒補亡論卷十四 陽毒

毒之作甚暴非陰毒比下原文缺雷時強人下原文缺

及小兒便宜用升麻湯豫防其毒又曰近人治傷寒脈洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如烟煤者則以水漬布薄之疊布數重新水漬之稍揆去水搭于胸上須與蒸熱又漬令冷如前薄之乃換新水日數十易熱甚者置病人于水中熱勢纔退即已亦良法也雍曰置人水中之法勢甚不得已雖可用亦難用須內熱少衰勢未解則可不然水迫外熱併歸于內則



不可支也大抵陽虛狂躁與傷寒下證不同下證只坐臥不安陽毒則必欲起走且有力人不能制雖見江河亦入也亦有偶然得解者非常道也雍曰嶺南治熱瘴取蚯蚓研爛新冷水漬取清汁飲之此未試也蓋說言獺肝治熱不治冷余嘗苦病後潮熱以冷水調少許未服之則止然未嘗用治大熱也漫書之以備用

### 陰毒七條

叔和脈經曰陰毒爲病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脈沈細緊數身如被杖五六日可治至七日不可治也或傷寒病一二日便結成陰毒或服藥六七日以上至十日變成陰毒甘草湯主之雍曰要略有咽喉痛字千金二毒並同脈經金匱要略陽毒之爲病面赤斑斑如錦文咽喉痛吐膿血陰毒之爲病面目青身痛如被杖咽喉痛此與脈經證同語異第語簡而易明故重錄之  
龐氏曰陰毒之爲病因汗下藥性冷所變多在四五

仲景傷寒補亡論

卷十四

陰毒

三

日也或素表陽氣虛冷始得病便成陰毒或始因傷寒冷物便成陰毒服甘草湯仍作返陰丹喘促吐逆者入口便定服藥三五服不退便于臍下一寸半灸之大炷百壯未愈可至二百壯若手足極冷小便濇小腹硬痛囊縮卽須于臍下四寸如前灸之仍用當歸四逆加吳茱萸湯同返陰丹頻頻與服內外逼逐亦可解稍緩則死矣其陰毒氣結在小腹故小便濇切不可用利小便藥有以炒鹽及熱藥熨臍下者其冷氣在少腹之間被熱物所熨無處通出卽衝上奔

仲景傷寒補亡論

卷十四

陰毒

四

心其死尤速也當須預服溫劑然後熨之非不當熨也  
又曰陰毒脈沈微欲絕四肢逆冷大躁而渴不止宜服附子飲子仍下疏黃丸尤妙  
活人書曰陰毒之爲病初得病手足冷背強咽痛糜粥不下毒氣攻心腹痛短氣四肢逆冷嘔吐不利身如被打宜服陰毒甘草湯白朮散附子散正陽散肉桂散返陽丹返陰丹天雄散正元散退陰散之類可選用之雍曰升麻甘草二湯觀其用藥性甚緩然諸



家必先用之者以古人治陰陽二毒者惟此二湯故須用之以去其毒勢而後輔之以他藥也

又曰陰毒本因胃氣虛寒或因冷物傷脾外傷風寒內既伏陰外又感寒或先感外寒而內伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發頭疼腰重

又曰陰盛傷寒心間煩躁四肢逆冷白朮散返陰丹皆主之雍曰朱氏返陰丹比之龐氏加附子乾薑桂心為六物其灸法先灸臍下一寸間若其人手足冷少腹硬即更于臍下兩邊各一寸三處齊灸之仍與

仲景傷寒補亡論 卷十四 陰毒 五

四逆返陰二藥頻服方可解退若加以小便不通及陰囊縮入少腹絞痛欲死者更于臍下三寸石門穴火灸之仍可服二藥切不可與尋常利小便藥也雍曰從兄盛年恃健不善攝生因極飲冷酒食內外有所感初得疾即便身涼自利手足厥額上冷汗不止遍身痛呻吟不絕偃臥不能轉側心神俱無昏愊恍惚呼醫視之治不效子言兄曰此疾證甚重而病人甚靜又覺昏憤身重不能起自汗自利四肢厥此陰病無疑也又遍身痛不知處所出則身如被杖陰

毒證也安得不急治醫者之言繆悞不可聽乃急令服四逆湯灸關元及三陰交未知加服九鍊金液丹利厥汗皆少止稍緩藥艾則諸證復出再救急治如此進退者三比三日兩夜灸十餘壯服金液六十餘粒四逆湯一二斗方能住火灸湯藥陽氣雖復而汗不出證復如太陽證未敢服藥以待汗二三日後大煩躁飲水次則譫語斑出熱甚無可奈何復與調胃承氣湯得利大汗而解陰陽反覆有如此者前言煩躁不可投涼藥此則可下證具非止小煩躁而已故

仲景傷寒補亡論 卷十四 陰毒 六

不可同也

發斑十三條

論曰發斑一證緣仲景書遺逸不詳見故諸家之說無所統大抵斑有數種惟熱毒入胃者當下之非下斑也下其胃中之毒也而胃中之毒由斑而後見也若皮間暴作癢疹無他裏熱證者不可下當服平涼去風解肌藥及以摩膏治之若在春末及夏不宜火灸及重覆隨其淺深略分內外不可一切用藥亦表虛不可發汗也



千金方載華元化之言曰傷寒熱毒之氣五日在腹六日入胃乃可下也若熱毒在外未入于胃而先下之者其熱乘虛入胃則爛胃也然熱入胃要須下去之不可留于胃中胃若實其熱為病三死一生胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出此候五死一生劇者黑斑出此候十死一生千金又曰病者過日不以時下則熱不得泄亦爛胃斑出雍曰發斑有下之太早者有失下者故王仲方謂下早熟入胃者斑出下之遲失下之亦斑出

仲景傷寒補亡論

卷十四

發斑

七

活人書曰發斑有兩證溫毒熱病皆有斑也溫毒發斑者冬時觸冒寒毒至春始發病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣未散故發斑黑膏主之又冬月溫煖人感乖戾之氣冬末即病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱溫毒始發則肌肉斑爛癰疹如錦文內攻心悶但嘔清汁葛根橘皮湯主之雍詳發斑有陽毒溫毒熱病即今之傷寒也溫毒發斑于三日之內毒氣在表時即出以此驗其溫毒非熱病也蓋其毒久鬱而發病不在裏故不可下

必隨表證治之當用藥解肌熱麻黃桂枝皆不可用也如三日毒不解其病入裏則同傷寒治之

又曰熱病發斑與時氣同或未發汗或已經汗下而熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出于皮膚所以發斑雍曰此證是溫毒發斑也與傷寒發斑不同蓋溫毒之毒本在裏久為積寒所折腠理閉塞不得出及天氣暄熱腠理開疎乃因表虛鬱發為斑是時在裏之毒發在表故可解肌而不可下也傷寒之毒初亦在裏久不能出及春再感溫氣腠理方開隨虛而出于

仲景傷寒補亡論

卷十四

發斑

八

表遂見表證而未成斑也醫者昧于表裏之證下之太早時內無毒氣可下所損皆胃之真氣真氣既損則胃為之虛矣邪毒者乘虛而出乘虛而入者以先損之虛胃而當復入之今毒力必不勝而胃將爛是以其華見于表而為斑則傷寒之毒初蘊于裏出而之表耳既見于裏又見于表是毒氣往來者再矣諸經者血脈之道路也今邪毒往來于道路而榮衛氣血不通其人可久乎此其所以不通也然溫毒之斑惟感于動而發從而散之則去矣傷寒之毒已發而



復過之又虛而復客之即入于胃如升堂入室不復可逐必使下泄于腸胃則可出故必下之所以救胃爛也元化曰要須下去之不可留于胃中是也故溫毒之斑鬱發之毒也傷寒之斑爛胃之證也發則可去爛則不可生是以言五死一生十死一生也其爛如何曰毒熱焚于內則胃為瘡爛矣

又曰大抵發斑不可用發表藥蓋表虛裏實若發汗重令開泄更增斑爛也元參升麻湯大青四物湯猪膽雞子湯可選用之雍曰溫毒發斑感在表惟可解

仲景傷寒補亡論

卷十四

發斑

九

肌不可發汗傷寒發斑毒氣在胃當下不當汗也故皆腹痛眼睛疼身體倦怠四肢逆冷額上手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失二三日間或可起行不甚覺重診之則六脈沈細而疾尺部短小寸口脈或大若誤服涼藥則渴轉甚煩躁急有此病證者便須急服辛熱之藥一日或二日便安

又曰若陰毒漸深其候沈重四肢逆冷腕腹轉甚或咽喉不利心下脹滿結硬躁渴虛汗出不止或時鄭聲指甲面青色黑六脈細沈而疾一息七至以上有

此證者速于氣海及關元二穴灸二三百壯以手足和緩為效仍兼服諸丹散內外逼逐令陽氣復而大汗解矣若陰毒盛而陽氣暴絕則為陰毒陽毒盛而陰暴絕則為陽毒大抵離絕陰陽非大汗不能復其正氣也

又曰若陰毒已深疾勢困重六脈附骨取之方有按之則無一息十至以上或不可數至此則藥餌難為功但於臍中用葱熨法或灼艾三五百壯如手足不溫不可治也如手足溫更服藥以助之若陰氣散陽

仲景傷寒補亡論

卷十四

發斑

十

氣來則漸減熱藥調治之陽氣乍復往往却煩躁切不可投涼藥煩躁甚者再與返陰丹則定也

又曰六脈俱浮大或沈取之而不甚疾者非陰證也大抵陽毒傷寒其脈多弦而洪數陰毒傷寒其脈沈細而弦疾

又曰陽盛則身熱而無汗陰盛則身冷而有汗岐伯曰陽盛則身熱腠理閉喘粗為之俯仰汗不出而熱陰勝則身寒汗出身常清數慄而寒寒而厥不可用發表藥雍曰發斑一證以仲景不言故諸書少至當



之論既不分溫毒傷寒在表在裏不同又不別發斑癰疹諸瘡之異雖朱氏亦然活人書曰斑瘡癰疹如錦文俗名麩瘡素問謂之疹此亦發斑癰疹麩瘡三病爲一證也雍詳發斑未嘗成瘡也傷寒之斑初如朱硃細點又如狗蚤嚙痕初甚稀有漸加稠密是也癰疹略如風尸亦有赤白二種赤者如錦文也不如風尸之高起漸隱而起相連續初多起臂腿次滿腹背皆成錦花者是也溫毒之斑略類赤色癰疹又不與傷寒斑同至俗名麩瘡者乃是陽毒諸瘡之類與

仲景傷寒補亡論

卷十四

發斑

十一

斑疹二者不同古有陽毒瘡者卽本俗名豆瘡麻子瘡水鈴麩瘡皆是也皆因形名之每有輕重惟豆瘡爲至重其他若悞服涼藥亦皆能殺人又有暴發錦文癰疹者初無傷寒證但前一日二日減食情思不佳次必臂腿癢搔之隨手錦文出丹毒治之塗赤小豆雞子清甚佳胸中餘毒不去則胸中煩悶不入食二三日服解毒藥去毒盡乃安石南湯元參升麻湯正解此毒諸家論斑毒瘡疹皆爲一類故此略辨之其詳自有陽毒斑瘡論並在小兒傷寒部中

問曰仲景不言斑者何也龐氏曰古方雖有治方而法不詳備疑當時熱毒未甚鮮有死者雍曰非也其論亡逸也如陰陽二毒本論皆無攷之千金則知嘗有而今亡矣亦猶是也又仲景自治傷寒必不至出斑蓋傷寒之斑非本證皆醫者之所爲仲景不可下則不下可下則下必不至于下之早亦必不至于失下何緣有斑出陽明證中多言急下之者是也亦恐傷寒爲庸醫所悞則斑出故不得不論耳醫者苟能工于汗下證則結胸痞氣發斑發黃皆不應有可不

仲景傷寒補亡論

卷十四

發斑

十二

審哉

問曰諸證發斑何藥以解之孫真人曰凡除熱解毒無過苦酢之物故多用苦參青箱艾梔子葶藶苦酒烏梅之屬是其要也熱盛非苦酢之物不解熱在身中旣不時治治之又不用苦酢之藥如此救火不以水也今諸療治多用甘辛薑桂人參之類此皆貴價不常有比行求之轉以失時而苦參青箱葶藶艾之屬所在盡有除熱解毒最良得病內熱者不必按藥決也便以青箱苦參艾苦酒療之但稍與促其間無



不解也雍曰此論不暇尋求所在可得之藥其他則如千金活人書龐氏論中藥與證相對者皆可用前已載之矣

問曰斑出必欲下何藥為宜雍曰三者之病陽毒最為重其斑為證自有之治從本方溫毒內外熱盛不能偏表偏裏須兩解之以去內外熱宜白虎加人參湯化斑湯若內外熱太甚者依陽毒治之常時傷寒候下失下致斑出者其毒已入胃審其無表證有下證宜用調胃承氣湯以除胃中熱蓋此斑非獨表證

仲景傷寒補亡論 卷十四 發斑 三

也 雍論曰仲景本論不見斑證惟千金方載華佗之說最為至當而近時醫家多不見取故其論不分毒在表裏仍并瘡疹混為一說設候汗下寧不害人惟龐氏朱氏善究根源持論亦如此若不用華言則無用調胃承氣之理雍曰睹其效驗故主其說然已經孫真人手復何疑哉

發黃三十條

仲景曰脈浮而動數醫反下之動數變遲陽氣內陷

心下因硬則為結胸若不結胸但頭汗出餘處無汗刺頸而還小便不利身必發黃常氏云發黃者與茵陳煎濃汁調五苓散亦可雍曰凡黃皆用二藥重者茵陳蒿湯輕者五苓散

又曰傷寒脈浮而緩手足自溫者是為係在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃治在陽明證中

又曰陽明病無汗小便不利心中懊懣者身必發黃又曰陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發

仲景傷寒補亡論 卷十四 發黃 西

黃常氏云可與茵陳湯五苓散

又曰陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃但頭汗出身無汗刺頸而還小便不利渴飲水漿者此為瘧熱在裏身必發黃宜下之茵陳湯主之

又曰傷寒六七日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳湯主之

又曰傷寒身黃發熱梔子蘗皮湯主之

又曰傷寒瘧熱在裏身必發黃麻黃連翹赤小豆湯主之



又曰傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏故也以爲不可下也于寒濕中求之常氏云可五苓散

又曰傷寒頭痛翕翕發熱形象中風下之益煩心發汗則致痙熏之則發黃雍曰治在不可汗證中發黃則茵陳蒿湯也

又曰陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也常氏云可茯苓湯五苓散雍曰宜千金方穀疸丸

仲景傷寒補亡論

卷十四

發黃

五

又曰太陽中風以火劫發汗兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出刺頸而還小便利者其人可治雍曰治法在不可火證中身黃者茵陳湯小便難者五苓散又曰寸口脈陽浮而陰濡弱陽浮則爲風陰濡弱爲少血浮虛受風少血發熱醫以火熏熨令汗出惡寒遂甚客熱因火而發身因爲黃小便難鼻中出血復下之熱瘀在膀胱畜結成積聚狀如狔肝當下不下心亂狂走赴水畜血若去目明心了此皆醫所爲輕

者得愈劇者不治雍曰詳治在不可火證中先下積血次身黃小便難治如前證

又曰陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難雍曰治在陽明證中身目黃茵陳蒿湯小便難者五苓散

又曰傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制雍曰治在不可下證中目黃如前法治

又曰得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三

仲景傷寒補亡論

卷十四

發黃

六

下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難雍曰治在吐下後證中身黃小便難治如前法千金方曰諸病黃疸宜利其小便假令脈浮當以汗解宜桂枝黃耆湯

又曰傷寒熱出表發黃疸麻黃醇酒湯冬用宜酒春用宜水

又曰治黃疸鼻中取黃汁宜瓜蒂赤小豆秫米末石瓜丁散

又曰時行病急黃并瘴癘疫氣瘡瘡宜茵陳丸餘見



千金十卷 今千金三十四卷

巢氏曰傷寒陽明病無汗小便不利心中懊憹必發黃被火額上微汗出而小便不利亦發黃其人黃如橘色或如桃枝色腹微滿此由寒濕氣不散瘀熱在脾胃也又時氣發黃候曰濕氣盛畜于脾胃脾胃有濕則新穀鬱蒸不能消化大小便結澀故發黃又溫病候曰發汗不解溫毒氣瘀結在內小便為之不利故發黃雍曰巢氏所論即仲景陽明懊憹被火二證及寒濕一證而已亦甚略也言簡多不盡意大抵瘀

仲景傷寒補亡論 卷十四 發黃 七

熱在裏不解必為黃熱在膀胱亦為黃也桃枝色者孫真人云久則變作桃皮色也

又巢氏黃病論曰黃病一身盡痛發熱面色深黃七

八日後熱結在裏有血當下如豚肝狀 龐氏云有血抵當湯狂者

血下必其人少腹滿急若眼睛濇痛鼻骨疼兩膊及

項強腰背急則是黃候大便濇但得小便利則不慮

死矣不用大便多多則心腹脹不住此由寒濕在裏

則熱蓄于脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏鬱蒸不

得消散則大小便不通故身體面背變黃色凡黃候

其寸口近掌無脈鼻口氣冷並死不治

活人書曰病人寒濕在裏不散熱蓄于脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏鬱蒸不消化故發黃此皆巢氏之言惟改一表裏字

又曰發黃與瘀血外證及脈俱相似但小便不利為黃小便自利為瘀血要之發黃之人心脾蘊積發熱引飲脈必浮滑而緊數若瘀血證發狂大便必黑此為異耳凡病人身體發熱頭面汗出身無汗劑頸而止渴引水漿小便不利如此必發黃茵陳蒿湯五苓

仲景傷寒補亡論 卷十四 發黃 六

散加茵陳主之

又曰茵陳蒿湯十分五苓散五分二藥拌勻每服三

錢溫酒調服日三服即以茵陳蒿湯調五苓散服之

最良病人服湯得小便利如皂角色赤一宿腹減則

黃從小便中出也梔子蘘皮湯麻黃連翹赤小豆湯

皆可選用

又曰傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搗一字許

入鼻中出黃水甚驗

又曰太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何也太陽



中濕也雍曰宜五苓散

太陽下宜有一病字中濕原木是温字

又曰白虎證與發黃相近遍身汗出此為熱越白虎證也頭面汗出頸以下都無汗發黃證也雍曰白虎證遍身汗出安能發黃故仲景言陽明熱越不得發黃也

雍曰巢氏黃病一論未為該通而諸家傷寒論中多從之夫致黃之由非一或悞下或火熏皆能成黃非止寒熱穀氣而已大抵寒邪中人久不能去變為熱毒假春風發動表為可出之時既動則不可復回而

仲景傷寒補亡論 卷十四 發黃 九

腠理不開無由作汗而出鬱而在裏終不能散淫邪泮衍血脈傳流其毒之重者過血相搏不能勝為之變結或如豚肝或如墨色此為邪氣所敗之血也無以泄其邪則血枯而人死其輕者鼓血而上隨衄可出瀉者因促滑氣而下隨溺可去既不能與血相搏又不能開腠理而生汗上不可出下不可去乃散于毛竅之際已失所舍而無可定止進退不能鬱為至黃之色以待汗與溺而後通此毒非不欲出也猶人之行及門而無路也醫者疏通其道而指示之不為

汗則為溺未有不去之理然毒在腠理之內與正氣爭持正邪相窒毛空亦不可開是以不能作汗必從開竅利小便而出此所以毒氣在裏不能出者必成黃血二證雖輕重上下不同其理一也有可汗而出者乎曰脈浮甚者其表必疏可汗而出之也

龐氏曰孫真人云凡遇天行熱病多內熱發黃但用瓜丁散內鼻中黃水出乃愈即後不復病患黃矣常須謹候病人四肢身面微似有黃氣即速行瓜丁散不可令散漫失候必大危矣特忌酒麪色慾犯者不

仲景傷寒補亡論 卷十四 發黃 十

治瓜丁細辛含水搗一字許千金方三味不同

仲景傷寒補亡論卷第十四終



仲景傷寒補亡論卷第十五

河南郭雍撰次

瘀血圍血便血證十一條 衄血吐血證十條

傷寒狐惑蠱病十條

傷寒百合病十四條

傷寒勞復三十二條

傷寒陰陽易病六條

瘀血圍血便血證十一條

仲景曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下

仲景傷寒補亡論 卷十五 血證 一

者愈其外不解者尙未可攻當先解其外屬桂枝湯

外解已血未下但少腹急結者乃可攻之宜桃核承

氣湯雍曰小便不利不可攻也

又曰太陽病六七日表症仍在脈微而沉反不結胸

其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿而小便自利

者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也

宜下之以抵當湯主之

又曰太陽病身黃脈沉結小腹鞭滿小便不利者爲

無血也小便自利其人如狂者血症諦也抵當湯主

之常氏云小便不利無血者與五苓散

又曰傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者爲有

血也當下之不可餘藥宜抵當丸

又曰陽明症其人喜忘者必有蓄血所以然者本有

久瘀血故令喜忘尿雖鞭大便反易其色必黑者宜

抵當湯下之

又曰病人無表裏症發熱七八日雖脈浮數者可下

之假令已下脈數不解合熱則消穀善飢至六七日

不大便者有瘀血宜抵當湯脈經云若脈數不解而

仲景傷寒補亡論 卷十五 血證 二

下不止必協熱而便膿血也

又曰少陰病八九日一身手足盡熱者此熱在膀胱

必便血也常氏曰宜用桃核承氣湯芍藥地黃湯雍

曰宜先犀角地黃湯

又曰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日

小便利色白者此熱除也欲得食其病可愈若厥而

嘔胸脇煩滿者其後必便血常氏云便血者可黃芩

湯雍曰熱已除者畏黃芩

又曰淋家不可發汗發汗必便血常氏云可藥皮湯



又曰太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必圍血也

雍曰凡病各有輕重治病用藥亦有輕重且如瘀血一症用抵當湯依法如此不可易也若其血症輕或治之早者亦不須用只服犀角地黃湯血症稍重及治之差遲者則用桃核承氣湯其重及治之遲者方用抵當湯丸抵當湯丸是十分之藥輕病不宜用也用他藥倣此

衄血吐血十條

仲景傷寒補亡論 卷十五 血症 三

仲景曰太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈

又曰傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之雍

曰麻黃湯發其汗則熱越而出其衄必輕怡雲子云

汗則不衄矣脉浮緊當用麻黃湯發汗非致衄後用也衄則愈矣

又曰太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解

表症仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑

劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

又曰傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其

小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者

必衄宜桂枝湯常氏云疑字悞也設須發汗當用麻

黃湯不然用桂枝麻黃各半湯取其小汗出而已雍

曰此症不言有汗無汗故後人用藥有疑然反覆詳

讀似無可疑者衄家固當用麻黃湯仲景以病仍在

表雖當發汗而裏症不大便六七日既不敢用承氣

攻裏亦不敢用麻黃大發汗故止用桂枝逐表邪表

解若見裏症待其可下復用承氣攻之也此不用麻

黃之意若頭痛必衄六字是此症中一小變症仲景

仲景傷寒補亡論 卷十五 血症 四

不言治衄法蓋此症其初裏症似重故仲景初欲與

承氣湯後言仍在表者是表症亦輕也表輕則衄衄

則表當解不必用藥雖桂枝亦不當服當移宜桂枝

湯四字於當須發汗之下看則意亦明矣

又曰陽明病口鼻燥但欲嗽水不欲嚥者此必衄常

氏云宜黃芩芍藥湯

又曰脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衄常氏曰可黃

芩湯



則吐水雍曰此有衄渴吐水三症故龐氏先五苓散以止渴次用竹葉湯以止煩煩止則衄退矣

問曰仲景言衄家不可發汗亡血家不可發汗此皆用麻黃湯何也雍曰王仲弓言久衄之家既已亡血故不可汗今緣失發其汗致衄當分其津液乃愈此論固已當又龐氏之言為甚明其言曰脉浮緊無汗服湯未中病其人發煩目瞑劇者必衄小衄而脉尚浮者宜麻黃湯衄已脉微者不可再行也此分有汗無汗麻黃桂枝脉浮脉微最為當理以是論之則小

仲景傷寒補亡論

卷十五

血症

五

衄者有發汗分津液之理大衄者病必自解當聽之惟慮其衄不肯止則依活人書以藥止之若小衄發汗無汗則反成大衄也

仲景曰少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出者是名下厥上竭為難治雍曰常氏用芍藥地黃湯以治上竭而不治下厥雍謂下不厥則上不竭必先以當歸四逆湯治下厥仍灸太谿穴三陰交湧泉穴以止少陰之厥或三陰交難取則太谿湧泉尤奇

又曰咽喉閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絕手足厥冷欲得蹠卧不能自溫龐氏曰乾薑甘草湯主之常氏曰咽中閉塞可小柴胡湯發汗吐衄者柏葉艾葉湯氣微厥逆蹠卧者當歸四逆湯雍曰亦宜灸三陰交湧泉穴以止厥逆蹠卧切勿服小柴胡湯

狐惑并蠱病十條

金匱要略曰狐惑之為病狀如傷寒王叔和曰其氣如傷寒活人書曰名狐惑傷寒默默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞

仲景傷寒補亡論

卷十五

狐惑

六

食臭其面目乍赤乍白乍黑千金同病源曰或因傷寒而變成此疾

又曰蝕於上部則聲喝一作嗅金 價作聲啞甘草瀉心湯主之

千金 又曰蝕於下部則咽乾苦參湯淹洗之千金又

曰此由溫毒氣所為也病源作濕毒 者所為候

又曰蝕於肛者雄黃散熏之千金外熏法宜用千金

也

又曰其人脈數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日日赤如鳩眼七八日日四眚黑叔和曰黃黑



若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之千金云治狐惑當用黃連薰草湯叔和曰病人或從呼吸上蝕其咽或從下焦蝕其肛陰蝕上為惑蝕下為狐狐惑並用猪苓散主之

千金曰此由濕毒氣濕當作温然濕所為者狐惑正病也

又曰傷寒不發汗變成狐惑狐惑者此自傷寒氣而變也

又曰蠶病與狐惑百合濕温之病鬼魅皆相似宜精察節氣其新故二氣相搏成此病也

仲景傷寒補亡論

卷十五

狐惑

七

活人書曰狐惑傷寒與濕蠶皆蟲證初得狀如傷寒或因傷寒成此疾雍曰狐惑與蠶雖是兩疾治法不相遠矣

又曰大抵傷寒病腹內熱入食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部為蠶病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽喜眠蟲蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡蟲蝕其藏下唇有瘡蟲食其肛也殺人甚多因下利而得治蠶桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散主之雍曰常見有

舌上齶成瘡不止唇而已病源作上唇內下唇內為當

雍曰狐惑之蠶病亦多有之因醫者既汗又吐或又下或利小便亡津液太過熱毒內攻藏府枯焦蟲不得安故上下求食亦有不發汗內熱焦枯而成者凡人之喉及陰肛常有是皆比其他肌肉最津潤處故蟲緣津潤而食之蠶病又不止因傷寒而成多自下感之因居濕地下利不止日久者必得依朱氏服湯用銳散若在肛外可見用蘆薈龍胆塗之尤妙然必

仲景傷寒補亡論

卷十五

狐惑

八

先湯內攻而後淋洗外塗也夏秋之交小兒因下利感此疾尤多當須淋洗肛外頻視之見細紅點初有十數即急治之稍遲則增多經夕即十數倍如倉卒不能辨只先以蘆薈加小豆以塗之他藥能殺蟲而不能毒人者亦可用醫工不識候小兒甚多若夫湯淹法屢驗

百合病十四條

千金論曰百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也皆因傷寒病虛勞大病已後不平復變成斯疾其狀



惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便堅三四日一大便時復小溇者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋漓難者病在下焦也三十三日當愈各隨其症以治之雍曰孫氏著論皆見於古書獨此論中分三焦症古無所見豈其書亡乎果分三焦則各有所在諸藥可治不應仲景曰諸藥不能治乃時用諸百合湯也千金百合病餘論則皆見於金匱矣惟此一論有異

金匱要略論曰百合病者百脈一宗悉致其病也意

仲景傷寒補亡論

卷十五

百合

九

欲食復不能食常默默然欲卧復不得卧欲行復不能行飲食或有美時或有不用間食臭時如有寒實無寒如有熱實無熱口苦小便赤千金云至朝口苦小便赤澁諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈所加者百合之病身形如和其脈微數其候於溺時即覺頭痛者六十日乃愈溺時頭不痛淅淅然寒者四十日愈若溺時覺快然但頭眩者二十日愈其症或未病而豫見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨症治之千金或病一月二十日後見其症者治之喜

悞也雍曰此論有言不甚明處今皆以千金論中字足之又如一月二十日後症方出則一月二十日之前為治安得不悞故千金論中治之喜悞四字最為要切論言其症者謂溺時三症也

叔和曰百合之為病其狀若默默欲卧復不得卧或如強健人欲出行而復不能行意欲得食復不能食或有美時或有不用間飲食臭時如寒無寒如熱無熱至朝口苦小便赤黃身形如和其脈微數百脈一宗悉病各隨症治之

仲景傷寒補亡論

卷十五

百合

十

金匱又曰百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆千金曰百合病見在於陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗為逆也見在於陽而攻其陰則陽不得解也復下之其病不愈雍曰金匱之意謂見陽當攻陰若不攻陰而發其汗則為逆見陰當攻陽若不攻陽而復下之亦為逆此為易明千金言見陰攻陽陰未解之間不可復發汗恐陽再受攻故為逆見陽攻陰陽未解之間不可復下之恐陽



再受攻故爲逆其意難明

又曰治百合病發汗後者宜百合知母湯外臺云發汗已更發者下之已更發者吐之已更發者

又曰治百合病下之後者宜百合滑石代赭湯

又曰治百合病吐之後者宜百合雞子湯

又曰治百合病不經吐下發汗病形如初者宜百合地黃湯

又曰百合病經月不解變成渴者宜百合洗方

又曰百合病渴不差宜栝樓牡蠣散

仲景傷寒補亡論

卷十五

百合

十一

又曰百合病變發熱者宜百合滑石散

千金曰治百合病變腹中滿痛者宜百合散

雍曰詳金匱言發汗後下之後吐之後皆有百合病

也而千金方言百合病已經發汗之後更發者百合

病已經下之後更發者百合病已經吐之後更發者

其意謂百合本病汗下吐之後而更發非傷寒汗下

吐之後變成百合病也反似百合病中治勞復之傷

而不見正行汗下吐百合病之藥於義未甚安恐因

數百年間傳錄校正悞有增加非孫氏之本文故活

人書只用金匱本文不用千金增加更發等字而龐氏直改其語云治汗後百合病治下後百合病治吐後百合病尤使人不疑也

又論曰仲景以藥之百合治百合病者與神農經主治不相當自古莫能曉其義是以孫真人言傷寒雜病自古有之前古明賢多所防禦至於仲景時有神功尋思旨趣莫測其致所以醫人不能鑽仰此亦未能鑽仰之一也古人以孫真人之智猶如此况乎後之來者然百合須百合治之智者不能知則前所謂

仲景傷寒補亡論

卷十五

百合

十二

三焦者既有所在又三焦各有主對之藥按圖可治何難之有不必須百合而後治雍是以疑非孫氏之言或因見三焦之症有如前所言更不必問是百合非百合皆以三焦藥治之可也然百合之爲物豈因治百合之病而後得名哉或因是病須百合可治因名曰百合乎皆莫能測知也然少時見先生言以百合湯治一僕病得愈是時雍未甚畱意不解仔細看症雖見其似寒似熱似饑似飽欲行欲卧如今百合之症又自呼其姓名有終夕不絕者時至醒時問



之皆云不知此症殊不可曉豈所謂如有神靈所加者乎恐人有如是症者因筆於此後此症又與素問所謂解休者相類

傷寒勞復三十二條

素問曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相搏兩熱相合故有所遺也治遺奈何曰視其虛實調其逆從可使必已矣

又曰病熱當奈何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復

仲景傷寒補亡論

卷十五

勞復

三

多食則遺此其禁也

仲景曰大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之

又曰傷寒差已後更發熱小柴胡湯主之脈浮者以

汗解之脈沉實實一作緊以下解之常氏云汗宜柴胡桂

枝湯下宜調胃承氣湯

又曰大病差後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主

之

又曰大病差後喜唾久不了了胸上有寒以丸藥溫

之宜理中丸

又曰傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之

又曰病人脈已解脈一作熱而日暮微煩以病新差人強

與穀脾胃氣尙弱不能消穀故令微煩損穀則愈

華元化曰時病差後酒肉五辛油麵生冷酸滑房室

皆斷之此其大略也

孫真人曰凡熱病新差及大病之後食猪及羊血肥

魚油膩等必大下利醫所不能治也必至於死若食

餅餌梁黍飴脯膾炙棗栗諸果脩脯及堅實難消之

仲景傷寒補亡論

卷十五

勞復

十四

物胃氣尙弱不能消化必更結熱設以藥下之則胃

氣虛冷大便難禁不下之則死下之則危皆難救也

熱病及大病之後多坐此死不可不慎也

又曰新病差後但得食糜粥寧少食令飢慎勿飽不

得他有所食雖思之勿與也引日轉久可漸食羊肉

白糜若汁羹雉兔鹿肉不可食猪狗肉也新差後當

靜卧慎勿早起梳頭洗面非但勞體亦不可多言語

用心使意勞煩凡此皆令人勞復故督郵顧子獻得

病已瘥華叔視脈曰雖差尙虛弱未得復陽氣不足



慎勿勞事餘勞尙可女勞則死當吐舌數寸其婦聞其夫差從百餘里來省之經宿交接中間三日發熱口噤臨死舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有古人名蓋正者疾愈後六十日已能行射獵以房室卽吐涎而死近有一士大病差十餘日犯之小腹急痛手足拘攣而死

又曰時病差後未滿五日食一切肉麵者病發必困又曰差後新起飲酒及韭菜病更發

又曰新差食生魚鮓下利必不止食生菜終身顏色

仲景傷寒補亡論

卷十五

勞復

十五

不復食生果及羊肉者必膈上作熱蒸食犬羊等肉必作骨中蒸熱食魚肉瓜生菜令人生腫食蒜膾者疾更發必致大困新汗解飲冷水者心包冷令人虛補不復雍曰傷寒之爲熱毒諸疾不可不謹懼其後者畏此毒之再作也一之已甚其可再乎况飲酒食棗羊犬肉皆大熱之物以此致復無不大困且汗下之後表裏俱虛胃氣困弱食過多食生冷及小有勞動必皆致復可不謹哉雍見北方多此疾亦有調攝之方疾愈之後三日之內惟食白粥言語亦忌三日

之外粥內稍加滋味六日之後方食至軟之飯稍加

麵絲葱蒜羹切忌梳頭洗手此疾初自足起故雖二

十日後亦不敢洗足犯之必皆復前論或言忌羊或

言忌猪不同者猪羊皆忌食也猪畏動風下利羊畏

熱復北土病愈一兩月後後有敢食猪肉者而羊近

亦忌兩月遠須百日更有其人若十分平復當少食

勿多食也北土羊羹其熱尤甚而洛原間猪不甚發

病西北至秦晉南至漢南則猪不可食秦晉尤甚南

方猪羊亦多有病仍須用心選擇蓋大病之後藏府

仲景傷寒補亡論

卷十五

勞復

十六

血氣不與平日同也禁忌三日如法則七日可保也七日如法則二七三七日可保三七如法則一月三月可保令其在初調護之力目擊如此之人未有不速平復者至房屋則須忌百日外孫氏之論一字不可忽蓋一勞復之後必困於前病時再復之後又困於一復時况有三復四復殆不勝其困矣是以往往以疾復而死也貴家大族多有女兒嬌縱又經汗下之後腸胃空虛急欲得食雖食而未能消化必須致疾難於勸說全在父母曉解左右有能調和之人爲



調節之則可也若病人差後惟喜食白粥則永無患矣

千金方曰傷寒差後更頭疼壯熱煩悶宜服黃龍湯

又曰男子新病起近房室而復者宜服赤帛燒散

又曰病後蚤起及食多勞復者鼠屎豉湯崔氏加梔子

又曰食飽不消勞復脈實者宜梔子香豉鼠屎大黃方

又曰勞復氣欲絕宜麥門冬湯起死人困有效

仲景傷寒補亡論

卷十五

勞復

七

又曰傷寒差後一年心下停水不能食者宜地黃白朮麵湯方

龐氏曰病新差後氣血津液衰耗切勿為諸動事凡

言語思慮勞神梳沐澡類勞力勞則生熱而病復如

初也又新差後精髓枯燥切不可為房事犯之必死

如顧子獻是也此名女勞復又非陰陽易素問有言

食多則難消化復病如初此名食復新差強人足兩

月虛弱人足百日則無復病矣

又曰天行勞復頭痛四肢疼痛宜葱豉鼠屎湯此湯

最妙

又曰天行勞復作熱旦至晚則腰脊痛頭項強重宜葛根薑豉湯

又曰傷寒已差勞復如初脈浮無汗者宜桂枝梔子湯自汗者去麻黃

又曰傷寒勞復如初脈浮無汗者重

又曰傷寒勞復如初自汗出者脈浮煩躁甚宜梔子石膏薑豉湯加雄鼠屎

又曰病新平復後勞動發熱熱氣攻胸手足拘急搗

仲景傷寒補亡論

卷十五

勞復

七

搗如中風狀宜瓜蒌竹筴湯

又曰天行差後勞復發熱嘔吐食不下者宜蘆根橘皮湯

又曰男子房勞成復者宜鼠屎薤根湯兼治陰陽易

神驗

又曰男子房勞復發口噤舌出者死又始得勞復百

節痛如被打渾身沉重恍惚失措脈促而絕不可治

或有吐涎不已或有譫妄煩亂者不治

又曰婦人病未平復因夫所動少腹篡中急痛腰勝



痛四肢不任舉動無熱症者附子黃芪湯

活人書曰新病差血氣尙虛津液未復因而勞動生熱熱氣復還入經絡名曰勞復仲景云小柴胡湯主之又有食復者大病新差脾胃尙弱強食過多停積不化因而發熱名曰食復仲景於枳實梔子湯後云若有宿食者加大黃如博棋子五六枚服之愈廣濟療復雄鼠屎湯許仁則七味葱白湯皆可選用雍曰病差後梳沐等事皆易為禁止惟腸胃空者食不已故多食復然勞復之中食服亦易所患再三作耳

仲景傷寒補亡論 卷十五 陰陽易 九

陰陽易六條

孫真人論曰婦人温病雖差未能平復血脉未和尙有熱毒足以毒人男子接之得病名為陰易之病其人身體重熱上冲胸頭重不能舉眼中生眵一作膜脈四肢一作膝脛拘急小腹絞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上冲胸頭重不能舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓竭便噓噓吸吸氣力轉少着床不能動搖或引歲月方死晉代名醫張黃言有婢得病差後數十日有六人接之皆死可不戒之

仲景曰傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣小腹裏急或引陰中拘攣熱上冲胸頭重不能舉眼中生花一作眵千金翊加胞赤二字膝脛拘急者燒棍散主之千金方曰交接勞復陰卵腫縮宜取婦人衣服以覆男子

龐氏曰陰陽交易陰陽相感動其毒氣着人如換易也男子病新差婦人與之交婦人得病名曰陽易婦人病新差男子與之交男子得病名曰陰易若二女二男則不相易然女犯男得病鮮有死者男犯女得病治稍緩則死無一生者又若女犯男而男自勞復則女不病男犯女而女自勞復則男得病亦輕富貴之家雖知其事後生忽恣意犯之多致不救田野之家蒙蒙昧昧只知傷寒能殺人因此死者又十有三四皆不知其所犯之由深可傷也宜服手足甲視灰散陰頭毛際二穴灸之男女初得病者便服薤根鼠屎湯出汗愈灸陰頭百壯而卵縮未下者灸大敦二穴小炷七壯足大拇指旋毛上是穴

仲景傷寒補亡論 卷十五 陰陽易 二十

活人書曰陰陽易病男子則體重少氣陰腫入腹絞



痛婦人則裏急腰胯連腹內痛餘與仲景孫氏龐氏  
三家同又曰燒棍散猴鼠屎湯竹葉湯乾薑湯竹節  
湯當歸白朮湯皆可選用雍曰男子用千金赤帛燒  
散為奇

雍曰男子初病傷寒其毒雖未必重及其易人則多  
殺人過於本傷何哉蓋本病所感必先太陽膀胱經  
自表入裏其傳有漸易人之病隨感而入直傷膀胱  
與腎五藏不由經脈故其病只見裏症無表症病在  
臟不在經也至其所用藥必須隱穢之物與本藏相  
侵者然後可敗而逐之至於灸法亦必在隱惡之處  
蓋病不在經絡之中不可取也

仲景傷寒補亡論

卷十五

陰陽易

主

仲景傷寒補亡論卷第十五 終

仲景傷寒補亡論卷第十六


河南郭雍撰次

第十六卷缺此遺逸於元之初也

仲景傷寒補亡論

卷一六

一





仲景傷寒補亡論卷第十七

河南郭雍撰次

痲濕暘叙論一條

痲瘧證二十六條

濕病十八條

中暘證六條

霍亂證二十六條

虛煩證七條

痲濕暘叙論一條

仲景曰傷寒所致太陽病痲濕暘三種宜應別論以爲與傷寒相似故此見之雍曰自此以下二卷皆論似傷寒非傷寒之疾痲濕暘蓋其首也三者皆在太

仲景傷寒補亡論

卷一 痲濕暘

一

陽一經與傷寒爲難辨故仲景論於傷寒之先以不能先別此三者則必不能辨傷寒也孫真人亦同此言近世方論列於雜病疑似諸疾之中然疑似諸病非太陽所感所以仲景獨先痲濕暘者爲其與傷寒同爲一經根源不異症亦多同悞治則殺人是以不得不先之今討論既詳復恐亂傷寒症治之法不免依近世所述與霍亂等項別爲一卷其疑似諸疾又附之後卷庶幾有所區別乎

痲瘧二十六條

雍曰先兄子若明醫道常疑醫經中痲瘧二字當只是一字傳寫之悞蓋漢晉之書皆作痲如仲景言結胸病項亦強如柔痲狀千金載之曰項亦強如柔痲狀其二字傳寫之悞明矣然素問靈樞二經亦有痲瘧一病不同則自仲景以來諸書皆有當爲痲瘧爲痲瘧者後世傳錄者俱不復辨別也政和間先人客京師有家人病招東平劉寅診視劉曰此痲瘧也治之愈因問痲瘧之別劉曰病以時發者謂之痲不以時發者謂之瘧後歸洛有兄病傷寒汗後以時作痲瘧者

仲景傷寒補亡論

卷一 痲瘧

二

先兄因劉醫語用龐氏葛根加麻黃湯治之而愈劉醫之言不見於諸書東平昔多名醫必有由來後雍頗讀醫經始悟劉醫之言雖當而不盡也蓋二字之悞固多有之在漢晉之書中有當爲痲瘧者亦有當爲痲瘧者在隋唐之書中亦有當爲痲瘧當爲痲瘧者方知痲瘧必竟二字蓋痲瘧者病名如曰中風傷寒之類也痲瘧者症名如結胸痞氣之類也如此言痲濕暘三病則痲瘧是病名不可作痲瘧也倉公當歸湯方云主賊風口噤角弓反張痲瘧者則是痲瘧病中一症之名不可作痲瘧



也蓋瘧是經脈與筋強直反張之病故為病中之一症所以諸風有瘧傷寒亦有瘧瘧病之中亦有瘧不瘧者大抵瘧為輕瘧為重瘧而又瘧者尤為重劉氏雖不分病名與症名有異而瘧病不以時發故有累日不知人事者瘧病則隨發隨止孫真人所謂須臾有十數發者則又與病以時發不以時發之言相應也故雍謂瘧病名瘧症名者究其源也劉謂以時發不以時發者別其流也活人書又曰陰陽二瘧者此言非古恐出於後世雍以意度之剛瘧之瘧名陽瘧

仲景傷寒補論 卷十七 瘧瘧 三

柔瘧之瘧名陰瘧朱氏雖言陰陽二瘧而終不明辨第曰陽瘧屬剛陰瘧屬柔而已其症與藥俱不詳言之

仲景曰太陽病脈沉而細者名曰瘧

又曰太陰病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧

又曰太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘧巢氏曰

柔瘧惡寒雍曰詳剛瘧即與太陽傷寒症同柔瘧即與太陽中風症同然傷寒脈浮緊中風脈浮緩瘧病脈沉細當以脈別之

又曰病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤日脈赤獨頭動搖卒口噤背反張者瘧病雍曰此病為瘧症字悞

問曰瘧病何由而感也素問三十七篇曰肺移熱於腎傳為柔瘧仲景曰太陽病發汗太多因致瘧又曰瘧家雖身疼痛不可發汗汗出則瘧在叔和曰風病下之瘧復發其汗必拘急此皆致瘧之由也千金曰先因傷風後感寒濕則致瘧故柔瘧亦有不惡寒而惡風者

仲景傷寒補論 卷十七 瘧瘧 四

問曰瘧脈如何仲景曰脈沉而細叔和曰其脈伏堅直上下又曰脈來按之築築而弦直上下行巢氏曰策策而弦直上下行者風瘧脈也伏堅直上下瘧而加瘧之脈也築築而弦策策而弦皆病脈築策亦疑一字悞

問曰治瘧如何叔和曰太陽病無汗而小便反少氣上冲胸口噤不得語欲作剛瘧葛根湯主之雍曰叔和既論治剛瘧次當言柔瘧今乃不言及再論剛瘧為病胸滿口噤卧不着席脚攣急其人必齟齬可與



大承氣湯雍以仲景傷寒本論無此一症故疑此亦非叔和之言悞從之殺人大承氣湯的非治剛症之藥縱是諸症皆不可用蓋症太陽中風再感寒濕之疾太陽屬表中風在表及寒濕之疾皆不可下其脈沉細伏弦亦不可下今又言胸滿非寒則虛痞口噤卧不着席又太陽中風之症脚攣急者脚蹇也胞中有寒也皆不當行承氣湯用之必死龐朱二氏不明改之去之者意其是叔和之言不敢削也朱氏之言加審之二字蓋亦有疑矣嘗見庸愚下此以殺人知

仲景傷寒補亡論 卷一 七 症 五

而不言不為無罪然則柔症用何藥以治之曰龐氏治剛柔症加減葛根麻黃湯症無汗者加麻黃症自汗者去麻黃加葛根朱氏治柔症以桂枝加葛根湯皆其藥治切當者也王叔和曰太陽病其症備身體強九九然脈反沉遲此為症括蕪桂枝湯主之龐氏曰括蕪不主項強九九其意以治肺熱令不移於腎也桂枝湯內加括蕪四兩雍曰審如龐言則移熱之症乃柔症也獨未知瘡家風家一症亦同治乎更當審其症而用之常見太陽傷寒出汗多致瘡服此亦

愈

千金曰其重者患耳中策策痛此風入腎經中也不治流入腎喜卒然體瘕直如此皆服小續命湯兩三劑雍曰亦須無汗乃可服又曰針耳前動脈及風府神良雍曰二穴亦難取動脈在客主人之下悞刺陷脈則為內漏為聾風府在腦戶瘡門之間悞刺亦死一瘡門風府又禁不可刺能者互審之

仲景傷寒補亡論 卷十七 症 六

又曰剛柔症宜加減葛根麻黃湯症自汗者去麻黃更加葛根雍曰此湯諸家未見惟龐氏載之又曰瘕病不宜大發汗及針灸宜小汗之叔和曰瘕病有灸瘡難療雍曰大抵瘡家忌灸惟孫真人云若耳痛腫生汁作癰癩者乃無害也惟風宜防耳此定為耳能泄腎氣故也瘕亦同活人書云柔症桂枝加葛根湯主之雍曰此即仲景治太陽病有汗之藥朱氏以叔和缺治瘕藥故取而用之若然則剛症正宜用龐氏葛根麻黃也又朱氏論二症取千金說云並宜服小續命湯此皆可為定



法其熱甚而欲移於腎者必加瘧宜以叔和桂枝加括萋湯主之

叔和曰瘧病發其汗已其脈澹澹如蛇暴腹脹大者為欲解也其脈如故反伏弦者必瘧既曰瘧病又曰必瘧何也雍曰必瘧當作必瘧則義通也此謂瘧病加瘧者也

問曰瘧病其詳何如孫真人曰太陽中風重感於寒濕則變瘧瘧者口噤不開背張而直如發癰之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十數發氣息如絲汗出如雨時

仲景傷寒補亡論

卷十七

瘧瘧

七

有脫易得之雍曰此即正謂之瘧也瘧同他病而有初無本病或因中風而瘧或因傷寒而瘧或因瘧而加瘧其用藥皆相類大抵葛根續命也

問曰婦人小兒多作瘧何也孫真人曰新產婦人及金瘡血脈虛竭小兒臍風大人濕溫得瘧風者皆死又熱病熱入腎中為瘧小兒病癰熱甚亦為瘧雍曰此二者可治之瘧也

問曰風瘧似瘧何如孫真人曰凡風瘧暴尸厥及鬼魘不寤久厥或癩皆與瘧相類宜精察之雍曰風瘧

暴尸厥鬼魘不寤皆冥冥不知人皆似瘧癩癰似瘧賊風口噤而瘧者為風瘧也倉公當歸湯主之龐氏曰瘧病卧不着席小兒腰背去席二指大人身側掌為難治雍曰難治尚可治非不治也瘧雖強直不至加瘧則幸矣亦見有反張過掌而愈者嘗見口噤似瘧略知人事但坐而順掣腰脊仰倒者亦風瘧也服倉公當歸湯而愈

問曰瘧瘧二字相混以經別之何如雍曰素問四五篇曰手陽明少陽厥逆發喉痺噎痛腫瘧此非是

仲景傷寒補亡論

卷十七

瘧瘧

八

太陽之疾而言瘧故全元起本作瘧蓋諸經有瘧獨足太陽有瘧也

問曰巢氏分風瘧傷寒瘧何也雍曰靈樞云熱病不可刺者九二曰熱而瘧者死腰折癉瘧瘧也此傷寒瘧也又曰風瘧身反折見取足太陽及胸中及血絡出血此風瘧也靈樞有瘧二故巢氏亦分二瘧嘗見熱病汗後發瘧亦服桂枝加括萋湯而愈經言熱而瘧者死必謂未汗而瘧其熱甚有異耳

雍曰龐氏言若汗出太多因而熱寐汗為冷濕之氣



復着太陽經故發瘧朱氏言先因傷風後感寒濕而致瘧二者皆謂先因病變而為瘧者皆瘧之一症如前仲景言太陽病發熱無汗反惡寒發熱汗出不惡寒者乃瘧之正病也朱氏又曰朮附散桂心白朮湯附子防風散八味白朮散桂枝煮散可選而用之其感疾既非一端固當依症選用也然瘧瘧二病終緣二字差悞諸書鮮有曉然無疑者所以近世無端確之論幸而用藥二病不甚相遠不然大悞也雍深取朱氏治柔瘧用桂枝加葛根湯龐氏治剛瘧用葛根

仲景傷寒補亡論

卷十七 瘧瘧

九

加麻黃湯叔和治太陽病欲作剛瘧用葛根湯熱甚而瘧用括蕪桂枝湯太抵皆宜續命湯而千金以此治瘧朱氏以治三瘧不同此復不須疑瘧瘧皆用惟無汗者可用也

雍曰二病亦多有之各為傷寒治或為風治故不愈風猶近之而未的也雍親見者數人略言其狀一人初如傷寒三數日後冥冥不知人亦似柔軟不甚強直惟忘記口噤不口噤雍謂此瘧也又一人初亦如傷寒數日後時作角弓反張作則口噤不知人罷則

略知人而困雍謂此瘧也

又有傷寒汗後方坐談語次忽瞠目口噤雖坐如故而四肢僵硬不可屈折少頃即罷罷而復作正所謂須臾數十發者罷則言語如故雍謂此緣出汗多所致傷寒瘧也時服桂枝括蕪而愈

又一兒如傷風一二日後不知人冥冥卧不語不食此瘧也忽四肢強直口噤手足皆如策腫手足指皆越開少頃即定復稍柔但冥冥然雍謂此為瘧病而加瘧者也

仲景傷寒補亡論

卷十七 瘧瘧

十

又一村人病二三日後口噤身強直反張覺臂腿長於常日略知人事齒縫中能作聲不甚明曉飲冷水反要火炙尋衣縫摸床撮空無所不至其症甚怪時雍思之只是瘧用大巖蜜湯擦其齒須臾口得開數進續命湯遂愈村人耐疾使富貴安得不死

又一家父子閉戶坐不出門人云患鎖牙風使偵之父子對坐各用兩手板面前一橫木少頃病來則兩手俱脫偃仆後甦而復坐父子更起更偃仆以倉公當歸湯主之其子遂愈父羸老不救問風來之狀則



自足起循太陽經而上過膈中至股分兩支一支循股外而上入腰則猛掣便側起一支循股內而上入少腹考之於經太陽無此別支應是入少陰也

又有一人行次仰面顧者三衆謂仰面有所視少頃即倒昇歸反張數日而沒此疾症甚不一亦有間者不能具記歷驗之症似微柔軟發痙則極強硬前人叙此未能盡雍雖加詳而次第紊亂耳

濕病十八條

雍曰活人書載濕病三種一曰中濕二曰風濕三曰

仲景傷寒補亡論

卷十七

濕病

十一

濕温

問曰何謂中濕仲景曰太陽病關節疼痛而煩脈沉而緩者朱氏云一作細者非也此名濕痺一云中濕濕痺之候其人小便不利大便反快當利其小便朱氏曰一身盡疼發熱身黃小便自利者未附湯小便不利大便反快者甘艸附子湯五苓散主之又曰至真要論曰治濕之法不利小便非其治也

問曰中濕之痺何如雍曰中濕與風寒氣合者為痺故素問曰風寒濕三氣雜至合而為痺靈樞所謂風

寒濕氣客於外分肉之間朱氏曰中濕與風寒氣合者為痺其寒多者為痛為浮腫非未附桂不能去也其風多者為煩劇為流走為拘急非麻黃薏苡烏頭不能散也其中濕氣者為堅滿為氣閉非甘遂芫花枳朮不能泄也

問曰何謂風濕仲景曰一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也金匱要略曰可與麻黃杏子薏苡甘草湯朱氏曰脈浮為風濕麻黃杏仁湯防己黃芪湯桂枝附子湯甘

仲景傷寒補亡論

卷十七

濕病

十二

草附子湯未附杏仁湯敗毒散可選而用之

仲景問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也荅曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也

金匱要略曰濕家身煩疼可與麻黃湯加朮四兩發其汗為宜切不可火攻之朱氏曰濕家雖身體疼不可大發汗汗出則作痙



又曰風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之  
仲景曰風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則  
痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫  
者甘草附子湯主之千里方名四物附子湯

又曰傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側  
不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主之若其人  
大便鞭小便自利者去桂枝加白朮湯主之龐氏云  
桂枝附子湯治大便自利小便不利者雍曰桂枝附  
子湯非桂枝加附子也自是第十七方名桂附湯者

仲景傷寒補亡論

卷十七 濕病

三

詳見太陽症治上

仲景曰濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若  
下之早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有  
熱胃中有寒渴欲得水而不能飲口燥煩也

又曰濕家之為病一身盡疼發熱身色如熏黃龐氏  
曰宜防已黃芪湯

又曰濕家病身上疼痛發熱面黃而喘脈經曰病人  
喘無而字已  
上十頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病  
病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈龐氏曰用瓜

蒂細末含水搽少許於鼻中

又曰濕家下之額上汗出微喘小便利者一云不死  
利者

若下利不止者亦死雍曰大抵濕家不可下也初虞

氏曰發汗下之死謂悞作傷寒治而汗下之也

問曰中濕風濕脈何以辨雍曰脈沉而緩者曰中濕

脈浮惡風者曰風濕中濕無風脈故也

問曰何謂濕温王叔和曰傷寒濕温其人常傷於濕

因而中暈濕熱相搏則發濕温病若兩脛逆冷腹滿

支胸頭目痛苦妄言治在足太陰不可發汗汗出不

仲景傷寒補亡論

卷十七 濕病

四

能言耳聾不知痛所在身黃而色變名曰重暈如此  
死者醫殺之也朱氏曰濕温多汗頭目痛苦妄言其  
脈陽濡而弱陰小而急治在足太陰經餘上下  
文同雍曰  
白虎加蒼朮湯主之活人書載中濕風濕濕温三種  
之外尙缺寒濕痺今續附於後濕痺謂緩風濕痺亦  
云濕風非風温也

仲景曰傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕在  
裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之常氏云  
可五苓散雍曰濕病汗不出者寒濕在裏不解也凡



濕家發黃者宜五苓散

又曰濕家病在頭中寒濕則頭痛鼻塞而煩內藥鼻中則愈其詳見上

千金方曰濕痺緩風身體疼痛如欲折如錐刺刀刺七物附子湯主之又曰濕風體痛如折肉如錐刺刀所刺入物附子湯

中暈六條

仲景曰太陽中熱者暈是也其人汗出惡寒身熱而渴也金匱要略曰白虎加人參湯主之雍曰亦有惡

仲景傷寒補亡論

卷十七

中暈

五

風者謂汗太多也

又曰太陽中暈者身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也要略曰瓜蒂散主之

又曰太陽中暈者發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細芤遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚龐氏曰宜大小橘皮湯大橘皮湯治動氣在下不可發汗者小橘皮湯手足逆冷嘔噦即二味生薑橘皮湯

問曰中暑中暈熱病何以別之雍曰冬傷於寒因暑氣而後發者為熱病冬不傷於寒而夏傷於暑為中暑中暑即中暈也皆太陽經受病故熱病正為傷寒而中暑為與傷寒相似活人書曰夏月發熱惡寒頭疼身體肢節痛重其脈洪盛者熱病也夏月自汗惡寒身熱而渴其脈微弱者中暑也太抵中暑與熱病外症相似但以脈盛脈虛別之甲乙經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛熱傷氣而不傷形所以脈虛傷寒肢節痛

仲景傷寒補亡論

卷十七

中暈

六

重其脈洪盛按之有力此冬月感寒深至夏發耳中暑則背寒而垢手足微冷煩渴口燥但覺倦怠四肢却不痛重其脈微弱按之無力白虎湯主之其厥逆惡寒者橘皮湯主之頭痛惡寒心煩躁心下不快者五苓散為最良

問曰中暑何故灑灑然毛聳惡寒朱氏云經曰四時八風之中人也因有寒暑寒則皮膚急腠理閉暑則皮膚緩腠理開開則灑然寒閉則熱而悶近人不問中熱暑或作熱病法治之復用溫熱藥必致發黃斑



出更爲蓄血尤宜戒之

問曰熱病暑病暈病三者異名諸家不分何如雍曰熱病亦可謂之暑暈病亦可謂之暑故時言熱亦時言暑其始則當有熱暈二病以其通可謂之暑故有三名是以難別素問曰熱病者皆傷寒之類也以熱而言也又曰先夏至日爲病溫後夏至日爲病暑此以暑而言也二者其實一也仲景叔和曰中而即病者名曰傷寒不即病者至春變爲溫病至夏變爲暑病又曰辛苦之人春夏多溫熱病此一病或言暑或

仲景傷寒補亡論

卷十七

中暈

七

言熱也是以巢氏於傷寒之外別出熱病一門而首曰暑病者熱重於溫也是熱病亦謂之暑也龐安常復出暑病一篇而取之實傷寒之熱病又二家所載皆以素問五臟熱病爲主是名同而實異也惟朱氏分別熱病與中暑不相差互然朱氏所謂熱病者傷寒也所謂中暑即暈者是也其意易明不令人惑當從朱氏名之其他諸家所論亦未嘗不同名特異耳

霍亂二十六條

仲景問曰病有霍亂者何荅曰嘔吐而利此名霍亂

問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病荅曰此名霍亂吐利而復發熱也一作自吐下又雍曰此論霍亂似傷寒之症也

又曰傷寒其脈微瀯者本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利一作利本嘔下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者此屬陽明也便必鞭十三日愈所以然者經盡故也下利後當便鞭鞭則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也惡寒脈

仲景傷寒補亡論

卷十七

霍亂

六

微而一作復利利止亡血也四逆加人參湯主之雍曰此論今是傷寒之症故言本嘔下利不可治若論霍亂則必嘔吐而利也一是傷寒而不屬陽明惡寒脈微復利利止者則用四逆加人參湯主之此湯若霍亂症亦可服千金翼合二論爲一是當經有缺文問曰霍亂何由而致也雍曰胸中逆亂之氣也初無疾而霍亂往往飲食失節而致胸中逆亂也故傷寒而霍亂者陰陽二氣亂於胸中也靈樞三十四篇曰清氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衛氣逆行清濁相干



亂於胸中是為大悅又曰亂於腸胃則為霍亂經言五亂霍亂其一也惟亂於胸所以吐亂於腸所以利也孫真人曰飲食狹穢復食乳酪海陸百品無所不噉眠臥冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣壅而伏痰陽氣欲升陰氣欲降陰陽乖隔變成吐利頭疼如破百節如解過體之筋皆為回轉論雖小卒病之中最為可畏雖臨履薄危不足論也故古人語此者刺之則徐出徐入導氣而已非補瀉也用藥者順其陰陽之氣而已無汗下也此伏治亂氣之道

仲景傷寒補論 卷十七 霍亂 九

仲景曰霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

又曰吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之

又曰吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

又曰既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之

又曰吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕

者通脈四逆加猪胆汁湯主之千金翼曰無猪胆以羊胆代之千金方別有加減法

又曰吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣故也雍曰勿服藥損穀則愈

叔和曰轉筋為病其人臂腳直脈上下行微弦轉筋入腹雞屎白散主之

千金要方曰凡霍亂務在溫和將息若冷則遍體轉筋凡此病定一日不食為佳仍須三日少少飲粥三日已後可恣意食息七日勿雜食為佳所以養脾氣也

仲景傷寒補論 卷一 霍亂 三

又曰凡諸霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止但與厚朴葛根飲若冬瓜葉但沾漬咽喉而不可多與若服湯時隨吐者候吐定乃止診脈絕不通以桂合葛根為飲吐下心煩內熱汗不出不轉筋脈急數者可犀角合葛根為飲吐下不止發汗心煩欲飲水可少飲米粉汁為佳若不止可與葛根薺苳飲服之

又曰霍亂吐多者必轉筋不渴即臍上築霍亂而臍上築者為腎氣動當先治其築治中湯主之去朮加

1 48 0 2 1 丹 貴 參 日 長 小 書 考 2 反 之 句



桂心去末者以腎虛故也加桂者恐作奔豚也霍亂而臍上築吐多者若下多者霍亂而驚悸霍亂而渴霍亂而腹中痛嘔而吐利嘔而利欲得水者皆用治中湯主之

又曰治中湯治霍亂吐下脹滿食不消化心腹痛

又曰霍亂轉筋內冷汗出嘔噦者四順湯主之

又曰霍亂多寒手足厥冷脈絕者宜當歸四逆加吳茱萸湯舊方用棗三十枚今以霍亂病法多痞故除之如退棗入葛根二兩佳霍亂四逆湯加半夏一合

仲景傷寒補亡論 卷十七 霍亂 三

附子小者一枚惡寒乃與大附子朱氏無此加減故詳錄之

又曰霍亂吐利已服理中四逆四順熱不解者竹葉湯主之與竹葉石膏湯方不同

又曰毒冷霍亂吐利煩嘔轉筋內冷汗出手足指皆腫喘息垂死絕語音不出百方不效脈不通者服人參湯取差乃止隨吐續更服勿止并灸之

又曰老人羸劣冷氣惡心飲食不化心腹虛滿拘急短氣霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶流汗扶老理中湯原係理中散常服以蜜爲丸

又曰霍亂四逆吐少嘔多者附子粳米湯主之

又曰婦人霍亂嘔逆吐涎沫醫反下之心下卽痞當先治其吐涎沫可服小青龍湯涎沫止次治其痞可與甘草瀉心湯

又曰中熱霍亂暴利心煩脈數欲得冷水者以新汲井水頓服一升

又曰凡霍亂灸之或未能立差終無死憂不可逆灸或但先下後吐當隨病狀灸之雍曰治霍亂之法惟千金要方最爲詳備除已前錄外尙有霍亂餘症及

仲景傷寒補亡論 卷十七 霍亂 三

轉筋危症等十六法灸法十八法當參同用之

活人書曰夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩腳轉筋宜服香薷散須井中沉令極冷頓服之乃效雍曰香薷厚朴藹藹皆古人治霍亂要藥故此藥爲有理中暑霍亂惟納冷水飲則不復吐逆時有以新汲水服理中丸亦佳靈苑方煮良薑末沉令極冷服皆宜冷服

問曰傳信載柳州嘗得乾霍亂吐之愈諸家未見有言乾霍亂者有之乎雍曰有之第當時不能究其說



其言少偽耳近世之人尤不如也霍亂者五亂之一也皆作吐利無乾而不吐利者其不吐利者亂氣也按靈樞經五亂之症惟亂於腸胃一症名霍亂故作吐利其餘四症皆不作吐利只謂之亂氣柳州之疾蓋亂氣干心之症非霍亂也謂為乾霍亂者雖謬然尚不失為五亂之一今則無復知亂氣之名矣

虛煩七條

孫真人曰諸虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故

仲景傷寒補亡論 卷一七 虛煩 三

知非裏熱也不可下如此內外皆不可攻而強攻之必遂損竭多死難救也此虛煩但當用竹葉湯若嘔者以橘皮湯一劑不愈為可重辨也此法宮泰數用甚效驗傷寒後虛煩亦服此湯

活人書曰王叔和云有熱不可大攻攻熱者則寒起正宜服竹葉湯

仲景曰傷寒虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

雍曰千金方竹葉湯有二方霍亂熱不解者用竹葉

湯與竹葉石膏湯方不同若裡虛煩不可攻者當以竹葉湯與前所說虛煩症同當用之即仲景竹葉石膏湯也

雍曰王仲弓云凡似傷寒症有五一日瘧二日濕三日暈四日霍亂五日虛煩已上四症見仲景論獨虛煩始於孫氏

龐氏曰虛煩似傷寒身亦熱而煩躁頭不痛身不疼脈不數者宜竹葉石膏湯主之兼治中暈吐逆脈滑數者

仲景傷寒補亡論 卷一七 虛煩 四

又曰虛煩或嘔逆吐脈弦細乳遲手足微寒胸寒者橘皮湯主之兼治暴寒下利只用生薑橘皮二物水煎

仲景傷寒補亡論卷第十七 終



仲景傷寒補亡論卷第十八

河南郭雍撰次

傷寒溫疫論一條

溫病論六條

風溫溫毒論四條

傷寒相似證論十四條

傷寒溫疫論一條

雍曰傷寒時氣症類亦多或名傷寒或名溫病或曰時行或曰溫疫或曰溫毒或以為輕或以為重論說不一益令人惑大抵其病往往有一種即時發者必

仲景傷寒補亡論

卷十八

溫疫

一

輕經時而發者必重也且如傷寒一病仲景以為冬傷於寒中而即病者名曰傷寒蓋初感即發無蘊積之毒氣雖為傷寒而其病亦輕仲景又曰不即病寒毒藏於肌膚至春變為溫病至夏變為熱病是則既傷於寒又感於溫兩邪相搏合為一病如人遇盜又有同惡濟之者何可支也故傷寒冬不即發遇春而發者比於冬之傷寒為重也又有夏至而發者蓋寒毒淺近在膚腠正氣易勝故難久留是以即發其毒稍深則入於肌肉正氣不能勝必假春溫之氣開疎

腠理而後可發是以出為溫病又其毒之盛者經時

既久深入骨髓非假大暑消燥則其毒不可動此冬

傷於寒至夏為熱病者所以又重於溫也故古人謂

冬傷於寒輕者夏至以前發為溫病甚者夏至以後

發為暑病也此三者其為傷寒本一也惟有即發不

即發之異隨脈變動遂大不同又有冬不傷寒至春

感不正之氣而病其病無寒毒之氣為之根雖名溫

病又比冬傷於寒至春再感溫氣為病輕然春溫冬

寒之病乃由自感自致之病也若夫一鄉一邦一家

仲景傷寒補亡論

卷十八

溫疫

二

皆同患者是則溫之為疫者然也非冬傷於寒自感自致之病也蓋以春時應煖而反寒夏熱反涼秋涼反熱冬寒反煖氣候不正盛強者感之必輕衰弱者得之必重故名溫疫亦曰天行時行也設在冬寒之日而一方一鄉一家皆同此病者亦時行之寒疫也大抵冬傷於寒經時而後發者有寒毒為之根再感四時不正之氣而病則其病安得不重如冬病傷寒春病溫氣與夫時行溫疫之類皆無根本蘊積之類纔感即發中人淺薄不得與寒毒蘊畜有時而發者



同論也惟溫毒一病既非傷寒又非溫病乃在冬時表嘗感寒先感冬溫不正之毒後復為寒所折膚腠閉密其毒進不得入退不得泄必假天氣暄熱去其外寒而後溫氣得通鬱積既久毒傷肌膚故斑如錦文或爛為瘡而後可出仲景曰其冬有非節之煖名為冬溫冬溫之毒與傷寒大異謂此溫毒也亦有所感輕淺則易出所感深重則非節之煖人人皆感故每為疫其實先溫後寒所以與傷寒大異然而時之氣有正有不正何也大論曰春氣溫和夏氣暑熱秋

仲景傷寒補論 卷一八 溫疫

三

氣清涼冬氣冰冽此則四時正氣之序所謂四時正氣之病也又曰春時應煖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣是謂不正之氣毒傷人者也雍論傷寒名例已見於初卷今辨析時行溫疫詳言著於篇下

溫病六條

雍曰醫家論溫病多悞者蓋以溫為別一種病不思

冬傷於寒至春發者謂之溫病冬不傷寒而春自感風寒溫氣而病者亦謂之溫及春有非節之氣中人為疫者亦謂之溫三者之溫自不同也素問曰冬傷於寒春必病溫又曰凡病傷寒而成溫者先夏至日為病溫此皆謂傷寒而成溫者比之傷寒熱病為輕而比之春溫之疾為重也其治法與傷寒皆不同或有冬不傷寒至春自傷風寒而病者初無寒毒為之根源不得謂之傷寒第可名曰溫病也又或有春天行非節之氣中人長幼病狀相似者此則溫氣成疫

仲景傷寒補論 卷十八 溫病

四

也故謂之瘟疫瘟疫之病多不傳經故不拘日數治之發汗吐下隨症可施行其不傷寒至春觸冒自感之溫治與疫同又輕於疫也或曰春時觸冒自感之溫古無其名何也曰假令春時有觸冒自感風寒而病發熱惡寒頭疼身體痛者既非傷寒又非疫氣不因春時溫氣而名溫病當何名也如夏月之疾由冬感者為熱病不由冬感者為暑為暘春時亦如此也活人書萎蕤湯方云治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒即其藥也曰何以辨其冬感春感之異曰但傳



經皆冬感也皆以傷寒治不傳經者皆春感也皆以  
溫氣治之今於諸家方論下別而言之庶幾易明然  
春溫之病古無專治之法溫疫之法兼之也

活人書曰春月傷寒謂之溫病冬傷於寒輕者夏至  
以前發者為溫病蓋由春溫煖之氣而發也雍曰此  
謂傷寒之溫也即素問所謂凡病傷寒而成溫病者  
是也其治與傷寒同故朱氏自註曰非徒溫疫也

又曰治溫病與冬月傷寒夏月熱病不同蓋熱輕故  
也雍曰此謂春溫非傷寒者若傷寒成溫則其熱輕

仲景傷寒補亡論

卷十八

溫病

五

於熱病而重於冬月傷寒也蓋冬月傷寒為輕至春  
發為溫病為重夏月熱病為尤重也朱氏註曰春秋  
初末陽氣在裏其病稍輕縱不用藥治之五六日亦  
自安即此推之則此春溫之病乃謂非傷寒成溫者  
又曰升麻湯解肌湯最良熱多者小柴胡湯主之不  
渴外有微熱者小柴胡加桂枝也嗽者小柴胡加五  
味也煩躁發渴脈實大便閉塞者大柴胡微利也虛  
煩者竹葉湯次第服之此治春溫之法其傷寒成溫  
者并依傷寒治之治溫疫之法并同春溫而加疫藥

也

又曰一歲之中長幼疾多相似此溫疫也四時皆有  
不正之氣春夏亦有寒涼時秋冬亦有暄暑時人感  
疫癘之氣故一歲之中病無長幼相似者此則時  
行之氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火  
丸聖散子敗毒散主之雍曰此謂春溫成疫之治法  
也若夏暑成疫秋瘟成疫冬寒成疫皆不得同治各  
因其時而治之况一歲之中長幼疾狀相似者即謂  
之疫如瘧利相似咽喉病相似赤目相似皆即疫也

仲景傷寒補亡論

卷十八

溫病

六

皆謂非觸冒自取之因時行之氣而得也  
又曰春應暖而涼氣折之則責邪在肝升麻解肌湯  
主之夏應暑而寒氣折之則責邪在心射干湯半夏  
桂枝甘草湯選用之秋應涼而反大熱抑之則責邪  
在肺溫熱相搏民多病瘧宜白虎加蒼朮湯煎茵陳  
湯調五苓散冬應寒而反大溫抑之則伏寒變為溫  
宜萎蕤湯土無正名因火而名當隨其經而取之此  
又治四時溫氣之法溫疫皆同治也

風溫溫毒四條



千金方曰風温之病脈陰陽俱浮汗出體重其息必喘其形狀不仁默默欲眠下之者小便難發其汗者必譫語加燒針者則耳聾難言但吐之則遺矢便利如此疾者宜服萎蕤湯活人書曰脈尺寸俱浮頭痛身熱常自汗出體重其息必喘四肢不欲收嘿嘿但欲臥者風温也病人素傷於風因復傷於熱風熱相搏則發風温主四肢不收頭疼身熱常自汗出不解治在少陰厥陰不可發汗汗出則譫語獨語內煩躁擾不得臥若驚癇目亂無精治者復發其汗如此死

仲景傷寒補亡論

卷十八

風温温毒

七

者醫殺之也活人書曰風温不可發汗宜萎蕤湯風温身灼熱者知母葛根湯風温加渴甚者栝萸根湯風温脈浮身重汗出漢防己湯

活人書曰初春病人肌肉發斑隱疹跡如錦文或咳心悶但嘔者此名温毒也温毒發斑者冬時觸冒寒毒至春始發病初在表症如傷寒或已發汗吐下而表症未罷毒氣不散或發斑黑膏主之成瘡者自作瘡毒治不可用黑又有冬月温暖人感乖戾之氣冬末即病至春或被積寒所折毒氣不泄至天氣暄熱温毒始發則

肌肉斑爛癰疹如錦文而咳心悶但嘔清汁葛根橘皮湯主之雍曰不必初春春夏皆發其斑與傷寒不同癰疹如錦文而不作瘡爛者是也其發瘡膿爛者即時行熱毒豌豆瘡也二者初症皆先有表証如傷寒又有癰疹赤白二種初無表症暴感温氣而作其毒輕淺風尸之類也又有一種遍身如錦初亦無表症暴感而作如丹如疹其毒亦輕皆詳見小兒瘡疹後斑瘡癰疹論辨中

雍曰仲景言風温温毒二症又與二說不同仲景之

仲景傷寒補亡論

卷十八

風温温毒

八

言曰傷寒過十三日以上不問尺寸陷者大危若更感異氣變為他病者當依後壞病症而治之若陽脈浮滑陰脈濡弱者更遇於風變為風温陽脈洪數陰脈實大者更遇温熱變為温毒温毒為病最重此乃傷寒後四種壞病此病最為重也又非但前所謂風温温毒而已其用藥亦當不同然則仲景所言傷寒壞病中風温毒也諸家所言者冬春自感風温温毒也其治之輕重不得不異也四種壞病中又有濕温一症見第八卷不可汗門中



雍曰天行溫疫雖症不多用藥亦多端如千金方言辟溫疫氣并斷溫疫相染諸方及千金翊彈鬼丸神明白散太乙流金散螢火丸等方前人雖嘗選用更嘗缺省收其遺逸用之大抵治疫尤要先辨寒溫然後用藥取陰陽表裏之在傷寒也故龐安常又述其治寒疫諸方蓋以赤散解聖散之類皆宜治寒疫若施之瘟疫則益熱矣

傷寒相似諸症十四條

雍曰活人書論痰症食積虛煩腳氣四者皆與傷寒

仲景傷寒補亡論

卷十八

似傷寒症

九

相似而實非傷寒醫者見其發熱惡寒多作傷寒治之因茲天橫甚多故特立此名使覽者知其非傷寒也雍取此論而廣之然虛煩一症已置之前卷者仲景言病有本是霍亂今是傷寒者孫真人言傷寒後虛煩故以霍亂虛煩二病次於前卷症濕暈之後今獨取朱氏之說繼之以瘡毒蟲毒溪水瘴霧諸症類傷寒者皆當辨症而後用藥也

活人書曰病有憎寒發熱者惡風自汗寸口脈浮胸膈痞滿氣上冲咽喉不得息而頭不疼項不强者此

為有痰也雖類傷寒但頭不疼項不强為異宜服柴胡半夏湯金沸草散大半夏湯若氣上冲咽喉不得息者用瓜蒂散吐之古法服瓜蒂散用一錢匕藥下便臥欲吐且忍之良久不吐以三錢匕湯二合和服以手指搥之便吐不吐復稍增之以吐為度若吐少病不除明日如前法再服之但不可令人虛也藥力過時不吐飲熱湯一升以助藥力吐訖便可食無復餘毒若服藥過多者飲水解之雍曰凡吐後須服糜粥二三日忌生冷油膩物

仲景傷寒補亡論

卷十八

似傷寒症

十

又曰頭疼脈數發熱惡寒而身不疼痛左手脈平和者食積也雖類傷寒而左手人迎脈平和身不疼痛者是也甲乙經云人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食蓋氣口主中人迎主外以此別之傷食之症由脾胃伏熱因食不消發熱故似傷寒若膈實吐嘔者食在上腕宜吐之若心腹滿宜下之治中湯五積散黑神丸可選用也雍曰巢氏言脾胃有伏熱因食不消所以發熱狀似傷寒但身不疼頭不痛為異又曰食積病亦類時行但發熱頭疼食病當速下之



時行病當待六七日下之

又曰傷寒頭疼身熱支節痛大便秘或嘔逆而脚屈弱者脚氣也傷寒只傳六經故症與脚氣相似然終不同者孫真人云卒起脚屈弱不能轉動者此為異耳其脈弦而浮者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而濇者起於寒風者汗而愈濕者温而愈熱者下而愈寒者熨而愈脚氣之病始得不覺由他病乃知毒氣入腹則少腹頑痺不仁令人吐嘔死在旦夕矣然脚氣之候必先從脚起或先緩弱疼痛

仲景傷寒補亡論

卷十八

似傷寒症

十一

寒勝為痛痺 或行起忽倒或兩脛腫滿或不腫脚膝枯細

或心中忪悸或少腹不仁病久入深營衛不榮故為不仁不仁者皮膚頑木不知是也

或舉體轉筋或見食吐遂惡聞食氣或胸滿氣急或遍體酸疼皆脚氣候黃帝所謂緩風痺是也頑

弱名緩風疼痛為濕風痺痺者閉也閉而宿患瘴毒不仁故名痺

得熱更增雖形候旺盛猶在於表未入腸胃不妨温

而汗之已入內者不妨吐而下之又本有冷今得温

瘴雖暴壯熱煩滿秘塞正須温藥汗之汗之不散不

妨寒藥下之若服利藥不瘥成黃疸不瘥為尸疽病

前熱而後寒者發於陽無熱而惡寒者發於陰發於

陽者攻其外發於陰者攻其內一日二日發汗必愈

三日以上宜吐之五日以上當下之雍曰要方叅千

金翅方十卷皆有方宜用

問曰瘴作瘧何如巢氏曰此病生於嶺南一帶山瘴

之氣其狀發寒熱休作有時皆由山溪源嶺瘴濕毒

氣故也其病重於傷寒暑之瘧鯪鯉湯主之此又休

作無時其初皆類傷寒也

問曰霧氣如何千金三十九卷曰患霧氣者心內煩

仲景傷寒補亡論

卷十八

似傷寒症

十二

問少氣頭痛項急起則眩暈又身微熱戰掉不安時

復憎寒心中欲吐吐時無物者猪清湯主之雍曰頭

痛項急身熱憎寒皆傷寒類也

問曰温瘧類傷寒何如素問三十三篇曰温瘧者得

之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發

邪氣不能自出因遇大暑腦髓爍肌肉消腠理發泄

或因有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先

從內出之於外雍曰温瘧始感之氣與傷寒同及其

發出之時與傷寒異故不為傷寒而為瘧也温瘧之



症寒中三陽所患必熱小續命湯去附子減桂一半  
主之大煩躁者紫雪最良大便秘者脾約丸神效丸  
五柔丸大三腕散木瓜散主之頭痛身熱肢體痛而  
腳屈弱者是其人素有腳氣此時發動也腳腫者枳  
榔散主之腳氣方論千金外臺最詳大熱越婢湯小  
續命湯薏苡仁酒脾約丸神效丸皆要藥仍針灸爲  
佳用補藥與湯淋洗皆大禁也雍曰此其大致也前  
言閉而不仁故名痺不仁者痺之一症非痺皆不仁  
也脚氣與痺各詳本症論之

仲景傷寒補亡論

卷十八

似傷寒症

三

雍曰凡射工毒水毒瘴霧瘡瘍斑豆等症其初如傷  
寒故孫真人於傷寒後附溪毒一症溪毒卽射工今  
詳其狀類以明其症與傷寒別是亦疑而辨之也  
孫真人曰江南有射工毒蟲一名短狐溪毒一名蟻  
其蟲形如甲蟲無目而利耳有一長角在口前如弩  
担其角端曲如上弩以氣爲矢因水勢以射人人或  
聞其在水中鈸鈸作聲要須得水沒其口便以口中  
毒射人此蟲畏鷺鷥能食之其初始症候先要寒噤  
寒熱筋急仍似傷寒亦如中風便不能語朝蘇晡劇

寒熱悶亂是其症也始得三四日急治之稍遲者七  
日死又曰中人瘡有三等巢云又曰其蟲小毒輕者  
及相逐者射著人影者皆不卽作瘡先病寒熱自非  
其地之人不知其症便謂傷寒作治乖謬是以致禍  
方見千金二十及雍曰巢言含沙射人影便成病此  
第十卷第五卷取杜元凱之說又曰中人頭面尤急腰以上去人心  
近多死腰以下小腹不治亦死

仲景傷寒補亡論

卷十八

似傷寒症

四

目眶痛心中煩懊四肢振掀腰背百節皆強兩膝痛  
或翁翁而熱但欲眠旦醒暮劇手足逆冷至肘膝二  
三日腹中生蟲蝕人下部肛中有瘡不痛不痒令人  
不覺不急治之六七日上蝕五臟下利不禁良工不  
能治矣水毒有陰陽覺之急視其下部若有瘡正赤  
如截肉者爲陽毒最急瘡如鯉魚鱗者爲陰毒猶小  
緩要皆殺人不過二十日也初中水毒時當以小蒜  
作湯試之方治詳見千金巢氏曰東南郡縣山谷溪  
源有水毒病亦名溪温以其病與射工診候相似故



通呼溪病其實有瘡是射工無瘡是溪毒也又曰水毒有雌雄脈洪大而數者為陽是雄溪易治宜先發汗及浴脈沉細而遲者為陰是雌溪難治欲審知是中水毒者手足指冷為是不冷非也又呼為蚩病巢氏曰嶺南從仲春至仲夏行青艸瘴季夏至孟冬行黃芒瘴先熱後寒自餘諸瘴疾見本病門

問曰傷寒亦變瘧乎千金三十五卷曰時行後變成瘧瘧者大五補湯主之

問曰酒病似傷寒何如巢氏曰酒有毒而性尤熱飲之過多故毒熱氣流溢經絡浸淫府藏而生諸病也或煩躁壯熱而似傷寒或洒淅惡寒有同溫瘧或吐利不安或嘔逆煩悶隨藏氣虛寒而生病焉雍曰凡癰疽病及豌豆胞瘡之類初症多類傷寒各見本門更不重出

仲景傷寒補亡論卷第十八 終

仲景傷寒補亡論卷第十九

河南郭雍撰次

婦人傷寒證十八條

妊娠傷寒證三十三條

小兒傷寒證十九條

小兒瘡疹上四十七條

婦人傷寒十八條

問曰婦人傷寒何如活人書曰男子調其氣婦人調其血血室不畜則二氣和諧血氣凝結則水火相刑

仲景傷寒補亡論卷十九 婦人傷寒

傷寒氣口緊盛則宜下人迎緊盛則宜汗婦人左關脈浮緊不可下當發其汗以救血室營衛得和津液自通澹然汗出而解

問曰熱入血室何如活人書曰仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣者言不可下也小柴胡湯主之若行湯遲則熱入胃令津液枯燥中焦上焦不榮成血結胸狀須當針期門

問曰譫語即下症而前症不可下何也活人書曰傷



寒胃實譫語則宜下婦人熱人血室譫語不可下也  
問曰犯胃氣者何如活人書曰五行相剋以生相扶  
以出平居之日水常養木水木相生則榮養血室血  
室不畜則脾無蘊積脾無蘊積則剛燥不生若犯胃  
氣則晝夜譫語喜忘小腹滿小便利者屬抵當湯

問曰婦人先調血男子先調氣何如活人書曰此大  
略之言耳要之脈緊無汗為傷寒脈緩有汗為傷風  
熱病脈洪大中暑脈細弱其症一也假如中暈者用  
白虎胃實用承氣豈必調血而後行湯哉仲景傷寒

仲景傷寒補亡論 卷十九 婦人傷寒 二

所以不分婦人良亦由此學者皆可隨病于男子藥  
症中以意選用也

活人書曰婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾  
經脈凝滯不得往來宜桂枝紅花湯

又曰婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食宜黃芩芍  
藥湯

又曰婦人傷寒喘息煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不  
可下宜柴胡當歸湯

又曰婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼

宜乾薑柴胡湯

又曰婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可近海蛤散

朱氏又言婦人血結胸證法當刺期門仲景無藥此

方疑非仲景意又云婦人傷寒發熱經水適來晝日

明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃

氣及上二焦宜小柴胡湯

又曰婦人傷寒七八日續得寒熱發作有時經水適

斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀宜小柴胡

仲景傷寒補亡論 卷十九 婦人傷寒 三

又曰婦人傷寒發熱惡寒經水適來得之七八日熱

除脈遲身涼和胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱

入血室也當刺期門隨其實而取之

又曰婦人傷寒六七日胃中有燥糞大便難煩躁譫

語目赤毒氣閉塞不得通宜三黃瀉心湯

又曰婦人傷寒差後猶有餘熱不去謂之遺熱宜乾

地黃湯

又曰婦人傷寒未平復因交合裏急腰膝連腹內痛

名陰陽易宜燒裊散



又曰婦人病未平復因有所動致熱氣上冲胸手足拘急搐搦如中風狀宜青竹茹湯

又曰婦人病未平復因有所動小腹急痛腰膝痛四肢不任舉動無力發熱者宜當歸白朮湯

娠婦傷寒三十三條

活人書曰娠婦傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不可與尋常婦人一概論治也

又曰婦人娠傷寒藥性須涼切不可行桂枝半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋為娠婦而去

仲景傷寒補亡論 卷十九 娠婦傷寒 四

也大抵產前必先安胎產後先補血次服傷寒藥若病稍退則止藥不可盡劑此為大法黃帝問婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

千金方治娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼石膏前胡湯七味

又治娠傷寒頭疼壯熱心煩嘔吐不可食生蘆根湯四味

又治娠傷寒服湯後頭疼壯熱不歇宜用竹葉石

膏湯拭其身

又治娠熱病葱白五兩豉一升煮服取汗

又曰大熱煩悶者葛根汁二升分三服如人行五里進一服

活人書娠婦傷寒安胎宜阿膠散又宜白朮散

龐氏曰娠婦時氣欲令子不落宜用護胎伏龍肝散伏龍肝為末水調敷臍中乾即易之疾差乃止

又曰娠傷寒內熱極甚令不傷胎宜取雞子以絹袋貯投井底浸令極冷旋破吞六七枚佳

仲景傷寒補亡論 卷十九 娠婦傷寒 五

又曰娠傷寒大熱甚胎不安者宜用阿膠末一錢半竹瀝調下如無竹瀝用小麥竹葉煎湯調下

又曰娠傷寒服汗下諸藥熱已退其間與此藥安胎宜服人參黃芪湯

活人書曰娠傷寒憎寒發熱發其汗宜葱白湯以白生薑同煎連服取汗

又曰娠傷寒頭疼壯熱肢節痛疼宜服前胡湯千金方

又曰娠傷寒或時行灑淅作寒振慄而悸或加噦



宜蘇木湯雍曰蘇木大破血更宜參究避之

又曰妊娠傷寒頭疼默默不欲飲食脇下痛嘔逆痰

氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適

斷病後勞復餘熱不解宜黃龍湯

又曰妊娠傷寒頭疼惡寒身熱躁悶四肢疼痛項背

拘急唇口乾燥宜柴胡石膏湯

又曰妊婦傷寒四日至六日已來加心腹脹上氣渴

不止飲食不多腰疼體重宜三物枳實湯

又曰妊婦傷寒頭目疼壯熱心煩宜旋覆花湯

又曰妊婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安

宜麥冬湯

又曰妊婦發斑變為黑色宜梔子大青湯

五 龐氏曰妊娠傷寒腹脹大便不通喘急宜牽牛散

活人書曰婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡寒

時時有熱心下堅乾嘔汗出宜陽旦湯

又曰婦人產後傷風發熱面赤喘而頭疼竹葉防風

湯

又曰婦人蓐中傷風四肢苦煩熱頭疼與小柴胡湯

頭不疼但煩與三物黃芩湯

龐氏曰妊娠熱病胎死腹中用鹿角屑一兩水一碗

葱白五莖豉半合煎六分去滓溫作二服又方益母

絞汁飲半升即出

又曰傷寒小產惡露不行腹脹滿悶欲死宜大黃桃

仁湯

又曰小產後惡露被熱蒸斷不行宜地黃飲生地黃

薄汁各一碗生薑汁一盞和勻溫服分作三四次服

仲景傷寒補亡論 卷十九 婦人傷寒 七

微有寒者煎二十沸服亦下死胎

又曰傷寒產後血暈欲絕宜紅花散

又曰凡傷寒小產夏月宜少用醋炭多有煩悶暈死

者雍曰寒月用炭多

又曰傷寒產後惡血沖心悶亂口乾生薑小便飲子

生地黃汁薄汁小便各一盞和勻煎二三沸分三服

又曰傷寒產後惡露為熱搏不下煩悶脹喘狂言者

抵當湯及桃仁承氣湯主之

又曰傷寒小產煩悶大燥渴石膏湯主之



小兒傷寒十九條

千金方論曰小兒未能涉冒霜雪乃不病傷寒也然天行非節之氣其亦得之有如行瘟之年小兒出腹患斑者治其時行節度故如大人之法但用藥分劑少異藥少冷耳

又曰治小兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆麥冬湯

又曰治少小傷寒芍藥四物解肌湯

又曰治少小傷寒發熱欬嗽頭面熱者麻黃湯活人書減

桂半兩加石膏名石膏麻桂湯

仲景傷寒補亡論 卷十九 小兒傷寒 八

又曰治小兒傷寒以葛根汁淡竹瀝各六合二味相

和二三歲兒分三服百日兒酌服不宜生煮服佳

又曰治小兒時氣枇杷葉三兩搗以水五升煮十沸

取汁日五六遍淋之若復發熱燒雄鼠屎二三枚用

水調服之

又曰治小兒傷寒久不除差後復劇瘦瘠骨立五味

子湯

又曰治少小傷寒宜莽草湯治之避眼與陰

又曰小兒傷寒發黃者搗土瓜根汁三合服之又曰

搗青麥汁服之又曰韭根汁澄清滴兒鼻中如大豆許即出黃水差

又曰小豆二七粒瓜蒂二七枚糯米四十粒以少許吹鼻中

活人書論小兒傷寒曰治法與大人同但小分劑藥

性差涼耳尋常風壅發熱痰嗽煩渴惺惺散主之咽

喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯主之頭額身體溫熱大

便黃赤腹中有熱四順散連翹散三黃丸主之頭額

身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙丸主之

仲景傷寒補亡論 卷十九 小兒傷寒 九

小兒無異疾惟飲食過度不能自節心腹脹滿身熱

頭疼雙丸悉主之小兒身體潮熱頭目碎痛心煩神

躁小便赤大便燥此熱劇也洗心散調胃承氣湯主

之頭疼發熱假人畏寒者此傷寒症也升麻湯主之

無汗者麻黃黃芩湯有汗者升麻黃芩湯皆要藥也

小兒尋常不可過當服涼藥胃冷蟲動其症與驚相

類醫者不能辨往往復進驚藥如腦麝之類遂發吐

胃虛而成慢驚者多矣小兒須有熱症方可疎轉仍

忌用九子藥利之以大黃川芎等吹咀作湯液以蕩

續修四庫全書 子部 醫家類



滌蘊熱蓋丸子巴豆可攻食積耳雍曰此症不止小兒傷寒症亦多及餘病故詳錄之

又曰治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱宜惺惺散又曰治傷寒中風頭痛憎寒壯熱肢節痛發熱惡寒鼻乾不得睡兼治小兒大人瘡疹已發未發皆可服皆治寒暄不時人多疾疫乍暖脫著及暴熱之次忽變陰寒身體疼痛沉重如石者升麻湯主之

又曰治胸中客熱口舌咽中生瘡赤眼目瞼重不欲開瘡疹已發未發宜服甘露飲子又曰洗心散通治

仲景傷寒補亡論

卷十九

小兒傷寒

十

變豆瘡時行瘟疫狂語多渴者又曰連翹飲子治小兒一切熱又曰解大人小兒膈熱退壅盛涼心經宜四順散又曰治小兒傷寒發熱咳嗽頭面熱者宜石膏麻桂湯千金名麻黃湯

龐氏曰小兒傷寒發熱自汗多啼宜葛根芍藥湯又曰小兒傷寒不解發驚妄言語狂躁潮熱鈞藤大黃湯

又曰小兒傷寒結胸其項強眼翻弄舌搐搦如發癇狀久則哽氣但啼聲不出醫亦多作驚風治之其脈

浮滑試以指按心下則痛而啼宜半夏黃連括樓湯斟酌大小服之當出黃涎便差

又曰小兒傷寒始日壯熱不除被湯丸下後其症一如前結胸狀但啼聲不出醫又以驚風治之多服涼藥無驗此由誤下後毒氣結在心胸內熱吐涎涎裹藥不能宣行所致宜服蕩涎散取下黑黃涎猶包裹諸藥啼聲一出即安雍曰此因初誤下後涼藥不宜通方服蕩涎散

又曰小兒傷寒蒸起風熱發癇手足搐搦而不省蛇

仲景傷寒補亡論

卷十九

小兒傷寒

十一

皮湯

又曰小兒傷寒胃中有熱煩悶不食至日晚潮熱煩赤躁亂嘔吐蘆根湯又曰小兒傷寒後盜汗體熱咽乾犀角黃芪湯

小兒瘡疹上四十七條

外臺曰肘後言比歲有病天下發斑瘡頭面及身須臾周遍狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療劇者數日必死療得差後瘡癥紫黯彌歲方滅此惡毒之氣也世人云建武中於南陽擊虜所得乃呼為虜瘡



諸家參詳作療用之有效方取好蜜通身摩瘡上或以蜜煎升麻數數拭之亦佳

又曰永徽四年此瘡從西域東流于海內但煮葵葉蒜薤啖之則止鮮羊血入口亦止巢氏曰表虛裏實熱毒內盛攻于藏府餘氣流于肌肉遂于皮膚毛孔之中結成此瘡重者匝遍其身狀如火瘡若根赤頭白則毒輕若紫色則毒重其瘡如豌豆亦曰豌豆瘡脈洪數者是其候也

活人書曰小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足冷脈

仲景傷寒補亡論

卷十九

小兒瘡疹

三

數疑似之間只與升麻湯丸緣升麻解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可疎轉此爲大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表尤不可轉也世人不學乃云初覺以藥利之宜其毒也誤已又云瘡豆已出不可疏轉出得已定或膿血大盛卽用疏利亦非也大抵瘡症皆不可下小兒身熱耳冷尻冷咳嗽輒用利藥則毒氣入裏殺人但與化毒甘艸木通湯鼠粘子湯出得太盛則用犀角地黃湯解之若瘡出不快煩躁不得眠者水解散麻黃黃芩湯升麻黃芩湯活血

散主之瘡黑倒靨猪尾膏無此散龍腦膏子無不驗也若熱毒攻咽喉痛如聖湯瘡毒入眼決明散撥雲散密蒙花散通聖散蛤粉散主之治瘡疹之法無出此矣

龐氏曰天下豌豆瘡自漢魏以前經方家不載或云建武中南陽征虜所得俗呼虜瘡其後名醫雖論發斑候是發汗吐下後熱毒不散表虛裏實熱氣湊于外故身體發斑又說豌豆痘瘡表虛裏實一如發斑之理別之熱毒內盛攻于藏府餘氣流于肌肉遂于

仲景傷寒補亡論

卷十九

小兒瘡疹

三

皮膚毛孔中結成此瘡既是裏實熱毒內盛則欲發未發瘡斑未見皆宜下之瘡已差則再下之此病有三種一則發斑俗謂之麻子其毒猶輕二則豌豆其毒最重多是冬溫所變凡覺冬間有非節之煖瘡毒未發卽如法下之次第預防之藥則毒氣內消不得作矣有不因冬煖四時自行者亦如法下之古方雖有治法而不詳備疑當時熱毒不甚鮮有死者近歲此疾歲歲未嘗無也甚者夭枉十有五六雖則毒氣內壞不治因醫爲咎又大半矣若身痛壯熱頭疼



不與小汗何由表散大府久秘毒攻腰脇或心腹脹滿不與微利何由釋去故當消息汗下然則寒藥固不當行溫藥反增熱毒若勢太甚脈候洪數涼性之藥不阻表裏氣者亦可通用若寒氣阻滯脈候浮遲則溫性之藥不阻表裏氣者可冀冰釋云不可汗下寒熱之藥只可紫草一味者乃滯隔之流祇是遭遇輕疾以自差為功若值重病則拱手待斃也世有權貴自信不任醫師忌冷熱汗下病或不救則責醫者謬誤斯又可為傷嘆小兒多染此患故此方多用小

仲景傷寒補論

卷十九

小兒瘡疹

十四

湯劑大人宜倍用之活人書小兒大人瘡疹已發未發皆宜服升麻湯

又曰傷溫病應發汗而不發汗內有瘀血者及鼻衄吐血不盡內有餘瘀血面黃大便黑者并宜犀角地黃湯以消化瘀血及瘡疹出得太盛亦以此湯解之又曰天行熱毒生豌豆瘡出不快益煩躁昏憤或雖出身體尚熱者宜麻黃黃芩湯以發其表無汗者宜用之有汗者非

又曰小兒時行瘡豆出不快煩躁不眠者宜升麻黃

芩湯加木香一錢半以殺其毒有汗者尤宜服  
又曰小兒瘡豆已出未出並宜服化毒湯紫艸木通湯

又曰痘瘡欲出未透皮膚熱氣攻咽喉眼赤心煩宜鼠粘子湯

又曰天行頭痛壯熱一日二日及瘡疱未出煩躁雖少身體發熱者宜冰解散去大黃芍藥止用四味

又曰瘡子不出宜活血散以白芍一錢溫熱水調下

又曰瘡子倒靨宜猪尾膏小兒尾鐵刀刺血一兩

仲景傷寒補論

卷十九

小兒瘡疹

十五

入生龍腦少許同研和水調下

又曰疹瘡有一切惡候及黑陷并宜服無比散取下惡物便安

又曰豌豆瘡出未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治宜龍腦膏子

又曰痘瘡入眼生翳有決明散撥雲散密蒙花散通聖散蛤粉散皆宜擇而用之

龐氏曰溫毒發斑大疫難救兼治豌豆瘡不出宜地黃膏



又曰天行發斑瘡須與遍身皆戴白漿皆惡物也

又曰凡覺冬溫將來春夏必發斑豆小兒輩于冬煖時預服漏蘆湯下之下後日逐空心飲甘艸汁直候腹疼乃止或下後飲羊血一盞則不發

雍曰冬溫時小兒逐日宜服鼠粘子湯則斑豆喉痺赤目口瘡皆不發下後煎甘艸黑豆竹葉湯亦好三晉人不用黑豆用槐豆尤勝羊血當依外臺法若下後服之非宜

又曰時行豌豆瘡以槿皮二兩細切水一升煮半升

仲景傷寒補亡論

卷十九

小兒瘡疹

去

去渣分服之此晉王中令方也

又曰初得病便驚狂不眠渾身熱汗出問之身不憎寒亦不惡風其脈如數以漏蘆根湯下之甚數者以大承氣湯下之瘡豆傷寒亦然

又曰小兒時行瘡豆恐相傳染先服漏蘆湯下之本治熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癰雍曰今依朱氏法但存其說

又曰瘡豆毒氣不出煩悶熱毒氣攻腰或脇腹疼不可忍大便不通五杏湯主之

又曰熱氣在表已發汗未解或吐下後熱毒不散煩躁譫語此為表虛裏實熱氣燥于外故身發斑如錦

文或不因汗下始得病一日二日便發皆由溫疫熱毒氣使然甚則發豌豆瘡其色白或赤發于皮膚頭作漿戴白膿者其毒則輕其紫黑色者作根隱隱在肌肉裏其毒則甚十死一生甚者五內七竅皆有瘡形如豌豆故以名焉脈洪數者是其候也雍曰瘡靨則有紫黑色初生者皆赤根白頭

又曰天行熱毒未解欲生豌豆發熱疼痛宜解肌發

仲景傷寒補亡論

卷十九

小兒瘡疹

七

汗葛根石膏湯

又曰斑豆始有白疱忽搐入腹漸作紫黑色有膿日夜啼叫煩亂宜鬱金散

又曰此疾小便澀有血者中壞也瘡黑靨無膿十死不治斑豆煩喘小便不利鼈甲湯定煩喘竹瀝飲子又定煩喘麻黃甘草湯

又曰常行豆瘡紫草湯最良患其服之太少不能中病但多槌切好紫草以沃之候溫去渣服紫草半升湯一升為準



又曰瘡出不快碎紅花子一合水半升煎百沸去渣服

又曰斑豆已出不可發表更增斑爛以虛故也

又曰瘡出不快表裏不解煩喘大便閉氣攻腹滿宜犀角升麻湯

又曰斑豆服涼藥太過咳嗽手足冷脈遲甘艸乾薑湯

又曰豆症已出定芒硝豬膽汁和研勻塗之勿動痂落無痕仍臥黃土末上良

仲景傷寒補亡論 卷一九 小兒瘡疹 六

又曰天行豆瘡預服三豆飲則不發

又曰瘡豆發斑下利赤黃或膿血遍身發熱宜梔子薤鼓湯 八卷

雍曰龐氏錢氏諸方如活人書有缺藥症及用之不應者則取之

錢氏曰凡小兒面燥頰赤目赤呵欠煩悶乍涼乍熱咳嗽噴嚏足稍冷夜臥驚悸多眠并瘡疹症惟用溫涼藥治之

又曰小兒在胎食五臟血穢生下則其毒當出故瘡

疹之狀皆如五臟之液雍曰世醫言初年不出至老亦出此說不經見龐氏亦無是說第俚俗有此言恐錢朱未能免俗也

又曰發熱潮熱三日以上熱入皮膚即發瘡疹而不甚欬者熱留膚腠之間故也

又曰瘡疹尻涼者順候也若瘡黑陷耳尻反熱者逆也用牛李膏百祥丸多至三服若不愈者死病也

又曰凡瘡疹一發便出盡者必重瘡夾疹出者半輕半重也出希者輕裏外肥紅者輕外黑裏赤者微重

仲景傷寒補亡論 卷十九 小兒瘡疹 九

外白裏黑大重瘡端裏黑點如針孔者勢劇也青乾紫陷昏睡汗出不止煩躁熱渴腹滿啼喘大小便不通者困也凡瘡當令乳母忌口不可令小兒飢及受風冷必變紫黑難治

又曰有大熱者宜利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥丸下之不黑者切不可下

又曰瘡疹更看時月逆順大抵屬陽故春夏病為順秋冬病為逆

又曰春膿泡夏黑陷秋斑子冬疹子亦不為順雍謂



錢氏大抵拘于藏謂膿泡為肺金黑陷為腎水斑子為心火疹子為脾土皆剋四時故不為順也然則黑陷者何時不為逆也

又曰重病猶十活四五黑者無問何時十難救一其候或寒戰噤牙或身黃腫紫宜急以百祥丸下之復惡寒不已身冷汗出耳輪反熱者死病也下後身熱氣溫欲飲水者可治之宜解毒不宜妄下若能食而痲頭焦起或未焦而喘實者可下之雍曰平時醫者有候瘡痲頭焦而下者云欲下餘熱不作痲癰也若仲景傷寒補亡論 卷十九 小兒瘡疹 下

症中果見有餘熱及瘡後脈不衰信可下若症無餘熱脈已衰弱則如何敢下瘡後兒已虛又下則重虛之非惟將息不起又因虛別成大病藏府脆弱故病未已新病復加則難治不可不慎也但當解餘熱又曰身熱煩渴腹滿如喘大小便濇而赤悶亂大吐此當利小便不差者宜風散下之若六七日痲未焦是內發熱熱氣蒸皮膚故不得痲焦也宜風散導之磨生犀角解之 又曰若瘡入腹為膿血及連痲皮得出者脾氣實也

出則安若瀉米穀及乳不化者是脾虛自瀉也必難治

仲景傷寒補亡論卷第十九終

仲景傷寒補亡論 卷十九 小兒瘡疹

下



仲景傷寒補亡論卷第二十

河南郭雍撰次

小兒瘡疹下十八條 斑瘡癰疹辨一條

小兒瘡疹下十八條

雍論曰朱氏作活人書亦多取蘄水龐安常之說至論瘡泡則二家之說如冰炭朱氏謂瘡疹首尾皆不可下龐氏謂未發欲發瘡斑未見皆宜下之瘡已差而再下之何其一說相戾如此雍曰攷漢魏醫方無所見至東晉王珉始有治時行熱惡毒瘡方隋巢元

仲景傷寒補亡論卷二十 小兒瘡疹 一

方始有疫癘疱瘡論候其言皆不甚詳此大疾也殺人不異傷寒何其輕易簡略如此故龐氏疑當時熱毒未甚鮮有死者雍謂不然上古岐黃之時其病尙與今日無異安有中古反不同也王中令旣以屬時行巢氏又以爲疫病則此疾當詳見于時行疫病中今以矣傷寒以仲景論故存得詳備時行瘟疫以無仲景治法故後世之說不得同仲景金匱玉函之書千百不存一二安知時行疫疾不逸于其間乎然瘡疹捨龐氏朱氏二家則別無可取之論雍疑其相

反無所適從嘗聞先兄子若曰朱氏之論後世不可易之常道也此法當獨得于朱氏雍曰然則龐氏之言失乎兄曰醫道精微言所不能盡述使醫之明如龐氏則可用龐氏之法不然則一從朱氏雖不肖者亦可跋而及也聞此方釋然又有東平錢乙仲陽以治小兒名家及論瘡疹亦稍支離滯于五藏五色究其說終不出于二氏之門然仲陽老于醫論症用藥有可取者故係于朱龐二氏之後

雍曰活人書下原 病人肌肉發斑下原

仲景傷寒補亡論卷二十一 小兒瘡疹 二

瘡疹始是溫毒下原 傷寒下原

初言止此不比其他亦未嘗言斑疹豈言之而亡逸歟故醫家所論溫毒等症多非仲景言時行溫疫至今未詳者詳此或謂瘡疹與傷寒相類謂其頭痛壯熱之類同也非謂所感之同也仲景曰其冬有非節之煖名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大異故龐氏曰凡覺冬間有非節之煖瘡毒未發卽如法下之則龐氏亦以爲冬溫之毒矣然如朱氏二家論症皆如溫毒而不欲明言者以仲景無正說故也以雍觀之瘡疹



卽溫毒之一晉人既名爲時行熱毒瘡卽溫毒瘡矣  
又何疑爲其感疾本與傷寒同皆感于冬藏于肌膚  
至春而發是其同也而仲景言與大異者傷寒感至  
寒之氣溫毒感冬溫之氣是其所以爲異也然有成  
瘡疹者亦有不成瘡疹者總其名皆謂之溫毒也雍  
謂感冬溫非節之煖藏于皮膚之中至春夏而其毒  
發鬱積之盛熏炮肌骨已久一旦發出于外必皆潰  
爛爲瘡而後已不但能爲一汗而已然溫毒成瘡有  
數種曰膿胞又名豌豆瘡曰水疱又名麻子瘡曰麤

仲景傷寒補論 卷二十一 小兒瘡疹 三

瘡亦名麤瘡又有癩疹斑爛皆其類其輕者世俗以  
其形象名之本其所感深重爲膿胞千金之後名曰  
豌豆瘡次者爲水疱輕者爲麤瘡膿胞生七日方長  
貫膿成痂然後愈其日未滿而乾者謂之倒靨也水  
疱生數口圓滿水出則愈麤瘡隨出則焦他處再出  
再焦如是遍及其身三者皆忌倒靨大者倒靨則色  
紫甚則膿血欲乾故變黑有黑者一二日尙可以藥  
再發黑者多則難藥已水疱瘡水如鈴倒靨則色乾  
不明麤瘡纔出多忽不見是倒靨也雖麤瘡倒靨亦

能殺人以溫毒之氣復入五內也非感溫毒之氣因  
時行暴發者多不殺人故瘡家畏風畏寒畏塗涼水  
涼藥大畏下皆恐毒氣倒靨于內當欲謹避風處若  
時尙寒則難出表雖溫不可太煖不可服熱藥朱氏  
所云但服升麻湯者最爲要法疹病多暴感非冬溫  
之氣所成病甚輕不成瘡但作癩疹起有赤白二種  
世俗所謂風尸者是也須服藥亦可塗治雖無倒靨  
之患亦有毒氣入腹之憂千金小兒澤蘭湯卽其藥  
也又有一種斑發如描畫遍身燦爛如錦文者又如

仲景傷寒補論 卷二十一 小兒瘡疹 四

火丹發雖無癩疹起亦如癩疹內外治之色淡則愈  
傷寒發斑見本文  
雍論曰諸家論瘡疹可下不可下世人不能無惑雍  
詳二法本于傷寒傷寒冬感至寒之氣藏于肌膚骨  
髓之中爲腠理閉密不得出至春腠理開疎而後發  
于表醫者發表中病則從經爲汗而出于表發不當  
或遇毒氣甚重則不能出因傳陰經遂入于裏至裏  
無可發之理候其入胃則下之五藏之毒其根在胃  
根去則諸藏之毒隨去若有餘毒在裏表未能入間



值胃中毒根已下則在表之毒如斷根之蓬隨其所  
在作汗而出矣故傷寒有汗而愈有下而愈下者亦  
必先泄後作汗而愈也瘡疱之家本無汗下症其初  
冬感于非節之溫氣藏于肌骨時方外寒腠理閉密  
不得出至春腠理開疏而發其藏于膚腠者發為麤  
瘡藏於肌肉者發為麻子瘡藏于骨髓者發為豌豆  
瘡既發為瘡則無發汗之理惟用解肌藥以托之庶  
其易出也毒氣既作瘡而出不復入裏亦如傷寒大  
汗之後不入陰經自無可下之毒故治傷寒之法惟  
仲景傷寒補亡論 卷二十一 小兒瘡疹 五

毒入深不能再至表因而深入急下之則可活矣是  
十死一生之候不得已而下他無救之之術此二可  
下之時也其三瘡疱既愈餘毒不已發為大癰既潰  
出膿血又別發癰相續不已世謂之炮癰必解利之  
而後已是時病人瘡方愈未得食力氣血虛羸下之  
甚危道主藉醫者斟酌用藥然不下則斃亦不得也  
此三可下之時也舍是三者皆不可下矣朱氏云小  
兒疏轉切忌用丸子藥當以大黃川芎等分咬咀作  
湯液以蕩滌蘊熱此說甚良雍謂宜加甘草大黃倍  
仲景傷寒補亡論 卷二十一 小兒瘡疹 六

之此常器之所用也盛冬初感未發之時宜用此湯  
及作癰癰之後亦宜用此但少加劑未效再服之惟  
瘡作黑陷倒靨發之不出者須朱氏無比散及錢氏  
百祥丸前所言大黃川芎藥亦不可用也此病原不  
見于仲景故無定論不免詳言之庶無惑焉

雍曰東晉中書令王珉有傷寒身驗方云檣樺木皮  
濃汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良此卽今之豌豆  
瘡當時謂之時行熱毒瘡也故龐氏方中載樺皮飲  
子者本之此至巢氏論疫癘瘡候曰熱毒盛則生



豌豆瘡周匝遍身狀如火瘡色赤頭白者毒輕色黑紫黯者毒重亦名為登豆此即熱毒瘡至巢氏而後有飽瘡豌豆之名至今呼之以二者攷之則瘡謂為溫毒瘡不謬也凡冬感于寒縱其病熱甚極不過為斑為黃終不成瘡惟感冬溫非節之煖者則成瘡故龐朱皆言溫毒之為瘡而王中令巢氏皆以熱瘡為時行為疫病諸家雖異同其實一也

雍曰余家值小兒將作瘡疹未辨傷寒時行即依朱氏法先服升麻葛根湯服之瘡未出而惡風發熱頭痛諸症不罷者即是藥性緩次日更兼敗毒散服之若是瘡子一夕便出或不成瘡亦以汗解仍能解瘡毒重者便輕屢驗

仲景傷寒補論 卷二十 小兒瘡疹 七

又曰瘡疹變出惡症者多是豌豆以其毒氣盛故也其他唯服藥有悞則有惡症不悞服藥者無惡症也又曰瘡疹雖不成瘡亦頭焦皮起如麩片然若癩疹則暴發初無表症亦不退皮愈後便消故世謂疹子為麩瘡其毒雖輕若悞服涼藥則盛出之際一夕忽不見便是倒靨毒氣入裏亦能殺人以牛李膏發之

又曰貧下之家養小兒素無煖衣衾亦無酒肉滋味至其感病止是時行所感候其氣散即便安愈豪貴之家溫煖太過飲食無度既感時行之氣人事又為之助是兩毒相攻所以多生異症遇冬溫時小兒午間常服牛蒡消毒飲甚好

又曰瘡疹大畏大小便不快惡症便生急須通之用牛李膏通大便麝香膏通小便大妙

又曰錢氏所謂五七日痂不焦以內熱蒸皮中此只是毒氣未盡亦不須宣風散但服牛李膏

仲景傷寒補論 卷二十一 小兒瘡疹 八

又曰牛李膏亦是舊方不止錢氏用正是瘡疹本藥如宣風散是外來借功自不同所以貴牛李膏者以出未快者可以出之多者可以解之在表者可因而越之在裏者可引而竭之是瘡疹八面可用之藥故凡瘡疹皆先服之

又曰牛李膏奇處正在能分毒氣在表者使出在裏使下表裏並用兩不為妨同時供應毒勢已衰諸藥皆無是之妙天生神物為人用非止此一物第人未能盡知之耳



又曰瘡疹初發固不必用牛李膏纔見出得稠密或大小便不快或出不快煩悶渴甚者便與服之牛李二種稍大而黑紫者奇微小而深黑者劣微小者即早李也本草共爲一物

又曰凡豌豆瘡根邊色紅活瘡顛圓滿如珠者大好初生亦未便圓日漸長也瘡根色紅淡瘡顛不圓好便當表發仍頻看觀雍有一孫四五歲患此已數日背上瘡盛而根色淡而不紅活瘡顛已半平半陷間有紫黑色者急與牛李膏二服不見色回再取猪尾

仲景傷寒補亡論

卷二十一 小兒瘡疹

九

血滴研龍腦水調服時已日暮少頃燈下視之瘡根復紅活如初次早陷瘡皆起累日再長圓滿焦痂而愈但病身中痛異常手不可觸病後羸極如兩次傷寒也是歲一房同時患者皆毒重稠密煩渴皆用牛李膏下黑涎而愈

又曰牛李膏之上惟猪尾膏奇但猪尾膏非惡候不用不若牛李膏可常用雖惡候未出使見熱盛便先解之猪尾膏如無龍腦即用麝香麝香大通小便小便快則毒自衰會用之驗

又曰惡候二膏不效方可下雍膏見一病醫者用無比散下之立愈惟百祥丸不親見用之者雍以多用前二膏故未嘗至于用大下藥

又曰活人等書諸方如升麻湯固必先用瘡出不快煩躁不眠者用升麻湯黃芩加木香湯毒攻咽喉心煩者用牛蒡子湯咽喉腫者如聖湯牛李膏猪尾膏瘡毒入眼成翳者用通聖乾柿皆親經用殊效

又曰瘡毒好攻人眼目須預防之方感此患便以蠟退去土入熱水放冷乘溫日飲至疾愈毒氣永不入

仲景傷寒補亡論

卷二十一 小兒瘡疹

十

眼溫冷任服甚驗

### 斑瘡癰疹一條

雍曰世醫論斑癰疹不甚詳明雖龐朱二氏亦然朱氏曰初春病人肌肉斑爛癰疹如錦文者溫毒也龐氏之言亦然朱氏曰發斑有二症有熱病發斑溫毒發斑溫毒如上所言是也熱病發斑者朱氏曰或未發汗或已經汗下而熱毒不散所以發斑瘡癰疹如錦文俗云麩瘡素問謂之疹此悞也雍謂斑與瘡疱及癰疹實是三種傷寒熱病發斑謂之斑其形如丹



砂小點終不成瘡退即消盡不復有瘡溫毒斑即成瘡古人謂毒熱瘡也舍是又安得別有熱毒一瘡後人謂豌豆瘡以其形似之也溫毒瘡數種豌豆瘡則其毒之最者其次水炮麻子是也又其次麩瘡子是也如麩片不成瘡但退皮耳以其不成瘡故俗謂之麩瘡又與癩疹不同癩疹者皮膚發癢搔之則癩疹壘起相連而出終不成瘡不結膿水亦不退皮忽爾而生復忽爾而消亦名風尸也世人呼麩瘡或曰麩疹即是

仲景傷寒補亡論

卷二十一

班瘡癩疹

十一

仲景傷寒補亡論卷第二十終

吳郡香門內  
張金彪局刻



南陽活人書叙

自朱紫陽訓醫為小道儒者  
 率卑瑣置之而不談不談則不  
 習之醫而獲名稱者皆業儒不  
 成者也然一旦疾病出延素所  
 不謀者不惜捐資託生家  
 以尊禮之夫術至於託生家也  
 豈非小道之極矣哉夫生家之  
 倚于是舉世惑於命謂命自  
 天而藥餌真屬可有可無之  
 物而取之則不過曰謂之能  
 療疾苦耳耳然則以為小道之

活人書叙

宜不亡命蓋難言矣矣夫生家之

豈非業以能生也則春毒藥之可  
 以不死耳一系世賢智之儒亦不  
 究詰委身庸愚就投金石之  
 末或輕信而自戕或務逐之而終  
 尤能知一室之難挽不問人事之  
 有缺或以吾官聖準之其所諄  
 諄言曰有命之矣夫夫之命以乎夫  
 壽猶短不可強者形以必慎  
 疾也不輕嘗業也謀以止以誠  
 之子與民之志家橋不為不也  
 命之毫後先同旨是文人生此自

活人書

序

二



法無之蒼茫而竟不能移也  
 亦必慎而業可停矣亦止者而  
 喉嚨下可立矣由是知軒岐  
 至神農至矣伊尹箕仲皆其  
 石乃去為陳陳之學一切可  
 矣以以古今必設必設也若夫但  
 活人書 四序 三  
 取瘡疾苦之言上不經見天地  
 宵六滄七情之所發動輕公疾  
 苦垂別危殆能治法與治之  
 先時危殆化一為疾苦不為其  
 以法與治之後時疾苦轉而為  
 危殆也立有二哉不信素不為

醫為方技近與五經其乃伯氏  
 譚駁之論遂先以我之心同於  
 規評救法醫籍合於十部而此  
 書至一言白世間真急難能  
 救世之醫籍者等難正之業儒  
 者多不諳醫也易伯所推許千  
 百載醫不數人物之不流於內難  
 者為是南陽仲景南陽內難者  
 也有宗之奉法南陽南陽也內  
 難之體具候南陽而用難南陽  
 之難難而奉法而理明也信是  
 書不世即尊醫振之明理與文

活人書

四序

四



河間藝人法也俱無以回鑿者  
 刻近代種之剽竊之偽去季然公  
 高伯軒岐之曾志奉濠南陽之  
 功匠學志德真派以見其人面  
 目一為中一二少情之微無自可  
 愛而通之矣為伯今通籍宦遠  
 頗厭雜此意余懼其久而佚也  
 謀於鄉紳悅然同好遂醴賓  
 付梓以廣其傳乃陽伯則自左  
 遠且大去無俟以為名于為也  
 萬曆丙辰歲陽月之志  
 勅討文林印一前


活人書

四序

王

活人書 叙

欽差巡按浙江等處貴州總  
 候補江西道監察御史蘭中  
 張惟任撰



活人書

四序

王



活人書序

武夷張葳

余頃在三茅見無求子傷寒百問披而讀之不知無  
以子何人也愛其書想其人非居幽而志廣形愁而  
志遠者不能作也惠民憂國不見施設游戲藝文以  
陶歲月者之所作乎逃世匿跡抗心絕慮灌園荒丘  
賣藥都市者之所作乎顛倒五行推移八卦積功累  
行以就丹竈者之所作乎不然則窮理博物觸類多  
能東方朔者耶浩歌散髮採掇方技皇甫謐者耶周  
活人書 序

流人間衛生救物封君達者耶前非古人後無作者  
則所謂無求子者余不得而知也三茅三年挾冊抵  
掌未嘗停手所藉以全活者不知其幾人也惜其論  
證多而說脉少治男子詳而婦人略錄兩訛舛升氣  
不明標目混淆語言不通俗往往間間有不能曉者  
此余之所以夙夕歉然者也今秋遊武林邂逅致政  
朱奉議泛家入境相遇於西湖之叢林因論方士奉  
議公乃稱賈誼云古之人不在朝廷之上必居鑿下  
之中故嚴君平隱於卜韓伯休隱於鑿然卜占吉凶

有因果不精於鑿寧隱於卜班固所謂有病不治  
得中醫蓋慎之也古人治傷寒有法治雜病有方葛  
稚川作肘後孫真人作千金陶隱居作集驗玄晏先  
生作甲乙率著方書其論傷寒治法者長沙太守一  
人而已華佗指張長沙傷寒論為活人書昔人又以  
金匱玉函名之其重於世如此然其言雅與非精於  
經絡不可曉會頃因投閑設為對問補苴綴緝僅成  
卷軸因出以相示然後知昔之所見百問乃奉議公  
所作也因乞其繕本校其詳略而傷寒百問十得五

活人書

序

六前日之所謂歉然者悉完且備書作於己巳成於  
戊子增為二十卷釐為七冊計九萬一千三百六十  
八字得此書者雖在崎嶇僻陋之邦道途倉卒之際  
據病可以識證因證可以得方如執左契易如反掌  
遂使天下傷寒無橫夭之人其為饒益不可思議昔  
樞密使高若訥作傷寒纂類翰林學士沈括作別次  
傷寒直秘閣胡勉作傷寒類例殿中丞孫兆作傷寒  
脉訣蘄水道人龐安常作傷寒卒病論雖互相發明  
難於檢閱比之此書天地遷落張長沙南陽人也其



雖詳其法難知奉議公祖述其說神而明之以遺  
惠天下後世余因揭其名爲南陽活人書云大觀五  
年正月日序

活人書

序

三

諸公助刊姓氏

張問達號誠宇刑部左侍郎

盛以弘號揚陞國子監祭酒

韓文煥號太素翰林院檢討

韓繼思號正堂擬授刑科給事中

王國禎號麟郊山東道監察御史

張惟任號覺菴貴州道監察御史

薛貞號正亭江西道監察御史

車朴號望莘吏部司務

活人書

姓氏

王豫立號玄洲禮部精繕司郎中

王建屏號時山戶部貴州司郎中

王之臣號任吾戶部河南司郎中

來于庭號五雲戶部廣東司郎中

侯國彌號念崗刑部山西司郎中

米萬鍾號友石工部營繕司郎中

李聯芳號蘭如戶部山東司員外

李采號質軒戶部湖廣司員外

常道立號還一戶部河南司員外



張國紳號見立戶部雲南司主事

楊蛟號巨嶠戶部山西司主事

解經傳號衡嶠兵部武庫司主事

周仕號顯吾兵部武選司主事

王弘祖號含一兵部職方司主事

薛承教號小雍刑部雲南司主事

王之宗號心一刑部河南司主事

審熿號永懷工部都水司主事

薛養性號心齋都察院司務

活人書

姓氏

二

張國祥號居白擬授禮科給事中

張鳳躍號聖徵中書舍人

杜繼芳號肖任中書舍人

張鎔號陶宇光祿司主事

馬鵬號光川光祿司主事

李孔度號生洲國子監典簿

董繼舒號崑陽國子監典簿

王徵號葵心舉人

以醫為多則未以醫為真則非未醫止為一人

之身用則小以之為天下人用則非小余不佞

非知醫者願常私謂百家之技惟此近真擴而

大之可以免天殄之患家居題其藥室云以義

皇之心手運堯舜之事功誰窮誰達將孔孟之

乾坤躋羨期之壽命何已何人十餘年託志如

此茲以往功疎矣亦不復言此道矣所批校諸

方書頗多半為人索去丙辰入都偶携數種以

備查晉活人書其一也侍御張覺菴先生民部

王任吾先生見而嘉賞之遂約同鄉諸薦紳先

活人書

姓氏

三

生見住長安者各捐金命工不數月告成此書

行而仲景之心法明即內難之奧旨明窮鄉鄙

邑按條檢方詳方治病傷寒雜證一以貫之其

有補于世道既備且久矣海內人士倘讀此有

得以之治療獲驗尚其念諸薦紳先生之功是

編經徐春沂鎔與不佞復攷纂又共社友胡含

素廷器梁君晉希淵若主應坊家弟馭仲臨校

正庶免無大訛謬觀者鑒其苦心

關中來復陽伯甫謹識



青詞

竊以神農嘗藥伊尹論方證順陰陽雖克求於民瘼  
 時無疫癘蓋有賴於神明瞻彼昊穹哀此黎庶伏念  
 浪遊東土空閱流光篋聞經國之謀端議濟人之  
 術冥冥長夜憐橫死之無辜斷斷窮年矧餘生之多  
 病自朝及夕考古驗今首尾幾二十一年前後僅九  
 萬餘字焦心皓首絕筆青編原其微功實自潛祐屬  
 或書之將上爰奏牘以先天恭卽蘭場肆陳醮席冀  
 九清之降鑒祈萬寓於康寧仰獲證明庶傳永久  
 活人書 表 四

進表

臣聞鍾山非矯幽人躡屩於深林衡岳雖遙志士獻  
 書於北闕蓋行藏之有數非狂狷所能知中謝伏念  
 出自葑屋之微嘗奉大廷之對昔為冗吏今作閑  
 人乃因三餘著成百問上稽伊尹湯液之論下述長  
 沙經絡之文詮次無差搜羅殆盡從微至著蓋不可  
 加自古及今實未曾有載在簡冊圖之丹青思欲膠  
 口而不傳大懼利已而無益恐先朝露虛棄寸陰學

活人書 青詞 表

古入官既無裨於國論博施濟眾庶或廣於仁風伏  
 惟

皇帝陛下經緯之文出自天縱紀綱之治成於日躋  
 瓊宇開拓於版圖弦歌洋溢乎天下棲神內景屬意  
 生民收拾人材凡片善寸長皆有所用勤卹民隱雖  
 沉疴垂老各安其居玉燭亘天以流離朱草填廷而  
 委積湛恩滂沱溫詔丁寧致茲丘園一介之愚亦効  
 涓埃萬分之助歲明大道敷奏彌文揚雄所懷以既  
 章秦澤沒齒而無憾重惟道途修阻巾笈護持未免  
 活人書 表 五

謝表

宸衷自警輿議特羈縻於丹竈徒景仰乎公車謹遣  
 男遺直齋臣所撰書一函八冊共二十卷躬詣檢院  
 投進以聞委有親采伏乞宣付國子監印造頒行如  
 臣學植淺陋違戾於經卽乞委官為詳然後布之天  
 下以福羣生臣無任干天冒聖激切屏營之至政和  
 元年正月一日奉議郎致仕臣朱肱謹上

謝表

命渙絲綸恩加田里撫躬無狀媿汗交流中謝竊以



澤拂衣本非絕物東山投褐終以為民自古及今  
 非狂則狷求之載藉賴有斯人伏念臣憂患餘生棲  
 遲末路爰脫身於簪紱遂晦迹於漁樵流浪江湖侵  
 尋歲月窮通有數莫知說駕之由出處何心第顧倦  
 遊而止曉猿夜鶴春韭秋菘絕交幾近於矯情苦誓  
 未忘於匿怨豈知聖世率在周行然而丘壑之志已  
 堅桑榆之光無幾辭華衰落素無翰墨之稱趨操澗  
 踈誰借齒牙之論偶緣著述誤被選掄特起於五湖  
 寂寞之濱置之在三墳討論之地未知一可先閱兩

活人書

表

六

官不期投老以偷安乃復彈冠而再仕此蓋伏遇

皇帝陛下發明道術游戲藝文欲稽上古之書單及  
 衛生之士肇新學校爰擇師儒豈容幽人而在此選  
臣敢不隨緣應世與物為春消息有時雖佩山公之  
 語始終一節難逃俗士之譏

謝啓

命出于中恩歸有自藝成而下唯濟世可以無嫌祿  
 在其中苟為貧有何不可如肱者瞿瞿遮眼豎下歲  
 身十載投閑憐桑麻之已長一朝就列媿松菊以難

存方將穿墨池以灌園安丹竈而息火掃除伎倆陶  
 汰因緣不虞湯液之言偶合春秋之法道俗交慶魚  
 鳥亦驚龍光祇荷於殊恩陶冶實資於大化此蓋伏  
 遇太師相公無心造物有意為民以人物升沉為深  
 憂以世諦俯仰為可媿苟有一得不問其他致茲流  
 落之餘亦在使令之數敢不激昂晚節筆策下愚稽  
 首傾心豈特平日之師仰斷臂拭目蓋將投老以依  
 歸

活人書

表

七



後序

傷寒諸家方論不一獨伊尹仲景之書猶六經也其餘諸子百家時有一得要之不可為法又况邪說妄意世業名家規利雖厚因果歷然特以伊尹湯液仲景經絡常人難曉士大夫又以藝成而下耻而不讀往往倉卒之際束手待斃卒歸之於命而已世人知讀此書者亦鮮縱欲讀之又不曉其義况又有好用涼藥者如附子硫黃則笑而不喜用磁石冬使人飲冷服三黃圓之類有好用熱藥者如大黃芒硝則畏活人書 後序 八

而不敢使雖盛暑勸人灸熨服金液丹之類非不知罪福蓋偏見曲說所起者然也陽根於陰陰本於陽無陰則陽無以生無陽則陰無以化是故春時氣溫當將理以涼夏月盛熱當食以寒君子扶陰氣以養陽之時也世人以為陰氣在內反抑以熱藥而成癰痢脫血者多矣秋時氣涼當將息以溫冬時嚴寒當食以熱君子扶陽氣以養陰之時也世人以為陽氣在內乃抑以涼藥而成吐利腹痛者多矣伐本逆根豈知天地之剛柔陰陽之逆順其不天橫也哉

活人書 後序

偶有病家會留意方書稍別陰陽知其熱證則召其人以其人善醫陽病知其冷證則召其人以其人善醫陰病往往隨手全活若病家素不曉者道聽泛請委而聽之近世士人如高若訥林億孫奇龐安常皆惓惓於此未必章句之徒不諳且駭也僕因間居作為此書雖未能盡窺伊尹之萬一庶使天下之大人無天伐老不哭幼士大夫易曉而喜讀漸浸積習人尊生豈曰小補之哉曾尼曰吾少也賤故多能鄙事學者不以為鄙然後知余用意在此而不在彼也

活人書

後序

九

大觀元年正月上元日前進士朱肱序

僕乙未秋以罪去官明年就領官祠以歸過方城見同年范內翰云活人書甚美比百問十倍然證與方分爲數卷倉卒難檢及至淮陽又見王先生活人書京師成都湖南福建兩湖凡五處印行惜其不曾校勘錯誤頗多遂取繕本爲參詳改一百餘處命工於杭州太隱坊鏤板作中字印行庶幾緩急易以檢閱然方術之士能以此書爲善者亦多矣僕嘗使人讀讀廣說流布不爲俗醫妄我其爲功德也

三五七



重校證萬曆十九年季春朔徐鉉重校

活人書

序

活人書徵說

春沂徐鏞之父集

文獻通考

晁氏曰南陽活人書二十卷宋朝朱肱撰序謂張長沙傷寒論其言雅與非精於經絡者不能曉會頃因投閑設其對問補苴綴緝僅成卷軸

陳氏曰肱以仲景傷寒方論多以類為之問答本號無求子傷寒百問有武夷張蕙作序易此名仲景南陽人而活人書者本華佗語肱吳與人秘為

活人書

雜說

臨之子中書舍人服之弟登第仕至朝奉郎直秘閣

齊東野語

朱承逸居嘗之城東門為本州孔目官樂善好施嘗五鼓趨郡過駱駝橋聞橋下哭聲甚哀使僕視之有男子攜妻及小兒在焉扣所以云貧勢家錢三百千計息以數倍營索無以償將併命於此朱憫然遣僕護其歸且往其家正見債家悍僕羣坐於門朱因以好言論之曰汝主以三百千故將使四



人死於水於汝安乎幸吾見之耳汝亟歸告若  
彼今既無所償逼之何益當為代還本錢可亟以  
元券來債家聞之慚思聽命既如數取付之其人  
感泣願終身為奴婢不聽復以二百千資給之而  
去是歲生孫名服熙寧間中榜第二人仕至中書  
舍人次孫肱亦登第著名節即著南陽活人書者  
服子或即著萍州可淡者遂為吾鄉名族焉天之  
報善昭昭也如此善音摺

活人書括序

活人書

雜說

十三

宋雙鍾李知先曰嘗觀論傷寒自仲景而下凡幾百  
家集其書則卷帙繁拏味其言則旨意微深最至  
當者惟活人書而已又曰豈不以無求子真一世  
之雄朱奉議肱長沙公乃百川之宗長沙太守張公仲景

傷寒解惑論序

宋龍溪湯尹才曰本朝政和之初有朱肱奉議致仕  
將仲景書析為百問該載諸說詣闕投進被  
旨令國子監鏤板頒行天下寥寥千百年間使仲  
景之書大備於我宋神而明之固有所待使君

臣無天枉之期夷夏有延齡之望豈小補哉

傷寒類書活人證治賦

宋仁齋楊士瀛曰傷寒證治賦長沙開其源朱奉議  
導其流前哲後賢發明秘妙吾儒之孔孟美世有  
謂傷寒論其辭艱深亦有以問答繁多增益意度  
議活人書者多見其不知量也活人宗師張朱作  
古是篇刊布不敢名稱使學者稽為驗為決以避  
古人之用心皆知起敬

醫聖元戎

活人書

雜說

十三

元海藏王好古曰金匱玉函要略傷寒論并雜療諸  
方皆張仲景神聖法伊尹體箕子而作也唐宋  
以來如孫思邈葛稚川朱奉議王朝奉輩其餘名  
醫雖多皆不出仲景書

湯液本草序

海藏曰成無已明理方例云自古諸方歷歲浸遠難  
可考評仲景方最為眾方之祖是仲景本伊尹之  
法伊尹本神農之經醫帙之中特為續細參合古  
法不越毫末實大聖之所作也文潞公藥準云惟



仲景為羣方之祖也昔唐宋以來得醫之名者如王叔和葛洪孫思邈范汪胡洽朱奉議王朝奉錢仲陽成無已陳無擇輩其議論方定增減變易千狀萬態無有一毫不出于仲景者金有潔古張元素遇至人傳祖方不傳之妙法嗣是其子雲岐子張壁東垣李杲明之皆祖長沙張仲景湯液惜乎世莫能有知者

伊尹湯液仲景大法題辭

海藏曰夫以醫名世者名人皆知之惟伊尹湯液人

活人書

雜說

十四

莫知之也何哉以其仲景命世之才獨能廣而行之於當時人惟知有仲景而不知有伊尹也但見傷寒論及本草所載雜見諸方凡稱仲景皆是知仲景而又能歸其元書嘗言之者啟玄子文潞公許學士朱奉議潔古東垣十數人而已或能知者止能用藥而忘其言不知者不能用藥而無所言則無怪其後世之不知也由是尋方檢論者多而從源注本者少嗟乎遊寬行屍酒甕飯囊豈知乎此

原病式序

金河間劉完素曰自黃帝內經之後二千五百有餘年有仲景方論一十六卷使後之學者有可依據文亦玄奧以致今之學者尚為難焉故今人所習皆近代方論而已但究其末而不求其本惟近世朱奉議多得其意遂以本仲景之論而兼諸書之說編集作活人書二十卷其門多其方眾其言直其類辨使後學者易為尋檢施行故今之用者多矣然而其間亦有未合聖人之意者往往但相肖而已

活人書

雜說

十五

傷寒發明

大明永樂時柯山張兼善曰朱奉議之學始崇仲景為不能深造其理未免有疑故以已見自成一家之說比之他書尤為近理但中間失枝脫節處歷歷可數由是不容鍼黹遂為之辨悉是非蓋傷寒一百一十三方苟知其妙用之有不能盡者朱肱以為不足復廣其方然亦皆仲景之意也雖小有增廣不同其大體不出乎規矩準繩之外故譬較



其弊以救其失使後知其過而不蹈其非庶幾免乎差謬之患矣

明理續論序

大明正統時節菴陶華曰昔朱肱奉議著傷寒百問書成經進授醫博士其書付監刊行道遇豫章名醫宋道方因就質之宋爲指駁數十條肱罔然自失由是書監不刊吾鄉先輩例以爲活人之書按活人之名所由始仲景傷寒論是也朱公雖知有仲景之書不能臻其闢與未足以克活人之名

活人書

雜說

六

大明萬曆春沂徐鏞曰據劉河間云奉議多得其意使後學者易爲尋檢施行張柯山云奉議始崇仲景然亦皆出仲景之意則知王叔和撰次方法之後歷晉沿唐及宋千餘年間惟奉議一人始躬類聚得仲景之旨也若無活人書豈得有成聊攝之注解譬如四書五經夫子沒而微言絕若無周程張邵發明於前安得有朱子集註於後活人書雖微有失枝脫節處卽如通書易傳正蒙觀物微有不合於經書者儒家豈肯以朱子之辨正而遂廢

周程張邵之書哉若張兼善傷寒發明趙嗣真活人釋疑已將活人書一一辨明矣夫何陶華無知而妄誕輒以已見而不欲後人讀其書欲讀已穿鑿之書於瑣言中始言仲景書殘缺頗多其中不可曉處十有四五續論序終言肱罔然自失由是書監不刊不知何所見而云然此正遊魂行屍酒甕飯囊多見其不知量也活人書因此遂隱至今百五十年醫家不復見其全書以誤天下蒼生者非華而誰余業傳五代學究卅年遇術尋訪觀板

活人書

雜說

十七

四樣湊之止得刻本十一卷餘九卷係四樣抄本其正方四卷有仲景方法離校庶無差謬若雜方及婦人小兒瘡疹五卷間有三同者因附的字於其下至歲甲辰西入秦中三原來星海陽伯甫宅因覩正德十四年寧夏刻本九卷一冊因去了的字若九卷抄本及刻本魚魯亥豕無從對閱則仍其舊云因此不合序言九萬一千三百六十八字也始於辛卯季春完於壬辰孟夏春沂徐鏞謹識

冊四十  
年也



徵說終

南陽活人書釋音

浴沂人曰音釋識字悉從許氏說文及四書五經與

洪武正韻若已上等書未載者却用海篇直音以訓之其身體病證藥名製鍛器用等類名物則係靈素金匱甲乙千金諸書中采緝以釋之

活人書

四雜說

六

釋音終

活人書目錄

大明應天匿迹自隱逸人徐鎔鎔之父重校正

關中來復陽伯甫校批

卷之一

○經絡圖

少陽經圖

厥陰經圖

○問傷寒

問傷寒一

問傷寒頭項痛腰脊強

尺寸

活人書

九

○問傷寒

問傷寒二三百身熱目疼鼻乾不得卧其

脈尺寸俱長

二經皆一而陽明有

○問傷寒

問傷寒三四日身熱而耳聾或口苦舌

乾或往來寒熱而嘔其尺寸俱弦

○問傷寒

問傷寒四五日腹滿咽乾手足自溫或自

利不渴或腹滿時痛尺寸俱沉細

人以四日太陰證病在胃腸則此而愈

○問傷寒

問傷寒五六日尺寸俱沉或口燥舌乾

而渴或口中和而惡寒



● 問傷寒六七日煩滿囊補其脉尺寸俱微  
緩

卷之二

○脉穴圖

氣口脉圖 人迎脉圖 衝陽脉圖

太谿脉圖 風池穴圖 風府穴圖

期門穴圖 關元穴圖

● 問三布之位

● 問診候之法

活人書

目錄

三

● 問脉息之證

● 問七表

● 問八裏

● 問脉按之來緩時一止復來脉來數時一

止復來又脉來動而中止不能自還因

而復動

卷之三

● 問表證 三陰可表證汗後有表證下後有表證

● 問裏證 三陰可下證

● 問表裏兩證俱見

● 問無表裏證

● 問病人有身大熱反欲得衣有身大寒反

不欲近衣者

卷之四

● 問陰證

● 問陽證

● 問手足逆冷臍腹築痛咽喉疼嘔吐下利

身體如被杖或多汗煩渴脉細欲絕

活人書

目錄

三

● 問發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦

文或下利赤黃而脉洪實

● 問病人潮熱獨語如見鬼狀發則不識人

尋衣撮空直視微喘

● 問胷膈不快臍滿閉塞唇青手足冷脉沉

細少情緒或腹痛 萬一飲食不節胃

膈不快寒中陰經何

● 問脉微細欲吐不吐心煩但欲寐五六日

自利而渴



問身微熱煩躁面赤脉沉而微

問手足逆冷而大便秘小便赤或大便黑

色脉沉而滑

問身冷脉細沉疾煩躁而不飲水

問手足逆冷○仲景少陰四逆陽又有四逆散○四逆湯用附子乾薑

而四逆散只用柴胡枳實其義不同

問吐長蟲

問身體重少氣陰腫入裏腹內絞痛熱上

衝胃頭重不欲舉眼中生花婦人則裏

活人書

目錄

三

急腰膝連腹內痛

卷之五

問冬謂之傷寒春謂之溫病夏謂之熱病

問三日已前當汗三日已後當下

問陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰

虛汗之則死下之則愈

問仲景有發汗者有和解之者

問仲景有宜下之者有微和其胃氣者○轉

藥孰

問傷寒一日頭疼口乾煩滿而渴二日腹

滿身熱不欲食譫語三日耳聾囊縮而

厥水漿不入不知人

問傷寒已經發汗吐下仍不解古人謂之壞病

卷之六

問脉浮而緊澹頭疼身體拘急惡寒無汗

寒多熱少面色慘而不舒腰脊疼痛手

足指末微厥不煩躁

問脉浮而緩寸大而尺弱自汗體熱頭疼

活人書

目錄

三

惡風熱多寒少其面光而不慘煩躁手

足不冷○傷寒與傷風何以別之

問有發熱惡寒煩躁手足溫而脉反浮緊

者有寒多熱少不煩躁手足微冷而脉

反浮緩者

問夏月發熱惡寒頭疼身體支節痛重其

脉洪盛者○夏至後行虎湯可

問夏月自汗惡寒身熱而渴其脉微弱者

○中暑何故洒洒然毛聳惡寒



問夏至已前發熱惡寒頭疼身體痛其脉

浮緊

問病人先熱後寒脉尺寸俱盛

問脉尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重

其息必喘四支不收嘿嘿但欲眠

問一歲之中長幼疾狀多相似

問一身盡痛發熱身黃小便不利大便反

快者

問支體痛重不可轉側額上微汗不欲去

活人書

目錄

三

被或身微腫

問兩脛逆冷胃腹滿多汗頭目痛苦長言

問發熱惡寒頸項強急腰身反張如中風

狀或癱瘓口噤剛柔二症與陰陽二症是如何

問初春病人肌肉發斑癰疹如錦紋或咳

嗽心悶但嘔清汁者

卷之七

問憎寒發熱惡風自汗寸口脉浮胸膈痞

滿氣上衝咽喉不得息而頭不疼項不

活人書 目錄

強

問頭疼脉數發熱惡寒而身不痛左手脉

平和

問不惡寒身不痛頭不疼脉不緊數但煩

熱者

問傷寒頭疼身熱支節痛大便秘或嘔逆

而脚屈弱者

卷之八

問發熱陰證有發熱

活人書

目錄

三

問熱多寒少

問潮熱

問往來寒熱

問傷寒瘧狀

問汗之而寒熱者

問汗之而仍發熱者

問下之而熱不退者傷寒暑後發熱○勞復食復

卷之九

問惡寒有汗出惡寒者○有汗出多而



者○前  
惡寒

問惡風

問傷寒不得汗

問自汗

問頭汗出

問頭疼

問身體痛 ○發汗後身疼脈沉而遲當用何藥○身痺

問筋惕肉跳頭眩身搖

問喘

活人書 六目錄

三六

問渴

問鼻衄 ○陰證有衄血者

問腹滿身重難以轉側口中不仁面垢譫語遺尿

卷之十

問心下緊滿按之石硬而痛 ○大陷胃湯與大陷胃圓

如何○聖餅子灸  
膈中如何○藏結

問心下滿而不痛

問嘔乾嘔附

問吐

問嘔吐而利

問欬嗽

問咽喉痛

問口燥咽乾

問病人但漱水不欲嚥

問不得眠 ○傷寒差後不得眠

問多眠

問身涼汗出兩脇疼痛或乾嘔

活人書 六目錄

三七

卷之十一

問咳逆

問發黃 ○白虎證亦身發熱煩渴引飲小便不利何以不發黃○太陽病一

身盡痛發熱身如煎黃○病人脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之

氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃小便難有潮熱時時咳者

問發狂

問發斑

問讖語 上女監切

問吐血

一書  
丹黃參日  
4  
三三



問腹痛腹脹滿者

問煩躁

問下利者

問小便不利小便難

問小便自利小便數

問有數日不大便有大便難有大便秘有燥屎有大便溏

問病人默默欲眠目不能開起居不安其聲啞或咽乾嚙所訝切聲破也

問病人飲食復不能食常默默欲臥復不能臥欲出行復不能行飲食或有美時或有不快飯時如強健人而臥不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦小便赤藥入即吐利

活人書

六目錄

問病人飲食復不能食常默默欲臥復不能臥欲出行復不能行飲食或有美時或有不快飯時如強健人而臥不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦小便赤藥入即吐利

卷之十二 以計百二十三方係正方各方具證治

桂枝湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝加桂湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二越婢一湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

桂枝加芍藥湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝人參湯

桂枝加葛根湯

麻黃湯

麻黃附子甘草湯

麻黃連翹赤小豆湯

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

卷之十三

大柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡加芒硝湯

小青龙湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加黃連湯

桂枝甘草湯

桂枝加大黃湯

桂枝附子湯

桂枝加厚朴杏子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃細辛附子湯

麻黃升麻湯

葛根加半夏湯

小柴胡湯

柴胡桂枝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

大青龙湯

小建中湯

膠飴法



大陷胃湯

大陷胃圓

小陷胃湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃核承氣湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

卷之十四

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

梔子蘗皮湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓甘草湯

甘草湯

甘草乾薑湯

炙甘草湯

芍藥甘草湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

白虎湯

白虎加人參湯

五苓散

猪苓湯

附子湯

木附湯

甘草附子湯

芍藥甘草附子湯

乾薑附子湯

理中圓

四逆湯

四逆散

四逆加人參湯

茯苓四逆湯

當歸四逆湯

當歸四逆加茱萸生薑湯

卷之十五

通脈四逆湯

通脈四逆加猪膽湯

黃連湯

黃連阿膠湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

文蛤散

三物白散

十棗湯

抵當圓

抵當湯

麻人圓

茵陳蒿湯

牡礪澤瀉散

竹葉石膏湯

枳實梔子湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

桃花湯

吳茱萸湯

猪膚湯

桔梗湯

半夏散及湯

苦酒湯



①直武湯

②烏梅圓

③乾薑黃芩黃連人參湯

④白頭翁湯

⑤赤石脂禹餘糧湯

⑥旋覆代赭湯

⑦瓜蒂散

⑧蜜煎導法 猪膽汁方

⑨燒棍散

卷之十六

以下計百二十六方係雜方各方具錄

⑩升麻湯

⑪防風白朮牡蠣湯

⑫李根湯

⑬大橘皮湯

⑭橘皮竹茹湯 生薑橘皮湯

⑮陰旦湯

活人書

目錄

三

⑯陰毒甘草湯

⑰白朮散

⑱附子散

⑲正陽散

⑳肉桂散

㉑回陽丹

㉒返陰丹

㉓天雄散 正元散 退陰散

㉔葱熨法

㉕葶藶苦酒湯

㉖陽毒升麻湯

㉗大黃散

㉘梔子人湯

㉙黑奴圓

㉚五積散

㉛靈犀散

㉜火焰散

㉝丹砂圓

卷之十七

①五味子湯

②殺鼠糞湯

③竹皮湯

④知母麻黃湯

⑤繁甲散

⑥人參順氣散

⑦蒼朮散

⑧麻黃葛根湯

⑨敗毒散

⑩獨活散

⑪桂枝石膏湯

⑫梔子升麻湯

⑬橘皮湯

⑭解肌湯

⑮小柴胡加桂湯

⑯白虎加桂湯

活人書

目錄

三

⑰柴胡桂姜湯

⑱瘧母煎

⑲祛邪圓

⑳猪膽雞子湯

㉑萎蕤湯

㉒知母葛根湯

㉓括樓根湯

㉔漢防已湯

㉕老君神明散

㉖務成子螢火圓 續添聖散子附

㉗調中湯

㉘射干湯

㉙半夏桂枝甘草湯

㉚麻黃杏仁薏苡甘草湯

㉛防已黃耆湯

㉜杏仁湯

㉝小續命湯

㉞附朮散



桂心白朮湯	附子防風散
八物白朮湯	柴胡半夏湯
金沸草散	
卷之十八	
大半夏湯	越婢湯
脾約圓	黑神圓
神功圓	五柔圓
大三腕散	檳榔散
意以人酒法	木瓜散
活人書	
目錄	
葱豉湯	連翹葱白湯
葛根葱白湯	雄鼠屎湯
黃芩芍藥湯	酒蒸黃連圓
茅花湯	枳實理中圓
小半夏加茯苓湯	桔梗枳殼湯
赤茯苓湯	香薷散
犀角地黄湯	黃連解毒湯
酸棗人湯	梔子烏梅湯
橘皮乾薑湯	羌活附子湯

半夏生薑湯	黑膏方
葛根橘皮湯	玄參升麻湯
大青四物湯	知母桂心湯
三黃圓	桔梗半夏湯
三黃熟艾湯	薤白湯
赤石脂圓	地榆散
黃連阿膠湯	桃人湯
黃連犀角湯	雄黃銳散
百合知母湯	消石代赭湯
活人書	
目錄	
雞子湯	百合洗方
百合地黃湯	括樓牡蠣散
滑石散	治中湯
陽旦湯	白虎加蒼朮湯
七味葱白湯	增損四物湯
化班湯	官局桔梗湯
麻黃加朮湯	竹皮大圓
古今錄驗橘皮湯	黃連橘皮湯
麥門冬湯	



卷之十九 以計單方係平方各方具證治

婦人并妊婦傷寒藥方

小柴胡湯 刺期門穴

瀉心三黃湯 桂枝紅花湯

黃芩芍藥湯 柴胡當歸湯

乾地黃湯 燒棍散 乾薑湯

青竹茹湯 當歸白朮湯

加減四物湯 阿膠散

白朮散 葱白湯

活人書 目錄 三六

蘇木芍藥湯 黃龍湯

柴胡石膏湯 枳實散

旋復花湯 麥門冬湯

梔子大青湯 蘆根湯

全膈法 葱白豉湯

葱白一物湯 葛根一物湯

梔子五物湯 前胡七物湯

升麻六物湯 陽旦湯

治瘧法 神功圓

桂心牡蠣湯 蜀漆湯

增損柴胡湯 竹葉防風湯

三物黃芩湯 小柴胡湯

乾薑柴胡湯 海蛤散

卷之二十 以計三方係平方各方具證治

小兒傷寒

洗心散 惺惺散

四順散 麻黃黃芩湯

升麻黃芩湯 甘露飲子

活人書 目錄 三七

雙圓 石膏麻桂湯

連翹飲 麥門冬湯

十物升麻湯 六物黃芩湯

五物人參飲 八物麥門冬湯

棗葉飲

小兒瘡疹

升麻湯 犀角地黃湯

麻黃黃芩湯 升麻黃芩湯

化毒湯 紫草木通湯



鼠粘子湯

水解散

活血湯

豬尾膏

無比散

龍腦骨子

如聖湯

决明散

撥雲散

蜜蒙花散

通聖散

蛤粉散

活人書目錄終

活人書

目錄

子入

活人書卷第一

大明應天浴沂人徐鉉鉉之父重校正

此一卷論經絡治傷寒先須識經絡不識經絡屬

途冥行不知邪氣之所在往往病在太陽反攻少

陰證是厥陰乃和少陽寒邪未除真氣受斃又况

傷寒看外證為多未診先問最為有准孫真人云

問而知之別病淺深名為巧醫病家云發熱惡寒

頭項痛腰痛強則知病在太陽經也身熱目疼鼻

乾不得卧則知病在陽明經也胃脇痛耳聾口苦

舌乾往來寒熱而嘔則知病在少陽經也腹滿咽

乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛則知病在

太陰經也引飲惡寒或中燥舌乾則知病在少陰

經也煩滿囊縮則知病在厥陰經也然後切脉以

辯其在表在裏若虛若實以汗下之古人所以云

問而知之為中工切而知之為下工若經隧支絡

懵然不分按寸握尺妄意疾證豈知坐授明堂藏

室金蘭者耶

○經絡圖

證云身 脈者氣之 居於表上 皆為脈孔 為胸中膈 與胃相通 下通於下 為脈之根 所以脈者 喉之前至 一尺六寸 系也○咽 經伊景並 經

醫書



九氣...  
九氣...

○太陽經

膀胱重九兩二銖縱廣九寸盛溺九升九合

活人書

一卷



活人書 卷一

足太陽經者自  
目大角為內眦  
髮際前為額腦  
上為額頂也  
循髮也又依也  
治也鬢音橫肩  
後之下一為肩髃  
絡逆也抵至也  
解音比膝也解  
音膝反也然腰  
履音兩旁為机  
机後為解脛音  
四解脛上膝後  
曲筋為臑臑音  
逆解脛也俗所  
謂脚肚也臑戶  
足切足後後兩  
足解骨為踝骨  
指也中惡強  
擊去至金手声

足太陽膀胱之經

腎與膀胱為合故足少陰與足太陽為表裏

從目內眦上頭連於風府分為四道下項并正別脉

上下六道以行於背與身為經太陽之經為諸陽主

氣或中寒邪必發熱而惡寒緣頭項腰脊是太陽經

所過處今頭項痛身體疼腰脊強其脉尺寸俱浮者

故知太陽經受病也

電樞經云足太陽之脉起於目內眦上額交巔  
上其支別者從巔至耳上角其直行者從巔入  
絡腦還出別下項循肩膊內夾脊抵腰中入循  
脊絡腎屬膀胱其支別者從腰中下會於後陰

活人書

一卷

三

○陽明經

胃重二斤十四兩盛穀二斗水一斗五升為水穀

之海

下貫腎入膈中其支別者從膈內左右別下貫  
膈大脊內過髀樞循髀外後廉下合膈中下貫  
膈內出外踝之後循  
京骨至小指外側端





活人書 卷一 四  
足陽明胃之經

脾與胃為合故足太陰與足陽明為表裏  
從鼻起夾於鼻終於目下咽分為四道并正別脈六  
道上下行腹綱維於身蓋諸陽在表陽明主肌肉絡  
於鼻故病人身熱目疼鼻乾不得卧其脈尺寸俱長  
者知陽明經受病也

靈樞經云足陽明之脈起於鼻交頰中旁約太  
陽之脈下循頰外入上齒中還出挾口環唇下  
交承漿却循頰後下廉出大迎循頰車上耳前  
過客主人循髮際至額顛其支者從大迎前下  
人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從  
缺盆下乳內廉下俠臍入氣衝中其支者起胃

此音通鼻裏也  
頰中為缺盆  
音義應音扎按  
膝解中也動音  
行脈骨端也廉  
隔也過地附音  
六寸也

膽在肝之短葉間重三兩三銖盛精汁三合  
○少陽經  
山下循腹裏下至氣衝中而合以下解開抵伏  
兔下膝膕中下循脛外廉下足跗入中指內間  
其支者下廉三寸而別以下入中指外間其支  
者別附上下入大指間出其端



活人書 卷一 五



好居為經  
皆丹陽也

足少陽經也  
為經脈之  
也筋外為骨  
外以以上為  
骨小指於骨  
四指也其六  
本節後為  
大指也其  
三毛

經脈

足少陽膽之經

肝與膽為合故足厥陰與足少陽為表裏

起目外眦終於耳分為四道下缺益循於脇并正別

脈六道上下主經營百節流氣三部故病人胃脇痛

而耳聾黃帝鍼經曰邪在肝則兩脇痛又曰膽脹者

脇下痛口中苦善太息或口苦咽乾或往來寒熱而

嘔其脈尺寸俱弦者知少陽經受病也

靈樞經云足少陽之脈起於目銳眥上抵頭

角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出

少陽之後入缺盆其支者從耳下入耳中出走

耳前至目銳眥後其支者別銳眥下大迎合手少

陽抵于頰下加頰車下頰合於頰以下胃中貫

膈滯肝肱循膈脇氣出腋循腋毛際入髀厭中

其直者從缺盆下腋循胃中過季脇下合淵腋

○太陰經

脾重二斤三兩魚鳥蹄內包胃脘象土形也經絡

之氣交歸於中以營運真靈之氣意之合也

活人書 卷一  
靈樞經云足太陰之脈起於大指之端循指內  
側白肉際過後後上內踝前廉上腕示其切  
內循脛骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉  
入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支  
者復從胃別上膈注心中

足太陰脾之經

為三陰之首其脈布於脾胃絡於嗌喉故病人腹滿

而嗌乾尺寸俱沉細者知太陰經受病也

靈樞經云足太陰之脈起於大指之端循指內

側白肉際過後後上內踝前廉上腕示其切

內循脛骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉

○少陰經

腎藏有二形如豇豆相並而曲附於脊筋外有脂

裹裹白表黑主藏精





何也跟音根  
外頭也即足跟  
同乳則為骨

活人書 一卷



足少陰腎之經

其脉起於小指之下斜趣足心別行者入跟中上至  
 股內後廉貫腎絡膀胱直行者從腎上貫肝膈入肺  
 中繫舌本傷寒熱氣入於藏流於少陰之經少陰主  
 腎腎惡燥故渴而引飲又經發汗吐下已後藏府空  
 虛津液枯竭腎有餘熱亦渴故病人口燥舌乾而渴  
 其脉尺寸俱沈者知少陰受病也

靈樞經云足少陰之脉起於小指之下斜趣足  
 心出于然骨之下循內踝之後別入跟中以上  
 踰時竟切內出腋內廉上股內後廉貫脊屬腎  
 絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨

避一本作通別  
作通非

活人書 一卷



肝重四斤四兩有七布葉一葉小如木甲折之象  
 各有支絡脉遊中以宣發陽和之氣魂之宮也

○厥陰經

然舌本具支者從  
 肺出絡心注腎中



足厥陰肝之經 符三毛三毛後 橫文為聚五葉 經也肝下為小 厥筋首動也所 釋名助動也所 以按助至厥目 內深處為系 筋首動也所 以下曲處為筋 筋首動也所 切

經仲景並作 陽病發熱作 之類桂枝湯下 之類桂枝湯下 無之類桂枝湯 却者桂枝湯與 桂枝湯下之類 桂枝湯下之類 桂枝湯下之類

**足厥陰肝之經**

厥者盡也靈樞曰亥為左足之厥陰戌為右足之厥

陰兩陰俱盡故曰厥陰夫陰盡為晦陰出為朔厥陰

者以陰盡為義也其脉循陰器絡於肝肝者筋之合

也筋者聚於陰器而脉絡於舌本也故脉弗營則筋

急筋急則引舌與卵故唇青舌卷而卵縮凡病人煩

滿而囊縮其脉尺寸俱微緩者知厥陰經受病也

靈樞經云足厥陰之脉起於大指聚毛之際上

循足附上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰

之後上膈內廉循股陰入毛中環陰器抵小腹

扶胃屬肝絡膽上貫膈布脅肋循喉嚨之後

活人書

上入頰頰連目系上出頰與腎脉會於巖其支

者從目下趨裏環唇內其支者復從肝別貫膈

上注 肺中

**問傷寒一二月發熱惡寒頭項痛腰脊強**

**尺寸脉俱浮**

答曰此足太陽膀胱經受病也仲景云太陽病欲太

陽病頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯正

散而藥宜用桂枝者 太陽病頭痛發熱無汗惡

寒宜麻黃湯 之類應解散而藥宜用麻黃

二者均為解散正分陰陽不可不慎也仲景所謂無

今本桂枝湯 汗不得服桂枝有汗不得服麻黃常須識此勿令誤

也今人纔見身熱頭痛便發汗不知汗空閉而用麻

黃汗空疎而用桂枝傷寒傷風其治不同古人有汗

者當解肌無汗者可發汗纔音才空孔同

**問傷寒二三日身熱目疼鼻乾不得臥尺**

**寸脉俱長**

答曰此足陽明胃經受病也仲景云陽明病欲

解時從申至戌上傷寒

二日陽明經受病可發其汗非正陽明也

正陽明者

不惡寒反惡

熱故可下也

今言二三日傳陽明經身熱目疼鼻乾

活人書

不得臥其脉俱長者足太陽陽明可表而已若無汗

尚惡寒宜升麻湯

有汗微惡寒者表未解也宜桂

枝湯

又問十二經皆一而陽明有三何也答曰有太陽陽

明有少陽陽明有正陽陽明也太陽陽明者本太陽

病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉

屬陽明也少陽陽明者本傳到少陽因發汗利小便

明也下利本注 云太陽陽明 是也大便 便利其脈 動則本實 下利本注

至寒下胸 製本無可



小柴胡湯  
乃字誤  
目誤  
作痛

陽合病屬表可發其汗蓋太陽與陽明合病脉必浮大而長外證必頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾也脉浮大者太陽也長者陽明也頭疼腰痛太陽也肌熱目疼鼻乾者陽明也尚惡寒者可升麻湯汗之若不惡寒反惡熱大便不秘者可白虎湯解利之不惡寒反惡熱大便秘或讞語者屬胃家實也可調胃承氣湯下之○又問三陽有合病有併病何也答曰脉浮大而長頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾者合病也太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉活人書 一卷 一上

屬陽明續自微汗出不惡寒者併病也三陽皆有合病唯三陰無合病不可不知也太陽證罷但發潮熱手足熱熱汗出大便難而讞語者下之愈宜大承氣湯正四三若太陽證不罷不可下宜用桂枝麻黃各半湯正四二小發汗設面赤色者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大微則陽氣怫鬱不得越散當汗不汗煩躁不知痛處其人短氣但坐蓋以汗出不徹故也更以麻黃湯發其汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知之



問傷寒三四日胃脘痛而耳聾或口苦舌乾或往來寒熱而嘔其尺寸脉俱弦仲景云少陽病欲解時從寅至辰上太陽病不解轉入少陽脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未可吐下診其脉弦緊者小柴胡湯主之正四九蓋脉弦細頭疼發熱屬少陽少陽受病口苦咽乾目眩宜小柴胡湯以解表不可發汗仲景云少陽證唯小柴胡為解表藥耳發汗則讞語讞語屬胃和則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯正四三此屬少陽陽明也

活人書 一卷 十三

問傷寒四五日腹滿咽乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛尺寸俱沉細

答曰此足太陰脾經受病也仲景云太陰病欲傷寒解時從亥至丑上傷寒手足必微冷若手足自溫者繫太陰也自利不渴屬太陰也腹滿時痛屬太陰也自利不渴者藏寒也當溫之宜四逆湯理中湯也腹滿脉浮者可桂枝正四二微發汗腹痛者桂枝加芍藥湯正四二痛甚者桂枝加大黃湯正四三又問古人以四日太陰證病在胸膈可吐而愈何也答曰不然有太陰證脉大

此本一作  
此本一作  
此本一作



少陰合言在  
胃滿多痰者可吐之脉大而無吐證者可汗而已大  
抵在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者泄  
之爪蒂  
問傷寒五六日尺寸脉俱沉或口燥舌乾  
而渴或口中和而惡寒

胃滿多痰者可吐之脉大而無吐證者可汗而已大  
抵在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者泄  
之爪蒂  
問傷寒五六日尺寸脉俱沉或口燥舌乾  
而渴或口中和而惡寒

谷曰此足少陰腎經受病也仲景云少陰病欲  
病口燥舌乾者急下之宜大承氣湯四十一若不渴不

口燥舌乾而脉沉者急溫之宜四逆湯四十四太陰厥

陰皆不惡寒只有少陰有惡寒之證不可不知也少

陰病得之一二日口中和其背惡寒者宜着灸并附

子湯也大抵傷寒陽明證宜下少陰證宜溫然仲景

於少陰證口燥咽乾即云急下之蓋少陰主腎腎苦

本傷寒熱氣入於藏流於少陰之經腎汁乾咽路焦

故口燥咽乾而渴須宜急下之非若陽明證宜下而

可緩也雖然陽明亦有一證發熱汗出多急下之陽

明屬胃汁多則胃汁乾亦須急下也

問傷寒六七日煩滿囊縮其脉尺寸俱微

緩

緩

緩

緩

緩

緩

緩

緩

緩

緩

谷曰此足厥陰肝經受病也仲景云厥陰病欲  
病其脉微浮為欲愈不浮為未愈宜小建中湯五十七  
脉浮緩者必囊不縮外證必發熱惡寒似瘧為欲愈  
宜桂枝麻黃各半湯五十二若尺寸脉俱沉短者必是  
囊縮毒氣入藏宜承氣湯下之五十九大抵傷寒病藏

府傳變陽經先受病故次第傳入陰經以陽主生故  
太陽水傳足陽明土土傳足少陽木為微邪也陰主  
殺故水傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木  
至六七日當傳厥陰肝木必移氣剋於脾土脾再受

活人書

賊邪則五藏六府皆困而危殆榮衛不通耳聾囊縮

不知人而死矣速用承氣湯下之可保五死一生古

人云脾熱病則五藏危又云土敗木賊則死若第六

七日傳厥陰脉得微緩微浮為脾胃脉也故知脾氣

全不再受剋邪無所容否極泰來榮衛將復水升火

降則寒熱作而大汗解矣

活人書卷第一終

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書



活人書卷第二

此本當作決

此本當作風  
此本當作傷  
此本當作

此一卷論切脉治傷寒先須識脉者不識脉則表裏不分虛實不辨仲景猶謂當時之士按寸不及尺握手不及足必欲診衝陽按太谿而後慊况於寸關尺耶大抵問而知之以觀其外切而知之以察其內證之與脉不可偏廢且如傷寒脉緊傷風脉緩熱病脉盛中暑脉虛人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食率以脉別之非特此也病人心中下緊滿按之石硬而痛者結胸也結胃證於法當下雖三尺之童皆知用大黃甘遂陷胃湯下之然仲景云結胃脉浮者不可下下之則死以此推之若只憑外證便用陷胸湯則誤矣况傷寒尤要辨表裏脉浮為在表脉沉為在裏陽動則有汗陰動則發熱得汗而脉靜者生汗已而脉躁者死陰病陽脉則不成陽病陰脉則不永生死吉凶如合龜鏡其微至於禍福休咎脩短貴賤無不可考然古人乃以切脉為下者特以脉理精微其體難辨而傷寒得外證為多故也外證易見切脉難明弦緊之混

此本當作決  
此本當作風  
此本當作傷  
此本當作

氣口在寸口  
之二十氣口之  
所候脉動者  
亦名寸口又名  
脈中

清遲緩之參差沉與伏相類濡與弱相似非得之於心超然領解孰能校疑似於錙銖者哉苟知浮乳滑實弦緊洪屬於表遲緩微清沉伏濡弱屬於裏表裏內外陰陽消息以經處之亦過半矣

○脉穴圖

○氣口脉

帝曰氣口何以獨為五藏主岐伯曰胃者水穀之海六府之大源也五味入口藏於胃以養五藏氣氣口亦太陰也是以五藏六府之氣味皆出於胃

活人書 二卷 二

變見於氣口



此經之所合  
脈之所聚也  
男子以氣精

本經下有凡  
三十三穴

活人書

二卷

三

人迎脈

人迎在頸法象天地要會始終之門戶

人迎屬太陰肺之經而黃帝乃云人迎亦胃脈何也左手關前一分寸者人迎之位挾結喉兩傍者人迎之穴人迎之位屬手太陰肺之經人迎之穴屬足陽明胃之經故素問云人迎亦胃脈也

問傷寒何以須診太谿脈耶

答曰太谿穴是足少陰腎之經男子以左腎為命門女子以右腎為命門主生死之要病人有命門脈者



活人書 卷二

平心齋

活無者死仲景云少陰病手足逆冷發熱者不死脈不至者灸太谿七壯故傷寒必診太谿以察其腎之盛衰也太谿二穴在足內踝後跟骨上動脈陷中

問傷寒何以須診衝陽脈耶

答曰衝陽穴是足陽明胃之經人受氣於穀穀入於胃乃傳與五藏六府藏府皆受氣於胃其清者為榮濁者為衛榮行脈中衛行脈外陰陽相貫如環無端胃為水穀之海主稟四時皆以胃氣為本是謂四時之變病死生之要會故傷寒必診衝陽以察其胃之有無也衝陽二穴一名會源在足跗上五寸骨間動脈上去陷谷三寸

活人書

二卷

四

三八一



太陽脈

太陽



衝陽脈

衝陽



活人書

二卷

五

仲景云太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池  
 風府却與桂枝湯愈謂服桂枝湯後其證尚自汗發  
 熱惡寒脈尚寸浮尺弱而反煩為邪痺在陽維經故  
 可先鍼風池風府此二穴陽維之會非太陽經也太  
 陽經穴在夾項後髮際大筋外廉陷中名曰天柱不  
 鍼此者桂枝已主太陽病故也風池二穴是足少陽  
 陽維之會在項後髮際陷中是穴甲乙經云風池在  
 顛額後髮際陷中者是穴鍼入一寸一分○風府一  
 穴是督脈陽維之會在項後入髮際一寸大筋宛中

商至注刺四  
 分甲乙刺三分  
 無一寸半主  
 深一寸半

其起  
 言休立下  
 十字

不可灸鍼入四分留三呼

活人書

二卷

六





期門穴

期門二穴在乳直下筋骨近腹處是也凡婦人病法當鍼期門不用行子午法恐纏藏膜引氣上但下鍼令病人吸五吸停鍼良久徐徐出鍼此是平寫法也凡鍼期門必寫勿補可肥人三寸瘦人寸半深



活人書 二卷

關元穴

臍下一寸五分名氣海二寸名丹田三寸名關元關元穴是小腸募足少陰任脉之會鍼入八分留三呼寫五吸灸亦良然不及鍼氣海穴或作臍下一寸按鍼灸經云臍下一寸曰陰交穴陰交下五分曰氣海



問三部之位

答曰左右手去魚一寸名曰寸口去澤一尺名曰尺部兩境之間名爲關位關位六分陽部出三分陰部入三分關前爲陽關後爲陰爲陰陽之關津寸脉下不至關爲陽絕尺脉上不至關爲陰絕陽得寸內九分取陽數陰得尺內一寸取陰耦之數是名寸關尺也寸上一分爲魚際關下一分爲神門左關爲人迎右關爲氣口三陽從地長故男子尺脉常沉三陰從天生故女子尺脉常浮男子陽多而陰少其脉在

活人書 二卷

關上故寸盛而尺弱女子陰盛而陽微其脉在關下故寸沉而尺盛所以男子不可以久寫女子不可以久吐男得女脉爲不足女得男脉爲太過所謂反也今人以男子尺脉常弱女子尺脉常盛謂之反非也男子陽有餘脉在上尺脉必弱女子陰有餘脉在下寸脉必微乃是正也非反也又以男子以右尺爲命門女子以左尺爲命門謂之反亦非也男子得陰以生先生右腎女子得陽以長先生左腎乃是正也非反也所謂反者只是男子尺脉常弱今反盛女子尺脉常盛今反弱耳聖人以察陰陽以决生死雖經絡流注如環無端豈能逃於三部者耶

問診候之法



真脈也  
以下為有

真

真

真

真

真

答曰凡初下指先以中指揣按得關位乃齊下前後

二指為二部脈前指寸口也後指尺部也若人臂長

乃疎下指若臂短乃密下指先診寸口男先左手女先右手浮

按消息之欠中按消息之次重按消息之次上竟消

息之次下竟消息之次推指外消息之次推指內消

息之豎家責肥人脈浮為肌肉厚實重取乃得若舉

附而易見若按之始凡診脈以氣息平定方下指以

應則其沉也亦甚矣一呼一吸為一息其一息之間脈息四至或五至不

大不小與所部分四時相應者為平和脈也過則為

活人書 二卷 九

至不及則為損損至之脈難經言之詳矣所謂心位洪

肺位浮腎位沉肝位弦脾胃緩也四時謂春脈弦夏

當見洪得冬脈沉微帶沉下是四時相應餘皆做此

問脈息之證

答曰脈之字从肉从爪又作廬蓋脈以肉為陽廬以

血為陰華陀云脈者氣血之先也氣血盛則脈盛氣

血衰則脈衰氣血熱則脈數氣血寒則脈遲氣血微

則脈弱氣血平則脈緩又長入脈長短入脈短性急

則脈急性緩則脈緩反此者逆按內經云形盛脈細

別本作發  
吐  
兒音曉滑言

氣少不足以息者危形瘦脈大胃中氣多者死形氣

相得者生參伍不調者病難經云數者府也遲者藏

也數則為熱遲則為寒諸陽為熱諸陰為寒王叔和

云脈沉為在裏脈浮為在表遲則在藏數則在府滑

為實為下數為虛為熱張仲景云脈大浮數動滑此

名陽也脈沉滑弱弦微此名陰也陰病見陽脈者生

陽病見陰脈者死大抵陽脈常浮而速陰脈常沉而

遲七表屬府病在於陽春夏見之易治八裏屬藏病

在於陰秋冬見之猶輕假令數在左寸浮之得者熱

活人書 二卷 十

入小腸沉之得者熱入於心餘皆做此脈理精微非

言可盡論其梗槩不出於此矣王叔和云在心易了

指下難明亦在乎人熟之而已矣

問七表

答曰七表陽也陽數奇浮按之不足舉之有餘寸口

尺中浮小便難跌陽浮即為虛芤浮大而軟按之中

央空兩邊實芤主失血寸口芤主吐血微芤者滑往

來前却流利替替然與數相似陽盛關上滑為嘔逆

尺中滑小便赤婦人經脈不利然而尺實脈大而長

脈滑者亦本形也跌陽脈滑者胃氣實

奇音焉

便音便  
跌音天九音

芤音  
數音

子書卷之六



分去者皆實  
下同  
數言別

數言別  
同上

數言別  
同上  
數言別  
同上

按之隱指幅幅然浮沉皆得寸口實主上焦熱關上

小腹痛并 弦舉之無有按之如弓弦狀又曰浮緊乃

為弦狀如弓弦按之不移陽弦則頭痛陰弦則腹痛

緊盛傷於寒人迎者少陽之分少陽脈主弦故也寒

邪中人其脈必弦弦則多兼洪數為其先有邪熱也

洪數甚者正為陽證若沉 緊按之實數似切繩狀

為寒寸口緊則為關緊心中滿痛入緊臍下 洪極大

在指下舉按滿指寸口乾尺中洪主大小便閉有血三部

俱熱

問八裏

活人書

卷二

十一

答曰八裏陰也陰數耦微若有若無極細而軟微則

寸口微為陽不足陽微 沉舉之不足按之有餘沉為

則惡寒陰微則下利 沉舉之不足按之有餘沉為

尺寸俱沉者少陰受病也然沉而遲者乃 緩去來亦

陰證也宜溫之沉而數者有熱也宜下之 緩去來亦

遲小駛於遲 緩則為虛太陽病其脈緩者 瀉細而遲

往來難時一止 瀉則少血寸口瀉少氣上焦冷關上

三部俱瀉腹中氣結王水曰瀉有餘則血少故脈 遲

瀉也又曰瀉者陽氣有餘陽氣有餘為身熱無汗 遲

呼吸三至去來極遲 遲則為寒寸口遲則上焦冷關

中進小便 伏極重按之指著骨乃得 伏主物聚寸口

多并白濁 伏極重按之指著骨乃得 伏主物聚寸口

從書後也

從脈弱見十

二卷中桂枝去

芍藥桂枝去

芍藥桂枝去

芍藥桂枝去

芍藥桂枝去

芍藥桂枝去

芍藥桂枝去

無不定當以 濡按之似無舉之全無力 形與緩瀉

為冷證 弱極軟而沉細按之欲絕指下 弱為虛寸口

自出關弱無胃氣胃中有熱脈弱為虛熱病 弱陽氣虛汗

作不可大攻熱去寒起尺中弱氣少發熱

問脈按之來緩時一止復來脈來數時一

止復來又脈來動而中止不能自還因而

復動

答曰有結脈有促脈有代脈結者陰也陰盛則結脈

來緩時一止復來曰結主胃滿煩躁促者陽也陽盛

則促脈來數時一止復來曰促主積聚氣痞憂思所

成 太陽病下之後脈促胃滿者桂枝去芍藥湯主之

也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之 正二十八 大

抵結促之脈雖時一止為病脈非死脈也惟代脈者

真死矣往來緩動而中止不能自還因而復動名曰

代也代者死也仲景傷寒脈結代心動悸炙甘草湯

主之 正二十六

活人書卷第二終



活人書卷第三

此一卷論表裏治傷寒須辨表裏表裏不分汗下  
 差誤古人所以云桂枝下咽陽盛即斃承氣入胃  
 陰盛以亡傷寒有表證有裏證有半在表半在裏  
 有表裏兩證俱見有無表裏證在表宜汗在裏宜  
 下半在裏半在表宜和解表裏俱見隨證參泄無  
 表裏證用大柴胡湯下之【正方三】又四逆湯【正方四】證  
 有先溫裏乃發表桂枝湯【正方一】證有先解表乃攻  
 裏仲景云下利清穀身體疼痛急當救裏身體疼  
 活人書 卷之三

痛清便自調急當救表如響應桴間不容櫛非特  
 此也均是發熱身熱不渴為表有熱小柴胡加桂  
 主之【正二十九】厥而脈滑為裏有熱白虎加人參主之  
【正三十】黃帝所謂發表不遠  
【正三十一】熱攻裏不遠寒也 均是水氣乾嘔微利發  
 熱而效為表有水小青龍加荳蔻花主之【正三十六】身體  
 涼表證罷效而脅下痛為裏有水十棗湯主之【正三十七】  
 均是惡寒發熱而惡寒者發於陽也麻黃桂枝小  
 柴胡主之無熱而惡寒者發於陰也附子四逆湯  
 主之【正三十八】均是身體痛脈浮發熱頭疼身體痛者

甚別本作

無陽證仲  
景作無證  
是

若陽別本  
作表陽

按春冬不  
可汗夏月  
不可用麻  
黃桂枝然  
則桂枝二  
湯何時可  
用耶又解  
肌與發汗  
不同今云  
不問風寒  
何其通背  
也且類數  
既與桂枝  
麻黃各半  
湯安得無  
汗乎若詩  
之○別本  
無汗至

為表未解麻黃湯主之【正三十一】脈沉自利身體痛者  
 為裏不和四逆湯主之【正三十四】以此觀之仲景之於  
 表裏甚詳矣學者宜深究之雖然傷寒六七日日  
 中不了了無表裏證脈雖浮亦有下之者少陰病  
 二三日無陽證亦有發汗者非表裏之所能拘又  
 不可不知也

問表證

答曰發熱惡寒身體痛而脈浮者表證也【正三十二】浮者陽也  
 不足舉之有餘素問云寸口脈浮而盛曰病在外寸  
 口脈沉而微曰病在中仲景云脈浮者病在表可發

汗又曰表有病者脈當浮又曰結胸證  
 脈浮者不可下則知脈浮者表證也 表證者惡寒  
 是也惡寒者表之虛此屬太陽宜汗之然傷寒發表  
 須當隨病輕重而汗之故仲景有發汗者有和解之  
 者兼四時發汗亦自不同春不可大發汗以陽氣尚  
 弱不可亟奪使陰氣勝于時天寒初解榮衛膜理緩  
 可用小柴胡湯【正三十九】之類冬不可汗者以陽氣伏藏  
 不可妄擾不問傷寒中風並數與桂枝麻黃各半湯  
【正三十三】或得少汗而解或無汗自解【正三十四】病勢甚者 夏月天  
 氣大熱玄府開脈洪大宜正發汗但不可用麻黃桂

活人書 卷之三



有過恐 生陰也 汗不可發 氣始收陰 氣始收陽 則陰陽二 十六字○ 中風不無 並數至半 湯十字有 以輕藥解 刺之傷寒 無汗者只 發麻黃桂 枝各半湯 傷寒有汗 桂枝湯三 十一字○ 自解下有 此三月是 閉藏之時 無泄皮膚 後氣發生 方為養生 之道也倘 有汗之宜 平為期邪 運已四 午三字○ 陰氣起至 病而止九 字作傷寒 證病或五

枝熱性藥須是桂枝麻黃湯加黃芩石膏知母升麻也夏月有桂枝麻黃證不加黃芩輩服之轉助熱氣便發黃斑出也白虎湯雖可用然治中暑與汗後一解表藥耳一白虎未能驅逐表邪况夏月陰氣在內或患熱病而氣虛人妄投白虎往往有成結胃者以白虎性寒非治傷寒藥也凡發汗欲令手足俱周濺濺然一時許為佳不欲如水淋漓服湯中病即止不必盡劑然發汗須如常覆腰以上厚衣覆腰以下蓋腰以上流瀉而腰以下至足心微潤病終不解凡發活人書 三卷 汗病證仍在者三日內可二三汗之令腰脚周遍為度○又問三陰有可汗者乎答曰陰病不當發汗發汗即動經然太陰脉浮少陰發熱亦須微微取汗但不正發汗耳大抵風寒中人與榮衛相薄而發熱又未曾行諸汗藥雖無陽證須少汗解逐之王叔和云表中風寒入裏則不消故知初病脉沉細數雖裏不消本表中風寒須宜溫覆少汗而解仲景太陰證脉浮可汗宜桂枝湯 少陰病發熱脉沉宜麻黃細辛附子湯 三三 少陰二三日常見少陰證無陽證者

○兼作 澀○按仲 景言無表 證者可與 白虎今云 汗後一解 表藥何耶 夏月陰氣 在內不可 妄投未審 何所據而 言白虎非 治傷寒藥 叔和何故 論中云 無陽字 別本汗小 仲景篇少 陰病得之 二三日麻 黃附子甘 草湯微發 汗以二三 日無證故 微發汗也 為改作常 見而添陽 字何耶 別本汗小 病也見五

宜麻黃附子甘草湯 三微發汗皆陰證表藥也 知脉沉細數病在裏不可發汗此大略之言耳脉應裏而發熱在表宜以小辛之藥取微汗而溫散也太抵傷寒太陽證發熱惡寒宜發其汗然熱多寒少其脉微弱或尺脉遲者不可表也 太陽病發熱惡寒熱無陽也 不可發汗宜桂枝二越婢一湯 少脉微弱者此時用小柴胡桂枝二越婢 其人當汗而衄血下血者不可表也 太陽病脉浮而緊發熱身無汗自衄者愈 又云太陽病不解熱結膀胱其人如瘧病者不可任血自下下者愈不愈宜桂枝湯 三三 活人書 三卷 表也 太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解又云太陽病不解轉入少陽者脅下硬滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者與小柴胡湯 三六 若已吐下發汗柴胡證罷此婦人經水適來者不可為壞病知犯何逆以法治之 婦人經水適來者不可表也 婦人病經水適下而發其汗則鬱胃風濕者不可表也 脉尺寸俱浮頭疼身熱常自汗體重其息必其汗者死宜濕溫者不可表也 兩脛逆冷身重其息必其汗者死宜濕溫者不可表也 痛苦妄言必多汗者濕溫證也 不可發汗發汗者名曰重暍如此死者虛煩豎殺之耳宜術附湯 正七白虎加蒼朮湯 經者濕者不可表也 諸虛煩熱與傷寒相似然不惡寒身不不緊故知非裏實也 病人腹間左右上下有築觸可下宜服竹葉湯 五



中 按此兼言 木附湯於 湯溫同部 言白虎而 不言未附 何耶 化別本作

動氣者不可表也 動氣在左不可發汗發汗則頭眩 服防風白朮牡蠣湯維方三汗止次當服建中湯正七 動氣在右不可發汗發汗則胸膈心苦煩飲則吐 水先服五苓散一二服至五六次服竹葉湯動氣在上 不可發汗發汗則氣上衝正在心端宜服李根湯 互動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節 疼目運惡寒食即反吐穀不得化先服大橋皮湯 建中湯正七 以此見古人慎用表藥如此

問裏證

芥曰不惡寒反惡熱手掌心并腋下濺濺汗出胃中 乾涸燥糞結聚潮熱大便硬小便如常腹滿而喘或 譫語脉沉而滑者裏證也 仲景云手足濺然汗出者 此大便已硬也傷寒欲下 活人書

而小便少手足心并腋下不滋潤者不可攻也 裏證者內熱是也內熱者裏 之弱此屬陽明宜下之傷寒始發熱惡寒今汗後不 惡寒但倍發熱而躁始脉浮大今脉洪實或沉細數 始惺靜今狂語此為胃實陽盛再汗即死須下之即 愈亦有始得病便變陽盛之證須便下之不可拘以 日數更有心胃連臍腹大段疰悶腹中疼坐卧不安 胃悶喘急極者亦不候他證便下之 凡大便便秘防悶 亦須少少飲小承氣湯正四三 恐尚有未證者 微解之不可過多令大泄也 若失下則氣血不通四 肢便厥墜人不知反疑是陰厥復進執藥禍如反掌

桂枝六 實無非 氣之所為 今云有積 何耶且所 寒因證太 陰及少陰 心下痛乃 下後乘虛 內陷之邪 也少陰燥 乾不大便 乃傳經入 裏之邪也 是邪非積 明者蓋蓋

不可不察也○又問三陰有可下者乎答曰三陰大 約可溫然須有積證方可也何謂積證太陰腹滿時 痛 桂枝加芍藥湯正十二痛甚 桂枝加大黃湯正十三 少陰口燥咽乾或腹滿 不大便或下利清心下痛皆積證也 仲景云少陰病 燥咽乾者急下之宜大承氣湯正十四 少陰病自利清 水心下痛口乾者宜大承氣湯少陰病六七日腹滿 不大便者宜大承氣湯 ○下證悉具服湯已更衣者 止後服不爾盡劑服之 更水謂病人服承氣湯後得 下後慎不中服補藥孫真人云服大承氣湯得利差 慎不中服補藥也熱氣得補復成更復下之是重困 活人書

也宜消息安養之大抵傷寒最慎于下若表證未罷 不可亂投湯劑虛其胃氣 仲景云表解而內不消非 也表已解而內不消大實堅有燥屎乃可下之 雖四五日不能為禍若不宜下而便攻之內虛熱入 協熱遂利煩躁諸變不可勝數輕者因篤重 者必死矣古人所以傷寒有承氣之戒 活人書

不可下 應汗而下為慎慎為痞為結胃 仲景云脉浮者病在表可發其汗 王叔和云脉微不可下 惡寒者不可下 惡寒者表 陽明證尚惡寒即與太陽合病屬 表可發其汗少陰惡寒當溫之 嘔吐者不可下 云嘔多雖有陽明證不可下陽明病脅下硬滿不大 便而嘔舌上白胎者宜與小柴胡湯正九上焦得通 津液得下胃氣因和身濺 然汗出得尿而解 不轉失氣者不可下 氣今



不知先云  
小便自如  
謂知常也  
每日三行  
今日亦三  
行不多不  
少故曰自  
如

所謂下泄也傷寒論云陽明病不大便六七日恐  
有燥屎欲知之法少與小承氣湯腹中轉失氣者此  
有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但頭硬後必  
澀不可攻之攻之必脹滿不能食也又云陽明病譫  
語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之正五十三因與小  
承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣  
者勿更與之仲景無治法今詳宜與小柴胡湯正二十九  
明日又不大便脈反微清者裏虛也為難治仲景亦  
無治法宜與大便堅小便數不可用承氣湯攻之  
脈浮而濡浮則胃氣強濡則小便數浮濡相薄大便  
則硬其脾為約麻子丸正九十二千金云脾約者  
大便堅小便利宜枳實丸正九小便清者不可下  
太陽陽明者脾約乃是也正九大便硬小便少者未可  
氣湯正六十七頭疼有熱與承大便硬小便少者未可  
攻之當問其小便日幾行若本小便日三四行今日  
活人書三卷  
再行故知大便不久出今為小便數少以陽明病自  
津液當還入胃中故知不久必大便也  
汗出若發汗小便自利者不可下此為津液內竭雖  
硬不可攻之當須  
自大便秘導之若土瓜根  
大猪膽汁皆可導之正百一十二以此知古人慎用轉藥如  
此

問表裏兩證俱見

答曰傷寒表證當汗裏證當下不易之法也發表攻  
裏本自不同甘遂神丹不可以合飲桂枝承氣安可  
以並進然而假令病人脈浮而大是表證當汗其人  
發熱煩渴小便赤却當下此是表裏證俱見五苓散

是  
作大實痛  
是

主之正五十四仲景云中風發熱六七日不解而煩有表  
裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散  
之假令傷寒不大便六七日頭痛有熱者是裏證當  
下其人小便清者知不在裏仍在表當須發汗此是  
兩證俱見即未可下宜與桂枝湯正方一假令病人心  
下滿口不欲食大便硬脈沉細是裏證當下其人頭  
汗出微惡寒手足冷却當汗此兩證俱見者仲景所  
謂半在裏半在表也小柴胡湯主之正廿九假令太陽  
病表證未除而醫數下之遂協熱而利利不止心下  
痞硬仲景謂之表裏不解桂枝人參湯主之正十六本  
活人書三卷  
太陽病豎反下之因爾腹痛是有表復有裏仲景用  
桂枝加芍藥湯正十二痛甚者桂枝加大黃湯又云太  
陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也  
喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之正三十三此皆仲景  
治傷寒有表復有裏之法學者當以意推之也  
問無表裏證  
答曰傷寒四五日後以至過經十三日無表證又於  
裏證未可下者但非汗證亦非下證者皆可用小柴  
胡正廿九隨證加減用之加減法在第十卷藥方中以至十餘日



者亦可用十餘日外用小柴胡湯不愈者若大便硬  
看證可下則用大柴胡下之正三十一以過經其人氣稍  
虛當下者用大柴胡湯則穩蓋恐承氣湯太緊病人

不禁也仲景云六七日目中不了了睛不和無表裏  
證大便難身微熱此為實也當下之宜大承氣湯正

正又云病人無表裏證發熱七八日脉雖浮數可大  
柴胡下之正三十一假令以下脉數不解至六七日不大

便者有瘀血也屬抵當湯正九十一

**問病人有身大熱反欲得衣有身大寒反**

活人書

三卷

九

不欲近衣者

答曰此名表熱裏寒表寒裏熱也病人身大熱反欲

得衣熱在皮膚寒在骨髓也仲景無治法宜先與陰

旦湯雜方六寒已次以小柴胡加桂雜三十九以溫其表病

人身大寒反不欲近衣寒在皮膚熱在骨髓也仲景

亦無治法宜先與白虎加人參湯正三十五熱除次以桂

枝麻黃各半湯正三十二以解其外大抵病有標本治有

先後表熱裏寒者脉瀕沉而遲手或微厥下利清穀

也所以陰證亦有發熱者四逆湯正三十四通脉四逆湯

寒而踰時  
自煩欲去  
衣被者皆  
治今改作  
不欲厚衣  
何哉况  
寒最慎于  
下今言下  
之又何耶

王之正八十一表寒裏熱者脉必滑而厥口燥舌乾也所  
以少陰惡寒而踰時時自煩不欲厚衣用大柴胡下  
之正三十一而愈此皆仲景之餘議也

活人書卷第三 終

活人書

三卷

十

仲景止  
分皮膚骨  
髓與經絡  
屬表裏之  
不同若  
皮膚為表  
骨髓為裏  
則麻黃湯  
證骨節疼  
痛其可名  
為有表復  
有裏耶

按仲景論  
少陰病也



活人書卷第四

此一卷論陰陽治傷寒須識陰陽二證手足各有三陰三陽合為十二經在手背者為陽屬表為府在手掌裏者為陰屬裏為藏足經做此傷寒只傳足經不傳手經素問熱論亦只說足三陰二陽受病巢氏言一日太陽屬小腸誤矣足之陽者陰中之少陽足之陰者陰中之太陰足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹陽務於上陰務於下陽行也速陰行也緩陽之體輕陰之體重陰家脉重陽

活人書 四卷

按仲景論喘而胃滿者麻黃湯是屬表也胃腸滿者小柴胡湯是半表半裏也至於

問陰證

答曰太陰少陰厥陰皆屬陰證也太陰者脾也少陰者腎也厥陰者肝也何謂太陰證太陰脾之經主胃膈膈脹甲乙經云邪生於陽者得之風雨寒暑邪中

陰止云  
厥陰不見  
有肺明  
別本無  
字又本  
不得即  
生字

陰家

陰家

意中並去  
聲理中之  
中如字  
別本作即

既暴絕矣  
是為不治  
又何難焉  
真若以極  
微二字易  
暴絕厥不  
為竭絕之  
証次篇陽  
其絕同此

於陰者得之飲食居處陰陽喜怒又曰賊風虛邪者陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入府陰受之則入藏入六府則身熱不時臥上為喘呼入五藏則膈滿閉塞下為癃泄久為腸澼何謂少陰證少陰腎之經主脉微細心煩但欲寐或自利而渴又問經云一二日少陰病者何也答曰謂初中病時腠理寒便入陰經不經三陽也傷寒雖是三陰三陽也發於陰則少陰也此二經為表裏其受病最為多陽明太陰受病頗稀至於少陽厥陰肝膽之經又加少焉凡病一日至十二三日太陽證不罷者但治太陽有初得病便見少陰證者直攻少陰亦不必先自活人書 四卷



善別本作  
苦訣

云辛甘發散為陽謂桂枝甘草乾姜附子之類能復其陽氣也微用辛甘甚則用辛若陰極發躁陰證似陽學者當以脉別之

問陽證

答曰太陽陽明少陽皆屬陽證也太陽者膀胱也發熱惡寒頭疼腰痛而脉浮也陽明者胃也不惡寒反惡熱濇濇汗出大便秘潮熱而脉長也少陽者膽也口苦咽乾脅下滿發熱而嘔或往來寒熱而脉弦也麻黃湯正二十 大青龍湯正二十五 桂枝湯治太陽經傷風活人書四卷 寒也大柴胡湯正三十 調胃承氣湯正四十三 小承氣湯正四十四 大承氣湯正四十五 治陽明傷寒也小柴胡湯正二十九 治少陽傷寒也其他藥皆發汗吐下後証也若陽氣獨盛陰氣暴絕即為陽毒心發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑如錦文或下利赤黃脉洪實或滑促當以酸苦之藥令陰氣復而大汗解矣古人云酸苦湧泄為陰謂苦參大青葶藶苦酒之類雜十六 能復其陰氣也微用苦甚則兼用酸苦折熱復陰若熱極發厥陽證似陰學者當以脉別之

陽証似陰  
與前証陰  
証以陽俱  
當以脉別

問手足逆冷臍腹築痛咽嗑疼嘔吐下利身體如被杖或冷汗煩渴脉細欲絕

答曰此名陰毒也陰毒之為病初得病手足冷背強

咽痛糜粥不下毒氣攻心心腹痛短氣四肢厥逆嘔

吐下利體如被杖宜服陰毒甘草湯雜七 白朮散雜

附子散雜九 正陽散雜十一 肉桂散雜十二 回陽丹雜十三

返陰丹雜十三 天雄散正元散退陰散雜十四 之類可選

用之大抵陰毒本因腎氣虛寒或因冷物傷脾外感

風寒內既伏陰外又感寒或先感外寒而內伏陰內

活人書四卷 外皆陰則陽氣不守遂發頭疼腰重腹痛眼睛疼身

體倦怠四肢逆冷額上手背冷汗不止或多煩渴精

神恍惚如有所失三二日間或可起行不甚覺重診

之則六脉俱沉細而疾尺部短小寸口脉或大六脉

大或沉取之大而不甚疾者非陰證也大抵陽毒傷

寒其脉多弦而洪數陰毒傷寒其脉沉細而弦疾不

可知若誤服涼藥則渴轉甚躁轉急有此病證者便

須急服辛熱之藥一日或二日便安若陰毒漸深其

候沉重四肢逆冷腹痛轉甚或咽嗑不利心下脹滿

結硬躁渴虛汗不止陽盛則身熱而無汗陰盛則身

加本枝下  
有汗者  
三三  
別本傷脾  
下有或因  
傷事傷腎  
天字〇外  
感別本作  
外傷  
陰毒有頭  
痛  
浮別本作  
按仲景敘  
陰毒之証  
不過面目  
青身痛如  
被杖咽嗑  
痛而已並  
不言陰寒  
極甚之証  
况其所治  
之方亦不  
辨麻甘



天地之氣... 陰陽之理... 活人書... 卷四

則身寒汗出... 或時鄭聲

指甲面色青黑... 息七至已來有此

證者速於氣海... 二百壯以手足和

媛為效仍兼服... 返陰丹天雄

散白朮散內外... 陰獨盛

暴絕則為陰毒... 若陰

毒已深疾勢困... 即無一

息八至已上或... 攻矣但於

臍中用葱熨法... 手足不溫

活人書... 四卷

者不可治也... 若陰

氣散陽氣來即... 勿令

投涼藥煩躁甚... 此勿令

誤也○陽伯按... 或

有一息至七至... 來者不可不知

問發躁狂妄言... 若錦

又或下利赤黃... 實

答曰此名陽毒... 暴絕必

發躁狂走妄言... 下利赤

黃脉洪實或滑... 而大汗

解美葶藶苦酒湯... 陽毒升麻湯... 大黃散

傷寒脉洪大內... 如烟煤則宜

以水漬布薄之... 稍拭去水搭於

胃上須更蒸熱... 仍數換新水日

數十易熱甚者... 亦良

法也

問病人潮熱獨... 不識人

尋衣撮空直視... 微倫

活人書... 四卷

答曰仲景云傷... 大便五六日

上至十餘日日... 見鬼狀

若劇者發則不... 直視

但發熱譫語者... 則止

後服脉弦者生... 陰脉者死

問胃膈不快腹... 沉

細少情緒或腹... 痛

答曰此名太陰... 不快

活人書... 卷四

活人書... 卷四

活人書... 卷四



經受之也

主胸膈脹滿

面色及唇皆無色

澤手足冷

脈沉細少

情緒亦因嗜慾

但內傷冷物

或損動胃

氣遂成陰

復投巴豆之類

胸膈愈不快

或吐而利

經一二日遂致

不救蓋不知寒中

太陰也太陰者脾

之經也

又問萬一飲食不節

胃膈不快寒中陰經

何法以治之

答曰急作理中湯

加青橘陳橘到如麻

豆大服一二劑

胃膈即快枳實理中圓

五積散

便投食藥非其治也大抵陰證者由冷物傷脾胃陰

經受之也主胸膈脹滿面色及唇皆無色澤手足冷

脈沉細少情緒亦因嗜慾但內傷冷物或損動胃

氣遂成陰證復投巴豆之類胸膈愈不快或吐而利

經一二日遂致不救蓋不知寒中太陰也太陰者脾

之經也又問萬一飲食不節胃膈不快寒中陰經

何法以治之答曰急作理中湯加青橘陳橘到如麻

豆大服一二劑胃膈即快枳實理中圓五積散

雜井一尤良

活人書 四卷 七

問脈微細欲吐不吐心煩但欲寐五六日

自利而渴

答曰此名少陰也少陰之為病欲吐不吐心煩但欲

寐五六日自利而渴者虛故引水自救若小便色白

者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制

水故令色白也四逆湯主之

少陰病若口燥舌

乾而渴者須急下之不可緩也大承氣湯主之

若脈沉而遲者須溫之四逆湯主之蓋以口燥而渴

者知其熱脈沉而遲者別其寒也

少陰屬腎古人謂

之腎傷寒也腎傷

欲坐井中宜以熱藥

治之

別本作大

柴胡下之

又本作大

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

柴胡下之

寒口燥舌乾而渴固當急下大抵腎傷寒亦多表裏

無熱但苦煩憤然而極不欲見光明有時腹痛其

脈沉細者用四逆湯古人恨其熱不堪用云腎病而

利不止手足微冷乃無熱少陰病若惡寒而踈時時

候可增損四逆湯

自煩不欲厚衣者用去大黃大柴胡湯

始得之反發熱脈沉者麻黃細辛附子湯

之少陰病得之二三日常見少陰無陽證者亦須微

發汗宜麻黃附子甘草湯

此學者不可不知也

問身微熱煩躁面赤脈沉而微

答曰此名陰證似陽也陰發躁熱厥物極則反也

大率以脈為主諸數為熱諸遲為寒無如此最驗也

假令身體微熱煩躁面赤其脈沉而微者皆陰證也

身微熱者裏寒故也煩躁者陰盛故也而戴陽者下

虛故也若醫者不看脈以虛陽上高躁誤以為實熱

反與涼藥則氣消成大病矣外臺秘要云陰盛發躁

名曰陰躁欲坐井中宜以熱藥治之仲景少陰證面

赤者四逆加葱白主之

問手足逆冷而大便秘小便赤或大便黑

欲坐井中宜以熱藥

治之

欲坐井中宜以熱藥

治之



別本下  
有眼關二  
字

分去声

老漢切

色脉沉而滑陽伯按要知陰證當自利但大便秘小便赤者即非陰證矣

答曰此名陽證似陰也重陽必陰重陰必陽寒暑之

變也假令手足逆冷而大便秘小便赤或大便黑色

其脉沉而滑者皆陽證也輕者白虎湯正六四甚者承

氣湯正四二傷寒失下血氣不通令四肢逆冷此是伏

熱深故厥亦深速用大承氣正四二加分劑下之汗出

立差仲景所謂厥應下之者此也兼熱厥與陰厥自不同熱厥者

微厥即發熱若陰厥即不發熱四肢逆冷惡寒脉沉

而細大小便滑泄矣

活人書

四卷

九

問身冷脉細沉疾煩躁而不飲水

答曰此名陰盛隔陽也傷寒陰盛隔陽者病人身冷

脉細沉疾煩躁而不飲水者是也若欲引飲者非也

不欲飲水者宜服霹靂散雜廿二須臾躁止得睡汗出

即差此藥通散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈火熾

散雜廿三

丹砂丸雜廿四

並主之

問手足逆冷海淵集辨厥與逆異

答曰此名厥也厥者逆也陰陽不相順接手足逆冷

也陽氣衰陰氣盛陰盛於陽故陽脉爲之逆不通于

活人書 卷四

惡去声

數言朔

實與腸相

反

手足所以逆冷也傷寒熱多厥少者其病當愈厥多

熱少者其病爲進然有冷厥有熱厥當子細辨認冷

厥者初得病日便四肢逆冷脉沉微而不數足多變

臥而惡寒或自引衣蓋覆不飲水或下利清穀或清

便自調清便自調即是或小便數外證多惺惺而靜

脉雖沉實按之遲而弱者知其冷厥也四逆湯正七四

理中湯正七三通脉四逆湯正八二當歸四逆湯正七八當

歸四逆加茱萸生薑湯正九白通加猪膽汁湯正九七

皆可選用也熱厥者初中病必身熱頭痛外別有陽

證至二三日乃至四五日方發厥兼熱厥者厥至半

日却身熱蓋熱氣深則方能發厥須在二三日後也

若微厥即發熱者熱微故也其脉雖沉伏按之而滑

爲裏有熱其人或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不

得眠大便秘小便赤外證多昏憤者知其熱厥也白

虎湯正六四承氣湯正四二隨證用之仲景云傷寒一二

日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱

亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷

爛赤熱厥當下故云厥應下之者又有下證悉具而

活人書

四卷

十



惡寒脈反沉伏而滑

兩手忽無脈或一手無脈是有正汗也

脈皆或時時也

見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥醫人不識

却疑是陰厥復進熱藥禍如反掌大抵熱厥須脈沉

伏而滑頭上有汗其手雖冷時復指爪溫須便用承

氣湯下之不可拘忌也諸手足逆冷皆屬厥陰不可下不可汗然有須下有須汗

證者謂手足雖逆冷時有溫時手足必暖非正厥冷也當消息之若病人寒熱而

厥面色不澤冒昧而兩手忽無脈或一手無脈者必

是有正汗也多用綿衣包手足令溫暖急服五味子

湯雜注或兼與麻黃細辛甘草湯之類服之晬時必

大汗而解矣或傷寒厥逆而心下怔忡者宜先治水

活人書 四卷 十一

常服茯苓甘草湯正五三却治厥不雨水漬入胃必下

利也又有病人手足厥冷脈乍結者邪氣結在胃也

心下滿而煩飢不能食者病在胃中當吐之宜瓜蒂

散正百十二蓋病在胸中亦能令人身足厥但認脈乍結

者是也陰盛則結脈來緩時一止復來日結主胃滿煩躁若傷寒發厥至七

八日膚冷而躁無時暫安者為藏厥此為難治又問

仲景少陰四逆湯又有四逆散何也答曰大抵少陰

病不可便用熱藥且如少陰病亦有表熱者仲景謂

之反發熱用麻黃細辛之類以發汗終不成少陰證

類本字起至散字止十八字無

號四

運聲

重去声少上声虎上橫骨為腰勝苦无切腰勝兩股間也差疑懈切病後亦作差

便不得發汗耶今少陰病四肢冷亦有內熱者仲景

用四逆散正七六是也四逆湯用附子乾姜而四逆散

只用柴胡枳實芍藥其義不同何也蓋四逆散主四

逆而其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利

下重已上病皆熱證耳

問吐長蟲

答曰此名虵厥也虵厥者藏寒虵上入膈其人吐虵

也此是厥陰證或病人有寒復發其汗胃中冷及因

發汗後身熱重發其汗胃中虛冷故長蟲逆上先服

活人書 四卷 十一

理中圓正七三次用烏梅圓正百五

問身體重少氣陰腫入裏腹內絞痛熱上

衝胃頭重不欲舉眼中生花婦人則裏急

腰勝連腹內痛

答曰此名陰陽易也傷寒病新差陰陽氣未和因合

房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則裏急腰勝連腹

內痛名為陰陽易也其男子病新差未平復而婦人

與之交得病名曰陽易其婦人病新差未平復男

子與之交得病名曰陰易若二男二女並不相易



辨本卷二  
至易况字  
無

渡音後著  
入声下同  
學別本作

則  
枯別本作

方別本作  
不  
狹伸業止

用燒根散  
言簡而意  
至本立二

條後人始  
知有氣熱  
之別熱用

微原豈可  
一途而取

所以呼為易者陰陽相感動其毒疫著於人如換易

然其病狀身體重熱上衝胃頭重不能舉眼中生花

四肢拘急小腹絞痛手足拳攣皆死其亦有不即死

者痛苦小腹裏急熱上衝胃頭重不欲舉百節解離

經脈緩弱血氣虛骨髓枯竭便恍恍翁翁氣力轉小

着床而不能搖動起止仰人或引歲月方死燒視散

正百十三 猴音鼠糞湯雜五 竹皮湯乾姜湯青竹茹湯當

歸白朮湯雜五 可選用之

活人書 四卷 三

活人書卷第四

活人書卷第五

此一卷論治法古人治傷寒有法非雜病之比五

種不同六經各異陰陽傳受日數淺深藥劑溫涼

用有先後差之毫釐輕者危殆况不識法者乎傷

寒惟兩感不治其餘證候雖感異氣能消息之無

不愈者其有差失仲景所謂醫殺之耳知其法者

若網在綱如此而汗如此而吐如此而下桂枝承

氣瓜蒂四逆用之無不差唯其應汗而下為痞為

結胃為懊懣應下而汗為亡陽為識語為下厥上

竭又有當溫反吐瘵熱以溫變證百出無復紀律

擾擾萬緒起矣大抵傷於寒為病熱孫真人云服

承氣湯得利差慎不中補也熱氣得補復成王叔

和云虛熱不可大攻之熱去則寒起二人之論疑

若相戾然熱氣有實有虛非深得仲景之意豈能

至此耶

問冬謂之傷寒春謂之溫病夏謂之熱病

谷曰素問云冬三月是謂閉藏水冰地坼無擾乎陽

又云彼春之暖為夏之暑彼秋之忿為冬之怒是以

差音又下

差音又下

差音又下

差音又下

差音又下

差音又下

差音又下

差音又下

差音又下

差音又下

差音又下



冬令嚴寒為殺厲之氣君子善攝生當嚴寒之時行住坐臥護身周密故不犯寒毒彼奔馳荷重勞房之人皆辛苦之徒也當陽閉藏而反擾動之則鬱發腠理津液強清為寒所薄膚腠緻密寒毒與榮衛相渾當是之時壯者氣行則已怯者則著而成病矣其即時而病者頭痛身疼肌膚熱而惡寒名曰傷寒其不則寒毒與陽氣相薄於榮衛之間至春夏陽氣發生無異但因春溫氣而變名曰溫病因夏熱氣而變名曰熱病溫熱二名直以熱之多少為義陽熱未盛為寒所制病名為溫陽熱已盛寒不能制病名為熱故大醫均謂之傷寒也

**問**三日已前當汗三日已後當下

答曰古人云未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已此大略之言耳病人有虛有實邪氣傳受遲速不等豈可拘以日數仲景云日數雖多但有表證而脈浮者由宜發汗日數雖少若有裏證而脈沉者即宜下之正應隨脈以汗下之

荷重並去  
去聲  
著入聲  
惡去聲  
惡平聲  
惡以伏寒  
而為溫為  
惡而為寒  
惡而為熱  
惡而為濕  
惡而為燥  
惡而為風  
惡而為火  
惡而為毒  
惡而為瘴  
惡而為疔  
惡而為癰  
惡而為疽  
惡而為疔  
惡而為癰  
惡而為疽  
惡而為疔  
惡而為癰  
惡而為疽

之又有腠理寒一二日便成少陰病者須急溫之 又况六氣之邪乘虛入經自背得之則入太陽或入少陰 伏脈在背 自背感之則入陽明之類不必皆始於太陽兼寒邪有首尾止在一經或間傳一二經不可以一理推但據脈與外證治之此活法也假令有人脈浮頭項強痛發熱而惡寒每日如此不以日數多少止是太陽經受之其餘經絡皆做此大抵傷寒憑脈與外證以汗下之若過日多脈尚大浮數按之不足者尚責太陽也可發汗而愈若按之實者汗之必死瀆下之而愈也若始得病脈細沉數外證或腹滿咽乾或口燥舌乾而渴為正責屬裏可下之而愈若無此證但發熱脈沉者誤下必死瀆行麻黃附子甘草湯 正廿三 麻黃細辛附子湯 正廿三 小發汗此皆仲景之確論也

**問**陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈

答曰素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則內熱陰盛則外寒故治傷寒者陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈也陰陽虛盛非

八音言脈  
在表可  
下却無脈  
沉誤下必  
死之証

發汗所  
注陰陽虛  
証未證一  
証未証一  
証未証一  
証未証一

一書〇〇〇  
丹黃參日車全書第 16 反正句



首非水言  
不和表病  
也今却將  
病陰陽  
虛盛四証  
合而引証  
仲景傷寒  
二証之發  
又改陽盛  
外無作內  
熱陰盛內  
寒作外寒  
受外寒  
所治合何  
邪

謂分脉尺寸也表陽也裏陰也外臺云表病裏和汗

之則愈表和裏病下之則愈亦只是論表裏陰陽以

汗下之難經云陰陽虛實者說脉也素問云陰陽虛

寒毒爭於榮衛之中必發熱而惡寒尺寸俱浮大內

必不躁設有微煩其人飲食欲溫而惡冷為陽虛陰

盛也汗之則愈誤下則死者寒毒相薄於榮衛之內

而陽勝陰衰極陰變陽寒盛生熱而陽熱之氣盛而

入裏熱毒居胃水液乾涸燥糞結聚其人外不惡寒

必蒸蒸發熱而躁甚則讖語其脉浮滑而數或洪實

為陽盛陰虛也下之則愈誤汗則死

問仲景有發汗者有和解之者

答曰傷寒表證須看榮衛淺深故仲景有正發汗湯

劑如麻黃湯正三十一 桂枝湯正一 大青龍湯正三十五 是也

有和解其表如小青龍湯正三十六 桂枝麻黃各半湯正

白虎湯正六十四 桂枝二越婢一湯正四 柴胡桂枝湯

小柴胡湯正三十九 之類是也後人不能深究寒邪

淺深藥性緊慢一槩用藥因茲天傷其間縱獲生全

活人書 卷五

活人書 卷五

至此用

往往汗後虛乏遂致勞復或變生百病淹引歲月卒

至不救此皆由汗下過度陰陽並竭血氣羸損以致

此禍如遇病輕但當和解之所謂和其榮衛以通津

液令其自解也

問仲景有宜下之有微和其胃氣者

答曰傷寒裏證須看熱氣淺深故仲景有宜下之如

大承氣湯正四十一 小承氣湯正四十二 十棗湯正八十九 大柴胡

湯正三十一 是也有微和其胃氣如調胃承氣湯正四十三 脾

約圓雜六六 少與小承氣正四十三 微和之之類是也金匱

活人書 卷五

玉函云虛者十補勿一瀉強實者瀉之虛實等者瀉

勿大洩之故王叔和序傷寒有承氣之戒○又問轉

藥孰緊答曰大承氣最緊小承氣次之調胃承氣湯

又次之大柴胡又次之仲景治法蕩滌熱積皆用湯

液不得用圓子藥不可不知也大柴胡加大黃小柴

問傷寒一日頭疼口乾煩滿而渴二日腹

滿身熱不欲食讖語三日耳聾囊縮而厥

水漿不入不知人

此本虛之  
下有補師亦  
云補老弱  
人服全藥分  
相安為佳耳  
大字○最上  
有厚和冬三  
字  
治傷寒不  
得用圓子藥  
仲景云知證  
以四藥下  
之非其治

蓋為病輕  
者設也



身熱不可... 少陰為表裏陽明與太陰為表裏少陽與厥陰為表裏陰陽雙傳藏府俱病此為難治六日而死夫故一日太陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥仲景無治法但云兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同尋至第三卷中言傷寒下之後得下利不止身疼痛者當急救裏宜四逆湯正七五復身體疼痛清便自調者急當救活人書五卷

若曰此名兩感傷寒也兩感者表裏俱病也太陽與少陰為表裏陽明與太陰為表裏少陽與厥陰為表裏陰陽雙傳藏府俱病此為難治六日而死夫故一日太陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥仲景無治法但云兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同尋至第三卷中言傷寒下之後得下利不止身疼痛者當急救裏宜四逆湯正七五復身體疼痛清便自調者急當救活人書五卷

活人書五卷 表宜桂枝湯正一遂以意尋比做例治兩感有先後宜先救裏若陽氣內正即可醫也內才正急當救表蓋內尤為急才溫內則急救表亦不可緩也

問傷寒已經發汗吐下仍不解古人謂之壞病 若曰仲景云太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者為壞病桂枝不中與也當知何逆隨證治之又云太陽病不解轉入少陽者脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下其脈沉緊者可與小柴胡湯正二十九 若已吐下發汗小柴胡證罷此為壞病知犯何逆以法治之蓋為病中又感異氣變為壞病以時令寒暑燥濕風火不節脈息與少陽相異小柴胡證 候與傷不同麻黃桂枝明當消息其由以法治之若脈尺寸俱盛重感於寒變為溫瘧先熱後寒名曰溫瘧 四陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變為風溫四肢不收頭疼 問陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變為風溫四肢不收頭疼 身熱常自汗出在陽脈洪數陰脈實大更遇溫熱變為溫毒為病最重春月肌肉發班名曰溫毒 陰脈弦緊更遇溫氣變為溫疫多相似感四時不正之氣在第六 脈證之變方治不同仲景謂溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經而取之也又有傷寒過經再受熱邪留畜藏府病候多變久而不差陰陽無復綱紀及傷寒解後虛羸少氣皆名壞傷寒也 知母麻黃湯雜廿八 驚甲散雜廿九 黑奴圓雜三十 檢方與病證相參選用之若傷寒解後虛羸少氣氣逆吐者竹葉石膏湯主之陽伯按奉議此條議論頗重長沙宗旨春沂公辨之甚明余始按讀便疑及觀春沂公辨嘆其先得我心然以言變証頗悉 活人書卷第五終



中音來  
疫音役症  
體也  
體去聲  
其音又

風上

製藥湯  
下木三三  
者只與桂枝  
麻黃各半湯  
十三字尺  
入於起用  
之十一字

活人書卷第六

此一卷論傷寒傷風熱病中暑濕溫瘧疾風濕溫

疫中濕濕溫瘧病溫毒之名天下之事名定而實

辨言順則事成又况傷寒之名種種不同若識其

名縱有差失功有淺深効有遲速耳不得其名妄

加治療往往中暑乃作熱病治之反用溫藥濕溫

乃作風溫治之復加發汗名實混淆是非紛亂性

命之寄危於風燭今於逐問下詳載疾狀而名之

曰某病庶幾因名識病因病識證如暗得明宵中

活人書

六卷

曉然無復疑慮而處病不差矣

問脉浮而緊滑頭疼身體拘急惡寒無汗

寒多熱少面色慘而不舒腰脊疼痛手足

指末微厥不煩躁

答曰此名傷寒也傷寒之候發熱惡寒頭疼腰脊痛

脉緊無汗宜發汗而解麻黃湯主之輕者只與

桂枝麻黃各半湯人參順氣湯葱豉湯

倉朮散麻黃葛根湯可選而用之然太

陽病亦有熱多寒少者須子細看脉與證也熱多寒

製者作  
按仲景其  
人不清便  
欬自九字  
不寒之証  
今反於多  
寒四字於  
其也他證  
各半湯汗之  
何邪之按之  
仲景麻黃湯  
發汗當身疼  
痛宜以汗解  
之便尺中  
遲者不可發  
汗以發氣不  
是血少故也  
今但舉尺中  
遲少之語  
而論發寒  
少四字又何  
邪

活人書

六卷

少不嘔清便自可宜桂枝麻黃各半湯若脉浮者雖

熱多寒少自可發汗若脉弱者無陽也桂枝二越婢

一湯主之熱多寒少而尺脉遲者榮氣不足血

少故也先以小建中湯加黃耆最良尺脉尚遲

再作一劑或太陽證宜汗而其人適失血及下利則

頻頻與少桂枝湯使體潤榮氣連日當自解假

如淋家衄血家法不可汗亦可以小柴胡之類

和解之

問脉浮而緩寸大而尺弱自汗體熱頭疼

惡風熱多寒少其面光而不慘煩躁手足

不冷

答曰此名傷風也傷風之候頭疼發熱脉緩汗出惡

風當須解肌宜桂枝湯主之輕者只與柴胡桂

枝湯敗毒散獨活散可選用治太陽

中風有汗用桂枝湯凡脉緊必無汗唯濡而緊却自

是脉浮而緩者項背強者桂枝湯加葛根也

製桂枝湯  
有主之輕者  
及與柴胡桂  
枝湯十一字  
反於發字起  
至厚字止



後汗不止為漏風桂枝加附子湯主之正六腹滿者

太陰證脈浮者可服桂枝湯微發汗腹痛者桂枝加

芍藥湯正十二痛甚者桂枝加大黃湯也正十三雖然桂

枝湯自西北二方居人四時行之無不應驗自江淮

間唯冬及春初可行自春末及夏至已前桂枝證可

加黃芩半兩陽且湯是也夏至後有桂枝證可加知母

一兩石膏二兩或加升麻半兩若病人素虛寒者正

用古方不在加減也岐伯所謂病異治者此也大

夏素問所謂用溫遠又問傷寒與傷風何以別之大

溫用熱遠熱者也活人書六卷

曰傷寒者脈緊而澁傷風者脈浮而緩傷寒者無汗

故也傷風者有汗傷寒者畏寒不畏風傷風者畏風

不畏寒大抵太陽病者必脈浮發熱惡風惡寒也惡

寒者不當風而自增寒惡風者當風而增寒也六經

皆有傷風傷寒其證各異太陽脈浮有汗為中風脈

緊無汗為傷寒陽明善飢為中風不食為傷寒少陽

兩耳聾目赤胃滿而煩為中風口苦咽乾目眩為傷

寒若三陰傷風無變異形證但四肢煩疼餘證同三

陽也

活人書

問有發熱惡寒煩躁手足溫而脈反浮緊者有寒多熱少不煩躁手足微冷而脈反浮緩者

活人書

答曰此名傷風見寒脈傷寒見風脈也蓋發熱惡風煩躁手足溫為中風候脈浮緊為傷寒脈是中風見

寒脈也寒多熱少不煩躁手足微厥為傷寒候脈浮

緩為中風脈是傷寒見風脈也中風見寒脈傷寒見

風脈俱宜服大青龍湯正十五蓋大青龍證脈似桂枝

反無汗病似麻黃反煩躁是也脈弱有汗為桂枝證

活人書六卷

大青龍湯治病與麻黃湯證相似但病尤重而又

加煩躁者用大青龍湯也其中以中風并傷寒俱盛故

青龍湯添麻黃作六兩又似合桂枝湯藥味在內添

石膏所以為緊此治榮衛俱病若證不審誤用大青

龍湯則發汗多傷人以其有煩躁一證大抵感外風

者為傷風感寒冷者為傷寒故風則傷衛寒則傷榮

桂枝主傷衛麻黃主傷榮大青龍主榮衛俱傷故也

風傷衛者病在皮膚之間也以衛行脈外為陽主外

皮膚之間衛氣之道路故也其病淺寒傷榮者寒氣

中於肌肉也以榮行脈中為陰王內肌肉之間榮氣

之道路故也其病深所以桂枝與麻黃所施各異或



詩音帝審也  
傷者喘言  
汗過多筋  
音燥  
法戶製  
書作制  
後因暑氣  
而發為熱  
麻黃大青  
龍湯辛熱  
之劑溫病  
則曰因春  
溫發之氣  
而發與冬  
月傷寒夏  
月傷暑不  
同蓋熱解  
故也用升  
麻湯解肌  
湯辛溫之  
藥又自知  
其說之抵  
格乃戒曰  
夏月藥性  
酒滯涼不  
可太過又  
曰桂麻性  
熱及月服  
之必有斑  
貴之失熱  
癘三日猶  
在纏綿宜  
桂枝石膏  
湯又將桂  
子升麻湯

勿誤用以有淺深之別風寒之殊大醫當宜審諸大  
青龍尤宜慎用仲景云脈微弱汗出惡風者不可服  
汗過多筋惕肉瞤此為逆也類纂云凡發  
汗此證俱宜服真武湯音五以救之蓋其者芍藥或  
量多少與之惡熱藥者去附子餘依加減法仲景製  
真武湯乃為合用桂枝却用麻黃之類發汗多亡  
陽有此證故用真武湯若調理順者無此證也

**問夏月發熱惡寒頭疼身體肢節痛重其  
脈洪盛者**

答曰此名熱病也久傷於寒因暑氣而發為熱病治  
熱病與傷寒同有汗宜桂枝湯正一無汗宜麻黃湯

**加煩躁者宜大青龍湯正廿五然夏月藥性須帶  
活人書 六卷 五**

涼不可太過桂枝麻黃大青龍須用加減法夏至前  
桂枝加黃芩半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母  
一兩石膏二兩或加升麻半兩也蓋桂枝麻黃湯性  
熱地暖之處非西北之比夏月服之必有發黃斑出  
之失熱病三日外與湯不差脈勢仍數邪氣猶在經  
絡未入藏府者桂枝石膏湯主之雜廿五此方夏至後  
代桂枝證用若加麻黃半兩可代麻黃青龍湯用也  
古方三月至夏為晚發傷寒梔子升麻湯雜廿六亦可  
選用之○又問夏至後皆可行白虎湯液耶答曰白

發于末以  
結之何其  
証治之不  
者哉  
按仲景言  
無兼証者  
可與白虎  
今云汗後  
一解表藥  
何耶夏月  
陰氣在內  
尤宜戒之  
豈因前用  
桂枝麻黃  
青龍之說  
藥邪  
中暑四厥  
不痛重

虎湯治中暑與汗後一解表藥耳今之醫者見六月  
中病多云中暑不  
辨熱病用藥太涼又况夏月陰氣  
在內最難調治白虎湯尤宜戒之

**問夏月自汗惡寒身熱而渴其脈微弱者**

答曰此名中暑也大抵中暑與熱病外證相似但熱  
病者脈盛中暑者脈虛以此別之甲乙經云脈盛身  
寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑蓋寒傷形而不傷  
氣所以脈盛熱傷氣而不傷形所以脈虛傷寒即身  
體肢節痛重其脈洪盛按之有力此是冬月感寒深  
至夏發耳中暑即背寒面垢其面如塗油類纂云面  
垢者陽證也一名面壅

**活人書 六卷 六**

若塵埃手足微冷煩渴口燥但覺倦怠四肢却不痛  
重其脈微弱按之無力白虎湯主之正六四痰逆惡寒  
者橘皮湯主之雜四不惡寒者竹葉湯主之正九五頭  
疼惡心煩躁心下不快者五苓散正六六最妙○又問  
中暑何故灑然毛聳惡寒答曰經云四時八風之中  
人也因有寒暑寒則皮膚急腠理閉暑則皮膚緩腠  
理開開則灑然寒閉則熱而悶近人多不明中暑或  
作熱病法治之復用溫熱藥必致發黃斑出更為畜  
血尤宜戒之



問夏至已前發熱惡寒頭疼身體痛其脉

浮緊

答曰此名溫病也春月傷寒謂之溫病冬傷於寒輕者夏至已前發為溫病蓋因春溫暖之氣而發也

溫疫 治溫病與冬月傷寒夏月熱病不同蓋熱輕故也

也春初秋末陽氣在裏其病稍輕升麻湯解肌

湯柴胡桂枝湯最良熱多者小柴胡湯主

之不渴外有微熱者小柴胡加桂枝也嗽者小

柴胡加五味子也煩躁發渴脉實大便秘澀者大柴

活人書 六卷 七

胡微利也或煩渴發熱不惡寒與虛煩者並竹葉石

膏湯正九五次第服之麻黃桂枝大青龍唯西北二方

四時行之無有不驗若江淮間地偏暖處惟冬月及

正初乃可用正方自春末至夏至已前桂枝麻黃大

青龍內宜加減也

問病人先熱後寒尺寸脉俱盛

答曰此名溫瘧也先熱後寒名曰溫瘧病人尺寸俱

盛重感於寒變成溫瘧小柴胡湯主之正九五瘧疾寒

熱相等及先熱後寒者俱宜與小柴胡湯先寒後熱

者小柴胡加桂湯正九有多熱但熱者白虎加桂湯

有多寒但寒者柴胡桂姜湯雜四一有汗多煩渴

小便赤澀素有瘴氣及不服水土嘔吐甚者可服五

苓散正六六脉小緊寒熱嘔吐間日頻日發作無時大

便秘者可服大柴胡湯下之正三十一脉浮大寒熱往來

者可服祛邪圓吐之雜四三久不愈者服瘧母煎圓雜

當自愈治瘧之法無以過也○大抵瘧脉自弦弦

數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者可

溫之弦緊者可發汗浮者可吐之夏傷於暑秋必病

活人書 六卷 八

瘧此非傷寒之謂以其壞傷寒有溫瘧一證故因而

反之

問脉尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重

其息必喘四肢不收嘿嘿但欲眠

答曰此名風溫也其人素傷於風因復傷於熱風熱

相薄即發風溫主四肢不收左傳日風頭疼身熱常

自汗出不解治在少陰厥陰少陰疾不可發汗發汗

即譫言獨語內煩躁擾不得卧若驚癩目亂無精瘵

之者復發其汗如此死者豎殺之也風溫不可發汗

別本最良 上有柴胡 桂枝湯五 字枝也下 有湯者小 柴胡去半 夏加入參 括蕒根十 四字 別本于也 下無煩躁 三利也十 八字

獨也下刑 本府加先 法在熱病 門 重平

瘧音占 精利本作 瘧音

別本喘下 有其形不 午四字

意言辨



宜萎蕤湯 雜四五  
風溫身灼熱者知母乾葛湯 雜四六  
風溫加渴甚者括蕞根湯 雜四七  
風溫脈浮身重汗出漢防已湯 雜四八

問一歲之中長幼疾狀多相似

答曰此名溫疫也四時皆有不正之氣春夏亦有寒清時秋冬或有暄暑時人感疫厲之氣故一歲之中病無長少率相似者此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散 雜四九  
務成子螢火圓聖散子 雜五〇  
毒散 雜五一  
活人書 六卷 九

當隨其經而取之也 別本無土無至 仲景云冬溫之毒與傷寒大異蓋傷寒者傷寒氣而作冬溫者感溫氣而作寒疫者暴寒折人非觸冒之過其治法不同所施寒熱溫涼之劑亦異不可拘以日數發汗吐下隨證施行要之治熱以寒溫而行之治溫以清冷而行之治寒以熱涼而行之治清以溫熱而行之以平為期不可以過此為大法 清音爭下同 ○此寒疫與景前後兩說不同而混為一證誤之甚矣所以溫疫有除而寒疫則無條矣溫疫則春夏秋冬俱有而寒疫止春三月起至秋八月止矣

問一歲之中長幼疾狀多相似

答曰此名溫疫也四時皆有不正之氣春夏亦有寒清時秋冬或有暄暑時人感疫厲之氣故一歲之中病無長少率相似者此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散 雜四九  
務成子螢火圓聖散子 雜五〇  
毒散 雜五一  
活人書 六卷 九  
而變更不拘以日數淺深汗吐下隨證施行所以聖散子不問寒暑陰陽者此也唯聖散子性差熱用者宜詳 若春應暖而清氣折之則責邪在肝 三四月或時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕 夏應暑而寒氣折升麻湯 雜一二 解肌湯主之 雜一八  
之則責邪在心 五月六月陽氣已盛為寒所折病熱病熱亦微調中湯 雜五二 射干湯 雜五三  
半夏桂枝甘草湯 雜五五 可選用也 秋應涼而反大熱折之則責邪在肺 濕熱相薄民多病癰瘡者黃也 宜白虎加蒼朮湯 雜百七 煎茵陳汁調五苓 冬應寒而反大溫折之則責邪在腎 其冬散百六六  
節之暖者名為冬溫此屬春時陽氣發於冬時則伏寒變為溫病宜萎蕤湯 雜四五 ○按此屬云云溫病仲景無則字乃春溫病也今奉議 添一則字而云冬溫溫疫何耶 土無正行因火而名

明寒疫干 五卷溫病 熱病答中 既云為寒 所折於此 復云為寒 所折何耶

活人書 六卷 十  
問一身盡痛發熱身黃小便不利大便反快者  
答曰此名中濕也風雨襲虛山澤蒸氣人多中濕濕流關節須身體煩痛其脈沉緩為中濕 脈細者主一身盡痛發熱身黃小便不利者木附湯 正七十一  
若小便不利大便反快當利其小便宜甘草附子湯 正七十五  
苓散 正六六  
主之 至真要論云治濕之法不利小便非與麻黃湯加白朮四分發其汗慎不可以火攻之濕家身煩痛可家雖身體痛不可大發汗汗出則作症大抵中濕者水濕之蒸氣及汗出當風取冷過度或中霧露與風寒氣合者曰痺皆由中於濕而後快以異氣

中音舉下 同 按仲景云 脈沉而細 為濕痺今 注以脈細 為非中濕 濕與中濕 異歟既曰 身黃又不 明言其色 豈中濕與 陽明濕熱 同歟至十



不可汗  
下何耶

寒多者為痛為浮腫非附子桂朮不能去也其風多者為煩熱為流走為拘急非麻黃薏苡烏頭輩不能散也其中氣者為壅滿為癢閉非甘遂葶藶枳朮不能泄也

問肢體痛重不可轉側額上微汗不欲去被或身微腫

答曰此名風濕也脉浮為風濕是風氣與濕氣相薄肢體痛重不可轉側額上微汗不欲去被或身微腫欲發汗但熱熱身潤則風濕俱去若大發其汗則風

氣去濕氣在矣麻黃杏子薏苡甘草湯防已黃

者湯桂枝附子湯 杏仁湯 敗毒散 甘草附

子湯木附湯 杏仁湯 敗毒散 可

選兩用之身腫者甘草附子湯加防風

問兩脛逆冷胸腹滿多汗頭目痛苦妄言

答曰此名濕溢也其人嘗傷於濕因而中暑濕熱相薄則發濕溫病苦兩脛逆冷腹滿又曾多汗頭目痛苦妄言其脉陽濡而弱陰小而急治在太陰

不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面

正不言  
附木何耶  
設者濕氣  
脈溫液所  
虛大便清  
不附其可  
厥乎心昭  
音說

色變名曰重暈如此死者豎殺之耳白虎加蒼朮湯主之 此方出傷寒微旨亦做 金匱白虎加桂湯雜四十一

問發熱惡寒頸項強急腰身反張如中風狀或瘈瘲口噤

答曰此名瘧也傷風頸項強急身體反張屬太陽經先因傷風又感寒濕而致然也古人謂之瘧病

作瘧巨即反瘧者強直也古人以強直為瘧金匱要略云太陽病其身體凡几便為瘧也外證發熱惡寒與傷寒相似但其脉沉遲弦細而項背反張強鞭如發瘧之狀此為異耳

活人書六卷 汗葛根湯主之 有汗桂枝加葛根湯主之

其有汗無汗以分剛瘧柔瘧 無汗惡寒名剛瘧有汗不惡寒名柔瘧

本草葛根主傷風 凡剛柔二瘧小續命湯雜五十七 並可

與之 有汗者小續命湯 若審知剛瘧胃滿口噤其人臥不着席脚攣急咬齒當行大瀉湯正四十一 外臺云熱

瘧者反折瘈 又問剛柔二瘧與陰陽二瘧是如何 瘧亦作瘧陽瘧屬剛瘧陰瘧屬柔瘧附朮散雜五十八 桂枝湯雜五十九 附子防風散雜六十一 八物白朮散雜六十二

桂枝湯散可選而用之



陰風未用  
諸藥治則  
是以陰專  
為寒証矣  
所以李書  
始吳指掌  
不取附木  
等分者以  
生者宜  
辨之

⑤

問初春病人肌肉發斑癢疹如錦紋或咳  
嗽心悶但嘔清汁者

答曰此名溫毒也溫毒發斑者冬時感胃寒毒至春  
始發病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不  
散故發斑黑膏主之又有冬月溫暖人感乖戾之氣  
冬未即病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣  
暄熱溫毒始發則肌肉斑爛癢疹如錦紋而咳心悶  
但嘔清汁葛根橘皮湯主之黃連橘皮湯尤佳

活人書

六卷

三

活人書卷第六終

活人書 卷七

活人書卷第七

此一卷論痰證食積虛煩脚氣與傷寒相似實非  
傷寒也所謂朱紫相陵玉石不分鑿者處病滅裂  
見其發熱惡寒往往作傷寒治之發汗吐下因茲  
天橫者多矣今特立一門別而論之庶幾覽者知  
其非傷寒也

⑤

問憎寒發熱惡風自汗寸口脈浮胃膈痞  
滿氣上衝咽喉不得息而頭不疼項不强

答曰此名有痰也中脘有痰亦令人憎寒發熱胃膈  
活人書 七卷

痞滿有類傷寒但頭不疼項不强為異耳宜服柴胡  
半夏湯雜三 金沸草散雜三 大半夏湯雜六四 若氣上

衝咽喉不得息者用瓜蒂散吐之古法服瓜蒂散

凡服一錢七藥下便卧欲吐且忍之良久不吐取

三錢七湯二合和服以手指撻之便吐矣不吐復稍

增之以吐為度若吐少病不除明日如前法再服之

可至再三不可令人虛也藥力過時不吐者暖熱湯

一升以助藥力吐訖便可食無復餘毒若服藥過後

飲水解之

撫音狄批  
發也漢書  
自相糾纏  
少去声  
聚音歡

邪音

痰音經氣  
隔不通  
強去声

聖去声



**問頭疼脈數發熱惡寒而身不痛左手脈**

平和

答曰此名食積也傷食亦令人頭痛脈數發熱但驗

左手人迎脈平和身不疼痛者是也甲乙經云人迎

緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食左手關前一分者人迎之位也

蓋人迎主外氣口主中以此別之傷食之

證由脾胃伏熱因食不消發熱似傷寒却身不疼痛

此為異耳若鬲實嘔吐者食在上腕宜吐之若心腹

滿痛者宜下之治中湯雜百五五積散雜十一黑神圓雜

活人書 七卷 二

可選而用之

**問不惡寒身不痛頭不疼脈不緊數但煩**

熱者

答曰此名虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似然不惡寒

身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊

數故知非裏實也不可下如此者內外皆不可攻攻

之必遂損竭多死也此虛煩但當與竹葉湯正九五若

嘔者與橘皮湯雜卅七一劑不愈再與之孫真人云此

法數用甚有効傷寒虛煩亦宜服之王叔和云有熱

不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯

**問傷寒頭疼身熱肢節痛大便秘或嘔逆**

而脚屈弱者

答曰此名脚氣也傷寒只傳足經不傳手經地之寒

暑風濕皆作蒸氣足當履之遂成脚氣所以病證與

傷寒相近其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕

汗而愈濕者溫而愈熱脚氣之病始得不覺因他病

乃知毒氣入心則小腹頑痺不仁令人嘔吐死在朝

夕矣然終是與傷寒不同者孫真人云卒起脚屈弱

活人書 七卷 三

不能轉動有此為異耳要之有脚氣之人先從脚起

或先緩弱疼痺寒氣勝者為痛痺有寒故痛也或行起忽倒或兩脛

腫痛亦有不一或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁

病久入深榮衛之行滲皮膚不榮故

為不仁不仁者皮頑不知有無也

或舉體轉筋或

見食嘔逆惡聞食氣或胃滿氣急或遍體酸痛皆脚

氣候也黃帝所謂緩風濕痺是也頑弱名緩風疼痛

為濕痺痺者閉也閉而寒中三陽所患必冷越婢湯

小續命湯雜五十一主之小續命煎湯成旋入暑中

三陰所患必熱小續命湯去附子減桂一半大煩躁

十 7 文下



良大便秘者脾約丸羅六八神功丸羅六八五柔丸羅六九

大三脘散羅七十一木瓜散羅七十三主之脚氣之疾皆由氣

以服藥致頭痛身熱肢節痛而脚屈弱者是其人素

有脚氣此時發動也脚腫者檳榔散主之羅七十一脚氣

方論千金外臺最詳此不復敘大抵越婢湯小續命

湯慧以人酒法羅七十三脾約神功圓背要藥也仍針灸

為佳服補藥與用湯淋洗者皆鑿之大藥也

活人書卷第七終

活人書 七卷

四

活人書卷第八

此一卷論發熱大抵傷寒多易治熱多難愈傷

寒發熱者以其寒極則生熱治法多用冷藥故令

熱不去仲景熱多寒少用桂枝二越婢一湯不渴

外有微熱者用小柴胡加桂湯皆溫表之義也近

時多行小柴胡湯不問陰陽表裏凡傷寒家皆令

服之此藥差寒不可輕用雖不若大柴胡湯小承

氣湯之緊要之藥病不相主其為害一也往往因

服小柴胡湯而成陰證者甚多仲景雖云傷寒中

活人書 八卷

風有柴胡證但見一證便是不必悉具此為是少

陽證當服小柴胡不必少陽證悉具耳况本方又

有加減隨證增損古人方治審諦如此後人妄投

良可怪也

問發熱

答曰發熱而惡寒者屬太陽也太陽病必發熱而惡寒

皮膚分肉寒氣留於外皮膚絳密則寒慄而發熱宜

發其汗麻黃湯吳王大青龙湯吳王若發熱微

惡寒者柴胡桂枝湯吳王桂枝二越婢一湯吳王主

之若吐利而發熱惡寒者霍亂也太陽病發熱而渴

不惡寒者為溫病若發汗已身體灼熱者為風濕也

○素問云汗出而身熱者風熱也其人素傷於風因



復傷於熱風熱相薄即身熱汗出澀澀然者屬陽明也

陽明也 陽明病脈浮者宜桂枝湯正氣不秘者白虎湯

和解毒六十四若陽明病發汗多者宜大承氣湯急下之

後不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜調胃承氣湯

正四十二太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬於胃也

宜下 脈細頭疼嘔而發熱者屬少陽也 少陽發熱小

柴胡湯主之 發汗即譫語 病人不渴外有微熱者小柴胡加桂

也 仲景表有熱者小柴胡加桂也裏有熱者白虎加

人參也 正五 大抵身熱不飲水者為表熱也口燥煩

渴者為裏熱也 二藥均治發熱然分表裏不可不知

也 病人無表裏證發熱七八日脈雖浮數宜大柴胡

湯下之 正三十大便秘 假令已下脈數不解今熱則消

穀善飢至六七日不大便者有瘀血也抵當湯主之

若傷寒差後更發熱者小柴胡湯 正廿九 主之 脈

者以汗解脈 又問陰證有發熱者乎 答曰太陰厥陰

皆不發熱只少陰發熱有二證仲景謂之反發熱也

少陰病初得之發熱脈沉者麻黃細辛附子湯 正三

主之 少陰病脈沉發汗則動經此大畧之言耳脈應

也 仲景云傷寒之病從風寒得之表中小陰病下利

風寒入裏則不消須用溫藥少汗而解 少陰病下利

清穀裏寒外熱手足厥逆脈不出者通脈四逆湯主

之 復傷於熱風熱相薄即身熱汗出澀澀然者屬

陽明也 陽明病脈浮者宜桂枝湯正氣不秘者白虎湯

及下利脈 數有微熱 身微熱及 嘔而發熱

四條太陰 四肢煩疼 是三陰皆 有發熱明

夫 仲景太 陽云 寒 為自初

重今之証 若其人 唯清便欲

自可九字 本是愈之 証今反與

他証各半 湯汗之何 邪文按仲

景篇脈浮 裏法當身 痛宜以

汗解之假 本尺中遲 者不可發

汗以發氣 不足血少 故也今但

衆尺中遲 血少之証 而脈多

藥少四字 又何耶此 八証連証

之 大抵陰證發熱終是不同脈沉或下利手

足厥也 問熱多寒少

答曰太陽熱多寒少有三證有熱多寒少而不嘔清

便自可者有熱多寒少而脈微弱者有熱多寒少而

尺脈遲者其用藥皆不同也太陽病八九日如瘧狀

熱多寒少不嘔清便自可宜桂枝麻黃各半湯 正三

熱多寒少而脈都大微弱者無陽也不可發汗宜桂

枝二越婢一湯 正三 主之 若脈浮雖熱多寒 熱多寒

少而尺中遲者血少也先以小建中加黃耆 正七 以

養其血尺尚遲再作一劑然後時時用小柴胡湯 正

桂枝二越婢一湯 正三 輩小劑隨證治之

問潮熱 答曰潮熱者大率當下仲景云潮熱者實也大承氣

湯證云其熱不潮未可與也則知潮熱當下無疑矣

雖然更看脈與外證脈若弦若浮及外證惡寒猶有

表證且與小柴胡湯以解之 正廿九 若腹大滿不通者

可與小承氣湯 正四三 微和其胃氣勿令大泄也 仲景

云日



正當收入不可汗門中不當附熱多寒也又脈微弱上添都大二字豈仲景論脈為未定而加之乎○別本小劑隨証治之作小分劑以和解之

按往來寒熱者邪正分爭也邪氣入正氣未與之爭則但熱而無寒若邪正分爭于其寒熱作也今以陰陽二氣相勝陽不云陰後寒此論雜病陰

補發熱者屬陽明也脈實者大承氣正四大柴胡也正三脈虛者桂枝也正一縱使潮熱當行大承氣亦須先少與小承氣若不轉矢氣不可攻之復發熱復硬者大柴胡下之正三若有腸滿而嘔

日晡發潮熱者小柴胡加芒消正三主之又有日晡發潮熱已而微利者又有微發潮熱而大便溏者或

潮熱而咳逆者皆當用小柴胡也正三傷寒十三日

日晡發潮熱已而微利潮熱者實也先服小柴胡以解外後以柴胡加芒消湯下之陽明潮熱大便溏胃

滿不去者小柴胡主之冬陽明潮熱當行黃芩湯正三冬陽明病脈

必盜汗黃芩湯主之正五已上潮熱並屬陽明也太

活人書八卷陽有潮熱乎仲景大陷胸湯一證正三結胸有潮熱者為大結胸屬太陽也正三結胸音通日加申時

問往來寒熱

答曰往來寒熱者陰陽相勝也陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒大抵有三證有表證而往來寒熱者用小柴胡也正三有裏證而往來寒熱者大柴胡也正三已表或已下而往來寒熱者皆可用柴胡

桂枝乾薑湯正三仲景云血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣分爭往來寒熱休作有時小柴胡主之又云

陽二氣自相乘於然非非可以謂傷寒也似非合仲景之意○

傷寒五六日中風往來寒熱胃腸苦滿默默不欲食心煩喜嘔或胃煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞

鞭或心下悸小便利或不渴身有微熱或欬者小柴胡主之傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者大柴

胡主之傷寒五六日已發汗復下之胃腸滿小便不利渴而不嘔頭汗出往來寒熱心煩柴胡桂枝乾薑湯也

問傷寒瘧狀

答曰形證似瘧有太陽證有陽明證有婦人熱入血室證太陽證服桂枝湯正一大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形似瘧一日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯正三傷寒八九日如瘧狀熱多寒少其人

不嘔清便欲自可日一二發者麻黃桂枝各半湯正三太陽證形似瘧寒熱等者與桂枝二麻黃一湯正三一湯熱多寒少者麻黃桂枝各半湯正二有陽明證病人煩熱汗出如瘧狀日晡發熱而脈浮虛者與桂枝湯脈實者宜承氣湯正三婦人熱入血室其血必結故使如瘧狀小柴胡主之正三

問汗之而寒熱者



發音

補音通日  
加由助

發音下

發音

發音

發音

芥曰太陽證發汗後依前寒熱者須看脉如何若脉  
 浮數或洪大則表證猶在當再表也如桂枝湯正一  
 或桂枝二麻黃一正三之類蓋人為見已汗或已下  
 而發寒熱不敢再表誤矣蓋脉浮為在表表之必愈  
 也或得汗而解復如瘧狀日晡而發者此屬陽明也  
 若脉實者可下之宜大柴胡正三十一大承氣正四二也若  
 發汗後只惡寒者虛也發汗後只發熱者實也只惡  
 寒屬芍藥甘草附子湯正七二只發熱屬調胃承氣湯  
正四三若厥陰證大汗出熱不去內拘急四肢厥又下  
 活人書八卷  
 利厥逆而惡寒者四逆湯主之正七五  
 問汗之而仍發熱者  
 芥曰素問云溫病汗出輒復熱而脉躁疾不為汗衰  
 狂言不能食謂之陰陽交交者死也又云熱病已得  
 汗而脉躁盛者死今不與汗相應是不勝其病也其  
 死明矣大抵病人得汗而脉靜者生今汗之而仍發  
 熱者若脉浮數則表證猶在汗之必愈也仲景云發  
 汗後更發汗宜桂枝湯正三汗解半日  
 許復熱煩脉浮數者可發汗後不敢再表者為脉沉  
 實耳脉若浮者須再汗也發汗後不惡寒只發熱脉

病變  
是難切

灼音  
發音標

發音

發音

沉實或狂語此為胃實陽盛即不可再汗也須當下  
 之設今下後又不解表裏邪亦衰矣仲景云太陽病  
 若蒸發熱者宜調胃承氣湯正四三和其胃氣也大醫  
 云若傷寒得汗後熱不退發昏及狂言者便可承  
 氣湯正四三下之若汗後熱不解但心下痞嘔逆又自  
 利大柴胡去大黃主之正三十一又有太陽證合行桂枝  
 却用麻黃之類發汗多亡陽仍發熱者真武湯正四四  
 主之更有風溫一證初得病熱而渴不惡寒雖發汗  
 已身灼熱者為風溫屬萎蕤湯雜五岐伯所謂汗出  
 而身熱者風熱也  
 若傷寒得汗後病解虛羸微熱不去可行竹葉石膏  
 湯正九五隨其虛實而治之  
 活人書八卷  
 問下之而熱不退者勞復食  
 復附  
 芥曰仲景云病人脉微而濇為醫所病大發其汗使  
 陽氣微又大下之使陰氣弱其人亡血病當惡寒後  
 乃發熱無休止時蓋陽微則惡寒陰弱則發熱陽微  
 惡寒四逆湯主之正七五陰弱發熱為內熱葶藶苦酒  
 湯主之雜十六大抵傷寒八日已上大發熱者此為難  
 治仲景云脉陰陽俱  
 虛熱不止者死又有醫人多用圓子藥下之身  
 熱不去微煩者梔子乾姜湯主之正四九傷寒五六日



卷九

去聲

刺本作干

金發復起

死人麥門

冬湯腹瀉

癆瘵勞復

雞鼠黃湯

許仁則七

味葱白湯

強生戶痞

音在噫音

監勉不忌

內音細  
噫上聲  
噫下聲

天下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之正四十五又問傷寒差後發熱者何也答曰此名

勞食復也病新差血氣尚虛津液未復因勞動生熱熱氣既還復入經絡名曰勞復神景云傷寒差已後

更發熱小柴胡湯主之正三十九脈浮者以汗解宜柴胡桂枝湯

脈實者以下解宜大柴胡湯又大病差後勞復者

枳實梔子湯主之正九十六麥門冬湯離五雄鼠尿湯離

七味葱白湯離八皆可選用○又食復者大病新

差脾胃尚弱穀氣未復強食過多停積不化因爾發

活人書八卷八

熱名曰食復大抵新病差多因傷食便作痞乾噫食

臭腹中雷鳴下利等證可與生薑瀉心湯正六十三仲景

於枳實梔子湯證云若有宿食內大黃如薄棋子五

六枚服之愈黃帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐

若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀食相薄兩熱

相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛

實調其逆從可使必已食肉

則復多食則遺此其禁也

活人書卷第八終

活人書卷第九

此一卷首論惡寒大抵太陽病必發熱而惡寒惡

寒家慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相薄脉

道沉伏愈令病人寒不可過但去被徹火兼飲以

和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火

寒氣入腹血室結聚針藥所不能治矣

問惡寒

答曰惡寒有二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而

惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脉必浮數屬桂

枝湯正一桂枝二越婢一湯正四麻黃湯正三十一青龍

湯正三十六證也發於陰者宜溫裏脉必沉細屬理中湯

四逆湯正七十五證也少陰病下利已惡寒而手足

若少陰病惡寒而手足自煩不足溫者可治宜建中湯

欲厚衣用大柴胡湯下之正三十一若發熱微惡寒者

屬柴胡桂枝湯也正三十一發汗後反惡寒者虛故也屬

芍藥甘草附子湯正七十二脉微而惡寒者此陰陽俱虛

也不可更吐下也發汗面色赤有熱者為欲解宜桂

枝麻黃各半湯正二十二傷寒大下後復發其汗心下痞

惡寒者表未解也不可攻其痞當先解表表解乃可

惡寒下

仲景少  
陰惡寒而  
手足自煩  
欲去衣被  
者可治今  
厚衣何欲  
况惡寒最  
慎于下今  
言下之又  
何邪  
仲景云  
不可更發  
下更



攻痞解表宜桂枝湯正二 攻痞大黃黃連瀉心湯正九

雖然太陽陽明少陰皆有惡寒要之太陽病或已發熱或未發熱必惡寒也陽明證俱宜下唯惡寒中

寒為病在經與太陽合病屬表發其汗耳若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡寒者白

虎證也正六四 又問有汗出惡寒者有汗出多而微惡寒者有頭汗出而微惡寒者何也答曰仲景云太陽

病其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以鑿下之也心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

活人書九卷 二

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯也正一 頭汗出而微惡寒者屬少陽宜

小柴胡湯也正廿九 又問背惡寒者何也答曰背惡寒有兩證三陽合病背惡寒者口中不仁口燥舌乾也

少陰病背惡寒者口中和也以此別之口中不仁口燥舌乾而背惡寒者白虎加人參湯主之正六五 口中

和而背惡寒者附子湯主之正八 仍灸之神景云少陰

當灸之附子湯主之神景云少陰

問惡風

惡風者衛中四時之虛風所以惡風也其人當汗出而脈緩也數與桂枝湯正二 桂枝加葛根湯正

使遍體微潤連日當自解矣又有太陽病發汗多亡陽遂漏不止衛虛而惡風者當溫其經也其人惡

風小便難四肢微急難 枝加附子也正六 若傷寒四五日身熱惡風頸項強胸下滿手足溫而渴者小柴

胡湯也正廿九 風濕相薄骨節疼痛掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草

附子湯主之正七

活人書九卷 三

問傷寒不得汗

答曰甲乙經云熱病脈常躁盛而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁而得汗者生大抵傷寒榮衛俱病

則無汗麻黃湯正十 葛根湯正十五 大青龍湯正三 葱豉湯雜七四 可選而用之若傷寒連服湯劑而汗不出

者死如中風法蒸之溫熱之氣於外迎之無不得汗也薪火燒地良久掃除去火可以水洒之取蚕沙桐

面色 反有熱色 者不欲解 也今改作 不可更吐 下也發汗 面色青有 熱者為欲 解何也 惡寒山寒 常坐惡寒 乃其方 是 按仲 景白虎證 時時惡風 今云惡寒 柯邪





是也今注  
云木附湯  
黃耆建中  
湯皆收汗  
藥則榮衛  
從出內熱  
寒美真若  
惜用各半  
湯為穩  
宜清職

去青寒強  
殊短羽鳥  
飛凡凡

亦傷寒亦有氣虛不能作汗者仲景云脈浮而遲遲  
為無陽不能作汗其身必痒宜桂枝麻黃各半湯主  
之正二陽明病法多汗反無汗如蟲行皮中狀者此  
久虛故也宜木附湯正七十黃耆建中湯正十七



問自汗

答曰傷寒無汗者七證自汗者九證太陽傷寒剛瘧  
病太陰病少陰病厥陰病陽明病皆無汗

凡少陰證無汗類麻黃湯之證然類麻黃證脈陰陽  
俱緊少陰脈微細為異也又汗出為陽微故仲景云  
陰不得有汗脈陰陽俱緊而汗出者九證衛不和自  
活人書

活人書

九卷

四

汗病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者衛不和  
也先其時發汗則愈屬桂枝也正一太陽病發熱  
汗出者此為榮弱衛強故汗出欲救風邪者宜桂枝  
湯又云病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不  
諸也以衛氣不共榮氣故以榮行傷風自汗  
脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈傷風自汗  
病發熱汗出惡風脈緩為中風屬桂枝湯正一又云  
太陽病項背強几几反汗出惡風桂枝加葛根湯  
八主之汗出而渴者五苓散去其不渴者茯苓甘草  
湯正三雖然仲景云傷風自汗用桂枝然桂枝湯難  
用須是子細消息之假令傷風自汗若脈浮而弱  
當行桂枝湯後無桂枝脈息證候而煩者即不可  
再服也若傷風自汗出而小便數者切不可與桂枝  
也仲景云太陽病自汗四肢拘急難以屈伸若小便  
難者可桂枝湯內加附子服之正六若小便數者慎  
不可與桂枝湯內加附子服之正六若小便數者慎  
桂枝附子攻表便咽乾煩燥厥逆嘔吐作甘草乾姜  
湯正五與之以復其陽若厥愈足溫更作芍藥甘草

活人書 卷九

音

發定切

少

去聲

惡去聲灼

音如灼

均之熱也

衛音漢臥

息也傷

別本作中

一本作風

難音中

音音中

音音中

音音中

音音中

音音中

音音中

音音中

湯與之其脚即伸若胃氣不和則語者與調胃承氣  
湯正三微瀉則止其語語者為藥甘草湯主脈浮自  
汗小便數者寸口脈浮為風大為虛風則生微熱虛  
則兩脛痺小便秘仍汗出為津液少不可快用桂枝  
宜服芍藥甘草補虛退風熱通風濕自汗大陽病發  
治誤服桂枝湯後病証仍存者風濕自汗熱而渴不  
惡寒者為溫病若發汗已身灼熱者名風濕自汗  
病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡息必汗語言  
難屬萎萎中濕自汗風濕相搏關節煩疼脈沉而細  
以知傷濕得之然當喜汗出不可止何以言中濕自  
之腎主濕故知腎入心為汗出不可止也中暑自  
汗惡寒身熱而渴屬白虎湯其出不可止也陽明病自汗  
惡熱身熱而渴屬白虎湯其出不可止也陽明病自汗  
而渴者不可與五苓散以汗多胃中燥者急下之陽  
明病其人汗多津液外泄胃中燥大便必硬下之陽  
明病其人汗多津液外泄胃中燥大便必硬下之陽  
活人書

活人書

九卷

五

者屬調胃承氣湯正三四雖然陽明汗多急下若小便  
自利者此為津液內竭雖爾不可攻之須自大便導  
之宜用蜜煎導法正四陽明病汗出而脈遲微惡寒  
者表未解也宜桂枝湯正一陽明病汗出而脈遲微  
汗而喘者發汗則亡陽自汗止其人惡風當溫其經  
愈宜麻黃湯正二亡陽自汗止其人惡風當溫其經  
宜桂枝加附子湯正六傷寒尺寸俱緊而汗出者  
亡陽也此屬少陰法當啣痛而復吐利其人熱不去  
內拘急四肢厥逆而惡寒者四逆湯正五主之汗  
多不止者可用溫粉撲之若汗多不止必惡風煩躁  
不得臥者先服防風白朮桂枝湯正七柔痙自汗  
喘滿逆次服小建中湯正七柔痙自汗喘滿逆次服  
口噤背反張汗出而不惡寒者霍亂自汗吐利汗出  
名柔痙小續命湯主之也雖少陰不得有汗而少陰亦  
四肢拘急手足厥冷雖少陰不得有汗而少陰亦  
有反自汗出之證陰證四肢逆冷額上反手陽明病

四一五



法多汗而陽明亦有反無汗之證不可不察也

問頭汗出

答曰病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於

頭凡頭汗出者五內乾枯胞中空虛津液少也慎不

可下下之者謂之重虛然頭汗出者有數證傷寒五

六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便

鞅脈細者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在

裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入

在裏此為半在裏半在外也脈雖沉緊不得為少陰

病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也

小柴胡湯傷寒五六日已汗下胃腸滿微結小便不

利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此表未解

也柴胡桂枝乾姜湯病人但頭汗出身無汗劑頸而還

小便不利渴飲水漿者此為瘧熱在裏身必發黃

散正六十一散陽明病下之其外有熱手足温不結胃

心中懊憹飢不能食但頭汗出者

滿無大熱頭汗出者

此名為水結在胃胸以頭汗出者

語者此為熱入血室但頭汗出者

愈汗出識語者有燥屎也過經乃可下也下之早語

言必亂以表實裏虛也下之愈宜承氣湯主之

答曰頭疼者陽證也太陽證頭疼必發熱惡寒無汗

者麻黃湯有汗者桂枝湯若已發汗或未

發汗頭痛如破者連翹葱白湯服湯不止者葛

根葱白湯主之陽明證頭疼不惡寒反惡熱胃

實故也陽明氣實故攻頭也調胃承氣湯主之

仲景云傷寒不大便六七日頭疼有熱者與承氣湯

其小便清者知不在裏續在表也當須發汗若頭疼

者必用葛根脈弦細頭痛發熱者屬少陽也少陽不

可發汗小柴胡主之太陰少陰經從足至胃俱

不至頭唯厥陰經挾胃屬肝絡膽循喉嚨上頰額連

目繫出額故太陰少陰並無頭疼之證仲景只有厥

陰一證吳茱萸湯治乾嘔吐涎沫頭疼而已大

抵屬三陽者頭疼為多也

者即是尚上有涎宜用瓜蒂末一錢暖水調下吐涎

立愈又問病人頭疼鼻塞而煩者何證也答曰此屬



濕家頭中寒濕故鼻塞而頭疼也內瓜蒂末鼻中則愈法在發黃門中

問身體痛 身痺附

答曰太陽少陰厥陰皆有身體痛當以外證與脈別

之太陽證表未解脈浮緊法當身體痛宜麻黃湯

以汗之脈浮緊當身體疼痛宜以汗解假令尺脈少故也尺脈遲者先以小建中湯

以養之脈浮者麻黃湯主之太陽中濕一身盡痛發熱身黃小便不利病人中濕因而傷風風濕相

薄一身痛重是名風濕當於風濕中求之麻黃加木湯主之

活人書 九卷 八

若脈沉自利而身體痛者陰證也急當救裏宜四

逆湯正五附子湯正六真武湯正五之類以溫之大

大便利而身體疼者當救裏大便如常或身重背強而身體痛者急當救裏不可不知也

腹中絞痛咽喉不利身如被杖者當作陰毒治之又

問發汗後身疼痛脈沉而遲當用何藥答曰仲景有

桂枝加芍藥生薑人參新加湯正十一蓋為此證也小

建中湯正十七兼治汗後身疼脈沉而遲者若霍亂吐

瀉止而身疼痛不休者少與桂枝湯正一即愈金匱

云瘡家雖身體痛不可發汗汗出作瘡又問身痺者

活人書 卷九

何也答曰脈浮而遲遲為無陽不能作汗其身必痺

太陽病七八日脈微而惡寒以陰陽俱虛不可更發

汗更下更吐也小柴胡湯主之正二十若重反發汗則氣虛必兩耳聾無聞素無熱人可為

藥甘草附子湯正七十二素有熱人可黃耆建中湯正二十七面赤有熱者未欲解也以

其不能得小汗出身必當痺宜桂枝麻黃各半湯正三

主之 問筋惕肉瞤頭眩身搖

答曰太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身瞤動欲擗

地者屬真武湯正五大凡發汗過多即身瞤動振擗

活人書 九卷 九

虛羸之人微發汗便有此證俱宜服真武湯羸甚者

去芍藥或少用之惡熱藥或有熱證者去附子餘依

本方加減法詳之傷寒若吐若下後心下逆滿氣上

衝胃起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振擗者茯

苓桂枝白朮甘草湯主之正五二傷寒應發汗而動氣

在左不可發汗發汗則頭眩汗出筋惕肉瞤此為逆

難治且先服防風白朮牡蠣散雜二次服建中湯正三

問喘 答曰傷寒喘只有太陽陽明二證太陽病頭疼發熱

活人書 卷九



去声

似音族遠  
也近也

示仲景作  
亦與

初本無麻  
黃主喘至  
五之五下  
五字

物音寸

變音硬

按傷寒  
引飲乃飲  
精本白頭  
身湯以實

身疼惡風無汗而喘者宜汗屬麻黃湯正三十一桂枝證

遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩湯正三十二

連湯也正三十九太陽病下之微喘者表未解故也桂枝  
加厚朴杏子湯也正十九發汗後不可更行桂枝湯汗  
出而喘無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯也正五

陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜下屬承

氣湯正四十三然陽明病脉浮無汗而喘發汗則愈宜麻黃湯正三十一太陽與陽明合病

喘而胃滿者不可下宜麻黃湯又發汗後飲水多欬

而微喘者水停心下腎氣乘心故也小青龍去麻黃

加杏仁正三十六也小腹滿者去麻黃加茯苓也正三十七麻

何故去之此治心下有水而喘不當汗也若陰證喘  
小便不利小腹滿故去麻黃加茯苓也正三十八

活人書正九卷十

促脉伏而厥者唯返陰丹五味子湯主之

問渴

若日脉浮而渴屬太陽傷寒表不解心下有水氣而

根正三十一太陽病服桂枝大汗出後大煩渴者白虎加  
人參湯若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散正六

太陽證身熱而渴者有汗而渴屬陽明正六

為人參湯主之虛人老人及春秋月可與竹葉石膏  
湯正五陽明病但頭汗出小便不利渴飲水漿身必  
發黃宜茵陳湯正五陽明病下利大便而嘔舌  
上白胎而渴者小柴胡去半夏加人參桂枝根正五

傷風寒熱或發熱惡風而渴屬少陽傷寒四五日身

手足溫而渴者小柴胡去傷寒熱自利而渴屬少陰傷寒熱

之及十一  
去下利者  
中虛出自  
利而渴除  
邪注云腎  
虛故引水  
白虎通用  
白通四逆  
指本宜武  
等湯此茶  
以湯為熱  
後發以渴  
為虛何耶  
徐見下利  
條按仲景  
篇無汗無  
表證者白  
虎加人參  
湯其表不  
解者不可  
與也

流于少陰之經少陰土腎腎惡燥故渴而引飲少陰  
下利欬而喘渴者皆湯主之正六十七下利欲飲水者以  
有熱也白頭翁

湯主之正五十八○切戒太陽證無汗而渴者不可與

白虎湯仲景云渴欲飲水無表證者白虎加人參湯

意以小青龍小柴胡湯出仲景云傷寒表不解心下  
有水氣咳而渴小柴胡湯去半夏加栝蒌也正三十一

寒四五日身熱惡風脈下滿手足溫而渴陽明證汗  
者小柴胡去半夏加人參栝蒌也正三十九

多而渴者不可與五苓散汗多胃中燥者復利其

之仲景云陽明病發作小便黃也意以竹葉湯與

有時汗出多者急下之然太陽病渴終不可與白虎  
耶太陽證得汗後脉洪大而渴者方可與之也陽明

病渴終不可與五苓耶陽明證小便不利汗少脉浮  
活人書正九卷二

而渴者方可與之此皆仲景之妙法也仲景諸苓湯

發熱渴欲飲水小便不利凡病非大渴不可與水若小  
利者諸苓湯主之正六十七

渴咽乾者小小呷滋潤之令胃中和若大渴煩躁甚  
能飲一斗者與五升飲之若全不與則乾燥無由作

汗發喘而死者見因渴飲水得汗小渴遂劇飲之  
致停飲心下滿結喘死者甚眾當以五苓散正六或

陷胃丸正三十九與之金匱云得時氣至五六日而渴飲

中熱尚少不能消之便更爲人作病矣至七八日大  
渴欲飲水猶當依證與之常令不足勿極意也凡人

但見仲景云得病反能飲水此爲欲愈遂小渴者乃  
強飲之因成其禍不可勝數大抵傷寒水氣皆因飲

強飲之因成其禍不可勝數大抵傷寒水氣皆因飲



平清致上  
其李  
切之瘧音  
扶也逆  
氣也說也  
乞悟也內  
則不致嘔  
嗜嗜音謂  
食氣不  
通亦在體  
細中  
音象累  
上音蓋  
楚解切  
鮮音胸中  
音象  
按泰議公  
此卷言有  
大厚非深  
于仲景者  
不能閉於  
許學士云  
活人書之  
意不可不  
察察夫何  
卒知仙書  
指及吳想  
指堂不知  
藥言有  
次序定疑  
以麻黃桂  
枝三湯用  
之於切後  
其誤人也  
深笑知仙  
徒知者書  
以活人不  
知通理而

水過多所致水停心下氣上乘心則為喘喘結於  
胃腸則為水結胃中虛冷則為嘔為噎為氣相薄  
則為噎上迫於肺則為咳清入腸中則為利邪熱所  
薄畜於下焦則為小便不利小腹滿或裏急瀉下  
膚則若陽毒倍常躁盛大渴者黑奴丸主之雜十  
暑伏熱深累取不差其人發渴不已酒蒸黃連丸主  
之雜十九

**問鼻衄**

春曰傷寒太陽證衄血者乃解蓋陽氣重故也仲景  
所謂陽盛則衄若脈浮緊無汗服麻黃湯正十不中  
病其人發煩目瞑者必衄小衄而脈尚浮緊者宜  
活人書九卷

再與麻黃湯正九後脈已微者不可行麻黃湯也若  
脈浮自汗服桂枝湯正一不中病桂枝證尚在必須  
疼甚而致衄小衄而脈尚浮者宜再與桂枝也衄後  
脈已微者不可行桂枝湯也大抵傷寒衄血不可發  
汗者為脈微故也治法衄家不可發汗汗出額上陷  
脈緊急直視不能瞬不得眠然而  
無汗而衄脈尚浮緊者須再與麻黃湯  
有汗而衄脈尚浮緩者須再與桂枝湯脈已微者黃  
芩芍藥湯雜七犀角地黄湯雜八衄血不止者茅花  
湯雜八十一若衄而渴心煩飲則吐水先服五苓散正六六  
次服竹葉湯正九五又問陰證有衄血者乎春曰陰證

得解即不  
明仲景之  
深意亦當  
守其戒之  
種言固知  
衄家亡血  
豈皆不可  
汗復用麻  
黃桂枝以  
發之其矣  
恐又從而  
和之載之  
指掌深流  
天下其為  
苦也廣矣  
以致我  
明陶華無  
知而妄作  
於瑣言中  
云桂枝麻  
黃治衄治  
聖乃欲以  
其種中邪氣  
耳此正東坡  
所宜交殺  
公報其子  
必行邪華  
而誰曰不仁  
別本中

自無熱何緣有衄若少陰病但厥無汗強發之必動  
血未知從何道出或從口鼻或從耳目是謂下厥上  
竭為難治



**問腹滿身重難以轉側口中不仁面垢讞語遺尿**

春曰此三陽經合病也白虎湯主之正六四不可發汗  
汗之則讞語下之則額上生汗手足逆冷若自汗者  
白虎加人參也正六五按仲景篇若自汗出者白虎湯  
主之若自汗者白虎加人參也  
也與仲景不同學者詳之  
活人書九卷



活人書卷第十

此一卷首論結胃與痞蓋病發於陽下之早即為結胃發於陰下之早即為痞然結胃與痞相似但以痛不痛為異耳心下滿而鞭痛者為結胃但滿而不痛者為痞蓋家不審一有差互立致危殆結胃屬陷胃證痞屬瀉心證其詳各於逐問備論之矣

問心下緊滿按之石硬而痛

答曰此名結胸也傷寒本無結胸應身熱下之早熱

活人書 卷第十

氣乘虛而入痞結不散便成結胸若已誤轉了初未成結胃者急與

理中湯正十四自然解了更不作結胃蓋理中治中焦故也此古人亦說不到後人因消息得之若大段轉損有厥證者兼與四逆湯正十五便安胃中強和傷寒未退者即候日數足可下却以承氣再下之正四三蓋前來下得其證心下緊滿按之石硬而痛項強如柔

未是故也其脈寸口浮關尺皆沉或沉緊

名曰結胃也治結胃大率當下仲景云下然脈浮與

大皆不可下下之則死尚宜發汗也仲景云結胃脈浮者不可下只

可用小陷胃湯正四十一大抵脈浮是尚有衣證兼以小柴胡湯等正二十九先發表未證罷方用下結胃藥便安

○西晉崔行功云傷寒結胃欲絕心膈高起手不得

近用大陷胃湯正三十八皆不差者此是下後虛逆氣已

不理而毒復上攻氣毒相薄結於胃中當用枳實理

中圓雜合十二先理其氣次療諸疾古今用之如神應手

而愈然結胸有三種有大結胃不披而痛胃連膈腹

胃丸主有小結胃按之心下痛為小結胃有水結在

胃脅間亦名結胃頭微汗出但結胃無大熱此水結

小柴胡去黃加又有寒熱二證有熱實結胃胃中煩

壯瀉主之正十九又有寒實結胃寒實結胃

煨懷舌上燥渴脈沉滑者皆有寒實結胃寒實結胃

三物白朮散正三十八近世治結胃多行金針丸用疏

黃陽起石者若寒實結胃行之或有差者若熱實結

胸行之必死也又問大陷胸湯與大陷胃丸如何大

陷胃用甘遂太峻不可輕用須量虛實輕重不得已

即大陷胃丸最穩又問聖餅子灸臍中如何此尤不

可用也又問臧結者何也答曰臧結者死仲景無治

法大抵臧結其證如結胃狀飲食如故時時下利陽

脈浮關脈小細沉緊名曰臧結舌上白胎滑者難治

也又云臧結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎

滑者不可攻也二者病人脇下舊有痞連在臍傍痛



九下戶  
引小腹痛入陰筋者亦名藏結死不治  
問心下滿而不痛  
答曰此名痞也傷寒本無痞應身冷豎反下之遂成  
痞積實理中丸  
最良  
仲景治痞氣諸湯中有生  
湯正六一此二方  
仲景云滿而不痛者為痞柴胡不中  
與也半夏瀉心湯主之  
此湯藥味益本理中  
痞先用桔梗枳殼湯尤妙  
綠桔梗枳殼行氣下  
高先用之無不驗也結胃與痞關脈瀕皆沉若關脈  
浮者大黃黃連黃芩瀉心湯  
主之  
關浮則結熱  
活人書  
六十卷  
若復惡寒汗出者附子瀉心湯  
主之病人心下  
痞與瀉心湯痞不解發渴口燥煩小便不利者五苓  
散  
主之汗出表解而胃中不和心下痞鞭乾噫  
食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主  
之  
下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭  
而滿此以醫下之也若復下之其痞益甚甘草瀉心  
湯主之  
蓋此非結熱以胃中虛客氣上逆故使  
鞭也下利而心下痞服生薑瀉心湯甘草瀉心湯利  
不止者當治其下焦赤石脂禹餘糧湯主之  
蓋

生薑瀉心甘草瀉心皆治中焦此利在下焦若只治  
中焦則利益甚耳服赤石脂禹餘糧湯利復不止當  
利其小便五苓散主之凡痞服瀉心湯不愈然後可  
用陷胃丸  
正五  
下之  
不可用陷胃湯蓋  
大抵結胃與  
痞皆應下然表未解者不可攻也仲景云當先解表  
表解乃可攻痞解表宜桂枝湯  
正一  
攻痞宜大黃黃  
連黃芩湯  
正五  
外證未解心下妨悶者非痞也謂之  
小柴胡湯加乾姜  
若太陽證未除而數下之遂協熱  
而利利不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主  
活人書  
十卷  
之  
正六  
十棗湯  
正八九  
大柴胡湯  
正二十  
皆治心下痞此  
方尤難用須是表證罷不惡寒身涼其人熱熱汗出  
發作有時頭疼心下痞鞭滿引脇下疼乾嘔短氣者  
乃可行十棗湯表未解者慎不可用也大柴胡湯治  
傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者非大  
柴胡湯不可也  
正三  
若發汗吐下後心下痞鞭噫氣  
不除者旋復代赭湯主之  
正百  
有旋復代赭湯證其  
人或咳逆氣虛者先服四逆湯  
正七  
胃寒者先服理  
中丸  
正七  
次服旋復代赭湯為良  
旋復花代赭湯是  
解後心下痞鞭證



問嘔者

答曰無陽則厥無陰則嘔嘔者足陽明胃之經足陽明之氣下行今厥而上行故為氣逆氣逆則嘔仲景云嘔多雖不大便不可下可與小柴胡湯正廿九上焦得通津液得下胃氣因和決然汗出而解大抵嘔證不一各有治法要之小柴胡湯尤相主當耳與小柴胡湯胃腸滿而嘔日晡發潮熱者可與小柴胡湯加芒硝也正廿四若嘔不止心下急鬱鬱微煩者與大柴胡湯也正廿三大便秘者方加大黃大柴胡湯治嘔最妙活人書十卷枳實去積壓虛氣須是去大黃仲景云嘔多難有積明證慎不可下官局桂枝湯最良亦用枳實耳方具第十卷 古人治嘔多用半夏生薑孫真人云生薑是嘔家聖藥仲景治嘔皆用之太陽與陽明合病必下利夏生薑湯主之正廿五中脘有積者胃氣不和嘔者黃連湯主之正廿六太陽與少陽合病而自利若嘔者黃芩加半夏湯正廿七金匱諸嘔吐穀不得下者小半夏湯正廿八小半夏加茯苓湯正廿九小半夏加橘皮湯皆可選用也嘔而發熱者小柴胡湯主之正廿九嘔而發渴者猪苓湯主之正三十先嘔却渴者此為欲解急與之水先渴却嘔者為水停心下此屬飲家仲景云本渴飲

差楚懶切 按嘔者聲 亦兼出者 也今云嘔 者飲食不 下何邪又 宛與噦蓋 字異而音 義俱同者 也乾嘔者 其聲輕小 而短噴者 其聲濁惡 而長難係 証却有所 微甚之殊 今云所謂 久而不叙 証則有 六經重矣

水而嘔者柴胡不中與也宜治鬲間有水赤茯苓湯主之雜廿四若少陰證而嘔者真武湯去附子加生薑也正百五若汗若吐若下後虛煩不得眠若嘔者梔子生薑湯正百七主之傷寒差後嘔者有餘熱在胃腕竹葉湯加生薑主之正百五又問有乾嘔者何也答曰大凡嘔者飲食不下乾嘔者今人所謂噦也或因汗出或因有水或因下利脾胃有熱故使乾嘔官局中楮梗湯最佳雜百世仲景治法汗自出乾嘔者桂枝證也正表不解心下有水氣乾嘔發熱者小青龍也正活人書六十卷身涼汗出兩脇痛或乾嘔者十棗湯也正九少陰下利脉微與白通湯正九利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯也正九少陰下利裏寒外熱脉微欲絕或乾嘔者通脉四逆湯也正六乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯也正百傷寒論云食穀欲嘔者屬劇者屬上焦也仲景無治法大抵吳茱萸湯治少陰證也穀入胃而嘔屬陽明宜與小柴胡湯正二十九○若病人直患嘔吐而復脚弱或疼乃是脚氣當作脚氣治之

問吐

飲如常 正三



仲景以  
本因寒下  
醫復吐下  
因成寒格  
吐証故用  
此湯公却  
言開味澤  
又不言吐  
下而言汗  
下何耶又  
有脈數為  
胃中虛冷  
而吐者仲  
景嘗言之  
美厥與証  
向何不引  
之以為証  
繞之別

答曰吐有冷熱二證寸口脈數手心熱煩渴而吐以

有熱在胃腕五苓散主之正六十六傷寒有表證渴欲飲

水逆由心經受熱而小腸不利故也宜服五苓散發

汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止小

半夏加茯苓湯大半曾經汗下關脈遲胃中虛冷而

吐乾薑黃芩黃連人參湯主之正百七寒多不飲水而

吐者理中湯去朮加生薑主之正百四少陰病飲食入

口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈

弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈上有寒飲

乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯正十五吐利手足

活人書八十卷七

逆冷煩燥甚者吳茱萸湯主之正百若傷寒解後虛

羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之正五

**問嘔吐而利**

答曰嘔吐而下利有兩證仲景云傷寒發熱汗出不

解心中痞硬嘔吐而下利者大柴胡湯下之正五又有

霍亂證霍亂嘔吐而利熱多而渴者五苓散正六十六寒

多不飲水者理中丸正十四或有寒腹痛滿或四肢拘

一作湯服之吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手

足厥冷者四逆湯主之正七十五少陰病吐利手足逆冷

煩燥欲死吳茱萸湯主之正百吐利止而身體痛不

休者當消息和解其外宜桂枝湯正三仲景大柴胡一

出不解心中痞嘔吐而下利吐利已汗出而厥四肢

拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加猪膽湯正三若夏

月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆

冷冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷散正須井中沉冷

極冷頓服之乃効香薷散夏月預宜合下以備此證

**問咳嗽**

答曰傷寒咳嗽有兩證有太陽證咳嗽小青龍湯正

活人書八十卷八

小柴胡也有少陰證咳嗽真武湯正百五四逆散正

猪苓湯也大抵熱在上焦其人必飲水水停心下

則肺為之浮肺主於咳水氣乘之故咳而微喘仲景

云傷寒表不解心下有水乾嘔發熱而咳小青龍湯

主之小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓正三十六往來

寒熱胃脇滿痛或咳者小柴胡湯主之小柴胡去人

參大棗加五味子乾薑正二十九若少陰證咳嗽四肢沉

重疼痛小便不利自下利而咳真武湯主之真武湯

加五味子乾薑大抵傷寒水氣皆因飲水過多古人



治水氣而咳者病在陽則小青龍主之病在陰則真武湯主之四肢厥逆腹中痛或泄利而咳四逆散主之四逆散加五味子乾薑正五十六下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠猪苓湯主之正五十七古今錄驗橋皮湯治嗽佳

問咽喉痛

答曰咽喉痛有陰陽二證脈浮數面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血者此陽毒也脈沉遲手足厥冷或吐利而咽中痛此少陰證也病源云此為下部脈都不活人書正五十八九

至陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上衝故咽喉不利或痛而生瘡也傷寒脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利此候汗下重熨俱不可汗出者橐本粉傳之咽喉痛者甘草湯正五十四桔梗湯正五十三猪膚湯正五十二半夏散正五十一通脈四逆去芍藥加桔梗湯正五十麻黃升麻湯正四十九可選而用之又伏氣之病謂非時有暴寒中人伏氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈微弱法先咽痛似傷寒非喉痺之病次必下利始用半夏桂甘湯正四十三次四逆散

懸譯四逆散不主咽

梨漿作湯

主之正五十六此病只一二日便差古方謂之腎傷寒也

問口燥咽乾

答曰脾藏有熱則津液枯少故令口燥而舌乾仲景云傷寒無大熱口燥渴而煩背微寒者白虎湯加入參也正五十五又云陽明病渴欲飲水口乾舌燥者白虎加入參湯主之正五十五若咽乾者慎不可發汗發汗則重亡津液少陽證口苦咽乾者小柴胡主之正五十四陰證口燥咽乾者急下之病人默默欲眠目不能閉起若不安其聲啞或咽乾者當作狐惑治之活人書正五十四十卷

問病人但漱水不欲嚥

答曰陽明病頭疼身熱口燥但漱水不欲入咽者必衄也若病人無表證不發寒熱胃腹滿唇燥但欲漱水不欲嚥者此為有瘀血必發狂也輕者犀角地黄湯正五十一甚者抵當湯正五十陽明病其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑者宜此藥下之假令已下病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者不可下之假令已下脈數不解熱則消穀善飢或太陽病身黃脈沉結小腹鞭小便不利者無血也小便不利其人如狂者血證諦也至六七日不大便者有瘀血也宜服此藥屬陽明

問不欲眠



答曰太陽證發汗大汗出胃中乾煩燥不得眠欲飲

水者當少少與之胃中和即愈若脉浮小便不利發

渴者五苓散正本六主之下後復發汗晝日煩燥不得

眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者

乾薑附子湯主之正本三若發汗若吐若下後虛煩不

得眠劇則反覆顛倒心中懊憹者宜梔子豉湯正本五

吐之梔子豉湯一盞半為一劑傷寒大熱乾嘔呻吟

錯語不得眠黃連解毒湯主之藥七傷寒吐下後心

煩之氣晝夜不得眠酸棗湯主之雜八少陰病得之

活人書十卷十一

二三日已上心中煩不得眠黃連阿膠湯主之雜五

若少陰病下利而渴不得眠猪苓湯主之正六七又問

傷寒差後不得眠何也蓋熱氣與諸陽相并陰氣未

復所以病後仍不得睡也梔子烏梅湯主之雜九

問多眠

答曰多眠有四證有風溫證有小柴胡證有少陰證

有狐惑證病人尺寸脉俱浮頭疼身熱常自汗出體

重其息必喘四肢不收默默但欲眠者風溫證也風

溫不可發汗宜萎蕤湯雜五○病人脉浮頭項強痛

而惡寒者太陽證也十日已去脉浮細而嗜臥者外

已解也設胃滿脇痛者與小柴胡湯正九脉但浮者

麻黃湯主之正十一病人尺寸脉俱沉細但欲寐者少

陰證也急作四逆湯正七十五復其陽不可緩也若狀如

傷寒四肢沉重忽忽喜眠須看上下唇上唇有瘡

蝕五藏下唇有瘡虫蝕下部當作狐惑治之

問身凉汗出兩脇疼痛或乾嘔

答曰此十棗湯證也仲景云太陽中風下利嘔逆表

解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心中

活人書十卷十二

痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解

裏未和也十棗湯主之正九○大抵脇下痛者此為

有飲須分表裏乾嘔微利發熱而咳為表有水小青

龍湯加羌花主之正十五身體凉表證罷乾嘔而脇下

痛為裏有水十棗湯主之十棗湯非小青龍湯之比

須量人虛實不可妄投

活人書卷第十終



活人書卷第十一

以吃逆與  
或逆呼之  
然欬逆二  
字僅見於  
脈平脈法  
中其餘篇  
但有咳而  
無咳逆後  
人遂謂咳  
即欬逆而  
曰欬逆者  
實逆之名  
由是咳與  
欬逆之名  
遂亦云仲  
景全法  
指與乳  
咽同類者  
言何曾指  
欬逆言乎  
欬逆言其  
語發聲于  
喉間則遠  
然止則然  
逆短促  
不長有若  
欬嗽之欬  
然故曰欬  
逆者逆者  
則言其似  
欲嘔物以  
出而無所  
但逆之

此一卷首論咳逆傷寒咳逆此證極難仲景經中  
不載孫真人云咳逆遍尋方論無此名稱深窮其  
狀咳逆者噦逆之名蓋古人以咳逆為噦耳大抵  
咳逆者古人所謂噦是也晚者今人所謂乾嘔是  
也

問咳逆

答曰咳逆者仲景所謂噦者是也噦逆氣胃寒所生  
傷寒本虛攻其熱必噦又云傷寒大吐下之極虛復

發汗者其人外拂鬱復與之水以發其汗因得噦所  
以然者胃中寒故也橘皮乾薑湯雜九十九 羌活附子散

差者灸之必愈其法婦人屈乳頭向下盡處骨間灸  
壯丈夫及乳小者以一指為率正  
柴胡湯正二十九 橘皮竹茹湯雜五 仲景又云傷寒噦而

腹滿視其前後知何部不利利之即愈仲景無方前  
部宜猪苓湯

香柿蒂各一分甘草良薑各半錢沸湯點作一服乘

胃承氣湯正十三 扁鵲中藏經治傷寒咳逆丁香散丁

有力直至  
承而後  
非如乾  
之輕而  
甚故曰  
咳逆今乃  
以噦逆當  
咳逆何耶  
吃音耶  
百押

柴胡湯解  
之

何謂起于  
下五止  
隨本無  
論論不  
相諸條係  
後人所增  
姑存之以

熱猛喫極効三因第十一卷又有竹茹湯等方亦下

香散方竹茹湯治陽證也本事方第八卷治傷寒候

咳逆豆蔻湯治陰證咳逆丁香茴香肉豆蔻等藥若

陽證不可用凡咳逆多有先熱而喫生冷或涼藥多

相激而成蓋陰陽二氣相搏林人之僕本發大熱以

涼藥下之想太甚咳逆四五日竟至於服丁香柿蒂

而后却再以小柴胡之屬解其餘熱遂愈下后蓋有

身熱不解治傷寒咳逆後二方出撫州華蓋山周

生惟一備急方救急方香附子橘核各半兩細判用

活人書 十一卷 二

酒半盞先將藥在石銀器內炒漸漸滴酒炒藥焦

色研細末每二錢水一小盞煎至八分細細旋

一方單用香附子末又方大蒜頭二箇煨動研爛

白薑末丸得研和如梧桐子大搗薤菜自然汁吞下

二十圓病退再服一十五圓

問發黃

答曰病人寒濕在裏不散熱畜於脾胃膜理不開瘀

熱與宿穀相薄鬱蒸不消化故發黃漢贊南方暑濕  
近夏瘴熱蓋瘴

者黃也古人以黃為瘴溫熱然發黃與瘀血外證及

相薄民多病瘴甚為附腫



脉俱相似但小便不利為黃小便自利為瘀血要之  
發黃之人心脾蘊積發熱引飲脉必浮滑而緊數若  
瘀血證即如狂大便必黑此為異耳凡病人身體發

熱頭面汗出身無汗劑頸而止渴引水漿小便不利

如此必發黃茵陳蒿湯正九三加五苓散正六六也茵陳蒿湯

十分五苓散五分二件拌和每服一錢溫水調下日三服病人脈湯得小便利如

皂莢汁赤一宿腹減則黃從小便中出也古人云治

濕不利小便非其治也大抵發黃者熱在裏梔子

藥皮湯正五十一麻黃連翹赤小豆湯正三十四可選而用之

活人書十一卷三

又方傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口哈水搗一字許

入鼻中出黃水甚驗即用茵陳蒿湯調五苓散服之

最良又問白虎證亦身熱煩渴引飲小便不利何以

不發黃答曰白虎與發黃證相近遍身汗出此為熱

越白虎證也頭面汗出頸已下都無汗發黃證也又

問太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何太陽中濕

也仲景云傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕

在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之第六卷第

十又問病人脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛

又按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小  
便難有潮熱時時咳嗽者何也答曰少陽中風也小  
柴胡湯主之匡正

問發狂

答曰發狂有二證陽毒發狂畜血如在其外證與脉

皆不同病人煩燥狂妄言面赤咽痛脉實潮熱獨

語如見鬼狀此陽毒也病人無表證不發寒熱唇燥

但欲漱水不欲入咽其脉微而沉小腹鞭滿小便反

利大便必黑身黃發狂此血證諦也病人加熱狀煩

活人書十一卷四

無熱此為陰伏其血證審矣仲景云太陽病不解熱

結膀胱其人如狂其血自下者愈若外不解者尚未

可攻當先解其表宜桂枝湯正一外已解但小

腹急結者乃可攻之屬桃仁承氣湯主之正十四大抵

傷寒當汗不汗熱畜在裏熱化為血其人喜忘而如

狂血上逆則喜忘血下畜則內爭其者抵當湯正九十二

抵當圓正九十一輕者桃人承氣湯正四十四犀角地黃湯正

須取盡黑物為効失汗熱畜在膀胱經若用抵當

有畜血證而外不解亦未可用抵當湯先用桂枝湯

桂枝湯以解其外緣熱在膀胱太陽經故也又有

火邪發驚狂者鑿以火於臥床下或周身用火迫切

汗出或熨而成火邪其人亡陽煩躁驚狂卧起不安



桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯正十一 桂枝甘

草龍骨牡蠣湯正十四 主之凡灸及燒針後証以火劫

引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣湯更捷正十三 者並用劫法治之金匱風

問發斑

答曰發斑有兩證溫毒發斑 溫毒發斑者冬月觸胃

寒毒至春始發或已發汗吐下表證未除毒氣未解

故發斑黑膏主之難九十三 或冬月溫暖人感乖戾之氣

至春初為積寒所折毒氣未得泄迨天氣暄暖溫毒

始發肌肉斑爛癰疹如錦文而咳心悶嘔清汁葛根

活人書卷十一 橘皮湯難九十四 屢用之驗黃連橘皮湯亦佳難百五廣州

如壞熱病發斑者與時氣發斑同或未汗下或已汗

下熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚遂發斑

瘡癰疹如錦紋俗呼麩瘡素問謂之疹發斑者下之

虛入胃故也下之太遲熱留胃中亦發斑服熱藥過

多亦發斑微者赤斑出五死生劇者黑斑出十死

一 大抵發斑不可用表藥表虛裏實若發其汗重令

開泄更增斑爛也皆當用化斑湯難百九 玄參升麻湯

阿膠大青湯難九十五 猪膽梔子湯難百四 或與紫雪

大妙可下者與調胃承氣湯正四十五 宜候才有赤點如蚊

其狀如蚤咬却 又有陽毒發斑見四卷二問四問宜參酌之

問識語

答曰病人有識語有鄭聲二證鄭聲為虛當用溫藥

白通湯主之正九十七 識語為實當須調胃承氣湯主之

再與之仲景云實則識語虛則鄭聲鄭重也重語也

世多不別然識語鄭聲亦相似難辨須更用外證與

脈別之若大小便利手足冷脈微細者必鄭聲也大

便秘小便赤手足溫脈洪數者必識語也以此相參

活人書卷十一 然後用藥萬全夫大抵傷寒不應發汗即識語仲景

寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏反發其汗識語屬

津液越出大便為難表虛裏實則識語 識語屬

胃和中則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯然亦有

三陽合病識語者三陽合病腹滿身重難以轉側口

實不可汗下宜 有胃實識語者病人身熱汗出大便

白虎湯正六十四 或發汗多亡陽識語者仲

氣湯正四十三 大承氣正四十四 外 或發汗多亡陽識語者仲

臺承氣湯無芒硝尤穩 胡桂枝湯正三十二 和其榮衛以通津液後自愈恐人作

燥屎攻之慎 有下利識語者下利識語有燥屎也調

不可攻也 有下後識語者傷寒八九日下之胃滿煩驚

湯主之 有下後識語者傷寒八九日下之胃滿煩驚



婦人傷寒  
明理論

側者柴胡加龍  
骨牡蠣湯正三十三有婦人熱入血室讖語者婦人傷寒

適來晝日明了暮則讖語如見鬼狀者比為熱入血  
室無犯胃氣及上二焦速用小柴胡湯治之正三十九若

行湯送熱入胃令津燥中焦上焦不榮成血結胃狀  
須常針期門也婦人中風發熱惡寒經水過來七八

日熱除脈遲身躁胃腸下滿如結胃狀讖語者此為  
熱入血室也常刺期門隨其實而取之已上二焦熱

結在期門也若犯胃氣晝夜讖語喜忘正三十九○又問仲景  
小腹滿小便利屬抵當湯證也正九十二

云無犯胃氣何也答曰熱因經水適來乘虛入室故  
血室有熱遂令讖語當以小柴胡解之正三十九即與胃

實讖語不同胃實有燥莖故宜調胃承氣湯下之正  
三十三

若血室有熱讖語非胃家實仲景恐人作胃實攻  
活人書四十一卷七

之故曰無犯胃氣也大抵讖語是熱屬陽而反見陰  
證者逆

問吐血  
答曰傷寒吐血由諸陽受邪熱初在表應發汗而不

發汗熱毒入深結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血  
甚者抵當圓正九十輕者桃人承氣湯正四十四兼服犀角

地黃湯正十六三黃圓正八十九

問腹痛 腹脹滿附

答曰日本太陽病豎反下之因爾腹滿時痛是有表復

有裏仲景所以用桂枝加芍藥湯主之正三十三痛甚者

加大黃正三十三桂枝加芍藥即是小建中也太陰脈弱

陽氣易動故也下利難經云痛為實大抵痛宜下  
者先煎芍藥十餘沸難經云痛為實大抵痛宜下

云發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯正四十二景

又曰腹中滿痛此為實當下之屬大柴胡湯正三十一腹

痛有二證有熱痛有冷痛尺脈弦腸鳴泄利而痛者

冷痛也小建中湯主之正三十一仲景云陽脈清陰脈弦

法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯

小柴胡去黃芩正三十九陰證腹痛即四逆散正七十五通脈四逆

加芍藥湯正八十一腹痛小便不利者真武湯正百五閉脈

活人書四十二卷八

實腹滿大便秘按之而痛者實痛也桂枝加大黃湯

黃連湯正八十三大承氣湯主之正四十二○又問腹脹

滿者何也陰陽不和也桔梗半夏湯最良正九十九仲景

論太陽證發汗後腹脹滿也厚朴生薑半夏甘草人

參湯正五十八下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯

吐後腹脹滿者與調胃承氣湯正四十三少陰病六



明經或因不大便中有燥屎故煩躁耳仲景云病人不大便五六日遠勝痛煩躁發作有時者此有燥屎也宜承氣湯大抵得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下硬小便利尿定鞭以小承氣湯五六日少與微利之然有病已差尚微煩必大便鞭當問其小便便日幾行若小便少津液當還 **大抵陰氣少陽氣勝則熱而煩故**

**太陽經傷風多煩而躁也**仲景云太陽傷風脈桂枝湯正一煩不解先刺氣池

風府却與桂枝湯又云太陽傷風脈浮發熱惡寒身疼痛無汗而煩躁者大清龍湯主之正五又云傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之正七又云傷風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐五苓散主之正六又云傷寒得病無熱但狂言煩躁不安精氣不與人相當但與五苓散二大錢服之當與新汲井水飲一升許即以指刺喉去之隨手愈然而太陽證自汗心煩若小便數者又不可用活人書

**桂枝也陽虛陰盛亦發煩躁陽氣弱為陰所乘而躁故**

**少陰病亦煩躁**連阿膠湯主之正三已上心煩不得卧手

足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之正四少陰病吐利手足逆冷而嘔渴煩不得眠猪苓湯主之正五少陰病下利七日欬而嘔渴煩不得眠猪苓湯主之正五少陰病惡寒而踈時時自煩欲去衣被大柴胡下之正三十一

**學者當以外證與脈別之**寸關浮數身熱而煩者屬

逆自利而煩者屬少陰也然有汗之而煩者仲景云太陽病發汗

者不得眠欲得飲水者少與之令胃中和則愈有

**下之而煩者**仲景云下之後發汗晝日煩躁不得眠

乾薑附子湯主之正三又云發汗吐下後虛煩不得眠心中懊憹者梔子豉湯主之正四發汗若下之病

人不解煩躁者茯苓又有病已解而反微煩者此由四逆湯主之正六 **病新差不勝穀損穀則愈**先用小柴胡湯正五和其

**問下利者**

**答曰傷寒下利多種須辨識陰陽勿令差互**三陽下

熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身不熱以此別之大抵下利挾太陽脈證便不得用溫藥俗醫但見下利便作陰證用溫熱藥 **太陽陽明合病必下利葛根湯**正二十六

主之 **少陽合病自下利黃芩湯主之**正十五 **若嘔者黃芩湯**

活人書 **加半夏生薑也**或性來寒熱而嘔其脈浮大而弦者

**陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者**

**失也互相尅賊名為負也**下利而身熱胃脘病滿乾

而弦者是其證也蓋陽明者土其脈長大少陽者木其脈弦若合病土被木賊更下利為胃已困若脈不

弦者順也為土 **自利不渴屬太陰**四逆湯主之正四

**利而渴屬少陰**白通湯正十七白通加猪膽湯正八通

正五四逆加人參湯 **其餘下利皆因汗下後證也大**

**抵傷寒下利須看脈與外證下利而脈大者虛也脈**

**微弱者為自止下利日十餘行脈反實者逆下利脈**



加入于... 之經少... 主腎... 短故... 引飲... 為熱... 為虛... 分... 初... 疑... 今... 陰... 利... 飲... 百... 沉... 以... 清... 利... 吐... 煩... 是... 經... 世... 微... 附... 何... 明... 合... 門... 之... 而... 滑... 便... 其... 攸... 利

數而滑者有宿食也下之愈脉遲而滑者實也其利未得便止更宜下之下利三部脉皆平按其心下硬者急下之協熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間津汁垢膩謂之腸垢寒毒入胃則臍下必寒腹脹滿大便或黃白或青黑或下利清穀濕毒氣盛則下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁也下利欲飲水者以有熱也下利譏語者有燥屎也寒毒入胃者四逆湯理中湯白通湯加附子四逆散加薤白主之協熱利者黃芩湯白頭翁湯三黃活人書 卷十一 濕毒下痢 赤石脂圓 黃連阿膠散 地榆散 血者桃花湯 然自利而渴屬少陰然三陽下利亦有飲水者乃有熱也三陰下利宜溫之然少陰自利清水心下痛口乾燥者却宜下之此又不可不知也 乾燥者却宜下之此又不可不知也 少陰泄利下重 濃煎薤白湯 內四逆散 散用枳實芍藥 之類又尋常胃中不和腹中鳴鳴下利生薑瀉心湯 最妙正六十三此法 不持寒證也 問小便不利小便難 谷曰傷寒發汗後汗出多亡津液胃中極乾故小便

活人書 卷一一

大便難

不利豎見小便不利往往利之誤矣類纂云胃中乾則無小便慎不可利故仲景云下之後復發汗小便不利者亡津液耳若傷寒引飲下焦有熱小便不通脉浮者五苓散 脉沉者猪苓湯也 表不解心下有水發熱而咳小腹滿小便不利者小青龍湯去麻黃加茯苓也 傷寒無汗翕翕發熱頭項強痛小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮也 而發熱胃脇滿心下怔忡小便不利者小柴胡湯去黃芩加茯苓 少陰病小便不利者四逆散加茯苓 活人書 卷十一 苓也 而飲停者有所不利者行之取其瀉也 有渴得行者其表裏得見煩躁口渴欲飲水水入即吐病名水逆及霍亂頭暈發熱身疼痛飲水者有發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者並宜五苓散其利而發熱渴欲飲水小便不利少陰病下利六七日欬而咽渴心煩不得眠者宜與猪苓湯其大病差後從膿已下有水氣者宜與澤瀉散此利水道滲洩之也 大抵中濕與發黃以利小便為先陽明汗多以利小便為戒 又問小便難何也陰虛故也陰虛者陽必湊之為陽所湊也故小便黃者中有熱也宜瞿麥滑石之類瀉之太陽病發汗遂滿不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

四三一



六陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗嗜卧身黃小便難潮熱而嘔者小柴胡加茯苓主之證

問小便自利小便數

答曰太陽證下焦有熱小腹必滿應小便不利而小便反利者下血證也抵當湯主之正九十二陽明證自汗

出應小便少而小便自利者津液內竭也尿雖硬不可攻也當用蜜煎導之正九十一少陰證四逆而小便自

利者虛寒證也四逆湯正九十四真武湯去茯苓主之正

活人書正九十一卷

○又問小便數者何也腎與膀胱俱虛而有客熱乘之也二經既虛致受於客熱虛則不能制水故令數小便熱則水行澁澁則小便不快故令數起也診其跌陽脉數胃中熱即消穀引飲大便必硬小便即數也太陽病自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡寒脚攣急若小便數者慎不可行桂枝也且與甘草乾薑湯正五十五芍藥甘草湯也正五十七大抵澁數則大便難

仲景云跌陽脉浮而澁浮則胃氣強澁即小便數浮澁相薄大便則鞭其脾為約麻子人圓主之正九十二太

陽病若汗若吐若下後微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯正四十三和之愈○又云傷寒脉浮自汗小便數若胃中不和譫語者少與調胃承氣湯正四十三

問有數日不大便有大便難有大便鞭有燥屎有大便澁

答曰傷寒數日不大便大便鞭及有燥屎皆知用大柴胡正三十一大承氣正四十四小承氣正四十三攻之然仲景論大便不通亦有數種不可攻者在第三卷第三問中詳言之矣○仲

景又有陽結陰結之論不可不別也其脉浮而數能食不大便此為實名曰陽結宜用小柴胡湯正九十九所謂和其榮衛以通津液縱不了了得屎而解也其脉沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結宜用金

液丹所謂陽盛則促陰盛則結促結同也○又問大便澁者何也古人云歲火不及寒乃大行民病澁澁大率病人腸中有寒即大便鳴澁蓋澁者胃中冷水穀不別故也華佗云寒即澁熱即垢仲景說初鞭後澁有二證小便不利小便少皆水穀不分耳

問病人默默欲眠目不能閉起屋不安其



喉所切  
是也

聲啞或咽乾

答曰此名狐惑傷寒也狐惑與濕蘊皆虫證初得狀如傷寒或因傷寒變成其疾其候默默欲眠目不能閉起居不安虫蝕其喉為惑其聲啞虫食下部為狐其咽乾狐惑之病並惡飲水面目乍赤乍白乍黑是其證也大抵傷寒病腹內熱入食少腸胃空虛三虫行作求食蝕人五臟及下部為蠱病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽喜眠虫蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡虫食其臟也下唇有瘡虫食其肛也殺人甚急多因下利而得治蠱桃人湯雜百五黃連犀角湯雜百六雄黃銳散雜百七主之

活人書

卷十一

十五

問

問病人飲食復不能食常默默欲卧復不能卧欲出行復不能行飲食或有美時或有不炊飯時如強健人而卧不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦小便赤藥入即吐利

答曰此名百合傷寒也百脉一宗悉致其病無復經

活人書 卷一一

絡也其狀欲食復不能食常默默欲得卧復不能卧

欲出行復不能行飲食或有美時或有不炊飯時如

強健人而卧不能行如有寒如無寒如有熱復無熱

口苦小便赤百合之病諸藥不治藥入即吐利如有

神靈此多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯疾

也百合知母湯雜百七滑石代赭湯雜百九雞子湯雜百十

百合地黃湯雜百十百合洗方雜百十一括樓牡蠣散雜百十二

滑石散雜百十三主之

活人書卷第十一終

活人書 卷十一 十六



活人書卷第十二

此一卷說藥證并藥方加減法所謂藥證者藥方前有證也如其方治其病是也傷寒有證異而病同一經藥同而或治兩證類而分之參而伍之審知其證者其經之病其湯者其證之藥然後用之萬全矣又况百問中一證下有數種藥方主之者須是將病對藥將藥合病乃可服之假如下利而心下痞稱十棗湯大柴胡湯生薑瀉心湯甘草瀉心湯赤石脂禹餘糧湯桂枝人參湯之類雖均是

活人書 卷第十二

治下利而心下痞其方有冷有熱子細詳藥證以對治之則無不中矣所謂藥方并加減法者仲景傷寒方一百一十三道病與方相應乃用正方稍有差別即隨證加減昔人云學方三年無病可醫療病三年無方可治往往世傳為名論竟不知執方療病或中或否不知加減移咎於方古人用藥如斗運轉故攻病的而取効速一服知二服愈假如理中圓證腎氣動者去白朮小柴胡湯證小便不利者加茯苓蓋脾惡濕腎惡燥白朮治濕茯苓

治燥

列本萬發 萬中矣

之別作

利水故腎氣動者去白朮小便不利者加茯苓以此推之然後知不可執方療病須是隨證加減今於逐方下說病證用藥加減庶幾脩合之際便見治法善古方凡稱改阻者直云剉如麻豆大云一升者只用一大白蓋以古准今易曉而通用也尋常疾勢輕者只抄籠末五錢七水一盞半入葛葉煮七八分去滓服之未知再作病勢重者當依古劑法古之三兩即今之一兩也二兩即今之六錢半也古之三升即今之一升也射利大者只一足矣

活人書 卷第十二

桂枝湯 太陽中風陽浮陰弱發熱汗出惡寒鼻鳴乾嘔者宜服之 太陽病頭痛發熱汗出惡風者宜服之 太陽病下之後其氣上衝者宜服之 桂枝本為解飢若脈浮緊發熱汗不出者不可與之 太陽病服桂枝湯煩不解先刺風池風府却與桂枝湯 服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯若形似瘧一日再發者宜桂枝二麻黃一湯 服桂枝湯大汗出大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之 服桂枝湯或下之仍頭項強痛翁翁發熱無汗心下滿



微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之○  
傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急與桂  
枝湯得之便厥咽乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之  
厥愈更作芍藥甘草湯與之其脚伸若胃氣不和與  
調胃承氣湯若重發汗加燒針者四逆湯主之○太  
陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜服○太陽病  
外證未解不可下也下之爲逆解外宜服○太陽病  
先發汗不解復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下  
之故今不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜服

活人書

卷十二

三

○病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧也  
以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脈中衛行脈外  
復發其汗榮衛和則愈宜服○病人藏無他病時發  
熱自汗出而不愈者衛氣不和也先其時發汗則愈  
宜服○傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯小  
便清者知不在裏當發汗宜服○傷寒發汗解半日  
許復熱煩浮數者可更發汗宜服○傷寒發下之清  
穀不止身疼痛急當救裏後身疼痛清便自調急當  
救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○太陽病發熱

得飲上當  
有脈字

別作時作  
熱

行其最三  
四果十二  
救六七升  
一升

汗出榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜服○傷寒大  
下後復發汗心下痞惡寒者不可攻痞先解表表解  
乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯  
○太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈  
其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但小腹  
急結者乃可攻之宜桃核承氣湯其解外宜服○病  
屬○陽明病脈遲汗出多微惡寒表未解宜服○病  
人煩熱汗出解如瘧狀日晡發熱脈實者宜大承氣  
湯脈浮虛者宜服○太陽病脈浮可發汗宜

活人書

卷十二

四

服屬太○下利腹脹滿身疼痛者先溫裏乃攻表溫  
裏宜四逆湯攻表宜服○吐利止身痛不休宜  
桂枝湯小和之屬霍亂  
桂枝  
芍藥各三  
甘草二兩  
右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入生薑  
五片棗子二枚煮至一盞去滓溫服須臾飲熱稀  
粥一盞以助藥力溫覆令一時許遍身漿漿微似  
有汗者佳○加減法桂枝湯自西北二方居人四時  
行之無不應驗江淮間惟冬及春可行之自春末



及夏至已前桂枝證可加黃芩一分謂之陽且湯  
 夏至後有桂枝證可知知毋半兩石膏一兩或加  
 升麻一分若病人素虛寒者正用古方不在加減  
 也○戒曰桂枝最難用雖云表不解脈浮可發汗  
 宜桂枝湯須是病人常自汗出小便不數手足溫  
 和或手足指稍作微冷少頃却溫身雖微似煩而  
 又增寒始可行之若病人身無汗小便數或手足  
 冷不惡寒或飲酒家不喜甘者慎不可行桂枝也  
 仍有桂枝證服湯已無桂枝證者尤不可再與

活人書

卷十二

五

桂枝麻黃各半湯三太陽病得之八九日如瘧狀發  
 熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三  
 度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱  
 虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲  
 解也以其不能得小汗出身必痒宜服桂枝湯

桂枝 芍藥 甘草炙各

麻黃半兩湯 杏仁十二箇湯湯去

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一  
 枚水一盞半煮至八分去滓溫服又見

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 麻黃 生薑 棗子 水

此方合  
 麻黃湯此  
 方藥甚當  
 用五分  
 別本服者  
 病人手

桂枝  
 芍藥  
 甘草  
 杏仁  
 麻黃  
 生薑  
 棗子

桂枝  
 芍藥  
 甘草  
 杏仁  
 麻黃  
 生薑  
 棗子

桂枝二麻黃一湯三服桂枝湯大汗出脈洪大者與  
 桂枝湯如前法若形似瘧一日再發者汗出必解宜  
 服桂枝湯

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 麻黃 生薑 棗子

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 麻黃 生薑 棗子

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 麻黃 生薑 棗子

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 麻黃 生薑 棗子

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 麻黃 生薑 棗子

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 麻黃 生薑 棗子

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 麻黃 生薑 棗子

桂枝 芍藥 甘草 杏仁 麻黃 生薑 棗子



升

枚水一盞半煮至八分去滓温服桂枝湯加桂以桂能泄奔豚氣也

桂枝加附子湯太陽病發汗遂漏不止其人惡風

小便難四支微急難以屈伸者宜服之屬太陽

桂枝去皮芍藥各一兩甘草一兩附子炮去皮用半箇

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓温服

桂枝去芍藥湯太陽病下之後脈促胃滿者宜服之屬太陽

桂枝去皮芍藥各一兩甘草一兩

活人書十二卷七

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓温服芍藥味酸脈促故去芍藥佐則單用辛甘發微毒氣也

桂枝去芍藥加附子湯太陽病下之後脈促胃滿者桂枝去芍藥湯主之若微寒者宜服之屬太陽

桂枝去皮芍藥各一兩甘草一兩附子去皮用半箇

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓温服小便利即愈

桂枝去桂加茯苓白朮湯服桂枝湯或下之仍頭

桂枝去皮芍藥各一兩甘草一兩茯苓半箇白朮半箇

仲景桂枝湯三兩甘草三兩芍藥三兩

二兩生薑三兩棗子十枚水七升取三升

一兩生薑三兩棗子十枚水八升取三升

二兩生薑三兩棗子十枚水八升取三升

升取三升

桂枝去桂加茯苓白朮湯服桂枝湯或下之仍頭

項強痛翁發熱無汗心下滿微疼小便不利者此主之屬太陽

芍藥 茯苓 白朮各一兩甘草一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓温服小便利即愈

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯傷寒脈浮醫火劫之亡陽必驚狂卧起不安者此主之屬太陽

桂枝去皮芍藥各一兩甘草一兩蜀漆兩半龍骨二兩

活人書十二卷八

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓温服

桂枝加芍藥生薑人參新加湯發汗後身疼痛脈沉遲者此主之屬太陽

桂枝去皮芍藥各一兩甘草一兩生薑半兩人參半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓温服

桂枝加芍藥湯太陽病下之因腹滿痛屬大陰

桂枝去皮芍藥各一兩甘草一兩

此主之

仲景方桂枝湯三兩甘草三兩芍藥三兩

二兩生薑三兩棗子十枚水七升取三升

一兩生薑三兩棗子十枚水八升取三升

二兩生薑三兩棗子十枚水八升取三升

升取三升

桂枝加芍藥湯太陽病下之因腹滿痛屬大陰



桂枝 三兩 甘草 二兩 芍藥 六兩 下利者先煎芍藥三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加大黃湯 太陽病反下之因腹滿痛屬太陰桂枝加芍藥湯主之大實痛者此主之

桂枝 六分 芍藥 三兩 甘草 一兩 大黃 二兩 痛甚者加大黃兩半應者減之

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 火逆下之因燒針煩躁者此主之

桂枝 半兩 甘草 炙 牡蠣 熬 龍骨 各一兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝甘草湯 發汗過多其人叉手自冒心下悸欲得按者此主之

桂枝 二兩 甘草 一兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

分去滓溫服

桂枝人參湯 太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者此主之

桂枝 三兩 人參 三兩 甘草 二兩 芍藥 三兩 乾薑 炮 一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服日再夜一服

桂枝附湯 傷寒八九日風濕相薄身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澹者此主之若其人大便鞭小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝 二兩 芍藥 二兩 附子 炮 一枚 白朮 三兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服日三服

桂枝加葛根湯 太陽病項強几几反汗出惡風者此主之

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 大黃 二兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服



二枚水八升  
先煮葛根  
三升內麻黃  
壓开服升

仲景方共  
桂枝湯方  
內加厚朴  
二兩杏仁  
五十餘  
以前法

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一  
枚水一盞半煮至八分去滓服覆取微汗

桂枝加厚朴杏子湯十九太陽病下之微喘者表未  
解故也此主之屬太

桂枝去皮 芍藥各一 甘草六錢三

杏仁去皮尖 厚朴去皮薑汁炙

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一  
枚煮至八分去滓溫服覆取微汗

麻黃湯二十太陽病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘  
活人書四十二卷

者宜服○太陽陽明合病喘而胃滿不可下宜服○

太陽病十日以去脈浮細而嗜卧者外已解也設胃  
滿者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與服之○太陽

病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在  
此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄

衄乃解所以然者陽氣重故也此主之○傷寒脈浮  
緊不發汗因衄此主之已上屬○陽明病脈浮無汗

而喘發汗則愈宜服○脈但浮無餘證者與服若不  
弱腹滿加噦者不治已上屬

活人書 卷一二

仲景方共  
二兩桂  
二兩芍  
水九升先  
煮麻黃  
二升內麻  
黃取二升  
中服八合

仲景方共  
草二兩石  
膏半斤杏  
仁五十箇  
麻黃二兩  
水七升先  
煮麻黃取  
二升服一  
升

甘草半兩 桂枝一兩 杏仁三十五箇

麻黃一兩半去節百沸湯

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八  
分去滓溫服覆取微汗不須飲粥加減傷寒熱病

藥性須涼不可太溫夏至後麻黃湯須加知母半  
兩石膏一兩黃芩一分益麻黃湯性熱夏月服之

有發黃班出之失惟冬及春與病人素虛寒者乃  
用正方不在加減

麻黃杏仁甘草石膏湯三十二發汗後不可更行桂枝  
活人書四十二卷

湯汗出而喘無大熱者可與此服之屬太

甘草一兩 石膏四兩碎 杏仁二十五箇

麻黃二兩去節湯泡

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八  
分去滓溫服

麻黃附子甘草湯廿二少陰病得之二三日可與此  
藥微發汗以二三日無證故微發汗也屬少

麻黃二兩去節湯泡 甘草二兩

附子一枚炮去

四三九



仙景方水  
吧升先煮  
麻黃一兩  
沸內藥取  
三升服一  
升日三

仙景方水  
一斗先煮  
麻黃一兩  
沸內藥取  
三升服一  
升日三

仙景方水  
一斗先煮  
麻黃一兩  
沸內藥取  
三升服一  
升日三

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服相次三兩服以身微汗為度  
麻黃細辛附子湯廿三少陰病始得之反發熱脈沉者此主之屬少陰

麻黃二兩去節湯泡 細辛二兩 附子一枚炮去皮破八片

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

麻黃連翹赤小豆湯廿四傷寒瘀熱在裏身必黃此活人書十二卷主之屬陽

麻黃一兩去節湯泡 赤小豆半升 杏仁二十枚去皮尖 甘草一兩 連翹兩或作半 生梓白皮切二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚潦水一盞半煮至八分去滓溫服

麻黃升麻湯二十五傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽噎不利唾膿血泄利不止者為難治此主之屬厥陰

仙景方水  
作十八  
炮一分作  
六錢水一  
斗先煮麻  
黃一兩  
內藥取三  
升分三服  
湘去如炊  
三斗米頃  
令盡

仙景方水  
根四兩桂  
枝甘草芍  
藥各二兩  
黃三兩麻  
黃一兩  
取三升服  
一升

麻黃二兩半去節湯泡 升麻二兩 當歸各一兩 知母各一兩 黃芩各一兩

萎蕤各三 芍藥各三 茯苓各三 麥門冬去心

桂枝去皮 茯苓各三 甘草炙 乾薑炮 石膏碎綿 白朮各一

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服相次一炊久進一服汗出愈

葛根湯二十六太陽病項背強几几無汗惡風又太陽與陽明合病者必自利此並主之屬太活人書十二卷主之屬太

葛根二兩 桂枝去皮 甘草炙 芍藥各一 麻黃一兩半去節湯泡

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服覆取汗為度

葛根加半夏湯二十七太陽與陽明合病不利但嘔者此主之屬太 葛根四兩或作一兩 半夏六錢 麻黃三分去節湯泡 甘草炙 桂枝去皮 芍藥各半

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚



葛根黃芩黃連湯 三十八  
一斗煮湯  
黃連二升  
內藥取三  
升服一升  
甘草二兩  
黃芩一兩  
黃連一兩  
或作  
六兩或作  
一兩半

枚水一盞半煮至八分去滓溫服覆取微汗  
葛根黃芩黃連湯 三十八  
太陽病桂枝證醫及下之利  
遂不止脈促者表未解也喘而汗出者此主之

甘草二兩  
黃芩一兩  
黃連一兩  
或作  
六兩或作  
一兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八  
分去滓溫服日進二三服

小柴胡湯 二十九  
太陽病十日以去脈浮細而嗜食者  
外已解設胃滿痛與服脈但浮者與麻黃湯○傷寒

活人書 十二卷 十五  
五六日中風往來寒熱胃膈苦煩默默不欲食心煩  
喜嘔或胃煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞輕或

心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者此主之  
○血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相薄結於脇

下邪正分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食臍  
府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也此主之○服

柴胡湯已渴者屬陽明以法治之○傷寒四五日身  
熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者此主之○傷

寒陽脈沉陰脈弦法當腹中急瀉先與小建中湯不

差者此主之○太陽病過經十餘日發汗吐下之後  
四五日柴胡湯證仍在者先與小柴胡嘔不止心下

急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之即愈○  
婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者

此為熱入血室其血必結故使如瘧狀此主之○傷  
寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大

便鞭脈細者為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在  
裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入

在裏此為半在裏半在表也脈雖沉緊不得為少陰  
活人書 十二卷 十六

病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也  
可與服此設不了了者得屎而解○傷寒五六日嘔

而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在  
者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却

發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胃也大  
陷胃湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之

宜半夏瀉心湯已上屬太陽○陽明病發潮熱大便溼小  
便自可胃膈滿不去者與服之○陽明病脇下鞭滿

不大便而嘔舌上白胎者可與服之上焦得通津液



得下胃氣因和身戢然汗出而解○陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後廔刺之小差外不解病過十日脉續浮者與此藥主之已上屬陽明○太陽病不解轉入少陽脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下或發熱者此主之若已吐下發汗温針譏語小柴胡湯證罷此為壞證知犯何逆以法治之已上屬少陽○嘔而發熱者宜服屬厥陰○傷寒差已後更發熱此主之脉浮者以汗活人書 六十二卷 十七

解之脉沉實者以下解之屬辨陰陽易差後勞復病脉證

黃芩 一兩半若腹中痛者去黃芩加芍藥一兩半芍藥或作三分若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓二兩

人參 一兩半若不渴外有微熱者去人參加桂枝一兩半温覆微汗愈若欬嗽者去人參并棗子加五味子一兩一分乾薑一兩

棗子 六枚若脇下痞鞭去棗子加牡蠣二兩熬牡蠣或作一兩

半夏 一兩一分湯洗若胃中煩不嘔者去半夏人參加栝樓實一枚用四分之一若渴者去半夏更加人參三分栝樓根二兩

柴胡 四兩 去蘆 甘草 一兩 半炙

升麻方香  
八八公三  
兩果十二  
枚半夏半  
升柴胡半  
斤甘草三  
兩生薑三  
兩水一斗  
二升取六  
升去滓再  
煎取三升  
服一升日  
三

石剉如麻豆大每服沙糖七生薑四片棗子三枚水一盞半煮至八分去滓温服日三服

活人書卷第十二  
六十二卷

十八



活人書卷第十三

大柴胡湯三十一 太陽病過十日發汗吐下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止止一云心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈

○傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與服○傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者此主之上已

○陽明病汗多者急下之宜服○少陰病下利清水心下痛口乾者可下之宜大柴胡大承氣湯○

病腹中滿痛此為實當下之宜大承氣大柴胡湯○

活人書四十三卷

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡大承氣湯○

傷寒後脈沉者內實也下之解宜服○傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者實

也急下之宜大承氣大柴胡湯○太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陰脈微者下之而解

宜服○病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之大柴胡湯主之○病人煩熱汗出則解又如瘧

狀日晡所發熱者屬陽明脈實者可下之大柴胡大承氣湯主之屬可下

承氣湯主之病脈證

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

活人書

柴胡 四兩 黃芩 各一兩半 枳實 二枚 芍藥 二枚 甘草 二兩 半夏 半升 生薑 四兩 大枣 十二枚 水 一斗 煮取 六升 去滓 再服 者加大黃一兩

柴胡桂枝湯三十一 傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者此主之屬太○發汗後自愈屬發汗後

柴胡 二兩 桂枝 去皮 黃芩 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 半夏 半升 生薑 四兩 大枣 十二枚 水 一斗 煮取 六升 去滓 再服

柴胡 四兩 桂枝 去皮 黃芩 各一兩半 枳實 二枚 芍藥 二枚 甘草 二兩 半夏 半升 生薑 四兩 大枣 十二枚 水 一斗 煮取 六升 去滓 再服

柴胡桂枝乾薑湯三十三 傷寒五六日已發汗而復下之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也宜服之屬太

柴胡 四兩 桂枝 去皮 黃芩 各一兩半 枳實 二枚 芍藥 二枚 甘草 二兩 半夏 半升 生薑 四兩 大枣 十二枚 水 一斗 煮取 六升 去滓 再服

柴胡 四兩 桂枝 去皮 黃芩 各一兩半 枳實 二枚 芍藥 二枚 甘草 二兩 半夏 半升 生薑 四兩 大枣 十二枚 水 一斗 煮取 六升 去滓 再服

柴胡 四兩 桂枝 去皮 黃芩 各一兩半 枳實 二枚 芍藥 二枚 甘草 二兩 半夏 半升 生薑 四兩 大枣 十二枚 水 一斗 煮取 六升 去滓 再服



<p><b>牡蠣</b> 煑 甘草 乾薑 括樓根 二兩</p> <p>右劉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服食頃再服</p> <p><b>柴胡加龍骨牡蠣湯</b> 傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者此主之</p>	<p><b>柴胡</b> 黃芩 龍骨 各一兩</p> <p><b>鈎丹</b> 人參 桂枝 茯苓 各三兩 大黃 半兩 半夏 半合</p> <p>活人書 十三卷 三</p>	<p>二兩半夏 二合半牡 一兩半生 薑一兩半 薑一兩半 水八升取 四升內六 煮取二升 湯服一升 據此柴胡 黃芩龍骨 鈎丹人參 桂枝茯苓 各用三分 大黃常用 一兩半夏 常用一合</p>
<p><b>芒消</b> 一兩 甘草 炙半 半夏 四錢 一兩 湯洗</p> <p>先宜服小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消主之</p>	<p><b>黃芩</b> 人參 各半 柴胡 一兩 三錢 三字</p>	

<p>右劉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓內芒消更微沸溫服</p> <p><b>大青龍湯</b> 太陽中風脈浮發熱惡寒身疼痛不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也○傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者此主之</p>	<p><b>桂枝</b> 去皮 甘草 一兩 石膏 如半箇雞子大碎 杏仁 二十枚 麻黃 三兩去節湯泡洗 去黃汁焙乾秤</p> <p>活人書 十三卷 四</p>	<p>二兩半夏 一兩半生 薑一兩半 水八升取 四升內六 煮取二升 湯服一升 據此柴胡 黃芩龍骨 鈎丹人參 桂枝茯苓 各用三分 大黃常用 一兩半夏 常用一合</p>
<p>右搗羅為細末每末一兩入米粉三兩和之粉撲周身止汗無藥本亦得若汗已出後盡劑服汗多</p> <p><b>白芷</b> 各半 藥本 川芎</p>	<p><b>白木</b> 藥本 川芎</p>	



亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

小青龍湯三十一傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不

渴服湯已渴者此寒去欲解也此主之○傷寒表不

解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小

便利小腹痛滿或喘者此主之

芍藥 桂枝去皮 乾薑炮

甘草炙 細辛各一兩半 五味子一兩別本或加一分

半夏一兩半湯洗若渴者去

麻黃一兩半微利者去麻黃加芫花如一彈子熱令赤色若噎者去麻黃加附子半箇炮

活人書十三卷

若小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓二兩若喘者去麻黃加杏仁一兩半去皮尖麻黃湯泡

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服杏仁半夏二味或各作一兩一分

小建中湯三十七傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛

先與小建中湯不差者小柴胡湯主之○傷寒二三

日心中悸而煩者宜服

芍藥三兩 甘草一兩 桂枝一兩半

膠飴半斤舊有微澁或嘔者去膠飴方加黃耆一兩半為黃耆建中湯

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四

三兩水七升

片大棗子一枚煮至八分去滓下膠飴兩匙許再

煎化溫服日三服夜二服尺脈尚遲再作一劑加

黃耆末一錢

煎造膠飴法

糯米一升 大麥蘗末六兩

右米一如炊飯甑上至氣溜取下傾入一盆于入

藥末一合并湯一盞來許拌和再上甑至飯熟却

入盆子內都以藥末拌和入一磁罐子可容五升

許冬月罐子熱春秋夏溫冬月用湯二升許入罐

活人書十三卷

子內約內面飯上湯三指許即得布并紙三五重

蓋定更以綿或絮抱定近火春秋夏即溫和至一

宿見米浮在水面上即以布絞裂取清汁銀石器

內煎至面上有膜即以木篋不住手攪至稀糊以

磁器收夏月置井中庶不酸

大陷胃湯三十八太陽病脈浮而動數浮則為風數則

為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反

惡寒表未解也盛及下之動數變遲膈內拒痛胃中

空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下



因鞭則為結腎大陷腎湯主之若不結腎但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃○傷寒六七日結腎熱實脈沉而緊心下痛按之石鞭者宜服○傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結腎無大熱者此為小結在腎脇也但頭微汗出者此主之○太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹脹滿而痛不可近者此主之○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復活人書 十三卷 七

與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結腎也此主之已上屬太陽

大黃一兩半去皮 芒消五分 甘遂一字赤連珠者細羅為末

右以水二盞先煮大黃至一盞去滓下消一沸下甘遂末温服得快利止後服

又大陷腎湯方 桂枝一兩 甘遂一兩或作半兩 大棗一兩或作三枚

伊是方夫 實六兩此 逐一錢七 芒消一升 永六升煮 天黃取二 升內消者 一兩內消 升遂末服 一升

人參一兩 括樓實一枚去皮只 右剉如麻豆大每服五錢七水一盞或作二盞煮至八分去滓温服腎中無堅物勿服之

大陷腎湯三十九 病發於陽而反下之熱入因作結腎病發於陰而反下之汗出一有因作痞也所以成結腎者以下之太早故也結腎者項亦強如柔瘕狀下之則和宜此藥主之屬太陽

大黃二兩或作四兩 芒消三分 杏仁三分去皮尖熬黑 苦苧蘆子三錢

右搗羅二味內杏仁芒消合研如脂圓如彈子大每服一圓抄甘遂末半錢七白蜜一合水二盞煮取一盞頓飯一宿乃下如不下再服甘遂性極宜斟酌量虛實

小陷腎湯四十一 小結腎病正在心按之則痛脈浮滑者此主之屬太陽

半夏湯洗秤 黃連一兩 括樓一枚去皮或作半枚

右剉如麻豆大水二盞先煮括樓至一盞半下諸藥煎至八分去滓温服未知再服微利黃涎便安

伊是方半 夏半升括 樓實十名 一枚水六 升去滓內 藥煎三升

產半升并 逐一錢七 實二合水 二升取一 升



也

大承氣湯四十二陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身

必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也

手足濇然汗出者此大便已鞭也此藥主之若汗多

微發熱惡寒者外未解也一法與桂枝湯其熱不潮未可與

承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣

勿令大泄下○陽明病潮熱大便微鞭者可與此藥

不鞭者不可與之○傷寒若下後不解不大便

五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如

活人書卷十三九見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微

喘直視脈弦者生瀉者死微者但發熱譫語者此主

之若一服利則止後服○陽明病譫語有潮熱反不

能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭耳

宜服○陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗

出者刺期門隨其實而瀉之濇然汗出則愈汗出譫

語者以為有燥屎在胃中此為風也瀉下者過經乃

可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之

愈宜服○二陽併病太陽證罷但發潮熱手足濇然

別發熱  
惡寒者  
又發惡寒

六二〇一  
桂枝湯

汗出大便難而譫語者下之則愈宜服○陽明病下

之心下懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微瀉初頭

鞭後必瀉不可攻之若有燥屎者宜服○病人煩熱

汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實

者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣發汗宜

桂枝湯○大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者

此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜服○傷寒

六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微

熱者此為實也急下之宜服○陽明病發熱汗多者

活人書卷十三十急下之宜服○得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩

躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微

和之令小安至六日與承氣一升若不大便更六七

日小便少者雖不大便但初頭鞭後必瀉未定成鞭

攻之必瀉瀉小便利尿定鞭此主之○發汗不解腹

滿痛者急下之宜服○腹滿不減減不足言當下之

宜服○病人小便利大便乍難乍易時有微熱喘

目不能卧者有燥屎也宜服○陽明少陽合病必下

利其脈不負者為順也負者失也互相剋賊名為負



湯二  
分服

也脉滑而數者有宿食也當下之宜服陽明也已上屬也陽明也  
 陰病二三日口燥咽乾者急下之宜服少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之宜服  
 少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜服已上屬  
 下利三部脉皆平按之心下硬者急下之宜服  
 下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜服  
 寸口脉浮而大按之反濇尺中微而濇故知有宿食當下之宜服  
 下利不欲食者以有宿食故也當下之宜服  
 下利差至其年月日時復發者以病不盡活人書  
 故也當下之此主之○下利脉反滑當下所去下乃愈此主之○脉雙弦而遲者必心下鞅脉大而緊者陽中有陰也可下之宜服○病腹中滿痛者此為實也當下之宜服此主之已上屬可  
 大黃二兩錫文者去枳實四枚或作三枚去  
 厚朴四兩去皮芒消二兩或作一合半  
 右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞先煮厚朴枳實至一盞餘下大黃煮取六分去滓入芒消煎一二沸放溫服以利為度未利再與一服

小承氣湯四十三陽明病潮熱大便微鞅者可與大承氣湯不鞅者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞅後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞅而少也以小承氣湯和之不轉失氣者不可攻也○陽明病脉遲雖汗出不惡寒其氣必重短氣腹滿而喘有潮熱者此為外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便已鞅也大活人書  
 承氣湯主之若腹大滿不通者與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下○陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞅鞅則識語此藥主之若一服識語止更莫復服○陽明病識語潮熱脉滑而疾者此藥主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣者勿更與之明日又不大便脉反微濇者裏虛也為難治不可更與承氣湯○太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便鞅者與小承氣湯和之愈○得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞅至四

似其大  
 林華斤  
 實全  
 一十者  
 去淫內  
 黃以二

子部 醫家類



其方取  
三枚水  
四升取一  
升二分

五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安

○傷寒下利譫語者有燥屎也此主之厚朴二兩去皮

大黃四兩 枳實四枚或作三枚去穢炒淨秤半兩也

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一大盞半煮

至八分去滓溫服以利為度初服湯更衣者止後服不爾者再服之

調胃承氣湯四十三 發汗後惡寒虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣此主之○太陽病未解脈陰陽俱

活人書十三卷 停必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗之而解但

陰脈微者下之而解若欲下之宜服○傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳掌急與桂枝湯欲攻其

表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作為藥甘草湯

與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯○傷寒十三日過經譫語者以有熱也當以湯下

之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫以圓藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反

和者此為內實也此主之○太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胃中痛大便反澀腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與服之若不爾者不可與但欲嘔胃中痛微澀者此非柴胡證以嘔故知極吐下也○陽明病不吐不下心煩者可與服○太陽病三日發汗不解蒸蒸熱者屬胃也此主之○傷寒吐後腹脹滿者與服已上屬陽明

甘草一兩 大黃二兩 芒消一兩三分或作一兩一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一大盞煎至

七分去滓下確更上火二三沸溫頓服之

活人書十三卷 桃核承氣湯四十四 太陽病不解熱結膀胱其人如狂

血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外

外解已但少腹結者乃可攻之宜用此藥屬太陽

大黃四兩 桂枝二兩 芒消二兩 桃人五十箇燒碎 甘草二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一大盞煮至八分去滓下確煎化溫服以微利為度未利移時再服



梔子豉湯四十五 發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必

及覆顛倒心中懊懣此主之○發汗若下之而煩熱

宵中望者此主之○仲景云凡用梔子湯病人舊微

溲者不可與服之○傷寒五六日大下之後身熱不

去心中結痛者未欲解也此主之已上屬太陽陽明病

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反

惡熱身重若發汗則躁心憤憤及譏語若加溫針必

休揚煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心

中懊懣舌上胎者此主之○陽明病下之外有熱手

活人書十三卷 十五

足溫不結胸心中懊懣飢不能食但頭汗出者此主

之○下利後更煩按之心下濡者為虛煩也此主之

屬厥陰

香豉二兩 肥梔子十六枚擘碎

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞先煮梔子

至一盞入豉煎至七分去滓溫服得快吐止後服

梔子甘草豉湯四十六 發汗吐下後虛煩不得眠若劇

者必及覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之若少氣者

此主之屬太陽

仲景方香  
豉四兩梔  
子十四枚  
水四升取  
梔子湯二  
升內香  
豉取一升  
滓一服

梔子七枚 甘草 豉各一兩

右分二服以水二盞先煎梔子甘草至一盞內豉

同煎取七分去滓溫服得快吐止後服

梔子生薑豉湯四十七 發汗吐下後虛煩不得眠若劇

者必及覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之若嘔者此

主之屬太陽

梔子七枚 生薑二兩 豉一兩

右分二服以水二盞先煮梔子生薑至一盞內豉


同煎至七分去滓溫服得快吐止後服

活人書十三卷 十六

活人書卷第十三

仲景方  
梔子豉湯  
內加甘草  
二兩餘  
註

仲景方  
香豉豉湯  
內加生薑  
五兩餘  
註





活人書卷第十四  
梔子厚朴湯治傷寒下後  
者屬太

梔子大者七枚厚朴去皮姜汁炙二兩枳實二枚取去穢

右剉如麻豆大分作二服以水二盞半煮至八分去滓溫服得吐止後服

梔子乾薑湯治傷寒醫以圓藥下之身熱不去  
微煩者屬太

梔子七枚乾薑一兩

活人書十四卷

右剉如麻豆大分二服以水二大盞煎至七分去滓溫服得吐止後服凡用梔子湯病人舊

梔子藥皮湯治傷寒身黃發熱  
者屬太

梔子八枚黃蘗一兩甘草半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至七分去滓溫服

茯苓桂枝甘草大棗湯治發汗後其人臍下悸者欲作奔豚  
者屬太

桂枝二兩茯苓四兩甘草一兩大棗十二枚

右剉如麻豆大每服抄五錢七棗二箇用甘爛一盞半煮至八分去滓溫服作甘爛水法用水二盞煮棗取三  
之上有珠子五六千  
願有珠相逐取用之

茯苓桂枝白朮甘草湯治傷寒若吐若下後心下  
為振振搖者屬太

茯苓二兩桂枝半兩甘草炙白朮各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

活人書十四卷

茯苓甘草湯傷寒汗出而渴者五苓散主之  
渴者此主之

茯苓各二兩甘草一兩桂枝去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑五片煮至八分去滓溫服

甘草湯少陰病二三日咽痛者可與服不差者  
與桔梗湯

甘草二兩



右剉如麻豆大每服抄四錢七水一盞煮至六分去滓溫服日二服

甘草乾薑湯五十五 傷寒麻浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急及與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥

咽中乾煩躁吐逆者宜此藥屬太

甘草四兩 乾薑二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半者至八分去滓溫服

炙甘草湯五十六 治傷寒脉結代心動悸屬太

活人書十四卷 三

甘草二兩 人參一兩 生地黃八兩

桂枝一兩 麻人一分 麥門冬一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七入薑五片棗一枚水一盞半入酒半盞煮至八分去滓內阿膠一片

膠烊盡溫服日三服

芍藥甘草湯五十七 傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急及與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥

咽乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更與此藥屬太

芍藥四兩 甘草四兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半者至八分去滓溫服

活人書十四卷 三

甘草二兩 人參一兩 生地黃八兩

桂枝一兩 麻人一分 麥門冬一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七入薑五片棗一枚水一盞半入酒半盞煮至八分去滓內阿膠一片

膠烊盡溫服日三服

傷寒方此  
三升取一  
升五分  
再服

傷寒方此  
草四兩  
人參二兩  
生  
桂枝三兩  
麻人半升  
麥門冬半  
升  
棗十二枚  
阿膠二兩  
水八升  
酒三升  
內  
再服一

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

厚朴生薑半夏人參湯五十八 治發汗後腹脹滿者屬太

厚朴四兩 半夏一兩 甘草一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑五片煮至八分去滓溫服

大黃黃連瀉心湯五十九 治心下痞按之濡其脉關上

活人書十四卷 四

浮者若傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜服此藥屬太

大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七以百沸湯二大盞熱漬之一時久絞去滓煖動分二服

附子瀉心湯六十 治心下痞而復惡寒汗出者屬太

附子一枚 黃連一兩 黃芩一兩

附子一枚 破川取汁

活人書十四卷 四

浮者若傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜服此藥屬太

大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七以百沸湯二大盞熱漬之一時久絞去滓煖動分二服

附子瀉心湯六十 治心下痞而復惡寒汗出者屬太

附子一枚 破川取汁

活人書十四卷 四

傷寒方此  
以一斤半  
再服

傷寒方此  
厚朴半斤  
半夏半斤  
人參半斤  
甘草半斤  
水一斗  
煮取五升  
再服

傷寒方此  
大黃二兩  
黃連一兩  
黃芩一兩  
水一斗  
煮取五升  
再服



仲景方  
二升分再

右三味剉如麻豆大每服抄五錢七以百沸湯二

大盞熱漬之一時以絞去滓內附子汁分溫再服

半夏瀉心湯六十三傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯

證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此

雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若

心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胃湯主之但滿

而不痛者此為痞柴胡不中與之宜服此陽太

黃連半兩黃芩半兩乾薑炮

人參各一兩半夏一兩一分

活人書十四卷五

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

甘草瀉心湯六十二傷寒中風醫及下之其人下利日

數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩

不得安醫見心下痞謂病不盡後下之其痞益甚此

非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也宜服此

甘草二兩乾薑炮黃芩各一兩

人參各半兩黃連兩大棗六枚

半夏一兩一分

仲景方  
草四兩乾  
薑不炮  
本三兩黃  
連一兩黃  
連一兩黃  
三升

仲景方  
三升水  
一斗煮取  
六升去滓  
再煎取三  
升

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服

生薑瀉心湯六十三治傷寒汗出解之後胃中不和心

下痞鞭乾噎食臭腸下有水氣腹中雷鳴下利者

黃芩各一兩人參各半兩

乾薑炮黃連各半兩半夏一兩一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑七

片梘子二枚煮至一盞去滓溫服

白虎湯六十四治傷寒脈浮滑者表裏有熱○又三陽

活人書十四卷六

合病腹滿身重難以轉側口中不仁面垢譫語遺尿

發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出

者○傷寒脈滑而厥者裏有熱並主之

知母三兩甘草一兩石膏八兩碎

粳米三合

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分取米熟為度去滓溫服

白虎加人參湯六十五服桂枝湯大汗出大煩渴不解

脈洪大者○傷寒若吐若下後七八日不解蒸熱

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服

仲景方  
三升服  
三升服



裏表裏俱熱時時惡寒大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者○傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者並主之屬太陽

人參 二兩 知母 一兩 甘草 炙二兩或作半兩

糯米 一合 石膏 四兩碎綿裹

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分取米熟為度去滓溫服

五苓散六十六 太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉

活人書十四卷 浮小便不利微熱消渴者○發汗已脉浮數煩渴者

○傷寒汗出而渴者不渴者與茯苓甘草湯 ○中風發熱六七

日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水逆者○本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人

渴而口燥煩小便不利者屬太陽 ○太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以

醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞅不更衣十日無所苦也

欲飲水少少與之但以法救之或渴者屬陽 ○霍亂

竹葉方澤 一兩六分 蘇精苓 白木 十 二兩服方 寸七日三 多飲水 汗出愈

仲景方阿 膠不炙

四升煮取 二升去滓 下厚煑酒 服七合日 三

竹葉方 茯苓 三 兩八分 兩白木 四 兩附子 二 枚不炮

頭痛發熱身疼熱多飲水者並主之屬霍亂

澤瀉 一兩 猪苓 去黑皮 茯苓 去皮

白木 各三分 桂枝 去皮半兩

右搗篩為散拌和每服抄三錢七白湯調下此藥

須各自事持秤見分兩然後合

猪苓湯六十七 陽明病脉浮發熱渴欲飲水小便不利

者○少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者並主之

猪苓 去皮 茯苓 阿膠 炙道

活人書十四卷 澤瀉 滑石 各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至七分去滓溫服

附子湯六十八 少陰病得之一二日口中和背惡寒者當灸之○少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者並宜服之

茯苓 芍藥 各一兩半 人參 一兩

白木 二兩 附子 一枚炮

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至七

分去滓溫服



八升者取  
三升服一  
升日三服

傷寒方生  
二兩半

傷寒方生  
六枚水  
二升者取  
一升分三  
服日三  
服別本作  
去滓湯者  
只一服

傷寒方生  
無骨字

傷寒方生  
草白木二  
兩附子二  
枚桂枝四  
兩水六升  
煮取三升  
服一升日  
三服

分去滓溫服日三服

木附湯六十九 傷寒八九日風濕相薄身體疼痛不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之

若其人大便堅小便自利者此主之屬太

白朮二兩 甘草一兩 附子一枚半炮去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑五片大棗一

枚水一盞半煮至七分去滓溫服日三服一服覺

身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怵也

即是附子與朮並走皮中逐水氣未得除故使之

活人書十四卷 九

耳法當加桂一兩其大便堅小便自利故不加桂

也

甘草附子湯七十 治風濕相薄骨節疼痛掣骨痛不

得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲

去衣或身微腫者屬太

甘草 炙 白朮 各一兩 附子 一枚炮

桂枝 二兩或作三兩身腫者加防風二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至七

分去滓溫服汗出即解

待微汗則  
鮮能食汗  
出後煩者  
服五合惡  
一升多者  
服六七合

傷寒方生  
仲景方水  
五升者取  
一升五合  
分服

傷寒方水  
三升者取  
一升頓服

中氣各  
炮以薑不

芍藥甘草附子湯七十二 發汗病不解反惡寒者虛故

也此主之

芍藥三兩 甘草三兩 附子一枚炮

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至七

分去滓溫服

乾薑附子湯七十三 下之後復發汗盡日煩躁不得眠

夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者此

主之屬太

乾薑一兩 附子一枚生

活人書十四卷 十

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至七

分去滓溫服未知再服

理中圓七十三 霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者

五苓散主之寒多不用水者此主之○大病差後喜

唾久不了了胃中有寒當以圓藥溫之宜服此屬陰

乾薑 炮 甘草 炙 人參 腹痛者

白朮 各一兩

右搗篩煉蜜和圓如鷄子黃許大以湯數合和一



此方乾薑不炮水三升取

圓研碎溫服之日三夜二服腹中未熱益至三四圓熱粥飲之微自溫覆勿揭衣然不及湯又方

人參 乾薑 甘草

白朮各三兩

腹痛者加人參一兩半寒者加乾薑一兩半渴欲得水者加白朮一兩半脾上集者腎氣動也去木加桂四兩吐多者去木加生薑三兩下多者還用木悸者加茯苓二兩或四肢拘急腹滿下利或轉筋者去白朮加附子一枚生用

活人書 卷十四 十一

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服日三服

四逆湯 傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒

脚攣急與桂枝湯得之便厥咽乾煩躁吐逆作甘草

乾薑湯與之厥愈更作甘草湯與之其脚伸若

胃氣不和與調胃承氣湯若重發汗加燒針者傷寒

醫下之續後下利清穀不止身疼痛急當救裏後身

疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜

桂枝湯 病太陽 自利不渴者以其藏有寒故也當

溫之宜服 屬太陰 或脈浮而遲表熱裏寒下利清穀

者此並主之 少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲

吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此有中實不

可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當

溫之或脈沉者急溫之並宜服 屬少陰 〇大汗若大下

利而厥冷者或大汗出熱不去內拘急四肢疼又下

利厥逆而惡寒者或下利腹滿身疼痛者先溫裏乃

攻表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯或嘔而脈弱小

便復利身有微熱見厥難治此並主之 屬厥陰 〇吐利

汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者吐利小便復

利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者此主

之 屬霍亂

甘草二兩 附子一箇 乾薑一兩

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一盞半煮至七

分去滓溫服 〇強人加附子半箇乾薑加一兩半

四逆散 少陰病四逆其人或欬或悸或小便不

利或腹中痛或泄利下重者此主之 屬少陰

枳實 去白穢 炒黃

甘草 柴胡

伊集方乾薑不炮水三升取



芍藥 已上各  
右搗節為細散米飲調下二錢日三服欬者加五味子乾薑各半兩并主下痢悸者加桂半兩小便不利者加茯苓半兩腹中痛者加附子半枚炮裂泄利下重先濃煎薤白湯內藥末三錢七再煮一二沸溫服

四逆加入參湯七十六惡寒脉微而利利止者亡血也此主之屬霍亂

甘草二兩 人參一兩 附子一枚生

活人書十四卷 乾薑一兩 右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服日三服

茯苓四逆湯七十七治發汗若下之病仍不解煩躁者

茯苓三兩 人參半兩 甘草一兩 乾薑七錢 附子半箇生

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

當歸四逆湯七十八治手足厥寒脉細欲絕者屬厥

當歸各一 桂枝各一 芍藥各一

當歸四逆加茱萸生薑湯七十九有當歸四逆湯證者其人內有火寒者宜服屬厥

當歸洗 桂枝去皮 芍藥 細辛各一 甘草各一 木通各一 茱萸五兩

活人書十四卷 右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片大棗一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

活人書卷第十四



活人書卷第十五

通脉四逆湯八十一治少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身及不惡寒其人面色赤或腹痛

或乾嘔或咽痛或利止脉不出者屬少陰○下利清穀裏寒外熱汗出而厥者屬厥陰

甘草炙二兩 乾薑三兩 附子大者一枚去皮破八片生用

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓温服未差急更作一劑其脉續出者愈

面赤者加連翹葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩

活人書四十五卷 一

兩嘔者加生薑二兩咽痛去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加入參二兩

通脉四逆加猪膽汁湯八十二治吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者屬霍亂

甘草二兩 乾薑三兩 附子大者一枚生去皮 猪膽汁半合

右三味剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓內猪膽汁温服其脉即來

黃連湯八十三治傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛

仲景方乾薑不炮半斤

夏半斤

十二枚水一斗煮取六升服一升日三夜二

即黃連連子湯

仲景方四分之一水作五升煮取二升服

七合日三

欲嘔者屬太陰

甘草炙 黃連 乾薑炮

桂枝各三兩 人參二兩 半夏二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七棗二枚水三盞煮取一盞半去滓分二服

黃連阿膠湯八十三治少陰病得之二三日已上心中煩不得卧者屬少陰

黃連二兩 阿膠三分 鷄子黃半箇

黃芩一分 芍藥半兩

活人書四十五卷 二

右剉如麻豆大每半劑水二盞煮取一盞去滓內膠消盡內鷄子黃攪令和温服日二服

黃芩湯八十四太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯

若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之屬太陰○傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯微其熱脉遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死屬厥陰

黃芩二兩 甘草炙 芍藥各一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七棗子一枚水一盞

使黃芩黃芩三兩并藥二兩

使黃芩黃芩三兩并藥二兩

使黃芩黃芩三兩并藥二兩

使黃芩黃芩三兩并藥二兩

使黃芩黃芩三兩并藥二兩



十二枚水  
一斗煮取  
三升服一  
升日再夜

仲景方作  
於黃芩湯  
內加半夏  
半升薑三

兩餘依前  
法服  
陽伯按既  
云如生薑  
而奉議用  
之太少有  
垂原旨

仲景方五  
分之一

半煮至八分去滓溫服黃芩或作一兩半

黃芩加半夏生薑湯八十五 太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者此主之屬太陽

黃芩 三分 半夏 二分 芍藥

甘草 各二分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞生薑四片

大棗子一枚煮至八分去滓溫服

文蛤散八十六 病在陽應以汗解之反以冷水噴之若

灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲

活人書 十五卷 三

水反不渴者宜服屬太陽 ○若不差者與五苓散寒實

臧龐安常云小  
陰胃湯非也

文蛤 一兩

右一味為散沸湯和服方寸匕

三物白散八十七 治寒實結胸無熱證者屬太陽

貝母 三分 桔梗 三分 巴豆 一分去心皮熬黑研如脂一分

右為散內巴豆研和以白飲和服強人半錢七贏

人可減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱

粥一盃利過不止進冷粥一盃身熱皮粟不解飲

引衣自覆若以水噴之洗之益令熱劫不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上述法

十棗湯八十八 太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之

其人漿漿汗出發作有時頭痛心下痞鞅滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也宜服

芫花炒赤 甘遂 大戟

右各等分異篩秤末合和之入臼中再杵治三百

活人書 十五卷 四

下先以水一升半煮肥棗子一十枚煮取八合去

滓內藥末強人一錢七贏人可半錢再單飲棗湯

送下平旦服若下少病不除者明日更服加半錢

利後糜粥自養合下不下令人脹滿通身浮腫而

死

抵當圓八十九 傷寒有熱小腹痛應小便不利今友利

為有血也當下之不可餘藥宜服屬太陽

桃人四箇去 大黃三分 蟅虫五箇去

水蛭五箇煮去子杵碎水蛭再生化為

仲景方桃  
八二十箇  
大黃三兩  
蟅虫二十



右楊簡只為一圓水一大白盞煮至七分頓服  
時當下血不下更作之

抵當湯九十一 太陽病六七日表證仍在脈微而沉反

不結胃其人發狂者以熱在下焦小腹鞭滿小便自

利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故

也或太陽病身黃脈沉結小腹鞭小便不利者為無

血也小便自利其人如狂者血證諦也或傷寒有熱

小腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不

可餘藥宜服屬太陽 陽明證其人喜忘者必有畜血

活人書十五卷 五

所以然者本有以瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易

其色必黑者宜此藥下之或病人無表裏證發熱七

八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱

則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血宜服屬陽

大黃一兩去一 蠶虫十枚去 桃人七枚去皮

水蛭十枚煮去子 碎水蛭入腹再生化

右劉如麻豆大作二服水二盞煮七分去滓溫服

麻人圓九十二 跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便

數浮濇相搏大便則鞭其脾為約此主之屬陽

黃二兩  
桃人二十  
蠶虫三十  
水五升  
取三升  
一升

一十箇  
圓水  
升者一  
日取七

麻人五兩 芍藥四兩 厚朴五寸去皮

枳實四兩 大黃八兩 杏仁二兩半

右為散蜜和為圓如桐子大飲下十圓未知益之

日三服

茵陳蒿湯九十三 陽明病發熱汗出者此為熱越不能

發黃也但頭汗出身無汗刺頸而還小便不利渴飲

水漿者此為瘀熱在裏身必發黃或傷寒七八日身

黃如橘子色小便不利腹微滿者此並主之屬陽

茵陳蒿一兩 大黃三錢半 梔子三枚

活人書十五卷 六

右劉如麻豆大每服抄五錢匕以水二大白盞先

煮茵陳減半盞次內二味煮八分去滓溫服日三

服小便當利尿如皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃

從小便中去也

牡礪澤瀉散九十三 治大病差後從腰以下有水氣者

陰陽易差後 勞傷病脈證

商陸煮 澤瀉 蜀漆洗去

栝樓根各等分 葶蘆煮 海藻洗去

大黃二兩  
梔子十四  
水一斗  
煮取三升  
分三服

仲宗方茵  
兩高六兩

伊景方  
人二升  
藥半斤  
升一尺  
實半斤  
黃一斤  
杏一升  
別本方  
四兩



右為散飲服方寸七小便利止後服

竹葉石膏湯九十四 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者陰陽易差後

仲景方 夏半升石 膏一斤 淡竹葉二把 人參三兩 甘草二兩 麥門冬一升 粳米半升 水一斗 煮取六升 去滓內米 熟湯成 米熟湯成

半夏一分 石膏四兩 淡竹葉半把

人參半兩 甘草半兩 麥門冬二兩 去心或作二兩二分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入粳米百餘粒煮取八分米熟湯成去滓溫服嘔者加生薑一兩半

積實梔子湯九十五 治大病差後勞復者陰陽易差後

仲景方 積實一兩 梔子三枚 水一斗 煮取六升 去滓內米 熟湯成 米熟湯成

積實一枚 梔子三枚 豉一兩 綿裹

右以清漿水二盞半空煎退八分內積實梔子煮取九分下豉再煮五六沸去滓溫服覆令汗出若有宿食內大黃如博棊子五六枚同煮

白通湯九十六 治少陰病下利脈微者屬少陰

仲景方 附子一枚 乾薑一兩 白通湯

附子一枚 乾薑一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入葱白四寸煮至七分去滓溫服

白通加猪膽汁湯九十七 少陰病下利脈微者與白通

仲景方 白通湯 猪膽汁

白通加猪膽汁湯九十七 少陰病下利脈微者與白通

湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者此主之服湯脈暴出者死微續者生屬少陰

猪膽半合 乾薑半兩 葱白四莖

附子半兩 去皮

右以水一盞煮至五分去滓內尿膽汁和相得分溫再服

桃花湯九十八 治少陰病下利便膿血者或病二三日

至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者屬少陰

乾薑一分 赤石脂四兩 半篩末

右剉如麻豆大每服抄四錢七入糯米一撮水一盞半煮至一盞去滓再入赤石脂末一方寸七服日三服若一服愈勿再服糯米或泔

吳茱萸湯九十九 食穀欲嘔屬陽明也此主之得湯反劇者屬上焦也屬陽明

欲死者或乾嘔吐涎沫頭痛者此並主之屬少陰

人參一兩 吳茱萸一兩 六錢半

右剉如麻豆大每服抄四錢七生薑四片棗子一枚水二盞半煮至八分去滓分二服

白通加猪膽汁湯九十七 少陰病下利脈微者與白通

仲景方 白通湯 猪膽汁

白通加猪膽汁湯九十七 少陰病下利脈微者與白通

白通加猪膽汁湯九十七 少陰病下利脈微者與白通



猪膚湯二百 治少陰病下利咽痛背滿心煩者屬少陰

猪膚二兩六錢半

右一味以水二大盞半煮取一盞許去滓加白

蜜一合半白粉一合相和溫服

桔梗湯二百 治少陰病二三日咽痛與甘草湯不差者屬少陰

桔梗一兩

甘草二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫分再服

活人書卷十五

半夏散及湯二百 治少陰病咽中痛者屬少陰

半夏湯洗

桂枝去皮

甘草炙

右等分各別搗篩已令和治之每服抄三錢七水

一大盞煮至八分令冷少少嚥之

苦酒湯二百 治少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者屬少陰

半夏洗碎如棗核十四枚

雞子一枚去黃內苦酒著雞子殼中

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安

火上令二三沸去滓少少含嚥之不差再服

真武湯二百四 太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心

下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者此主之屬太陽

陰病二三日不已至四五日腹滿小便不利四肢沉

重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利

或下利或嘔者此主之屬少陰

白朮二分

芍藥三分下利者去芍藥加乾薑二分

附子一枚炮去皮破八片用二片嚥者去附子加生薑三兩或云生薑足前成三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片水一盞

活人書卷十五

半煮至八分去滓溫服日三服若欬者加五味子

三分細辛一分乾薑一分

烏梅圓二百五 傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁

無暫安時者此為藏厥非蚘厥也蚘厥者其人當吐

蚘令病者靜而後時煩者此為藏寒蚘上入其鬲故

煩煩更復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人常

自吐蚘蚘厥者此主之屬厥陰

烏梅七十箇

細辛

人參

附子炮去皮

桂枝各一兩半去皮

一第000 丹黃參四庫全書 0 反E句



桂枝六兩  
乾薑十兩  
黃連一斤  
蜀椒四兩  
當歸四兩

仲景方各  
三兩水六  
升煮取二  
升分四服

仲景方白  
頭翁二兩  
餘三兩水  
七升煮取  
二升服一  
升不愈更  
服一分

乾薑二兩  
黃連四兩  
蜀椒去目出一兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核  
蒸之五升米下飯熟杵成泥和藥令相得內臼中  
與蜜杵三千下圓如桐子大先食飲服十圓日三  
服稍加至二十圓禁生冷滑膩等物

乾薑黃芩黃連人參湯一百六  
傷寒本自寒下醫後吐  
下之寒格更逆吐下若食入口即吐此主之陰

活人書  
人參各三分  
十五卷  
十一

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八  
分去滓溫服

白頭翁湯一百七  
熱利下重者或下利欲飲水者以有  
熱也血主之陰

黃蘗  
秦皮  
黃連各一兩半

白頭翁一兩半或  
右剉如麻豆大分作五服每服水二大盞煮至八  
分去滓溫服不差可服

活人書 卷一五

仲景方各  
一斤水六  
升煮取二  
升三服

仲景方旋  
覆花三兩

代補一兩  
甘草三兩  
瓜蒂散一百十  
瓜蒂散一百十  
病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮  
胃中痞鞭氣上衝喉咽不得息者此為胃有寒也當  
吐之宜服屬太

赤石脂禹餘糧湯一百八  
傷寒服湯藥下利不止心下  
痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止墜以理中  
與之利益甚理中治中焦此利在下焦宜服此藥復  
不止者當利其小便屬太

赤石脂碎  
禹餘糧各四兩

右剉每服抄五錢七水一盞半煮八分去滓溫服  
旋復代瀉湯一百九  
治傷寒發熱若吐若下解後心下  
痞鞭噎氣不除者屬太

活人書  
旋覆花三分  
人參半兩  
代補一分  
十二

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一  
枚煮至八分去滓溫服

瓜蒂散一百十  
病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮  
胃中痞鞭氣上衝喉咽不得息者此為胃有寒也當  
吐之宜服屬太

瓜蒂熬黃  
赤小豆各半兩

右各搗篩已合治之取一錢七豉一合湯七合先  
漬之漬更煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服不吐

四六三



少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

蜜煎導

百十一

陽明病自汗出若發汗小便自利者

此為津液內竭屎雖鞭不可攻之當須自欲大便宜  
蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可為導

蜜四兩

右一味內銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿

令焦着欲可圓捻作錠如指許長二寸當熱時急  
作令頭銳內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方

活人書

十五卷

十三

右以大猪膽一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道中

如一食頃當大便

燒視散

百三

傷寒陰易之為病其人身體重少氣小

腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼中  
生花膝脛拘急者此主之

視襠燒灰

右一味以水和服方寸七小便利陰頭腫即愈

活人書卷第十五

仙方日  
三服婦人  
病取男子  
限宿

活人書卷第十六

此一卷載雜方大率仲景證多而藥少使皆如仲

景調理既正變異不生則麻黃桂枝青龍用之而

有餘以後世望聖人難矣仲景藥方缺者甚多至

如陰毒傷寒時行溫疫溫毒發斑之類全無方書

今採外臺千金聖惠金匱玉函補而完之凡百有

餘道以證合方以方合病雖非仲景筆削然皆古

名方也譬猶周易參同華嚴合論步驟馳騁不外

乎聖人之意又况俗學久矣一旦革之悉用古法

活人書

十六卷

即陽春白雪復生誘致適足以杜絕治法今撥歸

經絡裁減湯濟參以雜方庶免庸人易曉日就月

將辛甘發散酸苦湧泄之術行即俗方不革而自

寢矣此余所以載雜方之意也又况五積散敗毒

散升麻湯萎蕤湯之類縱治不對病用之或差亦

無所害載之卷末以俟後之用方者采擇

升麻湯 治傷寒中風頭痛憎寒壯熱肢體痛發熱

畏寒鼻乾不得睡兼治小兒大人瘡疹已發未發皆

可服無治寒暄不時人多疾疫乍暖脫著衣巾及暴



熱之次忽變陰寒身體疼痛頭重如石者

升麻 白芍藥 甘草 乾葛

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服若大段寒即熱服若熱即溫服瘡疹

亦准此服藥已身涼止藥小兒量度多少服如老

兒喫去芍藥加柴胡一兩人參半兩雪白芍藥一

分

防風白木牡礪湯 治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

白木 牡礪粉 防風

活人書 十六卷

右搗羅爲細末每服抄二錢七以酒調下米飲亦

得日二三服汗止便服小建中湯

李根湯 治氣上衝正在心端

半夏 桂枝 當歸 芍藥

茯苓 黃芩 甘草 生薑

甘李根白皮

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服

大橘皮湯 動氣在下不可發汗發汗則無汗心中

大煩骨節疼痛目運惡寒食則反吐噦不得入先服  
大橘皮湯吐止後服小建中湯

甘草 人參 竹茹

橘皮 生薑 棗子

右剉如麻豆大每服抄五錢七水三大盞煮取一

盞去滓分二服

橘皮竹茹湯 治噦逆

橘皮 竹茹 甘草 人參

半夏 生薑 棗子

活人書 十六卷

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二大盞煮至一

盞去滓溫服日三服

生薑橘皮湯 治乾嘔噦若手足厥冷者

橘皮 生薑

右剉碎作一服水七盞煮至三盞去滓溫服一盞

下咽即愈

陰旦湯 治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩

芍藥 甘草 乾薑

黃芩 桂枝 大棗



右判如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服日三夜二覆令小汗

陰毒甘草湯治傷寒初得病一二日便結成陰毒

或服藥六七日已上至十日變成陰毒其病身重背

強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不

得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脉沉細而疾仲景

云此陰毒之候身如被杖喉咽痛五六日可治七日

不可治

甘草炙 升麻 當歸 桂枝去皮各二分

活人書十六卷 雄黃一分 鱉甲一兩半 蜀椒一分出汗閉口者及子去之

右判如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓服如人行五里頃更進一服溫覆取汗毒

當從汗出汗出即愈若未汗再作服

白朮散治陰毒傷寒心間煩躁四肢逆冷

白朮一兩 附子一兩炮裂去皮臍 川烏頭一兩炮裂去皮臍

桔梗去蘆頭一兩 細辛一兩 乾薑半兩炮裂

右件藥搗篩為細末每服二錢七水一中盞煮至六分不計時候稍熱和滓頓服

附子散治陰毒傷寒唇青面黑身背強四肢冷

桂枝半兩 當歸半兩 白朮半兩

附子三分炮裂去皮 乾薑一分炮裂 半夏一分湯洗七遍去滑

右件搗篩為細散每服抄三錢七水一中盞入生薑半分煮至六分去滓不計時候熱服衣覆取汗

如人行十里未汗再服

正陽散治陰毒傷寒面青張口出氣心下硬身不

熱只額上有汗煩渴不止舌黑多睡四肢俱冷按成

聊辨明理論中言舌黑俱熱証不備

活人書十六卷 甘草一分 麝香一錢細研入 附子一兩炮裂

乾薑一分炮裂 皂莢一挺去黑皮塗酥炙令黃色去子

右件搗羅為細末每服抄二錢七水一中盞煮至五分不計時候和滓熱服陽伯按此二段陰證亦有舌黑渴及昏憤者等

者非工力深到差謬多矣

肉桂散治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆

冷昏沉不識人變為陰毒別本無厚朴木香二味宋黃湯浸七遍焙乾微炒

肉桂三分 高良薑二分 厚朴三分去蘆皮

白朮三分 木香三分 人參一分去蘆頭

右件藥搗篩為細末每服抄二錢七水一中盞煮至六分不計時候稍熱和滓頓服



赤芍藥一兩 陳橘皮一兩 附子一兩炮裂去皮臍

前胡去蘆頭 當歸一兩剉 吳茱萸半兩湯浸

右件搗為麤末每服抄四錢七水一中盞棗子三

枚煮至六分去滓不計時候稍熱頻服

回陽丹十二 治陰毒傷寒面青手足逆冷心腹氣脹

脉候沉細

葶澄茄半兩 木香半兩 乾蠟半兩

吳茱萸半兩湯浸七遍 附子炮裂去皮臍半兩

硫黃細研入 乾薑一分炮裂剉

活人書 十六卷 六

右件藥搗羅為細末酒煮麪糊為圓如梧桐子大

每服三十圓不計時候生薑湯下頻服三服復以

熱酒一盞投之以厚衣蓋定取汗為度

返陰丹十三 治陰毒傷寒心神煩躁頭痛四肢逆冷

附子炮裂去皮臍 乾薑炮裂 桂心各半兩

硫黃五兩 太陰玄精石 消石各二兩別研

右件藥用生鐵鈹先鋪玄精石一半次鋪消石末

一半中間下硫黃末又著消石末蓋硫黃都以玄

精蓋上訖用小盞合著以三斤灰火燒令得所勿

別本令至和六字作極細米粉

一本透作別本作小

令煙出多急取瓦盆合著地面四向着灰蓋勿令

煙出直候冷取出細研如麩後三味搗羅為末與

前藥同研令細用軟飯為圓如梧桐子大每服十

五圓至二十圓煎艾湯下頻服汗出為度病重則

三十圓此方甚驗喘促與吐逆者入口便住若服

此藥三五服不退便於臍下一寸灸之須是大段

日夜不住手灸不限多少壯數灸之仍艾炷勿令

小小則不得力若其人手足冷小腹硬即須更於

臍下兩邊各一寸各安一道三處灸之仍與當歸

活人書 十六卷 七

四逆湯并返陰丹亦須頻服內外通逐方得解退

若遲慢即便死矣若是陰證加以小便不通及陰

囊縮入小腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴

大段急灸之仍須與返陰丹當歸四逆加吳茱萸

生薑湯慎勿與尋常利小便藥也尋常利小便藥

多是冷滑藥此是陰毒氣結在小腹所致也世有

醫者見小便不通便用炒鹽及暴熱藥於臍下便

覺欲望小便通緣陰氣在小腹之間致被熱物熱

著無處所出得即便奔上衝心往往有死者



天雄散十四正元散 治陰毒傷寒身重背強腹中疼

痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣嘔逆唇青面

黑四肢厥冷其脉沉細而疾

麻黃去根節 當歸剉微炒 半夏湯洗七遍

白朮半兩 乾薑三分 陳橘皮三分湯浸

天雄炮去皮 肉桂一兩去 川椒一分去目及閉

厚朴一兩去麩皮塗生

右件藥搗為麩末每服抄五錢七水一大盞入生

薑半錢棗子三枚煮至五分去滓不拘時稍熱服

活人書卷八 如人行十里未汗再服

正元散出本 治傷寒如覺風寒吹着四肢煩疼頭目

百骨節疼痛急煎此藥服如人行五里再服或連進

三服取汗立差若患陰毒傷寒入退陰散半錢同煎

或傷冷或傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無不有

効

麻黃去節 陳皮 大黃生 甘草炙

乾薑炮 肉桂去皮 芍藥 附子炮去

吳茱萸湯洗 半夏泡各等分內麻黃加

右搗為末每服一大錢水一盞生薑三片棗子一

枚煮至七分熱服如出汗以衣被蓋覆切須候汗

乾去衣被如是陰毒不可用麻黃免發出汗

退陰散出本 治陰毒傷寒手足逆冷脉沉細頭痛腰

重連進三服小小傷冷每服一字入正元散內同煎

入鹽一捻陰毒傷寒效逆煎一服細細熱啣便止

川烏 乾薑各等

右搗為麩末炒令轉色放冷再搗為細末每服一

錢水一盞鹽一捻煮半盞去滓溫服

活人書卷九 葱熨法十五 治氣虛陽脫體冷無脉氣息欲絕不省

人事及傷寒陰厥百藥不効者

葱以細索纏如繩許大切去根

右如大餅餃先以火煨一面令通熱又勿令灼人

即以熱處搭病人臍連臍上下四圍以醫布擁隔

火氣上用熨斗滿貯火放葱餅上熨之令葱餅中

熱氣鬱鬱入肌肉中須預作三四餅一餅壞不可

熨又易一餅良久病人當漸醒手足溫有汗即差

更服四逆湯量溫其內昔曾有患傷寒冥冥不知



人四體堅冷如石藥不可入用此遂差

葶藶苦酒湯十六治傷寒七八日內熱不解

葶藶一合 煎煎膏 苦酒米醋是也

生艾汁半升無生艾煮熟艾汁 或用艾根根煎汁亦可

右汁煎取七合分作三服

陽毒升麻湯十七治傷寒一二日便成陽毒或服藥

吐下之後變成陽毒腹背痛煩悶不安面赤狂言或

走或見鬼或下利脉浮大數面赤斑斑如錦紋喉咽

痛下膿血五日可治七日不可治

活人書十六卷

升麻二分 犀角屑

黃芩 人參 甘草一分

右剉如麻豆大以水三升煮取一升半去滓飲一

湯盡食頃再服温覆手足出汗則解不解重作

大黃散十八治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂

者

甘草一兩 木通一兩 大腹皮一兩

桂心三分 川芒消二兩 川大黃一兩

桃人二十一枚湯洗去皮尖

雙仁雙仁 麩麩 冬冬 後後 黃黃

右件搗為倉末每服抄四錢七水一中盞煮至六

分不計時候温服以通利為度

梔子人湯十九治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子人一兩 大青一兩 赤芍藥一兩

知母一兩 柴胡一兩 川升麻二兩

黃芩二兩 石膏二兩 甘草半兩

杏人湯洗去皮尖雙仁 首首 麩麩 冬冬 後後 黃黃

右件搗為倉末每服抄四錢七水一中盞入生薑

半分豉一百粒煮至六分去滓不計時候温服

活人書十六卷

黑奴圓二十治時行熱病六七日未得汗脉洪大或

數面赤目瞪身體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五

六日已上不解熱在胃中口噤不能言為壞病傷寒

鑿所不治乘為死人或人精意已竭心下纔暖撥開

其口灌藥下咽即活兼治陽毒及發斑証

黃芩一兩 金底煤研入一兩 大黃一兩

芒消一兩 竈突墨研入 梁上塵一兩

小麥奴小麥未成熟時兼中不成麥粒之

麻黃去節泡一二沸

別本也字  
下作無此  
云須取用  
本本作無

別大黃麻  
實存一兩

麻六常作  
胃中



此亦神供  
藥無邪子  
卷二十七

右件搗羅為極細末煉蜜為圓如彈子大以新汲水三合研下一圓渴者但與冷水盪足飲之須臾當寒寒竟汗出便差若日移五尺不汗依前法再服一圓差即止須微利也此藥須是病人大渴倍常躁盛渴者乃可與之若小渴者強與之翻為禍耳

五積散三十一 治陰經傷冷脾胃不和及感寒邪并食積所傷

官桂去皮二兩 人參二兩 川芎一兩

活人書卷十六 厚朴去皮淨三兩 白茯苓七兩

芍藥洗淨 當歸洗 半夏湯洗五遍

乾薑各三兩 甘草二兩 枳殼五兩

桔梗十二兩 陳橘皮八兩 吳白芷四兩

蒼朮二十四兩 吳白芷四兩 枳殼五兩

右件除枳殼肉桂橘皮外其餘並一處生搗為麩末分作六分於大鑊內用文武火炒令黃熟不得焦用紙攤於板上候冷入前件枳殼官桂橘皮末一處和勻入瓷合盛每服二錢水一盞生薑三片

一作茶末  
新淨洗  
乾無新  
水十字

新著作中

本合在

同煎至七分去滓溫服○傷寒入葱白一莖豆豉七粒同煎連服出汗或脾胃不和肉傷冷食渾身疼痛頭昏無力膏膈不快喫食不下氣脉不和四肢覺冷至晚心躁困倦即入鹽少許同煎或是陰經傷寒手足逆冷或睡裏虛驚及虛汗不止脉細疾面青嘔逆更宜入附子同煎加減多少並在臨時觀看虛實輕重候之

霹靂散三十二 治陰盛陽煩躁不飲水

附子一枚及半兩者炮熟取出用

活人書卷十六

真臘茶錢一大

右同和分作二服每服用水一盞煎六分臨熟入蜜半匙放溫冷服之須臾躁止得睡汗出即差

火燭散三十三 治傷寒惡候

船上硫黃 黑附子去皮 新鴈茶各一兩

右先用好酒一升調藥分大新碗五口放於火上攤蕩令乾合於瓦上每一碗下燒熟艾一拳大以瓦楮起無令火著直至烟盡冷即刮取却細研入瓷合盛每服二錢酒一盞共煎七分有火燭起勿



訝取起待温服下凡傷寒陰毒者四肢冷脉沉細  
或吐或瀉五心燥煩胃中結硬或轉早伏陽在內  
湯水不得下或無脉先喫一服如吐却更進一服  
服後心中熱其病已差下至臍腑中表未解者渾  
身壯熱脉氣洪大便宜用發表藥或表解者更不  
發熱便得睡眠渾身有汗方可用下胸膈行臍腑  
藥漸用調和脾胃補養元氣湯散如服此藥二服  
不應不可治也

丹砂圓三十四治傷寒陰陽二毒相伏危惡形證

活人書十六卷

十四

硝石半兩

太陽石

舶上硫黃

水銀

太陰石

玄精石各一兩研

右件藥爲末先用無油銚子以文武火炒下諸藥  
末令勻如灰色研如粉麩生薑自然汁浸蒸餅爲  
圓如菉豆大每服五圓龍腦牛黃生薑蜜水下壓  
躁也若陽毒裏子煎湯下若陰毒任湯下不得於  
屋底炒

活人書卷第十六

子作新錄

活人書卷第十七

五味子湯二十五治傷寒喘促脉伏而厥

人參二錢 麥門冬去心二錢 杏仁去皮尖

橘皮去白二錢 五味子半兩 生薑二錢 棗子三枚

右剉如麻豆大水二大盞煮至一盞去滓分作  
二服

殺鼠糞湯二十五療傷寒病後男子陰易及諸般勞復

韭根一大把 殺鼠糞十四枚兩頭

右二味水二升煮取半升去滓再煎三沸温温盡

活人書十七卷

服必有粘汗出爲効未汗再作服亦治諸般勞復

竹皮湯二十七療傷寒後交接勞復邪腫腹中絞痛欲

絕

刮竹青皮一升

右一味以水三升煮取一升半絞去滓分服立愈

知母麻黃湯二十八傷寒差後或十數日或半月二十

日終不惺惺常昏沉似失精神言語錯謬又無寒熱

盛或作鬼祟或作風疾多般治不差或朝夕潮熱煩

赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心胞絡間

再九十七  
知母桂心  
湯方同條

十五卷



所致也

知母一兩 麻黃去節 甘草炙 芍藥

黃芩各半 桂枝去皮半兩 盛暑中可減桂枝作一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八

分去滓溫服半日可稍次二三服溫覆令微汗若

心煩不眠欲飲水當稍稍與之令胃中和即愈未

汗須再服以汗為度

鱉甲散二十九 傷寒八九日不差名曰壞傷寒諸藥不能治者

活人書二十七卷 升麻 前胡去蘆 烏梅去核 枳實炒去穢

犀角鎊 黃芩各半 生地黃切兩 甘草一分

鱉甲去裙米醋炙赤

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八

分太滓溫服

人參順氣散三十 治傷寒頭疼憎寒壯熱四肢疼痛

乾葛 甘草炙 白朮 桔梗去蘆

香白芷 人參各一兩 乾薑半兩 麻黃去節一兩

右搗羅為麤末每服三錢水一盞半生薑三片葱

白二寸煎至八分通口服如要出汗連進二服

蒼朮散三十一 治傷寒一二日頭疼發熱憎寒身體疼

痛

石膏一兩 桔梗半兩 麻黃一兩去節湯洗

山茵陳去梗 甘草炙 蒼朮各半兩 米泔浸

右為麤末每服二錢水一盞煎至八分連服數服出汗

麻黃葛根湯三十二 治傷寒一日至二日頭項及腰脊

拘急疼痛渾身煩熱惡寒

活人書二十七卷 芍藥三兩 豆豉一合 乾葛四分 麻黃三兩去節

沸焙 乾秤

右剉如麻豆大每服四錢葱白七根水一盞半煮

至八分去滓溫服以厚衣蓋覆如人行四五里間

再服良久如未得汗更煮葱粥少少與之熱投以

助藥力取汗即愈

敗毒散三十三 治四時傷風溫疫風濕頭目昏眩四肢

痛憎寒壯熱項強目睛疼尋常風眩拘倦風痰皆可服之神効



羌活去苗 獨活去苗 前胡去苗 柴胡去苗

芎藭 枳殼去穢 白茯苓去皮 桔梗

人參各二兩 甘草半兩

右件搗為末每服三錢生薑三片水一盞煎至七分或沸湯點末服亦可老人小兒亦宜日三二服以知為度又烟瘴之地山嵐瘴氣或溫疫時行或人多風痰或處卑濕脚弱此藥不可闕也

獨活散三十四 治傷風濕熱等疾

羌活 獨活並去 枳殼去穢 防風

活人書 十七卷 四

黃芩細堅 麻黃沸湯泡一二 人參

細辛華陰 甘草炒赤 茯苓 蔓荊子

甘菊花各一兩 石膏水飛過

右搗為籠末每服三錢水一盞生薑三片薄荷四五葉同煎至七分去滓微熱呷服之年高者以川芎代黃芩

芎代黃芩

桂枝石膏湯三十五 治傷寒三日外與諸湯不差發熱

脈勢仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者

石膏二兩 黃芩半兩 梔子四枚小者 桂枝去皮

甘草各半 升麻 乾葛 白藥子各二分

生薑三分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取八分去滓溫服食頃再服若得汗即停後服此方可夏至後代桂枝證用若加麻黃去節半兩可代麻黃青龍湯用之也有汗脈緩為桂枝湯證無汗脈緊為麻黃煩躁為青龍證

梔子升麻湯三十六 治晚發傷寒三日至夏為晚發

梔子十枚 升麻一兩 生地黃半斤 柴胡二兩

活人書 十七卷 五

石膏二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓頻服病不解更作若頭面赤去石膏用乾葛二兩無地黃用豆豉代之

橘皮湯三十七 治傷暑痰逆惡寒

橘皮湯

甘草一兩 人參一分 陳橘皮去白

右為籠末每服五錢用新青竹輕輕刮皮一團薑四片棗一枚水一盞半煎至八分去滓熱服如不惡寒即宜竹葉湯



治寒濕  
及人行  
等

解肌湯三十八 治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根 一兩 黃芩 半兩 芍藥 半兩 甘草 炙 一分  
桂心 一分 麻黃 三分去節湯泡一沸焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服初服微煩復服汗出即愈  
再服發汗脈沉實者宜下之差

小柴胡加桂湯三十九 治瘧疾先寒後熱兼治支結

柴胡 八兩 人參 甘草 炙 半夏 浸七次 切  
黃芩 桂 去皮各 三兩

活人書 十七卷

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水二盞生薑七片

棗子二枚煮至八分去滓復煎取六分清汁溫服

日三夜二若渴者去半夏加人參栝樓根同煎服

白虎加桂湯四十 治瘧疾但熱不寒者及自汗作渴

知母 六兩 甘草 炙 二兩 石膏 一斤 粳米 二合

桂 去皮三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮八分

去滓溫服

柴胡桂薑湯四十一 治寒多微有熱或但寒不熱亦治

勞瘧

柴胡 四兩 黃芩 桂枝 去皮各 牡蠣 熬 研碎 各 一兩 半 栝樓根 二兩 甘草 炙 乾薑 兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服初服微煩復服汗出即愈

瘧母煎四十二 治久瘧不愈結為癥瘕寒熱

鱉甲 十二分 黃芩 三分 烏扇 燒存性 鼠婦 熬 三分 乾薑 炮 三分 大黃 三分 桂枝 去皮 三分 紫葳 三分 厚朴 薑炙 三分 柴胡 去蘆 芍藥 五分 石葦 去毛 三分

活人書 十七卷

蝨蟲 五分熬去足 牡蠣 五分炒去 桃人 二分炒去 葶藶 一分一作麤 麥 二分 半夏 湯洗 一分 人參 一分

阿膠 炒 三分 蜂窠 熬 四分 朴硝 十二分 蜚蠊 六分

右搗羅為末鍛竈下灰一斗清酒一斗五升浸灰

候酒盡一半著鱉甲於中煮令泛爛如膠漆絞取

汁內諸藥煎為圓如梧桐子大空心服七圓日三

服。一方無鼠婦朴硝加海藻三分大戟一分

祛邪圓四十三 治瘧疾脈浮大寒熱往來用此吐之衍

州書云瘧寒多熱少者痰多也然寒多熱少而脈浮



則痰無疑矣可吐之若脉遲微者惡寒瘧耳宜服柴胡桂薑也

恒山 甘草炙 大黃 知母各二兩

麻黃 四兩去節湯泡一沸焙乾秤

右搗羅為末煉蜜為圓如梧桐子大每服十五圓百向東無根水吞下

猪膽鷄子湯 四十四 治傷寒五六日班出

猪膽汁三合 雞子一枚 苦酒三合即

右三味和合煎三沸強人盡服羸人煎六七沸服

活人書 卷十七

汗出差

萎蕤湯 四十五 治風温兼療冬温及春月中風傷寒發

熱頭眩痛喉咽乾舌強胃内疼痞滿腰背強

萎蕤 三分 石膏 研末 白薇 麻黃 去根節湯

大羌活 去蘆 甘草 炙 芎 各半 杏仁 去皮尖雙

葛根 半兩生者可 青木香 一分冬一兩 春用半兩炒

右剉如麻豆大每抄五錢七水一盞半煎一中盞

日三四服

知母葛根湯 四十六 治風温身體灼熱甚者

知母 三錢 乾葛 八錢 石膏 六錢 萎蕤 五錢

甘草 炙 二錢 黃芩 二錢 木香 二錢 升麻 二錢

人參 二錢 防風 二錢 杏仁 炒 二錢 天南星 生 二錢

羌活 二錢 芎 二錢 麻黃 去節 四錢 湯泡 焙乾

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至一盞去滓温服未知再服

括樓根湯 四十五 治風温加渴甚者

石膏 一兩 括樓根 三分 人參 半兩 防風 半兩

甘草 炙 半兩 葛根 一兩 半生用 乾者只三錢

活人書 卷十七 九

右剉如麻豆大每服抄五錢七用水一盞半煮至

一中盞去滓温服

漢防已湯 四十六 治風温脉浮身重汗出

甘草 炙 黃耆 各 漢防已 四兩 白朮 三兩

生薑 三兩 大棗 十二箇

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取一

中盞去滓飲訖仍坐被中汗出如垂行或卧被中

取汗

老君神明散 四十七 辟疫癘



白水二兩 桔梗一兩 附子二兩炮 烏頭四兩炮

其華陰細辛一兩

右搗麤篩縫絹囊盛帶之居間里皆無病若有疫

癘者溫酒服方寸匕覆取汗得吐即差若經三四

日抄三寸七以水二碗煮令大沸分三服

務成子螢火圓五寸 主辟疫惡氣百鬼虎狼蛇虺

蜂蠆諸毒五兵白刃盜賊凶害皆辟之昔劉子南佩

之為虜所圍矢下如雨未至數尺矢輒墮地虜以為

神故五兵不能加害矣出神仙感應篇 聖散子附

活人書 十七卷 十一  
螢火 鬼箭削去皮羽 蒺藜各一兩 雄黃

雌黃 礬石各二兩 炒汁盡 羚羊角 銀電灰

鐵鑊柄入鐵處燒焦 各一兩半

右搗篩為散以雞子黃并丹雄雞冠一具和之如

杏人大作三角縫囊盛五圓帶左臂仍更掛戶上

續添聖散子方蘇內翰云昔嘗覽千金三建散方於

病無所不治而孫思邈特為著論以謂此方用藥節

度不近人情至於救急其驗特異乃知神物效靈不

拘常制至聖明感智不能知今予所謂聖散子者殆

此類也自古論病惟傷寒為至危急表裏虛實日數

證候應汗下之類差之毫釐輒至不救若時疫流行

用聖散子者一切不問陰陽二感連服取差不可與

傷寒比也若疫疾之行平日且輒煮一釜不問老幼良

賤各服一盞即時氣不入其門平居無病能空腹一

服則飲食快美百病不生真濟世衛家之寶也其方

不知其所從出而故人巢君世實之以治溫疫百不

失一千既得之請居黃州連年大疫所全活者不可

勝數巢君初甚惜此方指江水為盟約不傳人余切

活人書 十七卷 十一

臨之以傳新水道人麗安常麗以警聞於世又善著

書故以授之且使巢君之名與此方同不朽東坡居

士序 木猪苓去皮 石菖蒲 高良薑 茯苓

獨活去蘆 附子炮製去 麻黃去根 藜蘆去土

厚朴去皮薑 芍藥 柴胡去蘆 枳殼去穢

澤瀉 細辛華陰 防風去蘆 藿香去

半夏湯洗薑汁 肉豆蔻十枚去皮 甘草一兩

吳茱萸兩 吳木麗安常云蜀人謂蒼木之白

中烈本在



之白木為  
吳木半兩

右剉為麤末每服五錢水一盞半煮取八分去滓  
熱服餘滓兩服合為一服重煎空心服之則效

調中湯五十一治夏末秋初忽有暴寒折於盛熱熱結

於四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或  
赤滯下壯熱暈悶脈沉數宜下之

大黃去皮三分 葛根 黃芩 芍藥

桔梗去蘆 藁本補其者無此 茯苓去皮

白朮 甘草炙各半兩

活人書 十七卷 十二

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煮取一中

盞去滓溫服移時再服之得快利壯熱便歇小兒

減與服凡秋夏暑熱積日或有暴寒折之熱無可

表最易為暴寒傷之而下利也虛弱人亦不壯熱  
但下利或霍亂也不宜服此少實人可服又有服

五石人喜壯熱過與別乘斷下則加熱喜聞而死  
矣亦不止便作虛熱毒若壯熱不歇則劇是以宜

調中湯下和其胃氣也調中湯去大黃即治風濕  
證兼治陽病因下遂協熱利不止及傷寒不因下  
而自利表不解而脈浮數者  
皆可去大黃煎服之殊驗也

射干湯五十二治初秋夏月暴雨冷及天行暴寒其熱  
喜伏於內欬嗽曲折不可得氣息啞啞失聲乾嗽無

噤喉中如哽

射干 當歸 肉桂 麻黃去節湯

枳實炙 紫苑 獨活 橘皮

甘草炙各二兩 生薑四兩 半夏五兩 杏仁三兩去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢水一盞半煮至八  
分去滓溫服

半夏桂枝甘草湯五十三治伏氣之病謂非時有暴寒

中人伏氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈便微弱

法先咽痛似傷寒非啞痺之病次必下利始用半夏

桂枝甘草湯次用四逆散主之此病只二日便差古

方謂之腎傷寒也

半夏湯洗七次 甘草炙 桂心各一分

右等分剉如麻豆大每服抄五錢水一盞半煮

至七分放冷少少含細嚥之入生薑四片煎服

麻黃杏子薏苡甘草湯五十四病人一身盡疼發熱日

晡所劇者名曰風濕此病因傷於汗出當風或久傷

取冷所致也

甘草一分 薏苡人兩 杏仁去皮尖 麻黃去節湯

活人書 卷一七  
六字  
下有加  
安常大  
十四字  
不止至  
圖  
本五系  
活人別



右剉如麻豆大水三盞煮取一盞半去滓分溫三服有微汗避風

防已黃耆湯五十五 治風濕脈浮身重汗出惡風

防已一兩 甘草半兩 白朮三分 黃耆一兩一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片大棗一枚水一盞半煮取八分去滓溫服良久再服喘者

加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者

加桂枝三分下有隙寒者加細辛三分服後當如

虫行皮中從腰如冰後坐被上又以一被繞腰以

活人書十七卷 十四

下溫令微汗差

杏人湯五十六 療風濕身體疼痛惡風微腫

桂心二兩 天門冬去心 麻黃去節湯洗焙 芍藥各一兩

杏仁二十五箇去皮尖兩人者炒 生薑一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮取八分去滓溫服

小續命湯五十七 治中風及脚氣痺弱不能轉側兼治

小兒慢驚風

防風一分 芍藥 白朮 人參

一本防風一兩半附

五兩附

川芎 附子生 防已 黃芩各一分

桂枝半兩 甘草半兩 麻黃半兩去節湯洗三久焙乾

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至一盞去滓取八分清汁入生薑汁再煎一二沸溫服

日三夜二若寒中三陽所患必冷煎成清汁旋入

生薑自然汁一匙再煎一二沸溫服暑中三陰所

患必熱本方去附子減桂枝一半若柔痙自汗者去麻黃夏間及

病有熱者減桂附一半冬及始春去黃芩

附水散五十六 傷寒手足逆冷筋脈拘急汗出不止項

強直搖頭口噤

活人書十七卷 十五

附子炮 白朮各一兩 川芎三錢 獨活半兩

桂心二錢

右搗羅為末每服三錢水一中盞棗子二枚同煮

至五分去滓溫服

桂心白朮湯五十九 治傷寒陰痺手足厥冷筋脈拘急

汗出不止

白朮 桂心 防風去蘆頭 附子炮去皮

芎藭 甘草炙微赤剉

各一兩半



右剉如麻豆大每服抄五錢匕水二盞生薑四片棗子三枚同煮至八分去滓溫服

附子防風散六十一治傷寒陰痿閉目合面手足厥冷筋脈拘急汗出不止

白朮一兩茯苓七錢乾薑炮七錢甘草炙七錢

桂心半兩五味子一兩附子炮裂去皮臍七錢

防風七錢柴胡去苗一兩

右搗篩為粗散每服三錢水一盞生薑四片煎至六分去滓溫服不計時候

活人書十七卷十六

八物白朮散六十一治傷寒陰痿三日不差手足厥冷筋脈拘急汗不出恐陰氣內傷

白朮五錢茯苓五錢五味子五錢麻黃去根節湯泡三沸焙五錢

羌活半兩桂心七錢高良薑二錢附子七錢

右搗篩為散每服四錢水一大盞生薑四片煎至五分去滓溫服不計時候

柴胡半夏湯六十二治痰熱頭疼利膈除煩胸手足煩

熱榮衛不調肢節拘倦身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼治五飲消痰癖

羅五咳  
隨解詳

一本作汗  
不出

一本作亦  
可藥

柴胡八兩半夏二兩白朮三兩甘草炙

人參 黃芩 麥門冬去心各三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞生薑五片棗子一枚煮至八分去滓溫服

金沸草散六十三治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛項

筋緊急時發寒熱皆顛傷風但頭不痛為異耳


前胡三兩甘草一兩細辛一兩旋復花即金沸草三兩

荆芥穗四兩赤茯苓二兩半夏淨洗薑汁浸一兩

右搗羅為麤末每服三錢水一盞生薑五片棗子一枚同煎至七分去滓熱服未知再服

活人書十七卷十七

活人書卷第十七





活人書卷第十八

大半夏湯六十四 治膈間有寒痰

半夏湯洗如法 薄切焙乾 茯苓 生薑各一分

石為麈尾每遇膈間有寒痰只作一服水兩盞半

煎至一盞濃去滓臨睡温呷如有熱痰加炙甘草

一分如脾胃不和去甘草入陳橘皮一分同煎

越婢湯六十五 治風濕痺脚弱

石膏四兩 白朮二兩 附子一兩炮 甘草一兩炙

麻黃三兩去節 湯泡焙乾

活人書 卷第十八

右剉如麻豆大每服抄四錢匕水一盞半生薑三

片棗子一枚煮至八分去滓温服

脾約圓六十六 治老人津液少大便澁及脚氣有風大

便結燥

大黃二兩酒 浸焙乾 枳實麸炒 去穢 厚朴刮去皮 薑汁炙 芍藥以上各 半兩

麻子人一兩半微 炒別研 杏仁去皮尖 炒

右為細末煉蜜和杵千下圓如梧桐子大每服二

十圓温水下不拘時候未知加五圓十圓至五十

圓止下利服糜粥將理與正方九十二 同分兩各別

一本麻子 作一兩

黑神圓六十七 治温疫時氣有食積者

巴豆新好者一兩輕抽去殼以急流水兩碗浸 一宿然後更煮三五沸候冷澆出去心

膜以帛子拭去水然後研如膏用 厚紙十數層裹以重物壓去油用

五靈脂二分黑色 者為上 大戟半兩生用去皮裏 面如粉白者為妙

荆三稜半兩 生用 杏仁半兩炒過後 研入藥再研

豆豉二兩酒是新款者為妙不得 令燥乾與巴豆膏同研細

右三味為極細末方入巴豆豉研細後入杏仁

更研令細別入飛羅麩半匙以井花水調如糊漸

次拌藥搜和得所入白中搗三二千下圓如菉豆

活人書 卷第十八

大際乾入堯合內頻熬或微火焙亦得如遇傷寒

有食積者脈沉結身體不熱即下之量患人藏府

虛實加減圓數服用煎薑棗湯吞下取微利為度

不可大過澹泄身熱下之則為痞氣結胃若病在

上可吐者同生薑乾嚼三五圓

神功圓六十八 治三焦氣壅心腹痞悶六腑風熱大便

不通津液內枯大腸乾澁裏急後重或下鮮血痰唾

稠粘風氣下流腰疼脚重臍下脹痛弱赤如金色

大黃三兩 人參半兩 麻子人五兩研 呵子皮二兩

列作新自 仁者



活人書  
卷一八

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十圓溫  
水下日三服以通利為度產後大便秘米飲下十圓  
五柔圓六十九治老人虛人脚氣亡津液虛秘大便結

調補三焦

大黃四兩 前胡一兩 半夏洗七 茯苓酒浸

芍藥 茯苓去皮 細辛 當歸

葶藶炒各

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大溫水下二十圓  
以通利為度

活人書 十八卷

大三脘散七十 治三焦氣逆胃膈虛痞兩脇氣痛手

面浮腫大便秘澁兼治脚氣

獨活一兩 白朮三分 甘草三分 乾木瓜一兩切

紫蘇一兩 沉香一兩 木香三分 大腹皮一兩

陳橘皮三分 川芎三分 檳榔三分

右十一味同一處研為粗散每劑秤一分水二盞

同煎至一盞去滓分二服帶溫服取便利為効如

能臨晚常進半劑依法煎服即府藏調和風氣人

多秘滯數宜服之未通利者依法煎服此藥極不

虛人氣血不損元神經絡多矣脚氣心腹氣悶大  
便秘滯者最良

檳榔散七十二 治脚腫

橘葉一大 沙木一握 小便半盞 酒半盞 同已

右煎數沸調檳榔末二錢食前服

薏苡人酒法七十二 治脚痺

薏苡人 牛膝各二兩 海桐皮一兩 五加皮一兩

獨活一兩 防風一兩 杜仲汁炙 白朮半兩

枳殼一兩 生乾地黃二兩

活人書 十八卷

右剉為麩末以生絹袋盛之內無灰酒五升春秋

冬浸二七日夏月盛熱分作數劑逐旋浸酒每日

空心溫服一盞或半盞日三四次常令酒氣醞醞

不絕久服覺皮膚下如數百條蟲行即風濕氣也

木瓜散七十二 治脚氣

大腹皮一分 紫蘇一分 乾木瓜一分 甘草一分

木香一分 羌活一分

右剉為麩散分作三服每服水一盞半煎至八分  
去滓通口服之



葱豉湯七十四 治傷寒一二日頭項腰背痛惡寒脈浮而緊無汗

葱白十五 豉二大 乾葛八分 麻黃四分

右剉如麻豆大以水二升先煮麻黃六七沸掠去

白沫內乾葛煎數十餘沸下豉次下葱煎取八合

去滓分溫兩服如人行五六里路以再服服訖良

以煮葱豉粥熱喫即以衣覆出汗為度

連鬚葱白湯七十五 治傷寒已發汗或未發汗頭疼如破

活人書 十八卷 五

生薑二兩 連鬚葱白寸切

右以水二升煮取一升去滓分作二三服服此湯

不差者與葛根葱白湯

葛根葱白湯七十六 治頭疼不止

葛根 芍藥 知母各半 葱白一把

川芎一兩 生薑一兩

右剉如麻豆大以水三升煎取一升半去滓熱分

二服 雄鼠屎湯七十七 治勞復

梔子十四 枳殼二枚 雄鼠屎十四枚

右為麤末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉

三十粒同煎至一盞去滓分二服勿令病人知鼠

屎

黃芩芍藥湯七十八 治鼻衄

黃芩三分 芍藥 甘草各半兩

右剉碎每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

酒蒸黃連圓七十九 治暑毒伏深累取不差無藥可治

伏暑發渴者 活人書 十八卷 六

黃連四兩 以無灰好酒浸而

右搗羅為細末麵糊為圓如梧桐子大熟水下二

五十圓曾膈涼不渴為驗

茅花湯八十 治鼻衄不止

茅花一大把 無花

右以水三盞煎濃汁一盞徐徐服之即差

枳實理中圓八十二 治傷寒結胃欲絕心膈高起手不

得近 茯苓 人參 白朮 乾薑炮



甘草炙各枳實十六片

右搗羅為細末煉蜜為圓如雞子黃大每服一圓

熱湯化下連進二三服胃中豁然渴者加括樓根

二兩下利者加牡蠣二兩煨之

小半夏加茯苓湯八十二治諸嘔噦心下堅痞膈間有

水痰眩悸

半夏五兩易浸赤茯苓三兩

右剉如麻豆大每服半兩水三盞煎至一盞去滓

秤生薑四錢取自然汁投藥中更煎一二沸熱服

活人書十八卷七

不拘時候

桔梗枳殼湯八十三治傷寒痞氣胃滿欲絕

桔梗各一兩枳殼各一兩

右剉如麻豆大以水二盞煎至一盞去滓分二服

赤茯苓湯八十四治傷寒嘔噦心下滿胃膈間宿有停

水頭眩心悸

芎藭半兩或作人參一兩去

赤茯苓一兩或半夏半兩湯浸洗

白朮半兩陳橘皮一兩湯浸

右剉如麻豆大每服四錢水二盞生薑五片煎至一盞去滓溫服不拘時候

香薷散八十五治陰陽不順清濁相干氣射中焦名為

霍亂此皆由飽食豚膾復啖乳酪海陸百品無所不

餐多飲寒漿或眠卧冷席風冷之氣傷於脾胃諸食

結而不消陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升

陰陽交錯變成吐利不已百脉昏亂榮衛俱虛冷搏

於筋則轉筋痛宜服此藥

香薷穗一兩厚朴去皮黃連二兩已上二味以生薑

活人書十八卷八

右搗為麤末每服三錢水一盞酒半盞同煎至七

分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷

則効速也仍煎時不得犯鐵器慢火煎之兼治非

時吐利霍亂腹中攪痛大渴躁煩四肢逆冷冷汗

自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須入餅封口下井

中沉令極冷頓服之乃有神効

犀角地黄湯八十六治傷寒及溫病應發汗而不發汗

內有瘀血鼻衄吐血百黃大便黑色此方主消化瘀

血兼治瘡疹出得太勝以此解之



芍藥三分 生地黃半斤 牡丹去心

犀角一兩為屑如無以升麻代之

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取七

分有熱者加黃芩二兩如狂者亦加之其人脉大

來遲腹不滿自言滿者為無熱更不用黃芩

黃連解毒湯八十七 治時疾三日已汗解或因飲酒復

劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得卧

黃連三分 黃蘗半兩 梔子四枚 黃芩一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取一

盞去滓温服未知再服連劑以此漸差外壹云凡

大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠者傳此方諸人用

之有效此直解毒熱除酷熱不必飲酒劇者

酸棗人湯八十八 治傷寒吐下後心煩之氣晝夜不眠

酸棗四升取人炒 甘草一兩 知母二兩 茯苓三兩

川芎三兩 乾薑三兩 麥門冬一升去心

右為饌末每服四錢水一盞煎至六分去滓温服

梔子烏梅湯八十九 治傷寒後虛煩不得眠心中懊憹

梔子半兩 黃芩半兩 柴胡一兩 甘草半兩

烏梅肉十四枚

右剉如麻豆大每四錢水一盞半生薑三片竹葉

十四片豉五十粒煎至七分去滓温服

橘皮乾薑湯九十一 治噦

橘皮 通草 乾薑 桂心各二兩

人參一兩 甘草二兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞煎至六分去滓

温服日三服

羌活附子散九十二 治欬逆

羌活 附子炮 茴香微炒各半兩 木香

乾薑炮各一兩

右剉為細末每服二錢水一盞盞一捻同煎一二

十沸帶熱服一服即止

半夏生薑湯九十三 治噦欲死附金匱小

生薑二兩切 半夏洗七次一分

右剉如麻豆大水二盞煎取八分去滓分温二服

黑膏九十三 治温毒發斑

好豆豉一升 生地黃半斤切

生薑一升 乾薑一升 麥門冬一升 知母一升 茯苓一升 川芎一升 乾薑一升 麥門冬一升 知母一升 茯苓一升



右二味以猪膏二斤合露之煎令三分減一絞去滓用雄黃麝香如大豆內中攪和分三服盡服之毒便從皮中出則愈忌蕪荑

葛根橘皮湯九十四 治冬温未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其寒解冬温始發肌中斑爛癰瘡如錦紋而欬心悶但嘔吐清汁服此湯即靜

葛根 橘皮 杏仁去皮 知母

黃芩 麻黃去節 甘草炙各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半煎至八分去滓温服

活人書 十八卷 十一

玄參升麻湯九十五 治傷寒發汗吐下後毒氣不散表虛裏實熱發於外故身斑斑如錦紋甚則煩躁譫語煎治心閉腫痛

玄參 升麻 甘草炙各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至七分去滓温服

大青四物湯九十六 治傷寒熱病十日已上發汗及吐利後熱不除身上斑出一名阿膠大青湯

大青 阿膠 芍藥 枳實

活人書 卷一八

大青四兩 阿膠八兩 芍藥二兩 甘草二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至盡去滓旋入膠再煎令烱温服

知母桂心湯九十七 治傷寒後不差朝夕有熱如瘧狀

知母 桂心 麻黃去節 甘草炙 知母二兩炒 芍藥一兩

黃芩一兩 桂心二兩 芍藥一兩

右剉如麻豆大每服抄四錢匕水一盞半生薑四片煎取七分去滓温服日三服温覆令微汗愈若心煩不眠其人欲飲水當稍稍與之令胃中和則愈

活人書 十八卷 十二

三黃圓九十八 治吐血黃疸

黃連三兩 大黃一兩 黃芩二兩

右搗羅為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服十五圓白湯吞下

桔梗半夏湯九十九 治傷寒冷熱不和心腹痞滿時發痰痛順陰陽消痞滿

桔梗微炒 半夏生薑汁製 陳橘皮各一兩

枳實半兩 枳實炒赤色

活人書 卷一八

四八五



右剉如麻豆大每服抄伍錢七水一盞半生薑三片同煎半分去滓温服

三黃熟艾湯治傷寒四五日而大下熱利時作

白通湯諸藥多不得止宜服此湯除熱止利

黃芩 黃連 黃蘗各三分 熟艾半雞子大

右剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎取七分去滓温服

薤白湯傷寒下利如爛肉汁赤滯下伏氣腹痛

諸熱毒皆主之

活人書十八卷

豆豉半升 薤白一把 梔子七枚大者

右剉以水二升半先煎梔子十沸下薤白煎至二升下豉煎取一升二合去滓每服一盞

赤石脂圓傷寒下利

黃連 當歸各二兩 赤石脂 乾薑炮各一兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓米飲吞下日進三服

地榆散治傷寒熱毒不解口晚即壯熱腹痛便

痢膿血

地榆散治傷寒熱毒不解口晚即壯熱腹痛便

地榆剉 犀角屑一兩 黃連一兩去

茜根一兩 梔子人半兩 黃芩一兩

右搗爲麤末每服抄四錢七水一盞入薤白五寸煎至六分去滓不計時候温服

黃連阿膠湯治傷寒熱毒入胃下利膿血

梔子人半兩 黃蘗一兩 黃連二兩去 阿膠一兩

右搗碎每服抄五錢七水二盞煎至一盞去滓入阿膠再煎膠烊不計時温服

桃人湯治

活人書治

槐子碎 艾一兩 大棗十五枚 桃人一兩去

右以水二大盞半煎一盞半去滓分三服

黃連犀角湯治傷寒及諸病之後內有瘡出下部者

黃連半兩 烏梅七箇 木香一分 犀角一兩如無以

右剉碎以水二大盞半煎至一盞半去滓分三服

雄黃銳散治下部

雄黃研 苦參 青箱子 黃連各二分

桃人去皮尖



右為散以生艾搗汁和如棗子核大綿裹內下部

扁竹汁更佳冬間無艾只用散綿裹內下部亦得

百合知母湯 百八 治百合病發汗後者

百合 七枚 知母 三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以

泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母

取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯 百九 治百合病下之後者

百合 七枚 滑石 三兩碎 代赭 如彈丸大一

活人書 十八卷 十五

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以

泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石

代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫

再服

雞子湯 百十 治百合病吐之後者

百合 七枚 雞子黃 一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以

泉水二升煎取一升去滓內雞子黃攪令勻煎五

分溫服

百合洗方 百十一 治百合病一月不解變成渴者

百合 一升

右以水一斗漬一宿溫暖以洗身洗已食煮餅勿

以鹽鼓也

百合地黃湯 百十二 治百合病不經吐下發汗病形如

初者

百合 七枚 生地黃 汁一

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉

水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升五合

活人書 十八卷 十六

分溫再服大便當如漆中病勿更服

栝樓牡蠣散 百十三 治百合病渴不差者

栝樓根 牡蠣 熬等

右搗羅為細末飲服方寸七日三服

滑石散 百十四 治百合病變成寒熱者 一作發

右件羅為散飲服方寸七日三服當微利者止服

之熱即除

治中湯 百十五 治脾胃傷冷物胃膈不快腹痛氣不和



人參

乾薑炮

陳橘皮湯洗

白朮

甘草炙

青橘皮去穢

右各等分爲細末每服三錢水一盞煎數沸熱服  
尋常入鹽煎服

陽旦湯百六

治中風傷寒脈浮發熱往來汗出惡風

項強鼻鳴乾嘔

桂枝

芍藥已上各

甘草炙

黃芩各二

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半棗子一  
枚生薑三片煎至一盞去滓取八分清汁溫服○

活人書

十八卷

十七

自汗者去桂枝加附子一枚炮○渴者去桂枝加

栝樓根三兩○利者去芍藥桂枝加乾薑三兩○

心下悸者去芍藥加茯苓四兩○虛勞裏急者正

陽旦湯主之煎時入膠飴爲佳○若脈浮緊發熱

無汗者不可與也

白朮加倉朮湯百十七

治濕溫多汗

知母六兩

甘草炙二兩

石膏一斤

蒼朮三兩

粳米三兩

皆用梗米此方亦合用梗米

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎八分

去滓取六分清汁溫服

七味葱白湯百十八

許仁則治傷寒或因起動勞後或

因與食稍多皆成此候若復甚者一如傷寒若初有

此證宜服此湯

乾葛切三

麥門冬去心

葱白

連鬚切半

新豉半合

生薑切一

乾地黃二兩

澆水四升以杓揚之

千通名曰澆水

右七味用澆水煎之三分減二去滓分二服漸漸

覆蓋取汗

活人書

十八卷

十八

增損四順湯百十九

治少陰下利手足冷無熱候者

甘草二兩

人參二兩

龍骨二兩

黃連

乾薑各一

附子一枚炮

去皮臍

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分日三服

不差復作○下利腹痛加當歸二兩○嘔者加橘

皮二兩

化斑湯百二十

治斑毒

人參半兩

石膏半兩

萎蕤

知母

甘草各一



右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入糯米

一合煎八分取米熟為度去滓溫服

官局桔梗湯 百十五 治乾嘔

桔梗 半夏 陳橘皮 已上各一兩 枳實 炒半兩

右剉如麻豆大每服抄三錢七水一盞半生薑五

片煎至七分去滓溫服

麻黃加水湯 百十五 治中濕

甘草 半兩 桂枝 一兩 蒼朮 半兩 麻黃 一兩 節湯泡

杏仁 三十五箇 去皮尖

活人書 十八卷

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取八

分去滓溫服

竹皮大圓 百十五 治虛煩

石膏 三分 研 桂 一分 生竹茹 二分 甘草 二分

白薇 一分

右為細末棗肉圓彈子大米飲服一圓日三夜一

○有熱者倍白薇○煩喘者加枳實一分

古今錄驗橘皮湯 百十四 療春冬傷寒秋夏冷濕欬嗽

喉中鳴聲上氣不得下頭痛方

陳橘皮 紫苑 麻黃 去節湯泡 當歸

桂枝 杏仁 去皮 甘草 炙 黃芩 各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至一

盞去滓溫服

黃連橘皮湯 百十五 溫毒發斑

黃連 四兩 陳橘皮 去白 杏仁 去皮 枳實 炙

麻黃 湯泡 葛根 各二兩 厚朴 姜汁 甘草 各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八

分去渣溫服下利當先止

活人書 十八卷

麥門冬湯 百十六 治勞復能起死人或勞氣欲絕者

麥門冬 一兩 去心 甘草 二兩 炙

右剉如麻豆大先用水二盞入粳米半合煎令米

熟去米留水約得水一盞半入煎藥五錢七棗子

二枚去核新竹葉十五片同煎取一盞去滓大溫

服不能服者綿滴口中

活人書卷第十八



活人書卷第十九

此一卷論婦人傷寒古人治病先論其所主男  
子調其氣婦人調其血血室不畜則二氣和諧  
血室凝結水火相刑傷寒氣口緊盛即宜下人  
迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不可下當發其  
汗以收其血室榮衛得和津液自通浹然汗出  
而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮  
則識語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及  
上二焦無犯胃氣者言不可下也小柴胡湯主

活人書

十九卷

之若行湯遲則熱入胃令津燥中焦上焦不榮  
成血結胃狀須當針期門也五行相剋以生相  
扶以出平居之日水常養於木水木相生則榮  
養血室血室不畜脾無蘊積脾無蘊積則剛燥  
不生剛燥既生若犯胃氣則晝夜譫語喜忘小  
腹滿小便利屬抵當湯證也傷寒胃實譫語宜  
下之婦人熱入血  
室譫語不  
可下耳雖然婦人傷寒與男子治法不同男  
子先調氣婦人先調血此大略之詞耳夏之脈  
緊無汗名傷寒脈緩有汗為中風熱病脈洪大

中暑脈細弱其證一也假如中暈用白虎胃實  
用承氣豈必調血而後行湯液耶仲景傷寒論  
所以不分男女良亦以此學者皆可隨病於男  
子藥證中以意選用也

若妊婦傷寒藥性洵涼慎不可行桂枝半夏桃  
人等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋為妊婦而  
去也大控產前先安胎產後先補血次服傷寒  
藥若病稍退則止藥不可盡劑此為大法黃帝  
問婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無  
殞也大積大聚其可犯也衰其大半而止過者  
死

活人書

十九卷

○婦人傷寒藥方

男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間  
有婦人傷寒方書稱仲景所撰而王叔和為之  
序以法考之間有可取疑非古方也特假聖人  
之名以信其說於天下耳今取金匱玉函治婦  
人傷寒與俗方中可採者列為一卷雖不足以  
盡婦人傷寒之詳並可於百問中參用也

正宗  
公議  
之語

本津下  
以字



小柴胡湯<sup>三</sup> 治婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦

又治婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結致使如瘕狀者<sup>方在十卷正</sup>

刺期門穴<sup>三</sup> 治婦人傷寒發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼和胃腸下滿如結胃狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之<sup>鍼法在第十卷</sup>

活人書 十九卷 三

瀉心三黃湯<sup>三</sup> 婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩躁譫語目赤毒氣閉塞不得流通

蜀大黃 鼠尾黃芩 雞爪黃連<sup>各等分</sup>  
右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服取微利如目赤睛疼宜加白茯苓嫩竹葉瀉肝氣之餘

桂枝紅花湯<sup>四</sup> 婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脈凝滯不時往來

外本桂枝湯藥在卷二

桂心 芍藥 甘草<sup>各三兩</sup> 紅花<sup>二兩</sup>  
右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四片棗子二枚煎至七分去滓溫服良久再服汗出而解

黃芩芍藥湯<sup>五</sup> 婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食  
黃芩 芍藥 白芍藥 白朮 乾地黃<sup>各一兩</sup>  
右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煎至七分去滓溫服寒加生薑同煎

柴胡當歸湯<sup>六</sup> 婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下  
活人書 十九卷 四

柴胡<sup>三兩</sup> 白朮<sup>二兩</sup> 人參 甘草<sup>炙</sup>  
當歸 赤芍藥<sup>各一兩</sup> 五味子 木通<sup>各半兩</sup>  
右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四片棗子二枚煎至七分去滓溫服

乾地黃湯<sup>七</sup> 婦人傷寒差後猶有餘熱不去謂之遺熱  
大黃 黃連 黃芩<sup>各一兩</sup> 柴胡<sup>去蘆</sup>  
甘草<sup>炙</sup> 白芍藥<sup>各一兩</sup> 乾地黃<sup>一兩</sup>



右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煮至七分去滓溫服取微溫利汗出解

燒視散婦人傷寒未平復因交合裏急腰膝連腹內痛名曰陰陽易證也

男子視襠燒灰

右一味以水和服方寸七男子病用婦人視襠燒灰小便利陰頭腫即愈

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胃手足拘急搐搦如中風狀

括樓根無黃者 青竹茹剉半斤炙

右以水二升半煎取一升二合去滓溫分作二三服

當歸白朮湯婦人病未平復因有所動小腹急痛腰膝疼四肢不任舉動無力熱發者

白朮一分 當歸一兩 桂枝去皮 甘草炙 芍藥 附子生去皮 人參 黃耆各一分 生薑半兩

右剉如麻豆大以水三升煮取一升半去滓通口

七分去滓溫服取微溫利汗出解

服一盞食頃再服一盞溫覆後汗便差

○妊婦傷寒藥方

妊婦傷寒仲景無治法用藥宜有禁忌不可與尋常人一槩治之也

加減四物湯妊婦產前腹痛及治月事或多或少或前或後胎氣不安產後血塊不散或去血過多或惡露不下

當歸切焙 川芎 熟乾地黃 白芍藥各一分 右搗為麤末每服四錢水一盞半煎至八分取六分

活人書十九卷 分清汁帶熱服日二三服以知為度若妊婦下血即入艾五七葉阿膠末一錢七同煎服如前法○

疾勢甚大散藥不知以四味各半兩細剉以水四盞煎至二盞半去滓分四服熱啜食前服一日之中令盡以知為度平常產乳服至三蠟止如虛弱血臟不調至一月止○因虛致熱熱與血搏口乾渴欲飲水加括樓一兩麥門冬三分○腹中刺痛惡物不下加當歸赤芍藥各一分○血崩加地黃蒲黃各一兩○因熱生風加川芎一分柴胡半兩



○身熱麻躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩○秘

泄者加大黃半兩桃人一分炒○滑瀉加官桂附

子各一分○發寒熱加乾薑牡丹皮芍藥各一分

○嘔者加白木人參各半兩○腹脹加厚朴枳實

各一分○虛煩不得眠加竹葉人參各一分○躁

大渴者加知母石膏各半兩○水停心下微吐逆

者加猪苓茯苓防己各一分○虛寒狀類傷寒加

人參柴胡防風各三分

阿膠散十二 妊婦傷寒安胎次治其病

活人書十九卷 阿膠煨 桑寄生 白木吳者 人參

白茯苓各等分 右為麤末每服抄五錢七水一盞半煮八分去滓

溫服或為細末糯米飲調服二錢七日二服

白朮散十三 妊婦傷寒安胎

白朮 黃芩各等分新瓦上

右鶴為麤末每服抄三錢七水一盞生薑三片棗

子一枚擘破同煎至七分去滓溫服但覺頭疼發

熱便可服三兩服即差若四肢厥冷陰證見者未

可服也

葱白湯十四 妊婦傷寒憎寒發熱當發其汗無姓亦

可用

葱白十莖 生薑三兩

右以水三升煮取一升分作二服取汗為度

蘇木芍藥湯十五 妊婦傷寒或中時行洒淅作寒振

慄而悸或噦者

赤芍藥 廣陳皮 黃芩 黃連

甘草炙 蘇木各一兩

活人書十九卷 右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煎至

八分去滓溫服衣蓋有汗出差若胎不安兼服阿

膠散

黃龍湯十六 妊婦寒熱頭疼黑黑不欲飲食腸干痛

嘔逆痰氣及差後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水

通求適斷病後勞復餘熱不解

柴胡一兩 黃芩 人參 甘草炙各一分半

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞煮取一盞

去滓溫服



柴胡石膏湯十七 妊婦傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢

肢疼痛背項拘急唇口乾燥

柴胡四兩 甘草二兩 石膏八兩

右剉如麻豆大每服抄三錢七以水一盞生薑五

片煎至六分去滓溫服不計時候若氣虛體冷加

人參四兩

枳實散十八 妊婦傷寒四日至六日已來加心疼痛

脹上氣渴不止食飲不多腰疼體重

枳實一兩 炒微黃 麥門冬半兩 陳橘皮三分 湯浸去白 煨炒

活人書十九卷

右剉如麻豆大每服抄三錢七水一盞入生薑半

分葱白七寸煎至六分去滓溫服

旋覆花湯十九 妊婦傷寒頭目旋痛壯熱心躁

旋覆花兩 白朮三分 前胡一兩 去蘆頭 赤芍藥兩

黃芩三分 麻黃三分 去節根 人參三分 石膏一兩

甘草半兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生薑半分煎

取六分去滓溫服

麥門冬湯二十 妊婦傷寒壯熱嘔逆頭痛不思飲食

胎氣不安並宜服

人參一兩 石膏二兩 前胡三分 黃芩三分

葛根半兩 麥門冬半兩 去心

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四

片棗子二枚淡竹茹一分煮取八分去滓溫服

梔子大青湯二十一 妊婦發斑變為黑色及尿血

大青 杏人去皮 黃芩各一兩 升麻

梔子人各二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半細切

活人書十九卷

葱白三寸煎取一盞去滓溫服

蘆根湯二十二 千金治妊婦熱病頭痛壯熱心煩嘔吐

不下食 知母四兩 青竹茹三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入生薑

根一握粳米一握煎至一盞去滓溫服盡更作差

止

全勝法二十三 治妊婦遭時疾身大熱塗之令子不落

名伏龍肝散

別前胡作半兩

別未作竹葉

別本青杏各半兩

別葱白

別心疼腹脹作心腹脹周

別麥冬作一兩



竈中心黃土

右用水調塗臍下乾復易塗差乃止一方酒和塗方五寸又泄清和塗之並佳

葱白豉湯三十四 治妊娠熱病

葱白二兩 豉半升

右以水三升煮取一升分作二服取汗為度

葱白一物湯三十五 治妊娠熱病主安胎若胎已死者服之須臾胎出

葱白二把

活人書 十九卷

右以水一升煮令熟服之取汗食令盡

葛根壹物湯三十六 治妊娠熱病煩悶

葛根汁每服一小盞如人行五里再一服如無生者用乾葛

右吹咀煎濃汁服

梔子五物散三十七 廣濟療妊娠傷寒頭痛壯熱

梔子 前胡 知母各二兩 黃芩一兩

白石膏四兩

右判如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服

前本前胡 六分石青 十二分知 每四分大 子四分大 青四分黃 五分分竹 若三分黃 有守

前胡七物湯三八 治妊娠傷寒頭痛肢節煩疼壯熱

前胡 知母 梔子各二兩 石膏四兩

大青 黃芩各一兩 甜竹茹三分

右判如麻豆大每服抄五錢七水一盞半葱白三

莖煎至一盞去滓溫服

升麻六物湯三十九 救急療妊娠七月傷寒壯熱赤斑

變黑溺血

升麻 梔子各二兩 大青 杏仁去皮

黃芩各一兩

活人書 十九卷

右判如麻豆大每服抄五錢七水一小盞半入葱

白三莖煎至一盞去滓溫服

○產後藥方

陽旦湯四十 治婦人產後傷風十數日不解頭微痛

惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出方在十八卷

治瘧法三十一 婦人產後血虛多汗喜中風身體強直

口噤背反張作瘧治之法在第六卷 一方用荆芥穗

不以多少微炒為細末好酒調五錢七服之不過再

服



神功圓 三十三 治婦人產後亡津液大便多秘或譫語  
煩躁不可用湯液宜神功圓用青木香湯吞下 方在十八

桂心牡蠣湯 三十三 婦人產後頭疼身體發熱煎治腹  
內拘急疼痛

桂心 三兩 黃芩 二兩 白芍藥 乾地黄

牡蠣 煨各五兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煎至  
一盞去滓溫服

活人書 二十九卷

蜀漆湯 三十四 婦人產後寒熱往來心胃煩滿骨節疼  
痛及頭疼壯熱日晡加甚又如瘧狀

黃耆 五兩 生地黃 一斤 蜀漆葉 一兩 桂心

甘草 炙 黃芩 各一兩 知母 芍藥 各二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取一  
盞去滓溫服

增損柴胡湯 三十五 婦人產後虛羸發熱飲食少腹脹

或往來寒熱等疾

柴胡 三錢 人參 白芍藥 半夏 湯泡

金匱方

甘草 炙 陳橘皮 川芎 各三分  
右剉如麻豆大每服抄四錢七水一大盞生薑三  
片棗子一枚煎至七分去滓食後溫服日三

竹葉防風湯 三十六 婦人產後傷風發熱面赤喘而頭  
痛

竹葉 半把 防風 人參 桂枝 去皮

桔梗 甘草 炙各半兩 葛根 一兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生薑三片棗  
子一枚煎至八分去滓溫服示蓋汗出差○頭項

強加附子炮去皮臍一錢同煎○嘔者加半夏一  
錢

活人書 二十九卷

三物黃芩湯 三十七 婦人草薺中傷風四肢苦煩熱頭  
疼與小柴胡湯頭不疼但煩與此藥

黃芩 半兩 苦參 一兩 乾地黄 二兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至八分去  
滓溫服

小柴胡湯 三十八 婦人產後亡血汗多故令鬱冒其脈  
微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而

微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而

微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而

微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而



厥厥而必冒胃家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽  
上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽  
氣獨盛故當汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食  
也方在第十二  
卷二十九

乾薑柴胡湯 三十九 婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如  
瘡狂言見鬼

柴胡 四兩 桂枝 一兩 枳實 二兩 牡蠣 一兩  
乾薑 一兩 甘草 一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七分去  
活人書 十九卷終 十五

滓溫服初服微煩再服汗出而愈

海蛤散 四 婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近  
法當刺期門仲景無藥方此方疑非仲景然其言頗  
有理姑存焉

海蛤 滑石 甘草 一兩 芒硝 半兩

右搗羅爲散每服二錢鷄子清調下小腸通利則  
胃膈血散膈中血聚則小腸壅小腸既壅膈中血  
不流行宜用此方若小便利血數行更宜桂枝加  
紅花二兩發其汗則愈

活人書卷第二十

此一卷論小兒傷寒小兒大人治法一版但小  
分劑藥性差涼耳尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩  
渴惺惺散主之咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯  
主之頭額身體溫熱大便黃赤腹中有熱四順  
散連翹飲三黃圓主之頭額身體溫熱大便白  
而酸臭者胃中有食積雙圓主之小兒無異疾  
惟飲食過度不能自節心腹脹滿身熱頭痛此  
雙圓悉治之小兒身體潮熱頭目碎痛心神煩  
躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣  
湯主之頭疼發熱而假人惡寒者此傷寒證也  
升麻湯主之無汗者麻黃黃芩湯有汗者升麻  
黃芩湯皆要藥也小兒尋常不可過服涼藥胃  
冷亟動其證與驚相類醫人不能辨往往服進  
驚藥如腦麝之類逐痰發吐胃虛而成慢驚者  
多矣小兒須有熱證方可踈轉仍慎用圓子藥  
利之當以大黃川芎等吹咀作湯液以蕩滌蘊  
熱蓋圓子巴豆乃攻食積耳



洗心散 治遍身壯熱頭目碎痛背膊拘急大熱衝  
上口苦唇焦夜臥舌乾咽喉腫痛涕唾稠粘痰涎嗝  
食不進心神躁熱眼溢睛疼傷寒鼻塞四肢沉重語  
聲不出百 節疼痛大小便不利楚豆瘡時行瘟疫  
狂語多渴及小兒天吊風夜驚啼並宜服之

當歸 四兩 芍藥 四兩 甘草 四兩

荆芥 四兩 白朮 一兩 麻黃 四兩

大黃 四兩以米泔水浸一炊  
問漉出令乾慢炒取熟

右為末每服二錢水一盞半生薑一片薄荷二葉

活人書 二十卷 煎至八分放溫和滓服了仰臥仍去枕少時如五

臟壅實煎四五錢七若夏溽轉則熱服

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣或瘡疹發熱

桔梗 細辛 人參 白朮

甘草 瓜樓根 茯苓 川芎 各等

右搗羅為末每服二錢用水一盞生薑二片薄荷

二葉同煎七分服三歲已下作四五服五歲已上

分二服凡小兒發熱不問傷風傷寒風熱先與此

散數服往往輒愈

四順散 解大人小兒腸熱退滯盛涼心經

大黃 熟 甘草 當歸 酒洗 芍藥 各等

右為細末每服二錢水一盞薄荷三葉煎七分溫

服小兒量歲數與之

麻黃黃芩湯 治小兒傷寒無汗頭疼發熱惡寒

麻黃 去節 黃芩 赤芍藥 各半 甘草 炙

桂枝 去皮各半兩 或作一分

右搗羅為細末每服一錢或二錢暖水調下日進

三服煎治天行熱氣生豌豆瘡不快煩躁昏憤或

活人書 二十卷 出時身尚發熱

升麻黃芩湯 治小兒傷風有汗頭疼發熱惡寒

升麻 葛根 黃芩 芍藥 各三

甘草 半錢

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至六分去滓

溫服瀉者不可服若時行瘡豆出不快煩躁不眠

者加水香一錢半

甘露飲子 治傷寒壯熱口渴及胃中客熱口臭不

思飲食或饑煩不欲食齒齲腫痰膿血不住口舌咽



中有瘡赤眼目臉重不欲開瘡疹已發未發並宜服之

天門冬 麥門冬 並去心焙 甘草 炙 熟乾地黃

枳殼 麩炒去穢 枇杷葉 去毛 黃芩 生乾地黃

石斛 去苗 山茵陳

右各等分咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食後臨卧

雙圓 治小兒身熱頭痛飲食不消胃腹脹滿或心

腹疼痛大小便不利或下重數起未差可再服小兒

活人書 二十卷 四

蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調並

宜服此圓下之

甘遂 半兩 硃砂 二錢 別研 麩核 取人四兩 半別研

牡蠣 二兩 蒸 甘草 一分 炙 麥門冬 去心二兩 半

巴豆 六十枚 去皮心膜研新布絞去油日中熬之白如霜

右麥門冬甘草甘遂牡蠣四味為極細末入巴豆

硃砂麩人合和一處搗二千杵更入少蜜搗和極

熟旋圓半歲小兒服如荏子大一雙一歲小兒服

如半麻子大分為一雙二歲小兒服麻子大一枚

分一雙三四歲者服麻子大二圓五六歲者服麻

子微大二圓七八歲者如小豆大二圓十歲者微

大於小豆二圓常以鷄鳴時服如至日出時不下

者投熱粥飲數合即下藥圓皆雙出也下利甚者

濃煎冷粥飲之便止

石膏麻桂湯 治小兒傷寒未發熱欬嗽頭面熱

甘草 半兩 石膏 半兩 麻黃 一兩 湯包 芍藥 半兩

桂心 一分 黃芩 一兩 杏仁 十枚 去皮尖

右咬咀每服二錢水一中盞生薑二片煎半盞去

活人書 二十卷 五

滓服兒若甚小以意增減之

連翹飲 治小兒一切熱

連翹 防風 甘草 炙 山梔子 各等分

右為末每服二錢水一盞半煎七分去滓溫服

麥門冬湯 治嬰兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆

麥門冬 三分 去心 石膏 寒水石

甘草 各半 炙 桂 三錢 半

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓

溫服



十物升麻湯<sup>十一</sup> 治小兒傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹堅急大小便不利或口瘡或因壯熱四肢掣掣仍作癩疾時發時醒醒後身熱如火者

升麻 白薇 麻黃<sup>去根</sup> 萎蕤  
柴胡 甘草<sup>各半</sup> 黃芩<sup>一兩</sup> 朴消

大黃 鈞藤<sup>各一分</sup>  
右剉如麻豆大每服三錢水盪半煎至七分去滓下消再煎化溫服

六物黃芩湯<sup>十二</sup> 治嬰兒腹大短氣熱有進退食不活人書<sup>二十卷</sup> 六  
安穀為之不化

黃芩 大青 甘草<sup>炙</sup> 麥門冬<sup>去心</sup>  
石膏<sup>各半</sup> 桂<sup>三錢</sup>

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

五物人參飲<sup>十三</sup> 廣濟療小兒天行壯熱欬嗽心腹脹滿

人參 甘草<sup>各半</sup> 麥門冬<sup>一兩</sup>  
生地黃<sup>一兩半</sup> 乾地黄<sup>半兩</sup>

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎至七分去滓溫服

八物麥門冬飲<sup>十四</sup> 治小兒天行壯熱欬嗽心煩  
麥門冬<sup>三兩</sup> 甘草<sup>炙</sup> 人參<sup>各一兩</sup> 紫苑  
升麻<sup>各二兩</sup> 貝母<sup>一分</sup>

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎至七分去滓再入竹瀝少許重煎合和服

棗葉飲<sup>十五</sup> 療小兒天行壯熱五日以後熱不歇者  
棗葉<sup>半握</sup> 豉<sup>一合</sup> 麻黃<sup>半兩</sup> 葱白<sup>切一合</sup>

右件四味用童子小便二盞煎至一盞去滓分作二服

○小兒瘡疹藥方

此一卷論小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足冷脈數疑似之間只與升麻湯緣升麻湯解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可踈轉此為大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表尤不可轉世人不學乃云初覺以藥利之宜其毒也誤矣又云瘡痘已出不可踈轉出得已定或膿



血大盛却用疎利亦非也大抵瘡疹首尾皆不可下小兒身熱耳冷尻冷咳嗽輒用利藥即毒氣入裏殺人也但與化毒湯紫草木通湯鼠粘子湯出得大盛即用犀角地黄湯解之若瘡痘出不快煩躁不得眠者水解散麻黃黃芩湯升麻黃芩湯活血散主之瘡黑倒靨猪尾膏無比散龍腦膏子無不驗也若熱毒攻咽喉痛者如聖湯瘡痘入眼决明散撥雲散蜜蒙花散通聖散與蛤粉散主之治瘡疹之法無出此矣

活人書 卷二十一

升麻湯 治傷寒中風頭痛增寒壯熱肢體疼痛

發熱畏寒鼻乾不得卧并治大人小兒瘡疹已發未

發皆可服兼治寒暄不時人多疾疫乍暖脫著衣巾

及暴熱之次忽變陰寒身體疼痛頭重如石者

六卷

犀角地黄湯 治傷寒及溫病應發汗而不發汗

內有瘀血者及鼻衄吐血不盡內有餘瘀血而黃大

便黑者此方主消化瘀血兼治瘡疹出得太盛以此

方解之 卷八十六

麻黃黃芩湯 治小兒天行熱氣生豌豆瘡出不

快益煩躁身重昏憤或瘡出身尚寒熱者

升麻黃芩湯 治小兒時行瘡痘出不快煩躁不

眠加木香一錢半

化毒湯 治小兒痘瘡已出未出並可服之

紫草 嫩而肥 升麻 甘草

右剉如麻豆大作一服以水二盞糯米一撮煎至

一盞去滓量大小温服

紫草木通湯 治小兒痘疹

活人書 卷二十一

紫草 去蘆 木通 人參 茯苓 去皮

糯米 各等 甘草 半之

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一盞半煎至一

盞去滓澄清温温分服

鼠粘子湯 治痘疹欲出未得透皮膚熱氣攻咽

喉眼赤心煩躁者

鼠粘子 炒香 甘草 防風 荆芥穗

右爲細末每服二錢沸湯點服食後臨卧日進三

服大利咽膈化痰涎止咳嗽若春冬間常服免生



瘡癩老幼皆宜服

水解散 二十三 治天行頭痛壯熱一二日兼治疱瘡未出煩躁或出尚身體發熱

大黃 黃芩 桂心 甘草 炙

芍藥 各一兩 麻黃 四兩去節湯炮焙研

右搗羅為末患者以生熟湯浴訖以暖水調下二錢相次二服得汗利便差強實人服二方寸匕此調風實之人三伏中亦宜用之若去大黃即春夏通用

活人書 二十卷 十

活血散 三十四 治瘡子或出不快

白芍藥末 一錢

右用酒調如欲止痛只用溫熱水調下

猪尾膏 三五 治瘡子倒靨

小豬兒尾尖刺血一兩點入生腦子少許

右同研用新水調下立効

無比散 三十六 治瘡癩惡候不快及黑瘡子應一切惡候

牛黃 一分 麝香 一分 龍腦 一分 膩粉 一分 研細

硃砂 一兩先研如粉

石同研細小兒一字大人半錢水銀少許同小豬

猪尾上血三兩滴新汲水少許同調服先寧穩得

睡然後取轉下如爛魚腸蒲桃穉之類涎臭惡物

便安小兒用妳汁滴尤妙

龍腦膏子 三十七 治時疾發晚豆瘡及赤瘡子未透心

煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜早

治不爾毒入藏必死

梅花龍腦 生者一錢

活人書 二十卷 十一

右細研旋滴猪心血和圓如鷄頭子大每服一圓

心煩狂躁者用紫草湯化下若瘡子陷伏者用溫

酒化下少時心神便定得即瘡癩發透依常將息

取安也

如聖湯 三十八 小兒瘡癩毒攻咽喉腫痛

桔梗 一兩 甘草 生一兩 牛旁子 炒一兩 麥門冬 去心半兩

右為細末每服二錢沸湯煎細細呷服入竹葉煎

調尤妙

决明散 三十九 治瘡豆瘡入眼



決明子分一括樓根分半赤芍藥分二甘草一分

右搗羅爲末每服半錢蜜水調下日進三服

撥雲散三十一治瘡痘瘡入眼及生翳膜

桑螵蛸真者一兩炙

右爲極細末入麝香少許令勻每服二錢生米泔

水調下臨服臥之

蜜蒙花散三十二治瘡痘瘡並諸毒氣入眼

青箱子 決明子 車前子各半錢 蜜蒙花半錢

右爲細末用羊肝一片破開作三片摻藥令勻却

合定作一片以濕紙七重裹瘡灰火中煨熟空心

食之

通聖散三十三治瘡痘瘡入眼及生翳

菉豆皮 穀疇草去根各一兩

白菊花二兩如無黃甘菊花代之然不如白菊花

右搗羅爲末每服一大錢乾柿一箇生粟米泔水

一盞共一處煎候米泔盡只將乾柿去核喫之不

拘時候一日可喫三箇日淺者五七日可効遠者

半月即愈

蛤粉散三十三治小兒瘡子入眼

穀疇草 蛤粉各等分

右爲末每服一錢七猪肝二兩許批開摻藥卷了

青竹葉裹麻縷纏定水一椀煮令熟入收口甕瓶

內熏眼候温取食日作不過十日便退

活人書卷第二十終

活人書 二十卷

十三








宋奉議郎朱肱著

# 傷寒百問



南陽活人書原本

傷寒百問序

傷寒諸家方論不一獨伊尹仲景之書猶六經也其餘諸子百家時有一得要之不可為法又况邪說妄意世業名家規利雖厚因果歷然特以伊尹湯液仲景經絡常人難曉士大夫又以藝成而下恥而不讀往往倉卒之際束手待盡卒歸之於命而已世人知讀此書者亦鮮縱欲讀之又不曉其義况又有好用涼藥者如附子硫黃則笑而不喜用雖隆冬使人飲冷服三黃圓之類有好用熱藥者如大黃芫硝則畏而不敢使雖盛暑勸人灸熨服益液丹之類非不知罪福偏見曲說所趣者然也陽根於陰陰本於陽無陰則陽無以生無陽則陰無以化是故春時氣温當將理以涼夏月盛熱當食以寒君子扶陰氣以養陽之時也世人以為陰氣在內反抑以熱藥而成瘡痲脫血者多矣秋時氣涼當



將息以溫冬時嚴寒當食以熱希以扶陽氣以養陰之時也世人以陽氣在內乃抑以涼藥而成吐痢腹痛者多矣伐本逆根豈知天地之剛柔陰陽之逆順求其不夫橫也難矣偶有病家曾留意方書稍別陰陽知其熱證則召某人以某人善醫陽病知其冷證則召某人以某人善醫陰病往往隨手全活若病家素不曉者道聽泛請委而聽之近世士人如高若訥林億孫衡龐安常皆倦倦於此未必章句之徒不諳且也僕因問居作爲此書雖未能盡窺伊尹之萬一庶使天下之大人無矢伐老不哭幼士大夫易曉而喜讀漸浸積習人人尊生豈曰小補之哉仲尼曰吾少也賤故多能鄙事學者不以爲鄙然後知余用意在此而不在彼大觀元年正月日前進士朱肱序

傷寒百問目錄

卷之一

第一問均是傷寒也冬謂之傷寒春謂之溫病夏謂之熱病何也

第二問傷寒一二日發熱惡寒頭項痛腰脊強何以知太陽經受病

第三問傷寒二三日身熱目赤鼻乾不得臥何以知陽明經受病

第四問傷寒三四日胸脅痛而耳聾何以知少陽經受病

第五問傷寒四五日腹滿而噤乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛何以知太陰經受病

第六問傷寒五六日口燥舌乾而渴口中和而惡寒何以知少陰經受病

第七問傷寒六七日煩滿而囊縮何以知厥陰經受病

第八問古人云三日已前當汗三日已後當下何也

第九問傷寒只傳足經不傳手經何也



第十問素問曰傷於寒則爲病熱熱雖甚不死何故傷寒反爲熱病

第十一問如何謂之陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈

卷之二

第十二問傷寒與傷風何以別之

第十三問謂傷風見寒脈傷寒見風脈何也

第十四問熱病與中暑何以別之

第十五問難經云溫病脈行在諸經不知何經之動隨其經而取之何也

傷寒百問

第十六問有溫病有風溫有溫毒何以別之

第十七問有中濕有風濕有濕溫何以別之

第十八問瘧病是傷寒所致與傷寒相類何以別之

第十九問脚氣近傷寒何以別之

第二十問傷食近傷寒何以別之

第二十一問風痰近傷寒何以別之

第二十二問瘡疾近傷寒何以別之

第二十三問虛煩近傷寒何以別之

第二十四問發熱而惡寒者何也

第二十五問惡寒者何也

第二十六問惡風者何也

第二十七問太陽證熱多寒少者何也

第二十八問太陽陽明少陽發熱何以別之

卷之三

第二十九問往來寒熱者何也

第三十問傷寒如瘧狀何也

第三十一問如何是表證

第三十二問如何是裏證

第三十三問仲景有發汗者有和解者何也

傷寒百問

第三十四問仲景有宜下之有微和其胃氣者何也

也

第三十五問傷寒不得汗何也

第三十六問汗之而寒熱者何也

第三十七問汗之而仍發熱者何也

第三十八問下之而熱不退者何也

第三十九問汗後有表證者何也

第四十問下後有表證者何也

第四十一問病人有表證而脈微細者何也

第四十二問表裡兩證俱見者何也



第四十三問無表裡証者何也

第四十四問表熱裏寒表寒裏熱者何也

卷之四

第四十五問如何是陽證

第四十六問如何是陰證

第四十七問有陰毒有少陰有陰陽易何以別之

第四十八問三陰有可汗者乎

第四十九問三陰有可下者乎

第五十問三陰有發熱者何也

第五十一問陰證似陽何以別之

傷寒百問

第五十二問陽証似陰何以別之

第五十三問身冷脉細沉疾煩躁而不飲水何也

第五十四問手足逆冷者何乎

第五十五問吐長蟲何也

第五十六問兩感傷寒其治法如何

第五十七問潮熱者何也

第五十八問頭疼者何也

第五十九問身體痛者何也

第六十問汗出者何也

第六十一問但頭汗出者何也

第六十二問咽乾者何也

第六十三問咽喉痛者何也

卷之五

第六十四問嘔者何也

第六十五問吐者何也

第六十六問乾嘔者何也

第六十七問咳嗽者何也

第六十八問鼻衄者何也

第六十九問吐血者何也

第七十問渴者何也

傷寒百問

第七十一問煩者何也

第七十二問躁者何也

第七十三問發黃者何也

第七十四問發斑者何也

第七十五問發狂者何也

第七十六問譫語者何也

第七十七問病人但漱水不欲嚥何也

第七十八問腹脹滿者何也

第七十九問腹痛者何也

第八十問痞者何也



卷之六

第八十一問結胃者何也

第八十二問喘者何也

第八十三問咳逆者何也

第八十四問嗜卧者何也

第八十五問不得眠者何也

第八十六問大便溏者何也

第八十七問下利者何也

第八十八問數日不大便又有大便難又有大便  
鞭又曰有燥屎何也

傷寒百問

第八十九問小便利者何也

第九十問小便不利者何也

第九十一問壞傷寒何也

第九十二問孤惑濕鬻傷寒何也

第九十三問百合傷寒何也

第九十四問霍亂何也

第九十五問傷寒勞復食復何也

第九十六問傷寒不思食何也

第九十七問傷寒不得用九子藥者何也

第九十八問姪婦傷寒其治法如何

第九十九問小兒傷寒其治法如何  
第一百問小兒瘡疹發熱類傷寒何以別之

傷寒百問目錄終

傷寒百問



傷寒百問卷一

宋 奉議郎醫學博士朱肱著

第一問均是傷寒也冬謂之傷寒春謂之溫病夏謂之熱病何也

冬時嚴寒中而即病名曰傷寒其不即病者寒氣藏於腦巨下風府之上靈道之間至春夏陽氣王與寒毒薄下流兩腠隨流注經其候與冬時即病無異但因春溫氣而發名曰溫病因夏暑氣而發名曰熱病故本醫均謂之傷寒也

第二問傷寒一二日發熱惡寒頭項痛腰脊強何以知太陽經受病

足太陽膀胱經腎與膀胱為合故足少陰與足太陽為表裏從目內眥上頭連於風府分為四道下項并正別脉上下六道以行於背與身為經太陽之經為諸陽主氣或中寒邪必發熱而惡寒緣頭項腰脊是太陽經所過處今頭項痛身體疼腰脊強其脉尺寸俱浮者故知太陽經受病也

問曰太陽受病其治法如何

太陽病頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯之類應解散

而藥宜用桂枝者太陽病頭痛發熱無汗惡寒宜麻黃湯之類應解散而藥宜用麻黃者二者均為解散正分陰陽不可不慎也仲景所謂無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃常須知此勿令誤也太陽病自汗四肢拘急難以屈伸若小便難者可桂枝湯內加附子一分服之若小便數者慎不可行桂枝也宜服芍藥甘草湯若誤行桂枝附子攻表便咽乾煩燥厥逆嘔吐作甘草乾姜湯與之止吐以復其陽氣若厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯微瀉則止其譫語蓋芍藥甘草湯主脉浮自汗小便數者若以脉浮為風大為虛風則生微熱虛則兩脛痠小便數仍汗出為津液少故不可必用桂枝宜服芍藥甘草湯補虛退風熱兼此湯通治誤服桂枝後病證仍存者木抵桂枝湯難用須是子細假如中風自汗脉浮而弱誤當行桂枝湯後無桂枝脉息證候而煩者亦不可再與也宜消息之

第三問傷寒二三日身熱目疼鼻乾不得臥何以知陽明經受病

足陽明胃經脾與胃為合故足太陽與陽明為表裏



從鼻起火於鼻絡於目下咽分爲四道并正別脉六道上下行腹綱維於身蓋諸陽在表陽明主肌肉絡於鼻故病人身熱目疼鼻乾不得臥胃中寒故其脉尺寸俱長者知陽明經受病也

問曰陽明受病其治法如何

陽明在三有太陽之陽明有少陽之陽明有正陽之陽明也太陽之陽明者本太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明也少陽之陽明者本傳到少陽因發汗利小便已胃中燥實大便難也正陽之陽明者病人本風盛氣實不在亡津液便陽盛胃實也三陽明俱宜下唯惡寒及中寒爲病在經與太陽合病屬表可發其汗蓋太陽與陽明合病脉必浮大而長外證必頭疼腰痛肌熱目痛鼻乾也脉浮大者太陽也長者陽明也頭疼腰痛者太陽也肌熱目痛鼻乾者陽明也今言二三日傳陽明者若尚惡寒便可用升麻湯汗之若不惡寒手足熱汗出者白虎湯解利之若大便硬或譫語者胃家實也可用調胃承氣下之二陽有合病有併病脉浮大而長頭痛腰痛肌熱目疼鼻乾者合病也太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不

惡寒者併病也大抵病人雖有陽明證若其人面赤色煩躁短氣但坐而脉濡者是太陽證不罷陽氣拂鬱在表不得越散當更用麻黃湯發其汗則愈仲景所謂以汗出不徹故也又問陽明有中風其證如何病人脉弦浮數能食口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒或嗜臥身黃小便難潮熱而嘔者是陽明中風也可與小柴胡湯

第四問傷寒三四日胸脅痛而耳聾何以知少陽經受病

足少陽膽經肝與膽爲合故足厥陰與足少陽爲表裏起目外眥絡於耳分爲四道下缺盆循於脇并正別脉六道上下主經管百節流氣三部故病人胸脇痛而耳聾黃帝鍼經曰邪在肝則兩脇痛又曰膽脹者脇下痛口中苦善太息或口苦咽乾或往來寒熱而嘔其脉尺寸俱弦者知少陽經受病也

問曰少陽受病其治法如何

仲景曰太陽病不解轉入少陽脇下脹滿乾嘔不能食往來寒熱尚未可吐下診其脉弦緊者小柴胡主之蓋少陽受病口苦咽乾目眩仲景少陽證唯小柴胡方解表



第五問傷寒四五日腹滿而噎乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛何以知太陰經受病

足太陰脾經為三陰之首其脈布於脾胃絡於噎喉故病人腹滿而噎乾尺寸俱沉細者知太陰經受病也

問曰太陰受病其治法如何

傷寒手足必微冷若手足自溫者係太陰也自利不渴屬太陰也腹滿時痛屬太陰也自利不渴者藏寒也當溫之宜四逆湯理中湯也腹滿脈浮者可桂枝微發汗腹滿者桂枝加芍藥一倍痛甚者加大黃也

又問古人以四日太陰證病在胸膈可吐而食何

也答云不然有太陰證脈大而胸膈多痰者可吐之脈大面無吐証者可汗而已大抵三日已上氣浮上郭填塞心胸頭疼胸滿或多痰涎當吐之也

第六問傷寒五六日口燥舌乾而渴口中和而惡寒何以知少陰經受病

足少陰腎經其脈起於小指之下斜趨足心別行者入跟中上至股內後廉貫腎絡膀胱直行者從腎上貫肝膈入肺中繫舌本傷寒熱氣入於藏流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲又經發汗吐下

已後臟腑空虛津液枯竭腎有餘熱亦渴故病人口燥舌乾而渴其脈尺寸俱沉者知少陰經受病也

問曰少陰受病其治法如何

少陰病口燥舌乾者急下之若不口燥舌乾而脈沉者急溫之宜四逆湯也太陰厥陰皆不惡寒只少陰有惡寒之證不可不知也少陰病得之一二日口中和其奔惡寒者宜著灸并附子湯也若少陰病惡寒而倦手足自溫者小建中湯若惡寒而倦時時自煩不欲厚衣用大柴胡主之無不愈者大率陰證不宜發汗然少陰病始得之反發熱脈沉者須用麻黃細辛

附子湯微汗之及少陰病初得二三日常見少陰證無陽證者亦須少發汗宜麻黃附子甘草湯也夫脈

沉細數病在裏不可發汗此大畧之言耳風寒中人與營衛相薄而發熱又未曾行諸汗藥雖無證須少汗解逐之王叔和曰表中風寒入裡則不消故知初

病脈沉細數雖裡不消本表中風寒須用溫藥少汗而解矣仲景少陰藥惟有麻黃細辛附子湯麻黃附

子甘草湯蓋為此也

第七問傷寒六七日煩滿而囊縮何以知厥陰經受病



足厥陰肝經厥者盡也。靈樞曰支爲左足之厥陰，戌爲右足之厥陰，兩陰俱盡，故曰厥陰。夫陰盡爲嘔，陰出爲泄，厥陰者以陰盡爲義也。其脈循陰器而絡於肝，肝者筋之合，聚於陰器而絡於舌本也。脈弗管則筋急，筋急則引舌與卵，故唇青舌卷而卵縮，凡病人煩滿而囊縮，其脈尺寸俱微緩者，知厥陰經受病也。

問曰厥陰受病其治法如何？

厥陰病其脈微浮爲欲愈，不浮爲未愈。宜小建中湯。脈浮緩者必囊不縮，外證必發熱惡寒，似瘧爲欲愈。宜桂枝麻黃各半湯。若尺寸俱浮短者，必是囊縮，毒

傷寒百問  
氣入藏宜承氣湯下之。大抵傷寒六七日傳厥陰肝木必移氣尅於脾土，再受賊邪則五藏六腑皆因而危。殆營衛不通耳。囊縮不知人而死矣。速用承氣湯下之可保。五死一生，勿從容。極救令病人水漿不入。湯液不下，无可奈何也。素問曰脾熱病則五臟危。又云土敗木賊則死。若六七日傳厥陰脈得微緩微浮爲脾胃脈也。故知脾氣全不再受尅則邪無所容。否極泰來，營衛將復。水升火降則寒熱作而大汗解矣。

第八問古人云三日已前當汗三日已後當下何

也

黃帝曰未滿三日者可汗而已，其滿三日者可泄而已。此大畧之言也。病人有虛有實，邪氣傳受遲速不等，豈可拘以日數。仲景曰日數雖多，但有表證而脈浮大數，猶宜發汗。日數雖少，即有裏證而脈沉細數，猶宜下之。正應隨脈以汗下之。又况六氣之邪，乘虛入經，自脊得之則入太陽，或入少陰，緣少陰有伏脈在背，自面感之則入陽明之類，不必皆始於太陽。兼寒邪有首尾，止在一經，或問傳一二經，不可以一理推，但據脈與外證治之。此活法也。假令有人脈浮，頭項強痛，發熱惡寒，每日如此，不以日數多少，正是太陽經受之。其餘經絡皆倣此。大抵傷寒憑脈與外證以汗下之。若過日多，脈尚浮大數，按之不足者，責太陽也可。發汗而愈，若按之實者，汗之必死。須下之而愈也。若始得病，脈沉細數，外證或腹滿咽乾，或口燥舌乾而渴，爲正責屬裡，可下之而愈。若無此證，但發熱頭疼者，誤下必死。須行麻黃附子甘草湯少發汗，此皆仲景之玄旨也。

第九問傷寒只傳足經不傳手經何也

手足各有三陰三陽，合爲十二經。在手背者爲陽，屬



表為府在手掌裡者為陰，屈裡為臟，足經皆做此。素問熱論亦只說足三陰三陽受病。巢氏言一日太陽屬小腸誤矣。又問今大便硬，豈非大腸受病耶？此胃實故大便硬耳。靈樞論傷寒受病有標本，以先受病為本，傳者為標。足太陽為諸陽主氣，最在外。三日已前足之三陽受病在其肌，而手之三陰在其膈。三日已後足之三陰受病在其膈，而手之三陽在其肌。傳竟再受亦始於足太陽也。足之太陽者陰中之少陽也，足之三陰從足走腹。

第十問素問曰：傷於寒則為病，熱雖甚不死，何故？傷寒反為熱病。

寒毒流於經絡，薄於肌膚，毫毛畢直，玄府不閉。玄府者汗也。陽氣不得發散而內鬱結，故傷於寒反轉為熱也。岐伯所謂寒盛則生熱。

第十一問如何謂之陽虛陰盛，汗之則愈，下之則死？

陰陽盛虛非謂分脈尺寸也。營衛者表陽也，胃府者裡陰也。寒毒爭於營衛之中，必發熱而惡寒。尺寸俱浮，大內必不躁，故有微煩其人飲食欲溫而惡冷，為陽虛陰盛也。汗之則愈，誤下必死。若寒毒相薄於營

衛之內而陽勝陰衰，極陰變陽，寒盛生熱也。陽熱之氣盛則入裏，熱毒居胃，水液乾涸，燥糞結聚，其人外不惡寒，必蒸蒸發熱而躁，甚則譫語，其脈浮滑而數，或洪實為陽盛陰虛故也。須當下之則愈。誤汗則死。經曰：陽虛則外寒，陰虛則內熱。陽盛則內熱，陰盛則外寒，以此別之。

傷寒百問卷一終

傷寒百問



傷寒百問卷二

第十二問傷寒與傷風何以別之

傷寒者脈緊而澁。傷風者脈浮而緩。傷寒者無汗。脈澁故也。傷風者有汗。脈浮故也。傷寒者畏寒。不畏風。傷風者畏風。不畏寒。大抵太陽病者必脈浮。發熱惡風。惡寒也。惡寒者不當風。而自憎寒。惡風者當風而憎寒也。六經皆有傷寒。傷風其證各異。太陽脈浮。有汗為中風。脈緊。无汗為傷寒。陽明善飢。為中風。不食為傷寒。少陽兩耳聾。目赤。胸滿。而煩。為中風。口苦。咽乾。目眩。為傷寒。若三陰傷風。無變異形證。但四肢煩疼。餘證同三陽也。問傷寒治法如何。傷寒之候。脈尺寸俱盛。而緊澁。身體拘急。而无汗。面色慘。而不解。欲衣。畏身。惟覺寒。不可過。四體如經。挂挂。手足指末微厥。不煩躁。則麻黃乾葛湯。小荆芥散。麻黃湯。人參順氣散。麻黃圓之類。皆可汗之。然太陽有熱多寒少者。須子細看脈與證。浮者雖熱多寒少。自可發汗。若脈弱无陽也。桂枝二越婢一主之。熱多寒少。而尺脈遲者。營氣不足。血少故也。先以小建中湯加人參。最良。又尚遲。再作一劑。或太陽證宜汗。而其人適失血。又下利。則教少與桂枝湯。使體潤。黎黎連日。當自解。

假如淋家衄血家。法不可汗。亦可以小柴胡之類。和緩之也。問傷風其治法如何。傷風之候。脈浮而緩。寸大而尺弱。風至則索索然。惡之。冬月手心腋下。潤。春夏頭額汗出。其面光。而不慘。煩躁。手足不厥。則桂枝湯。小柴胡湯。萎蕤湯。升麻散。羌活散。獨活散。川芎散。之類。皆主之。項背強者。桂枝湯加葛根也。裏寒者。去芍藥。加附子。不飲水。凡發汗後。汗不止。為漏風。加附子一箇。也。去芍藥。太陽證。腹滿。脈浮者。可服。此微發汗。腹痛者。加芍藥一倍。痛甚者。加大黃也。傷風當用桂枝。而有所禁忌者。如酒家及目赤。大躁。唇焦等。

傷寒百問卷二  
宜用人參。葛根。石膏。三物湯。大抵桂枝湯。自西北二方。始人。四時行之。無不應驗。自江淮間。唯冬及春。可行之。自春末及夏至。已前。桂枝證。可加黃芩半兩。湯也。夏至後。有桂枝證。可加知母一兩。石膏二兩。或加升麻半兩。若病人素虛寒者。正用古方。不在加減也。

第十三問謂傷風見寒脈。傷寒見風脈。何也。  
發熱惡寒煩躁。手足溫。為中風。候脈浮緊。為寒脈。是中風見寒脈也。寒多熱少。不煩躁。手足微厥。為傷寒。候脈浮緩。為風脈。是傷寒見風脈也。中風見寒脈。傷



寒見風脈宜服大青龍湯蓋大青龍證脈似桂枝反  
 无汗病似麻黃反煩躁是也大青龍湯治病與麻黃  
 湯證相似但病尤重而又加煩躁者用大青龍湯也  
 以中風并傷寒俱盛故青龍湯添麻黃作六兩又似  
 合桂枝湯藥味在內添石膏所以為緊此治營衛俱  
 病若證不審誤用則發汗多傷人  
 大抵感外風者為傷風感寒冷者為傷寒故風則傷  
 衛寒則傷營桂枝主傷衛麻黃主傷營青龍主營衛  
 俱傷也  
 傷寒百問

發耳 問熱病治法如何熱病藥性須帶涼不可大  
 温桂枝麻黃大青龍須用加減法夏至前桂枝加黃  
 芩半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一兩石膏  
 二兩或加升麻半兩也蓋桂枝麻黃湯性熱夏月服  
 之有發黃斑出之失熱病三月外與湯不差脈勢仍  
 數邪氣猶在經絡未入於府者與桂枝石膏湯此方  
 夏至後代桂枝證用若加升麻半兩可代麻黃青龍  
 湯用也夏月熱病七物黃連湯梔子升麻湯陽且湯  
 并主之 又問夏至後皆可行白虎是耶白虎治中  
 暑與汗後一解利藥耳一白虎未能驅逐表邪故也  
 傷寒百問

重其脈數中按之而有力此是冬月感寒氣深至夏

已心下痞者屬五苓散小便利則解頭疼惡心煩躁



者五苓散香薷圓白龍圓消毒圓黃龍圓大順散主之若著熱倒地不省人事者乾姜橘皮散主之覺心下不快者便可用承氣湯下之然後服陽毒散遂絕悶絕不救者熱也大蒜散主之若暑氣伏深累取不差其人引飲不已者酒蒸黃連圓主之傷暑痰逆胃悶等疾兼治傷寒心熱煩躁舌出面赤而胃寒不可服涼藥宜服牛膽南星圓

第十五問難經云溫病脈行在諸經不知何經之動隨其經而取之何也溫病謂之天行病仲景無方外發千金句無密等語此言溫病之脈謂溫疫也非春曰溫病也不因冬時

四時皆有不正之氣春夏有寒時秋冬有暑時一方內長幼患狀率相類者謂之時氣是也若君神散大治溫疫不相移成子

散子火圓若春應煖而清氣折之則責邪在肝或三月寒其時陽氣尚弱為夏應暑而寒氣折之則責邪在或四月心五六月陽氣已盛為秋應涼而反大熱抑之則責

邪在肺春時陽氣發於冬時冬應寒而反大溫抑之則責則伏寒變為溫病土無正形因火而名當隨其經而取之也仲景曰溫疫與傷寒大異蓋傷寒

者傷寒氣而作冬溫者感溫氣而作寒疫者暴寒折人非觸胃之過其治法不同所施寒熱溫涼之劑亦

異不可拘以日數發汗吐下隨證施行要之治熱以寒溫而行之治溫以清冷而行之治寒以熱涼而行之治清以溫熱而行之以平為期不可以過此為大法春疫宜用升麻散米解散解肌湯夏疫宜用調中湯射干湯半夏桂甘湯秋疫宜用白虎加蒼朮湯煎茵陳湯汁調五苓散冬疫宜用姜糖湯也

第十六問有溫病有風溫有溫毒何以別之溫病有二名春月傷寒謂之溫病時氣疫癘亦謂之溫病冬傷於寒輕者夏至以前發為溫病冬傷於寒甚者夏至以後發為熱病蓋春傷寒為溫病者熱輕

故也春傷寒曰溫病脈數而大散但身壯熱頭項腰脚痛煩熱昏渴者小柴胡主之加煩躁發渴尿實大便秘澀者小柴胡加大黃也虛煩者竹葉湯次第服之益治溫病與傷寒熱不同故也升麻散解肌湯亦宜服之風溫者太陽病發熱而渴不惡寒為溫病

若發汗已身灼熱者名風溫風溫之病脈陰陽俱浮自汗出體重其息必喘其形不仁嘔嘔俱欲眠蓋其人素傷於風因復傷於熱風熱相搏即發風溫四肢不收左傳曰風頭疼身熱常汗出不解治在足少陰厥陰少陰火不可發汗汗出請言獨語內煩躁擾不

傷寒百問



得臥。若驚痲目亂無精。瘵之者復發其汗如此死者醫殺之也。風濕不可發汗。宜萎蕤湯。風濕身灼熱者知母乾葛湯。風濕加渴甚者枯樓根湯。或又謂中湯去大黃主之。風濕脈浮身重汗出。漢防己湯。風濕痲痺頭目昏眩。四支煩痛。荊芥散。溫毒者冬時觸胃寒毒至春始發。病初在表。或已發汗吐下而表證未罷。毒氣不散。故發斑。又冬月溫暖。人感乖戾之氣。未即病至。春或積寒所折。毒氣不得泄。至天氣暄熱。溫毒始發。則肌肉斑爛。癰疹如錦紋。而咳心悶。但喉清汁。葛根檣皮湯。黑膏黑奴圓。黃連檣皮湯主之。

傷寒百問

第十七問有中濕。有風濕。有濕濕。何以別之。

風雨襲虛山澤蒸氣。則人多中濕。然有中濕者。風濕有濕濕。雖並稱太陽。其脈其證其治法皆不同。大抵濕流關節。須身體煩痛。其人中濕。因而傷風。名曰風濕。其人傷濕。因而中暑。名曰濕濕。其脈沉緩。為中濕。脈浮。為風濕。脈陽濡而弱。陰小而急。為濕濕。當別而治之。中濕者。一身盡痛。發熱身黃。小便不利。大便反快。至真要論云。治濕之法。不利小便。非其治也。五苓散主之。然中濕亦有小便不利者。仲景治中濕小便不利者。木附湯。小便不利者。甘草附子湯。不宜大發汗。可用麻黃加朮湯。木附湯也。

發其表汗出。風濕者是風氣與濕氣相搏。肢體痲重。不可轉側。額上微汗。不欲去。被或身微腫。欲發其汗。但榮榮。身立。身潤。則風濕俱去。若人發其汗。則風氣去。濕氣在矣。麻黃杏子薑散。甘草附子湯。防己黃耆湯。桂枝湯。濕濕者。兩脛逆冷。腹滿。頭目痛苦。妄言。治在太陽。必多汗。屬木附湯。白虎加蒼朮湯。不可發汗。汗出必不能言。耳聾。不知痛所。身青。面色變名曰重。如此死者。醫殺之耳。

第十八問。痲病是傷寒所致。與傷寒相類。何以別之。

傷寒百問。痲病。傷太極經。蓋因傷風。又感寒濕。而致然也。外證發熱惡寒。與傷寒相似。但其脈沉遲弦細。甲乙經云。痲而項背反張。強硬。口噤。如發痲之狀。此為異耳。並可與小續命湯。更察其有汗無汗。以分。則痲柔痲。汗惡寒。名曰痲。在汗無汗。葛根湯主之。有汗。桂枝加葛根湯。上之。若審知。剛柔。胸滿口噤。其人臥。不著席。腳攣急。咬齒。當行大承氣湯也。又問。剛柔。二痲。與陰陽二痲。是。如何。作。痲。陽痲。屬剛。陰痲。屬柔。痲。是。陽。是。陰。附朮散。桂枝白朮散。附子防風散。八物白朮散。桂枝煎主之。傷寒。陰。痲。節。急。使。陽。痲。易。差。陰。痲。難。愈。又問。小兒驚痲。

散。桂枝煎主之。傷寒。陰。痲。節。急。使。陽。痲。易。差。陰。痲。難。愈。又問。小兒驚痲。



皆發症其治法如何小兒驚癇者古人謂之陰陽癇  
急驚是陽癇慢驚是陰癇陽癇屬肺當用涼藥陰癇  
屬厥當用溫藥溫藥如釣藤小續命湯最妙蓋有附  
子故也小兒急慢驚小便不利五苓  
散尤良

第十九問脚氣近傷寒何以別之

傷寒只傳足經不傳手經地之寒暑風濕皆作蒸氣  
足常履之遂成脚氣所以病證與傷寒相近也脚氣  
之病始得不覺因他病乃知毒氣入心則小腹頑痺  
不仁即令人嘔吐死在朝夕矣然終是與傷寒不同  
者孫真人曰平起脚屈弱不能轉動有此為異耳要

傷寒百問

之有脚氣之人先從脚起或先緩弱痛痺寒氣勝者  
有也或行起忽倒或兩脛腫痛亦有不  
腫者或脚枯細或

心中忪悸或小腹不仁病久入源營衛之行滯皮膚  
不仁也或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或胸滿

氣急或遍體酸痛皆脚氣候也黃帝所謂緩風濕痺

是也頑弱名緩風疼痛為濕痺痺者閉也閉而  
不仁故曰痺寒中

三陽所患必冷越婢湯小續命主之小續命煎  
湯成旋入生姜自然汁最良暑中

三陰所患必熱小續命湯去附子減桂一  
半大煩者紫雪尤良大便秘者

皆由氣實而始終五苓散大  
皆由氣實而始終以服藥致虛而阻者脚腫

者拱擲散主之脚氣方論千金外臺最詳此不復叙

大抵越婢湯小續命湯蒼朮仁酒脾約圓神功圓皆  
要藥也仍針灸為佳服補藥與用湯淋洗者皆醫之  
大禁也其脈浮而數者起於熱遲而流者起於風  
者汗而愈濕者溫而愈熱者下而愈寒者慰  
愈而

第二十問傷食近傷寒何以別之

傷食脈緊而頭疼發熱惡寒但驗左手人迎平和身  
不疼痛者是也甲乙經云人迎盛緊傷於寒氣口盛  
緊傷於食左手關前一分者人迎之位也蓋人迎主  
右手關前一分者氣口之位也外氣口主中以此別之傷食之候脈必滑而數狀似  
傷寒却身不疼痛此為異耳若腸實嘔吐者食在上

傷寒百問

腕宜吐之若心腹滿痛者宜下之瓜蒂散豆豉圓黑

神圓治中湯主之

第二十一問風痰近傷寒何以別之

風痰外似傷寒頭眩發熱而背寒其脈大而數胸膈  
痞滿或嘔吐是其證也柴胡半夏湯瓜蒂一味散細  
辛散半夏化痰圓金沸草散大半湯主之

第二十二問瘧疾近傷寒何以別之

脈浮而弦其人發熱而惡寒或思飲食是作瘧證也  
金匱要略云瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦  
小緊者可下之弦遲者可溫之弦緊者宜發汗浮大



者可吐之多熱但熱者白虎加桂湯多寒但寒者柴胡桂姜湯寒熱相等及先熱後寒可發汗者先熱後寒名曰瘧但可與小柴胡湯先寒後熱者柴胡加桂湯如汗多煩渴小便赤澀素有毒氣及不伏水土嘔吐甚者可服五苓散脈小緊寒熱嘔吐間日頻自發作無時大便秘者可服大柴胡湯下之脈浮大寒熱往來者可服祛邪圓吐之不愈者服葶芩煎圓朱粉如此則治瘧之法無以過也經曰恒山竹葉湯

第二十三問虛煩近傷寒何以別之

諸虛煩熱與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也

傷寒百問

傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故知非裏實也不可下如此者內外皆不可攻攻之必遂損竭多死也此虛煩但當與竹葉湯若嘔者與橘皮湯一劑不愈再與之孫真人曰此法數用有效傷寒虛煩亦宜服之上叔和曰有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯

第二十四問發熱而惡寒者何也

發熱而惡寒者屬太陽經太陽病必發熱而惡寒蓋太陽主氣以溫皮膚分肉寒氣留於外皮膚緻密則寒慄而發熱麻黃湯大青龍湯主之若發熱微惡寒

者柴胡桂枝湯桂枝二越婢一湯也 又問吐利而發熱惡寒者何也吐利而發熱惡寒者當於霍亂中求之

第二十五問惡寒者何也

惡寒有二證發熱惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脈浮者宜發汗發於陰者宜溫裡脈沉者宜溫裡發汗後反惡寒者虛而已附子湯又問惡寒而汗出者何也有太陽惡寒而汗出者汗出後惡寒者此皆下之也於瀉心湯證者有桂枝湯有陽明

傷寒百問

惡寒而汗出者陽明有脈遲汗出多者有少陽汗出而微惡寒者陽也柴胡桂枝湯有心下痞惡寒而汗出者心下痞惡寒者有心寒而汗出者治法又別也當先解表乃攻痞解表桂枝湯攻痞大黃黃連瀉心也蓋惡寒而汗出者表無事於解也三陽无汗而惡寒者當解表耳大抵太陽證寒多易治熱多難愈病人惡寒者慎不可過當衣被迫火氣寒熱相搏愈令病人寒不可過此不可不慎也

第二十六問惡風者何也



惡風者衛中四時之虛風所以惡風也其人當汗出而脈緩也數與桂枝湯桂枝加葛根湯使遍體微潤連日當自解矣又有太陽病發汗多亡陽遂漏不止衛虛而惡風者當溫其經也小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子也厥逆筋惕肉瞤者真武湯也若傷寒四五日身熱惡風頭項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利惡風不欲去衣者甘草附子湯主之

第二十七問太陽證熱多寒少者何也

太陽病熱多寒少有三證須子細辨認有熱多寒少而不嘔清便自可者有熱多寒少而脈微弱者有熱多寒少而尺脈遲者其用藥皆不同也太陽病八九日如瘧狀熱多寒少不嘔清便自可宜桂枝麻黃各半湯熱多寒少而脈都太微弱者無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一主之若脈浮熱多寒少者亦可發汗熱多寒少而尺脈遲者血少也先以小建中加人參湯可養其血尺尚遲再作一劑然後臨時用小柴胡桂枝二越婢一湯輩小劑隨證治之

第二十八問太陽陽明少陽發熱何以別之

發熱而惡寒者屬太陽也身熱汗出濇濇然者屬陽明也大便不結者曰濇汗之脈實者謂胃承氣下之者宜大承氣急下之也蓋汗脈細頭疼鳴而發熱者屬少陽也則濇語此屬胃和則食宜下之若天行時疫病一二日身熱頭痛肉瞤脈洪大肌熱如火者葛根一味主之病人无表裡證發熱七八日脈雖浮數宜大柴胡下之假令已下脈數而不解熱則消穀善饑至六七日不大便者瘀血也宜抵當湯

傷寒百問卷二終

傷寒百問卷二終







黃證不加黃芩輩服之轉助熱氣使發黃斑出也白  
虎湯雖可用如前論治中暑與汗後一解利藥耳一  
白虎未能逐表邪况夏月傷寒熱病或氣虛人妄投  
白虎往往有反結胸者以白虎性寒非治傷寒藥也  
凡發汗欲令手足俱用熱然一時許為佳不欲如水  
流離服湯中病即止不必盡劑然發汗須如常覆腰  
以下厚衣蓋腰以下難得汗雖得半身已上腰已下  
至足心微潤病終不解凡發汗病證仍存者三日內  
可二三汗之令腰脚周遍為度

傷寒百問 第三十二問如何是裏證

陽明證當下少陰證口燥咽乾當急下傷寒表證未  
罷慎不可亂投湯劑虛其胃氣也須是腹滿身重不  
惡寒惡寒者表證也反惡熱頭疼汗出手掌心并腋下繫繫  
滋潤胃中乾渴燥糞結聚方可下也此所謂陽表證  
已罷陽明證見固可下也若脈浮者亦未可下也脈  
若足太陽陽明如此者可桂枝湯少發汗和表證已  
罷陽明證見脈沉實固可下他證若小便清與小便  
少亦未可下仲景云傷寒不大便六七日口咽乾身熱  
在表也當發汗若頭痛者必宜桂枝湯陽明病或  
汗或有不汗大便雖硬小便少者未宜攻恐津液入  
胃小便自如下證悉具設當行大承氣亦須先少與  
不可攻之

小承氣二三劑聽其腹中若轉失氣即有燥屎轉失  
人謂之乃可攻之若不轉失氣此為緊後漉慎不可  
攻也明日又不大便脈反微瀟者裏虛也為難治若  
少陰病二三日口燥咽乾者承氣湯急下之非若陽  
明證可緩也少陰主腎腎本傷寒熱氣入於  
乾者須宜急下之若不口燥咽乾雖熱然陽明證亦有  
而脈沉微者須急溫之宜四逆湯雖然陽明證亦有  
急下者仲景云陽明病發熱汗出多者急下之陽明  
汗多則胃汁乾更有心胃連膈腹大段痞悶或腹中  
疼痛坐臥不安胃悶喘急極者亦不候它證便須下  
之此蓋已急也凡人便秘妨悶恐有裏證者須少少

傷寒百問 第三十三問仲景有發汗者有和解者何也

傷寒表證須看營衛淺深故仲景有正發汗湯劑如  
麻黃桂枝大青龍是也有和解其表如小青龍桂枝  
當服藥亦須平和



麻黃各半湯白虎湯桂枝二越婢一湯柴胡桂枝湯  
小柴胡之類是也。後人不能深究寒熱淺深藥性緊  
慢一槩用藥因致大傷其間縱獲生全往往汗後虛  
乏遂致勞復或變生百病淹引歲月卒至不救此皆  
由汗下過度陰陽並竭血氣羸損以致此禍如遇病  
輕但當和解之所謂和其營衛以通津液令其自解  
也

第三十四問仲景有宜下之有微和其胃氣者何  
也

傷寒裏證須看熱氣淺深故仲景有宜下之如大承  
氣小承氣十棗湯大柴胡是也有微和其胃氣如調  
胃承氣脾約圓少與小承氣微和之類是也金匱玉  
函云虛者十補勿一瀉強實者瀉之虛實等者瀉勿  
大洩之梅師亦云宿病老弱人使不令藥力相及為  
佳耳故王叔和序傷寒有承氣之戒 又問轉藥孰  
緊答曰大承氣最緊小承氣次之調胃承氣又次之  
大柴胡又次之

第三十五問傷寒不得汗何也

甲乙經云熱病脈常躁盛而不得汗者此陽脈之極  
也死脈躁盛而得汗者生大抵傷寒營衛俱病則無

傷寒裏證須看熱氣淺深故仲景有宜下之如大承  
氣小承氣十棗湯大柴胡是也有微和其胃氣如調  
胃承氣脾約圓少與小承氣微和之類是也金匱玉  
函云虛者十補勿一瀉強實者瀉之虛實等者瀉勿  
大洩之梅師亦云宿病老弱人使不令藥力相及為  
佳耳故王叔和序傷寒有承氣之戒 又問轉藥孰  
緊答曰大承氣最緊小承氣次之調胃承氣又次之  
大柴胡又次之

第三十六問汗之而寒熱者何也

太陽證發汗後依前寒熱者須看脈如何若脈浮數  
或洪大則表證猶在當再表也如桂枝二麻黃一之  
類醫人為見已汗或已下而發寒熱不敢再表誤矣  
蓋脈浮為在表表之必愈也 或大汗出熱不去惡寒  
利脈逆者或得汗而解復如瘧狀日晡而發者此屬  
陽明也若脈實者可下之宜大柴胡大承氣也若發  
汗後只惡寒者虛也發汗後只發熱者實也 只惡寒  
屬少陰藥

1 400 00 11 子部 醫家類 4



柴胡湯中加桂，令微汗也。

第三十七問汗之而仍發熱者何也

汗出輒復熱而脈躁疾不為汗裏狂言不能食謂之陰陽交交者死也。又曰熱病已得汗而脈躁盛者此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生今汗之而仍發熱者若脈浮數則表證猶在汗之必愈也。大抵傷寒其表極則熱生也表證熱多者須用溫藥表之也仲景凡發熱頭痛脈浮數身痛即溫其表若脈滿下利身熱不渴引有微熱者加桂及熱多寒少而脈微弱者桂枝二越婢二發汗後不敢再表者為脈沉實之類皆溫表之義也

耳脈浮者須再表也發汗後不惡寒只發熱始脈浮大今脈沉實始惺靜今狂語此為胃實陽盛再汗之即死須下之設令下後又不解表裡邪不棄矣。仲景謂有三日發汗不解者宜調胃承氣湯和言者使汗用承氣湯又有太陽證合行桂枝却用麻黃之類發汗多亡陽發熱惡風者屬桂枝加附子湯及真武湯更有風溫一證初得病發熱而渴不惡寒雖發汗已身灼熱者為風溫屬萎蕤湯若傷寒得汗後已解虛羸微熱不去只可行竹葉石膏湯隨其虛實治之

第三十八問下之而熱不退者何也

仲景云人發其汗使陽氣微又大下之使陰氣弱其人亡血而當惡寒後乃發熱無休止時大抵傷寒八日已上大發熱者為難治又有醫人多用圓子藥下之身熱不去微煩者屬梔子乾姜湯陽明下之仍有外熱手足溫心中懊憹飢不能食但頭汗出者屬梔子豉湯陰弱發熱甚蘆薈酒湯仲景又云太陽證服桂枝湯或下之仍頭項強身發熱无汗心滿痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯宜服此湯。

第三十九問汗後有表證者何也

汗後有表證者病未去也汗出脈洪大者與桂枝湯若形似瘧一日再發者屬桂枝二麻黃一湯服桂枝湯汗出煩渴不解脈洪大屬白虎加人參湯發汗已解半日復煩脈浮數者屬桂枝湯發汗後身疼脈沉遲者屬桂枝加芍藥生薑人參湯發汗病不解反惡寒者虛也屬芍藥甘草附子湯發汗不惡寒但熱者實也當和其胃氣屬調胃承氣湯太陽病發汗後大汗出胃氣乾煩躁不得眠若脈浮小便不利渴者屬五苓散又有發汗多亡陽惡風發熱者如太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢急難以屈伸者屬桂



枝加附子湯太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身軀動欲擗地者屬真武湯

第四十問下後有表證者何也

下後有表證者不應下也太陽病下之微喘者外未解也宜麻黃湯太陽病先發汗不解而復下之其脈浮病不愈者浮為在表而反下之故不愈也今脈浮故須解表則愈宜桂枝湯太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也汗出而喘者葛根黃芩黃連湯主之脈來緩時一止後來者名曰促脈來數盛則太陽病下之後脈促胸滿者桂枝加芍藥湯主之

傷寒百問卷之三

之服桂枝後下之仍頭項痛痛畜惡寒發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝加茯苓白朮湯主之傷寒醫下之後身疼痛不解清便自調者急須救表宜桂枝湯陽明中風脈緊浮大而短氣腹都滿脇下引痛久按之不痛鼻乾不得臥一身及目悉黃小便難時時噦耳前後臍刺之少差外不解者勿下之早宜麻黃湯

第四十一問病人有表證而脈微細者何也

有表證而脈沉細亦多般不可一槩作陽病見陰脈為難治蓋太陽病發熱脈沉而細名曰瘥太陽病關

節煩疼脈沉而緩名曰中濕夏月伏暑證外似傷寒而脈虛名曰中暑不可不察也非特此仲景云病人初得病若發熱身體疼師到診其脈沉而遲者知其差也何以知之若表有病者脈當浮大今脈反沉遲故知愈也又有得病數日太陽證經脈微而沉者當隨其證而治之又有病人而為醫所病外證發熱惡寒而脈微溢者仲景云病人脈微而溢此為醫所病也大發其汗又數下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時又曰凡病下之後發其汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也陽發惡寒四逆者下之必死

傷寒百問卷之三

歷昔又有太陽病得之八九日如瘥狀發熱惡寒多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得少汗其身必痒宜桂枝麻黃各半湯又有太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯又陽明少陽證近裡脈弦細外證只發熱不惡寒者屬陽明也往來寒熱而嘔者屬少陽也又曰得病二三日脈微者無太陽證也小柴胡主之以此知有表證而脈沉細者不可一槩作



陽證見陰脈也

第四十二問表裡兩證俱見者何也

假令病人脈浮而大是表證當汗其人心下滿口不  
飲食是裏証當下此兩證俱見者俱看若煩渴躁熱  
小便赤澁四肢煩熱雖脈浮亦當下微和其胃氣若  
支節痛不引飲无煩渴手足微冷雖胸膈滿悶亦有  
表證而脈遲者即不可汗亦不可下宜以小建中理  
中湯調治之假令病人心下滿口不欲食大便硬脈  
細者是裏証當下其人頭汗出微惡寒手足冷却當  
汗此兩証俱見者仲景所謂半在裡半在表小柴胡  
湯主之假令病人咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不  
寒反惡熱是陽明證當下其人脈浮而緊却當汗此  
兩証俱見者不可發汗汗之則心中躁譫語不可下  
下之則胃中空虛客氣動心中懊憹舌上有胎者仲  
景以梔子豉湯吐之亦宜此三證皆仲景治表裡  
兩證俱見法其它可以類推也千金救內解表三黃  
石膏湯亦治表裡兩證俱見之法也

第四十三問無表裡証者何也

傷寒四五日後以至過經無表証又於裏証未可下  
者但非汗証亦非下証者皆可小柴胡隨証加減用

之以至十余日者亦可用十余日外用小柴胡不愈  
者若大便硬看証而可用大柴胡下之以過經其人  
氣稍虛當下者用大柴胡則穩蓋恐承氣湯太緊病  
人大禁也仲景云病人無表裡証發熱七八日脈雖  
浮數可大柴胡下之假令已下脈數不解至六七日  
不大便者有瘀血也屬抵當湯又云六七日目中不  
了了暗不和無表裡証大便難身微熱此為實也當  
下之宜承氣湯

第四十四問表熱裏寒表寒裏熱者何也

表熱裏寒者病人身大熱反欲得衣被不飲水脈沉  
而遲手或微厥下利清穀皆是表熱裡寒所以陰  
亦有發熱者桂枝去芍藥加附子湯四逆湯通脈  
逆湯主之若內寒外熱虛煩者先與陰且湯也桂枝  
黃芩也表寒裡熱者病人身涼反不欲衣被口燥  
煩渴脈滑而厥皆表寒裡熱白虎湯主之若少陰惡  
寒而踈時時自煩不欲厚衣用大柴胡下之無不愈  
者此皆仲景之餘議也

傷寒百問卷三終



傷寒百問卷四

第四十五問如何是陽證



太陽陽明少陽皆屬陽證也。若陽氣獨盛，陰氣暴絕，發躁狂，走妄言，面赤，咽痛，身斑斑，若錦紋，或下利赤黃，脈洪實，或滑促，名曰陽毒。宜用酸苦之藥，折熱復陰。加苦參、大青、葶藶、苦酒之類。今陰氣復而大汗，解矣。葶藶苦酒湯、葛根龍腦湯、冰解散、黑奴圓、陽毒散、抱龍圓、消溫散、承氣湯、三解毒升麻湯。

第四十六問如何是陰證

陰證者，頭微寒而不甚，胸中痛，邪多於少，身亦不熱，亦有熱者乃表熱裡寒，脈沉細也。甲乙經云：邪生於陽者，得之風雨寒暑；邪中於陰者，得之飲食起居不時。者陰受之，陽受之則入腑，陰受之則入臟。入六腑則身熱不時，臥為喘呼；入五臟則膜滿閉塞，下為殞泄，久為腸澼。大抵陰證者，由冷物傷脾胃，陰經受之也。口中味淡，面色及唇皆白，而無光，手足冷，脈沉細，情緒亦不因嗜欲，但內傷冷物，或損動胃氣，遂成陰證。又問何故經中云一二日少陰病也。

答曰：此是初中病時，腠理寒，便入陰經，只惡寒不發熱者是也。蓋寒氣入太陽經，則發熱而惡寒；入少陰經，則惡寒而不發熱也。三陰中寒微，則理中湯加減，又枳朮或中寒下利，則乾姜甘草湯。手足指頭微厥，冷澀之清此未疾微故也。若大段重者，用四逆湯，無脈者用通脈四逆湯也。近人多不識陰證，才覺胃膈不快，便喫食藥而自利，胃膈愈不快，又進食藥，後吐而利，經一二日，遂致不救。蓋不知是寒中太陰也。太陰脾之經，主胃膈腹脹，亂投食藥，非其治也。又問萬一飲食不節，胃膈不快，寒中陰經，以何法治之。答云：急作理中湯，加青橘陳橘，則為吹咀服。一二劑，胸膈即快。此皆人所未論也。

第四十七問有陰毒，有少陰，有陰陽易，何以別之。陰毒之為病，初得病，手足冷，背強，咽痛，糜粥不下，毒氣攻心，心腹痛，短氣，四肢厥逆，嘔吐下利，體如被杖，陰毒甘草湯。返陰丹。正元散。主之火，抵陰毒。本因腎氣虛寒，或因冷物傷脾，外感風寒，內既伏陰，先感外寒，而內伏陰，則內外皆陰，而陽氣不守，遂發頭痛，腰重，身體倦怠，四肢逆冷，額上及手背冷，汗不止，或多煩渴，精神恍惚，如有所失。三兩日間，或可起行，不甚覺重，診之則六脈俱沉細，而疾尺部短小，寸口或大



六部脈俱浮大或沉或弦之  
 轉急也。有此證者，便須急服退陽散。退陽散五勝散，  
 一日或二日即安。若陰毒漸深，其候沉重，四肢逆冷，  
 腹痛轉甚，或咽喉不利，或心下脹滿，結硬煩渴，虛汗  
 不止，或時狂言，指甲面色青黑，六脈沉細而寒，一息  
 七至已來，有此證者，連於氣海，或關元二穴灸三二  
 百壯，以手足和煖為効。仍服金液丹，來麤丹，呷元散，  
 兼黑附子散，却陰散。若陰毒已深，病勢困重，六脈附  
 骨，取之有舉之即死，一息八至已上，或不可數也。至  
 此則藥何難為攻矣。但於臍中用葱熨法，或灼艾三  
 傷寒百問  
 二百已來，手足不溫者不可治也。如得手足溫，即服  
 前疏黃及熱藥助之。若陰氣散，陽氣來，即漸減熱藥，  
 而調治之。若陰毒結胃，返陰丹主之。少陰之為病，脈  
 微細欲吐，不吐心煩，但欲寐，五六日自利而渴，或小  
 便白，增損四順湯，黃連阿膠湯，吳茱萸湯，通脈四逆  
 湯，四逆散，枳椇甘草湯，半夏散主之。陰陽易之為病，  
 其人身體重，少氣令人陰腫入，腸內絞痛，婦人則裡  
 急腰勝連，腹內痛，名陰陽易也。燒裨散，蠶鼠糞湯，竹  
 皮湯，乾姜湯，青竹茹湯，當歸白朮湯主之。  
 人傷寒新差，味平復為交接成此，証  
 也。其毒衰氣度著於人，如換易之義。

第四十八問 三陰有可汗者乎  
 陰病不當發汗。發汗則動血，然太陰脈浮，少陰發熱，  
 亦須微微取汗，但不正發汗耳。大抵風寒中人，與營  
 衛相薄而發熱，又未嘗行諸汗藥，雖無陽證，須少汗  
 解逐之。王叔和云：表，中風寒入裡，則不消，故知初病  
 脈沉細數，雖表不消，蓋表，中風寒須宜溫覆，少汗而  
 解。桂枝湯，麻黃細辛附子湯，麻黃附子甘草湯，皆陰  
 證表藥也。  
 第四十九問 三陰有可下者乎  
 三陰大約可溫，然有積證者方可下也。何謂積證？太  
 傷寒百問  
 陰腹滿時痛，積積者，加黃，少陰口燥咽乾，或下利，  
 清水，心下痛，或腹滿，不大便，承氣湯皆積證也。  
 第五十問 三陰有發熱者何也  
 太陰厥陰皆不發熱，只少陰發熱，有二證，仲景謂之  
 反發熱，少陰初得病，有發熱，并裡寒，外熱，二證陰然  
 陰證發熱，終是不同。脈須沉，或下利，手足厥也。  
 得之命熱，脈沉者，麻黃細辛附子湯主之。少陰  
 病下利，清液者，黃芩湯主之。四逆湯主之。  
 第五十一問 陰證似陽，何以別之  
 陰發躁熱，發厥物極則反也。大率以脈為主。華佗云，  
 諸數為熱，諸遲為寒。為如此，最驗也。假令其人身體



微熱煩燥面赤其脈沉而微者皆陰證也身微熱者  
裡寒故也煩燥者陰盛故也而戴陽者下虛故也若  
醫者不着脈以虛陽上屬躁誤以為實熱反與涼藥  
則氣消成大病矣外臺秘要云陰盛發躁名曰陰躁  
欲坐非中宜以熱藥治之仲景少陰證而赤者四逆  
湯加葱白主之少陰病醫者強發汗血或  
從口鼻出者亦陰證似陽也

第五十二問陽証似陰何以別之

重陽必陰重陰必陽寒暑之變也假令手足逆冷而  
大便秘小便赤或大便黑色其脈沉而滑者皆陽證  
也四肢逆冷此是伏熱深故厥亦深速用大承氣湯

傷寒百問

加減劑下之汗出立差仲景所謂厥應  
下之者此也兼熱厥與陰

厥自不同熱厥者微厥即發熱若陰厥即不發熱四  
肢逆冷惡寒脈沉而細大小便滑泄矣

第五十三問身冷脈細沉疾煩躁而不飲水何也

傷寒陰盛陽者病人身冷脈細沉疾煩躁而不飲  
水者是也若欲引飲者非也不欲飲水者宜服霹靂  
散須臾躁止得睡汗出即差此藥通散寒氣然後熱  
氣上行汗出乃愈火熾散丹砂丸並主之

第五十四問手足逆冷者何也

厥者逆也陰陽不相順接手足逆冷也陽氣衰陰氣

盛陰勝於陽故陽脈為之逆不通於手足所以逆冷  
也傷寒熱多厥少者其病當愈厥多熱少者其病為  
進然有冷厥有熱厥當子細辨認冷厥者初得病日  
便四肢逆冷脈沉微而不數足多孳卧而惡寒或自  
引衣蓋覆不飲水或下利清穀或泄便自調清便自  
調即是大便或小便數外證多怪怪而靜脈雖沉實按之遲  
而弱者知其冷厥也四逆湯中湯冠脈四逆湯當  
用也熱厥者初中病必身熱頭痛又別有陽證  
至二三日乃至四五日方發厥兼熱厥者厥至半日  
即身熱蓋熱氣深則方能發厥須在二三日後也若

傷寒百問

微厥即發熱者熱微故也其脈雖沉伏按之而滑為

裡有熱其人或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便  
秘小便赤外證多昏憤者知其熱厥也白虎湯承氣  
湯隨証用之

仲景云傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱後

必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微應下之而反發  
汗者口傷赤爛熱厥當下故云厥應下之者  
若反發汗必口傷赤爛也又有下

證悉具而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥

醫人不識却疑是陰厥復進熱藥禍如反掌大抵熱  
厥須脈沉伏而滑頭上有汗其手雖冷時復指甲溫

須便用承氣湯下之不可拘忌也手足逆冷皆屬厥  
陰不可下不可汗



然有須下。有須汗。証者謂手足雖逆冷時有。若病人  
 溫時手足常心必煩。非正厥逆也。當消息之。若病人  
 寒熱而厥。面色不澤。胃味而兩手忽無。脈或一手無。  
 脈者必是有正汗也。多用綿衣包手足。令溫暖。急服  
 五味子湯。或兼與麻黃細辛甘草湯之類。服之。時  
 必大汗而解。失或傷寒厥逆而心下怔忡者。宜先治  
 水。當服茯苓甘草湯。却治厥。不爾水漬入胃。必下利  
 也。又有病人手足厥冷。脈乍結者。邪氣結在胃也。心  
 下滿而煩。飢不能食者。病在胸中。當吐之。宜瓜蒂散。  
 蓋病在胸中。亦能令人手足厥。但認脈乍結者是也。  
 陰虛則結。脈來緩時一止。若傷寒發厥。至七八日。膚  
 微紫。口結。主留滿煩躁。若傷寒發厥。至七八日。膚  
 傷寒百問 卷四

傷寒百問 卷四

病人有寒復發其汗。胃中冷。及因發汗後身熱重發  
 其汗。胃中虛冷。故長蟲逆上。烏梅丸主之。  
 第五十六問 兩感傷寒其治法如何  
 兩感者表裡俱病也。太陽與少陰為表裡。陽明與太  
 陰為表裡。少陽與厥陰為表裡。陰陽雙傳。臟腑俱病。  
 此為難治。六日而死矣。一日太陽與少陰俱病。則頭  
 痛口乾。煩渴而渴。二日陽明  
 與少陰俱病。則腹滿身熱。不欲食。譫言。三  
 日少陽與厥陰俱病。則耳鳴囊縮而厥。 仲景無治  
 法。但云兩感病俱作。治有先後。發表攻裏。本自不同。  
 尋至第三卷中言傷寒下之後復下利不止。身疼痛  
 者。急當救裡。宜四逆湯。復身體疼痛。清便自調者。急  
 當救表。宜桂枝湯。遂以意尋此。做効治。兩感有先後  
 宜先救裡。若陽氣內正。即可醫也。內才正。急當救表。  
 蓋內才為急。才溫內。則急救表。亦不可緩也。傷寒傳  
 為必不。死。設有諸異。說能消息。湯藥  
 死。不愈者。其有死者。乃醫殺之耳。

第五十七問 潮熱者何也  
 潮熱者。大率當下。仲景云。潮熱者。實也。大承氣湯證  
 內云。其熱不潮。未可與也。則知潮熱當下無疑矣。雖  
 然。更看脈與外證。脈若弦。若浮。及外證惡寒。猶有表  
 證。且與柴胡以解之。若腹大滿。不通者。可與小承氣。  
 微和。其胃氣。勿令大泄也。仲景云。日晡發熱者。為陽  
 明也。脈實者。大承氣。大柴



胡也，脈虛也。縱使潮熱，當行大承氣，亦須先少與小承氣。若不轉失氣，不可攻之。後發熱腹硬者，大柴胡下之。又有日哺發潮熱，已而微利者，又有微發熱潮熱而大便溏者，或潮熱而嘔者，皆當用小柴胡也。傷寒

第五十八問 頭疼者何也

頭疼者，陽證也。太陽證麻黃桂枝之若已發汗未發汗，頭痛如破者，連翹白湯服而不可止者，葛根湯白湯主之。陽明證頭疼者，胃寬故也。陽明氣寬，調胃承氣主之。少陽證小柴胡主之。太陰少陰經，但不至頭，唯厥陰經挾胃，屬肝絡膽循喉嚨上，頰頰連目出額故。太陰少陰並無頭疼之證。仲景只有厥陰一證。吳茱萸湯治乾嘔吐涎沫頭疼而已。大抵三陽者，頭疼為多也。若日次頭疼及發寒熱脈緊而不大，即是膈上有涎，宜用瓜蒂末一錢，暖水調下，吐涎立愈。又問病人頭疼鼻塞而煩者，何證也。此屬濕家頭

中有寒濕故鼻塞而頭疼，內瓜蒂末鼻中則愈。

第五十九問 身體痛者何也

太陽少陰厥陰皆有身體痛，當以外證與脈別之。太陽證表未解，脈浮緊者，當身體痛宜麻黃桂枝之類以汗之。風濕相搏，身痛者若脈沉而自利，身體痛者陰證也，急當救裏宜四逆湯。附子湯真武湯之類以溫之。陰毒身如散沙，當汗之。又問發汗後身疼痛，脈沉而遲者，當用何藥。仲景有桂枝加芍藥生薑人參新加湯蓋為此證也。小建中湯亦兼治汗後身疼，脈沉而遲者。若霍亂吐瀉止而身疼痛，少休者，少與桂枝湯則愈。

第六十問 汗出者何也

汗出有九證。唯太陽傷寒無汗，蓋營衛不和也。衛不和者，汗無汗，少陽病無汗，三陰病無汗，衛不和者，汗無汗也。先其時發汗，則愈。若生枝也，太陽病發熱汗出者，此為營衛不和也。中風有汗，發熱汗出者，此為風溫有汗。太陽病發熱而渴，不惡寒者，此為風濕有汗。關脈浮者，此為風濕有汗。汗自出者，惡熱者，此為陽明病有汗。然汗自出者，屬陽明也。汗出多而渴者，不可與五苓散，以汗多胃中燥，猪



本復利其小便故也故仲景云陽明病發熱汗多者急下之然陽明汗多急下小便自利者此為津液內竭不可攻之須自大便下之宜用蜜煎導法又有汗多而渴者亦不可下只與柴胡桂枝湯和其營衛以通津液恐大便亡陽有汗太陽汗出而惡寒當溫作燥屎攻之故也

**陽明有汗太陽汗出而惡寒**其經宜桂枝加附子湯寸俱發而汗出亡陽也此為少陰法當咽痛而復吐利其人熱不去內拘急四肢裏柔痙有汗太陽病發厥逆而惡寒者四逆湯主之

**柔痙有汗**太陽病發而不利者名柔痙霍亂有汗吐利汗出發熱惡寒逆者四逆散主之

**雖然少陰不得汗而亦有反自汗出之證**陽明病多汗也

**陽明病多汗而亦有反無汗之證**陽明病多汗也

行皮中熱者此以久煎故也又陽明病反汗汗但小便不利二三日嘔而熱手足厥者必苦頭疼若不致不嘔手足柔弱者頭不疼也陽明病無汗小便不利心中懊惱必當發黃

**傷寒百問**

第六十一問但頭汗出者何也

病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭者病者諸陽九頭汗出者五內乾枯胞中空虛津液少也

慎不可下下之者謂之裏虛然但頭汗出者有數證

被火而頭汗出者太陽中風以火發之邪風被火其氣發黃陽盛則為陰虛小便難陰陽俱虛身熱則結實但頭汗出而身熱者還宜桂枝湯以和之

或不大便久則譫語甚者至噤手足燥身熱衣被床小便不利其人不可治陽明發火額上微汗出而小

便不利者濕家為病但頭汗出者濕家宜微汗出而必發黃

濕家為病但頭汗出者

有熱下利者則嘔或腹滿小便不利不可下

利者下利之利不止者亦死

發黃但頭汗出者

病但頭汗出者此為發熱在裡身必發黃茵陳湯主之熱入血室而頭汗出者陽明病下血渴者此為熱入血

汗出而血虛者柴胡湯主之

**而頭汗出者**小柴胡湯主之

**能食但頭汗出者**仲景治法並無下之者也

第六十二問咽乾者何也

咽乾者慎不可發汗發汗則重亡津液也少陽證口苦咽乾者小柴胡主之少陰證口燥咽乾者急下之

又於他證可求之

傷寒又有口乾者太陽證其熱渴者烏梅散主之口乾喜唾者烏梅乾薑丸主之

**傷寒百問**

第六十三問咽喉痛者何也

咽喉痛有兩證脈浮數而赤斑斑如錦文咽喉痛者此陽毒也脈沉遲手足厥冷或吐利而咽中痛者此陰證也

病源云此為下部脈亦不至陰陽隔絕形寒於足少陰之絡毒氣上衝故咽喉不利或痛而生瘡也

傷寒脈陰陽俱緊及汗出者亡陽也此屬少陰宜咽痛而復吐利此候汗下薰窠俱汗出者某本粉傳之咽喉痛者桔梗湯猪膚湯半夏散通脈四逆去芍藥加桔梗湯主之

又有伏氣之病所謂非時



有甚寒中入伏氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈微弱法先咽痛似傷寒非喉痺之病必下利始用半夏桂甘湯次四逆散主之此病只一二旬便差古方謂之腎傷寒也

傷寒百問卷四終

傷寒百問

卷四終

傷寒百問

傷寒百問卷五

第六十四問嘔者何也

嘔屬胃足陽明經也足陽明之氣下行今厥而上行故為氣逆氣逆則嘔仲景云嘔多雖有陽明證慎不可下蓋為此也大抵胃中有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔黃連湯黃芩芍藥加半夏胃經汗下飲水多冷陽氣微胃中虛冷亦嘔理中湯茯苓生薑湯干姜黃芩黃連人參湯諸數為熱諸遲為寒當以脈別之然脈氣虛則脈數也數為客陽不能消穀胃中虛冷脈亦數當問病人曾與未曾汗下更以餘證別之嘔而發熱者小柴胡

傷寒百問

卷五

第六十四問

也太陽病過經十餘日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔止少安若其人復嘔心下急鬱鬱微煩者與大柴胡下之即愈嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之嘔而發渴者猪苓湯也先嘔却渴者此為欲解急與之先渴却嘔者為水停心下此屬飲家仲景云本渴飲水而嘔者柴胡不可與也宜治腸間有水小半夏加茯苓湯孫真人云凡嘔家多服生薑此是嘔家聖藥若少陰厥陰發嘔則外證與脈皆寒也灸厥陰白通湯真武湯附子加生薑湯四逆加生薑湯主之傷寒差後嘔者有餘熱在胃脫也枳朮丸竹葉加生薑



湯主之若病人直患嘔吐而後脚弱或疼乃是脚氣入心也當作脚氣治之金匱方治脚氣衝心用礬石二兩漿二升水煎三五沸浸

第六十五問吐者何也

吐有冷熱二證脈數引飲食已即吐手心熱胸膈煩躁以熱在胃脘細辛半夏湯黃連湯竹葉湯乾葛半

夏湯五苓散主之水道不利故也宜服五苓散注按道心數注若本皆行小便則心利也又曾經汗下胃中虛冷食久反出理中湯去木加生

姜也甘草乾姜湯小半夏湯仍吐不止者半碗來

傷寒百問 卷之五

避丹溫胃丸最良若病到陰經須臾須利手足厥自利脈沉而遲咽痛吐四逆湯吳茱萸湯乾姜黃芩黃連人參湯主之又問小兒吐者何也小兒尋常吐逆

第六十六問乾嘔者何也

乾嘔者今人所謂嘔是也傷寒乾嘔者熱氣在於脾胃也胃中畜熱熱氣上薰則心下痞結故乾嘔也桂枝小柴胡小柴胡十棗甘草瀉心湯若少陰證胃氣虛亦乾嘔當溫之也白通四逆茱萸湯金匱要略半

夏乾姜散橘皮湯乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之

第六十七問咳嗽者何也

傷寒咳嗽有兩證有太陽證咳嗽小青龍小柴胡是也亦有少陰證咳嗽真武湯四逆湯猪苓湯是也太陽證熱在上焦其人必飲水水停心下則肺為之

浮肺主於欬水氣乘之故咳嗽小青龍湯加五味子細辛干姜湯頭疼發熱而嗽者小柴胡湯去人參加大棗生薑五味子乾姜肺寒咳嗽聲重多涕者溫肺湯降氣湯若少陰證咳嗽四支沉重痺痛小便不利

傷寒百問 卷之五

自下利而咳真武湯加五味子細辛乾姜也四逆厥逆腹中痛或泄利而咳四逆湯加五味子乾姜也下利而喘煩渴不得眠而咳猪苓湯主之天行時氣咳嗽外臺千金方詳

第六十八問鼻衄者何也

衄血者熱證也火乘金而血上溢也傷寒太陽證衄血者陽氣重故也仲景所謂陽盛則衄若脈浮緊無汗脈澀不中病其人發煩日脈劇者必衄小衄而脈尚浮者宜麻黃湯也衄後脈已微者不可行也若脈尚浮自汗服湯不中病桂枝證尚在必須頭疼甚而致



衄小衄而脈尚浮者再與桂枝也。衄後脈已微者不可行也。大抵傷寒衄血不可發汗者為脈微故也。苦參湯地黃湯薤金散黃芩芍藥湯主之。其脈細小加嗽者黃芩芍藥散主之。服湯已衄血不止者用茅花湯即差。又法用好緊白龍骨不以多少研令極細塞鼻中血止則已。然不若茅花之妙也。傷寒之病差後小勞便鼻衄吐衄散主之。又問陰証有衄血者乎。陰証自無熱何緣有衄。若少陰病但厥無汗強發之必動血。未知從何道出。或從口鼻或從耳目是謂下厥上竭為難治。

傷寒百問 卷之五

第六十九問吐血者何也

傷寒吐血由諸陽受邪熱初在表應汗而不發汗熱毒入深結於五藏內有瘀積故吐血也。犀角地黃湯三黃丸主之。又問非傷寒證吐血者其治法如何。哈粉散不過再服。若虛勞肺嗽吐血羸瘦戶苦咽乾又不可服涼藥者黃耆湯主之。

第七十問渴者何也

脈浮而渴屬太陽傷寒表不解心下有水氣而渴者小青龍去半夏加瓜樓根太陽病服桂枝大汗出後煩渴者白虎加人參若脈浮小便不利微熱消渴者

五苓散傷寒四五日身熱惡風腸下滿手足溫而渴者小柴胡去半夏加人參栝樓根主之。太陽證身熱灼熱而渴者屬風溫也。於風溫中可求之。有汗而渴屬陽明陽明病腸下硬不大便而嘔舌上白胎而渴者小柴胡去半夏加人參栝樓根陽明病但煩汗出小便不利渴引水漿身必發黃宜茵陳湯自利渴屬少陰傷寒熱入於藏流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲少陰下利飲而嘔渴猪苓湯主之。下利欲飲水者以有熱故白頭翁湯主之。成太陽證無汗而渴者不可與白虎湯仲景云渴欲飲水表

傷寒百問 卷之五

證者白虎加人參湯脈浮發熱無汗是表未解也不可與白虎也。五苓散小青龍小柴胡。陽明證汗多而渴者不可與五苓散。汗多胃中燥者芒苈竹葉湯與之。仲景云陽明病發作有時汗出多者急下之。然太陽病渴終不可與白虎耶。太陽證得汗後脈洪大而渴者方可與之也。陽明病渴終不可與五苓耶。陽明證小便不利汗少脈浮而渴者方可與之。此皆仲景之玄旨也。凡病非大渴不可與水若小渴咽乾者少呷滋潤之令胃中和若大渴煩燥甚能飲一斗者與五升飲之若全不與則乾煩無由作汗發喘而



死常人見因渴飲水得汗小渴遂劇飲之致停飲心下滿結喘死者甚衆當以五苓散或陷胃丸與之若陽毒倍常躁盛大渴者黑奴丸主之中暑伏熱深累取不差其人發渴不已酒蒸黃連丸主之又問小兒非傷寒證瀉利引飲不已百方治之不差奈何此疳證也急作疳治之稍緩即唇齒俱落溫疳丸麝香丸主之

第七十一問煩者何也

傷寒煩者由陰氣少陽氣勝故熱而頁在太陽證脈浮者宜汗麻黃湯桂枝大青龍湯柴胡桂枝湯主之

傷寒百問 卷之五

然太陽證自汗小便數心煩即不表也在陽明證脈實者宜下大柴胡調胃承氣小承大承氣主之然病已差尚微煩必大便硬當問其小便日幾行若小便少津液當還入胃不須攻也在少陽證當和表小柴胡去半夏人參加枳椇根柴胡桂枝乾姜湯若傷寒六七日無大熱其人煩燥者此茯苓湯黃連阿膠湯上之凡病傳陰經須吐利而煩黃連阿膠湯止煩兼利也然有汗之而煩者服桂枝湯大汗出後病不解脈洪大者白虎加人參湯發汗已脈浮數煩渴者五苓散陽明病本有汗出醫更發汗大

便微煩者以亡津液胃中有燥矢也當小便不利苦發汗後復煩脈浮者更可發汗有下之而煩者茯苓四逆湯乾姜附子湯梔子厚朴湯梔子乾姜湯柴胡桂枝乾姜湯主之有發汗吐下已後府藏俱虛而熱氣不散虛煩者梔子豉湯梔子甘草湯竹葉湯又有病已解而又煩者此由病新差不勝殺損救則愈若吐利脈微發厥而煩者當於少陰中求之黃連阿膠湯白通加豬膽湯猪苓湯猪膚湯竹葉湯

第七十二問躁者何也

躁有陰證有陽證當子細辨之脈洪實或滑促大熱傷寒百問 卷之五 大便秘小便赤者陽躁也脈微細足逆冷大小便利者陰躁也太陽證煩躁大率宜汗少陽中風見寒脈傷寒見風脈汗不出加煩躁者大青龍主之太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者少少與之冷胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴五苓散主之仲景云傷寒得病无熱俱狂言煩躁不安精采不與人相當勿以火導之但以五苓散二文目服之當與新汲井水飲一升許即令指刺喉吐去之病隨手愈若不能吐者勿強與水水停則結心下當以瓜蒂散吐之陽明證煩躁大率宜下病人不大



便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥矢故也  
 得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩燥心下硬至四  
 五日雖飲食以小承氣少少與微和之令小安陽毒  
 散亦主熱病心躁陰證煩躁宜急溫之陽氣弱為陰  
 所乘而躁乾姜附子湯茯苓四逆湯吳茱萸甘草干  
 姜湯主之昔人有患傷寒身冷脈微手足厥而躁甚  
 醫以艾湯調硫黃末數錢與之即時安臥良久睡起  
 汗出而愈傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶不至誤入  
 急用附子一枚可半兩者立傍作四片三姜一大塊  
 勞作三片如中指長糯米一撮三味以水一大煎

傷寒百問 卷之五

取六分去滓如人體溫頻服之厚衣覆蓋汗出不  
 出候心神定即別消息服藥慎不得身冷水如渴將  
 滓再煎與喫今人多用有效若傷寒脈微而厥至七  
 八日膚冷而躁無時暫安者此為藏厥仲景无治法  
 第七十三問發黃者何也  
 病人寒濕在裏不散熱畜於脾胃腸理不調瘀熱與  
 宿穀相搏鬱蒸不消化故發黃然發黃與瘀血外證  
 及脈俱相似但小便不利為黃小便自利為瘀血發  
 黃之人發熱引飲脈浮大滑實而緊數若瘀血證多  
 發狂大便必黑此為異耳凡病人身體發熱渴引水

漿以其於熱小便不利頭面汗出齊頸而止如此必  
 發黃茵陳蒿湯五苓加茵陳散枳殼大黃散病人服  
 湯得小便如皂莢汁赤一宿腹減則黃從小便出也  
 古人云凡治濕之病不利小便非其治也梔子蘗皮  
 湯麻黃連翹赤小豆湯主之又方傷寒欲發黃者急  
 用瓜蒂末口含水插入鼻中出黃水甚驗便用五苓  
 茵陳湯尤良茵陳末十分五苓末五分又問白虎証身體熱煩渴  
 引飲小便不利何以不發黃也答曰白虎証與發黃  
 證相近但遍身汗出此為熱越必下下白虎湯主  
 之夫抵發黃證須是頭面汗出頸以下都无汗汗外

傷寒百問 卷之五

臺黃疽部并千金治黃家小便不利而赤色自不出  
 此為表和裏實宜下之大黃黃蘗枳實芍藥湯主之  
 漢贊南方暑濕近夏瘴熱古人以黃為瘴濕熱相搏  
 民多病瘴甚為附腫也  
 第七十四問發斑者何也  
 發斑有兩證有溫毒發斑有胃爛發斑也溫毒發斑  
 者為冬月溫暖人感乖戾之氣未即病發至春或被  
 積寒所折毒氣未得泄至天氣喧熱溫毒始發則肌  
 肉斑爛瘡疹如錦紋而咳其治法在溫毒門中若胃  
 爛發斑者傷寒未下即發斑下早亦發斑蓋不當下



而下之熱米，虛入胃，當下而失下，則胃熱不得泄，所以皆發斑也。凡發斑不可用表藥，蓋表虛裏實，若發其汗，重令開洩，更增斑爛，表虛故也。玄參升麻湯大青龍四物湯紫雪化斑湯白虎加人參湯龍腦丸加人參名化斑湯，出其書中，更與紫雪大妙，龍腦丸亦佳也。傷寒發斑無它，只是熱氣在藏府攻腸胃，裏先而成，瘡方發出，外赤者易治，黑者難治，蓋毒氣入胃深故也。

第七十五問發狂者何也

發狂有三證：陽毒發狂，畜血發狂，心火發狂。其外證與脈皆不同。病人面赤，咽痛，脈洪，上瀉數，大便小，便赤，煩躁，狂走，或見鬼神者，陽毒也。桂枝大黃湯浴腸湯黑奴丸主之。病人无表證，不發身熱，胸腹滿，唇燥，但欲飲水，不欲噦，其脈微而沉，但如熱狀，煩滿，口燥，其脈反無熱，此為陰伏，是瘀血也。小腹硬滿，小便反利，大便必黑，身黃，發狂，血證諦也。太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，其血必自下，下者愈，須解其外，宜桂枝湯。血上逆，則喜忘，血下蓄，則內爭，甚者抵當湯。輕者犀角地黃湯芍藥地黃加大黃黃芩湯，桔梗大黃湯主之。大抵當汗，不汗，熱蓄在裏，熱化為血，其人喜忘而如狂，須由抵當湯取盡黑物為效，未盡再服。

若火邪發狂，醫以火於臥床下，或周身用火，迫劫汗出，或熨而成火邪，其人亡陽，煩躁驚狂，卧起不安，桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯，桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。凡灸及燒針後，證似火劫者，並用火劫治之。金匱風引湯尤良。柴胡加龍骨牡蠣湯更捷。

第七十六問讞語者何也

病人言語錯謬，有虛實二証。鄭聲屬虛，常用溫藥治之。譫言屬實，當行大柴胡承氣湯，服承氣湯而讞語不止者，即勿服，不爾再服之。世多不辨，自謂之狂言亂道，尤不可不別也。仲景云：實則譫語，虛則鄭聲。蓋譫者，更須用外證與脈別之。若大小便不利，手足冷，脈微細者，必鄭聲也。大便秘，小便赤，手足溫，脈盛實者，必譫語也。以此相參，然後用藥，萬全矣。然有火迫讞語者，有三陽合病讞語者，白虎湯證有，胃實讞語者，大承氣調胃承氣湯，玄參升麻湯主之。外臺承氣湯尤捷，無芒硝有已得汗，身和讞語者，柴胡桂枝湯主之。此為津液不和，又小柴胡去人參，加桂和，其管衛以通津液，自愈。恐人作燥屎攻之，慎不可下也。有胃滿煩驚，小便不利，讞語者，柴胡加龍骨牡蠣湯有，婦人熱入血室。



譏語者婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譏語如見鬼狀者此為熱入血室无犯胃氣及上二焦速用小柴胡治之若行湯遲熱入胃令津燥上焦中焦不榮血成結胃狀須當針期門也婦人中風發熱惡寒經水適來七八日熱除而脈遲身涼胃腸下滿如結胃狀譏語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之已上二焦熱結在期門也若犯胃氣晝夜不語喜忘小腹滿小便利屬抵當湯證有下利而譏語者調胃承氣湯小承氣湯大便利者貞連解毒湯傷寒譏語妄語自當有熱而反四逆脈沉細者

傷寒百問

卷之五

第七十七問

病人頭疼身熱口燥但欲水不欲食何也

病入頭疼身熱口燥但欲水不欲食必嘔也黃芩湯主之若胃滿唇痿舌青口燥但欲漱水不欲嚥無寒熱為有瘀血必發狂也輕者犀角地黃湯芍藥地黃加大黃黃芩湯甚者抵當湯主之

第七十八問腹脹滿者何也

太素云胃中寒則腹脹素問曰藏寒生滿又曰藏火不及寒乃大行民病驚油腹滿食飲不下寒中腸鳴以此觀之腹脹滿者大率寒證也桔梗半夏湯尤良仲景太陽證發汗後腹脹滿者厚朴生姜半夏甘草

人參湯下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯若陽明證腹滿而喘大便硬有潮熱者大承氣湯主之吐後腹脹滿者與調胃承氣湯少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜大承氣湯厥陰証下利腹滿身體疼痛者先溫裏乃可攻表溫裏四逆湯攻表桂枝湯

第七十九問腹脹者何也

難經云痛者為實故有仲景桂枝加芍藥湯痛甚者加大黃大抵腹滿而痛者此為實也宜加芍藥湯即是小建中也太陰脈弱自利設行大黃芍藥者

傷寒百問

卷之五

第七十八問

宜減之其人胃虛陽氣易動故也下利者先煎芍藥十餘沸雖然腹脹有二證有虛痛不可不辨也人脈弦腸鳴泄利而痛者虛痛也當行小建中湯四逆加附子湯真武湯通脈四逆加芍藥湯四逆散桃花湯也小建中湯偏治腹中虛寒補氣血尤止腹痛大抵腹脹按之不痛者為虛腹滿時減復如故者為寒虛寒之證當用溫藥按之而痛大便不通為實當用大黃輩下之小建中外臺治虛勞腹痛遺失精四支酸疼手足煩熱咽乾口燥兼治婦人小腹痛仲景云陽脈滿陰脈弦當腹中急痛宜與小建中湯



實痛者小柴胡去黃芩加芍藥主之此二藥皆主腹  
痛關脈實腹滿按之痛者實痛也當行小柴胡去黃  
芩加芍藥湯桂枝大黃湯加黃連湯大承氣湯也  
者煩是心胃連膈腹大段在悶疼痛坐卧不安胃  
悶喘急用承氣急下之

第八十問痞者何也

病發於陽在表下之早因為結胃發於陰發於  
早因為痞心下滿而硬痛者為結胃但滿而不痛者  
為痞痞結胃與痞似是而非若同可下以痛不痛  
為異耳醫不審一有差互立致人死為知是痞先

傷寒百問

卷之五

十四

用桔梗枳殼湯桔梗枳殼但行氣下膈先服之心不  
驗也結胃與痞關脈須皆沉若關浮可下仲景  
云心下痞按之濡其關脈浮者大黃黃連瀉心湯主  
之痞有二種有滿而硬者桂枝人參湯大柴胡湯瓜  
蒂散甘草瀉心湯小柴胡湯十棗湯旋覆代赭湯陽  
明病心下硬滿不可攻之利不止死有滿而濡者半  
夏瀉心湯大黃黃連瀉心湯小柴胡加干姜湯若不  
滿不便但覺心下妨悶者非痞也謂之支結心下支  
結小柴胡加桂湯主之胃腸滿微結小柴胡加干姜  
牡蠣湯主之更隨證看病冷熱於瀉心湯選用冷證

如附子瀉心湯理中湯之類熱證如大黃黃連瀉心  
湯五苓散之類凡痞與瀉心湯痞不解其人渴而口  
燥煩小便不利者五苓散主之腸下痞硬者小柴  
胡也若胃下不快者於小柴去枳加牡蠣主之然有  
下利而心下痞者十棗湯大柴胡湯生薑瀉心湯甘  
草瀉心湯赤石脂禹餘糧湯桂枝人參湯有惡寒而  
心下痞者附子瀉心湯病未解者桂枝湯大黃黃連  
瀉心湯仲景云太陽陽明醫發汗遂發熱惡寒因復  
下之心下痞表裏俱虛陰陽並竭無陽則陰胃煩面  
色青黃虛瞶者難治今微黃手足溫者易愈也

傷寒百問

卷之五

十五

病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出惡寒不嘔且心  
下痞者此以醫下之也有嘔吐而心下痞者大柴胡  
湯甘草瀉心湯十棗湯小柴胡湯小半夏加茯苓湯  
以解問有頭疼而心下痞者及汗出而心下痞者  
十棗湯凡痞服瀉心湯不愈乃可用大陷胃湯下之  
傷寒百問卷五終



傷寒百問卷六

第八十一問結胃者何也

病發於陽及下之熱入因作結胃傷寒在表為醫被  
 誤踈轉熱氣乘虛而入痞結不散便成結胃若已轉  
 了初未成結胃急頻與理中湯自然解了更不作此  
 証蓋理中治中焦故也此古人亦說不到後來人消  
 息得之若大段轉損有厥證者兼與四逆湯便安胃  
 中雖和傷寒熱未退者即候口數足可下却以承氣  
 再下之蓋前時下得未足故也其口數緊滿按之  
 石硬而痛項強如柔痙其脈寸口浮關尺皆沉與沉  
 傷寒百問 卷之六

傷寒百問

卷之六

結胃

如神應手而愈然結胃有三種有大結胃不按而痛  
 為大結胃大陷胃湯主之結胃九最好較穩兼九子  
 經宿乃下其陷胃湯恐緊有小結胃按之而痛為小  
 結胃小陷胃湯主之有水結在胃腸間亦名結胃但  
 結胃尤大熱者以水結在胃腸間但頭汗出者大陷  
 胃湯主之又有一寒熱二證有熱實結胃用大小陷胃  
 丸有寒實結胃寒實結胃無熱證者三物白散主之  
 加減理中丸尤宜用之近世多行金針丸用硫黃陽  
 起石者若寒實結胃行之或有差者實結胃行  
 之必死也又見雜方云得結胃傷寒嘔吐不止小腸  
 傷寒百問 卷之六

傷寒百問

卷之六

結胃

痞塞諸藥無效但口中微有氣者可於臍中灸之並  
 錄于此以備緩急而已巴豆七粒鹿皮二寸  
 研極細入黃連末研勻按作餅子按臍中以艾壯拍  
 頭灸之輕者一炷重者不過二炷灸熱透腹中作  
 後常服和氣藥又問藏結者何也藏結者死仲  
 景無治法大抵藏結其證如結胃狀飲食如故時時  
 下利腸脈浮關脈小細沉緊名曰藏結舌上白胎滑  
 者難治也又曰藏結無陽證不往來寒熱其人反靜  
 舌胎滑者不可攻也二者病人脇下痛有痞連在臍  
 傍痛引小腹入陰筋者亦名藏結死不治是所醫人  
 可留心也



第八十二問喘者何也

華佗云盛而為喘，減而為枯。大凡發喘者，氣有餘故嘶聲，傷寒只有太陽陽明二證。太陽喘須表葛根黃芩湯，麻黃湯桂枝加厚朴杏子湯，麻黃杏子甘草石膏湯，麻黃杏仁湯，陽明病須下，腹滿而喘，有潮熱者大承氣主之。然陽明中寒脈浮，无汗其人必喘，亦發汗則愈。麻黃湯主之。又有發汗後飲水多必喘，以水停心下，腎氣乘心故喘也。小青龍去麻黃加杏仁，若脈浮手足微厥，面垢唇青昏憤而帶足，為陰陽不和。尚阻升降宜服五味子湯。陰證發喘則脈先起矣。

傷寒百問

卷之六

三

陰毒喘促者與來甦丹入口便定

第八十三問咳逆者何也

咳逆者古人所謂噦者是也。傷寒咳逆雖仲景書中不說，非無也。孫真人云咳逆遍替方論無此名稱，深窮其狀咳逆者噦逆之名。大抵噦者胃中虛冷故也。橘皮竹茹湯，橘皮湯，半夏生姜湯，退陰散，桂木散並主之。服藥無效者，雄黃末二錢用酒一盞煎七分急令病人鼻嗅其熱氣即止。又方用硫黃乳香等分為末以酒煎更令嗅之亦妙法也。若咳逆百方不差每咳至八九聲相連收氣不回至於驚入者灸之必

愈其法婦人屈乳頭向下，盡處骨間灸三壯。丈夫及乳小者以一指為率，正與乳相直間陷中動脈處是也。男左女右，艾炷如小豆許。

第八十四問嗜卧者何也

風溫為病多眠，必與萎蕤湯主之。太陽陽明嗜卧皆可與小柴胡，若少陰病脈微細但欲寐急作四逆湯，復其陽不可緩也。非特少陰也。熱病得汗身冷脈細欲絕，其人已安靜但昏沉喜睡亦急與四逆，重冷手足溫不爾，發寐而死。若狀如傷寒，口重忽喜眠，須看上下唇，上唇有瘡虫蝕五莖，下唇有瘡虫蝕下部當作狐惑治之。

傷寒百問

卷之六

第八十五問不得眠者何也

病人未得汗，若心煩不得眠，欲飲水者當稍與水，令胃中和則愈。若脈浮小便不利五苓散主之。傷寒二三日以上心煩不得眠，黃連阿膠湯主之。若發汗若吐若下後虛煩不得眠，劇則反覆顛倒心中懊憹者，梔子湯。若少氣腹滿者，梔子四逆湯。若乾嘔者，梔子生姜湯。若腹脹滿者，梔子厚朴湯。下後復發汗，晝日煩燥不得眠，夜則安靜，脈沉微身無大熱者，乾姜附子湯主之。大熱煩躁錯語不得眠，黃連解毒



湯汗解因飲酒復劇煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得  
回亦宜服之傷寒吐下後心煩乏氣晝夜不眠酸棗  
湯若少陰証下利而渴不得眠猪苓湯 又問傷寒  
差後不得睡者何也蓋熱氣未散與諸陽相并陰氣  
不復所以仍不得睡黃連芍藥黃芩阿膠湯主之

第八十六問大便溏者何也

病人腸中有寒則大便鴨瀉蓋瀉者胃中冷水穀不  
別故也華佗云寒則瀉熱則燥仲景曰初後瀉有  
二證小便不利小便少皆為水穀下

第八十七問下利者何也

傷寒百問 卷之六

五十二問

傷寒下利有三種太陽陽明合病以下利為根湯主  
之太陽少陽合病自下利黃芩湯主之黃芩加半  
夏生姜湯陽明少陽合病必下利陽明者土其脈長  
太少陽者木其脈弦若合病土被木賊更下利為胃  
已困若脈不弦者順也為土不負負者死脈滑而數  
者有宿食當下之大承氣湯其餘下利皆經汗下後  
證也太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促表未  
解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之傷寒醫下  
之續而下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼  
痛清便自調者急當救表救裏四逆湯救表桂枝湯

傷寒十三日不解胃腸滿而疼身痛必發潮熱已而  
微利此本柴胡下之不得利今反利者知醫以九子  
藥下之非其治也潮熱者實也先以小柴胡湯解外  
後以大柴胡湯下之傷寒十三日過經譫語者以有  
熱也當以湯下之若小便利痛大便當硬而反下利  
脈調者知醫以九子藥下之若自下利者脈當微弱  
今反和者此為實也調胃承氣主之太陽中風下利  
嘔逆表解者可攻之其人漿漿汗出發作有時頭疼  
心下痞硬滿引脅下痞乾嘔短氣干嘔惡寒者此  
表解裏未和也十棗湯主之傷寒汗出解之後胃中

傷寒百問 卷之六

五十三問

不和心下痞硬乾噎食臭腸下有才氣腹中雷鳴下  
利者生姜瀉心湯主之傷寒中風下利之其人下  
利且數十行穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔  
心煩不得安依見心下痞謂病不盡復下之其痞益  
甚此為結熱但以胃中虛客氣上逆故使痞也甘草  
瀉心湯主之傷寒服湯藥下利不吐心下痞結者瀉  
心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益  
甚速調治中焦而利下焦赤石脂禹余糧湯主之復  
不止者當利其小便五苓散主之太陽病外證未除  
而數下之遂腸契而利利不止心下痞硬表裏不解



者桂枝人參湯主之傷寒發熱汗出而後心下痞不嘔吐而下利者大柴胡湯主之若病傳到陰經不吐即利但自利不渴屬太陰自利而渴屬少陰宜先用黃芩阿膠湯止煩兼預斷利也大抵下利須看脈與外證下利脈大者虛也下利十餘行脈反實者死下利脈數而滑者有宿食也下之愈脈遲而滑者實也其利未得便止當更下之下利三部脈皆平按其心下硬者急下之三陽下利身熱太陽下利手足自溫少陰厥陰下利身不熱雖然自利可下少陰然三陽下利欲飲水者乃有熱也三陰下利宜溫之然少

傷寒百問 卷之六

陰自利清水心下痛口乾燥者却宜下之及陰下利譏語者有燥屎也亦須下之不可不知七要之腸熱利者臍下必熱須赤黃色及腸間津汁垢膩寒毒入胃則臍下必寒須黃白色或青黑或下利清穀寒則用四逆湯埋中湯當歸四逆湯四逆加薤白湯熱則用黃蘗湯調中湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白湯黃芩芍藥湯赤石脂丸下膿血者少陰證桃花湯熱毒便血者勝金散檗皮湯小兒下血黃蘗散須子細辨識陰陽勿令差互也

第八十八問數日不大便又有大便難又有大便

硬又日有燥屎何也

傷寒數日不大便大便難及有燥屎皆知用大柴胡大承氣小承氣攻之然仲景論大便不通亦有數種不可攻者不可不別也陰結者不可攻也若陰結者何也答云其脈沉而遲不能食身重大便難名曰陰結陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬不可攻之當須自大便審導之亦土瓜根及大猪膽汁皆可為導陽明病腸下硬滿不大便而嘔舌上白胎者不可攻之宜與小柴胡二三劑得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解陽明病不大便六

傷寒百問 卷之六

七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初硬後必溏不可攻之攻之心腹滿不能食也大便堅小便數不可用承氣湯攻之跌陽脈浮而濡浮則胃氣強滿則小便數浮濡相搏則大便硬其脾為約麻子仁丸主之千金云脾約者大便堅小便利宜枳實丸太陽陽明者脾約是也大便硬小便少者不可攻也恐津液還入胃必先硬後溏也小便自如乃可攻之當問其小便日幾行若未小便日三四行今已再行故知大便不久出以此知古人慎用轉藥如此金



匱云傷寒病六七日雖不大便傳而无所苦者尤不可下下之早熱氣乘虛入胃輕者難愈重者必死也

第八十九問小便不利者何也

傷寒發汗後汗出多亡津液胃中極乾故小便不利醫見小便不利往往利之誤矣類纂云胃中乾則無小便慎不可利故仲景云下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈或曰小便終不可利耶曰不然此謂汗後亡津液耳若傷寒引飲下焦有熱小便不通脈浮者五苓散散也表不解心下有水發熱而咳小腹滿小便不利者小青

傷寒百問 卷之六

九十一問壞傷寒何也

龍湯去麻黃加茯苓也傷寒无汗身熱發熱頭項痛小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮也嘔而發熱身熱滿心下怔忡小便不利者小柴胡湯去黃芩加茯苓也少陰病小便不利者四逆湯加茯苓也若陰毒傷寒加以小便不通及陰囊縮入小腹絞痛欲死者須是大段急灸之仍可與追陰丹當歸四逆加茱萸姜湯慎勿與尋常利小便藥此是陰氣在小腹故也世醫見小便不通便以瀝及燥熱藥於臍下壓欲望小便通不知陰氣在小腹之間致被熱物壓蒸无處出得即奔上心往往有死者大抵風濕與發黃

以利小便為先風濕甘草附子湯發黃茵陳湯陽明汗多以利小便為戒表虛裏實是故汗多自然无小便也 又問小便難者何也陰虛故也陰虛陽必濇之是以難也

第九十問小便自利者何也

太陽證下焦有熱小腹必滿應小便不利而小便反利者下血證也抵當湯主之陽明證自汗出應小便少而小便自利者津液內竭也大便雖硬不可攻之當用蜜煎導之少陰證四逆而小便自利者虛寒證也四逆湯真武湯加茯苓主之 又問小便數者何

傷寒百問 卷之六

九十二問小便數者何也

也腎與膀胱俱虛而有客熱乘之也二經既虛致受於客熱虛則不能制水故令數小便熱以水行流澆則小便不快故令數起也診其跌陽脈數胃中熱即消穀引飲大便必硬小便即數也

第九十一問壞傷寒何也

傷寒已經發汗吐下溫針仍不解小柴胡證罷者即名壞病仲景云太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者為壞病桂枝不可與也當知何逆隨證治之又云太陽病不解轉入少陽者腸下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下其脈沉緊者可與小柴



胡湯其小柴胡證罷者為壞病蓋証候不順又感異氣變成此証以時令寒暑燥濕風氣不節脈息與少陽相異證候與傷寒不同明當消息其由以法治之又傷寒過經再受熱邪留畜藏府病候多變而久不差陰陽無復綱紀皆名壞傷寒無憂散知母麻黃湯鱉甲散黑奴丸大黃桂心湯主之

第九十二問狐惑濕匿傷寒何也

狐惑與濕匿皆蟲證也初得狀如傷寒或因傷寒變成斯疾其候默默欲眠目不能閉起居不安蟲蝕其喉為惑其聲啞蟲食下部為狐也狐惑之病咽乾惡

傷寒百問 卷之六

飲食面目乍赤乍白作黑是其證也甘草瀉心湯主之

白湯雄黃蒸法赤豆當歸散黃芩散王王之若病人齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四支沉重忽忽喜眠者皆為蟲五藏及食其肛須頻看其上下唇上唇有瘡蟲食其藏也下唇有瘡者蟲食其肛也殺人甚急治醫桃仁湯黃連犀角湯雄黃散散主之

第九十三問百合傷寒何也

百脈一宗悉致其病無復經絡也其狀欲食復不能食常默默欲得卧復不卧欲出行復不能行飲食或有美時或有不快食時如強健人而卧不能行如有

寒如無寒如有熱如無熱口苦小便赤百合之病諸藥不効藥入即吐利如有神靈此多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯疾也百合知母湯滑石代赭湯鷄子湯地黃湯百合洗方栝樓牡蠣散滑石散主之千金曰百合病見在於陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗為逆也見在於陽而攻其陰則陽不得解也復下之其病不愈金匱要略云百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆其病難愈

傷寒百問 卷之六

第九十四問霍亂何也

霍亂有二証嘔吐而下利名曰霍亂不止不利腹滿煩悶絞痛短氣名曰乾霍亂嘔吐下利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸或有寒腹滿痛或四支拘急或下利轉筋理中加附子一枚生用作湯服吐利汗出發熱惡寒四支拘急手足厥冷者四逆湯吐利止而身體痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯少和之中暑霍亂非時吐利心腹撮痛大渴煩燥四肢厥逆冷汗自出兩脚轉筋宜服無比香薷散須井中沉冷極冷頻服之乃効扁豆湯治中湯四順附



子湯小交湯皆妙。乾霍亂者冷氣搏於脾胃，飲食不消，但腹滿煩悶絞痛短氣，其脾胃先夾食，故不吐利。柳宗元鹽湯紫蘘丸主之。

第九十五問傷寒勞復食復何也

傷寒病新差，津液未復，血氣尚虛，勞動早則病復成。蓋勞則生熱，熱氣乘虛，入經絡故病復如初。脈浮者以汗解，沉緊者宜下之。渴者五苓散，大抵勞復不宜大段發汗，亦不宜大段下之，為氣血先已虛也。小柴胡湯、豆豉湯尤良。梔子桂枝湯、枳實梔子湯、竹葉石膏湯皆可選用之。熱病已胃氣尚弱，不能節飲食。

傷寒食復減食則愈梔子桂心湯枳實梔子加大黃湯也

陽明病能食名中風，不能食名傷寒。不思食不足怪也。傷寒是變，與雜病不同。病人不思食，醫人謂脾胃不和，便服和胃藥，遂令胃熱，疾勢轉增。凡傷寒无和胃之理。

第九十六問傷寒不思食何也

第九十七問傷寒不得用九子藥者何也

寒邪流傳經絡，无有定舍，隨經蕩滌，猶恐不及。况熱氣無積聚，可破无堅癥，可消固不當用九子也。仲景

云醫以九子藥下之非其治也。又問仲景有陷胃丸、麻子仁丸何也。陷胃丸結胃證也。麻子仁丸脾約證也。

第九十八問妊婦傷寒其治法如何

妊婦傷寒，白朮散、葱白散、前胡散、大黃湯、知母湯、大青龍湯、地黃湯也。黃龍湯尤小柴胡去半夏名黃龍湯蓋為妊婦而去也。主產後傷寒，熱入胞宮，寒熱如瘧，或狂言見鬼，產前先安胎產後先補益。次服傷寒藥，若病稍退則止，不可盡劑為戒。安胎四物湯、補益當歸建中湯。

第九十九問小兒傷寒其治法如何

小兒傷寒如大人法，但用小分劑，藥性微冷耳。小兒病證未會說，難辨當子細別之。尋常風壅發熱，鼻涕痰嗽煩渴，惺惺散主之。頭額身體溫熱，大便黃而臭，腹中有熱，四順散主之。頭額身體溫熱，大便帶白，而酸氣者，胃中夾食，丁香丸主之。頭額身體壯熱，頭目碎痛，心神煩躁，小便赤，大便不利，此熱劇也。調胃承氣湯主之。頭額痛，身體熱而畏人惡寒，此傷寒證也。無汗者，麻黃黃芩湯有汗者，升麻黃芩湯。保生散、七寶散、升麻散、春月小兒踈轉，只服大黃川芎散尤佳。慎忌用九子藥也。



第一百問小兒疥疹發熱類傷寒何以別之  
小兒疥疹發熱與傷寒相似但耳鼻及尻尖冷耳並  
耳後有赤脈其脈長大身體壯熱或時驚搐以之別  
疥疹慎不可轉若轉則毒氣入裡殺人即與化毒湯  
紫草木通湯出得大盛即用犀角地黃湯解之若出  
豆不快煩躁不得眠者黃芩甘草主之也

傷寒百問卷六大尾

寶曆三年癸酉正月吉日

大坂心齋橋願慶町

書林

澁川清右衛門







張仲景傷寒百證敘

余少好岐黃術，聞張氏傷寒百證之書，不覺喟然嘆曰：至哉其言之也！夫人身一小天地，治天者必算漚度，察分秒而後知晦蝕之期；治地者必計崇卑，度源委而後識旱潦之歸。夫傷寒為生死之關，亦必參四時，究六脈，而後知受病之端，苟執一忘百，則六經傳變，七日剝復，與三陰三陽之殊感，其何以辯此？張氏之書，誠足當洛下閭伯子也。予故再梓以廣其傳云。

太醫院李存濟謹題

重鐫校正註解仲景傷寒百證歌發微論目錄

一卷

論傷寒七十二證候生死訣法

論桂枝湯用赤白芍藥不同

論傷寒慎用九子藥

論桂枝麻黃青龍等湯用藥三證

論兩感傷寒

論傷寒以真氣為主

論治傷寒須依次第

論緩急沉三脈

三卷

○傷寒脈證總論歌 第一證

○傷寒病證總類歌 第二證

桂枝湯 麻黃湯

大青龍湯 白虎湯

竹葉石羔湯 四逆湯

理中湯丸 大小承氣湯

大小瀉心湯 大小陷胃湯丸



茵陳湯

藥皮湯

五苓散

小柴胡湯

○表證歌 第三證

小柴胡加桂枝湯

麻黃湯

○裏證歌 第四證

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

承氣湯

脾約丸

蜜導煎

○表裏寒熱歌 第五證

桂枝湯

小柴胡加桂湯

白虎加人參湯

桂麻各半湯

○表裏虛實歌 第六證

四逆湯

理中湯

柴胡湯

承氣湯

○急救表裏歌 第七證

桂枝湯

四逆湯

○無表裏證歌 第八證

大小柴胡湯

大小承氣湯

○表裏水歌 第九證

小青龍湯

十棗湯

○表裏兩證俱見歌 第十證

五苓散

○三陰三陽傳入歌 第十一證

○陰陽兩感歌 第十二證

○陽證陽毒歌 第十三證

升麻枝子湯

○陰證陰毒歌 第十四證

關元灸法

金液丹

來麩丹

○太陽陽明合病歌 第十五證

葛根湯

葛根加半夏湯

麻黃湯

○太陽少陽合病歌 第十六證

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

○三陽合病 第十七證

白虎湯



○太陽少陽併病歌 第十八證	刺肺俞肝俞期門大椎
○陰證似陽歌 第十九證	
○陽證似陰歌 第二十證	
白虎湯	承氣湯
○陰盛陽陽歌 第二十一證	
霹靂散	火礮丹
○陰陽易歌 第二十二證	
燒棍散	豕鼠糞湯
橘皮湯	
○傷寒歌 第二十三證	
桂枝湯	麻黃湯
大青龍湯	桂枝二越婢一湯
建中湯	小柴胡湯
○中風歌 第二十四證	
桂枝湯	敗毒散
獨活散	桂枝加葛根湯
桂枝加附子湯	

○傷寒見風中風見寒歌 第二十五證	
大青龍湯	桂枝麻黃各半湯
○熱病中喝歌 第二十六證	
五苓散	白虎湯
橘皮湯	
○五種溫歌 第二十七證	
升麻解肌湯	小柴胡湯
竹葉湯	白虎加桂湯
黃芪防已湯	玄參升麻湯
○三種濕歌 第二十八證	
防已黃芪湯	朮附湯
瓜蒂搐鼻法	
○兩種瘧歌 第二十九證	
葛根湯	桂枝湯
續命湯	承氣湯
○四證似傷寒歌 第三十證	
竹葉湯	麥門冬湯
○可汗不可汗歌 第三十一證	



桂枝湯

麻黃湯

葛根湯

小青龍湯

麻黃附子甘草湯

小柴胡湯

○可下不可下歌

第三十二證

承氣湯

茵陳蒿湯

大承氣湯

大柴胡湯

大小陷胃湯丸

抵當湯丸

瀉心湯

密導煎法

○可吐不可吐歌

第三十三證

○可火不可火歌

第三十四證

外迎燒蒸布葉法

禁忌法

○可水不可水歌

第三十五證

少水和胃汁焦法

五苓散

猪苓湯

小青龍湯

可灸不可灸歌

第三十六證

三陰真寒證灸法

禁忌法

○可針不可針歌

第三十七證

刺法

桂枝湯

禁忌法

○傷寒可溫歌

第三十八證

四逆湯

理中湯

○發熱歌

第三十九證

大柴胡湯

小柴胡湯

柴胡解肌湯

麻黃細辛附子湯

四逆湯

○潮熱歌

第四十證

小柴胡湯

小承氣湯

大陷胃湯

三卷

○往來寒熱歌

第四十一證

大柴胡湯

小柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯

○汗之而熱不退歌

第四十二證

萎蕤湯

竹葉湯

○下之而仍發熱歌

第四十三證

小柴胡湯

枳實梔子湯

一書〇二二 丹黃參白經二書高 〇 二二二



○惡寒歌 第四十四證	桂枝湯	麻黃湯
大青龍湯	四逆湯	
理中湯	小柴胡湯加桂	
附子瀉心湯		
○背惡寒歌 第四十五證		
炙甘草附子湯	白虎湯	
附子湯		
○厥證歌 第四十六證		
細辛甘草湯	茯苓甘草湯	
瓜蒂散		
○結胃歌 第四十七證		
枳實理中丸	大陷胃湯	
小陷胃湯	三物散	
白散		
○痞歌 第四十八證		
大黃黃芩瀉心湯	五苓散	
桔梗枳實湯	半夏瀉心湯	

黃連瀉心湯	附子瀉心湯
生薑瀉心湯	甘草瀉心湯
○發黃歌 第四十九證	
茵陳蒿湯	五苓散
抵當湯	白虎湯
○發強歌 第五十證	
大承氣湯	
桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯	
○發斑歌 第五十一證	
升麻湯	玄參升麻湯
○發喘歌 第五十二證	
麻黃湯	桂枝加厚朴杏子湯
麻黃杏仁甘草石膏湯	小承氣湯
小青龍湯	逐陰丹
○發渴歌 第五十三證	
五苓散	白虎湯
白虎加人參湯	猪苓湯
黑奴丸	酒蒸黃連丸



○吐血歌 第五十四證

犀角地黄湯

抵當湯

陽毒升麻湯

○衄血歌 第五十五證

麻黃湯

桂枝湯

犀角地黄湯

茅花湯

○吃噎歌 第五十六證

橘皮乾薑湯

退陰散

灸法

小柴胡湯

○謔語歌 第五十七證

承氣湯

○煩躁歌 第五十八證

承氣湯

桂枝湯

白虎湯

竹葉石膏湯

○懊懷歌 第五十九證

梔子湯

大陷胃湯

○佛鬱歌 第六十證

承氣湯

○驚惕歌 第六十一證

柴胡龍骨牡蠣湯

○心悸歌 第六十二證

小柴胡湯

炙甘草湯

小建中湯

桂枝甘草湯

真武湯

○冒悶歌 第六十三證

刺法

○乾嘔歌 第六十四證

小柴胡湯

黃連湯

茯苓甘草湯

小青龍湯

五苓散

竹葉湯

梔子豉湯

真武湯加減

○吐逆歌 第六十五證

竹茹湯

理中丸

竹葉湯

橘皮湯

○霍亂歌 第六十六證



○遺尿歌 第七十二證	真武湯	猪苓湯	小柴胡湯	四逆湯	真武湯	通脈四逆湯	四逆散	小建中湯	四逆散	小柴胡湯	十棗湯	小柴胡湯	脇痛歌 第六十八證	小柴胡湯	麻黃湯	小柴胡湯	○頭疼歌 第六十七證	香薷散	四逆湯	香薷散	理中丸	五苓散
						桂枝加芍藥湯																
						桂枝加大黃湯																

○下膿血歌 第七十九證	刺法	桃花湯	小柴胡湯	○舌上胎歌 第七十八證	小柴胡湯	○欲得汗歌 第七十七證	小柴胡湯	○頭汗歌 第七十六證	小柴胡湯	○自汗歌 第七十五證	理中丸	烏梅丸	理中丸	○虵厥歌 第七十四證	桂枝加大黃湯	桂枝加芍藥湯	厚朴五物湯	○腹滿歌 第七十三證	小承氣湯	小柴胡湯	白虎湯	○腹滿歌 第七十三證	小承氣湯



○晝夜偏劇歌 第八十證

乾薑附子湯

○循衣摸空歌 第八十一證

大承氣湯

○筋惕肉瞤歌 第八十二證

真武湯

○口燥咽乾歌 第八十三證

白虎加人參湯

承氣湯

傷寒百證 卷之四

○傷寒似瘧歌 第八十四證

桂麻各半湯

桂枝湯

○邪中二焦歌 第八十五證

○多眠歌 第八十六證

治蜜桃仁湯

小柴胡湯

黃連阿膠湯

○不得眠歌 第八十七證

梔子豉湯

烏梅湯 外臺肘後方

○小便不利歌 第八十八證

小青龍湯

茵陳蒿湯

桂枝加附子湯

○小便自利歌 第八十九證

抵當湯

甘草乾姜湯

調胃承氣湯

○大便不利歌 第九十証

大柴胡湯

小承氣湯

○大便利歌 第九十一證

葛根湯

四逆湯

承氣湯

○狐惑證歌 第九十二證

瀉心湯

猪苓湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

調胃承氣湯和胃法

小柴胡湯

猪膽蜜煎導法

脾約麻仁湯

葛根黃芩黃連湯

桂枝人參湯

大柴胡湯

苦參湯



雄黃散

○百合歌 第九十三證

百合地黃湯

○辯傷寒疫氣不同歌 第九十四證

○婦人傷寒歌 第九十五證

柴胡四物湯

○婦人熱入血室歌 第九十六證

小柴胡湯

○傷寒差後病歌 第九十七證

理中湯

枳實梔子湯

小柴胡湯

牡蠣散

○傷寒五臟死絕歌 第九十八證

○傷寒死脉歌 第九十九證

○傷寒死候歌 第一百證

四卷

論表裏虛實

論桂枝肉桂

論滑脉

新鑄註解張仲景傷寒發微論卷之一

白沙 許叔微 知可述

○論傷寒七十二證候

○循衣摸床

仲景云傷寒吐下後不解不大便五六日至十餘日發潮熱不識人循衣妄撮微喘直視脉弦者生瀉者死

華陀云病人兩手循衣縫謔語者不可治

仲景云小便利者可治

○瞪目直視

○兩手撮空

仲景云直視搖頭此為心絕又云狂言及目直視腎絕也

熱摸床撮空皆宜大承氣湯服

○汗出如油

○瘖瘖不言

○舌卷囊縮

○鼻中煤煙

後脉弦者生瀉者死  
華陀云陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死也  
仲景云脉浮而洪身汗如油喘而不休此為命絕也  
瘖瘖者如發瘖之狀瘖瘖不言  
千金方熱病七八日其脉不脈不散當瘖瘖三四日汗不出者死也  
仲景云厥陰受病舌卷煩滿而囊縮  
扁鵲云舌卷囊縮者必死  
千金方陰陽病卵腫縮腹中舌出數寸而死  
宋迪除證訣云陰煤煙深則鼻中黑如煤煙



○指甲黑青

宋迪陰證云陰毒甚則指甲黑青

○目盲見鬼

甲下肉黑者死鬼脫陰者目盲

○九竅出血

或從口鼻耳目是謂下厥上竭

○環口紫色

仲景云環口紫色柔汗發黃此為脾絕也

○轉筋入腹

者難治也

吃噎噦噦

逆上氣其味散者死謂其形

○膈內拒痛

仲景云膈內拒痛胃中空虛心下因硬則為結胸此陷胃證也

○發黃疸熱

黃全云陽明病發熱在裏必發黃凡發黃寸口無脈鼻氣冷皆不可治也

○咽乾聲啞

孤感濕蠱證也

○瘵癢口噤

仲景云瘵癢面赤目赤赤暈頭卒口噤背反張者瘵病也又風

○筋惕肉瞤

仲景云筋惕肉瞤乃風誤服大青龍湯令人筋惕肉瞤傷寒

○叉手冒心

汗則動經身為振

○發斑癩疹

所以然者以重發汗虛故如此

○顛狂不定

狂者桃仁承氣湯小便利其人

○耳聾脇痛

仲景云少陽受病

○上氣喘急

下亦喘陰證喘者必喘而加急

○小腹硬滿

客熱也小腹硬滿小便利者勝

○唾膿咯血

仲景云肺浮熱甚而反灸之必

○上吐下利

復吐下利者霍亂也

○二便不通

陽明大便不利者承氣湯



○振欲擗地

仲景云太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身振欲振振擗地者真武湯

○遺尿夫溺

仲景云遺尿遺失狂言天月直視腎絕也風溫證下之則直視

○揚手擲足

太陽中風以火切則手足躁擾又云六七日三部脈至大手足躁擾者欲解也

○謔語鄭聲

仲景云實則謔語虛則鄭聲謔語重語也直視謔語喘滿者死

○心中懊懣

仲景云病發於陰而之下早則為痞懣懣于湯主之

○舌上滑胎

仲景云濕家舌上滑胎者丹田有熱胃中有寒又云臟結滑胎者不可攻也

○脚攣齒

風痺熱證屬陽也承氣湯主之

○臍上下築動

發汗後臍下悸者欲作奔豚

○項強几几

太陽病桂枝湯無汗者葛根湯也

○氣上衝霄

太陽病下之後其氣上衝者與桂枝湯

○外氣怫鬱

二陽併病小發汗面色綠溫正赤者陽氣怫鬱當解之

○脚膝攣拳

傷寒脈浮自汗出此誤也

○大便黑堅

陽明證其人喜忘必有蓄血所以然者木以久瘀血須硬大便反易

○手足逆冷

有熱厥有冷厥冷厥者初得病便四肢冷熱厥者手足雖冷半日復熱也

○漱水不嚥

陽明但欲漱水不飲者必勿又濕家丹田有熱胃中有寒渴欲飲水而不能

○額上冷汗

濕家額上汗出微喘陰證亦額上汗出皆有大煩渴

○肉上粟起

太陽病宜白虎加人參湯飲之却不得泄瀉更益煩肉上粟起

○咽喉乾痛

傷寒脈浮咽中乾痛而吐逆者甘草半夏湯主之

○多眠好睡

此證大約有四少陰孤感風溫及小柴胡證

○夜不得眠

傷寒在歌中六具在歌中

○心下驚悸

仲景云寒氣相搏則為雷鳴心下痞硬脇下有水氣腹中雷鳴

○腹中雷鳴

心下痞硬脇下有水氣腹中雷鳴

○下利溏垢

熱則溏垢



○潮熱不常

仲景云潮熱者實也大抵

○寒熱往來

此證有三一證具在胸中

○身體腫滿

黃芩湯證

○鬱胃不仁

仲景云寒則為

○額上脈陷

脈家不可發汗發汗則額上脈

○身重難轉

風濕相搏桂枝加白朮證

○鼻中衄血

陽明病口燥但欲飲水不咽者

○手背冷汗

宋迪云額上手背

○下利膿血

仲景云少陰下利便

○吐逆不止

熱吐者有胃冷吐者

○面垢背寒

中暈則面

○腹脹滿悶

發汗後腹脹滿者厚朴五物湯

又云不轉失氣而下之必腹滿

○咳嗽涎盛

或上焦有熱或

○頭疼惡心

頭疼惡心身不疼痛者食

○乾噎食臭

胃中不利心下痞硬乾噎食臭

○身痒如虫行

陽明病當汗而反无汗其身如

○鼻鳴乾嘔

太陽中風證鼻鳴乾嘔者桂枝

○洒淅憎寒

仲景云陰氣上入陽

○腰脊疼痛

仲景云一二日太陽受

○腹脇時痛

仲景云傷寒五六日中風或腹

○渾身壯熱

仲景云陽明受病則身熱日痛

以上七十二證或必死或可治淺深雖不同

要之對證用藥斯過半矣

○論桂枝湯用赤白芍藥不同

仲景桂枝湯加減法凡十有九證但云芍藥聖惠方皆用赤芍藥孫尚方皆用白芍藥聖惠乃太宗



朝命王懷德等編集孫兆為累朝醫師不應如此  
背矣然赤白補瀉極有利害常見仲景桂枝第四  
十七證云病發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出  
欲救邪風宜桂枝湯蓋風傷衛而邪乘之則衛強  
榮雖不受邪終非適平也故衛強則榮弱仲景以  
桂枝發其邪以芍藥助其弱故知用白芍藥也榮  
既弱而不受病乃以赤芍藥瀉之決非仲景意至  
於小建中為尺遲血弱而設也舉此皆用白芍藥  
而仲景亦止稱芍藥可以類推矣

○論傷寒慎用圓子藥

仲景論中百一十三方為圓者有五理中陷胸抵  
當麻仁烏梅是已理中陷胸抵當皆大彈圓煮化  
而服之與湯無異至於麻仁治脾約證烏梅治濕  
膈證皆欲必達下部故用小圓其他皆欲入經絡  
逐邪毒破堅癖導瘀血燥屎之類須憑湯劑以滌  
除也余見俗醫用小圓藥以巴豆而下邪毒致殺人  
者不可勝數蓋巴豆止導食積而不能去熱毒既  
下之後臟氣虛而邪毒宛然猶在更再以大黃利

硝下之鮮不致斃大抵下藥欲其必中必當一服  
而止也故不可不慎歟

○論桂枝麻黃青龍用藥三證

仲景論表證一則桂枝二則麻黃三則青龍桂枝  
治中風麻黃治傷寒青龍治中風見寒脈傷寒見  
風脈此三者人皆能言之而不知用藥對病之妙  
處故今之醫者不敢用仲景方無足怪也且脈浮  
而緩者中風也故當蓄惡寒淅淅惡風翕翕發熱  
仲景以桂枝對之脈浮緊而瀉者傷寒也故頭痛

發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘仲景以  
麻黃對之至於中風脈浮緊傷寒脈浮緩仲景皆  
以青龍對之何也予嘗深究三者審於證候脈息  
相對用之無不應手而愈何以言之風傷衛衛氣  
也寒傷榮榮血也榮行脈中衛行脈外風傷衛則  
風邪干陽氣陽氣不固發越而為汗是以自汗而  
表虛故仲景用桂枝以發其邪用芍藥以助其血  
蓋中風則病在脈之外其病稍輕雖曰發汗特  
解肌之藥耳故桂枝證云令遍身絪絪微似有汗



者若霍不可令如水流離病必不除是知中風不可大發其汗大發其汗則反動榮血邪乘虛而居其中故不除也寒傷榮則寒邪干陰血而榮行脉中者也寒邪居脉中則非特榮中病也邪自内作則并與衛氣犯之入則浸淫及骨是以汗不出而煩冤仲景以麻黃大發其汗又以桂枝辛甘而其發散欲損其内外之邪榮衛之病故爾大抵二藥皆發汗而桂枝則發其衛之邪麻黃并與榮衛而治之固有淺深也何以驗之仲景桂枝第十九證云病嘗自汗出者以為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧和故耳榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯又第四十七證云發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和也又第一卷云寸口脉浮而脈浮則為風脈則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗是知傷寒浮緊者榮衛俱病也麻黃湯中并桂枝而用此仲景之意歟至於青龍雖治傷寒見風

脉傷風見寒脉然仲景云汗出惡風者服之則筋惕肉瞤故青龍一證尤難用必須形證諦當然後可行王寔止以桂枝麻黃各半湯代之蓋慎之者也

○論兩感傷寒

仲景論兩感傷寒云凡傷於寒熱雖甚不死若兩感於寒而病者必死又云兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同既云必死又云治有先後何也大抵此病表裏雙傳臟腑俱受得此者十不全

一故云必死然仲景豈以已見而重誣後人哉故有發表攻裏之說以勉後世恐萬世之下一遇大聖而得之者不欲絕望於後人也則仲景仁心可知矣

○論傷寒以真氣為主

傷寒不問陰證陽證陰毒陽毒要之真氣完壯者易醫真氣虛損者難治諺云傷寒多死下虛人誠哉是言也蓋病人元氣不固真陽不完受病纒重便有必死之道何也陽病宜下真氣弱則下之多



脫陰病宜溫真氣弱則客熱便生故醫者難於用藥非病不可治也主本無力也素問稱岐伯云陽勝則身熱腠理閉喘麤爲之俛仰汗不出而熱齒乾以煩冤腹滿死能耐冬不能夏陰勝則身寒汗出身常清數慄而寒寒則厥厥則腹滿死能夏不能冬黃帝曰調此二者柰何岐伯曰能知七損八益則二者可調蓋陽勝而汗不出者傷寒也陰勝身寒而汗出者中風也二者須知七損八益而已蓋女子二七天癸至至七七止男子二八精氣溢至八八而止婦人月事以時下故七欲損男子精欲滿而不竭故八欲溢如此則男子女人身常無病也自身無病真氣完固雖有寒邪易於用藥故曰二者可調是知傷寒以真氣爲主

○論治傷寒須依次第

仲景論中雖云不避晨夜即宜便治醫者亦須顧其表裏待其時日若不循次第雖暫時得安損虧五臟以促壽期何足尚也昔范雲爲梁武帝屬官得時疫熱疾召徐文伯診視是時武帝有九錫之

命期在旦夕雲欲預盛禮謂文伯曰可使得愈乎文伯曰便瘥甚易政恐二年後復不起爾雲曰朝聞道夕死可矣况二年乎文伯於是先以火煖地布桃栢葉布席置雲其上頃刻汗出以溫粉裏之翌日遂愈雲甚喜文伯曰不足喜後二年果卒夫取汗先期尚促壽限况不顧表裏不待時日便欲速愈者即今病家不耐病未病三四日晝夜督汗醫者隨情順意鮮不致斃故予感此而以爲龜鑑也

○論仲景緩遲沉三脉

仲景云衛氣和名曰緩榮氣和名曰遲緩遲相搏名曰沉註云緩者四肢不收遲者身體俱重沉者脈中直腹內急痛苦煎則三者皆病脉也安得謂之和註者乃以脉訣中沉緩遲論之不知仲景傷寒脉與雜病脉異何以言之上文云衛榮盛爲高章綱衛榮弱爲慄卑損至此三脉謂之和則不盛不弱乃平和脉蓋傷寒之脉高章綱者陽證類慄卑損者陰證類即是而言則緩遲沉者陰陽向安



之脉也不特此爾下文云寸口脉緩而遲緩則陽氣長遲則陰氣盛陰陽相抱榮衛俱行剛柔相得非安平而何

張仲景發微論卷之一

新鐫註解仲景張先生傷寒百證歌發微論二卷

宋白沙許叔微知可述明清邑後學杏泉雷順春校正

第一證

○傷寒脉證總論歌

大浮數動滑陽脉陰病見陽生可得沉瀯弦微弱  
 屬陰陽病見陰終死厄仲景云脉大瀯弱弦微此  
名陰也陰病見陽者陰陽交互最難明輕重斟  
生陽病見陰脉者量當別白脉雖有輕重脈浮為在表  
 表實浮而兼有力但浮無力表中虛自汗惡風常  
 浙浙傷寒先要辨表裏浮為在表沉為在裏實此證有虛有實仲景云  
 有力者表實也無汗不惡風也重手脈沉為在裏  
 而無力者表虛也自汗惡風也裏實脉沉來亦實重手無力大而虛此是裏虛宜  
 裏實脉沉來亦實重手無力大而虛此是裏虛宜  
 審的裏證亦有虛實脈沉而無力者裏虛也或泄利或  
陰證之類也上八句風則虛浮寒堅牢水停水瀉  
辨表裏虛實盡矣必沉潛動則為痛數為熱支飲應瀕脉急弦太過  
 之脉為可怪不及之脉亦如然仲景云風則瀯水  
瀯支飲急弦動則為痛數則熱煩太過榮衛太盛  
可怪不及亦然邪不空見中必有奸名高章高章相持名曰綱榮衛微時名慄慄慄切



早牒卑相搏損名彰榮衛既和名緩遲緩遲名沉

此最良九種脉中辯虛實長沙之訣妙難忘

口衛氣盛名曰高榮氣盛名曰章高章相搏名曰

網衛氣弱名曰牒榮氣弱名曰早牒早相搏名曰

損衛氣和名曰緩榮氣和名曰遲遲緩相搏名曰

沉大抵仲景脉法論傷寒與雜病脉法異故予嘗

撰仲景三十警警有如羹上肥此脉定知陽氣微

紫紫來如蛛絲細却是體中陰氣衰脉如瀉漆之

絕者病人亡血更何疑仲景云脉警警如羹上肥

者亡血也陽氣衰也脉絲絲如瀉漆之絕陽結諸諸

如車蓋陰結循竿亦象之仲景云諸諸如循竿者

也陰結陽盛則促來一止陰盛則結緩而遲此謂促

也仲景云脉來緩時一止名曰結脉來數結二脉

時一止名曰促脉陽盛則促陰盛則結縱橫逆

順宜審察殘賊災怪須要知仲景云有相乘有縱

也日水行乘火火行乘金金行乘木木行乘水水行

乘金名曰橫水行乘火名曰順也又曰脉有殘賊能為諸症

水木行乘火名曰順也又曰脉有殘賊能為諸症

作病也又問曰脉有災怪何謂也吞曰舊時服藥

今乃發作脉靜人病內虛故人安脉病曰行尸

故為災怪脉靜人病內虛故人安脉病曰行尸

云脉病人不病名曰行尸以無主氣故眩仆不知

人人病脉不病名曰行尸以無主氣故眩仆不知

手氣口當主氣主血人迎左其位氣口緊盛食必

傷人迎緊盛風邪熾左為人迎右為氣口人迎緊

盛傷于風氣口緊盛傷于食

也數為在府遲為藏浮為在表沉在裏

為在裏數為在府遲為藏浮為在表沉在裏

脉浮而緩風傷榮浮緊兼濕寒傷

衛脉微大忌令人吐欲下猶防虛且細

可下沉微氣弱汗為難三者要須當審記

陰虛脉沉微而氣弱者不可汗三者汗

有汗證左手沉微却應未於陰謂之汗

定死生仲景說跌陽脉太谿腎脉為根蒂

跌陽者謂以腎脉胃脉為主仲

邪氣漸深須用意浮大晝加並屬陽沉細夜加分

陰位九至以上來短促狀若涌泉無入氣更加懸

絕漸無根命絕天真當死矣孫尚云脉及七至六

沉細夜加病更及八至精氣消神氣亂必有散脫

精神之候須切急為治療又加之九至十至雖和

扁亦難救如八至九至加以懸絕懸絕者無病人

三部脉調勻大小浮沉遲速類此是陰陽氣已和

勿藥自然應可喜小浮沉遲數同等雖有寒熱不

鮮此脉已和

雖劇當愈

第二證

傷寒病證總類歌

傷寒病證總類歌

傷寒病證總類歌

傷寒病證總類歌

傷寒病證總類歌

傷寒病證總類歌



傷寒中風與溫濕熱病瘧渴并時疫證候陰陽  
 則同別為調治難專一比上七證大略雖一則桂  
 枝二麻黃三則青龍如鼎立精對無差立便安何  
 須更數交傳日孫尚云一桂枝二麻黃三青龍三  
 候五日轉瀉反致壞病也發熱惡寒發于陽無熱惡寒自陰出  
 也無熱而惡寒者發于陽陽盛熱多內外熱  
 白虎相當并竹葉湯皆治內外熱證陰盛寒濕脈  
 沉弦四逆理中為最捷用四逆湯理中湯熱邪  
 入胃結成毒大小承氣宜疎泄傷邪入胃久則胃  
 氣滿宜用瀉心湯瀉心湯用瀉心湯結胃痞氣當  
 分別按之不痛為虛斬按之若痛為實結淺深大  
 小陷胃元仲景方中不徒折孫云結胃痞氣兩分  
 茵陳可治發黃證藥皮治痢兼下血用茵陳湯下  
 利腸毒惡痢下血藥皮湯小便不利更喘滿煩渴五苓安可缺  
 渴用五苓散半在裏半在表加減小柴胡有法  
 小柴胡治半在表裏仲景有加減法夜中得脈日中愈陰得陽兮災  
 必脫日中得脈中夜安陽得陰兮自相悅陰陽調  
 順自和同不須攻治翻為孽孫尚云凡傷寒三口

時身涼而和者此名欲解也夜半得脈必次日中  
 愈陰得陽而解也日中得脈夜半愈陽得陰而和  
 也陰陽  
 和同爾

第三證

表證歌

身熱惡寒脈又浮偏宜發汗更何求仲景云脈浮  
 要須手足俱周徧不欲淋漓似水流金匱云凡發  
 皆周發漿一得間益佳但不欲淋漓其病不離  
 當重發汗汗多則亡陽陽虛不得重發汗也  
 則隨時與和解重須正發病當瘳仲景有和解之  
 和鮮若小柴胡桂枝是也初春陽弱陰尚勝不可  
 正發若麻黃之類是也

亟奪成擾攘夏時暑熱脈洪大玄府開時汗易謀  
 初春陽弱不可大發汗以擾乎不可汗脈微而弱  
 陽夏則玄府汗空間故易汗更兼尺中脈遲緩  
 更兼尺中脈遲緩金匱云尺中脈遲緩不足血氣  
 火不微弱無陽遲少血安可麻黃求發散更有蚘  
 可汗微弱無陽遲少血安可麻黃求發散更有蚘  
 血并下血仲景云蚘家不可發汗發汗則額上  
 血并下血風

溫濕溫如何發壞病虛煩且慎之腹間動氣宜區  
 別此五證皆不可汗婦人經水適來時此是小柴  
 胡證決忽然誤汗表裏虛鬱胃不知人作孽婦人  
 通表適斷屬小柴胡  
 證誤汗鬱昌不知人



第四證

○裏證歌

不惡寒方反惡熱胃中乾燥并潮熱汗自出不惡寒反惡熱常下之又云手心腋下汗常潤小便如常大便結腹滿而喘或謔語脉沉而滑裏證決心手與兩腋下潤小便如常大便結硬皆裏證也內盛陰虛速下之安可日數拘肩脣仲景曰陽盛陰之則愈蓋陽虛則外熱附虛則內熱內外皆熱故當下雖二二日便可下不必四五日過經也失下心胃皆症悶胃鬱不安成熱厥寒故胃而厥上

則半日後庸醫不曉疑是陰誤服熱藥精魂絕復熱也見厥便以為陰誤服熱藥則發斑發黃不知人也三陰大約可溫之積證見時方發泄太陰腹滿或時痛少陰口燥心下渴積熱悉具更無疑要在安詳加審別三陰大約可溫之積證當下仲景云太陽病醫反下之因腹滿時痛屬太陰桂枝加芍藥湯主之其大實痛則大黃湯主之又云少陰口燥咽乾急下之宜承氣湯如此者當下之也病猶在表不可下脉浮更兼虛細者仲景云脉浮為在表惡寒嘔吐小便清惡寒者表未解金匱云欲吐者不可不轉失氣應難瀉不轉失氣者屎強大便堅硬小便數約

陽明自汗津液寡如斯之類下為難莫便參差成誤也

第五證

○表裏寒熱歌

病人身熱着得衣寒在骨髓熱在肌先與桂枝使寒已小柴加桂次溫之病人身寒衣襖退寒在皮膚熱在髓白虎加參先除熱桂黃各半解其外仲景曰身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也仲景俱無治法柴胡加桂湯熱在骨髓先以白虎加人參湯以

除其熱以桂枝麻黃各半湯以解其外也病有標本并始末先後不

同當審察裏寒表熱脉沉遲裏熱表寒脉必滑仲景云裏寒表熱者脉沉而遲裏熱表寒脉必滑也

第六證

○表裏虛實歌

脉浮而緩表中虛有汗惡風腠理疏浮緊而滑表却實惡寒無汗體焚如傷寒最要辨表裏虛實為有裏虛有表裏俱實有表實有裏實後用藥無不差矣蓋脉浮而緩又惡風有汗此表虛傷風證也脉浮緊而滑熱有汗此裏實證也脉沉無力裏虛證也



四逆理中為對病沉而有力紫且實柴胡承氣宜

相煎裏虛宜溫之故用四逆理中又有表和而裏

病下之則愈斯為正裏和表病汗為宜忽然誤下

應難拯外臺云表和裏病下之則愈汗之則死虛則

溫之實瀉之病形脉證要相宜更兼藥餌如精

立便安康待甚時孫向云精對無差立當見效不

第七證

傷寒下後表裏虛急當救療莫躊躇下利不止身

疼痛救裏為先四逆歟忽若清便自調適却宜救

表桂枝徒切莫遲延生別病過經脉變在斯須仲

云傷寒症下之太過裏虛又瀉不止身疼痛者急

當救裏或身疼痛清便自調者急當救表救裏宜

四逆救表

第八證

無表裏證歌

既無裏證又無表隨證小柴胡治療大便堅鞭脉

浮數却與大柴胡極妙仲景云病人無表裏證并

柴胡湯七八日後至過經證候如斯當辯真何况

下之

熱實睛不和常覺目中不了了仲景云一寒六

不和無表裏證大便難微

熱者急下之大承氣大柴胡

第九證

有水須分表和裏安可妄投增病勢乾嘔微利咳

發熱謂表有水青龍證仲景云傷寒表不解心下

渴或利或噎或小便不利小腹滿忽若身涼并汗

出兩脇疼痛心下痞表解爭知裏未和十棗湯不

能主治大陽中風心下痞硬滿引脅下痛乾嘔短

湯主

第十證

表裏兩證俱見歌

脉來浮大表證爾便赤煩渴却在裏脉浮者表證

煩渴又却表裏兩證俱見時當用五苓與調理此

有裏證也宜用五苓散蓋五又如大便數且結頭痛更兼身

有熱其人小便却又清亦是兩證當區別大便結

身熱小便却清知大便堅鞭脉沉細裏證當下分

不在裏而在表也明諦頭汗出時微惡寒手足兼冷却非是仲景云

傷寒五



六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脈細者此為陽微結有表裏也脈沉亦在裏也此為半在裏半在表仲景論非一端要在審詳而已矣

第十一證

○三陰三陽傳入歌

尺寸俱浮屬巨陽一二日內病如常經絡上連風

府穴頭項痛兮腰脊強仲景云尺寸俱浮者太陽連風府故項痛脈長陽明為受病二三日內斯為應

挾鼻絡目是其經目痛鼻乾眠不穩仲景云尺寸俱

病也當二三日發以其脈挾鼻絡于目故身熱目痛鼻乾不得卧也

少陽經絡貫耳中脈弦脇痛耳應聲四日以前皆在腑汗之即退

易為功仲景云尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以脈循脇絡耳故胃脇痛而耳聾此二經受病未入臟故可汗也

四五日中傳太陰太陰之脈細而沉布胃絡噎噎乾燥脾官腹滿病難禁仲景云尺寸俱沉細者大陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡於噎故腹滿而噎乾矣

少陰傳到脈沉緊貫腎絡肺繫舌本口燥舌乾渴不休五六日

中病有準尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡于肺係舌本故口燥舌乾

而渴七八日至厥陰經煩滿囊縮可愛驚三陰受

邪已入臟却宜瀉下自和平仲景云尺寸俱微緩七日發以其循陰器絡于肝故煩滿而六經已盡囊縮必三陰皆已入臟故可下而已也

第十二證

○陰陽兩感歌

傷寒熱甚雖不死兩感傷寒慢料理仲景云凡傷熱雖甚不死若兩感於寒而病者必死又曰兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同故漫料理也

可一日太陽少陰病腹瀉口乾煩飲水太陽膀胱也少陰腎也

腹瀉身熱如火熾不欲飲食口舌乾妄言譫語終

難睡仲景云二日陽明與太陰俱病則腹瀉身熱不欲食譫語三日少陽合厥

陰耳聾囊縮不知人厥逆水漿不入口六日為期

是死辰仲景云三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿不入口而不知人者六日死矣

第十三證

○陽證陽毒歌

太陽陽明與少陽三陽傳入是其常一二日太陽三四日少陽

太陽脈浮惡寒風陽明惡熱脈來

以其經傳入也



長太陽脈浮陽明脈長太陽惡少陽口苦脇下滿  
 往來寒熱脈弦張仲景云少陽之為病口苦咽乾  
 陽者陽下堅滿往陽若獨盛陰暴絕變為陽毒必  
 發狂必變為陽毒內外熱結舌又卷鼻中煤煙不  
 可當脈應洪實或滑促宜用升麻梔子湯

第十四證

○陰證陰毒歌

飲食不節陰受之太陰腹脹病在脾素問云起居  
 飲食不節則陰受之傷寒四五日少陰腎病脈微  
 細心煩但寐渴無時但欲寐又云少陰之為病微細  
 利而渴厥陰氣上衝心下饑不欲食食吐虵音四  
 衝心饑不欲食食吐虵音四陰病若深陽頓絕變成陰

毒更何疑四肢逆冷臍築痛身如被杖痛可知連  
 傷脾胃或因慾事腎經衰內感伏陰外寒氣腰重  
 頭疼覺倦疲陰毒本因腎氣虛寒嗜慾過多或傷  
 或先感外寒而內伏陰內外皆陰故陽氣不守遂  
 發頭疼腰重腹痛眼暗身倦急而不甚熱四  
 肢逆額上手背皆冷汗二三日內尚支持額上手  
 背皆有

冷汗二三日內或六脈沉細持來疾尺部短小力  
 可起行不甚勞重六脈沉細持來疾尺部短小力  
 還微寸口有時或來大誤經轉瀉若何醫陰毒診  
 脈但沉細而疾尺部短小寸口或大六脈俱浮大  
 或沉取之大而不甚疾者非陰證也誤轉瀉則瀉  
 轉急陰病漸深腹轉痛心胃膈脹鄭聲隨虛汗  
 不止咽不利指甲青黑色魚陰證深則咽不利  
 燥渴虛汗不止或時即聲指甲利心下脹滿結硬  
 面色俱青黑仲景云虛則鄭聲一息七至沉細疾  
 速灸關元不可遲六脈沉細而疾一息七至以米  
 壯穴在臍更兼金液來甦治庶得陽回命可追三百  
 下三寸更兼金液來甦治庶得陽回命可追三百  
 更以金液米甦助之庶幾陽復也

第十五證

○太陽陽明合病歌

太陽陽明同合病仲景法中有三證自利宜服葛  
 根湯但嘔却加半夏應喘而胸滿屬麻黃慎勿下  
 之輕性命循規守矩治為宜要使中和自安靜仲  
 二證一者太陽與陽明合病則自利葛根湯主之  
 二者合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之  
 三者太陽陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯

第十六證

○太陽少陽合病歌

太陽少陽合病歌



太陽少陽合病時亦須下利更何疑下利黃芩湯  
可用若嘔還加半夏奇仲景云太陽少陽合病自  
黃芩加半  
夏生薑湯

第十七證

○三陽合病歌

腹滿身重難轉側面垢遺尿譫語極三陽合病口  
不仁白虎湯功更奇時仲景云三陽合病腹滿身  
語遺溺發汗則譫語下之則額上  
出汗手足厥冷自汗白虎湯主之

第十八證

○太陽少陽併病歌

太少併病證有二汗下差之皆致斃頭痛眩冒如  
結胸誤若汗時譫語至肺俞肝俞皆可刺譫語却

刺期門是

仲景一證云太陽少陽併病頭痛眩冒  
時如結胸心下痞硬當刺期門肝俞不  
可發汗發汗則譫語脈弦頸項強時刺大椎此候  
五日譫語不止常刺期門

第十九證

○陰證似陽歌

煩燥面赤身微熱脉至沉微陰作孽脉來沉微  
陰也但微

熱身煩燥陰證似陽醫者疑但以脉恐斯要訣  
面赤身熱不熱裏寒陰躁盛面黃陽考下虛證  
而乘寒也煩躁者陰盛也而黃陽陰發躁考熱  
者下虛故也此皆陰證似陽也

第二十證

○陽證似陰歌

小便赤色大便秘其脉沉滑陽證是四肢逆冷伏  
熱深陽證似陰當審諦小便赤大便秘結熱生  
故令四肢逆冷以其伏熱也當行細審者且宜  
散逆冷便以為陰則誤也

供白虎重者須當用承氣重陽如陰理宜然寒者  
之變亦如是

第二十一證

○陰盛隔陽歌

身冷脉沉緊且細內雖煩躁不飲水此名陰盛隔  
陽證霹靂散用煩躁止脉沉緊而細不欲飲水者  
散躁若止考應得脾寒已散考陰自退熱氣上行  
得汗痊火燄丹砂宜用矣

第二十二證



○陰陽易歌

男子陰腫多絞刺婦人腰痛並裏急傷寒差後便  
行房男名陽易女陰易熱上衝胸頭不舉眼中生  
花氣翕翕燒視如鼠橋皮湯選此用之醫可必  
種急或引陰中拘急熱上衝胸頭不舉氣小腹裏  
腫婦人則腰痛千金外臺云有鼠鼠湯橋皮湯亦  
用可

第二十三證

○傷寒歌

脉浮緊澁是傷寒熱少寒多不躁煩傷寒脉浮緊  
而澁熱少寒多  
多心不頭無汗身拘急微厥之時在指端腰脊  
痠痛色多慘唯宜發汗與通關學者先須要辨傷  
寒中風者惡風不惡寒而後傷寒者惡寒不惡風  
寒者面色慘悽中風者無汗中風者自汗傷  
者其面色和悅也大青龍證及麻黃熱多寒少  
亦其常傷寒大抵雖少寒多亦有熱多寒少者  
如麻黃證云發熱身痛大青龍證云脉浮  
而惡風熱多寒少不煩躁亦宜汗解正相當微弱  
無陽桂枝越仲景云太陽病發熱多寒少脉微弱  
者無陽也湯尺遲血少建中湯仲景建中證云傷寒陽虛

第二十四證

○中風歌

惡風自汗是傷風仲景謂傷風體熱頭疼病勢濃手  
足不冷心煩躁面色如常無慘容前篇脉浮而緩  
是本證寸大尺弱有時逢傷風脉雖浮而緩活人  
者仲景云陽浮而陰弱陽浮者汗自出桂枝敗毒獨活輩宜  
皆選用在其中活人書云治傷風藥宜項強桂枝

第二十五證

○傷寒見風脉中風見寒脉歌

惡寒不躁微四逆脉浮而緩來無力惡風煩躁手  
足温脉診緊浮來又澁寒脉反得傷風證中風却  
見傷寒脉大青龍證是為宜和衛調榮斯兩得仲景



示人陽中風脈浮發熱惡寒身疼不汗出  
煩躁者大青龍湯主之云傷寒脈浮緩身不  
但受症有輕重無少陰證者大青龍湯主之  
宜浮緩今却浮紫傷寒宜浮紫今却浮緩此中風  
見寒脈傷寒要知其病加煩燥方可服之為最  
脈微自汗又惡風誤用內潤并筋惕仲景云脈微  
者不可服之服之厥逆筋惕肉瞤此為  
逆也故王寔止用桂枝麻黃各半

第二十六證

○熱病中喝歌

身熱惡寒頭痛楚心煩躁渴如何禦身熱惡風頭  
熱病中喝其證相以下脈洪緊盛為熱病脈虛細弱  
但脈不同耳語任下

為傷暑熱病味浮少壯紫傷夏暑必虛細而  
弱者身熱而脈微又云其脈弦細花遲小便已而  
洒然毛聳未眩云脈虛身熱得之傷暑又曰熱病  
弱當以意消息也傷暑面垢并背寒四肢倦怠汗  
無度口噤五苓白虎佳痰逆橘皮湯可愈仲景云  
冷小有勞身即熱口開前板齒痛若發其汗  
則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚皮膚  
既緩腠理開洒然毛疎反寒惡謬加熱藥發斑黃  
可怪庸醫心術誤人自出汗惡寒若行熱藥便發  
黃也

第二十七證

新鑄注解張仲景傷寒發微論 卷二

○五種溫歌

溫病 溫瘧 溫毒 風濕

傷寒春月名溫病脈來浮數是其證發熱頭疼亦  
惡寒久夏比之輕不甚升麻解肌為最良小柴竹  
葉宜相稱以上論溫病也素問云冬傷於寒春必  
於肌膚至春變為溫病故其類尺寸盛芍兼弦數重  
感於寒變溫瘧先熱後寒小柴胡但熱不寒白虎  
藥以上論溫瘧也仲景云若脈陰陽俱盛重感于  
寒者變成溫瘧素問云瘧脈自弦數者熱多  
但熱不寒者白虎加桂湯主之濡弱陰脈浮滑陽  
此是風溫證候當頭疼身熱常自汗四肢不收軀

睡長當治少陰厥陰病誤汗黃者防已湯以上論  
仲景云陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變為風溫也  
其病四肢痠緩又云風溫為病脈陰陽俱浮自汗  
出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小  
便不利直視失溲若被火者微發黃色則則如驚  
癇時痰涎也少陰火也厥陰本也當治之也陽脈濡  
火風木誤汗之則用黃耆防已湯救之也  
方陰弦緊更遇溫氣來行令變成溫疫作天行少  
長皆同無異病溫寒清熱順時宜以平為期如斯  
正此論溫疫也仲景云陽脈濡弱陰脈弦緊者更  
遇溫氣變為溫疫一歲少長皆同病者溫疫也  
最重溫毒為可怪陽脈洪數陰實大發斑癰疹如  
錦紋咳兼心悶何由快此論溫毒也(即景云)陽脈  
浮數陰脈實大更遇溫熱



變成濕毒溫毒溫病最重也故發斑生疹咳嗽心中不快病困宜用玄參升麻湯宜用玄參升麻湯長沙仲景分明載

第二十八證

○三種濕歌

濕溫 中濕 風濕

濕溫中濕并風濕三者同名而異實暑濕相搏成濕溫胸間多汗頭如劈兩脛逆冷苦妄言陽濡而弱陰小急

名的一身盡痛兼發黃大便反快小便澀

為病一身盡痛熱色如薰黃濕家其人但頭汗出皆強欲得發熱向火若下之早則心胸滿小便不利舌上白胎者以舟田在熱胸中有寒渴欲

腹中無病病若頭中寒濕故鼻塞納鼻中則愈

本是風雨山澤氣中之令人成此疾第三風濕

但浮腫體痛重難轉側額上微汗身微腫不欲去

被憎寒栗此論風濕也風濕之證仲景云一身盡汗出當風或久傷取冷所致也故發汗熱熱欲潤

身風濕俱去斯為良法當汗出而解也

止醫云此可發汗之病不愈何也

汗大出者但風氣未盡在是故不愈也

者發汗微微出者則防已黃耆木附湯對證用之醫可必湯皆治風濕自汗

第二十九證

○兩種瘧歌

發熱惡寒頭項強腰脊分明似反張瘧瘵口噤如

瘧狀此名瘧病是其常

症相當

柔瘧無汗惡寒名曰剛無汗葛根有汗桂二瘧皆

宜續命湯

陽瘧并陰瘧名異實同安可忘

第三十證

○四證似傷寒歌

食積虛煩并有痰更兼脚氣似傷寒四家病證雖

云異發熱憎寒却一般

此四證雖非傷寒然發熱



中腕寒痰胞痞滿脉浮自汗體難乾此痰證也

滿自汗食積令人頭必痛身不疼兮積證端氣口

緊盛傷於食心煩脉數嘔吞酸此食積也食積則

酸氣口脉紫或而他脉數身不疼但嘔惡吞

未眩云氣口紫盛傷于食虛煩之脉不紫實但覺

身心熱與煩身不疼兮頭不痛唯宜竹葉便須安

孫尚云虛煩與傷寒相似但得病二三日脉不浮

不惡寒身不疼痛但熱而不煩不可發汗發汗必

危損如脉不紫實不甚痛但熱而或不煩非裏

實亦不可下下之必危損唯可服竹葉湯主之

有脚氣之為病大便堅硬足行難兩脛腫滿或枯

細莫與傷寒一例看此論脚氣也脚氣大便堅脚

枯細者方其發也亦發熱憎寒嘔惡似傷寒證候也

第三十一證

○可汗不可汗歌

脉浮唯宜以汗解春夏用之何足怪仲景云脉浮

夏宜汗風若傷衛屬桂枝寒傷榮血麻黃快

屬麻黃二藥雖均曰發汗自有淺深也項強凡

凡葛根湯心間水氣青龍對仲景云項背強凡

下有水氣者小少陰亦可微發汗附子麻黃泄其

外麻黃附子甘草湯微發其汗風濕發汗惡欲瀉

風氣去兮濕氣在唯宜浥潤徧周身濕氣風邪俱

已退汗出者風氣雖去濕氣仍在也大抵天運汗

為逆以後諸症皆不足血氣微少不可汗尺中微

弱斯為害濡反在顛不可發汗發汗則寒探至矣

少陰沉細病在裏少陽弦細却內主仲景云少陰

在裏不可發汗又云傷寒脉弦細頭兩厥若汗必

痛發熱此屬少陽少陽不可發汗四動汗之還室礙

舌萎厥不可發汗發汗則聲四動汗之還室礙

在左動氣在上動氣在下動氣瘡家汗之必成痊淋

家汗之便血發勿家汗之額上陷咽乾汗之咽却

隘仲景云瘡家汗之不可攻其表汗之必痊

視不得胸不能眠咽乾燥者不可發汗亡血汗之必

寒慄汗發汗則寒慄而振汗家重汗精神憊

家重發汗必恍惚少陰強汗動經血仲景云少陰

心亂小便已陰痛虛煩壞病尤須戒可發汗宜用

其血動虛煩壞病尤須戒可發汗宜用

之月經適斷適來時切莫動經成胃味此小柴胡

知人

第三十二證

○可下不可下歌

新鑄注解張仲景傷寒發微論 卷二



宿食不消當下之寸口大尺中微

曰寸口脈浮大按之反滿天中

亦微而溢當下之承氣湯主之

神景云陽明熱在裏身譎語柴胡湯最宜

出而譎語者有燥屎在胃中此風也

過經乃下之宜大承氣湯大柴胡湯

圓對瘀血抵當不可遲

堅硬惟承氣痞氣瀉心湯勿疑

瀉心湯脈若陽微下則痞

或兼虛細更難之

浮大下之死

傾危

者表證在

不可下

氣必澹利

失氣者為有燥屎

難為

須忌

已虛脾

上下有動氣更在調和仔細醫

咽燥鼻乾頭眩心悸動氣在左下

動氣在上下之則掌握熱煩動氣在

必清血

陽明被火必怵惕

躁昏迷并發熱

中風忽然被火劫咽爛發黃津液竭

發其汗邪風被火劫咽爛發黃

逆虛家止可溫誤吐內煩誰受責

第三十四證

○可火不可火歌

傷寒大法春宜吐

胸中鬱鬱兼有涎寸口微數知其故

○可吐不可吐歌

傷寒大法春宜吐

胸中鬱鬱兼有涎寸口微數知其故

傷寒大法春宜吐

胸中鬱鬱兼有涎寸口微數知其故



小便難強責汗時翻作孽仲景云少陰病效而下利譫語是為被火劫故也或致虛煩不得眠或致發黃中

鬱結或致下血如豚肝或致譫言語無節仲景云陽明病

加溫針則煩躁不得眠陽明病被火劫額上汗出必發黃瘵熱在膀胱蓄結成積則下血如豚肝大

切必譫語此皆誤火之為病切須仔細加分別

張苗欲汗外迎之却取燒蒸布桃葉陳廩丘問張苗連發汗不出如何苗云亦可燒地布桃葉蒸溫之氣於外迎之可得汗也

第三十五證

○可木不可水歌

太陽汗後不得眠少與水飲當自全仲景云太陽病發汗後若

大出汗出胃中乾燥煩而不能眠其厥陰煩渴思得人欲飲當時飲之胃中和則愈矣

水斟量多寡亦如然仲景云厥陰病渴欲飲水者與水飲之則愈也霍亂

思水五苓妙嘔吐思水猪苓痊仲景云霍亂頭痛發熱身疼痛熱

多飲水五苓散主之又云嘔吐而病在過多反病

膈上後必思水者急與猪苓散飲之也

成喘咳小青龙證云水咳胃冷應知嘔噦愆

冷其人不能水嘔皮上有粟起仲景云病在陽當

食飲水則嘔水嘔皮上有粟起仲景云病在陽當

去益煩皮上粟起者是也水洗結胸熱可憐仲景云

水洗之灌之則益熱寒氣得水即成餒音噎食

汗大出以得寒氣冷必相搏其人即餒也可否

第三十六證

○可灸不可灸歌

少陰吐利時加嘔手足不冷是其候口中雖和背

惡寒脉來微瀝皆須灸仲景云少陰病其人吐利

脉不此者灸厥少陰七壯又云少陰一二日口中

和者惡寒者當灸之又云下利脉微澁者灸厥陰

十壯陰毒陽虛汗不止腹脹腸鳴若雷吼面黑更

兼指甲青速灸關元應不謬東垣陰證訣云陰毒

微數之脉却慎之因火為

邪恐難救仲景云微數之脉慎不可灸因火為

浮熱甚灸為難唾血咽乾不可灸仲景云脉浮熱

血自微數之脉以下皆不可灸也

第三十七證

○可針不可針歌

太陽頭痛經七日不愈再傳成大疾法中當刺足

陽明可使不傳邪氣出仲景云至七日自當愈其經

也若欲再傳者刺足陽桂枝服了煩不解風府風



池刺無失仲景云大湯病服桂枝湯而反煩不

則愈者當先刺風池風府却與桂枝湯服之

風經水適來又云經水適斷熱入項強當刺大椎

間脈有縱橫肝募吉仲景云太陽與少陽併病心

第一問又曰肝乘脾名縱肝乘肺而眩當刺大椎

月從腰以下如水溢當刺勞宮及關元以利小便

去心實仲景云婦人傷寒懷身腹痛從腰以

刺之逆熇熇之熱漉漉汗渾渾之脈安可失素問

刺熇熇之熱漉漉淺深分寸自依經此道相傳休

秘密

第三十八證

○傷寒可溫歌

大抵冬宜熱藥温大法冬宜下利少陰有二門仲景

云法中可温者有九證皆腹滿身痛先救裏

下利與少陰兩家而已腹滿身痛先救裏

發熱頭痛脈沉若不差身休更疼痛用救其表

四逆湯又云下利腹滿身休更疼痛用救其表

為脈來遲緊痛仍存仲景云下利脈遲緊而痛未

少陰膈上有寒飲仲景云少陰病其人飲食不

則吐心中温温欲吐復不得

吐始得之手是寒脈弦逆若膈上

有寒飲乾咳者切不可吐當温之

或加嘔利病難

分脈沉微澁如斯證四逆理中湯可温仲景云少

微澁者即嘔泄行者必數更衣反少當温之又云脈

沉者急當温之宜以四逆湯仲景云云謂温者

可與理中四逆附

子湯熱藥治之

第三十九證

○發熱歌

太陽發熱惡寒慄陽明身熱汗自出少陽發熱多

乾嘔三陽發熱證非一仲景云發熱而惡寒者發

太陽證云當發惡寒發熱也大抵三陽多發熱

寒慄也陽明證云身熱汗出不惡寒反惡熱故陽

明發熱則自汗也少陽證云頭痛發

易治熱多寒少因寒極寒極生熱故熱多者寒之

解熱大小柴胡湯更看淺深為妙術證當用大小

柴胡湯熱淺者宜小柴胡熱深者宜大柴胡小柴

胡解肌大柴胡正下之也當以外證內脈為之準

三陰初無發熱證唯有少陰兩證實脈沉發熱屬

麻黃裏寒外熱宜四逆仲景云少陰病始得之症

附子湯主之云云少陰病下利清穀裏

寒外熱手足厥逆通脈四逆湯主之

第四十證

○潮熱歌



潮熱為實當與下仲景之言可憑藉仲景云潮熱者實也大法

更看脉自浮與沉若但弦浮應未也仲景云脉沉為

在裏若但脉浮弦惡寒脉浮表證在與小柴胡湯

勿下仲景云陽明病有潮熱若汗出多腹滿不通

小承氣但和胃氣無多瀉仲景云若腹滿而不大便者

勿令天下潮熱之證有三說皆屬陽明小柴訣一

則潮熱且吃噫二則微熱或溘世仲景云陽明中

短氣腹痞滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不

得汗其人嗜甘一身及目悉黃小便難有潮熱特

便溘小便自可而胸脇滿不去者小柴胡湯主之

三則日晡發其時發已微利增嘔噦乙劣切逆

其人日晡而發潮熱太陽亦有一證存惟是結胸

發潮熱仲景云太陽重發其汗而後下之不大便

心下至小腹堅滿而痛者宜與大陷胸湯

新鑄註解張仲景寒百證歌發微論卷三

第四十一證

○往來寒熱歌

陰陽相勝互爭強往來寒熱亦何常先寒後熱為

陰盛先熱後寒責在陽陰陽交爭故往來寒熱陰

故先熱也此疾大約有三證大小柴胡薑桂湯中風

胸滿不欲食心煩喜嘔小柴良仲景云中風往來

嘔者屬小柴胡湯熱結在裏十餘日却是大柴胡

克當仲景云傷寒十餘日熱結在裏已汗復下胸

脇滿柴胡薑桂保安康仲景云傷寒五六日已汗

便不利渴而不嘔但頭汗出往來

寒熱者柴胡桂枝乾薑湯主之

第四十二證

○汗之而熱不退歌

已汗復下脉加躁不食狂言謾祈禱此證謂之陰

陽交死候難醫不可道素問云汗出而身復熱脉

食病名為何也曰病名陰陽交也此其人所以汗

出者皆生於穀穀生於精今邪氣隱藏於骨肉之

間而得汗者邪聚而精勝則當食而不能食熱者

邪氣也汗者胃氣也若汗出而狂言不能食邪盛

也死候得汗脉靜自然生汗後復熱命難保而時



脈若浮數可再汗況實之時下為好不得  
當汗下之浮尚可風溫之候屬萎蕤風溫自汗而  
虛煩竹葉湯為實虛煩自汗出而熱更者虛實治  
為宜可細斟量休草草淳于意診齊中御府長信  
者死今切之不交併陰陽者脈脈靜稱脈法熱病陰陽交  
順靜而愈其熱強邪未盡猶活也

第四十三證

○下之而仍發熱歌

病人脈微來又瀉誤汗誤下皆為失脈微則氣虛  
二者不可汗下既下而又汗津皆虛故發熱也既汗亡陽斯惡寒又下

陰微還熱極陰虛者陽必勝之既下則陰虛故陽  
則外熱陰虛則入陰分所以內外皆熱素問云陽虛  
內熱故熱極也最忌陰陽皆已虛熱又不止病斯

亟更有勞復并食復失於調治并將息既下之後  
今下之而復熱者不時汗出之誤亦有勞復食復二證  
治之新差血氣尚虛羸勞復生熱無氣力勞復則  
少脾胃尚弱食過多食復發熱還憎食食復則發  
臭矣小柴枳實梔子湯數者用之宜審的熱嘔吐憎

第四十四證

○惡寒歌

惡寒發熱在陽經無熱惡寒病發陰仲景云發熱  
發於陽也無熱而惡寒者病發於陰也陽宜發汗麻黃葶陰宜溫藥  
理中寧葶發於陽宜桂枝麻黃青龍畜畜惡寒桂枝  
證仲景云畜上惡寒畜汗後惡寒虛不任汗後惡  
脈微惡寒不可下尚宜發汗莫令深雖發汗亦故  
可也亦有頭汗惡寒者柴胡加桂值千金而惡寒  
者仲景用小柴胡加桂湯汗已惡寒心下痞附子增加入瀉心  
附子瀉心湯主之方第十八證

第四十五證

○背惡寒歌

背陽腹陰各異位陽弱惡寒多在背素問云背為  
惡寒者一則三陽合病生仲景云三陽合病額上  
陽弱也一則少陰寒在外仲景云少陰病得之一二日  
一則少陰寒在外仲景云少陰病得之一二日  
湯主之欲識陰陽病不同口和不和各分配仲景云  
口不仁者三陽合病也又云合病口燥并不仁白  
虎抑陽是其對仲景以白虎治少陰口和須灸之  
附子湯兼陰自退解在上

第四十六證



厥歌

有冷厥者熱厥脈證須當仔細別冷厥緣病四肢  
 冷脈但沉微身不熱冷厥初得病便覺四肢逆足  
 多擊卧并惡寒引衣自覆仍不渴神景云凡厥者  
 順接便為厥厥者手足厥冷是也故熱厥身熱頭  
 且痛三四日內厥方發半日之間熱復回揚手擲  
 足煩燥烈熱厥與冷厥本自不同冷厥終病便厥  
 來也揚手擲要之熱深厥亦深熱微厥亦微相侵  
 足心中煩燥神景云傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥  
 者後必熱厥深熱亦深厥微熱亦微厥愈下之而  
 發汗者必血氣不通手足冷醫人不識却疑陰其  
 口傷爛赤脈沉伏而更滑頭面有汗指爪溫急便下之安可  
 慢不然疑似禍相仍沉伏而滑伏熱在內也四肢  
 則愈又有正汗來相逼兩手一手忽無脈手足厥  
 冷面不澤細辛甘草湯脫厄朱肱云忽然兩手  
 恐是正汗來故有此證用細辛心下怔忡  
 并草湯以助其汗汗出則可愈心下怔忡  
 心職容切也厥有水脈緊厥時邪在裏傷寒厥  
 而心下悸先治其水當與茯苓甘草湯後治厥不  
 爾其水入胃必利又云病者手足冷脈乍緊者邪  
 結在胸中下瀉而煩即不能食發熱七八日身冷

此名藏厥為難治神景云傷寒脈微而厥至七八  
 者其人當吐

第四十七證

結胸歌

病發於陽下之早熱氣乘虛心慄慄神景云病發  
 成結胸者下之早故也按之石鞭頭項強此是結  
 胸證分曉神景云結胸者頭項亦強如柔痙狀下  
 堅脈浮與大未可下先汗後下無顛倒神景云其  
 可下下熱毒上攻結在胸枳實理中應恰好大抵  
 之則死神景云

大抵結胸有三說大結小結并水  
 理中加大枳實佳大結胸有水結胸  
 結無大熱者此為水結在胸膈也但頭汗出者大  
 湯治更有寒熱二證存熱實寒實宜區別神景云  
 從心下至小腹滿痛不可近者大陷胸湯主之此  
 大結胸也又云小結胸病正在心下按之痛脈浮  
 滑者小陷胸湯主之此小結胸也又云傷寒結胸  
 熱實脈沉緊心下痛大陷胸湯主之此熱實者也  
 又云寒實結胸無熱證者三物小陷胸湯主之此  
 陷胸湯白散亦可服此寒實者也此外有證名臍  
 結脈浮關小沉細絕神景云飲食如故時時下利  
 結舌上白胎滑者難治也舌上滑胎不可醫痛引陰筋當死別  
 神景云難治也陰筋者此名臍結死也結胸之狀如



痙病從心至臍不可近仲景云結胸者項亦強如胸不可近大心中懊憹并躁煩陽氣內陷非虛斬動屬短氣煩躁心中懊憹心下因硬則為結胸也

第四十八證

痙為結胸否為痞音被關脈皆沉本同類仲景云

而反下之因作痞仲景云陽論云病發於陰而反下之熱入因作結胸病發於陰而反汗之因作痞蓋痛則為結胸不痛則為痞結胸與痞寸脈浮關脈皆沉關上若浮且瀉心浮者大黃黃連瀉心湯主之發渴煩躁五苓對

佳先與服之使行氣湯往人治痞氣多作結梗枳實湯下利雷鳴心下硬甘草瀉心湯可治仲景論中瀉

第四十九證

發黃歌

寒濕在裏不能散熱蓄脾中成此患濕熱宿穀更相搏鬱塞不消黃色綻巢氏云寒濕在裏則熱蓄

宿穀相搏煩鬱不得消則大小便不通故身熱面目皆變黃色頭面有汗劑頸止渴飲水漿黃莫問仲景云但頭汗出餘處無汗劑浮滑緊數脈來時茵陳五苓皆可選茵陳蒿湯五

之瘀血之證亦相類大便必黑此其異血證其間發發狂要須辨別無乖戾先發黃與瘀血其證相似

便黑色仲景云太陽病六七日表證仍在脈微而沉及不結胸其人發狂者以熱在下焦小腹當硬利其人如狂者血證諦也白虎之證亦身熱大率異同難辨別白虎不能遂發黃蓋為周身汗發

越白虎與發黃證亦相似但白虎周身發汗更有中濕并中風發黃大抵亦皆同濕則黃黃身盡痛

第五十證

發狂歌

發狂二證當別白陽毒蓄血皆憑脈發狂有二證有蓄血陽毒發狂多乾嘔煩躁脈實并面赤難經陰者顏蓄血如狂脈沉微但欲嗽水不咽入小



腹硬蒲小便利不發寒熱大便黑仲景云陽明病在表微而沉及不結胸其人發狂者以熱在下焦小腹痛硬蒲小便利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏大抵當汗而不汗熱化為血故也抵當湯主之  
如何散血上蓄芍喜忘多血下蓄芍遠悶亂素問血在上則狂血在下則狂更有火劫發狂時桂枝救逆湯加減  
仲景云傷寒之脈浮而醫以火迫劫之亡陽發狂易治不安屬桂枝去芍藥加蜀漆牡蛎龍骨救逆湯

第五十一證

○發斑歌

溫毒熱病證兩般發斑隱疹滿身間仲景云風熱疹身熱為毒溫毒冬月冒寒氣至春始發在皮端此證謂冬月冒寒至春陽氣盛發于表膚者熱病表虛而裏實熱毒不散錦紋斑不可發汗重開泄升麻湯葦可求安運熱病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁謬語此為表虛裏實熱氣燥于外故身熱發斑如錦紋凡發斑不可用發汗藥令毒重發也  
增斑其熱微者赤斑出者黑斑出者赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生

第五十二證

○發喘歌

傷寒喘急是其常先論陽明及太陽太陽無汗麻黃證仲景云太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛下之微喘者表未解也桂枝湯加厚朴杏子湯  
陽病下之微喘者表未解也桂枝湯加厚朴杏子湯  
無大熱者不可與麻黃湯  
杏子其草石膏湯  
陽明朝熱小承湯仲景云潮熱小承湯熱短氣腹  
當咳或渴或利小腹痛而喘者小承湯熱短氣腹  
喘時須喘急反陰丹葦用為良陰證喘與陽證喘  
宜用反陰丹治之也

第五十三證

○發渴歌

脈浮而渴太陽病有汗而渴陽明證渴而自利屬少陰三者不同須審訂仲景云發汗已其津數煩中燥者若多而渴者不可與發汗湯以其汗多胃吐復不得吐而煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰此三證渴雖同其病則異也自非大渴莫與水小渴唯宜滋潤爾若令劇飲心下蒲縷成水結難調理仲景云太陽病胃中乾燥煩不得愈渴太陽無汗休供白虎湯汗後脈洪方可與此  
證思之要審量太陽病須汗後大渴方可行白虎亦須白虎加人參也仲景云傷寒脈



浮發熱無汗者表未解不可與  
 白虎湯渴者白虎如人參主之渴陽明有汗且休  
 供五苓小便不利汗仍少脉浮而渴用為精  
 明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中  
 燥猪苓復利其小便便故也又云若脉浮發熱渴欲  
 飲水小便不利陽毒躁盛黑奴用中暑黃連圓酒  
 蒸黑奴圓千金方也酒蒸黃連圓活人書方二  
 蒸藥雖非仲景之方然治陽毒中暑最為有效

第五十四證

○吐血歌

諸陽受病蘊邪熱在表當汗汗不發粟源有云吐  
 陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使  
 熱毒入深結于五臟內有瘀積故吐血也熱毒入  
 深結在中瘀血既停須吐血輕者犀角地黃湯重  
 者抵當方能絕小品犀角地黃湯主傷寒及濕病  
 吐血者此湯主之尺下寸口脉沉遲吐血升麻  
 抵當湯治瘀血在內尺下寸口脉沉遲吐血升麻  
 安可缺成陽毒或吐血下痢其脉浮大數面赤斑  
 如錦紋吐血者此湯主之

第五十五證

○衄血歌

太陽陽盛必須衄衄已解時何福幸  
 無汗或衄者愈蓋太陽病浮緊無汗係麻黃脉浮  
 有因衄血而便自解者

自汗桂枝葛二者服之不中病脉尚如前宜再  
 之故自汗脉浮緩宜桂枝也麻黃桂枝正分表裏  
 候不可不審察細詳仲景之書又云陽明病口燥  
 但欲飲水不啜入者此必衄衄家不可攻其表汗  
 出額上陷直視不得眠不能食又云亡血家不可  
 攻其表汗出衄後脈微血已虛慎勿服之令病篤  
 則寒慄而振衄後脈微血已虛慎勿服之令病篤  
 且看犀角地黃湯不止茅花須預速若脉微血虛  
 皆不可用也小品犀角地黃湯陰證本來無此候少  
 湯活人書云茅花湯皆可用陰證本來無此候少  
 陰強發紅來觸下厥上竭不可醫血流口鼻或耳  
 目知從何道出或從口鼻耳目中出是為下厥上  
 竭治

第五十六證

○吃噫歌

胃氣為噦名吃噫  
 極古人方書無吃字惟有一極皮乾薑退陰散或灸  
 乳下皆得力灸法見活人又有陽明小柴胡視其  
 前後部何如神景云傷寒噦而渴者視其  
 熱必生噦仲景言之豈妄歟其熱必噦噦火外切  
 又於月切更有一證欲作汗陰陽升降致電和胃  
 逆氣也

子部醫家類 8 之三



氣上逆無休止逡巡中汗自然除常說

第五十七證

○謔語歌

實則謔語虛鄭聲兩般相似最難明仲景云實則謔語虛則鄭聲

聲鄭聲者重語也直視謔語而大小便利手足冷

更兼脉細是虛形此鄭聲也脉來洪數二便秘謔語

為因實得名謔語之證本非一或因下利或胃實

云下利而謔語為有燥屎承氣湯主之又云陽明病其人多汗津液外出胃中燥大便必堅堅者謔語承氣

湯主之三陽合病或瘀血或是熱入於血室仲景云三陽合病腹滿身重難以轉側口中不仁謔語又大

云陽下滿如結胃狀其人謔語此皆熱入血室大抵發熱陽脉生反見陰脉斯為逆謔語發熱見陽

者死也

第五十八證

傷寒煩躁證如何陽明證與少陰科陽明脉長大

便秘仲景云陽明脉長自汗出醫復重發其傷風

之候太陽多仲景云太陽病服桂枝湯煩不解者

桂枝湯復大煩渴不解服桂枝湯又云服

解脉洪大者白虎湯

陰盛陽虛亦煩燥少陰之證

新鑄注解張仲景傷寒發微論 卷三

莫令訛大抵陰虛而陽虛亦煩故少陰證多煩躁者矣仲景云少陰病惡寒而倦臥自煩欲汗下

去其衣者可治又云自利煩躁不得眠者陰汗下

而煩者誤仲景云傷寒可下發汗虛煩脉甚微

病解而煩氣未和更有虛煩宜竹葉葉莫作傷寒

致誤作系兆云虛煩熱疾與傷寒相似得病二三

表候不可發汗如脉不惡寒身不疼痛但熱而煩非

實不可下汗下必危損但用竹葉湯主之其病自

愈也

第五十九證

○懊憹歌

傷寒懊憹意忡忡懊於告反擾千金音或實或虛

病胃中結胃下早陽內陷陽明誤下胃虛空懊憹

三此一證胃中因下空虛而致也仲景云胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊憹陽氣內陷心中

因硬則為結胃又云陽明證其脉浮緊下之則胃

中空虛客氣動膈心中懊憹舌上白胎者梔子湯

主之若渴欲飲水

客氣動膈心中躁梔子湯兼大

陷胸結胸陷胸湯主之胃中燥屎宜承氣腹滿頭

堅不可攻此一證胃中下後燥屎也仲景云陽

者可攻其人腹微滿頭硬後必煩胃中有燥屎

可下之有燥屎者宜承氣湯主之

第六十證

新鑄注解張仲景傷寒發微論 卷三



○佛鬱歌

佛鬱有虛亦有實要須仔細明證脈... 下者燥屎惟宜承氣湯... 汗出日須黃... 二陽併病面還赤... 洪大榮氣長... 經醫治何由失

第六十一證

○驚惕歌

傷寒何故生驚惕吐下溫針或火力... 下之謔語牡蠣湯... 風溫被火多痢... 陽明被火汗流... 出仲景云陽明病被火額上微汗出發熱汗脈浮

火劫必亡陽... 吐下悸驚常惕惕... 目赤胸中滿而不煩不可吐下

第六十二證

○心悸驚

傷寒心悸有多端大抵三陽不一... 陽太陽便利多飲水... 陽明煩嘔小便難... 利心煩善嘔者少陽吐下仍虛悸

第六十三證

建中行三日間... 甘證肉瞤真武定須安... 自胃心下悸欲得按者桂枝甘草湯... 者頭眩身瞤動振振欲擗地



○胃悶歌

二陽併病必須胃宜刺六椎當慎表仲景云太陽

痛或眩冒時如結胸硬當刺大下利面赤脉沉

推第一間肺俞肝俞慎不可發汗仲景云下利脉沉其人面

汗出中心常鬱憤仲景云下利脉沉其人面

必鬱胃吐下汗後或動經傷寒吐下後發汗虛煩

硬氣上衝咽嗝鬱胃筋汲水灌身那得好仲景云

脉動揚未久而成汲水灌身那得好仲景云

身慄慄振寒則以重被覆之故汗出而胃須汗出

表裏已先虛汗出表和痊可保仲景云太陽病下

以致表裏俱虛其人必冒家汗自

出愈所以然者汗出表和故也

第六十四證

○乾嘔歌

陽明胃絡從頭走氣上逆行須便嘔嘔者胃不和

頭走足今氣上陽明多嘔小柴胡仲景云傷寒五

行而逆故嘔也嘔者胃中煩而嘔小柴胡湯

胸中有熱黃連候傷寒嘔

中有熱胃中有邪氣腹中痛欲水停心下茯苓甘

-15 121 35 478" data-label="Text">

發熱吐下後心下逆滿者茯苓甘草湯先嘔後

-35 121 15 478" data-label="Text">

渴五苓散仲景云嘔而渴汗後餘熱竹葉湯

-55 121 35 478" data-label="Text">

嘔逆者竹葉煩虛梔子豉湯煩虛者梔子豉湯

-75 121 55 478" data-label="Text">

湯或橘皮湯

禁嘔而有癰膿者不又有少陰嘔證存真武湯中

可治嘔膿盡乃愈仲景云少陰病二三日不已至四五日

加減否仲景云小便不利四肢沉重疼痛而利此為有

水氣其人或咳或利或下利或

嘔者玄武湯主之論中有加減之法

第六十五證

○吐逆歌

吐有冷熱兩證異内脉外形當仔細吐有胃冷者

内脉外煩渴脉數手心熱此是胃熱之所致孫尚

來數手心熱煩渴者曾經汗下關脉遲胃中虛冷

胃熱也竹茹湯證曾經汗下關脉遲胃中虛冷

理中治中脘及湯主之理中寒痰四逆湯

膈上有寒欲乾嘔者不汗後虛煩竹葉已汗後虛

可吐當溫之宜四逆湯

者竹葉并少陰欲吐復不吐必竟吐之當審記仲

橘皮湯證少陰欲吐復不吐必竟吐之當審記

吐始得之手足寒脉弦遲此胃中實也不可下當

-75 515 115 865" data-label="Text">

第六十六證

-35 515 75 865" data-label="Text">

○霍亂歌

-15 515 35 865" data-label="Text">

嘔吐而利名霍亂仲景云病有霍亂者何也四肢

-55 515 15 865" data-label="Text">

逆冷誠斯患寒多不飲理中圓熱多而渴五苓散

-95 515 55 865" data-label="Text">

仲景云霍亂而頭痛發熱身熱多欲飲水

-135 515 95 865" data-label="Text">

五苓散寒多不飲食者理中圓在之又云吐利汗



手足厥逆寒四厥拘急 暑月忽然心撮痛兩脚轉

筋多冷汗上吐下利并躁煩水沉香薤煎數匙  
陰陽不和清濁相干飲食飽傷於脾胃而又取  
涼就冷陰陽交錯變成吐利三焦瀾亂腹中燥  
者當用香薤散主之

第六十七證

○頭疼歌

三陽往往病頭疼隨證醫治各異能三陽經絡  
三陰至胃中而還故三  
易之邪至頭必頭疼也  
太陽身熱麻黃證  
少陽身熱無汗  
而喘者麻黃湯主之  
無熱陽明胃氣蒸  
明病手足

若厥者其人頭必痛若不嘔  
不飲手足不厥者其頭不痛  
少陽受病脉弦細小

柴胡證自分明  
此為屬少陽少陽不可發汗則諸  
愈不和則煩而悸  
三陰太少無頭痛為是厥陰之  
證形無頭痛唯厥陰有也  
非時忽有瘡首疾消出

此必是停痰濕氣并  
停痰濕氣亦  
令人頭痛

第六十八證

○脇痛歌

少陽膽經循脇過邪入此經痛無邪  
腰脇痛仲是  
循脇貫耳因邪在  
心下堅滿引脇痛十棗醫治定

須可  
明堅蒲大便結項強不食并潮熱因而轉入少陽

經唯小柴胡湯緊切  
仲景云陽明病不大便腸下  
胡湯又云項強下滿者不可與小柴胡湯又云傷  
寒五六日中風往來寒熱胸脇若滿默默不欲食  
少陽病下之宜瀉之

貫膈傍痛引陰筋名藏結  
仲景云病者膈下痛素  
有痞積在膈傍痛引小

腹入陰筋  
若名藏結

第六十九證

○腹痛歌

腹痛有實亦有虛要觀證與脉何如尺脉帶弦并  
泄利陽明虛痛建中須  
仲景云傷寒陽脉濇陰脉

建中  
關脉若實大便秘更加腹滿實中居  
仲景云

大便繞臍腹痛煩躁  
陰證腹痛四逆散  
仲景云少

主之或散主之  
又云少陰病下利清穀裏寒外熱脉

欲絕脉不出或腹中痛通脉四逆湯主之  
又云少

湯主之  
下之腹痛桂枝法  
太陰病屬太陰桂枝法

者加大黃湯也  
胃中有邪胸中熱嘔吐黃連湯可  
除  
仲景云傷寒胸中有熱胃中有邪  
氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之



第七十證

咽痛歌

咽痛陰陽各異宜要須脈證兩參之脈浮而數吐

膿血此是陽毒之所為陽毒脈浮數而大嗜膿血

脈沉兼細手足冷或加吐利少陰本仲景云少陰

復吐少陰陰陽脈俱緊亡陽汗出要醫治仲景云

陽俱寒而反汗出又有伏氣之為病非時寒冷者

人肌咽喉先痛次下利作腎傷寒方可醫仲景云

病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有伏氣

當須脈之若脈微弱者當候下利傷寒下證

也病人云實喉中痛維爾今復欲下利

第七十一證

欬嗽歌

咳三經要辯明太陽陽明與少陰太陽停水青

龍候仲景小青龙二證皆云心下有水氣乾嘔發

咳而微喘者小柴治欬值千金仲景云心下有水氣

利身有微熱或欬陽明能食咽必痛欬時頭痛定

難禁仲景金匱云冬陽明但頭痛不惡寒故能食

其人頭必疼若不嘔不欬手足不厥者頭不痛少

陰煩渴猪苓治洩利須還四逆仲景云少陰病

而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之又云少陰四

逆其人或咳小便不利腹中痛泄利者四逆湯

忽然水氣因生欬真武湯功效最深仲景云少陰

已至四五日腹痛小便不利四肢沉重而利

玄武湯此為有水氣其人或咳或小便不利或嘔

第七十二證

遺尿歌

風濕被下必失洩射睡難言自汗流仲景云風濕

俱浮自汗出身重多眠睡息必射語為病肺陰陽

言難出若被下者小便不利互視失喪三陽合病

身體重不覺遺尿也可憂仲景云三陽合病腹滿

向經語遺尿發汗則語下之則額下佳不歸

亦遺溺三者依方病可瘳仲景云下焦不歸其部

可愈忽然直視并狂言腎絕如何得久留仲景云

失狂言及目直視者此為腎絕也

第七十三證

腹滿歌

太陰腹滿必時痛仲景云太陰之為病腹滿時

病腹滿身體重仲景云三陽合病腹滿時痛



苦乾微喘小柴胡可用仲景云陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱脈浮而

而下之則腹滿而小便秘也穀疸之時且調胃仲景云陽明病下之則腹滿潮熱更兼便不利勿令大下使之虛微和

胃府宜承氣仲景云陽明脈遲腹滿而喘有潮熱便者小承氣微和下後心煩而腹滿下後心煩腹滿汗後厚朴最為

宜爾仲景云傷寒下後心煩腹滿汗後厚朴最為吐後小承當審諦仲景云傷寒吐後腹

佳仲景云發汗後腹脹太陰桂枝芍藥湯大實大黃

湯可治仲景云太陰病腹脹下之則腹滿時痛屬大陰桂枝芍藥湯大實痛者則用大黃

第七十四證

○虵厥歌

胃冷仍加發汗重因成虵厥吐長蟲病源本屬厥

陰證宜用烏梅與理中仲景云虵厥者其人當吐今病者靜而復時煩此為

第七十五證

○自汗歌

傷寒自汗證有九衛不和芍桂枝候仲景云病人

傷寒自汗證有九衛不和芍桂枝候仲景云病人

傷寒自汗證有九衛不和芍桂枝候仲景云病人

傷寒自汗證有九衛不和芍桂枝候仲景云病人

傷寒自汗證有九衛不和芍桂枝候仲景云病人

發熱自汗出而不愈者此衛氣不風温風濕及

和也仲景云風温為病陰陽俱浮自汗出身重多

風仲景云風温自汗也此傷風自汗也仲景云太陽中風陰弱汗出微喘

此傷風自汗也仲景云太陽中風陰弱汗出微喘

自汗也中暑亡陽柔症有仲景云太陽中風陰弱汗出微喘

微惡寒脚筋急也仲景云傷寒自汗出惡寒身熱而渴

出附子温經七陽故也仲景云傷寒自汗出惡寒身熱而渴

出為亡陽屬少陰也仲景云傷寒自汗出惡寒身熱而渴

發熱汗出不惡寒名曰霍亂下利四肢逆仲景云太陽病

無汗或有之額上手背時時透仲景云陰不得有

第七十六證

○頭汗歌

病人裏虛而表實玄府不開腠理密無能作汗潤

皮膚陽氣上行頭上出津液既竭五內乾誤下重

虛成大疾病人表實玄府不開汗不能流於周身

津液寡少又重責頭有汗兮多塗徑劑頸而還發

津液寡少又重責頭有汗兮多塗徑劑頸而還發

津液寡少又重責頭有汗兮多塗徑劑頸而還發

津液寡少又重責頭有汗兮多塗徑劑頸而還發

津液寡少又重責頭有汗兮多塗徑劑頸而還發

津液寡少又重責頭有汗兮多塗徑劑頸而還發



勞病仲景云若不結胸但頭汗出餘處無往來寒

熱表未解仲景云傷寒五六日其人已發汗而復

但頭汗出往來寒熱而煩此手足冷時非陰證仲

為未解小柴胡湯桂枝湯此

不欲食大便堅其脈細此為陽微結有表裏

也脈雖沉緊不得為少陰所以然者陰不得有

汗今頭汗出故知非少陰也與小柴胡湯

乘肺部刺期門仲景云傷寒發熱畜畜惡寒其人

出小便利其病欲解此肝乘肺名心中懊憹梔子

意仲景云陽明病下之其外有熱手足溫不結胸

主之 膈間堅滿茯苓湯六者者詳宜審訂

第七十七證

○欲得汗歌

陽加於陰有汗期過關之脈要須知素問云陽加

汗俗謂過關之時

無脈者有汗證也病人本虛必發顛不虛得汗顛

何為不顛不汗自然解陰陽和順更何疑先曾吐

下并亡血內無津液故如斯仲景云病有戰而汗

曰脈浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出

也若脈浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解

也若日其脈自微此以當發汗若吐若下若亡血

內無津液此陰止愛澀澀周身潤來時最忌水淋

瀉得汗欲令手足自周繫汗出如油是惡證忽

加喘急病傾危仲景云汗出如油喘停痰塊癖皆

隔汗先須蕩滌要醫治傷寒最相先有宿患如痰

先開達渠道水升火降陰陽合大汗來時命得回

腎水升心火降坎離得交

第七十八證

○舌上胎歌

陰陽俱緊鼻出涕舌上胎滑勿妄治踈卧惡寒多

嘔痰腹內痛者須成利仲景云脈陰陽俱緊口中

鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也至七八日以來其

人微發熱手足溫者此為欲解或到七八日以上

必欲嘔也腹內痛者必欲利也陽明濕痺并臟

結色白胎滑多在舌下二證見臟結無陽不可攻

其人反靜舌上滑胎者不可攻濕痺丹田應有熱

其田有熱胸中有寒濕痺中濕也陽明懊憹脇下

堅梔子柴胡不徒設陽明有二證仲景云陽明心

之又云陽明病勝下堅滿不大便而嘔舌上胎者

可與柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濇

則解



第七十九證

○下膿血歌

傷寒表實裏還虛熱氣乘虛腸裏居下利膿血赤

黃汁或如魚腦狀難拘病源傷寒病若表實裏虛熱下膿血如魚腦或如爛肉汁太陽下之脈浮滑

定知便血色於切如仲景云太陽下之其陽明

下血而譫語熱入血室病難除仲景云陽明病下

證不爾刺之邪可祛仲景云少陰下利便膿血者

利便膿血下利脈浮尺中濇或是發厥熱如初二

證皆圓膿血利悉見長沙仲景書仲景云一證傷

反三四日後熱四日厥少熱多其病當愈四日厥

六日熱不除必清膿血又一證云下利脈又浮數

尺中自濇其人必清膿血

第八十證

○晝夜偏劇歌

衛氣循環不暫停晝則行陽夜在陰衛獨留陽陽

蹻盛陽盛陰虛夜不寧忽若留陰陰蹻蒲陰蒲陽

虛晝却爭黃帝經云衛氣者然晝行於陽夜行

於陰衛氣不得入於陰常留於陽留於

陽則陽氣滿蒲則陽氣盛而不得入於陰陰氣虛

則夜不得寧也對氣晉於陰不得行於陽留於陰

於陽陽氣虛故晝則爭而不得入暮譫晝了陰虛證

晝躁陽虛夜氣清仲景云婦人傷寒發熱經水適

血室又云下之後發熱晝則煩燥不得眠夜而

安靜不眠不渴無表裏證脈沉微身無大熱者乾

薑附子湯主之熱入血室以陰虛而邪入之也故

靜要須調衛各歸分二氣諧和可漸平

第八十一證

循衣摸空歌

傷寒吐下仍不解大便秘潮熱在循衣摸空

不安獨語猶如見鬼怪微喘直視不識人譫語狂

言還可駭大承服後脈弦生忽若濇号死何悔仲

云傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其

人日晡所發潮熱不頭痛如見鬼神狀若劇者緊

則不識人循衣妄撮牀揚不安微喘直視脈弦者

生瀉者莫不死仲景云太陽中風以火劫之兩陽

相薰灼其身發黃鼻動血循衣摸床不可治

便利者可治華陀云病人循衣摸床不可治

第八十二證

○筋惕肉瞤歌

病人肉瞤并筋惕汗過經虛真武敵仲景云大青

肉瞤此為逆也又云太陽病發汗汗出不解其



何發熱心下悸頭眩身動  
振欲擗地者真武湯主之  
不然邪入大經中狀  
如瘕癢驚癩疾發汗動經身振  
推宜用扶苓桂枝  
木則頭眩麻沉發汗則動經身振  
推者扶苓  
桂枝白木甘草湯又云傷寒吐下後汗  
虛麻微眩胃經脈動揚者久而成瘕  
動氣在左  
誤下之忽爾肉暄最為逆  
仲景云動氣在左不可  
止休場  
肉暄也

第八十三證

○口燥咽乾歌

脾中有熱胃乾枯口燥咽乾津液無陽明白虎加

參證少陽口苦小柴胡  
仲景云陽明病浮脈咽乾口苦者白虎湯又云少陽之為病口苦咽乾目眩者宜小柴胡湯咽乾慎不可發汗發汗無津氣愈虛仲景云咽乾少陰口燥急須下腎

經少水致焚如  
仲景云少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜服承氣湯又云少陰病二三日夜利者不可發汗

感咽乾蝕藏下聲名狐  
仲景云狐蝕上部聲啞下部則聲啞食下

咽乾

咽乾

咽乾

咽乾

咽乾

咽乾

○傷寒似瘧歌

第八十四證

傷寒似瘧三證詳血室陽明及太陽  
謂婦人熱入血室及陽明太陽也  
太陽汗出脈洪大桂枝各半合麻黃  
便目可宜桂枝麻黃各半湯  
陽明忽爾還如瘕不  
嘔清便熱復涼脈若浮桂枝小承氣脈實相  
當仲景云病者煩熱汗出即解復如瘕狀日晡所  
發汗宜承氣湯  
婦人熱入血凝結柴胡加入地黃  
湯仲景云婦人中風七八日寒熱往來經  
水適斷血結如瘕狀宜小柴胡湯主之

傷寒百證卷之三

傷寒百證卷之三



重鐫註解仲景傷寒百證歌發微論卷之四

宋白沙許叔微知可述 明清邑杏泉雷順春校

第八十五證

○邪中二焦歌

寸口陰陽脈俱緊上下二焦皆受病

者清邪中於上焦邪中上潔為名濁邪中下名渾

應索濁邪中下名曰渾也陰中於邪必內慄足膝

逆冷便溺出中下陰氣為慄足膝逆冷便溺妄出

也陽中於邪項必強發熱頭疼頸掣屈必發熱頭

痛項強頸掣也皆因霧露氣為傷隨證治之宜審的

仲景云此證皆因曉行夜住感胃露露之氣而成此病也

第八十六證

○多眠歌

多眠四證病形殊仲景請多風濕忌大發汗及狐

惑仲景云傷寒失汗變為狐惑上唇生瘡候日或

急用治蜜桃仁及柴胡亦多眠也更有少陰同共

四當觀形與證何如風濕身熱常自汗仲景云風

陰陽俱浮陽脈浮緩陰脈濡弱自汗身重多眠身

息必射又云汗證多汗若發汗後身猶灼熱者名

風濕主四肢不收也小柴胡湯項強拘

宜用萎蕤芍藥湯治之小柴胡湯項強拘

心及面目悉黃小便難而有潮熱者宜小柴胡湯

少陰自利自欲寐仲景云少陰自利但欲寐者惟

治察要在審詳然亦有不自寐者神景云少陰病其

人欲吐不吐而煩然亦有不自寐者神景云少陰病其

汗出不煩自欲吐五六日煩微細沉但欲寐者死

得少陰病心下煩而不得寐者非一途仲景

或證嘿嘿但欲眠自膜不得寐者瀉心湯

之千金方云緣傷寒腹內熱飲食少腸胃空虛三

舌上行作食食蝕人五臟并惡食而乍赤乍白乍黑

第八十七證

傷寒何事不得眠汗過胃中乾燥煩仲景云太陽

汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲飲或因吐下虛煩

飲水當稍飲之茶衛和則愈矣或因吐下虛煩

致必反覆顛倒心中懊憹枝子或湯吐之或因

大熱語言顛倒皆不得眠小便不利正發渴心煩少

氣苦致煎忽若水停心下蒲但與猪苓可保全

云胃中乾燥不傷寒差後熱尚在陰未復時陽使

得眠者猪苓湯傷寒差後熱尚在陰未復時陽使

然病源云衛氣盡行於陽夜行於陰陰主夜夜主

諸陽并所以陽獨盛陰偏虛雖復病後仍不得

眠者陰氣未復於本故也外臺有肘後烏梅湯



第八十八證

○小便不利歌

胃中乾則無小便慎勿利之強使然病源云傷寒

出故小便不通也故不可強利之伏下焦有熱不通

泄量病浮沉用藥宜下焦有熱者咳而有水青龍

候神景云傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而

項強無汗桂枝症項強痛翁二發熱無汗心下滿

脹利小便不利者桂枝大抵中濕發黃者先利小

便當使快中濕之為候其病小便不利大便反快

但當利其小便仲景論風濕證云若被下者小便

微滿者茵陳湯陽明汗多津液無却以小便利為戒

之陰分去聲虛小便難出熱中居必素問云陰虛者陽

則勝於熱而小便難澗風不止桂加附遂瀉風不止惡風小

加附子湯主之陽明風中小柴胡

第八十九證

○小便自利歌

太陽下焦有熱秘小腹必滿便不利小便不利反

自利此是抵當血證諦大抵熱在下焦小腹痛必

瘀血也仲景云傷寒有熱而小腹痛應小便不利

今反利者此為血證當下之宜抵當丸又云太陽

病身黃其脈沉結小腹堅小便不利為無血陽明

自汗小便結忽若利時津液竭屎雖堅硬不可攻

審兌用之斯要訣仲景云陽明病汗出若發其汗

或土瓜根豬膽汁皆可以導之也又問小便何故

數腎與膀胱虛熱作虛則故令小便頻熱則遲瀉

相擊搏難頻數必遲瀉也自汗不可服桂枝仲景

寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚挛跌陽浮

急脈桂枝得之便厥作甘草乾薑湯主之跌陽浮

瀉是脾約仲景云跌陽脈浮而瀉浮則胃氣強瀉

約麻仁胃中不和譫語時調胃承氣宜斟酌仲景

和諸語者少少與調胃承氣湯

第九十證

○大便不利歌

大便堅硬或不通柴胡承氣可收功大柴胡湯大

藥亦有不可攻擊者歌在前篇裏證中前篇裏證

者寒則溏泄則垢可見陰陽虛實候歲火不及大

寒行民病驚溏腸胃吼行民病驚溏者鳴溏也大



第九十一證

○大便下利歌

傷寒下利多種數要識陰陽勿差互三陽利時身必熱三陰但溫無熱具三陽下利身熱三陰下利但溫而不熱此其大槩也

合病自利葛根湯或用黃芩無致誤仲景云太陽自利葛根湯主之桂枝證豎反下

自利不止者葛根黃芩黃連湯自利不渴屬太陽之利不止者葛根黃芩黃連湯

陰少陰必渴腎虛故仲景云自利不渴屬太陽其少陰證故引水自救也外瀆審證內憑脈內外並觀

斯兩得脈大由來却是虛脈滑而數有宿食傷寒下利脈大者則為虛仲景云滑而數者有宿食也

者則為虛仲景云滑而數者有宿食也未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞硬表裏未解者桂枝人參湯朱砂下利而熱而利下必也

也謔語而利燥屎結仲景云下利而謔語者少陰心痛口燥煩却與利之斯要訣

心痛口燥煩却與利之斯要訣仲景云少陰病下必痛口乾燥者可下之宜大柴胡湯六經中泄少陰病難治有補瀉之法不可不審也

第九十二證

○狐惑證歌

蟲食下部名曰狐蟲食上部名曰惑狐則咽乾惑

聲嗶傷寒變壞成斯疾面目乍赤乍白黑但欲睡

眠昏默默更有懸蟲食臍間舌上盡白齒無色

云狐惑之病其氣如傷寒黑黑但欲卧目瞑不得

眠起則不安食於喉咽者為惑食於陰者為狐狐

惑之病並惡飲食不欲聞食臭其面赤赤黑赤

白食於上部其聲啞食於下部其咽乾食上部者

瀉心湯主之食下部者燒用雄黃薰之服之

下利而得之此證殺人為最急

第九十三證

○百合歌

百脈一宗皆病形無復經絡最難明葉氏云傷寒無經絡百脈一宗悉致病也皆因傷寒虛勞大病之後不平復而變成斯病也

不得卧欲行還復不能行飲食有美有不美雖如

強健步雖勝如有寒覆無寒如有熱作復無熱口苦

小便還赤結藥繞入口即吐利如有神靈來作孽

病後虛勞多變成百合地黃湯可吸葉氏云其狀得食常默默臥復不得卧欲出行而復不能行飲

食或有美時或有寒復如無寒時或有熱復如無熱

不得卧如有寒復如無寒時或有熱復如無熱至朝

而吐如小便赤黃百合之病諸藥不能療得藥則嘔

然如寒者四十日愈若赤時不頭痛漸漸

然如寒者四十日愈若赤時不頭痛漸漸



第九十四證

辨傷寒疫氣不同歌

春氣溫和夏暑熱秋氣淒涼冬凜冽四時正氣自  
 調勻不犯寒邪無病薛冬時寒凜欲周密君子深  
 藏宜入室中而即病曰傷寒觸冒寒邪成此疾  
 氣若深不即病至春與夏邪方出春為溫病夏為  
 暑變態無端證非一以上論傷寒也仲景云春為  
 溫夏為暑秋為燥冬為寒四時正氣之序也冬時  
 藏君子周密則不傷於寒觸冒之者乃傷寒耳  
 其傷于四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其  
 最成殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病  
 者與毒毒初肌膚至春變為溫病至夏亦變為暑病  
 暑病熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱  
 病者皆由冬時觸冒若乃時行自不同蓋是不時  
 所致非時行之氣 之氣失春時應暖反大寒夏時應熱却寒慄秋氣  
 清涼大熱來冬氣寒時似春日少長一般病相似  
 此是時行號溫疫欲知正氣與天行要在潛心占  
 斗曆以上論時行疫氣仲景云凡時行者春時應  
 而大熱冬時應寒而反大溫此非時有其氣耳一  
 歲之中長幼之病卒相仿者此時行之氣也夫欲候  
 知四時正氣為病及時行疫  
 氣之法者當按斗曆占之

第九十五證

婦人傷寒歌

婦人此疾當區別身重身輕不同列孕娠身重且  
 安胎產後血虛先補血產前安胎產後水火相刑  
 補血此大法也 浸自傷榮衛不和多阻節平居水常養於木木不  
 相資血通徹傷寒男子先調氣婦人先調血血空  
 不蓄則一氣諸和血室疑結水火相  
 刑五行相剋以生諸疾也夫平居之日水常養於  
 木木相生則榮養血室血室不蓄則脾無蘊積  
 蘊積則剛燥不生免邪熱謂無犯胃氣及上二焦  
 左關浮緊不可下當發其汗以救血室  
 榮衛得和津液自通決然汗出而解也 血室不蓄  
 脾無蘊剛燥不生免邪熱謂無犯胃氣及上二焦  
 傷寒可也

也產後多生三種病大便堅秘難通泄鬱胃仍兼  
 自汗多皆是血虛津液竭婦人產後有三種病大  
 便秘難通自汗皆是血  
 虛所致 血虛而厥厥必冒冒家解時汗流浹津液既  
 少大便難孤陽上出恐陰絕三病皆血少陰虛孤  
 陽獨行所致也當補  
 陰惟此柴胡四物湯庶可調和使安悅

○第九十六證

婦人熱入血室歌

婦人中風七八日身熱續發寒慄經水適來或  
 適斷熱隨陰血居其室晝則明了暮譫語狀如見



鬼如疴疾無犯胃氣及二焦小柴胡證尤為的更  
刺期門以瀉肝邪去自然保安吉切須急療莫遲  
遲變證來時恐無及仲景云婦人中國發熱惡寒後身涼背痛苦滿如結胸狀識語者此為熱入血室也當刺期門穴隨其虛實而取之又云婦人此為熱入血室八日續得寒熱發作有時經水適來者小柴胡湯主之又云婦人傷寒發熱水適來者則明矣暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦自愈

○第九十七證

傷寒差後病歌

傷寒差後還喜唾胃裏有寒實無那此候唯宜服

理中胃暖病除痰自破仲景云大病已後其人喜唾久而不了者上其寒當

元主之 勞復枳實梔子湯發熱小柴胡亦可仲

又云傷寒已後發熱小柴胡湯主之 腰下水氣壯

散仲景云壯者宜用壯散主之也 日暮微煩脾不

磨要須損穀自然安其主吉兮必無禍仲景云病

日暮微煩者以病新差強與穀食不消也損穀則

愈周易節卦九五其節吉往有尚象日其節之志

第九十八證

○傷寒五臟死絕歌

水漿不下汗如油形躄不仁喘不休此為命絕終

難治更看何藏絕中求汗出髮潤為肺絕唇吻反

青肝絕憂脾絕口黑并黃色腎絕便失與遺洩心

絕身似煙薰黑更兼直視與搖頭五臟皆絕無可

療縱逢和緩亦難瘳仲景云脈浮而洪身汗如油

仁乍靜乍亂此為命絕也又未知何臟先受其災

若汗出髮潤喘而不休此者肺先絕也陽反獨留

形體如煙薰直視搖頭此心絕也唇吻反青四肢

也洩便遺失狂言反環口黑柔汗發黃此脾絕

目直視此為腎絕也

○傷寒死脈歌

傷寒死脈定難痊陽病見陰端可憐仲景云陽病

上氣脈散為形損耳聾浮濇命難全仲景云陽病

脈散者死謂其形損故也濇者死也 謔言身熱宜洪

病若耳聾脈反浮大而濇者死也 謔言身熱宜洪

大沉細而微壽不延腹大洩利當微細紫大而滑

歸下泉吐衄若得沉細吉浮大而牢嘆逝川扁鵲

若謔言妄語身當有熱脈當洪大而反手足厥逆

脈沉細而微者死病若大腹而泄脈當微細而濇

反得濇大而滑者死病若大腹而泄脈當微細而濇

血者脈當沉細而反浮大而牢者死也陰陽俱虛



熱不止乍踈乍數命歸天仲景云陰陽俱虛熱不  
死脉如羞漏如雀啄來如彈石去解索經云脉如屋  
急也解索者動數而隨散乳無復以緒者也蝦遊  
魚翔脉證乖轉豆偃刀形候惡經云病人脉如蝦  
死脉如轉豆者下不至關陽氣絕上不至關陰氣  
死如偃刀者死下不至關為陽絕尺代脉來時不用  
鏗脉上不至關為陰絕皆死不治也  
醫必定傾危難救藥仲景云代陰也得  
此脉者必難治也

○傷寒死候歌

傷寒死候要須知泄而腹滿大難醫舌本爛傷熱  
不已千金云傷寒死候有九證二曰泄而腹  
脉躁亦傾危極之脉也死汗出雖多不至足千金云汗出手循衣絰  
更何為華陀云病人手循卵縮舌卷證候惡華陀  
者必死口張目陷不多時華陀云口如魚口不  
斑五死一生在黑斑十死更何疑凡發斑者熱乘  
也赤斑出五死一生兩感傷寒最大忌死期六日  
命難追仲景云傷寒難辨不死若兩百證歌畢  
感於寒而病者必死也

發微論

○論表裏虛實

傷寒治法先要明表裏虛實能明此四字則仲景  
三百九十七法可坐而定也何以言之有表實有  
表虛有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛予  
於表裏虛實歌中嘗論其事矣仲景麻黃湯類為  
表實而設也桂枝湯類為表虛而設也東實則承  
氣之類裏虛則四逆理中之類是也表裏俱實所  
謂陽盛陰虛下之則愈也表裏俱虛所謂陽虛陰  
虛汗之則愈者也嘗讀魏志華陀傳有府吏倪尋  
李延共止俱頭痛身熱所苦正同陀曰尋當下之  
延當發汗或難其異陀曰尋外實延內實故治之  
宜殊此所謂能明表裏虛實者也

○論桂枝肉桂

仲景桂枝湯用桂枝者蓋取桂之枝梢細薄者爾  
非若肉桂之肉厚也蓋肉桂厚實治五臟用之者  
取其鎮重也桂枝輕揚治傷寒用之取其發散也  
今人例用之是以見功寡



○論滑脉

仲景云翁奄沉翁曰滑沉為純陰翁為正陽陰陽和合故名曰滑古人論滑脉雖云往來前却流利展轉替替然與數相似曾未若仲景三語而足也翁張也言脉升而開張也忽焉而沉言脉降而復也奄言奄忽之間與奄觀銓艾同義仲景論滑脉可謂諦當矣然其言雅恐淺識者未易曉

○論用大黃藥

大黃雖為將軍然蕩滌蘊熱推陳致新在傷寒乃為要藥但欲用之當爾大柴胡湯中不用誠脫誤也王叔和云若加大黃恐不名大柴胡須是酒洗用為有力昔後周姚僧坦名善醫帝因發熱欲服大黃僧坦曰大黃乃是快藥然至尊年高不宜輕用帝弗從遂至危篤及元帝有疾召諸醫咸謂至尊至貴不可輕脫宜用平藥可漸宣通僧坦曰脉洪而實此有宿食非用大黃必無差理元帝從之果下宿食而愈此明夫用與不用之異也

○論陰不得有汗

仲景第四卷十七證云脉雖沉緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也又云脉陰陽俱緊而又汗出為亡陽此屬少陰大抵陰虛者多汗而此言陰不得有汗何也余嘗深究虛汗之證亦自有陰陽之別陽病自汗有九證皆有治法唯陰毒則額上手背有冷汗甚者如水洗然此是陽虛陰盛亡陽而將脫也其死必矣仲景此篇方論半在表半在裏故先曰汗出為陽微此則虛汗陽微故也非陰證無汗不得有汗也有汗則九死一生由是言之陽得有汗陰不得有汗以意逆志是為得之

○論林億疑白虎有差互

仲景稱傷寒若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱者白虎加人參湯主之又云傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯又云脉浮滑此以表有熱裏有寒白虎湯主之國朝林億校正謂仲景於此表裏自差矣是大不然大抵白虎能除傷寒中暍表裏發熱故此前後二證或云表裏俱



熱或云表熱裏寒皆可服之宜也中一證稱表不解不可服者蓋以脉浮無汗發熱此全是傷寒表證宜麻黃湯根之類也安可用白虎億但見所稱表裏不同便謂差互是亦不精不思之過也

○論弦動陰陽二脉不同

仲景云脉大浮數動滑此名陽也脉沉瀯弱弦微此名陰也脉訣以動脉為陰以弦脉為陽何也此是開卷第一行疑處而世人不知講予謂脉訣所言分七表八裏而單言之也此之所論兼衆脉而

合言之也大抵雜病各見一脉惟傷寒必兼衆脉而見何以言之仲景之意若曰浮大者陽也兼之以動數滑之類安得不為陽沉細者陰也兼之以瀯弦微之類安得不為陰故仲景論動脉則曰陽動則汗出陰動則發熱數脉見於關上上下下無頭尾如豆大厥厥動搖名曰動也又結胸證云脉浮而動浮則為風動則為痛故兼數與浮而言動脉則陽脉陽病也宜矣仲景論弦脉則曰弦者狀如弓弦按之不移弦則為臧又曰支飲急弦又少陰

證云手足寒脉弦遲故此兼遲而言弦則為陰脉陰病也宜矣故仲景傷寒脉不可與雜病脉同日而語今陽證往往浮大而厥厥動搖其沉細而弦者必陰證也何疑之有哉不特此也至如曰高曰章曰綱曰牒曰卑曰損有縱有橫有逆有順跌陽太谿之類極多予嘗撰仲景三十六種脉法圖故知治傷寒當以仲景脉法為本

○論中風傷寒脉

仲景以浮緩脉為中風脉浮瀯而緊為傷寒脉中風有汗傷寒無汗何也內經云滑者陰氣有餘也瀯者陽氣有餘也陽氣有餘則身熱無汗陰氣有餘則多汗身寒大抵陰陽欲其適平而已陽氣不足陰往乘之故陰有餘陰氣不足陽往從之故陽有餘風傷於衛則榮不受病故陽不足而陰有餘是以中風脉浮而緩必多汗也寒傷於榮則衛下受病故陰不足而陽有餘是以傷寒脉浮瀯而緊亦為無汗也仲景辨二者脉證亦有所受者矣

○論表證未罷未可下



仲景云凡傷寒之病多從風寒得之始表  
中風寒入裏則不消矣擬欲攻之當先解表乃可下之若  
表已解而內不消大瀉大實堅有燥屎自可除下  
之雖四五日不能為禍也不宜下而便攻之內虛  
熱入協熱遂利煩躁諸變不可勝數輕者困篤重  
者必死矣元本重復淺講者難曉故予刪正此一段而其理易明也大抵風寒  
入裏不消胃有燥屎或大便堅秘須是脉不浮不  
惡風寒表證罷乃可下之大便不通雖四五日未  
能為害若不顧表而便下之遂為協熱利也

○論中者脉不同

仲景云脉虛身熱得之傷暑又云其脉弦細芤遲  
何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣而不傷形則  
氣消而脉虛弱所謂弦細芤遲皆虛脉也仲景以  
弦為陰而朱肱亦云中暑脉細弱則皆虛脉也可  
知矣

○論傷寒須早治

仲景云凡作湯藥不可避晨夜覺病須臾即宜便  
治不等早晚則易愈矣如或差遲病即傳變雖欲

除治必難為力今之醫者不究根源執以死法必  
汗之於四日之前必下之於四日之後殊不知此  
大綱也又云甚者病不服藥猶得中醫此為無醫  
處而設也苟大小便不通可待其日差乎蓋前後  
不得洩必腹脹不過數日而死矣又况結胸瘀血  
發狂發黃發斑之類未有勿藥而愈者智者知變  
愚者執一所以取禍也須是隨病淺深在表在裏  
早為治療如救火拯溺庶易差也素問云邪風之  
至疾如風雨故善治者治皮毛其次治肌膚其次

治筋脉其次治六腑其次治五臟治五臟者半死  
半生也扁鵲望齊柯侯而老者其以此歟

○論發熱惡寒

仲景云假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽  
中則洒淅惡寒也尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷  
入陰中則發熱也此謂元受病而然也又云陽微  
則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大  
下之令陰氣弱此謂醫所病而然也大抵陰不足  
陽往從之故陽內陷則發熱陽不足陰往乘之故



陰上入陽中則惡寒陰陽不歸其分故寒熱交爭是以發熱而惡寒也故孫思邈云有熱不可大攻之熱去則寒至矣

○論風溫證

仲景云太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病若發汗已身灼熱者名風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時癩瘖又云陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變成風溫大抵溫氣大行更感風邪則有是證今當春夏病此者多醫作傷寒漏風治之非也不可火不可下不可大發汗而仲景無藥方古法或謂當取手少陰火足厥陰木隨經所在而取之如麻黃薏苡仁湯葳蕤湯之輩予以謂敗毒獨活續命減麻黃去附子益佳

○論溫瘧證


仲景云若脈陰陽俱盛重感於寒者變成溫瘧故朱肱初虞世以小柴胡白虎之類加桂以治之此

則仲景所謂溫瘧瘧之一證也今庸醫見前人有此治法不問是何瘧證但見發寒發熱一藥治之疎矣大抵瘧證多端有暑瘧有食瘧瘧瘧脾寒而千金又有五臟所受不同六腑之中止有胃瘧一證種類最多安得一藥而論瘧瘧者但熱不寒當用白虎食瘧者中有伏積當下而去之至於中暑瘧寒此二證若水火相反素問曰夏傷於暑秋為瘧瘧又曰夏暑汗不出者秋成風瘧蓋暑伏于中得秋氣乃發故先熱後寒熱多寒少頭昏痛虛則發戰汗出一時乃止蓋心惡暑心不受邪而胞絡受之胞絡舉涎所聚暑伏于涎心豈若脾寒厚朴草果所能祛也豈若溫瘧柴胡黃芩所能除也非砒砂腦麝之屬不能入故暑瘧脾寒患者多而醫妄識病源妄投以藥邪未退真氣先受病所以連綿不瘥也



予嘗精深究瘧病一科須是辯其脉察其證窮考  
得病之淵源擇方理療故十治十中無有失者衆  
人以瘧病為難治予獨為易調要在辯其種類何  
臟何腑識其先後何淺何深而素問瘧論中甚有  
妙處當思而得之

共一百七頁



四卷終



百證歌序

論傷寒而不讀仲景

儒而不知有孔

景之書其美

重覆而難

此世少

其書不異其義偶此治症

全者是亦幸而已矣余

幸於仲景傷寒論尤所

也讀誦以思之次也

之廣孰博訪如是者殆三

冬夜研疏殆將成於是撰

景傷寒脈法三十六圖翼仲

傷寒論三卷辨類五卷歲在

百 騎踐蹂多所遺失暇日

採錄校中有歌闕百首治法

十一篇皆依遵仲景之法用

治 九懼命始爐故

以備遺失昔華佗通術

術舉孝廉本作士人後以醫見

業意嘗自悔余每念世無良以

病人束手受斃間有能者又

蹇坐視而不救故余幸

得遊醫籍以掩儒者之羞



續編張仲景註解傷寒百證歌目錄

翰林學士許 蔚 知可 述

卷之一

傷寒脈證總論歌

傷寒脈證總論歌

寒病證總類歌

表證歌

表證歌

裏證歌

裏證歌

表裏寒熱歌

表裏寒熱歌

表裏虛實歌

表裏虛實歌

急救表裏歌

無表裏證歌

表裏水證歌

表裏證俱見歌

三陰三陽傳入歌

陰陽兩感歌

陽證陽毒歌

陰證陰毒歌

太陽陽明合病歌



太陽少陽合病歌

三陽合病歌

太陽少陽併病歌

陰證似陽歌

陽證似陰歌

卷之二

陰盛陽陽歌

陰陽易歌

傷寒歌

中風歌

傷寒見風脈中風見寒脈歌

熱病中暈歌

五種溫歌

兩種瘧歌

四證似傷寒歌

可汗不可汗歌

可下不可下歌



可吐不可吐歌

可火不可火歌

可水不可水歌

可灸不可灸歌

針歌

傷寒可濕歌

發熱歌

潮熱歌

卷之三

往來寒熱歌

汗之而熱不退歌

下之而仍發熱歌

惡寒歌

背惡寒歌

厥證歌

結胸證歌

痞證歌

發黃證歌



發狂證歌

發斑證歌

發喘證歌

發渴證歌

止欬

衄血證歌

吃噎證歌

謔語證歌

煩躁證歌

懊懷證歌

俳鬱證歌

卷之四

驚惕證歌

冒悶證歌

乾嘔證歌

吐逆證歌

霍亂證歌



頭疼證歌

第七

脇痛證歌

第六

腹痛證歌

第七

咽痛證歌

第七

效救證歌

第七

遺尿證歌

第七

腹滿證歌

第七

蚊股證歌

第七

自汗證歌

第七

頭汗證歌

第七

欲得汗歌

第七

舌上胎歌

第七

下膿血歌

第七

晝夜偏劇歌

卷之五

第八

循衣撮空歌

第八

筋惕肉瞤歌

第八

口燥咽乾歌

第八



傷寒似瘧歌

第八

邪中二焦歌

第九

多眠證歌

第十

不得眠證歌

第十一

小便不利歌

第十二

小便自利歌

第十三

大便不利歌

第十四

大便下利歌

第十五

狐惑證歌

第十六

百合證歌

第十七

辨傷寒疫氣不同歌

第十八

婦人傷寒歌

第十九

熱入血室歌

第二十

傷寒差後病歌

第二十一

傷寒五藏死絕歌

第二十二

傷寒死脈歌

第二十三

傷寒死候歌

新編張仲景註解傷寒百證歌目錄



# 張仲景註解傷寒百證歌



白沙許徽 知可述

## 傷寒脈證總論歌

大浮數動滑陽脈陰病見陽生可得沉瀋弦  
 微弱屬陰陽病見陰終死厄動滑此名陽也脈  
沉瀋若弦微此名陰也陰病見 陰陽交互最難

明輕重斟量當別白脈雖有陰陽須看輕 輕手

脈浮為在表表實浮而兼有力但浮無力表

中虛自汗惡風常漸漸傷寒先要辨表裏虛實

重手脈沉為在裏裏實脈沉來亦實重手無

力大而虛此是裏虛宜審的裏證亦有虛實脈

則虛浮寒牢堅水停火瀉必沉瀋動則為痛

也故腹滿大便不通沉而無力者裏虛也或泄 風

數為熱支飲應須脈急弦太過之脈為可怪

不及之脈亦然潛水瀉支飲急弦動則為痛數

則熱煩太過可怪不及亦然邪不空見中必有奸 榮衛太盛名高章高

章相搏名曰綱榮衛微時名牒徒煩切 卑牒

卑相搏損名彰榮衛既和名緩遲緩遲名沉

此最良九種脈中辨虛實長沙之訣妙難忘

搏名曰綱衛氣弱名曰牒榮氣弱名曰卑牒卑相搏

名曰損衛氣和名曰緩榮氣和名曰遲緩遲相搏名

曰沉大抵仲景脈法 醫醫有如羹上肥此脈定知陽氣

微榮榮來如蛛絲細却是體中陰氣衰脈如

瀉漆之絕者病人亡血更何疑如羹上肥者陽

氣微也脈榮榮如蜘蛛絲者陽氣衰也脈絲細如

瀉漆之絕者亡血也陽氣衰 陽

結藹藹如車蓋陰結循竿亦象之如更蓋者陽

結也車蓋如循 陽盛則促來一止陰盛則結緩

竿者陰結也 此謂促結一脈也脈來緩時一止名曰

結脈來數時一止名曰促脈陽盛則促陰盛則

結脈 結脈道順宜審察殘賊災怪要須知

結脈



有相乘有縱有橫有逆有順何謂也曰水行乘火金  
 行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘  
 金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也  
 六者名殘賊能為諸賊作病也  
 怪何謂也曰舊時服藥今乃發作故為災怪  
 人病內虛故人安脉病曰行尸  
 無主氣故眩仆不知人人病脉不  
 病名曰內虛以無穀神雖困無苦  
 氣主血人迎左其位氣口緊盛食必傷人迎  
 緊盛風邪熾左為人迎右為氣口人迎緊盛  
 數為  
 在府遲為藏浮為在表沉在裏  
 為在府遲  
 為在藏  
 脉浮而緩風傷榮浮緊兼澀寒傷  
 衛脉微大已令人吐欲下猶防虛且細  
 不可吐虛細  
 沉微氣弱汗為難三者要須常審  
 不可下  
 記者汗下吐三候脉有不可行者切當審也  
 於陰有汗證左手沉微却應未  
 陽胃脉定死生  
 太谿腎脉為根  
 帝  
 至或七至邪氣漸深須用意浮大晝加並屬

陽沉細夜加分陰位九至以上來短促狀若  
 滿泉無入氣更加懸絕漸無根命絕天真嘗  
 死矣  
 神之候須切急為治療又加之九至十至雖和扁亦  
 難救如八至九至加以懸絕懸絕者無根也如泉之  
 涌脉無入氣天  
 真盡而必死矣  
 病人三部脉調勻大小浮沉遲  
 速類此是陰陽氣已和勿藥自然應可喜  
 等雖有寒熱不解此脉已和雖劇當愈  
 ○傷寒病證總類歌  
 傷寒中風與溫濕熱病瘕喝并時疫證候陰  
 陽雜則同別為調治難專一  
 一則桂枝二麻黃三則青龍如鼎立精對無  
 差立便安何須更數交傳日  
 能精對無差立當見効不須  
 更候五日轉瀉反致壞病也  
 發熱惡寒發於陽無  
 熱惡寒自陰出也無熱而惡寒者發於陰也  
 陽  
 內外熱白虎相當并竹葉  
 石膏湯皆治



內外 陰盛寒濕脈沉弦四逆理中為最捷

四逆湯理中圓 熱邪入胃結成毒大小承氣

宜疎泄 宜調胃或大小承氣湯 胃滿宜用瀉心

湯 胃滿證候用 結胃痞氣當分別按之不痛為

虛斬按之若痛為實結淺深大小陷胃元仲

景方中不徒設 淺深則大小陷胃元 茵陳可

治發黃證 藥皮治痢兼下血 發黃疸熱則用茵

劑下血 小便不利更喘滿煩渴五苓安可缺

利小便止煩 半在裏半在表加減小柴胡有

法 小柴胡治半在表 夜中得脈日中愈陰得陽

苦炎必脫 日中得脈中夜安陽得陰苦自相

悅陰陽調順自和同不須攻治翻為孽

陽寒三日脈微而微數以順四時身涼而和者此各

也 陰陽和同爾

表證歌

身熱惡寒脈又浮偏宜發汗更何求

之要須手足俱周徧不欲淋漓似水流

發汗欲令手足皆周熱聚一時間益佳但不欲流離

若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得重發汗

也 輕則隨時與和解重須正發病當膠

解之者有正發之者和解若小柴胡 初春陽弱陰

尚勝不可奪成擾搜夏時暑熱脈洪大玄

府開時汗易謀 初春陽弱不可大發汗以擾乎

可汗脈微而弱更兼尺中脈遲緩

陽故也 尺中脈遲 微弱無陽遲少血安

藥不足血氣少不可汗 微弱無陽遲少血安

麻黃求發散更有衄血并下血

煩且慎之腹間動氣宜區別

婦人經水適來時此是小柴胡證決忽然誤

汗表裏虛鬱昏不知人作孽

汗鬱昏 不知人



裏證歌

不惡寒者反惡熱胃中乾燥并潮熱陽明證身不惡寒反惡熱當下之因

便如常大便結腹滿而喘或譫語脉沉而滑潮熱者實也宜下之乎

裏證決手心與兩液下潤小便如經大便結硬皆裏證也陽盛陰虛速下之安可日數拘骨骨

熱陰虛則內熱內外皆熱故當下雖三二日便可下不必四五

失下心胃皆症悶胃鬱不安成熱

厥失下則熱極生寒故胃而厥厥則半日後復熱也膚醫不曉疑是陰誤

進熱藥精魂絕痛醫見厥便以為陰誤服熱藥則發班發黃不知人也三陰

大約可溫之積證見時方發泄太陰腹滿或

時痛少陰口燥心下渴積證悉具更無疑要

在安詳加審別三陰大約可溫唯有積證當下痛屬大陰桂枝加芍藥湯主之其大實痛則大黃湯主之少陰口燥咽乾急下之宜承氣湯如此者

當下病猶在表不可下脉浮更兼虛細者

惡寒嘔吐小便清惡寒者表未解也

惡寒嘔吐小便清惡寒者表未解也

惡寒嘔吐小便清惡寒者表未解也

惡寒嘔吐小便清惡寒者表未解也

惡寒嘔吐小便清惡寒者表未解也

惡寒嘔吐小便清惡寒者表未解也

吐者不可下小便清白不轉失氣應難瀉知不在裏而在表也

大便堅硬小便數脾約陽明自汗津

液寡證如斯之類下為難莫便參差成誤也

表裏寒熱歌

病人身熱欲得衣寒在骨髓熱在肌先與桂

枝使寒已小柴加桂次溫之病人身寒衣襖

退寒在皮膚熱在髓白虎加參先除熱桂黃

各半解其外病人身大熱反欲得衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒及不發

近衣者寒在皮膚熱在骨髓也仲景無治法與

以桂枝麻黃各半湯以解其熱也

始末先後不同當審察裏寒表熱脉沉遲裏

熱表寒脉必滑而遲裏熱表寒脉必滑也

表裏虛實歌

身而緩表中虛有汗惡風膝理踈浮緊而

身而緩表中虛有汗惡風膝理踈浮緊而

身而緩表中虛有汗惡風膝理踈浮緊而

身而緩表中虛有汗惡風膝理踈浮緊而



消表却實惡寒無汗體熱如傷寒最要辨表裏

有表虛有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛先

辨此六者然後用藥無誤矣蓋脈浮而緩又惡風

只有汗此表虛中風證也脈浮緊而溢脈沉無力裏

虛證四逆理中為對病沉而有力緊且實柴

胡承氣宜相應裏虛宜溫之故用四逆理中

表和而裏病下之則愈斯為正裏和表病汗

為宜忽然誤下應難拯則愈汗之則死裏和表

病汗之則愈虛則溫之實瀉之病形脈證要相

宜更兼藥餌如精對立便安康待其時

對無差立當見効不必三日以前汗五日以後下也

急救表裏歌

傷寒下後表裏虛急當救療莫躊躇下利不

止身疼痛救裏為先四逆厥忽若清便自調

適却宜救表桂枝徒切莫遲延生別病過街

脈變在斯頃續得下利消發

清便自調者急當救表救裏宜四逆救表宜桂枝

無表裏證歌

既無裏證又無表隨證小柴胡治療大便堅

鞭脈浮數却與大柴胡極妙裏證發熱七八日

柴胡湯下之裏證發熱七八日七八日後至過經證候如斯當

辨曉何況熱實暗不和常覺目中不了了

傷寒六七日月中不了了者不可與下

表裏水歌

有水須分表和裏安可妄投增病勢乾嘔微

咳發熱謂表有水青龍解心下有水氣乾

小腹痛或喘者小清龍此謂表有水也忽若身

涼并汗出兩脇疼痛心下痞表解逆知裏未

和十棗湯方能主治太陽中風心下痞硬滿引脅

者此表解裏未和也下利乾嘔短氣汗出不惡寒



○第廿卷

○表裏兩證俱見歌

脈來浮大表證爾便赤煩渴却在裏脈浮者表証也小便

赤而煩渴又却表裏兩證俱見時當用五苓與調

理此證宜用五苓散蓋五苓治內外俱熱又如大便數日結頭痛

更兼身有熱其人小便却又清亦是兩證當

區別大便結硬頭痛身熱小便却清知不在裏而在表也大便堅鞭脈沉細

裏證當下分明諦頭汗出時微惡寒手足兼

冷却非是傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷此為陽微結有表裏也脈沉亦在裏也此為半在表半在裏焉仲景著論非一

端要在審詳而已矣仲景論中有兩證者凡十餘法故此略舉一二為例

○三陰三陽傳入歌

尺寸俱浮屬巨陽一二日內病如常經絡上

連風府穴頭項痛兮腰脊強尺寸俱浮者太陽受病當一

二日發以其上連風府故頭項痛腰脊強長陽明為受病二三日

尺寸俱浮者太陽受病當一

尺寸俱浮者太陽受病當一

尺寸俱浮者太陽受病當一

內斯為應挾鼻絡良是其經自痛鼻乾眠不

穩仲景尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈挾鼻絡於日故身熱自疼鼻乾不得卧也少

陽經絡貫耳中脈弦脇痛耳應聾四日以前

皆在府汗之即退易為功少陽受病也當三四日發以脈循脅於耳故胃脅痛而耳聾此三經受病未入藏故可汗也四五日中傳

太陰太陰之脈細而沉布胃絡噎噎乾燥脾

宮腹痛病難禁太陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡於腹故腹痛而難禁也

少陰傳到脈沉緊貫腎絡肺繫舌

本口燥舌乾渴不休五六日中病有準尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡於肺係舌本故口燥舌乾而渴七八日至

厥陰經煩滿囊縮可憂驚三陰受邪已入臟

却宜瀉下自和平三陰受病也當六七日發以其循陰器絡於肝故煩滿而囊縮必三陰皆已入臟故可下而已也六經已盡傳亦遍土

不受邪脈來緩水火相交氣已和雲興雨至

斯為汗若傳至厥陰其脈來緩者脾土不再受克故水升火降氣和而大汗解矣

若傳至厥陰其脈來緩者脾土不再受克故水升火降氣和而大汗解矣

若傳至厥陰其脈來緩者脾土不再受克故水升火降氣和而大汗解矣

若傳至厥陰其脈來緩者脾土不再受克故水升火降氣和而大汗解矣

若傳至厥陰其脈來緩者脾土不再受克故水升火降氣和而大汗解矣

若傳至厥陰其脈來緩者脾土不再受克故水升火降氣和而大汗解矣



○陰陽兩感歌

傷寒熱甚雖不死兩感傷寒漫料理傷寒則發為熱雖甚不死若兩感於寒而病者必死

感病俱作治有先後發表攻裏本自不同故漫料理也

可一日太陽少陰病腹痛口乾煩飲水太陽勝也少陰腎也為表裏故

與少陰俱病則腹痛口乾煩滿而渴二日陽明合

太陰腹滿身熱如火熾不欲飲食鼻內乾妄言謔語終難睡病則腹滿身熱不欲食謔語

少陽合厥陰耳聾囊縮不知人厥逆水漿不入口六日為期是死辰陰俱病則耳聾囊縮而

破水漿不入口不知人者六日死矣

○陽證陽毒歌

太陽陽明與少陽三陽傳入是其常二日太陽三陽傳入也

太陽脈浮惡寒氣陽明惡熱

少陽口苦

下滿往來寒熱脈弦張少陽之為病

口苦咽乾目眩

○陰證陰毒歌

太陽病不辨轉入少陽者腸下堅滿往來寒熱其脈弦細陽若獨盛陰暴絕

變為陽毒必發狂三陽病不治必變為陽毒

內外熱結舌又

升麻梔子湯

飲食不節陰受之太陰腹脹病在脾受之飲食不節則陰受之傷寒四五

微細心煩但寐渴無時微細但欲寐

變成陰毒更何疑四肢逆冷臍築痛身如被杖痛可知積陰盛於下則微陽消於上故

杖或因冷物傷脾胃或因慾事腎經衰內感

伏陰外寒氣腰重頭疼覺倦疲陰毒本因腎氣

或傷冷物復傷風邪內既伏陰外又感寒或先感外

寒而內伏陰內外皆陰故陽氣不守遂發頭疼腰重

○陰證陰毒歌

飲食不節陰受之太陰腹脹病在脾

微細心煩但寐渴無時

變成陰毒更何疑四肢逆冷臍築痛身如被杖痛可知

杖或因冷物傷脾胃或因慾事腎經衰內感

伏陰外寒氣腰重頭疼覺倦疲

或傷冷物復傷風邪內既伏陰外又感寒或先感外

寒而內伏陰內外皆陰故陽氣不守遂發頭疼腰重



腹脹脹痛疼身躄倦急額上手背皆冷汗二三

而不可甚熱四肢逆冷矣額上手背皆冷汗二三

日內尚支持額上手背皆有冷汗二三六脈沉

細時來疾尺部短小力還微寸口有時或來

大誤經轉瀉若何鑿陰毒診之則六脈俱沉細而

俱浮大或沉取之大而不甚疾者非陰病漸深腹

轉痛心胃脹脹鄭聲隨虛汗不止咽不利指

甲青黑面色薰陰證深則咽喉不利心下脹滿結

可逢六脈沉細而疾一息七至以來有此證者更乘

金液來甦治庶得陽回命可追灸畢更以金液

幾陽復也來甦丹助之

○第廿八證

○太陽陽明合病歌

太陽陽明同合病仲景法中有三證自利宜

服葛根湯但嘔却加半夏應喘而胃滿為麻

黃慎勿下之輕性命循規守矩治為宜要使

沖和自安靜自利葛根湯主之二者合病不下利

但嘔者葛根加半夏湯主之三者太陽陽

明合病喘而胃滿者不可下宜麻黃湯

○第廿九證

○太陽少陽合病歌

太陽少陽合病時亦瀆下利更何疑下利黃

芩湯可用若嘔還加半夏奇合病自下利者與

黃芩湯若嘔者黃

苓加半夏生薑湯

○第三十證

○三陽合病歌

腹滿身重難轉側面垢遺尿謔語極三陽合

病口不仁白虎湯功更奇特腹滿身重難以轉

側口中不仁謔語遺溺發汗則謔語下之

則額上生汗手足厥冷自汗白虎湯主之

○第三十一證

○太陽少陽併病歌

太少併病證有二汗下差之皆致斃頭痛眩

胃如結曾誤若汗時謔語至肺俞肝俞皆可



刺謬語却刺期門是一證云太陽少陽併病硬當刺肺俞肝俞不可發汗發汗則頭痛眩暈時如結胃心下痞謬語脉弦五日謬語不止當刺期門頸項強時刺大椎此候在心當切記一證云太少併病心下硬俞肝俞慎勿下

○**第十九證**

○陰證似陽歌

煩燥面赤身微熱脉至沉微陰作孽脉來沉微極生熱故煩躁面赤身熱陰證似陽醫者疑但以脉憑斯要

訣不必以脉為據身熱裏寒陰躁盛面戴陽方下

虛證身熱也裏寒也煩躁者陰盛也面戴陽者下虛故也此皆陰證似陽也陰發躁

方熱發厥物極則反皆理性皆物之理性也則發厥物極則反

○**第二十證**

○陽證似陰歌

小便赤色大便秘其脉沉滑陽證是四肢逆冷伏熱深陽證似陰當審諦小便赤大便秘脉沉滑陽證也陽極

且宜供白虎重者須當用承氣重陽如陰理宜然寒暑之變亦如是

張仲景註解傷寒百證歌

○**卷之三**



# 新編張仲景註解傷寒百證歌

## 第一一證

### 陰盛陽歌

身冷脉沉緊且細內雖煩躁不飲水此名陰  
 盛陽陽證霹靂散用煩躁止脉沉緊而細不欲飲水者陰盛陽  
 也當用附子霹靂散躁若止兮應得睡寒已散兮陰自退  
 熱氣上行得汗痊火燄丹砂宜用矣

## 第一二證

### 陰陽易歌

男子陰腫多絞刺婦人腰痛并裏急傷寒差  
 後便行房男名陽易女陰易熱上衝胃頭不  
 舉眼中生花氣翁翁燒棍猴音加鼠橘皮湯選  
 此用之醫可必傷寒陰陽易之為病身身辨  
重少氣小腹裏急或引陰中拘攣  
熱上衝胃頭重不欲舉眼中生花加胞赤膝脛拘急  
燒棍散主之此病男子則陰腫婦人則腰痛千金外  
橘皮湯亦可

## 第一三證

### 傷寒歌

脉浮緊澁是傷寒熱少寒多不躁煩傷寒脉浮  
少寒多心不煩躁頭痛無汗身拘急微厥之時在指端  
 腰脊疼痛色多慘唯宜發汗與通關要辨傷寒  
中風二證傷寒脉浮緊而澁中風脉浮而緩傷寒者  
惡寒不惡風中風者惡風不惡寒傷寒者無汗中風  
者自汗傷寒者面色慘悽大青龍證及麻黃熱  
 多寒少亦其常傷寒大抵雖熱少寒多亦有熱  
寒少者如麻黃證云發熱身痛大

## 第一四證

### 中風歌

青龍證云脉浮發汗用桂枝熱多寒少不煩躁亦宜汗解正  
 相當微弱無陽桂枝越太陽病發熱多寒  
二越婢一湯尺遲血少建中湯尺脈遲者血少也  
中證云傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急淋家  
 家不可汗小柴胡解自安淋家不可發  
汗者王寔皆  
用小柴胡湯



惡風自汗是傷風仲景謂傷風為中風體熱頭疼病勢

濃手足不冷心煩躁面色如常無慘容前解在

脈浮而緩是本證寸大尺弱有時逢傷風脈雖

而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出桂枝敗

毒獨活輩宜皆選用在其中治中風

活散之類項強桂枝加乾葛太陽病項背強

桂枝加葛根湯主之漏風加附可收功

惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

傷風傷寒何以判

寒脈緊潛風浮緩寒必惡寒風惡風傷風自

汗寒無汗前解在

傷寒見風脈中風見寒脈歌

惡寒不躁微四逆脈浮而緩來無力惡風煩

躁手足溫脈診緊浮來又澀傷寒反得傷風

診中風却見傷寒脈大青龍證是為宜調衛

調榮斯兩得太陽中風脈浮發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯

主之傷寒脈浮緩身不疼但重下有輕時無三

陰證者大青龍湯主之中風宜浮緩今却浮緊傷寒

見寒脈傷寒見風脈也要知其病加煩燥方

可服之為最的脈微自汗又惡風誤用肉桂

并筋惕脈微弱汗出惡風者不可服之服

枝麻黃之厥逆筋惕肉瞤此為逆也故王寔止用桂

各半湯

熱病中喝歌

身熱惡寒頭痛楚心煩躁渴如何禦身熱惡風

似但脈不同耳語在下脈洪緊盛為熱病脈虛

細弱為傷暑熱病脈必浮大洪緊傷暑之脈必虛

便已洒洒然毛聳云脈虛身熱得之傷暑

熱病脈洪大中暑脈傷暑面垢并背寒四肢倦

怠汗無度口噤五苓白虎佳痰逆橘皮湯可

愈若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則

甚皮膚既緩腠理開洒然毛疎風寒惡繆加

熱藥發斑黃可怪庸醫心術誤小便已



人可出而惡寒若行  
熱藥便發發黃也

○**傷寒**

**五種溫歌**

溫病

溫瘧

風溫

傷寒春月名溫病脈來浮數是其證發熱頭

疼亦惡寒冬夏比之輕不甚升麻解肌為最

良小柴竹葉宜相稱於春必病溫也

胃寒氣不即病者藏於肌膚至春變為

溫病故其證如此宜升麻解肌湯之類 尺寸盛兮

兼弦數重感於寒變溫瘧先熱後寒小柴胡

但熱不寒白虎藥以上論溫瘧也

陰脈浮滑陽此是風溫證候當頭疼身熱

自汗四肢不收斂睡長當治少陰厥陰病誤

汗黃者胃防已湯以上論風溫也

病四支痠緩風溫為病脈陰陽俱浮自汗出

也少陰火也厥陰木也當治炎火風木誤汗之則用

陽脈濡兮陰弦緊更遇溫氣來行

令變成溫疫作天行少長皆同無異病熱溫

寒清順時宜以平為期如斯正此論溫疫也

陽脈洪數陰實大發斑癩疹如錦文咳兼心

悶何由快此論溫毒也

也故發斑生疹咳嗽心下 宜用元參升麻湯長

沙仲景分明載

○**三種濕歌**

**三種濕歌**

風濕

中濕

濕溫中濕并風濕三者同名而異實暑濕相

搏成濕溫骨間多汗頭如劈兩脛逆冷苦妄

言陽濡而弱陰小急以上濕第二中濕之為

病脈來沉緩其名的一身盡痛兼發黃大便

反快小便澀此名中濕其候令人小便不利

利大便反快但當利其小便濕家之為病一身

胎者以丹田有熱膈中有寒渴欲得水而不能飲口



燥煩也。濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中无病病若頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中則愈。本是風雨山澤氣中之令人成此

疾第三風濕脈但浮肢體痛重難轉側額上

微汗身微腫不欲去被憎寒慄此論風濕也風

一身尺痛發熱日晡所劇此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也故其脈浮額上有微汗不

欲去發汗熱熱欲潤身風濕俱去斯為得

也風濕相傳一身疼痛法當汗出而解值天陰雨不

止此可發汗汗之病不愈何也發其汗汗

大出者但風氣去濕氣在是故不愈也治風防已黃

耆木附湯對證用之醫可必防已黃耆湯未附

兩種瘧歌

發熱惡寒頭項強腰脊分明似反張瘵瘵口

噤如癩狀此各瘵病是其常瘵病身熱暑

時頭回赤目赤赤獨頭面搖先感風寒後感濕沉

遲弦細脈相當太陽病發熱脈沉而細者

因成瘵病也太陽發汗太多有汗不

惡名柔瘵無汗惡寒名曰剛無汗葛根有汗

桂二瘵皆宜續命湯無汗葛根湯有汗持枝湯而

瘵剛瘵无汗柔瘵有汗自宜續命湯瘵有剛瘵有柔

瘵熱無汗及惡寒名曰剛瘵汗出不惡寒者名曰柔

瘵脚攣齒齒皆陽熱承氣湯宜下最良以上

證當用承氣湯亦名陽瘵并陰瘵各異實同安可忘

反各異實同也

四證似傷寒歌食積 虛煩 瘵氣

食積虛煩并有變更瘵氣似傷寒四家病

證雖云異發熱情寒却一般此四證雖非傷寒

當以脈中腕寒瘵會瘵滿脈浮自汗體難乾

此瘵證也有瘵則胃食積令人頭必痛身不疼

考積證端氣口緊盛傷於食心煩脈數嘔吞

酸此食積也食積則身不疼但嘔惡吞酸氣口

之脈不緊實但覺身心熱與煩身不疼兮頭

不痛唯宜竹葉便瀆安虛煩與傷寒相



浮不惡寒身不疼痛但熱而不煩不可發汗發汗必危損如脈不緊實不甚痛但熱而或不煩非裏實亦不可下下之必危慎唯又有脚氣之為病大便堅硬足行難兩脛腫滿或枯細莫與傷寒一例看此論脚氣也脚氣大便堅脚膝腫痛兩脛或有腫寒證或有枯細者方其發時亦發熱憎寒嘔惡似傷候也

○第廿四條

可汗不可汗歌

脈浮唯宜以汗解春夏用之何足怪仲景云脈浮宜

以汗解法春夏宜汗大風若傷衛屬桂枝寒傷榮血麻

黃快榮傷麻黃二藥雖均曰發汗自有淺深也項

強几几葛根湯心間水氣青龍對強几几者用

麻黃者小青龙湯主之少陰亦可微發汗附子

麻黃泄其外麻黃附子甘草湯微發其汗風濕發

汗惡淋漓風氣去兮濕氣在唯宜泥潤徧周

身濕氣風邪俱已退風濕性要微人似欲汗出若大汗出者風景雖去濕

不足血氣微微反在下微弦濡弱斯為害微反在下

少不可汗微反在下少陰沉細病在裏少陽弦

細却主內少陰脈沉細數病在裏不可發

陽少陽不兩厥若汗必舌萎厥不可發汗發汗則

前四動汗之還窒礙動氣在左動氣在上動氣在下

汗瘡家汗之必成瘥淋家汗之便血殺衄家

汗之額上陷咽乾汗之咽却隘身疼痛不可攻

其表汗之必瘥淋家汗之必便血衄家汗之額上促

急而緊直視不得响不能眠咽乾燥者不可發汗王

寔傷寒證治皆亡血汗之必寒慄可發汗發汗則

而振汗家重汗精神憊汗家重發汗必

少陰強汗動經血強發之必動其血虛煩壞

病尤須戒發汗宜用小柴胡湯主之月經適斷適

來時切莫動經成冒昧此小柴胡證發

可下不可下歌

食不消當下之寸口浮大尺中微人病有宿食何



以別之師曰寸口脈浮大按之反澁尺中亦微而澁當下之承氣湯主之陽明痰熱茵

陳證必發黃宜茵陳蒿湯主之譫語柴胡湯最宜

風也過經乃下之宜大承氣湯大柴胡湯結胃大

陷胃圓對痰血抵竟不可遲結胃宜大陷胃下

之大便堅硬惟承氣痞氣瀉心湯勿疑大便

宜下以承氣湯痞氣脈若陽微下則痞自此以

下也結胃微不可或兼虛細更難之結胃

微不可吐虛結胃浮天下之死結胃大者不可下

下之四逆若下命傾危四逆者不可

惡寒自是有表證惡寒者表證嘔吐仍兼胃氣

虧者不可下之不轉失氣必溏利大便六七日

恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中轉失氣

者為有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但頭硬後

必溏泄陽明自汗下難為陽明自汗少便利此

不可下為津液內竭難堅不

可攻宜用咽中閉塞尤須忌咽中閉塞

下重則欲跌陽浮數已虛脾而數浮則傷胃

則動脾此非本病左右上下有動氣更在調和

醫持下之所為也

子細察動氣在右下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸動氣在左下之則腹滿氣

急動氣在上下之則掌握熱煩動

可吐不可吐歌

傷寒大法春宜吐法春宜吐宿食不消胃滿症

在下管胃吐之胃中鬱滯兼有涎寸口微數知其

故之而反有涎唾下利日十餘行其脈反遲寸口微

滑此可吐之以上脈微若吐大為逆不可吐虛細

不可少陰寒飲無增劇少陰病其人欲

吐復不得吐始得之手足寒脈弦澀此胃中實可四

下也若鬲上有寒飲者乾嘔不可吐當溫之矣

逆虛家止可溫誤吐內煩誰受責四逆病厥不

可吐虛家亦然太陽病強吐

之則內煩論此皆不可吐者也

○第二十四論

可火不可火歌

中風忽然被火劫咽爛發黃津液竭太陽中

風以大劫發其汗邪風被火劫血榮微血弱與燒

氣流洗其身則發黃至於咽爛矣



針煩躁昏迷并發熱其脈沉者氣微也

而煩也陽明被火必怵惕加燒針者必怵惕

陽被火必清血其人必躁到經不解必清血

陰火劫小便難強責汗時翻作孽病效而下利

必難為強責少陰汗故也或致虛煩不得眠或

致發黃中鬱結或致下血如豚肝或致謔言

語無節明病被火物額上汗出必發黃痰熱在勝

膀胱蓄結成積則下血如豚肝此皆誤火之為病切

須子細加分別張苗欲汗外迎之却取燒

布桃葉陳原立問張苗連發汗不出如何苗云亦可

○論

可水不可水歌

太陽汗後不得眠少與水飲當自全太陽病

發汗後若大汗出胃中乾燥煩而不能眠其人欲飲當時飲之胃中和則愈矣厥陰煩渴

感得水則胃重多寡亦如然厥陰病渴欲

也霍亂思水五苓妙嘔吐思水猪苓痊霍亂

亂頭痛發熱身體疼痛熱多飲水五苓散主之嘔吐而病在葛上後必思水者急與猪苓散飲之也

過多反病成喘咳心下成喘咳胃冷應知嘔

噦噦人不能食飲水則噦水噦皮上有粟起

其病在陽當以汗解而反以水噦之若灌之

胃熱可憐以水洗之灌之則益熱寒氣得水即

成飽音啞食不下也寸口脈浮大數者乃

相搏其不可醫工要達權

○論

可灸不可灸歌

少陰吐利時加嘔手足不冷是其候口中雖

和背惡寒脈來微澀皆須灸少陰病其

反發熱者不死脈不足者灸厥少陰七壯少陰

一二日口中和背惡寒者當灸之下利脈微澀

可五十壯陰毒陽虛汗不止腹脹腸鳴若雷

乳面黑更兼指甲青速灸關元應不謬陰證

却慎之因火為邪恐難救不可灸因火為邪則



為煩逆焦骨 傷筋血難復也 脉浮熱甚灸為難唾血咽乾誠矣  
繆而動咽躁必吐血自微數之脉以下皆不可灸也

○第三十四證

可針不可針歌

大陽頭痛經七日不愈再傳成大疾法中當

刺足陽明可使不傳邪氣出病頭痛至七日自

當愈其經竟故也若欲再傳者 挂枝服了煩不解

風府風池刺無失煩不解者當先刺風池風府却

与挂枝湯服 經來經斷刺期門正恐熱邪居血

室婦人中風經水適來項強當

刺大推間脉有縱橫肝募吉陽併病心下痞頭

及七月從腰以下如水溢當刺勞宮及関元

以利小便去心實婦人傷寒懷身腹

七月太陰當養不養此心實當

刺勞宮及関元穴小便利則愈 大怒大勞并大醉

大飽大飢刺之逆熇熇之熱漉漉汗渾渾之

脉安可失漉之汗渾之脉淺深分寸自

○第三十五證

傷寒可温歌

大抵冬宜熱藥温大法冬宜下利少陰有二

門法中可温者有九證腹滿身痛先救裏

救其裏四逆湯下利腹滿身疼痛先温其裏

宜四 脉來遲緊痛仍存下利脉遲緊而痛

而便 少陰葛上有寒飲少陰病其人飲

湯垢不得吐始得之手足寒脉弦遲若

葛上有寒飲乾噦者切不可吐當温之 或加嘔利

病難分脉沉微澁如斯證四逆理中湯可温

少陰温之脉沉者急當温之宜以四逆湯

四逆附子湯熱藥治之

○第三十六證

發熱歌

太陽發熱惡寒慄陽明身熱汗自出少陽發



熱多乾嘔三陽發熱證非一發熱而惡寒者發於陽也大

抵三陽多發熱太陽證云啻二惡寒翕翕發熱故太陽發熱則惡寒慄也陽明證云身熱汗出不惡寒反惡熱故陽明發熱則自汗也少陽證云頭

痛發熱脅下堅滿乾嘔故少陽發熱則嘔大抵寒多為易治熱多寒少因寒極者寒之極寒多者

病淺故易治焉解熱大小柴胡湯更看淺深為妙術

若發熱无表證當用大小柴胡湯熱淺者宜小柴胡熱深者宜大柴胡小柴胡辨肌大柴胡正下之也當

以外證內脈為之準三陰初無發熱證唯有少陰兩證實

脈沉發熱屬麻黃裏寒外熱宜四逆少陰病

始得之反發熱脈反沉者麻黃細辛附子湯主之

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆通脈四逆湯主之

第四十證

潮熱歌

潮熱為實當與下仲景之言可憑藉潮熱者實也大法

當宜下更看脈息浮與沉若但弦浮應未也

浮為在表沉為在裏若但弦浮有表證在者未可下惡寒脈浮表證在與小

柴胡湯勿下陽明病有潮熱若汗出多而微惡寒其熱不潮勿與承氣湯腹

滿不通小承氣但和胃氣無多瀉瀉而不大便者

者可與小承氣湯微潮熱之證有三說皆屬陽

明小柴訣一則潮熱且吃噫二則微熱或溇

泄陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗其人嗜卧一

身及自惡黃小便難有潮熱時二歲宜与小柴胡湯

主之陽明病發潮熱大便溇小便自可而胃腸滿不去者小

柴胡湯主之三則日晡發其時發已微利增嘔

噦乙劣切逆氣也其入日晡而發潮熱若劇者發則不知人太陽亦有一

證存惟是結胃發潮熱而復下之不大便五六

日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹堅滿而痛者宜與大陷胃湯

新編張仲景註解傷寒百證歌





# 新編張仲景註解傷寒百證歌

## ○第四十一證

### 往來寒熱歌

陰陽相勝互爭強往來寒熱亦何常先寒後

熱為陰盛先熱後寒責在陽陰陽交爭故往來

寒後熱陽氣勝故先熱後寒也此疾大約有三證大小柴胡薑

桂湯中風曾滿不欲食心煩喜嘔小柴良

○中風往來寒熱曾滿苦滿默默不欲食心煩喜嘔者屬小柴胡湯熱結在裏十餘

日却是大柴胡克當○傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者宜大柴胡湯

已汗復下曾脇滿柴胡薑桂保安康○傷寒五六日已汗而復下之曾脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱者柴胡桂枝乾薑湯主之

○證

### 汗之而熱不退歌

已汗復下脉加躁不食狂言謾祈禱此證謂

之陰陽交死候難醫不可道○汗出而身復熱脉躁病不解

汗衰狂言不能食病各為何也曰病名陰陽交也此其人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣隱藏於骨肉之間而得汗者邪衰而精勝則當食而不發熱熱者邪氣也汗者胃氣也今汗出而狂言不能食邪盛也死

得汗脉靜自然生汗後復熱命難保

者生躁者死脉若浮數可再汗沉實之時下為

好不得已頂當汗下之浮風温之候屬萎蕤風温而熱屬虛煩竹葉湯為寶虛煩自汗出而熱更

看虛實治為宜可細斟量休草草中御府長信

○病意称脉法熱病陰陽交者死今切之不交併陰陽者脉順清而愈其熱強未及酒活也

## ○第四十二證

### 下之而仍發熱歌

病人脉微來又瀆誤汗誤下皆為失脉微則瀆則血少二者不可汗下既下而汗禁衛皆虛故發熱也既汗亡陽斯惡寒

又下陰微還熱極陰虛者陽必厥之既下則陰虛

虛則內熱故熱極也最忌陰陽皆已虛熱又不

止病斯亟更有勞復并食復失於調治并將

息既下之後必須身凉今下之而後熱者不時汗下之誤亦有勞復食復一證勞復謂病後用力食復



謂飲食過度失於調治之所致新差血氣尚虛羸勞復生熱無氣力勞復則无脾胃尚弱食過多食復發熱還憎食食後則發熱嘔吐憎聞食臭矣小柴枳實梔子湯數者用之宜審的

○第四十四論

惡寒歌

惡寒發熱在陽經無熱惡寒病發陰惡寒者病發於陰也陽宜發汗麻黃輩陰宜惡寒者病發於陽也無熱而

溫藥理中寧發於陽宜桂枝麻黃青龍輩發於陰宜四逆理中也啻啻惡

寒桂枝證發熱桂枝湯證汗後惡寒虛不

任汗後惡寒虛也脉微惡寒不可下尚宜發汗莫令

深脉微不可下雖發汗亦微發汗可也亦有頭汗惡寒者柴胡加

桂直千金頭有汗而惡寒者仲景用小柴胡加桂湯汗已惡寒心下

痞附子增加入瀉心心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之方第十八

○第四十五論

背惡寒歌

背陽腹陰各異位陽弱惡寒多在背背為陽背惡寒者陽弱也一則三陽合病生額上生汗背惡寒者

其證一則少陰寒在外少陰病得之一

當以灸以附子湯主之欲識陰陽病不同口和不和各分

配也口不和背惡寒者少陰也合病口燥

并不仁白虎抑揚是其對仲景以白虎治背寒抑退陽也少陰

口和須灸之附子湯兼陰自退解在上

○第四十六論

厥歌

有冷厥有熱厥脉證當須子細別冷厥纔病四肢冷脉但沉微身不熱冷厥初得病便身四

不甚足多攣卧并惡寒引衣自覆仍不渴熱也

凡厥者陰陽之氣不相順接便為厥者手足厥冷是也故多足拘攣外惡寒引衣自覆不煩渴熱

厥身熱頭且痛三四日內厥方發半日之間

熱復回揚手擲足煩躁列熱厥古冷厥本自不

厥必四五日內方發半日之間熱復來也揚手擲足心中煩躁要之熱深厥亦深



熱微厥亦微相侵傷寒論卷之九十一二日至四五日

深熱亦深厥微熱亦微厥厥者必發熱前厥者後必發熱

下之而發汗者必口傷爛赤血氣不通手足冷醫

人不識却疑陰其脈沉伏而更滑頭面有汗

指爪溫急便下之安可慢不然疑似禍相仍

沉伏而滑伏熱在內也四支維厥指爪必溫皆陽實也急下之則愈

逼兩手一手忽無脈手足厥冷面不澤細辛

甘草湯脫厄傷寒論卷之九十一

甘草湯以治厥冷者恐是正汗來故有此證用細辛

汗之出則可愈心下怔忡怔忡者心動

有水脈緊厥時邪在裏傷寒論卷之九十一

其草湯以治厥不其水入胃必利

治不安此為藏厥非蛇厥也蛇厥者其人當吐

發於陽下之早熱氣垂虛心燥燥發於陽而

反下之熱入因作結胸所按之石鞭頭項強此

是結胸證分曉狀下之則和

痛按之脈浮與大未可下先汗後下無顛倒

不可下下之則死熱毒上攻結在胃枳實理中

應恰好大抵結胸未辨虛實大抵結胸有三說大

結小結并水結有大結細胸有小結結胸有水結

在胃曾也但頭汗更有寒熱二證存熱實寒實

宜區別近者大陷胸湯主之此大結胸也

有證名臟結脈浮關小沉細絕故時時下利寸

陰筋當死別病者脅下素有痞而在臍傍

結胸之狀如瘕病從心至臍不可近結胸者

項亦強如柔瘕狀從心以心中懊憹并躁煩

陽氣內陷非虛斬居城切固也

躁心中懊憹心下因便則為結胸也

續修四庫全書 子部 醫家類 卷之九十一



○第四十一

痞歌

痛為結胃否為痞音被關脉皆沉本同類

因發於陰而反下之因作痞病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反汗之因

作痞蓋痛則為結胃不痛則為痞結胃與痞寸脉浮關脉皆沉

關上若浮且瀉心

上浮者大黃黃連瀉心湯主之

發渴煩躁五苓對

口煩躁小便不利者用五苓湯主之

桔梗枳實湯

晉人治痞氣多作桔梗枳實湯往往便差以其

最佳先與服之使行氣

下氣

故尔

下利雷鳴心下硬甘草瀉心湯可治

論中瀉心湯加減有五證皆為痞氣而設也但前而不痛者宜半夏瀉心湯色黃手足温者黃連瀉心湯惡寒汗出者附子瀉心湯乾嘔食臭脇下有水氣者生薑瀉心湯雷鳴心下硬心煩不得安者甘草瀉心湯也

也

○第四十二

發黃歌

寒濕在裏不能散熱蓄脾中成此患濕熱宿

殺更相搏鬱塞不消黃色綻寒濕在裏則熱蓄於脾胃

理不開熱與宿殺相搏煩燥不得消則大小不通故身軀面目皆變黃色

頭面有汗

劑頸止渴飲水漿胃裏間但頭汗出餘無汗劑頸而還小便不利身

浮滑緊數脉來時茵陳五苓皆可

必發黃也

浮滑緊數脉來時茵陳五苓皆可

選散皆可選用之

痰血之證亦相類大便必黑

此其異血證其間多發狂要須辨別無乖矣

發黃與痰血其證相似甘因痰熱在裏故也但發黃者小便多不利痰血則小便利小腹硬滿大便黑色

胃其人發狂者以熱在下焦少腹當硬滿小便不利者下血乃愈所以然者以太陽隨經痰熱在裏故也

白虎

之證亦身熱大率與同難辨別白虎不能遂

發黃蓋為周身汗發越白虎与發黃證亦相似但白虎周身發汗故不能黃發黃則餘

更有中濕并中風發黃大抵

亦皆同濕則黃黃身盡痛目黃風中氣難通

如黃黃又有中風黃者但目黃氣難通也

發狂歌

發狂一證當別白陽毒蓄血皆憑脉發狂有



陽毒發狂有蓄血發狂陽毒發狂多乾嘔煩躁脉實并面赤狂重陰者癩蓄血如狂脉沉微但欲嗽水不咽入小腹硬滿小便利不發寒熱大便黑

胃其人發狂者以熱在下焦小腹當硬滿小便不利經瘀熱在裏故也抵當湯主之大抵當汗而不

汗熱化為血如何散血上蓄者喜忘多血下蓄者還悶亂血在上則更有火劫發狂

時桂枝救逆湯加減傷寒之脉浮而醫以火迫劫之亡陽驚狂卧起不安屬桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯治

發斑歌

濕毒熱病證兩般發斑隱疹滿身間

搏則為隱疹身熱為痒者為泄風溫毒冬月冒寒氣至春始發

在皮端此證謂冬月冒寒至春陽氣盛發於表膏者熱病表虛而裏

實熱毒不散錦紋斑不可發汗重開泄升麻

湯輩可求安熱病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁謬語此為表

重裏實熱氣燥於外故身熱發斑如錦紋凡發斑不可用發汗藥今略重開泄升麻湯也宜升麻元參湯熱毒乘虛入胃胃爛故發斑其熱微者赤斑出劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生

發喘歌

傷寒喘急是其常先論陽明及太陽太陽無

汗麻黃證太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

一證太陽病下之微喘者表未解也桂枝加厚朴杏子湯主之一證下後不可便行桂枝湯若汗出而喘无大熱者可与麻黃杏仁甘草石膏湯

陽明潮熱小乘湯熱短氣腹滿而有潮熱者小承氣湯主之水停心下喘而咳加減青

龍必可當傷寒表不解心下有水氣發熱而咳或渴或利小腹滿而喘者小青龍湯

陰證喘時湏喘急及陰丹輩用為良陽證異其喘必急宜用反陰丹主之

發渴歌

脉浮而渴太陽病有汗而渴陽明證渴而自

利屬少陰二者不同湏審訂發汗已脉浮數煩渴者五苓



散主之因陽明病汗出多而渴者不可与猪苓湯以其汗多胃中燥猪苓復利其小便故也

病其人欲吐復不得吐而煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰此二證渴雖同其病則異也

大渴莫與水小渴唯宜滋潤爾若大劇飲心下滿變成水結難調理

水當稍飲之胃中和則愈渴太陽病汗後脈洪方可與此證思之要審量

白虎加人參也傷寒發熱無汗者表未解不可與白虎湯渴者白虎加人參主之

明有汗且休供五苓小便不利汗仍少脈浮而渴用為精

其小便故也若脈浮發熱渴飲飲水小便不利猪苓湯主之

用中暑黃連元酒蒸元活人書方二藥雖非仲景之方然治陽毒中暑最為有效

○第五十四卷

吐血歌

諸陽受病熱在表當汗汗不發

若皆由諸陽受病熱初在表應發汗而汗不發致使熱毒入深結於五臟內有痰積故吐血也

熱毒

張仲景注解傷寒百證歌 卷三

六三七

入深結在中痰血既停漬吐血輕者犀角地黃湯重者抵党方能絕

發之內痰蓄血及鼻衄吐血者此湯主之抵党湯治痰血在內

天下寸口脈沉遲吐血升麻安可缺

其脈浮大數面赤斑加錦文唾膿血者此湯主之

○第五十五卷

吐血歌

太陽陽盛必瀆衄衄已解時何幸福

發熱其身无汗自衄者愈蓋太陽病有因衄血而便自解者

浮緊無汗係麻黃脈浮自汗桂枝屬一者服之不中病脈尚如

前宜再服

麻黃桂枝正分表裏服之不中病尚宜再服此活人書之意也予謂此候不可不審察細詳仲景之書

可攻其表汗出額上暈直視不得眠不能食亡

血家不可攻其表

汗出則寒慄而振

衄後脈微血已虛慎勿服之

令病篤且看犀角地黃湯不止茅花須預速

若脈微血虛則麻黃桂枝皆不可用也小陰證本來

品犀角地黃湯

張仲景注解傷寒百證歌 卷三

六三七



無此候少陰強發紅來觸下厥上竭不可醫  
血流口鼻或耳目發之則血未從何道出或

吃噫歌

胃虛為噦名吃噫聲啞語難也多因吐下  
緣虛極古入方書无吃字惟有橘皮乾薑退陰  
散或灸乳下皆得力灸法見活人又有陽明

小柴胡視其前後部何如者視其前後知何部

不利愈其入本虛攻其熱必噦因虛攻熱必生噦仲景言豈妄歟

陰陽升降致屯如胃氣上逆無休止逡巡中

汗自然除龐安常說

第五十七論

謔語歌

實則謔語虛鄭聲兩般相似最難明實則謔

語虛則鄭聲鄭聲者重語也直視謔語而喘滿者死下利不止亦死矣大小便利手

足冷更兼脈細是虛形此鄭聲之證也脈來洪數二  
便秘謔語為因實得名謔語證本非一或因

下利或胃實湯主之三陽合病或痰血或是

外吐胃中燥大便必堅堅者謔語承氣湯主之三陽合病或痰血或是

熱入於血室側口中不仁謔語大抵發熱陽脈生反見陰脈斯

為逆謔語發熱見陽脈者生見陰脈者死

傷寒煩躁證如何陽明証與少陰科陽明脈

長大便秘汗其人微煩不了了者此大便堅也

傷風之候太陽多解者宜刺風池風府却與桂枝

陰之證莫令訛大抵陰盛陽虛亦煩故少陰證

傳入腎經則煩躁宜矣少陰病惡寒而倦則

自煩欲去其衣者可治自利煩躁不得眠者

湯不解脈洪大者白虎湯陰盛陽虛亦煩故少陰證

傷風之候太陽多解者宜刺風池風府却與桂枝

陰之證莫令訛大抵陰盛陽虛亦煩故少陰證

傳入腎經則煩躁宜矣少陰病惡寒而倦則

自煩欲去其衣者可治自利煩躁不得眠者



汗下而煩醫者誤傷寒吐下發汗虛煩脈甚微八九日心下堅痞經脈動  
而成萎病解而煩氣未和更有虛煩宜竹葉  
莫作傷寒致誤得病二三日脈不浮不惡寒身不疼痛但熱而煩非表候不可發汗如脈不緊實病但熱或不煩非裏實不可下汗下必危指但用竹葉湯主之其病自然而愈也

○  
懊懣歌

傷寒懊懣意忡忡陽於告反陽千金音忡農外臺云奴陳切或實或

虛病胃中結胃下早陽內陷陽明誤下胃虛

懊懣證有三此一證胃中因下空虛而致也  
內陷心中因硬則為結胃中因陽明證其脈浮緊下  
之則胃中空虛客氣動其心中懊懣舌上白胎者扼  
子湯主之若渴欲飲客氣動其心中躁扼子湯  
水者白虎湯主之

兼大陷胃結胃陷胃湯主之胃中燥屎宜承氣

腹滿頭堅不可攻此一證胃中下後有燥屎也

煩胃中有燥屎者可攻其人腹微滿頭硬後  
溲者不可下之有燥屎者宜承氣湯主之

○  
第六十證

佛鬱歌

佛鬱有虛亦有實要須子細明證脈佛鬱者蓋也吐下燥屎唯宜承氣湯利大便下難下易時者虛也  
有微熱佛鬱不得則有吐下極虛胃寒疾燥屎故也承氣湯主之  
寒大吐下後極虛復極汗者其人外氣佛鬱後復之  
水以發其汗因得熾所以然者胃中寒冷故致此也  
火薰汗出目須黃寸口脈陽浮陰濡而弱  
而熱發佛鬱蒸二陽併病面還赤病太陽初得病  
時先發其汗汗先出不微因轉屬陽明續自微汗脈  
出設面色緣緣正赤者陽氣佛鬱當解之薰之也  
來洪大榮氣長寸口脈洪而大者榮氣長  
隨經醫治何由失

新編張仲景註解傷寒百證歌卷之三



新編張仲景註解傷寒百證歌

卷之四

驚悸歌

傷寒何故生驚悸吐下溫針或火力或因吐下或因因

或因下之謬語牡礪湯之育滿煩驚小便不利

者柴胡牡礪龍骨湯主之妄用溫針於理逆因

陽傷寒加溫針必驚也風溫被小人多痢尺壯切痲子用切

溫被火者微發黃色劇則如驚痲時則陽明被火

汗流出陽明病被火額上微汗出發熱汗

麻浮火劫必亡陽亡陽必驚狂臥起不安者桂

枝去芍藥加蜀漆壯腎龍骨救逆湯三者不同同此疾少陽中風

耳無聞吐下悸驚常惕惕耳無所聞目赤腎中

滿而不煩不可吐下吐下則悸而驚

心悸歌

傷寒心悸有多端大抵三陽不一般證有八九

皆屬太陽便利多飲水以飲水多心下悸小便利者

三陽太陽便利多飲水以飲水多心下悸小便利者

少陽吐下仍虛悸少陽中

風兩耳無所聞目赤胃中滿而誤下煩時胃內乾

可發汗發汗則謬語為屬胃胃不和則煩

而悸脈來結代炙甘草悸多甘草湯主之方第三

九小建中行三日間建中湯汗過自

冒桂其證肉瞤真武定須安此二證自汗過而

湯多其人又手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草

湯方第二十七因太陽病發汗汗出不解其人仍

發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲僻地者真武湯主之方第四十二

集卷之三

冒悶歌

二陽併病必須冒且刺大椎當慎表太陽少

陽併病頭痛或眩冒時如結胸者利大便第一問肺俞肝俞慎不可發汗

麻沉遲汗出中心常鬱懊其人面赤身有微



執下利清穀者吐下汗後或動經傷寒吐下後發

八九日心下痞硬氣上衝咽喉汲水灌身那得好

汗下表裏已先虛汗出表裡痊可保

而愈先復發汗以此表裏俱盡其人必冒

家汗自出愈所以然者汗出表和故也

乾嘔歌

陽明胃絡從頭走氣上逆行瀆便嘔

絡從頭走是今氣陽明多嘔小柴胡

往來寒熱心煩喜嘔或胃中

痛欲嘔吐者黃連湯主之第二十五

苓甘發汗吐下後心下逆滿者茯苓湯

後渴五苓救者五苓散主之汗後餘熱竹葉湯

竹葉湯或橘皮湯煩虛梔子豉湯

武湯中加減否五日腹痛小

者不可治嘔膿尺乃愈又有少陰嘔證

痛而利此為有水氣其人或咳或小便自利或

吐逆歌

吐有冷熱兩證異內脈外形當子細

當以內脈煩渴脈數手心熱此是胃熱之所致

外脈來數手心熱煩渴者胃熱也竹茹湯

中虛冷理中治肝脈遲胃虛也理中葛上寒痰四

逆湯者不可吐當溫之宜四逆湯汗後虛煩竹葉

已竹葉并橘皮湯證少陰欲吐復不吐必竟吐

之當審記少陰病其人飲食入則心中

不可下當吐之

霍亂歌

嘔吐而利名霍亂

逆冷誠斯患寒多不飲理中圓熱多而渴五

散水方散散寒多不飲水者理中圓主之



利汗出發熱惡寒四支拘急手足厥四逆湯主之  
暑月忽然心撮痛兩脚轉筋多冷汗上吐下利并躁煩水沉香薤煎散  
暑月陰陽不和清濁相干飲食飲飽傷於脾胃而取涼就陰陽交錯變成吐利三焦瀾亂腹中撮痛大瀉而煩兩脚轉筋者當用香薤散主之

○第廿七證

頭疼歌

三陽往往病頭疼隨證醫治平各異能三陽經於頭三陰至胸中而還故太陽身熱麻黃證

太陽病頭疼發熱身疼無汗而喘者麻黃湯主之無熱陽明胃氣蒸

若陽明病手足若厥者其人頭必痛少陽受病脉弦細小柴胡證自分明

不可發汗則語為獨胃不和則愈不和則煩而悸三陰太少無頭痛為

是厥陰之證形無頭痛唯厥陰有也非時忽有

瘡首疾出周禮必是停痰濕氣并

停痰濕氣亦

○第廿八證

脇痛歌

少陽膽經循脇過邪入此經痛無邪

少陽經絡循脇過邪入此經痛無邪

醫治定須可

而轉入少陽經唯小柴胡湯緊切

下堅滿舌上有胎者可與小柴胡湯

病不解轉入少陽腸下堅滿乾嘔者小柴胡湯主之

病人痞積胃脘傍痛引陰筋名藏結

下積素有痞積在臍傍痛引小腹入陰助者名藏結

腹痛有實亦有虛要觀證與脉何如尺脉帶

弦并泄利陽明虛痛建中瀕

中急痛先與關脉若實大便秘更加腹滿實中

居

小建中湯

居

中痛泄利下重者

中痛泄利下重者



設寒外熱微欲絕脈不出或腹痛通脈四逆湯  
主之少陰病二三日不已至四五日腹痛小便  
不利真武下之腹痛桂枝祛太陽病醫反下之因  
湯加芍藥湯主之大胃中有邪胃中熱嘔吐黃  
連湯可除傷寒胃中有熱胃中有邪  
氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

咽痛歌

咽痛陰陽各異宜要須脈證兩參之脈浮而  
數吐膿血此是陽毒之所為傷寒脈浮數而大  
垂膿血千金外臺

有烏弱治之脈沉兼細手足冷或加吐利少陰兮

變醫治反汗出必亡陽病屬少陰又有伏氣之

為病非時寒冷着人肌咽喉先痛次下利作

腎傷寒方可醫之內欲有伏氣假令積有伏氣當  
須脈之若脈微弱者當喉中痛似傷寒非喉  
痺也病人云實喉中痛雖亦今復欲下利

效嗽歌

咳嗽三經要辨明太陽陽明與少陰太陽停

水青龍候仲景小青龍二證皆云心下有水氣乾  
嘔發熱而咳者小青龍湯主之小柴治效直千金八日心下悸  
喘者小青龍湯

頭痛定難禁故能食而咳者其人咽必痛不效者  
咽不痛冬陽明反無汗小便利二三日嘔而效  
手足厥者其人頭必疼若不嘔不效手足不厥者頭  
痛少陰煩渴猪苓治洩利瀉還四逆靈

忽然水氣因生效真武湯功效最深

遺尿歌

風濕被下必失洩軒睡難言自汗流溫為病  
陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾三陽合  
語言難出甚被下者小便不利直視失少

病身體重不覺遺尿也可憂三陽合病  
腹滿身重難以轉



口不仁向然語謬遺尿發汗則語下之下焦不  
則上生汗手足厥冷自汗宜白虎湯主之  
歸亦遺溺三者依方病可瘳  
三發證  
治之可愈  
留目直視者此為腎絕也

腹滿歌

太陰腹滿必時痛  
病腹滿身重  
陽明腹滿

口苦乾微帶小柴胡可用

潮熱宜承氣  
下後心煩而腹滿

子厚朴湯宜爾  
吐後小承當審

厚朴最為佳  
太陰桂枝芍藥

諸氣湯主之此

湯大實大黃湯可治  
大黃湯主之

蠱厥歌

胃冷仍加發汗重因成就厥吐長蠱病源本  
蠱厥陰證宜用烏梅與理中

傷寒自汗證有九衛不和芍桂枝候  
不和也先其時發汗則愈

自汗歌

傷風自汗也  
風濕風濕及

中風自汗也  
中風陰弱者汗出

自汗也  
自汗也

自汗也  
自汗也



其名曰系產此  
霍亂下利四肢逆  
利汗出發熱惡  
寒四肢拘急手足  
厥冷四逆湯主之  
汗出少者為自汗  
如汗多者太過  
者陽絕於內亡津  
液大便因堅也  
少陰無汗或  
有之額上手背時  
時透陰不得有汗故  
但額上手背有耳  
朱迪傷寒陰證  
病額上手背皆有  
冷汗三二日中尚  
可行隨證治  
療莫令差更看病  
形深體究

### 頭汗歌

病人裏虛而表實  
玄府不開腠理密  
無能作汗潤皮膚  
陽氣上行頭上出  
津液既竭五臟  
乾誤下重虛成大  
疾病人表實玄府不開汗不  
能決於周身故上  
騰而發  
於頸額也汗既出  
多五臟津液  
虛少又重責之以  
汗必成大疾  
頭有汗多塗徑  
劑頸而還發黃病  
必發頭汗出後下之  
往來寒熱表未解  
手足冷時  
非陰證心下滿口不欲食大便堅其脈細此為陽微

結有表復有裏也  
脈絛流緊不得為  
少陰所以然者  
陰不得有汗令頭  
汗出故知非少陰  
也可與小柴胡  
湯  
肝乘肺部刺期門  
其人大渴飲酢漿其  
脈必  
滿身自汗出小便  
利其病欲解此肝  
乘  
肺名曰橫當刺期  
門其病欲解此肝  
乘  
梔子應胸中懊懣若物不能食  
用梔子  
湯主之  
甘肅間堅滿茨  
冬湯六者看詳宜  
審訂

### 欲得汗歌

陽加於陰有汗期  
過關之脈要須知  
加於陰謂  
之有汗俗謂  
過關之脈也  
有時兩手忽無  
脈恰似重陰欲雨  
時有無脈者有汗  
證也  
病人本虛必發  
顫不虛  
得汗顫何為不顫  
不汗自然解陰陽  
和順更  
何疑先曾吐下并  
亡血內無津液故  
如斯  
病有戰而汗出因  
得解者何也答曰  
脈浮而緊按  
之反沈此為本虛  
故當戰而汗出也  
若脈浮而數按  
之不沈此人本不  
虛若欲自解但汗  
反耳不發戰也  
病有不戰不汗出  
而解者何也答曰  
其脈自微此以  
常發汗若吐若下  
若亡血內無津液  
此陰陽自和必自  
愈  
止愛灑灑周身潤  
來  
時最忌水淋漓  
凡得汗欲令手足  
皆周漿  
汗出如



油是惡證忽加喘急病傾危汗出如油

也停痰癥癖皆隔汗先瀉蕩滌要醫治傷寒

先有宿患如痰飲癥塊皆能蓄汗不能得先開達滯道經絡通為佳水升火降陰陽

合大汗來時命得回腎水升心火降坎離得交

○第廿八人證

舌上胎歌

陰陽俱緊鼻出涕舌上胎滑勿妄治踈卧惡

寒多嘔痰腹內痛者瀆成利脈陰陽俱

乾燥踈卧足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也至七

八日以來其人微發熱手足溫者此為欲解或到七

八日以上反大熱者此為難治設使惡陽明濕痺

并臟結色白胎滑多在舌下二證見臟結無陽

不可攻熱其人反靜舌上滑胎者不可攻濕痺丹田

應有熱丹田有熱中有寒濕痺中濕也陽明悞

懷脇下堅施子柴胡不徒設陽明有二證陽明

舌土胎者施子湯主之陽明病脇下堅滿不大

便而嘔舌上胎者可與柴胡湯上焦得通津液得下

胃氣因和身濼然汗出則解

○第廿九人證

下膿血歌

傷寒表實裏虛熱氣垂虛腸裏居下利膿

血赤黃汁或如魚腦狀難拘實裏虛熱氣乘虛

入於腸胃則下赤黃汁若濕毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如魚腦或如爛肉汁太陽下之

脈浮滑定知便血色殺切於開如太陽下

下血陽明下血而謔語熱入血室病難除

者陽明病下血而謔語者必為熱入血室頭汗出

者當刺期門隨其實而瀉之戰然汗出則愈

陰膿血桃花證不爾刺之邪可祛下利便膿血

者桃花湯主之少陰下利脈浮尺中澀或

是發厥熱如初二證皆圓膿血利悉見長沙

仲景書一證傷寒發熱四日厥反三四日後

不除必清膿血又證云下利脈

又浮數尺中自濇其人必清膿血

○第廿八人證

晝夜瀉劇歌

瀉氣循環不斷晝則行陽夜在陰衛獨留



陽陽躋盛陽盛陰虛夜不寧忽若留陰陰躋

滿陰滿陽虛晝却爭於陽夜行於陰衛氣者晝日行

於陰常留於陽留於陽則陽氣滿滿則陽躋盛而不得入於陰陰氣虛則夜不得寧也衛氣留於陰不得

行於陽留於陰則陰盛陰盛則陰躋滿

不得入於陽陽氣虛故晝則爭而不得入於陰

陰虛晝晝躁陽虛夜氣清婦人傷寒發

了暮則謔語為熱入血室

煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表裏證脈沉微

邪入之也故晝晝晝了而下而復汗以亡陽而衛在陰

要須調衛各歸分二氣諧和可漸平

### 新編張仲景註解傷寒百證歌卷之四

### 新編張仲景註解傷寒百證歌

卷之五

第八十一證

循衣摸床歌

傷寒吐下仍不解大便不利潮熱在循衣摸

牀惕不安獨語猶如見鬼怪微喘直視不識

人謔語狂言還可駭大承服後脈弦生忽若

瀉考死何悔六日至十餘日其人日哺所發潮熱

不惡寒如見鬼神狀若刺者發則不識人循衣摸床

太陽中風以火劫之兩陽相重灼其身發黃身熱血

第八十一證

筋惕肉瞤歌

病人肉瞤并筋惕汗過經虛真武散

湯証云若脈微弱汗出惡風者不可服之服之則厥

逆筋惕肉瞤此為逆也

動振之欲擗地者真武湯主之不然邪入大經中



大桂枝水 傷寒若吐下後心下逆滿氣上  
為振搖者扶苓桂枝白朮甘草湯  
下後汗虛脈微眩胃經脈動傷者久而成痲 動氣  
在左誤下之忽爾肉腠最為逆左不可發汗發  
汗則頭眩汗不止悸惕肉腠

第八十四證

口燥咽乾歌

脾中有執胃乾枯口燥咽乾津液無陽明白  
虎加參證少陽口苦小柴胡 浮察咽乾口苦口

乾古燥者白虎湯 少陽之為 咽乾慎不可發  
病口苦咽乾目眩者宜小柴胡湯 咽乾慎不可發

汗發汗無津氣愈虛燥不可發汗 少陰口

燥急須下腎經少水致焚如 少陰病得

乾急下之宜服承氣湯 少陰病二三日咽痛

者與甘草湯不差與桔梗湯此証切宜審用之 魚

蝕上部聲啞或咽乾蝕蔽下 上名狐狐感之

第八十五證

傷寒似瘧歌

病虫蝕上下部蝕上部 死声啞食下部則咽乾

傷寒似瘧三證詳血室陽明及太陽 熱入血

室及陽明 太陽汗出脈洪大桂枝各半合麻

黃 寒少清便可宜桂枝麻黃各半湯陽明忽爾還

如瘧不嘔清便熱復涼脈若虛浮桂枝穩小

承氣脈實相當 瘧狀日肺所發者屬陽明脈實者

當下之脈浮虛者當發其汗 下宜承氣湯發汗宜桂枝湯

胡加入地黃湯 瘧入中風七八日寒熱往來

斯 邪中二焦歌

寸口陰陽脈俱緊上下二焦皆受病 寸口脈

陰陽俱緊者當邪中 於上焦濁邪於下焦 清邪中上潔為名濁邪

中下渾應 清邪中上名曰陰中於邪必

內慄足膝逆冷便溺出 又云陰中於邪必內慄

為慄足膝逆冷 陽中於邪必強發熱頭疼頸

攣屈 陽中於邪必強發熱頭痛 皆因露露氣為

傷隨證治之宜審的



○  
○

### 多眠歌

多眠四證病形殊風溫狐惑及柴胡更有少  
 陰同共四當觀形與證何如風溫身熱常自  
 汗自汗身重多眠脈陰陽俱浮小柴脇滿項強  
 拘拘筋下及心痛其人皆卧一身及目悉黃  
 小便難有潮熱少陰自利但欲寐  
 宜小柴胡湯一經最難辨難治要在審詳然  
 吐辨亦有不一經最難辨難治要在審詳然  
 不吐而煩但欲寐五六日自利而渴者為少  
 陰仲景不論方又云少陰脈微沉但欲寐  
 汗出不煩自欲吐五六日自利煩躁不得寐  
 寐者死又云心中煩而不得卧者為連得寐  
 湯狐惑多眠非一途  
 苦參湯主之又玉函一證云三陽合  
 病脈浮大上関上但欲寐目合則汗

### 不得眠歌

傷寒何事不得眠汗過胃中乾燥煩因吐下  
 發汗若大汗出胃中乾燥煩不得眠其  
 人欲飲水當稍飲之榮衛和則愈矣

虛煩致必反覆煩刺心中懊憹梘子鼓湯主之或  
 因大熱語言顛皆不得眠小便不利正發渴心  
 煩少氣苦救煎忽若水停心下滿但與猪苓  
 可保全不得眠者猪苓湯傷寒差後熱尚在陰  
 未復時陽使然陰主夜夜主卧謂陽氣入陰氣盛  
 則目暈矣今熱氣未散與諸陽并所以陽獨盛陰偏  
 虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也外臺  
 烏梅湯

○  
○

### 小便不利歌

胃中乾則無小便慎勿利之強使然寒發汗後  
 而汗出不止津液少胃中乾小腸有  
 伏熱故小便不通也故不可強利之下焦有熱不  
 通泄量病浮沉用藥宣下焦有熱者咳而有水  
 青龍候而效或小便不利小腹滿或喘者小青龍湯  
 主項強無汗桂枝痊頭項強痛翕翕發熱無汗心  
 下滿脈利小便不利者桂枝  
 技去桂加茯苓白朮湯大抵中濕發黃者先  
 利小便當使快大抵中濕發黃者先利小便故付



大便反快但當利其小便仲景論風溫證云若被下者小便不利則傷寒身色如金黃如橘子色小便利腹微滿者茵陳高湯主之

**陽明汗多津液無却以小便利**  
陽明病汗出多而渴者不可與豬苓湯以汗多胃中燥猪苓復利其小便也

**為戒**  
陽明病汗出多而渴者不可與豬苓湯以汗多胃中燥猪苓復利其小便也

**溼之陰分**  
去聲 溼小便難出熱中君陽必溼之陽入

**熱而小便難**  
風小便利難四支急桂枝加附子湯主之

**陽明風中**  
小柴胡

小便自利歌

太陽下焦有熱秘小腹必滿便不利小便不利反自利此是抵堯血證諦

大抵熱在下焦小便必脹滿小便不利

利今反利者有瘀血也傷寒有熱而小腹滿

應小便不利今反利者此為血證當下之宜抵堯元

血小便自利其人如狂者血證諦也宜抵堯湯

**陽明自汗小便結忽若利時津液竭榮雖堅**

**硬不可攻密充用之斯要訣**  
出若發其汗小便

自利此為津液內竭榮雖堅不可攻之宜用密充

導之使通或土瓜根猪膽汁皆可以導之也

**問小便何故數腎與膀胱虛熱作虛則故令**

**小便頻熱則遲瀉相擊搏**  
虛中有熱小便故自

**汗不可服挂枝**  
心煩微惡寒脚卒急服挂枝得之

**跌陽浮瀉是脾約**  
而瀉浮則胃氣強

**胃中不和謔語時**  
胃承

**調胃承氣**  
胃承

胃承

大便不利歌

大便堅硬或不通柴胡承氣可收功

大柴胡湯

亦有不可攻擊者歌在前篇裏證中

不可下者

**寒則溼熱則垢可見陰陽虛實候**

**歲火不及大寒行民病驚溼腸胃吼**  
火不及寒

乃大行民病驚溼者鳴溼也

大便下利歌

傷寒下利多種數要識陰陽勿差互三陽利



時身必熱三陰但溫無熱具

三陽下利身熱三陰下利但溫而不

大藥也合病自利葛根湯或用黃芩之無致誤

枝證鑿反下之利不止者葛根黃芩黃連湯自利

不渴屬太陰少陰必渴腎虛故

有寒故也當溫之宜四逆輩外審證內憑

利而渴者屬少陰虛故引水自救也

脈內外並觀斯兩得脈大由來却是虛脈滑

而數有宿食

膈下熱而利

人參湯朱肱云瀉而利燥屎結

有燥屎也少陰心痛口燥煩却與利之斯要訣

者可下之宜大柴胡湯六經中惟少陰病難治有補

瀉之法不可不審也

狐惑證歌

蟲食下部名曰狐蟲食上部名曰惑狐則咽

乾或聲啞傷寒變壞成斯疾面目乍赤乍白

黑但欲睡眠昏默默更有膿蟲食臟間舌上

盡白齒無色

欲聞食臭其面赤下黑下白食於上部其

於下部其咽乾食上部者瀉心湯主之食下部

者苦參湯洗之食肛外者燒用雄黃熏之上脣

有瘡蝕其藏下脣瘡甚連肛食

急者也多因下利而得之此證殺人為最急

百合歌

百脈一宗皆病形無復經絡最難明

者謂無經絡百脈一宗悉致病也皆因傷欲卧又

却不得卧欲行遷復不能行飲食有美有不

美雖如強健步難勝如有寒復無寒如有熱

復無熱口苦小便還赤結藥纏入口即吐利

如有神靈來作孽病後虛勞多變成百合也

黃湯可吸

或有美時或有不美時或如強健人而欲卧復不得

卧如有寒復如無寒如有熱復如無熱至朝口苦小



便赤黃百合之病諸藥不能療得藥則劇而吐如有神靈所加也身形如和其人脈微軟每尿輒頭痛其病六十日乃愈若尿時不頭痛漸然如寒者四十日愈若尿時快然但眩者二十日愈也

第九十四節

辨傷寒疫氣不同歌

春氣溫和夏暑熱秋氣淒涼冬凜冽四時正氣自調均不犯寒邪無病孽冬時寒凜欲周密君子深藏宜入室中而即病曰傷寒觸冒寒邪成此疾毒氣若深不即病至春與夏邪方

出春為溫病夏為暑變態無端證非一

以上論傷

變也 春為溫和夏為暑熱秋氣淒涼冬氣水則此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子周密則不傷於寒蜀胃之者乃傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變為溫病至夏變為暑病暑病熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者若乃時行自皆由冬時觸冒所致非時行之氣 不同蓋是不時之氣失春時應暖反大寒夏時應熱却寒慄秋氣清涼大熱來冬氣寒時似春日少長一般病相似此是時行號溫疫

欲知正氣與天行要在潛心占斗曆

凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋氣應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非時有其氣是一歲之中長幼之病皆似若此時行之氣也夫欲候知四時正氣為病及時行疫氣之法者當按斗曆占之

第九十五節

婦人傷寒歌

婦人此疾當區別身重身輕不同列產前身重且安胎產後血虛先補血產前安胎產後補血此大法也水火相刑浸自傷榮衛不和多阻節平居水常

養於木水木相資血通徹傷寒男子先調氣婦人先調血血室不蓄則氣不出平居之日水常養於木水木相生則榮養血室血室不蓄則脾无血左關浮緊汗為宜正恐

室中成血結婦人左關浮緊不可下當發其汗以解也血室不蓄脾無蘊剛燥不生免邪熱蓄

則剛燥生仲景所謂無紀胃氣及上一二焦者產後多生三種病大便

堅秘難通兼自汗多皆血虛津液竭婦人產後有三種病大便秘血虛而厥厥必

婦人產後有三種病大便秘血虛而厥厥必



冒冒家解時汗流浹津液既少大便難孤陽  
上出恐陰絕三病皆血少陰虛孤陽獨唯有些  
胡四物湯庶可調和使安悅

婦人熱入血室歌

婦人中暑七八日身熱續續發寒慄經水適  
來或適斷熱隨陰血居其室晝則明了暮證  
語狀如見鬼如疴疾無犯冒氣及二焦小柴

胡證尤為的夏刺期門以瀉肝邪去自然痊

安吉切須急療莫遲遲變證來時恐無及

婦人中暑發熱惡寒經水適來得之七八日熱除  
後適身亦背膈苦滿如結胸狀識語者此為熱入血  
室也當刺期門穴隨其虛實而取之  
七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入  
血室其血必結故使如瘕狀發作有時小柴胡湯主  
之  
如見鬼狀者此為熱入血  
室無犯胃氣及上一焦自愈

傷寒差後病歌

傷寒差後還喜唾胃裏有寒實無邪此候唯  
宜服理中胃暖病除痰自破期門其喜唾久不

了旬上有寒當溫之宜理中元主之勞復枳實梔子湯發熱小柴

胡亦可之傷寒差後發熱小柴胡湯主之腰下

水氣牡蠣散氣者宜用牡蠣散主之也日暮微

煩脾不磨要須損穀自然安甘節吉号必無禍

傷寒差後病入脾已解日暮微煩者以病新差強與穀  
食不消也損穀則愈周易節卦九五甘節吉往有尚  
象曰甘節之  
吉居位中

傷寒五藏死絕歌

水漿不下汗如油形體不仁喘不休此為命絕

終難治更看何藏絕中求汗出髮潤為肺絕

唇吻反青肝絕憂脾絕口黑并黃色腎絕便

失與遺洩心絕身似煙薰黑更兼直視與搖

頭五藏皆絕無可療縱逢和緩亦難瘳

浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁下  
靜乍亂此為命絕也又未知何藏先受其災若汗出



髮潤喘而不休者此肺先絕也陽反獨留形軀如煙  
熏直視搖頭此矣絕也唇吻反青四支將背者此肝  
先絕也環口黑柔汗發黃此脾絕也  
渡便遺失狂言反目直視此為腎絕也

傷寒死脈歌

傷寒死脈定難痊陽病見陰端可憐陽病見陰端

陰脈上氣脈散為形損耳聾浮濇命難全陰脈上氣脈散為形損耳聾浮濇命難全

也傷寒效逆上氣其脈散者死謂其形損故也言身

熱宜洪大沉細而微壽不延腹大洩利當微

細緊大而滑歸下泉吐衄若得沉細吉浮大

而牢嘆逝川論曰病若澹言妄語身當有熱脈

者死病若大腹而泄脈當微細而濇反得緊大而滑

者死病若吐血復熱衄血者脈當沉細而反浮大

死也陰陽俱虛執米止下踈下數命歸天論曰

死脈至下數下踈者死如屋漏如雀啄來如彈

石去解索石去如解索者死彈石者辟辟急也解

形候惡者死脈如轉豆者死如偃刀者死下不至

關陽氣絕上不至關陰氣絕論曰寸脈下不至  
不至關為陰代脈來時不用醫必定傾危難救  
絕皆死不治代脈來時不用醫必定傾危難救  
藥此脈者必難治也

傷寒死候歌

傷寒死候要須知泄而腹滿大難醫言吉本爛

傷熱不已論曰傷寒死候有九論曰泄而腹

汗後脈躁亦傾危論曰傷寒死候有九論曰泄而腹

已得汗脈靜汗出雖多不至足不至足者死論曰

衣縫更何為衣縫者不可活論曰外縮舌卷證候

惡論曰口張目陷不多時論曰口如魚

赤斑五死一生在黑斑十死更何疑論曰

死期六日命難追論曰熱雖甚不死若

斑出五死一生黑斑出十死一生兩感傷寒最大忌

新編張仲景注解傷寒百證歌卷之五



愛日精唐傳鈔本

# 傷寒九十論

四庫未收書

傷寒九十論提要

張金吾藏書志

宋白沙許叔微知可述先列病證後論治法剖析頗精是書諸家書目俱未著錄伏讀

欽定四庫全書總目云叔微書屬辭簡雅不諧於俗故明以來不甚傳布是則因傳本稀少故藏書家俱未之見歟陳振孫曰叔微有傷寒治法八十一篇未知即此書否

傷寒九十論 提要

傷寒九十論 提要



傷寒九十論目錄

辯桂枝湯用芍藥證第一

桂枝加附子湯證第二

桂枝加厚朴杏子湯證第三

麻黃湯證第四

大青龍湯證第五

陽明可下證第六

陽明蜜兌證第七

腎虛陽脫證第八

傷寒九十論目錄

臍中出血證第九

陰中伏陽證第十

傷寒暴臥證第十一

夜間不眠證第十二

大柴胡湯證第十三

陽明急下證第十四

傷寒自解證第十五

熱入血室證第十六

筋惕肉瞤證第十七

陽明當下證第十八

桂枝加葛根湯證第十九

葛根湯證第二十

剛痊證第二十一

厥陰證第二十二

太陰證第二十三

太陽中暈證第二十四

指甲黑青證第二十五

瞪目直視證第二十六

傷寒九十論目錄

舌卷囊縮證第二十七

循衣摸牀證第二十八

邪入大經證第二十九

太陽桂枝證第三十

內併論桂枝麻黃青龍用藥三證

桂枝證第三十一

少陰證第三十二

少陽證第三十三

兩感證第三十四

三陽合病證第三十五



白虎加人參湯證第三十六  
 發熱惡寒證第三十七  
 結胃可下證第三十八  
 結胃可灸證第三十九  
 汗後吃逆證第四十  
 漏風證第四十一  
 小便出血證第四十二  
 妊娠傷寒腳腫證第四十三  
 風溫證第四十四

傷寒九十論目錄

三

狐惑證第四十五  
 發黃證第四十六  
 溼家發黃證第四十七  
 黃入清道證第四十八  
 先汗後下證第四十九  
 太陽瘀血證第五十  
 陰病陽脈證第五十一  
 辨少陰脈緊證第五十二  
 青筋牽引證第五十三

傷寒九十論 目錄

下膿血證第五十四  
 刺陽明證第五十五  
 陰陽交證第五十六  
 陰陽易證第五十七  
 叉手冒心證第五十八  
 傷寒耳聾證第五十九  
 揚手躑足證第六十  
 遺尿證第六十一  
 舌上滑胎證第六十二

傷寒九十論目錄

四

衄血證第六十三  
 傷寒脅痛證第六十四  
 傷寒溫瘧證第六十五  
 發斑證第六十六  
 臟結證第六十七  
 陽結證第六十八  
 傷寒協熱利證第六十九  
 胃熱嘔吐證第七十  
 霍亂轉筋證第七十一



兩脛逆冷證第七十二

汗後勞復證第七十三

汗後瘡瘍證第七十四

面垢惡寒證第七十五

傷寒下利證第七十六

傷寒閉目證第七十七

傷寒表實證第七十八

手足逆冷證第七十九

寒熱類傷寒證第八十

傷寒九十論目錄

失汗衄血證第八十一

脾約證第八十二

格陽關陰證第八十三

太陽陽明合病證第八十四

懊憹怫鬱證第八十五

兩手撮空證第八十六

下利服承氣湯證第八十七

溼溫證第八十八

血結胃證第八十九

六陽俱絕證第九十

傷寒九十論目錄終

傷寒九十論目錄



傷寒九十論

宋白沙許叔微知可述

辯桂枝湯用芍藥證一

馬亨道庚戌春病發熱頭疼鼻鳴惡心自汗惡風宛然桂枝證也時賊馬破儀真三日矣市無芍藥自指圓圓採芍藥以利劑一醫曰此赤芍藥耳安可用也予曰此正當用再啜而微汗解

論曰仲景桂枝加減法十有九證但云芍藥聖惠方皆稱赤芍藥孫尚藥方皆曰白芍藥聖惠方太宗朝翰林

傷寒九十論

王懷隱編集孫兆為國朝醫師不應如此背戾然赤者利白者補予嘗以此難名醫皆愕然失措謹案神農本草稗芍藥主邪氣腹痛利小便通順血脈利膀胱大小腸時行寒熱則全是赤芍藥也又桂枝第九證云微寒者去赤芍藥蓋懼芍藥之寒也惟芍藥甘草湯一證云白芍藥謂其兩脛拘急血寒也故用白芍藥以補非此時也素問云濇者陽氣有餘也陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒傷寒脈濇身熱無汗蓋邪中陰氣故陽有餘非麻黃不能發散中風脈濇多汗身寒蓋

傷寒九十論

邪中陽故陰有餘非赤芍藥不能刮其陰邪然則桂枝用芍藥赤者明矣當參百證歌

桂枝加附子湯證二

有一李姓士人得太陽因汗後汗不止惡風小便澀足攣曲而不伸予診其脈浮而大浮為風大為虛此證桂枝湯第七證也仲景云太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便澀四肢微急難以屈伸者桂枝加附子三投而汗止再投以芍藥甘草而足得伸數日愈

傷寒九十論

論曰仲景第十六證云傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝湯以攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其腳即伸若胃氣不和讖語者少與調胃承氣湯蓋第七證則為發汗漏不止小便澀第十六證則為自汗小便數故仲景於證候紛紛小變異便變法以治之故於湯不可不謹

桂枝加厚朴杏子湯證三

戊申正月有一武弁在儀真為張遇所虜日夕置於舟艙板下不勝跽伏後數日得脫因飽食解衣捫蝨以自



快次日遂作傷寒醫者以因飽食傷而下之一醫以解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高醫有愴惶安知所措予診之曰太陽病下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏子湯此仲景法也醫者爭曰某平生不曾用桂枝況此藥熱安可愈喘予曰非汝所知也一投而喘定再投而濺濺汗出至晚身涼而脈已和矣醫者曰予不知仲景之法其神如此豈誑惑後世也哉人自寡學無以發明耳

麻黃湯證四

傷寒九十論

三

鄉人耶忠臣寓毗陵薦福寺病傷寒予為診視其發熱頭疼煩渴脈雖浮數無力自尺以下不至予曰雖麻黃證而尺遲弱仲景云尺中遲者營氣不足血氣微少未可發汗予於建中湯加當歸黃芪令飲之翌日病者不耐其家曉夜督發汗藥其言至不遜予以鄉人隱忍之但以建中調理而已及六七日尺脈方應遂投以麻黃湯啜第二服狂言煩躁且悶須臾稍定已中汗矣五日愈  
論曰仲景雖云不避晨夜即宜便治醫者亦須顧其表

裏虛實待其時日若不循次第雖暫時得安虧損五臟以促壽限何足尚哉昔范雲為陳霸先屬霸先有九錫之命期在旦夕矣雲偶感寒疾恐不及豫盛事請徐文伯診視之懇曰便可得愈乎文伯曰便差甚易但恐二年後不復起爾雲曰朝聞道夕死可矣況二年乎文伯以火燒地布桃柏葉設席置其臥上頃刻汗解以溫粉撲之翌日愈甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒矣夫取汗先期而促壽限況不顧表裏不待時日便欲速愈乎每見病家不耐三四日晝夜促汗醫者顧利恐別更

傷寒九十論

四

醫隨情順意鮮不致弊故書此以為龜鑒

大青龍湯證五

何保養從王太尉軍中得傷寒脈浮濇而緊予曰若頭疼發熱惡風無汗則麻黃證也煩躁則青龍湯證也何曰今煩躁甚予投以大青龍湯三投汗解  
論曰桂枝麻黃青龍皆表證發汗藥而桂枝治汗出惡風麻黃治無汗惡寒青龍治無汗而煩三者皆欲微汗解若汗多亡陽為虛則煩躁不眠也

陽明可下證六



一武弁李姓在宣化作警傷寒五六日矣鎮無醫抵郡  
召予予診視之曰脈洪大而長大便不通身熱無汗此  
陽明證也須下病家曰病者年踰七十恐不可下予曰  
熱邪毒氣併畜於陽明況陽明經絡多血少氣不問老  
壯當下不爾別請醫占主病者曰審可下一聽所治予  
以大承氣湯半日殊未知診其病察其證宛然在予曰  
藥曾盡否主者曰恐氣弱不禁但服其半耳予曰再作  
一服親視飲之不半時間索溺器先下燥糞十數枚次  
溲洩一行穢不可近未離已中汗矣戢然周身一時頃

傷寒九十論

五

汗止身涼諸苦遂除次日予自鎮歸病人索補劑予曰  
服大承氣湯得差不宜服補劑補則熱仍復自此但食  
粥旬日可也故予治此疾終身止大承氣一服而愈未  
有若此之捷

論曰老壯者形氣也寒熱者病邪也臟有熱毒雖衰年  
亦可下藏有寒邪雖壯年亦可溫要之與病相當耳失  
此是致速斃也謹之

陽明蜜兌證七

庚戌仲春艾道先染傷寒近旬日熱而自汗大便不通

傷寒九十論

小便如常神昏多睡診其脈長大而虛予曰陽明證也  
乃兄景先曰舍弟全似李大夫證又屬陽明莫可行承  
氣否予曰雖為陽明此證不可下仲景陽明自汗小便  
利者為津液內竭雖堅不可攻宜蜜兌導之作三劑三  
易之先下燥糞次洩溲已而汗解

論曰二陽明證雖相似然自汗小便利者不可蕩滌五  
藏為無津液也然則傷寒大證相似脈與證稍異通變  
為要仔細斟酌正如以格局看命雖年月日時皆同貴  
賤窮通不相侔者於一時之頃又有淺深也

傷寒九十論

六

腎虛陽脫證八

朱保義撫辰庚戌春權監務予一日就務謁之見擁爐  
忍痛若不禁狀予問所苦小腸氣痛求予診之予曰六  
脈虛浮而緊非但小腸氣恐別生他疾越數日再往臥  
病已五日矣入其室見一市醫孫尚者供藥予診之曰  
此陰毒證腎虛陽脫脈無根蒂獨見於皮膚黃帝所謂  
懸絕仲景所謂腎如羹上肥也早晚喘急未幾而息已  
高矣孫生尚與北附湯灸臍下予曰雖盧扁之妙無及  
矣是夕外故論傷寒以真氣為主



論曰傷寒不拘陰證陽證陰毒陽毒要之真氣強壯者易治真氣不守受邪纔重便有必死之道何也陽證宜下真氣弱則下之使脫陰證宜溫真陰弱溫之則客熱便生故醫者難於用藥非病不可治也主本無力也經曰陽勝則身熱腠理閉喘粗為之俛仰汗不出而熱齒乾以煩冤腹滿外陰勝則身寒寒則厥厥則腹滿外帝曰謂此二者奈何岐伯曰女子二七天癸至七七止男子三八精氣溢八八止婦人月事以時下故七欲損也男子精欲滿不欲竭故八欲益也如此則男婦身常無

傷寒九十論

七

病無病精氣常固雖有寒邪易於調治故曰二者可調是知傷寒真氣壯者易治也

臍中出血證九

一婦人得傷寒數日咽乾煩渴脈弦細醫者汗之其始動血繼而臍中出血醫者驚駭而遁予曰少陰強汗之所致也蓋少陰不當發汗仲景云少陰強發汗必動其血未知從何道而出或從口鼻或從耳目是為下厥上竭此為難治仲景云無治法無藥方予投以薑附湯數服血止後得微汗愈

論曰本少陰證而誤汗之故血妄行自臍中出若服以止血藥可見其標而不見其本予以治少陰之本而用薑附湯故血止而病除

陰中伏陽證十

鄉人李信道權獄官得病六脈俱沈不見深按至骨則弦細有力頭疼身溫煩躁手指末皆冷中滿惡心更兩醫矣而醫者不曉但供調藥予往視之曰此陰中伏陽也仲景方無此證而世人患者多若用熱藥以助之則陰邪隔絕不能引導其陽反生客熱用寒藥則所伏真

傷寒九十論

八

火愈見銷鑠須是用破陰丹行氣導水奪真火之藥使火升水降然後得汗而解予令以冷鹽湯下破陰丹三百丸作一服不半時煩躁狂熱手足漸溫譫語躁擾其家甚驚予曰汗證也須臾稍寧略睡澱然汗出自昏達旦方止身涼而病除破陰丹方 硫黃水銀各一兩結沙青皮半兩為末麪糊和丸桐子大每服三十九丸冷鹽湯送下出中藏經方脈舉要

傷寒暴厥證十一

已未歲一時官病傷寒發熱狂言煩躁無他惡證四日外或者以為兩感然其證初無兩感證候是歲得此疾



三日四日外者甚多人竊怪予歎之曰是連使然也已  
爲土運土運之歲上見太陰蓋太乙天符爲貴人中執  
法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其  
病暴而外謂之異也又曰臣爲君則逆逆則其病危其  
害速是年少宮土運木氣大旺邪中貴人故多暴外氣  
運當然何足怪也

夜間不眠證 十一

陳姓士人初得病身熱脈浮自汗醫者麻黃湯汗之發  
熱愈甚夜間不得眠頭重煩悶悸悸然中風證強責汗  
之過也仲景云太陽病發汗後大汗出胃中乾燥不得  
眠其人欲得飲水者少少與之令胃氣和則愈予先與  
豬苓湯次投之以當歸地黃麥門冬芍藥烏梅之類爲  
湯飲之不汗而愈

傷寒九十論

九

論曰黃帝鍼經曰衛氣者晝行陽夜行陰衛氣不得入  
於陰常行於外行於外則陽滿滿則陽蹻盛而不得入  
於陰陰虛則夜不得眠也今津液內竭胃中乾燥獨惡  
於陽陰無所歸其候如此故以當歸地黃補血用烏梅  
以收之故不汗自愈

傷寒九十論

大柴胡湯證 十三

羽流蔣尊病其初心煩喜嘔往來寒熱醫初以小柴胡  
湯與之不除予診之曰脈洪大而實熱結在裏小柴胡  
安能除也仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱  
者與大柴胡二服而病除

論曰大黃爲將軍故蕩滌溼熱在傷寒爲要藥今大柴  
胡湯不用誠誤也王叔和曰若不大黃恐不名大柴  
胡須是酒洗生用乃有力昔後周姚僧坦名善醫上因  
發熱欲服大黃僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不宜  
輕用上弗從服之遂不起乃至元帝有疾諸醫者爲至  
尊至貴不可輕服宜用平藥僧坦曰脈洪而實必有宿  
食不用大黃病不能除上從之果下宿食而愈此明合  
用與不合用之異也

傷寒九十論

十

陽明急下證 十四

鄉里豪子得傷寒身熱目痛鼻乾不眠大便不通尺寸  
俱大已數日矣自昨夕汗大出予曰速以大柴胡下之  
眾醫駭然曰陽明自汗津液已竭當用蜜兌何故用大  
柴胡藥予曰此仲景不傳妙處諸公安知之予力爭竟

六六三



用大柴胡兩服而愈

論曰仲景論陽明云陽明病多汗者急下之人多謂己自汗若更下之豈不表裏俱虛如此少陰云少陰病一二口口乾燥者急下之人多謂病發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈盛也世人罕讀予以為不然仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏凡稱急者急下之有三處纔覺汗出多未至津液乾燥速下之則為徑捷勉致用蜜兌也蓋用蜜兌已是失下出於不得已耳若胃中識得了了何疑殆之有哉

傷寒九十論

傷寒自解證 十五

閩人李宗古得疾口中氣熱唇乾屈體臥足冷舌上有胎子診之尺寸俱緊或者謂氣熱口乾疑其陽勝踰足臥足冷疑其陰勝而又陰陽俱緊是誠可疑也若不熟讀仲景方法何能治予曰尺寸俱緊是寒邪勝也仲景云陰陽俱緊法當清邪中於下焦又云陰陽俱緊口中氣出唇乾舌燥踰臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人發熱手足溫者此為欲解蓋已上證候皆是陰盛陽弱故仲景云勿妄治者誠恐後人之

疑也故予以抑陰助陽溫劑與之緊脈漸退四體和氣汗而自解矣

熱入血室證 十六

辛亥二月毗陵學官王仲景妹始傷寒七八日昏寒喉中涎響如鋸目瞑不知人病勢極矣予診之詢其未昏寒以前證母在側曰初病四五日夜間譫語如見鬼狀予曰得病之初正值經候來否荅曰經水方來因身熱病作而自止予曰此熱入血室也仲景云婦人中風發熱經水適來晝日明了夜則譫語發作有時此為熱入

傷寒九十論

十五

血室醫者不曉例以熱藥補之遂致胃膈不利三焦不通涎潮上脘喘急息高予曰病熱極矣先當化其涎後當除其熱無汗而自解矣予急以一呷散投之兩時間涎定得睡是日遂省人事自次日以小柴胡湯加生地黃三投熱除無汗而解

筋惕肉瞤證 十七

鄉里市人姓京鬻繩為業謂之京城子其子年近三十初得病身微汗脈弱惡風醫者誤以麻黃湯汗之汗遂不止發熱心痛多驚悸夜間不得眠臥譫語不識人筋



惕肉瞶振振動搖醫者以鎮心驚風藥治之予視之曰強汗之過也仲景云脈微弱汗出惡風者不可服青龍湯服之則筋惕肉瞶此為逆也惟真武湯可收之仲景云太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸身瞶動振振欲擗地者真武湯主之予三投而大病除次以清心丸竹葉湯解餘毒數日差

陽明當下證 十八

鄉人李生病傷寒身熱大便不通煩渴鬱冒一醫以巴豆藥下之下之雖得溏利而病宛然如舊予視之曰陽

傷寒九十論

十三

明熱結在裏非大柴胡承氣不可巴豆止去寒積豈能蕩滌邪熱溫毒耶亟進大柴胡三服而溏利中夜汗解論曰仲景一百十三方丸者有五理中陷胃抵當麻仁烏梅也理中陷胃抵當皆大彈丸煮化而服之與湯散無異至於麻仁治脾約烏梅治溼蠶故須小丸達下部其他皆入經絡逐邪毒破堅癖導血潤燥屎之類必憑湯劑也未聞巴豆小丸以下邪毒且如巴豆性熱大毒而病熱人服之非徒無益而為害不小矣李生悞服不以其大幸歟

桂枝加葛根湯證 十九

庚戌建康徐南強得傷寒背強汗出惡風予曰桂枝加葛根湯證病家曰他醫用此方盡二劑而病如舊汗出愈加予曰得非仲景三方乎曰然予曰誤矣是方有麻黃服則愈見汗多林億謂止於桂枝加葛根湯也予令生而服之微汗而解

葛根湯證 二十

市人楊姓者病傷寒無汗惡風項雖屈而強醫者以桂枝麻黃各半湯與之予曰非其治也是謂項強几几葛

傷寒九十論

十四

根證也三投澀澀然微汗解翌日項不强脈已和矣論曰何謂几几如短羽鳥之狀雖屈而強也謝復古謂病人羸弱須憑几而起非是此與成氏解不同

剛瘧證 二十一

宣和戊戌表兄秦雲老病傷寒身熱足寒頸項瘰瘻醫作中風治見其口噤故也予診其脈實而有力而又腳舉齒大便不利身燥無汗予曰此剛瘧也先以承氣湯下之次以續命湯調之愈矣

論曰五常政大論曰赫曦之紀上羽與正徵同其收齊



其病瘥蓋戊太陽寒水羽也戊火運正徵也太過之火上見太陽則天氣且剛故其收齊而人病瘥者過氣然耳火木遇故年病此證多剛瘥

厥陰證 二十二

里中一中表病渴甚飲水不止胃中熱疼氣衝心下八九日矣醫者或作中腸或作賁豚予診之曰證似厥陰會吐蟲否曰昨曾吐蛔予曰審如是厥陰證也可喜者脈來沈而緩遲耳仲景云厥陰為病消渴氣上撞心飢不欲食食則吐蛔又曰厥陰病渴欲飲水者少少與之

傷寒九十論

五

愈今病人飲水過多乃以茯苓甘草白朮桂枝湯治之得止後投以烏梅丸數日愈

論曰病至厥陰若太陽傳者三陰三陽皆已遍惟恐脈強則肝邪盛脾土受剋故舌卷囊縮而外今脈來遲緩而沈則土脈得氣脾不受剋故有可喜之道仲景云衛氣和名曰緩營氣和名曰遲遲緩相搏名曰沈又曰寸口脈緩而遲緩則陽氣長其色鮮其顏光其聲商遲則陰氣盛骨髓滿精血生肌肉緊營衛俱行剛柔相濟豈非安脈耶

太陰證 二十三

曹生初病傷寒六七日腹滿而吐食不下身溫手足熱自利腹中痛嘔惡心醫者謂之陽多尙疑其手足熱恐熱畜於胃中而吐嘔或見吐利而為霍亂請予診其脈細而沈質之曰太陰證也太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛予止以理中丸用仲景云如雞子黃大晝夜投五六枚繼以五積散數日愈

論曰予見世醫論傷寒但稱陰證陽證蓋仲景有三陰三陽就一證中又有偏勝多寡須是分明辯質在何經

傷寒九十論

六

絡方與證候相應用藥有準且如太陰少陰就陰證中自有補瀉豈可止謂之陰證也哉

太陽中暈證 二十四

毗陵一時官得病身疼痛發熱體重其脈虛弱人多作風溼或作熱病則又疑其脈虛弱不敢汗也已數日矣予診視之曰中暈證也仲景云太陽中暈者身熱體疼而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也予以瓜蒂散治之一呷而愈

論曰仲景論暈有三證一則汗出惡寒身熱而渴此太



陽經中暈也一則發熱惡寒身疼痛其脈弦細芤遲一則夏月傷冷水水行皮中身熱疼痛重而脈微弱不可下不可行溫鍼上二證皆宜用白虎加人參湯後一證宜用瓜蒂散方治不見於本論而見于金匱要略其脈證云治太陽中暈身熱疼痛而脈微弱者夏月傷冷水水行皮中所致宜瓜蒂散蓋謂此也

指甲黑青證 二十五

乾明僧人病傷寒目赤煩渴咽乾飲水無筭腰疼身熱脈沈而微細此少陰證也恣縱不慎忌乃飲水遂致痞氣痞氣結聚身如被杖數日變為陰毒矣脈見於皮膚上大而且虛鼻中如煙煤甲青須臾發喘是夕外論曰扁鵲云手足爪下青黑者外宋迪陰證訣云陰毒盛則指甲黑青病至此則為不治

瞪目直視證 二十六

田仲容得傷寒數日身熱手足時厥腹滿瞪目直視狂言不識人予診之曰不可治也心腎俱絕矣故外論曰仲景云直視搖頭此為心絕也又曰狂言反目直視此為腎絕也目者五藏精華之所聚今直視而不胸

則知五藏有外絕矣故不治

舌卷囊縮證 二十七

句容縣豪子李姓初得傷寒手足冷氣上衝心飢不欲食脈緊而弦予診曰厥陰悉具脈有刑剋最忌舌卷囊縮翌日卷舌而外

論曰內經云厥陰者肝也肝者筋合之筋者聚於陰器絡於舌本厥陰之氣故舌卷而囊縮也

循衣摸牀證 二十八

儀真一婦病傷寒八九日發熱昏悶不識人手循衣縫摸牀謔語不識人事他醫不識或汗或利旬日增甚予診之曰此脈澀而小便不利不可治也翌日外論曰華陀云病人循衣摸牀謔語不可治仲景云傷寒吐下後不解不大便五六日發潮熱不識人循衣撮空

傷寒九一論 七

微喘直視脈弦者生脈澀者外又云小便利者可治全脈澀小便不利見其兩外不見一生吾莫能為也

邪入大經證 二十九

維揚謝康中任儀真酒官咽乾煩渴腰疼身熱脈細而微急予診視之曰此真少陰證也六經之中少陰難治



少陰病傳之經絡此證有補瀉法仲景瀉者用承氣補者用四逆誤之則相去遠矣此證常溫勿以水證為疑也子適以事出境後七日歸則為他醫汗之矣經絡既虛邪毒流入大經之中手足痠癢如驚癩狀其家狼狽求救予曰不可治也予驗此甚多是謂邪入大經不旋踵其家已哭矣

太陽桂枝證 三十

鄉人吳德甫得傷寒身熱自汗惡風鼻出涕關以上浮關以下弱予曰此桂枝證也仲景法中第一方而世人

傷寒九十論

十九

不究耳但公服之一啜而微汗解翌日諸苦頓除公曰仲景法如此徑捷世人何以不用予應之曰仲景論表證一則桂枝二則麻黃三則青龍桂枝則治中風麻黃治傷寒青龍治中風見寒脈傷寒見風脈此三者人皆能言之而不知用藥對證之妙處故今之醫者多不喜用無足怪也且脈浮而緩中風也故齋齋惡寒漸漸惡風翕翕發熱仲景以桂枝對之脈浮緊而澀傷寒也故頭痛發熱身疼腰痛骨節疼惡風無汗而喘仲景以麻黃對之至於中風脈緊傷寒脈浮緩仲景皆以青龍

對之何也予嘗深究三者特於證候脈息相對用之無不應手而愈何以言之風傷衛衛氣也寒傷營營血也營行脈中衛行脈外風傷衛則風邪中於陽氣陽氣不固發越而為汗是以汗出而表虛故仲景用桂枝以發汗芍藥以利其血蓋中風病在脈之外其病稍輕雖同曰發汗特解肌之藥耳故桂枝證云令遍身絪絪微似有汗者益佳不可如水淋漓病必不除是知中風不可大發其汗發其汗反動營血邪乘虛而居中故病不除也寒傷營則寒邪干於陰血而營行脈中者也寒邪客

傷寒九十論

二十

於脈中非特營受病也邪自內作則併於衛氣犯之久則浸淫及骨是以汗不出而熱煩冤仲景以麻黃大發其汗又以桂枝辛甘助其發散欲捐其內外之邪營衛之病耳大抵二藥皆發汗而桂枝則發衛之邪麻黃併衛與營而治之仲景桂枝第十九證云病常自汗出者此為營氣和營氣和者外不諧以衛氣不共營氣和諧故耳營行脈中衛行脈外復發其汗營衛和則愈宜桂枝湯又第四十七證云發熱汗出者此謂營弱衛強故使汗出欲救風邪宜桂枝湯是知中風汗出者營和而



衛不和也又第一卷云寸口脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷營營衛俱病也麻黃湯中併桂枝而用此仲景之意歟至於青龍雖治傷寒見風脈傷風見寒脈然仲景云汗出惡風不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤故青龍一證尤難用須是形證的當然後可行王寔大夫證治中止用桂枝麻黃各半湯代之蓋慎之也夫

桂枝證 三十一

里間張太醫家一婦病傷寒發熱惡風自汗脈浮而弱予曰當服桂枝彼云家有自合者予令三啜之而病不除予詢其藥中用肉桂耳予曰肉桂與桂枝不同予自治以桂枝湯一啜而解

傷寒九十論

三十一

論曰仲景論用桂枝者蓋取桂枝輕薄者耳非肉桂之肉厚也蓋肉桂厚實治五臟用之取其鎮重桂枝清輕治傷寒用之取其發散今人一例是以無功

少陰證 三十二

有人病傷寒數日自汗咽喉腫痛上吐下利醫作伏氣予診之曰此證可疑似是之非乃少陰也其脈三部俱

緊安得謂之伏氣伏氣脈必浮弱謂非時寒冷着人肌膚咽喉先痛次下利者是也近雖有寒冷不時然當以脈證爲主若誤用藥其斃可待予先以吳茱萸湯救之次調之以諸藥而愈

論曰仲景論伏氣之病其脈微弱喉中痛似傷寒非喉痺也實咽中痛今復下利仲景少陰云病人手足俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰證法當咽痛而復吐利此證見少陰篇今人三部脈俱緊而又自汗咽痛下利與伏氣異然毫釐之差千里之謬須講熟此書精詳分別庶免疑惑矣

傷寒九十論

三十二

少陽證 三十三

市人周姓者同里俱病頭痛發熱耳聾目赤胷中滿悶醫中見外證曾滿遂吐之既吐後病宛然在又見其目赤發熱復利之病不除惴惴然恟慄予診視之曰少陽誤吐下之過也仲景少陽中風兩耳無聞目赤胷滿而煩者不可吐下吐下則驚而悸此當用小柴胡湯令誤吐下遂成懷證矣乃以牡蠣四逆湯調於前繼之以桂枝柴胡各半湯旬日瘥



論曰仲景雖云三陽受病未入於藏者可汗然少陽脈  
眩細則不可汗將入少陰經也若誤吐下之是逆之且  
當以救逆先待驚悸定後治餘證此所謂急其所當先  
也

兩感證 三十四

族弟初得病頭痛口乾煩渴第三日子往視之則已耳  
聾囊縮昏冒不知人厥逆水漿不下矣予曰速治後事  
是謂兩感證不可治矣越三日外

論曰仲景論傷寒兩感云凡傷於寒熱雖甚不外若兩

傷寒九十論

三

感於寒而病者必外又曰兩感病俱作治有先後發表  
攻裏本自不同既云必外又云治有先後何也大抵此  
病表裏雙傳藏腑俱病患此者十無一生故云必外然  
仲景豈以已見而重誣後人哉故有發表攻裏之說以  
勉後人恐萬世後遇大聖而得之不欲絕望於後人仲  
景之心仁矣

三陽合病證 三十五

有市人李九妻患腹痛身體重不能轉側小便遺失或  
作中溼治予曰非是也三陽合病證仲景云見陽明篇

第十證三陽合病腹滿身重難轉側口不仁面垢譫語  
遺尿不可汗汗則譫語下則額上汗出手足逆冷乃三  
投白虎湯而愈

白虎加人參湯證 三十六

從軍王武經病始嘔吐俄為醫者下之已八九日而內  
外發熱予診之曰常行白虎加人參湯或云既吐復下  
是裏虛矣白虎可行乎予曰仲景云見太陽篇二十八  
證若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱者白虎加  
人參湯證相當也蓋吐者為其熱在胃脘而脈致令虛

傷寒九十論

三

大三投而愈

論曰仲景稱傷寒若吐下後七八日不解熱結在裏表  
裏俱熱者人參白虎湯主之又云傷寒脈浮無汗發熱  
不解不可與白虎湯又云脈滑為表有熱裏有寒白虎  
湯主之國朝林億校正謂仲景此法必表裏字差矣是  
大不然大抵白虎能除傷寒中暍表裏發熱故前後證  
或云表裏俱熱或云表熱裏寒皆可服之宜也中一證  
稱表不解不可服者以其宜汗發熱此全是傷寒麻黃  
與葛根湯證安可行白虎林但見所稱表裏不同便謂



之差是亦不思不精之過也

發熱惡寒證 三十七

人患發熱惡寒自汗脈浮而微弱予以三服桂枝投之遂愈仲景云太陽中風陽浮而陰弱者汗自出啻啻惡寒淅淅惡風翕翕發熱宜桂枝湯

論曰仲景云假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之使陰氣弱此謂醫所病而然也大抵陰不足陽從之故陽由陷發熱陽不足陰往乘之故陰上入陽中則惡寒陰陽不歸其分是以發熱惡寒也故孫真人云有熱不可大攻之熱去則寒起

傷寒九十論

五

結胃可下證 三十八

維揚李寅始病頭疼發熱惡風醫者下之忽爾心下堅硬項強短氣宛然結胃中證也予曰幸爾脈不浮心不煩躁非陷胃湯不可投之一宿乃下

論曰仲景言病發於陽而反下之熱入於胃因作結胃者以下之太早故也蓋惡寒尚有表證未罷而下之故

陽氣內陷陽內拒痛脈浮者不可下下之則外結胃煩躁者必外此是惡證辯者仔細

結胃可灸證 三十九

城東李氏子年十八病傷寒結胃狀如瘥自心至臍手不可近短氣心煩真結胃也醫者便欲下之予適過其門見其慘惶面無色予曰公有憂色何也曰以長子病傷寒作結胃證醫者將下之而猶豫予就為診之自關以上浮大表證未罷不可下也曰事急矣予以黃連餅子灸臍中數十壯得氣下心腹軟繼以和氣解肌藥數

傷寒九十論

五

日瘥當時若下定是醫殺

汗後吃逆證 四十

張保養得汗後吃逆或者以胃虛則噦故吃逆也投以乾薑橘皮等湯不下命予治之予曰此證不可全作胃虛治六脈尚躁是餘毒未解耳投以小柴胡湯兩啜而愈

漏風證 四十一

癸卯秋九月牒試淮南僧臺同試有建陽彭子靜得疾身熱頭痛嘔逆自汗如洗已數日矣召予診視謂予曰



去試不數日而疾勢如此為之奈何予曰誤服藥多矣此證當先止汗幸無憂也予作朮附湯與之三投而汗止次日微汗繫繫身涼五日而得愈

小便出血證 四十二

里人有病中脘吐心下煩悶多昏睡倦臥手足冷蓋少陰證也十餘日不瘥忽爾通身大熱小便出血予曰陰虛者陽必溲之今脈細弱而臍下不痛未可下桃仁承氣且以芍藥地黃湯三投而愈

妊娠傷寒腳腫證 四十三

傷寒九十論

里巷一婦人妊娠得傷寒自腰以下腫滿醫者或謂之阻或謂之腳氣或謂之水分予曰此證受胎脈也病名曰心實當利小便醫者曰利小便是作水分治莫用木通葶藶桑皮否曰當刺勞宮關元穴醫大駭曰此出何家書予曰仲景玉函經曰婦人傷寒妊娠及七月腹滿腰以下如水溢之狀七月太陽當養不養此心實當刺勞宮及關元以利小便則愈予教令刺穴遂瘥

風溫證 四十四

己酉虜騎破淮俱疫癘大作時有王朝奉寓天慶得疾

身熱自汗體重難以轉側多眠鼾睡醫作三陽合病或作漏風證治之不愈予曰此風溫病投以萎蕤湯獨活湯數日瘥

論曰仲景云見太陽病脈篇太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病若發汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘵癘又云陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變為風溫大抵溫氣大行更遇風邪則有是證令當春夏

傷寒九十論

病此者多醫作傷寒漏風治非也不是火不可下不可大發汗而仲景無藥方古法謂可取手少陰火足厥陰木隨經所在而取之故用萎蕤湯獨活湯輩為宜若發熱無下證者當用知母石膏湯誤汗之則防已黃芪湯救之

狐惑證 四十五

句容縣東豪子李姓者得傷寒數日村落無醫易師巫者五六日矣或汗下雜治百出遂成壞病予時自江北避寇遁伏江左求宿於其家夜半聞呻吟聲詢之云患



傷寒逾旬矣予為診視其脈見於上下脣皆已蠹蝕聲嘶而咽乾舌上白胎齒無色予曰病名狐惑殺人甚急秉燭為作雄黃丸瀉心湯投之數日瘥

發黃證 四十六

五月避地維揚東面里沙中一豪子病傷寒八九日身體洞黃鼻目皆痛兩膊及項頭腰皆強急大便澀小便如金子診曰脈緊且數其病脾先受溼暑熱蘊蓄於足太陰之經宿穀相搏鬱蒸而不得泄故使頭面有汗項以下無之若鼻中氣冷寸口近掌無脈則外今脈與證

傷寒九十論

五

相應以茵陳湯調五苓散與之數日瘥

溼家發黃證 四十七

人病身體疼痛面黃喘滿頭痛自能飲食大小便如常或者多以茵陳五苓散與之予診其脈曰大而虛鼻塞且煩其證如前則非溼熱與宿穀相搏乃頭中寒溼仲景云疼痛發熱而黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒溼故鼻塞納藥鼻中則愈而仲景無藥方其方見水壺刪繁證云治天行熱毒通貫臟腑沈鼓骨髓之間或為黃疸須瓜蒂散瓜蒂一

傷寒九十論

七枚赤小豆秫米各二七枚為末加大豆許內鼻中編鼻當出黃水慎不可吹入鼻中深處文煒按水壺二字疑有誤

黃入清道證 四十八

夏有高師病黃證鼻內痠疼身與目如金色小便赤澀大便如常則知病不在臟腑今眼睛疼鼻額痛則知病在清道中矣清道者華蓋肺之經也若服大黃則必腹脹為逆當用瓜蒂散先含水次搗之令鼻中黃水盡則愈如其言數日而病除

先汗後下證 四十九

傷寒九十論

三

己酉夏一時官病傷寒身熱頭疼無汗大便不通已五日矣予適自外邑歸城訪之見醫者治大黃芒硝輩將下之矣予曰子姑少待予適為診視視之脈緩而浮臥密室中自稱惡風予曰病人表證如此雖大便閉腹且不滿別無所苦何遽便下於仲景法須表證罷方可下不爾邪毒乘虛而入內不為結胃必為協熱利也予作桂枝麻黃各半湯繼之以小柴胡湯熱熱汗出大便通數日愈

論曰仲景云傷寒病多從風寒得之始表中風寒入裏



則不消矣擬欲攻之當先解表方可下之若表已解而內不消大滿大堅實有燥屎方可議下若不宜下而遽攻之諸變不可勝數輕者必篤重者必死

太陽療血證 五十

仇景莫子儀病傷寒七八日脈微而沈身黃發狂小腹脹滿臍下如冰小便反利醫見發狂以為熱毒蓄伏心經以鐵粉牛黃等藥欲止其狂躁予診之曰非其治也此瘀血證爾仲景云陽病身黃脈沈結小腹硬小便不利為無血小便自利其人如狂者血證也可用抵當湯再投而下血幾數升狂止得汗而解經云血在下則狂在上則忘太陽膀胱經也隨經而蓄于膀胱故臍下脹自闌門會滲入大腸若大便黑者此其驗也

陰病陽脈證 五十一

劉中道初得病四肢逆冷臍中築痛身疼如被杖蓋陰證也急投金液來復之類其脈得沈而滑蓋沈者陰證也滑者陽脈也病雖陰而是陽脈仲景所謂陰證見陽脈生也於是再灸臍下丹田百壯謂手足溫陽回體熱而汗解

或問滑脈之狀如何曰仲景云翕奄沈名曰滑古人論滑脈雖云往來前卻流利展轉替替然與數相似曾未若仲景三語而足也翕合也言張而復合也故云翕為正陽沈言脈降而下也故曰沈為純陰方翕而合俄降而下奄謂奄忽之間復降也仲景論滑脈方謂諦當也

辨少陰脈緊證 五十二

玄華得傷寒六七日煩昏睡多吐嘔小便白色自汗出予診其脈寸口尺中俱緊謂曰寒中少陰經中是以脈緊當作少陰治也仲景云病人脈繁反汗出亡陽也屬

傷寒九十論

三

少陰證當咽痛而復吐利蓋謂此也

有難者曰脈訣以緊為七表仲景以緊為少陰緊脈為陰耶子曰寸口脈俱緊者口中氣出唇口乾燥踈臥足冷鼻中涕出舌上白胎勿妄治也又云緊則為寒又云曾為人所難緊脈從何而來師曰假令亡汗若吐以肺裏寒故令脈緊又曰寸口脈微尺中緊其人虛損多汗由是觀之則是寒邪入經絡所致皆虛寒之脈也其在陽經則浮而緊在陰經則沈而緊故仲景云浮緊者名為傷寒又云陽明脈浮而緊者必潮溼此在陽則脈浮



而緊者仲景又云病人脈陰陽俱緊者屬少陰又云寸口脈微尺脈緊其人虛損多汗則陰常在絕不見陽又云少陰脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者此欲解也此在陰沈而緊也仲景云浮為在表沈為在裏數為定然後兼餘脈而定陽陰也若於脈訣而言則疏矣故予嘗謂傷寒脈者當以仲景脈為準法

青筋牽引證 五十三

吳德甫戊申春病傷寒先寒後熱項筋強急腳蹇縮不得伸醫者欲以麻黃輩除其頸強又欲桂枝加附除其

傷寒九十論

三

足縮予曰皆非治也此時行疫氣病為青筋牽引投以柴胡地黃湯三服而病已

論曰龐安常論四時受乖氣而成臟腑陰陽溼毒者春名青筋牽夏曰赤脈攢秋名白氣狸冬名黑骨溫毒四季中十八日名黃肉隨毒氣在頭項使人青筋牽急故先寒後熱腳縮不得伸蓋謂此夫天行之病大則流毒天下小則方次一鄉亦有過着一家者悉由氣運鬱結變成乖戾之氣人命遭之所成病者能調護將理庶可

傷寒九十論

免耳

下膿血證 五十四

遠族人患傷寒他醫以陰證治之硫黃附子相繼而進旬日大脹下膿血或如赤豆汁醫尚作少陰證治復下桃花湯治之予因診視曰所誤多矣表裏虛熱氣乘虛入腸胃而又投以燥藥是以下膿血也遂投梅煎散數劑愈

刺陽明證 五十五

庚戌五月李氏病傷寒身熱頭痛無汗渾身疼痛脈浮

傷寒九十論

三

大而緊予投以麻黃湯數服終不得汗又多用張苗燒蒸之法而亦不得予教令刺陽明少間汗出熱退遍身一時間是夕身涼病退

論曰刺熱論云熱病先手臂痛刺陽明而汗出又曰刺陽出血如大豆病已蓋謂刺也陽明穴在手大指內側去爪甲角手陽明脈之所出也刺可入同身寸之一分畱一呼大凡傷寒熱病有難取汗者莫如鍼之為妙仲景云凡治溫病可刺五十九穴素問云病甚者為五十九刺其詳在註中

六七五



陰陽交證 五十六

里有張姓者病傷寒醫汗之汗雖出身熱如舊予診之曰得汗宜身涼脈靜喜食今脈躁身熱不食狂言病名陰陽交不可治也素問黃帝問有溫病汗出輒復熱而脈躁病不為汗衰狂言不能食名何疾岐伯曰病名陰陽交交者外也人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪卻而精勝也精勝則能食而不復熱矣汗者精氣今汗出而復熱者是邪勝也不能食者精無俾也其壽可立而傾也果半日外

傷寒九十論

陰陽易證 五十七

己巳鄰人王友生以販京為業畜一婢患傷寒熱八九日子為治之得汗而愈未數日生自病身熱頭重不欲舉日中生花召予視之予曰是必傷寒初愈婦人交接得之即今陰頭上必腫小腹絞痛然是陰陽易也生日前患者婢子意謂已安遂與之交翌日得此疾良苦予曰失所治必吐舌數寸而外予作豶鼠糞燒禪散等以利其毒氣旬日安

叉手冒心證 五十八

乙巳六月吉水譚商人寓城南得傷寒八九日心下惕惕然以兩手捫心身體振振動搖他醫以心痛治之不效予曰此汗過多之所致也仲景云持脈時病人叉手自冒心心下悸所以然者以重獲汗虛故如此又云發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯證予投黃芪建中真武及甘草桂枝漸得平復

傷寒耳聾證 五十九

戊申年類試山陽一時官病傷寒八九日耳聾而無聞楚醫少陽治意謂仲景稱少陽受病則脅痛而耳聾也

傷寒九十論

予診之曰兩手脈弱而無力非少陽證也若少陽則渴飲水心煩但寐咽痛今俱無此證但多汗驚悸必汗過多所致也仲景云未持脈時令病人欬而不欬者兩耳聾無所聞也所以然者因重發汗虛故如此病家曰醫者嘗大發汗矣遂投以真武白朮附子湯葢數日耳有聞而愈

揚手躑足證 六十

己酉王仲賢患傷寒發熱頭痛不惡風身無汗煩悶脈浮而緊八九日不退予診之曰麻黃證也所感多熱是



以煩躁遂投以麻黃湯三服至暮煩愈甚手足躁亂揚  
躑不止或以爲發狂須用寒藥予爭之曰此汗證也幸  
勿憂切忌亂服藥守一時須稍定比寐少時中汗出矣  
仲景云至六七日三部大手足躁亂者欲解也蓋謂此  
耳若行寒劑定是醫殺

遺尿證 六十一

城南婦人腹滿身重遺尿言語失常他醫曰不可治也  
腎絕矣其家驚憂無措密召予至則醫尚在座乃診之  
曰何謂腎絕醫家曰仲景謂洩便遺失狂言反目直視

傷寒九十論

五

此謂腎絕也予曰令脈浮大而長此三陽合病也胡爲  
腎絕仲景云腹滿身重難以轉側口不仁譫語遺尿發  
汗則譫語下之則額上生汗手足厥冷白虎證也今病  
人譫語者以不當汗而汗之非狂言反目直視須是腎  
絕脈方可言此證乃投以白虎加人參湯數服而病悉  
除

舌上滑胎證

六十二

丁未五月鄉人邢原暉病傷寒寒熱往來心下鬱悶舌  
上白滑胎予曰舌上滑胎有數證有陰陽脈緊鼻出涕

傷寒九十論

者有藏結而不可治者有溫瘧丹田有熱者有陽明脅  
下堅者此證屬陽明宜梔子湯吐之於前小柴胡繼於  
其後數日汗解而愈

衄血證 六十三

睢陽張士美病傷寒七八日口燥飲水而不嚥入俄而  
衄血脈浮紫身熱醫者云傷寒脈浮紫不發汗因致衄  
血者屬麻黃湯予曰不可古人雖云當汗不汗熱化爲  
血此證亦有不可汗者仲景云陽明病口燥但欲飲水  
而不嚥者必發衄衄家不可發汗發汗則額上陷不得

傷寒九十論

五

眠不能眴此只可用犀角湯地黃湯若當時行麻黃必  
額上陷直視不眠也

傷寒脅痛證 六十四

董齊賢病傷寒數日兩脅挾臍痛不可忍或作奔豚治  
予視之曰非也少陽膽經循脅入耳邪在此經故病心  
煩喜嘔渴往來寒熱不能食胃脅滿悶少陽證也始  
太陽傳入此經故有是證仲景云太陽病不解傳入少  
陽脅下滿乾嘔者小柴胡湯主之三投而痛止續得汗  
解



傷寒溫瘧證 六十五

友人孔彥輔病傷寒身大熱頭痛自汗惡熱陽明證也此公不慎將理病未除當風取涼以自快越半月寒熱大交作子再視之則為壞病溫瘧矣仲景云若十三日以上更感異氣變為他病者當依舊壞病證而治之若脈陰陽俱盛重感於寒變成溫瘧脈之變證方治如法乃小柴胡湯之類加桂枝治之愈

論曰往來嘗見一士人施瘧方以榜雖陽市肆柴胡白虎之類也俗人不問是何瘧證例用前方往往反變大

傷寒九十論

三九

疾嗚呼將欲濟人反致損人豈理也哉予嘗謂瘧證最多有暑瘧食瘧脾寒瘧手足三陰三陽皆有瘧脾肺腎肝心胃亦有瘧各各不同安得一藥與柴胡白虎湯耶誤治尙可擬議惟脾寒中暑二證若水火不相將素問曰夏傷於暑秋為痲瘧又曰夏暑汗不出者秋成風瘧始因伏暑得秋氣乃發故先熱後寒或熱多寒少頭目昏痛虛則發戰汗出一時而止蓋心惡暑氣心為君心不受邪而心包絡痰涎所聚暑伏於涎中豈比脾寒而厚朴草果所能驅溫瘧而柴胡黃芩所能止也非砒礞

腦瘳之屬不能入故暑瘳脾寒患者多而醫者不識妄投以寒藥真氣先受病所以連綿不已也予嘗精究瘳證一病須詳審諦當然後行藥十治十中無有失者衆人以瘳為難療予獨以為易治要在別其證類識其先後耳因論溫瘳言及此亦欲使患者知藥不可妄投也素問瘳論甚詳當精觀之

發斑證 六十六

族有乳媪患傷寒七八日發斑肌體如火脈洪數而牢心中煩滿不快俄而變赤黑斑其家甚驚惶予曰此溫

傷寒九十論

三九

毒也溫毒為病最重而年齒為邁是誠可憂也仲景云傷寒脈洪數陰脈實大更遇溼熱變成溫毒溫毒最重也故斑疹生心下不快痞悶遂以升麻玄參湯與之日夜四五服斑退而愈論曰華陀云傷寒五日在腹六日在胃入胃則可下也若熱毒未入於胃而先下之者其熱乘虛入胃則胃爛然熱入胃要須復下之不得留在胃中也胃若實為致此病三外一生其熱微者赤斑出劇者黑斑出赤斑出者五外一生黑斑出者十外一生但看人有強弱耳病



者至日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出蓋此是惡候若下之早則熱乘虛入胃或下遲則熱入不得泄須是乘機不可失時庶幾輕可也

臟結證 六十七

甲辰鹽商艤舟江次得傷寒胃膈痞連臍下旁不可忍飲食不進予診之曰此非結胃乃臟結也不可救矣臟結者寸脈浮關脈細小沉緊者尚有白胎痛引小腹則以仲景云痛引小腹入陰經者以次日痛引小腹午時果以

傷寒九十論

陽結證 六十八

豫章劉商人傷寒發熱口苦咽乾腹滿能食大便閉醫作陽明治召予視同坐予問醫曰何以見證屬陽明醫曰仲景云陽明中風口苦咽乾腹滿又云陽明病若能食名曰中風不能食名曰傷寒又曰少陽陽明者胃中煩大便難是審茲三者全是陽明證也予曰陽明之脈長而實中風者必自汗今證雖陽明然脈反見數而身無汗果可作陽明治否醫無以應予曰以僕觀之所謂陽結也今計其日已十六日矣來日當病劇當與公治

傷寒九十論

之其家疑而不決來日病果大作亟召予曰是陽結證也仲景云脈有陰結陽結何以別之荅曰其脈浮而數能食不大便此為實名陽結也其脈沉而遲不能食身體重大便反鞭名曰陰結期十四日當劇今病者十七日而劇者是其候也乃投以大柴胡兩啜而病除矣

論曰仲景云脈來芤芤如車蓋者名曰陽結脈來累累如循長竿者名曰陰結芤芤如車蓋則是浮是數之狀仲景所謂善取象矣然則陽結何以十七日當劇陰結何以十四日當劇蓋十七日老陽少陽之數十四日老

傷寒九十論

聖

陰少陰之數也老陽之數九少陽之數七七九計十六更進一數陽之數而其道常饒又陽數奇故也老陰之數六少陰之數八八六計十四日不進者陰主靜而其道常乏又陰數偶也如此盈虛消長不能逃乎時數

傷寒協熱利證 六十九

庚戌四月鄉婦吳氏病傷寒頭疼身熱下利不止眾醫多以附子理中金液治之煩躁而利愈甚予視之曰脈遲而沉若臍下熱則協熱利也投三黃熟艾湯三服而利止渴除漸投以解肌汗藥而得汗瘥



胃熱嘔吐證 七十

丁未歲夏族妹因傷寒已汗後嘔吐不止強藥不下醫以丁香硝石硫黃藿香等藥治之蓋作胃冷治也予往視之曰此汗後餘熱尚留胃腕若投以熱藥如火濟火安能止也故以香薷湯竹茹湯三服愈

霍亂轉筋證 七十一

夏鍾離德全一夕病上吐下瀉身冷汗出如洗心煩躁予以香薷飲與服之翌日遂定進理中等調之痊

論曰仲景云病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病

傷寒九十論

聖

荅曰此名霍亂自吐下又利止而復作更發熱也此病多由暑熱陰陽不和清濁相干飲食過傷三焦瀾亂腹中撮痛煩渴不止兩足轉筋殺人頗急不可緩也

兩脛逆冷證 七十二

江西茶客吳某病頭疼如裹兩腳自膝以下皆冷曾問多汗時時譫語醫作陰證治以附子輩意其足冷而厥也予診其脈關濡尺急遂斷以溼溫脈證其病先日受溼而又中暘溼熱相搏故此證成急以白虎三投而解

汗後勞復證 七十三

有人傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數宛然復作斷

之曰勞心所致也神之所舍未復其初而又勞傷其神

營衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾便愈醫者在

座難之曰虛則補其母今補其子出在何經也予曰出

千金方論子不知虛勞之證乎難經曰虛則補其母實

則瀉其子此虛則當補其母也千金方心勞甚者補脾

氣以益其心脾旺則感於心矣此勞則補其子也蓋母

生我者也子繼我助我者也方治其虛則補其生我者

與錦囊所謂本骸得氣遺體受陰同義方治其勞則補

傷寒九十論

醫

其助我者與荀子未有子富而父貧同義故二者補法各自有理醫唯唯而退

汗後瘡瘍證 七十四

李琛大夫病傷寒發熱面目俱赤氣上衝腹滿大小便閉無汗脈緊而長予令服大承氣湯他醫以小柴胡湯與之不驗又以大柴胡湯與之亦不效又增大柴胡湯大劑大便通下燥屎得愈乃誇曰果不須大承氣予笑曰公苟圖目前而不知貽禍於後病雖瘥必作瘡瘍之證後半月忽體生赤瘡次日背發腫如盤堅如石痛不



堪忍渠以為背疽憂甚急召予予曰瘡瘍之證也若當日服承氣今無此患矣治以數日瘥或者問何以知其瘡瘍之證予曰仲景云跌陽脈滑而緊者胃氣實脾氣強持實擊強痛還自傷以手把刃坐作瘍蓋病勢有淺深藥力有輕重治者必察其病者如何耳疾勢深則以重劑與之疾勢輕則以輕劑與之正如持衡錙銖不偏也不然焉用七方十劑今病人毒邪如此深須藉大黃朴硝蕩滌藏府經絡毒氣利三二行則邪毒皆去今醫小心謹慎又不能了了見得根源但以大柴胡得屎因

傷寒九十論

聖

謂大便通行便得安痊不知遺禍於後必瘡瘍當時若聽予言豈有斯患

而垢惡寒證 七十五

一尼病頭痛身熱煩渴躁診其脈大而虛問之曰小便赤背惡寒毛竦洒洒然而垢中暑也醫作熱病治但未敢服藥予投以白虎湯數日愈

論曰仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈弦細芤遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而脈虛弱所以弦遲芤細皆虛脈而可知矣

傷寒九十論

傷寒下利證 七十六

呂商得傷寒自利腹滿不煩不渴嘔吐頭痛予診跌陽脈大而緊曰太陰證也若少陰下利必渴今不渴故知太陰證仲景云自利不渴屬太陰調治數日愈

論曰或問傷寒何以診跌陽予曰仲景稱跌陽脈大而緊者當即下利脈經云下利脈大為未止脈微細者今日愈仲景論跌陽脈九十一處皆因脾胃而設也且如稱跌陽脈滑而緊則曰滑乃胃實緊乃脾弱跌陽脈浮而濇則曰浮為吐逆水穀不化濇則食不得入跌陽脈

傷寒九十論

聖

緊而浮浮則腹滿緊則絞痛跌陽脈不出則曰脾虛上下身冷膚硬則皆脾胃之設可知矣大抵外證腹滿自利嘔惡吐逆之類審是病在脾胃而又參決以跌陽之脈則無失矣其脈見於足跌之陽故曰跌陽仲景譏世人握手而不及足

傷寒閉目證 七十七

李思順得傷寒惡寒發熱口中氣熱如火不絕七八日矣而目閉不肯開予診其脈陰陽俱緊是必汗之而復下之故也此壞證矣病家曰一醫於三日前汗之不愈



一醫復下之而目閉矣遂投以小柴胡湯五啜而愈

論曰或者何以知其汗下而目閉予曰仲景稱傷寒發熱口中氣勃勃然頭痛目黃若下之則目閉又云傷寒脈陰陽俱緊惡寒發熱目赤脈多睛不慧醫復汗之咽中傷若復下則兩目閉此壞證須小柴胡湯調之愈

傷寒表實證 七十八

羽流病傷寒身熱頭痛予診之曰邪在表此表實證也當汗之以麻黃輩數日愈

論曰或問傷寒因虛故邪得以入之今邪在表何以爲

傷寒九十論

吳

表實也予曰古人稱邪之所湊其氣必虛留而不去爲病則實蓋邪之入也始因虛及邪居中反爲實矣大抵調治傷寒先要明表裏虛實能明此四字則仲景三百九十七法可坐而定也何以明之有表實有表虛有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛予於表裏虛實百證歌中嘗論之矣仲景麻黃湯類爲表實而設也桂枝湯類爲表虛而設也裏實承氣之類裏虛四逆理中之類表裏俱實所謂陽盛陰虛下之則愈也表裏俱虛所謂陰盛陽虛汗之則愈也

手足逆冷證 七十九

酒家朱三者得傷寒六七日自頸以下無汗手足厥冷心下滿大便秘結或者見其逆冷又汗出滿悶以爲陰證予診其脈沉而緊曰此證誠可疑然大便秘結者爲虛結也安得爲陽脈沉而緊爲少陰證然少陰證多矣是自利未有秘結予謂此半在表半在裏也投以小柴胡湯大便秘通而愈

論曰傷寒惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者此爲陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出

傷寒九十論

吳

爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在表半在裏也脈雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解也難者曰仲景云病人脈陰陽俱緊及汗出者亡陽也此屬少陰今云陰不得有汗何也今頭汗出故知非少陰也何以頭汗出則知非少陰予曰此說正是議論處謂四肢冷脈沉緊腹滿全是少陰然大便秘頭汗出不得謂少陰蓋頭者三陽所聚三陽自胃中而還有頭汗出自是陰虛故曰汗出爲陽微是



陰不得有頭汗也若少陰有頭汗則九外一生故仲景平脈法云心者火也名火陰其病頭無汗者可治有汗者从心爲手少陰腎爲足少陰然相與爲病以意逆志是謂得之

寒熱類傷寒證 八十

一尼病惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩時或有汗他醫以傷寒溫瘧治之見其寒熱往來時方疫氣大作也大柴胡雜進數日愈甚轉劇予診之曰兩手不受邪厥陰脈弦長而上魚際此非傷寒乃陰動不得陽也此正

傷寒九十論

吳

與倉公治一繡女病同投以抑陰等藥數日愈論曰昔褚澄云治師尼寡婦別製方蓋有爲也師尼寡婦獨居怨曠獨陰而無陽欲心屢萌而不適其慾是以陰陽交爭乍寒乍熱虛汗倦怠全類溫瘧久久成癆瘵矣嘗記史書倉公傳載濟北王侍者繡女病腰背寒熱衆醫皆爲寒熱也倉公曰病得之欲男子而不可得也何以知之診其脈肝部弦出寸口是以知也男子以精爲主女子以血爲主男子精溢則思室女子血盛則懷胎肝攝血者也今肝脈弦長上寸口及魚際則血盛欲

男子之候也然則治師尼寡婦猶不可與尋常婦人一概論也

失汗衄血證 八十一

里人秦氏子得傷寒發熱身疼骨節疼痛惡風無汗或者勸其不須服藥待其自安如是半月矣而病不除不得已召醫治之醫至問日數又不審其脈與外證但云已過期矣不可汗下矣且與調氣藥以正氣復延予予診其脈浮濇而緊大此麻黃證無疑者但恐當汗不汗化爲衄血必有是證言未已衄血作予急以麻黃湯與

傷寒九十論

手

之繼之以犀角地黃湯血止汗解愈論曰仲景云凡作湯藥不可避晨夜覺病須臾卽宜便治不等早晚則易愈或稍遲病卽傳變雖欲除必難爲力今醫不究根源執以法必汗之於四日之前下之於四日之後殊不知此惑也又云病不服藥猶得中醫此爲無醫而設也若大小便不通必待其自差乎蓋前後不得洩必下部腹脹數日矣又況結胃蓄血發狂發斑之類未有勿藥而愈者知者知變愚者執迷以取禍也須是隨病淺深在表在裏或陰或陽早爲治療加



救火及溺然庶易瘥素問云邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脈其次治六腑其次治五臟治五臟者半死半生也扁鵲望齊侯而逃其斯之謂歟

脾約證 八十二

一豪子郭氏得傷寒數日身熱頭疼惡風大便不通臍腹膨脹易數醫一醫欲用大承氣一醫欲大柴胡一醫欲用蜜導病家相知凡三五人各主其說紛然不定最後請子至問小便如何病家云小便頻數乃診六脈下

傷寒九十論

至

及跌陽脈浮且澀予曰脾約證也此屬太陽陽明仲景云太陽陽明者脾約也仲景又曰跌傷脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便則鞭其脾為約者大承氣大柴胡恐不當仲景法中麻仁丸不可易也壅病親戚尙爾紛紛予曰若不相信恐別生他證請辭無庸召我坐有一人乃弟也逡巡曰諸君不須紛爭既有仲景證法相當不同此說何據某雖愚昧請終其說諸醫若何各請敘述眾醫默然紛爭始定予以麻仁丸百粒分三服食頃間盡是夕大便通中汗而解

論曰浮者風也澀者津液少也小便頻數津液枯竭又燥之以風是以大便堅鞭乃以大黃朴硝湯劑蕩滌腸胃雖未死恐別生他證當讀千金方論腳氣云世間人病有親戚故舊遠近問病其人曾不經一事未讀一方騁騁詐作明能詭論或言是虛或言是實或以為風或以為蟲或道是水或道是痰紛紛謬說種種不同破壞病人心意莫知孰是遷延未定時不待人忽然致禍各自走散凡為醫者要識病淺深探願方書博覽古今是事明辨不爾大誤人事識者宜知以為醫戒

傷寒九十論

至

格陽關陰證 八十三

張養愚患傷寒八九日以上吐逆食不得入小便注悶不通醫作胃熱而吐傳入膀胱則小便不通也予診其脈見寸上二溢而尺覆關中伏而不見乃斷之曰格陽關陰證也陽溢於上不得下行陰覆於下不得上達中有一關格之病是以屢汗而不得汗也予投以透膈散三啜而吐止小便利而解  
論曰或問何謂格陽關陰答曰難經云關以前動者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不



及遂入尺爲覆爲內關外格此陰乘之脈也又曰陰氣太盛陽氣不得營故曰關陽氣太盛陰氣不得營故曰格陰陽俱盛不能相營也故曰關格關格者不得盡期而灰矣素問曰人迎四盛以上爲格陽寸口四盛以上爲關陰人迎與寸口俱盛四倍以上爲關格仲景云在尺爲關在寸爲格關則小便不利格則吐逆又跌陽脈浮而澀伏則吐逆水穀不化澀則食不得人名曰關格由是言之關脈沉伏而澀尺寸有覆溢者關格病也何以言之天氣下降地氣上升在卦爲泰泰者通也天氣

傷寒九十論

重

不降地氣不升在卦爲否否者閉也今陽不降上魚際爲溢故其病吐逆名爲外格陰不得上浮入尺爲覆故其病小便不通爲內關此關格之異也

太陽陽明合病證 八十四

有豪子病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭疼腰脊強鼻乾不得眠予曰太陽陽明合病證仲景法中有三證下利者葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胃滿者麻黃湯也治以麻黃湯得汗而解論曰或問傳人之次第自太陽陽明少陽太陰少陰厥

陰何哉說者謂陽主生故足太陽水傳足陽明土土傳足少陽木爲微邪陰主殺故太陰土傳少陰水水傳足厥陰木爲賊邪少陰水傳厥陰木安得爲賊也故予以爲不然素問陰陽離合論云太陽根起于至陰結于命門名曰陰中之陽陽明根起于厲兌名曰陰中之陽少陽根起于竅陰名曰陰中之少陽太陰根起于隱白名曰陰中之陰少陰根起于涌泉名曰陰中之少陰厥陰根起于火敦名曰陰之絕陰大抵傷寒始因中之氣得之于陰是以止傳足經者是陰中之陽陽中之陰亦自

傷寒九十論

重

然之次第也故此篇因黃帝問三陰三陽之離合岐伯自聖人南面而立前曰廣明而推之且以太陽爲開陽明爲闔少陽爲樞太陰爲開厥陰爲闔少陰爲樞六經不得相失則其序有授矣不特此也以六氣在天而考之厥陰爲初之氣少陰爲二之氣太陰爲三之氣少陽爲四之氣陽明爲五之氣太陽爲六之氣此順也逆而言之則太陽而後陽明陽明而後少陽少陽而後太陰太陰而後少陰少陰而後厥陰傷寒爲病在氣則逆而非順自太陽而終厥陰也



懊懣怫鬱證 八十五

士人陳彥夫病傷寒八九日身熱無汗喜飲時時譫語因下利後大便不通三日非煩非躁非寒非痛終夜不得眠但心沒曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者不曉是何證但以寧心寬膈等藥不效召予診視兩手關脈長按之有力乃曰懊懣怫鬱證也此胃中有燥屎宜與承氣湯服之下燥屎二十枚次復下溏糞得利而解論曰仲景云陽明病下之心中懊懣而微煩胃中有燥屎可攻宜承氣湯又云病者小便不利大便乍難乍易

傷寒九十論

五

時有微熱怫鬱不得眠者有燥屎也承氣湯主之蓋屎在胃則胃不和素問曰胃不和則臥不安此所以夜不得眠也仲景云胃中燥大便堅者必譫語此所以時時譫言也非煩非躁非寒非痛所謂心中懊懣也聲口歎息而時發一聲所謂水氣怫鬱也燥屎得除大便通利陰陽交和是以其病得除

兩手撮空證 八十六

市人張某年可四十病傷寒大便不利日晡發熱手循衣縫兩手撮空目直視急更三醫矣皆曰傷寒最惡證

也不可治後召予予不得已往診之曰此誠惡候染此者十中九外仲景雖有證而無治法但云脈弦者生澀者外沉經吐下難于用藥設以藥與若大便得通而脈強者庶可料理也遂用小承氣湯與之一投而大便通利諸疾漸退漸退脈且微弦半月得瘥

論曰或問下之而脈得弦者生何也荅曰金匱玉函經云循衣摸牀妄撮怵惕不安微喘直視脈弦者生澀者外微者但發熱譫語承氣湯與之余嘗觀錢仲陽小兒訣法手循衣領及亂捻物者肝熱也此證玉函列在陽

傷寒九十論

五

明部陽明胃也肝有邪熱滯于胃經故以承氣湯瀉肝而得強脈則平而和胃且堅不受此百生之理也予嘗謂仲景論不通諸醫書以發明隱奧而專一經者未見其能也須以古今方書發明仲景餘意

下利服承氣湯證 八十七

客有病傷寒下利身熱神昏多困譫語不得眠或者見其下利以譫語為鄭聲皆陰虛證也予診其脈曰此承氣湯證也眾皆愕然曰下利服承氣仲景法乎荅曰仲景云下利而譫語者有燥屎也屬小承氣湯乃投以小



承氣得利止而下燥屎十二枚俄得汗解

論曰內經云微者逆之甚者從之逆者正治從者反治  
從少從多觀其事也帝曰何謂反治岐伯曰寒因寒用  
通因通用王冰以為大熱內結注瀉不止熱宜寒療結  
伏須除以寒下之結散利止此寒因寒用也小承氣止  
利正合此理

溼溫證 八十八

丙午歲商人張皓季夏得疾胃項多汗四肢時冷頭痛  
譚語予診其脈關前濡關後數斷曰當作溼溫治蓋先

傷寒九十論

五

受暑後受溼暑溼相搏是謂溼溫投以白虎加參次以  
白虎蒼朮頭痛漸退足漸溫汗漸止數日愈此病名賊  
邪誤服藥則死

論曰或者難云何謂賊邪予曰難經論五邪有實邪虛  
邪正邪微邪賊邪從後來者為虛邪從前來者為實邪  
從所不勝者為賊邪從所勝者為微邪自病者為正邪  
又曰假令心病中暑者為正邪中溼得之為賊邪今心  
先受邪而溼勝之水尅火從所不勝斯為賊邪五邪之  
最逆者也難經有云溼溫之脈陽濡而弱陰小而急濡

弱見於陽部溼氣搏暑也小急見於陰部暑氣溼蒸也  
故經曰暑溼相搏名曰溼溫是為賊邪也

血結胃證 八十九

丁未歲一婦患傷寒寒熱夜則譫語目中見鬼狂躁不  
寧其夫訪予詢其治法予曰若經水適來適斷恐是熱  
入血室也越日亟告曰已作結胃之狀矣予為診之曰  
若相委信急行小柴胡湯等必愈前醫不識涵養至此  
遂成結胃證藥不可及也無已則有一法刺期門穴或  
庶幾愈如教而得愈

傷寒九十論

五

論曰或問熱入血室何為而成結胃予曰邪入經絡與  
正氣相搏上下流行或遇經水適來適斷邪氣乘虛而  
入血室血與邪迫上入肝經肝既受邪則譫語如見鬼  
肝病則見鬼目昏則見鬼復入膈中則血結於胃也何  
以言之蓋婦人平居經水常養於目血常養肝也方未  
孕則下行之以為月水既妊娠則中蓄之以養胎及已  
產則上壅得金化之以為乳今邪逐之併歸肝經聚於  
膈中壅於乳下非刺期門以瀉不可也期門者肝之膜  
原使其未聚於乳則小柴胡尚可行之既聚於乳小柴



胡不可用也譬如凶盜行於閭里為巡邏所迫寡婦處女適啟其門突入其室婦女為盜所迫直入隱奧以避之盜躡其蹤必不肯出乃啟孔道以行誘焉庶幾其可去也血結於膈而刺期門何以異此

六陽俱絕證 九十

一達官乘舟急歸四月風雨飲食不時得疾如傷寒狀頭重自汗身體悉疼醫作中風溼證治投以朮附薑附等湯汗不止單服附子及灸臍下亦不止予往視之曰六陽俱絕不可治也其汗必如珠驗之果然半時卒

傷寒九十論

五

論曰雖經云六俱氣俱絕者陰與陽相離陰陽相離則腠理開絕汗乃出汗出如珠轉而不流夕占旦外且占夕以此之謂也蓋病者之汗有陽盛陰虛陰盛陽虛陽盛者如骨蒸熱病之汗則流溢如潤陽絕者如此證則凝聚而止假如甌槩之蒸物出汗而散者陽盛之類也假如置冰於金銀瓦器中汗出而凝聚不流陽絕之證也

傷寒九十論 終

昭文張金吾愛日精廬傳鈔本

仁和胡樹聲震之藏書 男 珽 校

吳縣貝毓誠

金匱江文煒 全校

元和徐立方

陽湖吳國正刷印

傷寒九十論

卒



傷寒九十論校語

是書世無刊本醫家得之奉為枕中祕余屢欲刊行又以原鈔多舛誤處未得善本校正文命攸關非細事也今夏與徐丈稼甫江君彤甫繙閱他書糾正數處而彤甫復不敢自信知貝君靜安素習是道攜往質之貝君更為曲證旁參於是殆可以無憾矣聞有疑似附錄於後咸豐三年十一月仁和胡珽識

目錄二頁四行

文煒按剛症原作剛瘕今从舊本仲景傷寒論改

三頁五行

文煒按吃逆素問吃音同呃

傷寒九十論校語

四頁十三行

班字誤原作班

本書一頁九行

文煒按尚字據下文當作光

十一行

毓誠按通順血脈以下出宏景

錄別

二頁七行

附字誤原作附子

三頁二行

文煒按有當作者

四頁一行

捐字誤原作捐

八行文煒按而當作何

十一頁二行

己字誤原作已

十二頁十六行

文煒按京城當作京經

十五頁七行

毓誠按刻字成注傷寒作就文煒按舊本仲景前亦作就下第九行同

十九頁十行

毓誠按但字當作使

廿二頁十七行

韻字誤原作韻

廿四頁二行

尿字誤原作尿

廿五頁九行

毓誠按謂當作為。文煒按由當作內

廿七頁十三行

醫字誤原作醫

十五行。毓誠按陽當作陰。心字下當有氣字

廿九頁八行

毓誠按搏字經亦有作搏聚之搏

十七行

文煒按水壘毓誠曰外壘是也蓋外壘有神效瓜蒂散方法治相等見金匱

三十頁四行

高原作蒿文煒謂蒿字必訛疑為高字夏有高乃人之姓字也毓誠謂或

傷寒九十論校語

是篙字篙師習於水故多溼又黃為溼熱溼熱盛於夏也。按若如貝君所言則當為篙工

三十二頁五行

毓誠按方謂當作方為

三十五頁十四行

今字誤原作令

三十八頁四行

舛从刃字得聲不从刃字下同

十行。陶字誤原从目旁作眇

四十三頁四行

腕字誤原作腕

四十五頁三行

跌字誤原作跌

四十八頁五行

毓誠按陽當作陰

十七行。毓誠按硬


五十頁一行

文煒按猶當作尤

五十一頁十行

十一行。跌字並誤原作跌。○。混字不清晰十二行同





ZW 21181888784281

S

2121.5  
15b(984)

續修四庫全書 子部 醫家類

五十二頁三行 文輝按當字疑嘗字之說 八行 願字誤原作隕

五十三頁六行 跌字誤 七行 入字誤原作入

五十四頁八行 火敦誤原作大敦

五十六頁五行 複漸退二字當勾去

五十八頁一行 博字誤原作博

五十九頁十行 六俱誤原作六陽

易經卷之六 命 校語

三