


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇二三・子部・醫家類

張氏醫通十六卷（卷十一至卷十六）〔清〕張璐撰……………一

辨證錄十四卷 洞垣全書脉訣闡微一卷（辨證錄卷一至卷十二）〔清〕陳士鐸撰……………三五三

2437/03

張氏醫通卷十一

長洲石頑張

璐路

男

以柔安世

訥遜言

婦人門下

產後

經曰。孔子而病熱。脈懸小。手足溫則生。寒則死。

孔子中風熱喘鳴。肩息者。脈實大而緩則生。急則死。

上條言產後以乳哺子之時而患熱病。其脈只宜

醫通卷十一 產後

懸小不宜實大者。以產後新虛故也。設脈雖懸小。而見手足逆冷。又為脾氣衰絕。陰氣暴逆之候。亦主死也。下條言產後中風熱而至喘鳴肩息。以風熱逆於陽位。其脈必不能懸小。但須實大之中。而往來和緩。則脾胃之氣在其中矣。設見急疾。胃氣已絕。安得不死。後世以為孔子二字。誤認小兒。如張介賓之明。亦不加察。且因此而謂小兒不當視虎口三關。即宜診兩手六部。非智者之一失歟。金匱云。問曰。新產婦人有三病。一者病瘧。二者病鬱。

胃三者大便難。何謂也。師曰。新產血虛。多汗出。善中風。故令病瘧。亡血復汗。寒多。故令鬱。胃亡津液。胃燥。故大便難。產婦鬱胃。其脈微弱。嘔不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。胃家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭汗出。所以產婦善汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔不能食。小柴胡湯主之。

醫通卷十一 產後

產後氣血俱虛。汗下皆禁。獨此一證。用大承氣者。乃證治之變。不當以尋常例測也。以其病解之後。尚有餘熱在胃。所以能食。食入既多。至七八日。更加發熱者。此必復傷飲食之故。故知胃有實結。恐其煎迫津液。故以急下救陰為務。然必年體強旺。脈證俱實。且時日既久。與新產大便難不同。是可議下。設遇胃虛之人。雖能食而所食不多。即有發熱便秘。亦屬血虛。急宜調養氣血。斷非承氣所宜。不可恣行攻擊也。

產後腹中疝痛當歸生薑羊肉湯主之并治腹中寒疝虛勞不足若寒多者加生薑成一飢痛多而嘔者加橘皮一兩白朮一兩

產後腹中疝痛乃寒積厥陰衝脈故用辛溫以散血中之寒助以血肉之性大補精血較諸補劑功効懸殊若腹痛兼嘔而所嘔皆是稀痰是知脾虛濁氣上逆故加橘皮以宣散其氣白朮以固護其脾倘見血逆而嘔所嘔渾是清水腹脹滿急則加桃仁肉桂具見言外矣至於寒疝虛勞少腹結痛

醫通卷十一 產後

三

總是下焦寒結亦不越是方也

產後腹痛煩滿不得卧枳實芍藥散主之并主癰膿以麥粥下之

仲景凡治腹痛多用芍藥以其能收陰氣之散也以其能除血痺之痛也以其能緩中而止急痛也本草謂主邪氣腹痛故多用之蓋五氣之邪莫如厥陰肝木之性急暴一有不平則直作痛也此方治疝痛用芍藥為主佐以枳實炒黑入血破積聚收陰緩中逐陳致新麥粥補血下氣而壯血脈

也

師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利頓服之新血下如豚肝

血之燥乾凝著者非芍藥枳實可能治須用大黃桃仁蠱蟲下其血閉更加蜜以緩大黃之急也產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露未盡不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則譫語至夜即愈宜大承氣湯主之熱在於裏

醫通卷十一 產後

四

結在膀胱也

太陽為表膀胱為裏七八日表證入裏故日無太陽證惡露已為病氣所鬱不能盡去因入裏與惡露相搏結在膀胱而作少腹堅痛下焦熱極故不大便煩躁發熱更切其脈微實再倍其發熱在日晡時而煩躁不食熱邪又攻於胃胃熱則不食食入則殺氣之熱更助兩熱相併故譫語至夜即愈者產後血虛熱邪易入血室入血室則夜如見鬼狀言此以明其熱不在血室而在膀胱與胃故

用大承氣湯也

產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在者可與陽旦湯

舉此與上文承氣湯為表裏之例

產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之溫覆使汗出頸項強用大附子一枚破之如豆人前藥揚去沫嘔者加半夏半升洗

此證太陽上行至頭表陽明脈過膈上循於面二經合病多加葛根以葛根為陽明解肌藥也防風

醫通卷十一 產後

五

佐桂枝去二經之風竹葉桔梗主氣上喘參草和中氣薑棗行營衛穀氣行則上下交濟而汗出解矣附子恐是方後所加治頸項強者以邪在太陽禁固其筋脈不得屈伸故用附子溫經散寒揚去沫者不使辛熱上浮之氣助其虛陽上逆也若邪在胸而嘔加半夏治之上言破之如豆入前藥舊本作如豆大今如徐忠可駁正
婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大圓主之有熱者倍白薇煩喘者加栢實一分

乳中虛言乳哺而乳汁去多則陰血乏而胃中亦

虛陰乏則火撓而神昏亂胃虛則嘔逆用甘草瀉

心火石膏療煩亂竹皮主嘔逆桂枝和營氣又宣

導諸藥使無杆格之逆煩喘者為心虛火動故加

栢實以安之

產後下利虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之

傷寒厥陰證熱利下重者用白頭翁湯苦寒治熱

以堅腸胃此產後氣血兩虛故加阿膠甘草然下

利血滯也古人云血行則利自止此方豈獨治產

醫通卷十一 產後

六

後哉

婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小

柴胡湯頭不痛但煩者千金三物黃芩湯

自發露謂自發衣露體得風非邪外傷者故不為

自汗風病蓋產時天機開發雖微風亦得入之外

感之風內應之火合化淫於四末而作四肢苦煩

熱上至於頭作頭痛病在表裏之間故用小柴胡

湯主治少陽若頭不痛是無表也惟肝膽風熱內

動上膈作煩故用黃芩退熱苦參養肝熟地補血

而益腎水則肝膽之火寧矣

婦人產後虛羸不足腹中刺痛不止吸吸少氣或苦少腹中急摩引腰背不能食飲千金內補當歸建中湯產後一月日得服四五劑為善令人強壯若大虛加飴糖六兩湯成內之於火上煖令飴消若去血過多崩傷內衄不止加地黃六兩阿膠二兩合八味湯成內阿膠

產後血去營衛俱虛內不充於五藏肝木妄動作腹中刺痛上不充於膈中遂吸吸少氣下不濟於

醫通卷十一 產後

七

腎故少腹急引外連腰脊六府不和則不能食用此以益營衛伐肝邪補中和內○按此即黃耆建中之變法彼用黃耆以助外衛之陽此用當歸以調內營之血然助外則用桂枝調中則宜肉桂兩不移易之定法也千金二字義見中風門方千金三黃湯下諸禁○一禁臥二禁酒三禁浴四禁寒五禁汗六禁下七禁利小便八禁寒涼藥九禁起動作勞蓋初產血氣未定遽臥則惡血上升故分燒之後須高卧仰倚切不可即臥三朝始可稍去其墊尚宜高枕七日

後如無他病方可安枕多有半月後未能貼席者酒能助火亂經誤用不無動血之虞至如雞子猪腎一切滯氣堅紉難化物及生冷膩滑皆不可食即砂仁湯亦能動血咸在禁例浴能升動惡露雖當夏月亦須禁之曾有產數日後因浴瘀血上衝而斃者亦有因浴動血誤用寒涼瘀結不行血化為水喘滿腫脹而死者不可不慎也新產驟虛最忌著寒則血氣凝滯諸變元生每至飲食不化腹痛作瀉禍患莫測欲去其瘀則正氣并脫欲止其瀉則瘀結不行惟薑

醫通卷十一 產後 諸禁

八

桂參木辛溫峻補庶幾血行瀉止故冬月一產即宜重綿兜護其腹在夏月亦當覆巾裏之機要云胎產之病從厥陰無犯胃氣及上中二焦為之三禁不可汗不可下不可利小便制劑之法能不犯三禁則營衛自和而寒熱止矣故產後雖有表證一切風藥皆不可用以其性升不特載血上行令人發暈抑且令人亾陽多致汗脫而死不特風藥當禁即佛手散中芍藥皆為散用恐湯能發汗也至於下藥尤為切禁非特硝黃難於輕試即洩便數難者只宜調養元氣

若車前澤瀉之類咸非所宜以產後百脈空疎自裏至表無一不虛虛則諸寒皆禁即芍藥亦難輕用以其酸寒伐生發之氣也地黃皆當慎用以純陰之味能令作瀉也黃芩能凝滯瘀血令人惡露不行爲害不淺然皆產後常禁設有表裏客邪又不當拘於上說也試觀金匱產後例中陽旦湯之用芍芍以其中有桂也薛按八珍十全之用熟地芍藥以其中有參朮及桂也豈復拘於此例哉况乎大承氣小柴胡三物黃芩下瘀血等方皆產後治例此聖人臨證如日

醫通卷十一 產後諸禁

九

大轉回天之手非尋常下士可得而測識也迨夫早起作勞不避風寒不禁飲食往往致成大病者皆自作之孽耳○凡產後之脈寸口洪疾不調者死沉微附骨不絕者生緩滑沉小者吉實大弦急者危牢革結代及滯滯不調者不治

血暈○產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神昏口噤或痰涎壅盛者急用熱童便主之若血下多而暈或神昏煩亂者芎歸湯加入參三五錢澤蘭葉一握童便半盞兼補而散之痰合二陳

加烏梅薑汁并用鐵秤鉅燒令赤以醋沃之或燒漆器并亂髮以烟熏之產後因虛火載血上行而暈用鹿茸灰爲細末好酒童便灌下一呷即醒行血極快產後昏暈嘔逆不能飲食此胃虛挾痰所致以紙聖散去赤芍加炮薑茯苓慎不可用芎歸血藥臍臍其嘔逆愈不能止矣○初產血暈速與扶起勿卧用韭葉一握切碎入有嘴磁瓶中将醋煎後澆入瓶內蓋蓋瓶口以嘴向婦鼻孔令氣透入鼻中即蘇若惡露未盡忽昏悶不省人事須問先因感氣而下胎者以

醫通卷十一 產後血暈

十

二陳加芎歸香附桃仁山查薑汁切不可作中風治產後口眼喎斜等證當大補氣血十全大補下黑龍丹肥人佐以痰藥如星半木香之類若作中風治而用小續命必殆若腹中刺痛者嚴氏清魂散血暈語言顛倒健忘失志此血入心包宜失笑散加鬱金或用血竭沒藥等分爲末熱酒和童便調下二錢良久再服惡血自下

三衝○敗血上衝有三或歌舞談笑或怒罵坐臥甚者踰牆上屋口咬拳打山腔野調號佛名神此敗血

衝心多死。方普用龍齒清魂散。然用之多不應。不若花蒙石散最捷。琥珀黑龍丹亦効。如雖悶亂不致顛狂者。失笑散加鬱金。若飽悶嘔惡。腹滿脹痛者。曰衝胃。古法用五積散。余嘗用平胃加薑桂。往往獲効。不應送來復升。嘔逆腹脹。血化為水者。金匱下瘀血湯。若面赤嘔逆欲死。曰衝肺。二味參蘇飲甚則加芒硝。蕩滌之大抵衝心者。十難救。一衝胃者。五死五生。衝肺者。十全一二。○產後口鼻起黑色而鼻衄者。是胃氣虛敗而血滯也。急用二味參蘇飲稍遲不救。

醫通卷十一 產後三條 三

三急○產後諸病。惟嘔吐盜汗泄瀉為急。三者並見。必危。痰閉心痰。抵聖散去芍藥加炮薑茯苓。多汗加烏梅。慎不可用浮麥。傷胃耗氣。棗仁膩滑作瀉。芍藥五味酸收。皆能阻滯惡露也。
三審○凡診新產婦。先審少腹痛與不痛。以徵惡露之有無。次審大便通與不通。以徵津液之盛衰。再審乳汁行與不行。及乎飲食多少。以徵胃氣之充饒。必先審此三者。以脈象證以證合。脈脈證相符。雖異尋常治之。必愈。脈證相反。縱無危候。必多變端。即如產

後惡露常以彌月為期。然間有六七朝即淨者。又未可以概論也。此雖產母稟質不同。而胎之所稟亦異。如胎息壯盛。則氣血盡歸其子。瘀血自少。胎息孱弱。則氣血涵養有餘。瘀血必多。亦有產時去多。產後必少。產時去少。產後必多。勢使然也。曾見一婦。艱產異常。三朝下一血塊。大小形色與茄無異。此後絕無瘀血。惟小便如皂莢汁。其少腹畧無痛楚。良由艱產過傷。子宮關闔廢弛。不能收斂。故其塊得下。世俗名兒枕者是也。大抵常產之婦。開闔有權。既產之後。子宮

醫通卷十一 產後三條 三

即閉。兒枕隨氣攻注。碎作小塊。續續而下。所以綿延日期。此則全塊頓出自無淋瀝之患。即有餘血盡歸洩便矣。此後屢見數婦。證雖大異。尋常以意逆之。其理自若也。產後血脫津傷。大便自應艱澀。每至五七日始通。無足怪也。其有發熱譫語。脈滑實者。又當急攻。以救津液。若兼少腹硬痛。又當破瘀為先。產後三朝。每有寒熱蒸乳。寒熱後。乳汁大行。此胃氣乎化。雖有餘病。必無他慮。如無寒熱而乳汁充然者。血氣本旺也。若不寒熱無乳汁。此營衛不調。總無所苦。急宜

當歸內補建中湯頻與調之。否則兩月後漸見寒熱骨蒸而為瘵勞之患矣。

嘔吐○嘔吐惡露不行。二陳加當歸。蓬朮肉桂乾薑。胸腹脹滿。多是傷食。二陳加丁香。不應加人參炮薑。澤蘭藿香。或抵聖散亦佳。如寒。理中湯加藿香。

呃逆○呃逆者。胃寒所生。產後氣血俱虛。風冷搏氣而逆上。乃胃氣虛寒之極。最為惡候。理中加丁香。古方以丁香豆蔻。伏龍肝為末。用桃仁吳茱萸煎湯。調下一錢匙。如人行五里。再服。未應。急投參附。遲則不

醫通卷十一 產後嘔吐 呃逆 傳四

救。

飽悶○產後飽悶惡露不行。多因血逆。宜行瘀血。為主。如有塊上升。飽悶欲吐者。二陳湯加薑桂香附。炮查蓬朮。塊不散。積久愈堅。琥珀黑龍丹。若惡露已淨而飽悶。受氣也。沉香降氣散。若敗血傷於脾胃。而腹脹嘔吐者。抵聖散加陵鯉甲肉桂。孕婦服安胎藥過多。或正產或半產後。經一兩月惡露未淨。此非敗血之比。宜導氣行血。若用止截。誤矣。飲食停滯。六君子加木香厚朴。大凡傷其脾胃者。當節飲食為主。

識語○識語多有血滯。亦有血虛。著風而痰鬱者。不可專以痰斷。亦不可認為血逆。其後識語必脈大有。

力始與證合。然又與產後不宜。故多難治。去血少者。血滯也。實則桃仁承氣。下瘀血湯。虛則龍齒清魂散。或四烏湯。用赤芍歸尾。加桃仁薑汁。去血多者。血虛也。蓋血虛則心神失守。故識語必先養血。不可用參木峻補。當歸內補建中湯。當歸芍藥散。膠艾湯。選用。若風兼痰鬱者。心經虛。故風痰客之。導痰湯加鈎藤鈎薄荷。又方益母草為末。薄荷湯為丸。童便服之。專

醫通卷十一 產後識語 如見鬼神

治產後識語

如見鬼神○產後傷耗血脈。心氣虛則敗血停積。上干於心。遂至心中煩躁。卧起不安。如見鬼神。言語顛錯。誤作風治。必殆。虛則四物湯。換生地。加桂心炮薑。生蒲黃石菖蒲。實則四烏湯。加川連煎成。入龍腦一捻。服後得睡。即安心。悸恍惚。語言錯亂者。千金遠志湯。如內虛敗血攻心。任言亂語者。龍齒清魂散。痰積不行。腹脹喘急者。急用下瘀血湯。攻之。庶或可收。稍遲必難挽回。此證多有心脾血少者。宜八珍加炮薑。

則痰清神自安矣
不語○產後不語多因停積敗血閉於心竅神志不能明了嚴氏清魂加蘇木丹參若因心腎氣虛而不能通於舌則舌強不語辰砂七珍散或人參石菖蒲等分不時煎服腎虛風熱地黃飲子肝木太過柴胡清肝散或小柴胡加鈎藤脾受木侮六君子加升麻鈎藤氣血俱虛八珍湯加菖蒲遠志不應獨參湯加附子一片峻補其氣而血自生若竟用血藥則誤矣發瘧○產後發瘧因去血過多元氣虧極或外邪相

醫通卷十一 產後不語發瘧 五

搏或陰火內動所致故傷寒汗下過多遺瘍膿血大泄多患此證須大補氣血或保無虞若攻風邪必死其證才關緊急腰背反張四肢抽搐兩口連刺十全大補有汗加炮薑多汗加附子不應并加薑附倍人參多服始應嘗治大虛之證服參耆數觔附子數枚方應若汗拭不及兩手漠空者不治
發熱○婦人產後血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治宜四物補陰而以炮薑之苦溫從治收其浮散使歸於陰若氣血俱虛惡寒發熱煩躁作渴十全

太補湯若熱愈甚急加桂附若血虛至夜發熱小腹腰脇作痛四物加黃耆五錢肉桂一錢若作渴而赤當歸補血湯若誤認為火證投以涼藥禍在反掌然產後脾胃多虛有過於飲食傷滯而發熱者慎勿誤作血虛治但遇產後發熱若胸膈飽悶噯氣惡食泄瀉等證只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血正法○產後大發熱必用炮薑同茯苓淡滲其熱一應苦寒并發表之藥皆不可用凡產後發熱惡寒皆屬血虛此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳故

醫通卷十一 產後發熱 十六

以補陰藥加炮薑大劑服之且炮薑能入肺胃散虛熱入肝脾引血藥生血然不可多用獨用必與補陰藥同用此造化自然之妙也惡寒發熱腹痛者當去惡血○產後脈洪數胎前脈瀉弱多死懷孕者脈宜滑數已產而滑數不收者雖未必死多費調理
寒熱○產後因氣血虛弱脾胃虧損而發寒熱皆不足證經云陽虛則惡寒陰虛則發熱若兼大便不通尤屬氣血枯槁切禁發表降火若寸口脈微為陽氣不足陰氣上入陽中而惡寒補中益氣湯加薑棗發

起之尺部脈弦為陰氣不足陽氣下陷陰中而發熱
六味凡加肉桂以收攝之若肌熱大渴引飲目赤面
紅此血虛發熱當歸補血湯不可誤認客邪而用表
散藥○下血過多寒熱而小腹不痛者此營衛虧損
陰陽不和屬虛增損四物湯若惡露未淨傷滯胞絡
寒熱而小腹痛者屬實輕則四烏湯重則醋煎散產
後臥不如法敗血流入經絡骨節間寒熱腰股腫熱
痛不可拊局方調經散有食積食頭痛骨疼寒熱者
外感風寒也參蘇飲增損柴胡湯柴胡四物湯選用

醫通卷十一 產後 寒熱

七

或兼瀉及吐者五積散○胸膈飽悶前後心痛寒熱
者傷氣血食也指迷七氣湯虛人局方七氣合沉香
降氣散如飽滿寒熱兼腹痛腰疼者四烏湯○熱而
不寒胸煩自汗與大病後虛煩相似此去血過多血
虛生熱也逍遙散若臍下熱非熱地不能治如大熱
必用炮薑日晡轉甚者非柴胡不能治不應必用肉
桂○新產蒸乳發熱不必服藥
中風○產後類中風證大多血虛非真中也或挾風
或挾痰或挾氣證雖不一治法莫要於行血芎歸湯

加荆芥穗淋黑豆酒煎服亦治角弓反張手足癱瘓
脈來虛浮者血暈四肢強直芎歸湯加童便或用荆
芥穗微焙為末豆淋酒調下二錢或童便服之口喫
則挾齒灌之斷噤則灌入鼻中即蘇手足癱瘓敗血
入經絡也用五積散又有形盛氣虛產後痿廢不起
者但當補氣藥中兼行氣為主朝用香砂六君子藁
用越鞠丸久服自効
欬嗽○產後欬嗽多因腠理不密外邪所感而致若
因風寒所感桔梗湯加葱白香豉生薑或小建中湯

醫通卷十一 產後 中風 欬嗽

六

虛用異功散去木加山藥細辛桂枝陰虛兼感客邪
者六味丸去茱加桂枝細辛陰虛水不制火而嗽六
味丸加麥冬五味乾欬內熱不寒桔梗湯加萎蕤麥
冬丹皮蜜煎薑橘之類蓋乾欬一證有小兒食乳易
治無則成勞
發喘○喘而痰聲大作此痰犯肺金也謠其痰喘自
定風則金匱旋覆花湯加甘草桔梗惡露未淨加炮
薑丹參有食加厚朴陳皮不嗽而喘此肺為火迫乃
真喘也難治若肺虛熱生脈散為主藥肺胃氣虛異

功散加倍。兼外邪加細辛。中氣虛寒。前方加炮薑。肉桂。陽氣虛脫。更加附子。腎虛不能納氣。歸元都氣丸。作湯送靈砂丹。兼氣虛者。與異功散。兼進大抵產後發喘。加以脈之虛大急疾。皆不可治。

瘵癰。○產後陰血去多。陽火熾盛。筋失營養。虛極生風。而成此證。若見唇青肉冷。汗出目眩神昏。命在須臾。四君子加芍歸丹皮。鈎藤。蓋血生於至陰。至陰者脾土也。若肝經血虛。遺送散加鈎藤。陽氣虛敗。十全大補加薑附鈎藤。鈎經云。脾之榮在唇。心之液為汗。

醫通卷十一 產後發喘瘵癰顛振

若心脾二藏虛極。而唇白多汗。急用參附救之。若無力抽搐。戴眼反折。汗出如珠不流者。皆不可治。顛振。○產後顛振。乃氣血虧損。虛火益盛。而生風也。切不可。以風為治。急用十全大補。溫補氣血為主。如小產後。半身肉顛。半身汗出。亦宜上法。若產後不省人事。口吐涎沫。而顛振。或瘵癰者。當歸補血湯。加荆芥穗。豆淋酒煎服。婦人胎前產後。顛振瘵癰。逍遙歸脾。小柴胡補中。皆可選用。傷風。○產後傷風。須問惡露淨否。而後用藥。若未淨。

而小腹疼痛者。以行血理氣為先。金匱旋復花湯。四烏湯。選用。若惡露已淨。小腹不疼。但頭痛身熱足冷。自汗欬嗽。黃耆建中湯。頭重。香蘇散。若風寒併傷。營衛俱病。遍體痛無汗。改毒散。虛甚。若風者。不可發散。逍遙去木。加桂枝。得効。雖遲無失。

傷寒。○產後傷寒。不可遽用小柴胡。蓋有黃芩在內。停滯惡血也。宜小建中湯。增損柴胡湯。時疫。柴胡四物湯。香蘇散。伏氣發溫。葱白香薷湯。感冒氣食。香蘇散。產後得熱病。四肢暖而脈息和平者。生四肢冷而。

醫通卷十一 產後傷風發喘瘵癰

脈沉瀯煩熱甚。而脈洪盛者。皆死證也。瘵。○產後瘵。瘵在初產時絕少。即胎前久瘵。淹纏產後。裏氣通達。無不霍然。間有微寒發熱不止者。此衛氣向虛。營血驟傷之故。但與內補當歸建中湯。熱多倍芍藥。寒多加黃耆。夜發一倍當歸。三倍黃耆。不應加生何首烏。虛熱不止。大便不實。加炮薑茯苓。惡露不行。小腹結痛。另用炮黑山查。葵枯。黑糖。伏龍肝湯煎服。或有產後一月半月。感犯風暑而瘵。小柴胡補中益氣。選用。風加羌活紫蘇。暑加香薷厚朴。隨證裁。

酌但黃芩苦寒無論惡露淨與未淨皆非所宜
痢。產後下痢有三一者因胎前患痢產後不止昔
人以爲七日必死之候若元氣未敗脈有胃氣可進
粥食者伏龍肝湯丸隨證加減多有得生者一者因
產後臍腹受冷飲食不化腹痛惡露不行理中湯爲
主白加吳黃木香赤加桂心茯苓一者因產後誤食
生冷或臨產飲食過度產後泄瀉下痢亦宜理中湯
白加枳實茯苓厚朴木香赤加香附炮查熬糖虛加
人參肉桂間有熱痢下重白頭翁加甘草阿膠湯清

醫通卷十一 產後痢 痔勞

三

理之惡露已淨痢久不止腹痛後重補中益氣升舉
之大抵產後下痢惟宜顧慮元神調和血氣則積滯
自下惡露自行非若妊娠之有胎息難於照顧也
痔勞。痔勞者因產理不順疲極筋力憂勞心慮或
將養失宜虛風客之致令虛羸喘乏寒熱如瘧百節
煩疼頭痛自汗肢體倦怠欬嗽痰逆腹中絞刺當扶
正氣爲主六君子加當歸若脾肺氣虛欬嗽口乾異
功散加麥冬五味氣虛頭暈補中益氣倍用歸耆肝
經血虛肢體作痛四物加參苓朮桂肝腎虛弱自汗

盜汗往來寒熱六味丸加五味子脾虛血弱腹痛月
經不調歸脾湯倍木香血虛有熱增損柴胡湯骨蒸
勞熱嗽痰有紅者異功散去朮加山藥丹皮五味阿
膠童便熱而無痰乾欬逍遙散用蜜煎薑橘蜜蒸白
朮產後虛損不時寒熱或經一二載元神不復月事
不轉先與千金當歸芍藥湯後與烏骨雞丸調補大
抵此證多因脾胃虛弱飲食減少以致疲憊而成當
補脾胃進飲食則諸藏有所倚賴病自愈矣
虛煩。產後虛煩皆氣血虧損虛火上泛所致千金

醫通卷十一 產後痔勞 虛煩 驚悸

三

治產後內虛煩熱短氣用甘竹茹湯產後乍寒乍熱
手足身溫心胸煩滿用知母湯產後虛煩頭痛短氣
悶亂不解用淡竹茹湯產後煩滿不安用人參當歸
湯俱孫真人法也
驚悸。產後心悸皆心虛所致千金治產後衝悸志
意恍惚言語錯亂用茯神湯虛熱口燥加麥門冬虛
加人參善忘加遠志麥門冬產後大虛心悸志意不
安恍惚恐畏虛煩不眠少氣人參圓吸吸乏氣善忘
本方去薯蕷加遠志亦孫真人法也

多汗。產後血虛身熱自汗。逍遙散加熟棗仁烏梅。不可用補氣藥。古方用麥煎散。治產後盜汗自汗。為害不可勝數。因外感而汗者。黃耆建中湯。氣血俱虛。十全大補湯。不應加附子。若汗多不止。必發柔痙。尤當前藥。若頭汗者。或因溼熱。或因痰血。當審虛實。治之。半身汗。山昔人用二陳合四物。治多不効。以血藥助陰。閉滯經絡也。此屬氣血不充。而有寒痰留滯。非大補氣血。兼行經絡。痰不効。宜十全大補人參養營。加星半川烏。肥人多加豁痰行氣藥。瘦人氣血本枯。

醫通卷十一 產後多汗麻脊

三

天。之徵也。麻脊。○產後麻脊。宜生血補氣。十全大補湯。去血過多。手足發麻。小腹大痛。則遍體麻。暈欲死。此非惡露凝滯。乃虛中挾痰。六君子加炮薑香附。當歸。曾治一婦。產後右半身麻。昏而昏暈。不省人事。發即胸膈痞悶。下體重著。或時心神蕩搖。若無心肺之狀。頃則周身冷汗。如澆。大吐痰涎。而蘇。此產後經脈空虛。痰飲乘虛襲入之故。因與六君子加歸。著肉桂。隨手而効。復有一婦。產後左半身麻。昏暈。不省人事。發則周

身大痛。筋脈痙。凝肌肉。動或時頭面赤熱。或時腿。上振振動。搥頭。則蒸蒸汗出。而蘇。此產後營血大虧。虛風襲入之故。用十全大補湯。治之。諸證悉平。但麻。昏不止。後與地黃飲子而安。

大小便諸證。○產後去血過多。大腸乾澀。每至三五日後。甚至五七日。而大便始通者。皆其常也。或血虛火燥。不可計其日期。必待腹滿。覺脹欲自去而不能者。乃結在直腸。宜用導法。蜜煎導。或削薑薑醬瓜。皆可為導。惟猪膽汁。導禁用。以其苦寒。誤用每致發呃。

醫通卷十一 產後麻脊大小便諸證

四

也。若用苦寒藥。攻通。反傷中焦元氣。或愈結難通。或通瀉不止。必成敗證。若屬血虛火燥。四物加鮮何首烏。潤下之氣。血俱虛之人。雖數日不通。飲食如常。腹中如故者。八珍加桃仁蘇子。熱蜜。若多日不解。躁悶異常。不得已。用人參當歸枳殼煎服。亦權宜之術耳。古人用玉燭散。治之。反致危殆者。多矣。至如產後日久。病外感熱結。有實邪。燥屎者。急用承氣。大柴胡。下之。又不當拘於此例也。○小便不通。腹脹如鼓。用炒鹽加麝半字。填臍中外。用葱白十餘莖。作一束。切如

半指厚置鹽罈上將艾灸之覺熱氣入腹難忍方止小便即通此惟氣閉者宜之若氣虛源涸與夫熱結膀胱者皆不可用產母但覺小水少此即是病便宜調治如大小便俱秘惡露不行先通惡露四烏湯加蓬朮山查如惡露不行大便泄小便難五苓散倍肉桂加桃仁不可服胃苓湯以蒼朮能止血也○產後小便數乃氣虛不能制水補中益氣加車前茯苓若膀胱陰虛而小便淋瀝生料六味合生脈散滋其化源須大劑煎成隔湯頓熱續續進之○產後遺尿不

醫通卷十一 產後大小便諸證

三

知乃氣虛不能統血也補中益氣湯若新產延孔未飲溺出不知此恆有之至六七朝自止不必治也○婦人產後水道中出肉線一條長三四尺動之則痛欲絕先服笑散數服次用帶皮薑三觔研爛入清油二觔煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲於水道邊以前薑煎之冷則熨之一日夜即縮二日即盡再服芎歸湯調理如肉線斷則不可收矣○產婦尿胞損破致病淋瀝者當與峻補丹溪云難產多是氣虛產後氣血尤虛當以參耆為君芎歸為臣桃仁陳皮為

佐同豬羊肝煎湯時時飲之勿令間斷使氣血驟長匝月其弊自完若稍緩則難成功矣○產間傷動膠破終日不小便但淋瀝不乾用天然黃絲二兩不用藥者牡丹皮白芩人參各一錢水煎至絲爛如飴服服勿作聲作聲則泄氣無効名補胞飲經月常服有効○產後損尿胞而淋瀝參耆朮草熬膏豬羊胞煎湯饑時調服月餘胞長淋止○產後陰戶著風痛四物湯加藜本防風不應有瘀傷也加血餘龜版灰肉桂陰頰脫下氣血俱虛不能收斂者八珍加升麻黃

醫通卷十一 產後大小便諸證

三

著○陰戶腫痛溼熱也用枯礬荆芥白芷當歸桃仁細辛川椒五倍子等分入葱三莖煎湯薰洗即愈諸痛○產後遍身疼痛氣虛百節開張惡露乘虛流入經絡骨節之間謂之敗血流經或流於腰膝或流入髀股痛不可耐痛處熱腫流注日深漸致身而浮腫局方調經散最當琥珀地黃丸亦宜若因虛風所侵以致肢體沉重不利筋脈引急發熱頭痛局方用五積散去蒼朮加陵鯉甲用生漆塗喉丸良或四神散加桂枝薑棗和營止痛最捷若誤作傷寒發汗致

行脈抽搐手足厥冷而變為瘳又當十全大補為主
若以手按而痛益甚者是瘀滯也四烏加陵鯉甲桂
枝薑棗以散之按而痛稍緩者此血虛也四物加香
附炮薑人參白朮甘草以養之如皮肉痛者外感也
如月內惡露未淨者香蘇散加肉桂陵鯉甲產後五
藏皆虛胃氣虧損飲食不充則令虛熱陽氣不守上
奏於頭則令頭痛補中益氣加川芎香附子不應加
附子一片若血虛四物加參朮有產後敗血上衝頭
痛非琥珀黑龍丹不効又方治產後敗血作梗頭痛

醫通卷十一 產後諸痛

諸藥不効用大附子一枚醃醋一碗用火四畔炙透
蘸醋令盡去皮臍加川芎等分並為末每服錢半或
二錢茶清調下○偏正頭風作痛川芎茶調散去白
芷加細辛黑豆淋酒煎乘熱熏患處候溫服之如左
半邊惡寒腦後掣痛者本方去白芷加歸芍右半邊
畏寒兩太陽引痛者本方去白芷加參耆千金治產
後中風頭痛手背逆冷白朮三兩附子一枚獨活一
兩生薑三兩豆淋酒煎服婦人患頭風者常居其半
每發必掉眩如在車船上皆因血虛邪運動其痰

二陳加當歸黃芩羌活防風不應加烏頭石膏挾氣
虛者必加黃耆然崩傷產後吐血衄血並令人眩暈
當隨所因而治○感氣而胃口作痛養胃湯因氣而
心腹痛降氣散感寒而痛甘草乾薑湯加焦白朮桂
枝有食積實理中加炮黑山查○產後惡血上攻心
痛為陰血虧損隨火上衝心絡名心胞絡痛宜理中
加當歸產後惡露未淨胸腹作痛或小便不利琥珀
地黃丸溫散之產後心痛大寒嘔逆不食千金蜀椒
湯產後心痛乾嘔吐涎沫大岩蜜湯若真心痛旦發

醫通卷十一 產後諸痛

夕死夕發旦死瘀血上衝用失笑散一錢童便調下
即定血既散而仍痛增損四物湯調補之○脇痛宜
分左右蓋左屬血血藏於肝肝傷有死血故痛小柴
胡去芩加丹皮香附薄桂當歸童便右屬脾脾有痰
積於脇則痛補中益氣去升麻加葛根半夏茯苓枳
殼生薑左右俱痛者屬虛補中益氣加桂下六味丸
○腹痛惡露已淨者下焦虛寒也六味丸加桂如痛
定於一邊及小腹者此是側臥敗血留滯所致四烏
湯加蓬朮有產後腹痛服上藥不應而喜溫喜按者

屬虛屬寒。寒則理中加肉桂。當歸虛則金匱當歸生薑羊肉湯。隨證加增。神驗。產後三日腹痛。補中益氣。強力消血。羊肉生地黃湯。若腹中疝痛。畏寒少食。大劑人參阿膠生薑煎服。効此。卽仲景當歸生薑羊肉湯之變法也。若痛而惡心。或欲作嘔。六君子加炮薑。有瘀加莪朮桃仁炮黑山查。若泄瀉腹痛。後重。補中益氣加木香炮薑。若胸膈飽脹。或惡食吞酸。或停惡露。至夜發熱。讖語腹痛。手不可按。此是飲食所致。當用二陳加枳朮查肉。虛人枳實理中加肉桂炮查發。

醫通卷十一 產後諸痛

无

熱腹痛。按之痛甚。不惡食。不吞酸。此是瘀血停滯。四烏湯加蓬朮肉桂。若止是發熱頭痛。或兼腹痛。按之却不痛。此是血虛。四物加艾附著桂。若腹痛脇脹。此氣寒不能溫養肝血。當歸乾薑香附肉桂丹皮茯苓。入鹽少許。熱服。產後下血不盡。腹內堅痛。不可忍。者甘草乾薑當歸芍藥桂心桃仁山查煎服。產後少腹作痛。俗名兒枕塊。古法用失笑散及四物加莪朮山查。產後崩中去血。赤白相兼。或如豆汁。千金伏龍肝湯能溫脾胃。涼肝血。其効如神。若惡露既去。而仍

痛。四神散調補之。小腹痛。當視去血多少。如敗血凝滯。有塊而痛者。醋煎散無塊者。四烏湯。須看人虛實酌用。產後臍腹作痛。冷氣乘虛也。內補當歸建中湯。產後腰痛者。因產勞傷腎所致。十全大補湯加附子。產後惡露漸少。忽然不來。腰中重痛。下注兩股。痛如錐刺入骨。此由敗血流滯。經絡不卽通之。必發癰疽。局方調經散加陵鯉甲水煎。日三服。以痛止爲度。琥珀地黃丸亦宜。下瘀血湯代抵當丸。皆可取用。切勿誤用五積散等辛溫之藥。丹溪云。局方五積散。

醫通卷十一 產後諸痛

三

治產後瘀血作痛。以蒼朮爲君。麻黃爲臣。厚朴枳殼爲使。雖有歸芍之補血。僅及蒼朮三分之一。不思產後之婦。有何寒邪。血氣未充。似難發汗。不過借藥性溫和。可以推陳致新。豈可用麻黃之悍。蒼朮厚朴之燥乎。虛而又虛。禍不旋踵矣。泄瀉。產後泄瀉。其因有五。一者因胎前泄利未止。產後尤甚。一者因臨產過傷飲食。產後滑脫。一者因新產驟食肥腥。不能尅運。一者因新產煩渴。恣飲水穀。混亂。一者因新產失護。臍腹藏府受冷。其致瀉之

由雖異一皆中氣虛寒傳化失職之患。宜理中湯為主。食加枳實山楂。水加桂心茯苓。虛加桂附倍參。寒加桂附倍薑。久瀉腎虛加桂心熟附。痰結不行加炮查歸身。若見完穀不化。色白如糜。此脾胃大虛。元氣虛脫之候。十有九死。惟猛進溫補之劑。庶可挽回。即有煩躁發熱。面赤脈來數大。皆虛火上炎之故。當并進桂附人參甘葛苓朮之類。伏龍肝煮湯代水煎服。仍得收功。若小便混濁如泔。或大便中有白沫如腸垢者。乃元氣下陷之故。並宜補中益氣。加桂苓炮

醫通卷十一 產後 腫

薑升舉之。或臭水不止。加斬艾香附吳茱萸。若兼痰結不通。腹脹喘急。神丹不能復圖也。
浮腫。○腫脹腹大筋青。小便不利。必食生冷。傷滯瘀血也。若用利水藥。病必轉劇。理中湯加木香肉桂蓬朮。身腫或腹大如鼓。四七湯加木香嗽者。忌木香。用炮薑灰。而腫下不腫。屬風宜發散。紫蘇飲加防風。下腫上不腫。屬溼宜利小便。紫蘇飲加木通。四肢與頭面腫甚。氣食也。紫蘇飲加消導藥。有血兼破血藥。停血不散。腹腫喘滿。夜甚於晝。四烏湯加蓬朮。若足忽

腫者乃溼熱注病。恐成脚氣。當歸拈痛湯。若紅腫而痛。恐生腫毒。則以膚熱與不熱為辨。○產後敗血乘虛停積。循經流入腿脇。留滯日澁。故令面目四肢浮腫。宜調血為主。醫者不識。便作水氣治。以導水之藥。必危。夫產後既虛。又以藥虛之。是謂重虛。往往多致夭枉。但多服局方調經散。或四神散。加蓬朮桃仁肉桂。穿山甲。血行腫消。則愈。陳無擇云。若風邪乘於氣分。皮膚腫而浮虛。乃邪氣有餘也。若皮膚腫其形色如熟李者。乃水也。水腫者宜利小便。氣腫者宜發汗。

醫通卷十一 產後 浮腫諸血

諸血。○產後鼻衄。乃氣血逆行所致。紫蘇飲入童便。荆芥灰。如口鼻黑氣起。而衄者難治。初產時口中血溢。出暴或吐血。嗽血。各血氣衝心。四物加延胡木香。炮薑。產久惡露已淨。吐咯。欬血者。治與平人同。產後血崩。因經脈未復。而勞碌惱怒。或犯房事。多成此候。若小腹滿痛。肝經已傷。最為難治。若血滯小腹脹滿。四烏湯加蓬朮肉桂。血少小腹空痛。四物加丁香膠艾。肝火迫血妄行。加味逍遙散。脾鬱不能統血。加味歸脾湯。脾虛不能攝血。補中益氣湯。厚味積熱傷血。

清胃散加炮查。風熱相搏傷血。四君子加防風枳殼。惡寒嘔吐。大便頻瀉。六君子加炮薑。下焦虛寒不能。統血漏下。色晦及痰淡不止。千金芎藭湯。鹿茸散。選用。

月水不通。○乳子過歲而乳母經行是其常也。若兒半歲而母經行。有血盛血熱之分。血熱者宜涼血。四物加續斷條芩。不乳者不在此例。若兒二三歲。其母經不行而無疾。不必服藥。若肢體倦怠。食少內熱。是血少也。宜逍遙散加參耆。以健脾胃。若以藥通之。則

醫通卷十一 產後諸血 月水不通 諸淋

誤矣。若脾胃虛弱。六君子湯加當歸。若兼鬱火傷脾。歸脾湯加丹皮。山梔。若怒火傷血。柴胡四物湯。氣血俱虛。八珍湯加丹皮。

諸淋。○淋因熱客於脬。虛則頻數。熱則瀉痛。氣血兼熱。血入胞中。則血隨小便出。而為血淋也。若膀胱虛熱。六味丸。若陰虛而陽無以化。腎氣丸。蓋土生金。金生水。當滋化源。若少壯元氣實強者。用滑石通草。車前。葵子。瞿麥。蒲黃。漿水煎服。乳汁。○產後三朝五更發寒熱。名曰蒸乳。若產後乳

雖腫而響。作者須服清利之藥。則乳自行。仍以美臙引之。○產後乳汁自出不止。乃胃氣虛。宜服五味異功散。加黃耆五味。以攝之。若乳多滿。急痛者。用溫扇。射之。○新產兒未能吮乳。乳汁蓄結。與血氣相搏。而壯熱大渴。通乳。服硬掣痛。名曰妬乳。當以手搗去宿乳。或吮去。尤妙。并以貝母。栝蒌。實。甘草。節。木通。煎服。初產因子不肯蒸乳。而發寒熱。作痛者。俗名乳膨。用斷乳法。以四烏湯加炒麥芽。一兩。即止。不然。恐內結成癰。多致潰膿。亦有乳囊潰。而成危候者。不可不知。

醫通卷十一 產後乳汁

○若有子而乳不下者。通草八錢。黃豬蹄湯飲之。白蝦汁亦妙。乳母氣血虛而不能蒸乳。八珍湯加黃耆。麥冬。肺胃虛寒而乳不通者。千金鍾乳湯。寒熱不均。氣道阻逆而乳不通者。麥門冬散。有熱去鍾乳。加漏蘆。因怒火者。逍遙散加參耆。麥冬之類。凡產不蒸乳者。後必有變。須預言之。元氣壯實者。不在此例。○吹乳腫痛。速用栝蒌實一枚。連殼搗爛。甘草節一寸。乳香一錢。煎成。加溫酒服。服後側臥於床。令藥氣行外。以天南星生末醋調敷。以手揉之。自散。

瘡
金匱云少陽脈滑而數者陰中生瘡陰中蝕瘡爛者
狼牙湯洗之

少陰脈滑而數熱結下部也治用狼牙煮湯纏著
如繭浸瀝陰中日四遍以解毒殺蟲但用一味以
取專功蓋此證多患於痿癭證必欬逆經閉骨蒸
寒熱凡見頰赤中有白斑下脣紅中白點皆陰蝕
之候雖用上法及服降火滋陰藥終歸必亡此情
志之病非藥可治故仲景但用外法絕不及於湯

醫通卷十一 瘡瘍

三

藥厥有旨哉

胃氣下泄陰吹而正喧此殺氣之實也豬膏髮煎導
之
導之者服之使病從小便而出非外用導引之謂
詳陰吹正喧婦人恆有之疾然多隱忍不言以故
方書不載醫不加察金匱明言胃氣不清殺氣之
實所以腹中喧響則氣從前陰吹出如失氣之狀
第用豬膏髮煎之治難於推測近余治一僕人之
婦經閉三月少腹痛貫徹心而見前證不已與失

笑散一服瘀血大下遂不復作又治一貴顯之婦
小產後寒熱腹痛亦有前證與炮黑燻肉熬焦黑
糖為丸用伏龍肝煮水澄清煎獨參湯送三錢一
服結糞大下再進瘀血續行而前證頓止始悟豬
膏髮煎皆為逐瘀而設雖皆未用其方而實不離
金匱之法也

瘰癧○婦人瘰癧多因憂思鬱怒傷損肝脾累累然
如貫珠多生於耳之前後項側胸脇間若寒熱腫痛
乃肝經氣鬱而為病不可峻用痰藥加味逍遙散若

醫通卷十一 瘰癧

三

寒熱既止而核不消乃肝經之血亦病四物湯加白
朮茯苓柴胡月皮若飲食減少經事不調為脾胃虧
損六君子加香附丹皮柴胡當歸若初生如豆粒附
著於筋肉色不變而後漸大腫痛內熱口乾精神倦
怠久不消瘡乃肝脾虧損逍遙散歸脾湯健脾土培
肝木切不可輕用散堅追毒之劑誤下之必犯病禁
經禁若久潰脈浮大邪火盛也面色皎白金剋木也
皆難治○凡風木之病但壯脾土則木自不能剋矣
若行伐肝則脾胃先傷而木反來侮土矣

結核。婦人結核皆因鬱怒虧損肝脾觸動肝火所致。非但婦人多鬱患此。則小兒胎中受母氣之鬱。生後至七八歲外。往往有之多。結於項側耳前後。或發寒熱。屬膽經風熱。怒火。柴胡清肝散。加鈎藤。山梔。以清肝火。若結於肉裏。其色不變。晡熱。內熱。屬肝火。血虛。加味逍遙散。或結於肢節。或累累如貫珠。其色不變。亦肝火血燥而筋攣。小柴胡加鈎藤。佐以六味丸。若時消時作。此氣滯而痰結也。用歸脾六君二湯。以調和脾胃之氣。外用一味香附。吹唾調作餅艾灸。

醫通卷十一 結核

乾即易之。勿令傷肉。常灸自消。丹方治痰核。用貝母全蠍。連皮胡桃肉。各百枚。同搗蜜丸。空心。日服彈子。大二三丸。効。又方。用羯羊角。磁片刮下。爲末。或舊明角。琉璃刮下。爲末。尤良。每筋入貝母四兩。全蠍二兩。蜜丸。空腹服三錢。外用皂莢肉。入鯽魚腹中。煨灰存性。蜜和醋調塗。大効。若潰而肉不腐。或肉不生。或膿水清稀。肌寒肉冷。白汗盜汗。寒熱。內熱。面色痿黃。食少。體倦。便利不調者。五藏皆虛也。但用補中六君益氣養營等湯。調補脾胃。則各證自退。故經云。氣傷痛。

形傷腫。慎不可輕用行氣破血之劑。

流注。婦人流注。多因憂思鬱怒。虧損肝脾。以致營氣不從。逆於肉裏。或因腠理不密。外邪客之。或溼痰流注。或跌蹠血滯。或產後惡露凝積。蓋氣流而注。血注而凝。或生於四肢關節。或留於胸腹腰髀。或結塊。或漫腫。皆屬鬱火。急用葱熨法。內服益氣養營湯。未成。自消。已成。自潰。須久服。無間。自然收功。若久而腫起。作痛。肢體倦怠。病氣有餘。形氣不足。尚可調治。若漫腫微痛。屬形氣病氣俱不足。最爲難治。或不作膿。

醫通卷十一 流注

或膿成。不潰。氣血虛也。人參養營湯。憎寒畏寒。陽氣虛也。十全大補湯。晡熱內熱。陰血虛也。四物加參。米作嘔。欲嘔。胃氣虛也。六君子加炮薑。食少。體倦。脾氣虛也。補中益氣。加茯苓半夏。四肢逆冷。小便頻數。命門火衰也。八味丸。小便頻數。痰盛。作渴。腎水虧損也。六味丸。加麥門冬。月經過期。多日不止。肝脾虛也。八珍加柴胡。丹皮。凡潰而氣血虛弱。不斂者。十全大補煎膏服之。久潰而寒邪凝滯。不斂者。豆豉餅散散之。其潰而內有膿管。不斂者。用藥腐化之。若不補氣血。

不節飲食不慎起居不戒七情或用寒涼尅伐俱不
治

乳癰乳巖。婦人乳癰有內吹外吹上逆下順之異
總屬膽胃二經熱毒氣血凝滯故初起腫痛發於肌
表肉色嫩赤其人表熱發熱或發寒熱或憎寒頭痛
煩渴引飲加味逍遙散加括蕪霜若至數日之間膿
成滿袋刺膿湧出膿盡自愈若氣血虛弱或誤用敗
毒久不收斂膿清脈大非大劑開鬱理氣溫補氣血
不能收功。丹方治乳癰初起用蒲公英草搗汁和

醫通卷十一 乳癰乳巖

陳酒服以洋救腫處即消然此施於蒸鬱之人輒効
若高粱七情內鬱所致者良非所宜當用鹿角磁條
刮屑加麝香溫酒調服若肥盛多痰鬱滯者用橘皮
穉碎如豆大湯泡淨以飛羅麩拌炒去麩爲末黑糖
調二錢醇酒服之又方用蟹殼煨存性醇酒服三錢
又乳房癰腫用貝母括蕪實甘草節各三錢煎服効
已潰加忍冬一兩佳。乳巖屬肝脾二藏久鬱氣血
虧損故初起小核結於乳內肉色如故其人內熱夜
熱五心煩熱肢體倦瘦月經不調益氣養營湯加味

逍遙散多服漸散氣虛必大劑人參專心久服其核
漸消若服攻堅解毒傷其正氣必致潰敗多有數年
不潰者最危潰則不治則季芝云乳癰乳巖結韃未
潰以活鮑魚同生山藥搗爛入麝香少許塗塊上覺
癢極勿搔動隔衣輕輕揉之七日一塗旋塗漸消若
存再歲月以致潰腐漸大類巖巖色赤出水深洞臭
穢用歸脾湯等藥可延歲月若誤用攻伐危殆迫矣
曾見一婦乳房結核如杯數年諸治不効因血崩後
日服人參兩許月餘參盡二劬乳核霍然

醫通卷十一 乳癰乳巖

陰瘡。婦人陰瘡乃七情鬱火傷損肝脾。淫熱下注
其外證有陰中舒出如蛇俗呼陰挺有翻突如餅俗
呼陰團亦有如雞冠如鼠乳亦有生諸毒腫痛淫癢
潰爛出水脹悶脫墜者其內證口乾內熱體倦經候
不調飲食無味晡熱發熱胸膈不利脇腹不調小腹
痞脹赤白帶下小水淋瀝其治法腫痛者四物加柴
胡山梔丹皮膽草淫癢者歸脾湯加山梔柴胡丹皮
淋瀝者龍膽瀉肝湯加白朮丹皮潰腐者加味逍遙
散腫悶脫墜者補中益氣加山梔丹皮佐以外治之

法可也。若陰中有蟲癢痛。乃肝經溼熱。此惟獨陰無陽鬱火內蘊所致。患此者必骨蒸潮熱。經水不調。乾欬吐紅。面赤聲啞。雖日用開鬱降火之藥。多不能愈。大抵五志之病。非藥可醫。而失合證治尤難。外治之法。以桃仁研膏。和雄黃末。輕粉。塗指肝納陰中。并用肥湯煎苦參洗滌。或以鯽魚膽塗之。然旋治旋發。如菌帶生蟲。不腐不止。又有交接時。輒出血作痛。此肝傷而不能藏血。脾傷而不能攝血也。多用加味逍遙散。加肉桂。或歸脾湯。下加減八味丸。自愈。

醫通卷十一

陰毒

四

嬰兒門上

脈法

小兒三歲已內。看虎口食指寅卯辰三關。以驗其病。脈紋從寅關起。不至卯關者。易已。若連卯關者。難愈。若寅侵卯。卯侵辰者。最劇。其脈紋見五色。如因驚必青。熱則赤。風熱瀉利。色紫。當以類推之。又紋色顯而有紫紆者。為有胃氣。易治。紋色細淡而直如刀刃者。乃正氣之虛。難治。紋上另有一點如流珠者。為宿食。紋傍另有一條如絲縷者。為風痰。紋斜向內者。易

醫通卷十一

脈法

四

已斜向指甲者。難愈。三歲後。則以一指轉側辨其脈。五六歲後。脈六七至。為平脈。浮為風。浮大而數。為風熱。沉細為寒。沉澇為傷食。伏結為物聚。微細為疳積。為腹痛。浮而洪。為有熱。浮而遲。為有寒。弦急為氣不和。促結為虛驚。脈亂不治。此論脈之大端也。

面目證

左腮屬肝。右腮屬肺。額上屬心。鼻屬脾。頤屬腎。青主驚積不散。紅主痰積驚熱。黃者食積癥癖。白主泄瀉。水穀。黑主腎氣受傷。○目內赤者。心實熱。淡紅者。心

虛熱。青者肝實熱。淡青者肝虛熱。黃者脾實熱。白而
混者肺實熱。目無精光者腎虛也。若目無大眚者。五
藏皆不滿。兒多不育。

五藏虛實寒熱

心主驚。實則叫哭發熱。飲水而痛。虛則困卧而悸。心
熱則合面睡。或上竅咬牙。心氣實則喜仰卧。肝主
風。實則面青目直。叫哭壯熱。項急頓悶。虛則咬牙呵
欠。肝熱則手循衣領及亂捻物。壯熱飲水喘悶。肝有
風則目連劄。得心熱則發搐。或筋脈牽掣而直視。肝

醫通卷十一 面目證 五藏虛實寒熱

熱則目赤兼青則發搐。風甚則身反張強直。脾主
困實則身熱引飲。虛則吐瀉生風。若面白腹痛口中
氣冷不思飲食。或吐清水者。脾胃虛寒也。呵欠多睡
者。脾氣虛而欲發驚也。肺主喘。實則悶亂氣急喘
促。飲水虛則哽氣出息。肺熱則手扞眉目鼻面。肺盛
復感風寒則胸滿氣急喘嗽。上氣肺藏怯則唇白若
悶亂氣粗喘促。哽氣者。肺虛而邪實也。腎主虛。皆
胎稟虛怯。神氣不足。目無精光。面白顛解。此皆難育
雖育不壽。或口畏明下窺者。蓋骨重則身縮也。咬牙

者。腎水虛而不能制心火也。惟痘瘡有實則黑陷證。
乃邪火亢盛。非正氣之實也。

變蒸

小兒變蒸。變者變其情智。蒸者蒸其血脈。大抵三十
二日為一變。每經變畢。則情智異常。全嬰方論云。變
蒸者。以長氣血也。變者。上氣蒸者。發熱。輕則體熱。虛
驚耳冷。飢冷微汗。唇生白泡。三日可愈。重者。寒熱脈
亂。腹疼啼叫。不能乳食。食即吐。五七日方愈。變蒸之
時。不欲驚動。當其時。有熱微驚。慎不可治。及灸刺。但

醫通卷十一 變蒸

孰視之。若良久不已。少與紫丸微下。熱歇便止。若於
變蒸之中。加以時行溫病。或非變蒸而得時行病者。
其證皆相似。惟耳及尻通熱。口上無白泡。當先服黑
散。以發其汗。汗出。溫粉粉之。熱歇便瘳。若猶不除。乃
與紫丸微下之。小兒稟虛之所不免。勿藥可也。嘗見
小兒變蒸發熱。有痰。投以抱驚丸。卒至不救。若不熱
不蒸。畧無證候。而胎變者。稟氣壯實故也。

胎證

小兒胎證。謂胎熱。胎寒。胎黃。胎肥。胎弱是也。胎熱者。

生下有血色旬日之間目閉面赤眼胞腫啼叫驚煩壯熱溺黃大便色黃急欲食乳此在胎中受熱及膏梁內蘊宜用清胃散之類胎寒者初生面色晄白啼聲低小或手足攣屈或口禁不開此母氣虛寒或在胎時母過食生冷或感寒氣宜用五味異功散之類胎黃者體目俱黃小便秘澀不乳啼叫或腹膨泄瀉此在胎時母過食炙煨辛辣致生熱宜用瀉黃散之類胎肥者肌肉稟厚目睛粉紅彌月後漸瘦五心煩熱大便不利口吻流涎此受母之胃熱所致也乳

醫通卷十一 胎毒

四十五

母服大連翹湯兒亦飲少許以疏利之胎弱者面無精光肌體瘦薄身無血色大便白水時時哽氣及噦因父氣不足者六味地黃丸因母氣不足者八珍湯母子並服近世初生小兒槩與化毒丹及黃連犀角貝母甘草硃砂之屬殊不知惟身面皆赤胎稟多熱毒者為宜若身面皆白胎稟虛寒本來少毒者服之反伐其始生之氣多致夭枉常用連皮胡桃肉三枚研極爛椒鹽核三枚燒存性明雄黃研細水飛淨三分甘草煎濃汁和生白蜜數匙研勻攪去滓時時

服引出腎藏之毒嘗見服此者多不出痘即出亦稀而無苦寒傷胃之患可不辨虛實寒熱而漫投化毒之劑乎

胎毒

小兒初生其身如有湯瀆火傷者皆母過食膏粱所致母服清胃散逍遙散清其氣血兒亦常飲數滴有身無皮膚而嫩赤發熱者皆由產母胃中火盛也用熟石膏末加珍珠粉撲之亦有因父遺毒所致當從徽瘡毒治夏月以兒卧蕉葉上尤良有身無皮膚而

醫通卷十一 胎毒

四十六

不嫩赤者皆由產母脾肺不足也以參耆末加珍珠粉撲之脾主肌肉肺主皮毛故知病脾肺也子母俱服保元湯如腦額生瘡者火土相合溼熱攻擊隨海也難治脚上有瘡者陰虛火盛也不滿五歲而死如未滿月而撮口握拳腰軟者此肝腎中邪勝正弱也三日內見者必不治如男指向裏女指向外尚可治鈎藤散主之

禁風撮口臍風

小兒初生禁風者胎中受熱毒流心脾生下復為風

邪所搏致眼閉口噤啼聲不出舌上如粟口吐白沫
七日內見者百無一生○撮口者因胎熱兼風自臍
而入心脾致面目黃赤氣息喘急聲不出舌強唇青
口撮腹脹急於額門灸七壯灸之不哭弔腸吐沫者
不救○臍風者因斷臍之後為水溼風邪入於心脾
致腹脹臍腫四肢厥直啼不吮乳甚則撮口發搐七
日內患者最危宜用麝香蠟尾銅絲輕粉辰砂為散
薑湯調服若臍邊青黑撮口噤是為內痛不治若
齒齲有泡如粟挑破即開不必用藥

醫通卷十一 噤風撮口臍風

急欲乳

急欲乳不能食者此風邪由臍而蘊心脾致舌乾唇
燥不能吮乳也○因外邪而唇口撮緊者名臍風多不
可救若心脾有熱舌尖痛不能吮乳者以柳華散敷
之目閉口噤啼聲不出吮乳不得而吐沫者辰砂膏
塗乳令兒吮之若舌下腫如小舌者或舌絡牽痛或
齒齲患白星俱用線鍼刺出血亦效柳華散凡鍼
車舌以鍼向外橫挑底尖細脈不可傷其本絡輕則
言語不清重則血出而死若暴病發熱作渴飲冷口

舌生瘡大便秘結瀉黃散若病後發熱口渴飲湯大
便不實異功散或口角流涎或痰氣壅盛脾不能攝
也六君子湯若兒自食甘肥或母食酒麪致兒口舌
生瘡清胃散

弄舌

脾藏虛熱令舌絡牽索時時微露而即收者名弄舌
屬心脾虧損溫脾散有熱人參安胃散舌舒長而良
久不收者名吐舌乃心脾積熱或兼口舌生瘡作渴
飲冷屬胃經實熱並用瀉黃散若飲水者脾胃虛而

醫通卷十一 急欲乳 弄舌

津液少也兼面黃肌瘦五心煩熱者疳瘦也胡黃連
丸大病未已而弄舌者凶

遊風猴疔

丹瘤之證俗名遊風因胎毒客於腠理搏於氣血發
於皮膚其赤暈遊走者乃血隨風熱也若發於胸脇
遊走四肢者輕發於頭面四肢延及胸背脇腹者重
○千金云赤遊風腫若蠶身人心腹者即能殺人伏
龍肝為細末雞子白和傅勿令乾或加髮灰豬膏傳
之古人云從四肢起入腹囊者皆不治當令人用力

於各患處遍吮毒血各聚於一處急取出之。內服小劑活命飲。惟百日內禁食。若肚腹膨脹。二便不通。毒入內也。用大連翹湯。亦有生者。或用雄黃二分。硃砂一分。水飛生蜜水調勻。隔湯溫熱常服。數匙得瀉。其毒便解。在小腹脇上陰囊等處。忽紅腫如霞。流行不定。不止一處者。用白朮胡桃七箇。連殼。大川連一錢五分。生甘草節去皮二錢。水煎。熱陸續勸服。鄉村不便醫藥者。以生萊菔搗汁塗之。亦可灌服。數匙。更以萊菔滓包烘。煖。裏紅腫處。○猴疔者。狀如

醫通卷十一 遊風猴疔

完

圓癰。色紅從鬢而起。漸及遍身。四圍皮脫。中露赤肉。醫疔若猴之狀。乃胎中毒邪。畜於腎藏而發。不急治必死。用大川連生甘草各六分。乳香沒藥並炙。雄黃水飛各四分。青黛研淨。硃砂水飛各分半。西牛黃一分。各為細末和勻。每服分半。蜜調。燈心湯下。日三夜二服。外用淨青黛二錢。黃蘗末微炒。閉口連翹炒。黑人中白火煨醋淬。各一錢。土貝母去心炒。褐色五錢。為末和勻。臨用入西牛黃水片各半錢。麻油調。傅神效。

胎驚

小兒胎驚者。因妊娠飲酒。忿怒驚跌。或外挾風邪。內傷於胎。兒生下即病也。若月內壯熱。翻眼。握拳。噤口。出涎。腰強。搐掣。驚怖。啼叫。頸縮。顛開。頰赤。面青。眼合者。當疎風利驚。化痰調氣。及貼顛法。若面青。拳搐。用鈎藤散。切不可誤作脾風。妄用溫藥。若眉間色赤。或虎口指紋曲裏者。可治鈎藤散。加全蠍。若眉間青黑者。不治。大抵小兒藏府脆弱。不可輒用銀粉。鎮墜之劑。反傷真氣。多致不救也。

醫通卷十一 胎驚 目睛蠕動

平

目睛蠕動

目者肝之竅也。肝膽屬風木。二經兼為相火。肝血不足。則風火内生。故目睛為之蠕動。經曰。曲直動搖。風之象也。宜四物湯滋其血。柴胡山梔清其肝。陰血內營。則虛風自息。兼用六味丸以滋其源。若愈後驚悸不寐。或寐中發搐。呀牙。目睛蠕動者。血虛不能榮筋脈也。補中益氣倍歸。著凡病氣有餘。皆屬元氣不足。况此證兼屬肝脾。多為慢驚之漸。尤當審之。

唇口蠕動

脣為脾之華。陽明之脈環脣而交人中。是以脾胃虛者多有此證。不獨病後而已。夫脾主涎。脾虛則不能收攝。多兼流涎。或誤認為痰。而用祛逐之藥。則津液益枯。不能滋養筋脈。遂致四肢抽搐。病勢愈甚。原其治法。與慢脾風相同。當大補脾胃。六君子加升柴。切禁青皮龍膽草伐肝之藥。若兼四肢微搐。或潮熱往來。或泄瀉嘔吐。面色痿黃。皆脾胃有傷也。加黃耆當歸白芍。若脾氣下陷。而肝木侮之。當補中益氣。以升其陽。加苓半芍藥。制肝補脾。切不可用疎風治驚之

醫通卷十一 脣口燥

五

藥

發搐

驚癇發搐。多因乳母鬱怒。傳兒胎中。受患。或生後乳傷。驚恐致病。證多吐乳。面青。若痰實。乳積。則壯熱面紅。當兼調治其母。切不可損其元氣。驗其順逆。男則握拳。拇指入食指中。為順。於外。為逆。女則入食指。為逆。於外。為順。凡小兒忽然驚搐。目直者。皆肝經風熱。若肝虛生風。則目連劄而不搐。及多呵欠。咬牙。若肝經風實。則目直大斗。呵欠。項急。頓悶。若用經有

驚。目直視。不睛。得心熱。則搐。其證千循。衣領及肌。捻物。宜瀉肝熱。為主。凡病之新入。皆能引動肝風。風內動。則上人於目。故目為之連劄。若熱入於目。牽其筋脈。兩皆俱緊。不能轉視。故目直也。亦有飲食停滯。中焦。致清陽不升。濁陰不降。肝木生發之氣。不得升。致生風者。若胸滿。腹瀉。嘔吐。惡食。輕則消導化痰。重則探吐攻積。更須審其所傷。寒物熱物。亦有因感冒吐瀉。致土敗木侮。而生虛風者。不可遽服驚藥。若輒用之。反成其風。而益其病矣。○潔古云。傷風發搐。

醫通卷十一 發搐

五

當辨有汗無汗。用大青膏。小續命分治。薛按。前證若口中氣熱。搐而有力。屬形病俱實。宜大青膏以散風邪。若口氣不熱。搐而無力。屬形病俱虛。宜異功散以補脾土。六味丸以滋肝木。鈎藤飲以清肝火。因風邪鬱熱而變者。當理肺經清風。邪若外邪既解。而諸證不愈者。當實脾土。補肺金。若竟治其風。恐脾氣復傷。諸證蜂起矣。若傷食後發搐。身濇多腫。或吐不思食。宜先定搐。搗止白餅子下之。後與秘旨安神丸。若飲食停滯。嘔吐不食。腹脹便秘。若屬實熱。白餅子下。

之。若下後。搐熱益甚。嘔吐不食者。屬虛熱。異功散補之。若脾胃既傷。肝火所勝。六君子加鈎藤鈎以健脾胃。氣平肝木。大凡飲食既消而不愈者。但調補脾胃。則諸邪自退。百日內發搐。真者不過兩三次必死。假者。發不死。真者內生驚癇。假者外傷風冷。血氣未實。不能勝任。故發搐也。口中氣熱。大青膏及塗額法。并用大青膏加白礬。取三錢入桃枝一握煎水浴之。勿浴兒背。此即浴體法也。前證多因胎中受惠。或乳母鬱怒傳兒。或兒脾傷自病。當固元氣為主。凡搐頻。

醫通卷十一 發搐

五

者。風在表易治。宜發散。搐稀者。風在藏難治。宜補脾。

癩癇

錢仲陽云。小兒發癩。因氣血未充。神氣未實。或為風邪所傷。或為驚怪所觸。亦有因乳母七情驚怖所致。若眼直目牽。口噤流涎。腹膨搐弱。背項反張。腰脊強勁。形如死狀。或一時二時醒。若反折上竄。其聲如雞。屬肝抽搐有力。為實邪。紫胡清肝散。大便不通者。瀉青丸。陰虛地黃丸。若目睛吐舌。其聲如馬。屬心發熱。飲冷為實熱。硃砂安神丸。發熱飲湯為虛熱。辰砂妙。

香散。若目直腹痛。其聲如牛。屬脾。若發熱抽搐。仰面色光澤。脈浮。病在府。為陽。易治。加味導痰湯。身冷不搐。覆卧。面色黯黑。脈沉。病在藏。為陰。難治。六君子加木香。柴胡。若驚跳反折。手縱。其聲如羊。屬肺。面色痿黃者。土不能生金也。五味異功散。面色赤者。陰火上衝於肺也。地黃丸。若肢體如尸。口吐涎沫。其聲如豬。屬腎。地黃丸。用紫河車膏代蜜。九服。腎無瀉法。故悉從虛治。凡有此證。先宜看耳後高骨間。有青紫紋。爪破出血。可免其患。此皆元氣不足之證。須常用六。

醫通卷十一 癩癇

五

味九加鹿角膠。或八味丸。用鮮河車膏代蜜。以助先天。更以六君子補中益氣。以助後天。設若泛行。尅伐復傷元氣。則必不時舉發。久而危殆。多致不救。凡癩癇。虎口脈亂。乃氣不和也。脈紋見有五色。由其病甚。色能加變。至於純黑者。不可治也。

睡中驚動

小兒睡中驚動。由心腎不足所致。蓋藏府脆弱。易為驚恐。夫人之神氣。寤則行於目。寐則棲於腎。今心腎既虛。則不能寧攝精神。故睡中驚動也。治宜清心安。

亦有驚嚇而作者。因擊動其肝。故魂不安也。宜抱龍丸以豁痰鎮驚。若食鬱生痰。驚動不安者。用四君子以健脾。加神麴半夏以化痰。山梔柴胡以清熱。

目動咬牙

小兒驚後。目微動咬牙者。皆病後亡津液。不能榮其筋脈也。亦有肝經虛熱生風者。宜審其氣血有餘不足而治之。其日中發熱飲冷而動者。氣有餘也。瀉青丸。夜間盜汗及睡不寧而動者。血不足而肝腎有熱也。地黃丸。或因肝經風邪傳於脾腎者。亦令咬牙先

醫通卷十一 睡中驚動 目動咬牙

用柴胡清肝散。次用五味異功散。六味地黃丸。若因脾胃虛熱。補中益氣加芍藥山梔實熱瀉黃散。以牙齦屬手足陽明故也。

搖頭使血

經曰。諸風掉眩。皆屬於肝。肝屬木。木得風則搖動。乃肝經火盛而生虛風也。使血者。風木搖動。則土受凌虐而不能統血也。或因乳母恚怒。風熱熾盛。肝木傷脾。使清陽不升。亦有風邪侵入大腸者。治法若因風熱。柴胡清肝散。若因怒火者。小柴胡湯加白芍丹皮。

若清氣不升。脾氣下陷者。補中益氣湯。肝經血熱妄行者。六味地黃丸。脾土不能培肝木者。六君子加柴胡鈎藤鈎。

偏風口噤

小兒偏風者。少陽厥陰肝膽二經證也。口噤者。由風木太甚。而乘於脾。則筋燥而急。然燥令主於收斂。勁切或左或右。其因一也。若足陽明胃經氣虛。風邪所乘。其筋脈偏急者。屬內因。若脾肺虛弱。痰理不密。外邪所乘。或吐瀉後。內亡津液。不能養肝。致口眼喎斜。

醫通卷十一 能頭使血 偏風口噤

皆屬肝血不足。內火生風。宜滋腎水養肝血。壯脾土。治法脾胃虛而動風者。異功散加柴胡鈎藤鈎。肝肺虛而外邪所乘者。鈎藤飲。若兼目緊上視。寒熱往來。小便淋瀝。面青腸脹。皆肝經本病也。或唇口喎斜。腹痛少食。目胞浮腫。面色青黃。肢體倦怠。皆肝木乘脾證也。當審五藏相勝而主之。設執其見證。繫投風藥。反成壞證矣。

角弓反張

角弓反張。即是瘧病。經脈空疎。虛風襲入。而致筋脈

拘急或因驚駭停食肝脾受困內動虛風皆能致此
若身反張強直發熱不搐者風傷太陽也人參敗毒
散小續命湯因驚咳目直呵欠項強頓悶者為木風
內病鈎藤散因暴怒擊動肝火者瀉青丸若服前劑
其證益甚者此邪氣已去而脾氣虧也異功散加芎
歸補之若氣血素弱或服攻伐之劑而手循衣領咬
牙呵欠者肺經虛甚也兼進六君子地黃丸補之

急驚

錢氏云小兒急驚因聞大聲或驚而發搐搐止如故

醫通卷十一 角子及張 急驚

此熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱二便黃赤甚
則發搐蓋熱盛生風陽盛而陰虛也經曰熱則生風
風則痰動痰熱客於心膈間風火相搏故抽搐發動
當用抱龍丸瀉青丸除其痰熱不可用巴豆之藥
全善云急驚屬木火土實木實則搐有力及目上視
火實則動劇頻眩土實則身熱而赤而不吐瀉偃睡
合睛治法宜涼宜瀉用利驚丸等亦有因驚而發者
牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顛動唇口眉毛
眨引口中熱氣煩赤唇紅二便秘結脈浮洪數紫此

內有實熱外挾風邪當截風疔搐若痰熱尚作仍微
下之痰熱既泄急宜調養脾氣此肝膽血虛火動生
風蓋風生則陰血愈散陰火愈熾若屢服祛風化痰
瀉火辛散之劑不愈便宜認作脾虛血損急以六君
子湯補其脾胃否則必變慢驚也急驚而見目睛翻
轉足擺跳搐忽大叫吐逆藥不得入搐鼻無嚏者不
治

慢驚

錢氏云小兒慢驚因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃

醫通卷十一 慢驚

肢體逆冷口鼻氣微手足癱瘓昏睡露睛此脾虛生
風無陽之證也因吐瀉脾肺俱虛肝木所乘或急驚
屢用瀉熱則脾損陰消遂變慢驚而致癱瘓微搐
全善所謂木虛則搐而無力火虛則身寒口中氣冷
土虛則吐瀉睡而露睛治宜溫補脾胃六君子薑桂
燉尾或兼夾熱夾食夾痰與外感證相似者當審其
因而治之大率吐瀉痰鳴氣喘眼開神緩昏睡露睛
驚跳搐搦乍發乍靜或身熱肢冷面淡唇青其脈沉
遲微緩者是也當溫補脾氣為主佐以安心制肝藥

若稟賦不足。或久病脾虛。及常服剋伐之藥者。多致此證。若因土虛不能生金。金不能平木。木來侮土。致成慢驚者。五味異功散。加當歸。棗仁。鈎藤。以補土平木。若脾土虛寒者。六君子加烏頭。蠅尾。泄瀉加炮薑。木香。不應急加附子。以回陽氣。凡元氣虧損。而致昏憤者。急灸百會穴。若待下痰不愈。而後灸之。則元氣脫散。而不救矣。此乃藏府傳變已極。總歸虛處。惟脾受之。無風可逐。無驚可療。因脾虛不能攝涎。故津液妄泛。而似痰者。當依前法。自効。若不審其因。泛用祛

醫通卷十一 慢驚

手九

風化痰之劑。反促其危也。每見小兒脾胃弱者。一病即成慢驚。不可泥為久病。誤藥而後始成也。內經謂之慢脾風。意可見矣。慢驚而見目不轉睛。痰鳴如拽鋸聲。項軟身冷。粘汗手足。一邊牽引者。不治。○喻嘉言曰。小兒初生。以及童幼。肌肉筋骨。藏府血脈。俱未充長。陽則有餘。陰則不足。故易於生熱。熱甚則生痰。生風。生驚。亦所恆有。設當日直以四字立名。曰熱痰風驚。則後人不眩。因四字不便立名。乃節去二字。後人不解。遂以為奇特之病。且謂此病有八候。以其頭

搖手動也。而立抽掣之名。以其卒口噤脚攣急也。而立目邪心亂。搐搦之名。以其脊強背反也。而立角弓反張之名。相傳既久。不知其妄造。遇此等證。無不以為奇特。而不知小兒之腠理未密。易於感冒風寒。病則筋脈牽強。因筋脈牽強。生出抽掣搐搦。角弓反張。種種不通名目。而用金石藥。鎮墜外邪。深入藏府。千中千死。間有體堅證。輕得愈者。又詫為再造奇功。遂至各守門戶。雖日殺數兒。不自知其罪矣。如方書中有云。小兒八歲以前。無傷寒。此等胡言。竟出自高明。

醫通卷十一 慢驚

六

偏足為驚風之說。樹幟曾不思小兒不耐傷寒。初傳太陽一經。早已身強多汗。筋脈牽動。人事昏沉。勢已極於本經。湯藥亂投。死亡接踵。何由見其傳經解散。耶。此所以誤言小兒無傷寒也。不知小兒易於外感。易於發熱。傷寒為獨多。世所妄稱為驚風者。即此也。小兒傷寒。要在三日內。即愈為貴。若待經盡方解。必不能耐矣。又剛瘧無汗。柔瘧有汗。小兒肌腠不密。故剛瘧少。柔瘧多。世醫見其汗出不止。神昏不醒。往往以慢驚風證為名。而用參耆木附等藥。閉其腠理。熱

邪不得外越亦為大害。但比金石藥為差減耳。所以凡治小兒之熱。但撤其出表不當。固其入裏也。仲景原有桂枝湯法。若舍而不用。從事東垣內傷為治。毫釐千里矣。

天鈞內鈞

天鈞者。發時頭目仰視。驚悸壯熱。兩目反張。淚出不流。手足搐掣。不時悲哭。如鬼祟所附。甚者爪甲皆青。蓋由乳母厚味積毒在胃。致兒心肺生熱。熱痰鬱滯為患。加以外挾風邪而發。法當解利其邪。鈞藤飲面。

醫通卷十一 天鈞內鈞 盤腸氣痛

空

色皎白。氣虛喘促者。四君子湯加蠟尾。內鈞者。腹痛多喘。唇黑囊腫。偃僕反張。眼尾赤色。若內藏抽掣。作痛狂叫。或泄瀉縮脚。內證一作則外證亦然。極難調理。內證烏蠟六君子丸。外證鈞藤飲。進乳食者可治。若因乳母醇酒厚味積毒在胃。加味消胃散。若因乳母鬱怒積熱在肝。加味逍遙散。稍加漏蘆。母子俱服。

盤腸急痛

小兒盤腸氣者。痛則曲腰乾啼。額上有汗。皆由肝經風邪所搏也。肝腎居下。故痛則曲腰乾啼者。風燥其

液。故無淚也。額上有汗者。風木助心火也。口閉足冷者。脾氣不榮也。下利清糞者。肝木乘脾也。丁香柿實丸。曲腰乾啼者。鹽湯送下。額上有汗者。葱豉湯下。口閉足冷者。人參湯下。若面赤唇焦。小便不通。小腹脹痛者。小腸熱也。加味通心散。若痛不止。煎葱湯淋搽其腹。就以熱葱熨臍。腹間良久。尿出痛止。若因乳母飲食停滯者。保和丸。怒動肝火者。加味逍遙散。子母俱服。

傷風

醫通卷十一 傷風

空

小兒傷風。鼻塞發熱。或痰壅發搐。多因乳母鼻吹。額門。但服惺惺散。或用葱頭七莖。生薑一片。細切搗爛。攤紙上。置掌中。合待溫。貼於額門。其邪即解。乃去其葱。却用絹緞寸餘。塗以麪糊。仍貼額門。永無傷風之患。其餘用藥發散。與大人不異。但脾胃怯弱。所以多手足寒冷之證。故治法以照顧脾胃為主。

諸經發熱潮熱

小兒之熱有五。藏之不同。虛實之各異。實則面赤氣粗。口燥唇腫。作渴飲冷。大小便難。或掀衣露體。煩啼。

暴叫伸體而臥。睡不露睛。手足指熱。宜用汗下。虛則面色青白。恍惚神緩。口中虛冷。噓氣軟弱。喜熱惡寒。泄瀉多尿。或乍涼乍溫。佛鬱驚惕。上熱下泄。夜則虛汗。屈體而臥。睡而露睛。手足指冷。宜用調補。○壯熱者。肢體大熱。熱不已。則發驚。癩若身熱。而口中氣熱。乃風寒外感也。輕則惺惺散。重則羌活之類。發熱而搐搦。上竄。拗哭昏睡者。驚熱也。實則瀉青丸。抱龍丸。虛則鉤藤散。肝火內熱者。龍膽瀉肝湯。陰盛格陽而熱者。理中湯。發熱而不欲飲水者。胃氣虛熱也。白朮

醫通卷十一 諸經發熱潮熱 全

散發熱而飲水作渴。喜冷飲食者。胃氣實熱也。瀉黃散。小兒諸熱。其因外證。而作者。當從外證治之。或乳母七情厚味。飲食停積。遺熱於兒。或兒嗜食甘肥衣裳過煖。或類浴熱湯。積熱於內。為患者。當詳其因而治之。○潮熱者。時間發熱。即退。來日依時而至。有風寒疔積。食癖之分。表裏陰陽虛實之異。如汗出身熱。呵欠面赤。風熱也。傷寒時疫。陰陽相勝。外感熱也。肌瘦口乾。骨蒸盜汗。疔熱也。大小便秘。瀉汗下不解。積熱也。腹背先熱。夜發日止。食熱也。涎嗽飲水乳食不

消癖積也。又有煩熱者。氣粗喘促。心煩不安。頰赤口瘡。兼發癩證。瘡疹熱者。耳鼻尖冷。心熱者。已午間發。至夜則涼。虛熱者。困倦少力。大凡壯熱飲水。大便秘結。屬實熱。瀉黃散加黃耆犀角熱湯飲湯。大便如常。屬陰虛。六味丸。若見驚搐等證。肝經血虛生風也。四物加天麻鉤藤鈎頰赤口乾小便赤色大便焦黃。表裏俱實熱也。清涼飲如大便已利。或熱未止。表邪未解也。惺惺散微汗之。陽氣下溜於陰中而發熱者。補中益氣若食乳嬰兒。當兼治其母。○小兒潮熱或壯

醫通卷十一 諸經發熱潮熱 全

熱不退。多是變蒸。及五藏相勝。不必用藥。又多食積鬱熱。由中發外。見於肌表。只理其中。清陽明之熱。而表熱自除。不可認作外感。用解表攻裏等藥。重傷其內。又潮熱不退。恐是出痘。亦當審察。勿使下藥。大抵發熱飲水者。熱在內。不飲水者。熱在外。宜詳辨之。
傷寒夾驚夾食
錢仲陽云。小兒正傷寒者。謂感冒寒邪。壯熱頭痛。鼻塞流涕。畏寒拘急是也。夾驚者。因驚而又感寒邪。或四傷寒熱極生風。是熱乘於心。心神易動。故發搐也。

无活散解之不可使用抱龍丸以有殊妙能鎮固其邪也。夾食者或先傷風寒後復停滯飲食或先停滯飲食而後傷風寒以致發熱氣粗噯氣壯熱頭疼腹脹作痛大便酸臭先用解散次與消導不解者大柴胡湯。周歲已前傷寒熱輕者惺惺散。周歲已後須解表微汗若五六日不除邪入經絡傳變多端不可枚舉。大畧參以六經例治之。

欬嗽

兒因勝理不密外邪內蘊或因乳母七情厚味鬱熱

醫通卷十一

傷寒火驚火食欬嗽

五

若風邪外傷鼻流清涕頭痛身重者參蘇飲。○小兒傷寒發熱欬嗽頭面熱千金用麻黃湯加石膏黃芩芍藥生薑。○小兒發熱喘欬喉中水雞聲千金射干湯若嗽而吐青綠水者六君子加柴胡桔梗若嗽而吐痰乳者但加桔梗勿用柴胡。嗽而嘔苦水者膽汁溢上也。二陳湯加黃芩嗽而喉中作梗心火刑金也。桔梗湯加山梔有痰加半夏茯苓風熱加萎蕤薄荷小兒嗽久不止服發散之藥不應至夜微熱急當改用小劑六味地黃以濟其陰若面目浮腫者五味異

功以益其氣其嗽立止切禁升發及助氣藥若痰中有血或嗽則鼻衄須加紫苑因風熱痰結屢嗽痰不得出者必用萎蕤白蜜以潤之。○百日內嗽者名乳嗽甚難調理桔梗湯隨證加薄荷紫蘇羌活前胡葱白香豉之類更須禁其吮乳但與粥湯乃効。風邪外感者惺惺散痰熱既去而氣粗痰盛或流涎者脾肺氣虛也異功散加桔梗口瘡眼熱五心煩熱腹滿氣粗大便堅實者涼膈散若因乳母食五辛厚味致兒為患者母服清胃散仍參所見諸證治之。

醫通卷十一

欬嗽喘

五

喘

喘急之證有因暴驚觸心者有因風寒之邪壅盛者有因膏粱積熱熏蒸清道者有因過服消導脾胃氣虛者然喘與氣急有輕重之別喘則欲言不能臨於胸臆氣急則但息短心神迷悶耳治法因驚者抱龍丸風寒傷肺氣者小青龍湯或三拗湯加減熱傷肺氣者當涼肺定喘痰聲如鋸者小劑金匱麥門冬湯加牙硝脾肺氣虛者面色青白四肢不溫大便不實五味異功散薛云前證因脾肺氣虛勝理不密外邪

所乘真氣虛而邪氣實者為多。若已發之際散邪為主。未發之先補脾為主。設藥攻其邪。則損真氣。徑補其肺。則壅其邪。惟在臨證之活法耳。凡喘嗽小便不利。則必生脹。脹則必生喘。當分先後標本治之。

吐瀉

小兒脾胃俱傷。則嘔泄並作。傷辛熱停滯。則嘔吐出酸穢。或黃色乳。或腹痛下利者。瀉黃散保和丸選用。胃虛食不化而發熱者。六君子加黃連吳茱萸木香。若停滯已去。泄瀉不已。理中湯去參。加茯苓木香。胃

醫通卷十一 吐瀉

七

氣不能化食。益黃散。若傷生冷腹痛。瀉利。青白六君子。加砂仁木香炮薑。若傷魚肉等物。六君子加山查砂仁。若瀉紅黃赤黑。腸胃俱熱也。養胃湯加木香黃連。若夏秋傷熱吐瀉。色黃者。玉露散。若夏秋霍亂吐瀉。手足心熱。口乾唇燥。喜飲冷水者。五苓散。凡霍亂吐瀉。手足逆冷。喜飲熱湯者。理中湯。若瀉利青白乳食不化。額上微汗。脈沉遲。而或噦逆者。由胃氣虛甚。過服尅伐。使清氣不升。濁氣不降。以致氣不宣通。而作也。若瀉而噯臭。吞酸胸腹滿痛。按之益甚者。雖作

瀉而所傷之物未消也。保和丸消導之。腹痛按之不哭者。乳食已消也。異功散加木香。驚瀉者。肝主驚。木盛必傳於脾。脾土既衰。則乳食不化。水道不調。故泄瀉色青。或兼發搐也。亦有因乳母脾虛受驚。及怒動肝火。致兒吐瀉色青。異功六君子加柴胡鉤藤鉤蟻梢之屬。實脾以寧肝膽之氣。慎勿用峻攻之藥。脾氣益虛。肝邪彌甚。甚至抽搐反張也。若母食厚味而乳熱者。清胃散。若母飲燒酒而乳熱。或子母身赤。或昏憤吐瀉。丹方用錫授盛滾水。蓋良久。取蓋上蒸氣水。

醫通卷十一 吐瀉

六

服之即解。同氣相求之義也。吐痰涎及綠水者。胃虛受冷也。吳茱萸湯。○小兒衣甚薄。則腹中乳食不消。不消則大便酸臭。此欲為癖之漸也。便將紫丸微消之。乳哺自當如常。若兒不受食。哺而但欲乳者。此是有癖當下之。不下必致寒熱吐利。失下之故也。凡小兒屎黃而臭。其此腹中有伏熱。龍膽湯微下之。若白而酸臭者。此宿食不消也。當與紫丸微者。少與藥令內消。甚者稍增藥。令小下。節乳哺數日。令胃氣平和。若不節乳哺。則病易復。復下之。則令腹脹滿。必發痼。

此為食痛。輕則下之。重則難療。○大凡吐乳瀉青色。手足乍冷乍熱者。屬驚法。當平肝補脾。若吐瀉青白色。而不甚臭。手足指冷。或昏睡露睛者。屬虛法。當溫補脾上。若吐瀉黃赤色。而臭穢異常。或喜冷飲。而睡不露睛。手足指熱者。屬實法。當消導。清理脾胃。此驗虛實補瀉法也。

魁病

海藏云。魁病者。因母有妊兒。飲其乳所致。他孕相迫。亦能致此。其狀微利。寒熱往來。或發熱形瘦。腹大毛。

醫通卷十一

魁病

奎九

髮爭髮。情思不悅。令兒斷乳。先與龍膽瀉肝湯。加扁蓄及白餅子。下之後。與異功散。益黃散。補之。稟氣素虛。不勝攻擊者。理中加黃連。茯苓。芍藥。或一味扁蓄。濃煎日服。以其能利小便也。

瘥

小兒瘥疾。不越風食乳癖。食積痰積。挾驚挾暑。與脾虛胃弱之不同。蓋風則多寒。食則多熱。乳癖則泄瀉。多痰積則嘔吐喘鳴。食積則腹脹下血。挾驚則發搐。指冷挾暑則昏睡壯熱。脾虛則倦怠肢冷。胃虛則

多渴少食。治法不離疎風消導。豁痰。如小柴胡。隨證加減。多寒則加羌活。桂枝。多熱則加橘皮。枳實。泄瀉則加厚朴。神麴。嘔吐則加橘皮。枳實。下血則加枳實。黃連。發搐則加鈎藤。羌活。昏睡則加茯苓。澤瀉。脾虛則補中益氣。加桂枝。胃虛則六君子。加草菓。夜發則加當歸。日晏則加升麻。若痢後瘥。瘥後痢。與夫三日瘥。及久瘥不止。俱補中益氣為主。瘥母以小柴胡加鼈甲。桃仁丸服。大抵小兒肌腠疎薄。無汗者。絕少。即使無汗。稍加桂枝。有汗。并加芍藥。不必用知母。石膏。

醫通卷十一

瘥

奎

紫蘇羌活輩也。至於勞瘥瘴瘥之類。小兒本無不復。贅及其有因乳母七情六淫所致者。又當以小柴胡。逍遙散之類。兼治乳母為當。

痢

錢仲陽云。瀉利黃赤黑。皆熱也。瀉利清白。米穀不化。皆冷也。東垣云。白者溼熱傷於氣分。赤者溼熱傷於血分。赤白相雜。氣血相亂也。羅謙甫云。小兒下利色白。大都受寒。下利膿血。大都受熱。與食積。薛云。手足指熱。飲冷者。為實熱。香連丸。手足指冷。飲熱者。為虛。

寒理苓湯若兼體重或病溼熱傷脾也升陽益胃湯
小便不利陰陽不分也五苓散若溼熱退而久利不
愈者脾氣下陷也補中益氣湯倍升柴瀉利兼嘔或
腹中作痛者脾胃虛寒也異功散加炮薑木香或變
而為礮者六君子加升柴若積滯已去利仍不止者
脾氣虛也四君子加肉果有寒加吳茱萸炮薑有熱
加炒黑宣連丸服尤妙

脫肛

腎熱則大便秘結虛寒則肛門脫出因吐瀉脾虛肺

醫通卷十一

病 脫肛

五

無所養故大腸氣虛下脫也補中益氣為主若脫出
排赤或作痛者血虛有熱也本方加丹皮芍藥甚則
加川連外用槐角煎湯熏洗若色淡不腫不痛無血
此屬氣虛只用補中益氣以升舉之或加烏梅以收
斂之大凡手足指熱屬胃熱手足指寒屬胃寒若小
兒肛癢或嗜甘肥大腸溼熱癢滯或生蟲而齒
蝕肛門者內服肥兒丸外以雄黃銅條為散納肛門
若因病不食蟲無養而蝕肛者為狐疝黃連犀角散
若蝕肛透內者不治

便血

熱入大腸則便血補中益氣加黃連柴胡熱入小腸
則尿血六味丸小兒多因胎中受熱或乳母六淫上
情厚味積熱或兒自食甘肥積熱或六淫外侵而成
糞前見血者清胃散加槐米糞後見血者清胃散加
犀角連翹若嬰兒則以治母為主餘當臨證制宜

大便不利

小兒大便不通肺與大腸有熱也清涼飲若飲食夾
驚及積滯不通者瀉青丸此皆治實熱也若因乳

醫通卷十一

便血 大便不利

五

母膏梁積熱及六淫七情鬱火傳兒為患者清胃散
加蜂蜜清邪解鬱若兒稟賦怯弱五心煩熱作渴引
飲而大便難者六味丸加三冬滋補肺腎若用大黃
麻仁輩是速其咎也

小便不通

小便不利有在氣在血之分上焦氣分有火則必渴
下焦血分有壅則不渴若津液虧滲於腸胃大便瀉
利而小便清少者五苓散加半身人參若脾胃氣滯
不能通調水道者補中益氣加木通澤瀉心神煩熱

膈腹脹悶而小便不通者。梔子仁散。肺燥熱陰無以化而赤滿者。黃芩清肺飲。膀胱陰虛陽無以生而淋瀝者。滋腎丸。若膀胱陰虛陽無以化而淋瀝者。六味丸。若因乳母厚味酒麪積熱者。清胃散。

遺尿

膀胱者州都之官。津液藏焉。則陽氣內收。腎與膀胱之氣虛寒不能約制。故睡中遺尿。一味補骨脂酒。妙為散。醇酒或益智仁煎湯送下。脾肺氣虛者。補中益氣加補骨脂山茱萸。

醫通卷十一 小便不通 遺尿

疔

楊氏云。疔者。府藏蟲疔也。其名甚多。姑舉其要。蟲疔者。其蟲如絲。出於頭項胸背之間。黃白赤者可治。青黑者難療。蚊疔者。皺眉多啼。嘔吐清沫。中脘作痛。腹脹青筋。唇口紫黑。頭搖齒齩。脊疔者。身熱羸瘦。煩渴下利。拍背有聲。脊骨如鋸齒。十指皆瘡。額疔。爪甲疔。疔者。頭皮光急。滿頭俱瘡。腦熱如火。髮結如穗。遍身多汗。腮腫。顛高。疔湯者。日則煩渴。飲水不食。夜則瀉止。疔瀉者。毛焦。唇白。額上青紋。肚脹。腸鳴。瀉下糟粕。

疔疔者。停積宿滯。水穀不聚。瀉下惡物。疔腫者。胃中有積。肚腹脹。脈復受滯。則頭面手足虛浮。疔勞者。潮熱往來。五心煩熱。盜汗。骨蒸。咳嗽。枯槁。瀉飲水。疔硬如石。面色如銀。無辜疔者。腦後項邊有核。如彈丸。按之轉動。軟而不疼。壯熱。羸瘦。頭露骨。高乃乏乳。所致。丁奚疔者。手足極細。項小。骨高。尻削。體瘦。腹大。臍突。號哭。胸陷。喘露。疔者。虛熱往來。頭骨分開。翻食。吐蟲。煩渴。嘔噦。走馬疔者。疔熱上攻。速如走馬。或痘毒上攻。到牙齒。蝕爛。蓋齒屬腎。腎虛受熱。疔火上炎。

醫通卷十一 疔

致口臭。齒黑。輕則牙齦腐爛。唇吻腫痛。可治。重則牙齦蝕落。腮頰透爛。不治。其證雖多。要不出於五藏治法。疔疔則頰左生瘡。眼目赤爛。肢體似癰。兩耳前後。頰側缺盆。兩股結核。或小腹內股。莖囊。九腫。潰便。溺癃閉。或出白津。或咬指甲。搔頭側目。白膜遮睛。羞明。畏日。吐大青筋。口乾下血。用蘆薈丸。以殺蟲。地黃丸。以滋腎。心疔。則口舌蝕爛。身體壯熱。面黃。頰赤。或作腫。腹痛。滿腹。悶或掌熱。咽乾。飲水。便出。盜汗。齒齩。虛驚。用胡黃連丸。以治心。異功散。以補脾。脾疔。則體

黃而瘦皮膚乾滿頭不生髮或生瘡疥或人中口吻赤爛吐逆乳食嗜土腹大脹突瀉下酸臭小便濁白或合目昏睡惡聞木音用肥兒丸以治疳五味異功散或益黃散以生土肺疳則鼻外生瘡咽喉不利頸腫齒痛喘嗽氣促寒熱少氣皮膚皺揭鼻癢出涕蚘血日黃小便混濁而頻數用加味疳疔丸以治肺補中益氣湯以生金腎疳則腦熱吐痰手足逆冷肢體瘦削夜則微寒發熱泄瀉腹痛口臭作渴齒齦潰爛爪黑面鰓尻耳生瘡或耳出水用蟾蜍丸以去疳地

醫通卷十

黃丸以補腎其無辜疳用保元湯蟾蜍丸丁奚喘露用六味丸蟾蜍丸走馬疳散馬鳴散服蟾蜍丸若作瀉瀉利腫脹勞瘵等類詳參方論而治之蓋疳者乾也因脾胃津液乾涸而患在小兒為五疳在成人為五勞總以調補脾胃為主○凡小兒疳在內目腫腹脹臍突溺稠瀉利青白體漸瘦弱疳在外鼻下赤爛頰揉鼻耳或肢體生瘡鼻癢蘭香散諸瘡白粉散熱疔如聖丸冷疔木香丸冷熱交錯元氣久虧溫脾丸最宜○疳病害眼者用蕪荑仁青箱子細末各一

錢不經水騙雞肝一具研爛入白酒釀飯上蒸熟食之不過五七服必愈

二便色白

秘旨云小兒便如米泔或瀉停少頃變作泔濁者此脾胃溼熱也若大便泔白色或如魚凍或帶紅黃黑者此溼熱積滯也宜理脾胃消滯去溼熱節飲食若忽然變青即變蒸也不必用藥若久不愈用補脾制肝藥若母因七情致兒小便如泔肥兒丸大便色青日久不復或兼泄瀉色白或腹痛者六君子加木香仍

醫通卷十一

二便色白

其

審乳母飲食七情主之

食積

小兒食積者因脾胃虛寒乳食不化久而成積其證至夜發熱天明後涼腹痛膨脹嘔吐吞酸是冷壯熱喜睡神昏大便酸臭甚則下血是也若兼寒熱者為食積發熱若食在胃者消之腹滿痞脹按之益痛者下之下後仍痛按之則止者積之夾食傷寒者先散之參蘇飲熱甚便秘者先利之六柴胡湯如無外感但只傷食不至於甚保和丸調之蓋脾為至陰之藏

故凡脾病者至夜必熱。熱而兼寒則又見所勝者侮所不勝矣。食未消者消之則寒熱止。食既消者補之則寒熱痊。若手足並冷喜熱飲食此中州虛寒也。宜溫之大便欲去不去脾氣下陷也。宜升之若夜間或侵晨泄瀉者脾腎俱虛也。四神丸手足並熱作渴飲水者脾胃實熱也。瀉黃散大便秘結大柴胡湯手足雖熱口不作渴大便不實者白朮散大便下血者理中湯去參加枳實黃連紅麴。

腹痛腹脹

醫通卷十一 食積 腹痛腹脹

小兒腹痛體瘦面色皸白目無精光手足指寒口中氣冷不思飲食或嘔利撮口此脾土虛而寒水所侮也。益黃散或理中丸去參加茯苓若口中氣溫手足心熱面色黃白目無精光或多睡惡食或大便酸臭此積痛也。消積丸甚者白餅子下之後以白朮散調補脾胃若腹脹而悶亂喘滿者白餅子若不悶亂喘滿者脾虛也。白朮散調補之。慢下而致目胞肥而四肢浮腫肚腹愈脹脾虛欲發驚癇者塌氣丸溫理之。若腹中有癖不食飲乳則吐按之則啼當暫用白餅

子下之蓋小兒病此良由乳食不消伏於腹中乍冷乍熱飲水過多脾胃虛弱不能傳化水穀以致四肢羸瘦肚腹漸大而成疳矣。六君子加乾蟾若痛連兩脇肝木乘脾也。四君子加柴胡芍藥若腹痛重墜脾氣下陷也。補中益氣湯加枳實若手足指冷或呃逆泄瀉寒水侮土也。六君子加炮薑肉桂不應急加附子若服剋劑之藥致腹作痛按之痛止者脾氣復傷也。五味異功散至於腹脹喘滿亦皆脾虛邪乘所致。東垣所謂寒脹多而熱脹少熱者六君子加苓連枳

醫通卷十一 腹痛腹脹

朴寒者六君子加薑桂吳茱萸黃亦有寒熱錯雜者瀉心湯苓連炮薑並用若治實脹用二陳加枳朴木香有熱加苓連可也。

煩渴

小兒唇紅如丹即發渴紅甚焦黑則危篤若三焦煩熱作渴導赤散風熱瀉青丸虛煩懊憹梔子豉湯虛煩不得眠酸棗湯夜甚者當歸補血湯傷寒後唇口焦者竹葉石膏湯瀉利作渴五苓散暑傷心脾煩渴引飲者人參白虎湯下利脾虛作渴七味白朮散熱

結膀胱小便秘瀉五苓散上焦虛熱四君子湯膏粱積熱清胃散脾虛積熱瀉黃散中氣虛熱異功散腎水虛熱六味丸慎勿誤用寒涼降火脾胃復傷則腹脹而為敗證矣

汗

小兒腠理疎薄常時微汗但不宜過多亦不可衣被過厚使汗大出若睡中出汗名盜汗止汗散遍身多汗煩熱為胃熱三補丸胃虛汗者上至項下至臍也益黃散六陽虛汗者上至頭下至項乃稟賦不足保

醫通卷十一 煩渴汗

完

元湯加防風白朮小兒元氣未充腠理不密或飲食停滯或厚衣溫煖熱鬱心包而津液妄泄也導赤散血虛用人參當歸等分煎服名團參湯其盜汗屬胃經虛熱者五味異功腎經虛熱者六味丸若寒水侮土益黃散設之行施治誤損脾胃多成疳瘵大凡汗多亡陽必至角弓反張頓項強用十全大補多有生者

黃瘧

夫人身之神貴於藏而默用見於外則內虛也其證

皆由脾氣有虧運化失職溼熱留於肌膚發而為瘧錢仲陽所謂身痛背強二便瀉滯遍身面目爪甲皆黃小便褐色是也治法宜固脾為先如專用越伐寬中淡泄利水之藥則鮮有不致危者若初生及百日之中半旬之內不因病而身黃者胃熱胎黃也腹大食土為脾疳兼作渴冷飲瀉黃散小便不利五苓散加茵陳大便秘茵陳蒿湯病後發黃肢體浮腫白朮散清便自調肢冷嗜卧益黃散身淡黃白理中丸加茵陳身熱膈滿肌膚面目皆黃瀉黃散加枳殼生薑

醫通卷十一 黃瘧

全

若閉目壯熱多哭不已大小便赤濇口中熱氣乃妊母厚味遺毒也母子並服清胃散生料地黃丸忌酒麪五辛熱物倘誤傷脾土急則驚風吐瀉緩則肢體浮腫小便不利眼目障閉多成疳疾矣又有脾虛發黃者當於脾胃中求之

蚘

曹氏云蚘者九蟲之一因藏府虛弱及傷甘肥生冷致就不安動則腹中攻痛或作或止口吐涎水貫心則死錢仲陽云吐水不心痛者胃冷也吐沫心痛者

蟲痛也與癩相似但目不斜手不搐耳化蟲丸田氏云蟲痛啼哭俯仰坐卧不安自按心痛時時大叫面色青黃唇色兼白目無精光口吐涎沫也若因胃冷即吐理中湯加炒川椒烏梅或送烏梅丸尤妙若中氣虛而蟲不安者但補脾胃自安冬月吐蟲多是胃氣虛寒白朮散加丁香烏梅

疳

小兒陰腫疳氣多屬肝腎氣虛為風邪所傷血氣相搏而成六味丸加茴香川棟子若坐卧溼地所致者

醫通卷十一 疳 全

五苓散換蒼朮加蠟尾柴胡山梔車前不時寒熱者小柴胡去參加桂苓川棟蠟尾若因啼哭不止動於陰器結聚不散而舉丸腫大者桂枝湯加細辛當歸木香蠟尾啼叫氣逆水道不行而致者沉香降氣散加青皮蠟尾柴胡小腹作痛小便清滯者龍膽瀉肝湯加延胡索肉桂

目

五藏六府之精氣皆上注於目而黑睛為肝之竅瞳神又為腎之精華小兒目無精光及白睛多黑睛少

者肝腎俱不足也地黃丸加鹿茸晝視通明夜視因見者所稟陽氣衰弱遇夜陰盛則陽愈衰故不能視也中和養胃湯煮肝散疳眼者因肝火溼熱上衝脾氣有虧不能上升清氣故生白翳瞳閉不開眵淚如糊久而膿流遂至損目益氣聰明湯決明雞肝散目閉不開者因乳食失節或過服寒涼之藥使陽氣下陷不能升舉補中益氣湯眼連翳者肝經風熱也柴胡清肝散若目劓面青食少體倦肝木剋脾土也五味異功散加白芍柴胡生薑黃耆去參換赤芍加羌

醫通卷十一 目 全

活蠟梢若生下目黃壯熱大小便秘結乳食不思面赤眼閉者皆由在胎時感母熱毒所致兒服瀉黃散母服地黃丸若乳母膏梁積熱致兒目黃者母服清胃散若肢體面目爪甲皆黃小便如屋塵色者難治餘赤眼日本門治之○小兒誤跌或打著頭腦受驚肝系受風致瞳神不正名曰通睛宜石南散吹鼻內服牛黃平肝鎮驚藥

耳

耳者心腎之竅肝腎之經也心腎主內證精血不足

肝膽主外證風熱有餘或聾聵或虛鳴者稟賦虛也或脹痛或膿癢者邪氣客也稟賦不足地黃丸肝經風熱柴胡清肝散若因血燥梔子清肝散不應佐以六味丸若因腎肝疰熱朝用六味丸夕用蘆薈丸若因乳母膏粱積熱而致者子母竝服加味清胃散

鼻塞鼻衄

曹氏云鼻乃肺之竅皮毛腠理乃肺所主因風邪客於肺而鼻塞不利者內服消風散外用葱白七莖入臍粉少許搗攤帛上掌中護溫貼額門小兒鼻衄多

醫通卷十一 目 鼻塞鼻衄

全

因驚仆氣散血無所羈而隨氣上脫先用小烏沉湯次用止衄散或異功散加柴胡山梔久不愈用麥冬黃耆當歸生地人參五味煎服若衄久血脫但出淡紅水或帶黃黑色者難已

解顛

解顛者生下顛門不合也長必多愁少笑目白睛多面色晄白肢體消瘦皆屬腎虛按腎主髓腦為髓海因父母精血不足不能斂固也地黃丸加五味鹿茸更用大南星微炮為末醋調攤餅焙烘貼額門

虛寒用細辛桂心乾薑為末乳汁和傅上乾復傅之兒面赤即愈○又方半夏生薑芫蕪細辛桂心烏頭苦酒煮去滓以帛浸藥汁中適寒溫以敷額上冷更溫之復敷如前朝暮各三四敷乃止二十日可愈存至七八歲或十四五歲氣血既盛而自合若縱恣色慾戕賊真陰終焉不壽此證若在乳下當兼補其母更以輭帛束繫兒首使其易合亦有顛陷額填俱屬賦稟不足或五疳久病元氣虧損瀉利氣虛脾氣不能上充所致者補中益氣及十補丸若手足並冷前

醫通卷十一 解顛 龜胸背

全

湯加薑桂不應虛寒之甚也急加附子緩則不救

龜胸背

龜背者由兒生下風客於脊入於骨髓小續命去附加防風龜胸者因肺受溼熱攻於胸膈龜胸丸並用龜尿點其骨節多有得愈者蓋小兒腠理不密風邪乘之或痰飲蘊熱於肺風熱交攻而致或坐蚤風入骨髓治用上法若稟受肝腎虛熱六味丸腎氣不足八味丸背加鹿茸胸加龜甲治之貴早遲則不驗

虛羸

小兒虛羸因脾胃不和不能乳食使肌膚瘦弱或大病後脾氣尚弱不能傳化穀氣所致若冷者時時下利唇口澇白熱者身溫壯熱肌體微黃更當審形色察見證如面赤多啼心之虛羸也面青目劓肝之虛羸也耳前後或耳下結核肝經虛火也頸間肉裏結核食積虛熱也面黃痞滿脾之虛羸也面白氣喘肺之虛羸也目睛多白腎之虛羸也仍參相勝治之

五遲五軟五懶

五遲者立遲行遲齒遲髮遲語遲是也蓋腎主骨齒

醫通卷十一

虛羸五遲五軟五懶

全五

者骨之餘髮者腎之榮若齒久不生生而不固髮久不生則不黑皆胎弱也良由父母精血不足腎氣虛弱不能榮養而然若長下可立立而骨軟大不能行行則筋軟皆肝腎氣血不充筋骨痿弱之故有肝血虛而筋不榮膝膝蓋不成手足拳拳者有胃氣虛而髓不溫骨骨不能用而足脛無力者並用地黃丸為主齒遲加骨碎補骨脂髮遲加龜版鹿茸何首烏立遲加鹿茸桂附行遲加牛膝鹿茸五加皮語遲之因不一有因妊母卒然驚動邪乘兒心不能言者

有稟父腎氣不足而言遲者有乳母五火遺熱閉塞氣道者有病後津液內亡會厭乾澀者亦有脾胃虛弱清氣不升而言遲者邪乘兒心葛蒲丸腎氣不足地黃丸加遠志閉塞氣道加味逍遙散津液內亡七味白朮散脾胃虛弱補中益氣湯若病久或五疳所致者但調補脾胃為主○五軟者仰頭噎氣手脚心堅口緊肉硬此陽氣不榮於四末獨陽無陰之候若腹筋青急者木乘土位也六味丸加麥冬五味若係風邪小續命去附子○五懶者頭項手足口肉皆軟

醫通卷十一

五遲五軟五懶

全五

胎稟脾腎氣弱也若口軟不能嚙物肉軟不能輔骨必先用補中益氣以補中州若項軟天柱不正手軟持物無力足軟不能立地皆當六味丸加鹿茸五味兼補中益氣二藥久服仍令壯年乳母哺乳為第一義

失音

舌者音聲之機也喉者音聲之關也小兒卒然無音者乃寒氣客於會厭則厭不能發發不能下開闔不致故無音也若咽喉聲音如故而舌不能轉運言語

則為舌瘡此乃風冷之邪客於脾絡或中舌下廉泉穴所致若舌本不能轉運言語而喉中聲動者則為喉瘖此亦風痰阻塞使氣道不通故聲不得發而喉無音也大抵此證多有稟賦不足不能言者有乳母五志之火遺兒熏閉清道不能言者有驚風中風不能言者若遺熱與津液耗者七味白朮散清氣不升者補中益氣湯稟賦不足與虛火傷肺者地黃丸若仰首欬嗽肢體羸瘦目白睛多或兼解頰呵欠咬牙等證悉屬腎虛非地黃丸加鹿茸遠志不能治也若

醫通卷十一 失音 變牙

吐瀉後或大病後雖有聲而不能言又能嚙物者非失音乃胃氣不能上升地黃丸與補中益氣湯兼服
咬牙
小兒寤寐不時咬牙及嚙乳者雖多屬驚然所致各有不同惟嚙乳驚搐者抱龍丸若發熱飲水叫哭而搐者心經實熱也瀉心湯睡困驚悸合目而卧者心經虛熱也導赤散而青目斜呵欠項強煩悶者肝經實熱也柴胡清肝散手筋衣領及亂捻物者肝經虛熱也發搐日青面赤肝經風熱也並宜六味丸

夜啼驚啼

夜啼有二曰脾寒曰心熱夜屬陰陰勝則脾藏之寒愈盛脾為至陰喜溫而惡寒寒則腹中作痛故曲腰而啼得燈火其啼便止其候面青白手腹俱冷不思乳食亦曰胎寒益黃散加鈎藤若見燈愈啼者心熱也心屬火見燈則煩熱內生兩陽相搏故仰身而啼其候面赤手腹俱暖口中氣熱導赤散加黃連麥冬若面色白而黑睛少屬腎氣不足至夜陰虛而啼也宜用六味丸因驚者必客忤驚啼治之○驚啼者邪

醫通卷十一 夜啼驚啼

氣乘心也哭而多淚是驚也啼而無淚是痛也若因心火不足而驚啼者必自安神丸心火熾盛導赤散木火相搏加柴胡梔子肝血不足六味丸

喜笑不休

經曰神有餘則笑不休又曰在藏為心在聲為笑在志為喜又火太過為赫義赫義之紀其病笑謔狂妄又云少陰所主為喜矣又云精氣并於心則喜此數者皆言屬心火也先用瀉心湯治其心火次與六味丸滋其腎水太僕所謂壯水之主以制陽光也扁鵲

云其人唇口赤色者可治青黑者死若腎水虧涸不勝心火而喜笑不休尋作不安之態者六味地黃丸肝不過盛上挾心火而喜笑不休者柴胡清肝散餘兼別證各從其類而參治之

循衣撮空

循衣撮空皆由肝熱筋脈血枯而風引之故手指爲之撮空也宜確服六味丸間有回生之功亦有脾虛肝乘者六君子加鈎藤蠟補若肝經實熱瀉青丸蓋循衣撮空皆病之敗證求其實熱十無一二許叔微

醫通卷十一

肝熱不休 循衣撮空

全元

云循衣撮空皆神虛無主非大劑獨參保元不能挽回虛寒則十全大補人參養營大建中溫補之然亦有心包熱極所致者王海藏治血脫循衣撮空摸牀揚手撻頭錯語失神脈弦浮而虛血脫內燥熱之極也氣粗鼻乾此爲難治生地黃黃連湯

壽夭

孫眞人曰兒初生叫聲連延相屬者壽聲絕而復揚急者不壽啼聲散不成人啼聲深不成人臍中無血者好臍小者不成人通身軟弱如無骨者不壽鮮白

長大者壽生下目自開者不成人目視不正數動者大非佳汗血者多危不壽汗不流不成人小便凝如脂膏不成人頭四破不成人常撻手足者不成人額上有旋毛者早貴妨父母兒生枕骨不成者能言而死尻骨不成者能踞而死掌骨不成者能匍匐而死踵骨不成者能行而死臙骨不成者能立而死身不收者死魚目者死股間無生肉者死頤下破者死陰不起者死陰囊下白者死赤者死卵縫通達黑者壽兒小時識悟通敏過人者多天大則項橐顏回之流

醫通卷十一

壽夭

全元

也小兒骨法成就威儀迴轉遲舒稍費人精神雕琢者壽其預知人意迴旋敏速者夭大則楊修孔融之徒也

張介賓曰小兒之壽夭其因有二一則由於稟賦一則由於撫養夫稟賦爲胎元之本精氣之受於父母者也撫養爲居處寒溫飲食饑飽之得失者也凡少年之子多有羸弱慾勤精薄也老年之子多強壯者慾少精全也多飲者子多不育蓋以酒溼亂精則精半非眞而溼熱勝也多慾者子多不育以孕後不節

則泄母陰奪養胎之氣也此外如饑飽勞逸五情六氣無不各有所關是皆所謂稟賦也至於撫養之法則俗傳有云若嬰兒安須帶饑寒此言殊為未審夫欲其帶饑者恐飲食之過耳過則傷脾而病生寧使畧饑其猶瘼幾至若寒之一字則大有關係小兒以未成之血氣嫩薄之肌膚較之大人相去百倍顧可令其帶寒耶嘗見新產之兒多生驚搐此為穩婆不慎則風寒襲之多致不救者此也及其稍長每多發熱輕則為鼻塞欬嗽重則為小兒傷寒勿科不識一

醫通卷十一 壽天

卷二

緊呼為變蒸投藥致斃者此也或寒氣傷藏則為吐瀉或因寒生熱則為驚為疳種種變生多由外感雖稟體強盛不畏風寒者亦所常有但強者三之一弱者三之二傷熱者十之三傷寒者十之七况膏粱貧賤氣質本是不同醫家不能察但知見熱攻熱嬰兒不能言病家不能辨徒付之命誠可歎也又有謂小兒純陽之體故多宜清涼治之此說尤為誤人而壬節齋又曰小兒無補腎謂男至十六而腎始充滿既滿之後妄用虧損則可用藥補之若受胎之時稟之

不足則無可補稟之原足又何待補嗚呼此何說耶夫小兒謂純陽者以其陰氣未成即腎虛也或父母多慾而所稟水虧亦腎虛也陰既不足而不知補之陰絕則孤陽亦絕矣何謂無可補耶殊不知錢氏六味地黃丸專治小兒腎虛解頤以其純陽無陰故取桂氏八味丸裁去桂附以獨補腎水也此義惟薛立齋得之惜乎世醫多所未悟也

張氏醫通卷十一

壽天

卷二

長洲石頑張

啓

男

以永安世

訓應言

嬰兒門下

夫人習尚不同趨舍各異痘疹一門向得涵高兄採輯諸家方論備列醫通其間方藥多有以意參易者惜乎筆削未竣完璧難求志兒心折其學因命續紹系以麻疹諸例庶不失先哲二者並名之

醫通卷十二 錢氏痘疹論

義六

錢氏痘疹論

小兒在胎時食母五臟血穢生後其毒當出故痘疹所發皆五臟之液肝水泡其色青小肺膿泡色白而大心爲斑其色赤小脾爲疹其色赤黃痘疹欲出五臟證具惟腎無候但身涼尻冷是也痘疹出時辨視輕重一發便出盡者必重也瘡尖疹者半輕半重也出稀者輕裏外微紅者輕外黑裏赤者微重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如鍼孔者勢甚也青乾

紫暗昏經汗出不止煩燥渴腫脹喘大小便不通者困極也凡瘡疹皆令乳母慎口不可令穢及受風冷致結子毒難治也有大熱當利小便有小熱

宜解毒若黑紫乾陷者百祥丸下之不黑者慎勿下更看時月輕重大抵痘疹屬陽出則春夏爲順秋冬爲逆又當辨春膿泡夏黑陷秋斑冬疹亦不順也黑者無問何時十難救一其候寒戰噤牙或身黃腫紫急宜百祥丸下之復惡寒不已身冷汗出耳尻反熱者死腎氣大旺脾虛不能制故也下後身熱氣溫欲

醫通卷十二 錢氏痘疹論

二

飲水者可治脾旺勝腎寒去而溫熱也治之宜解毒不可妄下下則內虛多歸於腎若能食而加頭焦起或未焦而喘實者四順清涼飲下之若身熱煩渴腹滿而喘大小便濇而赤悶亂大吐此當利小便不燥者宜風散下之若五六日痲不焦是內發熱熱淫蒸於皮中故痲不得焦宜宣風散導之用生犀磨汁解之便熱退痲脫矣○瘡疹欲出先欠呵頓悶肝也時發驚悸心也乍涼乍熱手足冷多睡脾也而腮頰赤欬嗽噴嚏肺也此四藏證俱見惟黑者屬腎也瘡疹

乃五藏之毒內一藏受穢多者出則歸其藏矣

丹溪參補陳氏痘疹論

小兒痘疹大抵與傷寒相似發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘喘痰涎始發之時有因傷風傷寒而得有因時氣傳染而得有因傷食嘔吐而得有因跌撲驚恐瘀血而得或為鼠眼驚搐如風狀或口舌咽喉肚腹疼痛或煩躁狂悶昏睡自汗或下利或潮熱證候多端卒未易辨須以耳冷尻冷足冷驗之蓋痘疹屬陽腎藏無證耳與尻足俱屬腎

醫通卷十二 丹溪參補陳氏痘疹論

三

故獨冷又不若視其耳後有紅脈赤縷為真候調護之法首尾俱不可汗下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中安表而已虛者益之實者損之冷者溫之熱者平之是為權度如庖人籠蒸之法但欲其熟耳蓋毒發於表如苟妄汗則營衛一虛開泄瘡爛由是風邪乘間變證者有之毒根於裏如苟妄下則內氣益虛毒不能出而返人焉由是土不勝水變黑歸腎身作振寒耳尻反熱腹脹黑陷十無一生汗下二說古人深戒以此視之痘疹證狀雖與傷寒相似而治法實

不同傷寒從表入裏痘疹從裏出表故也如欲解肌葛根紫蘇可也其或氣實煩躁熱熾便秘則犀角地黃湯或紫草飲多服亦能利之故雖云大便不通少與大黃尤宜斟酌若小便赤少者分利小便則熱氣有所滲出凡熱不可驟過但宜輕解若無熱又不能起發也○瘡疹分人清濁就形氣上取勇怯凡已發未發但覺身熱證似傷寒疑似未明先與惺惺散參蘇飲熱甚則升麻湯人參敗毒散張高日上方俱難應州當以輕劑透表一見紅點便忌葛根恐發則表虛也凡痘瘡初為妥

醫通卷十二 丹溪參補陳氏痘疹論

四

欲出時身熱鼻尖冷呵欠欬嗽面赤便宜升麻湯加山查大力子則瘡稀疎易愈凡痘瘡發熱時法以惡實子為末蜜調貼顛門免有患眼之疾凡初出之際須看胸前稠密急宜消毒飲加查肉黃芩紫草減食涼加人參初出之時色白者便大補氣血參耆朮草桂芍芎歸若大便瀉加水香肉豆蔻初起時自汗不妨蓋溼熱熏蒸而然有初起煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來瀕不齊急以涼藥解其標如益元散之類凡瘡已出可類與化毒湯當去升麻出不快者加味四

聖散或紫草飲紫草木通湯及快斑湯出太甚者人參敗毒散色赤犀角地黃湯疎則無毒密則毒盛宜多服涼藥解之庶無害眼之患。燻灰色白靜者作寒看齊湯者燥者熅發者作熱治。○黑屬血熱涼血爲主。白屬氣虛補氣爲先。中黑陷而外白起得遲者則相兼而治。凡痘瘡分表裏虛實吐瀉少食爲裏虛不吐瀉能食爲裏實裏實而補則結癰毒陷伏倒靨灰白者爲表虛紅流綻起爲表實表實而復補表則潰爛不結癰瘡瘡分氣血虛實虛則黃蒼蒼營活血之

醫通卷十二

丹溪參補陳氏痘疹論

五

劑佐以風藥實則芍藥黃芩爲君佐以白芷連翹之類調解之法活血調氣安表和中輕清消毒兼而治之。溫如當歸黃耆涼如前胡葛根佐以川芎白芍枳殼桔梗羌活木通紫草之屬則可以調適矣。黑陷二種因氣虛而毒不能盡出者酒炒黃耆紫草人參輩黑陷甚者用燒人矢蜜水調服。癢塌者於形色脈上分虛實實則脈有力氣壯紅紫虛則脈無力色淡平塌虛癢以參耆實表之劑加涼血藥實癢如大便不通少與大黃寒涼之藥下其結毒氣快輕者用淡蜜

水調滑石末以羽潤瘡上瘡乾宜退火祇用輕劑荆芥防風牛旁之類上引用升麻葛根下引用檳榔牛膝佐以貝母恐冬白芷枯蘂之類若咽喉痛者鼠粘子湯如聖飲選用喘滿氣壅者麻黃湯加黃芩白芍石膏煩渴瀉利者烏梅與棗豆黑豆作湯時溫服之瀉利嘔逆者理中湯加木香將欲成就却色淡者宜助血氣芍歸芍藥紅花之類將欲成就却色紫者宜涼血解毒生地芍連連翹之類甚者犀角大解毒毒淡白色將靨時如豆殼者蓋因初起時飲水多其靨

醫通卷十二

丹溪參補陳氏痘疹論

六

不齊俗呼爲倒靨但服實表之劑消息二便如大便秘通大便小便秘通小便赤澀大連翹湯甘露飲大便秘結內煩外熱者小柴胡加枳殼最當或少與四順清涼飲瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通其大便自下黃黑則毒已成不必多與湯劑但稍與化毒湯不用亦可二便一或閉焉則腸胃壅遏脈絡凝滯毒無從泄眼閉聲啞不旋踵而告變矣。陷入者加味四聖散更以胡荽酒薄敷其身厚敷其足噴其衣被并尋蓋之若循木也。獨聖散人木香煎湯

若其瘡已黑乃可用錢氏宣風散。如青皮錢氏云黑陷青紫者百祥丸下之不黑者慎勿下。知其所下者瀉膀胱之邪也。又云下後身熱氣溫欲飲水者可治。寒戰者為逆知其脾強土可以制水也。百祥丸太峻宜以宣風散代之。瀉後溫脾當用人參茯苓白朮等分厚朴木香減半為妙。蓋瘡發肌肉陽明為主脾土一溫胃氣隨暢何憚不消。耳已泄之腎水乎。此錢氏不刊之秘旨也。○其壞瘡者一日內虛泄瀉二日外傷風冷三日變黑歸腎。○近時痘疹多宗陳文中木

醫通卷十二 川溪參補陳氏痘疹論 七

香散異功散。殊不知彼時立方之時為嚴冬大寒鬱遏痘瘡不得紅綻。故用辛熱之劑發之。今人不分時令寒熱一槩施治。誤人多矣。夫渴者用溫藥。瘡塌者用補藥。自陳氏發之。迺出前輩。然其立方多用燥熱。或未適中。恐其立方之際必有挾寒而虛者設也。痘疹多是毒氣盛。便先宜解毒。然恐氣血周貫不定。故隨後亦宜兼補。以助成膿血也。

薛立齋痘疹大要 痘疹大要與癰疽治法無異。宜辨表裏虛實寒熱。蓋

表虛而用發表之劑。輕則斑爛重則不能起發而死。裏實而用托裏之劑。輕則患痘毒重則喘急腹脹而死。裏虛而用疎導之劑。輕則難以貫膿結痂重則不能結。屬落腐而死。治法可不慎哉。若骨赤發熱疼痛作渴能食便秘。此形氣病氣俱實也。雖在嚴冬必用四順清涼飲以救其陰。若黑陷不食嘔吐泄瀉寒戰咬牙手足逆冷。此脾土虛敗寒水所侮也。雖在盛暑必用六君薑附。或陳氏異功散以回其陽。此內經舍時從證之法也。若起發遲不紅活不作膿不結痂。或

醫通卷十二 薛立齋痘疹大要 八

發熱作渴飲食少思。此脾胃虛弱也。參耆四聖散補之。若雖起而色白雖灌膿而不滿。雖結痂而不落。或瘡塌作渴飲湯腹痛不食嘔吐泄瀉。此脾胃虛寒也。陳氏木香散以溫之。其在四五日之間死者。毒氣盛真氣虛而不能起發也。六七日之間死者。元氣虛而不能灌膿也。旬日之外死者。邪氣去脾胃敗而元氣內脫也。治者但能決其死而不知其死必本於血氣虧損。苟能逆推其因而預為調補。豈斷無生理哉。蓋起發灌膿結痂三者皆由脾胃榮養不可妄投。尅伐

之劑以致其天枉也。至於大人患此治法迥異。昔丹溪嘗治一老人初患痘昏憤不知。亟用大補四十餘劑。出痘而愈。觀此可見。

魏桂岩逆順險三法論

夫痘分逆順險法。古無有也。愚妄立之。何則。順者吉之象。逆者凶之象。險者悔吝之象。前痘而執此三法。以觀形色。驗吉凶。將無施而不當也。蓋痘發熱三日。放標。三日起長。三日灌漿。三日收靨。二日始於見形。終於結痂。凡十四五日之間而已。是故吉不必治。治

醫通卷十二 魏氏逆順險三法論

九

則反凶。凶不可治。治之無益。至如險者。治之則可以轉危就安。夫氣血盛。斯毒已解。氣血損。則毒難愈。惟氣血弱者。雖毒不能頓解。故必加補益扶持。使生意固乎其中。無不平矣。余嘗苦心究討。定立法式。觀者幸毋以余為僭。
一、二日初出如粟。血點淡紅潤色。於口鼻年壽之間。先發兩三點。順之兆也。形如蠶種。紫黑乾枯。於天庭司空印堂方廣太陽等處。先見者。逆之兆也。難稠紅潤澤成箇者。亦險也。圓暈成形。乾紅少

潤險之兆也。險者毒雖犯上。其氣未離。候其氣血交會。保元湯加桂。

二、三日根窠圓混。氣滿血附。長發飽滿。光潔為順。○根窠無暈。氣失血散。枯死不長。為逆。○根窠雖圓。而頂不滿。為險。保元湯加葛桂。

四、五日大圓光澤。大小不一。氣和血流。為順。○綿密如蠶種。黑陷乾紅。紫泡者。為逆。○根窠雖起。色不光潔。為險。保元湯加桂糯米。

五、六日氣會血附。紅活鮮明。為順。○氣雖旺而血不歸。附灰陷紫陷。或發水泡。糜塌。為逆。○氣弱血微。光白不榮。為險。保元湯加木香芍歸。

六、七日氣化漿行。光潔飽滿。為順。○漿毒不行。神去色枯。為逆。○氣血不足。不能成漿。為險。急以保元湯加桂米。

七、八日氣旺血附。神全色潤。為順。○毒不化。漿色枯乾。紫為逆。發癰者可治。外剝者必死。○氣血少。緩毒難化。而漿不滿。為險。保元湯加桂米。

八、九日漿足根化。而無他證。為順。○漿不足。而成外

醫通卷十二 魏氏逆順險三法論

十

劑者為逆。漿不充滿血附線紅氣弱者為險。保元湯加薑米。

十一二日血盡毒解氣調漿足而飲為順。氣弱血凝枯朽刺盡為逆。血盡漿足溼潤不飲內虛為險。保元湯加芩朮。

十三四日氣血歸本漿老結痂為順。毒未解而脫形諸邪並作雖結痂為逆。漿老結痂之際或有雜證相併不可峻用大寒大熱之劑。保元湯隨證加減。

醫通卷十二 魏氏逆順險三法論

十一

十四五日氣血收功痂落癢明為順。痂未易落寒戰咬牙讖語狂煩疔腫作者為逆。痂落潮熱唇紅口渴不能食者為險。四君子加黃連山查陳皮不解大連翹湯加減。

論曰保元湯即東垣所製黃耆湯也。不越人參黃耆甘草性味甘溫專補中氣而能補火。故虛火非此不去。人參固內黃耆固表。甘草解毒借以治痘。令其內固外護。扶陽助氣使氣生血。附藉此載領有回生起死之功。或云氣血與毒同途何專理氣而不理血。殊

不知氣旺自能載領其血也。或曰桂者辛物痘出已熱而更用之何也。蓋取其辛甘發散助參耆之力而成偉功也。今更採入痘科諸方協助保元湯以收圍治。是以升麻湯和解湯四順清涼飲等有開濟之功。故用於三日七日保元之前解毒湯大連翹湯參蘇飲等有平治之能。故用於十四日前後四君子湯生脈散桔梗湯參苓白朮散四苓散等。故用於保元之間。有贊相之能。不拘日數白螺散治痘之不收金華散治痘後肥疔疥癩生肌散治痘瘡蝕不斂。以上諸

醫通卷十二 魏氏逆順險三法論

十二

方不過連保元以濟陰陽虧盈之變。治痘用藥之要始出之前宜開和解之門。既出之後當寒走泄之路。痂落已後清涼漸進毒去已盡補益宜疎。其他雖有奇方不合中和之道悉皆不錄。

翁仲仁痘疹論

夫痘由中以達外用藥因期而變。通以常言之發熱三日而後見標出齊三日而後起脹蒸長三日而後灌膿漿滿三日而後收靨收靨後發熱三日當託裏解毒使其易出亦有氣弱而不能出者當微補其氣。漿

1023 冊

則出快切不可輕用。若恐勝理一密則痘難出也。四五六日起發之時宜清熱解毒。清熱則無血熱枯燥之患。解毒則無毒滯黑陷之虞。七八九日灌膿之時宜溫補氣血。氣血流行而成漿自易也。十日至十一二日收靨之時宜調和氣血。補脾利水。自然結靨矣。此特語其常也。蓋常者可必而變幻無期。當隨候參詳。見紅點之時如痘輕少不可過表。在後恐成斑爛。如乾紅紫色急宜疎利。不然在後必成黑陷。四五日之內痘出足下為齊。苟未盡出於解毒中宜兼發。

醫通卷十二 翁仲仁痘疹論

七

散若專於清涼則痘反凝滯不能起發也。七八日之間毒未盡解於溫補之中宜兼解毒。若偏於溫燥則毒反蘊蓄不能化漿也。十一二日之間漿未滿足雖當大補氣血然須兼解餘毒。不然恐有癰毒疱疔之患也。夫痘瘡之發也身熱和緩達於外者必輕。悶亂煩躁彰於外者必重。其顏色貴潤澤而嫌昏暗。貴光彩而嫌枯濇。貴淡紅而嫌黑滯。貴鮮潔而嫌嬌嫩。貴圓淨而嫌貧碎。貴高聳而嫌平塌。其皮膚貴堅實而嫌虛薄。貴勻淨而嫌冗雜。其根窠貴收緊而嫌散。

痘根陰陽見點最忌浮腫出要參差血宜歸附耳。後頭項心胸少於他處為吉。眉稜兩額額前先後潤而不滯為佳。夫色之紅者毒始出也。白者毒未解也。黃者毒將解也。乾黃者毒盡解也。灰白者血衰而氣滯也。焦褐者氣滯而血枯也。黑者毒滯而血乾也。如紅變白白變黃者吉。紅變紫紫變黑者死之兆也。

痘疹機論

張安世曰醫學貴乎專精。崇古分科習業。各擅所長。庶幾奪權造化。痘疹一門為嬰孺始基第一關隘。予

醫通卷十二 痘疹機論

十四

嘗歷攷錢陳朱魏諸家之論各執一端。緣其立言之義有就證而論者有究本而論者有因時而論者。觀費氏大運論云嘗稽痘證有獨取於辛熱有得意於寒涼有扼要於保元是皆治痘名家何不見有逐年先後之別。要知大運使然非三者之偏辭也。而費氏明指文中仲陽梓岩三子而言獨不及濟川者以濟川實得一本萬殊之妙。兼該三子之長其論可法後學可宗。有言於神宗丁巳至癸亥尚多氣虛由甲子而血熱者漸多矣。其毒亦漸深矣。而補宜從重者變。

而宜輕瀉宜從輕者變而宜重速及丁卯所宜重瀉者雖極清極解而亦弗靈矣勢必蕩蕩而九息之勢始殺然猶放標起服時之權宜也至壬申後蕩蕩之法向施於成癩前者竟有首尾而難免者矣其黃氏痘疹或問亦云予自萬曆辛巳始行其道所歷之痘多屬虛寒至癸卯歲忽然氣候大變自後當溫補者十無一二虛中挾火挾痰者十常八九痘色亦常變異良由運氣使然握司命之機者可不達權通變而固守成則敵於是會參諸家宗旨綜其大端不出血

醫通卷十一 痘疹機論

五

熱毒盛毒盛氣虛氣虛不振之二綱順險逆之三要順則無庸治逆則治何益惟險者在急治而尚變通其機不暇少緩不可泥於首尾而拘於繩墨也至於病有寒熱證有真假毒有淺深藥有輕重治有緩急時有寒暑人有貴賤稟有強弱安可槩論若夫膏梁之治與貧賤之治迥乎不侔夫膏梁之家素嗜肥甘肌體柔脆譬之陰地草木未經風日突堪勝任况一有微疴即日歷數醫雖其法眼亦難獨出已見稍用一有關之品即眾口說說功未見而各有歸此亦世

道使然無足憾也而貧賤之家且甘粗糲風霜切體縱有疾苦力能勝受印或從事醫藥則專任於一雖護劇可危尚堪重劑推板功成反掌第貧家之痘一涉危疑醫者往往忽略而委之不救棄以待斃因得土氣滋化而復蘇者亦恆有之達權之士務在見機於始萌之際變通於未發之先如毒因表邪而發者疎解之由裏邪而發者宣暢之熱劇者涼潤之毒悶者開洩之挾驚者清理之挾痰者驅導之虛者益之實者損之寒者溫之熱者清之此數者迺治痘之大

醫通卷十二

痘疹機論

論

十六

綱必須明燭其機而毅其之慎毋疑似而混用升發標證一退其痘自起蓋痘病必求其本審係血熱而用涼解即是升發審係氣虛而用補托即是升發以故新甫有見點忌升麻之說丹溪復有一見紅點便忌為根之誠夫今之以痘疹名世者或稱家秘或尚師傳下手不辨氣血之虛實熱毒之淺深稟賦之強弱兼證之有無槩以通套升發為務直待點齊而驗以凶吉不知延過三日則毒已歸經加之兼證交攻種種變端莫不由此此皆識見未真習俗之謬耳費

子所謂識見不真。先迷向住之路。膽力不確。同歸廢弛之地。理障未捐。神變化之川。是必瞻與識俱心。隨理運者。而後可以語此。嘗有痘雖初放。功不在於升發。時雖起脹。寧有事乎清涼。寓補於瀉。何嫌貫漿。而解利用散。為收何病結痂。而疏發至若臨證之機。必細察其形。熟驗其色。復於神情而釋之。兼內證以參之。庶乎似虛寒而反實熱。似有餘而反不足。似平易而實危。殆似必斃而實可生。熒然於心目間。其有素稟氣虛。而證見血熱者。當於發熱之初。乘毒未歸。

經元氣猶堪。宜先理其標。峻投涼血。以化熱毒。後固其本。任用溫養。以助成漿。設先不為清理。至四五日間。欲行涼解。則痘必難起。灌欲行補托。又礙熱毒未清。至此攻補兩難。而致天枉者。比比且有。悶痘一證。方書但言白悶紫悶。緊悶從無辨救之法。因思悶者。痘緣毒邪壅蔽。悶而不發。其證最急。是為逆中之逆。雖有神丹莫可救也。然有似悶而非真悶。即屬悶而緩者。是為險中之逆。此閉證也。世多例之。悶痘棄不救。可槩委之於數乎。若能明究其故而開其閉。庶

可轉危就安。倘之雞鳴度關。此關一過。前途別有料理。但閉證之由種種。有因火毒熾盛而閉者。有因痰垢凝塞而閉者。有因蟲蠱內攻而閉者。有因挾食挾血而閉者。有因真元虧極而閉者。畧舉一二言之。如發熱即報點。如丹身熱如烙。漸乾焦紫黑。煩躁悶亂。唇焦口臭。或唇口腫滿。是屬火也。雖冬月亦須大劑白虎化斑湯。石膏非數兩不應。或發熱時便頭項不舉。痰喘氣急。或目閉神昏。眩暈。顛仆。悶亂。搐搦。是屬痰也。或當猛進金匱大黃甘草湯。使上吐下泄。以

救之。或一發熱即煩悶。嘔吐舌下常流清水。或時沉默喜睡。或時躁擾不寧。或腹痛狐疑。或頻頻叫喊。驗其舌下筋青。或下唇有黑白細點。是屬蟲也。宜先與椒梅丸。誘入蟲口。即以紫草承氣湯下之。或初發時便壯熱。神昏腹痛。語舌刺如芒。或氣粗便閉。狂叫悶亂。是屬食也。急投大承氣湯。及三承氣選用。或因跌撲內傷。瘀血阻滯。證語神昏。喘脹。衄血者。桃核承氣湯。或有身無大熱。見點潮白。如瘡。氣怯無力。目閉無神。面色及唇反鮮澤。嬌嫩。无彩。信常是氣虛無陽。

脾胃之精華渙散於外也。然此亦不多見。惟秦養柔脆者。間或有之。若非峻用人參二三兩。生芪兩許。佐以升麻五味。續續灌下。烏能回元氣於無何有之鄉。而振起之耶。其證之屬實而閉者。竭力圖之。可全十之半。屬虛而閉者。則與秦越人起號太子不異。可知造化樞機。在掌握間。豈可拘於尋常例治哉。

辨證六則

初發悠悠身熱。最宜氣息和平。飲食甘而便溺如常。手足溫而面容不改。兼之睡卧安寧。便見證來之順。

醫通卷十二 辨證六則

九

四肢清而面色晄白。飲食少而精神倦怠。此證當作虛看。痘出決然不振。再見便澹。呢乳急當補氣為宜。若還熱甚。氣粗定須解毒。何疑。謔語狂言煩躁。均為內熱。喘滿氣粗便秘。須知毒壅。毒盛則頭面赤熱。氣虛則手足寒清。嘔吐為火氣上炎。瀉瀉為毒氣下迫。腹脹口張喘急。啼聲不絕。噴頻須防失血。而青糊眼。搖頭狂亂。忽生吐乳。發驚先兆。是以熱盛者。只宜清涼發散。不可峻用苦寒。發散則毒外出而熱自解。苦寒則毒反伏。而出愈難。故發散之劑。輕則升葛。以疎

其熱而煩躁壯實者。非此何以定其標。重則麻黃以開其壅。而喘急脹滿者。非此何以救其危。未萌先瀉。有熱證莫作虛看。已泄而渴。無熱證便從虛治。止熱泄以清涼。重加發散。治虛瀉以溫補。仍用開提。內虛誤用寒涼。助其作瀉。實熱妄投補劑。轉增煩劇。安靜能食。勿謂便實。可下。泄瀉煩渴。休言熱證。宜涼氣弱。而少食者。不任其毒。神強而能食者。不失其常。嘗謂痘初見點。便觀顏色。榮枯一來。便覺粗肥。稀疎可必。始發若還黃屑繁密。堪知帶熱。救瘡陸續出來。

醫通卷十二 辨證六則

三

猶可救。一齊沙出。嫩紅皮薄。總難生。細細白頭。如癩痞乾枯。必作內攻形。稠稠紅點。似丹朱。不久定成焦。萎勢粗肥。饅頂點子不紅。終白陷。頭尖皮薄。茶葉紋。起定空瘡。白嫩則皮薄。嬌紅黃瘦。則痘成褐色。若人蒼黑皮粗。瘡色必然慘暗。嬰兒肌肉不同。未可一例而斷。只宜從面有神。不喜嬌紅。平塌色澤。神安見點。如珠如粟。毛焦之燥。或瘡或膿。或帶熱出來。最恐。醫以麻頭。然續出。尤忌。形如瘡。如瘡如疹。亦無。莫不。立。脚地。俱無。此。皆不收。夾斑。

如回以咬最爲毒烈乃或燥或寒電差爲可治未熱
先敷散毒粉者非虛若還熱久不敷便作疔疔疔先發
塊而後發瘡塊爲風毒所發先發瘡而後發塊塊名
鬼腫難醫避痘避於隱僻眼胞唇內多凶悶痘悶於
要處喉舌胸背皆危順不憎多逆嫌一點疔疔先見
諸瘡何敢彰彰賊痘若生諸痘焉能灌汁辨認若真
急須挑破裏證未平痘雖出而毒猶在裏解毒爲務
便調人靜身雖熱而毒已透表安表爲先設使內外
證平此際不須過治再看精神勇怯審詳表裏如何

醫通卷十二 辨證六則

三

三日四日痘出當齊點至足心勢方安定猶是陸續
不齊尚隱皮膚之內若非風寒壅遏定屬氣虛不振
是以四日已前痘毒方出身表宜涼四日已後毒出
已定身表宜溫涼則氣血和平痘色必然潤澤溫則
腠理開通其勢易以成漿故至此而身不微熱色不
鮮澤雖不至於冰伏痘瘡斷乎不長五六日來血包
已成候當肥大而粗頂宜發光而白故根紅而頂白
者已具行漿之勢若還赤色過頭雖見嬌紅可愛綿
延六日依然到頭空殼虛花皮薄而光亮如燈內含

似水頂尖而根脚不紅行漿不實熱毒盛而未解則
爲紫爲黑壅而不起則爲陷爲塌滯而不榮則爲乾
枯爲青灰怯而不振則爲不快爲停漿或有肉先腫
而痘反不起者漿則滯而不行而已浮而痘反退伏
者毒則壅而不通故身不熱而痘不起已成冰硬之
形赤色若還不變溫之可興氣血弱而瘡不振遂成
不快之狀紅潤依然如舊補之可生紫色乾枯切忌
溫中滯補祇宜活血鬆肌毒勢壅滯烈藥雖然可發
透肌尤是良方溽泄惟於溫補瀉其佐以升提

醫通卷十二

辨證六則

三

六日七日之期氣血燄化之際順候漿行半足虛瘡
纔發微光毒重而壅遏者頂滯乾紅氣盛而歛發者
飽滿光澤頭面行漿而四肢未起切莫慌張腿膝發
泡而臉額焦枯且休歡喜既以懼其發瘡且又慮其
喘急飲食不多恐致藏虛而內陷水漿頻進須防泄
瀉而變危熱盛煩渴到此休爲實論再加溽泄此時
只作虛看黑紫乾枯急須攻發其熱氣虛塌陷便當
溫補其虛發瘡愁其失聲喘急恐其腹脹瘡或白而
少神根雖紅而難治尖不起而毒根起亦而無濟

色淡白而喘。此內必無痰。汗皮薄。而喘。紅有痰。亦是清毒。犯此。四端。轉為氣虛。八九日間。必然發。若還壯熱。燎人不審。行。乾枯。不須著眼。中疑血。迹。或可伴成。既行。而半。足。時。則未當收飲。忽爾一齊。紫黑。倒。屢。莫認。結。痂。若還。攻。後。得。宜。傍。生。血。點。再。行。漿。如。見。氣。急。腹。脹。不。久。失。音。死。在。週。痘。出。八。九。日。來。已。結。乾。紅。痂。死。如。或。少。生。不。順。至。此。方。得。灌。漿。若。過。身。重。發。熱。停。漿。不。易。結。痂。此。則。陽。亢。陰。虛。應。以。清。涼。收。斂。漿。足。氣。促。恐。因。痰。湧。而。然。忽。

醫通卷十一 辨證六則 五

爾發驚母乃二便秘結再見氣虛場陷必然倒屢黑焦一則溫補可興一則攻發可活泄瀉安寧大虛少毒脾寒則下白膿藏毒必然便血唾喉聲啞漿行飽滿亦無妨場癢咬牙便實清濁可活屢來痂硬變證終無花脫如麩須愁餘毒蒸發或致太過則潰爛難收身熱若見燎人則燎漿發泡空遺痘殼不成痂祇為漿清熱重腹脹喘呼而喘陷皆因毒入內攻出來不灌黃漿痂疔猶如血赤若曾解毒於先此證斷之極美胃氣絕則唇日腫硬肝熱盛則目睛吊白喘

急發於瀉後總屬氣虛便瀉繼以煩渴諒非實熱泄瀉而煩渴不止理必升提好飲而後渴愈其勢難救援氣虛寒戰痘瘡無恙即溫經漿足難收便實熱蒸須解利進清涼以助結痂此補法而防過益痘成痂死八九功成餘毒變遷終非吉兆是故眼合腹脹猶蹈危機虛浮不退尚懼凶咎痂成而反致失聲猶為黑腫未退而眼已先開恐毒內攻腸氣極而狂叫喘呼腸胃傷而便溺膿血熱毒逗遛不化結痂而壯熱憎寒經絡餘毒未盡日晡則往來寒熱

醫通卷十一 辨證六則 五

發在午前為實證煩渴腮紅申後方熱陰虛便調形瘦他如撮唇弄舌心經高熱無疑擲前擡胸肺胃毒冲有準身熱便秘恐成暴急驚風潮熱便溏防變慢脾風搐噎失明於眼合羞明辨口疔於唇焦眼黑實熱結於大腸必然便秘虛寒客於胃府乃成泄瀉喘渴須分虛實泄瀉當辨寒熱欲觀痂落之餘再審癢痕之色桃紅光澤營衛俱安灰紫乾焦尚留風熱粉白為氣血之虛皮粘為脾胃之疾遍體赤斑乃是失於解利渾身青紫恐為風寒所客餘毒未消不特

為痘為癩見風太早須防發瘡發癩匪人切勿胡傳
此本先賢真訣

表裏虛實論

凡痘灰白不紅綻不起發出不快昏暗頂陷皆表寒
而虛二便清身涼手足口氣俱冷不渴少食唇白涕
清飲食不化皆裏虛而寒此表裏虛寒之證急宜溫
脾胃補氣血常用參耆歸朮木香肉桂等藥以助灌
膿收靨夫表虛者以補氣為主補血次之裏虛者於
補血之中須兼補氣使胃氣條暢脾氣壯實在後必

醫通卷十二 表裏虛實論

五

無陷伏之憂苟能補氣則血亦週流送毒出盡不致
凝滯在後必無癢塌之患凡紅紫乾滯黑陷焦枯者
皆表熱而實大便秘結小便赤滯身熱鼻乾唇燥煩
渴者皆裏熱而實此表裏實熱之證急宜涼血解毒
當用紫草紅花連翹鼠粘木通蟬蛻荆芥甚則芥連
之類如表熱者則宜清涼解表而分利次之裏熱者
重於解毒而兼清涼如在二三日之前熱毒盛者以
硝黃微下之蓋涼血不至於乾紫解毒則免於黑陷
如表虛不補則成外刺裏虛不補則成內攻表實過

補則不結而裏實過補則發癩毒所以痘症變遷不
常若色一轉又當變通不可拘於一定也

氣血虛實論

夫氣有生血之功血無益氣之理故氣不可虧虧則
陽位不及而痘之圓暈之形不成血不可盈盈則陰
乘陽位而痘之倒靨之禍立至是以治虛證必當補
氣為先蓋氣有神而無形補之則易充血有血而無
神補養難收速效况氣陽而血陰陰從陽血從氣理
也故補氣不補血使氣盛而充血亦隨之而盛矣何

醫通卷十二 氣血虛實論

五

謂氣血虛實且如氣過熱則泡血過熱則斑氣不及
則頂陷不起血不及則漿毒不附凡痘色淡白頂不
堅實不礙手不起脹皆屬氣虛宜保元湯倍黃耆加
肉桂丁香人乳與酒釀同服根窠不紅不緊束或紅
而散漏以手摸過即轉白毫毛隆起枯槁不活者皆
血虛也保元湯加芍歸紅花及山查以行參耆之滯
木香以散滯氣而血自活也凡用黃耆當在痘出盡
之後凡用熱藥當看毒盡解之時更察氣血之虛實
偏勝而治之則藥無不効矣凡補血首尾用地黃防

薄血必用薑製用芍藥恐酸寒伐胃六用酒炒以和其潤下之性借酒力而行之達表也

虛證防變論

初發身熱悠悠乍熱乍涼明鬆神倦而青皖白飲食減少手足時冷時熱嘔吐便溏痘點方見隱隱不振淡紅皮薄三四日陸續不齊不易長發五六日不易成漿少食氣餒傷食易泄七八日塌陷灰白不起自汗微渴或腹脹喘渴泄瀉塌癢悶亂咬牙寒戰頭溫足冷勢所必致皆緣氣虛之故故治虛痘勿發不宜

醫通卷十二 虛證防變論

三

輕投透表之劑即參蘇飲人參敗毒散等亦不宜用况升麻湯等純行升發之藥乎至於黃連紫草皆為切禁惟宜保元湯為主若氣粗皮燥無潤色者亦當忌之只以四君子少加桔梗川芎補益之中畧佐升提之法俟點子出齊重用參善峻補其氣助其成漿至八九日間無他凶證十全大補湯倍桂壩陷灰白腹脹泄瀉木香散塌癢悶亂腹脹滿喘嗽頭溫足冷寒戰咬牙者急進異功散遲則不救

虛證變實論

氣虛痘疹調理得宜使元氣充實腠理堅固脾胃健二便調適仍可轉禍為祥若補益太過漿足之後重用參善多有腹脹喘急之患用枳殼湯誤用五苓木香散多有大便秘結之患用寬中散便實而渴用麥門冬湯過用丁桂辛熱之劑則有咽喉腫痛煩躁閉渴之患用潤燥湯蓋喘急腹脹大便秘堅煩渴咽痛皆類實證然而氣虛變實非真實也是病淺而用藥過深之失也只宜斟酌不宜疏通若誤行疏利則方生之氣復虛而脫證將至矣

醫通卷十二 虛證變實論

三

虛證似實論

氣虛痘疹或為飲食生冷調理失宜致傷脾胃遂成泄瀉津液下陷虛火上盛必發而為渴元氣下陷虛陽上壅下氣不續必發而為喘夫渴與喘實證也起於泄瀉之後斯為津液暴亡而渴陰氣蒸逆而喘故治渴則宜錢氏白朮散渴瀉不止則用錢氏異功散治喘則宜獨參湯不應亦用錢氏異功散大便實者少與生脈散調之喘渴而泄陳氏木香散異功散選用若至悶亂腹脹毒氣內攻眼合昏者此名失志

庸醫不察。誤認爲實。而投耗氣之劑。速其斃也。安有實熱而渴氣。漉而喘。生於泄瀉之後哉。

實證似虛論

身發壯熱。毛直皮燥。睡卧不寧。腮紅睛赤。煩渴腹脹。便秘喘急。皆實熱證。而復見嘔吐者。此熱毒在內。不得伸越。或爲寒冷所搏。乳食不節。冷熱相拒。則上逆而爲嘔吐。病機所謂諸逆衝上。皆屬於火者是也。治當升提發散。兼辛以散之。如升麻湯。加生薑。橘皮之類。吐逆勢甚者。更加豬苓。澤瀉引之。下行可也。又有

醫通卷十二

虛證似實論 實證似虛論

五

泄瀉兼見似乎虛證。然因熱毒鬱盛。熏炙脾胃。不得外達。則毒從下陷。尋竅而出。亦當升提發散。熱毒外解。內泄自止。有食則兼消導。如枳殼。山楂之類。又復有不思飲食。似乎內虛。不知鬱熱在內。不得伸越。二便秘結。腠理阻寒。熱毒壅遏。腹脹滿急。不思飲食。必然之勢。亦當升提發散。引毒達表。有熱則兼清熱。如山梔。黃連之類。則熱氣有所升越。而藏府和平。飲食自進矣。若誤用丁桂。半夏等熱藥於嘔吐泄瀉之證。用參耆白朮等補藥於腹脹不思飲食之證。立能殺

人他如能骨。豆蔻。麴蘖。縮砂。皆熱瀉之戈戟也。

然證變虛論

血熱痘疹。只宜清涼發散。不宜峻用苦寒。過投芩連之屬。必致內傷脾胃。外閉肌肉。而脾胃傷。則飲食減。而泄瀉重。則利泄無度。遂致虛寒。肌肉閉。則熱蒸之氣不行。腠理滯。則痘不起。發不行。漿遂成伏。陷。此熱證變虛之驗。虛證既形。便從虛治。不可膠執而畏參耆。丁桂也。六七日後見之。則木香。異功。皆可應用。但中病即止。不可過劑。以招陽澤之禍也。

醫通卷十二

實證變虛論 毒盛變虛論

三

毒盛變虛論

毒盛壅遏。固宜升提發散。而佐以清涼。使熱毒得平。而止。若發散太過。必致肌表空虛。元氣耗散。內灌清漿。或虛腫空殼。或癢塌外剝。或潰爛不收。百變皆至。而內氣亦不能自守。畧傷飲食。則成泄瀉。泄瀉不止。遂變虛寒。而氣脫。煩渴。悶亂。寒戰。咬牙。無所不至矣。夫始出之時。雖爲血熱。壅遏。至三四日後。身反不熱。愈瀉不。得。不進。溫和之劑。如桂枝。芍藥。乾薑之類。使內氣一煖。則外氣自和。泄瀉之。其內必虛。雖

有腹脹煩渴喘急焉得復為實熱不過內虛伏匿
氣內攻而然故實熱之證七八九日曾經泄瀉皆從
虛治有木香異功證便進木香異功如無水硬之證
非泄瀉之後切勿誤投溫劑蓋塌陷倒壓乾枯而無
冰硬泄瀉之患者多因熱毒內攻而然又當用百祥
九豬尾膏等方治之誤投溫熱虛扁不能復圖也

氣虛血熱毒盛三法治例

凡氣虛之證初發身熱手足厥冷乍涼乍熱精神倦
怠肌肉脫白飲食減少睡臥安寧清便自調此皆虛

醫通卷十二 三法治例

三

證無疑未見點前用保元湯加紫蘇防風白芷以發
散之見點後以保元湯加川芎桔梗以開提之見點
四五日後仍用保元湯隨證加減處治七八日漿足
之後宜四君子加歸芍山藥以調養之大便實者加
熟地以兼補其陰若證見虛寒不妨加肉桂倍參耆
以溫補之如見塌陷黑糜多用陳氏木香異功收功
○凡血熱之證初發壯熱腮紅臉赤毛焦色枯煩躁
渴欲飲水日夜啼哭睡臥不寧好睡冷處小便赤澀
此皆熱證無疑未出之前升麻湯加生地芎歸紅花

鼠粘連翹以涼血解毒見點三四日後熱證漸平將
欲灌漿紫草木通湯加生地川芎桔梗紅花山查之
類八九日漿足之後亦宜四君子加養血藥調理之
若七八日根脚紅暈不化或紫黑乾枯及青灰乾黑
陷者皆由血熱之故急宜清熱涼血為主切勿誤用
補氣之藥則營血愈虛愈熱矣惟泄瀉之後變黑陷
乾紅者則從小劑木香異功治之○凡熱毒壅遏之
證初發身熱面赤氣粗喘滿腹脹煩躁譫語狂言睡
中驚妄二便秘澀面浮眼脹多啼多怒此皆熱甚無

醫通卷十二 三法治例

三

疑未見標時先須升麻湯一服隨加羌防荆芥川芎
連翹紫草白芷桔梗鼠粘子以清熱透表至見點三
日之內諸證向寧勢將行漿紫草木通湯加川芎桔
梗山查蟬蛻鼠粘子之類漿足之後亦宜四君子加
養血藥調理之若六七日外根窠連肉通紅或紫黑
乾枯及青灰乾白陷者此皆氣虛血燥毒邪壅盛之
故急宜涼血解毒兼調中氣為主切不可輕用溫補
惟曾泄瀉內氣暴虛而陷則當小劑木香異功救之
汗下論

錢氏論痘疹發散利下皆不可妄又曰非微汗則表不解非微下則裏不解言表熱方熾痘點未見之先或外感寒邪約束腠理痘因出不快此當微汗之令陰陽和營衛通俾痘易出而毒易解若原無閉塞不快而妄汗之則成表虛癢塌斑爛之患也如痘出時煩熱讖語喘脹便秘此毒畜於腸胃之間當微下之但藏府疏通陳莖滌去氣血和平而毒易升發若原無裏實壅熱而妄下之則元氣下陷致變灰白虛脫之證矣張涵高曰余治血熱毒壅便秘之證每用涼

醫通卷十二 汗下論

十一

膈散下之百不失一

所感輕重論

或問時氣之盛衰而痘出之輕重者何也蓋痘之出必假天行時氣而發天時疫氣有盛而有衰人之生稟有強而有弱疫氣盛行雖輕亦能變重稟弱者當之必致於危厲氣已衰雖重亦能變輕稟強者當之益見其輕故貧賤家兒多歷辛苦風寒更無厚味傷脾即有重證亦能抵當富貴家兒煖衣厚味少見風日脾胃脆弱不經勞苦凡遇小疾亦為大病譬之陰

地草木豈能禦冰霜烈日乎臨證之際可不辨人之強弱貴賤參時氣之盛衰而為施治哉

死而復蘇論

痘有死而復生者非氣血相離也乃毒火彌熾氣血壅遏不行故肢體俱冷而氣絕本不終絕雖絕必通毒火有時而少解則正氣漸復而蘇嘗見痘兒氣絕轉臥於地良久復生者得土氣以化毒熱而正氣復矣然雖氣絕而死其心胸必溫暖若胸冷氣絕復生者未之有也

醫通卷十二

所感輕重 死而復蘇

十一

原委

嘗讀炎黃扁鵲仲景書從無痘疹一證相傳謂是伏波定交趾歸中原始有此患則知皆是炎方火毒蒸發先天淫火毒邪而成蓋得於有生之先發於既生之後或感風寒驚食或當歲氣併臨則蘊發為疔今之所見者不問何感所主但發熱之後一二日間紅點成水泡水泡成膿膿成膿泡後結痂脫落總謂之痘此則胎毒也其或隱隱於肌肉不膿不痂謂之癩疹一見紅色而復發復現者謂之膚疹凡人謂之癩疹

遍身紅斑如錦紋雲霞者之麻疹。人謂痧。越人謂瘡。其或初發紅點有似痘瘡。不三日而灌漿紅潤。見漿即焦者。謂之水痘。南人謂赤痘。已上諸證。乃脾肺畜熱。或外感風熱。或傷寒發斑之候。不可盡歸胎毒。方書所謂痘毒之發。傳於心為斑。傳於肝為水痘。傳於肺為疹。傳於脾為痘。其沿街里巷一染出痘者。此則歲氣併臨。疫癘傳染。豈可驟為胎毒哉。

發熱

痘瘡將出必先發熱。然其熱有風痰食驚變蒸之異。

醫通卷十二 原步 發熱

及時氣傳染。俱能出痘。疑似之間。即當審其所屬。隨證清理。以觀其勢。更察其耳冷尻冷。足冷中指稍冷。耳後紅絲赤纒。現阿欠噴嚏。六脈洪數。身微瀝。漸顫動。白睛微紅。目光如水。額間有花紋。見者乃為真候。如溫溫微熱。乍涼乍熱。欬嗽。喘欠。呵頓。面微紅者。此必痘稀毒少。身涼後出。尤輕也。其或驟發壯熱。如火熏灸。面俱赤。悶亂昏眩。狂躁不定。一熱便止。紅點此必稠密。毒盛急投柴胡。飲其則涼。膈散下奪之。發熱時肢體骨節俱痛者。六淫之邪也。宜表散兼

透毒之劑。發熱時遍身作癢。此表虛客胃風寒毒不能出。故養桂枝湯加黃耆防風。白芷。蟬蛻。發熱時惡寒身振。振動搖此氣血弱。不能過邪。快出邪正交爭。故振升麻湯加人參。穿山甲。桂枝。防風。發熱時腹痛。攻攪躁渴。此毒勢壅遏。熱氣內蒸。急以蜜調元明粉四五錢。不下再服。甚則涼膈散。大便一利。其痛即減。瘡亦隨發。勿泥首尾。不可下也。若虛寒脈弱而腹痛者。小建中加升麻。若腰脇痛者。此毒在肝腎。最為惡候。急以石膏六七錢。人參一錢。茶一撮煎好入元明

醫通卷十二 發熱

粉三五錢。加生白蜜熱服。或可十全一二。若唇口上下紫黑。燥裂疼痛者。此毒攻脾。藏難治。急投犀角消毒飲。加石膏。黑參以救之。發熱時或吐或瀉。此毒邪奔越。精神不減者為吉。兆毒氣上下分泄也。若見點後猶吐瀉不止。四苓散加枳實。山查。虛者錢氏異功散。加藿香。木通。發熱時如驚者。為熱乘心包。亦是吉兆。導赤散加蟬蛻。紫草。形質便秘者。瀉青丸微下之。如見點後驚搐不止者。危發熱時咬牙。竄視。此心經熱甚也。導赤散加黃連。赤芍。若咬牙悶脊為肝經風

熱羌活湯加青皮柴胡發熱時聲音遂變者宜清肺氣消毒飲加連翹桔梗便面赤加紫草發熱及見點時兩目紅腫者風熱上攻也導赤散加荆防蟬蛻若熱至五六日或腹脹喘急便秘狂煩痘不見點而熱甚於背者風寒留滯於經羌活湯不應加麻黃熱甚於腹者實熱亢盛於裏大承氣湯其或識語循衣昏睡不省者皆毒氣內攻導赤散加連翹犀角使小便流利神爽發出為吉若大便四五日不通而識語者紫草承氣湯下之昏迷累次識語不休者不治發熱二

醫通卷十一 發熱

三

三日痘隱隱不透壯熱識語喘脹便秘者夾食感寒而發先以升麻湯加麻黃汗之次以大柴胡利之發熱時小便黃赤短澇者熱毒不透滲入膀胱也導赤散加荆芥連翹鼠粘子自汗者邪從汗散也不須更與升發之劑衄血者邪從衄解也衄久不止犀角地黃湯去丹皮加水通利芥穗發熱時遍身皆熱手足獨冷者此脾胃虛弱宜補中益氣湯三四服仍厥冷者難治發熱時以火照之若皮肉裏有鮮紅成片者凶也若遍身如蚊迹蚤跡者不治發熱時壯熱識

語喘脹搐搦壽視腰背有一二點如蚊迹者關痘也不治發熱時腰痛如折不能坐立者折腰痘也四五日當口鼻出血而死痘出三四日身猶有熱者尚欲添痘也出盡則熱自止若五六日後痘出盡復熱者必有餘毒未盡當輕劑以解其毒不可驟過至八九日復發熱者名曰煎漿將欲收靨結痂故耳凡痘疹發熱不可誤認外感過投解散之劑則表之陽虛不能長發且有癢塌之患亦不可誤認內傷過投消導則裏之陰虧不惟不能灌漿倒陷之禍立至矣

醫通卷十一 發熱

三

見點

痘家以看法為要初見點時用紙捻蘸清油點照遍觀其色熟視其形須以火在內向外平照則隱於肌肉間者悉皆顯現以手揩摩面頰如紅色隨手轉白白隨轉紅謂之血活生意在矣如指之不自舉之不一紅是為血枯縱疎難治又看目睛光彩瞭然口唇尖上紅活如常無燥白紫滯之色乃為吉兆又須知燈火之下紅紙窗之下白不可不審○先哲看痘有四口根曰窠曰脚曰地根欲其活窠欲其起脚欲其固

地欲其寬四者俱順雖密無慮近世看法但言盤頂蓋盤即根也頂即窠也所謂脚地則本乎根窠之圓混痘點之稀密也凡見頂起盤深紅暈透在肉裏方是正痘若無盤頂紅色浮在皮膚即是水痘非正痘也否則必是氣虛毒盛之故始雖長發後必漿清脚瀾十朝十一朝必變穢場而死若根脚瀾散不成紅暈後必難於收斂十二三朝必有變也蓋痘疹須辨血氣之盛衰形色之輕重大抵形屬氣色屬血故形色為氣血之根本最為切要其起先專看根脚紫來

醫通卷十二 見點

元

紫束則熱聚易長易灌若灌漿後專要根脚溶化溶化則毒解易收易脫若發熱三四日身涼而出初見淡紅三四日方齊微覺明亮磊落如珠大小不等類類如黍米摸之礙手四五日間明亮光澤根窠紅活二三次出頭面胸腹腰背項下稀少大小便如常者為吉若一熱使出瘡多稠密者當詳視其根窠分與不分顏色紅潤不紅潤若其中有先起虛大色黃如令者名賊痘大而黑者為痘疔若報點青色著頭大一塊不起凸者此痘疔也若根窠分色紅潤或一盤

痘明瘡中有黑疔者當以銀錢挑破口含清水吸去穢血用紫草膏油蘸脂加血餘灰真珠末填人瘡內或珍珠散併與三仙散或犀角消毒飲加紫花地丁以解其毒挑後痛不止者隔蒜灸之若無根窠色紫黑疔多小弱者不治若頭面一片光潤如臙脂塗抹隱隱於皮膚中者是血滯不流氣凝不運為痰阻滯不得通貫也先以升均湯大吐其痰次以犀角地黃湯去丹皮加水通紫草蟬蛻連翹但兩額黃碎成積紅暈不分顆粒者急投羚羊解毒湯以分之若雖分

醫通卷十二 見點

單

根窠身熱枯紫者後必發躁導赤散以利小便更用涼血解毒藥入燒人矢一錢遲則變黑而危矣若身不熱只乾焦者熱也導赤散若雖紅活大瘡癩嫩此元氣不實毒入氣分保元湯加連翹忍冬若色淡皮寬者此元氣至虛參耆內托散若雖高起色紅但乾燥口渴此火盛血少四物湯換生地加荆芥紫草連翹木通最忌參朮若帶滯滯溼氣者此脾胃氣弱四君子加蒼朮荆防川芎切戒黃耆若色雖光潤捺之即破此氣不足大劑參耆內托散或保元湯若色如

楚發其水氣者此氣血俱虛。用十全大補加燒人
矢治之。能變紅潤。含水者可治。否則危矣。已上俱有
瘡塌之變。均險證也。若遍身有細如芥子者。夾疹也。
有皮肉鮮紅成片者。夾斑也。皆毒火太盛。故一齊湧
出。並宜化斑湯發之。熱劇勢甚。加石膏。若初見點簇
簇於皮中。不現不起者。非風寒壅遏。必氣虛不振。風
寒壅遏。必煩擾色晦。羌活湯加升葛氣虛不振。必氣
微色淡。保元湯加芎桂。有痘出身涼。而口燥渴者。此
熱毒內盛。其痘必密而重。急宜內解熱毒。禁用升麻。

醫通卷十二 見點

痘初出而肢體作癢。爬搔不寧者。此風寒滯於皮膚
也。解毒飲子加穿山甲。痘出隱隱不起。而發狂便閉
溺瀉者。此毒火鬱結於陽明也。涼膈散下之。痘本磊
落。而變乾焦紫黑。厥冷脈伏者。此必飲食所傷。不能
運化。致氣血凝滯。故形如死狀。但按其胸腹必熱。枳
實梔子豉湯加大黃。痘出將半。遍身作痛者。此熱毒
鬱滯而未盡外出也。煎防解毒飲。亦有六淫所滯而
作痛者。審時令寒暄。而調適之。痘出壯熱煩渴。痰喘
便秘者。肺胃二經實熱。滋潤也。涼膈散加前胡枳殼。

痘未出齊而煩躁壯熱。色赤。用涼劑轉躁熱者。此毒
得寒而凝滯也。仍用前藥。稍加辛溫之味。以開發之。
凡痘出未盡。毒猶在內。不可與大寒大熱之劑。寒
則凝滯其毒。熱則轉助其火。惟宜平和疎透之品。隨
表裏虛實寒熱調之。痘未出齊而刺下赤白。此血熱
毒盛。兼有積滯也。黃芩湯去棗。加植葉防風。若痘隱
不振。形色淡白者。非保元湯加桂附不救。痘出而手
足搖動者。由脈不能約束其毒。熱甚生風之象也。煎
防解毒飲加全蠍。痘出未齊而頭面浮腫者。風熱上

醫通卷十二 見點

攻也。解毒飲子。痘出而兩目赤腫。色見乾紅。大小便
秘。睡臥不寧者。此血熱毒盛不解。上攻於目也。犀角
地黃湯去丹皮。加連翹黑參牛旁荆芥。有未見點時
身熱和緩。見點後身反大熱不休。煩躁昏沉便秘。或
吐瀉者。逆證也。痘報形起脹時身熱。四肢冷者。後天
脾胃衰弱也。睡臥不伸者。先天腎氣本虧也。俱不可
治。有初出便見水泡。二三日即變白漿。不久即乾。
此火毒盛劇不治。若毒雖細密如蠶種。平塌如胖蠶。
如冷痢結面。或大者平塌。小者稠密皮薄。而或邪視。

考無皮肉收胞面骨光腫者。舌出血而危。若皮膚
癩。風粟起如疹。如疥。或現此不待長發。當
啼而危。若正面胸背手足腫硬。或成塊青紫。或紫
如瘡。狀當黑陷破爛而危。若紅紫黑斑。如蚤嚙蚊迹。
洒朱點黑。潑青與皮膚一平。頭面一片如臘脂者。三
五朝即危矣。

部位

痘瘡見點之時。先察部位。即可知吉凶輕重矣。痘為
陽。故隨陽而先見於面。凡口鼻兩傍。人中上下。腮耳

醫通卷十二 部位

望

年壽之間。出見者吉。若見於天庭。司空印堂。方廣太
陽等處。俱非佳兆。大抵見點於眉已下。頤已上。正中
陽明部分皆吉。若見點於眉心上。至髮際太陽部分
多凶。其見點於腮頰耳傍。少陽部分俱險。朱濟川曰。
余初業時。亦據前論。每每不應。究心三十餘年。從正
額間兩顙先見者。多順。人中口鼻先見者。多險。或口
唇目胞。預為浮腫者。此脾胃受毒。尤險。太陽頰頰腮
耳先見者。多逆。其不能先見於上。而反於下部見者。
亦元氣之不振耳。其起漿收靨亦同。凡初見點於正

面吉部相去一二寸。一額尖細。淡淡桃紅色者。必稀
而輕也。若初見點於正面凶部。二三相竝五六成叢。
或赤或白。頂平而少神者。必密而重也。張潔古云。一
發稠密如鍼頭者。形勢重也。輕則表而涼。其內連麴
升麻湯。然稠密之處。各有經絡部分所屬。額主心。面
主胃。腹與四肢主脾。脇主肝。兩腋主肺。腰足主腎。肩
背主膀胱。當隨見證。若面色黃。大便黑。煩躁喘
渴。或腹脹者。瘀血在內也。庫角地黃湯。或磨生犀汁。
但根窠分明。肥滿者。無妨。其頭面最要稀少。勻朗。綻

醫通卷十二 部位

望

山紅澤。肢體雖密。治之可生。若頭面稠密。半塌肢體
雖稀。未可輕議其吉。故額顙多者。為蒙頭。顙項多者。
為項項。曾前多者。為胸胸。兩頰兩顙。多致成片。或如
塗朱。則肝盛剋脾。八九日當作瀉。不食而為險候。惟
四肢雖多不妨。痘出稠密。難為險候。若面痘易起。易
透。口封能食者。可治。若身痘雖好。而痘漿清。半塌者。
難治。若諸處痘不起。惟面及臂上痘。有漿起綻者。
可治。有面痘好。惟鼻上無痘。或有痘不起。綻行漿者。
皆不治。四肢有癢。身而無者。難治。一身有痘。漿足。惟

面上不行漿者死。一身痘色紅活，惟面部焦枯者死。遍身痘好，惟兩足膝下全無者，凶。冬寒不出，胡荽酒熱洗多次，內服溫解透肌之藥，加木瓜、薏苡以引之。延至五日治無及矣。若面部漿足收靨，肢體尚不行漿，神清能食，可治。有面上左有右無，右有左無，此氣血乖離，必難漿，難綻，多不可治。痘出而面半已下稠，密灰白，面半已上勻朗紅潤者，補中益氣湯。若面半已上稠密灰滯，而面半已下勻朗綻澤者，名雲掩天。痘不治，痘出左半身稠密紅潤，右半身間有數點者。

醫通卷十二 部位

痘

此毒發於陽為順，補中益氣湯。若右半身稠密灰滯，平塌，左半身間有數點者，此毒發於陰為逆，漿難行，不能收斂。九日死。痘出齊而諸處俱勻朗紅潤，而腰圍稠密灰滯，作痛者，名纏腰。此毒滯於陰，不能成漿。九日死。遲則不過十一朝也。痘出齊而遍身稠密，頭面全無者，此陰毒不能升於陽位，不治。已上諸證，除不治外，俱要疏通營衛，使無乾枯焦黑之患。紫草消毒之味似不可少。若熱甚者，芩連地骨皮。牛旁子、連翹、葛根、氣虛、神性、香木、香大、便秘者，枳殼。

小便瀉者，木通、食少者，山楂、枳木、薄者，白芷、蟬蛻、脹者，木香、厚朴、腹痛者，芍藥、丁香、香然亦看人之大小。虛實大而實者，猶或可治。小而虛者，多不可收。諺云：樹小危多，難結果。小船重載，定傾危。可為善喻者矣。

形色

形乃色之充，色乃血之華。氣旺則頂尖圓，血旺則根盤緊。形貴尖圓起發，瘡皮堅厚。若見平塌皮薄為凶。色貴光明潤澤。根窠紅活，若見慘淡昏黑為危。然形有起發而致變者，由色不明潤，根不紅活故耳。若痘

醫通卷十二 形色

痘

色光澤，根窠紅活，雖塌可治。但以紅活為貴，而又有圈紅、暎紅、鋪紅之別。圈紅者，一線淡紅，緊附根下而不散，吉兆也。暎紅者，血雖似附，根脚隱隱出，部險兆也。鋪紅者，痘色與肉不分，平鋪散漫，凶兆也。根者，血之暈，膿者，血之腐。故六日已前，專看根窠。六日以後，專看膿色。若無根窠，必不灌漿。若無膿色，必難收靨。此必然之勢也。然間有色不明潤，而根脚好者，仍得收功。以根為痘之本也。若根脚不同，顏色雖好，須防七朝有變，不可以色好而輕許無事也。有初出色白。

不紅活若夫圓易起分類潤澤者此氣血未會至三四日色轉紅活不宜妄補反生變端若色白枯燥稠密脚散目微紅唇腫燥熱劇無神二便秘澀或作吐瀉此火盛無血多致內攻死在五六日間矣王肯堂曰痘疹之中惟黑者最難識若初出時隱隱有黑點見於頭面自三朝至六七朝黑色如故不見紅色形如圓珠而有光澤行漿尤滿漸漸黃赤者名曰黑痘今人皆以變黑歸腎者指為腎經之痘不知血熱毒盛之痘初必乾紅青紫至六七日後倒靨變黑與

初出便見黑潤不同與一熱腰下便見黑點如蚤咬者迥異此腎氣充實之黑豈可與尋常痘疹同例而論哉

起脹

痘瘡既出之後二三日間足心齊見漸漸長發肥潤光澤面目漸腫灌漿為吉若三四日內隱於肌膚不能收脹此元氣虛也快斑湯透肌散催之色不紅活其勢漸起脹身而但起于足四肢不能展舒者并附在所必用之藥若見吐瀉不食手足指清而不長

發者甚證必寒也陳氏木香散并雄冠血和酒釀灌之及羅明荃酒微噴衣被若四五日雖見長起顏色紫白唇頂者此氣虛也參茸內托散加糯米雖不白亦不紅活陷頂者此血虛也四物湯合保元若色赤而兼痛者血虛有熱也四物湯換生地加犀角連翹若氣虛有熱保元湯加連翹木通桔梗忍冬若痘頂色白連肉紅腫而痘反不腫且燥屑焦者九日死急以化毒湯加生地川芎調二寶散救之若色紅根散不長發者此血熱而氣不相依大氣粘子湯加紫草

醫通卷十二 起脹

若色雖紅而焦口乾不起發紫草飲加紅花酒茶連翹芍藥若大便秘結內有實熱不發者消毒散加犀角或四聖散加枳殼黃芩山樞穿山甲若大便利日渴不發者此內虛熱七味白朮散若自利不渴者此內虛寒理中湯加木香若出遲而小便瀉滯欬嗽有痰生聖散起遲而小便赤清四聖散去黃耆加速翹升麻虛則紫草木通湯若夏月暑氣熏炙煩渴不發四苓散加門冬竹葉冬月冷氣所侵寒凍不發者陳氏木香散寒頭湯瀉飲沸湯日不知熱陳氏昇功散

一書 1023 冊 貴參日全書第 5 版文身

先作漿次長者次作漿循循有序為順若脾胃弱則氣衰微不能助痘成漿為險若脾胃損則氣血澆漓不能灌汁必喘脹悶亂癢塌倒壓嘔噎泄瀉為逆其或肩上有痘先黃者此毒攻脾當十一二日不食而危若稠密焦紫不起頂者此血熱毒盛當視其人皮之厚薄厚者化毒湯加連翹黑參若皮薄如水泡者雖灌不滿必有癢塌黑陷之變若頭面稠密身上稀少色白不能起頂灌漿者此血氣虛少參耆內托散藥力在上先頭面漿滿四肢不灌前藥加糯米芍藥

醫通卷十二 灌漿 至

以牛膝下引至足若五六日漿雖灌而不稠濃不圓滿或陷頂者此為氣弱不能統血保元湯合四物加觀桂若雖飽滿色見眈白者此氣盛血弱也四物湯加木香糯米若六七日內灌漿不滿中有不灌者此氣血不和必變虛寒癢塌保元湯加芍歸芍藥白芷糯米若雖見長滿摸則皮皺此血虛而氣不相依必難收醫參耆內托散加糯米若氣虛之證用內托補藥暫起灌漿不滿而復平塌者更用大劑保元湯加芍歸木香升桂糯米煎養漿時漿不易充而色淡白

食少便溏此氣虛也保元湯加當歸肉桂若根赤煩渴便秘者此血熱也犀角地黃湯誤用參耆托漿而熱愈甚者四順清涼飲養漿時乾空無水此氣虛伏陷也若人事清爽飲食如常痘無損處補中益氣湯若喘脹噦瀉煩悶外刺者不治痘本稠密色淡養漿時昏睡妄言者此血虛神無所依也保元湯加棗仁茯神歸地門冬養漿時喜笑不止者此心包熱甚也保元湯加人中黃黃連養漿時嘔噎不止而漿不充者土敗木侮不治之證也灌漿時痘色明綻而兩臂

醫通卷十二 灌漿 至

腫痛如瓜者此手三陽氣虛而毒凝滯不散也保元湯加桂枝羌防當歸忍冬犀角連翹養漿時能食便溏諸痘俱灌惟正面平塌無漿此足陽明氣虛也保元湯加觀桂芍藥有灌漿時忽然倒壓或血熱毒盛不能起長伏陷喘脹便秘諸藥不効者攻毒湯有漿雖灌而清稀不能充滿者後來必有餘毒能食便堅者用嫩黃雌雞人黃耆一兩黃汁少和酒釀飲之若漿清頂不足而不犯條欵自能飲食者當發痘毒方可收功若有變及不能飲食者必危已上諸證年大

能食者十全五六年小不能食者難治。漿雖灌而色太紅。根脚散者。此血熱未解。九朝十一朝內必發。急宜化毒湯去升麻。加芍歸白芷連翹。忍心勿令抓破。如破處鮮血淋漓。則氣血流通。外用陳年屋茅研細。搽之。或以松花掩之。若因發癩而擦破。清水無血。必無生理。破後隨灌。隨乾。顏色青白。堆塚如雞矢者。終必咬牙寒顛。發渴作喘。二十日外必危。但抓破處。如刺光魚皮湯。水泡者。不治。若八九朝灌漿之時。身發壯熱。渴欲飲水者。此瘡多毒。盛表裏氣血俱虛之

醫通卷十二 灌漿

故加味四聖散。去木香加歸芍。亦有漿半足而熱甚。煩渴引飲不已。此津液外布而肺胃枯涸也。大劑保元湯。合生脈散。類進。漿滿而渴自止也。若壯熱煩渴。舌乾唇裂。痘色乾紫者。血熱毒盛。或重裘煖炕所致。不可誤與前藥。犀角地黃湯去丹皮加苓連。若行漿時感冒風寒。痰喘者。難治。畧與疎散。不効者。死。痘漿充而腹滿泄瀉。此停食所致。保和丸消導之。若灌漿時痛不止者。氣滯也。保元湯加山楂木香。以行其滯。則痛自止。有塌瘡不止者。此血熱也。四聖散加生地

黃乾首烏以涼其血。其癢自止。若漿足而癢不妨。若灌漿之時。十朝之外。身體倦怠。煩悶嗜睡。口有氣息。此必胃中蘊熱。喉舌生瘡之故。急用黃連解毒湯。或消毒飲。加防風。遲則瘡雖收。靨脫亦延至二十日外。牙齦蟲蝕。出血而成。牙宣呼吸息出。而成。息露。或為走馬崩砂。狐惑。齒落。唇爛。為不治矣。

收靨

痘瘡至八九朝至十一二朝。灌漿滿足。膿汁漸乾。先從人中上下口鼻兩邊。收至項下額上。遍身手足一

醫通卷十二 收靨

齊俱收。痂厚色黑。漸漸脫落。飲食便溺如常。為吉。若額上先收者。孤陽不生。腳上先收者。獨陰不長。為大逆。此若漿不稠濃。頂未滿足。而腫忽退。目閉忽開。瘡脚放潤。色白。乾皺。痂薄如紙。此津液枯竭。血少毒存。急用四君子湯加麥冬。牛蒡。荆芥。連翹。救之。今人每見此證。認作結痂無事。致成不救者多矣。或有將醫之時。熱不止。而脈滑數者。毒未盡也。托裏快斑湯服之。服後復出。則瘡其熱自除。有發瘡時。痘內復出。餘痘者。吉。若漿足難靨。色轉黑者。凶。亦有能食神清者。

可治有收曆時欬嗽咽喉不利者此肺胃餘火不清也。桔梗湯加牛勞連翹黑參痘漿清而忽然乾黑謂之倒歷。若漿足而次第收曆。痲厚色蒼忽然喘急腹脹者此傷食所致。保和丸消導之。若收曆如期而身熱喘逆者此容冒風寒也。當隨輕重以汗之。其或當壓之時身熱悶亂不寧。嘔氣腹脹泄瀉寒顛咬牙。急用錢氏異功散加水香當歸助其收曆。若日開腫退色白不收。反腹脹躁渴悶亂。噎氣者此必曾經泄瀉。或過用涼藥脾胃虧損所致。陳氏木香散否則倒歷。

醫通卷十二 收曆

五

而危矣。薛氏云若手足竝冷屬脾胃虛寒。陳氏異功散手足微冷屬脾胃虛弱。錢氏異功散加水香若手足熱大便秘作渴引飲屬脾胃實熱。四順清涼飲救其陰以抑其陽。又有當壓之時清爛淋漓者毒當發而發散遲則毒蓄肌肉未當發散而發散早則毒邪暴出肌肉虧損。熏灼腐爛甚至內氣併虛。滑泄自利。悶亂呻吟而死。急用陳氏木香散或錢氏白朮散治裏豆蔻丸以止瀉。外以白螺散或膏上敷草為末。搽之。或用黃牛糞燒存性入麝少許搽之。或薑黃燒灰。

加枯礬少許搽之。或用蕎麥麩者謂塗爛處并煎蕎麥麩視身下以收其毒。夏月盛暑用芒硝豬膽汁。謂塗若手臂臂膊之間。久者牀席屢擦破損。急難成痲。或破爛成片焦乾。驚黑如火燒湯潑亦難治也。又或當壓之時發熱惡寒身疼面青。瘡不收曆者此寒風寒侵襲故發身疼。桂枝湯加荆防淡豆豉。虛則參蘇飲。如或夏月居處過熱。熱與毒相凝而痛益元散加枳橘連翹白芍。痛去熱退瘡自曆矣。倘痘疔失於批拔。收曆時作痛。急宜批治以泄其毒。又或頂破膿出。

醫通卷十二 收曆

五

結聚如碎松香者此因多用溫補之藥邪氣得補反傷正氣。急磨生犀水飲之。及益元散利小便。當歸丸導大便自然收曆。亦有漿雖灌而未得滿足不能收曆者。犀角消毒飲解散其毒。方得收曆。又有曾用涼解之藥及飲冷水致腹中滑泄。氣短體倦而不曆者。以胃苓湯和胃安脾。亦能收曆。其或瘡頭有孔膿水流。出或清水無膿。卒然自破。水出乾黑。是名漏瘡。不治又有遲延日久潰爛淋漓。皮脫腥臭。若先曾成膿而後潰爛能飲食無他證者。當和脾胃。避風寒。多用。

不寧者熱毒不化也。犀角地黃湯加連翹牛旁者。狂言讖語。四物湯合生脈散加棗仁。若神薄如徒昏迷少食者。此脾胃虛也。大劑保元湯補中益氣並加穿山甲。預防發癰之患。有收靨後身熱。欬嗽聲啞吐痰而飢者。此毒火乘金。越出上竅也。犀角地黃湯加苓連。門冬牛旁子。有脫痂後自汗不止。疤痕色淡而手足清者。氣虛也。十全大補湯若身熱手足自汗不止。而疤痕紫赤者。胃中餘熱。傍達四末也。犀角地黃湯。夏暑人參白虎湯。脫痂後能食便秘身熱口渴者。此

醫通卷十二 脫痂

五

胃中積熱上蒸。須防口疳齒蠱之患。清胃散有脫痂後午後潮熱。臉赤煩悶。錯語昏沉者。此火從虛發也。保元湯加歸芍。有收靨後復發斑疹紫赤者。此餘毒熾盛也。犀角地黃湯加劑。防連翹牛旁人中黃。若服藥後反加瀉瀉或喘脹者。不治凡痘疤色白。急當調補中氣為主。若服藥而漸紅活為吉。色不轉者危。雖二三年後多患瀉痢而死。若妄投攻伐。禍在反掌。

陷伏

發生聚散而彰於外者。陽之德也。灌溉滋潤而守於

內者。陰之德也。陰不足則陽不長。而枯萎之變出焉。陽不足則陰不生。而陷伏之變出焉。痘瘡正當長發。灌漿之時。平塌不起。謂之伏出。而復沒謂之陷。有紫黑。白三者不同。虛實寒熱之異。今人乃謂變黑歸腎。欲用錢氏宣風散百祥丸下之。不知牽牛大戟峻利之藥。有傷元氣。非質堅便實者。不可輕用。大抵血熱之證。初必深紅。失於解散。必變紫變黑。甚至乾焦。自然之理。治者當於乾紅之時。急用解毒涼血。頂雖平陷。斷不可以氣虛。獨治而用參耆補劑。則氣盛而血

醫通卷十二 陷伏

六

愈涸矣。丹溪曰。瘡乾宜退火。祇用輕劑。防牛旁之類。若其人能食便秘。溺赤者。當用解毒防風湯。發散其毒。有黑疔。挑出惡血。內服犀角消毒飲。外以珍珠散塗之。觸犯寒邪。肌表固閉。毒氣伏而不發。致黑陷者。神應奪命丹發之。熱毒內攻。神昏悶亂。寒戰咬牙。而黑陷者。神授散救之。便秘氣實。四順清涼飲。小便不利。導赤散。減食氣弱。加味四聖散。兼扶脾以勝胃。水自愈。聞孝忠不達。錢氏本意。妄言黑陷為寒。及云。痘瘡終始不可服涼瀉之藥。後人因之。反致甚焉。

陷而死者多矣。觀斑痧之陷者，無不腹滿喘急，小便赤澀不通，豈非熱極所致耶？間有胃氣虛寒而陷伏不起，則用至寶丹毒邪傷胃，無何毒邪竄入腎經，人牙散毒邪伏於心腎珍珠人牙散，但人牙發痘最。猛用之不常，則有痘頂迸裂之虞，不可不慎。若因虛熱毒盛而陷，急用桑蟲漿地龍酒雞冠血等方，選用蓋氣虛白陷用桑蟲血熱黑陷用地龍瘡乾紫陷用雞冠血不可混也。朱濟川曰：毒壅心肺二經用雞冠血以發之，毒壅脾經用桑蟲漿以醇之，毒壅肝經用

醫通卷十二 陷伏

空

紫草茸以鬆之，毒壅腎經用人牙散以攻之，毒滯經絡用川山甲以透之，葉子蕃云：毒壅於肺則用桑蟲毒壅於肝則用雞冠血，毒壅脾胃則用地龍毒壅心腎無藥可治，惟寒閉毒邪於腎則用人牙與濟川稍異。古方牛李膏宣風散棗變百祥丸獨聖散周天散皆治毒盛黑陷之藥，咸可取用。如外觸穢氣，常用胡蔓酒噴其衣被，并燒紅棗乳香碎之，若瘙癢者，茵陳蒿為末，棗膏和，曬乾燒烟熏之，在大江以北則用水楊湯浴之，其見灰白陷者，此必不能食乳，或先因吐

渴脾胃虛弱毒匿不起而變虛寒白陷者，白癩最捷。蓋氣虛則為癢，為暗，血熱則為痛，為燥，痘色白者必至於灰，慳灰慳者必至於癩，癩此皆氣虛而不能起，脹血虛而不能華色也。參耆內托散加歸芍使血活氣行，白者可變為紅矣。若虛寒甚者，陳氏異功散加養血藥救之。若單行補氣則氣燥血虛必致發癢，抓破灰慳倒塌為不治矣。

倒靨

痘瘡能依期灌漿結痂如螺靨為吉，若膿未滿足忽

醫通卷十二 倒靨

空

然乾靨或膿成之後不痂破爛或收靨之時泄瀉膿血或空泡乾枯或發熱昏憤或咬牙寒戰或手足並冷飲沸湯而不知熱是名倒靨。由中氣不足毒從內入之故，宜參耆內托散補中益氣湯保元湯選用，使破者重復灌漿無處更出，膿瘡則正氣得補復祛，出毒邪也。若服補藥不出膿瘡破處不復腫灌更下膿血者不治。若將靨之時忽然黑靨或漿未充而忽然收靨或漿雖充而一齊結光乾紫此氣虛血熱因火迫而收之太速也。犀角地黃湯加紫草茸或四聖散

如人參當歸。然其形證又當推辨。如身痛四肢。瘡色青紫者。此則外感寒邪。腠理閉拒。而倒懸入參。敗毒散。并用胡荽酒噴之。忽然倒懸。而心神不寧者。豬尾膏。若心煩狂躁。讖語便秘。口渴飲水。能食者。此則外觸穢氣。而倒懸。內服奪命丹。外燒熏穢散。辟之。屍氣所觸。而壓。辟穢香解之。有藥未滿足。忽然目暈。深陷。乃氣脫倒陷。若作昏沉痰喘者。死。丹溪云。痘瘡倒壓。因真陽虛。而毒氣不能出者。保元湯加紫草之類。若將成就之際。如淡色者。屬血虛。芎歸之類。或加

醫通卷十二 倒壓

空

紅花紫草屬熱。升麻芍藥連桔梗之類。甚者用犀角薛氏云。若熱毒方出。忽被風寒閉塞。肌竅血脈不行。身體作痛。或四肢微厥。斑點不長。或變青紫黑色者。此為倒壓。若胃氣虛弱。不能補接。營衛出而復沒者。謂之陷伏。誤用解毒之藥。必致陷塌。若喜熱飲食。手足並冷者。乃脾胃虛弱之證。宜用辛熱之劑。補之。喜冷飲食。手足並熱。乃陽氣壯熱之證。宜用苦寒之劑。瀉之外感風寒者。溫散之。毒氣入腹者。分利之。陽氣虛者。溫補之。外寒觸犯者。重解之。陳文宿用異功散以

預保脾胃於未敗之先。實發前人之未發。開萬世之朦朧也。

夾斑

痘瘡夾斑疹而發。是藏府熱毒交盛。故一齊湧出。予嘗洗心體會。痘證但有夾麻。而夾斑之說未果。斑乃傷寒之熱毒內蘊。而發。安有與痘齊出之理。即前見點例中所言。皮肉鮮紅成片者。為夾斑。實麻疹也。細如芥子者。為夾疹。則癢疹也。然斑則多見於胸腹肢體。頭面絕少。於此可以明辨。而舉世通謂夾斑。若一

醫通卷十二 夾斑

高

齊家楚。大不合時矣。觀先輩治例。首推升麻葛根湯。先散表邪。俟斑退。痘起。然後隨證施治。編攷方書。無不皆然。張涵高曰。痘疹齊出。方書俱言先撤斑熱。往往痘隨斑陷。惟發其痘。則熱聚於痘。痘起其斑自退。兩說似乎相左。其實並行不悖。當知斑痘齊發。總由熱毒勢盛。絕無挾虛之候。得其旨。則撤斑無非清涼化毒。起痘亦無非清涼化毒。化毒一法。隨證而施。允為斑痘夾出之金錘。如斑色紫赤。加大劑。透肌以化之。大便秘結。稍加大苦。以利之。設不知此。而歸

真斑毒事寒涼。則毒氣凝滯。若不化。則毒力外發。則斑隨痘起。幾難不分。頭粒。兩難分解也。黃五芝云。風寒夾斑。當先表散。則痘自起。大便秘者。宜速下之。大便利者。涼血透肌。解毒為主。次言先痘後斑者。輕。先出以分痘之勢也。先斑後痘者。重。斑發於肺。表氣光虛。失其起灌之力也。癩痘齊出者。險。兩毒並發。但看癩之形色。痘之稀密。斟酌而為處治。若斑見紫黑。痘見漿清。證見喘急。皆不可治。大抵斑痘齊發。總由熱毒勢盛。不可誤用參耆。若元氣本虛。痘色淡白。小劑

醫通卷十二 夾斑 空

保元亦不禁也。如六七日內。熱毒未盡。而誤與之。必身復壯。熱痰喘不食而死。否則癩毒口疳。目疾之害。所不免焉。

板黃

痘瘡根窠薄劣。漿汁板滯不活。而枯黃已晦者。曰板黃。若方廣天庭板黃。而餘者潤活。癩毒必結於腦項。若腮臉板黃。而四肢潤美。癩毒必發於肩阜。若肚腹板黃。癩毒必發於曲池三里。若背脊板黃。癩毒必結於兩軸尻骨。如遍身板黃。頭項前後板黃。頭面板黃。

眼眶脣上板黃。兩吻莖囊板黃。皆死證也。愚按板黃皆由胃熱能食。食滯滯積於中。胃氣不得宣通。而致非痘之根氣本然也。治者能達斯意。急與苦寒消導。大便秘者。當微利之。熱滯去而內外宣通。烏有癩毒之患哉。

嗽赤

聞人規云。痘瘡嗽赤。大便不通。小便如血。或結癩毒。身痘破裂出血。乃內火熾盛。失於解利。急用犀角地黃小柴胡加生地黃。及四順飲之類。薛氏云。若心脾

醫通卷十二 板黃 嗽赤 空

熱甚。犀角地黃湯。心肝熱甚。小柴胡加生地黃。若大便不通。先用四順飲。次用犀角地黃湯。若色赤。嗽痛。二便不通。急用活命飲。加硝黃。若色赤。嗽痛。惡寒。發熱。活命飲。加麻黃。若因乳母怒火。加味道還散。

斑爛

聞人規云。痘瘡斑爛之證。因當發散而不發散。則毒氣閉塞。以致喘促。因亂不當發散。而誤發散。則毒透陽氣暴出。於外。遍身皮肉潰爛。治宜調脾胃。進飲食。大便調和。脾胃健旺。毒氣自解。而無目赤咽痛吐衄。

等證若發表過甚大便自利意用理中丸豆蔻丸以
救其裏亦有痘瘡如蚊所嚙面色黑乃危證也若小
便秘結煩躁導赤散加山梔犀角赤芍白利不食者
不可用蓋毒發於表而妄汗之勝理開泄營衛益虛
轉增斑爛由是風邪乘虛變證者有之若毒蘊於裏
而妄下之則內氣益虛毒不能出而反入焉由是土
不勝水變黑歸腎身體振寒兩耳尻冷服合腹脹其
瘡黑陷十無一生醫者審之

飲食

醫通卷十二 痘疹 飲食

痘瘡既出全藉脾胃安和進納飲食則易漿易靨自
四五日以至痂落之後飲食不減二便如常雖不起
發不紅綻或陷塌用藥得宜可保無虞若乳食減少
兼之泄瀉則元氣日衰雖無前證日移必至有變藥
亦難効豈能保其無事哉若胸膈稠密毒氣傷脾胃
食者消毒飲加黃芩山楂紫草人參有傷食腹脹不
食者枳朮丸有痘出太多中焦暴虛不食者四君子
加糯米有痘已痂起而不能食身熱者滋補脾胃
為主凡四五日不食者急起毒盛於裏者為

可治至六七日痂落食則變證百端痘毒何益
有稟受壯實而發於五歲之外者又不可一例而施
也又有痘起之後能食易饑者此胃大熱不久而變
生焉大便秘者四順飲加連翹牛旁散利之不甚
芍藥湯加茯苓木通牛旁子以和之又有饑欲食
不能者必喉舌有痘銀於吞嚼也

吐瀉

凡痘疹發熱有嘔吐者有泄瀉者有吐利兼作者
乾嘔而嘔者有不食者皆毒火所致不可驟止吐利

醫通卷十二 痘疹 吐瀉

中有疎通之義治宜平和疎透引毒達表則吐瀉自
止如不止兼瀉脾胃如乾嘔而嘔為胃虛火逆最危
之兆宜橘皮茶連散以安胃氣清火毒有不嗜食者
此脾受熱毒當升提發散俾毒得外出飲食自進若
誤認嘔吐泄瀉不食為裏寒而用丁桂薑附轉增煩
劇也誤認嘔吐泄瀉不食為裏虛而用參耆苓朮反
增壅遏也此專為痘疹初出未透者而言若漿正行
時而吐利不食者乃脾胃虛弱多有內虛倒靨喘脹
之患凡長發起頂痂瘰疔泄瀉誤為險候急用白朮

茯苓以滲泄健脾人參黃耆以助元氣真訶子肉果
以止瀉佐以升提之藥使無壅遏之患若不升發難
免倒靨之虞如見心煩乾嘔而喘此藏敗毒攻最爲
凶候二陳神黃連木通燈心竹葉夏月四苓散以利
小便利而不通者危至如泄瀉而手足熱面赤反者
也弱者白朮散加竹葉陳皮強者瀉黃散若下後更
甚上午瀉稀此傷食平皆散加山楂麥芽厥冷加枳
殼或益黃散補之瀉利而嘔逆厥冷理中湯加木香
上午瀉甚下午不瀉者脾虛也朝用白朮散夕用豆

醫通卷十二 吐瀉

院

蔻丸瀉出腥臭穢滯者腸胃熱也葛根芩黃連湯
瀉而失氣者氣下泄也白朮散加升麻防風提之若
受寒邪或食冷物而泄瀉清冷痘色灰白頂陷或手
足厥而寒顛咬牙者陳氏木香散異功散瘡雖正而
吐瀉或下血俱爲逆候若但吐不瀉無痰益黃散有
痰二陳湯吐而身熱煩渴腹滿氣促大小便瀉而赤
者當利小便若先吐而後出痘足蹠不伸聲啞熱蒸
者雖有清漿不治陳文宿云痘瘡瀉水穀或白色或
淡黃者陳氏木香散送豆蔻丸不愈異功散救之

腹痛

痘瘡腹痛者皆毒鬱三陰如腹痛面青手
胃虛寒理中湯益黃散選用若腹痛痞滿
厥逆而大便不通者此毒壅不透也桂枝大黃湯合
表裏而開泄之若腹痛面赤作渴手足熱此脾胃實
熱消毒飲加山楂枳殼黃芩木通若氣粗身發顛動
而痛口臭唇舌白胎者此毒攻藏府腸胃內潰不治
喪全善云腹痛多是熱毒爲患當臨證消息之薛氏
云若痘未出而發熱煩躁作渴飲冷大便堅實而痛

醫通卷十二 腹痛

午

此熱毒壅滯也急調元明粉通利之若痘不出而煩
熱渴不能飲冷大便不實此元氣虛也白朮散溫補
之若噤腐吞酸大便穢臭乳食停滯也保和丸消導
之凡腹痛作渴飲冷手足並熱者屬實熱若作渴飲
湯手足並冷者屬虛寒也翁仲仁云痘疹腹痛當升
發以解利痘毒兼分利小便使上下分消則痛隨利
減俗醫恆用厚朴以行滯氣不行升發解利者非其
治矣亦有乳食停滯而腹脹痛者當於升發解利藥
中加消導之劑兼審所傷何物而爲之清理又有數

日不大便者大便行而痛自止亦未可驟用硝磺然有實邪固結按之硬滿而痛又須峻攻不可膠於上說耳

腹脹

痘出腹脹皆毒鬱腸胃所致若胃中伏熱心氣不降小便赤濇而腹脹者導赤散加滑石紫草若痘乾紫而腹脹不大便者為血熱毒盛紫草承氣湯若瘀血在裏面黃煩躁小便利大便黑犀角地黃湯加穿山甲若氣促體倦大便利小便秘手足冷者脾虛也

醫通卷十二 腹脹

芥散加木通木香若膠脹腸鳴氣喘厥逆瘡白燥渴者急用陳氏木香散救之遲則陷伏難治矣若譫語便秘躁渴澹紫焦者此內實熱小承氣湯若長發時倒盤腹脹者不治

腰痛

經曰腰者腎之府痘瘡見腰痛或痛連背脊轉側不能皆因腎邪空虛邪火亢盛真陰不能勝邪之故急宜四順清涼飲救熱存陰為務若痘未出而驟熱腰痛面色紫赤痘必乾枯紫黑此腎藏火毒盛刻急用

百祥丸或水調元明粉以下奪其熱後用消毒飲加防風紫草連翹木通若腰下見紫黑成片如蚤嚙者不出七朝必死

二便秘瀉

痘疹要小便清而長大便澀而潤謂之裏氣和一有艱阻則毒邪內畜腸胃壅遏不能傳化便宜清解得大便通溺自利矣三黃丸四順飲前胡枳殼湯之類此專為痘始發時而言若痘正養漿時而二便秘者宜審虛實治之中病即止不可過劑若飲食如常二

醫通卷十二 腰痛 二便秘瀉

便如昔內證平和不可溫補亦不可妄施攻擊也

大便秘

痘瘡出後灌漿之時雖要大府堅實為順若痘出五六日不大便此毒火內乘津液外耗腸胃乾枯而秘也四順飲若色白少神不食嘔吐清水者虛秘宜錢氏異功散加歸芍若血熱口乾煩躁便秘四順飲加紫草使其便利二三度熱毒自解煩躁自寧若有風寒先宜解散然後可下若不先解恐表邪乘虛入裏疔反伏而不發發亦不齊遂成陷陰焦枯等所必致

如六七日灌膿之時。壯熱脈盛而大便不通。加味解毒散及蜜煎導以潤下之。否則腹脹喘滿。矣有過利小便。津液內耗而秘者。生脈散加常歸。又氣血俱化。成漿而四五日不大便者。只宜清涼活血。漿足自利。不須治之。薛氏云。痘疹大便不通。當分辨虛實。以手足冷熱及飲水飲湯驗之。

弱滿

痘瘡解毒。以利小便為要。小便不利。乃熱毒結於下焦。連翹防風湯。赤澹有血者。犀角地黃湯。加水通莖。

醫通卷十二

大便秘滿

七

中痛者。合益元散。延久則身熱躁悶。喘渴。焦紫。或生癰破裂。或口瘡咽腫。或內作膿血。變證不一。大抵未出之先。熱甚而小便不利。恐欲起驚。導赤散微解之。初出不快。小便赤澹者。生聖散。長發。癰漿時。別清者。五苓散。加水通收。醫之後。小便不利。煩熱而渴。豬苓湯。若肺熱氣化不行。小便不通。五苓散。探吐之元氣。虛弱不能清理。傳道者。補中益氣。加門冬。車前。肺虛不能滋其化源。生脈散。加黃耆。甘葛。膀胱不能吸引。肺氣錢氏。異功散。加麥冬。五味。胃熱。小便赤澹。無過。

生聖散。肝熱。小便澀閉。龍騰瀉肝湯。腎熱。水道不行。導赤散。腎虛。肝熱。小便枯約。生料六味。去黃。加麥冬。

痢

痘瘡未出之先。先會下痢。此元氣已虧。起灌最難。滿足。升發。痢中必兼實脾為要。又須辨其寒熱。赤白。如痘色紫赤。口燥咽乾。小便短澹。痢下鮮赤。此風能動血也。三奇散。四苓散。參用。若痘色淡白。四肢清冷。小水清利。痢下晦淡。此水液清冷也。補中益氣湯。陳氏異功散。參用。有食積而腹急脹痛者。平胃散。加山楂。

醫通卷十二

痢

七

水通。若至二七內外。而瀉利膿血。為餘毒未盡。熱移大腸。兼之溼熱相併。紅白交作。四苓散。加苓。連山楂。水通連翹。大抵痘後。利膿血。為五液注下。最危之兆。若以痢治。而峻用苦寒。不旋踵而告變矣。

驚搐

古人謂先發驚而後發痘者。是熱在心。而不在痘。為逆。然有順。先發痘而後發驚者。是熱在痘。而不在心。為因風邪所激。而發者。有因脾氣虛弱而發者。不可不辨。若正當灌漿之時。手足搐動。驚搐者。肝熱生風。

風火相搏生痰也。治當平肝木利小便為要。瀉肝則風去利小便則熱除。先與導赤散瀉青丸。次以四聖散加人參鈎藤。若手足癱瘓。口眼喎斜。涎盛語澀。腰項強急。口張舌強者。此火盛耗金木無所制而風生。消風散加蠍尾鈎藤。痰盛加元明粉。若渾身冰冷。不知人事者。不治。若發搐至口噤流涎。此脾胃受虛風。或誤服涼驚之藥所致。謂之痘風。急當清火養血。卒多莫救。若痘初出時無驚搐。收靨時忽然發搐。如角弓反張。直視流涎者。此毒火傳心移熱於肝木來乘。

醫通卷十二 驚搐

七

上氣血俱虛最凶之兆。惟痘疹將出先發驚搐者多。吉然發一二次即止而見點者。其痘必稀發十數次而報點者必密。報痘一二日而驚搐不止。多重雖曰痘前搐者。吉若發之不止為毒伏於裏。未可以言吉也。○安世曰。大抵痘前發搐。首在熱盛。痘後發搐。貴在正虛。昔余治一五歲兒。放標時忽發驚搐。痰涎壅盛。壯熱不省。忝在同道。不忍坐視。先與西黃散許點。舌上遂用簡黃。連佐以荆。透大力之類。下之一服。神清熱緩。痘亦隨起。反掌效。功近於都門。瀆正黃旗。

四川道監察御史譚粹然。字公之孫。年四歲。痧後忽發驚搐。諸方皆謂莫救。亟遂予往診。其六脈虛數。無力。手足時發拘攣。口眼喎斜。唇燥囊縮。溲便清難。證雖危殆。以舉家懇救甚切。因思痘後發搐。多緣氣血兩虧。土衰木賊。虛風內動所致。法當溫養肝脾。峻補氣血。使正氣有權。虛風得以自息。若治其驚。是速其斃也。為疏一方。以十全大補桂枝日進二服。搐遂稍定。又二服。二便自通。囊亦少縱。目睛轉動。諸證向安。但頭發毒數處。其色亦不甚赤。於前方中去芍地。

醫通卷十二 驚搐

七

加白芷。忍冬。貝母。三日後毒亦消散。聲音清朗。飲食如常。惟左臂與左足不能舉動。更於原方加牛膝。倍當歸。四劑。便能步履。獨手腕無力。仍以牛膝。易桂枝。先後不逾一方。調理而痊。孰謂證見危逆。而悉委之不救哉。○痘疹盛行時。如見驚搐。切不可作驚治。一切硃砂。牛黃。腦麝。粉等。皆痘所忌。不可不慎。

欬喘

欬嗽痰喘。雖屬肺熱。然有氣虛。痰理不調。風邪侵肺。而嗽吐稀痰者。參蘇飲。頭痛身熱。鼻塞喘嗽者。風寒。

一第1023 冊 續修四庫全書 子部 醫家類

也。芎蘇散若欬嗽不已。無表證者。此肺虛為痘毒所乘。補肺湯喘脹便秘者。肺熱也。黃芩瀉肺湯有湯水入口。即欬而吐出者。肺胃熱痰膠固也。先與梔子豉湯加葱白。桔梗。探吐。後服如聖飲。面白手足冷。喘促者。此虛寒也。白朮散亦有肺腕有痘。淫淫作癢。習習如梗。阻礙氣道。而為欬嗽。痘收自愈。有不欬嗽。但喘者。若初出。噴嚏鼻流清水。而喘風寒。客肺也。參蘇飲。痘點乾。紅腹脹便秘。而喘。毒盛氣不舒暢也。宜清火解毒。有氣虛不能逐邪。外出毒伏於內。而喘脹者。乃

醫通卷十二 喘

問痘證不治。有喘。後喘者。脾氣下陷。虛火上擁。下氣不續也。補中益氣湯有吐後喘者。胃虛不能制伏。相火也。六君子湯痘四五日。伏陷喘脹。必再攻發。復起可治。痘漿半足。而倒靨喘脹者。宜補兼攻。發復腫。灌為吉。有誤服參耆腹脹而喘。枳殼湯有痘密。以致鼻塞。而口中氣促。似乎喘者。非喘也。以喘治之。誤矣。
涕唾
痘瘡要涕唾稠粘。則難毒容易蒸發。若涕唾稠粘。身熱鼻寒。大便如常。小便黃赤。芎蘇散加減。如痰盛壯

胸中煩悶。大便堅實。則喘急。前胡枳殼湯微利之。庶元氣不傷。痘瘡易出。

咽喉

痘出最要咽喉清利。若毒火上熏。咽喉先受。以致腫塞。窄狹。呼吸不能。飲食不入。疼痛。啞。瘡。等證。如聖飲。甘露飲。射干鼠粘子。選用。血熱。咽喉痛者。紫草消毒。飲最當。若咽喉發熱。手指初捻似熱。捻久則冷者。此脾氣虛也。錢氏異功散。若咽喉發熱。作渴。引飲。手足並熱者。脾氣熱也。瀉黃散。若大便溏泄。飲食不進者。

醫通卷十二 涕唾 咽喉

白朮散慎勿用涼藥。致損脾胃。而變吐瀉。癘。塌也。若咽痛足熱。小便赤濇。而類數。此三陰虛。無根之火。循經上至咽喉也。生料六味加麥冬五味。

喉水

喉水者。咽喉門為毒所壅。則飲不得入。而溢於氣喉。故氣逆噴而噲也。若喉水在六七日。前見痘色紅紫者。乃熱毒上壅。若痘色灰白。不燧。元氣虛弱。肺胃受傷。大為危兆。急宜解毒。開胃。色紫兼涼。血色淡兼補。氣若七日後。外痘蒸長。光潤。此證乃內痘起發。

而瘡只須助其灌漿外痘結痂而瘡自愈矣

失音

失音之證大抵肺熱氣病咽喉有痘也若於七日前見者毒氣熏蒸肺竅閉塞內瘡糜爛呼吸俱廢者為難治若七日後瘡水失音乃內瘡先熱而醫射干鼠粘子湯或有內本無瘡多服熱藥所致者忌用消毒飲去荊芥加桔梗門冬款赤熱甚更加犀角黑參或涼膈散去硝黃若毒火上熏於肺肺受火鬱而發塞聲啞者導赤散加桔梗牛蒡若聲啞而煩熱喉痛

醫通卷十二

瘡水

失音

十一

吟作渴欲飲冷水大便不通者此心脾實熱急與清涼解毒夏月盛暑之時稍與冷水救之潔古云痘疹已出而聲音如故者形氣俱不病也痘疹未出而聲不出者形未病而氣先病也痘疹出而聲音不出形氣俱病也其治法可領悟矣凡痘瘡黑陷乾枯欬嗽失音吐瀉煩渴發熱肢冷昏睡少食痰多氣促寒顫咬牙黑陷燥癢者皆為不治惟益進溫養之劑間有得生者

寒顫咬牙

痘疹咬牙寒顫有先後之序痘正出時為寒邪所襲則肌腠閉塞不能宣達而發寒顫宜疎解之若養漿時寒顫乃陰凝於陽陽分虛則陰入氣道而作顫保元湯加丁桂以溫陽分若係表虛風寒所乘則宜保元湯加羌防荊芥連翹木香之類痘未透而咬牙者陽明胃熱宜清解之若養漿時咬牙乃陽陷於陰陰分虛則陽入血道故咬牙也保元湯加芎歸以益陰分若係肝盛木邪乘土則宜瀉青丸合導赤散作湯一證並作於吐瀉後者邪正交攻氣血俱虛之候十

醫通卷十二

寒顫咬牙

十一

全大補湯單見且內况並見乎若痘色紅紫大小便秘煩渴欲飲水者表裏俱熱之證而不寒但顫者瘡痛而播也咬牙者急痛也乍作乍止四順清涼飲若清瀾灰白泄瀉不止此脾胃虛寒純陰無陽之證急用陳氏木香其功若瘡癢因亂腹脹足冷者倒置也不治若痘焦紫陷伏悶亂昏睡或躁擾不寧聲啞氣急而寒顫咬牙者為熱毒內攻法在不治急投神授散以救之若青乾紫陷二便不通大渴不止者此純陽無陰百祥丸宜風散急下以收陰津下後身安手

足溫者方許可治。若腹脹氣喘譫語手足冷者伏陷也不治。大抵二證並見最為危候。又當以痘色辨其吉凶。或單寒顛者當補氣之中兼補其血。單咬牙者於補血之中兼助其氣。然此二證多發於痘後。其人屬虛無疑。雖有少熱亦餘毒耳。在養漿收靨之時最忌見此。故於七日前見者可治。在七日後見者為逆。

發泡

發泡為氣盛血虛之候。蓋肺火動而皮毛傷。遂聚而為泡。小者如水珠。大者如葡萄。色白而空。或有清水。

醫通卷十二

發泡

全

者氣虛有火也。治之當補脾肺。順水道而虛自實矣。錢氏異功散加車前澤瀉之類。紫而空者血虛有熱也。清肺湯加當歸芍藥茯苓車前。使小便下行則氣平。血和其泡自斂。若薄如竹膜。燎漿泡者必待漿臭而後可治。泡碎則亡矣。

發癢

氣虛則陷伏。血虛則癢塌。痘初出而遍身作癢者。此邪欲出。因風寒閉其腠理。其火游移往來故癢。宜疎散而瀉肝木。邪氣得泄。痘出而癢自止。痘收斂而作

癢者膿成毒解。火氣漸微。本無毒蘊也。芍藥湯若大便秘結。犀角消毒飲。痘養漿時淡白平塌。少食便溏。

漿清而癢。爬搔不寧者。此脾胃虛弱。氣血俱虛。虛火擾攘所致。參耆內托散。甚則陳氏木香散。佐之藥不應者。凶。痘色紅紫乾滯。二便秘。口渴煩躁。漿充而癢。抓破血流者。此氣盛血熱也。四物湯加連翹赤芍白芷。蟬蛻。甚則四順飲下之。如作癢人事清爽。自知其誤。抓破或言其癢。欲人拊之。吉。如癢而悶亂譫語。禁不止。搖頭手足舞亂。破損無血。眼割日開。凶也。若

醫通卷十二

發癢

全

他處破損雖多。膿血稠粘。正面不破者。其藏府精華不散。正氣未虧。儘可收功。有面痘雖癢甚。擦破即斃。能食神清者可治。昏亂者死。若破無膿血。不結靨。如無膚之狀。寒顛咬牙。便泄噤瘡者不治。

發渴

痘前渴者宜清金利水。痘後渴者當大補元氣。若痘瘡稠密而渴。為津液外泄。生脈散在。蔡蕙生津葛根湯。如煩躁譫語身熱者。白虎湯加麥冬竹葉。若大便黑。小便利而黃。小腹脹喘急而渴者。內有瘀血。犀角

地黃湯加歸尾桃仁紅花穿山甲若夏暑窗牖閉塞煩渴四苓散加麥冬黃連薛氏云若發熱作渴大便秘結手足並熱喜飲冷水此陽盛也四順飲若煩渴泄瀉手足俱冷飲沸湯而不知熱或陷伏黑脈者此屬虛寒錢氏白朮散或陳氏異功散選用若煩熱作渴而赤睛白此為腎經虛熱生料六味丸煎與恣飲以救腎家將竭之水燕都小兒出痘作渴恣與冷水飲之如期而愈亦無痘毒之患蓋北方人臥火炕飲火酒有熱與水相搏而然也按陳文宿云痘疹發熱

醫通卷十二 痘疹

口渴煩躁切不可與冷水蜂蜜柿子西瓜等物恐內損脾胃致腹脹喘滿寒顛咬牙則難治也蓋方宜各有不同不可一例而論張涵高曰痘出三四朝便秘溺滿煩渴壯熱痘色乾紅焦紫必用涼膈散下之後用涼血解毒調理如八九朝元氣虛弱而痘平塌漿色清稀保元湯補之有火證發渴始終不可溫補但與涼血解毒則漿行結疔而愈

煩躁

凡痘未出而煩躁者毒火內鬱或風寒壅遏不能即

出宜發散為主痘未盡出而煩躁者亦毒火盛也消毒飲加連翹黑參痘盡出而煩躁者乃血熱毒盛犀角地黃湯解之痘長養時煩躁者當辨虛實若痘頂平淡白少神漿不易充者此氣血不足保元湯加歸芍門冬虛煩懊懣者梔子豉湯加解毒之藥若綻凸紫滯便秘溺清乃正氣實而毒盛不解涼膈散四順飲三黃丸解利之小便赤滿益元散導赤散分利之若痘倒靨喘脹而煩躁悶亂乃氣虛毒盛難治

醫通卷十二 煩躁 昏沉

痘瘡成漿之時精神倦怠神思昏沉不省人事呼之不應自語呢喃如邪祟狀此痘出太過心藏空虛神無所依也人參酸棗湯氣虛大劑獨參或保元加麥仁茯苓若煩熱氣壯痰涎湧盛者改定清心丸如服藥後不寧反加悶亂者死漿清不食者不治

汗出

痘瘡多汗則津液外泄或未漿或既靨宜保元湯加養血藥然又有面赤發湯汗出不及膠者皆胃熱腎虛四君子湯去木易麥冬下六味丸若面赤作渴

手足心熱。大便堅者。腸胃實熱也。瀉黃散若初起發熱時自汗不疲。乃溼熱熏蒸而然。切不可使用蒼朮之類。以實勝理。亦不可妄用升葛之類。以泄肌肉。蓋自汗則痘熱已輕。恐發泄太甚。則津液內耗。陰隨陽散。難以收靨。即靨後自汗亦宜詳審而治。若血虛自汗。則至夜煩熱。作渴。當歸補血湯。氣虛不能自固而汗。則動作喘息。力微身熱。四肢不溫。四君子加歸著。有痘出平塌。淡白少神。身涼而汗者。保元湯加肉桂。當歸。有重幃煖炕。厚衣重衾。而多汗者。宜漸減。以清

醫通卷十二 汗出

六五

適之。

失血

痘疹失血。俱為危候。若氣血旺。毒火盛而失血者。乃邪從血解。不可妄投止血之劑。惟宜清血解毒。若治之不止者。凶。有氣血虛而毒盛失血者。不治。有悶痘五竅流血者。不治。有痘倒靨而鼻流血水者。不治。有熱證。誤投熱劑而失血者。宜清涼解毒。痘未盡出而用寒涼。毒為涼激。傷脾。不能運動其血。致逆於藏府之中。內毒搏滯於胸膈之上。積成穢血。妄行而暴吐。

衄昏暈。痘色淡白。陷伏者。理中湯獨參湯。並加肉桂。溫補為玉。所謂血脫益氣。陽生陰長是也。若痘尖綻紫滯而衄者。乃毒火刑金。犀角地黄湯加炒黑山梔。有靨後餘毒乘脾。脾氣受傷。不能統血而衄。小劑參苓白朮散。加炒黑連芎。若躁熱。則龜日乾。湯甚而衄。手足竝熱者。犀角地黄去丹皮。加黃連。山梔。炮薑。亦有中氣虛而不時。關熱。手足時冷。時熱而衄。此清陽之氣不能上升。無根之火。條往條來也。補中益氣加芍藥肉桂。有毒盛壅。熾肺金受制。流注大腸。而使血

醫通卷十二 失血

六五

者。四物湯換生地。加苓連。若下血不止。昏睡不醒者。危。凡痘中失血。惟從鼻出者。可治。從口中及口鼻齊出者。多不治。亦有從痘瘡出者。則為走泄。走泄多。則分肉空虛。毒無定位。是皆有犯於裏。為難治也。

身痛

經曰。諸寒為痛。又曰。甚熱則痛。又曰。諸痛為實。三說不同。各有其理。當熱作之時。毒始運行。忽遇暴寒。折之毒。邪壅於皮膚之間。不能宣發。此因寒而痛也。宜透肌連表。如煩躁渴甚。狂言讞語。便秘溺赤。更值春

痘更次之令痘見乾紅焦紫就火熱而痛甚就陰涼而痛衰此因熱而痛也宜清涼化毒若身不壯熱口不煩渴飲食如常二便清調痘見尖綻紅澤至七八日榮極充滿惟覺根窠脹痛此諸痛為實宜平和疏養若初出而身痛者為發未盡升麻湯冬月加蜜炙麻黃二三分既出稠密而身痛為毒盛瘀血也犀角消毒飲倍連翹加紫草兼腰背痛者肝盛血凝也瀉青丸減大黃加甘草防風便秘腹脹四肢厥冷醫痛瘡色紫黑者難治百祥丸若遍身如醫而色紫者瘡

醫通卷十二 身痛

全

毒壅滯最危之兆若二便秘結喘急煩躁梔子仁散自利不食者不治若身後痛屬太陽經用羌活防風甘草身痛屬陽明經用升麻葛根紫草身側痛屬少陽經用連翹柴胡防風四肢痛屬脾經用防風芍藥甘草急止之蓋恐叫號傷氣忍痛傷血而致變證也若食雞魚酒物而致者清胃散加生犀汁大凡痘瘡切不可食毒物恐作痛致傷元氣輕者反重重者難治然有專取毒物以攻其毒如豬尾膏雞冠血攻毒湯等方之義不可以此礙彼也

頭面

朱濟川曰痘未起發而頭面先腫者此陽火亢盛陰血不能歸附氣血相離之象若痘瘡起發頭面以漸而腫者此毒氣發越聚於三陽欲作膿血故宜腫也設當起發而頭面不腫者必痘本磊落毒勢輕淺所以不腫如痘本稠密起發應腫不腫此毒伏於內不能發越治宜助正為主如痘稀疎起發不應腫而腫者此感疫毒之邪須兼疫氣而治如應腫而平塌如傷餅或痘肉齊平或乾焦紫滯者此毒盛氣虛不治

醫通卷十二 頭面

全

之證也大凡應腫者直至漿滿結疔毒化而腫消目開為吉若疑未充足而腫消目開者此正氣不足不能化毒成漿名為倒靨乃凶兆也○聞人氏云痘疹屬火面色赤者為順赤甚為熱若肝木尅脾而色青者是為逆也急用四君子或附子理中並加升柴調補脾胃色正方許可治有痘毒遇風寒相搏凝滯於肌肉遍身皮膚色青急用奪命丹發之然冬不救

正額

朱濟川曰額乃心之部分若痘出漏處平黯而正額

勻則紅山紅潤調理無虞。而處雖勻紅綻而正額平。塌灰滯無神者。此元氣不足。不能成功於上。凶也。正額雖平塌而間有數點尖綻者。險也。又須兩額頰來助。若頰頰不起。發無潤澤。為氣血不足。終不可治也。若有心密簇如錢。而色灰滯。雖備身閉綻八九日。漿行俱滿。有心必空。殼無水後必癢塌倒。厥喘脹而死。

手足

朱濟川曰。四肢之痘。應出不出。應起不起。應癢而清。水應收乾而不痂。應脫磨而粘著不脫者。皆脾胃虛不能勞達四肢也。治宜調理脾胃為主。然四肢始終貴乎溫暖。若痘出手足冷者。脾弱也。痘出而手足作痛者。乃毒火乘脾。疏解為上。若備身漿滿而四肢尚空殼。多有不治者。臨病之際。可不撫按手足之溫冷哉。又有自言手足冷。及按之熱。而夜臥不寧者。此脾弱而虛陽發露於外也。當補脾調血為主。痘出而兩足常動搖不休。此熱毒流於陰分。不治。若出七八日。足不伸者。不治。

唇舌

痘出始終以唇舌紅潤為吉。若唇口腫脹紫黑乾裂。或有痘先黃。或唇色皎白。或有白泡。或腫爛流膿者。皆毒火乘脾。極為危候。當先升解以化其毒。次補益以培其本。庶可無虞。若痘出稠密。唇口瘡相粘乾黑者。死證也。若臭爛延及牙齦。腮頰腫破。而成走馬崩。砂牙宣。息露。狐惑等證。皆不易治。卽用化毒丸。馬鳴散。亦難取效。若初見古白唇紫。卽知實熱。急投涼膈散。及馬鳴散吹之。庶可急奪其勢。若見痰喘作渴者。不治。若氣虛火盛。津液不能上行。而舌乾口燥者。補

益為主。若毒火盛而舌乾口燥者。解利為主。若舌上燥黑芒刺者。此熱毒內蘊。急用硝黃下之。或可十救一二。又舒舌者。脾之熱。弄舌者。心之熱。有因唇燥而舒舌者。亦脾之熱也。若痘稠密。漿清。唇口搖動昏沉。寒顫者。不治。唇口腫動。目眶內陷。足常動搖者。不治。若下唇有白屑如芝。或翻轉如葵花。或有紫泡。出血及唇燥裂而見面色枯槁。煩渴不止。及腰足痛者。皆不可治。

眼目

痘疹初發熱時目赤腫者風熱上攻也四五日間目赤者火毒盛而上熏也痘後目赤腫者餘毒鬱於心脾也○痘疹出多至灌漿時自然眼閉然乾靨之後又當開眼若仍閉不開者此毒氣上攻於目急宜清解餘毒甚則涼膈散加荆芥牛旁蟬蛻大抵過期不開即當以舌舔潤去其眩汚自開○痘瘡害目不在於初而在收靨之後皆由頭而痘密膿血膠固或破爛而復腫灌毒火鬱蒸內攻於目又或痘出太盛成就遲緩過服辛熱失於清解或過受火氣或衣衾過

醫通卷十二 眼目

九

厚或客胃風寒或恣食諸卵皆能害目治當活血解毒得血活其毒即解切不可藥用涼劑恐冰凝血脈終成痼疾也亦不可點香竄之藥穀精散決明散蜜蒙散神功散羚羊散等方選用○初見點時有痘叢生日中急須移痘丹移之庶無害眼之患方雖似誕而功效特奇不可因其異而忽諸若三日後根氣已定不可移也輕者以象牙粉小兒入粉

餘毒

痘瘡平塌到靨破爛之證用藥得以收靨者餘毒發

泄未盡必循經絡而出發為癰毒看何經絡而用藥俱以托裏解毒為主如未潰腫硬者排毒散隨元氣虛實加減外用生黃豆嚼爛罨之或大黃酒煮入真菘豆粉敷之或蛇蛻煎生豆漿貼之若潰腫而膿未透解毒內托散加白芷陵鯉甲外用海石細研蜜調敷之如已潰膿盡者十宣散加連翹忍冬凡痘後餘毒發癰根赤而作癢者氣虛也四君子加當歸芍藥色赤而腫痛者血熱也四物湯換生地加犀角陵鯉甲連翹忍冬腫而不潰者氣血兩虛也托裏消毒散

醫通卷十二 餘毒

九

潰而不愈者脾氣虛弱也六君子加歸耆忍冬若發於皮膚之外或大片小片如塗朱或作核腫痛不可摸者此名紫丹癰內藏毒盛雖用解毒藥亦難消散從上發者過心即死從下發者過腎則死急以磁鋒砭去惡血毒腫未平再與砭之更須內奪其毒得以開泄也若皮膚發出隱隱紅斑搔癢或紅塊者俗名蓋痘痧消毒飲加防風若收靨安好忽然手足厥冷此脾氣虛弱不可認作寒證參耆內托散加桂枝若手足忽然拘攣不能屈伸者此外感風寒淫三氣勿

用發散耗血之藥十全大補湯用桂枝芍藥骨節痛
加羌防有痘瘡收靨後忽然下痢膿血者此毒氣流
入大腸須二三日間聽其下盡然後清熱利小便再
後補脾健胃不可用止瀉之劑若熱毒蘊畜於肺閉
塞咽喉則口張不食欲吐不吐乾嘔聲嘶此胃中有
瘡腐爛最凶之兆急用消毒飲加甘桔黑參牛蒡竹
葉并磨犀角水救之遲則咽爛而死若腹痛脹滿煩
躁氣急者此毒入於脾當用枳實導滯湯利之否則
喘急厥冷難治矣若痘後勝常飲食日漸羸瘦此氣

醫通卷十二 餘毒

九

血兩虧胃中虛火也錢氏異功散四物湯並加黃連
相間服之更節飲食為要若大便秘結毒盛血枯也
消毒飲加生地黃麻仁杏仁以潤之因多服熱藥燥
結者消毒飲加麻仁芍藥山梔若口舌生瘡赤者為
心脾蘊熱宜涼膈散白者為心肺有熱宜清肺湯外
以青布蘸水拭淨用馬鳴散摻之收靨時口舌生瘡
及患齒疔者皆由餘毒不解乘於陽明而熏逼上焦
也宜清胃化毒甘露飲加犀角連翹咽痛者亦由餘
毒留於管齋肺受火淫而為腫痛也如聖飲若收靨

之後目閉不開或生翳膜疼痛皆暗者俱宜涼血解
毒清心瀉肝隨證治之若收靨未齊忽發餘毒而身
面目睛俱赤者難治翁中仁云痘疹既靨之後或成
癰腫人固知為餘毒矣不知氣高而喘息作聲拗背
擡肚者餘毒之在肺也痰涎稠粘咬牙憂齒泄瀉不
止而口臭者餘毒之在脾胃也盜汗出於胸前向午
則熱而渴者餘毒之在心包也睡中多驚身常發熱
餘毒之在肝也耳輪與尻常熱餘毒之在腎也眼合
不開身腫不消壯熱不清鬱鬱不樂諸經皆有餘毒

醫通卷十二 餘毒

九

也又須知發於顛頂及胸者為心經之毒發於臂肘
及背者肺經之毒發於脇腋及筋聚處者肝經之毒
發於七節之傍及尻上者腎經之毒發於正面及咽
者胃經之毒肝肺及胃之毒多易治心毒多危腎毒
不必治也大抵血熱毒盛而發者其毒必嫩腫色赤
能食便秘並宜消毒飲加解毒涼血藥胃氣實者排
毒散微下之若氣虛毒盛而發其毒必漫腫色黃
少便滑難用參茸肉桂多不可治若用犀角芍藥酒
黃之屬是速其斃也如偏身流注清水延綿不已者

不治

婦人

女人天癸既至。陰常不足。痘疹以氣為主。血為輔。一有不足。則變易生。如發熱之時。正遇經來。此熱從血解。瘡自發出。最為吉兆。若四五日不止。則熱入血室。血必妄行。內動中虛之證也。小柴胡加芎歸。若非經行之期。於發熱時而經忽至者。此毒火內熾。逼血妄行。必瘡多毒盛。急以犀角地黃湯加紫草蟬蛻牛勞。連翹使熱清毒解。痘出經止。方無變患。遲則內虛瘡

醫通卷十二 婦人

五五

陷矣。又如起發灌漿之時。適遇經行三四日不止。必難起發。灌漿或平塌或灰色或黑陷。急用十全大補湯加熟附使起發。灌漿或出贈痘為吉。若寒顛咬牙喘滿者為內脫。不治。又如起發灌漿之時。經水適來。或口瘡不能語者。乃血去心虛。不能上榮於舌。先與保元湯加歸地門冬扶神棗仁。待其能言。後以十全大補湯加猪心血調服。又經不閉之時。適逢出痘。發熱神昏。言語狂妄。循衣撮空。如崇狀者。此經後血室空虛。邪熱乘虛而犯衝脈也。四物湯合導赤散加麥

冬又如崩漏不止。氣血俱虛之後。出痘此必不能勝。已難十全大補多不可救。又如向來經閉不通。血海乾涸。適逢出痘。毒氣怫鬱衝任之間。二陽之證併發。攻之則妄行不止。宜歸脾湯調其心脾。使毒得發泄。庶或可收。至如孕婦出痘。最為可慮。不問輕重。悉以安胎為主。胎動不安者。四物湯加參朮砂仁。有熱證常用黃芩。必須酒炒。胎安痘出稠密。參耆內托散加紫草歸芍。至如痘瘡正在起發灌漿時。忽遇分娩。氣血俱虛。十全大補倍參耆。加熟附子以補氣血。甚則

醫通卷十二 婦人

五五

大劑保元湯更加膠艾薑附續灌之。若少腹急痛。瘀血未盡。須加肉桂。胎下之後。絕無瘀血。按之急痛者。此必瘀積少腹。加炮黑山楂。以伏龍肝煎湯代水煎藥。臨服再加熬枯黑糖半兩。最妙。若咬牙寒顛腹痛作渴。手足冷身熱者。此脾胃內虛。而顯假熱於外也。十全大補湯加熟附服後止者。吉。不止者凶。如產後半月十日之間。適遇出痘。此氣血新虛。必以大補氣血為主。大抵男婦婚嫁之後。出痘其頂必不能高。算其形多大而扁闊。其色多淡而不黃。不可拘小兒

元氣未發泄之例

疔形

痘瘡從顙骨上起者曰當額痘。閉閉不妨稠密者危。○在口兩角出者曰監門痘。後必成水泡及瀉。○下頤先出曰脫鬚痘。漿雖充溢終屬危候。○痘出紅活光澤相細一勻者曰石痘。吉。○手足四肢皆有惟身少者曰四腕痘。凶。吉相半若身面皆無者不治。○通身皆有足心無者曰無根痘。須看同身多少。少者吉。多者凶。○上身少下身多者曰逆痘。凶。○上身多下

醫通卷十二 痘形

痘

身少者曰順痘。吉。○上下有而中間少或兩脇多而腹上無。腿不起者曰兩節痘。危。此證當從虛治。○胸前獨多曰瞞心痘。多凶。加瀉瀉者不治。○兩腰每邊一箇紫大者或皆紫黑如蚤咬者及未出先見腰痛者曰折腰痘。五日死。○初報點五七粒成叢數十處皆然者曰梅花痘。起腫必連成一片。平塌若有暗痘光澤如珠者吉。暗痘亦平塌枯滯者凶。○報點周時即痂復又報點如是數番名九焦痘。可治。若當額地角額骨心胸背手耳後有一二箇黑陷者亦曰九

焦不治。○痘粗肥而嬌紅。色艷不能結實者。危。不可因其好看而妄斷為吉。急宜調補脾氣。否則為瀉瀉瘡塌之患。○痘出而頂有皺紋者曰椒皮痘。或紋

如茱萸者皆不治。○痘出紅潤而中心少有黑點者曰茱萸痘。為血熱。可治。○中黑陷而四圍灰白者曰陷頂痘。九日死。○初出狀如蚊蚤所嚙。三日後反不見者曰反關痘。五日死。○痘起黑陷或紫黑中有血疔者曰紫疔痘。七日死。○痘瘡中有紫黑疔生於頰上太陽當心者曰黑疔痘。三日死。○痘黑而光澤者

醫通卷十二 痘形

痘

曰賊痘。在背部與當額監門及拘腮鎖口俱用銀鍼挑破。以珍珠散塗之。○初起瘡色淡紫成片。曰紫雲。痘十日死。○痘未出時先驚搐。曰先驚痘。不必治。驚痘出自愈。若出而復沒。雖少而不起。發者難治。若已出而發驚者曰逆驚痘。不治。○痘起稠密無縫。紫黑成片而發搐者曰驚搐痘。不出六日死。○痘出雖有縫。粒密而色昏者曰數更痘。不治。○痘出不同不起。頂紅根白者曰頂紅痘。不治。○痘空處有雲頭紅。色者名夾斑痘。治之而斑退。痘起者吉。否則凶。○痘空

細密有頭粒者曰火疹。痘稀而疹先退者輕。痘密而疹不退者重。○痘出大便秘結而痘瘡明紅。活者曰關門痘。不妨。○痘瘡不成膿而內瀉痢者曰伏陰痘。治宜溫裏。○痘瘡紅潤而引飲渴不止及狂言譫妄者曰向陽痘。治當涼解。○痘瘡正出而胸膈高腫內不寬者曰結胸痘。下之生遲則死。○周身皆收靨脫痂巔頂一粒紫大不收者曰鶴頂痘。二十日外必發驚而死。亦有周身痂脫正額一粒潰而不斂。至月餘作癢破出臭膿聲啞悶亂而死者。有周身痂

醫通卷十二 痘形

一粒

脫頭上一粒不斂。至四七日忽癢甚出蛆聲啞悶亂而死。皆鶴頂之類也。○有收靨脫痂之後忽身發火熱。舊靨愈處重出一番。痘莖囊聚腫痛愈加者曰橫。橫痘此毒毒營衛急宜涼血解毒。當慎風寒節飲食。否必毒邪攻迫。腹脹潰爛陰陽不分而死。○痘皮薄破爛者曰溼痘。大劑補脾燥溼。問有生者。切禁黃醬。以其反助表溼也。○痘一出如豆殼水泡兼腹瀉不止。曰水患痘。不治。○痘起脹而與肉齊。平雖有黃漿根血紫滯者曰板黃痘。亦名延日痘。雖痂盡脫而日

漸枯涸。延至月餘多死。○痘四圍平塌潤薄。中間一點色白而黯者曰蟻窠痘。必死。○痘出數粒成叢。平塌不起者曰蛛蛛痘。治之起發。分類者吉。否則凶。○初起發時瘡頭便帶白漿者曰疫痘。不治。○痘點見於下頤或耳下眉心。若白頭如痞。漸乾枯倒陷者曰白悶痘。三四日死。若報點如丹。漸乾焦紫黑者曰紫悶痘。五六日死。若喘脹衄血便血者曰紫悶痘。二三日死。○痘周身皆白。內空殼一聯者曰蛇殼痘。難治。若變臭者可治。○痘瘡至漿來而潰爛臭不可聞者

醫通卷十二 痘形

一

日臭痘無妨。臭而裂者為外剝。不治。○痘稠密不能起發。灌漿六七日間忽瀉膿血者曰瀉漿痘。此證多有生者。雖危不妨。○痘初起時光澤。至四五日反不起而伏陷。將發虛寒者曰伏陷痘。急當扶裏為主。○痘雖起發灌漿。漿未足而忽然乾靨者曰倒靨痘。多危。○痘出既紅。忽然變白。更加寒顛咬牙者曰寒顛痘。急當助表養血。亦須防過。二十四朝方可無事。○若先出紅澤。適遇婦人經事所觸。而變灰白色者。曰血厭痘。急覓月月紅花。或莖葉煎湯調紫草茸末

一錢匙入酒釀服之。後則難救。

異痘

夫痘有似凶而吉者。似吉而凶者。不可不辨。如諸痘不起。而天庭曉星起。灌者吉。諸痘壯起。而天庭曉星不起者凶。○諸痘不起。而太陽獨起者吉。諸痘壯起。而太陽不起者凶。○諸痘不起。而耳邊方圓寸許。獨起者。腎經旺也。吉。諸痘壯起。而耳邊方圓寸許不起者。為腎敗也。不治。遍身俱起。灌惟左耳下外面有兩三粒不起。灌者。肝腎毒盛。定作唇裂齒乾。宜急救之。

醫通卷十一 異痘

二頁

○凡頭面四肢密者為險。若得地角有數粒如珠者。為順。諸痘俱好。地角獨伏陷乾枯。或灰白不起者。為逆。○痘偏身俱陷。惟尻骨飽滿如珠。此腎藏有權。補托灌漿即愈。○面部俱稀。而鼻梁左右密如蠶種者。毒聚於胃也。危。面部俱稀。而口角有黑痘一粒。獨大。或兩邊有兩粒者。為欄門疔。初起可救。五六日不治。○痘出遍身稀疎。惟項下稠密一片。至順者。各鎖項托願不治。若喉頸太多者。急用山豆根牛蒡子黑參。不通甘桔芎歸。生地荆芥輩治之。遲則毒結咽喉不

救矣。○初見標時。胸上臍下俱有。中間一截無者。此脾胃虛。急用參耆歸芷。厚朴紫草木通。防風輩救之。

七日之外難矣。○痘出遍身斑斑成片。如打傷痕者。不治。○痘標既完。手足胸背俱多。而頭面無者。氣血不能上升也。急用升麻芎歸甘桔。防芷蘇葉前胡。加薑服之。五日後不治。曲池生癰而死。若遍身稀者。不在此例。○初出便如菜豆。兩三日大如碁子。其痘根頂全無血色。比衆獨大。按之虛軟。曰賊痘。四五日出血而死。○痘出數十粒成塊。肌肉結硬。中有一大者。

醫通卷十二 異痘

三頁

曰痘母。此血凝毒盛。急須挑破。內服真人解毒湯。外用綿蘸脂煮熱。敷之。敷之肉不柔和者。不治。○頭面無空平塌色白。俗名蛇皮。此乾枯不能作漿。至十一二日必危。若得發臭而不剝裂者。可治。○初標紅潤。至四五日忽變伏陷。此為藥患。急扶表裏。○痘雖肥滿。而內實乾無血水者。死。○痘中有凹。四邊特起。明亮堅硬。漿板不化。形如石白者。不治。○痘瘡生蟲。皆溼熱所化。毒流皮膚也。雖冬月亦有之。以柳葉鋪下。令兒臥上。則蟲自死。無柳葉時。預收乾者。為末。香油

毒敷亦効。○初出血點其色紅紫。遍身如點朱者。六日死。○血泡協熱而聚肥滿。刺泡血紅。急以犀角地黃湯加白芍治之。血黑不治。○痘本稀少。四五日起發。六七日收靨。痂乾而赤。九日而痂落。此氣血充足。毒少。故隨出隨痂。不及作膿也。最佳。○瘡雖起發。四畔又出小痘。攢簇如粟米。不長。養灌漿必加搔癢而死。○瘡頭有孔。膿水漏出。堆聚乾結。或清水自破。水去乾黑者不治。○痘發漿泡。而人中平滿。唇翻腹脹。氣急者不治。○痘發滌漿泡。切忌損破。漿臭後猶

醫通卷十二 異痘

痘

或可治。破則不治。○其形如豆殼灰白。全無血色。擦破血出。無膿不治。○痘已出齊。紫色不起。不漿如浮萍貼於肉上者不治。如微微高起。肥出有血。急以涼血解毒之劑救之。○黑痘多屬血熱。本為惡候。然形狀多端。宜隨證解救。紫黑點子。隱於皮膚間者。用人牙錢及豬尾血酒釀調五七分。量人大小與之。初出便不點。急用紫葳茸三錢酒煎服。或形如痣。或如老牛子。或如煤炭。或青紫成塊。皆為寒閉熱毒。宜化毒涼血。劑防蟬蛻紫葳草黑參木通連翹輩救之。熱甚

加黃連黑而軟大者。氣弱毒盛也。保元湯加紫葳。已上諸證。竭力圖成。或可十全一二也。○近看如水。花遠望如胭脂色。清水不能成漿者不治。○先見標一二點於面部。或口唇上下。周身俱無。如常起脹灌漿收靨。此為報痘。不知者以為本痘稀少。以火煎之。紅點隱隱藏於肌肉之內。急宜托裏解毒。其痘齊出。否則頤下發癰毒而成不收。

逆證

痘瘡不治之證。總勉強用藥。終無生理。初出時從天

醫通卷十二 逆證

痘

庭司空太陽印堂方廣等處發出。或如蠶種。或如魚鰓。或如點朱。灑墨。潑青。或青黑紫斑。或肌肉有成塊處。或有青臃。或紫黑乾枯。或遍身有瘡疹。或如玳瑁。或頭面一片如臙脂。或初出紅點帶紫。或夾斑如錦紋者。俱危於四五朝。遲則不過六七朝也。若見青痘者。傾刻危矣。○若遍身不起。俱發紫黑斑點。或初起頂陷。連肉通紅。或如沸無縫。或薄如竹膜。摸之便破。或如蛇殼。如魚皮。頂陷如羊眼。赤亮如湯。泡火燒。或腰腹作痛。上下出血。或如滋糕。成片連貫。眼合無

漿者俱危於七八朝遲則不過十朝也。○若四五日
面封浮腫而瘡不腫其痘黑陷紫陷或灰白或發
紫泡水泡癢塌者危於十一二朝其泡刺破出黑血
黃水者不治。○若四五日諸痘未灌漿脣上有瘡先
黃失於針挑者不治。○若五六日內痘白而腫光亮
如水根脚不紅或聲啞氣急或鼻陷齒齙或日閉忽
開露白無神不省人事者不治。○若六七日不能灌
漿但空殼乾枯全無血水搔破無膿血而癢塌者十
二日死有膿血者不死。○二三日根窠不分紅腫如

醫通卷十二 逆證

瓜或如冷粥結而或如胖蠶之形或如油光黍米內
有紅紫或頂陷有眼如鍼孔色紫黑者俱不治。○若
兩頰兩頰多致成片如塗朱者此肝乘脾當十二三
朝不食而危。○若七八日間陷伏焦紫乾枯不能灌
漿或咬牙寒顛譫語狂躁煩悶噎水錯喉在七日前
見者難治或日閉口中臭爛成疔延及內外者不治
○或七八日後腹脹氣喘有痰如拽鋸啼哭不止者
可治無啼哭者不治。○或嫩薄易破抓塌成餅堆聚
如雞屎泄瀉不止者不治。○或瀉下如豆汁或便膿

血或乳食不化痘爛或口臭脣焦或日閉反開者不
治。○或不時哽氣如欲大便狀或胸高突起神昏悶
亂或舌卷囊縮咽腫不食或蹠脚不伸或憎寒四肢
逆冷或目閉腹脹厥冷過膝或先痘後驚連發搐不
止及痘後慢驚目無神而色青者皆不可治。○當醫
癢塌無膿皮如血殼者必發寒顛咬牙日噤而死。
婦人經水不止或墮胎下血身大熱不退者並不可
治。○凡發熱時頭溫足冷昏悶如癡渴飲不止者其
痘必危。○凡腰下見點腰上不出者不治。○凡針視

醫通卷十三 逆證

之腹如桶皮不分肉地者死。○起脹時色白如飯平
塌不起者死若此者乃毒盛血枯不可認以為虛寒
之候。○至如可畏之證附列於後如不食或多渴寒
顛困倦脾虛也。○憂齒噤牙子經熱甚也。○煩躁體
熱搖頭肝熱生風也。○吐逆泄瀉食不化便膿血
者脾胃虛寒毒入大腸也。○瘡作黑坑內無膿血者
腎熱脾虛也。○大小便瀉口渴者心肺熱也。○喘急
痰盛者肺熱甚也。○已上可畏之證內犯一二用藥
得効者生不効者死若犯三四證必無生理也。

諸證

頭疼可治。目閉初起不治。八九日無事。十三四日凶。欬嗽無事。氣急初起無事。八九日凶。搥頭初起雖凶可治。八九日後不治。聲啞初起難治。七八日可治。痧落後凶。兼喘急不治。或哭泣聲啞。色澤者可治。色晦者不治。喉痛初起可治。痧落後凶。讖語初起重。痧落後凶。心胸痛不治。腹疼初起無事。痧落後凶。腰痛初起及痘中凶。十四日後無事。項不能舉。天柱折。雖結痧乾。二十日外必凶。

醫通卷十二 諸證

○十指冷脾虛者可治。毒盛者不治。手足搥不治。○手足痛初起凶。八九日無事。足冷過膝不治。○眼耳出血不治。鼻衄無事。吐血鮮紅可治。紫黑不治。○尿血不治。大便血可治。吐黃水腹不疼。無事腹疼者凶。吐清水無事。吐濃痰無事。吐臭痰不治。錯喉初熱凶。灌漿時不妨。寒顛初起不治。七八日後亦不可治。咬牙初起不治。起長時凶。七八日後可治。泄瀉清白寒也可治。泄瀉黑水藏府壞也不治。吐衄初起吐一二條無事。多則

凶。十四五日吐出血。即死。便出多者亦凶。燥渴結痧後凶。不食結痧後凶。餘毒盛也。

看法

朱濟川曰。醫以認證為要。凡一入門。必先知其家貧富。何如。時月炎冷。何如。兒之稟賦。何如。形色善惡。何如。脈診微盛。何如。肌膚老嫩。何如。痘出稀密。何如。部位順逆。何如。氣血虛實。何如。表裏寒熱。何如。聲音清濁。何如。口舌燥潤。何如。睡卧安否。何如。舉止動靜。何如。飲食多少。何如。二便堅利。何如。又有凶中藏吉。吉

醫通卷十二 看法

中藏凶不可不辨。審此數者。隨宜而治可也。

用藥

痘瘡者血蘊也。治宜活血為主。故紫草紅花不可少。紅甚便滑則忌。山植散血消積。胃虛不能食則忌。甘草解毒和中。中滿則忌。陳皮健脾行氣。自汗則忌。大腹皮利水治脹。發散則忌。牛蒡子疏風潤色。滑竅通肌。泄瀉則忌。木通疎利膀胱。溺多則忌。訶子烏梅止瀉。渴飲汁便實則忌。參朮扶元益胃。血燥毒盛則忌。升麻葛根升發開提。痘密汗多毒盛。裏實則忌。羌活

白芷類藥地黃涼血勿陰血寒不發則忌辰砂定
則忌芍藥地黃涼血勿陰血寒不發則忌辰砂定
除熱却煩灰白不發則忌糯米煖胃實脾氣滯則忌
防風散風解熱氣喘則忌木香調氣散寒止腹瀉瀉
青斑黑燥渴則忌厚朴溫胃治脹煩渴則忌細辛發
散上行通肺燥熱則忌柴胡發表透熱氣升則忌前
胡除痰治嗽便泄則忌半夏消痰止咳燥渴則忌麻
黃紫蘇散表逐寒表虛則忌薑桂助血溫中血熱妄
行乾紅焦紫則忌附子回陽補元治虛寒厥冷煩亂

醫通卷十二 用藥

煎

則忌大黃蕩滌實熱胃虛食少則忌人牙起發腎利
陷伏血熱毒陷則忌山梔降火下行氣虛便溏則忌
犀角涼血止衄時值行漿則忌牡丹皮行血歸經痘
前多汗則忌肉苳蔻健脾止瀉便實則忌桔梗開鬱
發導胃下則忌蟬蛻驅風散毒表虛汗脫則忌枳殼
寬胸下氣氣虛下陷則忌胡荽乳香時焚開竅血熱
毒盛煩渴汗則忌黃檗菜豆生甘草等分煎膏預
先塗目眶或臙脂塗眼眶耳前使痘不侵目出後則
忌一發熱起便以綠瓜近蒂三寸連子燒灰存性加

辰砂酒服可使痘稀見點則忌每年端午日服之服
久可使不出也

禁忌

痘瘡自初出至收靨時藏府俱虛外邪易觸飲食易
傷必須避風寒調飲食日用胡荽紅棗大黃乳香焚
之若血熱毒盛禁燒胡荽紅棗之屬恐變煩渴焦癢
之患如煎油炒豆殺牲腥血硫黃腦麝諸香葱蒜其
穢之氣及孕婦月經房事淫氣僧尼孝服生人及鐵
鍍金器之聲俱宜避之勿令洗面恐生水損眼故也

醫通卷十二 禁忌

痘

眼鼻勿動其痂則無眼吊鼻譁之患行坐勿令太早
免致腰痠脚痛之虞能食者與鯽魚白鯊之類切不
可與生冷瓜柿梨橘菲蒜醋醬糞棕雞鷄椒薑辛辣
等物雜于害目亦不可食近世多用鮮筍鮮魚發痘
若脾胃虛寒者誤與每致泄瀉不食如天大寒蓋覆
常宜溫煖恐毒氣為寒所滯則痘不能生發也如天
大熱勿使客熱與毒併致增煩躁潰爛也其麻疹
比之出痘同輕然調治失宜風寒不避禍不旋踵一
切辛辣厚味助火醱收之物咸須禁食如醃醋胡椒

猪肉核桃及梅杏櫻桃梨柿芋薺等類若誤犯之則有伏匿焦紫喘脹聲瘖而難救也誤食雞則終身肌膚粟起誤食糖霜多發疔蝕必俟兩月後方無禁忌也

麻疹總論

麻疹者手足太陰陽明二經熱所發小兒居多大人亦時有之是亦時氣傳染之類其發熱時多欬嗽多嚏多嘔眼中如淚面浮腮赤多瀉多痰多熱多渴多煩悶甚則躁亂咽痛唇焦神昏通身紅赤起而成

醫通卷十二 麻疹總論

原

粒勻淨而小斜目視之隱隱皮膚之下以手摸之磊磊肌肉之間其形若芥其色若丹以其陽氣從上故頭面愈多者為順法當清涼發散為主藥用辛散以升發之涼潤以清解之切忌酸收凡動氣燥悍及一切溫補之藥慎不可犯誤用禍不旋踵辛散如荊芥薄荷前胡葛根麻黃石膏鼠粘子涼潤如黑參栝藁根葶藶麥冬生甘草芩連貝母連翹竹葉皆應用之藥又當隨所發月時量兒大小及見證輕重而為制劑若漸出漸收者其勢雖輕而熱尚未平須防喘急

若連綿三四日者其勢雖盛而熱已發泄必無他變宜大青湯或消毒飲加黑參石膏麥冬竹葉若發熱時偏身汗出或衄血者此毒解也勿遽止之若汗出太多血流不止當以清肺湯去欬冬杏仁加麻黃根以飲汗犀角地黃湯以止血遲則氣虛神耗為難治也若發熱時或嘔吐或自利者此火邪內逼毒氣上下行也俱宜清熱解毒利小便切勿止瀉大凡疹證發熱時未有不渴者但當與葶豆燈心湯勿與冷飲致成水畜多生變幻也即黃腥酒麩生冷水果咸須

醫通卷十二 麻疹總論

原

禁之麻疹多有熱痰在肺初發時必欬嗽宜清熱透表不得止嗽麻後欬嗽切忌辛溫酸澀但用清咽滋肺湯以清餘熱痰壅自愈多喘者熱邪壅肺也切勿定喘惟應大劑竹葉石膏湯去半夏加貝母黑參薄荷如冬天寒甚麻毒為寒鬱於內不得透出而喘加蜜酒炒麻黃一劑立止夏月熱勢甚者即用白虎湯加竹葉忌用升麻誤服必喘然喘為肺氣壅遏故喘必兼嗽而張口擗肩首肺竅不通不治也故諺有喘而欬嗽者可療喘而不嗽者難醫之語又其證多泄

瀉慎勿止滿。惟宜芩連芩根。則瀉自止。疹家不忌瀉。瀉則陽明之邪熱得解。是亦表裏分消之義。又有疹收之後。飲食如常。卒然心腹絞痛。遍身冷汗如冰者。此元氣虛弱。而中惡氣也。朝發夕死。勿妄治之。凡麻疹以鮮明似錦為吉。黑晦如煤最凶。頭面不出者。重紅紫黯慘者。重咽喉腫痛不食者。重黑黯乾枯一出。即沒者。不治。鼻扇張目無神者。不治。鼻青糞黑者。不治。牙疳臭爛者。不治。疹之牙疳。最為難治。外用無比散吹之。內服加味清胃散。更加荆芥石膏。後則不收。

醫通卷十二 麻疹論

疹中諸患。不宜依證施治。惟當治本。本者。手太陰足陽明二經之邪熱也。解其邪熱。則諸證自退矣。○有夾痘而出者。此毒氣太盛。故一齊湧出。不必治疹。但當托痘為主。然治痘宜溫。治疹宜涼。此又不可不審。大人男婦出疹。當與外感並治。惟清涼解表。隨天時寒暑施治。凡麻痘並作。藏府風熱交患也。麻乃風邪外感。痘為胎毒內發。二者相雜。赤暈發嫩。多有誤認。痘出太密。而委之不救。殊不知其為疹夾痘也。當與化斑湯。續頓進。麻毒解而痘自起矣。○有種行漿

疹子。極似痘。最難看。然痘則必有頂盤。疹雖有漿。而頭粒必不堅。根盤必無紅暈也。疹後痘不結痂。乃元氣虧損。當大補脾胃為主。不可誤認邪熱未盡。復與清熱退火之藥。

例治 四十則

麻疹俗名痧子。浙人呼為瘡子。麻病風熱。人或未知。痧之與瘡。字學不收。皆土音習俗之訛耳。原其證之輕重。今昔懸殊。吾吳水土濡弱之鄉。生氣最易萌動。故麻疹之發。自始至終。不過二三日。即安。從古迄今。

醫通卷十二 例治

靡不皆然。邇來風氣變遷。有似北方氣候。即尋常麻疹。必六七日乃化。稍若熱勢未盡。或觸風寒。或犯飲食變證。百出其危。有甚於痘者。因遍攷方書。從無麻疹專學。間有一二及此。無非附見痘疹之末。一皆簡略不詳。何怪兒科之莫能舉措。且以痘方混治。曷知麻屬陽。陽從陰化。故外出內沒。而不漿。痘屬陰。陰從陽化。當外疎內托。以助膿。二者相去天淵。烏可不辨。然皆為嬰孺說也。但今不特嬰孺。少壯每多患此。雖當參詳診切。仍不能舍此繩墨。而臨證之機。活法在

手心手繩墨又不可拘也。予聞扁鵲入咸陽秦人愛小兒。即為小兒醫。予由是隨時兼愛。曲盡一貫之道。為麻疹特開生面云。

發熱。○麻痘之初。必由發熱。但痘熱不過二三日。即出。麻熱有六七日。或半月乃出。或乍涼乍熱。或壯熱經日不退。始熱之際。必見面赤眼腫。多涕淚。欬嗽連聲。是其候也。熱甚經日不退。日壯熱。惟正出時為正候。若初發壯熱。至已出而熱不少。衰者。其證必重。清熱透肌湯。出盡而壯熱不退者。竹葉石膏湯。去半夏。

醫通卷十一 麻疹發熱

星

加荆芥黑參。沒後而壯熱不退者。危急需涼解為主。其有熱數日止而復作者。有早熱而暮退者。在初發時為熱邪未透。為根解肌湯。正出之際而煩熱轉甚。乃邪熱未解而復內攻也。清熱退肌湯。沒後見者。為餘邪未盡。四物湯。換生地赤芍。加連翹黑參。亦有麻退身涼。越六七日而復熱者。非餘熱未清。即復感風邪。當以意消息。或因大病之後。中氣虛而然者。治本為要。臨病之機。不可不審也。

部位。○麻屬府候。發則先動陽分。而後歸陰經。一身

之中陽部宜多。陰部宜少。陽部宜透。陰部即不透。亦可無慮。若陰部多而陽部反少。不透者。為險。防有他變。陽部者。頭面背四肢向外者。皆為陽。陰部者。胸腹腰四肢向內者。皆為陰也。凡發自頭至足。為齊。頭面多者。為順。先從胸腹煖處起。漸發四肢者。順。如從手足起。漸發胸腹背者。逆。

形色。○色貴紅潤。形貴尖聳。若色雖紅潤而不起。二便艱澀者。清熱透肌湯。如色淡不起。二便如常。此屬本虛。兼當培養氣血。亦有色黯不起。大便秘結。唇舌

醫通卷十一 麻疹部位 形色

星

燥赤者。為火邪內鬱。白虎湯。加黑參。荆芥。其有色白不分肉地。惟點粒高聳。晡時即沒者。邪熱本輕也。然有表氣本虛而色白者。調護溫煖。越一二日自變紅活也。若正出時為風寒所遏。而色白如膚。必毛竅竅。栗為根解肌湯。或麻出成片。一被風寒。便變為白。身不發熱。而反內攻。煩躁腹痛。痰喘氣急者。危如毒攻於胃。則嘔吐清水。攻於脾。則腹脹不食。攻於肺。則鼻塞喘促。攻於心包。則唇舌焦燥。不省人事。搥頭掣手。攻於腎肝。則變黑而不救也。若色紫赤而點。是火毒

熾盛頂粒起者可治宜涼血飲子識語煩躁者黃連解毒湯調益元散枯燥不起者難治若頂粒焦者無論紅淡皆爲熱劇之候並宜白虎湯重用石膏乾燥無汗加麻黃以汗之夫便秘者涼膈散下之亦有癩發如雲頭大片其形有二一者大片焮赤一者大片之上復有小紅點粒皆火邪熾盛所致白虎湯加黑參竹葉若癩出斑爛如錦紋或出膿血腥臭不乾心胸煩悶嘔吐清水身溫熱者白虎湯加黃芩茅朮若初發時有似斑屑者乃風寒在表而成癩疹祇宜疎

醫通卷十二 癩疹形色 欬嗽

解俟癩一透其疹自退切勿誤認爲斑而與苦寒之劑以癩內陷而難救也
欬嗽○癩疹乾欬連聲不斷是火邪凌燥肺金所致然欬則毛竅開而癩易出故未出之先最喜欬甚發透其欬自已若出盡及沒後而欬仍不止者清咽滋肺湯欬嗽多痰去麥冬加橘皮茯苓其有感觸風寒欬嗽煩悶嘔逆清水眼赤咽痛口舌生瘡者甘桔湯加芩連沒後見者人參白虎湯去知母易麥冬以滋化之

汗○癩發之際常宜微汗微汗則肌腠疎豁而邪易透不可復用升發升發恐汗大泄不無亡陽之慮其有隱陷不透之壞證用權升發得大汗而解者此特語其變也若壯熱無汗而皮膚乾燥者必風寒壅滯難出多成內攻之候或腹脹痛或發喘促宜與葛根解肌湯冬月越脾三拗選用但不可過劑亦有因熱極火鬱皮膚乾燥而難出者必致唇舌燥裂二便秘瀉壯熱昏沉或身體脹痛喘促痰鳴無論何時急宜白虎湯加黑參牛旁苓梔竹葉之類大抵癩證常以

醫通卷十二 癩疹汗 嚏

微汗爲順若始終無汗雖沒後不無餘咎其治總不逾上法也
嚏○癩疹初起而多嚏者是內火因風邪激搏而然正出時有嚏者其候必輕如沒後尚有嚏者邪熱盡解可無餘患矣如嚏而多涕者濁壅得泄肺氣自清最爲吉兆若無嚏而鼻塞不通必有風邪留滯宜辛涼之劑以透達之
嘔吐○癩之初起吐瀉交作者順乾霍亂者逆欲吐不吐者危嘔吐是胃中熱邪不得發洩而作葛根解

肌湯正出及正沒時見者。消毒飲加枳實黃連多痰者。更加貝母栝蒌根。若沒後而嘔者。脾胃虛而熱滯也。石斛清胃散其有嘔而吐。虻者。胃中痰熱膠固。蟲無所養而上竄也。能食即定。如虻出多而不能食。為胃敗不治。

泄瀉○泄瀉為麻疹之常候。熱邪得以開泄也。發熱時瀉而黃赤稠粘。小水短澀者。屬熱。四苓散加水通滑石已出。人參白虎湯去知母易麥冬。其證必多發。瀉湯甚不止。熱甚不退。雖數劑無妨。如瀉下清稀白。

醫通卷十二

麻疹嘔吐泄瀉

五九

沫腹疼喜得溫。按者屬寒。胃苓湯去蒼朮加蝦蟇。瀉利竅道而腹痛脹滿。或噯氣如敗卵者。為飲食停滯。枳殼湯加檀蘆木。通大抵麻疹泄瀉。屬熱者多。屬寒者少。辨治宜早。不可令其瀉久。瀉久則正氣下陷。或成瀉滿。或變下利。並宜枳實理中之類。以理脾胃。為主。瀉後瀉利不止。口渴目閉。四肢不溫者。不治。嘔吐不食。洞泄不知者。不治。

目○麻疹發熱之時。眼光如水。而多眵淚。或白睛微紅。此正候也。若沒後猶見紅赤。為肺經風熱未盡。瀉

白散加荆芥薄荷黑參牛旁。閉不欲開。更加連翹木通。赤而腫痛者。風熱上壅也。導赤散加荆旁黑參。若為風熱所侵。而眼眶赤爛者。柴胡飲子。急須治之。否則為終身痼疾。

發不出○初起發熱。欬嗽。渾身脹痛。有似傷寒之候。惟乾欬連聲。目赤多淚。嘔惡便澀。確為麻疹之驗。若將發之際。或為風寒暴襲。或因肢體坦露。寒鬱熱邪。不能外出。此全盛之勢。未萌與出後沒。早不同。如氣相喘促。腹中脹痛。煩擾不寧。而不得出。急與麻杏甘

醫通卷十二

麻疹發不出

五九

石湯或越脾湯去棗。重用石膏。輕則升麻湯以升發之。若因觸犯霧露風寒。隱現不能發出。以新稻矢中湯隔簾蒸之。冷則更添滾者。并取豬矢燒灰。葱白湯下二三錢。乃痘瘡黑陷。用燒人矢之變法。即燒人矢亦能發之。發之仍不出者。神丹不能復圖矣。○按古方麻疹升發劑中。多用升麻。曷知升麻性升。能升動陽氣。每致邪熱上浮。而作喘逆。當以紫蘇葱白代用。非特升麻當慎。即桔梗初起。亦須酌用。忌其載引濁氣於上也。蓋麻疹宜涼宜潤。一切辛燥之味。咸為禁

劑用藥之機可不為之慎重乎

透表○癩疹無間尖大細小必得透表可無後患其
有一種匾潤嫩赤成塊塊上復有小粒平塌不起者
亦有一片如風毒偏高紅腫但頭粒不尖二者雖透
其中必有熱邪留伏防有他變並宜竹葉石膏湯去
半夏以滋化之縱有餘熱從此渙散矣
不透表○癩出而皮膚乾燥毛髮竦慄不能透表者
風寒鬱遏也越脾湯葛根解肌湯隨輕重取用其有
表虛不勝踈透者一味葱白濃煎時時與之但得微

醫通卷十二 癩疹透表 不透表

汗即解若頭粒隱紅紫一片而不透表者火毒熾
盛也白虎湯加荆芥黑參如肌膚不燥唇色淡白二
便如常而不透者中氣本虛也消毒飲加連翹木通
車前茯苓雖有蘊熱不可輕用寒涼即用峻劑升發
亦必不能復透但當解利使之內化為主亦有胸背
腰腹煖處起發而紅頭面手足乍有乍無此證必纏
綿難已且有沒後五七日復發如前兩三次而愈者
此氣候之異常非不透之比祇宜辛涼透表漸次向
安欲求速効轉增危殆

沒早○癩出未經三日或為風寒外鬱或熱邪內陷

或誤食酸收之物一日半日即沒周身煖處絕無紅
影終變危候若雖沒早肌膚煖處尚未全沒急需透
表發之不起即當審其所觸而與內解如外為風寒
所遏邪反內攻而沒早者消毒飲加葱頭熱服復透
者吉甚則加麻黃穿山甲或越脾三拗選用若不急
治必喘脹而死亦有偏身青紫熱腫喘脹氣急此毒
滯血凝半匿肌表急投涼膈散去茵陳加麻黃石膏
以發越之若腹脹喘促滿膈突者涼膈散加草薢

醫通卷十二 癩疹沒早

庶或可救一二若內挾痰熱火毒九劇而伏匿煩躁
或腹脹喘急不省人事者白虎湯加黑參竹葉若誤
食酸醋收斂之物伏匿壯熱喘欬煩悶以豬膽汁製
甘草煎成續續與之得吐微汗為効或苦瓜生甘草
煎湯灌之亦能取吐吐中便有發越之義誤食豕肉
喘脹氣急枳殼湯加山楂茵陳以下奪之誤食核桃
喘欬聲痛消毒飲加石膏馬兜鈴若得熱退身安氣
息漸調者方可無慮或大病之後或洞泄不止中氣
本虛不能發越而沒早惟當建運中氣畧兼解表清

熱若沒後遍身條瘰者。露風早也。消風散以疎解之。難沒。○西北水土剛勁。稟質亦厚。麻必五七日乃沒。東南風氣柔弱。麻出不過二三日即化。邇來地運變遷。未有不綿延數日者。當非難沒之比。若三四日後。點燥色白。隱隱於肌腠而難沒者。此必衛氣素微。不能煥發。或衣被單薄。阻其發越之機。以致綿延多日。法當辛散透達。不可遽用寒涼。蔽其開泄之路也。渴。○渴乃肺胃熱盛之候。唇口必紅。二便秘澀者。門冬甘露飲。若二便清利。唇色不紅。而但渴者。此必寒

醫通卷十二 麻疹難沒 渴

五

涼太過。脾虛不生津液而作渴也。七味白朮散去木香。加粳米。渴而煩躁者。是熱邪凌燦心包。白虎湯加麥冬。竹葉。正沒時。竹葉石膏湯去半夏。渴而腹脹者。本虛實滯。為難治也。喘。○喘者。熱邪壅遏。肺氣道阻塞而然。其證有虛實之分。虛者難治。實者易調。虛則小便清利。大便溏泄。身無大熱。雖清痰潤肺。多難獲效。實則大便堅燥。小便赤濇。身發壯熱。竹葉石膏湯去半夏。加葶仁貝母。冬月量加蜜炙麻黃。隨手而應。若喘而無涕。兼之

身扇者不治。大抵未出而喘者易治。沒後喘者難治。初發之時喘者。三拗湯加石膏。芽茶。喘而鼻乾。口燥者。白虎湯最捷。若見於麻後。又宜清咽滋肺湯以滋肺胃。白虎湯又為切禁。故曰醫不執方。活法在人耳。氣促。○氣促多。緣肺熱不清所致。初發正出時。見之。清熱透肌湯。在正沒沒後。清咽滋肺湯。如喉中有痰。胸膈而鳴者。熱邪阻逆。不得發越也。見於初發正出之間。除熱清肺湯。正沒沒後。見者必邪熱未透。或露風沒早。餘熱內攻。而肺氣受傷也。難治。

醫通卷十二 麻疹喘 氣促喘喘

五

瘡。○肺胃熱邪。為風寒所襲。不能盡達於表。致盛咽傷。故瘡宜清咽滋肺湯。若瘡而腫痛者。射干消毒飲。然瘡為麻疹之常。不可與痘瘡比例。搖。○搖為痰熱聚於心包。見於初發未透之時。清熱透肌湯。加葶仁竹葉。沒後見者難治。祇宜輕清之劑。調之。不可誤用金石痰涎壅盛者。一味栝蒌湧吐之。若痛無痰鳴。或白嚙指者。非真搖也。此為正虛不能主持。必死不治。切。○切者。大邪熾盛。血隨火載。上行而溢於鼻。癰疹

初起是為順候其熱得以開泄不治白已若初之不
止或失血者犀角地黃湯加荆芥穗正沒及沒之後
初仍不止者四物湯加茅根麥冬以滋降之

譫妄。譫妄是熱邪熾盛於心包若發熱正出時見
者為火邪內伏不得透表而致白虎湯加荆芥鼠粘
子甚則加麻黃以發越之在正沒及後並宜竹葉石
膏湯去半夏加生地黃以清解之

咬牙○痘證咬牙有寒熱之分癩疹咬牙皆為熱例
乃陽陷於陰故多發渴而手足熱喜飲冷者麥門冬

醫通卷十二 癩疹 齒齙 咬牙 唇燥

湯加丹皮若手足不熱而反厥冷喜飲熱湯此為熱
邪內亢後必下血咽喉作痛痰鳴而死即與白虎湯
多不可救

唇燥○唇燥多屬脾胃之熱淡而燥者其熱輕赤而
燥者其熱深紫黑而燥者熱劇而重也隨輕重以清
潤之

唇舌破裂○唇舌破裂者心脾之火上衝也其色必
多深赤初發正出時見之白虎湯加荊地黑參荆芥
薄荷若正沒沒後見者為心脾俱絕及紫黑枯燥而

血不活者皆難治也

口氣○口氣穢濁乃熱邪蘊隆於胃清胃散加石膏
連翹生甘草其有臭不可聞者此胃敗也不治若其
人本有是證不在此例

舌胎○舌者心之苗本火候心屬於火故舌多有
胎白為肺熱黃為胃熱但當清解疏利更參外證而
為施治純黑為心絕黑而溼者熱淫血分黑而燥者
熱淫氣分皆為危候並宜白虎湯溼者加生地黃黑
參燥者加麥冬竹葉黑參漸退者言不退者死

醫通卷十二 癩疹 唇舌破裂 口氣 舌胎

口疳○牙疳腐爛是熱留陽明餘毒上衝所致加味
清胃散加石膏荆芥大便秘者當歸散微利之外用
栗根白皮煎湯漱淨以無比散或燒鹽散吹之如通
膿色白者自外延入內者無膿血者齒落口臭者喘
促痰鳴者皆為不治若滿口唇舌黃赤白爛獨牙齦
無恙者此為口瘡非牙疳也亦胃中餘熱未盡毒壅
上焦二便必多艱澀導赤散以瀉心脾之火外以綠
袍散敷之

腹痛○腹痛之由不一總為火毒內鬱或風寒壅遏

或飲食停滯。皆能致痛於發熱正出時。風寒壅滯。反內攻而腹痛者。急與疎表。麻透自已。若飲食過傷。腹滿脹痛者。力為消導。其痛自除。時當正沒。沒未盡而腹痛者。兼清中外而痛自止。沒後見者。分利餘熱。其痛自愈。又須驗其有無他證。屬虛屬實而與治之。若熱邪內結而腹痛者。通利大便為主。有痲後脾氣不調而致腹脹。面目四肢浮腫。分利小水為要。至若元氣大虛。陰陽不能升降。小水不利。通身浮腫喘促。兼見者難治。

醫通卷十二 痲疹便秘瀉清

便秘。大便秘結。火壅血燥而耗津液。痲疹大非所宜。無論日期前後。速宜清潤。四順清涼飲甚則涼膈。散以通利之慎。勿遷延。恐痲變焦紫而難救也。大抵痲疹自出至沒。二便俱不宜秘。秘即微利可也。瀉瀉。小便赤濇。在初熱正出時。熱邪瀉滲。是為正候。沒後見之。為餘熱下墜。膀胱導赤散。加麥冬以滋氣化利之。仍不通者。必大便秘鬱之故。大便一通。小便自利。痲之作病。為熱邪內陷。在正沒或沒後而痢下。

色白者。黃芩湯加防風。枳殼。下膿血者。白頭翁湯去黃芩。加防風。或因食積而滯下者。枳殼湯加檳榔木。通腹中作脹時痛時止者。厚朴湯亦有瀉久而成痲者。乾薑黃芩黃連人參湯。自始至終。痲不徹者。必有風毒留滯於內。則宜解毒行滯而兼疎風。實脾。庶幾克應。如痢下紫黯如雞膿。如屋漏水。如雞肝色。如黑豆汁之類。加之氣喘躁渴。熱甚發呃。噤口不食。痲色紫晦者。皆死不治。

醫通卷十二 痲疹痢下蟲腫

而下也。與過食傷中。蟲不能容而下不同。但須測其飲食自愈。非上出之比。不須治之。睡。痲疹正出時。精神困倦。沉睡不醒者。為逆。蓋緣正氣虧損。邪火內鬱。正氣不勝所致。若沒後而沉睡。不醒者。為氣血俱虛。補脾養血為要。如沒後煩擾而反不得寐。是餘火復燃。急需滋養陰血。虛陽自斂。亦有昏睡不知起止。指其夾車合谷。不知疼痛。似寐非寐。無問正出沒後。其非吉兆。當察其兼見何證。而與施治可也。

不食。不食是胃中邪熱熾盛不可強與。雖數日不食亦無妨害。在初發正出時。白虎湯加荊芥蘇透熱。清自能食也。沒後不能食。下劑清胃散。諒加健運之味。元氣委頓者。急需培補。防有虛羸之患。

鼻扇。鼻扇者肺將絕也。若兼喘滿痰鳴。此必不治。如咽喉清利無喘滿而精神不減者可治。宜滋培肺氣為主。沒後見者死。

胸高。麻疹胸高。肺熱熾盛而脹也。多見於正沒沒後。為肺經壞證。不治。

醫通卷十一 麻疹 不食鼻扇 胸高身冷 百六

身冷。麻為肺胃邪熱所發。本屬於陽。肢體常宜溫煖。若反清冷如冰。是為逆也。其有沒後遍體溫涼如故。獨下體厥冷過膝者。為腎敗。不治。如初出腰已下。不熱毒不能透而反漸沒者。亦為逆候。急當溫養脾胃。或有得生者。

妊娠。麻屬火候。最易傷胎。若初發正出時。須驗其色之紅淡。熱之重輕。而與疎解。疎解之中。佐以清涼。滋血安胎為主。四物湯加條芩艾葉。荆芥紫蘇之類。若胎氣上衝。急用芩根艾葉煎湯。磨檳榔。續進以降。

之一切實脾行氣溫燥之藥。既發麻疹。復傷子氣。咸須禁之。

虛羸。麻患既平。形體羸瘦。精神倦怠。飲食減少。或欬嗽不止。或便泄不已。或身熱不除。皆真元虧損。恐成勞瘵。並宜製和湯。去川芎。以和之。嗽加橘紅貝母。欬加麥冬百合。瀉加白朮菟絲。食難消化。加砂仁穀芽。氣血俱虛。合四君子湯。隨證調之。切禁寒涼。傷犯脾胃之藥。專力資培。緩圖平復可也。

麻瘡。麻後發瘡。多緣生水。澡浴太早。水氣留滯。肌

醫通卷十一 麻疹 瘡毒 虛羸 瘡瘡 百七

滕而發。但須日以荆芥艾葉煎湯洗之。勿用生水。亦不可用瘡藥。熏塗。失治。必每歲依期而發。雖云小疾。亦須慎之。

水痘

水痘者。色淡漿稀。故曰水痘。色赤者。曰赤痘。將發之時。亦皆發熱。由紅點而水泡。有紅點。由水泡。膿泡。而結疔。但水痘則皮薄。色嬌。赤痘則紅潤。形較。總不似正痘之根窠。圓淨。緊束也。且見點起發。漸聚。漸止。於五六日之間。其邪氣之輕淺可知。皆由風熱鬱於

肌表面發小兒肌肉嫩薄尤多此證當與大連翹湯
引之亦有夾疹而出者有夾正痘而出者若先水痘
收後而發正痘其痘必輕

附種痘辨

痘本胎毒根於先天發則由於時氣以故沿門合境
安危相率與疫癘傳染無異且多外挾風寒內停宿
滯及乎跌撲驚恐為患種種匪可意料自伏波迄于
天生天殺莫可誰何邇年有種痘之說始自江右遠
於燕齊近則通行南北詳究其源云自亥女降乩之

醫通卷十一 大痘

真

方專取痘氣熏蒸發兒胎毒於安寧無病之時則開
發之機裕如不似正痘之天人合發內外合邪兩難
分解也原其種痘之苗別無他藥惟是蓋取痘兒標
粒之漿收人棉內納兒鼻孔女右男左七日其氣宜
通熱發點見少則數點多不過一二百顆亦有其痘
稍見微腫胎毒隨解大抵苗毒則順必然之理若痘
漿不得益痘痂亦可發苗痂無可藉則以新發痘
兒所服之衣與他兒服之亦能出痘總取同氣相通
為胎毒之嚮導其盜機也天下莫能知而聖功獨知

或有熱發出遲點不即起或雖發於痲疹之中用藥
扶持者悉如正痘法調理自安當知胎毒有慢症變
無窮况苗發之痘既無容邪鼓動血氣勢無變壞燥
亂之虞正氣內守雖汗氣穢氣也無妨礙脫痂後無
痕痕口鼻亦無殘廢之厄允為避險就安之捷徑若
有意外之變此兒正氣內奪加以容邪交迫時動必
潰命之制在氣道之理也值此而與種痘未有不告
變者故凡病後之兒及顏色太嬌骨幹太弱肌理太
疎者皆未可以輕試也其於痘證初行疫邪方熾之

醫通卷十一 附種痘

真

時切須避其銳氣當俟大勢稍平方可施補天浴日
之妙用其間或有不順者此必苗非順痘醫非慣家
是不能無握苗助長之憾然皆方士之所為人知其
神之神而不知不神之所以神吾以靜眼觀之曷若
順天隨時不假強為之為愈也

張氏醫通卷十二終

張氏醫通卷之十三

長洲石張

璐路玉父

登誕先

俾飛疇 參訂

諸家類集方藥皆隨論次第是編逐門但隸專方其藉古方加減各門可以通用者彷彿祖劑之義另白為卷於後

中風門

侯氏黑散 金匱 治大風四肢煩重心中惡寒不足

醫通卷十三

菊花 三兩

白朮 一兩

防風 八錢

桔梗 六錢

黃芩 四錢

人參

茯苓

細辛

當歸

乾薑

芍藥

桂枝

牡蠣 蒸

礬石 各二錢

右十四味杵為散酒服方寸匕日三服初服二十日用溫酒調服禁一切魚肉大蒜常山冷食六十一日止即藥積在腹中不下也熱食即下矣冷服自能助藥力 外臺借此治風癱疾

大風四肢煩重脾土受風木之制土氣內結不能散於四末也心下惡寒不足者胸中為濁氣填塞心火內蘊不得發越熱極反兼寒化也方中用菊花四十分為君以解心下之蘊熱防桂辛枳以升發腠理參苓白朮以實脾杜風芍歸以潤燥炮大牡蠣礬石以固滯腸胃使參朮之性留積不散助其入功乾薑黃芩一寒一熱寒為風之嚮導熱為火之反間也用溫酒服者令藥性走表以開其痺也冷食而禁諸熱物者恐禁得熱而下不能盡

醫通卷十三

其藥力以礬石性得冷即止得熱則下也 郭雍曰黑散本為條除風熱方中反用牡蠣礬石止滯之味且令冷食使藥積腹中然後熱食則風熱痰垢與藥漸次而下也

風引湯 金匱 千金 除熱癱瘓并治大人風引小兒驚癇瘵瘵日數十發

大黃

乾薑

龍骨 蒸 各一兩

甘草

牡蠣 蒸 各六錢

滑石

石膏 各一兩

赤石脂

紫石英

白石脂

寒水石 刀無石 桂枝 各一兩 子

右十二味 杵篩以葦囊盛之 取三指撮 井花水三

升 煮三沸 溫服一升 藥氏借治脚氣 郭壘借治火逆

風者外司厥陰 內應肝木 上隸手經 下隸足經 中

見少陽相火 所以風自內發者 由火熱而生也 風

生必害中土 土病則四末不用 聚液成痰 癰者風

木挾痰 注於四肢也 痼者風熱擾其經脈 內應於

心主也 前方祛風外散 此方引風內泄 故用大黃 兼

兼甘草 桂枝 滑石 石膏 以化風熱 乾薑 以爲反謀

使火無格拒之虞 石英 寒水 以潤血燥 石脂 龍骨

牡蠣 以補寒其空 絕風火復來之路也

千金三黃湯 命脈 治中風 手足拘急 百節疼痛 煩

熱 心亂 惡寒 經日不欲飲食

麻黃 黃芩 各三錢 獨活 三錢

細辛 一錢 黃耆 六錢

右五味 水煎 溫服 一服小汗 二服大汗 心熱加大

黃錢半 腹滿加枳實一枚 氣逆加人參二錢 悸加

牡蠣二錢 渴加栝蒌根二錢 先有寒加附子一片

石頑曰 此方千金云 仲景三黃湯 治惡寒 經日不

足 不欲飲食 全似內外虛寒之候 而方中反用黃

芩之苦寒 豈不礙麻黃輩之溫散乎 既用麻黃 復

用黃耆 豈不礙表氣之閉拒乎 曷知惡寒 經日不

食 雖有似乎虛寒 而實衛虛不能勝邪所致 不飲

飲食 亦是風熱內蘊之故 觀煩熱 心亂 一語 病情

灼然 故方中雖以麻黃 獨活 細辛 開發腠理 於外

卽以黃芩 清解風熱 於內 更慮衛虛 難於作治 乃

以大劑黃耆 助之 與黃耆 建中之義 不殊 其用黃

耆之意 有二 一以佐麻黃 開發之權 一以杜虛風

復入之路也 方後復云 心熱加大黃 言服前藥後

心中煩熱不除 知黃芩不能祛之外散 卽以本方

加大黃 以引之下泄也 其加枳實 加人參 加牡蠣

加栝蒌 等法 或治吐氣 或助本元 各隨標本 而施

加附子者 專佐麻黃之蒸發 助黃耆溫經 殊非陰

寒之謂 與麻黃附子細辛湯 同源異派 ○詳金匱

以千金二字 名方 珍重之也 千金祖金匱之意 而

銜其集曰 備急千金方 不忘祖述之本也

竹瀝飲子 千金 治風痲身熱痛四肢不收志亂不

甚者用此方當先以竹瀝一分生葛汁十分薑汁

一分和服然後用竹瀝飲子

芎藭 防已 附子

人參 芍藥 黃芩

甘草 桂心各一分 羚羊角三分

石膏六分 杏仁十四粒 麻黃

防風各分

右十三味水煮減半內竹瀝十分生葛汁五分薑

醫通卷十三 中風 五

汁半分分三服取汗間二三日更服一劑三服後

隨病進退增減

地黃飲子 治腎氣不上交於心舌瘡足癢

熟地黃三兩 巴戟天酒浸 肉苁蓉酒浸去

山茱萸去核 石斛 附子

白茯苓 石菖蒲 遠志甘草湯

甜肉桂 麥門冬去心各 五味子五錢

共為糜末每服五錢生薑五片大棗一枚薄荷七

葉水煎日二服服無時

喻嘉言曰方中桂附已戟原為驅逐濁陰痰涎而

設不可執已見而輕去之

天麻丸 治腎藏虛熱生風

天麻 牛膝二味酒浸 川芎 蘇

黑參 羌活各四兩 杜仲酒炒

附子炮去皮 當歸十兩 生地黃酒浸焙

為末煉白蜜丸侵晨沸湯臨臥溫酒送七十九

方中雖以歸地補養陰血為君其妙用全在天麻

與牛膝同浸同焙俾風痰濁溼咸從下趨而不致

上逆得力又在附子之雄引領歸地直入下焦填

補其空使風邪無復人之慮葶藶杜仲以祛在裏

溼熱羌活黑參以疎在表風熱標本合治有法歟

散各得其宜此方具矣

牛黃清心圓局方 治初中痰涎壅盛昏憤不省語

言寒瀆癰瘰不遂一切痰氣閉塞證

牛黃 羚羊角勿經火 茯苓

白朮生用 杜心 當歸

甘草各三錢 麝香 雄黃鍊水飛

龍腦 錢半

人參

犀角 各五錢

右十二味各取淨末配勻蜜和成劑分作五十九

金箔為衣待乾蠟護臨用開化沸湯薑湯任下

尚有防風黃芩麥門冬白芍柴胡桔梗杏仁芎藭
阿膠大豆黃卷蒲黃神麴白薇乾薑薯蕷大棗一
十六味因大元雜故去之

清心牛黃圓 治暴中神昏不語痰塞心包口角流

涎煩熱氣急一切痰熱閉遏證

西牛黃 三錢

陳膽南星 一兩

黃連 薑汁浸

當歸

甘草 炙各三錢五分

辰砂 五錢

醫通卷十三 中風

七

為極細末蒸餅和勻分作五十九金箔為衣候乾

蠟護臨服剖開生薑湯薄荷湯入參湯量虛實選

用調化服

至寶丹 局方

治諸中卒倒痰飲血氣俱閉寒熱交

錯者

生烏犀角 鎊

硃砂 研水

雄黃 研水

生玳瑁 鎊

琥珀 勿見火研

麝香 研

龍腦 一鎊

金銀箔 各五片

西牛黃 研半

安息香 一鎊

以無灰酒飛過濾去沙土約取淨一兩
微火熬成膏如無以蘇合香油代之

右將犀玳為細末入餘藥研勻將安息膏重用湯

煮後入諸藥和搜成劑分作百丸蠟護臨服用

參湯調化二丸卒中風障氣及產後惡血攻心

童便入薑汁化服

蘇合香圓 局方 治傳屍殞厥心腹卒痛僵仆不省

一切氣閉屬寒證

蘇合香 另研

安息香 無灰酒熬飛去

薰陸香 另研

龍腦 另研

丁香

麝香 另研

青木香

白朮

醫通卷十三 中風

八

沉香 另研

香附 炒

烏犀角 研極細

右十一味為末逐一配勻諒加煉白蜜和劑分作

五十九丸另以硃砂一兩水飛為衣蠟護臨用剖開

并花水生薑湯溫酒化下一丸 原方尚有白檀香

因太過燥故去之 蘇合香圓取諸香以開寒閉

僅用犀角為寒因寒用之嚮導與至寶丹中用龍

腦桂心 無異

李士材曰牛黃圓蘇合香圓皆中風門中奪門之

劑而功用迥異熱阻關竅用牛黃圓開之寒阻關

竅用蘇合香圓開之若夫口閉手攣眼合聲嘶自

1. 1022 丹黃丸 丹黃丸 3 頁 19

汗遺尿等虛脫證急用參附峻補庶或可救若用牛黃蘇合之藥入口即斃也

稀涎散 治中風卒倒痰涎擁盛者脈氣虛微禁用

豬牙皂角 四條去皮炭子 白礬 一兩半生

每用三字溫水灌下未甦少頃再用○一方用巴

豆六粒去皮膜研壓去油入礬中鎔化待礬枯為

末和牙皂末拌勻每用四五分吹入鼻中即吐

濁氣風湧而上則清陽失位倒置故令暴仆以此

先治其標使咽喉疎通能進湯藥便止若欲攻盡

醫通卷十三 中風

九

其痰則液無以養筋令人攣急筋枯此為大戒

舒筋三聖散 治口眼喎斜左急右緩血脈受邪者

當歸 肉桂 延胡索 等分

為散每服五錢水煎去滓早暮各一服

參歸三聖散 治風中血脈左半肢廢口目左喎

舒筋三聖散去延胡索加人參

風中血脈急需流布營氣營行脈中便不當泛用

風藥所謂血行風自滅也至於左半肢廢氣血不

能運行延切耗血胡敢輕試必藉人參引領當歸

肉桂何慮虛風之不散乎

正舌散 治驚痰堵塞喉隘肝熱生風舌強不正

蠍尾 去毒炭熯 茯苓 一兩薑

為散每服二錢溫酒調服并擦牙限日三度○而

赤倍蠍尾加薄荷半兩每服四錢水煎熱服取汗

効

解語湯 治中風脾緩舌強不語半身不遂

防風 天麻 煨切 附子 炮各一

棗仁 炒研 羚羊角 銹 梔桂

醫通卷十三 中風

十

羌活 各八分 甘草 炙五分

水煎入竹瀝半杯薑汁數匕服無時脈虛加人參

祛風定志湯 治心虛驚悸不能言

防風 棗仁 炒研 人參

當歸 各一錢 遠志肉 二分 橘紅

菖蒲 南星 泡 茯苓 各八分

羌活 甘草 炙各五分 生薑 五片

水煎服無時

甄權防風湯 千金 治偏風

防風	白芷
牛膝	狗脊
白朮 <small>各三錢</small>	羌活
附子 <small>外壹作人參</small>	杏仁 <small>各六錢</small>
石膏	桂心 <small>各九錢</small>
生薑 <small>兩半</small>	麻黃 <small>一兩二錢</small>
右十六味水煎分三服并鍼風池肩髃曲池支溝五樞陽陵泉巨虛下廉各一凡七穴一劑覺好更進一劑即鍼一度九劑九鍼即瘳矣亦得	

醫通卷十三 中風

十一

薏苡仁湯	治中風溼痺關節煩疼不利
薏苡仁 <small>一兩</small>	芍藥 <small>酒洗</small>
麻黃 <small>去節</small>	桂 <small>各八分</small>
甘草 <small>炙七分</small>	生薑 <small>七片</small>
水煎服無時	
若白汗加石膏煩熱疹痛加酒黃藥厥冷拘急加熟附子	
升麻胃風湯	治胃風能食手足麻脊日瞶而暈
升麻	當歸
白芷	

葛根 <small>各六分</small>	蒼木 <small>製八分</small>	麻黃 <small>去節</small>
葉本	羌活	草豆蔻 <small>研</small>
蔓荊 <small>子別各四分</small>	柴胡	黃藥 <small>薑製各三分</small>
甘草 <small>炙五分</small>	生薑 <small>三片</small>	大棗 <small>一枚</small>
水煎食遠服		
按風入胃府大便清血四射川人參胃風湯之桂芍祛之內散風入胃經而日瞶動而腫者用升麻胃風湯之升葛麻黃輩祛之外散不可不辨犀角升麻湯	治風熱頭面腫痛頰上加糊咽喉不利	

醫通卷十三 中風

十一

犀角 <small>鎊三分</small>	升麻 <small>一分</small>	防風
羌活 <small>各一分</small>	白芷	黃芩
白附子 <small>各六分</small>	甘草 <small>炙四分</small>	
水煎食遠服		
烏藥順氣散	治暴中風氣攻注遍身麻痺語言蹇澀口眼喎斜喉中氣塞有痰聲者	
麻黃 <small>去節</small>	橘皮	烏藥 <small>各三分</small>
枳殼	川芎	枳殼

甘草 炙

白芷

桔梗 各一兩

乾薑 炮 五錢

右十味為散每服半兩加生薑三片大棗一枚水煎熱服

吳鶴臯曰此治標之劑初病邪氣實者宜之

解風散 治風成為寒熱頭目昏眩支體疼痛手足

麻痺上膈壅滯

人參 二兩

麻黃 去節 一兩

芍藥

獨活

細辛

甘草 炙 各一兩

醫通卷十三 中風

三

為散每服四五錢入生薑五片薄荷七葉水煎服

按此木下金三黃湯去蒼芩加參芍甘草彼主杜

風清熱此主解散虛風同源異派。今人但知人

參為補虛之藥不知人參有祛邪蕩實之功此證

因虛風久襲若獨用麻黃無人參助其胃氣必不

能克効也

古今錄驗續命湯 方祖

近効白朮附子湯 虎附

千金八風續命湯 麻黃

千金獨活湯 桂枝

三生飲 省風

四物湯 方祖

四君子湯 方祖

二陳湯 方祖

小續命湯 結命

三化湯 方祖

六君子湯 四君子

大秦朮湯 四物

十全大補湯 保元

大建中湯 保元

人參養營湯 保元

大省風湯 星香

八味順氣散 四君子

千金附子散 麻黃

省風湯 星香

秦九升麻湯 升麻

滌痰湯 二陳

涼膈散 方祖

星香湯 方祖

導痰湯 方祖

醫通卷十三 中風

三

黑錫丹 全流

補中益氣湯 補氣

麻黃附子湯 麻黃

舍公當歸湯 麻黃

胃苓湯 脾胃

千金排風散 續命

黃耆建中湯 桂枝

小柴胡湯 方祖

當歸補血湯 保元

傷寒門

香蘇散 方祖

治感冒四時不正之氣

香附 薑汁

紫蘇莖葉各二兩 橘皮 一兩

甘草 炙 五錢

為散每服半兩加生薑三片大棗一枚水煎去滓
熱服暖覆取微汗日三夜一服以得汗身涼為度
芎蘇散 治三時感冒偏於血分者

半夏

茯苓

橘皮

葛根

柴胡

紫蘇

川芎

枳殼

桔梗 等分

甘草 炙減

為散每服半兩加薑棗煎服取微汗効

本方去川芎柴胡加人參前胡木香各參蘇飲治

醫通卷十一 傷寒

五

虛人感冒偏於氣分者

十神湯 局方

治感冒頭痛

麻黃 去節

葛根

紫蘇

香附

橘皮

芍藥

川芎 錢各一

白芷

升麻

甘草 錢各五分

生薑 五片

葱白 四莖

水煎去滓熱服取微汗

大陷胸丸 玉函

治結胸項強如柔瘰狀下之則和

大黃 八兩

葶藶 半斤

芒硝 半斤

杏仁 半斤去

皮尖

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取

如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕白蜜二合水二

升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取

下為効 如藥法

大陷胸湯 玉函

治結胸熱實脈沉而緊心下痛按

之石鞭

大黃 二兩

芒硝 三合

甘遂 一錢

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝

醫通卷十三 傷寒

六

煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

小陷胸湯 玉函

治小結胸正在心下按之則痛脈

浮滑者

黃連 三錢

半夏 三合

栝樓實 一枚

右三味以水六升先煮栝樓取三升去滓內諸藥

煮取二升去滓分溫三服

葱白香豉湯 玉函

治時疫傷寒三日已內頭痛如

破及溫病初起煩熱

葱白 連根

香豉 三合

右一味水煎入童子小便一合日三服秋冬加生薑二兩

按本方藥味雖輕功效最著凡虛人風熱伏氣發溫及產後感冒靡不隨手獲效與產後痢後川伏龍肝湯丸不殊既可探決死生且免招尤取謗真危證解圍之良劑也

加減葱白香豉湯 治三時風熱欬嗽咽喉腫痛難用葳蕤湯者用此代之

此即葱白香豉湯葱白減半加葳蕤二錢白薇青

醫通卷十三 傷寒

比

木香桔梗各一錢甘草薄荷各三分白蜜三七

葳蕤湯 千金 治風溫白汗身重及冬溫發熱咳嗽

葳蕤 錢半

石膏 二錢

白薇

青木香

麻黃 去節

杏仁 去皮

甘草 炙

獨活

芎藭 各一錢

右九味水煎日三服一方有葛根一錢

按千金葳蕤湯乃長沙麻黃升麻湯之變方為冬溫欬嗽咽乾痰結發熱自利之專藥以冬時有非節之暖則陽氣不藏少陰受病故首推葳蕤之獨

燥止欬為君佐以白薇青木香苦鹹降泄即春時

伏氣發溫更感於風之證亦不出此以葳蕤為少陰厥陰二經之嚮導也麻黃為發汗之重藥得石膏則有分解寒熱互結之功倘病勢較輕不妨於

中裁去麻黃石膏獨活芎藭杏仁等味合以葱白香豉之類未為不可如果熱勢紛糾急須開泄者

麻黃石膏又所必需在用方者臨病之權衡耳

犀角地黄湯 千金 治傷寒溫病一應發汗而不得

汗內畜血及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便血面

黃或中脫作痛

犀角 等分

生地黃 酒浸

牡丹皮

右四味水煎去滓入地黃再煎數沸濾清服喜忘

如狂加大黃黃芩脈大來遲腹不滿而自言滿者

加當歸肉桂吐衄加藕汁扁柏童便

褚膚湯 治少陰經伏熱咽痛

褚膚 五兩 湯泡下者

水煎濾去滓加白蜜白粉熬香和相得溫分六服

醫通卷十三 傷寒

比

黃連阿膠湯 玉兩

治熱傷陰血便紅

黃連 二錢五分

黃芩 一錢

芍藥 二錢

阿膠 三錢

雞子黃 一枚

右三味水煎去滓入阿膠烱盡小冷入雞子黃攪勻服

葛根黃芩黃連湯 玉兩

治誤下痢不止脈促喘而汗出

汗出

葛根 半兩

黃芩 二錢

黃連 三錢

甘草 炙二錢

醫通卷十三 傷寒

九

右四味先煮葛根次內諸藥去滓分溫再服

人中黃散 治疔瘡溫

人中黃 一兩

雄黃 辰砂各一錢

為散每服二錢薄荷桔梗湯下日三夜二服

導赤瀉心湯 治熱傳手少陰神昏

黃連 酒洗

黃芩 酒洗

山梔 薑製

滑石 碎

知母

犀角

甘草 生

人參

麥門冬 去心

茯神 各一錢

生薑 三片

大棗 三枚

燈心 一握

水煎熱服

此湯專治傷寒熱傳手少陰心經之證蓋取金匱瀉心湯為主以其熱在上而不在下病在氣而不在此故於本方裁去大黃易入山梔以清包絡之熱知母犀角以解肺胃之煩人參麥冬甘草茯神以安君主之神滑石為導赤之嚮導薑棗為散火之間使用犀角者即導赤散中之地黃用滑石者即導赤散中之木通雖無導赤散中藥味而導赤

醫通卷十三 傷寒

十

散之功效備其中矣嘗見時師畏人參助火除去不用此與驅饑疲而禦大敵何異哉

桂枝湯 方祖

麻黃湯 方祖

大青龍湯 麻黃湯下

五苓散 方祖

桃核承氣湯 承氣湯下

黃龍湯 承氣湯下

承氣湯 方祖

小柴胡湯 方祖

藿香正氣散 平胃散下

瀉心湯 方祖

大黃黃連瀉心湯 三黃湯下

附子瀉心湯 三黃湯下

梔子豉湯 方祖

梔子豉湯 梔子豉湯下

四逆湯 方祖

當歸四逆湯 桂枝湯下

白通湯 湯下

通脈四逆湯 湯下

黃耆建中湯 桂枝湯下

枳實建中湯 湯下

越脾湯 麻黃湯下

桂枝二越脾一湯 桂枝湯下

黃芩湯 湯下

白虎湯 方祖

涼膈散 方祖

雙解散 涼膈散下

黃連解毒湯 湯下

三黃石膏湯 湯下

三黃梔子豉湯 湯下

清熱解毒湯 湯下

人中黃丸 湯下

生料六味丸 丸下

傷寒

三

四逆加入參湯 湯下

保元湯 方祖

異功散 湯下

乾薑人參半夏丸 湯下

附子理中湯 湯下

附子湯 湯下

回陽返本湯 湯下

生地黃黃連湯 湯下

生脈散 方祖

暑門

一物瓜蒂湯 金匱

治夏暑以水灌汗身熱疼痛

瓜蒂 十四箇

右一味水煎去滓頓服少頃即吐不吐擇之

此方之妙全在探吐以發越鬱遏之陽氣則周身

汗出表和而在內之煩熱得苦寒湧泄亦蕩然無

餘今人目睹其方而不知用醫道之陋若此

消暑十全散 治傷暑兼感風邪發熱頭痛。

香薷 二錢 藜豆 炒掩 厚朴 薑製

陳皮 甘草 炙 白朮

茯苓 木瓜 藿香

蘇葉 各一錢

水煎熱服無時取微汗効

傷暑

三

香薷飲 局方 治傷暑腹中不和煩渴引飲。

香薷 二錢 厚朴 薑製 藜豆 炒研一錢五分

甘草 炙 一錢

水煎井中沉冷服之身熱欲得汗者熱服。

黃連香薷飲 治人 治傷暑大熱煩渴。

香薷 二錢 黃連 酒炒 厚朴 薑製 一錢

水煎熱服

導赤散 局方 治小腸實熱小便赤澀。

生地黃 五錢 木通 甘草稍 生各一錢

竹葉 一錢
 右四味水煎熱服。瀉血加辰砂五分。方多盛草。
 十味香薷飲 治傷暑體倦神昏頭重吐利
 香薷 二錢 人參 黃耆 酒炒
 白朮 茯苓 甘草 炙
 藜豆 陳皮 醋炒 厚朴 薑製
 木瓜 各一錢
 水煎欲作汗熱服欲利小便冷服
 六和湯 治傷暑霍亂煩悶喘嘔吐瀉

醫通卷十三 暑

三

香薷 二錢 人參 茯苓
 甘草 炙 藜豆 厚朴 薑製
 木瓜 杏仁 泡去 半夏 醋炒 各
 藿香 砂仁 炒研各 生薑 三片
 大棗 一枚
 水煎熱服
 清暑益氣湯 保元 白虎加人參湯 白虎
 五苓散 方祖 梔子豉湯 方祖
 益元散 方祖 白虎湯 方祖

竹葉石膏湯 白虎 消暑丸 湯下
 香香正氣散 散下 養胃湯 散下
 大順散 湯中 冷香飲子 湯下
 梨水散 湯下 來復丹 丹下
 清燥湯 湯下 補中益氣湯 湯下
 蒼朮白虎湯 湯下 生脈散 方祖
 小半夏茯苓湯 湯下 生料六味丸 丸下
 桂苓丸 散下 參苓白朮散 湯下
 錢氏白朮散 湯下 黃連解毒湯 湯下

醫通卷十三 暑

三

保元湯 方祖
 溼門
 羌活勝溼湯 治風溼上衝頭痛項似拔腰似折
 羌活 獨活 防風
 川芎 藜本 蔓荊子 碎
 甘草 炙 生薑 三片
 水煎熱服緩取微似汗過汗則風去溼不去也如
 無頭痛去蔓荊子換蒼朮
 除風溼羌活湯 治風溼相搏一身盡痛日哺發熱

羌活

防風

柴胡

蒼朮

升麻

升麻八分

生薑 一片

水煎空心熱服覆暖取微汗

按羌活勝溼湯與除風溼羌活湯同源異派此治頭項之溼故用羌防芎藭一派風藥以祛上盛之邪然熱雖上浮溼本下著所以復用獨活透達少陰之經其妙用尤在緩取微似之汗故劑中加用甘草以緩諸藥辛散之性則溼著之邪亦得從之

醫通卷十三

三

緩去無藉大開汗孔急驅風邪之法使肌腠餒弱無力濕邪因之內縮但風去而溼不去也其有腰以下重寒溼之邪留於陰分也本方加防己以逐溼必兼生附以行經或見身重腰沉沉然溼熱之邪過於陽分也本方加蒼朮以燥溼必兼黃芩以清熱非同達長沙朮附桂附梔子檠皮等方不能效用其法其除風溼羌活湯治外淫之溼而無上衝頭項之痛則川芎藭制無預也亦無溼著腰疼之患與獨活丸無交涉故但用羌防芎藭益大升

柴胡丸開提周身關脈則溼邪自無所容而外散矣

神木湯局方

治風木之邪內干溼土泄利下血

蒼朮 油浸炒

藥本

川芎

羌活 錢各一

白芷

甘草 炙

細辛 錢各五

生薑 三片

葱白 二莖 連須

右九味水煎熱服

按神木湯純用風藥與羌活勝溼相去不遠如何可治泄利下血蓋火淫陽明之血則燥金受傷祇

醫通卷十三

三

合清涼最嫌風燥若風乘太陰之血則溼土被鬱法當升散切戒寒涼當知陽明來者色必鮮明太陰來者色必濇其源各異故其治亦迥乎不作究其旨不越風能勝溼之義蒼朮專主木邪乘土故能治外內諸邪以風木之邪內干土藏故用羌芎藭辛等風藥兼川芎以引入血分甘草以調和胃氣胃氣收布有權泄利下血自止蓋汗即血之液奪其汗則血中之溼熱邪氣悉從外泄而無內滯之患矣

升陽除溼防風湯即升陽防風湯 治風溼癢泄及腸風滯

下便血

防風 二錢

蒼朮酒浸去皮

白朮土蒸

茯苓

白芍各一錢

生薑 一片

水煎熱服取微汗

陽陷於下則成癢泄溼犯於上則令頭痛清濁倒置而然故用風藥以勝溼也然風木之病稍加桂枝甘草監製其功尤捷

茵陳蒿湯玉函 治溼熱發黃便秘脈實

醫通卷十三 溼

毛

茵陳蒿 五錢

梔子五枚

大黃 二錢

右三味水煎熱服微利黃水去為度未去越三日再服

按茵陳蒿湯其旨全在通利水道不得不借幽門為嚮導也

清熱滲濕湯 治夏月濕熱痲風煩渴泄瀉赤

黃蘗鹽酒炒

蒼朮去皮同

白朮生

茯苓

澤瀉

黃連酒炒各

甘草炙五分

竹葉十片

水煎熱服小便利為效

老人虛人加肉桂少許氣虛喘乏加人參服虛合

生脈散內傷生冷加炮薑

按此本二妙合五苓之半加黃連甘草以燥夏令之溼熱良可法也

當歸拈痛湯 治溼熱走注遍身骨節煩疼胸膈不利足脛赤腫重痛

羌活

甘草炙

黃芩

茵陳酒炒各

人參

苦參酒洗

醫通卷十三 溼

毛

升麻多汗易

葛根

蒼朮酒浸自汗

歸身各六分

白朮薑製

防風下腫易

知母酒炒易

猪苓

澤瀉各八分

生薑 一片

水煎熱服無時

此溼熱痲腫之聖方若不赤不腫痛上不熱為寒

清熱滲濕湯

除溼湯

五苓散

腎著湯

湯下

黃耆建中湯 桂枝 芍藥 甘草 黃耆 饴糖

小建中湯 桂枝 芍藥 甘草 黃耆 饴糖

苓桂朮甘湯 茯苓 桂枝 朮 甘草

小青龍湯 麻黃 芍藥 桂枝 細辛 乾薑 五味子

麻黃加朮湯 麻黃 桂枝 芍藥 甘草 朮

麻黃杏仁薏苡甘草湯 麻黃 杏仁 薏苡仁 甘草

五積散 平胃 枳實 厚朴 蒼朮 芍藥 枳殼 木香 砂仁 羌活 獨活 白芷 川芎 薄荷 陳皮 甘草 茯苓 澤瀉 神曲 山楂 麥芽 黃連 黃芩 黃蘗 黃柏 知母 石膏 煨薑 大棗 小麥 白豆蔻 肉豆蔻 木香 砂仁 羌活 獨活 白芷 川芎 薄荷 陳皮 甘草 茯苓 澤瀉 神曲 山楂 麥芽 黃連 黃芩 黃蘗 黃柏 知母 石膏 煨薑 大棗 小麥 白豆蔻 肉豆蔻

敗毒散 小柴胡 羌活 獨活 白芷 川芎 薄荷 陳皮 甘草 茯苓 澤瀉 神曲 山楂 麥芽 黃連 黃芩 黃蘗 黃柏 知母 石膏 煨薑 大棗 小麥 白豆蔻 肉豆蔻

桂枝附子湯 桂枝 芍藥 甘草 附子

防己黃耆湯 防己 黃耆 桂枝 芍藥 甘草 薏苡仁

甘草附子湯 甘草 芍藥 附子 桂枝

白朮附子湯 白朮 芍藥 附子 桂枝

桂苓甘露飲 桂枝 茯苓 白朮 甘草 石膏 知母 黃芩 大青 犀角 滑石 木香 香薷 薄荷 陳皮 枳殼 神曲 麥芽 山楂 黃連 黃芩 黃蘗 黃柏 知母 石膏 煨薑 大棗 小麥 白豆蔻 肉豆蔻

虎潛丸 熟地 龜板 虎骨 黃柏 知母 芍藥 白朮 牛膝 杜仲 羌活 獨活 白芷 川芎 薄荷 陳皮 甘草 茯苓 澤瀉 神曲 山楂 麥芽 黃連 黃芩 黃蘗 黃柏 知母 石膏 煨薑 大棗 小麥 白豆蔻 肉豆蔻

神芎丸 神曲 川芎 羌活 獨活 白芷 川芎 薄荷 陳皮 甘草 茯苓 澤瀉 神曲 山楂 麥芽 黃連 黃芩 黃蘗 黃柏 知母 石膏 煨薑 大棗 小麥 白豆蔻 肉豆蔻

瀉心湯 大黃 黃芩 芍藥 甘草 瀉心散

六君子湯 白朮 茯苓 甘草 附子 桂枝 芍藥

清燥湯 保元 芍藥 甘草 附子 桂枝 芍藥

春澤湯 五苓散 芍藥 甘草 附子 桂枝 芍藥

控涎丹 白芥子 大戟 芫花 蘇合香 安息香 乳香 沒藥 阿膠 龜板 地龍 麝香 冰片 蘇合香 安息香 乳香 沒藥 阿膠 龜板 地龍 麝香 冰片

地黃飲子 中風 芍藥 甘草 附子 桂枝 芍藥

黑錫丹 金液 芍藥 甘草 附子 桂枝 芍藥

生脈散 方祖 芍藥 甘草 附子 桂枝 芍藥

濟生腎氣丸 八味 芍藥 甘草 附子 桂枝 芍藥

燥門

五味子湯 千金 芍藥 甘草 附子 桂枝 芍藥

皮膚乾枯

治傷燥欬唾中有血牽引胸脇痛

五味子 五分 炒研

桔梗

紫苑茸

續斷

甘草

竹茹

桑根皮 蜜炒 各一錢 生地黃 二錢 赤小豆 一撮 即亦豆之

右九味水煎空心服。秘旨加白蜜一匙。

麥門冬湯 十金 治大病後火熱乘肺。欬唾有血。胸

膈脹滿上氣羸瘦五心煩熱渴而便秘。

麥門冬 去心 二錢 桔梗 桑根皮 蜜炙

半夏 生地黃 紫苑茸

竹茹 各一錢 麻黃 七分 甘草 炙 九分

五味子 十粒 碎 生薑 一片

醫通卷十三 燥 三十

右十一味水煎空心服。

石頑曰按千金麥門冬湯即五味子湯中去續斷

赤小豆加門冬麻黃半夏生薑而五味子湯專治

燥欬方中反用續斷以燥溼麥門冬湯專治火熱

乘肺欬唾有血反用麻黃半夏世都莫解其故是

以并其方面置之不知致燥之由皆緣經脈阻滯

非續斷不能通之欬唾有血是傷寒大病後餘邪

蘊釀為火而乘於肺非麻黃不能開之痰凝氣結

津液不行非半夏不能祛之與活人知母麻黃湯

和劑欵冬花散等。立法不殊。今人每謂生夏性燥。一切渴家亡血家禁川。又謂半夏辛溫。不當與門冬竹茹寒潤藥同用。若爾則金匱麥門冬湯竹葉石膏湯俱不足法耶。

地黃煎 千金 治風熱心煩。欵喘便秘。脾胃熱壅。食不下。

生地黄汁

枸杞子汁 二味酒搗各取汁

荆瀝

竹瀝 各半 真酥

生薑汁 各一合

人參 天門冬 去心各一兩

醫通卷十三 燥

三

白茯苓 八錢

大黃 酒蒸

梔子 薑汁炒黑 各五錢

右十一味。以後五味為細末。入前六汁內。調服方寸匕。再服漸加。以利為度。

生地黄煎 千金

治積熱煩渴。日晡轉劇。喘欵面赤。能食便秘。

能食便秘。

葳蕤

知母

茯苓

栝蒌根

鮮地骨皮 各二兩

石膏 四兩

生地黄汁 二升

麥門冬汁

白蜜 各一合

生薑汁 二合

竹瀝 六分

右咬咀。以水一斗二升。先煮諸藥。取汁三升。去滓。下竹瀝。地黃。門冬汁。緩火煎至四升。下煉白蜜。薑汁。再煎數沸。初服三合。日三夜一服。加至四合。夏月為散。收薑汁。竹瀝。焙乾。蜜丸。煎膏。尤妙。

喻嘉言曰。此方生液涼血。製火椒熱。兼擅其長。再加人參。乃治虛熱之良劑。然非能食便秘者。斷不可施。

通幽湯 治大便燥結。使出堅黑。

可施。

油當歸 二分

升麻 三分

醋浸

桃仁泥 一錢

醫通卷十三 燥

三

甘草 生多各五分

紅花 少許

熟地黃

生地黄 各一錢五分

水煎。將成。用藥汁磨檳榔五分。調入。稍熱服。潤燥湯。

潤燥湯

通幽湯加麻仁。大黃各一錢。

清涼飲 治上焦積熱。肺氣不化。口舌乾燥。

黃連

黃芩

薄荷

黑參

當歸

赤芍藥 各一錢五分

甘草 各一錢

冰煎入生白蜜一七熱服。大便秘結。加酒蒸大黃。
四順清涼飲一名四順飲 治血熱便秘脈實者。

當歸 赤芍 甘草

大黃酒蒸各一錢五分

水煎入生白蜜一七熱服。

按清涼飲。治上焦之燥熱。故用薄荷之辛散。四順

飲主下焦之燥結。故用大黃之苦寒。功用天淵。

麻仁丸玉函 治脾約大便燥結。

厚朴薑汁炒 芍藥 枳實炒各二錢

醫通卷十三 燥

大黃四錢 麻仁泥 杏仁炮去皮尖各錢半

右六味為末。煉白蜜丸。梧子大。飲服五十九。日三

服。以利為度。

潤腸丸 治大腸風熱血秘。

麻仁 桃仁另研各一兩 羌活

當歸各半兩 大黃絲綫水浸淨紙裏煨半兩

皂角仁 秦艽各半兩一作防風

除二仁另研外。為細末。蜜丸。梧子大。每服五十九。

食前溫酒下。○本方加郁李仁。防風。名潤燥丸。

猪膽導玉函

大猪膽一枚。瀉汁和醋少許。以灌穀道中。如一

食頃。當大便出。虛人不可用。膽導。陳醬薑陳醬

瓜皆可。削為導。溼熱肥盛痰闊。可用黃瓜根浸

溼削之為導。此即土瓜根導也。

蜜煎導

白蜜七合。一味內銅器中。微火煎之。稍凝如餠

狀。攪之勿令焦著。欲可丸。并手捻作挺。令頭銳

大如指。長五寸。當熱時急作。冷則硬。納穀道中。

醫通卷十三 燥

以手急抵。欲大便去之。

異功散四君子湯下 六味丸八味丸下

固本丸二冬膏下 滋燥養營湯四物湯下

大補地黃丸四物湯下 虎潛丸大補丸下

火門

紫雪散治脾氣瘴毒。內外熱熾。狂越躁亂。心腹疔痛

口舌生瘡。一切實火閉結。諸藥不効者。

黃金十兩黃金鋪中葉子有効

用水三斗。先煮一斗。旋添。煮至一斗為度。去金取

汁煮下項藥。

石膏

寒水石如無真者元精石代之

磁石醋煨

白滑石各五兩

上四味搗入前汁中。煮至五升。入下項藥。

烏犀角鎊

羚羊角鎊

青木香切

沉香研各五錢

黑參切

升麻各一兩六錢

生甘草八錢

丁香搗碎一錢

上八味入前汁中。煮取一升五合。去滓入下項藥。

芒硝一兩

焰硝三兩

醫通卷十三 火

三

上二味入前藥汁中。微火上煎。柳木搥攪不住手。候有七合半。投在水盆中。半日欲凝。入下項藥。

硃砂研細水飛淨五錢

麝香當門子研一錢二分

上二味入前藥中攪勻。勿見火。寒之二日。候凝結。

成霜紫色。鉛罐收貯。每服一分至二分。杵細冷水。

或薄荷湯調下。小兒以意量減。

此即千金玄霜局方於紫雪方中。參入甘草丁香。

硃砂二味。遂用紫雪之名。一方面兼兩方之製。但。

此專主石藥毒火方中丁香一味。用方者審之。

黃金本無氣味。必鋪中葉子曾經煉煨。煮之方有。

性味。以其香味易散。故較原方減小其製。

碧雪局方 治一切積熱咽喉腫痛。口舌生瘡。心中。

煩躁。嚙物妨悶。或喉閉壅塞。水漿不下。天行時疫。

發狂昏憤。並皆治之。

寒水石

芒硝

石膏煨飛

青黛

馬牙硝

朴硝

硝石

甘草各等分

右將甘草煎湯二升。去滓。却入諸藥。再煎。用柳木。

醫通卷十三 火

三

攪不住手。攪令消鎔得所。却入青黛和勻。傾入砂盆內。候冷結凝成霜。研為末。每用少許。含化嚙津。不拘時候。如喉閉壅塞。不能嚙物者。用小竹筒吹藥入喉中。頻用神效。

朴硝煎下合

治服石藥成消瘰大渴者。

朴硝一兩

芒硝八兩

石膏二兩

寒水石四兩

右四味先內二硝於八升湯中。覺令消。以紙密封。

一宿。取清。內銅器中。別搗寒水石。石膏。碎如豆粒。

以絹袋盛之。納汁中。以微火煎。候其上有膜起。以箸投中。着箸如凌雪。凝白。急下。瀉貯盆中。待凝。取出。烈日曝乾。積熱困悶不已者。以方寸匕白蜜。合和冷水五合。攪和令消。頓服之。日二。熱定即止。

武德中貴高
人加金二兩

八味丸 方祖

保元湯 方祖

解毒湯 湯下

火鬱湯 湯下

瀉陰火升陽湯 湯下

升陽散火湯 湯下

佐金丸 方祖

當歸龍薈丸 湯下

醫通卷十三 火

聖錫丹 丹下

四君子湯 方祖

六味丸 丸下

生脈散 方祖

滋腎丸 丸下

傷飲食門

枳實導滯湯 治傷溼熱之物痞悶不安

枳實 錢三

白朮 錢五

茯苓 錢三

黃芩 錢二

黃連 錢三

澤瀉 錢三

大黃 錢一

神麴 錢四

生薑 錢三

水煎食遠服

此枳木丸合三黃湯而兼五苓之製。以祛溼熱。宿滯也。

木香化滯湯 治氣食痞結腹微痛不思飲食

半夏

甘草

草豆蔻

柴胡

木香

橘皮

枳實

當歸

紅花

生薑

水煎食遠稍熱服

保和丸 治宿食酒積

醫通卷十三 傷飲食

山查肉

半夏

扇紅

神麴

麥蘖

茯苓

連翹

萊菔子

黃連

為末。水泛為丸。每服二錢。茶清送下。

本方加炒白朮二兩。名大安丸。

按保和丸大安丸中。麥蘖傷腎。菔子傷脾胃之氣。

恐非丸劑所宜。久服之品。當易枳實香附子。功用

不殊。而不致傷犯先後天之真氣也。

紅丸子 治宿食不積作脹

荆三稜炒

蓬莪茂煨

青皮炒

陳皮炒

乾薑炒等

為末。陳酒麴糊丸。梧子大。礬紅為衣。每服三五十九。食前沸湯下。小兒量減。

葛花解酲湯 治傷酒嘔吐胸痞小便不利。

葛花

白豆蔻

砂仁炒各一錢

青皮炒

神麴炒

澤瀉

乾薑各五分

白木炒八分

人參

橘紅

茯苓

猪苓各四分

醫通卷十三 傷飲食

木香一分

水煎服。但得微汗。則酒溼去矣。

按此雖本五苓。四君子。益入葛花。豆蔻等。辛散之。味大損元氣。世人不知。參謂方中人。參有補益之功。恃此縱飲。是白伐其天也。

麴藥丸 治酒積成癖。腹脇滿痛。後便積沫。

神麴炒

麥蘖炒去殼

黃連半兩同炒

去巴

為末。水泛為丸。梧子大。每服五十九。食前薑湯下。

○酒積下白沫。加炮薑二錢。下鮮血。倍黃連。下赤血。加紅麴一兩。

塌氣丸 治肝氣乘脾腹脹。

胡椒一兩

蠍尾去毒滾酒泡去

為末。麴糊丸。粟米大。每服二三十丸。米飲下。

神保丸 治心胸腹脇脹痛。大便不通。宿食不消。

塌氣丸。加木香二錢五分。巴豆霜二分半。本方中胡椒用二錢五分。蠍尾用全者七枚。

為末。湯浸蒸餅丸。麻子大。硃砂為衣。每服五九空。

醫通卷十三 傷飲食

心薑湯醋湯沙糖湯任下。

酒癢丸局方 治酒癖腹病下積。遇酒即吐。

塌氣丸。去胡椒。加雄黃油煎。皂子大一枚。巴豆十五粒。不去油。本方中蠍尾用十五枚。不去毒。

為末。入白麴二兩半。滴水丸。如豌豆大。候稍乾。入麴炒香。每服二三丸。溫酒下。茶清亦可。

平胃散方劑 枳朮丸方劑

補中益氣湯保元湯下 二陳湯方劑

藜蘇散傷寒 藿香正氣散方劑

藜蘇散傷寒

藜蘇散傷寒

承氣湯 方祖

備急丸 方祖

白散 備急丸下

六君子湯 四君子湯下

七味白朮散 四君子湯下

九味資生丸 四君子湯下

枳實理中湯 理中湯下

連理湯 理中湯下

八味順氣散 四君子湯下

五苓散 方祖

獨參湯 保元湯下

四君子湯 方祖

涼膈散 方祖

六味丸 八味丸下

傷勞倦門

殊砂安神丸 治熱傷心胞氣浮心亂虛煩不寧

醫通卷十三 傷勞倦

聖

殊砂

水飛五錢 一半為衣

甘草 五錢

黃連 酒蒸六錢

當歸 二分

生地黃 一分

除殊砂共為細末湯浸蒸餅為丸黍米大殊砂為衣每服十五丸至三十丸獨參湯或補中益氣湯送下

送下

凡言心經藥都屬心包。惟殊砂外稟離明內含真汞故能交合水火直入心竅。但其性徐緩無迅掃陽焰之速効是以更需黃連之苦寒以直折其勢。甘草之甘緩以款收其微。俾膈上之實火虛火悉

從小腸而降泄之允為勞心傷神動作傷氣擾亂

虛陽之的方豈特治熱傷心包而已哉然其與

在當歸之辛溫走血地黃之濡潤滋陰以杜火氣

復熾之路其動靜之機多寡之制各有至理良工

調劑之苦心其可忽諸

黃耆建中湯 桂枝湯下

補中益氣湯 保元湯下

小建中湯 桂枝湯下

理中湯 方祖

平胃散 方祖

五苓散 方祖

六君子湯 四君子湯下

枳朮丸 方祖

醫通卷十三 傷勞倦

聖

枳實理中湯 理中湯下

八味丸 方祖

當歸補血湯 保元湯下

調中益氣湯 保元湯下

升陽順氣湯 保元湯下

升陽補氣湯 升府湯下

門冬清肺飲 生脈散下

升陽益胃湯 保元湯下

犀角地黃湯 傷寒門

保元湯 方祖

四君子湯 方祖

八珍湯 四君子湯下

十全大補湯 保元湯下

六味丸 八味丸下

虛損門

薯蕷丸 金匱 治虛勞諸不足風氣百疾

薯蕷 <small>即山藥</small>	當歸	桂枝
麴	乾地黄	大豆黃卷 <small>各七錢半</small>
甘草 <small>炙一兩</small>	人參	阿膠 <small>各五錢</small>
芎藭	芍藥	麥門冬
白朮	杏仁	防風
柴胡	桔梗	茯苓 <small>各四錢</small>
乾薑 <small>二錢</small>	白欬 <small>錢半</small>	大棗 <small>五十枚</small>
右二十一味末之。煉白蜜和丸。如彈子大。空心服。一丸。一百丸為劑。		

醫通卷十三 虛損

聖

酸棗湯 <small>金匱</small>	治虛勞虛煩不得眠盜汗
酸棗仁 <small>炒半兩</small>	甘草 <small>炙一錢</small>
知母 <small>炒</small>	芍藥 <small>各二錢</small>
茯苓	
右五味水煎。溫分二服。○潑師加生薑。便澹去。知母。加入人參。服此。盜汗不止。去芍藥。加芍藥。怔忡去。知母。芍藥。加入人參。黃耆。當歸。陳皮。蓮肉。	
大黃蠱蟲丸 <small>金匱</small>	治五勞虛極。羸瘦。腹滿。不能飲食。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。宜用此方。攻其惡血。然後補之。

大黃 <small>二錢</small>	黃芩 <small>二錢</small>	甘草 <small>三錢</small>
桃仁 <small>一合</small>	杏仁 <small>一合</small>	乾地黄 <small>一兩</small>
芍藥 <small>四錢</small>	乾漆 <small>散令爛</small>	蠱蟲 <small>一合</small>
水蛭 <small>十枚</small>	蠲蝟 <small>一合</small>	蠱蟲 <small>半合</small>
右十二味為末。蜜丸。如小豆大。溫酒服。五十九日。三服。		
百勞丸	治一切勞瘵。積滯。疾不經藥。壞者宜服。	
當歸 <small>炒</small>	乳香	沒藥 <small>各一錢</small>
人參 <small>二錢</small>	大黃 <small>四錢</small>	梔子 <small>十四枚</small>
去皮。熬。		

醫通卷十三 虛損

四

蠱蟲 <small>十四枚</small>	水蛭 <small>十四枚</small>
為末。煉白蜜丸。梧子大。每服百丸。百勞水下。取下。惡物為度。服白粥十日。百勞水。以杓揚之。百遍。然後煮沸。即甘瀾水法也。	
瓊玉膏	治虛勞。乾欬。喉中血腥。腸中隱痛。
鮮地黄 <small>四十兩</small>	人參 <small>另為末</small>
沉香 <small>另研</small>	琥珀 <small>另研各半兩</small>
白茯苓 <small>另為末</small>	
先以地黃。蒸膏。點紙上。不滲。入人參。茯苓。末。并入。糖。二十兩。攪勻。溶化。離火。再入琥珀。沉香。和勻。	

滋鑠收滋。清晨午前溫酒服數匙。沸湯亦可。

四味鹿茸丸 治肝腎督脈皆虛。欬嗽吐血脈虛。無力上熱下寒。

鹿茸酥炙另 五味子 當歸身各一兩

熟地黃二兩

為細末酒和九。梧子大每服四五十丸。空腹溫酒送下。

濟生鹿茸丸作湯各生 治腎藏真陽久虛。下體痿

弱疼痛。喘嗽水泛為痰。

醫通卷十三 虛損

聖

鹿茸酒炙 牛膝鹽酒 五味子各一兩

石斛 巴戟肉 附子炮

川棟肉酒蒸 山藥 肉桂

杜仲鹽酒 澤瀉鹽水炒 沉香另炒

為末酒糊丸。梧子大每服七十九。侵晨溫酒下。俗

本尚多白棘。兔絲慈石。陽起石。四味。

安腎丸 治腎虛風襲。下體痿弱。疼痛不能起立。

肉桂 川烏頭炮各 白茯苓炒

巴戟天去骨 薯蕷炒 茯苓

石斛酒炒 川草薢炒 白朮

肉苁蓉酒浸 補骨脂炒各四

為末煉蜜丸。梧子大每服七十九。空腹鹽湯。臨臥

溫酒下。

腎藏為風寒所襲。所以不安。故用烏頭。疾蒸祛風。

散寒之劑。風去則腎自安。原無事於溫補也。其他

桂苓木。薢脂。戟。蕤。解。難。曰。兼。理。脾。腎。而。實。從。事。乎

祛。溼。利。水。祇。緣。醉。飽。入。房。汗。隨。風。破。所。以。肢。體。沉

重。非。藉。疎。通。溝。瀆。病。必。不。除。因。彷彿。地。黃。飲。子。而

醫通卷十三 虛損

聖

為製劑。彼用地黃。菖志。冬味。萸附。以交心腎之氣。

此用疾薜。朮。積。骨。脂。烏。頭。以祛坎陷之風。與崔氏

八味丸。迥乎不同也。

四烏鯁骨一鹿如丸素問 治氣竭肝傷。脫血血枯。

婦人血枯。經閉。丈夫陰痿。精傷。

烏鯁骨四兩即 薤茹一兩本草作

丸以雀卵大。如小豆。以五丸為後飯。飲以鮑魚汁。

利腸中及傷肝也。

內經之方不多見。僅僅數方。世都棄置不講。况甲

乙太素誤作蔞茹致王太僕亦作蔞茹性味訓解
所以目睹其方究竟不識為何物爾嘗考本草
味並皆走血故內經以之治氣竭傷肝血枯經閉
等證九以雀卵飲以鮑魚汁者取異類有情以暖
腎調肝則虛中留結之乾血漸化黃水而下矣後
飯者先藥後飯使藥力下行也惟金水二藏陰虛
陽擾喘嗽失血強中滑精者禁用以其專主溫散
而無涵養真陰之澤也

或問烏鰂茹蔞俱蒐血之品如何可治血枯經閉

醫通卷十三 虛損

聖

之疾荅曰夫血枯經閉非純虛而經絕不行也良
由氣竭肝傷乾血內結以故營血不能內藏如胸
脇支滿目眩血結肝部也聞腥臊妨於食血結胃
腕也出清涕胃氣衰而濁逆清道也凡崩淋胞痺
諸證若沃以湯上為清涕皆陽衰不能灌注精微
敗殘之液悉化為涕得湯氣蒸而上走空竅也是
知血枯經閉必以清理乾血為首務故金匱治五
勞虛極羸瘦內有乾血用大黃廔蟲丸由此而推
胞痺精傷亦必清理敗濁為首務蓋大黃廔蟲丸

一瓜破瘀之味較烏鰂蔞茹丸之蒐血猛峻百倍
耳

又問雀卵以時而生急需未可必得奈何荅曰大
匠在乎繩墨不拘物料皆可成器雀卵功專煖腎
如無雀肉煮搗可代雞卵及肝亦可代雞屬異而
肝主血也活法在人可執一哉

花藥石散 治氣虛血凝瘀積壅聚胸膈作痛
宜用重劑竭之

花藥石 五兩碎產硫黃山中狀如黃石中有黃
點如花之心故名花藥石近世皆以玲瓏

醫通卷十三 虛損

聖

如花藥者偽充欲試真偽假
過置血上血即化水者真 硫黃 二兩
右二味同入煬成礮內鹽泥封固煨一伏時研如
麩每用二錢食遠童便調服婦人產後血逆血暈
胞衣不下或子死腹中俱宜服之瘀血化為黃水
然後以獨參湯調之

十灰散 治虛勞吐血咯血先用此過之

大劑 小劑 栝葉

薄荷 黃芩 茅根

山梔 大黃 牡丹皮

樓欄皮 等分

各燒灰存性紙裏蓋地上一夕食遠服二三錢童便調下

花藥石散為破血之峻劑功專化血為水而世畏其峻罕能用之葛可久言暴血成升斗者宜花藥石散若病久涉虛及肝腎二家之血非其所宜且與十灰散並舉而言不分寒熱主治所以後世不能無誤用之失常知十灰散專主火炎上湧之血倘誤用以治陰邪固結之證為害猶輕若誤用花

醫通卷十三 虛損

覽

藥石散治血熱妄行之病為患莫測况血熱妄行十常八九陰邪固結十無一二所以舉世醫者病者俱畏之如燧遂致置而不講乃致一切陰邪暴湧之血悉皆委之莫救豈其命耶

瑞金丹 治虛勞吐血紅痰結者

川大黃 酒拌炒黑至黃起為度

真秋石 各一兩

右杵為細末煮紅棗肉為丸小豆大空腹薄荷湯下二錢
痰在心包不時驚悸面赤神昏者加真鬱金三錢

皮色如栝刺 痰在胃吐血成盆者犀角地黄湯送下

童真丸 治虛勞吐血氣虛喘嗽

真秋石 川貝母等分

右二味煮紅棗肉為丸空腹薄荷湯下二錢

如脈虛氣耗加人參若脈細數為陰虛禁用人參加牡丹皮脾虛泄泄加山藥茯苓炙甘草

龜鹿二仙膏 治督任俱虛精血不足

鹿角膠 一兩 龜版膠 半兩 枸杞 六兩

醫通卷十三 虛損

詳

人參 西兩另為細末 桂圓肉 六兩

右五味以杞圓煎膏煉白蜜收先將二膠酒浸烱杞圓膏中候化盡人人參末磁罐收貯清晨醇酒調服五六錢

聚精丸 治腎虛封藏不固

鱉膠 白淨者一兩碎切焙粉或吐爛粉炒成珠再用乳酥炒則不粘粉

沙苑蒺藜 五兩乳浸一宿隔湯蒸一炷香晒乾勿炒

為細末煉白蜜中加入陳酒再沸候蜜將冷為丸不可熱搗熱搗則膠粘難丸丸如菜豆大空心溫

酒或白湯下八九十九忌諸魚牛肉

張景岳加五味二兩

大補黃庭丸 治虛勞食少便溏不宜陰藥者

人參 一兩 茯苓 一兩 山藥 二兩

右爲末用鮮紫河車一具用河水二升稍入白蜜

隔水蒸膏代蜜爲丸空心淡鹽湯下三錢

異順丸 治婦人倒經血溢於上男子咳嗽吐血左

手關尺脈弦背上畏寒有瘀血者

烏骨白絲毛雞 一隻男雌女雄取嫩長者湯例

醫通卷十三 虛損

序

留內金并去腸 烏鯽骨 童便浸晒乾爲末

茹薏 淨一兩即舊根 鮑魚 切薄片

右三味入雞腹內用陳酒童便各二碗水數碗砂

鍋中旋煮旋添糜爛汁盡擣爛焙乾骨用酥炙共

爲細末乾山藥末調糊爲丸梧子大每服五七十

丸空心百勞水下百勞水見

烏骨雞丸 治婦人鬱結不舒 蒸熱咳嗽月事

不調或久閉不行或倒經血溢於上或產後傷勞

或崩淋不止及帶下赤白淫諸證兼療男子斷

喪太早勞嗽吐紅成虛損者

烏骨白絲毛雞 一隻男雌女雄 製法同異順丸 北五味 一兩

熟地黃 四兩如血熱加 生地黃 二兩

右二味入雞腹內用陳酒酒釀童便於砂鍋中煮

如異順丸

綿黃耆 去皮蜜於木 飯上蒸九 白茯苓 去皮

當歸身 酒洗 白芍藥 酒炒各

右五味預爲粗末同雞肉搗爛焙乾骨用酥炙共

爲細末入下項藥

醫通卷十三 虛損

至

人參 三兩虛甚 加至六兩 牡丹皮 二兩酒洗 川芎 一兩童便

右三味各爲細末和前藥中另用乾山藥末六兩

打糊衆手丸成曬乾勿令餽磁罐收貯侵晨人參

湯或沸湯送下三錢卧時醇酒再服二錢大便實

者煉白蜜爲丸亦可

骨蒸寒熱加九肋鱉甲三兩銀柴胡地骨皮各一

兩五錢經閉加肉桂一兩崩漏下血倍熟地加真

阿膠二兩倒經血溢加麥門冬二兩鬱結痞悶加

童便製香附二兩沉香半兩赤白帶下加真川草

薜二兩四製香附二兩新艾一兩白浮倍用參薈
苓木

按烏骨雞丸諸藥皆平常無奇而調經最驗蓋雞
屬巽補肝尤妙在烏骨益腎變巽歸坎甲癸同源
兼滋衝任也

孫真人云自古名賢治病多用生命以濟危急雖
曰貴人賤畜至於愛命人畜一也如白鳳膏烏骨
雞丸等方為虛損門中調經要藥在證治之所必
需者不得已而用之以人命至重非蚘飛蠕動之

醫通卷十三 虛損

五

比苟有他方可以代充取効尤為曲體天地好生
之心倘用之無濟徒傷生命以為財利之謀仁人
君子諒不為之也

逍遙散 局方 治肝氣抑鬱寒熱咳嗽月事不調

柴胡 七分 白朮 蜜水拌 茯苓 一錢

甘草 炙八分 常歸 一錢 白芍 酒炒五分

陳皮 去白八分 薄荷葉 五分

煨薑 三片

右九味水煎半錢時服

加味逍遙散

逍遙散加牡丹皮一錢五分炒黑山梔一錢

脾虛食少便澀去山梔易香附

此本八珍湯去參之益氣芎之上竅地之臑膈而

加入柴胡陳皮薄荷以疎肝氣薑用煨者取其守

中而不致於辛散僭上也加丹皮山梔者以清上

下之火也

芎歸血餘散 治傳屍勞瘵面赤五心煩熱

室女頂門生髮 一團洗淨 芎藭 童便浸

醫通卷十三 虛損

五

當歸 三錢 木香 桃仁 去皮各

真安息香 如無極合 雄黃 各一

全蠍 三枚炒香 降真香 五分 獺肝 一具如無

鯉魚頭活散一 枚代之 為散新汲水煎月初五更空腹服頭導日午服二

導

龍甲生犀散 治傳屍勞瘵脾虛唇面手足清

天靈蓋 一具碎炙男者色不赤黑

龍甲 九肋者一 虎長牙 一 安息香

枚酥炙 一枚

桃仁去皮

尖橫櫛各半

生犀角鎊

木香

甘遂

降真香

乾漆炒令

真阿魏酒研各

雷丸二錢

穿山甲取四

龍尾火上

全蠍三枚醋

地龍七枚生

研和藥

右為細末每服半兩先用香豉四十九粒連豉葱煎取七分入麝香一字月初五更空腹溫服少時必瀉出蟲以淨桶盛之鉗取付烈火焚之如瀉不

醫通卷十三 虛損

五

止嘔龍骨炒黃連等分為末沸湯下五錢次日用

白梅粥補之

傅屍丸 治傅屍勞瘵初起元氣未敗者

鰻鱺魚半斤外

醋中先鋪薄荷葉四兩入鰻在內搽乾山藥粗末

勸餘鋪內人去心百部一勸煮三炷官香候鰻爛

極去薄荷取鰻與山藥連骨搗爛焙為末煉白蜜

丸侵晨臨卧沸湯各服五錢

桂枝龍骨牡蠣湯桂枝 小建中湯桂枝

黃耆建中湯桂枝

八味腎氣丸方祖

理中丸方祖

固本丸二冬

集靈膏二冬

四物湯方祖

犀角地黄湯傷寒

獨參湯保元

保元湯方祖

聖愈湯保元

異功散四君子

六味丸八味

納氣丸八味

十補丸八味

香茸八味丸八味

枳實理中湯理中

甘草乾薑湯理中

炙甘草湯桂枝

醫通卷十三 虛損

五

白鳳丸平胃

生脈散方祖

補中益氣湯保元

歸脾湯保元

增損柴胡湯小柴胡

滋腎丸六補

玉燭散四物

蘇合香丸中風

四君子湯方祖

六君子湯四君子

桂枝人參湯理中

當歸補血湯保元

澤木麋街湯五苓

刺熱門

涼瀉散方祖

大柴胡湯小柴胡

逍遙散

虛損

加味逍遙散

虛損

當歸補血湯

保元

惡寒門

大承氣湯

小承氣

理中丸

方祖

補中益氣湯

保元

二陳湯

方祖

升陽散火湯

升麻

小柴胡湯

方祖

六味丸

丸下

加減八味丸

丸下

指迷茯苓丸

二陳

升陽益胃湯

保元

枳實理中湯

理中

火鬱湯

升麻

大建中湯

保元

醫通卷十三

惡寒

惡寒

五

金花湯

三黃

生脈散

方祖

附子湯

木附

人參白虎湯

白虎

苓桂朮甘湯

桂枝

犀角地黄湯

傷寒

振寒門

白虎加人參湯

白虎

黃耆建中湯

桂枝

六味丸

丸下

異功散

四君子

八味丸

方祖

清暑益氣湯

保元

桃核承氣湯

小承氣

竹葉石膏湯

白虎

桂枝加附子湯

桂枝

戰慄門

大承氣湯

小承氣

寒熱門

小柴胡湯

方祖

補中益氣湯

保元

逍遙散

虛損

外熱內寒外寒內熱門

黃耆建中湯

桂枝

理中湯

方祖

麻黃湯

方祖

柴胡四物湯

小柴胡

理中湯

方祖

越脾湯

麻黃

火鬱湯

升麻

醫通卷十三

寒熱

寒熱

外熱內寒外寒內熱

五

上熱下寒上寒下熱門

梔子豉湯

方祖

既濟湯

白虎

八味丸

方祖

加減八味丸

丸下

瘧門

蜀漆散

金匱

蜀漆散

治牝瘧多寒

右枳為散發前以漿水調半錢

即酸漿見四時湯下

桂苓丸

五苓

既濟解毒湯

三黃

滋腎丸

大補

五苓散

方祖

雲母散

龍骨

龍骨散

等

溫瘧加蜀漆半分臨發時服一
 按蜀漆性升上湧頑痰最速雲母性溫
 最猛二味相需較之常山陽起石更捷
 太過卽以龍骨斂固其津仍取龍性純陽同氣相
 求佐上藥以發越陰分伏匿之邪則牝瘧之寒自
 已與桂枝龍骨牡蠣湯火逆湯之義不殊其外臺
 牡蠣湯用牡蠣蜀漆麻黃甘草四味藥雖異而功
 用則同蓋蜀漆得雲母則溫散頑痰於內蜀漆得
 麻黃則溫散寒邪於外亦恐發泄太過卽以牡蠣

醫通卷十三 上熱下寒上熱下寒

收斂陰津仍取其性入陰有軟堅散結之功也用
 甘草者令以協和中外則胃氣有權方得振祛邪
 作汗之力耳
 達原飲 治疫癘壯熱多汗而渴
 黃芩 五分 甘草 錢一
 知母 二錢 厚朴 一錢 白芍 一錢
 草菓 一錢 生薑 七片 檳榔 二錢
 大棗 一枚
 水煎發前熱服溫覆取微汗
 或問疫邪初犯募原吳又可以達原飲爲主方詳

方中檳榔草菓厚朴俱屬清理腸胃之品知母直
 瀉少陰邪熱與募原何預而用之答曰募原雖附
 軀殼貼近於裏爲經絡藏府之交界况溼土之邪
 從竅而入以類橫連未有不入犯中土者所以清
 理腸胃爲先非若傷寒傳次表證未罷快用裏藥
 則有結胃傳裏之變卽尚未離表但須薑棗佐芍
 芍甘草以和解之若見少陽陽明太陽必兼柴胡
 葛根羌活以開泄之設裡氣不通勢必盤錯於中
 而內陷則加大黃以攻下之又可專工瘟疫歷治

醫通卷十三 癘

有年故立此爲初犯募原之主方其變後則有白
 虎涼膈爲鼎足之任以此推原其他變證則三黃
 雙解清熱解毒人中黃丸等方可默識其微而用
 之必當矣余嘗以此治疫癘時瘧靡不應手獲効
 總藉以分解中外寒熱諸邪之力耳
 何首烏散 治瘧積滯去後寒熱不止至夜尤甚
 生何首烏 五錢 青皮 陳皮
 甘草 一錢 生薑 七片 大棗 一枚
 水煎露一宿侵晨熱服

多汗而渴加知母烏梅虛人腹痛加入參厚朴木香

七寶飲 治一切實癰服調理藥不止

厚朴 常山醋炒 檳榔

陳皮 青皮 草果各一錢

甘草炙七分 生薑七片

水酒各半煎露一宿侵晨熱服一方多半夏一錢大棗一枚

常山飲 治瘧發時至夜熱不止脈實邪盛者

常山醋炒 檳榔 青皮炒

醫通卷十三 瘧

空

甘草 當歸各一錢 穿山甲煨八分

木通 黑豆四十粒 生薑七片

水酒各半煎露一宿侵晨熱服

龜甲煎丸金匱 治瘧母一切痞積

龜甲炙一兩二錢 柴胡 芍藥

牡蛎 磁石煨 烏扇煨

鼠婦煨 蛭蠅各四錢 桂枝千金作桂心

阿膠各三錢 黃芩 桃仁

乾薑 大黃 半夏

人參 厚朴 蜂房炙各二錢

石葦去毛 紫葢各二錢 草薢

瞿麥各一錢半 赤石脂一兩

右二十三味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛浸

灰候酒盡一半濾去灰著龜甲於中煮令泛爛如

膠漆絞取汁納諸藥末煎為丸如梧子大空心服

七丸日三服千金無鼠婦非

此方妙用全在龜甲之用灰淋酒煮如膠漆非但

龜甲消積酒淋灰汁亦善消積較瘧母丸之用醋

醫通卷十三 瘧

空

者功用百倍

瘧母丸 治瘧痞結於左脇硬痛

青皮 桃仁 神麴

麥芽各一兩四錢 鱉甲三兩 山稜

蓬朮味俱炒 海粉即蛤粉 香附二兩五味

紅花三錢

神麴糊丸梧子大每服七八十九空心淡薑湯下

白虎湯方祖 白虎加桂枝湯白虎湯下

柴胡去半夏加枳實湯小柴胡湯下

柴胡桂薑湯 小柴胡湯下

一陳湯 方祖

柴胡桂枝湯 小柴胡湯下

人參養胃湯 散平胃下

清暉飲 湯下

補中益氣湯 湯保元下

人參黃蘗湯 湯保元下

白虎加人參湯 湯白虎下

胃苓湯 散平胃下

理中湯 方祖

小建中湯 湯桂枝下

苦薑建中湯 湯桂枝下

六味丸 丸八味下

當歸內補建中湯 湯桂枝下

涼膈散 方祖

大柴胡湯 湯小柴胡下

人參敗毒散 湯小柴胡下

逍遙散 湯下

醫通卷十三 瘧

三

六君子湯 湯四君子下

四獸飲 湯四君子下

芎歸鱉甲飲 湯四物下

清暑益氣湯 湯保元下

生薑瀉心湯 湯半夏瀉心下

八味丸 方祖

厥門

四逆散 湯下

四逆湯 方祖

附子理中湯 湯理中下

加減八味丸 丸八味下

清暑益氣湯 湯保元下

犀角地黃湯 湯傷寒下

地黃飲子 湯中風下

八味丸 方祖

承氣湯 方祖

二氣丹 丹金液下

五苓散 方祖

白虎湯 方祖

人參七氣湯 方祖

氣門

烏沉湯 局方

治一切冷氣及婦人血氣攻擊心腹

撮痛

天台烏藥

沉香

人參 各一兩

甘草 錢五

右四味為末每服半兩入生薑三片煎成入食鹽

一字熱服

醫通卷十三 厥 氣

六

沉香降氣散 局方

治一切氣滯胸膈不舒婦人經

癸不調少腹刺痛

沉香 四錢

甘草 灸八錢

砂仁 炒四錢

香附 童便浸去外皮微炒二兩

右四味為散每服二錢入鹽一字沸湯調服

木香調氣散 治氣滯胸膈虛痞嘔逆刺痛

白豆蔻 去殼

丁香

木香

檀香 各二錢

藿香

甘草 炙各八分

砂仁 四錢

右為散每服二錢入鹽一字沸湯調如稠糊晨夕各一服或滴水為丸服二錢
本方加人參白朮茯苓山藥橘皮青皮葶藶各育氣散治虛寒腹痛進飲食

四磨湯 治一切氣塞痞悶不舒不時暴發

沉香 烏藥 檳榔

人參

右等分酒磨各約半錢入鹽一字沸湯點服或磨上三味倍用人參煎湯入鹽調服

醫通卷十三 氣 六十五

六磨湯

四磨湯加枳殼木香

按四磨湯雖用人參實為散氣之峻劑蓋檳沉香烏藥得人參助之其力愈峻服後大便必有積沫下後即寬若六磨更加破氣二味下氣尤迅近世醫人以氣滯不敢用參但用諸破氣藥磨服殊失本方之旨

沉香化氣丸 治食積痰氣痞脹妨食

人參 條黃芩 各二兩

白朮 各三兩 沉香 另研

右將前四味剉碎用薑汁竹瀝七浸七曬候乾為末和沉香末再研神麴糊丸水飛硃砂為衣曬乾勿見火每服二錢淡薑湯送下小兒量減

此仿王隱君滾痰丸之製去礞石加參朮以祛食積痰飲雖較滾痰丸稍遜然二黃得參朮以鼓其勢亦是突圍猛帥勿以其中有參朮視為兼補漫施以伐後天為害非淺鮮也

四七湯 二陳湯 局方七氣湯 方祖

醫通卷十三 氣 六十六

二陳湯 方祖 理中湯 方祖

六君子湯 四君子湯 蘇子降氣湯 七氣湯

導痰湯 二陳湯 神保丸 傷飲

蘇合香丸 中風 異功散 四君子湯

三四七氣湯 十氣湯 八味丸 方祖

越鞠丸 治諸鬱痞悶

香附 薑便 蒼朮 油浸去粗 撫芎 薑便浸

山梔 薑汁 神麴 炒香各一兩

滴水為丸菜豆大每服百丸白湯下陰虛多火禁

用 越鞠者若人鞠屈鬱伏忽爾其氣發越也香附理

氣鬱蒼朮開溼鬱 撫芎調血鬱 梔子治火鬱 神麴

消食鬱 總以理氣為主若溼鬱加白朮茯苓熱鬱

加青黛黃連痰鬱 加半夏海石食鬱加枳實山查

血鬱加桃仁肉桂 氣鬱加木香砂仁此因病變通

之大畧也 承氣湯 方煎

火鬱湯 升麻 湯下

醫通卷十三 鬱

利金湯 桔梗 湯下

二妙散 大補 丸下

半夏厚朴湯 一陳 湯下

逍遙散 虛損 門

佐金丸 方祖

四君子湯 方祖

六味丸 八味 丸下

歸脾湯 保元 湯下

蘇子降氣湯 七氣 湯下

四烏湯 四物 湯下

痞滿門

五膈寬中散 治七情 結痰氣痞塞遂成五膈

厚朴 薑汁炒 廿一兩

木香 五錢

白豆蔻仁 三錢

為散每服三錢加生薑三片水煎入鹽一字和洋

服 丁沉透膈湯

五膈寬中散加丁香沉香半夏草果人參白朮

香附砂仁生薑入棗水煎服 一方多青皮陳

增損流氣飲 治諸氣鬱滯胸膈痞滿面目浮腫

半夏 亦茯苓 陳皮 各一

甘草 炙五分 蘇葉 香附

檳榔 大便難者去之 木香 大腹皮

醫通卷十三 痞滿

枳殼 桔梗 各七 人參 五分

肉桂 厚朴 薑製 各 生薑 七片

紅棗 二枚 水煎熱服

按十六味流氣飲以二陳加入破氣諸藥雜合成

劑施之藜藿往往 九應遂為名方其木香流氣飲

依傍局方七氣金 以四七似覺彼善於此然亦雜

亂無章至於分心 流氣飲分氣紫蘇飲皆彷彿流

氣風斯愈下今止 取水香流氣刪其繁蕪以為存

羊之意。

木香檳榔丸 實鑑

治一切滯氣。心胸腹脇痞滿。大

小便滯滯不快。

木香

檳榔

枳殼 炒

青皮 炒

陳皮 炒

廣茂 煨

黃連 各一兩

黃檗 炒

香附 醋炒

大黃 酒蒸

牽牛 腹滿便秘用黑者喘滿膈塞用白者取頭末各二兩

滴水為丸。豌豆大。每服三五十九至七十九。食遠

薑湯送下。以利為度。

醫通卷十三 痞滿

九

本方去陳皮廣茂香附黃連黃檗大黃牽牛加杏仁半夏皂角郁李仁蜜丸薑湯下五十九。即御藥院木香檳榔丸。專主痰痞風秘。實鑑方治氣痞熱秘。各有攸宜。

補中益氣湯 保元湯下

連理湯 理中湯下

乾薑黃芩黃連人參湯 瀉心湯下

瀉心湯 方祖

指迷七氣湯 七氣湯下

理中丸 方祖

小陷胃湯 傷寒方祖

三黃湯 方祖

二陳湯 方祖

小柴胡湯 方祖

平胃散 方祖

枳實理中湯 理中湯下

橘皮枳實生薑湯 胸膈門

九味資生丸 四君子湯下

六君子湯 四君子湯下

清暑益氣湯 保元湯下

異功散 四君子湯下

局方七氣湯 方祖

腹滿門

中滿分消湯 治中滿寒脹

半夏 一錢

厚朴

黃連

黃檗 上四味俱薑製

川烏 炮

乾薑 炮

醫通卷十三 腹滿

七

吳茱萸 淨用開口者炒 草豆蔻 炒研 木香 人參 各五分 茯苓 澤瀉 各一錢五分 生薑 五片

右水煎稍熱食前服。大忌房勞。生冷炙煇。酒麪糟

醋鹽醬等物。

身熱脈浮喘滿。有表證。加麻黃五分。血虛至夜煩

熱。加歸身黃耆各五分。陽氣下陷。便溺赤澀。加升

麻柴胡各三分。脾胃虛寒。飲食不磨。去黃檗。加益

智仁。草澄茄。青皮各二分。

中滿分消丸 治中滿熱脹

厚朴

半夏

黃連

三味俱薑汁炒

黃芩

枳實

白朮

二味同拌淫炒焦

乾生薑

茯苓

豬苓

澤瀉

人參

各五錢

甘草

炙一錢

湯浸蒸餅爲丸。梧子大每服百丸。食後沸湯下。

脾胃氣滯食積脹滿。加陳皮砂仁各五錢。經脈溼

滯。腹皮腿臂痛不可拊者。加片子薑黃一錢。肺熱

氣化不行。溺秘喘渴者。加知母三錢。

醫通卷十三 腹滿

圭

東垣分消湯丸。一主溫中散滯。一主清熱利水。原

其立方之旨。總不出內經平治權衡去菀陳莖開

鬼門潔淨府等法。其方下所指寒脹。乃下焦陰氣

逆滿鬱遏中焦陽氣。有似乎陰之象。故藥中雖用

烏頭之辛熱。宣布五陽。爲辟除陰邪之嚮導。卽用

連藥之苦寒。以降泄之。苟非風水膚脹脈浮。證起

於表者。孰敢輕用開鬼門之法。以鼓動其陰。羅四

寒乎。熱脹用黃芩之輕揚。以降肺熱。則用豬苓澤

瀉以利導之。故專以潔淨府爲務。無事開鬼門。宜

布五陽等法也。

附子粳米湯 金匱

治腹中寒氣雷鳴切痛胸腹逆

滿嘔吐。

附子 薑汁炮切

半夏 薑汁炒

甘草 炙各三錢

大棗 擘十枚

粳米 半升

右五味以水五升。煮米熟湯成。去滓溫服一升。日

三服。良方但用薑汁製附子一味煮粥食之。

溫胃湯 千金 治胃氣不平時脹欬不能食。

附子

當歸

厚朴

醫通卷十三 腹滿

圭

人參

橘皮

芍藥

甘草 各三錢

乾薑 四錢

蜀椒 一合

右九味。以水九升。煮取三升。分三服。

大承氣湯 小承氣湯下

大芫胡湯 小柴胡湯下

厚朴七物湯 小承氣湯下

厚朴三物湯 承氣湯下

當歸龍薈丸 三黃湯下

四物湯 方祖

四君子湯 方祖

藿香正氣散 平胃散下

沉香降氣散 氣門

局方七氣湯 方祖

生薑瀉心湯 半夏瀉心湯下

附子理中湯 理中湯下

濟生腎氣丸八味丸下

枳實導滯丸枳實門

水腫門

疏鑿飲 治水氣通身浮腫煩躁喘渴小便不利

澤瀉

商陸

赤小豆

羌活

大腹皮淨

椒目

木通

秦朮

茯苓

檳榔各七分

生薑三片

水煎頓服

掛功散 治陽水便秘脈實初起元氣未傷者

醫通卷十三 水腫

七

黑牽牛頭末四兩

茴香炒

木香各一兩

為散每服二錢加生薑自然汁調如膏而飲服

沉香琥珀丸 治血結小腹青紫筋結而急脹痛

琥珀另研

杏仁一作桃仁

蘇木

赤茯苓

澤瀉各五錢

葶藶隔紙

郁李仁去皮各一兩

沉香另研

陳皮

防己酒洗各五錢

麝香一錢

蜜丸棗豆大每服四五十九丸加至百丸空心人參湯下

三白散 治陽水囊腫二便不通

白牽牛頭末二兩

桑白皮薑汁炒

白朮生用

陳皮

木通各一兩

為散每服二錢空心淡薑湯送下未效再服

實脾散 治陰水發腫宜此先實脾土

白朮炒焦

附子炮

乾薑炮

茯苓

木香

木瓜

草果仁

厚朴薑製

大腹子各一兩

甘草炙五錢

醫通卷十三 水腫

五

為散每服四錢加生薑五片棗一枚水煎服

治水以實脾為先務不但陰水為然方下所云治

陰水發腫宜此先實脾土儼然陰水當溫散陽水

當寒瀉之旨橫於胸中夫陰水因腎中真陽衰微

北方之水不能發藏而泛溢無制倘腎氣不溫則

真陽有滅頂之凶矣實土堤水寧不為第二義乎

何方中不用肉桂辛溫散結反用木瓜厚朴大腹

子耶即有滯氣當散厚朴尚可為長若大腹子之

開泄大便斷乎不可妄用也

復元丹 治脾腎俱虛。或為水腫。

附子炮二 白朮炒焦

肉桂

吳茱萸去開 川椒炒去

茴香

木香 厚朴各

澤瀉炒

肉果煨各 茯苓各

為末陳米飲糊丸。梧子大每服五七十九。紫蘇湯或砂仁湯送下。

五皮散局方 治溼熱積於脾經。面目四肢浮腫。

五加皮 地骨皮 大腹皮

醫通卷十三 水腫

茯苓皮 生薑皮等分

為散每服五錢。水煎熱服。

詹察方去骨皮加皮。加桑皮橘皮。治喘而腹滿。

五子五皮湯

五皮散加紫蘇子。萊菔子。香附子。車前子。葶藶子。一方無香附子。多大腹子。加生薑煎服。

椒仁丸 治婦人先因經水斷絕。後至四肢浮腫。小便不利。血化為水。名曰血分。

椒仁炒 甘遂 續隨子去皮 千金子

附子炮 郁李仁去皮 黑牽牛頭末

五靈脂酒洗去 當歸 吳茱萸炒

延胡索各五 芫花醋炒 玳瑁十枚去翅

膽礬 白礞各一 石膏三錢

為末。翅糊丸。豌豆大。每服一九。空心橘皮湯下。

葶藶丸 治先因小便不利。後至四肢浮腫。名曰水分。

甜葶藶隔紙 續隨子去皮 乾笋末一兩

為末。煮紅棗肉為丸。梧子大。每服七九。煎扁蓄湯

醫通卷十三 水腫

送下。大便利者禁用。

人參丸 治月經不利。血化為水。四肢浮腫。亦曰血分。

人參 當歸 天黃酒蒸

薤麥德 赤芍藥 赤茯苓

肉桂各二 苦葶藶蒸一

為末。煉白蜜丸。梧子大。每服十五九。空腹米飲下。

防已黃耆湯方祖 越脾湯蘇黃

防已茯苓湯防已黃 蒲灰散散下

麻黃附子湯 麻黃湯下

杏子湯 麻黃湯下

越脾加朮湯 麻黃湯下

薯蕷桂酒湯 桂枝湯下

桂枝加黃耆湯 桂枝湯下

桂枝去芍藥加麻辛附子湯 桂枝湯下

湯 桂枝湯下

枳朮湯 方祖

濟川散 三黃湯下

神祐丸 十棗湯下

神芎丸 三黃湯下

五苓散 方祖

理苓湯 理中湯下

六君子湯 四君子湯下

濟生腎氣丸 八味丸下

金液丹 方祖

真武湯 木附湯下

小青龍湯 桂枝湯下

醫通卷十三 水腫

七

蘇子降氣湯 七氣湯下

除溼湯 平胃散下

增損流氣飲 痞滿門

葶藶木香散 五苓散下

胃苓湯 平胃散下

羌活勝溼湯 溼門

歸脾湯 保元湯下

金液丹 方祖

鼓脹門

雞矢醴 素問

治鼓脹內有溼熱停積日食不能暮

食

騙雞矢白 但與陳米煨食勿與雜食則矢乾有白

右取八合微炒入無灰酒三升煮取一升五合五

更熱服 如無以不落水雞兩金炙脆為末荷葉裹陳米飯為丸每服二三錢空心溫酒送下

此方出黃帝內經世本有加大黃桃仁者大謬

啟峻湯 治脾腎俱虛腹脹少食

人參

黃耆

當歸

白朮 炒枯各一錢五分

陳皮 八分

甘草 炙五分

肉桂 半錢

茯苓 一錢五分

乾薑 炮四分

肉果

沉香 各八分

附子 炮一錢五分

水煎溫服

氣滯硬滿者去黃耆加厚朴此方出醫林黃治啟

醫通卷十三 鼓脹

七

東之方不多見僅一夔耳

散血消脹湯 治血脹小便多大便溏黑光亮

歸尾 一錢五分

五靈脂

觀桂

烏藥

甘草 炙

木香 各六分

川芎 一錢二分

半夏

蓬朮 煨各八分

紫蘊 二分

砂仁 一錢炒

生薑 五片

水煎食前溫服

琥珀人參丸 治血蠱

人參

五靈脂 各一分

琥珀

肉桂	附子 <small>生各五錢</small>	赤茯苓
川芎	沉香	穿山甲 <small>各三錢</small>
為未濃煎蘇方汁為丸。每服二錢。早暮溫酒各一服。		
此人參與五靈脂並用。最能瀦血。血盡之的方也。		
二陳湯 <small>方祖</small>	中滿分消湯 <small>腹滿</small>	
中滿分消丸 <small>腹滿</small>	下瘀血湯 <small>瓶當</small>	
六君子湯 <small>四君子</small>	平胃散 <small>方祖</small>	
五苓散 <small>方祖</small>	金匱腎氣丸 <small>入味</small>	

醫通卷十三 鼓脹

堯

小建中湯 <small>桂枝湯下</small>	蘇合香丸 <small>中風</small>
黑錫丹 <small>金液丹下</small>	大黃附子湯 <small>承氣湯下</small>
積聚門	
奔豚湯 <small>金匱</small>	治腎積上貢犯肺喘脹發熱
甘草	芍藥
當歸	黃芩 <small>各一錢</small>
甘李根白皮	葛根 <small>各二錢</small>
右九味木煎溫分四服。日三夜一。以積下小腹減為度。不應加戎鹽一字。	半夏
<small>千金無甘草黃芩有吳茱萸。莫石膏人參茯苓桂心。</small>	生薑 <small>三片</small>

赤丸 <small>金匱</small>	治寒積厥逆
茯苓	半夏 <small>各四兩一</small>
細辛 <small>一兩千金</small>	烏頭 <small>二枚</small>
右四味為末。內真朱 <small>即砂</small> 。為色。蜜丸如麻子大。先食酒下三丸。日再夜一服。不知稍增。以知為度。 <small>千金無半夏有附子桂心射罔</small>	
普濟方用白鳳仙子一錢。小川烏二枚。半夏三枚。杏仁四十九粒。各生搗為末。紅棗肉九。梧子大。黃丹為衣。早暮各服七丸。俱溫酒下。若治小兒丸如	

醫通卷十三 積聚

平

粟米大量用三五丸。待穀道血出任服。忌大葷生冷腐醋等物。此方與赤丸功效相類。故附於此。此方烏頭與半夏同劑。用相反以攻堅積。沉寒非妙。達先聖至理。不能領畧其奧。與胡洽治膈上積。用十棗湯加甘草大戟同一妙義。而普濟方僅用烏頭半夏二味。易白鳳仙子杏仁黃丹為衣。服七丸。至穀道見血而止。其瞑眩之性可知。蓋藥之相反相惡。不過兩毒相激。元非立能傷人。後世以為相反之味。必不可同用。陋哉。

喬氏陰陽攻積丸 治寒熱諸積

吳茱萸

乾薑

觀桂

川烏

黃連

半夏

茯苓

延胡索

人參

沉香

琥珀

巴豆霜

為末皂角四兩煎汁糊丸。菉豆大。每服八分。加至一錢五分。薑湯下。與脾胃藥間服。

此方出土材先生必讀。先生向寓郭園。曾以此方授之郭媪。云是喬三餘所定方中。黃桂走肝。乾薑

醫通卷十三 積聚

全

入脾。烏頭逢腎。專取辛烈。以破至陰之固壘。半夏茯苓。以開痰蔽。延胡琥珀。以散血結。沉香。以通氣閉。巴霜。以蕩堅積。黃連。以除旺氣。人參。以助諸味之力也。其所授郭媪之方。酒麴糊丸。較之皂角汁。稍平。妙用全在與脾胃藥間服。予曾效用此方。每以六君去木倍苓。加肉桂當歸。米飲糊丸。或朝服。增損六君。夕用陰陽攻積。或服攻積一日。六君二三日。隨人強弱而施。但初服未嘗不應。積勢向衰。即當停服。所謂衰其大半而止。專力補脾可也。

普婆萬病丸 治七種痞塊五種癩病十種疔疔七

種飛尸十二種蠱毒五種黃病十二種瘧疾十種

水病八種大風十二種淋瀝并風入頭眼暗漠漠

及上氣欬嗽喉中如水雞聲不得眠卧飲食不作

肌膚五藏滯氣積聚不消塞閉不通心腹脹滿及

連胸背鼓氣堅結流入四肢或復又心膈氣滿時

定時發十年二十年不瘥五種下痢疔蟲寸白諸

蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡消瘦無力陰入

骨髓便成滯患身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四

醫通卷十三 積聚

全

肢沉重行立不能久。婦人因產冷入于藏。藏中不淨。或閉塞不通。胞中瘀血冷滯。出流不盡。時時疼痛。為患。或因此斷產。并小兒赤白下痢。及狐臭耳聾。鼻塞等病。此藥以三丸為一劑。服藥不過三劑。萬病悉除。說無窮盡。故稱萬病丸。

牛黃

麝香

犀角

桑白皮

茯苓

乾薑

桂心

當歸

芍藥

芍藥

甘遂

黃芩

蜀椒	<small>去目及閉口者炒出汗</small>	細辛
桔梗	<small>去皮心</small>	前胡
紫苑	<small>去蘆</small>	葶藶
防風	人參	朱砂
雄黃	<small>油煎</small>	黃連
禹餘糧	<small>醋炒</small>	大戟
石蜥蜴	<small>一寸去頭足炙</small>	芫花
右三十一味	<small>崔氏無黃芩桑白皮楮樹皮防風為二十七味</small>	黃芩
黃麝香犀角朱砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者合		大戟

醫通卷十三 積聚 全三

擣重絹下篩以白蜜和更擣三千杵密封下破除
 日平旦空腹酒服三九如梧子大取微下三升惡
 水為良若卒暴病不拘平旦早晚皆可服但以吐
 利為度若不吐利更加一丸或至三九五九須吐
 利為度不得限以丸數病強藥少即不吐利更非
 他故若其發遲以熱飲汁投之若吐利不止即以
 酢飯兩三口止之服藥忌陳臭生冷酢滑粘食大
 蒜猪雞魚狗牛馬驢肉白酒行房七日外始得一
 日服二日補之得食新米韭根汁作羹粥服飲食

之三四頓大良亦不得全飽產婦勿服吐利後以
 常須閉口少語於無風處溫牀暖室將息若旅行
 卒暴無飲以小便送之為佳若一歲以下小兒有
 疾者令乳母服兩小豆亦以吐利為度近病及卒
 病皆用多積久疾病即少服常取微溘利為度
 證服法詳解詳千金
 衍義膽府門本方下
 木香通氣散 治寒氣成積腹痛堅滿不可忍
 木香 戎鹽 三稜 炮各
 厚朴 薑製 枳實 炒 甘草 炙各
 一兩 二錢 三錢 三錢

醫通卷十三 積聚 全三

乾薑 炮 蓬朮 炮各
 為散每服三錢食前淡薑湯調下
 四味阿魏丸 治肉積發熱
 山楂肉 薑汁炒 連翹仁 黃連 薑汁炒
 一兩 一兩 各五錢
 為末易用阿魏一兩醋煮糊丸麻子大每服二十
 九至三十九食前沸湯下脾胃虛人六君子湯下
 和血通經湯 治婦人寒客胞門月事不來結為石
 瘕及一切血結成積
 當歸 熟地黃 蘇木 各
 錢 錢 錢

三稜 炮

廣茂 炮

木香

貫衆

肉桂 各八

紅花 三分

血竭 五分

食前紅酒煎服。忌酸醋生冷之物。

見睨丸 治寒氣客於下焦血氣閉塞而成石瘕腹

中堅大久不消者。

附子 炮去皮

鬼箭羽 如無鱗鱗甲代之肥人

紫石英 各三錢

澤瀉 肉桂 勿見

延胡索

木香 各二

檳榔 五分

醫通卷十三 積聚

全

血竭 分另研

水蛭 廣茂代之 桃仁 皮火乾漆

去漆灰

京三稜 各五錢

大黃 酒同三稜

宿培

右十三味除血竭桃仁外同為末。入另研二味和

勻紅酒打糊丸。如桐子大。每服三十九。淡醋湯下。

食前溫酒亦得。虛者去水蛭三枚。加人參一兩。當

歸五錢。虛甚用十全大補湯送下。

阿魏麝香散 治腸覃諸積痞塊

阿魏 酒煮

麝香 一錢

雄黃 三錢

野水荳花子 兩神麴 炒

人參

白朮 生各

肉桂 五錢

右為散。每服三錢。用烏芋 三箇。去皮搗爛和

藥。早晚各一服。砂仁湯過口。

三因化氣散 治息積上下賁脹

肉桂 勿見

蓬水 煨

青皮 炒

陳皮

乾薑 炮

沉香 另研勿見

木香

甘草 炙

丁香

胡椒

砂仁 各二

茴香 炒四

醫通卷十三 積聚

全

為散。每服三錢。薑蘇鹽湯調下。婦人醋湯調服。

阿魏膏 治一切痞塊

羌活

獨活

黑參

觀桂

赤芍

穿山甲 炮

生地黃

猴鼠糞

大黃

白芷

天麻 各五

紅花

槐柳枝 各三

土木髓 去殼

右用真麻油一觔。浸春五夏三。秋七冬十日。煎黑

去滓。人亂髮雞子大一握。再熬濾清。徐下真黃丹

煎較硬硬得中入芒硝阿魏乳香沒藥各五錢取
 起離火再入蘇合香油半兩麝香三錢調勻成膏
 磁器收藏臨用時取兩許攤大紅紵上貼患處內
 服健胃消積開鬱藥凡貼膏須正當痞塊不可偏
 偏則隨藥少處遞去即不得力貼後以綿紙掩用
 杖納隨患處鋪半指厚用熱熨斗熨一時許日熨
 三次硝耗再加月餘藥力盡其膏自脫便愈年久
 者連用二膏無不消盡若是肝積見於左脇加蘆
 薈末和硝熨之倘積去於所遞處再貼一膏必仍

醫通卷十三 積聚 全

歸舊窠矣
 普濟方無羌活黑參白芷天麻生地赤芍多川烏
 南星半夏甘遂甘草人參五靈脂各五錢
 鷓鴣丸 治食魚鼈成痞此方最捷餘俱不効
 鷓鴣一隻去毛水酒各半煮爛入阿魏五錢更
 水荳蔻六兩白朮二兩 阿魏一兩
 神麴 茯苓 當歸各一兩
 橘紅 甘草各五錢
 為末加生薑自然汁半杯入煉白蜜丸彈子大細

嚼一九沸湯或溫酒過口早暮各一服
 阿魏化痞散 治瘡痞寒熱及痲瘦虛人禁用
 川芎 當歸 白朮
 赤茯苓 紅花 阿魏各一錢
 隨甲火酥炙脆 大黃八錢酒炒 蕎麥麩一兩
 為散每服四錢好酒一盞調稀糊服服後三日腹
 痛見膿血為驗忌生冷油膩大葷溼麩等物
 金匱三物大建中湯理中湯下 金匱大黃附子湯小承氣湯下
 大七氣湯局方七氣湯下 六君子湯四君子湯下

醫通卷十三 積聚 全

五苓散 方祖 導痰湯二陳湯下
 理中湯 方祖 十全大補湯保元湯下
 痰飲門
 甘遂半夏湯金匱 治病者脈伏自利反快而渴雖
 利心下續堅滿此為留飲欲去故也
 甘遂三枚 半夏十二枚薑湯
 芍藥半枚 甘草如指大
 右四味水煎去滓以蜜半杯和服
 按甘遂與甘草相反而一方並用乃瘡痰逐飲之

峻劑非聖於治者不敢擬議也。

木防已湯 金匱 治支飲心下痞堅脈沉面黑吐下

不愈者

木防已 三錢 石膏 雞子大 桂枝 二錢

人參 四錢

水煎溫分再服

木防已去石膏加茯苓芒硝湯 金匱

木防已湯減防已一錢去石膏加茯苓芒硝各

四錢

醫通卷十三 痰飲

九

水煎去滓內芒硝再微煎分溫再服微利則愈。

葶藶大棗瀉肺湯 金匱 治支飲喘不得息肺癰喘

不得卧

葶藶 熟黃芩丸 大棗 十二枚

右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血

已椒蘆黃丸 金匱 治腹滿口乾燥此腸胃

間有水氣

防已 椒目 葶藶

大黃 各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服十九日三

服稍加口中有津液渴者加芒硝半兩

倍木丸 局方 治五飲留伏腹中鳴轉淅淅有聲

白朮 薑汁拌 乾薑 炮 肉桂 勿見火

神麴糊丸每服五七十九丸食前淡薑湯下

青礞石丸 治中外老痰胸膈痞悶經絡四肢不遂

青礞石 礞石 半夏 一兩 風化硝 三錢

白朮 生 橘紅 五錢 茯苓 八錢

黃芩 四錢

醫通卷十三 痰飲

九

神麴糊丸空心淡薑湯下二錢

滾痰丸 一名上聖君滾痰丸一名礞石滾痰丸 治諸實熱積

痰異證孕婦勿服

青礞石 色青者良三兩同焙硝三合入湯成礞

沉香 另研 川大黃 酒蒸 黃芩 酒炒

為末水泛為丸菜豆大每服一錢至二錢食遠弗

湯下 原方礞石一兩沉香

沉香化痰丸 治胸中痰熱積年痰火無血者宜服

半夏 八兩用薑汁一小 黃連 二兩薑

木香 一兩 沉香 一兩

爲細末甘草湯泛爲丸空心淡薑湯下二錢

運痰丸 治脾虛熱痰堵塞膈氣不舒

沉香化痰丸半料合四君參朮茯苓各三兩甘草一兩

消痰餅子 治老痰結於喉中燥不得出

栝蒌仁 壓去油 杏仁 去皮尖 海石 煨

桔梗 連翹 風化硝 等分

先用生薑自然汁少許拌加煉白蜜丸彈子大不

醫通卷十三 痰飲

左

時翰化一丸

倒倉法 治藏府腸胃經絡宿滯諸藥不効者

夏月三伏中揀肥嫩黃牛肉四蹄各七八觔切作

小片去筋膜入砂鍋中長流水煮糜爛搗絞取汁

三次去滓以汁入鍋內漫火熬至琥珀色爲度膠

成隔水頓鍋中時添微火則不冷不餒須預先斷

肉食淡三日前一勿食晚飯於明亮密室中不

通風處行之置穢桶瓦盆貯所下之物以新磁瓶

盛示出之湯令病者入室以膠汁飲一杯少頃又

飲一杯積數十杯自然吐利視所出之物必盡病

根乃止吐利後必渴甚不可與湯以所出之湯乘

熱飲之以蕩滌餘垢行後倦怠覺饑先以米飲次

與淡稀糜三日後方可稍食菜羹調養半月或一

月自覺精神煥發形體輕健沉痾悉去矣白後終

身須忌牛肉乳不復發如有餘膠熬如鹿角膠收

藏卽霞天膠可入補劑

瓜蒂散 治寒痰結於膈上及溼熱頭重鼻塞

瓜蒂 一分 赤小豆 二分

醫通卷十三 痰飲

左

右二味各別搗篩爲散已合治之取一錢匙以香

鼓一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫

頓服之不吐者少少加得快吐乃止

苓桂朮甘湯 桂枝 腎氣丸 八味 丸下

十棗湯 方 大青龍湯 麻黃 湯下

小青龍湯 桂枝 澤瀉湯 散下

厚朴大黃湯 承氣 小半夏湯 湯下

小半夏茯苓湯 二陳 五苓散 方 湯下

半夏厚朴湯 二陳 桂苓丸 五苓 散下

二陳湯 方祖

六君子湯 四君子湯下

利金湯 桂枝湯下

十味導痰湯 二陳湯下

千縉湯 二陳湯下

涼膈散 方祖

八味丸 方祖

導痰湯 二陳湯下

控涎丹 十棗湯下

局方七氣湯 方祖

小陷胸湯 傷寒門

四七湯 二陳湯下

指迷茯苓丸 二陳湯下

深師消飲丸 二陳湯下

外臺茯苓丸 四君子湯下

溫膽湯 二陳湯下

埋中湯 方祖

加味歸脾湯 保元湯下

醫通卷十三 痰飲

五

加味逍遙散 傷寒門

六味丸 八味丸下

異功散 四君子湯下

二冬膏 方祖

真武湯 附子湯下

補中益氣湯 保元湯下

枳朮丸 方祖

欬嗽門

桂苓五味甘草湯 金匱

治欬逆氣從小腹上衝

桂枝

茯苓 各四錢

甘草 炙三錢

五味子 二錢

水煎去滓溫分三服

桂苓五味甘草去桂加薑辛湯 金匱

桂苓五味甘草湯去桂枝加乾薑細辛各三錢

嘔逆更加半夏二錢形腫更加杏仁二錢面赤如

醉更加大黃三錢

射干麻黃湯 金匱

治欬而上氣喉中水雞聲

射干 三錢

麻黃 去節四錢

細辛 一錢

紫菀

欬冬花 各三錢

五味子 一錢

半夏 二錢

生薑 四片

大棗 二枚

先煮麻黃去上沫內諸藥湯成去滓溫分三服

醫通卷十三 欬嗽

五

厚朴麻黃湯 金匱

治欬而脈浮上氣胸滿喉中不利如水雞聲

厚朴 半兩

麻黃 去節四錢

石膏 雞子大碎

杏仁 去皮尖半兩

半夏 洗半兩

乾薑 二錢

細辛 一錢

五味子 半錢

小麥 一合

先煮小麥去滓內諸藥湯成去滓分溫三服

按此本麻杏石越厚朴半夏及大小青龍之製主

以厚朴辛溫散氣使以小麥補肝助胃西北二方

發汗之首劑也

澤漆湯 金匱

治欬而脈沉上氣咽喉不利

澤漆

一兩解大戟葶

白前

形如刺辛而白產嶺州砂石水中藏人藥肆中見之

紫參

如無紫苑代之

半夏

洗各半

桂枝

千金作桂心

人參

甘草

黃芩

各一錢

生薑

四片

右九味先煮澤漆去滓內諸藥湯成去滓溫服至夜盡

麥門冬湯 金匱

治火逆上氣咽喉不利

麥門冬

去心一兩

半夏

洗各半

人參

一錢

醫通卷十三 欬嗽

九

甘草

炙六分

梗米

半合

大棗

四枚

右六味水煎溫分日三夜一服

按此即白虎加人參湯去石膏加麥冬半夏大棗是也

金沸草散

治肺感風寒欬嗽鼻塞聲重

旋復花

即金沸草

麻黃

去節

前胡

各七

荆芥穗

半夏

甘草

炙

芍藥

各五分

生薑

三片

大棗

一棗

水煎去滓濾清溫服

清風散 局方

治風熱欬嗽遍身疥癩小兒瘡疹餘熱

熟

川芎

羌活

防風

荆芥穗

藿香

人參

茯苓

蠲蠶

蟬蛻

甘草

陳皮

厚朴

右十二味為散每服三四錢茶清調下或用五錢

水煎去滓服如久病頭風目昏每日三服效

此方妙用全在厚朴人參當知肌表之疾無不由

醫通卷十三 欬嗽

六

胃而發故用厚朴清理其內即以人參助諸風藥

消解風熱於外則羌防荆芥輩方始得力耳

瀉白散

治肺熱欬嗽手足心熱

桑根皮

薑汁和

地骨皮

各一兩

甘草

炙五錢

為散每服四五錢人參梗米白粒竹葉一把水煎服

加橘紅糖梗名加味瀉白散有熱更加知母黃芩

如有客邪禁用

或謂地骨皮三焦氣分藥瀉白用之何義答言三

焦屬腎實則瀉其子也門人曰唯吾道一以貫之

盧吸散 治冷哮寒嗽喘促痰清但肺熱者亦用

款冬花

川貝母

肉桂

甘草 炙各三錢

鴛管石 五錢 煎即鋪乳之煎者

為極細末以蘆管吸少許嚥化嚥之日五七次

此即宣明焚香透膈散之變法彼用雄黃佛耳此

用桂心貝母甘草彼取無形之氣以散肺中之伏

寒此用有形之散以搜肺絡之伏飲藥雖相類而

用法懸殊總取鐘乳款冬之溫肺利竅也

補肺湯 千金

治肺胃虛寒款嗽

醫通卷十三

款嗽

九七

五味子 一錢

乾薑

桂心

款冬花

麥門冬 去心各三錢

桑白皮 薑汁和

錢二

大棗 三枚

水煮溫分三服

紫菀茸湯 吹定

治傷酒癆肺發款痰中見血

紫菀茸 三錢

薇銜

白朮 於酒者

澤瀉 各一錢

牡丹皮

麥門冬 去心各

犀角 八分

甘草 炙三分

煎汁 半盞

右九味水煎食遠服。瘦人隱虛多火忌用燥藥

去白朮易白芍藥一錢兼傷肉食 胸膈膨脹去犀

角芍藥加炮黑山樞肉三錢炒出實一錢

紫菀散 治款唾有血虛勞肺痿

紫菀茸

人參 各二兩

麥門冬 去心

桔梗

茯苓

阿膠

川貝母 去心各

五味子

甘草 炙各五錢

為散每服四五錢水煎去滓服

紫菀膏 治肺熱款嗽肌膚灼熱而赤如醉

紫菀茸 二兩

款冬花 一兩

杏仁 泡去皮

醫通卷十三

款嗽

九七

枇杷葉 剝去毛

木通

桑根皮 蜜炙

大黃 酒蒸各

熬膏蜜收不時嚥化一二匙中病即止不可過服

久嗽去杏仁大黃煎成加童便半盞

小青龍湯 桂枝

異功散 四君子

六味丸 八味

桂枝二越婢一湯 桂枝

小青龍加石膏湯 桂枝

炙甘草湯 桂枝

小柴胡湯 方祖

理中湯 方祖

桂枝湯 方祖

華蓋散 湯下

九寶湯	湯下	芍蘇散	傷寒
學嗽化痰湯	湯下	小建中湯	桂枝
真武湯	湯下	濟生腎氣丸	八味
葳蕤湯	傷寒	越脾湯	湯下
古今錄驗續命湯	方祖	涼膈散	方祖
加減葱白香豉湯	傷寒	小陷胸湯	傷寒
麻黃加水湯	湯下	二陳湯	方祖
千緡湯	湯下	千金麥門冬湯	湯下
千金五味子湯	湯下	桔梗湯	方祖

醫通卷十三 欬嗽

九

地黃煎	方祖	千金地黃煎	湯下
生脈散	方祖	二冬膏	方祖
麻杏甘石湯	湯下	保元湯	方祖
蘇子降氣湯	湯下	四七湯	湯下
歸脾湯	湯下	逍遙散	湯下
加味道遙散	湯下	加味導痰湯	湯下
都元丸	湯下	補中益氣湯	湯下
平胃散	方祖	犀角地黃湯	湯下
		越鞠丸	湯下

四烏鯁骨一蘆茹丸	湯下	百勞丸	湯下
溫肺湯	湯下	半夏溫肺湯	湯下
參蘇溫肺湯	湯下	黃耆建中湯	湯下
瓊玉膏	湯下	加減八味丸	湯下
生料鹿茸丸	湯下	門冬清肺飲	湯下
三拗湯	湯下	竹葉石膏湯	湯下
五苓散	方祖	局方七氣湯	方祖
瑞金丹	湯下	童真丸	湯下
烏骨雞丸	湯下	大溫經湯	湯下

醫通卷十三 肺痿

百

肺痿門		
溫中生薑湯	千金	治肺痿虛寒喘吸胸滿
生薑一兩	桂心	橘皮各一兩
甘草	麻黃各一兩	
右五味以水一斗先煮麻黃兩洲去沫然後入諸藥合煮取二升半分三服		
生薑甘草湯	千金	治肺痿欬唾涎沫咽燥而渴
生薑半兩	甘草二錢	人參三錢
大棗五枚		

右四味水煎溫服

人參蛤蚧散 治肺痿失音欬唾膿血或面上生瘡

川蛤蚧 十對酒浸酥炙色白形如守
言者真若剖開如鼠皮者假

知母 酒炒 川貝母 去心 桑白皮 薑汁和

茯苓 各二兩 人參 甘草 炙各三兩

杏仁 去皮尖 五錢

為散每服三錢不拘時茶清或蜜水調服

甘草乾薑湯 湯中 炙甘草湯 湯下

紫苑散 欬嗽 固本丸 膏下

醫通卷十三 肺痿

二百

劫勞散 湯下

肺脹門

越解加半夏湯 湯下 麻黃

生脈散 方祖

異功散 湯下 四君子

局方七氣湯 方祖

肺離門

皂莢丸 金匱 治欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠

皂莢 刮去皮炙 子酥炙

張氏醫通 卷一三

右一味末之蜜九梧子不以棗膏和湯服三九日
三夜一服

葶藶湯 千金 治肺癰胸中甲錯

葶藶 節蘆管取 薏苡仁 三合 桃仁 五十

瓜瓣 如無括蕪仁代之

右四味以水一斗先煮葶藶得五升去滓內諸藥

煮取二升溫服一升再服當吐如膿

皂莢條肺胃濁垢葶藶瀉肺下水氣葶藶通肺絡

瘀塞治肺癰吐三法

醫通卷十三 肺脹 肺癰

二百

千金桂枝去芍藥加皂莢湯 湯下 桂枝

桔梗湯 方祖

葶藶大棗瀉肺湯 湯下 痰飲 葶藶薏苡瀉肺湯 湯下 桔梗

六味丸 丸下 八味

瘡門

酥蜜膏酒 千金 治肺氣虛寒癘風所傷語聲嘶塞

欬唾上氣喘嗽及寒鬱熱邪聲瘖不出

酥 崖蜜 飴糖 各一

生薑汁 生百部汁 棗肉

一六三

杏仁各半升 相皮五具

右八味先將杏仁和水三升煮減半去滓入酥蜜薑飴等味文火再熬取二升溫酒調服方寸匕細細嚥之曰三服七日痰色變二七日唾稀三七日嗽止

本方去百部柑飴加通草欬冬各二兩菖蒲人參百茹各一兩五味細辛桂心各半兩名通聲膏肺竅為風寒所襲而致喘欬上氣語聲嘶塞故用薑汁杏仁柑皮百部溫散肺絡之結膠飴棗肉乳

醫通卷十三 喘

三

酥崖蜜熬膏酒服通行脾肺之津津回燥潤而聲

自復矣。於本方中除去百部柑皮之耗氣膠飴之助壅加五味人參資肺之津欬冬竹茹清肺之燥桂心細辛搜肺之邪通草菖蒲利肺之竅仍取前方中酥蜜杏仁薑汁棗肉滋培津氣而通其聲蓋酥蜜膏酒專滋肺胃之燥通聲膏專資脾肺之津津本大腸所主故千金以此方隸諸大腸府門

消風散方祖

清咽寧肺湯湯下

二陳湯方祖

導痰湯湯下

生脈散方祖

六味丸丸下

都炆丸丸下

異功散湯下

代抵當丸湯下

麻杏甘石湯湯下

古今錄驗續命湯方祖

童真丸丸下

十全大補湯湯下

桔梗湯方祖

麻黃附子細辛湯湯下

喘門

麻黃蒼朮湯 治秋冬感寒至夜大喘

麻黃

羌活各八分

蒼朮油炒

醫通卷十三 喘

三

柴胡各五分

防風

當歸各四分

黃芩三分

草豆蔻炒

黃耆酒炒一分

五味子九粒

甘草生四分

水煎臨臥熱服

麻黃定喘湯 治寒包熱邪哮喘痰嗽遇冷即發

麻黃去節

杏仁十四粒泡 厚朴薑製

欬冬花去梗

桑皮蜜炙 蘇子微炒研

甘草生炙各

黃芩半夏薑製各一錢二分

煎成去滓以生銀杏七枚搗爛入藥絞去滓乘熱

服之去枕仰臥暖覆取微汗勿
人參定喘湯 局方 治遠年欬逆上氣胸滿痞塞聲
不出

人參 麻黃 去節 甘草 炙

阿膠 半夏麴 各一錢 桑白皮 炙

五味子 碎各半錢 罌粟殼 二分 生薑 三片

水煎食後服溫覆取微汗

八味丸 方祖 逍遙散 門虛損

佐金丸 方祖 六味丸 八味丸

醫通卷十三 喘 三夏

生脈散 方祖 六君子湯 門君子

華蓋散 麻黃湯下 滲澤湯 門中

白虎湯 方祖 二陳湯 方祖

四七湯 湯下 越脾加半夏湯 麻黃湯下

小青龍加石膏湯 桂枝湯下 濟生腎氣丸 八味丸下

靈砂丹 金液下 蘇子降氣湯 七氣湯下

參蘇溫肺湯 七氣湯下 四磨湯 氣門

千縉湯 湯下 導痰湯 湯下

神保丸 湯下 三拗湯 湯下

古今錄驗續命湯 方祖 九寶湯 麻黃湯下

短氣門

苓桂朮甘湯 桂枝湯下 腎氣丸 八味丸下

小青龍湯 桂枝湯下 厚朴大黃湯 承氣湯下

四君子湯 方祖 生脈散 方祖

少氣門

獨參湯 保元湯下 生脈散 方祖

保元湯 方祖 異功散 湯下

醫通卷十三 短氣 少氣 三夏

逆氣門

四磨湯 氣門 七氣湯 方祖

蘇子降氣湯 七氣湯下 越脾湯 麻黃湯下

杏子湯 麻黃湯下 小青龍湯 桂枝湯下

麻黃附子細辛湯 麻黃湯下 腎氣丸 八味丸下

靈砂丹 金液下

哮喘門

鐘乳丸 治冷哮喘但有血者服

滴乳石 酒溼研七日水飛七次草湯煮三伏時燻少許燃開光如鱗魚為度

麻黃醋湯泡 杏仁揀去雙仁 甘草炙等
 煉白蜜丸彈子大五更臨臥各嚼化一九去枕仰
 臥勿開言數日効
 此卽麻黃湯去桂枝麻杏甘石湯去石膏而易鐘
 乳互換一味寒熱天淵○本草言服鐘乳人一生
 忌朮以石藥標悍白朮壅滯犯之恐有暴絕之虞
 而千金方有二味並用者又非庸工可以測識也
 冷哮丸 治背受寒氣遇冷卽發喘嗽頑痰結聚胸
 膈痞滿倚息不得臥

醫通卷十三 逆氣 哮喘

一頁

麻黃 <small>泡</small>	川烏 <small>生</small>	細辛
蜀椒	白礬 <small>生</small>	牙皂 <small>去皮炙</small>
半夏 <small>麴</small>	陳膽星	杏仁 <small>去雙仁者</small>
甘草 <small>生各</small>	紫苑茸	款冬花 <small>各二</small>

右爲細末薑汁調神麴末打糊爲丸每遇發時臨
 臥生薑湯服二錢羸者一錢更以三建膏貼肺俞
 穴中服後時吐頑痰胸膈自寬服此數日後以補
 脾肺藥調之候發如前再服
 按此少變麻黃附子細辛湯之法而合稀涎散以

涌泄其痰開發肺氣之剛劑但氣虛少食及痰中
 見血營氣受傷者禁用以其專司疎泄而無溫養
 之功也觀方下所云服此數日後以補脾肺藥調
 之候發如前再服擒縱緩急之妙盡在乎此
 三建膏 治陰疽反肉不化

天雄	附子	川烏 <small>各一</small>
桂心	觀桂	桂枝
細辛	乾薑	蜀椒 <small>各二</small>

一右切爲片麻油二觔浸春五夏三秋七冬十日煎

醫通卷十三 哮喘

一頁

熬去滓摭淨再熬徐下黃丹不住手攪滴水不散
 爲度陰疽以葱湯洗淨攤成加銀粉少許貼患處
 腹痛少食泄瀉攤成加丁香末少許貼臍中及中
 脘陽衰精冷攤成加阿芙蓉少許貼臍中及丹田
 冷哮喘嗽攤成加麝少許貼肺俞及華蓋膈中癢
 寢冷積攤成加麝香阿魏少許貼患處

小青龍湯桂枝湯下 溫肺湯七氣湯下
 越脾加朮湯麻黃湯下 蔗吸散痰嗽門
 滾痰丸痰飲門

十三卷終

1. 續修四庫全書 子部 醫家類 2 頁

張氏醫通卷十四

長洲石頭張

路王父

男

登誕先
倬飛疇

噎膈門

開關利膈丸

實鑑名人
參利膈丸

治腸胃壅滯噎膈不通大便燥結

木香

檳榔

人參

當歸

藜香

甘草

醫通卷十四 噎膈

枳實

炒各一兩

大黃

酒蒸

厚朴

薑製各二兩

滴水為丸。枳子大每服三五十九。食後米飲下。

按此木小承氣加入參歸等味意在養正祛邪而實攻多於補。惟熱壅膈塞用之庶為得宜。然噎膈之燥結皆由五志抑鬱傷耗精氣而成。非有熱邪留結可攻下而除也。用方者審諸

五噎丸 千金 治胸中久寒嘔逆妨食結氣不消。

乾薑

蜀椒

桂心

細辛

人參

細辛

蜀椒

人參

白朮 各二兩

橘皮

茯苓 各一兩半

附子 一枚

右為細末煉白蜜丸。梧子大酒服十五丸。日三服。漸加至三十九。

五膈丸 千金

治飲食不得下手足冷上氣喘息

麥門冬

三兩去心

甘草

二兩

蜀椒

炒去

遠志肉

桂心

細辛

乾薑

炮各一兩

附子

一枚

人參

二兩

右為細末煉白蜜丸。彈子大先食含一九細細噉

醫通卷十四 噎膈

之喉中胸中當熱藥丸稍盡再含一九日三夜二服七日愈。

五噎五膈二丸同用。參附椒辛薑桂之屬。一以肝氣上逆胃氣不下而嘔噎。故用黃橘以疎肝降逆。

苓朮以健胃通津。一以腎氣不蒸肺胃枯槁而不納。故用冬草以滋肺和胃。遠志以補火生土。又嘔

噎而藥食可進者。類與小丸調之。膈塞而飲食不納者。時用大丸噉之。其立法之詳若此。可不辨而

忽諸。

旋復代赭石湯 玉函

治胃虛噫氣不除

旋復花 二錢

代赭石 煅一錢

人參 二錢

甘草 炙二錢

半夏 三錢

生薑 半兩

大棗 四枚

右七味水煎去滓分溫日三服

六君子湯 四君子湯下

異功散 四君子湯下

四君子湯 方祖

指迷七氣湯 局方七氣湯下

局方七氣湯 方祖

四物湯 方祖

代抵當丸 抵當湯下

理中湯 方祖

醫通卷十四 噎膈

三

越鞠丸 鬱門

八味丸 方祖

二陳湯 方祖

反胃門

藿香安胃散

治脾胃虛弱飲食不進嘔吐不腐

藿香

橘紅 各半

丁香 一錢

人參 一兩

為散每服二錢生薑二片水煎溫食前和滓服

四逆湯 方祖

小半夏湯 二陳湯下

大半夏湯 二陳湯下

理中湯 方祖

茯苓澤瀉湯 五苓散下

六君子湯 四君子湯下

異功散 四君子湯下

平胃散 方祖

四君子湯 方祖

桂苓丸 五苓散下

七味白朮散 四君子湯下

二陳湯 方祖

開關利膈丸 噎膈

固本丸 二冬膏下

逍遙散 虛損

歸脾湯 傷元

八味丸 方祖

黑錫丹 金液

六味丸 八味丸下

代抵當丸 抵當湯下

嘔吐噎門

醫通卷十四 反胃 嘔吐噎

四

甘草粉蜜湯 金匱

治吐涎心痛發作有時毒藥不止吐蛇者

甘草 半兩

粉 二錢

蜜 一兩

右三味以水三升煮甘草取二升去滓內粉蜜攪

令和煎如薄粥溫服一升瘥即止

吳茱萸湯 玉函

治胃氣虛寒乾嘔吐涎沫頭痛

吳茱萸 以酒洗七次

人參 半錢

大棗 四枚

生薑 半兩

右四味水煎去滓溫分日三服

通草橘皮湯 千金

治傷寒胃熱嘔逆

通草 二錢

橘皮 錢半

粳米 一合

生薑根汁 半合

右四味水煎熱服不瘥更作

本方去通草橘皮加竹茹生薑汁千金名薑根飲

子治傷寒後嘔噦反胃乾嘔

麥門冬理中湯 千金

治漏氣上焦熱腹滿不欲飲

食食則先嘔後瀉身熱痞悶

麥門冬 去心 錢五

白朮 錢五

甘草 炙

醫通卷十四 嘔吐類

五

茯苓 錢各二

人參

橘皮

蓴心

姜糖 錢各三

蘆根 生 錢一

竹茹 子大 團雜

生薑 四錢

陳米 一合

右十二味水煎溫分日三服

澤瀉湯 千金

治上焦飲食下胃胃氣未定面背身

中皆熱名曰漏氣

澤瀉

半夏

柴胡

生薑 錢各三

桂心

甘草 炙 錢各

茯苓

人參 錢各二

地骨皮 五錢

石膏 八錢

竹葉 一把

蓴心 五錢

右十二味水煎溫服日三

人參湯 千金 治下焦熱氣逆不續嘔逆不禁一便

不通名曰走嘔

人參

黃芩

知母

姜糖

茯苓 錢各三

白朮

梔子 薑汁 炒黑

陳皮

蘆根 錢各四

石膏 錢八

右十味水煎溫服日三 準繩多 竹茹

醫通卷十四 嘔吐類

六

走嘔漏氣皆屬火淫於內火性急速故得食則既

吐且利是名漏氣若得食即嘔而便溺不通者則

為走嘔總是胃虛火逆所致觀麥門冬理中湯人

參湯二方可知不可誤認虛寒輕用溫補之劑也

安虢散 治吐虢色赤成團而活屬熱者

烏梅肉 三錢

黃連

蜀椒

藿香

檳榔 錢各一

胡粉

白礬 錢各半

為散每服三四錢水煎如糊空腹服之差即止

半夏瀉心湯 方祖

小柴胡湯 方祖

文蛤湯 麻黃湯下

橘皮竹茹湯 二陳湯下

二陳湯 方祖

小半夏湯 二陳湯下

薑附湯 四逆湯下

逍遙散 門虛損

橘皮半夏湯 二陳湯下

豬苓散 五苓散下

大黃甘草湯 承氣湯下

橘皮湯 二陳湯下

半夏乾薑湯 二陳湯下

理中湯 方祖

大半夏湯 二陳湯下

黑錫丹 金液丹下

六君子湯 四君子湯下

小青龍湯 桂枝湯下

醫通卷十四 嘔吐痰

七

小承氣湯 方祖

橘皮乾薑湯 七氣湯下

黃芩加半夏生薑湯 桂枝湯下

連理湯 理中湯下

附子理中湯 理中湯下

五苓散 方祖

四君子湯 方祖

歸脾湯 保元湯下

霍亂門

豬苓湯 五苓散下

黃芩湯 桂枝湯下

佐金丸 方祖

補中益氣湯 保元湯下

平胃散 方祖

烏梅丸 理中湯下

異功散 四君子湯下

理中湯 方祖

胃苓湯 平胃散下

平胃散 方祖

香薷飲 方祖

五苓散 方祖

二陳湯 方祖

連理湯 理中湯下

導痰湯 陳下

六君子湯 四君子湯下

四逆湯 方祖

藿香正氣散 平胃散下

六和湯 若門

竹葉石膏湯 白虎湯下

漿水散 四逆湯下

黃芩加半夏生薑湯 桂枝湯下

天水散 方祖

補中益氣湯 保元湯下

醫通卷十四 霍亂

八

關格門

人參散 治胃虛津枯關格吐逆

人參 五錢至一兩 麝 半分至一分 冰腦 三分至五分

爲散水煎和滓分二三次溫服

此雲岐子治噎膈胃反關格不通九方之一用獨

參湯峻補其胃稍加腦麝以發越其氣得補中寓

寫之至訣乃肥盛氣虛痰窒中脘及酒客溼熱鬱

痰固結之專劑以中有腦麝善能開結利竅散鬱

也若瘦人津枯不能出納而大便秘結者即以此

方去腦麝加蘆根汁竹茹未嘗不為合轍也

栝子仁湯 治胃虛關格脈虛微無力

人參 錢半 白朮 茯苓

陳皮 各一錢 甘草 炙三分 栝子仁 剉三錢

麝香 一字 生薑 五片

水煎去滓入麝調服

此雲岐第二方取用異功加栝子仁麝香其法稍平而胃中津枯大便艱澇者最宜亦可加蘆根汁竹茹或竹瀝俱妙

醫通卷十四 關格

既濟丸 治關格脈沉細手足厥冷

熟附子 一兩 人參 三兩 麝香 少許

為細末陳米飲糊丸梧子大每服十九至三十九米飲下

此雲岐第三方用參附加麝單刀直入以破中下

二焦之結藥雖峻而用法最緩不可不詳此義而

擅改作湯也

二陳湯 方祖 四君子湯 方祖

補中益氣湯 保元湯下 黃連湯 湯下

生料八味丸 方祖

呃逆門

丁香煮散 與局方不同 治胃反嘔逆呃噦泄瀉

丁香 三七粒 建蓮肉 去心二七粒上

生薑 七片 黃秫米 半合

水一碗半煮熟去薑噉粥

此做附子粳米湯之制彼用粳米此用糯米皆取其直達胃府雖其勢稍平亦是突圍之將局方無蓮肉秫米而多川烏紅豆青皮陳皮甘草乾薑良

醫通卷十四 呃逆

蘇益智胡椒等味為散煮湯入鹽一字調服

異功散 湯 四君子 六味丸 八味

理中湯 方祖 僞皮竹茹湯 二陳

越鞠丸 鬱門 附子粳米湯 腹滿

四逆加入參湯 湯下 羌活附子散 湯下

連理湯 湯下 旋復代赭石湯 湯下

調中益氣湯 湯下 蘇子降氣湯 湯下

黑錫丹 湯下

胃院離門

射干湯 治人迎逆而盛嗽膿血營衛不流熱聚胃

口成癰

射干 去毛

梔子仁

煎汁

赤茯苓

去皮

升麻 各一兩

赤芍藥

兩半

白朮

生半兩

右為粗末每服五錢水二盞煎去滓入地黃汁一

合再煎溫日再服日晡發熱每服加犀角片皮各

一錢甘草二分

太乙膏 治內外一切癰瘍

黑參

白芷

歸身

醫通卷十四 胃厥癰

肉桂

大黃

赤芍

生地黄 各二兩

右切為片麻油二觔浸春五夏三秋七冬十日煎

熬去滓搥淨再蒸徐下黃丹不住手攪滴水不散

為度內癰可丸服之

金匱排膿湯 桔梗湯下

大黃牡丹湯 承氣湯下

涼膈散 方劑

金匱排膿散 桔梗湯下

犀角地黃湯 傷寒門

八珍湯 四君子湯下

請見血門

栝葉湯 金匱 治吐血不止

栝葉 炒三錢

乾薑 炮一錢

艾 一撮一本作阿膠三錢

右三味水煎入馬通汁一杯合煮取一盞分溫再

服 如無馬通以童便代之

而逆不止當責之於火旺故用栝葉治其旺氣即

兼薑艾之辛溫散結使無留滯之患更加馬通導

之下行非近世專用栝葉櫻灰血餘之屬可比

黃土湯 金匱 治陰絡受傷血從內溢先血後便及

吐血衄血色瘀晦者并主產後下痢

醫通卷十四 諸見血

白朮

附子 炮

甘草 炙

乾地黄

阿膠

黃芩 各錢半

竈心黃土 雞子大碎

右七味先用水煎竈心土澄清去滓內諸藥煎成

分溫日再服有熱加栝葉一握 干金無附子地黃有乾薑

赤小豆當歸散 金匱 治小腸熱毒流於大腸先便

後血及狐惑奇血腸癰便膿等證

赤小豆 二升仰赤豆之細者浸令芽出晒乾

當歸 三兩

為散漿水服方寸七日三服 如無酸漿水以醋和湯代之

瀉心湯 方劑印 三黃湯

八味丸 方劑

白通湯 湯四逆 湯下

歸脾湯 湯保元 湯下

衄血門

止衄散 治久衄發熱

黃耆 六錢

當歸

赤茯苓

白芍藥

乾地黄

阿膠 各三錢

為散半饑時麥門冬湯調服三錢日三服
而熱足冷心懸如饑下焦陰火也加肉桂末一錢
五分湯不能飲自覺膈滿者瘀血也加犀角丹皮

醫通卷十四

衄血

世

氣虛少食二便如常者獨參湯服之兼感微風發
熱頭痛者葱白香豉湯服之虛煩不安不時悶熱
者梔子豉湯服之素有偏風頭痛異常者黑豆荆
芥灰淋酒服之驟衄不止者茅花湯服之久衄不
時舉發者烏梅湯服之

小烏沉湯 局方

治血氣不調心中刺痛

香附 童便浸 三錢

甘草 錢一

烏藥 錢半

右三味水煎即用藥汁磨沉香五分入鹽一字熱
服上三味在婦科名抑氣散合四物即四烏湯乃

局方烏沉湯之變法方中去參薑而易香附其破
氣之力雖峻而功力稍遜故以小字加之立方之
意微矣

黑神散 局方

治吐血衄血屢發不止

甘草 錢二

乾薑 炮

肉桂 各一兩

熟地黄 四兩

當歸

蒲黃 各三兩 篩淨炒黑

白芍 酒製 二兩

右為散每服四錢用細黑豆半合微炒香淋酒半
盞和水半盞煎至半盞入童便半杯和服 世本以 黑豆炒

醫通卷十四

衄血

十四

熱夫穀同上藥為散不
知黑豆之功全在殼也 ○氣虛加人參三兩黃耆
六兩以固衛氣庶無營脫之患

當歸湯 千金

治衄血吐血

當歸 一錢

乾薑 炮 五分

芍藥

阿膠

黃芩 各錢半

右五味水煎日再服

小安腎丸

治風寒襲於腎經下體沉重夜多小便

耳鳴岐視牙齦動搖出血小腹寒痛作痛

香附 童便製 二兩

川烏頭 炮淨 兩

藜香 青鹽燉 兩

川椒去開口者 熟地黃四兩 川棟子酒蒸取肉三錢

酒糊丸 梧子大空心鹽湯臨臥溫酒各服三錢

清胃散 治胃中蘊熱中脘作痛痛後火氣發泄必

作寒熱乃止及齒齲腫痛出血痛引頭腦

生地黃四錢 升麻錢半 牡丹皮五錢

當歸 川連酒蒸各三錢

為散分三服水煎去滓細呷之半日再服

犀角地黃湯專以散瘀為主故用犀芍此則開提

胃熱故用升連其後加味清胃則兼二方之制但

醫通卷十四 動血 五

少芍藥且

加味清胃散 治斑疹口舌生瘡齒齲腐爛

清胃散加犀角連翹生甘草

麻黃湯方劑 越脾湯麻黃湯下

四物湯方劑 理中湯方劑

三黃補血湯四物湯下 犀角地黃湯傷寒門

當歸補血湯保元湯下 保元湯方劑

補中益氣湯保元湯下 小建中湯桂枝湯下

五苓散方劑 六味丸八味丸下

蘇子降氣湯七氣湯下 歸脾湯保元湯下

黃耆六一湯保元湯下 生脈散方劑

消風散欬嗽門 調胃承氣湯小承氣湯下

柴胡清肝散小柴胡湯下 梔子豉湯方劑

獨參湯保元湯下 黃耆建中湯桂枝湯下

當歸六黃湯三黃湯下 桃核承氣湯小承氣湯下

既濟湯白虎湯下

吐血門

柴胡疎肝散 治怒火傷肝脇痛血菀於上

醫通卷十四 血 六

柴胡 橋皮醋炒各二錢 川芎童便浸切

芍藥 枳殼炒各錢半 甘草炙五分

香附醋炒錢半 山梔醋汁炒黑一錢 煨薑一片

水煎食前溫服吐血加童子小便半盞

犀角地黃湯傷寒門 千金當歸湯傷寒門

十灰散虛損門 花紫石散虛損門

參蘇飲傷寒門 六味地黃丸八味丸下

四君子湯方劑 五苓散方劑

桂苓甘露飲五苓散下 新定紫菀茸湯欬嗽門

六君子湯 四君子湯下

獨參湯 保元湯下

烏得難丸 虛損

桃仁承氣湯 小承氣湯下

黑神散 門

生脈散 方劑

理中湯 方劑

都蒸丸 八味丸下

四烏鯁骨一蓮茹丸 虛損

醫通卷十四 吐血

枳實理中湯 理中湯下

歸脾湯 保元湯下

異順丸 虛損

小烏沉湯 門

十全大補湯 保元湯下

保元湯 方劑

異功散 四君子湯下

加減八味丸 八味丸下

加味歸脾湯 保元湯下

七

劫勞散 四物湯下

滾痰丸 痰飲

黃耆建中湯 桂枝湯下

補中益氣湯 保元湯下

洩血門

辰砂妙香散 局方

精衄血湯

黃耆 密炙

桔梗

瓊玉膏 虛損

靈砂丹 丹液

瀉心湯 三黃湯下

黑錫丹 丹液

治心脾不足恍惚不睡盜汗遺

人參 各

甘草 炙

山藥

遠志 甘草湯

扶神

辰砂 另研水飛淨三錢

右十一味為散每服二錢不拘時溫酒調服 秘旨

本方去黃耆山藥桔梗木香加龍骨益智即王荆

公妙香散

六味丸 八味丸下

五苓散 方劑

異功散 四君子湯下

醫通卷十四 洩血

茯苓 各一兩

麝香 另研

木香 五分

導赤散 生脈散下

四味鹿茸丸 虛損

沉香降氣散 氣門

下血門

瀉青丸 治肝經實熱大便不通腸風便血陰汗燥

臭

當歸

川芎

梔子 炒黑

大黃

羌活

防風

草龍膽 等分

滴水為丸空心茶清下七八十九至百丸

藏連丸 治大便下血正赤日久不止若血色晦淡者禁用

者禁用

宣黃連

炒為末

右用嫩豬臟二尺泡去油膩入黃連末線紫兩頭同韭菜蒸爛搗作餅焙乾為末米糊為丸如桐子大每服四五十九食前米湯或烏梅湯下。○一方加槐花二兩不用黃連用槐花名豬臟丸治痔同上

升陽除溼和血湯

治腸風下血如澀者

生地黃

熟地黃

當歸身各一錢

甘草炙六分生四分

白芍錢半

黃耆三錢

升麻醋炒七分

蒼朮酒浸去皮同芫藤炒

秦艽

醫通卷十四 下血

十九

肉桂

陳皮各三錢

丹皮錢半

水煎食前稍熱服。○秘旨無蒼朮有防風

斷紅丸 治下血久不止虛寒色淡晦者

側柏葉炒香

川續斷酒炒各三錢

鹿茸一具酥炙

前三味為細末醋煮阿膠為丸每服四五十九烏梅湯入參湯米飲湯任下

逍遙散虛損

人參胃風湯門君子湯下

小烏沉湯門血

黑神散門血

大陽除溼防風湯溼門

歸脾湯門元

人參敗毒散小柴胡湯下

升陽益胃湯保元湯下

四君子湯方劑

十全大補湯保元湯下

黃土湯諸見血門

赤小豆當歸散諸見血門

四物湯方劑

附子理中湯理中湯下

補中益氣湯保元湯下

桃核承氣湯承氣湯下

代抵當丸抵當湯下

理中丸方劑

香附醋炒

枳殼炒

青皮炒

香殼散 治畜血暴起胸脇小腹作痛

香附醋炒

枳殼炒

青皮炒

醫通卷十四 畜血

二十

陳皮

烏藥

赤芍藥

蓬朮醋炒各一錢

歸尾三錢

紅花五分

甘草炙二分生三分

為散每服四五錢水煎去滓加童便半盞空心溫服更以桃核黑糖酒助之不應加延胡索穿山甲有外風寒加桂枝羌活

復元通氣散 治因挫氣血凝滯腰脇引痛

茴香炒

穿山甲炮

延胡索

白牽牛

陳皮去白

甘草炙各半兩

木香 七錢半 勿見火

為散每服二錢砂糖調溫酒送下日二服

復元活血湯 治從高墜下惡血留於腹脇痛不可忍

忍

芫胡 錢半

當歸 二錢

甘草 炙六分

穿山甲 炮研七分

大黃 酒浸三錢

桃仁 五十枚研

紅花 二分

枳殼 五分

水二盞酒一盞煎至一盞去滓熱服以利為度利後痛不止三五日後痛尚不止更作半劑與之

醫通卷十四 奇血

三

當歸活血湯 治挾血如見祟狀

當歸 三錢

赤芍 酒洗

生地黃 酒浸別

桂心 各一錢半

桃仁 二十粒研

茯苓

枳殼

柴胡 各八分

甘草 五分

乾薑 炮四分

紅花 二分

右除生地水煎去滓入地黃再煎數沸加陳酒服之不應加穿山甲五分又不應加附子三分有實熱難用附子者須與大黃錢許同用

濟血丸 治肥人多年內傷血蓄於胃雜於痰涎諸

藥不効者

人參

白朮 生

赤茯苓 各一兩

甘草 炙四錢

半夏 麩炒七錢

浮石 五錢

牡丹皮 五錢

當歸身 四錢

桃仁 二錢乾漆炒去漆

穿山甲 三錢

桂 三錢病在脇下用觀桂在少腹用肉桂

為末紅麩糊丸溫酒下三錢瘦人去半夏浮石加生地黃蓬朮蜜丸服之

犀角地黃湯 傷寒

桃核承氣湯 承氣

抵當湯 方祖

抵當丸 抵當

醫通卷十四 奇血

三

下瘀血湯 抵當

代抵當湯 抵當

越鞠丸 鬱門

平胃散 方祖

理中湯 方祖

變通抵當丸 抵當

補中益氣湯 保元

六味丸 八味

頭痛門

茸珠丹 治腎虛火炎頭痛必先眼黑頭旋

辰砂 別研

草烏頭 一作川 瞿麥穗

黃藥子 各兩

右除辰砂以三味為粗末用瓷碗一箇將薑汁塗

烘數次入砂在碗鋪諸藥末以蓋蓋之掘地一窟
 安碗在內川熟炭五筋般令火盡吹去藥灰取砂
 研細用鹿茸一對燼去毛酒浸切片焙乾為末煮
 棗肉丸梧子大每服三四十九空心人參湯或黑
 豆淋酒下強者倍加羸者量減用之

羌活附子湯 治大寒犯腦厥逆 痛齒亦痛

麻黃 錢 黃耆 錢 若木 製五分

羌活 七分 防風 升麻

甘草 炙各三分 生附子 一錢 白芷

醫通卷十四 頭痛 三

蠟蠶 黃藥 酒炒各五分

水煎去滓食後溫服有嗽加佛耳草五分

遷奇湯 治風火相煽肩稜骨痛

羌活 錢半 防風 一錢 黃芩 酒炒錢半

甘草 錢一 生薑 一片

水煎去滓食後稍熱緩緩服之冬月去黃芩加香
 豉三錢葱白二莖

如痛連魚尾為血虛加黃耆三錢當歸一錢日晡
 發熱為血熱加白芍一錢五分日赤加菊花鼻塞

加細辛夏月近火痛劇為伏火加石膏三錢頭風
 疼熱不止加石膏麻黃不應屬血病也加川芎其
 茶

羌活甘草之辛甘發散僅可治風未能散火得黃
 芩以協濟之乃分解之良法也黃芩雖苦寒專走
 肌表所以表藥中靡不用之觀仲景黃芩湯柴胡
 湯及奉議陽旦湯可知

川芎茶調散 治久風化火頭痛及偏正頭風

川芎 白芷 羌活

醫通卷十四 頭痛 三

防風 荆芥 薄荷

甘草 炙各一兩 香附 童便浸炒二兩

為散食後茶清調服二錢日三服婦人產後豆淋
 酒服輕者三服重者五七服効

山牛湯 治微瘧頭痛不止

土茯苓 四兩 忍冬 三錢 防風

天麻 黑參 各一錢 辛夷仁

川芎 各六分 黑豆 四十九粒 芽茶 一撮

水煎溫服

半夏蒼朮湯半夏湯 治素有風證目澀頭疼眩暈

胸中有痰兀兀欲吐如居煖室則微汗出其證乃

減見風其證復作當先風一日痛甚

升麻

柴胡

藜蘆各五分

茯苓

神麴薑汁炒

蒼朮川製

半夏各二錢

生薑十片

甘草炙四分

水煎食遠稍熱服

清空膏 治頭風溼熱上盛過風即發

羌活三兩

防風二兩

甘草炙兩

醫通卷十四 頭痛

五

黃芩三兩

黃連兩

柴胡七錢

川芎五錢

共為細末每服五錢盛盞內以茶清半盞調勻隔

湯煮如膏臨卧湯送下此即選奇湯

芎辛湯 治熱厥頭痛

川芎錢半

細辛半錢

白芷一錢

甘草炙六分

生薑五片

芽茶一撮

水煎食後熱服有熱加酒黃芩一錢五分不應更

加生石膏三錢烏頭二分胃虛者去白芷易白朮

使邪無內賊之患兼犯客邪加葱白香豉產婦用

豆淋酒煎服之

三因芎辛湯 治寒厥頭痛

川附子去皮生用

川烏頭去皮生用

天南星薑湯泡

乾薑生用

細辛連葉

川芎各一錢

甘草炙半

生薑七片

芽茶一撮

水煎放凉卧時服而赤戴陽加葱白二莖童便半

杯不應史加酒炒黃連三分

大追風散 治一切頭風攻注屬虛寒者

醫通卷十四 頭痛

五

川烏頭炮

防風

羌活

川芎各兩

全蠍去毒醋

地龍去土

南星炮

天麻煨各

荆芥

甘草炙

殭蠶炒黃

石膏煨各

為散每服二錢臨卧茶清調服

局方多白附子白芷各五錢乳香沒藥草烏雄黃

各一錢五分

大三五七散千金 治頭風眩暈目鳴目斜耳聾及

八風五痺癱瘓脚氣緩弱

天雄三枚炮 細辛二兩 山茱萸肉
 乾薑炮各五兩 防風 茯苓各七
 右為散每服二錢食前溫酒調服
 本方去細辛乾薑防風茯苓加薯蕷即小三五七
 散局方無天雄用熟附子三枚
 頭風摩散 治大寒犯腦頭痛
 大附子一枚炮 鹽等分
 為散冰後以方寸匕摩痛處
 半夏白朮天麻湯 治痰厥頭痛目眩

醫通卷十四 頭痛

黃檗蒸汁炒一錢 乾薑炮二分 澤瀉
 天麻漿切 黃芩蒸汁炒 人參
 蒼朮泔製 神麴炒 白朮各錢半
 半夏麴炒 橘紅 麥蘗各七分
 茯苓八分 生薑三片
 水煎稍熱食遠服
 寶鑑石膏散 治風熱頭痛
 石膏生碎一兩 麻黃去節泡半兩 何首烏生酒
 葛根各七錢十

為散每服四五錢人主薑三片芽茶一撮水煎服
 取微汗効春夏麻黃量減不可執一
 透頂散 治偏正夾腦風一切頭風遠年近日者皆
 効并治鼻塞不聞香臭
 細辛三葉 瓜蒂七枚熬 丁香七粒
 糯米七粒赤小豆一作龍腦半分 麝香一分
 前四味杵為細米入腦麝同研置小口罐中塞塞
 罐口令患人口含清水隨左右搖一豆大許於鼻
 中良久涎出即安不愈三日後再搖

醫通卷十四 頭痛

草麻貼法 治氣攻頭痛不可忍
 草麻仁 乳香等分
 右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急於頂上解
 開頭髮出氣即去藥一方無乳香多麝香一分
 一字散 治頭風
 雄黃 細辛各一錢 川烏尖生三錢
 為散不拘時茶清調服一字日三服
 滴金 治首風偏正頭風
 人中白煨 地龍等分

一第1023 冊 續修四庫全書 子部 醫家類 2 頁 54

右爲細末羊膽汁爲丸芥子大每川一九新汲水
一滴化開滴鼻內

火筒散 治頭風鼻塞不利

蚯蚓糞 四錢 乳香 二錢 麝香 二分

爲散用紙筒自下燒上吸烟搐鼻內

清震湯 治雷頭風頭面疙痞憎寒壯熱如傷寒者

升麻 蒼朮 各四錢 薄荷 一大

水煎食後熱服

加味導痰湯 二陳 黑錫丹 丹下

醫通卷十四 頭痛 三

消風散 效嗽 芍歸湯 四物

六君子湯 四君子 蘇子降氣湯 七氣

稀涎散 中風 梔子豉湯 方祖

涼膈散 方祖 滾痰丸 痰飲

既濟解毒湯 三黃 吳茱萸湯 嘔吐

當歸四逆湯 桂枝 小建中湯 桂枝

補中益氣湯 保元 四物湯 方祖

外臺茯苓飲 四君子 羌活勝濕湯 產門

瓜蒂散 傷飲 藿香正氣散 散下

黃連解毒湯 三黃

越鞠丸 鬱口 逍遙散 虛損

六味丸 八味 玉真丸 金液

導痰湯 二陳 二陳湯 方祖

星香湯 方祖 蒼朮白虎湯 白虎

敗毒散 小柴胡 大柴胡湯 小柴胡

十全大補湯 保元 大建中湯 保元

葛根湯 麻黃 桂枝湯 方祖

獨參湯 保元 保元湯 方祖

醫通卷十四 頭痛 三

八味丸 方祖 鹿茸丸 虛損

歸脾湯 保元

面痛門 補中益氣湯 保元

犀角升麻湯 中風

越鞠丸 鬱口

心痛胃脘痛門

九痛丸 金匱 治九種心痛

附子 三兩 生狼牙 炙香印人參

吳茱萸 開口者 乾薑 生各 巴豆霜 熬作淨

右六味為末煉白蜜丸。梧子大溫酒送下。強人三九弱者二九。日三服。兼治卒中惡腹脹痛。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。并冷衝上氣。落馬墜車血疾等。皆主之。忌口如常法。

喻嘉言曰。九種心疼。乃客邪之劇證。即腎邪乘心。脚氣衝心之別名也。痛久血瘀。陰邪搏結。溫散藥中。加生狼牙巴豆。莫茱萸。驅之從陰竅而出。以其邪據胸中。結成堅壘。非搗其巢。邪終不出耳。
金鈴子散 治熱厥心痛。或作或止。久不愈者。

醫通卷十四 心痛胃脘痛

金鈴子 即川棟子酒煮去皮核 延胡索 醋炒等分

為散每服三錢。溫酒調下。
煮黃丸 治心胸腹脇痰食。痞脹急冷痛。但屬熱結。脣日燥渴。小便赤澀者。禁用。

雄黃 研二錢 巴豆霜 去皮心。蒸并淨二錢
入白麩三兩。研勻。滴水為丸。梧子大。滾漿水。煮十二九。以浮為度。濾入冷漿水內。沉冷。每服一九。涼茶下。逐時服之一日。服盡。以微利為度。不必盡劑。
水煮金花丸 治食積痰飲。結聚年久不散。

煮黃丸。去巴霜。加南星。半夏。各一兩。天麻。五錢。如煎法製。每服五十九丸。淡薑湯送下。日二服。
高良薑湯 千金 治心腹絞痛。如刺。兩脇脹滿。

高良薑 厚朴 黃製 當歸
桂心 各二錢 生薑 三片
右五味。水煎。溫服。若一服痛止。不須更作。虛人加芍藥。半夏。甘草。人參。乾薑。蜀椒。黃耆。
崔氏烏頭丸 治風冷邪氣。入乘心絡。或府藏暴感。寒氣卒然。心痛。或引背脊。經久不瘳。

醫通卷十四 心痛胃脘痛

附子 炮去皮臍 川烏頭 炮去皮臍 赤石脂 各三兩
蜀椒 炒去汗 桂心 乾薑 炮各二兩

右六味。杵為細末。煉白蜜丸。梧子大。每服三九。冷酒下。覺至痛處。痛即止。若不止。加至五六九。以知為度。若早服。無所覺。至午再服三九。若久心痛。每旦三九。加至十九劑。終不發。忌猪肉。生葱。

清中瀉痛湯 治中脘火鬱。作發。即寒熱。
山梔 黃汁炒黑 乾薑 炮三錢 川芎 黃汁炒
黃連 黃汁炒 橘紅 各五分 香附 黃汁炒

蒼朮 重便浸刮去皮切 神麴 薑汁炒

生薑 三片 大棗 一枚

水煎食前熱服

清中湯 治胃熱作痛

黃連 薑汁炒 山梔 薑汁炒 陳皮

茯苓 各二錢 半夏 各二錢 草豆蔻 研

甘草 七分 生薑 三片

水煎食前熱服

手拈散 治中脘死而作痛好飲熱酒人多此

醫通卷十四 心痛胃脘痛

延胡索 五靈脂 酒研 草果仁

沒藥 等分

為散每服三錢不拘時熱酒調服或用熬熟砂糖

作丸溫酒送下七十九

越婢湯 麻黃 涼膈散 方祖

木附湯 方祖 二陳湯 方祖

大柴胡湯 小柴胡 小建中湯 桂枝

理中湯 方祖 三物大建中湯 理中

四七湯 二陳 蘇子降氣湯 七氣

小半夏茯苓湯 二陳 半硫丸 金液

導痰湯 二陳 胃苓湯 平胃

五苓散 方祖 沉香降氣散 氣門

六君子湯 四君子 代抵當丸 抵當

四物湯 方祖 來復丹 金液

歸脾湯 保元 平胃散 方祖

胸痺門 栝蒌薤白白酒湯 金匱 治胸痺喘息欬唾胸背痛

栝蒌薤白半夏湯 金匱 薤白 二兩 白酒 七升

栝蒌實 一枚 薤白 一兩 半夏 二兩

醫通卷十四 胸痺

右三味合煮取二升分溫再服

栝蒌薤白半夏湯 金匱 治胸痺不得卧心痛徹背

栝蒌實 一枚 薤白 一兩 半夏 二兩

白酒 一斗 右四味合煮取四升溫服一升日三服 下金無白

枳實薤白桂枝湯 金匱 治胸痺心中痞結脇下逆

枳實 四枚 厚朴 二兩 薤白 三兩

枳實 四枚 厚朴 二兩 薤白 三兩

枳實 四枚 厚朴 二兩 薤白 三兩

枳實 四枚 厚朴 二兩 薤白 三兩

桂枝 三錢 栝蔞實 一枚

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內諸藥煮數沸分溫三服

茯苓杏仁甘草湯 治胃痺室塞短氣

茯苓 一兩 杏仁 五十粒 甘草 炙 三錢

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服

橘皮枳實生薑湯 治胸痺胸中怫怫如滿噎

寒習習如癢喉中清燥吐沫

橘皮 一兩 枳實 二枚 生薑 一兩

醫通卷十四 胸痺

一

右三味以水五升煮取二升分溫再服

薤白附子散 治胸痺緩急

薤白 五兩 大附子 一枚

右二味杵為散服方寸匕日三服

桂枝生薑枳實湯 治心中痞逆心懸痛

桂枝 各一兩 生薑 各一兩 枳實 五枚

右三味以水六升煮取三升分溫日三服

烏頭赤石脂丸 治心痛徹背背痛徹心

蜀椒 汗 去 赤石脂 兩 烏頭 一枚

附子 一枚 乾薑 一兩

右五味為末蜜丸梧子大先食服十九日三服不知稍加服

細辛散 治胸痺達背痛

細辛 各六錢 甘草 各六錢 枳實 各六錢

生薑 栝蔞實 乾地黃

白朮 各一兩 桂心 茯苓 各兩

右九味為散酒服方寸匕

前胡湯 治胸中逆氣心痛徹背少氣不食

醫通卷十四 胸痺

一

前胡 甘草 半夏

芍藥 各二錢 黃芩 當歸

人參 甘草 各一錢 生薑 三片

大棗 三枚 竹葉 一握

右十一味水煎去滓日三服 一方無竹葉多茯苓

方以前胡取名取其下氣氣下則寒熱諸邪解散

無餘并開通經絡使氣從外分解心手之靈若此

非拘於繩墨者之可測識也

下氣湯 治胸腹閉滿上氣喘息

杏仁

大腹槲榔

右二味咬明以童子小便煎日再服

熨背法 千金 治胸背疼痛而悶

烏頭

細辛

附子

羌活

蜀椒

桂心 各錢半

芎藭 一錢

右七味爲末帛裏微火炙令煖以熨背上取瘥止

慎生冷物

治中湯 理中 湯下

人參湯 自理中 湯方祖

醫通卷十四 胸痺

七

生薑半夏湯 二陳 湯下

腹痛門

調肝散 治鬱怒傷肝腰痛或小腹偏左結痛

半夏 兩

辣桂

木瓜

當歸

川芎

牛膝 各五錢

細辛

石菖蒲

酸棗仁 炒

甘草 各三錢

爲散每服四錢入薑五片棗二枚水煎去滓熱服

理中湯 方祖

真武湯 本附 湯下

當歸四逆湯 桂枝 湯下

芍藥甘草湯 桂枝 湯下

黃芩湯 桂枝 湯下

六君子湯 四君子 湯下

藿香正氣散 平胃 散下

桃核承氣湯 承氣 湯下

五苓散 方祖

控涎丹 十棗 湯下

枳實導滯湯 傷食 湯下

平胃散 方祖

人參養胃湯 平胃 湯下

二陳湯 方祖

十味香薷飲 局方 香薷飲下

胃苓湯 平胃 湯下

調胃承氣湯 小承氣 湯下

小建中湯 桂枝 湯下

七氣湯 方祖

麴蘗丸 傷食 湯下

醫通卷十四 腹痛

七

保和丸 傷食 湯下

大承氣湯 小承氣 湯下

麻仁丸 燥門

通幽湯 燥門

蜜煎導 燥門

豬膽導 燥門

豬苓湯 五苓 散下

代抵當丸 抵當 湯下

濟生腎氣丸 八味 丸下

十全大補湯 保元 湯下

當歸生薑羊肉湯 煎門

越鞠丸 鬱門

逍遙散 虛損 門

佐金丸 方祖

六味丸 八味 丸下

治中湯 理中 湯下

脅痛門

龍膽瀉肝湯 治肝經溼熱腋脇滿痛小便赤澀

柴胡稍 澤澤各錢 車前

木通 當歸稍 草龍膽各八分

生地黄二錢 生薑三片

水煎食遠熱服更以美饌壓之

此本導赤散加柴胡膽草之屬入肝以瀉溼熱也

推氣散 治右脇疼脹不食

片子薑黃皮極細 枳殼

肉桂各五錢 甘草錢

醫通卷十四 痞痛 三九

為散每服二三錢加薑棗水煎去滓溫服

小柴胡湯方祖 枳殼煮散湯下

枳實理中湯湯下 分氣紫蘇飲湯下

增損流氣飲門 當歸龍薈丸湯下

柴胡疎肝散門 二陳湯方祖

抑青丸佐金丸

復元活血湯門 大黃附子湯湯下

導痰湯湯下 控涎丹湯下

神保丸傷食門 煮黃丸心胃痛

六君子湯湯下 小青龙湯湯下

十棗湯方祖 逍遙散門

桃核承氣湯湯下 七味丸湯下

加減八味丸湯下 腎氣丸湯下

加味導痰湯湯下

腰痛門

摩腰膏 治老人虛人腰痛婦人帶下清水不臭者

附子 川烏頭 南星各二錢

蜀椒 雄黃 樟腦

醫通卷十四 腰痛 四

丁香各錢 乾薑一錢 麝香一分

右為末蜜丸彈子大每用一九生薑自然汁化開

如糜蘸手掌上烘熱摩腰中痛處即以煖帛束定

少頃其熱如火每日飽後用一九有疎砂誤

三痺湯改定 治風寒溼氣合病氣血凝滯手足拘

攣

人參 黃耆酒炒 白朮

當歸 川芎 白芍

茯苓各一錢 甘草炙 桂心

防已

防風

烏頭炮各五分

細辛三分

生薑三片

紅棗二枚

水煎不拘時熱服。

此方合保元四君內補建中防已黃耆防已茯苓湯千金防已湯等方但加防風以搜氣分之風川芎以搜血分之風細辛以搜骨髓之風於原方中削去生地牛膝杜仲續斷秦艽獨活增入防已白朮烏頭以祛除風溼則參附著附朮附桂附眞武等法俱在其中彼用附子之雄以播眞陽此藉烏

醫通卷十四 腰痛

聖

頭之烈以祛痺著蓋雜合之氣須雜合之方方爲合劑第恐地黃牛膝輩陰柔之藥難振迅掃之威是不得不稍爲裁酌用方者每以擅改成方爲妄也

燒羊腎十斤

治腎虛而受寒溼腰疼不得立

甘遂

桂心一作附子

杜仲

人參

右四味等分治下篩以方寸匕內羊腎中炙之令熟服之

青娥丸局方

治腎虛腰與季脇痛

補骨脂炒香

杜仲鹽酒炒斷絲各四兩

右二味爲末連皮胡桃肉三十枚青鹽去砂土淨一兩同搗成膏稍入煉白蜜和丸彈子大每服一丸空心溫酒化下

虎骨散 治腰膝連脚膝曉夜疼痛

虎骨酥炙

敗龜版酥炙

當歸

川草薢

牛膝各二兩

川芎

肉桂

羌活各一兩

醫通卷十四 腰痛

聖

爲散每服四錢空心溫酒調下亦可用蜜丸溫酒服之

二至丸 治老人腎虛腰痛不可屈伸頭旋眼黑下體痿軟

附子炮一枚

桂心一兩

杜仲鹽酒炒

補骨脂炒各二兩

鹿茸酥炙

麋茸酥炙各一具

右爲細末青鹽半兩熱酒中化去砂土入鹿角膠一兩糊丸如梧子大每服七十九空心醇酒同胡桃肉一枚細嚼送下惡熱去附子加肉蓯蓉一兩

龜版膠一兩倍杜仲補骨脂

按鹿是山獸性稟純陽其角乃陽中之陽夏至得一陰之氣而解糜是澤獸性稟至陰其角乃陰中之陽冬至得一陽之氣而解此方二茸並用故名二至加以桂附杜仲補骨脂峻溫腎肝充為老人調補下元虧損虛火上乘要藥但糜鹿二茸世罕能辨鹿茸則毛色黃而角門窄頂骨薄糜茸則毛色黑而角門開頂骨厚世人貴鹿賤糜而粗大短壯圓滿鮮澤者為之茄茸不知粗大者多是糜茸

醫通卷十四 腰痛

聖

若鹿茸則大者絕少即帶馬鞍樣肥嫩者亦佳縱獨獻而枯瘦太短血氣不多者無足取也更觀茸下有節若只一層者其鹿少壯力優茸如筍芽者則鹿老而力遜矣

小續命湯 續命湯下

乾薑附子湯 四逆湯下

五積散 散下

小柴胡湯 方劑

大柴胡湯 湯下

滲溼湯 理中湯下

木附湯 方劑

二妙散 大補湯下

羌活勝溼湯 溼門

復元通氣散 蓄血

復元活血湯 蓄血門

烏藥順氣散 中風門

八味順氣散 四君子湯下

導痰湯 二陳湯下

柴胡疎肝散 吐血門

調肝湯 腹痛門

桃核承氣湯 小承氣湯下

腎氣丸 八味丸下

六味丸 八味丸下

八味丸 方劑

腎著湯 理中湯下

安腎丸 虛損門

脊痛脊強門

椒附散 治項背強痛不可以顧

附子 一枚炮去皮臍

醫通卷十四 脊痛脊強

聖

為散每服二錢川川椒三十粒生薑七片水一盞煎至七分去椒入鹽一字空心熱服有熱加川羌活一撮而赤戴陽加葱白二莖火炎頭痛熱加臘茶一撮

地龍湯 治痰積太陽經中腰脊痛不可忍

地龍 焙乾

肉桂 各五分

桃仁 十粒

羌活 二錢

獨活

甘草 炙

黃蘗 帶酒炒

麻黃 六分

蘇木 八分

當歸梢 錢半

水煎食遠熱服

六味丸 八味丸下 羌活勝溼湯 溼門

麻黃湯 方祖 五苓散 方祖

二陳湯 方祖 二妙散 大補丸下

肩背痛

通氣防風湯 保元湯下 逍遙散 虛損門

升陽散火湯 升麻湯下 十全大補湯 保元湯下

羌活勝溼湯 溼門 消風散 欬嗽門

補中益氣湯 保元湯下 當歸拈痛湯 溼門

醫通卷十四 肩背痛

五

木煎熱服無時

五積散 平胃散下 十全大補湯 保元湯下

導痰湯 二陳湯下 指迷茯苓丸 二陳湯下

二陳湯 方祖 薏苡仁湯 中風門

近効白朮附子湯 木附湯下 十味劉散 四物湯下

加味逍遙散 虛損門

腿痛門

虎骨四筋丸 治肝腎虛寒而挾風溼足膝疼痛

木瓜 天麻 肉蓯蓉 酒洗去腐

醫通卷十四 骨痛手痛 腿痛

五

神保丸 傷飲食門 近効白朮附子湯 木附湯下

指迷茯苓丸 二陳湯下 導痰湯 二陳湯下

六君子湯 四君子湯下 聖愈湯 保元湯下

龍荷丸 三黃湯下 胃苓湯 平胃散下

骨痛手痛

蠲痺湯 治風溼相搏身體煩疼手足冷四肢沉重

當歸 赤芍藥 黃耆

片子薑黃 羌活 各錢 甘草 各錢

生薑 三片 紅棗 一枚

牛膝 各一 附子 炮二兩 虎脛并掌骨 具一

上四味以醇酒五升浸春五夏三秋七冬十日取

出焙乾切片曝燥同附子虎骨為細末用浸藥酒

打糊為丸梧子大每服五七十丸食前鹽湯臨臥

時用浸藥酒送下浸藥酒完以陳酒服之如無虎

脛骨隨前後左右用掌骨亦可

鹿茸四筋丸 局方 治腎肝俱虛筋骨痿弱顛掉

虎骨四筋丸去附子虎骨加鹿茸二具兔絲子

熟地黄杜仲各半筋蜜九梧子大每服六七十九丸空心淡鹽湯臨卧溫酒送下

川芎肉桂湯 治宿於寒溼地血凝腰脊痛不能轉側

側

羌活 錢半 此胡 川芎

當歸梢 甘草 肉桂

蒼朮 錢各一 獨活 防風 各五分

漢防已 酒洗 三分 桃仁 七箇 研

水酒各一升煎八合食遠熱服

醫通卷十四 腰痛

四七

六味丸 八味丸 下

除風溼羌活湯 溼門

導痰湯 二陳湯 方祖

補中益氣湯 保元湯 下

安腎丸 虛損門

十全大補湯 保元湯 下

除溼湯 散下

膝痛門

舒筋三聖散 中風門

白朮附子湯 木附湯 溼門

當歸拈痛湯 溼門

虎潛丸 大補丸 下

八味丸 方祖

三痺湯 腰痛門

二妙散 大補丸 下

滲溼湯 理中湯 下

附子丸 治溼痺一身如從水中出

附子 炮 川烏頭 炮 觀桂

川椒 菖蒲 甘草 各四兩

骨碎補 切薑汁 天麻 煨 白朮 生 各二兩

煉白蜜九梧子大每服三五十九溫酒下侵晨食

前臨卧各一服

活絡丹 局方 治寒溼襲於經絡而痛肢體不能屈伸

川烏頭 炮 地龍 去土 炮 研 南星 炮 各三兩

醫通卷十四 膝痛

四七

乳香 沒藥 酒研飛澄定晒 乾各一兩二錢

右五味為末酒麴糊丸如彈子大乾透蠟護臨服

剉開空腹荆芥湯或陳酒或四物湯化下痛處色

紅腫者勿用

鐵彈丸 治筋攣骨痛麻脊不仁

川烏頭 炮 兩 乳香 沒藥 各一兩

五靈脂 酒研淨四兩 麝香 一錢

為末滴水為丸彈子大食後薄荷湯臨卧溫酒各

服一丸

按此與活絡丹通治寒溼作痛肥人風痰流入經絡者則宜活絡丹瘦人風毒入傷血脈者則宜鐵彈丸若溼熱赤腫煩疼及癰毒將成腫痛二方皆在切禁

換骨丹 治風痿痺弱寒溼風氣鶴膝風等證

當歸 一兩 虎脛并掌骨 一具

羌活 獨活 防風

川草薢 名 秦艽 四兩 龜版 兩

牛膝 晚蠶沙 炒 枸杞子

醫通卷十四 膝痛

聖

油松節 各五兩 白茄根 八兩 蒼朮 兩

右用無灰酒一大罈將絹囊盛藥懸於酒內封固

候十四日開罈取酒不可以面對罈口恐藥氣衝

人面目每飲盞許勿令藥力斷絕飲盡病痊將藥

晒乾為末米飲糊丸梧子大每服七八十九空心

溫酒下忌食動風辛辣之物此藥可以常服但厥

赤腫痛甚於春夏者多屬溼熱非其所宜

史國公藥酒 治風溼疼痛

換骨丹去龜版蒼朮加鼈甲蒼耳子

二妙散 大補丸下 虎潛丸 大補丸下

當歸拈痛湯 溼門 川芎肉桂湯 腿痛

虎骨四筋丸 腿痛 鹿茸四筋丸 腿痛

六味丸 八味丸 八味丸 方劑

導痰湯 二陳湯 補中益氣湯 保元湯下

十全大補湯 保元湯下 腎著湯 理中丸下

身體痛門

麻黃復煎湯 治風溼倦怠常微汗出

麻黃 去節 一錢

醫通卷十四 身體痛

辛

用水三盞先煎令沸去上沫至二盞入下項藥

黃耆 二錢 白朮 人參 各錢半

柴胡 防風 羌活

黃芩 薑汁炒 生地黃 各一錢 甘草 生二分 炙三分

杏仁 皮炙研

右十味入麻黃湯中煎至一盞卧時半饑熱服不

可飽服後微汗為度不可過汗過汗則熱不止而

煩擾不寧也梔子豉湯解之

甘草附子湯 木附湯下 補中益氣湯 保元湯下

當歸拈痛湯 金匱

小續命湯 續命湯

逍遙散 門

六和湯 門

十全大補湯 保元湯

五苓散 方祖

妙散 大補丸下

防已黃耆湯 方祖

厚朴七物湯 小承氣湯下

痺門

烏頭湯 金匱

治病歷節痛不可屈伸及脚氣疼痛

麻黃 去節六錢

黃耆 黃耆汁和 芍藥 酒炒各三錢

甘草 炙一錢

川烏頭 一枚咬咀以蜜一升煎取五合仰出烏頭

醫通卷十四 痺門

至

右除烏頭咬咀四味以水三升煮取一升去滓內

蜜煎中更煎之分二服不知盡服之

附子湯 千金

治淫痺緩風身體疼痛如欲折肉如

錐刺刀割

附子 一枚

芍藥 桂心

甘草

茯苓 人參 各一兩

白朮 一兩

右七味咬咀以水八升煮取三升分二服

除澤瀉痛湯 治身體沉重痠疼天陰即發

蒼朮 川浸去皮切

白朮 同蒼朮炒各二錢 羌活

茯苓

澤瀉 各錢 陳皮 錢

甘草 炙五分

水煎入薑汁竹瀝各數七熱服取微汗効

摩風膏 治風毒攻注筋骨疼痛

草麻子 去殼一兩 川烏頭 生去皮半兩 乳香 半錢

右以豬脂研成膏烘熱塗患處以手心摩之覺熱

如火効

犀角散 千金 治熱毒流入四肢歷節腫痛

醫通卷十四 痺

至

犀角 兩

羚羊角 兩 前胡

黃芩

梔子仁 大黃

升麻 五味並盡汁拌炒

射干 酒炒黑各四兩 豉 一升

右九味為散每服五錢水煎食後熱服

通痺散 治風寒溼三氣襲於足三陰經腰以下至

足冷如冰不能自舉

天麻 三兩

獨活 紫木

當歸

川芎 白朮 各二兩

為散每服二三錢熱酒調晨昏各一服

右編用川烏一兩酒煎製天麻中蒼朮一兩黃芩半兩酒煎製白朮中深得三氣襲於陰經之旨

羚羊角散 治筋痺肢節束痛

羚羊角 二兩 肉桂 世本作薄荷誤 附子 炮各半兩

白芍 一兩 獨活 防風 各七錢半

川芎 一兩 當歸 五錢

為散每服四五錢入生薑三片水煎食遠熱服

人參丸 治脈痺大熱經脈不利

人參 麥門冬 去心 茯神

醫通卷十四 痺

龍齒 煨 石菖蒲 遠志肉

黃耆 各一兩 當歸 半兩 世本赤石脂 地黃 二兩

為末煉白蜜丸梧子大每服五七十九食前清米飲醇酒任下

吳茱萸散 治腸痺寒溼內搏腹痛脹急大便飧瀉

吳茱萸 取開日者 湯泡七次 肉豆蔻 煨

乾薑 炮黑 甘草 炙各五錢 砂仁 炒

神麴 炒 白朮 炒各一兩 厚朴 薑汁

陳皮 良薑 各三錢

為散每服三錢食前臨卧各一服米湯送下

腎瀝湯 治胞痺溺瀉不通蘊積為熱小腹急痛

麥門冬 去心 桑白皮 蜜酒 犀角 鎊各一錢

杜仲 鹽酒 桔梗 赤芍藥

木通 各錢 桑螵蛸 二箇

水二盞入羊腎二枚去脂膜竹刀切片入竹瀝少許同煎至一盞空心頓服留二導臨卧服之○右

編無赤芍藥多赤茯苓詳芍藥酸收不若茯苓清

心利小便之為愈也

醫通卷十四 痺

醫通卷十四 痺

按此名腎瀝者形容胞中之氣痺而不化水道滴瀝不出甚則結塊阻塞溺孔艱苦異常乃虛熱壅滯膀胱氣化不行所致桑皮螵蛸咸為治肺而設

不可誤認腎氣虛寒而用溫補之劑若淋瀝而靜坐頻數臨事相忘睡則遺出不知者方是腎氣虛寒之候又非此湯可治也

茯苓丸 治胞痺小腹膀胱按之內痛若沃以湯瀉於小便上為清涕

赤茯苓 一兩 細辛 五錢 澤瀉 五錢

澤瀉 五錢

澤瀉 五錢

澤瀉 五錢

澤瀉 五錢

澤瀉 五錢

肉桂 五錢 紫苑茸 一兩 附子 炮 三錢
 生地黃 一兩 牛膝 酒浸 一兩 山茱萸肉 五錢
 乾山藥 一兩
 爲末蜜九梧子大每服五七十九食前米飲臨卧
 溫酒送下
 按此方難以茯苓通利爲名全賴牛膝地黃山茱
 山藥調補津液爲主更需桂附之辛以行牛膝地
 黃之滯深得若沃以湯滿於小便之旨其用紫苑
 者上滋化源下利膀胱也妙用更在細辛一味開

醫通卷十四 痺

姜

發上竅專主上爲清涕而設九味相配成方更無
 遺議世本尚多黃耆白朮甘草芍藥花粉半夏防
 風獨活等味不特滋繁而且滯氣耗陰因從右編
 削去
 巴戟丸 治胞痺虛寒臍腹痲澁數不利則遺尿
 巴戟 去骨 生地黃 酒焙各 桑螵蛸 切破
 肉蓯蓉 酒浸 山藥 肉桂 各五錢
 兔絲子 酒煮各 附子 炮 肉桂 各五錢
 遠志 甘草湯泡 石斛 去根 鹿茸 酥炙

爲末煉白蜜九梧子大每服三五十九空心卧時
 米飲溫酒任下羊腎湯亦佳黃絲湯尤妙
 按巴戟丸治胞痺虛寒之候詳澁數不利當是勝
 胱熱壅何以見其虛寒而用桂附巴戟蓯蓉鹿茸
 等大熱之劑當知其入腎氣久虛寒氣乘虛而入
 所以臍腹痛巨陽之氣化不行縱溺積鬱化爲熱
 非溫補不能蒸動氣化因彷彿地黃飲子之製稍
 兼生地石斛爲假熱之使不必更用利水藥也右
 編止十二味世本尚多杜仲續斷龍骨五味子等

醫通卷十四 痺

姜

藥得無轉助酸收之患乎
 巴戟天湯 治冷痺脚膝疼痛行步艱難
 巴戟天 二錢 附子 炮 五加皮 酒洗
 石斛 甘草 炙 茯苓
 當歸 各一 牛膝 酒炒 川草薢 鹽酒炒
 肉桂 防風 防己 酒洗各
 生薑 三片
 水煎空心溫服
 黃耆桂枝五物湯 桂枝湯下 甘藷苓朮湯 即腎湯

桂枝芍藥知母湯 桂枝湯下 越脚加木附湯 麻黃湯下

神効黃耆湯 保元湯下 拈迷茯苓丸 二陳湯下

二陳湯 方祖 導痰湯 二陳湯下

桂枝附子湯 桂枝湯下 烏藥順氣散 中風門

防己黃耆湯 方祖 活絡丹 膝痛門

五苓散 方祖 當歸拈痛湯 溼門

附子丸 膝痛門 三痺湯 膝痛門

獨痺湯 骨痛門 虎骨散 膝痛門

補中益氣湯 保元湯下 安腎丸 虛損門

醫通卷十四 痺 五

越脚湯 麻黃湯下 痛風門

烏頭湯 痺門 敗毒散 小柴胡湯下

導痰湯 二陳湯下 四物湯 方祖

潛行散 太補丸下 倉公當歸湯 麻黃湯下

千金大棗湯 麻黃湯下 千金防己湯 防己黃耆湯下

附子理中湯 理中湯下 千金犀角散 痺門

烏藥順氣散 中風門 五積散 平胃散下

麻木門

二陳湯 方祖 補中益氣湯 保元湯下

生脈散 方祖 清燥湯 保元湯下

桃核承氣湯 小承氣湯下 二妙散 大補丸下

三痺湯 腰痛門 逍遙散 虛損門

六味丸 八味丸下 紫雪 火門

痿門

金剛丸 改定 治腎虛骨痿不能起於牀

川草薺 鹽酒炒 杜仲 鹽酒炒 肉苁蓉 酒浸去

兔絲子 酒煮搗 巴戟肉 酒煮各 鹿胎 一具

醫通卷十四 痺風 麻木 痿 美

右為細末鮮紫河車隔水蒸膏搗和為丸梧子大每服七十九空心參湯米湯臨卧溫酒下脾虛少食大便不同者加人參二兩乾山藥三兩精氣不固者更加山茱萸肉二兩

補血榮筋丸 治肝衰筋緩不能自收持

肉苁蓉 酒製 兔絲子 酒煮 天麻 煨各

牛膝 酒煮 鹿茸 酒炙 熟地黃 六兩

木瓜 薑汁炒 五味子 各

為末蜜丸梧子大每服七十九空心參湯米湯臨

卧温酒送下

虎潛丸 大補丸下

清暑益氣湯 保元湯下

二陳湯 方祖

四物湯 方祖

四君子湯 方祖

六君子湯 四君子湯下

導痰湯 二陳湯下

都氣丸 八味丸下

八味丸 方祖

五苓散 方祖

腎著湯 理中湯下

小青龍湯 桂枝湯下

清燥湯 保元湯下

安腎丸 虛損門

加味虎潛丸 大補丸下

滋腎丸 大補丸下

醫通卷十四 痰

五

潛行散 大補丸下

二妙散 大補丸下

補中益氣湯 保元湯下

百合門

百合知母湯 金匱

治百合病發汗後者

百合 七枚

知母 三錢

先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升去滓合煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯 金匱

治百合病下之後者

百合 七枚

滑石 一兩

代赭石 彈子大一枚碎

煎法如前

百合雞子湯 金匱

治百合病吐之後者

百合 七枚

雞子黃 一枚

煎百合如前去滓內雞子黃攪勻煎五分溫服

百合地黃湯 金匱

治百合病不經吐下發汗病形如初者

百合 七枚

生地黃汁 一杯

煎百合如前去滓內地黃汁煎取一升五合分溫

醫通卷十四 百合

三

再服

百合洗方 金匱

治百合病一月不解變成渴者

百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食

煮餅勿以鹽豉也 鹽豉即鹽醬也

栝蘆牡蠣散 金匱

治百合病渴不差者

栝蘆根

牡蠣 熬等分

為散飲服方寸七日三服

百合滑石散 金匱

治百合病變發熱者

百合 半兩

滑石 一兩

為散飲服方寸七日三服當微利者止服熱則除
生脈散 方劑 佐金丸 方劑

脚氣門

竹瀝湯 千金 治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹
起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷

竹瀝 半升

甘草

秦艽

葛根

黃芩

麻黃

防已

細辛

桂心

乾薑 各三錢

茯苓 六錢

防風

醫通卷十四 脚氣

至

升麻 各四錢

附子 一枚

杏仁 三十枚

右十五味咬咀以水七升合竹瀝煮取三升分三

服取汗○如卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺

擊急風經五藏恍惚志怒無常手足不隨本方去

秦艽附子乾薑杏仁加獨活芍藥白朮黃芩人參

石膏烏頭生薑○如風毒入人五內短氣心下煩

熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語本

方去防已杏仁乾薑加芍藥當歸人參白朮蜀椒

生薑

八風散 千金 治風虛而青黑土色不見日月光脚

氣痺弱

菊花 一兩

石斛

天雄 各四錢半

人參

附子

甘草 各半兩

薯蕷

續斷

黃耆

澤澤

遠志

細辛

秦艽

石葦

牛膝

菖蒲

札仲

茯苓

乾地黄

防風

白朮

醫通卷十四 脚氣

至

乾薑

葶藶 各三錢

烏頭 錢半

右二十四味為散酒服方寸七日三不効加至二

七

風引湯 千金 治兩脚疼痺腫或不仁拘急不得行

麻黃

石膏

獨活

茯苓 各六錢

吳茱萸

附子

秦艽

細辛

桂心

人參

防風

芍藥

防已

甘草 各三錢

乾薑 四錢

白朮 一兩 杏仁 六十枚
 右十七味。咬咀。以水一斗六升。煮取三升。分三服。取汗。服後。勢緩。本方去麻黃。石膏。吳茱萸。秦艽。芎藭。辛桂心。芎藭。防己。白朮。杏仁。加當歸。石斛。大豆。名小風引湯。并治中風。腰脚疼弱。
 麻黃湯 千金 治惡風。毒氣。脚弱無力。頑痺。四肢不仁。失音。不能言。毒氣衝心。
 麻黃 三錢 大棗 二十枚 茯苓 一兩 杏仁 三十枚 防風 白朮

醫通卷十四 脚氣 空

當歸 升麻 芎藭
 芍藥 黃芩 桂心
 麥門冬 甘草 各六錢
 右十四味。咬咀。以水九升。清酒七升。合煮。取二升。半分四服。日三夜一。覆令小汗。粉之。莫令見風。
 犀角 旋復花 橘皮
 腹不仁。喘息上氣。治脚氣初起。兩脰腫滿。或入。
 茯苓 生薑 各六錢 大棗 七枚

香豉 一升 紫蘇 葉 一握
 右八味。咬咀。以水八升。煮取二升。七合。分三服。相去十里。久服之。以氣下。小便利。為度。
 檳榔湯 治脚氣衝心。煩悶不識人。
 檳榔 木香 茴香 等分
 水煎。去滓。加童子小便一盞。薑汁數匙。溫服。
 酒浸牛膝丸 治脚氣枯瘦。冷淡。筋骨無力。
 牛膝 三兩 附子 一枚 炮去皮。臍切。同
 川椒 六兩 微炒。去汗。半兩 虎脰骨 一具

醫通卷十四 脚氣 空

右四味。盛生絹囊內。浸陳酒一斗。繫紫繩。日春五。夏三。秋七。冬十日。出藥。晒乾。為末。苦酒糊丸。梧子。大。每服三十九丸。空心卧時。卽用浸藥酒送下。忌食動風等物。
 獨活湯 千金 治脚痺冷痛。不可屈伸。
 獨活 三錢 當歸 防風
 茯苓 芍藥 黃芩
 葛根 人參 甘草 各錢
 乾薑 炮 附子 炮 各錢 黑豆 合

一萬一〇二三年 續修四庫全書 4 頁之二

右十二味以水五升清酒一升煮取三升分溫三服

烏頭湯千金 治風冷脚痺疼痛擊弱不可屈伸

烏頭 細辛 蜀椒各三錢

甘草 秦艽 附子

桂心 芍藥各六錢半 乾薑

茯苓 防風 當歸各一兩

獨活 一兩 三錢 大棗 二十枚

右十四味以水一斗二升煮取四升分五服

醫通卷十四 脚氣 五

半夏湯千金 治脚氣入腹衝胸氣欲絕者

半夏 桂心 人參各三錢

乾薑 二錢 附子 甘草 錢半

細辛 蜀椒 各一錢

右八味水煎分溫三服初服稍稍進恐氣衝上格

塞不得下耳

沉香導氣湯 治脚氣入腹衝心疼痛腫滿大小便秘

秘

羌活 白芍 檳榔 各一錢

甘草 五分 撫芎 香附 青皮

枳殼 炒各八分 紫蘇 蘇子

木瓜 各六分 生薑 三片

水煎去滓臨臥以藥汁磨沉香木香各半錢調服

水通散 治脚氣遍身腫滿喘逆煩悶小便不利

水通 紫蘇 豬苓 各一兩

桑白皮 薑汁炒 檳榔 赤茯苓 各二兩

為散每服半兩入生薑五片葱白五莖水煎去滓

空心熱服

醫通卷十四 脚氣 六

犀角散 治脚氣風毒生瘡

犀角 鈔 天麻 煨 羌活

枳殼 炒 防風 黃耆 生

黃芩 白茯苓 炒去刺 白藜皮 酒洗各七錢半

檳榔 一兩 甘草 炙半兩 烏蛇 酒浸

為散每服八錢生薑五片水煎去滓食前溫服

蟬麻葉裏法千金 治脚氣初發從足起至膝脛骨

腫疼

取蟬麻葉切搗蒸薄裏之日二三易即消若冬

月無蚘麻取蒟蒻根持研和酒糟三分棧一分
合蒸熟及熱封裏腫上如前法日二即消亦治
不仁頑痺

續命湯	麻黃湯下	越脾加水附湯	麻黃湯下
葛根湯	麻黃湯下	四七湯	陳湯下
香蘇散	傷寒門	越脾加水湯	麻黃湯下
除溼湯	散下	麻附細辛湯	麻黃湯下
清燥湯	保元湯下	敗毒散	小柴胡湯下
八味丸	方祖	羌活導滯湯	承氣湯下

醫通卷十四 脚氣 全

當歸拈痛湯	濟門	崔氏八味丸	方祖
蘇子降氣湯	局方七	養正丹	金液丹下
小青龍湯	桂枝湯下	平胃散	方祖
五苓散	方祖	金鈴子散	心痛胃脘痛門
鶴膝風門		五積散	平胃散下
十全大補湯	保元湯下	活絡丹	膝痛門
四物湯	方祖	換骨丹	膝痛門
八味丸	方祖	六君子湯	四君子湯下
大防風湯	四君子湯下		

逍遙散	虛損門	歸脾湯	保元湯下
補中益氣湯	保元湯下	加味逍遙散	虛損門
六味丸	八味丸下	安腎丸	虛損門
腎氣丸	八味丸下		

樺皮散	治癘風肺壅風毒遍身搔痒	枳殼	炒
樺皮	四兩	荆芥穗	
杏仁	去皮尖另	甘草	兩生
為散每服四五錢	食後溫酒米湯任下	亞麻	三兩

醫通卷十四 鶴膝風 癘風 全

再造散 治大風惡疾營血受病先起於足者

鬱金	五錢如無真者	大黃	皂莢煎酒
大皂角刺	炒五錢	白牽牛	取頭末淨六錢生炒各半

為散分五服五更時以無灰酒調服服後當下惡物禁一切厚味發毒動風物及鹽醬糟醋椒薑麩麩等

醉仙散 治癘風遍身麻木衛氣受病先起於面者

亞麻	俗名大胡麻	鼠粘子	炒
蔓荆子	炒各一兩	白蒺藜	炒去刺
		苦參	

防風

枯葉根

各五錢

為散每用末一兩五錢入輕粉二錢

錢茶清調晨午各一服服至五七日齒

涎令人如醉或下膿血病根乃去量病者強弱用

病重者須先以再造散下之候五七日元氣將復

方用此藥忌一切炙煇厚味止食淡粥時菜烏梢

蛇酒煮淡汁食之以助藥力或用水泛為丸服之

免傷口齒此實眩之藥中病即已不可過劑以取

糜傷口齒之患

醫通卷十四 癩風

完

必勝散 治癩風惡疾營衛俱病上下齊發

赤檳榔

皂角刺

炒各五錢

大黃

酒煨一兩

白牽牛

生取頭末六錢以一半炒

甘草

生炙各一錢

輕粉

為散壯年者分五服中年者分七服每服入黑糖

或白蜜二匙薑汁五匙調服臨臥時腹中稍空薑

湯送下至三更遍身麻木如鍼刺頭口齒縫俱痛

此藥尋病根重者七日行一次稍輕者十日半月

行一次以三五遍為度病退後眉髮漸生肌肉如

故如齒縫中有血以黃連買衆煎湯漱之

九龍丸 治癩風癩腫癢痛

當歸

苦參

各二兩

防風

荆芥

羌活

各兩

蟬蛻

川芎

各五錢

全蠍

滾水泡去鹹一錢

大楓仁

八兩

右九味俱木臼內逐味杵為細末紅米飯為丸如

梧子大不得見火日陰乾布囊盛之每服三錢茶

清送下日三服病起一年者服一料十年餘者服

十餘料。一方少川芎蟬蛻多大胡麻二兩風藤

醫通卷十四 癩風

完

一兩如下體甚者加牛膝二兩防已一兩

漆黃丸 治癩風赤腫硬痛不癢

生漆

雄黃

另研各

皂角刺

各四兩

蟾酥

麝香

另研各三錢

右五味以水三升先入皂角刺煎至一升去滓下

漆煎沸如八成銀花相似候漆浮花盡則水乾不

粘手即離火却下雄麝蟾酥木槌研勻衆手九菜

豆大每服五十九午時五更各一服熱酒下木形

人服之身瘡音啞者急以生蠟搗汁頻進并塗患

處以解之

希慈丸 治癘風脚弱

五月取赤華者陰乾以淨

當歸

芍藥 熟地各二兩

川烏 黑豆製淨六錢

羌活 防風各一兩

蜜丸每服二錢空心溫酒下

白花蛇丸 治大風惡疾歛赤腐爛

防風 金銀花 枸杞子

蟬蛻 苦參各二兩 荆芥穗 酒洗兩半

醫通卷十四 癘風

生

黃連 酒炒

全蠍 滾醋泡炒黃

牛膝

何首烏 鐵器不犯

牛蒡子

連翹

白蒺藜 細辛

胡麻 即亞麻

蔓荆子 各一兩

漏蘆 去苗四兩

白花蛇 一條去尾不犯鐵石

生用紫雲 烏梢蛇 一條去尾不犯鐵石

右十九味除烏梢蛇外預為麤末同蛇搗和焙乾

重為細末米飲糊丸梧子大每服五七十九茶清

送下日三服如頭面上腫加白芷一兩肌肉潰爛

加皂角刺一兩

加皂角刺一兩

鷺鴒散 治癘風惡疾赤腫腐爛

番木鱉 麻油煮乾漆 椒令烟 白鷺毛 存性子

不見星 苦參 皂角刺 各二兩

右為散分作五十服侵晨溫酒或茶清送下亦可

用蜜作丸分五十服

蜈蚣散 治癘風赤腫

蜈蚣 五十條去毒雄黃二錢 牛膝 生

穿山甲 生漆 檳榔 薏苡仁 炒各

為散酒服二錢出汗連服三日效

醫通卷十四 癘風

生

萬靈丹 治癘疔狀若傷寒頭痛發熱嘔渴渾身拘

急疼痛并治癘風麻木不仁

茅朮 川烏頭 炮法 何首烏 生各

全蠍 醋泡 石斛 天麻 煨

當歸 甘草 炙 川芎

羌活 荆芥穗 防風

麻黃 細辛 各一兩 明雄黃

硃砂 水飛淨 各六錢

右為細末煉白蜜杵勻每兩大者分作四丸中者

六丸小者八九珠砂為衣磁礮收貯隨年歲老弱
病勢緩急諒用以葱白香豉湯空心調服服後以
稀粥助令作汗避風寒忌生冷戒房室孕婦禁用
瀉黃散 治胃熱口臭煩渴引飲

藿香葉 七錢 山梔 黃汁炒 甘草 生炙各

石膏 兩 防風 八錢

為散每服四五錢水煎去滓入生白蜜少許調服

涼膈散 方祖 雙解散 涼膈 千金耆婆萬病丸 積聚

消風散 欬嗽 門

醫通卷十四 瀉風 七

升麻胃風湯 門 中風 地黄丸 八味 九下

小柴胡湯 方祖 黃連解毒湯 三黃 湯下

犀角地黄湯 傷寒 越脾加水湯 麻黃 湯下

七味白木散 六君子 加味逍遙散 虛損 門

柴胡四物湯 小柴胡 補中益氣湯 保元 湯下

四物湯 方祖 清燥湯 保元 湯下

人參養胃湯 散 四順清涼飲 燥門

當歸補血湯 保元 清胃散 門

加減八味丸 八味 九下

胃風門 白虎加人參湯 湯下 白虎

小柴胡湯 方祖 人參胃風湯 湯下 四君子

芎辛湯 頭痛 升麻胃風湯 門 中風

破傷風門

九味羌活湯 治太陽經感冒風邪 蒼朮 汁浸去皮 炒各一錢

羌活 錢半 防風 白芷 各一錢

細辛 五分 川芎 甘草 各六分

生地黃 黃芩 各八分

醫通卷十四 胃風 破傷風 七

葱白 二兩 生薑 三片 大棗 一枚

水煎溫服覆取微汗

芎黃湯 治破傷風便秘溺赤 黃芩 各錢 甘草 錢

川芎 香豉 一合

葱白 四葉 水煎溫服覆取微汗

大芎黃湯

芎黃湯去甘草加酒大黃三錢羌活錢半

左龍丸 治破傷風牙關緊急

左盤龍即鶴虱 白殭蠶炒 鱈膠蛤粉炒

雄黃一錢

為末飯糊丸梧子大每服十五丸溫酒下日二服
如證重不已每藥末一錢飯糊中加入巴豆霜五
釐每服中加一丸如此漸加至十九丸以利為度

護心散 治癰毒攻心口乾煩躁嘔吐

真紫豆粉一兩 乳香末三錢 生甘草一錢

硃砂另研水

右杵為散早暮各服二三錢沸湯調服

醫通卷十四 破傷風

毒

按護心散原為預防毒氣入心而設故用硃砂以
為心經之嚮導然其性最沉著不若易以沒藥而
無鎖固毒邪之患也

葱熨法 治癰腫被風發熱脹痛

用大葱一握隔湯蒸熟以線紮切平其根乘熱
熨背止冷即更迭互換得微汗為効倦則止之
來日再熨如前此法大能祛風散寒活血止痛
消腫解毒之捷法也

小柴胡湯方補

升麻湯方補

豬膽汁導雞門

四物湯方補

導赤散傷門

萬靈丹傷風

跌撲門

桃仁湯千金

桃仁

大黃

柱心

蜜煎導雞門

除溼湯散下

葱白香豉湯傷寒

保元湯方補

治從高墮下腹中瘀血滿痛

麝香各三

芎藭各三

甘草各二

荆芥半兩

當歸

蒲黃五兩

醫通卷十四 跌撲

毒

右九味水煮熟取三升分三服
調營活絡飲 治失力閃挫或跌撲瘀結大便不通
腰脇小腹急痛

大黃酒浸

桃仁炒研各

生地黃酒浸

肉桂各五

牛膝生

赤芍藥

羌活各二

紅花

當歸尾

芎藭

紅花

水煎食前溫服臨服入地龍末一錢如病久不能
取効加生附子尖炮穿山甲末各半錢人參一錢

當歸導氣散 治跌撲瘀血內壅喘急便秘

大黃 酒浸 兩 當歸 三錢 麝香 三分

為散每服三錢熱酒調日三夜一服

自然銅散 治跌撲骨斷

自然銅 煅通紅醋淬七次 乳香

沒藥 放酒上十日餘用 當歸身 羌活 等分

為散每服二錢醇酒調日再服骨傷用骨碎補半

兩酒浸搗絞取汁沖服

乳香定痛散 治跌撲傷筋

醫通卷十四 跌撲 七

乳香 沒藥 各半 川芎

白芷 赤芍 丹皮

生地黄 各七錢 甘草 錢二

為散每服四錢醇酒和童子小便調日再服大便

秘加酒大黃筋傷用生牛膝半兩酒浸搗絞取汁

沖服

紫金丹 治金瘡出血不止效此無癢痕

琥珀屑 降真香末 血竭 等分

為極細末敷傷處

香殼散 治血 復元通氣散 治血

復元活血湯 治血 小烏沉湯 治血

黑神散 治血

瘰癧門

葛根湯 治麻黃 桂枝湯 方祖

大承氣湯 治小承氣 麻黃附子細辛湯 治麻黃

桂枝附子湯 治木附 真武湯 治木附

附子湯 治木附 芍藥甘草附子湯 治桂枝

桂枝加附子湯 治桂枝 甘草附子湯 治木附

醫通卷十四 瘰癧 六

乾薑附子湯 治四逆 炙甘草湯 治桂枝

十全大補湯 治保元 祛風導痰湯 治二陳

小柴胡湯 治方祖 薯附湯 治木附

木附湯 治方祖 參附湯 治木附

附子散 治木附 倉公當歸湯 治麻黃

瘰癧門

神砂妙香散 治波血 導赤散 治傷暑

歸脾湯 治保元 加味逍遙散 治虛損

補中益氣湯 治保元 局方香薷飲 治暑

續命煮散 四物湯下

保元湯 方明

六君子湯 四君子湯下

十全大補湯 保元湯下

顛振門

平補正心丹 局方

治心血虛少驚悸顛振夜卧不寧

寧

龍齒 煨通紅醋淬水飛淨一兩形如筆架外埋如石中白如粉飾之枯者真

遠志 甘草湯泡去骨 人參 各一 茯神

酸棗仁 炒各兩半 柏子仁 歸身

石菖蒲 各一兩 生地 二兩一作熟地 肉桂 一兩不見火

醫通卷十四 癩癧 顛振 元

山藥 兩半 五味子 半兩 麥門冬 去心兩半

硃砂 另研水飛淨半兩

右十四味爲末煉白蜜九梧子大硃砂爲衣每服

三五十九丸米湯參湯龍眼湯醇酒任下空心臨卧

各一服

龍齒清魂散 治心虛挾血振悸不寧產後敗血衝

心笑哭如狂

龍齒 醋煨 遠志 甘草湯泡去骨 人參

歸身 各半兩 茯神 麥冬 去心

桂心 甘草 各三錢 延胡索 一兩

細辛 錢半

爲散每服四五錢薑三片紅棗一枚水煎日再服

此即平補正心丹去棗仁柏仁菖蒲生地山藥五味硃砂加延胡細辛甘草

瀉青丸 下血 六味丸 八味丸下

逍遙散 虛損 導痰湯 湯下

六君子湯 四君子湯下 補中益氣湯 保元湯下

八味丸 方祖 十補丸 八味丸下

醫通卷十四 癩癧 顛振 元

欒門 黃耆丸 治劇勞經脈拘攣疼疝少眠

黃耆 人參 熟地

白茯苓 山茱萸肉 薏苡仁 各一兩

酸棗仁 炒 羌活 當歸身

枸杞子 羚羊角 錢五分 桂心

防風 遠志肉 甘草製各半兩

煉白蜜九梧子大每服五七十九半饑時溫酒下

木瓜散 治筋脈拘攣縮急脣青面白爪疼痛

木瓜 酒浸七錢半 虎脛骨 酥炙 五加皮

當歸 桑寄生 如無續斷代之 酸棗仁 炒

人參 栢子仁 黃耆 各一兩 酒炒

甘草 炙五錢

為散每服四五錢薑五片水煎去滓熱服

續斷丸 局方 治風寒溼痺筋攣骨痛

續斷 薑酒炒 牛膝 薑酒炒 川草薺 各三兩

防風 兩半 川烏頭 一枚

煉白蜜丸彈子大醇酒細嚼一九

醫通卷十四

全

六味丸 八味丸下

瓜蒂散 蘇飲

羌活勝溼湯 溼門

五積散 散下

增損四物湯 湯四物

舒筋三聖散 中風

桂枝湯 方劑

安腎丸 虛損

眩暈門

正元散 治命門火衰不能生土吐利厥冷有時陰火上升則頭面赤熱眩暈惡心濁氣逆滿則

胸脇刺痛脘腹脹急

人參 三兩 川烏 一兩

煮汁收入法川烏

白朮 二兩 用極皮五錢 煮

張氏醫通 卷一四

扶苓 收二兩 肉桂 六錢 酒煎

甘草 兩 煎汁收入法烏藥 黃耆 川烏 一兩

右六味除茯苓文火緩緩焙乾勿炒傷藥性作為

散每服三錢水一盞薑三片紅棗一枚擘煎數沸

入鹽一捻和滓調服服後飲熱酒一盃以助藥力

此方出自虞天益製藥秘旨本千金方一十三味

却取烏頭薑桂等辛燥之性逐味分製四君著薯

之中較七珍散但少粟米而多紅豆雖其力稍遜

醫通卷十四 眩暈

全

原方一籌然雄烈之味既去其滓無形生化有形

允為溫補少火之馴劑而無食氣之虞真千金之

功臣也

三五七散 頭痛

養正丹 金液

茸珠丹 頭痛

三因芍辛湯 頭痛

半夏蒼朮湯 頭痛

導痰湯 二陳

沉香降氣散 氣門

八味丸 方劑

川芎茶調散 頭痛

半夏白朮天麻湯 頭痛

二陳湯 方劑

黑錫丹 丹下

一一〇七

青礞石丸瘵飲

理中丸方劑

補中益氣湯湯保元

六君子湯湯四君子

附子理中湯湯理中

六味丸丸八味

佐金丸方劑

靈砂丹丹金液

癩門

定志丸

治言語失倫常喜笑發狂

人參

茯神各二兩

石菖蒲

大遠志

甘草湯泡去骨各二兩

右四味為末密丸梧子大飲服七十九亦可作湯

醫通卷十四 癩

全

服○血虛加當歸有痰加橘半甘草生薑

防已地黃湯千金

治癩癩語言錯亂神氣昏惑

防已一錢

甘草

桂心

防風各三錢

生地黄四錢

生薑汁三七

上四味酒浸一宿絞取汁銅器盛之地黃另用蒸

之如斗米飯久亦絞取汁并入薑汁和分三服

半夏茯苓散 治癩妄因思慮不遂妄言妄見神不

守舍初病神氣未衰者用此數服効

半夏

茯苓各二兩

天麻一錢

膽星

遠志肉

棗仁炒

廣皮

烏藥

木香

礞石各八錢

右為散每服三錢水一盞煎數沸入生薑汁數匙

空心服

妙功丸 治蟲積在內使人多疑善惑而成癩癩

丁香

木香

沉香各半兩

乳香研

麝香另研

熊膽各二錢半

白丁香印雄雀屎三百粒但直者是雄

鶴虱印天各精

醫通卷十四 癩

全

子 散

輕粉四錢

白雷丸

陳皮去白各一兩

之細者勿誤半

大黃酒浸兩半

赤小豆印赤豆三百粒

為細末蕎麥一兩作糊每兩作十九丸硃砂為衣陰

乾每用一丸溫水浸一宿去水再用溫水化開空

心服之小兒減服久年病一服即愈未愈後三五

日再服重不過三服

控涎丹湯下

導痰湯湯下

稀涎散湯下

歸脾湯湯下

涼膈散

方劑

四七湯

湯下

滾痰丸

痰飲

狂門

生鐵落飲

治狂妄不避親疎

鐵落用生鐵火燒赤沸結上殼之有花紛紛墜地取升許用水二斗煮取一斗入下項藥

石膏二兩 龍齒兩 白茯苓

防風各兩 黑參 秦艽各一兩

為粗末入鐵落汁中煮取五升去滓入竹瀝一升

和勻溫服二合日三服

醫通卷十四

狂

第

來蘇膏

治遠近風痲心病風狂牙關不開痰涎潮

塞

皂角二兩大挺不蛀者去皮弦子切

用酸漿水二升浸透揉汁砂鍋內以文武火蒸用

槐柳枝攪熬成似膏藥攤夾紙上陰乾如遇病人

取掌大一片用溫漿水化在盞內將小竹管盛藥

扶病人坐定微擡起頭以藥吹入左右鼻孔內良

久扶起涎出為効吸溫鹽湯一二口其涎即止忌

雞魚生硬溼麩等物

三聖散

散人

治溼痰壅塞

瓜蒂炒微黃 防風各二兩 藜蘆半兩

為散每服四五分以薑汁三盞緩火熬至一盞去

滓澄清放溫徐徐服之以吐為度不必盡劑

洗心散局方 治心經積熱痰盛口舌生瘡不大小

便

麻黃連節一兩 當歸二兩 大黃酒拌麩裏三兩

白朮生用 芍藥 荆芥各一兩

甘草炙二兩

醫通卷十四

狂

第

為散每服三四錢生薑三片薄荷七葉水煎去滓

溫服或茶清調服三錢日再服○又方無白朮芍

藥荆芥甘草多生地黃二兩黃連木香各五錢

勝金丹 治癡病狂怒叫號遠年近日皆効但失心

風癲悲愁不語元氣虛人禁用

白礞一錢 萊菔三百六十粒水浸去殼

肥梔子四十枚去殼曬乾勿見火為末 雄黃

雌黃俱水飛各一錢 急性子印白鳳仙子去皮研二錢

右為極細末和勻磁罐收藏每服七八分強人至

一錢臨服入西牛黃五七釐冰片三五釐細細研
勻入糕餅內食之。○一方加珍珠磨內琥珀狗寶
各一錢分作二十服臨服亦如上方入西牛黃五
釐冰片三釐上好白麩一兩五錢將麩勻作二分
先將一半入白糖霜一錢半拌藥為餡。一半再入
白糖錢半裹外作餅煨熟與食食後薑湯過口少
頃即上吐下瀉而愈不吐以肥皂肉一錢插水灌
吐吐後銹釘磨水頻進六七次以鎮其神永不復
發。但藥中有砒大忌燒酒又須在團餅內以搜頑

醫通卷十四

七

痰方始得力然有一服即應者有服二三服應者
胃氣厚薄不同故也

清神湯 治心肺虛熱痰迷膈上

黃連

茯苓

酸棗仁

生研

石菖蒲

柏子仁

遠志肉

各錢半

甘草分五

薑汁少許

竹瀝

半杯

水煎食遠服

肺虛加人參一錢肺熱加沙參二錢痰壅加半夏
南星各一錢橘紅枳實霜各六分

大承氣湯 小承氣

涼膈散 方劑

龍齒清魂散 顏振

小柴胡湯 方劑

當歸活血湯 蓄血

芎辛湯 頭痛

歸脾湯 保元

癩門

涼膈散 方劑

戴人三聖散 狂門

安神丸 傷勞

承氣湯 方劑

清神湯 狂門

妙功丸 癩門

十全大補湯 保元

六味丸 八味

醫通卷十四

癩

六

瀉青丸 下血

導赤散 傷勞

四七湯 二陳

靈砂丹 金液

養正丹 金液

黑錫丹 金液

導痰湯 下陳

補中益氣湯 保元

煩躁門

葶藶苦酒湯

治汗後熱不止發狂煩躁面赤咽痛

葶藶 一合

以苦酒即米一升煎葶藶至半升入生艾汁半合

再煎三五沸去滓溫服如無生艾以乾艾

附子理中湯 理中湯

四逆湯 方劑

涼膈散 方劑

虛煩門

竹葉湯 千金

治五心煩熱口乾唇燥胃中熱悶

竹葉

小麥 各三

知母

石膏 各一

茯苓

黃芩

麥門冬 各六

人參 五錢

生薑 一兩

栝蒌根

半夏

甘草 各三

右十二味以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去

醫通卷十四

煩躁 虛煩

全

滓內藥煮取三升分三服老幼分五服

八珍湯 四君子

當歸補血湯 保元

殊砂安神丸 傷勞

生脈散 方劑

六味丸 八味

溫膽湯 二陳

竹葉石膏湯 白虎

梔子豉湯 方劑

五苓散 方劑

橘皮竹茹湯 二陳

識妄門

清神湯 狂門

平補正心丹 頓振

涼膈散 方劑

承氣湯 方劑

六君子湯 四君子

養正丹 金液

循衣摸牀門

生地黄黃連湯 四物

涼膈散 方劑

承氣湯 方劑

喜笑不休門

節菴升陽散火湯 保元

黃連解毒湯 三黃

二陳湯 方劑

怒門

生鐵落飲 狂門

大柴胡湯 小柴胡

柴胡疎肝散 吐血

四七湯 二陳

醫通卷十四

識妄 循衣摸牀 喜笑不休 怒

全

四磨湯 氣門

越鞠丸 鬱門

七氣湯 方劑

沉香降氣散 氣門

悲門

甘麥大棗湯 金匱

治藏燥善悲

甘草 三錢

小麥 三合

大棗 十枚

右三味以水六升煮取三升溫服一升日三服

生脈散 方劑

二冬膏 方劑

驚門

獨活湯

治肝虛內風昏則魂散不收若驚悸狀

獨活	羌活	柴胡
細辛 半錢	茯苓	人參
五味子	半夏	沙參
棗仁 炒研 三錢	甘草 炙一分	生薑 三分
烏梅肉 一箇		

水煎食前熱服

珍珠母丸 治肝虛不能藏魂驚悸不寐

珍珠母 煅赤醋 七錢五分

沉香 另研勿見火 各五錢

人參 茯苓

棗仁 炒	栝子仁	犀角
當歸身	熟地黃	硃砂
右為細末煉白蜜丸栝子大硃砂為衣每服五七		
十九臨卧薄荷湯送下		
遠志丸 治因事有所大驚夢寐不寧神不守舍		
遠志 日草湯 去骨	石菖蒲	茯苓
茯苓 一作 龍齒	人參	龍齒 各一兩
硃砂 五錢水飛 半為衣		

煉白蜜丸栝子大硃砂為衣每服五十九丸空心沸

湯臨卧溫酒送下精髓不守者加五味子半兩陽事不舉者加山藥黃肉各一兩肉桂半兩自汗不時者倍棗仁加黃耆一兩

補膽防風湯 治膽虛風襲驚悸不眠

防風 錢

人參 錢半

細辛 五分

甘草 炙

茯苓

獨活

前胡 各八分

川芎 各八分

生薑 三分

紅棗 二枚

水煎去滓熱服○卧多驚騰遺洩者本方加羌活

桂枝膽寒者去川芎前胡加熟棗仁遠志肉桂白朮有痰加半夏白朮天麻

妙香散 治血

平補正心丹 治

龍齒清魂散 治

溫膽湯 治

異功散 治

歸脾湯 治

來復丹 治

悸門

半夏麻黃圓 治寒飲停蓄作悸脈浮緊者

半夏 七次

麻黃 等分

醫通卷十四 驚 全

醫通卷十四 驚 全

續修四庫全書 子部 醫家類

右二味為末蜜丸如小豆飲服三十丸日三服
伏神湯千金 治心虛神氣不寧煩熱驚悸

茯苓

茯苓

人參各兩

葛蒲半兩

赤小豆四兩

右五味以水一斗煮取二升半分三服

半夏茯苓湯二陳

五苓散方祖

千金定志丸藥門

六君子湯四君子

歸脾湯保元

茯苓甘草湯桂枝

二陳湯方祖

小青龍湯桂枝

醫通卷十四

三

天王補心丹生脈

六味丸八味

炙甘草湯桂枝

導痰湯二陳

溫膽湯二陳

藿香正氣散平胃

人參養營湯保元

硃砂安神丸傷勞

恐門

六味丸八味

四君子湯方祖

遠志丸驚門

六君子湯四君子

加減八味丸八味

補腦防風湯驚門

八味丸方祖

健忘門

千金茯神湯悸門

歸脾湯保元

人參養榮湯保元

遠志丸驚門

導痰湯二陳

天王補心丹生脈

六味丸八味

四君子湯方祖

辰砂妙香散渡血

代抵當丸抵當

人魔走火門

獨參湯保元

六味丸八味

滋腎丸大補

天王補心丹生脈

醫通卷十四 恐健忘入魔走火養神

九

黃耆建中湯桂枝

枳實理中湯理中

養正丹金液

保元湯方祖

靈砂丹金液

黑錫丹金液

養性門

西嶽真人靈飛散 調養性靈崇修德業者服之

雲母燒赤清漿七晝夜磨極細 茯苓八兩

鐘乳同甘草煮一伏時杵粉 柏子仁

人參白木四兩 續斷 桂心各七兩

菊花去心帶 乾地黄兩

右九味為末。天門冬乾者五觔。去心。熬膏。搜藥內。銅氣中蒸之一斛。黍米下米熟。出藥曝乾。為末。先食飲服。方寸匕。服至七十日。煉白蜜丸。服之。服此者。卽有他疾。勿服他藥。專心服此。他疾自除。孫真人曰。此仙人隨身常所服藥也。予服此方已來。將逾三紀。頃面色美而悅之。疑而未敢措手。積年詢訪。屢有名人。曾餌得力。遂常服之一。如方說。但能業之不已。功不徒棄耳。服法如食胡蒜。

彭祖糜角丸 培理身心專事。永年者服此。

醫通卷十四 養性

糜角 一對 炙黃 檳榔 一二味 別搗 取淨末二兩 秦艽 人參

通草 菟絲子 酒浸 別搗 肉蓯蓉 酒浸 去腐 甘草 各二兩 預散

右以糜角檳榔二末共煎一食時。頃藥似稠粥。卽止火。少待熱氣歇。卽投後六味。散攪令相得。仍待少時。漸稠。粘堪作丸。如梧子大。空腹酒下三十九。日加一丸。至五十九為度。日暮二服。百日內忌房室。服經一月。腹內諸疾自相驅逐。有微利勿怪。修合時勿令雞犬婦人孝服等見。服法如人忌食胡蒜羊血。

右頑口糜角走腎脈而補陰中之陽。檳榔行腹內而破陰中之滯。兼通草秦艽通血脈而逆迴身之氣。菟絲蓯蓉填補腎藏。人參以助諸味之力也。或問服食諸方。宗派各立。獨以靈飛散為之首推。願聞其旨。云何。答言。靈飛一方。上真心印。第凡夫目之。則與泰山其峻無異。是以近世慕道之士。往往留心糜角丸。專取血肉之味。培理色相之軀。曷知異類有情之屬。豈若山靈無情之品。足以蕩練性靈。孫公服之。尸解。良由雲母性善。飛揚與性靈。

醫通卷十四 養性

結成一片。爾其糜角丸方。彭君餌之。得力長享遐齡。但以血肉性滯。不能上升。終歸地肺。不能使人無疑。以意推之。此雖平時修證之力。亦由宿昔根器使然。吾因洞哲其微。彭君以塵緣羈鞅。艱於脫凡。孫公以功行易滿。速於遷化。是豈羣迷之可以窺測哉。雖然。世之積功累行。以祈天仙者。未之見也。心慕長生。而欲求地仙者。在在有之。故以糜角丸方附之。靈飛散後。各從其尚可也。

泄瀉門

四桂飲 局方 治瀉利滑脫不止

人參 一兩

茯苓

附子 炮

木香 各五錢

右為細末每服四錢入生薑五片大棗一枚煎如

稀糜入鹽一字調服

六桂飲 治滑脫不止瀉利完穀

四桂飲加訶子肉豆蔻減半

二神丸 治腎藏陽虛五更泄瀉

補骨脂 炒

肉豆蔻 生用 等分

醫通卷十四 瀉瀉

六七

為細末蒸餅九梧子大每服二錢米湯溫酒任下

四神丸 治腎虛肝氣逆滿不能消尅腹脹泄瀉

二神丸加吳茱萸木香 減半 如陰虛惡燥去

木香以五味子代之

半夏瀉心湯 方劑

生薑瀉心湯 半夏瀉心湯下

甘草瀉心湯 半夏瀉心湯下

黃連瀉心湯 半夏瀉心湯下

乾薑黃芩黃連人參湯 半夏瀉心湯下

厚朴生薑半夏甘草人參湯 方劑

黃附湯 四逆

木附湯 方劑

升陽除溼湯 散下

胃苓湯 散下

香砂六君子湯 四君子湯下

枳實理中湯 湯下

黃芩芍藥湯 枳實芍藥湯下

二陳湯 方劑

保和丸 傷食門

附子理中湯 湯下

五苓散 方劑

理中湯 方劑

漿水散 湯下

連理湯 湯下

四君子湯 方劑

治中湯 湯下

平胃散 方劑

葛花解醒湯 傷食門

理苓湯 湯下

木香調氣散 氣門

醫通卷十四 瀉瀉

六八

茯苓甘草湯 桂枝湯下

錢氏白朮散 湯下

加減八味丸 八味丸下

春澤湯 散下

備急丸 方劑

藿香正氣散 散下

木香散 湯下

逍遙散 門

越鞠丸 鬱門

枳朮丸 方劑

補中益氣湯 保元湯下

九味資生丸 湯下

八味丸 方劑

六味丸 丸下

異功散 四君子湯下

痢門

桃花湯 金匱 治下利便膿血

赤石脂 四兩 半斤 剉

乾薑 三錢

粳米 三合

右三味以水七升煮米令熟去滓溫七合內赤石

脂末一方寸七日三服若一服愈餘勿服

白頭翁湯 金匱 治熱利下重

白頭翁 黃連

秦皮 各一兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈

醫通卷十四 痢

先

更服

紫參湯 金匱 治下利肺痛

紫參 三兩 甘草 一兩

右二味以水五升先煮紫參取二升內甘草煮取

一升半分溫二服如無紫參以紫苑代之以其同入肺經溫血分也

訶黎勒散 金匱 治下利失氣為氣下泄

訶黎勒 十枚

右一味為散粥飲和頓服

養藏湯 局方 治泄痢膿血有如魚腦後重脫肛臍

腹疝痛

人參 白朮 炒焦各 肉桂

訶子肉 木香 肉豆蔻

罌粟殼 蜜炙五分

右七味水煎分二次服忌生冷魚腥溼麩油膩等

物夜起不差者加附子五分不應加一錢

溫脾湯 千金 治積久熱痢赤白

大黃 四錢 人參 甘草

炮薑 各一錢 熟附子 一錢

醫通卷十四 痢

言

右五味水煎溫服○冷痢去甘草加桂心三錢倍

人參薑附減大黃一錢

此本大黃附子湯加薑桂人參以溫中滌垢也

羊脂煎 千金 治久痢不瘳

羊脂 子大 白蠟 子大 黃連 末

酢 七合煎 蜜 七合煎 烏梅肉 二兩

亂髮 灰汁洗去垢

右七味合內銅器中湯上煎之攪可丸飲服如梧

子大三十九日三碁子大小如方寸七

詳羊脂性滑利人千金用治久痢不瘥專取滑利以通虛中留滯也其後且有羊脂阿膠蜜蠟黍米作粥方深得炎帝本經補中寓瀉之旨

附子湯 千金 治暴下積日久不止

熟附子 阿膠 各三錢 酸石榴皮 一枚

龍骨 煨過 甘草 炙 烏藥 炒各一錢

炮薑 六分 黃連 薑汁 黃芩 各七分

右九味加梗米一撮水煎分溫三服

白頭翁加甘草阿膠湯 金匱 治挾熱利下膿血及

醫通卷十四 痢

二百

產後利不止

白頭翁 黃連 炒黑 黃蘗 炒黑

秦皮 甘草 炙各 阿膠 三錢

右六味先煮上五味去滓內膠炸盡溫分三服

桃花湯 千金 治冷痢臍下攪痛

乾薑 赤石脂 煨等分

右二味蜜丸豌豆大服十九日三服加至二十九

大桃花湯 千金 治下痢久脫虛冷白帶腹痛

赤石脂 乾薑 當歸

龍骨 煨 牡蠣 煨各六錢 附子 炮四錢 芍藥 炒 白朮 人參 各三錢

甘草 炙 二錢

右十味水煎分三服○膿稠加厚朴啞加橘皮

厚朴湯 千金 治二三年熱痢不止

厚朴 乾薑 阿膠 各四錢

黃連 六錢 石榴皮 艾葉 各五錢

右六味水煎日再服

椒艾丸 千金 治久痢完穀不化肌肉消盡

醫通卷十四 痢

二百

蜀椒 三白 烏梅 煨 熟艾 一觔

乾薑 三兩 赤石脂 煨 二兩

右五味椒薑艾下篩入石脂淨水梅著水下蒸熟

去核合搗蜜和丸梧子大服十九日三服不應加

至二十九不瘥加黃連

二高散 治痢後下重

枳殼 生一兩 黃耆 二兩 防風 一兩

為散每服二錢米飲調服

蒜根丸 治毒痢下血如雞肝心煩腹痛薑注下血

黃根	升麻	犀角
地榆	當歸	黃連
枳殼	白芍 <small>等分</small>	
為細末醋煮紅麴丸如梧子空心米飲下七十九		
黃芩湯 <small>治乾嘔下利</small>	人參	乾薑 <small>各一兩</small>
桂枝 <small>三錢</small>	大棗 <small>十二枚</small>	半夏 <small>二兩</small>
右六味以水七升煮取三升溫分三服		
三物膠艾湯 <small>治產後血痢</small>		

醫通卷十四 痢 三

阿膠	艾葉	酸石榴皮 <small>各一兩</small>
右三味水煮去滓內膠令烊盡分三服		
欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行者加黃檗		
黃連各一兩防已乾薑各半兩附子一枚麴半兩		
蜜丸梧子大飲服二十九日三漸加至三四十丸		
伏龍肝湯丸 治胎前下痢產後不止及元氣大虛		
瘀積小腹結痛不勝攻擊者		
炮黑查肉 <small>一兩</small> 熬枯黑糖 <small>二兩</small>		
右二味一半為丸一半為末用伏龍肝二兩煎湯		

代水煎末二錢送前丸二錢日三夜二服一晝夜		
令盡氣虛加人參二三錢以駕馭之虛熱加炮薑		
肉桂茯苓甘草兼感風寒加葱白香豉膈氣不舒		
磨沉香汁數匙調服		
黃連犀角散 治狐惑疔門生蟲		
犀角 <small>一兩</small> 黃連 <small>五錢</small> 木香 <small>錢半</small>		
烏梅 <small>十箇</small>		
為散每服二錢水煎和滓日再服		
大承氣湯 <small>小承氣湯</small>		小承氣湯 <small>方補</small>

醫通卷十四 痢 三

梔子豉湯 <small>方補</small>	通脈四逆湯 <small>四逆</small>
附子理中湯 <small>理中</small>	黃芩芍藥湯 <small>桂枝</small>
香連丸 <small>佐金</small>	桃核承氣湯 <small>小承氣</small>
胃苓湯 <small>散下</small>	小建中湯 <small>桂枝</small>
理中湯 <small>方補</small>	大黃黃連瀉心湯 <small>三黃</small>
枳朮丸 <small>方補</small>	胃風湯 <small>四君子</small>
神朮湯 <small>澤門</small>	補中益氣湯 <small>保元</small>
升陽除溼湯 <small>散下</small>	二陳湯 <small>方補</small>
枳實理中湯 <small>理中</small>	倉廩湯 <small>小柴胡</small>

駐中丸 方祖

歸連丸 九下

千金黃連湯 九下

錢氏白朮散 四君子

黃耆建中湯 桂枝

六君子湯 四君子

戊己丸 佐金

獨參湯 保元

參附湯 木附

阿膠丸 九下

阿膠梅連丸 九下

黃連阿膠湯 傷寒

五苓散 方祖

烏梅丸 理中

連理湯 理中

四物湯 方祖

四逆湯 方祖

吳茱萸湯 嘔吐

醫通卷十四 痢

一頁

薑黃芩黃連人參湯 湯心

甘草瀉心湯 牛夏瀉

黃連解毒湯 三黃

橘皮乾薑湯 二陳

緒苓湯 五苓

加減八味丸 八味

大小便不通

二陳湯 方祖

小承氣湯 方祖

甘草瀉心湯 牛夏瀉

大防風湯 八珍

小柴胡湯 方祖

八味丸 方祖

保元湯 方祖

涼膈散 方祖

三白散 水腫

導痰湯 二陳

控涎丹 十棗

五苓散 方祖

十全大補湯 保元

大便不通

麻仁丸 燥門

潤腸丸 燥門

四磨湯 氣門

半硫丸 全液

滾痰丸 痰飲

理中湯 方祖

生料濟生腎氣丸 八味

補中益氣湯 保元

降氣散 氣門

六磨湯 氣門

四順清涼飲 燥門

醫通卷十四 大小便不通 大便不通

一頁

通幽湯 燥門

蜜煎導 燥門

小便不通

黃芩清肺飲 梔子豉

導赤散 暑門

益元散 方祖

生脈散 方祖

六磨湯 氣門

金匱腎氣丸 八味

固本丸 二冬

滋腎丸 大補

五苓散 方祖

二陳湯 方祖

四磨湯 氣門

代抵當丸 抵當

補中益氣湯 保元

獨參湯保心湯下

六味丸八味丸下

淋門

栝蒌瞿麥丸全置

治小便不利有水氣口渴腹中冷

栝蒌根二兩

茯苓

薯蕷各三兩

瞿麥一兩

附子一枚

右五味為末煉白蜜丸梧子大飲服三十九日

服不知增以小便利腹中溫為知

加味葵子茯苓散 治石淋水道澇痛

醫通卷十四 小便不通 淋

五

葵子三兩

茯苓

滑石各一兩

芒硝半兩

甘草半兩

肉桂各二錢

右杵為散飲服方寸匙日三服小便利則愈

此金匱葵子茯苓散加後四味也

生附子散 治冷淋小便澇澇數起不通竅中疼痛

憎寒凜凜或飲水過多所致

附子去皮臍

滑石各半兩

瞿麥

半夏湯洗七次

木通各半錢

為散每服三錢薑七片燈心二十莖水煎入鹽半

匙空心冷服

參苓琥珀散 治小便淋澇莖中痛引脇下

人參

延胡索各五錢

丹皮一作柴胡

茯苓各四錢

川棟子去核

琥珀各二錢

澤瀉

當歸梢

甘草梢生各三錢

為散每服四錢長流水煎去滓熱服日進二服

蒲灰散益元散下

滑石白魚散益元散下

茯苓戎鹽湯五苓散下

白虎加人參湯白虎湯下

栝蒌湯五苓散下

紫雪火門

醫通卷十四 淋

頁

補中益氣湯保元湯下

六味丸八味丸下

犀角地黄湯傷寒門

沉香降氣散氣門

四磨湯氣門

聚精丸虛損門

金匱腎氣丸八味丸下

八味丸方祖

導赤散暑門

滋腎丸大補丸下

辰砂益元散益元散下

生料鹿茸丸虛損門

腎瀝湯痺門

茯苓丸痺門

巴戟丸痺門

五苓散方祖

清心蓮子飲生脈散下

生脈散方祖

歸脾湯 保元湯下 辰砂 炒香散門

黃芩清肺飲 梔子豉湯下 都炆 九八味下

小便不禁門

固脬丸 治虛寒小便不禁

兔絲子 酒浸一宿煑燥絲作餅焙乾 茴香 去子

附子 炮 桑螵蛸 破明 戊鹽 各半

為末乾山藥末糊丸梧子大空心酒十五九

加減桑螵蛸散 治陽氣虛弱小便頻數或遺溺

桑螵蛸 三十枚鹿茸一對黃耆三兩蜜酥炙

醫通卷十四 小便不禁

麥門冬 去心二兩半 五味子 半兩 補骨脂 鹽酒炒

人參 厚杜仲 鹽酒炒

為散每服三錢空心羊腎煎湯調服并用紅酒細

嚼羊腎或羊腎湯泛為丸空心酒下三錢

縮泉丸 治脬氣不足小便頻數甚於夜

益智仁 鹽拌炒 烏藥 等分

為末酒煮乾山藥糊丸梧子大每服五七十九空

心淡鹽湯送下

草解分清飲 治白濁凝如膏糊小便頻數

益智仁 鹽水拌炒 烏藥

川草薢 等分大塊色白兼黃者真之氣腥而絲脆者真

為散每服四錢入鹽一捻水煎熱服

精通尾脊澀出膀胱涇滑攸分游流各異詳漫便

之不禁乃下焦陽氣艾臟故用益智之辛溫以約

制之得鹽之潤下并烏藥亦不致於上竄也濁是

胃中濁溼下滲非草薢無以清之兼菖蒲以通九

竅利小便畧不及於收攝腎精之味厥有古哉

六味丸 八味 八味丸 方祖

醫通卷十四 小便不禁

生料鹿茸丸 虛損 生料五苓散 方祖

加減八味丸 八味 補中益氣湯 保元

五苓散 方祖 黃芩加肺飲 梔子豉

滋腎丸 大補 龍膽瀉肝湯 臨下

白虎加人參湯 白虎 茯苓甘草湯 木下

腎瀝湯 痺門 地黃飲子 中風

生脈散 方祖 導赤散 生脈

小便黃赤門

四君子湯 方祖 五苓散 方祖

生脈散 方劑

保元湯 方劑

消暑丸 二陳湯下

清燥湯 保元湯下

補中益氣湯 保元湯下

六味丸 八味丸下

龍薈丸 三黃湯下

竹葉石膏湯 白虎湯下

滋腎丸 大補丸下

遺精門

豬苓丸 治肥人溼熱傷氣遺精便濁淋痛

半夏 破如豆大取淨一兩 豬苓 炒黑皮切片以米糊蒸曬乾為末淨二兩

先以豬苓末一兩同半夏炒勿令焦放地上出火

醫通卷十四 小便赤 遺精

三

氣取半夏為末打糊同炒過豬苓為丸梧子大候乾更以豬苓末一兩同炒微裂裝罐收貯空心淡鹽湯下三四十九末申開溫酒再下一服

此方以半夏利痰豬苓導水通因通用之法也

威喜丸 局方 治洩瀉如泄瀉痛夢泄便濁屬火鬱者

蜂蠟 白茯苓 各四兩

右以茯苓為小塊如散子大用豬苓二兩煮汁一升去滓煮入茯苓內汁盡曬乾為末溶蠟為丸如

彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥下以小便清

為度忌米醋尤忌怒氣勞力

還少丹 治老人心脾腎三經精血不足精髓不固

厚朴 仲炒 鹽水 川牛膝 酒浸 巴戟天肉

山茱萸肉 肉蓯蓉 酒浸去腐 白茯苓 各二兩

遠志肉 甘草製 五味子 諸實子 各二兩

乾山藥 枸杞子 熟地黃 各四兩

石菖蒲 茴香 各一兩

煉白蜜同紅棗肉為丸梧子大每服五七十九清

醫通卷十四 遺精

三

晨鹽湯卧時溫酒送下。精滑去牛膝加續斷二兩即打老兒丸

金鎖玉關丸 治心腎不交遺精白濁

芡實 蓮肉 去心 藕節粉

白茯苓 乾山藥 等分 石菖蒲

五味子 減半

為末金櫻子熬膏代蜜搗二千下丸如梧子大每

服五十九饑時醇酒米湯任下

九龍丹 治斷喪太過取精夫道滑泄不禁

枸杞子 金櫻子 蓮鬚
 蓮肉 去心 刺核 去皮
 芡實 山茱萸肉
 當歸身 熟地黃 白茯苓 各三
 為末酒糊丸梧子人每服百丸或酒或鹽湯下
 經進萃仙丸 康熙癸酉太常伯王人宦進
 沙苑蒺藜 八兩海淨隔紙微焙取細末四兩
 山茱萸 取淨四兩核
 白蓮菜 四兩無蓮鬚代之
 菟絲子 酒浸蒸爛
 川續斷 去蘆酒
 二兩

覆盆子 九去蒂酒浸九蒸
 右八味共為細末以所留蒺藜粗末同金櫻子熬
 膏入前細末拌勻再加煉白蜜為丸如梧子大每
 服八十九丸漸加至百丸空腹淡鹽湯送下
 補中益氣湯 保元
 四七湯 二陳
 遠志丸 驚門
 六味丸 八味
 溫膽湯 二陳下
 金櫻子 去淨毛
 子二兩
 山茱萸 肉
 白茯苓 各三
 熟地黃
 當歸身
 蓮鬚
 蓮肉 去皮
 刺核
 芡實
 山茱萸肉
 熟地黃
 白茯苓 各三
 為末酒糊丸梧子人每服百丸或酒或鹽湯下
 經進萃仙丸 康熙癸酉太常伯王人宦進
 沙苑蒺藜 八兩海淨隔紙微焙取細末四兩
 山茱萸 取淨四兩核
 白蓮菜 四兩無蓮鬚代之
 菟絲子 酒浸蒸爛
 川續斷 去蘆酒
 二兩

精泉丸 小便不
 聚精丸 虛損
 二陳湯 方祖
 小建中湯 桂枝
 歸脾湯 保元
 赤濁白濁門
 二陳湯 方祖
 五苓散 方祖
 清心蓮子飲 生脈
 加減八味丸 八味
 九下
 淡痰丸 痰飲
 桂枝龍骨牡蠣湯 桂枝
 安腎丸 虛損
 清心蓮子飲 生脈
 九龍丹 遺精
 緒苓湯 五苓
 妙香散 痰血
 生脈散 方祖
 龍膽瀉肝湯 腸痛
 六味丸 八味
 九下
 逍遙散 虛損
 桂枝加龍骨牡蠣湯 桂枝
 湯下
 當歸內補建中湯 桂枝
 湯下
 前陰諸疾門
 柴胡勝濕湯 治外腎冷陰汗莖痿陰囊溼癢腫氣
 柴胡 羌活 茯苓
 澤瀉 升麻 甘草 生各
 黃檗 酒炒 草龍膽 當歸梢

生脈散 方祖
 補中益氣湯 保元
 四苓散 五苓
 散下
 桂枝加龍骨牡蠣湯 桂枝
 湯下
 當歸內補建中湯 桂枝
 湯下
 前陰諸疾門
 柴胡勝濕湯 治外腎冷陰汗莖痿陰囊溼癢腫氣
 柴胡 羌活 茯苓
 澤瀉 升麻 甘草 生各
 黃檗 酒炒 草龍膽 當歸梢

味黃根

漢防已酒洗各八分 五味子粒碎

水煎食前稍熱服忌酒醋溼麪

四逆湯方祖

黃耆建中湯桂枝湯下

枳實理中湯湯下

小柴胡湯方祖

龍膽瀉肝湯湯下

八味丸方祖

滋腎丸八補丸下

六味丸八味丸下

二陳湯方祖

桂枝湯方祖

防已茯苓湯防已黃芩湯下

舒筋三聖散中風門

柴胡清肝散小柴胡湯下

醫通卷十四 前陰諸疾

五

疝門

大烏頭煎金匱

治寒疝透臍痛白汗出手足逆冷

脈沉緊者

川烏頭大者二枚炮去皮臍破八片

右以水三升煮取一升去滓內蜜一升煎令水氣

盡取一升強人服五合弱者三合不差明日再服

當歸生薑羊肉湯金匱

治腹中寒疝虛勞不足并

治產後腹中疝痛

當歸一兩

生薑兩生

羊肉生者

先煮羊肉去滓及沫取清者煮上三味溫分三服

若寒多者倍生薑痛多而嘔者加橘皮白朮血積

不止千金去生薑換乾薑加生地黃產後虛羸喘

乏白汗腹中絞痛千金加桂心芍藥芍藥乾地黃

甘草產後虛乏本方去生薑加黃耆桂心乾地黃

芍藥麥門冬茯苓甘草大棗

抵當烏頭桂枝湯金匱 千金 烏頭湯 治寒疝腹痛逆冷

手足不仁身體疼痛

烏頭大者一枚炮去皮臍破八片

醫通卷十四 疝

五

右一味以蜜一觔煎減半以桂枝湯五合解之合

得一升餘初服三合不差即服三合又不知服至

五合其知者如醉狀得吐者為中病桂枝湯即桂

枝芍藥甘草薑棗木方

烏頭梔子湯金匱 治疝瘕少腹緩急痛處按之即

減

川烏頭童便浸炮去皮臍破八片

右二味水煎空心放冷服不差再服

酒煮當歸丸一名丁香棟實丸

治寒束熱邪疝瘕諸痛及

婦人帶下疲聚

當歸

附子炮

茴香各兩

川棟子

酒煮去皮核淨五錢

右四味以酒三升煮酒盡焙乾入後四味

丁香

木香各三錢

延胡索醋炒兩

全蠟

十四枚滾醋泡去蠟

共為細末酒糊丸梧子大每服五七十九至百丸

食煎溫酒送下雲岐家秘多肉桂五錢

天台烏藥散 治疝瘕小腹引控掣而痛

醫通卷十四 疝

夏

烏藥

木香

茴香鹽水炒

青皮

醋炒

良薑各五錢

檳榔赤去二枚

川棟子

大者二十枚酒浸煮去皮核取淨肉同巴豆二十粒炒去巴豆

為散每服二錢溫酒調服痛甚者薑汁酒送下

蜘蛛散

治陰狐疝氣偏有大小時時上下者

大蜘蛛

十四枚去頭足肉桂半兩同蜘蛛研

為散每服一錢日再服溫酒送下蜜丸亦可

寶鑑當歸四逆湯 治厥疝腸下久寒結痛

當歸錢半

附子炮

肉桂

茴香炒

延胡索

柴胡各錢

芍藥

茯苓各八分

澤瀉

川棟肉各六分

水煎空心稍涼服

香橘散 治睪丸偏墜

茴香鹽水炒五錢

藁香鹽水炒

橘核去殼研壓去油

山查肉炒各兩

為散每服三四錢空心溫酒調服○睪丸腫大痛其左右核換者加木香沉香各三錢川棟肉青鹽

醫通卷十四 疝

夏

各二錢荔枝核十枚燒灰

木香棟子散 治偏墜久藥不効屬溼熱者

川棟子三十枚同巴豆三十粒炒去巴豆製法如天台烏藥散

川草薢五錢 石菖蒲一兩鹽水炒 青木香一兩

荔枝核二十枚燒存性 茴香炒取淨末六錢

為散每服二錢半入麝香少許空心鹽酒送下

喝起丸 治疝腎虛腰痛

杜仲鹽水炒

葫蘆巴同芝麻炒

補骨脂炒

藁香鹽水炒

川草薢各兩

右為細末入連皮胡桃肉三十枚青鹽半兩同研如泥入煉白蜜九如彈子大空腹細嚼二九溫酒送下卧時再服二九

此本青娥丸入懷香葫蘆巴草解三味故端主腎虛腰痛小腹疝瘕

加味通心散 治小腸疝痛水道不通

瞿麥穗 一兩 木通 梔子仁 酒炒

黃芩 連翹 甘草梢

川棟肉 車前 各五錢 肉桂 三錢

醫通卷十四 疝

百九

為散每服五錢加燈心二十葦竹葉十片水煎服

立効散 治疝因食積作痛

山查肉 醋浸炒 川棟肉 酒浸 藜香 鹽水炒

枳實 炒 蒼朮 酒浸去粗皮炒 香附 醋炒

山梔 薑汁炒 青皮 醋炒 各 吳茱萸 去閉口者三錢

為散每服五錢加生薑三片水煎

九味蟠葱散 治疝因風寒溼氣等九腫痛

延胡索 一兩 肉桂 五錢 乾薑 炮二錢

丁香 一錢 茯苓 六錢 甘草 炙

蒼朮 酒浸 檳榔 羌活 各三錢

為散每服五錢入連鬚葱白二葦水煎食前熱服取微汗効不愈再服腹脹便秘有食積梗痛去羌活加三稜蓬朮縮砂仁

禹功散 水腫

五苓散 方祖 桂苓丸 五苓散

八味丸 方祖 龍膽瀉肝湯 方祖

代抵當丸 抵當湯 桂枝湯 方祖

交腸門

醫通卷十四 交腸

百九

五苓散 方祖 芎歸湯 四物湯

香連丸 佐金 四七湯 二陳湯

滾痰丸 痰飲 腸鳴門

升陽除溼湯 方祖 二陳湯 方祖

枳實理中湯 方祖 六君子湯 四君子湯

半夏瀉心湯 方祖 平胃散 方祖

葶藶木香散 五苓散 附子梗米湯 腹疝

胃苓湯 散下 葶藶丸 水腫

腸癰門

薏苡附子敗醬散 治腸癰初起

薏苡仁 一兩 附子 二錢 敗醬 五錢 鹿腸 微人

以之曝乾作 羹名苦燕菜

為散取方寸匕水煎頓服小便當利

薏苡敗醬湯 千金 治腸癰未潰

薏苡仁 桔梗 麥門冬 各一

敗醬 牡丹皮 茯苓

甘草 生薑 各六 丹參

醫通卷十四 腸癰 腸癰 豆

芍藥 各一兩 生地黄 兩半

右十一味水煮分三服日三

薏苡瓜瓣湯 千金 治腸癰

薏苡仁 三合 牡丹皮 桃仁 各一

瓜瓣 六合

右四味水煮分再服○崔氏有芒硝六錢云腹中 疔痛不安或脹滿不下飲食小便清此病多是腸 癰人都不識婦人產後虛熱多是此病縱非癰疔 便服此方無傷損也

赤小豆當歸散 諸血門 大黃牡丹湯 赤氣

桃核承氣湯 小承氣 千金托裏散 保元湯下

太乙膏 門脈

脫肛門 升麻湯 方祖

補中益氣湯 保元湯下 十全大補湯 保元湯下

人參胃風湯 四君子湯下 黃連犀角散 州門

人參固本丸 膏下

痔漏門

喚痔散 治內痔不出

醫通卷十四 脫肛 痔漏 豆

草烏頭 生用 刺蝟皮 燒存性 枯礬 五錢

食鹽 炒三錢 麝香 五分 冰片 三分

為散先用溫湯洗淨隨用津唾調藥三錢填入肛

門片時即出去藥上護痔膏

護痔膏

白芨 石膏 黃連 各三

冰片 麝香 各二

為細末雞子清入白蜜少許調成膏護四邊好肉 方上枯痔散如痔旁肌肉堅者不必用此

枯痔散 凡痔瘡突出即以此藥

白礬 二兩

蟾酥 二錢

輕粉 四錢

砒霜 一兩

天靈蓋

青鹽 水浸淨 水內碎七次四錢

共研極細末入小新鐵鍋內上用磁碗密蓋鹽泥封固炭火煨至二炷香待冷取藥研極細末鉛罐收貯每日上午葱湯洗淨用津唾調捻如錢厚貼痔上令著以薄綿紙接掩上捲束其藥不使侵好肉上若內痔至晚再換一次至六七日其痔枯黑堅硬住藥待其裂縫自落換落痔湯洗之

醫通卷十四 痔漏

三頁

落痔湯

一名起痔湯

黃連

黃蘗

黃芩

大黃

防風

荆芥

梔子

槐角

苦參

甘草

各一兩

朴硝

五錢

右作三服用水煎洗待痔落之後搽生肌散如痔傍肉不赤腫枯黑即落不必用此

生肌散

乳香

沒藥

海蝶蛸

水煎 五錢

黃丹

炒飛 四錢

赤石脂

煨淨 七錢

龍骨

煨淨 四錢

血竭

三錢

熊膽

四錢

輕粉

五錢

冰片

一錢

麝香

八分

珍珠

二錢

為極細末鉛罐收貯早晚搽二次膏掩漸斂而平洗痔消腫痛方

葶菜

一名魚腥草

苦楝根

朴硝

馬齒莧

各一兩

瓦礫花

各一兩

用水十碗煎至七八碗先薰後洗諸痔腫痛可消故附錄之

醫通卷十四 痔漏

三頁

胡連追毒丸

治痔漏不拘遠年近日有漏通腸汚

從孔出先用此丸追盡膿毒

胡黃連

一兩切

刺蝟皮

一兩切

再炒脆

麝香

三分

為末陳米爛飯為丸麻子大每服一錢食前溫酒下服後如膿水及多是藥力到也勿懼之候膿水將盡服黃連閉管丸

黃連閉管丸

胡黃連

淨末 五錢

穿山甲

麻油內 煮黃色

石決明

煨

槐花 微炒各

為末煉白蜜丸麻子大每服一錢晨昏各一服米

飲下至重者四十日愈如漏之四邊有硬肉突起

者蠶繭二十枚炒末和入藥中治遍身諸漏皆効

灸線方 治瘦瘤及痔根細者

芫花 半兩勿犯鐵 壁錢 二錢

用細白扣線三錢同上二味用水一碗盛貯小磁

罐內緞火煮至湯乾為度取線陰乾凡遇前患用

線一條大者用二條雙扣繫於根蒂兩頭留線日

醫通卷十四 痔漏

一頁

漸紫之其患自然紫黑冰冷不熱為度輕者七日
重者十五日後必枯落後用珍珠輕粉韶粉冰片
為散收口至妙○一方用芫花根洗淨擣汁入壁
錢浸線用之

六味丸 八味丸下

補中益氣湯 保元湯下

張氏醫通卷十四終

張氏醫通卷十五

長洲石頑張

路路

以柔安世

男

訥遜言

恭訂

目門

磁硃丸 千金 治神水寬大漸散光采不收及內障

撥後醫不能消用此鎮之

磁石 能吸鐵 考良 硃砂

先以磁石置巨火中煨七次每煨必淬以醋研細

醫通卷十五 目門

一

水飛澄定晒乾取淨二兩硃砂亦研細水飛晒乾
取淨一兩用生神麴末三兩與前二味和勻更以
神麴一兩水和作餅煮浮搜入前藥為丸如菜豆
大每服三四十九空心米飲送下

按千金磁硃丸方本指南之製而立昔黃帝征蚩
尤尤善布毒霧障蔽宇宙莫能破之因是玄女授
帝指南以定方隅而滅之於涿鹿指南之象是此
而傳於世法用神砂雄黃并鍼入生肌膠骨空中
煨鍊而成煨過必置磁石之上蓋硃藥南方離火

之氣而中懷嬰蛇磁稟北方坎水之精而外發氤
氲真匡正辟惡之靈物也用雁膠者以其生於漠
北而性必虛用得陰陽二氣之交所以入水不濡
戾天能飛用以佐磁珠而製鐵則最重之質置水
能浮隨磁吸引以為指南之準則近世以雁膠敷
得用白雄雞血珠砂雄黃拌鐵入活鯉魚首奴過
同磁石收貯取其華上午下子者用之與雁膠之
義不殊凡羽禽之目皆自下睫而交上睫性皆上
舉所以能飛非若毛獸之目悉自上睫而交下睫

醫通卷十五

也吾嘗靜觀飛走升沉之理於茲可默識矣
爰悟其旨取磁珠之重以鎮神水之不清而收陰
靈之障蔽用生麴者藉以發越丹石之性猶雁膠
鼓躍二氣之義也噫崇古立方之聖莫如長沙長
沙之後唐進士一人而已
皂莢丸 治外內一切障膜醫嗽不宜鍼撥者此丸
與生熟地黃丸並進
蟬蛻 元精石
穿山甲 地 當歸 白朮 生

茯苓 穀精草 木賊
白菊花 刺蝟皮 蛤粉 龍膽草
赤芍 連翹 各兩 黃猪爪 蛤粉 炒
人參 一兩 川芎 半兩
共為細末一半入牙皂十二挺燒存性和勻煉白
蜜丸梧子大每服一錢五分空心食前杏仁湯送
下一半入仙靈脾 半兩 每服三錢用猪肝三
片批開夾藥煮熟臨卧細嚼用原汁送下
生熟地黃丸 治肝虛目暗膜入冰輪內外諸障

醫通卷十五 目

生地黃 八兩 熟地黃 兩 石斛 煎水
牛膝 酒蒸各 四兩 菊花 去蒂 羌活
防風 杏仁 湯泡去 枳殼 各二兩
蜜丸梧子大每服五七十九以黑豆三升炒令烟
盡淬好酒六升每用半盞食前送下鹽湯亦可或
用生雞肝持爛為丸尤妙
此即明目地黃丸加菊花羌活其間防風杏仁枳
殼與地黃牛膝同用者以其久風襲人寒水之經
也若精血虧人則當去此三味易白朮當歸枸

杞未為不可也

夏枯草散 治肝虛目珠痛至夜疼劇

夏枯草花 一兩 香附 二兩 甘草 錢二

為散每服四錢茶清調日三服或加芽茶煎服

久血傷加當歸六錢白芍四錢生地黃一兩黃耆

二兩每服五錢入芽茶一撮水煎去滓服

洗肝散 治風毒上攻暴赤腫痛

薄荷 當歸 羌活

防風 山梔 甘草 各

醫通卷十五 日

大黃 酒蒸 二兩 川芎 八錢

為散每服三錢沸湯調日二三服

酒煎散 治暴露赤眼生翳

漢防己 酒洗 防風 甘草 炙

荆芥穗 當歸 赤芍藥

牛蒡子 甘菊 去蒂 等分

為散每服五六錢酒煎食後溫服

大黃當歸散 治眼癢腫痛血凝滯不散攻脈見翳

大黃 酒蒸 黃芩 酒炒 各 一兩 紅花 錢

蘇水屑 當歸 梔子 酒炒

木賊 各五錢

為散每服四五錢水煎食後服

瀉肺湯 治暴風客熱外障白睛腫脹

羌活 黑參 黃芩 各一錢

地骨皮 桑白皮 大黃 酒蒸

苳苳 各一錢 甘草 炙 八分

水煎去滓半饑溫服 世本無桑皮多枯梗

蜜蒙花散 局方 治皆淚昏暗

醫通卷十五 日

蜜蒙花 塞鼻即 嚏者真 甘菊花 去蒂 白蒺藜 炒去

白芍藥 局方 羌活 石決明 煨

木賊 去節 甘草 炙 各半兩 局方 無

為散每服二三錢茶清調服 羌活 準繩 無

還睛圓 局方 治男子女人風毒上攻眼目赤腫怕

日羞明多饒淚隱澁難開 眦痒赤痛臉紫紅爛

瘀肉侵睛或患暴赤眼睛疼不可忍者併服立効

白朮 兔絲子 酒浸 白蒺藜 炒去

木賊 去節 羌活 去苗 青箱子 去土

蜜蒙花

防風

甘草

右為末。煉蜜圓如彈子。人每服一圓。細嚼白湯下。日三服。又治偏正頭風。頭目眩運。

石膏散 治頭風患服

生石膏

蔡本

白朮

甘草

白茯苓

為散每服四五錢。熱茶清調。空腹臨卧各一服。通肝散 治轉轉關驗。便睛疼。風熱昏障。

梔子

炒黑

白茯苓

炒去刺。各一兩。瓦活。

醫通卷十五 目

六

荆芥穗

當歸

牛蒡子

炒研

甘草 各一兩二錢

為散每服三錢。食後竹葉湯調服。

世本無。差活當歸。多根。殺車前。

絳雪膏

治昏暗。疼痛。隱澁。難開。眵淚。生醫。

爐柑石

四兩。銀罐內。固濟。煨過。水飛。預將。黃連。

內以汁盡

為度。酒地。上。宿。去。火。氣。及。時。待。用。

明乳香

烏賊骨

白丁香

各一錢半

麝香

輕粉

各五分

錢半

煉白蜜四兩。先下。製淨。爐柑石。末。一兩。不住手。隨。

次下。後七味。攪至。紫金。色。不。粘。手。為。度。趁。作。挺。子。

每用。少許。新水。磨。化。時。時。點。之。忌。酒。醋。蒜。麥。

又方

用爐柑石。一兩。煨。赤。以。羊。膽。汁。青。魚。膽。汁。等。齊。

汁。梨。汁。人。乳。白。蜜。等。分。相。和。淬。之。再。煨。再。淬。汁。

盡。為。度。入。冰。片。麝。香。青。鹽。硼。砂。各。二。分。研。勻。

每用。少許。井。花。水。調。點。兩。皆。

石燕丹 點外障諸醫

醫通卷十五 目

七

爐柑石

四兩。用。黃。連。一。兩。歸。身。木。賊。羌。活。麻。黃。

製法如絳雪

硼砂

石燕

琥珀

硃砂

鷹屎白

香代

冰片

麝香

各一分

極細末。每用。少許。點。大。皆。如。枯。澁。無。淚。加。熊。

一分。白。蜜。少。許。血。醫。加。真。阿。魏。黃。醫。加。雞。內。金。

犀。熱。醫。加。麝。仁。熱。醫。加。珍。珠。牛。黃。冷。醫。加。附。子。尖。

雄。黃。老。醫。倍。硼。砂。加。豬。膽。子。

助陽和血湯 治氣血不和痛如鍼刺

黃耆	生三錢	當歸	甘草	炙
防風	各一錢	白芷	蔓荊子	
升麻	各六分	柴胡	八分	
水煎食後服。趙以德好酒芍藥七分。				
白蒺藜散	治肝腎虛熱生風赤滿多淚。	白蒺藜	炒去刺	菊花
草決明	甘草	炙	蔓荊子	連翹
青柏子	減半			等分
為散每服三四錢水煎去滓熱服。				

醫通卷十五 目

八

羌活勝溼湯	治目疾一切風熱表證	羌活	錢半	白朮	一錢	川芎	
		桔梗		枳殼		荊芥	
		柴胡		前胡		黃芩	各八分
		白芷	六分	防風	五分	細辛	一分
		薄荷	三分	甘草	炙四分		
水煎食後熱服。世本無細辛有獨活。							
瀉肝散	治肝熱目赤腫痛一切裏證	梔子仁		荆芥		大黃	

甘草	等分	為散每服四五錢水煎熱服。
此治肝熱不用赤芍芍藥當歸反用梔子清肝則血熱疼腫何能便退詳此四味治白睛赤痛則可治風輪赤痛則不可。		
春雪膏	治風熱生翳	
麩仁	去皮研細紙包壓去油	
右取淨麩仁五錢入龍膽五分煉白蜜一錢五分再研勻磁罐收貯每用少許箸頭點大眥。		

醫通卷十五 目

九

麩仁膏	治風熱眼生赤脈癢痛無定	麩仁	去皮研細
		右取淨麩仁霜五錢濃煎秦皮汁調和隔紙瓦上焙熟有焦者去之塗淨碗內以艾一錢分作三團每團中置蜀椒一粒燒烟起時將碗覆烟上三角墊起薰之烟盡晒乾再研入硃砂麝香各半錢磁瓶收貯每用麻子大點大眥日二度如點老眥加硃砂少許。一方但用麩仁研壓去油淨五錢麝香硃砂水飛各五分每用少許點大眥効。	

碧雲散 治外障攀睛收淚稠粘

驚不食草一兩 鴨之一兩 青黛

川芎各半

為散先驗水滿口每用茶豆許搐鼻內以嚏淚為
効搐無時一方加北細辛牙皂末各一錢

宣明丸 治瘀血灌睛赤腫滿痛

赤芍 當歸 大黃酒蒸

黃芩各二兩 生地黄三兩 黃連

川芎 薄荷各一兩

醫通卷十五 目

十

蜜丸梧子大每服五十九食後米飲服

羌活除腎湯 治太陽腎膜遮睛

麻黃根 薄荷各五分 生地黄酒浸

當歸 川芎 黃蘗酒炒

知母 荆芥各六分 藜蘆七分

防風八分 羌活錢半 川椒炒去

細辛各三分

水煎食前稍熱服忌酒醋淫麪炙燥

龍膽飲 治肝經淫熱目赤腫痛

黃芩 犀角 木通

車前 黃連 黑參各一錢

梔子炒黑 大黃 茯石各錢

龍膽草 淡竹葉各八分 黃蘗酒炒

水煎食後分二次熱服

清涼膏 治打撲傷眼腫脹

大黃 茯石 黃連酒炒

黃蘗 赤芍 當歸各一錢

細辛五分 薄荷八分 芙蓉葉三錢

醫通卷十五 目

十一

為細末用生地黄一兩酒浸搗絞汁入雞子清一

枚白蜜半兩同調貼太陽及眼胞上

四生散 治腎風上攻耳中鳴癢目癢昏花

白附子 黃耆 獨活

白蒺藜等分

為散每服二錢用豬腎批開入藥溼紙裏煨熟稍

入鹽花細嚼溫酒送下

萬應蟬花散局方名蟬花無比散 治奇經客邪目病

蟬蛻半兩 蛇蛻二錢 川芎

防風

羌活

甘草

當歸

茯苓

赤芍

石決明時研一伏蒼朮切蘇油拌炒各兩半

為散每服二三錢食後臨卧茶清送下秘旨無蒼

木多白蒺藜

保命羚羊角散 治陷腎久不得去用此煅發

羚羊角兩

升麻兩半

細辛一兩

甘草五錢

一半蜜丸一半為散以泔水煎吞九子五七十丸

薄荷

蜀椒

黃連

蟬蛻各五錢

蛇蛻酥炙

甘草各三錢

蜜丸每兩分作八九丸食後卧時細嚼一九茶清送

下

熊膽膏 治一切老腎

爐甘石煨過水飛丸如彈子大每淨一兩分作

汁盡為度每料

琥珀五分

瑪瑙三分

珊瑚水飛淨

珍珠煨飛淨

硃砂水飛淨

冰片二分

麝香二分

食後熱服取散為前導丸為後合也

阿魏搗鼻法 去星翳

阿魏三錢

雞內金一錢

冰片三分

和燃箸頭上令中空通氣外裹烏金紙去箸每

夜塞鼻中星翳自退

撥雲退翳丸 治陽躄受邪內背赤脈攀睛

蔓荆子

木賊去節

蜜蒙花

川芎

白蒺藜炒去

當歸各兩

菊花

荆芥穗各兩

楮實子

照水丹 治攀睛腎障

烏賊骨一錢

辰砂半錢

為散點之白翳加冰片少許赤翳加五靈脂少許

蠟附散 搗鼻退冷翳

鷺不食草一兩

青黛細辛

生附子尖

薑黃

薄荷

全蠍各五錢

為散口含冷水搗少許

神消散 治黃膜上衝

黃芩

蟬蛻

甘草

木賊

蒼朮

穀精草

蛇蛻

為散每服二錢臨卧時新汲水調服

爐甘石散 治爛瘡眼

爐甘石 以童便洗淨... 煎濃汁... 宿出火氣... 人炭擊一孔... 連牙茶用... 汁盡為度

醫通卷十五 目

古

防風瀉肝散 治蟹眼睛疼 鍼去惡水用之

防風

羌活

桔梗

羚羊角

赤芍

黑參

黃芩

細辛

甘草

為散每服二三錢沸湯調服

羚羊角散

治內外腎障但痠疼滿痛不熱不腫者

羚羊角

白菊花

川烏頭

川芎

車前

枳殼

羌活

半夏

薄荷

細辛

為散每服二錢生薑湯調薄荷湯送下

陷腎加升麻五錢肉桂二錢

補腎丸 治腎虛眼目無光

巴戟肉

山藥

補骨脂

牡丹皮

茴香

肉蓯蓉

枸杞子

青鹽

蜜丸梧子大每服五七十九空心鹽湯溫酒任下

醫通卷十五 目

古

羚羊角湯 治肝熱生風內障

羚羊角

人參

黑參

地骨皮

羌活

車前

水煎食煎熱服

羚羊角飲子 治風輪熱腎及黑泡如珠

羚羊角

五味子

細辛

防風

大黃

知母

枳殼

水煎食前溫服

龍木羚羊角飲子羚羊角散羚羊補肝散等方並
以羚羊為主丹溪云羚羊力能舒筋入厥陰經其
捷惟腎在風輪者用之為宜若不在風輪漫投寧
不引邪入犯耶

黃連羊肝丸 局方

治目多赤脈

黃連

白朮羊肝生用

先以黃連為細末用竹刀將羊肝刮下如糊除去
筋膜入盆中研細入黃連末搗和為丸如棗豆大
每服三四十九茶清送下睛痛者當歸湯下忌豬

醫通卷十五 目

六

肉冷水○其膽冬月以生白蜜相和盛滿懸掛當
風膽外漸生黃衣雞翅刷下點赤脈熱醫良

補腎磁石丸 治腎虛肝氣上攻目昏漸成內障

磁石

次水飛

甘菊花

石決明

煅各

兔絲子

酒煮搗

肉苁蓉

酒浸去腐切

煅各二兩

為末雄雀十五枚去皮嘴留腸以青鹽二兩水三
升煮雀至爛汁盡為度搗如膏和藥為丸梧子大
每服二三十丸空心溫酒送下

羚羊補肝散 治肝風內障

羚羊角 銹

人參 各三兩

茯苓

防風 各二兩

細辛

黑參

車前

黃芩

羌活 各一兩

為散食後米湯調服二錢

除風湯 治五風變成內障

羚羊角 銹

車前

人參

芍藥

茯苓

大黃 酒蒸

黃芩

茵陳 各一錢

蠅尾 醋泡三分

水煎食後服

醫通卷十五 目

七

夜光椒紅丸 治火衰目無精光至夜昏甚

川椒 去白 二兩

生地黄

熟地黄 各四兩

枸杞子 四兩

牡丹皮 三兩

麥門冬 四兩

蜜丸梧子大每服五七十九溫酒鹽湯任下

又方用椒紅四兩巴戟肉二兩金鈴子肉熟附子

茴香各一兩另研乾山藥末二兩酒煮糊丸梧子

大每服三十九空心鹽酒送下

前方治陰血虧而真火離散後方治陽精傷而真

火無光不可不求其故而為施治也

蛤粉丸 治雀目日落後不見物

蛤粉 黃臘等分

右銻臘搜蛤粉成劑捏作餅子每餅重三錢用猪肝一片重二兩竹刀批開裏藥一餅麻線纏入砂鍋內以泔水煮熟乘熱熏目至溫喫肝并汁以愈為度 楊氏家藏方用烏賊骨淨末六兩黃臘三兩制服同此方

煮肝散 治雀目羞明并眼瞽膜

夜明砂淘淨 青蛤粉即蚌殼灰 穀精草各一兩

醫通卷十五 目

七

為散每服三錢以豬肝竹刀批開勿犯鐵攤藥在內麻線纏定米泔水一碗煮肝至熟取出湯傾碗內熏眼肝分三次細嚼用煮肝湯熱下一日服之

决明夜靈散 治高風內障至夜則昏

石决明時另研 夜明砂淘淨另研

為散用豬肝二兩竹刀批開入藥以線纏定用泔水二碗砂鍋中煮至半碗先熏眼候溫臨卧連藥汁服之

防風飲子 治倒睫拳毛背臉赤爛

蔓荆子 黃耆生 黃連各錢半

甘草炙 防風 葛根各一錢

細辛三分 虛人加入參一錢當歸七分

水煎食遠熱服

柴胡飲子 治風熱眼腫赤爛

柴胡 羌活 防風

赤芍 桔梗 荆芥

生地黄各一錢 甘草炙五分

水煎熱服

醫通卷十五 目

九

止淚補肝散 治肝虛迎西北風流淚不止

白蒺藜炒去刺 當歸 熟地黄各三錢

川芎 白芍 木賊

防風 羌活各一兩 香附童便製

為散每服三錢入生薑三片紅棗一枚肥人加夏

枯草一兩瘦人加桂枝一兩水煎去滓熱服

菊花散與局方不同 治目風流淚見東南風則甚漸生

瞽膜

蒼朮半筋同皂莢三挺砂鍋內河水煮一日去皂莢將蒼朮刮去皮切片鹽水炒淨三兩

木賊去節

草決明

荆芥

旋覆花

甘草炙

菊花去蒂各半兩

為散每服一錢濃茶調空心臨卧各一服有昏者加蛇蛻一錢蟬蛻三錢

人參漏蘆散 治眼漏膿水不止

黃耆三兩

防風兩半

大黃酒浸

人參

遠志甘草湯泡去骨

當歸尾一作地骨皮

赤茯苓各二兩

黃芩

漏蘆各一兩

為散每服四五錢水煎食後服

醫通卷十五

竹葉瀉經湯

治背內窅如鍼孔津津膿出

柴胡

梔子

羌活

升麻

甘草炙

黃芩

黃連

大黃各八分

赤芍藥

草決明

茯苓

車前

澤瀉各六分

竹葉十片

水煎食後熱服

加減地芝丸 治目能遠視不能近視

生地黃四兩

天門冬煨熱去心另焙

枸杞子各三兩

甘菊一兩

熟地黃四兩

麥門冬去心

山茱萸肉各三兩

當歸身二兩

五味子一兩

蜜丸梧子大每服白丸沸湯溫酒任下

加味定志丸 治目能近視不能遠視

大遠志甘草湯泡去骨

石菖蒲各二兩

人參四兩

茯苓三兩

黃耆蜜酒炙

肉桂一兩

蜜丸梧子大每服白丸空米湯溫酒任下

加減駐景丸 治腎虛目眩如無所見

熟地黃六兩

當歸

枸杞各四兩

醫通卷十五

車前

五味子各二兩

楮實五兩

椒紅淨一兩

兔絲子酒煮搗焙二兩

蜜丸梧子大每服七十九空米湯溫酒任下

決明散 治痘瘡入目

草決明

赤芍藥

甘草炙

栝蔞根等分

為散入麝少許三歲兒一錢五分米泔調食後服以愈為度

審蒙散 治小兒痘疹熱毒入目

蜜蒙花 青柏子 决明子

車前等分

為散每服一二錢。日用生羊肝一片。竹刀切開。搽藥木麻紫。溼紙裏煨。空心食之。以愈為度。

穀精散 治斑瘡入目生翳

穀精草 豬蹄退 菜豆皮

蟬蛻 白菊花等分

為散每服二三錢。食後米泔煎湯調服。

神功散 治痘入目生翳

醫通卷十五 目

蛤粉 穀精草各一兩 羌活

蟬蛻各五錢 菜豆皮四錢

為散每服二三錢。至四錢。以豬肝一片。批開入藥。衣線紫煮熟。不拘時與汁同服。

羚羊散 治痘後餘毒攻目生翳

羚羊角屑一兩 黃耆 黃芩

草决明 車前 升麻

防風 大黃 芒硝各五錢

為散每服二三錢。水煎食後服。

决明雞肝散 治小兒疳積害眼及一切童穉障障。

决明子晒燥為極細末勿見火 雞肝生者不落水

右將雞肝搗爛和决明末小兒一錢大者二錢研

勻同酒釀一盃飯上蒸服。目昏無翳腹脹如鼓

用蕪荑末一錢同雞肝酒釀頓服。腎障腹脹用雞

內金蕪荑决明末同雞肝酒釀頓服。若小便如泔

者用黃臘同雞肝酒釀頓服。風熱腎障加白蒺藜

一錢輕者數服重者三十服劇者四五十服無不

愈也。或用生翳雞肝研糊丸服亦可。

醫通卷十五 目

又方

火硝一兩 硃砂三錢

右二味為末。每服四分。用不落。水雄雞肝一箇。竹刀剖開入藥紫好。同酒釀半盞。飯上蒸熟。空腹服

之。輕者一料。重者不過二三料。則腎膜推去半邊

而退也。

保元湯方祖 六味丸八味丸下

生脈散方祖 六君子湯四君子湯下

瀉青丸下血門 選奇湯頭痛門

洗心散	身門	普濟消毒飲	三黃湯
六味丸	八味丸下	神効黃耆湯	湯下
五苓散	方祖	導赤散	傷暑
益元散	方祖	清震湯	頭痛
清空膏	頭痛	三因芎辛湯	頭痛
冲和養胃湯	傷元	礞石滾痰丸	痰飲
大追風散	頭痛	黃連解毒湯	三黃湯下
涼膈散	方祖	雙解散	涼膈
四物湯	方祖	三黃湯	方祖

醫通卷十五 目

三

益氣聰明湯	傷元	八珍湯	四君子湯下
芎辛湯	頭痛	滋腎丸	大補丸下
梔子檉皮湯	梔子散	補中益氣湯	傷元
黃耆建中湯	桂枝湯下	川芎茶調散	頭痛
八味丸	方祖	逍遙散	虛損
瀉黃散	癩風	神芎丸	三黃湯下
金花丸	三黃湯下	千金托裏散	傷元
天王補心丹	生脈散下	升陽除溼防風湯	溼門
犀角地黃湯	傷寒	金匱腎氣丸	八味丸下

張氏醫通 卷一五

耳門	桂辛散	治風虛耳鳴	
辣桂	川芎	當歸	
石菖蒲	木通	麻黃	去節另為
細辛	木香	甘草	各一兩
白蒺藜	南星	白芷	各兩
黃耆丸	治腎風耳鳴及癢	食前服	一方加全蠍去毒三錢

醫通卷十五 目

三

黃耆	酒炒	白蒺藜	炒去刺	羌活	各一兩
附子	一枚生	去皮膜			
為末	用羯羊腎一對	去脂膜	勿犯鐵	酒煮	搗爛絞
汁	糊丸	梧子大	空心鹽湯	臨卧	溫酒下五十九
蠶散	治腎虛氣塞耳聾				
全蠍	四十九箇	去毒	滾水泡去蟻	以糯米三合	
十九片	置蠍	再煨			
至蠍	為度	去蟻			
為細末	三五日前	每日先服	黑錫丹一服	臨服藥	
時夜飯半饑	隨其酒量	勿令大醉	服已熟	睡勿	

二四一

叶醒令人輕輕喚如不聽得濃煎葱白湯一碗令飲五更耳中聞百十攢笙響自此得聞

犀角飲子 治風熱上壅耳內骨腫脹痛流膿

犀角屑 木通 石菖蒲

甘菊 黑參 赤芍

赤小豆 炒 甘草 炙 生薑 三片

水煎不拘時熱服

燒腎散 治腎虛耳聾

磁石 煨赤醋洗附子一枚炮 蜀椒 炒去汗煎

醫通卷十五 耳

三

巴戟肉 兩寶

為散每服一錢用豬腎一枚去筋膜細切葱白薑花和勻裹十重溼紙於塘灰中煨熟空心細嚼溫酒送下以粥壓之十日効

通神散 治耳聾

全蠍 泡 地龍 燒蠟 各三

明礬 生藥 雄黃 各五 麝香 一

為散每用少許葱白煎藥引入耳中閉氣面壁坐一時許三日一次

草麻丸 治久聾

草麻仁 二十粒 皂角 煨取肉 五分 地龍 大者

全蠍 二個 遠志肉 磁石 煨飛

乳香 各二 麝香 少許

為末鎔黃蠟為丸塞耳中

梔子清肝散 治寒熱脇痛耳內作癢生瘡

梔子 炒黑 牡丹皮 各一

茯苓 川芎 白芍

當歸 牛芎子 甘草 炙各五錢

醫通卷十五 耳

三

為散每服五錢水煎去滓半饑熱服

排風湯 續命湯 復元通氣散 蓄血

養正丹 金液 四物湯 方祖

龍蒼丸 湯下 滾痰丸 痰飲

溫膽湯 湯下 補中益氣湯 湯下

小柴胡湯 方祖 加減八味丸 八味

正元散 眩暈 黑錫丹 金液

安腎丸 虛損 四生散 目門

涼膈散 方祖 柴胡清肝散 小柴胡

加味道選散虛損

鼻門

麗澤通氣湯 治久風鼻塞

羌活

獨活

防風

蒼朮

去皮切麻油拌炒

升麻

葛根各八分

麻黃

連節四分

川椒五分

白芷一錢

黃耆錢半

甘草炙七分

生薑三片

大棗二枚

葱白三寸

水煎食遠服。冬月倍麻黃加細辛三分。夏月去獨

醫通卷十五 鼻

三

活加石膏三錢。忌一切冷物。及風涼處坐臥。

芎藭散 治鼻鼈

川芎

檳榔

辣桂

麻黃

防已

木通

細辛

石菖蒲

白芷各一兩

木香

川椒

甘草炙各半兩

為散每服三四錢。生薑三片。蘇葉一撮。水煎去滓

熱服。

辛荑散 治鼻塞不聞香臭。涕出不止。

辛荑仁 一兩

細辛 三錢

葉本 七錢

升麻

川芎

白芷

木通

防風

甘草炙各五錢

為散每服二錢。食後茶清調服。

通草辛荑搐鼻法

千金

治鼻塞腦冷清涕出

通草

辛荑各錢半

細辛

甘遂

桂心

芎藭

附子各一錢

右七味為末。蜜丸綿裹內鼻中。

醫通卷十五 鼻

三

搐鼻法 千金

治鼻鼈

通草

細辛

附子

右三味等分為末。蜜和綿裹少許內鼻中。又方

加甘遂。用白雄大膽丸取涕。漉。

礬石藜蘆散

千金

治鼈鼻。鼻中息肉不得息。

礬石

藜蘆各六錢

瓜蒂二七枚

附子十二錢

右四味各搗篩合和。以小竹管吹藥如小豆許於

鼻孔中。以綿絮塞之。日再。以愈為度。

升麻湯 <small>方祖</small>	補中益氣湯 <small>保元湯下</small>
香蘇散 <small>傷寒門</small>	當歸內補建中湯 <small>桂枝湯下</small>
六味丸 <small>八味丸下</small>	生脈散 <small>方祖</small>
雙解散 <small>涼膈散下</small>	涼膈散 <small>方祖</small>
甘露飲 <small>二冬膏下</small>	消風散 <small>方祖</small>
瀉青丸 <small>下血門</small>	升陽散火湯 <small>升麻湯下</small>
口門	
蘭香飲子 <small>白虎湯下</small>	滾痰丸 <small>痰飲門</small>
三黃丸 <small>三黃湯下</small>	加減八味丸 <small>八味丸下</small>

醫通卷十五 口

三

補中益氣湯 <small>保元湯下</small>	龍膽瀉肝湯 <small>脇痛門</small>
小柴胡湯 <small>方祖</small>	佐金丸 <small>方祖</small>
生脈散 <small>方祖</small>	六味丸 <small>八味丸下</small>
甘露飲 <small>二冬膏下</small>	六君子湯 <small>四君子湯下</small>
附子理中湯 <small>理中湯下</small>	連理湯 <small>理中湯下</small>
涼膈散 <small>方祖</small>	金花丸 <small>三黃湯下</small>
五苓散 <small>方祖</small>	導赤散 <small>暑門</small>
理中湯 <small>方祖</small>	蘇子降氣湯 <small>七氣湯下</small>
養正丹 <small>金液丹下</small>	瓜蒂散 <small>痰飲門</small>

神祐丸 <small>十棗湯下</small>	瀉川散 <small>三黃湯下</small>
齒門	
茵陳散 <small>治齒齲赤腫疼痛及骨槽風熱</small>	茵陳
	連翹
	荊芥
	麻黃
	升麻
	羌活
	薄荷
	僵蠶 <small>各五錢</small>
	細辛 <small>二錢半</small>
	大黃
	牽牛頭末 <small>各一兩</small>

醫通卷十五 齒

三

世本多半夏黃芩射干獨活丹皮	當歸龍膽散 <small>治齒痛寒熱身疼</small>
升麻	麻黃
當歸稍	白芷
草龍膽	黃連
為散每用少許擦牙疼處良久有涎吐去	羊脛骨灰 <small>等分</small>
五倍子散 <small>治牙齒為物所傷動搖欲落</small>	
川五倍 <small>為末</small>	乾地龍 <small>微焙為末</small>
先將生薑擦牙齦後以藥敷之七日不得嚼硬物	

用骨碎補濃煎時時漱之如齒初傷欲落時以膏
擦藥貼齒槽中至齒上即半如故

烏金膏 治牙齒動搖髮黃赤用此即齒半髮黑

生薑 牛筋搗取自然生地黄一觔酒浸一宿

大皂莢 皂莢文火炙乾再蘸再炙汁盡為度

右將皂莢同地黃滓入磁罐內煨存性為末牙齒

初搽用藥擦齦如髮髮黃赤以鐵器盛藥末三錢

湯調過三日將藥汁蘸擦髮髮臨卧時用之次早

即黑三夜一次其黑如漆不傷髮髮

醫通卷十五

三

長春牢牙散 烏鬚髮去牙風除口氣

升麻 川芎 細辛

白蒺藜 甘松 丁香

五倍子 皂礬 青鹽 各半

訶子肉 沒石子 麝香 各三錢五分

為散早暮擦牙次以水漱吐出洗髮鬚

承氣湯 方祖 涼膈散 方祖

清胃散 門 越麴丸 門

六味丸 八味丸 方祖

消風散 門 欬禁

羌活附子湯 門 頭痛

補中益氣湯 湯保元

犀角升麻湯 門 中風

小安腎丸 門 切血

還少丹 門 遺精

黑錫丹 丹 金液

桃核承氣湯 湯小承氣

甘露飲 丹 冬

髮髮門

七寶美髯丹 補腎元烏鬚髮延齡益壽

赤白何首烏 補骨脂 入兩同

川牛膝 去苗八兩與何首烏 補骨脂 入兩同

醫通卷十五 髮髮

三

妙無聲為 度去芝蔴

赤白茯苓 去皮各八兩為粗末

者用牛 乳并蒸

兔絲子 淘淨酒蒸一宿隔水蒸

乾取淨 末八兩

當歸 去稀酒淨切晒勿

枸杞子 八兩搗碎晒乾

共為細末煉白蜜丸龍眼大每日清晨午前臨卧

用鹽湯沸湯溫酒各嚼一九忌菜蔬豬血糟醋

烏金丹 染髮黑久

清煙好翠一塊煨大紅鳳仙梗中仍將剉下者

掩紫好以泥塗之有花摘去勿令結子候兩月

餘自壞取出又將青柿去蒂縷空入罌仍將柿
蒂掩紮好埋馬矢中七晝夜收藏罌盆中隨用
以龜尿磨搽則黑透鬚根經月不白不傷鬚
取龜尿法用三脚竹竿頂起龜腹令足無著
得扒動置大盆中以受其尿將豬豕唾溼煎麝
香細末燃入鼻孔其尿即出或用麝香燃紙條
燒烟薰其鼻尿亦出

赤金散 染鬚黑潤不燥久不傷鬚

紅銅落 打紅銅器落下者滾水刷淨銅杓
中炒赤米醋煨七次每次用三錢

醫通卷十五 髮鬚

川五倍 如菱角者佳碎如豆粒去末無油鍋內
透則不黑炒先赤烟起次黑烟起即更如泥若不
得宜將漆布一方包壓地成塊每料一兩

何首烏 乾者碎為粗末炒
黑者性忌犯鐵器 枯礬 三錢

沒石子 碎如米粒醋
拌炒黑存性

右五味各為極細末入飛麩三錢和勻每用二三
錢量鬚多少臨用每錢入食鹽一釐濃煎茶漿調
如稀糊隔水頓發候氣如棗光如漆再調勻先將
肥皂洗淨鬚上油膩拭乾乘熱將刷子脚搽上稍
冷則不黑以指捏鬚細碾勻搽完以紙掩之晨

起以溫水洗淨須連用二三夜即黑亮如漆過半
月後鬚根漸白只用少許如法調搽白根上黑處
不必再染○又方無沒石子何首烏有青鹽三錢
細辛一錢

黃耆建中湯 桂枝湯下 六味丸 八味丸下

四君子湯 方祖 烏金散 齒門

唇門

六味丸 八味丸下 加減八味丸 八味丸下

柴胡清肝散 小柴胡湯下 清胃散 齒門

醫通卷十五 唇舌面

犀角升麻湯 中風門 逍遙散 虛損門

歸脾湯 保元湯下 小柴胡湯 方祖

竹葉石膏湯 白虎湯下 真武湯 木附湯下

十全大全湯 保元湯下 黃芩芍藥湯 即黃芩湯
桂枝湯下

舌門

黃連瀉心湯 三黃湯下 補中益氣湯 保元湯下

涼膈散 方祖 甘露飲 齒門

金沸草散 欬嗽門 三黃丸 三黃湯下

面門

鼠粘子散 治面上風癢

鼠粘子生用

連翹

防風

荆芥

枳殼

桔梗

蔓荆子

白蒺藜炒去刺

當歸

蟬蛻

厚朴各十兩

為散每服四錢加生薑一片葱白一莖水煎薰服

硫黃膏 治面上生瘡及鼻臉赤風粉刺

生硫黃

白芷

括蕪根

鉛粉各五分

芫青七枚去翅足

全蠍一枚

醫通卷十五

三

蟬蛻 七枚

為細末麻油黃臘各半兩熬烊離火入諸藥末調

勻磁器收貯久則愈妙至夜洗面後以少許細細

擦之擦過即拭去否則起泡近眼處勿擦三四日

間瘡腫自平赤色自消風刺粉刺一夕見効

消風散方祖

涼膈散方祖

升麻湯方祖

犀角升麻湯中風

升麻胃風湯中風

調胃承氣湯小水氣

桂苓五味甘草湯欬嗽

當歸龍薈丸湯下

加減八味丸八味丸下

地黃飲子中風

附子理中湯湯理中下

補中益氣湯湯保元下

四逆湯方祖

通聖散涼膈

六君子湯湯四君子下

六味丸丸八味下

人參養營湯湯保元下

羌活勝溼湯溼下

咽喉門

礞砂丹 治纏喉風風熱喉痺

礞砂生研

白礬生研各一錢

西牛黃

人瓜甲焙脆研各一分

醫通卷十五

三

為極細末以爛白霜梅肉三錢研糊分作四丸驗

化取湧頑痰立効

利膈湯本事 治脾肺積熱咽喉生瘡

薄荷葉

荆芥穗

防風

桔梗

人參

牛蒡子

甘草等分

水煎不拘時緩緩服

如口瘡甚而多痰聲者加蠶絲壯熱脈實去人參

加黑參犀角山豆根

烏龍膏 治一切纏喉急證

皂莢 二挺 去皮弦子 搗碎 滾水三升 泡
接汁去滓 砂鍋內 熬成膏 入好酒 合

令入 下項藥 百草霜 煇附

硼砂 人參 另為極細 末各一錢

右四味 拌勻 入白霜 梅肉一錢 細研 入皂莢膏內

以少許 雞翎 點喉中 湧盡 頑痰 却嚼 甘草二寸 嚥

汁 吞津 若木舌 先用 青布 蘸水 揩之 然後 用藥

六味丸 八味丸 腎氣丸 八味丸 稀涎散 門中風

玉樞丹 腹痛 稀涎散 門中風

醫通卷十五 咽喉 三

涼膈散 方補 普濟消毒飲 湯下

荆防敗毒散 湯下 桔梗湯 方補

都烝丸 八味丸 半夏厚朴湯 湯下

異功散 湯下 四君子 湯下

癰疽門

活命飲 治一切癰毒 赤腫 未成者 消 已成者 潰 但

漫腫 色白 不起 及膿出 而痛不止 元氣虛者 禁用

穿山甲 炮 白芷 防風

乳香 沒藥 甘草節

赤芍 栝蒌根 歸身

貝母 去心 陳皮 皂角刺 各一

金銀花 三錢

水酒各半煎服

清熱解毒湯 治瘡瘍 喉腫 赤痛 形病俱實

黃連 酒炒 山梔 炒黑 連翹

當歸 各錢 芍藥 生地黃 各一

金銀花 二錢 甘草 六分

水煎熱服

醫通卷十五 癰疽 三

豆豉餅 治瘡瘍 腫而不潰 潰而不斂

江西淡豆豉

右一味 為末 唾和 成餅 如錢大 三四錢 厚 置患處

以艾壯於餅上 灸乾 即易之 如瘡大作 餅覆患處

以艾鋪上 灸之 未成者 即消 已成者 祛逐毒邪 則

愈 如鬱證 敗痰 失道 漫腫 不赤 不潰者 以香附一

味 為細末 唾調 作餅 如上法 灸之 或先用葱一握

切碎 焙熱 敷之 冷則 更迭 而敷 使氣血 調和 毒邪

歛 發 然後 灸之 尤妙

竹葉黃耆湯 治氣虛胃火盛而作渴

淡竹葉 一握 黃耆 生 生地黃

麥門冬 去心 當歸 川芎

甘草 黃芩 芍藥

人參 錢半 石膏 煨 二

水煎熱服

烏金膏 治潰瘍肉死不腐。若有毒根。以紙燃蘸。紙

即飲。

巴豆 去心膜 炒黑

醫歸卷十五 癰疽

一味研如膏。點反肉上。臨用修合。則不乾。

珍珠散 治不拘何疾。潰爛不肯長肉者。

爐甘石 製如目門。淨入兩 珍珠 煨淨 一錢

琥珀 淨末 龍骨 煨水飛 四分 赤石脂 煨水飛 四分

鐘乳石 時草湯煮一伏 硃砂 水飛淨 五分

麒麟竭 二分 象皮 末五分

右九味。務令極細。每藥一錢。入冰片二分。研勻。和

調敷。上立長。

三白丹 治微瘡結毒

水銀 一兩 白礬 煨 各二

右三味。內鐵鉢中。以厚磁碗合定。鹽泥固濟。壓定。

碗足。文火煨三炷。香昇在碗內。取出。放地一夕。以

出火。赤磁罐收貯。經年後。方可用之。每服三分。入

飛麩三錢。壯者分三服。中者分五服。羸者分七服。

每日以上茯苓半。助槌碎。用水七碗。煮至五碗。去

滓。入前丹一服。再煎至三碗。一日服盡。明日如前

法。再服二三日。後喉嚨腫痛。齒齦出水。七日毒盡。

自愈。腫甚者。用黃連犀角骨碎。補各一錢。黑豆一

醫歸卷十五 癰疽

合煎湯漱之。

加味三白丹 治元氣虛寒人結毒

本方加滴乳石一兩。天靈蓋二兩。服法如前。

五寶丹 治虛人結毒。不勝三白丹。及服三白丹。餘

毒未盡者。

沿粉 三錢。銅粉 內隔紙煨黃 珍珠 勿見火

滴乳粉 煨淨。取末。琥珀 勿見火 硃砂 水飛各

右五味。杵勻。湯浸蒸餅。為丸。菜豆大。分作七服。弱

者。分十服。每服用土茯苓四兩煎湯服之。

歸耆飲 治腦疽背癰毒盛痲腫及虛人肛門發毒

當歸 重人錢 綿黃耆 生 金銀花 淨各 五錢

甘草 生三錢

水酒各碗半煎至二碗分三次熱服一日令盡在

上者加升麻三分在下者加牛膝三錢

四順清涼飲 燥門 參耆內托散 湯保元

千金托裏散 湯保元 十全大補湯 湯保元

六君子湯 湯四君子 八珍湯 湯四君子

加減八味丸 丸八味 保元湯 方祖

醫譜卷十五 癰疽

聖

異功散 湯四君子 獨參湯 湯保元

人參敗毒散 湯小柴胡 托裏消毒散 湯保元

四君子湯 方祖 四物湯 方祖

六味丸 丸八味 歸脾湯 湯保元

補中益氣湯 湯保元 梔子清肝湯 耳門

內補黃耆湯 湯保元 當歸補血湯 湯保元

涼膈散 方祖 竹葉石膏湯 湯白虎

參苓白朮散 湯四君子 理中湯 方祖

四柱飲 湯瀉瀉 六柱飲 湯瀉瀉

二神丸 瀉瀉 四神丸 瀉瀉

連理湯 湯理中 萬靈丹 瀉瀉

汗門

澤木微銜散 素問 治酒風汗出如浴惡風短氣

澤瀉 木各十 微銜 五分

右三味合為散以三指撮水煎為後飯服藥而後

當歸六黃湯 湯三黃 黃耆建中湯 湯桂枝

耆附湯 湯木附 木附湯 方祖

醫通卷十五 汗

聖

參附湯 湯木附 真武湯 湯木附

玉屏風散 湯保元 補中益氣湯 湯保元

常歸補血湯 湯保元 逍遙散 瀉瀉

都炆丸 丸八味 涼膈散 方祖

羌活勝溼湯 瀉瀉 防己黃耆湯 方祖

桂枝湯 方祖 五苓散 方祖

參蘇飲 瀉瀉 附子理中湯 湯理中

二陳湯 方祖 十全大補湯 湯保元

生脈散 方祖 歸脾湯 湯保元

二妙散 大補

葛根湯 麻黃

犀角地黃湯 傷寒

茵陳蒿湯 澤門

理中湯 方劑

當歸龍薈丸 三黃

大建中湯 保元

小建中湯 桂枝

不得卧門

小柴胡湯 方劑

白虎湯 方劑

桃核承氣湯 小承氣

保和丸 傷寒

龍膽瀉肝湯 腸痛

人參養營湯 保元

小續命湯 續命

承氣湯 方劑

醫通卷十五 不得卧

半夏湯 靈樞

半夏 五合煎 汁泡 秋一升

右二味以流水揚之萬遍煮秫米取湯內半夏煮

去滓飲一盃日三稍益以知為度

此靈樞方也後世方書以此湯加入黃連遠志生

地棗仁乾生薑仍用流水煎服

六君子湯 四君子

竹葉石膏湯 白虎

溫膽湯 二陳

酸棗湯 虛損

茯苓甘草湯 桂枝

導痰湯 陳

獨活湯 傷門

梔子豉湯 方劑

益元散 方劑

六味丸 八味

胃苓湯 散下

不能食門

胃苓湯 散下

保和丸 傷寒

六君子湯 四君子

珍珠母丸 傷門

珠珀安神丸 傷門

補中益氣湯 保元

十全大補湯 保元

升陽益胃湯 保元

黃耆建中湯 桂枝

枳朮丸 方劑

枳實理中湯 理中

醫通卷十五 不能食 不能語 消癰

導痰湯 二陳

二陳湯 方劑

六味丸 八味

補中益氣湯 保元

不能語門

導痰湯 二陳

牛黃丸 中風

消癰門

文蛤散 玉山

二神丸 泄瀉

異功散 四君子

人參白朮湯 白虎

八味丸 方劑

至寶丹 中風

蘇合香丸 中風

治渴欲飲水不止

川文蛤即蛤蜊中一種殼厚色紫而滑者火煨用
右一味杵為散沸湯服方寸匙

腎氣丸八味丸下

五苓散方祖

白虎加人參湯白虎湯下

調胃承氣湯小承氣湯下

六味丸八味丸下

八味丸方祖

加減八味丸八味丸下

理中湯方祖

生脈散方祖

千金朴硝煎火門

清心蓮子飲生脈散下

宣明麥門冬飲子生脈散下

易老門冬飲生脈散下

蘭香飲白虎湯下

醫通卷十五 消神 痰火

聖

甘露飲二冬膏下

瀉黃散瀉風門

七味白朮散四君子湯下

固本丸二冬膏下

加味導痰湯二陳湯下

六君子湯四君子湯下

佐金丸方祖

滋腎丸大補丸下

保元湯方祖

獨參湯保元湯下

痰火門

玉竹飲子新定

治痰火痰涎湧盛欬逆喘滿

萎蕤一名玉竹三錢

茯苓二錢

甘草錢

桔梗一錢

橘皮一錢

紫苑錢

川貝母去心列三錢 生薑同橘皮蜜煎四錢

右八味長流水煎入熟白蜜二七分二服

氣虛加人參二錢。虛火加肉桂半錢。客邪加細辛三分。香豉三錢。咽喉不利。唾膿血。加阿膠三錢。藕汁半盃。頭額痛。加葱白二莖。便溏。用伏龍肝擊碎煎湯。澄清。代水煎服。氣塞。臨服磨沉香汁數匙。

香蘇散傷寒門 金匱枳實湯方祖

沉香降氣散氣局方七氣湯方祖 異功散四君子湯下

局方七氣湯方祖 六君子湯四君子湯下

醫通卷十五 痰火

六味地黃丸八味丸下

生脈散方祖

靈飛散養性門

黃蘗門

消石礬石散金匱

治腎痺額上黑

硝石等分

礬石等分

為散大麥粥飲和服方寸匙日三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是其候也

大黃硝石湯金匱

治黃蘗腹滿小便不利自汗

大黃

硝石

黃蘗各四錢

黃蘗各四錢

梔子 七枚

右四味水煎去滓內硝更熯分二服

豬膏髮煎 金匱 治女勞瘵及陰吹正噎

豬膏 三兩 亂髮 如雞子 大三枚

右二味合煮髮消藥成分二服病從小便出

桂枝加黃耆湯 湯下 茵陳五苓散 湯下

梔子大黃湯 湯下 茵陳蒿湯 湯下

耆芍桂酒湯 湯下 梔子黛皮湯 湯下

麻黃連翹赤小豆湯 湯下 小柴胡湯 湯下

醫通卷十五 黃痺 嘈雜 胃

補中益氣湯 湯下 犀角地黃湯 湯下

大黃附子湯 湯下 四君子湯 湯下

茵陳附子乾薑湯 湯下 茵陳四逆湯 湯下

桃核承氣湯 湯下 溫中丸 湯下

索攀丸 散下 越脾加木湯 湯下

桂枝二越脾一湯 湯下 理苓湯 湯下

瓜蒂散 散下 桂苓丸 湯下

嘈雜門

六君子湯 湯下 保和丸 湯下

越鞠丸 湯下 二味湯 湯下

導痰湯 湯下 佐金丸 湯下

四君子湯 湯下 枳朮丸 湯下

抑青丸 湯下 逍遙散 湯下

補中益氣湯 湯下 四神丸 湯下

六味丸 湯下 身重門

除溼湯 湯下 滲溼湯 湯下

胃苓湯 湯下 補中益氣湯 湯下

醫通卷十五 身重 解郁 脫管 過饑胃竭 藥毒 胃

防已黃耆湯 湯下 消暑十全散 湯下

甘薑苓朮湯 湯下

解郁門

虎潛丸 湯下 濡燥湯 湯下

脫管門

益氣養營湯 湯下

過饑胃竭門

保元湯 湯下 四君子湯 湯下

藥毒門

獨參湯 保元湯下

保元湯 方劑

當歸補血湯 保元湯下

六味丸 八味丸下

臭毒門

玉樞丹 一名紫金錠

治一切樂毒食毒瘡毒蟲毒痰毒

癰毒臭毒症疫毒溪毒並用水磨內服外敷無不神効惟正氣虛人及孕婦忌服

川文蛤 二兩即五倍子形如菱角者佳

千金子 即續斷去

取淨霜

紅芽大戟 杭州者良去條根煮去骨焙淨兩半

山慈如 淨一兩雄黃明淨者水磨香取當門

醫通卷十五 臭毒

右為細末以糯米粥糊搗成劑分作四十餅於

午七夕或辰日於石臼中杵千下勿令雜犬婦人

孝服者見 一方多水飛

點眼砂 一名人馬平安散

治時疫毒氣臭毒痧脹腹痛

冰片

麝香

雄黃 水飛

硃砂 水飛各半錢

焰硝 一錢

共為極細末磁瓶收貯男左女右以少許點目大皆立効用此入時疫病家則不沾染并治六畜瘟亦點眼大皆

越鞠丸 鬱門

沉香降氣散 氣門

藿香正氣散 平胃散下

蘇合香丸 中風

番沙門

香蘇散 傷寒門

梔子豉湯 方劑

黃芩湯 桂枝湯下

涼膈散 方劑

白虎湯 方劑

嶺南瘴毒門

蒼朮芩連湯 治瘴癘淫熱

蒼朮 甘製炒黃錢半

黃芩 酒炒

黃連 薑汁炒

醫通卷十五 番沙 嶺南瘴毒

木香

枳實

半夏 薑製

柴胡

升麻

川芎

厚朴 薑製

桔梗

木通 各一錢

甘草 炙七分

生薑 三片

水煎溫服

蒼朮羌活湯 治瘴癘腹滿寒熱

蒼朮 製

黃芩

枳實

半夏

柴胡

川芎

羌活

陳皮 等分

甘草 減半

生薑 三片

水煎溫服

蒼朮柴胡湯 治瘴瘧

柴胡 錢半

黃芩 酒炒

半夏

生薑 三片

水煎清晨服

藿香正氣散 平胃散

醫通卷十五 嶺南瘴毒 蟲

四君子湯 方祖

蒼朮白虎湯 白虎湯下

理中湯 方祖

蟲門

秦川剪紅丸 治蟲積為患噎膈反胃不能食

雄黃 油煎

三稜 煨

椒紅 各一兩

神麴糊丸 萊豆大每服五十九丸五更用雞湯送下

方中椒紅世本皆作陳皮惟何繼冲藏本作椒紅乃合立方命名之意方後五更用雞湯送下亦異世本

化蟲丸 局方 治蟲積肚腹常熱

鶴蝮 即天名

胡粉 炒半兩

為末米飲糊丸梧子大一歲兒五丸大人七八十丸酸漿水入麻油少許和勻送下清米湯亦可痛時用蜀椒湯調化服

丸酸漿水入麻油少許和勻送下清米湯亦可痛時用蜀椒湯調化服

丸酸漿水入麻油少許和勻送下清米湯亦可痛時用蜀椒湯調化服

醫通卷十五 蟲

集効丸 治蟲積四肢常冷

木香

訶子肉

熟附子

煉白蜜丸梧子大每服三五十九丸食前陳皮湯下

婦人醋湯下孕婦勿服

萬應丸 治腹中諸蟲血積

黑牽牛頭末

白雷丸 醋炒

木香

右將牽牛一處為末。檳榔雷丸水香大黃一處為末。沉香另自為末。以大皂莢苦楝皮各四兩煎汁。泛丸如菜豆大。每服四五丸至百丸。小兒量減。孕婦忌服。

遇仙丹 治膈上痰氣蟲積

白牽牛頭末 生一兩 炒一兩

白檳榔 一兩

茵陳 三稜 醋炒

蓬朮 醋炒

大皂莢 去皮弦子 酥炙

沉香 另末 勿見火 五錢

為末。醋糊丸。菜豆大。每服四五丸。五更時茶清

醫通卷十五 蟲

五

送下天明當有所下有積去積有蟲去蟲小兒量減。孕婦忌服。

膠艾稍歸湯 千金

治蟲蝕肛門癢痛

阿膠

當歸

青稍子 各六錢

艾葉 一把

右四味水煎分三服。

雄黃兌法 千金

雄黃 半兩

桃仁 一兩

青稍子 三兩

黃連 一兩

苦參 一兩

右五味為末。綿裹如棗核大。內下部。又方

雄黃

皂莢

麝香

硃砂 等分

右四味為末。蜜丸。梧子大。內下部。日一。

烏梅丸 理中湯下

九痛丸 心瀉門

妙功丸 癩門

蠱毒門

歸魂散 千金

治蠱毒初中在膈上者。以此藥吐之。

醫通卷十五 蟲

蠱毒

五

白礬 枯牛 生牛 建茶 各一兩 為散。每服五錢。新汲水頓服。服一時許。當吐出毒。此藥入口。其味甜。不覺苦。瀉者。即有蠱毒也。

雄朱丸 千金

治蠱毒從酒食中下者

雄黃

硃砂 俱另研 水飛

赤脚蜈蚣 微炙 去足

續隨子 為細末 麝香 各一兩 研

右五味。拌勻。再研。以糯米粥和丸。如芡實大。每服

一丸。熱酒吞下。毒當與藥俱下。端午日修合尤妙。

太乙追命丸 千金

治百病。若中惡氣。心腹脹滿。不

得喘息心腹積聚臚脹痲瘕宿食不消吐逆嘔噦
寒熱瘰癧蟲毒婦人產後餘

蜈蚣 一 枚

丹砂

附子

礬石

雄黃

藜蘆

鬼臼

各一分

巴豆

二分

右八味蜜丸如麻子服二丸日一陰毒傷寒遍身
疼痛爪甲青黑服一九當汗出綿裹兩丸塞兩耳
中下痢服一九下部塞一九蠱毒服二丸在外膏
和摩病上在膈上吐膈下利有瘡以一九塗之毒

醫通卷十五 蠱毒

美

白出產後餘疾服一九耳聾綿裹塞耳中

五香散 千金

治嶺南毒氣惡核射工中人暴腫生瘡

甲香 即螺甲

薰陸香

丁香

沉香

青木香

黃連

黃芩

各四錢

黃蘗

六錢

犀角

羚羊角

鼈甲

牡蠣

升麻

甘草

烏髮

各四錢

吳茱萸 二錢

右十六味治下篩水服方寸七日二并以水和少
許洗之仍以雞子白和散塗瘡上乾即易之

解水毒飲了 千金

治人忽中谿欄水毒手足指冷

或至肘際

吳茱萸

湯泡七次二兩

升麻

犀角

橘皮

各六錢

生薑

二兩

烏梅肉

十四枚

水煎分三服或以生犀磨汁服尤効身上赤斑退
為度

玉樞丹 臭毒

千金耆婆萬病丸 積聚

醫通卷十五 蠱毒 婦人上

美

理中湯 方祖

生脈散 方祖

六味丸 八味丸下

婦人門上

旋覆花湯 金匱

治虛風襲入膀胱崩漏鮮血不止

旋覆花

三錢

葱

五莖

新絲

生用尺許

右二味水煎頓服

旋復性專下氣兼葱則能散結祛風佐以繭絲專

補膀胱加以紅藍染就深得本經散結氣之肯

礬石丸 金匱

治婦人經水不利下白物

礬石用綠者燒過三錢杏仁一錢

右二味蜜丸棗核大內陰中

土瓜根散金匱 治瘀積經水不利或一月再見及

陰頰腫

土瓜根

芍藥

肉桂

麤蟲等分

右四味為散酒服方寸七日三服

土瓜根黃瓜根也藥舖不收往往以栝蒌根代用

攷之本經栝蒌根性味雖同苦寒而無散瘀血通

醫通卷十五 婦人上

五

月閉之功此治雖專惜乎其力綽緩故以桂麤粥之芍藥監之與旋復花湯之用新絳不殊

歸附丸 治氣亂經期或前或後

當歸四兩

香附八兩童便浸透服乾再加酒醋薑四製

為細末醋糊丸空心砂仁湯下三錢

血虛加熟地八兩虛寒加桂附各一兩帶下氣腥

加吳茱萸蘄艾各一兩臍下冷痛加桂附沉香各

一兩丁香三錢經行少腹先痛或血色紫黑結塊

加醋煮莪茂二兩沉香一兩經後少腹虛痛加參

者何膠各四兩蘄艾二兩經水色淡加薑桂各二兩八參四兩

醋煎散 治經行少腹結痛產後惡露不行

三稜

蓬朮

香附

烏藥

赤芍

甘草

肉桂等分

通用醋炒為散每服三錢空心砂糖湯調服

蘆薈丸 治肝疳口舌生瘡牙齦腐爛遍體生瘡及

婦人熱結經閉作塊上衝梗痛

醫通卷十五 婦人上

五

蘆薈

青黛

硃砂另研水飛

麝香一錢

大皂莢去皮弦子一兩乾蟾一兩同皂

為細末蒸餅糊丸麻子大每服三五丸空心米

湯下

防風丸 治風入胞門崩漏下血色清淡者

防風勿見火

為末醋丸梧子大空腹葱白湯下二錢五分

子芩丸 治風熱入犯肝經崩漏下血色稠紫者

條黃芩酒炒

為末酒九梧子大空腹烏梅湯下三錢

茯苓補心湯 千金 治心氣不足善悲愁恚怒衄血

面黃煩悶五心煩熱獨語不覺婦人崩中面赤

茯苓 六錢 桂枝 三錢 甘草 二錢

紫石英 碎如米 一兩 人參 麥門冬 去心各五錢

大棗 四枚 赤小豆 一合

水煮日三服

小牛角腮散 千金 治帶下五崩下血外實內虛之病

醫通卷十五 婦人上 辛

牛角腮 一枚 鹿茸 禹餘糧

當歸 乾薑 續斷 各二兩

阿膠 三兩 烏鯽骨 龍骨 各一兩

赤小豆 六合

右十味為散。空腹溫酒服。方寸七日三服。

伏龍肝湯 千金 治勞傷衝任崩中去血赤白相兼

或如豆汁臍腹冷痛口乾食少

伏龍肝 如彈子 生薑 生地黄 各兩

甘草 艾葉 赤石脂

桂心 各六錢

右七味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜

一

失笑散 治婦人瘀結少腹急痛

五靈脂 酒研澄 蒲黃 篩淨生半 去砂 炒半等分

為散每服二錢半酒煎入砂糖少許和滓服少頃

再服瘀結腹痛經水反多元氣虧弱藥力不行者

用人參二三錢調服以擊搏之

七子散 千金 治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補

醫通卷十五 婦人上 辛

不足 五味子 鍾乳粉 牡荊子

菟絲子 車前子 菥蓂子

石斛 乾地黃 薯蕷

杜仲 鹿茸 遠志 各八錢

附子 蛇牀子 芎藭 各六錢

山茱萸 天雄 人參

茯苓 黃耆 牛膝 各五錢

桂心 十錢 從蓉 十一錢 巴戟天 十二錢

右二十四味。治下節酒服方寸七日。二不知增至二七。以知為度。禁如藥法。不能酒者。蜜丸服亦可。紫石門冬圓。治全不產及斷緒方。

紫石英 大門冬各二兩 當歸

芎藭 紫葢 卷柏

桂心 烏頭 乾地黄

牡蒙 禹餘糧 石斛

辛荑各二兩 人參 桑寄生

續斷 細辛 厚朴

醫通卷十五 婦人上 一五

乾薑 食茱萸 牡丹

牛膝各一兩六銖 栝子仁一兩 薯蕷

烏賊骨 甘草各一兩半

右二十六味為末。蜜和丸。如梧子大。酒服十九日。三漸增至三十丸。以腹中熱為度。不禁房室。夫行不在。不可服。禁如藥法。比來服者。不至盡劑。即有娠。

慶雲散一合 治丈夫陽氣不足。不能施化。無成。

覆盆子 五味子各一升 菟絲子一升

天雄一兩 石斛 白朮各二兩
桑寄生四兩 天門冬八兩 紫石英一兩
右九味。治下節酒服方寸七。先食服。日三。素不耐冷者。去寄生。加細辛四兩。陽氣不少。而無子者。去石斛。加檳榔十五枚。

朴硝加檳榔十五枚

朴硝滋胞湯 治婦人立身已來。全不產及斷緒久不產二三十年者。

朴硝 牡丹 當歸

大黃 桃仁生各三錢 厚朴

醫通卷十五 婦人上 一五

桔梗 人參 赤芍藥

茯苓 桂心 甘草

牛膝 橘皮各二銖 附子六銖

蠱蟲 水蛭各十枚

右十七味。以清酒五升。水五升。合煮。取三升。分四服。日三夜一。每服相去三時。更服。如常覆被。取少汗。汗不出。冬日著火籠之。必下積血。及冷赤膿。如赤小豆汁。本為婦人。子宮內有此惡物。使然。或天陰臍下痛。或月水不調。為有冷血。不受胎。若

劑酌下盡氣力弱大因不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一日即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好如無水鯉甲以生漆塗之

白薇丸千金治月水不利閉塞絕產

白薇各一兩細辛各一兩人參

杜蘅各一兩牡蒙各一兩厚朴

半夏各一兩白蠟各一兩當歸

紫苑各一兩牛膝各一兩沙參

醫通卷十五 婦人上

乾薑各一兩秦芫各一兩蜀椒

附子各一兩防風各一兩

右十七味為末蜜和丸如梧子大先食服三丸不知稍增至四五丸此藥不可長服覺有娠即止用之大驗

葆真丸 治房勞太過腎氣虛衰精寒不能生子

鹿角膠八兩即鹿角杜仲各一兩

乾山藥微焙白茯苓人乳拌熟地黃

山茱萸肉各三兩北五味各一兩益智仁各一兩

益智仁各一兩并炒

遠志甘草湯泡去骨川棟子酒煮川巴戟肉酒炒

補骨脂五錢另為末勿見火胡蘆巴與補骨脂同煎

前十三味共為細末入沉香和勻以肉蓯蓉四兩

洗去皮垢切開心有黃膜去之取淨二兩好酒煮

爛糜如糊同煉蜜杵勻丸如梧子每服五七丸

空心溫酒下以美物壓之精薄者加鯉膠六兩

此方不用桂附壯火助陽純用溫養精血之味獨

以沉香益智鼓其氣氣又以棟子抑其陽氣引諸

醫通卷十五 婦人上

陽藥歸宿下元深得廣嗣之旨

千金種子丹 此方服之令人多子并治虛損夢遺

白濁

沙苑蒺藜取淨末四兩水一蓮鬚取淨末

覆盆子去核取山茱萸肉取淨芡實取淨

龍骨煨飛淨

右用伏蜜筋煉以紙粘去淨冰滴水成珠者止

用四兩將前五味藥末先以淡酒膏和作一塊再

入煉蜜搗千杵丸如豌豆大每服三十九空心鹽

湯送下忌房室二十日此藥延年益壽令人多子
五子衍宗丸 此藥添精補髓疏利腎氣不問下焦
虛實寒熱服之自然平秘

甘州枸杞子 兔絲子 酒蒸焙成

北五味子 一兩 覆盆子 酒洗去心 車前子 炒二

右五味俱擇道地精新者焙曬乾共為細末煉蜜
丸如桐子大每日空心服九十九丸卧時服五十九
沸湯鹽湯任下忌師尼鰥寡之人及雞犬見
煉真丸 治高年體豐痰盛飽饑肥甘恣情房室上

醫通卷十五 婦人上

盛下虛及髓藏中多著酒溼精氣不純不能生子
者服之並効

大腹子 七兩童 茅山蒼朮 去皮泔浸

人參 茯苓 各三 厚黃藥 三兩童

鹽水各 鹿茸 對酥炙 大茴香 去子

淫羊霍 去刺羊 澤瀉 蛇牀子 酒炒

白蓮鬚 酒洗 沉香 另末勿 五味子 各一

金鈴子 即川棟子酒煮 鳳眼草 一兩即

中有子一粒形如鳳眼 故各如無槁根皮代之

右為末用乾山藥末調糊代蜜為丸空心鹽湯送
下三四錢臨卧温酒再服二錢

煉真者煨煉精氣使之純粹也故方中專以太腹
佐黃藥茅朮滌除身中素蘊溼熱則香茸茴香不
致反助濁溼痰氣何慮年高艱嗣哉

抑氣散 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭目眩
暈腦滿體疼怔忡皆可服

香附 製炒淨 陳皮 焙二

甘草 炙各

醫通卷十五 婦人上

右為細末每服二三錢不拘時白湯調下

秦桂丸 即秦 治婦人子宮虛寒不能攝精成孕

熟附子 二枚 桂心 勿見 厚朴 薑汁

厚杜仲 酒炒 細辛 秦艽 酒洗

白薇 半夏 醋炒 當歸身

川牛膝 酒淨 沙參 各二 茯苓

人參 各四

煉白蜜丸梧子大空心温酒下五七十九得孕二
三月不可更服忌牛馬肉犯之難產

此方鄭心芽手裁。數世本減附子。兩細辛三兩。茯苓二兩。削去乾薑。易入當歸。以和陽藥之性。不致陽無以化。且免經水紫黑。胎息不育之虞。其秦芫朴。專理痰積。沙參。膝。薇。專清濁帶。使子戶溫。和陽施陰化。孕自成矣。

皴血丸 局方 治婦人血海虛冷。百病變生。氣血不調。時發寒熱。或下血過多。或久閉不通。崩中不止。帶下赤白。癥瘕癖塊。攻刺疼痛。小腹緊滿。脇肋脹痛。腰重脚弱。面黃體虛。飲食減少。漸成勞怯。及經

醫通卷十五 婦人

矣

脈不調。胎氣多損。胎前產後一切病。患無不治。療

熟地黄

甘菊

茴香

當歸身

延胡索

赤芍藥

桂心

蒲黃

蓬朮

牛膝

香附

蓬朮

右十一味。為末。用細黑豆一升。醋煮候乾。為末。再入米醋三碗。煮二碗。為糊。和九。梧子大。每服二十丸。溫酒或醋湯下。血氣攻刺。煨薑湯下。癥瘕絞痛。當歸酒下。忌鴨肉羊血。

方以皴血命名。取醋之酸。引藥

精氣也。蓋血海之虛。其皆緣肝藏生陽

宜散濁陰。而致子藏不淨。子藏不淨。烏

成胎息乎。故立方專以推陳致新。為綱。肯是以清

熱散瘀之劑。反過於歸地。桂。茴等味。使子藏安和。

生生之機。不竭矣。大抵婦人之百病。變生。總屬氣

血不調。即寒熱虛怯。經閉崩中。靡不因血海不淨。

所致。其妙用。尤在醋煮。烏。豆。以血得酸。則斂不致

滑脫。亦得辛則散。不致留畜。更慮陰寒內結。勢必

醫通卷十五 婦人

矣

虛陽上浮。故用菊花以清在上之虛陽。冷積胞門。

勢必熱留經隧。又需牛膝。赤芍。輩以祛在經之積

熱。與秦桂丸中用厚朴。秦芫。白薇。沙參之意。不殊

良工苦心。非深究其旨。何以獲先哲立方之旨哉。

但服此而得坤儀者多。良由純屬血藥。血偏旺而

氣偏餒。是不能無陰勝之過。宜於方中增入人參

一味。或等分。或倍加。隨質而助陽和之力。鼓氣

之氣。為乾道之基。未始其為不可也。

再詳廣嗣諸方。男子世稱葆真丸。婦人首推秦桂

丸然服之有驗有不驗者質之偏勝不同也蓋男
子腎藏陽衰婦人血海虛冷則二方為專藥若男
子體肥痰盛精氣不純婦人瘀積留著子戶不淨
豈可純以緩腎溫經為事哉又需煉真丸之大腹
芽木金鈴祛滌蘊澤鐵血丸之蓬朮牛膝甘菊清
解瘀熱為合劑耳用方者審諸
大黃丸 千金 治帶下百病無子服藥十日下血二
十日下長蟲及青黃汁三十日病除五十日肥白
而能成孕

醫通卷十五 婦人上

辛

大黃 破如豆 粒熬黑 柴胡 芒硝 各一
芍藥 五兩 乾薑 蜀椒 各一
茯苓 雞子大 一枚
右七味為末蜜和丸如梧子大先食米飲服七丸
加至十丸以知為度五日微下
桂心茯苓丸 金匱 治妊娠癥瘕下血胎動在於臍
上
桂心 茯苓 升丹皮
桃仁 去皮 大熬 赤芍藥 等分

右五味蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知利
至三九

當歸貝母苦參丸 金匱 治妊娠煩熱小便難

當歸 貝母 去心 苦參 等分

右三味蜜丸如小豆大飲服三九加至十九

葵子茯苓散 金匱 治妊娠小便不利惡寒頭眩

葵子 五兩向日 葵子也 茯苓 二兩

右二味為散飲服方寸七日三服

白朮散 金匱 治妊娠胎寒帶下

醫通卷十五 婦人上

辛

白朮 芍藥 各二 蜀椒 三分
牡蠣 熬五 分
右四味為散酒服一錢七日三服
半夏茯苓湯 千金 治妊娠惡阻心煩頭眩惡寒汗
出少食
半夏 生薑 各四 分 乾地黃
茯苓 各二 分 橘皮 旋覆花
剉辛 人參 芍藥
芍藥 桔梗 甘草 各一 錢

右十二味水煎服二劑便急使茯苓丸令能食便強健也

茯苓丸 千金

不能健運

茯苓

人參

桂心 熬

乾薑

半夏

橘皮 各一兩

白朮

葛根 煨

甘草 炙

枳實 各二兩

右十味為末蜜和丸如梧子大飲服二十九漸加至三十九日三妊娠忌桂故熬

醫通卷十五 婦人上

李

乾薑地黃散

治妊娠漏胎下血

乾薑 兩

乾地黃 六兩 切片

右二味為散酒服方寸七日三服

香桂散

治子死腹中胞衣不下服片時如手推出

肉桂 三錢

麝香 一分

為散酒煎和滓服加生川烏三錢為下私胎猛劑

鯉魚湯 千金

治妊娠遍身浮腫胎間有水氣

白朮

茯苓

當歸

芍藥 各三錢

橘皮 一錢

生薑 五片

活鯉魚 重一兩許

右六味先煮鯉魚至熟澄清取汁內藥煎汁分五

服日三夜二虛加人參一錢五分

竹瀝湯 千金

治妊娠子煩

竹瀝 一斗

麥門冬 去心

防風

黃芩 各三錢

茯苓 四錢

右五味以水四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥更作

加味竹葉湯 治妊娠心煩不解名日子煩

醫通卷十五 婦人上

李

白茯苓 錢半

麥門冬 去心 一錢半

黃芩 一錢

人參 一錢

竹葉 五片

粳米 一撮

水煎空腹熱服肥人加半夏生薑原方無人參粳米

右膏大青湯 千金

治妊娠傷寒頭疼壯熱肢節煩疼

石膏 八錢

大青

黃芩 各三錢

葱白 四莖

前胡

知母

梔子仁 各四錢

右七味水煎去滓溫服

此方既可散邪又能安胎允為妊娠傷寒溫熱諸
行神方非千金不能立也

膠艾榴皮湯 千金 治妊娠利下不止

阿膠 艾葉 酸石榴皮 等分

右三味水煎溫服

鍾乳湯 千金 治婦人肺胃虛寒乳汁不通

石鍾乳 四錢 甘草 二錢 漏蘆 二錢

通草 枳實根 半兩

右五味水煎溫服○一方有桂心

醫通卷十五 婦人上 毒

麥門冬散 千金 治婦人寒熱阻逆乳汁不通

麥門冬 通草 理石 即石膏 之硬者

石鍾乳 等分

右四味為散先食酒服方寸匕日三有熱去鍾乳 加有蘆如無

理石以石 膏代之

白薇散 千金 治妊娠肺熱遺尿

白薇 白芍 等分

右二味為散酒服方寸匕日三夜二服

芩朮芍藥湯 千金 治妊娠腹中滿痛又手不得飲

食

黃芩 二錢 白朮 六錢 白芍 四錢

右三味水煎分三服半日令盡微下水則易產日
飲一劑為善

全生白朮散 治妊娠子腫

白朮 一兩 薑皮 大腹皮 去外垢 內膜盡

橘皮 茯苓 各半

為散每服三錢水煎和滓日三服

此方較澹寮五皮湯稍善中間惟白朮易桑皮而

醫通卷十五 婦人上 毒

功用懸殊點鐵成金手也

兔腦丸 治妊娠難產催生第一神方

麝香 取當門 一錢 明乳香 二錢 母丁香 二錢

右為細末揀臘月天醫日修合活勞兔腦為丸如

芡實大珠砂為衣蠟和收藏待臨盆腰痛兒不能

下用白湯隔圖送下其子立產兔用小者為真若

形如兔而大者乃獐也誤用則不驗即真兔之死

者亦不驗修合時忌見雞犬婦人孝服及諸魔物

瘦胎飲 即枳 殼散 治妊娠體肥胎氣不運在九箇月服

黃芩酒炒 一兩

枳殼炒 一兩

為散每服二錢。饑時砂仁湯下。不可多服。恐傷正氣。瘦弱者勿服。

琥珀黑龍丹局方 治死胎胞衣不下。敗血逆冲。

五靈脂酒研澄 當歸 川芎

乾地黄 良薑各三

右五味入煬成確內。鹽泥封固。炭火煨通紅。去火候冷。研細入下項藥。

琥珀 百草霜 硫黃各三錢半

醫通卷十五 婦人上

花藥石煨 乳香各三錢

右五味逐為細末。同前藥和勻。米醋和丸。如彈子大。臨服以炭火煨通紅。投入生薑自然汁內。浸碎。研化。以無灰酒入麝香少許。不時頻服。一口加童子小便尤宜。

一味參蘇飲 治惡露入胞。脹大不能出。及產後敗血衝肺。喘滿而赤。大便溏泄者。禁用。

人參 蘇木碎各五錢

水煎人童子小便熱服

牛膝湯千金 治兒產胞衣不下

牛膝 瞿麥各一兩 當歸

通草各兩 滑石二兩 葵子半升

右六味水煎分三服。一方無滑石。有桂心一兩。

四烏鯁一蔥茹丸虛損 膠艾湯四物

大黃甘遂湯小承氣 抵當湯抵當

當歸芍藥散四物 小建中湯桂枝

溫經湯四物 加味逍遙散虛損

歸脾湯保元 小柴胡湯方劑

醫通卷十五 婦人上

四物湯方劑 補中益氣湯保元

十全大補湯保元 六味丸八味

八珍湯四君子 大溫經湯四物

逍遙散虛損 導痰湯二藥

滾痰丸痰飲 七氣湯方劑

保元湯方劑 藿香正氣散脾胃

八物湯四君子 艾煎丸四物

養胃湯脾胃 四烏湯四物

桂枝湯方劑 增損四物湯四物

六君子湯 湯四君子 下	大建中湯 湯保元 下	腎氣丸 丸八味 下	加減龍蒼丸 丸三黃 下	加減腎氣丸 丸八味 下	獨參湯 湯保元 下	人參養營湯 湯保元 下	三補丸 丸三黃 下	砂砂安神丸 丸勞倦 下	生料八味丸 丸方祖即八 味丸作湯	參苓白朮散 散四君子 下	異順丸 丸虛損 下	烏骨雞丸 丸虛損 下	異功散 散四君子 下	加減四物湯 湯四物 下	二陳湯 湯方祖 下	平胃散 散方祖 下	內補常歸建中湯
-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------

醫通卷十五 婦人上 六

車蘼分清飲 飲小便不 禁門	局方七氣湯 湯方祖 下	越鞠丸 丸鬱門	大補丸 丸方祖 下	清心蓮子飲 飲生脈 散下	清胃散 散助血 門	四七湯 湯二陳 下	香砂六君子湯 湯四君子 下	佐金丸 丸方祖 下	二妙散 散大補 下	控涎丹 丹十棗 下	聚精丸 丸虛損 下	滋腎丸 丸大補 下	附子湯 湯木附 下	乾參人參半夏湯 湯理中 下	當歸散 散四物 下	理中湯 湯方祖 下	沉香降氣散 散氣門
---------------------	-------------------	------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------

紫蘇飲 飲四物 下	當歸補血湯 湯保元 下	加味歸脾湯 湯保元 下	升陽除溼湯 湯平胃 散下	七味白朮散 散四君子 下	胃風湯 湯四君子 下	香殼散 散畜血 門	下瘀血湯 湯小承氣 下	當歸活血湯 湯畜血 門	聖愈湯 湯保元 下	香蘇散 散傷寒 門	胃苓湯 湯平胃 散下	葱白香豉湯 湯傷寒 門	涼膈散 散方祖 下	枳實理中湯 湯理中 下	承氣湯 湯方祖 下	黃連解毒湯 湯三黃 下	桂枝白虎湯 湯白虎 下
-----------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

醫通卷十五 婦人上 六

人參白虎湯 湯白虎 下	厚朴湯 湯平胃 散下	甘草乾薑湯 湯理中 下	厚朴生薑半夏甘草人參 湯下	湯二陳 下	黃芩芍藥湯 湯桂枝 下	香連丸 丸從金 下	連理湯 湯理中 下	千金三物膠艾湯 湯病門	駐車丸 丸方祖 下	白頭翁加甘草阿膠湯 湯病門	導赤散 散暑門	生脈散 散方祖 下	加味清胃散 散助血 門	五苓散 散方祖 下	黃芩清肺飲 飲梔子豉 下	川芎茶調散 散頭痛 門
-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------	------------	-----------------	-------------------	-----------------	--------------------	-------------------

千金托裏散 保元湯下

黑神散 門和

代抵當丸 抵當湯下

佛手散 四物湯下

加味佛手散 四物湯下

婦人門下

枳實芍藥散 金匱

枳實 燒令黑勿太過

右二味杵為散服方寸七日三服并主癰膿以麥

醫通卷十五 婦人下

生地黃黃連湯 四物湯下

大七氣湯 局力下

達生散 四物湯下

五積散 平胃散下

治產後腹痛煩滿不得卧

全

粥下之

方中枳實燒黑全是散逐瘀積故癰膿亦能主之

竹葉湯 金匱

竹葉 一把

桔梗

甘草 炙各一錢

右九味水煎服温覆使汗出○項強加附子嘔者

加半夏

此桂枝湯去芍藥加竹葉葛防枯梗人參因方後

治產後中風發熱面赤喘滿而頭痛

防風

芍藥

大棗 四枚

生薑 三片

所加附子向來混入方內故此著明不便歸入方祖以混檢閱

竹皮大丸 金匱

生竹茹

桂枝

右五味末之煮棗肉和丸彈子大以飲服一九日

三夜二服有熱倍白薇煩滿加栝實

千金三物黃芩湯 金匱

黃芩 一錢

醫通卷十五 婦人下

右三味水煎熱服

上三味皆純陰苦寒傷胃滯血之藥產後雖有煩

熱難以輕用當時立方必有質壯氣盛脈證俱實

能食便鞭者始堪任此用者審之千金義見中風

門千金三黃湯下

抵聖散

治產後腹脇滿悶嘔吐

人參

洋蘭葉 四錢

為散每服四五錢水煎入薑汁數匙和滓熱服日

二。三。度。以。嘔。吐。止。為。効。有。瘀。加。炮。黑。山。查。肉。半。兩。
按。方。中。赤。芍。性。味。酸。寒。非。產。後。嘔。吐。者。所。宜。宜。易。
赤。茯苓。下。水。止。嘔。為。當。此。必。傳。寫。之。誤。耳。
遠。志。湯。千金。治。產。後。心。悸。恍。惚。語。言。錯。亂。

遠志肉 麥門冬 人參
甘草 炙 當歸 桂心
芍藥 各一錢 茯苓 半錢 生薑 三片
大棗 四枚
右十味水煎去滓溫服心胸逆氣加半夏七枚

醫通卷十五 婦人下 三

嚴氏清血散 治產後氣虛血暈

人參 川芎 各一兩 荆芥穗 二兩
澤蘭葉 甘草 各八錢
為散沸湯溫酒各半盞調服二錢童便尤良
辰砂七珍散 治產後血虛不語
人參 葛蒲 各一兩 川芎 七錢
細辛 二錢 防風 四錢 甘草 炙三錢半
辰砂 三錢
為散每服三錢薄荷湯調服○肥人加半夏茯苓

蠶蠶瘦人加當歸蠟尾鈎藤
調經散 局方 治產後敗血乘虛停積於五藏循經
流入於四肢留滯日深腐壞如水漸致身體面腫
浮腫或因產敗血上干於心心不受觸致心煩躁
卧起不安如見鬼神言語顛倒並宜服之

赤芍藥 沒藥 別研 桂心
琥珀 別研 當歸 各一兩 麝香 別研
細辛 半錢
右七味為末和勻每服一錢溫酒入生薑汁少許

醫通卷十五 婦人下 三

服大抵產後虛浮醫人不識便作水氣治之凡治
水氣多以導水藥極是虛人夫產後既虛又以藥
虛之是謂重虛往往因致枉夭但服此藥血行腫
消即愈

當歸芍藥湯 千金 治產後虛羸
當歸身 錢半 芍藥
人參 各二錢
乾地黄 二錢 桂心
生薑 三片 大棗 五枚
甘草 各一錢
右八味水煎去滓溫分三服

琥珀地黃圓 治產後惡露未淨胸腹痛小便不利

琥珀 另研 延胡索 同糯米當歸 各一

蒲黃 四兩生 生地黃 乾者 生薑 一兩

右將地黃咀碎酒浸生薑切片各搗取汁留滓無

油杓中用薑汁炒地黃滓地黃汁炒薑滓各乾為

末忌犯鐵器煉白蜜丸彈子大每服一九空腹當

歸煎湯調服

甘竹茹湯 千金 治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹 一把 人參 茯苓

醫通卷十五 婦人下 命

甘草 黃芩 各三

右五味水煎分三服

知母湯 千金 治產後乍寒乍熱手足身温心胸煩

滿 知母 六錢 芍藥 黃芩 各四

桂心 甘草 各二

右五味水煎分三服

淡竹茹湯 千金 治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中

煩亂不解

淡竹葉 一把 麥門冬 一兩 甘草 三錢

小麥 一握 生薑 二片 大棗 三枚

右六味水煎分三服虛悸不已加人參少食加饅

米氣逆加半夏

當歸芍藥湯 千金 治產後煩滿不安

當歸 三錢 芍藥 人參

麥門冬 去心 乾地黃 各半 桂心 二錢

生薑 三片 大棗 三枚 粳米 一握

右九味水煎分三服

醫通卷十五 婦人下 命

扶神湯 千金 治產後衝悸志意恍惚語言錯謬

扶神 人參 芍藥

當歸 各六 桂心 甘草 各三

生薑 三片 大棗 三枚

右八味水煎分三服

人參丸 千金 治產後大虛心悸志意不安恍惚恐

畏虛煩不眠少氣

人參 茯苓 麥門冬 去心

薯蕷 各二 澤瀉 甘草

葛蒲

乾薑

桂心各一兩

右九味為末。蜜和棗膏九。如梧子大。空心酒服。二

三十九日。三夜一服。

蜀椒湯千金

治產後心痛大寒

蜀椒二合炒

芍藥

當歸

半夏

甘草炙

桂心

人參

茯苓各二錢

蜜一合

生薑汁半合

右十味。先煮蜀椒。令沸。內諸藥。去滓。入薑汁。蜜。禁

醫通卷十五 婦人下

全

勿冷食

此本金匱三物大建中。但飴與蜜稍變耳。

大巖蜜湯千金

治產後心痛

乾地黄

當歸

獨活

甘草炙

芍藥

桂心

遠志肉

細辛各二錢

吳茱萸去閉口者半合

乾薑炮

蜜半盞

右十一味。水煎。去滓。內蜜。重煎。溫分二服。

羊肉生地黃湯千金

治產後三日腹痛。補中益氣。

强氣力消血

羊肉一觔

生地黄二兩

人參

當歸

芍藥各一兩

桂心

芎藭

甘草各半兩

右八味。先煮羊肉。去滓。煎藥。分四日。三夜一服。○

有風熱。去人參。地黄。肉桂。加防風。黃耆。生薑。欬嗽

本方加紫苑。欬冬。細辛。五味。腰痛。本方加杜仲。黃

耆。白朮。附子。草薢。

鹿茸散千金

治婦人漏下不止

醫通卷十五 婦人下

全

鹿茸酥炙

阿膠蛤粉炒

烏賊骨醋炒

當歸各二兩

蒲黃篩淨二兩

右五味為散。溫酒調服。方寸匕。日三服。○本方去

阿膠。烏賊骨。名蒲黃散。治同前。

狼牙湯 治婦人陰中生瘡。蝕爛

狼毒牙一兩

右一味。水煎。取汁。半盞。以綿纏箸頭。如繭。浸湯。瀝

陰中日三四遍。

小柴胡湯方祖

大承氣湯小承氣湯下

當歸生薑羊肉湯 痲門

陽旦湯 桂枝湯下

內補當歸建中湯 桂枝湯下

八珍湯 四君子湯下

芎歸湯 四物湯下

黑龍丹 本門

龍齒清菟散 顛振門

五積散 平胃散下

來復丹 金液丹下

醫通卷十五 婦人下

下瘀血湯 抵當湯下

白頭翁加甘草阿膠湯 痲門

佛手散 四物湯下

十全大補湯 保元湯下

二陳湯 方祖

夫笑散 本門

花藥石散 虛損門

平胃散 方祖

二味參蘇飲 本門

全

理中湯 方祖

六君子湯 四君子湯下

四烏湯 四物湯下

膠艾湯 四物湯下

地黃飲子 中風門

獨參湯 保元湯下

當歸補血湯 保元湯下

六味丸 八味丸下

醋煎散 本門

沉香降氣散 氣門

桃仁承氣湯 小承氣湯下

當歸芍藥散 四物湯下

導痰湯 二陳湯下

柴胡清肝散 小柴胡湯下

四物湯 方祖

補中益氣湯 保元湯下

增損四物湯 四物湯下

參蘇飲 傷寒門

增損柴胡湯 小柴胡湯下

指迷七氣湯 局方七氣湯下

逍遙散 虛損門

越鞠丸 鬱門

小建中湯 桂枝湯下

金匱旋覆花湯 本門

都炆丸 八味丸下

四君子湯 方祖

黃耆建中湯 桂枝湯下

醫通卷十五 婦人下

柴胡四物湯 小柴胡湯下

局方七氣湯 方祖

香砂六君子湯 四君子湯下

桔梗湯 方祖

異功散 四君子湯下

生脈散 方祖

靈砂丹 金液丹下

歸脾湯 保元湯下

香蘇散 傷寒門

全

敗毒散 小柴胡湯下

伏龍肝湯 痲門

人參養營湯 保元湯下

大柴胡湯 小柴胡湯下

四神散 四物湯下

養胃湯 平胃散下

枳實理中湯 理中湯下

代抵當丸 抵當湯下

紫蘇飲 四物湯下

葱白香豉湯 傷寒門

烏骨雞丸 虛損門

玉燭散 四物湯下

五苓散 方祖

川芎茶調散 頭痛門

甘草乾薑湯 理中湯下

千金伏龍肝湯 本門

四七湯 二陳湯下

當歸拈痛湯 溼門

加味逍遙散 虛損

加味歸脾湯 保元

清胃散 明和

千金芎藭湯 湯下

腎氣丸 丸下

千金鍾乳湯 本門

千金麥門冬散 本門

豬膚髮煎 黃輝

益氣養營湯 湯下

八味丸 方祖

豆豉餅 湯下

龍膽瀉肝湯 腸痛

加減八味丸 丸下

小兒門上

紫丸 千金 治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫熱

醫通卷十五 小兒上

牛

汗後熱不歇及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐現

食瀰先寒後熱

赤石脂

代赭石 各一兩

巴豆 三十粒去油

杏仁 五十枚去波尖

右四味爲末加蜜少許密器中收三十日兒麻子

大一丸與少乳令下食頃後與乳勿令多至半日

當小下熱除百日兒如小豆一丸夏月多熱善令

發疹慎用紫丸無所不療雖下不虛人

黑散 千金 治小兒變蒸中挾時行溫病或非變蒸

時而得時行者

麻黃 淨末

杏仁 二錢

大黃 淨末

右三味和勻內密器中一月兒服小豆大一枚以

乳汁和服抱令得汗汗出溫粉粉之勿見風百日

兒服棗核大一枚溫粉方用龍骨牡蠣各散爲細

末取淨三錢入生黃耆末三錢和粳米粉一兩稀

絹包緩緩撲之

大連翹湯 治溼毒利小便

連翹

瞿麥

車前

醫通卷十五 小兒上

牛

木通

滑石 研

當歸

赤芍

防風

荆芥

柴胡 各一錢

蟬蛻

黃芩 酒炒

山梔 炒黑

甘草 炙各七分

水煎食前熱服熱甚加酒大黃兒小量與

本方去山梔加紫草名連翹防風湯治痘疹熱毒

壅閉小便不通

鈞藤散 治胎驚夜啼

鈞藤鈎

茯神

茯苓

川芎

木香

芍藥

當歸各一分

甘草各五分

為散每服一錢七入薑棗煎服心經有熱面赤去

木香加硃砂少許驚搐加蠟尾五分

柳華散 治口瘡赤爛

黃檗細末

蒲黃

青黛

人中白煨過

為散臨用加冰片少許再研敷之

長砂膏 治口禁目閉啼聲不出吐乳不化

醫通卷十五 小兒上

空

辰砂

牙硝各一分

硼砂

全蠍各五分

珍珠

麝香各三分

共為細末入生白蜜研膏每用豆大許薄荷湯下

潮熱甘草湯下月內兒塗乳頭令兒吮之

胡黃連丸 治熱疳

胡黃連

川黃連各半兩

硃砂二錢另研

為末填入豬膽中以線紮懸掛銚中酸漿水煮數

沸取出入蘆薈麝香各二錢飯糊丸如麻子大每

服一二十九米湯下若熱疳生蟲去硃砂加蕪荑

仁鶴蝨青皮雷丸

貼敷法 治百口內嬰兒發搐

麝香一分

蠟尾

蜈蚣各五分

牛黃三分

青黛三分

薄荷葉三分

右除牛黃先搗蠟尾等五味各取淨末再入牛黃

細研煮紅棗肉和成膏塗綿貼顙上四邊畧出一

指以手烘煖頻頻熨之

安神丸 治心經虛熱睡中驚悸夜啼

人參

棗仁

茯神

醫通卷十五 小兒上

空

半夏製各一分

當歸

橘紅

芍藥各七分

五味子七粒

甘草各三分

為末薑汁和丸芡實大每服一丸薄荷湯化下

大青膏 治驚搐吐瀉身温

天麻各半錢

青黛二錢

白附子

乾蠍去毒各三錢

烏梢蛇肉酒煮焙乾三錢

天竺黃二錢

麝香二分

硃砂飛淨五分

為末上白蜜和膏每服豆大許月中兒半粒薄荷

湯化下或塗乳頭吮之

鈎藤飲 治脾虛傷風身熱足冷欲成慢驚

鈎藤鈎 蟬蛻 防風

人參 麻黃 白殭蠶炒

天麻 蠟尾大毒各五分 川芎

甘草各三分 麝香一分研

水煎溫分二三服

愚按慢驚屬脾胃虧損所致前方乃辛溫散表之藥無調補之功須審而用之徐用誠云小兒脾虛傷風身熱足冷欲成慢驚用鈎藤飲然必大便實

醫通卷十五 小兒上

五

者為宜若吐瀉痰逆身無大熱而四肢清冷當用烏蠍六君此湯非所宜也

抱龍丸易方 治急驚

陳膽南星 一兩 天竺黃 三錢 辰砂飛淨半人劑半為衣

雄黃各錢半 麝香五分

右五味為末甘草湯丸皂角子大辰砂為衣每服一丸薄荷湯化下服後嘔吐稠痰即愈如痘疹發驚去辰砂易琥珀三錢
刊驚丸 治急驚發熱喘脹腹滿大小便秘

天竺黃 輕粉 青黛各一錢

黑牽牛頭末微炒三錢

為末蜜丸豌豆大一歲兒服一丸薄荷湯化下

羌活散即人參羌活散 治傷寒驚熱

羌活 獨活 柴胡

前胡 川芎 茯苓

桔梗 枳殼 廣皮

天麻 人參等分 甘草減半

為散每服一二錢加生薑一片薄荷五葉水煎去

醫通卷十五 小兒上

五

滓稍熱服取微汗効

射干湯千金 治小兒發熱喘欬喉中水雞聲

射干 麻黃 紫菀

甘草 半夏 桂枝各一錢

生薑 一片 大棗 三枚

右八味水煮分三服服後熱除而喘欬不已本方去麻黃射干大棗加細辛欬冬阿膠白蜜
龍膽湯千金 治嬰兒出腹血脈盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大吐哕者若已能進哺食人不消壯

熱及變蒸驚癇方悉主之

龍膽

釣藤鈎

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘草各一錢

蛻螂二枚

大黃三錢

右十味以水煎五合。兒生一日至七日分一合為三服。兒生八日至十五日分一合半為三服。兒生十六日至二十日分二合為三服。兒生二十一日至三十日分三合為三服。兒生三十一日至四十

醫通卷十五 小兒上

卷

日盡以五合為三服即止勿再服也

益黃散 局方 治脾虛乳食不化

陳皮一兩

青皮

訶子肉煨

甘草各半兩

丁香二錢

右為散每服二三錢水煎服或黑糖調服一錢

益黃不用補益中州反用陳青二橘辟除陳氣其

旨最微嬰兒久瀉連綿不已乳食積滯於內故需

二皮專理肝脾宿陰即兼訶子以兜瀉下脫丁香

以溫理中州甘草以和脾氣深得瀉中寓補之法

非同達斯義難與言至治也

肥兒丸 局方

治食積五疳頭項結核臂瘦髮稀發

熱作渴口疳目翳小便色白腹大青筋等證

肉豆蔻煨

史君子去殼

麥蘖炒

黃連薑汁炒

神麴炒各五兩

檳榔二十枚

木香二兩

神麴炒各五兩

檳榔二十枚

右七味為末蒸餅調糊稍加白蜜丸如彈子大每服一丸空心米飲調服江石山加白木五兩山查肉枳實各二兩此方近世所傳尚多胡黃連雷丸蕪莖等味大苦

醫通卷十五 小兒上

卷

大寒大傷元氣而因名誤實故世喜服之意謂有

益於兒也曷知立方之義本為疳熱腹脹羸瘦故

用祛熱伐肝之劑消去疳積元氣得復兒自肥矣

若本無疳熱服之與引寇破家何異嘗見富有之

家從幼好服此丸至十歲外漸至蒸熱欬嗽蓋緣

真陽虧損不能振生發之令而成童勞者不少奈

何習俗成風多所未悟因特表而出之

加味陷胃丸 治痰積痞滿疳熱喘嗽

黃連薑汁

半夏薑製

枳實

焰硝各三錢 輕粉二錢 滑石飛淨一兩
煉白蜜九芡實大。大兒五六丸。周歲兒一九。沸湯調化服。

蟾蜍丸 治無辜疔

蟾蜍大者數枚
以糞蛆三杓置桶中。以尿浸之。將蟾活搗爛。與蛆食之一晝夜。用布袋盛。蛆置急流水中漂淨。取出瓦上焙乾。入麝少許。陳米飯丸。麻子大。每服二三十丸。米湯或砂糖湯服之。一服虛熱退。二服煩渴

醫通卷十五 小兒上

一六

止三服瀉利愈。或用陳米炒為粉。入糖霜作餅服之亦可。

馬鳴散 治口舌生瘡。痘後疔爛。

人中白煨一錢 蠶退紙如無蠶代之 五倍子生半煨半

白礬生半煨半 硼砂生半煨半

為散。先以青布蘸水拭淨。用蠶翎管吹口中患處。

蘭香散 治鼻疔赤爛及癘風證。

蘭香葉二錢即香草 銅綠 輕粉各五分

為散。乾燥患處。乾者香油調敷。

白粉散 治諸疔瘡

烏鯛骨三錢 白芨二錢 輕粉一錢

為散。漿水洗拭乾敷之。

如聖丸 治熱疔善食腹大

史君子肉二兩 胡黃連 川黃連

白蕪荑仁炒各一兩 乾蟾五枚煨存性 麝香五分

右為末。蜜丸。彈子大。每服一九。人參湯化下。

木香丸 治冷疔泄瀉少食

木香 肉豆蔻 砂仁炒各三錢

醫通卷十五 小兒上

一六

麝香一錢 續隨子去油三錢 乾蟾三枚煨存性

為末。蜜丸。菉豆大。每服五丸至十五丸。薄荷湯送下。虛者去續隨子。加薑桂參朮。

止汗散 治腫中多汗

故蒲扇燒存性

為末。每服一二錢。溫酒或烏梅湯調服。

蒲灰止血利小便。與蒲黃不異。汗即血之液。故取多曾沾汗之舊扇燒灰。主治睡汗。同氣相求之妙。

世醫都未悟也。

石南散 治小兒通睛

石南葉 一兩 蒸蘆 三分 瓜蒂 七枚

為細末每用少許吹鼻中日三內服牛黃平肝藥

龜胸丸 治龜胸高起

大黃 酒煨 麻黃 去節 百合

桑皮 薑汁炒 木通 枳殼

甜葶藶 微炒 杏仁 炒黑 芒硝 等分

上七味為細末以杏仁芒硝同研如脂蜜和丸如芡實大每服一九葱白湯化下

醫通卷十五 小兒上

菖蒲丸 治心氣不足不能言語

石菖蒲 赤茯苓 各三錢 人參 五錢

丹參 二錢 天門冬 心切焙 麥門冬 去心

遠志肉 製 甘草 炙 各一錢

為末蜜丸赤豆大硃砂為衣每服二三十丸空心

燈心湯下

清胃散 治血 異功散 湯下 四君子

瀉黃散 治風 六味地黃湯 丸下 八味

八味丸 方配 逍遙散 湯下 庫損

保元湯 方劑

溫脾散 湯下 四君子

活命飲 湯下 癰疽

補中益氣湯 湯下 保元

白餅子 丸下 備急

瀉青丸 湯下 備急

辰砂妙香散 湯下 瀉血

四君子湯 方劑

桂枝湯 方劑

六君子湯 湯下 四君子

人參安胃散 湯下 保元

四物湯 方劑

小續命湯 湯下 續命

柴胡清肝散 湯下 小柴胡

硃砂安神丸 湯下 傷勞

加味導痰湯 湯下 二陳

人參敗毒散 湯下 小柴胡

烏蠅六君子丸 湯下 四君子

醫通卷十五 小兒上

加味清胃散 湯下 切血

丁香棟實丸 湯下 痼門

保和丸 湯下 傷飲

龍膽瀉肝湯 湯下 瀉血

錢氏白朮散 湯下 四君子

大柴胡湯 湯下 小柴胡

參蘇飲 湯下 傷寒

桔梗湯 方劑

小青龍湯 湯下 桂枝

加味逍遙散 湯下 虛損

加味通心散 湯下 痼門

惺惺散 湯下 四君子

理中湯 方劑

清涼飲 湯下 保元

麻黃湯 方劑

二陳湯 方劑

涼膈散 方劑

三拗湯 湯下 麻黃

全價麥門冬湯 <small>效嗽</small>	養胃湯 <small>胃</small>
玉露散 <small>白虎湯下</small>	吳茱萸湯 <small>嘔吐</small>
龍膽瀉肝湯 <small>脇痛</small>	小柴胡湯 <small>方和</small>
香連丸 <small>佐金丸下</small>	理苓湯 <small>理中</small>
升陽益胃湯 <small>保元湯下</small>	五苓散 <small>方和</small>
黃連犀角散 <small>痢門</small>	梔子仁湯 <small>梔子散下</small>
黃芩清肺飲 <small>梔子散下</small>	滋腎丸 <small>大補丸下</small>
蘆薈丸 <small>婦人門上</small>	四神丸 <small>泄瀉門</small>
消積丸 <small>備急丸下</small>	塌氣丸 <small>傷飲食門</small>

醫通卷十五

小兒上

三

瀉心湯 <small>三黃湯下</small>	導赤散 <small>暑門</small>
梔子豉湯 <small>方和</small>	酸棗湯 <small>虛損門</small>
當歸補血湯 <small>保元湯下</small>	竹葉石膏湯 <small>白虎湯下</small>
人參白虎湯 <small>白虎湯下</small>	三補丸 <small>三黃湯下</small>
十全大補湯 <small>保元湯下</small>	茵陳蒿湯 <small>溼門</small>
化蟲丸 <small>蟲門</small>	烏梅丸 <small>理中湯下</small>
沉香降氣散 <small>氣門</small>	冲和養胃湯 <small>保元湯下</small>
養肝散 <small>日門</small>	益氣聰明湯 <small>保元湯下</small>
决明雞肝散 <small>日門</small>	梔子清肝散 <small>耳門</small>

消風散 <small>效嗽門</small>	小烏沉湯 <small>血門</small>
止衄散 <small>衄門</small>	十補丸 <small>八味丸下</small>
獨參湯 <small>保元湯下</small>	生地黃黃連湯 <small>四物湯下</small>
小兒門下	
百祥丸 <small>治痘瘡黑陷喘脹便秘</small>	
紅芽大戟 <small>去傍枝葉</small>	
棗肉和丸粟米大三歲兒十九黑芝麻湯送下	
宣風散 <small>治痘毒腫乘腎腹脹黑陷</small>	
尖檳榔 <small>二個</small>	橘皮
	青皮

醫通卷十五

小兒下

三

甘草 <small>各二錢</small>	牽牛頭末 <small>四錢</small>
爲散三歲兒一錢七蜜水調服 <small>準繩無青皮</small>	
紫草飲 <small>治痘疹血熱口渴不能起發</small>	
紫草 <small>一錢</small>	甘草 <small>五分</small>
糯米 <small>一撮</small>	黃耆 <small>錢半</small>
水煎日再服○一方無黃耆糯米多人參蟬蛻穿山甲治氣虛血熱○一方無黃耆糯米多歸芍麻黃治血熱復感風寒不能起發	
按紫草飲本方係保元湯去參易紫草之製更迭	

一味而氣血攸分且補中寓發直是大匠運斤足
補桂岩未迨

消毒飲 治痘疹咽痛而起發遲

鼠粘子 研錢半

甘草 五分

荆芥 一錢

水煎日二服

化毒湯 治痘已發毒盛不能起脹

紫草茸 一錢

甘草

升麻

蟬蛻 各五分

地骨皮

黃芩 各七分

糯米 一撮

醫通卷十五 小兒下

水煎日再服

加味四聖散 治痘灌漿時熱渴引水或作癢

紫草茸 一錢

甘草 五分

黃耆 一錢

木通 七分

川芎 五分

木香 三分

人參 一錢

蟬蛻 七枚

水煎熱服

紫草水通湯 治痘疹行漿時氣虛血熱小便不利

不能起發

紫草 一錢

甘草 五分

木通 六分

人參

茯苓 各一錢

糯米 一撮

水煎不時溫服

快斑湯 快斑散

治痘毒盛起發遲而作癢

紫草 一錢

甘草 五分

木通 六分

人參 一錢

芍藥 一錢

蟬蛻 七枚

水煎熱服○一方多當歸防風○一方無芍藥多

當歸防風木香○

鼠粘子湯 治痘疹咽喉腫痛

鼠粘子 錢半

甘草 五分

荆芥 七分

醫通卷十五 小兒下

防風 六分

水煎不時溫服

如聖飲 治痘出不快咽喉不利

鼠粘子 一錢

甘草 五分

荆芥 七分

桔梗 六分

防風 五分

麥門冬 一錢

竹葉 十片

水煎不時溫服○一方無竹葉有黑參

獨聖散 治痘瘡毒盛伏陷

鼠粘子

麝香 沙研

紫草茸 等分

水煎日二三服

陳氏木香散 治痘瘡泄瀉後虛寒癢塌

木香 大腹皮 肉桂

半夏 青皮炒 柴胡

人參 赤茯苓 甘草炙

訶子肉 丁香等分

為散每服一二錢加薑棗煎服○自汗癢塌去腹

皮青皮柴胡加黃耆白朮糯米

陳氏異功散 治痘瘡灰白伏陷大渴泄瀉

醫通卷十五 小兒下

頁

木香 當歸身 茯苓

肉桂 肉豆蔻 丁香

熟附子 人參 白朮

半夏 厚朴 橘皮等分

為散每服二三錢人薑棗煎服

參耆四聖散 治痘胃虛少食發熱作渴而起發遲

人參 黃耆 白朮各錢

紫草茸 茯苓 芍藥各八分

當歸七分 木通六分 防風

甘草 川芎各五分 粳米一撮

水煎熱服

白螺散 治痘溼不收

白螺殼陳年十堵內者數過

為散痘瘡溼處乾摻之

金華散 治痘後肥疔

黃連 黃芩 黃檗

大黃 黃丹等分 輕粉減半

麝香少許

醫通卷十五 小兒下

頁

為散瘡溼則乾摻燥則豬脂調敷

生肌散 治疔蝕不斂膿血雜流

黃連 黃檗 甘草

五倍子 地骨皮等分

為散乾摻瘡上

白虎化斑湯 治痘為火悶不得發出

石膏生用 知母 生甘草

理蠟 麻黃 大黃生用

黃芩 連翹 黑參

竹葉

水煎大劑頻服

大黃甘草湯 金匱

治痘為痰悶不得發出

大黃 一倍

甘草 半減

水煎頓服取吐不應更服

余價本方用大黃四倍於甘草治食已即吐專取

大黃之沉降以泄逆滿之滯此用大黃再倍於甘

草治痰悶痘悶反借甘草之上溢以涌固結之積

一方小變而功用不同若此

醫通卷十五 小兒下

頁

椒梅丸 治痘為蟲悶不得發出

秦椒 三錢

烏梅

黃連 各一

為末飴糖丸如黍米大量兒大小分二三服服後

須臾得入蟲口次與紫草承氣湯下之

豬尾膏 治痘倒靨心神不寧

小豬尾尖上刺血數滴入冰片少許辰砂末一

錢同研成膏分作三五服木香湯化下

柴胡飲 治痘瘡初起熱甚表裏俱實

柴胡

防風

荆芥

黑參 各八分

大黃 二錢

黃芩

滑石 各錢

甘草 五分

水煎不時服

犀角消毒飲

治痘瘡發疔胃熱咽腫便秘

犀角 七分

連翹

鼠粘子 各一

荆芥 六分

甘草

防風 各五分

忍冬 錢半

水煎不時服

羌活湯 治痘疹未報點時熱甚不發頭痛腹脹

醫通卷十五 小兒下

頁

羌活

防風 各八分

荆芥

紫蘇 各七分

川芎 四分

赤芍 六分

枳殼 八分

山楂 錢

木通 五分

甘草 生三分

葱白 一葉

生薑 一片

水煎熱服

珍珠散 治痘疔

珍珠 生研

菜豆 生研

豌豆 燒研

髮灰 等分

為散腦脂調銀針挑破日含清水吮去毒血塗之

一方無菜豆加冰片少許

三仙散 治痘片

紫花地丁 番白草 當歸尾

為散水煎溫服

升均湯 治痘出隱隱不起面上紅暈成片根窠瑣

屑者

人參蘆 白木蘆 茯苓

甘草 生 防風蘆 桔梗蘆

水煎頓服取吐痰出氣升痘自起矣。一方無防

醫通卷十五 小兒下

風有升麻

羚羊解毒湯 治痘初起根窠不分額頰一片如朱

塗以此湯分之

紫草 黑參 各一錢 柴胡 八分

荆芥 六分 蟬蛻 四分 川芎 五分

紅花 三分 山查 一錢 連翹 八分

木通 七分 羚羊角尖 一錢

水煎去滓入羚羊角末攪勻服之

化斑湯 治痘與斑夾出用此消斑起痘

黑參 二錢 鼠粘子 一錢 柴胡 八分

荆芥 八分 防風 各六分 連翹 七分

木通 八分 枳殼 七分 蟬蛻 五分

生甘草 四分 燈心 二十 淡竹葉 十五

水煎溫日二三服

解毒飲子 治痘為風寒所遏而起發遲

柴胡 八分 紫草 六分 防風 七分

白芷 五分 荆芥 七分 鼠粘子 一錢

川芎 蟬蛻 木通 各五分

醫通卷十五 小兒下

水煎熱服

本方去白芷加黃芩羌活名荆防解毒飲

透肌散 即人參透肌散 治痘發遲作癢大便不實

人參 白木 茯苓

芍藥 紫草 各一錢 甘草 五分

蟬蛻 七枚 當歸 木通 各六分

糯米 一撮

水煎日再服

紫草快斑湯 治痘色不紅活不能起發

紫草

木通 六分

芍藥 各一
蟬蛻 七枚

甘草 五分

水煎熱服日再

二寶散 治痘頂色白肉紅腫而痘反不腫或黑陷不起。

生玳瑁

犀角 等分

為散人豬心血少許紫草湯調服。

大鼠粘子湯 治痘色紅根散不長發

鼠粘子 錢半

甘草 五分

當歸 七分

醫通卷十五 小兒下

聖

黃耆

連翹 各一

柴胡

黃芩

地骨皮 各八分

水煎溫服

四聖散 治痘出不快將欲倒靨。

紫草茸

黃耆 各一

甘草 五分

木通 六分

水煎熱服日三。大便秘加枳殼大便如常加糯

米氣虛少食加人參

按四聖散乃起痘乾紫倒靨之專藥其功在於紫

草茸一味世醫咸用紫草代充是以用多不効原

夫紫草茸本名紫鉞乃蟻穴麒麟竭樹脂凝結而

成不但可以活血起脹兼得蟲毒攻發內陷之邪

最銳且無鹹寒過潤作瀉之虞蓋緣紫鉞之功甚

於紫草故有紫草茸之名其實非一物也。

奪命丹 治痘觸邪黑陷不起

麻黃 去節蜜

升麻

山豆根

紅花

大力子

連翹

蟬蛻

紫草茸

人中黃 等分

醫通卷十五 小兒下

聖

為末蜜酒和丸辰砂為衣兒大者二錢中者錢半

小者一錢薄荷湯化下

托裏快斑湯 治痘起發遲而熱不止及痂後發熱

紫草

黃耆

鼠粘子

連翹 各一

木通 六分

當歸 七分

甘草

桂枝

川芎

防風 各五分

木香 三分

蟬蛻 七枚

淡竹葉 十片

水煎溫服

羌活救苦湯 治痘頭而太多及大頭證

羌活 白芷 川芎

蔓荊 防風 桔梗

黃芩 連翹 升麻

葶藶 人中黃 等分

水煎不時熱服

攻毒湯 治痘出不快伏陷倒靨大便實者宜之

大鱈魚頭丹 雄雞頭鮮笋尖各三五枚加生薑

三五片淡水煮熟加酒釀少許令兒先飲汁次

醫通卷十五 小兒下

頁

食雞冠笋尖餘俱不用 如無鱈魚頭

豆蔻丸 治痘出氣虛吐利不止

肉豆蔻 木香 砂仁

龍骨 嚴過水飛 訶子肉 煨 赤石脂 等分

枯礬 減字

為末神麴糊丸黍米大周歲兒二十九米飲下

當歸丸 治熱入血分大便秘結三五日不通

當歸 五錢 黃連 二錢 大黃 酒蒸 三錢

紫草 三錢 甘草 一錢

先取當歸紫草熬成膏以三味為細末膏和為丸
彈子大每川一丸水煎三五沸和洋服之不下再
服以利為度

加味消毒飲 治痘疹血熱咽喉不利

鼠粘子 錢半 甘草 五分 荆芥 七分

紫草 一錢 防風 六分 糯米 一撮

水煎不時服

解毒防風湯 治痘乾燥毒盛

防風 地骨皮 黃耆

醫通卷十五 小兒下

頁

芍藥 荆芥 鼠粘子

枳殼 等分

水煎不時熱服○一方多升麻葛根

神應奪命丹 治痘觸寒邪肌表固閉黑陷不起

辰砂 以絹囊盛線懸箸上同升麻麻黃紫草連

書夜取出辰砂研細將藥 麻黃 連根節

汁濾淨飛砂取淨二錢 紫草 酒洗 五分 紅花 五分

真蟾酥 三分 穿山甲 酒炙 五分

為末用醇酒杵和分作十九周歲兒半丸二歲者

一丸大者不過三丸熱酒化下煖覆取汗汗出痘亦隨發也必擇天醫生氣日修合佳

神授散 治痘黑陷咬牙昏熱悶亂煩躁不寧

人牙 蘇炙 苦參 各五錢 紫草

生地黃 犀角 鈔 麥門冬 去心 各六錢

黃芩 酒炒 燒人矢 童男者 各二錢

為散醇酒調服一錢五分日二夜一良久痘起光潤而惡候除不能酒者糯米飲調服

至寶丹 治痘脾胃虛寒肢冷不食伏陷不起

醫通卷十五 小兒下

夏

以生糯米與黃色雄狗飽食取矢中米淘淨炙乾研細每兩入麝香三分隨證用溫補脾胃藥或獨參保元送下

無價散 治痘毒傷胃黑陷

取臘月人矢乾者燒灰為散砂糖湯調服方寸

七服後即變紅活

人牙散 治痘瘡寒閉毒邪干腎而黑陷手足清

人牙燒存性為極細末每服四五分至一錢積豬尾血調紫草湯下○古方人麝少許酒釀調

服○錢氏云痘疹最怕麝與酒觸恐防發癢

珍珠人牙散 治痘瘡毒伏心腎黑陷神昏

人牙 煨五錢 珍珠 一錢 血竭 五分

為散每服四五分酒漿調服

桑蟲漿 治痘氣虛毒盛白陷不起

生桑樹內蟲一二枚蒸熟酒釀搗絞頓服之

地龍酒 治痘血熱毒盛黑陷不起

活地龍五七枚同烏芋搗絞入酒漿少許頓熱服之

醫通卷十五 小兒下

夏

雞冠血 治痘青乾紫黑陷血熱毒盛者

穿山甲炮研極細每用五六分至一錢刺老雄

雞冠上血數滴酒釀調勻頓熱服

牛李膏 一名必勝膏 治痘黑陷不起

牛李子 一名鼠李子又名烏絳子俗名綠子可以染絳

一味熬膏收乾丸如皂子大桃膠煎湯化下如無鮮者乾者熬膏用之

棗變百祥丸 治痘瘡黑陷便秘

大棗 十枚 大戟 二兩 去骨

右二味煮爛去大戟將棗搗丸如菉豆大周歲兒十九紫草湯或木香湯下從少至多以利為度

周天散 治痘黑陷頂強直視喘脹發搐

地龍 去土焙乾二兩 蟬蛻 去翅足

為散每服半錢至一錢乳香湯調下日三夜一痘起為効

周天之名因軫水蚓為二十八宿之末故取此義與地龍酒功用稍有不同若但黑陷喘脹用地龍酒最捷如兼作癢則周天散為合劑耳

醫通卷十五 小兒下

夏

水楊浴法 治痘出頂陷漿滯不行或為風寒所侵

俱宜用之如初出及收斂時癢塌破損者勿用

用水楊五觔三時用葉冬用枝以長流水一大

釜煎六七沸取三分之一置浴器內候溫浴之

內服應用之藥然後浴洗漸次加湯良久乃以

燈照藥藥然有起勢陷處量量有絲此藥影也

後必滿足如未滿足又浴如前力弱者只浴頭

而手足若無起勢則氣血敗而津液枯矣必難

救治

白花蛇散 治痘虛寒白陷毒匿不起

白花蛇 三錢 丁香 十枚

為散每服三五分熱酒調下

薰穢散

蒼朮 細辛 甘松

川芎 乳香 降香 等分

為散燒烟解血脈及諸穢氣

辟穢香

大黃 一倍 蒼朮 減半

醫通卷十五 小兒下

夏

為散燒烟辟尸厭諸穢

芍藥湯 治痘將靨時微癢

白芍 酒炒 甘草 炙 忍冬

茯苓 黃芩 等分 薏苡仁 倍用

水煎熱服

橘皮茶連散 治痘瘡初起乾嘔而嘔

橘皮 六錢 吳茱萸 三錢 黃連 一兩同吳

竹茹 一兩

為散每服一錢水煎服

前胡枳殼湯 治喘嗽上氣煩渴引飲便實溺赤

前胡 枳殼 赤茯苓

大黃 酒蒸 甘草 炙等

為散每服三錢水煎溫服身溫脈微者禁用

補肺湯 治氣虛痘毒乘肺欬嗽不已

黃耆 鼠粘子 各一錢 阿膠 八分

馬兜鈴 甘草 各五分 杏仁 去皮尖

枳梗 七分 糯米 一撮

水煎溫服

醫通卷十五 小兒下

黃芩瀉肺湯 治肺熱喘嗽裡實便秘

黃芩 酒炒 大黃 連翹

山梔 熬黑 杏仁 去皮尖

桔梗 薄荷 生甘草

水煎溫服

射干鼠粘子湯 治痘不起發咽喉疼痛

鼠粘子 錢半 甘草 五分 射干 六分

升麻 四分

水煎不時服之

紫草消毒飲 治痘疹血熱咽痛

紫草 連翹 鼠粘子 各一錢

荆芥 七分 甘草 山豆根 各五分

水煎不時溫服

生津葛根湯 治痘瘡發渴

葛根 枯蘗根 麥門冬 去心

生地黄 等分 升麻 甘草 生減

用糯米泔水煎去滓入茛菪根自然汁一合服之

人參酸棗湯 治心肺虛熱煩躁不寧

醫通卷十五 小兒下

人參 棗仁 炒 山梔 熬黑

生地黄 麥門冬 去心 當歸 等分

甘草 炙減

水煎溫服

梔子仁散 治痘疹毒盛色黑便秘

梔子仁 熬黑 白蘗皮 赤芍藥

升麻 各五分 寒水石 如無石 甘草 炙各

為散每服一二錢水煎量兒大小調紫草茸末半

錢七服之

後痘丹 治痘出日中初見點時用此移之

守宮 十枚去頭尾配辰砂一錢陰乾 珍珠

茯神 遠志肉 各一錢 琥珀 五分

為末紫草膏和丸如梧子大每服一錢二分欲移

在手是觀柱葳靈仙煎湯下欲專移在足牛膝木

瓜煎湯下微汗為度再用後藥二服

川芎 藜本 荆芥

白芷 各五分 蟬蛻 三分 防風 八分

生薑 一片 葱白 一莖

醫通卷十五 小兒下

三

水煎溫服○血熱者加紫草連翹

此方出麻城家秘黃石峯極言其神而吾吳以痘

疹名世者莫不以守宮為方士異端曷知醫學正

傳聖濟總錄衛生寶鑑丹溪摘玄聖惠方等咸取

入劑豈可以方士目之耶

排毒散 治痘後餘毒發癰能食便秘

大黃 酒蒸一兩 白芷 七分 沉香 另研

木香 各二錢五分 穿山甲 炮三錢 歸尾 五錢

為散每服二三錢忍冬花煎湯調日三服虛者減

大黃加荆防連翹甘草節欲托加黃耆防風
解毒內托散 治痘後發癰

黃耆 當歸 防風

荆芥 連翹 赤芍

木通 等分 甘草節 減半 忍冬花 倍用

水煎入醇酒少許服之

真人解毒湯 治痘母

木通 連翹 防風

荆芥 各三錢 忍冬花 牛蒡 甘草節 一兩

醫通卷十五 小兒下

重

水酒各半煎溫分三服以腫消痘出為度

清咽滋肺湯 治麻後餘熱欬嗽聲瘖

黑參 鼠粘子 荆芥

葳蕤 貝母 去心 栝蒌根

馬兜鈴 桔梗 麥門冬 等分

甘草 減半

水煎溫服○繆仲淳無馬兜鈴有薄荷

清熱透肌湯 治麻疹未透熱甚而欬

黑參 石膏 鼠粘子

荆芥

防風

前胡

葛根

杏仁等分

生甘草減半

水煎熱服

葛根解肌湯

治麻疹初起發熱欬嗽或乍涼乍熱

葛根

前胡

荆芥

鼠粘子

連翹

赤芍

蟬蛻

木通等分

生甘草減半

水煎熱服

涼血飲子 治麻疹火毒熾盛紫赤而黯

醫通卷十五 小兒下

頁四

生地黄錢半

黃連五分

黃芩

荆芥

黑參各一錢

紅花三分

赤芍

丹皮各八分

木通七分

水煎溫服

甘桔湯 治麻疹咽痛口舌生瘡

甘草

桔梗

山豆根

黑參

鼠粘子

荆芥等分

麥門冬倍用

水煎溫服

石斛清胃散

治麻疹後嘔吐胃虛不食熱滯

石斛

茯苓

橘皮

枳殼

藕豆

藿香

丹皮

赤芍等分

甘草減半

為散每服三四錢加生薑一片水煎服之

門冬甘露飲

治麻疹熱甚而渴

麥門冬二錢 去心

黑參

黃芩

栝蒌根

連翹各一錢

生甘草五分

燈心甘草

竹葉甘草

醫通卷十五 小兒下

頁四

水煎溫服

除熱清肺湯

治麻疹盡透而壯熱欬嗽大便秘結

石膏三錢

黑參

生地黄

赤芍

貝母

栝蒌根各一錢

麥門冬去心 錢半

甘草五分

水煎溫服

射干消毒飲

治麻疹欬嗽聲啞喉腫痛

射干

黑參

連翹

荆芥

鼠粘子等分

甘草減半

水煎溫服

當歸散 治口舌生瘡牙根毒發大便秘結

當歸

赤芍 各一錢

川芎 五分

大黃 三錢

甘草 生五分

為散加生薑一片水煎服之

無比散 治痲後牙疳腐爛

取黃牛糞煨存性入龍腦少許研細吹之

燒鹽散 治牙疳潰爛

取橡斗大者實鹽滿殼合起鐵絲紮定燒存性

醫通卷十五 小兒下

以碗覆地入麝少許研細敷之

祿袍散 治一切口瘡腐爛

荆芥穗

薄荷

青黛 各三錢

玄明粉

硼砂 各二錢

甘草 錢半

百藥煎 二錢

為散點舌上令其自化

雙和湯 治痲後虛羸

熟地黃

白芍 酒炒各一錢

黃耆 蜜酒

當歸 各七

川芎

甘草 炙各四分

肉桂 三分有熱去之

生薑 一片

紅棗 一枚去核

水煎溫服

四順清涼飲 燥門

犀角地黃湯 傷寒門

惺惺散 四君子湯下

參蘇飲 傷寒門

升麻湯 方祖

人參敗毒散 小柴胡湯下

益元散 方祖

麻黃湯 方祖

理中湯 方祖

大連翹湯 本門

甘露飲 二冬膏下

小柴胡湯 方祖

六君子湯 四君子湯下

保元湯 方祖

醫通卷十五 小兒下

四君子湯 方祖

和解湯 升麻湯下

解毒湯 四物湯下

生脈散 方祖

桔梗湯 方祖

參苓白朮散 四君子湯下

四苓散 五苓散下

紫草承氣湯 小承氣湯下

大承氣湯 小承氣湯下

桃核承氣湯 小承氣湯下

十全大補湯 保元湯下

枳殼湯 方祖

寬中散 四物湯下

麥門冬湯 四物湯下

潤燥湯 涼膈散下

錢氏白朮散 四君子湯下

錢氏異功散 四君子湯下

獨參湯 保元湯下

涼膈散 方劑

小建中湯 桂枝湯下

瀉青丸 下血

補中益氣湯 保元湯下

參耆內托散 保元湯下

枳實梔子豉湯 梔子豉湯下

黃芩湯 桂枝湯下

地黃丸 即六味丸 八味丸下

黃連解毒湯 三黃湯下

桂枝湯 方劑

導赤散 暑門

大柴胡湯 小柴胡湯下

活命飲 癰疽門

四物湯 方劑

連翹升麻湯 升麻湯下

生聖散 精梗湯下

保和丸 傷飲食門

胃苓湯 脾胃門

醫通卷十五 小兒下

夏

八珍湯 四君子湯下

歸脾湯 保元湯下

清胃散 芎血門

枳朮丸 方劑

瀉黃散 瀉風門

益黃散 木門

桂枝大黃湯 桂枝湯下

小承氣湯 方劑

蜜煎導 燥門

人參固肌湯 保元湯下

人參白虎湯 白虎湯下

加味道遙散 虛損門

二陳湯 方劑

平胃散 方劑

葛根黃芩黃連湯 傷寒門

五苓散 方劑

三黃丸 三黃湯下

連翹防風湯 附見本門上

豬苓湯 五苓散下

三奇散 痢門

芎蘇散 傷寒門

清肺湯 桔梗湯下

清心丸 三黃湯下

附子理中湯 理中湯下

馬鳴散 本門

決明散 目門

神功散 目門

龍膽瀉肝湯 腦痛門

消風散 效嗽門

梔子豉湯 方劑

白虎湯 方劑

當歸補血湯 保元湯下

化毒丸 蟲門

殺精散 目門

蜜蒙散 目門

羚羊散 目門

醫通卷十五 小兒下

夏

十宣散 保元湯下

枳實導滯湯 傷飲食門

竹葉石膏湯 白虎湯下

越脾湯 麻黃湯下

枳實理中湯 理中湯下

柴胡飲子 白門

白頭翁湯 痢門

乾薑黃芩黃連人參湯 傷寒門

張氏醫通卷十五 終

托裏消毒散 保元湯下

大青湯 白虎湯下

加味清胃散 芎血門

三拗湯 麻黃湯下

瀉白散 效嗽門

麻杏甘石湯 麻黃湯下

厚朴湯 脾胃門

厚朴湯 散下

張氏醫通卷十六

長洲石頑張

瑞路王父

以柔安世

男

訥遜言 叅訂

夫字有字母。方有方祖。自伊尹湯液一脈相傳。與釋氏傳燈無異。苟能推源於此。自然心手合轍。諒非時師所能測識也。

桂枝湯 玉函 治風傷衛氣。脈浮緩。發熱自汗。營衛不和。

醫通卷十六 桂枝

桂枝 三錢

白芍 三錢

甘草 炙 二錢

生薑 五片

大棗 四枚

右五味。水煎。溫服。啜熱稀粥一盞。以助藥力。覆煖取微汗。効。不汗。少頃再服。

小建中湯 玉函 治風木乘脾。寒熱腹痛。

桂枝湯倍芍藥加膠飴三錢

黃耆建中湯 金匱 治虛勞感寒。發熱自汗。

桂枝湯加黃耆錢半。膠飴一合。○千金多人參二錢。

桂枝湯和營表藥。倍芍藥。加膠飴。便能建立中氣。以芍藥之酸。欽護營血。膠飴之甘。培養中土。更加黃耆以實衛氣。營衛藏府俱和。而受益多矣。千金於小建中方。加入當歸。名曰內補建中。其調和中外之力可知。

陽旦湯 千金 治冬溫脈浮發熱。項強頭痛。

桂枝湯加黃芩錢半

陰旦湯 千金 治冬溫內寒外熱。肢節疼痛。中挾寒食。

醫通卷十六 桂枝

桂枝湯加黃芩錢半。乾薑五分。

陰霜四塞。非平日之氣。無以開收陽和。桂枝湯原名陽旦。開收陽邪之藥也。千金於中。加入黃芩之苦寒。性輕。以治冬溫在表之邪熱。仍以陽旦稱之。若兼挾寒食。再加乾薑之辛溫。散結。以治中土之停滯。遂因之曰陰旦。與經絡之陰陽風馬牛不相涉也。

獨活湯 千金 治風懿奄忽。不知人。咽中閉塞。不能言。四肢不收。手足痺曳。

桂枝湯桂枝易桂心去大棗加獨活栝蒌根生薑
葛發其汗不得汗去獨活栝蒌根生薑加防己
防風麻黃瘡癩不語並皆治之

當歸四逆湯

玉函

治陽邪入犯厥陰四肢厥逆

桂枝湯去生薑加當歸三錢細辛通草各一錢
邪犯厥陰之界有入無出雖有熱邪勢必從陰而
為厥逆故厥陰篇中有厥深熱深之例以振發傳
經之變端病邪至此最為緊迫醫者苟無成識於
胸中臨病將何措指南陽先師乃毫不以厥逆為

醫通卷十六 桂枝

意仍取太陽例中桂枝湯方加入當歸協濟芍藥
以護厥陰之營細辛引領桂枝以為厥陰嚮導通
草通利膀胱以疏厥陰出路與桂枝平分力量為
分解之捷徑雖厥陰與太陽兩經接壤邪既入陰
斷無復傳陽經之理先輩六經例有不能再傳之
說大可噴飯而桂枝方中獨去生薑者恐辛辣性
暴不待氣味入陰便從太陽開發轉虛其衛再行
向力以振驅邪之任歟由是廣推大小青龍大小
柴胡和解營衛兩岐表裏交界之邪必用薑棗為

一定之法若麻黃湯則專主寒傷營證便與生薑
無預逮至三陰等治從無一方泛用生薑者生薑
為手頭常用之物尚爾若此之慎况有不察厥深
熱深之旨一見四肢厥冷漫投薑附四逆於此能
無滅滅乎

內補當歸建中湯

千金

治產後血虛虛羸不足腹

中刺痛少腹中急或感寒發熱

桂枝湯桂枝易肉桂加當歸二錢膠飴六錢

崩傷內動不止加地黃六錢阿膠二錢產後一月

醫通卷十六 桂枝

服四五劑令人強壯

桂枝龍骨牡蠣湯

玉函

治虛勞夢泄惡寒發熱

桂枝湯加龍骨 牡蠣 各錢半

桂枝大黃湯

玉函

治太陰中風誤下引邪入內腹

滿痛

桂枝湯加大黃一錢

桂枝湯表藥也以其誤下引邪內賊而腹滿痛渾
是表邪在內不解之故故仍用桂枝湯畧加大黃
因勢利導病既變則藥亦不得不隨之而變也

桂枝葛根湯 玉函 治太陽經柔痙自汗脈浮

桂枝湯加葛根二錢

栝蒌桂枝湯 金匱 治瘧太陽證備身體強凡儿然

脈沉遲

桂枝湯加栝蒌根二錢

桂枝加附子湯 玉函 治亡陽漏風肢體屈伸不和

桂枝湯加熟附子一錢

桂枝加黃耆湯 金匱 治黃汗發熱脛冷腰以上汗

出下無汗

醫通卷十六 桂枝

桂枝湯加黃耆二錢

耆芍桂酒湯 金匱 治汗如菜汁肢體腫發熱汗出

而渴

桂枝湯去甘草薑棗加黃耆五錢苦酒和水煎

黃耆桂枝五物湯 金匱 治血痺身體不仁如風狀

桂枝湯去甘草加黃耆等分○千金桂枝易桂

心加人參各黃耆湯

茯苓甘草湯 玉函 治風邪入犯膀胱氣分小便不

利

桂枝湯去芍藥大棗加茯苓二錢

苓桂朮甘湯 玉函 治心下有支飲胸腹支滿目眩

桂枝湯去芍藥薑棗加茯苓二錢白朮一錢

此僅用桂枝湯之半以流動中外之支滿兼四君

子之半以運行在裏之痰氣也

桂枝去芍藥加皂莢湯 金匱 治肺癰吐涎沫初起

有表邪者

桂枝湯去芍藥加皂莢一枚 去皮槁酥炙

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯 金匱 治氣分心

醫通卷十六 桂枝

下如盤

桂枝湯去芍藥加麻黃附子各一錢細辛半錢

病在氣分非麻桂不能分解病氣盤錯非辛附不

能破結去芍藥者惡其酸收也

小青龍湯 玉函 治溢飲喘欬自利發熱當發其汗

桂枝湯去薑棗加麻黃三錢半夏二錢炮薑細

辛五味子各半錢

小青龍加石膏湯 金匱 治喘欬上氣煩躁心下有

水氣

小青龍湯加石膏雞子大一枚

桂枝麻黃各半湯 上面 治太陽證脈微惡寒

桂枝湯加麻黃杏仁

桂枝二越婢一湯 上面 治營衛俱傷風多寒少而煩滿

煩滿

桂枝湯本方各二錢加麻黃二錢石膏三錢

桂枝芍藥知母湯 全頁 治肢節痛脚腫如脫

桂枝湯去大棗加麻黃二錢白朮半兩知母防

風各四錢熟附子二錢

醫通卷十六 桂枝

七

炙甘草湯 玉函 治傷寒脈結代心動悸及肺痿唾

多心中溫溫液液虛勞不足汗出而悶

桂枝湯去芍藥倍甘草加人參二錢生地三錢

麥門冬二錢麻子仁一錢阿膠二錢

混是清潤調補藥中但用桂枝一味以流動經脈

之滯麻仁一味以滋潤腸胃之結而脈虛結代心

虛動悸一切虛勞不足得以榮養則脈虛自復心

悸自寧矣

芍藥甘草湯 玉函 治營血受傷熱不上

桂枝湯去桂枝薑棗

芍藥甘草附子湯 治發汗病不解反惡寒及瘡家

發汗成瘰

桂枝湯去桂枝薑棗加附子一錢 炮

黃芩湯 玉函一名黃芩芍藥湯 治伏氣發溫太陽少陽合病

自利

桂枝湯去桂枝生薑加黃芩三錢

黃芩加半夏湯 玉函 治伏氣發溫內挾痰飲痞滿

欬逆

醫通卷十六 桂枝

八

桂枝湯去桂枝加黃芩三錢半夏二錢

黃芩湯本治春夏溫熱熱自內發故於桂枝湯中

除去桂枝生薑之辛溫易以黃芩之苦燥轉溫散

為涼解大匠運斤妙用不可思議後世借以治下

利身熱亦不出此其黃芩加半夏湯治自利而嘔

與夏秋下利白沫若合符節異病同治總不出南

陽之繩墨也

麻黃湯 玉函 治寒傷營氣脈浮發熱無汗而喘骨

節痛

麻黃三錢 桂枝三錢 甘草一錢

杏仁二十枚

右四味水煎溫服。煖覆取微汗。不須啜粥。以寒邪入傷營氣。營氣起於中焦。恐穀氣反助邪熱也。

麻黃加木湯金匱 治溼家身體煩疼。日晡發熱。

麻黃湯加白朮四錢。

溼家身疼煩熱。渾是軀殼受傷。卽用麻黃湯開發肌表。不得白朮。徒運脾氣。則溼熱難從汗泄。而水穀之氣。依然復爲痰溼。流薄中外矣。然未必生用。

醫通卷十六 麻黃

若經炒焙。但有健脾之能。而無祛溼之力矣。

古今錄驗橋皮湯金匱 治寒邪傷肺。欬嗽吐血。

麻黃湯換肉桂。加橋皮。當歸。紫苑。黃芩。

麻杏甘石湯玉函 治發汗後。汗出而喘。無大熱者。

麻黃湯去桂枝。加石膏半兩。

此麻黃湯去桂。而兼越脾之意。當祛上焦溼熱。痰氣。與杏仁。木汁。湯互發。彼精。杏仁。專祛心下之支飲。此藉石膏。專祛膈上之溼熱也。

麻黃杏仁薏苡甘草湯玉函 治風溼一身盡痛發

熱日晡所劇者

麻黃湯去桂枝。加薏苡半兩。

杏子湯 治風木虛。脹脈浮。發其汗卽已。

麻黃湯去桂枝又易簡杏子湯用小青龍加人參杏仁

甘草麻黃湯金匱 亦治裏水。

麻黃湯去桂枝杏仁。方用甘草二錢。麻黃四錢。

葛根湯玉函 治太陽陽明合病。自利。或發熱無汗。喘滿不食。

麻黃湯去杏仁。增桂枝一錢。加葛根四錢。芍藥

醫通卷十六 麻黃

二錢。生薑三片。大棗三枚。

此卽麻黃桂枝二湯合用於中。但去杏仁。增葛根。爲陽明經證之專藥。以其能輔麻黃。大開肌肉也。

去杏仁者。旣開肌肉於外。不當復泄肺氣於內也。

聖人立法。一方一味。各有斟酌。非刻意研求。烏能

測識其微。而爲倉生司命哉。

三拗湯局方 治風寒傷肺。而欬。悞行飲肺。而喘嗽

喘急。

麻黃湯去桂枝。用麻黃不去。甘草生。杏仁去皮。

麻黃湯去桂枝。用麻黃不去。甘草生。杏仁去皮。

等分更加桔梗荆芥名加味三拗湯

麻黃附子細辛湯 玉函 治少陰病脈沉發熱及水腫喘欬

腫喘欬

麻黃湯去桂枝杏仁甘草加附子一錢細辛半

錢

附子散 千金 治中風手臂不仁口面喎僻

麻黃附子細辛湯加乾薑桂心人參防風芎藭

羚羊角為散水煮加竹瀝日服一劑効

急六當歸湯 治賊風口噤角弓反張成瘰

醫經卷十六 麻黃

麻黃附子細辛湯加當歸防風獨活酒和煎

口不開者格口內湯一服當蘇二服小汗三服

大汗

麻黃附子甘草湯 玉函金匱名 治少陰病脈沉發

熱二三日無裏證及水腫脈沉

麻黃湯去桂枝杏仁加附子一錢

千金大棗湯 治症節疼痛

麻黃附子甘草湯加黃耆薑棗日三服汗之

發表重劑莫如麻黃溫經峻藥首推附子表裏補

瀉功用天淵仲景於少陰病脈沉發熱二味合川

單刀直破堅壘而建補天浴日之功在一二日間

勢難叵測則用細辛以助其銳二三日無裏證則

用甘草以緩其治各有權度金匱於水腫治例亦

用二湯喘嗽則兼細辛以開肺氣之塞脈沉則兼

甘草以緩腎氣之逆與初起防變二三日無裏證

以發而倉公乃於麻附細辛方中加當歸防獨以

療賊風口噤發瘰千金復以麻附甘草湯內加黃

耆薑棗以治症節疼痛總賴麻黃附子輒外輒內

醫經卷十六 麻黃

迅掃其邪某日常陽何有陰霾之患乎

麻黃升麻湯 玉函 治冬溫誤行汗下下部脈不至

咽喉不利唾膿血

麻黃湯去杏仁用麻黃二錢桂枝甘草各八分

加升麻當歸各一錢知母黃芩萎蕤各二錢天

門冬芍藥乾薑白朮茯苓石膏各八分

此方專主陽熱陷於厥陰經脈為邪氣所遏故下

部脈不至而證見咽喉不利唾膿血也邪遏經脈

非兼麻黃桂枝之制不能開發肌表以泄外熱非

取白虎越脾之法不能清滿脾胃以化裏熱更以
芍藥甘草參黃苓湯寒因寒用謂之應敵甘草乾
薑合腎著湯熱因熱用謂之嚮導以病氣亂雜不
得不以逆順兼治也

華蓋散 局方 治肺受風寒欬嗽聲重煩滿昏眩脈
浮數

麻黃湯去桂枝方用麻黃杏仁各一錢甘草五
分加蘇子赤茯苓橘紅桑根皮各一錢生薑二
片紅棗一枚

醫通卷十六 麻黃

九寶湯 治經年久嗽不愈脈浮起於外感者

麻黃湯加紫蘇薄荷橘紅桑白皮大腹皮等分

生薑三片烏梅肉半箇

麻黃連軹赤小豆湯 玉函 治濕熱發黃

麻黃湯去桂枝減麻黃一錢加連軹即連二錢

赤小豆一合生梓白皮一兩生薑三片大棗四

枚水煎分溫三服半日服盡

越脾湯 金匱 治風水惡寒一身悉腫脈浮不渴續

白汗出無大熱者

麻黃湯去桂枝杏仁倍麻黃加石膏八錢生薑
三片大棗五枚水煎溫分三服

越脾者發越溼土之邪氣也水溼之氣因風流播
中外兩相激搏勢難分解不得不藉麻黃祛之從
表而越石膏清之從裏而化內經開鬼門法也本
方加水以助腠理開汗大泄於加水方中更加附
子以治脚痺惡風開中寓闔信手合敵其大青龍
小續命麻杏甘石湯或加桂枝以和營或加參歸
以鼓氣或加杏仁以泄滿總以此方為樞局也

醫通卷十六 麻黃

內

或問表無大熱何得輕用麻黃內無煩渴何得輕
用石膏蓋惡寒身腫自汗渾是溼氣鬱著非風以
播之不能解散麻黃在寒傷營劑中則為正治在
開痺溼門中則為導引石膏在白虎湯中則為正
治在越脾青龍續命方中則為導引不可以此礙
彼也

越脾加水湯 金匱 治肉極熱則身體津脫腠理開

汗大泄厲風氣下焦脚

越脾湯加白朮四錢

越脾加朮附湯 金匱 治脚痺惡風

越脾湯加白朮四錢附子一錢

越脾加半夏湯 金匱 治肺脹欬而上氣

越脾湯加半夏兩

大青龍湯 玉函 治營衛俱傷脈浮寒汗不得出而

煩躁

越脾加杏仁十四枚 去皮 桂枝二錢

文蛤湯 金匱 治吐後渴飲不止脈緊頭痛

越脾湯麻黃減半加文蛤半兩杏仁十五枚

醫通卷十六

續命湯 金匱名古今 治中風痲身體不能自收并

治但伏不得臥欬逆上氣而目浮腫

麻黃 桂枝 千金局方當歸

人參 石膏 乾薑

甘草 炙各三錢 芍藥一錢 杏仁 三十枚

右九味水煎溫服當薄覆脊憑几坐汗出則愈不

汗更服無所禁勿當風○千金續命湯無人參有

防風黃芩芍藥○續命風引湯多防風防風獨活

附子治中風癱眩不知人狂言舌腫出○千金依

源續命湯多白朮茯苓大棗為十二味

小續命湯 千金 治中風外顯六經形證

續命湯去石膏加芍藥防風黃芩各一錢四分

防已一錢熟附子七分生薑五片大棗一枚 崔氏

外臺不用防已大棗

無汗惡寒倍麻黃杏仁有汗惡風倍桂枝芍藥

汗身熱不惡寒去附子倍甘草加石膏知母有汗

身熱不惡風倍桂枝黃芩加芍藥無汗身涼脈沉

細倍附子加乾薑有汗無熱畏寒脈沉倍桂枝附

醫通卷十六

子甘草肢節痺痛麻木不仁脈緩加羌活連翹 易

張景岳曰按歷代相傳治中風之方皆以續命等

湯為主考其所自則始於金匱要畧附方中有古

今錄驗續命湯然此必宋時校正之所增而非仲

景本方也此自隋唐以來則孫氏千金方乃有小

續命大續命西州續命排風等湯故後世宗之無

不以此為中風上治矣夫續命湯以麻黃為君而

與薑桂並用本發散外邪之方至小續命大續命

西州續命等湯則復加黃芩以兼桂附。雖曰相制而水火冰炭道本不同。卽有神妙終非余之心服者。其他無論獨怪乎河間東垣丹溪三子者。既於中風門皆言此病非風矣。何於本門並首列小續命湯而附以加減之法。又何前後之言不相應耶。

大續命湯 千金 治中風肥盛多痰多渴肢體不遂。

續命湯 去人參加黃芩荆瀝一作竹瀝

西州續命湯 千金 治中風痲身不能自收口不能言。冒昧不識人。拘急不能轉側。

大續命湯去荆瀝

八風續命湯 千金 治卒中半身不遂手足拘急。

續命湯去麻黃芍藥加獨活黃芩水煎溫服覆汗不得汗倍麻黃。

掛風湯 千金 治中風肢體煩疼皮膚不仁。

續命湯去人參石膏乾薑加防風芍藥白朮茯苓獨活白蘗皮生薑。

升麻湯 一名升麻湯 治陽明經邪發熱及痘疹初起。

升麻 一錢 葛根 白芍 各錢

甘草 炙八分

右三味水煎溫服

升葛為陽明經之嚮導陽明專主肌肉恐開泄太過卽以白芍斂護營血甘草調和中氣所以解利本經邪熱及時行痘疹皆為專藥然在起脹後禁用。

秦芫升麻湯 治中風口目喎斜

升麻湯加秦芫人參桂枝白芷防風葱白

升陽散火湯 治胃虛過食寒物抑遏陽氣於脾土

中畏寒發熱火鬱則發之也

升麻湯加羌活獨活人參柴胡防風用生甘草火鬱湯 治火鬱不舒涼瀉惡寒不止

升麻湯用生甘草加柴胡防風葱白

按此卽升陽散火湯去羌活獨活人參加葱白內經所謂惡寒非寒火鬱則發之也

沖和順氣湯 治內傷脾胃氣惡寒發熱食少便溏

升麻湯加人參羌活防風蒼朮白朮薄荷

升陽補氣湯 治胃氣不足脾氣下溜氣短無力不

時發熱。早飯後煩悶。須要眠睡。五心煩熱。

升麻湯去葛根。加羌活。獨活。防風。柴胡。厚朴。澤

瀉。薑。棗。

和解湯。治痘三日前後起發遲。

升麻湯加人參。川芎。羌活。防風。

連翹升麻湯。治痘發太多。涼內解毒。

升麻湯加連翹。桔梗。牛蒡。木通。薄荷。燈心。竹葉。

小柴胡湯。玉函千金。治少陽受邪。往來寒熱。脈弦。

脇痛而嘔。

醫通卷十六 柴胡

十九

柴胡 三錢

黃芩

人參

甘草 一錢

半夏 二錢

生薑 五片

大棗 四枚

水煎去滓溫服。

治傷寒有五法。曰汗。曰吐。曰下。曰溫。曰和。皆一定

之法。而少陽例中小柴和湯。專一和解表裏。少陽

為陰陽交界。邪傳至此。已漸向裏。故用柴胡升發

其邪。使從外解。即以人參。構截於中。不令內犯。更

以半夏。黃芩。清解在裏之熱痰。生薑。大棗。併佐在

表之邪氣。又須甘草。協助參。柴。共裏匡正。辟邪之

功。真不易之法。無容擬議者也。其方後加減。乃法

中之法。定而不移。至於邪氣犯本。膽府受病。而加

龍骨。牡蠣。九藥。誤下。而加芒硝。屢下不解。引邪入

裏。心下急。鬱鬱微煩。而用大柴胡。為法外之法。變

通無定。不可思議者也。獨怪世醫。用小柴胡。一槩

除去人參。且必加枳。桔。耗氣之品。此非法之法。習

俗相承。罔於橫議者也。何惟乎道藝日卑。風斯日

下哉。

醫通卷十六 柴胡

二十

柴胡加龍骨牡蠣湯 玉函

治少陽經邪誤下犯本

胸滿驚煩

小柴胡湯去黃芩。甘草。加桂枝。茯苓。龍骨。牡蠣。

鉛丹。大黃。

柴胡加芒硝湯 玉函

治少陽過經不解

小柴胡湯加芒硝三錢

大柴胡湯 玉函

治寒熱便秘

小柴胡湯去人參。甘草。加芍藥。枳實。各一錢。大

黃二錢。

四逆散

玉函

治熱邪傳入少陰厥逆

小柴胡湯去人參半夏黃芩薑棗加枳實芍藥等分爲散飲服方寸七日三服

凡病各有真假真者易見假者難辨差之毫釐迥乎冰炭試以傷寒之厥逆辨之其始病便見者爲直中寒厥五六日熱除而見者爲傳經熱厥寒厥真而熱厥假也熱厥之治惟四逆散得之細推其邪從陽入陰必由少陽而達亦無不由太陰竟入少陰之理故首推柴胡爲末路之引經亦藉以爲

醫通卷十六 柴胡

三

去路之嚮導用枳實者掃除中道以修整正氣復回之路也夫陰爲陽擾陽被陰埋舍和別無良法故又需芍藥以和其營甘草以和其胃胃氣和而真陽敷布假證愈而厥逆自除但方後加減紛麗寒熱互用非隨證而推逆順之機難以語此如悸加桂枝小便不利加茯苓泄利下重加薤白皆陰爲陽擾隨其攸利而開泄之欬利加五味乾薑腹瀉加附子是陽被陰埋急須煥發以克復之真厥陰例中當歸四逆加吳茱萸同法須知真證正治

假證間取總不出此方之模範也至若二經熱邪亢極而厥自有大承氣下奪之法又非四逆散當歸四逆之和法可例治也

柴胡去半夏加栝蒌湯 全賈 治瘧多渴

小柴胡湯去半夏加栝蒌根

柴胡桂枝乾薑湯 玉函金匱各 治瘧寒多微有熱

小柴胡湯去人參半夏黃芩加桂枝乾薑栝蒌根牡蠣 煎

根牡蠣 煎

柴胡桂枝湯 玉函 治太陽少陽併病合病寒熱及

醫通卷十六 柴胡

三

瘧

小柴胡湯加桂枝芍藥 即小柴胡湯合桂枝湯

柴胡四物湯 治婦人經行感冒熱入血室

小柴胡湯合四物湯

柴胡枳桔湯 名枳桔湯 治少陽寒熱痞滿

小柴胡湯加枳殼桔梗

增損柴胡湯 治少陽血虛寒熱不止

小柴胡湯去黃芩加川芎芍藥陳皮

柴胡清肝散 治怒火憎寒發熱肝膽風熱瘡瘍

小柴胡湯去半夏黃芩加山梔川芎連翹桔梗
人參敗毒散 治時疫初起發熱及感冒發散
後熱不止

小柴胡湯去半夏黃芩大棗加茯苓羌活獨活
前胡川芎枳殼桔梗

問時疫初起用人參敗毒得毋助邪為慮之患乎
又何以治非時寒疫汗後熱不止詳此二者一為
全盛之毒一為未盡之邪胡一方可混治耶蓋時
疫之發或值歲氣併臨或當水土疎豁種種不件

醫通卷十六 柴胡

然必入傷中土土主百骸無分經絡毒氣流行隨
虛輒陷最難叵測亟乘邪氣未陷時儘力峻攻庶
克有濟其立方之妙全在人參一味力致開闢始
則鼓舞羌獨柴前各走其經而與熱毒分解之門
繼而調製津精血氣各守其鄉以斷邪氣復入之
路與桂枝湯中芍藥護營之意不殊如桂枝人參
湯小柴胡湯參蘇飲木常不用人參以協濟表藥
成功也但其所主惟天行大頭乃為合機加劑防
牛旁薄荷名劑防敗毒為陰頸痛咽喉腫痛之專

藥即上二證在熱毒既陷已後及北方黑骨溫等
總與此方無頂也至若傷寒傳變之邪伏氣鬱發
之證涇渭攸分略無交涉而先哲嘗借以治寒疫
汗後餘熱往往獲効者以非時之邪混則經中屢
行疎表不應邪伏幽隱不出非藉人參之大功不
能載之外泄也逮至疫癘昏熱日熾亦宜此方加
陳倉米引領入胃則毒隨藥化得非人參輔佐之
力歟獨怪近世醫流偏謂人參助長邪氣除去不
用專行羣隊攻發鼓激壯火飛騰不至竭絕真陰

醫通卷十六 柴胡

論

不已茲緣同學質問因祖述以政
荆防敗毒散 治大頭蝦蟇瘟證
人參敗毒散加荆芥防風薄荷牛旁子
倉廩湯 治疫癘發熱
人參敗毒散加陳倉米一撮
清脾飲 治食滯脈實瀉赤便秘
小柴胡湯去人參加白朮青皮厚朴草果
按清脾飲清理脾家痰氣宿滯及蘊積少陽經中
風熱之邪乃於小柴胡中除去人參益入青皮白

木厚朴草果。一派剋劑之味。在藜藿之人。固為相宜。若膏粱養柔脆者。即有留滯。亦難勝此。用者審之。

星香湯 治中風痰涎潮塞。不省人事。服熱不得者。

南星 三錢 木香 半錢 生薑 十片

水煎服無時

省風湯 局方 治卒中口噤不能言。口眼喎斜。筋脈

抽掣。風痰壅盛。

星香湯去木香。川陳膽星一錢五分。加防風一

錢。生半夏黃芩。生甘草各七分半。

大省風湯 局方 治卒中痰逆嘔泄。脈沉厥冷。

星香湯去木香。用陳膽星二錢。加防風獨活生

附子各一錢。全蠍生甘草各五分。

按此即省風湯去半夏黃芩。加獨活附子全蠍。二湯雖分寒熱主治。並用生薑十片以開發風痰。不可減也。

三生飲 局方 治中風卒倒。口眼喎斜。半身不遂。寒

閉。不省人事。痰氣上壅。

星香湯本方。川生南星一兩。木香三錢半。加生川烏生附子各五錢。搗羅為散。每服五錢。同生薑十片煎服。氣虛卒倒。另加人參兩許。駕馭之。

三生飲。中風門中破的之方。雖本星香。而實得大省風之妙用。與續命湯相為犄角。奪門革鼎。各有專功。貴在先聲奪氣。無容庸師擬議。

木附湯 治寒濕體痛。自汗身寒。

白朮 一兩 附子 半兩

右二味水煎去滓。放涼分三服。

醫通卷十六 木附

參附湯 治脾腎陽虛厥逆自汗。

木附湯去朮。加人參一兩。

省附湯 治元陽衰弱。虛風自汗。

木附湯去朮。加黃耆一兩。蜜酒炒

三因治自汗。用者附木附參附三方。皆用附子五錢。餘俱一兩分三服服之。其衛外之陽不固。則用省附。脾中之陽不固。則用木附。腎藏之陽不固。則用參附。凡屬陽虛自汗。不能舍此三方。而者附可以治虛風。木附可以治寒溼。參附可以壯元神。三

方亦相因為用祇用二物不雜他味取力銳以擅專功也。其外麻附桂附薑附椒附星附及大黃附子等法度森森分治九疔各具轉日回天之妙用。豈尋常可擬議乎。

桂枝附子湯 玉函 治風溼身重煩疼不能轉側。

木附湯去木本方用附子一枚加桂枝一兩二錢甘草六錢生薑一兩大棗十二枚分溫三服。

白朮附子湯 玉函 治風溼相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利。

醫通卷十六 木附

惡風不欲去衣或身微腫。

木附湯木方用木一兩二錢附六錢加甘草六錢生薑一兩大棗十二枚分溫三服。

甘草附子湯 玉函 治風溼大便堅小便自利。

木附湯木方用木附各六錢加桂枝一兩二錢。

甘草六錢分溫三服。

桂枝附子白朮附子甘草附子三方皆木木附湯方而立一加桂枝甘草薑棗以治身重煩疼不能轉側其病全在軀殼無關於裏故於本方除去白

木使桂附專行軀殼而振驅風逐溼之功用甘草以緩桂附之性不使其汗大泄汗大泄則風去而溼不去也。風在疾祛溼在緩攻故用生薑之辛以散之大棗之甘以緩之則營衛之開闔有權風溼無復入之虞矣。一加甘草薑棗以治骨節煩疼掣痛等證。渾是溼流關節之患故於本方但加甘草以緩木附之性薑棗以可開闔之機風之見證本輕故無藉於桂枝也。一加桂枝甘草以治風溼大便堅小便自利以病氣駸駸內犯故於本方

醫通卷十六 木附

加桂枝助附子以杜內賊之風溼加甘草助白朮以和二便之偏滲故大便雖堅法無下奪之理。

附子湯 玉函 治少陰病始得之背惡寒脈沉身體骨節痛。

木附湯加茯苓白芍各一兩人參六錢。

真武湯 玉函 治少陰下利腹痛或欬嘔小便不利。

木附湯木方白朮六錢附子一枚加茯苓芍藥生薑各一兩。欬者加五味子細辛乾薑小

便利者去茯苓下利去芍藥加乾薑嘔者去附子加生薑

詳附子湯與真武湯二方止差一味一治少陰病始得之便背惡寒口中和知其入真陽素虧故用人參以助附子之雄茯苓以行白朮之滯又恐生附性悍傷犯真陰故用芍藥以護持營血營血得安而真陰受蔭矣○一以少陰病二三日不已至四五日腹痛自利四肢沉重或欬或嘔其及內外皆是水氣故用生薑佐茯苓朮附以利水為務水

醫通卷十六 朮附

五

去則真陽自復當知此證皆山水氣鬱遏其陽陽氣原不大虛所以方中朮附僅用附子湯之半又恐辛燥有傷其陰因以芍藥保其營血與附子湯之立法不殊即過汗傷經振振欲僻地者亦不出是方也

附子散 治陰瘕

朮附湯本方二味各用一兩加桂心川芎獨活各半兩為散每服三四錢薑棗湯煎服

四逆湯

玉函

治陰寒脈沉四肢厥冷嘔吐泄瀉

附子生川一枚 乾薑五錢 甘草六錢 右三味水煎分溫再服強人可服大附子一枚乾薑一兩

四逆加人參湯玉函 治惡寒脈微而利

四逆湯加人參三錢至一兩

茯苓四逆湯玉函 治發汗若下之病仍不解煩躁

四逆湯加人參三錢至一兩茯苓六錢

通脈四逆湯玉函 治少陰病下利清穀裏寒外熱

四逆湯倍用乾薑

醫通卷十六 四逆

五

通脈四逆加豬膽汁湯玉函 治吐已下斷四肢拘急不解脈微欲絕者

四逆湯倍乾薑加豬膽汁

白通湯玉函 治少陰病下利脈微

四逆湯去甘草本方薑附各三錢加葱白四莖

白通加豬膽汁湯玉函 治少陰病下利厥逆無脈

乾嘔而煩

四逆湯去甘草本方薑附各用三錢加葱白四莖人尿五合豬膽汁一合

四逆湯去甘草本方薑附各用三錢加葱白四莖人尿五合豬膽汁一合

四逆湯去甘草本方薑附各用三錢加葱白四莖人尿五合豬膽汁一合

1023 冊 續修四庫全書 0 三三

乾薑附子湯

乾薑附子湯

治少陰病晝日煩躁

四逆湯去甘草

四逆湯用薑附之辛熱恢復其陽。卽用甘草以緩其性。使之徐行以達四末。專爲始病便見厥逆。脈沉不發熱者而設。卽太陰自利腹痛厥陰下利拘急。總不出此。以厥陰之邪無不由少陰而入也。非但三陰俱可取用。并太陽之頭痛發熱脈沉亦須用此。先救其裏然後解表。方爲合轍。而少陰病晝日煩躁用乾薑附子湯。卽四逆湯中除去甘草。

醫通卷十六 四逆

用二味以迅掃陰。與白通立法無異。以意通之。四逆一方太陽尚所攸賴。白通二例與厥陰獨無干。預耶雖厥陰經中但有通脈而無白通。詳二方。止五更一味通脈。有甘草而無葱白。白通有葱白而無甘草。一取甘緩以徐復欲絕之脈。一去甘草以急迫將脫之陽。皆用豬膽以除假熱。白通專用葱白以通真陽。又恐葱白性升引領薑附上僭。故以人尿折而下之。其通脈本方雖無葱白。方後便有而亦加葱之例。葱白既可用。人尿獨不可加。

用于况厥陰內藏厥水得無而赤戴陽。可用葱白之治乎。上法皆未流之挽。無問直中沉寒傳經壞病。病氣至此轉逆。元氣至此逮盡。非始病便見脈沉發熱之比。縱兩感勢劇。尚有麻黃附子細辛湯。儘力可救。與前太陽例中先後救裏解表之法。互相揮發。辨治之微。惟在頭之痛與不痛爲確據也。精義至此盡情剖露。後世畧不加察。妄立兩感之方。總未達長沙萬一耳。

同陽返本湯 治陽虛躁渴而赤戴陽欲坐臥泥水

醫通卷十六 四逆

中脈來無力欲絕者

四逆湯加人參麥門冬五味子臘茶陳皮

而赤者下虛也。加葱七莖黃連少許。用泥漿水澄。

清煎服。人白蜜五匙。冷服取汗。

此以白通合生脈。治陰極似陽。最爲神妙。加用臘

茶漿水等味。當矣。但陳皮一味似屬不必。當知人

參既合薑附。其勢款張。奚藉陳皮發揚之力哉。

羌活附子散 治胃冷呃逆

四逆湯去甘草。本方用附子半兩。乾薑二錢。加

羌活前香各半兩木香一錢為散每服二錢入鹽一字水煎微溫服

木香散 治虛寒滑泄不止

四逆湯本方用甘草乾薑各二兩附子一兩加

丁香木香肉豆蔻廣藿香訶子肉赤石脂各一

兩為散每服三錢陳米湯下世本無炮薑多當歸

冷香飲子 治中胃內挾生冷飲食腹痛瀉利

四逆湯去乾薑本方甘草附子各一錢加草果

仁橘紅各一錢生薑五片浸冷服之

醫通卷十六 四逆

漿水散 治中暑泄瀉多汗脈弱

四逆湯本方三味各用五錢加肉桂五錢良薑

半夏各二錢五分二味俱醋炒漿水煎去滓冷服

按漿水乃秫米和麴釀成如醋而淡今人點牛乳

作餅用之或用真粉作肉菜豆者尤佳

茵陳四逆湯 治陰黃脈沉細肢體逆冷腰以上自

汗

四逆湯本方用炮薑一錢五分附子甘草各一

錢加茵陳蒿一錢五分

茵陳附子乾薑湯 治陰黃脈沉細

四逆湯去甘草用熟附三錢炮薑二錢加白朮

二錢豆蔻枳實半夏茯苓澤瀉橘紅各八分茵

陳蒿一錢生薑五片

理中湯丸上兩全廣 治胸痺心胸痞氣霍亂吐瀉

不渴一切脾胃虛寒嘔吐清水飲食不入完穀不

化

乾薑炮半錢 人參一錢 白朮炒焦一錢

甘草炙半錢

醫通卷十六 理中

右四味水煎去滓溫服○腸胃虛脫完穀不化者

煉白蜜丸彈子大沸湯研和滓日三夜二服名理

中丸

附子理中湯 治下焦虛寒火不生土泄瀉嘔逆

理中湯加熱附子

按方中用參三錢僅可用附一錢若峻用溫補用

參一兩方可加附三錢如尋常小劑用參一錢止

可用附三分設不審此而附過於參下咽之後壯

火食氣反招竭澤之殃製劑不可不講

桂枝人參湯 玉函 治挾熱利不止心下痞硬

理中湯加桂枝

枳實理中湯 治胃虛挾食及結胸本虛不能受攻者

理中湯加枳實茯苓○千金加半夏厚朴附子

治胸中悶亦可用陳米飲或蒸餅丸服

治中湯 治冷食結滯

理中湯加青皮陳皮

連理湯 治胃虛挾食痞滿發熱

醫通卷十六 理中

理中湯加黃連茯苓

理苓湯 治胃虛食滯喘脹浮腫小便不利

理中湯合五苓散

乾薑人參半夏丸 金匱 治妊娠胃寒嘔吐不止

理中湯去白朮甘草本方乾薑人參各一兩加

半夏二兩薑汁糊丸梧子大飲服十九日三服

甘草乾薑湯 玉函 治胃中陽虛咽乾煩躁吐逆

理中湯去人參白朮

三物大建中湯 金匱 治胸中大寒嘔吐不能食及

少腹冷積作痛

理中湯去白朮甘草本方乾薑用四錢人參用

三錢加蜀椒半合去閉口者炒去汗水煎去滓內膠飴

半杯微火再煎溫服如炊頃少飲稀粥一升後

更服當一日食糜溫覆之

甘薑苓朮湯 金匱 治腰以下重著而痛

理中湯去人參加茯苓

腎著者腎受溼著而重痛故以燥溼為務非腎虛

腰痛可溼用也

醫通卷十六 理中

滲溼湯 局方 治溼滯經絡腰下重著而痛

理中湯去人參加蒼朮茯苓橘紅丁香薑棗

大順散 局方 治暑熱引飲過多霍亂吐瀉

理中湯去人參白朮本方甘草乾薑各半兩加

肉桂杏仁去皮各三錢先將甘草同白砂炒次

入乾薑却下杏仁炒過篩去砂合桂為散每服

三錢沸湯調服

烏梅丸 玉函 治嘔厥

理中湯去白朮甘草加烏梅黃連黃蘗附子蜀

椒桂枝細辛當歸以苦酒漬烏梅一宿蒸之五升米下飯熟去核搗成泥與蜜杵丸先食飲服十丸日三服稍加至二十九禁生冷滑物臭食緣千金治久痢諸藥不瘥本方去細辛附子人參黃蘗桂枝換桂心

半夏瀉心湯玉函 治心下痞滿不痛

半夏五錢 乾薑炮 甘草炙

人參各三錢 黃連一錢

天棗四枚

醫通卷十六 瀉心

右七味水煎溫分三服

生薑瀉心湯玉函 治心下痞硬下利腹鳴

半夏瀉心湯減乾薑二錢加生薑四錢

甘草瀉心湯玉函 治胃虛痞滿誤下利不止

半夏瀉心湯去人參加用甘草一錢

黃連湯玉函 治胃中寒熱不和心下痞滿

半夏瀉心湯去黃芩減人參一錢加桂枝二錢

乾薑黃芩黃連人參湯玉函 治胃虛客熱痞滿

半夏瀉心湯去半夏甘草天棗加用黃連一錢

七氣湯局方 治七情鬱結於中心腹絞痛服寬膈

破氣藥轉劇者投此即効

人參錢半至三錢 甘草炙 肉桂錢半至一錢

半夏錢半至一錢 生薑七片

右五味水煎空心服○千金加吳茱萸各奔氣湯

深師七氣湯 治七氣為患氣寒血熱嘔瀉痞滿

七氣湯加乾薑吳茱萸枳實橘皮桔梗芍藥乾

地黃黃芩

二因七氣湯 治七氣致病嘔逆痞悶腹脇脹痛

醫通卷十六 七氣

七氣湯加厚朴白芍茯苓橘皮蘇葉大棗

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作痛

七氣湯去人參易觀桂加香附青皮陳皮桔梗

蓬朮藜香益智仁大棗

大七氣湯 治積滯癥瘕結聚隨氣上下心腹疔痛

小腹脹滿二便不利

指迷七氣湯去半夏薑棗加山稜

橘皮乾薑湯 治乾嘔吐逆吐涎沫而嘔

七氣湯去半夏加乾薑橘皮通草

蘇子降氣湯局方千金木治脚弱上氣凡痰涎壅

盛肺滿喘嗽服之氣降即安

七氣湯去人參加蘇子三錢橘紅一錢當歸前

胡厚朴各五分大棗一枚

溫肺湯 治肺胃虛寒喘嗽嘔逆大便不實

七氣湯加橘紅乾薑木香鍾乳局方去人參

木香鍾乳加細辛杏仁芍藥五味子

半夏溫肺湯 治寒痰欬嗽心下注洋胃氣虛寒者

醫通卷十六 七氣

三九

七氣湯加橘紅赤茯苓細辛桔梗旋復花白芍

參蘇溫肺湯 治肺受寒而喘嗽

七氣湯加橘紅木香桑白皮紫蘇茯苓白朮五

味子冬月更加不去籐麻黃三分

崔氏八味丸金匱 治腎藏真陽不足火不歸源

熟地黃八兩 山茱萸肉 乾山藥微煨各

牡丹皮 白茯苓去皮 白澤瀉去毛各

附子童便浸炙 肉桂去粗皮勿見

右八味為末煉白蜜丸梧子大每服五七十九空

心淡鹽湯臨卧時溫酒下以美饌壓之

腎氣丸金匱

八味丸肉桂易桂枝

錢氏六味丸一名六味 治腎水真陰不足

八味丸去桂附方中熟地黃川縮砂蜜八錢製

按金匱八味腎氣地黃本無縮砂之製以中有附

子之雄肉桂之竄也錢氏裁去二味治小兒解頰

等證雖曰素稟腎虛而純陽未動地黃不製也

後世借治真陰不足乃用縮砂製地黃不特無減

醫通卷十六 八味

四一

食作瀉之虞服後連噉數餅氣轉食進脾腎安和

其陽生陰長之妙世都莫知茲特表而出之

加減六味丸 治陰虛咳嗽吐血骨蒸及童勞肺熱

消瘦等證

六味丸去山茱萸加葶藶四兩亦可作膏

河車六味丸 治稟質素虛將欲成勞

六味丸本方川紫河車熬膏丸服

都然丸 治腎水不固欬嗽精滑

八味丸去桂附加五味子一兩

七味丸 治腎虛火不歸根遊散在上在外

八味丸去附子川一方桂二兩

加減八味丸 治腎虛火不歸源則熱欬嗽

八味丸去附子加五味子一兩

濟生腎氣丸 治腎氣不化小便瀟數

八味丸本方用茯苓三兩熟地四兩山藥山萸

丹皮澤瀉肉桂各一兩附子五錢加牛膝車前

各一兩

此本金匱腎氣方中諸藥各減過半惟桂苓二味

醫通卷十六 八味

仍照原方為宣布五陽開發陰邪之端藥更加牛

膝車前為太陽厥陰之嚮導以肝為風水之藏凡

走足經之藥性皆上升獨牛膝通津利竅下走至

陰中前雖行津液之府而不傷犯正氣故濟生方

用之詳金匱腎氣用桂枝而不用肉桂者陰氣固

結於內勢必分解於外則腎氣得以流布周身而

此既用牛膝引入至陰又需桂附蒸動三焦不特

決瀆有權膀胱亦得以化所以倍用肉桂暗藏桂

苓丸之妙用愈於五苓十倍矣但方中牛膝澤瀉

精氣不固者勿用

清金壯水丸 治腎藏水虧火旺蒸熱欬嗽

八味丸去桂附加麥門冬三兩心六五味子一兩

納氣丸 治脾腎皆虛蒸熱欬嗽倦怠少食

八味丸去桂附加沉香一兩砂仁二兩如泄瀉

少食者用乾山藥末調糊代蜜為丸

香茸八味丸 治腎與督脈皆虛頭旋眼黑

八味丸去桂附加沉香一兩鹿茸一具

十補丸 治稟賦陽虛下體無力小兒解顛脛軟膝

醫通卷十六 八味

蓋不生

八味丸加鹿茸一具五味子一兩

枳木湯金匱 治水腫心下如盤邊如旋盤

枳實十枚 白木二兩

右二味水煎溫分三服腹中軟即當散也

枳木丸 治脾不健運飲食不化

枳木湯用枳實一兩白木二兩荷葉裹米燒飯

為丸米湯下七八十九

海藏曰東垣枳木丸本仲景枳木湯至晚年道進

用荷葉燒飯為丸。取留泮於胃也。太無曰。金匱治
水腫。心下如盤。故用湯以蕩滌之。東垣治脾不健
運。故用丸以緩消之。二方各有深意。不可移易。

香砂枳朮丸 治氣滯宿食不消

枳朮丸加木香砂仁各半兩

橘半枳朮丸 治痰食兼併不化

枳朮丸加橘皮半夏各半兩

深師消飲丸 治停飲胸滿嘔逆腹中水聲不思飲
食

醫通卷十六 枳朮

枳朮丸加茯苓一兩炮薑半兩薑汁調神麩煮

浮糊丸 梧子大淡薑湯或沸湯米湯任下三四

十九

按此即腎著湯去甘草之緩中易枳實以導滯也

平胃散 治胃中宿食不化 藜藿人宜之

蒼朮 泔浸去皮麻油炒黃四兩 厚朴 去皮薑汁炒

陳皮 泔浸去白 甘草 炙各三兩

右四味為散 每服四五錢 加生薑三片 水煎溫服

香連平胃散 治食積發熱腹痛作瀉

平胃散加薑汁炒川連二兩木香一兩

不換金正氣散 治時氣不正 感冒夾食

平胃散加藿香半夏時氣加香豉

藿香正氣散 治水土不服 感冒時氣夾食

平胃散換白朮加藿香紫蘇半夏茯苓白芷椿

梗大腹皮薑棗 治食滯痞滿寒熱痞瘕

人參養胃湯 治食滯痞滿寒熱痞瘕

平胃散加藿香半夏人參茯苓草果薑棗烏梅

參苓平胃散 治脾虛飲食不化大便不實

醫通卷十六 平胃

平胃散加人參茯苓

白鳳膏 治少年稟氣不足因飲食儀飽所傷致成
虛損形體羸弱日晡潮熱腹脹氣急脈來弦數者

平胃散四兩加參苓各一兩京棗四兩去核透

一填入煎藥入烏嘴白鴨腹內男雌女雄製法

如烏骨雞丸

此藥可久方丸以蒸餅取緩留胃脘而和中氣之

傷也蓋參苓平胃原非補益腎水之藥予嘗借此

以治飲食內傷中氣不和發熱羸瘦之症往往獲

効詳方名白鳳者以鬼字下儿字加於鳥字之上也。且丸以膏名。取脂膏之義。藏機法也。

厚朴湯 治脾胃虛寒作脹。腹中時痛時止。

平胃散去蒼朮加茯苓乾薑潔古加半夏枳實薑聚。

除溼湯 治溼熱痞滿不食。

平胃散加半夏茯苓白朮藿香生薑大棗。

升陽除溼湯 治脾胃虛弱不能飲食。腹鳴泄瀉。

平胃散去厚朴加羌活防風升麻柴胡豬苓澤。

醫通卷十六 平胃

瀉麥芽神效。

五積散 局方 治感冒內挾冷食。脾陰受傷。表裏俱病。

平胃散加麻黃桂枝炮薑。半夏茯苓枳殼桔梗。

白芍當歸。川芎白芷。每服四五錢。生薑三片。葱。

白三草。水煎去滓。熱服。溫覆取微汗。

調中飲 治食積類傷寒及手足四肢發冷。

平胃散加枳實白朮。乾薑黃連。山楂神效。草果。

水煎去滓。磨木香調服。

胃苓湯 治飲食停積。浮腫泄瀉。脈證俱實者。

平胃散合五苓散。生料煎服。

平胃。本平胃氣之墩阜。若因脾土之虛。不能消運。

又須稍藉參苓。如養胃之類。然復有土衰不能分。

利而成腫脹。且氣壅不勝參朮。難合理中者。乃合。

五苓以健運水土。與正氣散之假蘇藉以散客邪。

兩不移易之定例也。

棗糝丸 治食積發黃。

平胃散加皂糝。燒紅。棗肉丸服。

醫通卷十六 平胃

此消糜宿滯之第一峻利方。較平胃之緩。悉百倍。

膏粱慎勿剛施。服後以穀壓之。否則恐其嘔吐也。

枳殼湯 治痘疹誤服參耆。腹脹喘急。

平胃散去蒼朮加枳殼。

二陳湯 局方 治脾胃痰滯。

半夏 錢半 茯苓 錢半 陳皮 一錢 烏梅肉 半個。

甘草 錢一 生薑 三片。

右六味。水煎。空心溫服。

燥痰。減半夏生薑。加麥門冬。竹瀝。鬱痰。乾欬。去半。

夏用蜜煎薑加川貝母火痰加黃連竹茹老痰加蛤粉海石

按此方木內經半夏湯及金匱小半夏湯小半夏加茯苓湯等方而立加甘草安胃橘皮行氣烏梅收津生薑豁痰乃理脾胃治痰涎之專劑也其重

小半夏湯金匱又名生薑半夏湯治痰積膈上喘嗽嘔噦

二陳湯去陳皮甘草茯苓烏梅用半夏一兩水生薑汁半合

醫通卷十六 二陳

半夏湯千金治膈府實熱

二陳湯去陳皮甘草烏梅生薑易宿薑加黃芩生地黃秫米遠志酸棗仁以流水煮秫米去滓煎服

小半夏加茯苓湯金匱治痰飲多汗小便不利

二陳湯去陳皮甘草烏梅用半夏一兩生薑汁半合茯苓三錢

大半夏湯治胃反嘔吐

二陳湯去陳皮甘草茯苓烏梅加人參二錢以

水和蜜揚之二百四十遍煮藥溫服○千金有

橘皮治氣滿腹脹○又千金大半夏湯本方更

加附子當歸桂心蜀椒厚朴枳實茯苓甘草大

棗治胃中虛冷腹滿氣塞

半夏乾薑湯治乾嘔吐涎沫

二陳湯去茯苓陳皮甘草烏梅生薑加乾薑等分為散取方寸匕漿水煎服

橘皮湯治乾嘔噦手足厥

二陳湯去半夏茯苓甘草烏梅用橘皮四錢生

醫通卷十六 二陳

薑一兩

橘皮半夏湯治積氣痰痞飲食嘔吐不止

二陳湯去茯苓甘草烏梅用半夏橘皮各半兩生薑汁半合

橘皮枳實生薑湯金匱治胸痺短氣

二陳湯去半夏茯苓甘草烏梅用橘皮一兩生薑半兩加枳實三錢

橘皮竹茹湯金匱治胃虛噦逆

二陳湯去半夏茯苓烏梅用橘皮三錢甘草一

錢生薑半兩加竹茹三錢人參一錢大棗三枚
半夏厚朴湯金匱治氣結成痰狀如破絮或如

梅核結在咽喉咯不出嚥不下中脘痞滿氣鬱不
舒惡心嘔逆一切鬱證初起屬實者

二陳湯去橘皮甘草烏梅加紫蘇厚朴一方有
加味四七湯 治心氣鬱滯

四七湯加茯神遠志菖蒲甘草

指迷茯苓丸 治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足不
能轉移背上凜凜惡寒

醫通卷十六 二陳

七

二陳湯去陳皮甘草烏梅木方用半夏麴二兩

茯苓一兩加枳殼風化硝各半兩薑汁調神麴
糊丸梧子大每服三五十丸空心淡薑湯下

厚朴生薑甘草半夏人參湯玉函 治胃虛嘔逆痞

滿不食

二陳湯去茯苓陳皮烏梅加人參厚朴

二陳湯 治脾虛痰食不運

二陳湯加生白朮薑汁茅朮麻油

分氣紫蘇飲 治脇痛氣喘

二陳湯去半夏加紫蘇桑皮大腹皮桔梗五味
子食鹽

寧嗽化痰湯 治客邪傷肺久嗽不止

二陳湯加紫蘇葛根枳殼桔梗前胡麻黃杏仁
桑皮

導痰湯 治溼痰內外癰盛

二陳湯加南星枳實

加味導痰湯 治溼熱痰飲眩暈痰壅

導痰湯加人參白朮黃芩黃連枯蘗霜桔梗大

醫通卷十六 二陳

七

東竹瀝薑汁

十味導痰湯 治痰溼上盛頭目不清

導痰湯加羌活天麻蠅尾臨服入雄黃末少許

祛風導痰湯 治類中風筋脈顛掉

導痰湯加羌活防風白朮薑汁竹瀝

滌痰湯 治類中風痰迷心竅

導痰湯加菖蒲人參竹茹

溫膽湯千金 治心膽虛怯觸事易驚多汗不寐短

氣乏力皆由寒涎沃膽所致

二陳湯用橘紅加枳實竹茹紅棗

參胡溫膽湯 治往來寒熱嘔而痞悶

溫膽湯去竹茹紅棗加人參柴胡

十味溫膽湯 治寒涎沃膽膽寒肝熱心悸不眠短

氣惡心耳鳴目眩四肢浮腫

溫膽湯去竹茹加人參熟地棗仁遠志五味子

膽之不溫由於胃熱不清停蓄痰涎沃於清淨之

府所以陽氣不能條暢而失溫和之性故用二陳

之辛溫以溫膽滌涎涎聚則熱鬱故加枳實竹茹

醫通卷十六 二陳

五

以化胃熱也若寒熱嘔逆胃氣不振也去枳實之
消尅紅棗之滯胃加柴胡以疎肝人參以扶胃及
六君子之變法也更加熟地棗仁遠志五味又為
歸脾湯法派耳

消暑丸 局方 治肥人傷暑眩暈嘔逆

二陳湯去陳皮用醋炒半夏二倍生薑自然汁

為丸酸漿水或烏梅湯淡醋湯下七八十九

干縉湯 治風痰喘急脈證俱實者

二陳湯去茯苓橘皮烏梅木方用半夏七枚甘

草一寸生薑指大切加皂莢去皮炙淨末半兩

水煎溫服○一方無甘草但用半夏一兩皂莢

末半兩生薑七片同入紗袋中以手揉取清汁

作三服

溫中丸 治黃胖面腫足脹是脾虛不能健運雖有

積聚不可下之

二陳湯本方橘半茯苓各一兩炙甘草五錢加

黃連香附苦參鹹砂醋炒各五錢白朮二兩神

麴一兩醋水各半泛丸梧子大每服七八十九

醫通卷十六 二陳 四君

五

用白朮六錢陳皮一錢生薑三片煎湯送下虛
加人參一錢病輕者服此藥六七兩小便即長
病甚者服一筋小便始長積聚去淨然後六君
子之類調補之

四君子湯 局方 治胃氣虛弱飲食不思倦怠少食

人參一錢至三錢 白朮炒黃一錢至二錢 茯苓一錢至三錢

甘草炙六分至一錢

右四味水煎空心溫服

按四君子乃胃家氣分之藥胃氣虛而用之功

効立見。卽血虛用四物亦必兼此。故八珍之治。不獨氣血兩虛也。卽血虛者亦須兼用。但補氣則偏於四君。補血則偏於四物。若純用血藥。不得陽生之力。陰無由以化也。方中白朮。若治脾胃虛衰。大便不實。或嘔惡不食。合用炒焦。方有健運之力。如脾胃虛燥。咳嗽失血。須用陳米飯上蒸過十餘次者。則轉濁爲清。轉燥爲潤。是以異功散八珍湯。及歸脾逍遙等方內。並宜蒸者。卽陰虛乾欬。吐白血。總無妨礙。更加白蜜拌蒸。猶爲合宜。其於輕

醫通卷十六 四君

重炮製之。閉全在川者之活法。權變舉此。可以類

推三隅矣。

異功散 治肺胃氣虛稀痰喘嗽

四君子湯加橘皮白朮爲散。每服三四錢。加生

薑一片。水煎去滓服。

六君子湯 治胃虛少食。痰嗽嘔泄。

四君子湯加橘皮半夏生薑

香砂六君子湯 治氣虛痰食氣滯

六君子湯加木香砂仁烏梅

烏蠍六君子湯 治小兒慢脾風內釣

六君子湯加川烏蠍尾神麴糊丸服

溫脾散 治小兒心脾虧損弄舌及虛脹乳食不進

四君子湯加黃耆藿香訶子肉。橘皮桔梗木香

爲散。每服三四錢。加薑棗煎服。

茯苓飲外臺 治胸中停痰宿水吐後虛滿不食

四君子湯去甘草加枳實橘皮生薑

桂枝散局方 治小兒傷寒發熱欬嗽

四君子湯加桔梗細辛羌活一作芍等分爲散。每

醫通卷十六 四君

服一二錢。加薄荷五葉水煎熱服。取微汗愈不

愈再作。加葱白香豉。

四獸飲 治癰疾胃虛中挾痰食

四君子湯加半夏橘皮草果爲散。每服四五錢

加生薑七片。烏梅肉一箇。水煎清於熱服。

八味順氣散 治類中風虛脹喘逆

四君子湯加青皮橘皮白芷烏藥爲散。每服四

五錢。水煎溫服。

參苓白朮散局方一名參朮散 治胃虛喘嗽大便不實

四君子湯加山藥藕豆蓮肉桔梗薏苡砂仁爲散每服四五錢加薑棗煎服

七味白朮散即錢氏白朮散治胃虛津氣不行而渴

四君子湯加藿香木香煨葛根爲散每服三四錢水煎日三服

八珍散治胃虛痰中見血及粉紅痰

四君子湯加黃耆山藥粟米菟豆炒存性

九味資生丸治老人食難克運

四君子湯本方參朮各三兩茯苓一兩半炙甘草

醫通卷十六 四君

草半兩加橘紅橘肉真神麩各二兩川黃連白

豆蔻各三錢半煉白蜜丸服○古方止此九味

後人更加桔梗藿香各半兩澤瀉三錢半藕豆

蓮肉各一兩薏苡三兩山藥麥芽芡實各一兩

半醉飽後細嚼彈子大一丸淡薑湯下則酒食

易化健脾胃消食止瀉調和藏府滋養營衛

饑時服之即飽飽後食之即饑藥雖繁簡不同

而功效不異因兩存之

八珍湯治婦人胎產崩漏氣血俱虛者

四君子湯合四物湯

八物湯治營衛俱虛畏寒發熱

八珍湯去人參加黃耆

按八珍八物功用懸殊以人參專補藏府元氣黃耆惟司營衛開闢也世人每謂黃耆代人參恆用

八物補益藏府之氣大爲噴飯

人參胃風湯局方治風入胃中能食便血

四君子湯去甘草加當歸白芍川芎桂枝粟米

○一方多木香

醫通卷十六 四君

按風入胃中何以反能食蓋風爲陽邪其性善行

久而化熱即內經所謂痺成爲消中者是也方中

但用桂枝去風而不去熱者以熱必隨風外解不

必加治耳

益氣養營湯治瘰癧結核流注一切鬱熱毒氣

八珍湯加黃耆桔梗貝母香附橘皮生薑

大防風湯局方治邪襲足三陰腿膝疼痛及痲後

脛膝痛鶴膝風附骨疽證但赤熱焮腫者禁用

四君子湯去茯苓加肉桂附子黃耆牛膝杜仲

熟地白芍川芎羌活防風

四物湯局方 治營血虛熱

熟地黃 二錢 當歸身 一錢 白芍藥 錢半

川芎藥 八分

右四味水煎溫服。肥盛多淫痰及嘔逆少食便澹者禁用。

增損四物湯局方 治血虛發熱食少便澹

四物湯去地黃加入參甘草炮薑

加減四物湯 治停經血滯少腹結痛

醫通卷十六 四物

五

四物湯換赤芍加三稜蓬朮肉桂乾漆灰

四烏湯 治血中氣滯小腹急痛

四物湯加烏藥香附甘草

四神散 治產後血虛或瘀血腹痛

四物湯去地黃加炮薑為散溫酒服方寸七

當歸芍藥散 治腹中諸痛

四物湯去地黃加白朮茯苓澤瀉為散酒服方寸七

寸七日三

當歸散 治妊娠胎氣不安

四物湯去地黃加黃芩白朮為散

日三

芎藭湯千金 治產後崩漏下血不止

四物湯換乾地黃加黃耆甘草乾薑吳茱萸若

夏月經後有赤白不止除地黃加杜仲人參

三黃補血湯 治血虛至夜發熱自汗

四物湯加生地黃黃耆升麻柴胡丹皮

四物二連湯 治重陽無陰晝夜發熱

四物湯加宣黃連胡黃連

醫通卷十六 四物

六

按此本為重陽無陰晝夜發熱而立必其人時火亢極於陰分乃為相宜以陽邪蒸虛故曰重陽陰欲消亡是即無陰非真陰補虛之謂蓋陽全陰半陽得以統陰所以晝夜皆熱若陰氣自病斷無上午陽分發熱之理每見時師用以治虛勞蒸熱及血虛發熱之疾服之未有不嘔瀉奪食者易知方下原治發熱未嘗言蒸熱也夫熱發於外雖滯於陰實為客邪熱蒸於內陰不濟陽證屬久虛可不辨而混治乎其陰虛蒸熱自有六味地黃血虛發

熱自有常歸補血亦何藉於此哉

大秦朮湯 治中風外無六經形證內無便溺阻隔

宜此養血營筋血行風自滅矣

四物湯加秦朮生地黄羌活獨活防風細辛茯苓

苓白朮白芷黃芩石膏甘草

張景岳曰大秦朮湯在機要發明俱云治中風外

無六經之形證內無便溺之阻隔如是血弱不能

養筋宜養血而筋自榮以大秦朮湯羌活愈風湯

主之大秦朮湯雖有補血之藥而寒散之劑居其

醫通卷十六 四物

五

半矣夫既無六經之外邪而用散何為也既無阻

隔之火邪而用寒何為也寒散既多又果可養血

氣而壯筋骨乎秦朮湯且不可愈風湯則尤其不

可者也吾不知用此法者果出何意

獨活寄生湯 治風痺腰脚疼重

四物湯加獨活桑寄生杜仲牛膝細辛秦朮茯苓

苓桂心防風人參甘草○古今錄驗無寄生有

續斷肘後無寄生人參甘草當歸有附子產後

腹痛不得轉動及腰脚攣痛不得屈伸痺弱者

宜服此湯

十味劉散 治溼痺周身疼痛

四物湯加白朮附子防風茯苓黃耆肉桂

此即十全大補去人參甘草之甘緩補氣而加附

子防風以通達外內也

玉燭散 治血熱大便秘結

四物湯換生地黄加生甘草酒大黃玄明粉生

薑萬全方無大黃明粉易青皮枳殼

膠艾湯 治胎前下血孕婦胎漏不止

醫通卷十六 四物

六

四物湯用乾地黄加阿膠甘草艾清酒和水各

半煎服一方多千金無地黄芍藥

丁香膠艾湯 治經漏兼白帶

四物湯加丁香阿膠艾

加味香附丸 治倒經白汗胎漏下血

四物湯木方用熟地八兩歸芍各四兩芍藥三

兩加四製香附一筋澤蘭菜烏賊骨各六兩為

末用浮麥麩酒醋水調糊為丸如菜豆大每服

百丸早晚各一服溫酒沸湯任下

艾煎丸局方 治婦人崩傷淋瀝帶下赤白小腹痛

四物湯木方歸地芍各二兩川芎一兩加人參石菖蒲炒吳茱萸用醋炒各一兩為末用蘄艾四兩酒煎濃汁入糯米糊為丸梧子大每服百丸醇酒下更加肉桂熟附子各一兩香附四兩

名艾附丸

溫經湯金匱 治經水不調崩帶及唇口乾燥并治

經阻不通咳嗽便血此肺移熱於大腸也

醫通卷十六 四物

五

四物湯去地黃加阿膠甘草人參肉桂吳茱萸牡丹皮麥門冬半夏生薑更加白朮名大溫經湯

此方木膠艾湯而立以虛火上炎唇口乾燥故用麥冬潤澤下滲不時帶下故用半夏若無二證不必拘執成方也

芎歸湯及散 治妊娠胎不轉運

四物湯去地黃芍藥湯則煎服散則酒調服之以驗胎息若是真胎服之即動勿經火炒乃効

佛手散 治產婦胎不得下

四物湯去地黃芍藥等分炒研為散紅酒調服加味佛手散 治產婦交骨不開

四物湯去地黃芍藥木方歸用三錢芎用一錢加止揀人參三五錢去血過多加至一兩臨服入童便半盞續續進之質壯氣實者但加童便人參不用可也

紫蘇飲 治妊娠臨月浮腫喘脹

四物湯去地黃加紫蘇陳皮大腹皮人參甘草

醫通卷十六 四物

五

牛蒡葱白○感冒風寒去腹皮加香豉胎動不安加黃芩白朮胎不運動加水香砂仁肥盛氣滯加半夏厚朴虛羸少氣加白朮倍人參

達生散 治妊娠九個月後服數劑則易產

紫蘇飲去川芎加白朮黃楊腦三枚

芎歸鱉甲飲 治勞瘵久不止或暫止復來

四物湯去地黃加茯苓半夏橘皮鱉甲黃連烏梅寒多加草果熱多加柴胡胃虛少食加人參白朮汗多加黃耆甘草一方多 青皮

續命散 治風虛昏倒自汗手足痿癱

四物湯加人參甘草桂心遠志防風獨活細辛

葛根荆芥半夏為散每服一兩加生薑三片水

煎通口服多汗去葛根加牡蠣

生地黄黃連湯 治失血後燥熱癰脈數盛者

四物湯換生地赤芍加黃連黃芩山梔防風

滋燥養營湯 治血燥皮膚皴揭筋掣爪枯

四物湯去川芎加生地黃秦艽防風黃連甘草

大補地黃丸 治精血枯槁燥熱

醫通卷十六 四物

三

四物湯去川芎加生地黑參黃蘗知母乾山藥

山茱萸枸杞肉蓯蓉寧丸每服六七十丸空心

鹽湯臨卧溫酒下

劫勞散 治肺痿欬嗽痰中有紅線盜汗發熱

熱過即冷

四物湯去川芎加人參黃耆甘草阿膠五味子

半夏為散每服三四錢加薑棗煎空心服

加味四物湯 治血虛發熱

四物湯加白朮茯苓柴胡丹皮

解毒湯 治痘疹血氣弱乾焦黑陷

四物湯換生地加人參連翹黃連甘草陳皮木

通竹葉

寬中散 治痘疹誤用辛熱秘結

四物湯去川芎換生地加枳殼赤茯苓甘草為

散每服方寸匕水煎去滓服

麥門冬湯 治痘疹便實而渴

四物湯去川芎換生地加麥門冬

保元湯 治營衛氣血不足

醫通卷十六 保元

三

黃耆蜜酒炙三錢至六錢人參三錢至一兩甘草一錢

水煎空心服

獨參湯 治氣虛不能統血驟然脫血血崩不止

人參三錢至一兩大虛暴脫者一兩至三兩胃

虛少食加橘皮肺虛喘嗽加橘紅血脫加童便

半杯薑汁三七一方多京

歸脾湯 治心脾鬱結經癸不調

保元湯加白朮茯苓酸棗仁遠志肉苁蓉身桂

圓肉木香生薑紅棗

加味歸脾湯 治心脾鬱結經閉發熱

歸脾湯加柴胡山梔仁

聖愈湯 一治失血過多久瘡潰膿

保元湯去甘草加生地黃熟地黃川芎當歸

十全大補湯 局方 治營衛氣血俱虛

保元湯加白朮茯苓熟地當歸川芎白芍肉桂

薑棗

按和劑十全大補雖本保元而實四君四物黃耆

建中三方合成因飲食勞倦而致煩熱肌肉消瘦

醫通卷十六 保元

卷

者宜之若房勞傷精思慮傷神陰虛火旺欬嗽失血者誤用反致陰火上乘轉增其劇也又古方十全大補無黃耆肉桂多沉香木香此則專開脾胃之鬱爾

人參養營湯 局方 治心脾虛寒

保元湯加白朮茯苓橘皮熟地當歸芍藥肉桂

遠志肉五味子

按方中諸品皆心脾二經之藥而方下舊註補肺虛謬矣夫養營正當補養心脾原無藉於肺氣

也。

大建中湯 局方 治營衛俱虛上熱下寒

十全大補湯加附子肉苁蓉半夏麥門冬

人參安胃散 治小兒心脾虛極弄舌

保元湯加黃連茯苓白芍生甘草

人參實衛湯 治瘧自汗不止

保元湯加白朮芍藥初發加桂枝久瘧加烏梅

黃耆六一湯 局方 治衛虛自汗晝汗煩熱

保元湯去參用黃耆六錢甘草一錢加棗一枚

醫通卷十六 保元

卷

當歸補血湯 治血虛至夜發熱煩渴引飲其脈洪

大而虛重按全無者

保元湯去人參甘草用黃耆六錢加當歸三錢

玉屏風散 治衛虛自汗易感風邪用此補脾實衛

保元湯去人參甘草用黃耆六兩加防風二兩

白朮四兩為散每服四五錢加薑棗煎服

上三方並屬保元去參而黃耆六一則舊本方甘

草協助黃耆以實脾氣故晝日多汗煩擾者宜之

當歸補血專用當歸引領黃耆以護營血故夫血

至夜發熱者宜之。玉屏風散則加白朮防風以祛
衛溼。故理疎易感風邪者宜之。三方雖同以黃耆
為君。而主氣主血主肉各隨佐使功用迥乎不侔
也。

益氣聰明湯 治氣虛目暗生醫耳聾耳鳴。

保元湯加升麻葛根蔓荊芎藥酒黃蘗。

此保元湯合升麻湯加蔓荊子以治其上黃蘗以
治其下也。

神効黃耆湯 治氣虛耳目不明。

醫通卷十六

保元

卷

保元湯用黃耆二錢人參甘草各一錢加白芍
一錢蔓荊子二分橘皮五分。

耳目之患氣虛而陰火上乘者宜益氣聰明湯無

陰火者宜神効黃耆湯用者審之。

千金托裏散 治氣血虛寒潰瘍不收。

保元湯加川芎當歸肉桂白芷防風桔梗白芍

天冬連翹忍冬生薑。

參耆內托散 治潰瘍感冒風邪痘疹觸時伏匿及

癰疽久不潰。

保元湯加川芎當歸肉桂白芷防風桔梗木香
厚朴。

本方去木香名十宣散治痘癰。

托裏消毒散 治癰疽痘疹毒盛不能起發。

保元湯加當歸芍藥茯苓白朮忍冬白芷連翹

內補黃耆湯 治潰瘍膿水出多虛熱不寐盜汗。

保元湯加白朮茯苓五味棗仁。

人參固肌湯 治痘瘡表虛斑爛不能收靨。

保元湯加當歸白朮茯苓棗仁忍冬連翹

醫通卷十六

保元

卷

補中益氣湯 治內傷中氣下墜下元虛者禁用。

保元湯本方參耆甘草減半加白朮一錢當歸

橘皮柴胡各八分升麻五分勞力感寒加羌活

薑棗冬加桂枝春加香豉葱白。

調中益氣湯 治身體沉重百節煩疼胸滿短氣心

煩耳鳴目熱如火口中沫沫飲食失味嗜睡溺赤

補中益氣湯加白芍藥五味子。

升陽益胃湯 治脾胃受傷邪熱內陷外反惡風厥

冷脈沉大小便秘瀉不可誤認陰寒而用熱藥又

不可誤認實火而用涼藥。宜此湯升舉微汗則愈。
 補中益氣湯去升麻當歸加羌活獨活白芍防
 風半夏茯苓澤瀉黃連黃芩。服藥後忌言
 語一二時。戒酒麪生冷。薄滋味以養胃氣。補食
 美食以助藥力。更宜小役形體。使胃氣與藥轉
 運。升發慎勿大勞。以傷脾胃生發之氣。
 升陽順氣湯 治飲食不節。勞役所傷。腹脇滿悶。短
 氣。遇春則日淡無味。遇夏雖熱。猶有畏寒。饑則常
 如飽。不喜飲食。

醫通卷十六 保元

卷九

補中益氣湯去白朮加半夏。草豆蔻。神麴。黃蘗。
 生薑。
 瀉陰火升陽湯 治火鬱發熱。
 補中益氣湯去白朮當歸。橘皮加羌活。蒼朮。黃
 芩。黃連。石膏。早飯後大溫服。服後宜禁一。加升
 陽益胃湯。如見火肝及督任衝三脈。盛用酒炒
 黃蘗。知母。少許。不可久服。恐助陰氣為害也。
 沖和養胃湯 治風虛口患。空中有黑花。神水變淡
 綠色。次變淡白。漸成內障。

補中益氣湯去橘皮加羌活。防風。黃連。白芍。五
 味。生薑。
 通氣防風湯 治太陽氣鬱。肩背不可回顧。
 補中益氣湯去白朮當歸。加防風。羌活。藜蘆。木
 槿。白豆蔻。青橘皮。
 清暑益氣湯 治暑傷無形之氣。口燥。頭痛。發熱。溺
 赤。
 補中益氣湯去柴胡。加麥門冬。五味子。蒼朮。葛
 根。澤瀉。黃蘗。神麴。青皮。

醫通卷十六 保元

卷九

此以保元生脈為主。而兼開腠利水消尅之味。
 清燥湯 治夏秋溼熱傷氣。
 補中益氣湯加生地。黃芩。連。豬苓。茯苓。麥門冬。
 五味子。蒼朮。黃蘗。澤瀉。神麴。
 節菴升陽散火湯 治熱乘肺金。氣虛不能主持。循
 衣。撮空。小便利者。可治。不利者。不可治。
 補中益氣湯去升麻。黃耆。加麥冬。茯苓。神黃。蒼朮。白
 芍。葛根。有痰。加薑汁炒。半夏。大便燥實。瀉語發
 渴。加大黃。泄利。加升麻。倍白朮。

托裏散 治痘毒虛不能潰

補中益氣湯去升麻加熱地茯苓芍藥

生脈散 治熱傷脾胃虛熱喘嗽脈虛無力

人參 三錢 麥門冬 二錢 五味子 一錢

水煎不時熱服

門冬清肺飲 治火乘肺胃喘嗽吐血衄血

生脈散加黃耆甘草紫苑白芍當歸

此生脈保元合用以滋金水化源其紫苑佐黃耆而兼調營衛深得清肺之旨其餘芍藥酸收當歸

醫通卷十六 生脈

十一

辛散且走血而不走氣頗非所宜不若竟用生脈

保元清肺最妥先哲有保元生脈合用氣力從足

膝湧出以黃耆實胃五味欲津皆下焦之事藥耳

宣明門冬飲 治心移熱於肺傳為腦消

生脈散加茯神甘草生地黃栝蒌根煨葛根知

母竹葉

易老門冬飲 治老人津虧大渴

生脈散加茯神甘草枸杞生薑

一方並木生脈而易老差勝蓋明之重在壯氣易

老專滋血氣治得其本矣

天王補心丹 治心腎虛耗怔忡不寧

生脈散加熱地茯苓茯神遠志菖蒲黑參丹麥

栝子仁酸棗仁天門冬百部當歸杜仲桔梗廿

草蜜丸硃砂為衣空心龍眼紅棗湯下二三錢

清心蓮子飲 治心包火旺小便赤澀梗痛

生脈散加黃芩地骨皮車前茯苓黃耆蓮子

此用生脈散合黃芩清肺而兼導赤之製其旨在於心包火炎上灼於肺熱傷氣化不能生水故用

醫通卷十六 生脈 三冬

十一

生脈救肺之燥以滋上源則知肺本無熱皆緣受

火之淫而致熱傷氣化安可復用黃芩以伐其肺

乎曷不竟用生脈合導赤全方豈不源流同清理

明辭暢乎抑或不然不妨削去木通仍用茯苓蓮

子以存清心之意至於局方又以保元為上乃去

五味加入甘草益失滋肺上源之旨矣

二冬膏 治肺胃燥熱痰瀉欬

天門冬 去心 麥門冬 去心

右二味熬膏煉白蜜收不時啗熱噉之

固本丸 治老人津血俱虧。欬逆便秘。

一冬膏加生熟地黃與本方二冬各八兩。人參四兩。蜜丸。酒下。四錢。蒸膏尤宜。食少便滑。禁川。固本丸雖主扶陰抑陽。然四味純陰之性。僅用少許。人參已覺味勝於氣矣。而世本此方二冬二地各用八兩。人參二兩。幾幾乎羣陰剝陽之象。况復舉世醫流。往往割去人參。蓋知陰柔之味。不得陽和之力。每致奪食作瀉。內經所謂無陽則陰無以化。安望其有補益之驗歟。

醫通卷十六 二冬

壹

或問近世病家吝惜多金。醫家迎合鄙性。往往用參湯服丸。此法可否。曰此曲突徙薪之法也。鄙夫但知人參珍貴。以為入甘使補。不知配合之妙。全在佐使得宜。若用參湯送丸。則參力先行。至丸化時。參力相去已遠。非若膏劑之用參湯調服。仍得併力奏功也。

集靈膏 治久嗽氣血俱虛。不能送痰。即出。

固本丸中二冬二地各十兩。人參六兩。加枸杞六兩。熬膏。蜜收。如血虛便難。加歸身。脾弱。加。

加白朮以糖霜代蜜收之。

三才丸 治氣血俱虛。精神不同。以陽失合者宜之。

二冬膏去麥門冬。加入人參熟地。等分。蜜丸服之。

加黃燻甘草砂仁。各三才封髓丹。

甘露飲 局方 治胃中客熱煩躁。口鼻咽喉。牙宣口

臭。

二冬膏加生地黃熟地黃茵陳以殼黃芩石斛

甘草枇杷葉

桔梗湯 玉函 治冬時伏邪發於少陰。咽痛不差。及

醫通卷十六 桔梗

壹

風熱肺氣不清。喘嗽喉中。介介如梗。狀肺痿肺癰。

初起並得服之。

桔梗

甘草 各三錢

右二味水煎。緩緩服之。

利金湯 治肺燥滯不利而欬。

桔梗湯加貝母。橘紅。枳殼。茯苓。生薑。白蜜。

枳殼煮散 治欬引脇下痛。

桔梗湯加枳殼。細辛。川芎。防風。葛根。生薑。紅棗。

清肺湯 治痘疹肺熱喘咳吐痰。

桔梗湯加麥門冬欬冬花杏仁貝母牛蒡子

生地黃散 治斑疹肺熱欬衄血

桔梗湯加麥冬生地欬冬杏仁為散煎服二錢

○一方無杏仁多橘皮

生聖散 治痘出不快溺赤欬痰

桔梗湯加黃芩枳殼木通為散煎服二錢

十六味桔梗湯 治肺壅實熱唾痰

桔梗湯加薏苡貝母當歸桑皮枯蕩仁百合枳

殼葶藶五味地骨皮知母防已黃耆杏仁

醫通卷十六 桔梗

手

葶藶薏苡瀉肺湯 治肺癰初潰吐膿血

桔梗湯本方甘草用節加薏苡貝母橘紅黃耆

忍冬白芨葶藶生薑初起去黃耆加防風潰後

膿血去多加人參潰久不斂加合歡皮

排膿湯 治內癰膿從嘔出

桔梗湯加生薑大棗木煎日二服

排膿散 治內癰膿從便出

桔梗湯去甘草加枳實芍藥為散取雞子黃一

枚以藥與雞子黃相等揉和飲和服之日一服

防已黃耆湯 治風溼相搏客在皮膚關節疼

痛腰已下疼重脈浮自汗惡風

防已 酒洗 黃耆各錢 白朮 錢

甘草 炙八 生薑 四片 大棗 二枚

右六味水煎熱服後當如蟲行皮中腰已下如冰

後坐被上又以一被透腰下溫令微汗差

喘加麻黃胃氣不和加芍藥氣上衝加桂枝下有

陳氣加細辛陳氣久積之寒氣也

防已茯苓湯 治皮水四肢腫皮膚聶聶動

醫通卷十六 防已黃耆

手

防已黃耆湯去白朮薑棗本方中防已黃耆各

三錢甘草一錢加肉桂三錢茯苓六錢水煎溫

分三服

防已湯 治歷節四肢痛如錐刺

防已黃耆湯去黃耆大棗本方中防已白朮生

薑各四錢甘草二錢加桂心茯苓各四錢烏頭

一枚去皮人參二錢以苦酒和水煮日一夜一

服當覺焦熱痺忽忽然頓勿怪也若不覺復服

以覺乃止

梔子豉湯 玉函 治汗下不解虛邪留於膈上心下

結痛虛煩懊憹不得眠及覆頭倒臥起不安者

梔子 十四枚 香豉 四合

右二味水煎分二服溫進一服得快吐止後服

按仲景太陽例中用梔子豉湯有三皆主汗下後

虛邪不解之證其梔子必取肥者生用一吐而膈

上之邪與火俱散也若其時行疫癘頭痛發熱此

湯加葱白最捷多有服之不吐者胃氣強也加薑

汁服之或以鷓鴣探之或借用以清解膈上鬱結

醫通卷十六 梔子豉

七

之火不欲其吐又須山梔炒黑用之便屈曲下行

小便矣如衛氣素虛人感日客邪自汗多者此方

中香豉須炒熟用之至於少氣為胃氣之虛則加

甘草以緩調之嘔為痰飲之逆則加生薑以開豁

之下後心煩腹滿明是濁氣內陷乃於木方除去

香豉表藥加枳朴以湧泄之丸藥大下後身熱不

去微煩明是虛火外擾木方亦不用香豉而加乾

薑以溫順之其有身黃發熱明是溼邪鬱發亦於

木方去香豉而加槩皮以苦燥之下後勞復食復

明是正不勝邪木方加枳實以清理其內用清漿

水煮取味微酸使之下行而不土越也若有宿食

則加大黃如博碁子大五六枚同一梔子豉法功

用之妙神化莫測非庸俗所能擬議也

梔子甘草豉湯 玉函 治下後少氣

梔子豉湯加甘草

梔子生薑豉湯 玉函 治下後嘔吐

梔子豉湯加生薑

梔子厚朴湯 玉函 治下後心煩腹滿

醫通卷十六 梔子豉

七

梔子豉湯去豉加枳實厚朴

梔子乾薑湯 玉函 治丸藥大下後身熱不去微煩

梔子豉湯去豉加乾薑○上四方服法如梔子

豉湯

梔子槩皮湯 玉函 治太陽證身黃發熱

梔子豉湯去豉加槩皮甘草水煎分溫再服

枳實梔子豉湯 玉函 治勞復食復

梔子豉湯倍香豉加枳實三枚用清漿水七升

空煮取四升內枳實梔子煮取三升下豉更煮

五六沸去滓分溫再服覆令微似汗有食加大黃如博碁子大五六枚

梔子大黃湯 治酒痺心中懊憹或熱痛

梔子豉湯加枳實大黃

黃芩清肺飲 治渴而小便不利

梔子豉湯去豉用炒黑山梔加黃芩等分熱服

探吐之不應加香豉一撮

此方妙用全在探吐以提其上則肺氣立清若服而不吐不特綿延不能克應縱或小差其苦寒之

醫通卷十六 梔子豉

完

性留薄於內大傷氣氣之氣得不為之預慮乎

梔子仁湯 治小便不通煩悶腹脹

梔子豉湯去豉加甘草茅根葵子

小承氣湯 玉函 治少陽陽明府證

大黃 四錢 厚朴 六錢 枳實 三枚

初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣勿服之

經云亢則害承迺制專取大黃以制亢極之害也

承氣湯證有三太陽之邪初傳陽明之府用調胃

承氣藉甘草之緩欲留硝黃以祛胃中方張之邪

邪熱亢極於胃用大承氣之硝黃枳朴併攻全盛

之邪故無庸於甘緩也邪氣駸駸欲犯少陽之界

斯時熱已向衰但須枳朴助大黃以擊俯歸之邪

故無取於芒硝之峻銳也其桃核承氣則又主太

陽犯本之證以桃仁桂枝血藥引調胃承氣三味

以破膀胱畜血與陽明之府畧無交涉

調胃承氣湯 玉函 治太陽陽明府證

小承氣湯去厚朴枳實方中大黃酒浸加芒硝

三合甘草二錢

醫通卷十六 承氣

完

大承氣湯 玉函 治正陽陽明府證

小承氣湯本方大黃酒洗倍用厚朴半兩枳實

五枚加芒硝三合

桃核承氣湯 玉函 治熱結膀胱如狂

小承氣湯去厚朴枳實加芒硝甘草桃仁桂枝

厚朴大黃湯 金匱 治支飲胸滿

小承氣湯倍大黃

厚朴三物湯 金匱 治腹滿痛閉

小承氣湯倍厚朴用枳實五枚

厚朴七物湯 金匱 治腹滿發熱飲食如故

小承氣湯加甘草桂枝薑棗

此本小承氣合桂枝湯中間裁去白芍之酸收不致引邪入犯營血。雖同用桂枝甘草與桂枝湯溼潤攸分。其厚朴獨倍他藥。正以泄氣之濁逆耳。

大黃甘遂湯 金匱 治婦人血結少腹如墩

小承氣湯去枳實厚朴。本方大黃用四錢加甘遂阿膠各二錢頓服之。

大黃甘草湯 金匱 治食已即吐

醫通卷十六 承氣

小承氣去枳實厚朴用大黃一兩加甘草三錢

大黃牡丹湯 金匱 治大腸癰

小承氣湯去枳實厚朴加芒硝桃仁牡丹皮甜

瓜子

大黃附子湯 金匱 治脇下寒飲偏痛

小承氣湯去枳實厚朴。本方用大黃一兩加附

子六錢細辛二錢。水煎分溫三服。如人行四五

步進一服

按此印瀉心湯去芩連之苦燥瀉裏加細辛之辛

溫走表以治脇下寒積。兩不移易之定法也。

黃龍湯 治失下。循衣撮空。虛極熱盛。不下必死者。

小承氣湯。本方用大黃三錢。厚朴錢半。枳實一錢。加芒硝二錢。甘草一錢。人參較。大黃減半。當歸二錢。生薑五片。大棗一枚。如腸鳴去芒硝。加

半夏茯苓。血秘去甘草。加桃仁。泥生地黃。汁氣秘去當歸。加木香。風秘去大棗。加羌活。年老氣虛去芒硝。

湯取黃龍命名。專攻中央燥土。土既燥。雖三承

醫通卷十六 承氣

氣萃集一方。不得參歸鼓舞胃氣。烏能興雲致雨。

或者以為因虛用參。殊不知參在羣行。神中則此。掃之。威愈猛。安望其有神益之。力歟。千金又以小柴胡易名黃龍湯。意在培土以安風木。殊非此方

寓補於瀉之義。

三化湯 治類中風。外無六經形證。內有便溺阻滯。

小承氣湯加羌活。

羌活導滯湯 治大便風秘。

小承氣湯去厚朴加羌活。獨活防已當歸甘草。

此方較三化湯藥味稍異而功用不殊與枳實導滯丸則涇渭各別彼雖亦本承氣而兼枳朮三黃因隸之傷飲食門此不復列

紫草承氣湯 治痘瘡乾紫便秘喘滿

小承氣湯加紫草

抵當湯 玉函 治畜血少腹鞭滿小便自利

水蛭 熬黑如無以陵劍 蟲蟲 去翅足蒸

大黃 酒浸 桃仁 去皮尖

右四味水煎去滓取三升溫服一升不下再服

醫通卷十六 抵當

按此與承氣不同承氣用枳實厚朴以利氣此用水蛭蠱蟲桃仁以破血也

抵當丸 玉函 治畜血小便自利服湯不應用此丸

抵當湯本方用水蛭二十枚蠱蟲二十五枚餘

同湯方杵細入蜜分為四丸以水一升煮一丸

取七合服之時時當下血若不下者更服

變通抵當丸

抵當丸去水蛭加蠱蟲二十個雞血拌瓦上焙

乾餘如木方如欲緩攻臨臥時酒服五丸至十

丸瘀下止後藥

下瘀血湯 金匱 治婦人產後腹痛有乾血著臍下

抵當湯去水蛭蠱蟲加蠱蟲 煮去足

代抵當湯丸 治虛人畜血宜此緩攻

抵當湯去水蛭蠱蟲本方大黃用四兩 酒浸桃仁

用二十枚加芫硝蓬朮穿山甲歸尾生地黃各

一兩肉桂三錢為末蜜丸畜血在上部者丸如

芥子黃昏去枕仰臥以津嚥之令停喉以搜逐

瘀積在中部食遠下部空心俱丸如梧子白勞

醫通卷十六 抵當 涼膈

水煎湯下之用歸地者引諸藥入血分也如血

老成積攻之不動去歸地倍蓬朮肉桂

涼膈散 局方 治溫熱時行表裏實熱及心火亢盛

目赤便秘胃熱發斑

大黃 酒浸 芒硝 一兩 甘草 炙六錢

連翹 一兩 黃芩 一兩 山梔 八錢

薄荷 七錢

為散每服四五錢加竹葉十五片水煎溫日三夜

二服得下熱退為度世本無竹葉有黃芩一

硝黃得枳朴之重者則下熱承之而脈下得者極
翹薄之輕揚則上熱抑之而下清此承氣涼膈之
所攸分也。用甘草者即調胃承氣之義也。局方專
主溫熱時行。故用竹葉。若治感冒之證。從世本用
葱白薑棗可也。

清心散 治溫熱時行壯熱神昏不語便溺閉滿

涼膈散加黃連一兩為散每服四五錢加竹葉
一把白蜜少許煎服頭痛加川芎防風石膏不
應加麻黃

醫通卷十六 涼膈

轉舌丸 治類中風舌強不語神識不清

涼膈散加石菖蒲遠志肉各一兩蜜丸硃砂為
衣薄荷湯化下

潤燥湯 治痘疹過用丁桂熱藥咽痛煩躁秘結

涼膈散去硝黃加當歸白芍生地荆芥鼠粘子

通聖散 治西北卒中內外熱極

涼膈散去竹葉加麻黃石膏滑石生白朮防風

荆芥桔梗川芎當歸芍藥生薑

雙解散 治溫熱時行內外熱極

通聖散倍滑石用生甘草

備急丸 治心腹卒痛如錐刺宿食冷積脹滿

巴豆 去皮心膜乾薑生二錢 大黃三錢

右三味為末煉白蜜丸如小豆大溫水送下二三

十九壯娘禁用

按備急丸治寒實結積之峻藥凡傷寒熱傳胃府
舌胎黃黑刺裂唇口赤燥者誤用必死以巴豆大
熱傷陰故也其白散白餅子消積神保酒癥等方
皆然不可不慎○其神保丸酒癥丸見傷飲食門

醫通卷十六 備急

楊氣丸下茲不復見

白散 治寒實結胸

備急丸去乾薑大黃用巴霜一錢加桔梗蘆貝
母各三錢為散白飲和服半錢羸者減之

雷氏千金丸 治胸脹冷積作痛

備急丸加煇硝桂心

白餅子 治小兒腹中癥積飲乳即嘔面吐痰涎

備急丸去乾薑大黃用巴豆二十粒取霜加滑
石輕粉半夏南星各一錢共杵為末糯米飲丸

菴豆大捻作餅子每服二三餅葱白湯下

消積丸 治小兒食積發熱大便酸臭

備急丸去乾薑大黃用豆二十粒取霜加丁

香九粒縮砂仁十二粒共杵為末以爛烏梅肉

三枚糊丸黍米大每服三五丸溫水下

伊尹三黃湯金匱名瀉心湯

治三焦實熱煩躁便

秘

黃連酒煮

黃芩酒炒

大黃酒浸

麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服麻沸湯

醫通卷十六 三黃

全

者白水空煎鼎沸如麻也古方惟降火藥用之

三黃丸 治諸實熱不解

三黃湯為末煉白蜜丸梧子大每服五十九

心麻沸湯下

金花湯 治熱毒內蘊

三黃湯去大黃加黃檗三味等分煎服更加梔

子名梔子金花湯

三補丸 治陰火亢極不解

金花湯為末蜜丸服

黃連解毒湯 治熱邪內外俱盛

三黃湯去大黃加黃檗山梔等分煎服

金花丸 治積熱不解

黃連解毒湯為末蜜丸服之

大金花丸 治中滿熱極淋瀝溺血

三黃丸加黃檗等分滴水為丸小豆大新汲水

下三十九

按金花湯止苓連檗三味作丸名三補金花丸

較湯多山梔作湯名為解毒更加大黃則名大金

醫通卷十六 三黃

全

花丸湯丸雖異功用不殊但取急攻則用湯緩祛

則用丸微有區別耳

大黃黃連瀉心湯下兩即黃 治熱邪內陷脇下痞

滿

三黃湯去黃芩麻沸湯清絞服

附子瀉心湯下兩 治寒熱不和脇下痞結

三黃湯另煎熟附子汁攪勻服之

二黃梔子豉湯 治熱病時疫頭痛壯熱

三黃湯合梔子豉湯千金去黃

當歸六黃湯 治營血虛熱盜汗

三黃湯去大黃加黃蘗黃耆生地黃熟地黃當

歸汪石山去黃
柴加蒲黃

清心丸 治心熱神昏驚悸不寧

三黃湯去大黃用黃連三錢黃芩二錢加西牛

黃半錢鬱金錢半緒心血為丸黍米大硃砂為

衣燈心湯下三歲兒三十九

既濟解毒湯 治上熱下寒大便秘

三黃湯加甘草桔梗柴胡升麻連翹當歸

醫通卷十六 三黃

九

人中黃丸 治溫疫諸熱毒

三黃湯木方用大黃三兩芩連各一兩加人中

黃蒼朮桔梗滑石各二兩人參一兩防風香附

一兩五錢神麴糊丸清熱解毒湯送下二三錢

清熱解毒湯方
見白虎湯下

此方專以伊人三黃大解溼熱疫癘之邪其奧妙

全在人中黃一味以汚穢之味同氣相求直清中

上汚穢熱毒合滑石益元之製則兼清滲道用蒼

朮香附者宜其六氣之鬱也用桔梗者清其膈上

之氣也用防風者開其肌腠之熱也十味祛邪散

毒藥不得人參鼓舞其勢無以遲迅掃之力也用

神麴為丸者取其留中而易化也更需清熱解毒

下之即人參白虎合升麻葛根湯去粳米加羌活

芩連生地總解內外之熱畧取生薑之辛以行諸

藥之性散諸經之毒耳

三黃石膏湯 治熱病時行內外大熱

三黃湯去大黃加黃蘗山梔石膏麻黃香豉生

薑葱白用清漿水煎服半日許不得汗再服便

醫通卷十六 三黃

四

秘去麻黃香豉加大黃茵陳節庵梔法加芽茶

一撮

按此即解毒湯兼通聖散梔子豉湯之製而加麻

黃石膏葱薑以散外內熱毒也如脈數實便秘上

氣喘急舌卷囊縮則去麻豉而易硝黃又全用伊

人三黃矣

普濟消毒飲 治大頭捻頸癰等證

三黃湯去大黃加柴胡黑參連翹鼠粘升麻白

芷甘草桔梗馬勃蠶蠶板藍根半用水煎半用

蜜丸喻化氣虛脈弱加人參五七分大便秘加酒大黃錢許微下之

本方去升麻黑參鼠粘蠟蘇板藍馬勃加荆芥防風羌活枳殼川芎射干名芩連消毒湯

當歸龍薈丸 治肝經積熱時發驚悸搐搦神志不寧頭目昏眩咽膈不利腸胃燥結躁擾狂越等證

三黃湯加當歸龍薈薤白梔子青黛木香麝香

蜜丸淡薑湯送二三十丸

神芎丸 治水腫外內俱實者

醫通卷十六 三黃

四

三黃湯本方用大黃黃芩各二兩黃連半兩加

滑石牽牛頭末各四兩川芎薄荷各半兩滴水

為丸每服五七丸至十五丸臨卧溫水服溼熱

腰脇腫滿加甘遂一兩遍身走注疼痛加白芥

子一兩久毒熱腫脹加茵硝一兩關節不利

加羌活一兩腸胃結滯加郁李仁一兩腰腿沉

重加商陸一兩本方去黃連川芎薄荷名導

水丸

戴人取伊尹三黃丸變為神芎丸每令病人至夜

先服百餘粒繼以濟川散投之五更當下種種病

出投下少許再以和膈藥服之以利為度有五日

一下者三日一下者病輕者一二服止重者五六

度方愈是擒縱緩舒之妙臨病製宜非可言論自

非老年諸練有大負者焉敢效諸行事耶○詳方

後云每服五七丸至十五丸乃峻藥緩攻之成法

此言每令病人先服百餘丸急乘元氣未瀉為之

迅掃各有至理不可以此礙彼也

濟川散 治水腫脹急大便不通大實大滿證

醫通卷十六 三黃

七

三黃丸去芩連用大黃一兩加牽牛頭末郁李

仁各一兩茵硝甘遂各半兩木香三錢為散每

服二錢入生薑自然汁和如稀糊服

按此乃下水積之峻藥火熱拂鬱水液不能宣通

停滯而生溼熱在陽不去則化氣而為脹在陰不

去則化積而成形世俗不省內經留者攻之但挑

補燥之劑怫鬱轉加而病愈甚也戴人曰養生與

攻病本自不同今人以補藥治病宜乎不効也

東湯 治懸飲內痛脇下有水氣脈弦數

羌花熬

甘遂

大戟泡去骨

右三味搗篩以水一升五合先煮大戟肥者十枚

擘取八合去滓內藥末強人服一錢七麻人服半

錢七平且溫服若下少病不除者明日更服加半

錢七得快下利後糜粥自養補天石加生薑汁傷寒五法加肉桂

神祐丸 治陽水腫脹大小便秘

十棗湯本方各一兩加大黃二兩黑牽牛頭末

四兩輕粉一錢煮紅棗肉為丸初服五七九日

三服漸加快利為度

醫通卷十六 十棗

五

按此方守真本仲景十棗湯加牽牛大黃輕粉三味較十棗倍峻然作丸緩進則威而不猛其法最良其於神祐丸中加青皮陳皮木香檳榔各半兩名舟中神祐已屬蛇足更於舟中丸中加入乳香沒藥名除溼丹風斯愈下殊不足法

控涎丹 治脇下痰積作痛
十棗湯去羌花大棗加白芥子等分為末麴糊丸服十五丸至二十九驚痰加硃砂全蠍酒痰加雄黃全蠍驚氣成塊者加穿山甲鼈甲延胡

索遂木臂痛加桂枝黃黃痰嗽加風化硝寒痰加丁香肉桂胡椒

甘遂直達涎結之處大戟能攻胸脇之涎白芥子能破支結之飲此攻痰涎之峻劑也凡形盛色蒼氣壯脈實人有上證但服此藥數服其病如失後以六君子調補若氣虛皎白大便不實小便清利者誤服不旋踵而告變矣

五苓散 治傷寒表裏未解渴而小便不利

白朮 茯苓

緒苓 各二錢

醫通卷十六 五苓

五

澤瀉 三錢 桂 一錢

右五味為散白飲和服方寸匕日三服或生科煎服溫覆取微似汗

按五苓散本治太陽經邪犯本渴而小便不利飲水即吐之水逆故用二苓澤朮利水生津又需桂以蒸動其津則渴者自不渴矣後人不達此義每用五苓治陰虛泉竭之證重潤其水發熱發渴勢必轉加豈方之咎歟况有去桂而用四苓者易知此方全賴桂之辛溫則水不至寒滿用方者常須

按五苓散本治太陽經邪犯本渴而小便不利飲水即吐之水逆故用二苓澤朮利水生津又需桂以蒸動其津則渴者自不渴矣後人不達此義每用五苓治陰虛泉竭之證重潤其水發熱發渴勢必轉加豈方之咎歟况有去桂而用四苓者易知此方全賴桂之辛溫則水不至寒滿用方者常須

1. 醫通卷十六 五苓 2. 五

識此無愧聖賢一脈

豬苓湯

玉函

治渴欲飲水小便不利及少陰病下

利欬而嘔渴心煩不得眠

五苓散去朮桂加滑石阿膠等分水煎去滓溫

服日三

按此太陽少陰藥也五苓散用朮以導水滋乾印
兼桂之辛溫以蒸動其津氣此用滑石之清熱利
水即兼阿膠之甘潤以保護其血液汗乃血之液
故汗出多而渴者禁用

醫通卷十六

五苓

生

豬苓散

金匱

治嘔吐思水

五苓散去澤瀉桂為散飲服方寸匕日三服

澤瀉湯

金匱

治支飲眩冒

五苓散去豬苓茯苓

茯苓澤瀉湯

金匱

治胃反吐而渴欲飲水

五苓散去豬苓加甘草生薑家秘加

茯苓戎鹽湯

金匱

治胞中精枯血滯小便不利

五苓散去豬苓澤瀉桂加戎鹽即上

桂苓丸

治腎氣上逆水泛為疾逆衝膈上及冒者

煩渴飲水過多腹脹小便不利

五苓散去豬苓澤瀉白朮用桂一兩茯苓二兩

蜜丸沸湯下二錢日三服作湯名

桂苓甘露飲 治溫熱病小便不通煩渴引飲

五苓散加真寒水石石膏滑石

四苓散 治小便赤澀脹痛及溫熱時行煩渴

五苓散去桂

茵陳五苓散 金匱 治黃疸小便不利

五苓散加茵陳蒿

醫通卷十六

五苓

生

春澤湯

治氣虛傷溼小便不利

五苓散加人參

葶藶木香散 治陽水腹脹大小便秘

五苓散加葶藶木香木通滑石甘草

益元散

名天水散

治暑月小便不利

滑石 名六一散 甘草 名六一散

為散清水調服二三錢發散溫病熱痲加葱白五

七莖香豉四合水煎溫服老人虛人及病後傷津

小便不利禁川

此方加葱豉煎服則兼散表邪加吳茱萸則治白痢加紅麴則治血痢加炮薑則兼消飲食加神砂則兼退心火加青黛則散肝火加薄荷則清肺熱加石膏則除胃熱其入通聖雙解解毒等方隨證配合未遑枚舉

辰砂六一散 治暑月驚悸多汗小便瀉痛

益元散 一料加辰砂一錢飛

蒲灰散 金散 治皮水小便不利而渴

益元散去甘草用滑石三分加蒲灰七分為散

醫通卷十六 益元

金

飲服方寸七日三服

滑石白魚散 金散 治清渴小便不利小腹脹痛有瘀血

益元散去甘草加亂髮燒白魚炙等分為散飲

服方寸七日三服

白虎湯 玉函 治熱病壯熱煩渴及中腸煩熱而渴

石膏八錢半 知母三錢 甘草一錢

粳米半合

水煎溫分三服一日盡飲之

人參白虎湯 玉函即白虎 治熱病舌乾大渴發熱

背寒

白虎湯加人參

桂枝白虎湯 治溫病感冒客邪而渴及溫瘧先熱

後寒

白虎湯加桂枝

蒼朮白虎湯 治溼溫身熱足冷

白虎湯加蒼朮

竹葉石膏湯 玉函 治大病後煩熱作渴

醫通卷十六 白虎

炎

白虎湯去知母加竹葉人參半夏麥門冬

既濟湯 治上熱下寒

竹葉石膏湯加熟附子三五分

清熱解毒湯 治時疫大熱

白虎湯去粳米加人參羌活升麻葛根白芍黃

芩黃連生地黃生薑

栝蒌葛根湯 治風溫無大熱而渴

白虎湯去知母粳米加人參栝蒌根葛根防風

按此湯治風溫無大熱而渴夫既無大熱則不當

渴矣既渴必非無大熱也緣風流之熱邪內纏故
借白虎加入參湯裁去知母粳米加栝蒌根以清
熱解渴葛根以布胃行津防風以開表散邪人參
甘草佐石膏栝蒌以化熱性雖甘溫當無助長伏
邪之虞

大青湯 治斑子熱毒

白虎湯去粳米加大青黑參木通生地黃荆芥

竹葉

土露散 治小兒傷熱吐瀉色黃

醫通卷十六 白虎

九

白虎湯去知母粳米加寒水石如無真者為散

每服半錢七至一錢七沸湯調日三服

薛立齋云若飲食如常作瀉飲冷宜用此藥若食

少體倦喜飲熱湯此脾氣虛陷宜六君子湯加升

柴此方切禁

藜香飲子 治消中能食而瘦大渴便秘

白虎湯去粳米加入參生甘草藜香各名防風

升麻栝蒌連翹半夏白豆蔻

按消中為脾胃積熱故東垣用人參白虎而立藜

香飲子內經所謂治之以藜除陳氣也但方中防
風半夏豆蔻升麻未免過於辛燥曷不去此加入
麥冬五味以滋化源佐白虎以化胃熱藜香以除
陳氣與歸脾湯中用木香之意不殊或於竹葉石
膏湯中加知母藜香尤妥

生津甘露飲 治上焦熱渴

藜香飲子去防風半夏加當歸麥冬山梔黃連

黃蘗藿香水香

駐車丸千金 治陰虛下痢發熱膿血刺刺及休息

醫通卷十六 痢

九

痢

阿膠 三兩

黃連 炒黑

當歸 各兩

乾薑 兩

右四味搗篩醋煮阿膠為丸梧子大每服四五

丸晝夜三服米飲下

三車運精氣神分治三焦以調適陰陽此因陽熱

過壯陰精受傷故用黃連以駐鹿中之驟乾薑以

策牛車之疲阿膠以挽羊車之蹇當歸以和精氣

神之散亂也

阿膠丸 治冷熱不調傷犯三陰腹痛下膿血

駐車丸木方膠連各二兩歸藟各一兩加水香

黃芩赤石脂醋煎水飛龍骨醋煎水飛各一兩厚朴薑半

兩米飲凡梧子大每服三十九書二夜一服米飲下

歸連丸 治陰虛下痢五色及孕婦噤口赤痢

駐車丸去乾薑木方用阿膠二兩歸連各一兩

加黃芩黃檗炒各半兩藟艾兩半右除膠艾為

細末以醋二升煮艾至一升去滓入膠炸化為

醫通卷十六 駐車

丸菜豆大每服六七十九書夜三服米飲下

阿膠梅連丸 治陰虛下痢五色至夜發熱

駐車丸木方用膠連各三兩當歸一兩五錢炮

薑一兩加黃檗炒赤芍藥赤茯苓烏梅肉炒各

一兩五錢醋煮阿膠為丸梧子大每服三五十

丸書夜三服米飲下

黃連湯 治赤白痢

駐車丸木方用阿膠三錢黃連當歸各錢半炮

薑一錢加黃檗炒甘草炙各一錢酸石榴皮錢

半右除阿膠水煎去滓內膠炸化溫分三服

佐金丸 治肝經鬱熱吐酸綠青黃水

川黃連六兩 吳茱萸擘去附口者取淨

為細末米飲糊丸梧子大每服四五十九空心白

米陳皮湯或加味逍遙散作湯送下

抑青丸 治肝火腸下急痛

佐金丸二味等分製法如前製過棟去吳茱萸

取黃連焙燥一味為末滴木為丸每服四五十九

九空心沸湯臨卧陳酒送下

醫通卷十六 佐金

酒煮黃連丸 治心火亢盛外內俱熱及伏暑發熱

嘔吐

佐金丸去吳茱萸用黃連一味酒煮焙燥為末

滴水為丸每服四五十九空心沸湯下

香連丸 治下痢赤白相兼白多於赤者

佐金丸如前製過去吳茱萸加水香一兩醋糊

丸每服五十九米湯砂仁湯任下

戊巳丸 治溼熱泄痢腹痛不止

佐金丸加白芍六兩神麴糊丸空心米湯砂仁

湯斷艾湯任下

大補丸 治陰火亢極足脛疼熱不能久立及婦人火鬱發熱

厚黃藥

酒拌陳米飯上蒸每蒸必拌炒黑亮如漆為度

煉白蜜丸梧子大每服二錢空心醇酒下如服之不應每助加厚肉桂一兩

潛行散 治溼熱足膝腫痛

大補丸

川黃藥汁拌炒數次

為末每服錢半空心醇酒下

大補陰丸 治陰虛火旺煩熱易饑足膝疼熱

醫通卷十六 大補

大補丸四兩加知母四兩熟地黃龜版各六兩

豬脊髓和蜜丸梧子大空心蒸鹽湯下五十九

滋腎丸 治陰虛火渴小便滴痛熱起足心

大補丸十分加知母七分肉桂一分滴水為丸

食前沸湯下七八十九

凡熱在足心而衝股內而入腹者謂之陰火起於湧泉之下雖熱而不發渴為熱在膀胱此方主之

虎潛丸 治下體痿弱

大補丸三兩加龜版熟地各三兩知母牛膝各

二兩白芍藥瑣陽虎脛骨當歸身各一兩五錢

炮薑半兩醇酒為丸侵晨淡鹽湯下三錢痿而厥冷加熟附子半枚

虎體陰性剛而好動故欲其潛使補陰藥咸隨其性潛伏不動得以振剛勁之力則下體受蔭矣其膝脛乃筋骨結聚功力最優若用掌骨各隨患之前後左右取用不必拘於左前為善也

加味虎潛丸 治痿濡而厥

虎潛丸去知母加入參黃青山藥枸杞各二兩

醫通卷十六 大補

五味子一兩

二妙散 治身半已下溼熱疼重而腫

大補丸 改用黃藥汁加茅山蒼朮油拌炒淨等分

為散薑汁調每日空心溫酒送二錢

本方加肉桂名三妙散

金液丹 治陰極發躁厥冷脈伏爪甲唇青水腫脈伏小便不通陰結畏寒大便秘

明淨硫黃五兩研細水飛入錫盛罐內水調赤石脂末封口鹽泥通身固濟候乾三足釘釘於

張氏醫通 卷一六

三四五

地將鐵放釘上漫火燒養七晝夜再加頂火用炭十觔為度候冷取出研細每末一兩用蒸餅一兩打糊為丸梧子大每服二三十丸溫白湯送下陰極冷甚者服百丸

靈砂丹 局方 治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮降虛

火升降陰陽和五臟助真元

水銀 四兩 硫黃 一兩

右二味新銚內炒成砂子入水火兩煨煉為末糯米糊丸如麻子大每服三九空心棗湯米湯并花

醫通卷十六 金液

水人參湯任下量病輕重可增至五七九忌豬羊血菜豆粉冷滑之物

又法入煬盛罐內赤石脂封口鹽泥固濟三足釘

釘打火蓋內置水勿令乾候三炷香足為度

二氣丹 治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或瀉或吐

硝石 硫黃 等分

右為細末銀石器內炒黃色再研細糯米糊丸梧子大每服五七九新汲井花水下不應更服

玉真丸 治腎厥頭痛四肢逆冷

硝石 硫黃 味同製 石膏 生

半夏 湯泡七次等分

為末薑汁和神麩丸食後薑湯下二三十丸虛寒甚者加鍾乳粉

半硫丸 局方 治高年冷秘虛秘及痰癖冷氣

硫黃 醋煨柳木 半夏 湯泡七次等分

右二味等分用生薑自然汁調蒸餅糊杵數百下

丸如梧子大每服十五丸至二十九丸空心無灰酒

醫通卷十六 金液

或生薑湯任下婦人醋湯下

養正丹 局方 治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣

短身羸及中風痰盛涎潮不省人事傷寒陰盛自汗脣青婦人血海久冷

水銀 黑錫 與水銀結成砂子 硫黃 研

硃砂 木飛各一兩淨

用鐵銚鎔化黑錫入水銀將柳木槌攪次下硃砂攪令不見星子下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有焰以醋灑之候冷取出研細煮糯米糊丸

漿豆大每服十五丸至三十九鹽湯或棗湯人參湯任下或丸如芡實附圖服一丸得睡勿驚覺
 來復丹 局方 治上盛下虛寒外熱及伏暑泄瀉
 如水

硝石 同硝石為末銀石器內浸火炒柳木槌攪之不引
 藥力 火以傷 太陰元精石 飛 青皮 去穢
 陳皮 去白各 五靈脂 酒飛去砂石澄定晒乾二兩
 為末古法以醋和丸米飲下因醋易微壞今改用米飲糊丸如梧子大每服三十九空心醋湯下

醫通卷十六 金液

黑錫丹 局方 治真元虧憊陽氣不固陰氣逆衝三焦不和冷氣刺痛腰背沉重男子精冷滑泄婦人白帶清冷及陰證陰毒四肢厥冷不省人事急吞百丸即便回陽大能升降陰陽降痰定喘
 沉香 附子 炮 胡蘆巴 炒 酒浸
 陽起石 煨 補骨脂 舶上茴香
 肉豆蔻 煨 金鈴子 酒蒸去 木香 各一
 肉桂 半兩 黑錫 各二 硫黃 各二
 右用黑錫入鐵銚內鎔化入硫黃如常法製結成

砂子地上出火毒研令極細餘藥並細末和勻自朝至暮研至黑光色為度酒麴糊丸如梧子大陰乾藏鉛罐內每服四五十丸空心鹽湯或棗湯任下
 湯任下婦人艾湯下惡證可投百丸

三和丹 治一切陰寒諸藥不効者
 養正丹 十九來復丹 二十九黑錫丹 三十九鹽湯棗湯薑湯人參湯任下
 附張介賓八畧總論
 補畧

醫通卷十六 八畧

一補方之制補其虛也凡氣虛者宜補其上人參黃耆之屬是也精虛者宜補其下熟地枸杞之屬是也陽虛者宜補而兼煖桂附乾薑之屬是也陰虛者宜補而兼清門冬芍地之屬是也此固陰陽之治辨也其有氣因精而虛者自當補精以化氣精因氣而虛者自當補氣以生精又有陽失陰而離者不補陰何以收散亡之氣水失火而敗者不補火何以蘇垂絕之陰此又陰陽相濟之妙用也故善補陽者必於陰中求陽則陽得陰助而生化無窮善補陰者必於陽

中求陰則陰得陽升而泉源不竭。余故曰以精氣分陰陽。則陰陽不可離。以寒熱分陰陽。則陰陽不可混。此又陰陽邪正之離合也。故凡陽虛多寒者宜補以甘溫而清潤之品。非所宜。陰虛多熱者宜補以甘涼而辛燥之類。不可用。知宜知避。則不惟用補而八方之制皆可得而貫通矣。

和畧

一和方之制。和其不和者也。凡病兼虛者補而和之。兼滯者行而和之。兼寒者溫而和之。兼熱者涼而和之。

醫通卷十六 八畧

五

之和之為義廣矣。亦猶土兼四氣。其於補瀉溫涼之用無所不及。務在調平元氣。不失中和之為貴也。故凡陰虛於下。而精血虧損者。忌利小便。如四苓通草湯之屬是也。陰虛於上。而肺熱乾欬者。忌用辛燥。如半夏芥子細辛附子歸白朮之屬是也。陽虛於上者。忌消耗。如陳皮砂仁木香檳榔之屬是也。陽虛於下者。忌沉寒。如黃芩知母梔子木通之屬是也。大便泄瀉者。忌滑利。如二冬牛膝從蓉當歸柴胡童便之屬是也。表邪未解者。忌收斂。如五味棗仁地榆文蛤

之屬是也。氣滯者。忌閉塞。如黃耆白朮山藥甘草之屬是也。經滯者。忌寒凝。如門冬生地石斛葶連之屬是也。凡邪火在上者。不宜升火得升而愈熾矣。沉寒在下者。不宜降陰。被降而愈亡矣。諸動者。不宜再動。如火動者。忌溫煖。血動者。忌辛香。汗動者。忌疎散。神動者。忌耗傷。凡性味之不靜者。皆所當慎。其於剛暴更甚者。則又在不言可知也。諸靜者。不宜再靜。如沉微細弱者。脈之靜也。神昏氣怯者。陽之靜也。肌體清寒者。表之靜也。口腹畏寒者。裏之靜也。凡性味之陰

醫通卷十六 八畧

五

柔者。皆所當慎。其於沉寒更甚者。又在不言可知也。夫陽主動。以動濟動。火上添油也。不焦爛乎。陰主靜。以靜益靜。雪上加霜也。不寂滅乎。凡前所論論其畧耳。而書不盡言。言不盡意。能因類而廣之。則存乎其人矣。不知此義。又何和劑之足云。

攻畧

一攻方之制。攻其實也。凡攻氣者。攻其聚。聚可散也。攻血者。攻其瘀。瘀可通也。攻積者。攻其堅。在藏者可破。可結在經者可鍼。可灸也。攻痰者。攻其急。壯實者

斬宜解標多虛者只宜求本也。但諸病之實有微法。用攻之法分重輕。大實者攻之未及。可以再加微實者。攻之太過。每因致害。凡病在陽者不可攻陰。在胸者不可攻藏。若此者邪必乘虛內陷。所謂引賊入寇也。病在陰者勿攻其陽。病在裏者勿攻其表。若此者病必因誤。而甚所謂自撤藩籬也。大都治宜用攻。必其邪之甚者也。其若實邪果甚。自與攻藥相宜。不必雜之補劑。蓋實不嫌攻。若但畧加甘滯。便相牽制。虛不嫌補。若但畧加消耗。偏覺相妨。所以寒實者最不

醫通卷十六 八畧

喜清熱實者最不喜燥。然實而誤補。不過增病。病增者可解。虛而誤攻。必先脫元。元脫者無治矣。是皆攻法之要也。其或虛中有實。實中有虛。此又當酌其權宜。不在急宜攻。急宜補者之例。雖然凡用攻之法。所以除克剪暴也。亦猶亂世之兵。必不可無。然惟必不得已。乃可用之。若或有疑。慎勿輕試。蓋攻雖去邪。過則傷氣。受益者四。受損者六。故攻之一法。先苦最為詳密。正恐其成之難。敗之易耳。倘任意不思。其其人可知矣。

散畧 蓋麻黃為太陽之本藥。不可移易。裁一節石頑潤色。

一散方之制。散表證也。觀仲景太陽證用麻黃湯。陽明證用葛根湯。少陽證用小柴胡湯。此散表之準繩也。後世宗之。而復不能用之。在不得其意耳。蓋麻黃為太陽之本藥。陽明經證亦多用之。觀陽明經證治例。其義可見。按麻黃苦溫。專泄肺氣。仲景借以開發。太陽經邪為解表之重劑。若非冬月正傷寒。原無藉此。即陽明之為根湯。未嘗不用麻黃。未嘗不走太陽也。豈謂其經其藥。必不可移易哉。但用散之法。當知

醫通卷十六 八畧

性力緩急及氣味溫寒之辨。用得其宜。諸經無不應也。如麻黃桂枝峻散者也。防風荆芥紫蘇乎散者也。細辛白芷生薑溫散者也。升麻川芎能舉陷上行而散者也。第邪淺者忌峻利之屬。氣弱者忌雄悍之屬。熱多者忌溫散之屬。寒多者忌清涼之屬。凡渴而煩燥者喜乾葛。而嘔惡忌之。寒熱往來者宜柴胡。而泄瀉者忌之。寒邪在上者宜升麻。用芍而內熱火升者忌之。此性用之宜忌。所當辨也。至於相配之法。則尤當知要。凡以平兼清。自宜涼散。以平兼燥。亦可溫經。

宜大溫者以熱。濟熱宜大涼者以寒。濟寒此其運用之權。則毫釐進退自有伸縮之妙。又何必膠柱刻舟以限無窮之病變哉。此無他在。不知仲景之意耳。

寒畧

一寒方之制。為清火也。為除熱也。夫火有陰陽。熱分上下。據古方書。咸謂黃連清心。黃芩清肺。石斛芍藥。清脾。龍膽清肝。黃柏清腎。今之用者。多守此法。亦是膠柱法也。大凡寒涼之物。皆能瀉火。豈有涼此而不涼彼者。但當分其輕清重濁。性力微甚。用得其宜。則

醫通卷十六 八畧

善矣。夫輕清者宜以清上。如黃芩石斛連翹天花粉之屬也。重濁者宜於清下。如梔子黃檗龍膽滑石之屬也。性力之厚者能清大熱。如石膏黃連蘆薈苦參山豆根之屬也。性力之緩者能清微熱。如地骨皮玄參貝母石斛童便之屬也。以攻而用者去實鬱之熱。如大黃茵陳之屬也。以利而用者去癰閉之熱。如木通茵陳豬苓澤瀉之屬也。以補而用者去陰虛枯燥之熱。如生地二冬芍藥梨漿細甘草之屬也。方古之分經用藥者。意正在此。但不能明言其意耳。然火之

甚者在。上亦宜重瀉。火之微者在。下亦可輕清。夫宜涼之熱。皆實熱也。實熱在下。宜清利。實熱在上。不可升提。蓋火本屬陽。宜從陰治。從陰治者。宜降。升則反從其陽矣。經曰。高者抑之。義可知也。外如東垣有升陽散火之法。此以表邪生熱者。設不得與伏火內

炎者。而論表邪生熱。當作鬱熱外發為受。

熱畧

一熱方之制。為除寒也。夫寒之為病。有寒邪犯於肌表者。有生冷傷於脾胃者。有陰寒中於臟府者。此皆

醫通卷十六 八畧

外來之寒。夫所從來。則其治也。是皆人所易知者。至於本來之寒。生於無形無響之間。初無所感。莫測其因。人之病。此者最多。知此者最少。果何謂哉。觀丹溪曰。氣有餘。便是火。氣不足。便是寒。夫今人之氣。有餘者。能十中之幾。具有或因稟受。或因喪敗。以致陽氣不足者。多見寒從中生。而陽衰之病。無所不致。第其由來者。漸形見者。微當其未覺也。孰為之意。及其既甚也。始知難治。別庸醫多有不識。每以假熱為真火。因復斃於無形無響者。又不知其幾許也。

故惟高明見道之士常以陽衰根本為憂此熱力之不可不豫也凡用熱之法如乾薑能溫中亦能散表嘔惡無汗者宜之肉桂能行血善達四肢血滯多痛者宜之吳茱萸善暖下焦腹痛泄瀉者極妙肉豆蔻可溫脾胃除泄滑利者最奇胡椒溫胃和中其類近於華撥丁香止嘔行氣其煖過於豆仁補骨脂性降而善閉故能納氣定喘止帶濁泄瀉製附子性行如酒故無處不到能救急回陽至若半夏南星細辛烏藥良薑香附木香茴香仙茅巴戟之屬皆性溫之常

醫通卷十六 八畧

辨者然用熱之法尚有其要以散兼溫者散寒邪也以行兼溫者行寒滯也以補兼溫者補虛寒也第多汗者忌薑薑能散也失血者忌桂桂動血也氣短氣怯者忌骨脂骨脂降氣也凡氣香者皆不利於氣虛證味辛者多不利於見血證是用熱之槩也至於附子之辨凡今之用者必待勢不可為不得已然後用之不知回陽之功當於陽氣將去之際便當漸用以俾挽回若用於既去之後死灰不可復燃尚何益於事哉但附子性悍獨任為難必得大甘之品如人

參熟地炙甘草之類皆足以制其剛而濟其勇以補培之無往不利矣此壺天中大將軍也可謂之無川之地子但知之真而用之善斯足稱將將之手矣

固畧

一固方之制固其泄也如久嗽為喘而氣泄於上者宜固其肺久遺成淋而精脫於下者宜固其腎小便不禁者宜固其膀胱大便不禁者宜固其腸藏汗泄不止者宜固其皮毛血洩不止者宜固其營衛凡因寒而泄者當固之以熱因熱而泄者當固之以寒總

醫通卷十六 八畧

之在上者在表者皆宜固氣氣主在肺也在下者在裏者皆宜固精精主在腎也然虛者可固實者不可固久者可固暴者不可固當固不固則滄海亦將竭不當固而固則閉門延寇也二者俱當詳酌之

因畧

一因方之制因其可因者也凡病有相同者皆可按證而用之是謂因方如癩毒之起腫可散也蛇蟲之患毒可解也湯火傷其肌膚熱可散也跌撲傷其筋骨斷可續也凡此之類皆因證而可藥者也然因中

有不可因者。又在乎證同而因不同耳。蓋人之虛實寒熱。各有不齊。表裏陰陽。治當分類。故有宜乎此而不宜乎彼者。有同於表而不同於裏者。所以病雖相類。而但涉內傷者。便當於血氣中酌其可否之因。不可謂因方之類。盡可因之而用也。因之為用。有因標者。有因本者。勿因此因字而誤認因方之義。

兼畧 石頑參補

一兼方之制。用間法也。與師旅之間諜無異。舉世但知以寒治熱。以熱治寒。易知病勢之危殆。錯雜難分。

醫通卷十六 八畧

至

况多假脈假證。非洞達玉函金匱之奧。難以語此。如長證用麻黃。此正治也。越婢大青龍。則兼石膏以化熱。麻附細辛湯。麻附甘草湯。則兼附子以救寒。此變法也。陰寒用附子。此正治也。真武湯。則兼生薑以散水氣。白通通脈。則兼葱白以通陽。豬膽汁以收陰。此變法也。府實用大黃。此正治也。大黃附子湯。附子瀉心湯。則兼附子以破結。黃龍湯。則兼人參以助方足。補南陽之木。速此變法也。陽邪陷陰。欲轉陽。分用芍藥甘草。護持營氣。此正治也。四逆散。則兼柴胡以通

中道當歸四逆。則兼桂枝以通接。壞使陰從陽化。此變法中之定法也。妊娠胎息不安。用茯苓芍藥護持。陰血。此正治也。附子湯。則兼附子以治子藏。開少腹。如扇。桂心茯苓丸。則兼桂心以治宿有癥病。胎動下血。始知桂附反有固胎之用。是皆病證之變端。不能守尋常繩墨也。然必察其生氣未艾。方可特出奇兵以擊之。若脈證俱始。慎勿貪功。以招燥金之勞也。

讀景岳先生八畧。至末條因畧。畧無深意。而獨不及兼制之法。余不自揣。贅入此例。以續紹之不足。

醫通卷十六 八畧

其

其因畧原文。不敢擅裁。仍兩存之。石頑老人漫述。

序

醫小道也而益於民生者甚大習醫曲藝也而關於民命者最深岐黃以下代有名賢其間著書立說以傳於世者千百年來不啻汗牛盈棟矣然而意見各別言論參差求能去糟粕撥菁華更相表裏若出一人之手不少概見無惑乎醫道之難明而醫門之貽禍匪淺也余於斯術夙所未嫻適年屏棄塵事頗愛閒居嘗檢東垣李氏丹溪朱氏之書排遣寒暑反復尋繹一主清涼一主溫補以故宗朱者詘李宗李者詘朱而家攻難猶如水火愚竊謂藥性有溫涼病症亦有虛實叅觀互取不惟可以相通兼可以相濟則證之疑似不可不亟辨也彰彰矣庚午秋間漢川友人客於邗上假館小齋業工醫術因舉平日疑義相質乃為予條分縷晰洞開胸臆而於證候一節尤有發明詢其所傳則會稽陳子遠公也叩其所讀之書亦即陳子自著辨證錄一編也予索觀焉即啓篋笥抄本持贈展閱數過凡辨論證候別具新裁實能闡揚靈素所未備亟商付梓公諸當世客欣然笑曰此予與陳君有志未逮者也若果行此厥功懋矣於是彙輯全藁細加釐訂卷分一十有二

辨證錄 序

門分九十有一脈訣外科幼科以次類附焉越期年而告竣陳君篤實君子也自言授受之際踪跡甚奇要皆救世婆心而非故為大言以欺人者學者服膺是編窮其辯證之精微究其制方之妙旨引而伸之觸類而長之毋按圖而索驥刻舟而求劍是則陳君之矢志也夫抑予之所厚望也夫

皆維

乾隆十二年秋八月望後六日天都黃晟別號退菴書於

槐蔭草堂



辨證錄自序

丁卯秋余客燕市黃菊初放懷人自遠忽聞剝啄聲啓扉
返之見二老者衣冠偉甚余竒之載拜問曰先生何方來
得毋有竒聞誨鐸乎二老者曰聞君好醫特來辨難耳余
謝不敏二老者曰君擅著作才何不著書自雄顧咕咕時
藝竊耻之余壯其言乃尚論靈素諸書辨脉辨證多非世
間語余益竒之數共晨夕遂盡聞緒論閱五月別去訓鐸
曰今而後君可出而著書矣鐸退而記憶合以所試方日
書數則久乃成帙夫醫道之難也不辨脉罔識脉之微不

辨證錄

自序

辨證罔識證之變今世太習診者亦甚多矣言人人殊究
不得其指歸似宜辨脉不必辨證也雖然辨脉難知不若
辨證易知也古雖有從脉不從證之文畢竟從脉者少從
證者衆且證亦不易辨也今人所共知者不必辨也古人
所已言者不必辨也必取今人之所不敢言與古人之所
未及言者而暢辨之論其證之所必有非詭其理之所或
無乍聞之而竒徐思之而實未竒也客曰布帛菽粟可以
活人安在談醫之必竒乎余謝之曰布帛菽粟平淡無竒
而活人之理實竒也日服之而不知其何以溫日食之而

不知其何以飽致使其理之彰可乎鐸之辨證猶談布帛
菽粟之理耳客又笑曰君辨理竒矣已足顯著作之才矣
必託仙以銜竒耶鐸尼山之弟子也敢輕言著作乎聞二
先生教亦述之而已矣何必諱其非仙哉仙不必諱而必
謂是書非述也得毋欺世以銜竒乎書非銜竒而仍以竒
聞名者以鐸聞二先生之教不過五閱月耳數十萬言盡
記憶無忘述之成帙是則可竒者乎豈矜世以銜竒哉

山陰陳士鐸敬之甫別號遠公又號朱華子

題於大雅堂

辨證錄

自序

Blank space for text in the lower section.

凡例

一是編皆

岐伯天師 仲景張使君所口授錄敬述廣推以傳世實
遵 師誨非敢自矜出奇

一辨證不辨脈者以證之易識也苟能知症何必辨脈
哉雖然辨證更能辨脈則治病益精又在人善用之耳

一辨論證候均出新裁闡揚靈素所未備於二經不無
小補云

一編中不講經絡穴道以經絡穴道之義已顯載於靈
素二經人可讀經自考也

一各門辨證專講五行生剋之理生中有剋剋中有生

經權常變顛倒紛紜貴人善讀之耳

一鐸壯遊五岳每逢異人傳刀圭之書頗富凡可引證
附載於各辨證條後以備同人採擇

一祖父素好方術遺有家傳秘本凡關合各症者盡行
採入以成異書

一吾越多隱君子頗喜談醫如蔣子羽姚復菴倪涵初
金子如蔡煥然朱瑞林諸先生暨內父張公噩仍與同

輩余子道元葉子正叔林子巨源鏡子升璉丁子威如

家太士或聞其餘論或接其片言均採入靡遺

一茲編不講鍼灸非輕之也蓋九鍼治病之法已暢論
於靈素書中不必再為發明耳

一人病最多集中所論恐不足槩世人之病然生剋之
理既明常變之法可悟此編旁通治法正有餘也

一二師所傳諸方與鄙人所採諸法分兩有太多過重
之處雖因病立方各合機宜然而氣稟有厚薄之分生

產有南北之異宜臨症加減不可拘定方中疑畏而不
敢用也

一鐸年過六旬精神衰邁二師傳鐸之言愧難強記恐

至遺忘辨論之處或多未備尤望同人之教鐸也

一是編方法親試者十之五友朋親串傳誦者十之三
罔不立取奇驗故敢付梓告世然猶恐藥有多寡輕重

方有大小奇偶又將生平異傳諸方備載于後便世臨
病酌用也

一岐天師傳書甚富而外經一編尤奇篇中秘奧皆採
之外經精鑑居多非無本之學也鐸晚年尚欲箋釋外

經以求正於大雅君子也

一鐸勤著述近年以來廣搜醫籍又成一編決壽夭之奇關生剋之秘有益於人命不淺悵卷帙浩繁鐸家貧不克災梨倘有同心好善之士肯捐資削厥鐸傾囊付之不吝惜也

大雅堂主人遠公識

辨證錄

卷之二

主

辨證錄總目

卷之一

傷寒門 四十三則

中寒門 七則

卷之二

中風門 二十五則

痺證門 十一則

心痛門 六則

脇痛門 五則

頭痛門 六則

腹痛門 六則

腰痛門 六則

卷之三

辨證錄

總目

二

咽喉門 七則

牙齒門 七則

口舌門 二則

鼻淵門 三則

目痛門 十二則

耳痛門 七則

血症門 二十一則

遍身骨痛門 四則

卷之四

五鬱門 六則

咳嗽門 八則

喘門 四則

怔忡門 三則

驚悸門 二則

虛損門 二則

不寐門 五則

健忘門 四則

癩癩門 六則	呆病門 三則	卷之五	關格門 五則	翻胃門 五則	厥症門 七則	卷之六	火熱症門 十六則	燥症門 十五則	消渴門 五則	汗症門 五則	犬瀉門 九則	癥瘕門 八則	卷之八	瘡疾門 十則	癆瘵門 十七則	陰陽脫門 五則	癩癩門 六則	狂病門 六則	呃逆門 五則	中滿門 四則	噤脹門 七則	春溫門 三十三則	暑症門 十一則	痿症門 八則	瘰癧門 十一則	五癰門 十則	痢疾門 十三	虛損門 十二則	夢遺門 七則	淋症門 七則
--------	--------	-----	--------	--------	--------	-----	----------	---------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------

卷之九	大便閉結門 九則	內傷門 二十三則	陰痿門 五則	卷之十	鶴膝門 二則	遺尿門 三則	強陽不倒門 二則	火丹門 二則	疰夏門 二則	中邪門 六則	中毒門 十二則	自笑門 附自哭三則	瘖啞門 三則	種嗣門 九則	婦人科	卷之十一	帶門 五則	小便不通門 六則	疝氣門 附奔豚八則	痰症門 二十一則	癘風門 二則	脫肛門 二則	發斑門 二則	離魂門 三則	脚氣門 一則	中妖門 六則	腸鳴門 三則	惱怒門 二則	瘟疫門 一則	血枯門 二則
-----	----------	----------	--------	-----	--------	--------	----------	--------	--------	--------	---------	-----------	--------	--------	-----	------	-------	----------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

血崩門	七則	調經門	十四則
受娠門	十則	妊娠惡阻門	二則
卷之十二			
安胎門	十則	小產門	五則
鬼胎門	一則	難產門	六則
血暈門	三則	胞衣不下門	二則
產後諸病門	十一則	下乳門	二則
卷之十三 外科			
背癰門	七則	肺癰門	四則
肝癰門	二則	大腸癰門	三則
小腸癰門	三則	無名腫毒門	二則
對口疽門	一則	腦疽門	一則
囊癰門	二則	臂癰門	一則
乳癰門	四則	肚癰門	一則
多骨癰門	一則	惡疽門	一則
疔瘡門	一則	楊梅瘡門	五則
腰疽門	一則	拳疽門	一則
脚疽門	二則	贅疽門	一則

唇疔門	一則	瘰癧門	二則
痔漏門	四則	頑瘡門	二則
接骨門	二則	金瘡門	一則
物傷門	三則	癩門	一則
刑杖門	一則		
卷之十四 幼科			
驚疳吐瀉門	七則	便毒門	二則
痘瘡門	十五則	疹症門	三則
奧泥門	一則	胎毒門	一則

辨證錄總目 終

辨證錄卷之一

山陰陳士鏗敬之甫號遠公又號朱筆子著述

會稽陶式玉尚白甫號存齋又號 參訂

傷寒門

一冬月傷寒發熱頭痛汗出口渴人以為太陽之症也誰知太陽已趨入陽明乎若徒用乾葛湯以治陽明則頭痛之症不能除若徒用麻黃湯以治太陽則汗出不能止口渴不能解勢必變症多端輕變為重法宜正治陽明而兼治少陽也何則邪入陽明留於太陽者不過零星之餘邪治太陽反傷太陽矣故太陽不必治宜正治陽明蓋陽明為多氣多血之府邪入其中正足大恣其凶橫而挾其腑之氣血為炎氛烈焰者往往然也故必須用大劑涼藥始可祛除其橫暴也方用石膏二兩知母二錢麥冬二兩竹葉二百片茯苓三錢甘草一錢人參三錢柴胡一錢梔子一錢水煎服一劑而頭痛除二劑而身熱退汗止而口亦不渴矣此即白虎湯變方用石膏知母以瀉其陽明之火邪用柴胡梔子以斷其少陽之路徑用麥冬以清補其肺金之氣使火邪不能上

辨證錄 傷寒 卷之一

逼用茯苓引火下趨於膀胱從小便而出而太陽餘邪盡隨之而外泄也至於人參甘草竹葉不過取其調和臟腑所謂攻補兼施也

或懼前方太重則清肅湯亦可用也并載之以備選用

石膏五錢知母一錢麥冬一兩甘草人參柴胡梔子各一錢獨活半夏各五分水煎服

一冬月傷寒發熱口苦頭痛饑不欲飲食腹中時痛人為太陽之症也誰知少陽之病乎夫傷寒未有不從太陽入者由太陽而入陽明由陽明而入少陽者傳經之次第也何以邪入太陽即越陽明而入於少陽耶人以

為隔經之傳也而孰知不然蓋少陽乃膽經也膽屬木木最惡金肺屬金而主皮毛風邪之來肺金先受肺欺膽木之虛即移其邪於少陽故太陽之症往往多兼少陽同病者然則此症乃二經同感而非傳經之症也治法似亦宜二經同治矣而又不然單治少陽而太陽之病自愈方用柴胡二錢白芍五錢甘草一錢陳皮一錢黃芩一錢神麩一錢白朮三錢茯苓三錢水煎服一劑而熱止二劑而腹不痛頭不疼而口亦不苦矣此方即逍遙散之變方也蓋病在半表半裏之間逍遙散既解

散表裏之邪而太陽膀胱之邪何能獨留况方中原有茯苓白朮以利腰膈而通膀胱之氣乎余所以止加神麴黃芩少解其胃中之火以和其脾氣而諸症盡除也

此病用舒經湯亦佳

薄荷二錢白芍五錢甘草八分黃芩二分
白朮二錢茯苓五錢桂枝三分水煎服

一冬月傷寒發熱口渴謔語時而發厥人以爲熱深而厥亦深也疑是厥陰之症誰知爲太陰之症乎夫太陰脾土也脾與陽明胃經爲表裏表熱而裏亦熱此乃胃邪移入於脾經也此症最危最急蓋人以脾胃爲主脾胃

辨證錄 卷之一 傷寒 三

盡爲火邪所燥而腎水有不立時熬乾者乎治法宜急救脾胃矣然而救脾則胃火愈熾救胃則脾土立崩此中之消息最難惟當速救腎水之乾枯而已方用玄參三兩甘菊花一兩熟地一兩麥冬二兩芡實五錢水煎服此方名爲救枯丹用玄參以散其脾胃浮遊之火甘菊以消其胃中之邪麥冬以滋其肺中之液助熟地以生腎水庶幾滂沱大雨自天而降而大地焦枯立時優渥何旱魃之作祟乎又恐過於汪洋加入芡實以健其上氣而仍是腎經之藥則脾腎相宜但得其灌溉之功

厥陰太陰
最難辨令
辨得甚清
調用藥法
參論解頤

而絕無侵凌之患故一劑而謔語定再劑而口渴陰三劑而厥亦止身亦涼也此症世人未知治法即仲景張使君亦未嘗談及天師因士鐸之請特傳神奇治法以爲傷寒門中之活命丹也

此症用清土散亦妙

石膏一兩麥冬一兩生地一兩甘草一錢金銀花五錢白朮三錢水煎服

一冬月傷寒大汗而熱未解腹又痛不可按人以爲邪發於外未盡而內結於腹中乃陽症變陰之症也余以爲不然夫傷寒而至汗大出是邪隨汗解宜無邪在其中

辨證錄 卷之一 傷寒 四

何至腹痛此乃陽氣盡亡陰亦盡泄腹中無陰以相養有似於邪之內結而作痛蓋陰陽兩亡之急症也夫痛以可按爲虛不可按爲實何以此症不可按而又以爲虛乎不知陰陽兩亡腹中正在將絕之候不按之已有疼痛難忍之時况又按而傷其腸胃安得不重增其苦所以痛不可按也如遇此症急不可緩方用急救陰陽湯用人參二兩黃芪三兩當歸一兩熟地二兩甘草三錢白朮二兩水煎服一劑而腹痛頓止身熱亦解汗亦盡止矣此方用參芪以補氣使陽回於陰之內用當歸

實即
古而不
知亡陽即
其陰此
辨證論非
知人指授
實所末

熱地以補血使陰攝於陽之中用白朮甘草和其腸胃而通其腰臍使陰陽兩歸於氣海關元則亡者不亡而絕者不絕也倘認是陽症變陰純用溫熱之劑加入肉桂乾薑附子之類雖亦能回陽於頃刻然內無陰氣陽回而陰不能攝亦旋得而旋失矣

此症用救亡散亦易奏功
人參當歸熟地各一兩甘草二錢附子一片水煎服

一冬月傷寒大汗熱解腹微痛腰不可俯仰人以爲邪在腎經未出欲用稀菴丸加防已治之非其治也此乃發汗亡陽陽虛而陰不能濟之故也夫陰陽相根此症因

辨證錄

卷之一 傷寒

十一

汗泄過多陽氣無幾而陰又自顧不遑不敢引陽入室而陽無所歸故行於腹孤陽無主而作痛腎中之陰又因陽氣不歸而孤陰無伴不敢上行於河車之路故腰不可以俯仰方用引陽湯治之杜仲一錢山藥五錢甘草一錢茯苓二錢芡實三錢人參三錢肉桂三分白朮五錢水煎服一劑而腹疼止二劑而腰輕三劑而俯仰自適矣此方助陽氣之旺而不去助陰氣之微蓋陰之所以杜陽者欺陽氣之衰也子所以助陽而不助陰也倘用稀菴防已以重損其陰陽則終身不爲廢人者幾

希矣

此症清陽湯

亦可

杜仲二錢山藥一兩甘草一錢人參五錢白朮五錢破故紙一錢水煎服

一冬月傷寒大汗氣喘不能息面如硃紅口不能言呼水自救却僅能一口而不欲多飲人以爲熱極欲用白虎湯以解其陽明之火也而不知此爲戴陽之症乃上熱而下寒也若用白虎湯雖多加人參下喉即亡矣方用八味地黃湯半觔大鍋煎湯恣其渴飲必熟睡半日醒來汗必止氣必不喘而必清白口必不渴矣蓋此症原不宜汗而汗之以致大發其汗汗既大出而陽邪盡洩陽氣盡散陰亦隨之上升欲盡從咽喉而外越以皮毛出汗而陰氣奔騰不得盡隨汗泄故直趨咽喉大路不可止抑矣陰既上升陽又外洩不能引陰而回於氣海陽亦隨陰而上而陰氣遂逼之而不可下故氣喘不能息也且陽既在上火亦在上者勢也况陰盡上升則腎宮寒極下既無火而上火不得歸源故泛炎於面而作紅硃之色也上火不散口自作渴呼水自救者救咽喉之熱而非欲救腸胃之熱也夫實熱多成於胃火而胃

辨證錄

卷之一 傷寒

十六

作熱治則
無有不死
者

此快論
其作何病
腎之關非
腎之關之

是熱不
是寒

熱之病必多號咷狂呼之狀今氣雖喘息而寧口欲言語而不得非虛熱而何此真所謂上假熱而下真寒也八味地黃湯補水之中仍是補火之藥下喉之時火得水而解入胃之後水得火而寧調和於上下之間灌注於肺腎之際實有妙用也夫發汗亡陽本是傷氣也何以治腎而能奏功耶不知凶陽之症內無津液以致內火沸騰我大補其真陰則胃得之而息其燄胃火一息而腎之關門閉矣腎之關門閉而胃之土氣自生胃之土氣生而肺金之氣有不因之而得養者乎肺氣一生自然清肅之令行母呼子歸同氣相格勢必下引腎氣而自歸於子舍矣腎氣既歸而腎宮之中又有溫和春色以相薰又得汪洋春水以相育則火得水而生水得火而悅故能奏功之神且速也

返大湯治此症亦神
熟地三兩山茱萸一兩肉桂三錢水煎服

一冬月傷寒發厥面青手冷兩足又熱人以爲直中陰寒也宜用理中湯治之而不知非其治也此乃肝氣邪鬱而不散風邪在半表半裏之間也若用理中湯治之必然發狂而死矣夫直中陰寒之症未有不從足而先冷

者也今兩足既熱其非直中肝經明矣夫邪既不在肝經似乎不可徑治肝經矣然而邪雖不在肝經之內而未嘗不在肝經之外也邪在門外與主人何豫而忽現發厥面青手冷之症耶不知震隣之恐猶有警惕之心豈賊在大門之外而主人有不張惶色變者乎倘用理中湯是用水攻以殺賊賊未擒燒而房舍先焚賊且乘火而突入於中庭必至殺主人而去矣治法用小柴胡湯加減以散其半表半裏之邪而肝氣自安外邪化爲烏存方用柴胡二錢白芍五錢甘草一錢當歸二錢五分黃芩一錢半夏一錢水煎服一劑而手溫再劑而厥止身熱盡除而面青自白矣

此症用七賢湯亦甚效
白芍白朮各五錢甘草一錢肉桂三分柴胡一錢丹皮三錢天花粉二錢水煎服一劑即安

一冬月傷寒身熱汗自出惡寒而不惡熱人以爲陽明之症也欲用石膏湯治之而不知非也汗出似陽明然陽明未有不惡熱者今不惡熱而惡寒此陽氣甚虛邪欲出而不出內熱已解而內寒未散之症也此症必因悞汗所致方用補中益氣湯人參三錢黃芪三錢白朮二

汗之症
非內傷
治非勝議
兩到者斷
不致服用
難知放膽
勢之無不

錢當歸二錢柴胡一錢升麻四分陳皮一錢甘草一錢
加桂枝五分水煎服一劑而汗止身涼寒亦不惡矣夫
補中益氣之湯非治傷寒之症也李東垣用之以治內
傷之病實有神功我何所取乎不知傷寒之中亦有內
傷之病正不可拘拘於傷寒而不思治變之方也况此
症因誤汗而成者汗已出矣邪之存於經絡者必淺即
有畏寒其寒邪亦必不重是外感而兼內傷也補中益
氣湯補正之中而仍有祛邪之藥故兼用之而成功也
况又加桂枝散寒之味乎倘誤認作陽明之症而妄用
白虎湯少投石膏鮮不變為虛寒之病而死矣辨症烏
可不明哉

溫正湯亦

可用

人參五錢黃芪一兩當歸五錢柴胡一錢
甘草五分神麴一錢桂枝三分水煎服

一冬月傷寒身熱五六日不解譫語口渴小便自利欲臥
人以為陽明之餘熱未解也而子以為不然夫譫語雖
屬胃熱然胃熱譫語者其聲必高拂其意必怒今但譫
語而低聲非胃熱也但既非胃熱何以口中作渴欲飲
水以自救耶然口渴飲水不化痰上湧反直走膀胱

辨證錄

卷之一

七

而小便自利其非胃熱又明矣夫陽明火盛多致發狂
今安然欲臥豈是胃熱之病但既不是胃熱何以譫語
口渴不解至五六日而猶然耶不知此症乃心虛之故
也心虛則神不守舍而譫語心虛則火起心包而口渴
夫心與小腸為表裏水入心而心即移水於小腸故小
便自利也治法用茯苓五錢麥冬一兩丹皮二錢柴胡
一錢甘草五分水煎服一劑而譫語止二劑而口渴除
身熱亦解此方名為清熱散用麥冬以補心用茯苓以
分消火熱用柴胡丹皮甘草以和解其邪氣心氣足而
邪不能侵邪盡從小腸以泄出而心中寧靜津液自生
故渴除而腎氣上交於心而精自長亦不思臥矣倘疑
為胃熱而用白虎或用青龍之湯鮮不敗軀矣

涼解湯亦

可用

茯苓三錢麥冬五錢玄參一兩柴胡
一錢甘草三分炒棗仁二錢水煎服

一冬月傷寒至五六日往來寒熱胸脇苦滿或嘔或吐或
渴或不渴或煩或不煩人以為少陽之病也宜用小柴
胡湯和解之夫小柴胡湯治少陽邪之聖藥用之似乎
無不宜也以少陽居於表裏之間邪入而併於陰則寒

善風 風而無 濟之則 必欲乾酒 以風 未尤不 以兩治 之得快

邪出而併於陽則熱故痰結於胸而苦滿欲吐不吐欲
 渴不渴而煩悶生矣用柴胡湯以和解之自易奏功然
 而止可一用而不可常用也蓋少陽膽木最喜者水耳
 其次則喜風柴胡風藥得之雖可以解慍然日以風藥
 投之則風能燥濕愈見乾枯必以加兩濟之助鬱鬱
 怒其扶疎青翠為何如耶譬之炎夏久旱禾苗將至枯
 槁必得甘霖霑足庶乎可救故用柴胡湯之後必須用
 補水之劑以濟之方用濟生湯熟地五錢玄參五錢麥
 冬三錢山茱萸一錢山藥三錢茯苓二錢白芍三錢柴
 胡五分神麩三分竹茹一圓水煎服一劑而煩滿除再
 劑而寒熱止三劑而前症盡失也此方多是直補腎水
 之味直補其膽木之源助膽汁不枯足以禦邪而有餘
 况加入白芍柴胡仍散其牛表牛裏之邪安得不收功
 之速乎倘疑傷寒之後不宜純用補腎之藥恐胃氣有
 傷難以消化不知少陽之症由太陽陽明二經傳來火
 燥水涸不但膽汁為邪所逼半致熬乾而五臟六腑盡
 多炎燥是各經無不喜吟霖雨非惟少陽膽木一經喜
 水也然則用補水之藥正其所宜何至有停隔之虞哉

人見 柴胡 於傷寒 前問 其所傷 不勝枚舉

此症用和隔 散亦妙
 柴胡一錢白芍一兩生地五錢玄參三錢麥冬
 二錢茯苓二錢竹茹一圓白芥子一錢水煎服
 一冬月婦人傷寒發熱至六七日晝則了了夜則譫語如
 見鬼狀按其腹則大痛欲死人以為熱入血室而不知
 非止熱入血室也雖亦因經水適來感寒而血結故成
 如瘧之狀然而其未傷寒之前原有食未化血包其食
 而為瘧母也論理小柴胡為正治然而小柴胡湯止能
 解熱使熱散於血室之中不能化食使食消於血塊之
 內予有一方最神治熱入血室兼能化食可同治之也
 方名兩消丹用柴胡三錢丹皮五錢鱉甲三錢山查肉
 一錢枳殼五分炒梔子二錢甘草一錢白芍五錢當歸
 三錢桃仁十粒水煎服一劑而痛輕二劑而鬼去譫語
 亦止腹亦安然杳無寒熱之苦矣蓋此方既和其表裏
 而血室之熱自解妙在用鱉甲進攻於血塊之中以消
 其宿食所謂直搗中堅而瘧母何所存立以作崇乎服
 吾藥實可作無鬼之論也
 此症清白飲 治之亦妙
 丹皮三錢柴胡前胡各二錢白芍一兩青蒿三錢人
 參甘草半夏各一錢青皮炒梔子各二錢茯苓當歸

各三錢
水煎服

冬月傷寒項背強几几汗出惡風服桂枝加葛根治之而不愈人以爲太陽陽明合病舍前方又將用何藥以治之而不知不可執也夫太陽之邪既入陽明自宜專治陽明不必又去顧太陽也况於葛根湯中仍用桂枝以祛太陽之邪乎是太陽之邪輕而陽明之邪重矣方用竹葉石膏湯以瀉陽明之火而前症自愈但不必重用石膏也余定其方石膏三錢知母八分半夏一錢麥冬三錢竹葉五十片甘草一錢水煎服一劑而汗止再劑項背強几几之症盡去而風亦不畏矣倘必拘執仲景方法而仍用桂枝加葛根湯雖病亦能愈而消燦津液亦多矣予所以更示方法使治傷寒者宜思變計而不可死泥古人之文也

此症用清胃湯亦佳

玄參生地五錢知母二錢半
夏一錢甘草五分水煎服

一冬月傷寒頭痛几几下利夫頭痛太陽之症也几几陽明之症也是二經合病無疑似乎宜兩解其邪之爲得然而不可兩治之也正如其下種耳夫陽明胃土也今

靈壽邪
陰寒爲
可危若不
急爲挽救
一入於陰
便難措手
此藥用藥
必須力重
用解合湯
以止利直
去之法

挾陽明胃中之水穀而下奔其勢欲驅邪而盡入於陰經若不專治陽明而急止其利則陽變爲陰熱變爲寒其害有不可言者矣方用解合湯治之葛根二錢茯苓五錢桂枝三分水煎服一劑而利止二劑而几几頭痛之病頓愈蓋葛根乃太陽陽明同治之聖藥况加入桂枝原足以散太陽之邪而茯苓不獨分消水勢得桂枝之氣且能直趨於膀胱夫膀胱正太陽之本宮也得茯苓澹泄而葛根亦隨之同行祛逐其邪盡從小便而出亦便利而大便自止矣此不止利而正所以止利不瀉陽明而正所以瀉陽明兩解之巧又孰能巧於此者乎此予所以謂不必兩治而止須一治之也

此症用葛根桂枝人參湯太妙
葛根三錢桂枝五分人參一錢水煎服

一冬月傷寒六七日後頭疼目痛寒熱不已此太陽陽明少陽合病也而不可合三陽經而統治之然則終治何經而三陽之邪盡散乎夫邪之來者太陽也邪之去者少陽也欲去者而使之歸來者而使之去必須調和其胃氣胃氣一生而陽明之邪自孤勢必太陽少陽之邪盡趨陽明以相援而我正可因其聚而亟使之散也譬

如賊人散處四方自難擒勦必誘其蟻屯一處而後合圍守困可一舉而受縛也方用破合湯石膏三錢葛根三錢茯苓三錢柴胡一錢白芍三錢陳皮一錢甘草一錢水煎服此方治陽明者十之七治太陽者十之一治少陽者十之二雖合三經同治其實仍專治陽明也故一劑而目痛愈矣再劑而頭痛除矣三劑而寒熱解矣此皆胃氣發生之故奏功所以甚速也倘不治陽明而惟治少陽則損傷胃氣而少陽之邪且引二經之邪盡遁入陰經反成變症而不可收拾矣

傷寒

卷之十一

五

此症和陽

湯亦妙

石膏五錢葛根白芍各二錢人參二錢麻黃三分柴胡甘草各一錢天花粉五分水煎服

一冬月傷寒五六日吐瀉後又加大汗氣喘不得臥發厥者此悞汗之故人以爲壞症而不可治也夫大汗之後宜身熱盡解矣今熱不退而現此惡症誠壞症之不可治也吾欲於不可治之中而施可救之法亦庶幾於不宜汗之中而救其失汗乎蓋傷寒至吐瀉之後上下之邪必散而熱未解者此邪在中焦也理宜和解當時用柴胡湯調治之自然熱退身涼而無如其悞汗之也今

失汗必須
救汗又何
疑哉但苦
汗必多
用人參天
下發人多

傷寒
以全活之
乎余不贊

悞汗之後而熱仍未退身仍未涼是邪仍在中焦也此時若用柴胡湯則已虛而益虛不死何待乎必須大補其中氣使汗出亡陽仍歸於膝理之內少加柴胡以和解則轉敗為功實有妙用也方用救汗回生湯人參三兩當歸二兩柴胡一錢白芍一兩陳皮五分甘草一錢麥冬五錢水煎服一劑而汗收再劑而喘定可以臥矣三劑而厥亦不作然後減去柴胡將此方減十分之六漸漸調理自無死法此救壞病之一法也人見人參之多用未必不驚用藥之大峻殊不知陽已盡亡非多用

傷寒

卷之十一

五

此症用救散

亦效如响

人參何以回陽於無何有之鄉尚恐人參回陽而不能回陰故又佐之當歸之多助人參以奏功至於白芍麥冬之多用又慮參歸過於勇猛使之調和於肺肝之中使二經不相戰尅而陽回於陰之中陰攝於陽之內聽柴胡之解紛實有水乳之合也何必以多用參歸為慮哉

傷寒
下發人多

當歸麥冬人參各五錢白芍五錢柴胡甘草各五分北五味十粒神麴三分水煎服

冬月傷寒汗吐後又加大下而身熱猶然如火發厥氣

息奄奄欲死皆為壞症不可救矣然亦有可救之法正以其誤下耳夫誤下必損脾胃之氣救脾胃未必非生之道也惟是邪猶未解補脾胃之氣未必不增風寒之勢必須救脾胃而又不助其邪始可耳方用援下回生丹人參三錢白朮一兩茯苓五錢柴胡五分甘草一錢赤石脂末一錢水煎調服一劑而瀉止厥定二劑而身熱解口思飲食矣此時切戒不可遽與飲食止可煎米湯少少與飲漸漸加入米粒調理而自安設或驟用飲食必變為結胸之症斷難救死也夫同是壞症前條何以多用人參而此條少用人參耶蓋大汗亡陽其勢甚急大下亡陰其勢少緩亡陽者陽易散也亡陰者陰難盡也亡陽者遍身之陽皆泄非多用人參不能挽回於頃刻亡陰者脾胃之陰盡而後及於腎故少用人參而即可救於須臾此方之妙參朮以固其脾胃腎之氣茯苓以分消其水濕之邪柴胡甘草以調和於邪正之內加入赤石脂以收澁其散亡之陰所以奏功實神此又救壞症之一法也

此症用定亂湯亦神

人參山藥各一兩茯苓薏仁各五錢甘草黃連各五分陳皮神麩各三分砂仁一粒水煎服

一冬月傷寒汗下後又加大吐氣逆嘔吐飽悶胸中痞滿時時發厥昏暈欲死譫語如見神鬼且知生人出入此亦壞症之不可救者蓋不宜吐而誤吐以成至危之症則當深思安吐之方舍轉氣之法又將何求乎方用轉氣救吐湯治之人參一兩旋覆花一錢赭石末一錢茯苓五錢水煎服一劑而氣逆轉矣另用招魂湯人參三錢茯苓三錢山藥三錢芡實三錢陳皮三分神麩三分麥冬三錢柴胡一錢白芍五錢水煎服一劑而身涼神魂寧貼前症盡愈夫汗下之後而身熱未解者此邪在半表半裏也理宜和解乃不用和解而妄用吐藥邪隨氣湧氣升不降者因汗下之後元氣大虛又加大吐則五臟反覆自然氣逆而不能順矣氣既逆矣嘔吐何能遽止胸中無物而作虛滿虛痞之苦以致神不守舍隨吐而越出於軀壳之外故陰陽人鬼盡能見之也似乎先宜追魂奪魄之為急而必先轉氣者何也蓋氣不轉則神欲回而不能回魄欲返而不能返所以先轉其氣氣順而神自歸矣况轉氣之中仍佐以定神之品安得

此症必用參朮

不奏功如响哉至於轉氣之後反用招魂湯者豈魂向未回魄向未返而用此以招之乎蓋氣虛之極用轉氣之湯以順之苟不用和平之劑調之則氣轉者未必不重變為逆也招魂湯一派健脾理胃之藥土氣既生安魂定魄而神自長處於心宮而不再越矣然則招魂之湯即養神之湯也此又救壞症之一法也

更有救逆散亦能成功

人參二兩茯苓白芍各一兩附子一錢麥冬五錢牛膝二錢破故紙一錢水煎服

一冬月傷寒身重目不見人自利不止此亦壞症之不可

辨證錄

卷之二 傷寒

下三

救者乃悞汗悞下之故耳一悞再悞較前三條為更重本不可救而內有生機者以胃未經悞吐則胃氣宜未傷也扶其胃氣以回陽助其胃氣以生陰未必非可救之又一法也方用漸生湯人參三錢白朮五錢茯苓一兩山藥一兩芡實一兩黃芪五錢白芍五錢甘草一錢砂仁三粒水煎服一劑而目能見人再劑而自利止三劑而身涼體輕矣此方妙在緩調胃氣胃氣生而五臟六腑俱有生氣矣夫陰陽之衰易於相生陰陽之絕固難以相救第陰陽之道有一線未絕者猶可再延此症

悞汗悞下
斷非人參

雖壞而猶有生氣是陰陽在欲絕未絕之候故用參苓芪朮之品得以回春也倘陰陽已絕又安能續之乎此又救壞症之一法也

此症用救脾

飲亦效
人參茯苓巴戟天各五錢山藥芡實各一兩北五味陳皮各五分神麩五分水煎服

一冬月傷寒悞吐悞汗悞下而身熱未退死症俱現人為必死矣即法亦在不救吾不忍其無罪而入陰也再傳一起死回生之法以備無可如何之地而為追魂奪魄之方方名追魂丹人參一兩茯苓神五錢山藥一兩附子一分甘草一錢生棗仁一兩水煎服一劑而大便止者便有生機或汗止或吐止三者得一亦有生意蓋陰陽未絕得一相接則陰陽自能相生蓋悞吐悞汗悞下之症其陽與陰氣原未嘗自絕而亡其陰陽耳其陰陽之根實有在也故一得相引而生意勃發服之而大便止是腎陰之未絕也服之而上吐止是胃陽之未絕也服之而身汗止是五臟六腑之陽與陰俱未絕也何不可生之有倘三者杳無一應是陰陽已絕實無第二方可救矣或問追魂丹方中純是回陽回陰之藥而絕不

辨證錄

卷之一 傷寒

下三

下三
下四
下五
下六
下七
下八
下九
下十
下十一
下十二
下十三
下十四
下十五
下十六
下十七
下十八
下十九
下二十
下二十一
下二十二
下二十三
下二十四
下二十五
下二十六
下二十七
下二十八
下二十九
下三十
下三十一
下三十二
下三十三
下三十四
下三十五
下三十六
下三十七
下三十八
下三十九
下四十
下四十一
下四十二
下四十三
下四十四
下四十五
下四十六
下四十七
下四十八
下四十九
下五十

辨證錄

去顧邪者豈無邪之可散乎使身內無邪宜身熱之盡退矣何以又熱如故也嗟乎經汗吐下之後又有何邪其身熱之未退者因陰陽之虛為虛熱耳使早用補劑何至有變症之生耶故止須大補其陰陽陰陽回而已無餘事不必又去顧邪若又顧邪則追魂丹反無功矣

此症用奪魂湯亦神

人參生棗仁白芍各一兩茯苓神五錢附子一分水煎服

一冬月傷寒八九日腹痛下利便膿血喉中作痛心丙時煩人以為少陰之症也治法不可純治少陰然而本是

辨證錄

卷之一 傷寒

三

少陰之症舍治少陰必生他變使治膿血而用桃花湯則心煩者不宜使治喉中作痛而用桔梗湯則腹痛者不宜而我以為二方不可全用而未嘗不可選用也余酌定一方名為草花湯用甘草二錢赤石脂二錢糯米一撮水煎服一劑而腹痛除二劑而喉痛止三劑而利亦愈煩亦安蓋少陰之症乃脾氣之拂亂也故走於下而便膿血奔於上而傷咽喉今用甘草以和緩之則少陰之火不上炎而後以赤石脂固其滑脫况有糯米之甘以益中氣之虛則中氣不下墜而滑脫無源而自止

要辨土以定少陰之亂宜有定

何必用寒涼之品以瀉火而化膿血哉膿血消於烏有而中焦之間尚有何邪竹崇使心中之煩悶乎故一用而各症俱痊耳誰謂桃花甘草之湯不可選用哉

此症用脂草飲亦效
甘草赤石脂各一錢人參二錢水煎服

一冬月傷寒一二日即自汗出咽痛吐利交作人以為太陰之病也而不知乃少陰腎寒之病而非太陰脾虛之症也蓋傷寒初起宜無汗而反汗出者無陽以固其外故邪不出而汗先出耳此證實似太陰以太陰亦有汗自出之條但太陰之出汗因無陽而自泄少陰之出汗

辨證錄

卷之一 傷寒

三

因陽虛而自越也夫少陰之邪既不出於腎經不能從皮毛分散勢必隨任督而上奔於咽喉而咽喉之竅甚小小少陰邪火直如奔馬因竅小而不能盡泄於是下行於大腸而下焦虛寒復不能傳送以達於肛門又逆而上冲於胃脘而作吐矣方用溫腎湯人參三錢熟地一兩白朮一兩肉桂二錢水煎服一劑而汗止吐瀉亦愈而咽痛亦除此症乃下部虛寒用參朮以回陽用肉桂以助命門之火則龍雷之火喜於溫煖自然歸經安於腎臟矣然肉桂未免辛熱恐有助熱之虞得熟地以相

不致其邪
爭邪反留
一線之陰
正而可回
此證雖極
陰將絕矣
來附固能
回陽氣於
無何有之
無必宜加
入熱地黃
三錢無
邪陽發
之真耳何
如後方
見其正

也補先天之氣而後天之氣不期其續而自續矣方用
參附湯救之用人參二兩附子二錢水煎服往往有得
生者雖此方不能盡人而救之然而既有此症寧使用
此方而無濟於生不可置此方而竟聽其死也况人參
能回陽於無何有之鄉而附子又能奪神於將離未離
之際使魂魄重歸陰陽再長原有奇功烏可先存必死
之心豫蓄無生之氣哉

此症用參朮附棗湯亦神
人參一兩白朮二兩附子一錢炒棗仁五錢

辨證錄

卷之一 傷寒

三

一冬月傷寒六七日經傳少陰而息高人以爲太陽之症
未除而作喘而不知非也夫太陽之作喘與少陰之息
高狀似相同而實殊太陽之喘氣息粗盛乃邪盛也少
陰之息高氣息緩漫而細小乃真氣虛而不足以息息
若高而非高也故太陽之喘宜散邪而少陰之息高宜
補正因少陰腎宮大虛腎氣不能下藏於氣海之中乃
上奔而欲散實至危之病也宜用朝宗湯救之人參三
兩麥冬三兩熟地三兩山茱萸一兩山藥一兩破故紙
一錢胡桃一枚水煎服一劑而息平再劑而息定此方
純用補氣填精之藥不去治息而氣自歸源者氣得補

而有所歸也譬如敗子將田園消化無存不能安其室
而逃出於外豈不欲歸家哉實計無復之耳倘一旦有
資身之策可以溫飽自然歸故里而返舊居豈肯飄泊
於外而爲落魄之人哉或曰下寒則火必上越此等息
高獨非腎氣之虛寒乎何以不用肉桂引火歸源耶嗟
乎腎氣奔騰實因腎火上冲所致然而不用桂附者實
亦有說腎火必得腎水以相養不先補腎水而遽助腎
火則火無水濟而龍雷必反上升轉不能收息於無聲
矣吾所以先補水而不急補火也况故紙亦是補火之
味更能引氣而入於氣海何必用桂附之跳梁哉

此症延息
湯亦妙

人參熟地各一兩山茱萸五錢牛膝破故紙各三錢
胡桃一箇陳皮三分炮薑一錢百合一兩水煎服

一冬月傷寒頭痛遍身亦疼宜用麻黃湯以發汗矣倘元
氣素薄切其尺脉遲緩雖是太陽正治而不可輕用麻
黃以汗之也人以爲宜用建中湯治之以城郭不完兵
甲不堅米粟不多宜守而不宜戰耳然建中湯止能自
守而不能出戰且賊盛圍城而城中又有奸細安能盡
祛而出之此症是太陽傷營之病舍麻黃湯終非治法

辨證錄

卷之一 傷寒

三

用麻黃之湯加入參一兩治之則麻黃足以散邪而人參足以助正庶補攻兼施正既不傷而邪又盡出也或謂既是麻黃之症不得已而加用人參可少減其分兩乎誰識元氣大虛非用參之多則不能勝任故必須用至一兩而後元氣無太弱之虞且能生陽於無何有之鄉可以禦敵而無恐矣倘不加人參於麻黃湯中則邪留於胸中而元氣又未能復胡能背城一戰乎此方若以麻黃為君而人參為佐必致債事今用參至一兩而麻黃止用一錢是以人參為君而麻黃轉作佐使正

奇奇兼而用之此用兵之妙而可通之於醫道也

此症亦可用參苓麻草湯
麻黃一錢人參三錢茯苓一兩甘草一錢水煎服

一冬月傷寒吐下汗後虛煩脈微八九日心下痞硬脇痛氣上冲咽喉眩冒經脈動惕者必成痿症人以為太陽之壞症也然而不止太陽之壞也傷寒經汗吐下之後症現虛煩者虛之至也况脈又現微非虛而何夫痿症責在陽明豈未成痿症之前反置陽明於不治乎治陽明之火宜用人參石膏湯矣然既經汗下之後石膏峻利恐胃土之難受火未必退而土先受傷非治之得也

痿症治法
清非補
以散火

方用青蒿防痿湯人參一兩青蒿五錢半夏一錢陳皮五分乾葛一錢連服二劑胃氣無傷而胃火自散諸症漸愈而痿症亦可免也蓋此症不獨胃火沸騰而腎肝之火亦翕然而共起青蒿能去胃火而更能散腎肝之火也一用而三得之然非用人參之多則青蒿之力微不能分治於臟腑尤妙在佐之半夏陳皮否則痰未能全消而氣不能遽下痞硬脇痛之症烏能盡除哉然而青蒿瀉胃火尚恐勢單力薄復佐之乾葛以共瀉陽明之火則青蒿更能奏功况乾葛散邪而不十分散氣得人參以輔相青蒿尤有同心之慶也

此症可用調
胃二參湯
人參立參各五錢石膏三錢天
花粉二錢乾葛一錢水煎服

一冬月傷寒譫語發潮熱以承氣湯下之不應脈反微澁者是裏虛也仲景張公謂難治不可更與承氣湯豈承氣湯固不可用乎夫既以承氣湯下之矣乃不大便是邪盛而燥乾津液故脈澁而弱也非裏虛表邪盛之明驗乎倘攻邪則邪未必去而正且益虛故為難治當此之時不妨對病家人說此症實為壞症也子用藥以相

救或可望其回生而不能信其必生也用人參大黃湯救之人參一兩大黃一錢水煎服一劑得大便而氣不脫卽生否則死矣苟大便而氣不脫再用人參三錢陳皮三分甘草三分芍藥一錢煎湯與之二劑而可慶生全也

此症亦可用表

裏兼顧湯

大黃二錢人參五錢柴胡三分
甘草一錢丹皮二錢水煎服

一冬月傷寒發熱而厥厥後復熱厥少熱多病當愈既厥之後熱不除者必便膿血厥多熱少寒多熱少病皆進

辨證錄

卷之十一 傷寒

七

也夫厥少熱多邪漸輕而熱漸退也傷寒厥深熱亦深何以厥少而熱反深乎此蓋邪不能與正相爭正氣反凌邪而作祟也譬如賊與主人相鬪賊不敵主將欲逃遁而主人欺賊之懦愈加精神正氣既旺賊勢自衰故病當愈也至於既厥之後而熱仍不除譬如賊首被獲而餘黨尙未擒拿必欲盡殺爲快則賊無去路自然捨命相鬪安肯自死受縛勢必帶傷而戰賊雖受傷而主亦有焦頭爛額之損矣故熱勢雖消轉不能盡散雖不敢突入於經絡而必至走竄於腸門因成便膿血之症

矣治法不必用大寒之藥以助其祛除止用和解之劑賊自盡化爲良民何至有餘邪成羣作祟哉方用散羣湯甘草二錢黃芩三錢當歸五錢白芍一兩枳殼一錢水煎服一劑而無膿血之便者斷無膿血之災倘已便膿血者必然自止妙在用歸芍以活血加甘草黃芩以涼血而和血也所以邪熱盡除非單藉枳殼之攻散耳至於厥多熱少寒多熱少無非正氣之虛正虛則邪盛邪盛自易凌正而正不能敵邪自不敢與賊相戰安得而不病進乎治法宜大補正氣而少加祛邪之藥自然熱變多而厥變少而寒亦少也方用祛厥湯人參五錢白朮一兩甘草二錢當歸五錢柴胡一錢附子一分水煎服一劑而轉熱矣三劑而厥定寒除矣夫熱深而厥亦深似乎消其熱卽消其厥也何以反助其熱乎不知此二症非熱盛而厥乃熱衰而厥也熱衰者正氣之衰非邪氣之衰也吾用人參歸朮以助其正氣非助其邪熱也正旺則敢與邪戰而作熱一戰而勝故寒與厥盡除也方中加入附子者尤有妙義參朮之類未免過於慈祥尙不用附子將軍之藥則仁而不勇難成迅掃之

辨證錄

卷之十一 傷寒

七

功加入一分以助柴胡之力則無經不達寒邪聞風而盡散所謂以大勇而濟其至仁也

此症可用
勝邪湯

甘草柴胡各一錢當歸白芍各五錢枳殼五分白朮三錢附子一分人參二錢水煎服

一冬月傷寒四五日後下利手足逆冷無脈者人以為厥陰之寒症也急灸之不溫而脈亦不還反作微喘皆云死症而不必治也而吾以為可治者正因其無脈耳夫死而後無脈今未斷氣而無脈乃伏於中而不現非真無脈也無脈者固不可救脈伏而似於無脈安在不可救乎用灸法亦救其出脈也灸之而脈不還宜氣絕矣乃氣不遽絕而反現微喘之症此生之之機也蓋脈果真絕又何能因灸而作喘作微喘者正其中有脈欲應其灸而無如內寒之極止藉星星之艾火何能驟達是微喘之現非脈欲出而不能遽出之明驗乎急用參附湯救之以助其陽氣則脈自然出矣但參附宜多用而不宜少用也方用人參二兩附子三錢水煎服一劑而手足溫二劑而脈漸出三劑而下利自止而盡愈矣夫附子有斬關奪門之勇人參有回陽續陰之功然非

醫家類

卷之六

傷寒

三

多用則寒邪勢盛何能生之於無何有之鄉起之於幾微欲絕之際哉遇此等之症必須信之深見之到用之勇任之大始克有濟倘徒施灸法而不用湯劑或用參附而不多加分兩皆無識而害之兼財力不足而不能救也

此症可用人參雙薑湯
人參一兩乾薑三錢生薑三錢水煎服

一冬月傷寒身熱一日即發識語人以為邪傳陽明也誰知其人素有陽明胃火風入太陽而胃火即沸然不靜乎治之法若兼治陽明以瀉胃熱治亦無差然而太陽之邪正熾不專治太陽則衛之邪不能散營之邪不能解先去退陽明之火未必不引邪而入陽明反助其騰燒之禍也不若單治太陽使太陽之邪不能深入而陽明之火不治而自散耳方用平陽湯桂枝三分麻黃一錢甘草一錢青蒿三錢天花粉一錢水煎服一劑而身熱退識語亦止矣此方少用桂枝而多用麻黃者以寒輕而熱重也用青蒿為君者青蒿退熱而又能散邪且又能入膀胱而走於胃既解膀胱之邪而又解胃中之火不特不引邪以入陽明而兼且散邪以出陽明也方

醫家類

卷之一

傷寒

中又加天花粉者以讒語必帶痰氣天花粉善消膈中之痰而復無增熱之慮入於青蒿桂枝麻黃之內通上達下消痰而即消邪也痰邪兩消又何讒語乎所以一劑而奏功耳

此症亦可用爭先湯

桂枝五分麻黃五分石膏一錢麥冬五錢茯苓五錢半夏八分水煎服

一冬月傷寒身熱二日即有如瘧之狀人以為證傳少陽也誰知其人少陽之間原有寒邪一遇傷寒隨因之而並見乎世見此等之症以小柴胡湯投之亦能奏功然

辨證錄

卷之一

傷寒

三

終非治法也法當重治陽明而兼治少陽為是蓋陽明之火邪未散雖見少陽之症其邪仍留陽明也邪留陽明身發寒熱而讒語發狂之病未必不因之而起惟重治陽明則胃中之火自解使邪不走少陽而少陽原存之寒邪孤立無黨何能復煽陽明之焰自然陽明火息而少陽之邪亦解也方用破邪湯石膏三錢柴胡一錢半夏一錢茯苓三錢甘草一錢麥冬一兩玄參三錢陳皮一錢水煎服一劑而身熱解如瘧之症亦痊此方用石膏玄參以治陽明之火用麥冬以滋肺中之燥蓋肺

燥即不能制肝膽之過旺也且肺燥必取給於胃則胃土益加乾枯其火愈熾矣今多用麥冬使肺金得潤不必有藉於胃土則肺氣得養自能制肝膽之木而少陽之邪何敢附和胃火以作祟乎况柴胡原足以舒少陽之氣而茯苓甘草半夏陳皮之類更能調和於陽明少陽之間邪無黨援安得而不破哉

此症用八公和

陽湯亦神

石膏一錢柴胡二錢茯苓三錢白朮二錢甘草一錢炒梔子一錢青皮三分天花粉一錢水煎服

一冬月傷寒身熱三日腹滿自利人為陽傳於陰矣而

辨證錄

卷之一

傷寒

三

孰知不然夫陰症腹滿自利而陽症未聞無之也不辨其是陽非陰而概用治太陰之法鮮有不死亡者矣然陰與陽何以辨之夫太陰之自利乃寒極而痛也少陽之自利乃熱極而痛也痛同而症實各異此痛必須手按之按而愈痛是陽症也若太陰陰症按之而不痛矣故治陽症之法仍須和解少陽之邪而不可悞治太陰也方用加減柴胡湯治之柴胡一錢白芍五錢茯苓神二錢甘草一錢梔子二錢陳皮一錢當歸三錢枳殼五分大黃五分水煎服一劑而腹滿除二劑而自利止矣不

痛熱清

必三劑也此方和解之中仍寓微攻之意分消之內少兼輕補之思所以火邪易散而正氣又不傷也若以大承氣下之未免過於推蕩若以大柴胡下之未免重於分消所以又定加減柴胡湯以治少陽腹滿之自利耳

此症亦可用

和攻散

柴胡梔子丹皮各二錢白芍五錢茯苓三錢甘草陳皮大黃各一錢水煎服

一冬月傷寒身熱四日畏寒不已人以爲太陰轉少陰矣誰知仍是太陰也夫太陰脾土也少陰腎水也似不相同然而脾土乃濕土也土中帶濕則土中原有水象故

辨證錄

卷之一 傷寒

三

脾寒即土寒而土寒即水寒也所以不必邪傳入腎而早有畏寒之症矣治法不必治腎專治脾而寒症自消方用理中湯加減治之白朮一兩人參三錢茯苓三錢肉桂一錢附子一錢水煎服一劑而惡寒自解而身熱亦解矣夫方中用桂附似乎仍治少陰之腎然而以參朮爲君仍是治脾而非治腎也雖然脾腎原可同治參朮雖治脾而亦能入腎况得桂附則無經不達安在獨留於脾乎然則治脾而仍是治腎此方之所以神耳

此症用加味桂附湯亦效

白朮一兩肉桂乾薑各一錢附子甘草各五分水煎服

一冬月傷寒身熱五日人即發厥人以爲寒邪已入厥陰也誰知是腎水乾燥不能潤肝之故乎夫發厥本是厥陰之症邪未入厥陰何以先爲發厥蓋肝血燥極必取給於腎水而腎水又枯肝來顧母而腎受風邪子見母之警自然有不共戴天之恨故不必邪入厥陰而先爲發厥母病而子亦病也治法無庸治肝但治腎而厥症自定母安而子亦安也方用子母兩快湯熟地五錢麥冬五錢當歸二錢山茱萸三錢茯苓二錢芡實二錢山

辨證錄

卷之一 傷寒

三

藥二錢玄參五錢水煎服一劑而厥定再劑而身熱亦愈也此方純用補腎之味惟當歸滋肝之血也治腎而治肝在其中何必再用白芍以平肝氣耶且此症又不可用白芍也以白芍雖平肝氣可以定熱厥於須臾然而白芍定厥未免過於酸收與補水之藥同用於無邪之日易於生精與補水之藥同用於有邪之頃亦易於過火不若單用補腎之味使水足以制火而又無火留之害爲更勝也故子母兩快湯所以不用芍藥而單用當歸者以當歸之性動不比芍藥之酸收耳且當歸善

加藥症凡
兼太陽者
此可用桂
枝湯但宜
切實耳

助熱地山莫以生水生水以滋肝即補腎以制肝也

一冬月傷寒身熱六日而汗不解仍有太陽之症人以爲

邪返於太陽也誰知是邪欲返於太陽而不能返乎夫

邪既不能返於太陽當無太陽之症矣治法宜不治太

陽也然而不治太陽而邪轉有變遷之禍蓋邪既不能

復返於太陽窺太陽之門而欲入者亦勢之所必至也

用太陽之藥引邪而歸於太陽而太陽會已傳過邪走

原路而邪反易散矣方用桂枝湯少以散之一劑而邪

盡化也倘多用桂枝湯則焦頭爛額曷勝其祛除乎此

辨證錄 卷之一 傷寒 三

又用藥之機權也

此症用解邪
湯亦佳

桂枝三分茯苓五錢當歸三錢生地五錢白朮
三錢陳皮三分甘草一錢麥冬五錢水煎服

一冬月傷寒至七日而熱猶未解譏語不休人以爲證復

傳陽明也誰知是邪欲走陽明而陽明不受乎夫陽明

已經前邪見邪則拒似乎邪之難入矣然而切膚之痛

前已備經故一見邪再入太陽惟恐邪之重入陽明也

所以震隣之恐先即呼號而譏語生非從前邪實而作

譏語者可比治法不必專治陽明以截陽明之路惟散

太陽之邪而邪已盡散斷不復入陽明也方用桂枝湯

一劑而譏語自止又何必用石膏湯以重傷胃氣哉

此症用和營
湯亦神

麻黃三分茯苓三錢當歸三錢玄參五錢甘草
一錢麥冬五錢竹葉三十片半夏五分水煎服

一冬月傷寒至八日而潮熱未已人以爲邪再傳少陽矣

誰知是邪在陽明欲出而未出乎夫陽明之府多氣多

血之府也氣血既多臟邪亦正不少痰在胃膈原能自

發潮熱不必假借少陽之經也况邪又將出而窺伺少

陽乃少陽前受陽明之貽害堅壁以拒未免寒心故現

辨證錄 卷之一 傷寒 三

潮熱之症其實尙未入於少陽也治法正不須治少陽

之邪而單解陽明之熱陽明熱解而少陽之邪自散矣

方用解胃湯青蒿五錢茯苓二錢甘草五分麥冬五錢

玄參三錢竹葉五十片水煎服一劑而胃熱清矣再劑

而潮熱退矣不必三劑也此方息陽明之焰而又能解

少陽之氛一方而兩治倘徒解少陽之氛而陽明愈熾

矣倘徒息陽明之焰而少陽又燥矣兩陽有偏勝之虞

則二府必有獨乾之嘆自然輕變爲重邪傳正無已時

今一方兩治仍是單治陽明而少陽治法已包於中所

以能收全功也

此症用發越

湯亦妙

葛根三錢 茯苓五錢 甘草五分 麥冬三錢
玄參一兩 生地三錢 柴胡五分 水煎服

一冬月傷寒至九日而瀉利不已人以為邪入太陰陽又

變陰之症誰知是陽欲辭陰之病乎夫變陰與辭陰何

以辨之變陰者陽傳入於陰也辭陰者陽傳出於陰也

入於陰則自利豈出於陰而反自利乎不知陰陽不相

接時多為瀉利不已但入陰之自利其腹必痛出陰之

自利其腹不痛也倘至九日而瀉利不已其腹不痛者

辨證錄

卷之一 傷寒

三

正離陰之自利也切戒不可用太陰止利之藥一用止

利之藥而邪轉入陰必成危證矣法宜仍治少陽而解

其表裏之邪則自利自止而寒熱之邪亦散也方用小

柴胡湯加減用之柴胡一錢 茯苓三錢 甘草黃芩各一

錢 陳皮五分 水煎服一劑即止利而寒熱頓解矣此方

專解半表半裏之邪而又能分消水濕之氣既不入陰

而復善出陽故取效獨捷耳

此症用合陰

湯亦效

柴胡八分 茯苓五錢 甘草五分 天花粉一錢
枳殼三分 神麩五分 白芍三錢 水煎服

一冬月傷寒至十日惡寒嘔吐人以為邪再傳少陰矣誰

知是邪不欲入少陰乎夫邪既不欲入少陰何以惡寒

嘔吐不知傷寒傳經而再入於太陰其中州之氣前經

刻削則脾氣已虛脾氣既虛而脾必耗腎中之火氣而

腎又曾經邪犯在腎亦自顧不遑母貧而子不忍盜母

之財故邪入於脾而脾甘自受先行惡寒嘔吐不待傳

入少陰而始見此等證候也治法單治太陰脾土而嘔

吐可止然而單治脾而不治腎則腎火不生脾土而惡

寒終不能愈寒既不除而嘔吐仍暫止而不能久止也

辨證錄

卷之一 傷寒

四

方用脾腎兩溫湯人參三錢 白朮五錢 肉桂一錢 巴戟

天三錢 丁香三分 肉豆蔻一枚 芡實三錢 山藥三錢 水

煎服一劑而惡寒止二劑而嘔吐盡除也此方用參朮

以健脾用巴戟天芡實山藥以補腎而又用肉桂丁香

以闢除寒氣旺腎火以生脾土則土氣自溫母旺而子

不貧亦母溫而子不寒也

此症用加味參朮

附薑湯亦神

人參五錢 白朮五錢 肉豆蔻一枚
附子三分 乾薑一錢 水煎服

一冬月傷寒身熱十一日而熱反更盛發厥不寧一日而

三四見人以為邪再傳厥陰也誰知是邪不能傳肝乎夫少陰寒水也邪在少陰未入厥陰何以發厥而見熱症然而此厥乃似熱而非熱也內寒之甚逼陽外見而發厥故不待傳入厥陰之經而先發厥耳症見此等證候本是死證而用藥得宜未必至死仲景夫子未嘗立方者非無方也以灸法神奇示人以艾火灸少陰者正教人不必治厥陰也雖然灸少陰者固易回春而陽藥又安在不可以起死方用回生至神湯人參三兩肉桂三錢白朮二兩生薑汁一合葱十條搗汁同水煎服一劑而厥定再劑而身熱解矣此雖在用參朮之多第不佐之薑葱二汁則不能宣發於外而邪伏於腎中而不得出也惟參朮得薑葱之助導之出外不必走肝而厥反自安矣此治法之巧者

此症亦可用加味

人地湯殊驗

熟地二兩人參一兩白朮一兩附子一錢生薑汁一合水煎調服

一冬月傷寒身熱十二日而熱仍不退不見發厥人以為傷寒至厥陰不發厥而病將退矣誰知傷寒虛極欲厥而不可得乎夫熱深者厥亦深不厥似乎熱之不深矣

然而熱深而發厥者元氣足以鼓之也熱深而不能發厥者元氣不足以充之也傳經至十二日病已入肝而厥不應者非熱之不深乃元氣之甚困也烏可因不厥而即疑其厥陰之不熱乎治法補其肝氣而輔之以解熱之品則厥陰不燥而木氣大舒邪不能留非惟熱解而見厥抑亦邪散而消厥也方用消厥散白芍五錢當歸五錢丹皮三錢生地二錢甘草一錢人參一錢炒黑荆芥三錢炒梔子一錢天花粉二錢水煎服一劑而厥乃發再劑而厥反定矣此方補肝涼血以治傳經之傷寒世無其膽然而肝燥而內熱因虛而厥伏也非滋其肝中之血則熱深者何能外見乎故必補其虛而發厥隨可乘其厥而散熱也人亦可聞吾言而放膽治之矣

此症用增減道

逆散大效

白芍白朮各三錢當歸人參炒黑荆芥白芥子各二錢柴胡一錢甘草五分陳皮神麩各三分水煎服

一冬月傷寒至十二日之後忽然厥發去如死人一樣但心中火熱其四肢如冰有延至三四日而身體不腐者人以為尸厥也誰知是邪火犯心包絡堅閉其氣以守護其心乎夫傷寒傳遍六經未有傳心者也一至傳

此方固是
神效亦因
心中火熱
而致用之
若四肢厥
冷心中僅
見熱則
一點孤陽
不能自主
更用黃連
三錢以清
心中之火
雖有人參
其君若怒
不能相濟
不若少用
黃連以加
其天至稀

心無不死者然而邪得以傳心者亦因包絡之虛力不能障心使邪之竟入也若包絡素無虧損邪雖直搗心宮而膻中膜膈足以相拒然而三陰三陽俱為邪之所傳各各損傷包絡相臣出死力以禦賊號召勤王絕無一應惟有堅閉宮門甘與君王同殉至於各臟腑見君相號令不能宣揚於外自然解體有國亡無主之象所以手足肢體先冷如死灰也此時設有斬圍奪門之將掃蕩羣妖救君相於危亡之候自然外藩響應不必聽旨直召無不歸誠恐後矣然則治法奈何助包絡之氣而加之祛邪之味可返死而回生也方用救心神丹人參一兩黃連三錢菖蒲二錢茯苓五錢白芍一兩半夏三錢附子一分水煎一碗以筆管通於病人喉中只使親人含藥送下無不受者一劑而人之氣甦再劑而心中之大熱自解而四肢手足盡溫矣夫厥症多熱四肢之冷如冰者正心中之熱如火也熱極反為寒顛顛極而人死其實人死而心尚未死此方用人參以固其生氣以黃連清其心中包絡之火邪加附子一分為先鋒加菖蒲為向導引人參黃連突圍而共入於心中又得

恐過治之
何如此亦
自心中不
寒火熱而
也

白芍茯苓半夏平肝而不助火利濕而共消痰則聲援勢盛攻邪尤易也或疑用黃連以清熱是矣何必助之以人參而用人參亦不必如此之多孰知六經傳遍以攻心則臟腑自虛多用黃連而不君之人參則有勇無謀必至斬殺過甚反傷元氣又有主弱臣強之虞矣雖救君於頃刻而不能衛君於崇朝不幾虛用奇兵哉

此症用活心丹甚神

人參一兩黃連三錢菖蒲一錢麥冬生棗仁各五錢南星一錢附子三分良薑五分生薑十片水煎灌服

此方固是
神效亦因
心中火熱
而致用之
若四肢厥
冷心中僅
見熱則
一點孤陽
不能自主
更用黃連
三錢以清
心中之火
雖有人參
其君若怒
不能相濟
不若少用
黃連以加
其天至稀

中寒門

人遇嚴寒之時忽感陰冷直入於腑手足身皆冷面目色青口嘔清水腹中雷鳴胸脇逆滿體寒發顛腹中覺有涼氣一裹直冲而上猝不知人此寒氣直中七腑也夫中寒之病與傷寒之症大相懸絕蓋傷寒之寒由表而入於裏中寒之寒由腑而入於臟雖入腑入臟同是直中之症而治法終有不同也蓋入腑之寒輕於入臟則治腑之寒烏可重於治臟哉惟是腑有七而中腑之藥似宜分別大凡陰寒之中人必乘三焦之寒而先入溫三焦之寒而七腑之寒可盡散也然而三焦之所以寒者又由於胃氣之虛也徒溫三焦之寒而不急補其胃氣則氣虛而不能接續烏能回陽於頃刻乎方用救腑回陽湯人參五錢附子一錢肉桂二錢巴戟天一兩水煎服此方用人參以扶胃氣用肉桂以回陽亦不必更借巴戟天之為君矣不知巴戟天補心腎之火心腎之火旺而三焦之火更旺矣且巴戟天生胃氣而回陽故用之為君尤能統人參附桂同心之將而掃蕩祛除萬剔於撫之中也所以一劑奏功陽回而陰寒立散矣

此症用木桂乾薑湯甚效
白朮一兩肉桂三錢乾薑三錢水煎服

人有嚴冬之時忽感陰寒唇青身冷手足筋脉攣急上吐下瀉心痛腹疼囊縮甲青腰不能俯仰此陰寒中臟之病也夫中臟重於中腑寒氣入於五臟似宜分臟而治然而不必分也但直溫其命門之火則諸臟之寒可以盡散蓋命門為十二經之主主不亡則心君必不為下殿之走主不亡則肝木必不為遊魂之變主不亡則肺金必不為魄散之升主不亡則脾土必不為崩解之阨惟命門既寒而陽氣為陰邪所逼越出於腎外則五臟之神不能獨安各隨陽而俱遁矣然則五臟為寒邪所犯不必治五臟也獨溫其命門而五臟之寒可解雖然命門雖為五臟之主而五臟氣虛大兵到處掃蕩羣妖苟無糧草何以供命此命門宜溫而五臟之氣亦不可不補也方用蕩陰救命湯人參一兩白朮三兩熟地三錢肉桂一錢附子三錢山茱萸二錢茯神三錢水煎服一劑而陽回再劑而全愈何神速乃爾蓋寒入五臟由命門之陽外出一回其陽而寒氣無留於臟矣方中以參朮為君似乎止救心脾二經雖附子肉桂與熟地山

芎同用腎亦在所救之中而肝肺竟置之度外何以能
 斬關直入回陽於頃刻耶不知五臟為寒邪所犯大約
 犯腎之後即便犯脾而後犯心也犯肝肺者無多也故
 專顧心腎與脾經而肝肺已在其內况人參同附子並
 用無經不達又寧有肺肝之不入者乎而且補肝補肺
 之藥無非收斂之劑欲祛邪而使之出不可留邪而使
 之入倘用收斂之味以補肝肺反掣人參附子之手不
 能迅於蕩陰矣此用藥之不雜實有秘義也且腎中水
 火原不相離用桂附大熱之藥以回陽未免腎中乾燥
 與其回陽之後又補腎水以濟陽何如於用火之時而
 先為防微之為得哉吾所以少用熟地山茱於桂附之
 中以制火之橫且火得水而歸源水招火而入宅故能
 奏既濟之勲而無亢炎之失也
 此症用參朮桂附
 加熟地湯亦妙
 人參白朮各一兩附子肉桂
 各二錢熟地五錢水煎服
 一冬月直中陰寒吐瀉交作身發熱者人以為傷寒傳經
 之症也然而雖是傷寒實有分別此乃直中少陰之邪
 而非傳經少陰之邪也夫直中陰經原無身熱之症茲

何以身熱耶此正陽與陰戰乃邪旺而正不肯安於弱
 以致爭鬪而成熱也若傳經少陰之症必至數日後始
 行吐瀉未有初感第一日即身熱而上吐下瀉者故此
 症確是直中而非傳經也直中邪即入裏傳經邪在表
 而入裏本是懸殊不可不察也治法用參附茯苓湯人
 參一兩附子一錢茯苓五錢水煎服一劑而吐瀉止而
 身熱亦退何其效之速乎不知此症原因陽氣之弱不
 勝陰邪之盛故爾發熱吾助其陽氣則陽旺而陰自衰
 况又佐之附子之勇猛突圍破敵則陽氣更盛自然轉
 敗而成功矣且益之茯苓之澹泄分消水氣則胃土得
 安而上下之間無非陽氣之升降陰邪又安能冲决哉
 此症亦可用參苓朮附木加生薑湯
 人參白朮生薑各一兩附子二錢茯苓三錢水煎服
 人有直中陰寒腎經獨受身顛手戰者人以為寒入於骨
 中也誰知是命門火冷不能外拒夫陰寒乎蓋命門為
 十二官之主宰人有此火則生無此火則死火旺則運
 用於一身而手足自溫火衰則力不能通達上下而一
 身皆冷又何能溫熱夫手足耶故命門火旺外來之寒
 邪可以相拒而不敢相犯惟火衰之極而陰寒內逼直

更須辨之
以苦甘滑
者乃寒者
燥者乃熱
也天下往
非有陽症
以苦者亦
身手之
不動耳

入腎宮命門畏寒太盛幾幾乎有不敢同居之勢身顫者難以自主也手戰者難以外衛也治法亟溫補其命門使命門之火足以勝外來之寒則命門之主不弱而後陽氣健旺能通達於上下之間陰消寒散不致侵犯心宮也方用直中陰臟第一方治之附子一錢肉桂二錢丁香一錢白朮二錢水煎服一劑而寒祛身顫手戰皆定也此方盡是陽藥以陽藥而治陰症自是相宜然而至急之症何以少用分兩而成功至神者因火欲外越一助火而火即回宮火因弱而逃自必見強而返火

辨證錄

卷之二 中寒

真元

既歸矣又有餘火以相助則命門大旺毋論足以祛寒而寒邪亦望火而遁也

此症用援命拒寒湯實神

白朮三兩肉桂三錢破故紙三錢杜仲三錢水煎服

人有少陰腎經感中邪氣小腹作痛兩足厥逆人以爲寒邪之直犯於腎也誰知入腎而兼入於小腸之腑乎夫邪既入腎乃入臟也臟重於腑何必辨其邪入於小腸乎然而辨症不清則用藥必然寡效雖腎開竅於二陰又曰腎主大小便腎寒則小腸亦寒治腎則小腸亦愈而終不知小腸之與腎同感寒邪也蓋寒客於小腸則

腎者乃

腹痛而脈不通脈既不通安得兩足之不厥逆乎不可徒認作寒入於腎而不入於小腸也但治法不必治小腸而仍須治腎治腎者溫腎也溫腎即所以溫小腸矣方用止逆湯附子一錢白朮三錢車前子三分吳茱萸五分水煎服一劑而痛除厥止矣此方用附子以祛寒用吳茱萸以通氣加白朮車前利腰膈而消濕雖治小腸而實溫腎宮也腎宮之命門熱而小腸之氣化自行又烏有不通之病乎故不必止而痛除不必轉逆而逆定耳

辨證錄

卷之三 中寒

真元

此症亦可用木桂豆苓湯亦肉桂錢
白朮一兩茯苓三錢肉豆蔻一枚水煎服

人有猝中陰寒身不能動人以爲寒中於脾也誰知仍是寒中於腎乎夫中寒而致手足之不能動已是危症况一身全不能動乎蓋手足冷而不動猶是四圍之病身僵而不動實乃中州之患也人非火不生而火非心火乃腎火也腎火旺而脾土自可運用於無窮腎火衰而脾土難轉輸於不息故腎寒而脾亦寒脾寒而身即不能運動耳所以治法不可徒治脾而必須治腎尤不可統治腎而必須溫腎中之火也方用直中陰臟第二方

腎不成功
而得非
溫命門不
效然信然

治之附子一錢肉桂一錢熟地二錢乾薑一錢水煎服
一劑而身動寒消矣此方用桂附乾薑直搗中堅以迅
掃其寒邪則腎中命門之火勃然粹發而寒邪自去矣
第過用純陽未免偏於太燥益之熟地以佐之陽得陰
而不至耗水豈特相濟有成哉

此症亦可用附桂

薑木加熟地湯

熟地五錢白朮一兩乾薑三錢

肉桂二錢附子三分水煎服

人有猝犯陰寒之氣兩脇痛極至不可受如欲破裂者人

以為寒犯肝也誰知仍是寒犯腎乎夫脇乃肝位犯腎

寒之

中寒

寒

宜病在腎不宜病在肝因腎寒而又畏外寒之侵而腎

之氣乃逃避於肝子之家受創深重而不敢復出也在

肝木因腎水遁入忍見父母之受傷乎自然奮不顧身

怒極而欲戰也兩脇欲破正木鬱難宣之象治法以火

熨其外寒者少濟其一時之急也方宜用寬肝湯救之

人參一兩熟地二兩附子一錢柴胡五分甘草三分肉

桂三錢水煎服一劑而痛定也人見用參附以回陽未

必相疑用熟地以滋陰不能無疑也嗟乎腎氣遁入肝

宮而寒邪必乘勢以逼肝矣肝氣一怯非上走於心必

醫見肝

下走於腎矣走於心則引邪而上犯於心君必有下走
之禍走於腎則引邪而下侵於相位必有同殉之虞故
用參以補心使心不畏邪之犯用熟地以補腎使腎不
畏邪之侵而肝氣瞻顧於子母之間兩無足慮自然并
力以禦寒矣况又益之以助火舒木之品而肝中之鬱
大解故背城一戰而奏捷也倘用此藥而全無一效是
心腎兩絕而肝氣獨存不能生矣

此症用祛寒舒

腸湯亦神

人參五錢肉桂三錢白朮二錢當歸三錢

柴胡五分白朮一兩甘草五分水煎服

寒之

中寒

寒

辨證錄卷之一終

辨證錄卷之二

山陰陳士鏗敬之甫號遠公又號朱華子著述

會稽陶式玉尚白甫號存齋又號 參訂

中風門

人有入室向火一邊熱而一邊寒遂致左頰出汗偶爾出戶為賊風所襲覺右頰拘急口喎於右人以為中風之症也而余以為非中風也乃向火而火逼其熱以併於一邊耳若作風治而中實無風和其氣血而佐之以解火之味則火平而喎斜自正也方用和血息火湯升麻

辨證錄

卷之二 中風

一錢當歸五錢黃芪三錢防風三分秦朮一錢白芷五分桂枝三分天花粉二錢甘草一錢麥冬三錢玄參五錢水煎服一劑輕二劑而喎斜正矣方中以補血補氣為先而佐輔之藥多用陽明之味者何居蓋陽明之脉起於鼻交於頰中循鼻外入上齒中是兩頰與齒正陽明之部位也升麻白芷乃陽明經藥也故用之以引入於齒頰而秦朮能開口噤防風能散風邪桂枝實表而固營衛與歸芪玄麥同用自善通經絡而活臟腑使真有風邪亦於何處存活矧原無大風之犯不過些小之

雖是火逼
逆熱亦由
無血停虛
所致故以
歸芪為君
佐以升麻
提右邊清
氣上升餘
用陽明輔
之自無不
效者也

風乎自然效應如桴鼓也
此症亦可用
偏解散
當歸炒梔子生地各三錢烏藥防風白芷各三分半
夏一錢黃芪茯苓各一錢白芍五錢秦朮一錢水煎服
人有久痢之後一旦昏仆手撒眼瞪小便自遺汗大出不止喉作拽鋸之聲人以為中風之症也而余獨以為不然蓋此病乃下多亡陰陰虛而陽暴絕也本不可救然急灸其氣海之穴而陽氣得續亦有生者雖然陽氣回而不用補氣之藥陽氣隨回而隨絕也方用獨參湯人

辨證錄

卷之二 中風

參三兩附子三分煎湯灌之而人不死矣夫氣海之穴前與丹田相通乃生氣之原也故灸之而陽回非助之以人參則氣回於無何有之鄉而不能生生於無盡徒為接續又何益乎此人參所以為奪命之藥歟
此症亦可用參朮加桂湯
人參二兩白朮二兩肉桂一錢水煎灌服
人有兩手麻木而面亦麻者人以為中風將現之症也誰知乃氣虛而不能運化夫血乎夫頭乃六陽之經而面尤陽之外見也氣旺則陽旺氣衰則陽衰陽旺則氣行夫血而面乃和陽衰則氣滯於血而面乃木矣面既木

辨證錄

風大約皆
從氣虛而
中也麻木
者中之兆
也不補虛
而單防夫
風中鮮不
氣中矣

矣而陽氣之衰可知何能運動於臂指間母怪兩手十
指盡麻也治法宜補其氣之虛通其陽之閉方用助陽
通氣湯人參三錢白朮五錢黃芪五錢防風五分當歸
三錢葳蕤五錢廣木香三分附子二分烏藥二錢麥冬
二錢茯苓三錢天花粉二錢水煎服連服二劑而手之
麻木解矣再服二劑而面之麻木亦解矣更服二劑不
再發此方大補其氣氣旺而血行又何麻木之有

此症亦可用助

氣解麻湯

人參三錢白朮黃芪麥冬各五錢當歸荆芥各二錢
烏藥八分附子一分柴胡八分半夏一錢水煎服

辨證錄

卷之二 中風

三

人有身忽猝倒兩目緊閉昏暈不識人即子孫亦不相識
人以為中風之危症也誰知絕非中風乃心氣之乏絕
乎夫身中未有不痰盛者也痰盛則直走心經而心氣
乏絕則痰涎壅住於膻中而不能開矣雖膻中為心君
之相痰來侵心膻中先受所以障心而使痰之不能入
也然則膻中本衛心以障痰何反壅痰以害心乎不知
心氣既虛而膻中亦虛矣膻中既虛僅可障痰以衛心
力難祛痰以益心也况痰氣過盛犯心甚急膻中堅閉
夫膜膈使痰之不入而心氣因之不通不能上通於大

入膻中
則邪易中
誰知絕無

屬邪耶世
人治風而
死者比比
也請遠公
文可勝痛
笑

背故目緊閉而不識人也治法急補其君相之火而佐
之祛痰之味心氣一通目自開而人自識也方用四君
子湯加減用之人參一兩白朮二兩茯苓三錢附子一
錢竹瀝一合薑汁一合菖蒲三分水煎服一劑而目開
再劑而人識矣此方用參朮以救心氣之絕然非假附
子之力斷不能破圍而直入即用附子而不用竹瀝薑
汁則痰涎間隔恐附子孤軍難於斬殺耳又佐之菖蒲
者借其向導引附子羣藥徑達心宮易施其祛除之力
也

辨證錄

卷之二 中風

四

此症用加味三
生飲亦神效

人參白朮各一兩附子兩星半夏夏菖
蒲遠志各一錢生棗仁三錢水煎服

人有素性好飲兩臂作痛服祛風治痰藥更加麻木痰涎
愈盛體軟筋弛腿膝拘痛口噤語澀頭目暈重口角流
涎身如蟲行搔起白屑人以為中風之症已成也誰知
是脾氣之不足乎凡人後天全藉飲食之補益若飲食
過多反傷脾氣何能受益况酒能散人真氣少飲則益
多飲則損日日貪杯臟腑之間無非糟粕之氣欲真氣
之無傷得乎故體軟筋弛脾虛不能運也痰涎加盛脾

世人中風
者其脾氣
虛寒故一
作風治重
耗胃氣胃
虛而脾益
虛焉得而
不死乎

中風得於
肝木之旺
者居多得
於肝木之
虛者極少
遺公之論
論症之全

虛不能化也腿膝拘痛脾虛不能行也口噤語澀脾虛
氣難接也頭目暈重脾虛氣難升也至於流涎起脣一
則脾虛而不能攝一則脾虛而不能潤也以上諸症總
皆脾氣虧損之故方用六君子湯加味治之人參五錢
白朮一兩甘草一錢半夏二錢陳皮五分附子三分茯
苓三錢連服十劑而愈六君子湯端補脾氣之藥也而
又兼善治痰然非加入附子則不能走經絡而通血脉
或疑白朮太多不知白朮健脾而更善去濕多用始能
利腰膈而升陽氣則陽不下陷而脾得建其運化之功
也

辨證錄

卷之二 中風

五

此症用參朮去

濕湯亦妙

人參白朮各五錢甘草半夏附子各一錢

山藥一兩薏仁三錢砂仁三粒水煎服

人有怒後吐痰胸滿作痛服四物二陳之湯加苓連枳壳
之類杳無一應更加祛風之味反致半身不遂筋漸攣
縮四肢痿軟日晡益甚內熱口乾形體倦怠人以爲風
中於腑也誰知是鬱怒未解肝氣未舒所致本無風症
治風而反爲風藥所損損氣傷血以成似中風之病也
治法必須仍解其鬱怒而佐之補氣補血之劑益陰益

也不可就
此以概治
中風

精之味庶幾可救耳方用舒怒益陰湯熟地一兩當歸
五錢茯苓二錢甘草五分白芍一兩陳皮五分麥冬三
錢丹皮三錢柴胡一錢白朮二錢人參一錢水煎服十
劑而筋不攣縮矣再十劑而四肢不痿軟矣後純用六
味湯大劑煎飲二月而半身皆遂矣此方即逍遙散加
味者也用參熟麥丹於逍遙散中實有妙義蓋逍遙散
爲解鬱之聖藥鬱散而得補則補始有功而方中全在
用白芍至一兩以平肝氣肝平則木不尅土而土有生
氣况又有健脾開胃之品以輔佐而相成所以能反敗
爲功也

辨證錄

卷之二 中風

六

此症用加減逍

遙散亦驗

柴胡二錢白芍五錢白朮當歸生地各三錢

甘草炒梔子半夏各一錢青皮五分水煎服

人有懷抱鬱結筋攣骨痛喉間似有一枚結住不下服烏
藥順氣散等藥口眼歪斜兩臂不能伸舉痰涎愈甚內
熱晡熱人以爲偏枯之漸也誰知是肝木之不舒乎夫
木最喜水木鬱則耗水矣水耗而木更難舒木既不舒
而木中之火又安得而舒乎自然木來尅土而脾胃兩
傷脾熱胃燥內自生風而現風象正不必外來之風入

此方固上
藥而推廣
之也方治
鬱病最佳
不止治金

對症也

始見歪斜之症也治法自必補脾胃之土矣然而徒補脾胃之氣而肝來尅土脾胃仍不舒也必須摠肝以扶脾胃之為得耳方用舒木生土湯白芍五錢茯苓三錢山藥一錢生棗仁二錢遠志一錢甘草五分白木三錢熟地五錢鬱金一錢人參一錢麥冬二錢當歸二錢玄參三錢水煎服此方心脾胃肺肝腎兼治之藥也何以謂之舒木生土湯不知方中雖是兼治之藥而實為專治肝經也治心者不耗肝氣也治腎者所以生肝也治肺者使其不來尅肝也治脾胃者使其不來仇肝也故用羣藥無非滋肝以舒木木舒矣而脾胃有不得其天者乎此舒木生土之名實有微意耳

此症用疏木飲亦佳

柴胡薄荷甘草蒼朮白芥子各一錢白芍五錢茯苓三錢丹皮生地各二錢青皮五分水煎服

有人一時猝倒口吐痰涎發狂號叫自坐自起自立自行目不識人身中發斑數日後變成瘡癩者此謂真正中風蓋其人元氣未虛一時為風邪所中正氣既盛而邪氣又不弱正與邪相戰兩不肯負於是而痰涎生於是而狂叫起心中如焚坐立不安行止不定目不識人內

辨證錄

卷之二十一 中風

七

辨證錄

卷之二十一 中風

八

熱既盛必由內而發於外故紅斑燥爛於皮膚火毒難消於肌肉因變為瘡為癩譬如人家門戶既牢主伯亞旅又健突來強盜劈門而入兩相格鬪因而火攻焚殺反成焦頭爛額之傷矣治法不必助正而惟事祛邪掃蕩賊風而正氣已安方用掃風湯荆芥五錢防風三錢半夏三錢陳皮一錢天花粉一錢五分茯苓三錢黃芩二錢蘇葉一錢水煎服一劑而狂定二劑而痰消三劑而斑化瘡癩亦尋愈矣此等之症萬人中生一者也人亦不知是中風之真症吾獨表而出之使人知真中風之如此而類中風可照症而治之也

此症用排風飲殊效

大黃酒蒸三錢丹皮五錢甘草防風天麻天南星各一錢玄參一兩柴胡三錢黃芩蘇葉荆芥各二錢當歸三錢水煎服

人有素多內熱一旦顛仆目不識人左手不仁人以爲中風之症誰知此乃腎水不足以養肝肝木太燥木自生風而自仆非真中風也若作風治鮮不立亡即作氣虛治亦陽旺而陰愈消非恰中病情之法必須仍補腎水以生肝木則木得其養而左手之不仁可以復愈方用

木自生風 精而不風 情不靜誰 入知之

六味地黃湯加味治之熟地一兩山茱萸五錢山藥四錢茯苓三錢丹皮三錢澤瀉一錢白芍一兩當歸五錢白芥子三錢柴胡一錢水煎服一劑而目能識人四劑而手知痛癢十劑全愈矣夫六味地黃丸料非治中風之藥也今用之以滋其腎水又用芍藥當歸以平其肝木柴胡白芥子以疏通肝氣而消其兩脇之痰水足而木自條達痰去而氣自流通內熱頓除外體自適亦何至左手之不遂哉

此症用潤燥丹亦效

熟地二兩白芍一兩柴胡五分天花粉三錢水煎服

痰證錄

卷之二

中風

有人身忽自倒不能言語口角流涎右手不仁肌膚不知痛癢人以爲氣虛而中風也夫氣虛則有之而中風則未也此病乃心氣既虛不能行氣於胃而胃氣又虛則胃自生熱蒸其津液結爲痰涎壅塞隧道不能行氣於心即堵截其神氣出入之竅故神明昏亂神明無主則舌縱難言廉泉穴開而口角故流涎沫也一身能運者全藉氣以行之今氣既大虛不能行於四肢則手自不仁右手者尤氣之所屬也氣不能行於肌膚則痛癢不知矣此等之症若作風治未有不死者即於補氣之中

氣虛似中
世多利之
治風以成
痰證之不
仁皆由之
通醫病者
從無一悟
尚悔風藥
之多也
之不補乎

加入祛風之藥亦止苟延性命必成半肢之風症矣故半肢之風皆錯治中風而成之也治法宜用六君子湯加入附子治之人參一兩白朮二兩黃芪二兩半夏三錢茯苓五錢甘草一錢附子一錢陳皮一錢水煎服一劑而出聲二劑而痰涎收一連十劑而前症盡愈夫參苓芪朮補氣之聖藥也加入附子則將軍有威令遍達於諸經之內豈獨心胃相通使痰涎之不壅塞乎所以奏功之能神也

此症用釋躁湯亦佳

痰證錄

卷之二

中風

有人無故身倒肉跳心驚口不能言手不能動足不能行痰聲如鼾惟雙目能動者人以爲因痰而中風也嗟乎此痰病而非中風也天下怪病多生於痰而痰病多成於濕痰濕結而不散往往有見鬼神而猝倒者此病之無故身倒亦其一也醫工不知爲痰濕之氣見其倒而即呼爲中風悞矣然則治此病不治痰而治風適足以招風而生變即不治風而惟治痰亦不能消痰而彈災必須大補其氣血氣旺而痰自化血盛而痰自去也方

痰以治
痰化
而風無
風治風
益其氣

此至虛中
其巧而
成拙者也

用十全大補湯人參五錢黃芪一兩當歸五錢白芍三錢
錢茯苓五錢白朮五錢甘草一錢熟地一兩川芎二錢
肉桂二錢水煎服一劑而口能言二劑而心驚肉跳者
止三劑而聲息十劑而手能動足能行矣又二十劑
而氣血重旺一如無病之人此等之症世人皆以風治
多致債事苟不治風而惟治氣血之虛斷不至變生不
測者也或謂補虛則風自出用十全大補之湯而能愈
中風者是也誰知類中風之病絕無風也非必補虛而
風始出耳

辨證錄

卷之二 中風

十一

此症用扶傾

湯亦妙

人參當歸茯苓各五錢半夏二錢附子破故紙各一錢
黃芪麥冬各一兩砂仁三粒白朮五錢水煎服

有人一時猝倒痰涎壅塞汗如雨出手足懈弛不收口不
能言囊縮小便自遺人以爲中風急症誰知是陰陽兩
脫乎此至危之病刻不可緩生死在反掌之間也若作
風治下口立亡必須用三生飲救之人參二兩生附子
一枚生天南星五錢生半夏三錢水煎服一劑而囊縮
伸小便止再劑而口乃能言矣始可別用湯劑也世人
疑三生飲過於猛烈不知病來甚暴非此等斬關奪門

虛脫絕似
中風者辨
得

之藥何能直入臟腑而追其散失之元陽故必投於人
參數兩之中始可奪命於須臾也否則斬關而關不能
開奪門而門不得進惟是關門既開而前藥又不可再
用另用人參一兩白朮二兩茯苓五錢當歸一兩熟地
一兩山茱萸五錢麥冬一兩半夏三錢水煎服方名濟
急丹連服二劑而元氣日旺虛汗不流手足可以運動
而無癱瘓之憂也譬如破城而守內無糧草則士有飢
色全關門大開搬輸挽運而入者皆糗糧米穀則倉廩
既實兵馬有飽騰之氣賊自望風而飛遁矣倘仍用附

辨證錄

卷之二 中風

十二

子南星之屬未免過於酷烈民已歸誠而猶用虎賁之
士逼城搜糧其損傷元氣不又多乎妙在不用附子南
星而反用當歸熟地山茱萸麥冬資陰之品蓋從前斬
關奪門之時未免斬殺太甚搶劫無遺臟腑必有焦枯
之苦今一旦得資財接濟真不啻恩膏之賜矣

此症用救脫

飲亦甚效

人參一兩白朮二兩附子一錢乾
薑半夏各三錢貝母一錢水煎服

有人口眼喎斜身欲顛仆腹中鳴如囊裏漿之聲人以爲
此中風之症內有水濕之氣也而余以爲不然夫水濕

怪病多生
於痰一治
痰而怪病
自除故不
必治風得
其原委也

之氣由於脾氣之虛也脾氣不能運化乎水而水乃停
積不化下不能行必湧而上行矣於是湧於頭而作暈
湧於口眼而為喎斜水氣既在於上則頭重而足輕故
身欲時時顛仆有似乎中風而實非中風也方用分水
止鳴湯人參五錢白朮一兩車前子三錢茯苓一兩肉
桂一錢半夏三錢水煎服連服四劑腹中之鳴止而口
眼亦平復矣此等之症原無風之可祛故不必祛風單
健其脾土之氣而土勝自能制水又虞徒消其膀胱之
水恐水冷不化又補其命門之火以生脾土則土有先
天之氣益足以制其後天之狂瀾大地陽回而溪澗之
水無非春氣薰蒸則膀胱不寒尤能雪消冰解而無阻
隔之嘆下河疏通而上游又何患壅塞而成泛濫之害
哉或曰口眼喎斜實係風症安在水氣而能使之然也
不知水寒則成冰凍口眼處於頭面之間一邊吹寒風
而成喎斜似乎中風然而風在外而不在內也風既在
外不入於腠理之中何必加祛風之劑哉
此症亦可用木苓加桂湯
白朮茯苓各一兩肉桂三錢水煎服
有人猝倒之後致半身不遂人以爲中風而成偏枯也誰

辨證錄

卷之二 中風

十一

偏枯之症
多成於治
中風之得
可勝慨嘆

此等論出
實覺世人
誰知如是
不刊之論
固是論而

惟慢半生
之用藥加
意於補氣
之中兼用
清痰之味
民生之幸
亦不孫之
一顧也倘執
而不悟者
未如之何

知因治中風而成偏枯乎夫中風之症萬人中而間生
一二者也豈可因一時猝倒即認作中風而治風乎此
中原無風邪因氣虛而猝倒大用補氣之藥而少佐以
消痰之味焉有成偏枯之症乎惟其過於祛風以耗其
氣必至右身之不遂或過用祛風以耗其血必至左身
之不遂矣夫猝倒之時本正氣之不能主宰也乃不補
氣而轉虛其氣欲氣之周遍於身何可得乎天下至悞
者謂中風有中經中絡中腑中腑之分也自此言出世
遂信風初中絡不可引之入經風既中經不可引之入
腑風既入腑不可引之入臟於是諸般風藥雜然亂投
而民生不可救藥矣臟腑經絡未嘗有風而必欲強用
風藥成偏枯之症猶其幸也蓋臟腑既無風症即是元
氣未虛之人尚不禁風藥之侵耗况係羸弱之子搖搖
靡定之身乎今不致死亡而成偏枯者亦因其於補正
之中而用祛風之劑故猶存殘喘耳然則已成偏枯之
症其可再用風藥乎方用全身湯人參二兩白朮二兩
茯苓一兩半夏三錢附子三分神麴一錢水煎服連服
四劑而手足能舉矣再用四劑而步履如故身臂皆輕

辨證錄

卷之二 中風

十四

或疑偏枯之病似非急症可比何必大用參朮不知猝倒之後非重用參朮則元氣不能驟復與其日後而多用補劑零星而期久效何若乘其將絕未絕之先急為多用而救之也

此症用全身飲亦妙

人參黃芪各一兩半夏三錢附子一片水煎服

有人猝倒之後遍身不通兩手兩足不收者人以為中風而成癱瘓也不知此乃血虛而氣不順也夫手得血而能握足得血而能步今不能握不能步者正坐於血虛

辨證錄

卷之二 中風

五

耳然而氣血未嘗不相兼而行者使血虛而氣順則氣能生血而血尚足以供手足之用今氣既不順是氣與血有反背之失欲血之蔭手足也何可得乎故不獨手足不收而且一身盡不通也夫手足不收者猶在四隅之疾而一身不通者實腹心之患也此即所謂風非之症也名為風非實無風也方用四物湯加味治之熟地一兩當歸一兩白芍五錢川芎二錢人參二錢半夏二錢黃芪三錢水煎服二劑即知痛癢服十劑即能步履矣再服十劑全愈若作中風治之則風藥必耗樂其血

風邪之症近人鮮知得此藥湯天快

血乾而氣益不順氣既不順而血益加虛必變為廢棄之人矣

此症可用滋血通經湯

當歸熟地各一兩黃芩麥冬各五錢北五味子天花粉秦艽各一錢水煎服

有人猝倒於地奄忽不知人人以為中風之重症也然而非風也乃氣虛而不能接續耳既無口眼之喎斜又無手足之麻木是全無風象若作風治勢必引風入室耳世人謂中風之症必須填塞空竅使風之不能入也今反用風藥以治無風之症安得不開其腠理哉腠理既

辨證錄

卷之二 中風

六

開位府大泄欲風之不入其可得乎夫氣虛而不能接續以致猝倒奄忽而不知人本是風誌之病未嘗內有風也世人不察必欲以中風治之悞矣方用六君子湯治之人參五錢白朮一兩甘草一錢茯苓三錢半夏三錢陳皮一錢水煎服一劑而即能知人二劑全愈蓋不治風而反奏功也

此症用續氣湯亦效

白朮五錢人參白芥子白芍各三錢甘草一錢枳殼三分砂仁一粒水煎服

有一時猝倒狀似中風自汗不止懶於語言人亦以為中

亡陽者似
中風亦無
人遺破

風也誰知亦是氣虛乎夫猝倒已似中風更加自汗此
虛極之症乃亡陽而非中於風也亡陽之症必須參附
以回陽始有生機倘以為中風而用風藥有立亡而已
矣方用參芪歸附湯救之人參一兩黃芪二兩附子三
錢當歸一兩水煎服一劑而自汗止再劑而言語出四
劑而神氣復矣或曰猝倒之後既無五絕之虞不過自
汗多與言語懶耳似乎可以緩治何必藥品之多如此
不知此症看其似輕而實重看其似緩而實急天下初
病易於圖功而久病難於着力况亡陽之症元氣初脫
有根易於重活而無根難於再續故必乘此將亡未亡
之時以大補其氣血實省後日無數之挽回也苟畏藥
品之多因循退縮坐失機宜而不敢多用參芪迨至日
後自劑而不能見效矣

此症亦可用
龜螭神膏

人參黃芪各一兩麥冬五錢北五味蜀漆各
一錢肉桂二錢牡蠣龜膏各三錢水煎服

有人身未猝倒而右手不仁言語蹇澀口中流沫人以爲
半肢風也然而非外來有風乃本氣自病所謂中氣之
病也夫氣何以日中因其似乎中風而又非中風故別

辨證錄

卷之二

七

其名曰中氣其實乃氣虛而非氣中因其氣虛故不中
於左而中於右蓋人身左屬血而右屬氣也惟女子則
右爲血而左爲氣今所言之病乃男子耳男子既右手
之不仁非氣虛而何既是氣虛可不急補其氣乎一補
氣而右手之不仁隨補而隨效也方用至仁丹人參一
兩白朮一兩黃芪一兩茯苓三錢半夏三錢肉桂二錢
薏仁三錢甘草一錢水煎服一服而語言清再服而涎
沫止十服而不仁者愈矣此補氣之妙也或疑既是氣
虛補氣可矣何以必多加消痰之藥豈氣旺而不能攝
水氣盛而不能化水耶至加肉桂以助火不更多事乎
不知氣虛者未有不脾胃寒也脾胃既寒難以運化水
穀不變精而變痰矣故氣虛者痰盛痰即欺氣之虛而
作祟上迷心而旁及於手足故身欲仆而手不仁口吐
涎沫耳乃用參芪以補氣復用苓朮以健土治濕則痰
無可藏之經更加半夏薏仁以逐其已成之痰則未成
痰涎又安能再化哉猶恐脾胃久寒一時難以建功增
入肉桂以補其命門之火則火自生土土旺而氣自鬱
蒸氣有根蒂臟腑無非生氣而經絡皮肉何至有不通

辨證錄

卷之二

八

之患哉

此症亦可用固氣收涎湯

人參一兩白茯苓遠志山藥各三錢半夏二錢麥冬炒棗仁巴戟天各五錢附子三分水煎服

有人身未顛仆左手半邊不仁語言蹇澀口角流涎人亦

以為半肢風也然而此非風也乃血虛之故血不能養

筋脉有似乎中耳夫中氣病速而易於奏功中血病緩

而難於取效蓋中氣陽症中血陰症陽速而陰遲耳方

用生血起廢湯葳蕤二兩熟地一兩山茱萸四錢當歸

一兩茯苓五錢白芥子五錢水煎服一劑而語言清十

辨症錄

卷之二 中風

十五

劑而涎沫止三十劑而不仁者愈矣愈後前方中加人

參三錢黃芪五錢減當歸五錢再服二十劑一如無病

人矣或疑葳蕤之藥過於中和不若用四物湯之流動

雖白芥子能消膜膈之痰然用至五錢未免過多起首

口角流涎自宜多用至於後來似可少減何以始終用

至五錢耶不知血病多痰消痰始能補血況中血之病

血虛之極膜膈之間無非痰也非多用白芥子斷不能

消白芥子消痰而不耗氣且能助補血之藥以生血故

始終之所必需但其力少薄不比半夏貝母之力厚是

血虛似中世人少

以必宜多用而不可少用也四物湯雖是補血之聖藥

而白芍非中血之宜川芎亦過於動故特用葳蕤者以

葳蕤生血而又能起廢同熟地當歸用之尤善建功實

勝於四物湯耳且葳蕤之藥暫用則難於取勝久用則

易於建績以之治緩病實有相宜况多用至二兩其力

更厚用之為君主之藥又相佐得宜故始終任之而攸

利也

此症用益陰生血湯亦佳

熟地一兩茱萸白朮白芍麥冬各五錢人參二錢白芥子三錢五味子五分水煎服

辨症錄

卷之二 中風

十六

有人頭面腫痛口渴心煩一旦猝中手足抽搐言語不出

口眼喎斜人以為中風也誰知是中火也夫火生於木

之中火藉風之力似乎中火即中風也人謂不解其風

則火從何而息嗟乎中火而祛風非所以治火也火所

最惡者水也祛風以息火則火之焰少戢而火之根未

除滋水以救火則火之光自消而火之性盡滅是祛風

以治火不若滋水以治火也况中火之症內實無風用

祛風之藥則毛竅盡開反足以通火之路火之路開而

風反得入之矣火得風之威風恃火之勢本非中風欲

火盛似中世人實多

險似中
前人實無
治法得遺
公之論
積乎也

不變為風症而不可得矣治法貴乎補水而不必用祛

風之藥也方用滅火湯玄參三兩沙參二兩白芥子三

錢茯苓一兩熟地一兩山茱萸五錢麥冬五錢北五味

一錢水煎服一劑而心煩定二劑而口渴除三劑而語

言清四劑而喎斜正十劑而手足不撻搖矣蓋玄參能

消浮遊之火况益之熟地沙參茱萸麥冬五味之類純

是補水添精之味自然水足而火衰何必用風藥以搜

風哉倘於補水之中少加風藥則於補水添精反多牽

制而不能奏功矣或曰不用風藥是矣獨不可用涼藥

以解氛乎不知此火乃虛火而非實火也實火可用寒

涼以直治而虛火斷不可用寒涼以增其怒也况玄參

微寒未嘗不於補中以瀉火何必更用寒涼哉

此症用二冬二皮湯亦妙
麥冬天冬地骨皮丹皮各二兩水煎服

有人一時猝中手足撻搖口眼喎斜然神思則清言語如

故人以爲陽虛中風也而孰知不然夫陽虛猝倒未有

不神昏者也今猝倒而心中明了狀似陽虛而非陽虛

此乃陰虛之中耳夫陰虛非血虛之謂蓋真陰之虛腎

水乾枯不能上滋於心故痰來侵心一時迷亂而猝中

辨證錄

卷二

三

及痰氣既散而心之清如故也作中風治非其治也即

作中氣治亦非治法惟有直補其腎中之陰則精足而

腎自交於心而心之液自流行於各臟腑而諸症目痊

也方用真陰湯熟地四兩山茱萸二兩北五味三錢麥

冬一兩山藥一兩白芥子五錢破故紙一錢牛膝三錢

附子一分水煎服一劑而撻搖除再劑而口眼正一連

十劑而平復如常矣夫熟地山茱萸山藥實填精之聖藥

而麥冬北五味又益肺之仙丹蓋單補腎水恐水不能

速生故又補其肺使肺金以生腎水子母相資更易滋

潤也又慮陰不下降用破故牛膝下行以安於腎宮則

濁陰不致上干而真陰自然既濟矣復加附子一分者

以陰藥太多未免過於膩滯少加附子以行其真陰之

氣非假之以助其火也水得火之氣則水尤易生母怪

其奏功之奇矣

此症用清寧
湯亦效

熟地麥冬各二兩北五味三錢
實巴戟天兔絲子各一兩水煎服

有人平居無恙只覺手足麻木尚無口眼喎斜等症人以

爲風中於內三年後必有暈仆之症矣勸人預服搜風

形按風之
藥通所以
招風前八
亦有言之

順氣等藥以防猝中其論則是而所用之方非也手足麻木乃氣之虛非氣之不順也即氣之不順非風之作祟也人苟中風其來甚暴豈待至三年之後而始發哉然而氣虛能使手足麻木者何故蓋氣一虛即不能化痰痰聚於胸中而氣即不能通於手足也治法於補氣之中而佐以消痰之味則得之矣方用釋麻湯人參一錢當歸三錢黃芪三錢茯苓三錢半夏一錢白芥子一錢陳皮一錢白朮三錢甘草五分附子一分柴胡八分水煎服一連四劑而手足自然不麻木矣倘仍然麻木前方加倍再服四劑未有不愈者蓋麻木於手足此四餘之輕病原不必重治之也今人因不知症所以取效之緩遂疑為重症於是風藥亂投反致變輕為重矣苟知是虛而非風一治虛而風象滅矣何難之有

此症用甚附
湯亦妙

人參茯苓神各三錢白朮黃芪
各五錢附子二分水煎服

有人遍身麻木而身又不顛仆狀似中風然而風則有之而非中也此等之病不可不治風而又不可直治風也不治風則風不能出於軀壳之外直治風則損傷氣血

風而虛
補氣

風又欺氣血之虛反客為主而不肯去必須於補氣補血之中而佐之祛風祛痰之品則氣血不傷而風又易散也方用解縛湯黃芪一兩當歸五錢人參五錢附子一錢白芍五錢葶藶一兩白朮五錢熟地五錢天花粉三錢秦艽三錢羌活一錢水煎服一連四劑身知痛癢矣十劑全愈同一麻木之症何以上條用藥之少而此條用藥之多且重耶蓋上條麻木止在手足尚無風之入體也此條麻木在於遍身是風乘虛而入腑矣原不可同日而語也故上條可以輕治而此條非重治斷難奏效耳

此症用順氣和
血湯亦大佳

當歸三錢白朮五錢黃芪五錢人參二錢附子一
片天麻兩星羌活獨活各五分半夏一錢水煎服

有人天稟甚厚又素好燒酒一時怒氣相激致成口眼喎斜有似中風而未嘗身仆且善飲食其脈洪大有方此非風中乃火盛而肝傷也此等之症在西北人甚多而南人甚少然而治法又不可徒洩火而不養肝血也方用酒蒸大黃二錢柴胡一錢白芍一兩當歸一兩白芥子二錢炒梔子二錢水煎服方名解焚湯用大黃以瀉

其火酒之毒用梔子以洩其肝木之火用二味祛除未
免過於迅利復用芍藥當歸以大補其肝血蓋血足而
火自息也加柴胡白芥子以舒其肝葉之氣而消其膜
膈之痰痰消而肝氣益舒肝氣舒而風象自去倘誤以
為中風也而妄加入麻黃羌活等藥愈祛風而愈動其
火矣或不去滋肝而反去補氣則陽旺而氣盛轉來助
火肝中血燥益足以增添怒氣勢必火亢自焚而成猝
中之症矣

此症亦可用
寬氣湯

辨證錄

卷之二 中風

三

柴胡烏藥秦艽甘草酒蒸大黃各一錢白芍一兩茯苓
各三錢當歸三錢天麻防風各三分天花粉二錢水
煎服

有人猝中之後手足流注疼痛久之則麻痺不仁難以屈
伸人以爲中風之傷以致風濕相搏關節不利也而不
知不然此症實因先有水濕人不知治元虛之衰而反
去祛風利濕以成似中風之症也既因虛而成濕又因
濕而致中不去治元氣之虛尚可治風濕之旺乎然而
風濕既已搏結於一身但去補氣而不去祛風利濕亦
非救悞之道也今用兩利湯白朮五錢茯苓五錢薏仁

風濕相搏
最難治源
兩利湯

一兩人參一錢甘草五分白芍一兩當歸一錢肉桂二
分防風五分半夏一錢水煎服連服四劑而疼痛止再
服十劑而麻痺愈再服十劑而屈伸盡利矣方中補多
於攻用防風以散風而不用澤瀉猪苓以利水蓋因虛
而成風濕既祛其風何可復瀉其水况方中白朮薏仁
未嘗非利水之藥也於補水之中以行其利水之法則
水易流而無阻滯之虞水濕既去而風難獨留故少用
防風以表邪而孤子之風邪無水艱於作浪不必多用
風藥而風無不除也

辨證錄

卷之二 中風

三

此症用至仁湯
亦能收功
白朮黃芪白芍天花粉各三錢茯苓五錢車前子一
錢防風五分甘草五分肉桂三分益智仁五分水煎
服

痺證門

人有兩足牽連作痛腹又微溘人不能寐臥倒足縮而不能伸伸則愈痛者人以為寒濕之成痺也誰知是風寒濕同結於大腸乎夫風入大腸日日大便邪似易下即有濕氣亦可同散何以固結於中而痛形於兩足耶不知寒邪入腹而留於大腸又得風濕相搏每不肯遽散因成爲痺耳治法必去此風寒濕三氣之邪使不留於大腸而痺病可愈然而徒治大腸之邪而風寒濕轉難去也又宜益大腸之氣令氣旺於腸中而轉輸倍速則

濕在肢體
治得甚
寒不凝也
價

藥錄

卷之二 痺證

三

風寒濕亦易祛矣方用逐痺丹人參一錢茯苓五錢肉桂三分升麻五分甘草一錢薏仁一兩神麩五分白朮五錢水煎服一劑而濕去二劑而風寒亦散也此方治濕爲多而治風治寒反輕者蓋水濕最難分消治其難而易者更易况治濕之中不傷元氣則大腸自有傳化之妙力能使風寒隨濕而同解也

此症亦可用薏仁苓朮湯

茯苓白朮各五錢薏仁一兩肉桂三分炒荆芥三錢水煎服

人有嘔吐不寧胸膈飽悶吞酸作痛因而兩足亦痛者人

胃健則風寒濕俱不能侵故稱胃而三邪散也

藥錄

卷之二 痺證

三

特神也

此症亦可用溫胃消濕丹

人參黃芪茯苓神巴戟天各三錢遠志一錢肉桂三分肉豆蔻一枚益智仁甘草防風各五分水煎服

人有心下畏寒作痛腸鳴善驚懶於飲食以手按之如有水聲囁囁人以為水停心下也誰知是風寒濕結於心包絡乎夫水邪犯心則痛風邪乘心則痛寒邪入心則痛是邪無論風寒濕均能成病重則未有不死者今止畏寒作痛而不致有死亡者正心包以障心也然心包既障障心獨當其鋒安得而不痛乎治法自當急祛風

風寒濕入
於小腸而
成痺亦無
入能識

寒濕三者之邪使之母犯心包而心君相安何致心下
之痛哉雖然徒祛風寒濕之邪而不補心包之氣則心
包太弱而外援之師亦多相欺反成覆亡之禍故必補
心包而兼治風寒濕也方用散痺湯巴戟天五錢白木
五錢兔絲子三錢炒棗仁三錢遠志八分山藥五錢蓮
子五錢茯苓三錢甘草三分柴胡一錢半夏一錢水煎
服一劑而驚止二劑而胃氣開三劑而水聲息十劑而
心下之痛安然也此方之藥似乎單治心也然而心包
為心之相臣治心正所以治心包耳譬如君主清明而
相臣供職惟謹自能安反側於頃刻也

藥譜錄

卷之二 痺證

三

此症可用也

散天湯

人參白朮茯苓神巴戟天車前子各三錢
山藥一兩半夏肉桂各一錢水煎服

人有小便艱澀道瀉如淋而下身生疼時而升上有如疝
氣人以為疝或以為淋而不知非也蓋風寒濕入於小
腸之間而成痺耳夫小腸主泄水者也水入小腸何邪
不去乃縮住而不流蓋寒與風作祟也治法必須散小
腸之風寒而濕氣不難去也然而治小腸必宜治膀胱
之為得膀胱利而小腸無不利也雖膀胱亦有痺症而

與小腸之痺正無差別故治小腸之痺必當以治膀胱
者治之耳方用攻痺散車前子三錢茯苓三錢薏仁一
兩肉桂五分木通二錢白朮五錢王不留行一錢水煎
服一連數劑而似淋者不淋似疝者不疝再服數劑而
痛如失也此方利濕而又不耗氣祛寒而風自散所以
為佳何用逐風之品以損傷臟腑哉

此症可用
寄奴湯

白朮一兩茯苓三錢肉桂一錢
柴胡一錢劉寄奴二錢水煎服

藥譜錄

卷之二 痺證

三

人有一身上下盡行作痛有時而止痰氣不清欲嗽不能
咽喉氣悶胸膈飽脹二便艱澀人以為肺氣之不行也
誰知是風寒濕之犯於三焦乎夫三焦主氣而流通於
上中下之間者氣也風寒濕感一邪而氣即不能宣矣
况三邪搏結安能自舒乎母怪清濁二道舉皆閉塞因
而作痛也治法不急祛風寒濕三者之邪則三焦何以
流通哉然三焦不可徑治也治三焦必宜治腎腎氣旺
而下焦之氣始通更宜治肺肺氣肅而上焦之氣始降
尤宜治脾胃脾胃健而中焦之氣始化理肺腎脾胃之
氣而益之散邪之藥則三焦得令而風寒濕不難去也

方用理本湯人參一錢白朮五錢麥冬三錢山藥五錢
芡實五錢巴戟天三錢肉桂一錢桔梗五分貝母五分
白芥子二錢防己三分茯苓三錢菴菹草一錢水煎服
四劑而上中下之氣乃通一身之病盡解再用四劑諸
症全愈此方全去扶肺腎脾胃之氣而輕於祛風寒濕
者正所以理其本也理本而攻標在其內矣况原未嘗
無蕩邪之藥乎故能建功若是之神也

此症亦可用防

桂朮苓散

白朮茯苓防風各五錢巴戟天三錢肉桂一
錢桂枝八分天花粉黃芪各二錢水煎服

下

癩瘡錄

卷之二 癩瘡

三

人有胸背手足腰脊牽連疼痛不定或來或去至頭重不
可舉痰唾稠粘口角流涎臥則喉中有聲人以為此痺
症也宜用控涎丹治之而不知非也夫痺雖合風寒濕
三氣之邪以成然而人之氣血不虛則風寒濕何從而
入風寒濕之入乃乘氣血之虛而侵之也烏可徒治其
邪而不補其正乎控涎丹用甘遂大戟以祛邪而無補
氣補血之藥往往用之以治痺而不能收功反致敗績
者坐此弊也法宜補正而助以祛邪則百戰而百勝矣
方名補正逐邪湯白朮五錢薏仁五錢人參一錢桂枝

三分茯苓一兩白芥子三錢水煎服二劑輕十劑愈白
朮薏仁人參茯苓皆健脾補氣之藥又利水去濕之劑
也雖曰風寒濕合而成痺其內最多者濕也濕在經絡
腸胃之間最難分化逐其濕而風寒正不必治而自散
所以止佐桂枝數分而已足也惟是既用參朮薏苓以
健土而利濕尚何慮痰哉然而風寒濕之邪每藉痰為
奧援故治痺者必治痰今用白芥子膜膈之中痰且盡
消其餘各處之痰有不盡消者乎痰消而風寒濕無可
藏之藪欲聚而作亂已不可得况正氣日旺哉或曰痺
成於氣血之虛治法自宜氣血雙補矣何以方中止用
氣分之藥以益氣絕不用血分之藥以益血也不知氣
旺自能生血且血有形之物補之艱於速生且恐因循
等待有碍生氣之速不若專補其氣而去風去濕去寒
之更捷也

此症亦可用

自適湯

黃芪白芍當歸茯苓各五錢陳皮五分半夏
活甘草各一錢柴胡二錢桔梗五分水煎服

人有肌肉熱極體上如鼠走唇口反裂久則縮入遍身皮
毛盡發紅黑人以爲熱痺也夫風寒濕三者合而成痺

未聞三者之中更添入熱痺之謂此乃熱極生風似乎痺症而實非痺症也治法解其陽明之熱而少散其風則得矣不必更治其濕也至於寒邪尤不必顧蓋寒則不熱而熱則不寒耳方用化炎湯玄參一兩甘菊花五錢麥冬五錢升麻三錢羚羊角鎊五分生地五錢荆芥炒三錢水煎服連服二劑而熱少解再服四劑而諸症盡愈矣方中用玄參菊花生地麥冬解其陽明之火而更退其肺金之炎者以肺主皮毛也然而僅治其胃與肺恐止散其在內之熱而不能散其在外之熱也故又多用升麻荆芥導之出外而不使其內留以亂心君之神明外既清涼而內有不快然者乎至於羚羊角者雖取其散火之毒亦藉其上引而入於唇口之間使縮者不縮而裂者不裂也或謂既是陽明火毒何不用石膏知母寒涼之藥以瀉之不知火熱而外現於皮毛唇口肌肉之處一用大寒大涼之藥則直攻其火必從下泄不能隨升麻荆芥之類而外泄矣故不用石膏知母而用玄參菊花於補中表火之為得也

此症用涼散亦效

辨證錄 卷之二 辨證

茯苓三錢水煎服連服四劑而皮肉溫矣又服四劑而骨髓熱矣再服四劑脚膝之痛去更服四劑而步履無艱難之態矣方中用巴戟天為君補火仍是補水之藥而輔佐之味又彼此得宜不用肉桂當歸之品溫其血分實有意義蓋補氣則生精最速生精既速則溫髓亦速矣若一入血分之藥則沾濡遲滯欲速而不達矣革痹原忌防風使之相畏而相使更復相宜所以同羣而共濟也

辨證錄 卷之二 辨證

茯苓薏仁玄參各五錢甘草升麻各一錢炒荆芥一錢甘菊三錢麥冬三錢天花粉二錢水煎服

人有脚膝疼痛行步艱難自按其皮肉直涼至骨人以為是冷痺也夫痺而曰冷正合風寒濕三者之旨也此等之病雖三邪相合而寒為甚蓋挾北方寒水之勢侵入骨髓乃至陰之寒非至陽之熱不能勝之也然而至陽之熱又慮過於暴虐恐至寒之邪未及祛而至陰之水先已熬乾真水潤而邪水必然汎濫邪水盛而寒風助之何以愈痺哉方用真火湯治之白朮五錢巴戟天一兩附子一錢防風一錢牛膝三錢石斛三錢革薺三錢

筋脉攣急人以為此肝痺之症也夫肝痺是矣而肝之

所以成痺者人知之乎雖風寒濕三者成之然亦氣血

之不足而成之也肝之血不足而濕邪乘之肝之氣不

足而風邪乘之肝之氣血不足而寒邪乘之有此三邪

直入於肝經而後肝之血益虧肝之氣益耗於是肝之

魂不能藏於肝之中乃越出而作驚也肝經既病何能

生心心無血養安能生胃氣哉胃氣不生自難消化飲

食不能消化飲食而強飲強食焉必至吞酸作嘔矣夫

辨證錄

卷之二 痺證

五

布於筋脉則筋脉無所養安得而不拘攣哉然則治法

烏可徒治風寒濕三者之邪而不顧肝經之氣血耶方

用肝痺散人參三錢當歸一兩川芎五錢代赭石末二

錢羌活五分肉桂一錢茯苓五錢酸棗仁一錢丹砂末

五分水煎調丹砂代赭石末同服一劑而驚止二劑而

胸膈不痛肝氣不逆矣再服四劑而吞酸嘔吐之病痊

筋脉亦不攣急矣方中用當歸川芎以生血加入人參

益氣以開血引代赭石去通肝氣以佐川歸之不逮氣

開血通而後邪可引而出矣又加肉桂以辟寒加茯苓

以利濕加羌活以除風則邪自難留而魂自不亂矣所

以益之棗仁丹砂收驚特速也

此症用二木救

痺飲亦效

白朮白芍茯苓神各五錢陳皮肉桂柴胡各一錢

枳壳五分遠志白芥子蒼木各三錢水煎服

人有咳嗽不寧心膈窒塞吐痰不已上氣滿脹不能下通

人為肺痺也肺痺之成於氣虛盡人而不知也夫肺

辨證錄

卷之二 痺證

六

為相傳之官治節出焉統轄一身之氣無經不達無臟

不轉是氣乃肺之充而肺乃氣之主也肺病則氣病而

氣病則肺亦病然則肺痺即氣痺也肺痺既為氣痺治

肺痺者烏可舍氣而不治乎但肺雖主氣而補氣之藥

不能直入於肺也必須補脾胃之氣以生肺氣然而生

肺氣者止有脾胃之土而尅肺者有心焉仇肺者有肝

焉耗肺者有腎焉一臟腑之生不敵眾臟腑之尅此氣

之所以易衰而邪之所以易入也且脾胃之土又能暗

傷肺金蓋飲食入胃必由脾胃之氣以轉入於肺今脾

胃既受風寒濕之邪則邪亦隨脾胃之氣而輸之於肺

而肺乃受傷矣况多怒而肝之氣逆於肺多慾而腎之

氣逆於肺肺氣受傷而風寒濕之邪遂填塞肺竅而成

一第 1023 冊 續修四庫全書 子部 醫家類 6 5E9

痺矣方用肺痺湯治之人參三錢茯苓三錢白朮五錢
白芍五錢蘇葉二錢半夏一錢陳皮一錢枳殼三分黃
連三分肉桂三分神麩五分水煎服連用二劑而咳嗽
安再用二劑而窒塞開矣用十劑而諸症盡愈或謂人
參助氣是矣但多用恐助邪氣何以用之咸宜乎不知
肺氣之虛以成痺非肺氣之實以成痺也人參畏實不
畏虛况又有蘇葉以治風半夏以消濕肉桂以祛寒則
邪何能作祟哉而且白朮茯苓以健脾開胃白芍以平
肝黃連肉桂以交心腎則肺氣自寧自然下降正不必

辨證錄

卷之二 痺證

七

陳皮之助矣

此症可用助

氣散痺湯

甘草半夏乾薑各一錢桔梗茯苓各三錢人參二
錢陳皮紫苑各五分花椒黃芩各三分水煎服

人有下元虛寒復感寒濕腰腎重痛兩足無力人以爲此
腎痺也而腎痺之成非盡由於風寒濕也夫腎雖寒臟
而其中原自有火有火則水不寒而風寒濕無從而入
無奈人過於作強將先天之水日日奔泄水去而火亦
隨流而去使生氣之原竟成爲藏冰之窟火不能敵寒
而寒邪侵之矣寒氣直入於腎宮以邪招邪而風濕又

相因而至則痺症生矣故治痺之法不必去邪惟在補

正補正者補腎中之火也然而火非水不長補火必須

補水但補水恐增其濕濕旺而風寒有黨未必能遽去

爲憂孰知腎水者火中之水也此乃真水而非邪水也

真水衰而邪水始盛真水盛而邪水自衰故補真水而

實足以制邪水也况水中有火何濕不去乎夫最難治

者水邪也水邪既去風寒不治而自散矣方用腎痺湯

白朮一兩山茱萸五錢茯苓五錢薏仁五錢杜仲三錢

肉桂二錢附子五分防己五分石斛二錢地骨皮五錢

藥錄

卷之二 痺證

三

水煎服三劑而腰輕四劑而痛止十劑而兩足有力再

十劑而全愈方中補水之藥少而去濕之藥多然而又

無非補水也於水中補火則火無太炎之患於水中祛

濕則濕無太息之憂寒濕既去而風安得獨留哉方中

又有防己之祛邪故風寒濕盡去也

此症用利氣

丹亦效

白朮人參山藥各一兩附子三錢山茱萸四
錢薏仁五錢破故紙二錢防己三分水煎服

心痛門

蟲性心痛
二般蟲而
痛安方中
妙在不全
若殺蟲又
是補正之
藥所以奇

人有久患心疾時重時輕大約飢則痛重飽則痛輕人以
為寒氣中心也誰知是蟲傷胃腕乎蓋心君寧靜容寒
客熱之氣皆不能到倘寒氣犯心立刻死矣安能久痛
乎凡痛久不愈者皆邪犯心包與胃口耳但邪犯胃與
心包暫痛而不常痛也斷無飢重而飽輕者若蟲蝕則
覓食頭上行而無食以充其飢則其身上攬口齧胃腕
之皮則若心痛而實非心痛也不殺蟲而但止其痛痛
何能止乎方用化蟲定痛丹生地二兩水煎汁二碗入
白微二錢煎汁一碗淘飯食之非吐物如蝦蟆必瀉蟲
如守宮也大凡胃中濕熱人多生蟲飲食倍於尋常皆
易有蟲以此方投之皆能取效不止治心痛之蟲也蓋
生地殺蟲於有形而白微殺蟲於無形合而用之化蟲
最神蟲死而心痛自除非生地白微之能定痛也

此症用草根
粥亦效

棟樹根一兩煎湯二碗入甘草一
錢再煮粥一碗頓食之即止痛

人有一時心痛條痛條已一日而十數遍者飲食無碍晝
夜不安人以爲此蟲也而不知不然夫蟲痛必非一日

痛不可
用補法去
來痛是虛
寒必溫補
始愈

而成豈有無端而一時心痛者乎或曰此火也夫火則
終日痛而必非時痛時止者然則爲何痛乎非火非虫
乃氣虛而微感寒濕之邪邪冲心包而作痛邪不冲心
包而即不痛即古人所云去來痛也痛無補法而獨去
來痛必須用補不補虛而痛不能止然徒用補藥而不
加入祛寒祛痰之味亦不能定痛也方用去來湯人參
三錢茯苓三錢蒼朮三錢白朮五錢甘草二錢川烏二
錢半夏一錢水煎服一劑而痛即止再劑而痛不再發
方中用二朮爲君主最有佳意蓋痛雖由於氣虛畢竟
濕氣之侵心包也二朮去濕而又健脾胃之氣故用之
以佐人參茯苓補氣以利濕則濕去而氣更旺也氣既
旺矣而川烏得直入心包以祛逐其寒邪半夏得行於
中脘而消其敗濁之痰甘草和緩調停於邪正之間以
奏功於眉睫矣

此症用蒼朮參
苓散亦甚效

人參草烏各一錢茯苓蒼朮各三錢
巴戟天一兩水煎服一劑即止痛

人有心痛之極苦不欲生徹夜呼號涕泗滂沱者人以爲
火邪作祟也然致此火邪之犯心者何故乎蓋因肝氣

之鬱而不舒木遂生火以犯心矣夫肝木生心火者也
而何以反致尅心蓋心屬火而火不可極火極反致焚
心往往有自焚而死者故心火太旺火正爲心之所惡
而又得肝木之助火則心不能受必呼號求救於四隣
自然涕淚交垂矣且肝木之火又係鬱火正火順而鬱
火逆尤非心之所喜故入心而心不受然火勢太旺又
不能遏抑偏欲直入於心宮而心包又掩護重重未易
焚燒但肝木之鬱火乃木中之火龍雷之火也每從下
而上冲霹靂之威震開天門火光所至焚林燒木天地

辨證錄

卷之十一 心痛

聖

且爲之動蕩何能止遏哉此肝火之中心所以直受其
害也治法必須瀉肝木之火更須解木氣之鬱而少佐
以安心之劑則心痛自止也方用救痛安心湯白芍一
兩炒梔子三錢甘草一錢柴胡二錢貫仲二錢乳香一
錢沒藥一錢蒼朮三錢水煎服一劑而痛定再劑而全
愈矣白芍柴胡最解肝氣之鬱梔子貫仲最瀉肝火之
暴乳香沒藥最止臟腑之痛而甘草蒼朮和中消濕輔
佐得宜故一劑而奏功也

此症用梔香
飲亦妙

炒梔子荆芥各三錢茯苓五錢甘草乳香末丹
砂末木香末各一錢水煎調服一劑即止痛

人有真正心痛法在不救然用藥得宜亦未嘗不可生也
其症心痛不在胃脘之間亦不在兩脇之處恰在心窩
之中如蟲內咬如蛇內鑽不特用飯不能即飲水亦不
可入手足冰冷面目青紅者是也夫真心痛原有兩症
一寒邪犯心一火邪犯心也寒犯心者乃直中陰經之
病猝不及防一時感之立刻身死死後必有手足盡紫
黑者甚則遍身俱青多非藥食能救以至急而不遑救
也倘家存藥餌用人參一二兩附子三錢急煎救之可

辨證錄

卷之十一 心痛

聖

以望生否則必死若火犯心者其勢雖急而猶緩可以
遠覓藥餌故不可不傳方法以救人也余言前症正火
邪犯心也但同是心疼何以辨其一爲寒而一爲熱蓋
寒邪舌必滑而熱邪舌必燥耳倘辨其爲火熱之心痛
即用救真湯投之炒梔子三錢炙甘草一錢白芍一兩
廣木香末二錢石菖蒲一錢水煎服一劑而痛止矣不
必更用二劑但痛止後必須忍飢一日斷不再發或曰
既是真心痛宜用黃連以直治心火何以不治心而治
肝耶不知肝爲心之母瀉肝木之氣則肝不助火而心

辨證錄
微冰
何難活人

氣自平瀉肝木正善於瀉心火也倘直瀉其心則心必受傷雖暫取效於一時而脾胃不能仰給於心火則生氣遏抑必至中脘虛寒又變成他症矣此黃連之所以不用而反用梔子也

人有患心疼之病百藥治之不效得寒則痛得熱亦痛蓋此症非心痛乃胃痛也寒熱俱能作痛蓋寒與熱不並立寒熱同乘於心胃之間寒欲凌熱而熱不肯相讓熱欲欺寒而寒不肯相安兩相攻戰勢均力敵治心則胃氣受傷治胃則心氣受損所以治寒治熱而兩無一效

辨證錄

卷之二 心痛

聖

也治法宜兩治之以解紛而心痛自愈方用雙治湯附子一錢黃連一錢白芍五錢甘草一錢水煎服一劑而痛立愈用黃連以清心火用附子以祛胃寒用白芍甘草為君使兩家有和解之好蓋芍藥甘草最能入肝平木肝氣既平自然不去尅胃而又去生心調和於心胃之間實有至理非漫然而用之者也

此症亦可用蒼烏煖心丹

白朮一兩白芍二錢茯苓五錢蒼朮三錢川烏一錢肉桂甘艸各五分水煎服下喉即止痛

人有心痛不能忍氣息奄奄服薑湯而少安手按之而能

忍日輕夜重痛陣至時幾不欲生人以爲此寒痛也用熱藥少止片時而仍痛其故何與寒有不同也凡人心君寧靜由於腎氣之通心也腎氣不交於心而寒邪中之心遂不安而痛矣倘徒祛其寒而不補其腎則腎虛而火不能下熱於腎中即腎虛而水不能上交於心內此治心必須治腎而補腎中之火以救心尤必須補腎中之水以救腎也方用補水救火湯熟地一兩山茱萸三錢巴戟天五錢山藥三錢白朮五錢肉桂一錢北五味五分水煎服一劑而痛可止二劑而痛全愈十劑而痛不再發此方視之絕非治心痛之藥而用之治心腎不交之心痛實有奇功蓋腎中水火不交而腎邪直犯於心矣吾補其腎中之水火水得真火以相生火得真水以相養腎中之陰陽既濟則心腎之陰陽又安得有冰炭之乖乎故不必引其上下之相交而腎氣自通於心心氣自降於腎一如夫婦之好合矣邪亦烏能間之

辨證錄

卷之二 心痛

聖

况原無寒邪哉

此症用交濟湯亦佳

白朮蒼朮各五錢肉桂破故紙兔絲子各三錢廣木香甘草各一錢熟地一兩水煎服

脇痛門

脇痛多
肝肝病則
胆亦病必
然之理也

人有兩脇作痛終年累月而不愈者或時而少愈時而作痛病來之時身發寒熱不思飲食人以為此肝經之病也然肝經之所以成病尚未知其故大約得之氣惱者為多因一時拂抑欲怒而不敢一種不平之氣未得暢泄肝氣鬱而胆氣亦鬱不能取決於心中而心中作熱外反變寒寒熱交蒸則肝經之血停住於兩脇而作痛矣倘境遇順適則肝氣少舒其痛不甚及夫聽惡聲值逆境又觸動其從前之怒氣則前病頓興而痛更重矣

辨證錄

卷之二 脇痛

三

治法必須解其怒氣要在平肝方用遣怒丹白芍二兩柴胡一錢甘草一錢乳香末一錢廣木香末一錢白芥子三錢桃仁十粒生地三錢枳殼三分水煎服一劑痛輕四劑痛止十劑病除夫平肝之藥舍白芍實無第二味可代世人不知其功效不敢多用孰知白芍必多用而後能取勝用至二兩則其力倍於尋常自能遍舒其肝氣况助以柴胡之疏泄甘草之調劑桃仁白芥以攻其敗瘀乳香廣木以止其痛疼安得不直搗中堅以解散其敵壘哉

此症亦可用宣

鬱定痛湯

白芍一兩川芎當歸丹皮各三錢柴胡二錢甘草白芥子大黃牛膝炒梔子各一錢水煎服二劑即安

人有橫逆驟加一時大怒叫號罵詈致兩脇大痛而聲啞者人以為怒氣傷肝矣然而其人必素有火性者此等肝脈必洪大而無倫次眼珠必紅口必大渴呼水舌必乾燥而開裂當急用平肝瀉火之藥方能舒其暴怒之氣倘少遲藥餌或藥餌不中其病必觸動其氣有吐血傾盆之患矣急用平怒湯白芍三兩丹皮一兩當歸一兩炒梔子五錢荆芥炒黑五錢天花粉三錢甘草一錢

辨證錄

卷之二 脇痛

四

香附三錢水煎服一劑而氣少舒二劑而氣大平三劑痛如失不必四劑也蓋肝性最急怒則其氣不平用芍藥平其氣也甘草緩其急也肝氣既平而且緩而後可散其氣而瀉其火矣當歸辛以散之也荆芥引而散之也梔子丹皮涼以瀉之也然而徒散其火而火為痰氣所結則散火而未能遽散故又加香附以通其氣加花粉以消其痰君臣佐使無非解紛之妙藥怒氣雖甚有不自知其解而解者矣或疑藥劑太重涼藥過多詎知其人素係有火又加大怒則五臟無非熱氣苟不用大

脇痛不平
肝經非治

劑涼藥何以平其怒而解其火哉

此症用平怒

散亦妙

白芍一兩丹皮一兩當歸五錢炒梔子牛膝各三錢
甘草柴胡廣木香各一錢枳殼八分水煎服一劑輕

愈

人有跌撲之後兩脇脹痛手不可按人以爲瘀血之作祟

也用小柴胡湯加草龍膽青皮等藥而愈次年而左脇

復痛仍以前藥治之不能取效蓋瘀血存於其中積而

不散久而成痛也夫小柴胡乃半表半裏之藥最能入

肝以舒木而脇正肝之部位宜乎取效而不效者以小

辨證錄

卷之二 脇痛

四

柴胡止能消有形之活血而不能散有形之死血也血

活易於流動行氣而瘀滯可通血死難於推移行氣而

沉積不化必用敗血之藥以下死血而痛可除也方用

抵當丸以水蛭虻蟲有形之毒物庶易下有形之死血

耳服一劑必便黑血而愈愈後乃用四物湯加減而調

理之熟地一兩白芍一兩丹皮三錢川芎一錢當歸五

錢三七根末三錢水煎服四物湯補血之劑也既下死

血何以又補其血乎不知血死既久在肝經則肝血已

無生氣若不補其血則肝舍空虛未必不因虛而成痛

丹參去故
血生新血
心可兼用
去死血以
生新血
法

惟補其血則死血方去而新血即生肝氣快樂何至有
再痛之虞乎然則補血可也又加三七根以止血者何
居恐水蛭虻蟲過於下血萬一死血行而活血隨之而
下不徒補無益乎所以於補中止之得補之益而無下
之失始奏萬全之功也

此症亦可用

散瘀湯

水蛭炒黑色爲末一錢當歸五錢丹皮紅花各
五錢甘草一錢生地三錢水煎服一劑即愈

人有右脇大痛腫起如覆杯手不可按按之痛益甚人以
爲肝經之火也誰知是脾火內伏瘀血存注而不散乎

辨證錄

卷之二 脇痛

四

夫脇雖爲肝位而肝必尅脾脾受肝尅則脾亦能隨肝

而作痛然而無形之痛治肝而痛可止有形之痛治脾

而痛始消今痛而作腫正有形之痛也乃瘀血積於脾

中鬱而不舒乘肝部之隙因外腫於右脇耳治法必須

通脾中伏熱而下其瘀血則痛可立除也方用敗瘀止

痛湯大黃三錢桃仁十四粒當歸三錢白芍一兩柴胡

一錢黃連一錢厚朴二錢甘草一錢水煎服一劑而瘀

血下二劑而痛除腫亦盡消此方大黃柴胡黃連同用

能掃瘀去陳開鬱逐火迅速而無留滯之苦然非多用

無形治分
無形治分
肝脾尅是
形多論
痛在脾而
治在肝始
是標本之
法也
右脇腫起
之痛屬脾
痛血熱極
亦能作
人右脇痛
法

熱痛而不
燥此為乾
血痛乃死
症也惟宜
滋陰補血
或亦可愈
便之燥精
益血湯甚
得其治

補水安急
亦奇治也

白芍則肝氣難平而脾中之熱受制於肝正不易散是
病在脾而治仍在肝也

此症用木土兩
平湯亦效

石膏茯苓蒼朮炒梔子各三錢白芍五
錢甘草一錢水煎服一劑輕二劑愈

人有貪色房勞又兼惱怒因而風府脹悶兩脇作痛人以
為色慾損腎怒氣傷肝理常兼治而不知兼治之中尤
當治腎也蓋肝為腎之子腎足而肝氣易平腎虧而肝
血多燥肝惡急補血以制其急不若補水以安其急也
況肝血易生而腎水難生所以肝血不足輕補肝而木

辨證錄

卷之二 痛

辛

得其養矣腎水不足非大用補腎之味則水不能生然
則房勞之後脇痛其虧於精者更多烏可重治肝而輕
治腎哉方用填精益血湯熟地一兩山茱萸五錢白芍
五錢當歸三錢柴胡一錢丹皮二錢沙參三錢茯苓二
錢地骨三錢白朮三錢水煎服一劑而肝氣平二劑而
脇痛止連服十劑全愈此方重於補腎以填精輕於舒
肝以益血治肝腎之中而復去通腰膈之氣腰膈氣利
而兩脇之氣有不同利者乎故精血生而痛亦止耳
此症亦可用水
木兩滋湯

熟地一兩山茱萸山藥各四錢白
芍當歸各五錢甘草一錢水煎服

辨證錄

卷之二 痛

辛

頭痛門

人有頭痛連腦雙目赤紅如破如裂者所謂真正頭痛也

此病一時暴發法在不救蓋邪入腦髓而不得出也雖

然邪在腦不比邪犯心與犯五臟也苟治之得法亦有

生者我今傳一奇方以救世名爲救腦湯辛夷三錢川

芎一兩細辛一錢當歸一兩蔓荊子二錢水煎服一劑

而痛即止細辛蔓荊治頭痛之藥也然不能直入於腦

得辛夷之導引則入之矣但三味皆耗氣之味同川芎

用之雖亦得愈頭痛然而過於辛散邪氣散而真氣亦

辨證錄

卷之二 頭痛

五

散矣故又加入當歸之補氣補血則氣血周通於一身

邪自不能獨留於頭上矣有不頓愈者乎

此症用護首湯亦效

川芎五錢當歸一兩白芷郁李仁天花粉各三錢蔓荊子一錢水煎服一劑效

人有頭痛如破走來走去無一定之位者此飲酒之後當

風而臥風邪乘酒氣之出入而中之也酒氣既散而風

邪不去遂留於太陽之經太陽本上於頭而頭爲諸陽

之首陽邪與陽氣相戰故往來於經絡之間而作痛也

病既得之於酒治法似宜兼治酒矣不知用解酒之藥

飲酒得風 爲酒爲上 祛風之 然而酒氣 最難解也 不若先祛 風以救急

眞頭痛者 未嘗見腦 爲髓厚風 不易入也 魏武之痛 眞頭痛也

酒得頭痛之症必 頭痛而痛

必致轉耗真氣而頭痛愈不能效不若直治風邪能奏

效之速也方用救破湯川芎一兩細辛一錢白芷一錢

水煎服一劑而痛止不必再劑也蓋川芎最止頭痛非

用細辛則不能直上於巔頂非用白芷則不能盡解其

邪氣而遍達於經絡也雖如藥本他藥未嘗不可止痛

然而大傷元氣終遜川芎散中有補之爲得也

此症亦可用芷桂川芎湯

川芎一兩白芷三錢桂枝三分水煎服一劑即止痛

人有頭疼不十分重遇勞遇寒遇熱皆發倘加色慾則頭

辨證錄

卷之二 頭痛

五

岑岑而欲臥矣此乃少年之時不慎酒色又加氣惱而

得之者也人皆以頭痛之藥治之而不愈者何也蓋此

病得之腎勞無腎水以潤肝則肝木之氣燥木中龍雷

之火時時沖擊一身而上升於巔頂故頭痛而且暈也

治法宜大補其腎中之水而少益以補火之品使水足

以制火而火可歸源自然下引而入於腎官火有水養

則龍雷之火安然居腎不再上升而爲頭痛也方用八

味地黃湯加減用之熟地一兩山茱萸五錢山藥五錢

茯苓丹皮澤瀉各三錢川芎一兩肉桂一錢水煎服一

川芎能走 散入其氣

酒得頭痛之症必 頭痛而痛

久服之服
能令人暴
以若用一
兩而服至
十劑惡汗
出不收似
宜少用之

劑而頭輕十劑而全愈然後去川芎而加白芍當歸各
五錢再服二十劑永不再發矣蓋六味湯為補精之聖
藥肉桂為引火歸經之神品川芎治頭痛之靈丹合而
用之所以奏功如响惟是頭痛在上焦補腎中之水火
在下焦也何以治下而上愈且川芎乃陽藥也何以入
之至陰之中偏能取效耶不知腦髓與腎水原自相通
補腎而腎之氣由河車而直入於腦未嘗相格也川芎
雖是陽藥然能補血而走於巔頂既可上於巔頂獨不
可入於腦內乎况加之肉桂以助命門之火同氣相合

辨證錄

卷之二 頭痛

壘

故能同羣共濟使宿疾老邪盡行祛散而腎中水火又
復既濟何至有再冲上焦之患乎十劑之後不再用川
芎者頭痛既痊不可再用以耗真氣故改用白芍當歸
腎肝同治使木氣無乾燥之憂而龍雷之火且永藏於
腎宅尤善後之妙法倘倦服藥湯改湯為丸未為不可
也

此症用五德

飲亦佳

熟地二兩麥冬玄參各一兩川芎五錢肉桂三分水
煎服一劑而火降二劑而痛止連服一月永不再發
人有患半邊頭風者或痛在右或痛在左大約痛於左者

全邊頭風
痛多在左
邊非肝厥
之病而何

為多百藥治之罔效人不知其故此病得之鬱氣不宣
又加風邪襲之於少陽之經遂致半邊頭痛也其病有
時重有時輕大約遇順境則痛輕遇逆境則痛重遇拂
抑之事而更加之風寒之天則大痛而不能出戶痛至
歲久則眼必縮小十年之後必至壞目而不可救藥矣
治法急宜解其肝膽之鬱氣雖風入於少陽之膽似乎
解鬱宜解其膽然而膽與肝為表裏治膽者必須治肝
况鬱氣先傷肝而後傷膽肝舒而膽亦舒也方用散偏
湯白芍五錢川芎一兩郁李仁一錢柴胡一錢白芥子

辨證錄

卷之二 頭痛

壘

三錢香附二錢甘草一錢白芷五分水煎服毋論左右
頭疼一劑即止痛不必多服夫川芎止頭痛者也然而
川芎不單止頭痛同白芍用之尤能平肝之氣以生肝
之血肝之血生而膽汁亦生無乾燥之苦而後郁李仁
白芷用之自能上助川芎以散頭風矣况又益之柴胡
香附以開鬱白芥子以消痰甘草以調和其滯氣則肝
膽盡舒而風於何藏故頭痛頓除也惟是一二劑之後
不可多用者頭痛既久不獨肝膽血虛而五臟六腑之
陰陽盡虛也若單治膽肝以舒鬱未免銷鍊真陰風雖

出於骨髓之外未必不因勞因感而風又入於骨髓之中故以前方奏功之後必須改用補氣補血之劑如八珍湯者治之以為善後之策也

此症亦可用
半解湯

白芍一兩柴胡二錢當歸三錢川芎五錢
甘草一錢蔓荊子一錢半夏一錢水煎服

人有遇春而頭痛者晝夜不得休息昏悶之極惡風惡寒不喜飲食人以為中傷寒風之故而不知非也內經云春氣者病在頭氣弱之人陽氣不能隨春氣而上升於頭故頭痛而昏悶也凡有邪在頭者發汗以散表邪則

辨證錄

卷之二 頭痛

五

頭痛可愈今因氣微而不能上升是無表邪也無邪而發汗則虛其虛矣而清陽之氣益難上升氣既不升則陽虛而勢難外衛故惡風寒氣弱而力難中消故憎飲食耳治法補其陽氣則清氣上升而濁氣下降內無所怯而外亦自固也方用升清固外湯黃芪三錢人參二錢炙甘草五分白朮三錢陳皮三分當歸二錢白芍五錢柴胡一錢蔓荊子一錢川芎一錢天花粉一錢水煎服一劑而痛減再劑而病愈此方即補中益氣之變方去升麻而用柴胡者以柴胡入肝提其木氣也木主春

陽氣內虛
者用芎似
宜少用而
花粉亦可
不必

春氣頭痛
其清惡寒
木之氣以
動之不差

升木以應春氣使不陷於肝中自然清氣上升况參芪歸芍無非補肝氣之藥氣旺而上榮外固又何頭痛之不愈哉

此症亦可用
升陽湯

人參蔓荊子各一錢半夏一錢黃芪二錢白朮五錢
甘草五分白芍川芎各三錢升麻六分白芷三分水煎服四劑愈

人患頭痛雖盛暑大熱之時必以帕蒙其首而頭痛少止苟去其帕少受風寒其痛即發而不可忍人以為風寒已入於腦誰知乃氣血兩虛不能上榮於頭而然夫腦

辨證錄

卷之二 頭痛

五

受風寒藥餌上治甚難用祛風散寒之藥益傷氣血而頭愈痛古人有用生萊菔汁以灌鼻者因鼻竅通腦萊菔善開竅而分清濁故用之而可愈頭風然又不若佐以生薑自然汁為更勝也蓋萊菔祛腦中之風是其所長不能祛腦中之寒二物同用則薑得萊菔而併可祛風萊菔得薑而兼可祛寒也其法用生萊菔汁十分之七生薑汁十分之三和勻令病人口含凉水仰臥以二汁匙挑灌鼻中至不能忍而止必眼淚口涎齊出其痛立止也痛止後用四物湯加羌活藥本甘草數劑調理

二物同用
又勝於古
久之法

斷不再發此等治法實法之至巧者

此症亦可用

爽氣丹

人參三錢白朮甘草黃芪當歸茯苓川芎各一錢
防風荆芥各五分半夏八分水煎服服一月全愈

辨證錄

卷之二 腹痛

五

腹痛門

人有腹痛欲死手按之而更甚此乃火痛也但火痛不同
有胃火有脾火有大小腸火有膀胱火有腎火不可不
辨也胃火者必汗而渴口中臭脾火痛者必走來走去
無一定之處也大腸火者大便必閉結而肛門必乾燥
後重小腸火者小便必閉澀如淋膀胱火者小便閉澀
而若急腎火者則強陽不倒口不渴而面赤水竅澀痛
是也既知火症分明然後因症以治之自然不差然而
各立一方未免過於紛紜我有一方可以共治有火之

火不難治
難於不知
何種之火
也本明示
各經之火
用藥不若
學

辨證錄

卷之二 腹痛

五

腹痛方名導火湯玄參一兩生地五錢車前子三錢甘
草一錢澤瀉二錢水煎服連服二劑而諸痛皆可愈也
夫火之有餘水之不足也玄參生地滋其陰而陽火自
降况又益之車前澤瀉之滑利甘草之調和尤能導火
解氣化有事為無事倘知為胃火而加石膏知為脾火
而加知母知為大腸火而加地榆小腸火而加黃連知
為膀胱火而加滑石知為腎火而加黃柏尤效之極也
人有終日腹痛手按之而寬快飲冷則痛劇此寒痛也不
必分別臟腑皆命門火衰而寒邪留之也蓋命門為一

補火必須
補土外矣
又去制肝
以益土更
妙於補火
也

身之主命門寒而五臟七腑皆寒矣故只宜溫其命門之火為主然命門之火不可獨補必須治兼脾胃火土相合而變化出焉然又不可止治其土蓋土之仇者肝木也命門助土而肝木乘之則脾胃之氣仍為肝制而不能發生必須制肝使木不尅土而後以火生之則脾胃之寒邪既去而陽氣升騰濁陰銷亡於烏有土木無戰尅之憂而腸腹享安寧之樂矣方用制肝益火湯白芍三錢白朮五錢茯苓三錢甘草一錢肉桂一錢肉豆蔻一枚半夏一錢人參三錢水煎服一劑而痛減半再

辨症錄 卷之二 腹痛

五

此症亦可用
消寒飲

白朮人參各五錢肉桂肉豆蔻
甘草各一錢水煎服一劑即止

人有腹痛得食則減遇飢則甚面黃體瘦日加困頓者此腹內生蟲也夫蟲之生也必有其故或因飢食難化之物渴飲寒冷之湯以致久變為蟲者有之若陰陽之氣

發生於腹
實人自生
之也人不自
生蟲以陰
陽何從生
也

旺蟲即生而亦隨滅安能久據於腹而作巢窟哉惟其陰陽之氣衰不能運化於一身而蟲乃生而不死矣其初食物後將飲血而不可止及至飲血而腹痛之病作然則治法烏可單殺蟲而不培其陰陽之氣血乎方用衛生湯人參三錢白朮五錢白朮一錢甘草一錢梔子十枚切片檳榔一錢史君子十箇去壳乾葛一錢水煎服一劑而腹轉痛二劑而腹痛除矣此服藥後而腹痛者拂蟲之意切戒飲茶水一飲茶水止可殺蟲之半而不能盡殺之也故禁食半日則蟲盡化為水從大小便而出方中用人參白朮為君以升其陽氣陽升而蟲不能自安必頭向上而覓食所佐者盡是殺蟲之藥蟲何能久存哉倘一飲茶水則蟲得水而反可死中求活矣雖暫時安貼久則蟲多而痛如故也

辨症錄 卷之二 腹痛

五

此症用逐蟲
丹頗效

白朮茯苓各三錢雷丸甘草檳榔各一錢黃連
五分史君子十箇烏梅一箇水煎服二劑全愈

人有腹痛至急兩脇亦覺脹滿口苦作嘔吞酸欲瀉而又不可得此乃氣痛也用寒藥治之不效熱藥亦不效用補藥亦不效蓋肝木氣鬱下尅脾土土畏木尅而陽氣

辨證錄

不敢升騰因之下行而無可舒泄復轉行於上而作嘔
彼此牽掣而痛無已時也治法必須疏肝氣之滯而又
升騰脾胃之陽氣則土不畏木之侵凌而痛自止也方
用逍遙散加減最妙柴胡一錢白芍五錢白朮一錢甘
草一錢茯苓三錢陳皮一錢當歸二錢神麴一錢水煎
服二劑而痛止矣蓋逍遙散解鬱而此痛又須緩圖不
必更用重劑再服四劑而奏功全矣

此症用蒼白甘草湯亦妙
蒼朮五錢白芍一兩甘草一錢水煎服二劑愈

人多食生冷燔炙之物或難化之品存於腹內作痛手

辨證錄 卷之二 腹痛 李

按之而痛甚者此食積於腸閉結而不得出有燥屎之
故也法宜逐積化滯非下之不可然而下多亡陰不可
不防夫人能食者陽旺也能食而不能化者陰衰也使
陽旺之人何物不能消化焉有停住大腸之理必陰血
不能潤於大腸陽火焚燥而作崇遂致大腸熬乾留食
結為燥屎而不下矣及至燥屎不下則陰陽不通變成
腹痛之楚治宜於滋陰之中而佐以祛逐之味則陰不
傷而食又下也方宜用逐穢丹當歸尾五錢大黃三錢
甘草一錢枳實一錢丹皮三錢水煎服一劑而燥屎下

傷食之人
亦有未成
燥屎而即
作痛者治
法更宜消
食
能食不能
化分陰陽
何其明顯

腹痛頓除不必用二劑也此方用大黃枳實以逐穢加
入當歸丹皮以補血生陰攻補兼施復何患於亡陰哉

此症用利腹
湯亦甚效

大黃三錢當歸五錢枳實山查麥芽厚朴甘草各
一錢桃仁十粒水煎服一劑即通腹亦不痛矣

人有腹痛從右手指冷起漸上至頭如冷水澆灌由上而
下而腹乃大痛既而遍身大熱熱退則痛止或食或不
食或過於食而皆痛也初則一年一發久則一月一發
發久則旬日一發也用四物湯加解鬱之藥不應四
君子湯加消積之藥又不應用二陳湯加消痰破氣和

辨證錄 卷之二 腹痛 李

中之藥復不應人以爲有瘀血存焉誰知是陽氣大虛
乎蓋四肢爲諸陽之末而頭乃諸陽之會陽虛惡寒陰
虛惡熱陽虛而陰來乘之則發寒陰虛而陽往乘之則
發熱今指冷而上至於頭明是陽不能敵陰以失其健
運而痛乃大作痛作而熱者寒極變熱也及其寒熱兩
停陰陽俱衰兩不相鬪故熱止而痛亦止也治法單補
其陽陽旺而陰自衰况陽旺則氣自旺氣旺則血自生
氣血兩旺而陰陽又何致爭戰而作痛哉方用獨參湯
人參一兩加陳皮八分甘草一錢水煎服數劑而痛輕

十劑而痛止矣夫獨參湯乃補氣之藥也仲景夫子曰血虛氣弱以人參補之故用之而止痛也或曰四君子湯亦補氣之劑何以用之而不效蓋四君子有白朮茯苓以分人參之權不若獨參湯之功專而力大况前此兼用消積破氣之藥是為誅伐無過用人參止可救失耳何能成功哉

此症用陰陽和合湯亦效

白朮五錢人參二錢甘草一錢柴胡一錢白芍五錢枳殼五分水煎服二劑全愈

辨證錄

卷之七 腰痛

七

腰痛門

人有兩腰重如帶三千文不能俯仰者夫腰痛不同此病因房勞力役又感風濕而成傷腎之症治須補腎矣然有補腎而腰愈痛者其故何也蓋腰膂之氣未通風濕入於腎而不得出故也法宜先利其腰膂之氣以祛風利濕而後大補其腎中之水火則腰輕而可以俯仰矣方用輕腰湯白朮一兩薏仁一兩茯苓五錢防已五分水煎服連服二劑而腰輕矣此方惟利濕而不治腰又能利腰膂之氣一方而兩治之也然不可多服者以腎宜補而不可瀉防已多用必至過洩腎邪腎已無邪可祛而反損正氣故宜用補腎之藥而前藥不可再用矣方另用三聖湯杜仲一兩白朮五錢山茱萸四錢水煎服此方補腎中之水火而仍利其腰膂者腎氣有可通之路則俯仰之間無非至適也

此症用木桂湯亦神
白朮三兩肉桂三分水煎服二劑全愈不再發

人有動則腰痛自覺其中空虛無着者乃腎虛腰痛也夫腎分水火未可以虛字一言了之經謂諸痛皆屬於火獨腎虛腰痛非火也惟其無火所以痛耳治法似宜單

利腰膂而痛止妙法也

辨證錄

卷之七 腰痛

七

腎火始
能作痛亦
實也

補腎中之火然而火非水不生若徒補火而不補水所
謂無陰不能生陽而痛不可遠止必須於水中補火水
火既濟腎氣足而痛自除此即貞下起元之意也方用
補虛利腰湯熟地一兩杜仲五錢破故紙一錢白朮五
錢水煎服連服四劑自愈熟地補腎水也得白朮則利
腰臍而熟地不膩杜仲破故補火以止腰痛者也得熟
地則潤澤而不至乾燥調劑相宜故取效最捷耳

此症用實腰
湯亦佳

杜仲一兩白朮二兩熟地一兩山茱
黃四錢肉桂一錢水煎服十劑全愈

辨證錄

卷之二 腰痛

奎

人有腰痛日重夜輕小水艱澀飲食如故者人以爲腎經
之虛誰知是膀胱之水閉乎膀胱爲腎之府火盛則水
不能化而水反轉入於腎之中膀胱太陽之經也水火
雖犯腎陰而病終在陽而不在陰若不治膀胱而惟治
腎用補精填水或用添薪益火適足以增其腎氣之旺
陰旺而陽亦旺腎熱而膀胱益熱致水不流而火愈熾
膀胱之火愈熾必更犯於腎宮而腰之痛何能痊乎方
用寬腰湯治之車前子三錢薏仁五錢白朮五錢茯苓
五錢肉桂一分水煎服一劑而膀胱之水大泄二劑而

腰痛頓寬也夫車前茯苓以利膀胱之水薏仁白朮以
利腰臍之氣則膀胱與腎氣內外相通又得肉桂之氣
尤易引腎氣而外達於小腸從陰器而盡洩腰痛有不
速愈哉

此症用木桂加澤瀉湯亦神
白朮一兩澤瀉三錢肉桂五分水煎服一劑即通

人有大病之後腰痛如折久而成爲僂者此乃濕氣入
於腎宮悞服補腎之藥而成之者也夫腰痛明是腎虛
補腎正其所宜何以用補腎填精之藥不受其益而反
受其損乎不知病有不同藥有各異大病之後腰痛如
折者乃脾濕而非腎虛也脾濕當去濕而乃用熟地山
茱一派滋潤之藥雖非剋削之味而濕以加濕正其所
惡故不特無益而反害之也醫工不悟而以爲補腎之
藥尚少用之也益多加其分兩則濕以助濕腰骨河車
之路竟成泛濫之鄉矣欲不成僂不可得也方用起
僂湯薏仁三兩白朮二兩黃芪一兩防風三分附子一
分水煎服日用一劑服一月而腰輕服兩月而腰可伸
矣服三月而全愈此方利濕而又不耗氣氣旺則水濕
自消加入防風附子於芪朮之中有鬼神不測之機相

辨證錄

卷之二 腰痛

奎

以補腎而
反害之以
腎中有邪
邪未去而
藥用補劑
所以至成
廢人倘補
中利濕又
何害哉不
可謂藥不
可補而竟
不用補也
作之人大
病之後而
腰痛者乃
是虛也

無力服補藥之故似宜大補脾腎之陽氣為主

畏而相使建功實奇萬不可疑藥劑之大而少減其品味使廢人不得為全人也

此症用菘木防桂湯亦可

白朮四兩黃芪二兩防已一錢肉桂一錢水煎服十劑輕二十劑愈

人有跌打閃挫以至腰折不能起牀狀似偃僕者人以為此腰痛也而不可作腰痛治然腰已折矣其痛自甚何可不作腰痛治哉或謂腰折而使之接續其中必有瘀血在內宜於補腎補血之中而少加逐瘀活血之藥似未可止補其腎也而不知不然夫腎有補而無瀉加逐

辨證錄

卷之二 腰痛

三

折腰宜補而不宜瀉又不可不

瘀之味必轉傷腎臟矣折腰之痛內傷腎臟而非外傷陰血活血之藥不能入於腎之中皆不可用而必須獨補腎也惟是補腎之劑小用不能成功耳方用續腰湯熟地一觔白朮半觔水大碗數碗煎服一連數劑而腰如舊矣夫熟地原能接骨不止補腎之功白朮善通腰臍之氣氣通則接續更易但必須多用為神耳使加入大黃白芍桃仁紅花之藥則反敗事若恐其腰痛而加杜仲破故胡桃等品轉不能收功矣
人有露宿於星月之下感犯寒濕之氣腰痛不能轉側人

瀉而仍其補腎始能去其邪

以為血凝於少陽膽經也誰知是邪入於骨髓之內乎夫腰乃腎堂至陰之宮也霜露寒濕之氣乃至陰之邪也以至陰之邪而入至陰之絡故搖急而作痛惟是至陰之邪易入而難散蓋腎宜補而不宜瀉散至陰之邪必瀉至陰之真矣然而得其法亦正無難也方用轉腰湯白朮一兩杜仲五錢巴戟天五錢防已五分肉桂一錢蒼朮三錢羌活五分桃仁五粒水煎服一劑而痛輕再劑而痛止也此方以白朮為君者利濕而又通其腰臍之氣得杜仲之相佐則攻中有補而腎氣無虧且益之巴戟肉桂以祛其寒蒼朮防已以消其水更得羌活桃仁逐其瘀而行其滯雖瀉腎而實補腎也至陰之邪既去而至陰之真無傷故能止痛如神耳

辨證錄

卷之二 腰痛

三

此病用木桂防

菘湯亦佳

白朮二兩肉桂三錢防已一錢
菘菴草五錢水煎服十劑見效

辨證錄卷之二終



辨證錄卷之三

山陰陳士鏗敬之甫號遠公文號朱華子著

會稽陶式玉尚甫號存齋又號 參訂

咽喉痛門

人有感冒風寒一時咽喉腫痛其勢甚急變成雙蛾者其症痰涎稠濁口渴呼飲疼痛難當甚則勺水不能入喉此陽火壅阻於咽喉視其勢若重而病實輕也夫陽火者太陽之火也太陽之火即膀胱之火也與腎經之火為表裏膀胱火動而腎經少陰之火即來相助故直冲

辨證錄

卷之三 咽喉

於咽喉之間而肺脾胃三經之火亦復相隨而上升於是借三經之痰涎盡阻塞於咽喉結成火毒而不可解治法似宜連數經治矣然而其本實始於太陽泄膀胱之火而諸經之火自安矣但咽喉之地近於肺太陽既假道於肺經而肺經險要之地即狹路之戰場也安有舍戰場要地不解其圍而先搗其本國者乎所貴有兼治之法也方用破隘湯桔梗三錢甘草二錢柴胡一錢白芍五錢玄參三錢麻黃一錢天花粉三錢山豆根一錢水煎服一劑而咽喉寬再劑而雙蛾盡消矣方中散

太陽之邪者居其二散各經之邪居其五九加意於散肺之邪者由近以散遠也

此症用散蛾

湯亦神效

射干枳殼蘇葉當歸各一錢甘草二錢桔梗三錢天花粉三錢山豆根八分麻黃五分水煎服一劑即愈人有一時喉忽腫大而作痛吐痰如湧口渴求水下喉少快已而又熱呼水咽喉長成雙蛾既大且赤其形宛如雞冠此喉痺之症即俗稱為纏喉風也乃陰陽二火並熾一乃少陽之相火一乃少陰之君火也二火齊發其勢更暴咽喉之管細小火不得遽泄遂遏抑於其間初

辨證錄

卷之三 咽喉

十一

作腫而後成蛾也蛾有二一雙蛾一單蛾也雙蛾生兩毒兩相壅擠中間反留一線之隙可通茶水藥劑尚可下嚥若單蛾則獨自成形成塞住水穀之路往往有勺水不能嚥者藥物既不可嚥又從何路以進藥食哉法宜先用刺法一則刺少商等穴尚欠切近用刀直刺其喉腫之處一分則喉腫必少消可用吹藥以開之吹藥方膽礬一分牛黃一分皂角燒灰末一分麝香三釐冰片一分為絕細末和勻吹入喉中必大吐痰而愈然後用煎劑方名救喉湯射干一錢山豆根二錢玄參一兩

者有人患
五感必須
刺破可以
吹藥乃須
者其體必
不許刺醫
者請以用
小毫針
懸之乃暗
懸針於
頸之內張
其喉而刺

麥冬五錢甘草一錢天花粉三錢水煎服一劑而全愈也若雙蛾不必用刺法竟用此方玄參為君實足以瀉心腎君相之火况佐之豆根射干天花粉之屬以祛邪而消痰則火自歸經而咽喉之間關門肅清矣

此症用兩地湯加減亦神

熟地生地玄參各一兩肉桂三分黃連天花粉各三錢水煎服下喉即愈不必二劑

人有咽喉腫痛日輕夜重喉間亦長成蛾宛如陽症但不甚痛而咽喉之際自覺一線乾燥之至飲水嚥之少快至水入腹而腹又不安吐涎如水甚多將涎投入清水

辨證錄

卷之三 咽喉

三

中即時散化為水人以為此喉痛而生蛾也亦用瀉火之藥不特杳無一驗且反增其重亦有勺水不能下嚥者蓋此症為陰蛾也陰蛾則日輕而夜重若陽蛾則日重而夜輕矣斯少陰腎火下無可藏之地直奔而上炎於咽喉也治法宜大補腎水而加入補火之味以引火歸藏方用引火湯熟地三兩巴戟天一兩茯苓五錢麥冬一兩北五味二錢水煎服一劑而火自下歸咽喉之腫痛全消二劑即全愈方用熟地為君大補其腎水麥冬五味為佐重滋其肺金金水相資子母原有滂沱之

陰蛾治法古人多用附桂此備不用以出

桂附固氣引火歸經之藥然其性大熱從陰道而過藥未入腹而喉先受其熱益增腫痛矣故不用桂附為妙

樂水旺足以制火矣又加入巴戟之溫則水火既濟水趨下而火已有不得不隨之勢更增之茯苓之前導則水火同趨而共安於腎宮不啻有琴瑟之和諧矣何必用桂附大熱之藥以引火歸源乎夫桂附為引火歸源之聖藥胡為棄而不用不知此等之病因水之不足而火乃沸騰今補水而仍用大熱之藥雖曰引火於一時畢竟耗水於日後予所以不用桂附而用巴戟天取其能引火而又能補水則腎中無乾燥之虞而咽喉有清肅之益此巴戟天所以勝桂附也

辨證錄

卷之三 咽喉

四

此症用收火湯亦神效

熟地三兩山茱萸一兩茯苓五錢肉桂三錢水煎一劑探冷服一劑即消

人有咽喉乾燥久而疼痛人以為肺熱之故誰知是腎水之涸竭乎夫肺金生腎水者也肺氣清肅自能下生腎水惟肺氣既虛則肺中津液僅可自養而無如腎水大耗日來取給則剝膚之痛烏能免乎譬如父母未有不養贍其子者而處困窮窘迫之時則無米之炊何能止索飯啼饑之哭倘其子成立自能顧家為父母者不特可以取資而亦可免迫索之苦乃其子又伶仃狼狽不

善謀生則子貧而父母更貧其乾枯之狀不可形容者矣肺腎何獨不然故欲救肺之乾燥必先救腎之枯涸也方用子母兩富湯治之熟地三兩麥冬三兩水煎服一劑而燥少止三劑而痛少止十劑而燥與痛盡去也熟地滋腎救肺子之枯也麥冬滋肺救腎母之涸也上下兩治腎水有潤澤之歡則肺金自無焦焚之迫猶人子無憔悴之色則父母自有安享之愉此肺腎之必須兼治而熟地麥冬所以並用而能出奇也

此症用金水湯亦佳

辨證錄

卷之三

五

熟地山茱萸各一兩天門冬地骨皮丹皮各三錢沙參五錢水煎服

人有生喉癢於咽門之間以致喉癢疼痛者其症必先作癢面紅耳熱而不可忍其後則嚙唾之時時覺乾燥必再加嚙唾而後快久則成形而作痛變為楊梅之紅瘰或痛或癢而為癬矣夫癬必有蟲咽喉之地豈容生蟲世人往往得此病恬不為意到不能治而追悔於失治也不其晚乎此病因腎水之耗以致腎火之冲而肺金又燥清肅之令不行水火無既濟之歡金火有相形之勢兩相戰鬪於關隘之間致成此症治法仍須補腎中

之水而益其肺氣以大滋其化源兼用殺蟲之味以治其癬庶幾正固而邪散而蟲亦可以盡掃也方用化癬神丹玄參一兩麥冬一兩五味子一錢白薇一錢鼠黏子一錢百部三錢甘草一錢紫花二錢白芥子二錢水煎服二劑而疼痛少痊又服四劑而癬中之蟲盡死矣即不可仍用此方另用潤喉湯熟地一兩山茱萸四錢麥冬一兩生地三錢桑白皮三錢甘草一錢貝母一錢薏仁五錢水煎服連服十劑而癢與痛俱除矣方中再加肉桂一錢饑服冷服實為善後之策又萬舉而萬全也蓋從前多用微寒之藥恐致脾胃受傷加入肉桂以補火則水得火而無冰凍之憂土得火而有生發之樂下焦熱而上焦自寒也

此症先用白微湯十劑後可用潤喉湯三十劑亦能奏功

白微湯
白微二錢麥冬三錢款冬花桔梗各三分百部一分貝母五分生地三錢甘草三分水煎湯漱口服日服一劑服十日蟲死

潤喉湯
熟地二兩麥冬一兩甘草一錢白微五分水煎服

一月全愈

人有生長膏梁素耽飲酒勞心過度致咽喉臭痛人以為

冠肺 之理 火助

肺氣之傷誰知是心火太盛移熱於肺乎夫飲酒傷胃
胃氣薰蒸宜乎肺氣之熱矣然而胃火薰肺而胃土實
生肺也故飲酒尚不傷肺惟勞心過度則火起於心而
肺乃受刑矣况胃火助之則火性炎上而咽喉乃成燔
燒之路自然唾涕稠粘口舌乾燥氣腥而臭而痛症乃
成矣蓋心主五臭入肺而腥臭又何疑乎方用解腥丹
甘草二錢桔梗二錢麥冬五錢桑白皮三錢枯苓一錢
天門冬三錢生地三錢貝母五分丹皮三錢水煎服連
服二劑而痛止再服四劑而臭除此方治肺而兼治心
治心而兼治胃者也因膏梁之人其心肺之氣血原虛
不滋益二經之氣血而但瀉其火則胃中之氣血必傷
反增其火熱之焰矣今補肺以涼肺補心以涼心補胃
以清胃而火自退舍不止咽喉之痛而痛自定也

此症用息炎

湯亦可

黃連甘草黃芩各一錢麥冬五錢天冬生地玄參各
三錢紫苑天花粉石膏各二錢竹葉三十片陳皮三
分水煎服

四劑愈

人有咽喉腫痛食不得下身發寒熱頭疼且重大便不通
人以爲熱也誰知是感寒而成之者乎然而人不敢信

爲寒也論理用逍遙散散其寒邪而咽喉之痛即解雖
然人不敢信爲寒以用祛寒之藥獨不可外治以辨其
寒乎法用木通一兩葱十條煎湯浴於火室中如是熱
病身必有汗而咽喉之痛不減也倘是感寒雖湯火大
熱淋洗甚久斷然無汗乃進逍遙散必然得汗而咽喉
之痛立除此法辨寒熱最確不特拘之以治感寒之喉
痛也

此症用紫白

飲亦妙

紫蘇茯苓各三錢半夏一錢陳皮五分
甘草一錢白木二錢水煎服一劑即愈

藥錄

卷之三

七

牙齒痛門

人有牙齒痛甚不可忍涕淚俱出者此乃臟腑之火旺上行於牙齒而作痛也治法不瀉其火則不能取效然火實不同有虛火有實火大約虛火動於臟實火起於腑而實火之中有心包之火有胃火虛火之中有肝火有脾火有肺火有腎火同一齒痛何以別之不知各經在齒牙之間各有部位也兩門牙上下四齒同屬心包也門牙旁上下四齒屬肝也再上下四牙乃胃也再上下四牙乃脾也再上下四牙乃肺也再上下之牙乃腎也

辨證錄

卷之三 牙痛

九

大牙亦屬腎腎經有三牙齒多者貴治病不論多寡總以前數分治之多驗火既有如許之多而治火之法宜分經以治之矣雖然吾實有統治治火之法方用治牙仙丹玄參一兩生地一兩水煎服無論諸火服之均效察其為心包之火加黃連五分察其為肝經之火加炒梔子二錢察其為胃經之火加石膏五錢察其為脾經之火加知母一錢察其為肺經之火加黃芩一錢察其為腎經之火加熟地一兩飲一劑而火輕再劑而火散四劑而平復如故矣夫火既有虛實不同何以一方而均

分經加藥不可不知

治不知火之有餘無非水之不足也我滋其陰則陰陽

之火無不相戢矣况玄參尤能瀉浮遊之火生地亦能止無根之焰二味又瀉中有補故虛實咸宜實治法之巧而得其要者也况又能辨各經之火而加入各經之藥有不取效如神乎或曰火生於風牙齒之疼未有不兼風者治火而不治風恐非妙法不知火旺則生風未聞風大而生火人身苟感風邪則身必發熱斷無風止入牙而獨痛之理况火病而用風藥反增其火熱之勢是止痛而愈添其痛矣或疑膀胱有火肝經有火心經

辨證錄

卷之三 牙痛

十

有火大小腸三焦俱有火何俱遺之而不言不知臟病則腑亦病腑病則臟亦病治臟不必治腑瀉腑不必又瀉臟况膀胱心與三焦大小腸俱不入於齒牙故畧而不談也
此症外治亦可
用畢荒湯
畢撥荒花各二錢水一碗煎半盞漱口即止痛
內治用沙豆湯亦妙
沙參一兩荆芥丹皮各三錢山豆根一錢水煎服二劑即愈
人有多食肥甘齒牙破損而作痛如行來行去者乃虫痛

去痛其外
治其內

也夫齒乃骨之餘其中最堅何能藏虫乎不知過食肥
甘則熱氣在胃胃火日冲於口齒之間而濕氣乘之濕
熱相搏而不散乃虫生於牙矣初則止生一二虫久則
蕃行而多於是蝕損其齒遂致墮落一齒既朽又蝕餘
齒往往有終身之苦者此等之痛必須外治若用內治
之藥未必殺虫而臟腑先受傷矣方用五靈至聖散五
靈脂三錢研絕細末白微三錢細辛五分骨碎補五分
各研為細末先用滾水含漱齒至淨然後用前藥末五
分滾水調如稀糊含漱齒半日至氣急吐出如是者三
次痛止而虫亦死矣斷不再發蓋齒痛原因虫也五靈
脂白微最殺虫於無形加入細辛以散火骨碎補以透
骨引五靈脂白微直進於骨內則虫無可藏盡行勦殺
虫死而痛自止也

牙痛

卷之三

十一

此症用破顏丹亦
可外治甚效

丹砂三分麝香半分木片一分雄黃一錢

為細末將末搽於痛處口吐涎而痛立止

內治亦可用

安寧飲

玄參生地麥冬各五錢白微一錢骨碎
補五錢天門冬三錢木煎服三劑亦愈

人有牙痛日久上下牙牀盡腐爛者至飲食不能用日夜

火牙之痛
必須降火
然則用降
火之藥則
火區不消
時也連公
言是

呼號此乃胃火獨盛有升無降之故也人身之火惟胃
最烈火既升於齒牙而齒牙非藏火之地於是焚燒於
兩頰而牙床紅腫久則腐爛矣似乎亦可用治牙仙丹
加石膏以治之然而其火蘊結可用前方以消弭於無
形今既已潰破腐爛則前方又不可用以其有形難於
補救也方用竹葉石膏湯加減石膏五錢知母二錢半
夏二錢茯苓三錢麥冬三錢竹葉二百片葛根三錢青
蒿五錢水煎服連服四劑而火退腫消矣然後再用治
牙仙丹以收功也石膏湯以瀉胃火用之足矣何加入
葛根青蒿也不知石膏但能降而不能升增入二味則
能引石膏至於齒牙以逐其火而葛根青蒿尤能退胃
中之陰火所以同用之以出奇陰陽之火盡散齒牙之
痛頓除何腐爛之不漸消哉

牙痛

卷之三

十二

此症可用石
母降炎湯

石膏茯苓荆芥炒黑各三錢知母一錢麥冬一兩玄

參一兩甘草一錢升麻五分天花粉三錢水煎服四

劑全愈

人有牙齒疼痛至夜而甚呻吟不臥者此腎火上冲之故
也然腎火乃虛火非實火也若作火盛治之多不能勝

即作虛火治之亦時而效時而不效蓋火盛當作火衰
有餘當認作不足乃下虛寒而上現假熱也人身腎中
不寒則龍雷之火下安於腎宮惟其下寒之甚而水又
無多於是上冲於咽喉而齒牙受之正如龍雷之火至
冬則地下温煖而龍雷皆蟄春氣發動則地底寒冷而
不可蟄乃隨陽氣上升矣至於夜分尤腎水主事水不
能養火而火自遊行於外仍至齒而作祟譬如家寒難
以棲處必居子舍而作威而子又貧乏自然觸動其怒
氣矣治法急大補其腎中之水而益以補火之味引火

辨證錄

卷之三 牙痛

三

歸源則火有水以養之自然快樂而不至於上越矣方
用八味地黃湯加骨碎補治之一劑而痛止再劑而痛
不發也蓋六味地黃湯補其腎水桂附引火以歸於命
門但補水引火之藥不先入齒中則痛之根不能除所
以必用骨碎補以透入齒骨之中而後直達於命門之
內此拔本塞源之妙法耳

此症亦可用

引火湯

熟地二兩生地一兩玄參五錢肉桂三分骨
碎補一錢車前子二錢水煎服二劑即止痛

人有上下齒牙疼痛難忍閉口少輕開口更重人以爲陽

法固神
而動亦

明之胃火也誰知是風閉於陽明太陽二經之間乎此
病得之飲酒之後開口向風而臥風入於齒牙之中留
而不出初小疼而後大痛也論理去其風宜愈而風藥
必耗人元氣因虛以入風又耗其氣則氣愈虛風邪即
欺正氣之怯而不肯出疼終難止也古人有用灸法甚
神灸其肩尖微近骨後縫中小舉臂取之當骨解陷中
灸五壯即差但灸後項必大痛良久乃定而齒疼永不
發也然而人往往有畏灸者可用散風定痛湯治之白
芷三分石膏二錢升麻三分梧桐淚一錢當歸三錢生

辨證錄

卷之三 牙痛

四

地五錢麥冬五錢乾葛一錢天花粉二錢細辛一錢水
煎服一劑輕二劑即愈不必三劑也此方補藥重於風
藥正以風得補而易散也

此症可用

宣揚散

柴胡五分白芍五錢甘草白芷乾葛細辛各一錢
青蒿三錢天花粉三錢石膏二錢水煎服二劑愈

人有上下齒痛甚口吸涼風則暫止閉口則復作人以爲
陽明之火盛也誰知是濕熱壅於上下之齒而不散乎
夫濕在下易散而濕在上難祛蓋治濕不外利小便也
水濕下行其勢順水濕上散其勢逆且濕從下受易於

行濕從上感難於散故濕熱感於齒牙之間散之尤難以飲食之水皆從口入必經齒牙不已濕而重濕乎濕重不散而火且更重矣所以經年累月而痛不能止也治法必須上祛其濕熱又不可單利小便當佐之以風藥則濕得風而燥熱得風而涼濕熱一解而齒痛自愈矣方用上下兩疏湯茯苓五錢白朮三錢澤瀉二錢薏仁五錢防風五分白芷三分升麻三分荆芥二錢梧桐淚五分甘草一錢水煎服四劑而濕熱盡解而風亦盡散也蓋茯苓白朮澤瀉薏仁原是上下分水之神藥又得防風白芷升麻荆芥風藥以祛風夫風能散濕兼能散火風火既散則濕邪無黨安能獨留於牙齒之間耶仍恐邪難竟去故加入甘草梧桐淚引入齒縫之中使濕無些須之留又何痛之不止耶况甘草緩以和之自不至相襍而相犯也

癩症錄

卷之三 牙痛

五

口舌門

有婦人產子舌出不能收人以爲舌脹也誰知是難產心驚之故乎夫舌乃心之苗心氣安而舌安心氣病而舌病產子而胞胎已破子不能產欲顧子而母命恐亡欲全母而子命難保其心中驚恐自必異於常時心氣既動心火必不寧矣胎胞之系原通於心用力產子而心爲之懼故子下而舌亦出也舌出不收心氣過升之故治法必須降氣爲主古人有以恐勝之者然舌出由於心驚復因驚以增其恐吾恐愈傷心氣矣雖舌驟收未必不隨收而隨出也故降氣必須補心而不可增其恐方用助氣鎮心丹人參三錢茯苓二錢菖蒲五分硃砂一錢不可火製五味子一錢水煎含漱久之然後嚥下一劑即收二劑全愈此方用硃砂以鎮心又得人參以生氣氣旺則火自歸心火歸而焰息舌亦隨焰而自收矣何必增其恐懼而氣始下哉

此症亦可用

救舌神丹

人參一兩五味子一錢麥冬二錢附子心片
菖蒲良薑各三分水煎含漱嚥下一劑即收

人有舌下牽強手六指次指不仁兩臂麻木或大便閉結

癩症錄

卷之三 口舌

六

氣引玄參以解腦之火加柴胡梔子以舒膽中之鬱熱則膽不來助火而自受補氣之益也然不去止鼻中之涕者清腦中之火益腦中之氣正所以止之也蓋鼻中原無涕遏抑上游出涕之源何必截下流之水乎此治法之神耳或疑當歸過於多用不知腦髓盡出不大補則腦之氣不生辛夷耗散之物非可常用也故乘其引導大用當歸以補腦添精不必日後之再用倘後日減去辛夷即重用當歸無益矣此用藥先後之機又不可不識也人疑當歸之不可多用者不過嫌其性滑有妨於脾耳誰知腦髓直流之人必髓不能化精者也精不能化則精必少精少則不能分布於大腸必有乾燥之苦然則用當歸以潤之正其所喜何慮之有

此症用探淵丹亦能奏功

辛夷一錢當歸五錢麥冬二兩茯苓三錢黃芩二錢白芍一兩天花粉三錢生地五錢桔梗二錢水煎服

四劑全愈

人有鼻流清涕經年不愈是肺氣虛寒非腦漏也夫腦漏即鼻淵也原有寒熱二症不止膽熱而成之也然同是鼻淵而寒熱何以分乎蓋涕臭者熱也涕清而不臭者

辨證錄

卷之三 鼻淵

九

辨證錄

卷之三 鼻淵

十

寒也熱屬實熱寒屬虛寒茲但流清涕而不腥臭正虛寒之病也熱症宜用清涼之藥寒症宜用溫和之劑倘藥用散而不用補則損傷肺氣而肺金益寒愈流清涕矣方用溫肺止流丹呵子一錢甘草一錢桔梗三錢石首魚腦骨五錢煨過存性為末荆芥五分細辛五分人參五分水煎調服一劑即止流矣不必再服也此方氣味溫和自能煖肺而性又帶散更能祛邪故奏功如神或謂石首腦骨古人以治內熱之鼻淵是為寒物何用之以治寒症之鼻淵耶不知鼻淵實有寒熱二症而石首腦骨寒熱二症皆能治之但熱症之涕通於腦寒症之涕出於肺我用羣藥皆入肺之藥也無非溫和之味肺既寒涼得溫和而自解復得石首腦骨佐之以截腦中之路則腦氣不下陷而肺氣更閉矣所以一劑而止流也

人有鼻塞不通濁涕稠黏已經數年皆以為鼻淵而火結於腦也誰知是肺經鬱火不宜有似於鼻淵而非鼻淵乎夫鬱病五臟皆有不獨肝木一經之能鬱也內經曰諸氣廣鬱皆屬於肺肺氣鬱則氣不通而鼻乃肺經之

門戶故肺氣不通而鼻之氣亦不通也難經曰肺熱甚則出涕肺本清虛之府最惡者熱也肺熱則肺氣必粗而肺中之液必上沸而結為涕熱甚則涕黃熱極則涕濁敗濁之物豈容於清虛之府自必從鼻之門戶而出矣方用逍遙散加味治之柴胡二錢當歸三錢白木二錢陳皮五分甘草一錢黃芩一錢茯苓二錢白芍三錢白芷一錢桔梗三錢半夏一錢水煎服一劑輕二劑又輕連服八劑全愈此方治肝木之鬱者也何以治肺鬱而亦效不知道逍遙散善治五鬱非獨治肝經一部之鬱已也况佐之桔梗散肺之邪加之黃芩瀉肺之熱且引羣藥直入肺經何鬱之不宣乎故壅塞通稠濁化也

此症用宣肺散亦佳

柴胡黃芩紫苑各二錢白芍一兩當歸麥冬各五錢茯苓白芥子各三錢甘草款冬花各一錢紫蘇一錢辛夷五分水煎服四劑愈

辨證錄

卷之三

三

耳痛門

附耳聾

人有雙耳忽然腫痛內流清水久則變為膿血者身發寒熱耳內如沸湯之響或如蟬鳴此少陽膽氣不舒而風邪乘之火不得散故生此病法宜舒發膽氣而佐之祛風瀉火之藥則愈矣然有治之而不效者何也蓋膽受風火之邪燥乾膽汁徒用祛風瀉火之湯則膽汁愈乾膽火益熾火借風威愈肆焚燒而耳病轉甚矣方用潤膽湯白芍一兩當歸一兩柴胡一錢炒梔子二錢玄參一兩天花粉三錢菖蒲八分水煎服一劑而痛輕二劑而腫消三劑而膿血止四劑而寒熱盡除十劑而全痊也歸芍不特入膽而且入肝也膽病肝必病平肝則膽亦平也柴胡梔子亦是舒肝之藥舒肝正所以舒膽肝血自旺而膽汁有不濡潤者乎邪風邪火已有不治自散之機乃加天花粉之逐痰則風火無黨用菖蒲通耳中之竅引玄參以退浮遊之焰自然風火漸祛上焦清涼而耳病隨愈也

此症用止鳴丹亦效

白芍五錢柴胡二錢炒梔子三錢生地三錢麥冬三錢菖蒲五分茯苓三錢半夏五分水煎服數劑即愈

老人耳聾
者虛火
作補水
之法實
難之法也

人有耳中如針之觸而生痛者並無水生止有聲沸皆云
火邪作祟不知乃腎水之耗也夫腎開竅於耳腎氣不
足則耳閉然耳閉之前必痛而後閉何也蓋腎火冲之
也火冲而不得出則火之路塞而不通於懸火不再走
於耳而成聾矣但火既上冲於耳而火之路何以致塞
蓋火邪上冲耳竅之內如有物塞之狀故此等之病必
須速治否則成聾而難治矣方用益水平火湯熟地一
兩生地一兩麥冬一兩玄參一兩菖蒲一錢水煎服一
劑而痛止二劑而響息三劑而全愈而耳不再聾也四
辨證錄 卷之三 耳痛 三

味乃補水之藥又能於水中瀉火且不損傷腎氣則腎
火自降菖蒲引腎氣而上通火得路而上達又何有阻
抑之虞乎此等之病老人最多老人耳聾雖高壽之徵
似可不必施治不知已成之聾不必治未成之聾正不
可不治也此方治已聾者尚有奇功矧治未聾之耳有
不取效者哉
此症亦可用
息沸湯
熟地二兩山茱萸一兩麥冬五錢北五味十粒
菖蒲一錢遠志五分丹參三錢水煎服十劑愈
人有耳痛之後雖愈而耳鳴如故者人以爲風火猶在耳

此症耳聾
亦宜補陰
藥是萬全
治法

補腎以治
耳人易知
補心以治
耳人難識
也按腎爲

也乃用祛風散火之藥而鳴且更甚然以手按其耳則
其鳴少息此乃陽虛而氣閉也法宜補陽氣爲主而兼
理其肝腎之虛方用發陽通陰湯治之人參二錢茯苓
三錢白朮二錢黃芪三錢肉桂五分熟地五錢當歸二
錢白芍三錢柴胡一錢甘草五分白芥子二錢荆芥炒
黑一錢水煎服一劑輕二劑愈不必三劑也此方即十
全大補之變方也治氣血之虛者實有相宜茲何治陽
虛而亦宜也不知陽虛而陰未有不俱虛者倘單補陽
虛以助其陽恐陽旺陰衰轉動其火不若兼補其陰則
陰足以制陽陰陽相濟而彼此氣通燁燁之聲頓除也
辨證錄 卷之三 耳痛 三

此症可用
開閉丹
黃芪一兩當歸五錢肉桂甘草各五分菖蒲遠志
柴胡香附各一錢天花粉二錢水煎服二劑愈
人有雙耳聾閉雷霆喧呼之聲終不相聞而耳內不痛此
大病之後或年老人有之乃腎火內閉而氣塞也最難
取效法當內外兼治內治必須大補心腎雖耳屬腎而
非心氣之相通則心腎不交反致阻塞故必用補腎之
藥使腎之液滋於心即宜用補心之劑使心之氣降於
腎心腎之氣既交自然上升而通於耳矣方用啓竅湯

耳聾之症
心氣耳竅
之塞主客
相逐自無
閉塞

熟地二兩山茱萸一兩麥冬一兩遠志三錢五味子二錢石菖蒲一錢炒棗仁三錢茯神三錢栝子仁三錢水煎服一連四服而耳中必然作響此欲開聲之兆也再照前方服十劑而外用龍骨一分雄鼠胆汁一枚麝香一厘冰片三厘研絕細末為丸分作三丸綿裹塞之不可取出一晝夜即通矣神效之極耳通後仍用前湯再服一月後用大劑六味丸以為善後之計否則恐不能久聰也

此症用通耳湯亦妙

辨證錄

卷之三 耳痛

三五

熟地三兩麥冬一兩炒棗仁茯神各五錢菖蒲一錢栝子仁炒黑荆芥各三錢水煎服十劑自通

人有平居無事忽然耳聞風雨之聲或如鼓角之響人為腎火之盛也誰知是心火之亢極乎凡人心腎兩交治能上下清寧以司視聽腎不交心與心不交腎皆能使聽聞之亂然而腎欲上交於心與心欲下交於腎必彼此能受始慶相安倘腎火大旺則心畏腎炎而不敢下交心火過盛則腎畏心焰而不敢上交矣二者均能使兩耳之鳴但心不交腎耳鳴輕腎不交心耳鳴重今如聞風雨鼓角者鳴之重也治法欲腎氣復歸於心必

須使心氣仍歸於腎方用兩歸湯麥冬一兩黃連二錢生棗仁五錢熟地一兩丹參三錢茯神三錢水煎服二劑而鳴止四劑不再發此方涼心之劑也心既清涼則腎不畏心熱而樂與來歸原不必兩相引而始合也况方中全是益心滋腎之品不特心無過燥之虞而且腎有滋潤之樂自不啻如夫婦同心有魚水之歡而無乖離之感也又何至喧闐於一室哉

此症可用定喧湯

玄參三兩生地一兩貝母二錢水煎服一劑即止鳴

人有不交感而兩耳無恙一交接婦女耳中作痛或癢發

辨證錄

卷之三 耳痛

三五

不已或流臭水以涼物投入則快甚人以為腎火之盛誰知是腎火之虛乎夫腎中之火乃龍雷之火也火旺則難動而易息火衰則易動而難息其故何哉蓋火旺者水旺也火衰者水衰也水衰則不能制火而火易動水衰則不能養火而火難息耳故補水必須補火補火而水乃生亦補火必須補水補水而火乃盛二者原兩相制而兩相成也腎開竅於耳腎之水虛則腎之火亦虛矣耳之癢痛作於交感之後正顯其腎中水火之虛也治法必須補腎中之火而火不可獨補必須於水中

補之方用加減八味丸湯熱地一兩山茱萸五錢丹皮五錢澤瀉二錢茯苓三錢山藥五錢麥冬五錢北五味一錢肉桂二錢水煎服一劑而痛輕再劑而痛止三劑癢亦止四劑而水不出也十劑全愈此方補火而亦補水而補水多於補火者以火不可過旺也水旺於火而火有安寧之樂火引於水之中水資於火之內則火不至易動而難息又何致上騰於耳門作痛作癢而出水哉

此症用補陰制火湯亦妙

辨證錄

卷之三耳痛

三

熟地二兩山茱萸芡實各一兩肉桂一錢水煎服十劑全愈

婦人有因怒發熱經來之時兩耳出膿兩太陽作痛乳房脹悶寒熱往來小便不利臍下滿築此是肝氣之逆火盛血虧也夫腎雖開竅於耳耳病宜責之腎然而肝為腎之子腎氣既通於耳則肝之氣未嘗不可相通者子隨母之象也况肝藏血怒則血不能藏矣經來之時宜血隨經而下行不宜藏於經絡而作痛滿脹悶也不知肝喜疏泄怒則氣逆而上奔氣既上逆而血又何肯順行於下而為經乎勢必散走於經絡而不得泄則火隨

鬱勃之氣而上冲兩耳之間乃化為膿水而流出於腎母之竅矣太陽者膀胱之位也腎與膀胱為表裏肝走腎之竅獨不可走膀胱之路乎小便不利正肝氣之乘膀胱也腎之氣通於腰臍臍下滿築者正肝氣之乘腎也至於乳房脹悶尤肝逆之明驗以兩脇屬肝之部位而乳房乃兩脇之際也治法宜舒肝氣而使之順不必治耳而耳自愈也方用加味道遙散白芍一兩柴胡二錢當歸一兩甘草一錢陳皮一錢茯苓神三錢白朮五錢炒梔子一錢天花粉二錢枳殼五分丹皮三錢水煎服

辨證錄

卷之三耳痛

三

此症用莫愁湯亦神

白芍生地各五錢當歸一兩炒梔子天花粉香附各二錢甘草蒼朮各一錢炒荆芥三錢枳殼五分水煎服一劑輕二劑愈

目痛門

人有目痛如刺觸兩角多眵羞明畏日兩泡浮腫淚溼不
 已此肝木風火作祟而脾胃之氣不能升騰故耳人生
 後天以脾胃為主脾胃一受肝木之制則土氣遏抑津
 液乾涸於是木無所養而乾枯風又襲之則木更加燥
 眼目肝之竅也肝中無非風火之氣而自欲清涼得乎
 惟是肝經既燥而目偏生淚何哉蓋腎氣救之耳肝為
 腎之子肝子為風火之邪所困燃眉之禍必求救於腎
 母而腎痛其子必以水濟之然而風火未除所濟之水
 與風火相戰腎欲養木而不能肝欲得水而不敢於是
 目不得水之益而反得水之損矣然而水終為木之所
 喜而火終為木之所畏日為陽火燈為陰火故兩忌之
 治法自當以祛風滅火為先然而徒治風火而不用和
 解之法則風不易散而火不易息也方用息氛湯柴胡
 二錢當歸三錢白芍三錢天花粉二錢白蒺藜三錢蔓
 荊子一錢甘菊花三錢草決明一錢炒梔子三錢白茯
 苓三錢水煎服二劑而火退再服二劑而羞明畏日之
 症除再服二劑諸症盡愈也此方瀉肝木之風火而又

辨證錄

卷之三 目痛

三

善調脾胃之氣更佐之治目退翳之品真和解得宜也

此症柴劑
飲亦妙

柴胡薄荷荆芥甘菊各一錢甘草三分茯苓三錢白
 芍四錢白蒺藜草決明炒梔子各二錢密蒙花半夏
 各五分水煎
 服四劑愈

人有目痛既久終年累歲而紅赤不除致生努肉扳睛拳
 毛倒睫者乃悞治之故也大凡目疾初痛則為邪盛目
 疾久痛則為正虛正虛而悞以邪盛之法治之則變為
 此症矣世人不悟動以外治不知內病未痊而用外治
 之劫藥鮮不受其害者我今特傳一方凡有努肉扳睛
 拳毛倒睫者服之無不漸愈但不能取效神速也蓋眼
 既經悞治而成斯病其由來者非一日用藥何能責其
 近功乎方名磨翳丹葳蕤一觔甘菊花一觔當歸一觔
 白芍一觔陳皮二兩柴胡三兩同州蒺藜一觔白芥子
 四兩茯神半觔各為末蜜為丸每日早晚白滾水送下
 各五錢服一料全愈此方用攻於補之中不治風而風
 息不治火而火亡不治努肉而努肉自消不去拳毛而
 拳毛自去萬勿視為平平無奇而不知奇寓於平之中
 也

辨證錄

卷之三 目痛

三

此症用加減道
遙散亦佳

白芍當歸各一兩甘草白茯苓薤仁各一錢陳皮五分
分茯苓三錢甘菊三錢柴胡半夏各三分水煎服三
愈月

人有目痛後迎風流淚至夜則目暗不明一見燈光兩目
乾澇此乃少年時斲喪元陽又加時眼不守色戒以致
傷損大眇故皆孔不閉風寒透入其孔內氣既虛外邪
難杜故爾出淚也夫淚生於心大眇正心之竅也傷心
則淚出傷大眇而亦淚出者正見內外之關切傷大眇
卽傷心也然則欲止大眇之淚安可不急補其心乎而
辨證錄 卷之三 目痛

徒補心亦正無益必須兼腎與肝而治之使腎水生肝
木而肝木更能補心也方用固根湯薤蕤一兩當歸五
錢白芍五錢熟地一兩麥冬五錢甘菊三錢菖蒲三分
柴胡五分水煎服連服四劑卽不畏風再服四劑見風
不流淚矣再服十劑全愈蓋薤蕤最善止淚加之當歸
白芍以補肝熟地以滋腎益之麥冬以補心佐之甘菊
菖蒲柴胡以舒其風火而引諸經之藥以塞其淚竅此
固其根本而未症自愈也

此症用養目
湯亦效

當歸熟地薤蕤白芍各五錢山萸茯苓麥冬白朮丹
皮枸杞各三錢巴戟天二錢柴胡三分水煎服十劑
全愈

人有患時眼之後其目不痛而色淡紅然羞明惡日與目
痛時無異此乃內傷之目人誤作實火治之又加不慎
色慾故爾如此若再作風火治之必有失明之悲必須
大補肝腎使水旺以生肝木旺以祛風則目得液以相
養而虛火盡散也方用養目湯熟地一兩白芍五錢麥
冬五錢當歸一兩薤蕤五錢山萸茯苓四錢北五味一錢
甘草一錢甘菊花二錢柴胡五分水煎服二劑而目明
辨證錄 卷之三 目痛

又二劑而羞明之症痊更四劑而紅色盡除而愈矣此
方大補腎肝全不去治目正所以治目也世醫每拘執
成方不顧目之虛實一味以治火爲主者不知壞天下
之眼幾百萬矣幸治目者察其虛實如知其虛卽以此
方投之效應如响正不必分前後也然初起卽是內傷
之目痛又從何處辨之日間痛重者陽火也乃是實症
夜間痛重者陰火也乃是虛症虛症卽用此方急治之
隨手建功何至變生不測哉

此症用還光
飲亦妙

目痛不治
目能入能

熱地一兩山茱萸四錢枸杞甘菊同州羨黎玄參麥冬各三錢葳蕤五錢肉桂三分水煎服十劑全愈

人有陰火上冲兩目紅腫淚出而不熱羞明而不甚日出而痛輕日入而痛重此非虛症之痛乎然不在肝而在腎也腎中無火下焦寒甚乃逼其火而上行浮遊於目而目痛也治法不可瀉火而宜補火并不可僅補火而兼宜補水腎中真寒而火不存實腎中少水而火無養也水火原不可兩離補水即宜補火則水不寒補火即宜補水則火不燥治陰虛火動之症者無不當兼治何獨於治目者殊之方用八味地黃湯加減熱地一兩山茱萸五錢山藥五錢茯苓澤瀉丹皮各三錢柴胡五分白芍五錢甘菊花三錢肉桂一錢水煎服一劑而陰火歸源目疾頓愈抑何其治法之神乎蓋陰陽之道歸根最速吾用六味大滋其腎中之水加肉桂以溫其命門之火火喜水養即隨水而同歸於本宮龍雷安靜而雲漢之間火光自散有不返為青天白日之世界乎况佐之柴芍甘菊風以吹之通大澤之氣而雷火更且安然也

此症用抑火散亦效

熱地麥冬各一兩北五味肉桂各一錢巴戟天葳蕤各五錢水煎服一劑效二劑全愈

人有能近視而不能遠視者近視則蠅脚細字辨晰秋毫遠視則咫尺之外不辨真假人以為肝血之不足誰知是腎火之本微乎腎火者先天之火也是火存於腎水之中近視之人既非水之不足何致火之無餘不知先天之火天與之也生來火微光焰自短蓋眼目之中不特神水涵之抑亦神火藏之故凡光能照遠者火也近視之人正神火之微耳神火藏於目中而發於腎內治近視之病必補腎火為主然而火非水不養雖近視之人原有腎水然能保其後天之不斷削乎水中補火不易之道也方用養火助明湯熱地五錢山茱萸三錢葳蕤五錢巴戟天一兩肉桂一錢麥冬三錢北五味子三分枸杞三錢水煎服一月之後自然漸能遠視矣仍將前藥修合丸散日日吞服一年之後遠近俱能視也但服藥之時必須堅忍色慾為妙否則僅得半之道耳此方補命門之火所以助其陽也雖助陽無非益陰本無他害誠恐不善受益者借陽以作樂故戒之如此

此症用鑿遠湯亦佳

附子北五味各一錢熟地炭槩
各一兩山茱萸五錢水煎服

人有目痛二瞳子大於黃精視物無準以小為大人以為

內熱之故也誰知是氣血之虛而驟用熱物火酒以成

之者乎夫五臟六腑之精皆上注於目而瞳子尤精之

所注也故精足則瞳子明精虧則瞳子暗視物而昧大

小者蓋筋骨氣血之精而為脉并為系上屬於腦腦熱

則瞳子散大而腦之所以熱者由於多食辛熱之物也

火酒者酒中至熱之漿且其氣又主散腦中之精最惡

散而最易散熱而加散腦氣又烏能安然無恙乎自必

火酒能散
腦中之氣
熱則散
精耗則
瞳子散

辨症錄

卷之三

目痛

隨熱而隨散矣腦氣既熱則難於清涼更難於靜固欲

瞳子之不散大而不可得又烏能視物有準哉治法以

解熱益氣為主而解熱必須滋陰滋陰自易降火然後

於滋降之中佐之酸收之味始克斂瞳神之散大也方

用斂瞳丹熟地一兩山茱萸五錢白芍一兩當歸伍錢

黃連三錢五味子一錢人參三錢甘草一錢地骨皮五

錢柴胡五分柞木枝三錢陳皮五分黃柏五分水煎服

連服四劑瞳子漸小再服四劑而視物有準矣服一月

全愈此方涼血於補血之中瀉邪於助正之內祛酒熱

於無形收散精於不覺實有不知其然而然之妙較東垣治法為更神也

此症用東晴

丹亦效

熟地白芍麥冬各一兩人參五錢炒梔子川
芎各三錢北五味一錢水煎服十劑全愈

人有病目數日而即生翳由下而上其翳色作澹綠狀瞳

子痛不可當人以為肝木之風誰知是腎火乘肺肺火

與腎水相合而不解乎夫腎主黑色肺主白色白與黑

相合必變綠色也惟是腎為肺子肺為腎母二火何以

相犯乃子母之變耳弟子母相犯者無關輕重其翳由

辨症錄

卷之三

目痛

下而上是子犯其母亦緣母之過柔也天下安有母旺

而子敢犯者乎是治之之法補母而子之逆可安矣雖

然子之天性凶逆亦從旁之人必有導之始敢安於逆

而不顧腎火之犯肺者亦經絡之多不調也補肺金以

抑腎烏可不調其經絡以孤腎火之黨乎方用健母丹

麥冬天冬各一兩生甘草黃芩各一錢茯苓青蒿白芍

桔梗丹參各三錢陳皮三分天花粉二錢水煎服一劑

而綠色退四劑而目翳散十劑全愈此方用二冬以補

肺用甘草桔梗以散肺之邪用黃芩以退肺之火則肺

辨症錄

氣既旺而腎火自然難侵况益之茯苓以瀉膀胱之火
用青蒿以瀉胃脾之熱白芍以平肝膽之氣丹參以清
心內之炎是臟腑無非清涼而腎臟邪火安能作祟譬
如一家之中叔伯兄弟盡是正人君子羣來解勸而忤
逆之兒即不愧悔自艾斷不能增派其橫而為犯上之
亂矣

此症用益肺

湯亦效

麥冬二兩天門冬五錢生地
玄參各一兩水煎服十劑愈

人有兩目無恙而視物皆倒植人以爲肝氣之逆誰知是

辨證錄

卷之三

目痛

肝葉之倒置乎夫目之系通於肝而肝之神注於目肝
斜則視斜肝正則視正肝直則視直肝曲則視曲肝岐
則視岐此理之常也今視物倒植者乃肝葉倒而不順
耳此必因吐而得者蓋吐則五臟反覆而肝葉開張壅
塞於上焦不能一時迅轉故肝葉倒而視物亦倒也治
法宜再使之吐然而一吐已傷五臟再吐不重傷五臟
之氣血乎但不吐而肝葉不易遽轉吾於吐中而仍用
和法方用安麻湯參蘆鞭二兩瓜蒂七箇甘草一兩荆
芥三錢水煎三大碗頓服之即用鷲翎掃喉中必大吐

此症用參蘆湯
吐之亦妙
人參蘆四兩煎湯數碗盡服之
以鷲翎掃喉引吐吐後即愈

吐後而肝葉必順矣瓜蒂散原是吐藥余加參蘆鞭甘
草荆芥者於補中以行其吐即於吐中以安其經絡何
至五臟反覆以重傷其氣血哉此乃吐之變法也凡虛
人而宜用吐法者皆可照此法治之

此症用參蘆湯

吐之亦妙

人參蘆四兩煎湯數碗盡服之
以鷲翎掃喉引吐吐後即愈

人有驚悸之後目張不能瞑百計使之合眼不可得人以

爲心氣之弱誰知是肝膽之氣結乎雖五臟六腑皆稟

受脾土上貫於目而目之系實內連肝膽也肝膽血足

辨證錄

卷之三

目痛

而氣舒肝膽血虧而氣結然此猶平居無事之謂也肝
膽逢驚則血縮肝膽逢悸則血止血止血縮而氣乃因
之而結矣氣結則肝膽之系不能上通於目而目之睫
不能下矣治法必須解其氣結然而不易解也仍當補
其肝膽之血血旺則氣伸而結乃解也方用解結舒氣
湯白芍一兩當歸一兩炒棗仁一兩郁李仁三錢水煎
服一劑而目能瞑矣白芍平肝膽之旺於瀉中能補當
歸滋肝膽之枯於補中能散炒棗仁安心之藥心安則
不必取資於肝膽子安而母更安也郁李仁善能去肝

膽之結入之於三味之中尤易入肝而舒滯去鬱也所以一劑奏功耳

此症用舒結湯亦神

柴胡荆芥各二錢白芍一兩甘草半夏獨活各一錢炒棗仁四錢麥冬五錢水煎服一劑日瞑而卧

人有無故忽視物為兩人以為肝氣之有餘誰知是腦氣之不足乎蓋目之系下通於肝而上實屬於腦腦氣不足則肝之氣應之肝氣大虛不能應腦於是各分其氣以應物因之見一為兩矣孫真人曰邪中於頭因逢身之虛其入深則隨目系入於腦入於腦則轉轉則目系

辨證錄

卷之三

五

肝膽喜內水而惡燥

其肝而佐之祛邪之藥為當蓋腦氣不足而邪得以居之不祛邪而單補其精於腦氣正無益也治肝正所以益腦也

此症亦可用

補瞳神丹

當歸白芍各一兩郁李仁黑荆芥丹皮各三錢麥冬川芎葳蕤各五錢細辛五分水煎服二劑愈

人有病目之後眼前常見禽鳥昆蟲之飛走捉之則無人以為怪而不知非怪也乃肝膽血虛有痰而閉結之也夫肝膽屬木木中無血以潤之則木氣過燥矣內燥必取給於外水然而肝膽喜內水之資而不喜外水之養於是外水不變血而變痰血資肝膽則有益痰侵肝膽則有損且血能入於肝膽之中痰難入於肝膽之內痰既在外反壅塞肝膽之竅而氣不能展矣見禽鳥昆蟲之飛走者皆痰之作祟也治法益肝膽之血而兼消其外壅之痰方用四物湯加味治之熟地三錢白芍五錢當歸一兩川芎二錢酸棗仁五錢青箱子三錢茯苓三錢陳皮一錢甘草一錢半夏三錢白朮二錢水煎服四劑目無所見矣此方用四物湯以滋肝膽用茯苓半夏白朮以分消其溼痰加入棗仁青箱子以青箱走目中

辨證錄

卷之三

五

之系棗仁去心內之迷心氣清而痰易出目系明而邪自散也然但用二味而不合前藥同用正未能出奇制勝耳

此症用向榮湯亦妙

當歸白芍生地各一兩麥冬五錢白芥子茯苓各三錢貝母一錢柴胡五分水煎服十劑全愈

人有目痛之餘兩目白皆盡變為黑不痛不疼仍能視物無恙毛髮直如鐵條癡癡如醉不言不語人以為血債之症也誰知是腎邪之乘心乎夫心屬火腎屬水三經似乎相尅然而心火非腎水不能相養腎水不上交於

辨證錄

卷之三 目痛

聖

心則心必有煩燥之憂但腎水僅可相資於心而不可過侮夫心也腎氣乘心本欲救心之枯而腎中倘有邪水亦挾之以資心則心受傷矣心受腎邪本自死症乃不死而但現黑色於目者以腎來救心而非犯心也心畏腎邪而又不取明彰腎之過白皆變黑赤白難分毛髮直豎非怒極之驗乎癡癡如醉不言不語非挾制太甚無可如何之象乎治法宜斬關直入急救心君之垂危祛蕩腎邪撥亂反正之為得也方用轉治湯茯苓五錢人參五錢附子二錢五靈脂末二錢菖蒲一錢白芥

此症見於
推婦人有
之男子正

子三錢白木五錢良薑一錢水煎服一劑而癡醉醒二劑而毛髮軟三劑而黑皆解四劑全愈夫腎中之邪不過寒溼之氣用辛燥溫熱之劑自易祛邪况佐之奪門之將輔之引路之人有不恢復於須臾定亂於頃刻哉

此症用利水益心丹亦佳

茯苓人參薏仁巴戟天各五錢白芥子肉桂各三錢白木一兩水煎服四劑全愈

人有月經不通三月忽然眼目紅腫疼痛如刺人以為血虛而不能養目也誰知是血壅而目痛乎夫經水不通似乎血枯之症然而血過於盛則肝氣反閉塞而不通

辨證錄

卷之三 目痛

聖

經既不通則熱無可洩不下行而轉壅於上而肝之竅開於目乃走肝而目痛矣此等之痛肝脉必大而有力或弦而滑必非細澹微緩無力之狀也治法不可補血以助熱宜通經以瀉肝方用開壅湯紅花三錢當歸尾三錢牛膝二錢桃仁十四箇柴胡二錢丹皮三錢大黃一錢香附一錢鬱金三錢天花粉二錢玄胡索一錢水煎服一劑而經通再劑而目愈此方全不治目但去通經經通而熱散熱散而目安也

此症可用
瀉壅丹

當歸一兩紅花五錢大黃二錢生地五錢荆芥三錢
桃仁十粒丹皮三錢炒梔子二錢水煎服一劑而血
全消不必三劑也

寒之三

寒之三

寒之三

血症門

人有一時狂吐血者未有不本之火者也然血已吐出如
傾盆則火必變為虛火矣實火可瀉而虛火斷不可瀉
况血已吐出無血養身而又用瀉火之藥以重傷其胃
氣毋論血不能驟生而氣亦不能遽轉往往有至氣脫
而死者治法不可止血而當活血尤不可活血而急當
固氣蓋氣固則已失之血可以漸生未失之血可以再
旺耳方用固氣生血湯黃芪一兩當歸五錢荆芥炒黑
二錢水煎服一劑血止再劑氣旺四劑血各歸經不致

辨證錄

寒之三

寒之三

再吐矣此方即補血湯之變全在荆芥引血歸於氣分
之中引氣生於血分之內氣血之陰陽既交則水火之
陰陽自濟斷不至臟腑經絡再有拂逆使血冲擊而再
嘔也蓋有形之血不能速生無形之氣所宜急固吐血
不治血而治氣前人已有言之者余不必再論也大約
此方治初起嘔狂血者若吐血既久尚宜斟酌
此症用黃荆湯亦神
生地四兩炒黑荆芥三錢煎服即止
人有久吐血而未止或半月一吐或一月一吐或三月數
吐或終年頻吐雖未咳嗽而吐痰不已委困殊甚此腎

山脫益氣
雖本於前
人而實火
變虛實出
於創說

肝之吐也夫吐血未必皆是腎肝之病然吐血而多經
歲月未有不傷腎肝者腎肝既傷則水不能養肝而肝
木必燥龍雷之火不能安於木中必下尅於脾胃而脾
胃寒虛龍雷之火乃逆冲於上以欺肺金之弱挾胃中
之血遂火旺而沸騰隨口而出矣治法必腎肝肺三經
統補之方用三台救命湯熟地半觔麥冬三兩丹皮二
兩水煎二碗一日服盡不再吐熟地補腎以滋肝麥冬
清肺以制肝丹皮去肝中浮遊之火又能引上焦之火
以下歸於腎臟使血歸經也然非大用之則火勢燎原
何能止抑其炎炎之勢故必用重劑則滂沱大雨而遍
野炎氛始能熄焰至於火息血靜用地黃丸調理三年
乃延生之善計願人守服以當續命膏也

此症用填精止

血湯甚佳

熟地二兩山茱萸四錢麥冬五錢北五味子一錢
炒黑荆芥三錢白芍一兩水煎服十劑血不再吐

人有吐黑血者雖不至於傾盆而痰嗽必甚口渴思飲此
腎經之實火也蓋腎中之火又挾心包相火並起而上
冲耳然而心包之火可瀉而腎火終不可瀉瀉心包之
火必致有傷於腎吾乃瀉其肝則二經之火不瀉而自

瀉肝木以
瀉心包與
腎之火實
有見解

瀉也肝為心包之母而腎之子也母弱而子不能強子
虛而母亦自弱耳方用兩瀉湯白芍一兩丹皮二兩地
骨皮一兩炒黑梔子三錢玄參一兩水煎服連服二劑
而黑血變為紅色矣再服二劑而咳嗽除血自止神效
也夫黑乃北方之色也黑血宜屬腎而乃兼屬之心火
者亦猶火熱之極投於水中則化為烏薪心包之火同
入於腎中則火極似水又何疑乎今用兩瀉之湯雖瀉
肝木其實仍是兩瀉心包與腎經也火得水而解血得
寒而化此黑血之所以易變而吐血之所以易止也

辨證錄

卷之三

三

此症亦可用三仙散火湯
玄參三兩生地二兩白芍一兩水煎服二劑即止血

人有感觸暑氣一時氣不得轉狂嘔血塊而不止者此暑
邪犯胃也其症必頭痛如破汗出如雨口必大渴發狂
亂叫若作虛症治之必反增劇如當歸補血湯又不可
輕用也法宜消暑熱之氣而佐之下降歸經之藥則氣
不逆而血自止矣方用青蒿一兩當歸五錢荆芥炒黑
三錢石膏一兩麥冬五錢玄參五錢大黃一錢水煎服
一劑而暑氣消口渴止二劑而血歸於經諸症悉愈不
可再用三劑也此方名為解暑止血湯青蒿能於解暑

瀉心而
吐血不用
瀉以安
心是所
以瀉也
瀉以燥
熱不

通入及不
清通各經
之火而心
轉安也

血絲最難
止調理費
心為上服
藥尚其大
也

之中善退陰火則陰陽既濟而拂抑之氣自除於是
石膏退胃火麥冬退肺火玄參退腎火荆芥從上焦而
引火下行又得大黃迅速不再停於胃又恐血既上越
大腸必然燥結加入當歸之滑以助其速行之勢故旋
轉如環而取效甚捷也

此症亦可用散暑止血湯甚神
大黃生地石膏各三錢

人有痰中吐血如血絲者日間則少夜間則多咳嗽不已
多不能眠此乃腎中之火冲入咽喉而火不得下歸於
命門故火沸為痰而上升而心火又欺肺金之弱復來

辨證錄

卷之三 血症

三

相刑是水之中兼有火之氣所以痰中見血絲也方用
化絲湯熟地一兩麥冬五錢貝母一錢玄參五錢茯苓
三錢蘇子一錢地骨皮三錢沙參三錢荆芥炒黑一錢
水煎服一劑而血絲少再劑而血絲斷矣此方肺腎心
三經並治加之去痰退火之劑消弭於無形故能成功
之速倘不用補劑而唯事於去痰退火吾恐痰愈多而
血愈結也惟是既愈之後不可仍服此方宜服益陰地
黃丸方用熟地一兩山藥八兩麥冬十兩北五味三兩
山茱萸八兩丹皮六兩茯苓六兩地骨皮十兩澤瀉四

此症用還源
湯亦佳

兩蜜為丸服一年永不復發
熟地一兩山茱萸五錢炒黑荆芥三錢地骨皮五錢
麥冬三錢天門冬二錢甘草貝母各三分桔梗五分
水煎服三
十劑愈

人有久吐血百計止之而不效者蓋血犯濁道也夫火不
盛與氣不逆則血俱不吐當知氣逆由於火盛欲治氣
逆必須降火然而火盛既久則火不能盛氣逆既久則
氣更加逆似乎瀉火易而降氣難不知火瀉則氣亦隨
之而降矣但火久則變為虛火虛火宜引而引火之藥

辨證錄

卷之三 血症

四

多是辛熱之味恐反有助逆之慮不若壯水以鎮陽火
之為得也方用壯水湯熟地二兩生地一兩荆芥炒黑
二錢三七根末三錢水煎調服一劑而血即止再劑而
血即斷不再發也熟地與生地同用補精之中即寓止
血之妙荆芥引血而歸於經絡三七根即隨之而斷其
路徑使其入而不再出也火得水而消氣得水而降此
中自有至理也

此症單用三七根末三錢
加入童便一碗調服即止

人有大怒吐血色紫氣逆兩脇脹滿作痛此怒氣傷血不

驚傷肝
平肝則氣
平而血亦
止

能藏而吐也肝本藏血逢怒則肝葉開張血即不能藏
 矣肝氣本急怒則更急急則血自難留故一湧而出往
 往有傾盆而吐者况肝中原有龍雷之火因怒而擊動
 其火於是劈木焚林而血乃上越矣血既上湧肝無血
 養自然兩脇作痛輕則脹滿矣治法急宜平其肝氣而
 少加清涼之品則怒氣一平而龍雷之火自收血症可
 愈倘一味用止血之藥反足以拂其火熱之性也方用
 平肝止血散白芍二兩當歸一兩荆芥炒黑三錢炒梔
 子二錢甘草一錢丹皮二錢水煎服一劑而肝氣平二
 劑而吐血止三劑氣不逆而脹痛盡除也芍藥平肝而
 又能益肝中之氣血同當歸用之則生血活血實有神
 功丹皮梔子不過少涼其血以清其火以便荆芥之引
 經甘草之緩急也

此症用斷紅
飲亦神效

白芍當歸各一兩荆芥炒黑三錢三
七根末三錢水煎調服一劑即止血

人有咯血者血不驟出必先咳嗽不已覺喉下氣不能止
 必咯出其血而後快人以爲肺氣之逆也誰知是腎氣
 之逆乎腎氣者腎中之虛火也虛火之盛由於真水之

腎水既竭
之順子
火爲肺之
子亦前
人所未道

衰不能制火致火逆冲而上血遂宜大吐矣又何必咳
 而後出蓋肺氣阻之也夫肺爲腎之母腎水者肺之順
 子腎火者肺之驕子也肺本生腎水而不生腎火惡驕
 子之凌犯也其驕子因肺母之偏於腎水乃上犯劫奪
 肺金之血而肺又不肯遽予故兩相搏掣而咯血也方
 用六味地黃湯熟地一兩山茱萸三錢山藥三錢麥冬
 一兩五味子一錢茯苓澤瀉丹皮各二錢水煎服連服
 四劑血必不咯矣服一月全愈用六味湯以大資其腎
 水用麥冬五味以大益其肺金自足以制火之有餘何
 至於血之再咯而出哉此治水所以不須瀉火也

此症用生熟二地湯亦妙
生地熟地各二兩水煎服十劑即愈

人有嗽血者因咳嗽而出血也其症多因勞傷而成耗損
 腎水水不能分給於各臟而又不慎於女色則水益涸
 矣水涸而肺金必來相生以洩肺金之氣而無如腎水
 日日之取給也則子貧而母亦貧矣夫貧子盜母之資
 則母有剝膚之痛欲求救於胃而胃又受肝火之凌則
 胃不敢生肺肝木生火則心火必旺心火一旺必來乘
 肺肺受外侮必呼子以相援而腎子水衰不能制火火

欺水之無用凌肺愈甚肺欲避之子宮而腎子之家又窘迫乾枯無藏身之地勢不得不仍返於本宮而咳嗽吐血矣治法自宜救肺然而徒救肺而腎之涸如故則肺之液仍去顧腎而肺仍傷也故治肺仍須補腎腎水足而肝木平心火息不必治肺而肺已安矣方用救涸湯麥冬二兩熟地二兩地骨皮一兩丹皮一兩白芥子三錢水煎服一劑而嗽輕二劑而咳輕連服十劑咳嗽除而血亦自愈麥冬與熟地同用乃肺腎兩治之法也加入地骨丹皮者實有微義蓋嗽血必損其陰陰虛則火旺然此火旺者仍是陰火而非陽火也我用地骨丹皮以解骨髓中之內熱則腎中無煎熬之苦自然不索於肺金而肺中滋潤自然清肅之氣下濟於腎內子母相安則腎水漸濡可以養肝木可以制心火外侮不侵家庭樂豫何至有損耗之失哉至於白芥子不過消膜膈之痰無他深意以陰虛咳嗽者吐必有痰故取其不耗真陰之氣也

此症用麥冬熟地湯亦佳
熟地二兩麥冬一兩水煎服十劑全愈

人有鼻中流血經年經月而不止者或愈或不愈此雖較

大約血症
傷血所
此治血所
以皆其補
而不耳

口中吐血者少輕然而聽其流血而不治與治不得其法皆能殺人蓋吐血犯胃衄血犯肺胃為濁道肺為清道也犯濁道則五臟盡皆反覆犯清道則止肺經一臟之逆也氣逆則變症多端故皆能殺人治法宜調其肺氣之逆但肺逆成於肺經之火夫肺屬金本無火也肺經之火仍是腎水之火肺因心火之侵腎水救母而致乾涸以腎火來助乃火與火鬪而血遂妄行從鼻而上越矣然則調氣之法舍調腎無他法也而調腎在於補水以制火方用止衄湯生地一兩麥冬三兩玄參二兩水煎服一服即止麥冬直治其肺金之匱乏生地玄參以解其腎中遏抑之火火退而氣自順血自歸經矣倘畏此方之重而減輕則火勢炎炎未易止遏不能取效也

此症用麥冬三七湯亦神
麥冬三兩三七根末三錢水煎調服二劑即止

人有耳中出血者涓涓不絕流三日不止而人死矣此病世不嘗有然而實有其症也耳者腎之竅也耳中流血自是腎虛之病然而腎虛血不走胃不從口出而偏從耳出者正有其故蓋心包火引之也心包之火與命門

五臟發於
腎出血
宜在腎
傷於腎之
外發如
許醫
耳部外治
用龍骨末
次入即止

之火原自相通二火沸騰則血不走胃而走耳矣蓋胃
為心包之子胃恐腎火之害心而兼害胃故引其火而
上走於耳諸經所過之地盡捲土而行故血乃隨之而
出也雖耳竅甚細不比胃口之大無冲决之虞而涓涓
不絕豈能久乎故必須急止之方用填竅止氣湯麥冬
一兩熟地二兩菖蒲一錢水煎服一劑而效如响用熟
地以填補腎經之水麥冬以息心包之焰二經之火息
而耳竅不閉則有孔可鑽雖暫止血未必不仍然越出
也故用菖蒲引二味直透於耳中又引耳中之火而仍
返於心包火歸而耳之竅開矣如此用藥之神真有不
可思議之妙

此症用截流
湯亦神效

熟地二兩生地麥冬各一兩三七根末
三錢菖蒲一錢水煎服一劑即止血

人有舌上出血不止者舌必紅爛其裂紋之中有紅痕發
現血從痕中流出雖不能一時殺人然而日加頓困久
亦不可救援也此症乃心火太炎而腎中之水不來相
濟夫心必得水以相養邪水犯心則死真水養心則生
故心腎似乎相尅而其實相生也今腎水不交於心則

欲求腎之養而不可得乃借資於舌下之廉泉終日取
給其津液未免舌為之敝而乾涸矣夫廉泉有水能灌
注五臟然而腎水足而廉泉之水亦足腎水枯而廉泉
之水亦枯譬如江河之水旺而井水亦滿也今腎水既
不濟於心之中何能越心而上升於唇口之上此廉泉
欲自養方寸之舌而不能何能濟心之炎熱乎故泉脉
斷而井發裂亦無濟於心而并爛其舌舌既爛矣清泉
泥濘必流紅水而成血也治法必大補其心腎使心腎
交濟而舌血不斷而自止也方用護舌丹丹皮三錢麥
冬三錢桔梗三錢甘草一錢玄參五錢人參一錢熟地
一兩五味子一錢黃連三分肉桂一分水煎服一劑而
舌之血即止連服四劑而舌之爛亦愈此方全不治舌
而但交其心腎心腎交而心之氣下通於腎寧再求濟
於舌乎舌不耗津於心則舌得自養此不治舌正勝於
治舌不止血而正勝於止血耳

此症用清心救
命丹亦神效

玄參麥冬各一兩甘草一錢菖蒲三分茯神人參三
七根末各三錢五味子三粒水煎調服一劑即止血

大有齒縫出血者其血之來如一線之標此乃腎火之沸

騰也夫齒屬腎腎熱而齒亦熱腎虛而齒亦虛腎欲出血而齒即出血矣雖然齒若堅固則腎即欲出血無隙可乘似乎必須治齒然而徒治齒無益仍須治腎蓋腎為本而齒為末也夫腎火乃龍雷之火直奔於咽喉血宜從口而出何以入於齒耶蓋腎火走任督之路而上趨於唇齒無可出之路乘齒縫有隙而出之龍雷之火其性最急而齒縫之際細小不足以暢其所出故激而標出如線也方用六味地黃湯加麥冬五味骨碎補治之熟地一兩山藥四錢山茱萸四錢丹皮五錢澤瀉三

辨錄

卷之三 血症

五

錢茯苓三錢麥冬五錢五味子一錢骨碎補一錢水煎服一劑而血即止也連服四劑永不再發六味地黃湯大補腎中之真水水足而火自降火降而血不妄行矣又慮徒補腎水而水不易生用麥冬五味子以補其肺從腎之化源而補之也補肺而水尤易生加入骨碎補透骨以補其漏則血欲不止而不可得矣

此症亦可用

闔縫丹

猴薑人參北五味三七根末各一錢甘草三分各為細末擦牙含漱即止血止後用六味丸則不再發

人有臍中流血者其血不十分多夾水流出人亦不十分

狼狽然臍通氣海關元命門烏可洩氣乎雖流血非洩氣之比而日日流血則氣亦隨之而洩矣治法自應閉塞臍門然而不清其源而徒閉其門亦徒然也夫臍之所以出血者乃大小腸之火也二火齊旺必兩相爭鬪於腸中小腸之火欲趨出於大腸而大腸之火欲升騰於小腸兩不相受而火乃無依上下皆不可洩因臍有隙乃直攻其隙而出火出於臍而血亦隨之矣然則治臍之出血可不急安其大小腸之火乎然大小腸之火以動火以腎經乾燥無水以潤之也故治大小腸之火

辨錄

卷之三 血症

五

仍須以治腎為主方用兩止湯熟地三兩山茱萸一兩麥冬一兩北五味五錢白朮五錢水煎服一劑即止血不流四劑除根熟地山茱以補腎水麥冬五味以益肺氣多用五味子者不特生水而又取其酸而斂之也加白朮以利腰臍腰臍利則水火流通自然大小腸各取給於腎水而無相爭之亂水足而火息血不止而自止也

此症用障臍

湯亦甚神

大黃五分當歸生地各一兩地榆三錢水煎服一劑即止血

氣虛不能攝血然精
虛不能
藏血惡愈
精氣更實

人有九竅流血者其症氣息奄奄欲臥不欲見日頭暈身

困人以爲祟憑之不知此乃熱血妄行散走於九竅也

視其症若重然較狂血走一經者反輕引血歸經則血

不再流矣夫人一身之中無非血也九竅出血乃由近

而遠非盡從臟腑而出然而治法仍須治臟腑而不可

止治經絡以臟腑能統攝經絡也方用當歸補血湯加

味治之當歸五錢黃芪一兩荆芥炒黑三錢人參三錢

白朮五錢生地五錢水煎服一劑即止血二劑不再流

矣熱血妄行不清火而反補其氣因由於氣之虛也氣

辨證錄

卷之三 血症

三

虛則不能攝血血得火而妄行逢竅則鑽今補其氣則

氣旺矣氣旺自能攝血倘用止抑之法則一竅閉而衆

竅安保其盡閉乎用補血湯而又行氣涼血未嘗無清

火之味焉得不奏功如神哉

此症可用
掩竅丹

人參當歸生地玄參各一兩炒黑荆芥三錢
甘草一錢水煎服一劑即止血二劑全愈

人有大便出血者或糞前而先便或糞後而始來人以爲

糞前來者屬大腸之火糞後來者屬小腸之火其實皆

大腸之火也夫腸中本無血也因大腸多火燥乾腸中

一從從前
辨血先後
之誤

之液則腸薄而開裂血得滲入裂竅在上則血來遲裂

竅在下則血來速非小腸之能出血也小腸出血則人

且立死蓋小腸無血如有血則心傷矣心傷安能存活

乎故大便出血統小腸論之以辨症則可謂大便之血

以糞後屬小腸則不可也是治便血之症宜單治大腸

然而大腸之所以出血非大腸之故也腎主大小便腎

水無濟於大腸故火旺而致便血也方用三地湯熟地

一兩當歸一兩生地一兩地榆三錢木耳末五錢水煎

調服一劑即止血二劑全愈精血雙補則腸中自潤既

辨證錄

卷之三 血症

三

無乾燥之苦自無滲漏之患况地榆以涼之木耳以塞

之有不取效之速者乎

此症用薺苳熟
地湯亦神

熟地三兩地栗三兩搗汁同
熟地煎湯服二劑即止血

人有小便溺血者其症痛澀馬口如刀割刺觸而難忍人

以爲小腸之血也而不知非也小腸出血則人立死安

得痛楚而猶生乎因人不慎於酒色欲洩不洩受驚而

成之者精本欲洩因驚而縮入則精已離宮不能仍反

於腎中而小腸又因受驚不得直洩其水則水積而火

小腸之血
乃腎精所
化而

亦宜
是

生於是熱極而煎熬將所留之精化血而出於小便之
外其實乃腎經之精而非小便之血也治法宜解其小
腸之火然而解火而不利其水則水壅而火仍不得出
精血又何從而外洩哉方用水火兩通丹車前子三錢
茯苓五錢木通一錢梔子三錢黃柏一錢當歸五錢白
芍一兩扁蓄一錢生地一兩水煎服一劑而澀痛除二
劑而溺血止三劑全愈不必用四劑也方中通利水火
而又加平肝補血之藥者蓋血症最懼肝木尅脾胃則
脾胃之氣不能升騰而氣乃下陷氣陷而血又何從而
升散乎今平其肝則肝氣舒而脾胃之氣亦舒小腸之
水火兩通敗精有不速去者乎

此症用通瀉
飲亦神

黃柏車前各三錢茯苓白朮各五錢王不留行
二錢肉桂三分黃連一錢水煎服二劑即止血

人有皮毛中出血者或標出如一線或滲出如一絲或出
於頭上或出於身中或出於兩脛之間皆肺腎兩經之
虧火乘隙而外越也此等之症舍補腎水無第二法可
救然而補腎之功緩必須急補其氣氣旺則肺金自旺
而皮毛自固矣方用肺腎兩益湯熟地二兩人參一兩

此症用
治亦能止

麥冬一兩三七根末三錢水煎服一劑而血即止矣再
用六味地黃湯加麥冬五味調服一月不再發蓋熟地
壯水麥冬益金水相資則肺腎之火自息血自歸經
何至走入皮毛而外洩况三七根原能止血乎

此症用芪歸斂
血湯亦神效

黃芪玄參各一兩當歸五錢麥冬一兩北五味一錢
蘇子二錢三七根末三錢水煎調服一劑即止血

人有唾血不止者然止唾一口而不多唾人以為所唾者
不多其病似輕而不知實重蓋此血出於脾而不出於
胃也夫脾胃相表裏者也血犯胃已傷中州之土先天
已虧矣况更犯脾陰之後天乎胃主受而脾主消脾氣
一傷不能為胃化其津液雖糟粕已變但能化糜而不
能化精以轉輸於五臟六腑之間則臟腑皆困是脾之
唾血更甚於胃之吐血矣然而脾之所以唾血者仍責
之胃土之虛不特胃土之虛而尤責之腎水之衰也蓋
胃為腎之關門腎衰則胃不為腎以司其開闔而脾之
血欲上唾而胃無約束任其越出於咽喉之上矣故脾
之唾血雖脾火之沸騰實腎胃二火之相助也治法平
脾之火必須補脾之土更須補腎水以止胃之火也方

用滋脾飲人參三分茯苓二錢玄參丹皮芡實茅根山藥各三錢熟地一兩沙參五錢甘草五分水煎服一劑而唾血止再劑全愈此方輕於治脾而重於補腎誠探本之法也倘止瀉脾火之有餘必致損胃土之不足胃氣傷而脾氣更傷然後始去補腎則不能生腎水矣何能制脾火之旺哉毋論唾血難止吾恐胃關不閉而血且大吐矣此滋脾飲之所以妙耳

此症用同歸湯亦神效

白朮玄參各一兩熟地二兩北五味一錢荆芥炒黑三錢貝母五分水煎服一劑即止血

人有雙目流血甚至直射而出婦人則經閉不行男子則口乾唇燥人以爲肝血之妄行也誰知是腎中火動乎夫腎中之火相火也若君火寧靜則相火不敢上越惟君火既衰而後心中少動於嗜慾則相火即挾君主之令以役使九竅而九竅尊君之命不敢不從聽其所使矣心之系通於目肝之竅開於目肝中有火亦相火也與腎中命門之相火心中包絡之相火正同類也同氣相助而沸騰不啻如小人結黨比附而不可解直走心肝之竅系血不下行而上行矣治法似宜補心君之弱

以制腎火之動然而心火既虛補心而心不易旺必須補腎以生心則心火不動而腎火亦靜耳方用助心丹麥冬一兩遠志二錢茯苓三錢熟地一兩山茱萸五錢玄參五錢丹皮三錢芡實三錢蓮子心一錢當歸三錢柴胡三分水煎服一劑而血止二劑不再發此方心肝腎三經同治之藥也補腎以生肝即補腎以生心耳或疑腎中火動不宜重補其腎不知腎火之動乃腎水之衰也水衰故火動水旺不火靜乎况心火必得腎水之資而火乃旺也心火旺而腎火自平非漫然用之耳

此症用助心丹湯亦神效

熟地白芍各一兩山茱萸五錢柴胡五分荆芥炒黑三錢北五味十粒竹瀝一合同水煎服二劑愈

人有舌上出血不止細觀之有小孔標血此心火上升以尅肺金也夫鼻衄犯氣道也舌中衄血不過犯經絡之小者耳然有血出於口者犯胃而不犯心血出於舌者犯心而不犯胃犯胃爲腑而犯心爲臟焉可謂經絡細小之病而輕治之乎治法內補其心中之液而外填其舌竅之孔則心火自寧而舌血易止也方用補液丹人參三錢生地三錢麥冬五錢丹參二錢北五味子十粒

山藥三錢當歸五錢黃連一錢玄參五錢貝母一錢水煎服外用炒槐花三七根各等分爲末摻之卽愈夫槐花三七本能止血似不必借重於補液丹也然而內不治本而徒治其末未必不隨止而隨出也

此症用栝子安

心湯亦神效

人參茯苓神栝子仁各三錢遠志一錢菖蒲三分當歸生地各五錢五味子十粒貝母黃連各五分水煎服二劑卽止血

辨證錄

卷之三 血症

五

遍身骨痛門

人有一身上下由背而至腰膝兩脛無不作痛飲食知味然不能起牀卽起牀席而痛不可耐仍復睡臥必須捶敲按摩否則其痛走來走去在骨節空隙之處作楚而不可忍人以爲此症乃痛風也然痛風之症多感於風溼而風溼之感多入於骨髓風溼入於經絡則易去風溼入於骨髓則難祛以骨髓屬腎腎可補而不可瀉祛風溼則傷腎腎傷則邪欺正弱將深居久住而不肯遽出矣雖然腎不可瀉而胃與大腸未嘗不可瀉也瀉胃

辨證錄

卷之三 骨痛

查

與大腸之風溼而腎之風溼自去蓋胃爲腎之關而大腸爲腎之戶也方用並祛丹黃芪一兩白朮五錢茯苓五錢甘菊花三錢炙甘草一錢羌活五分防風五分水煎服一劑而痛減二劑而痛除三劑而痛全愈矣愈後用八味地黃丸調理永無再犯之患論理不治腎而治胃與大腸之風溼去風宜用乾葛也去濕宜用猪苓也有風有溼必化爲火去火亦宜用石膏知母也然邪在骨髓必須用氣分之劑提出在氣分使微寒之品與輕散之味以和解之則邪易於速化然後用補腎之藥補

腎不可瀉
胃與大腸
未嘗不可瀉也
瀉胃
祛風溼
則傷腎
腎傷則邪
欺正弱
將深居
久住而
不肯遽
出矣
雖然
腎不可
瀉而
胃與
大腸
未嘗
不可
瀉也
瀉胃
祛風
溼則
傷腎
腎傷
則邪
欺正
弱將
深居
久住
而不
肯遽
出矣

其腎中之水火真水足而邪水不敢再入真火足而邪火不能再侵也

此症亦可用芪

木兩活湯

人參肉桂各三錢白木黃芪各一兩茯苓五錢
甘艸一錢羌活獨活各五分水煎服四劑愈

人有遍身疼痛至腰以下不痛者人亦以為痛風也誰知乃火鬱於上中二焦不能散而成者也若作風溼治之全不能效然而僅治其火亦正徒然蓋火生於鬱則肝膽之氣不宜木必下尅脾胃之土而土氣不升則火亦難發以致氣血耗損不能灌注於經絡而作痛矣方用

辨證錄

卷之三

五

逍遙散加味治之柴胡三錢白芍五錢當歸一兩甘草一錢炒梔子三錢陳皮一錢伏苓三錢白木二錢羌活一錢水煎服一劑而痛如火矣逍遙散專解肝膽之鬱梔子尤善於解鬱中之火肝膽之火既盛則膽中之汁必乾肝中之血必燥多加當歸芍藥更於平肝平膽之內而濟之滋膽滋肝之味也血足而氣自流通復加羌活以通經絡自然火散而痛除耳

此症用此方

柴胡梔子各一錢蒼朮天花粉各二錢白芍五錢茯苓生地各三錢甘草一錢陳皮五分川芎一錢水煎服

四劑全愈

人有遍身生塊而痛者此雖是痛風然因溼氣不入臟腑而外走經絡皮膚以生此塊乃溼痰結成者也消痰於腸胃之內者易為力而消痰於經絡皮膚者難為功雖然經絡皮膚固難治而腸胃可易治也吾治其腸胃而經絡皮膚之痛塊自消方用消塊止痛丹人參三錢黃芪五錢防風一錢半夏三錢羌活一錢白木三錢桂枝五分茯苓五錢薏仁五錢水煎服二劑而痛輕四劑而痛止十劑而塊消二十劑而塊盡消也夫塊結不散正氣虛也氣虛則痰結吾用人參黃芪以補其氣而痰之勢衰矣况益之茯苓薏仁以利溼半夏以消痰防風羌活以去風桂枝以逐邪則痰之黨羽既孤而不能留其塊壘矣倘徒治經絡皮膚反耗損腸胃之氣而氣不能行於經絡皮膚則塊且益夫何以消之哉

此症用防其分

黃芪白木茯苓各五錢薏仁五錢防風柴胡天花粉各一錢桂枝三分麻黃五分水煎服四劑愈

人有遍身疼痛殆不可忍然有時止而不疼人以爲風溼相搏誰知是氣血虧損凝滯而不通乎夫風寒束於肌

榮血行而
滯而痛作
痛是虛症
極微得是

骨雨濕入於肢節皆能作痛然其痛必一定不遷非時而痛時而不痛也惟氣血既虛不能流行於肢節肌骨之中每視盛衰以分輕重氣到之時則痛輕氣散之後則痛重血聚之時則痛輕血滯之時則痛重也倘認作風寒雨溼之邪而用祛除掃蕩之藥則氣血愈虛而疼痛更甚治法必大補其氣血而佐以溫熱之味則正旺而邪不敢侵不必止痛而痛自止也方用忘痛湯當歸一兩黃芪二兩肉桂二錢延胡索一錢天花粉三錢秦

辨證錄


卷之三終

辨證錄

卷之三終

此症用化凝湯亦妙
當歸五錢黃芪一兩肉桂五分茯苓五錢柴胡甘草羌活半夏各一錢水煎服四劑愈

辨證錄卷之三終



去邪以致
木難論得
極是

辨證錄卷之四

山陰陳士鏗敬之甫號遠公受號朱華子著述

會稽陶式玉尚白爾號存齋又號

參訂

五鬱門

人有心腹飽滿作脹時或腸鳴數欲大便甚則心疼兩脇填實為嘔為吐或吐痰涎如嘔清水或瀉利暴注以致兩足面附腫漸漸身亦重大此等之病初起之時必雜然亂治及其後也未有不作蠱脹治之誰知乃是土之病乎土鬱者脾胃之氣鬱也內經將土鬱屬之五運

辨證錄

卷之四

辨證錄

卷之四

之氣而不知人身五臟之中原有土鬱之病正不可徒咎之歲氣而不消息其臟腑之氣也夫土氣喜於升不喜下降肝木來侮則土氣不升肺金來竊則土氣反降不升且降而土氣抑鬱而不伸勢必反尅夫水矣水既受尅不敢直走於長川大河自然泛濫於溪澗路徑遇淺則瀉逢窳必鑽流於何經即於何經受病治法宜疏通其土使脾胃之氣升騰則鬱氣可解然而脾胃之所以成鬱者雖因於肝木之有餘與肺金之不足然亦因脾胃之氣素虛則肝得而侮肺得而耗也倘脾胃之

氣旺何患成鬱哉故開鬱必須補脾胃之氣補脾胃而後用奪之之法則土鬱易解耳方用善奪湯茯苓一兩車前子三錢白朮三錢柴胡一錢白芍五錢陳皮三分半夏一錢水煎服連服四劑而諸症漸愈此方利水而不走氣舒鬱而兼補正不奪之奪更神於奪也何必開鬼門泄淨府始謂之奪哉

此症用疏土

湯亦佳

白朮茯苓各一兩肉桂三分柴胡五分白芍三錢枳殼三分半夏五分水煎服四劑愈

人有咳嗽氣逆心脇脹滿痛引小腹身不能反側舌乾噤

辨證錄

卷之四 五鬱

三

燥面陳色白喘不能臥吐痰稠密皮毛焦枯人以爲肺氣之燥也而不知乃是肺氣之鬱夫肺氣之鬱未有不先爲心火所逼而成然而火旺由於水衰腎水不足不能爲肺母復仇則肺金受虧而抑鬱之病起然則治肺金之鬱可不泄肺金之氣乎雖然未可徑泄肺金之氣也必須大補腎水水足而心火有取資之樂必不再來犯肺是補腎水正所以泄肺金也方用善泄湯熟地一兩山茱萸五錢玄參一兩荆芥三錢牛膝三錢炒棗仁三錢沙參三錢貝母一錢丹皮二錢水煎服一劑輕一

引論甚妙
然其明則
已夫心火
無水自然
燥灼肺金
受燥所不
必重補水
滋火而肺
山自安矣

劑又輕十劑全愈此方滋腎水以制心火實滋腎水以救肺金也肺金得腎水之泄而肺安腎水得肺金之泄而水壯子母同心外侮易制又何憤懣哉此金鬱泄之義實有微旨也

此症用和金

湯亦效

麥冬五錢蘇葉一錢桔梗二錢甘草一錢茯苓三錢黃芩一錢半夏五分百合三錢水煎服四劑愈

人有過寒心痛腰膝沉重關節不利艱於屈伸有時厥逆痞堅腹滿面色黃黑人以爲寒邪侵犯也誰知是水鬱之症乎水鬱之症成於土勝木復之歲者居多然而脾胃之氣過盛肝膽之血太燥皆能成水鬱之症也然則治法何可舍脾胃肝膽四經而他治水鬱哉雖然水鬱成於水虛而水虛不同水有因火而虛者真火虛也有因水而虛者真水虛也真水虛而邪水自旺真火虛而真水益衰大約無論真火真水之虛要在於水中補火火足而水自旺水旺而鬱不能成也方用補火解鬱湯

辨證錄

卷之四 五鬱

三

熟地一兩山藥五錢巴戟天五錢肉桂五分杜仲五錢薏仁五錢水煎服連服四劑自愈此方於補火之中仍是補水之味自然火能生水而水且生火水火兩濟何

本論
水虛不
多論

鬱之有正不必滋肝膽而調脾胃也

此症用濟水
湯亦效

白朮一兩杜仲三錢山藥一兩薏仁芡實
各五錢防已桂枝各五分水煎服四劑愈

人有少氣脇腹胸背面目四肢填脹憤懣時而嘔逆咽喉
腫痛口乾舌苦胃脘上下忽時作痛或腹中暴疼目赤
頭暈心熱煩悶懊懣善暴死汗濡皮毛痰多稠濁兩顛
紅赤身生癩瘡人以為痰火作祟也誰知是火鬱之病
乎夫火性炎上火鬱則不能炎上而違其性矣五臟之
火不同有虛火實火君火相火之異然火之成鬱者大

辨證錄

卷之四 五鬱

四

火不鬱
不發過鬱
亦不發亦
是至論

約皆虛火相火即龍雷之火也雷火不鬱則不發動過
於鬱則又不能發動非若君火實火雖鬱而仍能發動
也故治火之鬱者治虛火相火而已矣既曰虛火則不
可用瀉既曰相火則不可用寒所當因其性而發之耳
方用發火湯柴胡一錢甘草一錢茯苓三錢炒棗仁三
錢當歸三錢陳皮三分神麴炒梔子各一錢白芥子二
錢白朮二錢廣木香末五分遠志一錢水煎服一劑而
火鬱解再劑而諸症愈矣此方直入胞絡之中以解其
鬱悶之氣又不直瀉其火而反補其氣血消痰去滯火

遂其炎上之性也或疑龍雷之火在腎肝而不在心包
今治心包恐不能解龍雷之火鬱也殊不知心包之火
下通於肝腎心包之火不解則龍雷之火鬱何能解哉
吾解心包之鬱火正所以解龍雷之鬱火也不然心包
之鬱未解徒解其龍雷之火則龍雷欲上騰而心包阻
抑劈木焚林之禍必且更大惟解其心包之火則上火
既達而下火可以漸升且上火既達而下火亦可以相
安而不必升矣此治法之最巧者也

此症用通火
湯亦妙

辨證錄

卷之四 五鬱

五

白芍玄參麥冬各一兩生地五錢甘草一錢陳皮五
分荆芥一錢白芥子二錢茯苓三錢半夏八分水煎
服一劑而鬱解
矣二劑全愈

人有畏寒畏熱似風非風頭痛煩疼胃脘飽悶甚則心脇
相連填脹膈咽不通吞酸吐食見食則喜食完作楚甚
則耳鳴如沸昏眩欲仆目不識人人以為風邪之病誰
知是木鬱之症也夫木屬肝膽肝膽之氣一鬱上不能
行於心包下必至刑於脾胃人身後天以脾胃為主木
尅脾土則脾不能化矣木尅胃土則胃不能受矣脾胃
空虛則津液枯槁何能分布於五臟七腑哉且木尤喜

五鬱
水鬱則五

辨證錄
卷四

水脾胃既成焦乾之土則木無水養尅土益深土益病矣土益病則土不生肺而肺金必弱何能制肝肝木過燥愈不自安而作祟矣治法宜急舒肝膽之木氣然徒舒肝膽之氣而不滋肝膽之血則血不能潤而木中之鬱未能盡解也方用開鬱至神湯人參一錢香附三錢茯苓二錢白朮一錢當歸二錢白芍五錢陳皮五分甘草五分炒梔子一錢柴胡五分水煎服一劑而鬱少解再劑而鬱盡解也此方無刻削之品而又能去滯結之氣勝於逍遙散多矣或疑鬱病宜用解散之劑不宜用補益之味如人參之類似宜斟酌殊不知人之境遇不常拂抑之事常多愁悶之心易結而木鬱之病不盡得之歲運者也故治法亦宜變更不可執鬱難用補之說棄人參而單用解散之藥况人參用入於解散藥中正既無傷而鬱又易解者也

此症用舒木湯亦效

白芍當歸各三錢川芎荆芥鬱金蒼朮各二錢香附車前子猪苓甘草各一錢青皮五分天花粉一錢水煎服四劑愈

人之鬱病婦女最多而又苦最不能解倘有困臥終日痴

辨證錄 卷四

喜能解鬱
人易知怒
能解鬱
知美遠不

痴不語人以爲呆病之將成也誰知是思想結於心中氣鬱而不舒乎此等之症欲全恃藥餌本非治法然不恃藥餌聽其自愈亦非治法也大約思想鬱症得喜可解其次使之大怒則亦可解蓋脾主思思之太甚則脾氣閉塞而不開必至見食則惡矣喜則心火發越火生胃土而胃氣大開胃氣既開而脾氣安得而閉乎怒屬肝木木能尅土怒則氣旺氣旺必能冲開脾氣矣脾氣一開易於消食食消而所用飲餌必能化精以養身亦何畏於鬱乎故見此等之症必動之以怒後引之以喜而徐以藥餌繼之實治法之善也方用解鬱開結湯白芍一兩當歸五錢白芥子三錢白朮五錢生棗仁三錢甘草五分神麴二錢陳皮五分薄荷一錢丹皮三錢玄參三錢茯苓二錢水煎服十劑而結開鬱亦盡解也此方即逍遙散之變方最善解鬱凡鬱怒而不甚者服此方無不心曠神怡正不必動之以怒引之以喜之多事耳

此症亦可用打木湯加梔子一錢神麴五分殊效方見前

四五五

咳嗽門

人有驟感風寒一時咳嗽鼻塞不通嗽重痰必先清後濁
 畏風畏寒此風寒入於皮毛肺經先受之也夫肺之竅
 通於鼻肺受風寒之邪而鼻之竅不通者阻隔肺金之
 氣也肺竅既不能通而人身之火即不能流行於經絡
 而火乃入於肺以助風寒之黨矣故初起咳嗽必須先
 散風寒而少佐散火之劑不可重用寒涼以抑其火亦
 不可多用燥熱以助其邪用和解之法為最妙如甘桔
 湯小柴胡湯是也然而世人往往以小恙不急治者多
 矣久則肺氣虛而難愈則補母補子之道宜知也補母
 者補其脾胃也補子者補其腎水也似乎宜分兩治之
 法以治久咳久嗽之症而余實有兼治之方既有利於
 子母而復有益於咳嗽母論新久之嗽皆可治之以取
 效也方用善散湯麥冬三錢蘇葉二錢茯苓三錢玄參
 三錢甘草一錢黃芩八分天門冬三錢款冬花五分目
 母一錢水煎服此方用麥冬天冬以安肺氣用茯苓甘
 草以健脾胃之土用玄參以潤腎經之水用蘇葉款冬
 花以解散其陰陽之風邪又加黃芩以清其上焦之火

辨證錄

卷之四 咳嗽

八

除虛嗽
 勞傷最多
 非大補腎
 水烏龍濟
 事此篇方
 論救世不
 淺

貝母以消其內膈之痰斟酌咸宜調劑皆當故奏功取
 勝耳

此症亦可用
 寧嗽丹

蘇葉甘草天花粉天冬款冬花各一錢桔
 梗生地各三錢麥冬五錢水煎服二劑愈

人有風寒已散而痰氣未清仍然咳嗽氣逆牽引腰腹俛
 仰不利人皆謂必須治痰之為亟矣然而治痰而痰愈
 多嗽愈急咳愈重者何也蓋治痰之標而不治痰之本
 耳痰之標在於肺痰之本在於腎不治腎而治肺此痰
 之所以不能去而咳嗽之所以不能愈也人生飲食原
 宜化精而不化痰惟腎氣虛則胃中飲食所化之津液
 欲入腎而腎不受則上泛為痰矣蓋因胃中所化之津
 液無多不足以濟肺之乾枯而心火轉來相奪則津液
 不能滋肺反化為痰涎而外越矣然則治法宜大補其
 腎水使腎水汪洋既能制心火之有餘更能濟肺金之
 而足心火不敢相奪胃氣又復相安自然津液下潤腎
 經獨受化精而不化痰矣方用熟地二兩麥冬二兩甘
 草一錢柴胡一錢白芍五錢水煎服此方即子母兩富
 湯加味者也以熟地大滋其腎水以麥冬大安其肺金

辨證錄

卷之四 咳嗽

九

加芍藥柴胡甘草以舒其肝膽之氣使其不來尅脾胃
之士則脾胃之氣易於升騰上使救肺而下可救腎且
邪亦易散實有鬼神不測之妙也

人有久嗽不愈用補腎滋陰之藥不效反覺飲食少思強
食之而不化吐痰不已者人以爲肺經尙有邪留於胃
中而不知乃脾胃虛寒不能生肺使邪留連於中脘而
作嗽也夫肺金之母脾胃二經之士也土旺則金旺土
衰則金衰不補母以益金反瀉子以損土邪卽外散肺
且受傷况尙留餘邪未散乎母怪其久嗽而不愈也然

辨證錄

卷之四

十

則治之之法不可僅散肺之邪而當急補肺之氣不可
僅補肺之氣而尤當急補脾胃之士矣然不可徒補脾
胃也蓋補胃必須補心包之火而補脾必須補命門之
火心包生胃土命門生脾土實有不同耳然而胃病則
脾必病而脾病則胃亦病也吾補胃而卽兼補脾補脾
而卽兼補胃未嘗非肺金之所喜肺喜正氣之生自惡
邪氣之尅不必治嗽而嗽病自已矣方用補母止嗽湯
白朮五錢茯苓五錢人參一錢陳皮三分甘草一錢蘇
子一錢半夏一錢桔梗二錢麥冬五錢紫苑一錢肉桂

五分水煎服一劑而嗽輕二劑而嗽更輕四劑而嗽全
止矣此方乃補脾胃之聖藥加入肉桂以補心包命門
之二火一味而兩得之也又恐徒治脾胃之母置肺邪
於不問增入補肺散邪之味則子母兩得而久嗽安得
不速愈哉

此症用助金

湯亦佳

人參三錢甘草款冬花各一錢白朮百合各五錢茯
神二錢肉桂炮薑蘇葉百部各五分半夏三分水煎

服四
劑愈

辨證錄

卷之四

十

人有咳嗽長年不愈吐痰色黃結成頑塊凝滯喉間肺氣
不清用盡氣力始得吐出於口者此乃老痰之病也年
老陽虛之人最多此症然用消痰清肺之藥往往不驗
者蓋徒治其痰而不理其氣也夫痰盛則氣閉氣行則
痰消老年之人孤陽用事又加氣閉而不伸則陽火煎
熬遂成黃濁之痰氣虛不能推送故必咳之久而始能
出也方用六君子湯加減治之人參五分白朮五錢茯
苓三錢陳皮五分柴胡五分白芍一兩白芥子三錢甘
草一錢梔子一錢水煎服二劑而痰變白矣四劑而痰
易出矣十劑而咳嗽盡除補陽氣之虛開鬱氣之滯消

老痰最難
治君治
法之外其
在補腎

痰結之塊祛久閉之火有資益而無刻削則老痰易化而咳嗽易除也倘徒用攻痰之藥則陽氣必傷而痰又難化格格難吐何日是清快之時乎

此症用化老湯亦佳

人參三分白朮一錢生地二錢款冬花三分白芥子白芍地骨皮各三錢柴胡四分甘草一錢麥冬五錢水煎服四劑

人有陰氣素虛更加氣惱偶犯風邪因而咳嗽人以散風祛邪之藥治之而愈甚此不治其陰虛之故也然而徒

滋其陰而肝氣未平則木來侮金咳亦難已法宜平肝

升發余

卷之四

三

而益之以補水之劑則水能資木而木氣更平也方用

平補湯熟地一兩麥冬一兩甘草五分白芍一兩柴胡

一錢人參五分茯苓三錢天花粉二錢百合五錢炒黑

荆芥一錢水煎服此方大補肺腎肝脾之四經而尤能

解肝氣之鬱肝經鬱解而肺經風邪亦不必祛而自散

矣人謂補腎補肺平肝足矣何又兼補脾胃而用人參

即不知三經之氣非脾胃之氣不行吾少加人參茯苓

以通之則津液易生而腎肝肺尤能相益也

此症用漢邪湯下效

白芍熟地麥冬各五錢甘草柴胡香附各一錢陳皮三分白朮各三錢天花粉五分蘇子一錢水煎服四劑

人有久咳而不愈者口吐白沫氣帶血腥人以為肺經之

濕也而不知實肺金之燥苟肺氣不燥則清肅之令下

行而過身四達何處非露氣之下潤乎不特腎水足以

上升而交於心亦且心火下降而交於腎不傳於肺矣

心火既不傳於肺金曾何傷燥之慮哉惟其肺氣先已

匱乏高源之水無有留餘之勢而欲下澤之常盈以上

供於肺金之凡此必不得之數也治法自宜專潤肺金

升發余

卷之四

三

之燥矣然潤肺金之燥而腎火上冲則肺且救子之不

暇何能自潤此肺腎必宜同治也方用子母兩富湯熟

地二兩麥冬二兩水煎服連服四劑而肺金之燥除腎

火之乾亦解譬如滂沱大雨高低原隰無不霑足既鮮

燥竭之虞寧有咳嗽之患倘失此不治或治而不補益

其肺腎轉盼而毛瘁色弊筋急爪枯咳引胸背弔疼兩

脇諸氣膈鬱諸痿喘噎嗝塞血泄種種危候相因俱見

矣又用何藥以救其焦枯哉

此症用夜露飲亦妙

熟地麥冬各一兩山茱萸五錢貝母五分水煎服十劑全愈

人有久病咳嗽吐痰色紅有似嘔血而實非血也盜汗淋

瀉腸鳴作泄午後發熱人以為腎經之邪火大盛將欲

腎邪心也誰知是脾邪之將傳於腎乎此症初因腎

水乾枯腎經受邪腎乃傳心故發熱而夜重未幾心邪

傳肺故咳嗽而汗泄未幾肺邪傳肝故脇痛而氣壅未

幾肝邪傳脾故腸鳴而作泄今既盜汗淋漓腸鳴作泄

乃肺邪不傳肝而傳脾也邪不入腎肝尚有可生之機

亟宜平肝滋腎使邪不再傳則肝平而不與肺為仇腎

辨證錄 卷之四 咳嗽

滋而不與心為亢再益之健脾之品使脾健而不與腎

為耗自然心火不刑肺而生脾脾氣得養而肺氣更安

矣方用罇逆養肺湯白芍五錢麥冬三錢茯苓三錢玄

參二錢熟地五錢山茱萸五錢北五味二錢車前子二

錢地骨皮三錢丹皮三錢牛膝一錢破故紙五分貝母

一錢水煎服連服十劑而氣轉再服十劑而痰變為白

再服十劑而泄止腸亦不鳴也此方本非止泄之藥蓋

泄成於陰虛補其陰而泄自止陰旺則火息不去燥金

全安則木平不去尅土所以消痰而化其火炎之色止

泄而撤其金敗之聲故腸鳴盜汗盡除而咳嗽亦愈矣

此症用止傳湯亦妙

熟地二兩玄參百合各一兩白芥子二錢荆芥炒黑

一錢茯苓三錢沙參三錢地骨皮五錢桑葉十五片

水煎服十劑

輕三十劑愈

人有春暖夏熱則安然不嗽一遇秋涼即咳嗽不寧甚至

氣喘難臥人以為肌表之疏泄也誰知是鬱熱之難通

乎夫人身之氣血流通於肌肉之內則風邪不得而入

惟氣血閉塞不通而邪轉來相侮凝滯而變為熱矣蓋

春夏之間皮膚疎泄內熱易於外宣秋冬之際皮膚緻

密內熱艱於外發所以春夏不咳嗽而秋冬咳嗽也倘

不治其鬱熱之本而惟用發散之品徒虛其外愈不能

當風寒之風徒耗其中益轉增其鬱熱之勢均失其治

之之法也所貴攻補兼施既舒其內鬱之熱而復疏其

外入之寒則本既不傷而未亦易舉也方用當歸五錢

大黃一錢貝母二錢天花粉三錢薄荷二錢荆芥二錢

甘草一錢白朮三錢陳皮三分神麩五分黃芩二錢桔

梗二錢水煎服連服四劑秋冬之時斷無咳嗽之症矣

得當歸之補而不滯白朮之利而不攻同隊逐羣解紛
開結內外兩益矣

此症用鬱金丹亦甚效

白芍桔梗各三錢撫芎二錢白芥子茯苓生地各
三錢甘草款冬花各一錢水煎服一劑輕二劑愈

辨證錄

卷之四

咳嗽

二六

喘門

八有偶感風寒一時動喘氣急擡肩吐痰如湧喉中作水
雞聲此外感非內傷也倘誤認內傷少用補氣之味則
氣塞而不能言痰結而不可息矣治法宜用解表之味
然而純補之藥不可用而清補之藥未嘗不可施也方
用平喘仙丹麥冬五錢桔梗三錢甘草二錢半夏二錢
黃芩一錢山豆根一錢射干一錢白薇一錢烏藥一錢
蘇葉八分茯苓三錢水煎服一劑喘平再劑全愈不必
三劑也蓋外感之喘乃風寒之邪從風府而直入於肺
肅其痰而湧塞於咽喉之間看其病勢似重然較內
傷之喘大輕也平喘仙丹專消肺邪而不耗肺之正順
肺氣而不助肺之火故下喉即慶安全也

此症用止聲湯甚神

麻黃一錢天門冬三錢桔梗三錢甘草茯苓各二錢
山豆根八分射干陳皮半夏青黛各一錢水煎服一
劑

辨證錄

人有痰氣上冲於咽喉氣塞肺管作喘而不能取息其息
不粗而無擡肩之狀者此氣虛而非氣盛也乃不足之
症不可作有餘之火治之人身之陰陽原自相根而陰

辨證錄

卷之四

七

此治虛... 若少... 自可少... 人參非... 用不可... 爲... 人治不... 之... 人參... 則... 則... 急而... 禁不用... 至危... 世無... 然... 嘆... 在... 黃... 勝... 歸... 術... 症... 之... 宜... 感...

陽中之水火不可須臾離也惟腎水太虛而後腎火無
 制始越出於腎宮而關元之氣不能挽回直奔於肺而
 作喘矣然而關元之氣微雖力不勝任以挽回其將絕
 之元陽而猶幸其一線之牽連也則猶可救援於萬一
 耳方用定喘神奇丹人參二兩牛膝五錢麥冬二兩北
 五味二錢熟地二兩山茱萸四錢作湯煎服一劑而喘
 少止二劑而喘更輕四劑而喘大定此方人參宜多用
 不用至二兩則不能下達於氣海關元以生氣於無何
 有之鄉非用牛膝不能下行且牛膝能平胃腎之虛火
 辨證錄 卷之四 定
 又能直補其下元之氣也麥冬益肺金非多用則白顧
 不暇何能生汪洋之水以救燎原之炎耶人喘則氣散
 非五味子何以能收斂乎用熟地以益腎中之水也腎
 水大足自不去泄肺金之氣然非多加則陰不能驟生
 而火不可以遽制又益之以山茱萸以贊襄熟地之不
 速自能水火既濟而氣易還元也
 此症亦可用參
 熟桃蘇湯
 人參熟地各一兩破故紙五分茯神麥冬各五錢胡
 桃一箇生薑蘇子各一錢山茱萸巴戟天各二錢水煎
 服

人有七情氣鬱結滯痰涎或如破絮或如梅核咯之不出
 嚥之不下痞滿壅盛上氣喘急此內傷外感兼而成之
 者也此等之症最難治欲治內傷而外邪不能出欲治
 外感而內傷不能愈然則終何以治之乎吾治其肝膽
 而內傷外感俱皆愈也蓋肝膽乃陰陽之會表裏之間
 也解其鬱氣而喘息可平矣方用加味逍遙散治之白
 芍五錢白朮三錢當歸三錢柴胡一錢陳皮五分甘草
 一錢茯苓三錢蘇葉一錢半夏一錢厚朴一錢水煎服
 一劑而痰氣清再劑而痰氣更清四劑而喘急自愈病
 辨證錄 卷之四 定
 成於鬱治鬱而諸症安得不速愈哉
 此症用蘇葉破
 結湯亦神
 白芍五錢各五錢半夏二錢蘇葉三錢甘草一錢
 枳殼二分水煎服一劑氣通痰消矣二劑全愈
 人有久嗽之後忽然大喘不止痰出如泉身汗如油此汗
 出亡陽本是不救之病而吾以爲可救者以久嗽傷肺
 而不傷腎也夫喘症多是傷腎久嗽之人未有不傷腎
 者以肺金不能生腎水而腎氣自傷也然而傷肺以致
 傷腎與竟自傷腎者不同蓋傷肺者傷氣也傷腎者傷
 精也故傷肺以致傷腎者終傷氣而非傷精精有形而

一氣無形無形者補氣可以生精即補氣可以定喘有形者必補精以生氣又必補精以回喘也所以傷肺者易為功小且傷腎者難為力方用生脉散麥冬一兩人參五錢北五味子二錢水煎服一劑而喘定再劑而汗止三劑而痰少更加天花粉二錢白朮五錢當歸三錢白芍五錢再服十劑全愈生脉散補氣之聖藥也補其肺氣自生腎水矣腎得水而火不上沸則龍雷自安於腎臟不必又去補腎也以視傷腎動喘者輕重不大相懸殊哉

此症用歸氣湯亦妙
麥冬三兩北五味三錢熟地三兩白朮二兩水煎服一劑而汗止十劑全愈

怔忡門

人有得怔忡之症者一遇拂情之事或聽逆耳之言便覺心氣怦怦上冲有不能自主之勢似煩而非煩似暈而非暈人以為心虛之故也然而心虛由於肝虛肝虛則肺金必旺以心弱不能制肺也肺無火煅煉則金必制木肝不能生心而心氣益困故補心必須補肝而補肝尤宜制肺然而肺不可制也肺乃嬌臟用寒涼以制肺必致傷損脾胃肺雖制矣而脾胃受寒不能運化水穀則肝又何所取資而腎又何能滋益所以肺不宜制而宜養也方用制忡湯治之人參五錢白朮五錢白芍一兩當歸一兩生棗仁一兩北五味一錢麥冬五錢貝母五分竹瀝十匙水煎調服一劑而怔忡少定二劑更安十劑全愈此方不全去定心而反去補肝以平木則火不易動補肺以養金則木更能靜矣木氣既靜則肝中生血自能潤心之液而不助心之焰怔忡不治而自愈矣

此症用栢蓮湯亦佳
人參麥冬各五錢茯苓柏子仁丹皮各三錢丹參二錢半夏蓮子心各一錢生棗仁三錢水煎服一

劑安十劑愈

人有得怔忡之症日間少輕至夜則重欲思一睡熟而不可得者人以爲心虛之極也誰知是腎氣之乏乎凡人夜臥則心氣必下降於腎宮惟腎水大耗一如家貧客主無力而延客見主人之窘迫自然不可久留徘徊岐路實心勞耳治法大補其腎中之精則腎氣充足矣方用心腎兩交湯熟地一兩山茱八錢人參五錢當歸二五錢炒棗仁八錢白芥子五錢麥冬五錢肉桂三分黃連三分水煎服一劑即熟睡二劑而怔忡定十劑全愈

辨證錄

卷之四

三

此症用交合湯亦效

人參五錢熟地二兩黃連三分肉桂五分水煎服一劑即睡十劑全安

人有得怔忡之症心常怦怦不安常若有官事未了人欲

膽屬少陽心之母也母虛則子亦虛惟是膽氣雖虛何

便作怔忡之病不知臟腑之氣皆取決於膽膽氣一虛而臟腑之氣皆無所遵從而心尤無主故怦怦而不安者乃似乎怔忡而實非怔忡也治法徒補心而不補各臟腑之氣則怔忡之病不能痊補各臟腑之氣而不補膽之氣內無剛斷之風外有紛紜之擾又安望心中之寧靜乎故必補膽之氣而後可以去怯也方用堅膽湯白朮五錢人參五錢茯神三錢白芍二兩鉄粉一錢丹砂一錢天花粉三錢生棗仁三錢竹茹一錢水煎服一劑而膽壯三劑而膽更壯十劑而怦怦者不知其何以去也此方肝膽同治之劑亦心膽共治之劑也肝與膽爲表裏治膽而因治肝者兄旺而弟自不衰也心與膽爲子母補膽而兼補心者子強而母自不弱也又有鎮定之品以安神刻削之味以消痰更相佐之得宜卽是怔忡未有不奏功如响者况非怔忡之真病乎

辨證錄

卷之四

三

此症用龍齒壯膽湯亦效

人參竹茹各三錢五味子遠志各一錢生棗仁一兩白芍八錢當歸五錢龍齒醋碎研末五分水煎調服

二劑即安

驚悸門

五丙
先赤
大遺

人有聞聲而動驚心中怦怦半日而後止者人以為心中
 有痰也乃用消痰之藥治之不效久則不必聞聲而亦
 驚且添悸病心中常若有來捕者是驚悸相連而至也
 雖俱是心虛之症而驚與悸實有不同蓋驚之病輕於
 悸悸之病重於驚驚從外來而動心悸從內生而動心
 也若怔忡正悸之漸也故驚悸宜知輕重一遇怔忡即
 宜防驚一驚即宜防悸然而驚悸雖分輕重而治虛則
 一也方用安定湯黃芪一兩白朮五錢當歸五錢生棗
 仁五錢遠志三錢茯神五錢甘草一錢熟地一兩半夏
 二錢麥冬五錢栝子仁三錢玄參三錢水煎服一劑而
 驚悸輕再劑更輕十劑全愈夫神魂不定而驚生神魂
 不安而悸起皆心肝二部之血虛也血虛則神無所歸
 魂無所主今用生血之劑以大補其心肝則心肝有血
 以相養神魂何至有驚悸哉倘此等之藥用之驟效未
 幾而仍然驚悸者此心肝大虛之故也改煎藥為丸方
 用鎮神丹人參四兩當歸三兩白朮五兩生棗仁三兩
 遠志二兩生地三兩熟地八兩白芥子一兩茯苓三兩

辨症錄

卷之四 驚悸

三

栝子仁一兩龍骨一兩醋焯用虎睛一對陳皮三錢麥
 冬三兩各為末蜜為丸每日白滾水送下早晚各五錢
 一料全愈此方較前方更奇而神方中用龍虎二味實
 有妙義龍能定驚虎能止悸入之補心補腎之中使心
 腎交通而神魂自定也

此症用鎮心丹亦效

人參白芍各一兩丹砂一錢鐵落一錢天花粉一錢
 山藥五錢遠志二錢生棗仁五錢茯苓三錢水煎服
 十劑全愈

辨症錄

卷之四 驚悸

三

人有先驚而後悸亦有先悸而後驚似乎不同而不知非
 有異也不過輕重之殊耳但驚有出於暫而不出於常
 悸有成於暗而不成於明者似乎常暫明暗之不同然
 而暫驚輕於常驚明悸重於暗悸吾定一方合驚悸而
 治之名為兩靜湯人參一兩生棗仁二兩菖蒲一錢白
 芥子三錢丹砂三錢巴戟天一兩水煎服連服四劑驚
 者不驚而悸者亦不悸也此方多用生棗仁以安其心
 用人參巴戟天以通心腎心腎兩交則心氣通於腎而
 夜能安腎氣通於心而日亦安也心腎交而晝夜安即
 可久之道也

此症用鎮心丹
亦可同治

非... 卷之內... 妻

虛煩門

人有遇事或多言而煩心生常若胸中擾攘紛紜而嘈雜
此陰陽偏勝之故火有餘而水不足也或謂心熱則火
動而生煩膽寒則血少而厥煩矣不知虛煩實本於心
熱膽則未嘗寒也夫膽則最喜熱而惡寒世人云膽寒
則怯者正言膽之不可寒也膽寒既怯何敢犯火熱之
心可見虛煩是心火之熱非膽木之寒矣古人用溫膽
湯以治虛煩而煩轉盛者正悞認膽寒也治法宜於補
心之中而用清心之味方名解煩益心湯人參二錢黃

非... 卷之內... 妻

連一錢生棗仁三錢白朮一錢茯神三錢當歸二錢玄
參五錢甘草三分枳殼五分天花粉二錢水煎服一劑
煩止再劑煩除矣此方純是入心之藥清火而加入消
痰之藥者有火必有痰也痰火散而煩自釋矣况又有
補心之劑同羣並濟哉

此症用玄冬湯亦甚神
玄參麥冬各二兩水煎服一劑而心安二劑全愈
人有年老患虛煩不寐大便不通常有一畏熱氣自臍下
直冲於心便覺昏亂欲絕人以爲火氣之冲心也誰知
是腎水之大虧乎夫心中之液實腎內之精也心火畏

腎水之尅乃假尅也心火喜腎水之生乃其生也心得腎之交而心乃生心火腎之通而心乃死虛煩者正死心之漸也惟是腎既上通於心何以臍下之氣上冲而心煩不知腎之交於心者乃腎水之交而非腎火之交也腎水交於心而成既濟之泰腎火交於心而成未濟之否故既濟而心安未濟而心煩耳老人孤陽無水熱氣上冲乃腎火冲心也火之有餘實水之不足治法大補腎中之水則水足以制火火不上冲而煩自止矣方用六味地黃湯加品治之熟地一兩山茱萸五錢山藥四錢茯苓三錢丹皮五錢澤瀉二錢白芍五錢麥冬五錢炒棗仁五錢北五味一錢柴胡五分甘菊三錢水煎服二劑而煩却四劑而大便通二十劑不再發六味丸湯所以滋腎水之涸也麥冬五味滋其化源白芍柴胡以平肝肝平而相火無黨不至引動包絡之火又得棗仁甘菊相制則心氣自舒而復有腎水交通有潤之樂而無燥之苦豈尙有虛煩之動乎

此症用濟心

丹亦效

熟地二兩麥冬五錢生棗仁各五錢丹皮地骨皮
 梔子仁兔絲子巴戟天各三錢水煎服十劑全愈

不寐門

人有晝夜不能寐心甚燥煩此心腎不交也蓋日不能寐者乃腎不交於心夜不能寐者乃心不交於腎也今日夜俱不寐乃心腎兩不相交耳夫心腎之所以不交者心過於熱而腎過於寒也心原屬火過於熱則火炎於上而不能下交於腎腎原屬水過於寒則水沉於下而不能上交於心矣然則治法使心之熱者不熱腎之寒者不寒兩相引而自兩相合也方用上下兩濟丹人參五錢熟地一兩白朮五錢山茱萸三錢肉桂五分黃連五分水煎服一劑即寐蓋黃連涼心肉桂溫腎二物同用原能交心腎於頃刻然無補藥以輔之未免熱者有太燥之虞而寒者有過涼之懼得熟地人參白朮山茱萸以相益則交接之時既無刻削之苦自有歡愉之慶然非多用之則勢單力薄不足以投其所好而饜其所取恐暫效而不能久效耳

此症用芡蓮

丹亦佳

人參茯苓五錢熟地生地蓮子心山藥
 芡實各三錢甘草一錢水煎服四劑安

人有憂愁之後終日困倦至夜而雙目不閉欲求一閉目

1003 日黃書日華

而不得者人以爲心腎之不交也誰知是肝氣之太燥乎夫憂愁之人未有不氣鬱者也氣鬱既久則肝氣不舒肝氣不舒則肝血必耗肝血既耗則木中之血上不能潤於心而下必取汲於腎然而肝木大耗非杯水可以灌溉豈能堪日日之取給乎於是腎水亦枯而不能供肝木之涸矣其後腎止可自救其焦釜見肝木之來親有閉關而拒矣肝爲腎之子腎母且棄子而不顧況心爲腎之仇又烏肯引火而自焚乎所以堅閉而不納也治法必須補肝血之燥而益腎水之枯自然水可以養木而肝可以交心也方用潤燥交心湯白芍一兩當歸一兩熟地一兩玄參一兩柴胡三分菖蒲三分水煎服一劑而肝之燥解再劑而肝之鬱亦解四劑而雙目能閉而熟睡矣此方用芍藥當歸以滋其肝則肝氣自平得熟地以補腎水則水足以濟肝而肝之血益旺又得玄參以解其心中之炎而又是補水之劑投之柴胡菖蒲解肝中之鬱引諸藥而直入於心宮則腎肝之氣自然不交而交也

此症用安睡丹亦妙

白芍生地當歸各五錢甘草一錢熟地一兩山茱萸枸杞各二錢甘菊花三錢水煎服二劑即閉日矣十劑全愈

人有夜不能寐恐鬼祟來侵睡臥反側輾轉不安或少睡而即驚醒或再睡而恍如捉拿人以爲心腎不交而孰知乃膽氣之怯也夫膽屬少陽其經在半表半裏之間心腎交接之會也心之氣由少陽以交於腎腎之氣亦由少陽以交於心膽氣既虛至不敢相延心腎二氣而爲之介紹心腎乃怒其閉門不納兩相攻擊故膽氣愈虛驚悸易起益不能寐耳治法宜補少陽之氣然補少陽又不得不補厥陰也蓋厥陰肝經與少陽膽經爲表裏補厥陰之肝正補少陽之膽耳方用肝膽兩益湯白芍一兩遠志五錢炒棗仁一兩水煎服一劑而寐安二劑而睡熟三劑而驚畏全失此方白芍入肝入膽佐以遠志棗仁者似乎入心而不入膽不知遠志棗仁既能入心亦能入膽况同白芍用之則共走膽經又何疑乎膽得三味之補益則膽汁頓旺何懼心腎之相格乎

此症用無憂湯亦甚妙

白芍五錢竹茹三錢炒棗仁三錢人參三錢當歸五錢一劑睡寧四劑全愈

人有神氣不安臥則魂夢飛揚身雖在床而神若遠離聞聲則驚醒而不寐通宵不能閉目人以爲心氣之虛也誰知是肝經之受邪乎夫肝主藏魂肝血足則魂藏肝血虛則魂越遊魂亦因虛而變也今肝血既虧肝臟之中無非邪火之氣木得火而自焚魂將安寄自避出於軀殼之外一若離魂之症身與魂分爲兩也然而離魂之症與不寐之症又復不同離魂者魂離而能見物不寐而若離魂者魂離而不能見物也其所以不能見物者陰中有陽非若離魂之症純於陰耳治法祛肝之邪而先補肝之血血足而邪自難留邪散而魂自歸舍矣方用引寐湯白芍一兩當歸五錢龍齒末火煨二錢菴絲子三錢巴戟天三錢麥冬五錢栢子仁二錢炒棗仁三錢茯神三錢水煎服一劑而寐矣連服數劑夢魂甚安不復從前之飛越也此方皆是補肝補心之藥而用之甚奇者全在龍齒古人謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒正取其龍齒入肝而能平木也夫龍能變化動之象也不寐非動乎龍雖動而善藏動之極正藏之極也用龍齒以引寐者非取其動中之藏乎

辨證錄 卷之四 不寐 三

此亦古人之所未言余偶及之洩天地之奇也
此症用濯枝湯亦效
 炒梔子三錢甘草一錢白芍當歸炒棗仁各五錢升砂一錢遠志八分柴胡三分半夏一錢水煎服四劑愈

人有心顛神聾如處孤壘而四面受敵達旦不能寐目眩眇無所見耳聾聾無所聞欲少閉睫而不可得人以為心腎之不交也誰知是膽虛而風襲之乎夫膽虛則怯怯則外邪易入矣外邪乘膽氣之虛既入於膽之中則膽氣無主一聽邪之所爲膽欲通於心而邪不許膽欲交於腎而邪又不許此目之所以眇眇而耳之所以聾聾也心腎因膽氣之不通亦各退守本宮而不敢交接故欲閉睫而不可得也夫膽屬少陽少陽者木之屬也木與風同象故風最易入也風乘膽木之虛居之而不出則膽畏風之威膽愈怯矣膽愈怯而又無子母之援何啻如臥薪嘗膽之苦又安得悠然來夢乎治法必補助其膽氣而佐以祛風蕩邪之品則膽氣壯而風邪自散庶可高枕而臥矣方用祛風益膽湯柴胡二錢郁李仁一錢烏梅一箇當歸一兩川芎三錢麥冬五錢沙參

辨證錄 卷之四 不寐 三

此世人所以無

三錢竹茹一錢甘草一錢白芥子二錢陳皮五分水煎服連服二劑而顛倒止再服二劑而見聞有所用人亦熟睡矣此方絕不治心腎之不交而惟瀉膽木之風邪助膽木之真氣則膽汁不乾可以分給於心腎自然心腎兩交欲不寐得乎

此症亦可用

助勇湯

荆芥當歸各三錢防風天花粉各一錢川芎竹茹各二錢枳殼獨活各五分水煎服二劑愈

辨證錄

卷之四

不寐

三

健忘門

人有老年而健忘者近事多不記憶雖人述其前事猶若茫然此真健忘之極也人以為心血之涸誰知是腎水之竭乎夫心屬火腎屬水水火似乎相尅其實相尅而妙在相生心必藉腎以相通火必得水而既濟如止益心中之血而不去填腎中之精則血雖驟生而精仍長涸但能救一時之善忘而不能冀長年之不忘也治法必須補心而兼補腎使腎水不乾自然上通於心而生液然而老年之人乃陰盡之時補陰而精不易生非但

老人健忘自然定心腎之不足

補心而

補腎則

得之速也

辨證錄

卷之四

健忘

藥品宜重而卑特煎湯恐有一時難以取勝之憂服湯劑之後以丸藥繼之始獲永遠之效也方名生慧湯熟地一兩山茱萸四錢遠志二錢生棗仁五錢柏子仁去油五錢茯神三錢人參三錢菖蒲五分白芥子三錢水煎服連服一月自然不忘矣此方心腎兼補上下相資實治健忘之聖藥苟能日用一劑不特却忘併有延齡之慶矣然而人必苦服藥也則丸方又不可不傳耳方名扶老丸人參三兩白朮三兩茯神二兩黃芪三兩當歸三兩熟地半兩山茱萸四兩玄參三兩菖蒲五錢櫛

子仁三兩生棗仁四兩麥冬三兩龍齒三錢白芥子一兩各為細末蜜為丸丹砂為衣每日晚間白滾水吞下三錢久服斷不健忘此方老少人俱可服而老年人尤宜蓋補腎之味多於補心精足而心之液生液生而心之竅啓竅啓而心之神清何至昏昧而善忘哉

此症亦可用強記湯

熟地麥冬生棗仁各一兩遠志二錢水煎服三十劑不忘矣

人有壯年而善忘者必得之傷寒人病之後或酒色過度之人此等之病視若尋常而本實先置最為可畏世人

辨證錄

卷之四 健忘

美

往往輕之而不以為重久則他病生焉變遷異症而死者多矣子實憫之故又論及此此種健忘乃五臟俱傷之病不止心腎二經之傷也若徒治心腎恐胃氣甚弱則虛不受補甚為可慮必須加意強胃使胃強不弱始能分布精液於心腎耳方用生氣湯人參二錢白朮一錢茯苓三錢遠志八分炒棗仁二錢熟地五錢山茱萸二錢甘草三分神麩三分半夏三分麥冬一錢肉桂三分菖蒲三分芡實三錢廣木香一分水煎服四劑而胃口開十劑而善忘少矣連服三十劑全愈此方藥味多

而分兩輕者以病乃久虛之症大劑恐有阻滯之憂味少恐無調劑之益所以圖功於緩而奏效於遠也扶助胃氣而仍加意於補心腎二經則五臟未嘗不同補也有益無損殆此方之謂歟

此症亦可用強記湯加人參三錢治之

人有氣鬱不舒忽忽如有所失目前之事竟不記憶一如老人之善忘此乃肝氣之滯非心腎之虛耗也夫肝氣最急鬱則不能急矣於是腎氣來滋至肝則止心氣來降至肝則回以致心腎兩相間隔致有遺忘也治法必

辨證錄

卷之四 健忘

美

須通其肝氣之滯而後心腎相通何至有目前之失記乎然而欲通肝氣必須仍補心腎要在於補心補腎之中而解其肝氣之鬱則鬱猶易解不至重鬱否則已結之鬱雖開而未結之鬱必至重結矣方用通鬱湯白芍一兩茯苓三錢人參二錢熟地三錢玄參三錢麥冬三錢當歸五錢柴胡一錢菖蒲五分白芥子二錢白朮五錢水煎服一劑而鬱少解二劑而鬱更解四劑而鬱盡解此方善於開鬱而又無刻削乾燥之失直解其肝中之沉滯使肝血大旺既不取給於腎水復能添助夫心

通鬱湯可治陰虛而

火心肝腎一氣貫通寧尙有遺忘失記之病哉

此症可用

存注丹

白芍白朮生地各三錢麥冬栝子仁各五錢甘草薯
蒲各一錢柴胡天花粉各二錢青皮三分水煎服四
劑

人有對人說話隨說隨忘人述其言杳不記憶如從前並

不道及人以爲有崇憑之也誰知是心腎之兩開乎夫

心腎交而智慧生心腎離而智慧失人之聰明非生於

心腎而生於心腎之交也腎水資於心則智慧生生不

息心火資於腎則智慧亦生生無窮苟心火亢則腎畏

火炎而不敢交於心腎水竭則心惡水乾而不肯交於

腎兩不相交則勢必至於兩相忘矣夫心腎如夫婦也

夫婦乖離何能記及於他事乎治法必須大補心腎使

其相離者重複相親自然相忘者復能相憶耳方用神

交湯人參一兩麥冬一兩巴戟天一兩栝子仁五錢山

藥一兩芡實五錢玄參一兩丹參三錢茯神三錢菟絲

子一兩水煎服連服十劑卽不忘矣服一月不再忘此

方似乎重於治心而輕於治腎不知夫婦之道必男求

於女而易於相親重於治心者正欲使心之先交於腎

也然而方中之妙無一味非心腎同治之藥是治心無

非治腎也而交腎仍無非交心也兩相交而兩相親寧

有再忘者乎

此症可用天絲飲亦效
巴戟天一兩菟絲子一兩水煎服十劑卽不忘

癩癇門

人有素常發癩久而不效口中喃喃不已時時忽忽不知時而叫罵時而歌唱吐痰如涎蚰之涎人皆謂痰病也然以消痰化涎之藥與之多不效蓋此症乃胃中少微熱而氣又甚衰故症有似於狂而非狂有似於癩而非癩也治法宜補胃氣而微用清火之藥可以奏功然而胃土之衰由於心火之弱胃火之盛由於心火之微未可徒補胃土而清胃火也方用助心平胃湯人參五錢茯苓一兩貝母三錢神麩一錢肉桂三分甘草一錢

辨證錄

卷之四 癩癇

四

甘菊三錢菖蒲一錢生棗仁五錢水煎服一劑而癩止半再劑而癩盡除也此方補胃氣以生心氣助心火而平胃火故心既無傷而胃又有益不必治癩而癩自止矣

此症用天牛神丹亦神效

巴戟天三兩半夏三錢水煎服一劑即止癩十劑不再發

人有壯年之人痰氣太盛一時跌仆口作牛馬之鳴者世人所謂牛馬之癩也其實乃虛寒之症痰入心包也夫心屬火而心包亦屬火也心喜寒而心包喜溫所以寒

一氣一入包絡即拂其性矣况又有痰氣之侵乎夫人身之痰五臟六腑無不相入安在犯包絡之即至於迷心乎包絡為心君之相凡有痰侵心包絡先受之包絡衛心惟恐痰之相犯故痰氣一入即呼諸臟腑來相救援作牛馬之聲者所謂痛不擇聲也治法急救其心不若急救其包絡方用濟艱湯白朮五錢人參五錢茯苓三錢菖蒲五分遠志一錢栝子仁三錢半夏三錢天花粉一錢南星一錢附子一錢神麩一錢水煎服一劑而癩止再劑全愈連服八劑此症永絕不再發方中雖是救包絡之藥其實仍是救心之味也心安而包絡更安况附子南星俱是斬關奪門之將指揮如意而外邪近賊掃蕩無遺可慶救寧之福也

辨證錄

卷之四 癩癇

四

此症用菖薑湯亦神效

人參五錢肉桂二錢半夏三錢白朮一兩茯苓神五錢菖蒲一錢良薑五分水煎服十劑愈

小兒易於發癩癇者雖因飲食失宜亦由母腹之中先受驚恐之氣也故一遇可驚之事便跌仆吐涎口作猪羊之聲世醫謂是猪羊之癩用祛痰搜風之藥而益甚絕不悟其先天之虧損而大補其命門膻中之火所以愈

多成於胃
多成於脾
多成於肝
多成於心
多成於肺
多成於腎
多成於膽
多成於小腸
多成於大腸
多成於膀胱
多成於三焦

不能見效也治法宜補其脾胃之土而更補命門之火
以生脾復補膈中之火以生胃不必治痰而痰自消化
矣方用四君子湯加減人參一錢茯苓三錢白朮二錢
甘草一分附子一片半夏八分白薇三分水煎服一劑
即止驚而癲亦即愈四君子湯原是補脾胃之聖藥脾
胃健而驚風自收原不必用鎮定之藥以止之也况加
附子無經不達而更能直補命門膈中之火以生脾胃
二經之土則土更易旺而痰更易消益之半夏以逐其
敗濁白薇以收其神魂安得而癲哉

此症用溫養

湯亦妙

參二錢

人參二錢白朮三錢肉桂五分半夏八分
乾薑五分水煎服一劑止四劑全愈

婦人一時發癲全不識羞見男子而如怡遇女子而甚怒
往往有赤身露體而不顧者此乃肝火熾盛思男子而
不可得鬱結而成癲也夫肝火熾盛何便成癲蓋婦人
肝木最不宜旺旺則木中生火火逼心而焚燒則心中
不安有外行之失矣然而心宮之外有包絡之護何以
不為阻隔任其威逼乎不知肝木之火乃虛火也虛火
與相火同類庇匪比之朋忘聖明之戴聽其直燒心中

此症用溫養

湯亦妙

參二錢

而不顧也然而心君出走宜有死亡之虞何以但癲而
不死蓋有腎水之救援耳思男子而不可得者因腎經
之旺也雖所旺者半是腎火而腎水實未涸也有肝火
之相逼即有腎水之相滋所以但成癲痴而未至天喪
耳治法宜瀉其肝火補其腎水而兼舒其鬱悶之氣為
得也方用散花丹柴胡三錢炒梔子五錢白芍二兩當
歸一兩生地一兩熟地二兩玄參二兩天花粉三錢陳
皮一錢茯神五錢水煎服一劑而癲輕二劑而羞惡生
三劑而癲失必閉門不見人也此方全去瀉肝之火不
去耗肝之血疏肝之鬱不去散肝之氣補腎中之精不
去救心中之焰水足則木得所養而火自息於木內火
息則神得所安而魂自返於肝中况有消痰利水之劑
則痰氣盡消各化為水同趨於膀胱而出矣

此症用梔連瀉
火湯亦甚效

生地一兩當歸丹皮各五錢炒梔子天花粉各三錢
黃連二錢吳茱萸一錢水煎服一劑而癲輕二劑全
愈○此方兼可治熱入
血室少加柴胡一錢

人有入于戈之中為賊所執索金帛不與賊禱其衣將受
刀得釋遂失心如癡人以爲失神之病也誰知是膽落

之病乎夫膽附於肝者也因驚而膽墮者非膽之果落於肝中也蓋膽中之汁味散而不收一如膽之墮落於肝耳膽既墮落則膽中之汁盡為肝之所收則肝強膽弱而心不能取決於膽心即忽忽如失一如癩痴之症矣治法瀉肝氣之有餘補膽氣之不足則膽汁自生而癩痴可愈矣方用却驚丹治之附子三分陳皮一錢白朮三錢當歸五錢丹砂一錢鐵粉一錢茯神三錢遠志一錢半夏一錢人參三錢薄荷一錢天花粉二錢南星一錢各為細末蜜為丸如彈子大薑湯送下一丸而驚

辨證錄

卷之四 癩痴

聖

氣即收矣連服三丸而癩痴自愈不必盡服此方安神定志之聖方也方中全在用鐵粉為神鐵粉者鐵落也最能推抑肝邪而又不損肝氣肝與膽同類均木之象也木畏金刑故用鐵落以制肝非取其金剋木之意乎金剋肝木未必不金剋膽木矣然而肝木陰木也膽木陽木也鐵落剋陰木而不剋陽木故制肝而不制膽所以既伐肝邪即引諸藥直入膽中以生膽汁不獨取其化痰而靜鎮也

此症用收驚湯亦效

大約癩痴多生於痰治法非補虛不能奏效

當歸山茱萸各一兩白芍二兩北五味二錢附子三分水煎服一劑驚收二劑再不痴矣三劑全愈人有思慮過度耗損心血遂至癩疾或哭或笑或裸體而走或閉戶自言喃喃不已人以爲花癩之病也誰知是失志之癩乎夫思慮過多必傷於脾脾氣一損即不能散精於肺肺氣又傷而清肅之令不行而脾氣更傷矣且脾者心之子也脾病而心必來援猶子病而母必來顧心見脾氣之傷以至失志則心中無主欲救而無從欲忘而不得呼隣而不應忌仇而相侵於是自忘其身將為從井之事見人而嘯噉背容而絮叨遂至於癩而不自覺也治法非急清其心不可然而心病由於脾病也補心以定志更不若補脾以定志之為神方用歸神湯人參五錢白朮一兩巴戟天一兩茯神五錢紫河車一具半夏三錢陳皮一錢甘草一錢丹砂一錢菖蒲一錢麥冬五錢栢子仁三錢不去油白芥子三錢各為末先將紫河車淨水煮熟不可去血絲搗爛將各藥末再搗為丸白滾水送下五錢連服數日而癩如失也此方心脾同治之藥也雖消痰而不耗氣用紫河車者以紫河車為先後天之母更能歸神於頃刻神得河車而有

辨證錄

卷之四 癩痴

聖

依則志即依神而相守不特已失者重回而既回者尤能永固也

此症用加味温

養湯亦效

人參一兩白朮二兩麥冬一兩半夏三錢
肉桂一錢水煎服二劑少愈十劑全愈

辨證錄

卷之四

哭

狂病門

人有熱極發狂登高而呼棄衣而走氣喘發汗如雨此陽明胃經之火也夫陽明之火何以能使人登高而呼乎蓋火性炎上內火熾騰則身自飛揚矣熱鬱於胸得呼則氣泄矣衣所以蔽體者也內熱既盛衣之覆體不啻如焚棄之則快又何顧焉火刑肺金自然大喘喘極而肺金受傷不能自衛夫皮毛腠理開泄陰不攝陽逼其汗而外出有不可止遏之勢汗既盡出心無血養神將飛越安得而不發狂乎方用加味白虎湯救之人參二

辨證錄

卷之四

哭

兩石膏三兩知母五錢茯苓五錢麥冬三兩甘草一錢
半夏三錢竹葉二百片糯米一撮水煎服一劑而狂定
再劑而熱止矣不可用三劑也此症非用白虎湯以急
救胃火則腎水立時熬乾身成黑炭矣然而火勢燎原
非杯水可救必得滂沱大雨則滿山遍野之焰始能盡
行撲滅也

此症用坎水

湯亦效

石膏一兩玄參二兩甘草一錢天花粉三錢炒梔
子三錢車前子二錢水煎服一劑狂定再劑全愈

人有火起發狂腹滿不得臥面赤心熱妄見妄言如見鬼

狂病多火
但五分狂
極其不狂
耳

狀此亦陽明胃火之盛也然胃火是陽症而妄見妄言如見鬼狀又是陰症何也陽明之火盛由於心包之火盛也陽明屬陽而心包屬陰心包與陽明之火一齊並動故腹滿而不得臥倘僅有胃火之動而心包之火不動雖口渴腹滿而尚可臥也唯心包助胃火而齊動遂至心神外越而陰氣乘之若有所見因而妄有所言如見鬼而實非真有鬼也治法仍宜瀉胃之火而不必瀉心包之火蓋胃為心包之子心包為胃之母也母盛而子始旺然子衰而母亦弱耳瀉胃火非即瀉心包之火

辨證錄

卷之四 狂

與

瀉子湯終不及白虎湯之迅速然能多用其功於白虎勝於白虎余試之而極驗故特表出之

乎方用瀉子湯玄參三兩甘菊花一兩知母三錢天花粉三錢水煎服一劑而胃火平二劑而心包火亦平矣二火既平而狂病自愈論理此症可用白虎湯子嫌白虎湯過於峻削故改用瀉子湯以此症心包屬陰用白虎湯以瀉陽畢竟有傷陰氣不若瀉子湯既瀉其陽而又無損其陰之為愈也或曰母盛而子始旺瀉心包之火可也何以瀉胃子之火耶不知五臟六腑之火最烈者胃火也胃火一熾將腎水立時燥乾故必須先救胃火胃火息而心包之火亦息矣倘先瀉心包之火而寒

涼之藥不能先入心包必由胃而後入假道滅虜不反動胃火之怒乎不若直瀉胃火既能制陽又能制陰兩有所得也

此症用二石

湯亦神

人參五錢石青五錢寒水石二錢茯苓三錢半夏二錢丹皮五錢水煎服一劑狂定二劑全愈

人有易喜易笑狂妄謔語心神散亂目有所見人疑為胃火之熱也不知此病非胃熱也乃心熱耳心熱發狂膈中之外衛謂何亦因心過於酷熱則包絡膈中何敢代心以司令聽心中之自主而喜笑不節矣譬如君王恣

辨證錄

卷之四 狂

且

肆以擅威宰輔大臣不敢輕諫則近侍左右無非便佞一之流自然聲色可以娛心言語可以博趣此偏喜偏笑之所必至也於是所發之令無非亂政及至今不可行而渙散之景象有同鬼域矣人心之發熱何獨不然然而心中發狂以至神越宜立時暴亡矣何以仍能苟延一日月耶不知心熱之發狂不同於胃熱之發狂胃之發狂乃外熱而犯心心之發狂乃內熱而自亂故胃狂有遽亡之禍而心狂有苟延之倖也治法必以清心為主心清而狂自定矣方用清心丹黃連三錢茯苓神五錢生

棗仁五錢人參三錢麥冬一兩玄參一兩丹參三錢水煎服一劑而神定再劑而狂定不必用三劑也黃連所以清心火然徒用黃連則心火正燥恐黃連性燥反動其燥所以又益人參丹參麥冬之類潤以濟之蓋火有餘自然氣不足補氣以瀉火則心君無傷可靜而不可動矣

此症用解妄

湯亦效

人參一兩黃連茯苓神柏子仁玄參丹參各三錢生棗仁五錢甘草一錢肉桂二分水煎服一劑狂定二劑全愈

辨證錄

卷之四

狂

人有身熱發狂所言者無非淫亂之語所喜者無非歡愉之事一拂其言一違其事則狂妄發見神見鬼人以為心熱之極也誰知是心包之熱乎夫心包為心君之副心中安靜胡為任包絡之拂亂乖張至此蓋君弱臣強心中寒極不能自主耳譬如庸儒之主朝綱解散乃寄其權於相而相臣植黨營私生殺予奪悉出其手奉令者立即稱揚違命者輒加苛斥聞順情之辭則喜聽逆耳之言則怒顛倒是非違背禮法心自生疑若有所見心包熱狂正復相似治法自應瀉心包之火然而徒

辨證錄 卷四

治心包而心中內寒愈有震驚之嫌必須補助其心使心氣不弱而後呼召外人可清震主之賊矣苟或單瀉心包之火則心包且有犯逆之危非治法之善也方用衛主湯人參一兩茯苓五錢玄參一兩天花粉三錢麥冬五錢生地五錢丹皮三錢水煎服一劑而身熱止二劑而狂妄定四劑而喜怒得其正矣方中止玄參生地丹皮乃清心包之藥其人參茯苓麥冬仍是補心之品心強而心包之火自弱矣况玄參生地丹皮雖瀉心包而亦是補心之劑自然撥亂為安化奸為忠也或謂心中虛寒用人參以補虛是矣然用玄參丹皮生地之類雖涼心包獨不益心之寒乎似乎宜加熱藥以濟之也嗟乎心寒用熱藥理也然而心包火旺用助火之藥以益心必由心包而後能入火性炎蒸心未必得益而轉助心包之焰矣故不若用人參以助心之為得益人參亦能助心包非心包所惡用玄參之類共入之自然擁衛其心指揮羣藥以掃蕩炎氛將心氣自旺寒變為溫何必用熱藥以生變哉

此症用正心湯亦神效

辨證錄

卷之四

狂

四七七

人參熟地各一兩玄參麥冬各二兩葛蒲
一錢白芥子三錢水煎服一劑輕二劑愈

人有為強橫者所折辱憤懣不平遂病心狂時而持刀時

而踰屋披頭大叫人以為陽明胃火之盛也誰知是陽

明胃土之衰乎夫陽明火盛必由於心火之大旺也心

火旺而胃火盛是火生夫土也心火衰而胃火盛是土

敗於火也火生土而胃安土敗火而胃變雖所變有似

於真火之盛而中已無根欲土崩瓦解而不可救矣夫

狂症皆是熱而余以此為虛熱而非實熱孰肯信之不

知臟腑實熱可以涼折而虛熱必須溫引然而陽明胃

辨證錄

卷之四狂

三

經之虛熱又不可全用溫引也於溫中而佐之微寒之

品實治法之善者蓋陽明虛熱乃內傷而非外感也因

憤懣而生熱不同於邪入而生熱也明甚以邪熱為實

熱而正熱為虛熱耳方用平熱湯人參五錢黃芪一兩

甘草一錢麥冬一兩黃芩一錢青皮五分竹瀝一合白

芍五錢茯苓三錢棗仁三錢炒梔子五分天花粉三錢

柴胡五分水煎服二劑而狂輕四劑而狂定服一月而

安然熟臥矣此方變竹葉石膏湯以治陽明之虛熱也

甘溫以退大熱復佐之以甘寒使陽明之火相順而不

去表亦能
發從此從
古無入道
破

逆轉能健土於火宅之中消烟於餘氛之內土既有根

火亦自息何狂之不去乎倘以為實熱而用竹葉石膏

也去生自遠矣

此症用舒憤

湯亦神效

白芍二兩炒梔子五錢玄參一兩天花粉三錢
柴胡一錢水煎服一劑狂定再劑愈三劑全愈

人有忍饑過勞忽然發狂披髮裸形罔知羞惡人以為失

心之病也誰知是傷胃而動火乎夫胃屬陽明陽明火

動多一發而不可止世皆謂胃火宜瀉而不宜補然而

胃實可瀉而胃虛不可瀉也經云二陽之病發心脾二

辨證錄

卷之四狂

三

陽者正言胃也胃為水穀之海最能容物物入胃而消

胃亦得物而養物養胃而火靜胃失物而火動矣及至

火動而胃土將崩必求救於心脾心見胃火之沸騰而

心神有切膚之痛自擾亂而不寧脾見胃火之焚燒而

脾之意有震隣之恐亦紛紜而無定失其歸依安得而

不發狂哉治法不必安心之神莫脾之意也仍救其胃

氣之存而狂自可定也雖然救胃氣者必救胃土也欲

救胃土而不少殺胃火則胃氣亦未能獨存耳方用救

焚療胃湯人參一兩玄參一兩竹瀝一合陳皮三分神

亦見胃土
亦見胃土

麴五分山藥五錢百合五錢水煎服一劑而狂定再劑而狂止三劑全愈此方大人參以救胃土即兼用玄參以殺胃火又益之羣藥以調停於心肺脾腎之間使肝不敢來傷胃土則胃氣尤易轉也胃氣一轉胃傷可補胃既無傷而心之神脾之意又寧有擾亂紛紜之患乎此狂之所以易定耳

此病用過火

湯亦神效

人參白朮生地各五錢玄參一兩甘草一錢知母一錢天花粉二錢陳皮五分神麴一錢升皮五錢水煎

服一劑狂定

再劑全安

辨證錄

卷之四 狂

五

呆病門

人有終日不言不語不飲不食忽笑忽歌忽愁忽哭與之美饌則不受與之糞穢則無辭與之衣不服與之草木之葉則反喜人以爲此呆病不必治也然而呆病之成必有其因大約其始也起於肝氣之鬱其終也由於胃氣之衰肝鬱則木尅土而痰不能化胃衰則土制水而痰不能消於是痰積於胸中盤據於心外使神明不清而成呆病矣治法開鬱逐痰健胃通氣則心地光明呆景盡散也方用洗心湯人參一兩茯神一兩半夏五錢

辨證錄

卷之四 呆

五

陳皮三錢神麴三錢甘草一錢附子一錢菖蒲一錢生棗仁一兩水煎半碗灌之必熟睡聽其自醒切不可驚醒反至難愈也此等病似乎有祟憑之然而實無祟也即或有祟不可治邪補正而邪自退蓋邪氣之實亦因正氣之虛而入之也此方補其正氣而絕不去祛邪故能一劑而奏效再劑而全愈或謂此病既是正虛無邪何以方中用半夏陳皮如是之多乎不知正虛必然生痰不祛痰則正氣難補補正氣而因之祛邪是消痰仍是補正也雖然痰消而正氣旺是痰即邪也補正而佐

以攻痰引祛痰之藥直入於心宮以掃蕩其邪邪見正氣之旺安得不消滅於無踪哉或又謂呆病既成於鬱不解鬱而單補正以攻痰何以能奏功如此不知呆病之來其始雖成於鬱然鬱之既久而成呆其從前之鬱氣久則盡亡之矣故但補胃氣以生心氣不必又治肝氣以舒鬱氣也

此症用還神至聖湯亦神

人參一兩白朮二兩茯神生棗仁各五錢廣木香天南星荆芥各三錢甘草良薑附子枳殼各一錢菖蒲五分木煎灌之聽其自臥醒來前症如失

辨證錄

卷之四 呆

五

人有呆病終日閉戶獨居口中喃喃多不可解將自己衣服用針線密縫與之飲食時用時不用嘗數日不食而不呼饑見炭最喜食之謂是必死之症尙有可生之機也夫呆病而至於喜糞尙為可救豈呆病食炭反忍棄之乎蓋喜糞乃胃氣之衰而食炭乃肝氣之燥凡飲食之類必入於胃而後化為精粕是糞乃精粕之餘也精粕宜為胃之所不喜何以呆病而轉喜之乎不知胃病則氣降而不升於是不喜升而反喜降精粕正胃中所降之物也見糞而喜者喜其同類之物也然而呆病見

辨證錄

卷之四 呆

五

糞則喜未嘗見糞則食也若至於食糞則不可治矣以其胃氣太降於至極耳夫炭乃木之燼也呆病成於鬱鬱病必傷肝木肝木火焚以傷心則木為心火所尅肝中之血盡燥而木為焦枯之木矣見炭而喜食者喜其同類而食之思救其肝木之燥耳然而可生之機全在食炭夫炭本無滋味今食之而如飴是胃氣之未絕也治其胃氣而祛其痰涎則呆病可愈也方用轉呆丹人參一兩白芍三兩當歸一兩半夏一兩柴胡八錢生棗仁一兩附子一錢菖蒲一兩神麩五錢茯神一兩天花粉三錢栝子仁五錢水十碗煎一碗使強有力者抱住其身另用二人執拿其兩手以一人托住其下領一人將羊角去尖插其口灌之倘不肯服不妨以杖擊之使動怒氣而後灌之服後必然罵詈少頃必倦而臥聽其自醒切不可驚動自醒則全愈否則止可半愈也此方大補其心肝之氣血加之祛痰開竅之藥則肝中枯渴得滋潤而自甦心內寡弱得補助而自旺於是心氣既清肝氣能運力能祛逐痰涎隨十二經絡而盡通之何呆病之不可愈哉倘或驚之使醒則氣血不能盡通而

經絡不能盡轉所以止可半愈也然能再服此湯亦未有不全愈者矣

此症用麤心

湯亦神效

白芍當歸各三兩人參茯苓各一兩半夏炒梔子柴胡各三錢附子三分生棗仁五錢吳茱萸黃連各五分木十碗煎一碗灌之聽其自睡醒來病如失

人有一時而成呆病者全不起於憂鬱其狀悉與呆病無異人以爲有祟憑之也誰知是起居失節胃氣傷而痰迷之乎夫胃屬土喜火之生者也然而火能生土而亦能害土火不來生則土無生氣火過來生則土有死氣

辨證錄

卷之四

呆

矣雖然土中之火本生土者也如何生土者反能害土豈火爲外來之邪火而非內存之正火乎孰知邪火固能害土而正火未嘗不害土也正火者土中之真火如何能害土乎蓋正火而能養則火且生土以消食正火而相傷則火且害土以成痰痰成而復傷其胃土則火且迷心輕則成呆而重則發厥矣起居失節則胃中勞傷不生氣而生痰一時成呆者乃痰迷於心脫之下尙未直入於心包之中也倘入心包則人且立亡矣治法宜生其胃氣而佐之消痰之品則痰迷可以再開不必

竟治其呆也方用啓心救胃湯人參一兩茯苓一兩白

芥子三錢菖蒲一錢神麴三錢半夏二錢南星二錢黃

連一錢甘草一錢枳殼五分水煎服一劑而痰解再劑

而神清三劑而呆病如失不再呆也此方全去救心正

所以救胃也蓋胃爲心之子心氣既清而胃氣安有不

清者乎母清而子亦清也設作呆病治之亦用附子斬

關直入則火以助火有頃刻發狂而死矣總之呆病成

於歲月之久而不成於旦夕之暫若一時而成呆者非

真呆病也故久病宜於火中補胃以消痰而猝病宜於

辨證錄

卷之四

呆

寒中補胃以消痰又不可不知也

此症用指迷

湯亦效

人參五錢白朮一兩半夏神麴各三錢南星甘草各

一錢陳皮菖蒲各五分附子三分肉豆蔻一枚水煎

服四劑愈

呃逆門

人有忽然呃逆不止為是寒氣相感誰知是氣逆而寒入之也然氣之所以不順乃氣之不足也蓋丹田之氣足則氣守於下焦而氣順丹田之氣不足則氣奔於上焦而氣逆矣呃逆雖是小症然治之不得法往往有變成危症而不可救正徒散其寒而不補其氣也治法宜大補其丹田之氣而少佐之以祛寒之藥則氣壯而可以接續寒去而足以升提故不必止呃逆而呃逆遂自止也方用定呃湯人參三錢白朮五錢丁香五分陳皮五分

分茯苓五錢沉香末一錢牛膝一錢水煎服一劑而呃逆止矣參苓白朮純是補氣回陽之藥丁香祛寒沉香牛膝降入丹田以止其逆逆氣既回而呃聲自定孰謂補氣之藥非即轉氣之湯哉

此症用加味六君子湯亦妙

人參半夏蘇葉各一錢白朮茯苓各三錢陳皮五分甘草三分丁香二分水煎服一劑即止呃二劑全愈

人有痰氣不清一時作呃逆之聲者人以為火逆作祟也夫火逆之痰口必作渴今不渴而呃逆仍是痰氣之故而非火邪之祟也夫痰在胃口而呃逆在丹田何以能

致此耶蓋丹田之氣欲升而痰結胸中以阻之此種呃逆較虛呃者甚輕治法消其痰氣而呃逆自除方用二陳湯加減治之人參五分陳皮五分半夏一錢甘草三分厚朴一錢茯苓三錢水煎服一劑即愈二陳湯為治痰之妙劑加入人參厚朴於補氣之中而行降氣之藥自能祛痰於上焦達氣於下焦也

此症亦可用加味六君子湯治之

人有口渴飲水忽然呃逆者非水氣之故乃火氣之逆也人若胃火太盛必大渴呼水矣今但渴而不大飲水者

乃胃火微旺而胃氣猶虛也故飲水雖快而多則不能易消火上冲而作呃逆耳治法宜補其胃中之土而降其胃中之火則胃氣自安而胃火自息呃逆亦自止矣方用平呃散玄參白朮各五錢人參二錢茯苓甘菊花麥冬各三錢甘草五分水煎服一劑即平此方降胃火而又不耗胃氣所以奏功實神倘以為胃火之盛而輕用石膏雖亦能取勝而終於胃土有傷呃逆除而他病又生矣不若此方之和平而又神也

此症用兩宜湯亦妙

辨證錄

卷之四 呃逆

六

辨證錄

卷之四 呃逆

六

人參二錢 茯苓白朮各五錢 甘草澤瀉黃連各一錢
肉桂三分 陳皮五分 天花粉二錢 柴胡三分 水煎服
二劑 愈

人有氣惱之後肝又血燥肺又氣熱一時呃逆而不止人
以為火動之故也誰知亦是氣逆而不舒乎蓋肝性最
急一拂其意則氣必下尅脾土而脾土氣閉則腰膈之
間不通氣乃上奔於咽喉而作呃逆矣倘亦用降火降
氣之藥則呃逆更甚必須用散鬱之劑而佐以消痰潤
肺之藥始為得之方用解呃丹 茯苓神三錢 白芍三錢 當
歸二錢 白朮五錢 蘇葉五分 麥冬五錢 白芥子三錢 柴
胡一錢 水煎服一劑而呃逆即止此方為散鬱之神方
不特治呃逆已也用白朮以利腰膈之氣用柴芍當歸
以舒肝膽之氣用蘇葉麥冬以潤肺金之氣用茯苓以
通心與膀胱之氣用白芥子以宣膜膈之氣是一身上
下之氣盡行流通又何虞下焦之氣不上升於咽喉乎
故一劑而收功也

此症亦可用
平順散

柴胡甘草烏藥各一錢 白芍三錢 香附白芥
子川芎各二錢 砂仁一粒 水煎服二劑即止

人有呃逆時作時止者乃氣虛而非氣滯也夫氣旺則順

氣衰則逆


氣衰則逆五行之道也凡逆之至者皆衰之極耳惟是
氣衰而呃逆者不比痰呃與火呃也補其氣之虛而呃
逆自止倘不知補氣而惟從事於消痰降火則輕必變
重而重必入死矣况痰火之呃亦虛而致不惟寒呃之
成於虛也方用六君子湯加減治之人參三錢 白朮一
兩 茯苓三錢 陳皮一錢 甘草三分 半夏二錢 柿蒂三枚
水以服連服三劑而呃逆自除此方乃治胃之聖劑胃
氣弱而諸氣皆弱胃氣旺而諸氣皆旺故補胃氣正所
以補諸氣也氣既旺矣加以柿蒂之能轉呃自然氣轉
於須臾而呃逆頓止矣且胃又多氣之腑也諸氣之逆
皆從胃始然則諸氣之順何獨不由胃始哉

此症亦可用加

味木苓湯

人參白朮各五錢 茯苓三錢 半夏二錢
竹瀝一合 附子三分 水煎服二劑愈

辨證錄卷之四終



辨證錄卷之五

山陰陳志鏗敬之甫號遠父號朱華子著述

會稽陶式玉尚自甫號存齋又號 參訂

關格門

人有病關格者食至胃而吐欲大小便而不能出眼睛紅赤目珠暴露兩脇脹滿氣逆拂抑求一通氣而不可得世以為胃氣之太盛而不知乃肝氣之過鬱耳夫關格之症宜分上下一上格而不得下一下關而不得出也今上既不得入而下又不得出是真正關格死生危急

辨證錄

卷之五 關格

之症也治之原有吐法上吐則下氣可通今不必用吐藥而先已自吐是用吐藥無益矣若用下導之法則上既無飲食下胃而大腸空虛即用導藥止可出大腸之糟粕鞭屎而不能通小腸膀胱之氣是導之亦無益也必須仍用煎藥和解為宜但不可遽然多服須漸漸飲之初不受而後自受矣方用開門散白芍五錢白朮五錢茯苓三錢陳皮一錢當歸五錢柴胡三錢蘇葉一錢牛膝三錢車前子三錢炒梔子三錢天花粉三錢水煎一碗緩緩呷之一劑而受矣一受而上關閉再劑而下

格亦通此方直走肝經以解鬱鬱解而關格自痊所謂扼要爭奇也倘用香燥之藥以耗胃氣適足以堅其關門而動其格據矣

此症用通關

散亦效

白芍五錢茯苓三錢甘草三錢神曲各三分白豆蔻一枚川芎二錢生姜汁半合柴胡一錢水煎服一劑即開二劑愈愈後須用補腎之劑

人有無故而忽然上不能食下不能出者胃中脹急煩悶不安大小便窘迫之極人以為關格之症也誰知是少陽之氣不通乎夫少陽膽也膽屬木木氣最喜舒泄因

辨證錄

卷之五 關格

寒氣所襲則木不能條達而氣乃閉矣於是上尅胃而下尅脾胃畏木之刑不敢去生肺氣而併生大腸之氣矣肺金因脾胃之氣不生失其清肅之令而膀胱小腸無所凜遵故一齊氣閉矣此症原可用吐法一吐而少陽之氣升騰可愈其次則用和解之法和其半表半裏之間而膽木之鬱結自通二法相較和勝於吐吐必傷五臟之氣而和則無損五臟之氣也方用和解湯柴胡一錢白芍三錢甘草一錢枳殼五分薄荷一錢茯苓三錢丹皮二錢當歸三錢水煎服緩緩服之三劑則可

以開關矣上關一開而下格自愈此方乃逍遙散之變方也逍遙散有白朮陳皮未嘗不可開關余改用薄荷枳壳丹皮者直入肝經之藥取其尤易於開鬱也此方全不開關而關自開者正以其善於解鬱也

此症用寬緩

湯亦妙

柴胡茯苓各二錢當歸三錢白芍五錢甘草蘇葉黃芩各一錢竹葉三十片水煎服二劑愈

人有吐逆不得飲食又不得大小便此五志厥陽之火太盛不能營於陰遏抑於心胞之內頭上有汗乃心之液外亡自焚於中也存亡之機間不容髮此開格最危之

辨證錄

卷之五 開格

三

症人以爲氣之不通也欲用麝香片腦之類以切開其門必至耗散真氣反致歸陰矣法宜調其營衛不偏陰偏陽一味冲和毋犯胃氣使其臟腑自爲敷布不必問其關從何開格從何啓一惟求之中焦握樞而運以漸透於上下之間自能營氣前通衛氣不閉因其勢而利導之庶無扞格耳方用和中啓關散麥冬五錢人參五分甘草五分栝子仁三錢滑石敲碎一錢黃連一錢白芍五錢桂枝三分天花粉一錢五分水煎服一劑而上吐止再劑而下閉通矣此方解散中焦之火更能舒肝

以平木木氣既平而火熱自滅內中最妙者用黃連與桂枝也一安心以交於腎一和腎而交於心心腎兩交則營衛陰陽之氣無不各相和好陰陽既和而上下二焦安能堅閉乎此和解之善於開關也

此症用黃連啓

心湯亦效

人參一錢白朮丹皮各三錢黃連玄參各二錢甘草一錢桂枝三分半夏五分柴胡三分水煎服二劑愈

人有上吐下結氣逆不順飲食不得入溲溺不得出腹中作疼手按之少可人以此寒極而陰陽易位其脉必瀦而伏也法當吐不吐則死然而不必吐也夫上部無

辨證錄

卷之五 開格

四

脉下部有脉吐之宜也以食填塞於太陰耳今脉瀦而伏非無脉之比况所食之物已經吐出是非食填太陰也吐之不重傷脾胃之氣以堅其閉塞乎夫胃氣之所不閉與大小腸膀胱之所以閉結者由於腎氣之衰也胃爲腎之關門腎之氣不上則胃之關必不開腎主大小便膀胱之氣化亦腎氣化之也腎氣不通於三經則便溲何從而出然則上下開闔之權衡全在乎腎也治法必須大補其腎中之水火腎中之水火足而開格不治而自愈矣方用水火兩補湯熟地一兩山茱四錢

茯神五錢車前子三錢人參二錢麥冬一兩五味子五分肉桂一錢白朮五錢牛膝三錢水煎服連服二劑上吐止而下結亦開矣再服四劑全愈此方補腎中之水火而又能通腎中之氣氣足而上自達於胃下自達於膀胱大小腸矣倘用香燥之藥以救胃則胃氣愈傷倘用攻利之藥以救膀胱大小腸則膀胱大小腸愈損何日是開關解格之日哉

此症用化腎湯亦神效
熟地二兩肉桂二錢水煎服一劑即通二劑全愈

人有一時關格大小便閉結不通渴飲凉水少頃即吐又

辨證錄

卷之五 關格

五

飲之又吐面赤唇焦粒米不能下胃飲一杯吐出杯半脉亦沉伏人以爲脉絕也誰知是格陽不宣腎經寒邪太盛之故乎夫腎屬少陰喜溫而不喜寒也寒邪入腎則陽無所附陽欲杜陰而不能陰且格陽而愈勝於是陽不敢居於下焦而盡逆冲於上焦咽喉之間難於容物而作吐矣夫陽宜陰折熱宜寒折似乎陽熱在上宜用陰寒之藥以治之然而陽熱在上而下正陰寒也用陰寒以折陰寒正投其所惡也不特無功而反有大害蓋上假熱而下真寒非用真熱假寒之法從治之斷不

能順其性而開其關也方用白通湯治之方中原是熱之味得人尿猪膽以亂之則下咽覺寒而入腹正熱陽可重回而陰可立散自然脉通而關啓矣然後以大劑八味湯投之永不至關再閉而吐再發也

此症用加味木
桂湯亦神效
白朮一兩肉桂一錢甘草一分人參二錢丁香
一錢水煎加入人尿半碗探冷服之一劑即安

辨證錄

卷之五 關格

六

中滿門

人有飲食之後胸中倒飽人以爲多食而不能消用香砂枳實等丸消導之似覺少快已而又飽又用前藥久久不已遂成中滿之症腹漸高大臍漸突出肢體漸浮脹又以爲厥脹用牽牛甘遂之藥以逐其水內原無水溼之邪水未見出而正氣益虛脹滿更急又疑前藥不勝復加大黃巴豆之類下之仍然未愈又疑爲風邪固結於經絡用龍膽茵陳防風荆芥之類紛然雜投不至於死不已猶然開鬼門洩淨府持論紛紜各執己見皆操

辨證錄

卷之五 中滿

七

刀下石之徒也誰知中滿之症實由於脾土之衰而脾氣之衰又由於腎火之寒也倘用溫補之藥早健其脾氣何至如此之極哉方用溫土湯人參一錢白朮三錢茯苓三錢蘿蔔子一錢薏仁三錢芡實五錢山藥五錢肉桂三分穀芽三錢水煎服一劑而覺少飽二劑而覺少寬矣數劑之後中滿自除此方但去補脾絕不消導以耗其氣蓋中滿之病未有不因氣虛而成者不補脾胃之氣則脹從何消况方中加入蘿蔔子最妙助參朮以消脹不輔參朮以添邪又有茯苓薏仁芡實山藥之

類益陰以利水水流而正氣不耗自然下澤疏通而上游無阻滯之虞矣第恐水寒冰凍則溪澗斷流又益以肉桂於水中生火則土氣溫和雪消冰泮尤無壅塞之苦也奈何惟事於消導遂成不可救藥之病哉

此症用木苓加桂湯
白朮一兩茯苓五錢肉桂一錢水煎服

人有未見飲食則思既見飲食則厭乃勉強進用飽塞於上脘之間微微脹悶此不止胃氣之虛而心包之火正衰也心包爲胃土之母母氣既衰何能生子心包之火不足又何能生胃哉故欲胃之能食必須補胃土而兼

辨證錄

卷之五 中滿

八

補心包之火也方用生胃進食湯人參三錢白朮三錢炒棗仁五錢遠志八分山藥三錢茯苓三錢神麴五分良薑五分蘿蔔子一錢枳殼五分乾薑炒黑一錢水煎服此方治胃無非治心包也心包與胃原是子母何必分治之乎不治中滿而中滿自除此補火之勝於補土也

此症用調飢散亦妙

人參五分山藥一兩白朮三錢甘草五分肉桂一錢菖蒲五分肉豆蔻一枚炒棗仁三錢水煎服十劑愈
人有中心鬱鬱不舒久則兩脇飽滿飲食下喉即便填脹

不能消化人以爲噉脹之漸也而不知皆氣滯之故倘用逐水之藥必且更甚用消食之藥亦止可取一時之快而不能去永久之脹也法宜開鬱爲主然而氣鬱既久未有不氣虛者也使僅解其鬱而不兼補其氣則氣難化食脹何以消方用快膈湯人參一錢茯苓神五錢白芍三錢白芥子二錢蘿蔔子五分檳榔三分神麴五分枳殼三分柴胡五分薏仁三錢厚朴三分水煎服一二劑輕四劑全愈此方解鬱而無刻削之憂消脹而無壅塞之苦攻補兼施自易收功也

辨證錄

卷之五 中滿

九

此症用行脹

湯亦妙

神麴三錢柴胡五分白芍三錢茯苓蘿蔔子各一錢厚朴人參各五分白豆蔻三枚蘇葉八分白芥子二錢水煎服十劑愈

人有患中滿之病飲食知味但多食則飽悶不消人以爲脾氣之虛誰知是腎氣之虛乎腹中飽悶乃虛飽而非實飽若作水腫治之則喪亡指日矣蓋脾本屬土土之能制水者本在腎中之火氣土得火而堅土堅而後能容物能容物即能容水也惟腎火既虛而土失其剛堅之氣土遂不能容物而容水乃失其天度之流轉矣故

腹飽而作滿即水噉之漸也人不知補腎火以生脾土反用瀉水之法以傷脾無異決水以護土土有不崩者哉是治腎虛之中滿可不急補其命門之火乎然而徑補其火則又不可以腎火不能自生生於腎水之中也但補火而不補水則孤陽不長無陰以生陽即無水以生火也或疑土虧無以制水又補腎以生水不益增波以添脹哉不知腎中之水乃真水也邪水欺火以侮土真水助火以生土實有不同故腎虛中滿必補火以生土又必補水以生火耳方用金匱腎氣丸茯苓六兩附

辨證錄

卷之五 中滿

十

子一枚牛膝一兩肉桂一兩澤瀉二兩車前子一兩五錢山茱萸二兩山藥四兩牡丹皮一兩熟地三兩各爲末蜜爲丸每日早晚白滾水送一兩初服少脹久服脹除而滿亦盡消補火之聖藥也羣藥之內利水健脾之味多於補陰補火者雖意偏於補火而要實重於救脾補火者正補脾也故補陰不妨輕而補脾不可不重耳

此症用黨脾湯亦佳

熟地白朮各五錢山茱萸四錢破故紙一錢杜仲三錢附子五分水煎服二劑而飽悶除十劑全愈

翻胃門

人有飲食入胃而即吐者此肝木尅胃土也用逍遙散加吳茱萸炒黃連治之隨手而愈而無如人以爲胃病也雜用香砂消導之劑反傷胃氣愈增其吐又改用下藥不應復改用寒涼之味以降其火不獨胃傷而脾亦傷矣又改用辛熱之藥以救其寒又不應始悟用和解之法解鬱散邪然已成噎膈之症矣夫胃爲腎之關門腎中有水足以給胃中之用則咽喉之間無非津液可以推送水穀腎水不足力不能潤灌於胃中又何能分濟

辨證錄

卷之三 翻胃

十一

於咽喉乎咽喉成爲陸地水乾河涸舟膠不前勢所必至且腎水不足不能下注於大腸則大腸無津以相養久必瘦小而至艱澀腸既細小艱澀飲食入胃何能推送下既不行必積而上汎不特上不能容而吐抑亦下不能受而吐也治法必須大補其腎中之水方用濟艱催輓湯熟地二兩山茱一兩當歸二兩牛膝三錢玄參一兩車前子一錢水煎服一日一劑十劑必大順也此方純補精血水足而胃中有津大腸有液自然上下相通而無阻滯之患譬如河漕水淺舟楫不通糧糈不能

輸運軍民莫不徬徨而喧譁擾攘忽見大雨滂沱河渠溝壑無非汪洋大水則大舸巨舶得以裝載糗糧自人情踴躍關門大開聽其轉運而無所留難也

此症用制用

散亦效甚

白芍一兩吳茱萸五分黃連一錢茯苓五錢水煎服二劑即愈何至變成噎膈哉

人有朝食暮吐或暮食朝吐或食之一日至三日而盡情吐出者雖同是腎虛之病然而有不同者一食入而即吐一食久而始吐也食入而即出者是腎中之無水食久而始出者乃腎中之無火也蓋脾胃之土必得命門

辨證錄

卷之五 翻胃

十二

之火以相生而後土中有溫熱之氣始能發生以消化飲食倘土冷水寒結成冰凍則下流壅積必返而上越矣治法宜急補腎中之火然而單補其火則又不可腎火非腎水不生腎火離水則火又亢炎矣况上無飲食之相濟則所存腎水亦正無多補火而不兼補其水焚燒竭澤必成焦枯之患濟之以水毋論火得水而益生水亦得火而更生水火既濟自然上下流通何至有翻胃之疾哉方用兩生湯肉桂二錢附子一錢熟地二兩山茱萸一兩水煎服一劑而吐減半再劑而吐更減

連服四劑則吐止矣服十劑而全愈也此方水火兩旺脾胃得火氣而無寒涼之虞得水氣而無乾澀之苦自然上可潤肺而不阻於咽喉下可溫臍而不結於腸腹矣或謂下寒者多腹痛反胃既是腎寒正下寒之謂也宜小腹作痛矣何以食久而吐之病絕不見腹痛豈腎寒非歟不知寒氣結於下焦則腹必疼痛今反胃之病日日上吐則寒氣盡從口而趨出矣又何寒結之有

此症用加味化腎湯亦神效

熱地二兩山茱萸一兩肉桂三錢巴戟天五錢水煎服二劑吐輕十劑全愈

辨證錄

卷之五 翻胃

三

人有時而吐時而不吐吐則盡情吐出此症有似於反胃而非翻胃也此種之病婦人居多男子獨少蓋因鬱而成之也夫鬱則必傷其肝木之氣肝傷木即下尅脾胃肝性最急其尅土之性亦未有不急者其所尅之勢胃土苦不能受於是上越而吐木怒其土之不順受也於是挾其鬱結之氣捲土齊來盡祛而出故吐之不盡不止其有時而不吐者因木氣之少平耳治法不必止吐而惟在平肝方用逍遙散柴胡一錢白芍五錢茯苓三錢白朮一錢當歸三錢陳皮三分甘草一分水煎服一

本方則曰
參苓白朮
平肝則吐
亦必參

劑而吐少止再劑而吐全愈後仍以濟艱催輓湯減半分兩調理可也蓋逍遙散解鬱之後其木枯渴可知隨用濟艱催輓湯急補其水則木得潤而滋榮自然枝葉敷榮矣何至拂鬱其性而作吐哉

此症用增減逍遙散亦神效

白芍五錢茯苓白朮各三錢陳皮柴胡神曲各一錢白豆蔻一粒水煎服四劑愈

辨證錄

卷之五 翻胃

十四

人有胃中嘈雜腹內微疼痰涎上湧而吐嘔日以爲常蓋蟲作祟非反胃也夫人有水濕之氣留注於脾胃之間而肝木又旺來尅脾胃之土則土虛而生熱此熱乃肝木之火虛火也土得正火而消食土得虛火而生虫虫得肝木之氣其性最急喜動而不喜靜飢則微動而覓食飽則大動而跳梁挾水穀之物與波鼓浪而上吐矣然但吐水穀而不吐虫者何故蓋肝木之虫最靈畏金氣之尅居土則安入金則死故但在胃而翻騰不敢越胃而遊樂祛水穀之出胃而彼且掉頭而返恐出於胃爲肺金之氣所殺也治法必用殺虫之藥佐以瀉肝之味然而瀉肝殺虫之藥未免寒涼尅削肝未必遽瀉而脾胃先已受傷脾胃受傷而虫亦未能盡殺必須於穢

去得正火
而消食土
得虛火而
生虫亦劇
缺也細思
之即是至

濟艱催輓湯

脾健胃之中而行其斬殺之術則地方寧謐而盜賊難
以盤踞庶幾可盡戮無遺常靜而不再動也方用健土
殺虫湯人參一兩茯苓一兩白芍一兩炒梔子三錢白
薇三錢水煎半碗加入黑驢溺半碗和勻飢服一劑而
吐止不必再劑虫盡死矣夫驢溺何以能殺虫而止吐
也驢性屬金虫性畏金故取而用之世人有單用此味
而亦效者然而僅能殺虫而不能健土土弱而肝木仍
旺已生之虫雖死於頃刻而未生之虫不能保其不再
生也健土殺虫湯補脾胃以扶土即瀉肝以平木使木

辨證錄

卷之五 補胃

二五

氣既平不來尅土且土旺而正火既足則虛邪之火無
從而犯虛熱不生而虫又何從而生乎况方中梔子白
薇原是殺虫之聖藥同驢溺用之尤能殺虫於無形此
拔本塞原之道不同於單味偏師取勝於一時者也

此症用鋤種

湯亦神效

練樹根一兩檳榔厚朴炒梔子百部各一錢白木茯
苓史君子肉各三錢水煎服後不可用飲食須忍
飢半日尤不可飲茶
水二劑虫盡死而愈

人有食後必吐出數口却不盡出膈上時作聲面色如平
人人以為脾胃中之氣塞也誰知是膈上有痰血相結

而不散乎夫膈在胃之上與肝相連凡遇怒氣則此處
必痛以血之不行也血不行則停積而血成死血矣死
血存於膈上必有碍於氣道而難於升降氣血阻住津
液遂聚而成痰痰聚而成飲與血相搏而不靜則動而
成聲本因氣而成動又加食而相犯勢必愈動而難安
故必吐而少快也至食已入胃胃原無病胃自受也寧
肯茹而復吐乎此所以既吐而又不盡出耳然則治法
但去其膈上之痰血而吐病不治而自愈也方用瓜蒂
散加味吐之瓜蒂七枚蘿蔔子三錢韭菜汁一合半夏

辨證錄

卷之五 補胃

二六

三錢天花粉三錢甘草三錢枳壳一錢人參一錢水煎
服一劑即大吐去痰血而愈不必二劑也瓜蒂散原是
吐藥得蘿蔔子枳壳以消食得半夏天花粉以蕩痰得
韭汁以逐血誠恐過於祛除未免因吐而傷氣又加入
人參甘草以調和之使胃氣無損則積滯易掃何至惡
食而再吐哉此非反胃因其食後輒吐有似於反胃故
同反胃而共論之也

此症用清膈

散甚佳

天花粉桑白皮各三錢生地白芍各五錢紅花三錢
桃仁十箇杏仁十箇枳壳五分甘草一錢紫苑一錢

水煎服四劑全愈

駁脹門

人有兩足跗上先腫漸漸腫脹至腹按脹上如泥之可搏小便不利大便反結此由土氣之鬱非水腫也人生脾胃之氣健旺則土能尅水而水自灌注於經絡兩不相碍也惟脾胃氣虛則土不能轉輸水精於上而胃中之水積而不流於是浸淫於表裏皮毛而無所不到也然而脾胃氣虛非脾胃之故也由於腎氣之虛則土無升騰之氣而土乃鬱而不伸力不能制水使水來相侮而脾胃之氣愈虛也夫腎司開闔腎氣從陽則開腎氣從陰則闔陽太盛則水道大開陰太盛則水道常閉陽為腎中之火而陰為腎中之寒也腎寒則脾胃亦寒水畏熱而不畏寒此寒土之所以難制水也然則治水腫之法烏可舍補腎之火而他求畜水之土哉雖然水勢滔天補火以生土迂緩而難以決排放水以全土利便而易於畜泄故補腎中之火可治久病之水腫洩脾胃中之水實益初病之水脹也下身脹而上身未脹正初起之病宜急洩其水之為得方用洩水至神湯大麥蘗二兩茯苓一兩白朮二兩小赤豆三錢水煎服一劑而腹

辨證錄

卷之五 腫脹

駁脹門

水

必雷鳴瀉水如注再劑而水盡泄無遺不必三劑也論
理牽牛甘遂之方未嘗不可用但慮世人天稟日薄而
脾胃腎三經多虛恐不勝藥力之過迅故改立此方於
補中瀉水正氣無傷而邪水盡出之為妙方中白朮茯
苓健脾胃之土又能通脾胃之氣則土之鬱可解土鬱
既解力足以制水矣况大麥蘗能消無形之水赤小豆
能洩有形之溼合而相濟自能化水直出於膀胱由尾
閭之間盡瀉而出也

此症用冬瓜
湯亦甚效

辨證錄

卷五

冬瓜一箇煎水十碗另用白朮三兩車前子五錢肉
桂二錢將冬瓜水煎湯二碗先用一碗少頃又用一
碗其水從大便而出
一劑而脹腫全消

人有水腫既久遍身手足俱脹面目亦浮口不渴而皮毛
出水手按其膚如泥此真水腫也乃土氣鬱塞之甚故
耳夫土本剋水何為反致水侮蓋土虛則崩土崩則淤
泥帶水而流緩於是日積月累下焦阻滯而水乃上泛
脾胃之中原能藏水然水過於多則脾胃不能受乃散
布於經絡皮膚矣迨至經絡皮膚不能受勢不得不流
於皮膚之外泛濫於一身不用下奪之法何以瀉滔

天之水哉方用決水湯車前子一兩茯苓二兩王不留
行五錢肉桂三分赤小豆三錢水煎服一劑而小便如
注不絕二劑而腫脹盡消矣論理用雞屎醴逐水亦有
神效然而雞屎醴逐水從大便而出而此方逐水從小
便而出也水從大便出者其勢逆水從小便出者其勢
順逆則效速而氣傷順則效緩而氣固此方利水從小
便而出利其膀胱也凡水必從膀胱之氣化而後由陰
器以出土氣不宜則膀胱之口閉吾用王不留行之迅
藥以開其口加入肉桂引車前茯苓赤小豆直入膀胱

辨證錄

卷五

而利導之茯苓車前雖利水而不耗氣而茯苓且是健
土之藥水決而土又不崩此奪法之善也至於臍突手
掌無紋用此方尚可救也惟是服此方瀉水而愈必須
禁用食鹽一月倘不能禁則又脹矣脹則不可再治也

此症亦可用冬瓜湯更加劉寄奴
一兩茯苓一兩服之亦水瀉而愈

人有氣喘作脹腹腫小便不利大便亦溇漸漸一身俱腫
人以爲水腫也不知乃肺脾胃三經之虛也夫水氣不
能分消大都病在胃然胃之所以病者正由於三經之
虛耳胃爲水穀之海凡水入於胃爲歸蓋五臟六腑之

肺腎三經之虛亦成喘脹等症

大源也但胃能容水而不能行水所恃脾之散水以行於肺肺之通水以入於膀胱腎之化水而達於小腸也惟脾虛則不能散胃之水精於肺而病在中矣肺虛則不能通胃之水道於膀胱而病在上矣腎虛則不能司胃之關門時其輪泄而病在下矣三經既虛而胃中積水浸淫遂遍走於經絡皮膚而無所底止矣治法補其三經之氣而胃氣自旺胃氣旺而腫脹盡消方用消脹丹白朮三錢茯苓一兩麥冬五錢熟地五錢山藥一兩芡實五錢蘇子一錢水煎服一劑而喘少定二劑而脹漸消十劑而小便利二十劑而一身之腫無不盡愈也方中白朮茯苓以健其脾土麥冬蘇子以益其肺金熟地山藥芡實以滋其腎水自然脾氣旺而不至健運之失職肺氣旺而不至治節之不行腎氣旺而不至關門之不開水自從膀胱之府而盡出於小腸矣安得而再脹哉

此症用百合消脹湯亦效

白朮芡實各一兩茯苓百合各五錢山藥一兩肉桂二錢人參三錢水煎服十劑少愈三十劑全愈

人有腰重脚腫小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫喘急痰

脾胃得火始得制水然得火者必得腎中之火也

盛不可以臥此肺腎俱虛之病非熾脹也夫水症多是脾胃之虛茲何以肺腎之虛亦成水脹耶不知肺虛必盜脾胃之氣而腎虛則不能生脾胃之氣二經既虛則脾胃之氣更虛土難生金而肺之氣化不行而腎之關門不開矣於是水不能消而泛濫一如水腫之病也治法似宜補肺而兼補腎然而補肺又不若竟補腎之為得蓋肺雖生腎然止能生腎水而不能生腎火也脾胃必得腎火以相生水氣必得腎火以相化况補腎則肺不必來生腎水而肺金自安矣是補腎即所以補肺也

辨証錄 卷之五 熾脹 三

大非真水不生故又於水中補之

方用金匱腎氣丸茯苓十兩附子一箇牛膝三兩官桂二兩熟地四兩山藥六兩丹皮二兩澤瀉四兩車前子三兩山茱萸二兩各為末蜜為丸每日早晚白滾水各送下一兩服三日而小便利再服三日而腰輕服十日而上下之腫盡消服二十日而喘急痰盛無不盡除服一料完全愈再服一料斷不再發也此方經後人改竄分兩以致治肺腎之水脹多至不效因世人畏茯苓澤瀉之過於泄水耳不知水勢滔天既不用掃蕩之藥以決水乃畏利導之品而不用之以消水乎故必須多用

茯苓車前為君則水可泄之使從膀胱而下出然而腎之關門不開非附子肉桂回陽助火以蒸動腎氣則關何以開腎關不開而胃之積水何以下哉故必用桂附以開關關既開矣則茯苓車前牛膝得盡利水而直下又恐水過於利未免損傷陰氣得熟地山藥丹皮以佐之則利中有補陽得陰而生則火無炎亢之虞土有升騰之益誠治水之神方補土之妙藥也世人倘疑吾說之偏而妄增藥味或更改輕重斷不能收功也

此症用溫腎消水湯亦效

辨證錄

卷之五 臟腑

三

人參三錢熟地五錢山藥一兩山茱萸三錢茯苓一兩肉桂二錢薏仁五錢水煎服二十劑即愈

人有手足盡脹腹腫如臛面目亦浮皮膚流水手按之不如泥但陷下成孔手起而脹滿如故飲食知味大便不澀泄小便閉澀氣喘不能臥倒人以爲水臛之症而不知乃腎水之衰也真水足而邪水不敢橫行真水衰而邪水乃致泛決况真水既衰則虛火必盛虛火既盛而真水力不能制則火性炎上三焦之火與衝脉之屬火者皆同羣助逆無不澀冲而上行矣火既上冲而水從火泛上走於肺喘嗽而不寧矣臥主腎腎氣既逆安得

補腎火以生土則脾胃健而水化人多知之者乎

辨證錄

卷之五 臟腑

三

而臥耶人至不得臥則肺氣夜不得歸於腎之中而腎之中水空而無非火氣則肺之氣不敢久留於腎仍歸於肺經母因子虛則清肅之令不行於膀胱於是水入於膀胱之口而膀胱不受乃散聚於陰絡隨五臟六腑之虛者入而注之不走小腸而走手足皮膚而毛竅出水也此種水症必須補腎之水以制腎火尤宜補肺之金以生腎水蓋腎水不能速生惟助肺氣之旺則皮毛閉塞而後腎氣下行水趨膀胱而不走腠理矣方用六味地黃湯加麥冬五味治之熟地二兩山茱萸一兩山藥一兩茯苓二兩丹皮六錢澤瀉一兩麥冬一兩北五味三錢水煎服一劑可臥二劑水如注四劑而一身之腫盡消十劑而諸症全愈愈後服補腎肺之藥尤須戒色至一年禁鹽至三月否則雖愈而必發也蓋此症原有腎火故補水而不必補火也腎虛以致火動肺虛以致水流補其水則火自靜補其金則水自通實有至理而非泛然以作論也

此症用健腎湯亦佳

熟地茯苓各二兩麥冬蓮子連心用各五錢芡實山藥各一兩水煎服二劑而脹消十劑全消

人有單腹脹滿四肢手足不浮腫經數年不死者非水臌也蓋水臌不能越兩年未有不皮膚流水而死者今經數年不死皮膚又不流血豈是水臌之症乃虫結於血之中似臌而非臌也夫此症何因而得飲食之內或食生菜而有惡虫之子入腹而生虫或食難化之物久變為虫血即裹之不化日積月累血塊漸大虫生遂多所用食物止供虫食即水穀入腹所化之血亦為虫之外郭而不能灌注於各臟腑矣此等之症最忌小便不利與胃口不健者難以醫療倘小便利而胃口開均可治

辛酉錄 宋之二工 職 三

之蓋小便利者腎氣能通於膀胱也胃口開者心氣能行於脾胃也二臟之氣有根可用殺虫下血之藥而無恐以其本實未撥也方用逐穢消脹湯白朮一兩雷丸三錢白薇三錢甘草一錢人參三錢大黃一兩當歸一兩丹皮五錢蘿蔔子一兩紅花三錢水煎服一劑腹內必作雷鳴少頃下惡物滿桶如血如膿或有頭無足之虫或色紫色黑之狀又服一劑大瀉大下而惡物無留矣然後以人參一錢茯苓五錢薏仁一兩山藥二兩白芥子一錢陳皮五分白朮二錢調理而安前方用攻於

此症之脈
胃氣健者
可用攻法
若胃弱者
尚須斟酌
雖逐穢湯
補多於攻
亦未可輕
用也

補之中雖不至大傷臟腑然大瀉大下畢竟元氣少損故穢盡之後即以參苓薏藥之類繼之則脾氣堅固不憊亡陰之禍也或問此等之病既非水臌初起之時何以知其是虫臌與血臌也吾辨之於面焉凡面色澹黃之中而有紅點或紅紋者是也更驗之於腹焉凡未飲食而作疼既飲食而不痛者是也荷面有紅點紅紋與既飲食而不痛即可用逐穢消脹湯減半治之亦一劑而即愈也但下後毋論新久必須忌鹽者一月苟若不忌必至再病則難治矣

辨錄 卷之二工 職 三

人有上身先腫因而下身亦腫久之一身盡腫氣喘嗽不得臥小腹如光亮之色人以爲水臌已成誰知是水臌之假症乎夫溼從下受未聞溼從上受者也凡人脾土健旺必能散精於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行何致水氣之上侵惟脾土既虛飲食不化精而化水乃邪水而非真水也真水既無所生則腎中乾涸

此症用雷逐
丹亦神效
雷丸三錢當歸白芍各五錢紅花一兩雄黃厚朴檳榔各二錢枳實甘草各一錢水煎服一劑下惡穢一愈

無非火氣於是同任衝之屬火者俱逆而上出是水從

火溢上積於肺而嗽奔越於肺而喘既喘且嗽身自難

臥散聚於陰絡而成跗腫故先上腫而後下腫也似乎

治法亟宜治腎矣然而火盛由於水衰而水衰實先由

於土衰也補土其可緩乎惟是既補脾以健土必至燥

腎以旺火故補脾又必須補腎而補腎又必須補脾所

貴二者之兼治也方用二天同補丹山藥一兩芡實一

兩茯苓五錢白朮二兩肉桂三分訶子一錢百合五錢

水煎服二劑而喘嗽輕又二劑而喘嗽止十劑而腫脹

消再十劑全愈此方無一味非治脾之藥即無一味非

補腎之藥也健其土而不虧夫腎滋其水而不損於脾

兩相分消而又兩相資益得利之功而無利之失治水

臟之假症實有鬼神不測之妙也

此症用芡實湯亦效

白朮芡實各二兩茯苓一兩肉桂一錢車前子五錢水煎服二劑輕四劑又輕十劑愈

脾胃虛弱 實是至道 莫能其用 藥之太多 體疑為尚

厥症門

人有日間忽然發熱一時厥去手足冰涼語言惶惑痰迷

心竅頭暈眼昏此陽厥也乃陰血不歸於陽氣之中而

內熱如焚外反現假寒之象故手足冷也此等之症傷

寒中最多但傷寒之厥乃傳經之病必熱至五六日而

發厥非一日身熱而即發厥者也故不可用傷寒之法

以治此等之厥然而雖不同於傷寒而內熱之深正未

嘗少異夫厥乃逆也逆肝氣而發為厥厥乃火也逆火

氣而發為熱熱深而厥亦深熱輕而厥亦輕故不必治

厥也治熱而已矣惟是厥發於日陽離乎陰也無陰則

陽無所制離陰則陽無所依陽在裏而陰在表自然熱

居中而寒現外矣治法瀉其在內之火則內熱自除而

外寒自散然而火之有餘仍是水之不足瀉火之中而

佐之補水之味則陽得陰而有和合之歡斷不至陰離

陽而有厥逆之戾也方用安厥湯人參三錢玄參一兩

茯苓三錢白薇一錢麥冬五錢生地五錢天花粉三錢

炒梔子三錢白芍一兩柴胡五分甘草一錢水煎服一

劑而厥定再劑而身涼矣凡日間發厥之症俱可治之

人之一見 厥症不論 日數之多 亦必由傷 寒治之 藥亦何

瀉火而佐 以補水 治厥之妙

辨證錄

卷之五

厥症

無不神效此方和合陰陽實有調劑之妙助陽氣而不助其火生陰氣而不生其寒祛邪而不損其正解鬱而自化其痰所以定厥甚神返逆最速也

此症用黃連定厥湯亦效

黃連二錢當歸五錢麥冬五錢玄參一兩貝母三錢菖蒲五分水煎服一劑即回二劑愈

人有夜間發熱一時厥逆昏暈如死人狀惟手足溫和喉中痰响不能出聲此陰厥也乃陽氣虛而不能入於陰血之中以致鬼神憑之往往厥逆也直中陰寒之症多有一時發厥者但彼乃陰寒而猝中此乃陰熱而暴亡

各

各有不同陰寒之厥手足筋脉多青灌之水必吐

熱

之厥手足筋脉多紅飲之水必不吐陰寒之厥身必不

熱陰熱之厥身必不涼以此辨之不差毫髮故陰寒之厥舍參附無奪命之丹陰熱之厥飲參附即喪身之禍

治陰熱之厥法宜補陰以助陽使真陰足而邪陰自散陽氣旺而虛火自消庶痰涎化昏暈除厥逆定矣方用

補陰助陽湯玄參一兩麥冬一兩熟地一兩人參二錢

白芥子五錢柴胡一錢白芍一兩當歸一兩白朮一兩

茯苓五錢菖蒲一錢水煎服一劑而昏迷甦再劑而痰

涎化三劑而厥逆回則可生也否則不可救矣此方補

陰之藥多於補陽陰水足而陰火可散陰火散而陽氣

可回陰陽合而昏迷宜甦矣倘服之而不效是陰陽早

已相脫不能再續也非前藥之故耳或曰陽氣虛而難

陰是宜單補陽以入陰今補陰以合陽恐非治法不知

陽氣虛而不能入於陰血之中者以陰血之大燥火盛

而虛陽不敢入於陰耳非陰血過多之謂也苟補陽過

勝則陽旺而陰益消亡此所以必須補陰以合陽而萬

不可補陽以勝陰也况方中未嘗無補陽之藥補陰居

其七補陽居其三陰陽始無偏勝而厥逆可援也

此症用解暈神丹亦效

人參半夏各二錢茯苓五錢南星一錢天麻烏藥陳皮菖蒲各五分當歸三錢柴胡一錢水煎服

人有日間發厥而夜間又厥夜間既厥而日間又復再厥身熱如火痰涎作聲此乃陰陽相併之厥也熱多則厥

亦多用瀉火之藥則熱除而厥亦除矣然而厥既有晝

夜之殊而熱亦有陰陽之異正未可徒瀉夫火也宜於

瀉陽之中而用補陰之藥於抑陰之內而用補陽之劑

庶幾陽火得陰而消陰火得陽而化提陽出於陰而日

是治厥妙
升陰入陽
是治厥妙

間無昏暈之虞升陰入於陽而夜間無迷眩之害也方
用旋轉陰陽湯人參一錢白朮三錢白茯苓三錢白芍
五錢當歸三錢生地五錢麥冬三錢附子一分炒梔子
二錢天花粉三錢柴胡一錢水煎服一劑而厥逆安矣
不必再劑也此方陰陽雙補痰火兩瀉補瀉兼施不治
厥而厥自定也倘或補陰而不補陽或瀉陽而不抑陰
則陰陽必有偏勝而痰火必致相爭變出非常有不可
救藥者矣

此症用息爭
湯亦甚效

辨證錄

卷五

辨證錄

柴胡神麴各二錢甘草一錢炒梔子天花粉各三
錢茯苓五錢生地一兩水煎服一劑即安二劑愈

人有大怒之後又加拂抑事不如意忽大叫而厥吐痰如
湧目不識人此肝氣之逆得痰而厥也夫肝性最急急
則易於動怒怒則氣不易泄而肝之性更急肝血必燥
必求救於脾胃以紛取資然而血不能以驟生脾胃出
水穀之液以予肝未遑變血勢必迅變為痰以養肝肝
又喜血而不喜痰痰欲入於肝而肝不受必至痰阻於
肝外以封閉夫肝之竅矣肝不能得痰之益反得痰之
損則肝之燥結可知既無津液之灌注必多炎氛之沸

提透心竅
如未開痰
心竅也

可通安在
不發獨不
可通

騰痰閉上而火起下安得不冲擊而成厥哉治法宜去
其痰而厥乃定也然而去痰必須平肝而平肝在於解
怒方用平解湯香附五錢當歸五錢天花粉三錢半夏
二錢茯苓三錢神麴二錢麥芽二錢炒梔子二錢黃連
五分甘草一錢水煎服一劑厥輕再劑厥定三劑全愈
此方解肝氣之拂逆實有神功在清熱而不燥導痰而
不峻也

此症用三白
散亦效

辨證錄

卷五

辨證錄

白芍川芎各五錢梔子茯苓神天花粉各三錢當歸五
錢白豆蔻二枚南星菖蒲枳殼各一錢水煎服二劑

人有怒輒飲酒以為常不醉不休一日發厥不知人事稍
蘇猶呼酒號叫數次復昏暈人以為飲酒太醉故也誰
知是膽經之火動乎夫肝與膽為表裏肝氣逆則膽氣
亦逆肝火動則膽火亦動酒入臟腑必先入膽酒滲入
膽則酒化為水矣然而酒性大熱飲酒過多酒雖化水
而酒之熱性不及分消必留於膽中况怒氣傷肝則肝
火無所發泄必分流而入於膽膽得酒之熱又得肝之
火則熱更加熱矣夫肝膽為心之母母熱必呼其子以

世人多以
酒解怒誰
知得酒而
愈怒加怒
以酒解怒

得解時
飲也

解氣自然膽熱必移熱以予心而心不可受熱乃變而為厥矣治法亟解心中之熱而心熱非起於心也仍須瀉膽之熱而膽之熱非本於膽也仍須瀉肝之熱以解酒之熱而已方用逍遙散加味治之柴胡一錢白芍一兩茯苓五錢白朮五錢甘草二分陳皮五分當歸二錢葛花二錢炒梔子三錢白芥子三錢水煎服一劑厥輕二劑厥定三劑全愈逍遙散治鬱實奇佐之梔子以瀉火益之葛花以解酒加之白芥子以消痰酒病未有不溼者溼則易於生痰去其溼而痰無黨去其痰而火無勢溼既無黨火又無勢雖欲再厥其可得乎方中所以多用茯苓白朮以補助柴胡白芍者正此意也

此症用醒腦湯亦效

乾葛朮木枝各一錢人參二錢茯苓神三錢白芍五錢黃連半夏各五分吳茱萸二分水煎服一劑即效四愈

人有一過午時吐酸水一二碗至未時心前作痛至申痛甚厥去不省人事至戌始甦日日如是人以為陰分之熱也誰知是太陽膀胱之經有瘀血結住而不散乎但小便不閉是膀胱之氣未嘗不化也氣乃無形之物無

形能化若有瘀血結住而不散者以血有形不比氣之無形而可散也未申之時正氣行膀胱之時也氣行於血之中而血不能行於氣之內所以作痛而發厥欲活其血之瘀非僅氣藥之能散也必須以有形之物制血則氣可破血而無阻滯之憂矣方用逐血丹當歸尾一兩大黃三錢紅花三錢桃仁二十粒天花粉三錢枳殼五分厚朴二錢丹皮三錢水蛭火煨燒黑一錢水煎服一劑而瘀血通二劑而瘀血盡散此方用水蛭同入於大黃厚朴之中以逐有形之血塊則病去如掃而痛與厥盡去也倘不用水蛭雖亦能止厥定痛而有形之血塊終不能盡逐必加入水蛭而建功始神不可以此物為可畏而輕棄之遺人終身之病也

此症用破瘀丹亦神

水蛭炒乾黑二錢當歸白芍各一兩茯苓三錢肉桂三分桃仁十四箇生地五錢枳殼五分猪苓一錢水煎服二劑全愈

人有忽然之間如人將冷水澆背陡然一驚手足厥冷遂不知人已而發熱則漸漸甦省一日三四次如此人為祟乘之也誰知乃氣虛之極乎夫氣所以衛身者也

辨證錄

卷之五 厥症

三

辨證錄

卷之五 厥症

三

寒氣非寒
辨得明白

氣盛則體壯氣衰則體怯外寒之侵乃大氣之微也內
氣既微原不必外邪之襲無病之時常覺陰寒逼身如
冷水澆背正顯內氣之微何崇之來憑乎然而內熱之
極亦反生寒顛所謂厥深熱亦深與氣虛之極亦生寒
顛者似是而非苟不辨之至明往往殺人於頃刻可不
慎歟辨之之法大約內熱而外寒者脉必數而有力而
舌必乾燥也氣虛而外寒者脉必微而無力而舌必滑
潤也故見氣虛之症必須大補其氣而斷不可益之大
寒之品方用甦氣湯人參一兩陳皮一錢枳殼三分葛
蒲五分水煎服一劑輕二劑更輕連服數劑全愈此方
重用人參以補氣也陳皮枳殼寬中消痰則人參甦
氣更為有神益之葛蒲者引三味直入心中則氣不能
散於心外也

此症用助氣回
陽湯亦效

人參黃芪各五錢南星二錢甘草一錢茯苓三錢
枳殼五分砂仁三粒水煎服二劑效四劑全愈

辨證錄

卷之五 厥症

三

春溫頭痛
其傷寒頭
痛似此而
非千古疑
難一劑說
被豈不大
快

春溫門

一春月傷風頭痛鼻塞身亦發熱是傷風而欲入於太陽
非太陽之傷寒也夫春傷於風由皮毛而入肺也風入
於肺而不散則鼻為之不利肺金之氣不揚自失其清
肅之令必移其邪而入於太陽膀胱惟恐邪入乃堅閉
其口而水道失行於是水不下通而火乃炎上頭自痛
矣與傳經太陽之傷寒絕不相同散肺金之風杜其趨
入膀胱之路而身熱自退也方用舒肺湯桔梗三錢甘
草一錢蘇葉五分天花粉一錢茯苓三錢桂枝三分水
煎服一劑而身熱解二劑而頭痛鼻塞盡愈此方專入
肺金以散其風邪有風則必生痰有痰則必有火天花
粉消痰而又善解火一味而兩用之也桂枝茯苓開膀
胱之口引邪直走膀胱而下洩因肺欲移邪而移之其
勢甚便隨其機而順用之也

此症用加味甘
桔湯亦佳

桔梗川芎天花粉麥冬各三錢甘
草黃芩各一錢水煎服二劑愈

一春月傷風身熱咳嗽吐痰惡熱口渴是傷風而陽明之
火來刑肺金非傷寒傳經入於陽明也夫陽明胃土本

辨證錄

卷之五 春溫

三

生肺金何以生肺者轉來刑肺乎蓋肺乃嬌臟風入肺
及致火來
則肺不
傳經之胃
大竟水尅
即也亦
四邪

今而天氣
大冷感

生肺金何以生肺者轉來刑肺乎蓋肺乃嬌臟風入肺
經必變為寒胃為肺金之母見肺子之寒必以熱濟之
夫胃本無熱也心火為胃之母知胃欲生金乃出其火
以相助然而助胃土之有餘必至尅肺金之不足是借
其兵以討賊反致客兵殘民故胃熱而肺亦熱而咳嗽
口渴之症生矣治法瀉心火以安胃土自然肺氣得養
而風邪自散方用平邪湯黃連三分甘草一錢蘇梗一
錢紫苑一錢葛根一錢石膏三錢麥冬五錢貝母三錢
茯苓三錢水煎服一劑輕二劑又輕三劑身涼矣不必
四劑也此方瀉心火者十之三瀉胃火者十之六蓋心
火之旺尅肺者輕胃火之旺刑金者重輕瀉心中之火
則心不助胃以刑金重瀉胃中之火則胃不刑金以傷
肺肺氣既回肺邪又安留哉

此症用清胃
散亦效

石膏半夏各二錢茯苓三錢桂枝三分麥
冬三錢陳皮葛根各一錢水煎服一劑愈

一春月傷風發寒發熱口苦兩脇脹滿或吞酸吐酸是少
陽之春溫也何以冬月謂之傷寒而春月即謂之春溫
耶不知冬月之風寒春月之風溫寒則傷深溫則傷淺

風寒者竟
是傷寒非
引以為傷
風也
風寒入裏
風溫出表
兩言皆對
春溫之首

傷深者邪至少陽而有入裏之懼傷淺者邪入少陽而
即有出表之喜故同傷少陽而傷風與傷寒實有異也
至於治傷風之少陽法又不必大異皆舒其半表半裏
之邪而風邪自散雖然傷寒邪入少陽有入裏之症往
往用大柴胡與承氣之類和而下之若傷風入少陽以
小柴胡湯和解而有餘不必用大柴胡承氣而重用之
也方用加減小柴胡湯柴胡一錢五分茯苓三錢黃芩
一錢甘草一錢陳皮五分天花粉一錢水煎服一劑寒
熱解再劑諸症愈此方較原方更神以用茯苓之多使
邪從膀胱而出更勝於和解也佐柴胡以散邪乃建奇
功耳

此症用安
湯亦效

柴胡天花粉炒梔子各二錢甘草一
錢白芍丹皮各三錢水煎服二劑愈

一春月傷風身熱嘔吐不止人以為太陰之傷寒也誰知
是太陰之春溫乎夫太陰脾土也風傷太陰則土中有
風風在地中則土必震動而水溢故令人嘔吐不止非
陰寒之氣入於脾土之內而動人嘔吐者可比此與傷
寒傳經之入太陰者治法迥不相同也傷寒當溫其經

小柴胡湯
考藥錄
其酸也

辨證錄 卷之五 春溫 三

以回陽而傷風宜散其風以安土方用奠土湯白朮五錢茯苓三錢人參柴胡半夏甘草葛根各一錢神曲五分水煎服一劑而風散二劑而身涼三劑而病全愈矣方中祛邪於補脾之內脾健而風自息也

此症亦可用

護脾飲

白朮三錢人參二錢肉桂三分陳皮三分半夏一錢蘇葉五分水煎服一劑愈

一春月傷風出汗胃乾燥渴欲飲水是春溫之症火邪入

膀胱非太陽之傷寒也夫膀胱者肺金之表也肺受風

邪久則變熱肺乃求救於膀胱邪即乘其求救而下行

辨證錄

卷之五 春溫

三

而膀胱之水思欲救母乃不肯下泄而上與風火相鬪

邪見膀胱正氣之盛乃不入膀胱而入胃於是胃熱而

與邪相爭故爾出汗汗出而胃之津液自乾故口渴思

水以救其內焚也治法不必散風邪而瀉火焰速利其

膀胱使水從小便而出則胃中之津液自生方用五苓

散白朮一錢茯苓三錢澤瀉三錢猪苓三錢肉桂一分

水煎服一劑而小便利二劑而口渴汗出盡止矣蓋五

苓散專利其膀胱之水膀胱為太陽之經傷風已經出

汗宜太陽之邪盡出矣乃口渴思水明是邪熱不肯從

皮毛外出而欲趨膀胱下出矣五苓散利其膀胱則水

流而火亦流火隨水去胃火已消而胃自生液自然上

潤於肺肺得胃液之養則皮毛自閉邪何從而再入哉

此症知栝蒌苓

湯亦可用

知母黃栝各一錢茯苓五錢水煎服一劑而渴解二劑愈

一傷風頭痛發熱盜汗微出見風則畏此春溫傷風而非

太陽症也夫頭痛本屬太陽然而風能入腦亦作頭痛

未可謂身熱頭痛便是太陽之症風從皮毛而入皮毛

主肺肺通於鼻而鼻通於腦風入於肺自能引風入腦

辨證錄

卷之五 春溫

三

而作頭痛倘肺氣甚旺則腠理自密皮毛不疎風又何

從而入惟其肺氣之虛故風邪易於相襲邪正爭鬪身

故發熱肺氣既虛安能敵邪所以盜汗微微暗出也此

症明是傷風勿作傷寒輕治蓋邪之所湊其氣必虛補

其肺氣之虛表其風邪之盛自然奏效甚速方用益金

散風湯人參五分甘草一錢五味子三粒麥冬三錢紫

蘇一錢蔓荊子一錢天花粉一錢桔梗三錢水煎服一

劑頭痛除再劑身熱解三劑盜汗亦止此方散重於補

何以名為益金湯不知肺經為邪所傷其氣甚衰若用

大補重藥必且難受不若於散表之中畧為補益則邪既外出而正又內養兩得其宜是過於散正善於益也

此症用通膈

散亦神

川芎當歸茯苓各三錢桔梗二錢蔓荊子白芷各五分人參半夏各一錢水煎服二劑愈

一傷風頭痛發熱身疼腰重骨節俱痠疼惡風無汗人為傷寒而不知非也夫傷寒則不惡風矣此內傷脾胃而風乘虛以入肺則經絡之間不相流通故身熱耳聾內傷脾胃與肺無涉何以肺經即召外邪耶不知脾胃為肺之母而腎為肺之子母虛而子亦虛子虛而母亦虛

辨症錄

卷之五 春溫

聖

脾胃之氣既虛而肺安得不虛之理於是腠理不密毛竅難以自固故風邪易入於肺經而肺氣益虛何能下潤於腎宮而旁灌於百骸耶自必至滿身骨節痠痛而腰重矣但肺虛而邪既易入則汗亦宜易出何以邪入而汗不出耶此乃邪欺肺氣之虛又窺脾胃之不足反使邪氣得蔽於毛孔故見風反畏外邪且不能再入何況內汗能出乎然則治法惟散肺中之邪仍補脾胃之氣脾土旺而肺氣有生發之機腎水足而肺金無乾燥之苦自然上可達於腦而頭痛除下可通於膀胱而

腰重去中可和於中焦而一身支節之痠疼盡愈也方用黃紫丹白朮五錢茯苓三錢當歸五錢羌活一錢紫蘇一錢甘草一錢細辛五分黃芩一錢麥冬五錢人參一錢貝母一錢水煎服此方補多於散何補之中又純補脾而不補腎耶人生後天以脾胃之氣為主脾健則胃氣自開胃開則腎水自潤况人參白朮原能入腎而白朮尤利腰膈一身之氣無不利矣何况肺經為脾胃之子母健而子亦健力足以拒邪又有紫蘇黃芩羌活貝母祛風散火消痰泄水之藥足以供其戰攻之具自然汗出熱解而邪從外越也

辨症錄

卷之五 春溫

聖

此症用益氣散

風湯亦效甚

人參黃芪各三錢甘草半夏各一錢白朮五錢柴胡二錢茯苓三錢枳殼五分水煎服

一春月傷風身熱十餘日熱結在裏往來寒熱人以爲傷寒在太陽有入裏之變也誰知春月傷風與冬月傷寒不同冬月之寒入於太陽久則變寒春月之風入於太陽久則變熱寒則運動不常必至傳經入臟熱則靜守不移惟有固結在腑然而入臟在腑雖有不同而作寒作熱則無不同也寒在臟則陰與陽戰而發熱熱在腑

則陽與陰戰而發寒隨臟腑衰旺分寒熱往來此症之所最難辨亦辨之於時令而已在冬月而熱結在裏者宜用攻在春月而熱結在裏者宜用散散其熱而寒自除寒除而熱亦自止也方用散結至神湯厚朴一錢白芍五錢甘草一錢當歸三錢枳殼五分柴胡一錢炒地子三錢桂枝三分水煎服一劑而寒熱除內結亦散方中多是平肝之藥絕不去舒肺經之邪蓋肺氣為邪所襲則肝木必欺肺金之病而自旺矣旺則木中生火以助邪之熱而刑肺倘不瀉肝而徒去散肺經之邪則肺氣愈虛而熱何能遽解耶惟瀉其肝中之火則內熱既衰益之桂枝數分但去散太陽之風不去助厥陰之火此熱結所以頓解也

此症用清邪散亦效

桂枝五分茯苓五錢甘草一錢陳皮五分
 分半夏柴胡各一錢砂仁一粒水煎服

一傷風八九日風溼相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴人以為傷寒之症風溼在太陽之經也誰知傷風之病亦能使風溼之相搏乎夫濕從下受而風從上受者也下受者膀胱先受之上受者肺經先受之膀胱受溼無

辨證錄

卷之五 春溫

聖

風不能起浪肺經受風無溼亦不能生嵐傷風而致風溼相搏因下原感溼而上又犯風兩相牽合遂搏聚於一身而四體無不煩疼也夫煩疼之症風之病也溼主重着煩痛而至身不能轉側非重着乎以此分別風溼之同病實為確據且風症必渴溼症必嘔今風溼兩病風作渴而水濟之溼欲嘔而風止之故不嘔而又不渴也治法宜雙解其風溼之邪而已方用雙解風溼湯茯苓一兩薏仁一兩柴胡二錢防風甘草各一錢水煎服柴胡防風以祛風茯苓薏仁以利溼用甘草以和解之

自然風濕雙解而諸症盡痊也

此症用風濕兩舒湯亦佳

茯苓白朮各五錢柴胡防風半夏
 甘草各一錢桂枝三分水煎服

一春月傷風八九日如瘧之狀發熱惡寒熱多寒少口不嘔吐人以為傷寒中如瘧之證誰知春月傷風亦同有此症乎夫風邪入於表裏之間多作寒熱之狀不獨傷寒為然傷風之病輕於傷寒至八九日宜邪之盡散矣何尚有如瘧之病蓋無痰不成瘧無食亦不成瘧無痰無食即有風邪不能為害然則傷風而有如瘧之病者

辨證錄

卷之五 春溫

聖

亦其胸膈胃脘之中原有痰食存而不化八九日之後
 正風欲去而痰與食留之耳熱多寒少非內傷重而外
 感輕之明驗乎惟口不嘔吐乃內既多熱自能燥溼痰
 得火制自不外吐然熱之極則外反現寒惡寒之象乃
 假寒也假寒真熱適顯其如瘧之症乃似瘧而非瘧也
 治法亦治其如瘧而不必治其真瘧耳方用破假湯人
 參三錢白朮五錢陳皮一錢神麩五分柴胡二錢山查
 十粒甘草五分白芍五錢鱉甲三錢石膏一錢半夏一
 錢水煎服一劑惡寒除二劑發熱解四劑如瘧之症全
 愈此方於補正之中寓祛邪之味正既無虧邪又退舍
 此王霸兼施之道也

此症用散瘧湯亦效
 柴胡二錢何首烏白朮各五錢青皮二錢水煎服

一春月傷風汗多微發熱惡風人以為傳經之邪入陽明
 胃中也誰知傷風春溫之症亦有邪入胃者乎邪到陽
 明必然多汗而渴今汗雖多而不渴是火邪猶未盛所
 以微發熱而不大熱耳夫同一外邪也何傷寒之邪入
 胃而火大熾傷風之邪入胃而火微旺蓋傷寒之邪寒
 邪也傷風之邪風邪也寒邪入胃胃惡寒而變熱風邪

入胃胃喜風而變溫蓋其熱乃胃之自熱不過風以煽
 之也風煽其火則火必外泄反不留於胃中所以皮膚
 熱極而多汗而口轉不渴異於傷寒傳經入胃之邪而
 無燎原之禍也然而終何以辨其非傷寒哉傷寒惡寒
 而不惡風傷風惡風而不惡寒正不必以冬月之惡風
 為是傷寒之的症也蓋惡風即是傷風之病耳治法散
 其風而火自解也方用蕪解湯石膏三錢乾葛二錢甘
 草一錢荊芥一錢茯苓五錢麥冬五錢水煎服一劑汗
 止二劑熱盡散矣此方乾葛荊芥乃發汗之藥何用之
 反能止汗不知傷風多汗乃風煽之也今用乾葛荊芥
 以散其風則風息而火亦息况用石膏以瀉胃火火靜
 而汗自止又得麥冬以滋其肺茯苓以利其水甘草以
 和其中安得而出汗哉

此症用三奇湯亦效
 玄參一兩乾葛天花粉各三錢水煎服

一傷風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒人以為傷寒之邪
 入於陽明不知是傷風之邪入於陽明也夫傷風之邪
 既輕於傷寒何傷風之病竟同於傷寒乎不知傷寒之
 邪入於陽明其重病不同於傷風而輕病則未嘗不同

一第1021册續修四庫全書第11反三

也若口苦不過胃不和也咽乾胃少液也腹滿胃有食也微喘胃少逆也發熱惡寒胃之陰陽微爭也症既同於傷寒而治法正不可同也和其胃而不必瀉其火解其熱而不必傷其氣始為得之方用和解養胃湯玄參一兩甘菊花三錢甘草一錢麥冬三錢天花粉三錢藕子一錢水煎服一劑口苦咽乾之症除二劑喘熱腹滿惡寒之病去不必三劑此方解陽明之火而不傷胃土之氣所以能和胃而辟邪也

此症亦可用三奇湯加麥冬五錢治之

辨證錄

卷之五 春溫

聖

一傷風口燥但欲漱水不欲嚥下人以為陽明之火將逼其熱以犯肺必有衄血之禍矣不知冬月傷寒邪入於陽明則有此病若春月傷風烏得有此然傷風之症既同於傷寒安保其血之不衄耶而傷風終無衄血者蓋風性動而變不比寒性靜而凝也故傷寒寒在胃而逼其熱於口舌咽喉者陰陽拂亂而衄血成矣傷風逼其熱於上雖亦漱水而不欲嚥然風以吹之其熱即散安得而致衄哉治法瀉陽明之火而口燥自除也方用石瀉三錢葛根一錢玄參五錢金銀花五錢麥冬五錢甘

草一錢水煎服方名金石散服二劑此症全愈不必服三劑也此方單瀉胃中之火不去散胃中之寒然而玄參麥冬金銀花純是補水之劑上能解炎下又能濟水得甘草以調劑實能和寒熱於頃刻也

此症亦可用三奇湯治之

辨證錄

卷之五 春溫

聖

行也故必至發衄若傷風之脈原宜見浮非其火之必欲上行也故雖口渴鼻燥而能食則火可止遏火下行而不上行豈致發衄哉治法但瀉其胃中之火無庸顧其肺中之衄也方用寧火丹玄參一兩甘草一錢生地三錢青蒿五錢水煎服一劑身熱解二劑口渴鼻燥愈三劑脈浮亦平矣此方玄參生地以解其胃中之炎熱瀉之中仍是補之味青蒿同甘草用之尤善解胃熱之邪使火從下行而不上行也且青蒿更能平肝經之火脈浮者風象也肝火既平則木氣自安而風何動哉此

用藥之妙一舉而得之也

此症亦可用滋肺湯甚效

石膏二錢麥冬一兩生地三錢黃芩甘草各一錢水煎服

一春月傷風自汗出醫人又發其汗小便自利人以爲傷寒悞汗以致津液內竭也熟知傷寒邪入陽明火焚其內以致自汗明是陰不能攝陽而陽外泄又加發汗則陽泄而陰亦泄矣安得津液不內竭乎若傷風自汗出者乃肺金之虛非胃火之盛復發其汗則肺氣益耗金寒水冷而小便自利矣故治法迥不可同也若用治傷

辨證錄

卷之五 春溫

三

寒之法以治傷風之症必有變遷之禍治法但補其肺氣之虛而固其腠理則汗止而病自愈也方用六君子湯加減治之人參三錢白朮一兩陳皮三分甘草五分白芍三錢黃芪五錢麥冬五錢北五味五分水煎服一劑止汗而津液自生矣此方補胃健脾使土旺以生肺金則肺氣自安肺金既安則腠理自固毛竅自閉矣

此症用溫胃湯亦妙

白朮黃芪各五錢甘草肉桂北五味子各一錢人參二錢陳皮三分水煎服

一春月傷風下血讖語頭汗出人以爲陽明之火大盛必

有發狂之禍誰知是熱入血室似狂而非狂乎雖傷寒邪入陽明亦有下血讖語必致發狂之條然而傷寒之下血讖語者乃熱自入於血室之中傷風之下血讖語者乃風祛熱而入於血室之內雖同是熱入血室而輕重實殊蓋熱自入者內外無非熱也風祛熱入者內熱而外無熱也既熱有輕重而頭汗出無異者何故以血室之部位在下焦而脈實走於頭之上故熱一入於血室而其氣實欲從頭之巔由上而下泄特因下熱未除各腑之氣不來相應所以頭有汗至頸而止傷寒與傷

辨證錄

卷之五 春溫

三

風內熱同而頭汗出亦同也治法散其風引熱外出而各病自愈方用導熱湯當歸白芍各三錢柴胡二錢黃芩一錢丹皮三錢甘草天花粉各一錢水煎服一劑讖語除二劑熱退汗止矣此方亦小柴胡之變方但小柴胡湯純瀉熱室之火而此兼補其肝胆之血使血足而木氣不燥不來剋脾胃之土則胃氣有養胃火自平所謂引血歸經卽導火外泄耳

此症清室湯亦效

柴胡黃芩半夏各一錢丹皮三錢枳殼五分白芍五錢水煎服

一傷風潮熱大便微鞭人以為傷寒之邪入於陽明又將趨入於大腸也誰知是肺經乾燥乎蓋大腸與肺為表裏肺燥則大腸亦燥正不必邪入大腸而始有燥屎也風傷肺金最易煽乾肺氣不同寒傷肺金之清冷故風邪一入肺而大腸容易燥結然邪終隔大腸甚遠非大腸之中即有邪火結成燥屎而必須下之也是則傷風潮熱大便微鞭乃金燥之症非火盛之證明矣治法宜潤肺金之燥然而大便之開閤腎主之也腎水足而大腸自潤矣方用金水兩潤湯熟地一兩麥冬一兩柴胡

辨證錄 卷之五 春溫

一錢甘草一錢丹皮三錢水煎服連服二劑而微鞭解再服二劑而潮熱除矣此方用熟地以補水水足則肺金不必去生腎水而肺之氣不燥又得麥冬直補肺金金水兩潤自然大腸滋灌輓輸有水可以順流而下既無阻滯之憂何有餘熱之猶存哉

此症用地榆解熱湯亦效

當歸五錢生地三錢地榆天花粉各二錢黃芩甘草蘇葉大黃各一錢水煎服

一春月傷風讞語潮熱脈滑人以為陽明胃熱乃傷寒傳經之病誰知春溫之症亦有胃熱乎春令發生胃中本

宜熱也又加春風之薰蒸其胃中自然之熱原不可遏今一旦逢違逆春令之寒風以阻抑之而不能直達其湮鬱之氣所以讞語而發熱也然胃中無痰則發大熱而讞語聲重胃中有痰則發潮熱而讞語聲低脈滑者有痰之驗也方用消痰平胃湯玄參青蒿各一兩半夏茯苓麥冬車前子各三錢水煎服一劑讞語止再劑潮熱除不必三劑也此方主青蒿者以青蒿能散陰熱尤能解胃中之火得玄參麥冬更能清上焦之炎火熱去而痰無黨援又得半夏茯苓車前以利其水則濕去而痰涎更消痰消而火熱更滅欲作鬱蒸潮熱迷我心君胡可得哉

辨證錄 卷之五 春溫

此症用玄黃解熱散亦效

半夏花粉各二錢甘草人參各一錢玄參一兩生地茯苓各五錢枳殼五分水煎服

一春月傷風日晡發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀人以為陽明之症傷寒欲發狂也誰知是春溫之過熱乎但傷寒見此病乃是實邪春溫見此症乃是虛邪耳夫實邪之病從太陽來其邪正熾而不可遏必有發狂之禍若虛邪之病從少陰來其邪雖旺而將衰斷無發狂之災

蓋實邪乃陽邪而虛邪乃陰邪也陽邪如見鬼狀者火逼心君而外出神不守於心宮陰邪如見鬼狀者火引肝魂而外遊魄不守於肺宅故實邪宜瀉火以安心而虛邪宜清火以養肺方用清火養肺湯荆芥二錢麥冬五錢玄參一兩天花粉三錢甘草一錢蘇葉一錢茯苓三錢黃芩二錢水煎服一劑潮熱止二劑不見鬼矣三劑全愈此方全是清肺之藥何以能安胃火不知胃火乃肺之所移清其肺金則邪必來救肺矣有玄參為君乘其未入肺宮半途擊之則邪尤易走茯苓安心而又

辨證錄

卷之五 春溫

書

利水邪不敢上逼而下趨有同走膀胱而遁矣何能入肺入肝以引我魂魄哉

此症用梔子清

煎飲亦效

白芍一兩炒梔子茯苓各三錢
半夏二錢甘草一錢水煎服

一傷風發潮熱大便溏小便利胸膈滿人以為傷寒之邪入於陽明而不知乃春溫之熱留於陽明也夫風傷於肺邪從皮膚而入宜從皮膚而出何以熱反留胃不去乎蓋胃乃肺之母也母見子被外侮必報外侮之仇外侮見其母之來復隨舍子而尋母矣使母家貧弱則外

侮自舍母而尋子無如胃為水穀之海較肺子之家富不啻十倍外侮亦何利於子而舍其母哉自然利胃母之富而棄肺子之貧故堅留而不去此潮熱之所以作也顛寒作熱小便利而大便溏正陰陽之不正致轉運失職胸膈何能快哉治法祛胃中之邪而陰陽自正矣方用加減柴胡湯柴胡黃芩知母炙甘草各一錢茯苓五錢枳殼神麩各五分蘿蔔子三錢水煎服一劑潮熱解二劑陰陽分三劑諸症盡愈此方亦小柴胡之變方蘿蔔子與茯苓同用最能分陰陽之清濁清濁一分而

辨證錄

卷之五 春溫

書

寒熱自解寧至有胸膈之滿哉

此症用掃胃

湯亦佳

石膏甘菊花各二錢青蒿五錢茯苓三錢甘草一錢
陳皮三分柴胡五分厚朴一錢檳榔八分水煎服

一春月傷風四五日身熱惡風頭項強脇下滿手足溫口渴人以為太陽陽明少陽之合病誰知是春溫之症有似傷寒而非真正傷寒也夫傷寒有此三陽之合病何以春溫之症絕無相異乎蓋春溫之症風傷於少陽也少陽為半表半裏凡三陽之表俱可兼犯而三陽之症即可同徵不比傷寒之邪由太陽以入陽明而太陽之

症未去由陽明以至少陽而陽明之邪尚留由少陽以入厥陰而少陽之病仍在故治春溫之症止消單治少陽而各經之病盡愈不必連三陽而同治也方用加味逍遙散柴胡二錢當歸二錢白朮一錢甘草一錢茯苓三錢陳皮一錢白芍三錢炒梔子一錢羌活五分水煎服二劑諸症盡愈不必三劑論理瀉少陽胆經之火足矣此方併和其肝氣似乎太過然胆經受邪正因胆氣之太鬱也春溫之病每從肝胆以入邪吾治其肝胆則在表在裏之邪無不盡散矣

辨證錄

卷之五 春溫

五

此症用麻石打

陽湯亦神

柴胡石膏各二錢白芍五錢麻黃陳皮各三分半夏一錢茯苓三錢水煎服

一婦人經水適來正當傷風發熱惡寒胸脇脹滿譫語人以爲傷寒結胸也誰知是熱入血室乎夫熱入血室男女皆有之惟是男有熱入血室之病者乃風祛熱而入之也女子熱入血室者乃血欲出而熱閉之血化爲熱也似乎男女之症不同然而熱則同也故治法亦不必大異仍用導熱湯治之蓋導熱湯最舒肝胆之氣閉經水於血室之中正肝胆之病也肝藏血非少陽胆氣之

宣揚則血不外出今舒其肝氣則已閉之血肝不能藏血泄而熱又何獨留乎故一劑而發熱惡寒之病除再劑而胸脇脹滿譫語之症去矣

此症亦可用加

味清室湯

柴胡黃芩甘草半夏各一錢白芍五錢丹皮三錢陳皮五分水煎服

一傷風身熱後肢體骨節皆痛手足寒甚人以爲傷寒由三陽而傳入於少陰也誰知其人腎水素虛因傷風之後燥其肺金肺傷而不能生腎則腎水更枯不能灌注於一身之上下自然肢體骨節皆痛也水枯宜火動矣

辨證錄

卷之五 春溫

五

何手足反寒乎不知水火原相根也水旺而火亦旺水衰而火亦衰當水初涸之日火隨水而伏不敢沸騰故內熱而外現寒象治法不可見其外寒而妄用溫熱之藥當急補其腎中之水以安腎中之火則水足以制火水火既濟何至有肢體骨節生痛手足生寒之病乎方用六味地黃湯熟地一兩山茱萸山藥各五錢茯苓四錢丹皮澤瀉各三錢水煎服一劑手足溫二劑肢體骨節之痛輕連服四劑即便全愈蓋此症風邪已散若再用祛風之藥則肺氣愈虛益耗腎水水虧而火旺必有

虛火騰空反致生變何若六味地黃湯直填腎水使水火之既濟也

此症用養骨

湯亦效

熟地二兩甘草一錢金釵石斛地骨皮茯苓牛膝各三錢水煎服

傷風後下利咽痛胸滿心煩人以為傷寒邪入於少陰乃陰寒上犯於心肺而下犯於大腸也而孰知不然傷風之後身涼則邪已盡散何陰邪之留乎然則下利者乃大腸之陰虛自利非邪逼迫之也咽痛者亦陰虛之故陰水既乾則虛火自然上越咽喉竅細不能遽泄乃

辨証錄

卷之五 春溫

三

作痛也胸滿心煩者腎水不能上濟於心宮而腎火反致上焚於包絡胸膈在包絡之間安得不滿胸既不舒而心亦不能自安此煩之所以生也故傷風之後見此等症切勿認作陰寒而妄治之也治法補水以濟心復補金以生腎腎水足而腎氣生自然上交心而制火下通大腸而利水矣方用加味地黃湯熟地茯苓各五錢山茱萸澤瀉丹皮各三錢山藥麥冬各五錢北五味一錢肉桂五分水煎服一劑咽痛除二劑下利止三劑胸不滿心亦不煩矣夫既是腎陰之虛用地黃湯以滋水

加麥冬五味以益腎之化源是矣何加入肉桂以補命門之火非仍是治少陰之寒邪乎不知水非火不生用肉桂數分不過助水之衰而非祛寒之盛且大腸自利得壯火而瀉得少火而止雖地黃湯內減熟地之多增茯苓澤瀉之少亦足以利水而固腸然無命門之火以相通則奏功不速故特加肉桂於水中而補火也

此症用地苓芍桂湯亦效
熟地二兩茯苓五錢白芍五錢肉桂五分水煎服

一春月傷風 三日咽中痛甚人以為少陰之火寒逼之也誰知是少陰之寒火逼之乎夫傷寒咽痛乃下寒實

辨証錄

卷之五 春溫

三

邪逐其火而上出傷風咽痛乃下熱虛火逼其寒而上行正不可一見咽痛即用傷寒藥概治之也蓋傷寒之咽痛必須散邪以祛火傷風之咽痛必須補正以祛寒方用補喉湯熟地二兩山茱萸茯苓各一兩肉桂一錢牛膝二錢水煎服一劑而喉痛頓除熟地山茱萸滋陰之聖藥加入肉桂牛膝則引火歸源自易矣况茯苓去濕以利小便則水流而火亦下行何至上逼而成痛哉所以一劑而奏功也

此症用救咽

丹亦妙

熟地二兩山茱萸八錢山藥一兩肉桂一錢破故紙二錢胡桃肉一箇水煎冷服

一春月傷風身熱下利六七日咳而嘔心煩不得眠人以爲邪入少陰而成下利以致嘔咳心煩不眠也誰知春溫之病多有如此症相同而治法宜別蓋傷寒之治利其水而春溫之治不可徒利其水也夫傷風而至六七日邪宜散矣乃邪不盡散又留連而作利其脾土之衰可知咳而嘔不特脾衰而胃亦衰矣土既衰而肺腎亦衰矣况腎因下利之多重傷其陰力不能上潤於心心無水養則心自煩燥勢必氣下降而取給於腎腎水又涸則心氣至腎而返腎與心不交安得而來夢乎治法健其脾胃益其心腎不必又顧其風邪也方用正治湯人參二錢熟地白朮炒棗仁各五錢麥冬三錢茯苓一兩竹茹一錢水煎服此方心腎脾胃肺五者兼治之藥茯苓爲君能調和於五者之中又是利水之味下利既除身熱自止而咳嘔心煩不得眠俱可漸次奏功也

辨證錄

卷之五 春溫

五

此症用解煩湯亦效

人參巴戟天麥冬各五錢白朮一兩炒棗仁三錢菖蒲五分神麴一錢白豆蔻二粒水煎服

一春月傷風手足逆冷脉緊心下滿而煩飢不能食人以

爲傷寒之症邪入厥陰結於胸中也而孰知不然夫脉浮爲風脉緊爲寒明是傷寒之症而必謂春月得之是傷風而非傷寒人誰信之然而實有不同也蓋風最易入肝春風尤與肝木相應但肝性所喜者溫風而不喜寒風也春月之風溫風居多而寒風亦間有之倘偶遇寒風肝氣少有不順脉亦現緊象矣第於緊中細觀之必前緊而後濇緊者寒之象濇者逆之象也寒風入肝手足必然逆冷肝氣拂抑而心氣亦何能順泰乎心既不舒不能生脾胃之土肝又不舒必至尅脾胃之土矣所以雖飢不能食也夫傷寒之入厥陰由三陽而至傷風之入厥陰乃獨從厥陰而自入者也是以傷寒之邪入肝深而傷風之邪入肝淺入深者恐其再傳入淺者喜其易出但解肝中之寒而木中之風自散飲食可進煩滿逆冷亦盡除矣方用加味逍遙散治之柴胡二錢白芍五錢當歸三錢白朮五分甘草一錢茯苓神三錢陳皮五分肉桂一錢水煎服一劑諸症俱愈逍遙散原是和解肝經之神藥得肉桂則直入肝中以掃蕩其寒風陽和既回而大地皆陽春矣何鬱滯之氣上阻心而下

辨證錄

卷之五 春溫

六

尅脾胃哉脾胃有升騰之氣草木更爲敷榮斷不致有
遏抑摧殘之勢矣倘作傷寒治法而用瓜蒂吐之必有
臟腑反覆之憂也

此症用衛君
湯效亦捷

人參巴戟天各三錢茯苓三錢白芍白朮各
五錢陳皮三分肉桂半夏各一錢水煎服

一春月傷風忽然發厥心下悸人以爲傷寒中有不治厥
則水漬入胃之語得毋傷風亦可同治乎不知傷寒之
悸恐其邪之下行而不可止傷風之悸又慮其邪之上
冲而不可定蓋寒性屬陰陰則走下風性屬陽陽則升

辨證錄

卷之五 春溫

三

上故同一發厥同一心悸治法絕不相同傷寒宜先治
厥而後定其悸傷風宜先定悸而後治其厥也方用定
悸湯白芍當歸各一兩茯神生棗仁各五錢半夏炒梔
子各三錢甘草一錢菖蒲丹砂末各五分水煎調服一
劑悸定再劑厥亦定也此方止定悸而治厥已寓其內
蓋病原是心膽之虛補其肝而膽氣旺補其肝而心亦
旺又慮補肝以動木中之火加入梔子以補爲瀉而復
以瀉爲補則肝火亦平而厥亦自定噫之傷寒爲外感
傷風爲內傷斷不可以治外感者移之以治內傷也

此症用奠安
湯亦效

人參茯苓各三錢甘草半夏各一錢遠志柏
子仁各二錢山藥黃芪麥冬各五錢水煎服

一春溫之症滿身疼痛夜間發熱日間則涼人以爲傷寒
少陽之症也誰知是腎肝之陰氣大虛氣行陽分則病
輕氣行陰分則病重乎夫陰陽兩相根也陰病則陽亦
病矣何以春溫之症陰虛而陽獨不虛耶不知肝腎之
中原有陽氣陰虛者陽中之陰虛也故陽能攝陰而陰
不能攝陽所以日熱而夜涼耳治法補其肝腎之陰則
陰與陽平內外兩旺而後佐之以攻風邪則風邪自出

辨證錄

卷之五 春溫

三

矣方用補夜丹熟地一兩白芍五錢龜甲當歸生何首
烏丹皮地骨皮各三錢茯苓麥冬各五錢貝母三錢柴
胡一錢水煎服此方乃補陰之神劑亦轉陽之聖丹用
攻於補之中亦寓撫於剿之內也譬如黃昏之際強賊
突入人家執其主婦火燒刀逼苟或室中空虛無可跪
獻則賊心失望愈動其怒勢必釜楚更加焚炙愈甚今
用補陰之藥猶如將金銀珠玉亂投房中賊見之大喜
必棄主婦而取資財佐之以攻邪之藥又如男婦僕從
揚聲門外則賊自驚惶况家人莊容盡皆精健絕倫賊

自勢單各思飽颺而去安肯出死力以相鬪乎自然不戰而亟走也

此症用補陰散

邪湯亦妙

熟地一兩何首烏當歸各五錢地骨皮丹皮各三錢
天花粉神麩各二錢人參柴胡各一錢砂仁一粒水

煎服

一春溫之症日間發熱口乾舌燥至夜身涼神思安閒似瘧非瘧人以爲傷寒症中如瘧之病也誰知是傷風而邪留於陽分乎夫邪之所湊其氣必虛所謂氣者正陰陽之氣也風邪即陽邪也陽邪乘陽氣之虛尤爲易入

辨證錄

卷之五 春溫

三

以陽氣之不能敵耳治法於補陽之中而用攻邪之藥則陽氣有餘邪自退舍矣方用助氣走邪散柴胡二錢當歸三錢黃芪五錢人參一錢枳殼五分天花粉三錢白木五錢厚朴一錢黃芩一錢麥冬五錢山查十粒水煎連服二劑即愈此方乃補正以祛邪也譬如青天白晝賊進莊房明欺主人之懦耳倘主人退縮則賊之氣更張主人潛遁則賊之膽愈熾必至罄劫而去今用參芪歸朮以補陽氣則主人氣旺執刀而呼持戟而鬪號召家人奮勇格鬪許有重賞酬勞自然舍命相拒即鄰

佑聞之誰不執耒以張揚負鋤而戰擊賊且逃遁無踪去之惟恐不速矣

此症用破瘧散亦效

白木黃芪各五錢半夏防風羌活陳皮甘草各一錢水煎服

人有春月感冒風寒咳嗽面白鼻流清涕人以爲外邪之盛而肺受之誰知是脾肺氣虛而外邪乘之乎夫肺主皮毛邪從皮毛而入必先傷肺然而肺不自傷邪實無隙可乘又將安入是邪之入肺乃肺自召之非外邪之敢於入肺也然則祛邪可不亟補其肺乎惟是補肺必須補氣氣旺則肺旺而邪自衰然而但補其氣不用升提之藥則氣陷而不能舉何以祛邪以益耗散之肺金哉故補氣以祛邪不若提氣以祛邪之更勝也方用補中益氣湯加味治之人參二錢黃芪三錢當歸三錢陳皮七分甘草五分柴胡一錢升麻四分白木三錢麥冬三錢黃芩八分天花粉一錢水煎服一劑邪散二劑咳嗽流涕之病全愈也補中益氣湯治內傷之神劑春月傷風亦內傷之類也用參芪歸朮以補氣用升麻柴胡以提氣且二味升中帶散內傷而兼外感者尤爲相宜

辨證錄

卷之五 春溫

四

以提氣且二味升中帶散內傷而兼外感者尤爲相宜

故服之而氣自旺外邪不攻自散也

此症用益氣社

寒飲亦效

人參柴胡桔梗半夏各一錢黃芪茯苓各三錢當歸二錢蘇葉五分甘草五分水煎服

人有春日感冒風寒身熱發識人以為陽明之內熱也誰

知是肺熱之逼胃乎春日風邪中人原不走太陽膀胱

之經每每直入皮毛而走肺肺得風邪則肺氣大傷寒

必變熱與傷寒之邪由衛入營而寒變熱者無異其實

經絡實有不同若以冬寒治法治春溫反致傷命為可

惜也苟知春溫與冬寒不同雖見發熱譫語但治肺而

辨證錄

卷之五 春溫

查

不治胃則胃氣無傷而肺邪易散方用宜春湯枳壳五

分桔梗三錢甘草一錢麥冬五錢天花粉二錢黃芩二

錢紫苑一錢陳皮五分竹茹一錢玄參三錢水煎服一

劑而寒熱解再劑而譫語亦失此方散肺經之邪火又

不犯陽明之胃氣肺氣安而胃火亦靜矣此所以治肺

而不必治胃耳

此症用潤肺

飲亦效

麥冬玄參各五錢甘草半夏各一錢桔梗二錢竹葉五十片水煎服

一春溫之症頭痛身熱口渴呼飲四肢發斑似狂非狂以

躁非躁沿門闔室彼此傳染人以為傷寒之疫症也誰

知是傷風之時症乎夫司天之氣原不必盡拘一時天

氣不正感風冒寒便變為熱肺氣不宣胃氣不升火鬱

於皮毛腠理之中流於頭而作痛走於膚而成斑倘以

治傷寒之法治之必至變生不測以所感之邪實春溫

之氣而非冬寒傳經之邪也夫傳經之邪最為無定春

溫之邪最有定者也何以有定者反至變遷不常正以

時氣亂之也時氣之來無方與疫氣正復相同但疫氣

熱中帶殺而時氣則熱中存生雖時氣之病亦多死亡

辨證錄

卷之五

查

然皆治之不得其法乃醫殺之非時氣殺之也惟是沿

門闔室各相傳染者何故以時氣與疫氣同是不正之

氣也故聞其邪氣而即病耳雖然世人有聞邪氣而不

病者何以臟腑堅固邪不能入也春溫之傳染亦臟腑

空虛之故耳治法補其臟腑而少佐以解火祛邪之藥

則正氣生而邪氣自退矣方用遠邪湯人參一錢蒼朮

三錢茯苓三錢柴胡一錢蘇葉五分生甘草一錢玄參

一兩荆芥三錢黃芩一錢白菊五錢天花粉二錢水煎

服一劑頭痛止二劑身熱解三劑斑散狂躁皆安四劑

全愈此方却邪而不傷正氣治不正之時症最效不止

治春温之時病也

此症用正氣

湯亦佳

玄參一兩麥冬五錢荆芥三錢升麻八分甘草
黃芩各一錢天花粉三錢蔓荊子五分水煎服

辨證錄

卷之五春温

李



辨證錄卷之六

山陰陳士鏗敬之甫號遠公又號朱華子

會稽陶式玉尚白甫號存齋又號

參訂

火熱症門

一陽明火起發狂腹滿不得臥面赤而熱妄見妄言人皆
謂內熱之極也然而陽明屬土而不屬火何以火出於
土謂是外邪之助乎既非暑氣之侵又非寒氣之變乃
一旦火起以致發狂人多不解不知土中之火乃心中
之火也心火起而陽明之火翕然而發陽明胃經乃多

辨證錄

卷之六火熱

李

氣多血之府火不發則已一發而反不可制往往捲土
而來火焰升騰其光燭天而旁且沿燒於四境有不盡
不已之勢非惟焚盡於胃而且上燒於心心君不寧且
有下堂而走者神既外越自然妄有所見既有妄見安
能止其妄言此讖語之所以生也然則陽明之火乃內
因而成非外邪所致也治法宜與傷寒之狂傷暑之狂
俱不可同日而論矣然而陽明之火其由來雖有內外
之殊而治陽明之火其方法實無彼此之異必須急滅
其火以救燎原之勢而不可因循觀望長其火焰之騰

以致延燒各臟腑也方用人參竹葉石膏湯治之人參五錢石膏一兩麥冬一兩竹葉三百片知母三錢甘草一錢糯米一撮水煎服一劑狂定再劑腹滿不能臥之病除而妄見妄言之症亦去矣不必三劑此方退胃火之神劑也凡有胃熱之病用之皆宜然止可救一時之急而不可瀉長久之火論理內熱之火既起於心宜瀉心而反瀉胃者恐胃火太盛必致變生不測也蓋心火不止不過增胃火之炎而胃火不止實有犯心火之禍所以治心火者必先瀉胃也胃既瀉矣而後減去石膏

辨證錄

卷之六 火熱

知母加入黃連一錢玄參一兩再服二劑不特胃火全消而心火亦息也

此症用苦龍湯亦神

地龍二十條搗爛苦參五錢水煎服之一劑即止狂不必再服

一熱病有完穀不化奔迫直瀉者人以為大腸之火也誰知是胃火太盛乎夫胃火上騰而不下降胡為直下於大腸而作瀉耶蓋胃為腎之關腎虛則胃之關門不守胃乃挾水穀之氣而下行矣第腎虛為寒而胃何以反能熱耶不知腎虛者水虛也水虛則火無所制而命門

龍雷之火無可藏之地直冲於胃見胃火之盛亦其相附會不上騰而下泄矣胃火既盛又得龍雷之火則火勢更猛以龍雷之性甚急傳於大腸不及傳導故奔心而直也治法似宜先治腎矣然而胃火不瀉則腎火斷不肯回但遽瀉胃火則胃土因火而崩胃水隨土而洩又不能底止必須先健其土而分利其水則水清而土可健火可安而龍雷之火亦易於收藏也方用緩瀉湯茯苓一兩芡實山藥各三兩車前子五錢薏仁一兩白草一錢人參一兩五味子一錢此方無一味非健

辨證錄

卷之六 火熱

上之藥又無一味非利水之品然利水之中不走其氣不傷其土而上火自升矣况健土之品無非補腎之味以得補而真陰生龍雷之火自仍歸於腎臟腎火既安則胃火失黨而胃土又健則水穀之氣更易分消自然瀉而瀉止也

此症用滑苓湯亦甚效

滑石茯苓各一兩同研為末井水調服即止

人有口乾舌燥面目紅赤易喜易笑者人以為心火熱也誰知是心包膻中之火熾甚乎夫心包之火相火也相火者虛火也膻中為臣使之官喜樂出焉是膻中

乃心之輔佐代心而行其賞罰者也喜怒者賞罰之所出也心內神明則賞罰正心內拂亂則賞罰移譬如下人專擅借上之賞罰以行其一已之喜怒久則忘其爲下以一已之喜怒爲在下之賞罰矣治法宜瀉心包之火然而瀉心包必至有損於心心虛而心包之氣更虛必至心包之火更盛不如專補其心心氣足而心包之火自安其位何至上炎於口舌面目而成喜笑不節之病乎方用歸脾湯人參三錢茯苓三錢炒棗仁五錢遠志一錢麥冬三錢山藥三錢當歸三錢廣木香末三分

辨證錄

卷之六 火熱

四

黃芪二錢甘草三分水煎調服一劑面目之紅赤減二劑口舌之乾燥除三劑易喜易笑之症亦平矣此方補心氣之虛仍是補心包之火何以火得之而反息也不知心火宜瀉以爲補而心包之火宜補以爲瀉心包之火旺由於心君之氣衰補其心而心包不敢奪心之權何敢喜笑自若僭我君王哉

此症用參朮二仁湯亦效

人參茯苓神炒棗仁各三錢白朮五錢遠志半夏各一錢砂仁二粒水煎服

一鼻中出黑血不止名曰衄血心熱之極火刑肺金也

夫肺金爲心火所尅宜出紅血不宜出黑血矣得母疑爲腎火之刑母乎夫腎爲肺金之子安有子殺其母者然而黑血實腎之色也心火太盛移其熱於肺而肺受火刑必求救於腎腎惡心火之尅母乃出其全力以制心而心已移熱於肺矣腎即隨火而奔入於肺怒心火之肆惡併力以相戰肺無可藏之地腎即逐血而出於鼻紅血而變爲黑色真有不共戴天之仇焦頭爛額白日俱昏者矣治法單瀉心中之火不必瀉腎中之水蓋火息而金安金安而腎水何至與心相關哉方用救衄

辨證錄

卷之六 火熱

五

丹黃連二錢丹皮三錢茯苓二錢麥冬五錢玄參一兩生棗仁三錢生地三錢柏子仁一錢水煎服連用二劑黑血即止四劑不再衄此方制心火之有餘不損心氣之不足腎見君火之衰肺金之旺則報仇之恨已泄復國之謀已成自然返兵旋旅何至窮寇之再追哉或謂心君已爲腎子所蟻則心氣必傷自宜急瀉腎氣毋使追奔爲是何反瀉心以助其虐耶不知腎水原非有餘不過因肺母之難故奮不顧身因心火之起釁而轉伐腎子非理也况方中雖瀉心火而正未嘗少損心氣名

為瀉心而實補心也不過少解其炎氛以泄腎子之情而火即解矣且腎有補而無瀉何若瀉心火之為得哉

此症用生地冬苓湯
麥冬生地各二兩黃芩三錢水煎服

一人有熱極發斑身中如紅雲一片者人以爲內熱之極而外發於皮膚矣孰知此熱鬱於內而不能外發之故乎此等之病寒熱之藥兩不宜施夫火熱宜用涼藥內火未有不從外泄者但火得寒則又閉微火可以寒解而盛火不可以寒折往往得寒涼之味反遏其外出之機閉塞而不得泄有成爲發狂而不能治者若用熱藥

辨證錄

卷之六 火熱

六

投之則火以濟火其勢必加酷烈欲不變爲亡陽而不可得矣治法必須和解爲得第火盛者水必衰徒解其火而不益之以水未必火之遽散也宜用補水之中而引其散火之法則火無乾燥之虞而有發越之易也方用風水散斑湯玄參二兩當歸二兩荆芥三錢升麻一兩生地一兩水煎服一劑斑少消二劑斑又消三劑斑全消此方玄參補陰以解其浮遊之火當歸生地以補其心胃之血多用荆芥升麻風藥以解散鬱熱則火得水而相制亦火得風而易揚全無瀉火之品而已獲瀉

火之效實有深義耳

此症用化雲湯亦神
黃連三錢當歸一兩玄參二兩升麻二錢水煎服

一熱極發斑目睛突出兩手冰冷此心火內熱所謂亢則害也而不知又有肝火以助之耳夫熱病宜現熱象何反見寒冷之證乎蓋火極似水耳熱極於心則四肢之血齊來救心轉無血以養手足故手足反寒如冰之冷者外寒之極實由於內熱之極也至於目睛突出者肝開竅於目而目之大眚又心之竅也心火既盛又得木中之火相助則火更添焰而炎上所以直奔其竅而出

辨證錄

卷之六 火熱

七

但目中之竅細小不足以暢泄其火怒氣觸睛故突而出也治法宜瀉心火而更平肝木木氣既舒心火自散方用風水散斑湯加減而症自愈也玄參一兩當歸一兩黃連三錢荆芥三錢升麻三錢白芍一兩生地五錢水煎服此方加白芍黃連以黃連瀉心火而白芍平肝火也又得荆芥升麻引羣藥共入於腠理之間則上下四旁之餘熱盡消且不至遏抑其火有經絡未達之虞此方補多於攻散火而不耗損真氣庶幾有既濟之美也

此症用玄丹升麻湯亦神效
玄參半斤丹皮三兩升麻三錢水煎一碗一劑飲愈

一熱極不能睡熱日夜兩眼不閉人以爲心腎不交火盛

之故誰知是水火兩衰之故乎夫心火最畏腎水之克

而又最愛腎水之生蓋火非水不養也腎水又最愛心

火之生而又最惡心火之燒蓋水非火不乾也是心腎

一相愛則相交心腎相惡則相背求閉目而神遊於華胥

一之國自不可得矣治法補其心中之液以下降於腎補

其腎中之精以上滋於心并調其肝氣以相引於心腎

之間俾相惡者仍至相愛則相背者自相交矣方用引

辨證錄 卷之六 火熱 九

交湯熟地麥冬各一兩炒棗仁山茱萸沙參各五錢茯

神三錢玄參五錢白芍二兩炒梔子三錢菖蒲破故紙

各五分水煎服連服二劑即目閉而酣睡矣此方心腎

雙補而平其肝氣以清木中之火蓋肝火瀉則心火自

平腎水亦旺勢必心氣通於肝而腎氣亦通於肝也心

腎既通於肝而又有菖蒲以引心破故紙以引腎介紹

同心自能歡好如初重結寤寐之交矣

此症用水火兩滋湯亦效
熟地三兩肉桂二錢兔絲子一兩水煎服

一人肝火內鬱結而不伸悶煩躁急吐痰黃塊者人以爲

火鬱宜達也然達之而火愈熾此乃未嘗兼肝腎而同

治也夫肝木有火火鬱而不宣者雖是外邪蒙之亦因

內無水以潤之也木無水潤則木鬱更甚倘徒用風藥

以解肝中之火不用潤劑以蔭肝中之水則熬乾肝血

而火益盛矣倘徒用潤劑以益其肝中之水不用風劑

以舒其肝中之火則拂抑肝氣而鬱更深矣鬱深則煩

悶於心火盛則躁急於腹欲其痰涎之化得乎治法舒

其肝以解火復補其腎以濟水自然鬱結伸而諸症愈

也方用肝腎兩舒湯熟地玄參各一兩茯苓三錢白芍

辨證錄 卷之六 火熱 九

一兩柴胡一錢當歸五錢甘草炒梔子各一錢丹皮三

錢水煎服二劑漸輕四劑全愈此方歸芍柴梔所以舒

肝者風以吹之也熟地玄丹所以補腎者雨以溉之也

茯苓甘草又調和於二者之中使風雨無太過不及之

虞耳譬如夏令炎蒸鬱極而熱樹木枯槁忽得金風習

習大雨滂沱則從前鬱悶燥燥之氣盡快如掃而枯槁

者倏變爲青葱爽氣迎人豈猶有煩悶躁急等症哉

此症用快膈
湯亦效

白芍當歸熟地各一兩柴胡甘草各一錢生
地麥冬各三錢枳殼半夏各三錢水煎服

一人頭面紅腫下身自臍以下又現青色口渴殊甚似欲發狂人以為下寒而上熱也誰知是下熱之極而假現風象以欺人乎若作上熱下寒治之立時發狂而死必至皮肉盡腐也此種之病乃悞聽方士之言服金石之藥以助命門之火強陽善關助樂旦夕而金石之藥必經火煨其性燥烈加之鼓勇浪戰又自動其火戰久則樂極情濃必然大泄其精倍於尋常火極原已耗精復倍泄精以竭其水一而再再而三必有陰虛火動之憂無如世人迷而不悟以秘方為足恃以殺人之藥為靈

辨證錄

卷之六 火熱

十一

丹日日吞嚥而不知止則臟府無非火氣雖所用飲食未嘗不多然而火極易消不及生精化水於是火無水制自然上騰頭面其頭面初猶微紅久則純紅而作腫然自臍以下不現紅而現青者以青乃風木之色也臍下之部位屬腎腎火旺而腎水乾則肝木無所養於是肝氣不自安乃下求於腎而腎又作強火熾肝氣欲返於本宮而燥極不能自還遂走腎之部位而外現青色矣此等症候內經亦未嘗言及無怪世人之不識也夫肝氣之逆如此而火愈上升欲口之不渴得乎口渴飲

水止可救胃中之乾燥而不能救五臟之焦枯勢且飲水而口愈渴安得不發狂哉治法必須大補其水而不可大瀉其火蓋瀉其火則火息而水竭亦必死之道也方用救焚解毒湯熟地四兩玄參二兩麥冬三兩白芍二三兩金銀花三兩甘菊花五錢牛膝一兩黃柏一錢水煎服一連數劑下身之青色除再服數劑頭面之紅腫亦漸愈此方減半必再服一月始無癰疽之害蓋熱極發紅乃是至惡之兆况現青色尤為惡之極者幸臍之上不青若一見青色則臟府腸胃內爛瘡瘍癰毒外生

辨證錄

卷之六 火熱

十一

安有性命哉前古醫聖不論及者以上古之人恬澹冲和未嘗服金石之毒藥也後世人情放蕩覓春藥如飴糖而方士之輩但知逢迎貴介之歡心匠意造方以博裙帶之樂天人天年為可痛傷也我特傳此方以救之以火之有餘者水之不足故用熟地麥冬以大益其腎水又恐熟地麥冬不足以息燎原之火又益玄參甘菊以平其胃中之炎瀉火仍是滋陰之味則火息而正又無虧火既上行非引而下之則水不濟而火恐上騰加一之牛膝之潤下使火下降而不上升也腎水既久枯竭

所補之水僅可供腎中之自用安得分餘膏而養肝木之子復佐之白芍以滋肝則肝木既平不必取給於腎水自氣還本宮而不至走下而外泄然而火焚既久則火毒將成雖現在之火為水所尅而從前之火毒安能遽消故又輔之金銀花以消其毒而更能益陰是消火之毒而不消陰之氣也又慮陽火非至陰之味不能消化於無形乃少用黃栢以折之雖黃栢乃大寒之藥然入之大補陰水之中反能解火之毒引補水之藥直入於至陰之中而瀉其虛陽之火耳此方除黃栢不可多

辨證錄

卷之六

火熱

三

用外其餘諸藥必宜如此多用始能補水之不足瀉火之有餘否則火熾而不可救也夫救焚之道刻不可緩非滂沱大雨不能止其遍野燎原之火况火既升騰胃中得水不啻如甘露之止渴大料煎飲正足以快其所欲不必慮其多而難受也

此症用定狂湯亦神效

熟地三兩知母一兩荆芥五錢水煎服一劑即愈

一眼目紅腫口舌盡爛咽喉微痛兩脇脹滿人以爲肝火之旺誰知是腎火之旺乎夫眼目屬肝兩脇亦肝之位明是肝火之旺而謂是腎火者何居以咽喉口舌之痛

爛而知之也第口舌屬心咽喉屬肺與腎絕不相干何統以腎火名之不知腎火龍雷之火也雷火由地而冲於天腎火亦由下而升於上入於脇則脇脹入於喉則喉痛入於口舌則口舌爛入於眼目則眼目腫矣火無定位隨火之所至而病乃生今四處盡病乃腎火之大熾耳蓋各經之火止流連於一處斷不能口舌咽喉眼目兩脇一齊受病也似乎治法未可獨治一經矣然而各經不可分治而腎經實可專治治其腎火而各經之火盡散也方用六味地黃湯加味治之熟地一兩山藥五錢茯苓三錢丹皮五錢澤瀉三錢山茱萸四錢麥冬白芍各一兩水煎服一劑兩脇之脹滿除二劑眼目之紅腫愈三劑咽喉之痛解四劑口舌之爛痊也六味湯原是純補真水之藥水足而火自息又有白芍之舒肝以平木麥冬之養肺以益金金生水而水不必去生肝則水尤易足而火尤易平也蓋龍雷之火乃虛火也虛火得水而即伏何必瀉火以激其怒哉或曰用六味之方而不遵分兩進退加減者何也曰夫藥投其病雖佐使之味可多用病忌其藥雖君主之品自當少減輕重

辨證錄

卷之六

火熱

三

少殊又何慮哉

此症用止沸湯亦佳
熟地三兩麥冬二兩地骨皮一兩水煎服

一寒熱時止時發一日四五次以為常熱來時躁不可當寒來時顫不能已人以為寒邪在陰陽之間也誰知是火熱在心腎之內乎夫腎與心本相尅而相交者也倘相尅而不相交必至寒熱止發之無定蓋心喜寒而不喜熱腎喜熱而不喜寒然而熱為腎之所喜必為心之所惡寒為心之所喜必為腎之所惡腎惡心寒恐寒氣犯腎遠避之而不敢交於心心惡腎熱恐熱氣犯心堅

辨證錄

卷之六 火熱

十四

却之而不肯交於腎然而腎惡心寒而又惡其不下交於腎必欲交心而心不受反以熱而凌心矣心惡腎熱而不上交於心必思交腎而腎又不受反以寒而犯腎矣兩相犯而相凌於是因寒熱之盛衰分止發之時候矣夫心腎原無時不交也一日之間寒熱之止發無常因交而發因不交而即止又何足怪惟熱來時躁不可當寒來時顫不能已實有秘義也夫熱來之時乃腎氣之升騰也心雖惡熱而心中正寒宜不發躁而何以躁蓋寒則心氣大虛虛則惟恐腎氣之來攻乃懼而躁非

辨證錄

卷之六 火熱

十五

熱而躁也寒來之時乃心氣之下降也腎雖惡寒而腎中正熱宜不發顫而何以顫蓋熱則腎水大乏乏則惟恐心氣之來奪乃吝而顫非寒而顫也然則欲心之不振必須使其不寒欲腎之不顫必須使其不熱方用解圍湯人參五錢熟地一兩山茱萸五錢當歸一兩茯神五錢生棗仁五錢柴胡一錢白芍一兩遠志二錢半夏二錢玄參三錢菖蒲一錢水煎服二劑寒熱減半躁顫亦減半再服二劑前症頓愈再服二劑不再發此方心肝腎三部均治之藥也欲心腎之交必須借重肝木為介紹分往來之寒熱止彼此之躁顫方能奏功方中雖止腎熱而散心寒倘肝氣不通何能調劑所以加入柴胡白芍以大舒其肝中之鬱氣蓋祖孫不至間隔而為子為父者自然愉快矣寧尚至熱躁寒顫之乖離哉

此症用玄荆湯亦效
玄參二兩荆芥三錢水煎服

一熱極止在心頭上一塊出汗不啻如雨四肢他處又復無汗人以爲心熱之極也誰知是小腸之熱極乎夫小腸在脾胃之下何以火能犯心而出汗乎不知小腸與心為表裏小腸熱而心亦熱矣然而心中無液取給於

腎水以養心倘汗是心中所出竟同大雨之淋漓則發汗亡陽宜立時而化為灰燼胡能心神守舍而不發狂哉明是小腸之熱水不下行而上出也第小腸之水便於下行何故不走陰器而反走心前之竅耶正以表裏關切心因小腸而熱小腸即升水以救心而心無竅可入遂走於心外之毛竅而出也然則治法不必治心仍治小腸利水以分清其火氣則水自歸源而汗亦不從心頭外出也方用返汗化水湯茯苓一兩猪苓三錢劉寄奴三錢水煎服一劑而汗止不必再劑也茯苓猪苓俱是利水之藥加入劉寄奴則能止汗又善利水其性又甚速同茯苓猪苓從心而直趨於膀胱由陰器以下泄因水去之急而火亦隨水而去急也正不必再泄其火以傷損夫臟府耳

此症用苓連湯亦神
茯苓二兩黃連一錢水煎服

一口舌紅腫不能言語胃中又覺飢渴之甚人以為胃火之上升也第胃火不可動一動則其勢炎上而不可止非發汗亡陽必成躁妄發狂矣安能僅紅腫於口舌不能言語之小症乎故此火乃心包之火而非胃火也夫

辨證錄

卷之六 火熱

十一

舌乃心之苗亦心包之竅也若心包無火無非清氣上升則喉舌安閒語言響亮迨心包火動而喉舌無權况心包之火乃相火也相火易於作祟譬如權臣多慾欲立威示權必先從傳遞喉舌之人始今相火妄動而口舌紅腫勢所必至又譬如主人之友僕輕辱則友亦緘默以求容若不投以貨財則不能得其僕之所求此飢渴之所以來也治法清其心包之火而不必瀉其胃中之土恐瀉胃而土衰則心包之火轉來生胃其火愈旺也方用清火安胃湯麥冬一兩石斛三錢丹參三錢生地三錢炒棗仁五錢竹葉一百片水煎服一劑語言出再劑紅腫消三劑而胃中之飢渴亦愈矣此方全去消心包之火而又不瀉心中之氣心包火息而胃氣自安矣

此症用玄丹麥冬湯亦效
玄參丹麥冬各一兩水煎服

一熱症滿身皮竅如刺之鑽又復疼痛於骨節之內外以冷水拍之少止人以為火出於皮膚也誰知是火鬱於臟腑乃欲出而不得出之兆也蓋火性原欲炎上從皮膚而旁出本非所宜其人內火既盛而陽氣又旺火欲

辨證錄

卷之六 火熱

十一

外泄而皮膚堅固火本鬱而又拂其意遂鼓其勇往之氣而外攻其皮膚思奪門而出無如毛竅不可遽開火不得已仍返於臟腑之內而作痛以凉水拍之而少止者火喜其水之潤膚而反相忘其水之能尅火矣非因水之外擊足以散火而能止痛也然則治法亦先瀉其脾胃之火而餘火不瀉而自瀉也方用攻火湯大黃三錢石膏五錢炒梔子三錢當歸一兩厚朴一錢甘草一錢柴胡一錢白芍三錢水煎服一劑火瀉二劑痛除此方直瀉脾胃之火又不損脾胃之氣兼舒其肝木之鬱則火尤易消乃扼要爭奇治火實有秘奧何必腑腑而清之臟臟而發之哉

此症用宜揚散亦佳

柴胡一錢荆芥二錢當歸一兩麥冬一兩天花粉三錢水煎服

人有心中火熱如焚自覺火起即入小腸之經輒欲小便急去遺溺大便隨時而出入以為心火下行誰知是心與心包二火之作祟乎夫心包之火代君司化君火盛而相火寧君火衰而相火動然亦有君火盛而相火亦動者第君相二火不可齊動齊動而君相不兩立相火

見君火之旺不敢上奪君權乃讓君而下行而君火既動無可發洩心與小腸為表裏自必移其熱於小腸相火隨輔君火下行既入小腸而更引入大腸矣此二便所以同遺也治法安二火之動而熱焰自消方用四物湯加味治之熟地一兩川芎二錢當歸一兩白芍五錢黃連二錢玄參一兩黃栢一錢車前子二錢水煎服二劑少安四劑全愈四物湯補血之神劑也火動由於血燥補其血而臟腑無乾涸之虞涼其血而火焰無浮游之害况黃連入心以清君火黃栢入心包以清相火加

辨證錄

卷之六 火熱

七

車前利水引二火直走膀胱從水化而盡洩之又何亂經之慮哉

此症用二地湯亦佳

生地熟地當歸各一兩人參三錢黃連一錢肉桂五分水煎服

人有大怒之後週身百節俱疼胸腹且脹兩目緊閉逆冷手指甲青黑色人以為陰症傷寒也誰知是火熱之病乎夫陰症似陽陽症似陰最宜分辨此病乃陽症似陰也手指甲現青黑色陰症之外象也逆冷非寒極乎不知內熱之極反見外寒乃似寒而非寒也大怒不解必

傷其肝肝氣甚急肝葉極張一怒而肝之氣更急而肝之葉更張血沸而火起有不可止拂之勢肝主筋火起而筋乃攣束作痛火欲外焚而痰又內結痰火相搏溼氣無可散之路乃走其溼於手足之四末指甲者筋之餘也故現青黑之色手足逆冷而胸腹正大熱也治法平其肝氣散其內熱而外寒之象自散矣方用平肝舒筋湯柴胡一錢白芍一兩牛膝生地丹皮炒梔子各三錢當歸五錢陳皮甘草各二錢神麩五分秦艽烏藥各一錢防風三分水煎服一劑目開二劑痛止三劑脹除

辨證錄

卷之六 火熱

三

四劑諸症盡愈此方所用之藥俱入肝經以解其怒氣也怒氣解而火自平矣火平而筋舒必至之理也人見此等之症往往信之不深不敢輕用此等之藥遂至殺人陰陽之難辨也然我更有辨之之法與水探之飲水而不吐者乃陽症飲水而即吐者乃陰症倘飲水不吐即以此方投之何至有悞哉

此症用息怒

湯亦效

白芍三兩柴胡二錢丹皮五錢炒
梔子三錢天花粉三錢水煎服

暑症門

一行役負販馳驅於烈日之下感觸暑氣一時猝倒人以爲中暑也誰知是中暈乎夫暈者熱之謂也暑亦熱也何以分之蓋暑之熱由外而入暈之熱由內而出行役負販者馳驅勞苦內熱欲出而外暑遏抑故一時猝倒是暑在外而熱閉之也倘止治暑而不宣揚內熱之氣則氣閉於內而熱反不散矣治法宜散其內熱而佐之以消暑之味方用救暈丹青蒿五錢茯苓三錢白朮三錢香薷一錢知母一錢乾葛一錢甘草五分水煎服一

辨證錄

卷之六 暑症

三

劑氣通二劑熱散不必三劑此方用青蒿平胃中之火又解暑熱之氣故以之爲君香薷解暑乾葛散熱故以之爲佐又慮內熱之極但散而不寒則火恐炎上故加知母以涼之用白朮茯苓利腰膈而通膀胱使火熱之氣俱從下而趨於小腸以盡出也火既下行自然不逆而上冲而外暑內熱各消化於烏有矣

此症用解暑

散亦效

香薷茯苓各三錢甘草黃連各一錢白朮一兩
白扁豆二錢白豆蔻一粒水煎服一劑即愈

一膏梁子弟多食瓜果以寒其胃忽感暑氣一時猝倒是

中暑也蓋膏粱之人天稟原弱又加多慾未有不內寒者也復加之瓜果以增其寒涼內寒之極外熱反易於深入陰虛之人暑氣即乘其虛而入之治法不可祛暑為先必須補氣為主然既因陰虛以至陽邪之中似宜補陰為主不知陽邪之入脾依陰氣也補陰則陰氣雖旺轉為陽邪之所喜陽得陰而相合正恐陰弱不能相配若一旦助其陰氣無論陰難却陽而陽邪且久居之而生變矣惟補其陽氣則陽氣健旺益之散暑之味則邪陽不敢與正陽相敵必不戰而自走也方用人參五

辨證錄

卷之六 暑症

五

錢茯苓五錢白朮五錢香薷二錢白扁豆二錢陳皮五分甘草一錢水煎服一劑氣回二劑暑盡散此方名為散暑回陽湯方中參苓朮豆俱是健脾補氣之藥以回其陽用香薷一味以散其暑何多少輕重之懸殊乎不知陰虛者脾陰之虛也脾雖屬陰非補陽之藥不能效况陽邪甚盛非多用何以相敵乎倘少少用之恐有收斂難遏之虞即或取勝暑退而元氣未能驟復與其暑去而後補陽何若於邪旺之日而多用之正既無虧而邪又去速之為益哉

此症用加味四君湯亦效

人參白朮各五錢甘草香薷各一錢茯苓三錢炮薑三分水煎服二劑愈

中暑氣不能升降霍亂吐瀉角弓反張寒熱交作心胸煩悶人以為暑氣之內熱也誰知是陰陽之拂亂乎人身陰陽之氣和則邪不能相干苟陰陽不能相交而邪即乘其虛而入之矣且邪之入入臟府也助強而不助弱見陰之強而即助陰見陽之強而即助陽夏令之人多陰虛陽旺邪乘陰虛而入本欺陰之弱也然見陽氣之旺又助陽而不助陰陰見邪之助陽也又妒陽之旺

辨證錄

卷之六 暑症

五

而相戰陽又嫌邪之黨陽也欲嫁其邪於陰而陰又不受於是陰陽反亂氣不相通上不能升下不能降霍亂吐瀉拂於中角弓反張困於外陰不交於陽而作寒陽不交於陰而作熱心胸之內竟成戰場之地安得而不煩悶哉然則治法和其陰陽之氣而少佐之以祛暑之劑緩以調之不必驟以折之也方用和合陰陽湯人參一錢白朮二錢茯苓五錢香薷一錢藿香一錢蘇葉一錢厚朴五分陳皮三分枳殼三分砂仁一粒天花粉一錢水煎探徐徐服之一劑陰陽和二劑各症愈不必

三劑此方分陰陽之清濁通上下之浮沉調和於拂逆之時實有奇功以其助正而不增火祛邪而不傷氣化有事爲無事也

此症用加減六

君湯亦效

人參茯苓白芍各三錢白朮一兩香薷一錢砂仁一粒陳皮五分半夏一錢水煎服一劑即平

一中暑熱之氣腹中疼痛欲吐不能欲瀉不得此名爲乾霍亂也夫邪入胃中得吐則邪越於上邪入腹中得瀉則邪趨於下矣邪越於上則邪不入於中邪趨於下則邪不留於內今不吐不瀉則邪不上不下堅居於中焦

辨證錄

卷之六 暑症

五

譬如賊人反叛雖四境安寧而一時生變喋血於城門橫屍於內地斯時非奮不顧身之將號召忠勇冒矢石而奪門靖難烏能安反側於頃刻定禍患於須臾哉治法急用人參一兩瓜蒂七箇水煎一大碗飲之即吐而愈矣此方名爲人參瓜蒂散此等之病脈必沉伏不吐則死古人亦知用瓜蒂吐之但不敢加入人參耳蓋此症原因胃氣之虛以致暑邪之入今加大吐則胃必更傷非用人參則不能於吐中而安其胃氣也且胃氣素虛而暑邪壅遏雖用瓜蒂以吐之而氣怯不能上送往

往有欲吐而不肯吐者即或動吐而吐亦不多則邪何能遽出乎惟用人參至一兩之多則陽氣大旺力能祛邪而上湧況得瓜蒂以助之安得而不大吐哉邪因吐而遽散而正氣又復無傷譬如內亂一定而民安物阜仍是救寧之日何至動四郊之多壘哉

此症用參蘆

湯亦佳

人參蘆二兩煎滾湯一碗和之井水一碗少入鹽和勻飲之以鷄翎掃喉引其嘔吐吐出即安然不吐而愈也

一中暑熱極發狂登高而呼棄衣而走見水而投人以爲

辨證錄

卷之六 暑症

五

暑毒之侵誰知胃火之相助乎夫暑熱之入人臟府也多犯心而不犯胃蓋暑與心俱屬火也胃則心之子也胃見暑邪之犯心即發其土中之火以相衛胃乃多氣多血之府火不發則已發則其酷烈之威每不可當暑邪畏胃火之強益遁入於心而心又喜寒不喜熱畏暑邪之直入不敢自安胃火怒暑邪之直入於心中而不出乃縱其火以焚燒於心之外心又安禁二火之相逼乎勢必下堂而走心君一出而神無所依於是隨火熾而飛越登高而呼者火騰於上以呼救援也棄衣而走

者憎衣之添熱也見水而投者喜水之尅火也此時心中無津液之養皮膚之外必多汗出此陽是陰陽兩竭之病至危至急之候苟不大瀉其火則燎原之焰何以撲滅乎方用三聖湯人參三兩石膏三兩玄參三兩水煎數碗灌之一劑狂定二劑神安不可用三劑也另用緩圖湯玄參二兩人參一兩麥冬一兩青蒿一兩水煎服二劑而暑熱兩解矣三聖湯用石膏至三兩用人參玄參各至三兩未免少有霸氣然火熱之極非杯水可息苟不重用則燥乾腎水立成烏燼方中石膏雖多而

辨證錄

卷之六 暑症

三

人參之分兩與之相同實足以驅駕其白虎之威故但能瀉胃中之火而斷不至傷胃中之氣玄參又能滋潤生水水生而火尤易滅也至於緩圖湯不用石膏者以胃中之火既已大瀉所存者不過餘烟斷焰時起時滅何必再用陰風大雨以洗濯之故又改用麥冬青蒿既益其陰又息其火使細雨綢繆之為得也或問因暑發狂似宜消暑乃三聖湯但瀉火而不顧暑何以能奏功耶不知暑亦火也瀉火即瀉暑矣使瀉火之中加入香薷藿香清暑之藥則石膏欲下降而香薷藿香又欲外

散轉足以掣石膏之手反不能直瀉其火矣

此症用三清湯救之亦神
玄參四兩石膏一兩青蒿一兩水煎服一劑即安

一中暑熱症自必多汗今有大汗如雨一出而不能止者人以爲發汗亡陽必死之症也誰知是發汗亡陰之死症乎夫暑熱傷心汗自外泄然而心中無汗也何以有汗此汗乃生於腎而非生於心也蓋心中之液腎生之也豈心之汗非腎之所出乎雖汗出亡陽乃陽旺而非陰虛但陰不能制陽而陽始旺亦陰不能攝陽而陽始亡顧陰陽原兩相根也陰不能攝陽而陽能戀陰則陽

辨證錄

卷之六 暑症

三

尚可回於陰之中而無如其陽一出而不返也陰根於陽見陽之出而不留亦且隨之俱出罄其腎中之精盡化爲汗而大泄試思心中之液幾何竟能發如雨之汗乎明是腎之汗而非心之汗也汗既是腎而非心則亡亦是陰而非陽矣然則聽其亡陰而死乎尚有救死之法在方用救亡生陰丹人參二兩熟地四兩山茱萸二兩北五味五錢菴神一兩白芍一兩水煎服此方熟地山萸五味子均是填精補水之味菴神安其心白芍收其魂人參回其陽此人之所知也陰已外亡非填其精

髓何以灌注涸竭之陰陽已外亾非補其關元何以招其散失之陽山茱五味補陰之中仍是收斂之劑陰得補而水生則腎中有本汗得補而液轉則心內無傷又得茯神以安之白芍以收之則陽回陰返自有神捷之機也

此症用人參青蒿湯亦神

人參二兩生地麥冬各一兩青蒿五錢北五味子一錢水煎服汗止即生否則無效

一中暑熱極妄見妄言宛如見鬼然人又安靜不生煩躁口不甚渴此是寒極相戰寒引神出有似於狂而非熱

辨證錄

卷之六 暑症

天

極發狂也夫中暑明是熱症何以熱能變寒而有似狂之症也蓋其人陰氣素虛陽氣又復不旺暑熱之邪乘其陰陽兩衰由肺以入心而心氣不足神即時越出以遁於腎而腎中陰寒之氣上升則暑自出於心之外流連於肺經之內矣暑邪既已退出於心外而心君尙恐暑邪之來侵乃依其肝木之母以安神心神入於肝則肝魂不寧乃遊出於軀殼之外因而妄見鬼神而妄言詭異也魂既外遊而神居魂室反得享其寧靜之福况肝木原無火旺而腎中陰寒之氣相通心君正藉以杜

暑邪之侵且恃之無恐何生煩躁乎惟是肺氣獨受暑邪火刑金而作渴然腎見肺母之被刑乃陰寒之氣直冲而上以救肺故口雖渴而不甚也然則治法奈何散肺中之暑邪補脾胃之土氣土氣一旺而肺氣亦旺矣肺旺可以敵邪又得散邪之藥自然暑氣難留暑散而魂歸神返必至之勢也方用護金湯麥冬一兩大參三錢百合五錢茯苓三錢紫苑一錢香薷一錢甘草一錢水煎服二劑即愈此方但補肺脾胃之氣不去救心以益寒不去助腎以瀉火不去補肝以逐神而魂自歸肝神自返心者以邪有所制何必逐邪之太甚正未大虛何必補正之太多不可因邪居於上而下治正輕於下而重治也

辨證錄

卷之六 暑症

天

此症用人參麥冬湯亦妙
人參二兩麥冬三兩水煎服

一中暑熱吐血傾盆純是紫黑之色氣喘作脹不能卧倒口渴飲水又復不快人以爲暑熱之極而動血也誰知是腎熱之極而嘔血乎夫明是中暑以動吐血反屬之腎熱者蓋暑火以引動腎火也夫腎中之火龍雷之火也龍雷原伏於地夏月則地下甚寒龍雷不能下藏而

多上泄其怒氣所激而成霹靂之猛火光劃天大雨如注往往然也人身亦有龍雷之火下伏於腎其氣每與天之龍雷相應暑氣者亦天之龍雷火也暑熱之極而龍雷乃從地出非同氣相引之明驗乎人身龍雷之火不動則暑氣不能相引苟腎水原虧腎火先躍躍欲動一遇天之龍火同氣相感安得不勃然振興哉既已勃然振興而兩火相激其勢更烈乃直冲而上挾胃中所

辨證錄

卷之六 暑症

三

有之血而大吐矣胃血宜紅而色變紫黑者正顯其龍雷之氣也凡龍雷所劈之處樹木必變紫黑之色所過臟府何獨不然其所過之胃氣必然大傷氣傷則逆氣逆則喘胃氣既傷何能遽生新血以養胃乎此胸脇之所以作脹也胃為腎之關門關門不閉夜無開闔之權安能臥哉血吐則液乾液乾則口渴內水不足必索外水以救焚乃飲之水而不快以龍雷之火乃陰火而非陽火也治法宜大補其腎中之水以制龍雷之火不可大瀉其龍雷之火以傷其胃中之氣也方用沛霖膏玄參二兩入參一兩生地二兩麥冬二兩牛膝五錢荊芥炒黑三錢水煎服一劑血止二劑喘脹消三劑口亦不

渴四劑全愈愈後仍服六味地黃丸可也此方大補腎水水足而龍雷之火自歸於腎之宅火既安於腎宅血自止於胃關何必用黃栢知母以瀉火用香薷藿香以散暑哉况瀉火而火愈熾必至傷損夫胃土散暑而暑難退必至消耗夫肺金勢必血不可止火不可滅而死矣

此症用丹膏湯亦神
丹皮三兩荊芥三錢青蒿一兩水煎服

一中暑熱之氣兩足冰冷上身火熱煩躁不安飲水則吐人以爲下寒上熱之症乃暑氣之阻隔陰陽也誰知是

辨證錄

卷之六 暑症

三

暑散而腎火不能下歸之故乎人身龍雷之火因暑氣相感乃奔騰而上世醫不知治法徒瀉其暑熱之氣不知引火歸源於是暑熱已散龍雷之火下不可歸乃留於上焦而作熱矣火既盡升於上焦則下焦無火安得不兩足如冰耶火在上而寒在下兩相攻擊中焦之地排難解紛兩不相合煩躁不安有自來也上熱薰肺口必渴也飲水止可救上焦之熱及至中焦已非所宜况下焦純寒冷水正其所惡欲不吐得乎治法不可治暑而并不可瀉火不特不可瀉火必須補火蓋龍雷之火

虛火也實火可瀉虛火宜補然而補火之中仍須補水以濟之補水者補腎中之真水也真火非真水不歸真火得真水以相合則下藏腎中不至有再升之患也方用八味地黃湯熟地一兩山茱萸五錢山藥五錢丹皮茯苓澤瀉各三錢肉桂一錢附子一分水煎探冷飲之一劑兩足溫矣再劑上身之火熱盡散中焦之煩躁亦安且不思飲水矣六味地黃湯補水之神藥桂附引火之神丹水火既濟何至陰陽之反背乎

此症用還腎湯亦效
熟地三兩甘草一錢肉桂五分牛膝五錢水煎服

辨證錄

卷之六

暑症

三

人有夏日自汗兩足逆冷至膝下腹脹滿不省人事人以爲陽微之厥也誰知是傷暑而溼氣不解乎夫溼從下受溼感於人身未有不先從下而上故所發之病亦必先見於下溼病得汗則溼邪可從汗而解矣何自汗而溼仍不解耶蓋溼病而又感暑氣自汗止可解暑而不能解溼以暑熱浮於上身而溼邪中於下身汗解於陽分而不解於陰分耳治法利小便以解溼逐熱邪以解暑則上下之氣通而溼與暑盡散矣方用解利湯石膏一二錢知母一錢甘草五分半夏一錢白朮三錢猪苓一

錢茯苓三錢澤瀉一錢肉桂一分水煎服連服十劑全愈此方乃五苓散白虎湯之合方也溼因暑病不祛暑則溼不易消故用白虎湯於五苓散中解暑利溼而兼用之也

此症用清暑定
逆湯亦佳

白朮山藥薏仁各五錢肉桂三分香薷一錢陳分三分人參二錢茯苓三錢水煎服

人有冬時寒令偶開笥箱以取綿衣覺有一裹熱氣冲鼻須臾煩渴嘔吐灑灑惡寒翕翕發熱惡食喜水大便欲去不去人皆以爲中惡也誰知是傷暑之病乎夫冬月

辨證錄

卷之六

暑症

三

有何暑氣之侵人謂之傷暑不知氣虛之人遇邪即感不必值酷熱炎氛奔走烈日之中而始能傷暑也或坐於高堂或眠於靜室避暑而反得暑者正比比也是暑氣之侵人每不在熱而在寒衣裳被褥晒之盛暑夾熱收藏於笥箱之內其暑氣未發一旦開泄氣盛之人自不能干倘體虛氣弱偶爾感觸正易中傷及至中傷而暑氣必發矣况冬時人身外寒內熱以熱投熱病發必速故聞其氣而即病也治法不可以傷寒法治之當舍時從症仍治其暑氣而各症自消方用香薷飲加減治

之人參三錢白朮三錢茯苓二錢香薷二錢黃連五分
甘草三分陳皮五分扁豆二錢厚朴五分水煎服一劑
而愈不必再劑若執冬令無傷暑之症拘香薷非治寒
之方不固泥乎甚矣醫道之宜通變而治病之貴審問
也

此症用補氣化

暑丹亦效

人參二錢茯苓白朮麥冬各三錢香薷一錢砂仁
一粒陳皮炮薑神麴各三分水煎服一劑即愈

辨証錄

卷之六

三

燥門

一陰耗而思色以降其精則精不出而內敗！便道澀如
淋此非小腸之燥乃心液之燥也夫久戰而不泄者相
火旺也然而相火之旺由於心火之旺也蓋君火一衰
而相火即上奪其權心火欲固而相火欲動心火欲閉
而相火欲開况心君原思色乎母怪其精之自降矣然
心之衰者亦由腎水虛也腎旺者心亦旺以心中之液
腎內之精也精足則上交於心而心始能寂然不動即
動而相火代君以行令不敢僭君以奪權故雖久戰而
可以不泄精虛則心無所養怯然於中本不可戰而相
火鼓動亦易泄也至於心君無權心甫思色而相火燥
柄矣久之心君既弱而相火亦不能強有不必交接而
精已離宮又不能行河車逆流之法安能復回於故宮
哉勢必閉塞溺口水道澀如淋而作痛矣治法必須補
心仍須補其腎水少佐以利水之藥則濁精自愈矣方
用化精丹熟地二兩人參五錢山茱萸一兩車前子三
錢麥冬一兩牛膝五錢白朮一兩生棗仁五錢沙參一
兩水煎服一劑而澀痛除二劑而淋亦止矣此方人參

辨証錄

卷之六

三

以生心中之液熟地山茱沙參以填腎中之陰麥冬以益肺金使金之生水則腎陰尤能上滋於心又得生聚仁之助則心君有權自能下通於腎而腎氣既足自能行其氣於膀胱又得白朮利腰膈之氣則尤易通達復得牛膝車前下走以利水則水竅開而精竅自閉何患小腸之燥澁乎心液非補腎不化精竅非補腎不閉倘單用利水逐濁之味何能取效哉

此症用生液

丹亦妙

熟地二兩山茱萸人參生棗仁茯神各五錢北五味二錢丹皮丹參各三錢水煎服

雜證錄

朱之六燥

卷

陰已痿弱見色不舉若強勉入房以耗竭其精則大小便牽痛數至圍而不得便愈便則愈痛愈痛則愈便人以為腎火之燥也誰知是腎水之燥乎夫腎中水火兩不可離人至六十之外水火兩衰原宜閉關不戰以養其天年斷不可妄動色心以博房幃之趣犯之多有此病至於中年人患此病者乃縱色竭精以至火隨水流水去而火亦去一如老人之痿陽不可以戰矣倘能慎疾而閉關亦可延年無如其色心之不死也奮勇爭鬪或半途倒戈或入門流涕在腎宮本不多精又加暢泄

則精已涸竭無陰以通大小之腸則大小腸乾燥自然兩相取給彼此牽痛也上游無泉源之濟則下流有竭澤之虞下便則上愈燥而痛生下痛則上愈燥而便急治法必須大補其腎中之水然不可僅補其水而必須兼補其火蓋水得火而易生也方用潤涸湯熟地二兩白朮一兩巴戟天一兩水煎服此方用熟地以滋腎中之真陰巴戟天以補腎中之真陽雖補陽而仍是補陰之劑則陽生而陰長不至有強陽之害二味補腎內之水火而不為之通達於其間則腎氣未必遽入於大小之腸也加入白朮以利其腰膈之氣則前後二陰無不通達何至有乾燥之苦數圍而不得便哉

此症用天一

湯亦效

地骨皮玄參芡實各五錢山藥牛膝丹皮各三錢熟地一兩肉桂一錢水煎服

一人有日間口燥舌上無津至夜臥又復潤澤人以為陽虛之燥也誰知是陰畏陽火之燥而不交於陽乎夫陽旺則陰衰陽衰則陰旺口燥之病陰陽兩虛之症也然夜燥而日不燥乃陰氣之虛日燥而夜不燥乃陽火之旺夫腎中之水陰水也舌上廉泉之水乃腎水所注腎

辨證錄

朱之六燥

卷

水無時不注於廉泉之穴則舌上不致乾枯胡為陽火
遽至於燥竭哉且腎水一乾則日夜皆當焦涸何能日
燥而夜不燥乎此症蓋陽火甚旺而陰水尚未至大衰
然止可自顧以保其陰不能分潤以濟其陽於是堅守
其陰於下焦不肯上交於陽位自然上焦火熾而口燥
也治法不必瀉陽火之旺惟補其真陰之水則水足以
濟陽矣方用六味地黃湯加麥冬五味治之熟地一兩
山茱萸五錢山藥五錢丹皮澤瀉茯苓各三錢麥冬一
兩五味一錢水煎服連服數劑自愈此方專補腎水加

辨證錄

卷之六

五

麥冬五味以補肺肺腎相資則水尤易生陽得陰而化
亦陽得陰而平陰既相濟陽又不旺安得口之再燥哉

此症用灌舌丹亦佳

熟地麥冬各一兩沙參地骨皮各五錢水煎服

一人有作意交感盡情浪戰陰精大泄不止其陰翹然不
倒精盡繼之以血者人以爲火動之極誰知是水燥之
極耶夫腎中水火原兩相根而不可須臾離者也陰陽
之氣彼此相吸而不能脫陽欲離陰而陰且下吸陰欲
離陽而陽且上吸也惟醉飽行房亂其常度陰陽不能
平於是陽離陰而陽脫陰離陽而陰脫兩不相援則陽

之離陰甚速陰之離陽亦速矣及至陰陽兩遺則水火
兩絕魂魄且不能自主往往有精脫而死者今精遺而
繼之血人尚未死是精盡而血見乃陰脫而陽未脫也
使陽已盡脫外勢何能翹然不倒乎救法急須大補其
腎中之水俾水生以留陽也然陰脫者必須用陽藥以
引陰而強陽不倒倘補其陽則火以濟火必更加燥涸
水且不生何能引陽哉不知無陰則陽不得引而無陽
則陰亦不能引也法宜用九分之陰藥一分之陽藥大
劑煎飲水火無偏勝之虞陰陽有相合之功矣方用引

辨證錄

卷之六

五

陰奪命丹熟地八兩人參一兩北五味子三錢沙參二
兩肉桂一錢水煎服一劑而血止二劑而陽倒連服四
劑始有性命再將前藥減十分之七每日一劑服一月
平復如故此方用熟地沙參以大補其腎中之陰用人
參以急固其未脫之陽用五味子以斂其耗散之氣用
肉桂於純陰之中則引入於孤陽之內令其已離者重
合已失者重歸也倘不多用補陰之藥而止重用人參
肉桂雖亦能奪命於須臾然而陽旺陰涸止可救絕於
一時必不能救燥於五臟亦旦夕之生而已

此症用三仙膏亦神
熟地五兩人參二兩丹皮一兩水煎服

一人有夜不能寐口中無津舌上乾燥或開裂紋或生瘡
點人以爲火起於心誰知是燥在於心乎夫心屬火然
而心火無水則火爲未濟之火也既濟之火則火安於
心宮未濟之火則火鬱於心內火鬱不宣則各臟腑之
氣不敢相通而津液愈少不能養心而心益燥矣何能
上潤於口舌哉開裂生點必至之勢也治法大補其心
中之津則心不燥而口舌自潤然而徒補其津亦未必
大潤也蓋心中之液乃腎內之精也腎水上交於心則
成既濟之火補腎以生心烏可緩哉方用心腎兩資湯
人參三錢茯神三錢栢子仁一錢炒棗仁三錢麥冬五
錢北五味一錢熟地一兩丹參二錢沙參三錢山茱萸
三錢芡實三錢山藥三錢菟絲子二錢水煎服連服十
劑夜臥安而口中生津諸症盡愈此方心腎同治補火
而水足以相濟補水而火足以相生故不見焦焚之苦
而反獲優渥之歡也

此症夜清
湯亦效

人參麥冬各一兩甘草一錢栢子仁兔絲子各
三錢玄參炒棗仁各五錢黃連三分水煎服

人有咳嗽吐痰不已皮膚不澤少動則喘此燥在於肺也
內經云夏傷於熱秋必病燥咳嗽吐痰皮膚不澤而動
喘皆燥病也議者謂燥症必須補腎腎水乾枯而燥症
乃成然而此燥非因腎之乾枯而來因夏傷於熱以耗
損肺金之氣不必去補腎水但潤脾而肺之燥可解雖
然脾爲肺之母而腎乃肺之子補脾以益肺之氣補腎
而不損肺之氣子母相治而相濟肺氣不更加潤澤乎
方用子母兩濡湯麥冬五錢天冬三錢紫苑一錢甘草
三分蘇葉五分天花粉一錢熟地五錢玄參三錢丹皮

辨證錄 卷之六 燥 四十一

二錢牛膝一錢水煎服一劑氣平二劑嗽輕連服十劑
痰少而喘嗽俱愈此方肺脾腎同治之方也方名子母
兩濡似乎止言脾腎也然而治脾治腎無非治肺也脾
腎濡而肺氣安有獨燥者哉

此症用寧嗽
丹亦佳

麥冬二兩五味子二錢天冬三錢生地一兩桑白皮
二錢款冬花紫苑桔梗各一錢甘草五分牛膝三錢
水煎服

人有兩脇脹滿皮膚如虫之咬乾嘔而不吐酸人以爲肝
氣之逆誰知是肝氣之燥乎夫肝藏血者也肝中有血

則肝潤而氣舒肝中無血則肝燥而氣鬱肝氣既鬱則伏而不宣必下尅脾胃之土而土之氣不能運何以化精微以生肺氣乎故傷於中則脹滿嘔吐之症生傷於外則皮毛拂抑之象見似乎肝氣之逆而實乃肝氣之燥也肝燥必當潤肝然而肝燥由於腎虧滋肝而不補腎則肝之燥止可少潤於目前而不能久潤於常久必大滋乎腎腎濡而肝亦濡也方用水木兩生湯熟地一兩白芍一兩茯苓三錢柴胡一錢陳皮一錢甘草三分神麴五分白朮三錢甘菊花二錢枸杞子二錢牛膝三

蘇註錄

卷之六

四三

錢玄參三錢水煎服二劑而肝血生四劑而肝燥解或謂肝燥而用白芍熟地濡潤之藥自宜建功乃用白朮茯苓柴胡神麴之類不以燥益燥乎不知過於濡潤反不能受濡潤之益以脾喜燥也脾燥而不過用濡潤之藥則脾土健旺自能易受潤澤而化精微否則純於濡潤未免太濕矣脾先受損安能資益夫肝經以生血而解燥哉用燥於濕之中正善於治燥耳

此症用濡木

飲亦效

白芍一兩熟地川芎各五錢柴胡香附炒
梔子神麴各五分白豆蔻一粒水煎服

人有口渴善飲時發煩躁喜靜而不喜動見水果則快遇熱湯則憎人以爲胃火之盛也誰知是胃氣之燥乎夫胃本屬土土似喜火而不喜水然而土無水氣則土成焦土何以生物哉况胃中之土陽土也陽土非陰水不養胃中無水斷難化物水衰而物難化故土之望水以解其乾涸者不啻如大旱之望時雨也且人靜則火降人動則火起內火既盛自索外水以相救喜飲水而惡熱湯又何疑乎第燥之勢尙未至於熱然燥之極必至熱之極矣治法解燥須清熱也方用清解湯玄參一兩

蘇註錄

卷之六

四三

生地五錢甘菊花三錢天花粉三錢茯苓三錢麥冬三錢丹參二錢沙參三錢水煎服連服四劑而煩躁除再服四劑口渴亦解再服四劑全愈此方平陽明胃火者居其半平少陰相火者居其半蓋陽明胃火必得相火之助而勢乃烈雖治燥不必瀉火然土燥即火熾之原先平其相火則胃火失勢而燥尤易解此先發制火乃妙法也

此症用潤土

湯亦效

玄參生地各一兩甘草一錢地
骨皮五錢茯苓三錢水煎服

人有肌肉消瘦四肢如削皮膚飛屑口渴飲水人以爲風消之症誰知是脾燥之病乎蓋脾燥由於肺燥而肺燥由於胃燥也胃燥必至胃熱而胃熱必移其熱於脾脾熱而燥乃成矣夫脾爲濕土本喜燥也何反成風消之症乎脾最懼者肝木也木能尅土肝怒胃火逃竄見胃火之入脾卽挾其風木之氣以相侮脾畏肝木不敢不受其風風火相合安得而不燥乎脾燥而何能外榮是以內外交困而風消之症成方用散消湯治之麥冬一兩玄參二兩柴胡一錢水煎服四劑口渴止八劑肢膚潤二十劑不再消也此方潤肺而不潤脾何脾消之症能愈以症成於肺故潤肺而脾亦潤也方中加柴胡於二味之中大有深意柴胡最抒肝氣肝抒則肝不尅脾脾氣得養况又瀉其脾肺之火火息而風不揚此脾燥之所以易解而風消不難愈也

此症用丹白生母湯亦效
白芍生地各一兩丹皮五錢知母一錢水煎服

人有目痛之後眼角刺觸羞明喜暗此膽血之乾燥也夫膽屬木木中有汁是木必得水而後養也膽之系通於目故膽病而目亦病矣然而膽之系通於目不若肝之

辨證錄

卷之六

四

竅開於目也目無血而燥宜是肝之病而非膽之病然而肝膽爲表裏肝燥而膽亦燥矣膽與肝皆主藏而不瀉膽汁藏而目明膽汁瀉而目暗蓋膽中之汁卽膽內之血也血少則汁少汁少卽不能養膽養目矣治法不可徒治其目也亟宜滋膽中之汁尤不可止治其膽更宜潤肝中之血而膽之汁自潤目之火自解矣方用四物湯加味治之熟地一兩川芎一錢當歸三錢白芍一兩柴胡一錢甘菊花三錢白蒺藜一錢五分水煎服連服四劑而目痛之疾自除再服四劑而羞明喜暗之病去四物湯補血補肝中之血也補肝而膽在其中矣且四物湯尤入心腎心得之而濡不來助膽之火腎得之而澤不來盜膽之氣心肝腎全無乾燥之虞而膽豈獨燥乎所以服之而奏功也

此症用甘風丹荆湯亦效
丹皮一兩防風五分荆芥五分甘菊花五錢水煎服

人有雙目不痛瞳神日加緊小口乾舌苦人以爲心火之旺也誰知是心包之乾燥乎夫目之系通於五臟不止心包之一經也瞳神之光心腎之光也心腎之光心腎之精也然而心之精必得腎之精交於心包而後心腎

辨證錄

卷之六

四

之精始得上交於目蓋心君無爲而心包有爲也所以心包屬火全恃腎水之滋益腎不交於心包卽心包不交於心火無水濟則心包無非火氣乾燥之極何能內潤心而外潤目乎然則瞳神之緊小皆心包之無水由於腎水之乾枯也補腎以滋心包烏可緩哉方用救瞳湯熟地一兩山茱萸五錢甘菊花三錢玄參一兩柴胡五分白芍一兩當歸五錢山藥三錢丹皮五錢水煎服此方乃肝腎同治之法也心包無水不治心包而滋肝腎者以肝乃心包之母也肝取給於外家以大益其子

辨證錄

卷之六

四

舍勢甚便而理甚順緊急之形不化爲寬大之象哉

此症用菊女飲亦效
女貞子一兩甘菊花五錢麥冬五錢水煎服

人有秋後閉結不能大便此燥傷肺金而大腸亦燥非大腸之火也蓋肺與大腸相爲表裏肺燥而大腸不能獨潤且大腸之能開能闔者腎氣主之也腎足而大腸有津腎潤而大腸無澤是大腸之不燥全藉乎腎水之相資也然腎水不能自生肺金乃腎之母肺潤則易於生水肺衰則難於生水腎水無源救腎不暇何能顧大腸哉治法惟補肺腎而大腸自潤矣方用六味地黃湯加

味治之熟地一兩山藥三錢山茱萸四錢茯苓三錢丹皮三錢澤瀉三錢麥冬一兩北五味一錢水煎服連服四劑自通切戒用大黃芒硝以開結也蓋此病本傷陰之症又加劫陰之藥重傷其陰必成爲陽結之症使腹中作痛百計導之而不得出不更可危哉何若大補其肺腎之陰使陰足而陽自化之爲得耶

此症用冬歸湯亦效
麥冬當歸各二兩水煎服

辨證錄

卷之六

四

人有夏秋之間小便不通點滴不出人以爲膀胱之熱結誰知是肺燥而膀胱亦燥乎夫膀胱之能通者由於腎氣之足亦由於肺氣之足也膀胱與腎爲表裏而肺爲水道之上游二經足而水有源流二經虛而水多阻滯况乾燥之至既虧清肅之行復少化生之氣膀胱之中純是乾枯之象從何處以導其細流哉此小便之不通實無水之可化也治法不可徒潤膀胱而亟當潤肺尤不可徒潤夫肺尤當大補夫腎腎水足而膀胱自然滂沛何虞於燥結哉方用啟結生陰湯熟地一兩山茱萸五錢車前子三錢薏仁五錢麥冬五錢益智仁一錢肉桂一分沙參三錢山藥四錢水煎服此方補腎而仍補

肺者滋其生水之源也補中而仍用通法者水得補而無停滯之苦則水通而益收補之利也加益智以防其遺加肉桂以引其路滂沛之水自然直趨膀胱燥者不燥而閉者不閉矣

此症用栢桂生麥湯亦效

麥冬一兩黃栢三錢生地五錢肉桂三分水煎服

人有消渴飲水時而渴甚時而渴輕人以爲心腎二火之沸騰誰知是三焦之氣燥乎夫消症有上中下之分其實皆三焦之火熾也下焦火動而上中二焦之火翕然相從故爾渴甚迨下焦火息而中上二焦之火浮遊不定故又時而渴輕三焦同是一火何悉聽於下焦之令

辨證錄

卷之六

燥

蓋下焦之火一發而不可遏故下焦之火宜靜而不宜動又易動而難靜也必得腎中之水以相制腎旺而水靜腎虛而水動矣天下安有腎足之人哉腎水虛而取資於水者又多也水虧奚能制火乎火動必燥乾三焦之氣則三焦更燥勢必仰望於外水之相救以迅止其大渴也欲解三焦之渴舍補腎水何法哉方用六味地黃湯加味治之熟地二兩山茱萸一兩茯苓五錢山藥五錢丹皮一兩澤瀉五錢麥冬一兩北五味子二錢水

煎服十劑渴輕二十劑渴解三十劑全愈六味治腎更加麥冬五味以治肺者非止清肺金之火也蓋補肺以助腎水之源肺旺而腎更有生氣矣腎水旺足以制下焦之火下焦之火不動而上中二焦之火烏能興焰哉

此症用二丹湯亦妙

丹皮丹參各五錢茯苓栢子仁各三錢水煎服

人有大病之後小腸細小不能出溺脹甚欲死人以爲小腸之火誰知是小腸之乾燥哉夫小腸之開闔非小腸主之也半由於膀胱半由於腎氣故小腸之結全在膀胱之閉而膀胱之閉又成於腎氣之閉也蓋腎水竭而膀胱枯故小腸亦燥而成結耳治法必須大補腎中之水而補水又必補肺金之氣以膀胱之氣化必得肺金清肅之令以行之也肺氣旺而水流而後助之利水之藥則腎氣開而小腸亦開也方用治本消水湯熟地二兩山茱萸一兩麥冬一兩車前子五錢五味子二錢茯苓五錢牛膝三錢劉寄奴三錢水煎服一劑水通再劑腸寬小便如注矣此方不治小腸專治肺腎肺腎不燥小腸之燥自潤矣

辨證錄

卷之六

燥

此症用廣澤湯亦效
麥冬二兩生地一兩車前子劉寄奴各三錢水煎服

痿證門

人有胃火薰蒸日冲肺金遂至痿弱不能起立欲嗽不能欲咳不敢及至咳嗽又連聲不止肺中大痛非肺癰之毒乃肺痿之病也夫肺之成痿也由於陽明之火上冲於肺而肺經津液衰少不能滅陽明之焰金從火化累年積歲肺葉之間釀成火宅而清涼之藥不能直入於肺非杆格清涼之故也肺既大熱何能下生腎水水乾無以濟火則陽明之炎蒸更甚自然求救於水穀而水穀因肺金清肅之令不行不能化成津液以上輸於肺

辨證錄

卷之六 痿症

五

則肺之燥益甚肺燥而肺中津液盡變為涎沫濁唾矣肺液既乾肺氣自怯所成涎沫濁唾若難推送而出此欲嗽之所以不能也然而涎沫濁唾終非養肺之物必須吐出為快無奈其盤踞於火宅倘一咳而火必沸騰胸膈之間必至動痛此欲咳之所以不敢也迨忍之又忍至不可忍而咳嗽涎沫濁唾雖出而火無水養上冲於咽喉不肯遽下此咳嗽所以又連聲而不止也咳嗽至連聲不止安得不傷損乾燥之肺而作痛乎人見其痿弱不能起立或用治痿之藥愈傷肺氣奚能起痿治

法宜瀉其胃中之火大補其肺經之氣然又不可徒補其肺中之氣更宜兼補其腎中之水方用生津起痿湯麥冬一兩甘草二錢玄參一兩甘菊花五錢熟地一兩天門冬三錢天花粉一錢貝母一錢金銀花五錢水煎服連服四劑而咳嗽輕再服四劑而咳嗽止再服十劑而痿症除矣蓋陽明之火本可用大寒之藥然而陽明初起之火可用大寒而陽明久旺之火宜用微寒因陽明之火乃胃土中之火初起可用大寒瀉火以救腎中之水久旺用微寒散火所以生胃中之土也胃火之盛胃土之衰也扶其土即所以瀉其火而胃土自健自能升騰胃氣化水穀之精微輸津液於肺中也又加之冬甘草天貝之類原能益肺消痰則肺中更加潤澤得金銀花同入以消除其敗濁之毒則肺金何至再燥乎加熟地者以填補腎水水旺而肺不必去顧腎子之潤則肺氣更安清肅下行於各府水生火息不必治痿而痿自愈也

辨證錄

卷之六 痿症

五

此症用紫花飲亦神

麥冬三兩 枯梗 甘菊 花蒲 公英 各五錢 生甘草 貝母 各二錢 生地 一兩 紫花地丁 三錢 水煎服

一胃火上冲於心心中煩悶怔忡驚悸久則成痿兩足無力不能動履此總屬胃火之盛非心火之旺也夫胃屬土而心屬火心乃生胃而胃不宜尅心然心火生胃則心火不炎胃火薰心則心火大燥此害生於思也倘徒瀉心火則胃子見心母之寒益肆其炎氣愈添心中之燥必下取於腎水而腎因胃火之盛熬乾腎水不能上濟於心火益旺而水益枯骨中無髓安得兩足之生力乎治法宜大益其腎中之水少清其胃中之火則胃氣安而腎水生自然上交於心也方用清胃生髓丹玄參

辨證錄

卷之六 痿症

三

一兩麥冬五錢甘菊花五錢熟地二兩北五味二錢沙參五錢水煎服十劑即可行步二十劑怔忡驚悸之病除又十劑煩悶痿弱之症去再服十劑全愈痿症無不成於陽明之火然用大寒之藥如石膏知母之類雖瀉胃火甚速然而多用必至傷胃胃傷而脾亦傷脾傷而腎安得不傷乎故不若用玄參甘菊之類既清其胃火而又不損其胃土則胃氣自生能生津液下必注於腎而上且灌於心矣况麥冬五味以益心熟地沙參以滋腎上下相資水火既濟痿病豈不愈乎

此症用石斛玄參湯亦佳
全釵石斛一兩玄參二錢水煎服

一陽明之火固結於脾而不肯解善用肥甘之物食後即饑少不飲食便覺頭紅面熱兩足乏力不能行走人為陽明胃火之旺以致成痿誰知是太陰脾火之盛以燥乾其陰乎夫痿症皆責之陽明何以太陰火旺亦能成痿蓋太陰與陽明為表裏陽明火旺而太陰之火亦旺矣二火相合而搏結於腑臟之間所用飲食僅足以供火之消磨而不能佐水之浸渥火旺水虧則腎宮乾涸何能充足於骨中之髓耶骨既無髓則骨空無力何能起立以步履哉治法益太陰之陰水以勝其陽明之陽火則脾胃之中水火無亢炎之害而後筋骨之內髓血有盈滿之機也方用調脾湯人參五錢玄參一兩麥冬五錢甘菊花五錢薏仁五錢金釵石斛三錢芡實一兩山藥五錢水煎服連服四劑便覺腹不甚饑再服四劑火覺少息再服十劑全愈此方補脾胃之土即所以補其火也然而火之所以旺者正坐於土之衰耳土衰則不生水而生火矣今於補土之中加入玄參甘菊石斛微寒之藥則脾胃之火自衰而脾胃之土自旺脾胃

辨證錄

卷之六 痿症

三

能起立以步履哉治法益太陰之陰水以勝其陽明之陽火則脾胃之中水火無亢炎之害而後筋骨之內髓血有盈滿之機也方用調脾湯人參五錢玄參一兩麥冬五錢甘菊花五錢薏仁五錢金釵石斛三錢芡實一兩山藥五錢水煎服連服四劑便覺腹不甚饑再服四劑火覺少息再服十劑全愈此方補脾胃之土即所以補其火也然而火之所以旺者正坐於土之衰耳土衰則不生水而生火矣今於補土之中加入玄參甘菊石斛微寒之藥則脾胃之火自衰而脾胃之土自旺脾胃

之上既旺而脾胃之津自生於是灌注於五臟之間轉
輪於兩足之內火下温而不上發頭面無紅熱之侵何
至脛趾之乏力哉或曰火盛易消以至善饑似宜用消
導之劑以損脾胃之氣乃不損其有餘而反增益其不
足恐未可為訓也不知脾胃之土俱不可傷傷土而火
愈旺矣補陰則陽伏消食則傷陰補陰可也寧必用消
導之藥哉

此症用玄母菊英湯亦效

玄參二兩甘菊花一兩知母三錢熟地二兩水煎服

一大怒之後兩脇脹滿胸間兩旁時常作痛遂至飯食不

辨證錄

卷之六

痿

思口渴索飲久則兩腿痠痛後則遍身亦痛或痛在兩
臂之間或痛在十指之際痛來時可臥而不可行足脛
筋麻不可行動人以爲痰火之作祟也誰知是肝經之
痿症乎夫肝經之痿陽明之火助之也當其大怒時損
傷肝氣則肝木必燥木中之火無以自存必來尅脾胃
之土脾陰不受而胃獨受之胃初自強不服其尅兩相
戰尅而胸脇所以作痛後則胃土不敵肝木之旺乃畏
之而不敢鬪亦歸附於肝久之而飲食少用則不化津
液以生腎水腎無水以養肝而肝氣無非火氣胃亦出

其火以增肝火之焰肝火之性動遂往來於經絡之內
而作痛倘更加色慾則精泄之後無水制火自然足軟
筋麻呻吟於臥榻之上而不可行動也治法必須平肝
而併瀉陽明之火惟是陽明久爲肝木之尅則陽明之
經必虛若再加瀉火胃氣烏能不傷必須瀉陽明之火
仍不損陽明之氣爲得也方用伐木湯炒梔子三錢白
芍一兩當歸五錢甘菊花五錢女貞子五錢地骨皮三
錢丹皮三錢青黛三錢金釵石斛三錢水煎服連服四
劑而諸痛除再服四劑口思飲食再服十劑全愈此方
瀉肝火以平肝氣然而陽明胃火未嘗不同治之胃氣
不傷而胃火自息飲食進而津液生腎水足而骨髓裕
不須止痛而痛自失毋煩治痿而痿自起矣

此症用二石
湯亦佳

白芍一兩熟地三兩金釵石斛
牛膝各五錢石膏三錢水煎服

一素常貪色加之行役勞瘁傷骨動火復又行房鼓勇大
戰遂至兩足痿弱立則腿顛行則膝痛臥床不起然頗
能健飯易消人以爲食消之症也誰知是腎火之盛引
動胃火以成腎痿乎蓋胃爲腎之關胃之開闔腎司之

辨證錄

卷之六

痿

也腎火直冲於胃而胃之關門曷敢阻之且同羣助勢以聽腎火之上炎矣况腎火乃龍雷之火也胃中之火其性亦喜炎上二火相因而起銷鑠腎水有立盡之勢幸腎火盛而胃火尚未大旺故但助腎以消食不至發汗以亡陽且飲食易消猶有水穀以養其陰雖不能充滿於骨中亦可以少滋於腎內故但成痿而不至於死亡也治法急宜大補腎水以制陽光方用起痿降火湯熟地三兩山茱萸一兩薏仁五錢金釵石斛五錢牛膝五錢水煎服四劑腿顛足痛之病去十劑可以步履飲食不至易饑二十劑全愈此方大補腎陰全不去瀉胃中之火譬如城內糧足則士馬飽騰安敢有鼓噪之聲而與攘奪爭取之患乎

此症用充髓

湯亦妙

熟地三兩玄參二兩金釵石斛牛膝各五錢女貞子五錢水煎服

一煩躁口渴面紅耳熱時索飲食飲後仍渴食後仍饑兩足乏力不能起立吐痰甚多人以為陽明之實火也誰知是陽明之虛火乎夫陽明屬陽火亦宜實何以虛名之不知胃火初起為實而久旺為虛當胃火之初起也

口必大渴身必大汗甚則發狂登高而呼棄衣而走其勢甚急所謂燎原之火也非實而何至於旺極必衰時起時滅口渴不甚汗出不多雖讖語而無罵詈之聲雖煩悶而無躁擾之動得水而渴除得食而饑止此乃零星之餘火也非虛而何實火不瀉必至熬乾腎水有亡陽之變虛火不清則銷鑠骨髓有亡陰之禍陰既亡矣安得不成痿乎故治痿之法必須清胃火而加之生津生液之味自然陰長而陽消也方用散餘湯生地一兩玄參一兩茯苓三錢竹葉一百片麥冬一兩人參三錢麥芽一錢天花粉二錢神麴一錢水煎服二劑陽明之餘火息再服二劑煩躁饑渴之病除更用十劑痿症全愈此方散胃火之餘氛不去損胃土之生氣胃氣一生而津液自潤自能灌注腎經分養骨髓矣倘用大寒之藥直瀉其胃火則胃土勢不能支必致生意索然元氣之復反需歲月矣譬如大亂之後巨魁大盜已罄掠城中所有而去所存者不過餘黨未散耳用一文臣招撫之有餘若仍用大兵搜索勦除則雞犬不留玉石俱焚惟空城獨存招徠生聚有數十年而不可復者矣何若

辨證錄

卷之六 痿症

五

勦撫兼施之為得哉

此症用潤胃

湯亦效

人參五錢麥冬二兩天花粉三錢玄參一兩丹參一兩甘草一錢山查二十粒神麩二錢水煎服

人有好酒久坐腰痛漸次痛及右腹又及右脚又延及右手不能行動已而齒痛人以為賊風之侵體也誰知是痿症乎或謂痿不宜痛今腹脚手齒俱痛恐非痿也嗟乎諸痿皆起於肺熱人善飲則肺必熱矣經曰治痿必取陽明陽明者胃也胃主四肢豈獨脚耶夫痿雖熱病而熱中有濕不可不察痿病兼濕重者必筋緩而軟痿

辨證錄

卷之六 痿症

五

病兼熱多者必筋急而痛是痿症未嘗無痛也苟不祛濕以清火而反助濕以動熱則痿症不能痊轉增添其痛矣治法專治陽明以生胃氣佐之瀉火利濕之品則諸痛自消方用釋痛湯人參三錢黃芪三錢白朮五錢茯苓三錢生地五錢麥冬五錢當歸三錢玄參一兩甘草三分水煎服連服四劑而病除此方皆入陽明之藥也入陽明以平胃氣即入陽明以平胃火宜痿症之頓起矣况茯苓白朮善能去濕復是生胃之品是治濕又治陽明也藥投病之所喜安得而不速愈哉

此症用解醒

飲亦佳

乾葛白朮人參石膏各三錢麥冬三兩茯苓五錢半夏一錢水煎服

人有肥胖好飲素性畏熱一旦得病自汗如雨四肢俱痿且復惡寒小便短赤大便或溏或結飲食亦減人以為感中風邪也誰知是痿病之已成乎夫痿有五皆起於肺熱好飲之人未有不熱傷肺者也肺之母為胃欲救熱傷之肺必須速救胃土經曰治痿獨取陽明正言其救胃也胃土不足而肺金受傷則金失所養而不能下生腎水水乾則火盛而肺金益傷矣况胃主四肢肺主

辨證錄

卷之六 痿症

五

皮毛今病四肢不舉非胃土之衰乎自汗如雨非肺金之匱乎明是子母兩病不急救胃何能生肺以生腎水哉方用滋潤湯玄參一兩麥冬一兩茯苓三錢芡實五錢人參三錢甘菊花三錢女貞子三錢生地二錢天門冬三錢黃芩一錢天花粉一錢水煎服十劑胃氣生二十劑肺熱解三十劑痿廢起四十劑全愈此方獨取陽明以補胃土兼清肺經之熱也不必去補腎而腎水自潤矣李東垣立有清燥湯亦可治痿不若此方之更神耳

此症用柞木化
醞湯亦效

玄參麥冬各二兩柞木枝三錢甘草五分人參一兩
天冬三錢黃芩貝母各二錢水煎服

辨證錄

卷之六 痰症

六

消渴門

一消渴之病有氣喘痰嗽面紅虛浮口舌腐爛咽喉腫痛
得水則解每日飲水約得一斗人以爲上消之病也誰
知是肺消之症乎夫肺屬金宜清肅何火熾如此蓋
心火刑之也肺爲心火所刑則肺金乾燥又因腎水之
虛欲下顧腎肺氣既燥肺中津液自顧不遑安得餘津
以下潤夫腎乎肺既無內水以潤腎乃索外水以濟之
然救其本宮之火炎而終不能益腎中之真水腎又不
受外水而與膀胱爲表裏即將外水傳於膀胱故飲水

辨證錄

卷之六 消渴

李

而卽洩也治法似宜瀉心中之火以救肺金之熱矣然
而肺因火熱發渴日飲外水則水停心下者有之水日
侵心則心火留於肺而不歸心中已成虛寒之窟是寒
涼之藥反爲心之所惡且寒涼之藥不能上存勢必下
趨於脾胃夫肺火之盛而不解者正苦於脾胃之虛土
不能生金之故苟再用寒涼必至損傷脾胃之氣肺金
何以養哉必須仍治肺金少加補土之味則土旺而肺
氣自生清肅之令行而口渴自止方用清上止消丹麥
冬二兩天冬一兩人參三錢生地五錢茯苓五錢金銀

花一兩水煎服十劑渴盡減二十劑全愈此方重治肺而輕治胃與脾治肺而不損金清火而不傷土土生金而金生水又何疑乎惟方中加入金銀花者火刑金而多飲涼水則寒熱相擊熱雖暫解於片刻而毒必留積於平時用清金之藥以解其熱不能解其毒也與其日後毒發而用散毒之品何若乘解熱之時即兼解其毒先杜其患哉况金銀花不特解毒且善滋陰一味而兩用之也

此症用二冬苓車湯亦效
麥冬三兩天冬一兩茯苓五錢車前子三錢水煎服

辨證錄

卷之六 消渴

三

一消渴之病大渴恣飲一飲數十碗始覺胃中少快否則胸中嘈雜如虫上鑽易於饑餓得食渴減不食渴尤甚人以爲中消之病也誰知是胃消之病乎胃消之病大約成於膏粱之人者居多燔熬烹炙之物肥甘醇厚之味過於貪饕釀成內熱津液乾涸不得不求濟於外水水入胃中不能游溢精氣上輸於肺而肺又因胃火之熾不能通調水道於是合內外之水建瓶而下飲一澁二不但外水難化且平日素醞水精竭絕而盡輸於下較暴注暴泄爲尤甚此竭澤之火不盡不止也使腎水

未虧尙可制火無如膏粱之人腎水未有不素乏者也保火之不燥乾足矣安望腎水之救援乎內水既不可制勢必求外水之相濟而外水又不可以濟也於是思食以濟之食入胃中止可解火於須臾終不能生水於旦夕不得不仍求水以救渴矣治法宜少瀉其胃中之火而大補其腎中之水腎水生而胃火息腎有水而關門不開胃火何從而沸騰哉方用閉關止渴湯石膏五錢玄參二兩麥冬二兩熟地二兩青蒿五錢水煎服二劑而渴減四劑而食減十劑消渴盡除二十劑全愈此方少用石膏青蒿以止胃火多用玄參熟地以填腎水重用麥門冬以益肺氣未嘗閉胃之關門也然而胃火之開由於腎水之開腎水之開由於腎火之動也而腎火之動又由於腎水之乏也今補其腎水則水旺而腎火無飛動之機火靜而腎水無沸騰之患腎水既安守於腎宅而胃火何能獨開於胃關哉此不閉之閉真神於閉也

辨證錄

卷之六 消渴

三

此症用止消湯亦效
石膏人參茯苓各五錢玄參一兩生地二兩知母麥芽穀芽神麩各三錢水煎服

一消渴之症小便甚多飲一斗溲一斗口吐清痰投之水中立時散開化為清水面熱唇紅口舌不峭人以為下消之病也誰知是腎水泛上作消乎夫腎水泛上水升於咽喉口舌之間宜乎不渴何以渴之甚也蓋下寒之極逼其火於上焦故作渴耳此火乃腎中之火即龍雷之火也一發而不可制宜引而不宜逐可於水中引之論此等消渴仲景張夫子腎氣丸最妙世傳腎氣丸乃張夫子定之以治漢帝之消渴者也然而腎氣丸止可治消渴已痊之症不能治消渴初起之症也當年漢帝

辨證錄

卷之六 消渴

奇

用肉桂者正引火歸源也引火而少用肉桂又何不可不知玄參善消浮遊之火但其性太涼非多用肉桂則不足以制其寒制其寒則寒變為溫而又非大熱正龍雷之所喜也蓋龍雷之性惡大寒而又惡大熱大寒則愈激其怒而火上炎大熱則愈助其橫而火上熾今用肉桂三錢入於玄參三兩之中則寒居其九熱居其一調和於水火之中又有山茱萸五味麥冬之助正不見其熱惟見其溫也龍雷喜溫所以隨之直歸於腎臟火歸於腎命門不寒蒸動腎水下溫而上熱自除此方較腎氣丸治下消之症效更神速鐸不惜傳方又闡揚其義以見鐸之論症非無本之學也

辨證錄

卷之六 消渴

奎

此症用丹桂止
氣湯亦效

熟地三兩肉桂二錢茯苓丹
皮各一兩麥冬二兩水煎服

一消渴之症口乾舌燥吐痰如蠟涎白沫氣喘不能臥但不甚大渴渴時必須飲水然既飲之後即化為白沫人亦以為下消之病也誰知是腎火上沸之消症乎夫腎中有火乃水中之火也火生水亦火藏於水內火無水不養亦無水不藏明是水之制火也然而水之不足

必至火之有餘而火反勝水火欺水之不能相制於是越出於腎宮上騰於咽喉口齒之間火與水原不能離者也火既上升水必隨之而上升矣水即不欲上升釜底火燃安得不騰沸哉惟是水涸以致沸騰而烈火日炊自成焦釜不以外水濟之得乎然焦釜而沃之以水仍沸騰而上故吐如蠶之涎沫耳治法不必瀉火而純補其水使陰精之寒自足以制陽光之熱也方用寧沸湯麥冬三兩山茱萸三兩茯苓一兩水煎服一劑渴少止再劑渴又止飲半月全愈此方用山茱萸二兩以大

辨證錄

卷之六 消渴

癸

此症用解沫散亦神
 熟地二兩麥冬二兩山茱萸丹皮各一兩車前子五錢水煎服
 人有素健飲啖忽得消渴疾日飲水數斗食倍而溺數服消渴藥益甚人以為虫消也誰知是脾氣之虛熱乎夫消渴之症皆脾壞而腎敗脾壞則土不勝水腎敗則水難敵火二者相合而病成倘脾又不壞腎又不敗宜無消渴之症矣不宜消渴而消渴者必脾有熱乘之得之飲啖酒果而致之者也夫酒能生熱熱甚則饑非飽餐則不能解其饑然多食則愈動其火矣火盛水不能相濟飲水既多不得不多溺也此似消渴而實渴之症治法平脾中之虛熱佐之解酒消果之味則火毒散而消渴之病自除方用蜜香散木蜜三錢麝香三分酒為丸更用黃連一錢茯苓三錢陳皮五分神麴二錢人參三錢煎湯送丸藥日用三丸丸盡而愈此丸用麝香者取麝能散酒也且麝香最剋瓜果瓜果聞麝香之氣即不結子非明驗耶木蜜乃枳枸也釀酒之房苟留木蜜酒化為水故合用二味以專消酒果之毒也酒果之毒既消用參苓連曲之類以平脾中之虛熱則腹中清

辨證錄

卷之六 消渴

癸

涼何消渴之有哉

此症用消飲散亦佳

入參天花粉茯苓各三錢枳殼厚朴各一錢
山查二十粒麥冬二兩甘草一錢水煎服

辨證錄卷之六終

辨證錄

卷之六

消渴

亥

辨證錄卷之七

山陰陳士鏗敬之甫號遠公號朱華子著述

會稽陶式玉尚書號存齋又號

叅訂

痙瘓門

一感溼熱之氣忽又傷風口噤不能言項背幾幾脚手攣
急角弓反張人以爲太陽之傷寒也誰知是太陽之痙
病乎夫痙病亦有二陽三陰之殊亦能傳經與傷寒之
症無異但傷寒單傷於風而痙病則合溼熱而成之也
似乎治傷寒可單治風而無難痙病宜治一而不

辨證錄

卷之七

痙瘓

易也誰知邪之所湊其氣必虛一邪相入已

氣之

虧况三邪之同犯乎補正以祛邪治痙無難速愈或謂
一邪相犯尚須祛邪爲先三邪並犯則邪氣彌漫非用
祛邪之藥安能濟哉不知一邪之犯其力專衆邪之犯
其勢散力專者宜攻勢散者可補於補之中而行其攻
之法何不濟之有無如其症同於傷寒不可驟用補也
所以殺人苟知可補之法分症以治之實易易也如此
症見太陽之徵不可徑治太陽之邪宜補太陽之正太
陽之正氣旺而風溼熱之邪不必攻而自散矣方用五

苓散加減治之白朮一兩茯苓一兩澤瀉三錢猪苓一錢羌活五分桂枝三分水煎服一劑而角弓反張之疾定二劑而口不噤脚手不攣急也三劑諸症盡痊五苓散專利膀胱之水三邪之中至難去者溼耳先利其溼則火隨水泄而風邪無黨矣故少用羌活桂枝以祛風則風自易解况五苓散亦非單利濕之藥也其白朮茯苓原能健脾生胃今多加為君則補重而利輕所以能建功之速倘少少用之則攻多於補反無益矣

此症用桂苓薏湯亦效
茯苓一兩羌活二錢薏仁一兩桂枝三分水煎服

辨證錄 卷之七 痲症 一感溼熱之氣又感風邪頸項強直一目左右手足搐搦人以為少陽之傷寒也誰知是少陽之痲病乎夫少陽居於半表半裏之間其勢將欲入肝也而尚留於陽明故三邪同感目所以左右視亦現證於二者之間耳手足搐搦者風性動而溼性靜兩相違背風欲動而溼挽之溼欲靜而風激之熱邪又從中冲擊此搐搦之所以起也搐搦不已又風引而上行於是頸項不利而溼氣留中遂至強直不搖矣治法必須和少陽之正氣少用散邪之品易於解紛也方用小柴胡加減治之柴

胡二錢白芍五錢當歸三錢茯苓五錢黃芩一錢甘草一錢水煎服一劑病減再劑病全愈小柴胡湯和少陽之聖藥也今又加入白芍當歸以補其肝中之氣使肝旺而邪不敢遁於肝加茯苓五錢以健胃而利溼則邪不敢回於胃茯苓且同柴胡以祛風熱引之而共入於膀胱尤易下走此又法之至神者也

此症用龍車散亦效
柴胡甘草各一錢白芍茯苓各五錢車前子三錢龍膽草五分水煎服

辨證錄 卷之七 痲症 一感溼熱之氣復感風邪手足牽引肉瞶心脹低頭視下肘膝相構人以為陽明之傷寒也誰知是陽明之痲症乎夫陽明胃土也風入於胃必變為熱况原感熱氣則熱以濟熱宜至發汗出陽何肉瞶胸脹而不發狂手足牽引而不出汗反低頭視下無登高而呼之症肘膝相構無棄衣而走之病正以溼邪混之也蓋陽明之火最惡者燥耳今有溼氣在胃雖侮胃中之土亦益胃中之燥即發汗而不至出陽發狂之禍也若妄用風藥以散其表必至汗出而不可止仲景張夫子曾用大承氣湯以下其邪然而脾旺者尚不致損傷脾氣否則下之

陰恐有意外之虞也然則風溼熱既同入於胃中則治法不可不治胃而又不可傷胃也方用全陰救胃湯玄參五錢茯苓五錢桃仁一錢葛根一錢人參一錢麥冬五錢水煎服一劑病半痊二劑病全愈方中資胃中之陰而不損其胃中之氣玄參去熱葛根去風茯苓去濕三邪皆去而又得人參以生胃麥冬以生肺則桃仁不亦可以已乎不知桃仁最動之味三邪併入於胃中而補藥多於攻藥則邪得補而反流連不去加入桃仁性急之物補既不滯而攻亦不緩始能相濟以有成也

辨證錄

卷之七 瘧症

四

此症用二苓槐

膏湯亦妙

石膏猪苓槐米各三錢茯苓五錢防已五分黃芩一錢水煎服

一感溼熱之氣復感風邪發熱腹痛肌肉顫動四支堅急人以爲太陰之傷寒也誰知是太陰之瘧症乎太陰者脾經也脾土溼土也溼土何堪溼邪之再犯乎溼入於脾最難分消溼邪去而溼之根尙在一再感溼仍如前溼之病矣况加熱以發其炎蒸加風以生其波浪自然中州反亂而四境騷然緊急之勢成顫動之形兆倘用安土之品則土旺而水無泛濫之虞水乾而土無鬱勃

之氣風卽欲作祟而平成既奏亦可以解慍矣無如世人動輒言下詎識下多亡陰無陰以灌注於五臟七腑胸腹手足何所資以爲養哉勢必緊急顫動有亡陰而死者矣方用安土散白木一兩茯苓五錢車前子三錢薏仁五錢赤小豆一錢通草一錢柴胡五分石斛三錢水煎服此方以水利水之藥爲君仍是健脾之藥蓋土旺自能制水况又有利之者乎此症原是溼邪之難治單去攻溼而風與熱邪自易吹散所謂攻邪必攻其堅也譬如大敵在前滿山遍野俱是賊黨倘止從偏旁掠陣

辨證錄

卷之七 瘧症

五

則賊且全營俱來死關反至敗勦不若竟攻中堅突圍直入搗擒巨魁則餘氛不戰而自遁瘧病之重治溼邪亦正此意可借敵而作鑒也

此症用意未定

瘧湯亦效

白木一兩薏仁芡實各五錢柴胡知母甘草天花粉各一錢神麩二錢水煎服

一感溼熱又且感風遂成瘧瘵身躄足彎不能俛仰人以爲少陰之傷寒也誰知是少陰之瘧病乎夫少陰者足少陰腎也腎宜熱不宜寒宜濕不宜燥何以瘧病有濕有熱反成瘧瘵躄彎不能俛仰之症耶不知腎最惡風

而喜熱者喜真火之生非喜邪火之尅也喜真水之養非喜邪水之傷也蓋邪火助燥邪水增溼耳既有二邪入於腎中又益之以風安能無癩瘧蹇不能俛仰之苦哉然則治法仍須治溼熱少佐以祛風為得也方用助腎辟邪丹茯苓五錢薏仁五錢防已一錢稀莖草一錢玄參三錢水煎服此方用防已以治腎中之風用薏仁茯苓以去腎中之溼川玄參稀莖草以治腎中之熱是風熱溼二者均治何病之不可去哉夫腎宜補而不宜瀉今去風去溼去熱得非瀉腎之藥乎然而薏仁茯苓雖利溼而不損其陰防已雖去風而不傷其氣玄參稀莖雖去火而不滅其光非瀉腎而仍是補腎若單瀉而不補則誤矣

此症用散瘕湯亦佳

防已一錢白木一兩澤瀉稀莖草炒黑荆芥各二錢薏仁三錢水煎服

一感溼熱又感風邪厥逆下利舌卷囊縮背曲肩垂項似拔腰似折手足俱冷其腹脹大人以為厥陰之傷寒也誰知是厥陰之瘕症乎夫風溼熱三合而成瘕邪傳入厥陰乃入肝木之經也其勢更急世人誤發其汗必致

辨證錄

卷之二 瘕症

六

辨證錄

卷之七 瘕症

七

動溼溼雖陰類然是外受之陰邪非肝中之真血也所動之陽奔入溼中為溼所沒必至亡陽蓋脫出之陽不啻如龍之出谷其體輕矯飛騰而不可止遏今為溼所滯留則如蛇行匍匐儘力奔越究難飛去故此等瘕病皆誤汗而成之也治法又不可拘於散邪仍須補正惟救其亡陽而亟使其回陽耳雖然陽之所以亡者終由於陰虛之不能攝陽故補陽必須補陰而補厥陰之陰仍從少陰腎經以補之也方用回陰散瘕湯巴戟天五錢茯苓一兩山藥五錢防風五分炒梔子一錢白芍五錢當歸三錢白木一兩甘草一錢水煎服此方補肝經之血而佐之去溼去火去風之味自是正治之法而又補腎中之火益之巴戟天何居正補少陰之謂也第厥陰之木非少陰之水不生何必補腎中之火詎知汗發亡陽陽氣盡從外泄腎中已無真火單用寒涼以祛熱則脾胃不勝其寒矣巴戟天溫腎不至大熱腎溫而陽回肝清而陰足陰陽和合內之正氣既固風熱溼之外邪不必攻而自破况原有攻之者乎此有益無損之治法又何患厥陰瘕症之無傳久哉

此症用黃白茵

陳湯亦效

白芍茯苓各一兩猪苓三錢茵陳一錢白朮
五錢甘草一錢黃連半夏各五分水煎服

小兒頭搖手動眼目上視身體發顫或吐而不瀉或瀉而不吐人以為驚風之抽掣也誰知是風熱溼三者合之以成痙乎小兒純陽原不宜虛然而多食瓜果溼留於胃溼久則變熱熱極則生風此風起於內而不來於外也人見小兒頭搖手動等症毋論其虛實投以抱龍丸不效改用牛黃丸又不效乃用金石腦麝香竄之藥以開其竅而鎮其驚無不立亡嗟嗟驚風二字自創立以

辨證錄

卷之七 痙症

八

來殺小兒者不啻數百萬矣並無有一醫闢其非者南
昌喻嘉言頗知其失大聲告誡無如傳世既久一時不
可轉移且嘉言有論無方世亦不識治法鐸聞師言甚
悉因暢論之而且傳其方也小兒之易於成痙者因其
骨脆皮薄不耐風邪故邪一入腠理便入臟腑况其飲
食喜寒而不喜熱以致損傷脾胃而成吐瀉之症上吐
下瀉則陰陽兩虧平日所受之溼盡行越出溼出而熱
留臟腑之中無陰相養遂變成風象以惑人人亦即為
其所惑但治風而不治正所以十人十死也故見此等

之症斷不可祛風一作風治去生便遠蓋其身中實實

無風無風而妄用風藥以倍耗其損傷之氣安得不速

其死哉治法惟補其脾胃而止其吐瀉則十人十生也

方用救兒回生湯人參二錢白朮三錢茯苓一錢砂仁

三粒炒黑乾姜五分山查五粒蘿蔔子五分車前子一

錢厚朴三分神麴三分半夏五分水煎服此方以十歲

為準五歲者減半一劑即吐瀉止二劑即抽掣定三劑

即全愈此方補中有利調和於脾胃之內則陰陽有既

濟之歡自然無變動之害矣或曰補之是矣少加去風

辨證錄

卷之七 痙症

九

散熱之藥未為不可夫熱當夏令或可少加黃連數分
以解其暑若值冬令更當增入辛熱之品蓋小兒吐瀉
之後熱必變寒况加時令之嚴寒乎斷不可用寒涼也
至於風藥毋論四時俱不可亂增萬不得已少加柴胡
二三分可也

此症用加味

六君湯

人參八分白朮三錢茯苓二錢甘草半夏各三分
陳皮黃連各二分神麴麥芽防風各五分水煎服

一小兒吐瀉之後口噤不出聲手脚攣急人以為驚風之
搐搦也誰知是脾胃寒虛之痙病乎小兒純陽先天腎

氣原自完固無如後天之斷喪也人生後天以脾胃為主小兒喜餐生冷傷其後天而先天亦損自然變症紛紜吐瀉之後無津液以潤腸胃更有何氣以運動四支乎此手足彎急搐搦之所以現也脾胃虧損肝木必來相侮脾胃又苦無津液以供給肝木之取資則肝木大燥燥極生火火極生風又其常也肺金見肝木之尅脾胃也欲出其清肅之令制肝以報土母之仇無奈脾胃為肝所傷則土弱而金不能強力難制肝反為肝之所凌而肺金畏肝中之風火惟恐逼乾肺氣自顧不遑何

辨證錄

卷之七 痘症

十一

能救母故不敢出聲也然則治法可不急治肝以救脾胃之虧乎方用活兒湯白芍三錢茯苓五錢人參二錢白朮三錢梔子五分麥芽五分枳殼三分半夏五分甘草一分神麩五分水煎服一劑肇急搐搦之症止二劑口噤之聲出三劑全愈此方平肝之氣以扶其脾胃之土脾胃之氣生而肺氣自旺足以制肝何風火之不息哉或謂肺弱不能制肝自宜補肺不知用補肺之藥必用潤劑不又助脾胃之濕乎痘病正苦濕也方中用茯苓之多正去其濕而反可用濕乎故不若平肝以安肺

不可潤肺以害脾胃耳

此症用四君湯亦可效

人參一錢茯苓二錢白朮三錢甘草肉桂各二分神麩柴胡各三分水煎服

一小兒偶感風邪發熱身顫手背反張人以爲驚風之角弓反張也誰知是痘病中之寒邪乎小兒氣血未旺不耐傷寒壯熱故一時昏沈非因風而動驚也故治小兒之傷寒斷不可與大人一例同治動用風藥以祛風蓋因虛入風治其虛則風自外出况止犯寒而不犯風是原無風也何可祛風哉倘輕施祛風之藥則風門大開

辨證錄

卷之七 痘症

十一

內既無風可散勢必損傷正氣致營衛無所蔽而腠理不密且旬引外風深入內藏遂成不可救之症矣治法補其正氣而少加散邪之味寒既易解臟腑不傷手到便可奏功方用護子湯人參一錢茯苓三錢白朮二錢柴胡五分桂枝二分水煎服一劑驚定不必再劑亦何方法之神乎蓋小兒初傷風寒必先從太陽而入今用桂枝柴胡兩解其太陽少陽之邪則邪不敢遁入於陽明况有人參以固其脾胃之氣則邪尤不敢入於中宮加入白朮以利腰膈茯苓以通膀胱則邪從外入者即

散即無外邪而柴胡以舒肝氣桂枝以煖脾胃之土正
有利益又何損哉無如世不知此等治法妄捏驚風名
色輕施發散鎮墜之味以至殺兒無算醫工不悟而病
家未知皆委於天數而不責其悞誰知萬鬼啼號於夜
臺哉吾願世人盡消滅驚風二字名曰庶幾小兒之福
乎

此症亦可用

救嬰丹

人參一錢茯苓三錢柴胡三分白芍二錢
神麩五分砂仁一粒炮姜三分水煎服

一婦人新產之後忽然手足牽搐口眼喎斜頭搖項強甚

辨證錄

卷之七 瘧症

三

則角弓反張人以爲產後驚風誰知是亡血過多而成
瘧乎產後舊血已虧新血未長血舍空虚風尤易入原
不必戶外之賊風也即一舉一動風自内生覺兩腋之
閒陰寒逼人一不慎而風入之矣然風因虛而入補虛
而風即能出也第補虛之法血亡不能速生而氣怯則
宜急補補氣則血尤易生血生而風不能存故血舍驅
風尚非正治矧純用鎮驚之藥耶方用救產止瘧湯人
參五錢當歸一兩川芎三錢荆芥炒黑一錢水煎服一
劑病輕二劑又輕三劑全愈此方即佛手散之變大補

其氣血之虛加之人參則氣更旺矣氣旺而邪不敢敵
况有荆芥引血歸經之藥血既歸經而邪何能獨留况
荆芥原能祛邪而不損正氣故可兩用之以出奇耳倘
不補氣血惟事祛風則血舍更空風將直入是立殺其
婦矣可不慎哉

此症用活母

丹亦神效

當歸人參各一兩川芎五錢柴
胡三分肉桂一錢水煎服即愈

人有一時手足捧掣口眼歪張人以爲中風之症也誰知

是瘧病之驟發乎夫中風病身必顛覆口必吐痰瘧病

辨證錄

卷之七 瘧症

三

狀如中風而身必不顛覆口中喉內必無痰涎之出入
與水雞聲也蓋中風無風風從內起瘧病則風從外入
風自成威不必借重內痰之助所以但有牽掣歪張之
風象絕無洶湧秘塞之痰聲也若風自內起者火動生
風痰以助之也故中風無外邪瘧病無內邪也無外邪
者不可治風無內邪者不可不治風耳然而單治外而
不治內則外風雖去內風必生是以祛風必須補正也
方用補中益氣湯人參一錢白朮三錢黃芪三錢當歸
三錢柴胡三錢升麻四分陳皮一錢甘草一錢水煎服

一劑而牽掣定再劑而歪張止三劑不再發夫補中益氣湯補氣之藥非祛風之劑乃用之以治痙瘓之風反易奏功者何故乎蓋氣虛則風易入也補其氣則正旺足以祛邪方中用柴胡原能祛邪也少用之於補藥之中則能提氣以衛正多用之於補藥之中則能益氣以祛邪故用至三錢而風難再留矣何必更借重他藥散風之多事哉世人但知參歸芪朮之多用以補正絕不知柴胡多用於參歸芪朮之中尤易祛邪余所以持表而出之也

辨證錄

卷之七 痙瘓

南

此症用九宮

湯亦神效

人參一兩巴戟天葦蕪各五錢半夏烏藥蒸
芎各一錢陳皮附子天麻各五分水煎服

汗症門

人大病之後無過而遍身出汗日以爲常人以爲內熱發汗也誰知是陽氣之虛外泄而腠理不能自閉乎大病之後氣血大虧氣不能入於血之中血必至逼其氣於膚之外使肺金清肅之令行則氣雖欲越出於皮毛而腠理未疎何能外泄惟大病之後必先損其肺肺先無自主之權安能禁其氣之不固哉氣不固而汗乃氣之所化汗隨氣泄遍體出汗淋漓又無內邪之散有不散盡其真氣者乎似乎較亡陽之症相同然而亡陽之症身喪於頃刻自汗之病不至遽殞於須臾其故何也蓋亡陽之症乃熱邪驅之自汗之症乃陰虛促之也陽病暴而陰病緩陽暴難於救援陰緩易於調劑治法自當以補氣爲主而補氣之中兼以補陰則陰能攝陽汗不止而自止矣方用攝陽湯人參一兩黃芪一兩白芍五錢麥冬五錢北五味一錢山茱萸三錢熟地一兩水煎服二劑汗少止四劑汗大止十劑全愈此方用參芪以大補其氣氣足則肺氣有養皮毛自固益之麥冬五味則肺金不持自足以衛外兼可以分潤於腎水猶恐

辨證錄

卷之七 汗症

五

汗出太多必損耗真陰更加熱地山茱以益精使肺金不必又來下生腎水則肺氣旺而皮毛益固矣增入白芍一味以收斂肝氣則肝木自平使肺金無仇家之相逼則肺氣安然自能行其清肅之氣而下輸於膀胱則上下之氣舒而心中生液不來尅肺則肺金有權得以自主安肯聽汗之自出哉此攝陽之妙法也倘貧窮之人無力買參豈忍視死不救前方之中倍加黃芪二兩增入防風五分同前藥煎服功未嘗不同但必須多服數十劑也

辨證錄

卷之七 汗症

六

此症用斂汗湯甚妙

黃芪一兩麥冬五錢北五味二錢桑葉十四片水煎服

人有夢遺之後身體狼狽加之行役太勞或行房太甚遂至盜汗淋漓人以爲腎氣之虛也誰知是心氣之熱乎夫心喜寒而不喜熱腎喜熱而不喜寒似乎心腎之相違然而於相違之中未常不相合也腎因夢遺之後自然精水不足加之行役行房以勞其筋骨則內陰大虧何能上濟於心乎心無腎水之濟則心添其熱而腎水更耗久則腎畏心之取資堅閉腎宮而心不得不仍返

於心宮無奈心無液養而煩躁之念生然心雖無寧靜之氣未常無專主之權徒然煩躁而相火尚不敢顯背夫心以自越出於軀壳之外但乘心假寐乃竊其資重而潛移耳故盜汗之出與自汗之出實有不同自汗者心不得而自主也盜汗者心尙能操其意此等之汗必出在胸間者尤甚汗本熱也而越出於軀壳之外則熱變爲寒正因相火之熱乃虛火而非實火况乘心之未知而遁出非明目張膽者可比熱出爲寒正顯其陰之象也况心原無液何從而得汗乎亦竊腎之餘津私自

辨證錄

卷之七 汗症

七

潛移者也治法瀉心中之熱仍宜補腎中之水腎水足而心火自清心火寧而心汗自止矣方用防盜止汗湯麥冬五錢生棗仁一兩熟地一兩山茱萸三錢黃連五分人參三錢丹參三錢茯神三錢肉桂五分水煎服一劑汗少止二劑汗全愈此方心腎雙補之藥也心腎兩足自有離而復合之勢黃連清心肉桂溫腎二味同用能使心腎交於頃刻心腎既交則心火清明相火畏主何敢竊財用而偷出哉倘不補心腎惟事止汗汗不能止必且輕變重而重變危矣烏可輕用止澀之味乎

此症用四參湯亦效

玄參一兩麥冬生地各五錢天門冬人參沙參各三錢丹參茯苓各二錢黃連五分北五味一錢水煎服

人有夜間發熱初時出汗星星後則漸多日久每夜竟出大汗至五更而止人以爲陽虛盜汗也誰知是陰虛出汗乎夫陰虛者腎虛也腎藏真陰宜秘藏何故發汗蓋腎中之火動也腎水非火不養何反致洩水即水洩宜從下出何走皮毛而旁出耶不知腎火生水真火也真火喜靜而不喜動水靜則真火生水水動則真火泄水矣生水則火能秘藏泄水則火乃奔越故腎中之火

辨證錄

卷之七 汗症

六

動者仍腎中之水自動由於人之縱慾而好泄其精也精泄過多則勞其精而水動而火亦動火動而水不足以濟之則火且挾水而騰出於本宮不從下走而乃隨其火性遊行於經絡腠理之間遇毛竅而泄也初則偶爾遊行久則夜夜出汗陰氣愈虛則愈汗毛竅之細路竟成轉輸之大道矣然汗既易出宜無分晝夜何夜汗而晝不汗耶得母陰虛而陽未虛乎不知陰陽各有道路行於陽之分則陰不敢奪陽之權行於陰之分則陽不敢奪陰之柄夜間出汗實陰走於陰之途至於五更

辨證錄

卷之七 汗症

九

則陰不敢入於陽之界故陰汗遇陽氣而自轉非陰虛而陽不虛也治法宜大補其真陰而加之陽分之藥提陰出於陽分庶幾陰遇陽而止也方用補陰止汗湯熟地一兩山茱萸五錢人參二錢白朮三錢地骨皮一兩沙參三錢北五味子一錢桑葉十片水煎服二劑汗少止四劑汗乃止十劑汗不再出矣此方熟地山茱補精之物也地骨沙參補陰而更能清骨髓中之虛熱五味桑葉止汗之神劑人參白朮健脾開胃補氣之聖藥也多用補陰之品則水足以制火少用補陽之味則陽易於提陰陰陽水火既無偏勝之虞自無走泄之患何必用澀精之壯蠟斂汗之瞿麥哉

此症用湛露飲亦效

熟地二兩地骨皮沙參丹皮各五錢北五味一錢水煎服

人有飲食之時頭項至面與頸頰之間大汗淋漓每飯皆如此然身又無恙人以爲陽氣之旺也誰知是胃氣之盛乎夫胃氣即陽氣也胃旺則陽旺而分爲二者何故不知陽旺者合三陽而言之胃旺者單舉胃一經而言之也胃本屬土無水穀之入則胃氣安靜即處飢餓之

時而其火暗起亦不過在胸膈間不能上至於頭項惟得水穀之氣填於陽明之經則胃中之火借水穀之氣以助其勢遂化汗而上騰越出於頭面之上下也此等之汗明是胃火之盛由於心包之火旺也心包生土以生火非助火以害土胃得火生以出汗不同於邪火之自焚也故止出汗於上焦而不亡陽於下焦耳治法瀉胃火之有餘不可損胃土之不足使胃平而汗自止也方用收汗丹玄參三錢生地三錢荆芥一錢五味子三分桑葉十片白芍五錢蘇子一錢白芥子一錢水煎服

辨證錄

卷之七 汗症

三

服一月全愈此方不去瀉胃火反去滋陰蓋陽之盛者陰之衰也補陰則陰旺自足攝陽不必止汗而汗自止况方中有桑葉荆芥為引經止汗之藥白芥蘇子為消痰定氣之品原調劑之咸宜抑陽而歸陰化汗而為精又何疑乎然必久服而始奏效者以調胃之藥宜和緩而不宜急遽也

此症用龜豕膏亦奇效

殺猪心內之血一兩龜板膏二兩五味子二錢為末煮成一塊日含化嚥服作一次食完永不再發先將龜板融化後入猪心血再入五味子末調化膏切片含化神方也

人有心頭有汗一身手足無汗者人以爲心熱之故也誰知是思慮過多心虛而無血以養心乎夫心主火也思慮過多則心火炎燒逼乾其液液乾宜無汗矣何心頭多出汗耶不知此汗非汗也乃心中之液內不能存外走而汗出耳或疑心液無多安得盡化為汗不知心爲君主之宮心熱則五臟七腑之液羣來相資因其內熱之甚不養心而爲液反越心而爲汗也汗既多出無有盡期五臟七腑之液何能相繼勢必心愈熱而汗不可止及至汗不可止而心中乾燥煩躁不眠之症生矣治法補血以養心瀉火以生液不必止汗而汗自止矣方用滋心湯人參三錢桑葉十四片黃連五分丹參三錢麥冬五錢甘草五分熟地一兩山茱萸五錢栢子仁二錢生地五錢白朮三錢沙參二錢玄參三錢丹皮三錢水煎服二劑心汗止十劑不再發此方名爲滋心實多滋腎之味蓋心之液必得腎之精上溉而液乃生故欲補心中之液必須補腎中之精也補腎而少加清心之品則心火安寧而液不外越矣

辨證錄

卷之七 汗症

三

此症用助思湯亦效

此症用助思湯亦效

人參五錢熟地一兩生地五錢麥冬五錢北五味一錢黃連一錢肉桂三分茯苓二錢兔絲子二錢丹皮二錢丹砂一錢不可經火栝子仁三錢炒棗仁二錢蓮子心一錢水煎服

辨証錄

卷之七 汗症

十一

五癰門

一穀瘵之症胸中易飢食則難飽多用飲食則發煩頭眩小便艱澀身如黃金之色此是胃中虛熱之故非胃中之溼熱也人身脾胃屬土脾陰土也而用則陽胃陽土也而用則陰脾胃和同則剛柔並濟通調水道易於分消惟七情傷損於內則陰陽不相和合胃無陰以和陽則熱聚而消穀脾無陽以和陰則寒聚而積水兩相搏激故昏眩煩悶生焉於是所食之水穀不變為精華之清氣而反蒸為腐敗之濁氣矣濁氣下降者也濁氣下

辨証錄

卷之七 五癰

十二

流於膀胱膀胱受胃之熱氣化不行小便閉塞水即走於陰器而熱散走於皮膚故一身發黃也治法升胃中之清氣以分利其膀胱則清升而濁易降水利而熱易消方用分濁散茯苓一兩車前子三錢猪苓三錢茵陳一錢梔子三錢水煎服一劑水少利二劑溼乃退十劑全愈方中以茯苓為君者利水而不傷胃氣胃氣不傷而後佐之去熱消溼之品則胃無火亢之憂自然脾無水鬱之害倘不早治而水溼之氣流入於腎則腎被其傷必至腹滿成蠱不可治矣

此症用茵陳苓木湯亦效
茵陳三錢茯苓白朮薏仁各五錢知母一錢水煎服

一酒疸之症心中時時懊懣熱不能食嘗欲嘔吐胸腹作滿然清言了了人以爲酒食作疸也然而酒溼之成疸由於內傷飢飽勞役也夫人之善飲者由於膽氣之旺也夫膽非容酒之物而能滲酒酒經膽氣之滲則酒化爲水入於膀胱而下泄矣惟其內傷於飢飽勞役則五臟受損臟損而腑亦損矣五臟六腑俱已受損寧膽氣之獨旺乎膽氣既衰則飲酒力不能滲無如人之縱飲如故則酒多而滲亦多更傷膽氣膽損不能滲酒酒必

辨證錄

卷之七 五癉

五

留於脾胃之間而脾胃不及從前之旺則酒肉不能受傳之膀胱而膀胱又不及從前之健則水入不能消下既不行必返而上吐而下洩又艱中州又不可久留於是溼熱之氣蘊蔭衝膈懊懣而發於心由是遍漬周身分佈四體盡發爲黃也夫心至懊懣其心神之昏亂可知何又能清言了了耶不知酒氣薰蒸於一時則見懊懣懊懣者欲痛不痛之狀非心中之神至於妄亂不寧也治法宜解其酒之毒而兼壯其膽膽氣旺而酒氣自消酒氣消而水氣自泄水氣泄而黃自解矣方用旺膽

消酒湯枳木枝三錢山梔子三錢桑白皮三錢白茯苓三錢白芍藥一兩竹葉一百片澤瀉二錢水煎服二劑而膀胱利四劑而黃色輕八劑全愈夫枳木專能消酒毒於無形酒毒既消則拔本塞源矣至助膽之藥舍白芍山梔無他味也其餘之藥不過分消溼熱之氣世不知治法或吐或下皆操刀而殺之也可不慎哉

此症用郁李歸芍湯亦效

白芍一兩當歸茯苓各五錢郁李仁五分甘草三分黃連五分車前子二錢水煎服

一女勞之疸其症腎氣虛損四支痠痛夜夢驚恐精神困

辨證錄

卷之七 五癉

五

倦飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痠緩房室不舉股內溼癢水道澀痛時有餘瀝小腹滿身盡黃額上黑人以爲黃疸之症誰知因女色而成者乎夫入室久戰相火充其力也相火衰則不能久戰矣火衰而勉強入房則泄精必多火隨水散熱變爲寒矣人身水火不可少者也水衰則不能制火而火易動火衰則不能利水而水易留顧水留宜可以制火矣然而所留之水乃外水而非內水也內水可以制火而成液外水不能消火而成瘴故女勞之疸仍是溼熱而結於精竅之間非血

瘀而閉於骨髓之內也倘用抵當湯水蛭之類以峻攻其瘀血或用礬石散硝石之品以蕩滌其微陰則促之立亡矣治法宜補腎中之氣而不可有助火之失宜利膀胱之水而不可有亡陰之愆當緩以圖功不當責以近效也方用減黃丹治之白茯苓五錢山藥五錢人參三分白朮一錢芡實五錢薏仁五錢兔絲子三錢車前子一錢生棗仁一錢水煎服十劑黃疸減又十劑黃疸更減又十劑全愈再服三十劑可無性命之憂女勞疸最難治人生此病未有不死者苟存堅忍之心絕慾憊

辨證錄

卷之七 五癘

未

疾信服前湯無不生者蓋此丹固本以救傷並不逐邪以瀉瘀腎氣日健而黃色日減矣或疑女勞之疸成於腎之無火似當補火不知疸雖成於無火今病久陰耗若補火則恐燥陰不特無益而反害之矣

此症用菟絲杜

木湯亦效

白朮二兩杜仲五錢茯苓五錢車前子三錢菟絲五錢山藥一兩水煎服

一肺疸之症鼻塞不通頭面俱黃口澹咽乾小水不利人以為黃疸之症誰知實由於肺氣之虛耶肺金氣旺則清肅之令下行於膀胱凡有溼熱盡從膀胱下泄則小

水大行何溼能存水既直瀉則熱亦難留惟其肺氣先虛而後溼熱鬱蒸於胸膈之間致肺燥而失其清肅之令水氣遂乘其燥而相入燥與溼合而成熱溼熱相留欲分入膀胱而膀胱不受欲走於皮毛之竅而腠理未疎不能越行於外遂變現黃色於皮膚也治法宜宣通肺氣健其脾胃之土蓋因肺氣閉於上而後水氣塞於下使肺氣上通則水且下降况重補其脾胃以生肺乎此治肺疸必宜宣揚夫肺氣也方用揚肺利溼湯桔梗三錢天花粉二錢白朮五錢茯苓五錢桑白皮三錢茵

辨證錄

卷之七 五癘

三

陳三錢猪苓二錢黃芩五分水煎服一劑鼻塞通二劑咽乾潤三劑口澹除四劑小水大利十劑頭面之黃盡散矣此方開腠理而生津液則肺金有潤燥之功合之茯苓茵陳花粉白朮則土氣大旺金氣亦揚清肅令行而膀胱之壅熱立通小便利而黃色烏能獨存哉

此症亦可用

通氣飲

桔梗二錢紫花二錢白朮五錢茯苓五錢甘草三分茵陳一錢益智仁三粒貝母二錢水煎服

一疸之症煩渴引飲一飲水即停於心之下時作水聲胸前時多汗出皮膚盡黃惟兩目獨白人以爲黃疸也

誰知是心中虛熱以成之乎夫心喜燥不喜溼然過於燥則未免易其性以喜溼矣然而心終宜燥而不宜溼以溼濟燥可權宜行於一時不可經常行於長久蓋水乃陰物陰居陽地不肯遽入於小腸心又因水制力不能分消移其水以入於膀胱故水停心下作聲而臆中乃心之相臣見水邪犯心且出其火以相救戰爭於胸間水得火炎而熱化爲汗時出於胸其餘之水何能盡解旁趨而出諸皮毛乃壅閉而變爲黃矣一身皆黃而兩目不變者蓋因肝開竅於目心爲肝子邪見肝本之

辨證錄

卷之七 五痺

天

旺不敢犯肝之界兩目正肝之部位所以溼熱不至於目而無黃色之侵耳然則治法宜補肝氣以生心瀉水溼以逐熱則黃疸不攻而自散也方用瀉肝利溼湯白芍一兩茯苓五錢白朮五錢茵陳三錢炒梔子三錢木通一錢遠志一錢水煎服一劑症輕二劑又輕十劑全愈此方補肝即所以補心瀉水即以瀉熱倘徒治黃而不辨其臟氣之生尅妄用龍膽草等藥必至變爲寒黃之症反難施治矣

此症用茵陳苓朮黃連湯亦效
茵陳三錢茯苓白朮各五錢黃連二錢水煎服

一肝疸之症兩目盡黃身體四肢亦現黃色但不如眼黃之甚氣逆手足發冷汗出不止然止在腰以上腰以下無汗人以爲黃疸也誰知是肝氣之鬱溼熱團結而不散乎夫肝屬木非水不長何以得溼而反鬱乎不知肝之所喜者腎水也非外來之邪水也腎水生木而發生邪水尅木而發癰蓋肝藏血而不藏水外來之水多則肝閉而不受於是移其水於脾胃然而外來之水原從脾胃來也脾胃之所棄而脾胃仍肯容之乎勢必移其水於膀胱而膀胱又不受蓋膀胱因肝木之溼熱不敢

辨證錄

卷之七 五痺

素

導引而入以致自焚於是溼熱復返而入肝而肝無容身之地乃鬱勃而發汗汗不能盡出而黃症生矣使汗能盡出未必遽成黃也無奈肝之溼熱欲下走於腎宮而腎氣惡肝木之犯杜絕而不許入境腰以下正腎之部位也所以無汗而發黃耳治法開肝氣之鬱佐之分溼散邪之劑則黃疸自愈矣方用利肝分水飲龍膽草二錢茵陳三錢茯苓一兩猪苓三錢柴胡一錢車前子三錢白蒺藜三錢甘菊花五錢水煎服二劑而目之黃澹矣又服四劑身之黃亦澹矣再服四劑氣逆汗出之

病止又服十劑全愈此方開鬱於分溼之中補肝於散熱之內既善逐邪又能顧正兩得而無失矣

此症用利目

湯亦妙

龍膽草二錢茵陳三錢白芍一兩茯苓五錢澤瀉車前子白茯苓各三錢柴胡一錢草決明二錢水煎服

一脾疸之症身黃如秋葵之色汗沾衣服皆成黃色兼之

涕唾亦黃不欲聞人言小便不利人以爲黃汗之病也

誰知是脾陰之黃乎夫脾土喜溫黃病乃溼熱也熱宜

非脾之所惡何故成黃不知脾雖不惡熱而畏溼脾乃

溼土又加溼以濟溼脾中陽氣盡行消亡無陽則陰不

能化土成純陰之土何能制水哉水存於脾中寒土不

能分消聽其流行於經絡皮膚矣凡臟腑之水皆下輸

膀胱今脾成純陰則無陽氣達於膀胱矣然水寒宜清

變黃色者何故蓋寒極似土也夫寒極宜見水象水寒

宜見黑色不宜見黃而今變黃者以水居於土之中也

其不欲聞人言者脾寒之極其心之寒可知心寒則膽

怯聞人言則惕然驚矣故不願聞則治法宜大健其脾

而溫其命門之氣佐之以利水之劑則陰可變陽黃病

可愈矣方用補火散邪湯白朮三兩附子三錢人參二

兩茵陳三錢白茯苓一兩半夏三錢水煎服連服四劑

而小便利再服四劑汗唾不黃矣此方白朮人參以補

其脾茯苓茵陳以利其水附子以溫其火真火生而邪

火自散元陽回而陰氣自消陰陽和協水火相制何黃

病之不去哉

此症用茵陳分溼湯亦效

白朮二兩肉桂茵陳猪苓各三錢半夏一錢水煎服

一腎疸之症身體面目俱黃小便不利不思飲食不得臥

人亦以爲黃疸也誰知是腎寒之故乎夫腎本水宮然

最不能容水凡水得腎之氣而皆化故腎與膀胱爲表

裏腎旺則膀胱亦旺然腎之所以旺者非腎水之旺而

腎火之旺也腎火旺而水流腎火衰而水積水積多則

成水腫之病水積少則成黃瘧之病故黃瘧易治而水

腫難治如腎疸之病不可治瘧一治瘧而黃疸反不能

痊必須補其腎中之火而佐之去溼健脾之藥則黃疸

可指日而愈也方用濟水湯白朮二兩肉桂三錢茯苓

一兩山藥一兩薏仁一兩茵陳一錢芡實五錢水煎服

二劑小水大利再用二劑飲食多矣再用二劑可以臥

矣再用二劑身體面目之黃盡去此方用白朮以健脾

并登錄 卷之七 五庫 三

也然而白木能利腰膂之氣是健脾正所以健腎况茯苓山藥芡實之類俱是補腎之味又是利溼之劑得肉桂以生其命門之火則腎不寒而元陽之氣自能透化於膀胱况所用薏仁之類原是直走膀胱之品所謂離照當空而冰山雪海盡行消化何黃之不散哉或謂發黃俱是溼熱未聞溼寒而能變黃也嗟乎黃病有陰黃之症是脾寒亦能作黃豈腎寒獨不發黃耶况腎寒發黃又別有至理夫黃者土色也黃之極者即變為黑黑之未極者其色必先發黃腎疸之發黃即變黑之兆也黃至於黑則純陰無陽必至於死今幸身上發黃是內已無陽陰逼其陽而外出尙有一線之陽在於皮膚欲離而未離也故補其陽而離者可續耳倘皮膚已黑此方雖佳何以救之哉

此症用加減五

苓散亦佳

白朮二兩茯苓一兩澤瀉三錢薏仁三錢菴藎草三錢肉桂三錢水煎服

人有心驚膽顫面目俱黃小水不利皮膚瘦削人以爲黃疸之症誰知是膽怯而溼乘之乎夫膽屬少陽乃陽木也木最喜水溼亦水也水溼入膽宜投其所喜何反成

黃疸之病蓋水多則木泛木之根不實矣少陽之木非大木可比曷禁汪洋之侵蝕乎此膽之所以怯也膽怯則水邪愈勝膽不能防水邪直入膽中而膽之汁反越出於膽之外而黃病成矣治法瀉水溼之邪則膽氣壯而木得其養又不盡然也木爲水浸久矣瀉水但能去水之勢不能固木之根本雖尅於土而實生於土故水瀉而土又不可不培也培其土而木氣始能養耳方用兩宜湯茯苓五錢白朮一兩薏仁五錢柴胡五分龍膽草一錢茵陳一錢郁李仁五分水煎服三劑輕四劑又輕十劑全愈此方利溼無非利膽之氣利膽無非健脾之氣也脾土健土能尅水則狂瀾可障自然水歸膀胱盡從小便而出矣

此症用竹茹龍

膽湯亦效

白芍一兩龍膽草半夏各一錢茯苓五錢茵陳竹茹各二錢白朮三錢水煎服

人有小便點滴不能出小腹膨脹兩足浮腫一身發黃人以爲黃疸矣誰知是膀胱溼熱結而成瘕乎夫膀胱之經氣化則能出水無熱氣則膀胱閉而不行無清氣則膀胱亦閉而不行所以膀胱寒則水凍而不能化膀胱

熱則水沸而亦不能化黃瘧之病無不成於溼熱是膀胱之黃瘧乃熱病而非寒病也熱而閉結必解熱寒而閉結必祛寒第黃瘧既成於溼熱宜解熱而不宜祛寒矣然而祛寒者必用熱藥以溫命門之火解熱者必用涼藥以益肺金之氣蓋肺氣寒則清肅之令下行於膀胱而膀胱不能閉結也方用清肺通水湯白朮一兩薤白子一錢茯苓三錢半夏一錢麥冬三錢桑白皮三錢茵陳一錢澤瀉二錢車前子三錢黃芩二錢蘇子二錢水煎服一劑小便微利二劑小便大利四劑而黃瘧之症全消此方雖與揚肺利溼湯大同小異實有不同也揚肺利溼湯提肺之氣也清肺通水湯清肺之氣也二方皆有解溼之藥而利與通微有異利則小開其水道而通則大啓其河路也

此症用通流
飲亦效
茯苓五錢白朮三錢桂枝五分茵陳一錢木通車前子各二錢水煎服

大瀉門

人有飢渴思飲食飲食下腹便覺飽悶必大瀉後快或早或晚一晝夜數次以為常面色黃瘦肌肉減削此非胃氣之虛乃脾氣之困也夫脾與胃宜分講也能消不能食者胃氣之虛由於心包之冷也能食不能消者脾氣之困由於命門之寒也今飢渴思飲食食後反飽飲後反悶是胃能納而脾不能受也但脾不能受何至大瀉後快蓋脾乃溼土既無溫煖之氣又受水穀則溼以助溼惟恐久留以害土情願速傳之為快譬如黃河之水入於中州既無高山峻嶺以為防又少深池大澤以為畜水過之處土鬆水泛易於冲决其波濤洶湧連泥帶水一瀉千里不可止遏亦其勢然也日積月累非斷岸之摧崩即長堤之遷徙也脾正中州之土其大瀉之狀正復相同治法不宜治胃而宜治脾不宜單治脾兼宜治腎中之火方用奠土湯白朮一兩茯苓一兩砂仁五分山藥一兩人參五錢薤白子二錢附子三分半夏一錢破故紙一錢水煎服此方白朮茯苓人參皆健脾之聖藥附子破故紙助命門之神品山藥補腎之奇味砂

仁半夏醒脾之靈丹而蘿蔔子又分清濁之妙劑也一
二服便能止瀉止不必多用然多用亦無妨碍自能回
陽於既危生陰於將絕

此症用加味四

君湯亦效

人參小茴香各三錢白朮山藥各一兩肉桂一錢蘿
蔔子一錢甘草一錢肉豆蔻一枚茯苓五錢水煎服
人有長年作瀉五更時必痛瀉二三次重則五六次至日

間又不作瀉人以爲脾胃之虛寒誰知是腎與命門之
虛寒乎此等之病亦從脾胃虛寒而起乃久瀉亡陰脾
傳入腎苟腎中之火不衰脾即傳腎久之而腎仍傳於

辨證錄

卷之七 大瀉

素

脾而自愈惟其命門火衰不能蒸腐水穀脾遂傳水溼
之氣於腎而不返矣五更乃亥子之時也其位在北正
腎水主令之時水寒而火不能溫水乃大瀉此瀉即內
經所謂大瘕瀉也用止水之劑反不能止必須用補水
之味使亡陰者速生尤須於補陰之中兼補其火則陽
壯如能攝陰也方用填坎湯山茱萸一兩茯苓一兩巴
戟天五錢肉桂三錢車前子三錢北五味三錢人參三
錢芡實一兩白朮二兩水煎服一劑瀉輕再劑瀉又輕
連服十劑斷不再瀉此方脾腎兼補又是分水止瀉之

藥則溼氣自解况得肉桂以溫命門之氣則膀胱易於
化水寧復走大腸而作瀉哉

此症用五神

丹亦佳

熟地二兩山茱萸一兩五味子二
錢破故紙肉桂各二錢水煎服

人有腹中大痛手不可按一時大瀉飲食下喉即出完穀
不化勢如奔馬不可止抑頃刻之間瀉數十次一日一
夜約至百次死亡呼吸此肝經風木挾邪而大瀉也其
病得之夏日貪涼向風坐臥將暑熱之氣遏抑不宣藏
于脾胃之內一過秋天涼風透入以尅肝木而肝木之

辨證錄

卷之七 大瀉

素

風鬱而不舒乃下尅脾胃而脾胃之熱遂與風戰將腹
中所有之水穀盡驅而直下必欲無留一絲以爲快故
腹中作痛其勢甚急脾胃欲止而風不肯止脾胃欲閉
而熱不可閉下焦之關門大開上焦之關門難闔所以
食甫下喉不及傳化而即瀉也治法必須急救其脾胃
之氣而後因勢利導之然非多用藥餌星速補救則王
道遲遲鮮不立亡矣方用逆挽湯人參一兩茯苓二兩
大黃一兩黃連三錢梔子三錢甘草三錢水煎服一劑
腹痛除瀉亦頓止此方用人參以固其脾胃之氣則氣

不至於驟脫然最奇在用大黃也蓋此瀉乃火留於腸
一胃非用大黃迅逐則火不遽散水不盡流然徒用大黃
不用黃連梔子則火邪甚熾盤踞於斷澗曲溪未必驟
涸三味並用則大小河渠無不盡行啓洩然分消無法
則壅塞阻滯亦未可知益之茯苓以分清濁且是健脾
開胃之藥則土氣既堅自無冲決之患更慮過於迅逐
邪去雖速未免傷損腸陰又佐甘草之和緩以調劑於
遲速之間使人參易於生氣所謂剿撫並用無激而死
關之虞自然風浪息平水歸故道平成立奏也

辨證錄

卷之七 大瀉

三

此症用參連

湯亦效

人參茯苓各一兩白芍二兩黃連三錢甘草一錢水煎服愈

人有口渴飲水忽然大瀉一日或十餘行或數十行晝夜
之間瀉至數百次完穀不化直下無留人以爲火瀉也
誰知是腎水不足以制火乎夫胃爲腎之關胃火必得
腎水以相制腎水一虧胃火必旺而內火無資自索外
水以相濟然外水只可少止上焦之炎不能竟助下焦
之水故外水入而腎不受腎與膀胱爲表裏而膀胱亦
不納水無從而化乃直趨於大腸而作瀉矣但胃火既

辨證錄

卷之七 大瀉

三

盛渴飲凉水宜變爲汗今不爲汗而作瀉者故因腎水
不能制胃火之炎胃火必欺腎水之弱於是挾水以侮
腎不泄汗而瀉水耳及其後也不特水之驟崩且火亦
驟降關門不閉上下盡開不啻如崩潰倒峽建瓶而下
也論其治法自宜急救其標然而徒止其瀉不急救其
陰則亡陰立盡何以制火以存其胃氣乎方用生陰止
瀉湯山茱萸二兩車前子一兩茯苓一兩白芍二兩肉
桂三分白朮一兩甘草五錢山藥二兩薏仁一兩水煎
服一劑瀉減再劑瀉又減三劑瀉全止矣此方純是補
腎補胃之藥非止瀉之劑也然而止瀉之妙已存於補
陰之中蓋陽火得陰而即止也倘作胃虛有火治之亦
能止瀉然下多亡陰雖止瀉於一時而陰虛何能驟復
何若此方既能止瀉而陰陽兩不相傷之爲得哉

此症用存陰

湯亦效

熟地二兩山藥茯苓各一兩車前子五錢白朮二兩甘草澤瀉各二錢水煎服

人有終年飲酒不知禁忌逞醉入房適於泄精久則脾氣
大傷變成水瀉一感風寒遂大瀉不止如溏如積人以
爲酒濕損脾也誰知是酒濕傷腎乎夫脾乃濕上最惡

者濕也而酒又最濕幸酒性大熱而脾亦喜熱濕熱相合則脾不甚傷無如人借酒氣之熱以助其命門之火鼓動其焰以博久戰之歡究之熱不可長恃精不能堅守與闕精泄火息而濕留於腎宮矣夫五臟六腑之水皆賴腎火以化之也而腎中有濕則火去濕存長年相伴歲月既深火日衰而濕日盛腎不能久留仍傳出於脾前酒之濕未去新酒之濕又來於是濕盛而熱亦盛脾不受熱之益專受濕之害故經年經月而作瀉也治法必須大補脾腎而後解其濕熱之毒方用解醒止瀉

辨證錄

卷之七 大瀉

四

湯白朮一兩山茱萸一兩茯苓一兩柞木五錢黃連三五分白芍五錢附子一分水煎服此方脾腎雙補之藥也用柞木黃連以解其酒毒用苓朮以消其水濕用芍藥以斂其耗脫之陰用附子一分引羣藥入腎以掃蕩其濕熱而非助其命門之虛陽也但此方必須多服為佳蓋酒濕之瀉甚難建功以濕熱入腎最不易出或十服之後改湯劑為丸朝夕服三月可以全愈矣

此症用黃柞

湯亦效

山茱萸一錢柞木枝肉桂五味子各二錢山藥茯苓各一兩水煎服十劑愈

人有無端一時作瀉腹痛不可止面青唇黑幾不欲生肛

門之邊宛如刀割大瀉傾盆人以為火瀉也誰知是受毒而作瀉乎夫毒必有所由來非漫然而作瀉也或食瓜果或飲凉水或斟隔宿之茶或吸露天之酒或遊神廟陰寒之地或探古洞幽暗之方或貪臥於濕處或如餐夫樹間或饕牛羊自死之物或吞禽鳥難化之肉皆能受毒而發瀉雖毒受於腹中瀉出於腸外非必死之症然腹疼欲死烏可無藥以救之耶救法於解毒之中而輔之瀉毒之品因勢利導祛毒更神方用化毒神丹

辨證錄

卷之七 大瀉

五

生甘草五錢大黃一兩丹皮五錢當歸一兩雷丸三錢蒲公英五錢水煎服一劑而所中之毒無不盡出而愈不必二劑此方生甘草蒲公英以解毒合之大黃雷丸則祛毒而無太剛之懼掃毒而無過滯之憂又得當歸丹皮以助之但逐毒之穢而不損腸之陰非孟浪以用之也

此症用雷轟

丹亦神效

雷丸紅花甘草各二錢白芍車前子各五錢澤瀉猪苓各二錢水煎服

人有面黃體瘦善食易饑不食則痛日以為常一旦大瀉

連蟲而下如團如結血瘕膜包人以為蟲瀉也然蟲之
 生也生於濕蟲之養也養於水穀也善食者蟲食則易
 消易饑者蟲饑則易餓也不食則痛蟲無食以養則醫
 人腸胃歲月既久蟲以生蟲竟將腸胃之間變成巢穴
 飲之食之而不肯散團結包裹何肯遠出哉且所用之
 飲食供蟲而不足何能生津化液以養五臟七腑乎自
 然臟腑之氣衰而胃氣亦漸弱矣胃弱則脾亦弱胃弱
 則食必減而不能入脾弱則食難化而不能出久則胃
 寒而脾亦寒脾胃寒冷則蟲苦無藏身之地偶將熱湯
 熱水乘機下遁而大瀉一蟲既行衆蟲無止遏之勢成
 羣逐隊而下團結於膜血之內勢之所必至也治法乘
 蟲之遷徙而下下之則腸胃無留餘之蝕然而下之過
 甚必至損傷脾胃於攻之中用補則正氣得養蟲亦盡
 除兩益之道也方用掃蟲湯人參五錢白朮一兩大黃
 三錢白薇三錢百部三錢甘草一錢烏梅一箇水煎服
 一劑大瀉蟲盡出矣不必二劑服此藥後用四君子湯
 調理而安夫此湯雖曰掃蟲實補脾胃以生氣腹中生
 蟲至於如許之多其傷損脾胃者非一日矣似宜單補

而不用攻然蟲既大出不用攻蟲之藥惟用補劑則脾
 胃之氣回而蟲亦回矣反留為後日之害故因其自出
 之時即用祛蟲之藥蟲不敢貪補而流連也况攻之中
 仍有補劑但瀉蟲而不耗氣是攻補並用且善後得宜
 安得不收全功哉

此症用追蟲
丹亦神

甘草枳殼雷丸各一錢黃連百部檳榔各二
錢人參史君子肉各三錢白朮五錢水煎服

人有臟腑不調久瀉不愈人以為洞瀉也誰知是肝乘脾
 土濕氣下行之故乎夫肝屬木最能尅土然而土旺則
 木不能尅木平則土不受尅惟肝木既旺而土又過衰
 則木來尅土而土之濕氣難安矣人身之脾土易衰肝
 木復易旺肝木能旺非腎水生之而旺也大約得之怒
 與謀慮者居多大怒則肝葉開張過於謀慮不決則失
 於剛斷而躁妄之念生皆能使肝氣之旺旺則肝氣不
 能發泄必致乘脾脾乃濕土畏肝之尅氣不上升而下
 降遂致成瀉人之怒氣不常而謀慮無已肝亦烏能平
 而瀉又烏有止期乎治法平肝以瀉水則瀉可止也古
 人有用上涌之法而效者有用下泄之法而亦效者然

辨證錄

卷之七 大瀉

聖

皆非善法也方用平瀉湯芍藥二兩茯苓一兩白朮二兩水煎服一劑肝氣平二劑洞瀉止三劑不再瀉矣此方用芍藥以平肝用白朮茯苓健脾以去濕肝氣既平不去刑土而脾得養無畏於木氣之尅况濕去則土燥無波可興何能作瀉奚必上涌以傷氣下泄以損陰用劫藥以制勝哉

此症用調脾

飲亦妙

白芍茯苓各五錢白朮一兩甘草一錢陳皮五分神麴二錢白豆蔻二粒水煎服

人有侵染鬼魅一旦大瀉此陰氣之侵傷於脾土也夫脾

辨證錄

卷之七 大瀉

醫

屬太陰本是陰臟然陰中有陽則脾土運行易於變化無復有過濕之虞是太陰濕土全藉腎中至陽之氣以變化之也若鬼則至陰之氣也相接至久則至陽之氣皆為至陰所盜陰中無陽何以消化水穀况鬼氣又邪氣也邪氣之盛由於正氣之衰正不敵邪則陰氣更勝陰勝陽微泄何能止乎治法非補陽以去濕助正以消陰則瀉正無底止也方用消陰止瀉丹蒼朮五錢白朮一兩附子三分乾姜一錢山藥一兩水煎服連服十劑不特瀉止精神亦健此方用蒼朮以祛邪用白朮以利

濕用姜附以生陽足矣何又入山藥補陰之多事也不知人為鬼魅所侵不惟陽氣消亡而陰精亦必暗耗加入山藥之補陰者補真陰之精非補邪陰之水也况真陽非真陰不生補其真陰正所以速生陽氣耳陽得陰而姜附無太勝之虞反能助二木以生至陽之氣矧山藥原是健脾利水之神物原非純陰無陽可比故同用以出奇也

此症用逐癘

丹亦佳

蒼朮二兩乾姜三錢良姜二錢茯苓一兩甘草一錢肉桂一錢管仲三錢水煎服

辨證錄

卷之七 大瀉

醫

痢疾門

人有夏秋之間腹痛作瀉變為痢疾宛如魚凍久則紅白相間此是肝尅脾土也蓋夏秋之間寒熱必然相雜肝遇涼風則木氣不舒上不能宣必至下尅而脾胃之中受三夏暑熱肝木凋零乃與肝木相爭肝木激而成怒尅土更甚脾胃之土傷難容水穀遂腹痛而作瀉矣瀉久而糟粕已盡脾乃傳肝木之氣於腎而腎見其子之氣乃相助而作惡忘其自損母氣也紅白相間者肝不藏血而紅見腎不藏精而白見也惟是肝內之血無

辨證象

卷之七 大瀉

果

多腎中之精有限何以能綢繆不斷如水之傾如泉之湧也不知六腑畏肝木之橫五臟助腎之困交相成之也治法急平其肝氣之怒少佐祛穢之藥則肝氣不降而腎氣頓收不必止痢脾胃之土自安脾胃既安何懼痢之有方用平肝止痢湯白芍一兩當歸五錢梔子二錢枳殼一錢車前子二錢甘草一錢水煎服一劑痢輕再劑痢又輕三劑全愈此方全不去治痢但去平肝而痢自止蓋痢之來也始於肝痢之成也本於腎平肝則肝氣平肝平而腎氣亦平肝腎之氣平而脾胃烏有不

平者乎今人但去治脾胃也所以痢不能遽止耳

此症用和腹

湯亦可

白芍一兩當歸五錢枳殼三錢
廣木香二錢甘草一錢水煎服

人有夏秋之間先瀉後痢腹中疼痛後重之極不痢不可欲痢不得口渴飲水小便艱澀小腸作脹人以爲火邪之重也誰知是濕熱之盛乎蓋夏傷於熱必飲水過多熱雖解於一時濕每留於腸胃迨至秋天寒風襲於皮毛熱必秘於臟腑於是熱欲外泄而不能熱不得不與濕相合然而濕與熱非好相識也相合相爭而疼痛生

辨證象

卷之七 瀉法

果

矣熱欲下出濕欲相留彼此牽掣於大腸之間而後重現矣熱欲出而不得出則熱必上焚不得不求救於水然而濕留於下焦而火則忌水也使水不能傳入於膀胱水火戰鬪仍從大腸而出此小腹之所以發脹耳治法分解其濕熱俾濁者趨於大腸清者入於小腸不必用瀉藥以止痢也方用分解濕熱湯車前子一兩厚朴三錢黃連一錢甘草一錢枳殼一錢檳榔一錢滑石末三錢水煎服一劑後重除二劑瘳脹止三劑口渴解痢亦全愈此方用車前以利水用黃連以清熱用厚朴以

分清濁餘則止穢去滯調和於邪正之間以解紛爭也
君相佐使既用之攸宜安有不取效之捷哉

此症用二黃
湯亦神效

澤瀉二錢車前子五錢大黃檳榔滑石各
二錢黃連一錢甘草五分水煎服二劑愈

人有濕熱作痢大渴引飲飲後又不甚快心中懊懣小便
不利紅白相間似膿非膿似血非血此是火熱未解之
故也夫濕熱之極始成痢疾但其中有濕輕熱重熱輕
濕重之分耳如此等之痢明是濕熱兩重之症單消水
則熱存而水難降單清火則濕在而火難除必須兩瀉

辨證錄

卷之七 痢疾

吳

之熱與濕俱不能獨存也然而瀉熱必致傷陽瀉濕必
致傷陰治法必於補陰之中佐以瀉熱濕之劑則陰既
不虧陽亦無害夫瀉之既能損傷陰陽則補陰亦宜補
陽矣何僅補其陰即能不傷其陽也不知陰陽原兩相
根也瀉熱之藥仍走於大腸之內雖損其陽仍損其陰
也今補其陰則陰不傷矣何害於陽乎此補陰之所以
不必再補陽耳方用滋陰止痢丹白芍一兩當歸一兩
大黃三錢車前子五錢檳榔二錢蘿蔔子三錢水煎服
一劑膿血減二劑懊懣除三劑口渴解而痢亦頓止矣

此方奇在大黃與蘿蔔子並用逐瘀穢實神分清濁甚
速用之於白芍當歸之內補以行攻有攻之益無攻之
失也

此症用通快
飲亦佳

黃連茯苓各三錢白芍一兩黃芩車
前子枳殼各二錢厚朴一錢水煎服

人有濕熱之極腹痛作痢上吐不食下痢不止至勺水難
飲胃中悶亂人以為噤口之痢也誰知是胃中濕熱之
毒乎夫痢宜下行下利宜也何以上吐而不能入乎此
蓋胃中之火得濕而蘊結不宣一旦作痢本欲下行乃

辨證錄

卷之七 痢疾

吳

投之以飲食則火反上熾而不降以致胃口閉塞而成
噤口也然而胃火之盛者由於心火之旺心火最惡濕
一得濕則火鬱而不通則停住於胃口胃中之火愈增
其薰蒸之氣二火相合則熱之勢固結而不散濕亦停
住於腸胃之內胃中交戰安得不悶亂乎治法必須開
鬱火之門而門不能易開必須引火開門之為捷耳方
用引胃湯人參一錢黃連三錢吳茱萸三分菖蒲三分
各為細末滾水調入於茯苓末中大約茯苓須用五錢
一匙一匙調如稀餲者噤之初時噤下必吐吐後仍噤

藥一受則不吐矣即將前藥服完上下俱開門矣然後用靖亂湯白芍一兩車前子五錢黃連一錢甘草二錢枳壳一錢木通一錢廣木香五分茯苓三錢水煎服二劑痢止不必三服也前用引胃湯者以心火喜燥黃連雖寒然其性正燥也以燥投燥原非所惡况吳茱萸性熱而燥以火入火同性豈有杆格之虞况入之人參葛蒲之中乎蓋胃中之火乃邪火而心中之火實正火也居於邪正之間非得正人君子之藥則邪不能散於頃刻非得導引之使則心火不能返於故宮况胃氣之閉正胃氣之虛也人參補胃氣之聖藥胃虛逢補不啻如饑者之得食關一開而良將勇士奪門而入邪自驚走矣後用靖亂湯者譬如以計奪門若後無大兵相繼則敵且欺寡不敵衆未必不狹巷而戰死鬪而不肯遁今又以利水逐穢平肝之藥濟之是前鋒既勇於斬關而後隊又善於蕩寇安得不成功哉

此症用啓開散亦效

黃連人參茯苓各二錢木香三分吳茱萸五分水煎服緩飲之隨飲即愈

人有濕熱作痢數日之後腹不疼痛如膿如血陣陣自下

手足厥冷元氣欲絕此是火變為寒而陰絕也夫痢無止法古人之語也然痢實不同有初起即宜止者有日久而不可止者未可執痢無止法一語竟不用止也然不止痢不過久病之難痊若止痢每至變生於不測是痢又不可輕言止也此等之症正不可不止者蓋腹中作痛為邪腹既不痛何邪之有腹不痛而膿血陣陣自下乃氣脫而欲崩也手足厥冷乃氣脫而不能運也必須看其舌之滑燥何如耳熱極則舌必燥寒極則舌必滑也熱變為寒其舌必滑須先止其痢以救脫不可瀉

此症用加味四君湯亦效

人參白朮各二兩肉桂三錢北五味子三錢茯苓一兩甘草三錢水煎服

其痢以攻邪矣方用止脫救痢湯人參二兩白朮二兩白芍一兩肉桂三錢茯苓一兩甘草二錢赤石脂末三錢水煎服一劑手足溫二劑膿血止三劑痢全愈減各藥一半去赤石脂再服十劑元氣如故矣此等之痢世不常有不可執此方以治痢余論症不敢不備質於天師以存此治法救萬人中之一人也

此症用加味四君湯亦效

人有受暑濕之毒水穀傾囊而出一晝夜七八十行膿血

稠黏大渴引水百杯不止人以爲腸胃爲熱毒所攻也
誰知是膀胱熱結而氣不化乎夫水濕之邪從膀胱而
出乃上由於肺氣之清肅下行膀胱奉之而能化也今
胃受暑熱之毒蒸薰於肺肺不能受乃移其熱於大腸
而大腸奔迫必鬱結於膀胱矣膀胱熱結則氣不化而
小溲短赤邪熱邪濕盡趨於大腸而出不啻如決水轉
石之驟猛也治法必須清膀胱之熱以迅利其小便但
肺與大腸爲表裏肺熱而大腸始熱故不若先清肺經
之熱也方用清源止痢湯黃芩三錢茯苓五錢紫參三

辨證錄

卷之二 痢疾

三

錢訶黎勒三錢甘草一錢天花粉三錢地榆三錢水煎
服一劑減半三劑痢止此方清肺金化源之方也用黃
芩地榆以涼肺卽所以涼大腸之熱也紫參療腸胃之
熱能消積聚而通大小之便訶黎勒能固腸脫合而用
之於茯苓甘草諸藥之內則通中有塞而塞中又有調
和之妙所以奏功特神也

此症用迅行

湯亦神

王不留行茯苓猪苓黃芩
各三錢白朮三錢水煎服

人有下痢純血色如陳腐屋漏之狀肛門大開不能收閉

面色反覺紅潤唇似硃塗人以爲痢疾之死症也然治
之得法尚可獲生以其症雖見死象而氣猶未絕有可
續之機也凡下痢純紅開手卽宜用補陰之藥因人執
痢無補法以至如此不知痢症何常不可補也用補陽
之藥以治痢則有宜有不宜用補陰之藥以治痢則實
無不宜也若一見紅白不問虛與不虛動用攻邪逐穢
之劑以致白變紅紅變陳腐屋漏之色也夫下痢純血
原是陽旺陰虛之症不補陰以制陽反助陽以攻陰則
陰氣愈虛虛極則陰氣但有降無升矣肛門大開不能

辨證錄

卷之七 痢疾

三

收閉正有降無升之明驗也面色紅潤唇如硃塗正陽
在上而陰沈下之顯徵也陽宜降而反升陰宜升而反
降則陰陽不交不死何待乎然能奄奄不死者以其陰
氣雖降而未絕也治法急救其陰以引其陽氣之下降
兼補其陽以提其陰氣之上升未必非死裏求生之法
也方用補陰升提湯人參一兩熟地一兩白芍三兩茯
苓一兩升麻二錢甘草一錢山藥一兩北五味子三錢
山茱萸一兩訶黎勒三錢水煎服一劑痢減半再劑痢
止倘服之仍如前之痢也則陰已絕而陽不能交不必

再服論此方乃救陰之奇方提氣之聖藥苟有陰氣未絕未有不可續之而升提者也正不可因一用之無功竟置此方於不用如一見純紅之症急以此方減半投之何至有死亡之嗟哉

此症用續絕湯甚佳

人參五錢熟地山茱萸山藥芡實各一兩甘草一錢北五味二錢水煎服

人有貪酒好飲久經歲月濕熱所積變成痢疾雖無崩奔之狀而有溏鷺之苦終年累月而不愈人以爲酒積之在脾也誰知是腎泄之病乃濕熱之酒氣薰之也氣薰

癆瘵

卷之七 痢疾

音

於腎之中腎即醉於酒之味正不必其濕熱之盡入之也然而濕熱之侵由於腎衰之故腎不能敵乃移其濕熱於脾脾又久受濕熱之困不能再藏乃釀成酒積而作痢矣雖其積在脾病實在腎但治脾而痢不能愈必須治腎然徒治其腎病亦不能愈必須解酒之毒分消其濕熱之氣則不治痢而痢自止方用化酒止痢湯人參三錢白朮一兩山茱萸五錢黃連一錢茯苓五錢枳木枝五錢白芍五錢檳榔五分薏仁五錢水煎服連服四劑痢疾自愈不可多服愈後仍須忌酒否則暫止而

仍發也論此方實解酒毒然力止能解於目前不能解於日後非藥之過也蓋酒氣薰蒸於腎受毒最深用此方以解酒毒則脾胃有更甦之氣倘不遵酒戒仍然酣飲則酒入於脾胃其尅伐之性較前更甚蓋已傷而不可再傷也此酒積之病酒徒每每坐困不得享長年之樂可不慎哉

此症用黃水杜枳湯亦佳

山茱萸白朮各一兩枳木枝杜仲各一錢水煎服十劑可愈

人有長年累月裏急後重而作痢者乍作乍止無有休歇

癆瘵

卷之七 痢疾

音

人以爲休息之痢誰知是正氣已復而邪氣尚存之故哉夫痢不可妄止必須因勢利導之苟邪火邪水未會滌盡一旦用補塞之藥遽止之則痢雖遏於旦夕邪在腹中時動時靜靜則安動則發亦其常也况益之厚味之貪饕勞役之妄作安得不成休息之痢乎治法必宜以利爲主利小便不若利大便也蓋正氣已復膀胱之氣必能氣化以分水何必再利其小便邪之不盡者火留於大腸也利大腸則邪且盡下然而利大腸之藥必先從胃而入脾由脾而入大腸吾恐湯劑之入大腸不

遠受益胃與脾先受其損矣方用盡穢并大黃一錢滑石一錢厚朴一錢地榆二錢檳榔一錢各為細末用蜜煮老為丸一次服盡服後即用膳以壓之不使留於胃中必得微利為度一利而痢病頓除此方專下大腸之濕熱也邪原在大腸所以一用奏功倘畏損傷脾胃用人參湯送下更妙然亦止宜於虛弱之人不宜於健旺之客也

此症用緩攻

湯亦神

白芍一兩枳殼五分大黃一錢

檳榔五分水煎服一劑即止

辨證錄

卷之七 痢疾

五

人有中氣不順口中作噁下痢不止人以為濕熱作痢誰知是氣逆作痢乎夫痢疾多是濕熱然濕熱之所以停積於腹中者氣阻之也凡人大便氣閉則結氣逆則瀉有濕熱而更兼氣逆徒用消濕瀉熱之藥不用理氣之味則過於下行氣必更滯矣治法必須利氣佐之消濕瀉熱之劑為妙雖然氣之所以逆者以下多亡陰陰血虧損氣乃不順遂因之作逆也欲氣逆而仍反為順必須補陰以生血然而血不可以遽生陰不可以驟長用順氣之藥加入於補陰補血之中則陰血漸生痢可速

止矣方用萹撥散萹撥三錢芍藥五錢當歸五錢牛乳半斤同煎一半空腹頓服一劑痢止再劑不再痢也蓋萹撥最能順氣且去積滯更神入之於歸芍之中更能生長陰血佐之牛乳者牛乳屬陰乳乃血類無形之陰血不能遽長用有形之陰血以滑其腸中之迫急則血既無傷陰又不損轉能佐氣以去其結滯故奏功甚捷取效獨奇耳

此症用順氣

湯亦效

廣木香三錢烏藥甘草枳殼各一錢白芍五錢炒梔子車前子各三錢水煎服

辨證錄

卷之七 痢疾

五

人有腸辟下血另作一派噴啣而出且有力而射遠四散如篩腹中大痛人以為陽明氣沖熱毒所作也誰知是氣血下陷之極乎夫清氣上升則濁物自降惟清陽之氣既不能上升則濁陰之物必留滯於腸中而不化况助之濕熱之毒則血不能藏乃下注而噴射矣或疑血不上藏洞瀉宜矣何下出如篩乎此乃濕熱之毒氣火盛逞其威作其勢也至於另作一派啣血遠射者邪與正不兩立正氣化食而邪氣化血正氣既虛不敢與邪氣相戰聽邪氣之化血不與邪氣同行以化食邪氣遂

驅腸中之血以自行腸中之食既不得出乃居腹而作痛邪氣奪門而出是以另行作一派遠射有力也治法升其陽氣瀉其濕熱之毒則正氣盛而邪自衰邪衰而血亦不下也方用升和湯陳皮五分熟地五錢當歸三錢生地二錢丹皮一錢升麻一錢甘草五分黃芪三錢白芍五錢車前子三錢黃芩一錢水煎服二劑血止再二劑全愈此方名為升陽其實補陰但升陽而不補陰則陽氣愈陷以陽氣之升升於陰氣之充也蓋下血既久其陰必亡惟用當芎二地以補陰而後益之黃芪之補氣則氣自升舉即不用升麻之提而陽已有躍躍欲舉之勢矧助升麻又加車前之去濕丹皮黃芩之散火則濕熱兩消何氣之再陷乎此升陽全在和之之妙也

此症升陷
湯亦神

人參當歸各五錢熟地白芍各一兩丹皮荆芥車前子各三錢甘草黃連各五分水煎服

人有痢久不止日夜數十行下如清涕內有紫黑血絲食漸減少脈沈細弦促人以爲濕熱之毒未除誰知是瘀血未散乎夫痢成於濕熱未聞痢成於瘀血也不知血喜流行若不流行且化瘀矣况因內外之傷以成瘀欲

其不化爲痢難矣世人不知成瘀之故試舉其一二言之如飽食之後復加疾走或飲酒之餘更多叫號或毆傷忍痛或跌磕耐瘀或大怒而氣無可泄或遇鬱而愁無可解或餐燔灸之太多或受訶責之非分皆能致瘀而成痢也及致成痢以治痢之藥投之絕無一驗者以所成之痢乃似痢而非痢也治法但治其瘀不治其痢則得耳方用消瘀神丹乳香一錢沒藥一錢桃仁十四箇滑石三錢廣木香一錢檳榔一錢白芍五錢神麩餉爲丸米飲下百丸連服二日即下穢物而愈倘二日少瘥不全愈者此瘀盛也用大黃一錢煎湯送前丸二百丸無不愈矣此方治瘀而痢未常不兼治也凡治痢久不愈者可用此丸以下其瘀血要在人消息之也

此症用分瘀
湯亦神

大黃車前子各三錢丹皮五錢當歸一兩枳殼柴胡各一錢水煎服

155 1023 續修四庫全書 8 五八〇

癥瘕門

人有肝氣甚鬱結成氣塊在左脅之下左腹之上動則痛靜則寧歲月既久日漸壯大面色黃稿吞酸吐痰時無休歇人以為痞塊也誰知木鬱而成癥瘕乎夫肝木之性最喜飛揚不喜閉滯肝氣一鬱必下尅脾胃脾胃受尅則氣不能暢行於臟腑遇肝之部位必致阻滯而不行日積月累無形化為有形非血積而成癥必食積為癥也治法舒其肝中之鬱助其脾胃之氣則有形仍化為無形矣倘見有形誤認為食與血妄用消食敗血之劑則脾胃之氣大傷而肝之鬱仍不能解勢必其形愈大往往有致死不悟者不重可悲乎方用平肝消癥湯治之白芍一兩當歸五錢白朮一兩柴胡一錢鼈甲二錢神麩一錢山查一錢枳殼一錢半夏一錢水煎服四劑礮小又用四劑而礮又小十劑礮全消矣此方全去平肝以解鬱氣一舒不來尅脾胃之土則土氣自安加白朮以健脾開胃則脾胃氣旺不畏肝氣之尅則氣自通肝何阻滯之有况用鼈甲山查皆是攻堅去穢之神藥何至有鬱悶不舒哉

癥瘕錄

卷之七 癥瘕

本

此症用化痞膏外治亦可

大黃五錢人參三錢白朮五錢枳實三錢丹皮二錢鼈甲一兩神麩一兩山查五錢麥芽五錢厚朴三錢當歸一兩白芍一兩史君子肉三錢兩頭尖二錢蒲公英一兩金銀花一兩生甘草二錢檳榔二錢防風一錢川烏一箇香油三斤鍋熬以上藥煎數沸用白布將藥渣灑出再煎油滴水成珠然後再入後藥末薄荷葉二錢乳香沒藥各五錢麝香一錢赤石脂二兩冰片二錢阿魏三錢血竭三錢各為末入油內再煎又入炒過木飛過黃丹末一斤收之成膏矣貼痞塊止消一箇即消其膏藥須攤得厚不可大也

人有脾氣虛寒又食寒物結於小腹之間久不能消遂成硬塊已而能動人以為癥結而生瘕也誰知是命門火衰不能化物乎夫脾乃濕土必藉命門之火薰蒸倘命門火衰則釜底無薪何以蒸腐水穀哉譬如陽和之地有太陽之照則萬物發育處於陰寒幽冷之區則草木萎稿安得有萌芽之達耶又譬如淤泥濕田非遇烈日炎氛未易燥乾是土必得火而燥也人身脾土何獨不然無火則所用之飲食停積於中而癥瘕生焉若用攻逐之法則虧損脾陰勢所不免何若仍補命門之火扶助脾土則旺土自能消化不必攻逐而癥瘕自開更覺漸移默奪之為勝哉方用溫土消癥湯白朮一兩茯苓一兩肉桂二錢枳實二錢人參五錢巴戟天五錢山查

癥瘕錄

卷之七 癥瘕

空

一錢水煎服二劑塊少減又二劑塊又減十劑消化於
烏有矣此方用巴戟天肉桂溫補命門之火火旺則陰
霾自滅人參白朮茯苓健脾又能利濕濕去而土燥溫
和寒蟲水怪何所潛形况有枳實山查之類原能攻逐
乎此方殆治其源而又治其標者也

此症亦可用化
塊丹治之

人參五錢白朮二兩肉桂神麩各
二錢葶藶一兩龍甲三錢水煎服

人有胃氣虛弱食不能消偶食堅硬之物存於胃中久則
變為有形之物腹中亂動時疼不可忍得食則解後

辨證錄

卷之七續

五

則漸大雖有飲食亦痛人以爲痞塊成體也誰知似體
非體乎蓋痛之時以手按之宛如體身之背四足之齊
動也夫體動物也豈肯久安於一處其非體也明甚何
形之宛似乎蓋胃屬土土中所生之物大約四足者居
多土中所生之物喜靜而不喜動故安土重遷形如體
而不移也但既喜動何以亂動蓋性雖喜靜而覓食
充饑則動靜之物相同試看其得食則減而不亂動非
索食之驗乎日用飲食以供其口腹則身形日大身形
既大所用之飲食何足以供之自然嚙皮傷肉安得不

痛哉治法自當以殺蟲爲主然殺蟲猶攻邪也攻邪必
傷正氣補正以殺蟲又何疑乎方用攻補兩益湯榧子
十箇白微三錢雷丸三錢神麩三錢檳榔二錢史君子
十箇白朮一兩人參五錢水煎服一劑腹必大痛斷不
可飲之茶水堅忍半日如渴再飲二煎藥汁少頃必將
蟲穢之物盡下而愈不必二劑此方神奇方中盡是殺
蟲之味用之於人參白朮之中且以二味爲君主之藥
蓋冲鋒破陣之帥必得仁聖之君智謀之相籌畫於尊
俎之間始能奏凱成功耳倘舍人參白朮不用徒用殺
蟲之味亦未必無功然斬殺過傷自損亦甚非十全之
師也

辨證錄

卷之七續

五

此症用化體
湯亦效

人參三錢白朮五錢白微百部各三錢麩香枳
壳各一錢檳榔二錢鱈魚骨炒黑爲末煎汁服

人有氣虛下陷飲食停住於脾胃之間而成塊者久則其
形漸大悠悠忽忽似痛不痛似動不動人以爲痞塊也
誰知是陽氣不升之故乎夫脾胃之氣日動宜升不可
朝下陷倘饑飽勞役以傷其形房幃秘戲以傷其骨
加之厚味醇醪不節口腹則脾胃之氣何能升哉於是

陽閉於陰之中陰離於陽之內陰陽兩不交接飲食不
易消化矣即能消化而氣結不伸亦能成形但其形外
大而內軟按之如空虛之狀見假象以惑人也治法不
必治塊惟升提陽氣則脾胃無下陷之虛氣塊不消而
自化矣方用補中益氣湯人參三錢黃芪一兩當歸三
錢陳皮一錢甘草一錢白朮一兩柴胡一錢升麻四分
半夏一錢水煎服補中益氣湯乃提陽氣之聖藥也此
病原是氣虛故用黃芪補氣為君用白朮一兩者以塊
結於腹取其利胥臍以通上下之氣參歸助芪朮以健
脾胃之土土氣既旺用升柴提之則氣尤易升癥瘕之
塊未必無痰涎之壅加半夏入於陳皮甘草之中則消
痰而又不耗氣同羣共濟發揚陽氣之升即有邪結無
不散矣况原係氣塊而非食塊有不立時消化者哉多
亦不過數劑便可奏功也

辨證錄

此症亦可用加減
六君子湯治之
人參三錢白朮茯苓各五錢甘草山查麥芽厚
朴各一錢陳皮枳殼各五分神麴二錢水煎服

人有正值飲食之時忽遇可驚之事遂停滯不化久成癥
瘕者醫有作痞塊治之不效用補藥治之亦不效蓋驚

辨證錄

卷之七 癥瘕

壹

辨證錄

卷之七 癥瘕

壹

二經之鬱結開則脾胃之癥瘕不攻自破矣

此症用消瘕
湯亦神效

白芍一兩白朮龍甲各五錢甘草鬱金各一錢枳殼
五分天花粉丹皮香附各二錢茯苓巴戟各三錢白
豆蔻二粒廣木
香五分水煎服

人有偶食難化之物忽又聞驚駭之事則氣結不散食亦
難消因而痰裹成瘕人以為痞也誰知是驚氣之閉結
乎夫驚則氣下疑有食必隨氣而下矣胡為因驚反多
留滯耶不知氣乃無形食乃有形也無形之氣隨驚而
下降有形之物隨驚而上升且驚則氣下於肝中而不

下於脾中也氣下於肝則肝之氣不散而下尅脾土即無物相間尚留物不化况原有難化之物受於未驚之前安得即化乎此癥瘕所以生也治法必去驚駭之氣大培脾胃之土則癥瘕不攻自散也方用培土化癥湯白朮一兩柴胡一錢茯苓三錢山藥四錢神麩二錢山查一錢枳殼五分兩頭尖三錢厚朴一錢鼈甲一錢五分白微一錢何首烏生用二錢白芍五錢白芥子二錢水煎服十劑癥瘕消半再服十劑全消此方用白朮以培土何又用白芍以平肝蓋脾弱由於肝膽之相制用

辨證錄

卷之七 癥瘕

癥

白芍以平肝膽正所以培脾胃之土也肝既不尅脾胃之土則土氣升騰無物不化况益之消癥破癥之味何塊之不除哉且方中柴胡一味已抒肝膽之氣膽氣揚而肝氣快總有驚駭不知消歸何處寧患癥瘕之固結哉

此症亦可用消癥湯治之

人有飽食即睡於風露之間睡未覺腹中飽悶不舒後遂成痞人以爲食未消而成痞也誰知風露之邪裹痰於胃中乎夫風邪陽邪也露邪陰邪也二邪合而不陰不

陽之氣最難化物故往往停積腹中而不散治法通其陰陽使陽邪入於陰之中陰邪出於陽之外則陰陽正氣兩不相損庶痰氣開而邪易遁也第陽邪易散而陰邪難散然雖有陰陽之分而祛邪何論陰陽但補其陰陽之正氣則邪不祛而自祛矣方用兩祛丹白朮一兩人參三錢何首烏生用三錢鼈甲末三錢地栗粉三錢神麩二錢茯苓二錢當歸三錢半夏一錢貝母一錢水煎服二劑輕四劑又輕十劑痞塊全消此方脾胃雙治之法也脾胃俱屬陰奈何置陽不問乎不知陽邪入於

辨證錄

卷之七 癥瘕

痞

陰分已全乎爲陰矣全乎爲陰是忘其爲陽也故治陰而不必治陽然方中雖是治陰未常非治陽之藥所以能入於陰之中又能出乎陰之外而陰邪陽邪兩有以消之也

人有食蔬菜之類覺胃膈有礙遂疑有蟲因而作痞人以爲蟲子之作祟也誰知是心疑而物不化乎夫脾胃主化物者也母論蔬菜入胃俱化即蟲子之類到胃入脾胃胃之所以能化物者全藉乎先後天之火氣也後天

火氣在心包先天火氣在命門心包之火生胃命門之

火生脾胃胃有二經火氣而後能化糟粕而出精微土

得火而生也食蔬菜而動疑則心動矣心包代心出治

主動而不主靜今心動而心包反不敢動心包不代心

君以出治則火氣不入於胃胃既不能化物而脾遂不

為胃以運行其所食之物又安能化自然停住於腹而

成痞矣若不解其疑止去健脾消痞則癥瘕寧易蕩除

哉方用釋疑湯人參三錢巴戟天五錢茯苓三錢白朮

五錢白微二錢甘草一錢史君子三枚砂仁三粒肉桂

辨證錄 卷之八 癥瘕

一錢廣木香三分菖蒲五分水煎服三劑輕四劑又輕

十劑全消此方全去溫補心包之氣心包氣旺則心包

之火自必升騰寧肯自安於無為而不代心君以宣化

哉心包火氣宣於胃中而命門之火翕然相從不啻如

夫婦同心內外合力齊心攻擊雖有癥瘕不立時消化

吾不信也

此症亦可用加味

四君湯治之

人參遠志山藥各三錢白朮五錢甘草枳殼各一錢
茯苓五錢菖蒲一錢山查二十粒神麩一錢

辨證錄卷之八

山陰陳士鐸敬之甫號遠公又號朱華子

瘧疾門

人有發瘧先腰痛頭疼且重寒從背起先寒後熱熱如火

熾熱止汗出不能即乾遍身骨節無不痠痛小便短赤

世俗皆稱脾寒此乃太陽膀胱經之瘧也夫風邪從太

陽經而入即瘧邪也惟是冬月風邪入太陽而成傷寒

若夏秋風邪入太陽而成瘧耳蓋冬月之風乃至寒之

風夏秋之風乃至熱之風也風不同而病亦異總之無

辨證錄 卷之八 瘧疾

食無痰不能成瘧夏秋之間明是熱風作祟暑住痰食

不化行於陰而作寒行於陽而作熱也夫痰食之類遇

寒則停住遇熱宜流通何反裹痰食而不化此乃寒熱

酷烈因脾胃之衰盛以分勝負邪旺之極正不能敵邪

遂至狼狽無津液以養身體骨節所以痠痛也正既不

能敵邪邪勢更張反堵截其關津路口小便不能遽出

而邪火入之此所以短赤也治法健脾胃之土散太陽

之邪消痰化食邪無所恃而自散矣方用開邪散白朮

五錢茯苓五錢前胡一錢柴胡一錢甘草五分猪苓二

錢人參一錢青皮一錢枳壳一錢白豆蔻三分山查一錢半夏一錢水煎服一劑輕再劑又輕三劑全愈此方健脾胃之氣則土旺敢與邪戰健脾胃之中用利水化濕之藥引邪直走於膀胱太陽之經邪從太陽而入仍從太陽而出在本經尤易分消耳方中不專散太陽之邪而兼表少陽之鬱蓋少陽乃太陽之去路早斷其竄走之途則邪不得不仍趨太陽原路而去况消痰化食之品無不用之得宜則堂堂之陣自然望旗幟而驚遁矣

齊書錄 卷之八 瘧疾

此症用加味四君湯亦甚效

人參甘草桂枝各一錢白朮茯苓各五錢半夏二錢水煎服

人有發瘧之時身先發熱頭疼鼻乾渴欲飲水日胸胸不得眠甚則煩燥畏火光厭聽人聲喧嘩人謂熱病誰知是陽明胃經之瘧乎夫陽明胃土也邪入陽明其勢自大蓋陽明多氣多血之經其容水穀亦至盛宜足以容邪何邪入反能作祟蓋水穀之氣盛正足資盜賊之糧也譬如賊居深山勢不甚張及至入於城市則妄行流毒恣其擄掠無有止足也陽明胃經之邪亦復如是若

胃中水穀未足充其飢渴必索水以救其內炎渴甚多飲則水停於心胃之中心氣為水所遏不得下交於腎則心腎兩開何能寐乎心不能下交於腎則腎畏火炎何敢上交於心以滋心中之液自然心無所養而煩燥一生火邪更熾傷火畏火喜靜而不喜動人聲喧嘩安得不惡總皆陽明熱邪作祟也治法可不急瀉其陽明之熱邪乎然而火邪居於胃中燥乾津液胃氣必虛但瀉其邪不補其正則正氣消亡邪益跳梁是終無痊可之日也故必須補中以瀉其火熱之邪則正不傷而邪亦

齊書錄 卷之八 瘧疾

三

易解也方用平陽湯乾葛二錢人參三錢白朮五錢貝母三錢橘紅一錢石膏三錢麥冬五錢柴胡一錢茯苓五錢水煎服一劑輕再劑又輕四劑全愈此方以人參白朮助脾胃之氣乾葛石膏瀉陽明之火邪貝母橘紅消陽明之痰食麥冬滋肺經之炎柴胡舒胆經之鬱茯苓泄太陽之滯既攻補兼施復彼此相制邪安得不退避哉

此症用伐邪湯亦效

石膏人參各三錢半夏柴胡各二錢麥冬五錢茯苓一兩甘草厚朴枳壳各一錢水煎服

人有瘧病初發之時往來寒熱口苦耳聾胸脇脹悶作痛或嘔或不嘔人以爲火熱之瘧也誰知是少陽胆經之瘧乎夫風邪入於人身不敢遽入於臟每伏於半表半裏之間乘人虛弱而後深入進退於表裏而寒熱生焉故進與陰相爭則寒出與陽相爭則熱半表半裏者少陽之地也瘧發之時必有寒熱之兆寒熱之往來適在少陽所主之位口苦者胆汁外泄也耳聾者胆氣不舒也胸脇脹悶作痛者胆血有滯也或嘔或不嘔者胆邪挾痰食而上冲也治瘧之法甚多烏可舍少陽而別治

辨證錄 卷之八 瘧疾 四

然治少陽之瘧有偏陰偏陽之分偏陰則多寒偏陽則多熱有純熱無寒有純寒無熱之時補偏救敵總不可離少陽而求協其和平也方用和瘧湯柴胡三錢當歸一兩白朮五錢茯苓五錢半夏一錢甘草五分生薑五錢白芍五錢山查一錢青皮一錢水煎服一劑輕二劑又輕三劑全愈此方無一味不入少陽之經絡又無一味不入脾胃之臟腑祛邪復能輔正解表隨可固裏真和解之仙丹非特祛瘧之神劑也

此症用首攻湯亦效

白芍五錢當歸二錢茯苓五錢半夏二錢香附三錢羌活五分甘草神麩各一錢水煎服

人有發瘧之時先寒作顛寒後變熱面色蒼白善起太息之聲甚者狀如欲死或頭疼而渴人以爲寒熱相間之瘧誰知是厥陰肝經之瘧乎夫肝經之瘧由少陽胆經而入若肝木自旺則少陽之邪何敢深入今因肝木之虛邪遂乘機突入矣肝氣本急邪入肝中宜有兩脇脹滿之兆茲安然不見有此等之病是肝之大虛也蓋肝旺必怒不怒而起太息之聲者是肝弱之極不敢怒而又不能制其邪故反生太息也甚如欲死者因氣逆不能發聲也氣逆則火升於上而不易下降咽嗝自存火氣而作渴矣治法自宜急補肝以祛邪不可縱邪以伐肝也方用補肝祛瘧湯白芍一兩當歸一兩何首烏生用一兩鱉甲三錢茯苓五錢青皮一錢柴胡一錢半夏二錢甘草一錢水煎服一劑輕二劑全愈此方全不祛邪純補肝氣肝氣旺而邪氣難留得柴胡引出於少陽之分則邪有出路自然易解矣

辨證錄 卷之八 瘧疾 五

此症用護肝湯亦效

熟地鱉甲各五錢山茱萸二錢何首烏三錢白芥子三錢當歸一兩柴胡一錢五分水煎服

人有發瘧之時先寒後熱寒從腹起善嘔嘔已乃衰熱過汗出乃已人以爲感邪作瘧誰知邪盛於太陰之脾經乎夫脾乃濕土原易生痰食即難化又得風邪合之自易成瘧夫各經之瘧俱宜兼顧脾土豈脾土自病反置脾於不補乎惟是脾乃濕土其性原濕單補脾土則土不能遽健痰濕之氣不能驟消嘔吐之逆未易安也必須兼補命門之火則土得溫和之氣而痰濕自化風邪無黨難於作威欲久踞脾而不可得矣故治法不治脾不可單治脾亦不可也方用溫脾祛瘧湯白朮二兩茯苓

辨證錄

卷之八 瘧疾

六

苓五錢 山藥五錢 芡實五錢 人參三錢 肉桂一錢 炮姜一錢 橘皮一錢 半夏一錢 甘草一錢 白豆蔻三粒 水煎服一劑嘔吐定二劑寒熱除三劑全愈夫瘧病多本於脾寒此方尤治脾寒聖藥凡是脾胃虛寒而得瘧症者將方煎服無不神效正不必問其一日二日之瘧也

此症用加味木

苓湯亦效

白朮二兩 茯苓五錢 半夏三錢 肉桂

二錢 生薑一兩 白豆蔻三粒 水煎服

人有發瘧之時寒熱俱盛腰痛脊強口渴寒從下起先脚冷後由腿冷至臍由臍冷至手而止其頸以上則不冷

人以爲寒瘧也誰知是足少陰腎經之瘧乎此瘧最宜早治亦須補陰爲主倘不補其陰開手用祛邪之藥必變爲四日兩發之瘧也蓋此瘧原是內傷於陰邪乘陰虛而入之初起時陰不甚虛即用補陰之劑加入散邪之味則隨手奏功無如人但去祛邪不知補正遂至陰愈虛而邪益深也雖然邪乘陰虛深入吾仍補其陰陰日盛而邪日退何不可治之有夫邪既深入尚且補其陰而邪退况邪初入之時補陰而邪有不速退者乎方一用退邪湯熟地一兩何首烏生用一兩當歸五錢 鱉甲

辨證錄

卷之八 瘧疾

七

五錢 茯苓五錢 山藥五錢 白芥子三錢 柴胡五分 人參三錢 水煎服一劑輕二劑又輕四劑全愈此方補腎中之陰何加入柴胡人參舒少陽之氣健脾胃之土耶不知邪入於腎必須提出於少陽半表半裏之間風邪易於消散又恐柴胡入於至陰而提出於至陽非用人參則升提無力故用之以健其脾胃則脾胃有生氣陽足以升陰也况鱉甲首烏俱是入陰攻邪之藥邪見陰分之中無非能征善戰之將何敢久戀於陰而不去乎越出於陽分陽氣不虛豈容邪之存住陰陽並攻邪見之

却走矣

此症用四瘡
散亦效

熟地二兩白朮一兩甘草一錢山茱萸一兩人參五錢白芥子三錢柴胡三分荆芥一錢炒黑水煎服

人有四日兩頭發瘡者終年累月不愈但有熱而不寒雖有汗而不渴每發於夜人以為陰虛之極誰知是陽衰之極乎夫邪入人身每乘陰陽之虛然瘡之初入必先入陽而後入陰入於陽則發近入於陰則發遠入於至陰之中則其發更遠四日兩發者乃內經所云間二日之瘡即邪入於至陰也最難祛逐以陽氣衰微不敢與

辨證錄

卷之八 瘡疾

八

邪相戰邪得安居於至陰之中耳夫邪正原不兩立正不容邪而邪每欺正今邪居於至陰譬如強梁之輩僑寓人家欺主人之軟弱鵲巢鳩居心忘主人於戶外矣四日兩發之瘡情形實有相似故治法必須大補陽氣後益之以攻陰邪之藥則邪出而與陽相角始可成功倘以為陰虛惟用滋陰之藥則邪且樂得相資雖佐之祛邪之味彼且謹閉至陰之藏而不出矣方用提陰升陽祛邪湯人參一兩白朮一兩何首烏生用一兩鱉甲一兩茯苓五錢熟地一兩山茱萸五錢肉桂一錢柴胡

一錢白芥子三錢水煎服二劑反覺寒熱交戰而病重

再服二劑寒熱不生全愈矣此方雖陰陽雙補而意重

補陽陽旺則敢與邪鬪故初服之兩病重者正陽氣與

邪氣交戰也兼補陰者助其陰氣之旺則陰旺而邪不

敢重回於至陰之內用柴胡於補陰補陽之中者提出

陰氣以交於陽則邪亦從陰俱出一遇陽氣則彼此大

開又有鱉甲何首之輩超勇絕倫邪有不披靡而遁哉

故一戰不勝連戰未有不勝者也

此症用遠瘡
湯亦佳甚

辨證錄

卷之八 瘡疾

九

人參山茱萸鱉甲當歸各一兩白朮熟地各二兩山藥五錢附子一錢柴胡五分白芥子三錢水煎服

人有哀哭過傷病後成瘡困倦甚疲人以為瘡母之未消誰知是陰陽兩虧乎夫瘡之盛衰全視乎陰陽之衰旺也下多亡血亡其陰也悲哀傷氣傷其陽也陰陽兩虧正氣虛極何能與邪氣相爭惟聽瘡邪之往來邪盛則盛邪衰則衰治法宜助正以祛邪倘惟事攻邪而不知補正則正氣愈虛汗必大出陰虛陽散欲不亡得乎方用救正湯人參一兩黃芪一兩白朮二兩炙甘草一錢當歸五錢半夏三錢水煎服連服數劑瘡止十劑全愈

夫瘧邪之久居不散者正藉痰氣之彌滿耳補正氣以消痰氣則正氣自旺痰氣自消此瘧之更易痊也此方全在用半夏之神補非呆補消非峻消矣

此症用救哀湯亦效

黃芪一兩白朮二兩人參五錢茯苓一兩驚甲山茱萸白芍各五錢半夏三錢水煎服

人有一時病瘧自卯足寒至酉分方熱至寅初乃休一日一夜止甦一時人以爲風邪之入於營衛也誰知是寒氣之入於陽明乎夫足陽明與衝脉合宗筋而會於氣街行房之後陽明與衝脉之氣皆奪其所用其中空虛

辨證錄

卷之八 瘧疾

十

寒邪相犯即乘虛而入舍於二經之間二經過脛會足跗上因邪之相合而二經之陽日虧不能滲榮其經絡故疴行而不能止也治法補二經之虛兼散其寒邪則陽氣自旺寒邪難居得汗可解然而足跗道遠藥力未易驟到非多加藥餌何能取勝哉方用解寒湯人參五錢白朮一兩附子三分蒼朮三錢川芎二錢柴胡五分水煎服二劑汗出而愈此方用參朮以大補其氣佐之蒼朮川芎柴胡以發其汗用附子以引至陽明衝脉宗筋氣街之所自然氣因補而無秘塞之憂邪得散而無

閉結之患矣

此症用參朮附半湯亦效

人參一兩附子二錢半夏三錢白朮二兩水煎服二劑全愈不必再服

人有瘧病發寅申巳亥之時者人以爲痰瘧也然亦知爲陰中之陽與陽中之陰乎夫同一瘧病何以分其陰陽哉大約晝發者爲陰中之陽夜發者爲陽中之陰也故晝發者發於巳而退於申巳陽而申陰也夜發者發於亥而退於寅亥陰而寅陽也以此而辨別陰陽斷不少悞然則症既分陰陽治法烏可合治之乎吾以爲未常

辨證錄

卷之八 瘧疾

十一

不可合治也雖陽病在於氣虛陰病在於血少然而無痰無食終不成瘧消化痰食寧有異哉且痰食之不消而結成瘧母要不離乎肝氣之鬱結以下尅夫脾土也疎肝以健土則脾之氣旺而痰與食自化是治肝以治瘧陰陽正不可異也方用疎肝兩消湯白芍三錢白朮五錢陳皮一錢半夏一錢當歸三錢厚樸一錢柴胡二錢茯苓三錢白芥子一錢氣虛者加人參三錢血虛者加熟地八錢水煎服八劑必發大汗而愈此方陰陽兩治之法也陰中引陽以出於陽分而陰又不傷陽中引

陰以離於陰分而陽又無損兩相引而陰陽之正氣日盛自然兩相制而陰陽之邪氣日消况氣虛加人參以助陽血虛加熟地以滋陰又陰陽之分治何瘡之不除哉人見其治瘡之神也遂以此方能統陰陽而治瘡也誰知單消痰食止疎其肝氣之鬱結乎

此症用散母

湯亦效

人參何首烏半夏鱉甲各一錢白芍白朮各一錢柴胡一錢青皮神麩各二錢水煎服

辨證錄

卷之八 瘡疾

七

虛損門

人有多言傷氣咳嗽吐痰久則氣怯肺中生熱短氣嗜臥不進飲食骨脊拘急疼痛發痠夢遺精滑潮熱出汗脚膝無力人以爲癆怯之症也誰知其先傷於氣乎夫傷氣者傷肺也肺傷則金弱不能生水腎經無滋化之源何能分餘潤以養臟腑乎肺金生熱則清肅之令不行膀胱之氣不化脾胃俱失其運化之權土虧而金益弱金弱而水益虛水難養肝而木燥水難灌心而火炎木強則侮金火勝則尅肺欲氣之旺也得乎氣衰則不能攝精精涸則不能收汗汗出則不能生力此骨脊之所

辨證錄

卷之八 虛損

七

以痠疼飲食懈怠而嗜臥也治法必須先補其肺更宜兼補脾胃蓋肺氣不能自生補其脾胃則土能生金脾胃爲肺金之母也方用益肺丹人參三錢白朮三錢當歸三錢麥冬五錢北五味三分柴胡五分荆芥五分山藥三錢芡實三錢水煎服四劑而脾胃之氣開又四劑而咳嗽之病止又服四劑痠疼之疾解又四劑潮熱汗出之症痊再服十劑氣旺而各恙俱愈或疑損其肺者益其氣未聞損其氣者益其肺也不知益肺實益氣也

肺衰則氣衰肺旺則氣旺氣衰烏可不補肺哉若補肺何能舍脾胃而他補乎

此症亦可用壯

氣湯治之

人參三錢麥冬一兩甘草三分
百合一兩貝母三分水煎服

人有失血之後不知節勞慎色以致內熱煩渴目中生花見火耳內蛙聒蟬鳴口舌糜爛食不知味鼻中乾燥呼吸不利怠惰嗜臥又不安貼人以為癆瘵之漸也誰知是傷血而成之乎夫肝藏血失血者乃肝不藏血也然其由非大怒以動其血即大勞以損其血也雖動與損

辨證錄

卷之八 遺損

四

不同而補血養血必宜合一無如酒色財氣無非動血之媒耳目口鼻無非損血之竅養血者既無其方補血者又缺其藥此失血者往往難痊因循誤治不至於死亡不已也倘一見失血即用平肝止血之藥治之何至於瀕傷不救但失血成損苟徒補其血則血不可以驟生而耗血之臟腑損於內燥血之情慾損於外亦必死之道也蓋補血必須補氣而養血必宜益精使陰陽兩資於上下而中焦肝臟之血已損者能增未損者能固也方用緩中湯白芍一兩當歸一兩人參一兩甘草一

錢熟地一兩山茱萸五錢麥冬五錢三七根末三錢荆芥炒黑一錢炒黑姜炭五分水煎服一劑睡臥安二劑煩渴止十劑病減半二十劑又減半三十劑全愈此方氣血精同補之藥也然補氣藥少於補精血之藥者以失血之病畢竟陰虧吾重補其陰而少補其陽則陽能生陰陽不至於大亢陰能制陽陰不至於太微自然氣行於血之中以生血即血固於氣之內以藏血也寧尚有走失之患哉况方中原有荆芥之引經姜炭三七根之止血又用之無不咸宜者乎

辨證錄

卷之八 遺損

五

此症用八物湯亦佳

白芍山藥各五錢當歸熟地麥冬各一兩甘草五分丹皮沙參各三錢水煎服

人有入房縱慾不知葆潔以致形體瘦削面色痿黃兩足乏力膝細腿搖皮聚毛落不能任勞難起牀席盜汗淋漓此損精而成癆症也夫陰精足者其人壽未有精虛而能長年者也然而精足者舉世絕無其人所以腎有補而無瀉其或病或不病亦分之於能節與不能節耳世人貪片刻之歡至於死亡無論也泄精未至於死亡烏忍其病而不救要不能舍填精而別求異術也然而

填精實難泄精既多者不特傷腎必且傷脾脾傷胃亦傷矣胃為腎之關門胃傷則關門必閉雖有補精之藥安能直入於腎宮是補腎必須補胃胃與脾為表裏補胃而補脾在其中故填精之藥斷宜合三經同治耳方用開胃填精湯人參三錢白朮五錢熟地一兩麥冬三錢山茱萸三錢北五味一錢巴戟天一兩茯苓三錢肉豆蔻一枚水煎服連服十劑精神生飲食知味胃氣大開再用十劑可以起衰再用十劑前症頓愈此方雖非起死之方實係填精妙藥填精而精足精足人可不死然則此方正起死之方也人亦加意而用之乎

此症用扶弱

湯亦妙

熟地一兩石斛麥冬各五錢北五味子一錢巴戟天兔絲子各三錢山茱萸五錢水煎服

人有行役勞苦動作不休以至筋縮不伸臥牀呻吟不能舉步遍身疼痛手臂痠麻人以為痿症之漸也誰知是損筋之故乎夫筋屬肝肝旺則筋旺肝衰則筋衰損筋是損肝也補肝其可緩乎然肝之所以衰旺者乃腎之故也腎水生肝木腎水足而肝氣旺腎水虛而肝氣衰故筋衰者必補其肝而肝衰者必補其腎雖然補其腎

肝受益矣但肝又去生心吾恐補腎以生肝尚不服養筋也更須補其心氣之不足則肝不必去生心肝木得腎之滋枝葉條達筋有不潤者乎方用養筋湯白芍一兩熟地一兩麥冬一兩炒棗仁三錢巴戟天三錢水煎服二劑筋少舒四劑筋大舒十劑疼痛痠麻之症盡痊矣此方心肝腎三經同治之藥也凡三經之病均可用之非獨治傷筋不足之症在人通用之耳

此症用舒筋

湯亦效

白芍熟地各一兩甘菊丹皮牛膝秦艽各二錢白朮五錢枸杞二錢葳蕤五錢水煎服

人有久立腿痠更立而行房則兩足必然無力久則面黃體瘦口臭肢熱盜汗骨蒸人以為瘵病也誰知起於傷骨乎夫骨中籍髓以能堅骨無髓則骨空矣又何所恃而能立乎然而傷骨亦能耗髓况立而行房則骨與髓兩傷矣何能不病哉且傷骨中之髓者即傷腎中之精也髓潤者腎水先潤也腎潤不能化髓骨中所以空虛也故欲補骨中之髓必先補腎中之精方用充髓丹熟地二兩山茱萸一兩金釵石斛五錢地骨皮三錢沙參五錢牛膝三錢五味子一錢茯苓三錢水煎服此方真

補真陰使腎水充足精滿髓充而骨健也倘用冷藥以損胃或用熱藥以助陽則熬乾津液燥以益燥必成爲癆瘵而不可救矣

此症用龜鹿

飲亦效

熟地二兩山茱萸一兩金釵石斛牛膝虎骨龜膏杜仲各三錢山藥鹿角膠兔絲子白朮各五錢水煎服

人有過於歡娛大笑不止遂至唾乾津燥口舌生瘡渴欲思飲久則形容枯槁心頭出汗人以爲陰虛火動也誰知是陽旺火炎哉夫心屬陽火腎屬陰水陰水遇陽火而燥乾陽火必得陰水而灌溉是心火非腎水相交不能止其炎上之性惟是心中無液則心必燥矣何心頭偏能出汗耶不知喜主心而喜極反至傷心蓋喜極則心氣大開液不上行於脣口盡越於心頭之皮肉矣故腎中之津到於心卽化爲汗何能上濟於廉泉之穴以相潤於口舌之間乎明是心氣之傷截流而斷塞也然則治法不必補腎水之源仍補其心氣之乏而廉泉之穴自通矣方用通泉飲炒棗仁一兩麥冬一兩天門冬三錢北五味一錢人參三錢丹參三錢遠志一錢當歸五錢甘草一錢柏子仁三錢水煎服一劑口潤再劑心

辨證錄

卷之八

七

頭之汗止三劑諸症全愈此方補心氣之傷又是生津液之藥何必補腎以通源哉

此症用玄參蓮

棗飲亦佳

玄參三兩丹皮炒棗仁各一兩丹參五錢柏子仁蓮子心各三錢水煎服

人有用心太過思慮終宵以至精神恍惚語言倦怠忽忽若有所失腰脚沉重肢體困憊人以爲怯症之成也誰知是勞心以至傷神乎夫心藏神神之久安於心者因心血之旺也思慮無窮勞其心矣心勞則血必漸耗而神無以養恍惚惚有無定之形且神宜靜不宜動神動則心更動心動而血益虧血虧而神愈動雖有腎水之資而血不能滋雖有肝木之養而液不能入寡弱之君無以自立雖有良輔而四體不能強健此腰脚肢體所以沉重而困憊也治法必急救其心而救心必以安神爲主方用定神湯人參一兩茯神五錢白朮五錢丹參五錢遠志一錢生棗仁五錢丹砂末一錢柏子一錢巴戟天三錢黃芪一兩當歸五錢山藥三錢甘草一錢白芥子二錢水煎服一劑心安二劑神定十劑而身健矣此方心脾胃肺肝同治之藥也蓋心爲孤主非得心

辨證錄

卷之八

七

包戴獲則神恐有下堂之走今得脾胃肺肝之同治則扶助有力心血易生心神自旺矣

此症用龍齒安

神丹亦妙

人參麥冬各一兩黃連二錢柏子仁三錢龍齒火煨醋煨為末一錢炒棗仁三錢甘草五分北五味子一

錢水煎服

人有終日勞心經營思慮以致心火沸騰先則夜夢不安久則驚悸健忘形神憔悴血不華色人以爲心氣之弱也誰知是心血之虧乎夫心宜靜而不宜動靜則火不自炎腎水自然來濟若動則心腎兩不相交矣蓋腎水

辨證錄

卷之八

三

非火不生然而腎得溫火而水易生腎得烈火而水易竭心過勞而火動正烈火而非溫火也腎畏避之不暇敢來上升以受火之威逼乎水不上升心愈乾燥必且自焚虛損之症成矣夫五臟之損損至心而亡今損不由五臟心先自損宜爲不治之症然而心宮寧靜原取給於各臟腑也各臟未損正有生機補各臟之氣自然虛者不虛損者不損也治法專補其脾胃肺肝之氣方用衛生生氣湯人參三錢白朮五錢麥冬五錢北五味五分白芍一兩白芥子二錢炒棗仁三錢玄參一兩水

煎服二劑心血生心氣亦旺矣此方五臟兼補之藥也然而兼補五臟又是獨補心宮所以爲奇倘止補心而不補餘臟或單補一二臟而不五臟之兼補反有偏勝之憂非善補心傷虛損之法也

此症用益心

丹亦可治

人參當歸各五錢麥冬炒棗仁各一兩天花粉北五味遠志神麴丹砂各一兩菖蒲五分兔絲子三錢水

煎服

人有過於好色入房屢戰以博歡趣則鼓勇而鬪不易泄精漸則陽事不剛易於走泄於是骨軟筋麻飲食加少

辨證錄

卷之八

三

畏寒之症生人以爲氣虛之故誰知是腎中之水火兩損乎夫腎中相火藏於命門之中乃水中之火也腎中水火不可兩離頻於泄精者似乎損水而不損火殊不知火在水中水去而火亦去也凡人火動之極而水泄之水泄之極而火無水養則火更易動而易泄水火欲腎之不損得乎治法必須大補腎中之水不可補夫腎中之火蓋水雖生於火而水涸之時驟補夫火則水不能制而火且炎上亦足以害之也惟大補夫水使水足以制火而火亦自生方用六味湯大劑煎飲服至兩

月然後加入附子肉桂以培補命門之真火則水火有既濟之妙庶幾兩受補陰補陽之益也世人認八味丸為補陽之藥然仍於水中補火是補陽而兼補陰之藥也所以補火無亢炎之禍補水無寒冷之虞耳

此症用免絲地

黃湯亦神

熟地一兩山茱萸五錢免絲

子一兩巴戟天五錢水煎服

人有易於動怒雖細微飲食瑣碎居處家人父子之間無不以盛氣加之往往兩脇滿悶其氣不平遂致頭疼面熱胸膈脹痛人以為肝氣之勝誰知是肝血之損乎夫

難症錄

卷之八 虛損

三

肝性最急得血以養惟肝中無血則肝氣抑鬱而不舒遂易動怒矣蓋肝氣最不能藏而喜泄肝氣藏則肝血必然外越肝血藏則肝氣必然外疏肝氣泄則肝血必然內生肝血泄則肝氣必然內鬱是二者原相反而相成者也今易於動怒者是肝血欲藏而不能藏肝氣欲泄而不能泄矣治法補肝血以使之藏平肝氣以使之泄而已方用逍遙散加味治之白芍一兩白朮五錢陳皮五分甘草五分茯苓當歸各五錢柴胡一錢炒梔子三錢半夏一錢荆芥炒黑三錢水煎服連服十劑血藏

於肝中氣撼於肝外兩得其宜也蓋此方原善疏肝經之鬱氣鬱解而氣自和况清其火血有寧靜之氣引其經血有返還之思重用白芍當歸以生其新血輕用柴胡半夏以解其逆氣所以兩收其功也

此症用加減生熟

二地湯亦妙

生地熟地各一兩白芍麥冬各五錢山萸三錢

北五味一錢炒梔子二錢甘草一錢水煎服

人有不食則腹中若饑食則若飽悶吞酸滯瀉日以為常遂至面色痿黃吐痰不已人以為胃氣之傷也誰知是脾氣之損乎夫脾為胃土代行其傳化者也胃之氣全

難症錄

卷之八 虛損

三

籍脾氣之運動胃乃得化其精微不特脾受益而各臟腑之氣無不受其益也今脾氣受傷不能為胃以代行其傳化不特胃之氣無以生而脾不得胃氣之化則脾亦受損而不受益勢必至脾胃兩損何能分其津液以灌注夫各臟腑之氣耶治法必大健其胃兼補夫脾蓋胃與脾為表裏兩者宜合不宜離者也方用益脾湯人參一錢山藥五錢芡實三錢巴戟天三錢砂仁一粒半夏三分茯苓二錢扁豆一錢神麴一錢肉果一枚白朮三錢水煎服三月胃氣開再服三月脾氣壯但見有

益不知有損矣此方開胃之藥多於補脾以脾損由於胃虛故補胃而自益其脾也

此症用果腹
飲亦效

白朮一兩甘草一錢破故紙一錢砂
仁一粒茯苓三錢芡實五錢水煎服

人有終朝咳嗽吐痰微喘少若行動則短氣不足以息人以為心火之刑肺誰知是肺氣之自損乎夫肺主氣五臟七腑雖各自有氣皆仰籍肺中清肅之氣以分布之也今肺金自損自衛不足何能分給於各臟腑乎且腎水非肺金之氣不生肺既自顧不暇不來生腎腎無肺

辨證錄

卷之八 遊撰

毒

氣而水涸肺又分其氣以救子而不足自然子病而母之氣亦盡矣治法宜大補肺氣兼補腎水方用六味湯加麥冬五味子大劑與之久服腎旺而肺亦旺也夫六味湯補腎之藥即加五味麥冬之補肺而入於六味丸湯中仍是補腎者也補腎以治肺此勝於治肺者也腎旺而肺不必顧子况又有麥冬五味之滋肺受益正無盡也何損之不愈哉

此症用延息

湯亦佳
人參百合各五錢甘草一錢熟地一兩山茱萸
四錢牛膝二錢北五味五分茯苓三錢水煎服

人有貪用飲食甚至過難化之物而不知止逢過寒之味

而不知節遂至胸腹脹悶已而作痛生疼後至起噯吞

酸見美味而作噯不欲食者人皆以為脾氣之困誰知

是胃氣之損乎夫脾胃雖為表裏然一主入而一主出

能入而不能出者脾氣之衰能出而不能入者胃氣之

乏也雖脾胃交相傷損然治法不可槩治必分別其何

經之傷使損者多獲其益則胃易開而脾易健蓋脾胃

同屬一土而補土實有兩法脾虛屬腎寒胃虛屬心冷

也故補脾者必須補腎而補胃者必須補心不可混也

辨證錄

卷之八 遊撰

毒

今見美味而噯明是胃虛而非脾虛矣治法補其心火而胃氣自開方用六君子湯加味治之人參二錢白朮三錢炒棗仁茯苓各三錢陳皮五分甘草五分半夏一錢乾姜炒二錢附子一片水煎服連用十劑胃中溫和再服十劑前症頓去此方雖仍是統治脾胃之藥然加棗仁乾姜附子之類是補心者居其重補脾者居其輕矣名是脾胃兼治實偏於治胃者也

此症用生氣

湯亦妙
人參二錢白朮一錢巴戟天二錢陳皮三分甘草二
分茯苓二錢砂仁一粒藜芽一錢泡姜五分水煎服

癆瘵門

有縱慾傷精兩脛痠痛腰背拘急行立足弱夜臥遺泄
陰汗痿靡精神倦怠飲食減少而耳聾如聽風聲人
以為傳尸之癆瘵也誰知是自傷於腎為初起之癆瘵
乎夫人之貪色或立而行房或勞而縱送或一泄未已
而再泄或已勞未息而再勞或興未來而勉勉强合或
力已竭而帶乏圖歡或天分原薄服春藥而快志或材
具本小學展龜以娛心或行役辛苦猶然交會或思慮
困窮借以忘憂一宵之歡遂成終身之疾原不在婦女

癆瘵

卷之八 癆瘵

三

之衆與泄精之多也不知節便即成癆矣必致失血兼
之吐痰咳嗽夜熱盜汗畏寒畏熱似瘧非瘧胸中似饑
非饑似痛非痛飲饑之類既不能多復不能化失情失
緒骨蒸火動又思色以洩其火見色而動其意思交夢
遺而不可止於是發寒發熱骨髓之中遂生癆蟲因循
至死深可傷也治法補真精之乏開胃氣之衰加之殺
蟲之藥安在將死者之不可救乎方用救癆湯熟地五
錢白芍二錢山藥二錢沙參三錢地骨皮五錢麥冬二
錢北五味十粒人參五分白微五分白芥子一錢鼈甲

一錢茯苓一錢水煎服十劑蟲死二十劑胃氣大開連
服二月精神漸旺服一年而愈然必須斷色慾也此方
補陰居多少加人參以助胃氣則補陰而無膩滯之憂
即所用殺蟲之藥非狼虎毒味可比消弭於無形所以
有益無損也此方看其平常配合精良以治初起之癆
實有神功耳

此症用救敗

湯治之

地骨皮丹皮各五錢人參三分白芍
三錢山藥一兩甘草二分水煎服

一前病用前方妙矣然傷腎以成前病者世人頗多恐一

癆瘵

卷之八 癆瘵

三

方不足以概治也我受異人之傳尚有一方以治前
病甚效因并誌之異人謂傷腎以致生癆蟲者必須先
殺其蟲後用補腎之藥則腎經受益否則徒補其精也
蓋蟲不去則所生之精僅足以供蟲之用蟲得精之旺
蟲之勢愈大與其於補中殺蟲不若先殺其蟲後補其
陰之為勝惟是殺蟲之藥未有不更傷其陰者吾方則
不然雖死其蟲而於陰仍未有損且能開胃方名祛祟
丹鱧魚一條重六兩懷山藥三兩芡實一兩水煮極爛
少加青鹽同食食完不必吃飯一日必須食完連湯汁

飲之一次之後隔七日再照前食之三次則骨中之蟲無不死者然後另用起瘵湯人參一錢茯苓三錢麥冬三錢北五味子十粒生棗仁二錢熟地五錢山茱萸二錢巴戟天二錢白芍一錢白芥子五分沙參一錢水煎服一月精漸旺矣再服一月全愈此方平中有奇前方奇中實平皆異人所傳余不敢隱願與世共之以救初起瘵癆之病云

人有夜臥常驚或多恐怖心懸懸未安氣吸吸欲盡淫夢時作盜汗日多飲食無味口內生瘡胸中煩熱終朝無

辨證錄

卷之八 瘵癆

三六

力惟思睡眠層似殊塗顛如脂抹手足心熱液燥津乾人以爲腎經之瘵癆誰知腎傳於心而心初受病乎夫心宮寧靜邪不可侵邪侵於心則神必越出於外腎瘵生蟲無形之邪氣犯心尚不可救烏容有形之蟲深入哉不知蟲雖有形而蟲之氣亦無形腎氣既交於心而腎中之蟲氣烏得不上交哉蟲之氣與腎之氣自是不同腎氣交心而心受益蟲氣交心而心受損何必蟲入心而心始病乎然則治法不必治心仍治腎可也然而徒治腎而蟲在則蟲之氣仍在腎心仍受蟲之害也故

救心必須滋腎而滋腎必須殺蟲方用起瘵至神湯熟地一兩山茱萸五錢麥冬一兩茯苓五錢山藥五錢芩實三錢肉桂三分白朮三錢杜仲一錢鼈甲五錢百部二錢水煎服連服十劑瘵蟲死矣再服一月腎氣旺而心氣安再服一月全愈此方全是補腎安心之劑惟鼈甲百部乃殺蟲之藥鼈甲深攻引百部直入於至陰之內又是補陰而不傷於髓蟲以爲養身之味詎知是殺身之味耶蟲死而腎無異氣則心氣受益而又有麥冬茯苓白朮之相扶自然慶安莫於官中喜救寧於殿上

辨證錄

卷之八 瘵癆

三六

也

此症用安養湯亦效

人參百部各一錢山藥一兩甘草三分麥冬五錢北五味十粒白朮二錢茯苓神三錢水煎服

人有咳嗽吐痰氣逆作喘臥倒更甚鼻口乾燥不聞香臭時偶有聞即芬郁之味盡是朽腐之氣惡心欲吐肌膚枯燥時作疼痛肺管之內恍似蟲行乾皮細起狀如麩片人以爲肺經瘵癆也誰知是心瘵而傳之肺乎夫肺爲嬌藏最惡心氣之尅心以正火刑肺肺尚受病况以尸蟲病氣移而刑肺肺安得而不病乎然而肺氣之傷

者傷於心之火氣也心受蟲氣之傷心自顧不遑何能分其蟲氣以尅肺不知心嫌蟲氣之侵乃不自受即以蟲氣移入於肺而自避其毒也况肺為腎之母肺原能自交於腎而腎之蟲氣何獨不交於肺乎此心腎交侵癆瘵之勢倍重於腎之傳心矣治法消心中之蟲氣不若仍消腎中之蟲氣也然而心腎兩傷又消兩經之蟲藥必先經於胃蟲未必殺而胃氣先亡則肺金大失化源非治之善也法宜健胃則分布精液心腎有益胃又無損則蟲可得而誅矣方用健土殺蟲湯白朮五錢人

辨證錄

卷之八 癆瘵

三

參二錢白朮二錢萬年青一片熟地一兩麥冬一兩山茱萸三錢生棗仁三錢車前子二錢貝母一錢水煎服二劑氣喘少平又二劑咳嗽漸輕又二劑知香臭又二劑疼痛漸止服三月全愈此方補胃氣又不助陽消蟲氣又不損液腎足以制心而心不至於刑肺實治癆瘵肺之妙法也

此症用獲肺飲亦佳

白朮人參百合各二錢白朮天冬各一錢麥冬三錢款冬花五分天花粉桔梗各六分水煎服

人有兩目眈眈面無血色兩脇隱隱作痛熱則吞酸寒則

發嘔痰如鼻涕或清或黃臭氣難聞淚乾皆濕嘗欲合眼睡臥不安多驚善怖人以為肝經之癆瘵也誰知是肺癆次傳於肝乎夫肺金尅肝木者也使肝木本旺肺何能尅之無如腎癆之後久不生肝則肝木無滋潤之氣肝弱可知肺即乘其弱將蟲氣交於肝肝欲拒之而無力不得已順受其蟲氣矣肝為腎之子腎見肝子已受蟲氣惟恐肝氣不敵乃移其腎氣以生肝而蟲氣即因腎氣之移而同移入於肝矣蟲蝕肝血肝又何養乎治法仍須救腎以生肝兼之生肝以殺蟲也方用援瘵

辨證錄

卷之八 癆瘵

三

湯白芍一兩當歸一兩熟地一兩山茱萸五錢茯苓五錢龍甲五錢白朮二錢水煎服十劑少痊二十劑更痊服三月乃愈此方肝腎兩治之湯也止鼈甲白朮乃殺蟲之味不寒不熱既無偏勝之虞能補能攻又是兩全之道殺蟲於無形起死於將絕者也或謂痰色青黃方中消痰逐穢之品似不可少不知蟲入腎肝非直救二經何能奪命况消痰逐穢之品用之益傷脾胃肝既受蟲之侵正欲移傳於脾倘再傷之不引蟲入於中州乎故寧大補腎肝使二臟受益其痰自化斷不敢輕用消

痰逐穢之品以再傷脾胃耳

此症用療瘵

湯亦佳

白芍熟地各五錢當歸四錢龜甲三錢饅
魚骨燒黑灰三分北五味十粒水煎服

人有胸前飽悶食不消化吐痰不已時時溏瀉肚痛腹脹

空則雷鳴唇口焦乾毛髮乾聳面色黃黑微微短氣怯

難接續便如黑汁痰似綠涕人以爲脾經之癆瘵也誰

知是肝癆而傳於脾乎夫五臟之癆傳入於脾本不可

救不必更立救脾癆之法也雖然人有胃氣一綫未絕

無不可接續於須臾脾與胃爲表裏胃絕則脾絕萬無

辨證錄

卷之八 癆瘵

三三

生理脾絕而胃未絕尚有生機正不可因其肝蟲之入

脾卽諉於天命之絕也余自行醫以來曾救一婦人得

此症脈又細數衆醫皆以癆病傳脾爲必死之症其大

亦棄之不治余見飲食知味謂其夫曰尊正尚有一線

可救何忍看其死而不一援乎其夫曰衆醫皆棄而不

治非我不欲生之也余勸其單服二白散用山藥芡實

各等分約各四觔萬年青四大片各炒磨爲細末入白

糖一斤滾水調服遇饑卽用無論數次其婦聞之如法

喜吞頭一日卽服五大碗約五月每日如此脾氣漸服

漸愈竟得不死問其前後所服幾何約百斤也後見余

稱謝因備誌之以助行醫方法之窮二味既能健脾尤

能補腎腎脾兼治所以奏功况萬年青殺蟲於無形入

之於二味之中蟲亦不知其何以消滅於無踪也此方

不特單治脾癆但不可責其近功耳若加入人參二兩

以助胃氣則胃氣更健脾氣尤易援耳

此症用援性

湯亦妙

白木山藥各一兩茯苓三錢人參三錢芡實五錢
白微一錢饅魚骨末五分肉桂三分水煎調服

人有陰虛火動每夜發熱如火至五更身涼時而有汗時

辨證錄

卷之八 癆瘵

三三

而無汗覺骨髓中內炎飲食漸少吐痰如白沫人以爲

骨蒸之癆瘵也誰知是腎水不能制火乎夫腎中水火

必須兩平火之有餘水之不足也水不足火始有餘骨

蒸之病正坐於火旺水虧耳治法不必瀉腎中之火但

補其腎中之水則水足濟火腎既不熱骨髓之內外何

能熱乎方用涼髓丹地骨皮一兩丹皮一兩麥冬五錢

金釵石斛三錢牛膝二錢茯苓二錢水煎服連服四劑

而內熱輕再服四劑內熱盡除服一月而前症盡愈此

方用地骨丹皮不特補腎中之水且取其能涼骨中之

髓與消骨外之血也夫骨中髓熱必耗其骨外之血骨外血熱必燻其骨中之髓故兼用二味則髓與血兩治無太熱之虞腎中寧獨熱哉况石斛牛膝無非補腎陰之味陰旺則陽平水勝則火退骨蒸不蒸而癆瘵何能成哉

此症用純陰

湯亦佳

玄參麥冬丹皮地骨皮

熟地各三錢水煎服

人有氣虛氣息短促不足以息與癆役形體氣急促者迥殊懶於語言飲食無味身體困倦人以為氣癆也誰知

辨證錄

卷之八 癆瘵

三五

是陽虛下陷由於內傷其元氣乎夫元氣藏於關元之中上通肺而下通腎元氣不傷則腎中真陽自升於肺而肺氣始旺行其清肅之令分布於五臟七腑之間若元氣一傷不特真陽不能上升且下陷於至陰之中以生熱矣此熱乃虛熱非實熱也實熱可瀉虛熱宜補故必用甘溫之藥以退其虛熱然而單用甘溫以退其熱不用升提之味以挈其下陷之陽則陽沉於陰而氣不能舉雖補氣亦無益也即升提其氣矣不用補氣之味則升提力弱終難輕舉其氣也方用補中益氣湯人參

五錢白朮五錢炙黃芪三錢當歸三錢陳皮五分甘草五分升麻二分柴胡三分加貝母一錢水煎服一劑氣升二劑氣旺十劑生力胃氣大開前病頓失補中益氣湯乃李東垣一生學問全注於此方妙在用柴胡升麻於參朮芪歸之內一從左旋而升心肝腎之氣一從右旋而升肺脾胃命門之氣非僅升舉上中二焦之氣也

此症用提陷

湯亦效

黃芪麥冬各五錢白朮人參各二錢甘草三分桔梗一錢神麩五分水煎服

人有血虛者面無色澤肌肉焦枯大腸乾燥心多怔忡健

辨證錄

卷之八 癆瘵

三五

忘不寐飲食少思羸瘠不堪夜熱無汗人以為血癆也誰知是肝燥而生火乎夫肝中火盛往往自焚終由於腎水之不能生木非失血吐於外即耗血燥於內耳肝既自燥火生木中正可火生木外似乎心火得肝木之火而旺矣無如木中有水則肝可生心木中有火則肝能焚心故火在心中可取給於肝而火在肝中則自顧之不暇耳然則治法必先治腎而治腎必先補水也方用玄參一兩丹皮五錢沙參五錢白芍一兩當歸五錢甘菊花三錢茯苓三錢麥冬五錢水煎服十劑夜熱除

二十劑燥症解三十劑各病均愈此方名為滋肝飲實
補腎以滋肝也肝得腎水之滋則肝木之火不發何致
自焚而成癆哉

此症用加減
四物湯

自芍當歸生地各五錢熟
地一兩丹皮三錢水煎服

人有過於貪饗燔熬烹炙之物馨香甘肥之品盡情恣食
以至食不能化胸中胞悶久則結成痞滿似塊非塊似
瘕非瘕見食則憎每飯不飽面色黃瘦肢體日削人以
為因食成癆誰知是脾衰而不能化乎夫食未至而思

辨證錄

卷之人癆瘵

三

餐者胃氣之強也食已下而難受者脾氣之弱也過於
貪饗正胃氣之強耳人恃胃氣不論精粗生冷盡皆食
之未免損傷胃氣胃與脾為表裏未有胃傷而脾不傷
者然人有腎氣旺者雖胃傷而脾不能傷以腎中之火
能生脾氣故脾氣不足往往補其腎火而愈今食不能
消至於見食則憎是脾傷而胃亦傷單補腎中之火恐
僅能生脾土而不能生胃土耳蓋脾土非腎火不生而
胃火非心包之火不能長也治法必須補心包以生胃
土補命門以生脾土也方用助火生土湯人參三錢白

朮五錢黃芪五錢茯苓三錢甘草一錢肉桂一錢巴戟

天五錢菖蒲五分山查十粒神麴五分遠志八分水煎

服二劑脾氣健又二劑胃氣開十劑脾胃之氣大旺矣

又十劑全愈此方上補心包下補命門中補脾胃火生

而土健土健而食消不易之理也世人不知補火之道

更不知補火而有心包命門之異所以口健脾而脾不

健日開胃而胃不開必成癆而始止也豈不可歎息哉

此症用溫化
湯亦佳

人參茯苓巴戟天龍甲各三錢白朮黃芪各一兩肉
桂神麴各一錢枳殼五分白豆蔻一粒山查十粒水

辨證錄

卷之人癆瘵

三

煎服

人有遭遇坎坷或功名蹭蹬或柴米憂愁以致鬱結胸懷
兩脇脹悶飲食日減顏色阻喪漸肢瘦形凋畏寒畏
熱人以爲因愁而成瘵也誰知是肝氣不宣木尅脾胃
乎夫肝木最喜飛揚一遇寒風遇憂愁皆鬱而不伸也
然而肝氣不肯自安於不伸於不伸之中而求其伸於
是上不得展舒以生心下不得不刑尅而傷脾矣脾上
既傷胃氣亦弱胃氣既弱而飲食自少何能分潤於臟
腑哉人見其悠悠忽忽不飲不食疑是蟲之作祟乃用

消蟲逐穢之藥肝氣不開脾胃反損愈加困頓變成癆疾而死者比比也治法亦仍開其鬱結而已矣方用順適湯白芍一兩白朮三錢人參五分白芥子一錢當歸二錢鬱金一錢陳皮三分甘草五分茯苓三錢香附一錢川芎八分水煎服二劑脾胃開四劑寒熱除十劑鬱結之症盡散矣二十劑全愈此方專入肝經又能入脾入胃舒木氣之滯宣土氣之沉所以能奏功之神也若欲殺蟲祛祟此症本無蟲與祟也甚矣鬱癆之易治無如人之不知治鬱何哉

辨證錄

卷之八 癆瘵

三五

此症用適志湯亦效

白芍茯苓各五錢甘草枳殼半夏各五分砂仁一粒神麩香附人參各二錢蘇子一錢水煎服

世有尼僧寡婦失嫁之女丈夫久出不歸之妻妾相思鬱結欲男子而不可得內火暗動燥乾陰水肝血既燥必致血枯經斷朝熱夜熱盜汗鬼交日復一日年復一年飲食懈怠肢體困倦肌膚甲錯面目暗黑人以爲瘀血之癆也誰知是乾血之癆乎凡婦女慾火一動多不可解慾火者雷火也雷火一動而天地變陰陽乖水隨火而沸騰火得水而炎上有不燒乾者乎婦女之慾火乃

起於肝肝火者木中之火也雷火喜劈木者以火從木中出也夫肝火宜藏以肝藏血也肝火動則血不能藏矣火動則血泄况火不動則已動則不能遽止故火屢動而血屢泄動之不已則泄之不已血安得不乾乎治法似宜泄木中之火矣然而火止可暫瀉以止炎不可頻瀉以損木方用消愁湯白芍一兩當歸一兩葳蕤一兩玄參柴胡一錢五分丹皮三錢地骨五錢白芥子一錢熟地一兩水煎服連服數劑肝氣不燥再服數劑肝火可平更服十劑血枯者不枯諸症可漸愈也此方補

辨證錄

卷之八 癆瘵

三五

肝木而兼補腎水水旺而木得其養水平而火息其機不必治癆而癆自退補肝補腎之中而仍有開鬱達鬱之藥也彼徒補肝血徒瀉肝火者尚隔一層耳

此症用散思湯亦佳

生地一兩白芍丹皮各五錢白朮一兩地骨三錢柴胡一錢當歸五錢陳皮五分炒梔子二錢荆芥一錢水煎服

人有濕熱積於脾胃又加生冷之物存而不化久則變成寸白之蟲或結成蠅蟲之類以致腹痛肚疼面黃肌瘦盜汗淋漓氣怯身弱此是蟲積而不散也夫蟲生雖因

於濕熱之化而濕熱之積實因於脾胃之虛土堅之處
蟲不能生土鬆則水入水入則濕留濕積則熱熱則蟲
生矣然則治法不必用殺蟲之藥但健脾胃之土則蟲
宜皆去然蟲居土之中既已成穴則子孫繁庶可知使
單健其脾胃之土土氣薰蒸蟲未必不死吾恐不能盡
死也故健其脾胃仍須佐以殺蟲之味則拔本塞源亦
斬草除根之道也方用滅蟲湯白朮一兩檳榔二錢史
君子二十箇人參三錢練樹根三錢陳皮五分神麩三
錢炙甘草二錢黃連三分百部一錢水煎服一劑蟲下
二劑蟲大下三劑蟲盡滅矣不必四劑也此方殺脾胃
中濕熱之蟲非殺脾胃中血肉之蟲也血肉之蟲每有
靈機濕熱之蟲原無知識小治尙可建功况以治癆蟲
之法以治之乎母怪元氣既回而殺蟲又捷也

此症用饅羹
飲亦效
饅魚一筋煮湯四碗另用山藥白朮各二兩茯苓神
麩各三錢百部二錢肉桂一錢湯二碗煎一碗服渣
再用湯二碗煎一
碗服二劑全愈

人有好耽麩羹致成酒積脾氣損傷五更作瀉久則淹淹
忍忽飲食少思時多嘔吐盜汗淋漓人以為酒癆之病

辨證錄 卷之八 癆瘵

誰知是脾腎兩虧乎夫酒從胃入似宜傷胃不知酒雖
入於胃而受之者脾也脾所惡者濕而酒性正濕是脾
之所惡也乃移而之腎腎雖水臟藏精而不藏濕酒氣
薰蒸腎受酒氣之毒仍傳於脾而脾又不能受遂傳大
腸而出大腸又惡酒氣之濕不肯久留而逆發矣飲酒
既多下瀉必甚下多亡陰人安得不病乎人之貪酒而
不啻肺腑之親日飲如故有加無已不至腐腸爛胃而
不止然則治法必須先戒酒而後以化酒之藥以解酒
毒仍以健脾益腎之品以救其火土之衰則酒癆之病
庶幾其可瘳乎方用消酒散白朮一兩山茱萸一兩葛
花二錢薏仁二兩肉桂三分茯苓三錢水煎服十劑瀉
輕又十劑瀉止又十劑而酒積除又十劑全愈此方脾
腎兩補分解酒濕而消其毒也惟是酒性大熱今不特
不解其熱并且用肉桂以助其熱者以濕之不行由於
命門之火衰也真火衰而邪火自盛真火盛而邪火自
衰則邪水自流矣

此症用解藥湯
亦可治之
白朮二兩茯苓五錢肉果二枚
作木枝五錢水煎服十劑愈

辨證錄 卷之八 癆瘵

小兒多餐水果恣食肥甘以致成疳身體黃瘦毛豎膚焦形如猿猴狀如刺蝟食土食炭人以為兒癆也誰知是脾胃虛寒之病乎小兒純陽本不宜虛寒也然而先天無虧而後天每不能無損蓋先天屬腎後天屬脾胃也小兒餐水果食肥甘正坐於傷脾胃耳脾胃一傷五臟之氣不能行六腑之氣不能運小兒性格不常何知樽節水果仍餐肥甘仍食欲不成癆何可得乎治法補其脾胃之氣調其飲食之傷原可隨手奏效寧至兒癆之病哉無如世醫以膽草蘆薈胡黃連之類以瀉其火以

辨證錄 卷之八 癆瘵 聖

半夏枳殼檳榔厚朴之類以降其痰以麥芽山查大黃之類以逐其食以梔子棟根烏梅以殺其蟲以至兒不勝任反消損其真元之氣無異下之石也方用六君子湯加減救之人參二錢白朮三錢茯苓三錢甘草三分附子一分黃芪三錢神麩五分水煎服一劑而兒之神氣轉再劑而兒之神氣生連服十劑無不全愈正不必多劑也此方原是補氣之劑補氣者補脾胃之氣也小兒之病原傷於脾胃也先天實未常傷脾胃之氣一轉是後天無損先天何不接續哉此癆病之所以易愈耳

此症用神人散亦甚效
人參二錢白朮三錢甘草五分肉桂三分白豆蔻一枚神麩五分水煎服

人有感染尸蟲遂至釀成癆病其症與所感之病人無異世為傳尸癆者男子自腎傳心由心而肺由肺而肝由肝而脾女子自心傳肺由肺而肝由肝而脾而腎五臟復傳六腑而死矣此古人之言也而孰知不然傳尸癆症感病人之蟲視蟲所入之臟即於是臟見病無不傳於脾而死不必五臟之皆傳也彼五臟之皆傳者乃自傷於腎由腎而傳心心而肺肺而肝肝而矣於脾

辨證錄 卷之八 癆瘵 聖

耳以自傳而為傳尸之病則悞之甚矣所以治傳尸之病不必同於治自傳之症也雖然傳尸之蟲雖不擇臟而入治法必須補胃腎為主而佐之殺蟲之味蓋胃氣不敗而津液能生腎氣不涸而火氣能伏且胃為腎之關門胃土能消而腎水始足傳尸之病未有腎水不竭者也此腎與胃之二經必宜兼補耳方用移尸滅怪湯人參一兩山茱萸一兩當歸三錢乳香末一錢龜蟲十四箇水蛭火煨死十四條二蠶沙末三錢各為末蜜為丸每日服百丸此藥服完而傳尸之蟲滅跡矣古人傳

祛逐癆蟲之藥多至損傷胃腎所以未能取效今用人參以開胃用山茱萸以滋腎且山茱萸又是殺蟲之味同虫蟲水蛭以蟲攻蟲則易於取勝尤恐有形之物不能深入於尸蟲之內加當歸以動之乳香以開之引其直入而殺之也復慮蟲蝕補劑以散藥味更加二蠶沙者乃蟲之糞也蟲遇蟲之糞則棄而不食而人參歸黃得行其功力助諸藥以奏效也

此症用逐尸飲亦神

人參三分白朮二錢山茱萸五錢饅魚骨燒灰一錢水煎服

辨證錄

卷之八

醫

人有傳染鬼疰者闔家上下大小無不生尸蟲之病是重於傳尸也蓋傳尸止病於一人一人死而一人又病非若鬼疰之重也此等之病雖是冤鬼相纏然初起之時未常非尸蟲引之也夫尸蟲作祟已能殺人况又有鬼邪相輔變動不一其為害也更甚其症使人夢遺鬼交泄精淋瀝沉沉默默不知所苦而無處不惡經年累月漸就困頓以至於死一家傳染多至滅門絕戶實可傷也葛雅川曾傳懶肝散以救人然止可救傳染之初起不可救傳染之已深余逢異人傳方名為三清丸蒼朮

半斤炒人參三兩山茱萸一斤白微三兩廣蟲三兩阿膠三兩白芍十兩鼈甲十兩饅魚骨三兩白朮一斤柏子仁不去油四兩地骨皮十兩沙參五兩肉桂一兩地栗粉一斤神麴三兩貝母二兩各為細末蜜為丸每日早晚各服三錢服一月而鬼氣散服二月而尸蟲死矣一家盡服之斷不致有絕門滅戶之禍也此方補陽氣以制陰則鬼不敢近滅尸氣以殺蟲則祟不敢藏有攻之益無攻之損起白骨而予以生全救闔家而令其壽考功實偉焉

辨證錄

卷之八

聖

此症用散疰飲亦佳

鼈甲炒為末五錢狐心末一錢人參二錢甘草三分神麴二錢白朮五錢山茱萸五錢白芍五錢水煎服服一月即愈不再傳

人有花前月下兩相盟誓或阻於勢而不能合或盡於緣而不能逢遂思結於心中魂馳於夢寐漸而茶飯懶吞語言無緒悠悠忽忽終日思眠面色憔悴精神阻喪因而畏寒畏熱骨中似疼非疼腹內如餒非餒人以為癆病之已成也誰知是相思之惡症乎夫相思之症原不必治遇情人而鬱開矣然而情人何易急得醫道豈竟

無他治哉大約相思之病先傷於心後傷於肝久則傷於脾胃欲治相思之症宜統心肝脾胃四經治之治此四經多有得生者未可信古人之言以相思之症為不可治之病也夫傷心之病本不可治如何相思之傷心猶為可救蓋思其人而不得必動肝火火動生心其實一綫之延正籍此肝木之火以生心也用平肝解鬱之品佐之補心安神之味益之開胃健脾之藥則肝氣一舒心火自發不必去生脾胃之土而相思病可逐漸而衰也倘更加人事之挽回何病之不可愈哉方用遂情

辨證錄

卷之八 癆瘵

四

湯香附三分白芍一兩荆芥五分麥冬三錢茯神三錢白朮三錢生棗仁三錢人參五分神麴三分甘草一分柴胡五分白芥子五分水煎服十劑肝氣開又十劑心氣開又十劑脾胃之氣大開矣此方補多於散貴在調和不貴在爭戰也倘作癆瘵治之反無生機矣

此症用鬱蓮散亦甚佳

白芍一兩柴胡八分香附五分鬱金一錢生棗仁一錢茯神二錢巴戟二錢蓮子心三錢麥冬五錢丹參三錢水煎服

夢遺門

人有用心過度心動不寧以致夢遺者其症口渴舌乾面紅顫赤眼閉即遺一夜有遺數次者疲倦困頓人以為腎虛之過也誰知是心虛之故乎夫心喜寧靜不喜過勞過勞則心動心動則火起而上炎火上炎則水火相隔心之氣不能下交於腎腎之關門大開矣蓋腎之氣必得心氣相通而始能藏精而不洩今心不能攝腎則精焉得而不走乎雖然心未常不惡腎之不藏也無如心欲攝腎而力不能也然則治法何必治腎補心中之

辨證錄

卷之八 夢遺

四

虛而夢遺自止矣方用靜心湯人參三錢白朮五錢茯神五錢炒棗仁山藥各一兩芡實一兩甘草五分當歸三錢北五味十粒麥冬五錢水煎服二劑遺止十劑永不復遺也此方大補心氣之虛全不去瀉心之火蓋火之動由於心之過勞是火乃虛火非心之實火也實火可瀉虛火宜補世人以實火瀉之此夢遺之所以不能止也

此症用斷遺神丹亦效

人參一兩山藥五錢芡實五錢麥冬五錢北五味一錢水煎服

人有朝朝縱慾漁色不厭遂至夢遺不能止其症腰足痿弱骨內痠疼夜熱自汗終宵不乾人以爲腎火之作祟也誰知是腎水涸竭乎夫腎中水火兩得其平久戰尙不肯泄夢中之遺實水火之不得平耳火衰而水旺者亦能遺火盛而水衰者亦能遺也二者相較火衰而遺者輕火盛而遺者重輕者略補火而卽痊重者非大補水而不能愈蓋火易接續而水難滋益也治法不必瀉火補腎水以制火可耳方用旺水湯熟地一兩沙參五錢北五味一錢山藥一兩芡實一兩茯苓五錢地骨皮

辨證錄

卷之八 夢遺

吳

三錢水煎服連服四劑不遺矣此方純是補精絕不入澀精之藥以夢遺愈澀而愈遺也補其精則水足以制火之動火不動精能自止何必澀之今不特不澀且用通利之藥者以夢遺之人精竅大開由於尿竅之閉也火閉其尿竅則水走其精竅矣通其尿竅正所以閉其精竅也倘用澀藥精竅未必閉而尿竅反閉矣何日是止精之時哉

此症用熟地添

精丹亦佳

熟地二兩麥冬山藥芡實各一兩北五味一錢水煎服

人有怒氣傷肝忽然夢遺久而不止凡增煩惱泄精更多其症兩脇多悶火易上升於頭目飲食倦怠發躁發脹

人以爲肝氣之動也誰知是肝血之燥乎夫肝中有火得血則藏何無血則不能藏也蓋肝中之火木中之火也木缺水則木乾肝少血則肝燥肝燥之極肝中之火不能自養乃越出於外往來心腎之間遊魂無定而作夢其夢每多淫夢者因肝氣之虛也治法補肝血而少瀉其火則火不旺而魂自歸何夢而再至於遺也方用潤木安魂湯當歸一兩白芍一兩甘菊花三錢北五味

辨證錄

卷之八 夢遺

吳

五分茯苓五錢白朮五錢炒梔子一錢金櫻子三錢甘草五分水煎服二劑肝火平又二劑肝血旺又二劑夢遺止矣再用十劑永不再發此方寓瀉於補之中寓止於通之內反能歸魂而入於肝澀精而收於腎也倘不知補而徒瀉之不知通而單止之則肝無血養魂安能歸哉魂旣不歸搖搖靡定夢難斷絕遺亦寧有止日耶

此症用芍藥潤

燥丹亦可

白芍山藥各一兩炒梔子三錢芡實一兩水煎服

人有心氣素虛力難久戰然又思慕美色心中怦怦遂至

夢遺其症陽痿不振易舉易泄日日夢遺後且不必夢亦遺見美婦而心動聞淫語而色移聽女音而神馳往往走失不止面黃體瘦自汗夜熱人以為心腎之兩虛也誰知是心包之心大動乎夫心包為心君之相臣代君行令者也心氣旺則心包奉君令而不敢上奪其權心氣衰則心包奉君令而反行其政矣治法必須補心經之衰瀉心包之火則夢遺可斷而自遺亦可止也方用強心湯人參一兩茯苓神五錢當歸五錢麥冬三錢巴戟天五錢山藥五錢芡實五錢玄參五錢北五味五分

辨證錄

卷之八 夢遺

五

蓮子心三分水煎服連服四劑夢遺少矣再服四劑自遺少矣再服一月夢遺自遺均愈服三月不再發此方補心者居其七瀉心包者居其三蓋心包之旺原因於心氣之衰補其心則心旺而心包自衰故少加玄參蓮子以瀉心包之火而君相兩得其平矣但必須多服始能奏功積弱之勢成非一日其由來者久也漸移默奪之功烏可責旦夕哉

此症用蓮心清

火湯亦效

玄參生地各五錢丹參三錢山藥芡實各一兩蓮子心二錢麥冬一兩北五味五分天冬一錢水煎服

人有素常縱慾又加勞心思慮終宵仍然交合以致夢遺不止其症口渴引水多飲又復不爽臥不安枕易驚易懼舌上生瘡脚心冰冷腰痠若空脚顫難立骨蒸潮熱神昏魂越人以為心腎之虛也誰知是心腎二經之火一齊俱動乎夫心中之火正火也正火必得腎水以相制腎中之火虛火也虛火必得心火以相伏故心火寧靜而腎火不能動也腎火之動由於心火之衰耳心腎兩動則二火相合豈能久存於中火性炎上自然上勝而不肯止矣一火動水猶不升兩火齊動安望其水之

辨證錄

卷之八 夢遺

五

下降乎火升之極即水降之極也心腎之氣不閉則五關大開安得止之然則何以救之耶仍補其心腎氣足而關自閉也方用兩益止遺湯人參一兩熟地二兩山藥一兩芡實一兩白朮一兩生棗仁一兩黃連五分肉桂五分水煎服二劑遺即止服二月諸症全愈此方乃心腎交合之聖劑心腎交則二火自平正不必單止其遺也况止遺必用溫藥內火煽動愈澀而火愈起矣

此症亦可用

兩寧湯

熟地二兩麥冬二兩黃連一錢肉桂三分山藥一兩芡實一兩水煎服

人有專攻書史誦讀不輟至四鼓不寢遂成夢遺之症久則玉莖著被精隨外泄不著則否飲食減少倦怠困頓一人以為心火之盛也誰知是腎火隨心火之奔越乎夫一心火易動而難靜人一日之內無刻不動心也動心一日全籍夜分之安寢則心之血歸於肝中而腎水來滋雖腎水本來養肝而不養心然心氣既歸於肝中腎即養肝肝有不養心者乎自然以養肝者養心矣心既得養則心猶不動也惟過勞其心則心血耗損血不能歸肝而火熾腎見心火之沸騰腎不來交矣况腎未必平日之積畜則水源有虧水虧而火更旺火以引火心火乘熱而入腎客於下焦以鼓其精房於是精不閉藏而外泄矣此正氣虛絕欲脫之象也方用絕夢丹人參三錢麥冬五錢茯神三錢白朮三錢熟地一兩芡實五錢山藥五錢北五味一錢玄參一兩兔絲子三錢丹參三錢當歸三錢蓮子心三錢炒棗仁三錢陳皮三分沙參三錢水煎服十劑輕二十劑更輕三十劑疾如失此方安心之聖方即補腎之妙劑蓋合心腎而兩救之也人疑火盛之極宜用止火之味矣不知火起勞心火乃虛

辨證錄

卷之八

三

火而非實火虛火可補不可瀉故大補心腎虛火自安倘執君火為實火妄用大寒過涼之藥則生機頓失矣此症用養備湯亦妙
 熟地一兩金櫻子芡實山藥玄參麥冬各五錢牡蠣末三錢北五味五分水煎服
 人有至夜脊心自覺如火之熱因而夢遺人以為河車火燒也誰知是腎水之涸乎夫河車之路即脊骨之椎也腎之路走夾脊者乃腎水之路亦腎火之路也水火相濟而河車之路安水火相勝而河車之路塞路塞者無水以灌注之也無水相通則火氣上炎而成熱脊心安得清涼哉火炎於上自然水流於下矣治法救在上之火炎必先沛在下之水涸水足火息黃河始可逆流也方用挽流湯熟地二兩山藥一兩白朮一兩澤瀉三錢玄參一兩北五味二錢山茱萸五錢水煎服十劑熱解二十劑遺絕此方純是補水之味過於酸收者取其收斂以止遺也夫夢遺之症愈澀愈遺茲何用酸收而不顧乎不知河車之路最喜酸澀非酸澀則水不逆流終日夢遺水成順流之勢水順流之至則火逆衝之至矣酸收之味用之於漫漶之中則逆流而上可以救中谷

辨證錄

卷之八

三

之焚火降而水更升何至下遺之靡止乎故春熱除而夢遺亦斷也

此症用充春

湯亦佳

山茱萸熟地山藥芡實各一兩北五味三錢金櫻子白朮各三錢水煎服

辨證錄

卷之八 夢遺

五

陰陽脫門

一男子久戰不已忽然樂極情濃大泄不止精盡繼之以血氣喘而手足身體皆冷人皆以男脫精為陽脫女脫精為陰脫其實男女俱有陰陽之脫不必分男女以治之也大約脫症俱宜治陽蓋精脫之後精已盡亡是無陰也而陽氣亦在將脫未脫之際若不急救其陽氣則陽氣一散歸陰甚速况陰性遲而陽性速徒補其陰則迂緩之極何濟於事乎倘執補陰之說陰已盡泄內絕真陰之根又從何處補起是補陽可以續陰而補陰難以引陽也然陰盡繼之以血似乎血亦宜止而止血之藥要不外澀藥以閉之但內已無陰何從閉塞不若用補氣之劑以助其陽氣陽旺而陰自能生陰陽交濟氣血交通自然精生血閉不澀之澀也方用續陰救絕湯人參三兩白朮三兩附子一錢巴戟天一兩水煎服一劑血止二劑陰生連服四劑可以不死此方補陽氣之聖藥也用人參開絕續於無何有之鄉用白朮以通利其腰臍之氣用附子以追其散失之元陽用巴戟天補其心腎之陰仍是補陽之藥則陽回而陰亦回也倘不

辨證錄

卷之八 陰陽

五

用人參止用附木巴戟亦可奪命於須臾然無參為君
主之味則附子之熱無以駕馭恐有陽旺陰消之弊倘
能以補陰之藥濟其後亦不至有偏勝耳

此症用參附五味湯亦大效
人參三兩附子二錢北五味子三錢水煎服

有婦人愛風月者盡情浪戰以致虛火沸騰陰精下脫死
去更甦頭目昏暈止存遊氣人以為陰脫也誰知是陽
脫乎婦人主靜不主動最難泄精以婦人滿身純陰腎
中獨存陽氣也男子成仙者採婦人之陽氣以為丹母
然而採者多而能得之者絕少凡婦人泄精必自動之

辨證錄

卷之八 陰陽

五

極而漏泄之時其樂有不可言者正泄其陽氣也陽氣
之泄將一身骨髓之真陽盡從胞胎之管而噴出然亦
止泄其氣而非泄其精也惟火動之極則肝氣大開血
不藏矣血不藏則精亦不能固而腎中之真陰亦隨之
俱洩當此之時婦人乃動極而不能自止情願身死以
狗故愈動而愈泄而及至精盡一笑而亡惟藉男子緊
抱其身以嘴哺氣陽不離陰之戶然後死去還魂是陽
脫而陰尚未絕耳可不急救其陰乎然而救陰不能回
陽必須仍救陽也方用回陽救陰丹人參三兩黃芪三

兩當歸一兩茯神五錢生棗仁三錢北五味子一錢水
煎服一劑陽回二劑陰生然後方中再加熟地一兩山
茱萸五錢一劑煎飲連服一月可以還元如故此方先
用參以挽回於一時後用熟地山藥以善後於平日蓋
人參實能救脫以回陽而不能救涸以填陰先補陽而
後補陰則已脫之精可生未脫之氣易長庶不至陽旺
而陰消也

此症用參朮湯亦可救
人參三兩白朮三兩水煎服

辨證錄

卷之八 陰陽

五

精泄也人以為中風之症誰知是陰陽兩脫乎夫膀胱
氣化殆能小便此氣即腎中之氣也人過泄精則氣不
能旺矣氣衰則精易泄精泄而氣益微小便之時脫去
者未有不因過於交感泄精所致交感時泄精以脫者
因於樂極情濃交感後當小便而脫者必戰敗陽痿之
人故脫於男女身上者多有回生脫於坑廁之地者每
難救死蓋彼有陰陽之根此無陰陽之倚也然脫有不
同倘脫去昏暈外勢縮入者尚可救援急以手拽出龜
頭不使縮入後用生人湯救之方用生棗仁五錢人參

二兩附子三錢白朮四兩菖蒲五分水煎服一劑再甦
 二劑更健改用調陰回陽湯熟地二兩山茱萸一兩白
 朮一兩茯神三錢人參一兩肉桂一錢白芥子二錢水
 煎服調理二月而愈前方回陽于無何有之鄉後方生
 陰於正可續之際自然陽回而陰不至於驟絕陰生而
 陽不至於太旺耳或謂龜頭縮人明是寒極宜死之兆
 不知猶有生机者以內有陽氣未絕耳使陽已絕矣則
 龜頭反不深入龜頭之深入者陰欲入陽之兆也故以
 陽藥急救之而更甦矣

辨證錄

卷之八 陰陽

五

此症用參朮附子湯亦可效
 人參白朮各二兩附子三錢水煎服

人有大便之時一時昏暈而脫者兩目上視手足冰冷牙
 關不收不能語言人亦以為中風不語也誰知是陰脫
 之症乎夫大便之能開闔者腎主之也腎水足大便無
 燥結之虞腎水衰大便有滑利之患是大便之燥潤全
 責之腎也然大腸之病何能遽絕不知大腸過燥則火
 燥其水而陰絕過滑則水制其火而陰亦絕也且大腸
 陰絕仍絕於腎耳故腎脫而大腸亦脫惟救其腎絕而
 已方用六味地黃湯熟地二兩山茱萸一兩茯苓八錢

丹皮六錢山藥一兩澤瀉六錢水煎服一劑昏暈甦再
 劑言語出連服一月全愈此方非救脫之藥也然腎水
 枯而腎始絕大滋其腎水枯槁之時得滂沱之澤則溝
 洫之間無非生意是補水正所以救腎之絕豈大腸得
 水而反不能救其脫乎

此症用兩援湯亦可治
 熟地二兩當歸人參白朮各一兩肉桂二錢水煎服

人有並不與婦人交感一聞婦女之聲音而淫精流出雖
 非陰陽脫症之重然亦脫症之漸也夫陰陽不相離者
 也久戰不泄者腎火與腎水俱旺也惟腎水衰而火易

辨證錄

卷之八 陰陽

五

動腎火衰而水難固久戰不泄者非惟腎中水火之旺
 亦心中水火之旺也心火旺腎火不敢奪其權心水旺
 腎水不敢移其柄惟心中水少而腎中之水始有下竭
 之憂心中火少而腎中之火始有下移之患聞婦女之
 聲淫精即出此心中水火虛極而動也而腎中水火隨
 心君之動而外泄矣若流而不止此陰陽將脫之候尤
 為危症苟不急治亦與鬼為隣治法宜大補其心腎方
 用交濟湯人參五錢熟地一兩山茱萸五錢麥冬一兩
 栝子仁三錢龍骨醋焯二錢黃連五分肉桂五分當歸

五錢黃芪五錢水煎服十劑雖聞婦女之聲亦止而不流矣更服二十劑全愈此方心腎兩補少加滋精之味使玉門自閉不至經絡之大開也蓋心腎不交而玉門之關既易開心腎易交而玉門之關及難閉聞聲流精者其精原先離於腎宮故隨聞隨出亦其中之關門大開故耳所以宜用澁於補之中也

此症用葆精丸亦佳
人參五兩白朮黃芪各一斤山藥熟地芡寔各一斤
北五味三兩遠志四兩炒棗仁山萸肉巴戟天兔絲子麥冬各八兩龍骨三兩醋碎金櫻子四兩蜜為丸
每日早晚白滾水吞服各六錢一料全愈

辨證錄

卷之八 陰陽

淋證門

人有小便流白濁者如米泔之汁如屋漏之水或痛如刀割或澁似鍼刺溺澀短少大便後急此膀胱之火壅塞也此症大約得之入房不使暢泄而忍精者居多夫入精泄之時必由腰腎而上趨夾脊透泥丸而下喉嚨百節骨髓無不同趨下走於陰器而出倘少遏抑之則精即止遏於中途而不得散欲反原舊之百骸而不可得于是不得已而走膀胱之路欲隨溺而泄也夫膀胱化水而不化精且與腎為表裡尤不肯將腎中之精外泄故閉塞其口而精不得出膀胱因精在門外不敢化水而水不行水不行而火乃熾于是熬乾水液精色變而為濁遂得下潤于膀胱而膀胱仍不受也乃自流於陰器而出矣治法瀉膀胱之火佐之以利水之味則火隨水流精亦隨火而散矣方用散精湯劉寄奴一兩車前子五錢黃柏五分白朮一兩水煎服一劑即愈此方用白朮以利腰膺之氣用車前以利水用黃柏以泄膀胱之火用寄奴以分清濁而此味性速無留滯之虞取其迅逐行水止血不至少停片刻也

辨證錄

卷之八 淋證

李

此症用桂車湯亦效
車前子一兩肉桂三分知母一錢王不留行二錢水煎服一劑即通

人有小便流赤濁者似血非血似溺非溺溺管疼痛人以爲血淋也誰知是氣虛血壅乎夫氣旺則血行氣衰則血閉然氣虛之人多不能忍精而戰不能忍而必欲忍則精塞水竅氣衰不能推送以出由是積而內敗化爲膿血矣精化爲血而血無所歸仍流於膀胱膀胱不能化血隨其自流精化之血相火猶存火性作祟所以疼痛也雖然精即化血精何能多血亦宜少何終日流而

辨證錄

卷之八 淋症

三

不能止不知血與血同類也精既化血則血以引血何有底止乎治法急宜止血爲主然不可徒止血也止血必須補氣蓋氣能化血也方用斷血湯黃芪一兩當歸五錢三七根末三錢茯苓三錢丹皮三錢水煎服一劑血淋止二劑全愈此方用黃芪以補氣用當歸以補血氣既旺無難推送夫敗濁矣况所化精血久已外出所流者乃舊血而非敗血也今用補氣補血之藥以生新血新血一生舊血自止况有三七根之善於止血乎方中用丹皮以清血中之火茯苓以分其水中之血自然

清濁不至混雜壅阻得以疏通也世人不知治血淋之法以濕熱治之往往至於困頓耳

此症用玄車丹亦甚效
玄參車前子各一兩水煎服二劑即愈

人有小便之中溺沙石者其色不同而堅實如石投之熱湯之中頃刻不能即化其欲溺之時必疼痛欲死用盡氣力始得溺出而後快其症大約得之入房而又行路涉水或加沐浴而成之者人以爲砂石淋也誰知是腎火煎熬之故哉夫腎火之盛由於腎水之衰也入房泄精水虧之後其火未能遽息復加行役以勞其筋骨則

辨證錄

卷之八 淋症

三

火且大動而不可止沐浴涉水似乎外水可以制火詎識腎火乃虛火也外水乘腎氣之虛直入以遏其火火乃不敢外散反閉守於腎宮腎水乃至陰之水猶天地之海水也海水得火而成鹽之塊腎水得火而成石之淋又何足怪乎惟是外水澹水也腎水鹹水也腎火喜鹹而畏澹一遇澹水之侵腎火閉結而不得伸乃行其氣於膀胱煎乾鹹水而成石也治法通其腎中之氣利其膀胱則腎火解而砂石自化矣方用化石湯熟地二兩茯苓一兩薏仁五錢山茱萸一兩澤瀉五錢麥冬五

錢玄參一兩水煎服一劑二劑輕十劑全愈此方不去
治淋反去補腎以茯苓薏仁淡滲之藥解其鹹味以麥
冬玄參微寒之品散其火氣以地黃山萸甘酸之珍滋
其陰水又取其甘能化石而酸能消石也又慮其性滯
而不行留而不走益之澤瀉之鹹鹹以入鹹且善走攻
堅領羣藥趨於腎中又能出於腎外迅速於膀胱之裏
而破其塊也倘不補腎而惟治膀胱則氣不能出烏能
化水哉

此症用化沙湯亦效

熟地二兩山茱萸一兩甘草二錢澤瀉車前子各三

辨證錄

卷之八 淋症

李

煎服

人有感濕氣而成淋者其症下身重溺管不痛所流者清
水而非白濁人以爲氣虛成淋誰知是濕重成淋乎五
淋之中惟此淋最輕然而最難愈以濕不止在膀胱之
經也大濕從下受宜感於足今足不腫而變爲淋是濕
一不入於皮膚而入於經絡且由經絡而入於臟腑矣然
治臟腑之濕而經絡之濕宜乎盡散何淋症最難愈耶
蓋濕之能入於臟腑者乘虛而入也瀉濕必損臟腑之
氣氣損則不能行水濕何能瀉耶濕既難瀉淋何能即

愈哉故治濕必須利氣而利氣始能去淋也方用禹治
湯白朮一兩茯苓一兩薏仁一兩車前子三錢水煎服
此方利水而不耗氣分水而不生火勝於五苓散實多
蓋五苓散有猪苓澤瀉未免過於疏決肉桂大熱未免
過于薰蒸不若此方不熱不寒能補能利之爲妙也大
約服此湯至十劑凡有濕症無不盡消不止淋病之速
愈也

此症亦可用氣化湯治之

白朮一兩茯苓猪苓車前子各三錢黃芪一兩升麻

五分水

煎服

辨證錄

卷之八 淋症

李

人有春夏之間或遭風雨之侵膚或遇暑氣之逼体上熱
下濕交蒸鬱悶遂至成淋絕無驚懼忍精之過人以爲
濕熱之故也誰知是腎虛而感濕熱乎夫腎虛者腎中
之火虛也腎寒則火不足以衛身外邪得以直入于腎
幸腎中之水足以外護不至于深入乃客于腎之外郭
腎與膀胱爲表裏腎之外即膀胱也濕熱外邪遂入于
膀胱之中代腎火之氣以行其氣化之令然膀胱得腎
氣而能化得邪氣何能化哉故熱不化水濕且助火不
爲溺而爲淋矣治法急宜逐膀胱之濕熱以清其化源

然而膀胱之濕熱去而腎氣仍弱何能通其氣于膀胱
淋症即愈吾恐有變病之生矣故於利濕利熱之中更
須益腎中之氣也方用通腎祛邪散白木一兩茯苓五
錢藟麥一錢薏仁五錢扁畜一錢肉桂三分車前子三
錢水煎服此方分解濕熱又不損腎中之氣故腎氣反
通轉能分解夫濕熱也淋症去而腎受益何至變生不
測哉

此症用散淋湯亦效

白木二兩杜仲一兩茯苓一兩薏仁二錢薏仁五錢
黃柏一錢肉桂一分水煎服

辨證錄

卷之八 淋症

六六

人有交感之時忽聞雷轟忽值人至不得泄精遂至變為
白濁溺管疼痛宛如鍼刺人以為腎精之內敗也誰知
是胆氣之阻塞乎夫胆喜疏泄者也今胆氣受驚則收
攝過多而十二經之氣皆不敢外泄精亦阻住而不得
流逐畜積于膀胱陰器之間而胆氣不伸自顧未遑何
能為十二經決斷耶所以精變為淋壅塞而艱于出也
治法抒其胆氣少加導水之藥則胆氣既伸得決其一
往莫禦之氣自然水通而精亦化也方用助胆導水湯
竹茹三錢枳壳一錢車前子三錢白芍五錢蒼朮三錢

滑石一錢木通二錢薏仁三錢猪苓二錢水煎服二劑
少愈四劑全愈方中雖導水居多然導水之中仍是抒
胆之味故胆氣開而淋症愈耳

此症用順胆湯亦效

柴胡黃芩各二錢白芍車前子各五錢茯苓神澤瀉炒
梔子蒼朮各三錢
水煎服四劑愈

人有下痢之時因而小便閉塞溺管作痛變為淋者人以
為濕熱太盛也誰知是清濁之不分乎夫夏感暑熱多
飲涼水或過餐茶瓜皆能成痢是痢疾固濕熱所成惟
是濕熱留于腸胃宜從大便而出今從小便而出者是

辨證錄

卷之八 淋症

六七

濕熱過盛其大勢雖趨于大腸而奔迫甚急大腸不及
流乃走膀胱而膀胱得濕熱之氣則肺金清肅之令不
行欲化溺而不得遂變為白濁而滲出者也故清濁不
分者專言膀胱非大小腸也然水入膀胱清濁之分全
責其滲化之奇今因濕熱不能化非膀胱之病乎夫膀
胱氣化能出氣者火也濕熱非火乎何得火而反變為
白濁耶不知膀胱寒而溺頻出膀胱熱而溺不能出白
淋是熱而仍出者以其有濕以相雜耳且膀胱得火而
化溺者乃真火而非邪火也真火化溺而易出邪火爍

溺而難出耳濕熱之火正邪火而非真火也治法清膀胱之邪火兼逐大腸之濕熱則痢止而淋亦止矣方用五苓散加減治之茯苓三錢猪苓二錢澤瀉五錢白朮五分炒梔子三錢白芍五錢枳榔二錢水煎服連服二劑少輕再服二劑又輕更服二劑全愈此方利水之藥多於治痢何以痢先愈而淋反後愈也蓋痢本濕熱所成利其水則濕熱易解水不走大腸而盡走於膀胱則膀胱反難滲水之速故少遲奏效耳

辨證錄


卷之八 淋症

三

此症用分濁飲亦效

蘿蔔子一兩白茯苓澤瀉車前各五錢甘草黃柏各

一錢炒梔子
三錢水煎服



辨證錄卷之九

山陰陳士鏞敬之甫號遠公又號朱華子著述

會稽陶式玉尚甫號存齋又號 叅訂

大便閉結門

人大便閉結者其症口乾舌燥咽喉腫痛頭目昏暈面紅煩躁人以爲火盛閉結也誰知是腎水之涸乎夫腎水爲肺金之子大腸與肺爲表裏肺能生子豈大腸獨不能生水乎不知金各不同金得清氣則能生水金得濁氣不特不能生水反欲得水以相養故大腸得氣之濁無水則不能潤也雖然大腸之開闔雖腎水潤之亦腎火主之也而腎火必得腎水以相濟無腎火而大腸洞開矣無腎水以濟腎火則大腸又固結而不得出故腎虛而大腸不通不可徒瀉大腸也瀉大腸愈損其真陰矣此等之症老人最多正以老人陰衰乾燥火有餘而水不足耳治法但補其腎中之水則水足以濟火大腸自潤矣方用濡腸飲熟地二兩當歸一兩肉苁蓉一兩水洗澹水浸一日換水五次水煎空腹服一連數劑無不通者此方用熟地補腎用當歸生血潤腸用苁蓉

辨證錄

卷之九 大便

一

性動以通便補陰而非亡陰於老人尤宜而少年腎虛之輩亦何獨不利哉

此症用濡腸湯亦效
熟地當歸各一兩升麻五分牛膝三錢水煎服

人有大便閉結小腹作痛胸中噯氣畏寒畏冷喜飲熱湯人以爲火衰閉結也誰知是腎火之微乎夫大腸屬金金宜畏火之刑何無火而金反閉耶不知頑金非火不煨所以大腸必得火始能開闔大腸者傳道之官也有火則轉輸無碍無火則幽陰之氣閉塞其輸轉之途如大溪巨壑霜雪堆積結成冰凍堅厚而不可開倘得太

辨症錄

卷之九 大便

二

陽照臨則立時消化非大腸有火則通無火則閉之明驗乎然而大腸本經不可有火也火在大腸則大腸有太熱之虞火在腎中則大腸無大寒之懼倘腎中無火則大腸何以傳化水穀哉治法必須補腎中之火不必通大腸之結也方用溫腸開閉湯巴戟天一兩白朮一兩熟地一兩山茱萸五錢附子二錢水煎服此方用巴戟熟地山茱萸以補腎至陰之中仍有至陽之氣又用白朮以利腰膈因附子直通其腎迅達于膀胱則火氣薰蒸陽回黍谷雪消冰泮何至固結閉塞哉

此症用煖腸湯亦效
白朮肉苁蓉各一兩附子一錢水煎服

人有大便閉結煩躁不寧口渴舌裂兩目赤突汗出不止人以爲火盛閉結也誰知是胃火之沸騰乎夫陽明胃火一發必有燥乾腎水之禍大便不通正胃火燥乾腎水也似宜急救息其火但火性炎上若以細微之水澆之則火勢愈烈而不可止必得滂沱大雨傾盆倒壅淋漓澆濯則燎原之火庶几盡息方用竹葉石膏湯石膏一兩知母三錢麥冬一兩甘草一錢茯苓二錢人參五錢竹葉一百片粘米一撮水煎服一劑火瀉二劑便通

辨症錄

卷之九 大便

三

改用清肅湯玄參一兩麥冬五錢白芥子三錢竹葉三十片甘菊花二錢生地三錢陳皮五分丹皮二錢水煎服十劑大便永無閉結之苦前用白虎湯以火勢太盛不得已暫救腎中之水也但石膏辛散而性又猛烈頻用多用反致損耗真陰真陰一耗則前火雖消後火又將復起况火之有餘水之不足也與其瀉火以損陰何若補水以制陽之爲得所以改用清肅湯補水以息陽火之餘燄耳

此症用潤胃丹亦效
石膏五錢知母一錢玄參一兩生地五錢牛膝三錢

甘草五分
水煎服

人有大便閉結胸中飽悶兩脇疼痛嘔酸作吐不思飲食
人以爲火之作祟也亦知爲肝火之故乎夫肝屬木木
易生火火旺似宜生脾胃之土土又生金何至大腸無
津成閉結之症不知肝中之火乃木中之火半是雷火
也雷火最能爍水試看連陰久雨必得雷電交作始散
陰霾正爍水之明徵也故肝火不動則已動則引心包
之火而沸騰引陽明之火而震動火多而水有不涸者
乎水涸而大腸安得不閉結哉故欲開大腸之閉必先

辨證錄

卷之九 大便

四

瀉肝木之火則肝氣自平不來尅土胃脾之津液自能
轉輸于大腸而無阻滯之苦矣方用散火湯白芍一兩
當歸一兩炒梔子三錢柴胡三分大黃一錢地榆二錢
水煎服一劑大便通二劑肝火盡散不再閉結也此方
專入肝以瀉火又能舒肝之鬱蓋肝不鬱則肝火必不
旺肝火一散各經之火無不盡散豈獨留大腸一經之
火哉况方中原有地榆又專解大腸之火者也

此症用丹黃湯亦神
炒梔子丹皮各三錢白芍五錢甘草黃芩各一錢水
煎服

人有大便閉結口乾唇裂食不能消腹痛難忍按之益痛

小便短澀人以爲大便之火閉也誰知是脾火之作祟
哉夫脾乃濕土得火則燥宜爲脾之所喜何反成閉結
之症不知土太柔則崩土太剛則燥土崩則成廢土土
燥則成焦土也然而土焦非陽明之儀下逼必命門之
火上炎二火合攻脾之津液涸矣水穀之入僅足供脾
之用何能分潤于大腸乎大腸無津液之潤則腸必縮
小不能容物安得不閉結哉治法須急救脾土之焦又
必先瀉陽明命門之火始脾土得養自易生陰陰生而

辨證錄

卷之九 大便

五

津液自潤何必通大腸之多事哉方用救土通腸湯玄
參二兩當歸一兩生地一兩知母一錢厚朴一錢升麻
五分大麻子三十粒水煎服二劑大便必通減去大麻
子與知母再用四劑脾火盡散大便不再結矣此方玄
參生地補脾土之陰又是瀉命門脾胃之火當歸取以
潤腸知母厚朴取其下行以解熱升麻提脾土之氣則
陽升而陰自降大麻子最潤大腸而引火下行不使陰
氣上升正助升麻以提陽氣陽既升而陰又降則津液
無乾澀之虞何患大腸之不通哉

此症用助陰湯亦效
玄參當歸生地各五錢知母一錢牛膝三錢水煎服

人有大便閉結舌下無津胸前出汗手足冰冷煩悶發燥
大背紅赤人以爲大便之火閉也然亦知是心火之焚
燒乎夫心與小腸爲表裏未聞心與大腸有妨碍也然
大腸雖不與心爲表裏實與肺爲表裏心火之盛刑肺
卽刑大腸矣蓋大腸屬金心火太盛則心不能受自分
其火與大腸而大腸又最畏心火火盛燥金可立而待
也雖肺能生水肺與大腸有表裏之關切豈無津液之
降以救大腸之枯渴無如肺先受心火之刑自救不遑

辨症錄

卷之九 大便

六

親子如腎尚不能分潤安有餘波以及兄弟來救援大
腸乎此大腸之所以不通也治法宜急瀉火但徒瀉其
火無汪洋甘澤之降恐不足以濟大旱之渴也必須以
大雨淋之則旱魃之氣頓除而河渠盡通矣方用掃氛
湯黃連三錢玄參三兩沙參一兩當歸一兩麥冬一兩
丹皮一兩瓜萹二錢水煎服一劑心火降大便卽通不
必二劑此方用黃連以直解其心中之熱然徒用黃連
不益之玄參則黃連雖寒而性燥火雖解而大腸之燥
如故也得玄參之潤以助勦黃連則浮遊之火不特盡

除且潤以去燥不啻如夏熱之時忽得大雨既去火炎
又沾漫渥也至於沙參生陰當歸生血麥冬涼肺丹皮
涼腎無非斷四路之氛使其不來助心中之燄加入瓜
萹使火存于心中者盡隨濡潤之藥下降而消滅之也
火滅水生則大腸之炎氛頓掃欲不通得乎所以一劑
而奏功也

此症用散襟湯亦效
黃連丹皮各三錢當歸麥冬各一兩天花粉二錢水

煎服

辨症錄

卷之九 大便

七

人有大便閉塞不通咳嗽不寧口吐白沫咽喉乾燥兩脚
冰冷人以爲三焦之火旺也誰知是肺經之火旺乎夫
肺屬金大腸相表裏最爲關切者也肺火之旺何竟傳
入于大腸不知肺乃嬌藏僅可微火薰蒸不可猛火煨
煉故一遇火生卽移其熱于大腸也且肺主皮毛肺氣
少虛風寒襲之則肺中正氣與邪氣相戰寒變熱而風
變邪肺因生火自燥其津肺與大腸既相唇齒肺之津
涸大腸之液亦竭矣治法但宜輕治肺火而不可重施
以輕清下降之味少抑其火庶胃中之火不來助炎心
中之火不來添旺則肺火自散陰液自生大腸不必通

而自通也方用抑火湯山豆根二錢黃芩三錢麥冬一
兩天門冬五錢當歸一兩升麻五分水煎服二劑肺火
清又服二劑大腸之閉開再服二劑全愈此方抑肺金
之火又不傷肺金之氣肺金得養津液通而大腸潤矣

此症用苓麻地冬湯亦效

麥冬二兩黃芩天門冬各三錢升麻甘草各一錢生

地五錢

水煎服

人有大腸閉結不通飲食無碍并無火症之見亦無後重
之機有至一月不便者人以爲腎中之無津也誰知是
氣虛而不能推送乎夫大腸無津固不能潤而氣弱亦

雜症錄

卷之七 大便

八

不能行陽氣一衰則陽不能通陰而陰與陽相隔水穀
入于腸各消各化不相統會故留中而不下也治法不
可滋陰以降之亟當助陽以升之也方用升陽降濁湯
人參五錢黃芪五錢白朮五錢當歸五錢柴胡三分荆
芥五分麥冬五錢肉桂一錢附子一分水煎服一劑大
通此方純是補陽分之藥止麥冬當歸少益其陰則陽
氣勝陰始有偏旺之勢又得附子肉桂直入于至陰之
中引柴胡荆芥升題其陽氣也陽氣一升陰氣立降安
能阻塞之哉

此症用潤輪湯亦效
黃芪五錢當歸一兩川芎五錢升麻五分紅花五分
麥冬肉桂各
五錢水煎服

人有大便閉結不通手按之痛甚欲死心中煩躁坐卧不
寧似乎有火然小便又復清長人以爲有鞭屎留于腸
中也誰知有畜血不散乎夫畜血之症傷寒多有之今
其人並不感風寒之邪何亦有畜血之病不知人之氣
血無刻不流通于經絡之中一有拂抑則氣即鬱塞不
通血即停住不散于是遂遏于皮膚而爲癰留于腸胃
而成痛搏結成塊阻住傳化之機隔斷糟粕之路大腸

雜症錄

卷之九 大便

九

因而不通矣治法宜通大腸佐之逐穢之味然而草木
之藥可通無形之結不能通有形之結也血乃有形之
物必得有形相制之物始能入其中而散其結方用抵
當湯治之水蛭三錢剪碎如米粒大炒黑蜜虫二錢各
爲末桃仁十四粒研碎大黃五錢水煎調服一劑而大
便通頓失痛楚矣蓋大黃泄下其勢最猛得水蛭蜜虫
桃仁破血之味相佐其破堅逐穢之效更神此等閉結
不速通利必有發狂之變但何以辨其爲畜血之病乎
全在看其小便之利與不利耳蓋畜血之病小便必利

以血不能入于膀胱之中故膀胱之氣能行能化無害
其下出之水道耳故見小便利而大便結者用抵當湯
萬無差謬耳

此症用大黃散瘀湯亦神
水蛭炒黑三錢大黃丹皮各三錢當歸一兩紅花二
錢桃仁十四個生
地五錢水煎服

癩症錄

卷之九 大便

小便不通門

人有小便不通點滴不能出急悶欲死心煩意躁口渴索
飲飲而愈急人以爲小腸之熱極也誰知是心火之亢
極乎夫心與小腸爲表裏小腸熱極而癰閉乃熱在心
而癰閉也 蓋小腸之能開闔者全責于心腎之氣相
通也今心火亢熱則清氣不交于小腸惟烈火之相迫
小腸有陽無陰何能傳化乎小腸既不能傳化膀胱何
肯代小腸以傳化耶况心腎之氣既不入于小腸亦何
能入于膀胱以傳化夫水哉治法瀉心中之火兼利其

癩症錄

卷之九 小便

膀胱則心腎氣通小便亦通矣方用涼心利水湯麥冬
一兩茯神五錢蓮子心一錢車前子三錢水煎服二劑
水出如注四劑全愈此方補心之藥即涼心之藥也在
心既無太亢之虞在小腸又寧有大乾之患况又有滑
利澹滲之味以通其水則心氣自交於腎腎氣自交于
膀胱氣化易于出水豈尚有不通之苦哉

人有小腸不通眼睛突出面紅耳熱口渴引飲煩躁不寧
人以爲上焦之火盛也誰知是膀胱之火旺乎夫膀胱
與腎爲表裏膀胱必腎氣相通而後能化水是膀胱之

火即腎中命門之火也膀胱無火不能化水何火盛反閉結乎不知膀胱得正火則水易分消得邪火而水難通利蓋膀胱乃太陽之經也太陽最易入邪一入邪而寒變為熱熱結于膀胱乃邪將散之時也邪既將散宜火隨溺而泄矣何反成閉結之症蓋因邪將出境惟恐截殺去路故作威示強屯住于膀胱耳治法不必泄腎火但利膀胱則邪去如掃方用導水散王不留行五錢澤瀉三錢白朮三錢水煎服一劑通達如故不必二劑此方逐水至神因王不留行性速善走故用之以祛除耳閉原在膀胱利膀胱而閉自開何用張皇輕投迅利之劑耶

人有小便閉結點滴不通小腹作脹然而不痛上焦無煩躁之形胸中無悶亂之狀口不渴舌不乾人以爲膀胱之水閉也誰知是命門之火寒乎夫膀胱者決瀆之官腎中氣化而能出此氣即命門之火也命門火旺而膀胱之水通命門火衰而膀胱之水閉矣或曰小水之勃者由于命門之火衰也火衰正宜小便大利何反至于閉塞耶不知命門之火必得腎水以相養腎水衰而火

淋症錄 卷之九 小便

乃旺火旺者水無力以制之也無水之火火雖旺而實衰無火之水水欲通而反塞命門火衰而小水勤衰之極者勤之極勤之極者閉之極也人見其閉錯疑是膀胱之火及用寒劑愈損其命門之火膀胱之氣益微何能化水改投利水之藥轉利轉虛矣治法必須助命門之火然徒助命門之火恐有陽旺陰消之慮必須于水中補火則火生于水之中水即通於火之內耳方用八味地黃湯熟地一兩山茱萸五錢丹皮三錢山藥五錢澤瀉三錢茯苓五錢肉桂二錢附子一錢水煎服一服即如注八味湯乃水中補火之聖藥也水中補火而火無大炎之懼火中通水而水無竭澤之虞即久閉而至于胞轉以此方投之無不奏功于眉睫况區區閉結哉

此症用行水湯亦甚效
熟地二兩巴戟天茯苓神芩實各一兩肉桂二錢水煎服

人有小便不通目睛突出腹脹如鼓膝以上堅硬皮膚欲裂飲食不下獨口不渴服甘淡滲泄之藥皆無功效人以為陽盛之極也誰知是陰虧之至乎夫陰陽不可離也 淡甘滲泄之藥皆陽藥也病是無陰而用陽藥宜

淋症錄 卷之九 小便

乎陰得陽而生矣然而無陰者無陰中之至陰也陰中之至陰必得陽中之至陽而後化小便之不通膀胱之病也膀胱為津液之府必氣化乃能出是氣也即陽中至陽之氣也原藏于至陰之中至陽無至陰之氣則孤陽無陰何以化水哉治法補其至陰而陽自化也方用純陰化陽湯熟地一兩玄參三兩肉桂二分車前子三錢水煎服一劑小便如湧泉再劑而閉如失此方又勝于滋腎丸以滋腎丸用黃柏知母苦寒之味以化水不若此方用微寒之藥以化水也論者謂病勢危急不宜用補以通腎且熟地濕滯不增其閉瀆之苦哉詎知腎有補無瀉用知母黃柏反瀉其腎不虛其虛乎何若用熟地純陰之品得玄參濡潤之助既能生陰又能降火攻補兼施至陽得之如魚得水化其亢炎而變為清涼安得不崩決而出哉或謂既用熟地玄參以生陰則至陽可化何必又用肉桂車前子多事然而藥是純陰必得至陽之品以引入于至陽而又有導水之味同羣共濟所以既能入于陽中又能出於陽外也矧肉桂止用其氣以入陽而不用其味以助陽實有妙用耳

辨症錄

卷之九 小便

十四

此症用加生化腎湯亦神
 熟地四兩生地二兩肉桂三分水煎服
 人有小便不出中滿作脹口中甚渴投以利水之藥不應人以為膀胱之火旺也誰知是肺氣之乾燥乎夫膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣上焦之氣不化由于肺氣之熱也肺熱則金燥而不能生水投以利水之藥益耗其肺氣故愈行水而愈不得水也治法當益其肺氣助其秋令水自生焉方用生脉散治之人參一兩麥冬二兩北五味子一錢黃芩一錢水煎服二劑而水通矣生脉散補肺氣以生金即補肺氣以生水是矣
 何加入黃芩以清肺不慮伐金以傷肺乎不知天令至秋而白露降是天得寒以生水也人身肺金之熱不用清寒之品何以益肺以生水乎此黃芩之必宜加入于生脉散中以助肺金清肅之令也
 此症用麥冬茯苓湯
 麥冬三兩茯苓五錢水煎服
 人有飲食失節傷其胃氣遂至小便不通人以為肺氣之虛也誰知是胃氣下陷於下焦不能升舉之故乎夫膀胱必得氣化而始出氣升者即氣化之驗也氣之升降全視乎氣之盛衰氣盛則清氣升而濁氣降氣衰則清

辨症錄

卷之九 小便

十五

一第... 冊... 頁...

氣不升而濁氣不降矣若胃者多氣之府也羣氣皆統之胃氣之盛衰尤爲衆氣之盛衰也所以胃氣一虛各經衆氣多不能舉故脾胃虛而九竅皆爲之不通豈獨前陰之閉水哉治法必須提其至陽之氣而提氣必從胃始也方用補中益氣湯人參二錢黃芪三錢白朮三錢當歸二錢甘草一錢陳皮三分柴胡一錢升麻五分水煎服一劑而小便通矣再劑全愈此方用參芪甘溫之味補其胃氣以升麻柴胡從化原之下而升提之則清升濁降而肺氣不虛自能行其清肅之令何至有閉

辨症錄

卷之九 小便

二六

結之患哉

內傷門

人有好食肥甘烹炙之物遂至積于胸胃久而不化少遇風邪便覺氣塞不通人以爲傷風之外感也誰知是內傷于食因而外感乎凡人胃氣若強則土能生金肺氣必旺外邪不能從皮毛而深入也惟胃氣之虛則肺金亦虛邪始能乘虛而入然胃不能自強必假飲食之助故胃氣開則食易消胃氣閉則食難化食易消則胃強食難化則胃弱世人多食本欲助胃也誰知多食反以損胃乎胃損則胃弱胃弱則肺何能強以外衛夫皮毛乎是邪因內傷而入非邪無引而直入也治法烏可純治外感哉方用護內湯白朮三錢茯苓三錢麥芽一錢山查五粒甘草一錢柴胡一錢半夏一錢枳殼五分神曲八分肉桂二分水煎服一劑氣塞通二劑全愈此方乃消食神劑又能祛逐外邪且不傷胃氣真治內傷感邪初起之良法也所以二劑奏功耳

辨症錄

卷之九 內傷

七

此症用參芪甘桔湯亦效

山查十粒麥芽人參桔梗各一錢枳殼甘草各五分
茯苓三錢
水煎服

人有饑飽勞役傷損津液以致口渴舌乾又感風邪頭痛

發熱人以爲外感也誰知是內傷于陰乎夫人身非血不養血足而津液自潤傷血而津液自少血少則皮膚無養毛竅空虛風尤易入然風雖入于皮膚而不能驟進于經絡以陰虛而陽未衰也陽與邪戰而發熱故頭痛耳治法不必補陽補其陰血之虛少佐之祛風之味則陰陽和合邪安能久留哉方用養陰辟邪丹當歸五錢白芍五錢柴胡一錢甘草一錢蔓荊子五分川芎三錢天花粉一錢茯苓三錢水煎服一劑邪解二劑全愈此方補血以養陰則津液自生原因津液之虧而邪入

辨症錄

卷之九 內傷

六

津液足而邪有不出者乎况川芎蔓荊子能祛頭上之邪柴胡炙甘草更善解紛之妙天花粉與茯苓善消痰利濕引邪盡從膀胱而去治陰虛內傷感邪莫良于此倘用攻于補陽之中則陽旺陰消邪轉熾矣烏能速愈哉

此症養津湯亦可用

柴胡半夏甘草蔓荊子各一錢丹皮麥冬各三錢

參四錢神曲

五分水煎服

人有饑飽勞役又感冰雪之氣或犯霜露之感遂至腹痛畏寒身熱不解人以爲外感之症也誰知是陽氣之內

傷乎凡人陽氣壯盛者雖受冰雪霜露而亦不懼惟饑飽損其脾胃勞役困其體膚則臟腑經絡自先虛冷此邪之所以易入也雖有外邪俱作正虛治之况腹痛畏寒尤是虛冷之驗外身雖熱內寒又何疑乎方用加味六君子湯治之人參一錢白朮五錢茯苓三錢陳皮五分甘草一錢半夏五分肉桂一錢柴胡一錢水煎服一劑痛止而蕩其內寒也倘疑身熱而外邪之盛純用祛風利濕之劑則損傷陽氣不啻下石勢必變症蜂起成不可治之症矣

辨症錄

卷之九 內傷

七

此症用雙桂湯亦效
白朮五錢茯苓三錢肉桂甘草各一錢桂枝羌活各五分水煎服

人有懷抱素鬱悶悶昏昏忽然感冒風寒身熱咳嗽吐痰不已雖似外感誰知是肝氣不舒因召外感邪夫肝氣最喜條達一遇憂鬱之事則澹滯而不可解正喜外風之吹動則內鬱可舒無如內鬱之甚則木中生火風火相合而熱乃熾也故感冒風寒所以作熱風火作威肝不畏金之剋反去侮肺肺氣不甘兩相戰鬪肺又懼火刑呼救于腎子而咳嗽生矣雖有津液又爲肝中風火

所耗而津液變為痰涎治法自宜急散肺中之風然風雖散而火尤存則火以引風非救本之道也尤宜舒肝之鬱則火息而風尤易散也方用逍遙散加味治之柴胡一錢白芍三錢當歸二錢甘草一錢白朮一錢陳皮五分茯苓二錢炒梔子一錢半夏一錢水煎服一劑身熱解二劑咳嗽除三劑全愈此方解鬱之聖藥亦祛風之神劑也直入肝中舒泄其滯鬱之氣鬱解而風自難留加入半夏以消痰梔子以退火更能相助為理所以奏功益捷也

辨症錄

卷之九 內傷

三

此症用舒解散亦效
白芍當歸各二錢天花粉香附各一錢五分青皮神
麴各五分甘草
一錢水煎服

人有忍饑受餓腹中空虛時遇天氣不正時寒時熱遂至胸隔悶塞宛如結胸人以為外邪相侵誰知是內傷其胃氣乎夫胃為水穀之海雖多氣多血然亦因能受水穀而氣血始旺故水穀多受而胃強水穀少受而胃弱今既饑餓強忍則胃無水穀胃火沸騰遏抑之而不舒則胃氣消亡天時不正之寒熱自易相感乘虛入于胃中而不散因現悶塞之狀治法必須助胃弱而使之強

則邪不戰而自退也方用加味四君子湯人參三錢白朮五錢茯苓三錢甘草一分柴胡一錢枳殼五分水煎服一劑輕二劑全愈論理既感寒熱自宜用熱藥以祛寒用寒藥以散熱然而用寒用熱之藥必皆先入于胃胃既空虛寒熱相戰必以胃為戰場矣胃弱何能堪乎故寒熱兩有所不用惟以健胃為主佐之和解之味于補中散之也

辨症錄

卷之九 內傷

三

此症用和腹湯亦效
人參柴胡甘草神麴厚朴各一錢白朮二錢陳皮五
分水
煎服

人有素耽麪藥日在醉鄉忽感寒疾不可以風人以為外傷于風也誰知內傷于酒乎夫酒醉之時熱性可以敵寒酒醒之時邪風易于浸正蓋酒能散氣氣散則陽虛而腠理營衛無不空虛邪所以易入也故好飲之人無不氣虛氣虛而邪入助其氣而邪自出矣方用補中益氣湯人參二錢黃芪三錢當歸三錢白朮五錢甘草三分陳皮五分升麻三分柴胡一錢水煎服一劑氣旺不畏風矣二劑全愈東垣先生制此方以治內傷而兼外感實神以之治傷酒而感冒風邪者尤為相宜使不用

此方以升提陽氣而專用祛風逐邪之味則散盡真氣風邪轉不肯出必至輕變重而重變死也可不慎歟

人有貪戀房幃縱情色慾遂至感冒外邪傷風咳嗽睡臥

不寧人以爲外感于風也誰知內傷于腎乎夫腎爲肺

子泄精過多必取給于肺母腎虛而肺亦虛肺氣不能

充于毛竅邪即乘虛而入倘以爲外邪之盛日用散風

之劑則肺氣益虛腎水又來取資是內外盜肺之氣肺

金安得不困乎肺氣既困不特不能生腎中之水且

以耗腎中之氣遂至變勞變怯者比比也治宜補其肺

辨症錄

卷之九 內傷

三

金更補其腎水使腎不盜母氣則肺自得子援子母兩

旺外邪自衰不戰而遁矣方用金水兩滋湯麥冬一兩

天門冬三錢桔梗一錢甘草一錢熟地一兩茯苓二錢

山藥五錢肉桂三分白朮三錢紫苑一錢白芥子二錢

水煎服二劑睡臥安四劑咳嗽除十劑全愈腎虛感邪

最難愈之病也以散邪之藥不能直入于腎經耳詎知

腎虛感邪邪不遽入于腎仍在肺乎散肺經之邪仍補

其腎中之水腎得其益肺又無損正善于散邪也

此症用增減六君湯亦效
人參熟地白朮各五錢甘草陳皮神麴各五分柴胡

一錢茯苓三錢肉桂三分水煎服

人有防危慮患日凜恐懼之懷遂至感冒風邪畏寒作顫

人以爲外感於風也誰知內傷于心膽乎夫恐起于胆

懼起于心過于恐則胆氣先寒過于懼則心氣先喪胆

寒則精移心喪則精耗精移耗心與胆不愈虛乎心

胆氣虛邪易中矣夫胆屬少陽胆氣既怯則邪入少陽

胆不勝任故畏寒而作顫倘再用祛風之藥則耗損胆

氣胆耗而心氣更耗矣心胆二經之氣耗邪又何所畏

肯輕出于表裏之外乎治法自宜急助其胆氣之壯胆

辨症錄

卷之九 內傷

三

不寒而心亦不喪則脇力同心祛除外邪自易易耳方

用加減小柴胡湯柴胡一錢白芍二兩茯苓五錢麥冬

三錢甘草一錢陳皮五分水煎服一劑胆氣壯二劑心

氣安三劑風邪盡散此方用柴胡以和解胆中之邪實

佐白芍茯苓麥冬補胆氣之弱而即補心氣之虛也二

經得補而氣旺恐懼且不畏又何懼于外邪哉

此症用攸利湯亦可治
白芍五錢茯苓神三錢甘草半夏人參各一錢青皮五

分柴胡一錢水煎服

人有處得意之境過于歡娛盡情喜笑遂至感寒畏風口

乾舌苦人以爲外感也誰知內傷于心包乎夫心包乃
臚中也臚中者臣使之官喜樂出焉是歡娛者正心包
之職掌喜樂何至相傷惟喜樂太過大笑不止未免津
乾液燥耳夫心包護君以出治者也心包乾燥必盜心
之氣以自肥將內府空虛則宵小之輩乘機竊發而邪
易入矣治法自宜急補心中之氣心氣既旺心包亦必
同旺蓋國富而家自不貧自然協力同心以禦外何至
有四郊之多壘哉方用衛君湯人參二錢白朮五錢茯
苓三錢甘草一錢菖蒲一錢蘇葉一錢半夏一錢桔梗

辨症錄

卷之九 內傷

五

一錢丹參一錢水煎服一劑津液生二劑風邪散三劑
全愈此方心與臚中均補之藥也心與心包原不可分
治內寧何愁外擾乎

此症用滋生湯亦效

人參柴胡天花粉各一錢巴戟天茯苓白朮各二錢

甘草神麴各五分肉桂

三分麥冬三錢水煎服

人有終日思慮憂愁致面黃體瘦感冒風邪人以爲外感
之病誰知是內傷于脾腎乎夫人後天脾胃先天腎也
二經最不宜病然最易病也天下無不思之人亦少無
愁之客但過于思慮則胃土之氣不升脾土之氣不降

食乃停積于中州而不化何能生津生液以灌注于五
臟乎甚矣思慮之傷人也而憂愁更甚蓋思則傷脾憂
則傷腎腎傷則腎水不能滋肝而肝無水養仍剋脾胃
之土故憂思二者相合則脾胃兩傷而外邪尤易深入
欺先後二天之皆虛也人至先後二天皆虛其元氣之
弱爲何如乎治法烏可散邪而不扶正哉方用脾胃雙
益丹人參一兩白朮一兩巴戟天一兩山藥一兩茯苓
五錢柴胡一錢甘草一錢肉桂五分山茱萸三錢水煎
服二劑風邪全散十劑全愈此方補土之中有補水之

辨症錄

卷之九 內傷

五

味補水之內有散邪之劑有補之益而無散之傷實乃
治憂思內損之神方非止治憂思外感之妙藥也

此症用復正湯亦妙

熟地白朮各五錢柴胡山茱萸茯苓丹皮各二錢甘

草一錢山藥三錢神麴

五分貝母五分水煎服

人有動多氣惱大聲罵詈覺飲食坐卧居處晉接無非可
怒之場遂至感觸風邪身熱胸滿兩脇作脹人以爲風
邪外感誰知是肝經內傷乎夫肝性急氣惱則肝葉開
張氣愈急矣急則氣不能順而逆作血不能藏逆則氣
不能舒而脹生血亦不暢木鬱不泄木乃生火火鬱不

宣火乃生風內風與外風齊動則內火與外火同焚此風邪之所以易入不可徒祛于外也方用風火兩消湯白芍一兩炒梔子三錢柴胡二錢天花粉二錢甘草二錢車前子二錢丹皮五錢水煎服一劑輕二劑全愈此方治肝經之內火內風也然而外來風火未常不可兼治故兩治之而奏功也倘不用白芍為君單用柴胡梔子之類雖風火亦能兩平肝中氣血之虛未能驟補風火散後肝木仍燥怒氣終不能解何如多加白芍既能補肝又能瀉風火之得哉

辨症錄

卷之九 內傷

三

此症用却念散亦妙
柴胡半夏甘草薄荷黃芩神連各一錢當歸茯苓各三錢白芍四錢炒
梔子二錢水煎服

人有晝夜誦讀不輟眠思夢想俱在功名勞瘁不自知饑餓不自覺遂至感入風邪咳嗽身熱人以爲外感之症誰知內傷于肺乎夫誦讀傷氣氣傷則肺虛而腠理亦虛邪即隨虛而入于肺肺虛不能敵邪呼腎子以相救腎水亦正無多力難上灌于肺而肺氣往來于肺腎之間故咳嗽而不自安也治法急補其肺氣可也然肺爲邪所侮補肺則邪更旺而肺愈難安必兼補胃土之氣

以生肺氣則邪不能奪然補胃而不佐以散邪之品則肺畏邪侵未必能受胃氣之益惟于胃中散邪則邪畏土氣之旺聽肺氣自生而邪乃遁矣方用助功湯人參二錢茯苓三錢麥冬五錢甘草一錢桔梗一錢半夏一錢黃芩五分水煎服一劑輕二劑又輕三劑全愈此方肺胃同治也助胃中之氣即助肺中之氣瀉肺中之火即瀉胃中之火祛肺中之邪即祛胃中之邪邪入肺中未有不入陽明者也肺中邪散寧有遁入陽明者乎

辨症錄

卷之九 內傷

三

此症亦可用來復湯
人參茯苓白朮天花粉各三錢遠志甘草各一錢黃連三分麥冬一兩陳皮三分
分蘇葉一錢五分水煎服

人有終日高談連宵聚語口乾舌渴精神倦怠因而感冒風寒頭痛鼻塞氣急作喘人以爲風邪外感誰知是氣血內傷乎夫多言傷氣而血生于氣氣傷而血未有不傷者况多言則津液盡耗津液亦陰血之餘氣屬肺血屬肝氣血兩傷即肺肝之兩傷也往往邪入之而最易惟是邪既乘肺肝之虛深入于二經之中使氣逆于下而上不通將何以治之仍治其肺肝之虛少佐散邪之藥則得矣方用兩治湯白芍五錢當歸三錢麥冬五錢

人參一錢甘草一錢桔梗二錢蘇葉八分天花粉一錢
水煎服此方入肝入肺補氣補血消痰消火各各分治
二劑便可奏功正不必多也

此症用加減補中湯亦妙
生地人參茯苓各三錢白朮當歸各五錢甘草半夏
各一錢黃芪一兩川芎
一錢柴胡一錢水煎服

人有貪眠樂卧終日倘祥枕蓆之上遂至風邪襲之身痛
背疼發熱惡風人以為風邪外感誰知脾氣之內傷乎
夫脾主四肢四肢倦怠多欲睡眠以脾氣之不能運動
也畧為睡卧亦足養脾氣之困然過于睡卧則脾氣不

辨證錄

卷之九 內傷

夫

醒轉足傷氣已虛益虛安得不招外風之入乎專治其
風必至損傷脾氣脾氣因虛而招風祛風而重傷脾氣
邪且欺脾氣之虛而不肯出人不知用補脾之法往往
變證蜂起也方用補中益氣湯加味治之人參三錢黃
芪五錢白朮五錢當歸二錢陳皮五分甘草一錢升麻
三分柴胡一錢半夏一錢神麩一錢水煎服一劑輕二
劑又輕三劑全愈補中益氣湯正益脾聖藥况睡卧既
久脾氣下陷正宜用之以升提下陷之氣加半夏神麩
者以久睡脾氣不醒者飲食多致生痰二味最善醒脾

故用之也

此症用加味益氣湯亦妙
人參二錢白朮五錢甘草一錢茯苓三錢陳皮五分
半夏一錢柴胡
一錢水煎服

人有終日呼盧長夜鬪頁筋痠背痛足重腹饑以至感冒
風邪遍身皆痛身發寒熱人以為風邪外感誰知血氣
內傷乎凡人日用尋常原易損傷氣血况呼盧鬪頁勞
其心神損傷氣血為尤甚無柰世人借此為消閒適意
之具以致耗散氣血邪已入身猶然不悟為之醫者復
昧其內傷之因惟治其外感之病正氣益虧邪氣愈旺

辨證錄

卷之九 內傷

夫

非變為癆瘵之病必成為怯弱之疾矣故治法須大補
氣血少加以和解之品則正氣足以祛邪而邪自外遁
也方用十全大補湯加減治之人參三錢黃芪五錢川
芎一錢當歸三錢茯苓三錢甘草一錢白朮三錢陳皮
五分白芍三錢熟地三錢柴胡一錢水煎服一劑汗解
二劑熱退連服數劑全愈此方乃氣血兼補之方氣血
不足舍此原無第二之劑原方有肉桂以補命門之火
但呼盧鬪頁之人未免火有餘而水不足故去肉桂易
之柴胡于補中和之則邪尤易散也

此症用兩治湯亦效
生地人參各三錢白朮五錢茯苓三錢甘草半夏川
芎柴胡各一錢黃芪一
兩當歸五錢水煎服

人有爭強好鬪或赤身不顧或流血不知以致風入皮膚
畏寒發熱頭疼脇痛人以為風邪外感誰知筋骨之內
傷乎夫筋屬肝骨屬腎肝血足而筋舒腎水滿而骨健
是筋骨必得髓血之充也世人之耗髓血者無過泄精
人盡知之鬪毆以耗髓血人未盡知也蓋鬪毆之時必
多動怒怒起而肝葉開張血多不藏而血自耗肝血既
耗必取給于腎水腎水供肝木火內焚又易乾燥腎且

辨症錄

卷之九 內傷

手

資肝血之不足何能分潤于骨中之髓乎血與髓兩無
有餘筋安得舒骨又安得健乎人至筋骨兩無旺氣風
邪乘虛而侵不能拒絕治法宜急救其虛方用四物湯
加味治之熟地一兩當歸五錢川芎一錢白芍五錢柴
胡一錢牛膝三錢金釵石解二錢丹皮二錢白芥子一
錢水煎服四物湯補血之藥亦補髓之藥也原因髓血
虛而入邪補髓血而邪自易出故少加柴胡和解風邪
隨手即散彼專治風邪不補髓血者尚昧于治內傷之
法也

此症用護骨散效
牛膝丹皮各三錢金釵石斛山萸各二錢熟地白芍
當歸各五錢柴胡天
花粉各一錢水煎服

人有終日捕魚身入水中時而發熱畏寒惡冷人以為風
濕之外感也誰知是肺氣之閉塞乎夫肺本主氣氣旺
則周流一身從皮毛外泄雖有外邪之感不能損傷倘
肺氣少虛則氣有停住之虞矣身入水中遏抑皮毛則
虛氣難以舒轉濕且中之夫濕本外受今從皮毛旁入
致使一身之氣閉塞不通此畏寒惡冷之所以起也肺
氣既虛則皮毛不能外衛水冷金寒肺氣與濕邪相戰

辨症錄

卷之九 內傷

手

則身熱生矣此熱乃肺氣之虛不能敵邪而身熱也治
法補其肺氣為主兼帶利水之味則正旺而邪自易散
方用利肺湯紫蘇一錢人參二錢白朮三錢茯苓五錢
甘草一錢桔梗一錢半夏一錢神麩三分附子一分水
煎服一劑熱解二劑寒冷俱不畏矣三劑全愈此方補
肺氣之不足不見利水水自從膀胱而去惟其內傷以
致邪入故不必治外感耳

此症用宣開湯亦效
黃芪茯苓各五錢人參猪苓各三錢澤瀉二錢半夏
肉桂羌活各
一錢水煎服

人有憂思不已加之飲食失節脾胃有傷面色黎黑不澤環唇尤甚心中如飢然見食則惡氣短而促人以爲內傷之病誰知是陰陽之相逆乎夫心肺居于上焦行榮衛而光澤于外腎肝居于下焦養筋骨而強壯于內脾胃居于中焦運化精微灌注四臟是四臟之所仰望者全在脾胃之氣也倘脾胃一傷則四臟無所取資脾胃病而四臟俱病矣若憂思不已則脾胃之氣結飲食不節則脾胃之氣損口者脾氣出入之路唇爲口之門戶脾氣通于口而華于唇金水反侮土故黑色著于唇非陰陽相反而成逆乎不惟陽明胃脉之衰而面焦已也是脾胃陰陽之氣兩有所虧烏可不急救其中州之土乎方用和順湯升麻五分防風三分白芷三分黃芪三錢人參二錢甘草三分白芍三錢白朮五錢茯神三錢炮薑五分午前服連服十劑黑色盡除再服十劑諸病全愈此方乃補中益氣之變方升陽氣以散陰氣之治法也凡陽氣下陷于陰中則用補中益氣之方升提陽氣倘陰氣上浮于陽中則用此方升散其陰氣皆能奏功之甚速也

此症用調逆湯亦效
 人參茯苓白芍生地沙參各三錢白朮五錢甘草五分蘇子神連各一錢
 荆芥二錢水煎服

人有怔忡善忘口淡舌燥多汗四肢疲軟發熱小便白而濁脉虛大而數人以爲內傷之病也誰知是由思慮過度而成之者乎夫君火者心火也相火者膻中之火也膻中手厥陰之經性屬陰而主熱古人以厥陽名之以其火起之不可遏也越人云憂愁思慮則傷心心氣一傷心血自耗心血既耗心氣遂不能自主每欲寄其權于相火而相火欺君火之弱即奪心之權而恣肆矣治法宜以水濟火然見火勢之熾張用寒涼以濟之則心氣益虛愈激動其焦焚之害矣宜亟補其心氣之虛大滋其腎水之涸則心火寧靜相火不安而自安矣方用坎離兩補湯人參五錢熟地一兩兔絲子三錢生地五錢麥冬五錢丹皮二錢炒棗仁三錢北五味子一錢茯苓三錢桑葉十四片山藥五錢白朮三錢水煎服連服數十劑而愈此方心腎兩補腎水上濟于心水足而火無亢炎之禍自然火息而有滋潤之樂也心中清淨而外有轉輸則心包何敢竊柄勢必相合而得生也

此症用鎮神湯亦效
人參炒棗仁茯苓山藥各五錢遠志一錢巴戟天三錢甘草五分黃連三分水煎服

人有勞倦中暑服香薷飲反加虛火炎上面赤身熱六脉疾數無力人以爲暑火之未消也誰知是內傷于中氣乎凡人中氣充足則暑邪不能相犯暑氣之侵皆氣虛招之也然則內虛發熱烏可不治虛而治邪哉况夏月伏陰在內重寒相合反激動虛火之升上此陰盛隔陽之症也治法宜補陽退陰然而陰盛陽微之際驟用陽藥以入于衆陰之中未必不扞格而不相入必熱因寒

寒症錄

卷之九 內傷

言

用始能不違陰寒之性以奏其助陽之功也方用順陰湯人參三錢白朮五錢茯苓三錢附子二錢乾薑二錢青蒿二錢白扁豆三錢水煎探冰冷服之必出微汗而愈此方用薑附入于參朮之中未免大熱與陰氣不相合乃益之青蒿之寒散投其所喜且又熱藥冷服使上熱得寒不至相激及到中焦寒性除而熱性發不特不相格及至相宜耳

此症用參朮二香湯亦效
人參三錢香薷一錢甘草一錢砂仁一粒神麩五分白朮二錢陳皮五分藿香五分水煎服

人有形體素虛忽感風邪遍身淫淫循行如虫或從左脚腿起漸次而上至頭復不行于右脚自覺身癢有聲人以爲奇病也誰知內傷而氣不足乎夫氣血自行周流不息何至生病惟氣血止而不行皮毛之間卽有淫癢之病生矣此氣血之衰也氣血大衰而皮毛焦氣血少衰而皮毛脫氣血既衰又少有微邪身欲自汗邪又留而不去兩相爭鬪拂抑皮膚之間因而作癢不啻如虫之行非真有虫也傷寒症中汗多亡陽亦有身如虫行之病夫傷寒本是外感然至于亡陽則外感變爲內傷矣今非傷寒亦現虫行之象非內傷而何治法大補氣血氣血行而身癢自愈也方用補中益氣湯人參一兩黃芪一兩當歸五錢白朮五錢陳皮五分甘草一錢升麻五分柴胡一錢玄參三錢桑葉二十片水煎服十劑全愈補中益氣湯原是大補氣血之神劑多用參芪尤爲補氣氣旺而血自旺更能流行也方中加玄參桑葉者身癢多屬于火能退浮遊之火也桑葉善能止汗汗多者發癢止其汗而癢自止也

寒症錄

卷之九 內傷

言

此症用蚕蝎歸芪湯亦效
當歸黃芪各五錢茯苓三錢僵蚕半夏各一錢全蝎

一個陳皮五分水煎服

人有色白神怯秋間發熱頭痛吐瀉食少兩目喜閉喉啞昏昧不省人事粥飲有碍手常搵住陰囊人以爲傷風重症也誰知是勞倦傷脾之故乎夫氣本陽和身勞則陽和之氣變爲邪熱不必有外風襲之而身始熱也諸陽皆會于頭陽氣一虛則清陽之氣不能上升而邪熱遂乘之薰蒸于頭而作痛不必有外風犯之頭始痛也清氣不升則濁氣不降上下拂亂安得不吐瀉哉人身之脉皆屬于目眼眶屬脾脾氣既傷目無所養欲不閉

辨症錄

卷之九 內傷

美

而不可得也脾之絡連于舌本散布于舌下脾傷則舌之絡失養此言語之難也咽喉雖通于肺然脾虛則五臟皆虛肺虛而咽喉難司出入心之神明亦因之昏聩矣陰囊屬肝脾虛則肝欲來侵頻按其囊者惟恐肝木之旺土虧之極反現風木之象也治法大健其脾土則風木之象自消矣方用補中益氣湯人參三錢白朮五錢黃芪五錢當歸三錢茯苓三錢陳皮三分甘草五分柴胡一錢升麻三分製附子三分水煎服二劑輕十劑全愈病本內傷用補中益氣湯自中病情方中加入附

子者蓋參芪歸朮非得附子則其功不大建功亦不甚神况用止三分亦無太熱之虞轉有反正之速也

此症用加減歸脾湯亦效

人參當歸茯苓白朮白芍各三錢甘草半夏各五分

川芎二錢白豆蔻一粒柴胡遠志棗仁各一錢麥冬

五錢水煎服

人有日坐于圍爐烈火之邊以致汗出不止久則元氣大虛口渴引飲一旦發熱人亦以爲外感于風誰知是肺金受火之傷乎夫肺本屬金最畏火氣外火雖不比于內火然肺氣受二火之煎逼自然不得其養矣况肺乃腎水之母肺自難養何以能生腎水腎水不生日索母

辨症錄

卷之九 內傷

美

乳母病不能應則子亦病矣子母兩病勢必至皮膚不充風邪易入不必從膀胱風府之穴而後進也然則治法何必治風但補其肺氣大滋其腎水則肺金得養內難藏邪風從皮膚而入者仍從皮膚而出矣方用安肺散麥冬五錢桔梗二錢生地三錢白芍三錢茯苓三錢紫蘇二錢欵冬花一錢天門冬三錢紫苑一錢黃芩三錢熟地三錢山茱萸二錢玄參五錢貝母五分水煎服而身熱解二劑全愈此肺腎同治之法安腎正所以安肺倘不顧肺氣一味祛邪是因傷益傷矣不變爲勞怯

者幾希矣

此症用蘇桔湯亦效
蘇葉桔梗甘草各一錢生地三錢沙參白芍各五錢
黃芩天花粉各二錢當歸
三錢玄參一兩水煎服

辨症錄

卷之九 內傷

天

疝氣門 附奔豚

人有感浸寒濕辜丸作痛者冷即發痛不可忍此濕氣之入于腎經也夫濕侵于腎宜病在腰何以腰不痛而痛在辜丸乎不知辜屬腎腎氣不至辜丸則外勢不能振興蓋因腎得濕則寒寒在腎即寒在辜丸而氣結于腰腎之中宜辜丸之不應矣其辜丸作痛者因疝氣之成雖成于腎氣之寒亦成于辜丸之濕也當日泄精之後入坐于寒濕之區內外兩感辜丸獨受之矣治法溫其腎中之寒消其辜丸之濕病去如掃矣方用救丸湯肉

辨症錄

卷之九 疝氣

差

桂三錢白朮二兩茯苓一兩薏仁一兩橘核一錢水煎服
劑二劑輕三劑痛除十劑全愈不再發也此症乃少陰腎經之病腎中寒極而腎氣不通腎中濕重而腎氣更滯去其寒濕而腎氣自行于辜丸之內况肉桂橘核尤善入辜丸自然手到功成也

此症亦可用桂荔湯
白朮二兩肉桂二錢山藥一兩小茴香二錢荔枝核三個敲碎
水煎服

人有感浸濕熱亦辜丸作痛遇熱即發然痛不至甚此熱氣之入于腎經也天腎最惡熱腎中虛火自旺尚有強

陽不倒之虞况邪火相侵熱以濟熱畢九作痛烏能免哉但火性甚急火痛宜不可久何終年累月不愈即或暫時無恙遇熱復發者何為也蓋因熱而又得濕耳熱性急而濕性遲濕熱交攻熱欲散而濕留濕欲潤而熱燥畢九之內竟成陰陽乖異求其不痛得乎治法去其濕熱之氣疝病自除矣方用利九湯茯苓一兩薏仁一兩沙參二兩水煎服一劑輕二劑又輕十劑斷根不再發也此方以茯苓薏仁分清其濕氣以沙參化其腎中之熱且沙參善能治疝故兩用之而成功耳

辨症錄

卷之九 疝氣

早

此症用沙參湯亦甚效

茯苓白朮沙參各一兩甘草一錢丹皮五錢肉桂二分

煎服

人有畢九作痛氣上冲于肝兩脇脹滿按之益疼人以爲陰寒在腹誰知是厥陰之氣受寒也蓋畢九不獨通腎而且通肝陰器者宗筋之聚也筋屬肝畢九可升可降其膜實聯絡于陰器之間故肝病而筋亦病筋病而畢九亦病矣畢九之痛上冲于肝者正顯同氣者其病亦同乃肝氣之冲于畢九耳方用畢九湯白芍二兩小茴香三錢橘核一錢柴胡一錢沙參五錢水煎服一劑痛

少止二劑痛大止三劑兩脇之脹滿盡除四劑全愈此方平肝氣而不冲于畢九得小茴香橘核沙參之類散畢九之邪兩丸安奠何至上下相連而痛哉

此症用解疝湯亦神

肉桂二錢白芍白朮各二兩柴胡一錢沙參五錢水

煎服

人有膀胱閉癢小水不利畢九牽痛連于小腸相掣而疼者皆云小腸之氣誰知是膀胱之熱結耶夫膀胱化水者也膀胱寒則水不化熱亦不化水不化而熱結膀胱水必分于經絡水入畢九丸乃日太往往有囊大如斗而不能消者是必分清其水矣然但消其水不解其熱則膀胱之火直趨畢九其疼更甚方用散九湯茯苓一兩野杜若根枝一兩沙參二兩水煎服一劑痛除二劑丸漸小連服二劑水泄如注囊小如故矣此方之奇奇在杜若非家園之杜若也乃野田間所生藍菊花是也此物性寒而又善發汗且能直入畢九以散邪故用以助茯苓沙參既利其濕又瀉其熱所以建功特神惟是此藥發汗服此方後即用當歸補血湯數劑以補氣血則自無太虛之患也

辨症錄

卷之九 疝氣

早

此症用沙參湯亦甚效

此症用散瘧湯亦佳
茯苓一兩車前子三錢肉桂二分草薢二錢甘草一錢黃柏知母各一錢水煎服

人有畢丸作痛後變為不痛不疼者名曰木腎乃寒極而氣不通也此症初起必感寒濕因而行房又感寒濕則濕入下畢丸之中寒結于畢丸之外遂至不痛不疼此種疝氣非用桂附不能直入畢丸以通其氣然無散邪之藥雖用桂附止可與陽而畢丸之邪終久難散且散邪之藥甚多而能散畢丸之藥甚少此世人所以治木腎之病不能多効耳方用化木湯白朮二兩附子一錢

瘧症錄

卷之九 疝氣

望

肉桂一錢杜若根一兩柴胡一錢水煎服即擁被而臥身必發汗必至雙腎之外汗出如雨而後止一劑即愈也此方白朮利腰膈之氣杜若根發畢丸之邪得附子肉桂通達內外柴胡解其肝中之濕故一劑奏功如神耳

此症用衛畢丹亦妙
附子甘草玄胡索柴胡各一錢白朮三兩肉桂三錢黃芪一兩水煎服

人有生狐疝者日間則縮入而痛夜間則伸出而安且能強陽善戰此乃真正狐疝若日縮夜伸不能久戰者仍

假狐疝也假狐疝乃寒濕之症用前救丸湯治之即愈至于真狐之疝或于神道之旁行房或于星月之下交感乃祟憑之也疝既不同治亦宜異大約狐疝淫氣未散結于畢丸之內狐最淫而善戰每于夜間媚人蓋狐屬陰也日間縮入不可以戰戰則疼痛欲死此祟禁之也凡祟亦屬陰入夜則陰主令矣人身之陽氣入于陰之中陰與祟之陰相合則同氣相得祟不禁焉反得遂其善戰之歡及至精泄陽氣奔出純陰無陽又復作痛矣治法似宜祛逐其祟然祟之入也必乘其虛不補虛

瘧症錄

卷之九 疝氣

望

而逐祟何能愈乎方用逐狐湯人參一兩白朮五錢茯苓五錢肉桂三分橋核一錢白微一錢荆芥三錢半夏二錢甘草一錢水煎服連服四劑全愈此方純助其陽陽氣旺則陰氣自消狐疝不逐自愈矣或謂夜伸善戰正陽火之旺也助其陽氣未必非增其妖氣也何助陽而祟滅乎蓋日間陽氣用事祟乃遏抑其陽氣而不敢出至夜乃乘陰氣借交合而聚于陰器之間乃陽旺之假象非真旺也吾助其陽氣則陽氣勃發身中晝夜皆是陽氣祟亦何敢附之况方中又益以舒鬱逐邪之味

消痰解祟之品此陰不敵陽祟棄之而去矣非助陽而烏得奏功之神如此哉

黃芪二兩肉桂三分甘草柴胡各一錢貝母三錢沙參一兩水煎服二劑即愈

人有外感寒邪如一裹之氣從心而下直至于陰囊之間名曰奔豚言其如豕之奔突其勢甚急不可止遏痛不可忍人為外寒之症誰知是心包命門二經之火衰乎夫心包之火與命門之火一在心一在腎二火未常不相通也人有此二火相通則寒邪不能侵二經火衰寒邪得而中之矣然寒氣入內宜先犯心何反下趨于腎

辨症錄

卷之九 疝氣

聖

囊乎蓋腎氣虛寒脾經又濕寒與濕同氣相親故逢濕則急趨而下勢甚便也此等之症痰如風雨之來乃一時暴病非長年之久疾也似疝而非疝耳治法不可作疝治補心腎之虛溫命門心包之火去脾經之濕不必治奔豚而自愈也方用安豚丹治之人參五錢白朮五錢肉桂一錢山藥一兩巴戟天五錢蛇床子三錢附子五分茯苓三錢遠志一錢甘草一錢水煎服一劑即安二劑全愈此方補心補腎則心腎氣足後用桂附熱藥始足以駕馭其猛烈之氣轉易祛除然邪勢既急而藥

過于猛烈則急以治急未免有太剛之懼加入甘草之緩緩急相濟邪不難制無有死關之失也

此症亦可用參苓桂朮湯

白朮二兩肉桂二錢人參五錢半夏五分茯苓二錢

水煎服

人有小水甚勤羣丸縮入遇寒天更痛者此膀胱之寒結也夫膀胱之化水命門之火化之也似乎命門寒而膀胱始寒膀胱之寒結獨非命門之寒結乎孰知膀胱亦能自寒也此症多成于人坐寒濕之地寒氣襲入于膀胱而不能散雖有命門之火亦不能化蓋命門之火止

辨症錄

卷之九 疝氣

聖

能化內濕而不能化外濕耳外濕既留于膀胱勢必與命門之真火相戰邪盛正衰而痛作矣治法必須直祛膀胱之寒濕則羣丸舒展痛亦自止方用辟寒丹肉桂三錢茯苓五錢白朮五錢甘草一錢橘核三錢荔枝核三個搗碎同水煎服二服即少減四服全愈此方用肉桂為君既能溫命門之火復能祛膀胱之寒白朮茯苓又是利水之劑橘核荔枝核更善定羣丸之痛非肉桂相引不能直入而散其寒結也

此症用木桂湯亦妙

白朮二兩肉桂一錢水煎服

陰痿門

人有交感之時忽然陰痿不舉百計引之終不能鼓勇而戰人以為命門火衰誰知是心氣之不足乎凡入房久戰不衰乃相火充其力也陰痿不舉自是命門火衰何謂是心氣不足不知君火一動相火翕然隨之君火旺而相火又復不衰故能久戰不泄否則君火先衰不能自主相火即聳憑于其旁而心中無剛強之意包絡亦何能自振乎故治陰痿之病必須上補心而下補腎心腎兩旺後補命門之相火始能起痿方用起陰湯人參

辨症錄

卷之九 陰痿

藥

五錢白朮一兩巴戟天一兩黃芪五錢北五味子一錢 孰地一兩肉桂一錢遠志一錢栢子仁一錢山茱萸三錢水煎服連服四劑而陽舉矣再服四劑而陽旺矣再服四劑必能久戰不敗苟能長服至三月如另換一人不啻重堅一番骨再造一人身也此方大補心腎之氣不十分去溫命門之火而火氣自旺世人不識補心以生火則心氣既衰火旺則焚心矣不識補腎以生火則腎水既虧而火旺則損腎矣心焚而腎損雖火旺何益乎及足以燒乾陰血勢必陽旺陰消而不可救耳

此症用濟陽丸亦妙
人參六兩黃芪半斤鹿茸一個酒浸切片又切作小塊粉炒龜膏半斤人胞一個火焙麥冬四兩北五味一兩炒棗仁三兩遠志二兩巴戟天半斤肉桂三兩白朮八兩兔絲子一斤半夏一兩砂仁五錢黃連八錢神麩一兩各為末蜜為丸每日白滾水送下五錢服一月陽舉矣且能善戰

辨症錄

卷之九

藥

人有精薄精冷雖亦能交接然半塗而廢或臨門即泄人以為命門之火衰誰知是脾胃之陽氣不旺乎夫脾胃屬土土生于火脾胃之陽氣不旺仍是命門之火衰蓋命門之火乃先天之火脾胃之土乃後天之土也後天之土本生于先天之火先天之火不旺則後天之土不能生然脾胃之土雖屬後天而其中未常無先天之氣命門之火寒則脾胃先天之氣何能生哉命門既不能生脾胃先天之氣而脾胃後天之氣益加衰微欲其氣旺而能固精厚而不薄焉可得乎治法必須補先天命門之火更補後天脾胃之土則土氣既旺火又不衰庶几氣溫精厚乎方用火土既濟丹人參一兩白朮一兩山茱萸一兩兔絲子一兩山藥五錢巴戟天一兩肉桂一錢水煎服連服十劑而精厚矣再服十劑而精溫矣再服三月永不再弱是方健脾胃之土仍是補命門之

火濕氣去而精純寒氣去而精煖寒濕既除陰氣消亡而陽氣健旺何至成怯弱之病哉

此症用旺土丹亦甚佳

人參六兩白朮黃芪各一斤巴戟一斤茯苓五兩山黃肉半斤兔絲子八兩肉豆蔻二兩北五味一兩肉桂三兩破故紙四兩杜仲八兩山藥八兩芡實八兩神曲三兩各爲末蜜爲丸每日白滾水送下五錢服一月陽事改觀而精亦不薄矣

人有年少之時因事體未遂抑鬱憂悶遂至陽痿不振舉而不剛人以爲命門火衰誰知是心火之閉塞乎夫腎爲作強之官技巧出焉藏精與志者也志意不遂則陽氣不舒陽氣者即腎中之真火也腎中真火原奉令于

辨症錄

卷之九 陰痿

一

心心火動而腎火應之心火抑鬱而不開則腎火雖旺而不能應有似于弱而實非弱也治法不可助命門之火如助命門之火則火旺于下而鬱勃之氣不能宣必有陽旺陰消之禍變生癰疽而不可救宜宣通其心中之抑鬱使志意舒泄陽氣開而陰痿立起也方用宣志湯茯苓五錢菖蒲一錢甘草一錢白朮三錢生棗仁五錢遠志一錢柴胡一錢當歸三錢人參一錢山藥五錢巴戟三錢水煎服二劑而心志舒矣再服二劑而陽事舉矣不必多劑也蓋此病原因火閉而悶其氣非因火

寒而絕其燼也故一升火而陽痿立起矣

此症用啓陽娛心丹甚佳

人參二兩遠志四兩茯苓神五兩菖蒲一兩甘草橋紅砂仁柴胡各一兩兔絲子白朮各八兩生棗仁當歸各四兩白芍山藥各六兩神麩三兩各爲末蜜爲丸每日白滾水送下五錢服一月陽不閉塞矣

人有天分最薄無風而寒未秋而冷遇嚴冬冰雪雖披重裘其身不溫一遇交感數合之後即望門而流此命門之火太微也夫命門雖是先天之火氣而後天功用實可重培 第命門藏于腎中乃無形之火也有形之火宜以火引火無形之火宜以水引火以火引火而火反

辨症錄

卷之九 陰痿

一

不旺以水引火而火自難衰此補命門之火與補他火實不同也方用扶命生火丹人參六兩巴戟天一斤山茱萸一斤熟地二斤附子二個肉桂六兩黃芪二斤鹿茸二個龍骨醋焯一兩生棗仁三兩白朮一斤北五味四兩肉苁蓉八兩杜仲六兩各爲細末蜜爲丸每日早晚各用五錢服三月自然堅而且久此方填精者補水以補火也何加入氣分之藥不知氣旺而精始生使但補火而不補氣則無根之火止能博旦夕之歡不能邀久長之樂惟氣旺則精更旺精旺則火既有根自能生

生于不已况氣乃無形之象以無形之氣補無形之火則更為相宜所以精又易生火亦易長耳

此症用壯火丹亦甚佳
人參五兩巴戟天八兩白朮炒熟地各一斤山茱萸八兩肉蓯蓉枸杞各八兩附子一個用甘草三錢煎汁泡過切片微炒熟肉桂三兩破故紙炒茯苓各四兩北五味一兩炒棗仁三兩柏子仁二兩山藥芡實各五兩龍骨醋焯為末一兩各為末蜜為丸服二月堅而且久

人有中年之時陽事不舉雖婦女捫弄而如故即或振興旋即衰敗此心包之火氣大衰也夫心包之火相火也心包火旺力能代君行事若心包火衰心火雖動如相

辨症錄

卷之九 陰痿

五

臣臥病氣息奄奄欲其奮身勤王其可得乎且心包之火與命門之火正相通也未有心包寒而命門能獨熱者所以心包之火微有扶之而不起者治法温其心包不必温其命門也方用人參一兩巴戟天一兩肉桂三錢炒棗仁五錢遠志二錢茯神一錢良薑一錢附子一錢栢子仁二錢黃芪五錢當歸三錢免絲子二錢水煎服連服十劑興趣自生服二十劑陽旺不倒矣此方名為救相湯專治心包虛寒之症不止振舉其陽也方中雖治心包實皆統治心者蓋補其心君則君王富足而

相臣自強相助為理矣

此症用輔相振陽丸亦佳
人參五兩巴戟十兩炒棗仁麥冬各五兩免絲子十兩遠志栢子仁肉桂各二兩茯神枸杞各三兩黃芪八兩當歸仙茅各四兩白朮六兩人胞一個陳皮五錢陽起石火煨醋焯一兩各為末蜜為丸每日早晚各服四錢滾水下三月陽事振發

辨症錄

卷之九 陰痿

五

痰證門

人有腸胃之間漉漉有聲飲水更甚吐痰如湧人以為痰飲之病誰知是胃氣之虛乎夫胃為水穀之海飲食無不入於胃中遊溢精氣上輸脾胃下輸膀胱水精四布五經並行此胃氣之旺而然也倘胃氣一虛僅能消穀不能消水由是水入胃中不存於胃而下流於腸故漉漉有聲也其症初猶不覺久之水之精華變為混濁遂成痰飲團聚于呼吸難到之處而上湧矣然則痰之來也由于胃氣之虛痰之成也由于水氣之盛治痰必先

消水消水必先健胃但徒補胃土而胃氣不能自旺蓋胃氣之衰由心包之氣弱也補胃土必須補心包之火耳方用散痰湯白朮三錢茯苓五錢肉桂五分陳皮五分半夏一錢薏仁五錢山藥五錢人參一錢水煎服此方即二陳湯之變也二陳湯止助胃以消痰未若此方助心包以健胃用肉桂者不特助心包之火且能引茯苓白朮入于膀胱以分消其水濕之氣薏仁山藥又能燥脾以洩其下流之水水瀉而痰涎無黨不化痰而化痰矣豈尚有痰飲之不愈哉

辨症錄

卷之九

痰症

三

此症用運痰湯亦效
人參半夏各三錢茯苓一兩陳皮三分益智仁五粒
肉桂一錢
水煎服

人有水流脇下咳唾引痛吐痰甚多不敢用力人以為懸飲之病誰知是胃氣之怯乎夫飲水宜入于腸今入于脇乃胃氣之逆也第胃不怯則胃之氣不逆胃氣旺而水怯胃氣怯而水旺欲使水逆而歸于順必使胃旺而後可導其水勢之下行提其胃氣之上升自然怯者不怯逆者不逆也方用弱痰湯人參一錢茯苓五錢荊芥一錢薏仁一兩陳皮五錢天花粉三錢枳殼三分白芥

辨症錄

卷之九

痰症

三

子二錢水煎服上能消膜膈之痰下能逐腸胃之水助氣則氣旺而水降矣倘徒用消痰之藥不補其胃氣之虛則氣降而水升泛濫之禍不止矣

此症用加味四君湯亦效
人參白芍各三錢白朮茯苓各五錢陳皮五分益智仁一錢甘草
三分水煎服

人有痰涎流溢于四肢汗不出而身重吐痰靡已人以為溢飲之病誰知是胃氣之壅乎夫天一生水流灌無處不到一有瘀蓄則穢濁叢積水道泛濫而橫流旁溢矣凡水必入胃胃通而水何能積惟胃土有壅滯水不走

膀胱而順流乃由胃而外滲于四肢四肢無泄水之路必化汗而出然水能化汗由于胃氣之行也今胃既壅阻胃氣不行何能化汗水又何從而出身重者正水濕之徵也四肢水濕不能出自然上湧而吐痰矣治法必順其性因勢利導之庶几泛濫之害可除開胃土之壅而膀胱小腸之水道自通然土壅由于肝木之尅宣肝氣之鬱補胃氣之虛胃壅可開矣方用啓閉湯白朮三錢茯苓五錢白芍三錢柴胡五分猪苓一錢厚朴一錢澤瀉一錢半夏一錢水煎服連服四劑而痰消再服四

痰症錄

卷之九 痰症

膏

劑而身輕矣此方即四苓散之變也加入柴芍以舒肝加入厚朴以行氣加入半夏以消痰自然氣行而水亦行氣化而痰亦化矣

此症用白花飲亦佳

白朮五錢薏仁茯苓各一兩甘草五分天花粉三錢柴胡一錢枳殼五分水煎服

人有咳逆倚息短氣其形如腫吐痰不已胸膈飽悶人以爲支飲之症誰知是胃氣之逆乎夫胃爲水穀之海宜順不宜逆順則水化爲精逆則水化爲痰然逆有深淺之不同逆淺而痰入于胸逆深而痰入于膈然而胃氣

之逆致痰飲上行竟入于胸膈之間則其逆亦甚而逆何以至此也胃爲腎之關腎虛而氣冲于胃則胃失其啓闔之權關門不閉反隨腎氣而上冲腎挾胃中之痰而入于肺肺得水氣而侵故現水腫之狀咳逆倚息之病生其症似乎氣之有餘而實氣之不足故短氣而不能以接續也治法轉胃氣之逆而痰可降補腎氣之虛而胃可順矣方用轉胃湯山藥一兩薏仁一兩人參一兩白朮五錢牛膝三錢附子一分陳皮三分蘇子二錢麥冬一兩白芥子三錢水煎服一劑胃氣平二劑胃氣

痰症錄

卷之九 痰症

膏

轉三劑咳逆短氣之症除四劑全愈此方轉胃爲名而實所以轉腎氣之逆也腎逆而後胃逆然則轉腎正所以轉胃也此等之病非此大劑則胃之氣必不能通于腎之中而腎之氣必不能歸于腎之內倘日日治痰則耗損胃氣而腎氣益逆何日是降痰之時哉勢不至于死不已也

此症用加味參朮苓桂湯亦佳

人參茯苓麥冬山藥各五錢白朮一兩破故紙一錢蘇子肉桂各一錢水煎服

人有終日吐痰少用茶水則心下堅築短氣惡水人以爲

水在于心誰知火鬱于心乎夫心屬火最惡者水也若
心氣不虛水之入胃正足以養心而水亦不敢直入以
犯之惟心氣之虛火先畏水而水即乘其畏以相攻火
欲出而不得出自鬱于內而氣不得宣故築動而短氣
非氣之真短也火既與水相戰則水正火之仇也傷水
惡水又何疑乎治法不可徒利乎水也利水必先消痰
而消痰必至損胃胃氣損而心氣愈虛水與痰終難去
也必須補心以生胃散鬱以利水則火氣旺而水不能
侵自不至停于心下而變為濕痰也方用勝水湯茯苓

辨症錄

卷之九 痰症

善

一兩車前子三錢人參三錢遠志一錢甘草三分苴蒲
一錢柴胡一錢白朮一兩陳皮五分半夏一錢水煎服
一劑輕二劑又輕四劑全愈此方六君子之變也補心
散鬱並而行之心氣健而火氣自通火氣通而胃之氣
自旺土旺自能制水何畏于水之攻心哉

此症用加減運痰湯亦効

人參三錢茯苓神一兩益智仁一錢苴蒲一錢澤瀉五
錢肉桂五分
分水煎服

人有口吐涎沫渴欲飲水然飲水又不能多仍化爲痰而
吐出人以為水之在肺也誰知是肺氣之熱乎夫肺主

氣行營衛布津液周流于一身不可停住者也惟水邪
入之塞其氣道氣凝不通液聚不達遂變為涎沫而清
肅之令失肺乃生火以自焚故引外水以救內火然內
火終非外水可息外水亦非內火易消故不化精津仍
變為痰涎而上吐也治法清肺金之熱不取給于外水
則水不入肺而涎沫可解然肺金失清肅之令不止水
邪之故蓋水邪之入肺因心火之尅肺也肺因火邪相
侵原思水以相濟水乃乘其渴而入之故欲解肺金之
熱必須清心火之炎方用解炎湯黃連五分天花粉二

辨症錄

卷之九 痰症

善

錢黃芩一錢麥冬一兩茯苓五錢桔梗一錢甘草三分
陳皮三分神麴五分水煎服一劑渴解二劑痰消不必
三劑此方清心肺之熱而痰氣過升亦非所宜加入茯
苓下行于膀胱則火隨水走其勢自順既能消痰又能
降火何至肺氣之壅塞乎且此方雖消痰降火不耗損
肺金之氣此痰之所以易消火之所以易降也

此症用息沸飲亦佳

麥冬二錢款冬花一錢茯苓神二錢甘草一錢桔梗三
錢黃芩二錢天花粉二
錢竹葉三十片水煎服

人有少氣身重日吐清水清痰人以為水在脾也誰知是

脾氣之寒乎夫脾為濕土所惡者水喜者火也火衰則水旺水旺則火衰必然之理也蓋無火則土為寒土水不能燥而且有凝凍之憂即有微火僅可化水而不能化津但能變痰而不能變液且火既衰微止可化上焦之水不能解下焦之凍此清痰清水所以上吐而不下行也濕流于四體身安得不重乎治法必須利水清痰以燥脾土之氣然而脾中無火雖脾土之衰由于腎火之弱也不補腎中之火則釜下無薪土如冰炭安能大地陽回變濕污之地為膏壤之區乎故必須補腎火之

辨症錄

卷之九 痰症

五

旺而土自燥土燥而濕自除耳方用燥土湯白朮一兩茯苓一兩肉桂二錢人參三錢破故紙一錢山藥五錢芡實五錢砂仁三粒益智仁一錢半夏二錢水煎服此方燥脾者居其七燥腎者居其三似乎仍重在補脾而輕在補腎不知脾喜燥而腎惡燥使燥腎之藥太多則腎先受損何以益脾乎此用藥之妙于權衡也

此症亦可用加減運痰湯
人參茯苓各三錢白朮五錢肉桂一錢白豆蔻一枚
陳皮五分神麩半夏一錢
一錢水煎服

人有痰氣流行脇下支滿發噫而痛輕聲吐痰不敢重咯

此非水氣在肝乃鬱氣在肝也夫肝藏血而不藏水宜水之所不到然而肝氣鬱則血不藏矣血不藏而水乘隙而入肝而肝終不藏水水乃留伏于肝之外而不散肝氣本鬱以招水又因水而愈鬱肝氣之逆可知矣脇下正肝之部位肝氣已鬱即無水邪相犯尚有脹急之症水停脇下安得不支滿乎發噫而痛者以火鬱未宣得噫則火欲出而不得出因弔動作痛也治法必須達肝氣之鬱少佐以消痰分水之藥則隨手奏功矣方用開痰飲柴胡一錢半夏一錢甘草一錢炒梔子一錢陳

痰症錄

卷之九 痰症

五

皮一錢薄荷一錢枳殼三分蒼朮二錢茯苓五錢水煎服二劑肝氣之鬱舒四劑脇滿之痛去不必五劑此方專解肝鬱鬱舒火散自不下剋脾胃之土上引痰涎之閉矣寧尚有水停脇下以增痛滿者哉

此症可用疏痰湯

白芍茯苓各五錢甘草神麩半夏各一錢水煎服

人有水泛為痰涎如清水入水即化人亦不知為腎中之痰豈知腎寒而精變為痰乎夫各經之痰皆外水入而化痰惟腎中之痰乃內水所成故心肝脾肺之痰可以用攻而獨治腎中之痰必須用純補之藥不可少間攻

痰之味蓋腎中之痰乃純陰之水也陰火非陽火不能攝陽火者水中之火也陰水泛而火微陽水旺而火伏大補其水中之火不必降痰而痰自降矣方用八味地黃湯熟地一兩山藥伍錢山茱萸五錢澤瀉三錢丹皮三錢茯苓一兩肉桂二錢附子一錢水煎服一劑水泛為痰者立時即消天下治痰之捷効未有勝于此方者也然亦止可治腎寒而痰泛者不可執此方以概治痰也蓋痰非腎泛則痰為外邪何可以治內痰者移而治外痰乎惟真正是腎水上泛者用此方實効應如響然

辨症錄

卷之九 痰症

三

亦必須多用茯苓與熟地之分兩相同則腎水歸源而上中下三焦之濕氣盡行消化始無伏留之弊萬勿執定仲景夫子原方謂茯苓不可多用故又表而出之

此症用復陰丹亦妙

熟地一兩山茱萸五錢芡實山藥各一兩肉桂一錢水煎服

人有吐痰純是白沫咳嗽不已日輕夜重人以為肺火之痰也誰知腎熱而火沸為痰乎此等之痰乃陰虛火動大約成癆瘵者居多即古之所謂吐血也其痰一似蠟涎吐之不已必色變如綠涕之色即癆瘵之已成而

不可救療者也然而癆瘵而吐白沫是腎絕之痰也亦有未成癆瘵與陰虛之火初動而即成此痰與癆瘵已成者尚有分別何可置之不救世人一味治痰絕不識治腎中之陰不變成癆瘵而不止夫火沸為痰者成于腎火之太旺由于水衰之極也腎可補不可瀉補腎水之衰即所以瀉腎火之旺故用補陰之藥以制陽不可用瀉陽之品以救陰也倘見其腎火之旺而輕用黃柏知母母論火不可以驟息痰不可以遽消且擊動其火以變為癆瘵者比比也治法但補水以逐痰則痰消于烏

辨症錄

卷之九 痰症

三

有矣方用定沸湯熟地二兩山茱萸一兩麥冬一兩北五味二錢茯苓一兩山藥一兩玄參一兩白芥子三錢水煎服連服二劑火沸之痰不知其何以去也此方宜連服十劑不可見二劑之效便撤飲不服蓋火沸之痰實本於陰虛而陰虛之火非多服補陰之藥則陰不能大長火不能急散也病者以此方為續命之湯醫者以此方為奪命之劑幸勿輕棄之也

此症用歸沫湯亦大妙

熟地二兩山茱萸肉玄參各一兩天冬女貞子生地百合各三錢款冬花一錢水煎服

人有偶感風邪鼻塞咳嗽吐痰黃濁人以為寒塞胸膈也法宜吐誰知風邪塞于肺經乎夫邪在肺古人亦有用吐而效者以肺氣閉塞謂吐中有發散之義也然必大滿大實之症始可用吐如瓜蒂散湧出其痰是也若鼻塞咳嗽吐痰黃濁非大滿大實可比何必用吐法哉且不宜吐而吐必有損傷胃氣之憂胃氣傷而肺氣亦傷肺胃兩傷舊疾雖去而新痰復生一吐不已而再再吐不已而三必變為不可治之症矣故毋論虛人不可吐即實人亦不可輕吐以吐後必須守戒五臟反覆而氣

痰症錄

卷之九 痰症

空

未易復一犯戒而變症蜂起也况肺邪閉塞之痰亦易于表散蓋肺氣閉塞于風邪非閉塞于痰也散其邪而肺氣自通肺氣通而痰自化王道原自平平尚吐者霸道也霸道可間用不可常用慎勿謂吐法神于表散而盡用吐也方用散痰湯桔梗三錢紫蘇二錢黃芩一錢麥冬五錢半夏二錢甘草一錢陳皮一錢茯苓三錢水煎服一劑鼻塞通二劑咳嗽止三劑痰濁化四劑全愈此方名為散痰其實散肺之邪也

此症用二紫湯亦效
紫蘇葉紫苑各一錢桔梗二錢甘草枳壳黃芩各一

錢天花粉三錢水煎服

人有寒氣入胃結成寒痰日日嘔吐人以為寒痰在胃誰知是胃氣之虛而寒結為痰乎凡人胃氣旺則水穀入而化精原不生痰惟胃氣虛僅能消穀不能消水則水積而為痰矣然而胃虛者火氣之衰也火旺則土旺火衰則土衰土衰不能制水故不變精而變痰也夫胃土自寒尚且水變為痰况外寒又侵胃乎內外之寒合自然痰涎日多下不能化必至上湧而吐矣祛寒其可緩乎惟是祛胃土之寒必須補心火之旺火旺土堅何痰

痰症錄

卷之九 痰症

李

不化哉方用六君子湯加味治之人參三錢白朮五錢茯苓三錢陳皮一錢甘草三分半夏一錢肉桂二錢水煎服六君子湯原是補脾胃之聖藥胃病而治脾者脾胃為表裏脾健而胃更健也肉桂上補心火而下尤補腎火也心火旺而胃溫腎火旺而脾熱脾胃兩熱寒痰有不立消者哉

此症用加味參朮苓附湯亦甚効
人參一錢白朮三錢茯苓三錢附子二分神麴一錢
麥芽一錢白芥子三錢水煎服

人有熱氣入胃火鬱成痰痰色黃穢收濁不堪人以為熱

痰作祟誰知是胃火之未消乎夫胃本屬土胃火之盛由于胃土之衰也胃土衰而外熱犯之似與胃相宜何以反化爲痰乎蓋胃土既虛則水穀之入不能生津以潤土而土氣太乾必索外水以相救水多火勝而不相化胃土仰鬱而不伸胃火亦搏結而不發痰何能消必變爲黃穢敗濁之色矣然則治法不必治痰補胃氣之虛少加散火杼鬱之味則胃土復強消痰更易方用疏土湯白朮三錢茯苓五錢乾葛五分人參一錢甘草三分陳皮五分天花粉三錢竹葉三十片甘菊二錢柴胡五分水煎服一劑胃鬱解二劑胃火散三劑胃痰消四劑全愈此方補胃重而瀉火輕以鬱火之痰原未常大旺也故補胃而水可散散火而鬱自解况方中原有葛根柴胡以解其鬱乎鬱開痰豁必至之勢也

此症亦可用石花粉散
石膏二錢白朮三錢茯苓五錢天花粉玄參三錢水煎服

人有感雨露之濕或墻垣土房之濕以致濕變爲痰成爲痰飲肢節痠痛背心作疼臍下有悸人以爲濕痰成病誰知是脾氣之濕濕以助濕乎夫脾最惡濕必得腎火

辨證錄

卷之九 痰症

三

以燥之則汙泥之土始成膏壤水入脾中散精而無留伏之害惟腎火衰微不能生脾土而脾土愈濕土濕自易成痰又加天地之水氣兩相感召則濕以添濕痰更添痰矣治法補腎火以生土補火之藥仍于補脾之中用之則火無亢炎之禍土有健順之宜方用五苓散治之白朮一兩猪苓三錢澤瀉二錢茯苓一兩肉桂三錢半夏三錢水煎服一劑臍下之悸除二劑肢節背心之疼痛止三劑痰飲盡消四劑全愈五苓散乃利水之神劑也肉桂溫命門之火更能引濕痰化水盡趨于膀胱而出尚恐舊痰已化而新痰又生故加入半夏以消之助苓朮之醒脾尤能奏健土之功也土生火中火旺土內一方而火土兩安脾腎兼補此五苓散之功也

此症用制涎湯亦效
茯苓薏仁白朮山藥各五錢肉桂一錢半夏二錢水煎服

人有陰虛枯槁肺氣困乏噎塞喉乾咯痰動嗽此肺氣之燥也夫肺之燥必非一日夏傷于熱秋必病燥肺屬金而金最畏火夏火炎炎肺金不能敵火氣之剋耳但金既畏火尅即宜發燥何待火退金旺之時反現燥象不

辨證錄

卷之九 痰症

登

知金畏火刑而金尚出其肺中之液猶可以敵火氣之炎迨火令既過金無所畏不足之氣形焉轉難濟肺氣之乏勢必求外水以止渴然而外水止可入胃終不可入肺且肺氣既燥肺難自顧何能下生腎水乃腎中取給又不免則燥且益燥咳嗽吐痰之症生矣治法似宜補脾胃以生肺金矣然健脾胃助胃之藥性多燥烈以燥投燥則肺中之津液未能遽生反足以添其火炎必須於潤肺之中而大補其腎水腎水足而肺金得養子富而母自不貧也且肺金之氣夜藏于腎向因腎涸力

辨證錄

卷之九 痰症

空

難迎肺金以歸藏于腎之內肺乃取給于腎而腎之水不足以供肺之用肺乃半途而返不忍入于腎子之宮腎見肺金之燥出其涸竭之水以濟之涸竭之水水中

潤四劑腎潤十劑全愈此方用二冬以潤肺用熟地茱萸以補腎肺腎相通加人參五味以益氣氣旺而津液尤易生也又恐過于補腎而不上走益肺故加升提之味使益肺多于益腎尚慮用參以助燥更入蘇子甘草使之調和于上焦之間同白芥子以消膜膈之痰又不動火以增燥亦何致有痰嗽之患哉

此症亦可用潤稿湯治之
熟地麥冬葶藶各一兩甘草五分百合五錢貝母一錢水煎服

辨症錄

卷之九 痰症

空

小兒痰氣壅阻竅隧不開手足逆冷有如風症人以爲慢脾風也誰知是脾虛而痰盛乎夫小兒以脾健爲主脾土不旺則所食之水穀盡變爲痰痰氣既盛則經絡之間無非痰結竅隧閉塞氣即不能展舒矣脾主四肢手足者脾之所屬也脾氣既不能展舒何能運動夫手足乎此逆冷之所以成而非外風之中也風性甚動而且急使真有風入則疾風暴雨勢不可當安有迂緩舒徐者乎無奈前人巧立名色謂是慢驚之風創造黃牛犀角蛇蝎等藥以療之遂至殺小兒如草菅深可痛惜使早用健脾之劑少佐之以祛痰之藥則無兒不可活也方

用健土開涎散人參五分茯苓二錢陳皮三分薏仁二錢乾薑二分砂仁一粒白朮二錢天花粉五分水煎服一劑風定二劑痰消三劑全愈此方健土以消痰與六君子湯不相上下然六君子用半夏以消痰未免有耗氣之失不若此方專利脾中之濕又能通氣溫中更勝于六君子也倘執此方概治小兒之痰庶幾全活者眾矣

此症用健運湯亦佳

人參一錢茯苓三錢甘草枳殼蘇葉半夏各三分益

智仁三粒白朮

薤一粒水煎服

辨症錄

卷之九 痰症

癸

人有老痰結成粘塊凝滯喉嚨之間欲嚥不下欲吐不能人以爲氣不清誰知是肝氣之甚鬱乎此等之痰必成黃穢之色蓋留于膜膈之上也老人虛人最多此痰非舒發肝木之氣斷難消然徒舒肝木之氣不大補肝中之血則脇間之燥不能除膜膈之痰亦不能化然而肝中之血腎水之所滋也補肝必須補腎而兼消痰方用潤燥破痰湯白芍一兩香附一錢青黛五分天花粉二錢白芥子二錢玄參五錢茯苓三錢山藥三錢水煎服一劑痰易吐二劑痰易嚥矣連服四劑而痰塊開矣

再服四劑而老痰盡消此方肝腎兩治肝氣宣而肝血養則肝火不搏聚于胸中自然老痰不凝滯於膈內惟是老痰最難速化此方必須多用但不可責其近功耳

此症用寬膜湯亦效

白芍三錢枳殼三分甘草五分神麩三錢白芥子三

錢炒梔子一錢白朮二

錢薛全一錢水煎服

人有痰在膈上大滿大實氣塞不能伸藥祗而不得下人以爲邪在上也誰知是邪在下乎夫上病宜療下何以古人用上治吐法而能愈乎此亦一時權宜之法非可常用之道世人遵張子和之教一見滿實之症便用吐

辨症錄

卷之九 痰症

癸

藥誰知儘可不吐哉凡見實滿之症下之自愈但下不同耳下之者乃祛入胃中非祛入腸中也痰涎上壅于膈原是胃氣之盛而本于胃火之盛也瀉胃火之有餘自然現胃氣之不足胃氣無滿實之象膈中滿實安能重滿重實耶勢必痰氣頓消盡落于胃中矣何必湧痰下吐損傷胃氣使五臟之盡反覆哉方用降痰舒膈湯石膏三錢天花粉三錢厚朴一錢枳殼一錢半夏二錢茯苓五錢益智仁五分水煎服一劑滿實平二劑滿實盡除痰亦盡下此方瀉胃火而降痰實有奇功雖其性

亦迅烈不平然勝于吐法實多也世人欲用吐法者先用此方不效後再用吐藥有益于生命無窮幸勿哂醫學平庸謂用藥之胆怯也

此症亦可用伸屈湯治之
瓜蒌三錢半夏三錢枳殼一錢甘草一錢水煎服

人有遍身俱長大小之塊累累不一人以為痰塊也誰知是氣之不行而痰因結之而不散乎夫怪病多生于痰身中長塊亦怪病之一也然而痰生塊結必有其故蓋痰之生本于濕塊之結成于火故無濕不能生痰而無痰不能成塊第痰之生也雖生于濕塊之成也雖成于

辨症錄

卷之九 痰症

辛

火苟氣旺而濕又何留濕苟不留火又何從而起是消塊不必去火惟在于消痰亦不必全消夫痰又在亟補其氣蓋氣旺則痰消痰消則塊亦消也方用二陳湯加味治之人參三錢茯苓三錢白朮五錢陳皮二錢半夏三錢白芥子三錢薑炒黃連五分水煎服十劑消半三十劑全消此方本消痰之聖藥亦消塊之神劑塊成于痰消痰即所以消塊也

此症亦可用礬石消壘散
澤瀉半夏各三錢茯苓神白朮各五錢薏仁一兩附子二分人參二錢甘草五分白芥子一錢黃連三分水煎服十劑自消

人有性喜食酸因多食清梅得痰飲之病日間胸膈中如刀之刺至晚而胸膈痛止膝骨大痛人以為胃中之寒誰知痰飲隨氣升降而作痛乎夫痰在上宜吐痰在中宜消在下宜降今痰飲在胸膈之間是痰在上焦也不可用消痰降痰之法必當用吐藥吐之惟是吐痰必傷其氣毋論大吐之後使臟腑反覆多傷胃氣而多食酸味之人則肝木必旺而恣肆其橫逆之勢以傷中州之土矣土傷則胃氣更損雖久積之痰頓失新長之痰安保其不再聚乎治法於吐中而仍行其補胃平肝之法

辨症錄

卷之九 痰症

辛

使痰去而正又不虧之為得也方用參蘆一兩瓜蒂七枚白芍一兩白芥子一兩竹瀝二合水煎服一劑必大吐盡去其痰其痛如失然後用二陳湯調理不再痛前方名為例痰湯用參蘆以扶胃土用白芍以平肝木用白芥子竹瀝共入于瓜蒂之中吐痰即用消痰之藥使餘痰盡化舊痰去而新痰不生得治痰之益又絕其傷氣之憂也

此症用參蘆飲亦佳
瓜蒌三錢甘草一錢半夏三錢蘇葉三錢竹瀝一分陳皮一錢水煎服

人有偶食難化之物忽然動驚因而飲食減少形體憔悴

面色黃瘦顛寒作熱數載不愈人以爲勞瘵之症也誰

知痰曩其食而不化乎夫傷食之病未有手按之而不

痛者况痰曩其食其痛尤甚何以經歲經年而人未知

也且食至歲月之久宜當消化何久留在腹乎不知食

因驚而留于腹者食存于兩脇之旁外有助骨護之手

按痛處不能及也食因痰曩痰既不消食亦不化故有

留中數載仍爲舊物人所未知也兩脇之地乃肝木之

位痰食積于中自生如瘡之症發寒發熱狀似勞瘵以

瘵症彙

卷之九 瘵症

三

勞瘵治之則驚氣不解而痰食如故病何能愈哉治法

開其驚降其痰食數載之病一朝可去方用釋驚湯治

之白芍一兩當歸五錢青木香三錢大黃三錢枳實一

錢白芥子三錢茯苓三錢枳壳一錢甘草五分麥芽一

錢山查十粒水煎服一劑而痰食盡下不必再劑此方


消痰降食專走于兩脇之間開其驚氣故奏功如神耳

此症用易消散亦效

山查三錢麥芽三錢白木一兩當歸一兩茯苓三錢

半夏三錢附子

一片水煎服



辨證錄卷之十

山陰陳士鏗敬之甫號遠公又號朱華子著述

會稽陶式玉尚書號存齋又號 叅訂

鶴膝門

人有足脛漸細足膝漸大骨中痠疼身漸瘦弱人以爲鶴

膝之風誰知水濕之入骨乎夫骨最堅硬濕邪似難深

入何竟入於膝乎此因立而行房所成也凡人行房必

勞其筋骨至於精泄之後則髓必空虛髓空則骨空邪

即乘其虛空而直入矣若膝則筋骨聯接之處骨靜而

辨證錄

卷之十

十一

膝動能變而靜不能變也不變者形消能變者形大

但其病雖成於腎精之虛而治病斷不可單治其腎因

所犯者濕耳濕乃陰邪陰邪必須以陽氣祛之腎之精

陰水也補精則精旺陰與陰合陰無爭戰之機不戰而


邪何能去故不當補精而當補氣方用蒸膝湯生黃芪

八兩金釵石斛二兩薏仁二兩肉桂三錢水煎二碗先

服一碗即擁被而卧覺身中有汗意再服第二碗必兩

足如火之熱切戒不可坐起任其出汗至汗出到湧泉

之下始可緩緩去被否則萬萬不可去也一劑病去六



半再劑病全愈此方補氣未免太峻然氣不旺不能週遍於一身雖用利濕健膝之藥終不能透入於邪所犯之處而祛出之也第大補其氣而不加肉桂之辛熱則寒濕裹住於膝中亦不能斬關直入於骨髓而大發其汗也至於絕不治風者以此病原無風也若作風治愈耗其氣安得取效哉

此症用加味芪桂湯亦妙

黃芪三兩肉桂三錢破故紙二錢牛膝三錢水煎服服必有大汗如雨二服愈

一鶴膝之症有二一本於水濕之入骨一本於風濕之入

辨證錄

卷之十

十一

骨也前條乃言水濕入骨未言風濕入骨之症大約水濕之病骨重難移風濕之症骨輕可走至於痠痛則一也雖然痠痛亦有微別水濕之痛在一處而不遷風濕之痛移來移去而無定治法不可徒治風濕也用散膝湯治之黃芪五兩防風三錢肉桂五錢茯苓一兩水煎服服後亦擁被而卧聽其出汗不必驚惶汗出愈多去病愈速夫黃芪原畏防風得防風而功更大吾多用黃芪正恐人之難受加入防風能於補中以行其氣得肉桂之辛散引入陽氣直達於至陰之中又得茯苓共入

膀胱利水濕之邪內外兼攻內既利水而外又出汗何風濕之不解哉惟是大汗淋漓人恐有亡陽之懼誰知用散藥以出汗若為可慮今用黃芪補氣以出汗乃發邪汗而非損正汗也邪汗能亡陽正汗反能益陽耳所以二劑而收全功也

此症用薤木防

桑湯亦效

防風三錢桑葉二兩陳皮一錢破故紙二錢薤仁一兩白朮一兩水煎服亦必出大汗而愈只消一劑也

辨證錄

卷之十 風

三

癘風門

人有頭面身體先見紅班後漸漸皮破流水成瘡以致鬚眉盡落遍身腐爛臭穢不堪人以為大麻風也誰知是火毒結成之病乎大麻風之病南粵甚多以其地長蛇虫熱毒之氣裹住於皮膚之間濕蒸之氣又藏過於肌骨之內故內外交迫蘊結不能遽宣反致由班而破由破而腐也此係最惡之病不特南粵多生此病也蓋毒氣何地蔑有濕熱乃天地所成正不可分南北也治法必以解毒為先然而近人元氣虛者甚眾徒瀉其毒未必不先損其正惟是補正又恐引邪入內要當於補中散邪為妙方用散癘湯蒼朮三錢熟地一兩佐參一兩蒼耳子三錢車前子二錢金銀花二兩薏仁五錢水煎服連服十劑可半愈也再服十劑必全愈此方補腎健脾又有散風去濕化毒之品則攻補兼施正旺而邪退也倘純用寒涼或全用風藥鮮有奏功者矣

辨證錄

卷之十 癘風

四

此症用黃金湯亦效
 大黃五錢金銀花半斤水煎汁三碗分作三次服一日服完必然大瀉惡糞後單用金銀花三兩連服十日全愈
 人有生大麻風者不必盡在兩粵之中往往居於兩粵之

辨證錄 卷一〇

外而亦生者人以火毒之入身也誰知感酒濕之毒而成之者乎夫酒氣薰蒸最能害人或卧於酒槽之上或坐於酒缸之邊皆能成病大約多得之行房之後蓋行房泄精則毛竅盡開酒氣易中其病與大麻風無異但兩粵之病必相傳染於家人父子之間獨感酒毒而成者止在本人而他人無恙也治法雖瀉火毒仍須兼化酒毒為妙方用解癘神丹茯苓三錢白朮五錢薏仁五錢黃連一錢玄參一兩金銀花三兩柞木枝三錢水煎服連用十劑未爛者可愈已爛者再服二十劑可愈也

辨證錄

卷之十

五

此方健脾去濕化毒解酒正氣無傷邪氣易退倘認癘風純是火毒單用祛毒瀉火之味置酒濕於不問非善治之法也然酒濕之毒何以別之聞酒香而生憎飲美醞而添疼此乃感酒毒而成者也倘若聞酒香而流涎飲美醞而作癢者非感酒毒乃感火毒也
 此癘成於酒毒亦可用黃金湯加柞木枝五錢煎前服之得瀉而愈

遺尿門

人有夜卧遺尿者其人畏寒喜熱而黃體怯大便溏泄小便必勤人以爲小腸之虛誰知腎氣之虛乎夫腎與膀胱爲表裡膀胱之開闔乃腎主之也蓋膀胱奉令於腎腎寒則膀胱自不尊腎之令故腎不閉而膀胱亦不閉也治法約腎之水而水寒不若溫腎之水而水縮也方用溫泉飲白朮一兩巴戟天一兩益智仁三錢肉桂一錢水煎服一劑卽止遺連服四劑不再遺矣此方脾腎兩補之法肉桂溫命門之寒益智斷膀胱之漏且白朮通腰臍之氣自然病與藥宜蓋遺尿之病雖成於腎寒亦由腰臍之氣不通則水不走於小腸而竟走於膀胱也通其腰臍之氣則水迂迴其途自走小腸小腸與心爲表裡而心氣能攝之而不遽遺也且白朮又上能補心之氣心氣虛則水瀉心氣旺而水又難瀉矣心腎交而泉溫亦心腎交而泉縮矣

此症可用莢朮
益桂湯治之
山茱萸五錢白朮一兩肉桂一錢益智仁一錢水煎服

人有年老遺尿者不必夜卧而遺也雖日間不睡而自遺

辨證錄

卷之二

六

辨證錄

卷之十 遺尿

七

較前症更重此命門寒極不能制水也夫老人孤陽何至寒極而自遺乎蓋人有偏陰偏陽之分陽旺則有陰虛火動之憂陽衰則有陰冷水沉之患少年時過泄其精水去而火又何存水火必兩相制者也火無水制則火上炎水無火制則水下泄老人寒極而遺正坐水中之無火耳惟是補老人之火必須於水中補之以老人火衰而水亦不能甚旺也方用八味地黃湯熟地一兩山茱萸一兩山藥五錢茯苓二錢澤瀉一錢丹皮一錢附子一錢肉桂一錢水煎服連服二劑溺卽止矣服十日全愈約照此方分兩修合丸散每日服一兩永不再遺八味地黃湯正水中補火之聖藥水中火旺則腎中陽氣自能通於小腸之內下達於膀胱膀胱得腎之氣能開能闔一奉令於腎何敢私自開關聽水之自出乎氣化能出卽氣化能閉也惟是八味湯中茯苓澤瀉過於利水老人少似非宜丹皮清骨中之熱遺尿之病助熱而不可助寒故皆略減其分量以制桂附之橫斟酌得宜愈見八味湯之妙然此方但可加減而不可去雷加減則奏功去雷則寡效也

此症亦可用助

老湯治之

熟地一兩山茱萸一兩益智一錢肉桂二錢遠志一錢炒棗仁五錢人參三錢北五味二錢水煎服

人有憎熱喜寒面紅耳熱大便燥結小便艱澀作痛夜卧

反至遺尿人以爲膀胱之熱也誰知是心火之炎亢乎

夫心與小腸爲表裡心熱而小腸亦熱然小腸主下行

者也因心火太盛小腸之水不敢下行反上走而顧心

及至夜卧則心氣趨於腎小腸之水不能到腎只可到

膀胱以膀胱與腎爲表裡到膀胱卽是到腎矣然而勝

胱見小腸之水源欲趨腎意不相合且其火又盛自能

辨證錄

卷之十 遺尿

八

化氣而外越聽其自行全無約束故遺尿而勿顧也治

法將瀉膀胱而膀胱無邪將補膀胱而膀胱又未損正

然財奈何瀉心火之有餘而遺尿自止矣方用清心蓮

子飲加減治之茯苓三錢麥冬三錢竹葉二十片蓮子

心三錢黃連二錢白芍五錢陳皮五分丹皮二錢天門

冬三錢紫苑一錢玄參二錢水煎服一劑少利再劑大

利三劑全愈此方專清心火不去止小腸之水蓋此等

遺尿愈止而愈遺也

此症亦可用加減逍遙散治之
茯苓白芍當歸車前子各五錢山藥丹皮各三錢柴

胡黃連各一錢人參五分陳皮三分甘草五分水煎服

辨證錄

卷之十 遺尿

九

脫肛門

人有脫肛者一至大便則直腸脫下而不肯收久則澀痛人以為腸虛下陷也誰知陽氣之衰不能升提乎夫脫肛之症半成於脾泄泄多則亡陰陰亡必至下墜而氣亦下陷腸中濕熱之污穢反不能速去為快於是用力虛努過於用力直腸隨努而下矣迨至濕熱之邪已盡脫肛之病已成必須升提陽氣佐之去濕去熱之劑然而提氣非用補氣之藥則氣不易升補氣不用潤腸之味則肛無難脫要在兼用之為妙也方用提腸湯人參

辨證錄

卷之十 脫肛

十

三錢黃芪五錢當歸三錢白芍一兩升麻一錢茯苓三錢槐米一錢薏仁五錢水煎服連服四劑肛腸漸升而人再服四劑不再脫此方補氣以升提則氣舉於上焦一身之滯氣自散潤腸則腸滑濕熱自行矣

此症亦可用加味補血湯

黃芪當歸各五錢升麻一錢北五味子十粒連服十劑全愈

人有不必大便而脫肛者疼痛非常人以為氣虛下陷也誰知大腸之火奔迫而出之乎夫大便屬金原屬於肺肺與大腸為表裡休戚相關大腸不勝火氣之炎燒不

得已欲求救於肺而肺居膈上遠不可救乃下走肛門聊為避火之計肛門既屬於肺大腸畏火豈肛門獨不畏火耶况魄門與大腸既有同氣之好禍難相救寧忍坐棄故以己之地方甘心讓客而已身越境以避其氣此肛門直腸所以脫出於糞門之外也疼痛者火焚被創無水以養故乾燥而益疼也此等之病用升提之法全然不效反增其苦楚蓋升提之藥多是陽分之品陽旺則陰虛陰虛則火益勝安有取效之日哉治法宜急瀉其腸中之火火息而金自出矣然而大腸之火不生於大腸也胃火盛而大腸之火亦盛腎水乾而大腸之水亦乾單治大腸之火而不瀉胃中之火單治大腸之水而不益腎中之水則大腸之水不生而大腸之火亦不息何以使大腸之氣返於腹中肛門之腸歸於腸內哉方用歸腸湯玄參一兩石膏三錢熟地一兩丹皮三錢當歸三錢地榆三錢槐花二錢荊芥炒黑三錢水煎服一劑痛安再劑腸升三劑全愈此方胃腎同治兼去清大腸之火水源不斷則火氣自消有不急返者乎客去而主歸此必然之理也

辨證錄

卷之十 脫肛

十一

此症用榆地玄
歸湯亦效

地榆三錢當歸一兩玄參一兩生
地一兩水煎服連用十劑全愈

辨證錄

卷之十 脫肛

主

強陽不倒門

人有終日舉陽絕不肯倒然一與女合又立時泄精精泄
之後隨又興起人以爲命門之火誰知陰衰之極乎夫
陰陽原兩相平者也無陽則陰脫而精泄無陰則陽孤
而勢舉二者皆能殺人彼此相較陰脫之症驟而死陽
孤之病緩而死似乎驟而死者難治緩而死者易醫而
孰知陰脫之症其陽不絕補陽可以攝陰陽孤之病其
陰已涸補陰難以制陽蓋陽生陰甚速陰接陽甚遲故
脫陰留陽者往往可援孤陽無陰者每每不救耳雖然

辨證錄

卷之十 強陽

主

陰根於陽補陽而陰可生安在陽不根陰而補陰即不
能生陽乎使強陽不倒之人尚有一線之陰在則陰必
可續而可生陰既生矣則陽不爲孤陽陰日旺而陽日
平誰謂非死裡求生之妙法乎方用平陽湯玄參三兩
山茱萸一兩沙參二兩地骨皮一兩丹皮一兩水煎服
連服二劑而陽不甚舉矣又服四劑陽又少衰矣再服
四劑陽平如故此方純是補陰之藥更能涼其骨中之
髓又恐過於純陰與陽有格格不入之意復加入山茱
萸陰中有陽也使其引陰入陽以制其太剛之氣真善

於制剛也倘見其火旺之極妄用黃柏知母以寒涼折之毋論水不可以滅火反激動其龍雷之怒陰不能入於陽之中陽反離夫陰之外有不至於死亡而不可得也

此症亦可用濟陽湯治之
熟地二兩玄參麥冬沙參各一兩久服自安

人有終日操心勤於誦讀作文之時刻苦搜索及至入房又復鼓勇酣戰遂至陽舉不倒胸中煩躁口中作渴兩目紅腫飲之以水不解以為陽旺之極誰知心腎二火之齊動手夫心腎無一刻不交心交於腎則腎火無

辨證錄

卷之十 強陽

古

飛騰之禍腎交於心則心火無亢烈之憂若日勞其心則心不交於腎夜勞其腎則腎亦不交於心心腎不交則水火無既濟之好覺一身上下無非火氣於是心君失權腎水無力而命門之火與心包之火反相合而不相離骨中髓動髓海煎熬肝中龍雷之火亦起而相應三焦之火亦且附和以助其炎上之勢火盡上升陽無所寄勢不得不仍歸於下下又難藏因走於宗筋陰器之間陽乃作強而不可倒矣此等之病至危之症也非迅解二火陽何能倒然解火又禁用寒涼以直折其火

蓋二火乃虛火而非實火惟有引火歸經少用微寒之品以退其浮遊之火則火自歸源而鮮決裂之虞方用引火兩安湯玄參一兩麥冬二兩丹皮五錢沙參一兩黃連一錢肉桂一錢水煎服一劑而火少衰二劑而陽乃倒矣連服四劑而火乃定減黃連肉桂各用三分再服數劑兩火不再動矣此方補陰以退陽補陰之中又無膩重之味得黃連肉桂同用以交心腎心腎合而水氣生水氣生而火自解况玄參麥冬沙參又是退火之味仍是補水之品所以能退其浮遊之火解其亢陽之

辨證錄

卷之十一 強陽

古

禍也

此症亦可用加減濟心丹
人參炒棗仁各五錢熟地玄參麥冬丹皮各一兩蓮子心茯苓各三錢水煎服四劑即安

發斑門

人有身不發熱胸脇之間發出紅斑不啻如絳雲一片人以為心火熱極誰知胃火之鬱極乎夫胃火本宜炎上何鬱滯不宜蓋風寒外束之也火欲外出遇寒遏抑之則火不得出而內藏然而火蘊結於胃中終不能藏之也於是外現於皮膚發紅雲之斑矣此時以涼藥逆投之則拂其熱之性而變為狂以熱藥治之則助其火之勢而增其橫必須以風藥和解之為得又不可竟用風藥也大約火旺者水必衰不補其水僅散其火則胃中

辨證錄

卷之一 發斑

十六

燥熱何以解氛不得風而愈揚乎誠於水中散其火則火得水而有制水佐風而息炎斑且消滅於烏有斷不至發汗以陽以成不可救之症也方用消紅湯乾葛二錢玄參一兩當歸一兩芍藥五錢升麻一錢生地一兩麥冬一兩甘草一錢天花粉二錢水煎服此方補陰以制火涼血以化斑但用散而不用寒但用和而不用戰自然鬱宣而熱滅水旺燥除何斑之不盡消哉

此症用散雲湯亦神

葛根三錢青蒿五錢生地一兩玄參一兩升麻一錢貝母三錢麥冬五錢水煎服二劑愈

人有滿身發斑非大塊之紅赤不過細小之斑密密排列

斑上皮膚時而作癢時而作痛人以肺火之盛也誰知肺火之鬱乎蓋肺主皮毛肺氣行而皮毛開肺氣鬱而皮毛閉其所以鬱者以心火刑金外遇寒風之吹肺火不得達於皮毛而斑乃現矣然則肺之生斑仍是內熱之故治法仍宜瀉火然火鬱於皮毛不用解表而驟用瀉火之品反能遏抑火氣不向外達反致內攻勢必至表症變為裡症尤可虞也故必須散表之中佐以消火則散斑自速也方用散斑飲玄參五錢升麻二錢白芷

辨證錄

卷之十 發斑

十七

一錢荆芥二錢甘草一錢麥冬五錢生地一兩黃連一錢天花粉二錢水煎服一劑斑消二劑全消此方散多於清者以清火則火愈鬱而氣不宜散風則風盡解而火亦息也

此症亦可用蘇葉解斑湯

蘇葉三錢生地三錢麥冬五錢甘草一錢桔梗二錢升麻一錢貝母二錢當歸五錢水煎服二劑愈

火丹門

人有身熱之後其身不涼遍身俱紅紫之色名曰火丹人以為熱在胸膈誰知熱在皮膚乎夫火丹似與發斑相同何分二名不知二病熱雖相同而症實各異蓋發斑者紅白相間也火丹者一身盡紅也發斑熱鬱於內而發於外火丹熱鬱於外而趨於內發於外者有日散之機趨於內者有日深之勢故發斑之症輕火丹之病重然不知消火之法輕者未必不變為重苟知散鬱之方重者亦變為輕也故治火丹之病補其水之不足散其火之有餘使火外出不在內攻可也方用消丹飲玄參三兩升麻二錢麥冬一兩桔梗二錢生甘草一錢水煎服一劑丹化不必二劑此方用玄參解其浮遊之火以麥冬滋其肺金之氣用桔梗升麻表散於毛竅之間用甘草調和於臟腑經絡之內引火外行所以奏功神速耳

此症亦可用防
 桔湯治之
 防風一錢麥冬玄參各一兩桔梗三錢甘草一錢
 天花粉二錢黃芩二錢水煎服一劑輕二劑愈

人有赤白遊風往來不定小兒最多此症似乎發斑但發

辨證錄

卷之十 火丹

一

辨證錄

卷之十 火丹

一

斑有一定之根赤白遊風無一定之色人以為三焦之實火誰知是胃火之鬱熱乎夫胃火不鬱必有發汗出陽之禍正惟火鬱不宣則熱不在外而在內矣然而火盛自必由內達外而外又不可遽達於是或發於此而移於彼或現乎白而改乎紅竟無有定象耳論其治法自宜以清熱為主而清熱必須涼血然血寒則凝滯不行雖血能止火而終難散火必須行血以舒熱耳方用清火消丹湯生地一兩丹皮三錢甘草一錢玄參三錢牛膝二錢赤芍三錢荆芥二錢天花粉一錢水煎服連服三劑而丹消矣再服三劑全愈此方涼血而兼行血清火而並散火既無大寒之虞自無甚熱之慮鬱易開而火易達矣

此症用荆芥祛風湯治之
 荆芥二錢甘草一錢半夏五分麥冬五分當歸三錢白芍三錢水煎服

人有滿身發斑色皆黃白斑上有水流出時而作疼久之皮爛人以為心肝二經之火誰知脾肺之濕熱乎蓋火丹原有二症一赤火丹一白火丹也赤丹皮乾白丹皮濕赤丹屬心肝之火白丹屬脾肺之濕然而熱鬱於皮

毛則赤白乾濕一也夫濕從下受其病宜在下身何上
身亦成黃白之丹乎蓋脾爲肺之母脾病子願代母以
受其苦將濕氣分散於皮毛火熱亦隨之而外越然而
脾病肺尚不至十分之切膚所以濕熱之邪畏肺氣之
健不敢徑從皮毛而泄反畱戀於皮毛之中而色乃外
現黃白耳治法利其水濕之氣解其火熱之炎仍從膀
胱下走皮毛正不必外逐也蓋濕熱之盛原在脾不在
肺母逐其仇子有不隨之而共逐者乎所以祛其脾之
濕熱而肺中之濕熱不逐自散方用除濕逐丹湯防風

辨證錄

卷之十 火丹

干

三分蒼朮三錢赤茯苓五錢陳皮五分厚朴一錢猪苓
一錢山梔子三錢甘草三分白朮三錢薄桂三分水煎
服連飲數劑丹退而愈此方利水多於散火者以濕重
難消水消則火亦易消也

此症用桑白分

解散亦效

薏仁二兩澤瀉三錢升麻一錢天花粉
三錢桑白皮三錢神曲三錢水煎服

離魂門

人有心腎兩傷一旦覺自己之身分而爲兩他人未見而
已獨見之人以爲離魂之症也誰知心腎之不交乎人
身之心腎無刻不交心不交於腎則夢不安腎不交於
心則神發躁然此猶心病而腎不病腎病而心不病也
故夢雖不安魂猶戀於心之中神雖發躁魂尚依於腎
之內魂欲離而不能離也惟心腎之兩虧則腎之精不
能交於心而心之液不能交於腎而魂乃離矣雖然魂
藏於肝未聞藏於心腎也心腎虧而肝氣未傷則肝能

辨證錄

卷之十 離魂

主

藏魂何便至於離哉不知肝之母腎也肝之子心也肝
居於心腎之間腎虧則無水以生肝而肝傷矣心虧則
無液以耗肝而肝又傷矣肝傷則血燥血燥則魂不能
藏往來於心腎母不能生子不能養魂安得不離哉治
法似宜大補其肝血以引其魂之入肝矣然而魂雖入
肝心腎未補仍耗損肝木之氣魂即暫歸而復離必須
兼補心腎之爲得也方用攝魂湯生棗仁五錢麥冬一
兩熟地一兩白芍一兩當歸五錢山茱萸五錢人參一
兩茯神五錢遠志二錢巴戟天五錢柏子仁三錢白芥

子二錢水煎服一劑而魂合為一矣連服數劑不再離也此方心肝腎兼治腎水潤而肝不燥肝血旺而心不枯心欲交於腎而肝通其氣腎欲交於心而肝導其津自然魂定而神安神安而目一不至有岐視之分也

此症用合魂丹亦可治

人參五錢茯苓神三錢炒棗仁一兩熟地二兩蓮子心五錢巴戟天一兩水煎服一劑而魂合矣

人有終日思想情人杳不可見以至夢魂交接醒來又遠

隔天涯日日相思宵宵成夢忽忽如失遂覺身分為兩

能知戶外之事人以為離魂之症誰知心肝之氣鬱乎

辨證錄

卷之十

三

夫肝本藏魂氣鬱則肝氣不宜宜乎魂之不出矣不知

肝鬱必至尅脾思想又必傷脾脾土一傷即不能輸精

於心肝之內而心氣必燥肝又因鬱而血乾無津以潤

心則心更加燥心燥則肝氣不安日欲出氣以顧心而

情人不見心中拂抑愈動其鬱鬱極火炎而魂不願藏

於肝中乃隨火外出之為快魂既外出而軀壳未壞故

能回顧其身視身為二也治法必須舒肝氣之鬱滋心

氣之燥兼培其脾土使土氣得養生津即能歸魂矣方

用舒魂丹人參一兩白芍一兩當歸五錢白朮五錢茯

神五錢麥冬五錢丹砂末一錢菖蒲一錢柴胡一錢鬱金一錢天花粉一錢甘草一錢水煎服一劑而魂定二劑而身合為一矣此方心脾肝同治之法也而舒肝為甚病成於鬱解鬱而神魂自定然則舒魂丹即舒肝之丹也

此症用歸魂丹亦可治

白芍二兩人參五錢貝母香附各三錢鬱金一錢水煎服二劑而魂歸矣

人有狂症初起身在牀上能知戶外之人口中罵詈嫌家

人不出戶迎入人亦為離魂之病誰知胃火犯心乎夫

心火本生胃土有母子之誼何故犯心使心神之出外

辨證錄

卷之十

三

不知胃土乃心之嬌子也胃弱則心火來湊於胃胃強

則心火反避夫胃矣蓋心火寧靜胃火沸騰當胃火焚

燒之時胃且自身不顧安顧其父母乎其犯上作亂弑

逆之事往往不免故心君姑息寧下堂而走以避胃火

之焚燒所以心神外出成離魂之危病也夫魂既離身

宜隨出隨死何尚有一二日之苟延因心神雖出而心

氣猶未絕耳救法舍人參竹葉石膏湯別無二法然必

須大劑煎之恣其酣飲庶几可救否則尚在生死之間

也方中最宜多者石膏也其次必多人參大約石膏宜用二兩人參須用一兩兼而施之實奪魂之妙藥也倘因循不用或用此方畏首畏尾少用石膏人參均無濟於返魂也或謂多用石膏少用人參未爲不可嗟乎定狂原止藉石膏之多返魂非人參不可蓋魂已外越一時回宮必搖搖靡定若不多用人參何以安神使之不再離耶此人參之所以必當多用耳

此症單用玄參三兩水煎服二劑而魂不離也

辨證錄

卷之十 雜

雷

疰夏門

人有時值夏令便覺身體昏倦四肢無力朝朝思睡全無精神脚痠腿軟人以爲疰夏之病誰知腎水之虧乏乎夫夏令火炎全藉腎水之潤則五臟六腑得以灌注不至有乾燥之患然而夏日正當水衰人之腎水未有全旺者也凡人至夏雖多困倦但未若疰夏之甚疰夏者腎水虧乏乃冬不藏精之故也精不藏於冬火難勝於夏故困乏矣雖然夏令火勝多傷脾胃人之困乏自是脾胃之氣衰弱故也與腎水似乎無涉詎知腎中無水不能分潤於脾胃則脾胃水乾何能制外火之旺乎火無水制脾胃受火之刑則脾胃無津僅可自顧勢難轉輸於手足四肢無力精神倦怠亦其宜也治法必須健脾胃開胃爲主脾健胃開則所用飲食自然變化精微以生腎水又得補腎之藥以蒸動脾胃之氣則水土不相尅而相生何慮疰夏之病哉方用勝夏丹白朮二錢茯苓二錢陳皮三分人參五分北五味子三分熟地五錢山茱萸二錢神麴三分白芥子一錢山藥三錢芡實三錢炒棗仁一錢水煎服每日一劑服十劑精神煥發矣

辨證錄

卷之十 疰夏

五

脚氣門

人兩跗忽然紅腫因而發熱兩脛俱浮作疼作痛人以爲傷寒之病誰知是脚氣之症乎夫傷寒症中原有脚氣之門然而脚氣非傷寒也脚氣感染濕熱先從下受傷寒感冒風寒先從上受故傷寒乃陽症而脚氣乃陰病也夫濕熱下感宜從下治若用風藥散之濕邪反致上犯以風藥多陽升之藥也陽升陰邪一至犯心即死非陰變陽之謂也所以治脚氣之病斷不可以傷寒法治之宜下消其濕熱濕從下行身熱自解方用消跗散

辨證錄

卷之十 脚氣

一

苓一兩茵陳一錢防己一錢炒梔子一錢薏仁一兩澤瀉三錢木瓜一錢水煎服一劑小便利二劑身熱解再用二劑而脚腫消再服二劑全愈此方利小便之水使濕熱之氣盡從膀胱下泄總有邪氣無不盡散不必又去散邪也夫膀胱者太陽之經也風邪初入多在膀胱膀胱大利邪又何居况脚氣原無風邪不過膀胱氣壅下不行而上發熱今治下而下通上何不通之有上下氣通身熱自解一用風藥則引陰濕而入於陽分反成不可治之症矣散邪之藥斷斷不可用也是以脚氣之

病即生於冬月尚不可用散邪之藥矧春夏秋之令哉

此症用順導湯亦佳

茯苓澤瀉各五錢肉桂三分木瓜一錢龍胆草一錢車前子三錢水煎服

辨證錄

卷之十 脚氣

三

中邪門

人有無端見邪口中大罵以責自己口吐頑涎眼目上視怒氣勃勃人不可犯人以爲中邪之病誰知是中肝氣之邪乎夫邪各不同大約不離五行者近是而此病中邪實中木氣之邪也但邪之中人必乘人氣之虛而入倘人之肝氣不虛則木邪何從而入哉故治木邪者必須補正正氣旺而邪氣難留也雖然邪氣甚旺一味補正則邪且格拒而不許入須於補正之中佐之祛邪之味則邪自退舍而正氣日旺邪不必爭戰而暗散矣方

辨證錄

卷之一 中邪

三

用逐客湯柴胡一錢茯苓五錢半夏三錢白芍一兩炒
梔子三錢菖蒲一錢枳殼一錢神麩二錢甘草一錢白
朮三錢白礬二錢水煎服一劑神定二劑怒平三劑罵
詈止痰涎漸消四劑全愈此方平肝氣而瀉火補肝血
而化痰痰火既清邪又何藏况方中半是攻邪之藥木
邪即旺何敢爭戰乎有棄之而去矣

此症用定魂

湯亦妙

白芍二兩炒梔子三錢甘草一錢半夏三錢
肉桂三分枳殼一錢水煎服一劑而魂定矣

人有猝然遇邪一時卧倒口吐痰涎不能出聲發狂亂動

眼珠大紅面如火燒紅色髮或上指此中心氣之邪也夫心屬火邪中心宜火邪之犯心也然心君清淨之宮不可犯邪一犯即死斷不能邪附於身多延時日而死者此乃火邪犯膈中之府非犯心君之臟也第膈中爲心君之相臣邪入膈中逼近於心包絡犯邪心中驚戰謹閉其臟何能頒發討邪之令哉爲相臣者惟恐貽害於心君怒氣填胸上現於面目皆盡裂憤極而髮乃上指此邪激之使然也雖然邪之入也膈中招之不治膈中之虛而惟瀉火邪則正氣愈虧邪氣益旺非治法

辨證錄

卷之一 中邪

三

之善也方用助腑祛除湯人參五錢茯苓三錢甘草一
錢生棗仁三錢遠志二錢半夏三錢黃連二錢枳殼一
錢白薇二錢白芥子三錢水煎服二劑邪退此方助膈
中之正氣益之瀉火消痰之品則邪不敵正邪且自遁
消滅於無踪矣

此症用涼心

丹亦神

人參茯苓丹參各五錢黃連半夏各三錢吳茱萸五
分菖蒲一錢生薑五片麥冬一兩水煎服二劑即安

人有一時中邪目見鬼神口出胡言或說刀斧砍傷或言
弓矢射中滿身疼痛呼號不已人亦以爲中邪誰知是

中肺氣之邪乎夫肺屬金邪盛乘肺氣之虛而入自是金氣之邪其神必金甲將軍其鬼必猙獰之狀或斷頭折臂帶血淋漓者有之似乎邪從外入非由內召也然而肺藏魄者也肺氣一虛魄且外遊魄屬陰與神鬼原為同類其感召諸邪尤易入體且肺主皮毛肺氣虛皮毛之竅盡開邪乘空竅而入於腑由腑而入於臟又何難哉故治此邪必須治肺氣也但肺為嬌臟治肺之藥不能直入於肺則攻邪之藥何能直達於肺乎肺之所畏者火也肺之所喜者土也補其脾胃之土則肺之正

辨證錄

卷之十 中邪

三

氣自旺瀉其心經之火則肺之邪氣自衰於補土瀉火之中少佐以消痰逐邪之味可也方用助金祛邪丹麥冬一兩茯苓五錢黃連五分蘇葉一錢桔梗二錢甘草一錢白朮三錢人參一錢陳皮一錢天花粉三錢神麩二錢水煎服一劑心清二劑魄定三劑邪散矣此方心肺脾胃四經同治之法也攻邪之中不傷正氣所以正氣既回邪氣即散矣

此症用安魂散亦神

桔梗三錢甘草一錢青黛五錢百部一錢山豆根一錢人參三錢茯苓五錢天花粉三錢水煎服一劑即安

人有猝中邪氣眼目昏花或見婦女之妖嬈或遇兒童之嬌媚兩目注戀彼此調笑遂至心魂牽纏語滯亂低聲自語忽忽如失皆謂中邪然此邪乃腎氣之水邪也夫邪每乘人邪念而入古人云心正何懼邪侵故正氣未衰則邪正兩途烏能相併惟正氣既虛而邪念又起是予邪以入門之機也但腎有補無瀉今人之腎氣無不虛者腎虛宜正氣亦虛矣腎之有補無瀉者言腎之真陰非言腎之正氣正氣虛而邪火旺邪火旺而邪氣生所以正氣未瀉者雖真陰少虧邪不能入惟真陰大虧正氣又喪邪始得而憑之治法必須補腎之正氣邪氣不必治也蓋攻腎中之邪必損腎中之正故攻邪之法不在攻腎而在攻胃以胃為腎之關也邪在腎之關門而腎之正氣不能上通於心故作鄭聲之語搗其關門之邪正所以救腎也方用搗關救腎湯人參五錢白朮一兩山藥一兩茯苓五錢薏仁一兩白芥子三錢澤瀉三錢半夏三錢玄參五錢知母一錢厚朴一錢水煎服一劑痰涎消二劑心魂定三劑全愈此方治胃之邪仍是治腎之藥雙治之法也或謂治腎不宜治胃以胃

辨證錄

卷之十 中邪

三

仍是治腎之藥雙治之法也或謂治腎不宜治胃以胃

在上而腎在下也何以治胃而能愈不知入腎之藥必先入胃後入於腎故瀉胃邪即所以瀉腎邪也今兼治之則二經之間邪俱無藏身之地是以不必多劑即能奏功耳

此症用益智助神湯亦效

白朮熟地各一兩白芥子天花粉炒黑荆芥各三錢山茱萸巴戟天各五錢水煎服四服全愈

人有感邪氣於一時即狂呼大叫見人則罵大渴索飲身體出汗有似亡陽然而亡陽之症必然躁動中邪之病惟高聲呼叫而身臥於牀絕無有登高踰垣之事聽木

辨證錄

卷之十 中邪

書

聲而大笑聆人語而開顏見天光而若畏曠日色而如驚人以爲陽明之熱病也誰知是中土氣之邪乎夫脾胃屬土脾屬陰胃屬陽土邪多不正之氣故病兼陰陽所以難治也攻其陽而陰邪未去必有逗遛之患搗其陰而陽邪仍在更多狂越之炎必兼陰陽兩治邪始不敢停畱耳方用兼攻湯石膏五錢人參三錢白朮一兩厚朴二錢天南星二錢半夏三錢陳皮一錢麥冬一兩水煎服一劑神定二劑神安三劑全愈此方脾胃兼治瀉陽火以平胃祛陰痰以養脾胃胃氣旺則邪難侵正

人生以脾胃爲主土邪之相侵以土附土也何反稱難治不知正土之氣得邪土之氣相間則正土必崩土之正氣衰以致土之邪氣入可不急補正氣乎故諸邪襲人皆宜急補正氣而土邪尤宜補正倘徒攻其邪則十人十死不可不戒也

此症用培土飲

治之亦神效

人參三錢白朮一兩茯苓五錢半夏三錢附子三分玄參一兩水煎服二劑愈

人有爲鬼魅所憑經歲不愈裸體瞠目大詬且祛人不使近醫藥治之即傾於地無可如何人以爲邪氣之入心

辨證錄

卷之一 中邪

三

也誰知是火熱之在胃乎夫胃火一發多不可救何鬼魅憑之反不發狂乎蓋狂症乃自己發狂非己不欲狂而代爲之狂者也代爲之狂仍是祟而非病也第無祟者可以治狂而有祟者治狂而藥不能入口將奈何夫狂病未有不胃熱也熱病見水未有不心快柔順者也吾用水以解熱即用水以定狂方用軫水散用蚯蚓數十條搗爛投水中攪勻少頃去泥取此淨水一大盆放於病者之前切不可勸其飲水病者見之色喜必自飲之而安卧醒來狂定祟亦去矣夫祟最喜潔而惡穢

蚓入水則水穢矣穢宜鬼魅之所惡然而水則投病者之喜病者欲自飲祟不得而禁之也蚯蚓解胃中之惡又善清心故入口爽然也心清而熱又解祟又安能憑而復狂哉

此症用解魅

丹亦神效

白礬二錢甘草黎蘆一錢水煎執病人灌之一劑必大吐而愈不可再劑也

中妖門

人有偶遇妖狐歲久纏綿不肯遽去以致骨瘦形枯與死為鄰者本難治療以妖狐惟盜人之精也精為人生根本根實先撥僅存軀壳安得久乎雖然狐媚之盜人精者必使人昏迷而後取是乘人夢中竊之也苟用藥得宜尚可接續以夢中竊盜腎根未漓也若大補病人之精仍為狐媚所取漏卮又何能補必須用內外兼治之法狐媚可祛也內治方名為斷媚湯巴戟天一兩人參一兩熟地二兩山茱萸五錢茯苓五錢水煎服日日一劑外治方名為却媚丹花椒一錢生附子三分射香一分砂仁三粒細辛三分瓜蒂三枚三柰一錢各為細末用蜜調男搽陰莖頭上并根下女搽陰門內外狐見之必大罵而去不敢再犯一連七日敷之若來即敷其迹自斷而斷媚湯必須服一二月也內治之藥不過補其心腎之虧用外治方者以狐媚迷人先以唾送入人口入燕其津即刻昏迷彼即乘人之迷乃用舌戰人亦如夢非夢聽其口吮藥甚而忘其泄精也外治之藥皆狐媚所畏吾即因其所惡而制之也

此症用翰精

湯亦妙

熟地二兩巴戟天一兩肉蓯蓉麥冬各五錢
北五味一兩水煎服後宜便漱口即去

人有感遇蛇妖綢繆繆數月之後身體乾枯皮膚燥裂

宛如蛇皮之斑此蛇祟也蛇係至陰之物能盜至陽之

氣肺屬氣肺氣盡為蛇妖所吸則肺氣不能生津津枯

則肺無所養皮毛者肺之所主也內既不能養肺肺將

何津以養皮毛乎此燥裂如斑之形見也治法必須補

肺氣之不足然而補氣益助邪之所喜不若用解毒之

藥入之健脾利水之中則邪氣易散正氣可回耳方用

辨證錄

卷之十 中 妖

五

逐蛇湯白芷一兩白朮二兩蒼朮一兩車前子一兩水

煎服小便中必有黑氣噴出隨洩而泄也一連四服則

皮膚之斑少軟後以雄黃二兩白芷二兩各研細末滾

水煮數沸乘熱薰洗之如是者三日斑乃盡消仍服逐

蛇湯四劑而愈愈後再用四君子湯加味治之人參三

錢白朮一兩生甘草二錢茯苓三錢麥冬一兩天門冬

五錢百合一兩沙參五錢水煎服一月可復元也否則

蛇毒雖解羸弱之極恐變成癆瘵矣或問服逐蛇湯蛇

妖禁不許服奈何不知蛇最懼者白芷也將前藥在病

人房中煎之彼聞氣而疾遁矣何敢作祟乎但煎藥之
時不可令病人知道備藥之時亦不可令一人知也人
苟不知妖斷斷不覺耳

此症用蒼黃散亦神

人參三錢蒼朮雄黃各一兩煎湯沐浴數日即止祟

人有身體伶仃有皮無肉胸脇間長成鱗甲然健飯如故

人以為與龍交也然人與龍交則其人身雖變成鱗甲

必然有肉蓋其人為龍所愛豈有喪人性命之理且人

與龍交龍必轉與之精氣其人久且變龍遇風雨而化

去蓋龍壽萬年龍亦水中之仙也人變為龍即人化為

辨證錄

卷之十 中 妖

五

水仙耳安有僅存皮骨者乎然則前症非龍交也乃龍

盜人之氣故肉盡消耳雖然真氣為龍所盜則人宜死

矣何故猶存人世而胸脇長成鱗甲耶不知龍止吸人

之氣不吸人之精龍屬陽而惡陰人之精水屬陰故龍

不食也胸脇生鱗甲者龍吸人之氣不能一口吞嚥呼

吸之間以龍氣回冲而龍涎偶沾濡於人之胸脇遂至

生長鱗甲耳治法必須化龍之毒大補其真氣則無氣

可以生氣無肉可以長肉也方用解鱗丹人參三兩白

朮二兩茯苓一兩生甘草五錢肉桂二錢白礬二錢丹

砂末三錢麥冬五錢當歸一兩白芥子三錢水煎服一劑鱗甲盡消再劑氣旺減藥之半連服十劑人之肉生再服十劑全愈此方補氣為君少佐之白礬丹砂龍毒何以易消乎蓋白礬最能軟堅而化痰丹砂最化魚龍之毒二味入於補氣之中全無干礙所以合用成功也但丹砂必須同藥共煎切不可生用調服蓋丹砂生用無毒熟用則有毒取其以毒攻毒也或問龍吸人之氣則人之陽氣盡散宜胃氣消亡不宜健飯如故詎識胃為腎之關腎精未喪則腎火猶存腎火上蒸而胃火接續胃氣升騰所以可救倘胃氣消索雖有解鱗湯之奇亦無可如何矣

此症用增味補氣湯亦神

人參當歸各一兩黃芪二兩蒼朮三錢雄黃一錢水煎服服十日而鱗甲隱矣漸生肉也

人有山林之間偶遇少婦兩情眷顧遂與野合泄精如注倦極困臥醒來少婦已失所在玉莖微痛明日大痛三日之後腫如黃瓜之樣人以為野合浪戰之傷誰知是花妖之毒哉夫花木之精有何毒不知樹木歲久始能成精物經長久未有無毒者况花木經數千百年之後

其孔隙之間安保無蛇蟲所居得日月之靈氣雖已成精而毒氣畱存未化也雖然木氣慈仁花妖每不殺人不過盜人精氣以圖自化其身不意孔隙之間畱毒尚在以致玉莖腫痛花木之精不皆陰物有化老人者有化道士者有化秀士者不止化女人以迷惑男子也化女者多使人玉莖腫痛化男者反無恙耳所以老樹成精往往得婦人之精氣便能立變為人或投胎奪舍而去惟化女者未免貽害男子天所以惡其過而使斬伐之也故花妖每不能成人耳樹妖與花妖均盜人精氣

而樹妖得成正果者以其求道心切又不壞人天所以恕而成之也倘樹妖純盜人精氣不死不休者仍為天之所怒非遭斧斤之厄即遇霹靂之震耳玉莖腫痛妖再不至者畏天耳然人何以治之乎方用安陰湯生甘草五錢茯苓五錢蚯蚓二條葱二枝黃柏三錢水煎服一劑即消不必再劑也以渣再煎湯洗之此方用生甘草以解毒用茯苓以利水蚯蚓者最善消腫黃柏祛火葱能發散同羣共濟引毒直走膀胱從陰器而出毒出而腫自化矣

此症用射柏丹

外治亦佳

炒黃柏五錢射香一錢生甘草一錢各為細末香油調搽三日愈

人有邂逅少艾目挑心許或投以佩帶勾以語言遂至引

入家門兩相配合晨夕肆淫形體消瘦初不知其為山

魘也久則時隱時現常去常來彼必自稱仙子號曰真

人且能體病人所欲飲饌金物等項心思得之立時猝

至皆可用之而無疑惟是山魘來時必欲人盡去其衣

裸體而戰不似他妖之喜掩飾也此等之怪甚於花木

之妖輕於狐狸之祟蓋狐狸盜人之精不盡不止山魘

辨證錄

卷之十 中妖

望

止吸人之氣適可而止也然而狐狸之祟易祛山魘之

魅難遣以山魘亦具神通未便以草木之藥治之也夫

山魘陽妖耳陽妖自必喜陽而山魘則喜陰故逢女則

易合也然其性最喜潔惡穢裸體而戰者正恐女子之

穢其體也治法即以穢治之方用善穢湯犬肉二兩先

煮湯二碗入人參一兩紅鉛紙一片肉苁蓉三錢二蚕

沙三錢雞卵二枚山羊血一錢龍骨末一錢秋石一錢

水煎服山魘知煎此湯必在房中大罵須令人鑼鼓喧

天大鬧於房外彼必大笑然後以此湯灌病人之口得

飲一口山魘知之大笑而去乘其去後急以狗血塗病
人之面與下身不便之處少頃彼必再來見此等形狀
斷必絕交不再至也此乘其好潔而亂之也

此症用蒼狗湯

治之亦神

蒼木一斤狗血一斤和在一處水一斤再和一處

煎敷沸將病人身體遍擦彼必大罵而去所擦之人
亦將血水擦面妖即不能暗擊矣但煎藥

之時須在鄰舍無人處煎之妖不能知也
人有遊於洲渚之間或遇矮人或見長老鬚眉頰白道貌

可觀引至其家談心論性時往時來莫能踪跡此有道

之士即是怪物何必拒之間有化秀士以鬪風流變妖

辨證錄

卷之十 中妖

望

姬以逞姣好乃美言相挑以珍物相贈人為所惑遂至

野合久之採戰吸精盡情縱慾人逐之而不避人罵之

而生噴飛沙走石壞屋倒廬世多不識其怪誰知是魚

鱉元龜之族哉夫水族之怪不能離水何以登岸而作

祟耶不知凡物之偷生於世者年至千歲皆能變化為

人既能變化有何陸之不可遊行乎千歲之物往往出

而迷人者亦其慕道之心太切耳蓋人之氣最靈物得

之可以入道但其初心亦不過欲竊人之靈氣未常有

害人之念也故天亦置而不問迨既與人接欲盡取之

而後快遂動殺人之心於是作祟與妖之事起人始知是妖而謀共逐之矣治法又不同於祛他妖之法以他妖生於陸內魚鱉元龜生於水耳方用硫黃數兩研末煎湯遍洒於病人之室與病人之家房中時時燒之使氣味充閭彼必畏縮而不敢入更用蒼朮一兩白朮二兩煎湯日與病人服之更將二味之渣襍之硫黃煮薰病人之衣服褥被自此永絕其跡矣二木乃純陽之氣妖聞之最惡况加入硫黃相尅之物安得不畏避哉

辨證錄

卷之十

四

此症用遠邪餅亦神
胡椒四兩乾薑一斤炒蒼朮一斤各為末取蘆柴燒
灰和勻成餅在房內焚餅薰之三日
即斷跡矣如無蘆柴用炭末亦妙

中毒門

人有服砒礪之毒疼痛欲死苟不急救必至腐腸爛胃吐嘔紫血而死蓋砒礪乃天生之石未常經火煨煉何以毒至如此不知砒礪生於南岳之山鍾南方之火毒又經火氣則其氣大熱毒而加熱則酷烈之極安得不殺人耶且其性又善走下喉必升降於腸胃之上下腸薄皮穿人乃死矣天下毒藥之橫莫此為甚救法必須吐出其毒然而雖經吐出不能盡出其毒必須用解毒之味世人往往用羊血以吐之亦有能生之者但初下喉之人可救食之多時久入胃中則無益矣我有一方得之異人所傳久暫皆可救方名救死丹生甘草二兩瓜蒂七個玄參二兩地榆五錢水煎服一下喉即吐再煎渣服之又吐砒礪之毒必然全解甘草最善解毒得瓜蒂必上湧而吐砒礪原能上升故引之而盡出也然而砒礪又善下行得玄參地榆最解大腸之火毒砒之大毒從上而出走下者不過餘毒耳又得玄參地榆而解之則上下共相解氛毒何能施其燥烈之虐哉况玄參地榆俱是潤中解毒所以能制其酷也大約此方用之

辨證錄

卷之十一

中毒

四

十人中斷可救八人惟服下不能吐者此腸胃已壞不可救矣非藥之無效也幸人急救之可耳倘藥不及煎飲於飯鍋中煮前藥汁灌之庶不致因循失救也

此症用苦參湯救之亦神妙
苦參二兩煎湯一碗一氣服之即大吐而愈

人有服斷腸草者初則胸前隱隱作疼久則氣不能通及至腹痛大小便俱不能出而死夫斷腸草即鉤吻也至陰之物狀似黃精但葉有毛鉤子二個此物最善閉氣猶能使血不行動氣血閉塞故爾人死非腸果能斷也聞廣之間多生此物婦女小忿往往短見偷食覓死如

辨證錄

卷之十 中毒

吳

飴取其不大痛楚也世亦以羊血灌之得吐則生然亦有服羊血不肯吐者往往不救不知斷腸之草殺人甚緩苟用解毒通利之藥無不生者不比砒毒酷烈方用通腸解毒湯救之生甘草一兩大黃一兩金銀花一兩水煎服一瀉而愈不必二劑此方用金銀花生甘草以解其毒用大黃迅速以通其氣毒解氣通斷腸之草何能作祟哉

此症用白礬湯亦神

白芍三兩白礬五錢當歸丹皮各一兩柴胡三錢附子一錢水煎服一劑氣通即愈

人有食漏脯充飢致胸膈飽滿上吐下瀉大腸如刀割疼痛瀉不可止而死者有之夫漏脯即隔宿之肉食屋漏之水滴入而名之也似乎無甚大害何以成毒殺人此言歲久之屋樑塵甚多屋上必有蛇蝎行走塵灰倒掛係蜘蛛蛸蟻結成無非毒物天雨之水順流而下凡毒氣得水則化然化於水中也水入肉食之內毒將何往自然結於脯中而不化矣以毒物充飢安得不變生不測哉但世多食漏脯不死又是何故其屋必非歲久之屋未曾經蛇蝎行走故耳食之雖不至死病則斷不能

辨證錄

卷之十 中毒

吳

免所以漏脯為太上所戒倘人悞食疼痛吐瀉急用解毒之藥可以得生方用化漏湯山查三錢生甘草五錢大黃三錢厚朴三錢白芷二錢麥芽二錢水煎服一劑毒盡出矣二劑痛定不必三劑此方消其肉食則脯易變化後以大黃推蕩之白芷甘草從中解毒則順流利導易於祛除也

此症用山查湯妙

山查汁三大碗用山查肉三錢神麩三錢麥芽生甘草各三錢水一碗連汁同煎
取二碗頓服之吐瀉止即愈

人有飲吞鴉酒白眼朝天身發寒顛忽忽不知如大醉之

狀心中明白但不能語言至眼閉即死夫鳩毒乃鳩鳥之糞非鳩鳥之羽毛亦非鶴頂之紅冠也鳩鳥羽毛與鶴頂紅冠皆不能殺人不遇生病惟鳩糞則毒此鳥出於異國異國之人恐言鳥糞則人必輕賤故但名爲鳩以貴重之也此鳥非蛇蝎不食故毒勝於孔雀之糞孔雀之糞冲酒飲之有死不死鳩酒飲之則無不死矣蓋鳩毒性熱而功緩善能閉人之氣所以飲之人即不能語言發寒顫者心中熱也心脉通於眼中之大背心熱則目必上視眼閉而死者心氣絕而目乃閉也幸其

辨證錄

卷之十 中毒

四

功緩可施救療之法無如世人未知鐸逢異人之傳何敢自隱飲鳩者倘眼未閉雖三日內用藥尚可活方用消鳩湯金銀花八兩煎湯取汁二碗用白礬三錢寒水石三錢菖蒲二錢天花粉三錢麥冬五錢再煎一碗灌之一時辰後眼不上視口能出言再用前一半如前法煎飲二劑而愈斷不死也嗟乎鳩毒之殺人醫經並未言及可以救療者世人服鳩毒亦絕少似可不必傳方然而人事何常萬一有悞飲鳩酒者以此方救之實再生之丹也

此症用加味連草湯亦可救
黃連三錢生甘草一兩菖蒲一錢貝母三錢生薑汁半茶鍾竹瀝半茶鍾水煎一碗服之
即解不必二服得吐猶愈之速也

人有食鱉而腹痛欲死往往有手足發青而亡者夫鱉雖介屬本無大毒然鱉之類多屬化生有蛇化者有龜化者有魚化者龜魚所化俱能益人惟蛇最毒其鱉腹之下必有隱隱蛇皮之狀且其色大紅斷不可食食必殺人人苟悞食腹必大痛以毒氣之攻腸也手足發青者手足屬脾毒中於脾外現於手足也治法不可解鱉之味而仍當解蛇之毒方用白芷三錢雄黃末三錢山查

辨證錄

卷之十 中毒

四

一錢丹砂末一錢枳實一錢茯苓五錢水煎服一劑疼痛止二劑穢毒出矣不必三劑此方白芷雄黃俱是制蛇之藥而山查丹砂善化魚肉之味合而用之則鱉毒易消加入枳實茯苓者枳實最能去積茯苓尤能利水水族之物毒隨水化更易於解散耳

此症用駒溺

湯甚神

馬尿一碗生甘草一兩水煎服得吐即愈不吐即再飲二煎無不愈者

人有道途之間悞服濛汗之藥以致頭重脚輕口吐涎沫眼瞪不語此迷心之故也山東村店最多此藥乘其一

時心迷以取財物醒來多不記憶恍恍惚惚辨別不真其藥大約用天仙子為君加入狐心等物雖不至殺人然久迷不醒亦為可畏世人以涼水解之亦能少醒但涼水入心水停心下倘係虛人必變他症非解法之善也方用止迷湯茯苓五錢生甘草三錢瓜蒂七枚陳皮五分水煎服即大吐而醒其從前情景斷不遺亡不似涼水之解如醉如痴也蓋茯苓通其心生甘草解其毒陳皮清其痰寬其中又得瓜蒂上通使藥不停心一吐氣清神朗不至五臟反覆也或問漾汗藥必是痰迷心

辨證錄

卷之一 中毒

五

竅宜用生薑以開之何故不用未審止迷湯中可少投薑汁否耶不知漾汗藥中用天仙子居多天仙子得姜而愈迷其心矣故中其毒者斷不可輕與薑湯反致久迷耳

此症用解漾湯亦神效

黃連枳殼各一錢天花粉白芥子神麩人參各三錢

生甘草瓜蒌各二錢茯苓神五錢

附子一片水煎服一劑即解

人有遊兩粵之間或與婦女交好或與男子成仇多下毒毒於飲食之中人食之則面目漸黃飲食倦怠或一年或三載無藥解之必至暴死世傳蠱毒土人將各毒蟲

與蛇蝎等物投於缸中聽其彼此相食食完止存一物不死者取之以為蠱母此訛也蓋彼地別有蠱藥乃天生之毒也土人治蠱有方法可解大約皆用礬石以化蠱惟恐外人知之故秘而不言礬石清痰又善化堅蠱積於腹中內必堅硬外以痰包之所以一物兩用奏功頗神惟是人身柔弱多剛強者少又得蠱毒結於胸腹之間必然正氣大虛倘徒用礬石不更虛其虛乎必須於補氣補血之中而加用消痰化蠱之藥則有益無損始稱萬全方用破蠱全生湯人參一兩茯苓五錢當

辨證錄

卷之一 中毒

五

歸一兩生甘草三錢白礬三錢半夏三錢水煎服一劑胸腹爽再劑胃氣開三劑蠱毒漸消於烏有矣此方補氣血之虧化痰涎之魄正氣既旺邪氣自消况有攻堅消蠱之品蠱何能再聚而不散哉

此症用散蠱丸亦佳妙

白礬人於鴨蛋內火煨為枯礬後用茯苓一斤白木

一斤枯礬四兩同為絕細末米飲為丸

每日白滾水送下三錢不須服完愈

人有悞食竹間之葦或輕吞樹上之菌遂至胸脹心疼腹痛腸瀉而死夫葦菌之物亦芝草之類竹根樹柯生葦生菌者以土之濕熱也其下必叢聚蛇蝎惡蟲其氣上

騰葦菌得氣溫而不寒易於生發故較他產更加肥壯其味最美而其氣實毒也方用解菌湯救之生甘草二兩白芷三錢水煎服後乃用鵝翎掃其咽喉引其上吐必盡吐出而愈即或已過胃中鵝翎探引不吐亦必腹疼下瀉可慶安全蓋生甘草原是解毒之神品又得白芷最解蛇毒相助同攻自易下逐而盡消也

此症用白礬五錢瓜蒂七枚水煎服非吐即瀉而愈

人有食牛犬之肉一時心痛欲吐不能欲瀉不可此毒結於心胃不升不降也論理亦宜用吐法然亦有探吐之不應者夫牛犬乃資補精血之物何以有毒此必牛犬抱病將死未死之時又加束縛以激動其怒氣毒結於皮肉心肝之間人不知而食之適當其處故食而成病重至暴亡也治法消化其肉食佐之以解毒之品則脹悶一寬即可不死方用消肉化毒丹山查三錢枳壳一錢神麴三錢雷丸三錢厚朴一錢大黃三錢水煎服一劑而大下之則犬牛之肉盡消而出不必二劑然此方乃下逐之神方倘可上湧不必用此苟用吐法不效急用此方無不可救療也

辨證錄

卷之十 中毒

毒

此症用黃蘗飲亦神效

大黃當歸各五錢山查肉蘿蔔子各三錢枳壳檳榔各一錢柴胡五分丹皮二錢水煎服

人有一時短見服鹽瀘之毒必至口鹹作渴腹中疼痛身蹇脚縮而死夫鹽能補腎何便殺人不知鹽瀘味苦苦先入心心遇鹽瀘心氣抑鬱不通鹽瀘見心不受乃犯於腎腎見其味苦腎又不受遂往來於心腎之間心腎之氣不交而鹽瀘流入於腸而不可救矣蓋大小腸最惡鹽瀘入之必縮小其腸而成結腸結而氣又不通安得不蹇曲而死乎治法必用甘以解之方用生甘草三兩煎湯救之如服瀘未久生甘草湯中加淡豆豉一兩同煎飲之必吐如服已久生甘草湯中加入當歸二兩同煎飲之腸潤未必皆死也要在人活變耳

辨證錄

卷之十 中毒

毒

此症亦可用歸冬榆草湯救之生甘草二兩當歸一兩麥冬一兩地榆五錢水煎服

人有恣飲燒酒大醉而死其身體必腐爛臭穢夫酒為大熱之物况燒酒純陽無陰尤為至熱者乎多飲過度力不能勝一時醉倒熱性發作腐腸爛胃往往不免必須用井水頻撲其心胸解其頭髮浸頭於冷水之中候溫即易涼水後用解炎化酒湯救之人參一兩柞木枝二

兩黃連三錢茯苓五錢菖蒲一錢寒水石三錢水煎服
 一碗以冰水探冷灌之得入口中即不死矣此方以柞
 木解其酒毒黃連寒水石解其火毒菖蒲引入心中用
 茯苓以分消其酒濕之氣然必用人參以固真氣者使
 氣不隨酒俱散蓋燒酒係氣酒也熱極則氣易散越固
 其真氣而火可瀉毒可解也倘止瀉其火而解其毒火
 瀉毒解而氣脫矣氣脫而身將何在哉此人參之所以
 必用苟無人參以黃芪二兩代之可也

此症用龍湯
救之亦神妙

辨證錄 卷之十 中毒

毒

新引二十條葱四十條同搗爛如泥以井水二碗
澆過取汁一碗灌醉人口中即可保其不死也

人有愛食河魴以致血毒中人舌麻心悶重者腹脹而氣
 難舒口開而聲不出若久不治亦能害人大約肝經血
 燥而胃氣又弱者多能中毒蓋河魴乃魚中之最善怒
 者也食之自能動氣况肝經血燥之人則肝氣自急以
 急投急安有不增其急暴之氣乎氣急而腹難舒故心
 悶也氣急而聲難出故舌麻也治法吐出其肉則氣舒
 腹寬聲出而口閉何至有心悶舌麻之症哉方用瓜蒂
 散加味治之瓜蒂七枚白茅根一兩蘆根一兩水煎汁

飲之必大吐吐後前證盡解不必再服古人有拚死食
 河魴之語亦是愛食之也其實河魴不能殺人但與性
 怒者不甚相宜耳

此症用蘆姜湯
救之亦神效

神效三錢半夏二錢茯苓三錢蘆根
汁一碗生薑汁一合水煎一劑即安

辨證錄

卷之十 中毒

毒

腸鳴門

人有腸中自鳴終日不已噎氣吞酸無有休歇人以爲脾氣之虛也誰知是肝氣之旺乎夫肝木不鬱則脾氣得舒腸亦安然輪輓順流而下何至動不平之鳴耶惟肝木尅脾土則土氣不能伸而腸乃鳴矣蓋坤道主安寧者也惟地中有風震動之聲出如霆如雷非明驗乎故治腸鳴之病不必治腸治脾土而已亦不必專治脾土治肝木而已肝木之風靜脾土之氣自靜也方用安土湯白芍一兩白朮一兩柴胡一錢茯苓二錢甘草一錢

辨證錄

卷之十 腸鳴

五

蒼朮二錢神麴二錢炮薑一錢水煎服一劑少止二劑全止不必三劑此方脾肝同治之法肝平而脾氣得養矣脾安而腸氣得通矣不必止鳴而鳴自止者妙在行肝氣之鬱居多所以奏功特神耳

此症用香柅平

肝飲亦佳

炒梔子三錢茯苓白芍白朮各五錢
陳皮甘草各一錢香附二錢水煎服

人有飢餓之後腹中腸鳴手按之鳴少止者人以爲大腸之虛也誰知胃氣之虛乎蓋胃氣者陽氣也胃與大腸同合陽明之經胃屬足陽明大腸屬手陽明也故陽明

胃燥大腸亦燥陽明胃虛大腸亦虛大腸之糟粕必由

胃而入大腸氣虛必得胃氣來援今胃氣既虛僅可自顧安能分布於大腸此大腸匱乏所以呼號求濟於同經之胃而頻鳴也治法必須助胃氣之弱方用實腸湯黃芪一兩茯苓五錢山藥五錢白朮一兩甘草一錢神麴二錢五味子一錢肉果一枚水煎服一劑而腸鳴止連服四劑不再發此方大補胃中之氣絕不去實大腸治胃而腸鳴自止故即謂之實腸湯

此症用加味四

君湯亦妙

辨證錄

卷之十 腸鳴

五

白朮三錢茯苓二錢人參穀芽各一錢
甘草神麴各五分砂仁一粒水煎服

人有腸中作水聲者如囊裏漿狀亦腸鳴之病也誰知是水畜於大腸乎夫大腸之能開能闔者腎火操其權也腎熱而大腸亦熱腎寒而大腸亦寒大腸寒而水乃注於中而不化故作水聲也雖然大腸能容糟粕而不能容水水入大腸必隨糟粕而出何以但作水聲不隨糟粕而即出耶蓋大腸之下爲直腸直腸之下爲魄門乃肺操其政非腎操其政也肺憐腎之弱欲救之而無從未常不惡邪水之入腸也肺居上游不能禁邪水之不

入於腸實能斷邪水之不出於腸况大腸與肺為表裡
肺氣不下行大腸之氣亦因之而不洩魄門正肺之門
也肺門謹鎖大腸之水又何從而出乎所以愈積於其
中作嘔漿之聲也治法補命門之火兼利其水則水從
膀胱而化矣方用五苓散治之白朮五錢茯苓五錢猪
苓澤瀉各一錢肉桂三錢一劑而膀胱之水若決江河
而大出矣二劑而腹中之水聲頓息蓋五苓散本是利
水之聖藥我多加肉桂則腎氣溫和直走膀胱水有出
路豈尚流入大腸哉故不必治大腸而自愈也

辨證錄

卷十 腸鳴

癸

此症用消滯

飲亦效

茯苓山藥各一兩芡實五錢肉桂一錢車前子二錢水煎服

自笑門

人有無端大笑不止或背人處自笑異於平素者人以為
心家有邪熱也誰知心包之火盛乎其狀絕似有祟憑
之孰知絕非祟也倘祟憑其身必有奇異之徵不止一
自笑而已臚中為心之相過熱則權門威赫妄大自尊
縱欲窮奢無所不至隨地快心逢人適意及其後有不
必喜而亦喜不可樂而亦樂是豈相臣之素志亦權大
威傾勢驅習移而然也臚中火盛發而自笑正相彷彿
耳治法惟瀉心包之火笑自止矣方用止笑丹生棗仁
三錢黃連二錢犀角屑五分丹砂末一錢丹皮三錢生
甘草一錢麥冬三錢茯苓三錢丹參二錢天花粉二錢
水煎服一劑笑可止二劑笑全止三劑全愈此方瀉心
包之火仍是安心君之藥蓋心中清明包絡自不敢有
背主私喜之事故安心正所以安心包也

辨證錄

卷之十 自笑

癸

此症用蒲柏

飲亦效

菖蒲一錢玄參麥冬各一兩柏子仁三錢貝母一錢水煎服四劑愈

人有笑哭不常忽而自哭忽而自笑人以為鬼祟也誰知
積痰類祟乎夫心虛則不能自主或哭或笑之病生蓋

心氣虛而不能生胃而胃氣亦虛矣胃氣既虛水穀入胃不化精而化痰痰將何往勢必仍留於胃中胃苦痰濕之蕩漾必取心火之氣以相資而心虛不能生土痰即乘勢入於心宮心惡痰之相犯堅閉不納又恐胃土之沉淪故心癢而作痛也痛至則哭痛失則笑何崇之有治法以化痰之藥動其吐痰出而哭與笑皆愈矣方用茯苓五錢白朮五錢甘草三錢陳皮三錢半夏二錢竹瀝二合水五碗煎三碗頓服之以鵝翎掃其咽喉必吐痰升許而愈蓋痰在上焦非吐則痰不能出非用二

辨證錄

卷之十一 自笑

空

陳湯爲吐藥則舊痰雖出新痰又積笑哭正無止期惟用二陳湯爲吐藥則新舊之病一治而永愈也

此症用加味參

茯苓亦效

人參茯苓各五錢半夏三錢天花粉三錢甘草一錢竹瀝二合附子一片水煎服

人有無故自悲涕泣不止人以爲魅憑之也誰知爲臟燥之故乎夫臟燥者肺燥也內經曰悲屬肺肺之志爲悲又曰精氣併於肺則悲是悲泣者肺主之也肺經虛則肺氣乾燥無所滋潤哀傷欲哭之象生自悲出涕者明是肺氣之匱乏也肺虛補肺又何疑乎然而肺乃嬌臟

補肺而肺不能遽受益也必須補其肺金之母土旺而金自旺矣虛則補母正善於補肺耳方用轉輸湯人參三錢甘草二錢小麥五錢大棗十枚白朮五錢茯苓三錢水煎服十劑全愈此方用參朮茯苓補脾土也土旺而肺金安有再弱之理惟肺燥善悲不潤肺解燥反助土生火不益增其燥乎不知助土生火正助金以生氣也氣旺而肺之燥自解小麥成於麥秋有秋金之氣焉入於參朮苓甘之內全無真火之氣所以相劑而成功也

辨證錄

卷之十一 自笑

空

此症用加味參朮湯妙
人參天花粉生地各五錢白朮麥冬各一兩水煎服

惱怒門

人有少逢拂意之事便覺怒氣填胸不能自遣嗔惱不已
 人以為肝氣之逆也誰知肝血之少乎夫肝性急宜順
 不宜逆惱怒之事正拂抑之事也拂抑必致動怒怒極
 必致傷肝輕則殮泄重則嘔血者甚多然此乃猝然而
 至肝經因怒而成病者也若肝血少者不必有可怒之
 事而遇之大怒不必有可惱之人而見之甚惱蓋血少
 則肝燥肝燥則氣逆也故同一氣惱之症須分虛實以
 治之前症乃實後症乃虛也雖然實者火實非血之實
 也虛者血虛非火之虛也所以虛實之症前後若有異
 治虛治實之法實彼此無有殊耳方用解怒補肝湯白
 芍一兩當歸五錢澤瀉一錢柴胡一錢荆芥一錢甘草
 一錢枳殼三分丹皮三錢天花粉二錢水煎服一劑氣
 平連服數劑自然不易怒也此方全是平肝之藥非瀉
 肝之品也肝得補而血生鬱得血而易散肝氣不鬱惱
 怒何能動乎即或天性多乖平時無病尚多氣惱安得
 惱怒之不生哉然多服此藥亦可免嘔血殮泄之症也

此症用加味歸
 芍湯亦效

辨證錄

卷之十 惱怒

全

當歸白芍各一兩生地麥冬各五
 錢天花粉炒梔子各二錢水煎服

人有晨夕之間時多怒氣不必有可怒之事而心煩意躁
 不能自遣至夜則口乾舌燥止有一更睡熟餘則終夜
 常醒人以為肝血之少也誰知是腎水之匱涸乎夫肝
 為腎子肝子不足由於腎母之不足也蓋肝屬木而木
 必得水以灌溉則枝葉敷榮今腎水日日耗去腎且自
 顧不遑則肝木零仃勢所不免况有境遇之拂抑自然
 肝益加燥無津液以養心此卧之所以不安也治法必
 須大滋腎水甘霖大降則田疇漫漶者立蘇萌芽條
 達無非快心之景也自然心火取給於腎腎水足濟夫
 心而肝木之氣往來相通而順適矣方用潤肝湯熟地
 一兩山茱萸四錢白芍五錢當歸五錢五味子一錢玄
 參三錢丹皮三錢炒梔子一錢水煎服十劑夜卧安又
 十劑而怒氣息又十劑雖遇可怒之事亦且不怒矣是
 方補腎者六補肝者四也絕不去治心而心氣自交於
 腎者因腎水之足則心不畏木火之炎可通其交腎之
 路也

此症用萸芍熟地湯亦效
 熟地二兩山茱萸一兩白芍一兩水煎服

辨證錄

卷之一 惱怒

全

瘖啞門

人有口渴之極快飲凉水忽然瘖啞不能出聲人以爲心

火亢熱也誰知肺氣之閉乎夫肺主氣氣通則聲音響

亮氣塞則聲音瘖啞蓋肺屬金金實則不鳴耳但肺金

最惡心火火來刑金宜爲金之所畏金不敢出聲理也

何得水而反閉耶不知水來尅火則火必爲水所尅金

雖幸水之尅火猶恐火之刑金肺氣隨水氣而下降金

沉於水底何能自鳴耶此種瘖啞乃水抑肺氣而不升

非肺氣之自敗治法宜揚肺氣分消其水濕不治瘖啞

辨證錄

卷之十 瘖啞

壹

而瘖啞自鳴矣方用發聲湯枇杷葉五片貝母二錢茯

苓五錢百部一錢蘇葉一錢麥冬三錢甘草一錢玄參

五錢桑白皮三錢水煎服一劑聲少出再劑聲大出矣

三劑全愈此方宣通肺氣則肺氣自揚分消水勢則火

氣自降火降水消金無所畏肺亦何所顧忌而不鳴哉

此症亦可用冬

茯苓貝湯

蘇葉三錢麥冬二兩貝母三錢

茯苓五錢水煎服二劑而聲出

人有勞損弱怯喘嗽不寧漸漸瘖啞氣息低沉人以爲肺

氣之絕也誰知是腎水之涸乎夫肺爲腎之母本生腎

者也肺母自病何能乳子腎父不足日來取資於肺則

子貧而母益貧矣子母兩貧伶仃苦弱氣息奄奄所謂

金破不鳴也世醫謂金破必須補土然而脾胃雖能生

金而補土之藥多屬陽藥用陽藥以補土則陽旺而陰

愈消反有損於肺矣治法必須大補腎子之水子富而

母自不貧况肺氣夜歸於腎子之官將息安寧勞瘁之

肺忽變爲逸樂之肺而又有津液以供肺母之用則肺

金頓生自必氣息從容重施其清肅之令矣方用助音

湯熟地一兩麥冬一兩北五味子一錢甘草一錢蘇子

辨證錄

卷之十 瘖啞

壹

一錢天門冬二錢貝母三分款冬花五分沙參五錢地

骨皮三錢水煎服二劑而喘少平四劑而嗽少止連服

二十劑聲出矣再服二月斷不瘖啞也一月後前方加

人參五分山藥一兩茯苓二錢再服半年可變癆怯爲

平人矣此方補腎之中意仍注於補肺然補肺之中仍

是補腎所以能收已敗之功克奏將壞之績也

此症亦可用雷錢湯治之

熟地五錢款冬花一錢山茱萸二錢麥冬五錢地骨

皮五錢貝母蘇子各一錢山藥

失寶各三錢百部三分水煎服

人有口渴之甚舌上無津兩唇開裂喉中乾燥遂至失音

人以為肺火之旺也誰知心火太旺乎夫肺屬金最畏者心火之尅肺也金氣已衰心中之火過於大旺未免刑金太甚煨煉銷燦金無清肅之氣惟有焚化之形欲求其音聲之踈越何可得耶治法必須瀉心火之有餘滋肺金之不足則火易息而肺可安矣雖然又不可徒瀉心火也蓋心之所以有餘者實因腎水之不足耳水衰不能制火火得遂其炎上之性倘不補水而徒瀉其火則火無水制服寒涼之藥反增其助火之焰所謂因激而成其橫也方用黃連三錢麥冬五錢玄參五錢生

辨證錄

卷之十

全

地五錢桔梗三錢甘草二錢天花粉二錢水煎服一劑聲出二劑聲响不必三劑方名鳴金湯瀉火而補腎存其中全不見補腎仍是救肺之藥蓋肺腎為子母救肺正所以生腎水也腎水生而心火降矣

此症用加味元

冬湯亦可治
元參一兩丹麥三錢麥冬一兩
北五味子一錢水煎服十劑全愈

瘟疫門

世有城市之中鄉村鎮店之處傳染瘟疫多至死亡其症必頭痛眩暈胸膈膨脹口吐黃痰鼻流濁水或身發紅斑或髮如焦黑或嘔涎如紅血或腹大如圓箕或舌爛頭大或脇痛心疼種種不一象形而名人以為天災流行誰知皆人事召之也此症雖奇奇怪怪不可執一而論然皆火熱之毒不宣鬱而成之耳蓋火性炎上鬱則火氣不伸拂抑其性蘊藏於腹中所以大閉作熱熱閉成毒其由來者非一日也治法自宜大瀉其火毒以快

辨證錄

卷之十一

全

泄其鬱悶之氣第瀉火之藥未有不寒者也不先用表散之味遂用寒涼火轉閉塞而不得達適所以害之也故必須於散中用瀉則疫去如掃耳方用散瘟湯荆芥三錢石膏五錢玄參一兩天花粉三錢生甘草一錢黃芩二錢陳皮一錢麥芽二錢神曲三錢茯苓五錢水煎服一劑病輕二劑病又輕三劑全愈此方瀉肺胃之火者以瘟疫之熱多是二經之火也用荆芥以助石膏黃芩瀉火而又散火也火散則熱發於外矣火瀉則毒化於內矣火解毒消瘟神疫鬼何能作祟哉

余又聞南陽張真人之教謂瘟疫自來無方然方亦可
豫定以瘟病皆熱症也去火退熱解邪逐穢未嘗不可
於難定之中以定一可救之劑也其方用大黃一錢荆
芥一錢生甘草一錢柴胡蒼朮川芎各一錢白芷五分
水二碗煎八分一劑回春此方較散瘟湯少異然散火
為主其意正同瘟疫治法不可拘執又誌此方於後以
便治疫者之採擇也

伯高太師別號懷真子傳錄元天苦救湯治前瘟疫亦
甚效并附於後

辨證錄

卷之十 瘟疫

一 癸

苦參五錢元參一兩天花粉五錢三
味水煎服一劑必無性命之憂

又云偶傳瘟疫眼角忽然大腫身子驟發寒熱喉嚨大
脹作痛數日之後即鼻中出血口出狂言見人罵詈發
渴若飲之水則又瀉痢不止不過半月其人即亡一見
眼角發腫即用七星湯治之二劑即愈若至瀉痢此方
不可救矣方另用加味木苓湯救之痢止則生否則不
救寧傳方以防疫不可有疫而無方故罄述之不敢隱
也二方載後

七星湯

治傳染瘟疫眼角忽然大腫身驟
發寒熱喉嚨大脹作痛罵詈發渴

玄參麥冬各一兩天花粉三錢甘草一錢荆芥二錢
神曲一錢桔梗二錢水煎服若鼻中出血加犀角一
錢切不可用升麻代
之軍用黃芩一二錢
加味木苓湯治前症瘟疫鼻中出血後飲水瀉痢白
木五錢茯苓一兩骨節一兩甘草二錢車前子五錢
水煎服病止則
生否則不救

辨證錄

卷之十 瘟疫

一 癸

種嗣門

男子有交感之時婦人正在興濃而男子先痿陽事不堅
 精射遠人以爲命門之火衰也誰知陽氣之大虛乎
 夫氣旺則陽旺氣衰則陽衰此氣也乃五臟之真氣非
 止命門之火也蓋命門原有先天之火氣然非五臟後
 天之氣不能生世人戕賊五臟因而命門之火氣不旺
 隨五臟之真氣而消磨矣又安能助命門之火乎此所
 以半塗先痿也治法似宜急補五臟之陽氣也然而五
 臟不必全補也但補其脾腎之氣若心若肝若肺之氣
 自旺五臟氣旺而命門之火欲不旺得乎方用助氣仙
 丹人參五錢黃芪一兩當歸三錢茯苓二錢白朮一兩
 破故紙三錢杜仲五錢山藥三錢水煎服連服四劑氣
 旺再服四劑氣大旺自然久戰可以壯陽洩精可以射
 遠玉燕投懷矣此方補氣絕不補陰以病成於陽衰則
 陰氣必旺若兼去滋陰則陽氣無偏勝之快矣方又不
 去助火蓋氣盛則火自生若兼去補火則陽過於勝而
 火炎復恐有亢烈之憂反不種子矣此立方之所以妙
 也

辨證錄

卷之一 種嗣

三

此症川火龍丹
長服亦佳

人參五兩白朮五兩巴戟天杜仲兔系子麥冬各五
 兩肉苁蓉一大枚破故紙遠志肉桂各二兩黃芪八
 兩當歸三兩北五味一兩各爲末蜜爲丸每
 日酒送五錢服一月即陽舉可以久戰矣

男子有泄精之時止有一二點之精此等之人亦不能生
 子人以爲腎水之虧誰知是天分之薄乎夫精少之人
 身必壯健予謂天分之薄誰其信之殊不知精少者則
 精不能盡射於子宮得天之厚者果如此乎天既予人
 以薄醫欲逆天而予人以厚似乎不可得之數矣然天
 心仁愛人苟有遷善之心醫卽有種子之法蓋精少者
 雖屬之於天未必不成之於人也恃強而好用其力若
 思而過勞其心多食而反傷其胃皆足以耗精也苟能
 淡漠以死其心節少以養其胃益之補精添髓之方安
 在精少者不可以多生乎擇得逢異人秘傳實有添精
 神術今著書至此不敢隱忍不傳傳之以救萬世無子
 之人也方用生髓育麟丹人參六兩山茱萸十兩熟地
 一觔桑椹乾者一斤鹿茸一對龜膠八兩魚鱈四兩兔
 絲子四兩山藥十兩當歸五兩麥冬六兩北五味三兩
 肉苁蓉六兩人胞二個柏子仁二兩枸杞子八兩各爲

辨證錄

卷之一 種嗣

三

1023 丹黃白朮山藥 4 更E句

細末蜜搗成丸每日早晚時用白滾水送下五錢服三
月精多且陽亦堅安有不種子者哉此方妙在純用填
精益髓之味又無金石之犯可以久服而無害不特種
子而得八元兼可延齡而至百歲即名為百歲丹何不
可者

此症用添精嗣續
丸長服亦甚佳

人參鹿角膠地椒膠山藥枸杞子各六兩山茱萸肉
麥冬兔絲子肉茯苓各五兩熟地黃魚鱉炒巴戟天
各八兩北五味一兩柏子仁三兩肉桂一兩各為末
將膠酒化入之為丸每日服八錢服二月多精而可
孕矣

辨證錄

卷之一 一種嗣

三

男子有精力甚健入房甚久泄精之時如熱湯澆入子宮
婦人受之必然吃驚反不生育者人以為久戰之故使
婦女興闌以致子宮謹閉精不得入孰知不然夫胎胞
居於心腎之間喜溫不喜寒然過寒則陰凝而胎胞不
納過熱則陽亢而胎胞難受交感之際婦人胎胞之口
未有不啓安有茹而吐之乎惟是過於太熱則口欲閉
而不能中欲受而不得勢不得不棄之於外以享其清
涼之快矣是以婦人坐娠數十日經來者正坐於受胎
而復墮非外因之傷乃精熱之自難存養也然則欲胎

氣之永固似宜瀉火之有餘矣而火不可瀉瀉火必致
傷胃反無生氣何以種玉乎治法但補其腎中之水使
水旺而火自平方用平火散熟地一兩玄參五錢麥冬
三錢生地二錢丹皮二錢山藥三錢金釵石斛三錢沙
參三錢水煎服連服十劑精不過熱與婦女交接便可
受胎且慶永安也此方補陰而無大寒之虞瀉火而有
生陰之妙無事解氛自獲退炎之益宜男之道即在於
斯何必加知母黃柏大苦寒之藥以求奏效哉

此症用鎮陽丸
長服亦佳

辨證錄

卷之十 一種嗣

三

男子有泄精之時寒氣逼人自難得子人以為命門之火
衰極誰知心包之火不能助之耶蓋命門之火生於下
必得心包之上火相濟則上下相資溫和之氣充溢於
骨髓之中始能泄精之時無非生氣倘命門有火以興
陽而心包無火以濟水則命門之氣散安能鼓其餘火
發揚於精管之中哉世人治法但去助命門之火不去
益心包之焰則精寒不能驟復必難受胎矣方用溫精

毓子丹人參二兩肉桂一兩五味子一兩兔絲子三兩
 白朮五兩黃芪半斤當歸三兩遠志二兩炒棗仁三兩
 山茱萸三兩鹿茸一對肉苁蓉三兩破故紙三兩茯神
 二兩柏子仁一兩砂仁五錢肉果一兩各為末蜜為丸
 每日酒送一兩服一料精變為溫矣夫無子因於精寒
 今精寒易為精熱安有罷熊之無夢者乎况此溫中有
 補雖助心包之炎仍是益命門之氣二火同溫陽春遍
 體謂不能生子者吾不信也

此症用勝寒延嗣
 丹長服亦效

辨證錄 卷之十

人參六兩白朮黃芪兔絲子巴戟天鹿角膠淫羊藿
 各八兩附子一箇茯苓炒棗仁各四兩山藥六兩遠
 志肉桂各二兩炙甘草一兩廣木香五錢肉苁蓉一
 大枚各為末蜜為丸每日早晚各服三錢服兩月精
 熱而孕矣附子用生甘草三錢
 煮湯一碗泡透切片微炒熟

男子有精滑之極一到婦女之門即便泄精欲勉強圖歡
 不可得且泄精甚薄人以爲天分之弱也誰知心腎之
 兩虛乎夫入房可以久戰者命門火旺也然作用雖屬
 於命門之火而操權實在於心宮之火蓋心火乃君火
 也命門之火相火也心火旺則相火聽令於心君火衰
 則心火反爲相火所移權操於相火而不在君火矣故

心君之火一動相火即操其柄心即欲謹守其精相火
 已暗送精於精門之外至於望門泄精者不特君火衰
 極相火亦未常盛也治法補心火之不足不可瀉相火
 之有餘蓋瀉相火則君火益衰耳方用濟火延嗣丹人
 參三兩黃芪半斤巴戟天半斤五味子三兩黃連八錢
 肉桂二兩當歸三兩白朮五兩龍骨一兩 煨 山茱萸四
 兩山藥四兩柏子仁二兩遠志二兩牡蠣一兩 煨 金櫻
 子二兩芡實四兩鹿茸一具各為末蜜為丸每日白滾
 水送下一兩不拘時服一月即改觀服二月可以堅守

辨證錄 卷之十

服三月可以久戰服一年如改換一人此方心腎兩補
 不專尚大熱之藥故可久服延年非惟健陽生子但服
 此藥必須堅守三月不戰始可邀長久之樂否則亦不
 過期月之壯種子於目前已也

此症用補天育
 麟丹亦佳妙

鹿茸一具人參十兩山茱萸熟地肉苁蓉巴戟天各
 六兩炒白朮炙黃芪淫羊藿山藥芡實各八兩當歸
 蛇床子兔絲子各四兩柏子仁肉桂各三兩麥冬五
 兩北五味瑣陽各二兩人胞一箇火焙海狗腎一根
 蛤蚧兩條黃連一兩砂仁五錢各為末蜜為丸每日
 早晚各送五錢服二月可以久戰生子矣無海狗腎
 可用大海馬二箇代之不用蛇床子可用附
 子七錢代之附子用甘草三錢煮湯泡浸製

男子身體肥大必多痰涎往往不能生子此精中帶濕流入子宮而仍出也夫精必貴純濕氣雜於精中則胎多不育即子成形生來亦必夭殤不能永壽者也凡人飲食原該化精而不化痰今既化為精如何有濕氣入之不知多痰之人飲食雖化為精而濕多難化遂乘精氣入腎之時亦同羣共入正以遍身俱是痰氣腎欲避濕而不能也濕既入腎是精非純粹之精安得育麟哉治法必須化痰為先然徒消其痰而痰不易化蓋痰之生本於腎氣之寒痰之多由於胃氣之弱胃為腎之關門非腎為胃之關也內經年久謬寫誤傳世人錯認腎為胃之關門矣胃氣先弱不能為腎閉其關門腎宮又寒內少真火之運用則力難燥乾濕氣水泛為痰亦且上浮而不下降矣故治痰必當治腎胃之二經健其胃氣而痰可化補其腎氣而痰可消矣方用宜男化育丹人參五錢山藥五錢半夏三錢白朮五錢芡實五錢熟地五錢茯苓一兩薏仁五錢白芥子三錢肉桂二錢訶黎勒五分益知一錢肉豆寇一枚水煎服四劑而痰少再服四劑痰更少服一月而痰濕盡除交感亦健生

辨證錄

卷之十 種嗣

五

來之子必可長年蓋此方補腎者十之三健胃者十之七胃健而脾更健以胃強能分消水氣何濕之入腎乎腎又氣溫足以運用即有水濕之入腎自能分泄於尾閭則精成為純粹之精生子全美必然之理也
 此症用純一丸
 長服亦妙
 白朮山藥芡實各二斤薏仁半斤肉桂四兩砂仁一兩各為細末蜜為丸每日服一兩服一月即可得子
 男子有面色痿黃不能生子者乃血少之故也即或生子必多乾瘦久成兒癆之症人以爲小兒不慎飲食之故或歸咎於生母乳汁之薄誰知父無血以子之乎世人生子動曰父精母血不知父亦有血也夫血氣足而精亦足血氣全而精亦全為父者氣有餘而血不足則精之中自然成一偏之精雖伴成形鳥能無偏勝之病哉先天無形之血能生後天有形之血也若後天有形之血何能生先天無形之血乎故雖食母之乳吞肥甘之物終不能生兒之血以全活之也然則為父者少血鳥可不亟為補之哉惟是血不能速生必補其氣蓋血少者由於氣衰補氣生血又何疑乎方用當歸補血湯黃芪五錢當歸一兩熟地五錢水煎服夫補血宜用四物

辨證錄

卷之十 種嗣

五

湯矣今不用四物湯者正嫌四物全是補血而不補氣也若補血湯名雖補血其實補氣原方用黃芪一兩當歸五錢者重在補氣而輕在補血也我今用當歸為君用黃芪為臣佐之熟地之滋陰是重在補血輕在補氣自然氣以生血而非血以助氣氣血兩旺無子者易於得子根深本固寧至有天殤之歎哉

此症用滋血繩振丸長服亦效
黃芪二斤當歸麥冬熟地巴戟天各一斤各為末蜜為丸每日早晚白滾水送下各五錢服二月血旺生子必長年也

辨證錄

卷之十

夫

男子有懷抱素鬱而不舉子者人以為命門之火不宜也誰知心肝二氣之滯乎夫火性炎上憂愁則火氣不揚歡愉則火氣大發而木性條達摧阻則木氣抑而不伸悠揚則木氣直而不屈處境遇之坎坷值人倫之乖戾心欲怡悅而不能肝欲坦適而不得勢必興盡致索何風月之動於中房帷之移其念哉久則陽痿不振何以生子雖然人倫不可變境遇不可反而心氣實可舒肝氣實可順也吾舒其心氣則火得遂其炎上之性吾順其肝氣則木得遂其條達之性矣自然木火相通心腎

相合可以久戰以消愁可以盡歡以取樂宜男之道亦不外於是矣方用忘憂散白朮五錢茯苓神三錢遠志二錢柴胡五分鬱金一錢白芍一兩當歸三錢巴戟天一錢陳皮五分白芥子二錢神麴五分麥冬三錢丹皮三錢水煎服連服十劑鬱勃之氣不知其何以解也因鬱而無子鬱解有不得子者乎方中解鬱未常無與陽種玉之味倘改湯為丸久服則鬱氣盡解未有不得子者也

此症用適興丸長服亦佳

辨證錄

卷之十

夫

男子有天生陽物細小而不得子者人以為天定之也誰知人工亦可以造作乎夫陽物有大小者世分為貴賤謂貴者多小賤者多大造物生人歎於此必豐於彼雖然賤者未常無小貴者未常無大蓋人之陽物修偉者因其肝氣之有餘陽物細小者由於肝氣之不足以陰器為筋之餘也又屬宗筋之會肝氣旺而宗筋伸肝氣虛而宗筋縮肝氣寒則陰器縮肝氣熱則陰器伸是陽

物之大小全在肝經盛衰寒熱之故也欲使小者增大
 要非補肝不可然而腎為肝之母心為肝之子補肝而
 不補其腎則肝之氣無所生補肝而不補其心則肝之
 氣有所耗皆不能助肝以伸其筋助筋以壯其勢故必
 三經同補始獲其驗矣方用奪天丹龍骨二兩酒浸三
 日然後用醋浸三日火燒七次用前酒醋汁七次焯之
 驢腎內外各一具酒煮三炷香將龍骨研末拌入驢腎
 內再煮三炷香然後入人參三兩當歸三兩白芍三兩
 補骨脂二兩兔絲子二兩杜仲三兩白朮五兩鹿茸一

辨證錄

卷之一 種嗣

全

具酒浸透切片又切小塊山藥末炒五味子一兩熟地
 三兩山茱萸三兩黃芪五兩附子一兩茯苓二兩柏子
 仁一兩砂仁五錢地龍十條各為細末將驢腎汁同搗
 如汁乾可加蜜同搗為丸每日早晚用熱酒送下各五
 錢服一月即見效但必須堅忍房事者兩月少亦必七
 七日具大而且能久戰射精必遠含胎甚易半世無兒
 一旦得子真奪天工之造化也

鐸

傳方至此不畏犯神明之忌者不過欲萬世之人盡
 無絕嗣之悲然天下人得吾方亦宜敬畏為心生兒為

念慎莫戲媮縱慾倘自耗其精非惟無子而且獲癆瘵
 之病 鐸 不受咎也

此症用展陽神丹亦
 奇絕并傳於世

人參六兩白芍當歸杜仲麥冬巴戟天各六兩白朮
 兔絲子熟地各五兩肉桂牛膝柏子仁破故紙各三
 兩龍骨二兩醋焯瑣陽二兩蛇牀子四兩覆盆子淫
 羊藿各四兩驢鞭一具人胞一箇海馬兩對蚯蚓十
 條附子一箇肉苁蓉一枝鹿茸一具照常製各為末
 蜜為丸每日酒送下五錢服二月改觀三月偉然可
 以久戰而生子矣但必須
 保養三月始驗否則無功

辨證錄

卷之一 種嗣

全



辨證錄卷之十一

山陰陳子錄敬之甫號遠公文號朱華子著述

會稽陶式玉尚白甫號存齋又號 參訂

婦人科

帶門

婦人有終年累月下流白物如涕如唾不能禁止甚則臭穢所謂白帶也夫帶是溼病以帶名者因婦人有帶脉不能約束故以帶名之帶脉通於任督之脉任督病而帶脉亦病帶脉者所以束帶胎之係也婦人無此則難

辨證錄

卷一一 帶門

以繫胎故帶脉弱而胎易墮若損傷帶脉則胎必不牢然帶脉損傷非獨跌閃挫氣也行房過於縱送飲酒出於顛狂雖無疼痛之苦其中暗耗則白物自下故帶病尼師寡婦出嫁之女多處子在閣未破瓜之女少也然室女天稟虛弱者亦有此病况加之脾氣之虛肝氣之鬱溼氣之侵火氣之逼安得不患此症哉夫溼盛火衰肝鬱脾虛則脾土受傷溼土之氣下陷是以脾精不守不能化為榮血變成白滑之物由陰門直下欲自禁止而不可得也治法宜大補脾胃之氣少佐之舒鬱之味

使風水不閉塞於地中則地氣自升騰於天上脾氣健而溼氣自消方用完帶湯白朮一兩蒼朮三錢甘草一錢車前子三錢山藥一兩陳皮五分人參二錢白芍五錢柴胡六分荆芥五分半夏一錢水煎服二劑輕四劑止六劑全愈此方脾胃肝三經同治之法寓補於升寄消於散開提肝木之氣則肝血不燥何致下尅於脾土補益脾土之元則脾經不溼何難分消夫水氣至於補脾而兼補胃者脾胃表裏也脾非胃氣之強則脾不能旺補胃正所以補脾耳

辨證錄

卷一一 帶門

二

此症用束帶湯亦效

鷄冠花一兩白朮一兩水煎

二劑即愈鮮鷄冠花三兩

婦人有帶下色紅者似血非血所謂赤帶也赤帶亦溼病火熱之故也惟是帶脉係於腰臍之間近於至陰之地不宜有火不知帶脉不通腎而通肝婦人憂思以傷脾又加鬱怒以傷肝於是肝火內熾下尅脾土而脾土不能運化溼熱之氣蘊結於帶脉之間肝火焚燒肝血不藏亦滲入於帶脉之內帶脉因脾氣之傷約束無力溼熱之氣隨氣下陷同血俱下觀其形象似血非血其實

血與溼俱不能兩分之也世人以赤帶屬之心火者悞耳治法清肝中之火扶其脾氣則赤淋庶幾少愈乎方用清肝止淋湯芍藥一兩當歸一兩阿膠三錢生地五錢丹皮三錢黃栢一錢牛膝二錢黑豆一兩香附一錢紅棗十枚水煎服一劑少止二劑又少止四劑全止十劑不再發此方但去補肝之血全不利脾之溼者以赤帶之病火重而溼輕也夫火之所以旺者由於血之衰也補血足以制火矣且水與血合成赤帶竟不能辨其是溼而非溼則溼盡化為血矣所以治血可也何必利溼哉此方純治血少加清火之味故奏功獨奇倘一利其溼反引火下行轉難遠效耳或問先前言助其脾土今但補肝木之血絕不補脾土之氣何也不知用芍藥以平肝則肝氣得舒自不去尅脾土是補肝正所以扶脾何必加人參白朮之多事哉

此症用黃白牛車散亦效

牛膝一兩車前子三錢黃栢二錢白芍一兩水煎服四劑愈

婦人有帶下而色黑者甚則下如墨汁其氣最腥人以下寒之極也誰知是火熱之極乎夫火色宜紅何成黑色

辨證錄

卷十一 帶門

三

不知火極似水乃假象也其症必然腹痛小便時必如刀觸陰門必發腫面色必紅久則黃瘦飲食兼人口必大渴飲水少覺寬快此命門之火與膀胱三焦之火合胃火又旺四火同煎安得不熬乾成炭色耶此等之症不致發狂者以腎水與肺金之氣涓涓不絕足以潤心而濟胃耳所以飲水下胃但成帶下之症火結於下而不炎於上也治法惟以瀉火為主火退而溼熱自舒也方用利火湯大黃三錢白朮五錢茯苓三錢車前子三錢錢王不留行三錢劉寄奴三錢黃連三錢炒梔子三錢

辨證錄

卷十一 帶門

四

石膏五錢知母二錢水煎服一劑小便利二劑黑帶變為白帶矣三劑白帶亦少減去一半再服三劑全愈此方未免過於迅利殊不知火盛之時用不得依違之法救焚而少為迂緩則火勢延燒不盡不止今用黃連石膏知母梔子一派寒涼瀉火之味入於大黃之中則迅速掃除又得王不留行與寄奴之味利溼甚急俱無停住之機佐白朮車前子茯苓成既濟之功也

此症用清帶湯亦效

炒梔子三錢黃栢三錢甘草一錢白芍一兩車前子二錢王不留行二錢麥冬一兩玄參二兩水煎服四

劑愈

婦人有帶下色黃者宛如黃茶濃汁其氣帶腥人以爲脾經之溼熱誰知是任脉之溼熱乎夫任脉本不能容水如何溼氣入於中而化爲黃帶乎不知帶脉通於任脉任脉直上走於唇齒唇齒之間原有不斷之泉下灌於任脉使任脉無熱則口中津液盡化爲精以入於腎中矣惟有熱以存於下焦之間則津不化精而化溼夫水色白火色紅今溼與熱合欲變紅而不能欲返白而不得煎熬成汁因變爲黃色矣黃乃土之色也真水真火

辨證錄

卷一 帶門 五

合而成丹邪水邪火合而成帶世人以黃帶爲脾之溼熱單去治脾此黃帶之所以難痊也方用退黃湯治之山藥一兩芡實一兩黃栢二錢車前子一錢白菓一枚水煎服連用四劑無不全愈凡有白帶者俱可以此方治之而治黃帶尤奏奇功蓋山藥芡實專補任脉之虛又能利水加之白菓引入任脉之中更爲便捷所以奏功甚速至所用黃栢清腎中之火腎與任脉相通同羣共濟解腎中之火即解任脉之熱矣

此症亦可用鮮帶利溼湯治之

白菓茯苓各一兩澤瀉車前子炒梔子各二錢水煎服

婦人有帶下色青者甚則色綠如綠豆汁稠黏不斷其氣亦腥此肝經之溼熱也夫肝屬木木之色屬青帶下流如綠豆之汁明是肝木之病但肝最喜水溼亦水也何以竟成青帶之症不知水雖爲肝之所喜熱實爲肝之所惡以所惡者合之所喜必有違其性者矣肝之性既違則肝之氣必逆氣欲上升溼欲下降兩相牽掣必停住於中焦之間於是走於帶脉從陰門而出其色青綠者正乘肝木之氣也逆輕者熱必輕而色青逆重者熱必重而色綠似乎治青者易治綠者難然而解其肝中之火力其膀胱之水則帶病自愈矣方用逍遙散加減治之茯苓五錢白朮五錢甘草五分陳皮一錢柴胡一錢白芍五錢茵陳三錢炒梔子三錢水煎服二劑色淡四劑青綠之帶絕不必多劑也夫逍遙散解鬱之方也何取之以治青帶如是之神耶蓋肝經溼熱留之者因肝氣之逆也逍遙散最解肝之逆氣逆氣平則溼熱難留况益之茵陳之利溼梔子清熱肝氣清涼青綠之帶何自來乎此方之所以奇而可用也倘僅治青帶惟以

辨證錄

卷一 帶門 六

利溼清熱爲事置肝氣於不問亦安有止帶之日哉

此症用利肝解溼湯亦效

白芍二兩茯苓一兩乾雞冠花五錢炒梔子三錢水煎服

辨證錄

卷十一 帶門

七

血枯門

婦人有年未至七七之期經水先斷者人以爲血枯經閉誰知是心肝脾之氣鬱乎人若血枯安能久延人世醫見其經水不行謂其血枯其實非血枯乃血閉也且經水非血也乃天一之水出之腎經之中至陰之精而有至陽之氣故其色紅赤似血而非血也世人以經水爲血此千古之悞倘果是血何不名之曰血水古昔至聖創呼經水者以出於腎經故以經名之然則經水早斷似乎腎水之衰涸吾以爲心肝脾之氣鬱者何蓋腎水

辨證錄

卷之十一 血枯

八

之生不由於三經而腎水之化實關於三經也腎非肝氣之相通則腎氣不能開腎非心氣之相交則腎氣不能上腎非脾氣之相養則腎氣不能成倘三經有一經之鬱則氣不入於腎之中腎之氣即閉塞而不宣况三經齊鬱縱腎水真足尙有格格難出之狀而腎氣原虛何以媾精盈滿化經水而外泄耶此經之所以閉有似乎血枯耳治之法必須散三經之鬱大補其腎補腎之中仍補其三經之氣則精溢而經自通也方用溢經湯熟地一兩白朮一兩山藥五錢生棗仁三錢白芍三錢

當歸五錢丹皮二錢沙參三錢柴胡一錢杜仲一錢人參二錢水煎服連服八劑而經通矣服一月人健不再經閉兼易受孕此方心肝脾腎四經同治之藥補以通之散以開之也倘徒補則鬱不開而生火倘徒散則氣益衰而耗精設或用攻堅之味辛熱之品不特無益而反害之也

此症用續補湯亦效

人參二錢當歸五錢白芍三錢柴胡五分麥冬五錢北五味十粒白朮一兩巴戟天五錢炒棗仁五錢紅花五分牛膝一錢沙參三錢水煎服十劑必通

辨證錄

卷十一 血枯

九

人有在室未嫁者月經不來腹大如娠面色乍赤乍白脉乍大乍小以為血枯經閉也誰知是靈鬼憑身乎大凡人心正則邪不能侵心邪則邪自來犯或精神恍惚夢裏求親或眼目昏花日中相狎或假戚屬暗處貪歡或明言仙人靜地取樂其先未常不驚詫為奇遇而不肯告人其後則羞赧為淫褻而不敢告人矣年深月久之精血僅足以供腹中之邪邪日旺而正日衰勢必至經閉血枯死而後已欲導其經邪據其腹而經難通欲生其血邪飲其精而血難長醫以為胎而非胎醫以為

瘕而非瘕往往有因循等待成爲癆瘵之症至死不悟不重可悲乎治法似宜補正以祛邪然而邪之不去補正亦無益也必先去其邪而後補正爲得耳方用蕩邪丹雷丸三錢桃仁三十粒大黃三錢當歸五錢丹皮五錢生甘草二錢水煎服一劑必下穢物牛楠再用調正湯治之白朮五錢蒼朮五錢茯苓三錢陳皮一錢甘草一錢薏仁五錢貝母一錢水煎服連用四劑脾胃之氣轉經血漸行矣前方蕩邪後方補正實有次第也或疑身懷鬼胎必傷其血所以血枯而後經閉也今既墮其胎乃不補血反補胃氣者何故蓋鬼氣中人其正氣之虛可知且血不能驟生補氣自易生血二朮善補陽氣陽氣旺而陰氣難犯尤善後之妙法也倘服補血之藥則陰以招陰吾恐鬼胎雖下鬼氣未必不再種矣故不若補其陽氣使鬼祟難侵生血愈速耳

辨證錄

卷十一 血枯

十

此症用殺鬼破胎湯亦效

水蛭炒黑研爲細末三錢丹皮五錢當歸尾五錢大黃三錢厚朴二錢紅花五錢牛膝三錢生地五錢桃仁去尖研碎水與酒同煎一碗空腹服一劑即下胎如不下再服二劑無不下者不必用三劑也

血崩門

一婦人有一時血崩雙目黑暗昏暈於地者人以為火盛動血也然此火非實火也乃虛火耳世人一見血崩往往用止澀之藥雖亦能取效於一時而虛火未補易於沖擊隨止隨發終年終月不能愈者是止崩之藥斷不可用必須於補之中行其止之法方用固本止崩湯熟地一兩白朮一兩黃芪三錢人參三錢當歸五錢炒黑乾姜二錢水煎服一劑崩止十劑永不再發倘畏藥味之重減去其半則力量甚薄不能止矣方中全不去止

辨證錄

卷十一 血崩

十一

血惟去補血且不僅補血更去補氣非惟補氣兼且補火何也夫血崩至於黑暗昏暈則血已盡去僅存一線之氣若不急補氣而先補血則有形之血不能速生無形之氣必且盡散此所以不補血而先救氣也然而補氣而不補血則血又不能易生補血而不補火則血且凝滯不能隨氣而速生也况乾姜引血歸經補中有收所以間補氣血之藥並用之耳

此症亦可用補

虛寧血湯

當歸五錢熟地一兩黃芪一兩甘草一錢炒黑荆芥三錢水煎服一劑即止崩四劑全愈

一老婦血崩目暗暈地人以為老婦虛極因不慎房勞之故也誰知多言傷氣 不節飲食之故乎夫老婦

原宜節損飲食復加閉口始氣不傷而神旺無奈老婦聞喜事而心開稱譽不肯閉舌未免有不宜言而言者况原有宿疾安肯無言故一發而不可救夫老婦血衰因氣虛之極而不能生也况加之多言耗氣又安能助氣以生血乎氣益衰而血難長矣故任衝大開欲不崩而不可得者治法必止其血也誰知血愈止而愈多以氣衰不能攝血耳方用助氣斂血湯白朮二兩土炒黃

辨證錄

卷十一 血崩

三

芪四兩醋炒三七末三錢水煎服一劑血少止二劑血止四劑全愈此方補氣不補血以氣能止血也加之醋炒芪朮以酸能救血也加之三七者以其能斷血也然必多服始能愈者以老婦血虧氣衰不大補何以止其耗散之原陽使氣旺以生血乎然此方可以暫止老婦之血不能久旺老婦之氣也另用前方去三七而多加當歸用補血湯朝夕吞服並行為之得到

有老婦血崩者其症亦與前同人以為老婦之虛耳誰知因虛又不慎房幃之故哉婦人至五十之外者天癸匱

乏原宜閉關不宜出戰苟或適興草草了事尚不致腎火大動倘與酣浪鬪一如少年時鮮不血室大開崩決而墜矣方用當歸補血湯加味療之黃芪一兩當歸一兩三七根末三錢桑葉十四片水煎服二劑而血止四劑不再發然必須斷慾也設再犯忌未有不重病者也夫補血湯乃氣血雙補之神劑三七根乃止血之聖藥加入桑葉滋其腎中之陰又有收斂之妙耳但老婦陰精既虧用此方以止其暫時之漏實有奇功不可責其永遠之績者以補精之味尚少也服此方四劑之後增

辨證錄

卷十一 血崩

三

入白朮五錢熟地一兩山藥四錢麥冬三錢北五味一錢服三月則崩漏可以盡除矣

此症用閉血湯亦效

人參白朮各一兩三七根末三錢北五味子二錢水煎服一劑即止崩減人參五錢加熟地一兩山藥黃五錢麥冬五錢再服四劑全愈

有少婦甫受孕三月即便血崩胎亦隨墜人以為挫閃受傷而血崩也誰知是行房不慎哉少年婦人行房亦事之常也何便血崩亦因其氣之衰耳凡婦人氣衰者不耐久戰戰久則必泄精精泄太多則氣益不能收攝夫

血矣况加久戰則虛火內動精門不關而血室亦不能閉於是胎不能固內外齊動而血又何能固哉治法自當以補氣為主而少佐之止血之味方用固氣湯人參五錢白朮五錢當歸三錢熟地五錢茯苓二錢甘草一錢杜仲三錢山藥二錢遠志一錢五味子十粒水煎服一劑血止連服十劑全愈此方固氣而兼補其血已去之血可以速生將脫之血可以盡攝凡因虛血崩者此方最宜通治非僅治小產之血崩也茲方不去止血而止血之味已全於中所以可通治耳

辨證錄

卷十一 血崩

古

人參三錢白朮五錢茯苓山藥麥冬各三錢遠志五分杜仲山藥各二錢阿膠三錢甘草一錢水煎服一劑則愈

有婦人一交感流血不止者雖不至血崩之甚然至終年不愈未免氣血兩傷久則有血枯經閉之憂此等之病成於月經來時貪歡交感精沖血管也夫血管不可精傷凡婦人受孕乃血管已淨之時倘經初來其血正旺彼欲出而精射之則所泄之血盡退而縮入既不能受孕成胎勢必至積精化血遇交感之時淫氣觸動其舊日之精則兩氣相感精欲出而血即隨之俱出矣治法

須通其胞胎之氣引精外出益之填精補氣之藥則血
管之傷可以再補方用引精止血湯人參五錢白朮一
兩茯苓三錢車前子三錢黃柏五分炒黑乾姜一錢熟
地一兩山茱萸五錢炒黑荆芥三錢水煎服連服四劑
卽愈十劑不再發此方用參朮補氣用熟地山藥補精
精氣既旺則血管自然流動加入茯苓車前利其尿竅
尿竅利而血竅亦利矣加入黃柏直入於血管之中引
風精出於血管之口再荆芥引敗血出於血管之外益
之炒黑乾姜止其血管之口一方之中實有調停曲折

辨證錄

卷十一 血崩

五

之妙故能除舊疾而去陳疴也然既服此藥必須慎房
韓三月則破者不至重傷補者不至再損否則亦止可
取日前之效耳慎之哉

此症用截流

丹亦甚效

茯苓炒黑荆芥車前子各三錢牛膝人參各三錢熟
地一兩白朮一兩斷艾一錢肉桂三分水煎服十劑
全愈

婦人有懷抱甚鬱口乾作渴嘔吐吞酸而血下崩者人以
火治之時而效時而不效者蓋肝氣之結也夫肝主藏
血氣結宜血結矣何反致崩漏不知肝性甚急氣結其

性更急矣急則血不能藏矣治法宜開鬱為主然徒開
其鬱不用平肝之藥則肝氣大開肝火更熾血亦何能
止遏也方用平肝止血湯白芍二兩白朮一兩當歸一
兩柴胡一錢三七根末三錢甘草二錢丹皮三錢荆芥
二錢生地三錢水煎服一劑嘔吐止二劑乾渴除四劑
血崩自愈白芍平肝得柴胡而鬱氣盡解白朮利腰膈
血無積住之慮荆芥通經絡血有歸還之藥丹皮涼其
骨髓之熱生地清其臟腑之炎當歸三七於補血之中
行止血之法自鬱散而血止也

辨證錄

卷十一 血崩

六

此症用舒肝藏

血湯亦佳

白芍一兩香附荆芥三七根末各三錢陳皮五分甘
草一錢當歸白朮各五錢白芥子一錢水煎調服

婦人有升高墜下或閃跌受傷以致惡血下沖有如血崩
者若作血崩治之用止瀉之藥適所以害之也其症必
然按之疼痛久則面目痿黃形容枯槁治法須行血去
瘀活血止疼則其血自止苟不解其瘀痛卽用補澀之
品則瘀血內攻痛不能止反致新血不生舊血作祟也
方用逐瘀止崩湯大黃三錢生地一兩當歸尾五錢敗
龜板三錢芍藥二錢丹皮一錢枳殼五分桃仁十粒水

煎服一劑痛輕再劑痛止三劑血亦全止矣不必服四劑也此方於活血之中佐以下治之藥故逐瘀如掃止血亦如神也此跌閃升墮非由內傷而致其本實不撥去標之病可耳何必顧其本而補其內哉

此症用靈龜散
血湯亦甚效

敗龜板一兩生地一兩大黃一錢丹皮三錢紅
花二錢桃仁十四箇水煎服一劑輕二劑愈

人有每行人道經水即來一如血崩人以為胞胎有傷觸之以動其血也誰知子宮血海因熱不固之故乎夫子宮即在胞胎之下而血海又在胞胎之上血海者衝脉

辨證錄

卷十一 血崩

七

也衝脉寒而血虧衝脉熱而血沸血崩之病正衝脉之熱也然而衝脉既熱宜血之日崩矣何必交接而始血來蓋脾與肝之無恙也脾健則能攝血肝平則能藏血人未入房則君相二火寂然不動雖衝脉獨熱血不外泄及至交接子宮大開君相之火翕然齊動鼓其精房而血海泛溢有不可止遏之勢肝欲藏血而不能脾欲攝血而不得故經水隨交而至若有聲應之捷焉治法必須絕慾者三月然後用滋陰降火之藥涼其血海則終身之病可半載而愈也方用清海丸熟地一觔桑葉

一觔白朮一觔玄參一觔山茱萸八兩北五味三兩麥冬十兩沙參十兩地骨皮十兩丹皮十兩白芍一觔龍骨醋焯二兩山藥十兩石斛八兩各為細末蜜為丸每日早晚白滾水各送下五錢服半年全愈此方補陰而無浮動之虞縮血而無寒冷之害日計不足月計有餘潛移默奪子宮清涼血海自固也倘不治其本源止以髮灰白礬黃連五倍子外治其幽隱之處吾恐愈塞愈流也

此症用清火歸
經湯亦效

辨證錄

卷十一 血崩

八

人參白芍各一兩蒼朮藜炒灰二錢黃柏末二錢甘草一錢三七根末三錢水煎調服十劑可愈二十劑全愈然必須絕慾事三月否則要犯也

調經門

婦人有先期經來者其經水甚多人以為血熱之極也誰知腎中之水火旺乎夫火旺則血熱水旺則血多此有餘之病非不足之症也似不藥有喜但過於有餘則子宮大熱亦難受孕恐有燥乾男精之慮太過者損之亦既濟之道也然而火不可任其有餘水斷不可使之不足治法但少清其火不必瀉水也方用丹皮三錢地骨皮五錢白芍三錢青蒿二錢黃栢五分熟地三錢茯苓二錢水煎服此方名為清經散服二劑自平也方中雖是清火之品然仍是滋水之味火瀉而水不與之俱瀉則兩不損而兩有益也

此症用損餘湯亦效

地骨皮一兩茯苓五錢黃栢二錢生地五錢炒黑荆芥三錢玄參五錢水煎服四劑而經調矣

婦人有先期經來其經水止有一二點人亦以為血熱之極也誰知腎中火旺而陰水虛乎先期者火氣之冲多寡者水氣之驗故先期之來多火熱而水有餘先期之來少火熱而水不足倘一見先期俱以為有餘之熱但瀉火而不補水或水火兩瀉如何不增病哉治法不必

辨證錄

卷十一 調經

九

瀉火專補其水水足而火氣自消方用位參一兩生地一兩白芍五錢麥冬五錢阿膠三錢地骨皮三錢水煎服連服四劑而經調矣方名兩地湯以地骨生地同用耳二味俱能涼骨中之熱也骨中之熱由於腎中之熱涼其骨髓則腎氣自寒又不損傷胃氣此治之巧也况所用諸藥純是補水之味水盛而火安得不平乎此條與上條並觀斷無悞治先期之病矣

此症用加味純陰湯亦效

熟地玄參麥冬各五錢山茱萸二錢北五味子一錢丹皮五錢水煎服可用十劑經水自多

辨證錄

卷十一 調經

三

婦人有經來後期而甚多者人以為血虛之病也誰知非血虛也蓋後期之多少實有不同後期來少血寒而不足後期來多血寒而有餘夫經水雖本於腎而其流則五臟六腑之血皆歸之故經一來而諸血盡來附益以經開而門啓不遑迅闔諸血乘其隙而皆出也但血既出矣則成不足之症治法宜於補中溫之非日後期者俱不足也方用溫經攝血湯白芍一兩川芎五錢肉桂五分熟地一兩白朮五錢續斷一錢五味子三分柴胡五分水煎服二十劑經調矣此方大補腎肝脾之精而

加肉桂以祛其寒加柴胡以解其鬱是補中有散而散非耗氣補中有瀉而瀉非損陰所以受補之益收溫之功也是方凡經來後期者俱可用誠調經之妙藥攝血之仙丹也倘人元氣虛加入人參一二錢未為不可耳

此症用溫帶益經湯亦效

熟地一兩白朮杜仲各五錢肉桂一錢茯苓人參各三錢水煎服

婦人有經來斷續或前或後無一定之期者人以爲氣血之虛誰知是肝氣之鬱結乎夫經水出諸腎經肝爲腎之子肝鬱則腎亦鬱腎鬱而氣自不宣前後之或斷或

辨證錄

卷十一 調經

三

續正腎氣之或通或閉耳雖然肝氣鬱而腎不應未必至於如此然子母關切之病而母必有顧復之情肝泄而腎自有繾綣之誼肝氣之或藏或閉即腎氣之或去或留有相因而至者矣然則治法舒肝之鬱即所以開腎之鬱也即所以定經水之流也方用定經湯白芍一兩當歸一兩熟地五錢山藥五錢兔絲子一兩柴胡五分荆芥炒黑一錢茯苓三錢水煎服二劑經水淨四劑經期定矣此方舒腎肝之氣非通經之藥也補肝腎之津非利水之品也腎肝氣舒而經通肝腎津旺而水利

不治之治正妙於治也

此症用順經湯亦效

香附生地茯苓白芥子各三錢當歸一兩白芍一兩車前子二錢神曲甘草各一錢水煎服十劑自調

婦人有數月一行經者每以爲常且無或先或後之異又無或多或少之殊人以爲異而不知非異此乃無病之人氣血兩不虧損耳婦人之中有天生仙骨者經水必四季一行蓋以季爲數不以月爲盈虛也婦人之經水不泄則黃河便可逆流真氣內藏則坎中之陽不損倘加以煉形之法一年之內便易飛升無如世人不知煉

辨證錄

卷十一 調經

三

形之法見經水之不來悞認作病妄用藥餌往往無病而成病余聞異人之教特爲闡揚使世人見此等行經在不必治之列萬勿疑爲氣血之不足而輕施醫療也雖然天生僊骨之婦世正不少而嗜慾深者天分損也又不可不立一救療之方方名助仙丹白朮三錢茯苓五錢甘草一錢山藥三錢陳皮五分白芍三錢杜仲一錢兔絲子二錢水煎服二四劑而仍如其舊不可再服此方平補健脾益腎解鬱消痰不損天然之氣血便是調經之大益何必用重劑以助火用熱藥以通經哉

此症用肝腎雙

治湯亦佳

白芍三錢當歸山藥熟地各五錢甘草五分陳皮三分茯苓山朱萸各二錢神曲一錢水煎服自然如期矣

婦人至五十之外或六七十歲者忽然行經或如紫血之

塊或如紅血之淋人以為老婦行經是還少之期誰知

乃血崩之漸乎婦人至七七之外天癸已窮又不服補

陰濟陽之藥如何能使精滿化經一如少婦乎不宜行

經而行經者乃肝不藏血脾不統血也非泄精而動命

門之火必氣鬱而發龍雷之炎二火發動血乃奔失有

辨證錄

卷十一 調經

三

似行經而寔非行經也遇此等之病非大補脾肝則血

不能驟止然而補肝脾者不可全補血以止血尤當兼

補氣以止血也方用安老丹人參一兩黃芪一兩熟地

一兩山茱萸五錢甘草一錢木耳灰一錢當歸五錢阿

膠一錢香附五分荆芥一錢白朮五錢水煎服一劑少

減二劑又減四劑全止十劑全愈此方補益肝脾之氣

氣足自然生血且能攝血也况且大補腎水腎水足而

肝氣益舒肝氣舒而脾氣得養肝藏血脾統血安有漏

泄乎血既無漏泄之失何慮於血崩乎

此症亦可用莖木

調經散治之

人參三七根末各三錢白朮當歸黃芪各一兩生地五錢水煎調服一劑即止四劑愈

婦人有經水忽來忽斷時痛時止往來寒熱人以為血結

之故不知乃肝氣不舒耳夫肝屬木最惡者寒風也婦

人行經則腠理大開適逢風吹則肝氣閉塞經水之門

亦隨之而俱閉於是腠理經絡各皆不宣而作寒熱氣

行於陽而熱生氣行於陰而寒生也然此猶感寒之輕

者倘外寒更甚則內熱益深往者熱入血室變為似狂

之症一如遇鬼之狀今但往來寒熱是寒未甚而熱未

辨證錄

卷十一 調經

四

深耳治法補肝中之血通鬱而散其風則病隨手而效

也方用加味四物湯熟地一兩川芎三錢白芍五錢當

歸五錢白朮五錢甘草一錢延胡索一錢丹皮三錢柴

胡一錢水煎服此方用四物以滋脾腎用柴胡白芍丹

皮以宣揚風鬱用甘草白朮延胡利腰膈以和腹痛入

於表裏之間通於經絡之內用之得宜自然奏功如响

也

此症用開結

湯亦佳

柴胡續斷神曲各一錢香附川芎丹皮各三錢當歸熟地各一兩白朮五錢甘草一錢水煎服十劑全愈

婦人有經前疼痛數日後行經者其經水多是紫黑之塊
 人以爲熱極也誰知鬱極而火不能化乎夫肝中有火
 鬱則不揚經欲行而肝氣不應則拂抑其氣而痛生然
 經滿則不能內藏肝中火氣焚燒內逼經出而火亦隨
 之而怒泄其色紫黑者水火兩戰之象也成塊者火煎
 成形之狀也經失其爲經正鬱火內奪其權耳治法似
 宜大瀉肝中之火矣然瀉肝之火不解肝之鬱則熱之
 標可去熱之本未除也方用宣鬱調經湯白芍五錢當
 歸五錢柴胡一錢香附一錢鬱金一錢丹皮五錢白芥
 子二錢甘草一錢黃芩一錢炒梔子三錢水煎服連服
 四劑下月斷不先腹痛而後行經也此方補肝之血又
 解肝之鬱利肝之氣又退肝之火所以奏功如神耳
 此症用香草
 散亦佳
 香附茯神各三錢 佐胡索甘草神麩天花粉各一錢
 炒梔子黃芩各二錢 白木生地麥冬各五錢 陳皮五
 分 水煎服
 婦人有經後小腹作痛人以爲氣血之虛誰知是腎氣之
 涸乎夫經水乃天一之水滿則溢空則虛亦其常也何
 以虛能作痛哉蓋腎水一虛則水不能生肝而肝必下

尅於脾土土木相爭而氣逆故作痛也治法亦須舒肝
 氣爲主而益之補腎之味則水足而肝氣益安矣方用
 後調湯阿膠三錢荆芥三錢巴戟天一錢山藥五錢白
 芍三錢當歸三錢甘草一錢山茱萸三錢水煎服此方
 平調肝腎既能轉逆於須臾尤善止鬱痛於頃刻經後
 以此方調理最佳不止治經後腹痛也
 此症用填經止
 痛丹亦神
 熱地二兩 山茱萸五錢 山藥三
 錢 甘草一錢 肉桂五分 水煎服
 婦人有行經之前一二日忽然腹痛而吐血人以爲火盛
 辨證錄 卷十一 講經 五
 之極也誰知肝氣之逆而不順行而上吐乎夫肝之氣
 最急宜順不宜逆順則氣安逆則氣動血隨氣而俱行
 若經逆從口上出乃少陰之火急如奔馬得肝中龍雷
 之氣直冲而上其勢最捷反經爲血又至便也不必肝
 不藏血始成吐血之症但此等吐血不同各經之吐血
 各經吐血乃內傷而成此逆經吐血者乃內溢而激之
 使出也其症絕有異同而逆氣則一也治法似乎治逆
 以平肝不必益精以補腎雖然逆經而吐血雖不損夫
 血而反覆顛倒未免傷腎之氣而血又上泄過多則腎

水亦虧必須於補腎之中以行其順氣之法也方用順經湯當歸五錢白芍三錢熟地五錢茯苓三錢牛膝三錢丹皮五錢沙參三錢荆芥炒黑三錢水煎服一劑吐血止二劑經順連服十劑不再逆經也此方於補腎補肝之中用引血歸經之藥肝氣不逆腎氣自順也腎氣既順經何能逆哉

此症用順肝藏

血丹亦效

白芍當歸熟地各一兩荆芥炒黑三錢牛膝人參茯苓各二錢柴胡五分烏藥五分澤瀉一錢水煎服二劑即順

行矣

辨證錄

卷十一 調經

三

人有經水將來三五日前臍下疼痛狀如刀刺寒熱交作下如黑豆汁既而經來因之無娠人以為血熱之故誰知是下焦寒溼相爭耶夫寒溼之氣乃邪氣也婦人有任衝之脉居於下焦衝脉為血海任脉主胞胎為血室皆喜正氣之相通最惡邪氣之相犯經水由二經而出若寒溼之氣彌滿於二經之外勢必兩相爭而作疼痛矣邪感正衰寒氣生濁下如豆汁之黑者見北方寒水之象也治法利其溼而溫其寒衝任無邪何至搏結作痛哉方用溫臍化溼湯白朮一兩茯苓三錢巴戟天

五錢山藥五錢扁豆三錢白菜十枚蓮子三十粒連心用水煎服然必須經未來前十日服之四劑而邪去經調兼可種子也此方用白朮以利腰臍更用巴戟白朮以通任脉再用山藥扁豆蓮子以衛衝脉故寒溼盡去經水自調矣倘疑腹痛為熱邪之作崇妄用寒涼則衝任虛冷血海變為冰海血室成爲冰室毋論艱於生育疼痛何有止日哉

此症可用木

桂草玄丹

白朮二兩肉桂一錢甘草一錢

玄胡索一錢水煎服一劑愈

辨證錄

卷十一 調經

三

婦有經水過多行後復行面色痿黃人倦無力人以為血熱之故也誰知血虛而不歸經乎夫血旺則經多血少則經縮然血歸於經雖血旺而經亦不多血不歸經雖血衰而經亦不少世人以經水過多為是血旺此治之所以錯也惟多是虛故再行而不勝其困乏血損精散骨中髓空不能華於面也治法大補其血之不足引其歸經寧有經後再行之病哉方用四物湯加味治之熟地一兩川芎五錢白芍三錢當歸五錢荆芥三錢山茱萸三錢白朮五錢續斷一錢甘草一錢水煎服四劑血

歸經矣十劑之後加人參三錢再服十劑下月行經適可而止不再行也四物湯乃補血之神藥加白朮荆芥行中有利加山茱萸續斷止中有補加甘草而調和得宜所以血足而歸經歸而血淨也

此症用加味補血湯亦佳

當歸黃芪各一兩荆芥三錢白朮五錢水煎服四劑人健十劑全愈

婦有行經前先瀉三日而後行經人以爲血旺之故也誰知是脾氣之虛乎夫脾統血脾虛則氣不能攝血矣且脾屬溼土脾虛則土不實而溼更甚經水將動而脾氣

辨證錄

卷十一 調經

完

先不能固脾血欲流注於血海而溼氣先乘之所以先瀉水而後行經也調經之法在先補其氣蓋氣旺而血自能固亦氣旺而溼自能瀉方用健固湯人參五錢茯苓三錢白朮一兩巴戟五錢薏仁三錢水煎服連服十劑而經行不瀉矣此方補脾氣以固脾血則血攝於氣之中脾血日盛自能運化其溼溼既化爲烏有何能作瀉哉

此症用米芩固脾飲亦佳

白朮一兩茯苓人參山藥芡實各五錢肉桂五分肉豆蔻一枚水煎服經未瀉前服此則不瀉矣多服爲

妙

婦人有行經之前一日大便出血者人爲血崩之症也誰知經入於大腸乎夫大腸與行經之路徑各別何以能入於其中乎蓋胞胎之系上通心而下通腎心腎不交則胞胎之血兩無可歸心腎二經之氣不來照攝聽其自便血乃不走小便而走大便矣治法單止其大便之血則愈止而愈多反擊動三焦之氣拂亂而不可止蓋經之妄行原因心腎之不交今不使心腎之既濟而徒安其胞胎則胞胎之氣無所歸而血又安有歸經之日

辨證錄

卷十一 調經

辛

哉故必須大補心腎使心腎之氣接而胞胎之氣不散則大腸之血自不妄行也方用歸經兩安湯人參三錢當歸五錢白芍五錢熟地五錢山茱萸二錢巴戟天一錢白朮五錢麥冬五錢荆芥炒黑三錢升麻四分水煎服一劑血止三劑經止兼可受娠此方大補心肝腎三經之藥全不去顧胞胎而胞胎有所歸者以心腎之氣合也心腎虛而氣乃兩分心腎足而氣乃兩合心腎不離而胞胎之氣聽令於二經之靜攝安有亂動之形哉然則補心腎可也何兼補夫肝木耶不知肝乃腎之子

心之母也補其肝血則肝氣往來於心腎之間自然上引心而入於腎下引腎而入於心不啻如介紹之歡也

此症用加味歸
芎散亦神效

當歸白木生地各一兩川芎五錢升麻
一錢一劑即止血而經行矣二劑全愈

受妊門

婦人有瘦怯身軀久不孕育一交男子臥病終朝人以為氣虛之故也誰知血虛之故乎夫血藏肝中精涵腎內若肝氣不開則精不能泄及精既泄肝氣益虛以腎為肝之母母既泄精不能分潤以養肝木之子而肝燥無水則火且暗動以燬精腎愈虛矣况瘦人多火又加泄精則水益少而火益熾水難制火腰腎空虛所以倦怠而臥也此等之婦偏易動火然而此火出於肝木之中又是雷火而非真火不交合則已交則偏易走泄陰虛

火旺不能受胎即偶爾受胎逼乾男子之精有隨種而隨消者也治法必須大補腎水平其肝木水旺而血亦旺血旺而火亦滅也方用養陰種玉湯熟地五錢白芍五錢當歸^{五錢}茯苓二錢山茱萸五錢甘菊花一錢丹皮二錢山藥三錢杜仲二錢牛膝一錢水煎服一月便可受孕服三月身健斷斷可以種子此方不特補血純於填精精滿則子宮易於攝精血足則子宮易於容物皆有子之道也惟是世人貪慾者多節慾者少服此藥必保守者二月定然坐孕否止可身健勿咎藥品之未

靈也

此症用五美

丹亦效

熟地一兩當歸山茱萸麥冬山藥
各五錢水煎服十劑可以受胎矣

婦人有飲食少思飽悶倦怠惟思睡眠一行房事呻吟不

已人以爲脾胃之氣虛也誰知腎氣之不足乎夫氣宜

升騰不宜降陷升騰於上焦則脾胃易於分消降陷於

下焦則脾胃難於運化人無水穀之養則精神自然倦

怠惟是脾胃之氣實生於兩腎之內無腎中之水氣則

胃氣不能騰無腎中之火氣則脾氣不能化故宜亟補

辨證錄

卷十一 受胎

三

腎中水火之氣然僅補腎而不用補脾胃之藥則腎中

水火二氣不能提於至陽之上也方用兼提湯人參五

錢白朮一兩熟地一兩山茱萸三錢黃芪五錢枸杞二

錢柴胡五分巴戟天一兩水煎服一月腎氣大旺再

服一月未有不可受孕者此方補氣之藥多於補精似

乎以補脾胃爲主孰知脾胃健而生精自易是補脾胃

正所以補腎也脾胃既旺又加補精之味則陰氣既生

陽氣易升不必升提氣自騰越於上焦况原有升提之

藥乎陽氣不下降無非大地之陽春隨遇皆是生機安

得不受育哉

此症用旺腎

湯亦甚效

熟地一兩山茱萸巴戟天各四錢白朮人參各五
錢茯苓三錢砂仁二粒水煎服一月自可受孕

婦人有下身冰冷非火不煖交感之時陰中絕不見有温

熱之氣人以爲天分之薄也誰知胞胎之寒乎夫寒水

之地不生草木重陰之淵不長魚龍胞胎寒冷何能受

孕哉即茹之於暫不能不吐之於久也蓋胞胎居於心

腎之間上系於心下系於腎胞胎之寒冷乃心火之微

腎火之衰也故治胞胎者仍須補心腎之二火方用温

辨證錄

卷十一 受胎

三

胞散人參三錢白朮一兩巴戟天一兩破故紙二錢杜

仲三錢兔絲子三錢芡實三錢山藥三錢肉桂二錢附

子三分水煎服連服一月胞胎熱矣此方補心即補腎

温腎即温心心腎氣旺則心腎之火自生心腎火生則

胞胎之寒自散原因胞胎之寒以致茹而即吐胞胎既

熱豈尙有施而不受者乎倘改方爲丸朝夕吞服則尤

能攝精斷不至悲伯道無兒之嘆也

此症用春温

湯亦佳

人參巴戟天白朮杜仲各五錢破故紙三錢肉桂一
錢兔絲子五錢水煎服十劑自然温和可以受胎

矣

婦人有素性恬澹飲食用少多則難受作嘔作瀉胸飽悶

脹人以爲天分之薄也誰知是脾胃之虛寒乎夫脾胃

虛寒亦是心腎之虛寒也胃土非心火不生脾土非腎

火不化心腎之二火衰則脾胃失其生化之權即不能

傳化水穀以化精微矣脾胃既失生化之權不能化水

穀之精微自無津液以灌注於胞胎欲胞胎有溫暖之

氣以養胎氣必不得之教也總能受胎而帶脉之間斷

然無力亦必墜落者也然則治法可不亟溫補其脾胃

辨證錄

卷十一 受胎

三

乎然脾之母在於腎之命門胃之母在於心之包絡溫

補脾胃必須溫補二經之火蓋母旺而子不弱母熱而

子不寒也方用溫土毓麟湯巴戟天一兩覆盆子一兩

白朮五錢人參三錢神曲一錢山藥五錢水煎服連服

一月可以種子蓋所用之藥既能溫命門之火又能溫

心包之火火旺則脾胃無寒冷之虞自然飲食多而善

化氣血日盛而帶脉有力可以勝任愉快安有不玉麟

之毓哉

此症用培上

散亦效

肉桂一錢茯苓三錢蛇床子二錢肉豆蔻一枚北五
味子一錢陳皮五分神麴一錢人參白朮各五錢肉

菴蓉三錢

水煎服

婦人有小腹之間自覺有緊迫之狀急而不舒斷難生子

乃帶脉太急由於腰臍之不利也腰臍之不利者又由

於脾胃之不足脾胃虛而腰臍之氣閉使帶脉拘急胞

胎牽動精雖直射於胞胎胞胎雖能茹納力難載負必

有小產之虞且人又不能節慾安保不墜乎治法必須

利其腰臍之氣而又大補脾胃則帶脉可寬也方用寬

帶湯白朮一兩巴戟天五錢補骨脂一錢肉菴蓉三錢

辨證錄

卷十一 受胎

美

人參三錢麥冬三錢五味子三分杜仲三錢蓮肉二十

個不可去心熟地五錢當歸二錢白芍三錢水煎服連

服四劑腹無緊迫之狀服一月未有不受胎者此方脾

腎雙補又利其腰臍之氣自然帶脉寬舒可以載物勝

任或疑方中用五味白芍之類酸以收之不增帶脉之

急乎不知帶脉之急因於氣血之虛血虛則縮而不伸

氣虛則攣而不達芍藥酸以平肝則肝不尅脾五味酸

以生腎則腎能益帶似乎相碍而實能相成也

此症用寬帶

湯亦效

白朮二兩杜仲一兩甘草二錢
水煎服服四劑無急迫之狀矣

婦人有懷抱素惡不能生子乃肝氣之鬱結也夫有子之心脉必流利而滑肝脉必舒徐而和腎脉必旺大鼓指未有三部脉鬱結而能生子者即心腎二部之脉不鬱不結而肝部之脉獨鬱獨結即非喜脉矣肝氣不舒必下尅脾土脾土之氣塞而腰臍之氣不利何能通任脉而達带脉乎带脉之氣閉而胞胎之口不開精到門亦不受治法必須開其胞胎之口但舍開鬱無第二法也方用開鬱種子湯香附三錢白芍一兩當歸五錢丹皮三錢陳皮五分白朮五錢茯苓三錢天花粉一錢水煎服連服一月則鬱結之氣盡開無非喜氣之盈腹自然兩相好合結胎於頃刻矣此方解肝氣之鬱宣脾氣之困腰臍氣利不必通任脉而任脉自通不必達带脉而带脉自達不必啓胞胎而胞胎自啓也

此症用鬱金
舒和散

白芍一兩當歸五錢鬱金香附神麴各一錢枳壳三分白朮三錢川芎二錢水煎服鬱開自易得子矣

婦人身體肥胖痰多不能受孕溼盛之故耳夫溼從下受乃言外邪之溼也婦之溼實非外邪乃脾土內病也因

辨證錄

卷十一 受胎

三

辨證錄

卷十一 受胎

三

氣衰肉勝外似健旺內實虛損不能行水而溼停於腸胃不化精而化涎矣且肥胖之婦內肉必滿遮隔子宮難以受精何況又多水溼亦隨入而隨流出矣治法必須以瀉水化痰為主但不急補脾土則陽氣不旺溼痰未必去人先病矣方用補中益氣湯加味治之人參三錢當歸三錢黃芪三錢白朮一兩陳皮五分甘草一錢柴胡一錢半夏三錢升麻四分茯苓五錢水煎服連服八劑而痰氣盡消再服十劑而水亦利子宮潤出易於受精此方提脾氣而升於上則水溼反利於下行助胃氣而消於下則痰涎轉易於上化不必用消尅之藥以損其肌不必用瀉決之味以開其竅陽氣旺自足以攝精邪溼散自可以受種也

此症用敦厚
散亦佳

白朮一兩半夏人參各二錢益智仁一錢茯苓五錢砂仁二粒水煎服十劑痰消易於得子

婦人口乾舌燥骨蒸夜熱遍體火焦咳嗽吐沫斷難生子人以爲陰虛火動也誰知骨髓之內熱乎夫寒陰之地不能生物而火燥旱田之內何能望禾黍之油油也然骨髓與胞胎何相關切而能使人無嗣蓋胞胎爲五臟

外之臟因其不陰不陽所以不列入於五臟之中不陰不陽者以其上系於心包下系於命門系心包者通於心系命門者通於腎也陰中有陽陽中有陰所以善於變化生男生女俱從此出然必陰陽兩平不偏不枯始能變化生人否則正不能生人也且骨髓者腎之所化也骨髓熱而腎熱腎熱而胞胎亦熱矣况胞胎無骨髓之養則嬰兒何以生骨髓熱而骨中空虛惟存火氣何能成胎而作骨哉治法必須清骨中之熱然骨熱由於水虛補腎中之陰骨熱自除胞胎無乾燥之虞矣方用

辨證錄

卷十一 受胎

三

清骨湯地骨皮一兩丹皮五錢沙參五錢麥冬五錢玄參五錢北五味子五分金釵石斛二錢白朮三錢水煎服連服一月而骨中之熱自解再服二月自可受孕矣此方補腎中之精涼骨中之髓不清胞胎胞胎無太熱之患矣陰虛內熱之人原易受胎今因骨髓過熱所以受精變燥以致難於育子本非胎之不能受精也所以少調其腎以殺其火之有餘况又益其水之不足更易種子耳

此症用解氣散亦效

地骨皮一兩丹皮沙參各五錢白芥子三錢山藥一兩水煎服一月骨蒸自退便可望子矣婦人有腰痠背楚胸中脹悶腹内生瘕日日思寢朝朝欲

臥百計求子不能如願人以腰腎之虛誰知任督之困乎夫任脉行於前督脉行於後然皆從帶脉上下而行也故任督脉虛而帶脉墜於前後雖受男子之精必多小產况任督之間有疝瘕之症則外多障礙胞胎縮入於疝瘕之內往往精不能施治法必去其疝瘕之病而補其任督之脉則提挈有力足以勝任無虞外無所障內有可容安得不受孕乎方用升帶湯白朮一兩人參

辨證錄

卷十一 受胎

四

三錢沙參五錢肉桂一錢葶藶粉三錢鼈甲炒三錢神麩二錢茯苓三錢半夏一錢水煎服連服一月任督之氣旺再服一月疝瘕亦盡消也此方利腰膈之氣正升補任督之氣也任督之氣升而疝瘕有難存之勢况方中有肉桂之散寒有葶藶之祛積有鼈甲之攻堅有茯苓之利溼有形自化於無形無非升騰之氣何至受精而再墜乎

此症亦可用任督兩滋湯

白朮一兩人參五錢肉桂一錢茯苓三錢白朮十個黑豆一大把杜仲五錢巴戟天五錢水煎服十劑而

任督之脈氣旺可
以攝精而受孕也

婦人有小水艱澁腹中作脹兩腿虛浮不能坐孕乃膀胱
之氣不能化也夫膀胱與胞胎相近水溼之氣必走勝
胱然而膀胱不能自已分消必得腎氣相通始能化水
從陰器以泄倘膀胱無腎氣之通則氣化不行水溼必
且滲入於胞胎汪洋之田何能生物哉治法必須分消
胞胎之溼然腎氣不旺胞胎之水氣何從而化故須治
腎中之火使火氣達於膀胱也方用北水種玉丹人參
三錢白朮一兩巴戟天一兩肉桂二錢兔絲子五錢茯
苓五錢車前子二錢芡實五錢水煎服二劑膀胱之氣
化矣四劑艱澁之症去又服十劑虛脹之形盡消連服
二月腎氣大旺易於受胎此方利膀胱之水全在補腎
中之氣然而補腎之藥多是濡潤之品不以溼而益助
其溼乎方中所用之藥補腎之火非益腎之水補火無
燥烈之虞利水非蕩滌之甚所以膀胱氣化胞胎不至
於過溼安有佈種而難於發育者乎

此症用參朮加

桂湯亦效

茯苓一兩白朮一兩肉桂一錢人參五錢水煎
服十劑而膀胱通利腹亦不脹可以受胎矣

妊娠惡阻門

婦人懷妊之後惡心嘔吐思酸解渴見食則憎困倦欲臥
人以爲妊娠之惡阻也誰知肝血之太燥乎夫腎一受
精則腎水生胎不能分潤於他臟肝爲腎之子日食腎
母之氣一旦無津液之養則肝氣燥而益急火動而氣
乃逆也於是惡心嘔吐之症生雖嘔吐不至大甚而傷
氣則一也氣傷則肝血愈耗世人以四物治產前諸症
正以其能生肝血也然補肝以生血未爲不佳但恐生
血不能生氣則脾胃衰微不勝頻嘔吾恐氣虛血不易

辨證錄

卷十一 妊娠

聖

生也故治法平肝補血之中宜用健脾胃開胃之藥以生
陽氣則氣能生血尤益胎氣耳然雖氣逆而用補氣之
藥氣旺不益助其逆耶不知懷妊惡阻其逆不甚且逆
亦因虛而逆非因邪而逆也因邪而逆者助其氣而逆
增因虛而逆者補其氣而逆轉况補氣於補血之中則
陰足以制陽何患於逆乎方用順肝益氣湯白芍三錢
當歸一錢白朮三錢人參一錢茯苓二錢熟地五錢蘇
子一錢麥冬三錢砂仁一粒神麩一錢陳皮三分水煎
服一劑惡阻輕再劑而平三劑全愈此方肝腎脾胃肺

五經同調之法其意專主於肝腎肝平則氣不逆腎旺則血易生凡胎不動而少帶惡阻者俱以此方投之無不安靜如故有益於孕婦不淺實勝於四物之湯也蓋四物湯專治肝此方不止治肝所以奏功尤神耳

用潤肝安胎

湯亦佳

人參茯苓扁豆山藥各三錢半夏熟地白朮各五錢川芎麥冬丹皮蘇子神麩各二錢白豆蔻一粒陳皮三分水煎服連服四劑而惡阻止矣

一妊娠每至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面俱腫人以為犯溼而然也誰知是脾肺之

辨證錄

卷十一 妊娠

醫

氣虛乎夫妊娠雖有按月養胎之分其實不可拘於月數摠以健脾補肺為主蓋脾統血而肺通氣也胎非血不蔭兒非氣不生脾健則血旺而蔭胎肺清則氣壯而生子苟肺衰則氣餒即不能運氣於皮膚矣脾虛則血少即不能運化於肢體矣氣血兩衰脾肺失令飲食難消精微不化勢必氣血下陷不能升舉而溼邪即乘其所虛之處聚溼而浮腫矣治法當補其脾肺之虛不必以去溼為事方用補中益氣湯加減治之人參五錢白朮五錢當歸三錢黃芪三錢陳皮三分甘草一分柴胡

一錢升麻三分茯苓一兩水煎服一劑少脹二劑即寬三劑漸消四劑即愈十劑不再犯也補中益氣湯原是升提脾肺之藥似益氣而不益血也不知血非氣不生况溼氣相犯未便補血故補氣而助之利溼之味則氣升而水尤易散耳然則少用利水之味可也何重用茯苓至一兩不幾以利水為君乎夫重用茯苓於補氣之中雖是利水仍是健脾清肺凡利水之藥多耗氣血茯苓與白朮補多於利所以重用以分溼邪即所以補氣血耳

辨證錄

卷十一 妊娠

醫

用土金雙培湯亦效甚
人參蘇子茯苓穀芽巴戟天兔絲子白芍各三錢白朮薏仁各五錢山藥五錢神麩二錢砂仁一粒甘草二分柴胡五分水煎服四劑全消

辨證錄卷之十二

山陰陳士鏗敬之甫號遠公又號朱華子著述

會稽陶式玉尚白甫號存齋又號 泰訂

安胎門

婦人小腹作痛胎動不安如下墜之狀人以為帶脉之無力也誰知脾腎兩虧乎夫胞胎雖係於帶脉而帶脉實關於脾腎二經虧損則帶脉力微胞胎何能勝任乎然人致脾腎之虧者非因於飲食之過多即由於色慾之太甚不補脾補腎而帶脉迫急胞胎所以下墜也芟胞

辨證錄

卷之十二 安胎

胎通於心腎不通於脾補腎可也何必補脾不知脾胃為後天腎為先天脾非先天之氣不能化腎非後天之氣不能生補腎不補脾則腎之精正不能遽生也補後天之脾正所以補先天之腎補先後天之脾腎正所以固胞胎之氣蓋胞胎原備先後天之氣安可不兼補先後天脾腎哉方用安奠二天湯人參一兩白朮一兩熟地一兩山茱萸五錢山藥五錢炙甘草一錢杜仲三錢枸杞子二錢扁豆二錢水煎服一劑痛定二劑胎安不必二劑夫胎動乃脾腎雙虧之症必須大用參朮熟地

補陰補陽之味始能挽回於頃刻世人往往畏用參朮或少用以冀建功反致寡效此方正妙在多用也

用煖親湯

熟地一兩白朮一兩甘草一錢人參五錢杜仲五錢山藥五錢水煎服

婦人懷妊至三四月自覺口乾舌燥咽喉微痛無津以潤以致胎動不安甚則血流如經水人以為火動之故也誰知水虛之故乎夫胎非男精不結亦非女精不成逐月養胎古人每分經絡其實不能離腎水以養之也故腎水足而胎安腎水缺而胎動又必腎火動而胎始不

辨證錄

卷之十二 安胎

寧蓋火之有餘仍是水之不足火旺動胎補腎水則足以安之矣惟是腎水不能遽生必須上補肺金則金能生水而水有化源無根之火何難制乎方中少加清熱之品則胎氣易安方用潤燥安胎湯熟地一兩山茱萸五錢益母草二錢黃芩一錢麥冬五錢生地三錢阿膠二錢五味子二分水煎服二劑燥減又二劑胎安連服十劑胎不再動矣此方專添腎中之精雖兼於治肺然補肺無非補腎故腎經不燥火不燥胎安得而不寧靜乎

用過炎散

亦效

熟地一兩玄參地骨皮麥冬各五錢北五味子
甘草各一錢貝母五分炒棗仁五錢水煎服

婦人有上吐下瀉以致胎動下墜痛疼難忍急不可緩人

以為脾胃之寒極也誰知脾胃之虛極乎夫脾胃氣虛

則胞胎無力必有崩墜之虞况加上吐下瀉則脾胃

愈虛欲胞胎無恙得乎然而胞胎雖疼痛而猶不下者

蓋脾胃雖損而腎氣尚固也胞胎系於腎而連於心腎

未損則腎氣交於心心氣通於胞胎所以未至於胎墜

也且腎氣能固則腎之氣必來生脾心氣能通則心之

辨證錄

卷十二 安胎

三

氣必來援胃脾胃雖虛而未絕則胞胎雖動而未落耳

治法可不急救其脾胃乎然而脾胃將絕止救脾胃而

土氣難生更補助其心腎之火則火能生土尤易接續

也方用援土固胎湯人參一兩白朮二兩肉桂二錢山

藥一兩附子五分炙甘草一錢杜仲三錢續斷三錢枸

杞子三錢山茱萸一兩兔絲子三錢砂仁三粒水煎服

一劑瀉止二劑吐止腹中疼痛急迫無不盡止也此方

救脾胃之士十之八救心腎之火十之二救火輕於救

土者豈土欲絕而火未絕乎不知土崩非重劑不能援

火息雖小劑亦可助熱藥多用必有太燥之虞不比溫

補之品可以多用况懷妊胎動原係土衰非係火衰也

何必用大熱之劑過於助土以傷胎氣哉

用脾胃兩安

湯亦效

白朮五錢白茯苓人參各三錢陳皮五分
砂仁一粒山藥一兩薏仁五錢水煎服

婦人有懷抱憂鬱以致胎動不安兩脅悶痛如子上懸人

以為子懸之病誰知是肝氣之不通乎夫養胎半係腎

水然非肝血相助則腎水亦必有獨力難支之勢使肝

經不鬱則肝氣不閉而肝血亦舒自然灌注於胞胎以

辨證錄

卷十二 安胎

四

助腎水之不足今肝因憂鬱則肝且閉塞不通子無血

蔭安得不上升以覓食乎此子懸之所必至乃氣使之

升非子之欲自懸也治法不必治子懸以瀉子但開肝

氣之鬱結補肝血之燥乾則子懸自定方用解懸湯白

芍一兩當歸一兩炒梔子三錢枳殼五分砂仁三粒白

朮五錢人參一錢茯苓三錢薄荷二錢水煎服一劑悶

痛除二劑子懸定三劑全安去梔子多服數劑尤妙此

方乃平肝解鬱之聖藥鬱開而肝不去尅土肝平而木

不去生火况方中又有健脾生胃之藥自然水穀生精

四布各藏肝腎有潤澤之機則胞胎自無乾澁之患何至嬰兒之上懸哉

用通肝散

亦佳

白芍一兩歸身川芎茯苓各三錢鬱金薄荷各一錢香附神曲各二錢陳皮三分蘇葉五分白朮五錢水煎服

婦人有跌閃失足以致傷損胎元因而疼痛人以為外傷之故也誰知仍是內傷之故乎凡人跌撲閃挫亦能動胎若作跌閃外治未能奏功且有因治反墮者必須大補氣血少加行動之味則瘀血自散胎又得安然補血

辨證錄

卷十二 安胎

五

宜多補氣宜少方用救損湯治之歸身五錢白芍三錢白朮五錢人參一錢生地一兩甘草一錢蘇木三錢乳香末一錢沒藥末一錢水酒煎服一劑疼痛止二劑胎不墮矣不必三劑此方既能去瘀又不傷胎蓋補血補氣復無停滯之憂更少通滑之害治無胎之跌閃可建奇功治有胎之跌閃尤有殊績者也

亦可用救傷

散治之

歸身熟地各一兩白朮白芍生地杜仲各五錢甘草一錢丹皮二錢水煎服

婦人有胎雖不動腹亦不疼然時常有血流出人以為血

虛胎漏也誰知氣虛不能攝血乎夫血能蔭胎胎中之血必藉氣以包之氣虛下陷血乃隨氣亦陷矣夫氣虛則血必旺血旺則血必熱血寒則靜血熱則動動則必有躍躍欲出之兆况加氣虛安得不漏泄乎猶幸其氣之虛也倘氣旺血熱則血必大崩不止此些之漏出矣治法補氣之不足瀉火之有餘則血不必止而自止方用助氣補漏湯人參一兩甘草一錢白芍五錢黃芩三錢生地三錢益母草二錢續斷二錢水煎服一劑血止再劑不再漏也此方用人參以補陽氣用黃芩以漏陰

辨證錄

卷一 安胎

六

火火瀉則血不熱無欲動之機氣補則血能包無可漏之虞自然氣攝血而血歸經寧有漏洩之患哉

用攝血丹

亦效

黃芪白朮各五錢人參二錢甘草荆芥破故紙各一錢續斷二錢肉果一枚水煎服

婦人有懷妊至七八月忽然兒啼腹中腹亦隱隱作痛人以為胎熱之故也誰知氣虛之故乎夫兒在胎中母呼亦呼母吸亦吸未嘗有一刻之間斷也然嬰兒至七八月母之氣必虛兒不能隨母之氣以呼吸則子失母氣而作啼矣腹中聲啼似乎可異其實不必異也治法大

補其氣使母之氣能哺於子則子之氣既安而子之啼亦息方用止啼湯人參一兩黃芪一兩當歸五錢麥冬一兩橘紅五分甘草一錢天花粉一錢水煎服一服即止啼二服斷不再啼也此方用參芪歸冬以補肺氣以肺主氣也肺氣旺而胞胎之氣不弱胞中之子自安矣所以一二劑而奏功耳

用接氣飲

亦效
人參白朮黃芪麥冬各五錢茯苓三錢當歸三錢貝母神曲各一錢炮薑五分水煎服一劑即止啼四劑

發不

辨證錄

卷一二 安胎

七

婦人有口渴出汗大飲涼水煩燥發狂腹痛腰疼以致胎動欲墮此乃胃火熾炎熬乾胞胎之水故耳夫胃爲水穀之海多氣多血以養各藏府者也萬物皆生於土土氣厚而物生因土中有火也然則火在胃中宜乎生土何以火盛反致太乾以害土乎不知無火難以生土而多火又能燬水也土中有火則土不死土中無水則爲焦土使胃火過旺必致先燬腎水而土中燥裂何以分潤於胞胎哉土燥之極火勢炎蒸犯心而神越以致嬰兒逼迫安得不下墮乎治法必須急瀉其火濟之以水

水旺而火自衰火衰而胎自定也方用止焚定胎飲玄參二兩甘菊三錢青蒿五錢茯苓三錢生地一兩知母二錢白朮五錢人參三錢天花粉二錢水煎服一劑狂少平二劑狂大定三劑火盡解胎亦安也不必四劑此方藥料頗大恐有不勝之憂第懷妊而火盛若此非用大劑之藥火不肯息狂不肯止而胎不肯寧也然而藥料雖多均是補水之味亦正有益無損不必顧忌耳

用滋胎飲

亦效
麥冬二兩黃芪三錢生地歸身各一兩天花粉二錢甘草一錢水煎服二劑狂定四劑愈

辨證錄

卷十二 安胎

八

婦人懷子在身痰多吐涎偶遇鬼祟忽然腹痛胎向上頂人以爲子懸之病也誰知亦有中惡而胎不寧乎凡不正之氣最能傷胎蓋陰邪陽祟多在神宇潛踪幽陰岩洞實其往來之所觸之最易相犯故孕婦不可不戒也治法似宜治痰爲主然而治痰必至耗氣之虛則痰雖消化胎必動搖必須補氣以生血補血以活痰少加消痰之味則氣血不虧痰又易化方用消惡安胎湯白朮五錢甘草一錢白芍一兩陳皮五分蘇葉一錢沈香末一錢乳香末一錢天花粉三錢當歸一兩人參三錢茯

芩五錢水煎調服一劑腹痛定鬼神亦遠矣此方大補氣血惟圖顧本正足而邪自消痰清而胎自定也

用散惡護胎

丹亦效

人參三錢茯苓五錢白朮五錢半夏一錢貝母一錢甘草一錢白微一錢管仲三錢水煎服一服胎安

婦人懷妊之後未至成形或已成形其胎必墮而性又甚急時多怒氣人以爲氣血之衰不能固胎誰知肝火之盛常動而不靜乎蓋木中實有相火也相火宜靜不宜動靜則安動則熾然而木中之火又最易動而難靜况加大怒則火更動而不可止遏火勢飛揚不能生氣化

辨證錄

卷一二 安胎

九

胎反致食氣傷精自然難蔭而易墮治法必須平其肝中之火大利其腰膈之氣使氣生血而血清其火也方用利氣瀉火湯白朮一兩當歸三錢甘草一錢黃芩二錢人參三錢白芍五錢熟地五錢芡實三錢水煎服服二月胎不墮矣此方名爲利氣其實乃補氣也補氣而不加之瀉火之藥則氣旺而火不能平轉害夫氣矣加黃芩於補氣之中益以熟地歸芍之滋肝則血不燥而氣益和氣血既和不必利氣而無不利矣况白朮最利胃膈者哉

用息怒養妊

湯亦佳

白芍二兩茯苓五錢人參三錢陳皮五分甘草一錢熟地一兩生地五錢白朮五錢神麩一錢水煎服

辨證錄

卷十二 安胎

小產門

婦人因行房顛狂遂至小產血崩不止人以爲火動之極也誰知是氣脫之故乎凡懷孕婦人惟藉腎水蔭胎水原不足水不足而火易沸加之久戰不已則火必大動若至顛狂則精必大泄腎水益乾腎火愈熾水火兩病胎何能固胎墮而火猶未息故血隨火崩有不可止之勢治法自當以止血爲主然而火動由於水虧血崩本於氣脫不急固其氣則氣散不能速回血將何生不大補其精則精涸不能遠長火且益熾方用固氣填精湯

辨證錄

卷一 二 小產

十一

治之人參一兩熟地一兩白朮五錢當歸五錢黃芪一兩炒黑荆芥二錢三七根末三錢水煎調服一劑血止再劑身安四劑全愈此方全不清火惟補氣補精救其匱乏奏功獨神者以諸藥甘溫能除大熱也蓋此熱乃虛熱非實熱耳實熱可以寒折虛熱必須溫補故補氣自能攝血補精自能止血也

用固氣止脫

湯亦效

人參熟地山茱萸各一兩白朮麥冬各五錢甘草一錢丹皮三錢水煎服

婦人因跌撲閃損遂至小產血流紫塊昏暈欲絕人以爲

瘀血之作祟也誰知是血室傷損乎夫婦人血室與胞

胎相連胞胎損而血室亦損然傷胞胎而流血者其傷淺傷血室而流血者其傷深矣傷淺者漏在腹傷深者暈在心同一跌閃之傷也未小產與已小產治各不同未小產而胎不安者宜顧其胎不可輕去其血已小產而血大崩者宜散其血不可重傷其氣蓋胎已墮矣血既盡脫則血室空虛惟氣存耳倘又傷其氣保無氣脫之憂乎故必須補氣以生血新血生而瘀血可止也方用理氣止瘀湯人參一兩黃芪一兩當歸五錢紅花一

辨證錄

卷一 三 小產

十二

錢丹皮三錢炒黑乾姜五分茯苓三錢水煎服一劑瘀血止二劑昏暈除三劑全安此方用人參黃芪以補氣氣旺而血可攝也用當歸丹皮以補血血生而瘀難留也用紅花黑姜以活血血活而暈可除也用茯苓以利水水流而血易歸經也

用加味補血

湯亦神

黃芪二兩當歸人參各一兩丹皮三錢荆芥三錢益母草三錢水煎服

婦人懷娠口渴煩躁舌上生瘡兩脣腫裂大便乾結至數日不通以致腹痛小產人以爲大腸之火也誰知是血

熱爍胎乎夫血所以養胎者也然血溫則胎受其利血熱則胎受其損兒在胞中不啻如探湯之苦如何存活自然外越下奔以避炎氣之逼耳夫血乃陰水所化血日蔭胎則取給甚急陰水不能速生以變血則陰虛火動陰中無非火氣則血中亦無非火氣矣兩火相合焚逼兒胎此胎之所以下墮也治法清胞中之火補腎中之精始可矣蓋胎中純是火氣此火乃虛火非實火也實火可瀉虛火宜於補中清之倘一味用寒涼之藥以降其火全不顧胎之虛實勢必寒氣逼人胃中生氣蕭

辨證錄

卷一二小產

三

索何以化精微以生陰水乎不變為癆瘵者幾希矣方用四物湯加減治之熟地五錢白芍三錢川芎一錢當歸一兩山茱萸二錢山藥三錢梔子一錢丹皮二錢水煎服連服四劑餘血淨而腹痛全消

用生地飲

亦神

生地二兩於未小產前救之若已小產此方亦可用或減半用之尤為萬安也

娠婦有畏寒腹痛因而落胎者人以爲下部太寒也誰知氣虛而又加寒犯遂至不能攝胎而下墮乎夫人生於火亦養於火然火非氣不充氣旺而後火旺氣衰則火

不能旺矣人之坐胎者受父母先天之火也先天之火即先天之氣成之故胎成於氣亦攝於氣氣旺則胎牢氣衰則胎弱胎日加長氣日加衰安得不墮哉况遇寒氣之外侵則內之火氣更微當其腹痛時即用人參乾姜之藥則痛止胎安無如人之不敢用也因致墮胎僅存幾微之氣不急救其氣用何法以救之乎方用黃芪補血湯黃芪二兩當歸一兩肉桂五分水煎服一劑而血止三劑而氣旺庶不致有垂絕之憂也倘認定是寒大用辛熱之品全不補其氣血則過於燥熱必至亡陽

辨證錄

卷一二小產

四

又爲可危耳

用加味參朮

湯亦效

人參一兩白朮五錢甘草一錢肉桂一錢白蘆豆三錢水煎服

娠婦有大怒之後忽然腹痛因而墮胎及胎墮之後仍然腹痛者人以爲肝經之餘火未退也誰知血不歸經而痛乎夫肝藏血大怒則血不能藏宜失血而不宜墮胎胡爲血失而胎亦墮乎不知肝性最急血門不閉其血直搖於胞胎而胞胎之系通於心腎之間肝血來衝心腎路斷而胎氣一時遂絕此胎之所以墮也胎既墮

血猶未盡故餘痛無已也治法引其肝血仍入於肝中而腹痛自止然而徒引肝血不平其肝木之氣則氣逆不易轉卽血逆不易歸也方用引氣歸血湯白芍五錢當歸五錢炒黑荆芥三錢白朮三錢丹皮三錢炒黑乾姜五分香附五分鬱金一錢甘草一錢麥冬三錢水煎服此方名爲引氣其實仍皆引血也氣血兩歸腹痛猶作痛余不信也

用歸經佛手

散亦神

當歸一兩川芎白朮各五錢荆芥三錢炒黑乾姜一錢甘草一錢人參三錢熟地一兩水煎服

辨證錄

卷十二 小產

五

鬼胎門

婦人有懷妊終年不產面色黃瘦腹如斗大肌膚消削常至二三年未生者此鬼胎也或入神廟山林起交感之念皆能召祟成胎幸其人不至淫蕩見祟驚惶遇合愧慙則鬼祟不能久戀一交構而去然而淫氣妖氛已結於腹遂成鬼胎其先人尙未覺迨後漸漸腹大蓋人身之氣血不行內外相包一如懷胎之兆有似血臑之形其實非胎非臑也治法必用逐穢之藥爲主但人至懷胎數年卽非鬼胎其氣血必衰况非真妊則邪氣甚旺

辨證錄

卷十二 鬼胎

六

正不敵邪虛弱可知烏可以迅利之藥竟用祛蕩乎自必從補中逐之爲得方用蕩鬼湯雷丸三錢大黃一兩紅花三錢枳壳一錢厚朴一錢桃仁二十粒當歸一兩人參一兩牛膝三錢丹皮三錢水煎服一劑腹必大鳴瀉出惡物半桶再服二煎又瀉惡物而愈斷不可用三劑也此方用雷丸以祛穢又得大黃之掃除佐之紅花厚朴等藥皆善行善攻之品亦何邪能留於腹中自然盡情逐下然用參歸以補氣血則邪去而正又不傷否則單用雷丸大黃以迅下之必有血崩氣脫之害矣倘

或自知鬼胎如室女寡婦之人一旦成形雖邪氣甚盛而真氣未濟可用岐天師新傳紅黃霹靂散紅花半斤大黃五錢雷丸三錢水煎服亦能下胎然未免過傷血氣不若蕩鬼湯有益無損之更佳也亦在人斟酌而善用之耳

用追崇丹亦神效

大黃五錢枳實三錢丹皮一兩紅花半斤附子二錢當歸尾一兩人參五錢牛膝五錢麝香一錢鱉甲一兩半夏三錢南星三錢桃仁十四粒水煎服一劑而胎破矣不須二劑瀉出惡物之後單用當歸三兩紅花一兩水煎服自然敗血淨而新血生也連用四劑自慶安然

辨證錄

卷一 二 鬼胎

二

難產門

婦人腹痛數日不能生產人以爲氣虛力弱不能送子出產門也誰知血虛膠滯胎中無血兒不易轉身乎夫胎之成由於腎之精而胎之養半資於五臟六腑之血故血旺者子易生血衰者子難產所以臨產之前必須補血雖血難驟生補氣正所以生血也然徒補其氣不兼補其血則陽過於旺而陰反不足偏勝之害恐有升而不降之虞故又宜氣血之兼補氣能推送而血又足以濟之則汪洋易於轉頭何至有膠滯之憂哉方用送子

辨證錄

卷十一 難產

六

丹治之黃芪一兩當歸一兩川芎三錢熟地五錢麥冬一兩水煎服二劑子生且無橫生倒養之病此方補氣補血之藥也二者相較補血重於補氣補氣止有黃芪其餘無非補血之品無論氣血兩平陰陽交泰易於生產而血旺於氣則胞胎之內無非血也譬如舟遇水淺之區雖用盡人功終難推動忽得春水泛濫則舟能自行又遇順風之送有不揚帆而迅走者乎血猶水也氣猶風也無水則風雖順何益哉故補氣必須補血耳

用麥冬升麻湯亦效

麥冬四兩升麻二錢水煎服
而兒身即轉易於速下也

婦人有兒已到門竟不能產此危急存亡之時人以為胞

胎先破水不能推送之故誰知交骨不開乎蓋產門之

上原有骨二塊兩相關合未產之前其骨自合將產之

際其骨自開故交骨為兒門之關亦為婦人陰門之鍵

然其能開能合者氣血主之也無血而兒門自閉無氣

而兒門不開欲兒門之開闔必須交骨順滑自非大補

氣血不可然而閉之甚易開之甚難其不開者因產前

之貪色也過於泄精則氣血大虧交骨粘滯而不易開

辨證錄

卷十二 難產

九

故開交骨必須於補氣補血之中用開交骨之藥兩相

合治不必推生子自迅下方用降子散當歸一兩人參

五錢川芎五錢紅花一錢牛膝三錢柞木枝一兩水煎

服一劑兒門一響响亮骨如解散子乃直降矣此方用

人參補氣用歸芎補血用紅花活血用牛膝下降用柞

木開關君臣佐使同心協力所以取效甚神用開於補

之內也雖單服柞木亦能骨開但無補氣補血之藥則

開不易合兒門不關不無風入之憂不若用此方而能

開能閉之為妙也至於兒未到門萬不可先用柞木以

開其門然用降子散亦正無礙以其補氣補血耳若單
用柞木必須俟兒頭到門而後用之也

用突門散

亦效

黃芪二兩改龜板一箇搗碎牛膝川芎各五錢附子
三分水煎服一劑而兒門開兒即生矣加當歸亦可

加人參
更神

婦人生產有脚先下者有手先出者人以為橫生倒產至

危之病誰知氣血甚衰之病乎凡兒在胎中兒身正坐

惟男向內坐女向外坐及至生時則頭必旋轉而後生

此天地造化之奇實非人力所能勉強雖然先天與後

辨證錄

卷一二 難產

三

天未常不並行而不恃天機之動必得人力以濟之人

力者非產母用力之謂也謂產母之氣血耳氣血足而

胎必順氣血虧而胎多逆蓋氣血既虧則母身自弱子

在胎中何能獨強勢必子身怯弱雖轉頭而往往無力

故破胞而出此手足之所以先見當是時急以針刺兒

手足則兒必驚縮而入急用轉天湯救之人參一兩當

歸二兩川芎五錢升麻四分牛膝三錢附子一分水煎

服一劑而兒轉身矣急服二劑自然順生此方用人參

歸芎以補氣血之虧人盡知其義乃用升麻又用牛膝

附子恐人未識其妙蓋兒已身斜非用提挈則頭不易轉然既轉其頭非用下行則身不速降二者並用非加附子則不能無經不達使氣血之迅速推生也

用轉氣催生

湯亦神

人參二兩川芎五錢當歸黃芪龜膏各一兩升麻旋覆花各一錢水煎服一劑兒即轉身而生矣

婦人有生產三四日子已到門交骨不開子死而母未亡者服開交骨之藥不驗必有死亡之危今幸不死者正因其子之死則胎胞已墮子母離開子死而母氣已收未至同子氣之俱絕也治法但救其母不必顧其子矣

辨證錄

卷十二 難產

主

然死子在門塞住其口亦危道也仍宜用補血補氣使氣血兩旺死子可出矣倘徒用祛除降墮之劑以下其子則子未必下母先脫矣方用救母丹當歸二兩川芎一兩人參一兩荆芥三錢益母草一兩赤石脂末一錢水煎服一劑子下此方用芎歸以補血用人參以補氣氣血既旺上能升而下能降氣能推而血能送安得有阻滯之憂乎况益母草善下死胎赤石脂復易化瘀血自然一湧而齊出耳

用牛膝益母

湯亦效

牛膝三兩益母草一兩水煎服一劑而死子立下矣後用人參當歸各一兩川芎五錢肉桂一錢服之保無變生也

婦人生產六七日胞水已破子不見下人以為難產之故也誰知其子已死於腹中乎兒在門邊未死者兒頭必能伸能縮已死者必安然不動也若係未死少拔其髮兒必退入矣若只子死腹中者產母之面必無黑氣母不死也若產母有黑氣現面兼唇黑舌黑者子母兩死既知兒死於腹中而母不死不能用藥以降之亦危道也雖然生產至七日若用霸道之藥其氣血困乏子下

辨證錄

卷一二 難產

主

而母且立亡必須仍補其母補母而子可自出矣方用療兒散人參一兩當歸二兩川芎一兩牛膝五錢鬼臼三錢乳香末二錢水煎服一劑而死兒下矣凡兒生必轉其頭原因氣血之虛致兒頭之難轉世人往往用催生之藥耗兒氣血則兒不能通達反致閉悶而死此等之死實醫殺之也所以難產之病斷不可輕用催生之藥一味補氣補血全活嬰兒之命正無窮也此方救兒死之母仍用大補氣血所以救其本也誰知救本正所以催生哉

用參芪救母

湯亦神效

人參黃芪各一兩當歸二兩升麻五分龜板一箇母丁香三枚水煎服一劑而死子下生矣

婦人產數日而胎不下服催生藥皆不效前條曾言交骨難開不知又有氣結而不行者夫交骨不開固是難產然兒頭到門不能下者乃交骨之不開也自宜用開骨之劑若兒未到門而不產者非交骨不開之故也若開其交骨則兒門大開兒頭不轉必且變出非常萬萬不可輕開兒門也大約生產之時切忌坐草太早兒未轉頭原難驟生乃早於坐草產婦見兒不下未免心懷懼

辨證錄

卷一 二 難產

三

恐恐則神怯神怯則氣下而不升氣既下而不升則上焦閉塞而氣乃逆矣上氣既逆上焦脹滿氣益難行氣阻於上下之間不利氣而催生則氣愈逆而胎愈閉矣治法但利其氣不必催生胎自下也方用舒氣飲人參一兩紫蘇三錢川芎五錢當歸一兩陳皮一錢白芍五錢牛膝三錢柴胡八分水煎服蔥白七寸同煎一劑逆轉兒即下矣此方利氣而實補氣也氣逆由於氣虛氣虛則易於恐懼補其氣恐懼自定恐懼定而氣逆者不知其何以順也况方中紫蘇柴胡白芍牛膝之類無非平肝

疏肺之品佐人參芎歸實有補利之益也何必開交骨

之多事哉

亦可用歸末降

胞湯治之

當歸二兩白朮二兩柴胡一錢牛膝三錢丹皮三錢紅花五錢荆芥三錢益母草五錢水煎服一劑即產又不傷胎

辨證錄

卷十一 難產

十四

血暈門

婦人甫產後忽眼目昏暈惡心欲吐額上鼻尖有微汗鼻
 出冷氣神魂外越人以爲惡血衝心之患也誰知氣虛
 欲脫而血暈乎蓋新產之後血已盡傾血舍空虛止存
 微氣倘其人陽氣素虛則氣怯原不能生血及胎破而
 心血隨胎而墮則心無血養所望者氣以固之也今氣
 又虛脫心君無護所剩殘血非正血不可歸經內庭變
 亂反成血暈之症矣治法必須大補氣血不宜單治血
 暈也補血以生新血正活血以逐舊血也然血乃有形

辨證錄

卷一 血暈

五

之物難以速生氣乃無形之物易於迅長補氣以生血
 不更易於補血以生血乎方用解暈湯荆芥三錢人參
 一兩當歸一兩炮薑一錢黃芪一兩水煎服一劑暈止
 二劑心定三劑氣旺四劑血生不再暈也此方實解血
 暈之聖方凡產後能服此方斷無退母之症或人參力
 不能用減去大半或少用一二錢餘如分兩多服數劑
 無不奏功也

用參歸荆芥

湯亦效甚

人參一兩荆芥三錢

當歸一兩水煎服

婦人子方下地即昏暈不語此氣血雙脫也本在不救我
 受岐天師秘傳以救萬世產亡之婦當急用縫衣鍼刺
 其眉心之穴得血出即出語矣然後以獨參湯人參一
 兩急煎灌之無不生者倘貧家之婦無力買參用當歸
 補血湯黃芪二兩當歸一兩煎湯一碗灌之亦生萬不
 可於二方之中輕加附子蓋附子無經不達反引氣血
 之藥走而不守不能專注於胞胎不若人參歸芪而救
 其氣血之絕聚而不散也蓋產婦昏暈全是血舍空虛
 無血養心以致血暈舌爲心之苗心既無主舌又安能

辨證錄

卷十二 血暈

五

出聲眉心者上通於腦而下通舌系則連於心刺眉心
 則腦與舌俱通心中清氣上升則瘀血自然下降然後
 以參芪當歸補之則氣血接續何能死亡乎雖單用參
 芪當歸亦能生者然終是刺眉心則萬無一失瘀血冲
 心所以昏暈不語解其瘀血之冲真所謂扼要爭奇也
 世人但知灸眉之法誰知刺勝於灸乎蓋灸緩而刺急
 緩則難以救絕急則易於回生耳

亦可用參附芪

母湯治之

人參一兩附子一錢益母草二錢水煎遇此等症急

用一人拖住產母頭頂心解開以艾火急灸之必然

出聲然後以參附益
母湯救之多有生者

婦人有產後三日發熱惡露不行敗血攻心狂言呼叫甚
欲奔走拏捉不定人以爲邪熱之在胃也誰知血虛而
心無以養乎產後之血盡隨胎胞外越則血室空虛五
臟皆無血養當是之時止心中之血尙存些微以護心
也而各臟腑皆欲取給於心心包爲心君之相攔絕各
臟腑之氣不許入心故心安神定是護心者全藉心包
也然心包亦虛倘不能障心各臟腑之氣遂直入心中
以分取心血而心包情極既不能顧心又不能禦衆於

辨證錄

卷十二 血暈

三

是大聲疾呼本欲召臟腑以救心而迹反近於狂悖有
無可如何之象故病似熱而非實熱也治法大補其心
中之血使各臟腑分取之以自養不必再求於心君則
心安而心包亦安方用安心湯乾荷葉一片生地黃五
錢丹皮五錢當歸二兩川芎一兩生蒲黃二錢水煎調
服一劑卽定而惡露亦下矣此方用歸芎以補血何又
用生地丹皮之涼血似非產後所宜不知惡血奔心未
免因虛熱而相犯吾於補中涼之則涼不爲害况益之
乾荷葉則七竅相通能引邪外出不內害於心轉生蒲

黃以分解惡露也但此方止可暫用一劑以定狂不可
多用數劑以取勝不可不慎也

用參歸荆棗益
母湯亦效

人參當歸炒棗仁各一兩荆
芥益母草各三錢水煎服

辨證錄

卷十二 血暈

三

胞衣不下門

婦人見已生地而胞衣尚留於腹三日不下心煩意躁時欲暈去人以爲胞胎之蒂未斷也誰知血少乾枯黏連於腹乎世見胞衣不下心懷疑懼恐其上衝於心有死亾之兆然胎衣何能冲於心也但胞衣未下則瘀血未免難行有血暈之虞耳治法仍大補氣血使生血以送胎衣則胎衣自然潤滑生氣以助生血則血生迅速尤易推墮也方用送胎湯當歸二兩川芎五錢乳香末一錢益母草一兩沒藥末一錢麝香半分研荊芥三錢水煎調服立下此方以當歸川芎補其氣血以荊芥引氣血歸經用益母草乳香等藥逐瘀下胎新血既長舊血難存氣旺上升瘀濁自然迅降無留滯之苦也蓋胞衣留腹有回顧其母胎之心往往有六七日不下胞衣竟不腐爛正以其有生氣也可見胎衣在腹不能殺人補之自降也或謂胞衣既有生氣補氣補血則胞衣宜益堅牢何補之反降不知子未下補則益於子子已下補則益於母益子而胞衣之氣連益母而胞衣之氣脫實有不同故此補氣補血乃補各經之氣血以推送之非

補胞膽之氣血是以補氣補血而胎衣反降也

用加味佛手

散殊效

當歸二兩川芎一兩益母草五錢乳香末一錢敗龜板一具水煎服一劑即下也

婦人子生五六日胞衣留於腹中百計治之竟不肯下然又絕無煩躁昏暈之狀人以爲瘀血之黏連也誰知氣虛不能推送乎夫瘀血在腹斷無不作祟之理有則必然發暈今安然無恙是血已淨矣血淨宜清氣升而濁氣降今胞胎不下是清氣下陷難升遂至濁氣上浮難降然濁氣上升必有煩躁之病今反安然是清濁之氣兩不能升也然則補其氣不無濁氣之上升乎不知清升而濁降者一定之理也苟能於補氣之中仍分其清濁之氣則升清正所以降濁矣方用補中益氣湯人參三錢黃芪一兩當歸五錢升麻三分柴胡三分陳皮二分甘草一分白朮五錢加蘿蔔子五分水煎服一劑胎衣自下夫補中益氣湯補氣之藥即提氣之藥也並非推送之劑何能下胎衣如此之速不知濁氣之下陷者由於清氣之不升也提其氣則清氣升而濁氣自降腹中所存之物無不盡降正不必又去推送之也况方

辨證錄

卷十二 胞衣

三

辨證錄

卷十二 胞衣

三

中又加蘿蔔子數分能分理清濁不致兩相杆格此奏

功之所以神耳

用加味補血
湯亦神效

黃芪二兩當歸一兩升麻五分
益母草三錢水煎服一劑即下

辨證錄

卷一二 胎前

三

產後諸病門

婦人產後小腹疼痛甚則結成一塊手按之益痛此名兒

枕痛也夫兒枕者前人謂兒枕頭之物也兒枕之不痛

豈兒生不枕而反痛乎是非兒枕可知既非兒枕何故

作痛乃瘀血成團未散之故也此等之痛多是健旺之

婦血之有餘非血之不足似可用破血之藥然血活則

瘀血自除血結則瘀血作祟不補血而敗血雖瘀血可

消畢竟耗損血氣不若於補血中行其逐穢之法則瘀

血既去氣血又復不傷方用散結安枕湯當歸一兩川

辨證錄

卷一二 產後

三

芎五錢山查十粒丹皮二錢荆芥二錢益母草三錢桃

仁七箇乳香一錢水煎調服一劑痛即止不必再劑此

方逐瘀於補血之中消塊於生血之內不專攻痛而其

痛自止人一見兒枕之痛動以延胡蘇木蒲黃五靈脂

之類以化塊何足論哉

用歸荆安枕

湯亦神
當歸五錢丹皮一錢荆芥三錢
山查十粒水煎服一劑即止痛

產後小腹痛按之即止人亦以為兒枕之痛也誰知血虛

之故乎產後亡血過多則血舍空虛原能腹痛但痛實

不同如燥糠觸體光景此乃虛痛非實痛也凡虛痛宜補而產後之虛痛尤宜補惟是血虛之病必須用補血之劑而補血之味大約潤滑居多恐與大腸不無相礙然而產後則腸中乾燥潤滑正相宜也故補血不特腹中甚安腸中亦甚便耳方用腹寧湯當歸一兩續斷二錢阿膠三錢人參三錢麥冬三錢炙甘草一錢山藥三錢熟地一兩肉桂二分水煎服一劑痛輕二劑痛止多服更美此方補氣補血之藥也然補氣無太甚之憂補血無太滯之害氣血既生不必止痛而痛自止矣

辨證錄

卷十二 產後

三

用木歸桂草湯亦神

白朮當歸各五錢肉桂五分炙甘草一錢水煎服二劑愈

產後氣喘最是危症苟不急治立刻死亡人以為氣血之兩虛也誰知氣血之兩脫乎夫氣血既脫人將立死何故又能作喘此血已脫而氣猶未脫也血脫欲留而氣又不能留血之脫故氣反上喘但其症雖危而可救處正在於作喘肺主氣也喘則肺氣若盛而不知是肺氣之衰當是時血雖驟生止存些微之氣望肺之相救甚急肺因血失氣實無力難以提挈則氣安保不遽脫乎

是救氣必須提氣而提氣必須補氣方用救脫活母丹人參二兩肉桂一錢當歸一兩麥冬一兩山茱萸五錢熟地一兩枸杞子五錢阿膠三錢荊芥炒黑三錢水煎服一劑喘輕二劑喘又輕三劑喘平四劑全愈此方用人參以接續元陽然徒補其氣不補其血則血燥而陽旺雖回陽於一時而不能制陽於永久亦旋得旋失之道也即補其血矣不急補其腎肝之精則水實不固陽將安續乎所以又用熟地茱萸枸杞以補其肝腎之精後益其肺氣則肺氣健旺升提有力也又慮新產之後

辨證錄

卷十二 產後

三

用補陰之藥膩滯不行加入肉桂以補其命門之火非惟火氣有根易助人參以生氣且能運化地黃之類以化精微也然過於助陽萬一血隨陽動瘀血上行亦非萬全之計更加荊芥引血歸經則肺氣更安喘尤速定也

用蛤蚧救喘丹亦佳

人參二兩熟地二兩麥冬三錢肉桂一錢蘇子一錢蛤蚧二錢半夏三分水煎服三劑喘定十劑全愈

婦產後惡寒惡心身顫發熱作渴人以為產後傷寒也誰知氣血兩虛正不敵邪之故乎凡人正氣不虛則邪斷

難入若正氣已虛原不必戶外之風襲體卽一舉一動風卽乘虛而入矣雖然產婦風入易而風出亦易凡有外邪俱不必祛風况產婦惡寒者寒由內生非由外進也發熱者熱因內虛非由外實也治其內寒而外寒自散治其內熱而外熱自解矣方用十全大補湯人參三錢黃芪一兩白朮五錢茯苓三錢甘草一錢熟地五錢白芍二錢川芎一錢當歸三錢肉桂一錢水煎服二劑寒熱解身涼矣此方但補其氣血之虛絕不夫散風邪之實正以正氣既足邪氣自除况原無邪氣乎所以治

辨證錄

卷十二 產後

三

之奏功也

用正氣湯

亦效

人參當歸各一兩肉桂炮姜各一錢
白朮五錢甘草五分水煎服二劑愈

一產後惡心欲嘔時而作吐人以爲胃氣之寒也誰知腎氣之冷乎夫胃爲腎之關胃氣寒則胃不能行於腎中腎氣寒則胃亦不能行於腎內是胃與腎原不可分爲兩治也惟是產後失血腎水自涸宜腎火之炎上不宜胃有寒冷之虞何腎寒而胃亦寒乎蓋新產之餘其水遽然涸去其火尙不能生而寒象自現治法當補其腎

中之火矣然腎火無水以相濟則火過於熱未必不致陰虛火動之虞必須於火中補火腎中溫胃而後腎無太熱之病胃有既濟之歡也方用溫胃止嘔湯人參三錢橘紅五分白豆蔻一粒巴戟天一兩白朮一兩茯苓二錢炮薑一錢熟地五錢山茱萸五錢水煎服一劑吐止二劑不再吐也四劑全愈此方治胃之藥多於治腎然治腎仍是治胃所以胃氣升騰寒氣盡散不必用大熱之味以溫胃而祛寒也

用全母湯

亦神

辨證錄

卷十二 產後

三

白朮人參熟地各一兩肉桂二錢炮薑五分
丁香五分山茱萸五錢水煎服一劑卽止嘔吐

產後腸下者亦危症也人以爲兒門不關之故誰知氣虛下陷而不收乎夫氣虛下陷宜用升提之藥以提氣矣然而新產之婦恐有瘀血在腹若提氣併瘀血亦隨之而上升則衝心之症又恐變出非常是不可竟提其氣補其氣則氣旺而腸自升惟是補氣之藥少則氣衰力薄難以上升必須多用則陽旺力大而豈能終降耶方用升陽飲人參一兩黃芪一兩白朮五錢當歸一兩川芎三錢升麻一分水煎服一劑而腸升矣此方純乎補

氣絕不去升腸即加升麻之一分但引氣而不引血蓋升麻少用則氣升多用則血升也

產後半月血崩昏暈目見鬼神以為惡血冲心也誰知不慎於房幃乎夫產後半月其氣血雖不比初產之一二日然氣血新生未能全復即血路已淨而胞胎之傷損如故斷不可輕易交合以重傷其門戶今血崩而至昏暈且目見鬼神是心腎兩傷不止損壞胞胎門戶已也明是既犯色戒又加酣戰以致大泄其精精泄而神亦脫矣此等之症多不可救然於不可救之中思一急

辨證錄

卷十二 產後

三

救之法舍大補其氣無別法也方用救敗求生湯人參三兩熟地一兩當歸二兩川芎五錢白朮二兩附子一錢山茱萸五錢山藥五錢棗仁五錢水煎服一劑神定再劑必暈止而血亦止否則不可救矣倘一服見效連服三劑減半再服十劑可慶更生此方補氣回元陽於無何有之鄉陽回而氣回矣氣回可以攝血以歸神可以生精以續命不必治暈而暈除不必止崩而崩斷也

用救死丹治之亦可

黃芪二兩巴戟天一兩附子一錢白朮一兩兔絲子一兩北五味一錢水煎服一劑神定便有生機可再

服也否則不救

婦人生產之時因收生之婆手入產門損傷尿管因致尿滴不止欲少忍須臾而不能人以為胞破不能再補也夫破傷在皮膚者尚可完補豈破傷在腹獨不可治療乎試思瘡瘍之毒大有缺陷尚可服藥以長肉况收生不謹少有傷損並無惡毒何難補其缺陷耶方用完胞飲人參一兩白朮一兩當歸一兩川芎五錢桃仁十粒黃芪五錢茯苓三錢紅花一錢白芨末一錢益母草三錢以猪羊胞先煎湯後熬藥饑服二十日全愈蓋生產

辨證錄

卷十二 產後

三

致收生之婆以手探胞其難產必矣難產者因氣血之虛也因虛而損復因損而虛不補其氣血而胎破何以重完乎今大補氣血則精神驟長氣血再造少有損傷何難完補故旬日之內即便成功耳

用補胞散亦神效

人參二兩黃芪一兩麥冬一兩白朮四兩山甲三片陳土炒髮研細末象皮三錢人身懷之研細末龍骨醋煨研末木煎藥汁一碗空腹將三味調服即熱睡之愈久愈效不須三服全愈真神方也

婦有產子之後四肢浮腫寒熱往來氣喘咳嗽胃膈不利口吐酸水兩脇疼痛人以為敗血流入經絡滲入四肢

以致氣逆也誰知腎肝兩虛陰不能入於陽乎夫婦當
產後氣血大虧自然腎水不足腎火沸騰水不足則不
能養肝而肝木大燥木中無津火發於木而腎火有黨
子母兩焚將火焰直沖而上金受火刑力難制肝而咳
嗽喘滿之病生肝火既旺必尅脾土土衰不能制水而
浮腫之病出然而肝火之旺乃假旺非真旺也假旺者
氣若盛而實衰故時熱時寒往來無定非真熱真寒是
以氣逆於胃膈而不舒兩脅者尤肝之部位也酸乃肝
木之味吐酸脅痛皆肝虛而腎不能榮之故也治法補

辨證錄

卷十二 產後

五

血養肝更宜補其精以生血精足而血亦足血足而氣
自順矣方用人參三錢熟地一兩山茱萸三錢白芍五
錢當歸五錢破故紙茯苓芡實各三錢山藥五錢柴胡
五分白朮三錢水煎服方名轉氣湯方中多是補精補
血之品何名為轉氣耶不知氣逆由於氣虛氣虛者腎
肝之氣虛也今補其腎肝之精血即所以補其腎肝之
氣也氣虛則逆氣旺有不順者乎是補氣即轉氣也氣
轉而各症盡愈陰入於陽而陽無杆格之虞矣

用歸氣救產
湯亦效

八參三錢熟地五錢白芍二錢茯苓一錢山藥
五錢白朮五錢柴胡三分砂仁一粒水煎服
婦人產後水道中出肉線一條長三四尺動之則痛欲絕

此帶脉之虛脫也夫帶脉束於任督之脉任前而督後
兩脉有力則帶脉堅牢兩脉無力則帶脉崩墮產後亡
血過多無血以養任督而帶脉崩墮力難升舉故隨溺
而隨下也帶脉下垂每作痛於腰臍况下墜而出於產
門其失於關鍵也更甚安得不疼痛欲絕哉治法大補
其任督之氣則帶脉自升矣方用兩收丹白朮二兩人
參一兩川芎三錢巴戟天三錢山藥一兩芡實一兩白
果十枚篇豆五錢杜仲五錢熟地二兩山茱萸四錢水
煎服一劑收半再劑全收此方補任督而仍補腰臍者
以任督之脉聯於腰臍補任督而不補腰臍則任督無
力而帶脉何以升舉哉惟兼補之任督得腰臍之助則
兩脉氣旺何難收帶於頃刻乎

用收帶湯

亦效

白朮杜仲人參各一兩荆芥二錢水煎
服一劑即收大半二劑全收亦不痛也
婦人產後陰戶內一物垂下其形如帕或有角或二歧人
以為產類也誰知肝痿之病乎夫產後何以成肝痿也

蓋因產前勞役傷氣又觸動惱怒產後肝不藏血血亡過多故肝之脂膜隨血崩墮其實非子宮也若子宮下墮狀如茄子止到產門不越出產門之外肝之脂膜往往出產門者至六七寸許且有黏席乾落者一片如掌大使子宮墮落人且立死矣安得重生乎治法大補其氣血而少用升提之法則脾氣旺而易升肝血旺而易養脂膜不收而自收矣方用收脂湯黃芪一兩人參五錢白朮五錢升麻一錢當歸三錢白芍五錢水煎服一劑即收或疑產婦禁用白芍何以頻用奏功嗟乎白芍原不可頻用也然而病在肝者不可不用况用之於大補氣血之中在芍藥亦忘其酸收矣何能作崇乎且脂膜下墮正藉酸收之味助升麻以提氣血所以無過而反能奏功耳

用葳蕤收陰
湯亦效
葳蕤二兩人參一兩白芍三錢當歸一兩柴胡五分水煎服四劑愈十劑全愈

辨證錄 卷十二 產後 聖

下乳門

婦人產後數日絕無點滴之乳人以為乳管之閉也誰知氣血之涸乎夫無血不能生乳而無氣亦不能生乳乳者氣血所化也然二者之中血之化乳又不若氣之化乳為速新產之後血已大虧生血不遑何能生乳全藉氣以行血而成乳也今數日乳不下血誠少而氣尤微世人不知補氣之妙一味通乳無氣則血從何生無血則乳從何化不幾向乞人而求食問貧兒而索金耶治法補其氣以生血不可利其竅而通乳也方用通乳丹

人參一兩當歸二兩麥冬五錢黃芪一兩猪蹄二箇木通三分桔梗三分水煎服二劑而乳如泉流矣此方但補氣血以生乳正以乳生於氣血也
用化乳丹
亦佳
當歸熟地黃芪各一兩麥冬三錢山茱萸四錢川山甲一片兔絲子五錢枸杞子三錢水煎服連用四劑即多乳矣

辨證錄 卷二十三 下乳 聖

有壯婦生產後數日或聞丈夫之嫌或聽公姑之碎遂至兩乳脹滿作痛乳汁不通人以為陽明之火也誰知肝氣之鬱結哉夫陽明多氣多血之腑乳汁之化原屬陽

明然而陽明屬土必得肝木之氣相通則稼穡作甘始成乳汁未可全責之陽明也壯婦產後雖亡血過多而氣實未衰乳汁之化全在氣而不盡在血也今產數日而兩乳脹滿作痛是欲化乳而不可得明是有鬱而肝氣不揚陽明之土氣亦因之同鬱木土不相合而相鬱安得而化乳哉治法大抒其肝木之氣則陽明之氣血自通不必通乳而乳自通也方用通肝生乳湯白芍五錢當歸五錢麥冬五錢通草一錢柴胡二錢白朮五錢甘草三分熟地一兩遠志一錢水煎服一劑即通此方

辨證錄

卷二下乳

星

藥味太重治產婦似乎不宜不知健婦抱鬱不妨權宜用之若非少壯之女雖因鬱少乳不可全用減半治之亦不全失又在臨症時裁酌之也

用生汁湯

亦佳

當歸二兩川芎四錢通草一錢柴胡五分麥冬四錢白朮五錢甘草三分熟地一兩水煎服四劑必大通

