


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇〇一・子部・醫家類

癸巳新刊御藥院方十一卷 (元)許國禎撰……………一

太醫院經驗奇效良方大全六十九卷 (卷一至卷五十六) (明)方賢輯……………一三九

御藥院方序

聖朝以三代相生養之道域民於仁壽唯血氣之屬不能無病又立醫師掌醫之政令如周制而加詳焉醫之術固深大槩已効之方為前人所寶藏者尤為難得太醫提點榮祿許公暨二三僚友取御藥院壬寅所刊方書板正其訛補其缺求其遺亡而附益之將宏肆流傳俾人人如在良醫左右余嘉其用心從而敘述之自仲景傷寒論論證處方之後後世以方為書者無慮數百家至御藥院號稱大備蓋發集諸家之善而增損持擇雖湯液齊和昭然無纖芥崎仵

御藥院方

精思堂

殆與黃帝內外經扁鵲八十一難相表裏其功用豈淺淺哉雲起太山膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下格物君子請以是觀之至元丁卯八月九日翰林直學士河東高鳴序

癸巳新刊御藥院方目錄

卷之一

治風藥門

換骨丹	活命金丹	大辰
龍腦川芎丸	生朱丹	獨活續命湯
芎朮湯	通頂散	木瓜虎骨丸
上清白附子丸	石膏丸	四物附子湯
麒麟竭散	蛇蠍續命湯	不換金丹
乳香消風散	生犀丸	龍腦紫芝煎
透空丸	虎骨丸	換骨丹
清神散	金砂丹	防風通聖散
百全丸	辟風丹	靈犀丹
犀角搜風散	神應丹	旂覆花丸
獨活丸	如聖散	茵芋散
青金丹	七寶膏	分涎丸
分涎散	銀粉丸	龍腦安神丸
牛黃鐵粉丹	靈砂丹	加減薄荷煎丸
四蒸木瓜丸	大木香丸	清膈湯
增損防風通聖散	加腦子白豆蔻薄荷煎丸	
天麻丸	芎朮丸	薄荷煎

御藥院方

目錄

精思堂

祛涎丸	至靈散	二聖散
石膏散	芎藭散	神聖散
上清散	王瓜散	沒藥丸
摩挲丸	輕骨丹	浸酒
龍腦清膈湯	虎風丸	芎藭天麻丸
透關丸	八仙丹	太白丸
大白丹	太一散	芎黃湯
旋覆花湯	人參附子湯	龍香散
獨活寄生湯	蠟稍半夏丸	通開散
胡麻丸	川芎石膏湯	威靈仙
甘菊花荆芥湯	羌活丸	皂角丸
大通聖白花蛇散	芎辛湯	虎骨木瓜丸
菊花散	木香保命丹	烏蛇丸
卷之二		
治傷寒門		
桂苓丸	敗毒散	小柴胡湯
五積散	升麻葛根湯	金沸草散
木附湯	防己黃耆湯	水葫蘆丸
梅蘇丸	沉香飲子	神解丸
六一散	生薑附子湯	四君子湯

白朮散	福壽二味散	桂漿
化水丹	屠蘇	白虎湯
桂苓甘露散	荔枝膏	牛黃七寶丹
桂沉漿	桂苓白朮丸	桂苓甘露散
橙皮散	小柴胡加桂湯	交解飲子
七寶散	柴胡枳實根湯	七珍散
草果飲子	瓜蒂散	治瘧方
香蘇散	竹葉石膏湯	五苓散
大順散	香薷丸	薑朮湯
猪苓湯	丹砂丸	茯苓桂枝白朮甘草湯
增損白朮散	百解丸	
卷之三		
治一切氣門上		
平胃散	思食丸	木香三稜丸
氣丸	玄胡丸	木瓜湯
思食調中丸	治中湯	沉香降氣丸
三脫痞氣丸	丁香和胃丸	養胃進食丸
調胃散	白豆蔻散	杜翰林枳實丸
逍遙丸	通膈丸	赤茯苓丸
香橘湯	陳橘皮湯	調胃丸

木香調中丸	枳實理中丸	來復丹
理氣丸	沉香餅子	木香順氣丸
順氣寬中散	小沉香丸	分氣丸
神保丸	神保丹	補真丹
小橘皮丸	導滯丸	中和丸
調中丸	枳殼丸	橘皮枳殼湯
氣寶丸	法製生薑散	丁皮丸
荊蓬煎丸	商殼丸	逐氣丸
木香場氣丸	沉香散	七氣湯
木香三稜丸	雞舌香丸	小分氣丸
感應丸	蓬莪菥丹	降氣橫櫛丸
集香丸	木香三稜丸	木香分氣丸
酒癥丸	橫櫛枳殼丸	人參湯
通膈散	寬膈丸	法製陳皮
育氣湯	溫中降氣丸	寬中丸
調中丸	均氣散	十全丸
無礙丸	菟效聖餅子	沉香大腹皮散
木香橫櫛丸	木香枳實丸	
鐵甕申先生交感丹	降氣湯	牙藥
順氣丸	和中丸	大葦澄茄丸

御藥院方 目錄 四 精思堂

卷之四		
治一切氣門下		
十膈氣散	抑心氣湯	綾錦養脾丸
枳實理中丸	玄明粉	厚朴橘皮丸
代豬石湯	吳茱萸丸	沉香導氣散
厥氣散	交泰丸	葶澄茄丸
橐籥丸	橙皮丸	紫沉通氣湯
威靈仙丸	降氣湯	沉香丸
通氣湯	奔氣湯	減甘草白豆蔻散
當歸湯	順氣枳殼丸	沉香和中丸
調中沉香湯	備急丸	寬中理氣丸
快活丸	小麝香丸	木香餅子
木沉煎丸	木香三稜湯	大七香丸
橫櫛丸	紫沉丸	百杯丸
麝香平氣丸	藿香和中丸	蓬莪菥丸
妙應丸	沉香溫胃丸	木香消殼丸
阿魏丸	厚朴丸	荳蔻湯
人參藿香散	養氣湯	場氣散
萬病無憂散	丁香生胃散	藿香厚朴湯
平胃丸	木香煎散	內應散

御藥院方 目錄 五 精思堂

沉香葶澄茄丸 引氣丸 沉氣升降散

加減思食丸 煨薑丸 藿香安胃散

豆蔻木香丸 枇杷葉散 大腹湯

檳榔湯 荳蔻散 通膈散

流氣飲子 木香檳榔丸 沉香降氣散

茯苓丸 大枳殼丸 百鍾丸

通膈丸 沉香聖餅子

磁州張七郎家橙香餅子 化鐵丹

導氣散 導氣枳實丸 茴香枳殼丸

白朮妙功丸 沉蘇丸 御藥院方 目錄 六 精思堂

卷之五

治痰飲門

導飲丸 半夏利膈丸 紫蘇半夏湯

大半夏湯 小半夏湯 賺氣湯

青龍散 參蘇半夏湯 前胡散

寧氣湯 寧神丸 玉仙散

消痰丸 祛風丸 滌痰丸

蠟煎散 人參補肺散 貝母湯

開結枳實丸 神應丹 紫苑丸

潤肺丸 藿香散 利膈丸

大人參半夏丸 團參散 蛤蚧膏

小枳殼丸 十珍餅子 大半夏丸

白雪丸 木香半夏丸 小半夏丸

止噎丸 沉香湯 玉芝徐老丸

製半夏法 辰砂利膈丸 半夏利膈丸

平肺散 導飲丸 柴胡飲子

藿香散 安眠散 半夏丸

人參丸 潤肺丸 鍾乳補肺湯

紫團參丸 蘆筒散 款冬花散

清肺丸 天南星丸 欬冬花散

含化止嗽丸 神功散 百部散

八味款冬花散 紫參丸 開結枳實丸

消痰破飲丸 法製溫半夏 梅青丸

玉塵散 安眠散 異功丸

法製白半夏 法製紅半夏 化痰鐵刷丸

瀉肺湯 消飲白朮丸 白金散

辰砂利痰丸 人參前胡散 白朮茯苓丸

溫胃化痰丸 三倍丸 人參枳殼湯

丁香半夏丸 橘皮半夏湯 枳實半夏丸

皂白丸 法製半夏 辛夷湯

龍膽丸	獨飲枳實丸	天門冬丸
神秘湯	紫苑湯	養肺丸
立効丸	沉香墮痰丸	除痰丸
乳香半夏丸	細辛五味湯	玉液散
寧肺散	紫金散	暖胃湯
白雲丸	錦朱丸	人參紫苑散
壞痰丸	人參蛤蚧散	
卷之六		
補虛損門		
靈宿丹	猪肚丸	酸棗人丸
固真丸	榮芝丸	鎮心丸
牛黃鐵粉丸	烏金散	木猪苓丸
神助丹	萬壽地芝丸	平安丸
金櫻丹	代穀丸	王倪丹砂
乾荷散	黃連茯苓丸	延生護寶丹
保神丹	補真丹	金鎖丹
九子丸	補明補心丹	延生丹
茯苓散	烏銀丸	栢子人丸
五香驚甲散	神仙六子丸	兩炒丸
辰砂遠志丸	鐵甕先生瓊玉膏	

補陰丹	草靈丹	煨腎散
健步丸	通津丸	乳香沒藥丸
大瓜煎丸	百倍丸	增損四斤丸
寧志膏	續斷丸	酸棗人煎
救生丹	凌陽子木香丸	養壽丹
牛膝丸	八物腎氣丸	三才丸
保神丸	燒肝散	預知子丸
橘皮煎丸	走馬茴香丸	栢子人丸
大建中湯	樂令黃耆湯	封髓丹
仙茅丸	覆盆子丸	助神丸
菖蒲丸	通絡丸	加減仙茅丸
酸棗飲	五加皮丸	禹餘糧丸
延靈丹	養真丹	巴戟丸
茯苓丸	紫芝丹	永壽丹
固陽丹	秘元丹	沉香鹿茸丸
益壽地仙丸	人參遠志丸	人參補虛湯
神功七寶丹	參耆散	太一守中丹
青娥丸	沉香驚甲散	天真丸
巨勝丸	補虛黃耆湯	烏銀丸
三才丸	五味子丸	秘真丸

御藥院方 目錄 精思堂

太和膏	神効丸	木香燈草丸
二靈丹	何首烏丸	二神丸
通經湯	玉鎖丹	固真丹
未央丸	玉蕊丹	接真丹
天雄丸	胡桃丸	延壽丹
何首烏丸	腎氣丸	
卷之七		
積熱門		
紫雪	紅雪通中散	涼膈散
洗心散	八正散	妙香丸
御藥院方	目錄	十一
龍腦雞蘇丸	加減火府丸	神芎丸
清涼飲子	消痞丸	賀蘭先生解毒丸
治時疾神聖熱藥	黃連解毒湯	牛黃瀉心湯
無憂散	清心丸	時毒藥
酒蒸黃連丸	管仲散	海仙丸
三黃丸		
治泄痢門		
豆蔻固腸丸	縮砂丸	真方聖散子
戊巳丸	堅中丸	炙肝散
水煮木香膏	潤腸橘杏丸	潤腸丸

換腸丸	二聖散	加減神功丸
肉豆蔻丸	厚朴丸	大已寒丸
吳茱萸丸	黃連烏梅丸	大道固腸丸
椒艾丸	附子草撥丸	大聖散
卷之八		
治雜病門		
拈痛散	聖靈丹	犀皮湯
澡洗藥	三粉散	淋瀝藥七寶散
淋瀝頑荆散	洗髮菊花散	長髮滋榮散
刷牙沉香散	麝香散	乳香消毒散
御藥院方	目錄	十一
虎杖散	沒藥乳香散	蒲黃散
接骨丹	當歸血竭散	桃人散
栢葉散	暖手法	代灸膏
益脾丸	葛花散	抵聖散
五生膏	淋瀝藥威靈仙散	
淋瀝藥地榆散	髮髮秀落生髮膏	
越痛丸	摩腰片	神枕法并序
牛蒡子丸	出油藥	愈痔散
槐荆丸	結陰片	蒴藿散
淋瀝桂附散	淋瀝烏頭散	枳殼散

續修四庫全書 子部 醫家類 卷之七

犀角散	擒虎散	何首烏散
鎮肝丸	麝香散	淋瀝吳茱萸湯
楓香散	槁藤子丸	治漏藥
地榆散	消腫木香散	葶藶木香散
葶藶丸	喻化毒澄茄丸	檳榔湯
接骨烏金散	乾洗頭香白芷散	
芎藭散	通關散	膩粉散
金銀散	木香枳殼丸	威靈仙散
搜風潤腸丸	衝開散	淋瀝葫蘆湯
乾荷散	還童散	百花散
御藥院方 目錄 精思堂		
無礙丸	加腦子收陽粉	木瓜丸
引水散	海金沙散	管仲散
松節散	人參湯	菖蒲散
白蒺藜散	熨烙當歸散	苦葫蘆方
玉壺丸	出油藥	苦參丸
尋痛丸	琥珀散	金剛骨丸
虎杖散	木瓜丸	如意散
三聖膏	代茶新飲	梅角春丸
旋生春散	荆芥散	洗風散
紫葛散	威靈仙丸	白蓮散

止血散	乳香丸	淋瀝藥
乾上藥	收陽粉	五皮散
淋瀝藥山茱萸散	淋瀝藥丁香散	
沐浴九仙散	桂香膏	紫稍花散
蛇床子散	遠志散	淋瀝藥
丁香石燕子散	神應散	泔乾散
三物膏	槐角丸	湯腫湯
琥珀藥	麝香丸	熏蒸方
淋瀝藥鷄冠散	流氣丸	牡蠣散
卷之九 御藥院方 目錄 精思堂		
消毒散	利膈散	如聖湯
龍腦散	龍腦破毒散	漱口沉香散
槐枝散	天門冬丸	漱口地黃散
礪砂散	仙方地黃散	祛毒牛黃膏
春水散	消毒寬喉散	咽喉碧玉散
麝香朱砂丸	龍麝聚聖丹	朱砂膏
胡桐淚散	增損如聖湯	一捻金散
生地黃散	發聲散	乳香膏
胡桐律散	仙方刷牙藥	莽草散

玉池散	太和散	發聲散
甘露飲子	地黃散	當歸散
蜜陀僧散	消毒散	麝香散
槐白皮散	立勝散	石膽散
黑牙縫刷牙藥香附子散		延齡散
犀角升麻湯	玉塵散	青雪散
細辛散	一字散	露蜂房散
熟銅末散	細辛湯	葦撥散
穿牙如聖散	宣牙膏	五倍子散
代鍼散	白龍散	青龍散
御藥院方	目録	精思堂
礪砂散	漱毒散	升麻散
獨活散	葦撥散	獨活散
青龍散	至靈膏	射干散
柳豆散	血竭散	地骨皮湯
丁香散	柳枝散	乳香定痛散
三聖散	玉池散	立效散
升麻散	補骨脂散	香附子散
追風散	蒟醬散	茵草葉散
地龍散	藥本散	漱風散
草烏頭散	地黃餅子	土蒺藜散

一字救苦散	二聖丸	槐枝八仙散
胡桐律散	柳枝湯	石膽散
二勝散	檳榔散	香芍散
升麻丸	人參清肺散	救生散
開關散	犀角散	中都惠民司無名兒藥
鼠黏子散	五癩散	茯苓散
如聖散	烏犀湯	黑參丸
柑桔湯	應痛散	升麻散
牙藥麝香散	清上防風散	地黃膏
青金散	桔梗湯	涼膈甘露丸
御藥院方	目録	精思堂
消毒犀角飲子	牙藥麝香散	石燕子散
牢牙石燕子散	加減牙藥麝香散	二色漆牙藥
白牙藥升麻散	白牙藥珍珠散	白牙藥
會仙救苦丹	柳花散	牙藥方
雄黃膏	定痛散	生肌桃紅散
旋篩巫雲膏	陳希夷刷牙藥	如聖散
訶子散	如神散	沉香散
常使齒藥玉池散	柳枝湯	吹喉散
青礪砂散	噉藥斬邪散	雄黃散
卷之十		

治眼目門

吹鼻碧玉散	七仙丸	通腦散
菊花散	石膏散	生地黄湯
金絲膏	白龍散	龍腦礪砂散
金蓮散	青金散	五黃散
冰池散	五倍丸	地黃丸
白龍粉	至明膏	決明散
金髓煎丸	芎藭丸	荆芥散
香附散	生犀丸	當歸立効散
通光丸	神仙碧霞丹	還睛湯
黃連湯	遇明丸	還睛丸
生地黄湯	杞菊丸	增明丸
犀角散	羚羊角丸	神應散
消毒散	生明丸	七寶散
洗面藥門		
無皂角洗面藥	藿香散	洗手檀香散
新方烏頭散	七白膏	舊方烏頭藥
凈手藥	御前洗面藥	玉容散
玉容散	神仙玉女粉	鍾乳粉散
皇后洗面藥	到流油烏髮三聖膏	

御藥院方 目錄 十六 精思堂

塗髮方

塗髮方	胡桃膏	韓侍郎神驗熱髮方
烏頭藥	烏雲膏	烏雲散
烏髮借春散	朱砂紅丸子	冬瓜洗面藥
黏痛散	立馬烏	
治瘡腫傷折正骨門		
陳元膏	白龍膏	摩風膏
消毒膏	善應膏	碧霞膏
玉容膏	金黃散	桃紅散
寸金錠子	大紅膏	金傷散
佛手散	紫葛散	追毒散
拔毒散	檳榔散	寸金丸
黃連散	搜膿散	定痛黃藥散
平肌散	燒湯着底藥	艾煎膏
楮實散	桃人膏	玉屑膏
止痛貼膏	托裏黃耆散	凍瘡藥
萬痊膏	塗擦雄黃膏	樺皮散方
刀箭藥	漏蘆煮散	黑神膏
乳香膏	內托散	辛夷膏
金花散	瑩肌膏	外用漬毒湯
麝香散	熊膽散	浴毒湯

御藥院方 目錄 十七 精思堂

鯪鯉甲骨貼煨膏 沒藥膏 金絲膏

定痛沒藥散 大紅膏 雙靈膏

定痛沒藥散 至聖黑龍膏 至聖黑龍膏

加血蠟大紅膏 神效膏 大紅膏方

卷之十一

治婦人諸疾門

芎藭湯 說說丸 黑神丹

延靈護寶丹 活血散 益斯九

靈寶散 五聖丸 人參荆芥煎散

茯苓湯 保安丸 大保生丸

御藥院方

目錄

六

精思堂

六神湯 當歸地黃丸 人參荆芥散

必效散 旋覆花丸 虎骨散

禹餘糧散 當歸良薑散 滋陰丹

抽刀散 廣胤丹 沒藥丸

滋血湯 當歸血竭丸 地髓煎丸

八珍湯 萬病丸 滋陰湯

加味四物湯 滋榮丸 地黃膏子

當歸沒藥丸 禹餘糧丸

治小兒諸疾門

玉柱杖散 珍珠丸 塗顏麝香散

三味天漿子散 五味天漿子散

通聖餅子 引風湯 聚寶膏

導赤散 雙金散 利膈丸

聖惠烏犀丸 聖惠牛黃丸 太一銀珠丹

大天南星丸 開胃丸 導飲丸

涼驚丸 人參橘皮湯 水銀福九子

百當膏 罷驚丸 木香化滯丸

金珠化痰丸 洗浴菖蒲湯 大青膏

惺惺散 人參羌活散 大鎮心丸

牛黃散 羚羊角散 寒水散

御藥院方

目錄

六

精思堂

錢氏羌活膏 金砂丹 虎睛膏

丹砂鎮心丸 五味麝香餅子 祛風墜涎丸

青芝散 木香通氣飲子 乾蠟天麻散

大惺惺丸 牛黃丸 太一散

斷癩丸 人參茯神湯 寧眠散

安神散 醒風煎 抱龍丸

朱砂丸 菖蒲丸 天麻煎丸

十珍餅子 金瓜丸 八物定志丸

無價散 釣藤丸 牛黃丸

丹砂虎睛丸 郁李人丸 麝蟾丸

七味羌活膏 胡黃連丸 加減益黃散

固腸丸 木香豆蔻丸 豆蔻香連丸

駐車丸 黃連阿膠丸 虎睛丸

溫白丸 異功散

九篇衛生方陸香丸 正舌膏

訶叅勒散 均氣散 雄黃丸

凡新 三日浴法 犀角散

天漿子散 鐵粉丸 錢氏地黃丸

錢氏浴體天麻散 大青膏 安神丹

瀉白散 十味麝香餅子 蘆薈丸

史君子丸 瀉青丸 全蠍丸

阿膠散 菖蒲煎丸 錢氏白朮散

御藥院方目錄終



癸巳新刊御藥院方卷之第一

風藥門

換骨丹 療血滯而不流衛氣逆而不通風寒濕氣

相搏筋血之間內含偏虛發為不遂之病氣感入

風血凝五痺筋攣骨痛癱瘓偏枯一切風證並皆

治之服之神妙難以言宣

槐角子熟黃 桑白皮去麩 川芎

蒼朮去 白芷 蔓荊子去

人參 威靈仙 何首烏

防風已 苦參 五味子

御藥院方 卷一 精思堂

香附子各 麝香別 麻黃斤

朱砂末

右將麻黃去皮根不去節用河水三石三斗三升

斗七熬六斗濾去麻黃澄清再熬至二升半

入其餘藥末每一兩三錢作一十九朱砂為衣

每服一丸用酒一盞浸至晚溶化開臨臥服之

活命金丹 治中風不語半身不遂肢節頑痺痰涎

上潮咽啞不利飲食不下牙關緊閉及解一切藥

毒酒毒發熱腹脹大小便不利胸膈痞滿上實下

虛氣閉而赤汗從餘熱不退等病諸藥不治無問

老幼男子婦人但得服食貫衆

甘草 板藍根 乾薑各一兩

龍腦研三錢 麝香研三分 牛黃研半兩

生犀 珠子末各半兩 川大黃半兩

辰砂四分半入 青黛三錢

薄荷兩 桂三兩 甜消一兩

右件藥搗羅為末與研藥一處攪勻煉蜜同水浸

餅為劑每兩作十九別以朱砂為衣就濕真

金箔四十箔為衣臘月修合磁器收貯多年不

壞如療風毒茶清化下解藥毒新冷水化下汗

御藥院方 卷一 清思堂

後餘熱勞病及小兒驚熱薄荷湯化下已土並

量病大小加減用之大有効

大辰砂丸 清頭目化痰涎利咽膈手足麻木支節

疼痛鼻塞聲重頭昏目眩項背拘急皮膚瘙癢卒

生癰疹皆觸風寒並服之

天麻去苗一兩 防風去蘆頭二兩 細辛去苗葉土半兩

薄荷葉兩 川芎兩 甘草兩

吳白芷兩 朱砂為末一兩

右件七味為細末煉蜜丸如彈子大朱砂為衣每

服一丸細嚼食後生薑湯下茶清亦得

生朱丹 治諸風痰甚頭痛目眩旋運欲倒肺氣鬱

滯胸膈不利嘔噦惡心恍惚健忘頸項強直偏正

頭痛面目浮腫筋脈拘急涕唾稠黏咽喉不利常

服清神爽

白附子炮製去皮臍半斤 石膏燒通紅放半斤 龍腦字一

朱砂半兩為衣

右件三味為細末燒粟米飯為丸如小豆大朱砂

為衣每服三十九食後茶酒任下

獨活續命湯 治平暴中風不省人事漸覺半身不

遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澁肢體麻痺神情

昏亂頭目眩重痰涎併多筋脈拘攣不能屈伸骨

節煩疼不得轉側及治諸風服之皆驗若治脚氣

緩弱久服得差久病風人每遇天色陰晦節候變

更宜先服之以防瘡症

麻黃去節根一兩 人參去蘆頭一兩 黃芩一兩

芍藥兩 芎藭兩 甘草剉兩

防已半兩 杏仁細切炒黃一兩 桂兩

防風去蘆頭一兩半 附子細切去皮臍三兩 白花蛇肉錢

獨活錢 乾蠍錢

右件為粗末每服三錢匕水一盞半入生薑五片

御藥院方 卷一 清思堂

煎取一盞去滓稍熱食前服

芎朮湯 清神爽志祛風消蘊治頭目昏痛止鼻塞
聲重

川芎二兩半 白朮二兩七錢半

右二味為粗末每服三錢水一盞入生薑五片煎
至七分去滓稍熱服或細末白湯點亦得

通頂散 治風痰旋運頭目大痛及偏正不定發作

神志昏憤或冒風寒鼻塞聲重

藜蘆去苗土半兩 躑躅花去土一錢 藿香葉去土二錢

右為細末每用紙燃薰藥鼻內喘不拘時

御藥院方 卷一 四 精思堂

木瓜虎骨丸 治風寒濕合而成痲脚重不仁疼痛

少力足下癱痛不能踏地腰膝筋攣不能屈伸及

項背拘急手臂無力耳內蟬鳴頭眩目運及諸證

脚氣行步艱難並宜服之

木瓜 騏驎竭研 沒藥各一兩研

乳香研半兩 虎脛骨塗酒炙一兩 木香

自然銅醋淬七遍 楓香脂 敗龜去殼炙去

骨碎補去毛 甜瓜子 桂

當歸一切焙各一兩 地龍去土二兩 安息香酒熬入藥

右件一十五味除研藥外為細末拌勻酒麩糊為

丸如桐子大每服三十九空心煎木瓜湯下

酒亦得漸加至五十九

上清白附子丸 治諸風痰甚頭痛目眩旋運欲倒

嘔噦惡心恍惚不寧神思昏憤肢體倦疼頸項強

硬手足麻痺常服除風化痰清利頭目

白附子炮 半夏湯洗 川芎

天南星炮 白殭蠶炒 菊花

陳皮白去 旋覆花 天麻各一兩

全蠍炒半兩

右件十味為細末生薑汁浸餗餅為丸如梧桐子

御藥院方 卷一 二 精思堂

大每服三十九食後生薑湯下

石膏丸 治諸風痰涎頭痛目眩旋運欲倒心忪悸

動恍惚不寧神思昏憤肢體倦疼頸項強硬手足

麻痺常服除偏正頭疼

石膏別 白附子炮 半夏湯洗七次

川芎 天南星炮 白殭蠶炒去系

菊花揀淨 陳皮白去 旋覆花

天麻已上各一兩 全蠍炒半兩

右件一十一味為細末生薑汁浸餗餅為丸如梧

桐子大每服五十九漸加一百丸食後生薑湯

下忌黏滑生硬等物

四物附子 治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不得屈伸近之則痛自汗而短氣惡風不欲去衣或頭面手足時時浮腫

附子地一分 桂八分 白木六分

甘草四分

右四味咬咀每服稱半兩水一大盞生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時

麒麟竭散 治寒濕搏於經絡疼痛不可忍

血竭 南乳香 沒藥

御藥院方 卷一 六 精思堂

水蛭并碎炒 麝香 白芍藥

當歸各一分 虎脛骨塗酥炙黃

右件藥八味每味各為細末各抄一錢和勻每服三錢溫酒調下食前服之痛立止痛甚者不過

二服

蛇蠍續命湯 治卒中急風牙關緊急精神昏憤口

眼喝斜不省人事痰涎不利喉中作聲

白花蛇酒浸去骨焙 全蠍炒 獨活去土

天麻 附子皮炒去 人參

防風 肉桂去粗皮 白木

藥本 白附子地 赤箭

川芎 細辛去葉 白殭蠶去土炒

甘草炒 半夏湯洗 白茯苓去

麻黃去節水浸三沸去沫切 已上各一兩

右件為粗末每服五錢水一盞人生薑五片煎至七分去滓稍熱服不拘時候

不換金丹

荆芥穗 白殭蠶炒 天麻

甘草炙各一兩 羌活去蘆 川芎

白附子生用 川烏頭生用 細辛去

御藥院方 卷一 七 精思堂

蠍去毒炒 藿香葉各半 薄荷兩

防風兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼茶酒任下如口喝向左即右腮上塗之便正

乳香消風散 治諸風眩偏正頭疼項背拘急肢體

煩疼肌肉蠕癢巨陽風虛耳作蟬鳴目澁多睡鼻

塞聲重清涕不止

乳香研 細辛去葉各一分 川芎兩

吳白芷好者 熟白天南星 以生薑 一兩搗為細末

皮細切與天南星一處搗為泥焙乾如 此製三次訖焙乾并碎炒令微黃為度

右為細末每服一錢或加二錢擦生薑熱茶點服

消風併服出汗

生犀丸 主心虛喜忘煩悸風涎不利聰明耳目治諸風顛掉及治三十六種風益精神壯心氣或多健忘寢寐之驚心常似憂或忪或動往往欲倒狀類暗風四肢顛掉多生怯懼每起煩燥悲涕愁煎並皆屬心臟氣虧宜服此以鎮心神

生犀 兩

天麻 兩

敗龜 兩

牛黃 分

茯神 分

遠志 分

人參 分

肉桂 分

龍齒 分

御藥院方

卷一

八

精思堂

朱砂 分

麝香 分

龍腦 分

石菖蒲 兩

金箔 片

銀箔 片

羚羊角屑 兩

右件搗研極細煉蜜為丸如梧桐子大食後臨臥

溫水化下二丸或加四丸至七丸

龍麝紫芝煎 善療一切諸風半身不隨口眼喎斜

頭旋耳鳴鼻塞咽乾四肢麻木痲痺痰毒下注腰

膝沉重筋攣骨冷皮膚癢癢昏迷困倦飲食進退

行步少力

何首烏

天麻 兩

吳白芷

附風 兩

羌活 兩

甘草 兩

黑附子 兩

甘松

胡椒

良薑

零陵香

藿香葉

肉桂

川薑 兩

白檀 兩

麻黃 兩

龍腦 兩

麝香 兩

右為細末炒米粉四兩黃色糯米粥汁入白蜜二

兩和就作錠子一寸半長每服一錠細嚼茶酒

下如病重每服三錠子日三服

透空丸 治男子婦人一切諸風頑麻疼痛上攻頭

目下注腰脚手背顛動

御藥院方

卷一

九

精思堂

香附子

藁本

藿香葉

地龍 兩

川芎

白殭蠶 兩

乾薑 兩

甘草 兩

乾蠍

天麻 兩

天南星 兩

白芷 兩

神麴 兩

茴香 兩

麥蘖 兩

胡椒 兩

川烏頭 兩

右一十七味杵為細末每藥末三兩白麴六兩水

和就丸小彈子大相連排放自空夏月新瓦上

發每服一九細嚼茶酒任下食前

虎骨丸 治經絡凝滯骨節疼痛筋脈攣急遇陰寒

愈痛

南乳香別研 沒藥別研 赤芍藥一兩

血竭別研 熟乾地黄一兩 當歸一兩

虎脛骨酥炙黃

右杵為末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內

以麻縷纏定勿令透氣好酒二升煮至酒盡取

木瓜去皮研如泥更入熟蜜少許杵和為丸如

梧桐子大每服三十九至五十九病在上食後

服病在下食前服用溫酒送下

換骨丹 治中風癱瘓久不愈四肢羸曳不隨服諸

藥不效者

麝香研分 桂去粗皮各 麻黃去根節一

七斗煮減半去滓澄清 朱砂二兩

甘松去土 川烏頭生去 白芥子炒

藿香 草烏頭生去 海桐皮炒

何首烏 羌活 龍腦研

骨碎補去毛 牛膝酒 威靈仙土

桑白皮炒 槐角 木鱉子仁炒

自然銅酒 青皮白 陳皮去白已上

白芷 防風 甜瓜子炒

草薺炒 五靈脂 川芎

甘草炙 苦參 白膠香半兩

右為細末用煎麻黃膏子入少熟蜜搜和成劑丸

如彈子大以朱砂為衣每服一九食後碓碎茶

酒任下或用生薑自然汁更入酒半盞化開服

藥可更進酒一二盞授之日二服至三日於當

病處微有汗為效至十日外大效無不愈者但

藥性稍熱病寒者多効

清神散 治頭風旋暈面目瞶動神志不清鼻塞聲

重

御藥院方 卷一 十一 精思堂

王瓜細碎妙令 川芎一兩 香附子二兩

防風 薄荷葉 白芷

荆芥穗 羌活 細辛去葉

甘草炙已上

右件搗雜為細末每服一大錢食後茶清點服或

溫水亦得

金砂丹 治中風涎潮失音不語面赤脈大數急迷

悶口眼喎斜但係風熱之疾半身羸曳或傷寒剛

瘕瘕方

白花蛇 烏蛇各酒浸去 蠍稍炒

白蠟各 犀角屑 玳瑁屑

天麻 人參 白茯苓

甘草各 龍腦研 麝香研

朱砂研 牛黃研 雄黃研

真珠研 天竺黃研 金箔

銀箔各 鐵粉研

右件為細末真石腦油和九每兩作十九磁盒內
收每服取一九人參湯化下或竹葉湯新汲水
亦得如中風不語涎潮上管又治剛瘕柔瘕婦
人產後角弓只一服愈

御藥院方 卷一 十一 精思堂

防風通聖散 治一切風熱鬱結氣血蘊滯筋脈拘
攣倦手足麻痺肢體焦痿頭痛昏眩腰脊強痛耳
鳴鼻塞口苦舌乾咽啞不利胸膈痞塞咳嗽喘滿
涕唾稠黏腸胃燥泄便溺淋閉或腸胃蘊熱鬱結
水液不能浸潤於周身而為小便出多者或濕熱
內甚而有溇泄者或表之正氣與邪熱併甚於裏
陽極似陰而寒顛煩渴者或熱甚變為虐疾久不
已者或風熱走注疼痛頑麻者或腎水陰虛心大
陽甚熱暴甚而中風或暴瘖不語及暗風癩病或
破傷中風時發時搐并小兒熱甚驚風或癩疹未

出不快者或熱劇黑陷將欲死者或風熱瘡疥久
不愈者并解酒熱毒及調理傷寒發汗不解頭項
肢體疼痛宜服之

防風二錢 川芎兩 石膏兩

滑石兩 當歸兩 赤芍藥兩

甘草炒 大黃兩 荆芥穗二錢

薄荷葉兩 麻黃兩 白木兩

山梔子三錢 連翹兩 黃芩兩

桔梗兩 牛膝兩 人參兩

御藥院方 卷一 十三 精思堂

右件藥同為粗末每服四錢水一盞入生薑三片
煎至六分去滓溫服不計時候日進三服病甚
者五七錢至十餘錢極甚須可下者多服二三
十錢得利後却常服三五錢以意加減病愈後
更宜常服三二錢別無所損使病不能再作
百全丸 流行經絡開發鬱滯
何首烏雄雌各 天南星二兩 用生
白附子兩 黃丹炒 內打兩
右除前項黃丹外為細末入前項黃丹三兩用白
麵二兩半用醋同調為糊和有色為度丸如梧

桐子大每服六七十九食後生薑湯下溫酒亦得

辟風湯 治諸風疾無問新久者半身不遂口眼喎斜語言蹇澁精神昏憤痰涎併多咽嗑不利及風虛頭痛目眩旋運欲倒或心忪健忘恍惚不寧手足麻痺顛掉無力筋脈拘急骨節煩疼行步艱難並宜服之

獨活洗去土焙乾 防風去蘆頭 吳白芷

桂 藁本去土 麻黃去節

白芍藥皮去 天麻已上各一兩

御藥院方 卷一 精思堂

川烏頭炮製去皮碎炒黃半兩 藿香葉去上

川芎七錢 羌活去苗 甘草剉炒

白花蛇酒浸去皮骨半兩 白殭蠶炒黃

全蠍去毒炒黃色半兩 朱砂為衣

白附子炮製搗碎炒 天南星牛膽黃四錢

遠志湯浸去心

右件搗羅為細末煉蜜和九每兩作十九朱砂為衣每服一丸細嚼或化服用生薑湯送下麝香湯亦得如破傷風豆淋酒下急風痲病人參湯下不拘時候此藥功效不可具述

靈犀丹 治一切諸風言語蹇澁心神昏憤

犀角屑 天麻 防風

川羌活 木香 吳白芷

甘菊 白殭蠶炒 天南星牛膽

甘草 地骨皮 山藥

薄荷葉 川芎 蔓荊子

麻黃去根 當歸 桂去粗皮

乾蠍稍半 麝香別研

白花蛇酒浸去皮骨

右為細末煉蜜和九每兩作八丸朱砂二兩半為

衣每服一丸不拘時候細嚼人參湯化下或茶

酒亦得

犀角搜風丸 治風下痰解結順氣

牽牛頭末四兩 乾生薑半兩 車前子一兩

白茯苓去皮一兩 生犀屑半兩 青皮三兩

陳皮二兩 枳實麩炒去 木通一兩

木香半兩

右為細末湯浸餅為丸如梧桐子大每服三十丸至五七十九食後溫生薑湯下

神應丹 治諸痲

辰砂不以多少

右細研水飛過候乾用猪心血和之得所以餅劑裹蒸熟為度取出就熱便丸如梧桐子大每服一粒食後臨臥溫人參湯下不十服取效如神

旋覆花丸 治諸風痰實頭目昏眩旋運欲倒嘔噦惡心恍惚不寧神志持憤肢體倦怠頸項強硬手足麻痺常服除風化痰清利頭目及偏正頭痛並宜服之

旋覆花二兩

防風去蘆

吳白芷

御藥院方

卷一

六

精思堂

甘菊花

天麻

天南星炮

白附子炮

半夏湯洗

陳皮去白

芎藭

蠟稍炒去毒

蠶蠶妙去

石膏研已上各一兩

右件搗羅為細末生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服三四十九溫生薑湯下或茶清亦得食後服

獨活丸 治風氣上攻頭目疼痛昏眩不快樂腸化痰

獨活

川芎

甘菊花各一兩

乾蠍一分

防風一兩

半夏湯洗去滑

右件五味同為末以半夏末用生薑自然汁二大盞煮如膏和為丸如豌豆大每服七九至十九荆芥薄荷湯下

如聖散 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃細研

白礬飛過

藜蘆厚去皮用

猪牙皂角去皮

右件各等分搗羅細末每用一豆大各鼻內噓立

御藥院方

卷一

十七

精思堂

效

茵芋散 治風寒濕痺皮肉不仁骨節疼痛不可忍者宜服茵芋酒

茵芋

草薺

蜀椒出汗

狗脊去毛

桂去粗皮

附子炮各一兩

牛膝酒浸

石斛去根

生薑各一兩半

右件九味咬咀以生絹袋貯以酒一斗浸經三兩宿每服一盞或二盞酒服至半再旋添新酒覺藥味淡再合

青金丹 治中風不省痰涎鬱滯在咽嗌間如拽鋸

聲連服三兩丸或吐或利後精神出立省

膩粉 粉霜 水銀錫絲沙子各一分

半夏湯洗過三分汁 續隨子去皮研一百斤

滑石為末 青黛錢二 腦子

麝香各一錢

右件各為末同研令勻水丸如榛子大每服三兩

凡煎葱白湯下或薄荷湯化下

七寶膏 治中風涎潮不下精神昏憤不省人事

丹砂 牛黃 粉霜

腦子 水銀 麝香各一分

御藥方 卷一 十八 精思堂

金箔二十

右件同研水銀星盡裏內為丸如鷄頭大每服二

三九薄荷湯磨下

分涎丸 治中風忽然倒作痰涎壅塞不省人事

水銀錫絲子 粉霜 乾蠟為末各半兩

膩粉錢二 腦子 麝香

天竺黃 朱砂各一錢 天南星生用為末一兩

右件同研令勻石腦油丸如雞頭大每服三五丸

薄荷湯化下一歲小兒服半丸至一丸

分涎散 治中風涎潮作聲不得出口噤手足搐搦

藿香葉 乾蠟 白附子各一兩

丹砂 膩粉 粉霜各二兩

天南星炮一兩已上為末

右件同研勻細每服一錢匕至二錢薄荷湯或茶

清調下未吐利再服

銀粉丸 治中風痰涎不得下精神昏塞不省人事

水銀二兩錫絲子 天南星四兩牛乳

突中煤 牛黃別研各半兩

白附子生薑汁拌勻 蠟稍 麝香別研各一兩

右件除別研外為細末後同研令勻煉蜜和丸如

御藥方 卷一 十九 精思堂

彈子大每服半丸薄荷湯化下如大便不利薄

荷湯調膩粉半錢匕下小兒服量虛實服如大

一二丸

龍腦安神丸 治男子婦人小兒五積癩癩無問遠

年日近發作無時服諸藥不效但服此藥無不痊

愈

茯神去粗皮 人參去蘆 麥門冬去心

烏犀取末 朱砂各二兩 真地骨皮

甘草取末 桑白皮取末各一兩 馬牙消別研

龍腦研別 牛黃研別 麝香別研各

金箔五箔

右一十三味為細末煉蜜丸如彈子大金箔為衣

如有風癩病多歲冬月用溫水化下夏月涼水

化下不拘時候多歲病服如二三年病日進三

服小兒一九分作二服又治男子婦人虛勞發

熱喘嗽新汲水一盞化開服其喘滿痰嗽立止

又治男子婦人語澁舌強日進三服食後溫涼

水化下

牛黃鐵粉丹 治中風痰甚精神昏憤語言蹇澁手

足不隨諸藥不效服之神驗

御藥院方

卷一

二十

精思堂

牛黃

膩粉

朱砂

麝香

生犀末

腦子

鉛白霜

雄黃已上各一分

天南星牛膽製

鐵粉

川甜消

人參已上各半兩

金箔

銀箔各十片大者

右件一十四味研細煉蜜和丸如雞頭大每服二

丸以薄荷湯化下

靈砂丹 治風熱鬱結氣血蘊滯頭目昏眩鼻塞清

涕口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嗽痰實腸胃

燥澁小便赤黃或腎水陰虛心火熾甚及偏正頭

疼髮落齒痛遍身麻木疥癬瘡瘍一切風熱並皆治之

天麻 獨活 羌活

細辛 石膏 防風

連翹 薄荷葉各二兩 川芎

山梔子皮去 芍藥 荆芥穗

當歸 黃芩 大黃生用

全蠍炒 菊花 人參

白朮已上各半兩 朱砂為衣 寒水石生用

桔梗各二兩 滑石四兩 縮砂人一分

御藥院方

卷一

十一

精思堂

甘草三兩生用

右件同為細末煉蜜為丸每兩作一十九朱砂為

衣每服一九細嚼茶清下食後

加減薄荷煎丸 治頭目昏眩口舌生瘡痰涎壅塞

咽喉腫痛除風熱消瘡疹

薄荷葉八兩 川芎一兩 桔梗二兩

防風兩 甘草半兩 縮砂人兩

腦子半兩 白豆蔻人兩

右件為細末煉蜜和每兩分作二十九每服一九

噙化服

四蒸木瓜丸 治肝腎脾三經氣虛為風寒暑濕相

搏流注經絡竭日曠歲治療不痊 六氣更變

作情不寧必至發動或腫或頑痺脚膝疼痛不能

自持增寒壯熱

威靈仙 苦苧藤 黃耆

續斷 蒼朮 橘皮

烏藥 茯神木各半兩

右八味為細末大木瓜四箇去頂穰填藥在內却

用頂蓋蓋定酒灑蒸熟研為膏如梧桐子大每

服五十九空溫酒下鹽湯下世傳木瓜丸甚

多此方最有神效當敬之

大木香丸 治偏風半身不遂語言蹇澁麻痺不仁

風毒注腫痰潮涎出精神昏憤

木香一分兩 天麻 桔梗

防風 天南星薑製 半夏麩

黃耆 白芷 白鮮皮

海桐皮 羌活 川芎

當歸 茯苓去 麻黃去根

白殭蠶炒 虎脛骨酥炙已上一十

白花蛇酒浸取肉 烏蛇酒浸取肉 犀角鎊

羚羊角鎊 人參 阿膠炒

蟬殼 沒藥 桂心已上各

乾薑炮 白附子炮 全蠍炒

麝香別研各四錢 牛黃別

麝子別研各

右為細末煉蜜和丸如彈子大朱砂為衣每服一

丸生薑湯下食前服

清膈湯 治風熱化痰利咽膈清頭目消瘡疹

甘草剉炒 瓜蒌根 桔梗炒黃

紫蘇葉各二兩 雞蘇葉去土 荆芥穗兩

黍黏子六兩煉 御藥院方 卷一 十三 精思堂

右為細末每服一大錢食後或臨睡白湯點服

增損防風通聖散 治鼻塞不利肺氣不和

黍黏子 桔梗 桑白皮

紫茸苑已上各 荆芥穗三 甘草各生用已上

右為粗末防風通聖散各一半伴和勻每服八錢

水一盞半入生薑五片同煎至七分去滓溫服

食後

加腦子白豆蔻薄荷煎丸

薄荷葉兩 川芎半兩 桔梗半兩

甘草二兩 防風半兩 縮砂人二錢

加腦子兩兩 加白豆蔻人兩

右為細末煉蜜和丸每兩作二十九每服一九噲

化服之

天麻丸 治肺臟風熱鼻塞不通常服涼膈明目治

頭昏腦悶

龍腦薄荷葉兩 荆芥穗去 天麻

甘草兩半 川芎 羌活

白芷 馬牙消 玄參兩半

川烏頭二分半炮製去皮膽

右件為細末煉蜜和丸如雞頭大每服一九至二

丸細嚼茶清下食後

芎枳丸 治心肺積熱去風鬱痰實清利頭目令氣

不止甚盛

川芎用海米附殼一宿刷淨沙土焙乾秤

枳殼用海米附殼一宿刷淨沙土焙乾秤

已上二味各四兩並為細末煉蜜放冷和丸如梧

桐子大每服一百丸食後臨臥溫水送下日進

二服

薄荷煎 治頭目昏眩口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫

痛除風熱消瘡疹

薄荷一斤取頭 川芎半兩取 腦子半錢

甘草半兩取末 縮砂人末二分

右將上項藥件和令勻於藥末內稱出半兩為衣

用白沙生蜜五兩半和成劑用明淨水於器盒

內盛上面放藥吞夜不歇每兩裁作二十塊每

服三塊細嚼噲化亦得

祛涎丸 治風痰上攻頭目昏痛旋暈欲倒嘔噦惡

心恍惚健忘神思昏憤肢體煩痛頭項拘急頭面

腫癢手足難舉或時麻痺

御藥院方 卷一 精思堂

天南星兩 半夏九兩 白附子六錢

川烏頭七分

已上四味並生為細末用生絹袋盛以井花水揉

洗澄濾有滓再更研入袋擺洗盡磁盆中日曬

夜露每至曉澄去宿水別換井花水攪勻曬春

五日夏三日秋七日冬十日去水曬乾如玉片

方入後諸藥

劍脊烏梢蛇酒浸一宿去骨焙乾秤一兩 川芎兩

白花蛇酒浸去骨焙乾秤一兩 天麻兩

全蠍一兩去毒 白僵蠶一兩炒

右件同為細末生薑自然汁煮麵糊和丸如梧桐

子大以飛研細朱砂一兩麝香末二錢衣為風

乾密器中盛之每服三十九食後煎生薑薄荷

湯下

至靈散 治偏頭疼

雄黃 研

細辛 去苗葉為末各等分

右二味再同研每服一字左邊頭疼搗入右鼻內

右邊頭疼搗入左鼻

二聖散 治風頭痛上焦壅滯心膈煩熱及治偏頭

疼

御藥院方

卷一

其

精思堂

消石

細辛 去苗葉華陰者各一分

右二味搗研為細散每用半字發時搗入不痛邊

鼻內如未已方搗痛邊鼻內或用紙撚子蘸藥

絛鼻中

石膏散 治風壅頭痛骨痛

石膏 研

芎藭

旋覆花 各一兩

白附子 炮

細辛 去苗葉

甘草 炙各一分

右六味搗羅為散每服半錢匕臘茶調下不拘時

候

芎藭散 治頭目昏眩肢體煩倦

芎藭

菊花

荆芥穗

石膏 研

甘草 各等分

右五味各生用搗研為細散每服一錢匕熱湯調

下

神聖散 治偏頭疼不可忍

乾蠍 去土

藿香葉

麻黃 去根節

細辛 去苗葉

右四味搗羅為細散每服一錢匕用薄荷葉酒調

下

上清散 治頭痛骨痛眼痛

御藥院方

卷一

廿二

精思堂

川芎

鬱金

芍藥

荆芥穗

薄荷葉

芒消 已上各半兩

乳香

沒藥 各一錢

腦子 錢半

右為細末每用一字鼻內搗

王瓜散 專治偏正頭痛

荆芥穗 半兩

木香

川芎

天麻

麻黃 去節

防風 去蘆頭

細辛 去苗葉

甘草 炙

王瓜 燈心炒黃已上各半兩

兩半

右同為細末每服二三錢熱茶清調下食後

沒藥丸 治中風手足不隨

沒藥 乳香 丁香

木香 地龍土 生犀 鎊

人參去蘆 羚羊角 鎊 朱砂 飛

龍腦 麝香 各二錢半 天麻 兩一

川烏頭 半兩 裂 白花蛇 二錢半 酒浸取肉

右件為細末令勻煉蜜為丸每一兩作十九金箔

為衣每服一丸空心食前細嚼溫酒或溫水送

下 摩挲丸 治中風擗緩半身不隨口眼喎斜言語蹇

御藥院方 卷一 精思堂

澁精神昏塞步履艱難或肌肉偏枯手足痺曳或筋脈拘攣不得屈伸及氣痺之疾諸風身體疼痛

天麻 一斤洗 天台烏藥 自然銅 燒碎

薰陸香 用滴乳者別研 辰砂 水飛 麝香 別研

生龍腦 別 烏犀 鎊屑別 雄黃 飛研各

地榆 苗 黑參 煉潤者洗焙乾 丁香

川烏頭 炮裂去皮尖 木香 各八兩 真珠末 二兩 細

右件一十五味為末研勻煉蜜和丸如楮實大每服一丸溫酒化下不拘時候服訖避風處衣被蓋復令汗出患重者服一月珍安輕者半月差

初患者五七服可安

輕骨丹 治中風手足緩弱肢節不身筋脈攣急癱

瘓偏風半身不遂口眼喎斜語言蹇澁肌肉不生

一切諸風並皆治之常服此藥壯筋骨補虛賦顏

色強骨生力益真氣除骨節間風邪

獨活 土去 牛膝 酒浸 兔絲子 酒浸

茯苓 酒浸 草薢 酒浸 金毛狗脊 土去

川心巴戟 燉 骨碎 補毛去 破故紙 炒

葫蘆 芭 炒 大附子 皮去 熟地黃

常歸 土去 天麻 防風 土去 精思堂

羌活 土去 白芥子 炒 川芎 木香 已上各

五味子 炒 川烏頭 炮去皮 地龍 土去

木鱉子 兩 甜瓜子 炒 兩 沒藥 別研

全蠍 炒 兩 乳香 別研 續斷 兩一

已上二十八味右為細末酒煮麵糊為丸如楮桐

子大每服三十九四十九食前溫酒下

浸酒 治諸頭目腰脚筋骨風益血添氣力 虎脛骨 入兩 炙令黃 丹參 天麻 各一兩 桂 牛膝 菝葜

人參各一兩 烏豆二升炒 羚羊角

杜仲 芎藭各六分 薏苡人分八

南椒半兩擇 右一十三兩細剉吹去末生絹袋寬盛沉於三斗

酒中浸令沒密封經七日開空腹量性飲恒令

微有酒氣取一盞添一盞藥味薄則換

龍腦清腸湯 治風熱化痰利咽膈清頭目消瘡疹

黍黏子六兩擇 荆芥穗四兩 雞蘇葉一兩半

甘草剉炒 瓜蒌根 桔梗炒黃

紫蘇子二兩各 龍腦二錢

御藥院方 卷一 三十 精思堂

右為細末每服一二錢食後或臨睡白湯點服

虛風丸 治一切虛風頭痛眩暈旋暈欲倒嘔吐痰

涎牙關緊急手足無力麻木不仁不省人事

天蓼木 吳白芷 白鮮皮

白茯苓去黑皮 川芎 獨活去蘆

防風去蘆 天南星酒浸切作 天麻酒

烏蛇酒浸去 全蠍炒 人參去蘆

麻黃去根 甘草剉 白木

細辛去土 川烏頭炮裂去 白獨活去蘆

巴上各 天雄炮裂去 黑附子去皮

雄黃各 馬牙消研

朱砂二錢半 龍腦 麝香各半

右件二十五味為細末煉蜜為丸每兩作一十九

每服一九溫酒化下或荆芥湯亦得食後臨臥

服 芎藭天麻丸 清利頭目消風化痰寬胃利膈心悵

煩悶旋暈欲倒頭項緊急肩背拘倦神昏多睡肢

體煩痛皮膚瘙癢偏正頭痛鼻塞聲重面目浮腫

並宜服之 芎藭兩 天麻兩

御藥院方 卷一 三十一 精思堂

右二味為細末煉蜜為丸每一兩半作二十九每

服一九食後細嚼茶酒任下

透關丸 治中急風榮衛滯滯頭目昏運額角偏痛

手足無力舉動艱掉語言蹇澁心神不寧

麻黃去根節 麝香研 天麻各半

乳香研 沒藥研 地榆

黑參 甜瓜子 川烏頭生去皮

右件九味同為末以酒一升慢火熬為膏更量入

煉蜜同和為丸如梧桐子大每服三十九溫酒

芥湯下不計時候

八仙丹 治大癩病

白附子 天麻 升麻

丹參 威靈仙 細辛

赤箭各一兩 蜈蚣一對 酥炙

右件八味同為細末每用一兩八錢藥末用胡麻

子淘淨一升重五兩炒令香熟入藥末同搗極

細煉蜜為丸分作十九每日常食後米飲嚼下一

九日進三服服之十日或一月至兩月筋骨疼

痛是其驗也比至有驗且忌出入行動

御藥院方 卷一 精思堂

太白丸 治諸風頭旋額角偏痛肢體拘攣寒氣

寒鼻塞聲重咽膈不利清爽神志解利四時邪氣

天麻 芍藥各一兩 附子炮去

細辛去苗葉 天南星二兩 白附子五兩

半夏一十五兩 歐一兩 寒水石燒

白礬三兩 人參半兩 阿膠三分

右件一十二味同搗羅為末水蘘糊為丸如梧桐

子大每服三十九生薑湯下不拘時候

太白丹 治諸風頭目旋暈偏正頭痛肢體拘攣

盛氣壅鼻塞聲重咽膈不利清爽神志解利四時

邪氣

天南星二兩 細辛去 附子炮去

芍藥 天麻各二兩 半夏湯洗

滑切作片 白附子五兩 歐一兩

青皮白 木香各三兩 寒水石燒

右為細末生薑汁蘘糊和丸如梧桐子大用寒水

石為衣每服三十九生薑湯下不拘時候

太一散 治陽明經虛風邪客入令人口眼喎斜麻

木不仁及驚風癱瘓手足搐搦不省人事

御藥院方 卷一 精思堂

獨活去蘆頭 續斷 杜仲炒去

肉桂皮 牛膝酒浸 黑附子炮去

白茯苓皮 人參去蘆 防風去蘆

白芍藥 當歸去蘆頭 川芎

熟乾地黄 秦艽去蘆 甘草對

細辛去苗葉 右件一十六味為羅末每服三錢水一大盞煎至

十分去滓溫服不計時候

芎黃湯 治偏正頭痛外傷風鼻塞聲重涕多嚏

者

荆芥穗三錢 全蠍五個 大川烏頭兩個

皮臍切碎 妙黃色 川芎兩 細辛去苗葉 一錢半

雄黃研水飛 一錢

右件六味各修製畢碾羅為細末每服半錢茶少

許白湯點服不拘時候

旋覆花湯 治風熱則而生赤癩子腦昏目疼鼻塞

聲重面上遊風狀如蟲行

旋覆花土去 人參去頭 赤茯苓土去

黃芩土去 柴胡土去 枳實炒

赤芍藥土去 甘草已上各 二兩

御藥院方 卷一 精思堂

右為散每服二錢水一大盞入生薑五片同煎至

七分去滓食後服日進三服忌猪肉燒麵等

人參附子湯 治風濕體疼痛欲折肉如錐刀所刺

人參去蘆 黑附子炮去 乾薑炮

芍藥 茯苓土去 甘草炙

桂心各半 白木二錢

右件八味為細末每服二錢水一盞同煎至七分

去滓溫服不計時候

龍香散 治偏正頭痛不可忍並宜服之

地龍去土為末 乳香各半

右二味為細末每用一錢摻在紙上作紙捻子燈

上燒令煙出鼻內聞煙氣

獨活寄生湯 治腎氣虛弱冷臥濕地腰背拘急筋

攣骨痛或當風取涼過度風邪流入脚膝為偏枯

冷痺緩弱疼痛或腰痛牽引脚重行步艱難

獨活三兩 寄生 杜仲

牛膝 細辛 秦艽

茯苓 桂心 防風

苧藟 人參 甘草

當歸 芍藥 地黃乾已上 各二兩

御藥院方 卷一 精思堂

右為散末每服五錢水一大盞入生薑五片煎至

七分去滓稍熱服食前

蠍稍半夏丸 治風壅痰實咳嗽鼻塞頭目昏痛手

足麻木頭項強急筋脈不利常祛風化痰清痰頭

目 蠍稍去刺 白僵蠶生薑汁炒 各半兩 天南星炮

半夏湯洗七返用 薑製作麩 明天麻去蘆 川獨活去蘆

白花蛇酒浸 取肉 川芎土去 南青皮去

紫蘇葉 棟木香 防風去蘆頭 各半兩

右件一十二味修製訖同為細末用生薑自然汁

打麵糊爲丸如梧桐子大別用朱砂爲衣每服

三十九至五十九食後生薑湯送下

通關散 治風熱上攻頭目筋脈拘急痰涎壅滯支

節煩疼

羌活

獨活

防風

天麻

山梔子

大黃

甘草各一兩

滑石二兩

右件爲麤末每服三錢水一盞生薑五片煎至七

分去滓溫服食後

胡麻丸 治大風

御藥院方

卷一

三

精思堂

天麻

白附子炮

人參

細辛

川芎

定風草

窮賊

川山甲黃上林

丹參

升麻

玄參

何首烏酒

紫參

蔓荊子

威靈仙

防風已上各一兩

全蜈蚣對

右爲細末每用二兩用胡麻一斤炒香爲末拌勻

入蜜和丸都分爲九十九每服一丸細嚼溫漿

水下日進三服不拘時候淡白粥服一百二十

日不再發次服

川芎石膏湯 治一切風熱上攻頭目昏眩或痛或

悶或風痰喘嗽或目疾時發或生翳膜或鼻塞口

瘡煩燥多渴或便溺淋閉或瘡癬皴揭並宜服之

清利頭目宜通氣血并一切風熱或中風偏枯推

解中外諸邪所傷及調理汗病下之前後并汗後

餘熱勞復傳染等疾

石膏

防風

連翹

薄荷葉各一兩

川芎

山梔子

荆芥穗

當歸切

芍藥生

大黃

菊花

人參

御藥院方

卷一

三

精思堂

白朮各半兩

甘草三兩

滑石四兩

寒水石

黃芩

桔梗各二兩

縮砂人二分

右爲麤末每服三四錢水一盞煎至六分濾汁溫

服日進二三服食後忌薑醋發熱諸物或爲極

細末溫水調下二三錢

威靈仙 味鹹溫無毒主諸風宣通五臟去腹內冷

滯心膈痰水久積癥瘕疰癘氣塊膀胱宿膿惡水

腰膝冷疼及療傷折一名能消久服無瘟疫瘰癧出

商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生先

於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月丙丁戊巳日採忌若

醫經云商州有人重病足不履地數十年良醫碑技莫能療所親置之道傍以求醫者一新羅僧見

之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因爲之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履

崔元亮海上方著其法云採得陰乾月餘擣篩溫清酒和二錢匕空心服之如人本性殺藥可加及

六七分匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可

也
御藥院方 卷一 三九 精思堂

崔氏海上集有云威靈仙一味洗焙爲末以好酒

和令微濕入竹筒內牢塞口九蒸九暴如乾添酒

重灑之以白蜜和爲丸如桐子大每服二十九至

三十九至五十方溫酒下

甘菊花荆芥湯 治風痰頭痛咽膈塞閉

甘菊花 防風 旋覆花

川芎各半 皂角酥炙去皮子 石膏碎各

枳殼去穢炒 甘草炙 荆芥穗各七

右九味搗羅爲麤末每服三分水一盞入生薑三

片同煎至六分去滓食後熱服

羌活九 治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘

急及風邪寒壅頭痛項強鼻塞聲重肢節煩疼天

陰風雨先覺不安

羌活去蘆 甘菊 麻黃去根

川芎 防風去蘆 石膏細研

前胡去蘆 黃芩 細辛去苗

甘草剉 枳殼白 白茯苓去皮

蔓荆子上去白皮已 朱砂飛研一兩

右爲細末水麪糊爲丸如梧桐子大每服四十九

生薑湯下不拘時
御藥院方 卷一 三九 精思堂

皂角丸 治風氣攻注頭面腫癢遍身拘急痰涎壅

塞胸膈煩悶頭眼目眩鼻塞口乾皮膚瘙癢腰脚

重痛大便風秘小便赤澁及咳嗽喘滿痰唾稠濁

語澁涎多手足麻痺暗風癩病偏正頭痛夾腦風

婦人血風攻注遍身疼痛心忪煩躁癢疹瘙癢並

宜服之

半夏湯洗 白礬過 威靈仙洗

知母 貝母去心 青楠皮

甘菊花各一 牽牛子爛二 槐角燼

薄荷葉

皂角各五兩將皂角碎以水

一斤同煎
成膏為用

右為末以皂角膏子搜和為丸如梧桐子大每服

二十九食後生薑湯下如治痰實咳嗽用蛤粉

薑汁湯下手足麻痺用生薑薄荷湯下語澁

盛用荆芥湯下偏正頭疼夾腦風用薄荷湯下

大通聖白花蛇散 大治諸風無問新久手足羸曳

腰脚緩弱行步不正精神昏冒口面喎斜語言蹇

澁痰涎壅盛或筋脈攣急肌肉頑痺皮膚癢癢骨

節煩痛或痛無常處遊走不定及風氣上攻面浮

耳鳴頭痛目眩下注腰脚腰疼腿重腫痿生疥並

宜服之

御藥院方

卷一

四十一

精思堂

天麻生薑

赤箭

防風去苗

厚朴生薑

藁本去土

海桐皮

草薢

木香

肉桂去皮

杜仲剉

乾山藥

當歸去苗

甘草炙

威靈仙

白附子炮

菊花去枝梗

蔓荊子去皮

羌活去頭

郁李人別研

虎骨炙

白芷

乾噉炒

牛膝去苗

白花蛇酒浸去皮骨用

肉已上
各一兩

右為散每服一錢至二錢溫酒調下荆芥湯亦得

空心服之常服祛逐風氣通行榮衛久病風人

尤宜常服輕可中風不過二十服平復如故

芎辛湯 治腦痰風厥頭目昏痛鼻塞聲重肩背拘

急

芎藭半兩

細辛去苗土

甘草炙半

右三味為麩末每服二錢水一盞煎至七分去滓

食後溫服

虎骨木瓜丸 治飲酒過度寒濕停駐經絡不和傷

御藥院方

卷一

四十一

精思堂

敗氣血走注筋骨疼痛晝靜夜甚或霧所傷亦致

筋骨走注并婦人血風疼痛並皆治之

虎骨炙

南乳香研

沒藥各一兩

木瓜

天麻

茯苓

牛膝上項四味各二兩用酒

右為細末將元浸酒作糊和丸如梧桐子大每服

三十九至五十九溫酒送下空心食前日進二

三服

菊花散 治風冷邪氣入於腦停滯鼻間氣不得宣

散結聚不通故使鼻塞也

甘菊花 防風 前胡各一兩

細辛 桂心各半 甘草錢二

右件為細末每服二錢入乳香少許煎荊芥湯調

下食後

木香保命丹 治男子婦人體虛膝開中風牙齒噤

口眼喎斜手足偏枯四肢拘攣屈伸不得麻痺不

仁驚癇等病過身瘙癢疼痛頭目昏暗風入腹內

拘急切痛體如蟲行心神恍惚傷風瘴疫偏正頭

疼風病諸般冷氣兼療男子婦人脾胃氣虛或傷

冷物心腹大痛臟腑不調婦人產前產後中風病

御藥院方 卷一 四三 精思堂

壯熱體重頭疼旋暈欲倒氣閉血溢房服不行此

藥引血調養榮衛升降陰陽補益五臟好飲之人

酒煎一服即發風動氣之物不能為患或中酒痰

作昏倦力乏飲食減少一服見効常服細嚼溫酒

茶清任下不計時候如中風加薄荷湯化下如不

能嚥者灌之藥下立効若早晨一服除諸風永不

患傷寒時氣壯熱壯元陽理筋骨腿膝之患化風

痰快滯氣溫脾胃進飲食小兒急慢驚風薄荷湯

下一皂子大如人纔覺痰涎畜滯手足意麻體脚

緩弱乃是中風之兆急服此藥無不立愈之者

木香 白附子生用 官桂

杜仲去粗皮 厚朴去皮生薑 藥本去土

獨活 羌活生用去 海桐皮生

白芷 甘菊花去 牛膝去日酒乾

白花蛇酒浸三口去 全蠍炒

威靈仙去土 天麻別去取

當歸去土乾碎 蔓荊子生去

虎骨酒浸焦黃去油或 天南星藥水煮

大防風去蘆頭 山藥生 甘草酥炙

赤箭生用已上二十 麝香三錢真

御藥院方 卷一 四三 精思堂

朱砂上好者

右件為細末其藥分作十分將麝香一分拌勻煉

蜜和丸如彈子大每服一九細嚼酒下不計時

候

烏蛇丸 療諸風疾無問久新半身不遂手足麻木

精神不爽咽隘不利及風虛頭痛目眩欲倒心忪

健忘恍惚不寧心氣不得下通脾氣滯而不散筋

脈拘急骨節煩疼並皆治之

獨活去蘆 防風去蘆 吳白芷

人參去蘆 桂心 藥本去

麻黃節去根 芍藥 天麻去蘆頭

川烏頭去皮 薑香葉去土

烏蛇酒浸去骨 全蠍去毒 甘草炙

生犀鎊各半兩 川芎鎊 羌活去土

白殭蠶炒 遠志去心 牛黃研

天南星牛膽製各三錢 白附子炮裂

龍腦研 朱砂為衣各二錢

右件為細末入研藥令勻煉蜜為丸每一兩作一十九以朱砂為衣每服一丸煎荊芥湯化下或加至二丸茶酒亦得化下重身婦人不宜服之

御藥院方 卷一 四四 精思堂

御藥院方卷第一

癸巳新刊御藥院方 卷一

癸巳新刊御藥院方卷第二

較勘無差

治傷寒門

桂苓丸 治冒暑大渴飲水過多伏冷心腹脹滿見食欲嘔頭眩小便赤少大便滑瀉

桂 赤茯苓去皮各五兩

右二味為細末煉蜜為丸每兩作一十九每服一丸細嚼白湯送下冷水化服亦得

敗毒散 治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩痛及寒壅咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並

皆治之 人參洗去蘆頭 茯苓剉去皮 甘草燻

前胡洗去苗 芎藭 羌活洗去苗

獨活洗去苗 桔梗 柴胡洗去苗

枳殼炒去穢各三十兩

右為細末每服二分水一盞入生薑薄荷各少許同煎至七分去滓溫服不拘時候

小柴胡湯 治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急胸

滿脇痛嘔噦煩溫寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘硬或過經來解或潮熱不除及差後勞復

御藥院方 卷二 一 精思堂

三三

發熱頭痛婦人傷風頭煩熱經血適斷寒熱如
瘧發作有時及產後傷風頭痛煩熱此藥並皆治
之

柴胡去蘆頭 半夏湯洗七次 甘草炙 黃芩
人參去蘆頭 甘草炙

右五味同為粗末每服三大錢以水一盞半入生
薑五片棗一個擘破同煎至七分濾去滓稍熱
服不計時候小兒分作二服更量大小加減

五積散 調中順氣除風冷化痰飲治脾宿冷腹脇
脹痛胸膈停痰嘔噦惡心或外感風寒內傷生冷
御藥院方 卷二 二 精思堂

心腹痞悶頭目暗痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往
來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不
調或閉不通並宜服之

蒼朮洗淨去皮 桔梗去蘆頭 枳殼去穢
陳橘皮白去 麻黃上各六兩 芍藥

白芷 當歸去蘆頭 甘草炙
桂皮去粗 半夏湯洗七次 茯苓去皮

川芎已上各 厚朴去皮 乾薑已上各
有除桂枳殼二味另為粗末外一十三味同為粗
末慢火炒令色轉攤冷次入桂枳殼末令勻每

服三分水一盞半入生薑三片煎至一中盞去
滓稍熱服如令氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反
胃嘔吐泄利清穀及疰癘癢癢勝脫小腸氣痛
即入煨生薑三片鹽少許同煎如傷寒時疫嘔
痛體疼惡風發熱項背強痛入蔥白三寸豉七
粒同煎若偏覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或
手足厥冷即入炒茱萸七粒鹽少許同煎如寒
熱不調咳嗽喘滿入棗煎服婦人難產入醋一
合同煎服之並不拘時候

升麻葛根湯 治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢
體煩疼及瘡疹已發未發疑貳之間並宜服之
御藥院方 卷二 三 精思堂

升麻 葛根剉 甘草炙
芍藥各十兩

右同為粗末每服三錢用水一盞半煎取一中盞
去滓稍熱服不計時候日進二三服以病氣去
身清涼為度小兒量力服之

金沸草散 治風化痰除頭目昏痛頸項強急往來
寒熱肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利咳嗽喘滿涕
唾稠黏及冷時行寒疫壯熱惡風

荆芥穗四兩 旋覆花去 前胡去蘆

麻黃去根節 各二兩 甘草炙 赤芍藥

半夏洗七次用生薑汁浸各一兩

右件同為粗末每服二錢水一盞半入生薑三片

棗一個同煎至八分去滓溫服不拘時候有寒

邪則汗出如風盛則解利

木附湯 治風濕相搏身體疼痛不能轉側不嘔不

渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不

知食味

附子炮去皮臍細切一兩半 白朮四兩 甘草二兩

右搗白朮甘草為粗末入附子令勻每服三錢水

御藥院方 卷二 精思堂

一盞半入生薑五片棗一個擘破同煎至一盞

去滓溫服食前此藥暖肌補中助陽氣止自汗

防已黃耆湯 治風濕相搏客在皮膚一身盡重身

肢少力關節煩疼時自汗出瀝漸寒風不欲去衣

及治風水客搏脚膝浮腫上輕下重不能屈伸

防已四兩 黃耆五兩 甘草二兩

白朮三兩

右同為粗末每服三錢水一盞半入生薑三片棗

一個同煎至一盞去滓稍熱服不計時候服訖

蓋覆溫臥汗出差

水胡蘆丸 生津液止煩渴利咽噎

人參 乾葛 紫蘇葉各二錢

烏梅肉 木瓜 甘草炙各一錢

右為細末煉蜜和丸每兩作三十九丸每用一丸綿

裹嚼化嚥津不計時候或新水化服亦得

梅蘇丸 止渴生津液

烏梅肉 白梅肉 乾木瓜

紫蘇葉各一兩半 甘草炙半兩 白檀錢二

麝香研一錢

右為末入麝香勻入乳糖淨入兩窰一兩同煉和

御藥院方 卷二 精思堂

為劑每兩作二十九丸每服一丸細嚼嚥津不拘

時候或新水化服亦得

沉香飲子 治飲冷過多短氣喘促心膈妨悶全可

思食

沉香半兩 紫蘇葉二兩 白茯苓去皮一兩

人參一兩去頭

右四味咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓

時時服

神解丸 治內外所傷骨節疼痛壯熱憎寒頭疼身

體拘急

朱砂研 礞砂研 黃蠟各等分

右銻蠟和成劑旋丸如菜豆大每服一九冷水送

下如人行一二里地以熱葱醋粥投汗出解

六一散 治身熱嘔吐泄瀉腸澀下痢赤白治瘧閉

淋痛利小便偏主腸胃中積聚寒熱益精氣通九

竅六府津液去留結消畜水止渴利中除煩熱心

躁治腹脹痛補益五臟大養脾腎之氣理內傷陰

痿安魂定息補五勞七傷一切虛損主癩瘰驚悸

健忘止煩滿短氣藏傷咳嗽療飲食不下肌肉疼

痛治口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋骨通血脈和氣

御藥院方 卷二 六 精思堂

血消水穀保真元解百藥酒食邪毒耐勞役飢渴

寒熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身駐顏延壽

及解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮恚怒驚

恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能

令偏身結滯宣通氣和而愈及婦人下乳催生并

產後損液血衰陰虛熱甚一切熱證並宜服之兼

不患妨發吹乳或已覺吹乳乳痛頻服即愈乃神

驗之仙藥也桂有孕婦人不得服恐滑胎也

滑石六兩賦好者 甘草微炒

右為極細末每服三錢蜜少許溫水調下或無

亦得無時日三服或欲冷飲者新水調下亦得

解利發汗煎葱白豆豉湯調下四錢併三四服

以効為度此藥是寒涼解散熱鬱設病甚不解

多服無害但有益耳

生薑附子湯 治痰冷澀氣胸滿短氣嘔沫頭痛飲

食不消化亦主平風

附子炮製去皮臍細切

每服三錢水二大盞入生薑一十片煎至一盞去

滓溫服空心食前

四君子湯 治煩熱躁渴

御藥院方 卷二 七 精思堂

白茯苓去皮 人參去蘆 甘草炙

白朮各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓放溫服

不計時候

白朮散 治諸病煩渴津液內耗不問陰陽服之止

渴生津液

白朮 人參去蘆 茯苓去皮

甘草炙 藿香葉 木香各一兩

乾葛二兩

右為粗末每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫

服不計時候

福壽二味散

乾薑用生

石決明各等

右為細末每用藥一錢用男兒津唾於左手心內調稀稠得所不犯婦人手

桂漿

生蜜斤三

熟水斗一

赤茯苓去皮為末三兩

大麥燒末兩

細麴末半斤

桂去粗皮為末三兩

木人湯浸去皮一百

右用前項桑蜜杏泥并水一處攪勻了和水共煎

御藥院方

卷二

八

精思堂

得三大紅盃入於磁罐子內或磁瓶內以油子

封口上用數重紙蓋泥固濟入冰窖內三日方

熟綿濾去滓水浸飲之

化水丹 消化水飲

牡蠣燒二兩

甘草炒二兩

蛤粉兩六

川烏頭四隻秤重一兩四錢炮去

皮得淨一兩四錢六分

右為細末醋浸餅為丸如梧桐子大每服十五

丸不拘時候溫水下

屠蘇 大辟瘟疫氣令人不染溫病及治傷寒

大黃

小椒子去

桂去粗皮

桔梗各一兩 白朮八錢 虎杖一兩

川烏頭生去皮六錢

右件七味修製畢剉細一處和勻用絳袋子內盛

於十二月晦日日中懸井中沉至泥正月朔日

平明取出袋子放在酒中同煎數沸面向東戶

飲之屠蘇之飲先從小飲至大自意飲之一人

飲一家無病一家飲一里無病飲屠蘇三日後

其滓還置井中能仍歲飲可世無病當家內外

井中皆悉注大藥辟瘟疫氣

白朮湯浸去皮一兩 治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩渴

御藥院方

卷二

九

精思堂

欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏

表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水

數升者宜服之又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱

而渴

石膏洗二十斤

知母一百五十兩

甘草燬七十兩

右為末每服三錢水一盞半人糯米三十餘粒煎

至一盞濾去滓溫服小兒量力少少與之或加

人參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋

前可服春時及立秋後并亡血虛家並不可服

桂苓甘露散 治飲水不消嘔吐瀉利流濕潤燥宜

通氣液水腫腹脹泄瀉不能止者兼治霍亂吐瀉
下利赤白止煩渴解暑毒大有奇効兼利小水

白茯苓皮去 白木 豬苓皮去

寒水石別研 甘草炙 澤瀉各一

滑石別研 桂去粗

右件為細末或煎或水調三二錢任意或入蜜少
許亦得

荔枝膏

烏梅八兩 桂一十 乳糖六兩

生薑取汁 麝香半 熟蜜四兩

御藥院方 卷二 十一 精思堂

右用水一斗五升熬至一半濾去滓下乳糖再熬
候糖鎔化開入薑汁再熬濾去滓俟少時入麝
香用如常法服

牛黃七寶丹 治傷寒時疫熱毒暑病心胸痞塞或
發黃發斑狂躁迷悶及久經取轉不較蘊毒滯積

潮熱

牛黃研 龍腦研 麝香別研各

朱砂研二 白麵半 寒水石燒通赤

輕粉研半

右件同研勻滴水和作二十九每服一九澄清水

化下小兒化半丸不拘時候

桂沉漿

紫蘇葉 烏梅肉各一 沉香三

乳糖六

右件四味用水三椀熬至二椀濾去滓入桂漿一

升半合和作漿飲之滲濕逐飲順氣止渴

桂苓白朮丸 消痰逆止欬散痞滿塞開堅結

痛悶進飲食調和臟腑無問寒濕熱嘔吐瀉痢皆

能開發以令遍身流濕潤燥氣液宣平而愈并解

酒毒兼療肺痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服

之利止為度後以鹽齏調之

乾生薑 棟桂各一 茯苓去

半夏各一 白朮 澤瀉

紅皮湯浸片去

右為細末麵糊為丸小豆大每服二三十九生薑

湯下日進三服病在膈上食後在下食前在中

即不計時候或一法更加黃連半黃蘗二水丸

取効愈妙

桂苓甘露散 消飲止渴去煩生津通利小便

桂苓去粗 茯苓去 白朮各半

甘草 澤瀉 寒水石

石膏 滑石

右件為極細末欲冷飲者新水調下不拘時候或

只以沸湯亦得

橙皮丸 調中順氣生津止渴

沉香 白木 木瓜

烏梅肉 橙皮 白茯苓

糖霜 乾生薑

右件搗羅為細末用甘草膏子和成劑每兩作二

十五丸欲作湯水用水化開寒熱溫涼任意飲

御藥院方 卷二 精思堂

之欲噙化亦得

小柴胡加桂湯 治瘧疾先寒後熱兼治支結

柴胡 人參 甘草

半夏 黃芩 桂枝

右剉如麻豆每服抄五錢匕水一盞半生薑七片

棗二箇煎至八分去滓取六分清汁溫服日三

夜二若渴者去半夏加人參栝樓根同煎服之

交解飲子 治瘧疾辟瘴氣神効

肉豆蔻 草豆蔻 白麩 赤色去麩各

厚朴方二寸 炙熟一半生用

甘草大者熟一寸半生用

生薑 紙裏煨熟一塊生用

右件生熟各破剉碎同勻每服分一半用水一椀

煎至一大盞去滓溫服空心

七棗散 治脾寒瘧疾

川烏頭大者一箇 凡七次炮 去皮臍

右為細末都作一服用大棗七箇生薑十片葱白

七寸水一椀同煎至一盞疾發前食棗次溫

服只一服差雖然烏頭性熱以七處炮熟散其

熱性服之必効

御藥院方 卷二 精思堂

柴胡栝樓根湯 治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡 黃芩 人參

甘草 栝樓根

右五味搗篩為末每服五錢水一盞半生薑五

片棗二枚同煎至一盞去滓不計時候細細服

七珍散 治瘧後及傷寒中暑後宜服此調胃養氣

進食此方溫平不熱服之十日外飲食倍常

人參 白木 黃耆

山芋 白茯苓 粟米

甘草 炙已上

右搗羅爲細末每服二錢水一盞生薑二片棗一
个同煎至七分去滓食前溫服

草果飲子 治寒熱往來煩渴頭痛或但寒但熱方

草果子仁四枚 人參去蘆頭半錢 半夏一十三枚中樣者沸湯浸洗七次 甘草炙半錢 大棗三枚

烏梅三枚 生薑三寸一塊

右件咬咀用水一大椀同煎至一盞去滓五更時
溫服

瓜蒂散 治太陽經頭痛寒熱方

瓜蒂十枚 川山甲鱗一片片尾上焙焦

御藥院方 卷二 十四 精思堂

右爲細末每用一剗耳許右鼻內噴大有神効

治瘡方 如合時具冠帶向神堂前旋看呪曰

弟子不爲自身爲五姓瘡病

白殭蠶一個直者切作七段用綿裹定燃爲丸用朱砂爲衣

右只作一服日未出面向東用左手插寅文用桃

柳枝煎湯送下

香蘇散 治四時瘟疫傷寒

香附子四兩慢火炒 陳橘皮二兩不去白 甘草一兩

香蘇葉四兩

右爲羅末每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服

不抱時候日進三服

竹葉石膏湯 傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐

淡竹葉半斤 石膏四兩 人參

甘草各半 麥門冬一兩 半夏二分

右剗如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半入粳米

百餘粒煮取八分米熟湯成去滓溫服

五苓散 治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥

咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出

表解煩渴不止者宜服之又治霍亂吐利躁渴引

飲

御藥院方 卷二 十五 精思堂

澤瀉剗二十兩 豬苓去皮一兩 桂去粗皮一兩

茯苓去皮二兩 白朮去蘆頭一兩

右爲細末每服二錢熱湯調服不計時候服訖多

飲熱湯有汗出即愈又治瘧熱在裏身發黃疸

濃煎茵陳湯調下食前服之疽病發渴及中暑

引飲亦可用水調服

大順散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不

分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草剗長一寸許三十斤 乾薑 杏仁去皮尖

桂去粗皮各四斤

右先將甘草用白沙炒及八分黃熟次入乾薑同

炒令薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲為

度用篩隔淨後入桂一處搗羅為散每服二錢

水一中盞煎至七分去滓溫服如煩躁即冷服

不計時候以沸湯點服亦得

香薷丸 治大人小兒傷暑伏熱躁渴昏悶頭目昏

眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體倦怠不思

飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷去土

紫蘇葉並用 去梗

乾木瓜各一兩

丁香

白茯苓去木

藿香葉去土

御藥院方

卷三

一六

精思堂

甘草剉

檀香剉已上 各半兩

右為細末煉蜜和丸每兩作三十九每服一九至

二九細嚼溫湯下或新汲水化下亦得小兒服

半九不計時候

薑木湯 溫和中外退除寒濕治陽虛寒外挾風

冷頭痛惡風戰慄多汗風濕相搏身體疼痛腰背

強直轉側不能又療食寒飲冷內傷脾胃嘔逆吐

痰不思飲食

川薑炮

白朮炒

茯苓各一兩

附子炮去 皮臍

甘草炙各 半兩

右為麤末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫

熱服不計時候

豬苓湯 治脈浮煩渴不利小便不分

豬苓

澤瀉

滑石

赤茯苓

阿膠各等 分

右為麤末每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫

服不拘時

丹砂丸 治痰寒溫瘴更作證候悉皆治之

丹砂研一 分

常山搗末 三分

右件二味研勻煉蜜為丸如梧桐子大先一日一

御藥院方

卷二

一七

精思堂

更時服三九溫米飲送下更作日平且時服三

九溫米飲送下

茯苓桂枝白朮甘草湯 治心下逆滿氣上衝胸時

發煩渴

白茯苓去皮 四兩

甘草炮

白朮各二 兩

官桂去粗皮 三兩

右咬咀每服五分水一大盞煎至七錢去滓溫服

不拘時候

增損白朮散 生津止渴順氣下痰

白朮

葛根

茯苓去 皮

藿香葉

人參

木香各一兩

陳皮二兩

乾生薑錢一

右為麤末每服五錢水一大盞半煎至七分去滓

溫服不計時候或涼服亦得

百解丸 解內外傷頭痛壯熱增寒腹脹喘癘

辰砂研半兩

硝砂研一分

巴豆去皮心膜出油一錢

黃蠟兩半

右除黃蠟外同研令勻入前黃蠟溶開和成劑丸

如菜豆大每服二九新水送下後少時用熱粥

投之汗出立愈

御藥院方

卷二

十八

精思堂

御藥院方卷第二

癸巳新刊御藥院方卷第三

較勘無差

治一切氣門上

平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺

痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色

萎黃肌體瘦弱怠墮嗜臥體重節痛常多自利或

發霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之

厚朴去皮薑汁炒三斤二兩 蒼朮去粗皮米泔浸一宿五斤

陳皮去白三斤二兩 甘草剉炒二兩 人參

茯苓各二兩

御藥院方

卷三

一

精思堂

右為細末每服二錢以水一盞入生薑二片煎

一個同煎至七分去薑棗稍熱服空心食前入

鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣煖胃化宿食

消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣或以棗肉

為丸小豆大每服五十九溫生薑湯送下空心

食前服

思食丸 生津大進飲食

烏梅肉 大麥藥

神麴碎炒各一兩

乾木瓜 桂去粗皮

茯苓去皮

人參去蘆頭各半兩 乾生薑錢二

甘草錢三

右為細末煉蜜和丸每兩作一十九丸每服一丸細

嚼白湯下不以時候日進三服或作小丸如桐

子大每服一丸亦可

木香三稜丸 治胸膈痞悶心腹脹滿脇肋疼痛寬

中順氣化痰消食

木香兩一

三稜兩二

蓬莪術兩二

大麥蘖兩四

神麴兩二

白木兩四

陳皮兩二

乾薑兩二

黑牽牛兩六

一方用牽牛頭末 取六兩

右為細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服三

御藥院方

卷三

二

精思堂

五十九丸食后生薑湯下

助氣丸 治諸膈氣三焦痞塞升降陰陽獨去寒濕

胸膈滿悶背脊引痛心腹膨脹諸虛動氣久而不

散蘊結成積疰癘氣塊飲食不下嘔吐痰逆噫氣

吞酸氣短煩悶並皆治之常服去停飲和脾胃進

飲食寬中順氣消積滯

京三稜兩二

蓬莪術兩二

白木

青皮兩一

陳皮兩一

檳榔

枳殼兩一

木香兩一

右件八味同為末水煮麵糊為丸如梧桐子大每

服五十九丸溫熱水下不拘時候

玄胡丸 解化傷滯內消飲食治吐利腹脹心腹刺

痛癥瘕結氣蟲煩不安調順三焦安和脾胃

玄胡

當歸

青皮兩一

雄黃兩一

蓬莪術兩一

檳榔

木香兩一

荆三稜兩六

右為細末入雄黃勻水麵糊為丸如梧桐子大每

服三十九丸生薑湯下不拘時候

木瓜湯 調氣利膈消痰止嗽治胸膈煩悶口乾多

渴治脚氣

御藥院方

卷三

三

精思堂

木瓜兩一

鹽兩一

甘草

生薑兩四

右一處拌勻磁盆器內淹一宿焙乾搗羅為細末

每服一分沸湯點服不拘時候

思食調中丸 治脾胃久弱三焦不調胸膈痞悶肢

體倦怠嘔逆惡心飲食進退氣道不勻

神麴兩一

麥蘖兩一

半夏兩一

陳皮兩一

烏藥兩一

檳榔

人參兩一

木香

沉香兩一

白木兩一

右為細末蜜調白麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前溫米飲下

治中湯 治脾胃傷冷物胸膈不快腹病氣不和

青皮去白 陳皮去白 甘草炙

人參去蘆頭 白朮 乾薑炮各等分

右為麤末每服三分水一盞同煎至七分去滓溫服食前

沉香降氣丸

治胸膈痞悶氣不升降飲食減少肢體怠墮嘔噦惡心臍腹疼痛常服和脾胃進飲食利胸膈

御藥院方 卷三 四 精思堂

沉香半兩 香附子去毛五兩 蓬莪茂剉

木香各二兩 甘草輕炒七兩 豆粉輕炒九兩

薑黃洗淨焙八兩半 右為細末水浸蒸餅為丸如櫻桃大却以本末為衣每服三二九至五九細嚼生薑湯下溫水亦可不以時候

三脘痞氣丸 治三焦痞滯氣不升降水飲停積不得流行脇下虛滿或時刺痛並宜服之

木香 白豆蔻去皮 青皮去白

陳皮去白 荆三稜炮各一兩 大腹子三分

半夏湯洗七次二兩 縮砂仁 檳榔

沉香各半兩

右為細末水麵糊和丸如梧桐子大每服三十九漸加至五六十丸陳皮湯下食後

丁香和胃丸 治脾胃不和中脘氣痞胸膈停痰嘔吐惡心脇肋刺痛飲食無味肢體倦怠常服溫中和胃止嘔進食

御藥院方 卷三 五 精思堂

丁香 木香 沉香各半兩

藿香葉 白茯苓去皮 白豆蔻人

陳皮去白 白朮 人參已上各一兩

半夏薑製三兩 右件同為細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服三十九至五十九煎生薑湯下不拘時候

養胃進食丸 治脾胃虛弱心腹脹滿面色萎黃肌肉消瘦怠墮嗜臥全不思食常服滋養脾胃進美飲食消痰導氣去風寒暑濕冷邪氣

人參去蘆頭 甘草剉各一兩 白朮

白茯苓去皮各二兩 厚朴三兩去粗皮生薑製炒

陳皮去白半兩 神麴炒半兩

大麥蘖炒黃一兩半 蒼朮五兩去粗皮泔浸

右爲細末水麪糊和丸如梧桐子大每服三十九
至五十九食前用溫生薑湯下或粥湯下亦得
調胃散 療陰陽氣不和三焦痞格五勞七傷山嵐
瘴氣八般瘧疾四時傷寒頭目肢節疼痛心腹脹
滿嘔吐惡心痰涎咳嗽手足虛腫五種膈氣噎塞
寒熱水瀉諸痢婦人胎前產後羸勞脾胃不和飲
食減少並皆主之

藿香

甘草

陳皮

半夏麪每一兩用生薑三兩半

厚朴每一兩用薑一兩伴製

右五味各二兩同爲細末每服二分水一盞入生

御藥院方

卷三

六

精思堂

薑二片同煎至七分和滓溫服不拘時候

白豆蔻散 治脾胃氣弱不進飲食

白豆蔻人

厚朴

白朮

沉香

陳皮

甘草

右爲細末每服二錢水一盞入鹽少許同煎至七

分和滓熱服食前

杜翰林枳實丸 疎導老人及虛家風氣痰實腹肋

有妨諸飲癖積

枳實

赤茯苓

人參

檳榔

白朮

黑牽牛

右爲細末水麪糊爲丸如梧桐子大每服食後以
橘皮湯下十五丸至二十九漸加如要不動時
臨臥熱水下五丸至十九別一方加木香半兩
逍遙丸 治膈實氣痞痰實喘促

半夏湯洗七次

枳實

檳榔

赤茯苓去皮各

右爲細末生薑汁糊爲丸如豌豆大每服二三十

丸食後溫生薑湯下

通膈丸 治胸中氣痞不通水飲停滯

檳榔

枳實

御藥院方

卷三

七

精思堂

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十九至

五十九生薑湯下溫水亦得食後

赤茯苓丸 治痰飲氣痞

赤茯苓

檳榔

枳實

白朮

右爲細末生薑汁麪糊爲丸如梧桐子大每服五

十九溫生薑湯下或風眩頭痛則荆芥湯下食

後

香橘湯 療一切氣不快之病服藥不下者

白朮

枳實

香附子

陳皮去白各四兩 甘草炙三兩

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點或用生薑

棗煎尤妙如傷風用葱白二寸生薑五片棗二

枚水一盞煎至七分溫服不拘時候

陳橘皮湯 治胸痺連心氣閉喉中塞不通

陳橘皮白法 桂去粗皮各半 赤茯苓去黑皮

枳殼去麩炒 栝樓實去皮各半兩 甘草炙一兩

右為細末每服五錢匕水二盞煎取一盞去滓

心溫熱服日午臨臥各一服

調胃丸 療陰陽氣不和三焦痞隔五勞七傷山嵐

御藥院方 卷三 精思堂

毒氣八般瘧疾心腹脹滿嘔吐惡心痰涎咳嗽手

足虛腫五種膈氣噎塞寒熱水瀉諸痢脾胃不和

飲食減少並皆治之

藿香 陳皮白法 甘草炙

半夏麩 厚朴薑製各二兩

右為細末生薑麩和丸如梧桐子大每服五十

丸食前生薑湯下

木香調中丸 治因飲食不調腸胃致傷心腹疼痛

兩脇脹悶臟腑泄瀉米谷不化腹中雷鳴不思飲

食或下膿血或便赤水並宜服之

木香 青皮白法 陳皮白法

檳榔 肉豆蔻麩製煨去熱 京三稜炮

訶子皮 草豆蔻人兩各一

右件為細末水麩糊和丸如梧桐子大每服六十

丸食前熱米飲送下

枳實理中丸 治中脘痞滯氣不宜通積寒停飲食

入不化

人參 乾薑炮 枳實炒

白朮 甘草炙 白茯苓去皮各一兩

右為細末煉蜜和丸每兩分作四丸每服一丸水

一盞同煎至八分去滓熱服不計時候

來復丹 破痞開結分正陰陽治中滿不受攻擊下

虛不任峻補並宜服

硫黃細研甘草水酒令潤 消石細研厚朴水酒令潤

右二味相和并令勻同淹少時於文武火上炒令

二味氣氳相結取出

五靈脂 玄精石 青皮白法

陳皮去白各一兩

右為細末生薑汁麩糊和丸如梧桐子大每服三

十丸食前生薑湯下

理氣丸 治胸中噎塞氣滯不通酒食所傷常服消

導滯氣

枳殼麩炒去穢

蓬莪木各半兩

半夏洗七次

薑黃

甘松去土各錢二

陳皮白法

大麥藥炒各七錢半

右為細末水麪糊和丸如梧桐子大每服五十九

煎陳皮湯下食後

沉香餅子 治食飲停積胸膈痞滿腹脇疼痛嘔吐不止

京三稜

蓬莪木

青皮

御藥院方

卷三

十

精思堂

陳皮

紅豆

訶子煨

縮砂人

半夏

芫花醋炒

乾薑

檳榔

薑黃

巴豆和皮

益智去皮為粗末燻火炒令褐紫色

桂去皮

木香

藿香葉

沉香

礞砂另研細已上等分

右件一十九味同為細末打白麪糊和丸如小豆

大捏作餅子每服七餅子至十餅子更覺虛實

加減溫生薑湯下食後服

木香順氣丸 治停飲遲化中氣不和

京三稜炮

石三稜

鷄爪三稜

檳榔

木香

陳橘皮白法

半夏製生薑

人參土蘆

白茯苓皮

蘿蔔子微炒已上各一兩

白豆蔻人

縮砂人各半兩

黑牽牛微炒頭末五兩

右件為細末生薑汁麪糊和丸如梧桐子大每服

四十九加至五十九食後溫生薑湯下

順氣寬中丸 治陰陽不和三焦痞膈氣行滯滯中

滿不快咽噎悶悲氣奔急肢體煩倦可欲飲食常

服宜通氣血

御藥院方

卷三

十一

精思堂

枳實炒

檳榔

京三稜煨

蓬莪木煨

大麥藥炒

人參去蘆

桑白皮去粗皮剉各一兩

甘草錢七

右件同為細末每服二分入鹽末少許生薑二片

沸湯點服不拘時候

小沉香丸 和中順氣嗜食消痰又治飲酒後乾嘔

痰涎氣噎痞悶宜服之

沉香錢六

香附子去毛炮一兩八錢

甘草錢一兩

舶上丁香皮二兩四錢

縮砂仁錢四

益智人微炒一兩二錢

甘松去土三兩六錢

蓬莪朮

右為細末湯浸餅為丸如梧桐子大每服三十丸至四十九食後溫生薑湯下或嚼破更妙

分氣丸 治胸膈氣痞痰實不化宜服之

木香 青皮白去 陳皮白去

白豆蔻人 縮砂仁 京三稜炮

蓬莪朮炮 葶澄茄 蘿蔔子

枳實麩炒各一兩 黑牽牛炒二兩

右件一十一味為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十九生薑湯送下食後

御藥院方 卷三 十一 精思堂

神保丸 治心膈痛腹痛血痛腎氣膈下痛大便不

通氣噎宿食不消並皆治之

木香 胡椒半錢 巴豆十個去皮心膜研

乾蠍七枚

右件四味為末湯浸餅為丸如麻子大硃砂為衣

用二錢每服三九心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛

柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下腎氣脇下

痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔下氣噎木

香湯下宿食不消茶酒漿飲任下

和中益氣丸 治脾胃不和氣不升降嘔吐減食

苦吞酸胸滿短氣收體怠墮面色萎黃中焦虛痞不任攻擊藏氣久寒不受峻補又療心膈福福如滿五飲停滯不散常服和中益氣進美飲食或大便不通尤宜服之

木香 丁香各半兩 肉豆蔻

茴香微炒 京三稜炮 桂皮去毒

白豆蔻人 人參去蘆頭各一兩 縮砂人二兩

青皮白去 陳皮去白各四兩

右為細末白麵糊和丸如梧桐子大每服六十五至七十九食後溫生薑湯送下

御藥院方 卷三 十一 精思堂

小橘皮丸 調中順氣寬膈進食治心腹痞悶腹脹

脹滿飲食遲化嘔噦惡心口苦無味肢體煩倦傳

導不調或秘或泄

橘皮去白斤 木香 縮砂人

檳榔各二兩 青皮去白四兩 半夏六兩湯洗七次

右為細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服六

七十九食後溫生薑湯送下

導滯丸 治心腹痞滿脇肋刺痛嘔吐痰水不思飲

食常服和中順氣消穀嗜食逐飲滲濕

黑牽牛微炒取頭末四兩 檳榔半兩

青皮去白 二兩 木香二錢 胡椒半兩

三稜半兩 丁香皮一兩

右為細末入牽牛頭末令勻薄麵糊為丸如小豆

大每服三十九至五十九食後生薑湯下

三和丸 治三焦不和氣不升降心胸痞悶脇肋疼

痛因傷冷物傳化失常

枳實妙製 檳榔 半夏湯洗各二兩

木香 青皮白去 陳皮去

赤茯苓皮去 丁香皮 蘿藦子炒

白木各一兩半 京三稜四兩 蓬莖木三兩

御藥院方 卷三 十四 精思堂

白豆蔻人 沉香 桂皮粗

藿香各一兩 黑牽牛頭一斤微炒搗細

右為細末酒麵糊為丸如梧桐子大每服三十九

至五十九食後生薑湯下

調中丸 治脾胃不和內挾濕煥煩燥發渴不思飲

食頭目昏眩小便不清胸膈悶痞脇肋脹

赤茯苓皮去 白朮 陳皮去

桔梗 豬苓皮去 澤瀉

黃芩 大黃 桂去粗皮

枳殼去穢妙 葛根 木通各一兩

半夏湯洗 滑石各一兩 黑牽牛六兩

右為細末水煮薄麵糊為丸如梧桐子大每服三

五十九不拘時候溫水送下

枳殼丸 治中焦氣滯胸膈痞悶食飲遲化四肢困

倦嘔噦惡心常服升降滯氣消食化宿祛痰逐飲

進美飲食每服五十九溫生薑湯送下食後

京三稜炮 蓬莖茂炮各二兩 白朮

青皮白去 陳皮白去 白茯苓去皮各一兩半

檳榔 木香 枳殼去穢妙

半夏湯洗七次 黑牽牛三兩

御藥院方 卷三 十五 精思堂

右件為細末水麵糊為丸如梧桐子大

橘皮枳殼湯 治胸膈氣痞短氣噎悶不得升降

枳殼去穢妙 半夏不製各二兩 陳皮不去白三兩

人參一兩

右各剉碎每藥一兩用泉水一升生薑片子十餘

片同煎至八分一盞去滓稍溫服如大便澀入

白蜜少許食後大劑如上喘用東流河水更妙

此是半夏湯古語右四味用泉水五大升入白

沙蜜四兩調勻用杓揚藥水二百四十遍煮取

一大升去滓分作三服一日常服盡食後服之

氣寶丸 治一切滯氣腹中積聚心膈痞滿脹悶喘

急及風邪久滯痰涎咳嗽酒食有傷脾胃滯氣勝

脫寒氣攻注體背腰脊痛重不可俛仰大行順一

切滯氣為氣藥之寶因名氣寶

船上茴香煉淨銀石器內用 陳皮湯去白

大檳榔一分四味同 黑牽牛四兩

用吳茱萸二兩慢火同炒茱萸焦

右件藥末同共拌勻煉蜜和劑為丸如梧桐子大

每服十九至十五丸米飲或木香湯下有痰即

用檳榔末半分水半盞煎數沸放溫下藥欲微

疎利加至三十九至四十九看虛實稍空腹服

之

法製生薑散 治飲酒過多或生冷停滯嘔逆惡心

不欲飲食

生薑十兩切作片用青鹽炒過 桂皮去粗

青皮白 陳皮去 半夏生薑

白朮各一 丁香 木香

葶澄加各二 縮砂人 白豆蔻人

白茯苓各一 甘草炙 葛根各半

右件為細末每服一二分不拘時候溫酒調下

丁皮丸 行滯氣利胸膈進飲食

丁香皮 陳楠皮白 京三稜切

檳榔各一 青木香分 麝香別研

蓬莖皮

右件搗羅為末微炒再搗為細末水煮麴糊和

丸如菉豆大每服七丸至十九不計時候溫生

薑湯送下胸膈滿悶用橘皮湯嚼破十九下七

丸或加至六十九至八十九如胸中滿悶用橘

皮湯嚼破二十九下五十九不計時候

荆蓬煎丸 破痰癖消癥塊及冷熱積聚胃膈疾悶

通利三焦升降陰陽順一切氣消化宿穀

荆三稜二兩到酒浸冬 蓬莖皮

日二味用去皮巴豆二十片同於銀石器內

木香 枳殼去 青皮湯

川茴香炒 檳榔各一兩

右件藥七味修製畢搗羅為細末水煮麴糊和丸

如豌豆大每服三十九溫生薑湯下食後

商殼丸 治胸膈痞滯氣不宜暢破痰逐飲

商枳殼麩炒片 大皂角去皮子酥炙

青皮白 半夏洗 檳榔

木香各半兩

右件搗羅為細末生薑汁作薄麴糊和丸如豌豆

大每服四五十丸食後溫生薑湯送下

逐氣丸 治脾胃停飲攻注腹脇痞滯疼痛或停痰

飲留漬胸膈痞悶不快或欬或喘并水氣流注四

肢浮腫及大腹滿

沉香二錢

破故紙微炒

檳榔各半兩

郁李人五枚

黑牽牛四兩一分熟用

大皂角一十錠

水浸投投盡濾去滓慢火熬成膏將欲成更下生薑一匙

熱如稀餅相似是膏也

御藥院方

卷三

十八

精思堂

右將前五味為細末用皂角膏和丸如梧桐子大

每服十五丸至二十九丸生薑湯下食後如欲游

利臨時覷虛實加減服之若治腫滿及腹脹用

葱白湯送下

木香場氣丸 治胸膈氣痞痰實不化

木香

青皮

陳皮

白豆蔻人

縮砂人

荆三稜炮

蓬莪茂炮

萹澄茄

蘿蔔子

枳實各一兩

威靈仙去土三兩

右為細末水麴糊為丸如梧桐子大每服五十九

食後生薑湯送下

沉香散 治氣游不通利飲食不得息者

沉香

木通

白牽牛炒

青皮白法

枳殼各一兩

右為麴末每服五錢水一盞半入生薑五片同煎

至七分去滓稍熱服食後

七氣湯 治虛冷上氣及寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣

憂氣愁氣內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲

食時發時止此藥主之

半夏湯洗七次切作片子焙乾五兩

人參去蘆頭一兩

御藥院方

卷三

十九

精思堂

桂去蘆皮一兩

甘草炙一兩

右為麴末入半夏令勻每服三錢以水一大盞入

生薑三片煎至七分去滓稍熱服食前

木香三稜丸 治脾胃氣弱則所食之物不能腐熟

又與新穀相兼宿滯腹內噫氣生熱腹脹膈悶瀉

刺痛此藥寬利胸膈消化宿食

木香

桂去粗皮

青皮白法

陳皮去白各半兩

京三稜煨

茂煨各三分

大麥蘖炒

檳榔各一兩

右為細末水麴糊和丸如梧桐子大每服三十五丸

食後生薑湯下

鷄舌香丸 治傷冷腹脹痞悶疼痛嘔逆痰水

黑牽牛 妙取頭末四兩 京三稜 炮半兩

丁皮 檳榔 木香 各一兩

青皮 二兩 胡椒 半兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十

丸食後生薑湯下

小分氣丸 消滯氣利胸膈止心疼化酒食治毒腹

脇脹滿

荆三稜 醋浸一宿切作片焙乾用 牽牛 微炒

御藥院方 卷三 精思堂

大戟 各三兩細切炒 芫花 以醋炒

甘遂 各二兩麩碎炒黃色 官桂 去皮一兩

右同杵為末以醋煮麵糊為丸如菉豆大每服十

丸煎陳橘皮湯下不嚼破如大瘕腹脹膨滿氣

滯如惡行動漸加丸數日進三服以微利為度

感應丸 治久積滯氣胸膈痞悶噫氣吞酸嘔逆惡

心脇肋脹滿心腹痞痛水穀不消便利膿血痲痺

氣塊發作有時內傷脾胃停飲不散飲食無味並

皆治之

木香 去蘆頭 揀丁香 各半兩 肉豆蔻 二十

乾薑 炮製一兩 巴豆 七十個去皮膜心

百草霜 細研二兩 杏仁 揀肥者去雙仁一百四

皮研極細如膏

右七味除巴豆粉百草霜杏仁三味外四味搗為

末與前三味同拌研令細用好蠟匾和光將蠟

六兩溶化作汁以一重綿濾去滓更以好酒一

升於銀石器內煮蠟溶滾數沸傾出候冷其蠟

自浮於上取蠟稱用丸春夏修合用清油一兩

於銚內熬令沫散香熟次下酒煮蠟四兩同化

作汁就鍋內乘熱拌和如前項藥末秋冬合清

御藥院方 卷三 精思堂

油一兩半同煎煮熬作汁和匾藥末以劑分作

小錠子以油單子裹之每服旋丸如菉豆大五

七丸食後溫水下量臟腑虛實加減服之每兩

作五錠

蓬莖葦丹 治久患癖瘕積聚心腹痞悶飲食減少

四肢困倦欲成勞瘵

蓬莖葦 京三稜 木香

白芍藥 鱉甲 各半兩 白朮

人參 各一兩 當歸 二錢

右件同為細末用浸飯餅為丸如豌豆大每服三

一第... 冊 續修四庫全書第 4 卷五內

十九食後溫粥飲下常服調和榮衛美進飲食

消精聚長肌肉

降氣橫櫛丸 調順三焦升降陰陽美進飲食潤腸

去燥

檳榔二兩

杏人皮一兩湯浸去尖

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五十九食後溫

生薑湯送下

集香丸 消積磨塊去痰療癖治一切積滯不拘老

弱虛損者得皆服餌

附子二个各重五錢半以上者預得正生好者炮裂去皮臍刺作窠兒

御藥院方

卷三

廿三

精思堂

硃砂半兩水化開

木香七錢

草撥直者一兩

破故紙一兩

右將飛過硃砂末分在附子裏內却用剝出附子

末蓋口用和成白麵裹約半指厚慢火內燒勻

黃色去麵爲末却將元裏附子麵再爲細末醋

調糊爲丸如菜豆大每服十五丸至二十九食

後生薑湯下

木香三稜丸 治宿食不消心腹痞悶噫氣吞酸破

痰癖消積塊順氣進食

木香兩半

丁香一分

京三稜酒浸宿

蓬莪茂一兩

枳殼去穢

青皮剝去白

川棟子剝

茴香各一兩

巴豆二十個去皮同前六味炒黃色不用巴豆

朱砂半兩

右件八味同爲細末醋煮麵糊爲丸如菜豆大朱

砂爲衣每服十五丸至二十九生薑湯下食後

木香分氣丸 善治脾胃不和心腹脹滿兩脇膨脹

胸膈注悶痰嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不

化並皆治之大有效

木香

檳榔

青皮湯浸去白

陳皮湯浸去白

薑黃

玄胡

御藥院方

卷三

廿三

精思堂

荆三稜濕紙裹炮香

蓬莪茂炮製

乾生薑

當歸切

白朮

赤茯苓皮去

肉豆蔻等分

右件一十三味爲細末白麵糊爲丸如小豆大每

服三四十九食後生薑湯送下日進三服忌馬

齒生茄子秋冬加丁香爲妙

酒癥丸 善療男子婦人一切酒食所傷日久成積

心腹脹滿不思飲食四肢無力時發寒熱涎痰咳

嗽兩脇刺痛及肚裏疼每服兩丸食後細嚼燒生

薑溫酒送下傷食後溫水下心氣痛醋湯下若取

轉使物隱破兩九臨臥冷水送下量虛實加減丸
數常服食後一丸用茶酒任下有孕婦人不可服

寒食麵斤半 神麴兩三 雄黃二錢

巴豆五十個去油

右同為細末滴水為丸如梧桐大寄乾用殼糠同

藥丸一處炒令糠焦為度每服二三丸茶酒任

下不拘時候

檳榔枳殼丸 寬中利膈行滯氣消飲食治胸膈噎

塞腹脇脹滿心下痞痛大小便不利及一切氣滯

不勻

鮮藥院方

卷三

甘

精思堂

檳榔 木香各四錢 丁香皮

厚朴製 青皮 陳皮

當歸 玄胡 枳殼

荆三稜 蓬莪茂 雷丸半兩

蘿蔔子炒一兩 牽牛兩

右為細末醋麵糊和丸如梧桐子大每服五六十

丸食後生薑湯下

人參湯 治諸氣咽寒憂結不散

人參 赤茯苓去黑皮 白朮

桂枝去粗皮 京三稜炒 甘草炙

枳殼去穢 訶梨勒皮炒

陳橘皮湯浸去白皮焙 檳榔剉各

木香 草豆蔻去皮各

右一十二味麴搗篩每服五錢水一盞煎至七分

去滓溫服食後

通膈散 治胸中氣痞不通水飲停滯

檳榔二兩 枳實炒

右為細末每服二錢食後濃煎生薑湯調下

寬膈丸 療氣不升降胸膈痞結

木香 京三稜炒 青橘皮去白各

半夏洗七次 大腹子二錢 精思堂

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧桐子大每服七

十九食後生薑湯下

法製陳皮 消食化氣寬胸利膈每服不以多少細

嚼咽津無時 陳皮半斤去穢淨四兩 茴香二兩

青鹽兩 甘草二兩 乾生薑半兩

烏梅肉兩 白檀半兩

右件除陳皮外並為細末用水一大椀藥末三兩

同陳皮一處慢火煮後陳皮極軟控乾少時別

煎

用乾藥末拌勻焙乾

育氣湯 通流百脈調暢脾元補中脘益氣海思進

飲食大益臟虛寒新祛陰寒止腸鳴

白朮

丁香

人參

木香

白茯苓

藿香

縮砂人

肉豆蔻

葶澄茄

甘草炙各半兩

乾山藥兩一

陳皮白

青皮去白各一分

右為細末每服一二錢木瓜湯煎服空心鹽湯點

亦得

御藥院方

卷三

其

精思堂

溫中降氣丸

治脾胃不和不思飲食心腹滿悶腹

脇刺痛嘔吐痰水噎醋吞酸飲食遲化或逆氣上

衝或中滿虛痞胸膈不利常服消痞快氣進美飲

食

京三稜煨

蓬莪朮

青皮白去

陳皮去

乾薑炮

良薑剉

吳茱萸洗湯

木香已上各一兩

右為細末水煎麵糊和丸如梧桐子大每服六七

十九食後生薑湯送下

寬中丸 治氣不升降痰涎鬱塞飲食不化

檳榔炮熟

木香二兩

半夏二兩半

陳橘皮

青橘皮各半兩

京三稜七錢

牽牛四兩末二兩取

右件為細末水煎麵糊為丸如梧桐子大每服五

十九食後生薑湯下

調中丸 剖判清濁升降水土流濕潤燥消飲除痰

赤茯苓

白朮

桔梗剉

澤瀉

陳皮白去

乾葛各一兩

滑石

枳殼去穢炒

半夏湯洗七次焙

豬苓去

黃芩

木通各二分

御藥院方

卷三

其

精思堂

黑牽牛半兩

乾生薑三錢

右為細末白麵糊和丸如梧桐子大每服五十九

生薑湯送下食後服

均氣散 治三焦滯滯氣不宜通

木香

桔梗剉

廣茂

木通各半兩

枳殼去穢炒

青皮去白各一錢半

京三稜剉

甘草炙各一兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七

分去滓食前溫服

十全丸 治心腹痞悶脇肋脹滿食少多傷

檳榔 枳殼去穢 青皮

陳皮去穢 京三稜 茂炮

縮砂人各二兩 丁香一兩 木香一兩

香附子炒四兩

右爲細末麴糊和丸如梧桐子大每服五十九溫

粥飲送下空心食前服

無礙丸 治脾胃受濕橫流四肢手足皆腫

連皮大腹子一兩 京三稜二兩濕紙裹

蓬莪茂炮二兩 檳榔半兩 木香一兩

右爲細末炒麥蘖麴糊和丸如梧桐子大每服五

御藥院方 卷三 精思堂

十九溫生薑湯下食後

尅效聖餅子 治積痰停飲留滯不散胃中噎悶膈

肋刺痛噫醋吞酸不嗜飲食及宿有沉積攻衝膈

脘痞悶並宜服之

安息香研 南乳香研 丁香

木香 川薑炮 石三稜剉各

高良薑 荆三稜剉 蓬莪茂剉

粉霜研各一兩 乾漆炒一兩并碎 硃砂水飛

右件藥一十二味除研藥外搗羅爲細末和勻用

石腦油溫就和丸如菜豆大捻作餅子每服五

餅至七餅食後溫熱水送下

沉香人腹皮散 治脚氣腫滿沉重疼痛筋脈不利

此證皆由濕氣鬱滯經絡所致服之宜通經絡使

上下無礙血氣和平腿脚輕利爲效

連皮大腹子三兩 沉香剉 檳榔剉

桑白皮剉 烏藥剉 荆芥穗

陳皮洗去穢 茴香炒 白茯苓去

木通剉 紫蘇子炒 紫蘇葉

甘草炒各一兩 乾木瓜二兩半 枳殼剉

右件一十五味爲麴末每服五錢水一盞生薑五

御藥院方 卷三 精思堂

片蘿蔔五大片同煎至七分去滓溫服食前日

進二服十日之後一日進一服病愈即止如無

蘿蔔用蘿蔔子一分微炒搗碎同煎代之如覺

大便乾燥即服加減神功丸

木香檳榔丸 疎導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣

消食通潤大腸

木香 檳榔 枳殼炒

杏仁去皮尖 青皮去白各 半夏麴

皂角去皮 郁李人去皮各

右爲細末別用皂角四兩用漿水一椀搓揉熬膏

更入熟蜜少許和丸如梧桐子大每服五十九
食後溫生薑湯下

木香枳實丸 治濕飲停積胸膈痞悶消痰快氣宿
食遲化

木香

枳實炒

乾生薑兩一

白朮

澤瀉

縮砂人

檳榔

青皮法

赤茯苓皮去

半夏湯洗七次
各三兩

右為細末水煮麵糊為丸梧桐子大每服七八十

丸溫生薑湯下

御藥院方

卷三

廿九

精思堂

鐵髮申先生交感丹

俞居易侍郎傳世人中年精

耗神農常言百事心灰蓋緣心血少而火不能下

降於腎腎氣憊而水不能上升至心中焦隔絕榮

衛不和所苦者上則心多驚悸中則寒痞飲食減

少下則虛冷遺泄甚至於陰痿不興藏氣滑泄愚

醫徒知峻補下田非獨失真不能生水滋心而建

偽立見衰悴夭折之由當自此始悲夫所以處此

方廣濟迷惑然不可忽此藥品志心服之半年屏

去一切暖藥又不可恃此而馳嗜慾然後力習秘

固泝流之術其神效不可殫述質之天地切勿妄

傳居易之祖通奉遺訓云子年五十一歲過鐵甕

先生授此秘術酷志行持服食一年大補平日所

服暖藥一切屏盡而飲食嗜好不減壯歲此藥力

之功大矣今年八十五享天然之壽瞑目無憾獨

此藥傳之理當普示羣生同登道果藥後有湯與

牙藥同用之

茯神兩

香附子一斤去毛用新木
浸一夕妙令黃色

右為末煉蜜和丸如彈子大每服侵晨一九以後

降氣湯嚼下

降氣湯

御藥院方

卷三

三

精思堂

茯神兩

香附子半斤妙
浸如前 甘草一兩半
炙黃

右為細末每服一分沸湯點服下

牙藥

香附子五兩

右以生薑三兩研和滓汁浸香附子三錢炒焦黑

存性為末以青鹽二錢拌勻揩牙

順氣丸 治風濕毒氣攻疰腿膝或腫或疼降氣消

食

木香

青皮法

檳榔各一兩

黑牽牛三兩取頭末

郁李人湯浸去皮
別研半兩

麻子人皮別研

右六味除麻子人郁李人外為細末入麻子人郁

李人末同研勻細煉蜜和丸如梧桐子大每服

三十九加至五十九溫麻人湯下或用生薑湯

下亦得

和中丸 治脾胃怯弱陰陽不和三焦氣滯心腹痞

悶嘔逆痰甚頭目不清困倦少力飲食減少肌體

瘦瘁肢節煩疼常服和中順氣升降陰陽消痰止

嘔長肌退困美進飲食

藿香葉

人參

陳皮各一

御藥院方

卷三

三

精思錄

丁香兩半

木香兩

白朮兩二

白茯苓去皮

半夏生薑汁洗

巴豆二錢半與砂皮同炒焦不用巴豆

右件為細末水煎麵糊和丸如梧桐子大每服五

十九煎生薑湯下食前

大華澄茄丸 和脾胃美進飲食治腹胸虛滿消積

滯化痰飲

葶澄茄兩一

青皮白法

陳皮白法

廣茂煨

川丁皮

厚朴去粗皮

赤茯苓去皮

麥蘗炒

半夏湯洗

御藥院方

卷三

三

精思錄

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧桐子大每服六

七十九不拘時候溫生薑湯下

癸巳新刊御藥院方卷之第四

較勘無差

治一切氣門下

十膈氣散 專治十般膈氣治冷膈風膈氣膈痰膈

熱膈憂膈悲膈水膈食膈喜膈皆是病源也並因

憂驚冷熱不調又乖將攝更於喜怒無時貪嗜飲

食因而化滯積在胸中上喘痰嗽歲忽漸深心

胸噎塞漸致瘦羸久若不除必成惡疾

人參去蘆

白茯苓去蘆

官桂去粗

枳殼去穢

甘草炙

神麴炒令

御藥院方

卷四

精思堂

麥藥炒

訶黎勒皮煨生

吳白朮

陳橘皮白去

乾生薑炮

京三稜炒

蓬莪茂煨到已上

厚朴去粗皮用生

檳榔剉

木香已上各

右件一十六味搗羅為細末每服一錢入鹽一字

白湯點服亦得如脾胃不和腹脹心胸滿悶用

水一盞生薑七片棗兩枚鹽少許同煎至八分

和滓熱服空心食前

抑心氣湯 治心氣實熱火氣炎勝銷燦金精肺受

心邪因而生疾若人患肺先審心虛實若心氣勝

實其脈洪大或肺脈微得心脈即先服此抑心氣湯

黃芩去黑

赤茯苓去黑

黑參

麥門冬焙去心

甘草炙

牡丹皮

升麻

桔梗去蘆

犀角屑

貝母去心已上

沉香

木香各一

右件一十二味搗篩每服三錢匕用水一盞煎

至七分去滓食後溫服

綾錦養脾丸 大補脾胃極進飲食調順三焦保養

榮衛每服一丸沸湯磨化下空心食前

御藥院方

卷四

精思堂

木香

丁香

沉香

紅豆

大椒

官桂去粗

附子地製去皮臍已

肉豆蔻

白豆蔻皮去

草澄茄

川薑炮

草撥

甘草炙

人參去蘆

白茯苓皮去

白朮

陳皮白

神麴打碎

麥藥炒

縮砂人

訶子肉已上一十四

良薑炒

厚朴去粗皮

破故紙微炒已上三味

右件二十四味為細末煉蜜和丸每兩作六丸此

藥雖有三五味辛熱藥煉蜜合和成約四兩半藥并煉淨熟蜜約四兩半計九兩分作五十四丸每一丸重一錢六分有餘若服此藥一料大補脾胃極進飲食調順三焦保養榮衛

枳實理中丸 治胸痺心下痞留氣結胸胸滿膈下逆氣搶心

人參去蘆

乾薑炮

甘草炙

白朮

枳實炒

茯苓去皮各兩

附子炮去皮臍半兩

右為細末煉蜜為丸每一兩作四九每服一九水

御藥院方

卷四

三

精思堂

一大盞煎至六分和滓溫服不拘時候

玄明粉

朴消煎過打澄濾了似此五七遍晚於星月下露地至明自然結作青白成塊消也用定瓷罐兒按實於炭火內從慢至緊罐子內自然成汁煎沸直候不響再加項火一煨便取去火於淨地上倒合下用盆合蓋去火毒至晚取出碾為細末每二斤入甘草生熟二兩為末一處攪勻臨臥斟量用之或一錢二錢用桃花煎湯或葱白湯調下如調少用一口湯次用湯再送治膈上氣滯滯五藏秘澀

邪熱朴消木性寒燒過性溫無毒出在證類本草石部前臣常自服及與他人服之皆得效驗氣快通利忌諸般魚及藕等

厚朴橘皮丸 治傷冷溇下腹滿腹脹其狀如覆枵枵喘鳴奔急鼻張口吐厥氣上下不得分泄又不任瀉下藥此方應效方

厚朴去粗皮用生薑製三兩

枳殼去穢炒

乾薑炮

夏薑判各一兩二錢

青皮去

陳皮去

五靈脂

乾蠍去

桂去皮已上各八錢

肉豆蔻

草豆蔻

川烏頭炮裂去皮臍各

御藥院方

卷四

四

精思堂

大附子炮去皮臍

檳榔各三

縮砂人

益智人

川椒去目

胡椒

丁香

木香

吳茱萸湯洗七次焙乾已上各四錢

木通剉三

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服三十九至

四十九煎生薑橘皮湯下食前服

代赭石湯 治逆氣上衝奔逼息道滯塞不通

代赭石打碎

陳皮

桃人炒

桂

吳茱萸湯洗七次焙乾已上各四錢

右各剉碎每服秤二兩水三大盞生薑三分切同

煎至一盞其下去滓食前溫服一日一服

吳茱萸丸 治其氣自腹中起上築於咽喉逆氣連屬而不能出或至數十聲上下得喘息此由寒傷

胃脘腎氣先虛逆氣上乘放胃與氣相侷不止者

宜服吳茱萸丸

橘皮兩洗一

吳茱萸炒

附子炮裂去皮

右為細末白麵糊為丸如梧桐子大每服七十九

至八十九溫生薑湯下食前

沉香導氣丸 消食順氣止逆升降陰陽

沉香

木香

丁香

御藥院方

卷四

五

精思堂

白豆蔻人

白檀

縮砂人各一

藿香葉去土

香附子去毛各

麝香一錢

右為細末甘草膏子和丸如鷄頭大每服三五丸

細嚼白湯下加至十九更妙每日不計服數每

兩作四十九

厥氣散 治氣上及短氣少氣吃悶

人參去蘆

白茯苓去土

藿香去土

陳皮去白

木香

甘草炙

附子炮

枳殼麩炒各

右件為細末每服三錢水一大盞紫蘇木瓜生薑

各少許入銀石器內煎至七分再入重湯內煎

五七沸去滓不拘時候時服之

交泰丸 溫中降氣進美飲食

沉香兩

木香兩

青皮白

陳皮白

京三稜煨

蓬莪茂煨

枳殼麩炒去穢

神麴炒

大麥蘖炒

檳榔已上各

麝香二錢

阿魏半兩細研

和作餅子炙令

香熟用水和

右件為細末水煮熟麵糊為丸梧桐子大每服四五

十九食後生薑湯送下

御藥院方

卷四

六

精思堂

葶澄茄丸 寬中順氣消積滯化痰飲及水谷不化

療心腹滿悶大便閉澀

京三稜剉碎

陳皮去白

蓬莪茂剉碎

枳實生

檳榔兩

黑牽牛剉碎

右為細末水麵糊和丸如梧桐子大每服五六十

丸煎淡生薑湯送下食後虛實加減

藁箘丸 治胸膈不利痞悶結胸產後吐逆陰陽不

謝男子氣痛及諸嘔吐昇降陰陽服之立愈

硫黃兩

水銀一兩二味同

木香

當歸

肉桂去皮

藿香葉半兩

大黃濕紙裏連灰火內
煨熟去紙一兩

右件爲細末煉蜜爲丸如彈子大每兩作十九每服一丸生薑米飲化下兼治傷轉令元氣虛損及中暑毒者宜服

橙皮丸 傷寒方同調順中氣生津止渴

沉香 白木各半兩 木瓜去

烏梅肉各一兩 白茯苓去 糖霜各二兩

橙皮去白 乾生薑二錢

右件爲細末用甘草膏子和成劑每兩作二十五丸欲作湯水用水化開寒熱溫涼任意飲之如

御藥院方

卷四

七

精思

欲合化亦可

紫沉通氣湯 治三焦氣滯不能宣通水液腹脇痞悶大便或難

紫蘇葉

枳殼炒 陳皮去

檳榔 赤茯苓 甘草各一兩

沉香 木香 麥門冬去

五味子 桑白皮 黃耆

乾生薑 薄荷葉 荆芥穗

枳實各半兩

右爲麤末每服稱半兩用水一盞半煎至八分去

滓溫服食稍空服

威靈仙丸 治三焦氣滯大便秘難臥風順氣化痰消穀

威靈仙洗淨焙 大黃二兩 檳榔

木香 陳皮 枳殼去白

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九溫水送下食後稍空服以意斟量加減丸數氣順

爲度藥中雖有威靈仙非單服不忌茶

降氣湯 治氣不宣暢心胸痞悶腹脹滿胸痹心腹痛不可坐臥喘癢悶亂不思飲食

御藥院方

卷四

八

精思

石菖蒲 青皮去 陳皮去

大黃 木通剉 赤茯苓去

川芎 人參已上各 川薑炮

甘草各半兩

右件爲麤末每服五錢水二盞入生薑五片同煎至七分去滓溫服不拘時候

沉香丸 治胸中氣痞煩悶飲食不下或心下苦滿

噫氣吞酸時聞食臭大小便秘澁此由思慮寒熱動其氣結於胸膈間

丁香 木香 茴香

沉香一分

青皮一分

肉豆蔻二兩

麝香一分

吳茱萸一分

檳榔二兩

浸令軟同炒令香
熟去牽牛不用

右件爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九

至四十九食後生薑湯下

通氣湯 主胸滿氣噎

半夏八錢

生薑六錢

大棗三枚

右咬咀每服五錢水一大盞生薑一十片大棗二

枚煎至五分去滓溫服不拘時候

御藥院方

卷四

九

精思堂

奔氣湯

係局方第六內抄錄到
內有王太判更改治法

治大氣上奔胸膈間諸病發時迫滿短氣不得臥

劇者腹中濕冷濕氣腸鳴相逐成結氣

半夏洗

吳茱萸炒

桂各五錢

人參

甘草炙各三錢

右咬咀每服抄六錢水二盞入生薑十片煎至六

分去滓溫服不拘時候

減甘草白豆蔻散 治脾胃虛寒氣痞胸膈不思飲

食

白豆蔻人

厚朴生薑製

白朮

沉香

陳皮各等

右件各咬咀每服稱一兩水二大盞入生薑十片

同煎至七分去滓稍熱服不拘時候

當歸湯 療冷氣脇下往來胸膈引痛脇背悶

當歸

芍藥

桂

吳茱萸湯洗

人參

大黃

甘草炙各二兩

茯苓去皮

枳實炒各一兩

乾薑炮三兩

右件爲麤末每服五錢水一盞半煎至一半去滓

溫服其痛立止

御藥院方

卷四

十

精思堂

順氣枳殼丸

宣通一切疑滯消化宿食清利頭目

消磨積蘊疰癖等疾形身瘦弱不禁宜瀉並宜服

之

枳殼炒去白三兩

益智人

玄胡

雷丸

白豆蔻人

木香

當歸去蘆頭

白朮

半夏湯洗七次切焙乾已上各二兩

縮砂人兩

青皮用湯浸去

京三稜四兩

蓬莪茂四兩

右件爲細末用生薑半斤自然汁同水打麵糊爲

丸如梧桐子大每服三十九至四十九諸飲皆

下不拘時候如覺內傷每服可用七八十九至一百丸有益無損男子婦人老幼皆得服之有孕婦人不可服久服令人肥壯美進飲食并治腿脚沉重不任攻擊者服一月之後覺身輕為驗

沉香和中丸 治痰飲氣痞嘔吐涎沫粥藥難停

沉香 丁香 木香

肉豆蔻 煨熟 半夏 湯洗七次 人參

吳茱萸 湯洗 白茯苓 去皮已上

水銀 硫黃 各半兩 二味 研結沙

御藥院方 卷四 十一 精思堂

右件為細末生薑汁煮麵糊為丸小豆大每服三四十九生薑湯下食空時服

調中沉香湯 調中順氣除邪養正治心腹暴痛胸

隔痞滿短氣煩悶痰逆惡心食飲少味皮體多倦常服飲食增進臟腑和平肌膚充悅顏色光潤

沉香 二兩 白豆蔻 人 木香 各一

甘草 炙黃 一分 生龍腦 錢一 麝香 別例 半錢

右為細末入研藥勺每服一錢人生薑鹽各少許沸湯點服酒食後服之大妙

備急丸 療心腹卒暴百病中惡客忤心腹脹滿卒

痛如錐刀刺氣急口禁

巴豆 二兩 去油 大黃 二兩 乾薑 二兩

右件為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三丸不拘時候溫水送下

寬中理氣丸 順理諸氣寬利胸膈調和脾胃消化

痞滯除心腹脹滿腹脇刺痛嘔噎痰水噫聞食食全不思食常服順氣寬膈消留飲停痰導引諸氣

升降陰陽美進飲食

木香 兩 青皮 兩 炒 陳皮 兩 炒

檳榔 兩 煨熟 白豆蔻 人 蘿藦子

御藥院方 卷四 十一 精思堂

薑乾 炮 葫蘆 巴

杜丁皮 兩 各半 黑牽牛 兩 炒

厚朴 兩 各半 煨熟 生薑 兩 炒

右件為細末白麵糊為丸如菜豆大每服二十九生薑湯送下食後

快活丸 治上膈停痰中脘氣痞不下飲食不入或

時嘔吐食不消化心腹脹滿大便不通

良薑 乾薑 各四兩 吳茱萸 炒

木香 兩 枳實 白 陳皮 各二兩

右為細末酒煮神麴麵糊為丸如梧桐子大每服

十五丸至二十九生薑陳皮湯下不拘時候

小麝香丸 治鬼疰飛尸百病風寒客搏經絡走疰

疼痛久不愈者並一切惡氣邪毒並皆治之

麝香三分 雄黃研 當歸炒

丹砂四分 乾薑炮 桂

芍藥各五分 莽草炙 犀角屑

梔子人各三分 芭豆五十枚去皮炙

附子炮去皮 烏頭炮裂去皮 各五

蜈蚣條炙去頭足

右件一十四味加細辛五分蜜和合搗千杵服如

御藥院方 卷四 精思堂

小豆大每服三九日三服可至五九溫水下一

切尸瘞疝悉皆主之

木香餅子 欬氣消食利胸膈化涎痰止宿酒痰逆

嘔噦惡心

木香 薑黃洗 香白芷

香附子炒上 甘松土 芎藭

縮砂人 桂去 甘草炙

右件為細末水和捏作餅子每服十數餅子細嚼

溫生薑湯下不拘時候

木沉煎丸 治一切陰冷氣攻瘧四肢百脈刺痛及

留飲痰癖積聚心腹堅脹疝痛

木香二兩 沉香 陳皮湯洗去

當歸洗焙 檳榔各一 肉桂去粗

胡椒各半 芫花二兩半搗末以醋

右件為細末以芫花膏和丸如梧桐子大每服七

丸至十九食後臨臥溫酒送下

木香三稜湯 和脾胃進飲食消化生冷物治心腹

刺痛霍亂吐瀉胸膈膨脹

木香兩 京三稜二兩 陳皮湯洗去

甘草炙 益智人四 神麴炒

御藥院方 卷四 精思堂

蓬莪茂六兩

右搗為細散每服一錢入鹽沸湯點服空心食前

大七香丸 治脾胃不和三焦痞滯氣不宜通腹脇

脹滿胸膈噎塞食飲遲化氣刺氣疰中酒吐酒常

服消穀進食

丁香三兩 縮砂人 甘草炙

陳皮白 肉桂去粗 藿香各二

香附子炒二分 甘松去土四分

烏藥六錢 大麥蘖炒一

右為細末煉蜜和丸每兩作八九每服一丸不拘

時候細嚼溫酒或鹽湯生薑湯下或作小丸如

楮桐子大每服四五十九亦得服

檳榔丸

太和五年五月十七日御直馬玄童傳奉聖旨降到寶印九方一道便交合者

治氣不宜通飲食遲化胸膈痞悶噫氣吞酸頭目

重悶脇肋刺痛嘔逆惡心並可服之

丁香

木香各半

檳榔

舶上丁香皮

青皮白去

陳皮白去

縮砂人

桂去粗皮

肉豆蔻錢一

烏梅全用

巴豆搗一不去皮別 確砂別切

右為細末醋麵糊放冷和丸如大菜豆大不得見

御藥院方

卷四

十五

精思

日並火只風中閉乾每服三五丸食後生薑湯

放冷下更量臟腑虛實加減

沉丸 治宿食不化痰飲留滯心腹脹滿脇肋往

刺胸膈痞滿噎塞不通嘔噦吞酸噫氣生熱並宜

服之

丁香兩一

青皮白去

陳皮白去

荆三稜剉

蓬莪茂剉

縮砂人

桂去粗皮已

確砂飛研

木香錢三

烏梅和核令碎

巴豆三十個去皮

右為細末將巴豆確砂和令極勻麵糊和丸如菜

豆大每服十五丸至二十九食後溫生薑湯下

百益丸 治酒不散胸膈滯悶嘔吐酸水心腹疼痛

並服之

沉香半兩

丁香六錢

縮砂人半兩

白豆蔻人兩二

紅豆

乾葛

陳皮白去

甘草各半兩

乾生薑兩一

右為細末煉蜜和成劑每兩作二十九每服一九

細嚼生薑湯下不拘時候

辟香平氣丸 治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇

肋脹滿痰逆惡心吞酸噫食腹脇疼痛肢體倦怠

御藥院方

卷四

十六

精思

又治陰陽不和寒冷之氣留滯於內氣積於中食

即噎悶胸膈不快心腹引痛停飲不散並皆治之

常服和脾胃進飲食辟除邪氣

麝香別

木香

沉香

丁香

肉豆蔻

丹砂別研各

檳榔剉

桂皮去

厚朴去粗皮塗生薑

乳香生薑汁內煮軟俱

半夏湯洗七次切焙

和作餅子燒化

右件除別搗研外並為細末次入丹砂麝香再研

勻將乳香半夏末入生薑汁煮作薄糊和前藥

硬軟得所九如梧桐子大每服三十九至四十五

十九食後溫米飲下

霍香和中丸 治痰食不消胸膈痞悶頭目昏痛嘔

吐酸水或心腹滿痛急墮嗜臥痰癖氣塊

藿香葉兩一 丁香兩半 人參兩半

白朮兩二 白茯苓去 半夏生薑製 各兩二

陳皮去一兩不 巴豆去皮 秤二錢半 與陳皮 同

不用只用陳皮

右件為細末麵糊為丸如菜豆大每服三四十九

食後生薑湯下

御藥院方

卷四

十七

精思堂

蓬莪茂丸 治九種心痛胸膈滯氣及腹脇疔刺疼

痛不可忍者並宜服之

五靈脂 木香 當歸去 薑

良薑炒 蓬莪茂炮已上 各等分

右為細末用蜜麵糊為丸如梧桐子大每服三五

十九熱酒下不拘時候

妙應丸 治九種心痛積年痼聚久癥癖塊或大或

小因傷寒疼痛發無時或心下堅結上衝胸痞或

氣攻兩脇嘔逆苦水或喉痺煩悶吐虫

京三稜炮 如豆 青皮去 白剉 石三稜剉 如豆

雞爪三稜剉 如豆 厚朴生薑製 剉如豆已上 取

各一兩 檳榔 肉豆蔻

白豆蔻各一 木香六錢 巴豆霜 兩

硝砂一兩 飛 乾漆六錢 炒

右除巴豆霜硝砂外同為細末後入硝砂巴豆霜

同研極細用元浸藥醋打糊為丸如梧桐子大

每服二丸或三丸食後溫醋湯下

沉香溫胃丸 治脾胃虛弱三焦痞塞中脘氣滯胸

膈滿悶宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹

嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄利水穀不化肢體倦

御藥院方

卷四

十六

精思堂

怠不思飲食常服可益脾胃大進飲食溫中消痞

寬膈順氣

沉香剉 陳皮去 白去 青皮去 白去

人參去 薑 大麥蘖炒 乾薑炮

神麴炒 白茯苓去 桂去 薑

甘草炙已上 棟丁香 木香

白豆蔻人 高良薑剉 丁香皮剉

草撥 縮砂人 紅豆已上 各

白朮剉 炒 大椒二錢

右二十味各修製畢為細末煉蜜和丸每兩作一

十九每服一丸細嚼生薑湯下食前

木香消穀丸 治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞

悶腹脇時脹連年累月食減嗜臥口苦無味虛羸

少氣又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔

吐及病後新虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常

並宜服之

青皮洗淨焙乾 陳皮洗淨焙乾 桂去粗皮

乾薑炮二兩 牽牛用四兩熟用

木香兩半

右為細末水煮麵糊為丸如小豆大每服十五丸

加至二十九米飲下日進二服不拘時候

阿魏丸 治男子婦人一切氣攻刺疼痛呼吸不得

滑洩

阿魏半兩 當歸細切 桂去粗皮

陳皮湯浸去 吳白芷 附子炮去

吳茱萸醋炒 川芎剉配 肉豆蔻

朱砂別研細末已 白及

木香 延胡索剉碎醋炒已

乾薑炮 蓬莪茂各一兩

右件除阿魏朱砂外同杵為細末以頭醋半升浸

阿魏經宿用生絹袋取汁煮糊為丸如梧子

大以朱砂為衣每服五丸溫酒下橘皮湯亦得

婦人醋湯下不拘時候

厚朴丸 寬中利膈行導滯氣消化飲食治胸膈噎

塞腹脇脹滿心下堅痞腸中水聲噎噦痰逆不思

飲食

厚朴薑 百草霜各二兩 乾薑炮

京三稜炮 蓬莪茂炮 半夏

檳榔已上各 甘松兩 陳皮白去

青皮去白各 黑牽牛炒入 黑附子不炮去

右件一十二味為細末麵糊為丸如豌豆大每服

二十九生薑湯下食後

豆蔻湯 治胸膈痞滿噎噦惡心腹脇刺痛短氣噎

悶噎氣吞酸不思飲食一切氣痰並皆治之常服

溫中和氣進美飲食

草豆蔻人七錢 杜茴香炒 大鹽炒

乾生薑 甘草炒已上

右件為細末每服一錢沸湯點服不計時候

人參藿香散 治霍亂定嘔逆止心腹刺痛進飲食

化痰益氣

藿香葉 厚朴各二兩 人參

白茯苓去皮 乾薑炮 青皮白

枇杷葉去毛 半夏生薑製已 甘草錢半

丁香半兩 草豆蔻去皮

右件爲末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七

分去滓熱服不拘時候

養氣湯 治冷氣上攻心腹脇肋脹滿刺痛口苦無

味噫氣吞酸痰逆嘔吐胸膈痞悶不思飲食或發

霍亂又治五膈五噎一切氣疾並皆治之

乾薑炮 甘草炙各二兩 白檀香剉

御藥院方 卷四 十一 精思堂

丁香各一兩 丁皮一兩 胡椒二錢

鹽二兩 人參二錢 白芷一錢

右件一處碾微碎用慢火燼令香熟乘熱入磁器

中密覆候冷碾羅爲細末入器中密盛勿令泄

氣每服一錢沸湯點服不拘時候常服溫暖脾

胃進美飲食

場氣散 順氣寬中升降利膈治中脘痞滯心腹堅

脹脇下緊硬喘滿短氣噫息不通嘔吐痰水大便

不調

茴香炒 枳殼麩炒 茯苓

人參 乾薑各一兩 陳皮白

青皮去白各二兩 甘草炙 蒼朮

良薑各半兩 丁香一錢

右件爲末每服三錢水一盞入生薑五片煎至

七分去滓稍熱服不拘時候

萬病無憂散 消積快氣散飲逐濕

黃耆 白朮 木通

桑白皮剉 木香 陳皮白

胡椒已上各一兩 牽牛半斤用手微炒

右抄黃耆等七味十錢匕別抄牽牛頭末十錢匕

御藥院方 卷四 十一 精思堂

同和勻每服五六錢用生薑湯大半盞調藥服

訖更用生薑湯半盞送下空心五更時服如覺

疎利下青綠水濕或稠黏之物是其驗也如不

欲作散服只滴水和丸如梧桐子大亦名無憂

丸每服五十九丸溫生薑湯送下不拘時候

丁香生胃散 治中焦不和氣滯不下嘔逆惡心飲

食進退肢體困倦當服美進飲食止嘔逆消痰

丁香 藿香葉 肉桂去粗皮

薑黃 甘草炙

右件爲細末每服三錢水一盞入生薑二片煎至

七分去滓溫服食前

雀香厚朴湯 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

厚朴去蘖皮用生薑二兩切片棗十枚

半夏漿水浸宿切湯洗七次入

藿香葉 甘草生剉 人參

白茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸去白

右七味燒搗篩每服三錢水一盞入生薑三片大

棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候

平胃丸 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食進食消痰

半夏麴焙 沉香各一兩 肉豆蔻皮去

御藥院方

卷四

三

精思堂

檳榔剉各二個 青橘皮湯浸去白 木香

丁香各半兩 麝香別研

右件為細末棗肉與糯米粥和九如梧桐子大丹

砂為衣陰乾每服三五丸生薑湯嚼下

木香煮散 治脾元氣不和不思飲食心胸痞悶口

淡無味調順中焦兼解傷寒

木香 人參 白朮各二分

陳皮去白 乾薑半兩 白茯苓去皮

官桂去皮 檳榔好者 草豆蔻二

半夏一分 甘草半兩 訶子皮五個

枳實剉半兩 厚朴一分

右件一十四味剉為木每服以水一盞藥末一錢

匕煎至七分不拘時候去滓熱服

內應散 治胃氣虛弱臟腑不止乾嘔不思飲食

青皮白 陳皮白 甘草各一

乾薑二錢

右為細末每服三錢水一盞乾棗五個去核同煎

至七分去滓稍熱空心服

沉香華澄茄丸 治下經不足內扶積冷臍腹弦急

痛引腰背面色痿黃手足厥冷脇肋虛滿精神困

御藥院方

卷四

四

精思堂

倦臟腑自利小便滑數如育腸小腸一切氣疾服

之有效

沉香 華澄茄 木香

葫蘆芭炒 破故紙炒 官桂去粗

巴戟去心 舶上茴香炒 川棟子去核

肉已上 附子炮裂去

桃人去皮尖 川烏頭半兩

右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服三四

十九溫酒下鹽湯亦得空心食前服

引氣丸 治痰氣不下心虛生熱神氣怯浮恍惚多

驚者

磁石水飛二兩

人參去蘆

半夏生薑製

生地黄

麥門冬心法

青皮去白配一兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大朱砂為衣每服

五十九溫米飲送下空心食前

沉香升氣散 治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞

塞

沉香

檳榔各二兩

人參兩半

白木兩一

烏藥兩一

訶子兩半

麥蘖炒

神曲炒

香附子炒

御藥院方

卷四

廿五

精思堂

紫蘇葉各一兩

紅皮去

薑黃各四兩

京三稜

蓬莪茂煨

益智各二兩

大腹皮半兩

甘草四兩

厚朴一兩 去薑製

右件一十八味為細末每服二錢食前沸湯點服

加減思食丸 治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞

悶腹脇時脹連年累月致減嗜臥口苦無味虛脫

少氣又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔

吐及病後新虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常

並宜服之

神麩二兩

大麥蘖二兩

烏梅四兩

乾木瓜半兩

白茯苓去

揀甘草細剉各

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸細嚼白

湯下不拘時候如渴時嚼化一丸生津液進飲

食

煨薑丸 治脾胃虛冷飲食不消嘔噦氣逆心胸疰

悶腹脹心痛積滯寒飲膈氣酒癖惡心虛煩不入

粥食

木香

附子炮去

硃砂好明

桂去粗皮

沉香

丁香

陳皮去

舶上茴香

葶澄茄

御藥院方

卷四

廿六

精思堂

青皮去白已上

如更加 檳榔

雞舌香並各等分用

右為細末好酒煮稀麵糊為丸如小彈子大每一

兩作十六丸每服一丸生薑一塊切作兩處各

剉取成坑子安藥在內以濕紙裹於慢火內煨

令紙焦為度取出和薑細嚼溫酒或鹽湯下空

心食前

霍香安胃散 治嘔吐不止

藿香葉兩一

半夏二兩 湯洗 陳皮二兩 去白

厚朴二兩 去粗皮 蒼朮三兩 米泔浸

甘草二兩

右為纒末每服五錢水一盞入生薑五片棗二枚同煎要七分去滓溫服食前日進三服

豆蔻木香丸 宣通一切滯氣消化宿食痰飲清利

頭目消磨積蘊痰癖等疾形體瘦弱不禁宜瀉並宜服之

商枳殼一兩半 益智 玄胡

雷丸 荆三稜炮赤 蓬莪茂炮熱

白豆蔻人兩半 縮砂人半 青皮去白

常歸去蘆頭 木香 胡椒各半

御藥院方

卷四

七

精思堂

白朮 陳皮去白 牽牛取頭末

兩四 半夏一兩湯洗

右件藥為細末生薑汁麵糊為丸如梧桐子大每

服三四十丸食後生薑湯下諸痰飲皆下如覺

內傷可用七八十丸有益無損令人肥壯老幼

都得服之一月已後但覺身輕為驗

枇杷葉散 治脾胃氣虛嘔逆吐食

枇杷葉去毛 陳皮去白

右為纒末每服五錢水一盞半生薑半分擘碎同

煎至一盞去滓溫服不拘時候日進三服

大腹湯 治諸膈氣冷熱不調喜怒無度胸中咽塞

不思飲食或憂思過甚不足之氣蘊積心臆日漸消瘦

大腹皮切 檳榔剉 木通剉

青橘皮湯浸去 防已 紫蘇莖葉

甘草剉 桑根白皮 枳殼去白

草豆蔻皮去 丁香皮剉 大黃剉

木香剉

右件藥搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片大棗

一枚擘破同煎至七分去滓溫服日三夜一

御藥院方

卷四

七

精思堂

檳榔湯 治諸膈氣心胸煩結噎塞不通飲食日減

檳榔剉 訶梨勒皮炒 葶澄茄

赤茯苓皮去黑 人參 青皮用湯浸

甘草剉 沉香剉 麥藥炒

厚朴去粗皮生 京三稜剉 白朮已上各

右件藥搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片大棗

二枚擘破同煎至七分去滓溫服日三夜一

豆蔻散 治五種膈氣

肉豆蔻去皮 木香 人參

厚朴去粗皮 赤茯苓皮去黑 桂去粗皮

甘草炙兩 檳榔二枚 青橘皮湯浸一兩

訶梨勒皮炮去核

右件搗為散每服二錢匕如茶點服若入生薑棗

同煎亦佳並治氣補勞通血脈益脾胃

通膈散 治五種膈氣

枳殼去白炒 桂皮去粗 甘草炙

陳麴炒 訶梨勒皮 白朮

赤茯苓去黑皮 陳皮用湯浸 人參

乾薑炮 京三稜炒 草豆蔻去皮

檳榔半生 五味子炒 厚朴去粗

御藥院方 卷四 精思錄

半夏湯洗了同上 郁李人湯浸去皮

右件一十八味搗羅為散每服二錢匕入鹽少許

如茶點服不拘時候

流氣飲子 治男子婦人五臟不調三焦氣壅心胸

痞滿噎塞不通腹脇膨脹嘔吐不食又治上氣喘

急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫痛大便秘澀小便

不通及治憂思太過致陰陽之氣鬱結不散壅滯

成痰又治傷寒纒覺得疾便服此藥昇降陰陽汗

出立愈又治脚氣腫滿疼痛喘急腹脹大便不通

及氣攻肩背脇肋走注疼痛並皆治之

紫蘇葉 青皮 當歸洗

芍藥 烏藥 茯苓

桔梗 半夏洗 川芎

黃耆 枳實炒 防風已上各

甘草炙 陳皮三分 木香分

連皮大腹子剉薑汁浸一宿焙一

右咬咀如麻豆每服秤半兩水一大盞生薑三片

棗一枚擘破同煎至七分去滓熱服不拘時候

如心脾入菖蒲五片同煎婦人血氣病人艾同

煎傷寒頭痛發熱咳嗽入連鬚蔥白三寸同煎

五膈氣病入陳皮少許同煎心中怔忡入麥門

冬數粒同煎臟腑利入粳米一撮同煎並不拘

時候或處搗篩亦可

木香檳榔丸 治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹人

小便結滯不快利者並宜服之

木香 檳榔 青皮白

陳皮去 廣茂燒 黃連

商枳殼去 黃蘗皮去粗

香附子炒 大黃各三兩 黑牽牛生半

右為細末滴水和丸如豌豆大每服三十九或五

十九加至微利為度食後生薑湯送下

沉香降氣散 治三焦痞滯氣不宜暢心腹疼痛嘔

吐痰沫脇肋膨脹噫氣不通噎逆醋臭胃中虛冷

腸鳴絞痛宿食不消除反胃吐食不止及五臟五

噎心胸滿悶全不思食宜服之

沉香 木香 丁香

藿香葉 人參上蘆 甘草地

白朮已上各 白檀二 肉豆蔻

縮砂人 桂花 檳榔

陳橘皮白法 青皮白法 白豆蔻

白茯苓去皮各 川真地 枳實炒各

右為細末每服二錢入鹽少許水一大盞同煎至

七分和滓溫服不拘時候日進三服

伏苓丸 治中焦氣滯胸膈痞悶飲食遲化四肢困

倦嘔逆惡心常服昇降陰陽消化滯氣祛痰逐飲

美進飲食

京三稜六兩 蓬莪茂六兩 青皮白法

陳皮白法 白朮各三 檳榔二兩

小香一兩 枳殼炒去 白茯苓去皮

半夏湯洗七次去 牽牛頭末

右為細末生薑汁麵糊為丸不以多少食後生薑湯下

大枳殼丸 治一切酒食所傷胸膈痞悶脇肋脹滿

心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噎醋吞酸飲食遲

化並宜服之

枳殼炒 茯苓皮去 白朮

厚朴去粗皮 半夏湯洗 人參上蘆

木香 青橘皮

陳橘皮二味各湯洗 京三稜

蓬莪茂二味煨 檳榔 神麴炒

麥蘖炒已上 乾生薑半 牽牛揀淨

大黃各二兩

右為細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服一

百丸飲食後生薑湯下

百鍾丸 調順三焦理諸痞氣去脹滿積聚酒癖癥

瘕又治積聚腹滿

青皮白法 陳皮白法 神麴炒

荆三稜 蓬莪茂地 麥蘖炒

蘿蔔子炒已上 枳實炒 雷丸

益智人兩各一 牽牛兩炒三

右為細木水麵糊為丸如梧桐子大每服五十九

食後煎生薑陳皮湯送下

五膈丸 治留飲停積不消胸膈痞氣去塵垢

大黃 牽牛 木香各一兩

陳皮二兩去白皮焙乾

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十丸

冷水下

沉香聖餅子 治一切冷氣上攻心腹脇肋脹滿刺

痛胸膈噎悶痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中

御藥院方

卷四

三

精思堂

虛冷嘔吐不止及治五膈五噎宿食宿飲不散並

宜服之

沉香 檀香各一錢 丁香二錢

木香三錢 桂花 縮砂人

檳榔各半兩 吳白花半兩 甘松七錢半水洗淨

京三稜炮 蓬莪茂炮各一兩 搽甘草四兩用糖

右為細末用酥油餅和丸如梧桐子大捻作餅子

每服五七餅至十餅細嚼白湯送下不拘時候

磁州張七郎家橙香餅子 溫脾益胃降氣寬中生

津液止煩渴消逐痰飲大治中酒不散細嚼一二

餅子因酒送下或杯中沉可增酒味以津化自逼

人香 詩云 洞庭香不變

江佐味猶新 津化杯沉處 風流更可人

木香 橘皮紅 白檀

甘松各半兩 白豆蔻人 橙皮各一兩

華澄茄 沉香各三錢 薑黃兩四

龍腦錢一

右件為細末用甘草膏子和作餅子每服二三餅

子細嚼白湯送下

化鐵丹 治遠年近日沉積及內傷冷物心腹疼痛

御藥院方

卷四

三

精思堂

烏梅八個不去核 巴豆一十六個不去皮油 胡椒八個

青皮白不去 陳皮各半兩

右為細末醋麵糊和丸如菉豆大每服五七丸食

後溫生薑水下 又增加華澄茄兩半 丁香

二錢 服之更快

賺氣散 治心胸痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宣

通

荆三稜兩五 白朮三兩 木香兩半

蓬莪茂五兩煨熟 枳殼兩去白炒

右同為細末每服二錢生薑三片水一盞煎至六

分食前溫服

導氣枳實丸 理順三焦和調脾胃去脹滿及痞噎不通

枳實銹炒四兩 荆三稜 蓬莪茂煨

青皮白法 陳皮白法 神麴炒

麥藥炒已兩 沉香 檳榔各半兩

右件同為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九至六十九食後生薑湯下

茴香枳殼丸 治中滿下虛腹脹滿氣不宣通

枳殼去白銹炒 茴香微炒香各等分

御藥院方 卷四 清思堂

右為細末酒麵糊為丸如梧桐子大每服七八十

丸空心食前溫酒送下或米飲湯送下亦得

白朮妙功丸 治腎氣久虛上攻下注臍腹久冷腰

背麻痛及膀胱疝氣痲氣閉小腸作聲時時下墜

白朮 芩 澤瀉

當歸去蘆頭 厚朴去粗皮生薑製 破故紙炒各半兩

延胡索錢二 川苦棟 檳榔各三錢

木香錢二 半夏一兩生薑汁製

右件同為細末水煮麵糊為丸如豆大每服七十

丸食前溫水下

沉蘇飲子 治胸膈塞滯氣不宣通津液闕少

沉香半錢 紫蘇葉兩半 乾木瓜二兩

人參兩半 赤茯苓兩一 生粟黃兩二

甘草二錢黃色 白檀香二錢 肉桂一兩去皮

右為細末每服一錢水一大盞煎至三沸和滓涼服

御藥院方卷第四

御藥院方 卷四 清思堂

癸巳新刊御藥院方卷之第五

較勘無差

治痰飲門

導飲丸 治風痰氣滯膈腕痞滿停飲不消頭目昏

眩手足麻痺聲重鼻塞神困多睡志意不清常服

去痰涎進飲食

京三稜炮 蓬莪茂炒各三錢 青皮白

陳皮白去 白朮各一兩半 檳榔

枳殼去麩炒 木香各一兩

白茯苓去皮半兩 半夏三錢改

御藥院方 卷五 精思堂

右為細末水麪糊為丸如梧桐子大每服五十九
食後生薑湯下漸加至一百九忌豬肉蕎麥等

物

半夏利膈丸 治風痰鬱甚頭疼目眩咽膈不利涕

唾稠黏胸中煩滿酒癖停飲嘔逆惡心膈下急痛

腹中水聲神思昏憤心忪面熱止嗽化痢

白朮 人參 白茯苓皮去

白礬生 滑石 貝母各一兩

天南星生用一兩 白附子生二兩 半夏湯洗

右為細末水麪糊為丸如梧桐子大每服二十九

食後生薑湯送下

紫蘇半夏湯 治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇葉 半夏湯洗七次 紫苑茸

五味子 陳皮各半兩 杏仁去皮尖麩炒

桑白皮炙一兩半

右為麪末每服三錢水一盞半入生薑七片煎至

一盞去滓取六分清汁熱服日進三服食後臨

臥

大半夏湯 治痰飲及脾胃不和

半夏 白茯苓皮去 陳皮各二錢半

御藥院方 卷五 精思堂

右咬咀都用水二盞半入生薑二錢半細切同煎
至一盞濾去滓臨睡溫呷

小半夏湯 治諸嘔噦心下堅痞膈間有痰水眩悸

半夏五兩湯洗七次 白茯苓去皮用三兩

右咬咀每服稱半兩水三盞煎至一盞稱生薑四

錢取自然汁投藥中更煎一兩沸熱喫不拘時

候

賺氣散 治新久喘嗽不已

甘草炒 桔梗各一兩 人參半兩

烏梅肉三錢 杏仁湯洗去皮尖 御米殼鹽炙一兩

兩沸湯浸一時許投御米
殼一宿再用麥水拌勻炒

右為細末每服二錢水一盞同煎至七分去滓稍
熱服不拘時候

青龍散 治咳嗽上氣不得臥

人參去蘆 陳皮去白 五味子

紫蘇葉各一兩

右為麤末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分

去滓溫服不計時候

參蘇半夏湯 治咳嗽痰涎咽膈不利喘滿氣不宣
通

御藥院方

卷五

三

精思堂

人參 桂皮去粗

木香各一兩 五味子

陳皮去白 白朮

半夏生薑製 桑白皮炒

右為麤末每服五錢水一大盞半入生薑一十片

同煎至八分去滓溫服食後

前胡散 治濕飲停留肢體時痛痰氣膈於上焦心

下痞悶不欲飲食頭目昏眩

前胡 人參 赤茯苓去皮

紫蘇各七錢 陳皮去白 半夏麤

甘草炙 枳殼去穢炒 木杏已上各

右為麤末每服三錢水一盞半入生薑七片煎至
一盞去滓取七分熱服日進三服

寧氣湯 治肺氣不利咳嗽聲重咽啞乾燥痰唾稠

黏少得睡眠

御米殼二兩半蜜水 甘草炙

杏仁去皮尖 紫苑去 桔梗各七錢

五味子 甜葶藶隔紙 人參

半夏生薑 桑白皮炒 紫蘇葉

陳橘皮去穢各

御藥院方

卷五

四

精思堂

右為麤末每服五錢水一大盞入生薑七片煎至

六分去滓稍熱服食後

寧神丸 止一切咳嗽

白茯苓去皮 五味子炒 乾山藥

杏仁去皮尖 阿膠炒

熟乾地黃已上各 栝子仁搗 麥門冬去

杜仲炒 百部 肉桂去粗

川芎 當歸去蘆 細辛去

人參去蘆 甘草炙 貝母去心已上

右為細末煉蜜和丸每兩作二十九每服一九含

化嚔津不拘時候常令咽喉中藥氣不歇益佳

玉仙散 治一切咳嗽

白礬枯一錢

烏梅去核四個

杏仁去皮尖雙

佛耳草

款冬花

知母

貝母去心各錢半

甘草炙三錢

右為細末每服半錢乾摻舌上嚔津無時服

消痰丸

貞祐元年閏九月初四日 文童利氣丸改消痰丸

治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛生四兩半炒

槐角子

青皮去白各半兩

半夏湯洗七次

皂角不蟬肥者去皮子

御藥院方

卷五

五

精思堂

右為細末生薑麩糊和丸如小豆大每服十五丸

至二十九食後服生薑湯下

祛風丸 清腸化痰降氣消穀宣通蘊滯調順三焦

車前子

赤茯苓去皮

木香

檳榔各一兩

枳殼去穢炒

青皮白

陳皮去穢

半夏湯洗各二兩

乾生薑兩半

大黃三兩

黑牽牛生六兩

皂角燒存性一兩

右為細末燒餅為丸如梧桐子大每服五十九至

七十九食後生薑湯下

滌痰丸 治三焦氣滯痰飲不利胸膈痞滿咳唾稠

渴面日熱赤肢體倦怠不思飲食常服升降滯氣清膈化痰

木香

檳榔

青皮白

陳皮白

京三稜煨剉

枳殼去穢炒

大黃濕紙裏煨

半夏湯洗七次已

黑牽牛二兩炒

右件為細末白麩糊為丸如梧桐子大每服四五

十九食後生薑湯下

煎煎散 順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

款冬花

紫苑洗去土

甘草炙各三分

御藥院方

卷五

六

精思堂

五味子炒半兩

桑白皮炒

桔梗

杏仁湯浸去皮

紫蘇葉各一兩

右為麩末每服四錢水一大盞入黃蠟少許同煎

至七分去滓溫服食後臨睡

人參補肺散 補五勞七傷咳嗽氣所不接痰涎稠

黏骨蒸潮熱除一切風痰熱證

人參

柴胡

當歸

芍藥

桑白皮

知母

白木

川芎

黃耆

紫苑錢各二

白茯苓去皮

黃芩

山梔子人 連翹各半 甘草

桔梗各一 石膏 滑石

寒水石 荆芥穗 地骨皮各二

大黃兩半 薄荷半兩已上

右為粗末每服三四錢水一盞生薑三片煎至七

分去滓溫服漸加至五七錢無時日進三四服

泄者去大黃

貝母湯 治暴發咳嗽多日不愈

貝母心去 桑白皮剉 五味子

甘草炙對各 款冬花二兩 知母一分

御藥院方 卷五 七 精思堂

杏仁去皮尖麩

右粗搗篩每服四錢水一大盞入生薑五片煎至

六分去滓溫服食後

開結枳實丸 宜導疑滯消化痰飲升降滯氣通行

三焦滋榮心肺澆灌腎肝補助脾元養胃轉行百

脈去風結惡氣流暢大小腸專主中痞痰逆惡心

嘔噦膈實酒醒不解宿物停積兩脇膨悶咽嗝不

利上氣咳嗽等

枳實麩 白朮 半夏湯洗

天南星炮 白礬枯 苦苧藤隔紙

大黃各半 木香二錢 黑牽牛頭末

大皂角去皮子酥 青皮半兩 或加旋覆花兩

右同為末入牽牛頭末令勻生薑汁煮麵糊為丸

如梧桐子大如單腹脹上喘涎多四肢腫滿生

薑湯下三四十九食後以微利為度婦人乾血

氣膈實腫滿或產後有傷面目浮腫小便不利

生薑葱白湯下酒疸病溫酒下

神應丹 治諸遠年喘嗽

麻黃四兩斤走水洗淨去土搗爛用河水

貝母心去 桑白皮土去 紫蘇子

御藥院方 卷五 八 精思堂

款冬花枝 桔梗 知母各二

栝蒌大者 皂角二錢去

已上八味搗爛入前麻黃汁內熬至一半去

滓澄取清汁再熬成稠膏

白茯苓去皮 紫苑洗去 天麻

人參去蘆

已上三味各一兩為細末

阿膠并碎為末并

右以藥末搜和前膏杵熟為丸如小彈子大每服

一九溫薑汁化開臨臥時飲之便去枕仰臥不

計久坐如不得睡乃藥之效也此藥治嗽較慢
如治喘不以新久如神如服此藥三服之後似
見利一般

紫苑丸 治遠年近日咳嗽痰涎不利

紫苑土去 款冬花梗去 白前各二

人參兩 甜葶藶炒 烏梅肉各半

御米殼水一兩半去蒂塗

右件為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四五
丸食後生薑湯送下

潤肺丸 治肺氣不調咳嗽聲重日久不止痰涕結

御藥院方 卷五 九 精思堂

樽咽嗑不利心神煩燥頭目昏重精神不爽心忪

煩悸喉中呀呷逐氣有聲一切痰實並皆治之

朱砂飛水 五靈脂各二兩 苦葶藶隔紙

杏仁去皮尖 半夏曲各一

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧桐子大每服四

十九食後生薑湯送下

藿香散 溫脾胃化痰飲消宿食止嘔吐治胸膈痞

滿腹脇脹痛短氣噎悶咳嘔痰水噫醋吞酸嘔噎

惡心

藿香葉 半夏切作四片生薑汁

陳橘皮去白

右為散行服二錢水一盞人生薑三片棗一枚去

核同煎至七分去滓稍熱服不計時候日進二

三服

利膈丸 治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

牽牛四兩 半夏兩 皂角去皮子酥

青皮白 槐角炒 木香各一

右件為細末生薑麵糊和丸如梧桐子大每服五
十九食後生薑湯下

大人參半夏散 化痰墜涎止嗽定喘或風痰酒痰

御藥院方 卷五 十 精思堂

茶痰食痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正

頭疼或風壅頭目昏眩或耳鳴鼻塞咽膈不利心

腹痞悶筋脈拘倦肢體麻痺疼痛常服宣通氣血

清利頭目調和臟腑消進飲食

人參 茯苓 薄荷淨

天南星各半 寒水石生 白礬生

乾生薑 半夏各一 細蛤粉二

藿香葉羅淨

右為細末麵糊為丸如小豆大每服三十九食後

生薑湯下日進三服溫水冷水下亦得

一方加黃連兩半 黃蘗兩

水丸取効如治酒病調和脾胃尤宜服之

團參散 治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參 款冬花 紫苑茸等分

右為細末每服二錢水一盞烏梅一枚同煎至七

分去滓溫服食後

蛤蚧膏 治遠年近日咳嗽上氣喘滿如神

麻黃一斤去根節 紫苑茸 艾葉炮

槐角炒 陳皮 枇杷葉毛去

桑白皮 甜葶藶 款冬花

御藥院方 卷五 十一 精思堂

薄荷葉 杏仁去皮尖 佛耳草

五味子 貝母 紫蘇葉

皂角去皮子各半兩

右件搗羅為麤末用河水三斗於鍋內慢火熬至

一斗半搓揉勻濾去滓極細再用生絹袋濾過

以文武火再熬成膏然後下後藥二味蛤蚧一

對用雌雄各半米泔刷洗二十遍酥炙黃色路

參一兩半用為細末與膏子和勻丸如彈子大

每服一粒任意湯磨下食後臨臥服

小枳殼丸 治脾胃不和宿寒留飲心腹痞悶脇肋

刺痛嘔逆痰水不思飲食

枳殼炒去穢 半夏湯洗去滑 白木各三兩

赤茯苓皮去 乾薑炒各兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九食

後生薑湯送下

十珍餅子 治大人小兒嘔吐痰涎粥藥難停無問

久新必愈

丁香 沉香 桂去

藿香 肉豆蔻 吳茱萸洗焙

木香各半兩 半夏湯洗七次乾一兩用生薑汁製

御藥院方 卷五 十一 精思堂

舶上硫黃 水銀各七錢細結沙研

右件一十味搗羅為細末同和勻煉蜜和丸如小

豆大捏作餅子每服十餅子生薑湯下或化服

亦得量病加減不拘時候服

大半夏丸 消痰順氣治咳嗽

半夏兩 桑白皮 生甘草各一兩

皂角搗碎各八兩 生薑剉碎各

右五味漿水五升同煮令汁盡取出半夏焙

乾為末後用

郁李人湯浸去皮別研各二兩

右四味與前半夏末拌勻取生薑自然汁打白麵

糊為丸如梧桐子大每服三十九食後生薑湯

下

白雪丸 治痰實胸膈嘈逆及頭目昏眩困倦頭目

脹痛

天南星炮

白附子生

半夏炒各

滑石研

石膏研

龍腦

麝香各二錢半

右稀麵糊為丸極稀為妙如菜豆大每服三十九

薑鴈茶或薄荷茶下每遇頭目昏困精神惰昏

御藥院方

卷五

三

精思堂

胸中痰逆憤憤如中酒則服此藥良久間如塞

去重裘豁然清爽頓覺夷暢食後服為佳

木香半夏丸 治痰涎上壅惡心胸膈不利常服消

痰飲

木香七錢

半夏一兩湯洗七次切片焙乾

陳皮去白半兩

白茯苓兩

乾生薑兩半

草豆蔻人兩半

白附子兩半

人參兩半

右件為細末用麵糊和丸如梧桐子大每服二三

十九不拘時候煎生薑湯下

小半夏丸 治留飲不散膈腕不利宿食不消嘔逆

惡心

半夏二兩

木香

沉香

青皮去白各半兩

檳榔一枚麩裏煨熟

右為細末以生薑汁浸餅為丸如梧桐子大每

服三十九生薑湯下不拘時候

止噁丸 治停寒積飲嘔吐痰水無問冷熱不可食

者服之必愈

沉香

丁香

木香

吳茱萸湯洗七遍生薑焙乾

半夏湯洗七遍生薑汁製各半兩

水銀各一兩二味研令砂子星盡為度

御藥院方

卷五

一四

精思堂

右件為細末以生薑糊就和丸如菜豆大每服二

三十九生薑湯下不拘時候

沉香湯 治肺氣虛弱咳嗽痰涎不已

阿膠炙

沉香各半兩

人參去蘆

桑白皮焙各一兩

右件同為燼末每服三錢水一盞同煎至七分去

滓溫服食後日進三服

玉芝徐老丸 除風壅消痰利咽膈美飲食

天南星兩半

半夏兩一

細蛤粉兩

白礬兩一

牽牛兩四

大黃兩一

乾薑兩半 黃蘗兩

右為細末水丸如小豆大每服一二十九溫水下

食後日三服常服化痰消食順氣調血令人徐

老或已衰老或一切風氣或下後結愈宜服之

或除腸垢積物者可漸加至三五十丸以意消

息或滑泄忌牽牛大黃並孕婦此外更忌大南

星半夏皆不可服

製半夏法

齊半夏二斤河水洗七遍白礬二斤為末用醋漿

水三碗同入磁甕中浸用退皮濕柳棒析二錢

御藥院方

卷五

十一

精思堂

長二尺一根日攪一十遍候四十日嘗試如不乾

喉方成取出用布袋盛沉至井底十日取出曬乾

每服一兩粒生薑湯嚼下或細細嚼服亦得

辰砂利膈丸 治胸膈痞滿痰飲氣滯上焦窒塞肺

氣不利咳嗽喘滿嘔吐痰涎咽噎不利風熱相搏

頭目昏痛精神困倦並皆治之

天南星炮

白茯苓

乾生薑

生犀各二兩

半夏半斤

白礬三兩一分

乾山藥三兩

皂角一斤去皮子

右件為細末以皂角膏子和丸如梧桐子大朱砂

為衣每服六十九至七十九食後生薑湯下

半夏利膈丸 崇慶元年八月初六日改作換藥利

治風上攻痰實喘滿咳嗽

黑牽牛生四兩一分 皂角子不坤肥者去皮

槐角子兩 齊州半夏湯洗七次

青橘皮湯洗去穢 檳榔一兩麩裏

右六味為細末生薑自然汁打麵糊為丸如梧桐

子大每服二十九生薑湯下食後如要疎風痰

加至四五十丸

平肺散 治久咳嗽神効

御藥院方

卷五

七六

精思堂

御米殼四兩對碎蜜

烏梅肉半兩

訶子皮兩 人參兩

貝母心

右件為末每服三錢水一盞煎至七分食後臨臥

熱服

導飲丸

京三稜炮

蓬莪茂各六兩

白朮

青皮法

陳皮三兩

檳榔二兩

木香半兩

枳殼二兩

茯苓六兩

半夏湯洗七次去

一方加神麴三兩炒 麥蘖三兩炒

右為細末生薑汁煮麵糊為丸不已多少食後生薑湯下或茶清下

柴胡飲子 治痰熱頭疼利膈除煩悶手足煩熱榮衛不調肢節倦怠身體疼痛嗜臥少力飲食無味兼治五飲消痰癖

柴胡八兩

半夏湯

白朮各二兩

甘草炙

人參

黃芩

麥門冬三兩去心各

右剉如麻豆大每服秤五錢水一盞半入生薑五片棗一枚同煎至八分去滓溫服不拘時候

御藥院方

卷五

十一

精思堂

藿香散 治諸瘧胸中痞悶痰逆嘔噦並宜服之

厚朴去 半夏洗

生薑去皮各一兩三

甘草炙

藿香

右搗羅為燼末每服三錢水一盞生薑五片棗一枚同煎至七分去滓溫服食前

安眠散 治上喘咳嗽久而不愈

欬冬花 烏梅肉 佛耳草

麥門冬去心各二錢 陳皮去 柏 甘草炙三

麥門冬

陳皮

柏

甘草

御米殼七錢半

右為細末每服三錢水一盞入黃蠟如棗核許同煎至八分去滓大溫臨臥服

半夏丸 治痰嗽膈上不利

栝蒌肥者

半夏四十九枚湯洗七次

右件栝蒌取子殼焙乾與半夏一處為細末次用栝蒌穰同熟水熬成膏和前藥末為丸如栝蒌子大每服三十九生薑湯下食後

人參丸 治肺氣上攻鼻塞不通

人參 防風 細辛

御藥院方

卷五

十一

精思堂

甘菊花各半

木通

沙參

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食後溫水下

潤肺丸 治肺氣不利咳嗽痰實咽嗑乾燥

鵝梨二箇去

瓜樓二箇去

麻黃二兩

皂角三錢去 河水一升 半得少時銀石器內熟成膏

天南星

半夏各一

生薑三兩同 天南星半 乾

寒水石二兩

枯白礬一兩

寒水石

枯白礬

右件同為細末用前膏為丸如梧桐子大每服五
七十九溫生薑湯送下

鍾乳補肺湯 治肺氣不足咳嗽上氣胸滿上迫咽
喉閉塞短氣喘乏寒從背起口中如含冰雪語言
不出並皆治之

紫苑土去 五味子 白石英碎

款冬花 桂去粗 人參各半

鍾乳石碎 麥門冬心去 桑白皮錢各七

右為散每服四錢水一大盞生薑三片棗二箇
粳米三十粒煎至八分去滓溫服食後

御藥院方 卷五 精思堂

紫園參丸 治肺氣有餘咳嗽喘急胸膈痞痛短氣

噎悶下焦不利腿膝微腫

潞州人參二錢 蛤蚧一對酥 白牽牛三兩

苦葶藶一兩 甜葶藶微 木香各半

右件六味搗羅為細末用熟棗肉和丸如梧桐子

大每服四十九煎人參桑白皮湯下食後

蘆筒散 治年深日近咳嗽

鍾乳石錢半 白礬錢二 人參去蘆

佛耳草各三 甘草炙 官桂去粗皮

右六味為細末每服半錢夜臥抄在手內竹筒子

吸嚔後用茶清送下頻用治年深日近者三五
日見效

款冬花散 治年深日近咳嗽

款冬花多不以

右於室密中如香焚之煙起以筆管吸其煙則嚔
之或坐臥處如香焚之不吸亦妙重病數日見
效輕者便効

清肺丸 治心肺伏熱咳嗽煩悶時有痰涎喉中介

介咽隘不利氣不宣暢並宜服之

木香 青黛研 蛤粉研

御藥院方 卷五 精思堂

前胡 人參去蘆 黃連各半

桔梗炒 枳殼去穢炒 薄荷葉

半夏湯洗七次 天南星生 大黃生

牽牛微炒各

右件搗羅為細末清水和丸如梧桐子大每服五

十九生薑湯下食後

天南星丸 治痰實結搏咽隘不利咳嗽久不愈

天南星 白礬 寒水石

半夏 白附子 乾薑各二兩

右件為細末水麵糊和丸如梧桐子大每服五六

一丸食後生薑湯下

款冬花散 治咳嗽痰涎不利

款冬花 紫苑各一兩

右為羅末每服四錢水一大盞生薑五片同煎至

六分去滓溫服食後

膾化止嗽丸 治肺氣不和咳嗽常服潤養心肺及

治大人小兒一切咳嗽服之大效

款冬花 杏仁各一兩 貝母各一兩

吳白芷 甘草各一兩

右件搗羅為細末煉蜜和丸每兩作一十五丸每

服一九至二九時時膾化不拘時候

神功散 治久咳嗽

雄黃 兩 款冬花 兩 甘草 兩

肉桂 各一兩

右為細末入雄黃勻每用半錢吸入咽喉中不拘

時候

百部散 治咳嗽無問新久冷熱並宜服之

款冬花 百部各一兩 知母

貝母 各半兩

右為細末每服三四錢用煖薑汁調下食後

八味款冬花散 治肺寒熱不調涎嗽不止

款冬花 紫苑各一兩 五味子

甘草 各七錢 桑白皮 各二錢 麻黃 各一兩

杏人 湯洗去皮 紫蘇葉 各二兩

右為羅末每服五錢水一盞半入黃蠟皂子大煎

至一盞去滓食後熱服

紫參丸 治遠年日近咳嗽諸藥不效者服之必愈

紫參 甘草 桔梗 各二兩

五味子 阿膠 各半兩 桂 去

烏梅肉 杏人 湯洗去皮 各二錢

右件搗羅為細末煉蜜為丸每兩作一十五丸每

服一九新綿裹定湯濕過膾化咽津不計時候

開結枳實丸 宜導凝滯消化痰飲并降滯氣

枳實 白朮 半夏 湯洗

天南星 地 枯白礬 苦葶 各一兩

大黃 生半兩 木香 二兩 黑牽牛 頭末

旋覆花 兩 青皮 半兩 大皂角 子一兩 去皮

右同為細末入牽牛頭末令勻生薑汁煮麵糊為

丸如梧桐子大每服四五丸食後生薑湯送

下如常服消食快氣下痰利膈

消痰咳嗽丸 消痰快氣除咳利咽膈

白朮 牽牛炒 檳榔

白芷 厚朴製各 半夏五兩

陳皮四兩 乾生薑一兩 人參

木香 青皮各一兩 赤茯苓

枳殼炒去穢

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五七十九食後生薑湯下

法製溫半夏

齊半夏二斤用河水洗七返後用 白礬一斤

御藥院方 卷五 精思堂

好酒一瓶 川升麻 丁皮

縮砂人 草豆蔻人 甘草紀上五兩

右將藥五味為末同半夏白礬酒人在磁甕中密

封四五日後取出一粒嚼試不軟喉是藥成如

未成再浸十日更試中後即止取出曬半乾用

麩同炒火慢為度後黃色堪用每服一粒細嚼

生薑湯下不計時候

梅青丸 平肺氣止咳嗽利咽膈化痰涎

青黛二錢 半夏四兩湯洗七過 消石三兩

桔梗 天南星生 蛤粉各一

白礬半兩

右件搗羅為末水浸餅為丸如豌豆大每服五

六十九食後溫生薑湯下

玉塵散 治大人小兒痰實咳嗽氣促喘滿咽膈不

利

天南星去皮 半夏各一兩湯洗七

桔梗 桑白皮自株土下

右為羅末每服三大錢水一盞半生薑如錢大七

斤煎至八分去滓溫服不計時候

安眠散 調肺止嗽消痰順氣如咳嗽不得息者服

御藥院方 卷五 精思堂

之必得安寧

佛耳草 知母 貝母

欬冬花 桔梗 陳皮湯浸

白茯苓去皮各 漢防已

猪牙皂角去皮酥炙各二兩半

右件九味搗羅為細末每服三錢水一大盞入黃

蠟烏梅各少許同煎至五分去烏梅和滓溫服

異功丸 升降陰陽逐痰飲治咳嗽喘逆痰實昏眩

和氣止渴

半夏 大腹子 人參

赤茯苓各一兩 甘草各半兩 生薑五兩

白朮 紫蘇葉各半兩 加烏梅肉半兩

右生薑外並搗為纒末將生薑和皮剉碎與藥末同和許勻和丸鷄黃大每服一九搥破入紫蘇連莖五葉烏梅肉一个水一大盞半同煎至一盞去滓溫服

法製白半夏 治觸冒感寒咳嗽消飲化痰

右用上好半夏湯洗一遍去臍輕焙乾再洗如此

七通用濃米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬一兩半研細溫水化浸半夏上留水

御藥院方 卷七 三五 精思堂

兩指許頻攪冬月於暖處頓放浸五日夜取出

輕焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通

七日盡取出再用漿水於慢火內煮勿令滾候

漿水極熟取出放乾於銀石或磁器內收貯每

服一兩粒細嚼溫生薑湯送下食後

法製紅半夏 治風濕止咳嗽清頭目利咽喉消痰

降氣

右只依造白半夏法造成未乾時每半夏一兩用

龍腦半錢研極細展在半夏上又用水飛朱砂

於半夏上再為衣先鋪長燈草一重約厚一指

單排半夏在燈草上又用燈草蓋約厚一指以煮豆焙之候乾取出於器內收貯每服一兩粒細嚼食後溫水或冷水送下

化痰鐵刷丸 治男子婦人風痰酒痰茶痰食痰氣痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛頭目昏眩肺痿哈膿聲如拽鋸並皆治之常服此藥化痰墮痰止嗽定喘

白附子炮 南星炮 半夏湯洗

白礬生用各兩 寒水石一兩 乾生薑七錢

硝砂 輕粉各一 皂角皮一兩去

御藥院方 卷五 共六 精思堂

右件搗羅為細末水麵糊和丸如梧桐子大每服

二三十丸食后生薑湯下

瀉肺湯 治肺氣有餘氣逆上甚

防已 陳皮湯浸去 桔梗去蘆

赤茯苓各一兩 杏仁湯浸去皮尖

苦苧藤二錢

右咬咀每服十錢匕水一盞半同煎至六分去滓

溫服食後日進二服或三服

消飲白朮丸 治痰癖及飲酒停痰積聚不利嘔吐

目視眩暈

半夏二兩 白朮三兩 乾薑炒三兩
枳殼四兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子人每服三十九溫

米飲下

白金散 清利肺能下痰止煩渴

桑白皮炒

紫蘇葉小

桔梗各一兩

甘草炒

右為末每服五錢水一盞半煎至一盞去滓不

拘時候溫酒任下

辰砂利痰丸 治痰涎留滯停留不散心腹痞悶飲

御藥院方

卷五

七

精思堂

食運化或時咳嗽咽膈不利宜服之此藥化痰

止嗽消飲飲食

神曲炒

麥蘖各半斤

陳皮四兩

白礬飛

皂角炙

天南星炮

半夏湯洗

香白芷大

右件同碾為末生薑汁麵糊為丸如梧桐子大朱

砂一兩為衣每服六七十丸煎生薑湯下不拘

時候茶清亦得

人參前胡散 治痰氣客於上焦嘔吐胸中痞悶不

欲飲食頭目昏眩並皆治之

前胡五兩 人參 紫蘇葉

赤茯苓各一兩 陳皮不去 半夏湯洗

甘草炙 木香 枳殼各半兩

右為末每服三錢水一大盞半生薑七片同煎

至一盞去滓溫服不拘時候日進三服病愈即

止服

白朮茯苓丸 治三焦氣滯停痰不消胸膈痞悶腹

脇脹滿咳嗽涎甚咽嗝乾痛心忪悸動頭目眩暈

寒熱時作肢節疼痛嘔吐清水神昏多倦不欲飲

食

御藥院方

卷五

八

精思堂

白茯苓 白朮各半兩 天南星

白附子各一兩 白礬三分 半夏三兩

右為細末白麵糊和丸如梧桐子大每服二三十

丸生薑湯下不拘時候

溫胃化痰丸 治諸間有寒厚胃停飲胸中不快痰

涎不盡

半夏三兩 橘皮白 乾薑炮

白朮各二兩

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧桐子大每服二

十九溫生薑湯下不拘時候

三倍丸 溫中下氣治胸膈痞悶止噎逆嘔吐腹脇

脹痛

半夏三兩生薑製 青皮去白一兩 木香一兩

右為細末生薑汁麴糊和丸如梧桐子大每服三

十丸不拘時候生薑湯下

人參枳殼湯 消痰利膈下氣潤腸胃消導一切氣

人參一兩去蘆頭 枳殼麩炒去一兩 陳皮去白一兩

半夏湯洗七次

右咬咀作一劑每用藥二兩半六一服用泉水二

大盞半先揚水二百一十遍入生薑一七錢切

御藥院方 卷五 精思堂

碎慢火同熬至六分濾去滓食後溫服如大便

秘加白蜜少半匙頭再熬蜜消服之

丁香半夏丸 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞

酸噎醋心腹痞滿脇肋刺痛短氣噎悶不思飲食

丁香 木香 肉豆蔻人

人參去蘆頭 陳皮去白一分 藿香半兩

半夏湯洗七次生薑汁炒黃色三兩

右為細末以生薑汁煮麴糊為丸如小豆大每服

二十丸生薑湯下不拘時候

橘皮半夏湯 治積痰氣痞不下飲食嘔吐不止

半夏洗 橘皮各一兩 生薑一兩

右三味咬咀水五盞煎至一大盞去滓三分服食

後臨臥

枳實半夏丸 消痰順氣利胸膈進飲食

枳實一兩麩炒去穢 半夏次一兩切作片子湯洗七

白朮三分 蓬莪茂兩 白茯苓一分

右為細末用生薑汁煮麴糊和丸如梧桐子大每

服六七十丸陳橘皮湯下不拘時候

皂白丸

天南星生三兩 半夏生七錢 白附子生一兩

御藥院方 卷五 精思堂

川烏頭半兩生用去皮 生薑二斤取汁

皂角一兩者二斤去皮子水 煮藥

右咬咀以皂角同煮乾為細末以生薑汁煮麴糊

為丸如梧桐子大治諸風痰酒痰茶痰食痰頭

痛目眩旋暈欲倒手足頑麻痰涎壅塞並一切

諸風病他藥所不能療者此藥並皆主之常服

寬利胸膈進美飲食不生一切風痰大有神效

每服三十丸食後生薑湯下

法製半夏 治咳嗽

半夏一兩湯洗七次去其水

右用生薑一兩取自然汁銀石器內用文武火同
熬汁盡為度每服嚼一粒食後生薑湯下含化
亦得

辛夷湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯啞稠

黏

辛夷去毛

甘菊花去枝

吳白芷

前胡去蘆

川芎

薄荷葉去土

石膏

白朮

赤茯苓去皮

生乾地黄

陳橘皮去白各一兩 甘草炙二兩

右件同為末每服五錢水一盞半煎至一盞去

御藥院方

卷五

三

精思堂

泮溫服食後日進三服

龍膽丸 解暴熱化涎涼膈清頭目

草龍膽

白礬燒過 天南星

半夏各二兩半 水浸切作片用藥水雪水

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九蠟

茶清下食後臨臥服麵糊須極稀如濃漿可也

應痰壅膈熱頭目昏重服之頓清嶺南瘴毒纔

覺意思昏悶連服使解咽喉腫疼口舌生瘡凡

上壅熱痰諸症悉可服小兒尤良

獨飲枳實丸 逐飲消痰導滯清膈

枳實炒

半夏湯洗七次

陳橘皮各二兩 黑牽牛半斤取頭末二

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十

丸生薑湯下不拘時候

天門冬丸 治肺臟客熱喘促咳嗽心神煩悶

天門冬去心

麥門冬去心

人參

百合

桑根白皮炙

赤茯苓去皮

紫苑去苗

貝母

杏仁湯浸去皮

妙別研已

前胡去蘆

五味子各三分

甘草炙半兩

御藥院方

卷五

三

精思堂

右為細末煉蜜和丸搗三五百杵丸如彈子大每

服一九綿裹噙化嚥津或煎桑白皮湯化下一

丸亦得食後服

神祕湯 若病人不得臥臥則喘者水氣逆行上乘

於肺肺得水而浮面使氣不通流其脈沉大宜神

秘湯

橘皮洗

生薑

紫蘇葉

人參

桑白皮對各半兩

右咬咀以水三升煎至一升去滓溫服分三服

紫苑湯 治咳嗽喘急胸腹脇肋脹悶疼痛

紫苑去苗 桔梗炒 欽冬花去梗

枳殼炒去穢 陳皮去白 赤茯苓去黑皮

赤芍藥 百合各一兩 大腹子二枚

右九味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食後日三服

養肺丸 治脾胃呼吸風冷咳嗽上氣喘急語聲不

出喉中似噎

人參去蘆頭 官桂去 甘草炒

五味子 乾薑炒 紫苑去土

細辛去苗葉土

御藥院方 右件為細末煉蜜和丸每兩作二十九每服一九

綿子裏口內含化隨津液下之食後

立效丸 治肺虛膈熱咳嗽氣急胸中煩滿肢體倦

疼咽乾口燥渴欲飲冷肌瘦發熱減食嗜臥音聲

不出

黃蠟濾去滓用漿水煮八兩 蛤粉四兩

右件每兩作一十五丸用前蛤粉為衣養藥每服

一九胡桃穰半個細嚼溫水下臨臥閉口不語

沉香降痰丸 治宿飲不消咽膈不利咳嗽痰涎頭

目昏通咽逆惡心胸膈不快

半夏麩 木香分 沉香二錢

青皮白 檳榔大者二枚

右件為細末生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大每服

二十九生薑湯下不拘時候

除痰丸 療宿飲不消咽膈不利咳嗽痰涎頭目昏

運

天南星炒 半夏湯洗七次 蛤粉微炒

皂角大一錢去皮 右件除皂角汁三味共為細末以皂角汁調麩糊

和丸如梧桐子大每服三十九食後生薑湯下

漸加至五十九臨臥更進一服忌甜物

乳香半夏丸 治風痰除咳嗽清頭目

半夏湯洗七次 天南星用薑汁煮

白礬一兩

右件三味各修製訖同為細末水浸蒸餅和丸如

梧桐子大每服五十九生薑湯下不拘時候

細辛五味湯 治肺氣不利咳嗽喘滿胸膈煩悶痰

涎多喉中有聲鼻塞涕淚頭痛目眩肢體倦怠

咽嗌不利嘔逆惡心

五味子二錢 半夏洗七次 乾薑炮

癸巳新刊御藥院方 卷五

九

甘草炙 桂去粗皮 芍藥

麻黃去根節 細辛去苗葉

右為末用紗羅子羅每服二錢水一盞生薑十片

同煎至七分去滓稍熱服不拘時候

玉液散 治胃虛有痰咳嗽嘔逆不思飲食煩燥惡

心

半夏洗七次 生薑去皮細切一兩 陳粟米揀淨

右三味同熬研焙乾羅為末每服二錢水一盞生

薑三片同煎至六分溫服不計時候

寧肺散 治久新咳嗽肺氣不通漸咯膿血或壅滯

不利咳嗽黏涎坐臥不安或語聲不出

烏梅肉八錢 御米殼一斤

右為細末每服二錢煎烏梅湯調下不拘時候

紫金散 療一切痰嗽晝夜不得眠睡此藥治嗽別

有神效

大南星去皮 甘草細切 白礬各半

烏梅取肉

右件四味同搗成羅散用慢火於銀器內炒令紫

色放冷再搗羅為細末每服二錢臨臥時身體

都入鋪臥內只坐地用蓋汁七分溫湯三分煖

令稍熱調前藥末服之嚔下便仰臥高枕想藥入於肺中須臾得睡其嗽立止

暖胃湯 治痰嗽胸膈不快多吐寒痰兼治飲酒過

多

生薑一斤去皮淨洗橫文切片子用白鹽二

器內慢火炒入上好神麴丁香兩

齊州大半夏一兩湯洗七次去滑焙乾

大草豆蔻三個 甘草一兩

陳皮一兩湯浸

右件同搗羅為細末每服一錢沸湯點服空心或

食前此藥若空心進一服大辟風寒霧露之氣

白雲丸 治痰實胸膈嘔逆及頭昏眩困倦頭目脹

痛

大南星炮 川烏炮去 白附子生

半夏洗各 滑石研 石膏研各

麝香龍腦各一

右件稀麵糊為丸極稀為妙如菜豆大每服五十

九薑酒茶或薄荷茶下每遇頭目昏困精神

昏胸中痰逆憤怖如中酒痢服此藥良久開如

塞去重裘豁然清爽顏色夷暢食後服為佳

錦朱丸 治膈痰風厥頭目昏痛眼黑旋運怔忡惡

心驚悸恍惚夢寐不安漸發盲昧不知人事

乳香研 硃砂研 白礬灰研

皂莢子炮裂為末 鉛白霜研 鐵粉研各一兩

半夏麩二兩

右為細末生薑汁麩糊和丸如菜豆大每服十五

二十九生薑湯下驚悸語澁金銀湯下或荊芥

湯下

人參紫苑湯 治濕熱流注足脛浮腫痰咳等

人參 川芎 木香

御藥院方 卷五 精思堂

防已 白朮各一兩 紫苑土去

苦苧藤各二兩 妙紫色

右為燼散每服三錢水一大盞生薑四片烏梅一

个煎至八分去滓溫服食前日進三服慎溫麵

溫酒等物

壞痰丸 治風痰利咽膈破積滯散疼痛止咳嗽

皂角刮去黑皮去子 枯白礬各半

右為細末水浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三四

十力食後生薑湯下或溫水送下亦得

人參蛤蚧散 治三二十年間肺氣上喘咳嗽咯唾

膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對去首以河水浸洗淨去腥氣酥炙香熟

甘草炒 杏仁炒去皮尖 人參

茯苓 貝母 桑白皮

知母各二兩

右為細末淨磁盒子內盛每日如茶點服一料水

除神效

御藥院方 卷五 精思堂

御藥院方卷第五

癸巳新刊御藥院方卷第六

補虛損門

靈宿丹 大補益強心志壯筋骨益氣血調榮衛補

骨髓固元陽黑髮治腰膝無力通九竅利三焦

去諸風除冷痰安五臟明目補虛損

兔絲子酒浸一宿 覆盆子酒浸焙

檳榔煨 牛膝酒浸 肉苁蓉去殼切焙

天麻酒浸焙 熟地黃酒浸各二兩

鹿茸炙 桂去粗皮 巴戟天去心

附子炮裂去 石斛去根 青皮白

豬寶炒 懷香子炒 白龍骨研

杜仲去粗皮 補骨脂炒 葫蘆巴

石葦去毛 枸杞子 遠志去心

五味子炒 沉香剉 蛇床子炒

山茱萸 草薺 山藥各一兩

右三十八味搗羅為末用浸藥酒調山藥末煮糊

更入酥蜜各一兩和藥搗三五百杵丸如梧桐

子大每服二十九空心溫酒送下溫粥飲亦得

豬肚丸 治男子肌瘦氣弱咳嗽漸成勞瘵

白朮四兩 牡蠣燒四兩 苦參三兩

右為細末以豬肚一箇煮熟剉研成膏和丸如梧

桐子大每服三四十九丸米飲下日三四服以藥

神効瘦者服即肥莫測其理穎昌李薦方叔其

子得效施人亦屢應

酸棗仁丸 治膽經不足心經受熱精神恍惚恐畏

多驚情思不樂時有盜汗虛煩不眠朝差暮劇或

發眩運

酸棗人炒 地榆各一兩 丹砂研為

茯神去木 人參 菖蒲對各

右為細末水蜜麵糊為丸如梧桐子大以朱砂為

衣每服三十九至五十九煎人參湯下不拘時

候或米飲下亦得

固真丸

鹿角對一

右用殺者去頂骨捷作三寸長短解作兩縷秤見

斤兩用河水浸七日每日一換新水浸候日數

足每角一斤入好黃蠟一兩用磁缸子內以河

水用桑柴火煮三伏時不得住火如水少漸漸

添浸著角後煮得角軟削去黑皮只取霜曬乾

將煮角汁再以慢火熬成清膠每用鹿角霜一

斤入上好者雪白茯苓五兩刮去黑皮二味同
 搗羅爲細末將鹿角膠水搜和爲丸如梧桐子
 大每服五十九空心用溫酒吞下漸漸加至一
 百丸亦得若不喫酒以清米飲吞下亦得治腎
 經虛損真元不足常服暖丹田補真氣活血脈
 健筋骨添精固氣延年助陽此藥別無性
 榮芝丸 治諸虛不足起陰發陽安神定魄補五臟
 和六腑活血脈填骨髓強骨生力駐顏色久服輕
 身延年不老

鹿角霜五兩

鹿茸去毛酥炙三兩

麝香兩

御製方

卷六

三

精思堂

沉香

白木

當歸去蘆

熟乾地黄

茯苓酒浸二宿

牛膝酒浸二宿

兔絲子酒浸別研

葶藶炒

川芎

五味子各一兩

右爲細末用麩二兩并煉蜜和丸如梧桐子大每
 服三十九空心粥水下或溫酒鹽湯亦得漸加
 至五十九用殺角十斤已上每五斤東流水浸
 四十九日刷去水漬令淨入大鍋研麻子五升
 黃蠟半斤青鹽四兩甜水煮兩伏時溫湯添取
 出刷淨著絹袋子盛曬乾爲末取煮角汁濾滓

去慢火熬成膏

鎮心丸 治心氣不足志意不定精神恍惚語言錯
 妄忪悸煩亂愁憂慘戚喜驚多恐健忘少睡夜多
 異夢寤即驚覺或發狂眩暴不知人並宜服之

預知子皮去

人參去蘆

白茯苓皮去

遠志去心

石菖蒲

山藥

枸杞子淨煉

黃精蒸熟

栝子人

地骨皮去土

茯神去木

朱砂飛研各

右件爲細末煉蜜丸每兩作二十九更以朱砂爲
 衣每服九細嚼人參湯下不計時候

御製方

卷六

四

精思堂

牛黃鐵粉丸 鎮定心氣止驚悸不寧

牛黃研半

鐵粉研

紫石英研

白石英研

酸棗人炒

茯神去木

陳皮白去

人參去蘆頭各一兩

右爲細末入研者勻白麩糊和丸如梧桐子大每
 服五十九煎人參湯下食前服
 烏金散 療虛夢泄精滑不禁

九肋鱉甲

右不以多少去裙襴淨洗過燒存性研細末每服
 一字用清酒小半盞童子小便半小盞陳葱白

七八寸同煎至七分去葱白和滓日西時溫服
之須更得黏臭汗為度次日只進白粟米粥忌
食他物

木猪苓丸 療虛夢泄精滑不禁

半夏五兩者三塊小者不須木猪苓八兩劈作塊子同上

右同入無油器中慢火炒候半夏紫色則止揀出

木猪苓不用只取半夏杵細末以陳粟米飯和

丸如梧桐子大噉藥九子微乾却將木猪苓杵

碎為麩末與前藥九子入銚子內再同炒候九

子藥乾篩去木猪苓不用每服五十九空心溫

御製醫方

卷六

五

精思堂

要木飲下

神助丹 補益元臟大進飲食能壯筋骨

附子二兩五錢已川烏頭四兩正生

右二味同於磁器內用好醋五升浸直至通心軟

透為度四時之間不計日數或三五日以至半

月但以通心軟透為妙每日一攪浸透取出藥

切作片子將所浸醋棄於無蟲處恐傷生并磁

器亦不可別用止可再浸藥再別用好醋五升

浸藥掘一上坑子深潤約七八寸許用木炭火

燒并周圍四五指許盡令通赤傾藥片子并醋

在內以新瓦盆蓋了用黃土圍定勿令透氣一

晝夜取藥片子噉乾去其泥土青鹽四兩先搗

為粗末將藥片子炒令深香黃色為度同與細

末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服十五丸至二

十九至三五十九如氣虛弱或冷所傷可倍加

丸數溫酒下空心或鹽湯亦得婦人淡醋湯下

餘無所忌如久服真氣壯實尤宜節慎俱傳

萬壽地芝丸 和顏色利血氣調百節黑髮堅齒逐

風散氣愈百疾

生地黃八兩天門冬八兩菊花四兩

枳殼去穢

卷六

六

精思堂

右為細末酒蜜麵糊為丸如梧桐子大每服三十

丸漸加至四五十丸空心溫酒下晚食前再服

萬安丸 秘寶方本名養

補下經起陰發陽能令陽氣入腦安魂定魄開三

焦破積聚消五谷益子精安臟腑除心中伏熱強

筋骨輕身明目去冷除風無所不治補益極多常

服最妙七十老兒服之尚有非常

茯苓四兩乾薯蕷二兩五味子二兩

杜仲三兩牛膝酒兔絲子酒

赤石脂 白茯苓去 澤瀉

熟乾地黄 山茱萸 巴戟去心各

右件為細末用菴蓉末半斤酒熬膏和丸如梧桐

子大每服五七十九空心溫酒下不在將息別

無所忌只忌大醋及陳臭之物七日後四體光

澤口脣赤手足熱面有光潤消食體輕舌厚聲

響是其驗也十日長肌肉其藥通中入腦鼻辛

酸不可怪也

又篋中秘寶加減法云

若要肥加燉煌石膏二兩

御藥院方 卷六 七 精思堂

如失狂多志加遠志一兩

體少津潤加栝子人一兩

欲進房事加白馬莖若無川鹿茸代之二兩去

毛酥炙黃陰下濕癢加蛇床子一兩

金櫻丹 治男子去血失精婦人半產漏下五勞七

傷三尸百疰肌肉陷下形色俱脫傳尸骨蒸虛勞

至損諸風變易瘦劣難痊或因嘔吐或從汗出利

積久津液耗散婦人崩漏無停色肉衰朽男子氣

滑不固筋力消痿傷寒累經勞復瘡漏方在淹延

大脈不定下血過多心氣不足健忘成狂目血衰

虛昏暗作眩陰陽表廢飲食忘思常服充實肌肉

堅填骨髓悅澤面目長養精神秘精固氣壯力強

筋冲和百脈正理三焦定神魄安尸蟲烏髭髮牢

牙齒男子全道使婦人妊娠通神明不老能健捷

其藥之功不可具述乃神仙傳世之方

金櫻取 山木取 生地黄取

仙靈脾取 肉菴蓉酒浸 兔絲子別研

牛膝酒浸 生鷄頭肉乾 生蓮子肉乾

乾山藥 人參 茯苓去

丁香 木香 菖蒲

御藥院方 卷六 八 精思堂

麝香別研 甘草炒 陳皮去

栝子人別研各

右將兔絲子已下同為細末入栝子仁勻以白沙

蜜入銀石器中於天地爐中置熟火五斤煉微

解入兒孩兒乳汁二升已來以木篋攪以入上

項膏汁同攪令勻勿令住手傾入藥木一處攪

熬之火消續續旋添熟火勿令太緊熬至膏成

可丸即止取出却於銀石器中候稍溫入麝香

末一處攪和成劑更於石臼中杵千余下每兩

作一十九每服一丸空心細嚼酒下

代穀丸 治脾胃久虛全不思食

精羊肉批切三斤 陳皮三分

小椒二分 蔥十

先以水高肉二指已來同煮水盡去陳皮等只取

肉慢火焙乾次入

人參法蓋 神麴炒 大麥蘖炒各

右同為細末用生薑麴糊為丸如梧桐子大每服

五七十丸不拘時候溫酒或米飲送下

王倪丹砂 無所不主大補心益精血愈癯疾壯筋

骨久服不死王倪者丞相遵十二代孫明文九年

為滄州無棣令有一人善相見倪曰公死明年正

月乙卯我有藥可以不死也能從我乎倪再拜稱

幸乃出鍊丹砂法餌之開元元年倪壽之弟亦遇

異人授以杏丹法曰吾聞王倪能鍊丹砂願以此

易之倪以杏丹賜其子辨而倪與授杏丹者後皆

仙矣刺史李休光表賜問其弟為道觀鍊丹砂法

丹砂兩二十八 甘草

檳榔 訶梨勒皮各一兩 桂去粗皮八

右甘草等四味剉以水二大斗益以細布囊盛丹

砂垂於釜中看水和藥炭火煮之第一日兼夜

用陰火水紋動第二日兼夜用陽火魚眼沸第

三日兼夜用木火動花沫沸第四日兼夜用火

火汨汨沸第五日兼夜用土火微微沸第六日

兼夜用金火沸乍緩乍急第七日兼夜用水火

緩調調沸先其泥二釜一釜常暖水用添煮藥

釜水涸即添暖水常令不減二斗七日滿取出

丹砂於銀盒中盛其盒中先布桂肉一兩拍碎

即令布丹砂又以餘桂一兩覆之即下合置甌

中先布糯米厚三寸乃置合又以糯米覆培上

亦令米厚三寸許桑薪火蒸之每五日換米桂

其甌蔽可以完竹子為之不爾蒸多甌墮下釜

中也甌下側開一小孔子常暖水用小竹子注

添釜中勿令水減第一五日用春火如常炊餅

兼夜第二五日兼夜用夏火猛於炊餅第三五

日用秋火以炊餅乍緩乍急兼夜第四五日用

冬火兼夜火暖於炊餅依五行相生用文武助

之藥成即出丹砂以玉椎力士鉢中研之當膩

如麴即可服加以楮實煎丸如梧桐子大每日

食前服一九每日三食計服三九鍊成丹砂二

十兩為一劑二年服盡盡後每十年即鍊服三

兩仍取正月一日起服一月使盡既須每十年

二兩不可旋合宜預煉取一劑

造楮實煎法六月六日收取楮實熟者絞取汁

於銀器內慢火熬成膏接和煎藥末

乾荷散 治陰囊腫痛濕潤瘙癢及陰痿弱

牡蠣燒 蛇床子 乾荷葉

浮萍草各等分

右篩纒末每用兩匙水一大碗同煎三五沸濾去

滓淋潔洗下風寒

黃連茯苓丸 壯水源降心火

御藥院方

卷六

十一

精思堂

黃連兩五

白茯苓兩五

破故紙微炒

菖蒲兩半

右同為細末酒麵糊和丸如梧桐子大每服六十

丸食前溫水送下

延生護寶丹 補元氣壯筋骨固精健陽通和血脈

潤澤肌膚久服益壽延年

兔絲子水淘淨酒浸 肉苁蓉酒浸切

二味浸藥酒各多著要熬膏子

家韭子四兩水淘淨用藥二兩同煮令熟去

乾釋二兩 蛇床子二兩水淘淨去藥焙乾研一兩

晚蠶蛾全者二兩用醋 木香兩

白龍骨一兩用茅香一兩同煮一日去茅香用

鹿茸 桑螵蛸炒香 蓮實去皮炒

乾蓮花藥 葫蘆巴微炒 丁香兩

南乳香別研 麝香別研

右一十五味除乳香麝香兔絲子末外一二二味

同為細末將前兔絲子末三兩用浸藥酒二升

用文武火熬至一半入蕎麥麵兩匙重一兩用

酒調勻下膏子內攪勻次下乳香麝香不住手

攪輕沸熬如糊糊放冷此膏子都要用盡恐硬

御藥院方

卷六

三

精思堂

入酒少許與前藥末和成劑杵搗千余下丸如

梧桐子大每服三十九丸絕早日未出時溫酒入

炒鹽少許送下淨坐少時想藥至丹田以意斟

量漸加丸數如陽道衰精滑者空心臨臥各進

一服

保神丹 壯氣養精調和心腎

白木半斤 鹿茸四兩 柏子人兩

右件三味為細末用菖蒲末四兩酒熬一作薄膏

入白麵四兩熬成膏子和如硬入熟蜜六錢如

梧桐子每服五十九丸溫酒送下食前服

補真丹 接真養氣健脾胃升降陰陽調順三焦

常服寬利胸膈消進飲食性平不燥

沉香 丁香 白豆蔻人

檀香 肉豆蔻已上各 肉從蓉半兩酒浸

牛膝半兩酒浸 巴戟七錢 白木半兩

香附子二兩 縮砂人兩 木香二兩

乳香半兩 乾山藥七錢 穿山甲半兩

青皮二兩 附子七錢炮製 補骨脂一兩

桂去粗皮 沒藥別研 藍黃一兩

茴香半兩 甘草二兩

御製此方 卷六 精思堂

蒼木三兩酒浸三日取出焙未乾

右為細末酒浸餛餅為丸如梧桐子大每服八十

丸至一百丸空心溫酒或鹽湯下

金鎖丹 凡人中年之後急務建助秘真之術以代

殘年不衰矣若每日一服至老無痿之理其治不

可具陳

桑螵蛸微炙 晚蠶蛾是雄者 紫稍花

蛇床子微炒 遠志去心 鹿茸精炙

川茴香炒已上 穿山甲炙片 海馬二對

續斷三錢 石燕子一對炭火 赤

麝香研一 南乳香研二 木香二錢

黑牽牛頭末三錢

右件一十五味搗羅為細末用酒煮薄麵糊和丸

如梧桐子大每服五十九溫酒下空心及晚食

前各一服其功不可言也如不及作丸只作散

服更妙

九子丸 強陰補腎益子精倍氣力

鹿茸一兩刮去毛酥塗炙令黃色其味甘酸其

性溫無毒主男子腰腎虛冷脚膝少力夜多

異夢精溢自出助陰

御製此方 卷六 精思堂

肉從蓉四兩酒浸三宿切焙化其味甘酸鹹其

性溫治男子絕陽不興女子絕陰不產潤五

臟長肌肉暖腰膝益精令人有子

仙茅一兩以糯米泔浸三宿用竹刀刮去皮於

槐木砧子上切陰乾其味辛其性溫主丈夫

虛損老人失溺無子久服通神強記壯筋骨

益肌膚長精神明目彭祖單服

遠志一兩去心其味苦其性溫主傷中補不足

除邪氣利九竅益意惠聰耳明目強志不忘

久服輕身不老好顏色益精神陰氣

續斷一兩槌碎去筋脈酒浸一宿其味苦辛其

性溫主助氣潤血脈補不足

蛇床子一兩微炒其味苦辛其性平主男子

陰痿濕痿久服輕身好顏色強陰令人有子

巴戟一兩去心其味辛甘其性溫主陰痿強筋

骨安五臟補中增志益氣

覆香子細上者微炒其味辛其性平主膀胱腎

間冷氣國人重之云有助陽道用之一兩

車前子一兩其味甘其性平微寒主男子傷中

強陰益精令人有子明目利水道

御藥院方

卷六

十五

精思堂

右件藥已上計九味搗羅為細末用鹿角脊髓五

條去血脈筋膜以無灰酒一升煮熬成膏更研

爛同煉蜜少許和丸如梧桐子大每服五十九

溫酒下空心服不足者能補痿者能建滑者能

澁弱者能強久服延年不老令人多子

神明補心丹 治心氣不足神志不足恍惚多驚虛

煩少睡心情沉黙惡聞人聲一切心虛之證並可

常服

遠志心法

紫石英飛

石菖蒲各八錢

熟地黄

白茯苓去皮各

麥門冬心法

卷柏去根

人參去蘆

丹參

黃耆

白朮

澤瀉

山茱萸

防風

秦艽

桔梗已上各

柏子人

川薑各半

乾山藥

白欬

芍藥

石膏飛

鐵粉飛

神麴炒

當歸

半夏生薑

牡丹皮各二錢

朱砂研飛四錢

右件為細末入朱砂令勻煉蜜和丸每兩作一十

丸朱砂為衣每服一九煎人參湯化下溫酒亦

御藥院方

卷六

十六

精思堂

得不拘時候

延生丹 治丈夫婦人虛損五勞七傷腹內一切痛

大便滑小便數或小便不通男子小腸膀胱氣病

婦人經脈閉赤白帶下酒食多傷大人小兒吐逆

不定諸塊積聚寒疝氣疰亦治中惡鬼疰傷屍勞

疾久嗽水腫瘡痢脚氣病

辰砂別研

木香

沒藥

礞砂別研

白朮

人參

沉香各半

附子炮裂

葫蘆巴各半

右已上並為極細末同研勻用大蘿蔔去頂用銀

匙剉作罐子將已剉出蘿蔔絞取汁積在碗內
 入藥末一重旋以銀匙捺蘿蔔汁在上再一層
 如上法若汁不透用銀筋匙投之令入藥及八
 分蘿蔔頂蓋之用竹簽簽定如一個蘿蔔盛藥
 不了即用三兩個分盛之先用紙封閉次用鹽
 泥固濟周回約一指許用木炭火煨令通赤開
 藥有香方出火藥罐子不動只於燒處存放至
 次日去泥開罐子以銀匙取藥在磁器內揉和
 令勻為丸如要乾再入蘿蔔汁和令得所丸如
 小豆大每服一十九粒嚼三九吞七九空心溫
 酒下或米飲亦得日二服臨時量力加減服之
 茯苓散 治腎氣不能攝精心不能攝念或夢而泄
 或不夢而泄

御藥院方

卷六

一七

精思堂

白茯苓去皮五兩
 右為細末每服五錢溫水調下空心食前
 烏銀九

- | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 牛膝 <small>去蘆頭</small> | 覆盆子 | 葶澄茄 <small>去枝</small> |
| 巨勝子 <small>炒二兩</small> | 肉桂 <small>去皮</small> | 白茯苓 <small>去皮</small> |
| 吳白芷 | 甘菊花 <small>淨</small> | 遠志 <small>去心</small> |
| 熟乾地黄 <small>焙</small> | 旋覆花 | 旱蓮草 <small>去枝</small> |

已上各一兩旱蓮草加倍方妙
 右除巨勝子外同為細末再與巨勝子拌勻酒糊
 丸如梧桐子大每服五十九至六十九食前溫
 酒送下服至七日覺陽氣堅壯是驗久服黑髮
 鬢益子精神効不可具述

柏子仁丸 補益元氣充實肌膚

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 山茱萸 <small>四兩</small> | 柏子仁 <small>半兩</small> | 遠志 <small>去心</small> |
| 覆盆子 <small>兩</small> | 山藥 <small>另取末</small> | |

右為細末用山藥白麪同酒煮糊丸如梧桐子大
 每服三十九溫酒下空腹食前日進二服其效

御藥院方

卷六

一七

精思堂

如神

五香驚甲散 治五臟虛勞氣攻注四肢無力手足
 疼痛背脾氣刺日漸瘦弱心下氣滿不思飲食

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| 驚甲 <small>醋炙二兩</small> | 京三稜 <small>炮</small> | 白茯苓 <small>兩</small> |
| 人參 <small>兩</small> | 大黃 <small>七錢</small> | 黑附子 <small>半兩</small> |
| 枳殼 <small>兩</small> | 牛膝 <small>半兩</small> | 桂 <small>半兩</small> |
| 羌活 <small>兩</small> | 檳榔 <small>兩</small> | 熟乾地黄 <small>炒半</small> |
| 厚朴 <small>去蘆皮</small> | 五味子 <small>兩</small> | 木香 <small>兩</small> |
| 丁香 <small>兩</small> | 當歸 <small>炒</small> | 白朮 <small>兩</small> |
| 白芍藥 <small>兩</small> | 肉豆蔻 <small>兩</small> | 沉香 <small>兩</small> |

右件藥搗羅為細末每服三錢水一大盞棗三枚

生薑五片同煎至七分去滓服再將兩服滓用

水一盞半煎七分一服

神仙六子丸 治男子氣血衰敗未及年五十歲之

上髭鬚斑白或年少人髭鬚蒼黃若服此藥百日

內變黃白色如黑漆

兔絲子一兩細酒 金鈴子一兩 枸杞子一兩

覆盆子一兩 五味子一兩 蛇床子一兩

何首烏一兩酒浸 地骨皮一兩酒浸

木瓜一兩 船上荷香二兩

御藥院方 卷六 九 精思堂

熟地黃三兩 牛膝三兩酒浸

右件一十二味為細末用前項酒浸兔絲子酒澄

清作麵糊為丸如梧桐子大每服五十九空心

食前溫酒送下日進一服如要疾黑前件藥內

加人參茯苓石苜蒲各一兩若服此藥大忌蘿

蔔生韭薤蒜菜常服養精髓養氣血壯筋骨補

腎水滑肌膚駐容顏黑髭鬚此藥効依驗

兩炒丸

半夏六兩切 龍骨六兩

木豬苓六兩切

右件先用生薑一斤切作片子換熱水洗半夏七

返去生薑不用只將半夏一味同木豬苓一處

拌勻炒半夏微乾碾為半夏為末用無灰酒打

麵糊為丸如梧桐子大用銀器中炒藥丸子用

木炭五斤炒藥丸子不犯銅鐵用新磁罐子一

个只用龍骨養藥丸子擇去木豬苓不用每日

空心五十九覺手足暖住服此藥補下元養精

令人少病大安三年七月二十三日本院制仲

湯送

辰砂遠志丸 安神鎮心補腎益志治驚悸消風痰

御藥院方 卷六 三十 精思堂

止頭眩

石苜蒲 遠志去心 人參

茯苓 川芎 山芋

鐵粉 麥門冬 天麻

細夏麴 天南星剉炒 白附子生川已上

細辛兩 辰砂藥一兩四錢入

右為細末生薑五兩取汁入水煮麵糊為丸如棗

豆大以朱砂為衣每服三五十九臨臥生薑湯

下

鐵甕先生瓊玉膏

新羅人參二十四兩青一 生地黃一十六斤淨

白茯苓四十九兩木 白沙蜜斤一十

右件人參茯苓為細末蜜用生絹濾過地黃取自

然汁搗時不用鐵器取汁盡去滓用藥一處拌

和勻入銀石器或好磁器內封用如器物小介

兩處盛用淨紙二三十重封閉入湯內以桑柴

火煮六日如連夜火即三日夜取出用蠟紙數

重包瓶口入井內去火毒一伏時取出再入舊

湯內煮一日出水氣取出開封取三匙作三晝

祭天地百神焚香設拜誠至端心每晨朝以二

匙溫酒化服不飲者白湯化之此膏填精補髓

腸化為筋萬神具足五藏盈溢髓實血滿髮白

變黑返老還童行如奔馬日進數服終日不食

亦不飢開通強記日誦萬言神識高邁夜無夢

想人年二十七歲以前服此一料可壽三百六

十歲四十五歲以前服者可壽二百四十歲六

十三歲以前服者可壽一百一十歲六十四歲

以上服之可壽至百歲服之十劑絕其慾修陰

功成地仙矣一料分五處可救五人癱疾分十

處可救十人勞瘵修合之時沐浴志心勿輕示

御藥院方 卷六 精思堂

人每服二匙溫酒化下空心服之

補陰丹 滋益腎水真陰鎮伏心火大熱堅強骨髓

補養精氣治發熱怔忡脚膝痺弱通調血脈潤澤

肌膚使心腎交泰熱無妄動其功不可盡述

磁石紫者燒赤醋淬七次 鹿茸三兩去

生乾地黃八兩 石斛三兩 澤瀉三兩

官桂一兩半 杜仲二兩細切 山茱萸三兩

右件八味除磁石外搗羅細末後入磁石末同研

勻煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九溫酒送

下或鹽湯送下亦得空心食前日進一服服兩

月覺功一百日見効

草靈丹 補腎益真滋榮養衛填實骨髓堅固牙齒

聽耳明目延年不老悅顏色黑髮

生地黃三十二兩細切用無灰酒一

鹿茸二兩為末 肉苁蓉二兩酒浸七日

牛膝七兩酒浸 桂心一兩 蛇床子一兩

兔絲子一兩酒浸七日 遠志一兩

大棗一百枚

右為細末元方煉蜜和丸今改 如梧桐子大每服

三十九溫酒下

御藥院方 卷六 精思堂

煨腎散 治腎經積水不散流於經絡腿膝舉急腫

悶往來疼痛服之

甘遂生 木香一兩

右件搗羅為細末每服用藥二錢以猪腰子一

隻薄批開去筋膜摻藥在內淹勻用荷葉裹定

外用濕紙五重以麻線纏定更用水蘸過乾濕

得所於文武火內煨熟紙乾為度臨臥細嚼少

用溫酒送下當下黃水是其効也

健步丸 治乾濕脚氣腿膝麻痺冷痛足下隱痛行

步艱難下注生瘡並宜服之

御製方

卷六

三

精思堂

石南葉

天南星炮

羌活去

天麻去

薏苡人

防風去

續斷

蘇蘇

黃耆去

當歸去

石斛去

牛膝切

檳榔半

乾木瓜兩

威靈仙兩

自然銅一兩

右件為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五

十九溫酒下或木瓜湯下食前服

通津丸 治一切腫滿風濕脚氣變成腫氣宜導小

水愛飲水者常服妙日日見效

赤茯苓

木通

大腹子

木香

破故紙炒

葶澄茄

苦苧蘆上

白牽牛五兩

右件為細末水麵糊為丸如梧桐子大每服五六

十九漸加至七八十九陳皮燈心湯下食後或

食遠亦得

乳香沒藥丸 治遠年日近風寒濕氣攻注脚膝或

腫或筋筋舉不能屈伸脚不能踏地及一切疼痛

往來不已並宜服之

乳香研

沒藥研

骨碎補去

御製方

卷六

廿四

精思堂

威靈仙去

縮砂仁

白附子

甜瓜子

牛膝酒

當歸去

乾木瓜

地龍去

木鱉子各

白牽牛三兩

右件一十三味同為細末酒麵糊為丸如梧桐子

大每服二十九溫木瓜湯下溫酒亦可不拘時

候服

木瓜煎丸 治脚氣腫滿不仁或時作痛

甜瓜子炒

天麻兩

薏苡仁兩

乳香研

白龍去

右件為細末與乳香拌勻用大木瓜一枚酒一升同熬膏子搜和為丸如無新木瓜以乾木瓜二兩為細末熬膏子亦可丸如梧桐子大每服五十九煎紫蘇葉湯下或溫酒亦可空心或食前

難

百倍丸

治男子婦人腰膝疼痛筋脈拘攣行步艱

敗龜

虎骨二味各醋浸一宿

肉苁蓉酒浸一宿

乳香別研

牛膝酒浸一宿

木鱉子去殼

自然銅醋淬七次

破故紙炒已上十味

御製方

卷六

十一

清心堂

右件為末以浸苁蓉牛膝酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十九溫酒下

增損四斤丸 治風寒濕冷搏經絡或痛或不仁及

諸脚氣正並宜服之

牛膝

天麻

木瓜各半斤

全蠍四兩已上四味別對用乾 乳香四兩別研

右件藥搗羅為細末研勻用浸藥酒煮麵糊為丸

如梧桐子大每服三十九至五十九溫酒下食

前服

空志膏 寧神定志安眠止痛

朱砂半兩別研

乳香半兩別研

人參一兩

酸棗人微炒

右件人參酸棗仁同為細末入乳香朱砂令勻煉

蜜為丸如櫻桃大每服三九溫人參湯化下荆

芥湯化下亦可

續斷丸 活血通關節行經絡引滯氣散寒濕治筋

攣骨痛

續斷二兩

草薺對碎

牛膝酒浸一伏時

乾木瓜二兩

杜仲去毒皮對碎炒

右五味同為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九

御製方

卷六

其

精思堂

細嚼溫酒下食前

酸棗人煎 與定五年正月二十六日權直長張古

合藥后升酒作一升 治不得睡

酸棗人取末二兩半

乳香二兩

蜜四兩

牛黃別研

糯米二合

丹砂半兩

右六味用酒半升和蜜等一處慢火煎如稀餈每

服一匙頭溫酒調下腹空時服

救生丹 治男子婦人小腸元氣上攻心腹痛并男

囊偏腫痛消積聚補丹田

荆三稜三兩

廣茂二兩

乾漆二兩半

朱砂 <small>二兩</small>	川茴香 <small>一兩</small>	破故紙 <small>一兩</small>
葫蘆巴 <small>半兩</small>	川苦棟 <small>半兩</small>	芭戟 <small>半兩</small>
紅豆 <small>兩</small>	縮砂仁 <small>兩</small>	海蛤
當歸	半夏 <small>湯洗</small>	礞砂
沒藥	馬蘭花 <small>炒</small>	芫花 <small>醋洗 各色已</small>
水蛭 <small>一錢 炒</small>	紅花 <small>一錢</small>	附子 <small>製去皮 兩半炮</small>
紅娘子 <small>二錢 去梗米 同炒 梗米不用</small>	蛤蚧 <small>一個 酥炙</small>	
右為細末醋麵糊和丸如梧桐子大每服三五丸		
空心食前溫酒送下		
凌陽子木香丸	滋陰養正補腎秘真堅骨髓調榮	
御製此方 卷六 精思堂		
衛悅顏色黑髭鬚補益之法不可具陳		
山茱萸 <small>一兩 去核</small>	蓮花 <small>一兩</small>	破故紙 <small>兩</small>
白茯苓 <small>兩</small>	木香 <small>兩</small>	胡桃仁 <small>半斤 研</small>
兔絲子 <small>五兩 酒浸 三宿 焙乾</small>		
右件搗羅為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服七		
十九溫酒送下空心每日一服		
養壽丹 補五臟散麻痛注容顏黑髭鬚壯筋骨久		
服不老		
遠志 <small>心法</small>	菖蒲	巴戟 <small>心法</small>
白朮	茯苓	地骨皮

續斷	枸杞子	甘菊花
細辛	熟地黃	車前子
何首烏	牛膝	菴蓉
兔絲子 <small>酒浸 三味</small>	覆盆子 <small>各半</small>	
右一十七味為細末煉蜜和就復白千杵丸如梧		
桐子大每服二十九空心溫酒下		
牛膝丸 治風氣下疰脚膝無力筋骨酸疼或上攻		
頭面腫痛通身疼倦壯熱並皆治之		
菴蓉 <small>酒浸</small>	牛膝 <small>酒浸</small>	防風 <small>去蘆</small>
葶藶 <small>切碎</small>	海桐皮 <small>去粗</small>	自然銅 <small>搗碎</small>
御製此方 卷六 精思堂		
威靈仙 <small>土去</small>		
去皮	金毛狗脊 <small>去毛</small>	川烏頭 <small>已生</small>
地龍 <small>去土</small>	沒藥 <small>半兩 另研</small>	乳香 <small>半兩 另研</small>
右一十四味搗羅為細末酒麵糊為丸如梧桐子	骨碎 <small>補去毛</small>	木鱉子 <small>去殼 另研</small>
大每服五十九溫酒送下食前		
八物腎氣湯 平補腎氣堅固牙齒活血駐顏益壽		
熟地黃 <small>兩</small>	山藥 <small>兩</small>	山茱萸 <small>兩</small>
桂 <small>兩</small>	澤瀉 <small>兩</small>	牡丹皮 <small>兩</small>
白茯苓 <small>兩</small>	五味子 <small>兩</small>	
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九溫		

酒下空心食前日二服

三才丸 滋陰養血潤補不燥

天門冬法 熟乾地黄 人參上各等分

右件藥同為細末蜜麴糊為丸如梧桐子大每服

七十九九空心溫酒送下或米飲亦可服之

保神丸 調和心腎補養精神

白茯苓兩二 黃連兩二 菖蒲兩一

遠志兩一 朱砂半兩

右為細末水浸餅和丸如梧桐子大每服五十

九煎入參湯下臨臥漸加至八十九

御製院方 卷六 一 芫 精思堂

燒肝散 治五勞七傷三十六風二十四冷膈腹寒

痛四肢少力困倦黃瘡久患諸藥不能治者並皆

救之

黑附子兩一 縮砂人 川芎

青皮 陳皮 肉桂

益智 肉豆蔻 紅豆

山茵陳 柴胡去 芍藥

桔梗 白木 蒼木去

遠志心去 乾薑 白芷

良薑 細辛 蓬莖茂

蕪荑 華撥 大椒半兩

右二十四味為細末每服五錢猪羊肝四兩批開

蕪白二枚細切搽藥蕪重重盡紙裏三五重文

武火燒香熟空心食前喫白麵燒餅二箇壓米

飲送次更喫好酒三兩盞頻頻喫此藥多驗

預知子丸 治心氣不足志意不定神情恍惚語言

錯忘忪悸煩鬱愁憂慘戚喜驚多恐健忘少睡夜

多異夢寤即驚魔或發狂眩暴不知人並宜服

預知子去 人參去 白茯苓去

遠志 石菖蒲 山藥

御製院方 卷六 三 精思堂

枸杞子 黃精 柏子仁

地骨皮去 茯神去 朱砂

右件一十二味搗羅為細末煉蜜丸如龍眼核大

更以朱砂為衣每服一九細嚼人參湯下不拘

時候服

橘皮煎丸 治久虛積冷心腹疼痛嘔吐痰水飲食

減少脇肋脹滿臍腹弦急大腸虛滑小便利數肌

膚瘦瘁面色萎黃肢體怠墮腰膝緩弱及治痰癖

積聚上氣咳嗽久瘧久痢腸風痔瘻婦人血海虛

冷赤白帶下久無子息並宜服之

陳橘皮去穢一兩 石斛 巴戟心去

牛膝 內莖蓉 兔絲子

鹿茸 杜仲 陽起石

肉桂 厚朴 乾薑炮

京三稜 甘草兩一 葶藶

末並修事 各秤三兩

右為末熬膏用酒五升於銀石器內將橘皮末於酒內煎如餲傾在諸藥末內一處攪和搜勻更

入臼內搗五百杵丸如梧桐子大每服二十九

至三十九空心溫酒下鹽湯亦得

御藥院方 卷六 三 精思堂

走馬茴香丸 治丈夫積年傷憊久冷及治瘵氣

黑附子去皮 桂 胡蘆巴

馬蘭花炒 青橘皮白去 舶上茴香

川棟子炒 乾薑炮 巴戟心去

破故紙各半 右為細末酒糊和丸如菉豆大每日空心鹽湯下

二十九

柏子人丸 補益元氣充實肌膚

山茱萸兩四 柏子人 遠志

覆盆子兩一 山藥兩一

右為細末用山藥木添麴酒煮成糊丸如梧桐子

大每服三十九溫酒下空腹食前日二服其效

如神

大建中湯 療內虛絕裏急少氣手足厥逆少腹墜

急腹滿弦急不能食起即微汗出陰縮或腹中寒

痛不堪勞苦唇口舌乾精自出或手足作寒作熱

而煩苦酸疼不能久立多夢寤補中益氣

黃耆二錢 人參一錢 當歸一錢

桂心三錢 半夏二錢 芍藥一錢

生薑八錢 甘草一錢 黑附子半錢

棗一

右咬咀都用水五盞煎至二盞去滓分三服

樂令黃耆湯 治虛勞少氣胸心痰冷時時驚悸心

中悸動手脚逆冷體常自汗補諸不足五臟六腑

虛損腸鳴風濕榮衛不調百病又治風裏急

黃耆 人參去 陳皮白去

常歸 桂心 細辛去

前胡 芍藥 甘草炙

茯苓去 麥門冬去心各一錢 生薑二錢

右咬咀都用水四盞煎至二盞半去滓分二服

封髓丹 降心火益腎水

黃藥三兩 縮砂人一兩 甘草

右件搗羅爲細末水煮麵糊稀和丸如桐子大每

服五十九丸用菴蓉半兩切作片子酒一大盞浸

一宿次日煎三四沸濾去滓送下空心食前服

仙茅丸 治男子真氣不足常服強筋骨益精神明

目黑鬚髮神驗不可具述

仙茅二斤糯米泔浸五日浸去赤水用銅刀去

皮銅刀剉取一片夏月止浸三日風乾不

見 蒼朮二斤泔浸五日或三日

去皮焙乾秤取一斤

馬蘭花 船上茴香半斤 椒紅二斤醋炒

熟乾地黄一斤焙乾 柏子人半斤

右件爲細末醋煮糊爲丸如桐子大酒丸亦得每

服三十九至四十九或五十九空心食前溫酒

下一日二服漸加至七八十九

覆盆子丸 壯筋骨益子精明目黑鬚髮

覆盆子去毒 遠志去心

杜仲去皮炒 柏子人林香另

枸杞子焙乾 地膚子微焙

破故紙鹽焙 山茱萸取肉

山藥另取末 胡桃人去皮

右件一十味爲細末將山藥末同白麵酒調爲糊

丸如梧桐子大每服四五十丸空心溫酒下

助神丸 治陰器不能運用滋陰助陽益血氣黑髮

髮潤澤皮膚榮養肌肉明目壯筋骨益精補髓其

效不可細述

何首烏用千里水淘梁米泔浸軟川竹刀去皮

爲雄 生地黃投於水中揀沉底者於柳木甌中鋪勻

瓦釜中用千里水木甌安於釜上桑柴

火蒸蒸得氣通透日中曝乾用生地黃自然汁

酒勻再曝乾如此蒸曝九返曝乾秤一斤

當歸淨洗去蘆頭 穿心巴戟七兩酒

五味子去枝炒 熟

右件五味同於木杵臼搗羅爲細末用地黃自然

汁銀石器熬成膏爲丸如桐子大用磁器中貯

放每服七十九空心食前各進一服用溫酒與

地黃煎各半相和送下畏蕪蕪忌猪羊血至如

悞食亦無及惡只是解當日藥力不爲效如小

便渾濁加澤瀉七兩 如大便秘澀加柏子人

七兩 如氣不順加木香七兩大和元年九月

用此味

舊蒲丸 建陽道壯筋力快氣入小腸

商枳殼一分 甘草三十個 如豆許大 巴豆

黑巴豆一分 全蠍一分 焦色內 木香半

山茱萸去核 木賊一分 苜蒲兩

黑牽牛生 兩

右同為細末用茴香半兩酒熬三二十沸去滓取

酒作麵糊和丸如梧桐子大每服三五十九食

前溫酒下

通絡丸 益血明目通經絡壯筋骨

生乾地黃兩 覆盆子兩 菴蓉二兩 酒

巴戟一兩 酒 川芎兩 白芍藥兩

當歸一兩 枳殼二兩 木香兩

川棟子兩 地膚子兩 楮實子兩

山茱萸兩 遠志去心 茯神去皮

五味子兩

右為細末酒麵糊為丸如梧桐子大每服五十九

溫酒送下空心米飲送下晚食前亦得

加減仙茅丸 常服強筋骨益精神明目黑髮髮神

驗不可具述

仙茅二斤 米泔浸 五日浸 去赤水用 銅刀子 去

日乾秤 蒼朮二斤 米泔浸 五日或 二日

白茯苓去皮 秤 車前子二兩 茴香炒 香

枸杞子斤 生乾地黃四兩 乾秤 柏子人搗 炒黃

熟乾地黃四兩 乾秤 右件為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五

六十九空心食前溫酒下日二服漸加至七八

十九

酸棗飲 治虛煩不得眠助下氣氣衝心

酸棗人炒 秤半 人參一錢 去 白朮錢

陳皮焙 乾秤 白 五味子一錢 桂心半錢

御藥院方 卷六 三五 精思堂

茯神去皮 錢

右咬咀每服稱五錢水一盞半入生薑七片去滓

溫服不計時候

五加皮丸 治風寒濕氣合而成痺遍身疼痛難以

轉側筋脈拘攣不能屈伸及頭目旋暈心腹脹悶

小便赤澀大便秘滿

五加皮 芍藥 當歸 牛膝

大腹子連皮 芎 石南葉 薏苡人

赤小豆 麻黃去 杏仁各半

木瓜 獨活 杜仲炒

草薺各一兩 牽牛頭末二兩

右件為細末酒浸餗餅為丸豆大每服三四十九

木瓜湯下不以時候

禹餘糧丸 治本氣不實陰陽不調積月累年漸至

虛怯宜滋補本氣當服禹餘糧丸

禹餘糧七兩 人參 肉桂皮

石斛去 肉苁蓉酒浸三日焙乾

紫石英 龍骨 桑寄生

川烏頭皮去 杜仲炒 遠志去

御藥院方 卷六 精思堂

五味子焙 澤瀉 當歸

乾薑各二兩 川椒子去 牡蠣燒

甘草各一兩

右為細末煉蜜和為丸如梧桐子大每服三十九

至二十九米飲下食前日進二服量疾勢大小

加減丸數服之

延齡丹 脾胃不足真氣傷憊肢節困倦舉動乏力

怠墮嗜臥而無潤澤可思飲食氣不宣暢少腹裏

急臍下疔痛及奔豚育腸氣攻衝臍腹發歇無時

常服補五臟養真陽和血脈壯筋骨

牛膝酒浸二宿 菴蓉酒浸二宿 金鈴子皮去

補骨脂炒 川茴香七錢 鹿茸毛去

益智人 檀香 晚蠶蛾炒

沒藥研 丁香 青鹽

川山甲已上各半兩 沉香 香附子炒

薑黃 薯蕷 木香

巴戟去 甘草各一兩 乳香研

白朮 青皮 蒼朮三兩

右件藥二十四味搗羅為細末酒煮麩糊和丸如

梧桐子大每服四十九空心溫酒下或煎茴香

御藥院方 卷六 精思堂

湯下

養真丹 治陰衰消小痿弱不舉

補骨脂炒 益智人 晚蠶蛾炒

沒藥研 丁香 青鹽研

川山甲各半兩 茴香 白朮

乳香研 南青皮三錢 沉香剉

香附子炒 薑黃 薯蕷

木香 甘草各一兩 巴戟去心已上

川棟子去皮及子 牛膝酒浸一宿

菴蓉酒浸一宿 檀香七錢 蒼朮三兩

蛤蚧一對 縮砂人兩半

右件藥二十五味搗羅為細末酒浸麩糊為丸如
梧桐子大每服四十九空心及食前溫酒送下
日二服

巴戟九 治男子陽道衰弱令人多子長命身輕矣

巴戟酒浸 益智 杜仲

菟絲子酒浸 茯苓 遠志

蛇床子 乾山藥 牛膝酒浸

續斷七兩 山茱萸 五味子兩二

肉苁蓉酒浸

御藥院方 卷六 精思堂

右件為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九
或三十九空心溫酒下服五日筋骨輕健百日
面如童子手心如暎血明白肌體眼目清爽若
要秘精加柏子人三錢精虛加五味子一兩半
陽道不興加續斷一兩半

菘蓉丸 壯元氣養精神

菘蓉酒浸 楮實子 枸杞子

地膚子 金毛狗脊去毛 五味子

覆盆子 兔絲子 乾山藥

補骨脂炒 遠志心 石菖蒲

蘇解 杜仲去皮 熟乾地黄

石斛根 白茯苓去皮 牛膝酒浸

澤瀉 柏子人微炒別研已

山茱萸酒浸取肉一兩

右件為細末酒麩糊為丸如梧桐子大每服六七
十九食前溫酒下日可一二服

紫芝丹 降心火益腎水秘真氣建陽事

紫芝兩 朱砂兩 白石英兩

石決明兩 黃連兩 黃芩兩

茯苓兩 白礬 瓜瓣兩

御藥院方 卷六 精思堂

右件藥搗羅細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十
九溫酒下食前服

永水丹 補陰氣益子精常服百日效

蒼朮米泔浸一宿 熟乾地黄兩

天門冬入心 白茯苓兩 何首烏

地骨皮兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空
心溫粥飲湯送下漸加至八十九

固陽丹 養氣守神固精壯陽大補益真氣服之有
非常之效

固陽丹 養氣守神固精壯陽大補益真氣服之有
非常之效

黑附子炮三兩 川烏頭炮二兩 白龍骨一兩

補骨脂七錢 川棟子七錢 舶上茴香七錢

右件六味各修製畢碾羅為細末酒打麵糊為丸

如梧桐子大每服五十九空心食前溫酒下晚

食前亦得

秘元丹 助陽消陰正氣溫中治內虛裏寒冷氣攻

心脇肋脹滿臍腹刺痛嘔逆泄瀉自汗時出小便

不禁陽氣衰微手足厥久虛下冷真氣不足一切

虛冷並宜服之

白龍骨三兩 訶子十個 縮砂一兩

御製方 卷六 聖 精思堂

靈砂二兩

右四味為細末煮糯米粥丸如麻子大每服空心

酒送下兩丸臨臥冷水下三丸忌葱茶葵菜等

物

沉麝鹿茸丸 大補益脾胃強壯筋骨辟除一切惡

氣令人肉實五臟外充肌膚補益陽氣和暢榮衛

沉香一兩 麝香別研 鹿茸一兩

右件藥三味同研拌令勻水煮日麵糊和丸如梧

桐子大每服三十九或五十九煖酒送下空心

服

益壽地仙丸 補五臟填骨髓續絕傷黑髮和血

駐顏輕身健體延年益壽補益丹田清頭目聰耳

聽

甘菊花一兩 枸杞二兩 巴戟天去心二兩

肉苁蓉

右四味為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十

九空心鹽湯下溫酒亦得

人參遠志丸 治心氣不安驚悸恍惚神思不寧

人參去蘆 遠志去心 黃耆半兩

酸棗人兩半 桂二錢 桔梗炒黃二錢

御製方 卷六 聖 精思堂

丹砂半錢 天門冬半七錢 菖蒲七錢

白茯苓去皮七錢

右為細末蜜為丸如豆大每服二十九米飲下加

至三十九下不拘時候

人參補虛湯 治虛勞少氣不足四肢困弱嗜臥少

力心中悸動夜多盜汗常服補諸虛不足健中進

食

黃耆 人參 陳皮白法

當歸炙 桂皮 細辛去葉

前胡 白芍藥皮去 甘草炙

白茯苓皮去 麥門冬心去 半夏炮

熟乾地黄已計各

右一十二味為細末每服三錢水一大盞入生薑

五片棗兩箇煎至七分稍熱服食前

神功七寶丹 補益真元固精實髓通暢百脈悅澤

顏色久服延年益壽強力壯神

臘臍脂兩三 黑附子炒三 陽起石火燒地赤

鍾乳粉兩二 鹿茸去毛塗酥 龍骨兩二

沉香兩一 麝香兩半

右件八味同搗研羅為細末再入麝香研勻酒煮

麵糊為丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒

送下

參耆散 主虛寒自汗調榮衛補不足

人參 黃耆 當歸

芍藥 白朮 五加皮

官桂 甘草 前胡

秦芫已上各

右為細末每服五錢水一盞入生薑五片棗二枚

去核同煎至七分去滓溫服不拘時候

大一守中丹 治陰氣不足虛熱內生陰痿不振

熟乾地黄 天門冬心去 遠志心去

白茯苓皮去 草薺 實子

木香已上各 人參 地骨皮

牛膝焙 地膚子炒香已上

右一十一味同為細末煉蜜和丸如梧桐子大每

服五十九溫酒送下空心食前服或用溫水下

亦得加至八十九

青娥丸 秘精黑髮治風長年

破故紙六兩用芝麻同炒變 杜仲五兩

胡桃二十五斤去

右三味同再搗為細末復雜令勻煉蜜和為丸劑

再杵一千餘下丸如梧桐子大每服三十九至

五十九空心溫酒下鹽湯亦得

沉香驚甲散 婦人門 治室女榮衛不調經候凝滯或

時頭目昏悶上隔積涎四肢不利五心煩熱飲食

進退多困少力

沉香七錢 驚甲一兩半九肋 木香一兩

甘草七錢 常山一兩 當歸一兩

柴胡一兩 人參一兩 白茯苓一兩

麥門冬一兩 青橘皮去白 陳柏皮去白

生地黄兩一 半夏 檳榔七錢

右件搗羅為細末每服二錢水一盞入生薑三片

煎至七分去滓溫服空心日中臨臥各一服

天真丸 治先曾損血及脫血肌瘦絕不入食行步

不得手足痿痺血氣枯槁形神不足如滑腸絕不

入食守死無法可治者如咽喉窄下食不得只能

五七粒漸漸服之粒數多便可養起久服令人面

色紅潤無血者便生血并津液大便燥者服之自

潤實中有虛虛中有實皆可治之

羊肉七斤并去脂者為妙先去筋膜 肉苁蓉兩十

御藥院方 卷六 聖 精思堂

當歸一十二兩 濕山藥十兩

天門冬焙去心

右將前件四味置之在肉內裏定用麻縷纏定用

上色糯酒四瓶煮令酒盡慘在藥內再入水二

升又煮直候肉如泥再入黃耆末五兩人參末

三兩白朮末二兩熟糯米餅焙乾為末一十兩

前後藥末同劑為丸如梧桐子大一日約服三

百粒初服百粒旋加至前數服之定覺有精神

美飲食手足添力血脈便行輕健如久瘖不言

者服之半月語言有聲或云血下喘咳嗽行步

不得服之必效恐藥難丸即入宿餽餅五七枚

焙乾為末同搜和入白中搗千百下丸之用溫

糯酒送下空心食前服

巨勝丸一名補 治男子筋痿少腹不利小便頻數

腰背疼悶不能久立則腿膝麻冷難以屈伸心意

多忘耳內蟬鳴久服不開滋血氣壯元陽鬢髮返

黑令人不老添精補髓益壽延年神效不可具述

或婦人服之亦可

巨勝子 甘菊花 旋覆花上

吳白芷切 白茯苓去黑 肉桂去粗

御藥院方 卷六 聖 精思堂

葶澄茄去枝 牛膝去頭 覆盆子去枝

熟乾地黄焙 遠志去心 旱蓮子去莖

右件一十二味各修事畢除野芝麻外共為細末

再與野芝麻同碾羅勻和酒煮麵糊為丸如梧

桐子大每服四五十九空心食前溫酒下日進

一兩服久服忌羊血生葱蘿蔔等

補虛黃耆湯 治諸虛不足少腹急痛脇肋膜脹臍

下虛滿胸中煩悸面色萎黃唇口乾燥少力身重

胸滿短氣腰背強痛骨肉痠疼行動喘乏不能飲

食或因勞傷過度或因病後不復並宜服之

人參三兩

常歸三兩

白木三兩

黃耆三兩

桂三兩

甘草三兩

白芍藥六兩

右為燼末每服三錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至七分去滓溫服食前日進三服

烏銀丸 治白髮之木并一切諸風

吳白芷

甘菊花

旋覆花

桂心

巨勝子

白茯苓

葶澄茄

牛膝去

覆盆子半兩

蓮子草二兩

御藥院方

卷六

聖

精思堂

右件為細末好酒煮麵糊為丸如梧桐子大每日空心每服三十九溫酒下更喫一二盞動藥力

三才丸 滋陰養血潤補不燥養氣和血養神

天門冬三兩

生地黃三兩

右用柳篋算以酒灑之九蒸九曝乾

人參二兩

右同為末以棗肉為丸如梧桐子大每服三十九

食前溫酒送下日進三服歲久為驗

五味子丸 治肝腎俱虛收斂精氣補陰養陽充悅

肌膚進美飲食

菴菴

蛇床子炒

兔絲子

遠志去

五味子各四

右為細末酒麵糊為丸如梧桐子大每服四十九

空心溫酒下

秘真丸 治腎水真陰本虛心火狂陽過甚心有所欲速於感動應之於腎疾於施泄故服此藥秘固

真元降心火益腎水

蓮花藥一兩

白茯苓去

縮砂人半兩

益智人一兩

黃藥二兩

甘草二兩

半夏

木猪苓去皮二錢

御藥院方

卷六

聖

精思堂

右為細末水浸餅為丸如梧桐子大每服四五

十九空心溫酒下食前

太和膏 治諸虛不足氣血虛衰精神減少肢體瘦

体行步艱難久而服益精補壯元陽

當歸三兩

川芎二兩

肉桂從

舶上茴香六兩

川苦棟

破故紙

白茯苓

枸杞子

葫蘆巴

遠志去

白木已上各

黃蠟一兩

葱白二十

胡桃分作眼子

右用鹿角三十斤東流河水三十擔同竈鐵鍋二

隻靠鹿頂截角用赤石脂鹽泥於截動處塗固之勿令透氣於甑內蒸一炊時用馬蘭刷就熱湯刷去角上血刺塵垢訖可長二四寸截斷鹿角外將前件藥一十四味拌和停勻先鋪一層角於鍋內角上鋪一層藥如此勻作三層鋪之將河水添在藥鍋內其水於角上常令高三寸用無煙木炭慢慢煎熬常令小沸勿令大滾外一鍋內專以將河水煎湯下勿令大滾如藥鍋內水稍下却於熱湯內取添止令三寸卻取河水添在熱湯內續續倒添至二十四時住火候

御製醫方

卷六

聖丸

精思堂

冷將鹿角撈出川生絹在取汁其藥滓不用外將藥汁如前法再熬更不用客水如膏成滴水中凝結不散方始成膏每服秤三錢暖酒化服空心每服一服改作每服三錢酒一大盞

神効丸 治男子腎氣衰弱陰痿陽事不舉

原蠶蛾 取味連者不以多少去頭足毛羽一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七丸至十

丸臨臥溫菖蒲酒送下

木香燈草丸 治陰形中痛小便澀滯或濃濁不通

木香

紅花

燈草三兩

右件為細末糯米粉酒打糊丸如梧桐子大每服七十九溫酒送下食前日進三服

二靈丹 補暖腑臟祛逐風冷利腰膝強筋骨黑髮

髮駐容顏性溫無毒久服輕身延年不老

何首烏 雄雞各半抹刮搗者俱不犯鐵器內先

排棗一重各孽開上鋪何首烏一重又用棗一重復再鋪何首烏一重令盡次日清河水於藥

上烏指約五指以末用慢火煮候棗極爛并何首烏指軟取出不用藥只揀何首烏入在諸令

水中浸少時用竹刀子刮去黑皮及兩面浮沫令淨竹刀切用薄片子慢火焙乾取淨一斤

牛膝 揀去蘆頭并細梢只取中間者折作半寸以末用酒浸二宿取出焙乾淨半斤

右件一處拌和用石杵臼內搗羅為細末煉蜜和

御製醫方

卷六

五十

精思堂

丸如梧桐子大每日空心溫酒或米飲送下六十九服至半月加至七八十九又服至一月加至一百九服之百日前疾皆去

何首烏丸 補養五臟六腑強筋壯腎黑髮髮堅固

牙齒久服延年益壽駐顏色

何首烏 雄雞各半刮搗者俱不犯鐵器內先

排棗一重各孽開上鋪何首烏一重再上排棗一重復再鋪何首烏一重令盡次日清河水

於藥上烏指約五指以末用慢火煮候棗極爛并何首烏指軟取出不用藥只揀何首烏入清

水中浸少時用竹刀子刮去黑皮極一兩面浮沫令淨竹刀切用薄片子慢火焙乾取淨一斤

右件用石杵臼內搗羅為細末煉蜜和丸如梧桐

子大每日空心溫酒或米飲送下六十九服至
半月加至七八十九又服一月加至一伯九服
之百日前疾皆去

二神丸 治脾腎虛弱全不進食臟腑泄瀉米穀完
出有人全不進食服補脾藥皆不驗授此方服之
頓然能食此病不可全作脾虛蓋腎氣怯弱真元
衰劣自是不能消化飲食譬如鼎釜之中置諸米
穀下無火力雖終日米不熟其何能化嘗記黃魯
直服兔絲子酒浸為末空心日抄數匙以酒調下
十日外飲噉如湯沃雪亦知此理也出本
事方

御藥院方 卷六 至 精思堂

破故紙四兩 肉豆蔻一兩

右為細末用大肥棗四十九箇生薑四兩細切同
煮棗爛去薑取棗剝去皮核用肉研為膏入藥
和杵丸如梧桐子大每服三十九鹽湯下

通經湯 治陰陽升降失常暴感寒邪真氣不足手
足厥冷囊縮或少腹急痛並皆治之

蛇床子三兩 左顧牡蠣三兩

浮萍草三兩 草香附子三兩

磁石二兩 引針試有力者杵如豆
大用絹袋盛煎十遍勿用

用向陽仰泉水一斗同上件藥煎至七升濾粗貯

於瓶中臨臥陰器貯於瓶口中提地戶三七遍薰
浸少時傾於盆子中通手淋射少時

玉鎖丹 治精氣虛滑或遺而洩或夢而脫不能得

禁兼瀋精養氣壯陽

龍骨 蓮花藥 鷄頭實

烏梅肉已上各
等分

右為細末饒山藥熟去皮研如膏和丸如小豆大
每日空心進二十九米飲湯下

固真丹 養真氣補不足治下元衰憊精神減少常
服令人益精髓

御藥院方 卷六 至 精思堂

南乳香半斤 代赭石丁頭 棟丁香

廣木香 沒藥 桂府滑石

舶上茴香 沉香 木通

甘草 朱砂為衣已上十
味各一兩

蓮子心分三

右為細末醋浸宿餗餅丸如鷄頭大選辰火日合

比午時前惡畢合時忌鷄犬婦人陰乾盛在竹

筒子內再選隻火日服一九假令初日初服一
九初二日服二九

一日遇丙丁火
日之類是也

未央丸 治氣血虛弱肢體沉重情思少樂飲食減

少及腎氣衰憊腰腿沉重

巨勝子九蒸 巴戟心法 川椒目

枸杞 甘菊花 菖蒲

人參去蘆頭已

右用金襴袈裟一具東流水洗千遍荷葉裏用文

武火燒稍乾好酒煮爛入藥末為丸如梧桐子

大每服六七十九至百丸空心溫酒或米飲下常

日進二服藥一兩用膏

玉蘂丹 治小腸氣疼痛不可忍欲絕

青木香七錢 茴香兩 蠟稍兩

御藥院方 卷六 精思堂

黑附子地裂去皮 白礬生二 陽起石兩

硫黃細研 硃砂湯化土水飛

右同再研極細酒麵糊為丸如梧桐子大於疾發

時用新綿秤二錢半燒灰與藥十五丸同研熟

酒調下甚者加至二十九即時氣定不上攻須

更即愈久有此疾者日服十九半月小便中常

有如桃膠即根本除矣其效不可具錄

接真湯 治陰病手足厥冷臍腹疼痛真氣不足表

德欲絕者

沉香二錢 丁香二錢 附子地裂去皮

麝香錢一

右為麝末水二盞生薑七片棗二枚去核煎至一

盞瀝去滓溫服只作一服

天雄丸 治真氣不足陽氣衰憊失精腰痛臍腹痠

急及陽事不興男子本氣脫者並宜服

蛤蚧一對 朱砂錢二 沉香三錢

丁香三錢 陽起石三錢 鍾乳粉十錢

木香半錢 紫稍花兩 晚蠶蛾一兩

牡蠣粉半錢 天雄一個 桂半錢

石燕子一對炭火燒 鹿茸半兩

御藥院方 卷六 精思堂

白米半錢 菴蓂半兩酒浸

兔絲子三錢酒浸 龍骨二錢 海馬一對

乳香三錢

右件藥二十味并為細末煉蜜和丸如彈子大每

服一丸空心細嚼好酒煎木通入麝香少許送

不得過三服

胡桃丸 益精補髓強筋壯骨延年益壽悅心明目

滋潤肌膚壯年高人臍不燥結久服百病皆除

破故紙 杜仲 草蓆

胡桃仁兩

右將破故紙杜仲草蓊三味搗羅為細末次入胡

桃膏子一處秤和令勻再搗千餘下丸如桐子

大每服三十九至五十九空心溫酒下鹽湯亦

可

延壽丹 治腎經不足補精髓益氣壯元陽久服輕

身耐老

松脂三十兩依法 茯苓 甘菊花一十

柏子仁十兩各

右四味為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九

空心溫酒送下或鹽湯亦可一日三服應是諸

御藥院方 卷六 精思堂

疾服之皆愈

何首烏丸 補養五臟六腑強筋壯骨黑髮堅固

牙齒久服延年益壽駐顏色

何首烏去毒

右不犯銅鐵器為細末用棗肉和丸如豌豆大每

服七八十九空心溫酒送下或米飲亦可忌豬

肉血無鱗魚腐菜無力

腎氣丸 治腎氣虛乏下元冷憊夜多漩溺脚膝緩

弱肢體倦怠面色黧黑可思飲食又治脚氣上入

少腹不仁及虛損不足渴飲冷水腰重疼痛少腹

拘急小便不利或男子消渴小便反多者並宜服

之 熟乾地黄八兩 山藥四兩 白茯苓三兩

山茱萸三兩 澤瀉四兩 牡丹皮三兩

五味子六兩 桂心三兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空

心溫酒送

御藥院方卷第六

御藥院方 卷六 精思堂

癸巳新刊御藥院方卷第七

較勘無差

治積熱門

紫雪 療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂蕩

叫走瘧疫毒厲卒死溫瘧五尸五注心腹諸疾疔

刺切痛及解諸熱藥毒發邪熱平黃等并解蠱毒

鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金兩一伯 寒水石 石膏

磁石 滑石石各三斤並搗碎已上用木一

玄參一斤洗 羚羊角屑 犀角屑

御藥院方

卷七

精思堂

沉香搗碎 青木香搗碎各 升麻斤一

丁香搗碎 甘草炙判八兩已上入味入前

去滓入 消石四升芒消亦得每

朴消精者十斤已上二味入前藥汁中盛火上

中半口欲 朱砂飛研

麝香當門子一兩二錢半研二味入煎

右件為藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調

下大人小兒臨時以意加減食後服

紅雪通中散 治煩熱黃疸脚氣溫瘧解酒毒消宿

食開三焦利五臟爽精神除毒熱破積滯去腦悶

治眼昏頭痛鼻塞口瘡重舌腸癰喉閉及傷寒狂燥胃爛發斑等病並宜服之

川朴消斤一 羚羊角屑 川升麻

黃芩兩各三 枳殼色去穢 赤芍藥

人參去蘆 淡竹葉 甘草生

木杏 檳榔已上各 葛根

大青去 桑根白皮 藍葉

木通 梔子去皮各 朱砂一兩研

麝香研 蘇枋對碎

右件除朱砂麝香外並細剉以水二斗五升煎至

御藥院方

卷七

精思堂

九升去滓更以綿濾過再以緩火煎令微沸然

後下朴消以柳木篋攪勿住手候凝次下朱砂

麝香等末攪令勻傾於新瓷盆中經宿即成矣

細研每服一錢至二錢新汲水調下更量老小

虛實臨時加減服之凡服靈寶丹者先依上件

服法調此藥服訖須臾更以熱茶投令宜瀉一

兩行為度後依法服靈寶丹立效

涼膈散 治大人小兒腑臟積熱煩燥多渴面熱頭

昏唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌

生瘡痰實不利涕唾稠黏睡臥不安譫語狂妄腸

胃燥泄便溺秘結一切風壅並宜服之

川大黃剉 朴消 甘草十兩各二

山梔子人 薄荷去土用葉 黃芩各一十兩

連翹二斤

右為末每服二錢水一盞入竹葉七片蜜少許同

煎至七分去滓食後溫服小兒可服半錢更隨

歲數加減服之得利下住服

洗心散 治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩

疼熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾

稠黏心神煩燥眼澁睛疼及寒壅不調鼻塞聲重

精思堂

咽乾多渴五心煩熱小便赤澁大便秘硬並宜服

之

大黃剉去 甘草燻 當歸洗

芍藥 麻黃節不去 荆芥穗各六

白朮五兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑薄荷各少許

同煎至七分去滓溫服如小兒麩豆瘡疹欲發

先狂語多渴及驚風積熱可服一錢並臨臥服

如大人五臟壅實欲要溥轉加至四五錢乘熱

服之

八正散 治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口

燥人渴引飲心忪面熱煩燥不寧目赤睛疼唇焦

鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澁或癃閉

不通及熱淋血淋並宜服之

大黃剉去 瞿麥剉 木通

篇蓄 車前子 山梔子人

甘草炙 滑石已上各

右為散每服二錢水一盞入燈心煎至七分去滓

溫服食後臨臥小兒量力少少與之

妙香丸

精思堂

辰砂飛研 巴豆三百一十五粒去皮

牛黃研 龍腦研 膩粉研

麝香研各 金箔九十

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻

為丸每兩作三十九解五毒治潮熱積熱等疾

如潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走燥熱口乾面

赤大小便煎大黃炙甘草湯下一丸毒利下血

煎黃連湯調膩粉少許下如患酒毒食毒茶毒

氣毒風痰伏痞吐逆等並用膩粉龍腦米飲下

中毒吐血悶亂煩燥欲死者用生人血下立愈

小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉蜜湯下菘豆大二丸諸積食積熱頰赤煩燥睡臥不寧驚哭瀉利並用金銀薄荷湯下更量歲數加減如大人及婦人因病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘燥眼赤潮發不定再經日數七八日已下至半月日未安鑿所不明證候脈息交亂者可服一丸或分作三丸亦可並用龍腦膩粉米飲調下半盞已來下此一服取轉下一切惡毒涎并藥丸瀉下如要却收水洗淨以油單子裹埋入地中五日取出可再與人

薛藥院方

卷七

五

精思堂

人小兒依法服一丸救三人即不堪使如要藥速行即用鍼割一眼子冷水浸少時服之即效更速

龍腦鷄蘇丸 除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主肺熱咳嗽治鼻衄吐血血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止消渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱喉腥脾疽口甜膈疽口苦常服聰耳目目開心益智

雞蘇淨葉一斤龍腦薄荷是也 真蒲黃炒 阿膠炒令燥
人參去蘆頭 木通剉各兩

麥門冬四兩湯浸去心焙 甘草炙一兩半
生乾地黃末六兩後入膏 黃耆去蘆頭
真銀州柴胡二兩剉將上件二物湯中外
右件另研後入外並搗羅為細末將西路蜜二斤先煉一沸然後下生乾黃末 不住手攪時時入絞上者木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和為丸如豌豆大每服二十九嚼破熟水下不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血將麥門冬湯浸去心煎湯下並食後臨臥服之惟血崩下血

薛藥院方

卷七

六

精思堂

諸淋疾皆空心食前服治淋用車前子湯下加減火府丸 治心經蘊熱頭目壅赤小便秘澀生乾地黃洗切焙 木通兩半 黃連去鬚二分 黃芩去黑皮一分 小茯苓去黑皮半兩
右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九至四十九食後溫水下
神芎丸 治腎水真陰本虛心火狂陽損甚以致風熱壅滯頭目昏眩肢體麻痺皮膚瘙癢筋脈拘倦胸膈痞悶或鼻窒翳衄口舌生瘡咽嗑不利牙齒疳蝕或遍身多生瘡疥或睡語咬牙驚惕虛汗或

健忘心忪煩燥多渴或大小便澀滯或煩熱腹滿
或酒過積毒或勞役過度中外一切勞損神狂氣
食羸心志不寧口苦咽乾飲減少變生風熱諸疾
虛羸困倦或酒病瘦悴及老弱虛人尤宜服之或
脾腎陰虛風熱燥鬱色黑齒槁身瘦耳焦或熱中
煩滿飢不欲食或瘴成消中善食而瘦或消渴多
飲而數小便及常服保養除痰飲消酒食清頭目
利咽喉能令偏身結滯宣通氣和而愈神強體健
耐傷省病并婦人經病及產後血滯腰脚重痛及
小兒積熱驚風潮搐並皆治之

御藥院方

卷七

七

精思堂

大黃 生

黃芩 各二兩

生牽牛

滑石 各四兩

黃連

薄荷葉

川芎 各半兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服四十九至

五十九溫水下食後

清涼飲子 治小兒血脈壅實腑臟生熱頰赤多渴
五心煩燥睡臥不寧四肢驚掣及因乳哺不時寒
溫失度令兒血氣不理腸胃不調或溫壯連滯欲
成伏熱不歇欲發驚癇又治風熱結核頭面瘡癩
目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅滯並宜服之

大黃 米下蒸

赤芍藥

當歸頭 去蘆

甘草 各一分

右為燼末每服一錢水一中盞煎至七分去滓溫

服量兒大小虛實加減微瀉利為度食後臨臥

服之

消痞丸 治酒毒麪毒上焦蘊熱痰實氣滯皮膚乾

燥多渴饒睡神志恍惚頭目昏眩飲食遲化不能

勝 乾

黃連

青黛 別

乾葛 各二兩

黃芩

大黃

大梔子

御藥院方

卷七

八

精思堂

黃蘗

藿香葉

薄荷

厚朴

茴香 各一兩

木香

桂 各半兩

牽牛 炒四兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十九食

後溫生薑湯送下

賀蘭先生解毒丸

亦名保命丹 又名化毒丹

善解諸毒藥毒酒毒山嵐瘴毒果毒肉毒麪食魚

菜痰冬月丹毒夏月暑毒傷風後餘熱小兒瘡疹

後毒並皆治之及喉閉之患應是有名毒悉皆治

之

管仲 茯苓 黃藥子

藍根 乾葛 地黃

雄大豆 甘草 滑石

縮砂人 陰地厥 薄荷各三兩 好者用

土馬騾 萊豆粉 益智

寒水石 山豆根 紫河車

馬譬字 草龍膽 白蠶蠶

百藥煎 山梔子 大黃各一兩

右件二十四味去土水洗淨焙乾為細末蜜水浸

餅併為丸如彈子大每服一丸細嚼新水送下

御藥院方

卷七

九

精思堂

小兒一九分作四服煎薄荷湯放冷磨下小兒

急驚磨刀水下更在臨時看病大小加減服之

此藥長宜將帶備急若夏月頻服使諸疾不生

神效不可盡述

治時疾神聖熱藥

白花蛇肉 黑烏蛇肉 紫色雄黃各二錢

錦文大黃兩半

右四味各生用搗雜為細末大人每服三四錢水

一盞半同煎三五沸食後稍熱服病大者每日

三四服若十歲已下小兒每服一錢半至二錢

煎服同上法

黃連解毒湯 治大熱甚煩錯語不得眠

黃連七錢 黃柏 梔子各半兩

黃芩兩一

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎取一湯熱

去滓服未知再服

牛黃瀉心湯 治心經邪熱狂語精神不爽

腦子二錢 牛黃二錢 大黃末生二兩

朱砂二錢

右同研極細每服三錢涼生薑蜜水調下

御藥院方

卷七

十

精思堂

無憂散 治諸熱譫語精神昏冒及裏有畜熱

天南星牛膽製為細末一兩 腦子半錢

右二味同研勻每服三錢濃煎人參湯調下如人

行三里地更飲人參湯一盞投之須臾下惡物

為度累用有效

清心丸 治經絡中熱夢漏心忪恍惚屬熱夢遺不

可全作虛冷亦有經絡熱而得之也

黃藥二兩 龍腦錢二

右二味為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服一十

九臨臥麥門冬酒送下

時毒藥 治時疾生熱脫胎在咽喉間增寒壯熱頭
痛頭面赤腫狀若雷頭相傳染無可救者並宜服
之

大黃生用

寒水石生用

當歸各等分

右為細末每服二三錢至五錢無根水調下食後

服臨時覷虛實加減服之

酒蒸黃連丸 治消渴日飲水數升漸至三二斗小

便五七十次發熱瘦弱口甘食已如飢此名消癉

今用黃連味苦寒無毒除熱氣止煩渴厚腸胃消

渴之人飲水脾胃惡濕黃連為對

御藥院方

卷七

十一

精思堂

黃連

淨半斤酒二升重湯
蒸候時取出曬乾

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服五十九大

茶飲前服之溫水送下初伏日為

管仲散 解一切諸熱毒或中食毒酒毒藥毒等並

皆解之

黃連

管仲

甘草各三錢

駱馳蓬錢五

右為細末每服三錢冷水調下

海仙丸 治諸伏熱頭目不清神志昏塞解諸大毒

以取水之精漬於船板木中縷見風日久則日炙

變為青色以取太陽之氣水見太陽之氣而曝

中有陰陽之氣結而不散聚而成青服之分陰陽

去邪熱調腑臟聖人處治以度物之氣味所用且

如東壁牆上土取之以新水調化取清水服之治

腑臟不調謂脾主於土脾受濕濡瀉取以大陽真

火其土引入於脾藉大陽真火之氣以除去其濕

而吐瀉得止又以魚骨入喉中肉內不出燒魚細

灰新水調服其魚骨即時便出又有月蝕瘡不愈

者令人燒救月鼓杖燒灰乾摻瘡上立已此聖人

取其物類相感故也具船板青與上同意

御藥院方

卷七

十一

精思堂

船板青附

酥油餅末半兩

右為細末稀麪糊和丸如梧桐子大每服四五十

丸酒送下不拘時候

三黃丸 治法千金方同治吐血黃疸熱病

黃連兩

黃芩

大黃各二錢半

右件為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九

溫水送下食前

治泄痢門

豆蔻固腸丸 治脾胃虛弱臟腑頻滑可思飲食腸

鳴腹痛並皆治之

木香 赤石脂 乾薑

縮砂 厚朴生薑製 肉豆蔻麩裹去

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服六十九食

前米飲下

縮砂丸 治大便泄瀉米穀不化腹中疼痛可思飲

食

縮砂人 黃連去鬚 附子炮去

吳茱萸湯洗七次 訶子皮

肉豆蔻各一兩 乾薑炮 木香各半兩

御藥院方 卷七 精思堂

右為細末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服五七

十九食前米飲送下

真方聖散子 治男子婦人脾胃受濕中脘停寒嘔

物頻傷心胸滿悶脇肋膨脹腸鳴虛痞小腹堅痛

臍下強急或大便不調米穀遲化裏急後重下痢

膿血或下五色或便如魚腦或如豆汁或有鮮血

或如爛肉相似日夜無度久而不愈嗜臥身嘔虛

羸肢體沉困寒熱時作此藥能固養脾胃溫中止

腹痛服之甚有所益

御米殼三兩搗碎 肉豆蔻麩裹

赤石脂 烏魚骨去 甘草炙

棟丁香 訶子皮 乾薑炮製 肥上

右件為細末每服先用水一盞入乳香少許煎五

七沸調藥末二錢和滓食前熱服

戊巳丸 必用方 治脾胃受濕米穀不化泄瀉注下

黃連剉如 吳茱萸 白芍藥剉如豆

右同炒候吳茱萸黃熟則止放冷為細末水煮麵

糊為丸如梧桐子大每服五七十九食前米飲

下

堅中丸 治脾胃受濕滑瀉注下

御藥院方 卷七 精思堂

黃連去鬚 黃蘗兩 陳皮兩

赤茯苓去皮 白木 澤瀉各一兩

肉豆蔻 白芍藥 人參

桂 半夏麩裹

右為細末水浸餛餅和丸如梧桐子大每服五七

十九食前溫米飲送下

炙肝散 治脾胃虛弱五勞七傷肌體羸瘦全不思

食久患泄瀉腸滑不止心胸滿悶臍腹疼痛或便

膿血困倦無力四肢沉重心勞口瘡並皆治之

木香 白木 生犀末

山茵陳 <small>根</small>	紅豆蔻	縮砂人
桂皮 <small>粗</small>	人參 <small>上蘆</small>	黑附子 <small>炮製去</small>
石斛 <small>剉</small>	狗參 <small>皮</small>	川芎
良薑	柴胡 <small>去</small>	訶子 <small>炮去</small>
草豆蔻 <small>炮去皮各</small>	陳皮 <small>白</small>	白芍藥
白蕪黃 <small>炒去</small>	乾薑 <small>炮</small>	桔梗
吳茱萸 <small>洗焙</small>	防風	紫苑 <small>土</small>
紫參 <small>去皮各</small>		

右二十五味各修製畢搗羅為細末每服二錢羊肝二兩去筋膜薄批摻藥入葱白生薑絲鹽各

御藥院方 卷七 十五 精思堂

少許拌勻用紙裹水濕文武火煨熟却用生薑粥送下食前日進二服

水煮木香膏 治脾胃受濕臟腑滑瀉腹中疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲利時裏急後重或下赤黃或便膿血並宜服之

木香	丁香	訶子皮
當歸	藿香葉	黃連 <small>去</small>
白芍藥	青皮 <small>白</small>	陳皮 <small>白</small>
甘草 <small>炙</small>	厚朴 <small>生</small>	枳實 <small>炒</small>
乾薑 <small>炮</small>	乳香	肉豆蔻

縮砂人 <small>各一兩半</small>	御米殼 <small>蜜水拌炒深</small>
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九水一大	蓋擘破煎至七分和滓稍熱服食前
潤腸橘香丸 此二味降氣潤腸服之大腸自無滯	橘皮
右為細末煉蜜和丸如梧梧子大每服五十九空	杏仁 <small>去皮尖雙入殼</small>
腹溫水下久服不損胃氣	
潤腸丸 治津液耗少大便秘澁下焦氣滯常服消	
食下氣祛風潤燥	
威靈仙 <small>半</small>	郁李人 <small>去皮</small>
木香 <small>二錢</small>	
御藥院方 卷七 十六 精思堂	
枳實 <small>二錢半</small>	麻人 <small>七錢</small>
檳榔 <small>三錢</small>	
人參 <small>二錢</small>	
右件為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九	
至五十九生薑湯下食後臨臥服	
換腸丸 治泄瀉不止及諸下痢之疾	
御米殼 <small>一兩去屑淨</small>	木香
訶子皮	白芍藥
甘草 <small>炒</small>	
當歸 <small>去蘆</small>	人參 <small>各一兩</small>
白木	
白茯苓 <small>去皮各</small>	
右件為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九水一	

蒸煎化稀熱食前服

二聖散 治泄痢不問新久並皆治之

乾黑木耳一兩 鹿角膠一分炒

右為細末每服三四錢溫酒調下不拘時候

加減神功丸 治三焦氣滯心腹痞悶六腑風熱大

便不通腰腿疼痛肩背重悶頭昏面熱口苦咽乾

心胸煩燥睡臥不安及治脚氣并素有風人大便

結燥

訶黎勒四兩 人參二兩 牽牛四兩

天麻人別搗如

右為細末入麻人搗研勻煉蜜為丸如梧桐子大

每服四十九溫水下溫酒米飲皆可服食後臨

臥如大便不通可倍丸數以利為度

肉豆蔻丸 治腸虛胃弱停積風冷大便泄瀉水谷

不化腹脇脹痛下痢膿血通數頻併裏急後重嘔

逆惡心肢體困倦飲食減少並宜服

肉豆蔻煨 黑附子炮去 川薑炮

桂皮去 硫黃研 白朮炒

當歸頭去 訶子皮各一 川烏頭炮去

紅豆蔻各半

右為細末醋麵糊為丸如梧桐子大每服三十九

米飲送下空心食前服

厚朴丸 和脾暖胃益氣治心腹疼痛胸膈虛痞腹

脹腸鳴口苦吞酸肢體倦怠飲食減少痰逆惡心

時發嘔吐便利不調或即泄瀉並宜服之

厚朴去 乾薑炮 桂皮

川椒去 乾薑炮

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十

九至五十九溫米飲下食前服

大已寒丸 治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不

調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛大便泄瀉

腹中雷鳴霍亂吐瀉手足厥逆便利無度及療傷

寒陰濕形氣沉困自汗

附子炮去 川烏頭炮 高良薑炒 桂心

川乾薑炮 吳茱萸炒

吳茱萸炒

右為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服五七

十九熱米湯下空心食前日進二服無所忌

吳茱萸丸 治一切積冷脾胃不和心腹疼痛嘔吐

泄瀉腹內絞痛

吳茱萸洗七次焙乾半兩 良薑剉碎五兩 乾薑炮五兩

右件三味各修製畢搗羅為細末醋打麵糊為丸

如梧桐子大每服五十九空心食前清粥飲送

下

黃連烏梅丸 治諸熱利不差

烏梅肉炒 黃連去鬚各四兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫

米飲下食前日進二服

大道固腸丸 治腸虛滑泄水谷直下完谷不化久

寒積冷心腹脹滿可思飲食怠墮嗜臥困倦少力

御藥院方 卷七 九 精思堂

又治白帶候沉微

陽起石燒一 硫黃飛水 赤石脂燒通

白礬過 肉豆蔻醋麩裏燒熟為度各一兩

白龍骨二兩 川烏頭炮上 乾薑炮各一兩

木香 縮砂人各半兩

右件研羅為細末醋麵糊為丸如梧桐子大每服

五七十九空心粥飲下

椒艾丸 治久虛寒泄痢不止

烏梅去核二兩半 川椒炒去目

柔成無滓艾半兩 乾薑炮 赤石脂

黑附子炮裂去皮

右件除烏梅外同為細末將蒸烏梅肉研勻更入

熟棗肉蜜少許和丸如梧桐子大每服二十九

米飲湯下食前

附子畢撥丸 治經虛月候不時腸滑下痢頻併常

服助氣安血大補

黑附子炮裂去皮 官桂去 大椒

良薑細剉 陽起石火燒 川薑炮

厚朴生薑 白木剉 白茯苓去

赤石脂火燒通紅 肉豆蔻醋和麩裏

御藥院方 卷七 九 精思堂

右件各修製畢搗羅為末酒煮麵糊為丸如梧桐

子大每服四十九空心食前服

大聖散 治脾胃積寒心腹疼痛悶厥泄瀉腸鳴絞

痛 益智二兩連皮炒 川烏頭炮裂去 陳皮湯浸去白

乾薑炮裂 茴香七錢 甘草半錢

右為末紗羅子羅每服二分水一盞入鹽一捻同

煎至七分去滓食前熱服

御藥院方卷第七

癸巳新刊御藥院方卷第八

較勘無差

治雜病門

祛痛散 治肢節疼痛熨烙藥

羌活去蘆 獨活去蘆 細辛去苗

肉桂去皮 防風去蘆頭 白朮

川烏頭生去 良薑剉 麻黃節不去

天麻苗 吳茱萸生 葛根

乳香另 小椒去子及 全蠍生

常歸去苗 上川薑生用

御藥院方 卷八 精思堂

右為麤末入乳香勻每抄藥一十錢痛甚者加至

十五錢同細鹽一升一處炒令極熱用熟絹袋

內貯藥熨烙痛處不拘早晚頻用為效如藥冷

即再炒一次用畢其炒藥不用

聖靈丹 治一切打撲傷損及折傷疼痛不可忍者

並皆治之

乳香錢五 烏梅去核

高苳子二兩八錢 薑炒黃取

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼熱

酒 時不痛如痛再服

犀皮湯 治髮髮乾澁令潤澤洗髮方

小麥麩半升計 半夏湯洗七次去

沉香末兩 生薑皮用切

右都用藥水兩椀人生薑一兩和皮細切同煎三

兩沸生絹濾去滓取清汁入龍麝少許攪勻洗

髭髮令潤柔易長

操洗藥 淋瀝一切諸風

乾荷葉三十 威靈仙土去 藁本土去

藿香葉 零陵 茅香各一十

甘松土去 香白芷各八

御藥院方 卷八 精思堂

右為麤末每用二兩生絹袋盛用水二桶約四斗

煎三沸放稍熱於無風處淋瀝了避風少時常

用治遍身癢瘡光膩皮膚如水少時更添入熟

熱水斟量得所使用勿令添入冷水藥末不添

玉粉散 治熱汗浸漬成瘡腫癢癩痛

定粉兩 蛤粉兩 石膏兩

白石脂兩 滑石兩 白龍骨兩

粟米粉兩 寒水石燒赤於淨地上

右為末再研極細勻每用藥乾擦患處

淋瀝藥七寶散 治熱汗浸漬成瘡癢痛不已

黃耆

當歸

防風

荆芥穗

地骨皮

木通各二兩

白礬兩一

右為燼末每用藥一兩以水三大碗煎五六沸濾

去滓稍熱淋潔患處拭乾避風少時

淋潔頑荆散 治從高失墜及一切傷折筋傷骨碎

瘀血結痛

頑荆葉一兩半

蔓荆子

白芷

細辛去蘆

防風去蘆

桂心

川芎

丁皮

羌活各一兩

御藥院方

卷八

三

精思堂

右件為末每度用藥二兩鹽半匙葱白連根五莖

用漿水五升煎五七沸去滓通手淋潔痛處冷

即再換淋潔了宜避風煖蓋量病大小臨時加

減用藥

洗髮菊花散 治頭髮脫落

甘菊花兩二

蔓荆子

乾栢葉

川芎

桑根白皮去蘆皮生用

白芷

細辛去蘆

旱蓮草根莖花葉已上各一兩

右件燼篩每用藥二兩漿水三大碗煎至兩大碗

去滓沐髮

長髮滋榮散

生薑皮各一兩

人參各一兩

右為細末每用生薑切斷蘸藥末於髮落處擦之

隔日用一次

刷牙沉香散 榮養髮髮堅固牙齒

沉香

白檀

醋石榴皮

訶子皮

青鹽研

青黛各二錢

當歸

川苦楝破四片焙

細辛去

香附子各半兩

母丁香一錢

荷葉灰一錢

南乳香研一錢

龍腦研

麝香各半錢

御藥院方

卷八

四

精思堂

右為細末每用半錢如常刷牙溫水嗽之早晚兩

次用

麝香散 治鼻衄不止

白礬枯過研

白龍骨枯者另研各半兩

麝香另研半字

右三味令勻每用一字先令冷水洗淨拭去鼻內

血涕然後吹藥於鼻中或以軟紙濕過蘸藥鼻

內尤妙

乳香消毒散 治一切傷折跌厥腫疼不可忍

者

乳香另研

沒藥研

白欬

白芍藥各一兩 常歸 白芥子各半兩

黃柏另研細末三兩 滑石二兩 黃丹三錢

加血竭另研

右為細末入另研者一處再令研勻每用新水調

如稠膏攤在紙花子上貼患處

虎杖散 治折傷血瘀不散

虎杖二兩 赤芍藥一兩

右二味搗羅為細末每服三錢匕溫酒調下不拘

時候

沒藥乳香散 治打撲傷損疼痛不可忍

白木五兩 當歸焙 甘草剉

白芷 沒藥另研各二兩 朴去粗皮

乳香另研各一兩

右件搗羅為細末入研藥再研令勻每服二分溫

酒一盞調下不拘時候日進二三服

蒲黃散 治因墜墮內損血

蒲黃 常歸 芍藥剉

桂去粗皮各一兩

右件搗羅為細末每用二錢溫酒調下不拘時候

接骨丹 治從高墜墮傷損疼痛

當歸二兩 甘草三兩 沒藥別研

桂去粗皮一兩 乳香別研 澤蘭一兩

自然銅火燒紅醋淬淨

右為細末入研者藥再研令勻水麪糊和丸如梧

子六每服三十九溫酒送下不拘時候日進

三服

當歸血竭散 治傷損筋骨疼痛不可忍宜服止痛

麒麟竭別研 沒藥別研 常歸

赤芍藥 桂各一兩 白芷二兩

右六味為細末每服二錢用溫酒調下不拘時候

桃人散 治被壓窄損瘀血在腹中疔痛不散心胸

短氣大小便不通

荆芥兩 大黃生用 蒲黃各二兩

芎藭 桂 木通

當歸各一兩 桃人四十枚湯浸去皮尖熱炒

右件為細末每服二錢用溫酒調下不拘時候微

利為度

柏葉散 常使榮養髮鬚

側柏葉四兩 何首烏 地骨皮

白芷各二兩

右為燼末每用半兩入生薑十片水一大碗煎五
七沸去滓淋洗髭鬚臨睡用子條節

煖手法
鍼砂兩四 硃砂研一

右同研勻以醋或水并令濕用油紙裹之盛在袋

兒內任意執之冷即再拌

代灸膏

大附子炮 木香 吳茱萸炒

馬蘭子 桂 蛇床子各等

右為細末每用藥半匙白麵半匙以生薑汁同煎

御藥院方 卷八 精思堂

成膏以方元三寸紙花子上攤貼在臍下油子

隔之綿衣裏自晚至明一傳勝百壯如腰痛腰

上貼子

益脾丸 飲酒不醉又益脾胃

葛花兩二 小豆花兩一 萊豆花兩半

木香分一

右為細末白蜜為丸如梧椰子大煎紅花湯下十

九或夜飲津液下五丸不醉大妙

葛花散 飲酒令人不醉

葛花 小豆花各一

右為末每用三方寸匕飲服行進葛汁及枇杷葉

飲倍能飲酒又九月九日菊花臨飲服方寸又

小豆花葉陰乾百日末服之

抵聖散 治五淋

檳榔三兩 赤芍藥兩一

右為燼末用紗羅子羅每服三錢水一大盞煎至

七分去滓溫服

五生膏 治寒濕客於經絡留結不散疼痛不止

生附子半兩 當歸 吳茱萸

桂 木香各半

御藥院方 卷八 精思堂

右為細末每用藥末三錢取生薑自然汁調如膏

攤於蠟紙上貼痛處乾即更易新者上用綿子

或軟帛繫定

淋瀝藥威靈仙散 治大腸頭癢痛或腫悶

威靈仙 枳殼兩一

右為燼末每用一兩水三碗同煎至一碗半澄去

滓乘熱薰通手浴不拘時候

淋瀝藥地榆散 治肛門痛癢或腫

地榆 荊芥穗

苦參 蛇床子各等

右為纒末每用藥一匙水一碗煎二三沸去滓通
手避風處熱洗患處

髮鬢禿落生髮膏

莽草兩一

防風

升麻

白芷各二兩

薺芎兩二

燒蟬個四

驢鬚膏

豹膏一作狗膏

馬鬚膏

熊膏一作雄鵞膏

豬膏

右一十一味諸膏成煎各半升合煎諸藥沸則下

停冷復上火三五沸止濾去滓傳頭擇當用之

赴痛丸 治風毒留客日深氣虛邪實攻擊不定走

移醫院方

卷八

九

精思堂

注疼痛

大戟刮去皮

甘遂

白芥子各一兩

大麥麵

一兩并前三味末拌和作餅
子浸大麥黃熟再為細末

右除大麥麵一兩外碾羅為細末與大麥麵拌和

令勻周薄麵糊為丸如梧桐子大每服十九漸

加至十五丸空心用冷酒送下

厚膠丹 治寒濕腰痛

附子炮製去皮

白礬燒灰

橘皮去穢為末

丁香

木香

雄黃研

硫黃研

吳茱萸為末

杏仁去皮尖

乾薑炮各一兩

麝香別

膩粉別研各一錢

朱砂研一

右同為細末研藥勻煉蜜和丸每兩作八九每用

一丸生薑汁化開薄攤痛處用綿裹了乾後手

捺令藥力入裏為妙

神枕法并序

叙曰昔太山下老翁者失其名字漢武東巡見老

翁鋤於道背上有白光高數尺帝怪而問之有道

術否老翁對曰臣昔年八十五時衰老垂死頭自

齒落有道士者教臣服棗飲水絕穀并作神枕法

每藥院方

卷八

十

精思堂

中有三十二物其三十二物中二十四物善以當

二十四氣其八物毒以應八風臣行轉少黑髮更

生障齒復出日行三百里臣今年一百八十矣不

能棄世入山願戀子孫復還食穀又已三十餘年

猶得神枕之力往不復老武帝視老翁顏壯當如

五十許人驗問其隣人皆云信然帝乃從受其方

作枕而不能隨其絕穀飲水也方用五月五日七

月七日取山林柏以為枕長一尺二寸高四寸空

中容一斗二升以柏心赤者為蓋厚二分蓋致之

令密又當使可開閉也又鑽蓋上為三行行四十

九孔凡一百二十孔令容粟米大其用藥

芎藭 當歸 白芷

辛黃 杜衡 白木

藁本 木蘭 蜀椒

桂 乾薑 防風

人參 桔梗 白菽

荆實一云牡荊實 肉苁蓉 飛廉

柏實 薏苡人子 款冬花

白衝 秦椒 麩蕪已上二十

二十四氣後加八味毒皆以應八風 烏頭

附子 藜蘆 皂角

茵草 石礬 半夏

細辛

右三十二物各一兩皆咬咀以毒藥上安之滿枕

中用囊以枕百日面有光澤一年體中所疾及

有風疾一一皆愈差而身盡香四年白髮變黑

齒落重生耳目聰明神方驗秘不傳非其人也

藁本是老芎藭母也武帝以問東方朔答云昔

女廉以此方傳玉青玉青以傳廣成子廣成子

以傳黃帝近者穀城道士淳于公枕此藥枕耳

御藥院方

卷八

十一

精思堂

百餘歲而頭髮不白夫病之來皆從陽氣起今

枕藥枕風邪不得侵人矣又雖布囊衣枕猶當

復以幃囊重包之須欲臥枕時乃晚去之耳詔

賜老翁疋帛老翁不受曰臣之於君猶子之於

父也子知道道以上之於父義不受賞又臣非

賣道者以陛下好善故進此耳帝止而更賜諸

藥

牛蒡子九 治風毒結核癰癰腫硬疼痛內消

牛蒡子各二 何首烏各二 乾薄荷

雄黃各一 麝香 牛黃各二

皂角七挺水二升提汁

右為細末已皂角膏子為丸如梧桐子大每服二

十九煎黃耆湯送下

出油藥

龍骨 烏魚骨 滑石

定粉各一 風化大灰四

右五味搗羅為細末如冬月用熱坑上燂夏月用

日頭炙

愈痔散 治男子婦人一切腸風痔漏無問新久皆

可服之立效

御藥院方

卷八

十一

精思堂

南乳香別 槐花微 木香

商枳殼去穢 鶴虱 葦澄茄去

白蕪荑各一

右為細末始服後先嚼核桃一个次用熱酒一盞調藥二錢空心食前日進一服忌發熱風動氣等物

槐荆丸 治男子婦人腸風痔漏先臟腑後便血宜服之

槐花微 荆芥穗土 枳殼去穢

白礬生 薄荷葉 蔚金各半

御藥院方 卷八 精思堂

右為細末水麵糊為丸如梧桐子大每服六七十

丸空心食前溫粥飲送下日進二服

結陰丹 治腸風下血及臟毒下血諸大便下血疾

枳殼去穢 威靈仙 黃耆

椿根白皮 陳皮 何首烏

荆芥穗各等

右為細末酒麵糊內入蜜少許同和丸如梧桐子大每服五十九至七十九食前米飲下

胡蘆散 治榮衛不順氣血偏虛風寒濕氣攻注脚膝疼痛

蒟醬 吳茱萸 頑荆

黃耆 防風 防已各四

躑躅花 白獨活 荆芥穗

藁木各二

右件為細末都入水半碗葱白二七莖細剉小瓜半个按碎拌令勻分作三分每用藥一分於銚內慢火炒令通熱用綿帛兩重裹藥熨引痛處如覺藥微冷依前別炒餘藥更換熨之三劑必減

淋瀝桂附散 治因傷損後筋骨疼痛

御藥院方 卷八 精思堂

桂皮粗 附子生 白礬

細辛去苗 白芷各一 五加皮剉

桑葉各二

右件搗篩為散每劑用二兩入葱白連根十莖水一斗煎一沸逐旋淋瀝立效

淋瀝烏頭散 治一切頑痺不仁及筋骨疼痛舉急

澤烏頭生用不 木鱉子去 白芥子

鱉甲去穢 杏仁生用不去

右為細末都作一次用水三大碗煎數沸去滓乘熱淋瀝患處冷即再煖熱依前淋瀝三五遍其

藥無力不用

枳殼散 治腸風痔瘻便血無數疼痛不可忍者

枳殼去穢 槐子微炒 荆芥穗各半

右為細末每服三錢薄粟米粥調下如人行一二

里地再用粥壓之空心日進二三服

犀角散 治風寒暑濕毒氣攻注經脈凝滯畜於筋

骨經隧之間或在四肢肉色不變發作連骨髓痛

乍歇乍作或晝靜夜發去來不常並宜服之

犀角鎊 當歸 白芍藥各二

牛膝酒浸 沉香 木香

御藥院方 卷八 二十五 精思堂

虎頭骨酥炙 柵葉銀二大 麝香半

右件除麝香外咬咀每用藥一兩水三盞半煎至

一盞半濾取清汁內麝香抄半錢攪勻放溫服

食前日進三服

擒虎散 若有前證或臟腑稍實宜間服擒虎散三

兩服疎導腸胃中澁滯鬱積毒氣

沒藥 當歸 黑牽牛生

大黃各一 甘草生一

右為散每服五錢匕用皂角刺七个槌破隔宿

以酒一升浸之來日取酒一盞更加水一盞內

梧樓子七粒同煎至十分去滓取及盞內八分

許放溫服遠以後服以利為度

何首烏散 治風痿瘡癢之汁出

何首烏酒

右為細末每用水一大碗入艾葉半抄煎至半碗

入藥末一大匙再煎三兩沸去粗熱洗拭乾後

敷貼艾煎膏

鎮肝丸 治癩癧結核腫硬令內消

皂角六挺去皮末二兩水調塗皂角上炙二錢用

青皮末二兩水調 金皂角炙黃

御藥院方 卷八 二十六 精思堂

右為細末用精羊縷肉搗丸如梧桐子大每服三

十九漸加至五六十丸溫水下臨臥食後

麝香散 治癩癧結核腫硬不消疼痛宜服之

麝香半錢 枳殼去穢炒 白丁香二

右件為細末每服二錢用溫酒半盞調勻食後日

進一服

淋瀝吳茱萸湯 治風毒瘡久不差

吳茱萸 川烏頭生用不 蛇床子

桂各一 荆芥穗 附子生不去皮

右為細末每用藥半兩水半碗煎三兩沸去粗用

帛子蘸藥淋掃患處臨臥頻頻用之後用楓香散

楓香散 治諸風毒瘡發癢白屑起

楓香脂 大黃 輕粉各等

右為細末生油調稀擦患處

楮藤子丸 治腸癖下血痔漏結核疼痛

楮藤子一個重七錢者 茴香炒

皂角刺燒存 蝟皮燒存 枯白礬

白附子炮 枳殼去穢 樗皮焙乾

乳香二錢

御藥院方 卷八 精思堂

右件為細末醋麵糊為丸如梧桐子大每服四五

十九溫酒下食前如有痔瘡疼痛醋研五七九

津唾塗患處

治漏藥

獨角仙一個河南地分 甜葶藶

砒各半錢

右件同細末煉蜜為錠子每用臨時覘瘡口大小

旋捏作錐任於瘡口內其蟲俱出即時見効

地榆散 治足脛濕毒腫滿按之不起

地榆 荆芥 蒴藋

告參各等

右為龜末每用藥二兩水三大椀煎三五沸去粗

避風處熱淋洗患處冷即再溫

消腫木香散 治濕毒腫皮肉色不變

木香 當歸 射干

莽草 黃蘗別為 大黃各等

右件為細末每用藥一大匙入白麵一匙頭淡醋

調稀慢火上熬令稠攤在紙花子上貼患處勿

令大乾別換新藥一日四五次

葶藶木香散 治濕熱內餘水腫腹脹小便赤澀大

御藥院方 卷八 精思堂

便滑泄膝脛腫滿

葶藶炒香 木香錢 茯苓去皮

桂錢 豬苓去皮 澤瀉

木通 甘草各半 白木兩

滑石三兩

右為細末每服三錢白湯調下不拘時候

葶藶丸 治脾胃受濕流於四肢足脛浮腫小便澀

少宜服此

苦葶藶炒 郁李人去皮 赤茯苓去皮

桑白皮剉 黑牽牛生取頭 漢防已

川羌活

陳橘皮湯洗去

澤瀉各二分

白朮兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九溫

水送下不拘時候

腎化葶澄茄丸 專治鼻塞不通

葶澄茄兩

薄荷葉錢三

荆芥穗錢一

右為細末糖霜蜜和丸如櫻桃大每服一九時時

喻化嚙津

檳榔湯 治濕毒脚氣腫滿小便澀

檳榔兩二

桑根白皮兩三

黑豆升

御藥院方

卷八

十九

精思堂

右件搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去

滓溫服日三夜一不拘時候

接骨烏金散

半兩錢一百之陌碎

錦文水蛭兩半

使不利南乳香

自然銅兩半

麝香錢一

右為細末每服半錢生薑自然汁溫酒少許同調

服之如損在腰上食後服腰下食前服如筋骨

無傷藥即吐出無忌此藥神驗不可盡述

乾洗頭香白芷散

香白芷

王不留行各二分

右為細末每用乾摻頭髮內微用力擦去垢膩後

用筴子刮去藥末

芎藭散 治外傷風冷鼻塞氣息不通閉悶

芎藭

檳榔

人參兩

赤茯苓

白朮

麻黃兩

郁李人湯洗去皮

肉桂兩

甘草兩

杏仁湯洗去皮

右件搗篩為散每服五錢水一大盞生薑二錢切

作片子同煎至七分去滓食後溫服

御藥院方

卷八

二十

精思堂

通開散 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕

多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾瓦上炒

白附子炮

苦參

益智皮

蒺藜子炒去

乾薄荷兩

右件搗羅為散每服三錢溫酒調下不拘時候

膩粉散 治皮膚受風邪發作癢痛諸瘡

膩粉錢二

藜蘆末兩

狼毒末錢三

右件三味并勻每用乾擦患處

金鍼散 治久痔及腸風下血疼痛諸藥不差者

皂角刺赤紅

破故紙并碎紙上炒

右件搗羅為細末每服三錢溫酒調下食前服

木香枳殼丸 治腸風痔疾下血

木香二附 商枳殼去麩炒 黃耆

熟乾地黃 當歸 防風各四兩

槐角子一斤炒

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服三五

十九不拘時候精米飲下溫酒亦得

威靈仙散 治腰脚痛

威靈仙以生用少

右為細末每服一錢匕溫酒調下逐日微利為度

御藥院方

卷八

十一

精思堂

搜風潤腸丸 治三焦不和胸膈痞悶氣不升降飲

食遲化腸胃燥澁大便秘硬

沉香 檳榔 木香

青皮去穢 陳皮去穢 京三稜

蘿蔔子炒 槐角炒 商殼去穢炒

枳實去穢炒 木通各十兩 郁李人去皮

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五六十丸

食後煎木瓜湯下常服滋潤腸胃導化風氣

衝開散 治關格不利上焦有熱胸中痞悶小便澀

少或不通

人參 陳皮去穢

木通 檳榔各一兩 青皮一分

甘草一分

右為散每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫

服食前以小便通利為度

淋瀝煎湯 治風毒脚氣膝痛痺腫行履不得

片骨如小蟲行宜淋瀝

茄楷 葫蘆 蒺藜子

蒼耳 海桐皮 柳木蠹末

柴胡 茯苓皮 水紅各一兩

御藥院方

卷八

三

精思堂

右九味剉碎每用藥四兩以水五椀煎取三椀去

滓淋瀝慎避風冷

乾荷散 治陰囊腫痛濕潤瘙癢及陰痿弱

牡蠣粉 蛇床子 乾荷葉

浮萍草各等分

右為細末用篩羅每用兩匙水一大椀同煎三五

沸濾去滓淋瀝洗避風寒

還童散 外固壯陽氣

丁香 麝香葉 官桂去穢

露蜂房燒烟 川椒去白 牡蠣燒

吳茱萸炒 零陵香 木鱉子去

馬蘭花 韶腦別 白礬灰已上各

紫稍花 蛇床子各二

右件為燼末每用藥三匙水一碗半煎至一碗濾

去滓乘熱薰俟湯通手時自少腹已下沐浴臨

睡用

百花散 補元陽通血脈

百花窠燒烟盡為度 蛇床子炒令焦黃

零陵香 麝香葉各一

右為燼末每用藥兩大匙水三碗煎三五沸乘熱

淋洗臨臥用避風寒

熱礙丸 治膈病橫泄四肢

大腹皮二 蓬莪菹

京三稜皆濕細要煨熟各一兩 木香熟畏煨

檳榔生 加郁李人湯浸去

右為細末炒麥蘖搗粉為糊和丸如梧桐子大每

服二十九生薑湯下不計時候

加腦子收陽粉 治一切虛汗盜汗自汗及漏風等

諸證汗泄不禁服諸藥不能止者並宜用之

麻黃根 藜本 白花

牡蠣燒 龍骨各半 米粉二

腦子半

右為細末研攪勻以紗帛包藥於汗處撲傅之汗

止為度

木瓜丸 補益壯筋骨治腰痛

牛膝二兩溫酒 木瓜一枚去頂煨入

巴戟天去 茴香炒 木香各一

桂半兩

右件為細末入熟木瓜并艾同杵干下如硬更下

蜜丸如梧桐子大每服二十九空心鹽湯下

引水散 治小水秘澀不快或不通及腫滿脚氣一

切濕證

石燕子一雙 海馬 海蛤

滑石 琥珀 赤茯苓

川木通 通草 越桃炒

澤瀉 豬苓去黑 車前子炒

茴香炒 藎麥穗 篇蓄

苦葶藶紙覆 忘憂根 木香

白丁香 鬼棘鍼已上各

右件二十味除石燕子海馬外各一兩同為燼散

每服五錢水一盞半燈心三十莖同煎取清汁
八分內麝香一字拌勻放溫食前服麝香少許
亦可

海金沙散 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或
五種淋疾癢閉不通

海金沙 木通 瞿麥穗

滑石 通草各半 杏仁湯浸去皮尖

右件為細末每服五錢水一盞半燈心二十根同
煎至七分去滓食前溫服

管仲散 治腸風痔瘻

管仲 紅藤各四兩 精思堂

右件同為細末分作四服用綿包作四裹每服一
包上好酒一升煎至五沸溫服藥滓收着候四

服藥滓一處用水一椀半熬至五沸用小口器
合內盛放被兒內薰着於門就熱通手洗如蟲

子死後便不瘳痛

松節散 治閃撲筋骨腫痛

松節 桑白皮 蠶沙

香附子 朴消已上各

右為藥末每用藥一兩水一椀半煎至一椀熱渫

痛處

人參湯 治脾氣上攻鼻塞不通

人參 白茯苓去黑皮 黃芩去

陳皮去 麻黃去根 羌活去蘆

蜀椒去目及閉口者

右件為細末每服三錢水一盞半煎至八分去滓
溫服

菖蒲散 治鼻窒塞不得喘息

菖蒲 皂角等

右二味搗為細散每服一錢綿裹塞鼻中仰臥少

時 精思堂

白蒺藜散 治腰痛

白蒺藜

右為細末每服三錢溫酒調下空心食前

熨烙當歸散 治寒濕留注腰腿疼痛經脈逆滯不
得宣通

防風去蘆 當歸去蘆 藥本去

獨活去 荊芥穗 頑荆葉已上各

右為藥末每用藥一兩半鹽四兩慢火炒令熱用

絹袋盛之去痛處熨烙

苦葫蘆方 治諸痔疼痛不可忍

苦葫蘆子

右一味每用一錢水一升煎十餘沸濾去滓

冷熱得所淋洗隔一三日淋洗一次

玉壺方 治三種瘰癧

海藻

昆布

雷丸

海帶各等分

右件揀擇極淨搗羅為細末燒陳米飯搗和為丸

如榛子大每服九合化嚥津不拘時候常令藥

力不斷

御藥院方

卷八

其

精思堂

出油方

白石脂

右研碎絹雀兒隔過有油處摻定用紙隔熨斗熨

過如有顏色衣服亦不改色

苦參丸 治肺毒邪熱頭面生瘡生疥癬並宜服之

苦參

右為細末粟米飯和丸如梧桐子大每服五十九

空心溫米飲送下

斗痛丸 走飲濕已後宜用藥經絡除疼痛

駝間皮燒存性一兩半

皂角子人二兩炒

當歸頭去蘆

乳香別研

沒藥別研

川山甲紀一兩四味

木香兩

麝香別研

右件同為細末酒煎麵糊和丸如梧桐子大每服

五十九不拘時候溫酒下或木瓜湯下亦得

琥珀散 治五淋澀痛小便有濃血出

琥珀研

海金沙研

沒藥

蒲黃研各一兩

右為細末每服三錢食前濃煎萱草根湯調下日

進二服

金剛骨丸 治五種腰疼

御藥院方

卷八

其

精思堂

草薺剉

兔絲子酒浸軟別如泥炒乾秤

金毛狗脊去毛淨秤四兩

右件為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五

十九食前溫酒送下

虎杖散 治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷

虎杖八兩

右為細末散每用二兩水五椀煎五七沸乘熱淋漑

木瓜丸 治腰脚少力疼痛無時及諸風氣濕閉

茯苓酒浸

牛膝酒浸

當歸各四兩

血竭

沒藥各五錢

木瓜

威靈仙 防風各二兩 石菖蒲

牽牛各四兩 人參三兩 全蠍

白花蛇酒洗 朱砂 麝香

天麻各二錢 雄黃三錢

右件為細末水麪糊為丸如梧桐子大每服五十

丸浸木瓜酒送

如意散 治疥瘡時發癢痛

乾漆生 黑狗脊生 輕粉研

僧者黃生研各一兩

右為細末研藥令勻每用藥先微撥破用生油調

御藥院方 卷八 精思堂

如稀糊擦患處一日三兩次用

三聖膏 治鬢髮脫落令生長方

黑附子生 蔓荊子 柏子人各半

右件為細末烏雞脂和搗研干下於磁合內密封

百日取出塗住鬢髮落處三五日即生自然半

壯不落

代茶新飲

黃耆 通草各二斤 茯苓

乾薑 桑根白皮 干葛各一斤

鼠黏根加一斤濕 生乾地黃 枸杞根洗

忍冬十二月採枝葉陰乾濕加五兩 薏苡人各十兩

菝葜六兩 麥門冬心 萎蕤各五兩

右一十四味並揀擇取州土堅實上者刮削如法

然後稱大斤兩各各別搗以馬尾羅子篩之不

用細攪令勻調重篩務令相入不令偏併別取

黃白楮皮白皮根相兼細切者取濃汁和搜令

硬軟得所更方白中搗別作一竹捲子圍闊二

寸半厚二分以下臨時斟量大小厚薄作之此

亦無定象手依摸捻作餅子中心穿孔日暴乾

百餘餅為一穿即以葛蔓為繩貫之竹作篋亦

御藥院方 卷八 精思堂

得陽掛之通風陰處妙若須煮用以炭火上炙

令香熟勿令焦白中搗末任隨時取足煎以代

茶大都濃薄量之著少隨煮之頻揚之即滑美

著鹽橘皮葦撥亦佳除風破氣理丹石補腰脚

聰耳明目堅肌長肉緩筋骨通腠理頭腦閉悶

眼睛疼痛心虛脚弱不能行步其效不可言若

患脚氣肺氣疝氣咳嗽入口即愈患消中消渴

尤驗主療既多不復一一具說但服之立取其

驗禪居高士持宜多飲暢臟腑調適血脈少服

益多心力無勞飢飽飲之甚良若臘月臘日合

之十年不敗

梅覺春丸 專治陽事痿弱

丁香

木香

朱砂研各一錢

黑附子一個重半兩者剉去中心成空瓮子

右將丁香木香朱砂等三味同為細末傾在附子

甕兒內以蕎麥麪和如餅劑裹却用生羅荷一

个徑四寸劈作兩半中間剉得可容上件藥置

之於內以竹簽子簽定用六一泥固了約厚半

指許於淨地剉一坑子深五寸許川炭火燒紅

去了炭火及灰令坑內淨用好醋一盞潑在坑

御藥院方

卷八

三

精思堂

子泣定將藥安在坑內四畔用炭火一斤鋪蓋

煨之一時辰為度去火用新盆合定令冷與後

藥一處為末

舶上茴香妙

天台烏藥

白茯苓去皮各一錢

地龍去上秤一字

右為細末酒煮麪糊為丸如菜豆大每服二十九

空心乳湯酒送下

旋生春散 同上方一對服

朱砂分一

紫礬錢二

丁香錢一

木香

沒食子和皮

川棟子剉

川茴香妙

陽起石煨

廣零陵香

乳香

漏蘆炮去皮

麝香

沒藥已上各一錢

蛤蚧酥炙一對

右為細末每服一大盞溫酒調下食前服九子

藥相隨服散子藥十日見效亦不可久服待藥

力敗再服之初服此藥權忌房事恐走藥力可

量藥力欲盡再接引服之雖年老之人與少壯

無異

荆芥散 治肺壅腦熱鼻淵不止

荆芥穗

雀舌菜各一兩

苧莖二兩

御藥院方

卷八

三

精思堂

沙草根二兩去毛石膏研如粉一兩龍腦錢一

右件為細末每服三錢食後荆芥湯調下

洗風散 洗療一切風毒頭面生瘡

防風去蘆頭

荆芥穗

吳白芷

川芎

蔓荆子去白

威靈仙去土

何首烏

白茯苓去皮各一兩

苦參

白牽牛各半斤

右件同為羅末每用藥末三兩好漿水三升煎五

七沸去滓洗面每日早晚二次用

紫葛散 消腫散毒

紫葛

升麻

黃芩

赤小豆

白欬

榆白皮

玄參各一兩

木香半兩

黃連

大黃各二兩

右為細末每用溫水調藥塗掃赤腫處藥乾再掃

威靈仙丸

宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水久積

癥瘕痰癖氣塊膀胱冷膿惡水腰膝冷疼但是股

脚腫痛麻痺皆可治之

威靈仙用生

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九漸

御藥院方

卷八

三

精思堂

加至五十九溫酒送下食前忌茶

白蓮散

治癩癧及或彫青或肌肉內破川紙灰焙

以紙灰漬入肉中不去便似彫青不去宜用此藥

花滅錢二

桑柴灰錢一

風化石灰錢半

糯米錢三

右將藥一處盛在小瓷罐兒內上用瓦蓋口用黃

泥固濟以文武火焙定半時取出藥用乳鉢研

令極細每用先川針尖撥過麝香川藥少許乾

貼忌油膩物及當風行立

止血散 治腸風下血或在便前或在便後在便前

者其血近腎肝血也在便後者心肺血也其血遠

此藥並主之

皂角刺錢二兩

胡桃人皮去

破故紙錢

槐花各一兩半

右為細末每服二錢清米飲煎下溫酒亦得

乳香丸

腎虛骨節疼痛兼打撲傷折從高墜下

跌傷損及治寒濕搏於骨節之間疼痛有時並皆

治之

蒼木五兩去皮炒

澤烏頭三兩生去皮膽

乳香兩一

天仙子炒

自然銅兩七兩

黑牽牛錢

御藥院方

卷八

三

精思堂

官桂去粗皮已上四味各二兩二錢半

右件為細末水麵糊和丸如梧桐子大每服十九

至十五丸食前空心溫酒送下

淋瀝藥 治腸風痔疾經久不差痔以成漏瘡口膿

汁涓涓不絕及瘡內有蟲瘻痛不止並宜淋洗之

如瘡不破者用後方乾上藥塗貼

威靈仙去土

荆芥穗土

商枳殼炒去

乳香各一兩

鳳眼草兩二

細辛二錢半

右為細末每用藥三兩水一大升半同煎至一升

濾去滓稍熱淋洗患處如冷後再溫熱更洗一

通不用如洗罷用綿或熟白絹揩乾上藥如瘡
後不須上藥只淋洗

乾上藥 如瘡不破川前方淋濕訖用此藥塗之

馬牙消研 馬勃各半 輕粉二錢

右為細末如瘡癢痛不破者靚瘡大小用藥末多

少津液調成膏擦於患處日用三五次

收陽粉 治一切虛汗盜汗自汗及漏風等諸證

藁本 麻黃根 白芷各半

米粉一兩

右為細末攪和勻紗帛包撲傳汗出腿兒痛處

御藥院方 卷八 精思堂

五皮散 治他病差後或久痢之後身體面目四肢

浮腫小便不利或虛而大此山脾肺虛弱不能運

行諸氣氣虛不理散慢於皮膚肌肉之間故令腫

滿也此藥並宜服之

大腹皮 赤茯苓皮 生薑皮

陳橘皮 桑根白皮各等分

右件為麤末每服五錢水一大盞同煎至八分去

滓溫服不拘時候日進二服

淋瀝藥山茱萸散 治腎氣虛弱陰囊多汗或冷腫

痛不消或牽引少腹時發疼痛並皆治之

山茱萸 吳茱萸 硃砂飛

紫稍花 零陵香 藿香葉

丁香皮各半 木通 細辛

續斷 遠志 蛇床子

木鱉子 天仙子三錢

右為麤末每川一匙水一碗煎五七沸先以熱氣

薰然後浴宜蓋覆避風

淋瀝藥丁香散與上治法同

紫稍花 丁香 肉桂

蛇床子 吳茱萸 細辛各半

御藥院方 卷八 精思堂

紅豆 川芎 荈若子

黑狗脊 藿香葉 甘松

山茱萸 蜀椒後炒已上 香附子

羌花 巴戟 木香

甜葶藶炒 香白芷 槐子炒

芸臺子 天雄炮裂不去皮已上各三分

右件為麤末每川酸漿水三升藥末一兩鹽少許

煎五七沸漸漸乘熱小浴下部臨臥用之

淋浴九仙散 助陽退陰令堅頸急疾陰痿陽事不

舉

附子地製去皮 蛇床子土 石菖蒲

紫稍花 遠志心 雄蠶蛾一已上各

浮萍草二 丁香半 韶腦另研

右為麤末每用水兩碗藥末一兩葱白一莖細切煎至一椀半乘熱淋洗拭乾仍避風冷十年痿者十次見效

桂香膏 治陰痿陽事不舉

桂皮去毒 牡蠣燒 蛇床子炒各

細辛土 零陵香各半 胡椒九粒

麝香另研

御藥院方 卷八 三十七 精思堂

右同為細末臨時每用一錢津唾調塗上立驗

紫稍花散與上治法同

紫稍花 母丁香 血竭研

牡蠣燒各半兩 桑螵蛸一兩 藁本七錢

蛇床子三錢 舶上茴香一兩 晚蠶蛾三錢

南乳香

右為麤末每用藥末三錢水二升煎三五沸去滓

熱淋洗

蛇床子散已上三方治法同

蛇床子 細辛 藁本

吳茱萸 小椒 枯礬

紫稍花各半

右件為細末每用藥末半兩水三椀煎至兩椀臨臥稍熱淋潔

遠志散 治形中痛及囊縮津液不行

遠志心 五味子焙 蛇床子各等分

右為細末每用藥末五錢水三升入葱白三寸同煎三五沸去滓熱淋潔

淋瀝藥與前治法同

蛇床子去皮煉淨四兩

御藥院方 卷八 三十八 精思堂

右為麤末每用藥一兩水二椀煎至一椀半去滓乘熱薰下部候通手沐浴臨睡用

丁香石燕子散 治腎經不足齒斷不固或動搖不牢或髭髮斑白或陰痿陽事不舉皆可用之

丁香二錢 石燕子一對燒七通開淨 海馬一對力上

舶上茴香半兩 白礬水 龍骨燒紅各半兩

右為末每用一錢擦左右牙後用溫酒送下臨臥時用

神應散 治諸瘡腫硬色白不潰疼痛不已

吳茱萸少生用

御藥院方 卷八 三十九 精思堂

神應散 治諸瘡腫硬色白不潰疼痛不已

吳茱萸少生用

神應散 治諸瘡腫硬色白不潰疼痛不已

吳茱萸少生用

右為燼末燬烙却用鹽包蓋之

泄乾散 治津液不收攝泄汗玄府不閉腰疎汗多

不止宜用

滑石二兩

白芷兩

寒水石粉兩

黃丹生香多少用顏
色如桃紅為度

右件並為極細末和勻每用乾擦患處

三物膏 齒者骨之所終髓之所養若嗽嚙令液灾

不干齒揩理無妨因風招病由此用三物膏揩擦

令牙齒堅牢

柳枝

桑核

槐枝各對
一升

御藥院方

卷八

三九

精思堂

右三味以水二斗同煎至一斗去滓入好鹽一斤

熬成膏磁合內貯臨臥揩牙妙

槐角丸 治腸風痔疾大便澁滯氣結不通飲食衰

少面黃肌瘦或下血不止或在便前或在便後者

並宜服之

槐角一斤
焦熱煉淨秤

黃耆對

枳殼對
去穢

熟乾地黄

當歸

防風各四

木香兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服六七

十九溫米飲送下不拘時候

湯腫汗 治諸腫痛不消或筋脈拘攣不能屈伸

蒲翁盈地丁

枸杞苗

黃芩味

升麻

葛根各等

右為燼末每用半兩水一升煎十沸去滓熱湯冷

則再暖

琥珀藥 治陰囊瘙癢不已及自汗不收

西琥珀錢六

枯白礬錢一

黃丹錢七

麝香錢四

龍泉粉兩二

右為細末每用半錢摻在手心於患處擦

麝香丸 治婦人陰中久冷或成白帶淋瀝不斷久

御藥院方

卷八

四十

精思堂

無子息

零陵香

藿香各二

蛇床子兩

吳茱萸

枯白礬

木香各三

麝香二錢

丁香

韶腦各一

不灰木

白芷各二

龍骨錢五

右為細末煉蜜和丸每兩作四十九每用一九綿

裏內陰中

薰蒸方 治腎氣衰少脾腎肝三經受於寒濕停於

腿膝使經絡凝而不行變成脚痹故發疼痛此藥

能和榮衛通經絡

小麥麩約四升 小椒把一 鹽

葱白三寸大莖 酒一盞 醋不計多少攪拌上件製等濕潤為度

右件以銀器炒令極熱攤臥褥下將所患腿脚就

臥薰蒸薄衣被蓋得汗出勻過約半個時辰微

去炒麩止就鋪褥中卧待一兩時辰以來覺汗

稍解再用收陽粉撲傳汗孔畢然後出鋪臥中

勿見風

淋瀝藥雞冠散 治五痔肛邊腫痛或生鼠乳或穿

穴或生瘡久而不愈變成漏瘡

雞冠花 鳳眼草各一兩

御藥院方

卷八

聖

精思堂

右為燼末每用藥半兩水一碗半煎三五沸熱淋

溲患處

流氣丸 治五積六聚癥瘕癖塊留飲已上此疾皆

係寒氣客搏於腸胃之間久而停留不去變成諸

疾此藥能消導滯氣通和陰陽消舊飲雖年高氣

弱皆可服

木香 川茴香炒 菖蒲

青皮去蘊 蓬莪茂炒 紅橘皮去蘊

檳榔 羅荀子 補骨脂炒

葶澄茄 縮砂人 神麴炒

麥藥炒 枳殼去穢已上一兩 牽牛炒一

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服五十九食

後細嚼白豆蔻人一枚白湯送下

牡蠣散 治虛汗不止玄府不閉

牡蠣一兩錫內盛用鹽泥固濟木炭火燒盡夜 定粉半兩

右一處同研令勻及細用綿裹之擦於患處

御藥院方卷第八

御藥院方

卷八

聖

精思堂

癸巳新刊御藥院方卷第九

較勘無差

治咽喉口齒門

消毒散 治小兒瘡疹已出未能勻透及毒氣澁遏雖出不快壯熱狂躁咽膈窒塞睡臥不安大便秘澁及治大人小兒上屬攻熱咽喉腫痛胸膈不利並宜服之

牛蒡子鹽六兩

甘草炙二兩

荆芥穗兩

右為麩末每服一錢用水一盞煎至七分去滓溫服食後小兒量力少少與之如治瘡疹若大便

御藥院方

卷九

精思堂

利者不宜服之

利膈散 治咽喉諸疾腫痛生瘡

黑牽牛炒

甘草炒各四兩

防風兩

牛蒡子炒八兩

右件各慢火炒令熟與防風同為細末每服二錢

沸湯一大盞點藥澄清服不拘時候

如聖湯 治風熱毒氣上攻咽喉咽痛喉痺腫塞妨

悶及肺壅咳嗽咯唾膿血胸滿振寒咽乾不渴時

出濁沫氣息腥臭久久吐膿狀如米粥又治傷寒

咽痛

桔梗兩 甘草二兩

右為麩末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服小兒時時呷服食後臨臥

龍腦散 治咽喉腫痛皆因風熱在於脾肺邪毒蘊滯胸膈不利故發疼痛及急喉痺閉塞腫痛粥飲難嚥

硼砂 腦子 朱砂各一分

滑石細末

石膏二兩

甘草生取末一錢少

右為細末每服半錢用新汲水調服或乾搽喉津亦得

御藥院方

卷九

精思堂

龍腦破毒散 治不側急慢喉痺咽喉腫塞不通

益消細末

白殭蠶微炒去嘴為衣抄八錢

甘草生為末八錢

青黛抄八錢

馬勃末三錢

蒲黃秤半兩

腦子秤一錢

麝香一錢

右同研令勻細用磁合子收如有病證每用藥一錢用新汲水少半盞調勻細細呷嚥如是喉痺

即破出血便愈如不是喉痺自然消散也若是

諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上下嚥

津如是小兒一錢作四五服亦如前法用並不

計時候

漱口沉香散 治牙疔熱毒之氣衝發齒斷腫痛或

瘡或差或發並宜服之

香附子八兩

沉香

升麻各一兩

華細辛兩

右為細末每用二錢水一大盞同煎至三兩沸去

滓溫漱冷吐悞嚥不妨不計時候日用三四次

槐枝散 治牙齒腫痛牙斷宜露氣臭齒挺出時發

疼痛常用去疳牢牙

細辛去土一兩

歟稍生二兩

川芎

白芷各一兩

御藥院方

卷九

三

精思堂

右為細末每用半錢擦在牙痛處有涎即吐悞嚥

無妨早晨臨臥日用一兩過

天門冬丸 治上膈鬱熱咽喉腫痛唇焦舌乾腮頰

生瘡解化痰毒並宜服之

天門冬慢火

玄參湯洗

牛蒡子炒各一兩

百藥煎

紫蘇葉各一兩

甘草炙

人參各一兩

右為細末煉蜜和丸如皂子大每服一丸噙化嚥

津食後

漱口地黃散 治脾熱風熱上攻咽喉腫痛生瘡閉

塞不通或生舌脹

黃芩八兩

甘草生二兩

荆芥穗一兩

薄荷葉一兩

右為細末每用二錢水一盞入薄荷少許煎三兩

沸去滓熱漱冷吐不計時候

硼砂散 治心脾風毒熱無發咽喉生瘡腫疼痛或

子舌脹或木舌重舌脹至腫悶寒水漿不下

南玄參

管仲

白茯苓去

縮砂人

滑石研

荆芥穗

山豆根

甘草生

青黛研各

御藥院方

卷九

四

精思堂

硼砂例三兩

蒲黃

薄荷葉各一兩

寒水石燒過研

右為細末入研藥勻每服半錢新水調下或諸舌

脹搽在舌上嚥津無妨不計時候

仙方地黃散 治牙齒黃色不白常用此藥令牙齒

瑩白滌除腐氣牙齒堅牢斷槽固密黑髭髮

猪牙皂角

乾生薑

升麻

槐角子

生乾地黃

木律

華細辛

旱蓮

香白芷

乾荷葉各二兩

青鹽另研一兩

右剉碎用鍋子內燒有青煙存性為度用紗羅子

重羅別研青鹽末和勻同入藥內每用少許刷

牙蘸藥刷牙合口少時有涎即吐然後用溫水

漱口早晨臨臥用

祛毒牛黃膏 治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬或

滿口生瘡涎潮喘急胸膈不利飲食難進

牛黃錢二 人參兩一 南琥珀

犀角屑取極末 桔梗 生乾地黃沉水

雄黃飛二 川升麻

南玄參各三 蛤粉水飛 南硼砂兩

御藥院方 卷九 五 精思堂

朱砂飛研 鉛白霜錢一 腦子錢三

金箔為衣 寒水石燒赤去火

右為細末入研藥勻煉蜜和丸如小彈子大金箔

為衣用磁器內收每服一九濃煎薄荷湯溫化

下或新汲水化服亦得食後日進三兩服更或

噲化嚙津亦得

春冰散 治脾肺積熱咽喉赤腫疼痛

大黃生一兩 益消兩二 薄荷

甘草微炒各

右為細末每服二錢食後新水一盞調服入蜜少

許亦得

消毒寬喉散 治急慢喉痺咽喉閉塞腫痛或舌本

強硬滿口生瘡

寒水石生四兩 馬牙消 朴消各六

青黛兩半

右為極細末每服二錢濃煎薄荷湯點勻熱漱咽

喉內冷吐悞嚙不妨不計時候日川三五次

咽喉碧玉散 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水

漿不下或生喉癰重舌木舌腫脹並宜服之

青黛 益消 蒲黃

御藥院方 卷九 六 精思堂

甘草末各一兩

右同研勻細每用藥少許乾摻在咽喉內細細嚙

津綿裏噲化亦得若作丸沙糖和丸每兩作五

十九每服一九噲化嚙津亦得

麝香朱砂丸 治咽喉腫塞閉痛或作瘡癰或舌本

腫脹滿口生瘡津液難嚙

燒寒水石煉淨 馬牙消生用 南硼砂兩二

鉛白霜 龍腦各三錢 麝香錢二

甘草二十兩 朱砂一兩半

右研極勻細用甘草膏子和丸如梧桐子大朱砂

為衣何服一兩九噲化嚙津不拘時候

龍麝聚聖丹 治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫疼

痛或成喉癰或結硬不消愈而復發經久不差或

舌本腫脹滿口生瘡飲食難嚙並宜服之

川芎兩一 生地黃 犀角屑

羚羊角 南琥珀研 南玄參

桔梗 連翹已上各半兩按方各五錢

馬牙消研 人參 赤茯苓去

升麻 牛黃研 麝香研

腦子研已上各三錢 南硼砂研一錢 鉛白霜例一錢

朱砂水飛 金箔為衣五片

右為細末煉蜜和為丸每兩作一十五丸用金箔

為衣每服一九用薄荷湯化下或新水化服亦

得更或細嚼服并噲化嚙津皆可服食或臨臥

日進三兩服

朱砂研 鎮心安神及解熱損滲血等疾

金末二錢 朱砂例 珍珠末

生犀 甘草炙 人參

玳瑁已上各一兩 西琥珀另 午黃

麝香 龍腦 南硼砂

羚羊角 赤茯苓 遠志去心已上各半兩

蘇合香油 鐵粉各一錢

安息香石另研入藥

右都為末拌和煉蜜破蘇合油劑諸藥為小錠子

更以金箔裹之磁器內收密封每服一皂子大

食後噲化衛尉葉承得效并阿膠 相雜服此

藥活血安神更勝至寶丹每兩作五錠子

胡桐淚散 治足陽明經虛風熱所襲傳流齒牙攻

注斷肉則致腫結妨悶甚者與斷開津液相搏化

為膿汁宜用此藥

胡桐淚 石膽 黃礬

蘆薈各半兩 朱砂 細辛

當歸 牛膝 川芎各半兩

亂髮灰 麝香各一錢 川升麻兩半

右件為細末先以甘草湯漱口後用藥少許傳之

如常用少許揩齒去風退熱消腫化毒牢牙永

無宜露血疳之疾

增損如聖湯 治心脾風熱攻衝會厭語聲不出咽

喉妨悶腫痛並皆服之

桔梗兩二 甘草微炒一兩 防風兩半

枳殼湯浸去穢
二錢半

右件爲細末每服三錢水一大盞煎至七分去滓

入酥如棗大攪勻溫服食後

一捻金散 治牙齒疼痛

蝸稍二錢

川芎一兩

華陰細辛

香白芷各半兩

右爲細末每服少許以指蘸藥擦牙痛處吐津悞

噤不妨不計時候

生地黄散 治牙齒疼痛

生地黄

升麻

川芎

御藥院方

卷九

九

精思堂

華陰細辛擇淨

露蜂窩炒

防風已上各一兩

大皂角二錢去黑皮炙焦

右爲麩末每服三四錢水一大盞入荆芥數穗同

煎至八分去滓微熱漱冷吐食後或臨臥日漱

三兩服

發聲散 治咽喉語聲不出

栝蒌皮細切慢火炒赤黃

白殭蠶大頭微炒黃

甘草剉碎黃色各等分

右爲極細末每服一二錢用溫酒調下或濃生薑

湯調服更用半錢綿裹喉化噤津亦得並不計

時候日三兩服

乳香膏 治蟲蝨牙齒疼痛去蟲止痛

乳香

雄黃

細辛淨

皂角各一錢有性

莽草

麝香各半兩

右爲細末鎔黃蠟和成錠子看蟲窠大小塞在窠

內上用少許綿子填蓋之有津即吐悞噤不妨

食後或臨臥

胡桐律散 半牙止痛

胡桐律二錢

生地黄

升麻各半兩

川芎一兩

白芷半兩

細辛二錢

御藥院方

卷九

十

精思堂

燒寒水石二兩

青鹽例

麝香各半錢

右爲細末每用少許擦牙痛處吐津悞噤不妨日

用五七次

仙方刷牙藥 烏髭鬚牢牙齒延年遲老

青鹽二兩

堅訶子二十箇

芝麻粹五兩

夏蠶沙七錢

旱蓮草一兩

皂角不蝨者去皮二兩

右同爲末醋漿水和丸如毬子大曬乾用新瓦藏

瓶內盛藥用鹽泥固候乾留一小眼子出烟置

一淨埽上用木炭火燒煙淡藥熟之後即出旋

研如常刷之如已白者百日黑未白者半月見

效唯頻刷尤妙

莽草散 治牙齒痛烏髭髮牢牙

莽草

生薑

柳枝皮白取

牛膝去苗

胡蒜子

生乾地黃

兔絲子

無食子

桐子漆

猪牙皂角記七各六兩

右件各剉如麻豆大入藏瓶鹽泥固火煨一日後

入地一尺二寸深埋三復時取出露三夜不得

見日氣研羅為細散每用手指蘸藥於牙上旋

擦

御藥院方

卷九

二

精思堂

玉池散 治牙痛或動搖不牢

地骨皮

白芷

升麻

防風

細辛

川芎

槐花

當歸去蘆頭

藁本去土

甘草生配錢各四錢

右件為麤散每用抄三錢水一盞入生薑三片黑

豆三十粒同煎至七分去滓熱漱冷吐

太和散 治牙齒動搖斷肉浮腫蟲蚋發痛

梧桐律

生乾地黃

白茯苓各半兩

華陰細辛

川芎

升麻

香白芷各三錢

麝香半錢

青鹽錢一

猪牙皂角燒存性二錢

右為細末青鹽麝香另研拌勻每用藥少許以指

蘸藥擦牙病處常用去疳牢牙定疼止痛

發聲散 治語聲不出胸滿短氣涎嗽喘悶咽喉噎

塞

升麻

桔梗

川芎

桑白皮各一兩

甘草

羌活

馬兜零各半兩

右件為細末每服一錢水一盞入竹茹薄荷同煎

至六分去滓食後溫服

御藥院方

卷九

五

精思堂

甘露飲子 治男子婦人胃中客熱口氣齒斷腫悶

宜露心中久熱不欲食喜眠睡及咽喉中有瘡並

皆治之

熟地黃

生乾地黃

天門冬去心

麥門冬去心

黃芩

枇杷葉去心

石斛

枳殼麩炒去穢

山茵陳

甘草炙各等分

右搗篩為麤末每服五錢水一大盞煎至七分去

滓溫服食後若齒斷宜露腫悶煎藥嗽之冷熱

皆可極効

地黃散 治風熱攻注陽明齒痛斷腫或血出宣露

生地黃一兩

防風

細辛

薄荷葉

地骨皮

藥本各一

當歸

茵草葉

荆芥穗各半

右同為細末每用四錢水一盞半煎至一盞去滓

微熱漱口冷即吐之不計時候

當歸散 治血氣不調風毒攻注齒斷腫悶生瘡時

有膿血或成齒漏久而不愈

當歸

牛膝生各一兩

細辛

御藥院方

卷九

三

精思堂

丁香

木香各半

右為細末每用指蘸貼於齒斷病處吐津嚙津不

妨無時

蜜陀僧散 治齒斷宣露腫悶生瘡或有膿血

蜜陀僧

雄黃各半

石膽二錢

麝香一字

右為細末每用少許乾貼患處吐津嚙嚙不妨不

計時候

消毒散 治齒斷并口唇生瘡腫痛

晚蠶蛾

五倍子

蜜陀僧各一兩

右件同為細末每用少許乾傳瘡上有津吐去

麝香散 治斷頰口舌生瘡

麝香一分條一分錢內

乳香錢半

白龍骨一錢

定粉二錢

烏魚骨去皮錢半

檳榔生一枚

蜜陀僧兩

寒水石燒赤三錢半

黃丹慢火炒一錢

右件為細末每用少許乾上瘡處有津即吐嚙無

妨不拘時候日三五次上

魏白皮散 治牙齒動搖不佳寒熱嚙物隱痛時發

時止

魏白皮兩半

地骨皮

葶撥

御藥院方

卷九

十四

精思堂

五靈脂兩

蛇床子炒

乳香另別二錢半

麝香另別

右為細末入研藥令勻每用少許貼牙病處吐津

嚙嚙不妨如痛不已用藥末三錢水一盞煎令

沸和滓熱漱冷吐並不計時候

立勝散 治牙齒腫悶疼痛宜洩諸陽毒氣行經絡

鬱滯

藜蘆

猪牙皂角去皮

白礬生

雄黃一分

細辛

蠟稍各半

右同為末每用一豆許噙溫水隨患左右鼻內噤

石膽散 治齒斷腫痛生瘡或欲成疔乍差乍發

石膽錢三 胡桐律兩半 蟾酥兩

輕粉抄一錢并重半錢

右為細末每用食後臨臥傳半字於患處貼吐津

噤不妨

黑牙縫刷牙藥香附子散

綠礬五錢內步令煙放冷用 五倍子

訶子皮各五錢 香白芷三錢 甘松

栗蓬各二錢 棗核灰三錢 螺螄二錢青者

石膽五錢生錢試如銅 香附子四錢 麝香半錢

御藥院方 精思堂 十五

右件為細末入麝香一味拌勻每日早晨先刷牙

潔淨然後用藥刷溫水漱口候少時稍等方吐

令牙縫黑牙板白牢牙黑髭鬚永不患牙痛

絕餘散 牢牙齒定疼痛固斷腫益氣血黑髭鬚大

有神效

澤烏頭 皂角去皮 生地黃各一兩

右三味同為細末用生薑自然汁和成團子用槐

枝火燒令煙盡取出於淨地上用碗蓋一宿出

火毒再搗為細末入後件藥

細辛取 青鹽各三錢 石膽

白礬灰 麝香各二錢已研

右件人前藥中同研令勻細每用擦牙病處或用

刷牙蘸刷亦得早晨食後臨臥日用三次有津

脚吐悞噤不妨

犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱口脣頰車髮鬚

腫痛及鼻額間連頭痛

犀角七錢 川升麻五錢 防風三錢

羌活三錢 川芎 白附子

香白芷各二錢半 黃芩三錢 生甘草一錢

右咬咀都作一服水五盞煎至三盞半去滓分作

三服一日服訖其證必減如臑胸有些滯不妨

玉塵散 治大人小兒咽喉腫痛口舌生瘡

寒水石燒三兩 馬牙消枯一錢 鉛白霜半錢

南硼砂兩半

右為細末每用少許乾摻口瘡上噤津無妨不拘

時候

青雪散 治魚骨鯁咽喉內不出并急慢喉痹

盆消兩 白殭蠶去頭炒黃色取末一錢半

牙消三錢 甘草生取末一錢半 青黛二錢

右件為細末每用二錢用井花水半盞調藥糰

細呷服或少許頻乾搽嚙津亦得

細辛散 治牙齒疼痛

露蜂房 荆芥 細辛各等分

右為麤末每用三錢水一大盞煎至七分去滓溫

漱冷吐

一字散 治牙齒疼痛

蠟稍 細辛 露蜂房炒

高良薑 華撥 胡椒各半

右為細末每用半字噙溫水隨痛左右鼻內噙更

用半錢擦牙痛有津即吐悞嚙不妨不拘時候

御藥院方 卷九 精思

露蜂房散 治牙齒疼痛經驗神効

大戟三兩 防風半兩 露蜂房炒

細辛各一兩

右件為細末每用五錢水一大盞煎至八分去滓

熬漱冷吐不拘時候

熟銅末散 治牙齒非時脫落令牢定

熟銅末一兩 當歸 地骨皮

細辛 防風各一分

右為細末和銅末同研如粉封齒日夜二三度三

五日牢定一月忌嚼硬物封齒是先塗藥在患

處用蠟紙封之

細辛湯 治牙齒痛久不差

細辛 華撥各等分

右為麤末每用一錢水一中盞煎至七分去滓熬

漱冷吐

華撥散 治牙齒疼痛神妙

華撥二錢 蠟稍 良薑各一錢

草烏頭尖半錢生不夫皮

右為細末指蘸擦牙痛處吐津悞嚙不妨

牢牙如聖散 牢牙齒止疼痛

御藥院方 卷九 精思

石燕子三對燒七返煎 乳香研 青鹽各一兩

細辛半兩

右為細末每用以指蘸藥乾擦於痛處良久溫煎

芥湯漱

宜牙膏 治牙齒動搖不牢疼痛不止

龍骨 定粉各二錢半另研 麝香字一

右件前二味為細末後入麝香勻用黃蠟一兩磁

盞內鋪開入藥於內攪勻放冷取出熨斗燒熱

鋪紙用藥攤之勻薄每用剪作紙條兒臨臥於

齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出藥

每夜用之如此半月消牙齒腫悶生斷肉治疳
蝕去風邪牢牙齒大有神妙

五倍子散 治牙齒搖及外物所傷諸藥不效欲落
者

川五倍子兩半 乾川地龍兩半

右為細末先用生薑搯牙根後以藥末傅之五日

內不得攻硬物如齒初折落時熱黏齒槽中貼
藥齒上即牢如故

代針散 治咽喉腫痛氣息難通

硝砂為君 白礬為臣 牙消三錢

御藥院方 卷九 精思堂

消石兩 黃丹兩 巴豆六枚

右件磁罐子一個先煨令熱後次第漸又下藥

巴豆逐個咬破後有火焰盡更入一箇續入蛇
退皮一條為之七擒以火養成汁後結硬乃成

也每用少許以竹筒子吹在患處忌雞犬婦人
見之唯鴈月合之

白龍散 治大人小兒咽喉腫痛滿口生瘡

西礪砂錢一 鉛霜 腦子各一

寒水石兩

右為細末每用一許乾摻舌上嚥津不拘時候

青龍散 治咽喉腫痛妨悶

石膏兩 朴消 甘草生各

青黛兩

右為細末每服二三錢煎薄荷湯調勻熱嗽冷吐

不拘時候悞嚥不妨

礪砂散 治心風熱毒克發咽喉生瘡腫痛或木重

舌脰或紫舌脹至腫悶塞水漿不下

南玄參 管仲 白茯苓去

縮砂人 滑石木 荆芥穗

山豆根 甘草生各 南礪砂兩

御藥院方 卷九 精思堂

鄆州薄荷葉兩

右件除研藥五味外搗羅為細末同合和勻每服

半錢新水調下或摻舌上嚥津無妨不計時候

漱毒散 治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

薄荷葉錢三 荆芥穗兩 細辛錢一

地骨皮去 鱗皮兩

右件為細末每用七錢水二盞煎至一盞半去滓

食後溫漱冷吐

升麻散 治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風

升麻 當歸切 防風去

藥本

甘草

白芷

細辛

芎藭

木香

右件搗羅爲散更於乳鉢中研細塗貼齒斷癩者

以水二盞藥五錢煎五七沸去滓熱漱冷吐悞

噉不妨

獨活散 清頭目發散風熱治陽明經不利邪毒攻

注牙齒斷肉虛浮宜露褪下動搖發痛又治偏正

頭痛漸漸攻注眼目或發疼痛視物不明其藥功

效不可俱述

川芎

獨活

羌活

御藥院方

卷九

廿一

精思堂

防風

華細辛

荆芥

鄆薄荷

生地黄

右件爲羅末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫

服食後日進三兩服

葦撥散 治牙齒疼痛

良薑

胡椒

葦撥

細辛

右爲細末每用少許噙溫水隨痛處鼻內噴

獨活散 治牙痛不可忍諸藥不効者

獨活

華細辛根

右爲羅末每用五錢水二盞入荆芥一穗同煎至

一盞去滓熱漱冷吐無時宜先用丁香散擦後

用此藥漱三兩次

青龍散 治陽明經風熱齒斷腫痛

青黛

薄荷葉

細辛

盆消

川芎

香白芷

右爲細末以指蘸藥擦齒腫處吐津悞噉不妨不

計時候

五靈膏 治牙齒動搖

五靈脂

松脂

黃蠟

御藥院方

卷九

廿二

精思堂

黃丹

蟾酥

右件藥同於磁器中以慢火熬成膏用白熟絹上

攤候冷剪作片子每夜貼於斷上有津卽吐悞

噉無妨此藥臨臥時用一次於惡硬物底一个

牙根兒下裏外貼之亦不甚悶若是牙兒堅固

自然得力不惡硬物也

射干散 治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛悶亂噉

物不下

射干

犀角屑

桔梗

川升麻

訶藥勒皮

紫蘇子

赤苓茯

枳殼去穢炒

檳榔各一兩

甘草炙赤

木通剉

木香各半兩

右件搗羅爲羅末每服三錢水一中盞煎至八分

去滓溫服不拘時候

柳豆散 治齒斷風腫去齒根下熱毒

赤小豆炒

黑豆炒熟各一合

柳枝剉一握

地骨皮一兩

柳蠹末半合

右件搗篩爲散每用四錢水一大盞煎至七分去

滓熱漱冷吐不拘時候

血竭散 牢牙定痛治牙根疔悶連膈骨疼痛久而

不愈

御藥院方

卷九

精思堂

血竭

石膽

乳香

五靈脂

蜜陀僧已上等

右各另研極細再同研勻每用一字指蘸塗貼牙

病處候少時用溫荊芥湯微漱有津吐去候

不妨

地骨皮湯 治牙齒疼痛喫物不得

地骨皮一兩

細辛去苗葉

生乾地黄一兩

戎鹽研一分

右四味搗篩每用五錢匕以水二盞煎三五沸

去滓熱漱冷吐以差爲度

丁香散 治牙齒疼痛

丁香

華撥

蠟稍

大椒各七箇

右爲細末每用少許以指蘸藥擦於牙痛處有津

卽吐

柳枝散 治牙齒諸疾常用牢牙去風甚效

柳枝

槐枝各長四寸一握切碎

皂角不蟬者七錢

右同入磁瓶中黃泥固濟糠火燒一宿後冷取出

御藥院方

卷九

精思堂

研細擦牙用如前法石佛庵主年七十餘云祖

上多患牙疼脫落得此方效數世用之齒白齊

密乃良方也

乳香定痛散 治牙齒疼痛

玄胡索

紅豆各二箇

乳香半錢

青黛二錢

盆消兩

麝香一字

右爲細末每用少許以指蘸藥擦於牙齒痛處有

津卽吐候候不妨如痛甚用藥一字嚼溫水隨

疼處鼻內噴

三聖散 治牙齒疼痛久不已

細辛一兩 荆芥穗二兩 蒼耳莖三兩

右三味並咬咀每用半兩水三大盞煎至一盞半

去滓熱漱冷吐悞噉無妨以痛止為度

玉池散 治牙齒疼痛不可忍

寒水石燒通紅研一兩 細辛去苗葉土 胡椒各半兩

荆芥穗二錢

右件為細末與寒水石一處再研令細勻用軟刷

牙如常刷牙使用日用三二次

立效散 治牙疼不可忍

百草霜研細 滄鹽研細各一錢 麝香煉去皮毛另研細半錢

右件一處再研勻細每用少許口噙溫水隨牙疼

乳香半錢

一邊鼻內噙之用無時

升麻散 治牙疼

升麻

荆芥穗 川芎

細辛去苗葉土 防風各半兩 露蜂房一錢

椒去日微炒

右為麤末每用三錢水一大盞煎三兩沸去滓溫

漱冷吐

補骨脂散 調養氣血治牙齒疼痛久不已

補骨脂二兩 青鹽半兩

右二味同炒令微爆為度候冷取出搗為細末每

用少許以指蘸藥擦於牙齒疼處有津即吐悞

噉無妨每日丁香散與補骨脂散相間使用

香附子散 治牙齒疼痛往來不歇

草香附子四兩 細辛半兩

右為麤末每用二錢水一盞煎至八分去滓稍熱

漱冷吐

追風散 治牙齒疼痛不止

川薑炮製 川椒去目各等分

右為細末每用以指蘸藥無時擦牙痛處後用鹽

湯漱之

蒟醬散 治牙齒疼痛發作往來不久已

蒟醬 細辛各半兩

大皂角一錢去皮子青鹽每煎除滿火燥存性細研川

右件為細末如痛時用軟刷牙蘸藥刷痛處次用

蒟草葉散通口

蒟草葉散 治牙齒疼痛

蒟草葉

胡桐淚 升麻各一兩

槐枝二兩

右為藥末每用一兩水二盞煎至一盞半去滓通

口漱深

地龍散 治牙齒疼痛

地龍去土

延胡索

葶撥各一分

右為細末如左牙疼用藥一字新綿裹納左耳中

右邊牙疼納右耳中其疼必止

藥本散 治牙齒疼痛

藥本兩一

川芎

細辛各半兩

胡桐律錢三

白礬灰錢二

右為細末每用一指蘸藥擦牙病處吐津候噤不

御藥院方

卷九

廿七

精思堂

妨無時

漱風散 治牙齒疼痛并斷腫

荆芥穗

藥本

細辛

香附子各等分

右為藥末每用五錢水一盞半煎至一盞去滓熱

漱冷吐不拘時候

草烏頭散 治牙齒疼痛動搖不穩用之辟風邪能

令病牙易落

草烏頭一兩炒令紫黑色

細辛錢一

右為細末每用少許擦牙病處後用手左右擺動

日用三五次有津即吐候噤不妨

地黃餅子 治牙齒痛

地黃五斤

右一味淨擇去苗於甑內蒸先鋪布一重以上二

層密閉令熟出暴之當日乾如經三度以生地

黃汁二升灑之却暴乾然後搗為餅子每服一

餅噙化嚥津一治齒二生津液三變白髮為

黑其功極妙

土蒺藜散 治牙齒疼痛斷腫動搖

土蒺藜去角生用不以多少

御藥院方

卷九

廿七

精思堂

右為藥末每服五錢淡漿水半碗煎七八沸去滓

入鹽末一捻帶熱時時漱之別無所忌然雖藥

味不衆蓋單方之藥取效急速兼神仙秘指云

若人服蒺藜一年已後冬不寒夏不熱服之二

年老者復少髮白重黑齒落重生服之三年輕

身長生今雖不作湯散服餌久而漱之其驗亦

同

一字救苦散 治牙疼

香白芷兩一

草烏頭半兩去皮膽心白者用必黑不用

雄黃一錢半另研

右件爲極細末與雄黃拌勻每服用藥末少許擦

於患處待少時以溫水漱立止

二聖丸 治牙齒動搖疼痛

川烏頭生用 蒼木去皮

右同爲細末醋麵糊丸如梧桐子大每服七九食

煎鹽湯下忌熱物少時

槐枝八仙散 治牙齒疼痛

新槐枝取東引者五握細對本人秤重一兩半 生乾地黄

地骨皮 梧桐律 莽草各一兩

細辛去苗半兩 青鹽 乳香各二錢

御藥院方 卷九 精思堂

右件八味除槐枝乳香青鹽外同爲細末另入槐

枝乳香青鹽攪勻停分作八服每服川水三盞

煎三沸去滓帶熱緩緩漱之悞嚥無妨令即吐

去大止牙痛痛愈更不宜再漱忌甘甜之物

胡桐律散 治齒斷腫四宣露血出

胡桐律 川芎 細辛

白芷各半兩 生地黄一兩 青鹽二錢

寒水石燒通赤出

右件同爲細末每用塗貼患處吐津悞嚥不妨無

時日川五七次

柳枝湯 治齒根宜露動搖疼痛

柳枝握一握 地骨皮 防風去蘆

杏仁湯浸去皮尖 生地黄切 蔓荆子

細辛各一兩 青鹽半兩

右件爲麤末每用藥一兩酒水各一盞煎至一盞

去滓熱漱冷吐不拘時候

石膽散 治牙齒斷肉根縮虛浮時有膿汁牙齒動

搖疼痛

胡桐律 黃礬燒 朱砂

升麻各半兩 石膽 華細辛研

御藥院方 卷九 精思堂

當歸對 小蓀對 川芎

棘刺炒 地龍去土燒已 乳香

麝香各二錢半 龍腦字一

右爲極細末每用藥少許傳擦牙斷上吐津悞嚥

不妨早晨臨臥并每食後日川五六次

二勝散 治齒斷成根或腫牙齒動搖疼痛

甜葫蘆子晒乾 牛膝對四兩

右爲麤散每用五錢水一盞半煎至一盞去滓微

熱漱多時吐之悞嚥不妨食後并臨臥日漱三

四服

檳榔散 治牙齒疼痛連斷頰俱腫去風熱消腫痛

檳榔 荊芥穗 茵草

升麻 羌活 藁本

木香 細辛各半

右八味並不見火生搗羅為細末每用半錢傳在腫痛處吐津候無妨不拘時候

香芎散 治牙齒動搖疼痛

川芎 羌活 細辛

防風 茵草 郁李人湯浸去皮尖

右同為末每用五錢水一盞半煎三五沸去滓

御藥院方 卷九 精思堂

熱漱冷吐不拘時候

升麻丸 治陽明經有熱攻注牙齒腫痛疎風毒

升麻 細辛 防已

羌活去蘆 枳殼麩炒去穢 大黃剉散

麻人研末 牽牛末

大腹子剉 郁李人生去皮

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前

溫酒下

人參清肺散 治脾肺不利風熱攻衝咽喉腫痛嚔

物妨悶

人參去蘆 甘草生 山梔子

盆消各一 薄荷葉 黃芩清

川大黃生各一 連翹三 黃連去蘆

白附子去皮

右為末每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食

後溫服

救生散 治咽喉閉塞氣息難通

雄黃另 藜蘆 猪牙皂角生去尖

白礬生用另研

右除礬外為細末入研藥同研勻細每用一字

御藥院方 卷九 精思堂

噴兩鼻內出黃水為效

開關散 治纏喉風氣息不通

白蘆蠶直者去頭 枯白礬一

右為細末每服三錢生薑蜜水調勻細細服之不

拘時候

犀角散 利咽喉下痰

大黃二 荊芥穗半 甘草二

薄荷半

右為末每用四錢水一大盞煎三沸去滓溫調

青雪散三錢細細服食後

中郡惠民司無名兒藥 治咽喉閉疔痘堵塞不通

氣水米雞下至危者

牽牛四兩一牛熟用

鼠黏子兩一 防風七錢

甘草生

枳殼各半兩

右為細末每服五錢沸湯熱服不拘時候

鼠黏子散 治時行熱毒攻發咽喉及頸外腫痛

鼠黏子

馬牙消

寒水石生各一兩

大黃兩半

右為細末每服三錢蜜水一盞調勻和滓服不拘

時候

御藥院方

卷九

三

精思堂

五癆散 治咽喉腫閉不通

白薑直者去

大黃生各一兩

右同為細末每服五錢生薑自然汁三分溫蜜水

七分調勻細細服

茯苓散 治牙齒疼及牙齦腫痛

白茯苓去皮

細辛苗

香白芷各一兩

寒水石生用研

右件為細末每用少許擦牙痛處含口良久吐去

津然後用溫水漱之不拘時候

如聖散 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙開

緊不省人事

雄黃細

藜蘆厚片皮用

白礬飛

猪牙皂角去皮炙黃

右件搗羅為細末每用一豆各鼻內噴之立見效

烏犀湯 治口舌生瘡

犀角屑

羚羊角屑

丹砂研

黑參各三

黃耆剉

升麻各半

大黃剉

射干各一

生乾地黃焙

天門冬生去心焙

甘草炙剉各

右件燒搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後服

御藥院方

卷九

三

精思堂

黑參丸 治口舌生瘡久不愈

黑參

天門冬去心

麥門冬去心炒

右件為末煉蜜和丸如彈子大每以綿裹一丸嚥

化嚥津

柑桔湯 治胸中結氣咽喉不利下一切氣

桔梗

杏仁湯浸去皮尖

甘草炙一

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓微溫

時時服

應痛散 治陽明經有風熱攻注牙齦疼痛

細辛 白芷 升麻各錢

南礪砂錢一 川芎錢五 鉛白霜

龍腦錢一 麝香錢半

右為細末頻擦牙痛處吐津悞嚥無妨不拘時候

升麻散 治陽明經受風邪入齒牽引牙槽疼痛不

止

升麻 香附子 細辛

莽草各等分

右同為細末每用三錢水一盞煎至七分去滓熱

漱冷吐日用三四度

御藥院方 卷九 精思堂

牙藥麝香散 牢牙齒止痛養氣血黑髭鬚

綠礬 枯 石燕子 燒通赤醋

生地黃 青黛各半 青鹽二錢

石膽錢三 五倍子二兩 訶子皮

何首烏 龍骨各四 白茯苓兩

縮砂人錢八 甘松錢四 零陵香

藿香葉錢六 百藥煎兩 細辛二錢

龍腦 麝香各二錢

右為細末每用以刷牙蘸藥刷牙齒上待少時用

溫水微漱早晨食後或臨臥日用三兩次

清上防風散 治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙

齒悶痛斷肉虛腫鼻塞聲重頭昏目眩並皆治之

防風 細辛 薄荷葉各一

川芎七錢 獨活 荊芥穗

天麻 甘草 白檀

白芷 片腦子各一錢

右同為細末入腦子再研勻細每服二錢淡茶清

調勻稍熱漱冷吐不計時候如覺頭昏目痛牙

齒腫悶用熱茶清調三錢食後服亦得

地黃膏 治風牙齒斷腫痛熱毒上攻連頰腫

御藥院方 卷九 精思堂

當歸 白芷 細辛各二錢

鹽花錢一 生地黃汁五

右件前四味為細末以地黃汁於銀石器內慢火

熬成膏塗患處日用三五度

青金散 治心肺客熱上攻咽喉腫痛生瘡舌本強

硬妨罔不利

南礪砂另兩 薄荷 甘草七錢

百藥煎三 馬牙消 青黛各

紫河車二錢 白薑 取末一錢

腦子另錢

右除件藥外同為細末入研藥再研勻細每用少

許時時乾擦舌上細細嚥津

桔梗湯 治咽喉疼痛如有物妨悶

桔梗二兩 半夏切洗一兩 人參去蘆

甘草炙剉各半兩

右四味麩搗篩每服三錢加至五錢匕水一大盞

入生薑五片同煎至六分去滓溫服食後臨臥

涼膈甘露丸 治咽喉疼痛多痰

南礪砂研半錢 丹砂研一分 龍腦字一

甘草半兩 川百藥煎搗碎焙乾

御藥院方 卷九 精思堂

右為細末研勻用糯米粥清和丸如梧桐子大無

時喻化一九

消毒犀角飲子 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利

痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚遍身風

疹瘡毒赤癩及瘡疹已出未出不能快透並皆治

療

鼠黏子四斤 荆芥穗二斤 甘草一斤

防風半斤 藟頭去

右件為麩末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫

服食後小兒疹豆欲出及已出熱未解急進此

藥三四服快透肌消毒應手神効

牙藥麝香散 治牙齒不牢固去一切疳蝕黑牙縫

去腐殞

綠礬一兩 石膽炒二錢 五倍子去坤穰一兩

訶子皮 何首烏 白茯苓去皮

白龍骨 甘松去 藿香葉各四錢

縮砂人參八錢 零陵香六錢 百藥煎二兩

細辛去苗一錢 麝香研一兩

右件為細末入研者令勻先用熱漿水漱口每日

藥少許擦牙含口少時後用熱水漱口每日早

晨用 御藥院方 卷九 精思堂

石燕子散 治牙齒風冷疼痛及牙斷不密固

石燕子五對緊小者火燒過去火 茯苓去皮

寒水石燒過去火 細辛淨 香白芷各一兩

右為細末入研藥勻每用藥半錢以指蘸藥擦牙

斷上合口少時後用溫鹽湯微漱一兩口存藥

性食後或臨臥日用一兩遍

牢牙石燕子散 治牙齒斷肉不固及腎弱齒疎或

血山侵蝕

石燕子再燒一次去氣細研

石燕子再燒一次去氣細研

青鹽研

麝香研各一錢

右合研勻細每用藥半錢以指蘸藥刷牙斷上合口少時後用溫酒漱嚙如不欲嚙吐出不無妨早晨只用一遍

加減牙藥麝香散 治腎氣虛弱故齒者及骨之所

終髓之所養也若腎氣實則骨髓堅固齒無病矣

綠礬研一兩

石膽炒二兩

五倍子二錢

訶子皮

何首烏

龍骨

麝香葉

甘松四錢

白茯苓去皮一兩

縮砂人八錢

零陵香六錢

白藥煎二兩

御藥院方

卷九

三九

精思堂

細辛二錢

生乾地黃

青黛研

龍腦研

麝香研已吐各半兩

右為細末入研藥勻如常用藥少許用刷牙蘸藥刷牙齒上合口少時後用溫水漱口吐之

日早晨用

二色漆牙藥

治牙縫疎及牙瑩淨黑牙縫

五倍子二錢

訶子四錢

黃丹一錢

與上同研已係是紅牙藥

綠礬生用一錢

銅綠半錢

已上係是青牙藥

右每日早晨洗漱罷用荆芥杖兒蘸紅牙藥於牙

縫內上一次後却蘸青牙藥於紅牙藥上俾之

後少時用溫漿水微漱一兩口即休

白牙藥升麻散 治風牙疼痛及牙斷腫硬不消

川芎四錢

升麻

藥本

石膏

白芷各一兩

皂角一兩燒存性用拜二錢二分

細辛六錢

右為末紗羅三度每用刷牙蘸藥少許刷牙用溫

水漱之

白牙藥真珠散 治齒斷宜露牙黃黑不白

真珠一錢

白檀三錢

石膏二兩

御藥院方

卷九

四十

精思堂

烏魚骨兩

白石英半兩

浮石半兩

朱砂

香白芷

川芎

川升麻各二錢

右件為細末每用少許以指蘸藥擦牙合口食久

吐津後用溫水漱口

白牙藥 治牙齒黃黑不瑩淨

零陵香

香白芷

青鹽

升麻各半兩

細辛二錢

麝香另研半錢

砂錫細末

石膏細末各一兩

右除砂錫石膏麝香三味外同為細末八砂錫等

三味同研勻每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫

水漱口

會仙救苦丹 治咽喉閉塞不通有劫噤物

揀甘草兩抄一 縮砂人抄 白茯苓兩各半

烏魚骨 寒水石兩燒一 管仲兩半

南硼砂錢一 白僵蠶兩附一 麝香錢少

象牙末錢一

右件為細末重羅麵糊為丸如鷄頭大用朱砂為

衣每服一九噲化嚙津勿得非傳此方 和取

庚申甲子日

御藥院方 卷九 聖 精思堂

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索兩一 黃蘗去粗 黃連兩各半

青黛兩另研 寔陀僧兩另研

右為細末每用傳貼口瘡上有津即吐食後臨臥

用

牙藥方 治腎氣不足齒斷不固黑牙縫及髭鬚半

牙

訶子 沒食子兩各四 五倍子錢三

細辛 甘松 零陵香

麝香錢另 綠礬兩另 白茯苓錢二

百藥煎兩半 橡斗兒五 青鹽錢少

金絲繫兩半

右件除麝香礞礬二味另研其餘極細然後入諸

藥拌勻稍熬水漱每日兩次用藥半錢刷牙

髭鬚半牙齒白間黑其功效不可具述

雄黃膏 治齒痛不已

雄黃錢二 乳香 沒藥錢各一

麝香錢半

右四味同研為細末鎔黃蠟為丸安在牙蟲蝕處

中

御藥院方 卷九 聖 精思堂

定痛散 治牙風疼痛立効

華細辛兩半 香白芷生一兩 川烏頭生一兩

乳香錢三

右為細末每用少許擦牙痛處有津吐之嚙津無

妨

生肌桃紅散 治齒斷內血山并有瘻眼時時吐血

寒水石粉兩三 朱砂錢二 甘草一字

腦子加一字不用

右為細末每用少許乾於有瘻處

以師坐雲膏 治髮髮黃白不黑

膽礬 五倍子 百藥煎

訶子 青胡桃皮 醋石榴皮

木瓜皮 猪牙皂角 何首烏

細辛 三分

右為極細末煉蜜和丸如小錢大常於木炭灰內

培養勿得離灰如要烏髭時用好熱酒磨化開

熱髭上如烏髭時用好熱醋磨以掠頭刷髭上

陳希夷刷牙藥 進華山陳希夷先生刷牙烏髮藥元在碑記上有此方

字牙齒烏髭髮

豬牙皂角及生薑 西國升麻熟地黃

御藥院方 卷九 一聖三 精思堂

木律旱蓮楓角子 細辛荷蒂要相當

青鹽等分同燒煉 研熟將來使最良

擦齒牢牙髭髮黑 誰知世上有仙方

右件十味各二兩除青鹽一味外其餘藥味並剉

碎用一新瓦罐兒內盡盛其藥又用瓦子蓋合

罐兒日子以麻索子繫定上川鹽泥固濟約厚

半寸許曬乾穿一地坑子方潤二尺約深七寸

先放一新方磚後安放藥罐子以口向下坐用

木炭火一和燒令透後青煙出稍存其性去火

放經宿取藥出熬研為細末每用刷牙子蘸藥

少許刷上下牙齒次用溫水漱之每日早晨臨

臥時用一次於內旱蓮葉如馬齒花如星宿升

麻形如鷄骨其色青綠此二味藥本山京兆府

奴婢高邦才謹言字牙烏髭髮之藥古今方論

甚多少有曾經驗者奴婢在私家之日實緣此

藥常是與人修合使用親經効驗 畧言如後

有祐德觀景碧虛先生常用此藥年八十已

上面若童子髭髮甚黑齒落重生儀師顏亦識

此人

明昌二年有統軍司書表姓大年紀五十歲已

御藥院方 卷九 一四四 精思堂

上髭髮本生來黃色因患牙疼用此藥兩月髭

髮皆變黑色更不脫落

貞祐二年陝西安撫事老瓦患牙疼數月用此

藥痊可至今常用

曾經效驗者歷歷甚多不敢盡言

如聖九 治咽喉腫痛水漿不下

甘草 桔梗 牛黃

腦子 各一

右為細末煉蜜和丸每兩作二十九每服一九嚥

化細細嚥津不拘時候

訶子散 漆牙藥牙縫黑

綠礬二兩 銅綠二錢研已上二味

五倍子末六錢 訶子皮取末一兩半

黃丹五錢已上係是紅牙藥後

右件先川前二味牙縫中上了後少時再用後三

味依前上封裏少時用溫漿水漱

如神散 治舌腫強及斷腫不消

露蜂窩 椒末 青鹽各等分另

右件每川各抄一錢和勻用水一盞半煎至八分

去滓熱漱冷吐藥盡為度

御藥院方 卷九 精思堂

沉香散 揩齒瑩淨命白及治口瘡是楷牙藥

沉香各一錢 麝香各一 細辛各一

升麻 藁本 藿香葉

日松 白芷各二錢半 石膏四兩

寒水石二兩

右為細末

常使齒藥玉池散 治牙齒垢膩不淨潔

升麻去 藁本去 甘松去

茵草 香白芷 川芎已上各

華細辛去苗葉并 生乾地黄焙乾

地骨皮煉淨秤 皂角性去皮燒存

麝香一錢煉去毛 青鹽二兩

右件為細末入另研者一處再研勻細每日早晚

揩牙如常使用

柳枝湯 治牙根宜露動搖疼痛

羌活 獨活 地骨皮

防風去蘆 柳枝皮各一兩 小椒半兩

蒼木八兩煉淨

右件為細末每用二錢水一盞入柳枝黑豆少許

同煎至七分去滓熱漱冷吐食後日三二次

御藥院方 卷九 精思堂

吹喉散 治喉痺腫硬水漿不下

白礬一兩 半夏七枚 芭豆七枚

右件礬白礬生半夏巴豆在汁中候汁乾切為細

末吹入喉中

青礬砂散 治咽喉赤腫疼痛不消有妨飲食

防風去蘆 白茯苓去 五倍子去

牙消各四錢 甘草二兩 薄荷葉四兩

白礬 紫河車各四錢

右件為細末每用半錢搽於患處如咽喉疼痛用

蜜水調半錢溫服

噤藥新邪散 治喉中腫痛不消及痰盛氣不宜通

藜蘆七錢 去苗 川芎兩半 細辛二錢半 去苗葉

草烏頭尖一十箇

右為細末每川少許鼻內噴之

雄黃散 治牙齒動搖脫落暗黑歷蟲時發疼痛漸

至損壞

川升麻 吳白芷 川芎

生乾地黃 猪牙皂角燒存性已 各半兩

寒水石燒通 白茯苓去皮 兩

華陰細辛去葉酒 三錢 青鹽 麝香各一錢

御藥院方 卷九 精思堂

胡桐律 雄黃末各三錢

右為細末每用半字燕藥擦於患處又煎漱深吐

嚙不妨

御藥院方卷第九

癸巳新刊御藥院方卷第十

收勒無差

治眼目門

吹鼻碧玉散 治邪熱攻衝目睛疼痛

消石二錢 龍腦 青黛各一錢

右三味合研令細每用一豆許噴兩鼻內

七仙丸 治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生翳

障視物不明迎風有淚久服補肝腎增目力

兔絲子酒浸另研 為末五兩 菴蓉酒浸去皮炒 切焙乾一兩

芭戟去心 兩 車前子 熟乾地黃

御藥院方 卷十 精思堂

枸杞子各三兩 甘菊花煉淨 兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九至

五十九溫酒送下鹽湯亦得空心食前

通腦散 治目赤腦熱

寒水石燒通赤過 研細二錢 腦子另研細 一錢

南礪砂另研 一錢 盆消另研細 一錢

右件再一處研勻極細每用少許鼻內噴無時用

菊花散 治眼目暴赤生瘡赤腫疼痛目自淚出

薄荷去土 三兩 甘草二兩 大黃去粗 一兩

芒消各一兩 甘菊花去枝枝 土各半 縮砂人兩

右為細末每服三錢茶清調服和滓食後

石膏散 治腦熱鼻寒頭目昏重

石膏三錢 龍腦另包

右二味細研每用少許鼻內啗之

生地黄湯 治眼暴赤總發或經一二日赤痛澁隱

不開

淡竹葉 草決明 黃芩各一兩

生乾地黄二兩 赤芍藥半兩

右為蠶末每用五錢水三盞煎五七沸絹濾去滓

乘熱洗眼冷即止日用二次

御藥院方 卷一 二 精思堂

金絲膏 治內外障眼赤筋瘀肉瘀血翳膜遮障昏

游多淚及治一切病眼

宣黃連 川黃連並用竹葉 黃蘗去粗皮

黃丹羅過三錢 青鹽二錢 明乳香研一

沒藥 硃砂各半 燈心長者白

青州大棗四個 新丁香重四錢

真白蜜四兩煉過

右件除蜜外並剉碎溫湯急浴過控乾仍不得犯

銅鐵器內并花水一升銀石器或砂銚子內慢

火熬慎勿火緊候熬至一盞以來以生絹濾去

滓放冷入蜜再入銀石器或砂銚子內熬至七

分再濾入於乾淨磁器中密封勿令透氣於簾

下滴漏處掘深一尺埋之用水一桶照滴漏簾

於埋處坑子上猛傾下次日取出再入

生龍腦 好麝香各半 南礪砂

馬牙消各一皂

右四味同研極細入前膏中每點粟米大

白龍散 去翳膜昏澁每用少許鼻內啗如點少用

大有神效

川芒消五兩

御藥院方 卷十 三 精思堂

右除黑黃膠不用用真白如雪者用銷金銀錫子

內盛用新瓦蓋口又有熟炭火約及秤用一小

埽火內存放先燒埽熱然後下藥在鍋埽上四

面有火慢慢微微近前至鍋蓋良久鍋內有

聲定先去頂上火并瓦鍋中覷不沸顯清明汁

外用鐵器或金銀器亦得用鐵鈴鈴出錫傾集

汁在器中凝潔如玉色者成也若用時少少研

細膩入片白龍腦各等分任用通頂點眼

龍腦礪砂散 治頭目風熱

龍腦半兩 南礪砂一兩

右研極細每用少許兩鼻內噴之

金蓮散 治風熱攻眼目赤眵淚昏澁

黃連去 當歸去 赤芍藥各一

右咬阻每用三錢水三盞煎三兩沸綿濾去滓澄

清熱洗眼不以時候

青金散 治風熱清腦明目

龍腦 青黛各一 薄荷葉

盆消各一 乳香一

右為細末每用半字鼻內噴

五黃散 治目赤

御藥院方 卷十 四 精思堂

黃藥一 黃連 黃芩

黃丹 大黃已上各

右為細末每用一錢水蜜調成膏攤在絹花子上

隨目赤貼於太陽穴

冰池散 治眼目赤

黑豆去皮生搗 馬牙消研一

腦子研一錢 青黛研一

右件研為細末如粉每用半錢涼蜜水調如麵糊

相似攤於圓絹帛上貼兩太陽穴涼水時時頻

潤

五倍丸 治眼見黑花兒去翳明目

巴戟去心 枸杞二 甘菊花煉三

旋覆花煉四 蜀椒去目及閉者五兩

右將椒入銀石器中入青鹽四兩醋三升慢火煮

乾如器小旋添醋煮候乾只將椒與前四味焙

乾杵為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九

空心日午夜臥溫酒送下或鹽湯亦可

地黃丸 補腎氣治眼昔李揆相公患眼時生翳膜

或即疼痛或見黑花如蠱形翅羽之狀僧智深請

謁云此乃腎毒風也凡虛則補其母實則瀉其子

緣腎是肝之母今腎積風毒故令肝虛非但目疾

丈夫所患乾濕脚氣消中消渴及諸風氣等皆腎

之虛憊但服此補腎地黃丸無不神效此藥微寒

量人性服之

地黃二斤一斤生

杏人半斤去皮尖炒黃 紙壓四五度

金釵石斛 牛膝 防風

枳殼各四

右件於石臼中木杵搗為末煉蜜為丸如梧桐子

大每日空心用無灰豆淋酒下三十九

御藥院方 卷十 五 精思堂

白龍粉一名玄明粉 治腎水衰虛肝經邪熱視物不明

或生障翳努肉攀睛或迎風淚出眼見黑花或如蠅翳或如油星或睛游腫痛或癢不可忍並皆治之

消三

右於一九月造一大罐熱水浸開以絹濾過入銀

器或石鍋內煎至一半已上就鍋內放濕傾銀

盆內於露地放一宿次日結成塊子於別水內

淨洗再用小罐熱水化開熬入蘿蔔二筒切作

片子同煮以蘿蔔熟為度傾在磁器內撈出蘿

蔔不用於露地露一宿次日結成塊子去水於

中曬一日去盡水先入好紙袋成放於透風日

處掛曬至風化開成用逐旋於乳鉢內熬研極

細點眼如常法

至明膏 治暴赤疼痛淚出眵多熱氣上攻視物昏

花

黃連一兩 當歸二錢 蕤人去皮秤一錢

已上三味用水一大碗浸一時辰慢火熬至半

碗澄濾去滓入白蜜半兩再重湯煮成膏重綿

濾過出火毒入後藥

龍腦一錢 南硼砂一錢 青鹽一錢

右三味研極細與前藥一處同研令勻每月黃米

粒大或一菜豆許每日點一次兩眼各點一筋

决明散 治眼目昏花遠視不明

川芎 井泉石 仙靈脾

槐花各一兩 川椒二錢 蛤粉飛

石决明飛 防風 荆芥

羌活 蒼朮米泔 甘菊花

黃芩 杜蒺藜炒 木賊去

地骨皮 薄荷 甘草各一兩

右件一十八味事持畢稱為細末每服二錢熱茶

清調溫服食后日進一二服

金睛煎丸 治眼目昏花遠視不明久視乏力常服

滋血益水去風助目

生乾地黃一斤 熟乾地黃一斤

金釵石斛去根剉四兩 杏仁半斤去皮尖炒黃黑

覆盆子去 牛膝切酒 防風去蘆

枳殼 當歸各四兩

右件藥並用石臼中搗羅為末蜜和丸如梧桐子

大每服四五十丸空心溫酒下粥飲亦可

芎藭丸 治遠視不明常見黑花久服增明目力

芎藭 菊花 荆芥

薄荷 甘草各一 蒼木二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九至

六七十丸食後茶清送下日進一服或二服

荆芥散 治肝寒滯熱毒不可宜通目惡癢痛

荆芥穗 當歸 赤芍藥各一

黃連兩

右為麤末每用二錢水二盞煎三沸濾去滓熱洗

眼

御藥院方 卷一 八 精思堂

香附散 治眼赤腫痛眩淚生瘡

香附子炒 槐花炒各一兩 大黃兩半

右為細末每服三錢入沙糖少許冷水調下食后

服

生澤丸 散赤腫痛隱澁止眩淚生瘡

荆芥穗 大黃各一 甘草

川芎各半 薄荷葉錢七

右為細末煉蜜和丸每兩作十九每服二丸細嚼

溫水送下食後服

雷歸立效散 涼血定眼睛疼痛

當歸 大黃各一 乳香少許 定

右件三味剉碎分作三服每服七錢水二盞煎至

一盞半去滓溫服食後臨臥看虛實加減服之

通光丸 清神水退翳膜昏暈赤隱莫開

蒼木去黑 黃芩去心 朴消各二

甘草七錢

右為細末乾柿為丸每兩作五九每服二九細嚼

冷水送下食後服

神仙碧霞丹 內障點之遂愈

銅條兩半 當歸 沒藥各二

御藥院方 卷一 精思堂

白丁香 血竭 片腦

硼砂 麝香各一 馬牙消

南乳香各半 黃連三錢

右件為細末熬黃連膏子為丸如鷄頭大每用新

汲水半盞於磁盒子內浸常用每一丸可洗四

十日大病不過一月小病半月冷淚三日見效

此方不可亂傳

還睛湯 治風赤暴赤眼退浮翳珠目胎赤皆爛澁

癢腫痛

山梔子 黃蘗去粗 黃連各一

杜仲去皮

細辛去土

草龍腦各二

秦皮四兩

甘草炙半兩

右為麤末每用五錢水三大盞竹葉七片燈草二

十莖煎一二十沸綿重濾去滓閉目洗了避風

少時每日三兩次洗冷即再煖

黃連湯 治目赤腫痛及散頭面熱

黃連去

秦皮

苦竹葉切

薄荷葉各一兩

右件剉如麻豆每用五錢以水三盞煎至五七沸

綿濾去滓就熱淋洗不計度數

御藥院方

卷一

十

精思堂

遇明光 治風痰頭目昏眩視物眩暈目見黑花飛

蠅常服清神水行滯氣下流飲

皂角三斤二斤

燒成灰裝在新磁罍內用磁漿

水濕過蓋錫口

何首烏去粗皮

牽牛頭末三兩黑

薄荷葉去土

右件為細末後用皂角一斤熱水浸軟去皮弦子

用穰酒 升搓揉成濃汁用新布濾去滓入麴

一匙同熬成膏子入上四味和丸如小豆大每

服二十九煎生薑湯下日進一服食後漸加至

三十九

還睛丹 治腎虛眼見黑花飛蠅見花或黑或白或

紅久不已將變內障

茯苓酒浸一伏

威靈仙去

青箱子去土

巴戟去

蟬殼去

川菊花淨

密蒙花

旋覆花

防風并去蘆頭

枸杞子

天麻酒浸一

地骨皮各二

蛇蛻皮一兩半酒浸

香白花一兩

桑花

麻子水淘去浮者

右件為細末煉蜜為丸如菟豆大每服五十九空

心食前溫酒白湯粥飲任意下

御藥院方

卷一

十一

精思堂

生地黃湯 治男子婦人小兒暴赤眼遮隱腫痛不

開洗眼

生地黃去

決明子

黃芩去

竹葉各二

川黃連

芍藥各一

右為麤末大人用十錢匕水三盞煎五七沸綿濾

去滓乘熱洗眼冷即止再煖再洗日二三次只

用一日次日換藥小兒約量歲數

杞菊丸 治內外障眼有翳暈或無翳視物不明

川菊花淨

枸杞各二

川芎

薄荷葉各一

蒼朮六兩米泔浸三日一

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼茶清下食後日進二服

增明丸 治一切眼目昏暗翳膜遮睛或眼見黑花

熱淚時出視物不明並皆治之

當歸 芍藥 川芎

熟乾地黄 木香 連翹

甘草 檳榔各一兩 山梔子

薄荷葉 黃芩各半兩 大黃二兩

芒消七錢 牽牛輕炒取頭末一兩半

右件同為細末燒餅為丸如梧桐子大每服三四

日進一二服服經月餘自覺功效

十九不拘時候茶清下或荆芥湯下諸飲亦得

犀角散 治暴赤眼腫澁疼痛

犀角 子芩 瞿麥

黃連各三分 梔子人 車前子

大黃微炒 木通各一兩 芒消一兩

右件搗篩為散每服三錢以水一中盞入竹葉二

七片煎至六分去滓食後溫服

羚羊角丸 治肺肝風熱凝滯見紅白黑花頭額偏

疼漸漸昏暗不見物宜服羚羊角丸

羚羊角屑一兩 石決明搗細研水飛過 決明子

車前子 犀角屑各三分 獨活

防風去蘆 蔓荊子 甘菊花

吳藍子 梔子人 甘草炙微赤剉各半兩

右為細末煉蜜和搗三二百丸如梧桐子大每服

二十九食後溫漿水下日用二服

神應散 治眼暴赤疼痛

玄明粉生用風化朴飛便是 爐甘石燒通赤為度各等分

右同研極細每用藥一粟米粒大用新水一匙調

藥點無時

解毒散 治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消

黃芩 黃蘗各一兩 大黃生用半兩

右為細末每用生蜜水調藥如稀稠糊攤在絳絹

花子上隨目赤左右貼於太陽穴如乾用溫水

頻潤

生明丸 治眼目暴赤睛痛腫赤

薄荷葉 川芎各七錢半 縮砂人

甘菊花各半兩

右為細末煉蜜和丸每二兩作一十五丸每服一

九至二九細嚼溫水送下噙化亦得

七寶散 治目不明昏游難開

南爐甘石 一斤用木炭火燒令熟為細末

黃連 二兩上鬚揀淨剉碎用水一

右件將黃連水於前項爐甘石末內用紙糊三兩

重坐於灰池內參令乾次川枯白礬一錢同研

為細末每點一黃米大於大背頭漸加至一葉

豆許每日只點一筋

洗面藥門

無皂角洗面藥

藿香葉

白芷

藁本

律藥院方

卷十

十四

精思堂

檀香

瓜樓根

楮桃兒

白茯苓

防風 已兩各

甘松

零陵香

茅香 各二兩

丁香 兩一

麝香 錢三

沉香 兩一

黑牽牛 兩四

赤小豆 兩三

川芎 兩一

糯米 升一

右為細末

雀香散 去點洗髭

廣明膠 碎妙如珠七錢

藿香葉 兩一

糯米 升一

白丁香 錢七

零陵香 兩一

皂角 去皮子

香白芷 兩二

檀香 兩一

龍腦 兩二錢半

沉香 兩一

丁香 錢七

右為細末每日如常使用洗髭髮手面百日令光

悅潤澤

洗手檀香散

藿香

甘松

吳白芷

藁本 兩一

瓜樓根

零陵香 兩二

大皂角 去皮子

茅香 兩二

白檀 兩一

楮桃兒 兩三

糯米 升一

右一十一味為細末紗羅子羅如常洗手使用

新方烏頭藥

律藥院方

卷十

十五

精思堂

訶子皮

當歸 各一兩

沒食子 二錢兩

醋石榴皮 兩一

五倍子 兩半

百藥煎 一兩

右件同為細末先用大麥麵半兩蕎麥麵半兩鉞

沙一兩六錢先用二麵醋調熬成糊入鉞沙調

勻先用溫漿皂角洗淨髮後上鉞沙麵糊藥擦

過後用前件烏頭藥一兩有使不盡麵糊調藥

遍擦髮上用荷葉包裹一宿用溫漿水洗淨為

度

七白膏 令人面光潤不皺退一切諸點

香白芷

白欬

白木 兩一

白茯苓三錢 白及半 白附子三錢

細辛三錢

右件為細末以鷄子白調九如彈子大或如人小

指狀陰乾每夜淨洗了面溫漿水於甕器內磨

汁塗之極妙

舊方烏頭藥

訶子皮一兩 當歸兩 沒食子一兩

醋石榴皮六錢 五倍子二錢 百藥煎一錢

右為細末用度如前法

淖手藥 臨睡使用

御藥院方

卷十

十六

精思堂

栝蒌連子皮一 土瓜連子皮一

杏人去皮尖

右各細剉用綿包於器盒內酒浸每洗手訖塗淖

手

御前洗面藥

糯米一升 黃明膠一兩

大皂角火地半斤 白及一兩 白欬一兩

香白芷二兩 白木一兩 沉香兩

藥本皮一兩 川芎去皮一兩 細辛土一兩

甘松去一兩 川芎去皮一兩 白檀半一兩

栝桃兒新者三兩

右為細末

玉容散 治面上熱刺黥點

牽牛四兩 香白芷兩 甘松去土兩

廣零陵香兩 栝樓根七錢 川芎兩

細辛二錢 阿膠半兩 豬牙皂角兩

藿香兩 栝桃兒兩 藥本兩

右為細末每用一錢如洗面藥用早晨晚夕各用一次

玉容散 治面上諸黥點及滅癍痕

御藥院方

卷十

十七

精思堂

白及半 白欬 白殭蠶生

成煉鍾乳粉各半 白附子生 冬瓜子

韶腦別例各 栝桃兒錢 麝香別研

右件同為極細末用玉漿調勻稠得所臨臥塗患

處明且用溫淡漿水洗去

神仙玉女粉 治黥點退皺皺令人皮膚光澤

益母草

右件每用少許早晚洗患處

鍾乳粉散 治黥點去黯子

玉女粉益母草 白附子二錢 白及二錢

白歛二錢 輕粉粉半錢 鍾乳粉二錢

蜜陀僧半錢 細辛末半錢

右同研勻細用兒孩兒乳汁調塗患處或溫水調

亦得臨臥川次日用溫水洗去

皇后洗面藥

川芎 細辛 附子

藜木 藿香 冬瓜子

沉香各一兩 白檀二兩 楮桃一斤

白木半兩 絲瓜四個 甘草二兩

生栗子第二皮半兩 杜荅荅二兩 廣荅荅一斤

御藥院方 卷十 十六 精思堂

白及二兩 白歛半兩 土瓜根一兩

阿膠 吳白芷二兩 白荻荅二兩

腦子二錢 皂角末一兩 糯米粉一斤

右為細末

到流油烏髭三聖膏

酸石榴皮子 新胡桃連青皮用 新柿子青者連用

右件各等分用鐵杵臼內搗爛如泥用一小口新

磁罐子內好黑錫三斤拍作小錢大

葉子及生牛乳同伴前藥令勻罐口上用木拍

子油絹密封上用石灰磨搗泥之日內點令極

乾於馬糞內培一月取出看藥顏色若深黑色

即成如未黑再封於糞內培之如用時先以溫

漿水洗淨以脂皮盛臨臥指蘸藥燃之忌生葱

生蘿蔔大蒜如燃時自下燃之其黑自下至髭

根

塗髭鬚方

栗青 白膠各一兩

右為末一處川紙撚煙薰瓦盆取煤同胡桃穰研

成膏子塗髭鬚尤妙

胡桃膏

御藥院方 卷十 十九 精思堂

新小胡桃三枚

右一味和皮搗細用乳汁二盞於銀石器內文武

火熬竹篋子攪成膏每用時淨洗髭髮以荖蕪

點髭髮上

韓侍郎神驗燃髭方

百藥煎一兩 五倍子半兩 訶子皮一兩

菝把一兩 荷葉一兩 定粉三錢

礞礬半兩

右件為細末用鐵漿一碗煎至半碗綿濾過再入

文武火熬成膏為度隔宿先用白礬水浴過髭

髮早長熱之尤妙

烏頭藥

訶子核去

當歸

沒食子和皮用

百藥煎各一兩

醋石榴皮兩

五倍子二錢半

右件同為細末先用大麥麵半兩蕎麥麵半兩鉞

砂一兩六錢先將蕎麥麵大麥麵二味醋調為糊

入前件鉞砂一兩六錢先用溫皂角漿水淨洗

頭髮後上鉞砂麵糊藥擦過後用前件烏頭藥

一兩有使不盡麵糊調藥再上鉞砂一般用荷

葉包裹一宿溫漿水洗淨為度每鉞砂八兩醋

御藥院方

卷一

三

精思堂

浸五宿炒乾破為細末

大麥麵三匙

蕎麥麵三匙二味用好醋調為糊量髮多少

一宿用溫漿水洗次用醋麵糊加減入藥末同

烏雲膏

鉞砂二

醋一

蕎麵

右件前二味入鉞鏡內同煎十餘沸入蕎麵八錢

為糊稀稠得所溫上髮髮用荷葉包或用手帕

裹一吋辰以來溫水洗淨次用烏雲散

烏雲散

訶子五錢核去

百藥煎八錢

川沒食子一錢

輕粉少

右同為細末為炒蕎麵同前藥末各依等分相和

自使用水為糊稀稠得所依前溫上用荷葉封

裹

烏髮借春散

鉞砂先炒令赤投醋中 大麥麵

蕎麵三味各炒

右先以漿水洗髮髮令極淨用醋調上件三味煮

糊熱塗在髮髮上用荷葉封裹上更以帛裹須

御藥院方

卷一

三

精思堂

臨臥時用次日除去以溫漿水洗淨再晚用次

下藥塗

沒食子

百藥煎

五倍子

訶子

何首烏

當歸已上各等分

右為細末每用半匙頭入大麥麵蕎麵各半匙頭

醋調煮成糊臨臥塗髮髮上依前用荷葉封裹

次日早晨用溫漿水洗淨可黑兩箇

朱砂紅丸子 治面色不瑩淨及黧黑面黑皺

朱砂細

白朮

白欬

白附子

吳白芷

白僵蠶

木香已上各 白及 白茯苓

蜜陀僧已上各 鍾乳粉二兩

右為細末用阿膠半兩熬成膏子入上項藥末一

處就成丸如梧桐子大如常用溫水蜜少許磨

化開調塗面上次日早晨用溫治亦洗之甚妙

冬瓜洗面藥 治顏面不潔蒼黑無色

冬瓜箇一

右用竹刀子去青皮切作片子酒一升半水一升

同煮爛用竹綿擦去滓再以布子濾過熬成膏

入蜜一斤再熬稀稠得所以新綿再濾過於磁

器內盛用時取栗子大用津液調塗面上用手

擦

柴二稱炭一稱布一大

黏痛散 澡浴藥

當歸去蘆 赤芍藥 藥本去

防風去蘆 桂皮去粗 細辛去苗

黑狗脊去毛 骨碎補去毛 自然銅七兩

草薺已上各

右件為燒末每用二兩用手帕包定上用熱鹽包

納在痛處熨之

立馬烏

定粉錢一 瓦粉錢一 蜜陀僧錢半

龍骨錢半 輕粉三兩 朴消錢一

鉛白霜錢一 韶脂兩半 花滅六

玉霜三錢

右為細末先用白土黃丹副過毳地後乾將前項

藥水調再上毳髮上用紙裹後少時其髮便黑

用新水洗去過時不中

御藥院方 卷十 精思堂

治瘡腫折傷門

陳元膏 摩治諸風拘攣疼痛麻痺不仁風癢癢疥

癬腹中疼痛積聚並可治之

當歸兩三 朱砂兩 細辛去

川芎兩二 附子如指十二錢對 桂皮去粗皮一

天雄三兩 乾薑三兩一 雄黃三兩二

松脂斤半 大醋二升即 生地黄取汁

白芷已上並到 猪肪脂切作指大

右以地黃汁大醋漬九物一宿并脂合煎之十五

沸膏成新綿濾去滓入雄朱和令疑不令小兒

婦人六畜見之切須忌也每用少許摩擦患處
熱徹為度

白龍膏 治一切惡瘡赤腫痛

沉香半錢

白檀

白茯苓皮去

木香各半錢

白附子錢一

桔梗錢一

白及二錢

白斂兩半

白芷半錢

白微錢一

白朮半錢

黃耆半錢

川芎半錢

甘草錢二

防風半錢

白芍藥半錢

當歸半兩

生乾地黃錢一

瓜蒞根半錢

杏仁湯浸去

桑白皮

御藥院方

卷一

四

精思堂

杞人湯浸去

木鱉子去殼

人參去蘆頭各

木通

獨活

川升麻

槐白皮

零陵香葉二錢半

苦參錢一

臘日澄清芝麻油二兩

上好瓦粉四兩

右件並剉碎上項油浸七日七宿於淨石鍋

或銀器中以慢火煎候白芷焦黃色放溫以新

綿濾去滓於磁罐子內密封澄三日三宿候取

出傾於鍋內以慢火輕溫再濾去滓傾在上好

磁碗中吊慢火再熬動次下黃蠟一十四兩川

竹筴子不佳手攪令勻放溫次入瓦粉再攪令

勻以慢火再輕熬動下攪令勻積次再上火

三日方欲膏成於磁盒內盛密封每用藥時用

軟白絹子上攤藥貼

摩風膏 摩風止癢消腫定痛治頭面唇鼻諸瘡肌

肉裂痛

黃耆去粗皮一兩二錢

白芍藥

茅香

甘草

防風各半錢

白芷

杏仁湯浸去

桃人湯浸去

檀香七法

檀香

川芎

御藥院方

卷一

廿三

精思堂

零陵香錢三

白附子

沉香

白及

白斂

天麻

獨活

木香各半錢

木通二錢

大瓜蒞連皮一兩

龍腦錢四

清油二兩

黃蠟冬月用一兩九兩半夏

右並剉碎用清油浸七日於淨石器磁器銀器中

以慢火煎候白芷微黃色以白綿濾去滓於淨

磁罐子內密封澄一宿再濾過於上等磁碗中

慢火再輕溫熬動次下黃蠟和令勻放溫次下

研細龍腦而於磁盒子內盛定每用藥少許

摩搽患處

消毒膏 治一切腫毒結硬疼痛

玄參二錢

藥本

牛膝

續斷各一錢

羌活二錢

葛根二錢

柴胡去苗一錢

木鱉子去皮三錢

沉香半錢

木香

當歸洗

升麻各二錢

赤芍藥半錢

丹參半錢

何首烏二錢

牡丹皮半錢

芝麻二錢

槐白皮

甘草

白欬

川芎

桃仁湯浸去皮尖

杏仁湯浸去皮尖

白附子

御藥院方

卷十

其

精思堂

木通

赤茯苓

亂髮用木漂洗令氣已

錢半二錢

細辛半錢

白芷三錢

防風

黃耆各半兩

蒼木去皮一錢半

白及四錢

上好黃丹三兩

臘月飛清芝麻油四兩

右件已上三十二味並剉碎同亂髮一處用油淨

七日七夜於淨石鍋或銀器中以慢火煎候白

芷焦黃色放溫以白綿濾去滓於磁罐子內密

封三日三宿夜候取出傾於鍋內慢火輕溫再

濾去滓傾在上好磁碗中川慢火再煎動下

黃蠟一十五兩用竹筴子不住手攪令勻次下

黃丹再攪令勻以慢火再煎動擡下攪令勻續

次再上火三日方欲膏成於磁盒子內密封每

用時用軟白絹攤藥勻貼於患處

善應膏 治惡疽瘡腫毒癰漏發背腦疽癰子寒濕

氣刺冷痺頑麻貼藥不疼牙腫外貼打撲接骨因

內歇血毒氣不散鎌刀鐵器所傷杖瘡藥到不疼

小兒頭面瘡癩丹流聚熱雜瘡蜈蚣蜂兒蠍蟻淨

洗伏抵消停取毒狗子馬咬蟲蛇所傷湯火漆瘡

甜指水毒下疳廉瘡諸般瘡腫藥到取毒滋潤止

痛乾濕疥癬撥動貼藥婦人吹爛九如梧桐子大

新汲水下二十九產前催生產後趁敗血臍腹刺

痛經脈不調溫酒下二十九此藥不得犯葷手火

上焙化淨紙上攤貼

號州上等黃丹二斤

南乳香兩一

白及生

杏人生

新柳枝一斤加筋頭

右除黃丹乳香沒藥外其餘藥材用好芝麻油五

御藥院方

卷十

其

精思堂

沒藥兩一

木鱉子全

白芷生

常歸生

桂長三寸生用

右除黃丹乳香沒藥外其餘藥材用好芝麻油五

斤浸一宿去炭火上用鐵鍋內熬令藥材變黃色
色濾去藥材不川次將黃丹入鍋內用新柳枝
一條長四尺如小錢兒籠攪令藥丹微變褐色
撥鍋在地再用柳枝攪令勻藥冷傾在磁盆內頓放
在內再用柳枝攪令勻藥冷傾在磁盆內頓放
候藥硬用刀子盆內取藥出切成塊子用油紙
裹然後使用此藥修合春季三月間合秋季八
月間合

碧霞膏 治肉刺

銅綠兩二 乳香兩二 沒藥兩一

御藥院方 卷十 精思堂

松脂兩四 白膠香兩一 黃蠟兩一

芝麻油 另煉香熟冬
添夏減香用

右件先煉松脂濾去滓次下白膠香又下芝麻油
攪令勻看硬軟得所續次下黃蠟再攪令勻又
次下乳香沒藥銅綠末攪令勻冷於磁盆子內
盛每用之上煨藥攤於紙上貼患處

玉容膏 治中皮膚骨瘡癬癩唇裂面皺風刺及打
撲傷損舒緩筋通流血消腫止痛發散邪毒每用
少許塗摩熱為度如耳鼻有瘡用綿杖兒點少許
在瘡上

黃耆兩二 當歸兩二 白芍藥兩二

白芷兩二 川芎兩二 藿香葉兩二

零陵香兩二 白檀兩二 白附子兩二

白及兩二 白欬兩二 瓜蒌兩二

杏仁兩二 湯洗去皮尖研 龍腦兩二

清油兩四

右件除龍腦一十三味入清油浸三日用銀器內
慢火熬令藥焦黃色用新綿濾過去藥滓放濕
入黃蠟鎔令勻再用新綿濾過入龍腦不佳手
用柳木篦子攪候冷密封如前法用冬川三兩

御藥院方 卷十 精思堂

油一兩 蠟夏月五兩 油二兩 蠟臘月熬蠟油入

蠟

金黃散 治諸瘡瘍癢極發疼

乳香兩三 輕粉兩一 瓦粉兩二

白龍骨兩一 滑石兩二 寒水石兩二

黃柏兩二

右件同為細末再研令勻每用藥少許時時乾慘
患處或用油調之擦亦可

桃紅散 生肌肉斂瘡口

定粉兩二 乳香兩一 龍骨兩一

白石脂

烏魚骨去皮微炙黃

寒水石火燒通赤

黃丹慢火微炒放

右件同為細末再研勻極細每用藥少許乾摻患處

寸金錠子 治一切痔瘻經久不可者

麝香

輕粉

硫黃

雄黃

雌黃

藤黃

砒霜

粉霜

黃丹已上九味各

乾漆

牡蠣粉

紅藤根各一

御藥院方

卷一

三十

精思堂

右件一十二味為細末燒陳米飯和勻捏作如大

棗核大一用一錠子紐在肛門內可深二寸許

放定用新磚毬兒兩個燒赤醋內蘸過綿裹肛

門外煖冷即易一个次日大便取下惡物

大紅膏 治從高下墮落馬傷損瘀血結滯筋脈學

急肌肉腫硬疼痛不可忍者並皆治之

常歸各一

赤芍藥各一兩

天台烏藥各一兩

小油斤

已上三味浸油七日七夜

沒藥各一兩

乳香各二兩

琥珀研為細末

壓青斤一

黃丹兩一十

右件藥先將壓青以銀石器內慢火熬鐵篋子攪

化開為度時月春硬軟旋旋入沒藥油硬軟停

當次人另研藥三味攪勻用綿濾在淨水盆內

以手持按如錫白色次入黃丹再持按令勻盛

在磁盆內每用熱鐵篋子攤在厚軟紙上貼於

患處

金傷散 治金刃箭簇所傷血出不止及落馬打傷

肉綻血出亦皆治之

白及

白歛

乳香各一

御藥院方

卷一

三十

精思堂

龍骨兩

石灰年者佳

黃丹少

右為細末入黃丹有如淡紅色每用乾捻在患處

上用軟紙更以絹帛裹護者忌風水乾痂為効

佛手散 治一切腫毒

黃柏

大黃各一

甘草兩

朴消兩三

粟米粉兩三

右件藥搗為末每用水調如膏塗於患處

紫葛散 消腫散毒

紫葛

升麻

黃芩

赤小豆各一

木香兩半

黃連

大黃各一 白欬 玄參

榆白皮各一

右為細末每用溫水調藥塗掃赤腫藥乾再掃

追毒散 追毒排膿

五靈脂 川烏頭炮 白乾薑炮各一兩

井鹽 全蠍各半兩 芎藭根兩

無心草兩

右為細末每用藥少許津唾調塗患處

拔毒散 治丹腫

寒水石兩 石膏兩 黃蘗

御藥院方 卷十 精思堂

甘草兩

右件為細末每用新汲水調如膏攤於小紙花子

上散貼腫赤處

檳榔散 欬瘡

大檳榔個 紅娘子個 黑狗脊

硫黃 赤石脂 黃連各半兩

輕粉錢一

右為細末每用藥少許乾摻患處

寸金丸 二名返魂丹三名再生丸四名追命丹五

延壽丸六來甦丸七知命丸八得道丸非人勿示

此方也若有人患瘡身未爛者與三九服之噦下便活如口禁但幹開牙開研下三九灌之下咽喉中立生此方善治發背腦疽氣疽癰腫偏身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發寒發熱四肢沉重身體壯熱

蟾酥錢二 金頭蜈蚣七個頭尾全用

狗寶兩 狗膽若用之 南乳香錢一

膩粉錢一 雄黃錢一 鯉魚膽若用之

麝香分一 沒藥錢一 粉霜錢三

硃砂兩半 烏金石錢一 黃蠟錢三

御藥院方 卷一 精思堂

頭首兒孩兒乳合一

右同為細末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同為丸

如菜豆大小兒如芥子大每服一九 痲重者

加至三九用白丁香七箇研爛調新汲水送下

用衣服蓋出汗為度大段疼痛無頭瘡腫不過

三服立效服瓜蓋白米粥妙

黃連散 治風熱毒氣客搏肌膚成瘡癢痛不止

黃連兩一 輕粉錢一

右為細末入輕粉和勻每用瘡兒乾燥生油調塗

有濃汁乾搥 處一日兩三上

搜膿散 治諸瘡膿汁不絕腐肉未盡

黃耆 白芍藥 香白芷各等分

右為細末每用少許乾摻患處上用膏藥敷貼一

日一換

定痛黃蘗散 治凍瘡焮赤黃汁出及差後癩痕疼

痛

黃蘗四兩去蟲皮塗蜜慢火炙令黃色

右為細末每用蜜水調攤軟紙花子上貼患處

平肌散 治諸瘡久不斂

爐甘石兩半 龍骨兩半

御藥院方 卷十 精思堂

右為細末每用乾摻患處上用膏藥貼

燒湯着底藥

木炭不以多少

右件搗羅為細末每用不以多少用小油調如稀

麵糊用雞翎蘸藥掃患處

艾煎膏 治頭面風熱小瘡多癢少痛黃汁出並皆

治之

艾葉二兩 醋一斤

右將艾葉同醋於銀鍋內同煎數沸濾去滓慢火

再熬成膏每用薄薄在衫紙上貼患處一日一

兩上

楮實散 去皴皺悅皮膚

楮桃兒 土瓜根 商陸各等分

右為細末每日早晨用少許如常洗擦患處後用

桃人膏

桃人湯浸去皮尖研如泥不以多少

右用桃人膏同蜜少許一處用溫水化開塗摩患

處後用玉屑膏塗貼

玉屑膏 治面頰手指肌膚皴滋不澤

御藥院方 卷十 精思堂

輕粉 定粉各三錢 蜜陀僧二錢

右三味研為細末用皂角子取白人以熱漿水浸

成膏子調藥稀硬得所塗患處塗貼無時

止痛貼膏 治因傷損筋脈時發疼痛遇寒則甚

桂心 附子生去皮 乳香別

川椒小可 吳茱萸 白及各一兩

生薑汁五合 酒五合

右件藥為細末先將薑汁并酒同煎取七合每用

放溫汁調藥如膏詳所患大小攤絹帛上敷貼

痛處上用軟絹帛裹護

托裏黃耆散 治口乾微熱

人參兩半

白朮

茯苓

芍藥

桔梗各一兩

黃耆二兩

甘草兩半

右件為末每服三錢水一盞煎至七分去滓稍

熱服不拘時候

凍瘡藥

米粉不以多少炒存性

右為細末鵝梨汁調塗害處紙花子貼

萬痊膏 治一切瘡瘍已潰未潰膿水不絕及灸瘡

御藥院方

卷十

三六

精思堂

久不差斂瘡生肌肉每用黏在鐵錐子上炭火炙

消攤紙上貼患處一兩日一換

乳香

沒藥各別錢半

半夏

當歸

續斷

杏仁

桃人

巴豆和皮搗碎

木鱉子去殼

羌花

大戟

川芎

熟地黃

芍藥

蒼朮

防風

乾薑生

桂

蛇床子已上各半兩

松枝

桃枝新者各二兩

亂髮二塊如馬打毬子大

澄清芝麻油斤一十

右將前項藥下在油內浸七日慢火煎熬令鐵馬

杓攪至半夏黃黑色為度用竹篩濾去滓另研

血竭三錢半下在油內攪令勻用新綿濾在盆

器中澄去滓油搗錫并馬杓至淨再用綿濾入

鍋內入油每一斤用上好黃丹五兩若黃丹性

緊者只用四兩半唯備冬春秋間便用如夏月

用者使黃丹五兩二三錢並看丹急慢調品川

慢柴火燒熬不住手和令候變黑色微溢住火

至沫下依前用慢火熬候黑煙出住火如此二

日後用木炭火養仍不得暫住手攪直至通前

御藥院方

卷十

三七

精思堂

四五日已來攤紙上不溼硬軟得所盛在磁器

內方欲凝時用絹子裹水銀搭在膏藥面上如

用時搽去水銀如此不至膏藥上面一重乾了

臍月內熬者佳

塗擦雄黃膏 治髮際內諸瘻瘡及膚起癩疹癢不

可忍旬用少許臨臥塗搽患處以癢住為度

豬脂肪兩三

天麻

香白芷各三錢

巴豆五個重半錢

輕粉二錢

黃蠟

雄黃各五錢

麝香半兩

右件以豬脂肪煮天麻白芷巴豆黃色濾去巴豆

等不用澄清上項輕粉等四味和勻放冷為度

樺皮散方 治肺癰風毒遍身瘡疥及癰疹瘙癢

之成瘡又治面上風刺及婦人粉刺

樺皮燒成灰 荆芥穗 甘草炙各二兩

杏仁二兩去皮尖用水一握於鍋內熬却水一斗已來取出放冷

枳殼四兩去穢用炭火燒欲成灰取於濕紙上令冷

右件藥除杏仁外餘藥都為細末却將杏仁另研

令極細次用諸藥末旋入研勻每服二錢食後

溫酒調下日進三服瘡疥甚者每日頻服

刀箭藥

御藥院方 卷十 三六 精思堂

牛膽 大灰多似 乳香炒

血竭炒 白及附

右用新牛膽內盛藥物窰乾為末每用少許乾貼

不得犯婦人手開

漏蘆煮散 治瘡癰癰腫內消

漏蘆去土 白欬 黃芩去黑心

麻黃去根節 白薇洗 枳實炒

升麻 芍藥 大黃炒

甘草炙各一兩

右件搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至七分溫

服

黑神膏 治諸瘡榮衛未腐腫痛堅硬嫩赤不消

當歸兩一 杏仁湯洗去皮 黃丹兩六

柳枝二十 桃枝二十 血餘如雞子大二塊

小油二十

右除黃丹外入鍋內以慢火熬兩時辰綿濾去滓

再入鍋內熬令滴水成珠不散入黃丹用文武

火熬成黑膏使用

乳香膏 治諸瘡腫硬疼痛及膿潰肌肉腐爛兼治

腐肉不退

御藥院方 卷十 三九 精思堂

南乳香兩一 沒藥兩半 松脂兩五

天台烏藥兩一 木鱉子三錢用人去皮二錢 當歸

赤芍藥各三錢 小油兩二 加血竭三錢

右九味除乳香沒藥松脂血竭等四味外用前項

小油浸烏藥等四味計五日慢火同煎數十沸

濾去滓澄清一宿入南乳香等用柳木篦子不

住手攪成膏

內托散 治一切癰疽毒腫發骨發背發疔發發

髭發腦發手足發足應係瘡瘍毒腫未膿者即消散

已膿者即破潰已潰者即收斂消毒順氣托裏定

痛收瘡口散腫毒及腸癰胃癰皆可用化毒排膿
內補

黃耆 當歸 川芎

白茯苓 芍藥 白芷

甘草 人參 厚朴去薑皮生薑汁製

桂去皮已上各等分

右件一十味為細末每服三錢至五錢不計時候

溫酒調下如不飲酒以木香湯調下

辛夷膏 治鼻內生瘡疼痛或鼻中窒塞不通利及

龜鼻氣不宜通並宜塗用之

御藥院方 卷十 四十一 精思堂

辛夷葉兩 細辛 木香

木通 香白芷 杏人湯浸去皮尖

右件用羊髓豬脂各二兩同諸藥相和於石器中

慢火熬成膏子赤黃放冷入龍腦麝香各一錢

金花散 消赤腫止疼痛散毒氣

川大黃 黃藥 蔚金

黃連 黃芩各一兩 甘草

消 寒水石各半兩 白及

白欬各三錢 糯米粉三合

右為細末每用生蜜水調稀鷄塗翎掃四畔焮赤

腫處

瑩肌膏 治毛髮亂長茸散頻剃復生不盡者以膏

貼之次日隨膏藥茸毛自退瑩淨再不復長

乳香二錢 歷青兩

右二味用慢火同化開入小油一處煎沸硬軟得

所臨臥塗患處明且用溫淡漿水洗去

外川清毒藥 治諸腫毒堅硬不消

黍黏子 葛根 升麻

地骨皮 黃花地丁 甘草

金銀花各等分

御藥院方 卷十 四十二 精思堂

右件為細末每用五七錢水一升煎十沸於腫四

畔熱用冷則再暖

麝香散 治下部脫血或瘡痔瘻久不差

麝香 血竭各半 蝟皮一兩

右先研蝟皮并血竭為細末次入麝香拌勻每服

半錢溫酒一盞調勻食前日進二服

熊膽散 治痔瘻瘡口不合膿汁清稀腫硬不消

熊膽一錢 雄黃半錢 輕粉半錢

麝香半錢

右件研為細末乾搽藥瘡口上

浴毒湯 治諸瘡疼痛堅硬不消及破後膿水不絕

慈肉未退好肉不生

何首烏不以多

右為麤末每川藥末秤一兩乾艾葉半兩水一大

碗同煎至水減半濾去滓稍熱洗冷即再暖

正骨藥

鯪鯉甲骨貼膏 治閃肋疼痛

鯪鯉甲塗醋炙

桂去盡

當歸切焙各

生地黄汁

麴重九錢

附子生去兩

生薑汁

御藥院方

卷十

聖

精思堂

右七味除汁外搗為細末將地黃汁生薑汁各半

和勻暖熱調藥如膏攤於軟紙上乘熱敷貼患

處用綿絮護每日一換

沒藥膏 治筋骨閃肋疼痛

沒藥研

乳香研

虎骨酥炙各

吳茱萸

白芥子

白及

白欬

米粉各一

生薑汁

酒各三

右件八味為細末將生薑汁并酒同煎七合旋入

藥末調勻乘熱攤於紙上敷貼痛處一日一換

用綿裹護

金絲膏 治筋骨損傷時發疼痛不已

通明松脂四兩

良薑取一兩

乳香研細

木鱉子大者四箇去

川烏頭三箇剉如

杏仁麻豆大連皮

小油斤

右件先將小油煎熬下烏頭杏仁煎熬燻黃色為

度取出以綿濾去滓極淨再川銀石器內慢火

鎔松脂化開然後下良薑乳香木鱉子等末不

住手攪勻旋旋入烏頭杏仁油看硬軟得所再

用綿濾在器盒內貯放如用攤紙花子上貼患

御藥院方

卷十

聖

精思堂

處

定痛沒藥散 按摩導引令血氣復行

乳香錢

沒藥

當歸

芎藭

地龍

細辛

羌活各一

蛤粉兩

黃丹二錢

蒲黃三錢

右為細末每用乾捻在痛處用手擦摩捻十餘遍

然後上大紅膏

大紅膏

歷青斤

黃丹兩

乳香兩

油不以多少
漆減用

右件藥先用歷青以銀器內慢火熬開鐵篋子攪
觀時月看硬軟旋旋入油硬軟恰好次下乳香
攪勻用綿濾過次入黃丹再攪勻盛在磁盆子
內每用藥時煇過熱鐵篋子攤在厚軟紙上
雙靈膏 治一切筋骨肌肉疼痛

良薑一斤

白芥子半斤

右為細末每用藥二錢半頭白麵半兩水調成膏

攤在紙花子上貼患處

定痛沒藥散 治一切打撲傷損筋骨疼痛並宜服

御藥院方

卷十

醫

精思堂

之

蒼木

一斤刮去黑皮炒深黃色

桂去粗皮

熟乾地黃焙

沒藥

研

甘草炙

蒲黃各一兩

右為細末每服二錢溫酒一盞調下不拘時候日

進二服

至聖黑龍膏

米粉

一斤緊者炒用砂

甘松半斤

香白芷半斤

滑石

六兩

黃蘗二兩

黃丹四錢

右為細末每用滴水調成黑強膏子攤在皺紙條

兒上可於內損疼痛處敷貼每日一換

至聖黑龍膏 治一切筋骨損傷疼痛

米粉四兩於銀器內炒成塊子

乳香研

沒藥研

右三味研極細每用以好酒或醋調如膏攤在紙

花子上貼患處

加血竭大紅膏

當歸

木鱉子碎

天台烏藥剉

赤芍藥剉

小油四兩

已上四味用小油浸七日七夜濾去滓

乳香研

歷青一兩

持六兩

黃丹一兩

御藥院方

卷十

醫

精思堂

加血竭半兩

沒藥一兩

琥珀研

右件乳香歷青鐵鍋內以慢火熬令消盡為度時

月看硬軟旋旋入前項沒藥油加減用之候硬

軟停當以綿濾在水盆內持拔白色旋入黃丹

再持拔顏色勻於磁盆子內存放每用鐵篋子

攤在厚軟紙上貼患處

神効膏 治損撲着筋骨疼痛

小椒二兩

乳香八錢

右為細末用好醋打麵糊調藥塗在痛處上用紙

貼之

大紅膏方

乳香

當歸各二兩

琥珀

香白芷

沒藥

白芍

白及

白欬各一兩

歷青六兩

黃丹兩一

小油兩四

綿子兩一

木炭斤三

定磁碗隻二

右八味為細末同歷青一處放在碗內用文武火熬以歷青溶開次下小油徐徐下之看覷硬軟得所用綿濾在木盒內放溫次下丹熬成膏若用時攤於紙上用之

御藥院方

卷十

四

精思堂

御藥院方卷第十

癸巳新刊御藥院方卷第十一

較勘無差

治婦人諸疾門

芎藭湯 治產後去血過多運悶不省及傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多不止懸虛心煩眩暈頭重目暗耳聾滿塞舉頭欲倒前皆治之

芎藭兩三

當歸三兩去蘆頭洗切焙乾

右為細末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓稍熱服不計時候

御藥院方

卷十一

精思堂

說說九 治衝任不和子藏怯弱或經墮胎後氣不復常九藥常服調和衝任滋益氣血

熟地黄

當歸各二兩

延胡索

澤蘭葉各一兩半

川芎

赤芍藥

白薇

人參

金釵石斛

牡丹皮各一兩

右件為細末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒送下或溫粥飲亦得

黑神丹 治婦人產後大發熱消渴不止煩燥不休或汗病後胃脘愛水者並宜服之

黑附子炮裂去皮 天麻去蘆 天南星炮

桂皮去毒 半夏煨水煮 麻黃去根

乾薑炮已上各 草烏頭二兩炮裂

白附子炮黃色 麝香研上毛細

天雄二兩慢火上用童子小便內蒸如此七返無

坑子約深五寸先用熱火坑內炙乾去火坑內

酒約半升天雄在內用磁瓶蓋定周迴泥了

不致漏氣冷定取出用之

右一十一味各修製訖一處碾為細末煉蜜和搜

成劑約搗千餘杵丸如彈子大發熱渴用蜜水

化服欲出汗熱酒化服汗病後胃腕硬愛水依

前用蜜水化服一丸

延齡護寶丸 治婦人血脈虛損經候過多每行時

暴下不可禁止因成崩中連日不斷致五臟空虛

失色黃瘦崩竭暫止日少復發不耐動搯小勞輒

劇此藥但澄心服必有大効

禹餘糧石二兩醋燒 龍骨 人參

桂 赤石脂 紫石英研

熟乾地黄 杜仲去粗皮 桑寄生

續斷 吳白芷 芎藭

當歸剉 金釵石斛去根 遠志去

白茯苓皮 阿膠炒 牡蠣煨

五味子 艾葉炒已上

右二十味同為細末煉白沙蜜和丸如梧桐子大

每服四五十九溫粥飲下空心食前

活血散 治衝任氣虛經事不調或多或少或前或

後並治之

當歸 川芎 白芍藥

延胡索各四兩 肉桂去粗皮

右為最末每服抄五大錢水一盞半煎至七分去

滓稍熱食後服

御藥比方 卷二 精思堂

益斯丸 治婦人無子術金城太守范羅謹上臣驗

此術若服藥四十日無子請戮臣一家以令天下

醫人賜子丸

附子生去 白茯苓皮去黑 白薇

半夏湯洗 杜仲去毒 桂心

厚朴去毒 秦艸已上各 防風

乾薑生 牛膝 沙參已上各

細辛去苗 人參錢四

右件為細末煉蜜和丸如小豆大日服五丸空心

任下如覺無益稍加丸數為度如服七日後陰

覺有娠三日後不可更服臣妻年二十七歲無子服此藥有娠又殘藥與前太子中含宇文妻李氏年四十無子服此藥十三日有娠此藥名益斯九屢用屢驗此方不可不廣傳與人夫不在家不可服

靈寶散 治血氣刺痛引兩脇疼痛及痰癖刺氣

丁香 木香 乳香各一錢半

當歸 玄胡索 白芍藥各半兩

右件為細末每服一錢溫酒調下食前

五聖丸 調益榮衛滋養氣血治衝任氣虛損月水

御製方 卷二 四 精思堂

不調臍腹疼痛崩中漏下血瘕塊硬發歇疼痛奸娠宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內搏惡露不下結生瘕聚小腹堅痛時作寒熱

當歸 熟乾地黄 川芎

白芍藥各一兩 生乾地黄二兩

右件為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服六

七十九食前溫酒送下

人參荆芥煮散 治婦人血風勞氣攻刺疼痛四肢無力不思飲食多困黃瘦胸膈痞滿經水不利心

多怔忡並治之

荆芥穗四兩 柴胡 秦艸去蘆頭

肉豆蔻 白芷 黃耆

鱉甲醋炙黃 桔梗 官桂去皮各二兩

常歸 川芎 蓬莪茂

麥門冬心 考藥 人參

茯苓 海桐皮 甘草炙

枳殼去穢炒 熟乾地黄 酸棗人

木香各一兩 沉香 檳榔各半兩

右件羅為末每服三錢水一盞生薑三片烏梅二

御製方 卷二 五 精思堂

箇煎至七分溫服一日四五服如覺臟腑熱即空心食前服小便多即食後臥時服如患氣血塊立得消化亦治丈夫風勞病其功不可具述 茯苓湯 治妊娠惡阻嘔逆惡心四肢疼痛惡聞食氣惡松煩悶多損墜宜安胎調勻血脈

白茯苓皮 旋覆花各二兩

生乾地黄本方用二兩後調使

陳橘皮一兩 細辛去蘆本方用一兩半後調

芎藭 人參 芍藥

桔梗去蘆 甘草各一兩半

右件一十味鹽搗篩每服三錢匕以水一盞同煎至六分去滓溫服不拘時候

保安丸 治婦人產前產後三十六種冷血風半身不遂手脚疼痛諸疾並宜服之

赤茯苓去粗皮 牡丹皮 白芍藥各三分

石菜萸去粗皮 沉香各一分 人參去蘆頭

當歸洗去土切焙 牛膝酒洗

吳白芷 木香 藁本去蘆頭

蘇黃法極 川芎 細辛淨

藜蘆子細法 藜香葉 甘草炙

御製良方 卷二 六 精思堂

寒水石煨 防風去蘆頭者 桔梗去蘆頭

蟬殼去足翅已上一 馬鳴退炙

生乾地黄各一兩

右件二十四味杵羅為細末煉蜜和丸如小彈子

大每日空心用溫酒化下一丸療八風十二痺

疝瘕乳中風淋血聚并治胎不安子死腹中不

過三九生下死胎胎衣不出一九便山產前產

後痢并赤白帶下及嘔逆填心痰氣煩滿一九

差產前產後腹中疝瘕邊臍下如刀刺相似者

一九便止入雞月便一日一服至產下可覺疼

痛產前傷寒中風體如板者以熱煎麻黃湯化

下一丸立效經脈不通或頻併來或赤白喫食

無味瘦惡乍寒乍熱面赤唇焦手足煩痛遍身

黑點生血斑者一切病服此藥悉愈每服一九

細嚼空心溫酒送下

大保生丸 調和本氣主療諸疾滋補榮衛久服之

大有功益

生乾地黄 人參 藁本

白茯苓 當歸 赤石脂

白芷 玄胡索 肉桂去

御製良方 卷二 七 精思堂

白薇 白芍藥 川芎

白朮 甘草炙 牡丹皮

沒藥半兩 乳各

右件為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九溫酒

化下空心食前服

六神湯 治脾氣不和榮衛不足怠墮困倦可嗜飲

食服之補真養氣進美飲食充實肌膚並宜服之

當歸 熟地黄 白芍藥

川芎 地骨皮 黃耆各一兩

右件六味搗篩為末每服五錢水一盞半煎至

三消空虛服

當歸地黃丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼

當歸

熟地黃

川芎

白芍藥

南玄胡索

牡丹皮

人參

黃耆

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸
飲送下食前日進二服常服平養氣血

人參荆芥散 治婦人血風氣滯身體疼痛頭昏目

澁心松煩悶寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神

不爽或月水不調膈腹疔痛癩塊便疼痛發歇

或時嘔逆飲食不進

荆芥穗

人參

白朮

桂

生乾地黃

柴胡

鱉甲

枳殼

羚羊角

酸棗人

芍藥

當歸

防風

牡丹皮

赤芍藥

甘草

右為麤末每服五錢水一盞半入生薑三片煎至

八分去滓熱服不計時候

必效散 治婦人本經不調及崩漏不止

櫻皮 木賊 麝香

右切勻每服二錢溫酒調下食前

旋覆花丸 治停痰積飲在腸下久而不愈漸成大

癖心腹脹滿羸瘦不能食雖食不消化善睡乾嘔

大小便或澁或利在腸中動搖有水聲或口乾好

飲水漿兩脇疰痛服之必安久服除根

旋覆花 桂皮 枳實

人參 乾薑 芍藥

白朮 赤茯苓 狼毒

川烏頭 吳茱萸 橘皮 厚朴

大黃 黃芩 厚朴 生薑

葶藶 芩蘆 日逐 礞石

右二十味為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一

十九丸漸加至二十九丸溫酒下不拘時候日進二

服

虎骨散 婦人血風走注疼痛

虎骨 敗龜 當歸

桂枝 炮龍 牛膝

虎骨 敗龜 當歸

桂枝 炮龍 牛膝

延胡索

自然銅煅各一兩

右一十味同為細散每服一錢匕熱酒調下每日

一服

禹餘糧散 治氣血傷衝任虛損崩傷帶漏久而不

斷或下如豆汁或成片如肝或五色相雜或赤白

相兼臍腹冷痛面體痿黃心忪悸動發熱多汗四

肢困倦飲食減少

禹餘糧經

伏龍肝

赤石脂

白龍骨

牡蠣

烏魚骨

桂皮

浮石各等分

精思堂

右件同為細末每服三錢煎烏梅湯調下食前服

白多加牡蠣龍骨烏魚骨亦多加赤石脂禹餘

糧黃多加伏龍肝桂心隨病加治

當歸良薑散 補養血氣去心腹疼痛脇肋脹滿經

絡不調或帶下赤白腰脚冷痛一切固疾

高良薑五兩

厚朴去皮薑製二兩

當歸

桂去皮各三兩

右用紗羅子羅每服二錢水一盞入艾十葉同煎

至七分去滓熱服食前

滋陰丹 養血和氣調順榮衛充成肌膚活血住顏

久服大補衝任勻順月經神良不可具述

熟乾地黄

生乾地黄

白茯苓

人參各二兩

黃耆

甘菊花

枸杞

丹參

柏子人參

白芍藥各一兩

右件為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九

至六十九米飲下空心食前日進二三服

抽刀散 治婦人心腹脇肋疼痛不可忍者產前後

用尤佳

川烏頭如土

牡丹皮

芍藥

乾薑炮

桂心

沒藥

當歸此方無分兩

右為細末每服二錢熱酒調下不過三服輕可一

服效產後加紅花

廣胤丹 治久無子息方

黃耆制細碎一兩半

人參上黨者去

川續斷碎

澤蘭葉去枝

熟地黄碎

牡丹皮碎

延胡索碎

白芍藥

川芎

白薇七兩

嫩鹿茸去毛酥酒塗炙

御製院方

卷十一

十一

精思堂

白茯苓去黑皮 當歸去尾

肉苁蓉酒浸軟去鹹皮 防風去苗及尾

藥本去苗土 華細辛去苗土吹

陳皮湯浸去白 蓬莪茂

京三稜二味各和 碎碎各一兩

乾薑炮裂 木香兩 肉桂去粗皮

山茱萸兩 甘草二兩 黑附子炮裂去皮

覆盆子去枝

右二十七味同搗為細末煉蜜和丸如彈子大每

服一粒空心食前細嚼溫酒下日進三服有孕

御藥院方 卷二 十一 精思堂

佳服臣祖母常服此藥而生七男以此常合此

藥與人服餌而皆應効

沒藥丸 治婦人本經不調肌瘦發熱飲食減少

沒藥 苒若子 乾薑

蒼朮 川芎 熟乾地黃

白芍藥 常歸各一兩 血竭兩

右件除血竭沒藥外並咬咀先炒苒若子燒黑色

次下乾薑炒令黃次下蒼朮微黃色次下川芎

等藥並令微黃色與血竭沒藥等同為細末醋

炙麵糊為丸如梧桐子大每服五六十丸漸加

至八九十九空心食前溫酒送下或醋湯亦得

日進二服

滋血湯 治婦人皮聚毛落心肺俱損血脈虛弱月

水愆期益氣養血調進飲食

人參 白茯苓去皮 熟乾地黃

川芎 當歸 白芍藥

乾山藥 黃耆已上各

右件為麤末用馬尾羅子羅每服五錢水一盞半

煎至一盞去滓溫服

當歸血竭丸 治婦人產後惡物不下結聚成塊心

胸痞悶及臍下堅痛

當歸二兩 血竭兩 蓬莪茂二兩

芍藥兩 五靈脂兩

右件為細末醋麵糊和丸如梧桐子大每服四十

丸溫酒下或溫粥飲下空心食前

地龍煎丸 治婦人經氣不調虛煩發熱肌體瘦悴

形羸困弱飲食不進欲成勞病

熟乾地黃不以

多少

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九溫

粥飲送下空心食前

八珍湯 和榮調衛理順陰陽滋血養氣進美飲食

常歸 川芎 赤芍藥

熟地黃 人參 茯苓

甘草 縮砂人各等分

右為錢末每服三錢水一大盞入生薑七片棗三枚去核同煎三五沸去滓放溫空心日進二服

萬病丸 治婦人久虛血氣衰少怠墮嗜臥飲食不進精神不足

熟乾地黃 當歸各四兩

右為細末蜜麵糊和丸如梧桐子大每服五十九丸

溫粥飲送下空心食前

滋陰湯 治婦人血熱氣虛經候不通或血聚支體

麻木肌熱身重倦怠少力將成勞瘵不可妄行破

血湯九宜滋養潤利

馬鞭草 荊芥各四兩 官桂

川芎 白芍藥 當歸各二兩

枳殼 牡丹皮各一兩

右為麤末每服四錢水一盞半入烏梅半枚同煎

至一大盞去滓溫服食後

加味四物湯 治婦人衝任不調臍腹疼痛或月事

失時不來及衝任太過致使陰陽不和或發寒熱

漸減飲食欲成勞病

當歸 地黃 芍藥

川芎 柴胡 黃芩 各一兩

右咬咀服食依前

滋榮丸 治婦人本經衰少愆期不來及有血結成塊臍下堅硬疼痛不消並宜治之

熟乾地黃 人參 五味子

赤芍藥 當歸 遠志 白茯苓 牡丹皮 桂心

藥本 防風 卷柏

細辛 山藥 白木 各半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食

前空心溫酒下日進二服

地黃膏子 治婦人本臟血氣衰少困倦無力或發

川熱飲食減少並宜服之

熟乾地黃 淨蜜 各八兩

右將熟乾地黃為細末同蜜熬成膏子丸如梧桐

子大每服四五十九溫酒送下米飲亦得食前

或作膏子酒化服或不飲酒者白湯化服亦得

當歸沒藥丸 治婦人真氣虛憊血氣衰少不能榮

養致使經氣不來或發寒熱飲食減少怠墮嗜臥

以致虛勞

當歸炒

沒藥

川薑炮

天仙子炒黑

蒼木炒黃

芍藥

熟乾地黄

川芎紀上各等分

右件八味為細末麵糊為丸如桐子大每服五十

丸溫粥飲送下食前

經候

論曰經者常候謂其一身之陰陽愆伏知其安危

御藥院方

卷二

十六

精思堂

故其來必以月太過不及皆為不調過於陽則前

期而來過於陰則後期而至其有乍多乍少斷絕

不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱為邪詳說於

下若經候乍多乍少或前或後臍腹時痛而色不

澤久不治之漸至虛損俱令人斷產變生他病此

由衝任虛弱後致榮衛不調或陰氣乘陽胞寒氣

冷血不運行故乍少或陽氣乘陰血熱流散故令

乍多當調其陰陽順其血氣宜服

禹餘糧丸

桂皮

禹餘糧燒醋

龍骨

川烏頭炮

紫石英

人參

桑寄生

杜仲去皮

五味子

遠志去心

澤瀉

當歸切洗

石斛根

菴蓉

乾薑各二

牡蠣燒

甘草炙

川椒去目炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九漸

加至三十九日三服

治小兒諸疾門

玉桂枝散 治急慢驚風發不時省

全蠍七

薄荷葉

麻黃七

御藥院方

卷二

十七

精思堂

右三味以溫湯浴潤以兩葉 蠍一箇川麻黃一

條縛定炒至焦黑次入白木半斤自然

右同為末每服半錢煎丁香柿蒂湯調下不拘時

候

珍珠丸 治風化痰

珍珠米

朱砂

雄黃

輕粉

蠍稍各一

右為細末粳米飯和丸如粟米大每服二十九不

拘時候薄荷湯下

金頭得香散 治小兒百日内發搐

麝香一字 蠍尾去毒牛 薄荷葉半錢

蜈蚣七 牛黃末七 青黛末七

右同研勻棗肉就新綿上塗貼顛上

三味天漿子散 治小兒慢驚風

天漿子 白殭蠶炒 乾蠍各二十

右為細末每服一字煎麻黃湯調下或薄荷湯調

下無時

五味天漿子散 治小兒急慢驚風

天漿子錢一 朱砂末錢一 龍腦錢一

蜈蚣一條 乾蠍一個

御藥院方 卷二 一八 精思堂

右為細末每服一字煎薄荷湯調下不拘時候

通聖餅子 治小兒慢驚風瀉泄多咽喉不利手足

搐搦

天麻 使君子皮去 白殭蠶炒

白附子炮 天南星炮各一分 乳香

青黛 蠍稍炒 膩粉

水銀錢一 黑鉛半錢與水 麝香

腦子各半 無食子一對

右為細末麪糊和為丸如梧桐子大捏作餅子每

服一餅子用薄荷湯化下食後臨睡服量兒大

小加減

引風湯 治大人厥顛口有涎沫牽引口眼手足少

小驚痰癡日數十發醫所不治

大黃生 乾薑生 龍骨各四

桂三 甘草炙 牡蠣炒各一

凝水石生 滑石 赤石脂

白石脂 石膏 紫石英各六

右為細末每服三錢匕水一盞半煎取七分清汁

食後臨卧溫服小兒以意斟酌與服

聚寶膏 治小兒一切驚風壯熱涎多精神昏憤

睛上視手足搐搦饒睡多驚

朱砂二 犀角屑 西琥珀

玳瑁各一 南硼砂 龍腦各一

牛黃 麝香各半 人參

茯苓各三 紫河車二 甘草生一

銀箔五片 茯神分一 珍珠分一

右為細末煉蜜和丸如雞頭大每兩作三十九每

服半丸煎薄荷葉湯化下乳後常服安魂定魄

治驚寧神響音聲利咽噎解諸毒涼上焦療驚

搐搦

御藥院方 卷二 一九 精思堂

導赤散 治小兒心熱其證目赤口中氣溫合而睡

或上竄咬牙

生乾地黄

木通

甘草

右為麤末每服三錢水一盞入竹葉三片煎至八

分食後溫服量大小加減

雙金散 治天癆驚風目久不下眼見白睛兼角弓

反張聲不出者

蜈蚣一去頭足尾真酥塗慢火炙黃置砧子上

面南立川竹刀子當脊縫中停劃作兩個左

邊者入一左貼內寫左字右邊者亦入一貼

御藥院方

卷二

三

精思堂

子內寫右字不得交錯大悞矣

麝香錢一細研分二處先將左邊者同於乳鉢內

研作細末却入在左字貼內收起別用乳鉢

將右邊字者入麝香同研極細却入右字貼

內收不得相犯

右以細葦筒子取左字貼內藥少許吹在左邊鼻

右亦如之川藥不可多若眼全未下更量添些

小其眼隨手便下即止大有神效

利膈丸 治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

無牽牛四兩

皂角

不坤肥者去皮子

槐角子兩

青皮半兩

半夏湯洗七次

右為薑湯下薑汁麵糊和丸如黍米人每服十五

九至二十九丸溫生薑湯下

聖惠烏犀丸 治小兒驚風癇病及諸風手足搐搦

不定

烏犀角屑

天南星炮

白附子炮

乾蠍微炒

天麻各一

白花蛇半兩酒浸去

已上六味為細末以無灰酒一小盞同入銀器

內煎令稠則入後七味同和為丸

牛黃

麝香

膩粉

御藥院方

卷二

廿一

精思堂

龍腦

水銀以棗少許研

朱砂半兩

虎睛一對酒浸

右七味都研令勻入前膏子為丸如麻子大每服

三丸用竹漚下不拘時候量大小以意加減

聖惠牛黃丸 治小兒中風手足拘攣身體強直口

禁壯熱

牛黃

犀角屑

麝香

羚羊角屑

胡黃連

朱砂

釣藤

雄黃

水銀棗肉研

乾蠍

天竺黃已上各

烏蛇半兩酒浸

右為末蒸餅和丸如黍米大每服五九薄荷湯下

量兒大小加減服之

大水銀珠丹 治小兒驚風壯熱涎多發癇手足搐

搦目睛上視及風蘊痰實心膈滿悶嘔吐痰涎

黑鉛煉十遍甘草十兩水煮半日候冷取甘細研

水銀兩三 鐵粉兩三 朱砂飛牛

膩粉兩一 天南星炮為末

右同研細以麵糊為丸如麻子大每一歲兒服一

九川薄荷蜜湯利為度未利再服乳食後

大天南星丸 治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上

視口眼相引牙關緊急背脊強直精神昏塞連日

不省

滴乳香 龍腦 牛黃各半

朱砂錢三 麝香半錢 天南星牛膽製

人參 天麻 防風各一分

蠟國去 十四个湯後內土微

右杵研為末煉蜜為丸如雞頭大每兩作五十九

每服一九荆芥薄荷湯化下看兒大小以意加

減服不計時候

開胃丸 治小兒臟腑怯弱內受風冷腹脹滿腸

鳴泄利或青或白乳食不化又泄厥冷夜啼胎寒

腹痛

木香 蓬莪茂 白木

人參 當歸剉炒各 麝香細研

白芍藥分一

右為末都研勻湯浸炊餅為丸如黍米大每服十

五九溫米飲下又一法煉蜜和搜每兩作五十

九每服一九米飲化下不拘時候

導飲丸 消乳食化痰涎

荆三稜三兩 蓬莪茂三兩 青皮白

陳皮去 白木各半 檳榔

枳殼炒 木香各一 白茯苓兩

半夏錢一 生薑

右為細末煉蜜和丸每兩作五十九不拘時候淡

生薑湯化下一丸或溫水亦得

涼驚丸 治風熱相搏手足搐搦目睛上視

草龍膽末 防風木 青黛末

釣藤末錢三 牛黃 麝香各一分

黃連末錢二 龍腦一分

右同研勻麵糊為丸如粟米大每服三五為至一

二十九煎金銀湯送下瀉服

人參橘皮湯 治小兒吐乳令乳母服此藥

人參兩 橘皮去白兩 乾生薑半兩

右為麻末每服三錢水一中盞煎至六分去滓溫

分二服服了良久令兒飲乳大效

水銀福九子 治小兒驚風壯熱涎甚喘急或發搐

搦或目睛上視及因乳哺不節胸滿嘔逆精神迷

悶發癇瘵並宜服

水銀兩 黑鉛銀結沙兩 乾蠟全

賦粉各一分 黃明膠炙令黃 鉛白霜一分

御製院方 卷二 精思堂

青黛一分 百草霜黑燒一分

牛黃一分 巴豆膜一兩去皮心

右為細末入研藥末勻以陳粟米飯和丸如茶豆

大搜福每一歲兒服一九二歲服二九三歲服

三九四歲已上服四九川乾柿湯下薄荷湯亦

得更審虛實加減服利下青黏消涎為度乳食

後服不得化破

百當膏 治一切積聚心腹疼痛年月深久者皆治

之百歲至一歲皆服

丹砂兩 膩粉各半兩 水銀

鉛各一分 牛黃 龍腦

鉛霜二錢 粉霜研 陽起石研各

黃蠟兩 巴豆肥者一百二十粒去

蠟稍炒 半夏二錢湯洗七次

右件一十三味合研極勻鎔蠟并熟蜜少許同和

成膏旋丸如梧桐子大小兒如黍米大每服三

丸至五丸量大小虛實加減服吐逆霍香湯下

取熱積生薑蜜水下取冷積乳香湯下風涎薄

荷湯下便利米飲下

罷驚丸 治驚風諸癇壯熱昏憤神志不寧痰涎壅

塞或發搐搦目睛上視並皆治之

雄黃飛研一分 青礞石研一分 鐵粉一分

朱砂飛研一分 地黃飛研一分 蝦蟇灰一分

右同研勻水浸餅和丸如梧桐子大每服一九

煎薄荷水磨剪刀股化下日二三服此藥治驚

化涎不用銀粉小兒臟腑口齒腸胃柔弱丸用

銀粉藥切須慎之

木香化滯丸 治小兒宿食不消心腹滿脹嘔吐壯

熱

木香 京三稜 青橘皮去白各

補骨脂二兩 黑牽牛四兩 炒令黑

右五味搗羅為末滴水和丸如黃米大每服一二十九溫水下不拘時候

金珠化痰丸 治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍

德胸膈煩悶涕唾稠黏痰實咳嗽咽噎不利

金鉞為衣二片 辰砂飛研 皂角子仁炒微黃

白礬光明者於鐵器內熬令汁盡放冷研一兩 鉛白霜細研

天竺黃研一兩 生白龍腦細研 薑製半夏四兩

右為細末入研藥令生薑汁麩糊和丸如梧桐子

大小兒如黍米大每服十九至十五丸食後臨

御藥院方 卷二 精思堂

卧生薑湯下

洗浴菖蒲湯 散風截癩

菖蒲九節者 防風 荊芥穗各二兩

石膏 梅根各一兩

右件搗羅為末每川五匙頭水三椀煎三五沸

適寒溫浴兒先洗頭面次浴身體為佳

大青膏 治小兒傷風其候伸欠煩悶口中氣熱或

偃人惡風鹹浮

大青生一分 白附子生一分 蠍尾生一分

朱砂一字 青黛一字 麝香一字

烏蛇補肉半錢 天竺黃一字

右為細末朱砂研入生蜜和成膏月內兒粳米大

一歲皂子大餘以意加減川溫薄荷湯化下

惺惺散 治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱日

遊多睡咳嗽喘癆鼻塞清涕

桔梗 細辛去葉 人參去蘆

甘草炙 白茯苓去皮 瓜樓根

白木各一分 加川芎一兩

右為末每服一錢水一小盞入薄荷三葉同煎不

四分溫服如要和氣人生薑煎服不計時候

御藥院方 卷二 精思堂

人參羌活散 治小兒寒邪溫病時疫瘡疹頭疼體

痛壯熱多睡下治潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活去苗 獨活去苗 柴胡去苗

人參去苗 芍藥去苗 枳殼去穢

白茯苓去皮 甘草炙各二兩 前胡去蘆

桔梗 地骨皮土 天麻酒洗

右為散每服一錢以水七分入薄荷少許煎至五

分去滓溫服不計時候

大鎮心丸 治小兒精神不爽寢寐多驚心忪恐悸

四肢戰掉舉動欲倒狀類暗風或煩躁而多啼退

驚風化痰涎壯心氣益精神

生犀角末

鐵粉一兩

羚羊角末

龜甲末

赤箭兩

牛黃

茯神木

遠志去心

真珠末

人參

桂去粗皮

蛇蛻皮天黃

天竺黃

龍腦各一分

麝香

菖蒲各半

丹砂各半

金箔

銀鉞各五

右一十九味搗研為末煉蜜和丸如梧桐子大每服一九至二九食後臨卧薄荷湯化下更煎大

小加減 治心肝臟風熱致眼偏視宜服之

牛黃散 治心肝臟風熱致眼偏視宜服之

牛黃細一錢

犀角屑

甘菊花

天麻

槐子

人參去蘆

芍藥

防風去蘆

車前子

決明子

黃耆剉

蔓荆子已上各

朱砂一分

龍腦細列

甘草一分

羚羊角屑兩

右件藥搗細羅為散入研了藥同研令勻每於食後以竹葉湯調下一錢臨卧再服

羚羊角散 治眼風邪所攻瞳人不正顏靨常偏宜服

服

羚羊角屑一兩

犀角屑一兩

龍腦細研

牛黃一分

朱砂半兩

赤芍藥

甘菊花

細辛

防風去蘆

酸棗人炒

沙參去蘆

蔓荆子

玄參

人參去蘆

蕤人去赤皮

天竺黃半兩

蜜蒙花一兩

甘草半兩

右件藥搗細羅為散入研了藥更研令勻每於食後以竹瀝湯調下二錢

寒水散 治肝風暴赤目睛偏視

青黛錢一

大豆三錢

馬牙消二錢

黃連錢二

黃蘗錢三

右件同搗羅為細末每用一錢蜜少許冷水調成膏緋絹作花子如小錢大攤藥於上貼太陽穴

病左貼右病右貼左

錢氏羌活膏 治脾胃虛肝氣熱盛生風或取轉過

或吐瀉後為慢驚者亦治傷寒用無不效

羌活去蘆

川芎

人參切去

白附子炮

赤茯苓去皮

天麻一兩

白殭蠶酒浸 乾蝦去毒 白花蛇酒浸取

川附子炮去 防風去頭

麻黃去節 肉豆蔻 雞舌香母丁

藿香葉 沉香 木香各二

輕粉子 珍珠末 牛黃各一

龍腦字 麝香半錢 雄黃

辰砂各一分已入

右同為細末熟蜜丸劑旋丸大豆大每服一二丸

食前薄荷湯或麥門冬湯溫化下實熱急驚勿

服性溫故也服無時

金砂丹 治中風涎潮失音不語而赤脈浮大數急

迷悶口眼喎斜但係風熱之疾半身痺曳或傷寒

剛瘥痰癢口噤小兒急慢驚風並皆治之

白花蛇各用酒浸一宿 蠍稍去毒

犀角 玳瑁

天麻 人參 茯神

甘草炒各 腦子 麝香

牛黃 雄黃 珍珠末

天竺黃 鐵粉另研各 銀箔二百五

金箔二百五十片於內 朱砂五兩通

右件二十味為細末再研勻用真石膽油為丸每

兩作一十九川金鉞為衣每服一粒煎人參湯

化下或竹葉湯亦得新汲水亦得小兒量大小

虛實服不拘時候

虎睛膏 治小兒胎風及驚風

虎睛一隻酒浸 天麻 乾蝦炒

烏蛇肉炙小 羌活 獨活

麝香各二錢已上 金箔為

右件藥搗羅為末以蜜和丸每兩作四十九前項

金箔為衣每服一九薄荷湯化下不拘時候

丹砂鎮心丸 治小兒心神不寧有時驚悸目睛偏

視痰涎不利甚則痰癢服之安鎮心神罷驚止搐

朱砂飛研 牛黃錢一 生龍腦

麝香各一 鉛白霜錢二 天竺黃各二錢已上

天麻明大者 人參兩 茯苓半兩白者

甘草兩

右一十味為細末與研藥同研勻細煉蜜和丸如

鷄頭實大每服一九煎金銀薄荷湯化下

五味麝香餅子 治小兒驚風發癇目睛斜視胸膈

多痰搐搦不定神昏不醒又治變蒸溫壯不解

麝香半錢 青黛三錢 全蠍去毒生用 一十五枚

蜈蚣一對 生用 石膏飛例細 一兩

右為細末研勻湯浸油餅為丸如梧桐子大捏作

餅子每服五七餅子金銀薄荷水化下

祛風墜涎丸 治小兒諸癩

荆芥穗 蜜陀僧 白礬生各 半兩

半夏湯洗 一兩 朱砂為衣 一錢

右為細末水糊為丸如黍米大朱砂為衣每服三

十九荆芥湯下乳後

青芝散 乳母服之

青黛別研 三錢 藍寶三兩 白芝麻生用 九兩

已上二味同為末入青黛令勻每服三錢沸湯點

服食後日進二服常服甚效

木香逆氣飲子 治一切氣病噎塞食飲不下

青皮白 去 木香 檳榔

陳皮去白 半兩 香白芷二錢 蘿蔔子牛兩

藿香葉一兩 甘草炒 半兩 人參兩

枳殼炒 半兩

右為細末每服三錢水一大盞煎至八分去滓瀝

服不拘時候

乾蠍天麻散 治小兒慢驚風

乾蠍全首 十枚 炒 蔓陀蘿十朵 重 一字 天麻二錢

乳香研 天南星地 丹砂研各 一分

右六味搗研為細散每服半錢匕薄荷湯調下不

拘時候

大惺惺丸 治驚疳百病及諸壞病不可具述

辰砂研為 衣 青礬石 金牙石各 一錢

雄黃錢 蟾灰二錢 牛黃二分 半另 研

麝香半錢 另研 龍腦三分 半另 研 蛇黃兩 半 另 研

右研勻細水煮蒸餅為丸朱砂為衣如棗豆大百

日兒每服一九一歲兒每服二九薄荷湯溫化

下食後

牛黃丸 治小兒風癇發即迷悶手足搐掣口內多

涎良久不惺

牛黃二錢 天南星生 白僵蠶生

白附子生各 半兩 乾蠍生 麝香研

半夏湯洗 七 湯洗 滑 蟬殼各 半 二 天麻兩

水銀

右件藥並生用搗羅為末又以水銀一兩煮棗三

十枚去皮核與水銀同研令星盡人前藥末和

九如菜豆大如隔日發者每服煎黃牛乳汁下

三九日三服如驚風即煎荆芥湯下兩丸

太一九 治胎癇正發未分差後亦宜常服

天漿子炒 蠟稍各二十 防風

天麻 朱砂各五 麝香錢一

右為細末乳汁調下不拘時候加減服

斷癇丸 治胎風久為驚癇時發時愈

蛇蛻三寸數枚 蟬蛻四枚 牛黃錢半

釣藤鈎子 黃耆 細辛

甘草生已上

右為細末研勻麵糊為丸如小黍米大每服百粒

內兒三五九人參湯送下不拘時候量兒大小

加減服

人參茯神湯 治諸癇心神不定

羚羊角末 人參 茯神

白鮮皮各一 天門冬去心 酸棗人各半

天竺黃 甘草一分

右為細末每服一錢水八分入生薑薄荷各少許

煎四分去滓溫服

寧眠散 治搐搦不得安臥

天南星炮 人參去蘆 白附子炮

乾蠍生用 乾赤頭蜈蚣一條酒浸

乳香 血竭各一分

右件同諸藥拌勻每服一字至半錢用酒好少許

浸薄荷煎湯調下每兒潮搐服之得眠睡是驗

安神散 截癇安心神

白茯苓二 人參 遠志

石菖蒲 白鮮皮各一分 石膏兩

犀角屑 甘草一分

右為細末每服一錢水一盞入去心麥門冬少許

煎五分去滓放溫時時與服

醒風煎 治小兒風癇涎潮發搐不省人事

白花蛇頭一枚自開 乾蠍全者

牛黃研半 丹砂研一 龍腦研半

麝香研半

右六味搗研為細末煉蜜和為煎瓷盒內收每服

一棗豆大薄荷湯水化破服之量小兒大小加

減服

抱龍丸 治壅嗽痰實欲生驚風時作潮熱宜服

天南星二兩 天竺黃兩 雄黃另研

大附星二兩 雄黃另研

辰砂另研二錢 麝香另例一錢

右為末將研藥一處并和勻煉蜜和丸如芡實大每兩作五十九煎薄荷甘草湯化下一丸食後

朱砂丸 治小兒疝氣

朱砂重一錢比淨 當門子一枚如皂子大

石燕子燒一錢 木香三錢 史君子末一錢

訶子地一錢

石件藥細研如粉川米飲為丸如黍米大從一力

至七九薄荷湯下日二服早晚乳食前各一服

百濟丸 治小兒心氣不足五六歲不能言語

石菖蒲各二錢 丹參各二錢 人參各一錢

天門冬心一兩 麥門心一兩 赤石脂三錢

右同為細末煉蜜和丸如棗豆大或麻子大溫水

下五七丸至一二十丸不計時候日三四服久

服取效

天麻煎丸 治小兒一切驚風身體壯熱多睡驚悸

手足搐搦精神昏憤痰涎不利

天麻去蘆 防風去蘆 人參去蘆

白礬炒 乾蠍炒 朱砂研水

雄黃研 甘草各半兩 麝香

牛黃各二錢

右為細末煉蜜為丸每兩作四十九每服一九至二九薄荷湯化下不拘時候

十珍餅子 治大人小兒嘔吐痰涎藥難停無問

新久服之愈

丁香 沉香 木香

桂皮 薑芥 肉豆蔻

吳茱萸洗焙乾已 半夏湯洗七返曬乾

舶上硫黃 水銀各七錢半研

右件為羅為細末同和勻煉蜜和丸如小豆大均

作餅子每服十餅生薑湯下或化服亦得量病

加減服不拘時候

金瓜丸 治小兒肌熱盜汗瘦弱飲食不進常服退

肌熱肥孩兒大有神效

黃連 青皮

甘草已上各半兩

右為細末人麝香半錢取獾豬膽和釀在膽內用

漿水煮十餘沸取出東房山頭掛一夜第二日

丸作棗豆大每服十九加至二十九溫米飲送

下不拘時候

八物定志丸 補心氣安精神

遠志法 麥門冬心 菖蒲

茯神木 茯苓上各半兩 牛黃錢一

白木分一 人參錢六

右為細末煉蜜為丸每一兩作三十九以朱砂為

衣每服一丸人參湯化下食後

無價散 治疔瘡發出不快

人貓豬狗腦炭燒 少許微將蜜水調

百者救生無一死 萬錠黃金也何銷

右將前四物於臘日早晨日未出盛貯於銷一錠

御藥方 卷二 三六 特思堂

銀鍋子內川木炭火大瀆煨令煙盡白色為度

但發瘡似覺有瘡或發不快倒推黑磨一切惡

瘡並皆治之每遇小童但覺瘡證每用藥一字

用蜜調服萬無一失據此藥工效無可揚以無

價散呼之

釣藤丸 治小兒治風癩時發時止歲月不休常服

除根元

釣藤 川升麻 烏犀角

黃芩并皮 玄參 茯神

防風去蘆 秦艽 檳榔

黃連 大黃 地骨皮

天竺黃 甘草炙 牙消

麥門冬法 龍齒 琥珀

青黛 珍珠另 麝香

牛黃 丹砂另 龍膽已上各

蛻螂足翅 蟬用各三個 人參一兩

金箔 銀箔各四片 虎睛一對酒

右件除另研外為細末軟飯丸如黃米大每一歲

兒服二十九至三十九人參湯或薄荷湯下

牛黃丸 治法同前釣藤丸治法同

御藥方 卷二 三九 特思堂

白花蛇酒 人參 茯神

獨活已上各 釣藤分一 腦子

麝香 牛黃已上各 朱砂另研

雀兒餅三十

右件除研藥外為末後同研令勻煉蜜丸一兩作

三十九金箔為衣每一歲兒服一丸人參湯或

薄荷湯化下

丹砂虎睛丸 治小兒諸驚癇兼壓驚鎮心藏

丹砂分 虎睛雙 牛黃研

麝香研 犀角末各一字 釣藤二

白茯苓去黑皮 黃芩去黑 人參

梔子人半已上各 大黃濕紙裹

右件搗初為末煉蜜為丸如鷄頭實大每服一丸

至二九煎金銀湯化下人參湯亦得更量兒人

小加減

郁李人丸 治襁褓小兒大小便不通并驚熱痰實

欲得溥動

川大黃一兩半和皮取實者對酒

郁李人夫一兩 滑石半兩

右先將郁李人研成膏和大黃滑石丸如黍米大

量大小與之以乳汁或薄荷湯下

射蟾丸 治驚風涎熱潮搐

大乾蟾錢二 鐵粉錢三 朱砂末錢二

青礞石末 雄黃末 蛇黃燒取末各

龍腦一字 麝香各別研

右件研勻水浸蒸餅心丸如梧桐子大朱砂為衣

薄荷水化下半丸至一丸無時

七味羌活膏 治急慢驚風壯熱發搐

羌活 獨活 烏蛇肉酒浸一宿

天麻 全蠍 白殭蠶

人參各半

右為細末煉蜜和丸如皂角大每兩作五十九每

服一丸煎荊芥湯化下

胡黃連丸 鎮驚散熱截疳

胡黃連 黃連各半 朱砂一分

右上一二味為細末研人朱砂末都填在棕豬膽內

川淡漿水煮以杖子於銚子上川線釣之勿着

底候一炊久取出研入蘆薈麝香各一分餅九

黃米大每服十九至二十九至三十九食後米

飲下

益黃散 治小兒胃虛脾弱脹滿泄瀉等疾

肉豆蔻 陳皮去 訶子皮各半

丁香錢二 甘草錢半

右為細末每服二錢水一盞煎至六分食前溫服

去青皮加肉豆蔻

固腸丸 治小兒脾胃不和腸滑泄瀉

木香 肉豆蔻熱去麩用 縮砂人

赤石脂 厚朴製 川薑

右各等分為細末麵糊為丸如黍米大每服三十

丸至五十九乳食前煎草節湯下

木香豆蔻丸 治小兒泄痢不止進食不氣

木香 草豆蔻八 檳榔

陳皮 青皮去白各一兩 京三稜兩

肉豆蔻

右為細末麵糊為丸如黃米大每服五十九棗湯

下

豆蔻香連丸 治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之

氣客於腸間下赤白痢腸胃疴痛日夜頻併不欲

乳食並皆治之

木香兩 黃連三分 肉豆蔻二分

御製醫方 卷二 精思堂

丁香一分 訶梨勒半兩

右為細末粟米粥和丸如黍米大三歲小兒每服

十九乳食前溫服米飲下更量大小加減

駐車丸 治一切下痢無問新久冷熱膿血腸滑裏

急日夜無度臍腹絞痛不可忍

黃連三兩 當歸去鱗頭一兩半 乾薑兩

阿膠為末以醋四升熬成膏

右為細末以阿膠膏和併手丸如黃米大每服三

十九乳食前溫米飲下日三服

黃連阿膠丸 治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白狀

如魚腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴大便不利

黃連三兩 茯苓去粗皮二兩 阿膠為末

右黃連茯苓同為末水調阿膠和衆手丸如黃米

大每服二十九乳食前溫米飲下

虎睛丸 治小兒二十四種驚癇壯熱手足嘔逆夜

啼臥睡不安驚痢

虎睛一對 牛黃 梔子人

白茯苓各半 人參去蘆 釣藤

川大黃 黃芩已上各一兩 生犀角屑二

蛇蛻皮

御製醫方 卷二 精思堂

右竹葉搗羅為末細研令勻煉蜜和丸如梧椰子

大三歲兒每服以熱水研破一丸服之三四歲

兒每服二九以粥飲下亦得更隨兒大小以意

加減

溫白丸 治小兒脾氣虛弱泄瀉瘦弱冷疝洞利及

因吐瀉或久病後成慢驚身冷瘦瘵

天麻兩半 白殭蠶地 白附子生

乾薑去 天南星剉湯洗七次

右同為末湯泛寒食麵為丸如菜豆大九了仍於

寒食麵內養七日取出未及養七日每服五七

九至三二十九空心煎生薑米飲下漸加九數

多與服

異功散 溫中和氣治吐瀉不思乳食凡治小兒虛

冷病先與數服以正其氣

人參去蘆

茯苓去皮

白朮

甘草

陳橘皮各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑五片棗二枚同

煎至七分食前溫熱服量多小與之

九箇衛生方薰陸香丸 治小兒虛風慢驚潮搐瘈

瘕安神魂益心氣

御製此方

卷十一

四

精思堂

血竭兩

乳香二錢半本方該分

右件同研細用火上炙為丸乾時滴水丸如酸棗

大每服一九薄荷酒化下不計時候家傳如夏

月嬰兒患上件病證為細末薄荷人參湯調下

不拘時候

正舌膏 治小兒風病搐搦機關不利喫乳難至於

不能發聲者此因病作之後風邪客於舌之絡脈

而致此也服之累效

天麻明大者

白僵蠶直者去

大葉薄荷州

者各半兩

上好朱砂飛研一分計一錢半入藥一牛為衣

麝香研一錢 腦子

右除研者外為末研勻煉蜜和丸如榛子大每服

一丸薄荷湯化下時時服少許朱砂為衣

訶梨勒散 治小兒脾胃氣弱不欲乳食四肢不和

訶梨勒

陳皮去白各兩

黃耆去蘆

藿香葉

白朮

白茯苓

桂心各一分

甘草各一分

右為細散每服一錢水一小盞入生薑少許棗一

枚同煎至五分去滓溫服食前

均氣散 治脾肺氣逆喘嗽而浮腫膈痞悶小便不

利

御製此方

卷十一

精思堂

桑白皮兩

陳皮去白兩半

桔梗

甘草炙

赤茯苓各一分

藿香葉兩半

木通兩四

右為細末每服二錢水一小盞入生薑一二片煎

至五分去滓溫服食前

雄黃丸 治小兒諸般驚頭瘈初降誕下便與乳母

帶碎諸驚忤之氣

雄黃兩一

虎頭骨三分

麝香一分

猴猴頭骨三分

白龍腦一分

大蛇頭一枚

乳香一分 降真香一分 芫香一分

白交香一分 鬼白一分

右件都併勻細用熟棗肉和丸如彈子大初降誕

兒煎熱一九次用綠絹袋子帶一九於身碎一

切驚忤之氣

凡新 降誕兒浴法用豬膽一枚投湯中令不生瘡

疥湯中勿添生水浴訖斷疥

降誕三日浴法

桃根 李根 梅根各二

右三味以水八升煎二十沸去滓浴之去不祥令

身無瘡痍一方煎成去滓入麝香末少許

犀角散 治小兒驚熱睡臥不安筋脈抽掣

犀角 人參去蘆 茯神

甘草炙 黃芩各一 生乾地黃

麥門冬去心 龍齒各二

右件同為末每服一錢水半小盞煎至五分去

滓溫服不拘時候

天漿子散 治小兒初降誕斷臍了便傳此散免一

臘內疾

天漿子三 亂髮燒灰存 蜈蚣燒灰

羚羊角一分 麝香一分

右五味併令極細纒斷了臍便用少許傳之

鐵粉九 墜風涎

水銀 鉛二味同結沙

鐵粉一字 輕粉一分 天南星去膽地為末

右一處研至水銀星盡為度生薑汁麵糊和丸如

粟米大每服十五丸至二十九丸生薑湯送下

錢氏地黃九 治小兒木氣虛怯山胎氣不成別神

不足則下窺蓋骨重惟欲墜於下而縮身也腎水

陰也腎虛則畏明目無睛光者並宜補之

熟乾地黃八錢 山茱萸 乾山藥各四

澤瀉 牡丹皮 白茯苓去皮各

右為細末煉蜜和丸每兩作五十九三歲已下每

服一二九至三九溫水空心化下

錢氏浴體天麻散 治小兒百日內發搐真者不過

三兩次必死假者發頻不為重真者內生驚癇假

者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃撥搖也欲

知假者口中氣出熱也治之可發風邪川浴體塗

頤法

天麻末二錢

蠍尾去毒

朱砂各半

烏蛇肉酒浸焙

白礬各三錢

麝香一字

青黛三錢

右同研勻每服三錢水三椀桃枝一握并葉五七

枚同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

大青膏 治小兒外感風寒呵欠頓口中氣熱肝

主風實則目直大 虛則前牙多欠又胸滿短

氣急喘嗽上氣故當發散之又治小兒外傷寒其

候伸欠頓口中氣熱或怕畏人惡風蟻浮者並

宜服之

御藥院方

卷二

天

精思堂

天麻末分

白附子末錢半

朱砂研七

青黛一錢

麝香七

烏蛇稍肉酒浸焙乾取末半錢

天竺黃上研字

蠍尾去毒生

右同再細研勻生蜜和成膏每服半皂子大至一

皂子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷湯化

一處服之五歲已上同甘露散服之

安神丹 治小兒心神不寧因臥多睡及痰涎壅塞

恍惚不定

朱砂二錢

南乳各兩

酸棗人炒去皮

人參二錢

遠志去心一錢

右五味為細末蜜丸如榛子大金箔為衣每服一

九人參湯化下每兩作三十九

瀉白散 治小兒肺氣壅塞壯熱飲水喘悶及胸滿

短氣氣急喘嗽痰涎壅塞唇深紅色者並宜服之

地骨皮去

桑白皮細剉

甘草炒

右為細末每服一二錢水一中盞入粳米百粒同

煎至六分去滓食後溫服

十味麝香餅子 治小兒風癩潮熱瘰癧及口眼偏

斜項背強直目睛上視並皆治之

川烏頭炮去

天南星炮

白花蛇肉

乾蠍稍兩

乾赤頭蜈蚣二條

上並酒浸焙乾為末

真好麝香半兩

乳香另研

鐵粉另

朱砂研

牛黃另研各一分

右件都一處研細拌勻酒打白麵糊和為餅子如

雞頭實大每服一粒至二粒煎人參薄荷湯化

下量兒大小加減

蕭蒼丸 治小兒疳氣羸瘦而色萎黃腹脇脹滿頭

足作穗揉鼻咬甲好喫泥土利色無定寒熱往來

口澁口臭齒斷爛畢常服長肌肉退黃煞疳蟲進

飲食

乾蝦蟇 大皂角性溫味甘每木一兩入下

青黛 分一 蘆薈 麝香

朱砂 各一

右為細末湯浸蒸餅為丸如麻子大三歲兒服十

五九米飲湯下量兒大小加減用之

史君子丸 治小兒五疳或抓頭揉目或頭暈筋青

下痢頻多久而不痊轉甚羸瘦並皆治之

史君子 二兩 丁香 木香

厚朴 製 沒食子 胡黃連

肉豆蔻 已上各 蘆薈 麝香 一錢

右作爲細末粟米餅為丸如黍米大每服一十五

丸米飲湯送下食前

瀉青丸 又名瀉肝丸 治小兒肝臟實熱手尋衣領

及亂捻物目直視不搖得心熱則搖身反折強直

目連割或目內青者或臟腑泄瀉諸藥不能止者

以致脾胃久虛並宜服之

當歸 去蘆頭切焙 龍膽 焙 川芎

山梔子 人 大黃 濕紙 羌活

防風 去蘆頭切焙

右為細末煉蜜和丸每兩作三十九每服半丸至

一九煎竹葉湯同沙糖溫水化下

全蠍散 治小兒急慢驚風搐掣痲癢痰實壅塞胸

膈不利

全蠍 一 朱砂 研 乾胭脂 各一

薄荷 四

右為細末每服半錢乳汁調下

阿膠散 治小兒肺氣虛怯唇內色悶亂氣喘喘促

暖氣長出氣皆肺虛損故也宜補之

阿膠 二兩 黍黏子 焙 甘草 炒

馬兜鈴 半 糯米 一兩 杏仁 七個

右為末每服一二錢水一盞煎至六分去滓服食

後

菖蒲煎丸 治小兒肺氣壅實咳嗽痰涎喘鳴肩息

人參 石菖蒲 款冬花

桂心 紫苑茸 已上各

右為細末煉蜜和丸每兩作三十九每服一九煎

糯米湯化下食後服

錢氏白朮散 治小兒吐瀉之後腹中疼痛氣不和

煩渴引飲不止及傷寒下後胃中虛熱飲水無以

當生胃中津液多服愈佳常多煎不代水

癸巳新刊御藥院方卷第十一

御藥院方

卷二

三

精思堂

癸巳新刊御藥院方跋

御藥院昉于宋有勾當官有典有樂童掌按驗秘方以時和藥以進御及供奉禁中之用金元因之蓋唐尚藥局也此書不題撰人姓名按翰林學士高鳴序云太醫提點榮祿許公暨二三僚友取御藥院千寅所刊方書板正其訛補其缺求其遺亡而附益之元史許國禎傳世祖即位錄前勞授榮祿大夫提點太醫院事壬寅元太宗十四年此時未建年號乃宋淳祐三年也由此觀之其書係于元太宗朝諸醫官所集高序成乎至元四年距壬寅二十五年許遷禮部尚書在至元十二年乃知所謂許公者為國禎無疑矣又按政和本草中收御藥院方者十餘道今考諸此書無一所見而宋藝文志馬氏經籍考俱不載其目蓋宋舊有御藥院方而佚已久矣徐東阜於古今醫統中引此書方藥而於採摭書目則云宋太宗朝無名氏集抑攻核之不審也元人方書李明之羅天益王好古危亦林薩德彌實李仲南孫允賢等之外流傳未廣此乃輯宋末金源諸方者頗備亦寶架中不可欠之書也壬子夏日借抄于佐伯侯高標紅粟齋因記其后爾是歲重九卅波元簡廉夫書

御藥院方

精思堂

寬政初元

國家布維新之政再修學校而令朝士志於醫者入學焉乃課講習使長於技者代辨診脈論病證講方書而學者皆孳孳有所進云既有學政則又不可以不廣貯其書也於是乎所謂秘于帳藏于山之書亦無日不至焉佐伯侯有鄴侯之好其富典籍聞於海內藏中有元御藥院方法眼多紀君乞而勝之余從而借讀之多備所未聞之方乃知彼時典藥者承詔集之以考異同無所不搜也既得斯書又思公之因就工而上木授之海內學醫者觀斯多方庶乎有補於政化之萬一云爾

御藥院方

精思堂

戊午仲冬

醫官法眼千賀芳久識

右御藥院方十一卷倣乾隆聚珍之式
擺字刷印凡貳百有五十部以廣其傳
原本舛錯不遑僂指今釐訂其可攷者
以待後之君子爾

御藥院方
庫

奇效良方序

醫之方何始乎上古聖神繼天保民而素問太素之書作方其昉於此乎素問論病之因本草著藥之性合是二者而醫之方出矣然則二書其學之源乎譬之規矩準繩為方圓平直者亦取法於此而已耳厥後秦和六氣之論明此者也越人難經之述述此者也仲景金匱諸方推而廣之者也思邈千金備急觸類而長之者也其他如脈訣如病源如和劑聖惠如秘要五行與夫經驗集驗之殊其名得效

神效之異其目簡帙浩繁不可殫紀貯之足以充棟載之至於汗牛醫之方不亦博矣乎我朝醫藥有專官方脈有專科治療有全效

列聖仁民之心即古聖神之心也乃者太醫院判方賢以醫書一集見示曰此前院使董宿所輯賢續而成之者董慮方書太泛欲斟酌損益約之於中顧其書未備賢竊惜之間得御醫楊文翰相與重加訂正刪繁舉要慎於去取總六十餘類凡若干卷名曰奇效良方將繡諸梓以上

禪

聖覽下與四方君子共之願為之
序予惟醫者意也如對敵之將
操舟之工貴臨機應變方固難
於盡用然非方則古人之法弗
傳茫如望洋如捕風必有率意
而失之者矣方果可以弗用乎

是宜董輯之而賢成之擇之愈
精守之愈約而用之愈效其有
功於醫學大矣雖然方固良矣
有志之士必熟之素問以求其
本熟之本草以究其用熟之診
視以察其證熟之治療以通其
變始於用方而終至於無俟於

方夫然後醫之道成矣昔許胤
宗謂我善讀仲景書而知其意
然未嘗專用其方誠名言哉予
故誦之以為檢方用藥者之勸
成化六年庚寅冬十一月長至
日資善大夫兵部尚書兼翰林
院學士知

制誥

經筵官溥安商輅序

奇効良方序

聖朝於醫內設院使院判主掌其事外設正典訓科分理之蓋倣成周委任醫正諸士美意也仁民之心何其至哉嘗考成周醫正掌養萬民疾病每歲終以諸士所書制其祿然其教令蓋以五聲五氣五色求察其劇易以九竅九藏參兩其變動以五味五穀五藥五毒攻其羸養其不足故當時民生咸樂於壽考之天者實於醫有賴焉凡茲數術皆始於古聖賢所審用著於書以詔來世如攻養之術始於神

農子儀求察之術始於扁鵲倉公參兩之術始於秦和厥後聞人達士徃徃能祖述之制為方訣者非一但世之業醫者有生長遠方僻邑或無師友講明或無古書稽究粗知方脈一二輒情然赴人之求故人不死於病而死於藥石之誤者比比也此院判方賢惓惓於是書之編也歎聞諸賢自陞今官以來恒慮無以仰副

朝廷委任也乃博采古書所載及世所未傳與嘗試用有效者悉手錄之復取前院使董宿所輯

同御醫楊文翰訂正之共為一書將具表進

呈鈔木傳世觀其書總六十有九卷凡六十有四門門各首發以論次繫以方一覽而陰陽表裏虛實及經絡脉證之故與夫可攻可養先後疾徐節次指掌

皆在則凡天下之為正典訓科以及業醫者獲之即能見方識證見證得藥倉猝而用了然如載司南以適四方自無問津之感矣庸詎知斯民在在有不由茲咸樂於壽考之天乎若賢之用心非惟能推明古聖賢之術

而於

朝廷仁民之政亦庶乎有所裨益也因其求特為序諸

成化六年庚寅冬十二月吉

賜進士第通議大夫禮部左侍郎

翰林院學士同修

國史知

制誥兼

經筵官眉山萬安序

古昔聖人既竭心思之力而必繼之以不忍人之政斯仁覆天下矣夫醫一不忍人之政也神農氏嘗百草黃帝著內外經伊尹製湯液三聖人治天下之大經大法官無不至而充竭心思於醫之一術何也誠欲拯生民疾苦為天下萬世法厥後漢張仲景者出推明三聖人心法作金匱要略遂為醫家不刊之典自是晉王叔和唐王太僕以及劉守真李時珍之朱丹溪輩演群經以立論銓衆藥以制方其他嚙嚙味餘而著為方論者無慮數十百家於是後之人得對證尋

方按方投劑生人多賴焉自三聖人至於今數千百年而濟利之澤流布無間於乎何其仁之廣遠哉
洪惟

國朝廓天地好生之德設醫學局編天下選秀民肄方術復官其藝能之良者司其事仁澤淪洽百有餘

年迨我

皇上續承

列聖道契黃農拳拳留意於活民之術而太醫院判方賢仰體

至懷慨古今方書浩瀚無涯學者如探囊珠魚目夜光混淆莫辨臨病漠然生人伊戚乃因前院使董宿

所集方論斟酌去取併入已嘗經
 驗者而又蒐輯衆家之長令御醫
 楊文翰詳加訂正得若干卷分門
 別類目之曰齊効正少鏤板以行
 視余為序顧余雖未能洞究醫家
 言然考之成周六典醫師掌于天
 官固其職也矧賢用心勤厚宜有
 取焉是書行不特為醫氏後學指
 南吾知贖夭傷於壽康回膏腴於
 枯槁而於
 國家仁民愛物之意不無小補云
 成化七年辛卯歲春三月朔旦資
 德大夫正治上卿吏部尚書嚴郡
 姚瑩序

醫之為道豈易言哉大而天地日
 月星辰之運行山嶽川瀆之流峙
 雨露霜雪雷電霰雹之施化微而
 陰陽寒暑溫涼燥濕之變更幽而
 鬼神精恠山妖木魅魍魎射工沙
 虱屍氣之幻惑細而毫分抄忽絲
 縷鍼芒之杳眇發之為頭面耳目
 口齒咽喉臟腑手足腰脊肌膚骨
 節之疾疢形而為浮沉乳滑弦緊
 洪微緩瀉遲伏濡弱諸脉而吉凶
 禍福壽夭死生性命之重關焉診
 視得其理治療適其宜則夭可壽
 死可生而轉凶為吉易禍成祥矣
 反是則凶禍夭死可立而待醫可

以易言哉醫不可以易言而古之岐和彭緩之流起人若易易者何哉精於其道故也今不皆古也不皆岐和彭緩也窮鄉下邑孤居匹處猝罹疾疢譁譽噪號求一庸師瞽醫有不可得得一書如善救簡要諸方按證而藥之鮮弗瘳者此桐雷篇冊之載政不能以或無也後世纂述既多醫之為術亦不下六十餘家其為書亦且至四千餘卷雍熙普救方且至千卷篇帙浩博亟難檢閱承訛傳謬未易信憑又不能無待於今日也太醫院使會稽董宿嘗集諸家之方類為

一帙未及成書而逝今院判吳興方賢惜其採輯未備猶不能無擇簡去取之未安者間與御醫楊文翰翻閱載籍重加訂正凡方論之輕重失宜先後不倫煩而未及刪要而未及採者悉從校勘與夫投用而經驗者悉從收入條分縷析精思博究彙萃成編為門六十有四為卷六十有九題曰奇効良方爰鏤諸梓上以裨乙夜之覽下以廣四方之傳其用心甚溥其為力勤亦可嘉也已亦可尚也已吾知是一出不惟有以鞏億載於

皇圖抑且有以登群黎於壽域豈曰
小補之哉於不可易言之中而有
至易者存吾於是書有取焉故特
書為之序

成化七年歲次辛卯春三月朔旦
朝列大夫國子祭酒

經筵官前翰林侍讀學士兼脩

國史古兵陳鑑書

奉政大夫修正庶尹太醫院使吳興方賢纂集

脩職即太醫院御醫臨江楊文翰校正

脩職即太醫院御醫會稽董燦同校正

脩職即太醫院御醫武進蔣宗武同校正

脩職即太醫院御醫江趙瑄同校正

太醫院冠帶醫士嘉禾許觀同校正

脩職即良醫所 貴珍膳錄

奇効良方卷之一目錄

風門 附論

八味順氣散

為藥順氣散

排風湯

省風湯

大防風湯

大防風湯

消風散

小續命湯

三花飲

大素丸湯

星香湯

救急稀涎散

川芎石膏湯

三化湯

牛黃清心丸

祛風至寶丹

三化湯

滌痰湯

羌活愈風湯

加減三五七散

資壽解語湯

青州白丸子

清神散

深洗藥

追風散

川芎茶調散

搐鼻通天散

犀角散

附論

牛黃散

映明子丸

射干湯

治肝臟中風心

神煩熱言語蹇澁不得卧

心藏中風

附論

麻黃散

扶神散

加味牛黃散

遠志湯

犀角丸

珠砂丸

石斛酒

脾臟中風

附論

獨活散

白朮湯

細辛散

防風散

羚羊角丸

天麻丸

肺臟中風

附論

五味味湯

獨活散

麻黃散

腎臟中風

附論

獨活散

革薛散

天麻散

天麻丸 吳萊萸丸 狗脊丸
黃菁丸 萬靈丸

順風勻氣散 獨活酒 側子散

李守散 治口眼喎斜奇方

正舌散 轉舌膏 活命金丹

腦壽祛風丸 四白丹 大神效活絡丹

追魂湯 黃老酒 虎骨散

透骨膏 蒼莖仁湯 如神效苦散

十味劉散 龜甲湯 活命金丹

附子湯 神照散 桂附續命湯

通關散 治中風失音并一切風疾

治感風不能語 三聖散 甘竹瀝湯

白礬散 治中風牙關緊急方

白神散 金箔丸 消風丸

不換金丹 搜風順氣丸 一字散

蒜塗法 草麻膏 松葉酒

蜘蛛摩方 白魚膏 皂角膏

禦風膏 三蛇散 清涼丹

治中風口喎 換骨丹 天麻浸酒方

金虎丸 舒經保安散 輕脚丸

追魂散 換骨酒 至聖一醉膏

經進骨碎補丸 乳香寬筋丸 保命龍虎丸

酒浸藥仙方 夜合枝醞酒 鐵骨丹

八風九州湯 金鳳丹 雄豆散

仙靈脾散 海桐皮浸酒方 桑枝煎方

治風軟脚 又治風軟脚 白花蛇丸

五參散 赤箭丸 附子湯

羚羊角丸 犀角搜風丸 乳香尋痛丸

七寶丸 紅龍散 十二味正氣散

二香三建湯 楊氏神效散 蘇青丸

定神魂功丸 牛黃定志丸 開關散

牛黃丸 蘇黃湯 天麻湯

續命湯 治中風痙口噤面青手足急強

大豆紫湯 歸荆湯 犀角散

龍腦丸 枸杞浸酒 蒼莖仁散

急風散 牛黃散 蟬蛻丸

雄黃散 追風散 透關丸

雄黃散 分涎散 茵芋散

五加皮散 枳殼入參丸

治偏風手足不遂皮膚不仁 牛膝浸酒

羌活散 天麻丸 防風散

五加皮散 仙茅散 虎骨散

杜仲浸酒方 五加皮浸酒方 獨活散

治風走注疼痛不定隨痛處熨之 治風走注疼痛

赤芍藥散 搜風丸 羌活散

一品丸 治脾氣虛弱 清神散

治熱風 去風熱 治一切風熱

防風散 石膏吻 防風散

前胡散 天竺黃丸 黃連白朮湯

温中湯 雄黃散 金箔牛黃丸

菊花酒 羌活湯 羊肉湯

卷之三

菊花散	人參羌活散	半夏飲
上清白附子丸		
五膽丸	抱膽丸	奪命散
牛黃丸	治癩痢	鬱金丹
治諸癩風	瓜蒂散	治邪癩狂
守官膏	治癩疾	來甦膏
治癩疾	大定心湯	小定心湯
秦光竹瀝湯	防已湯	金箔十珍丸
茯神丸	茯神散	石菖蒲丸
虎骨散	沒藥散	海桐皮散
攝風酒	治白虎歷節風	烏蛇浸酒方
四神散	硫磺方	又一方
又一方	治白癩風	治白癩風
治白癩風	鯪魚塗方	鶴膝風
薰耳散	治風何首烏丸	蔡風
骨玉酒	治風疾	搜風大九寶飲
二香散	黃耆羌活飲	人參湯
扶神湯	附子散	六神散
伏龍肝湯	羚羊角散	四生散
羌活飲子	麻仁丸	搜風散
導秘丸	枳殼飲	通秘散
漢防已散	倉公酒	白花蛇煎
乳香犀角丸	天麻散	續肝丸
牡蠣白朮散	養髮飲	附子湯
牛黃天南星丸	苦參丸	效蒿散

卷之四

治風熱毒	垂柳湯浴方	苦參散
療輿體痛痿	苦參丸	卷栢散
秦光丸	鬼箭湯	蒼耳散
清肌散	五參散	死黃酒
治諸破傷風腫及頭面者	急風一字散	
大白散	治破傷風將欲死者	
守官丸	又方治破傷風	治破傷風欲死者
白蠶蠶散	羌活防風湯	白朮防風湯
蜈蚣散		
寒門 附論		
不換金正氣散	人參養胃湯	理中丸
生料五積散	理中湯	薑附湯
薑桂散	附子理中湯	沉附湯
沉香桂附丸	熨法	又方
溫中降氣丸	附子散	
卷之五		
暑門 附論		
五物香薷湯	香薷縮脾飲	冷香飲子
香薷劉散	二氣丹	五苓散
批把葉散	消暑丸	桂苓甘露飲
解暑三白散	十味香薷飲	香朴飲子
六和湯	聖惠方	竹葉石膏湯
黃連香薷湯	辰砂益原散	冷香湯
御愛薑蘇丸	廣順散	龍鬚散
地仙散	治中暑不拘老少	

治中暑甚妙 香薷丸 水厥丸
水葫蘆丸 潑火散 通章散
異功敵暑丸 檀香丸 白梅湯
五聖湯 蠟梅丸 治中暑迷悶欲死
治時暫伏暑 春澤湯

卷之六 濕門 附論

除濕湯 羌附湯 滲濕湯
清燥湯 木瓜虎骨丸 羌活勝濕湯
四物附子湯 防己黃耆湯 大橘皮湯
天麻散 導水丸 除濕丹
溼濕湯 瓜蒂搐鼻法 白木酒
金沙流濕丸 尋痛丸 補骨脂丸

生附湯

七聖散

蒼朮散

乳香沒藥丸 上馬丸 治脚轉筋
治風寒濕痺麻木不仁煎法 言木除眩湯
輕脚丸 秘傳循經丸

卷之七

燥門 附論

當歸潤燥湯 導滯通幽湯 升麻瀉濕湯
麻黃白朮散 潤腸丸 活血潤燥丸
神效丸 脾約丸 麻仁丸
潤體丸 導氣除燥湯

卷之八

火門 附論

涼膈散 黃連解毒湯 瀉心湯

八正散 三黃丸 芍藥散皮丸
大金花丸 清涼飲子 黃連清心湯
犀角散 黃連木通丸

傷寒門 附論

桂枝湯 麻黃湯 麻黃桂枝各半湯
柴胡桂枝湯 升麻葛根湯 柴胡升麻湯
葛根解肌湯 葛根葱白湯 小柴胡湯
大柴胡湯 柴胡飲子 黃連解毒湯
小青龍湯 大青龍湯 小承氣湯
大承氣湯 三乙承氣湯 調胃承氣湯
桃仁承氣湯 升草瀉心湯 大黃黃連瀉心湯
半夏瀉心湯 附子瀉心湯 生薑瀉心湯

白虎湯

白虎加入參湯 一名化斑湯

四逆湯

五苓散 猪苓湯 四逆湯
四逆散 通脈四逆湯 當歸四逆湯
真武湯 羌活附子散 咳逆灸法
陽毒升麻湯 梔子豉湯 梔子仁湯
枳實梔子湯 梔子烏梅湯 竹葉石膏湯
人參石膏湯 旋覆代赭湯 茵陳湯
玄參升麻湯 抵當湯 抵當丸
犀角地黄湯 小建中湯 大陷胃湯
小陷胃湯 陷胃丸 五味子湯
溫膽湯 加味溫膽湯 桂枝附子湯
茯苓四逆湯 人參敗毒散 參蘇飲
香蘇散 消風百解散 十味和解毒

十味芍藥散	金沸草散	十神湯
藿香正氣散	不換金正氣散	蜜道煎法
猪膽汁	黃芩湯	桃花湯
桔梗湯	赤石禹餘糧湯	
大半夏湯		
卷之十		
奪命獨參湯	附子回陽散	迴生神膏
葱餅發法	霹靂散	大羌活湯
神效沃雪湯	桔梗枳殼湯	
治傷寒陽證結胃死無可藥者		茵陳蒿大黃湯
茅根湯	茵陳五苓散	百合知母湯
百合散	治傷寒百合病腹中滿痛	
雄黃丸	訶梨勒丸	黃連丸
訶梨勒飲	燥湯丸	
治傷寒發汗吐下後體虛元臟積今氣刺腰痛		
杜仲酒	二溼湯	人參湯
牡蠣散	羚羊角丸	姜製湯
柴胡石膏湯	扶神散	龍齒丸
柴胡湯	鼈甲散	
治傷寒後虛羸日夜汗出不止心躁口乾咽喉不利		
大病瘥後多虛汗		紫苑散
補肺散	韭根散	
治傷寒婦人得病雖瘥未滿百日不可與交合		
二灰散	六均子湯	養脾湯
補脾湯	建脾散	助胃丸
神仙百解散	加減五苓散	

卷之十一		
普濟消毒飲子	治熱病五六日壯熱狂語欲走	
羚羊角散	鐵粉丸	含化犀角丸
生地黄煎	刺薊飲子	
治熱病衄血日夜無變身面如金黃色		龍膽煎
治熱病衄血若血下數升者		白蘇皮散
青箱子丸	解毒犀角丸	承氣丸
藍葉散	茵陳散	
木通散	石菖散	
卷之十二		
瘧門 附論		
消脾湯	定齋草菓飲子	草菓飲
四獸飲	人參養胃湯	柴胡桂薑湯
七寶飲	小柴胡湯	白虎加桂湯
鼈甲飲子	老瘧飲	四將軍飲
勝金丸	碧霞丹	灸法
桂枝黃芩湯	露薑飲	芍歸鼈甲散
交加効子	虎頭骨丸	尅効餅子
常山酒	五行神驗丸	辟邪丹
神聖藥師餅	斷癆如聖丹	白扁豆丸
瞻仰丸	治瘧疾如神方	治瘧方
龍華散	療十二瘧	截瘧散
知母散	大蒜平胃散	一剪金
鼈甲丸	足厥陰肝瘧 附論	
手少陰心瘧 附論	知母湯	木香犀角丸

甘草湯	附論	神聖丸	紅九子
足太陰脾瘕	附論	常山酒	菓附湯
橘皮甘草湯	人參飲	神聖丸	白朮丸
良薑丸	獨蒜丸	大青飲	香椿散
手太陰肺瘕	附論	附子湯	保安湯
人參丸	杏仁丸	附子湯	山瘴瘴酒
足少陰腎瘕	附論	附子湯	破塊丸
烏梅丸	從蓉丸	附子湯	茵陳蒿湯
足少陽膽瘕	附論	附子湯	常山飲
升麻湯	犀角湯	附子湯	常山飲
足太陽膀胱瘕	附論	附子湯	治瘧或間日發或夜發者
柴胡湯	附論	附子湯	半夏散
足陽明胃瘕	附論	附子湯	七葉湯
順氣湯	積殼湯	附子湯	治久瘧
神効方	分利順元散	附子湯	祛瘧神應丸
知母龍甲湯	藥餌飽	附子湯	龍虎丹
却毒散	預固丸	附子湯	龍虎丹
鯨鯉甲酒	山瘴瘴酒	附子湯	龍虎丹
觀音丸	破塊丸	附子湯	龍虎丹
沃雪湯	茵陳蒿湯	附子湯	龍虎丹
常山飲	鬼哭散	附子湯	龍虎丹
治瘧或間日發或夜發者	常山酒	附子湯	龍虎丹
半夏散	常山酒	附子湯	龍虎丹
七葉湯	龍虎丹	附子湯	龍虎丹
治久瘧	龍虎丹	附子湯	龍虎丹
祛瘧神應丸	龍虎丹	附子湯	龍虎丹

露星飲	神効手把丸	治鬼瘧神効丸
萬安丸	推黃丸	消癖丸
柴胡括蕞根湯	麥門冬湯	從蓉湯
卷之十三	痢門 附論	
胃風湯	地榆散	神効參香散
木香散	真人養臟湯	痢聖散子
訶劑勒散	黑九子	駐車丸
五苓散	黃連香薷散	香連丸
水菴木香丸	黃連阿膠丸	戊巳丸
豈惹固腸丸	番根丸	芍藥藥皮丸
阿膠梅連丸	地榆散	蒼木芍藥湯
黃連湯	當歸活血湯	木香烏梅丸
升陽除濕防風湯	木香豈惹丸	白朮安胃散
宿露湯	白朮調中丸	纏金丹
肉苳蔻丸	汶石子丸	加味六均子湯
震靈丹	育腸丸	地榆湯
斷痢散	石榴皮散	六神散
治泄痢方	神効鷄清丸	灸鷄散
不二散	治痢仙方	御米丸
地榆丸	秘方養臟湯	治痢如聖散
治痢方	痢藥乳香散	黑虎丹
獨神丸	金粟湯	治痢方
遇仙立効散	治痢絕妙丸	犀角丸
聖棗子	治痢千百種雜下	楊梅方
百中散		

真方聖散子	治痢	瓜蒌散
止痢法	頂禮散	百歲丸
育腸湯	玉粉散	木香散
葛根湯	神効散	木香散
地榆湯	龍骨散	神驗丸
木香縮砂散	牛乳方	巴石丸
藍青丸	附子五味散	神妙橡實散
蠟皮丸	黃根散	
治腸蟲先下赤後下黃白沫		
阿膠丸	木香散	歸連丸
附子散	內補丸	加減當歸地榆散
和中散	楊子建萬全護命方	
治毒痢	治疫毒痢	治下赤痢
建脾丸	十寶湯	外灸膏
五神散	倉米湯	豬肝丸
豬脬酒	黃耆散	犀角散
黃連丸 一名養羊角丸		生地黃湯
欝金散	如聖湯	艾葉丸
治赤白痢	秘傳斗門散	金鳳散
安和飲子	變通丸	雞白散
治下痢赤白	神効散	御愛丸
鯽魚方	玉抱肚	軟紅丸
千金散	治赤白痢下	豈慈丸
萬補丸	伏龍肝丸 一名艾葉丸	
六神湯	黃蘗丸	治赤白下痢久不止
補黃散	龍骨丸	黃根散

六妙湯	治男子病膿血惡痢	聚珍丸
椿皮丸	栢連散	荳蔻八味散
治腸風血痢	赤石脂湯	借氣散 一名神聖
解毒金華散	當歸四聖散	麴蘗丸
魚鮮湯	欽陽丸	金星鱗散
御米湯	雲母散	香粟散
明蛇膽方	蕪荑丸	麥蘗丸
五奇湯	烏梅湯	治休息痢羸瘦
治休息痢羸瘦	縛兜丸	陳米湯
又方 一名羊肝散 瓜蒌根湯		茯苓湯
治痢後渴	澤漆湯	治禁口痢 一名石
消痞丸	豬肝丸	通神丸
倉廩湯	參苓白朮散	
芍藥黃芩湯	三奇散	治裏急後重
大黃湯	白木黃耆湯	烏梅湯
治丈夫婦人小兒久痢成疳		療五疳蒸下痢
治疳 蠶蟲蝕下唇裏生瘡		
導氣湯	白木聖散子	立効丸
木香黃連湯	玄青丸	
泄瀉門 附論		
理中湯	調中湯	肉荳蔻散
平胃散	六和湯	加味五苓散
厚朴丸	補脾丸	大藿香散
神丸	豆附丸	肉荳蔻散
鎖正元丹	豆附丸	燒胃丸

訶梨勒丸	九宝飲子	實腸散
升陽除濕湯	益胃湯	白朮芍藥湯
升陽湯	止瀉秘方	欽腸丸
訶子四柱散	葦撥丸	縮砂丸
羊肉扶羸丸	麴木丸	百粒丸
治脾泄多年老人腎虛		麴蘄丸
棗肉丸	香茸丸	神授丸
治臟腑泄瀉	治瀉久不効者	胃苓散
棗附丸	治夏月脾胃傷冷滑腸泄瀉肚痛	
實腸丸	養臟丸	黃連烏梅丸
煨肝散	療二十種雜下	換腸丸
豬臟丸	癸卯歲冬十月小雪薄冰天令應時	
訶子皮散	治久患脾泄瀉臟腑虛滯不進飲食	
龍骨散	代赭丸	如聖丸
梅棗湯	紅豆丸	高良薑湯
乾薑丸	木香散	堅中丸
肉苳菟散	當歸散	灸肝散
白苳菟湯	葦撥丸	龍骨黃連湯
橘皮散	木香訶梨勒丸	茱萸斷下丸
苳菟附子散	固腸散	加味三建湯
苳菟壯脾丸		
卷之十五		
氣門 附論		
三香正氣散	沉香降氣湯	紫沉通氣湯
異香散	順氣木香散	和氣散
化氣湯	蟠葱散	木香流氣飲

拉煎散	熟舌香散	分心氣飲
七氣湯	蘇合香丸	撞氣阿魏丸
沉香降氣湯	聚香飲子	益智仁湯
回陽湯	複原通氣散	手拈散
流氣飲子	分氣紫蘇飲	勻氣散
指迷七氣湯	四七湯	沉香化氣丸
桔梗枳殼湯	導氣枳殼丸	蘇子降氣湯
神保丸	三和散	白苳菟散
集香丸	三和丸	寬中丸
沉香升降散	木香檳榔丸	萬和散
引氣丸	一塊氣丸	升降氣六一湯
二聖散	勝金散	醪醑丸
溫中分氣丸	疎氣丸	半夏湯
壓氣散	無比沉香丸	
膈噎門 附論		
五噎散	五膈散	瓜萸實丸
嘉禾散	人參丁香散	四七湯
寬中散	寬膈丸	沉香開膈散
沉香散	奪命回生散	三膈散
膈氣散	五膈丸一名琥珀丸	沉香丸
羚羊角丸	草苳菟丸	萊菔木香散
狀元丸	通中散	桃花散
治膈氣噎食久成翻胃		瑞香散
萬靈木香丸	乾嚙妙功丸	導氣散
分氣丸	無比丸	旋覆花散

半夏五香丸	芫花丸	厚朴湯
華澄茄散	神麴丸	枳殼丸
枳實散	華撥飲	草薹慈丸
昆布丸	治五噎立効方	竹皮散
治男子婦人氣噎病		
治胃中氣噎食不下喉中有肉塊方		
治胃膈氣滯食噎不下		
東坡先生家藏五行記云	生薑汁煎	
荳蔻散	人參利膈丸	秦川剪紅丸
寬中丸	入藥靈砂	丁附散
掌中金	正胃散	
敵痰丸		

嘉禾散	脾胃門 附論	四君子湯	六君子湯
平胃散		二陳湯	參苓白朮散
千金大養脾丸		養胃湯	丁附遊膈湯
透膈湯		凝神散	枳朮丸
木香和中丸		治中湯	進令散
思食調中丸		八味湯	補脾湯
養脾丸		白朮湯	天下受拜平胃散
和中益氣丸		殺神丸	快活丸
延年草	一方治心腹膨脹手足厥冷		
辟寒湯	丁附丸	棗附丸	
神麴丸	至靈散	白苳慈丸	
脾不磨方	以湯調方	四炒健脾散	

消穀丸	丁香附子散	粟附丸
和胃丸	大健脾丸	吳茱萸丸
溫脾散	大藿香散	白朮沉香散
桂麴丸	荳蔻橘紅散	木香啓中湯
丁香和胃丸	是齋安中湯	七珍散
建脾湯	理中丸	益中丸
秦續錦家二十四味養脾丸		六君子湯
胃愛散	桂附丸	沉香養脾丸
運脾散	安胃丸	大黃瀉熱湯
鴻黃散	參附大正氣散	參苓壯脾丸
啓脾丸	升陽益胃湯	黃蓍人參湯
升陽除濕湯	益胃湯	草薹慈丸
和中丸	木香消穀丸	加減思食丸

法製薑附丸	水沃雪丹	溫中良薑丸
和胃丸	大溫脾丸	張氏建中湯
鷄舌香散	治脾疼	脾疼單方
炙鷄散	治脾胃氣冷噎食嘔逆下痢赤白	
治脾胃氣弱下痢日夜不止腸滑不食		
枳脂丸	六君子湯	猪臟丸
麥酒	麥門冬湯	大腹木香湯
當歸黃連丸	升麻湯	薑棗丸
卷之十八		
脾胃門 附論		
安脾散	附子黃蓍草菓飲	
丁香薑散	薤白粥	桂苓散
薑合丸	養胃湯	大倉丸

小半夏丸	十膈氣散	膈氣散
五噎散	五膈散	五膈寬中散
玉浮丸	丁香餅子	化鐵丸
千轉丹	瞿粟粥法	甘露湯
大効散	加味青金丹	健脾丁香散
鯽魚散	螺泥丸	
治翻胃朝食暮吐暮食朝吐旋即吐者		
又方治翻胃	治翻胃始因膈噎所成	
治翻胃噎塞煩悶諸藥不効者	治翻胃吐黑汁	
又方治翻胃	治翻胃吐食除心胃痰水	
治翻胃		
卷之十九	嘔吐噦門附論	
丁香煑散	大藿香散	丁香半夏丸
霍香半夏散	丁香治中湯	理中湯
旋覆花湯	香薷飲	玉浮丸
安脾散	藿香安胃散	養胃湯
小半夏湯	三乙承氣湯	沉香煎丸
木香白朮散	丁香丸	大養胃湯
大枳殼丸	麴木丸	十珍餅子
助胃膏	一物湯	炮附子丸
加味二陳湯	麥門冬湯	竹茹湯
加味七氣湯	小丁沉丸	草薺蔻湯
生薑丸	開胃丸	參粟湯
三聖散	石蓮丸	温中白朮丸
忍食丸	參香枳朮丸	

卷之二十	霍亂門附論	
霍香正氣散	通脈四逆湯	薑附湯
七氣湯	不檢合正氣散	木瓜湯
桂苓甘露飲	批把蕪散	二香散
加味五苓散	加減理中湯	冷香湯
止渴湯	回生散	乾濟湯
麥門冬湯	白朮散	人參散
丁香散	乾薑湯	四均子湯
建中加木瓜柴胡湯		霍亂證
四均子加白芍藥高良薑湯		香薷丸
建中加附子當歸湯		丁香散
正胃湯	良薑飲	吳茱萸湯
治霍亂吐瀉臨時無藥		水壺散
艾熨方	訶梨勒散	桔梗散
正氣丹	丁香散	木瓜丸
烏梅散	黃連丸	止血湯
赤石脂湯	人參散	吳茱萸湯
附子散	四順附子湯	回陽散
胡椒湯	活命散	抵聖散
批葉飲	鹽熨法	木香散
白芷薤丸	真珠散	吳茱萸餅
乾霍亂附論		
厚朴湯	活命散附論	冬葵子湯
中惡霍亂	桃核湯	丹硃丸
十香丸		

白芷龜丸	人參散	竹瀝飲
水香湯	竹葉湯	薑香散
麥門冬湯	白朮散	雞白湯
補皮湯	治霍亂轉筋方	附子湯
鹽塌方	裏足法	治轉筋不止
治沙于絞腸危急之甚		絞腸沙方
糯米薑水	灸法	洗法
瀆法		
卷之二十一		
諸虛門 附論		
十全大補湯	黃耆建中湯	三建湯
十四味建中湯	人參養榮湯	鹿茸大補湯
九子丸	固陽丹	固真丸
還少丸	八仙丸	十精丸
八味丸	安腎丸	無比山藥丸
小兒絲丸	還少丹	黃耆十補湯
黃耆六一湯	黃耆益損湯	大建中湯
鹿茸四斤丸	葫蘆巴丸	雙芝丸
玉關丸	沉香續斷丸	萱慈薑香湯
水芝丸	牛髓丸	參香散
接氣卅	枸杞煎丸	天真丸
交感丹	降氣湯	肉桂茶丸
雙和湯	抱殘丸	沉香永壽丸
十精丸	天桂丸	秋蓮丸
八仙丹	玉霜丸	補精膏
法製鐵米	藥角霜丸	參附湯

苑非酒	沉香既濟丸	加味青鐵丸
益中丹	鹿血酒	益精氣強志意
益氣調中耐飢強志		補骨脂煎丸
金鎖丹	洞陽丹	金櫻丸
秋石丸	茸附煎丸	藥角龍茸丸
老奴丸	延生護賢丹	膈膈丸
椒紅丸	補骨脂丸	地仙丸
茯苓丸	代灸膏	肉蓯蓉丸
雀附丸	金髓丸	治虛冷短氣
復老還童丸	真人換白丸	加減仙茅丸
何首烏丸	神仙一井金丹	椒紅丸
更生丸	補腎茯苓丸	補腎茯苓丸
壽命茯苓丸	補真丹	補真丸
神助丹	神仙巨勝子丸	金鎖丸
延壽丹	靈芝丸	秋石方
陽鍊法	陰鍊法	保命延齡丸
陳赫常先生兔絲子丸		枸杞子丸
治五臟虛損羸瘦益氣力壯筋骨		薯蕷丸
骨補丸	容顏不老方	枸杞煎
駐春丹	蒼木丸	令人好顏色
令人肥白美顏色		悅顏色令人肥澤
益顏色	令人好顏色	應驗打老丸
既濟丹	藥角丸	金髓煎
三仙丸 一名長壽丸		何仙姑慶世丹
琴腰膏	坎離丸	神仙不老丸
續髓全陽膏	三才丸	封髓丹

大沉香丸	萬應延齡丹	膈膈丸	鹿血丸	大金液丹	茯苓酥	服地黃延年不老	作熟乾地黃法	服黃精成地仙方	服天門冬方	服枸杞養神延年不老地仙方	杏仁酥	夏姬服杏仁法	服兔絲子方	服人參方	服柏實方	服柏實法	服鹿角法	吳真君服椒方	服槐子法	服術子法	鍊雲母粉服餌	鍊天門冬法	服天門冬方	黃精膏	二精丸	服地黃治病長生方	真人餌養冬法	鍊茯苓方	既濟丹	玉女砂	韓魏王自養丸	正氣補虛湯	巨勝丸														
辟穀方	天門冬酒	菊花酒	地黃煎	梅橙湯	檀香湯	檉欖湯	近侍湯	寇相入朝湯	卷之二十二	樂令建中湯	黃耆龍甲散	秦允龍甲散	天門冬酒	葛蒲酒	九仙薯蕷煎	醍醐湯	金粟湯	桂花湯 <small>一名桂</small>	洞庭湯	香橙湯	醍醐膏	附論	樂令建中湯	黃耆龍甲散	秦允龍甲散	辟穀方	地黃酒	枸杞酒	薯蕷酒	葡萄酒	韻梅湯	暗香湯	荔枝湯	鳳池湯 <small>一名忘</small>	經進過院湯	醍醐膏	辟穀方	地黃酒	黃精酒	薯蕷酒	葡萄酒	韻梅湯	暗香湯	荔枝湯	鳳池湯 <small>一名忘</small>	經進過院湯	醍醐膏

秦允扶羸湯	龍甲地黃湯	黃耆飲子	參耆散	切勞散	凝神飲子	阿膠丸	青蒿散	清骨散	圓參飲子	地仙散	白木黃耆散	當歸地黃湯	地骨皮散	神効取麤青桑散	雄黃丸	再生丹	芎歸血飲散	龍甲生羸散	五枝散	代勞鬼哭飲子	金龍丸	藍汁方	潤神散	薤白散	患勞人喘香法	神傳膏	太上延年方勝追魂散	神投散	夏貴公薰勞法	治勞瘵	治勞瘵	治傳尸勞疾	治五蒸方	一曰骨蒸	二曰脉蒸	三曰皮蒸	四曰肉蒸	五曰內蒸	加減青蒿丸	加減黃耆建中湯	麥門冬湯	團魚丸	黃耆益損湯	起胡梅連散	陽病開關散	陰病開關散	起胃散	玉龍膏	天門冬散	龍柳散	甜葶散	龍甲丸	檳榔散	紫苑散 <small>一名紫</small>	生羸散	益母草煎丸	又方	天門冬丸	雄黃丸	又方	五香丸	鸚鵡丸	還魂湯	密陀僧散	獺肝丸	高鷄丸	奔角紫河車丸	天靈蓋丸	壯陽粉	天門冬大煎	填骨丸	鍾乳白澤丸	石斛萬病散	聚寶丹	金櫻丹	入參五味子散	玉龍散金丹	又方
-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-------	-------	------	---------	-----	-----	-------	-------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	--------	-----	-----------	-----	--------	-----	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------	---------	------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------------------------	-----	-------	----	------	-----	----	-----	-----	-----	------	-----	-----	--------	------	-----	-------	-----	-------	-------	-----	-----	--------	-------	----

補勞花神散	治五勞七傷	延齡膏	治男子婦人風勞熱毒攻注四肢
敗龜湯	天門冬丸	華澄茄散	治一切虛勞室女未有房室之勞却有思想之志因而
木香湯	地黃煎丸	犀角丸	感得勞氣
治一切虛勞室女未有房室之勞却有思想之志因而	華澄茄散	燒肝散	愚魯湯
神效太乙丹	治一切男女虛勞冷證	前胡飲	治一切男女虛勞冷證
治一切男女虛勞冷證	第一方	第二方	治一切男女虛勞冷證
地骨皮散	冷湯飲	第三方	治一切男女虛勞冷證
人參黃耆散	小品湯	胡黃連丸	治一切男女虛勞冷證
猪骨煎	五蒸湯	清肌十全飲	治一切男女虛勞冷證
太上混元丹	牛膝丸	離珠丹	治一切男女虛勞冷證
蛤蚧散	鹿髓煎	焚香透膈散	治一切男女虛勞冷證
治勞嗽虛證	天竺黃散	地黃金粉散	治一切男女虛勞冷證
大薊飲	沉香散	紫菀湯	治一切男女虛勞冷證
鹿角膠散	枸杞湯	項骨萬金煎	治一切男女虛勞冷證
人參補虛湯	清神甘露丸	半夏飲	治一切男女虛勞冷證
附子湯	紫金丸	宜蕪湯	治一切男女虛勞冷證
治一切男子虛勞	遠志丸	千里水湯	治一切男女虛勞冷證
川椒丸	棟實丸	綠雲丸	治一切男女虛勞冷證
酸棗仁散	芫花丸	三神煎	治一切男女虛勞冷證
鮮勞散	磁石丸	補腎湯	治一切男女虛勞冷證
陳橘皮丸			治一切男女虛勞冷證

白羊肉湯	麻黃根散	壯羈散	治一切虛勞
輕骨湯	治男子婦人勞極虛損	五味子丸	治一切虛勞
大補摩腰膏	干膝散	酸棗仁散	治一切虛勞
治虛勞腰脚無力	骨填煎	治虛勞	治一切虛勞
枯萸根丸	續命丸	椒紅丸	治一切虛勞
紫芝丸	工不留行散	八靈散	治一切虛勞
堅固丸	五柔丸	車撥散	治一切虛勞
茅根散	附子丸	羌活散	治一切虛勞
赤石脂丸	蔓荊子散	石斛散	治一切虛勞
防風散	附子丸		治一切虛勞
川椒丸			治一切虛勞
卷之二十三	咳逆門 附論		治一切虛勞
橘皮竹茹湯	栝蒂湯	半夏生薑湯	治一切虛勞
桂苓白朮丸	小茈胡湯	灸咳逆法	治一切虛勞
丁香柿蒂散	治久患咳噫	治寒氣攻胃咳噫	治一切虛勞
橘皮乾薑湯	羌活附子散	丁香散	治一切虛勞
丁香柿蒂散	治丈夫女子傷中絕脉筋急痛咳逆	治咳逆	治一切虛勞
治寒氣攻胃咳噫	華澄茄散	治諸吃噫	治一切虛勞
香飲子	又方 煎法	硫黃煎法	治一切虛勞
治寒氣攻胃咳噫	又方 煎法		治一切虛勞
卷之二十四	頭痛頭風大頭風門 附論		治一切虛勞
芎朮湯	小芎朮湯	川芎散	治一切虛勞
菊花散	通關散	三上丸	治一切虛勞

天香散	藿香散	芎辛導痰湯
如聖餅子	加減三五七散	川芎茶調散
普濟消毒飲	大川芎丸	大追風散
急風散	清空膏	神應散
墨烏散	通頂烟	點頭散
石膏鼠粘子散	又方	又方
芎犀丸	青火金鐵	赤火金鐵
神聖餅子	白附散	葱附丸
升蒼荷葉散	上清散	麝香茶芽散
大芎辛湯	川芎羌活散	烏嬰散
治頭痛不止	葫蘆已丸	韭根丸
止痛太陽丹	治氣攻頭疼不可忍	芎辛丸
治頭疼不可忍	治頭疼	
龍珠丹	黑錫丹	順氣和中湯
清上瀉火湯	既濟解毒湯	治偏頭疼不可飲
治偏頭疼方	神効方	仙靈脾浸酒方
一字散	飛虎散	千金散
盪落湯	抽刀一字散	蘆薈散
沐頭方	惡貫入篋中方	都梁丸 <small>各止</small>
大蒜搗鼻法	枕頭方	仙方如聖餅子
一字輕金散	清神散	一滴金丸
治頭風百藥不效者		芎藭丸
羌活散	治雷頭風發	通關散
太一麝香湯 <small>一名烏香散</small>		必捷散
湖南押衙顏思退傳頭風掣疼		全蝎散
治胃心并眉梁骨疼者		

卷之二十五	眩暈門 附論	
半夏白朮天麻湯	羚羊角散	仙朮芎散
芎朮湯	川芎散	三五七散
小芎辛湯	川芎散	人參前胡湯
川芎散	加味二陳湯	芎朮除眩湯
香橘飲	川芎石膏湯	蔓荊子散
漢防已散	芎藭散	菊花丸
療風邪氣未除發則心腹滿急頭旋眼運欲倒	芎藭散	芎藭散
羚羊湯	人參丸	芎藭散
白朮飲	防風飲子	祛痰丸
松花浸酒方	增損黑錫丹	羌活湯
沉香磁石丸	菊花散	人參湯
守中丸	瓜蒂神妙散	小三五七散
芎歸湯	治風頭眩心肺浮熱手足無力	
天南星丸	麝香天麻丸	大芎辛湯
麟金散	神芎散	愈風餅子
玉液湯	芎藭散	天麻羌活丸
卷之二十六	心痛門 附論	
加味七氣湯	加味四七湯	七氣湯
妙香散	卻痛散	鷄舌香散
玄胡索散	勝金散	拈痛丸
薑桂飲	生薑枳殼湯	九痛丸
愈痛散	蜜附湯	加味麻黃湯
二薑丸	沒藥散	大沉香丸

蘇合香丸	沉香降氣湯	燒脾散
紫沉煎丸	靈脂酒	蕪荑散
金鈴子散	木附湯	蠶沙散
立應散	神保丸	鐵刷湯
辰砂一粒金丹	神効散	神聖代針散
治心寒	治心脾疼	
治男子婦人急心氣疼	海上方	
治暴心痛	神捷丸	雷九鶴風散
暖胃散	香附散	獨毒丸
必効方	又方治同前	玄胡散
治心氣冷痛	調中湯	
卷之二十七	腰痛門 附論	
獨活寄生湯	獨活湯	五積散
木香流氣飲	木附湯	人參順氣散
烏藥順氣散	生附湯	通氣防風湯
當歸拈痛湯	舒經湯	青絨丸
立安丸	牛膝酒	杜仲酒
蒼朮湯	麻黃蒼朮湯	二至丸
橘香丸	腰重痛方	
治腰痛牽引足膝脚腫	治腰痛方	
速効散	治腰疼	
散滯丸	神翅酒	又方治同前
葶藶酒	復春丸	附子散
張走馬家飛步丸	沉香丸	沉香丸
牛膝丸	獨活散	虎骨散

補骨脂丸	百倍丸	養賢散
腎著湯	神應丸	如神湯 <small>一冬終筋湯</small>
牽牛丸	立安散	補骨脂丸
菴蘭丸	治腰痛如神方	
卷之二十八	脇痛門 附論	
芎藭湯	分氣紫蘇飲	枳殼黃散
推氣散	枳芎散	枳殼散
香橘湯	枳實散	異香散
流氣飲子	加味小訖胡湯	氣鉞丸
治脇痛如打	木通散	芍藥散
白朮丸	芎歸芍藥湯	
卷之二十九	秘結門 附論	
大黃飲子	潤腸丸	脾積丸
二香丸	疎風散	三和散
脾約麻仁丸	滋腸五仁丸	潤腸湯
檳榔丸	掩臍法	牛黃散
潤燥湯	穿結藥	三仁丸
小提益散	敷藥	枳殼丸
皂角丸	六磨湯	
卷之三十	咳嗽門 附論	
華蓋散	加減麻黃湯	溫肺湯
三拗湯	金沸草散	杏子湯
橘蘇散	白朮湯	團參飲子

參蘇飲	人參紫苑湯	五拗湯
玉液丸	玉芝丸	人參潤肺丸
人參養肺丸	溫中化痰丸	鐘乳補肺湯
人參清肺湯	八味欬花散	人參丸
大降氣湯	平肺湯	人參荆芥散
桔梗湯	紫苑茸湯	杏仁煎
祛痰丸	紫蘇半夏湯	人參平肺散
寧肺湯	補肺湯	人參飲
人參潤肺散	知母茯苓湯	人參欬花散
貝母散	人參散	人參養肺湯
星香丸	加減海白散	人參寧肺湯
清金湯	紫蘇飲子	人參潤肺湯
葶藶散	欬花散	杏仁煎
治嗽得効方	治嗽方	含化止咳丸
治嗽補虛方	訶黎勒散	平肺湯
法製溫半夏	雌黃丸	治咳嗽
青州白丸子	人參欬花膏	鳳髓湯
滴油散	紫金散	黑金散
青金丹	治久咳嗽上氣	治上氣咳嗽
治久咳嗽上氣心胃煩熱嘔膿血	蘇子煎	
救急療上氣咳肺氣胃痛病源	百合湯	
葶藶散	天門冬丸	通聲煎
羊肺湯	葶藶散	
治一切肺疾咳嗽膿血不止	桑白皮煎	
蛤蚧湯	枯薑湯	阿膠散
杏仁膏	黃芪散	

治一切肺病咳嗽膿血及吐血不止方	前胡散	寧氣湯
天門冬丸	又方調肺止咳順氣消痰	安眠散
秘方煙筒兒	欬花散	三荷散
卷之三十一	痰飲門 附論	
橘皮湯	前胡半夏湯	蘇子降氣湯
人參飲	俞山入降氣湯	豁痰丸
辰砂化痰丸	桔梗湯	二陳湯
四七湯	參蘇飲	導痰湯
大人參半夏丸	海龍五飲湯	丁香五套丸
半夏利膈丸	茯苓半夏湯	訶胡半夏湯
半夏白朮天麻湯		黑錫丹
破痰消飲丸	控涎丹	化痰鐵刷丸
沉香墜痰丸	快活丸	茯苓丸 <small>一名指迷</small>
神仙墜痰丸	搜飲丸	二賢湯
半星丸	烏巴丸	醉鄉寶膏
治懸飲心腹氣滯兩脇多痰	溫胃散	破飲丸
九寶丸	御愛紫宸湯	批杷葉散
檳榔散	銀粉丸	驅痰飲子
八珍丸	旋覆花散	錫梨煎丸
麝香丹砂丸	法製紅半夏	化涎散
金珠化痰丸	奇効湯	萬良薑散
丁香茯苓湯	水玉湯	二生湯
省風湯		
卷之三十二		

喘門 附論

人參定喘湯	團參散	蘇子降氣湯
分氣紫蘇飲	杏參散	四磨湯
紫蘇子湯	五味子湯	人參潤肺湯
杏仁半夏湯	葶藶散	華蓋散
葶藶散	兜肺湯	杏蘇飲
玉華散	人參理肺散	麻黃散
元寶湯	神秘湯	安神散
加味控涎丸	千縉湯	陳皮湯
消氣散	五味子湯	消脹飲
五味子散	神秘方	葶肺丸
定喘化涎方	平氣散	加減瀉白散
調降湯	八仙丸	沉香散
白雲換肺丸	治速年近日喘嗽方	
定喘丹	人參方	百花膏
七七散	內金丸	紫金丹
鯽魚丸		
卷之三十三		
消渴門 附論		
地黃飲子	麥門冬飲子	烏梅五味子湯
加味錢氏白朮散		人參石膏湯
六神湯	止渴湯	瓜蒌散
人參散	加減八味丸	茯神丸
加減腎氣丸	黃芪六一湯	降心湯
黃芪湯	天花散	止渴劉散
鹿茸丸	天王補心丹	雙補丸

玉泉丸	川黃連丸	天花粉丸
拘杞子丸	平補丸	茯苓丹
和血益氣湯	黃連膏	生地黃膏
三和甘露飲	三消丸	硃砂黃連丸
加減三黃丸	黃連猪肚丸	爛金丸
真珠丸	天花丸	梅花聚香丸
子童桑白皮湯	參芪湯	龍鳳丸
冬瓜飲	醍醐膏	薑絲湯
治消渴方	珍珠龍腦丸	天門冬丸
猪腎養老湯	蘇芩丸	止渴潤燥湯
腎瀝散	金銀箔丸	白茯苓丸
梅蘇丸	肥脛散	神仙滅水法
生津并露飲子	赤茯苓湯	肉桂蠶丸
鐵粉丸	紫蘇湯	瞿麥湯
葶藶丸	填骨煎	藍葉散
玄參散	忍冬丸	
卷之三十四		
遺精白濁門 附論		
加味清心飲	蓮子六一湯	龍齒補心湯
分清飲	益智湯	鹿茸益精丸
固精丸	瑞蓮丸	遠志丸
心腎丸	秘精丸	鎖精丸
固精丸	地黃丸	四精丸
小菟絲子丸	玉鎖固真丹	子午丸
桑螵蛸丸	僊方固真丹	鎖陽丹
辰砂妙香散	鎖精丸	芡實丸

水中金丹	八味丸	秘真丸	固真散	韭子丸	烏金散	葛玄真人百補交精丸	既濟丹	藥角既濟丸	石斛散	固氣丸	紫石英丸	桑螵蛸散	枸杞子散	金鎖玉關丸	蓮肉散	治虛憊便濁滴地成霜方	二參丸	韭子丸	坎離丹	韭子方	蓮實丸	卷之三十五
秘真丸	秘真丹	固真散	烏金散	王荆公妙香散	香茸丸	既濟固真丹	既濟固真丹	既濟固真丹	韭子丸	茯神散	栝子仁丸	雞腸散	安中湯	大茴香丸	通靈散	玉鎖丸	益智子湯	搏金散	水陸二便丹	秘真丸	龍骨湯	赤脚道人龍骨丸
八味丸	秘真丸	固真散	烏金散	王荆公妙香散	香茸丸	既濟固真丹	既濟固真丹	既濟固真丹	韭子丸	茯神散	栝子仁丸	雞腸散	安中湯	大茴香丸	通靈散	玉鎖丸	益智子湯	搏金散	水陸二便丹	秘真丸	龍骨湯	赤脚道人龍骨丸
八味丸	秘真丸	固真散	烏金散	王荆公妙香散	香茸丸	既濟固真丹	既濟固真丹	既濟固真丹	韭子丸	茯神散	栝子仁丸	雞腸散	安中湯	大茴香丸	通靈散	玉鎖丸	益智子湯	搏金散	水陸二便丹	秘真丸	龍骨湯	赤脚道人龍骨丸

海金沙散	小蘗飲子	葵子散	火府丹	木通湯	猪苓湯	二神散	栝蒂散	鬱金黃連丸	淡竹葉湯	肉蓯蓉丸	革薢丸	鷄腸散	循脬飲	引水散	沉香琥珀散	琥珀散	葵子散	膜眩膏	治耳淋痛	車前子散	通草散	參苓琥珀湯	瞿麥湯	槿柳散	生附散	肉蓯蓉丸	澤瀉散	沉香散
海金沙散	小蘗飲子	葵子散	火府丹	木通湯	猪苓湯	二神散	栝蒂散	鬱金黃連丸	淡竹葉湯	肉蓯蓉丸	革薢丸	鷄腸散	循脬飲	引水散	沉香琥珀散	琥珀散	葵子散	膜眩膏	治耳淋痛	車前子散	通草散	參苓琥珀湯	瞿麥湯	槿柳散	生附散	肉蓯蓉丸	澤瀉散	沉香散
海金沙散	小蘗飲子	葵子散	火府丹	木通湯	猪苓湯	二神散	栝蒂散	鬱金黃連丸	淡竹葉湯	肉蓯蓉丸	革薢丸	鷄腸散	循脬飲	引水散	沉香琥珀散	琥珀散	葵子散	膜眩膏	治耳淋痛	車前子散	通草散	參苓琥珀湯	瞿麥湯	槿柳散	生附散	肉蓯蓉丸	澤瀉散	沉香散
海金沙散	小蘗飲子	葵子散	火府丹	木通湯	猪苓湯	二神散	栝蒂散	鬱金黃連丸	淡竹葉湯	肉蓯蓉丸	革薢丸	鷄腸散	循脬飲	引水散	沉香琥珀散	琥珀散	葵子散	膜眩膏	治耳淋痛	車前子散	通草散	參苓琥珀湯	瞿麥湯	槿柳散	生附散	肉蓯蓉丸	澤瀉散	沉香散

當歸散	榆皮飲	八珍散
透泉散	通消散	治尿血方
四苓散	蒲葦丸	牡蠣散
如神散	龍耳散	治小便出血方
治小便頻數卒然下血不止並不痛		
犀角地黄湯	石葦散	
治小便不利莖中疼小腹急痛	治小便不快	
治小便不快	治忍小便胞轉方	
治男子婦人過忍小便胞轉	通關瞿麥湯	
治小便不通數日欲死者神効	獨蒜塗臍方	
牛膝湯	猪肚丸	鷄脰脰丸
川方五子丸	治小便數氣少走泄	
水芝丸	雙白丸	

五疔門 附論	加戒五苓散	葛根湯	當歸白朮湯
	白朮湯	赤芩飲子	山茵陳散
	加味四君子湯	一清飲	茵陳湯
	金黃丸	穀疸丸	滑石散
	黃連散	必効散	噶藥瓜蒂散
	桂枝加黃芩湯	抱子丸	茵陳散
	黃芪湯	荷葉苦酒湯	犀角散
	治陰黃汗染衣濕嘔黃		秦朮湯 一名秦丸散
瞿麥散			

卷之三十六	遺溺失禁門 附論	二氣丹	家韭子丸	茯苓丸
		鷄內金散	兔絲子丸	桑蠶蛸散
		益智仁湯	治小便遺失方	鹿角霜丸
		牡蠣丸	鷄腸散	
		治少小脬中遺尿不自覺方	療尿床方	
		固脾丸	治小便不禁方	澤瀉散
		治小便遺失方	阿膠飲	治小便失禁方
		白薇散	白茯苓散	鹿茸散
		菴葦散	兔絲子散	治小便多不禁
		治遺尿及小便多或不禁		

防風湯	附子八物湯	茯苓湯	烏頭湯
舒筋散	茯苓川芎湯	虎骨散	
續斷丸	獨痛丸	升麻湯	
五積散	薏苡仁湯	尋痛舒筋丸	
人參補氣湯	羌活散	循絡丸	
巴戟天湯	松節散	石斛萬病散	
黃芪酒	乳香宣經丸	透骨通氣驅馬丹	
烏頭粥	獨痛丸	木瓜虎骨丸	
烏頭湯	治腰脚不隨方	防風丸	
石楠散	人參散	補肝湯	
草薢丸	犀角散	茯神湯	
枳實散	黃芪丸	温中法麴丸	

當歸湯	五味子湯	紫蘇子湯
白附子丸	牛膝酒	舒筋丸
五加皮酒	羚羊酒湯	導痺湯
人參丸	天麻丸	羌活湯
黃荊實丸	石斛丸	附子獨活湯
黃芪酒 一名黃芪酒	草薺薺散	革薺丸
吳茱萸散	利膈散	巴戟丸
腎瀝湯	五菟湯	半夏湯
吳茱萸散	枳實散	枳實散
半夏湯	枳實散	枳實散
耐背散	枳實散	枳實散
擒虎丹	羌活散	防風湯
蕪蒸方	通痺散	革薺丸
		六生散
天樞丸	天樞丸	
卷之三十九	脚氣門 附論	
羌活導滯湯	神祕左經湯	加味敗毒散
五積散	檳榔散	大黃左經湯
烏藥平氣湯	木通散	檳榔湯
麻黃左經湯	半夏左經湯	當歸拈痛湯
神烏丸	獨活寄生湯	四蒸木瓜丸
十全丹	八木丸	神應養真丹
紫蘇子湯	秘方換腿丸	木瓜牛膝丸
蒼朮散	透骨丹	活絡丹
五斤丸	竹瀝湯	獨活湯
風引湯	木引湯	四斤丸

加味四斤丸	經効立應散	不老地仙丹
導氣飲	洗藥外應散	脚氣止痛方
搜風丸	木香行氣散	黑虎丹
獲蓉牛膝丸	枳實大黃湯	振囊
乳香木瓜丸	甘龍散	神授方
木瓜丹	烏藥丸	鷄鳴散
治脚氣風氣諸惡氣		川膝煎
舒筋丸	御愛忘杖丸	桃花散
桑白皮散	獨活酒	五獸二匱丹
松葉酒	立効丹	又方
辰砂丹	五加皮丸	沉香丸
沉香大腹皮散	甘豆湯	旋覆花丸
細辛散	立効散	沉香湯
杉節湯	高良薑丸	松節湯
吳茱萸湯	桑白皮丸	側子酒
茯苓丸	草薺薺散	蓬莪木散
止嘔湯	大八風湯	桂心湯
大腹皮散	麻仁湯	澤瀉散
沉香羌活散	海蛤散	猪苓湯
蕪蒸子丸	五加皮散	知母散
漏蘆丸	治脚氣風毒壅盛生瘡腫痛不斂	
導氣除濕湯	足踏丸	薰洗方
鷲鷲藤散	沉香散	枳殼散
加味香蘇散	紫蘇散	桑白皮散
獨活湯	活血定痛丸	
卷之四十		

水腫門 附論	葶藶木香散	大橘皮湯	葶藶丸
	白朮木香散	十水丸	分氣補心湯
	杏蘇飲	蘿蔔子飲	調榮飲
	神助丸 <small>一名葶藶</small>	五皮散	當歸散
	實脾散	木香流氣飲	踈鑿飲子
	消腫丸	郁李仁散	烏鯉魚湯
	無碍丸	導滯通經湯	神助散 <small>一名葶藶</small>
	鴨頭丸	三仁丸	海金沙散
	椎黃木香散	半邊散	椎黃神金散
	塗臍膏	退腫集賢丸	木香分氣湯
	沉香海金砂丸	三白散	治男子陰腫大
	治婦人陰腫硬	蟬蛻散	神効木香丸
	導水茯苓湯	沉香琥珀丸	葶藶丸
	治氣腫水腫浮脹方		治腹中水腫水腫
	鯉魚方	大腹皮散	猪白皮散
	海蛤丸	檳榔散	漢防己散
	木香丸	木香丸	人參木香散
	治水氣方	治水氣方	
	治脾腎受水變轉藥了後服		補脾蘆香散
	加味枳朮湯	桃溪氣寶丸	六莖散
	羌花丸	又方	沈附湯
	大半夏湯	鯉魚湯	甜葶藶丸
	治卒腫滿身面目浮大方		防己湯
	耳遂餅	炮腎散	奪命丸
	商陸豆方	檳榔散	

治腫淡脚起補上進者入腹殺入	猪苓散	海蛤丸	甘甜丸
	大沉香葶藶丸	無比丸	續隨子丸
卷之四十一	張滿門 附論		
	中滿分消湯	消脹丸	導氣丸
	沉香散	順氣木香散	七物厚朴湯
	中滿分消丸	廣茂潰堅湯	半夏厚朴湯
	三棱煎丸	木香流氣飲	五膈寬中散
	溫胃湯	人參芎歸湯	木通飲
	參香散	大半夏湯	平肝飲子
	紫蘇子湯	強中湯	大正氣散
	祝實湯	沉香交泰丸	木香塌氣丸
	大異香散	氣鉞丸	萬金丸
	遇仙如意丸	甘露散	撞關飲子
	數藥	葶藶茄丸	十全丸
	木香化滯散	治腹脹方	治腹脹方
	消脹丸	又方	木香順氣湯
	鷄矢醴		
卷之四十二	積聚門 附論		
	散聚湯	息賁湯	奔豚湯
	枳殼散	六七氣湯	廣茂潰堅湯
	木香化滯湯	溫白丸	勝紅丸
	香稜丸	妙應丸	肥氣丸
	伏梁丸	化氣湯	痞氣丸

積氣丹	木香通氣丸	天南星丸
妙功丸	麝積丸	二香化積丸
化鐵丹	消痞丸	荆蓬煎丸
鷄爪三稜丸	三稜煎丸	瑞露丸
保安丸	三聖丸	軟金丸
麴葉丸	酒癥丸	狀元丸
破塊丸	秘傳掌中金丸	法製檳榔
流氣丸	硃砂煎丸	取積妙應丸
沉香海金砂丸	萬病無家散	治酒食積水病
三稜丸	剪紅丸	馬家五積丸
削堅丸	龍甲丸	肝之積肥氣丸
半夏散	乾漆丸	心之積伏梁丸
蒜紅丸	勻氣湯	龍甲丸
沉香飲子	脾之積痞氣丸	半夏湯
枳實散	肺之積息貫丸	沉香石斛湯
木香檳榔散	沉香丸	茴香金鈴丸
腎之積奔豚丸	解鈴丸	白荳蔻散
檳榔散	異香紅丸子	仙方內消丸
七星丸	龍甲丸	蓬莪木散
麝香丸	三稜草煎	檳榔湯
乾膝丸	取積一現氣丸	常山散
麥蘖湯	八靈丸	
卷之四十三		
宿食內傷門 附論		
香蘇散	縮砂香附湯	穀神丸
三稜煎丸	紅丸子	黑丸子

如意丸	阿魏丸	丁香脾積丸
感應丸	五百丸	丁香爛飯丸
木香枳木丸	麴蘖枳木丸	三黃枳木丸
菊花解醒湯	大枳殼丸	集香丸
紫沉消積丸	法製生薑散	仙方內消丸
木香丸	小分氣丸	益智散
快活丸	破積導飲丸	
卷之四十四		
自汗盜汗門 附論		
桂枝湯	木附湯	黃芪建中湯
當歸六黃湯	黃芪湯	三建中湯
建中湯	防風散	白木散
麥煎散	大建中湯	止汗溫粉
止汗紅粉	牡蠣白木散	芪附湯
撫芎湯	牡蠣散	止自汗方
周衛湯	四白散	又方
止汗粉	加腦子收陽粉	椒目散
團參湯		
卷之四十五		
痿門 附論		
東垣清燥湯	藿香養胃湯	補肝湯
溫腎湯	芎桂散	加味四斤丸
麋角丸	健步丸	龍骨丸
起痿丹	又方治筋痿	金剛丸
牛膝丸	煨腎丸	
卷之四十六		

怔忡健忘動悸門附論

益榮湯	茯苓飲子	薑木湯
五苓散	龍齒丹	參乳丸
小定志丸	壽星丸	歸脾湯
寧志膏	人參遠志丸	朱雀丸
二丹丸	萬蒲益智丸	加味茯苓湯
十味溫膽湯	溫膽湯	加味四七湯
養心湯	茯苓甘草湯	寧志丸
十四友丸	速志丸	妙香散
天地煎	治膽虛暗卧不安心多驚悸	
秘傳酸棗仁湯	俞居士選奇方	藥珠丸
警金丸	朱雀湯	

卷之四十七

奇效方附論

聚香飲子	蟠葱散	五積散
桂枝烏頭湯	益智仁湯	玄附湯
金鈴子散	狼毒丸	木香散
沉附湯	桂薑湯	金鈴丸
川練子丸	立効散	三葉丸
葫蘆巴丸	海藻丸	補腎湯
勳法	敵金丸	海藻丸
茴香練實丸	荔枝丸	安息香丸 <small>一名煉</small>
寸金丸	天雄沉香煎丸	廣益黃散
山茱萸丸	木香丸	四製茱萸香煉丹
木香湯	三增茴香丸	吳茱萸丸
蜀椒散	羌花丸	昆布丸

雄黃洗方	治陰忽疼痛	宣胞丸
治蚯蚓吹腎囊腫方		神効方
木香導氣丸	加味通心飲	喝起丸
一捻金散	沉香內消丸	奪命丹
救痛散	尋氣丸	神効胡桃酒
葱白散	茴香散	小腸氣方
治奔豚氣	代灸膏	腰子散
治腎氣疼痛方	八仙丸	挑仁丸
橘核丸	療超越舉重卒得陰癩	
蜘蛛散	香附散	秘傳茱萸內消丸

卷之四十八

積熱門附論

井露飲	消毒犀角飲	八正散
荆黃湯	清氣散	黃連解毒湯
人參瀉肺湯	天門冬散	四順清涼飲子
黃芩湯	利膈湯	防風通聖散
三黃丸	薄荷煎	天竺黃散
龍腦雞蘇丸	喻化三黃丸	大金花丸
神芩丸	牛黃涼膈丸	酒蒸黃連丸
碧雪	既濟清神散	玄明粉
地黃煎	海仙丸	珠砂膏

卷之四十九

痼冷門附論

附子理中丸	三建湯	薑附湯
沉附湯	芪附湯	參附湯

茸附湯	桂附湯	訶子四柱散
沉香葶澄茄散	附子茴香散	黑錫丹
十補湯	八味丸	金鎖三元丹
來復丹	灸法	保元丹
浴體法	洞陽丹	接真湯
卷之五十		
諸血門 附論		
茯苓補心湯	必勝散	茵根散
天門冬湯	大薊散	雞蘇散
犀角地黄湯	麥門冬飲子	一名清肺飲子
人參飲子	是齊白朮散	龍腦雞蘇丸
黃芪芍藥湯	人參救肺散	升陽去熱和血湯
犀角地黄湯	涼血地黄湯	雞蘇丸
奇效良方目錄 四六		
團參丸	當歸地黄湯	生地黃湯
麥門冬散	藕汁飲	犀角湯
天門冬丸	綠雲丸	雲雪散
地黃煎	掌中金	人參湯
治傷力吐血方	四生丸	生乾地黄散
雙荷湯	松花散	百花煎
又方	石膏散	杏仁散
加味理中湯	白朮丸	鷄子白丸
茅花湯	蘿蔔飲	門冬飲子
三奇散	白芨散	吹鼻方
刺薊散	千針散	二花散
山梔子散	扎指法	大蒜貼足方
刺薊湯	當歸湯	竹茹散

麥門冬汁	治嘔血方
聖餅子	黑散子
南天竺飲	神白散
蓮心散	側柏散
大薊飲	麝香散
九九竅出血方	
卷之五十一	
腸痔漏門 附論	
秦艽白朮丸	秦艽蒼朮湯
當歸郁李仁湯	秦艽羌活湯
秦艽當歸湯	地榆散
鉤腸丸	皂刺丸
芎歸丸	乾葛湯
荆枳湯	神效散
黑九子	
逐瘀湯	蝟牛膏
蝟皮散	拔毒散
七物湯	加味四君子湯
五聖丹	治痔瘡膏
熊膽膏	治痔瘡道中虫瘻不止
熏洗方	又方
龍腦散	厚朴煎
鷄峯烏金散	臭標皮散
雙金散	龍骨散
枳殼散	能消丸
烟熏方	白金散
猪蹄灰丸	穢榔散
赤小豆散	麝香散
槐皮湯	
洗諸痔方	
熏洗方	
寬腸丸	
半夏散	
治痔	
蒸青散	
導赤散	
試玉散	
乳香散	
楮藤散	
桑木耳散	

神效方	地榆散	治血箭痔
止血方	治痔便血方	威靈仙丸
薰麝方	洗藥	神驗真藥方
槐角散	結陰丹	治腸風臟毒方
猪臟丸	鯽魚方	治腸風及脫肛
勝金丸 <small>一名百</small>	四季側柏散	腸風黑散
黃連散	神應丸	蒜連丸
香梅丸	椿皮丸	猪臟丸
卷栢丸	治腸風臟毒方	
卷之五十二	脫肛門 附論	
娟皮散	文蛤散	槐花散
縮砂湯	乳香丸	磁石散
香荊散	治腸頭挺出	治脫肛歷年不愈
木賊散	螻蛄丸	治穀道腫赤腫
治肛門腫痛		
卷之五十三	疔風門 附論	
通天再造散	神效追命散	皂棘湯
皂角丸	硫黃酒	黑虎丹
烏蛇丸	治大風	雷丸散
蝦蟆丸	萸荊丸	胡椒散
得效第一方	仙方	浴洗
換骨丹	遇仙丹	疎風散
佛手膏	去毒丹	甘草散
解毒丸	黑神丹	水膏藥

三濟丸	八葉湯	換肌散
如聖散	黃精煎	治大風癩
舊艾酒	雄株散	白花蛇造酒方
治身上癩瘡		
卷之五十四	瘡瘍門 附論	
內托羌活湯	白芷升麻湯	當歸拈痛湯
內托升麻湯	芫胡通經湯	郭氏升麻牛旁子散
中和湯	升麻和氣飲	當歸飲子
托裏十補散	十六味流氣飲	神效烏金散
奪命丹	蟾酥丸	托裏榮衛湯
托裏溫中湯	內疎黃連湯	托裏散
破推丹	瀉心湯	五香連翹湯
清涼膏	五香湯	托裏護心散
定痛托裏散	乳香止痛散	黃芪人參湯
竹葉黃芪湯	聖愈湯	內補黃芪湯
羌活散	烏蛇丸	內托升麻湯
連翹飲子	牡丹湯	薏苡仁湯
神仙蠟蜜丸	雙解散	復原通氣散
敷藥方	牡丹散	排膿散
五香白木散	單方	治諸瘡腫不散
牛旁湯方	將軍缺縮膏	治諸瘡腫馬毒瘡
加味當歸飲子	齊香輕粉散	葵花散
神秘方	當歸和血散	百合散
地瘡金銀花散	二金散	芙蓉傳方
治蛇纏瘡	鱗內金散	拾時從證

一第... 丹... 續修四庫全書第 8 版反內

連翹散	堅湯	柴胡連翹湯	消腫湯
熏洗方	四生散	千金托裏散	
治疔瘡	返魂丹	破棺丹	
內托連翹散	不二散	三馬回疔丹	
走馬赴蓮丹	奪命返魂散	滴七金	
疔瘡錠子	回瘡錠子	日本國治疔瘡方	
五聖散	又方	玉山韓光方	
蟾酥膏	水沉膏	治一切疔腫懸癰	
治一切疔腫	治疔瘡	治疔瘡	
飛龍奪命丹	立馬回疔奪命散	托裏溫中湯	
治疔疔了黃打衣將死者	先花根膏		
治魚臍疔瘡	治疔瘡除證脉沉		
治疔瘡陽證	救生丹	照脂散	
甘草坐傳方	惡實根坐傳方	升麻湯	
香辨瘡方	鷄冠血塗方	猪骨膏	
乳香膏	雄黃散	附子散	
黃芪湯	白蒺藜散	密陀僧散	
白金散	玉粉散	七寶散	
赤石脂散	龍腦粉方	玉女英	
揀花粉傳方	治暑月汗漬腋下赤腫及癩瘡		
皂子散	鉛丹散	連翹飲	
桑螵蛸散	洗瘡藥	救苦黃芪散	
托裏金銀地丁散	洗藥	紫花地丁散	
桃花散	龍葵散	塗藥	
增益四物湯	拔毒散	萬寶代蟻膏	
神効方		烏金膏	

熊膽膏	碧霞錠子	治蛇頭瘡
治一切惡瘡及沙虱水弩甲疽疼痛不可忍者		
乳香散	水銀膏	治膿瘡方
隔紙膏	治膿瘡久不愈	治膿瘡下注
治膿瘡	治膿瘡方	驢蹄散
翠玉膏	治血注脚	治膿瘡方
奇妙梔子散	治足瘡方	牛黃金虎丹
治膿瘡方	治膿瘡方	治湯火傷
清涼膏	麻子膏	黃蘗散
止痛膏	神効當歸膏	栢葉散
蛤粉散	紫雪	治湯火燒瘡
治湯火傷	鷄黃油	治湯火燒方
治人向火生火斑成瘡有汗及治火氣入瘡方		
止痛生肌散	栢皮膏	綠雲散
四時貼護方	內托黃芪丸	
治馬汗入瘡毒氣攻腫痛方	連翹散	治驢涎馬汗入瘡
五香散	治遊腫流穢身赤色入腹即死	獨活散
治赤遊腫方	生地黃散	連翹飲
玄參散	解毒散	水澄膏
內消散	牡丹散	梅仁湯
天南星膏	四聖散一名神効	桔梗湯
大黃湯	治肺癰方	瓜萎散
四順湯	治外腎癰瘡	治腎癰
三物湯	貫衆湯	當歸散
甘草膏	內托黃芪紫胡湯	
密陀僧散		

內托黃芪酒煎湯	犀角湯
黃連散	大黃散
治石癰堅如石未作膿者	芍藥湯
雄黃散	玄參散
沉香散	人參散
猪蹄湯	去水膏
清水膏	水調膏
漏蘆湯	四虎散
漏蘆湯	應痛丸
枳實湯	射干散
海桐皮浸酒方	松脂膏
加味平胃散	螺蛳散
穗麥散	龍骨散
神應散	治脚指縫爛瘡
生瘡連年累月俗為腎風瘡宜用此藥	治男子兩足癢痒
雄腦膏	栝葉膏
拔毒散	治惡指謬云天蛇頭
松脂膏	無食膏
蟾酥膏	蝦蟆散
蛇黃散	雄燁散
治脚跟裂痛不可忍	黃蠟膏
連翹湯	編蝠散
四聖散	螺灰散
荔枝膏	治瘰癧
治鼠瘻	海藻丸
治瘰癧不問有頭無頭者	又方

治瘰癧結核	琥珀膏
鷄鳴散	祛風丸
水紅花散	又方
瓜萎子散	黑靈散
治漏瘡	治脇下生漏瘡如牛眼之狀膿水出
海藻丸	守癭丸
木通散	治忽生癭病及一二年者
五癭丸	白頭翁丸
昆布散	治癭氣胃膈壅塞咽喉漸癭
治癭氣神驗方	水黃散
加味消毒飲子	圓腫方
治無名腫毒或背疽治法	神效方
犀角升麻湯	如冰散
犀角散	熨風散
拔毒散	水澄膏
療竈丹從兩脚亦如火燒	十二件單方
除濕散	苦參丸
一掃散	治遍身癢痒明目爽神
四生散	疥癬神效散
治一切男子女人渾身疥癬一家染易經年癢痒不効	一上散
五龍膏	赤小豆散
一笑散	神捷散
治疥神効	備急葛氏療疥瘡方
熏芥方	丁香散
銀粉散	水銀膏
治癬神効方	治癬積年不瘥
	胡粉散
	三神丸
	半夏散

治頸項及面上白駁浸淫漸長有似癬但無瘡可治	東坡先生家藏方	一捺散
治乾癬積年生疥瘡之黃水出每逢陰雨即痒方	螺殼散	荆芥散
治濕癬方	定粉膏	五倍子散
八宝散	浴毒湯	陰瘡膏
黃運膏	玉粉散	全蠍散
七寶攪柳散	蚯蚓散	石灰散
牡蠣散	地連散	川連散
丹胞散	治穀道中瘡	小浴方
神妙方	銅綠散	青黛散
沐浴長春散	治陰濕生瘡	津調散
麝香散	燕脂散	蠟燭散
洗毒湯	甘石散	金銀花散
截疳散	銀粉散	治下疳瘡
梔子散	烏龍德生膏	摩風膏
消毒膏	神仙太乙膏	透骨金絲萬應膏
太乙靈應膏	白龍膏	膏藥方
青龍五生膏	神異膏	白玉膏
膏藥方	十香膏	止痛膏
水晶膏	拔毒膏	太乙膏
生肌膏	五枝膏	司馬溫公解毒膏
麒麟膏	萬金膏	活絡內多膏
神效回生膏	無比神應膏	飛丹法
金絲萬應膏	無比神應膏	
敷膏藥法		

鍼灸門 附論	指法一十四條	行鍼法	春夏刺淺秋冬刺深
三才法	龍虎交戰	赤鳳搖頭	蒼龍擺尾
陽中隱陰	陰中隱陽	龍虎升騰	子午搗臼
透天涼	留氣法	燒山大	燒山大
提鍼法	鍼解法	進氣法	進氣法
逐日人神所在不宜鍼灸	人身血忌不宜鍼灸出血	死神	死神
午時補瀉譌	午時前後譌	補法	補法
瀉法	榮衛回逆八法	禁鍼穴法	禁鍼穴法
醫與病者作用	停鍼持氣病人作用	八證勿刺鍼之無功	八證勿刺鍼之無功
鍼畢病人禁忌八法	定灸多少法	點灸法	定灸多少法
卷之五十六	正骨兼金鍼門 附論	傷元活血湯	傷元活血湯
論手有四折骨六出白	十不治證	肩脾上出白	肩脾上出白
用麻藥法	打攪及樹木壓痛身痛者	用藥加減法	用藥加減法
用藥湯使法	沒藥乳香散	去惡血法	去惡血法
花蕊石散	加味芍藥湯	補損當歸散	補損當歸散
大紫金皮散	沒藥降聖丹	沒藥降聖丹	沒藥降聖丹
萬金膏	洗藥荆葉散	導滯散	導滯散
		活血散	活血散
		玉真散	玉真散

急風散	如聖散	一字散
紫金皮散	草烏散	白膠香散
應痛丸	乳香散	破血散
地龍散	調經散	治金瘡白藥
定痛乳香散	生肌止血立効方	
太乙膏	百草散	凡殺傷不透膜者
殺傷氣偶未絕	灰彈散	神仙刀箭藥
治刀斧傷擦及破傷風浮腫者	又方	
藥組方	地榆縮煎	治刃傷
治金瘡	麒麟竭散	敗毒筋散
治傷筋斷骨續筋方		磁石散
治破傷腸出不断腸出欲燥而草上着腸者		
治金瘡中腸出不能入者		治金瘡腸出者
雄黃散	藍汁飲	具子散
紅散子	桂丹散	蜻蟻丸
出箭頭方	解骨丸	治箭頭不出方
治箭鏃入骨取不出疼痛		取箭鏃方
治箭頭在咽喉中或胃膈中及諸處不出者		
牛膝膏	治箭頭在肉不出方	
又方	鼠油膏	
神聖膏	當歸散	內塞散
蒲黃散	如神散	金傷散
定血散	神仙止血散	
治金刃或打傷血出不止		治金瘡傷損血出
五倍散	神奇散	軍中一捻金散
治金瘡出血內漏		治諸傷瘀血不散

生乾地黃散	白薇散	琥珀散
補黃方	虎骨散	豆淋酒
金封方	又方	葫蘆方
必効方	豆淋酒	治金瘡因風水腫
艾葉方	龍骨散	金傷散
完肌散	生肌膏	劉奇奴散
治金瘡生肌肉	止血收瘡口方	蠶蛾散
定血散	綠礬散	
治被人刺入肉或鐵棘竹木等多日不出疼痛		
治手足卒中刺中水毒		又方
治竹刺不出者	牛旁葉散	治刺傷中風水腫
松脂方	治鍼入肉方	又方
桂蠟丸	乳香膏	治杖瘡
乳香散	治杖瘡	龍腦潤肌散
生肌桃花散	靈異膏	團棗
松皮散		
卷之五十七		
眼目門 附論		
還睛補肝丸	鎮肝丸	遠志丸
羌活散	青箱子丸	羊肝丸
地黃丸	補肝湯	石決明丸
菊花散	湯泡散	雷巖丸
春雪膏	又方	枸杞酒
二妙散	養肝丸	萬壽地芝丸
洗肝湯	羚羊角散	竹葉湯
龍膽飲	决明子湯	麥門冬湯

瀉肝散	羊肝丸	田螺方
助陽和血湯	甘菊花散	决明子方
羚羊羌活湯	空青丸	益陰腎氣丸
剪霞膏	加減駐景丸	補腎磁石丸
煎椒法	千金神麴丸	杏仁方
三仁五子丸	麴仁丸	甘菊湯
觀音丸	八子丸	菩薩膏
洗眼方	靈圓丹	單服蒼朮法
太陰玄精石散	夢靈丸	五退還光丸
立應散	煮肝散	治內外障服膏藥
秘傳去翳聖金膏	照水丸	捲簾散
道人開障散	指甲散	通光散
去翳障生血止痛方	神妙散	退翳散
撥雲散	珊瑚散	七寶膏
五退散	治赤障白膜風淚方	益氣聰明湯
日精月華光明膏	神仙碧霞丹	補腎丸
磁石丸	羅漢應夢丸	通脾瀉胃湯
墜翳丸	一名地黃丸	猪膽方
羌活退翳丸	搜風湯	油風湯
退熱飲子	青金丸	天門冬飲子
炙肝散	排風散	補腎丸
羚羊角飲子	瀉膽散	瀉肺散
摩風膏	石决明丸	朱僧熱翳方
補肝丸	羚羊角飲	
磁石丸	七寶湯	
七宝丸		

墜翳丸	白蘇皮湯	空青丸
菊花散	珍珠退翳散	療翳五十年不瘥
治赤眼後生翳膜方	補陽湯	拘杞煎
傳信方	青葙子丸	連和益陰丸
升陽柴胡湯	蕤仁散	琥珀煎
桑白皮湯	雞距丸	知母飲子
琥珀散	雀乳散	决明子散
真珠散	羌活退翳膏	真珠膏
鷄子殼散	開明丸	補肝散
蠍附散	龍腦膏	治積年失明方
點眼金絲膏	補腎丸	磨光散
撥雲退翳丸	杞苓丸	夜光丸
四物五子丸	又方	一名双美丸
真珠煎	又方	
治暑月或行路目昏澁多眵粘者	青魚膽方	治眼目昏暗
又方	金絲膏	又方
寒象花散	熟乾地黃丸	點益法
蕤仁丸	摩頂膏	摩頂膏
决明丸	服磁方	白龍粉
煮肝散	光明散	芎藭散
羊肝夾子	七寶散	决明子丸
還睛丸	金絲膏	蟬花散
開明散	草龍膽散	琥珀煎
羌活散	瀉風散	地黃散
撥雲散	春水散	截惡眼立効方
攻毒散		通項散

青箱子丸	垂柳枝煎	又方
銅清湯	治風赤澀痛	拘杞方
拜堂散	薰洗方	噴鼻藥
蟬殼散	吹鼻散	涼膽丸
羌活散	菊花散	蟬殼餅子
川芎丸	羌活散	真珠散
乳汁煎	洗眼方	蠶液膏
食鹽方	連翹飲子	吹雲膏
滴金膏	治目中熱淚	摩風膏
棍子丸	羚羊角湯	抵聖散
前胡犀角湯	羌蔚子丸	瀉肝散
大黃丸	桑白皮散	洗眼青皮湯
玄參丸	瀉肺湯	硃砂煎
治睛疼難忍者	補肝散	拈痛散
一捻金	救苦散	點眼金華水
黃牛膽煎	治眼澀痛方	黃連散
又方	點眼麩仁膏	魚膽傳眼膏
車前散	治血灌瞳仁生障膜方	
麥門冬湯	真珠散	
卷之五十八		
耳鳴耳聾門	附論	
犀角飲子	芷芎散	排風湯
芍藥散	益氣聰明湯	治厥耳聾
桂星散	益腎散	蔓荊子散
通神散	補腎丸	菴蓉丸
通耳法	紅綿散	磁石丸

肉獲參丸	桑螺鮑湯	追風散
清神散	磁石羊腎丸	草麻丸
雄黃散	菖蒲丸	透耳筒
治耳聾方	燒腎散	桂心膏
鯽魚膽膏	蠍稍膏	鼠膽膏
菖蒲散	鷄卵方	治耳聾灸方
又方	蠶蠟散	治耳聾方
治耳聾法	驢脂方	治大痲後耳聾方
醋附方	龜尿方	乾地龍方
通氣散	白龍散	磁石浸酒方
魚腦膏	羊腎灸方	白鹽方
肉獲參丸	羊腎附子丸	通耳丸
治暴耳聾	犀角散	茯神散
羚羊角散	磁石散	草麻丸
天雄鷄子方	通氣散	水銀方
大蒜方	勝金透關散	龍齒散
沁黃湯	麝香散	療耳鳴沸開
芎歸飲	黃芪丸	生犀丸
白龍散	治耳內疼	又方
治耳內極痛方	杏仁膏	礬石散
又方	葱涎膏	柴胡聰耳湯
通氣散	治聾耳有膿	菖蒲散
竹筴散	蠟倍散	立効散
治聾耳方	治聾耳膿水不止方	
麝香散	香附散	附子丸
治耳膿	三黃散	二聖散

麝香佛手散	治凍耳成瘡	治耳瘻方
黃馬散	治凍耳成瘡	立驗散
治蝨涎入耳方	治蝨涎入耳方	治百虫入耳
治蝨涎入耳	車脂膏	治百虫入耳
治蝨涎入耳	治蝨涎入耳	治蝨涎入耳
治百虫入耳	治諸虫及虱等入耳方	
治飛虫入耳方	治蝨涎入耳	治蝨涎入耳
治蝨涎及百虫入耳	又方	
又方	治百虫入耳方	治百虫入耳方
治蜈蚣入耳方	治惡虫入耳方	追毒膏
治諸虫入耳方	治蝨涎及百虫入耳方	
治百虫入耳	治虫入耳	治蚤虱入耳痛
蠟彈丸	塞耳丹	

卷之五十九

鼻門 附論

人參湯	辛夷散	防風湯
蒼耳散	白芷散	川椒散
梔子仁丸	白礬散	硫黃散
細辛散	菱香花散	增損通聖散
葛蒲散	羊肺散	消鼻痔方
辛夷湯	醍醐散	通關散
又方	治鼻塞不通及治衄血	
禦寒湯	防風湯	排風散
通頂散	芎藭散	瓜蒂散
痰梨汁方	溫肺湯	溫衛湯
芎藭散	山茱萸丸	赤龍散

通頂散	雄黃散	黃白散
治息肉方	二子散	治鼻痔方
瓜丁散	地龍散	沒藥散
白礬皮湯	葫蘆酒	脂膏方
神効宣腦散	川芎丸	治鼻淵腦瀉
細辛散	塞鼻柱膏	白芷丸
烏犀丸	地黃煎	辛夷膏
椿根湯	烏香散	治鼻口急疔
犀角散	桑根白皮散	吹鼻散
何首烏丸	治赤鼻方	冬瓜子散
治肺風鼻赤	治酒渣鼻	治酒渣鼻
治赤白鼻	治酒渣鼻及婦人鼻上生黑粉刺	
治赤鼻肺風	荆芥散	草麻子膏
葦澄茄丸	千金細辛膏	抑金散
通草膏		

卷之六十

口舌門 附論

杏仁散	牛黃丸	瓜蒌根散
井露丸	含化丸	含香丸
五香丸	荳蔻丸	治口臭方
丁香丸	治心氣不足口臭方	
生香膏	地骨皮丸	升麻黃連丸
治口氣臭方	生地黃煎	
治冬目唇乾折血出方		治緊唇面泡
走馬散	治口瘡	龍膽湯
蘆薈散	玄參散	麝香丸

蓬砂丸	綠雲散	并麻煎
黃葉丸	治口舌生瘡爛痛方	
治口舌生瘡方	定齋灌足法	
治飛絲入口令人舌生泡		貼臍散
并露飲	加味龍石散	吹喉散
并麻飲	蓬砂散	紫金霜
黃連散	蟾酥綿	冰藥丸
治口瘡方	綠雲散	治口瘡方
紅芍藥方	蜜藥法	治舌上腫硬方
治舌上腫硬出血方		
黃葉散	玄參并麻湯	亂髮灰方
檳榔散	烏金散	治口吻瘡
硫黃散	黃藤散	治口唇常瘡爛黑
黃連散	五福化毒丹	白燈散
檳榔散	治緊唇方	并麻飲
獨活散	治唇生腫核方	蒼苡仁湯
牛黃散	黃藥湯	治重舌方
治重舌喉痺方		又方
薄荷蜜煎	治重舌喉痺方	
牛黃散	馬牙疳丸	治木舌方
廣玉散	又參散	飛礬散
細舌膏	治舌種強方	百草霜散
戒煙丸	又方	巴豆方
寸金散	香參丸	并麻湯
治舌上出血如簪孔方	熱艾湯	紫霜丸
黃葉散	槐花散	聖金散

卷之六十一

三黃丸	附論	上清丸	龍麝對聖丹
祛毒牛黃丸		碧玉散	玉粉丸
防風散		玄參散	追風散
升麻散		七寶散	又方
防風通聖散		蓬砂散	碧雪散
治風熱喉痺		鍼法	五香散
涼膈散		并露飲	麝香珠砂丸
清心利膈湯		勝金散	白礬散
治咽喉牙關緊閉方			碧雪
絳雪		吹喉散	并桔湯
利膈湯		解毒雄黃丸	玉鑰匙
如聖散	奇效方目錄	并麻散	絳雪散
乾喉風		開關潤喉蓬萊雪	
奪命無憂散一名玉屑無憂散		龍腦散	
龍腦丸		摘皮湯	仙方奪命丹
開喉關方		龍腦破毒散	射干湯
如聖勝金錠		如神散	金鎖匙
碧雪		一字散	一捻金散
牛膽膏		治鎖喉風	奪命筋頭散
雄黃散		如聖湯	地龍膏
山豆根湯		奪命散	治喉中毒
去涎方		金鎖匙	立聖膏
立應丸一名玄聖		治咽喉不得用鍼者	
潤關住痛方		紫苑方	如聖丸一名各寶

治豎鵝方	治急喉腫閉	奪命丹
治喉痺及毒氣	治喉痺卒不得語	
治喉痺方	瓜蒂散	射干丸
玄參散	燒益散	馬牙硝散
射干散	蓬砂散	啓閉散
治喉內生癰方	聖藥筒	橘葉湯
治喉癰方	治咽喉痛方	黃芪散
桃紅散	琥珀犀角膏	救命散
牛旁子丸	蓬砂散	馬牙硝煎
治咽喉忽然氣塞喘息不通須更欲絕		
射干湯	射干散	含化龍腦丸
木香散	絡石湯	四味湯
杏仁煎丸	玄參升麻湯	會仁救苦丹
無地散	山豆根丸	治咽喉腫方
牛旁子湯	備急散	神效破棺散
發聲散	秘傳解毒丸	王醫師法
百靈丸	治一切咽喉腫毒	
卷之六十二		
牙齒門	附論	
清胃散	神功丸	漱口玉池散
牢牙散	麝香散	蛀牙散
牢牙地黃散	荆槐散	鬱金散
防風散	香椒散	川芎散
秘方措牙散	細辛散	救苦散
麝香散	長春散	草薺菴散
麻黃散	白芷散	治疔散

皂莢散	升麻散	黃丹散
麝香散	脆壞欲盡方	治齒痛方
神應散	露蜂房散	治牙疼方
治牙疼方	麝香白牙散	升麻散
雄黃散	九寶散	草烏頭散
定痛追風散	閉突散	一字散
透閃散	巴豆散	萹蒲散
露蜂房散	透閃雄黃散	麝香丸
玄胡索散	治牙疼方	單撥丸
香附子散	治諸牙疼方	治牙疼方
麝香一字散	蟾酥丸	胡椒丸
橘鐵湯	治牙齒痛方	鯽魚砒方
又方	治牙疼方	治牙疼方
治牙疼方	治齒疼立効方	固牙散
治牙疼殊方	麝香散	黃礬散
細辛散	麝膽散	青金膏
三礬散	青金散	紅鉛散
治走馬牙疳方	青黛散	八仙散
鶴風散	麝香散	鯽魚散
細辛散	七香散	附子丸
雄黃膏	白礬丸	掃痛丸
治虫牙疼方	殺虫牙方	治虫牙方
治虫牙疼方	取虫牙法	柳枝湯
細辛散	消毒飲	皂角散
五倍丹	治齒熱痛斷腫方	
治風熱毒攻頭面齒斷腫痛	清上防風散	

升麻湯	雄黃散	草烏散
透心散	治風熱上攻齒痛	天雄散
又方	治風齒疼頰腫	治熱毒上攻宣露
牢牙散	治齒斷宣露	黃連散
牙藥紫金散	雄黃麝香散	治牙宣出血
生肌桃花散	鬱金散	治齒縫中血出
神效散	治齒口齒血出	牙痛齒陳散
治齒縫中血出	漱口沉香散	治牙齒不生
露蜂房散	川升麻散	地骨皮湯
治大人小兒牙齒多年不生方	龍齒散	蔓荊子散
甘草膏	治牙齒宣露挺出方	石膽散
太和散	五靈膏	地黃丸
治牙齒動搖疼痛	宣牙膏	五倍子散
治牙齒動搖髮赤黃	治牙齒動搖	治齒根動搖欲脫
土羨藜散	治牙齒動搖	麝香礬雄散
牙藥麝香散	安腎丸	熱銅末散
牢牙散	煨腎散	牢牙密齒方
祛風牢牙散	烏金散	牢牙散
取牙不犯手	長春牢牙散	沉香散
砂砂散	妙應散	白牙散
沉香散	受拜齒藥	石膏散

卷之六十三

婦人門 附論

大溫經湯 四物湯 逍遙散

加味吳茱萸湯 桃仁散 薑黃散

紫石英丸	吳茱萸湯	椒紅丸
暖宮丸	驚甲丸	當歸散
紅花當歸散	人參荊芥散	伏龍肝散
滋血湯	牡丹散	六神湯
大腹皮散	異功散	玄胡索湯
六合湯	溫經湯	人參白朮散
栝子仁湯	白朮散	八珍散
玉燭散	滋血湯	增減四物湯
麥煎散	桂枝桃仁湯	增損四物湯
大玄胡索散	牡丹散	黃蘗散
麥門冬散	犀角散	地骨皮散
滋血湯	大腹皮散	桑白皮散
神秘湯	柴胡散	黃芪散
瑞金散	牡丹散	石膏散
神授湯	八物湯	旋覆花湯
小柴胡湯	黃芩芍藥湯	三黃瀉心湯
竹茹湯	青竹茹湯	當歸白朮湯
乾薑柴胡湯	凌宵花散	內補當歸丸
熟乾地黃丸	禹餘糧丸	神仙聚寶丹
洗洗丸	紫蘇散	濟陰丹
南嶽魏夫人濟陰丹	小烏雞丸	妙應丹
烏雞煎丸	加味五積散	白聖丹
琥珀澤蘭煎	內炙散	萬應紫苑丸
沉香煎丸	斂血丸	勝金丸
龍骨散	溫白丸	烏喙丸
卷栝丸		義木散

玉仙散	補氣升陽和中湯	滋陰萬病丸	渾身碎痛飲子	黃芪飲子	理中茯苓湯	黃芪白水湯	地榆散	柏葉散	斷下湯	補宮丸	鹿茸散	治崩漏方	熟附丸	小薊湯	加減四物湯	涼血地黃湯	治室女血崩不閉	冷熱皆治	十灰丸	十灰散	鹿茸丸	五靈脂散	奇効四物湯	鶴頂丸	治婦人經年血崩	烏金散	獨聖散	治婦人血崩不止	治崩中下血方	治婦人血崩方	縮砂散	梅飲子	一笑散	治婦人血崩方	膠艾湯	鎮宮丸	治漏下五色	治白崩方	豆蔻散	馬蹄丸	牡蠣散	茯苓散	益胃升陽湯	沉香牡丹丸	卷柏丸	艾煎丸	芎藭湯	一名芎藭溫中湯	麒麟竭湯	弟花散	治婦人赤白帶下	不問遠年近日	益母草散	治帶下方	玳瑁丸	酒煮當歸丸	補經固真湯	丁香膠艾湯	治婦人赤白帶下	不問年月深遠	柒更浴湯	固真丸	二豆散	薑黃散	內金鹿茸丸	治婦人久積虛寒	小便白濁	又方	抑氣散	土牛膝散	溫經湯	通經丸	三棱丸	當歸散	芩心丸	橘歸丸
-----	---------	-------	--------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-------	-------	---------	------	-----	-----	-----	------	-------	-----	---------	-----	-----	---------	--------	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	---------	------	-----	---------	--------	------	------	-----	-------	-------	-------	---------	--------	------	-----	-----	-----	-------	---------	------	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

三神丸	洗藥散	靈寶散	加味烏沉湯	琥珀丸	當歸木香湯	安胎飲	半夏茯苓湯	竹茹湯	竹瀝湯	知母飲	全生白木散	全生茯苓散	瘦胎枳殼散	桑寄生散	安胎散	麥門冬湯	旋覆半夏湯	安胎和氣飲	大腹皮散	紫蘇飲	芎藭補中湯	安樂散	桑螺蛸散	白薇散	當歸芍藥湯	芎藭散	百合散	驅邪散	平安散	消風散	天門冬飲子	枳實攪柳丸	黃芩湯	扶穀湯	五動散	白朮散	芍藥湯	安胎當歸湯	旋覆花湯	人參獨皮湯	人參丁香散	二香散	桔梗湯	馬兜鈴散	蘇黃散	升麻散	柴胡散	保安白朮散	安胎阿膠散	安胎白朮散	前胡湯	黃龍湯	火龍散	獨聖散	萬應丸	秦允散	人參散	厚朴散	黃連湯	葶藶散	催生丹	催生如聖散	香桂散	來麩散	無憂散	澤瀉散	防己湯
-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-------	-----	------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-------	-------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----

四製艾附丸	琥珀丸	交感地黃煎丸
龍鬚湯	佛手散	返魂丹
旋覆湯	芎歸湯	黑神散
四順理中丸	人參當歸散	當歸養血丸
四神散	當歸黃芪湯	當歸散
七珍散	玉露散	當歸血竭丸
川芎散	各書高	增損花胡湯
人參湯	失笑散	清魂散
增損四物湯	調經散	越痛散
抵聖湯	濟危上丹	熟地黃湯
地黃散	卷荷散	四味湯
獨行散	胡氏孤鳳散	二母散
參蘇散	丁香散	瑞蓮散
漢防已散	三分散	芎藭散
牡蠣散	挂心丸	辛菜飲子
生熟飲子	皂蛤散	連翹湯
卷之六十四	小兒門 附論	
遠和說	小兒初生總統	先小兒三脈五脈法
辨虎口紋訣	辨三部脈證	辨三關脈色細訣
正定三十一般死候不治		
辨孩兒生下三腸已前中病不治		變蒸
小兒諸熱須分主治		小兒初生先見顯
虎口脈候	面部	七表
八裏	九道	視嬰兒大要
驚風搐不治證	驚風治證	驚

風	痰	食
五癩	瘰癧散	七寶散
天竺黃散	紫霜丸	辰砂金箔散
四順飲子	地黃煎丸	牛黃膏
龍腦飲子	金蓮飲子	尅効湯
竹葉石膏湯	惺惺散	三鮮牛黃散
大黃朴硝湯	錢氏白朮散	紅錦丹
異功散	地骨皮飲	補肝腎地黃丸
人參生犀散	五蟾丸	金瓜丸
肥兒丸	調中散	龍膽丸
硃砂膏	烏犀丸	青金膏
紅綿散	人參羌活散	五癩丸
神丹	人參辛梗湯	人參辛梗湯
人參清解散	人參前胡散	天竺黃薄荷散
白虎湯	人參前胡散	藿香正氣散
枳殼半夏湯	加減建中湯	竹茹湯
小柴胡湯	抱龍丸	藿香安胃散
人參白朮散	益黃散	益脾散
實脾散	實腸散	異攻散
人參和中散	助胃膏	人參膏
安胃和脾散	胃風湯	生熟飲子
大効至聖千金飲子	沒石子丸	鶴頂丹
木香荳蔻丸	人參散	二順散
益中膏	人參散	訶子湯
橘蘇半夏湯	瀉白散	潤肺散
知母湯	補肺散	定喘芎藭散

百部丸	麝香散	丹砂丸
定命散	立聖散	瓜蒂散
五福化毒丹	錦灰散	白龍散
一字金	封臍散	白礬散
神効散	至聖保命丹	全蠍餅
奪命丹	麝香湯	犀角散
雄麝散	猪苓湯	金箔鎮心丸
烏梅散	白芍藥湯	寧心膏
三鮮散	辰砂膽胃膏	木通散
人參羌活散	木通散	太乙金丹
全蠍散	觀音全蠍散	吉州醒脾散
抱龍丸	太乙保生丹	保安散
大醒脾散	實脾散	固真湯
摘鼻開關藥	天麻防風丸	防風湯
硃砂丸	全蠍散	寬氣飲
木通湯	續命湯	追風散
薏苡仁丸	海桐皮散	香砂保安丸
三棱散	補腎地黃丸	調元散
栝仁散	桂辛散	參芪當歸散
人參前胡散	秦芫湯	二薑丸
寧心膏	寧眠膏	小柴胡湯
大柴胡湯	一捻散	五福化毒丹
蓬砂散	鎮驚丸	蟬花散
散風丹	保安丸	獨活湯
細辛大黃湯	牛黃丸	比金膏
鎖驚丸	虎睛丸	七寶鎮心丸

清神散	妙聖丹	天麻丸
牛黃清心丸	紹黃丸	斷癩丸
當歸六黃湯	代赭石散	地龍散
定癩丸	釀乳香	生地黄湯
五疳保童丸	胡黃連麝香丸	大蘆薈丸
龍粉丸	消氣丸	分氣丸
子丑散	黃土丸	又方治癩土
天柱丸	五加皮散	健骨散
生筋散	落砂散	三黃丸
茯苓補心湯	天門冬丸	是齊白木散
藕汁飲	四生丸	千金龍膽湯
槐角丸	槐花散	槐角散
烏梅丸	黃連散	黃連黃散散
干黃散	柳李仁丸	犀角丸
汝藥散	導赤散	五淋散
八正散	消心蓮子飲	五苓散
靈蘇散	史君子丸	漏蘆湯
忍冬散	加味羌活散	當歸飲子
麻黃湯	撮湯方	敗毒散
地龍散	消毒飲	清涼飲子
又方	又方	治魚鰓骨鯁
又方	又方	又方
獸骨鯁	食牛羊馬肉毒	治蠱毒
香薷湯	王氏半夏散	湯氏玉露散
竹茹湯	附子理中湯	不換金正氣散
益胃散	釀乳法	五苓散

調中丸	香橘餅子	調中散
保安丸	沉香煎丸	黃連阿膠丸
倉稟湯	真人養丸湯	駐車丸
道氣湯	神效參香散	聖效散
軍賜丸	感應丸	消食丸 又各消乳丸
木香丸	七聖丸	異香散
敷神丸	七香丸	保和丸
稍九子	長生丸	十全丹
麝香進食丸	撲癆丸	錢氏地黃丸
木香丸	代精丸	五珍丸
廣茂瀆堅湯	木鱉膏	肥氣丸
息費湯	散聚湯	伏梁丸
瘡氣丸	奔豚湯	六七氣湯
香枝丸	四順清涼飲	指迷七氣湯
蘇合香丸	當歸散	五精散
鈞藤膏	乳附丸	蓬仙丸
參香丸	化虫丸	安虫丸
遣虫丸	實脾散	大橘皮湯
葶藶木香散	二物湯	牡蠣散
牽牛丸	五皮散	內消丸
塌氣散	中滿分消湯	中滿分消丸
四炒丸	塌氣丸	消氣丸
導氣丸	瀉心湯	七寶洗心散
涼膈散	大連翹飲子	瀉黃飲子
柳花散	又方	又方
又方	小防風湯	小流氣飲

生熟地黃湯	小菊花膏	密蒙花散
牛黃丸	通頂散	貼顛通關膏
消風散	辛夷散	嚙化葶澄茄丸
犀角飲子	龍骨散	花胭脂膏
紅綿散	敗毒散	養臟湯
蛻皮散	香荊散	又方
萊萸內消丸	當歸散	川練散
牡蠣散	木通散	臘茶散
又方	又方	又方
又方	鈞藤飲	鈞藤飲
鈞藤飲子	午黃丸	塗頂膏
天漿子散	青黛丸	再生散
三白散	鈞藤膏	

卷之六十五 奇效良方目錄 百十七

論瘡疹初出證第一 附論

論瘡疹

瘡疹是在母腹中所受積穢故五臟各有一證

瘡疹論日數

瘡疹出於心則有先驚搐者

紅斑點隱隱在肌中似出不出者

瘡疹未見但偏身見青紫紋

瘡疹出有逆順

瘡疹出遲有數證

論諸熱失治變為瘡疹候

瘡疹作搐

瘡疹論疎利

論表出與溫裏不同

論瘡疹膚疹

天氣暄熱即與疎轉後有瘡疹則輕既出不可疎利

瘡疹已出諸證不一

諸瘡疹熱毒所出之由

瘡疹已出不可服油劑

瘡疹有發出者有溫出者有解毒者

瘡疹雖有熱證大便如常過則不可再下不可妄發妄下

發熱有時則應臟腑知其斑疹痘水疱膿疱

蘊熱而斑毒

瘡疹已出未能勻

瘡疹未發者令內消

瘡疹發熱而疼者

瘡疹出不快

瘡疹面青者逆

瘡疹身熱而脉反遲

瘡疹非微汗則表不解

瘡疹非微利則裏不解

瘡疹既出不盡透透而不長血疱

未出可下已出不可下出已定當利其大小便

發瘡疹有微盛

瘡疹熱在表不可疎轉

瘡疹出太盛

傷寒與瘡疹同異

未能辨認間服升麻湯已發未發用胡荽酒

張氏論瘡疹氣勻即出快

瘡疹血疱作成膿疱令人心膈煩躁不安

瘡疹身熱耳尖冷脚稍冷腹內痛或塊

愛護將理

手足冷腹內硬為瘡疹

聖惠方論瘡疹未見者乃可疎利

石壁經論瘡疹歌備詳其證

辨劉氏論轉下張氏論用藥

論瘡疹已出證第二

瘡疹熱與諸熱不同

瘡疹出視輕重

瘡疹疎利與致毒不同

辨董汲指迷方論錢氏活人書不同

治瘡疹方宜不同用藥亦異

瘡疹成失飢不可當風冷

瘡疹有大熱者當利小便有小熱者當解毒

小便赤色心腹脹痛

先曾利而後瘡疹出不可再利但解毒而已

煩躁而渴

瘡疹煩躁睡卧不安者

瘡疹斑毒狀如蚊蚤所咬毒盛而黑色者

畏服涼藥水狀瘡疹者服胃受散

瘡疹子糞血糞黑睡不醒者

瘡疹已出而腹脹

當下當救裏

瘡疹既下懼太早

快下證

論瘡疹已出後復生他疾第三

瘡疹當令大便過者有當溫者有當令下者

瘡疹或吐或瀉或不食

瘡疹皆多在表不可妄下

瘡疹陷伏倒靨

瘡疹黑陷耳聾反熱

瘡疹亦有逆瀨者

瘡疹出遲朝夜啼哭

癩痕凸凹生瘡

瘡疹大便如常

瘡疹慢服熱藥則損目服冷藥則無不夫傷

斑爛

感寒與瘡疹伏熱混雜而發者

驚毒不散

飲乳嬰兒與能食童子用藥不同

瘡疹本稀不可發表

瘡疹無凝滯則勿表勿下

瘡疹起而能食

黑靨而未發寒

可下證

論雜病第四

諸惡證

先知節候陰陽臟腑虛實

行房觸犯燒赤木猪甲

初生服生地黄汁令不生瘡

瘡疹毒氣令胃爛便血

餘毒失解利則嘔吐并諸雜證

預服油劑以解陷疹法

論斑疹得熱則出愈難大便不通小便如血或為瀉此候

慢以巴豆子藥下之則內虛而熱不除

瘡疹不可用巴豆水銀輕粉

熱毒攻肝衝於目

瘡疹後餘毒咳嗽脇痛

傷寒熱毒甚則不可發表

瘡疹餘毒不盡煩渴胃滿

瘡疹不結疔疔

辨疹痘并水瘡子入大腸

結核腫毒

冬溫發斑癩疹如錦紋

瘡疹用百祥丸證

瘡疹後患日醫忌點藥

冬月預服三五飲子

瘡疹入目防備法

瘡疹攻咽痛

瘡疹大小便不通

乳下嬰兒服湯藥多則反為累

瘡疹冬溫當先下其毒

瘡疹便膿血

瘡疹膿汁不乾

瘡疹入目用藥

瘡疹後餘毒諸方

消癢瘰

痘癰

瘡疹後發痛

瘡疹愈後忽遍身青色或黑色手足厥冷口禁脈絕者

瘡疹已出狂叫喘呼

猪尾膏證

貴賤不同用藥亦異

防用藥之失

病證未分所用藥

瘡疹後觀虛實而解利

預截熱毒門第一

一初生服生地黄汁

三冬溫服三五飲子

五覺溫世服葛根散

七必勝散

九疔萎散

病疑似間解利門第二

十升麻湯

十二荊芥散

十四奪命散

十六冬溫發斑葛根橘皮湯十七薄荷散

熱其生風門第三

十八獨聖散

感冒風寒與瘡疹相雜證門第四

二十紅綿散

二十二麻黃湯

二冬溫服生油劑

四欲不患瘡疹服葛根汁

六樺皮湯

八涼驚丸

十一惺惺散

十三羌活散

十五牛房散

十九抱龍丸

紫草散

二十一五積散

和瘡疹用之門第五

二十三紫草飲子

二十五牛房甘草散

二十七安斑散

二十九紅子湯

三十一井草散

三十三化毒湯

三十五紫草木通湯

三十七蟬退甘草湯

三十九當歸散

防備熏沐用之門第六

四十一胡荽酒

四十三燒赤木猪甲

四十五黃土末

四十七黑牛糞灰

四十九白芥子散

微表而欲散門第七

五十一蟬蛻散

五十三麻黃紫草湯

五十五玄參升麻湯

五十七升麻黃芩湯

微下而自消門第八

五十九四順散

六十一交食紫霜丸

瘡疹出太盛解毒門第九

六十二消毒散

六十三化斑散

二十四髮灰湯

二十六羌肉醬

二十八蘿蔔湯

三十快斑散

三十二紫草如聖散

三十四調中散

三十六如聖湯

三十八紫草枳殼湯

四十快毒丹

四十二葡萄酒

四十四燒乳香

四十六苦硝猪膽汁

四十八黃蘗膏

五十爛肉汁洗法

五十二猴梨酒

五十四水解毒

五十六黃芩湯

五十八葛根散

六十利毒丸

六十四地黃雄黃散	六十五犀角散
六十六紫荷車散	六十七珠珀湯
六十八白虎湯	六十九人參竹葉湯
七十通神散	七十一青黛散
七十二野通散	七十三無比散
七十四豆湯	七十五透肌散
七十六黃連散	七十七通關散
七十八紫雪	七十九竹葉湯
八十道赤散	八十一救生散
八十二年角湯	八十三牛黃散
八十四玉露散	八十五年角飲子
八十六犀角地黃湯	
毒氣壅厥倒腐黑色門第十	此不詳附
八十七猪尾膏	八十八控心散
八十九獨味麻黃湯	九十南金散
九十一滑石散	九十二橄欖核水
九十三飲毒丹	九十四紅粉丹
九十五乳香猪血膏	九十六紫金散
九十七金藤紫草散	九十八麝香猪血丸
九十九木犀飲子	一百四聖散
一百一脫酸散	一百二山梔子湯
一百三化毒散	一百四宣毒膏
一百五百祥丸	一百六牛膝膏
一百七倍金散	一百八抵聖丸
一百九濕生虫散	一百一十白蛇散
毒氣滿盛而下門第十一	

一百一十一敗毒牛黃丹	一百一十二大黃丸
一百一十三川黃散	一百一十四大承氣湯
瘡疹病中表裏感寒或吐或利門第十二	
一百一十五益黃散	一百一十六參朮膏
一百一十七二和散	一百一十八六神散
一百一十九治中湯	一百二十胃風湯
一百二十一乾薑甘草湯	一百二十二胃受散
一百二十三勻氣湯	一百二十四豆乳散
一百二十五薑附湯	一百二十六七珍散
一百二十七薤白湯	
瘡子因吐利內蘊自陷門第十三	
一百二十八活血散	一百二十九人齒散
一百三十內補散	
解毒利餘毒門第十四	
一百三十一赤茯苓湯	一百三十二小柴胡湯
一百三十三大青四物湯	一百三十四沙糖水
一百三十五藍根散	一百三十六甘露散
一百三十七視花散	一百三十八淨心散
一百三十九青金丹	一百四十黃芩散
一百四十一燈心湯	一百四十四宣風散
一百四十五耳枯湯	一百四十六定命硃砂散
一百四十七鼠粘子湯	一百四十八斑痧入眼下
卷之六十六	
脈具門	
十香丸	五香丸
治體氣方	治脈氣方
治脈氣方	治脈氣真於狐狸

卷之六十七

諸毒門 附論

鶴風丸

取魚鱗衣

萬靈丸

石榴枝湯

狼牙散

竹節丸

檳榔湯

麥門冬丸

前胡湯

雷丸丸

貫衆散

桑根白皮酒

芙蓉根浸酒方

水銀膏

集效丸

蠶蛹汁方

錫灰丸

治寸白虫令化

治寸白虫為水瀉出亦除方

聖功散

治寸白虫方

治濕匿方

治虫蝕下痢肚盡穿腸者

卷之六十八

中惡門 附論

辟穢丹

柳皮湯

硃砂丸

硃砂散

治卒中惡方

治卒中惡方

治卒中惡氣絕

治中惡與卒死鬼擊亦相類

殺界五邪丸

辟諸邪祟附著及小兒驚風哭恐悸

治人卧忽不寤

鎮心丸

茯神散

八毒赤丸

破推散 一名復生散

治卒鬼擊如中箭忽然一點痛如注不可忍

治夢中披刺殺或杖打諸般不祥卒然吐血衄血下血

治自縊死方

治自縊死方

治自縊死及中惡

治自縊死方

又方

又方

治自縊死方

又方

又方

治自縊死救之未活以車載之法

治溺水死

治溺水蒸汁導水法

治溺水死酒灌法

治忽溺水死

治溺水石及壅之得活

救溺水法

治溺水

凡溺水一宿尚可救

又方

又方

治凍死

治凍死

又方

療入井塚悶胃

夏月不可淘井多致殺人

治遊身忽皮底濕濕如波浪聲痺不可忍抓之血出

亦不能解謂之氣奔

治手十指節斷壞唯有筋連無節肉間虫出如燈心長

尺餘隨身綠毛名曰血餘

治眼鼻赤張大帶渾身出斑毛髮直起乃熱毒氣結於

下焦

治手足甲忽然長倒生肉刺如鉅痛不可忍

治眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血

出名曰肝脹

治腹中有物作聲隨人言語

治人自竄自形作兩人並卧不別真假不語問亦無對

是離魂

治頭面發熱有光色他人手近之如火燒人

治鼻中毛出書夜可長一二尺漸漸窳圓如繩痛不可

忍雖忍痛摘去一莖即復更生

治脇破腸出臭穢

治忽然氣上喘不能言語口中汁流吐逆齒皆搖動氣

出轉大則悶絕蘇後如是名曰傷寒併熱霍亂

治渾身生燎泡如井棠梨每箇破出水肉有石一片如指甲大泡破復生担盡肌層肉則不可治

治大腸頭出寸餘

治口鼻中水流腥臭以梳盛之有鐵色鯪魚如硬米大

走躍不住以手捉之即化為水此肉壞矣

治兩足心凸如腫上面生黑色豆瘡硬似釘子釘了發

地不得脛骨生碎眼髓流出身發寒顫唯思飲酒此

是肝腎氣令熱相吞

治四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解

治腹脹如鐵石臍中水出旋變作虫行之狀繞身匝味

痒痛難忍撥掃不能盡

治眼白瞳仁渾黑見物依舊毛髮直如鐵線雖能飲食

不語如醉名曰血潰

治遍身忽然肉出如錐既寒且痛不能飲食此名血注

若不速治潰而膿出

治眉毛搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經

日不効

治毛竅節次血出若血不出必脹膨如鼓頃更脹鼻口

被氣脹合矣

治血自皮膚濺出

治恠疾奇方

治居民逃避者密中賊以烟火熏之

治因頓穿舌心血出不止諸藥不能效者

治人身上及頭面肉上浮腫如蛇狀者

昔江左常有商人左膊上有瘡如人面

昔華陀行道見車載一人病咽塞食不下呻吟

治有豆如蠶走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化

治腹上瘰癧不化

凡腹脹細久忽瀉數升晝夜不止服藥不効乃為氣脫

治眼前常見禽虫飛走以手捉之則無乃肝膽經為疾

治面上及遍身生瘡似猶先眼有光彩無膿血但痛痒

不常飲食減少久則透脛名曰寒瘡

治口内生肉越臭惡自己惡見有根線長五寸餘如釵

股吐越出以飲食了却吞其以手輕捏痛徹於心

治婦人產後忽兩乳仲長細小如筋垂下直下小肚痛

不可忍危亡須更名曰乳懸

治婦人臨產服催生藥太早驚動未嘗離經而用力太

過以致育腹有傷產後水道不通垂出四線

諸毒門 附錄

神仙解毒萬病丹

解毒毒方

治誤毒中毒

蓋根散

解斑貓羌青毒

解蝕吻毒方

解鼠莽草毒方

解一切藥毒草毒六畜肉中毒方

解藥過劑毒

又方治何前

治丹砂毒方

解丹毒方

附錄

誤飲蛇交水毒

治中蠱毒

粉草飲

解長岩毒方

解砒毒方

解砒毒方

解砒毒方

解砒毒方

治中已豆下利不止

齊老湯

治石鍾乳毒

治一切藥毒毒

青黛雄黃散

解毒丸

白扁豆飲

解半夏毒方

治中此毒方

解巴豆毒方

解附子毒方

解藥毒方

治銀毒方

黑鉛酒

治五石毒	治丹石毒	解麩毒方	解一切石毒及飲酒不知中何毒卒急無藥可解
治禽小粉片積方	治中豆腐毒方		
治掠粒為積方	黃龍湯	治誤吞水蛭方	
獅肝丸	治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾		
治食六畜肝中毒方	治河豚毒方		
治食自死六畜肝中長方	治食狗肉不消		
治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾或發熱不語	治誤吞蜈蚣方		
治食馬肝牛肉毒方	解狐子毒		
療食葷卉菌中毒致殺人者	七寶丸		
中葷毒方	石刻方		
東坡雄毒丸	蜜髓煎	治蠱毒	
馬兜零根湯	治蠱毒方	鐵精丸	
治中蠱毒	謝皮散	治中蠱毒	
地榆散	苦瓠湯	療卒中蠱下血	
雄黃散	麥麩散	誠靈法	
廣南衛生方	挑生	治挑生	
葱白湯	五加皮散	牡丹散	

太醫院經驗奇效良方卷之目錄

太醫院經驗奇效良方大全卷之一
 奉政大夫太醫院使吳興方賢纂集
 脩職郎太醫院御醫臨江楊文翰校正

謹按玉機真藏曰風者百病之長也風之為病善行而數變者也金匱論曰天有八風經有五風八風發邪以為經風觸五臟邪氣發動且八風之名偏風腦風目風漏風內風首風腸風泄風此八風者皆中臟腑者言之以五音宮商角徵羽應乎五臟所感不同其病大同小異岐伯曰風名有四一曰偏枯半身不遂口眼喎斜肌肉偏而不用且痛言不變智不乱病在分腠之間二曰風痲者身無疼痛四肢不收智乱不甚言微有知可治甚則不能言不可治內經脈解論曰內奪而厥則為瘖瘖此由腎虛所致瘖瘖之狀舌瘖不能語足瘖不為用蓋腎脈挾舌

本故不能言而為瘖瘖以循陰股內廉斜入膈中循膈骨內廉及內踝後入足下腎氣不順故瘖而為瘖三曰風懿者一旦奄忽不語人事痰涎上迷心竅咽中窒塞然舌強不語牙關不開手足拘攣氣不升降病在臟腑故風中臟則性命危中腑則肢體痿矣四曰風痺者脈浮而緩筋骨痠弱肢體麻痺不仁又有飲酒中風謂之漏風則身熱懈惰汗出少氣謂酒所以養陽酒入於胃與穀氣相搏熱盛于中其氣慄悍陽氣俱泄腠理疎風邪入以中之證似風懿其脈短而滑或洪而數內熱外汗法當清解消痰祛風及其內風名曰勞風由勞勞虛損真氣內虧風邪從此入病之所由皆從此始但髮直吐沫遺尿失禁口開眼合鼻鼾手撒搖頭上窺面赤如粧或頭面青黑汗綴如珠昏不知人皆為不治風證多端所感各異臨病詳辨察脈觀形對證用藥故風者清靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此

因時之序也尤當切脈究之風以散之寒以溫之實以竭之虛以補之熱以涼之痰以越之又有中氣與中風相類語言蹇澀涎潮昏塞不知人事牙關緊急但手足不偏廢為異耳大凡治中風之藥必先順氣後以疎風其功可獲若中氣妄用風藥其悞豈淺哉此病皆由七情不調氣鬱所致以富貴汲汲貧賤戚戚久思不遂鬱而不通者成此氣中之疾所用之劑調降其氣自然平復經曰暴喜傷陽暴怒傷陰憂思不樂遂多厥逆此之謂也與夫中風中氣何以別之當辨其脈若浮盛而弦緊或浮而洪斯為風也脈沉而伏者為中氣治中氣比多風少先以蘇合香丸薑汁磨化擦牙通竅人事漸甦然後徐灌服看其虛實若虛則補若實則瀉寒則溫熱則清切其脈理審病詳細用藥主治無不效矣若一藥作風治之則愈傷脾胃氣所悞以反掌之間經云無故而得瘖瘖不至者不治此為寒氣暴逆故也俟其氣復則已切不可用疎風泄氣之劑悞人性命醫工不諳是理反加發散導散其氣虛邪愈作遂致不瘖可不痛哉

風證通治方

八味順氣散 凡有風之人先服此藥順氣次進風藥

人參 白朮 茯苓 去皮 青皮

陳皮 去白 白芷 烏藥 各一各半 甘草 七分半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

烏藥順氣散 治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛

遍身頑麻九卒手足癱瘓言語蹇澀先宜多服此藥以疎

通氣道然後隨證投以風藥

烏藥 陳皮 各二各半 麻黃 去根節 白僵蠶 炒去絲

川芎 枳殼 炒 甘草 炙 桔梗

白芷 各一錢 乾薑 炮半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服

排風湯 治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯亂

乎足不仁痰涎壅盛

白鮮皮 當歸 去片 肉桂 去粗皮 芍藥

杏仁 去皮尖 麻黃 去根節 甘草 防風 去芦

川芎 獨活 各一錢 茯苓 去皮 白朮 各二錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時溫服

省風湯 治卒急中風口禁全不能言口眼喎斜筋脈急掣

疼痛風盛痰實頭目眩眩胃膈煩滿左癱右瘓手足麻痺

骨節煩疼恍惚不定神志昏憤一切風證可服

防風 去芦 天南星 各錢半 夏 湯洗 黃芩 各二錢

甘草 各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

大醒風湯 治中風痰涎壅盛半身不遂歷節痛風筋脈拘急

南星 四錢 防風 二錢 全蝎 半錢 微炒 附子 去皮臍生用

獨活 甘草 各一錢

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

大防風湯 去風順氣活血壯筋又治刺後脚痛緩弱不能行

履名曰刺風或兩膝腫痛脚脛枯細名曰鶴膝風

防風 熟地黃 白朮 羌活

人參 川芎 黃芪 牛膝 各一錢

附子 炮去皮臍 當歸 酒洗 杜仲 姜汁炒去絲 芍藥 各一錢半

甘草 炙半錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

消風散 治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻涕聲重耳作

蟬鳴皮膚頑麻癢癢癢癢婦人血風頭皮腫痒並治之

荆芥穗

甘草各一錢半

陳皮

人參

茯苓去皮

白礬炒去絲

防風

川芎

藿香葉

蟬返

厚朴

羌活各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

小續命湯

治中風半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澀

麻黃去節

人參去芦

黃芩

芍藥

甘草炙

川芎

杏仁去皮尖麩炒

防己各一錢

肉桂七分

防風一錢半

附子炮去皮臍二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

中風無汗惡寒倍加麻黃防風杏仁

中風有汗惡風加桂枝

中風身熱無汗不惡寒加石膏知母

中風身熱有汗不惡風加葛根

中風無汗身涼倍加附子加乾薑

中風有汗無熱倍加附子加桂枝

三生飲 治卒中風昏不知人口眼喎斜半身不遂并痰厥

氣厥

南星五錢生用

木香一錢半

川烏一錢生用

附子一錢去皮生用

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服有卒中

風不省人事者以蘇合香丸用生薑自然汁化開擦牙

大素元湯 治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔為

血弱不能養於筋故手足不能運化言強不能言宜養血

而筋自榮

秦朮

石膏各一錢半

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風

黃芩

白芍藥

白芷

白木

生地黃

熟地黃

白茯苓各一錢

細辛五分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服如心下

痞加枳實一錢

星香湯

治中風痰厥服熱藥不得者

南星六錢

木香一錢

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

救急稀涎散

治中風四肢不收痰涎壅塞氣閉不通

晉礬一兩

猪牙皂角四箇肥實不蛀者去黑皮

右為細末碾勻每服二錢溫水調下以吐為度

川芎石膏湯

治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴

石膏

桔梗各一錢

川芎

芍藥

山施

人參

白朮各五分

黃芩

大黃

菊花

荆芥穗

防風各七分

寒水石

甘草各二錢

滑石三錢

連翹

薄荷各一錢

縮砂三分

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

防風通聖散

治一切風熱等證

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷葉

麻黃

連翹

芒硝各五分

石膏

黃芩

桔梗各一錢

滑石三錢

甘草二錢

荆芥

梔子

白朮各二分半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服如痰厥

加半夏一錢

半黃清心丸

治諸風緩緩不隨語言蹇澀痰涎壅盛心狂

健忘或發癲狂並皆治之

羚羊角各二兩半 犀角各二兩半 龍腦另研各二兩 人參去芦

蒲黃各二兩半 白茯苓各二兩半 芍藥各二兩半 柴胡

杏仁另研 桔梗各西 防風去芦 白朮

白芍藥 麥門冬 黃芩 神麴

當歸各二兩半 阿膠炒 大豆黃卷 肉桂各兩七錢半

乾薑七錢半 牛黃西 犀角二兩另研 雄黃八錢另研

金箔千二百箔 甘草五錢 乾山藥十兩 白斂七錢半

大棗一百棗另研

右除大棗杏仁金箔羚羊角犀角麝香龍腦雄黃另研餘藥別研為細末入羚羊角等藥七味入內再研和勻將大棗煮熟去皮核搗爛如泥同煉蜜為丸每一兩作十九金箔為衣每服一九食後溫水化下

祛風至寶丹 治諸風熱等證

防風 芍藥各兩半 石膏 黃芩

桔梗 熟地黃 天麻 人參

羌活 獨活各兩 當歸 川芎各二兩半

滑石三兩 甘草二兩 梔子六錢 白朮二兩三錢

連翹 荆芥穗 薄荷 麻黃

芒硝 黃連 大黃 黃柏

全蝎 細辛各五錢

右為細末用煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼茶酒任下臨臥服

三化湯 治中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證

治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚朴姜製 羌活各二錢 枳實一錢半 大黃四錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

滌痰湯 治中風痰迷心竅舌強不能言

南星姜製 半夏湯洗七次各二錢半 枳實姜炒二錢

茯苓姜製 橘紅一錢半 石膏蒲 人參各一錢

竹茹七分 甘草半錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

羌活愈風湯 治腎肝虛筋骨弱語言難神昏憤風濕內弱

風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂心不寧自

勞役則百病生心靜則万病息此藥能安心養神調陰陽

無偏勝

羌活 甘草炙 防風去芦 黃芪去芦

人參去芦 蔓荊子 川芎 細辛去苗

枳殼炒 地骨皮去骨 麻黃去節 知母去毛

杜仲炒去絲 秦艽去芦 柴胡去苗 拘杞子

當歸去芦 獨活 白芷 半夏姜製

厚朴姜製 防己 芍藥 黃芩

白茯苓 甘菊花 薄荷 前胡各七分半

石膏 生地黃 熟地黃 蒼朮各一錢

官桂去皮半錢

右作二服每服水二鍾生薑三片煎至一鍾空心服臨睡

查再煎服

加減三五散 治八風五痺肢體不仁大治風寒入腦陽虛

頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴濕痺脚氣緩弱並治

細辛八兩 乾薑炮十兩 防風土兩去芦 山茱萸十六兩去核

茯苓十六兩去皮

右為細末每服二錢食前溫酒調服

資壽解語湯 治心脾中風舌強不語半身不遂

附子炮去毒 防風去毒 天麻 酸棗仁各一錢半

羚羊角 官桂 羌活各一錢 甘草五分

右作一服水二鍾煎至一鍾入竹瀝二匙不拘時服

取竹瀝法用鮮竹數竿截長一尺餘許劈開作片用磚兩

口對立置竹在上其下着火磚外兩頭各置碗以盛竹瀝

瀝盡以絹濾澄清夏秋沉冷水中防瀝酸大熱有風痰人

亦可單服冷煖隨意勿過度劑柴燒瀝法同

青州白丸子 治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫

及小兒驚風並皆治之

南星生用 白附子各二兩 川烏頭兩去 半夏七兩好白者

右礮為細末以生絹袋盛於井花水內攤出未出者更以

手揉令出以滓更研再用絹袋攤盡為度於磁盆中日曬

夜露每旦換新水攪而後澄春五夏三秋七冬十日去水

曬乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清為丸如棗豆大每服

二三十丸生薑湯送下不拘時服如癱瘓風濕酒送下小

兒驚風薄荷湯下三五丸

清神散 消風化痰治頭風日眩耳鳴鼻塞咽嗑不利

檀香剉 人參去毒 羌活 防風各五兩

甘草炙 荆芥穗 薄荷各一兩 細辛去

石膏研各二兩半

右為細末每服二錢食後沸湯點服

燥洗藥 治一切風疾燥痒淋洗

乾荷葉 藿香葉 威靈仙 藜蘆各三兩

陵零香 茅香各四兩 香白芷 井松各二兩

煎湯無風處帶熱洗燥

追風散 治諸風上攻頭疼目眩鼻塞聲重皮膚癢痒眉角牽

引婦人血風及一切頭風並治之

川烏炮 石膏另研 防風去毒 甘草炙

白僵蚕去絲 全蝎炒 荆芥各二兩 川芎三兩

麝香另研一兩

右為細末每服二錢食後臨臥茶湯調下

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重

川芎 荆芥穗各四兩 細辛去毒 白芷

甘草 羌活各兩 防風去毒 薄荷各八兩不見火

右為細末每服二錢食後茶清調下常服清頭目

搐鼻通天散 治卒暗中風倒地牙關緊急人事昏沉

川芎 細辛 藜蘆 白芷

防風 薄荷各一錢 猪牙皂角刮去皮三箇

右為細末用蘆筒納藥每用少許吹入鼻中

五臟正治方

夫肝臟中風者其候筋脉拘攣手足不收厲風入肝坐踞不得

曾背強直脇肋脹滿目眩心煩言語蹇澁此其是也

犀角散 治肝臟中風流注四肢上攻頭面疼痛言語蹇澁

上焦風熱口眼喎斜脚膝疼痛無力

犀角屑二錢 石膏二錢 羌活去毒一錢半 羚羊角一錢半

人參 井菊花 獨活去毒 黃芩

天麻 枳殼去核炒 當歸去毒 黃芪二兩

芍藥 白木 酸棗仁 防風

白芷各五分 甘草三分

石作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

蕙苡仁散 治肝臟中風四肢蹇急身體強直

牛黃 另研	麝香 另研	犀角屑	羚羊角屑
龍齒 另研	防風 去芦	天麻	獨活 去芦
人參 去芦	茯神 去木	川升麻	甘草 炙
白鮮皮	遠志 去心	天竺黃 各二錢 半另研	硃砂 水飛
鐵粉 另研	麥門冬 去心 各半兩		
右為細末研勻每服二錢煎麥門冬湯調下不拘時服			
遠志湯 治心經受病多汗惡風善怒口不能言其狀但得			
偃卧不可傾側悶亂胃絕汗出風中於心也唇色正赤尚			
猶可治急灸心膺百壯或青黃不定面色時時戰慄動者			
不可治			
遠志 去心 二錢	人參 去芦	石菖蒲	羌活 去芦
細辛 洗去苗	麻黃 去根 各半兩	赤芍藥	白木 各一兩
右為細末每服二錢煎小麥湯調下不拘時日服二次			
犀角丸 治心臟中風語言顛倒神思錯亂頭面心骨煩熱			
或時舌強語澀驚悸不安並皆治之			
犀角屑	羚羊角屑	天麻	防風 去芦
遠志 去心	羌活 去芦	沙參 去芦	茯神 去木
川升麻	天門冬 去心	萎蕤	玄參 各七錢 半
牛黃 另研	麝香 另研 各二錢 半	龍齒 另研	鐵粉 另研
硃砂 各一兩 水飛過	金箔 另研 十片	銀箔 另研 十片	
右為細末研勻煉蜜和搗五七百下丸如梧桐子大每服			
五十九不拘時以薄奇湯送下			
硃砂丸 治心臟中風手足驚掣心神狂亂恍惚煩悶言語			
澀澀並宜服之			
硃砂 水飛	犀角屑	羚羊角屑	人參 去芦
茯神 去木	遠志 去心	龍齒 另研 各一兩	麥門冬 去心

鐵粉 另研 各一兩 半	防風 去芦	黃芩	漢防己 去皮
秦艽 去土	天麻	升麻 各七錢 半另研	鉛霜 半錢
右為細末入研藥勻煉蜜和搗三四百下丸如梧桐子大			
每服二十九粒米湯送下不拘時服			
石斛酒 治心臟中風下注腰脚除頭面遊風兼補損			
石斛 四箇	黃芪 去蘆	人參 去芦	防風 去芦 各一兩 半
硃砂 水飛	杜仲 炒去絲 牛膝 酒浸	五味子	
白茯苓 去皮	山茱萸	山藥	萸薢 略 二
細辛 去苗	天門冬 去心 生薑 各三	薏苡仁	
拘杞子 各半兩			
右為以咀并入硃砂末酒五斗用稀絹袋裝浸三日三			
夜後溫熱酒隨量飲之不可斷絕服不拘時候			
脾臟中風			
歧伯曰季夏戊巳傷於邪者為脾風脾風之狀多汗惡風身體			
怠墮四肢不欲動色微黃不嗜食言語澀澀口喎僻肌膚不仁			
腹膨心煩翕翕發熱神思如醉手足不能重診其脈浮緩者			
是脾臟中風也			
獨活散 治脾臟中風胃滿痰涎言語澀澀翕翕發熱志意			
昏濁並宜服之			
獨活 去蘆 一錢 半	防風 去芦	茯神 去木	人參 去芦
附子 炮去	前胡 去芦	沙參 去芦	半夏 湯洗 七次
黃芪 去蘆	旋覆花	羚羊角 各一錢 半	甘草 炙 一錢
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服			
白米湯 治脾經受病多汗惡風身軀怠墮四肢不動不能			
飲食口角兩邊黃者可治其狀但臨而腹滿通身黃色口			
吐酸水風中於脾也急灸脾膺百壯目下及手足青者不			

可治	白朮二錢	厚朴二錢	防風二錢	附子炮去
橘紅	白蘇皮	五加皮		
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服				
細辛散	治脾臟中風肉熱肌層滿滿如虫行或膝理開汗			
大漢脾肉色不澤唇鼻黃色				
細辛去苗	白朮去蘆	獨活去蘆	附子炮去	
肉桂	防風去蘆	厚朴姜製	麻黃去脚各	
枳實炒	甘草			
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服				
防風散	治脾臟中風手足緩弱舌強語澀胃膈煩悶志意恍惚身體沉重宜服之			
防風去蘆	麻黃去脚	人參去蘆	川芎	
附子炮去	桂心	黃芪	赤茯苓去皮	
酸棗仁	白朮	獨活	桑皮	
羚羊角	甘草五分			
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服				
羚羊角丸	治脾臟中風口面偏斜語謇虛煩手足腰脚不隨			
羚羊角	防風去蘆	漢防已去皮	白芍藥	
白茯苓	獨活去蘆	酸棗仁	麥門冬去心	
杏仁	各七錢半	乾熱地黃	川芎	
附子炮去	乾熱地黃	川芎	桂心	
附子仁	當歸	薏苡仁		
右為細末煉蜜和搗二三百下丸如梧桐子大每服五十				
丸空心及晚食前溫酒下忌鷄猪肉粘滑之物				
天麻丸	治脾臟中風身軀怠墜四肢緩弱惡風頭痛舌本			

強直語言蹇澀皮膚頑麻並宜服之				
天麻	獨活去蘆	附子炮去	桂心	
麻黃去節	烏蛇肉	全蠍	白僵蠶	
人參去芦	防風去芦	細辛去苗	羚羊角	
當歸	白朮	薏苡仁	牛膝酒	
川芎	天南星	牛黃	麝香	
茯神	砂	龍腦		
右除珠砂牛黃麝香龍腦另碾餘藥碾為細末同珠砂等				
藥和勻煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每服三五				
丸不拘時溫酒下				
肺臟中風				
岐伯曰以秋庚辛中於邪者為肺風由腠理開疎正氣虛怯風				
邪所侵攻於肺臟也肺主氣氣為衛衛為陽陽氣行於表循於				
皮膚若衛氣虛少風邪相搏則曾滿短氣謂金木相制肝肺相				
剋胃悶汗出虛吸顫掉語聲嘶塞身體沉重四肢痿弱其脉浮				
弦者是肺臟中風也				
五味子湯	治肺經受病多汗惡風時咳短氣晝寢夜甚其			
狀偃卧曾滿息促胃悶風中於肺也其鼻兩邊下至於口				
上至於眉白色急灸肺俞百壯若色黃其肺已傷化而為				
血不可治也若妄撮空指地拈衣摸床如此數日必死矣				
五味子	杏仁	桂心	防風	
甘草	赤芍藥	川芎	川椒	
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服				
獨活散	治肺臟中風頭痛項強背痛鼻乾心悶語聲不出			
獨活	細辛	附子	菊花	

麻黃 去節 白芷 五味子 紫苑茸
 赤茯苓 去皮 肉桂 白木 川芎
 桑白皮 各一 甘草 炙半錢 杏仁 剉碎去皮 防風 去節 各
 作一服水二鍾煎一鍾不拘時服

麻黃散 治肺臟中風心曾氣促項背強硬皮膚不仁並宜服之
 麻黃 去節 附子 炮去 天麻 防風 去節
 細辛 去苗 杏仁 炮去 葛蒲 白蒺藜
 桑白皮 白花蛇肉 浸酒 荊芥 各七錢 麝香 錢半
 右為細末同和勻每服二錢薄奇酒調下不拘時服

腎臟中風 岐伯曰以冬壬癸中於邪者為腎風腎氣虛弱風邪所侵則踞而腰疼不得俛仰或則偏枯兩耳聾鳴語聲渾濁面色浮腫骨節痠疼精神昏憤喜恐好忘肌色薰黑身體沉重多汗惡風隱曲不利此是腎臟中風也

獨活散 治腎臟中風腰脊疼痛不得俛仰兩脚冷痺緩弱不隨頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重並宜服之
 獨活 去節 附地 去 當歸 去節 防風 去節
 天麻 桂心 各一錢 川芎 丹菊 花
 枳殼 麩炒 山茱萸 去核 黃芪 丹參 去節
 牛膝 酒浸 草薢 酒浸 甘草 炙 細辛 去苗
 葛蒲 白木 各半錢

草薢散 治腎經受病多汗惡風面浮腫脊骨疼不能行立肌膚變色但坐而腰痛此風中於腎經也視脇下左右上下赤黃如餅者可治急灸腎俞百壯齒黃髮鬚直面如土

色者不可治 狗脊 杜仲 炒去絲 白茯苓 去皮 各
 何首烏 天桂 去皮 澤瀉 各半兩
 右為細末每服二錢米飲調下不拘時服

天雄散 治腎臟風邪所傷語言蹇澀腰脊不可轉側脚膝軟弱疼痺頭眩耳鳴身體沉重無力並宜服之
 天雄 炮去皮 麻黃 去節 枳殼 麩炒 桂心 各六分
 石龍芮 獨活 人參 去節 防風 去節
 茯苓 去木 杜仲 炒去絲 草薢 酒浸 丹參 去節
 羌活 去節 當歸 去節 五味子 牛膝 酒浸
 細辛 去苗 各一錢

天麻丸 治腎臟氣虛風邪所中腰脚緩弱無力視聽不聰
 天麻 肉蓯蓉 各一兩半 酒浸一宿
 附子 炮去皮 巴戟 酒浸 葛蒲 草薢 酒浸
 天桂 炮去皮 杜仲 炒去絲 當歸 炒去節 肉桂 去皮
 牛膝 酒浸 獨活 去節 丹參 去節 鯢鱗 炒各
 鹿茸 酥炙 磁石 各二兩 煅

腰脊痠疼臍腹虛冷顏色不澤志意昏沉並宜服之
 天麻 肉蓯蓉 各一兩半 酒浸一宿
 附子 炮去皮 巴戟 酒浸 葛蒲 草薢 酒浸
 天桂 炮去皮 杜仲 炒去絲 當歸 炒去節 肉桂 去皮
 牛膝 酒浸 獨活 去節 丹參 去節 鯢鱗 炒各
 鹿茸 酥炙 磁石 各二兩 煅

吳茱萸丸 治腎經震損惡風多汗面色浮腫腰膝痠痛形色憔悴並宜服之
 吳茱萸 細辛 白茯苓 去皮 獨活 去節
 山茱萸 去核 木香 牛膝 酒浸 石斛
 草薢 酒浸 附子 炮去皮 葛蒲 各二錢

右為細末以酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九空心用鹽湯送下日進二次

狗脊丸 治腎臟風虛毒氣上攻下注腿膝脚氣腫痛並宜服之

狗脊 草薢酒浸 防風去芦 川烏頭炮去皮脐

牛膝酒浸 肉桂卷酒浸 破故紙炒 巴戟酒浸去心

葫蘆巴炒 甜瓜子炒 威靈仙 沒藥另研各

自然銅四兩火煨醋淬 常歸一兩去芦

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十九加至三十丸食前用溫酒送下日服二次

黃芪丸 治腎臟風毒上攻下注麻痺腫痛少氣無力並宜服之

黃芪去芦 川椒炒 茴香炒 川烏頭炮去皮脐

狼毒 防風去芦 川練子炮去皮子 白蒺藜炒

地龍去土炒 黑附子炮去皮 赤小豆各等分

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十九加至四十丸食前用溫酒送下日進二服

萬靈丸 治腎臟虛寒耳鳴腰痛筋骨痠疼

草烏去皮脐 細辛去苗 赤芍藥 五靈脂

地龍去土炒 防風去芦 黃芪去芦 海桐皮

骨碎補去毛 黑狗脊 青皮去白 牛膝酒浸

何首烏 蔓荊子 御米子炒各 紫荊花三錢

白附子炮去皮 巨勝子 川烏頭炮去皮 蒼朮一兩

黑牽牛為末 山茵陳一兩

右為細末酒糊丸如梧桐子大每服十九至二十九空心溫酒送下

經驗百效良方卷之一

太醫院經驗奇效良方卷之二

順風勻煎散 治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此

白朮四錢 天麻一錢 沉香 白芷

青皮各半錢 甘草各半錢 人參一錢 烏藥三錢

紫蘇 木瓜各半錢

分作二貼每貼水二盞生薑三片煎八分溫服二渣併煎

風氣腰疼亦宜服之

獨活酒 治中風通身令口禁不知人者

獨活四兩去芦

用好酒四大盞煎分二三次熱服

側子散 治中風手足不遂言語蹇澀用之累驗

側子炮 附子炮 人參 白朮各七

防已半錢 白茯苓七分半 麻黃七分半 防風七分半

甘草四分 川芎 秦艽 茯神各七分半

當歸 細辛 肉桂各一錢 赤芍藥七分半

右剉分作二貼水二盞生薑三片棗一枚去核煎服

牽正散 治中風口眼喎斜半身不遂

白附子 僵蚕 全蠍

右等分生用為末熱酒調下不拘時服二錢

治口眼喎斜方

桂心用酒煮取汁紙蘸貼患處左喎貼右右喎貼左

一方用大鱈魚一條以針刺頭上血左喎塗右右喎塗左正即

洗去鱈魚放之

一法灸耳垂下艾炷三壯左灸右右灸左

正舌散 治中風舌本強難轉語不正神效

蝟梢去毒二 茯苓一兩

右劉分二貼每貼水二盞生薑五片棗一枚去核煮八分去滓不拘時服

轉舌膏

治中風痰塞舌蹇不語即涼隔散加石菖蒲遠志為末煉蜜為丸如彈子大珠砂為衣每服一丸薄荷湯化開食後或臨臥服

活命金丹

治中風神不清即涼隔散加青黛藍根右為細末煉蜜為丸如彈子大珠砂為衣金箔蓋每服一丸茶清化開食後臨睡服

肥翁祛風丸

治左癱右瘓最效
白花蛇 頭一箇帶項 烏梢蛇 尾二箇長七寸酒浸炙
川烏尖 七箇去黑皮 附子底 四箇去黑皮 半夏 姜製
白附子 細辛 防風 天麻

全蝎

去毒如 鱧鱓 炒去毒 草烏 地各五錢 片腦 一分

四白丹

清肺氣養魄中風多昏胃肺氣不清也
白木 人參 縮砂
香附 甘草 防風 川芎 各五錢
白芷 一兩 白檀香 三錢半 知母 二錢 羌活

薄荷

獨活 各一錢半 細辛 三錢 麝香 一錢另研
牛黃 半錢另研 龍腦 半錢另研 麝香 一錢半 甜竹葉 二兩

石為細末

煉蜜為丸每兩作十九粒臨睡嚼一丸煎愈風湯送下上清肺氣下強骨節

大神効活絡丹

治風濕諸痺筋骨疼痛清心明目寬胃益

血養氣暖腰膝臂疼痛口眼喎斜行步艱辛筋脉拘攣年四十已上每服一九至老不生風疾大有神効

白花蛇

二兩酒浸焙乾 烏梢蛇 半兩酒浸焙乾 麻黃 二兩去毒 細辛 一兩去土

全蝎

去毒 兩頭尖 兩隻 赤芍藥 一兩 貫芎 二兩

防風

二兩半 葛根 一兩 沒藥 一兩 血竭 七兩半 烏犀骨 半兩 地龍 半兩 甘草 二兩去皮

丁香

一兩 白僵蠶 一兩 乳香 一兩 麝香 半兩 片腦 一兩半 官桂 二兩去皮 草豆蔻 二兩 川羌活 二兩

虎脛骨

一兩 去毒 玄參 一兩 半黃 二兩半 威靈仙 一兩半 天麻 二兩 蘆香 二兩 天然黃 一兩 敗龜板 二兩炙

人參

一兩 何首烏 二兩 白芷 二兩 烏藥 一兩 安息香 一兩 青皮 一兩 黑附子 一兩炮 香附 一兩 白豆蔻 一兩 骨碎補 一兩 黃連 二兩 茯苓 一兩

黃芩

二兩 白木 一兩 熟地黃 二兩 松香脂 半兩 大黃 二兩 當歸 一兩半 木香 二兩 沉香 一兩 金箔 為衣

右為細末

煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼溫酒茶清漱下隨證上下服之頭風搖茶下

追魂湯

治卒厥暴死及客忤鬼擊蜚尸奄忽氣絕口噤分作二服煎至七分去滓灌之口噤幹開若更不下分病人髮左右提掇有引之藥下漸甦若唇青身冷為入臟即死身和汗出即愈

黃耆酒

治風濕痺身熱癢麻皮膚瘙癢筋脉拘攣言語蹇澀手足不遂時覺不仁

黃耆

防風 桂心 天麻

羊躄	石斛	虎骨	白芍藥
當歸	雲母粉	白朮	茵芋葉
木香	仙靈脾	甘草	川續斷
右劉生縮袋或好酒一斗浸之五日夏三日月秋七日冬十日每次一盞溫服不拘時候常令酒氣相續為佳			
虎骨散	一名乳香定疾散	治風毒邪氣乘虛攻注皮膚骨隨之間血氣相搏往來交繫痛無常處遊走不定晝靜夜劇少得眠睡筋脉拘攣不得屈伸	
血竭	另研	附子炮	赤芍藥
肉桂	去皮	白芷	沒藥
骨碎補	自然銅	火煨	牛膝
天麻	橫柳	羌活	虎脛骨
敗龜板	各一兩	蒼耳子	微炒
右為細末每服一錢溫酒調不拘時服			
透骨膏	治一切風濕走注疼痛		
生乾地黄	馬鞭草	各半斤	吳茱萸
骨碎補	敗龜板	各四兩	鱉甲
右為細末用米醋調似膏子火上溫熱攤於痛處用紙裹候冷再炒於避風處用之			
薏苡仁湯	治中風手足流注疼痛麻痺不仁難以屈伸		
薏苡仁	當歸	芍藥	麻黃
官桂	各一兩	甘草	蒼朮
右劉每服七升半水二盞生薑七片煎至八分去滓食前溫服自汗減麻黃熱減官桂			
如神救苦散	治左癱右瘓風濕痺走注疼無問男子女人遠近並皆治之		

御米殼	去頂殼	陳皮	去白
乳香	研	沒藥	研
右為細末每服三錢水一盞煎八分連滓熱服如煎藥一順攪之忌雞猪等肉			
十味劉散	治中風血弱臂痛連及筋骨舉動艱難		
當歸	黃耆	白芍藥	附子
川芎	防風	白朮	肉桂
茯苓	熟地黄	酒浸	各
右咬咀分二貼每貼水二盞生薑八片棗二枚煎至八分食後臨臥服			
龜甲湯	治中風手足不隨舉體疼痛或筋脉學急		
龜甲	醋炙	虎骨	海桐皮
丹參	獨活	草薢	羌活
五加皮	酸棗仁	炒	附子
天麻	去毒	防風	去叉
當歸	切焙	桂心	紫參
右劉如麻豆每用八錢七水一盞酒一盞生薑十片同煎去滓取一大盞溫分三服空心日午夜臥服出汗併二服如人行五里以熱生薑稀粥投厚衣覆汗出慎外風			
活命金丹	治中風不語半身不遂肢節頑痺痰涎上潮咽噎不利飲食不下牙關緊及解一切藥毒酒毒發熱腹脹大小便不利胃膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱不退勞病諸藥不治無問老幼男子婦人俱宜服之		
貫衆	甘草	板藍根	鮮薑
乾薑	各一兩	龍心	研
麝香	研	老薑	各三錢

一五二一冊續修四庫全書第 10 版及內

牛黃 研 生犀 珠子末 薄荷 各半兩

大黃 兩半 辰砂 四錢 另研半 桂心 三兩

右為細末與研藥和勻煉蜜同水浸蒸餅為劑每兩作十
丸以硃砂為衣就濕以真金箔四十箔為衣臘月脩合磁
器收貯多年不壞如瘵風毒茶清化下解藥毒新冷水化
下汗後餘熱勞病及小兒驚熱薄苛湯化下已上並量病
入大小加減用之大有効 一方無買藥

附子湯 治中風欲死身體緩急目不得開舌強不能語

芍藥 甘草 炙 麻黃 去根節 白朮 各一兩

防風 去叉 防己 各一兩半 附子 炮裂去皮 人參

黃芩 去黑心 桂心 獨活 去芦 川芎 各一兩

天雄 炮裂去皮 右劉如麻豆每服五錢七水一盞半入生薑半分切煎至

八分去滓空心日午夜卧各溫服如人行五里以熱生薑
粥投之微汗出慎外風

神照散 治中風昏塞肢體不收口眼喎斜

木香 白茯苓 去皮 川芎 蒺藜 炒去角

人參 獨活 去芦 黃耆 剉一兩 附子 炮裂去皮

遠志 去心 草薢 茵芋 各一兩 梔子仁 二兩

右為細末每服一錢七溫酒調下加至二錢三錢空心日
午夜卧服

桂附續命湯 治中風有汗無熱

桂枝 附子 甘草

依本方加一倍宜鍼太谿此一證少陽經中風也用水煎
服

通關散 治失音不能言由風邪客於脾經上入關機者舌

木也又關隔不通其人精神昏憤失志

白僵蠶 兩半 羌活 三分 麝香 半錢

右為細末每服二錢先以薑汁少許調勻以沸湯浸放溫
服之以真葛蒲末時時著舌根下

治中風失音并一切風疾

以白僵蠶七枚為末用酒調服方寸七立効

治感風不能語

以黃耆防風煮湯數斛置床下薰之

昔唐許喬宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時有柳太后感
風而不能言脉沉而口噤喬宗曰既不能下藥宜湯氣薰
之藥入腠理週時可瘥乃造此湯數斛置床下氣如烟霧
其夕便得語藥力薰蒸其効如此

三聖散 治中風舌強不語

沒藥 研 琥珀 研各 乾蝎 七枚 全

右為細末每服三錢七用鵝梨汁半盞皂角末一錢七濃
煎湯一合與梨汁相和調下須臾吐出涎毒便能語

井竹瀝湯 治卒中惡風噎倒悶口噤不能語肝厥尸厥死
不識人閉目灸鍼不知痛風狂宜服此湯

井竹瀝 一斗 生薑 三兩 防風 甘草 各

防己 麻黃 去節 人參 黃芩

白朮 細辛 茵芋 秦艽

桂心 各一兩 附子 一枚 大

右以咀以湯漬藥令赤合竹瀝煮取四升分為四服忌海
藻菘菜桃李雀肉生葱生菜猪肉冷水

白礬散 治一切急風口噤不開

白礬 半兩 益花 一分

太醫院經驗奇效良方大全 卷二

一二九三

右並細研以手點指牙根下更將半錢七以綿裹安于盡頭

治中風牙關緊急方

用甘草比中指節截作五截於生油內浸過炭火上炙候油入甘草以物斡開牙關令咬定甘草可人行一里時候又換甘草一截後灌藥極効

白神散

治中風或吐瀉牙關緊閉下藥不能

用白梅末不以多少將指牙立開蓋酸能收斂自然齒骨易開也

金箔丸

治風癱奄忽不知人喉中噫噫然有聲舌強不能言身軟自汗口吐涎沫項背強直神志昏憤

金箔 研一百片 犀角屑 另研 牛黃 另研 丁香 另研 龍腦 另研 沉香 另研 珍珠末 另研

木香 另研 麝香 另研 琥珀 另研 蓬砂 另研 烏蛇 酒浸去 天麻 酒浸切焙 雄黃 另研 錫精 炒

白殭蠶 炒 附子 炮裂去 南星 炮 防風 去 白附子 炮 甘草 一分 丹砂 另研 墨 燒研

右將九味各依製度研為細末却入另研藥一處和勻將金銀箔入水銀三分同研如泥與諸藥再研和勻煉蜜和丸如菜豆大每服大人五九薄荷酒下小兒二九薄荷湯化下

消風丸

治風邪引頰口喎僻言語不正

草烏頭 半斤用香油炒 麻黃 去節根先煎 白芷 各半兩 附子 炮裂去皮 防風 去 白茯苓 去皮

藿香葉 乾薑 炮 前胡 去 青橘皮 去白炒 桂心 各一兩 甘草 炙二兩 龍腦 研 麝香 研

丁香 木香 白殭蠶 炒 各一分 烏角 不蛀者一兩一分 去皮子蘇炙焦黃

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九用溫酒化下不拘時候服

不換金丹 治中風口喎

荆芥穗 白殭蠶 炒 天麻 甘草 炙 防風 各一兩 川烏頭 半兩 白附子 生用 羌活 去 細辛 去葉 川芎 蠟 精 去毒炒 藿香 各半兩 薄荷 三兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼茶酒任下如口喎向左即右腮上塗之便正

搜風順氣丸

治風濕氣口服喎斜大便結澀

人參 一兩半 麻子仁 栝子仁 大黃 各一兩 皂角 用二兩 黑牽牛 六分 仙 二兩 朴硝 半兩

一字散

治賊風吹著口眼喎斜

烏頭 生用 青礬 各半兩

蒜塗法

治中風口眼喎斜

草麻膏

治中風口眼喎斜不正

大草麻子 二十四箇正東面以蒜 七箇至西面上取七箇 巴豆 七箇 去皮

右為泥成膏子後加麝香半錢一處和成膏子左患安藥於右手勞宮穴內用紙七重蓋定藥餅上於碗坐在藥上碗用熱酒蒸之如右患用左手略坐一時辰用手托碗便正也一方無麝香

松葉酒 治中風口眼喎斜亦治三年中風不較者

用青松葉一斤細剉如豆木石臼中搗令汁出用生絹囊貯以清酒一斗浸二宿近火煨一宿初服半升漸加至一升頭面汗出即止或無酒止用水浸亦可

蜘蛛摩方 治中風口喎

用蜘蛛大者一枚摩其偏緩頰車上及耳前候視正則止亦可向火摩之或取蜘蛛大網絲成團如彈子摩之亦得

白魚膏 治中風口眼喎斜

用衣中白魚七枚摩偏緩一邊繞正便止恐大過凡患急邊緩邊皆有病先摩緩邊次摩急邊急邊少用

皂角膏

治中風口喎不正語則牽急四肢 餘無他苦此由君憂不便因卧而孔風入耳客於陽明之經宜傳之

用大皂角五兩去皮子為末以三年米醋和左喎塗右右

喝塗左乾更塗之

三蛇散 治諸風口眼喎斜

吳公三條一條蜜炙一條酒浸一條 南星 三箇每箇切作四塊 逐箇如吳公法製

白芷 半兩

右為細末入真麝香少許熱酒調一錢食後服

清涼丹

治風熱壅實上攻頭面口眼喎斜語言不正肌肉

熱並皆治之

片腦 半兩另研 牛黃 三兩另研 蠲瘡 去毒心 石膏 已上二味 各一兩半

白花蛇 酒浸 犀角屑 防風 去叉 升草 炙

珍珠末 硃砂 大黃 已上七味 南星 未四兩臘月 黃牛膽製者

右為細末研勻煉蜜為丸每兩作十九粒服一丸薄荷湯 化下食後服

治中風口喎

以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面以麵密封塞不透風一頭以艾炙之七壯患右灸左患左灸右耳痛亦灸得

換骨丹 治中風癱瘓久不愈四肢躄曳不隨服諸藥不効

麝香 研半錢 桂心 一兩半 井松 去土 川烏 生用去

白芥子 炒 藿香 草烏 去皮斷 海桐皮 炒

何首烏 羌活 龍腦 研 骨碎補 去毛炒

牛膝 酒浸炒 威靈仙 去土 桑皮 炒 槐角

木鱉子 炒 青皮 去白 自然銅 研碎 陳皮 去白各

白芷 防風 甜瓜子 炒 革薢 炒

五靈脂 川芎 井草 益水炙 苦參

白膠香 各半 硃砂 二兩為衣 麻黃 去根節一十斤阿水七斗煮減半

右為細末用麻黃膏子入煉蜜少許搜成劑丸如彈子大

硃砂為衣每服一九食後搥碎茶酒任下或用生薑自然

汁更入酒半盞化開服可更進酒一二盞投之日二服至

三日於病處微汗為効至十日大効無不愈但藥性稍熱

病寒者多効

天麻浸酒方 治癱瘓風不計深淺又在床枕

天麻 骨碎補 龍骨 虎骨 酒炙

烏蛇 酒浸去 白花蛇 酒浸去 惡實 切焙 熟地黃 焙各

松節 剉 敗龜板 醋炙 川芎 當歸 切焙各

茄子根 切焙 大麻仁 原蠶沙 炒各 附子 炮裂去皮

菴活 去叉 獨活 去芦 牛膝 酒浸炒 各半兩

右咬咀如麻豆大用酒二斗浸密封春夏三日秋冬七日

熟每服一匙不拘時溫服

金虎丸 治癱瘓風

南星	天麻	白附子	烏蛇 <small>酒浸去</small>
附子 <small>去火麻</small>	乾蝎 <small>去土</small>	狼毒	白僵蠶 <small>各兩</small>
桂心	檳榔 <small>三兩</small>	五靈脂	烏頭 <small>去皮麻</small>
牛黃	麝香	丹砂 <small>三味同細</small>	

右並生用除別研外為末共和勻煉蜜為丸如雞頭大每服一九嚼細茶酒下若用牛膽丸尤妙

舒筋保安散 治左難右癱筋脉拘攣身體不遂脚腿少力

乾濕脚氣及濕滯經絡久不能去宜導諸氣

木瓜	五兩	草薢	五靈脂	牛膝 <small>酒浸</small>
續斷	白僵蠶 <small>炒</small>	松節	白芍藥	
烏藥 <small>去木</small>	天麻	威靈仙	黃耆	
當歸	防風	虎骨 <small>酒炙各</small>		

右用無灰酒一斗浸上藥二七日緊封扎日數足取藥焙乾搗為細末每服二錢用浸藥酒半盞調下喫酒盡用米湯調下又方金毛狗脊一兩却將乳香白膠香各一兩同研入乾藥末內

輕脚丸 治左癱右癱脚弱不能行履

木鱉子 <small>另研</small>	白膠香 <small>另研</small>	白芍藥 <small>各三兩</small>	草烏 <small>去皮尖</small>
赤小豆 <small>一兩另研</small>			

右為末以赤小豆糊為丸如梧桐子大每服七丸旋加至十九溫酒或木瓜湯下病在上食後臨卧服病在下空心服忌熱物少時

追魂散 治癱瘓風

五靈脂	三兩
-----	----

右杵碎以水浸攪勻先傾去上黑濁者後去下沙石者取中間細者於灰盆之中紙上把乾搗研為末每服三錢七

酒一盞煎兩沸服小續命湯

換骨酒 昔人早年患偏風證四肢不舉未服此藥非人回轉不能自動服藥三日便覺手梳頭七日四肢漸舒十日行步半月覺身輕服明此藥神効不敢隱藏

白茯苓	晚蠶沙 <small>炒各</small>	蒼耳子 <small>炒</small>	天雄 <small>炮去皮</small>
乾薑 <small>炮</small>	郁李仁 <small>湯浸</small>	附子 <small>炮去皮</small>	虎脛骨 <small>酒浸</small>
白花蛇 <small>酒浸去</small>	牛蒡子根	牛膝 <small>各牛兩</small>	何首烏
甘草	檳榔	白附子	益智仁 <small>各一兩</small>
井菊花	防風	瓜蒌	牡蠣
牡丹皮	石菖蒲	杜仲 <small>炒去絲</small>	黃耆
羌活	鼠粘子	枸杞子 <small>各半</small>	天麻
山茱萸 <small>去核</small>	白朮	桔梗	狗脊 <small>去毛</small>
蛇床子	肉蓯蓉	兔絲子 <small>各一</small>	紫苑 <small>半兩</small>

右入白為籠末用無灰好酒三五斗生絹袋盛藥在罈子內封閉令密浸之春夏二七日期冬三七日期開時入面不得向壘口上取浸藥酒日進三服各一盞溫暖服久患者不過月日近者只三五服其藥粗陰乾為末煉蜜為丸亦名換骨丹每服三四十九梧桐子大溫酒送下此藥神効益精補虛活血駐顏潤皮膚兼治眼目能退一切風疾常服烏髭髮身輕骨健爽精神淨房脩養一月妙

至聖一醉膏 治癱瘓風

天麻	一分	沒藥	黃明滴乳香 <small>各半兩</small>
附子 <small>一兩炮裂</small>	安息香 <small>一分</small>	麻黃 <small>去根節</small>	片腦 <small>少許</small>

右件七味一處搗羅為細末每服四大錢用法酒一升於銀石器內熬成膏後却出分在四盞內別用法酒看病人喫酒多少漸調膏子服盡為度令枕病處卧以衣被蓋或

汗出或似虫行即効次日再喫一服手足必已舉得此疾
五十日已上方治若髮直者不在治限

經進骨碎補丸 治左癱右瘓

五靈脂去砂石 木鱉子去殼到 生薑片子 地龍用麻布包石

黑牽牛炒令微 草烏去皮不切作小塊子用 黑豆炒令微熟

威靈仙用鐵煎者 滴乳香用酒米飯同煎 南星灰火炮去

麝香一錢另研碎 白膠香中少時控乾另研細用 防風去各

各依製度研為細末和勻用醋糊為丸如梧桐子大初服

五九加至七九食後薄荷茶酒

乳香寬筋丸 治左癱右瘓口眼喎斜走注風氣腰脚麻痺一

切風疾赤根白頭風瘡如瘡乾用油調塗瘡濕只搽如打

撲閃的皮膚損碎入沒藥乳香半錢調塗

乳香別研 沒藥別研 川烏炮去 草烏炮去皮尖

地龍去土 白牽牛炒去內殼 白蠟去絲

五靈脂七各酒研 何首烏一兩炒器煮

右焙碾為細末酒糊為丸如梧桐子大每服十五九至二

十九食後茶酒任下

保命龍虎丸 治癱緩走注疼痛風勞氣冷腰膝軟弱四肢羸

曳兼治從高墜下折傷口眼喎斜又臥床枕起止不得

白膠香別研 虎骨酥炙 黑牽牛生 乳香別研

地龍去土炒 古文錢火燒醋 木鱉子去殼 當歸洗焙

川烏炮去皮 沒藥別研 附子炮去皮 巴戟去心

草烏炮去皮 牛膝酒浸炒 肉蓯蓉酒浸 自然銅火燒醋

右件各等分為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服三

十九溫酒或盞湯送下婦人醋湯下空心服

酒浸藥仙方 凡患風疾四肢不舉服之三日舉手梳頭七

日漸舒十日行步半月通身依舊竟得輕健眼目更明大
有神効治之

其菊花 防風去芦 羌活 杜仲

牡蠣 瓜蒌根 牡丹皮 紫苑

黃浦 人參 白茯苓 牛蒡子

狗杞子各半升 白花蛇 桔梗 白木

山茱萸去核 白茯苓 晚蚕沙炒 官桂

遠志去心 牛膝各二升半 羌活骨 牛蒡根

乾薑 熟地黃 栝子仁 狗脊去毛焙

天雄炮去皮 草薢 蛇床子 附子

肉蓯蓉 兔絲子 續斷 芍藥去皮

石斛各三升

右並要川廣好者依方揀擇為粗末用新絹袋盛藥用新

小瓮兒一箇放藥在內以無灰酒二斗將藥浸之密封其

口春夏浸二七日秋冬浸三七日開瓮早晨臨午晚三時

令病人自取冷酒三盞依時服之每服不過一盞不多服

亦不可添減亂開酒瓮久病服者不過一月近者十日輕

者五日見効不問男子婦人小兒骨節疼痛四肢浮腫眼

目昏暗半身不遂語言蹇澀口眼喎斜中風失音並治之

夜合枝醞酒 治中風手足不隨攣縮屈伸艱難

夜合枝 桑枝 槐枝 栝枝並生用

糯米五升 石榴枝生用 羌活去心 黑豆炒

防風去心 細麴七斤半

右先以水五斗將五枝同煎取二斗五升去滓浸米黑豆

兩宿蒸熟入麴與防風羌活二味并和造酒依常醞法封

三七日壓去糟滓取清酒三合至五合飲之常令有酒氣

無令過醉恐致吐即停亂正氣
鐵骨丹 治諸風癱瘓拳挛半身不遂
川烏 炮去皮 草烏 炮去皮 川芎 當歸 酒浸晒
肉桂 續斷 洗晒 細辛 補骨脂 炒
烏蛇 酒浸半日 白蠟 炒 木鱉子 炒 天麻 酒浸晒
巴戟 去心酒 防風 乳香 沒藥
麻黃 去節 羌活 獨活 南星 炮
白蒺藜 炒 薏苡仁 蒼朮 炒 各 草薢 鹽水煮
杜仲 去皮剉薑 牛膝 酒浸 虎脛骨 酒洗 白附子 炮 各
全蝎 去毒炒 秦九 各二 五靈脂 四 麝香 半 另研
自然銅 大塊 碎沖七次 三兩

右為細末除乳沒麝別研細拌入和勻以浸藥酒調飛麵
裹糊為丸如彈子大每服一九溫酒磨下或木瓜煎湯下

黑豆淋酒下不拘時服仍間用良薑碎一升煎湯圍蓋湯
浴最妙未服藥前須以斑貓二十一箇去翅足用黑豆一
建盞慢火同炒焦只用七箇并豆入全蝎十四枚微炒五
靈脂二錢半為末糕糊丸麻子大每服二十一丸老酒下
先去其風根

八風九州湯 治男子婦人寒冷不自愛護當風解衣汗出
卧冷濕地半身不遂或倦仰屈伸難週身燥痺四肢不
收狀如風狂飲食損少手足苦冷或不隨

麻黃 四兩 甘草 乾姜 附子
防風 獨活 各三兩 石膏 煑 茯苓
白朮 川芎 柴胡 當歸
人參 細辛 各二兩 杏仁 各四十九粒

右以咀以水一斗清酒五升漬三夜煮取四升分為三服

一日令盡若病人羸瘦者用水煎服藥訖厚覆當汗出微
微去上衣汗解以粉粉之忌生菜海藻菘菜酢桃李猪肉
雀肉

金鳳丹 治肝腎虛風邪攻注腰脚不隨
五靈脂 天麻 酒浸 烏頭 炮裂去 楓香脂 研 各二
乳香 研一分 地龍 去土炒 沒藥 研半兩 木鱉子 去殼
海桐皮 剉 黑豆 去皮 草烏 去皮 全蝎
狼毒 炮 牛膝 酒浸 炒 丹砂 研半兩 附子 炮裂去皮
薄荷 葉 各 當歸 切焙 一 自然銅 醋火煑 碎 補 去毛
虎骨 酥炙 各 龍腦 研 麝香 研 各一錢

右為細末以生薑葱白汁為丸如鷄頭大每服一九生薑
葱酒下諸風疾治之皆效

走注風乳香酒下 卒中風薄荷酒下

卒中暗風鷄冠血酒下 半身不遂煎松明酒下
婦人產後破血氣煎黑豆酒下不可食葱
婦人產後虛腫及頭面生瘡遍身痒痛白芷酒下

雄豆散 治中風腰脚不隨筋急行履不得
用雄黑豆緊小者不限多少以新汲水淨淘乾頻灑水
候生蘗繞及半曝乾炒熟不退皮搗羅為末每服二錢至
三錢七溫酒調下日三服至半月後所患處覺有觸動是
驗也

仙靈脾散 治中風脚膝軟弱筋骨緩縱不能行立
仙靈脾 天麻 炮裂去 石斛 去根到 天麻
牛膝 去苗 麻黃 去節 川芎 五加皮
草薢 丹參 桂心 當歸
防風 羌活 各三分 虎脛骨 酥炙 擯榔 各一兩

右以咀以水一斗清酒五升漬三夜煮取四升分為三服

右三細末每服一錢食前溫酒調下忌生冷油膩猪雞肉

海桐皮浸酒方 治風毒脚膝軟弱行立不得

石斛去根 桂心 防風去蘆 當歸 天雄炮裂去

杜仲去皮 仙靈脾 草薢 牛膝

薏苡仁 生地黃 虎脰骨 三附子

石細剉以生絹袋盛用清酒二斗春夏浸七日秋冬浸二

七日每日時時啜飲一小盞常令醺醺不得大醉重者不

過兩劑若酒盡旋添之以藥味盡即止

桑枝煎方 治風脚膝軟弱

桑枝 剉三升 黑豆一升 附子生用剉 茄子根剉一

已上四味用水三斗煮至一斗濾去滓再熬取五升入後

藥末

石斛 天雄炮裂去 天麻 牛膝

川芎 桂心 兩各二

石為末入前汁中於銀鍋內慢火熬用柳木筥不住手攪

假如膏盛於磁盆中每日空心用熱酒調下一茶匙晚食

前再服尤妙

俗風軟脚

以丹參酒浸服之可逐奔馬

俗風軟脚

用龜殼炙之為末酒調服之

白花蛇丸 治中風不仁皮膚癢等症之如陽衣

白花蛇酒浸乾錫炒 仙靈脾 天雄炮裂去

天麻 桂心 麻黃 鹿角膠 炙令

草薢 桑螵蛸 茵芋 烏頭炮裂

南星 炮各 雄黃 研 麝香 研各

右為細末外又用火麻仁三兩為末入無灰酒慢火熬成

膏與前末和搗五百杵丸如梧桐子大每服二十九薄苜

酒下不拘時候服

五參散 治風不仁皮膚癢麻繞腰通身似蛇皮黑癩旋生

按沒通身瘡痺

人參 玄參 丹參 沙參

苦參 各一兩 白花蛇酒浸去皮骨

右為細末每服二錢七加至二錢七食後夜卧溫酒調下

赤箭丸 治風邪所攻肌膚虛弱手足痺曳筋脈不利

赤箭 二兩 天雄去皮臍 丹參 川烏去皮臍

南星 獨活 防風去芦 五加皮

桂心 白附子

牛膝去苗 仙靈脾 白僵蚕 桑螵蛸

續斷 細辛 酸棗仁 乾蝎

野狐肝 蒺藜 草薢 各一兩 麻黃 去根節

牛黃 細研 硃砂 研水飛 麝香 細研 龍腦 一分 細研

右並生用搗羅為末入別研藥和令勻煉蜜和搗五七百

杵為丸如梧桐子大每服二十九食前用溫酒下忌食生

冷油膩毒滑魚肉羊血

附子湯 治風痺曳手足不隨身躄不能俛仰

附子炮裂去 乾薑 甘草 防風去芦

獨活 去芦各 石膏 白茯苓 去皮 白朮

川芎 柴胡 去苗 當歸 酒浸 人參 各一兩

杏仁 去皮尖炒 細辛 一兩

右剉如麻豆每服五錢七水酒共一盞半煎至一盞去粗

濕服日三蘇瘦者只用水煎服
 羚羊角丸 治中風手顫痺曳語澀
 蒼活去薑 防風去又各
 蒼活仁洗各 茶元洗各
 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九漸加至三十九
 煎竹葉湯下
 犀角搜風丸 治風下痰解結順氣
 乾生薑 木香各半 白茯苓去皮 車前子
 木通各一 青皮去白 陳皮去白 枳實炒各
 牽牛四兩 犀角半
 右為細末湯送蒸餅為丸如梧桐子大每服三十九加至
 五十九食後溫生薑湯下
 乳香身痛丸 治中風癱瘓不遂手足顫曳口眼偏斜或旋
 運僵仆延瀆搐搦卒中急風不省人事每服二十九黑豆
 淋酒下風虛眩冒項筋拘急太陽穴疼痛亦用生地黄汁
 調酒下滋脚疼重行步艱辛筋脈攣促伸不利賊風所
 中痛如錐刺皮膚頑厚麻痺不仁或血脈不行肌肉乾瘦
 生葱酒下或生葱茶亦可風溫脚氣腿膝無力或腫或癢
 不能卒步兩脚生瘡膿血浸漬癢痛無時愈而又發溫酒
 酒下打撲閃胸筋骨內損已經多日每遇天寒時發疼痛
 皮藥酒下
 乳香 川烏 沒藥 五靈脂
 白膠香 地龍 白薑 半夏
 五加皮 赤小豆各等
 右為細末麩糊丸如梧桐子大隨證一引如前並空心服
 七寶元 治中風不計變急逆胸胃不知入

丹砂 牛黃 水銀 龍腦
 膩粉 麝香細各五分 金箔大者二十一片
 右再同研令水銀星盡用蒸棗肉為丸如梧桐子大病經
 者每服十九重者二十九溫水化破服利下涎須服和氣
 藥日後時慢服治風藥
 治中風涎潮不下精神昏貴不省人事用薄荷湯磨下
 紅龍散 治一切中風前閉閉塞不致枯廢服此藥後服治
 風之藥
 硃砂別研 五靈脂各一兩 全蝎半兩 茯神
 草薢各一兩 片磁別研 麝香別研各
 右為細末每服二錢用溫酒或荊芥薄荷湯調服
 十二味正氣散 治風中氣中
 人參二錢半 厚朴 半夏 藿香
 甘草 茯苓 白木 石菖蒲
 遠志去心 蒼朮 陳皮 木香各半兩
 右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎八分服
 二香三建湯 治男子婦人中風虛極言語蹇澀六脉俱微
 舌強不語涎涎涎餅多精神如癡手足偏廢不能舉運此等
 訂候不可攻風止可扶虛
 天雄去皮 附子去皮 川烏去皮 木香不見火
 沉香去皮
 右咬咀每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓溫服
 空心食前
 楊氏神指散 治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足
 彈曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人卒有
 此訂無藥去藥用之得力

栢葉一握 葱白一握

右研如泥無灰酒一升同煎一二十沸去滓溫服不拘用
時如不飲酒分作四五服服盡方進他藥

蘇青丸

和氣血散風痰亦可常服

右以蘇合香丸與青州白丸子打和薑蘇湯化下

定神琥珀丸

治心中風發動不知漸成癲癩驚悸恍惚

琥珀研

珍珠研

牛黃研

天竺黃研

鐵粉研

龍涎研

膩粉研

犀角研

甘草炙到

龍膽研

升麻研

露蜂房微炙

丹砂研

防風去叉

黃芩去黑心

麥門冬去心焙

白芍藥

釣藤

人參

遠志去心

知母焙

天門冬去心

茯苓去木各

乾蝎酒炒

麝香研一分

金箔一百片

銀箔一百片

與金箔并研同

石菖蒲洗淨切焙三分

右除別研藥外為末入研者同研令斷星煉蜜和搗三百
杵九如梧桐子大每服二十九食後臨臥煎甜竹葉湯下
日二夜一

牛黃定志丸

治心中風精神不寧驚悸鎮心化涎安神

牛黃研

龍腦研

乾蝎研

蠶蚕炒

白附子炮各

雄黃研一兩

丹砂研二兩

天麻酒浸焙

甘草炙各

半夏湯洗七次焙乾

琥珀研三分

麝香研一分

南星牛膽製烏蛇酒浸去皮

右為細末煉蜜為丸如鷄頭大每服一九細嚼荆芥人參
湯下食後臨臥服

開關散

治急中風目瞤牙噤無門下藥者

用南星搗為末白龍腦二件各等分研自五月五日午時

合患者只使一字至半錢以中指點末搗齒三二十指在

牙左右其口自開始得下藥

牛黃丸

治風痙身體強直牙關緊急心神昏昧

牛黃研

麝香研

龍腦細研各

硃砂細研水飛

白僵蚕炒

鹿角膠搗碎各半兩

白茯苓細研

白芍藥酒浸去皮

白附子炮裂

天麻

白蒺藜炒去

赤茯苓

白芷

羌活

獨活

蔓荊子

麻黃去根節

防已

木香

檳榔

藜蘆

防風

乾蝎炒

當歸炒各一兩

右為細末入研藥令勻煉蜜和搗二三百杵九如梧桐子
大每服十九不拘時用溫酒研化服

麻黃湯

治風痙身體強直口噤不知人事

麻黃去節先煎掠去

甘草炙

當歸焙

黃芩去黑心

石膏碎

桂心

川芎

附子炮去皮

乾薑半兩

杏仁湯浸去皮尖

右剉如麻豆每服五錢七水二盞煎至一盞去滓入荆蘆
半合更同煎三五沸溫服日二夜一一方治風痙身體不
能自收不能言語胃昧不知人者不用荆蘆每服六錢七
水三盞煎至一盞半去滓分溫二服空心夜卧各并二服
初服一日猶能自覺者勿熱服服訖密室卧用厚衣覆微
汗出漸減衣未汗出更用熟生薑稀粥投之汗出忌觸外
風并治上氣效逆若面目大腫但得坐不得卧九產婦并
病人已曾大汗者不可服若虛羸人但當少服

天麻湯

治風痙身如板直遍身痙強

天麻半兩

羌活去节

人參

桂心

白朮

麻黃去節先煎

杏仁湯浸去皮尖

附子炮製去灰

右劉如麻豆每服五錢七生薑三片水二盞煎至一盞去滓入酒半盞再煎一佛熱服服後以生薑稀粥投之即愈日二服

續命湯

治風痙口噤不開身背強直發如癩伏

麻黃去節先煎獨活各一兩升麻各半兩葛根各半兩

羚羊角屑桂心各一兩風棘各一兩甘草炙一兩

右咬咀每服六錢七水二盞浸一宿明且煎取一盞去滓

濕服衣覆避外風每午春分後常服二三劑即不患天行傷寒及諸風邪等疾

治中風痙口噤面青手足急強婦人產後亦宜服之

右用竹瀝一升分為五服微溫頻服大効

大豆紫湯 治風痙昏迷吐沫抽掣背脊強直產後中瘧

右用黑豆炒焦好酒淋之取清汁酒一盞獨活對三錢煎

七分溫服又連續進劑以瘥為度此湯大能去風消血結

如妊娠折傷胎死腹中服此並瘥此歸荆湯獨活酒人為

邪氣所平則發而為病若氣若血若痰若水若風若寒若

暑若濕腑臟表裏令熱虛實各有受病之處用藥之法必

究其原而後可以起病否則前賢所謂猶不知鬼廣絡原

野異一人獲之術亦疎耳是可以人試伎乎哉一方用羌

活得汗則愈

歸荆湯

治風痙昏迷吐沫抽掣背脊強直產後中瘧通用

當歸各半兩荆芥穗各半兩

右為細末每服二錢水一盞酒少許煎七分灌下如牙關

緊用銅匙幹開以鷄羽蘸藥入口或用童尿調下或以川

芎代當歸亦効

犀角散 治中風角弓反張心神煩亂口噤不語

犀角屑麻黃去根節羌活附子炮裂去皮
杏仁去皮尖防風去羌桂心 白木

當歸各三分石膏二兩甘草炙赤細辛

右搗羅為散每服四錢用水一中盞入生薑半分煎至五

分去滓入竹瀝一合更煎一二沸不拘時溫服

龍腦丸

治中風身如角弓反張不語昏悶

龍腦細研麝香細研蟬殼 牛黃細研各一

乾竭炒南星炮珠砂研阿膠炒

香墨 白附子炮裂防風去羌羚羊角屑

肉桂去皮羌活各半烏蛇肉酒浸去皮骨

右為末入別研藥和勻煉蜜和搗三五百杵丸如黍豆大

每服十九用溫酒下不拘時候服

拘杞浸酒

治中風身如角弓及張反婦人一切血風上攻

下注若久服悅澤顏色滋潤皮膚退風益氣強力

拘杞子 晚委沙炒各各蒼耳炒各一升

防風去皮大麻子炒各各子根伏時須要九月九日

牛膝酒浸炒惡實根各各桔梗炒

羌活去羌秦朮去土石菖蒲九煎香

右以夾絹袋盛用酒三斗浸密封閉勿令通氣七日

方開開時不得面對瓶口每服一盞溫過空心食前臨臥

服常令有酒容久病風疾不過一月瘥

薤苳仁散

治中風身如角弓反張心胃滿悶

薤苳仁 川芎 桂心各一兩當歸

細辛 前胡去羌羌活 茵芋

生地黃 葶藶 羚羊角屑甘草炙赤

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時稍熱服

急風散 治中風身如角弓反張
附子 一枚炮裂 川烏 二枚炮裂
南星 一枚炮 防風 去叉 白芷 各半兩
全蝎 一分炒 白附子 一分炮

右為細末每服半錢七五淋温酒調下併二服未愈再服

牛黃散 治急風番延腎脾胃膈燥悶
牛黃 研 龍腦 研 麝香 研 蟬殼 炒各
珠砂 研 雄黃 研 南星 炮裂 烏蛇肉 酒浸去皮
白附子 炮裂 僵蚕 炒 川芎 防風
紫芎 蘇黃 去根節 細辛 薑本 各三分
側子 炮裂去 天麻 乾蝎 炒 井菊花

犀角膏 羚羊角屑 天竺黃 研
右為細末入別研藥和勻不拘時候以熱酒調下二錢

蟬蛻丸 治急風卒中半身不隨腰脚軟弱節疼痛手足拘攣口面喎斜言語蹇澁白瘰頑麻心驚恍惚肢體戰掉

腰腿癱緩及脚氣風腫疼痛等疾
蟬蛻 一兩 乾蝎 炒 烏蛇 酒浸法皮 五味子 一兩四味用
附子 生去皮 南星 炮 天麻 各二兩 白附子 炮 乾薑 炮

川芎 僵蚕 炒 防風 去叉 乾薑 炮
麻黃 去根節 薊子 去白 狗脊 去毛 雄雀糞 炒各
當歸 切 雄黃 研 一分 丹砂 麝香 研 各

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服半丸薄荷酒嚼下急風癱緩及攻注筋骨疼痛薄荷汁化開一丸以熱酒投下向患處貼衣被蓋汗出腫覺疼痛即定

雄黃散 治急風不省人事
雄黃 研 香墨 乾蝎 炒 蟬蛻 炒各

龍腦 研 麝香 研 丁香 牛黃 研
膩粉 各一分 珠砂 研三分 南星 炮裂 阿膠 炮各一兩

右為細末入研藥和勻不拘時候用温酒調下一錢炒

追風散 治一切急風角弓反張四肢抽掣牙關緊急骨節疼痛及破傷風
川烏 去皮 附子 去皮 白附子 白花蛇 酒浸去
丹砂 研 蝎稍 麝香 研 各 膩粉 研 一分
南星 去根 又

右並生困搗羅六味為細末入別研藥和勻磁盒收每服半錢至一錢五淋酒或煎葱白酒下口噤者用少葉搯牙即開為妙

透關丸 治中急風茶瘧瘴滯頭目昏連額角偏痛手足無力舉動戰掉語言蹇澁心神不寧
麻黃 去根節 麝香 研 天麻 各半兩 沒藥 研
乳香 研 地榆 甜瓜子 川烏 生去皮 研
玄參 各一兩

右為末以酒一升慢火熬為膏更重入煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸温荊芥湯下不拘時候

雄黃散 治急風及破傷風立効
雄黃 研 白附子 炮 南星 酒煮十沸炙乾已止各
牛黃 研 一分 麝香 研 一分 胡椒 炒 各
天麻 二兩 白花蛇肉 酒浸炙

右為細末入研藥和勻不拘時候以温酒調下一錢

分涎散 治急風口噤者足指溺涎潮作聲不得出

麝香葉 蠟稍一方用 白附子炮裂去 南星 泡半兩

丹砂研 膩粉研 粉霜研

右先將四味搗羅為末次入丹砂膩粉粉霜同研勻每服一錢七至二錢薄荷茶調下未吐利再服

茵芋散 治偏風積年不瘥手脚枯細口面喎斜精神不守

言語倒錯

茵芋 桂心 漢防己 附子炮裂去皮

測子炮裂去 川芎 人參 麻黃去根節

當歸炒 赤芍藥 茯神 五加皮各三

秦尤去苗 防風去叉 白朮 黃耆

細辛 甘菊花 甘草炙略

右咬咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入竹瀝一合更煎二三沸不拘時溫服忌生冷油膩毒

魚滑物

五加皮散 治偏風不遂肌體煩疼肢節無力

五加皮 防風去叉 白朮 附子炮裂去

葶藶 川芎 桂心 赤芍藥

枳殼數炒 荊芥 羚羊角屑 丹參各一兩

麻黃去根節 羌活各二兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

枳殼人參丸 治偏風手足一邊不隨筋骨煩疼

枳殼數炒 人參 羌活各一兩 甘菊花未開者良

防風去叉 羚羊角銹 葛根一兩 熟地黃焙二兩

升麻二兩 黃連二兩 桂心一兩 薏苡仁炒一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九漸加至三

十九空心溫酒下日再

治偏風手足不遂皮層不仁

用仙靈脾一斤細剉絹袋浸酒春夏三日秋冬五日用厚紙重重封閉無使失氣逐旋開隨意煖飲常令醺醺不得大醉之無不効驗合時切忌鷄犬見之

牛膝浸酒 治風痺偏枯腰膝疼痛

牛膝去苗 茄子根各八兩 附子炮裂去 防風去叉

葶藶 狗杞子 羌活 海桐皮

蒼耳搗碎 附子炮裂去 五加皮 虎脛骨酥

牛旁根四兩 大麻子搗碎 晚蚕沙 黑豆炒

秦尤去苗 右細剉以生絹袋盛用好酒三斗纒盛密封浸七日每日空心午時及夜臨卧溫飲一小盞其酒旋淡味淡即換

忌鷄狗毒魚粘滑物

羌活散 治風毒入四肢筋脉拘攣疼痛

羌活 天麻 酸棗仁炒 羚羊角

地骨皮 栝子仁已去 川芎 鹿角膠炒

側子炮裂去 人參 白附子炮裂 桂心

薏苡仁 海桐皮各一兩 牛膝二兩 烏蛇肉酒浸

犀角屑 右為細末每服二錢以豆淋酒調下不拘時候服

天麻丸 治中風四肢筋脉拘攣骨節疼痛少力

天麻半兩 蠟稍微炒 沒藥研 蘇黃去根節

丹砂研 麝香研 地龍去土炒 防風去叉

川烏炮裂去 自然銅火 乳香研 安息香研

右除安息香外搗研為末却入別研藥以安息香膏和利

為九如梧桐子大每服二十九不拘時以薄苜酒下忌羊
血有人患手臂不隨又有患腿膝無力行步顛倒服之並
効素有熱人減川烏一半

防風散

治風身體疼痛轉側不得

防風

羌活

當歸

川芎

肉桂去皮各

薏苡仁

仙靈脾

附子炮裂去

牛膝

骨碎補略一細辛

枳實炮炒各

右咬咀每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時候
稍熱服

五加皮散

治風氣墜滯身體疼痛

五加皮

羌活

丹參

赤芍藥

羚羊角屑

檳榔三上各

枳殼炮炒

桂心炮上各

右咬咀每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時候
稍熱服

仙第散

治背膊手足頭目筋脉虛掣一切風證疼痛不可
者立有効

者立有効

仙第一及無見存

陳皮

枳殼炮炒

厚朴姜製

官桂

秦艽各一錢

白茯苓

白芍藥

白芷

川芎

半夏炮各一錢

麻黃不去節沒藥

甘草

川烏炮各半及

白姜

乳香各二分

獨活二分

麝香半尔

右除桂並麝乳沒餘並炒轉色却入不炒藥同為末每服
三大錢炒大黑豆同木瓜切浸酒旋溫調服不拘時候

虎骨散

治風腰脚疼痛下注脚膝行步不得或腫癢或在

兩膝腫疼痛久癒不瘥漸致足脛細小少力

虎脛骨二節炙

木香

羌活

川芎

黃耆

羌活

沉香

大腹皮

桂心

檳榔

白茯苓主皮

桃仁去皮

山芋

葛根

海桐皮

五味子

敗龜板燻浸

甘草炙半

肉蓯蓉略

附子炮裂去

右為細末每服二錢七空心臨卧溫酒或薑湯調下

杜仲浸酒方

治風冷腰脚疼痛屈伸不得

杜仲炙

蛇床子

當歸

川芎

乾姜炮

秦艽

附子炮裂去

石斛去根

桂心

細辛

茵芋

天雄炮裂去皮

川椒去目炒

防風去

獨活二各

右細剉以生絹袋盛用法酒三斗於甕餅中浸之七日後
開每溫飲一小盞常令醺醺不得大醉酒盡其藥滓晒乾

搗羅為細末每服以溫酒調下二錢

五加皮浸酒方

治風毒氣攻腰脚連骨隨日夜疼痛

五加皮

熟地黃各三

枳殼炮炒

防風

乾姜炮

獨活

地骨皮

牛膝去苗

烏啄炮裂去

石楠葉略

丹參一兩

虎脛骨燻炙

右細剉以生絹袋盛用清酒二斗於磁餅中浸密封七日
後開每日三五度溫飲一小盞常令醺醺以瘥為度

獨活散

治走注風其病狀兩足疼痛腫起或偏在一足痛行
履不得其痛處時走不定或上項頭目昏亂或走在左手
或走在右手或在一手指上或在一脚指上只有一點疼
痛不可勝忍宜服此一方服了未轉加衆藥四錢牽牛半

夏三錢共作七錢為一服也。疔疔走痛處一點常赤色其則遍身有赤色或攻項膊或把腰背或注脚下或攻胃腸腿骨與脛骨俱小惟有膝胸頭項腫突此藥後或在痛處手指甲下或在脚指甲下破出得惡血或在鼻中出得惡血其病方可除根又有白虎風治之亦同此方服之。愈但人患白虎必常夢一猫一虎一羊一牛一四足畜類等物或夢見小兒婦人女孩將花翠果食與已其疾與走注風十分相類但其則下青糞宜服此方

獨活 去升 阿膠 麩少許 知母 蘇子 火土 桂心

大黃 牛膝 羌活 黃芩 醋炙

當歸 乾薑 黃耆 川芎

赤茯苓 去皮 木香 蘇黃 去根節 蔓荊子 各一分

吳茱萸 少許 荆芥 穗 二錢 虎骨 酥炙 麝香 少許

白花蛇 酒浸 手背炙 乾用 酒浸 又用 羌活 一兩

狼毒 於石 器內 煮乾 半兩 半夏 湯洗 牽牛 取頭末

右將羌花狼毒一味別作一處為末牽牛半夏亦別作一處為末其餘衆藥共作一處為末每服羌花狼毒半錢半夏牽牛末一錢衆藥末一錢半計三錢七共作一服臨臥葱湯調下

治風走注疼痛不定隨痛處發之

黑豆 五升 羌花 一斤 生姜 切半斤

右都炒旋入醋拌用青布畏封罨上更番炒發以効為度

治風走注疼痛

地龍 微炒 麝香 研一分

右研為細末每服一錢以溫酒調下不拘時候

赤芍藥散 治風入腹攻五臟拘急不得轉側陰縮手足心

冷腹中疔疔

赤芍藥 桂心 甘草 炙 防風 去叉

川芎 各一兩 川烏 炮裂 去

右咬咀每服三錢以水一中盞入生姜半分棗二枚煎至六分去滓不拘時候稍熱服

搜風丸 治邪風上逆以致上實下虛風熱上攻眼目昏朦耳鳴鼻寒頭痛眩暈燥熱上壅痰涎涎嗽心腹疼痛大小便結滯常服清利頭目開通鼻竅聰耳明目宣通血氣調順飲食

南星 人參 茯苓 各半 乾生薑

寒水石 白礬 半夏 各二 蛤粉

大黃 黃芩 各二 牽牛末 滑石 各四及

薄荷葉 半兩 薑香 二錢

右為末滴水丸如小豆大每服十丸加至二十九用生薑湯下日進三服

羌活散 治風熱頭面生瘡

羌活 去皮 防風 去叉 川芎 荆芥 穗

蘇黃 去根 甘草 炙 惡實 水通 各等分

右為細末每服二錢七茶酒調下不拘時候

一品丸 治風熱上攻頭目昏眩及癩偏正頭疼

右用大香附子去毛皮用水煮一時久細切焙乾為紙末煉蜜為丸如彈子大每服一九水一盞煎至八分通口服婦人用醋湯煎服

治脾氣虛弱肝熱有餘胃氣不足虛涎所積聚在胃口風氣一上潮涎涎起其狀先有津液滿口漸次心前潰亂如有一物上觸咽喉即便噎塞滿悶不覺兩手相扞把按頭上按

痰或氣上時忙惶高聲叫喚遂巡仍遂平復此名虛涎無
論大人小兒若得此病但大胸虛冷即喫此藥若大胸熱
熱不可喫此藥喫後方也

草豆蔻 細辛 川芎 厚朴各一分

防風 羌活 獨活 蒼朮

黃柏皮 商星 半夏 磁石各一分

損柳 肉豆蔻 牽牛各一分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大早朝空心姜湯下四十
丸食後喫後方大胸熱添

牽牛半兩 防風 荆芥穗 蘇黃

羌活 獨活 乾蝎 薄荷

運翹 鱧蚕各一分 半夏三分

清神散 治風壅熱甚咽膈不利

荆芥穗 薄荷葉各二分 牛蒡子炒

川芎各半

右為細末每服二錢沸湯調食後服

治熱風 以牛乳服之

去風熱 以椰子漿飲之

治一切風熱毒氣攻注目臉外及發於頭面并四肢腫痛癢手
神驗石於臘月中以新瓦罐滯貯熱水用朴硝二升投湯
中攪散掛北蒼下候硝冷以罐外以羽收之每用時以人
乳汁調半錢搽之

防風飲 治中風發熱無汗肢節煩疼腹內急痛大小便秘澀

防風去義 當歸切焙 白木 麻黃去節洗

赤茯苓去皮 附子炮裂去 山茱萸去核 黃芩去心

人參 甘草炙 大黃三分 熟地黃各一分

右到如麻豆大每服五錢七用水一盞半入生薑半分切
碎大棗二枚擘破煎至八分去滓溫服空心日晚各一

方加天門冬一兩

石膏湯 治中風頭疼煩熱口乾小便赤

石膏研 白茅根 福壽草各三分 滑石半兩

右咬咀每服三錢七水一盞煎至七分去滓食遠熱服

防風散 治熱毒風痰壅頭目運心神不寧

防風去義 枳殼麸炒 沙參半兩 秦艽去苗一兩

平角胥 休麻 木通 羌活

右咬咀每服三錢水一中盞煎至五分去滓入生地黃汁
一合更煎一二沸不拘時溫服

前胡散 治熱毒風攻頭面壅熱口乾心煩不欲喫食

前胡 子苓 山梔仁 防風

甘菊花 沙參 甘草半兩 羚羊角胥

麥門冬去心 枳殼麸炒 石膏二兩

右咬咀每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

天竺黃丸 治熱毒風心神煩躁頭目昏痛

天竺黃 硃砂研水 子苓各一兩 犀角胥半兩

石膏研 甘草各三分 甘菊花 防風

右為末入別研藥令勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十
丸不拘時煎竹葉湯下

黃連白朮湯 治風證寒熱二氣交爭調順陰陽

黃連 麥門冬 各心治 旋覆花 甘草炙

黃芩去黑心 附子炮裂去 白朮各半 桂心

白茯苓去皮 陳皮炙 桔梗炒各 地骨皮二兩

桑白皮半兩

右剉如麻巨大每服五錢七水一盞半入生薑三片同煎

至八分去滓溫服

溫中湯 治風邪疴傷肌瘦世汗寒中泣出

當歸切焙 白朮各二 人參 附子炮裂去皮

乾姜炮 甘草炙 蜀椒去目炮 桂心各一兩

右咬咀剉如麻巨大每服四錢七以水一盞半煎取八分

去滓溫服日二

雄黃散 治風氣入中蘊積生熱口乾目黃時發潮燥

雄黃研末 丹砂研 牛黃研 丁香各一分

桂心半兩 麝香研一 南星炮 半夏湯洗去毒汁

蘇黃去節 蠶蚕炒 天麻各三 龍腦研一分

附子炮裂去 大黃 醋炒 乾薑炮各

右將十味搗為細末入別研五味藥和勻每服半錢加至

一錢七空心夜臥溫酒調下汗出即愈

金箔牛黃丸 治風邪除熱中

金箔研片 牛黃研 龍腦研各 犀角鎔

琥珀研 人參各一 丹砂研水 白茯苓去皮各

白花蛇酒浸去天麻各半 白附子炮 蠶蚕炒

甘草炙各

右為細末入別研藥和勻煉蜜和搗一千杵丸如櫻桃大

以金箔為衣每服一丸細嚼溫酒或溫薄荷湯下茶湯亦

得常服半丸不拘時候

菊花酒 治男女風虛寒冷腰背痛食少羸瘦無顏色嘔吸

少氣去風冷補不足

菊花 杜仲各一 防風 附子

黃耆 乾薑 桂心 當歸

石斛各四 紫石英 肉桂各五 草薢

獨活 鍾乳粉各八 茯苓三兩

右咬咀以酒七斗浸五日一服二合稍稍加至五合日三

千金翼不用乾姜

羌活湯 治寒風中面青遍身骨節俱冷兩手拘急筋脉牽

抽手足不仁頸冷得接氣則舒展

羌活 獨活 乾薑炮 牛膝酒浸

草豆蔻 桂心各半 細辛 藿香各

吳茱萸湯洗 陳皮半斤各 乾蝎炒 半夏湯洗各

甘草炙四 川芎 白朮各一

右咬咀每服三錢七水一盞煎至七分去滓稍熱不拘時

候身暖并筋脉舒展則止

羊肉湯 治風冷氣血虛之

羊肉一斤半湯 當歸切焙 芍藥

黃芩 川芎 甘草炙 防風去叉各

右除羊肉外咬咀如麻巨大每服五錢心羊肉汁二盞煎

取一盞去滓不拘時溫服

菊花散 治風冷邪氣入於腦傳滯鼻閉氣不得宣散結聚

不通故使鼻塞也

菊花 防風 前胡各一 細辛

桂心各半及甘草各二 水半

右為細末每服二錢入乳香少許煎荊芥湯食遠調
人參羌活散 治風痙瘓與頭目昏運遍身拘攣頭項強急
肢節煩疼壯熱煩渴

前胡 羌活 人參 防風
天麻 赤茯苓 去皮 薄荷 蔓荊子
川芎 粉草 黃芩 枳殼

石咬咀每服四錢水一盞生姜三片桑白皮七寸煎至六
分去滓不拘時服

半夏飲 治風痙心腹煩嘔吐不欲飲食

半夏 湯洗 麥門冬 去心 赤茯苓 去皮 白朮
桔梗 青皮 去白 前胡 各三分 厚朴 生薑 剉碎
批把葉 去毛 防風 路半 大腹皮 三分

右咬咀每服三錢七水一盞入生姜三片煎至六分去滓
不拘時候熱服

上清白附子丸 治諸風痙甚頭疼目眩旋運欲倒嘔噦惡
心恍惚不寧神思昏憤肢節倦痛頸項強硬手足頑麻常
服除風化痰清利頭目

白附子 炮 半夏 湯洗 川芎 菊花
南星 僵蚕 炒 陳皮 去白 旋覆花
天麻 各一兩 全蝎 炒半兩

右為細末用生薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二十
丸食遠生薑湯下

太醫院經驗奇效良方卷之二

太醫院經驗奇效良方卷之三
五膽丸 治心風狂走癲癩

鯉魚膽 雞膽 狗膽 猪膽
羊膽 各一箇 蛇黃 膽汁 各為度

右為末別以狗膽汁為丸如菴豆大硃砂為衣每服十五
丸食後以磨刀汁吞下或只作末以磨刀水調服亦可

抱膽丸 治男子婦人一切癲癩風狂或因驚恐怖畏所致
者及婦人產後血虛驚氣入心室女月脉通行驚恐結
此方累曾經効本長忠懿王之子有疾忽得一僧授此服
之即効本名靈砂觀音丹忠懿得之未敢輕信或有一風
大飼以此藥立効破犬腹而視乃抱犬膽因易名

水銀 二兩 硃砂 細研 黑鉛 一兩 乳香 一兩 細研
右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下硃砂滴乳香

熟有柳木提研勻丸如鷄頭大每服一九空心并花水吞
下病者得睡切莫驚動覺來即安再服一九可除根本

奪命散 壓風癲癩
用青礞石好者一兩為末同煅硝一兩拌勻入甘鍋內炭
大煨通紅須化盡為度冷色如金取研為末每服一錢用
薄荷自然汁入蜜調微溫服良久其藥自暴發逐下隨大
便夾和稠粘如膠乃藥之功

牛黃丸 治風邪變成癲癩時時發動不知人事定心神風
癲之狀發無常時每發則仆地吐涎沫無所覺知蓋由血
氣皆虛精神離散魂魄失守風邪入於陰經故也又以胞
胎之初其母卒大驚精氣并居能令子發癲其證與風癲
大率相似

牛黃 另研 真珠 另研 琥珀 另研 鐵粉 另研

大竺黃易研龍齒另研 麝香另研 入參去芦

龍膽草去土 升麻 防風去義 黃芩去黑心

釣藤 犀角鎊 水銀 丹砂各半兩

金箔七十 銀箔七十 金箔七十 銀箔七十 天門冬去心 石菖蒲切酒浸

全蝎酒炒各 知母 麥門冬去心 甘草各一分

白芍藥 茯苓 右除另研藥外餘藥搗羅為細末却入另研藥再羅令勻

煉蜜拌和得所更搗千杵九如梧桐子大夜卧及食後煎

新竹葉湯下十五丸至二十九

治癩癩發熱急狂走

右以鐵漿服之

鬱金丸 治癩狂可畏數年不愈多因驚憂得之乃瘳涎留

於心竅

蟬肚鬱金真鬱金也末 明礬三兩

右為末以薄糊丸如梧桐子大每服五十九湯水任下初

服覺心胃間有物脫去神氣酒然再服稍甦多服此藥大

能去痰一方治癩以生薑汁糊為丸仍以生薑湯下

治諸癩風等疾

右用鯉魚一片製淨切成塊用明礬四兩為末醃一兩日

煎喫其疾必愈

瓜蒂散 治風癩宜服此藥吐之

右用瓜蒂末一錢熟水調下吐痰如吐不止者以真麝香

少許溫水服之一方名獨聖散治諸風隔實諸癩癩涎津

液涌溢雜病亦然瓜蒂一兩右剉如麻豆大炒令黃色為

細末每服量虛實久新或三錢藥末茶一錢酸漿汁一盞

調下若用以祛天氣晴明陰晦無用如病卒暴者不拘於

此法吐時辰午巳前故內經曰平旦至日中天之陽陽中

之陽也論四時之氣仲景曰大法春宜吐是天氣在上入

氣亦在上上一日之氣實於上候也故宜早不宜夜也先令

病入膈夜不食服藥不吐再用熱漿水投之如吐風瀉病

者如全蝎半錢微炒如有蟲者加狗油五七點雜黃末一

錢甚者加堯花末半錢立吐出蟲如濕腫蒲者加赤小豆

末一錢故此不可不用大要辨其虛實實則瓜蒂散虛則

梔子散湯滿加厚朴不可一藥用之吐罷可服降火利氣

安神定志之劑

治邪癩狂大叫奔走

右用蝦蟆一枚大者去腸中滓令淨將腸胃却入腹中入

瓶子中固濟以火燒通赤以土壘定隔日取出入麝香一

錢同研令細每服一錢新汲水調下

守宮膏 治久年驚癩心血不足

守宮蟾脚珍珠 麝香 片腦各一字

右將守宮一箇以鐵針定剪子取去四足連血細研入珍

珠麝香片腦各一字許研細薄荷湯調作一服先須用

奪命散逐下痰涎或用吐法吹服此藥大有神効蓋癩者

皆心血不足此物可守宮其血與心之血類也取下如童

女血服之於心故能補也心全則病瘳也

治癩疾

右用凌霄花白末每服三錢空心用溫酒調下每服藥時

鮮開頭髮用小梳不住手梳以冷水一大碗在側含水口

中溫即換以一梳水盡則住梳如此法服四十九日永絕

根本不以受勿淺深皆愈百無所忌

來麝膏 治遠年日近風癩心恙風狂中風涎沫潮閉牙關

不開破傷風搗並皆治之

右用皂角一斤好肥實無虫蛀者去皮切碎用漿水一大碗春秋浸三四日冬浸七日夏浸一二日揉取淨漿水浸透皂角汁入銀石器或砂鍋內以文武慢火熬用新柳條槐枝攪熬似膏藥成攤在夾紙上陰乾收頭如遇病人取手掌大一片用溫漿水化在盞內用竹筒兒盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將藥吹入左右鼻孔中內良久扶起涎出為驗欲要涎止將溫鹽湯令病人服一二口便止忌鷄魚生硬濕麵等物

治瀉疾

右用金燈花根以蒜者一箇以茶清研如泥令患者日中卧茶清調下仍且卧日中良久吐出鷄子大物永不發如不吐即以熱茶投之

大定心湯

治心虛中風驚悸恍惚多忘或夢寐驚悸志少不足

人參 白茯苓 去皮 茯神 去木 遠志 去心
龍骨 乾姜 炮 當歸 切焙 甘草 炙
白朮 芍藥 桂心 紫苑 去苗土

防風 赤石脂 各一兩
右吹咀每服五錢七水二盞入棗二枚擘破煎至一盞去滓溫服日三夜二

小定心湯

治心氣不足風邪所乘驚悸恍惚夢多魘

白茯苓 去皮 官桂 去粗皮 其草炙 芍藥
乾姜 炮 遠志 去心 人參 各一兩
右吹咀每服五錢七水二盞棗二枚煎至一盞二分去滓溫服日三夜一

秦元竹瀝湯

治風狂亂走

秦元 去苗 竹瀝 一升 石膏 三兩 白茯苓 各一兩 防風 一兩
生鐵 煮取一斗用水二斗

右為散入鐵汁中煮取五升去滓內竹瀝和勻不拘時候溫服二合

防已湯

治人風邪入肝脾二經言語不轉

漢防已 防風 桂心 附子 麻黃 各半 威靈仙 三分

右吹咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入竹瀝煎瀝地黃汁各一盞生薑自然汁半盞和勻溫服之日三四

金箔十珍丸

治心神驚悸頭目不清

金箔 五片 銀箔 五片 丹砂 錢兩 同炒

琥珀 別研 瑤瑁 別研 珍珠 別研 犀角 別研 蓬砂 別研 龍腦 別研 牛黃 別研 白茯苓 去皮 人參 各半 紫河車 二兩 茯神 去木 甘草 生一兩

右除別研藥外搗羅為末入別研藥和勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服一丸嚼細用竹葉湯下食後臨卧服
茯神丸 治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽喜忘朝暈暮劇暮暈朝發則狂眩加茯神名茯神丸不加茯神名定志丸

芎藭 遠志 去心 茯苓 各三 人參 三分
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服六七十丸食後白湯下日三亦得一方加茯神一兩半牛黃五銖為六物茯

芎藭 遠志 芎藭 各一兩 忌酥物羊肉餒
茯神散 治諸風恍惚心神煩亂忘意不安或卧驚恐

烏蛇浸酒方 治風及白癩紫癩

烏蛇六兩酒浸去毒 防風去毒 桂心

白蒺藜炒去刺 五加皮各二兩 熟乾地黄四兩

天麻 牛膝去苗 枳殼炒去穢 羌活各二兩

右剉細以生絹袋盛藥以無灰酒二斗於磁甕中浸密封

七日後開每日三度溫飲一小盞忌毒滑物猪雞肉

四神散 治紫白癩風

雄黃 雌黃 硫黃 白礬用透

右各等分研為末每用時先浴令通身汗出次以生薑醃

藥擦患處良久以熱湯淋洗當日色淡五日除根

硫黃方

詩曰赤癩白癩兩般風 附子硫黃最有功

薑汁調勻茄蒂擦 一擦之後更無蹤

白癩用白茄蒂 紫癩用紫茄蒂

如用藥時先以布擦洗其瘡令損却以茄蒂醃藥擦之

一方去附子加磨石專療白癩

一方用鷄子一枚醃醋浸過宿針刺小孔瀝取清液入砒霜一

棗豆許和勻將布痛擦患處以指點藥指之亦效

一方治紫癩風再入胡粉一分膩粉少許同繫柳汁和勻臨卧

時搽三五遍並瘡

治白癩不拘遠近

用烏鷄卵一枚取清先用硫黃礬為末以鷄子清調勻用

生布一片將藥刷在布上日中曝反覆刷三四次釘布于

在板上令不皺候乾收起每遇浴罷或動作勞苦汗出之

時將布子於患處擦之即愈

治白癩風

詩曰紫癩白癩一般風 水銀輕粉最成功

搗取生薑有汁 只消一擦便無蹤

治白癩風

右平且以手掠取韭頭露水塗之極效

鱧魚塗方 治頭項及面上白駁浸淫漸長如癬狀但即

無瘡者

右用鱧魚一頭肥者美令脂出先洗白駁用物揩拭之

令小痛然後用熟魚脂塗之一度便愈甚者不過三度

鶴膝風 又名膝風 治兩大小腿瘦如蘆柴止有膝蓋大

者行履不得用小續命湯料內加草薢川練子獨活乾木

瓜咬咀不用生薑用水煎熬於枕底先放麝香少許去滓

入於枕內服之服至數十貼後加五積散同煎服永瘳

一方用紫荊皮老酒煎候溫常服

耳聾耳散 治諸風

右於五月五日午時乾地刈取蒼耳葉洗曝燥搗下篩酒

若漿服一方寸七日三作散若吐逆可蜜和為丸每服十

丸准前計一方寸七數也風輕易治者日再服若身體有

風者皆作粟糠從肌膚出或如麻豆粒此為風毒出也可

以鉞鍼刺潰出之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾

貯大甕中稍取用之此草碎惡若欲看病者疾者便服之

令人無所畏若時氣不和舉家取之若病胃脹滿心悶發

熱即服之并殺三蟲腸疳能進食一周半服之佳七月七

九月九皆可採用一方用子炒令香搗去刺使腹破浸酒

服能去風補益一方取嫩葉一石切搗和五升麥蘖團作

塊放於高文中盛二十日狀成麴取米一斗炊飯飯香於

暖入蒼耳麥蘖麴依三大升釀之封二十四日成熟取此

酒可兩重布不得金密則溢出又不可和馬肉食之空心
暖服酒妙

治風何首烏丸 王羊甫傳云其父禹玉平生服此有効

何首烏西京者才佳來一宿用竹熟地黃四兩倍

懷州牛膝酒一宿

右不得犯銅鐵器搗羅為末煉蜜為劑再入木拍內杵一
千下丸如梧桐子大每日空心温酒下四五十九忌羊血
生葱蘿蔔藕不飲酒以酸飲下大有神効

療風

以丁公藤漬酒服 南史解叔謙馮門人母有疾夜於

庭中稽顙祈告聞空中語云得丁公藤為酒即差訪醫及

本草皆無至宜都山中見一翁伐云是丁公藤能療風

乃拜位求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈

魯王酒

治風眩心亂耳聾目指淚流鼻不聞香臭口爛生

瘡風瘰癧瘰癧下生瘡煩熱厥逆上氣胃腸有脾痛手不

能上頭不能解衣帶腰脊不能俯仰脚酸不仁蒸以久立

八風十二痺在緩六急半身不遂四肢偏枯筋牽不能屈

伸賊風咽喉閉塞變更不利成如雞刀所刺行人皮膚中

無有常處久不治入五臟或在心下或在背脊骨遊走

四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損

百病悉皆治之

茵芋 烏頭 躑躅 天雄

防己 石斛 細辛 牛黃

甘草 栝子仁 通草 桂心

秦艽 茵陳 山茱萸 黃芩 附子 乾地黄 杜仲

澤瀉 石楠葉 防風 遠志 去心

王不啻行胡洽作天門冬千金翼

右咬咀以酒四斗漬十日每服一合加至四五合以知為

度千金翼名此為魯公酒有乾姜胡洽無防己以絹囊盛

藥用水二斗法麴二斤同漬三四宿出藥囊炊二斗黍米

內汁釀之酒熟飲如鷄子大日二服稍稍飲之以知為度

治風疾

取消梨不限多少絞汁而飲昔有一朝士見梁奉御診之

曰風疾已深請速歸去朝士復見鄰州馬醫趙鄂者後診

之言疾危與梁辨說同矣曰只有一法可試喫消梨不限

多少咀齧不及絞汁而飲到家旬日唯喫消梨頓爽矣亦

以梨葉作煎服

搜風大九寶飲 治挾氣中風痰雖微去當先服此順氣併

開其閉竅不致枯發然後進以風藥或非重熱氣實者亦

可服之

沉香 防風 南星 炮 天雄 氣弱子以

薄荷 地龍 去土 木香 不見火 全蝎 去毒各

右咬咀每服四錢水一盞生姜五片煎六分去滓入麝香

少許暖服不拘時

二香散 治風氣食三證通用調暢胃氣須兼服之

木香 藿香 白芷 薤 半夏 麴

厚朴 姜製 陳皮 茯苓 蒼木 炒

甘草 炙各 益智仁 縮砂仁 各一 丁香 半錢

右咬咀每服二錢半水一盞生姜三片棗二枚煎五分去

滓不拘時温服

黃耆 羌活 飲 治心脾受病精血虛少風氣乘之日益削消

黃耆 <small>一兩</small>	羌活	石斛 <small>去根</small>	防風
枳殼 <small>麩炒</small>	人參	附子 <small>炮裂去</small>	茯苓 <small>去皮</small>
牛膝 <small>酒浸</small>	五味子	牡蠣 <small>煅各一兩</small>	續斷 <small>半兩</small>
地骨皮 <small>三分</small>	生地黄 <small>二兩</small>		
右劉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服日三服			
人參湯	治風厥志意不樂身背疼痛多驚善欠噫氣		
人參	川芎	枳殼 <small>麩炒</small>	芍藥
防風	細辛	附子 <small>炮裂去</small>	甘草 <small>炙</small>
桂心 <small>各半</small>	桔梗 <small>炒</small>	茯苓 <small>去皮</small>	木香 <small>各一分</small>
右咬咀每服五錢七水一盞半生薑半分煎至八分去滓溫服			
茯神湯	治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲		
茯神 <small>去木</small>	獨活 <small>各四</small>	黃耆	遠志 <small>去心</small>
防風 <small>各五</small>	生薑 <small>三兩</small>	甘草	人參
當歸	牡蠣 <small>煅</small>	白朮	茯苓
附子 <small>各二兩</small>			
右咬咀以澇水一斗二升煮取三升服五合一日夜盡			
附子散	治風眩目痛耳聾		
附子 <small>炮裂去</small>	乾姜 <small>炮</small>	防風 <small>去皮</small>	山茱萸 <small>去核</small>
細辛 <small>各一兩</small>	山芋 <small>一兩</small>		
右為細末每服一錢七空心溫酒調下			
六神散	治風眩煩悶頭目運轉不止		
川芎	防風 <small>去皮</small>	甘草 <small>炙</small>	羌活 <small>一兩</small>
荆芥穗	雞蘇 <small>各一兩</small>		
右為細末每服一錢不拘時米飲調下			

太醫院經驗奇效良方大全 卷三

伏龍肝湯	治風痺卒不能言口噤手足不隨而強直者		
右用伏龍肝末五升水人升和攪取汁飲之以盡為善			
羚羊角散	治風痺筋脈緩弱言語蹇澀		
羚羊角 <small>屑</small>	桂心	茯神	麻黃 <small>去節根</small>
葛根	附子 <small>炮裂去</small>	當歸 <small>炒</small>	酸棗仁
五加皮 <small>各一兩</small>	升麻	枳殼 <small>麩炒</small>	獨活 <small>各一兩半</small>
右咬咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時服			
四生散	治男子婦人肝腎風毒上攻眼赤疼痛不時羞明多淚下注脚膝生瘡及遍身風癬服藥不驗者常多覺兩耳中痒正宜服此無不取效		
黃耆	羌活	沙苑蒺藜	白附子 <small>生用各</small>
右為細末每服二錢用薄荷酒調下如腎臟風下注生瘡			
以猪腰子批開以藥末二錢合定裹煨香熟空心細嚼以鹽酒送下			
羌活飲子	治風毒上攻頭面發熱頰赤唇焦眼溢鼻出熱氣項背拘急兼治肝元盪風等疾		
羌活	獨活	川芎	柴胡 <small>去苗</small>
前胡	細辛	白蒺藜 <small>炒去</small>	麥門冬 <small>去心</small>
山藥	紫蘇葉	黃耆 <small>蜜炙</small>	升麻 <small>已上各</small>
烏梅 <small>去核</small>	枳殼 <small>麩炒</small>	防風	蔓荊子
桑木 <small>去土</small>	荆芥穗	甘草 <small>炙</small>	桑皮 <small>已上各</small>
乾葛 <small>一兩</small>			
右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片薄荷五葉同煎至八分去粗食後溫服			
麻仁丸	順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱壅結津液		

耗少大便閉難或不通者年高氣弱及有風之人大便秘澀者宜服

枳殼 白檳榔 兔絲子 山藥

防風 山茱萸 肉桂 車前子

木香 羌活 郁李仁 大黃

麻仁

右為細末入別研藥和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸至二十九溫水臨臥服之

搜風散 治風氣中脘不利大便閉

大黃 郁李仁 枳殼 旋覆花

麻子仁 檳榔 木香 旋覆花

防風 青皮 牽牛 枳殼

右為細末每服二錢七臨臥生薑茶調老小加減服

聖九 治風熱大腸秘澀不通心煩腹滿體熱引飲

檳榔 木香 川芎 羌活

桂心 大黃 郁李仁 枳殼

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九漿水下茶湯亦得一方加枳殼二兩蜜九一方加枳殼麻仁各四兩

各麻仁九一方加其芎訶梨勒生地黃山芋各二兩名如

聖九一方治熱毒風用溫酒或生薑湯空心服

枳殼飲 治老人大便風秘不通塞澀妨悶或用蜜導之類不能通者

右用枳殼水洗去穢炒為齋散每服一大錢入阿膠二

片生薑五片葱白五莖水一大盞煎至六分去滓入蜜少許空心溫服次用葱白十莖爛研塗臍中却以手巾蘸葱

湯自內腎腰間浴熨至小腹下少頃氣透即通

通秘散 治風秘大便澀

香白芷 香白芷 香白芷

右為細末每服二錢食前用蜜少許溫米飲調下連進二服即通

漢防已散 治賊風身體拘急舌強言手足不遂

漢防已 黃芩 麻黃 石膏

赤芍藥 川芎 防風 羌活

附子 當歸 杏仁 白木

右咬咀每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

倉公酒 治賊風口噤角弓反張

當歸 防風 獨活 麻黃

細辛 附子 獨活 麻黃

右咬咀每服四錢水酒各半煎服口不開者扶開納藥一服甦二服少汗三服大汗愈

白花蛇煎 治蠱風身痛如刀割

白花蛇 烏蛇 白蜜

生薑汁 薄荷汁 白蠟 乾蝎

苦參 白附子

右為末先下蜜并生薑汁薄荷汁次下諸藥末拌和勻銀器中重湯熬成煎以無灰酒調下半匙七次服身體滑膩

乳香 犀角 自然銅 附子

木香 蔓荊子 草烏

人參 丹砂 鐵火

治刺風遍身如針刺

自然銅 附子

木香 蔓荊子 草烏

人參 丹砂 鐵火

治刺風遍身如針刺

自然銅 附子

木香 蔓荊子 草烏

人參 丹砂 鐵火

治刺風遍身如針刺

自然銅 附子

木香 蔓荊子 草烏

香附各半

右為末并同研藥和勻用酒糊杵為丸如梧桐子大每服十五丸米飲下臨卧服

天麻散

治體虛糜理開為風邪所中遍身澀澀如鍼刺

天麻

白花蛇酒浸去

槐實子炒

羌活

防風去叉

蔓荊子

白鮮皮

晚蠶沙炒

枳殼麩炒

威靈仙去苗

甘草炙

右為細末每服二錢七溫酒調下不拘時候

續肝丸

治四肢攣縮不伸等證曾有人自幼年酒多長而

風癱為酒使痰注骨節四肢不能運動服此有效

茯神去心

白茯苓去皮

薑黃

白朮

黃耆

羌活

五加皮

川烏炮去

薏苡仁

木瓜

半夏炒

神麩

天麻炮去

白芍藥

乳香別研

沒藥別研

防風

獨活

當歸

玄胡索

桑寄生

海桐皮去粗

木香

陳皮去白

枳殼麩炒

南星炮

地龍去土

荆芥穗各五

麝香一錢

右用續肝一具洗淨煮存性研爛同藥末酒糊為劑搗十

杵丸如梧桐子大每服三十九用溫酒吞下如不欲酒用

木瓜湯送下

牡蠣白朮散

治風虛多汗少氣汗出如洗少者癢勞

牡蠣煅

白朮二兩

防風兩半

右為細末每服二錢七溫水調下不拘時候如惡風倍防

風少氣倍白朮汗多面腫倍牡蠣

姜糖飲

治勞風項強急痛四肢煩熱

姜糖三兩

羚羊角鎔

人參各二

右搗篩每服半兩入豆豉三合葱白一握以水五盞煎取二盞去滓分溫空腹二服

附子湯

治房室怒中風惡風多汗汗出粘衣口乾上瀆不

能勞事身體盡痛名曰內風

附子生去

人參各半

茵香炒

茯苓

山藥各一

甘草炙

乾薑炮

右以咀每服四大錢水二鍾生薑三片鹽少許煎至七分

去滓食前服之

牛黃天南星丸

治風熱相搏肌肉瞤動頭目眩眩筋脈拘

急涎潮發搐精神昏昧舌強語澀肢節煩疼心胃不利凡

病風氣悉皆治之

天南星以牛膽製者用二兩如無即用

裝水者煮切作片子焙乾

天麻二兩

獨活

白附子炮

僵蚕炒

人參各一

當歸先切

桑螵蛸炒

乾蟬炒

甘草生用各

桂心一分

羚羊角鎔

麝香別研

犀角鎔

牛黃別研

雄黃別研

片腦別研各

丹砂別研

右先以十三味搗羅為細末再入別研五味和勻煉蜜為

丸如酸棗大每服一九不拘時候細嚼溫酒下或鷄蘇湯下

苦參丸

治榮虛衛實肌肉不仁病名肉苛

苦參二兩

丹參去土

仙參去土

人參

五加皮

防風去叉

茯苓去

烏蛇酒浸

蔓荊子

敗龜板炙

虎骨炙

玄參各

右為末用不銹皂角一斤剉碎以水三升換取汁去滓於

無油鐵器內煎熟成膏用煉蜜四兩拌和為丸如梧桐子

大每服十五丸至二十九食後良久夜卧共三服各用荆

茶薄苛酒下

膏散 治面及項或生白皰狀如白癩名曰癰瘍

故吹膏 甄帶 覆底 蛇蛻皮一具

右以月餘夜伺候正蝕時都燒成灰研令細每服不拘時

候以溫酒調服二錢仍以醋調藥如骨以塗傳膠上即消

治風熱毒氣客於皮膚遍身生瘡癩狀如麻豆方

秦光一兩 防風 黃芩 麻黃去根

犀角屑 玄參 甘草 枳殼 黃耆

牛蒡子 黃耆 升麻 枳殼

右吹咀每服三錢以水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

香柳湯浴方 治皮膚風熱生瘡癩或痒痛

倒垂柳二斤 白礬生用 杏仁三兩

右吹咀以水一斗五升煎一斗去滓於無風處浴極妙

苦參散 治遍身風癢痒不可止

苦參 蒼耳苗 牡荊子 白蒺藜炒去刺

玄參 胡麻子 晚蚕沙 蛇床子

天麻 晚蚕蛾 乳香各半

右為細末每服二錢不拘時候以紫笋茶湯調下

瘰癧體痛痒如蟲齧皮上痒時癢則皮脫作瘡

蒺藜子 蛇床子 羌活子 防風 五兩

大戟一斤 大黃二兩 礬石三兩

右吹咀以酒四升水七升煮取四升去滓內礬石三上火

燒用帛拭身上瘰癧止一方無大黃

苦參丸 治肺風皮膚癢痒或生癩疹疥癬冠宗與云有人

病遍身風熱細癢痒痛不可任者連背頸膈腹及近隱皆

然從咳亦多夜不得睡

苦參一斤 皂莢去皮并子搗碎二斤以水一斗

右搗苦參末用皂莢膏和丸如梧桐子大每服三十

丸荆芥薄荷酒下一方無荆芥薄荷唯酒調下治遍身風

熱細疹痒痛亦可

卷栢散 治風皮膚癢疹及風熱毒瘡

栢栢 枳殼炒 羌活 五加皮

麻黃去根 犀角屑 天竺黃 赤箭

藜蘆 桑耳 防風 川芎

黃耆 烏蛇酒浸去皮骨

右為細末每服二錢食前薄荷湯調下忌熱麪鷄猪肉蒜

秦光丸 治諸風癢痒癩疹之愈甚

秦光 防已 松指 川芎

枳殼炒 蒺藜炒去角各

苦參 白朮 防風 附子 乾薑

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每二十服九溫酒下漸

加至三十九早晚食前各一服

鬼箭湯 治風癢痒醫不効

鬼箭 白朮 礬石

甘草 防風 白朮 礬石

右吹咀每服五錢七水一盞半粟米粉二錢七同煎至七

分去滓食後溫服兼用粉粉身一方以溫水調藥服

蒼耳散 治風癢痒癩疹不止

右用蒼耳花子葉各等分為細末以黑豆炒微焦浸酒在

內夫豆以酒調藥二錢不拘時候服此酒名豆淋酒

清肌散 治風寒暑濕外傳肌骨發為癩疹遍身癢痒或赤

或白口苦咽乾或作寒熱用散毒散一兩半加天麻薄荷
各三錢蠲退二錢分作六服每服水一盞半生薑三片
煎溫服取効

五參散 治惡風
人參 沙參 丹參 玄參
苦參 不通 蒺藜炒去 烏蛇酒浸去
乾蝎 去上 天麻 赤箭 何首烏去皮

陳皮 去白 黃芩 去黑 原蚕蛾 一分
右並生用搗羅為細末每服三錢七熱茶湯調下服及半
料即減服二錢七初服三日後先覺頭項脊脊身上疼痛
乃藥力與病相繫也當安外兩德時許即無事如或身上
有瘡腫服藥一日後便愈漸減

硫黃酒 治惡風頭面肢體癩疹癩瘰
用透明蜂芒硫黃二錢乳鉢內研細入醇酒再研空心飲
其清酒將滓又研細再入酒飲之連日如是硫黃能殺惡
蟲自大便下

治諸破風腫及頭面者宜服
人參 茯苓 甘草 前胡
芎藭 羌活 獨活 桔梗
柴胡 枳殼 當歸 防風

急風一字散 治破傷風
右吹咀每服五錢水一鍾半生薑一片煎一鍾不拘時服

雄黃 川烏各二 兩星 川芎
白芷各半 全蝎 白附子各半辰砂一錢
麝香

右為細末每服半錢七溫酒調下忌熱物片時
太白散 治破傷風欲死者雖患入口已禁但心腹間緩者
嚥藥入口下咽喉即生

附子炮去 章烏炮去 天南星炮 藿香去土
人參 當歸各一 水銀一錢 錫銀一錢半與水

右為細末每服半錢溫酒調下不拘時服惟忌冷水如飲
令水再發不可治矣一方無錫
治破傷風將欲死者
川烏頭生 天南星生 半夏生 天麻去苦各
右剉碎每服一兩半以童男子小便二升半隔夜浸藥明
日煎取一大升空心溫服分為三服次服調檳榔末三錢
如人行十里更進一服如丈夫病婦人煎婦人病丈夫煎

合藥時忌孝子孕婦病人及腥穢物雞犬等仍忌油膩濕
麵生令硬物服至一二劑即吐出蟲子或泄瀉更不須服
餘藥若未吐利即當盡服病在上即吐病在下即利皆出
蟲如馬尾人髮即瘥此藥能逐諸疾

守宮丸 治破傷風身如角弓反張及筋脉拘急口喎
守宮七枚炙乾去 膩粉半錢 天南星三兩酒洗
右搗研為細末以薄麵糊為丸如菘豆大每服乾開口以
酒灌下七丸有項汗出得解更與一服再汗即瘥一方加
白附子一兩煉蠶為丸守宮一名辟宮子

又方治破傷風
用蝦蟆二兩半切爛為泥入花柳一兩同酒炒熟再入酒
二盞半溫熱去滓服之如重車行五里地通身汗出神効
治破傷風欲死者

用蜈蚣碾為細末擦牙吐出涎沫立瘳

白蠶蚕散 治破傷風身腫牙關不開

用白蠶蚕直者不拘多少生研為末每用生薑自然汁調以鷄翎於瘡口掃之勿令乾斯須腫塌皮皺為效仍用生

薑汁調半錢七服一方治癰疹及大腸風秘以酒調服之一方治風痰生薑汁一茶脚濕水調灌之

羌活防風湯 治破傷風初得在表

羌活 防風 川芎 藁本

當歸 芍藥 甘草 地榆

細辛 各一錢

石分作二貼每貼水二盞煎至八分熱服若大便閉加大

黃緩緩令過加黃芩

白木防風湯 若服前藥有自汗者

白木 四錢 防風 八錢 黃芩 四錢

石分作二貼每貼水二盞煎至八分食後服

蜈蚣散

蜈蚣 一對 魚鱉 五分炒 左盤龍 五分炒相蓋

右為細末用防風湯調服

太醫院經驗奇效良方大全卷之三

太醫院經驗奇效良方大全卷之四

寒門 附論

論曰夫中寒者寒為天地殺萬之氣人中之者其病速而危倉卒受邪生命暴絕蓋由胃氣大虛而又觸胃大寒胃虛則時不能生旺而皮毛之氣先絕氣弱則表失衛護而寒邪易於外入使周身陽氣過絕而不行四肢厥逆禁固而僵直故口禁目瞤而色青白或自汗表絕或下痢內脫內外俱虛而寒邪獨盛治失稍緩脈散而死岐伯曰冬三月此為閉藏水冰地圻無擾乎陽早卧晚起必待日光乃去寒就溫之意寒者天地為殺厲之氣在天為寒在地為水在人臟為腎而寒喜中腎若中之者拘急學痛昏不知人但言寒喜中腎者不言他臟中者且如辛苦之徒饑寒勞役不避風雪觸冒嚴寒之氣卒然病者以其五臟皆能有所中寒之證先頭痛身熱惡寒體病此是傷寒也當以

傷寒法內求之若卒然暈倒懵然無所知覺而牙緊口禁與中風相類但脈弦緊或沉細者乃中寒也若素有血虛氣滯沉寒瀉冷偏枯不仁拘攣一厥之證與夫虛寒者虛謂陽不足寒謂陰有餘陽不足則五虛生焉陰有餘則寒氣積矣五虛既生則脈細弱氣少泄利不食乃其證也此證非比傷寒為病邪氣次序循經相傳表漸入裏熱雖甚不死夫人以腎為根本惟腎受寒傷腎氣一虛寒邪交併致生為大抵中寒脈必遲挾風脈必浮眩暈不仁兼濕則脈濡腫痛痲痺治法之法不可妄吐妄下則當補陽消陰暖丹田固真氣若嚴氏所論惟中寒時刻之間便有挾風兼濕脈證之轉辰相乘者經曰以身之虛而逢天之虛兩虛相感其氣着人則傷五臟醫工救之不可妄悞緩急之勢明可見矣欲求捷效局方發揮論前人治以附子理中湯其議此藥用得之矣蓋謂溫經則寒散而陽復補上則氣和

而表實氣充形完神無餒而不病矣

寒證通治方

不換金正氣散 解散寒邪

蒼木

摘皮

半夏麴

厚朴薑製

藿香

甘草

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎至一鍾食前服

人參養胃湯

治外感風邪內傷生冷

蒼木

厚朴薑製

半夏湯洗七次

人參

茯苓

草菓

藿香

橘皮

甘草

右作一服水二鍾生薑七片烏梅半箇煎一鍾不拘時服

理中丸

治中寒腹痛

人參

白朮

乾薑炮

甘草

右為末麴糊為丸如梧桐子大每服八十九米飲湯送下

食前服一方加炮過附子一兩

生料五積散

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐

肚腹疼痛外感風寒及寒濕客於經絡腰脚酸疼並治之

白芷七分

陳皮一錢

厚朴薑製

桔梗九分

枳殼

甘草

茯苓

肉桂六分

蒼木

麻黃一錢

芍藥

乾薑炮

半夏湯洗七分

右作一服水二鍾生薑三片葱白三莖煎一鍾不拘時服

理中湯

治五臟中寒口禁失音四肢強直兼治胃脘停痰

冷氣刺痛

人參

乾薑炮

甘草

白朮

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

薑附湯 治中寒四肢厥冷強直失音口噤吐沫

附子炮三

乾薑炮五

右作一服水二鍾煎至八分不拘時服

薑桂散

溫中散寒

乾薑

良薑各半

辣桂

木香

半夏麴

甘草

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎一鍾不拘時服

附子理中湯

治中寒中濕嘔逆虛弱

人參

白朮

乾薑炮

附子炮去皮臍

甘草

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服如血少加

當歸一錢同煎服

沉附湯

治虛寒無陽胃弱乾嘔

附子炮去皮臍

乾薑炮

沉香

白朮

甘草

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

沉香桂附丸

治中寒心腹冷痛霍亂轉筋等證

沉香

附子炮去皮臍

乾薑炮

良薑炮

官桂去皮

茴香

川烏頭炮去皮臍對作

吳茱萸

洗湯浸

右各一兩為細末用好醋煮麴糊為丸如梧桐子大每服

發法

五七十九熱米飲送下空腹食前日進二服忌生冷硬物

陰毒傷寒四肢厥冷脘腹高咽喉疼嘔吐下利身背強自

汗脈沉細唇青面黑諸虛冷證皆宜用之

肥葱

切

麥麴

滄益

治三陰中寒一切虛冷厥逆嘔噦陰盛陽虛之證及

治中寒四肢厥冷強直失音口噤吐沫

治中寒中濕嘔逆虛弱

治中寒心腹冷痛霍亂轉筋等證

治中寒四肢厥冷強直失音口噤吐沫

治中寒四肢厥冷強直失音口噤吐沫

治中寒四肢厥冷強直失音口噤吐沫

右三件入水一大盞同和拌勻濕分作二次於鍋內同炒極熱用重絹縫作二包將一包熱熨臍上冷更易一包葱包既冷再用蓋水拌濕炒焦依前用之至煤爛不用別取葱熨日夜不住相續至身體溫熱脉壯陽氣復來而守正氣養之和之

又方 治陰證傷寒腹痛吐利唇青面黑身背強四肢冷脉沉細咽喉不利

右用滄蓋一斤炒焦大熱布絹二重作囊包裹盛之熨陰臍間亦同葱熨法尤妙

溫中降氣丸 治中寒氣痞脾胃不和飲食進退臍腹虛冷及中酒吐逆胃膈不利

附子 去皮臍切作片大肝一及用生薑自然汁半升良石器內慢火煮薑汁盡為度薄切焙乾生薑 去皮 白木 人參 陳皮 去白

神麴 炒黃 半夏 湯洗 白附子 當歸 洗焙

天南星 炮 高良薑 煨切 丁香 木香

沉香 胡椒 肉桂 去粗皮 右為細末用生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九生薑湯下不拘時服

附子散 治陰證傷寒唇青面黑身背強痛四肢厥冷及諸虛沉寒

附子 炮 官桂 當歸 白木 各半

乾薑 炮 半夏 麴 各二 右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服

太醫院經驗奇効良方大全卷之四

太醫院經驗奇効良方大全卷之五

暑門 附論

夏三月炎暑大行山澤燥林木流津正由火熱極其薰蒸於物致之然也在人亦應之而多汗由火氣浮泄於表時於此際濕熱陰盛人多肢體困倦精神短少一或將理失宜輕則氣虛身熱頭重脚軟脾弱少食之證所謂注夏病也暑之為氣在天為熱在地為火在人臟為心且暑之中人者先着於心伏為三焦腸胃之間凡中之者蓋熱傷氣而不傷形也乃六淫中無形之火大率以五行中有形之水制之輕則前證所感大同小異重則昏不知人或吐或瀉或眩暈頭痺丹溪以陰虛所致甚則腎悶懊懷而死者客氣旺而主氣弱為熱傷元氣古人立法夏月宜補者補天真元氣非補熱火也以用人參五味子麥門冬各生散散蓋此藥能益金水以禦火土之旺又令人夏食寒以扶

陰氣養其陽也蓋謂陽亢於外陰微於內庚金受囚於上清肅之源竭於下也丹溪又辯云世言夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰陰者其誤甚矣或曰以手捫腹明知其冷而何曰人之腹屬地氣於此時浮於肌表散於皮毛腹中之陽虛矣如子月一陽生寅月三陽生此氣之升也已月六陽生陽盡出於地之上矣此氣之浮也經曰夏者經滿氣溢入孫絡受血皮膚充實長夏孫絡皆盛內溢肌中又曰陽氣在孫絡長夏氣在肌肉所以養陽也何以溫熱取其用此理固然且如涼臺水館當風取涼寒泉水菓之物所傷或吐或瀉或腹疼自內及外當用溫劑前哲又謂非降浮沉則順寒熱溫涼則逆夏月火令之時不可妄投溫燥之藥者其虛實不為慮乎或曰巳月純陽五月一陰生六月二陰生陰氣既動豈無陰於此陰之初動於地下

四陽浮於上燔然炎流全燦石何冷之有且繁古治中暑之
 藥有中者傷暑之分若人或傷或中之意但言避暑納涼於深
 堂大厦請靜而得之為中暑其病必頭疼惡寒身形拘急肢節
 疼痛而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所遏使周身陽氣
 不得伸越為陰證故治以大順散以取辛甘發散之意後人不
 察用溫熱之意又辨傷暑之證若人或農夫於日中勞役謂動
 而得之為傷暑其病必頭疼發躁熱閉之肌膚大滿大熱大渴
 引飲汗大出無氣已動乃為大熱外傷肺氣以人參白虎湯為
 陽證熱傷元氣非研體受病也夫白虎治熱傷氣謂元氣不甚
 虛也暑去氣清則安矣脾胃論中長夏濕熱胃困尤甚又有暑
 風一證因其夏月而病搖動故有此名非風也乃病暑執尤極
 火盛金衰木無以制正邪相拒汗閉於外痰鬱於內風勢妄行
 脾必受邪故手足陽為動搖內擾神舍志識不清而昏悶無所
 知矣慎勿以風藥治之治以兼化但清時令之火則心經之熱
 亦泄金清氣行則木邪有制而風不作開鬱悶之疾則神識氣
 寧當用黃連香薷飲加羌活且如有人在途路中傷暑者湯藥
 皆無將人挽扶涼處就將當道熱上包裹腹脹之上下或
 布蘸湯熨之冷即頻易待其甦醒用溫米飲湯徐徐灌之便不
 可用剛燥之劑可不畏哉

五物香薷湯 驅暑和中通用
 香薷 四錢 白扁豆 厚朴 薑製各一錢 白茯苓 一錢
 甘草 炙 各一錢
 右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服
 香薷縮脾飲 驅暑和中除寒止渴
 香薷 三錢 縮砂 二錢 草薢仁 乾葛 各一錢
 烏梅肉 白扁豆 甘草 炙 各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服
 冷香飲子 治老人瘧人伏暑煩躁引飲無度惡心疲倦服
 服涼藥不得者
 草薢仁 五錢 附子 橘紅 甘草 炙 各一錢
 右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾去粗沉冷旋旋服
 不拘時候

香薷劉散 解暑毒止霍亂
 香薷 厚朴 薑製各一錢 茯苓 一錢 甘草 半錢
 陳皮 良薑 各一錢
 右作一服水二鍾入鹽些少煎至一鍾不拘時服
 二氣丹 治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞悶或頭痛惡心並
 皆治之
 硝石 硫黃 各等分

右為末銀器內文武火炒冷鵝黃色再碾細用糯米煮糊
 為丸如梧桐子大每服四十九新汲水送下不拘時服
 五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤色心神
 恍惚一方加辰砂各辰砂五苓散
 澤瀉 二錢 肉桂 一兩 赤茯苓 白朮
 猪苓 兩各半

右為細末每服二錢白湯調下不拘時服
 枇杷葉散 治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩
 枇杷葉 去毛 厚朴 薑製 陳皮 丁香 各半
 白茅根 麥門冬 去心 乾木瓜 甘草 炙 各一錢
 香薷 七錢
 右為細末每服二錢生薑湯或冷水調下不拘時服
 消暑丸 治伏暑引飲脾胃不和

半夏 <small>醋炙</small> 甘草 <small>生用</small> 茯苓 <small>去皮</small>	右為細末用生薑汁煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸熱湯下不拘時服
桂苓甘露飲	治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂吐瀉皆治
肉桂 <small>半兩</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 白木 <small>猪苓</small>	
滑石 <small>二兩</small> 寒水石 <small>碎</small> 甘草 <small>炙</small> 澤瀉 <small>各一兩</small>	右為細末每服三錢入蜜些少熱湯冷水任調下
解暑三白散	治胃暑伏熱霍亂吐瀉小便不利頭目昏眩
白茯苓 白木 <small>各五</small>	
右作一服水二鍾生薑五片燈心十莖煎一鍾不拘時服	
十味香薷散	消暑氣和脾胃
香薷 人參 陳皮 白木	
黃菁 白扁豆 甘草 <small>炙</small> 厚朴	
木瓜 <small>去皮</small>	
右為細末每服二錢熱湯冷水任調下不拘時服	
香朴飲子	治大人小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂
人參 <small>去蘆</small> 茯苓 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙</small> 紫蘇	
澤瀉 香薷 半夏 <small>麩</small> 白扁豆	
烏梅肉 木瓜 厚朴 <small>薑製</small>	
右作一服水二鍾生薑三片紅棗一箇煎至一鍾食前服	
六和湯	治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱
交作痰喘咳嗽胃脘痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜臥倦怠	
小便赤澀并傷寒陰陽不分胃暑伏熱煩悶或成痢疾中	
酒煩渴畏食並皆治之	
縮砂 半夏 <small>湯洗</small> 杏仁 <small>去皮</small> 人參 <small>去蘆</small>	
赤茯苓 <small>去皮</small> 藿香 <small>去土</small> 白扁豆 <small>薑製</small> 香薷	

厚朴 <small>薑製</small> 木瓜 <small>各一</small> 甘草 <small>炙</small>	右作一服水二鍾生薑五片紅棗一箇煎一鍾不拘時服
聖惠方	治絞腸痧痛不可忍展轉在地或起或仆其腸絞
結在腹此是中毒之深須臾令人死	
右用鹽一兩熱湯調灌病人口中蓋氣到腹其痛即定	
竹葉石膏湯	治伏暑內外熱熾煩躁大渴
石膏 <small>半兩</small> 麥門冬 <small>去心</small> 人參 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙</small>	
右作一服水二鍾生薑五片青竹葉十四片粳米一撮煎	
至一鍾不拘時服	
黃連香薷湯	治伏暑傷冷霍亂轉筋心腹脹痛四肢厥冷
香薷 <small>三</small> 厚朴 <small>薑製</small> 黃連 <small>各一</small>	
右先將厚朴黃連二味同生薑四錢一處搗細於銀石器	
內慢火同炒令紫色取起入香薷入水一盞酒一盞煎八	
分去粗用磁器盛於新汲水中沉令極冷服如中暑搗	
內加羌活二錢尋常感暑燥渴吐瀉不甚重者方中去	
黃連只加白扁豆二錢微炒對煎如前法服之如燥熱	
莫化銅錢器	
辰砂益原散	治伏暑煩渴引飲小便不利心神恍惚
辰砂 <small>三</small> 滑石 <small>六兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	
右為細末每服三錢不拘時白沸湯調下	
冷香湯	治伏暑引飲躁渴過食生冷成霍亂
良薑 附子 <small>炮去</small> 甘草 <small>炙</small> 檀香 <small>各二</small>	
乾薑 <small>細</small> 丁香 <small>三分</small> 草葉 <small>一</small>	
右咬咀作二貼用水二鍾煎至一鍾去滓貯瓶中沉井中	
待冷服之	

御愛薑蘇丸 治中暑惡心頭疼煩燥生津止渴

紫蘇葉五兩 烏梅肉二兩 甘草一分 桂心半兩 香薷半兩 生薑一分 木瓜去乾者二兩 如生

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸細嚼熱水送下

黃順散 治中暑煩渴

甘草三兩 肉桂去粗皮 乾薑兩 紫蘇葉半兩 烏梅肉兩

右為細末每服二錢冷水調下沸湯調服亦得

龍鬚散 一名甘草散 治胃暑伏熱心膈燥悶飲水過度不知

人事及霍亂吐泄作渴衄血吐血小便下血頭旋目暈

五倍子一作五味子 烏梅去仁 甘草兩 飛羅麵二兩 白礬方生用

右為細末每服二大錢新汲水調下一服即愈即解諸毒

物雖平日不飲冷者服之亦有奇効一方加訶子肉滴水

為丸謂之龍涎丸仍似末調下霍公異參政易名濯熱飲

子為丸彈子大陰乾細嚼水送下

地仙散 治傷寒後伏暑煩熱不安及煩熱虛勞

地骨皮去味 防風去蘆 甘草兩 右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓食遠溫服

治中暑不拘老少

右用不蛀皂角不計多少刮去黑皮燒煙欲盡用盆合於

地上周回勿令透煙每用皂角灰一兩用甘草末六錢和

勻每服一錢新汲水調下氣虛人溫漿水調下昏迷不省

者不過兩服其內翰備急用皂角五片去皮弦炙焦存性

其草玉兩蓋中暑人痰塞開竅皂角能疎利去痰故也一

方用米飲下

治中暑甚妙

右用上等重羅細麵以薑汁及水和成餅子曝乾却碾末

收之每服二三錢新汲水調服

香薷丸 治大人小兒傷暑伏熱燥渴昏悶頭目昏眩胃膈煩

滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐

利轉筋並宜服之

香薷去根 紫蘇去籠 乾木瓜 藿香洗去

茯苓五兩 甘草色赤 檀香剉 丁香各二 右為細末煉蜜和丸每兩作二九每服一丸至二九細

嚼溫湯下或新汲水化下亦得小兒每服半丸不拘時候

水瓢丸 治胃暑毒解煩渴

烏梅肉四兩 甘草 青鹽各二 乾木瓜 白茯苓 檀香各一 麝香一分

右除麝香別碾餘並為細末煉蜜為丸每兩作三十九每

服一丸含化或新汲水溫水嚼下不拘時候一方有人參

水葫蘆丸 治證同前

川百藥煎三兩 麥門冬 烏梅肉 白梅肉 乾葛 甘草各半

右為細末麵糊為丸如雞頭大每服一丸含化夏月出

行一丸可度一日

發火散 治傷暑煩燥發渴口苦舌乾頭痛惡心不思飲食

昏迷不省人事欲死者及治血崩婦人熱血崩

青皮去白 赤芍藥 黃連去鹽 地榆各等

右為細末每服三錢冷水調下如蓄熱而氣血妄行加其

草等分一方漿水調服治血痢水一盞煎服

通草散 治伏暑下血如久痢崇寧二年自太府出為發運夏

及秋患痢兩月一日一夜三四次然血多白少各醫皆曰此痢也聞泗州青陽鎮李中和助教善醫即遣人召之中和至看脈即曰此非痢也殆甚怒之徐叩之李曰血多白少小便澀少即非痢其言中余之病心已神之乃是舊因伏暑小便轉導入大腑由心經而過遂化為血大小便下故其狀似痢而非痢也但令大小便各歸本處即安

通草

水通各半

澤瀉一分

竹茹二升少用

右到如大米粒或為細末就到時即每服秤三錢水一盞煎至七分溫服細末即每服抄二錢依前法煎食後并夜卧各一服便住信知天下有如此妙醫余家數婢久痢服之皆安故記傳久

異功敵暑丸

治伏暑或吐或瀉有效

黃連

一斤 陳倉米二升水二

右於鍋內如煮飯法米熟為度曬乾為末以水為丸如梧桐子大每服三五十九飯湯下不以時

檀香丸

解毒

檀香

杏仁

烏梅肉

紫蘇葉

茵香

百藥煎

甘草

右為細末煉蜜為丸如彈子大非時含化

白梅湯

治中熱五心煩燥霍亂嘔吐口乾煩渴津液不通

白梅

檀香

甘草

鹽

右為細末每服二錢入生薑五片青竹葉七片粳米百粒

水煎服

五聖湯

治暑病嘔惡每遇夏月不進飲食疲倦少力見日色

則頭目昏痛惡心多嘔

貫衆

黃連

甘草

吳茱萸

白茯苓 去皮

已上五味並生用各半兩右咬咀平分三服每服用水一椀半前至一椀去滓放候日午時先取香熟甜瓜一枚切去皮作十二片先嚼瓜一片呷藥一二呷送下了再如前嚼瓜一片呷藥一二呷看喫得幾片以藥汁盡為度不損脾胃不動臟腑須是覺大煩時服之

蠟梅丸

止渴生津

蠟梅花末

乾薑末

甘草末

枇杷葉末

百藥煎末

烏梅肉末

蠟五兩

右先燻蠟開投蜜一兩和上件藥末搗二三百下丸如鷄頭實大夏月長途一日含化一九妙

治中暑迷悶欲死

右取蒜一瓣生嚼以新水送下或不能嚼水研灌之立可

効熱死人切勿便與冷水及卧冷地正如凍死人須先與冷水若遲近火即死一法行路暈死人惟得置日中或令近火以熱湯灌之即活一方以爛蒜嚼三兩辦溫水送下

治時暫伏暑

右用香附子春中搗去皮入薑汁炒香為末入砂糖丸龍

眼大先呷麻油少許次嚼藥冷水送下當時便覺清涼

香澤湯

治伏暑發熱煩渴引飲小便不利兼治傷寒陰陽

不分疑二之間最宜服此

澤瀉

猪苓

茯苓

白朮

桂心

人參

柴胡

麥門冬

渴甚去桂加五味子黃連各二錢

石咬咀每服七錢水一鍾半燈心二十根煎一鍾食遠服

太醫院經驗奇效良方大全卷之五

六氣之中濕熱為病十居八九故內經云濕上潤而熱又云因於濕首如裹濕熱不攘大筋絀短小筋弛長絀短為拘弛長為痿或云濕熱在其中又云濕熱在其中古人論其細微之處世之有病濕者或履卑濕或冒雨露或臥陰潤或衣濕汗俱能致言其病開節疼痛而煩肢體頑麻而重脈沉細者名曰濕痺其小便不利大便反快者當利其小便或身痛而煩脈沉而緩名曰重濕患一身盡痛發黃小便自利當燥陰土若肢體重者不可轉側額上微汗不欲去被身微腫或脈浮者名曰風濕是其風濕二氣相搏以致此治當微汗發汗使風濕俱從汗出若

大發汗則風去而濕存兩脛逆冷胸腹滿頭目痛多汗妄言脈陽濡弱陰急小是名濕濕因傷濕而後傷暑者濕熱相搏而成此患不可發汗則必不能言及耳聾不知痛癢乃是重濕濕家寒多者為痛為腫凡濕家不可大下下之額上汗出微喘小便利者不治下利不止者亦不治又有脾胃素弱內畜痰飲外胃風露寒濕相搏上衝心胃令人涎潮壅塞口眼喎斜半身不隨昏不知人与中風相似但脈沉澹或沉而細不可作中風治之謂其脾土好乾惡濕而被濕流相干則有是疾若作中風治之脾元愈虛痰濕愈盛必致危篤戴人論濕之證而以濕熱為原風寒為兼深得內經之旨也治濕得行則燥然而濕行而氣復散暫時開也殊不知濕得行則澀然而收也濕得澀也或從

此亦思權者有可劫之病也要當分別上下內外之由自外而

成者或因露露陰雨所客濕浴為風所閉水為寒所凝汗出當風而快坐則卑池清氣衰虛從下而起上為頭重鼻塞而煩表鬱則發寒熱身色如似薰黃者入骨節為重疼痛足跗浮腫其脈浮緩內經曰地之濕氣感則害人皮肉筋脈又云傷於濕者下先受之非外感所致乎大法腰已上宜汗腰已下宜利小便之分東垣云濕淫所勝助風以平之非風藥表散之謂乎經云濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而止此治上治外之法也自內而致者或因酒麵積多過飲湯液停滯臍物甘滑陳久燒炙香辛膏梁過度氣熱薰蒸濁液不行滯溢於中濕從內作重則發瘧強直霍亂吐利輕則痞膈中滿怠惰嗜卧沉重無力流澀關節則煩疼注於絡脈屈伸不可轉則水性潤下氣不能照滯於絡絡發腫肉軟如泥按之不起其脈多沉潛內經曰濕氣在中又曰脾惡濕非內致所生乎治法脾胃苦溫急食

若以燥之又曰溫淫於內以苦燥之以淡泄之此溫自內成故宜燥宜利小便非表散所能去也此治內治下之法也今溫分上下內外蓋可知矣藥亦有所執乎金匱方以汗藥發溫者也古方以熱藥燥寒溫者也東垣以風藥勝溫者也河間以涼藥治溫熱者也大率言淡滲之藥利濕者也諸家發明互相追矣前人治病之證各有立論全在醫者識病或內因或因或虛或實六淫七情所感的於何經受證以致之治之無不效矣

溫證通治方
除濕湯 治寒濕所傷身體重着腰脚痠疼大便澹泄小便赤澀

半夏麴炒半一厚朴薑製一蒼朮米泔浸一藿香一系
陳皮祛拍一白茯苓去核白朮二系 甘草一系
作一服水二鍾生薑七片紅棗一棰煎至一鍾食前服

羌附湯 治風濕相搏身體煩疼掣痛不可屈伸或身微腫

不仁 羌活 附子炮裂 白木 甘草各二

作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

溼濕湯 治坐臥濕地或為雨露所襲身重脚弱關節疼痛

發熱惡寒或多汗惡風或小便不利大腑溼泄

白木 三升 乾薑炮 白芍藥 附子炮裂

白茯苓 去皮 人參各一 桂枝不見 甘草半各

作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

清燥湯 六七月之間溫令大行子能令母突而熱旺溫熱

相合而刑夷踏腸故寒涼以救之燥金受溫熱之邪寒水

生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓

不能行走不正兩足欹側以此藥主之

蒼木 米泔浸 五味子 竹西 黃耆 黃連

白木 橘皮 白茯苓 去皮 當歸各一

人參 生地黃 各七 麥門冬 去心 神麴炒

猪苓 黃蘗 酒炒 甘草 澤瀉 各半

柴胡 升麻 各三

作一服水二鍾煎至一鍾食前服

木瓜虎骨丸 治寒濕合而成痺脚痛不仁疼痛少力足下

癢痛不能落地腰腿筋掣不能屈伸及項背拘急手擎無

力耳內蟬鳴頭眩目旋脚氣行步艱難

木瓜 血竭另研 沒藥另研 虎胫骨 酒炙

木香 自然銅 醋炒 楓香 骨碎補 去毛

當歸 甜瓜仁 敗龜板 肉桂 略一

安息香 酒熬 乳香 另研 地龍 去土

羌活勝濕湯 右為末酒糊丸如梧桐子大每服五六十丸食前溫酒下

太陽經不行 如脊痛項強腰似折而似按上衝頭痛及足

羌活 獨活 各二 藥本 防風

蔓荊子 川芎 各一 甘草 半

作一服水二鍾煎至一鍾食後溫服如身重腰沉沉然乃

經中有濕熱也加黃蘗一錢附子半錢蒼木二錢

四物附子湯 治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不得屈伸

附子 炮裂 肉桂 二升 白木 三升 甘草 一升

作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

防已黃耆湯 治風濕相搏客於皮膚四肢少力關節煩疼

防已 三升 黃耆 四升 白木 三升 甘草 一升

作一服水二鍾生薑三片紅棗一箇煎至一鍾不拘時服

大橘皮湯 治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑泄

橘皮 三升 滑石 四升 茯苓 半升 木香

檳榔 猪苓 澤瀉 白木 各一

官桂 半升 甘草 三分

作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

天麻散 治風濕痺痛黃腫

天麻 全蝎 去毒 熟地黃 木瓜

烏頭 當歸 各三 牛膝 酒洗 乳香

沒藥 川山甲 炮 川芎 各一

右為細末每服三錢空心用溫酒調服

導水丸

大黃 二升 黃芩 二升 滑石 四升 牽牛 頭末

去濕熱腰痛泄水溫腫痛久雨則加甘遂一兩

去遍身走注腫痛加白芥子一兩

退熱散腫毒止痛久早加朴硝一兩

散結滯通關節潤腸胃行帶氣通血脈加郁李仁一兩

去腰腿沉重加樟榔根一兩

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十九加至一百丸白

湯送下臨卧時服

除濕丹

治諸濕客傳腰膝重痛足胫浮腫筋脈拘急津液

凝澁便溺不利目赤癰疹疥癬走注脚氣盡皆治之

檳榔

甘遂

威靈仙

澤瀉

赤芍藥

葶藶

乳香

沒藥

牽牛五斤

大戟炒三

陳皮四白

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服五六十丸漸加八九

十丸食前溫白湯送下服藥後忌酒溫麵二三日一方有

澤瀉陳皮各一兩無葶藶

參溫湯

治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澀或利

大便澀泄皆因坐卧濕處或因雨露所襲或因汗漬衣冷

又久得之腰下重疼兩脚痠痛腿膝或腫悉能除之

蒼木製

白木

甘草炙

茯苓

乾薑炮

陳皮

丁香各一

右咬咀分作二貼每貼用水二鍾生薑三片棗一枚煎至

一鍾食遠服

瓜蒂搐鼻法

治傷濕鼻塞頭疼

右用瓜蒂為末口含水搐一字入鼻中流出黃水効

白木酒

治中濕口噤不知人

白木一及

右咬咀作一服用酒三盞煎至一盞頓服不飲酒水亦可

金砂流濕丸 治男子婦人雜證及風濕酒濕

海金沙五斤木通去皮木香

澤瀉

白茯苓去皮大黃略半牽牛頭末

滑石各五

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十九至八十九生薑

湯下忌溫麵

如小便不通燈草湯下

傷酒生薑湯下

酒疸食黃蘗菊湯下

痢疾高良薑湯下

婦人血氣不調當歸湯下

肢節疼痛溫酒下

心疼韭根湯下

膈氣枳實湯下

尋痛丸

治走注流濕已後宜用襲經絡除疼痛

機欄燒存性穿山甲酥炙當歸去蘆乳香別研

沒藥別研木香半斤麝香別研皂莢子仁炒

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九不拘

時溫酒下或木瓜湯下

補骨脂丸

治溫傷內外痲疾俱作陽氣衰絕乳石補益之藥

百端皆不應唐鄭相公為海南節度七十有五越地卑濕

服諸藥不應原和七年有訶陵國船主李摩獻此方經七

八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京

錄方傳之

破故紙針及東洗胡桃肉去皮二十

右胡桃肉泥入破故紙末更以好煉蜜和勻如飴盛磁器

中且日以溫酒化藥一匙服之不飲酒者以溫熱水化下

彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血

生附湯

治受濕腰疼痛

附子生用牛膝酒浸厚朴製乾薑生用

白木

杜仲各

茯苓

甘草各 二 蒼朮

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至八分去粗食前服

七聖散 治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨或脚膝疼痛不能步履

續斷

獨活

防風

杜仲

單辭

牛膝酒浸

杜仲

右各修事淨乾半兩為細末每服二錢溫酒調下

蒼朮散

治風濕常服壯筋骨健步

蒼朮以童子小便浸半斤無灰好酒浸半斤

右浸至春五日夏三日秋七日冬十日取出蒼朮於淨地上撥一坑以炭火煨坑紅去炭將浸蒼朮酒少便傾在坑

內却放蒼朮在坑內以瓦器蓋覆用泥封固經一宿取出蒼朮研為細末每服二錢空心益陽或酒調服常服除濕壯筋骨明目

乳香沒藥九 治遠年近日風濕脚氣攻注脚膝或腫或寒筋

掌不能屈伸脚不能踏地及一切疼痛往來不已宜服

乳香別研 沒藥別研 骨碎補去毛 五靈脂去土

縮砂仁 白附子 甜瓜子 牛膝酒浸

當歸去蘆 乾木瓜 地龍去土 木鱉子各一

白牽牛三及 右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九溫木

瓜湯下或溫酒亦可不拘時服

上馬丸 治寒濕臂痛腿疼筋骨諸疾

川烏炮 木香不見火 虎骨酥炙 牛膝

杜仲

木瓜

當歸酒浸

敗龜板酥炙

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三四十九溫酒下

治風寒濕痺麻木不仁粥法

右川烏生為末用香熟白米作粥半碗藥末四錢同米用

慢火熬熟稀薄不要稠下薑汁一茶脚許蜜三大匙攪勻

空心服之溫為佳如是中濕更入薏苡仁末二錢增米作

一中碗服此粥大治手足四肢不隨痛不能舉者有此證

者預服防之左氏云風淫末疾謂四肢為四末也脾主四

肢風邪客於肝則溼脾脾為肝輔故疾在末穀氣引風濕

之藥徑入脾經故四肢得安此湯劑極有力予嘗製此方

以授人服者皆驗

治脚轉筋

急伸脚將脚緊的向前其痛即止

輕脚丸 逐風去濕消腫行血止痛

白木 赤茯苓 赤芍藥 紫蘇葉 葫蘆巴

枳實炒 檳榔各五 桃仁及 雙仁各

地膚子一及 右除桃仁別研外搗羅為細末入桃仁煉蜜和搗三五百

杵丸如梧桐子大每服三五十九加至百丸空心紫蘇湯

下膈有寒濕之疾每發時不可忍呻吟之聲徹於外幾至

於死忽遇道人授此方繞服半料間或發作頓覺減於前

時服盡全料疾遂瘳信而服之其驗如神

秘傳循經丸 治男子婦人兒童室女諸經絡風邪寒溢氣血

留滯流注作痛筋脈牽牽並皆治之常服亦可

秘傳循經丸 治男子婦人兒童室女諸經絡風邪寒溢氣血

留滯流注作痛筋脈牽牽並皆治之常服亦可

川烏炮去 當歸酒浸 地龍去土 南星炮各
草烏炮去 豆餅三兩 黑豆不以多 少去皮好酒
乳香別研 沒藥別研 各 右為末 消如 溫酒下
考水除眩湯 治感寒濕頭目眩暈

川芎二升 白朮三升 附子半 甘草炙
官桂各一
右作一服水二盞生薑三片煎至一鍾食前服

太醫院經驗奇效良方卷之六

太醫院經驗奇效良方卷之七

燥門 附論

內經曰諸燥枯涸乾勁破揭皆屬於燥乃陽明燥金肺與太陽
之氣也故曰燥萬物莫熯乎火燥之為病皆屬燥金之化然金
鉅本燥能令燥者火也夫金為陰之主為水之源而受燥氣寒
水生化之源竭絕於上而不能灌溉周身營養百骸色乾而無
潤澤皮膚滋生毫毛若有自來矣或大病而尅伐太過或吐利
而亡津液或預防養生誤餌金石之藥或防勞致虛補塞燥劑
食味過厚辛熱太多醇酒炙肉皆能偏助狂火而損害真陰陰
中伏火日漸煎熬血液衰耗使燥熱轉甚為諸病在外則皮膚
皴揭在上則咽鼻焦乾在中則水液衰少而煩渴在下則腸胃
枯涸津不潤而便難在手足則痿弱無力在脉則細澀而微此
皆陰血為火熱所傷也原病式云風熱火同陽也寒燥濕同陰
也又燥濕小異也燥金雖高秋陰而異於寒濕故反同其風熱
也火熱勝而金衰而風生則風能勝濕熱能耗液而反寒陽實
陰虛則風熱勝於水濕而為燥也凡人風病多因熱甚而風燥
者為其兼化以熱為其主也然陽實陰虛而風熱太甚以勝水
濕因而成燥肝主於筋而風氣自甚又燥熱加之液還聚於胃
膈則筋大燥也燥金主於收斂切腎瀆故為病筋脈勁強緊
急而口噤也或病燥熱太甚而脾胃乾涸而成消渴者或風熱
燥甚佛鬱在表裏氣平者善伸數欠筋脈拘急或時惡寒或筋
惕而搐脈浮數而弦也風熱燥鬱甚於裏故煩滿而或閉結也
及風痲之發作者由熱甚而風燥為其兼化從溢胃腸燥燥而
痿痺昏冒僵仆也凡此諸證皆由熱甚而生風燥各有異者由
風熱燥各微甚不等故也所謂中風或筋緩者因其風熱勝濕
而為燥乃燥之甚也然筋緩不收而痿痺故諸積鬱病痿皆屬

金肺乃燥之化也如秋深燥甚則草木凋落而不收病之象也
是以手得血而能握足得血而能步夫燥之為病血液衰少而
氣血不能通暢故其病也治法當以甘寒滋潤之劑故甘寒俱
能生血又寒能勝熱陰得滋而火液得潤而燥除源泉下降
精血上榮如是則氣液宜通由內神茂而外色澤矣內經治法
燥者潤之非養血潤燥之謂歟世或有言風熱而燥誤以辛涼
驅風苦泄之劑愈燥其液損之又損殊不知血衰致燥多招風
象乃木火得侮金水之衰也風燥之疾當求其本治則不失矣

燥通治方
當歸潤燥湯
熟地黃 生地黃 大黃
桃仁泥 麻仁 甘草各一 升麻二

右作一服水二鍾煎至一鍾空心熱服
導滯通幽湯 治大便難幽閉不通上衝咽閉不開噎塞不便
燥閉氣不得下治在幽閉以辛潤之
當歸 桃仁泥 升麻 熟地黃
升麻 紅花 甘草各半

右作一服水二鍾煎至一鍾去粗調攪細末二升稍溫服
升麻瀉濕湯 治煙隔不通逆氣裏急大便不行
升麻 生地黃 熟地黃 蒼朮
青皮 黃柏 當歸 黃耆

右作一服水二鍾煎至一鍾食前熱服
麻黃白朮散 治大便不通小便赤黃身腫其色黃麻木
重如山沉困無力四肢痿軟不能卒動喘促唾清水白沫

神功丸
大黃 訶子肉 麻子仁 別研 人參 去

如膠吐噦痰喘時燥熱欲去衣頃更而過振寒頃額有
時如冰頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭少腹急痛
當胸有動氣按之堅硬而痛
麻黃 吳茱萸 草豆蔻 厚朴
生甘草 神麴 升麻 柴胡
白朮 蒼朮 茯苓 澤瀉
人參 黃耆 猪苓 桂枝
杏仁 黃柏 橘紅 黃連
青皮 炙甘草

右作一服用水二鍾入麻黃先煎令沸去沫再入諸藥同
煎至一鍾食遠稍熱服一方有白豆蔻半錢
潤腸丸 治脾胃伏火大便便秘或乾燥塞不通全不思食乃
風結秘血結秘皆令閉塞以潤燥活血疎風自然通快
麻子仁 桃仁 大黃 羌活
太黃 桃仁 羌活 當歸尾

石除麻仁桃仁別碾如泥外餘藥研為細末和勻煉蜜為丸
如梧桐子大每服三五十九空心白湯送下
活血潤燥丸 治大便風秘不通常燥結
當歸 防風 大黃 羌活
桃仁 升麻 麻子仁 別研
皂角仁 滑石 升麻 升麻 升麻
右除桃仁麻仁別研外其餘藥研為末和勻煉蜜為丸如
梧桐子大每服五十九三兩服後大便日久不能結燥也
以磁器盛之勿令見風

神功丸
大黃 訶子肉 麻子仁 別研 人參 去

神功丸
大黃 訶子肉 麻子仁 別研 人參 去

右為細末入麻仁泥和勻煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫水下或酒或米飲下食後臨卧如大便不通加服

脾約丸
麻仁一斤二枳實麩炒厚朴去皮芍藥各一斤

大黃蒸四杏仁去皮尖炒黃
右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九臨卧溫水下

麻仁丸
郁李仁別破麻子仁別研大黃生枳殼炒防風去木香各半乾山藥各半檳榔半

右為細末入別研藥和勻煉蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九食後溫湯下加牽牛滑石尤妙

潤體丸
郁李仁大黃桂心黑牽牛輕粉少許

當歸用各半右為細末滴水丸如梧桐子大每服三十九至四十九用溫湯或生薑湯送下

導氣除燥湯
治小便閉澀不通乃血澀致氣不通而澀也

知母酒製澤瀉為末茯苓去皮滑石各二黃芩各二

右和勻作一服用水二鍾煎至一鍾空心稍熱服如急閉不拘時候服

太醫院經驗奇效良方七卷

太醫院經驗奇效良方卷之八

火門 附論

內經曰六氣所入風寒在下燥熱在上濕氣在中惟火遊行其間能貫皆發上下之病者多乎動而為病者惟火也病機論云五火為病內格嘔逆食不得入是有火也諸熱皆屬於火熱氣甚則濁亂昏昧也經所謂病筋脈相引而急名曰瘵故俗謂之瘵是也諸禁慄鼓如喪神守皆屬於火禁慄驚或如喪神守悸動怔忡皆熱之內作故治當以制火之劑其神守血榮自愈也諸逆衝上皆屬於火衝攻也火氣炎上故嘔湧溢食而不下也諸躁狂越皆屬於火胃火則四肢安而能登高也故四肢者諸陽之本經所謂陰不勝陽則脈流薄疾病乃狂是以陽勝則使妄言罵詈不避親疏神明之亂也治之以補陰瀉陽奪其食則病已諸証皆屬於火然火也其中有君相二火之名焉是以丹溪云君火入火也相火天火也火內而外陽主乎動者五行之中惟火有二雖然尤不止於是也故凡動皆屬於火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無之位稟命因其動而可見故謂之相火主生物故恒於動人有此生亦恒於動其有所恒於動者皆相火助之為也見於天者出於龍雷之氣出於海者則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝屬木而腎屬水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心胞絡者腎之配三焦以焦言而下焦同肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能生何謂深察內經之意言之詳病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓癰疽癩瘡氣結核頰下霍亂瘧疾鼻衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚或悲笑譫妄或蠱血汚此皆少陰君火之熱乃真心小腸之氣所為也若腎寒暴瘡胃味燥擾狂越罵詈驚駭附腫疼

酸氣逆上衝禁慄如喪神牛瘡癆喉痺耳鳴及舌嘔瀉溢食不
 下目昧不明暴注爛熲暴病暴死此皆少陽相火之熱乃心胞
 絡三焦之氣所為也君火之氣經以暑與熱言之相火之氣經
 以言之其暴悍酷烈有甚於君火者也相火易起五性厥陽之
 火相煽則妄動矣火起於妄變化莫測無時不有煎熬真陰陰
 虛則病陰熱則死東垣謂相火為元氣之賊也又曰相火與元
 氣不兩立一勝則一負曰然則如之何可使無勝無負乎曰神
 矣之矣五性感動而万事出五者之性為物所感不能不動動
 者即內經五火也古人以中正仁義而主靜朱子以道心常為
 一身之主而人心每存焉此善處乎火者人心听命於道心
 而又能主之以靜比五火寂然不動而相火者惟有裨造化而
 為生生不息之運用何賊之有曰謂相火之賊又臟腑所陽之
 火此經所謂一水不勝二火之大出於天造厥陽此經所謂一
 水不勝五火之大出於人焉所謂五臟各有火夫五志激之其
 火隨起蓋大怒則火動此皆少陰君火之熱乃真心小腸之氣
 所為也若大怒則火起於肝肝飽則火起於胃房勞則火起於
 腎悲哀動中則火起於肺心火自焚則死矣且火出於臟腑為
 病之狀曰諸風掉眩屬於肝火之動也諸氣膈鬱病痿屬於肺
 火之升也諸溫腫滿屬於脾火之勝也皆相火少陽相火之熱
 乃心胞絡三焦之氣所為也故為諸病諸痛諸瘡皆屬於心火
 之用若少陽病內為瘵癯太陽病時眩仆少陰病發暴瘡胃
 不知人諸熱者瘵以屬火少陽惡寒鼓慄癯病振寒少陰病酒
 溺惡寒振慄厥陰病酒溺振寒若諸振鼓慄如喪神守皆屬火
 也原病式曰五臟之志過度則勞傷本臟凡五志所傷皆熱也
 所謂陽動陰靜則清平也是故上善若水水若火若卒暴僵
 仆多因五志之情過度而卒病也故喜為心火之志病矣者火

之甚也五志過極皆為火也王太僕云君相二火為治之法夫
 病微少者猶入火也過章而熾得水而熾可以溫伏可以水滅
 逆其性氣折之攻之病之太甚猶龍火也故經曰逆者正治從
 者反治從少從多觀其事也若去五臟六腑之火黃連瀉心火
 黃芩瀉肺火白芍藥瀉脾火知母瀉腎火木通瀉小腸火石膏
 瀉胃火柴胡瀉三焦火黃芩佐之柴胡瀉肝火須黃連佐之膽
 經亦然黃蘗瀉膀胱火又曰龍火勝水府之火故也東垣又
 言相火主足太陽少陰之經治以炒黃蘗取其味苦能瀉水中
 之火也此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元
 氣火不兩立為陽虛之病治當甘溫之劑除之如黃耆人參其
 草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熬為血虛之
 病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實
 為陽強之病而以鹹冷之劑折之如大黃朴硝之屬若腎水受
 傷其陰失守無根之火為虛炎之病而以壯水之劑制之如生
 地黃玄參之屬若右腎命門火衰為陽脫之病而以溫溫之劑
 濟之如附子乾薑之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土為
 火鬱之病而以升散之劑發之如升麻乾葛柴胡防風之屬醫
 者若不明此而治火病為難且前人備述其詳全在臨病處方
 庶免實虛之禍也

火證通治方

涼膈散	大黃二兩	連翹四兩	黃芩	薄荷
	山梔子	朴硝	甘草	
	右作一服水二鍾入蜜一匙竹葉十片煎至三升沸去粗			
黃連解毒湯	溫服不以時候			

黃連 黃蘗 黃芩 大梔子
右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

瀉心湯
大黃 當歸 芍藥 荊芥
麻黃 甘草各半 白朮三分
右作一服水二鍾生薑三片薄荷少許煎至一鍾去粗不拘時溫服

八正散
大黃 瞿麥 蒴藋 車前子
木通 山梔子 甘草各一 滑石二分
加木香九分

三黃丸
右作一服水二鍾燈心二十莖煎至一鍾不拘時溫服

大黃 黃芩 黃蘗
右為末滴水為丸如梧桐子大每服三十九丸熱水下又方
去黃芩用黃連

芍藥藥皮丸
芍藥 黃蘗去皮各當歸 黃連各半
右為末滴水為丸如梧桐子大每服三十九丸熱水下食前

大金花丸
黃連 黃蘗 黃芩 大黃各等
右為末滴水為丸如梧桐子大每服三十九丸新水下加梔子減大黃各梔子金花丸

清涼飲子
大黃 赤芍藥 當歸 甘草各
右作一服水二鍾煎至一鍾去粗溫服

黃連清心湯
即涼膈散加黃連半兩
犀角散
犀角 鎊 黃連 大黃 芍藥
甘草各半

右作一服水二鍾煎至一鍾去粗溫服無時
黃連木通丸 治心經蓄熱夏至則甚
黃連二兩 木通半兩

右為末用生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服三十九食後用燈心湯下日三服

大醫院經驗奇效良方大全卷之八

大醫院經驗奇效良方大全卷之九

傷寒門 附論

傷寒之為病經曰冬傷於寒春變為溫病夏變為熱病皆係六淫之邪併為四氣四氣者風寒暑濕是也其氣互交最能傷人風寒之性暴傳六經暑濕之性偏著五臟壯者氣行則已怯者則著成病若風寒傷人先入皮毛肺之外候肺主氣上通於鼻下連膀胱皮毛客邪肺先受害肺虛與邪相拒則病生焉肺實邪無所容其邪勿能為害病若中者始傳膀胱屬足太陽之經邪入其經相連於肺故右手脈浮弦而洪令人毫毛畢直皮膚閉而為熱身疼頭痛氣逆喘嗽風傷者自汗惡風寒傷者無汗惡寒且太陽為州都之官不能自禦治之以藥藥不勝邪雖汗不解邪氣留連必奪穀味豈不虧於皮胃邪氣乘虛入胃屬足陽明之經主肌肉依鼻終於目故身熱自痛鼻乾不眠病自太陽而傳陽明或猶有惡寒者知邪尚在太陽傳過未盡尤宜汗解若不惡寒反欲嘔吐煩躁脈數急者其邪蓋在陽明津溢先竭胃實乾燥大便難宜以蕩滌其邪邪去脈靜知不傳經而安矣設若蕩滌未盡邪留於胃胃者倉廩之官倉廩既虛榮衛失養經絡已寒不能勝邪傳入於膽屬足少陽之經循耳絡於脇令人脇痛耳聾口苦咽乾往來寒熱而嘔邪毒在裏而不在外也依法治之如或不解膽者中正之官而無果決任邪留移於脾屬足太陽之經終於咽喉令人咽乾腹滿時痛手足微冷或自利不渴脾虛受邪則為內寒溫助脾元實倉廩使正勝邪衰獲安矣或治不當而邪勝正又傳入腎屬足少陰之經其絡廢就繫舌本貫肝入肺其性惡燥故渴引飲和自三陽而傳少陰已經汗下津液枯竭令人口燥舌乾而渴虛者宜溫甚者攻之腎者作強之官不能自持而傳於肝屬足厥陰之經終舌本循

陰經於筋謂之厥陰厥者盡也三陰三陽至此盡矣肝者將軍之官不能與邪相抗至使六經傳盡邪毒入深榮衛失調經絡已虧以致手足厥冷則筋急囊縮六經傳遍戰汗而解者或不戰不汗出而解者或六七日不解者又復再傳其病已危又有兩感傷寒者蓋緣未稟雙傳臟腑俱病為難治也一日太陽與少陰俱病則頭痛舌乾煩滿而渴二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不食譫語三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮水漿不入不知人者六日而危殆矣謂其三日六經俱病榮衛不行內外臟腑不相通於上下至於六日之氣皆絕故不治而死矣論曰人生天地之間藉氣血以全真原故天無一歲不寒暑人無一日不憂苦故有天行瘟疫之病且傷寒冬令為殺厲之氣善調攝者嚴寒之時行住坐卧護身周密不犯寒毒或房勞之人辛苦之徒當陽閉藏而反擾動致使斯病而作治傷寒之法始自漢張仲景分六經之相傳定汗吐下之三法在表宜汗在裏宜下在上吐之半表半裏和解之當汗反下當下反汗變證百端不可盡述又云桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡焉釐之差失之千里正所謂實實虛虛損不足益有餘如此死者醫殺之耳全在乎識經絡明表裏別虛實用藥則庶幾不差矣此則言其大畧所有六經傳變之藥當以傷寒書中求之

傷寒通治方

桂枝湯 傷寒中風病頭痛發熱汗出惡風者

桂枝 芍藥各二錢 甘草三錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

麻黃湯 傷寒病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘者

麻黃三錢 桂枝二錢 杏仁七枚 甘草一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

麻黃桂枝各半湯

麻黃去根 桂枝

芍藥各半 甘草各二

杏仁十箇

右作一服水二鍾生薑五片大棗二枚煎一鍾不拘時服

柴胡桂枝湯 治傷寒六七日發熱微有惡寒表證未解者

柴胡三錢 芍藥二錢 桂枝去皮 甘草炙

黃芩各半 半夏三分 人參一錢

右作一服水二鍾生薑五片大棗二枚煎至一鍾食遠服

升麻葛根湯 治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱及瘡疹已發未發皆可服

升麻 芍藥

甘草各半 乾葛三錢

右作二服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

柴胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻寒咽乾咳

嗽涕涎稠粘

柴胡去苗 乾葛

荆芥去枝 赤芍藥

石膏各半 前胡去苗 升麻 桑白皮

黃芩各

右作一服水二鍾生薑三片豆豉二十粒煎至一鍾不拘時服

時服

葛根解肌湯 治傷寒頭疼發熱惡寒肢體拘急胃膈煩悶

葛根

麻黃二錢 肉桂

甘草炙

黃芩各一 芍藥各一

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

葛根葱白湯 治感風熱頭疼不止

葛根 芍藥

知母各二 川芎三錢

右作一服水二鍾生薑七片葱白五根煎一鍾不拘時服

小柴胡湯 治傷寒七熱如瘧胃膈滿痛小便不利大便澀

柴胡三錢 人參

黃芩各二 半夏各一

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

大柴胡湯 治傷寒十餘日不解邪熱結不裏身熱煩燥語言

諸妄大便不通

柴胡二錢 大黃三錢 枳實一錢 芍藥

黃芩各二 半夏各二

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾食遠服

柴胡飲子

柴胡去蘆 人參去蘆 黃芩 當歸

芍藥 甘草各半 大黃二錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

黃連解毒湯 治傷寒雜病熱毒煩悶乾嘔口燥呻吟滿

陽厥極深舌熱於內傳為陰毒並皆治之

黃連 黃芩 山梔各二

右作一服水二鍾煎至一鍾如腹滿嘔吐或欲作利者加

半夏三枚生用厚朴二錢茯苓二錢生薑三片煎熱服各

曰半夏黃連瀉心湯

小青龍湯 治傷寒表證不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽

微喘又治肺經受寒咳嗽喘急

干姜湯洗 乾薑炮 細辛去葉 麻黃去根

肉桂去皮 芍藥各半 甘草各一 五味子五分

右作一服水二鍾煎至一鍾下拘時服

大青龍湯 治傷寒頭痛發熱惡寒無汗燥煩六脈浮緊

麻黃去節 石膏各三 杏仁去皮 甘草炙

桂枝格一 大棗五箇 生薑半一斤

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

小承氣湯 治傷寒潮熱語大便六七日不通有燥糞結

滯此藥主之

大黃 五斤 厚朴 三斤 枳實 二斤

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

大承氣湯 治陽明裏熱大便五六日不通日晡潮熱語

煩燥發渴

大黃 厚朴各枳實 芒硝各二斤

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

三乙承氣湯 治傷寒雜病內外所傷日數遠近腹滿咽乳

煩渴譫妄心下按之硬痛小便赤澀大便結滯或濕熱內

甚而為滑泄熱甚喘咳悶亂驚悸狂癲目疾口瘡舌腫喉

痺癰瘍陽明胃熱發斑脉沉可下

大黃 厚朴 枳實各芒硝各二斤

甘草 二斤

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

調胃承氣湯 治傷寒不惡寒但熱十餘日過經譫語當和

胃氣

大黃 五斤 甘草 三斤 芒硝 一斤

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

桃仁承氣湯 治傷寒蓄血熱結膀胱其人如狂但小腹結

血下者愈

桃仁去皮 甘草 芒硝 大黃

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

甘草瀉心湯 治傷寒醫反下之并自利心下痞硬乾嘔心

煩不安

甘草 乾薑 黃芩 黃連

右作一服水二鍾生薑三片紅棗三箇煎一鍾不拘時服

大黃連瀉心湯 治傷寒大下後復發汗心下痞按之濡

其脉關上浮者不可下宜此藥攻其痞

大黃 黃連 黃芩

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

半夏瀉心湯 治心下痞滿而不痛乾嘔者

半夏 黃連 黃芩 甘草 乾薑

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎一鍾不拘時服

附子瀉心湯 治心下痞而後惡寒汗出者

附子 大黃 黃連 黃芩

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

生薑瀉心湯 治傷寒汗出後胃中不和心下痞硬噎氣臭

生薑 黃連 黃芩 甘草 乾薑

脇下有水氣腹中雷鳴下利者

半夏湯洗 黃連 大棗 甘草

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

白虎湯 治傷寒脉浮滑者表裏有熱若汗下吐後七八日

不解熱結在裏大渴舌上乾燥欲飲水者

知母 石膏 甘草 粳米

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

白虎加人參湯 治傷寒發斑口燥煩渴

白虎加人參湯 又名白虎湯 治傷寒發斑口燥煩渴

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

白虎加人參湯 又名白虎湯 治傷寒發斑口燥煩渴

<p>知母三升 石膏五升 人參二升 甘草一升</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服</p>	<p>五苓散 治發汗後胃中乾煩燥不得眠渴欲飲水脈浮小便不利者</p> <p>澤瀉三升 猪苓 茯苓 白朮各一</p> <p>官桂去枝</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服</p>	<p>猪苓湯 治陽明高熱浮發熱渴欲飲水小便不利或下利咳而嘔心煩不眠者</p> <p>猪苓 茯苓 阿膠 澤瀉</p> <p>滑石各二</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服</p>	<p>四逆湯 治傷寒大下汗後自利清穀身疼痛不渴四肢拘急手足厥冷乾嘔腹滿脈沉者</p> <p>甘草三 乾薑三 附子半</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服</p>	<p>四逆散 少陰病四逆其入或咳或悸小便不利腹中痛或洩利下重者</p> <p>甘草炙 柴胡 枳實 芍藥各三</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服欬者加五味子乾薑各一錢半下利者加官桂一錢半小便不利者加茯苓一錢半腹中痛者加炮附子一錢半泄利下重用蘆白二十根同煎服</p>	<p>通脈四逆湯 治少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或下利味不出者</p>
---	--	---	---	---	--

<p>甘草二升 乾薑三升 附子半</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服面赤者加連翹葱白三根腹痛者去葱加芍藥二錢嘔者加生薑二錢半咽痛者加桔梗二錢下利脈不出者去桔梗加入人參二錢半</p>	<p>當歸四逆湯 治手足厥寒脈細欲絕者</p> <p>當歸 桂枝 芍藥 細辛各二</p> <p>通草 甘草各半</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服</p>	<p>真武湯 治傷寒數日已後發熱腹痛頭目昏沉大便自利小便或利或澀或嘔或咳或已汗不解仍復發熱心下忪悸頭目眩暈皆由渴後飲水停留中脘所致並皆治之</p> <p>芍藥三升 白朮三升 茯苓三升 附子一枚</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服</p>	<p>白朮二升</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服咳者加五味子三錢半細辛乾薑各一錢二分</p>	<p>羌活附子散 治吐利後發逆胃寒</p> <p>羌活半升 附子一枚</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服</p>	<p>咳逆灸法 治男子婦人傷寒咳逆</p> <p>其法婦人屈乳頭向下盡處骨間是穴男子乳小指一節為率男左女右直間陷中動脈是穴艾炷如小豆大灸三壯</p>	<p>陽毒升麻湯 治陽毒赤斑狂言咽痛</p> <p>升麻 犀角 射干各半 黃芩二升 人參 甘草各一</p>
--	--	---	--	---	--	---

<p>右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服</p> <p>肥拖子四箇香豉半升</p> <p>右作一服水二鍾先將拖子煎至八分入豉同煎至七分不拘時服</p> <p>拖子仁湯 治發斑煩燥面赤咽痛喉乾</p> <p>拖子仁 赤芍藥 大青 知母</p> <p>升麻 杏仁 各一 黃芩半升 石膏半升</p> <p>柴胡二升 甘草</p> <p>右作一服水二鍾生薑五片三豉五十粒煎至一鍾不拘時服</p> <p>枳實拖子湯 治大病瘥後勞復者</p> <p>枳實三升 拖子半升 豆豉三升</p> <p>右作一服青漿水二鍾煎至一鍾不拘時服如有宿食者加大黃三升煎服</p> <p>拖子烏梅湯 治傷寒瘥後不得眠</p> <p>拖子 烏梅 各二 柴胡三升 甘草一升</p> <p>烏梅三箇</p> <p>右作一服水二鍾生薑三片竹葉十四片豆豉三十粒煎至一鍾不拘時服</p> <p>竹葉石膏湯 傷寒解後虛羸少氣上逆欲嘔而渴</p> <p>淡竹葉三升 石膏三升 麥門冬三升 半夏一升</p> <p>人參 甘草 各半</p> <p>右作一服水一鍾生薑三片粳米一撮煎一鍾不拘時服</p> <p>又參石膏湯 治傷寒咳嗽不已心煩及風熱頭疼精神不</p>	<p>利骨情宜服</p> <p>人參 桂枝 石膏 一月 半夏 湯泡 拖子仁</p> <p>黃芩 各一 川芎 白木 茯苓 去皮</p> <p>知母 各半 甘草 各二</p> <p>右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服</p> <p>旋覆代赭湯 治傷寒發汗吐下解後心下痞硬噯氣不除</p> <p>旋覆花 代赭石 半夏 湯泡 人參 各二</p> <p>甘草 各一</p> <p>右作一服水二鍾生薑三片紅棗七箇煎一鍾不拘時服</p> <p>茵陳湯 治陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以致濕熱相搏而身發黃疸但頭汗出身無汗小便不利渴飲水漿身必發黃宜茵陳湯調五苓散利大小便</p> <p>茵陳 湯泡 大黃 半升 大拖子 五箇</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服以利為度</p> <p>玄參升麻湯 治傷寒失下熱毒在胃發斑甚則煩燥謔語</p> <p>玄參 升麻 甘草 各三升</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服</p> <p>抵當湯 太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人發狂熱在下焦小腹硬滿小便自利而狂大便黑者為有血也當下瘀血宜服之</p> <p>大黃 酒洗 水經 十枚 炒去子 碎用 石炭 炒紫</p> <p>水經 十枚 炒去子 碎用 石炭 炒紫</p> <p>右作二服每服水二鍾煎至七分不拘時服</p> <p>抵當丸 治傷寒有熱小腹滿痛小便不利今反利為有血也當下其血</p> <p>大黃 三升 水經 七枚 炒去子 碎用 石炭 炒紫</p>
---	---

家蠶起此桃仁八箇

右為末水和作一丸水一大鍾煎至七分不拘時頓服以
利下血不可再服

犀角地黄湯 治血證大便黑痢後脈微冷狂發黃當汗不
汗內有瘀血

犀角 如無非 生地黃 牡丹皮 芍藥 各二
右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

小建中湯 傷寒陽厥陰脈弦腹中急痛二三百心中悸
而煩自汗者

芍藥 三 桂枝 甘草 各二 膠飴 一 雞子
右作一服水二鍾生薑五片薯一棗煎至一鍾去粗下膠
飴再煎化不拘時服

大陷胃湯 傷寒大陽表證未解醫及下之結胃胸突心下
痛按之石硬脈沉而緊者

大黃 七 芒硝 三 枳實 一 芍藥 一
右作一服水二鍾先煎大黃至一鍾去粗下硝再煎一沸
下其遂末不拘時服快利為度

小陷胃湯 小結胃病心下痞滿而軟按之則痛脈浮滑者

半夏 五 黃連 二 枳實 三
右作一服水二鍾先煮枳實至一鍾半後入諸藥煎至一
鍾不拘時服

陰胃丸 病發於陽而反下之熱入因作結胃者項亦強如
柔瘰狀下之則和

大黃 二 杏仁 法 煨 芒硝 各半
右先將大黃煎至二水為末後研杏仁芒硝為泥入前藥
末和令勻丸如彈子六每服一丸抄甘遂末半錢白蜜半

兩水二匙煮取一盞不拘時頓服一宿乃下如不下再服

其逐性猛宜斟酌量虛突服之

五味子湯 治傷寒喘促脈伏而厥及汗下後氣閉咳血
五味子 二 麥門冬 去心 人參 三 杏仁 皮尖

陳皮 二
右作一服水二鍾生薑七片紅棗三箇煎一鍾不拘時服

溫膽湯 治傷寒產後調理
半夏 湯泡 茯苓 去皮 陳皮 去白 枳實 炒 各
甘草 半 竹茹 一
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

加味溫膽湯 治心膽虛怯驚悸易驚夢寐不安氣鬱生涎
涎與氣搏更生諸證以短氣因乏或復自汗四肢浮腫熱
良無味心虛煩悶坐卧不安

枳實 炒 半夏 湯泡 白茯苓 去皮 橘紅
人參 各半 竹茹 香附 麥門冬
柴胡 桔梗 各一 甘草 半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

桂枝附子湯 治傷寒八九日不罷風濕相搏身熱煩疼
桂枝 三 附子 炮 去皮 甘草 二

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服活人書
有芍藥大棗

茯苓四逆湯 治傷寒汗下之後病證不解而煩燥者
茯苓 四 去心 人參 去蘆 乾薑 炮 各一 甘草 炙 三

附子 炮 去皮 用一黃切
石作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

人參敗毒散 傷寒頭痛吐熱惡寒及風痰咳嗽鼻塞聲

重身體疼痛

柴胡去蘆 川芎一分 前胡去芦 甘草炙

人參去芦 桔梗去芦 羌活去芦 獨活去芦

茯苓去皮 枳殼炒 薄荷少許

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

參蘇飲 治感冒風邪發熱頭痛咳嗽聲重喘喘稠粘此藥

大解肌熱快膈

人參去芦 紫蘇 茯苓去皮 半夏湯洗

前胡去芦 乾薑各二分 枳殼炒 甘草炙

陳皮各一分 桔梗 木香各七分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

香蘇散 治四時傷寒頭痛發熱惡寒

香附 紫蘇各三分 陳皮二分 甘草一分

右作一服水二鍾生薑五片葱白三根煎至一鍾不拘時

服如頭痛甚者加川芎白芷各五分香蘇散

消風百解散 治四時傷寒頭眩發熱及寒壅咳嗽鼻塞聲重

荆芥 白芷 陳皮 麻黃去根

蒼木各二分 甘草一分

右作一服水二鍾生薑三片葱白三根煎至一鍾不拘時

服如咳嗽加烏梅煎

十味和解毒散 治頭疼發熱發散風邪

白朮二分 桔梗去芦 人參去芦 甘草炙

陳皮去白 枳殼炒 赤芍 厚朴薑製

當歸各一分 防風七分

右作一服水二鍾生薑三片葱白三根煎一鍾不拘時服

十味香蘇散 治四時傷寒發熱頭疼

川芎二分 紫蘇 桔梗去芦 柴胡去芦

茯苓去皮 半夏 枳殼 陳皮各一分

乾薑一分 甘草各半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

金沸草散 治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕唾稠粘及治

時變寒熱

金沸草 前胡 甘草炙 麻黃去節

芍藥各半 荆芥穗 半夏各二分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

十神湯 治傷寒時令不正痲疫妄行感冒發熱或欲出疹不

問陰陽兩感風寒並皆治之

川芎 麻黃去節 乾葛 紫蘇

赤芍藥 升麻 白芷 甘草炙

陳皮 香附各半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服發熱頭

疼加連翹葱白二根中滿氣急加枳殼煎

藿香正氣散 治傷寒頭疼吐寒壯熱或感濕氣霍亂泄瀉常

服除山嵐瘴氣

藿香二分 紫蘇去梗 厚朴薑製 茯苓去皮

陳皮 白芷 半夏湯洗 桔梗去芦

大腹皮 白朮各一分 甘草一分

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

不換金正氣散 治四時傷寒瀉時氣及山嵐瘴氣寒熱往

來霍亂吐瀉下痢赤白並宜服之

方見寒門

靈草煎法 陽明病自汗出若發汗小便自利者為津液內竭

雖硬不可攻之若大便不去者宜蜜導煎以通之
右用蜜四兩銅器中微火煎之稍凝如飴攪令赤色勿令
焦欲可丸手捻作錠令頭銳大如指長二寸許性熱一時
難疑急於冷處放必破納於穀道中以手急按之一時大
便出乃去之

猪膽汁 治證同前

右用大猪膽一箇瀉汁同和醋少許灌入穀道中頃時大
便行

黃芩湯 治傷寒自利多熱者

黃芩四錢 芍藥 甘草三錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

桃花湯 治傷寒下痢膿血

乾薑三錢 赤石脂七錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

桔梗湯 治傷寒咽痛

桔梗五錢 甘草三錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

赤石禹餘糧湯 治傷寒下痢不止熱在下焦

赤石脂 禹餘糧各四錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

大半夏湯 治傷寒膈間有寒痰

半夏湯 茯苓各三錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

太醫院經驗奇效良方大全卷之九

大醫院經驗奇效良方大全卷十
奪命獨參湯 治傷寒汗下後終日昏閉不省人事發熱發渴
渴似狂言一物危急之證宜服此藥服後額上鼻尖有微
汗是其應也

揀人參一丸

右咬咀作一服用水一升煎至七分去滓溫冷不拘時服

滓再煎服神效

附子回陽散 治陰毒傷寒面青四肢及臍腹疔痛身軀如冰

并一切卒暴冷氣

右用附子二枚炮裂去心臍為細末每服三錢七取生

薑自然汁半盞冷酒攪勻共 盞調服更以冷清酒一盞

送下相次更進一服良久臍下如火遍身和暖為度

廻生神膏 治男女陰毒傷寒外按法

牡蠣煨粉 乾薑各

右為細末男病用女唾調手內擦熱緊捲二卵上得汗出

愈女病用男唾調手內擦熱捲二乳上得汗出愈如與

乳男女之根蒂坎離之分也陰證大小便不通及諸雜證

陰候大小便不通並宜此外治法數日不通為急非急

者勿用

煮餅發法 治氣虛陽脫身冷無脈氣息欲絕不省人事及傷

寒陰厥百藥不效者

右用葱一束以索纏如餅餃大去根葉唯存白長二寸許

先以火煨一面令通熱勿至灼人乃以熱覆著病人臍下

上以熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透入腹中更作三四餅

過一餅壞不可熨即易一餅候病醒手足溫有汗乃差更

服四逆湯以溫其中昔曾有患傷寒真不知人四肢堅

終如石藥不可入用此遂差一方用醋醋拌麩炒熱注布袋中蒸熨比上法尤佳

霹靂散 治陰勝隔陽傷寒其人必躁熱而不欲飲水是也

右用附子一枚燒為灰存性為末作一服蜜水調下而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

大為活湯 解利兩感神方天之和氣感則害人五臟以是知

內外兩感腑臟俱病欲表之則有裏欲下之則有表之裏既不能一治故云兩感者不治然所裏有虛實所感有淺

深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治治之而不救者有矣未有救治而獲生者也予嘗用此間有生者

十得二三故立此方以待來世君子用之

羌活 獨活 防己 防風 黃芩 黃連 蒼朮 白朮

甘草妙 川芎 細辛 生地黄

知母 右咬咀每服秤半兩水二大盞煎至一盞半去滓得清藥

一大盞熱飲之不解再服三四解之亦可病愈則止若有餘證並依仲景實法

神效伏雪湯 治傷寒陰陽二證未辨時行疫癘惡氣相傳服之如湯沃雪此藥功力不可具述

蒼朮 剉去地乾薑 剉製 甘草 炙各 厚朴 剉製

防風 剉者 白芍藥 剉去皮乾葛 剉各 右咬咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓熱服之不拘時

服少頃取生姜葱作羹或粥投之避風坐臥身體微潤即愈如疫氣正相傳染清晨進一服為佳常服每用二錢水

一盞煎至八分服

桔梗枳殼湯 治結胸心下痛欲死者

桔梗炒 枳殼炒 甘草 炙各 右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓服

或不用生薑亦可痰多加半夏生薑有熱加黃芩

治傷寒陽證結胸死無可藥者

右用蚯蚓十五條活者搗爛蜜半盞冷水半碗灌服若無

蜜砂糖亦妙

茵陳蒿大黃湯 治傷寒發黃面目悉黃小便赤宜服

茵陳蒿 山梔 柴胡 黃蘗 蜜炙

龍膽草 各半 黃芩 剉 大黃 炒各

右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓服

茅根湯 治傷寒發黃遍身如金位著

茅根 洗到 山梔 茵陳蒿 地骨皮

甘草 炙各 右咬咀每服五錢用水一盞半生薑三片豆豉六七粒同

煎至一盞去滓早晚食後服

茵陳五苓散 治傷寒溫濕熱病成胃後發為黃疸小便黑赤

煩渴發熱不得安此蓋汗下太早服藥不對證因感濕

熱病以致遍身發黃予嘗用茵陳五苓散治之甚效

右用生料五苓散一兩加入茵陳半兩車前子一錢水通

一錢半柴胡一錢半酒後得證加乳葛二錢作咬咀并煎

藥和勻分作二服每服水一椀燈草五十莖同煎八分去

滓食前服滓再煎連進數服小便清利為愈

百合知母湯 治百合傷寒已經汗後病人欲食復不能食常

然欲臥復不能臥欲行復不能行有寒如無寒有熱如

無熱飲食或美不美如強健人而臥不能行口苦小便赤

藥入口即吐利此因虛勞大病之後不平復變成此疾名

百合病宜服

百合散 知母 一兩

右先將百合擘碎用新汲水二盞浸一宿當有白沫出去

却沫水了却用新汲水二盞煮百合取汁一盞去粗盛於

淨器中又將知母亦用新汲水二盞煮取一盞去粗後將

百合知母汁相和同煎取一盞不拘時分作二服

百合散 治傷寒百合病一月不解變如渴疾宜服

百合 蘇黃 瓜蒂 牡蠣 麥門冬 各一分

山梔仁 各三分 甘草 一分

右咬咀每服五錢水一中盞入生薑半分竹葉二七片煎

至六分去滓不拘時溫服

治傷寒百合病腹中滿痛宜服此方

右用百合一兩炒令黃色為細末每服二錢不拘時米湯

調下

雄黃丸 治傷寒狐惑微煩默默少臥毒氣止攻咽乳聲嗔下

雄黃 研 當歸 三分 蘆薈 研 麝香 一分

右搗研為末煮麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸至一

十九食前溫粥飲下日三服

訶梨勒丸 治傷寒後膿血痢下部疼痛

訶梨勒 炮去 入參 各一分 白茯苓 去皮 當歸 焙

木香 白芷 各三分 牡丹皮 半兩

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三

十九食前采飲下日再服

黃連丸 治傷寒熱病後熱毒下痢膿血

黃連 三分 烏梅肉 兩分

右為細末煉蜜入少蠟和搗五六百杵丸如梧桐子大每

服二十九加至三十九空心米飲下

訶梨勒飲 治傷寒後氣不和自利無度

訶梨勒 四枚 生 草豆蔻 二枚 生

右咬咀每服二錢七漿水一盞煎至六分去粗空心溫服

燥腸丸 治傷寒汗下後大小便自利腹中痛者

附子 一枚 乾薑 一兩 龍骨 吳茱萸

訶梨勒 去核 米殼 研

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九溫水下痢

止勿服

治傷寒發汗吐下後體虛元臟積冷氣刺腰痛轉動艱難

原蠶 蠶 半斤 糯米 半升

右二味同炒令米色焦然後搗羅為末每用半兩以米醋

調如稀糊入銚子內煎攪令稠菜熟攤於蠟紙上貼痛處

以帛纏縛冷即易之

杜仲酒 治傷寒後體虛元臟挾風冷腰膝疼痛行履不得

杜仲 去粗 破 獨活 半兩 附子 炮製 去牛膝 兩

仙靈脾 三分

右細剉用生絹袋盛以酒五升浸密封頭經七日後開每

日取三二合溫服日三服未差再浸服

二瀝湯 治傷寒失音不語

竹瀝 荆瀝 梨汁 各二

右搗令勻以綿濾過分溫四服空心日晚各一服

入參湯 治傷寒後虛羸少力嘔噦氣逆

人參 湯

<p>人參二分 白茯苓<small>去皮</small> 麥門冬<small>去心</small> 黃耆<small>各一分</small></p> <p>半夏<small>洗七次</small> 陳皮<small>去白</small> 白木<small>各半</small> 甘草<small>一分</small></p> <p>右吹咀每服五錢七水一盞半入生薑三片棗二枚擘破同煎至八分去滓食前溫服</p>	<p>牡蠣散 治傷寒後虛損心多怔忡夜夢洩精</p> <p>牡蠣<small>燒為粉</small> 桂心 白芍藥 鹿茸<small>酥炙</small></p> <p>龍骨<small>各一分</small> 甘草<small>各半</small></p> <p>右吹咀每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去粗食前溫服</p>	<p>羚羊角丸 治傷寒夜夢精洩不禁身體枯燥瘦脊骨立者</p> <p>羚羊角<small>屑</small> 犀角<small>屑</small> 石龍芮 葦子<small>炒</small></p> <p>龍骨<small>水研</small> 硃砂<small>水研</small> 鹿茸<small>酒浸</small> 澤瀉<small>各一分</small></p> <p>桂心 木香<small>各一分</small></p> <p>右為細末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下</p>	<p>姜糖湯 風溫之病脈陰陽俱浮汗出體重其息必喘其形狀不仁嘿嘿但欲眠下之者則小便難發其汗者必譫語加燒針者則耳聾難言但吐下之則遺失便利如此病者宜服</p> <p>姜糖 白薇 麻黃 獨活</p> <p>杏仁 川芎 青木香 甘草<small>各一分</small></p> <p>石膏<small>三兩</small></p> <p>右吹咀以水八升煮取三升去粗分三服取汗若一寒一熱加朴硝一分及大黃三兩下之如無木香可用麝香一分小品方云姜糖湯治冬溫春月風傷寒則發頭腦疼痛咽喉乾舌強肉疼心胃痞滿腰背強</p>
---	--	--	--

<p>柴胡石膏湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胃煩滿寒熱往來痰實咳嗽喘滿</p> <p>柴胡 石膏<small>煨</small> 赤芍藥 前胡</p> <p>乾薑<small>各十兩</small> 升麻<small>五兩</small> 黃芩 桑皮<small>各三十兩</small></p> <p>荆芥<small>穗</small><small>三十兩</small></p> <p>右吹咀每服五錢水一盞生薑三片豆豉十餘粒同煎七分去滓熱服小兒分作三服更量大小加減不拘時服</p>	<p>扶神散 治傷寒後虛羸心氣之力弱驚悸多忘</p> <p>扶神 黃耆 葛蒲<small>各一分</small> 白芍藥</p> <p>人參<small>各半</small> 遠志<small>三分</small></p> <p>右吹咀每服五錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服</p>	<p>龍齒丸 治傷寒後伏熱在心心虛驚悸</p> <p>龍齒 人參 生乾地黄 扶神<small>各一分</small></p> <p>遠志<small>去心</small> 鐵粉<small>細研</small> 苦連<small>去積</small> 馬牙硝<small>細研</small></p> <p>防風<small>各三</small> 麝香<small>細研</small> 麥門冬<small>半兩</small></p> <p>右為細末都研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九竹葉金銀湯下不拘時服</p>	<p>柴胡湯 治傷寒後夾勞五心煩熱背膊疼痛手足無力不能飲食</p> <p>柴胡 赤茯苓 龍甲<small>去垢</small> 黃耆<small>各一分</small></p> <p>秦光 地骨皮 黃芩<small>去黑</small> 枳殼<small>去炒</small></p> <p>葛根<small>各半</small> 甘草<small>一分</small> 人參<small>各三分</small></p> <p>右吹咀每服四錢水一盞半煎至七分不拘時溫服</p> <p>龍甲散 治傷寒後虛羸汗不止四肢無力向晚增寒</p>
--	---	--	---

人參 乾薑 白朮 陳皮去白

青橘皮去白 甘草各等

右為細末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得又
記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心不得寧
真勞復也予診曰勞心之所致米復其初而又勞其神榮
衛失度當補其子入其脾解發其勞庶幾得愈授以補脾
湯佐以小柴胡湯得解難經曰虛則補其母今補其子何
也予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉
其子此虛當補其母人所共知也千金曰心勞甚者補脾
氣以益之脾王則感於心矣此勞則當補其子人所未聞
也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其
生我者與錦囊所謂本骸得氣遺精受養同義方治其勞
則補其助我者與荀子所謂未有子富而父貧同義此治

虛與勞所以異也

建脾散 治傷寒後脾胃虛弱不欲飲食繼食不能消化

訶梨勒皮 白朮 麥蘗炒令黃 人參各一

神麴炒 甘草炙 枳殼炒 大腹皮各半

乳薑三分

右咬咀每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

不拘時稍熱服

助胃丸 治宿食不化

縮砂仁 茯苓去黑皮 白朮各一 紅豆

甘草炙 人參 枳殼各五

右搗羅為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服

十五丸空心溫酒送下米飲亦得

神仙百解散

治傷寒無問陰陽二證其間所用藥味各隨經絡治病如
傷寒在表未傳入經發熱惡寒腰痛連進二服汗出而愈
若已傳經絡骨痛短氣肢麻煩躁目睛微痛耳聾口燥
乳或渴或不渴手足自溫或四肢厥逆自利或不利小便
反快服之調中順氣祛逐寒邪如頭面感寒底傷膝理頭
痛項強發熱增寒鼻流清涕咳嗽痰涎及治以溫相搏骨
節煩疼肢麻沉重西浙惡風時自汗出此藥大能調順三
焦解表散裏溫潤肺經正四時之氣升降陰陽進美飲食
不問傷風傷寒中暑中暈骨蒸頭疼氣逆胃滿失肌吐逆
眩暈惡心及已經汗後不解下之不當吐之不中此藥清
而不涼溫而不燥無問老人虛人丈夫婦人孕婦小兒並
宜服之如連進二服無不取效春常服免瘟疫之疾夏常
服不中暑暈之病秋服之下生瘡疾冬服之不感寒毒真
神仙衛生之藥也功效不可盡述

山茵陳 柴胡去芦 前胡 人參

羌活 獨活 蒼朮米泔炒 甘草

乳葛 白芍藥 升麻 防風

藁本 藿香 半夏薑製 白朮各一

立春以後不加減立夏以後一料內加

柴胡 赤茯苓 當歸各半片

立秋以後減柴胡一分不用當歸赤茯苓只加

乳葛地 肉桂去粗皮 麻黃去根

立冬以後並無加減一方無當歸有黃芩去根

右為細末每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎一盞熱

服不拘時服併進二服如要表散加葱白三寸淡豆豉三

十粒同煎服以衣被蓋覆汗出而愈一方無山茵陳前胡

一... 3 反...

加減五苓散

藥中之寶五苓散 專治傷寒有大功 陽證見時須去桂
 陰加附子水煎濃 狂言亂語夜砂末 頭目疼痛入川芎
 咳嗽多加五味子 心氣不定麥門冬 胃中嘔逆入參妙
 痰多半夏喜相逢 定喘馬兜零最好 蒼朮去濕腹中空
 小便澀閉加瞿麥 黃芩能使大便通 腹中氣塊三稜木
 青皮能退熱如烘 麻黃用根除盜汗 下部赤腫使椒紅
 飲水煩渴加乳葛 鼻衄烏藥却為功 眼中黃色茵陳妙
 勞復枯梗有神功 目赤令添赤芍藥 茵陳退腫又相逢
 眼中若赤石膏末 陳皮止渴又參同 急醫水氣甜葶藶
 伏暑燈心浸水中 二十四證真妙訣 專心盡救効無窮

太醫院經驗奇効良方大全十卷

太醫院經驗奇効良方大全卷之十一

普濟消毒飲子 時毒治驗泰和二年先師以進納監濟源
 稅時四月民多疫癘初覺增寒體重次傳頭面腫盛目不
 能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相
 訪問如染之多不能救張縣丞姪亦得此病至五六日醫
 以承氣加藍根下之稍緩翌日其病如故下之又緩終莫
 能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可請治之遂命診
 視具說其由先師曰夫身半已上天之氣也身半已下地
 之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭目而為腫盛以承
 氣下之瀉胃中之實熱是誅罰無過殊不知適其所至焉
 故遂處方用黃芩黃連味苦寒瀉肺間熱以為君橘紅
 味平玄參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以為臣連翹鼠粘
 子薄荷葉苦辛平板藍根味苦寒馬勃白僵蠶味苦平散

腫消毒定喘以為佐升麻柴胡苦平行少陽陽明二經不
 得伸桔梗味辛溫為舟楫不令下行共為細末半用湯調
 時時服之半用蜜為丸噙化之服盡良愈因嘆曰性者不
 可追來者不可及凡他所有病者皆方書以貼之全活甚
 衆時人皆曰此方天人所制遂刊於石以傳永久

- 黃芩 黃連 各半 人參 三才 橘紅
 - 玄參 生甘草 柴胡 桔梗 各二
 - 連翹 鼠粘子 板藍根 馬勃 各一
 - 白僵蠶 升麻 各七
- 右件為細末服餌如前法或加防風薄荷當歸身吹咀如
 麻豆大每服秤五錢水二盞煎至一盞去滓稍熱時時服
 之食後服如大便硬加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫
 勢甚者宜破刺之

治熱病五六日壯熱狂語欲走

鷄子取殼 芒硝研細 寒水石細研各

右先以新汲水一小盞調芒硝等末次下鷄子清攪令勻不拘時候分為二服

羚羊角散 治熱病發汗後熱毒未盡因有所驚發熱癩狂

羚羊角屑 犀角屑 茯神 黃芩

甘草炙 防風略半 龍齒 人參

鐵粉略一 地骨皮三分

右吹咀每服五錢水一大盞煎五分去滓不拘時溫服

鐵粉丸 治熱病心神恍惚悲喜不常發狂欲走

鐵粉細研 牛黃細研 遠志去心 丹參

茯神 升麻各半 金箔三七片 銀箔三七片

麝香細研 白僵蠶微炒 白附子炮 馬牙硝三分

右為細末同研令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大

每服二三十九不拘時薄荷湯下

含化犀角丸 治熱病心脾虛熱肺氣暴逆喉中腫痛口舌乾

燥燕津有防不下飲食宜服

犀角屑 黃藥子 子芩 鬱金

大黃剉炒 玄參 甘草炙 升麻各半

絡石葉 射干各三 天門冬去心 馬牙硝各一

右為細末入馬牙硝研令勻煉蜜和搗三五百杵丸如小

彈子大每服不拘時常含化一九燕津

生地黃煎 治熱病心胃煩熱口乾皮肉黃宜服

生地黃汁 生瓜薑汁 生麥門冬根汁各五

蜜二合 酥一兩 生藕汁三合

右一處相和於鍋中熬令稍稠每服不拘時抄半匙服

刺刺飲子 治熱病頭痛壯熱鼻衄及吐血心中緊硬遍身寒

刺刺 生地黃 生麥門冬去心各

赤茯苓 鷄蘇 生薑略半 青竹茹一分

右吹咀水三大盞煎一盞半去滓不拘時分溫三服

治熱病衄血日夜先度身面如金黃色

右以薑根一握搗絞取汁以罐盛索繫投於井中深處良

久急取出瀝水同和滴二七滴於鼻中差

治熱病鼻衄若血下數升者宜服

右以好松煙墨二兩搗羅為細末用鷄子白和為丸如梧

桐子大每服二十九用生地黃汁下如人行五里再服以

瘞為度

龍膽煎 治熱病口瘡疥癩痛不可忍宜塗

龍膽煎 黃連 升麻 槐白皮

大青略一 薔薇 竹葉各二

右細剉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜三合慢火

煎成膏塗於瘡上有涎吐之

青箱子丸 治熱病毒攻於眼內宜塗宜服

青箱子 防風 枳殼各一 拘杞子

生地黃 石決明 澤瀉各一兩 麥門冬去心

羌活子 細辛 黃連各三 車前子兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十

九以粥清飲下不拘時服

解毒犀角丸 治熱病毒氣外攻皮膚斑出狂亂躁熱宜服

犀角屑 黃芩 馬牙硝 大青略一

梔子仁 牛黃細研 天竺黃細研 亦茯苓

右一處相和於鍋中熬令稍稠每服不拘時抄半匙服

甘草 <small>生用</small>	黃連 <small>各半</small>	麝香 <small>一錢</small>	麥門冬 <small>去心</small>
右為細末每服二錢不拘時竹葉煎湯調下			
白鮮皮散	治熱病毒氣不散遍身生熱毒瘡		
白鮮皮	升麻	黃芩	犀角屑
梔子仁	赤芍藥	大黃 <small>炒</small>	甘草 <small>炙</small>
玄參	杏仁 <small>湯浸去皮尖</small>	麥門冬 <small>去心</small>	兩夫
右咬咀每服四錢水一中盞煎六分去粗不拘時溫服			
藍葉散	治熱病熱毒盛喉瘡出頭黑者為難治		
藍葉	玄參	瞿麥 <small>各一</small>	犀角屑
升麻 <small>各一</small>	木香 <small>一分</small>	甘草 <small>炙</small>	兩夫
右咬咀每服五錢以水一大盞煎五分去粗不拘時溫服			
首陳散	治熱病黃疸月黃如金小便如血心煩躁悶口若頭		
痛宜服			
茵陳	梔子 <small>各三</small>	木通	瓜蒌根
柴胡	秦艽 <small>各一</small>	甘草 <small>炙</small>	麥門冬 <small>去心</small>
右咬咀每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分			
去滓不拘時候溫服			
承氣丸	治熱病若十餘日不大便者宜服		
大黃 <small>炒</small>	芒硝 <small>各二</small>	枳實 <small>炒</small>	大麻仁 <small>研入</small>
都李仁 <small>湯浸去皮</small>			
右為細末和勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服			
五十九丸不拘時以溫水下未利再服			
木通散	治熱病小便不通或淋瀝疼痛		
木通	琥珀 <small>研各</small>	赤芍藥	枳實 <small>炒</small>
茅根	甘草 <small>炙</small>		
右咬咀每服四大錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服			

太醫院經驗奇效良方大全 卷一一

石菖散	治熱病小便不通		
石菖 <small>去毛</small>	瞿麥 <small>各一</small>	木通	甘草 <small>炙</small>
子芩 <small>各半</small>	葵子 <small>三合</small>		
右咬咀每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服			
太醫院經驗奇效良方大全卷之十一			

三五

奇效良方卷之十二

疔論

疔之為病其名有五... 疔者難愈失瘳瘳陰氣獨微陽... 氣獨發但熱不寒寒實不泄煩渴且嘔吐肉消瘦也寒瘳自感... 寒而得無汗惡寒變痛而慘先寒後熱也濕瘳肩襲兩濕汗出... 濕瘳得之身體重肢節煩疼逆脹滿也此瘳久受陰濕陰勝... 陽虛不能制陰所以寒多不熱氣虛而泄悽慘振振也此瘳飲... 食不節飽飢有傷表裏俱虛致使然也病由邪氣交爭陰陽二... 氣更相勝負邪正相搏而作焉衛氣與邪氣相離故汗而解衛

氣晝行陽夜行陰得陽而外出故發於日間得陰則內搏故發... 於暮夜若邪氣內搏於五臟積連於募原其道遠不能與衛氣交... 併故有隔日發之又有三四日一發衛氣之行遊行速病作有... 發有晏者內外失守真邪不分陰陽失勝寒熱五起則休作... 無定時也素問論六經瘳足太陽瘳令人腰痛頭重寒從背起... 先寒後熱渴上喝上熱止汗出難已足少陽瘳令人身體解... 休寒不甚熱不甚惡人見人心湯上熱多汗出甚足陽明... 瘳令人先寒洒洒漸寒甚久乃熱去汗出喜見日月光欠... 氣乃快然足太陰瘳令人不寐好太息不嗜食多寒熱汗出病... 至則善嘔已乃衰足少陰之瘳令人嘔吐甚多寒熱多寒... 少發閉戶牖而震其病難已足厥陰之瘳令人腰痛少腹痛小... 便不利如癢狀非癢也數便意恐懼氣不足腹中絕上如此交... 分皆五臟之受病夫心瘳者令人煩心甚欲得清水反寒後

不甚熱肝瘳者令人色蒼上然太息其狀若死者脾瘳者令人... 寒腹中痛熱則腸中鳴已汗出肺病者令人心寒甚熱... 間善驚如有所見腎瘳者令人洒上然腰脊痛宛搏大便難目... 眈眈然手足寒又有胃瘳者令人且病也善飢而不能食而... 支滿腹大上痺治法瘳脈多弦數則熱弦遲則寒風以散之寒... 以溫之不虛不實以經取之痰以條之停滯疎利之虛則補之... 不可便用斷截之乘截之太早邪氣薄於五臟傳留日久變證... 多端用藥次序無不効矣

瘳疾通治方

清脾湯 治瘳瘳脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾

小便赤澀

青皮 厚朴薑製 白木 半夏

柴胡 黃芩 茯苓 去皮 草葉 錢半

甘草 錢半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

定齋草葉飲子 快脾治痛

草葉 二錢 蒼木 三錢 厚朴 薑製 半夏 錢

陳皮 半錢 甘草 半錢 烏梅 一箇

右咬咀每服半兩水一盞半薑五片棗二枚煎至七分不

拘時服寒多者加乾薑附子熱甚者加芫胡瘳瘳加檳榔

所加者各等分一方加入參一方熱多者加石膏

草葉飲 治寒熱瘳疾初愈服此進食理脾

草葉 仁 紫蘇 良薑 川芎

青皮 白芷 甘草 錢半

石作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

四訣 治五臟氣虛善怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與

衛氣相搏發為瘡疾

人參 白朮 茯苓 橘紅

半夏 湯泡 草菓 烏梅 甘草 半錢

右作一服水二鍾生薑七片紅棗三枚煎一鍾不拘時服

人參養胃湯 治瘡疾與多熱少者必須服此

人參 厚朴 陳皮 蒼朮 茯苓 甘草 半錢

茯苓 去皮 半夏 湯泡 草菓 藿香

甘草 各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

柴胡桂薑湯 治瘡疾寒多微熱但寒不熱并治勞瘵

柴胡 三錢 桂枝 乾薑 牡蠣

甘草 各一錢 黃芩 半錢 瓜蒌根 二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

七寶飲 治一切瘡疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱如

似瘡證

厚朴 薑製 陳皮 草菓 常山 錫骨

檳榔 青皮 甘草 各一錢

右作一服水一鍾半酒半鍾煎至一鍾去粗露星月一宿

空心向東服

小柴胡湯 治瘡疾熱多寒少或單熱頭痛胃滿咽朝

方見傷寒門

白虎加桂湯 治瘡疾但熱不寒者

知母 三錢 石膏 五錢 粳米 一撮 甘草 半錢

肉桂 一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

鼈甲飲子 治瘡疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘡母

鼈甲 諸炙 白朮 草菓 檳榔

川芎 白芍藥 厚朴 薑製 橘紅

甘草 各一錢 黃芩 半錢

右作一服水二鍾生薑七片紅棗一枚烏梅少許煎至一

鍾不拘時服

老瘡疾 治久瘡結成癥瘕痞在胃脇諸藥不愈者

蒼朮 米泔 草菓 桔梗 青皮

陳皮 良薑 半夏 湯泡 茯苓 各一錢

枳殼 麩炒 甘草 炙 乾薑 桂心

紫蘇 川芎 白芷 各半

右作一服水二鍾生薑少許煎至一鍾空心服

四將軍飲 治寒熱瘡疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此

雖一時急用之有驗

附子 炮去皮 訶子 半錢 陳皮 三錢 甘草 半錢

右作一服水二鍾生薑七片棗七枚煎至一鍾不拘時服

勝金丸 治一切寒熱瘡疾胃膈停痰發散不愈者

檳榔 四兩 常山 一斤酒

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服三十九當發前一

日臨卧時用涼酒吞下便睡至四更再吞一服一方用鷄

子清為丸

碧霞丹 治久瘡不愈者

東方甲乙木巴豆 別研 南方丙丁火官桂 別研

中方戊己土硫黃 別研 西方庚辛金白礬 別研

北方壬癸水青黛 別研

右於五月一日備治了用紙各裹以盤盛依前方位排定

勿令猫犬及婦人見安在神佛前至端午日午時用五家

粽尖和前藥令勻九如梧桐子大遇患者以綿裹一丸繫於鼻竅中男左女右於未發前一日安之約度尋常發過少許方除一方塞於耳內

灸法 治瘰癧疾久不愈不問男女皆治

其法於大椎中第一骨節盡處先鍼後灸三七壯立効或

第三骨節亦可

桂枝黃芩湯 治瘰癧三陽合病熱甚者

桂枝一錢 黃芩 半夏 人參各二錢

柴胡六錢 石膏四錢 知母半錢 甘草一錢

右咬咀分作二貼用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

露薑飲 大治脾胃衰發為寒熱

生薑 四兩

右和皮搗汁一椀夜露至曉空心冷服或吐或利即安

芎歸龍甲散

治勞瘵表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞復來

復來

川芎 當歸 龍甲 醋炙 茯苓

青皮 陳皮 半夏 芍藥

右咬咀各等分每貼二兩用水二鍾生薑五片棗二枚烏梅一枚煎至一鍾食遠服熱加柴胡寒多加草菓

交加飲子 治久瘵不巳山嵐瘴氣

肉苳蔻 二箇一箇同 草菓 上法 厚朴 二寸一分生

甘草 二寸一分 生薑 一塊半

右咬咀作一服當發日用水二鍾煎八分服粗再煎服

虎頭骨丸 治一切瘵疾

虎頭骨 二兩 川大黃 剉炒 乳香 甘草

桂心 知母 一兩 各 硃砂 細研 牡蠣粉

烏梅肉 炒 附子 炮 枳殼 去穢 麝香 別研

木香 常山 半兩 各 桃仁 三七枚 湯浸去

生薑 大 半塊 煨半生

右為末入研藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大

每服十五丸食前用桃條湯下

剋効餅子 治一切瘵疾發作有時先覺伸欠乃作寒慄鼓

振顛顛中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已內外皆熱頭痛如

破渴欲飲冷或痰聚胃中煩滿欲嘔或先熱後寒或先寒

後熱或寒多熱少或熱多寒少或寒熱相半或但熱不寒

或但寒不熱或一日一發或一發後六七日再發皆治之

甘草 薑 萊豆末 荷葉 各 定粉 研

龍腦 研 麝香 半兩 金箔 二十五片 信砒 兩半

硃砂 一兩

右為細末煉蜜搜和每兩作二十九裡匾以金箔為衣每

服一餅以新水磨化日發者未發前服之間日者不發夜

服隔數日發者前一日夜服連日者凌晨服

常山酒 治瘵

常山 龍甲 醋炙 黃 虎頭骨 炙 半 豉 炒 半

桃枝 一握 柳枝 一握 桃仁 三七枚 去

乾棗 三枚 烏梅 炙 七

右細剉以酒一升浸一宿明日入生薑五片煎取五合去

滓空心分為二服

五行神驗丸 治一切瘵疾

硫黃 二兩 桂心 南方 乾姜 兩方 巴豆 北方

硫黃 十兩 麝香 少許

右將五般藥於盤內揀五方安排定取四月二十八日夜

安車子上於中庭露以香一爐當處心如露七夜至端
 午日早脩合時已且去殼湯五十沸搗研餘藥為散入麝
 香以薄糊調散花末為丸如櫻桃大各時忌女子等見丸
 子焙乾於盒內盛發日淨手取以綿裹香火灸令熱男左
 女右頸前帶安耳中便利時除却淨手後再安耳中不得
 女子捻觸女子患男子與安忌一切葷腥菓子一方無

醉邪丹 治嵐瘴鬼瘧食瘧癩癩併者
 雄黑豆一作紫豆各四錢 信硫另研 黃丹為一錢
 右為末於端午日同入乳鉢內滴水為丸分作三十粒每
 服一粒用東南桃心七枝研汁將井花水早晨日欲出未
 出時吞之醋湯亦得其驗不具言三五月患者只一丸服
 後大段者只微寒若小可便絕去也當發日服忌葷腥三
 日一服孕婦不可服一方有雄黃

神聖藥師餅 治瘡疾等證
 人言 雄黃錢半 白麩七錢 乾胭脂一錢
 右各研極細和勻滴水和為餅子如蒸子大每服三餅臨
 卧細嚼冷水送下忌濕麪葷腥生硬冷物分作三十服虛
 實大小加減服之

斷癩如聖丹 治瘡疾
 人言 一錢 蜘蛛大者 雄黑豆九粒
 右為末同研細滴水和丸如豌豆大來日發今夜北斗下
 獻早晨紙裹一丸塞耳中一粒可治三人其效如神
 白扁豆丸 治瘡疾
 白扁豆炒 葶豆炒 好信五錢
 右為末入白麩四兩水和丸如梧桐子大臨發日五更用
 凉水送下忌熱物

瞻仰丸 治一切瘡疾
 常山四兩 草藥二兩
 右為末薄糊為丸如梧桐子大臨卧冷酒下四十九五更
 時再服三十九忌熱物并羊肉
 治瘡疾如神方
 黃丹 大蒜亦可

治瘡方
 右二味先將大蒜搗碎後入黃丹為丸朝東吞下一方去
 蒜皮再入大蒜五箇入辰砂末一錢宿蒸餅丸如梧桐子
 大空心井花水下一丸十歲以下丸如麻子大忌生冷油
 膩熱物湯合藥時宜端午日

龍華散 治諸瘡疾
 右用蛇蛻一條或三五條用炭火燒存性研為細末每服
 一字無根水下未發前一時服忌鷄魚冷物一方用蛇皮
 塞兩耳中臨發服少許

療十二瘡 昔黃帝問岐伯曰瘡多方少愈者何岐伯答曰瘡
 有十二種帝曰瘡鬼何可得聞乎岐伯曰但得瘡鬼字便
 愈不得其字百方不愈帝曰願聞之
 寅時發者獄死鬼所為瘡之以瘡人著蜜上灰火一周莫
 令火滅即瘡
 卯時發者鞭死鬼所為瘡之用五色衣燒作灰三指撮著
 酒中無酒用清水平服之

辰時發者墮木死鬼所為瘵之令瘵人上木高處
巳時發者燒死鬼所為瘵之令瘵人坐地以周匝然大
午時發者餓死鬼所為瘵之令瘵人持脂火於田中無人
處燒脂香假拾薪去

未時發者溺死鬼所為瘵之令瘵人臨發時三渡東流水
申時發者自刺死鬼所為瘵之令瘵人欲發時以刀刺家
上使得姓名字呪曰若瘵我與汝技却

酉時發者奴婢死鬼所為瘵之令瘵人確稍上卧莫令人
道姓名字

戌時發者自絞死鬼所為瘵之左索繩繫其手脚腰頭
亥時發者盜死鬼所為瘵之以刀子一口箭一枝及一周
安瘵人腹上其箭橫著底下

子時發者寡婦死鬼所為瘵之令瘵人脫衣東廂床上卧
左手持刀右手持杖打令声不絕瓦盆盛水著路邊

丑時發者斬死鬼所為瘵之令瘵人當戶前卧頭向東

截瘵散

常山鷄骨柴 茯神 去皮 肉桂去粗皮 甘草減半 熟

右石槌不犯鐵器為齋散每服半兩用常酒大半碗浸一
宿於當發日早晨空心去滓冷服服後不可喫熱湯熱物
滓再浸或暑煎近發時再服一方不用肉桂茯神却用楮
榔烏梅要在人增損也凡瘵須是發作三五次後却用截
之為妙

知母散

治一切瘵疾不問先熱後寒先寒後熱熱多寒少
寒多熱少年久瘵者止一服取効朝州羅監稅傳方大有

功效

知母直者 貝母

常山

楨榔子

右咬咀作一服水酒各一盞用綿蓋定露一宿五更望東
冷服直到巳時食乾物著喫水便吐煎時不得婦人見
大蒜平胃散 治一切瘵

右平胃散一貼大蒜一箇搗爛用一大碗井花水調蒜澄
清以半調平胃散飲盡又以餘蒜水再飲用厚被蓋卧汗
出即愈友人鄧瀛叟由赴監試感此遇道人授此方

一剪金 治瘵疾寒熱乃聖藥也
人言 硫黃各等

右同研末用緋紅絹子手捻一捻放絹上裹如豆大細絲
練繫纏數遭繫定用剪子剪下勿得不繫緊恐有藥失每
服一九星全新水送空心服無得人知如服藥先一日夜
服至明正發日早勿令人知去無人知靜處避之或廟宇
內亦得

足厥陰肝瘵

夫經謂足厥陰肝瘵在經則令人腰痛小腹滿小便不利如瘵
狀非瘵也數便意欲恐懼氣不足腹中悒悒在臟則令人色蒼
蒼然太息其狀若死者俱刺足厥陰蓋足厥陰之脈循陰器邪
氣客之則少腹滿小便不利也肝為將軍之官謀慮出焉故病
則恐懼不足也蒼上者肝之色也宜察其經絡腑臟而治之治
肝瘵顏色蒼蒼頭掉氣喘積年不瘵鼈甲丸等方主之

鼈甲丸

治肝瘵色蒼蒼頭掉氣喘久不瘵者或久熱勞微
動如瘵

鼈甲去粗皮 爛 蜀漆葉 烏梅取肉 常山

知母各一 姜糖 甘草微炙 苦參

石膏各半 香豉一合 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九未發前米飲

下臨發解服

知母湯 治肝瘡上焦壅滯心煩頭疼寒熱不止肌肉消瘦不

下食

知母 地骨皮 升麻 龍甲 蘇合

犀角 麥門冬 柴胡 石膏 甘草 虎頭骨 赤茯苓 三兩

右龍搗篩每服四錢水一火盞入香豉五十粒煎至六分

去滓不拘時溫服

木香犀角丸 治肝瘡

木香 羚羊角 犀角 升麻 豬苓 檳榔 鼈甲 酥炙

甘草 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸用溫酒或

未飲送下日再服體熱即去甘草檳榔加大黃五兩

手少陰心瘡 附論

夫心瘡者內經謂令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺于

少陰是也蓋心為神舍邪不可干邪氣干之故煩心其欲清水

者以心火內熱故也其反寒多不甚熱者內熱而外寒故也治

宜通心經利邪熱則愈

甘草湯 治心熱為瘡不止或止後熱不渴乍來乍去令人

煩心甚欲飲清水反寒多不甚熱者

甘草 蜀椒 常山 鼈甲 石膏 香豉 梔子 烏梅

竹葉 右以咀以水九升煮取三升分三服

麝香丸 治心瘡

虎骨 黃丹 砒霜 珠砂

右細研令勻用粳米飯和丸如梧桐子大男左女右中指

節上用緞線繫繫一丸發前以公醋湯一丸忌食熱物

珠砂丸 治心瘡

光明砂 常山 杏仁 右為末研入珠砂令勻煉蜜和丸如梧桐子大未發前以

粥飲下十五丸發時再服

足太陰脾瘡 附論

夫足太陰之經脾之脉也脾經之瘡令人不樂好太息不嘗食

多寒熱汗出病至則嘔嘔已乃寒寒則腹中痛熱則腸中鳴鳴

已汗出故謂太陰瘡又名脾瘡

摘皮甘草湯 治脾臟不和瀉利瘡瘕腹痛下部無力體重

足痿脚痛飲食中滿四肢不舉等病陸景淵方曾以治

瘡甚効

橘皮 耳草 厚朴 羌活 防風 茵苳 茯苓

川芎 右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去粗食

前服

人參飲 治脾瘡

人參 甘草 陳橘皮 烏梅 枳殼 枳實 枳實 枳實

右到為末每服五錢用濕紙裹煨熟用水二盞生薑一片

棗一枚擘碎煎至一盞未發前溫服

獨行丸 能截脾寒

石於五月五日用大蒜不以多少鳩爛次入礬紅碎勻為丸如圓眼大每服一九大蒜湯嚥下

良薑丸

右為末猪膽汁和丸如梧桐子大紫蘇湯空心下二十九

手太陰肺瘰

夫肺瘰者內經謂令人心寒寒甚其熱熱間善驚如有所見刺

動於心則為寒熱善驚之候也

人參丸

人參

常山

桂心

阿魏

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸空心用水飲下

未發時併二服

杏仁丸

杏仁

甘草

右為細末煉蜜和丸如菽豆大每服十五丸未發米飲下

日再服之

足少陰腎瘰

內經謂足少陰腎瘰在經則令人嘔吐甚多寒熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已在臟則令人洒洒然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰蓋腎脈入肺中肺脈環胃口故使人嘔陰虛則陽氣偏故熱多若洒洒然腰痛大便難目

胸手足寒時以氣內虛機關不利故為此證也

烏梅丸

烏梅肉

附子

桂心

右搗研為末拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空

腹米飲下未發服

肉蓯蓉

升麻

酒下

足少陽膽瘰

夫少陽膽之狀內經謂令人身體懈懈寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽是也蓋膽為中正之官決斷出焉今瘰邪外中其氣不守故心常惕惕然邪盛故熱多有風故汗出

升麻湯

升麻

犀角

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓空心日午溫服

犀角湯

犀角

知母

升麻湯 治足少陽瘰身體懈懈見人心惕惕然熱多汗出

犀角湯

犀角

知母

升麻湯 治足少陽瘰身體懈懈見人心惕惕然熱多汗出

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓於未發前溫服

足太陽膀胱瘧 附論

夫太陽瘧之狀內經謂令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇然熱止汗出難已刺郛中出血蓋膀胱經下抵腰中上巔絡腦故腰痛頭重寒從背起也經受邪故先寒后熱也熱止汗出難已以真氣不勝邪故也

柴胡湯 治足太陽瘧寒熱

柴胡 常山 知母 鼈甲 青蒿 乾者 甘草 枳殼 官桂 右倉揭篩每服三錢水一盞入柳枝心七枚葱白二寸細切同煎至七分去滓空腹溫服發前再服

足陽明胃瘧 附論 夫足陽明胃瘧在經則令人先寒洒淅寒甚久乃熱去汗出悉見日月火光氣快然當刺足陽明跗上在胃則令人且病善飢而不能食也則支滿腹大當刺足陽明太陰橫墨出血蓋胃圍冲氣為水穀之海邪氣客之則冲氣不和故善飢不能食也則支滿腹大傳於經者為寒熱陽不勝於陰故喜見日月光及火氣也

順氣湯 治足陽明胃瘧支滿腹大

厚朴 陳皮 白朮 半夏 乾薑 柴胡 甘草 右倉揭篩每服三錢水一盞薑五片棗二枚擘破煎七分去滓不拘時溫服

枳殼湯 治胃瘧心膈脹滿不食

枳殼 厚朴 人參 白朮

白茯苓 兩二

右倉揭篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大切煎至一盞去滓溫服

紅九子 專治食癪

荆三稜 醋煮蓬木 胡椒 青皮 阿魏 右為細末別用陳倉米同阿魏醋煮糊為丸如梧桐子大每服五十九加至百丸用薑湯吞下或因食生菓成癪用麝香湯吞下一方炒土珠為衣以老瘻飲下古方雖有驚神効方 治寒瘧

神効方 治寒瘧 珠砂 白芥子 阿魏 右為細末別用陳倉米同阿魏醋煮糊為丸如梧桐子大每服五十九加至百丸用薑湯吞下或因食生菓成癪用麝香湯吞下一方炒土珠為衣以老瘻飲下古方雖有驚神効方 治寒瘧

右為末以硃霜煎丸如黍米大每於未發前冷醋湯下一丸至二丸忌食熱物

分利順元散 治體虛之人患瘧寒多不可服截瘧藥者

川烏 附子 南星 木香 右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一半炮熟合和咬咀每服四錢水一盞半生薑十片棗七枚煎至七分發前一日及當發日早晨連進兩三服半生半熟能解陰陽

菜附湯 治氣虛脾寒瘧疾不愈夜寒少熱面青或單寒者 或大便溏泄小便反多不下食

草菓仁 附子 右各等分咬咀每服半兩水二盞生薑七片棗一枚煎至七分去滓不拘時溫服

如母醫甲湯 療溫瘧壯熱不能食

知母 龍甲炙 地骨皮各三 竹葉物一

石膏 常山二兩

右切以水七升煮取一升半去滓分三服忌蒜猪肉菘菜

生葱生菜

藥龍丸 治證同前

良薑 吳茱萸 胡椒各一

右為細末猪脾一條剉作塵加五分炒之一半衮藥一半

不衮藥並作餛飩有藥者以墨點之遇點者吞下無藥者

嚼下一服効

白木九 治瘴瘧

白木 丹砂研 麝香研 丁香

訶梨勒皮 安息香 檀香 蘇合香

犀角 董陸香 木香 龍腦

沙草根 石膏 木香 蘇合香

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十九丸空腹并花水下老

入小兒三九仍用紗絹袋盛藥帶於臂上辟鬼氣臘月合

以磁器盛勿令泄氣

却毒散 治山嵐瘴氣有黑霧起處急服

麻黃 防風 蜀椒 白木 桔梗

烏頭 官桂 白木 桔梗

乾薑 右為細末每服一錢溫酒調下每日食前常服

一云嵐氣者嶺南青草黃芒瘴狀如嶺北傷寒也角地暖

故大陰行草木不黃而落伏蟄不閉而藏雜蟲因暖而生

則仲夏有青草瘴孟冬有黃芒瘴彼人失醫多成痼病即

為難治嶺南人得之亦如傷寒壯熱頭疼一日三日已上

在于皮膚前可汗而愈五日已上結于臟腑身重而腹痛

當下之得愈即不可先下下之亦為難療其或不解則春

秋作瘧痢而肌膚黃瘦

預固丸 治嶺南諸瘧

丹砂 雄黃 鬼臼

阿魏 右再研令勻以阿魏膏和丸如鷄頭大緋絹袋貯十九常

執手中頻嗅瘴氣內行不着人遇瘴氣病者并花水嚼下

三九五服瘥

香椿散 治瘴氣惡心四肢痠痛口吐酸水不思飲食增寒

壯熱發過引飲二廣八閩多山嵐烟霧蛇虺瘴毒之氣當

秋七八月之間芒華發時此時疾大作謂之黃芒瘴又謂

之黃茅瘴是也蓋人或因飢飽或由虛怯或衝烟霧或涉

溪澗遂得此疾謂之黑脚瘴蝦蟇瘴其各不一並皆

治之

香椿嫩葉 南壁土 甘草

臘茶 右為細末每服四錢用酒調下如患久者更入甘遂柴胡

各半兩空心臨卧服

絞經甲酒 治山嵐瘴南方山嶺瘴氣令人寒熱發作無時

瘴黃腫滿四肢痺弱

絞經甲 烏賊魚骨 附子

常山 右細剉以酒二升半煎漬一宿瘴發前稍服之勿絕藥

味兼以酒塗身體服藥良久方可進食

山瘴瘴酒 瘴乍寒乍熱乍有乍無及瘴痰滯發歇不寢

不瘴者

常山 三兩

龍甲炙

升麻

魚賊魚骨

去甲

附子 各一兩

右並切縮袋盛以酒六升漬之以火轉之一宿每服

一合七發可數服或吐忌猪肉生葱生菜菹菜

保安湯

治山嵐瘴癘寒熱久不瘳

常山 半兩

青蒿

知母 各一兩

桃仁

去皮尖

右蠶搗篩每服二錢水一盞生薑半分同煎至六分去滓

不拘時稍熱服

觀音丸

治取下暑毒瘴毒

圓白半夏 生烏梅肉

川巴豆

不去油

母丁香 每枚各

右為末薑汁煮麵糊丸如麻子大上下以厚紙蓋貼有油

臘又再易紙每張五九臨卧冷水下此方舟入於海角遇

白衣人授之

破塊丸

治受瘴結成氣塊腹中不能消散服之効

葶撥

大黃 俱生用

右為細末入麝香少許煉蜜為丸如梧桐子大每服三十

九空心冷酒下日三服

附子湯

治瘴癘經久不瘳正氣羸弱身熱如火極寒極熱

連日方醒發時沈著枕簟不能搥身戰掉不堪便溺飲食

不便

附子 二枚 一枚生去皮時一枚炮

右劉散每服三錢水一盞半生薑七片紅棗七枚煎至七

分去滓攤令吞靈砂丹五十粒或百粒未効再以七葉湯

吞黃芽丹二十九仍服黑錫丹以墜痰亦可回元氣凡此

瘴但當守續真元沉匿熱為法

沃雪湯

治山嵐瘴氣

蒼朮 去皮

厚朴 去皮

乾葛 各四兩

朴硝 半兩

白芍藥 去支

右劉散每服四錢水二盞煎至一盞去滓不拘時熱服服

畢少時以薑葱作羹或作粥喫了避風坐卧身禮滋潤即

愈兩滓又合煎服

茵陳蒿湯

治瘴癘發作有熱無寒頭痛不安通身俱

黑大腸秘熱小便黃赤

茵陳蒿

山梔子 去心

柴胡

黃芩 去黑

桔梗 炒

牡丹皮 去心

貝母

荆芥穗 去梗

升麻

半夏 七次焙

羌活

杏仁 湯浸去皮

獨活

麻黃 去根節

已

細辛 一分

右蠶搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎一沸急瀉出臨

發熱頭痛去滓熱服不拘時候但出瘴止發熱并初發時

先壯熱者可服熱多寒少食後喫此藥

大青飲

瘴癘積熱痰盛寒少熱多寒躁引飲

大青 一兩 莖葉紫者是不紫即是遠志 醋炒

赤芍藥 常山 龍膽 去土 甘草 炙

右蠶搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓溫服氣

盛熱多宜服得利或熱稍退即止入宿有冷疾年四十以

上者雖有熱證不宜多服

常山飲

治瘴癘但熱不寒煩渴不止

常山 半兩 甘草 炙 青蒿 分

烏梅 去核 燒

右篩却以小便一盞水一盞酒一盞煎至一盞去滓當

發日空心服

鬼哭散 治瘧瘧但熱不寒

神聖丸 右用黃丹煨過時發時蜜湯調下稍大能飲酒用酒調下
治間日瘧

此藥一 大棗三枚黃豆小者二十一
右須於重午七文日備合研九如豌豆大以丹砂為衣合

時忌婦人鷄大見於發日早晨將一九面北香上度過用
冷茶清送下忌熱物一復時

治瘧或間日發或夜發者

常山 竹葉酪三 林米一 石膏八兩

右咬咀以水八升銅器中漬藥露置星月下高淨處橫刀
其上月日取藥病人房中以銅器緩火煎取三升分三服
清旦一服未發前候一食頃一服臨發一服服訖靜室中
卧莫共人語當日勿洗手面及漱口勿進食取過時不發

少頃乃燥洗進食并用藥汁塗五心前頭面藥滓置頭
邊

常山酒 治間日瘧

常山 一兩 糯米 一百 石膏 八兩

右咬咀以清酒一升病未發前一日以酒浸藥於甕中以
白紙覆之甕上橫一刀欲發時三分飲一分如之吐更服
一分得吐則瘧

半夏散 治瘧瘧發作有時熱多寒少頭痛額角并骨前此

肉潤動食終入口即吐出面色帶赤宜服此

半夏 湯洗去滑為末生薑香 羌活

右為細末每服三錢食後白湯調下

蘇丹丸 截瘧消痰

魏丹 穿山甲煨火中飽 土硫半兩

右為末以獨蒜煨去皮研膏和丸如梧桐子大每服十九
生薑烏梅紫蘇湯送下

醫甲清酒 治瘧瘧以時發

醫甲 兩 烏賊魚骨 常山 兩 附子 炮裂去

甘草

右剉如麻豆大每服五錢以酒一盞半清藥一宿明日以
酒先塗五心遇發時瘧斷若不斷可飲藥酒一二盞即瘧

七葉湯 治五臟氣虛陰陽相勝作瘧瘧不問寒熱先後與
夫獨作瘧作間日及瘧瘧塞不通發作無時或寒多熱少
或單寒者悉皆治之

附子 一枚炮裂以鹽水泡再炒如此七次不覺
右咬咀分作二服水半碗生薑七片末七枚煎至八分盞

當發日去滓空心溫服川烏亦可一、二名冷附湯去棗煎
熟露一宿五更初冷服

凡患瘧疾無過是瘧實痞塞不通脾氣弱虛熱在上停於
胃膈不得入於臟腑所以五更冷服乃使藥下達壯脾胃
夫瘧實降虛熱養心氣靈試驗治瘧瘧寒久不瘧者空心
服仍食棗三箇一方葱白七寸同煎

龍虎丹 治瘧久不瘧或止或發繼月連年諸藥無効者

狗頭骨 鼠頭骨 牛頭骨 虎頭骨

兔頭骨 狸頭骨 龍角 狗猴頭骨

馬頭骨 天靈蓋 鼈甲 龜甲

阿魏 細研 麝香 別研 各 蛇頭 一枚 雄黃 細研

珠珀 細研

右為末入別研藥和令勻以軟飯和丸如鷄頭大以青絹

暴男左文右中指上繫一丸未定即以醋茶下一丸

鯪鯉甲酒 治久瘡不瘥

鯪鯉甲酒 去垢爛醋浸 烏賊魚骨 去甲

常山 烏梅肉 竹葉 一握 豉 一合

桃仁 二十四枚 湯浸去 葱白 七莖

右對如麻巨大用生綸袋盛以酒三升浸經一宿每日空
腹溫服半盞良久取吐如不吐至巳午時再服三劑服如
不瘥哺日更依前服之

治久瘡

批莖 雄黃 阿魏 黃丹

硃砂 丁香 麝香 一分

石同研為細末醋煮麩糊為丸如雞頭尖大以緋帛裹一
丸男左女右繫其臂上

治瘡久不瘥

蜘蛛 五枚 大者去 蛇蜕皮 一條 全

輪扁 一枚 炙 麝香 半兩 龍甲 一兩 去毒

右為末研勻五月五日合以蚊蛛膏入煉蜜和丸如麻子
大每服五丸空心溫酒下小兒茶下二丸

久瘡丸 治瘡百方不瘥者宜服

批莖 一錢 乳香 半兩 半夏 湯洗七遍 兩

右為細末於重午日正午時用粽子尖和為丸如皂角子
大發時以醋湯下一丸更不再服如非重午日須兩服藥

祛瘡神應丸

右用三姓人家寒食日食用白麩每家取一匙於五月
五日午時採青高擗取自然汁和麩為丸如菘豆大每
服一丸當發日早晨取無根井水送下一方用黃丹一匙

炒過与麩二麥碾和勻

治勞瘡

獾甲 醋浸 黃香 刺 牛膝 酒浸 天靈蓋 炙

兔絲子 酒浸 續斷 各半 羌活 去毒 柴胡 去毒

赤茯苓 去皮 生乾地黃 焙 木香 陳橘皮 湯浸去

骨節 山茱萸 去核 獨活 去毒 麝香 各一

麝香 研一

右為末每服三錢水一盞入鹽少許同煎七分空心
服或煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下四十九丸亦得

烏梅丸 治勞瘡及瘡鬼等瘡悉皆治之

烏梅肉 微炒 肉桂 各一兩 龍甲 去毒 麝香 各一

桃仁 湯浸 已上各一兩 香鼓 炒 麝香 各一

常山 川升麻 人參 去毒 甘草 炙

知母 桂心 各三

右為末入麝香研勻煉蜜和搗二三日杵丸如梧桐子大
每服未發前空心溫酒下三十九至發時又服三十九每
日服之以瘥為度

露星飲 治久瘡成勞

白茯苓 檳榔 常山 秦苑

柴胡 黃苓 半夏 官桂

白朮 甘草 各等

右咬咀每服三錢水酒各半盞露一宿次早溫去滓服

神効手把丸 治鬼瘡

獾頭骨 虎頭骨 貓兒頭骨 批莖 細研

常山 硃砂 細研 乳香 細研 麝香 細研

白芥子 阿魏 各一 蜈蚣 一枚

右為末研令勻取五月五日干時煉蜜和搗三五百杵丸如皂角子大以緋絹裹一九男左女右臂上繫之發時於淨室內焚香赤信解下男左女右以手把之時時就鼻嗅之四五度効

治鬼瘡神効丸

砒霜細研 硃砂細研 乳香細研各 麝香細研 阿魏細研 安息香 葶豆末 糊猴頭骨 虎糞中骨各一分

右為末研勻以蒸餅和丸如梧桐子大未發前男左女右手把一九便卧一炊時久便瘥

萬安丸

虎頭骨酒炙 三兩 藜蘆六兩 雄黃研 鬼臼 天雄炮去 蕪荑炒 皂莢酥炙去皮

右為細末入引研雄黃末令勻煉蜜和丸如彈子大令患者頭上敷一九立瘥若除伏屍於室內四角燒四粒除度氣於床前燒一粒或熱甚男左女右臂上帶一粒則便愈矣

雄黃丸

治一切遠年瘡結成癥瘕

雄黃研 丹砂研 麝香半兩 鼈甲去殼 龜甲醋炙 木香 虎頭骨酒炙 羚羊角銹屑 犀角銹屑 白薇 玄參 當歸切焙 知母 防風去叉 麻黃節去根 龍膽去苗 狂瀉燒赤 猪苓去黑 柴胡去苗 茯神去木 升麻 檳榔剉 地骨皮 赤芍藥 蛇子仁 黃連去鬚 烏梅肉 阿魏 安息香研 桃仁湯浸去皮 養絲

龍齒各三

石除別研外餘藥為細末合研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十大白粥飲下未發前服

消癖丸

治瘡母停水結腹脇堅痛

芫花兩 硃砂細研 右為末煉蜜和丸如小豆大每服十九濃煎棗湯下去癖用芫花大戟破水之劑下後即愈

柴胡括蕪根湯

治瘡而發渴

柴胡 黃耆 人參 甘草 生薑各三 大棗二十 括蕪根四兩

升日三

右咬咀用水一斗二升煮取六升去滓煎取三升温服一升日三

麥門冬湯

治瘡病發熱煩躁體黃小便不利令人多驚如

有所見

麥門冬去心 犀角屑 杏仁浸去皮尖雙 常山 甘草半兩 糯米一升

右煮搗篩以水五盞煎至三盞去滓分為五服於發前溫服之

茯苓湯

治瘡病發熱身黃小便不利

茯苓去黑 白芍藥 瞿麥各一 右煮搗節每服

碎同煎至七分去滓食前溫服

奇効良方十二卷終

新刊大醫院奇效良方卷之十三

痢門 附論

夫痢者有云滯下今為痢疾脈經云陽浮下膿血脈沉小留連
指生數也且大有熱者死又腸澼筋擊其脈小細安靜者生浮
大緊者死嚴氏云下痢之脈微小若生洪者難治腸澼下膿血
者脈宜滑大若改急者死仲景分治之法下痢脈沉弦者下重
脈大者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死下痢手足
厥冷無脈者灸之不溫若脈不至反微喘者死下痢有微熱而
渴脈弱者令自愈脈數有微熱汗出令自愈設脈緊為未解下
痢脈數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也病機要
云後重則宜下腹痛則宜和身重則除濕冰弦則去風膿血稠
粘以重劑竭之身汗有汗以藥溫之風邪以縮宜汗之驚溼為
痢當溫之又云在外發之在裏下之在上以之在下竭之身表

熱內疎之小便澁分利之又曰盛者和之六者送之至者止之
蘭室秘藏云假令傷寒飲食脹滿而傳陰江者宜溫熱之劑以
消導之傷濕熱之物而成膿血者宜苦寒之劑以內疎之風邪
下陷者升舉之濕氣內勝者分利之裏急者下之後重者調之
腹痛者和之洞泄腸鳴無力不及括衣其脈弦細而弱者溫之
收之膿血稠粘至固而不能便其脈洪大而有力量者寒之下之
機要又云太陰經受濕而為水泄虛滑身重微滿不知酸味又
則防變而為膿血脾經傳腎謂之賊邪故難愈者若先痢而後
滑謂之微邪故易愈此皆脾土受濕之所為也陳無擇云帶下
之證內經所載血溢血泄血便注下古方則有清膿血今為痢
疾其實一也或由脾胃不和飲食過度停積於腸胃不能消化
又為風寒暑濕之氣所干故為此疾傷熱則赤傷冷則白傷風
則下清血傷濕則下如豆汁今熱交併赤白兼下治法當通利

之藥疎滌臟腑嚴氏以已豆等劑推其積熱後辨以冷熱感濕
之證用藥調治熱赤者清之冷白者溫之傷風而下清血者則
法逐之傷濕而下豆汁者分利之冷熱相併溫涼以調之仍須
先調胃氣切不可驟用罌粟訶子之藥止之澁之使停滯不泄
多致老殆陳無擇又云古方風停膏膠下瘀血或下鮮血濕毒
下如豆汁皆外因之所致古方有五泄因臟氣鬱結隨其所發
使利膿血作青黃赤白黑一一不同即內因也又飲食油膩熱
物酒醴醞醢縱情恣慾房室致傷精血腸胃粘澁久積冷熱遂
成毒痢皆不外因治之先推其歲運以平其外察其鬱結以
調其內審其所傷以治不內外條然明白不致妄投也此分三
因而治用藥當以三因內求之大全良方云有一方一家之內
上下傳染長幼相似是疫毒痢也治法雖百察運氣之相勝亦
不可抑泥當先察其虛實冷熱首用敗毒以倍加人參甘草陳

皮隨證用之陳無擇又云飲食冷熱酒醴醢醢腸胃粘澁久積
冷熱遂成毒痢嚴氏云或有飲冷酒寒物必慾勞傷精血而成
又痢則宜化毒以保衛之病機云裏急後重脈大而洪實為裏
熱甚而閉是有物結壅也若脈大甚不宜下雖裏急後重而脈
沉細弱者謂寒在內而氣散可溫養自愈裏急後重閉者大腸
經氣不宣通也宜加檳榔木香宣通其氣原病式云下迫後重
裏急窘迫急痛也火性急速而燥物故也機要云腹痛泄瀉
之如發熱惡寒腹不痛以黃芩多用腹痛甚者加當歸倍芍藥
百一選方云禁口痢是毒氣上衝心肺所致用石蓮肉以通心
氣丹溪云吃病氣自下衝上衝火之象古方悉以胃弱言之殊
不知胃弱者陰弱也虛之甚也滯下之久多見此證乃久下而
陰虛也原病式曰或言下痢白為寒者誤也若果為寒則不能
消穀何由反化為膿也所謂下痢穀反為膿血如世之穀肉菜

痰濕熱甚則自化腐爛潰發化為污水也其熱為赤熱為心火
 故其濕為黃濕為脾土也燥鬱為白屬肺金也經曰諸氣憤
 鬱皆屬於肺謂燥金之化也然諸陽病皆兼於濕今反言氣滯
 者謂濕熱甚於腸胃之內而腸胃佛鬱結而又濕至于否以致
 氣液不得宣通因以成腸胃之燥便煩渴不止也假如下痢赤
 白俗言寒熱相兼其說尤悞豈知水火陰陽寒熱者猶權衡也
 一高則必一下一盛則必一衰豈能寒熱俱甚於腸胃而同為
 痢也如熱瘡瘍而出白膿者豈可以白為寒欤其在皮膚之分
 屬金故色白也次在血脉之分屬心火故為血也其色紅在肌
 肉屬脾土故作黃膿在筋部屬肝木故其膿色帶蒼深至骨屬
 腎水故紫黑血出也各隨五臟之部而見五色是其標也本則
 一出於熱但分淺深而已大法下迫瀉痛後重裏急小便赤澀
 皆屬燥火而下痢白者必多有之然為熱明矣又云白痢既為
 熱病何故服辛熱之藥亦有愈者耶蓋辛熱之藥能開發腸胃
 鬱結使氣液宣流通流濕潤燥氣和而已蓋病微者可愈甚者鬱
 結不開其病轉加而死矣凡治熱甚吐瀉亦然夫治諸痢者莫
 若以辛苦寒藥治之或微加辛熱佐之則可蓋辛能發散開通
 鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已如錢氏香連丸之類
 是也故治諸痢者黃連黃蘗為多以其至苦大寒正主濕熱之
 病乃若世傳辛熱金石毒藥治諸吐瀉下痢或有愈以其善開
 鬱結故也然雖亦可驗者或不中效更宜加苦甘淡白或問何
 間之言滯下似無扶寒者乎予曰淺痢之病水穀或化或不化
 虛實何如惟意困倦若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或
 腸垢或死糟粕或糟粕相混有痛不痛大痛之異然皆裏急后
 重逼迫腦人似乎皆熱實證也系病式云所論痢之赤白皆云
 有熱在氣分為白熱在血分為赤白相雜者氣與血皆受

病也且滯下之證古人多與泄瀉同論至三因方始能另立條
 目蓋實有不同夫病有從外感而得者須分六氣之異外既受
 傷腸胃鬱結遂成赤白等證當隨其氣血虛實以調之有因臟
 氣發動干犯腸胃而得者須察其何臟相乘以平治之之有因
 飲食失節而得者則又審其何物所傷以消剋之世之感此疾
 者其因誠不越乎是三者但其受病之后腸胃佛鬱膿血稠粘
 裏急后重諸方雖有寒熱虛實之論劉河間則以為熱內經亦
 以熱多而寒火丹漢以為扶虛挾寒之證且前人立論各有立
 法是證立方各有受病之源隨證用藥后之學者宜深審之可
 不慎諸人之命豈可輕忽也

痢疾通治方

胃風湯 治大人小兒風冷乘虛客於脾胃水穀不化泄瀉注

下腹腸虛滿腸鳴腹痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血

白木 白芍藥 川芎 人參

茯苓 去皮 當歸 錢二 肉桂 半錢

右作一服水二鍾粟米一撮煎至一鍾不拘時服

地榆散 治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血赤多白

少或純下鮮血裏急后重小便不利

地榆 乾葛 錢四 乾姜 錢一 當歸 去蘆

茯苓 去皮 赤芍藥 錢三 甘草 錢二 罌粟殼 錢六

神效參香散 治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積而成痢或

下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤

白相雜裏急后重日夜頻數無間新舊並皆治之

白扁豆 炒 木香 人參 去蘆 各 錢二 茯苓 去皮 錢六

肉苁蓉 酒洗 兩 罌粟殼 去蒂 陳皮 去白 兩

右為細末每服三錢用溫米飲調下不拘時服
木香散 治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化腹中痞
痛又痢脾滑不禁

木香 赤石脂 訶子肉 附子
甘草 藿香葉 肉豆蔻 當歸
丁香 半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一箇煎一鍾不拘時服
其人養臟湯 治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚
腦裏急後重臍腹疼痛如脫肛墜下酒毒便血並治之

肉桂 人參 當歸 訶子
木香 肉豆蔻 甘草 白芍藥
白木 罌粟殼 白芍藥

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服臟寒者加附子
痢聖散子 治男子婦人遠年近日赤白下痢
罌粟殼 黃蘗 枳殼 御米
甘草 當歸 乾薑

右作一服水一鍾薑白二條碎同煎至一鍾空心服
訶子散 治脾胃虛弱內挾冷氣心脇刺痛嘔吐惡心腸鳴
泄利水穀不化漸成痢疾

訶子 肉豆蔻 青皮 附子
肉桂 五錢

右為細末每服三錢淡生薑湯調下不拘時服
黑丸子 治脾胃法弱飲食過傷留滯不化遂成痢下服此藥
推導更須斟酌受病淺深增減丸數當盡積滯方佳然
後徐徐補之

烏梅肉 杏仁 半夏 縮砂

百草霜 六錢 巴豆霜 半錢
右為細末和勻用稀糊為丸如黍米大每服十五丸加至
二十丸用白湯送下看人虛實加減丸數服之

駐車丸 治冷熱不調下痢赤白日夜無度腹痛不可忍者
黃連 阿膠 當歸 乾姜
右為細末醋煮米糊為丸如梧桐子大每服五十九丸至
七十九丸空心用米飲湯送下

五苓散 治伏熱下痢分利陰陽
方見醫門

黃連香薷散 治感暑下痢鮮血
方見醫門

香連丸 治必熱不調下痢赤白膿血如雜糞急後重
黃連 木香 訶子 當歸 青皮
右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五七十九丸食前用
米湯送下

水瀉木香丸 治一切下痢赤白膿血和雜糞急後重
木香 訶子 當歸 青皮
甘草 罌粟殼 枳殼

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸用水一鍾煎至
六分空心服

黃連阿膠丸 治必熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口
燥煩渴小便不利
黃連 阿膠 茯苓 芍藥

黃連茯苓丸 治必熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口
燥煩渴小便不利
黃連 茯苓 芍藥 甘草
七十九丸空心用米飲湯送下
戊己丸 治脾經受濕泄瀉不止米穀不化清腹刺痛

杏仁計四 其章一 右作一服用水二鍾生薑三片烏梅二箇煎至一鍾露一宿早晨服

木香薑蔻丸 治臟腑冷極久冷傷備口瘡下泄米穀不化飲食無味肌肉消瘦心多嘔怒婦人產後虛冷下泄及一切水泄冷痢脾泄此方於東坡家藏方內言用此藥與入莫不神應備錄病愈人各姓悉不備述子用此方十餘年無不取効脾泄者即愈而瀉痢者只一服見効惟熱痢熱瀉不治蓋藥性熱也隨證用之

木香 破破紙兩 良薑 砂仁 厚朴 赤芍藥 陳皮 官桂 白木 吳茱萸 胡椒 肉豆蔻 檳榔

右為細末用漿水煮豬肝和藥攪勻仍用此藥糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心熱稀米粥飲下

而復發腹中疼痛者宜服之 硃砂 乳香 巴豆 杏仁 硃砂 木香 白膠香 黃丹 右為細末鎔黃蠟一兩搜和丸如麻子仁大每服一丸小兒半丸水瀉新汲水下赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下赤白痢甘草乾姜湯下並效冷臨臥服厚綿勿服忌熱物一二時辰一方絡蟻入油二十點和劑令軟用油紙裹旋丸

飲食減少

肉豆蔻 黑附子 川薑 硫黃 白朮 當歸 訶子肉 桂心

川烏頭 紅豆

右為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十九空心用米飲下

白木調中丸 治脾胃不和下墜痞兩脇脹滿腹疼痛意宿腐氣霍亂吐瀉米穀不消久痢赤白膿血相雜多日羸瘦不思飲食

白朮 神麴 人參 白茯苓 豬苓 澤瀉 木香 官桂 甘草 乾姜 右為末麵糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心用淡

生姜湯下 加味六均子湯 治一切脾胃虛弱泄瀉之證及傷寒病後米穀不化腸中虛滑發渴微瀉久不瘳者及治小兒脾泄瀉得痢

人參 白朮 黃耆 山藥 甘草 砂仁 加厚朴 肉豆蔻

右為細末每服二錢用飯湯調服不拘時候如渴煎麥門冬湯調服

赤石脂 紫石英 滴乳香 赤石脂 紫石英 滴乳香 赤石脂 紫石英 滴乳香

五更脂 <small>研各二兩</small>	珠砂 <small>一兩</small>	右並研為細末糯米粉糊為丸如小鷄頭大風乾每服三九用炒故紙入棗煎湯調鍾乳粉少許空心下小兒腎泄白膿楊汁面煎黃脫畏人怯寒震盪丹未入也鍾乳粉以棗并炒故紙共煎熱湯調下
沒石子丸	治臟氣虛弱大腸滑泄次數併日漸羸瘠不進飲食或久患赤白痢脾泄等病並宜服之	沒石子 <small>南番者</small> 肉苁蓉 <small>各二兩</small> 訶子肉 <small>濕熱</small>
白薑 <small>切作片</small>	丁香 <small>不見</small> 赤石脂 <small>別研</small> 白茯苓	白木 <small>記上各</small>
右為末和勻湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三四十九食前用米飲吞下一日三四服棗肉丸亦得	地榆湯	治泄痢無問老少
地榆	酸石榴皮 赤芍藥 厚朴 <small>去蘆皮</small>	甘草 <small>炙各</small> 阿膠 <small>炙切</small> 白石脂 <small>研</small> 龍骨 <small>研碎</small>
右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓空心日午溫服	斷痢散	治一切瀉痢腹痛久不差
肉苁蓉	乾薑 <small>炮</small> 丁香 <small>各二</small> 訶子 <small>去核</small>	甘草 <small>炙</small> 陳皮 <small>各一</small> 御米殼 <small>炒三兩</small>
右吹咀每服二錢半水一盞乳香一粒粟米百粒同煎至七分去滓溫服食前霍亂吐瀉水冷服	育腸丸	治腸胃虛弱內傷生冷腹脹泄瀉時時刺痛裏急後重下痢赤白或交膿血晝夜頻併經久不瘥此藥空腸胃進飲食
烏梅肉	黃連 <small>去蘆</small> 訶子皮 鹽粟殼 <small>去蒂</small>	肉苁蓉 <small>各半兩</small> 當歸 <small>去蘆頭</small> 酒浸

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九至五十九空心食前飯湯下如小兒作小丸煎甘草乾薑湯下一方如川芎一分	六神散	治瀉痢赤白腹痛不可忍痢久不止者
乾薑 <small>炮各</small> 甘草 <small>炙三</small>	御米殼 <small>一兩</small> 青皮 <small>去白</small> 陳皮 <small>去白</small> 烏梅肉	
右件吹咀每服四錢水一盞半乳香一粒同煎至六分去滓溫服食前日進二服一方無乳香赤痢冷服白痢熱服	花痢溫服一方無乾薑	
治泄痢方	夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得疾泄痢連月夢登間有韻語方一紙讀之數過其詞曰	暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘰獨煉桂黃蒸餅和藥甘草作湯服之安樂別作治瘰醫家大錯如方服之
遂愈	石榴皮散	治暴瀉不止及痢下赤白
右用酸石榴皮燒灰存性不以多少研為細末每服二錢空心用米飲調下	炙鷄散	治脾胃氣虛腸滑下痢
右用黃雌鷄一隻治如食法以炭炙之撻了以鹽醋刷之又炙令極乾燥空腹食之	不二散	治諸般瀉痢神效
鹽粟殼 <small>去蒂</small> 青皮 <small>去核</small> 陳皮 <small>去核</small>	當歸 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙</small> 甜藤 <small>如無只以乾葛</small>	
右件吹咀每服三錢水一盞煎七分去滓通口服如患赤白痢用酸石榴皮一片同煎極效	神効鷄清丸	治一切瀉痢

木香二兩 黃連二兩 肉苁蓉七箇生用
 右先為細末取鷄子清攪和藥作餅子於慢火上炙令黃色變紅極乾再研為末用麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲湯下

肉苁蓉 訶子肉 白茯苓 白木香

石連肉 當歸各半 乳香三錢 罌粟殼一及半

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服三五十丸空心用米飲下如血痢或血痢白木當歸罌粟殼

地榆丸 治瀉痢或血痢

地榆 當歸 阿膠 糯米 黃連 去黃

訶子 木香 烏梅 去核 肉 押已

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二三十粒空心用

陳米飲吞下先公頃在扶養病痢踰月得此方而愈頃在嘗上士人蘇子病此危甚其婦翁孫德來告急錄此方以與之徒即痊安致謝云

治痢仙方 哥曰

八痢臨終事可危 仙方等分與均醫

三香止痛最為緊 四白和中不可虧

甘枳更加罌粟殼 訶榆全藉石榴皮

半夏李朴黃連橘 救苦天醫只片時

丁香 沉香 木香 白木

白芷 白茯苓 白芍藥 甘草

枳殼 罌粟殼 訶子 地榆

酸石榴皮 半夏 厚朴 黃連

陳皮

右各一錢分作五服白加生薑煎赤加烏梅煎食前服
 治痢如聖散 治一切痢疾無問久新或赤或白或赤白相雜日夜無度悉能治之紹興王子浙東提筆黃即中施此藥頗有效驗

當歸 地榆 縮砂仁 赤石脂

陳皮 石榴皮 訶子肉 罌粟殼

乾薑 甘草各等

右為藥末每服三錢水一盞半入陳霜梅一箇煎至七分去滓赤痢冷服白痢熱服赤白痢濕服年高婦小兒皆可服忌生冷油膩物

治痢方

右用生鷄子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取鷄子白攤遍連紙日乾摺作四重包撮烏梅艾燻斗中用白炭火

燒煙盡取出以盞碗蓋覆候冷研令極細入水銀粉少許和勻如大人患分為二服小兒分為三服不拘時赤白痢空心并花水調服如覺臟腑微有疎利更不須再服

秘方養臟湯 治五色痢經驗

陳皮 枳殼 黃連 烏梅 去核

南木香 杏仁 厚朴 甘草 各五

罌粟殼 去蒂 膜 蜜

右到散五色痢黑豆葶子煎服紅痢生地黃春茶甘草煎煎服五色痢久不効加龍骨赤石脂人參芍藥各一兩為末煉蜜丸烏梅甘草湯下粟米飲亦可立効

黑龍丹 治痢疾不可者

右用十二月殺的猪膽可收一百之上將雄黑豆裝入膽內麪香少許陰乾看人大小每服五七粒為細末如紅痢

甘草湯下如白痢生薑湯下

獨神丸 治一切赤白痢不問久新百藥不効者

右用罌粟殼十兩重分作三分一分醋炒一分生用去穢

又蒂萼一分蜜炙研為末煉蜜和丸如小指頭大紅痢生

地黃春茶煎湯嚼下白痢烏梅并草節俱為末二錢陳米

盪湯下亦効一方薑煎一方用米醋一中盪將粟殼且炙

且蘸候盡色黃為度焙乾研為末煉蜜為丸如彈子大每服

一丸水一盞入生薑三片煎至八分通口服

痢藥乳香散

白梅燒灰 棗子燒灰 訶子半兩 罌粟殼燒灰

右為粗末每服一二錢用水一小盞入乳香一小豆許同

煎至七分不拘時溫服

治痢方

右用臘茶為細末不以多少用白梅肉和丸赤痢甘草湯

下白痢烏梅湯下泄瀉不止陳米飲下每服二十九團茶

尤佳大凡痢疾不問赤白而後為冷熱之證若手足和暖

則為陽當先服五苓散用粟米飲調下次服感應丸二十

粒即愈若手足厥冷則為陰當服暖藥如已寒九附子之

類如此治痢無不効有人夏月患痢一日六七十行用立

茶散立止

遇仙立効散 治諸般惡痢或赤或白或濃淡相雜裏急後重

臍腹疼痛或下五色或如魚腦日夜無度或禁口不食不

問大人小兒虛弱老人產婦並宜服之

川當歸洗 甘草炙 御米殼去蒂 蘇合二兩

赤芍藥 地榆 酸石榴皮各半

右為藥末每服三錢水一盞半煎至七分空心溫服小兒

薑散數加減以瘳為度忌生冷油膩腥月等物一方入赤

扶苓北棗等分

金粟湯 治丈夫婦人室女小兒一切下痢無問新久冷熱不

調日夜無度臍腹疼痛諸痢肢體困倦小便閉澀不思飲

食漸加羸瘦大治內傷生冷脾胃怯弱飲食不消腹脹雷

鳴泄瀉不止連月不瘳並宜服之

陳皮去白 車前子炒 乾薑炮 甘草炒

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗一箇煎七分空心

食前稍熱服或飯飲調下亦得忌生冷油膩魚酢醬等物

犀角丸 但是痢服之無不瘳

犀角有者 黑文理 宣州黃連 苦參炙

金州黃蘗去皮 川當歸五物

右各搗研為末各等分和勻空腹爛煮糯米飲調方寸七

服之日再服忌粘滑油膩生菜

聖藥手 治一切下痢臍腹痛

木香半錢 乳香別研 沒藥別研 肉苳蔻炒

右為末每服一錢大乾棗一枚去核先入一半棗在內次

用水浸已豆半粒再入藥末半錢合定用油餅麩裹一指

厚火煨熟為度去麩并已豆不用只細嚼藥末米飲空

心下一方用乳香一兩研肉苳蔻二兩煨作末用陳米糊

為丸服効

治痢絕妙丸

金櫻花葉炙 子 罌粟殼去蒂 蘇合二兩

右為末煉蜜為丸如手指頭大五色痢用春茶陳皮煎湯

下如為末用蜜一匙春茶烏梅煎湯調服

揚梅方 和五臟能條腸胃除煩悶惡氣切不可多食甚能損

齒及筋亦能治痢

右用揚梅燒灰研為細末每服一錢食前用白沸湯調服

百中散 治一切痢不問赤白或一日之間一二百行只一服

便疎再二三服即愈

罌粟殼 三斤去上蒂頂隔剉成

厚朴 三斤去皮用生薑白紙紙汁

右為細末每服二三錢空心用米飲調下忌生冷油膩魚

鮮毒物三日

治痢千百種雜下

黃連 三兩 烏梅 介四

右用以水八升煮取四升停冷納雞子白一枚攪調又煎

取二升分為三服一方下痢熱諸治不瘥為末煉蜜為丸

如梧桐子大每服二十九日三夜二米飲送下

真方聖散子 治男子婦人脾胃受暑中腕停寒嘔物煩傷心

胃痛悶助助膨脹為甚下痢膿血或下五色或便如魚

不調等症或如爛肉相似日夜無度久而不

愈嗜臥怠惰羸瘦肢體沉困寒熱時作此藥能固養脾胃

溫中止腹痛服之甚有所益

訶子皮 乾薑 揀丁香 肉苳蔻 麩裏煨

烏魚骨 去皮 赤石脂 甘草 炙黃各 御米殼 碎炒

右為細末每服先用水一盞入乳香少許煎五七沸調藥

末二錢食前熱服

治痢

右用罌粟古方未聞今人所用雖其法小異而皆有奇功

或用數顆慢火炙黃為末米飲下或去粟用殼如上法或

以殼五七枚并草一寸半生半炙用水一大碗煎取半碗

溫溫呷服即愈

瓜蒌散 治五色痢疾久不愈者

瓜蒌 一箇黃色者以炭火煨存性

右研為細末作一服用溫酒調服胡大卿有一僕患痢半

年至杭州遇一道人傳此方而愈

止痢法

肉苳蔻 一介 訶子 二介 煨

右為末每服一錢空心用米飲調下

下禮散 治陰陽相搏真氣失守上盛下寒便痢不禁先宜同

住腸胃

白茯苓 白朮 各半 木香 煨 草菓仁

陳皮 訶子 白扁豆 生薑 自然汁 煮

罌粟殼 七次 炙 煨 煨 煨

右同為末每服五錢濃煎粟米飲一大盞同藥煎至七分

空心溫服

百歲丸 治一切惡痢雜下赤白及休息等痢

蒲蘭子 一箇 阿膠 木香 罌粟殼 等

黃連 兩 乳香 另研

右除乳香外將餘藥剉作小塊炒合焦黑色存半性不令

煙絕研為末入乳香和勻用麩糊和丸如梧桐子大每服

一歲服一九十歲服十九依歲數服之不拘時米飲下

育腸湯 治腸胃虛弱內挾風冷腹痛振痛下痢虛滑或變膿

血並宜服之

人參 去薑 白朮 高良薑 肉桂 煨

赤石脂 <small>煨過</small> 當歸 <small>洗淨</small> 附子 <small>炮法</small> 肉苳蔻 <small>煨過</small>	甘草 <small>炙</small> 厚朴 <small>去粗皮</small>	右各等分為籠末每服五水水二盞入梗米二百粒同煮至一盞去滓溫服	玉粉散 治血痢解臟腑積熱毒	海蛤	右為細末每服二次蜜水調服	木香散 治隔年痢不止并血痢	木香 黃連 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 粟殼 <small>去毛</small>	右為末入麝香必許每服二次米飲湯調服	葛根湯 專治酒痢	葛根 枳殼 半夏 生地黃	杏仁 <small>去皮</small> 茯苓 <small>略</small> 黃芩 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small>	右分作二貼水二盞黑豆百粒生薑五片白梅一丁煎至一盞去滓食前溫服	神助散 治休息痢氣痢膿血不止疼痛因弱	當歸 烏梅肉 黃連 <small>各等</small>	右為細末研大蒜作膏和丸如梧桐子大每服三四十九厚朴煎湯下一方研何膠	木香散 治氣痢泄瀉心腹疼痛	木香 沉香 官桂 <small>去粗皮</small> 沒藥	胡椒 當歸 <small>切</small> 乾薑 <small>炮</small> 附子 <small>炮</small>	密陀僧 甘草 <small>炙</small> 肉苳蔻 <small>一</small> 赤石脂	龍骨 <small>略</small>	右為細末每服一水食前用米飲調下	地榆湯 治脾毒氣痢下血如鴉鴨肝腹痛不止
---	---	-------------------------------	---------------	----	--------------	---------------	---	-------------------	----------	--------------	--	--------------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------------------	--	--	---------------------	-----------------	---------------------

地榆 訶子肉 <small>略</small> 當歸 <small>切</small> 甘草 <small>炙</small>	栝瀉 茜根 芍藥 赤茯苓 <small>去皮</small>	右細剉每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服一方無赤茯苓有炒黃連一兩	龍骨散 治氣痢腹內虛鳴日久不差	龍骨 黃連 <small>去</small> 黃蘗 <small>去</small> 乾薑 <small>炮</small>	阿膠 <small>炙</small> 人參 厚朴 <small>去粗皮</small> 生薑	右為細末每服二錢空心粥飲下日再	神驗丸 治冷勞氣痢腹脇疼痛水穀不消	陳麩 吳茱萸 <small>湯浸</small> 黃連 <small>去</small>	右為細末生薑汁和為丸如梧桐子大每服十五丸合前用溫米飲下	木香 <small>略</small> 治氣痢腹脹腹中虛鳴	木香 <small>半</small> 縮砂仁 <small>半</small> 枳殼 <small>去</small> 訶梨勒皮 <small>各</small>	右為細末每服一錢空心用陳米飲調下良久以食壓之	牛乳方 治氣痢日久不差諸痢困弱諸藥不効者	右以牛乳汁煎薑搗服之立瘥唐貞觀中太宗苦於氣痢詔問殿廷左右有能治其疾者當重之賞有術士張寶藏進此方時賞官三品一方牛乳半升薑搗末二水七同煎減半空心服	巴石丸 治氣痢	右以白礬飛令雪白謂之巴石以熟豬肝作丸空心米飲下丸數隨人力氣加減若得水牛肝更妙素食人蒸餅丸之亦可或云白礬中青黑者名巴石一方白礬不以多少炭火於淨地上燒令汁盡變其色如雪名之巴石一兩研
---	--------------------------------	----------------------------------	-----------------	--	---	-----------------	-------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--	------------------------	----------------------	---	---------	--

藍青丸 療中焦水穀下痢

藍青汁三升 黃連八兩 黃芩四兩 阿膠五兩

白朮 地膚子 烏梅肉 地榆各三

右為末用藍汁和微火上煎取可為丸如青杏大每服二

一丸空心用溫白湯化下忌猪四冷水桃李雀肉

附子五味子散穀痢之候痢無期度食不消化腹痛每遇冷便

發有此候者宜服

附子炮 細辛 白朮各五 乾薑 四兩

神麩一升

右為末以飲下之物粥一方寸匕日再服稍加至二三

匕良忌猪肉冷水生菜桃李雀肉等

神效橡實散 治水穀痢無問老小日夜百餘行

橡實二兩 乾楮葉一兩

右為末每服一錢不拘時為梅煎湯調下

蠟皮丸 治臟腑傷動腸胃虛弱血滲腸間風冷相乘大便下

血瘀黑有片或五痔腫痛久下膿血者

蠟皮一具切 槐實炒 續斷 黃耆

連翹 當歸 乾薑 附子炮裂去

白礬二兩 生乾地黃 五兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心食前

用米飲下

茵根散 治蟲注下血如鷄肝體熱心腹中煩悶

茵根 川升麻 犀角屑 地榆 剉

黃芩 黃連 炒各

右為散每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

治腸蟲先下赤後下黃白沫連年不瘥兼治痢下應先白後赤

若先赤後白為腸蟲

右用牛膝一兩切推碎以醇酒一升漬一宿平旦空心服

之再服愈

阿膠丸 治冷熱不調痢下膿血不止腹痛不可忍

阿膠 乾姜 木香 黃連 炒

當歸 黃芩 赤石脂 龍骨 各二

厚朴 生薑 汁塗炙

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九不拘時以

粥飲下

木香散 治冷熱痢虛損腹痛不能飲食日漸乏力

木香 乾姜 甘草 黃芩 各半

栝葉 當歸 白朮 乾熱地黃 各三

黃連 炒

右為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不拘時溫服

歸連丸 治痢無問冷熱及五色痢入口即定

當歸 黃蘗 黃芩 阿膠 炒

熟艾 各二 黃連 四分

右為末以醇醋三升煮膠烊下藥煮令可為丸如豆大每

服七八十九日二夜一月米湯下若產婦痢加蒲黃一兩

煉蜜和丸

阿子散 治冷熱痢腹痛不能飲食

附子炮裂去 黃連 炒 地榆 龍骨 各一

當歸 炒 木香

右為末每服二錢不拘時以粥飲調下

內補丸 治冷熱氣不和腹痛下痢不止及通血氣

黃連 乾薑 當歸 阿膠 各三

黃連 乾薑 當歸 阿膠 各三

右為未煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每服三十丸不
拘時以粥飲下日再服一方以醋煮膠令消緩手熱
九又瘰癧下痢不止者服之甚驗忌生冷膩
加減當歸地榆散 治冷熱不調氣毒惡毒濕熱腸疔毒痢休
息當歸腥穢乾嘔不食肌熱小便澀

當歸 地榆 黃連 芍藥

甘草 御米殼 右咬咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓食前溫服日
進二服氣毒痢加黃連當歸一倍

和中散 治冷熱痢腹痛裏急
附子 黃連 香 右如患冷熱痢取黃連附子各半錢乳香一字以陳米飲
調下未止再服以青皮陽調下如患赤痢附子半錢黃

連末一錢乳香一字如患白痢黃連半錢附子末一錢乳
香一字米飲調下未止以黑豆七粒煎湯止之

楊子建萬全護命方 今有人患痢其脈微小者再尋之大沉
而濡此之一候若下白痢其勢雖重庶幾可治若是下血
切忌發熱通身發熱者死熱見七日死已上所陳雖未足
以達痢之淵源亦足以明其粗迹議者謂如子所言自甲
子至於癸亥每六十年中未嘗有一年不生痢疾今世人
所患痢疾於數年中間忽止有一年其故何也答曰六十
年中未嘗有一年無木土相攻未嘗無七火相鬱未嘗無
水火相犯但五運之政譬如操衡一年間五行氣數更相
承制得其平等則其疾自然不作若一氣太過一藏有
餘痢疾之生應不旋踵予故備陳其粗以開後學未信
庶幾診察之間無差悞之過若矣但毒痢傷人不一惟

邪犯心為重世入初患痢時先發寒熱投藥治之其熱不
退發熱大甚食則嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼藥
只思喫冷水忽思狂走渾身肌肉疼痛着手不得此候十
難治其三四也治疫毒痢方須是子細首尾讀此方論令
分明識病根源然後與藥但毒痢初得時先發寒熱忽頭
痛或吐熱忽轉數行便下赤痢忽赤白相雜忽止下白痢
忽先下白痢後變成赤痢忽先下赤痢後却變成白痢並
宜與此方但初下痢時先發寒熱頭痛即是寒邪犯心寒
氣犯心水火相戰故初病時先發寒熱水火相犯血變於
中所以多下赤痢如紫草水如菟萊水無色澤者寒邪犯
心之重也先發寒熱而所下之痢止白色者寒邪犯心之
未動也先下白痢而後有赤痢之變者寒邪犯心其勢漸
加也先下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸減也
赤白相等者水火相犯其氣相等寒濕之氣相持也忽有
赤多而白少忽有赤少而白多此寒邪之勢有多少毒痢
之病有重輕以白多為輕赤多為重治之之法先奪其寒
則其所下之藥一也以太歲分之則丙子丙午甲子甲午
庚子庚午年丙寅丙申年甲寅甲申年庚寅庚申并辰戌
之年運遇丙甲及庚運所臨其害尤甚及丑未之年宜有
此候又兼無問太歲蓋天地變化其候多端難可窮盡
此但世人亦不必撞定太歲但看一年中春夏之內多有
寒濕之化陽光少見忽寒熱二氣更相交爭忽於夏月多
寒濕之化寒邪犯心所受之痢先發寒熱忽頭痛忽先轉
數行後有赤痢忽赤白相雜忽止下痢並宜與此通神散
藥後取壯熱便退若兩三盞後壯熱不退更不與此方自
別有方論在下

蘇黃去根 官桂各三分 大芍 白木各二

藁本 獨活 桔梗 防風

芍藥 白芷各半 牡丹皮去心 甘草各一

細辛入沸 牽牛四絲

右為細末每服二錢味時熟湯調下和滓熱喫若喫兩三

蓋後寒熱不退更不請喫自別有方論在下

若喫此藥後寒熱已退赤痢已消減便脩合第二方第三

方藥喫取安効

若寒熱已退赤痢未消減更服兩三蓋然不可多喫一日

只兩蓋後赤痢消減忽變成白痢旋次脩合第二方喫候

出後度數減少便脩合第三方喫取平安但六甲之年六

庚之歲春夏之內時氣多寒人得前疾此藥通神若是六

甲之年丑未之歲濕化偏多人得痢疾先發寒熱即於方

內添草薺一兩同脩合也又不問大歲但一年間春夏

之內多寒人有痢疾先發寒熱並宜喫此方

治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤痢已消減宜進

此還真散若喫前方寒熱未退赤痢未消減更不宜進

此藥但天地變化其候非常痢疾證候多端此不得不盡

其子細

訶子五箇用麩裹火炮熟不要生亦不要焦去殼不

石搗羅為細末每服二錢七以米湯一盞半同煎煉取一

盞空心和平喫若吐出一兩口延更佳如此喫經數盞大

時漸安出後減少脩合第三方藥喫以牢固大腸若喫前

方藥壯熱未退血痢未減不可進此藥

治疫毒痢喫前面兩方藥病熱已減所下之痢上餘此小兒心下

清糞或如鴨糞忽如湯或如濁忽只餘些小紅氣

喫此方以牢固大腸還復真氣舶上硫黃九

舶上硫黃二兩去殼石 蒼朮仁二兩炒熟

右二末相和令勻滴熱水和為丸

尤空心以米湯下

治下赤痢身體並無增寒壯熱此名肝心雙滯宜服此方

黃連一及蜜浸一 木香三錢

右為細末每服二錢七食後濃煎陳米湯調下

建脾丸 脾胃弱洩下不禁飲食不消腸鳴汚痛

附子炮 蜀椒各一兩桂心 赤石脂

黃連 石斛 人參 茯苓

乾薑 大麥蘖 當歸 陳麩各二

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九酒下稍稍加

之日三服忌猪肉冷水生葱醋仍有鍾乳粉三兩

十寶湯 治冷痢如魚腦者三服見効甚疾

黃耆四兩 熟地黃酒浸 白茯苓 人參

當歸酒浸 白木 半夏

五味子 官桂各一 甘草半兩 白芍藥

右為麗末每服二錢水一盞生薑三片烏梅一箇煎至七

分食前溫服

外灸膏 治一切虛寒下痢赤白或時腹痛腸滑不禁心腹冷

極皆可用 木香 附子炮 蛇床子 吳茱萸

胡蘆 川烏各等

右為細末每藥末三錢用麩二錢用生薑自然汁調作糊

貼臍中上下以衣服物蓋定熨斗盛火熨之劑止為度

五神散 治大腸積冷下痢不止裏急後重腹痛

附子炮去烏梅去核各乾薑炮訶梨勒煨去

延胡索各一

右為鹿散和白麩裹煨慢火內燒令乾熟為度去麩焙乾搗羅為細末每服一錢空心食前用米飲調下

倉米湯 治小腸冷氣積聚結成冷痢日行三四十行

倉粳米半升用水香豉三升以水一斗

蘇白青細切羊脂煎

右先以羊脂煎蘇白令黃并米內豉汁中煎取四升平日

空腹溫服一升如人行十里久更進一升得快痢止若痢

不止更服如前利後進粳米豉粥若復作更服一劑永瘥

猪肝丸 治冷勞氣痢久不瘥

積猪肝一具去筋膜切作柳葉大蒜黃令熟

烏梅肉 桂心 黃連去屑厚朴去麩皮紫

乾薑炮陳皮湯浸去訶梨勒煨去當歸切焙各

右除猪肝蒜外搗羅為末將猪肝與蒜細研如麩糊入藥

末和勻搗數百下丸如梧桐子大每服三十九空心用熱

麩湯下日午再服

猪胆丸 瘥冷痢久不瘥方云此是脾氣不足暴冷入脾故舌

上生瘡飲食無味縱喫下還吐小腸雷鳴時時心悶皮乾

粟起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沉重日漸瘦劣或成氣塊

及婦人血氣不通逆飯憂煩行常無力四肢不舉丈夫瘥

瘥兩肋虛脹變為水氣服之皆効驗此法出於傳屍方

右用猪胆一具細切青蒿葉一合相和微炒以無灰酒一

大升火溫之乘熱內猪膽和蒿葉共一處再入桂心末一

兩於酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再

一服甚驗忌熱麩油膩等物

黃耆散 治熱痢下赤黃膿腹痛心煩

黃耆剉龍骨當歸各三生乾地黃二分

黃連去屑黃蘗各一黃芩犀角屑

地榆各半

石為細末每服二錢不拘時用粥飲調下

犀角散 治熱痢下赤黃膿血腹痛心煩困悶

犀角屑 黃連去屑地榆 黃耆各一

木香三分當歸半兩

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不拘時溫服

黃連丸 一名養羊角丸 治一切熱痢及休息痢日夜頻併兼

治下血黑如鷄肝色

黃連兩半羚羊角兩半黃蘗去粗皮赤茯苓去黑皮

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九薑蜜湯下

暑月下痢用之尤驗一方用白茯苓臘茶送下

生地黄湯 治熱痢不止

生地黄半兩地榆三分甘草炙

右咬咀如麻豆大用水二盞煎至一盞去滓分溫二服空

心日晚再服

醫金散 治一切熱毒痢下血不止

川鬱金 槐花炒各甘草炙

右為細末每服一二錢食前用豆豉湯調下

如聖湯 治下痢赤白甚重者

人參 當歸各一滴乳香一兩甘草炙

大北棗 烏梅各七罌粟殼一兩白芷各

縮砂仁 大丁香各二十生薑二兩黃芩各

右為末分三服水一盞半煎七分去滓服不用粟殼亦可

艾葉丸 治赤白痢血多痛不可忍

艾葉 炒

黃連 炒

木香 一兩 性肉荳蔻 炒

地榆 一兩

阿膠 炒

當歸 切 炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲下

治赤白痢 詩曰

三片生薑三箇棗

一箇烏梅三寸草

更加嬰粟與陳皮

赤白瀉痢一齊掃

秘傳斗門散 治八種毒痢

臟腑脹痛 膿血赤白或下瘀血

成片子或有五色痢

日夜頻併兼治禁口惡痢裏急後

重久渴不止全不進食 藥不能治者立見神効

黑豆 炒去皮

嬰粟殼 炒

甘草 炒

白芍藥 三兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分溫服

金鳳散 治男子婦人赤白痢疾

鳳眼草

粟殼 炒

母黑豆 炒

右為籠末加蜜一匙水二盞煎至一盞去滓空心溫服

此藥後仰臥忌冷水

安和飲子 治赤白痢不問老幼並治之

嬰粟殼

木香 炒

甘草 炒

地榆 炒

右為細末每服二錢米飲湯調下

變通丸 治赤白痢腹痛日夜無度膿血相雜裏急後重及

治腸風下血

吳茱萸

黃連

右各揀擇淨共酒浸透却擇出各自焙乾各自碾為細末

各自粟米飯丸如梧桐子大每服三十九如赤白痢相雜

各十五丸用甘草煎湯下紅痢甘草湯下黃連丸三十

九白痢乾薑湯下茱萸丸三十九一方為末米飲調下亦

當歸此方浙西河山純老以傳蘇船光云救十年救之無

數人多求方不敢輕授恐以其藥品之微而忽之翰光每

以救人甚効洪氏方亦有筒製湯使少異

誣白散 治赤白痢

右用誣白一握切搗如泥搗皮一兩好乳一升先以少乳

煎誣熟後下餘乳及搗皮末勻攪煎十餘沸空腹分兩服

之如啜黍不止更作之

治下痢赤白

右用老酸石榴皮微炙為末以粟米飯為丸如梧桐子大

空心服滑則加附子赤石脂一倍

神効散 治赤白痢新舊疾

右用鹽霜梅三箇用黃泥裹杖慢火內煨乾研為細末用

米湯調下

御愛丸 治茱萸氣虛風雅變於臟腑之間值腸胃虛弱精粕

不聚便利赤白或作膿血臍腹疼痛心胃痞滿裏急後重

煩滿渴逆脇助脹滿腹內虛鳴四肢倦乏不進飲食宜服

御米殼 炒

乾蒸餅 切

右為細末煉蜜為丸如鷄子大每服一粒用水一盞煎至

化為度不拘時熱服

鯽魚方 治赤白痢及治野鷄病

右用鯽魚作膾食之止暴下痢和蒜食之有少熱和薑蒜

食之有少冷溫二服

玉胞肚 治一切虛寒下痢赤白或時腹痛腸滑不禁心腹冷

極者可用

針砂 炒

白礬 半斤

官法 一升

右為末和勻作一包冷水調攤皮紙上貼臍上下以帛繫之如瘡大熱即以衣襯之藥乾再以水溫令潤其熱如初可用三四次

軟紅丸 消虛積治冷熱不調下痢赤白膿血相雜

乳香別研 大蠟別研 續隨子別研 粉霜別研 臍粉別研 黃丹別研 硃砂別研 已豆別研 黃蠟別研

右未共和勻用磁器內溶蠟成汁入麻油半茶脚許後入藥和丸如菽豆大每服二九乳香湯下小兒丸如黃米大每服一九乳香湯下食前服

千金散 治赤白痢日夜無度服之立瘥

人參五寸 紫蘇連梗 糯米各二 罌粟殼二十文 陳皮 良薑 燈心 甘草

黑豆 菽豆各五

右二豆搥破水一大椀同諸藥煎一盞半入熟蜜少許去滓通口服不拘時候禁口如腸潰者只兩服傳於臨訂學正類簡敬賴得於趙守兼善兼得之余丞相巨言

治赤白痢

石用訶梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦得若水痢加甘草末一錢七若微有膿血加二錢七若血多加三錢七昔劉禹錫傳信方云予曾苦赤白痢下諸藥服遍久不瘥轉為白痢令狐將軍傳此方服之効

治白帶痢腹臍微痛

肉苳蔻別研 草薢別研 枳殼去毛 縮砂仁 母丁香別研 木香 沉香別研 地榆二寸

墨燒如為

右為細末燒粟米飯為丸如櫻桃大每服二九食前用米飲化下

萬補丸 治脾胃久虛大腸積冷下痢白膿或腸滑不固久服諸藥不効服之神驗并產前產後皆可服立効

人生 當歸切焙 草薢切焙 乳香各五 白木 吹起石切研 縮砂仁 赤石脂 鍾乳粉 肉苳蔻別研 沉香 白薑炮 厚朴去皮 茵香 丁香 厚朴去皮 白茯苓各一 地榆 大麥蘖炒 神麩炒各 大附子去皮 肉苳蔻別研 罌粟殼切焙 罌粟殼切焙

右為細末研勻用木瓜十五个去穢蒸爛同藥末搗和得所丸如梧桐子六曬乾每服三十九食前用米飲下頗併者如至五七十九

伏龙肝一名艾葉丸 治赤痢腹痛四肢羸困 伏龙肝 艾葉炒 木香 地榆 阿膠炒 當歸切焙 黃連去黃 赤芍藥 黃芩去黑

六神湯 治赤痢腹痛或下純血 黃連去黃 車前子洗 地榆 山梔子仁 甘草炙 陳皮切 白

右為細末煉蜜為丸如梧桐子六每服三十九不拘時用溫粥飲下

石咳咀每服五牙以漿水一盞半煎八分去滓空心服 治赤痢下黃水或黃赤膿四流頰皮膚冷者

黃藥丸 治赤痢下黃水或黃赤膿四流頰皮膚冷者

黃連去毒 黃連去毒 熟艾半斤 黃芩去黑心
右為細末用白蜜三兩煉熟入蠟一兩鎔化入煎藥末和
搗先如梧桐子大每服三十九空心用米飲下日晚再服
一方作湯煎服

治赤白下痢久不止

右用黃連為末用鷄子清為丸如梧桐子大每服三十九
食前用米飲送下即差

蒲葶散 治血痢

蒲黃三台 乾地黄 桑耳 甘草

芒硝 茯苓 人參 栝實

阿膠 艾葉 生薑各二 禹餘糧

黃連各一 赤石脂五分

右以水一斗煮取四升分作五服

龍骨丸 治下血痢腹痛

龍骨 羚羊角 當歸

附子 乾薑 黃連各三 赤石脂

礬石各半 犀角 甘草 熟艾各十

右為末煉蜜和丸如小豆大先食前米飲下十五丸

苦根散 治血痢心神煩熱腹中痛不納食

苦根 地榆 生乾地黄 當歸微炒

犀角屑 黃芩各一 梔子仁半斤 黃連二斤
右咬咀每服四錢以水一中盞入豉五十粒薤白七寸煎

至六分去滓不拘時溫服

六妙湯 治下血或痢不止

烏梅一斤 甘草生用 丁香五十 桂心二寸
去

鑿栗殼一斤 縮砂仁四錢

右同拌勻作一服以水一盞半於銀石器內煎至七分已
銅鐵器去滓溫服洋用水二盞再煎至小半盞服

治男子病膿血惡痢痛不可忍積毒熱

昔有人忽見水浸甜瓜心酷喜之連皮食數枚膿血皆已
人言下痢無正形是何言也人止知痢是虛冷溫之燥之
洗之截之此外無術矣豈知風暑火溫燥寒六者皆為痢

此水甜瓜所以効也

楮皮丸 治下痢清血腹中刺痛

右用楮根白皮不以多少曬乾為細末酸漿麩糊為丸如
梧桐子大每服三四十九空心用米湯送下

栝實散 治男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如靛

色所謂蠱痢者治之殊效一方又能殺五臟蟲

右用側柏葉焙乾為末黃連亦為末二末同煎為汁服之

或用熱水調二錢服亦可

聚珍丸 治血痢酒痢尤妙

川百藥煎半斤 薄荷煎及 陳槐花半斤

感應丸一貼 麝香以許

右件為末拌勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九食前

服男子用龍牙草煎湯下女人用生地黃煎湯下

治腸風血痢

右用鯽魚鱗白礬燒灰為細末每服二錢食前米湯調下

赤石脂湯 治膿血痢裏急後重日夜頻併

赤石脂 白芷 天雄炮裂去 當歸切焙

龍骨各一 肉苁蓉去殼 黃連去毒 厚朴去殼

地榆 白木 官桂去粗 訶梨勒微取

木香各一 吳茱萸湯洗 黃芩去毒

右劉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑五片煎至八分
去津食前溫服
登寇八味散 治腸癰痢候或稀或稠便似膿每便極滑利
無常期

肉苳蔻各二丁香各二細辛 附子炮

乾薑各四黃耆 人參各五赤石脂各六

右搗篩為散以飲下之初服一方寸七日再稍稍加至二
三七忌生葱猪肉冷水

解毒金華散 治下痢膿血熱毒

黃連 黃蘗各一黃芩 赤茯苓

赤芍藥 白芍藥

右咬咀每服四錢水一盞煎七分去滓溫服無時如腹痛
加梔子二枚同煎

當歸四聖散 治一切下痢膿血頻併臍腹絞痛不可忍

當歸 切焙 芍藥各二 御米殼炒甘草炒一

茯苓半兩 黃耆無地論同用

右咬咀每服三錢水一盞半煎至六分去滓食前溫服

借氣散 一名神聖香膏散 治膿血痢久患脾泄瀉

黃連去麩 生薑細切

右二味同入銀石器內炒焦赤色去生薑取黃連為細末
每服二錢七食前陳米飲調下一方用臘茶清下甚者不
過二服差

魚鮮湯 治痢下五色膿血或如爛魚腸並無大便腸中攪痛
不可忍呻吟呼聲聞于外

粉霜研 輕粉 硃砂研 礞砂去灰

白丁香一乳香五 巴豆二七粒 油

右為末蒸棗肉為丸嬰兒三九如粟米大二三歲如麻粒
大四五歲每服三四丸並旋丸煎鮮湯吞下仍間服調胃
藥此證緣久積而成故小兒多有之

欬腸丸 治下痢膿血 木香一錢 地榆二錢 酸石榴皮二錢

嬰粟殼一兩半去

右件為細末煉蜜為丸如彈子大每服一粒陳米泔一盞
煎六分食前服

翅蘗丸 治下痢數年不止消穀下氣補虛羸

官桂去粗 附子炮 黃連去麩 當歸

陳麴炒黃 乾薑炮 麥蘗炒各 吳茱萸湯洗

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九加至四十

丸食前用米飲調送下一方用粟米糊為丸

御米湯 治久患痢疾或赤或白臍腹疝痛裏急後重發歇無
時日夜無度及下血不已全不飲食

嬰粟殼蜜炙 白茯苓去皮 甘草炙各 厚朴去皮薑

人參去芦 乾薑炒

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片大淮棗三枚烏梅
一箇煎至一盞去滓食前通口服如年老七十八十歲每
服貳大錢小兒每服錢半依前法煎更量兒歲加減腹痛
加木香亦多加赤豆十五粒

雲母散 治久痢經年不瘥 雲母粉 白茯苓去黑 附子炮製去皮

赤石脂 龍骨各半

右為細末每服二錢食前用溫酒或米飲調下亦治血痢

金星膳散 治久痢

金星膳 醋炙 白礬 鉛丹各半

右為細末每服二錢食前用米飲調下

蝮蛇膳方 治溫痢久不斷體瘦多昏坐則閉目食不下

右用蝮蛇膳大如豆二枚煮通草汁研磨以意多飲之

塗五心并下部

蕪蕪丸 治久痢不瘥有蟲并下部脫肛

蕪蕪 煨 黃連去積各半蛇膳半及

右為細末蜜煉和丸如梧桐子大每服三十丸食前用杏

仁湯下日再服

香栗散 治久新痢疾

香栗殼 二及 木香 地榆 陳皮

乾薑炮 甘草各半及

右件為粗末每服三錢水一盞半棗一枚煎至一盞去滓

食前溫服

五奇湯 治久患痢疾不問赤白並皆治之

訶子 二枚一投生用一投用麩 木香 一塊如

草豆蔻 二枚一投生用一投 甘草 一吋如指面

肉豆蔻 二枚一投生用一投 薑 一吋如指面

右件為細末每服二錢不拘時用米飲調下

烏梅湯 治久痢不瘥成腸疝

右用烏梅二十个搥碎用水一升煎四合去滓空心服未

愈日晚再煎服

麥蘖丸 治休息痢不能飲食及羸瘦

大麥蘖 附子炮裂去陳麩 官桂去皮

烏梅肉 白茯苓去皮 人參各一

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸棗肉飲

治休息痢羸瘦

黃連 半及 未定粉 半及 棗 二十枚

右春藥如泥鋪於紙上安二味藥暴之燒令通赤取出候

冷細研為末每服使好精羊肉半斤切作片子用散藥三

子搗藥在肉上使濕紙裹燒熟放冷食之不過三兩服効

縛虎丸 治休息痢經一二年不瘥羸瘦衰弱治腰痛脾寒

等候 砒成塊 黃蠟各半

右將黃蠟鑿開以柳條七箇逐箇撓頭焦即換俟用足取

起旋丸如梧桐子大每服一丸治痢冷水下脾寒亦然治

腰疼冷酒下食前服小兒丸如粟米大服一丸湯使同

治休息痢羸瘦宜服

杏仁 一及 湯浸去皮尖 獐猪肝 一及 切作片

右件將肝用水洗去血切作片於淨鍋內一重肝一重杏

仁入盡用童子小便二升入鍋中以物蓋慢火煎令小便

盡即熟放冷任意食之

又方 一名羊肝散 證治同前

縮砂 一及 肉豆蔻 半及

右為細末用羊肝半具細切拌藥以濕紙三五重裹上更

以麩裹用慢火燒令熟去麩并紙入軟飯搗和丸如梧桐

子大每服三十丸食前以粥飲下

枯薑根湯 治下痢冷熱相衝氣不和順本因下虛津液耗以

口乾咽燥常思飲水毒氣更增煩燥轉甚宜服此藥救之

枯薑根 白茯苓 甘草 半及 麥門冬 一及

太醫院經驗奇效良方大全 卷一三

三三三

右以咀每服五錢水一盞半棗二枚碎破煎至七分去滓不拘時服

陳倉米 治吐痢後大渴飲水不止

右用陳倉米二合水淘淨用水二盞煎至一盞去滓空心溫服晚食前再煎服

治痢後渴

右用糯米二合以水一盞半同煮研絞取汁空心頓服之

澤漆湯 治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血

澤漆微炒桑根白皮郁李仁湯浸去皮尖陳皮去白白朮炒杏仁湯浸去皮尖

人參半兩

右以咀每服五錢水二盞生薑三片煎取八分去滓溫服候半時反再服取下水數升或小便利為度

赤茯苓去黑皮白朮微炒功已 桑根白皮黃芩 射干 澤瀉各三澤漆葉

右以咀每服五錢先以水三盞煮大豆一合取二盞去滓內藥煎取一盞分為二服未瘥頻服兩料

治痢後肚腹瀉悶

陳皮去白青皮去白各二錢 蒼朮米泔浸焙右為末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒送下小兒服三五七九米湯下

豬肝丸 治痢後脾胃虛弱不思飲食四肢乏力

豬肝一大斤以鹽煮烏梅穉妙乾薑炮草薹冠去皮當歸微炒桂心半兩葶草一分訶梨勒裝用葶草各一肉苁蓉去殼厚朴去皮

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒送下小兒服三五七九米湯下

治痢後脾胃虛弱不思飲食四肢乏力

右為末用豬肝和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時以粥飲下

治禁口痢甚妙 一名石蓮散

右用石蓮肉不以多少剝去殼反將肉并心碾為細末每服二錢陳米飲調下便覺思食此疾蓋是毒氣上衝華蓋心氣不通所以不食服此藥後心氣通利當頓下而愈未愈自服前藥一方以日照東方壁土炒真橘皮為末

薑棗略煎佐之澹寒云痢疾不納飲食者俗謂之禁口今人多以四柱散理中湯參苓散加肉苁蓉木香或噉震靈丹等藥調之恐非其治當以脈證辨之如脾胃脈不弱問而知其頭疼心煩手足溫熱未嘗多服涼藥者此乃毒氣上衝心肺所以吐而不食宜用敗毒散每服四錢重入陳倉米一百粒薑三片棗一枚水一盞半同煎八分溫服若

其脈微弱或心腹脹膨手足厥冷病則不嘔因服藥果致烏梅澀劑或厥厥則太迫以致聞食先嘔此乃脾胃虛弱一方用乾山藥剉如小豆大一半銀鈔內炒一半生月同為細末飯飲調下

陳慶長知縣云頃守官南康其子年十許歲患禁口痢水漿不入數日惟能進藥同官有方書載一治法試用之一服而痢稍疎三服遂索粥飲頗食半盞許自是痢止而安此乃用山藥一味

全藥湯 治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐

人參 茯苓 甘草 前胡 川芎 羌活 獨活 桔梗 柴胡 枳殼 陳倉米各等

右以咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓不

治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐

人參 茯苓 甘草 前胡 川芎 羌活 獨活 桔梗 柴胡 枳殼 陳倉米各等

右以咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓不

治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐

人參 茯苓 甘草 前胡 川芎 羌活 獨活 桔梗 柴胡 枳殼 陳倉米各等

拘特熱服

參苓白朮散 治胃虛禁口

人參 茯苓 白朮 白扁豆去殼

山藥 蓮肉 砂仁 薏苡仁炒

桔梗 甘草炙

右為細末石葛蒲煎湯下宜食生韭菜

通神丸 治膿血雜痢後重疼痛日久不瘥

沒藥研 五靈脂去砂 乳香研 巴豆霜研

右同研勻滴水為丸如黃米文

湯下小兒服三九隨歲加減

芍藥黃芩湯 治痢痢腹痛或後重身熱久不愈脈洪疾者及

下痢膿血稠粘

芍藥 黃芩 甘草炙

右以咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服無時如

痛加桂少許煎服

三奇散 治痢後裏急後重

枳殼 黃耆 防風

右等分為末每服二錢安湯調下米飲亦得

治裏急後重

好蛤粉 川山甲炒

右等分為末每服一錢空心用好酒調服

大黃湯 治泄痢久不瘥膿血相雜稠粘裏急後重日夜無度

又不愈者

石用大黃一兩劉細以好酒二大盞浸半日許煎至一盞

半去大黃不用將酒分二服頓服之未利再服以劑為度

後服芍藥湯和之痢止再服黃芩芍藥湯以徹其毒也

白朮黃耆湯 服前藥痢疾雖除更宜服此和之

白朮 黃耆 甘草

右以咀分作三服用水煎服一方無黃耆用黃芩半兩

烏梅湯 療熱下痢方

烏梅炙 梔子炒 黃連 阿膠炙

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞溫服

治丈夫婦人小兒久痢成癖百方不瘥

黃連 麝香 丁香

右為細末每以一錢七用竹筒吹入下部小兒量度減之

不過三四上瘥一方食前以粥飲調下二錢

療五疳蒸下痢

青黛 丁香 黃連

右為細末用此散和為丸如梧桐子大口中有瘥含之若

下部有瘥以綿裹內下部日服六十九食前不飲下

治疳積蟲積下唇裏生瘡多腫面黧時腫下部瘡痛不止

鷄子取黃 好漆一合

右相和令勻空腹仰頭頓服令盡當吐出蟲即愈

導氣湯 治下痢膿血日夜無度裏急後重

木香 檳榔 黃連 大黃

黃芩 枳殼 芍藥 當歸

右以咀作二服用水二盞煎一盞去滓食前溫服

白朮聖散子 治一切瀉痢久不瘥并婦人產後痢

當歸 肉苁蓉 砂仁 石榴皮

訶子肉 乾薑炮 陳皮 甘草

白朮 芍藥

右各等分咬咀每服五錢水二盞入乳香一豆許煎至一盞去滓食前溫服

立効丸 治痢

木香

當歸 酒浸

檉斗子 各一兩

青蒿子 各一兩

烏梅 焙乾

黃連 酒炒

五倍子 各二兩

枳殼 去穢一兩

右為細末用神麴糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心

用米湯送下日二三服先須服丁香辟穢丸次服立効丸

木香黃連丸 治下痢膿血裏急後重神効

木香

黃連

川木通

川黃蘗

枳殼 炒

陳皮 各二兩

大黃 三錢

右咬咀分作二貼用水二盞煎至一盞去滓食前溫服

玄青丸 治下痢勢惡窘痛膿血頻併或久不愈宜下之

黃連

黃蘗

大黃

甘遂

大戟

芫花 醋炒各五錢

輕粉 二錢

青黛 一兩

牽牛 二兩

右為細末滴水為丸如豆大初服十九每加十九空心午

前臨卧三服以利為度

奇効良方卷之十四

泄瀉門 附論

素問云春傷於風夏必飧泄邪氣留連乃為洞泄和云濕多成五泄腸走若雷奔此因氣血虛弱肌膚不密邪氣薄於腸胃因虛襲之遂成此證但泄瀉人為一證耳豈知泄者泄瀉之義時時澹泄或作或愈瀉者一時水去如注泄名有五有胃泄脾泄大腸泄小腸泄有大腹泄胃泄者飲食不化色黃脾泄者腹脹滿泄注食即嘔吐逆大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛小腸泄者澀而便膿血小腹痛大腹泄者裏急後重數至固而不能便莖中痛又有飧泄腎泄洞泄濡泄胃寒腸熱泄驚瀉之分且飧泄者始春之時風木盛行脾土受風木之邪夏以伏陰在內或當風取涼過食生冷復傷脾胃不能消化飲食水穀完出而脈弦細名為飧泄腎泄者由腎虛每於五更時澹泄一

二次而連月經年弗止水泄者謂臟腑虛寒四肢厥冷暴瀉洞下洞泄者手足厥冷心腹疼痛轉筋驚瀉者少腹生寒則為此證蓋陰中之至陰脾也脾胃虛弱為風寒所勝則陰氣太盛陰盛則臟寒臟寒則糟粕不化大便黑狀似鷄瀉大腸有寒證亦如之又云濁寒之氣在上清熱之氣在下則脹滿而泄也且大腸為傳送之官胃為水穀之海其精英則流布以養五臟其糟粕則傳送以歸大腸且如傷食一證因夫肌傷飽胃不能消則脹滿所下酸臭可驗此證當疎利消道前證諸瀉以脈論之大抵泄瀉非特在脾胃經亦有當以各類推之治法以分利為先實脾土益元氣用藥無不効矣

泄瀉通治方

理中湯 治腸胃虛弱瀉瀉有聲泄瀉瀉併

人參

白朮

乾薑

甘草

各半

加茯苓 厚朴 <small>薑製各</small>	右作一服水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾不拘時服	調中湯 治腸虛泄瀉止嘔進食	藿香 縮砂 蓬朮 <small>炮</small> 乾薑 <small>炮</small>	肉桂 茴香 <small>炒</small> 草菓 <small>各一</small> 麥芽 <small>炒</small>	益智仁 橘紅 蒼朮 神麴 <small>炒</small>	桔梗 甘草 <small>炙各</small>	右作一服水二鍾生薑三片紅棗二箇鹽少許煎至一鍾不拘時服	肉豆蔻散 治脾虛腸鳴泄瀉不食	肉豆蔻 <small>每枚每一枚刺一發納乳香一</small>	右碾為細末分作二服不拘時用米飲湯調下	平胃散 治傷濕泄瀉	蒼朮 <small>三錢</small> 厚朴 <small>薑製</small> 橘紅 <small>各二</small> 甘草 <small>炙一</small>	右作一服水二鍾生薑三片紅棗二箇煎一鍾不拘時服	六和湯 治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉或致泄瀉寒熱交併小便赤澀	方見暑門	加味五苓散 治伏暑發熱及胃實泄瀉或煩渴小便不利	赤茯苓 <small>去皮</small> 木猪苓 <small>去皮澤瀉</small> 白朮 <small>各二</small>	車前子 肉桂 <small>各一</small>	右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服	厚朴丸 治泄瀉不止	白龍骨 乾薑 <small>炮</small> 附子 <small>炮去</small> 厚朴 <small>薑製</small>	訶子 <small>去</small> 肉豆蔻 <small>炮</small> 陳皮 <small>各一</small>	右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心
------------------------------	------------------------	------------------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------	--------------	--	------------------------	----------------------------------	------	----------------------------	--	-----------------------------	---------------------	--------------	--	---	------------------------

用米飲送下	補脾丸 治滑泄不禁	肉豆蔻 <small>炮</small> 川厚朴 <small>薑製</small> 川白薑 <small>炮</small> 赤石脂	白朮 <small>各一</small> 神麴 <small>炒</small> 麥蘖 <small>炒</small> 附子 <small>炮去</small>	葷撥 <small>各五</small>	右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用米飲送下	大藿香散 治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛如泄瀉不已最能取効	藿香 <small>一兩</small> 陳皮 厚朴 <small>薑製</small> 青皮 <small>炒</small>	木香 人參 肉豆蔻 <small>炮</small> 良薑 <small>炒</small>	麥蘖 <small>炒</small> 神麴 <small>炒</small> 訶子 <small>去</small> 白芷 <small>去皮</small>	甘草 <small>半兩</small> 白乾薑 <small>炮三</small>	右為細末每服三錢空心用生薑湯調服如水瀉滑泄腸風臟毒米飲湯調下赤白痢甘草黑豆湯調下脾胃虛冷宿滯酒食痰氣作暈入鹽少許生薑紅棗湯調服胃氣吃噫生薑自然汁一呷入鹽少許調服此藥大能消食順氣利隔開胃	四神丸 治脾泄腎泄	肉豆蔻 <small>二兩</small> 破故紙 <small>炒四</small> 木香 <small>不見</small> 茴香 <small>炒各</small>	右為細末生薑煮棗肉為丸如梧桐子大每服八九十九空心用鹽湯送下一方去木香茴香用神麴麥蘖各炒一兩為丸	三附丸 治腸胃虛弱內受風寒水穀不化泄瀉注下	肉豆蔻 <small>炮</small> 附子 <small>炮去</small> 白茯苓 <small>去皮各</small> 木香 <small>不見</small>	乾薑 <small>炮</small> 肉桂 <small>各二</small> 丁香 <small>一兩</small>
-------	--------------	--	--	----------------------	----------------------------	----------------------------------	---	---	---	---	--	--------------	--	---	--------------------------	--	---

右為細末生薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服五七十丸或至一百丸用生薑湯送下粥飲亦可

肉苳菟散 治脾胃虛弱腸脹痛水穀不消臍滑泄

甘草 芍香 肉桂 訶子皮 蒼朮 米泔浸 蒼朮 炒四兩

右為細末每服二錢用生薑煎湯不拘時調服

金鎖正元丹 治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷之證並皆治之

五倍子 茯苓 去皮各 龍骨 煨 珠砂 另研各 肉苳菟 洗焙 紫巴戟 去心 葫蘆巴 炒各 補骨脂 酒浸炒

右為細末和勻酒煮糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空心用溫盜酒送下

豈附丸 治臟腑久虛下寒泄瀉不止腸滑不禁日夜無度全不進食一切虛寒泄瀉因之

肉苳菟 煨 附子 炮去 訶子 煨 良薑 炒 乾薑 炮 赤石脂 煨 陽起石 煨 白礬 枯

龍骨 二兩 生用 白茯苓 去皮 桂心 不見 細辛 先各一 右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服七十九空心用米飲送下

燒胃丸 治脾胃虛冷疼痛泄瀉

乾薑 厚朴 二味 同 附子 炮去 茯苓 去皮 陳皮 桂心 不見 訶子 皮 甘草 等分

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服三十九食前用米飲送下

訶黎勒丸 治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化

訶黎勒丸 青皮 陳皮 龍骨 生用 白茯苓 去皮 細辛 洗 吳茱萸 桂心 不見

右為細末生薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服八九十丸空心用米湯送下

九寶散 分利水穀止泄瀉

壘粟 煨 赤茯苓 去皮 陳皮 木通 各二 黃耆 煨 厚朴 薑製 青皮 各一 車前子 微炒

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

實腸散 治泄瀉不止

蒼朮 二兩 訶子 煨 肉苳菟 陳皮 煨 茯苓 煨 木香 甘草 半各

右作一服水二鍾生薑五片紅棗三箇煎一鍾不拘時服

升陽除濕湯 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃色四肢沉困

蒼朮 二兩 生用 半夏 湯洗 益智 羌活 防風 去蘆 神麩 柴胡 去苗 升麻 各一 猪苓 陳皮 各六 麥蘖 炒 甘草 四分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前服

益胃湯 治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠墮燥熱短氣口乾不知味腸鳴大便微澹黃色身體昏悶並皆治之

蒼朮 二兩 當歸 稍 陳皮 各 升麻 一兩 益智 白朮 人參 柴胡 黃芩 各 半夏 黃芩 各 升麻 一兩 柴胡 黃芩 各

黃芩 各 半夏 黃芩 各 升麻 一兩 柴胡 黃芩 各

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓食前通口服
白木芍藥湯 治大陰脾經受濕水泄注下體重微滿困弱無
力不欲飲食暴泄無數水穀不化宜服此藥

白木 芍藥各五 甘草各二
右作一服水二鍾煎至一鍾食前服
升陽湯 治一日大便三四次澹而不多有時澀瀉腹中鳴小
便黃

黃耆三斤 甘草二斤 橘皮一斤 升麻七分
柴胡 當歸身 益智各五 紅花少許
右作一服水二鍾煎至一鍾食前溫服

止瀉秘方
人參去蘆 白朮 乾薑炮 訶子去核
茯苓去皮 木香 藿香去上 甘草炙

肉苳蔻 藥性論云 治一切
右作一服水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服
飲腸丸 治久瀉

木香 丁香 附子炮去 縮砂仁
訶子皮 罌粟殼去殼 川薑炮 沒石子
白龍骨 肉苳蔻炮 赤石脂煨 梓州厚朴薑製

禹餘糧醋洗七次
右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服七十九食前用米
飲湯送下

訶子四粒散 治臟腑虛怯元氣弱脾胃不決不進飲食時加
泔利晝夜不息

附子炮去 白茯苓 去皮 人參去蘆 木香
訶子 皮各半兩

右件咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六分
食前服一方加肉苳蔻一方有白木真陽耗散兩耳常鳴
臍腹冷痛頭旋目暈四肢怠倦脾胃不和晝夜洩痢小便
滑數並宜服之

畢撥丸 治清泄甚妙
附子炮去 草撥 川薑炮 丁香不見
吳茱萸炒 良薑 胡椒各一 山茱萸

草苳蔻 半兩
右為細末棗肉為丸如梧桐子大每服五十九食前陳米
飲下日三服廬州知錄周汝功嘉禾人乃尊守永嘉時每
苦滑泄服此藥果有效此方黃發運問有序多不復錄上
二方亦周糾所傳也

縮砂丸 治大便泄瀉米穀不化腹中疼痛不思飲食
縮砂仁 黃連去蘆 附子炮去 吳茱萸湯洗七
訶子皮 肉苳蔻各二 乾薑炮 木香各半

右為細末水煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九食
前用米飲送下

羊肉扶羸丸 治脾胃不和進飲食臟腑虛滑老人虛人皆
可服之

肉苳蔻 白薑炮 川椒去目并合口
木香一分 神麩炒 附子炮去皮

精羊肉 焙乾取末四兩
右為細末煮粟米飯為丸如梧桐子大每服五十九食前
用米飲送下

麩木丸 治時暑暴瀉壯脾溫胃進美飲食及療飲食所傷留
膈痞悶等疾服此取効

神麴炒 蒼木米泔浸二宿焙
右為細末水煮麴糊為丸如梧桐子大每服三十九不拘
時用米飲送下

百粒丸 治遠近泄瀉大腸滑神効

紅椒 胡椒 附子炮 丁香
乾薑炮 麥蘖各等分

右為細末酸醋煮大蒜為丸如梧桐子大每服百粒食前
用米飲送下

治脾泄多年老人腎虛謂之水土同化

右用吳茱萸炒淨不以多少白米煮去滓盡內入益少許
通口服蓋吳茱萸能暖腸脫水道既清大腸自固餘藥雖
熱不能分解清濁也

神麴 治脾胃中風濕脹滑泄不止

神麴 芍藥 白木 附子炮去皮

右為細末麴糊為丸如梧桐子大每服三十五粒空心用
米飲送下左氏述楚子園蕭將漬無社告甲叔辰曰有
麥麴乎有山麴乎鞠窮芍藥也意欲令迷水中以避禍是
知芍藥能除濕予常加木附以製方治脾濕而泄者萬無
不中此藥亦治飧泄素問曰春傷於風夏必飧泄飧泄者
食谷不化蓋春木旺時肝生風邪滯於脾經至夏飲冷當
風故多飧泄此藥尤宜

棗肉丸 治脾腎虛寒或腸鳴泄瀉腹脹或胃膈不快食
不消化宜服

破故紙四兩 木香一兩 肉苳蔻二兩 麴裹
右為細末燈心煮棗肉為丸如梧桐子大每服七十九空
心用生薑湯送下

香茸丸 治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但再飲一二盞泄
作幾年矣

神授丸 治臟腑滑瀉
南木香二兩 肉苳蔻一兩 麴
右為細末煮棗肉為丸如梧桐子大每服三十九不拘
時用陳米飲下

右用雞爪黃連不以多少碾為細末用大蒜煨熟去皮研
和丸如梧桐子大每服三十九或五十九米飲下

神授丸 治臟腑滑瀉

右為細末用白陳米飯為丸如梧桐子大每服五十九空
心用米飲下熱者服酒蒸黃連丸

治腸腑泄瀉

右用大附子一筒炮去皮臍以韭菜根研爛絞取汁和丸
如梧桐子大曬乾每服三十九米飲湯下不乾恐麻人一
方治一切冷瀉出後頗併面無顏色不思飲食并為未以
一錢煮粥一椀空心服

胃氣散 治傷暑泄瀉煩渴引飲所下如水

右用平胃散五苓散各二錢用水一盞棗二枚生薑三片
同煎至七分嚼薑棗和滓熱服少刻又服辰砂五苓散亦
可用來復丹亦可或寒濕水泄正胃散理中湯蘇梅米湯
下一方入鹽煎

棗附丸 治臟腑寒滑泄

右用端正大附子一箇乾棗半斤同於銀石器中用水於
慢火煮上留水二指許水乾旋添湯煮兩三時取出切作
半箇再煮候至晚棗爛壞將附子溫水洗刮去皮臍切作

薄片焙乾搗為末別煮棗肉和丸如梧桐子大每服三四
十九空心用米飲下患滑泄者服之皆愈

治夏月脾胃傷冷滑腸泄瀉肚痛及治霍亂吐瀉不止

右用胡椒末不以多少研爛搜和手心內揉勻丸如梧
桐子大每服四十九食前用陳米飲吞下

實腸丸 治腸胃虛弱腹脹泄瀉時上刺痛

黃連淨一兩 肉苳薤菜 乾薑炮 白茯苓去皮
當歸洗焙 訶子煨去 丁香各半 木香一分

治瀉久不効者老入尤宜改一名護命方

右用大附子一箇炮去皮臍以韭菜根研爛絞取汁和丸
如梧桐子大曬乾每服三十九米飲湯下不乾恐麻入一
方治一切冷瀉出後頓併面無顏色不思飲食并為末以
一錢煮粥一椀空心服

胃苓散 治傷暑泄瀉煩渴引飲所下如水

右用平胃散五苓散各二錢用水一盞棗二枚生薑三片
同煎至七分將薑棗和滓曬服少刻又服辰砂五苓散亦
可用來復丹亦可或寒濕水泄正胃散理中湯蘇梅米湯
下一方入鹽煎

棗附丸 治臟腑寒滑泄

右用端正大附子一箇乾棗半斤同於銀石器中用水於
慢火煮上留水二指許水乾旋添湯煮兩三時取出切作
半箇再煮候至晚棗爛壞將附子溫水洗剝去皮臍切作
薄片焙乾搗為末別煮棗肉和丸如梧桐子大每服三四
十九空心用米飲下患滑泄者服之皆愈

治夏月脾胃傷冷滑腸泄瀉肚痛及治霍亂吐瀉不止

右用胡椒末不以多少研爛搜和手心內揉勻丸如梧

桐子大每服四十九食前用陳米飲吞下

實腸丸 治腸胃虛弱腹脹泄瀉時時刺痛

黃連淨一兩 肉苳薤菜 乾薑炮 白茯苓去皮
當歸洗焙 訶子煨去 丁香各半 木香一分

右為細末用猪膽汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服五十
九空心用米飲下

養臟丸 治腸胃虛寒泄瀉無度不進飲食

生硫黃四兩 附子炮去 鹿角霜 肉苳薤菜 煨山藥三
右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服三十九漸加至五
十九用溫米飲下空心食前服

黃連去蘗 阿膠成粉 當歸洗 人參去蘗
龍骨煨 赤石脂 乾薑炮 白茯苓去皮
烏梅肉 煨乾陳皮去白 訶子去核 肉苳薤菜
罌粟殼蜜炙 木香一

右為細末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九食前
米飲送下如腹痛當歸煎湯下下血地榆煎湯下

煨肝散 治臟腑久虛挾寒滑泄全不入食口生白瘡

川椒去目炒 茴香炒 砂仁 肉苳薤菜
丁香 木香各半 附子炮去 鹿角去
白木四兩 醋煮十數沸 煨乾

右為細末每用二錢用猪肝或羊肝二兩切作片子批
開棗藥末在內更用好紙三兩重裹於慢火煨候肝熟取

開棗藥末在內更用好紙三兩重裹於慢火煨候肝熟取

開棗藥末在內更用好紙三兩重裹於慢火煨候肝熟取

開棗藥末在內更用好紙三兩重裹於慢火煨候肝熟取

開棗藥末在內更用好紙三兩重裹於慢火煨候肝熟取

開棗藥末在內更用好紙三兩重裹於慢火煨候肝熟取

開棗藥末在內更用好紙三兩重裹於慢火煨候肝熟取

開棗藥末在內更用好紙三兩重裹於慢火煨候肝熟取

出細嚼用溫酒送下不拘時候

瘵二下種雜下 江夏太守用此法瘵盡愈

黃連 黃蘗 熟艾 附子炮

甘草 烏梅 乾薑 二兩

右七物搗下蜜丸如大豆服十九漸至二十九日三忌肥

肉生冷一方無甘草附子黃蘗一方除甘草附子

木香 訶子皮 白芍藥 當歸 炒

人參 白茯苓 去皮 白木 甘草 兩半

御米殼 二兩 去殼 炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服七十九用生白薑

絲蓋各少許拌勻用絛累水濕文武火煨熟却用生薑煮

粥送下食前日進二服

猪臍丸 治元臟久冷滑泄不止飲食不進漸至危困

研黃 二兩 猪臍 一兩 淨洗入研末內以泉

候乾為末取出入後藥吳茱萸炒厚木薑汁炒

右為末先研臍令細次入藥末一處同研勻丸如梧桐子

大每服十九空心鹽酒益湯下

癸卯歲冬十月小雪薄冰天冷應時白樞判家一老僕而塵脫

色神氣衰弱病脫肛日久服藥未驗近日復下赤白膿瀉

作裏急後重白多赤少不任其苦先師料曰此非肉食膏

梁必多蔬食或飲食不節天氣應時衣蓋尤薄寒氣形體

乃寒滑氣泄不固故形質下脫也當以瀉去其脫而除其

滑微酸之氣固氣上收去其下脫以大熱之劑陰寒補陽

以補氣之藥升陽益氣是於對其證

訶子皮散 治腸胃虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛或作

膿血日夜無度

訶子 七分 乾薑 六分 粟殼 去殼 炒 橘皮 各半

本草十劑云澁可去脫以粟殼之酸微澁上收固氣去脫

主用為君也以訶子皮之微酸上收固血治其形脫橘皮

微苦溫益真氣升陽為之使以乾薑大辛熱之劑除寒為

臣

右為細末分作二服水二盞煎至一盞和滓熱服空心再

服全愈

治又患脾泄瀉臍虛滑不進飲食

右用青州大棗擘破去核以木香如棗枝大置棗中十數

枚以水一盞煮候棗軟熟食前溫啣契就以煮棗湯送下

甚者不過一二劑

龍骨散 治水瀉腹痛不納飲食

龍骨 當歸 炒 肉豆蔻 煨 木香 各

厚朴 二兩 去殼 炒

右為細末每服二錢食前用粥飲調下

代赭丸 治水瀉腸鳴臍腹脹痛

代赭石 乾薑 炮 龍骨 兩 附子 炮 去皮

右為細末研軟飯和丸如梧桐子大每服三十九空心用

米飲湯送下日午再服

如聖丸 治水瀉并赤白痢

菘豆 烏頭 炮 正 大 者 炮 裂

右為細末新水和丸如菘豆大以丹砂為衣每服五九不

拘時服白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾薑甘草

湯下水瀉新汲水下小兒服一二丸

梅棗湯 治水瀉不止

烏梅 十個 棗子 十個 罌粟殼 一個 去

右到粗末每服二錢水一盞煎七分去滓不拘時溫服
紅豆九 治臟腑泄瀉名為殮泄

紅豆 糖求 蓬木根

欒金 陳皮 去白 青皮 去穢 甘草 各三

神麴 麥蘖 半夏 湯洗 砂仁 各半

良薑 蘇合 丁香 半兩 硃砂 醋化

右為細末水浸麴粉為丸如梧桐子大每服一百丸用米
飲或隨物空心送下病甚者日進三服

高良薑湯 治腸胃受風久為殮泄下痢嘔逆腹內疝痛

高良薑 木香 檳榔 赤茯苓 去皮

人參 各三 肉苁蓉 去穢 吳茱萸 湯洗 陳皮 湯洗 去

縮砂 湯洗 乾薑 一分

右以咀每服四錢水一盞半煎至八分不拘時日三服

乾薑丸 治腸胃風冷殮泄注下腹痛不止

乾薑 炮 厚朴 湯洗 當歸 切 各 阿膠 炙 條

龍骨 略一

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心用棗
湯下日午再服

木香散

內經曰清氣在下則生殮泄又曰久風入中則為腸風殮

泄夫脾胃土也其氣中和以化為事今清氣下降不升則

風邪久而干胃是木賊土也故中和之氣不能化而令物

完出謂之殮泄或飲食太過腸胃兩傷亦致米穀不化此

俗呼水穀痢也法當下舉之而消之加以減木香散注

木香 枳殼 枳實 檳榔

人參 湯洗 肉苁蓉 湯洗 吳茱萸 湯洗 陳皮

砂仁 乾薑 神麴

右為細末每服四錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫服

聖中丸 治脾胃受濕滯泄注下

黃連 去穢 黃蘗 赤茯苓 白木

澤瀉 各一 陳皮 人參 肉苁蓉

白芍藥 半夏 麴 官桂 各半

右為細末水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五七十九食
前用溫米飲送下

肉苁蓉散 治腸胃受濕滯泄不止兼治暴水瀉

肉苁蓉 湯洗 訶梨勒 湯洗 黃連 湯洗 甘草 炙

赤茯苓 去皮 乾薑 炮 白木 各半 厚朴 湯洗 去皮 湯

右為細末每服二錢空心米飲調下日三
當歸散 治腸胃寒濕滯瀉腹內疝刺疼痛

當歸 湯洗 乾薑 炮 肉苁蓉 湯洗 木香 各半

訶梨勒 湯洗 黃連 湯洗 各三分

右為細末每服三錢用甘草生薑各一分黑豆一合並半
生半炒用水四盞煎取二盞作二次空心日午調服

炙肝散 治飲食生冷內受風寒泄瀉無度

川椒 薑 炮 大附子 炮 縮砂仁 湯洗 肉苁蓉 二角

小茴香 湯洗 小川椒 四兩

右為細末用白羊肝二三兩或豬羊肝或豬羊腰子批開
放其末三四錢在內益一錢葱白二錢同肝內一處用濕

紙裹燒香熟空心食前細嚼用生薑湯或米湯或酒送下

白苳蔻湯 治腸胃受濕滯瀉無度腹脹飲食不化

白苳蔻 湯洗 訶梨勒 湯洗 陳皮 湯洗 去穢 乾薑 湯洗 各半

厚朴 湯洗 去穢 乾薑 湯洗 各半

右咬咀每服五錢切薑白三寸水一盞煎至七分去滓
空心溫服日午再服

單撥丸 治腸胃久寒大便難

單撥 附子炮裂去厚朴去粗皮肉苳蔻

乾薑炮各 訶黎勒皮 縮砂仁 龍骨各半

右為細末用麩糊和丸如梧桐子大每服二十九食前用

米飲送下日再

龍骨黃連湯 治大便滑泄色如鷲溲

龍骨 黃連三分 當歸切焙 乾薑炮

甘草各

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓食前溫服日再

橘皮散 治脾胃虛寒洞泄不止腸內雷鳴氣脹膨滿冷氣

陳皮炮白 白木炒各 訶黎勒炮 乾薑炮

枳殼去穢 官桂去粗皮 木香炮 甘草炙

人參略一 檳榔炮一 草苳蔻炮五半夏湯洗七次

厚朴去粗皮生薑 厚朴去粗皮生薑

右為細末每服二錢食前煎生薑棗湯調下

木香訶黎勒丸 治洞泄大腸切痛腸鳴食不化

木香半生 白木 高良薑炒 肉苳蔻去殼各

訶黎勒炮 厚朴去粗皮生薑 無莢炒各一 附子炮裂去

厚朴去粗皮生薑 甘草炙 乾薑炮

右為細末用陳麩末煮糊為丸如梧桐子大每服二十九

食前煨生薑湯送下

茱萸斷下丸 治臟腑寒腹痛泄瀉不止甚効

吳茱萸半兩赤石脂 川薑各半 艾葉炒

縮砂仁 肉苳蔻 附子炮去粗皮

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服五七十九食前用
米飲送下趙從簡通判甲辰年丁母憂食素之久苦瀉不
止日七八行首尾歲年每服他藥不過一二日後作得此
方而愈後數年間遇瀉服之又効

茱萸附子散 治脾胃久寒大腸虛滑洞泄

肉苳蔻炮 附子去粗皮 縮砂仁 木香半分

右為細末每服一錢食前用米飲調下

固腸散 治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水救不分冷熱不
調下瀉膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛數頻并心
腹脹滿食減乏力並宜服

陳米炒二 木香不見火 肉苳蔻生用 粟殼去蒂各二兩

乾薑炮 甘草各二

右為細末每服二錢酒一盞生薑二片棗一枚煎至七分

不拘時溫服如不飲酒水煎亦得忌酒麩魚腥等物

如味三建湯 治洞泄不止

大川烏 綿附 大椎三味並炮薑

木香 肉苳蔻炮 訶子肉去殼各

右對散每服三錢水一盞生薑十片紅棗二枚鹽梅一箇

陳米一撮煎六分空心熱服

白茯苓 蒼朮 厚朴略二 陳皮七錢

甘草半斤 訶子 附子 川烏各一

生薑半斤 棗子五七 大蒜十枚

右為細末用神麩糊為丸如梧桐子大每服百十九空心

用米飲湯任下

奇効良方卷之十四終

奇效良方卷之十五

氣門 附論

陰陽應象論云喜傷氣怒傷形暴怒傷陰暴喜傷陽厥氣上行滿脉去形喜怒不節寒暑過度生乃不固故重陰必陽重陽必陰玉機真藏論云憂喜悲怒怒怒怒不得以其次故令人有大病矣因而喜大虛則腎氣乘矣憂則心氣乘矣怒則肝氣乘矣悲則肺氣乘矣恐則脾氣乘矣丹溪云夫氣周流一身以為生者氣也陽往則陰來陰往則陽來一升一降無有窮已苟內不動於七情外不感於六淫其為氣也何病之有世言冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降蓋蒸清道甚而至於上焦不納中焦不化下焦不滲展轉變為嘔吐為膈為噎為痰為飲為胃為吞酸或痞或痛為脹滿或嘈雜或噎噎氣或不思食諸證互見後人不明經旨以脉訣熟則生

風冷生氣寒主收引令於氣上衝氣逆氣喘矣非冷而何原病或曰諸氣皆衝上嘔噎溢食不下皆屬於火諸病吐嘔酸皆屬於熱諸積飲痞膈中滿皆屬於濕然則諸氣諸飲諸嘔吐翻胃若酸等病豈有寒乎曰五臟各有火五志激之其火隨起若諸寒為病必須身犯寒氣口食寒物乃為病寒非若諸火病有內邪所以氣之病寒者十無一二舉痛論云有病生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收是則氣泄驚則氣亂勞則氣耗恐則氣結九氣之不同也然諸氣動作皆為熱也乎和云夫天地之氣常則安變則疾况人稟天地之氣五臟迭侵於外七情交戰於中是以前人借氣如待至空甯人投物而反傷大和此軒岐所以論諸痛皆由於氣有病皆生於氣隨有九氣不同之說氣本一也因所觸而為九怒喜悲恐寒暑驚恐勞也其言曰怒則氣逆其則嘔血及衄也氣逆上矣王

大僕曰怒則陽氣逆上而肝木乘脾故其則嘔吐及衄也喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心氣急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却上則上焦閉則氣逆則下焦脹故氣不行矣又曰恐則傷精却上而不下流下焦陰氣亦回還而不散故聚而脹也然上焦固禁下焦氣聚故氣下行也寒則腠理閉氣不行故氣收矣又曰身涼則衛氣沉故皮膚之理及參世之慶皆閉密而氣不流行衛氣收斂于中而不散矣則腠理開榮衛通汗大出故氣泄矣又曰入在陽則舒在陰則慘故熱則膚腠開發榮衛大通津液而汗大出驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣又曰疲勞後則氣奔速故喘息氣奔速則陽外發故汗出內外皆踰越於常紀故氣耗損也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣又曰繫心不散故氣亦停

留此素問之論九氣其變甚詳其理甚明然論九氣所感之疾則略惟論嘔吐及衄泄餘皆不言惟靈樞論思慮悲哀憂怒憂盛怒恐懼而言其病曰思慮而傷神傷神則恐懼自失破肌脫肉毛瘁色天死于冬脾憂愁而不解則傷意傷則恍惚四肢不舉毛瘁色天死于春肝悲哀動中則傷魂傷則狂忘不靜不正陰筋而牽兩脇不舉毛瘁死于秋肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人毛瘁焦毛瘁色天死于夏心盛怒而不止則傷志志傷則善忘其前腰脊不可俯仰身毛瘁色天死于季夏脾恐懼不解則傷精傷則憂鬱精神自下是故五臟主藏精者也不可傷也則失守而陰虛也則無氣無氣則死矣又曰神意魂魄志精所主之病然無寒暑驚勞四證余以是推廣之怒氣所至為嘔血為衄泄為煎厥為薄厥為陽厥為胃滿脇痛食則氣逆而不下為瘧為煩心為消痺為肥氣為目

暴盲為耳暴閉筋縱發於外為疝癰毒氣所至為笑不休為毛
 華焦為肉病為陽氣不收其則為狂悲氣所至為陰縮為筋攣
 為肌痺為脈痿男為數洩血女為血崩為酸鼻平頰為目昏為
 少氣不能報息為泣則腎脈恐氣所至為破爛脫肉為骨痿痠
 厥為暴下尿水為面熱肅急為陰痿為懼而脫頰驚氣所至為
 潮涎為口吐為癡癩為不省人為僵仆又則為癱痺勞氣所至
 為咽噎病為喘促為欬血為腰痛骨痿為肺喘為高骨塚為陰
 痿為嘔血為冥視為耳閉男為少精女為不月衰甚則瀆于乎
 若壞都汨汨乎不可止思氣所至為不眠為嗜卧為昏瞶為中
 疝三焦閉塞為咽嗝不利為臍腹嘔苦為筋痿為白淫為慮後
 與氣快然如衰為不嗜食寒氣所至為上下所出水液是氣所
 至為喘嘔吐酸暴注下迫凡此九者內經有治法但以五行相
 勝之理治之夫怒傷肝肝屬木怒則氣并於肝而脾土受邪木

太過則肝亦自病喜傷心火喜則氣并於心而肺金受邪
 火太過則心亦自病悲傷肺肺屬金悲則氣并於肺而肝木受
 邪金太過則肺亦自病恐傷腎腎屬水恐則氣并於腎而心火
 受邪水太過則腎亦自病思傷脾脾屬土思則氣并於脾而腎
 水受邪土太過則脾亦自病寒傷形形屬陰寒勝熱則陽受病
 寒太過則陰亦自病是傷氣氣屬陽熱勝寒則陰受病熱太過
 則陽亦自病凡此七者更相為治盛衰之理經曰脈滑者多血
 少氣澁者少血多氣大者氣血俱多脈來大而空者血氣俱實
 小者血氣俱少脈來細而緩者血氣俱虛代者氣衰細者氣少
 浮而絕者氣辟大而滑中有短氣尺脈瀋而堅為血實氣虛大
 脈細而微者血氣俱不足也剋立之脈理玄要曰下手脈沉便
 知是氣沉極則伏瀋弱難治或沉滑氣漸衰飲且入身稟天
 地陰陽以生籍血肉以成其氣一氣同流以成其神形神氣

乃謂全體故陰陽升降血脈流行榮衛運轉五臟六腑相
 生皆氣之使也蓋天地有五行而變化生風寒暑濕燥之順逆
 順之平逆之害人有五臟亦生喜怒哀思恐故曰根於化育者
 天地之泰和其體自安發於疾疫者陰陽之乖戾大抵氣鬱在
 上宜以散之氣鬱在下當以利之此則舉其大略言之工於醫
 者當推脈證治之

氣通治方

三香正氣散 治陰多陽少手足厥冷氣刺雍滯胃膈噎塞

心下堅痞嘔噎酸水

木香 丁香 各半 陳皮 去白 厚朴 去粗皮

益智仁 縮砂仁 香附子 炒去毛 苜蓿 各半

乾薑 炮 丁香皮 蓬莖木 炮 烏藥 各一

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾去滓

不拘時服

沉香降氣湯 治三焦痞滯氣不宣暢心腹疼痛嘔吐痰沫五

噎五膈並皆治之

沉香 木香 丁香 藿香葉

人參 去薑 白木 甘草 炙 肉苳蔻

桂花 檳榔 陳皮 去白 縮砂

川薑 炮 枳實 炒 白檀香 各一 白茯苓 去皮

青皮 去白 白芷 薑 各半

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至一鍾不拘時服

紫沉通氣湯 治三焦氣滯不能宣通腹脹大便秘

紫蘇葉 枳殼 炒 陳皮 去白 赤茯苓 去皮

檳榔 甘草 炙 沉香 麥門冬 去心

木香 五倍子 桑白皮 黃蘗

乾生薑

薄荷葉

荊芥穗

子實炒各

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心溫服

異香散

治腎氣不和腹脇膨脹飲食難化噯氣吞酸一切

冷氣結聚腹中刺痛並皆治之

石蓮肉去皮

蓬木根

甘草炙各

青皮去白

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚鹽一捻同煎至

一鍾不拘時熱服

順氣木香散

治氣不升降胃膈痞悶嘔吐高及酒食過

度噯氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣痛並皆治之

木香

蒼朮米泔

桔梗去蘆

煎薑也

陳皮去白

縮砂仁

丁香

良薑炒

肉桂去粗

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾不拘

時熱服入鹽少許亦可

和氣散

治脾胃不和中脘氣滯心腹脹滿嘔吐酸水

青皮去白

茴香炒

蒼朮米泔

肉桂去粗

良薑炒

香附子炒去

桔梗去蘆

甘草炙各

右為細末每服二錢鹽少許沸湯調服

化氣湯

治一切氣逆胃膈壅塞心脾卒痛嘔吐酸水丈夫

小腸氣婦人血氣並皆治之

沉香

胡椒略半

縮砂去殼

木香略

乾薑炮

蓬木根

茴香炒

陳皮去白

丁香

右為細末每服二錢生薑三片紅棗二枚煎至一鍾不拘

蠟慈散

治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛勝

脫小腸腎氣痰痛及婦人血氣刺痛並皆治之

延胡索

肉桂去粗

乾薑炮

蒼朮米泔

甘草炙各

縮砂去殼

檳榔

丁香炒

三稜煨

蓬木根

茯苓去皮

青皮去白

右作一服用水二鍾連根慈白一莖煎至一鍾空心熱服

木香流氣散

治諸氣痞塞不通胃膈膨脹面目虛浮四肢

腫滿口苦咽乾大小便秘

陳皮去白

半夏湯洗

厚朴去皮

青皮去白

紫蘇葉

香附去毛

肉桂去粗

蓬朮根

丁香不見

大腹皮

檳榔

藿香葉

木香不見

草菓

甘草炙各

木通去節

麥門冬去心

香白芷

赤茯苓去皮

白朮

乾木瓜

人參去蘆

石菖蒲去心

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾不拘

時熱服

蠶煎散

治男子婦人一切冷氣攻冲胃膈刺痛不已及脾

胃虛冷嘔吐泄瀉勝脫小腸氣婦人血氣並皆治之

縮砂仁去殼

蒼朮米泔

茯苓去皮

草菓煨

川芎

肉荳蔻

茴香炒

藜蘆加

大麥芽

檳榔

良薑炒

枳殼炒

厚朴去皮

陳皮去白

羌活去蘆

甘草炙各

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至一鍾空心熱服

蠶舌香散

治心脾引痛中脘氣滯傳積飲胃膈脹滿陰

陽不和臟腑虛弱並皆治之

香附子炒去

肉桂去皮

赤芍藥

天台烏藥

良薑二各 并草二各

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至一鍾服之

分心氣飲 治一切氣留滯於胃腸之間不能消化致成嘔

悶噎塞不通大便屢秘

木香不見 丁皮 人參去薑 麥門冬去心

大腹皮 大腹子也 桑白皮 草果仁

桔梗去薑 厚朴去皮薑 白木各七 香附子皮去

藿香去土 紫蘇葉去根 陳皮去白各 甘草五分

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚去核燈心十莖

煎至一鍾食遠服

七氣湯

治七情之氣鬱結于中心腹絞痛不可忍者

人參 肉桂去皮 芍藥去根 半夏湯洗七次

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

蘇合香丸

專能順氣化痰治傳屍骨蒸諸症等際辛暴心痛

鬼魅墮瘴赤白下痢小兒驚搐等證並皆治之

沉香 麝香 訶梨勒去根 丁香

青皮 安息香別研為末用酒 香附子炒去

萹撥 白木 白檀香 犀角

珠砂二兩各 蘇合香酒入 蘇合香酒入

右件研為極細末和勻用安息香膏并煉蜜和劑每一兩

作五丸不拘時用溫水化下一丸或溫酒化服或生薑湯

磨化服亦可

撞氣阿魏丸

治五種噎疾九般心痛癆瘵氣塊冷氣攻刺腹

痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並皆治之

茴香 青皮去白 陳皮去白 蓬木炮

川芎 甘草炙 生薑同 一痛妙

肉桂去皮 縮砂仁 丁香皮 白芷略半

胡椒 阿魏煨 狗寶

右為細末用阿魏和麝香丸如鷄頭大每服二

三九丈夫氣痛炒薑鹽湯下婦人血氣刺痛醋湯下

沉香降氣湯 治陰陽壅滯氣不升降胃脘痞塞喘促短氣又

治脾胃留飲噎膈吞酸脇下妨悶

沉香四兩 縮砂仁附二 甘草各三 香附子去白

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯調服不拘時

香飲子 治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可悅仰

檀香 木香 乳香 沉香

丁香並 荜香各半 玄胡索炒 片子薑黃炒

川烏炮 桔梗炒 桂心不見 甘草半

右作一服用水二鍾生薑五片棗子一枚煎一鍾食遠服

益智仁湯 治疝氣連小腹痛甚不已診其脈沉緊是腎經有

積冷所致

益智仁 乾薑炮 茴香炒 并草二各

烏頭炮 青皮去白

右作一服用水二鍾生薑三片入鹽少許煎一鍾空心服

四陽湯 治心虛氣中脈息大弱飲食不進

乾薑炮 益智仁四錢 青皮去白 川烏生去皮

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾食前

服入木香一錢煎亦可

復原通氣散 治氣不宣流或成癆瘵并悶裡腰脇氣滯疼痛

並皆治之

舶上茴香炒 川山甲同 炮各二兩 地胡索炒

右為細末每服二錢用熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒者煎南木香湯調下

手粘散 治心脾氣痛

延胡索 五靈脂 草菓 沒藥 各等

右為細末每服三錢不拘時熱酒調

流氣飲子 治男子婦人五臟不和三焦氣壅心胃痞悶咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食上氣喘急咳嗽痰盛面目浮四肢腫大便秘澀小便不通憂思太過鬱結不散腹脹脇肋走注疼痛脚氣腫痛並皆治之

紫蘇葉 青皮 去白 當歸 洗 芍藥

烏藥 茯苓 去皮 桔梗 半夏 湯洗

川芎 黃芩 枳實 煨炒 防風 去蘆

陳皮 去白 甘草 炙 木香 大腹皮

檳榔 枳殼 煨炒 各

右作一服用水二鍾生薑二片紅棗一枚煎至一鍾去滓不拘時服

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胃膈壅塞脇疼氣促喘急心下脹滿飲食不思嘔逆不止

紫蘇 五味子 去梗 桑白皮 炙 陳皮 去白

桔梗 去蘆 草菓仁 大腹皮 茯苓 去皮

甘草 炙 各

右作一服用水二鍾生薑三片煎一鍾入鹽少許食遠服

勻氣散 治氣滯不勻胃膈脹滿虛痞宿冷不消心腹刺痛噎塞嘔吐惡心並皆治之

丁香 檀香 木香 白芷 各等

養香藥 甘草 炙 縮砂 四兩

右為細末每服二錢入鹽一字沸湯調服不拘時

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作咳宜服

香附子 二錢 青皮 去白 陳皮 去白 桔梗

蓬朮 官桂 養香 益智仁

半夏 湯洗 甘草 炙 各

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食遠服

四七湯 治善怒喜憂悲恐驚之氣結成痰凝狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也中脘痞滿氣不舒快或嘔飲逆惡心並皆治之

半夏 湯洗 茯苓 去皮 紫蘇葉 厚朴 薑製 各

右作一服用水二鍾生薑七片紅棗二枚煎一鍾食遠服

沉香化氣丸 治諸氣

茯苓 人參 去蘆 木香 不見 青皮 去白

丁香 沉香 不見 白木 山藥

砂仁 三稜 蓬朮 菖蒲

檳榔 橘皮 白芷 薑製 各 官桂 一兩

蘿蔔子 炒 香附子 兩 黑牽牛頭末 八兩

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服五七十九不拘時生薑湯下

桔梗枳殼湯 治諸氣痞結滿悶

桔梗 去蘆 枳殼 煨炒 各 甘草 炙 一分

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

通氣枳殼丸 治氣結不散心胃痞滿氣逆上攻分氣逐水

枳殼 煨炒 木通 青皮 去白 陳皮 去白

桑白皮炒 蘿蔔子炒 白牽牛炒 蓬朮煨

茴香炒 三稜煨

右為細末薑汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服三五十丸不拘時橘皮湯送下

蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘促短氣煩悶胃膈噎塞中脘不快心腹脹滿咳嗽痰涎留飲停積不消並皆治之

紫蘇子炒 半夏湯洗各半 前胡去蘆 甘草炙 厚朴去皮 薑炒 陳皮去白 各川當歸 去薑 肉桂去粗皮 不見火 七分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服神保丸 治諸氣刺痛流入背脊及脇下諸藥不能治者

木香 胡椒各一 全蝎七枚 巴豆十箇 心研

右為細末湯浸蒸餅丸如麻子大硃砂為衣每服五九心

腹痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂生薑湯下血痛炒薑諸湯下肺氣甚者白礬粉各三 黃丹一分 研為末煎桑皮搽

米飲下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲隨意送下不拘時服

三和散 治五臟不調三焦不和心腹痞滿脇肋脹風氣壅滯肢節煩疼頭面腫浮手足微腫腸胃燥澀大便秘難年

高氣弱並可服之 羌活去蘆 宣木瓜 沉香 荜芎

陳皮各半 紫蘇 白朮 檳榔

木香 大腹皮 甘草炙 右作一服用水二鍾煎一鍾不拘時服四磨湯亦可兼服

白芷散 治七情所傷滯於胃膈窒於咽喉脹痛於心下噎

氣吞酸不能飲食

白芷煨 仁 薑炒 縮砂 丁香

木香 甘草一分 青皮 陳皮

右咬咀每服三錢用水一盞生薑三片鹽一捻煎至七分不拘時服

集香丸 治一切氣胃膈痛悶脇肋脹滿心腹疼痛嘔吐吞酸嘔逆惡心不思飲食或因飲酒過傷脾胃不和並皆治之

白芷煨 仁 縮砂 木香不見 薑黃 丁香六兩 麝香八錢 甘草二兩 香附子炒 兩

右為極細末入麝香末和勻用甘草膏和為丸如梧桐子大每服一二九不拘時細嚼津嚥下常服寬中順氣消宿酒進飲食養精神去積塊

三和丸 治三焦不和氣不升降心胃痞悶脇肋疼痛因傷

枳實煨 檳榔 半夏湯浸 蓬朮各三 木香 青皮去白 陳皮去白 赤茯苓去皮

丁香皮 薑子 白朮各一 荆三稜四兩

白芷煨 桂心 沉香 藿香各一

黑牽牛頭 新半 右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九至五十九食後用生薑湯下

寬中丸 治氣不升降痰涎壅塞飲食不化

檳榔煨 半夏生薑 木香各二 荆三稜七錢 青皮 陳皮各半 黑牽牛頭 兩二

右為細末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服五十九食後

用生薑湯送下

沉香升降散

治一切氣不升降脇肋刺痛胃膈痞塞

沉香

檳榔各半 人參 大腹皮炒

訶子碎

白木 烏藥 香附子炒

紫蘇葉

厚朴去粗皮神效 麥蘖炒

荆三稜

蓬木 益智仁 陳皮去白

薑黃

甘草 四各

右為細末每服二錢食前用沸湯調服一方加紅花

木香檳榔丸

治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹大小便結滯

不快利瀝逆酸臭宿食不消

此者木香檳榔

不是子和之方 治腎水陰不足

又服養陰發湯

諸虛腫滿流濕 又名潤燥通腸

破積通和血氣

痰涎不利胃室 酒積食傷同治

世瀉腹脹膨脹

手足四肢無力 飲食面色痿黃

脾肺骨蒸勞嗽

更兼口舌生瘡 打撲內傷閉墜

腫腸馬交蛇傷

只敗往來客旅 不服水土他鄉

諸般雜證同治

調理偏宜此方

木香

檳榔 青皮 商枳殼炒

陳皮

蓬木 黃連 黃蘗

香附

大黃 黑牽牛 生并四兩

右為細末滴水如和梧桐子大每服三十九或五十九

加至微利為度食后生薑湯下如不利加九數服常服快

氣消食通潤大腸一方無黑牽牛一方有當歸黃芩

萬和散 治男子婦人一切氣刺氣脹食傷及中毒積滯

兩脇臍下四肢收注宿有氣痰心腹痞塞嘔吐不思飲食

傷風煩悶鼻出清水夜多盜汗漸致瘦弱腸滑水瀉不上

等疾皆治之

黃香

蘿蔔子 蓬木 桂心

白生

陳皮 麥蘖 乾薑

甘草

白木 井水 荳蔻 牽牛

荆三稜

厚朴 麥蘖

右為細末每服一錢水八分煎至六分

和滓稍熱服或入

藥煎如湯點服亦得婦人血氣入骨歸少許心痛炒茴香

酒調下中酒熱酒調下小兒久瀉不止及瀉後傷動胃氣

不思飲食瘦悴血以一錢素半枚水五分煎四分熱服

引氣丸

治一切滯氣

枳砂

安息香 麝香 白芥子

大戟末

牽牛末 牛黃 巴豆

五靈脂

乳香 沒藥 斑蝥

右同研勻用糯米飯和丸如麻子大臨時隨意湯使下

引氣丸

官桂 延胡索 蓬木 薑黃

砂仁

枳實 枳殼 黑牽牛

檳榔

大黃 醋煮 菴朮 史均子

白豆蔻

丁香 羌化 香附子

荆三稜

陳皮 胡椒 皂角

沉香

木香 枳殼 川烏

糖卷

青皮 大麥芽

蘿蔔子

紅子

右為末酒糊丸如梧桐子大

吞治諸般病疾每服五七丸

各隨後項湯使下有孕婦入下可服之忌一切熱物

婦人一切血氣當歸酒下

蘇子泥湯下小兒脫肛艾

湯下小兒疳積皮湯下小兒驚風一歲一丸薄荷湯下
 白痢乾薑湯下小兒脾積史均子猪膽膏湯下赤痢其
 草湯下一切吐逆生薑湯下心膈膨脹新水下元冷好
 酒下風熱閉塞大小便不通并花水豆粉調下婦人紅脈
 不通紅花當歸酒下赤白帶下荊子湯下血昏當歸酒
 下產前產後吳茱萸一兩重酒一升煎至二沸下血塊氣
 血等生薑橘皮煎湯入醋少許下常服者淡薑湯下小女
 紅脈不通紅花當歸酒下男子小腸氣茴香湯下咳嗽烏
 梅湯下腰疼牽牛湯下傷寒葱白湯下
 升降氣六一湯

香附子炒六 藿香葉一兩
 右為細末每服二錢食前白沸湯點服
 工聖散 治諸般氣痛

芫花醋煮 延胡索炒
 右為細末每服一錢男子元臟氣痛葱酒調下瘰癧疔烏
 梅湯下婦人血氣痛當歸酒調下諸般氣痛薄荷湯調下
 小腸氣茴香湯調下

勝金散 治男子婦人五臟氣一切冷氣血氣肥氣息實氣痞
 氣奔豚氣伏梁氣疾捨心切痛不可忍似板築定冷汗喘
 急不語欲絕痛冷立止

天台烏藥細切酒浸 茴香炒 青皮去白
 良薑炒
 右為細末每服二錢空心用溫酒調服婦人用薑煎童子
 小便調服

酸醪丸 順氣胃進美飲食
 木香 甘草炒 丁香 枝 薑黃炒

右為細末煉蜜丸每兩作四十九每服一丸細嚼溫水下
 溫中分氣丸 治三焦氣不升降胃膈滿悶
 南星 半夏略 香附醋半 青附醋半 薑水一盞 薑末一盞
 白木 茯苓略 木香一分 青皮

陳皮 良薑 乾薑細切 水一盞 同煎半
 右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服三十九不拘時
 湯飲任下不拘時服

疎氣丸 治上氣腹脹
 大黃略 檳榔三 郁李仁去殼 陳皮去白
 青皮略 枳殼炒 羌活 川芎略
 檀香略 木香各一分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九用生薑湯
 送下食後臨卧時服

半夏湯 治上氣嘔吐不能下食
 半夏三分 陳皮略 白木 甘草略
 桂心略 人參一兩 厚朴去殼 薑二兩
 右吹咀每服五錢水一盞生薑五片棗三枚煎至七分去
 滓溫服日三

散氣散 治上氣嘔逆及疎利過多虛氣上攻又短氣少氣嘔
 悶宜服

木香 人參 白茯苓去皮 藿香葉
 陳皮去白 枳殼炒 甘草一兩 附子一兩 薑一兩
 右為細末每服二錢煎紫蘇木水生薑湯調再入銀盞重
 湯煎五七沸溫服

無名 沉香丸 治男子婦人諸物所傷通身走注疼痛多年沉
 積不散嘔吐惡心胃脘不利心腹刺痛人嗣不止助脇脹

一第... 冊... 6 ...

痛一切冷氣不知婦人胎前產後諸疾益皆治之

沉香 檀香 木香 乳香

沒藥各半 丁香 香附去 八角茴香

蓬木炮 胡椒 官桂 荆三稜醋炙

良薑 青皮 陳皮去白 巴豆炒去油

川烏炮 草烏炮 大麥蘗 川椒去目炒各

右為細末用醋煮麩糊為丸如櫻桃大每服一九用棗一
枚燒熟去核同藥細嚼用冷米飲送下小腹急痛用冷水
送下傷損腸內痛煎乳香湯下積聚亦如前法服後以乾
物壓之忌熱物大有神效食後臨卧時服

太醫院經驗奇效良方卷之十五終

太醫院經驗奇效良方卷之十六

五噎散

肺者為病葉氏以憂思為食氣五噎為五噎以憂思寒熱氣為
五噎之因雖分之為二不云治療之法內經言三陽結謂之

肺三陽者大腸小腸膀胱是也結者執結也小腸熱則血脈燥
大腸熱則後不圓膀胱熱則津液涸三陽結熱則前後閉澀不

通氣反上行食噎不下此皆熱證內經又云諸氣為陽也氣結
則脈結脈結於陽郊必寸關澀澀而沉伏此謂之陽結也結者

乃結聚之義也膈者謂膈在心脾之間上下不通若格拒之狀
也或結於咽候時竟有所碍吐之不出噎之不下由氣鬱發搏

而然久則漸妨飲食而為膈也噎者飲食之際氣卒阻滯飲食
不下而為噎也凡憂愁憤怒益出於思思則傷神氣不舒泰

聚結不散為結為痞為膈為噎乃正氣虛使氣道壅塞大便自
結結則氣止不下食不得入入則反出俾腸胃胃空上吐下結

遂成結腸反胃蓋氣膈之病胃中氣痞煩悶飲食不下或心下
苦滿噎氣吞酸時聞食臭大小便閉澀不時吐逆皆由憂思傷

氣故陽脈結而謂之膈氣也夫喜則氣散怒則氣逆憂則氣聚
忽則氣結悲則氣急恐則氣驚則氣亂此七氣不和則百病

生膈噎之證得氣愈盛氣噎其脈澀澀食噎其脈短澀治法透
膈疎氣化痰和胃後之幸者幸而辨之治證乘類開列于後

膈噎通治方

五噎散 治五噎食不下嘔噎痰多咽喉噎塞胃膈滿痛

人參 半夏湯洗 桔梗去苗 白豆蔻

木香 枳頭糠 沉香不見 葶藶炒

批把藥 乾生薑 白木各一 甘草炙

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾食後服

五膈散 治胃膈痞悶諸氣結聚胸肋脹滿痰逆惡心不進飲食並皆治之

枳殼去穢 青皮去白 大腹子 半夏麩炒

丁香不見 天南星湯洗 乾薑炮 麥蘖炒

章棗仁 白朮各一分 甘草炙五分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

瓜蒌實丸 治胃膈痞滿胃中痛喘急妨悶

瓜蒌實另研 枳殼去穢 半夏湯洗 桔梗去蘆

右為細末薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九食後用淡薑湯下

五膈並皆治之

五膈並皆治之

白茯苓去皮 縮砂去皮 薏苡仁炒 批把葉去毛

桑白皮炒 沉香不見 五味子炒 木香不見

青皮去白 穀蘖炒 藜蘆炒 杜仲去皮

隨風子 石斛酒浸 大腹子 陳皮去白

半夏麩炒 神麩炒 檳榔各三分 白豆蔻

丁香 人參 白朮 甘草炙 各一分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

五噎入柿乾一箇膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚同煎

人參丁香散 治脾胃不和停痰留飲不能運化腹脇脹滿短

氣噎悶或吐痰水噎醋吞酸不思飲食漸至羸瘦

人參去蘆 丁香 白芍藥 當歸去蘆

肉桂去皮 蓬朮煨 丁皮煨 乾薑炮

茯苓去皮 香附子炒 白朮 甘草炙

山藥各一錢半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾空心服

四七湯 治喜怒不節憂思兼併多生悲恐或時振驚致臟氣

不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上鬱咽喉吐噓不下

皆七情所生

方見氣門

寬中散 治因憂志鬱結或作寒熱速成膈氣不進飲食

白豆蔻去穢 青皮去白 縮砂去皮 丁香兩各二

小香半 甘草炙 陳皮去白 香附子炒

厚朴炒 枳殼去穢 沉香一 檳榔二

右為細末每服二茶不拘時用生薑湯調服

寬膈丸 治七情鬱結膈塞不通及食冷物即發其病緊痛欲

吐食飲不下甚者手足冷短氣或上氣喘急嘔逆

麥門冬去心 甘草炙 人參四 川椒炒

遠志去心 細辛去苗 桂心各三 乾薑炮

附子炮 右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三五十食前米湯

下夏加麥門冬甘草人參各一兩一方以吳茱萸代桂湯

寒冷則心痛咽中有物吐不出噓不下飲食減少皆治之

沉香開膈散 治五膈五噎痞滿嘔吐心腹刺痛脇肋脹

沉香 白豆蔻 荊三稜 蓬朮

縮砂 草澄茄 草萊仁 益智仁

丁香 川白薑 人參 丁皮各半

木香 白茯苓 香附子 藜蘆

青皮 半夏麩 陳皮炙 甘草炒

右為細末每服三茶水一盞半生薑五片棗二枚煎至中

盞去滓食前服

沉香散 治五膈五噎胃中久寒諸氣結聚嘔逆噎塞飲食不

化結氣不消常服順氣通噎寬中進食

白木 茯苓 木通 當歸

青皮 陳皮 大腹皮 大腹子

白芍藥 木香 子蘇葉 枳殼

白芷 甘草 沉香

右為末每服二水一盞生薑三片棗一枚煎至七分空

心溫服一方無木香

奪命回生散 治五膈五噎翻胃嘔吐不進飲食此藥多有神

効不可輕視

丁香 川芎 白薑 南木香

肉桂 新羅人參 神麩 訶子

縮砂 義木 粉草 大草葉

巴豆 水浸十四日去毒心腹不吐

右日乾為末入乳鉢內和勻巴豆膏再篩過入瓦盒內以

油紙蓋盒口却用黃蠟和松脂鎔如法封固盒縫每以十

二月上辰日或初八黃道生氣天月二德日至誠脩念於

高北爽處埋土中三尺深至次年六月中伏節擇晴日

日取向當風處攤去濕氣以不瀉瓦并收貯密封壯人

每服半茶匙時百沸湯調半盞頓服仰臥片時徐以溫白

粥壓下若羸弱只服一字二三服即能進食止嘔吐續以

寬中散丁沉香湯搗皮煎九厚朴煎九等兼進佐助胃

氣忌生冷魚腥粘膩硬物一兩月則全愈矣孕婦不可服

五膈散 治五膈氣痞心胃壅塞漸致羸瘦

人參 赤茯苓 枳殼 厚朴

官桂 陳麩 訶梨勒皮 白朮

陳皮 乾薑 荆三稜 檳榔

木香 甘草 右為細末每服二錢入鹽沸湯調服如脾氣腹脹

悶每服三錢水一盞入生薑一塊切棗二枚擘破益少許

煎至八分不拘時和滓熱服

膈氣散 治五膈氣三焦痞塞胃膈滿悶背脊引疼心腹膨脹

脇肋刺痛食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦

少力短氣煩悶常服順氣寬中消痰癖積聚散驚憂恚氣

三稜 蓬木 肉桂 益智仁

陳皮 枳殼 檳榔 肉苳菴

木香 乾薑 青皮 厚朴

甘草 右為細末每服二錢水一盞入生薑二片棗半箇煎七分

和滓不拘時熱服如不煎入鹽少許沸湯點服亦可

五膈丸 一名聖藥丸 治五膈氣噎滿悶不下食心胃壅塞

琥珀 木香 訶梨勒皮 陳橘皮

昆布 桃仁 白朮 官桂

半夏 枳殼 五味子 檳榔

大黃 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心生薑

棗湯下

沉香丸 治膈氣

沉香 木香 丁香 茴香

青橘皮 枳實 檳榔 阿膠

吳茱萸 枳殼 牽牛 生薑

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸生薑湯下

羚羊角丸 治五膈氣心胃妨則食少胃虛四肢無力

羚羊角 人參 去蘆 桂 各一 乾薑 炮

甘草 炙 各 赤茯苓 訶梨勒皮 各二

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服五十丸不拘時煎陳皮湯下

草薺菹丸 治五膈氣飲食難下胃膈噎悶四肢不利

草薺菹 去支 附子 炮裂去 遠志 去心 乾薑 炮

細辛 桂心 川椒 炒去目并各一 口者殺

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如彈子大不拘時候含一丸嚥津

萊菔木香散 治膈氣喘促腹脇脹滿胃膈不快痰逆惡心不思飲食

萊菔子 二升 粟米 半升 陳皮 湯浸去 白粉 一分 木香 一分

巴豆 三 大者 二 小者 一 候葉焦黑皮枯石器內待用

右為細末用煮萊菔湯調下二錢或以生薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大以萊菔湯下十五丸亦得

狀元丸 治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿

巴豆 取霜 神麩末 半升 半夏 洗 一升 棗黃 者州好

右研和勻滴水丸如小豆大用細米糠炒變赤色每服三九食後溫水吞下童子二歲三四歲服一九歲半服半九止嗽用薑汁下止嘔吐用生薑湯下

通中散 治五膈氣胃中不利膈膈壅滯宜服

牽牛子 各一分 木香 一分 檳榔 三分 乾薑 炮

右為細末每服二錢以熱酒調服空心可二服續續更以

一兩盞熱茶投之得利三兩行下得惡物是効

桃花散 治五膈氣飲食不下漸致羸瘦

桃花 當年 檳榔 胎三 縮砂 去皮 牙硝 各二

吳茱萸 更 一兩 湯浸 乾 吳茱萸 更 一兩 湯浸 乾

右為細末每服一錢不拘時溫酒調下

治膈氣

右用附子一箇先以銚子炒石灰令十分熱埋附子於灰中候灰冷取取出將石灰依前法再炒埋如此三次然後取

附子去皮臍入丁合四十九粒不見火同為細末空心以糟茄兒二兩片翻覆藥食之然後食物

治膈氣

右用大鯽魚一尾市中自死者可用活魚則不効剖腹去盡腸物留鱗用大蒜去淨皮薄切片填入魚腹內仍合魚

為一尾用濕紙裹定用麻皮纏之却用熟黃泥厚厚外固曬微乾以碎碎灰火慢慢煨熟取出去鱗并刺骨入局方

平胃散末搗和可為丸如梧桐子大日乾搗收勿令泄氣味每服三十九空心用米湯送下

治膈氣噎食久成翻胃

右用壯老薑一片連皮洗淨切如大錢厚以疎竹羅子盛入寺觀內廁坑中浸七日取出長流水中漂七日取出曬乾為末每淨末一斤入甘草末一兩和勻每服二三錢米

飲調徐徐服次用高良薑去毛切片清油炒變色為末陳米飯為丸如梧桐子大每服二三十丸至五十九漸漸米

飲調良薑末送下忌生冷難化之物

瑞香散 治五種膈氣膈胃正氣進食

南木香 檳榔 殼 長 阿子 炮 去 肉桂 炮 去 不

川薑 麥蘖 白茯苓 白朮	人參 青皮 荆三稜 甘草	丁香 白扁豆	右為細末每服一錢紫蘇鹽酒湯調服	萬靈木香丸 治膈氣咽噎噎塞	木香 陳皮 附子	右為細末醋煮麩糊為丸如梧桐子大以丹砂為衣每服二十九不拘時生薑湯下茶酒下亦可	乾嘔妙功丸 治膈氣咽噎噎塞咳嗽上氣痰盛喘滿氣道痞滯不得升降	蓬砂 丹砂 礞砂 巴豆霜	益智仁 官桂	右各別研為極細末拌和勻用糯米粥為丸如麻子大每服一九或二九食後臨寢乾嘔下	導氣散 治膈氣噎塞不入飲食	虎頭王字骨 犀角 華撥 人參	右為細末每服二錢溫水調食後臨睡服	分氣丸 治膈氣嘔逆不下食	白朮 桂心 益智仁 阿魏	右為細末湯浸蒸餅和丸如芡實大每服一九不拘時用
-----------------------	-----------------------	-----------	-----------------	------------------	----------------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	------------------	-----------------	-----------------------	------------------------

溫湯嚼下 無比丸 治膈氣嘔逆不下食	乾薑 附子 官桂 澤瀉	巴豆 右為細末和勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三九至五丸	溫酒送下早晚各一服	旋覆花散 治胃中痰結痞塞不通不能飲食	旋覆花 赤茯苓 桂心	右咳咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時稍熱服	半夏五香丸 治膈氣痰結和胃氣進飲食	半夏 沉香 木香 龍腦	右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九空心食前細嚼用生薑鹽酒送下	芫花丸 治膈氣痰結痞塞心胃壅悶	芫花 桂心 右為細末煉蜜和搗二三百粒丸如小豆大每服二九食前以溫酒下	厚朴湯 治膈氣宿食不消	厚朴 人參 柴胡
-------------------------	----------------------	------------------------------	-----------	-----------------------	------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---	----------------	----------------

<p>為頭<small>也</small>陳皮<small>湯浸去白</small>甘草<small>炙</small> 陳麩<small>各一匕</small></p> <p>草薺<small>菴</small> 高良薑 五味子 桂心<small>各半</small></p> <p>益智<small>也</small> 乾薑<small>分</small></p> <p>右以咀每服三錢水一盞薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓不拘時稍熱服</p>	<p>草澄茄散 治膈氣壅滯脾胃虛弱宿食不消四肢乏力</p> <p>草澄茄 荊三稜 木香 人參<small>去蘆</small></p> <p>草薺<small>菴</small> 去皮 高良薑 青皮<small>湯浸去白</small> 甘草<small>各半</small></p> <p>五味子 白木 九腹皮<small>各三</small></p> <p>右以咀每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時稍熱服</p>	<p>神麩丸 治膈氣不下食縱食不能消化</p> <p>神麩<small>炒</small> 麥蘖<small>炒</small> 厚朴<small>薑汁炙</small> 桂心<small>各一</small> 訶梨勒皮</p> <p>乾薑<small>地</small> 檳榔 陳皮<small>湯浸去白</small> 各一兩半</p> <p>右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十丸不拘時用淡生薑湯送下</p>	<p>積殼丸 治膈氣脹滿噎食妨悶手脚煩疼漸加羸瘦身體無力並皆治之</p> <p>積殼<small>炒</small> 木香 赤芍藥 羚羊角</p> <p>檳榔<small>各一</small> 前胡<small>去蘆</small> 赤茯苓<small>各二</small> 麥門冬<small>去心</small> 各一兩半</p> <p>右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時以粥飲下</p>	<p>枳實散 治膈氣心中氣逆時作疼痛</p> <p>枳實<small>炒</small> 桂心<small>各一</small></p>
---	--	---	---	--

<p>右為細末每服一水不拘時用熱酒調下</p> <p>華撥 沉香 丁香 草薺<small>菴</small></p> <p>青皮<small>湯浸去白</small> 桃仁<small>去殼</small> 生薑<small>切</small> 大腹子<small>各</small></p> <p>枳殼<small>炒</small> 甘草<small>各</small> 訶梨勒皮<small>二</small></p> <p>右以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時溫服</p>	<p>草薺<small>菴</small>丸 治五膈氣脾胃久冷嘔吐酸水脘腹疼痛不思食</p> <p>草薺<small>菴</small> 去皮 附子<small>炮裂去白</small> 縮砂<small>去皮</small> 陳皮<small>湯浸去白</small></p> <p>乾薑<small>地</small> 枳實<small>炒</small> 雞舌香 吳茱萸<small>湯浸去</small></p> <p>當歸<small>微炒</small> 檳榔 木香<small>各半</small> 桂心<small>三分</small></p> <p>右為細末水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服三十九丸不拘時用熱酒送下</p>	<p>昆布丸 治五噎嗝咽妨塞食飲不下宜服</p> <p>昆布<small>洗去</small> 麥門冬<small>去心</small> 天明冬<small>去心</small> 訶梨勒皮<small>去</small></p> <p>木通 川大黃<small>微炒</small> 川朴<small>硝</small> 郁李仁<small>湯浸去</small></p> <p>桂心 百合<small>各一</small> 羚羊角<small>屑</small> 杏仁<small>湯浸去</small></p> <p>紫蘇子<small>微炒</small> 射干<small>各半</small> 柴胡<small>去芦</small> 陳皮<small>湯浸去</small></p> <p>檳榔<small>各</small></p> <p>右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時熱酒送下夜飯後用綿裹彈子大一丸嚥化</p>	<p>治五噎立効方</p> <p>批把葉<small>洗去</small> 陳皮<small>湯浸去</small> 生薑<small>半</small></p> <p>右件藥都以水二大盞半煎至一大盞半去滓不拘時候分溫三服</p>	<p>竹皮散 治噎聲不出</p> <p>竹皮<small>一方</small> 細辛 通草 人參</p>
---	---	---	---	--

五味子 茯苓 蘇黃 桂心

生薑 甘草

右咬咀以水一斗煮竹皮下藥煮取三升分三服

治男子婦人氣噎病

鷄嗉子凡竹和商食用溫水浸黃泥固封其口內燒附

木香 丁香 沉香

右為細末用大棗煮熟去皮核研和丸如梧桐子大每服三十九食前用米飲送下

治胃中氣噎食不下者喉中如有肉塊方

昆布二月洗 小麥二分

右件藥以水三大盞煎候小麥爛熟去滓每服不拘時喫

一小盞仍揀取昆布不佳含三兩片嚙津液効

治胃膈氣滯食噎不下方

右以手巾布裹杏林頭糠時七試齒治卒噎刮春米杵頭

細糠含之煎湯呷亦得

東坡先生家藏五行記云

絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開吾胃視

有何物言終而卒弟子依言而開視胃中得一物形如魚

而兩頭適體是肉鱗弟子置器中跳躍不止戲以諸味

皆隨化及時夏中藍多依戲有一僧以戲置器中此蟲遂

逐盤中走須臾化為水故世藍說治噎有效一方治膈氣

咽喉噎塞飲食不下

生薑汁煎 治噎不能下食咽喉壅塞心胃煩悶

生薑汁 白蜜 牛酥 人參

百合為末

右件藥內銅鍋中以慢火煎如膏不拘時候含一匙如半

棗大噎症或煎人參湯調下一茶匙亦得

宜寇散 治五種膈氣能治氣補勞通血脉益脾胃去痰飲

肉苳蔻 五枚 木香 人參 厚朴薑製

赤茯苓 官桂 檳榔 訶子煨去核

青皮 陳皮 甘草 郁李仁炒皮

右為細末每服一茶半鹽湯調不拘時服右咬咀每服七

錢水二盞薑棗各三枚煎至一盞去滓不拘時服亦可

人參利膈丸 治胃中不利痰嗽喘滿利脾胃壅滯推陳致新

治膈氣聖藥

人參 當歸 藿香 枳實

甘草炙各 木香 檳榔各半 厚朴薑製

大黃酒浸各 右為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十九食前

用米飲送下

秦川剪紅丸 治膈氣成翻胃服此吐出瘀血及下蟲而効

雄黃別研 木香各五 檳榔 三稜煨

蓬木煨 貫仲去毛 乾漆炒烟 陳皮各一

大黃半兩 右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服五十九食前用米

飲送下

寬中丸 治氣不升降胃膈痞結

木香 青皮 三稜各半 大腹子二枚

半夏湯泡洗 右為細末薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服五十九不

拘時用倉米湯下

入藥靈砂 治翻胃嘔吐飲食不下

入藥靈砂 治翻胃嘔吐飲食不下

靈砂 一兩 丁香 木香 胡椒 各五

右件藥肉并和為丸如梧桐子大每服五十九用生薑湯下

丁附散 治翻胃嘔逆粥藥不下者

大附子 一兩 生於石四兩 著火煎新通熱入生薑汁中浸一宿時再用火通再煎薑汁不半 煎去皮焙乾研末

丁香 二兩 切為末 右和勻每服二錢水一盞粟米少許煎至七分去滓溫服

掌中金 治證同前 大附子 一兩 薑汁 母丁香 一箇 右為細末以少許安掌中舐服

正胃散 治證同前 右用白牛牛喉去兩頭節并筋膜脂肉節 取下如阿膠片以好米醋一大盞浸微火頓番勻炙乾再煎再炙醋盞

為慶存性不要見日火焙燥為末每服一錢陳米飲下

敵痰丸 治翻胃嘔噎 半夏 麩炒 枯礬 各一 皂角 炙子 二兩 皮

黑牽牛 取頭末 三兩 右為細末用蘿蔔煮熟搗爛和丸如梧桐子大每服五十

丸食遠用生薑湯送下

奇効良方卷之十六終

太醫院經驗奇効良方卷之十七

脾胃門 附論

夫脾胃者清純沖和之氣位居中州其屬土也無物不入無物不包榮衛出焉而脾又受胃之稟行其氣血灌溉諸經榮養百骸生發諸陽上升之氣元氣由此而充焉故為十二經之海常以食入於胃散精於肝滯氣於筋食氣入胃濁氣歸心滯精於脉脈氣流經氣歸於肺肺朝百脉輸精皮毛毛脉合精行氣於府府精神明流於四臟氣歸於權衡權衡以平氣口成寸以决生死也飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也凡人之生皆以胃氣為本經云穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成若人絕水穀則死蓋胃氣絕而故也正所謂安穀則昌絕穀則亡水去則榮散穀消則衛亡榮散衛消將何以立此之謂也蓋天地以生五氣五味人之所養莫重於此慎勿以太過不及以傷其正故曰陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味可不謹乎此乃大經大法故調經篇論云病生陰者得之飲食居處陰陽喜怒五亂交作病則身熱頭痛目眩體重四肢不收怠惰嗜卧實者則腹脹中滿停食霍亂虛者為嘔吐噦逆泄瀉浮腫惡心又曰飲食勞倦則傷脾脾傷則內閉九竅外壅肌肉衞氣散解此謂自傷氣之劑也蓋脾好乾惡濕或濕邪所滯為五泄變為痢為疸原病式云諸濕腫滿皆屬脾土土衰則不能制水水泛四肢上乘於肺為腫為滿為喘為小便不利為泄瀉為飲食停積胃口呆不能化鬱而為痰交生嗽喘眩暈嘈雜嘔氣吞酸翻胃吐食胃腕當心而痛有脾間蟲動其為痛也氣血痰水食積風冷諸證之痛每每停聚而不散惟蟲痛則乍作乍止未去無定又嘔吐清沫之為可驗又有動

氣按之牢若痛者脾胃虛之故也若人湯飲入胃至將飽飲小
 便者由精不輸於脾不歸於肺心火上攻令人口燥咽乾陰火
 太盛也東垣發明迨盡其旨之要人之百病皆由脾胃虛而生
 也至於經論天地之邪氣感則害人五臟六腑及形氣俱虛乃
 受外邪不困虛邪賊邪不能獨傷人乎豈不從脾胃虛而生明
 矣然所傷之因不一為病多端分而其略飲食傷胃勞倦傷脾
 飢則損氣飽則傷氣勞則氣耗逸則氣滯及喜怒憂恐皆能損
 胃之元氣而為不足之證惟飲食所傷者有異耳一則內弱強
 食填塞不化此有物也屬乎尅伐一則中虛少食痞滿難運此
 不足也屬乎補養醫者便以飲食內傷中氣不和之病治之而
 分何物所傷又不審傷物之有無又不辨脾胃之強弱而援按
 局方之劑輕以香熱尅化重以巴豆攻逐一途取利矣虛上
 之禍豈小哉實者則已虛者愈損其胃甚至病轉危殆而死者
 有之今將治法分類施之是以物各有性若傷於飲者飲乃無
 形之物或微汗散之於表或淡滲利之於下或若溫以燥其中
 傷於食者或損穀以和之或強脾以磨之果因食物停滯甚盛
 而作悶亂者吐下以奪之中有物傷於寒者則熱之傷於熱者
 則涼之寒熱共傷者各從其性以和之傷於魚肉菜菓之類水
 其氣之相尅而相制者用之如礪砂阿魏治肉積胡黃連麝香
 治菓積神麴麥蘖礞石巴豆皆治酒積食積痰積是皆有形之
 物填塞不化必待驅逐然後從其所宜制之而得安豈可一例
 而用香熱藥也若夫飲食勞倦內傷中氣脾胃虛弱虛滿不食
 使營運減削不能輸精皮毛行氣六腑發為諸證此乃不足之
 邪理宜溫之和之調之養之必使生氣增益胃氣完而後愈也
 脾胃之證前人所論甚詳後學必須誠究決無妄虛之咎
 豈可輕易哉

<p>脾胃通治方</p> <p>嘉禾散 治脾胃不和胃膈痞悶氣逆生痰不進飲食如五噎</p> <p>五膈並皆治之</p> <p>方見膈噎門</p>	<p>四君子湯 治脾胃不和不思飲食</p> <p>人參 去蘆 茯苓 去皮 白朮 甘草 炙各</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服</p>	<p>六君子湯 治脾胃不和不思飲食</p> <p>人參 去蘆 茯苓 去皮 白朮 甘草 炙各</p> <p>半夏 湯泡 陳皮 去白各</p> <p>右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食遠服</p>	<p>平胃散 治脾胃不和嘔吐惡心不思飲食</p> <p>蒼朮 米泔水三洗厚朴 法炒 陳皮 去白 甘草 炙各</p> <p>右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食遠服</p> <p>一方加草菓名草菓平胃散或為細末每服二錢用鹽湯調服亦可</p>	<p>二陳湯 理脾胃消痰飲</p> <p>陳皮 去白 茯苓 去皮 半夏 湯洗 甘草 炙各</p> <p>右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服</p>	<p>參苓白朮散 治脾胃不和飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病後調理脾胃</p> <p>方見痢門</p> <p>千金大養脾丸 治脾胃虛弱停寒留飲膈塞氣噎翻胃吐食</p> <p>常服養脾壯氣多進飲食</p> <p>枳殼 炒 神麴 炒 陳皮 去白 麥蘖 炒</p> <p>三棱 煨 茴香 炒 白蘆 炒 肉苁蓉</p>
---	--	---	---	--	--

<p>右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九食遠細嚼用白湯或溫酒送下</p>	<p>養胃湯 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉或有外感寒熱如瘧骨節痠疼宜服之</p>	<p>藿香 法製 厚朴 薑炒 半夏 湯泡 茯苓 去皮 各半</p>	<p>甘草 炙 各 白木 七 分</p>	<p>右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚烏梅半箇煎至一</p>	<p>鍾食速服</p>	<p>丁沉香 湯 治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲食不進十</p>	<p>脯五噎痞塞不通並皆治之</p>	<p>丁香 白芷 蔻 肉桂 蔻 青皮 去 白</p>	<p>麥蘖 五 分 半夏 湯 泡 神麴 炒 草菓 各 三</p>	<p>沉香 厚朴 薑 製 藿香 陳皮 各 七</p>	<p>香附子 炒 縮砂 仁 人參 去 蘆 各 木香 五 分</p>	<p>白木 二 分 甘草 炙 半</p>	<p>右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服</p>	<p>透膈湯 治脾胃不和中脘氣滯胃膈滿悶噎塞不通噫氣香</p>	<p>酸脇肋刺脹嘔逆痰涎食飲不下並皆治之</p>	<p>木香 白芷 蔻 縮砂 仁 檳榔</p>	<p>枳殼 麩 炒 厚朴 薑 製 半夏 湯 泡 青皮 去 白</p>
-------------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------	-------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------

<p>右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服</p>	<p>凝神散 收斂胃氣清涼肌表</p>	<p>陳皮 去 白 大黃 朴硝 甘草 炙 各</p>	<p>白扁豆 知母 生地黃 粳米</p>	<p>右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服</p>	<p>枳木丸 治痞消食強胃</p>	<p>枳實 法 製 白木 二 兩</p>	<p>右為細末用荷葉包米煨熟飯搗和丸如梧桐子大每服</p>	<p>五丁丸 不拘時白湯送下</p>	<p>木香 和中丸 治脾胃氣益腎水消腸胃中積聚癥瘕癖塊宣暢</p>	<p>三焦和脾開胃膈氣逆攻心脇助脹滿痞痛身體困倦</p>	<p>大小便不利並皆治之</p>	<p>木香 沉香 檳榔 枳實 法 製</p>	<p>青皮 去 白 蓬木 櫻 橘皮 去 白 當歸 酒 浸</p>	<p>黃芩 去 蘆 木通 去 皮 黃連 白芷 蔻</p>	<p>郁李仁 法 破 牙皂 連子 各 三 稜 各 一 縮砂 仁 二 兩</p>	<p>香附子 去 毛 黃蘗 三 兩 牽牛 研 頭 大黃 四 兩</p>	<p>右為細末滴水為丸如梧桐子大每服二錢不拘時生薑</p>	<p>湯下或茶湯下亦可</p>	<p>治中湯 治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致泄瀉</p>	<p>人參 去 蘆 乾薑 炮 青皮 去 白 陳皮 去 白</p>	<p>白木 甘草 炙 各</p>	<p>右作一服水二鍾煎至一鍾空心服如嘔吐不已加半夏</p>	<p>二錢丁香一錢名丁香溫中湯</p>
-------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	---------------------

進食散 治脾胃虛冷不思飲食

青皮去白 陳皮去白 良薑炒 肉桂炒

川烏頭炮 草蓼 甘草各一 訶子炒

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾空心服

思食調中丸 治脾胃久弱三焦不調氣滯胃弱痞悶不食嘔

逆惡心或吐痰水

人參 檳榔各半 神麴炒 麥蘖炒

陳皮去白 半夏麴 木香 沉香各半

烏藥一兩 白木半兩

右為細末蜜調白麩打糊為丸如梧桐子大每服三十九

食遠用米飲湯送下

八味湯 治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛臍虛滑

吳茱萸炒 乾薑炮 肉桂去粗 人參去蘆

當歸洗焙 丁香 木香 陳皮各半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

補脾湯 治脾胃虛寒泄瀉腹痛氣逆嘔吐飲食不消

人參去芦 茯苓去皮 草蓼去皮 乾薑炮

麥蘖炒 甘草各半 厚朴去皮 陳皮

白木各一

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

養脾丸 治脾胃虛寒心腹脹滿逆惡心臍寒泄瀉

人參去蘆 白茯苓去皮 麥蘖炒 白木三兩

縮砂去皮 乾薑炮 甘草各半

右為細末煉蜜和丸每兩作八九每服一九不拘時細嚼

用生薑湯送下

白木湯 理脾和胃順氣進食

白木 厚朴 桂心 乾薑

桔梗 人參 茯苓 當歸

甘草各半

右作一服水二鍾生薑三片棗二枚煎至一鍾不拘時服

天下受拜平胃散 治脾胃不和嘔吐痰水胃弱痞滯不羨飲

食並皆治之

茅山蒼朮去皮米泔浸 厚朴去皮 陳皮

甘草炙 生薑各三 紅棗二百枚

右件用水五升煮乾搗作餅子曬乾再研為細末每服二

錢食遠用益湯調服治泄瀉用生薑湯調下

和中益氣丸 治脾胃不和氣不升降嘔吐減食口苦吞酸胃

滿短氣肢體怠墮面色痿黃中焦虛痞不任攻擊臍氣久

寒不受峻補又療心胃悞悞如痛五飲停滯不散常服和

中益氣進羨飲食或大便不通尤宜服之

木香 丁香各半 肉苳蔻 茴香微炒

京三稜炮剉 白蓋菟 人參去蘆 官桂各一兩

縮砂仁二兩 青皮去白 陳皮各四兩

右為細末用白麩糊為丸如梧桐子大每服六十九至七

十九食遠用溫生薑湯送下

穀神丸 消食健脾胃益氣進羨飲食

人參 縮砂 香附子炒 三稜

蓬朮 青皮 陳皮 神麴

麥蘖炒 枳殼各等分

右為細末用粳米煮糊為丸如梧桐子大每服三十九空

心用米飲送下益湯下亦得

快活丸 消導飲食順氣健陽住小便

快活丸 消導飲食順氣健陽住小便

丁香 木香 官桂 茴香

乾薑 蒼木 各半

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服五七十丸食前用酒送下

延年草 邢和璞真人常服安神導氣消酒令益脾胃光入小兒皆可服清晨食後嚼數片安神健體賜呂申公劉斯立秘之名迨年草

上等白鹽花 用酒洗淨白上茴香 四兩 青皮 一斤湯浸三日投水微苦味出盡 甘草 六兩

右用甜水一斗同藥入銀鍋內熬不住手攪勿令着底置密器中收不得走氣候水盡取出慢火炒令乾不得有炒焦氣選勤謹者一人專一掌之去甘草茴香不用只取青皮如傷生冷及菓實蔬菜之類即嚼數片氣通即無恙

常服一兩片極佳以其尤宜老人邢和璞所以名延年草斯立又以延年自之也

一方治心腹虛膨手足厥冷或飲苦澁涼劑晨朝未食先嘔或聞食即吐不思飲食此乃脾胃虛弱

右用山藥剉如小豆大一半銀石器內炒熟一半生用末不拘時用米飲調二錢服之

碎寒湯 治脾寒胃弱嘔逆惡心腹脇脹痛 茴香 三兩 高良薑 二兩胡椒 半兩 丁香 一分

甘草 二兩 白鹽 三兩 右為細末每服一錢不拘時沸湯調服

下附丸 治脾胃虛寒嘔吐不止 丁香 一兩 附子 炮 草薹 剉 胡椒 各半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸不拘時服

細煎橘皮湯下

藥附丸 治脾氣虛弱大腸冷滑臟腑泄瀉米穀不化飲食無味乏力短氣常服益脾壯氣

方見泄瀉門 神效丸 治脾胃冷氣不和心腹疝痛脇肋氣滯不思飲食四肢少力

神效丸 附子 炮裂去 橘皮 湯浸去 甘草 炙 桂心 各半 當歸 剉 人參 各

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十丸不拘時生薑橘皮煎湯下

至靈散 療食飽煩悶但欲卧而腹痛 用神效炒令香黃為末不拘時用米湯調服方寸七用

大麥藥亦佳 白苳蔻丸 治脾胃不和不能飲食

白苳蔻 去皮乾薑 炮裂 白木 各三 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九用薑棗煎湯送下空心食前服

脾不磨方 脾虛不磨塞心胃 腹滿腹脹如物攻

但將五膈煎三服 可送尋常小理中 病後傷脾胃膈痛 老人強食氣必短

更兼可食惡心來 草菓寬中煎一梳 右病後傷脾經令人氣必短用寬中散加草菓二箇灰火

炮對用水二鍾生薑十片煎至八分去滓不拘時服

四炒健脾散 進食極妙

蒼木 乾薑 甘草 五兩半

烏頭 六兩以紅水浸七日取出切半以鹽四兩炒乾或

右為細末每服一錢食前用白湯入鹽調服

消穀丸 治脾胃氣弱飲食多傷胃膈痞悶可思飲食

肉苳菟 檳榔 神麴 青皮 去白

京三稜 橘皮 麥蘗 木香 半兩

右為細末用湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十九食

後用橘皮湯送下

丁香附子散 治脾胃虛弱胃膈痞結吐逆不止

丁香 附子 生薑 半斤取白

右將附子鑽孔四十九箇以丁香填在孔內將生薑汁用

文武火熬盡取大蘿蔔一箇取一穴子入附子在內仍以

蘿蔔蓋之用文武柔柴火燒香熟為度取出附子切片焙

粟附丸 治脾胃氣虛四肢倦怠肌體瘦弱橫痃受濕大便頻

數不思飲食

陳粟米 一升附子 一兩

右同入鍋銚內用水煮令附子透取出附子切作片焙乾

別取陳粟米半升水淘淨控乾慢火炒令香熟同附子碾

為細末却用元黃附子者粟米飲和為丸如梧桐子大每

服三十九加至五十九丸陳橘皮湯下空心食前服

和胃丸 治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰

逆噎氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脇刺痛便利不調少

力嗜卧體重節痛及治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞

滿並宜常服老幼氣弱皆可能和中溫脾胃進飲食

李朴 去粗皮切細生 半夏 一兩半湯洗日乾

神麴 麥蘗 白朮 肉桂 各二兩

枳殼 三稜 青皮 人參 各三

訶子 陳皮 檳榔 當歸 各一

芍藥 甘草 赤茯苓 乾薑 各

右為細末煉蜜和丸如小豆大每服二十九加至三十九

微嚼碎用溫水送下不拘時服

大建脾丸 調中養氣和胃健脾治中焦積寒胃膈氣痞嘔逆

惡心腹脇疼痛膈虛滑飲食多傷困倦少力肢體怠惰

少精神

肉桂 李朴 附子 乾薑 丁香

甘草 麥蘗 白朮 訶子 陳皮 檳榔

枳殼 三稜 青皮 人參 芍藥 甘草 赤茯苓 乾薑

胡蘆 附子 木香 葶藶

白芷 麥蘗 人參 白茯苓 白茯苓 去皮

右為細末煉蜜和丸彈子大每服一丸細嚼用溫米飲送

下食前服

吳茱萸丸 大建脾胃胃膈不通胸中順氣方治冬三月陰氣

在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗內消陰火勿令泄

瀉此閉藏周家之大要也盛冬乃水旺之時水旺則金旺

子能令母實若腎之母皮毛之陽元本虛弱更以冬月

助其令致病者善噴鼻流涕涕甚出濁涕不止比常

人大惡風寒小便數而欠或上飲下便泄清而多大便不

調夜寒無寐甚則為痰咳為嘔為噦為吐為唾白沫以致

口開舌澀氣不交通欲絕者此藥主之

吳茱萸 草薺 卷仁 各一分 益智仁

人參 黃耆 升麻 各八分 白殭蠶

澤瀉 薑黃 柴胡 各四分 當歸 身

甘草 六分 木香 二分 青皮 三分 半夏 一分

大麥蘗 五分 橘皮 八分

右為細末用湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服三十九細嚼

用白湯送下無時夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此

病而值此時是天助正氣而勝其邪氣不治而自愈然亦

有當愈而不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈

噎不通咽中如梗甚者前證俱作治法當從時利膈丸瀉

肺火以黃耆補中湯送下如兩足痠厥行步顛然欲飲

倒脾臍如折及作痛而無力或氣短氣促而喘或不得倚

息以黃耆人參甘草白朮蒼朮澤瀉猪苓茯苓橘皮等作

湯送下瀉腎丸一百五十九六七月之間濕熱之令大行

氣短不識言者加五味子麥門冬如心下痞脹悶食不下

以上件白朮蒼朮等湯下消痞丸五七十九更審而用之

溫脾散

青皮 陳皮 縮砂仁 乾薑

舶上茴香 炒 枳實 白芷 良薑

厚朴 各一分 木香 香附子 麥蘗

白朮 各半 紅豆 三分 甘草 一分

右以咀每服三錢水一盞半煮一飯煎七分空心服

大霍香散 大治一切心肺脾胃氣變為萬病服之皆愈盛季

文傳於賀方回云頃在河朔因食羊肝生肝胃泄瀉膿血

仍發嘔吐霍亂心腹脹痛府出冷汗四肢厥逆不可忍色

宰万侯浞懷此藥煎以送再服即定

藿香葉 三兩 白乾薑 半兩 木香 青皮 去白

神麴 炒 人參 去蘗 良薑 炒 肉苳菴 炒

訶子 炒 白茯苓 大麥蘗 炒 厚朴 炒

陳皮 去白 甘草 炙 各

右為細末每服二錢吐逆瀉痢不下食或嘔酸苦水翻胃

惡心並用水一盞煨生薑半塊擘破同煎鹽一捻安盞中

候煎藥七分熱呷水瀉滑瀉腸風疝毒陳米飲熱調入鹽

少許下赤白痢煎甘草黑豆湯下脾元受虛邪變為寒熱

或脾胃虛冷醋心氣脹宿滯酒食噎滿不化膈上不快面

色積黑痰氣作暈頭目眩掉水一盞薑三片棗一枚擘開

同煎七分入鹽少許嚼薑棗湯熱服胃氣吃噎生薑自然

汁半茶脚入鹽點熱呷絕不思食或吃少氣弱膈滿煨薑

一小塊先嚼入鹽點熱呷中酒亦如之一切氣膈變成百

病如上服之不拘時如湯點入鹽薑紫蘇尤佳大能消食

順氣利膈開胃功效不可細述

白朮 沉香 人參 白茯苓 半夏 麴

木香 訶子肉 乾薑 各一分 乾山藥

白朮 各半 丁香 半兩 附子 炮 甘草 大錢

右為細末每服二大錢水一中盞生薑三片棗子一枚木

瓜一片煎七分食前服

桂麴丸 健脾胃進飲食化生冷温中下氣治食少易傷胃

滿惡心或心腹疼痛病後衰弱氣不復常

桂心 陳皮 湯 肉苳菴 炒 縮砂仁

良薑 乾薑 炒 草撥 人參

白朮 各一分 神麴 炒 三兩 丁香 甘草 炒 各

神麴 <small>炒</small>	麥蘖 <small>炒</small>	乾薑 <small>炮</small>	良薑 <small>炒</small>
陳皮 <small>各二兩</small>	枳殼 <small>去穢</small>	肉苳蔻 <small>煨</small>	丁香 <small>各半</small>
右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九食遠溫米飲或白湯送下			
秦綾錦家二十四味養脾丸			
治風冷寒濕邪氣腹脹痞滿刺痛腸鳴泄瀉逆吞酸羸弱困倦無力不思飲食一切脾胃之疾並宜服之			
丁香	沉香	木香 <small>各半</small>	附子 <small>炮去灰</small>
陳皮 <small>去白</small>	大腹皮	神麴 <small>炒</small>	大麥蘖 <small>炒</small>
肉桂 <small>去皮不見火</small>	白木 <small>各半</small>	厚朴 <small>去皮</small>	訶子 <small>去核</small>
人參 <small>去芦</small>	茯苓 <small>各四錢</small>	縮砂 <small>八錢</small>	葶藶 <small>各</small>
白附子 <small>炮</small>	良薑 <small>炒</small>	紅豆 <small>去皮</small>	胡椒 <small>炒</small>
草撥	川薑 <small>炮</small>	甘草 <small>炙</small>	生薑 <small>十四兩切</small>
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼用白湯送下食前服			
六君子湯 治胃膈痞悶脾寒不嗜食服燥藥不得者宜服			
人參	白朮	茯苓	陳橘皮
半夏	枳殼 <small>各半</small>		
右咬咀每服五錢水二盞生薑五片煎至一鍾去滓不拘時溫服			
胃愛散 治脾胃火虛中焦氣滯壅上或有冷涎上潮嘔惡或胃脘疼痛不思飲食			
人參 <small>一兩</small>	白朮	茯苓	丁香
甘草 <small>各一</small>	肉苳蔻 <small>三箇</small>	黃耆	乾薑 <small>各半</small>
右用白米二盞同碾為細末每服二大錢水一盞入生薑一片同煎至七分通口服如臟腑不調加丁香十四粒石			

蓮肉七粒同煎如前法空心食前服			
桂附丸 和脾胃進飲食			
桂心	香附子	厚朴	陳皮
蒼朮	三稜	阿膠 <small>別研</small>	甘草 <small>各半</small>
肉苳蔻 <small>一箇</small>			
右為細末酒煮麩糊和丸如龍眼大每服一丸生薑一塊切開作孔安藥在內合定用濕紙裹煨候熟嚼細鹽湯下			
沉香養脾丸			
沉香 <small>一分</small>	人參	白朮	肉苳蔻 <small>煨</small>
乾薑 <small>炮</small>	縮砂	丁香	木香
甘草 <small>各半</small>			
右為細末煉蜜和丸每兩作十九每服一丸食前細嚼用白湯送下或化下亦可			
連脾散 通中健胃消食快氣			
人參	白朮	藿香	肉苳蔻
丁香	縮砂	神麴 <small>各一</small>	甘草 <small>半兩</small>
右為細末每服二錢不拘時用橘皮湯調服			
安胃丸 治寒邪傷胃溫中補氣安胃進食			
木香 <small>半錢</small>	縮砂	白茯苓	青皮 <small>各二錢</small>
乾薑 <small>炮</small>	陳皮 <small>各三</small>	大麥蘖	白朮 <small>各五</small>
右為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服三十九食前用溫水送下忌冷物			
大黃瀉熱湯 治脾脈厥逆大腹中熱切痛舌強腹脹身重食不下心注脾急痛			
大黃 <small>三兩切以水一</small>	茯苓	澤瀉	
黃芩	橘皮	細辛	芒硝 <small>各三</small>

<p>并草二兩</p> <p>右咳吐除大黃芒硝外以水七升煮至三升三合去滓下大黃更煎兩沸并去滓下芒硝分作三服</p> <p>瀉黃散 治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴頰痛心煩唇口乾燥壅滯不食</p> <p>防風<small>去蘆</small> 藿香<small>七錢</small> 石膏<small>板</small> 縮砂仁</p> <p>山梔仁 甘草<small>半兩</small></p> <p>右吹咀每服五錢水一盞半煎七分去滓食後溫服</p> <p>參附大正氣散 治男子婦人虛弱及墮安後體氣尚虛眼昏暗加淨枸杞子陳菊花菴絲各半常服順氣快脾進羹飲食</p> <p>附子<small>去皮</small> 人參<small>去蘆</small> 木香<small>不見</small> 藿香</p> <p>縮砂仁 檳榔 白茯苓 益智仁</p> <p>沉香<small>不見</small> 草菓仁<small>煨</small> 丁香<small>不見</small> 白木<small>各半</small></p> <p>陳皮<small>去白</small> 香附<small>去毛</small> 肉桂<small>不見</small> 烏藥<small>炒黃</small></p> <p>青皮<small>去白</small> 枳殼<small>去穢</small> 黃菁<small>炒開</small> 厚朴<small>姜製</small></p> <p>粉草<small>各一兩</small></p> <p>右吹咀每服四錢水二盞生薑三片棗一枚煎至八分去滓空心服</p> <p>參麥壯脾丸 治脾胃虛弱胃膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛翻胃吐食上苦吞酸胃薄短氣肢體怠惰面色痿黃及中焦痞悶不任攻擊臟腑虛寒不受峻補或因病後氣衰食不復常或元稟受怯弱不能飲食及久患泄瀉腸胃虛滑者並宜服之</p> <p>人參 茯苓<small>去皮</small> 白朮 肉桂<small>去粗皮</small></p> <p>乾薑 縮砂仁 胡椒 麥蘖<small>炒</small></p> <p>神麴<small>炒</small> 山藥 扁豆<small>炒</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸空心細嚼用白湯或溫酒送下常服育養神氣和補脾胃進羹飲食</p> <p>啓脾丸 治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨脹腸鳴泄瀉不思飲食宜此最佳</p> <p>人參 白朮 青皮<small>湯洗</small> 陳皮<small>湯洗</small></p> <p>神麴<small>炒</small> 麥蘖<small>炒</small> 縮砂仁 乾薑</p> <p>厚朴<small>去粗皮</small> 生薑 甘草<small>半兩</small></p> <p>右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前細嚼用米飲送下</p> <p>升陽益胃湯 脾胃虛弱怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口苦舌乾飲食無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見肺病洒淅惡寒慄慄不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃</p> <p>黃耆<small>二兩</small> 半夏<small>湯洗</small> 人參<small>去蘆</small></p> <p>并草<small>各一兩</small> 防風<small>以辛溫</small> 白芍藥</p> <p>羌活 獨活<small>各五錢</small> 橘皮<small>不去白</small> 茯苓<small>湯洗</small></p> <p>澤瀉<small>加酒</small> 柴胡 白朮<small>各三錢</small> 黃連<small>二錢</small></p> <p>右吹咀每服三錢水三盞生薑五片棗二枚去核煎一盞去滓溫服早飯午飯之間服之禁忌如前其藥漸加至五錢止服藥後如小便嚴而病加增劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚少胃氣不得轉運升發也須薄滋味之食或羹食助其藥力益升得之氣而滋其胃氣也慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可以少後形體使胃與藥得轉運升發慎勿為勞役使被傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣弱</p>
---	---

強少食集以助藥力之經云五穀為養五菜為助者也
 黃耆人參湯 脾胃虛弱必上焦之氣不足過夏天氣熱盛損
 傷元氣急值嗜卧四肢不收精神不足兩脚痠軟過早晚
 寒厥日高之後傷氣將旺候熱如火乃陰陽氣血俱不足
 故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中濁火而
 視物恍惚無所見小便頻數大便難而結秘胃脘當心而
 痛兩脇痛或急縮脐下過如繩束之急甚則如刀刺腹
 雖舒伸胃中閉塞時頭嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌強腰
 背脚脹背痛頭痛時作食不下或食入即飽全不思食自
 汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天氣之熱助本病也乃
 庚大腸辛肺金為熱所乘而作當先助元氣理治庚辛之
 不足以此藥主之

黃耆 一分 人參 五分
 升麻 六分
 精皮 杯去 麥門冬 一分 蒼朮 一分 白朮 一分
 當歸 身 兩錢 炙甘草 五分 五味子 九個 炒
 黃蘗 兩錢 已上各三分
 右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服食遠或空
 心服之忌酒濕麪大料物之類及過食生冷物
 如心下痞悶加黃連三分或
 如胃脘當心痛減大寒藥加草薺冠仁五分
 如脇下痛或痞急加柴胡三分或
 如頭痛目中濁火加黃連三分或川芎三分
 如頭痛目不清利上壅上熱加蔓荊子川芎三分各藥本
 生地黃七分各細辛一分
 如氣短精神疲乏夢寐之間困乏無力加五味子九箇
 如大便澀滯隔一二日不見者致食少食不下血少血中

伏火而不得潤也加當歸身生地黄麻子仁此正也
 批仁三錢湯泡去
 如大便進行所加藥勿再服
 如大便久不便利勿用別藥少加大黃五分
 如不利者非血結血秘而不通也是熱則生風其病人必
 頸風眩暈血藥不可復加之止常服黃耆人參湯藥只用
 羌活防風二味或咀以水四盞煎至一盞去滓空
 心服之其大便必大走也一服便止
 如胃中氣滯如青皮散傳清香可與并去白橘皮楮之去
 其和氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之
 如氣滯太甚或補藥太過病人心下有要滯鬱結之事更
 加木香縮砂仁各三分白豆蔻二分與正藥同煎
 如腹痛不思食者加白芍藥五分黃耆二分却減五味子

升陽除濕湯 始脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹瀉泄瀉無度小
 便黃四肢困倦並宜服此
 蒼朮 一分 半夏 一分 益智 一分 澤瀉 一分
 羌活 一分 防風 一分 神麴 一分 柴胡 一分
 升麻 各半 猪苓 一分 陳皮 一分 麥蘗 一分
 甘草 各三
 右咬咀作一服水三盞生薑三片棗二枚煎至一鍾去滓
 空心服
 益胃湯 治頭暈勞動則微痛不喜飲食四肢怠倦躁熱氣短
 口不知味腸鳴大便微澀黃色身軀昏悶口乾不喜食冷
 蒼朮 半斤 當歸 兩錢 升麻 一分 陳皮 一分
 人參 兩錢 白朮 一分 柴胡 一分 麥蘗 一分
 黃耆 兩錢 半夏 一分 黃耆 一分 甘草 一分

右以咀作一服水二大盞生薑三片煎至一盞去滓食前
稍熱服忌飲食失節生冷硬物及酒濕麪一方用紅花少
許名入參益胃湯

車宜羸丸 治脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮上焦元氣過
冬腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致肺金大勝相輔
而未尅心乘脾胃此大復讐也經云大勝必大復理之常
也故皮毛血脈分肉之間元氣已絕於外又大寒六燥二
氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引而痛鼻息不通
不聞香臭額寒腦痛大惡風寒目時眩不欲開腹中為寒
水反乘痰唾沫食則反出腹中常痛及心胃作痛胸下
縮息有時而痛腹不能勞大便多瀉而少秘下氣不絕或
腹中鳴此脾胃虛之至極也胃中氣亂心煩不安而為霍
亂之漸咽膈不通則噎塞有聲喘喘閉塞或於目陽處

或於喉室中少緩口吸風寒之氣則復作四肢厥逆身體
沉重不能轉側頭不可以回顧小便澀而時躁此藥主之
秋冬寒涼大復氣之藥也

草益慈 用七一分四分 神麩 柴胡 詳腸下痛

黃菁 人參 益智仁 生甘草

吳茱萸 白殭蠶 陳皮 澤瀉 小使數

半夏 麥蘗 桃仁 入湯後去

右除桃仁外餘藥為細末同研勻湯浸蒸餅和丸如梧桐
子大每服五七十九食速用白湯送下甚酌加減
和中丸 治脾胃怯弱陰陽不和三焦氣滯心腹痞悶噎逆痰
甚頭目不清困倦少力飲食減少肌體瘦弱節節頹常
服和中順氣并降陰陽消痰止嘔長肌起困進美飲食

丁香 不見 木香 各半兩
石為細末麪糊為丸如梧桐子大每服五十九食前生薑
湯送下一方用生薑汁煮麪糊和丸食速米湯下

木香消穀丸 治脾胃俱虛不能消化水穀胃膈痞悶腹脇時
脹連年累月食減嗜臥口苦無味虛羸少氣又治胃中有
寒飲食不下翻胃惡心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣
或因兩氣衰食不復常並宜服之

木香 半兩 青皮 洗淨 陳皮 洗淨 焙乾
揀桂 去粗 乾薑 炮各 牽牛 取頭末八兩
右為細末麪糊和丸如小豆大每服十五九加至二十九
不拘時用米飲送下

加減思食丸 治脾胃俱虛水穀不化胃膈痞悶腹脇時脹連
年累月食減嗜臥口苦無味虛羸少氣又治胃中有寒飲
食不下及胃惡心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣或因
病氣衰食不復常並宜服之

神麩 炒黃 麥蘗 炒黃 烏梅 四兩 乾木瓜 兩半
白茯苓 去皮 揀甘草 二兩 枳實 炒

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一九不拘時細嚼用
白湯送下如渴時噙化一九生津液進飲食一方無木瓜
茯苓有人參乾薑

法製薑附丸 治脾胃虛弱
香附子 炒去毛 一斤 用酒洗入銀器中三日夏蒸一日
上水寸餘火取大餅二十箇去皮蒸餅在香附子餅
不見引於五取取大餅二十箇去皮蒸餅在香附子餅

香附子 炒去毛 一斤 用酒洗入銀器中三日夏蒸一日
上水寸餘火取大餅二十箇去皮蒸餅在香附子餅
不見引於五取取大餅二十箇去皮蒸餅在香附子餅

人適一道人曰我受官人供困非所惜但取漢椒二十一
粒浸於漿中盆內一宿漉出還以漿水吞之若是而也張
如所戒明日微熱下腹即脫然更不復作

炙鷄散 治脾胃氣虛腸滑下痢

方見痢門

治脾胃氣冷突食嘔逆下痢赤白如麪糊腰腹作痛

右用豬腎一對細研着胡椒陳皮鹽醬椒末等搜麪如常
法作餛飩煮熟空心喫立瘥

治脾胃氣弱下痢日夜不止腸滑不下食

右用野鷄一隻如常法細切着陳皮椒葱鹽醬調和作餛
飩煮熟空心食之

松脂丸 治脾胃氣不和時有泄瀉食少無力宜

肉苳菴 去殼單撥 縮砂 去皮

人參 去蘆 乾薑 炮 木香 白茯苓

麥蘖 炒黃 白朮 已上各 訶子 二兩 陳皮 半兩 炒 白
右為細末用白蠟鎔和丸如梧桐子大每服三十丸食前
用粥飲送下

六君子湯 治臟腑虛怯心腹脹滿嘔噦不食腸鳴泄瀉

人參 白朮 茯苓 甘草

訶子 煨去 肉苳菴 煨去油已上各 時分

右以咀每服三錢水二鍾生薑三片棗三枚煎至一鍾不
拘時服或為細末用熱鹽湯調服亦可

指臟丸 治臟寒泄瀉飲食不進氣體倦怠

吳茱萸 煨去 鹽 水 浸 下 以

右用豬臟頭一枚去脂膜淨洗將茱萸入臍內兩頭用
線扎定慢火煑令極爛用醃蒸熟尤好二味於臍內搗碎

下令極細丸如梧桐子大每服五十九食前米湯下
麥酒 治胃脘不能飲食耳目不聰明四肢無力冬卧脚冷服
此酒十日後耳目聰明精神充壯

右於八月三日取麥曝燥把之如五升六升把水六石
煮一石去滓釀酒如常法隨多少飲之其功甚速

麥門冬湯 治胃熱腸寒善食數飢小腹脹滿

麥門冬 炮 甘草 炙 各 羌活 白茯苓 去皮

旋覆花 玄參 白朮 柴胡 去苗

白芍藥 人參 升麻 桑根 白皮 剉
當歸 切 焙 各 木香 半兩 胡黃連 一分 乾地黃 兩 半

大腹木香湯 治胃寒腸熱腹脹泄瀉

大腹子 剉 半夏 湯 洗 七 木香 剉 各 枳殼 去 穢

前胡 去 蘆 白芷 剉 肉桂 去 粗 陳橘皮 湯 浸 去

白朮 各 一 延胡索 當歸 切 焙 旋覆花

柴胡 去 苗 芍藥 甘草 炙 各 乾薑 炮

人參 各 三 右以咀每服三錢水一盞生薑三片經棗三枚煎至六分
去滓食前稍熱服

當歸黃連丸 治胃寒腸熱腹脹泄利

當歸 剉 焙 黃連 去 蘆 各 赤茯苓 去 皮 吳茱萸 湯 洗 焙

厚朴 剉 汁 製 訶子 炮 去 木香 已 上 各
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前用米
飲送下 月三

升麻湯 治胃熱消穀善飢不生肌肉病名食併

赤麻 山梗仁 赤茯苓 去皮射干 各三

芍藥 四兩 白朮 五兩 生地黃汁 蜜 各一

右六味咬咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入生地黃

汁半合再煎兩沸次下蜜半匙共煎取一盞溫服

薑棗丸 治胃寒痰逆噎醋吞酸胃膈不利不思飲食

生薑 焙乾四兩 附子 炮裂去丁香 已上各

右為細末用蒸熱棗肉和為丸如梧桐子大每服十五丸

加至二十九不拘時用米飲送下

太醫院經驗奇效良方卷之十七終

太醫院經驗奇效良方大全卷之十八

翻胃門 附論

金匱要略曰發汗令陽微喘氣虛脈乃數上為客熱不能消穀
胃中虛冷故也胃氣無餘則朝食暮吐為反胃又云跌陽脈浮
而濡浮則為虛濡則傷脾脾傷則不磨穀而朝食而暮吐也暮
食而朝吐者宿食不化名曰反胃王水注云以晨食入胃胃虛
不能消化至暮胃氣行裏與邪相搏則食反出也巢氏曰榮衛
俱虛血氣不足停水積飲而在胃腕即臍冷臍冷則脾不磨而
宿食不化其氣逆而成反胃也則朝食暮吐暮食朝吐甚則食
已即吐其脈緊而弦緊為寒弦為虛虛寒相搏故食已即吐曰
反胃經曰食不得入是有大也食入反出是無大也諸書論之
詳矣夫反胃者本乎胃食物所傷嘔吐言胃口翻也多因胃氣
先逆飲酒過傷或積風寒或因憂思怏怏或因蓄怒抑鬱宿滯
滯積聚令痰動擾脾虛胃弱不能消磨穀食遂成此證原其
所自女人得之由血氣虛損男子得之多因下元冷倦又因喜
怒不常驚恐無時氣與痰搏升而不降留於咽噎則成膈噎結
於痰者略之不出噎之不下有大便秘少如羊屎者名結腸反
胃大抵翻胃未嘗不由膈噎而起內經謂陽結謂之膈蓋氣之
與神並為陽也逸則氣神安勞則氣神耗氣神俱擾使陽氣先
結陰氣後亂陰陽不和臟腑生病結於胃膈則成膈氣留於咽
噎則成五噎五膈治之不當歲月因循久則反胃治法氣虛者
補其氣血虛者養其血朝陽陰陽化痰下氣陰陽平勻氣順痰
下其證自平王水又云食痺者食已心下痛陰上然不可忍也
吐以痛止此胃氣逆而下行也若脈更散當病食痺又脈病
傳肝曰肝痺膈痛出食者是也金匱要略又有肝中寒心中風
厥陰之為病三者皆以食入即吐者全在切脈用藥醫者人

之司命可不謹乎且如十膈氣散治冷膈風膈氣膈痰膈熱膈
憂膈悲膈喜膈水膈食膈對其脉證用之取効用之不當取膈
非輕且翻胃不可峻用香燥之劑治之不循次序如抱薪救火
其脉浮緩者生沉瀆者逆在乎審察慎之可也

翻胃通治方

安脾散 治胃氣先逆飲食過傷憂思蓄怒宿食痼癖積聚冷
痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾女人得之皆由血
氣虛損男子得之多因下元虛憊有食罷即吐有朝食暮
吐暮食朝吐所吐酸臭可畏或吐黃水凡有斯疾乃是脾
敗惟當速療遲則發煩渴大便秘水飲不得入口而不旋
踵斃矣

高粱薑 一兩以百等量上土三合散
草葉 去根陳橘皮去白入參 白茯苓
白木 胡椒 丁香 甘草 兩各半
右為細末每服二錢食前米飲入鹽調服鹽酒不可

附子黃耆草葉飲 治翻胃不進飲食
白木 胡椒 丁香 甘草 兩各半
厚朴 去皮姜製
白芍藥 白茯苓 黃耆 去皮
良姜 各一兩 白豆蔻 檀香 甘草 各五分
半夏 湯洗七次

丁香煮散 治翻胃嘔吐
石蓮肉 各十枚 生薑 七片 北棗 七枚
丁香 黃黍米 淘淨
右四味用水洗半煎去滓入黃黍米煮稀粥食之

蘇白粥 治翻胃牙問久新冷熱皆治

蘇白二莖 鷄子三箇 人參 一兩細切以水一
白粟米 三合
右以蘇白鷄子白白粟米三味同煮熟攪勻然後溫熱人
參湯相和調頓服不拘早晚如思食即與粟米粥飲漸
加粳米和之

桂本散 治翻胃發渴
桂心 甘草 各一錢半 赤茯苓 半夏
澤瀉 各二錢
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

養胃湯 治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐
白豆蔻仁 人參 丁香 縮砂仁
肉豆蔻 附子 炮 甘草 沉香
橘紅 麥芽 麥麩 各二錢 粉草 各錢

右為細末每服二錢姜湯下不拘時服
大倉丸 治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之
白豆蔻 二兩 丁香 一兩 縮砂仁 二兩
陳倉米 一升用黃七炒米熟去土不用

右為細末用生薑自然汁法丸如梧桐子大每服百丸食
後用淡姜湯送下

小半夏丸 治翻胃

半夏湯泡 胡椒各等

右為細末生薑汁和丸如梧桐子大每服三十九食遠用生薑湯送下

十膈氣散 專治十般膈氣令膈風膈氣膈痰膈熱膈憂膈悲

膈水膈食膈喜膈
人參去芦 白茯苓 官桂去皮 枳殼去穢炒

甘草炙 神曲炒黃色 麥蘖炒黃 訶梨勒皮煨去

蓬莪木煨 京三稜煨 乾生薑炮 陳皮去白

白朮各一兩 厚朴去皮薑 檳榔煨 木香各半兩

右為末每二錢益一字白湯調如脾胃不和腹脇脹滿用水一盞姜七片棗一枚益少許煎服

膈氣散 治五種膈氣三焦痞塞嘔吐痰逆飲食不下

方見膈噎門

五噎散 治五噎食不下嘔吐痰多咽喉塞噎

方見膈噎門

五膈散 治五種膈氣胃膈吞悶痰逆惡心不進飲食

方見膈噎門

五膈寬中散 治七情之氣傷于脾胃以致陰陽不和胃膈痞

痛停痰氣逆遂成五膈之病一切冷氣並皆治之

青皮去白 陳皮去白 丁香各四 厚朴去皮薑製

白芷去破縮砂仁 木香 香附子炒去毛

甘草炙 右為細末每服二錢不拘時用姜豉湯調服

五浮丸 治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐及久新翻胃皆可服之真良方也

人參 白僵蠶炒去 白朮 乾薑炮

丁香 肉荳蔻炮 檳榔紅 麥蘖炒

檳榔 白荳蔻 南星炮 木香不見火

附子炮去 半夏湯泡 甘草炙

右為細末用白麵一分與生薑自然汁攪和作棊子大餅入百沸湯煮令浮極漉出搗爛和煎藥末為丸如梧桐子

大每服五十九用淡生薑湯送下不拘時服病甚者不過

三服如惡熱藥者去附子大便秘者除肉荳蔻

丁香餅子 治脾胃虛寒痰逆嘔吐飲食減少十膈五噎翻胃

惡心並皆治之

丁香 木香各一 白荳蔻 半夏炮

神交兩半 白朮 白薑 陳皮各一

人參 華澄茄各三 肉荳蔻半兩 甘草二錢

右為細末用生薑汁煮和作餅子如棊子大每服一餅空心嚼細生薑湯送下

化鐵丸 治結腸翻胃兼治蠱脹緊急如鼓妨悶氣促不能坐

即飲食頓減手足乾瘦累治不效者服之立瘥

五靈脂去沙 青皮不去 陳皮各一 兩陳枳米一作陳米

巴豆三十五粒 右各剉先炒五靈脂香透次下青皮炒候色變又下陳皮

亦炒變色却下枳米巴豆炒黃色取出以紙攤在地上出

火毒揀去巴豆不用晉三五粒亦可為細末用好米醋

浸化蒸餅和丸如棊子大每服十五丸加至二十九用葱

湯或茶湯送下婦人醋湯或艾湯送下

千轉丹 治翻胃吐食等病

牛涎半斤 好蜜半斤 木鱉子三十箇 去

右共一處入銀器內用慢火熬以捋條七根攪煨乾為羹
每和白粥兩匙日進三服

鹽粟粥法 治翻胃不下食

白粟粟米二合

人參為末一 生山芋五寸長

右共用水一升二合煮取六合入生薑自然汁及鹽花少

許攪勻分二服不拘時食之亦不妨別物湯丸

甘露湯 治翻胃嘔吐不止飲食減少常服快利胸膈調養脾

胃欣進飲食常州一富人病翻胃往京口甘露寺設水陸

泊舟岸下夢一僧持湯一椀與之飲罷猶記其香味便竟

胸膈少快早入寺知客供湯乃是夢中所飲者胸膈尤快

遂求其方合數十服後疾遂瘥名曰觀音應夢散予得之

常以待賓易名曰甘露湯在臨汀療一人旋愈切勿忽之

乾錫精頭者

生薑連皮用

右拌勻搗爛作餅子或焙或曬乾每十兩入艾草二兩

同研為末每服二錢用沸湯入鹽少許調不拘時服

大効散 治翻胃

田螺殼

二件不以多少在土中多年陳

右每料用田螺殼灰二兩黃蠟殼灰一兩用白梅肉四兩

同搜和作團以砂盒子盛蓋了鹽泥固濟發頂火煨令焦

黑存性取出研細每服二錢人參縮砂煎湯調下陳米飲

亦得如無盒子只以建盞兩隻相合依上法燒食前服凡

竇心腹疼痛即是翻胃以此藥治之

加味青金丹

治清濁不分中焦氣痞若心下牢大如杯或

或熱朝食暮吐暮食朝吐其關脈弦而緊弦則為虛緊則

為寒虛寒相搏此名為格與關格同也是謂之反胃

硫黃

水銀

木香別切

丁香別切

右先將硫黃水銀同研至無星次下木香末丁香末研勻
用生薑自然汁煮糊和丸如梧桐子大每服十五丸食前
用米飲送下

健脾胃丁香散 治翻胃嘔逆氣噎關格不消

淨全丁香 廣木香各一兩

右以咀每服四錢水一盞半煎一盞時先用好黃土和泥

做成枕一箇却以藥灑在土枕內食前服滓依時再煎服

此方因薑椽吳安之得傳於內臺蓋耘夫都事自得之効

本堂試果驗蓋用土枕盛藥取其有脾胃土生助之功

鯽魚散 治翻胃

右用大鯽魚一箇去腸胃膽納綠礬末填滿縫口以炭火

炙令黃乾為細末每服一錢陳米飲調下日三服

螺泥丸 治翻胃嘔噎

右用大田螺不拘多少洗淨磁盆內養令吐出泥用米篩

張灰於地上却將沙皮紙鋪於灰上去已養田螺令泥水

澄清旋去上面清水却將泥傾於紙上候泥乾稠丸如梧

桐子大每服三十九釐香湯下立愈仍將田螺放江中如

殺食之其病則不愈一方用爛殼燒灰服之

治翻胃朝食暮吐暮食朝吐旋即吐者

右用甘藷汁七升生薑汁一升相和打如粉分作三服

又方治翻胃

右用驟小便昔有患此疾每遇食餅或羹粥等須臾吐出

真觀中許奉御弟兄及弟等家時稱名醫奉勅令治盤

竭其術所患竟不能療漸至羸瘠死在朝夕忽有一術士

云服驟小便極驗日服二合後食微吐一半晡時又食二

合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中

五六人患翻胃同服一時俱瘥此物有毒服之不可過多
經取尿及熱服二合病深七日以來服之良後瘥人並瘥
治翻胃始因膈噎所成有痰母蟲瘕 非好手不能治

附子片一兩南星片一兩巴豆二十一粒去皮

右用糯米一兩同炒色變去巴豆入乾薑丁香末各半同

前作末五更早掌中舌蘸乾梨半錢津化橘皮湯一呷下

又方治翻胃噎塞煩悶痰藥不効者

右以蘇合香丸與青州白丸子相和勻用生薑汁丸用薑

根煎湯下或枳殼湯下

又方治翻胃吐黑汁

右用葶澄茄為末米糊丸姜湯下仍令服平胃散三十貼

又方治翻胃

用真阿魏末少加外野人拋下乾糞多作末五更初以姜

片蘸食能起死回生

治翻胃吐食除心胸痰水

右以年深蜆爛殼燒為白灰米飲調下一錢蚌殼亦得

治翻胃

右用附子一枚極大者坐於磚上四面以炭火逼熱淨生

姜自然汁內依前再逼再淨直待生薑汁約至半椀許却

搗為細末每服一錢用米飲調下不過三服瘥

大醫院經驗奇効良方卷之十八

大醫院經驗奇効良方卷之十九

嘔吐噦門 附論

經曰足太陰脾之脈後從胃別上膈注心下是動則病古本強
食則嘔噦解篇云所謂食則嘔者物盛滿而上溢故也卒痛論
云米食客於腸胃厥逆上出故痛而嘔厥陰之病少腹堅痛厥
心病嘔吐食不下入而復出厥甚寒氣入脾念畢而吐至真要
大論云諸嘔吐逆衝上皆為於火又云諸嘔吐酸皆為於熱
靈樞又曰人之噦蓋穀入於胃氣上注於肺寒氣和氣穀氣俱
還入胃新故相和真邪相攻氣併相逆復出於胃故為噦又云
胃氣逆為噦又曰病深者其氣喘逆逆出於胃噦者俱屬於
胃者總司也究其三者之源皆因脾胃虛弱或因寒氣客胃
加以飲食所傷而致胃氣上逆或嘔或吐或噦者皆陰火之邪
上衝而吸入之氣不得入故食不下也邪氣充之火逆胃中而
作者也以其虛火為異耳如噦者陽明也且陽明者多血多氣
故有聲有物氣血俱病也伊景云噦多雖有陽明證不可攻之
徐真人云噦家多服生薑為噦家之聖藥也故以生薑為主或
有形質之物為病者因而噦之可也謂上焦氣壅表突而言之
非以瀉氣而言之也吐者太陽也太陽多血少氣故有物无聲
為血病也有食入則吐以膈紐主之有食已則吐有食又則吐
噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物氣病也治以姜製半
夏朱奉叔治嘔吐噦以生薑橘皮半夏湯是也又有膈噎氣意
食久反出名曰反胃反胃者因脾胃虛寒清穀不化則朝食暮
吐暮食朝吐有隨食而隨出者脈緊者難治蓋六淫之變七
情之逆未嘗不由脾胃而病也故胃為水穀之海上之納水穀
胃若受病飲食不下飲食不行榮衛不和則脈風虛邪犯其陽
飲食飢飽滿其陰則嘔吐之作也乃是足太陰足陽明二經之

病也哉金匱要略曰嘔而心下痞者有嘔而胸滿者有嘔而
 利者有嘔吐較不得入者有嘔吐病在膈上者有胃反嘔吐者
 有食已即吐者有胃反吐而渴者有吐後欲飲食者有嘔吐涎
 沫者有嘔而發熱者有乾嘔手足冷者有嘔而脈弱小便復利
 身有微熱四肢厥者有似嘔不嘔者有似嘔不嘔心中无柰者
 古人論嘔吐噦言之詳矣見證立方詳具于後全在醫者對證
 用藥又有婦人懷妊嘔吐者名曰惡阻各從其類而治之又有
 因時疫亂者當以溫胃養脾之劑外有脚氣攻心嘔吐者此證
 多端所感不一大抵厥病順者生逆者死以厥推之藥不失其
 次序治之必收功矣

嘔吐噦通治方

丁香黃散 治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香 不見 乾姜 炮 川烏 炮去 甘草 炙各

紅豆 去皮 良姜 炮 青皮 胡椒 各一

陳皮 二升 益智 三升

右作一服水二鍾生薑三片鹽一捻煎至一鍾不拘時服

六蘆香散 治七情傷感氣鬱于中交成嘔吐或作寒熱眩暈

痰滿不進飲食

藿香葉 土 半夏 白木 木香 不見火各

白茯苓 去皮 桔梗 去芦到 人參 去芦 枇杷葉 制云已

官桂 不見火 甘草 炙各七

右為末每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎七分溫服

丁香半夏丸 治胃寒嘔吐吞酸酸水

丁香 不見火 白木 半 半夏 湯泡 乾姜 炮

橘紅 各二

右為細末用生薑自然汁煮糊和丸梧桐子大每服五

七十九食遠生薑湯送下

藿香半夏散 治胃虛中寒停痰留飲嘔吐噦逆

藿香 二錢 半夏 湯泡七次 丁香 皮半

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾食前服

丁附治中湯 治胃寒停痰嘔吐不止

丁香 甘草 炙 青皮 炒 陳皮 炒

人參 各五升 附子 炮 白木 煨 乾姜 炮各一兩

右以咀每服四錢水一盞薑五片煎八分空心熱服

理中湯 治感寒嘔吐

方見寒門

旋覆花湯 治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花 去梗半升 橘紅 乾姜 炮各一

檳榔 人參 白木 甘草 各一升

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

香薷散 治伏暑嘔吐

方見暑門

玉浮丸 治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐

方見翻胃門

安脾散 治停飲傷胃以致與食噦酸嘔吐黃水不已

方見翻胃門

藿香安胃散 治嘔吐不止

藿香 半夏 湯泡 厚朴 製汁 蒼朮 湯洗

陳皮 各一 甘草 炙

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

養胃湯 治脾胃虛寒不思飲食翻胃嘔吐

方見翻胃門

半夏湯 治諸噦嘔吐心下堅痞滿間有痰水眩暈

半夏 五子 茯苓 三子

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓入生姜汁再煎二三沸不拘時熱服

三乙承氣湯 治嘔吐水漿不入食即吐大便秘或利而不快時覺腹痛滿悶或下痢赤白而嘔吐食不下者或大小腸膀胱結而不通上為嘔吐

方見傷寒門

沉香煎丸 治嘔吐除中滿痞氣痰逆惡心宿昔成積而黃腹脹臍肺不調水穀不化此藥調順脾胃

沉香

丁香

硫黃 別研

檳榔 通黑煨

胡椒

沒藥 別研

丹砂 別研

硃砂 別研

良姜

青皮 去白

木香 各一

縮砂 半兩

巴豆 去殼心

阿膠 用醋和作餅炙焦

右除別研藥外餘藥為細末入別研藥研勻煉蜜和丸如菜豆大磁盒盛貯每服二丸食前臨卧用溫生姜橘皮湯下更量入虛實大小加減

木香白朮散 治嘔而嘔食謂持實擊強是無積也胃強而乾嘔有聲無物脾強而吐食持實擊強是以腹中痛當以和之一名丁香半夏湯

丁香

木香 各

半夏 麩一兩 檳榔 二子

白朮

茯苓 各五

甘草 四兩

右為細末每服二錢濃煎生姜芍藥湯調下有積而痛手按之愈痛無積者按之不痛一方無丁香

丁香丸 治因食冷物凝滯胃間嘔吐不止

大丁香 半兩 木香

胡椒

藿香

甘草 炙各

乾薑

肉桂 各二

右為細末湯浸蒸餅和丸如菜豆大焙乾時上乾噦不必飲湯水水入口即愈吐如齋養弱更加附子隨意

大養胃湯 治飲食傷脾胃宿食不化朝食暮吐暮食朝吐上氣復熱四肢冷痺三焦不調及胃虛寒氣在上憂氣在下二氣並爭但出入不入嘔不得食

厚朴 去皮

生薑 各二

肥棗 三兩 同

白朮

山藥

人參

川芎

橘皮

當歸

五味子

藿香

枇杷葉 剝去

黃耆

甘草 炙各

右以咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚煎七分去滓空心服或為細末米湯調下亦可

大枳殼丸 治一切酒食所傷胃腸痞悶脇肋脹滿心腹疼痛

飲食不消痰逆嘔惡噎醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼 炙

茯苓 去皮

白朮

厚朴 薑製

半夏 湯泡

人參

木香

青皮 去核

檳榔

陳皮 去白

荆三稜 煨

蓬朮 煨

麥蘖 微炒

神麩 炒各

乾生薑 半兩 牽牛 微炒

大黃 各二

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服一百丸食後用生薑湯送下

麩木丸 治中脘有宿食留飲酸噎心痛口吐清水噎宿腐氣

神麩 炒

蒼朮 木 煨

陳皮 各一

枳殼 各一

右為細末用生薑汁別煮神麩末為糊和丸如梧桐子大每服三五丸不拘時生薑湯送下

十珍餅子 治大人小兒嘔吐痰涎瀉痢雜症無問久近皆治

丁香	沉香	官桂	木香	水浸
肉苳蔻	吳茱萸	木香	水浸	水浸
船上茴香	半夏	生薑	汁製	一兩
右為細末煉蜜和丸如小豆大程作餅子每服十餅不拘時生薑湯下或化服亦得量病加減				
助胃膏	治嘔吐不食			
人參	白木	伏苓	橘皮	
縮砂仁	丁香	木香	肉苳蔻	煨
草菓仁	白苳蔻仁			
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸生薑煎湯化下一物湯	治卒吐逆粥飲入口即吐因弱無力			
人參	拍破			
右以水一大升煎取四合頓熱服兼以人參汁煮粥喫立愈徐即中患反胃諸方不瘥只服參而愈				
炮附子丸	治胃脘有熱胃中有寒嘔吐不止			
右用附子炮去皮脐碾為細末以麩糊和丸如梧桐子大就濕以大黃末為衣每十九加至二十九薑湯送下				
加味二陳湯	治胃熱嘔吐不已			
半夏	陳皮	白茯苓	甘草	
刮筴竹青				
右吹咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去滓不拘時服				
麥門冬湯	療煩熱嘔逆食下則出			
麥門冬	青竹茹	三茅根	生薑	
人參	甘草			
右切以水七升煮取二升五合分溫三服如人行三里送				

一服不吐利忌海藻松菜				
竹茹湯	治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不食			
芩根	半夏	甘草		
右吹咀每服五錢水二盞入竹茹如棗許生薑五片煎至七分去滓服清汁微冷細細服不拘時有熱乎足心熱政和中一人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香霍香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃孫兆竹茹湯正相當爾亟治藥與之即時愈良方槐花散亦相類一方加棗一枚同煎				
加味七氣湯	治氣鬱嘔吐			
半夏	人參	厚朴	辣桂	
茯苓	甘草			
右吹咀每服三錢半生薑七片棗一枚煎至七分去滓服				
加木香煎亦得				
小丁沉丸	治乾嘔和調胃氣			
丁香	白芷	陳皮	沉香	
甘草	生薑			
阿魏	升麻			
右為細末入阿魏膏拌勻用醋煮麩糊和丸如鴉頭實大研丹砂麝香細末各少許同為衣每服一丸細嚼用薑湯送下空心服				
草苳蔻湯	治乾嘔和胃下氣			
草苳蔻	白木	枳殼	陳皮	
白木	山芋	桂心	丁香	
右吹咀每服三錢水一盞棗二枚擘破粟米少許同煎至				

七分去滓食前溫服

生薑丸 治乾嘔惡心 益津液和胃氣

生薑 三兩 和皮切作片以青皮 甘草 炙 各一兩

陳皮 乾薑 各四兩 香白芷 縮砂仁 去皮

胡椒 略一 蓬朮 炮

右為細末以麩糊和丸如小彈子大用丹砂細末為衣每服一丸細嚼溫酒送下食前服

開胃丸 治乾嘔氣逆不止

半夏 麩 三兩 人參 半兩 白豆蔻 去皮 陳皮 去白

白朮 略

右為細末用生薑汁同棗肉和丸如梧桐子大每服二十九加至三十九不拘時用粥飲送下

參粟湯 治乾嘔不下食

人參 一兩 陳粟米 一兩 生薑 五兩

半夏 用生薑同搗碎焙乾

右同入銀石鍋中慢火焙令焦黃粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚去核煎至七分去滓微熱空心服

三聖散 治噦逆不食

半夏 七枚 大者先以錐子穿透心用酒送吞 薑汁 一盞 水 一盞 煎 七 日 取 出 煎 汁

丁香 九粒 胡椒 錢 四

右為細末大人用生薑湯調一字小兒筋頭蘸生薑汁後點藥少許口中立愈至甚者不過三服

石蓮丸 治胃寒噦逆

石蓮肉 去心 附子 炮製去 乾薑 炮 各

右為細末用粟米粥和丸如菜豆大每服十九用蜀椒湯送下噦止勿再服

溫中白朮丸 治胃寒嘔噦

白朮 三兩 半夏 二兩 乾薑 一兩 丁香 半兩

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服三十九不拘時生薑湯送下

思食丸 助脾胃消導飲食止吐逆

烏梅肉 五兩 神麩 炒 麥蘖 炒 各 人參

乾薑 炮 甘草 炙 各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三五十九食前用米飲湯送下

參香枳木丸 開胃進食止嘔吐

人參 木香 各 三 枳實 炒 白朮 半兩

陳皮 四兩 乾生薑 半兩

右為細末用荷葉包米煨飯和丸如梧桐子大每服五七十九不拘時用米湯送下

奇効良方十九卷

新刊太醫院奇效良方二十卷

霍亂門 附論

內經云太陰所至為中滿霍亂吐下河間言霍亂吐下濕為留飲痞滿而傳化失常故甚則霍亂吐瀉也病起于中焦皆因胃暑中熱或因渴大飲或飲而過壅或飢而飽食或食而過度飲食不節寒熱不調清濁相干陰陽乖隔時當夏月風濕勝三氣應之故其邪大作矣風者風木也內應足厥陰肝木濕者濕土也內應足太陰脾土腸者火熱也內應手少陰心火此三經各為顯然之病經言諸傳反戾水液渾濁皆為熱熱氣燥燥於筋故筋轉而痛應風為於肝也故諸轉筋以湯漬之而使腠理開泄陽氣散則愈矣因湯漬而愈俗又疑於寒也又言濕勝則濡瀉瀉為濕土也而脾主濕應濕為於脾也又言諸嘔吐逆皆為於熱王注曰炎熱薄燥心之氣也心火炎上胃腸熱甚故為吐應腸為於心也是則風動肝熱則轉筋水濕傷脾則為瀉腸熱乘胃則為吐三氣雜乃為霍亂又有乾霍亂濕霍亂之分吐利並作邪氣得出名為乾霍亂九死一生且夫人既有入必有出今有其入而不得出者否也塞也此其鬱甚而不通也且東垣發明木鬱則達之意正謂此也如飽食所傷填塞胃中當吐不吐者死也內經五亂篇云清氣在陰濁氣在陽榮氣順轉衛氣逆行亂於胃中是謂大悅亂於腸胃則成霍亂內經又云陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味由此觀之雖五味能養五臟過則亦能傷人之體弱遂感前證長沙公論治之法有所主矣若邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且利熱多欲飲水者五苓散寒多不欲飲水者理中丸原病式曰大法吐利煩渴為熱不渴為寒或熱吐利始得亦不渴者此亡津液後

必渴也或寒本不渴若亡津液過多則燥而渴但寒者脈當沉細而遲熱者脈當實大而數戴人論此死生反掌之說為急病土為風木所剋土化不行也嘗以治驗而斥巢氏論因為寒之非以及方士妄用熱劑誤治而死主以六一散通導脾胃受傷風濕腸三氣為邪於時宜矣故言飲食調養之節大忌飲食太早謂脾胃極損不能傳化穀入於胃則必危矣病安之後宜以粥飲漸之養之大凡霍亂脈大者生沉細而遲氣少不語者為難治也

霍亂通治方

霍香正氣散 治中寒霍亂嘔吐泄瀉

方見傷寒門

通脈四逆湯 治霍亂多寒肉冷脈絕

吳茱萸三錢 附子二錢 桂心不見 當歸

甘草一錢 白芍藥 木通 細辛各半

右作一服用水二鍾酒半鍾生薑七片紅棗一枚煎至一

鍾不拘時服

薑附湯 治中寒霍亂轉筋手足厥冷

方見寒門

七氣湯 治七氣鬱結五臟之間互相刑剋陰陽不和揮霍交

亂吐利交作

半夏湯泡 厚朴 白芍藥 茯苓各二

桂心 紫蘇 橘紅 人參各一

右作一服用水二鍾生薑七片紅棗一枚煎至一鍾不拘

時服

不換金正氣散 治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭眩不止

方見寒門

木瓜湯 治霍亂吐瀉轉筋攪悶

酸木瓜三錢 吳茱萸洗炒各二錢 甘草一錢

右作一服用水二鍾生薑五片紫蘇十葉煎一鍾食前服

桂苓甘露飲 治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂瀉利並治之

方見暑門

枇杷葉散 治中暑轉筋煩渴引飲

方見暑門

二香散 治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香 白木 厚朴 陳皮

茯苓 半夏 紫蘇 桔梗

白芷 香薷 黃蓮 扁豆各一錢

大腹皮 甘草各半

右作一服用水二鍾生薑五片葱白三根煎至一鍾不拘

時服

加味五苓散 治霍亂吐瀉其効如神

即暑門五苓散減桂加蘇木煎

加減理中湯 治霍亂嘔吐

人參 乾薑 白木各三錢 甘草一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

若為寒氣濕所中者加附子一錢名附子理中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青皮各半一名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透即

進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁皮半夏各一錢生薑十片煎

若泄瀉者加橘紅茯苓各一錢一名補中湯

若瀉泄不已者於補中湯內加附子一錢不喜飲食水

不化者再加砂仁一錢

若霍亂嘔吐心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟

附子名四順湯

若傷寒結胸先加桔梗枳殼各半煎服不愈者及諸吐利

後胸痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實白茯苓

各一錢名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加括蔞根一錢

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煨石膏一錢

若臍上築者腎氣動也去朮加官桂半錢腎惡燥去朮恐

作奔豚故加官桂

若悸多者加茯苓一錢

若渴欲飲水者加木半錢

若寒者加乾薑半錢

若腹滿者去白朮加附子一錢

若飲酒過多及啖炙煖熱食發為鼻衄加川芎一錢若傷

胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉只用木方

冷香湯 治夏秋傷暑引飲過食生冷無度脾胃不和遂成霍

亂之證

方見暑門

止渴湯 治霍亂煩渴

人參 去薑 麥門冬 去心 茯苓 去皮 桔梗

瓜蒞根 葛根 澤瀉 甘草各五錢

右為細末每服二錢不拘時用蜜湯調下

回生散 治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮 去白 藿香各半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

既濟湯 治霍亂後虛煩不得眠

麥門冬 去心 人參 各三錢 淡竹葉 一斤 附子 半斤 甘草 各一兩

右作一服用水二鍾生薑五片粳米百餘粒煎至一鍾不拘時服

麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬 去心 白茯苓 去皮 半夏 湯洗七次 橘皮 各一兩

右作一服用水二鍾生薑五片烏梅少許同煎至一鍾不拘時服

白朮散

治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

白朮 茯苓 去皮 人參 藿香 各半斤

葛根 一兩 木香 半錢 甘草 兩半

右為細末每服二錢用白湯調下如煩渴加滑石二兩甚者加薑汁續飲之不拘時服

人參散 止吐逆及治瀉後除煩渴常服調中和氣

人參 半錢 茯苓 二錢 葛根 半錢 藿香 半錢

木香

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

丁香散 治霍亂吐利不止

丁香 桂心 白朮 各半兩 訶黎勒 煨去 厚朴 去粗皮 附子 炮去 良薑 各三錢 陳橘皮 湯洗去 木瓜 乾者 各一兩

右為細末每服二錢不拘時粥飲調下

乾薑湯 治霍亂吐利心腹疼痛氣逆手足冷

乾薑 炮 桂心 去粗皮 附子 炮去 草薹 去皮

木香 高良薑 炒 肉苳蔻 去殼 乾木瓜

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

香薷丸 治冷熱不調霍亂吐瀉

香薷 一兩 白扁豆 炒 寒陵香 赤者 藿香 去梗 木香 各一兩 丁香 皮 二兩 益智仁 一分

右為細末用麩糊和丸如梧桐子大每服二十九食前用溫紫蘇湯下

霍亂證 本自胃經或因寒飲水或傷暑毒或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏故轉筋身痛經絡亂行暴熱吐瀉中焦胃氣所主也察其色脉隨經標本此治霍亂吐瀉之法也

如頭痛發熱邪自風寒而來中焦為熱相半之分邪稍高者居陽分則為熱熱多飲水者五苓散以散之如邪稍下者居陰分則為寒寒多不飲水者理中丸以溫之如吐利後有表者解之汗出厥者溫之

如既吐且利小便利大汗出內外熱者亦溫之如吐下後汗出厥逆不解脉欲絕者四逆等湯治之

如吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜和中四君子湯平胃散建中湯

四君子湯

人參 白朮 茯苓 黃耆 各一兩

右剉如麻豆大每服一兩水三盞生薑五片煎至一盞去滓不拘時服

如吐瀉轉筋頭痛自汗脉虛者四君子湯加桂五錢

如吐瀉轉筋頭痛自汗脉虛者四君子湯加桂五錢

如吐瀉轉筋頭痛自汗脉虛者四君子湯加桂五錢

如吐瀉轉筋頭痛自汗脉虛者四君子湯加桂五錢

如吐瀉轉筋頭痛自汗脉虛者四君子湯加桂五錢

如吐瀉轉筋頭痛自汗脉虛者四君子湯加桂五錢

如吐瀉轉筋脇下痛脈弦者宜

建中加木瓜柴胡湯 平胃散加木瓜 五錢亦可也

桂枝二兩 芍藥二兩 甘草一兩 膠饒半升

生薑半兩 大棗六枚 木瓜五錢 柴胡五錢

右剉如麻豆大每服一兩水三盞煎至一盞半去滓下膠

饒兩匙服

如吐瀉轉筋腹中痛體重脈沉而細者宜

四君子加白芍藥高良薑湯

四君子湯各一 芍藥 良薑各五

同前法煎服

如吐瀉霍亂四肢拘急脈沉而遲者宜

四君子加薑附厚朴湯

四君子湯各一 生薑 附子炮 厚朴各

同前法煎服

如吐瀉四肢厥冷脈微緩者宜

建中加附子當歸湯

桂枝一兩 芍藥二兩 甘草半兩 膠饒半升

附子三錢 當歸三錢 生薑半兩 大棗六枚

同前法煎服

丁香散 治霍亂不止

肉荳蔻去殼木香各一

右為細末每服二錢用白粥飲調熱服不拘時

正胃湯 治霍亂吐利不止

枇杷葉去毛炙厚朴去粗皮陳橘皮去白桂心各半兩

右為末每服二錢匕水一盞入生薑三片煎至六分去

滓不拘時熱服

良薑飲 治霍亂神效

良薑 陳皮各一 甘草三

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分不拘時服

吳茱萸湯 治胃暑伏熱腹痛作瀉或痢并飲水過度霍亂吐

瀉其證始因飲冷或胃寒或忍飢或大怒或乘舟車傷動

胃氣令人上吐下瀉吐瀉併行頭旋眼暈手脚轉筋四肢

逆冷用藥遲慢須臾不救命在頃刻之間

吳茱萸 木瓜 食鹽各半

右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮令百沸入藥煎至二

升已下傾一盞冷熱隨病人服之辛無前藥用枯白礬為

末每服一大錢沸湯調服更無前藥用鹽一撮醋一盞同

煎至八分溫服或鹽梅酸等物皆可服

治霍亂吐瀉臨時無藥

右用生蒜頭研細塗心下及兩脚心

米壺散 治備急霍亂吐利不止

右用高良薑炙令香焦三兩打破以酒一升煮三四沸

頓服亦治腹痛氣惡一方加粳米水煮良薑作粥食之一

方用水煎服

艾熨方 治霍亂吐瀉

右用患人仰卧揉艾鋪臍上如楮子大一指厚熨斗盛火

熨之如無熨斗以鐵子盛湯盪之亦可

訶梨勒散 治霍亂嘔吐脾胃虛冷氣隔不思飲食

訶梨勒皮三錢 澤瀉 赤芍藥

乾薑炮 人參各半 白朮 陳皮湯洗去

厚朴去粗皮薑汁塗炙 甘草一分

右咬咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時溫溫服

桔梗散 治霍亂食不消化嘔吐不止

桔梗 去蘆 陳皮 湯燉去 白木 各一 枇杷葉 去毛

乾薑 炮 良薑 各半 白茯苓 三分 甘草 一分

右咬咀每服三錢用水一中盞入倉粳米五十粒紅棗三

枚同煎至六分去滓不拘時溫服

正氣丹 治下虛陰陽逆霍亂吐利飲食不下

半夏 炮 未生薑汁 薑香葉 各一 硫黃 三分 益肉

水銀 一分 入研黃汁 附子 炮裂去皮

右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大以丹砂末為衣每

服二十九加至三十九不拘時飲送下

丁香散 治霍亂嘔吐不止

丁香 藿香葉 去土 枇杷葉 去毛

右剉碎用水一盞生薑半錢煎七分去滓不拘時熱服

木瓜丸 治霍亂腹中冷氣下利

木瓜 乾者 當歸 切焙 熟艾 微炒 官桂 去粗

人參 各半 陳橘皮 湯浸 高良薑 炒

厚朴 去粗皮 白朮 已上各 木香 半兩 赤石脂 二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用米

飲送下

烏梅散 治霍亂後利不止冷汗出服脇脹

烏梅肉 微炒 黃連 湯燉 當歸 切微 附子 炮裂去

熟艾 已上各 阿膠 湯燉 肉苳菟 去殼 赤石脂 已上各

甘草 兩半

右為細末不拘時以粥飲調下二錢

黃連丸 治霍亂後下利無度腹中疝痛

黃連散

黃連 湯燉 厚朴 去粗皮 生薑汁 各三

當歸 切微 乾薑 炮裂 木香 不見 地榆 各半兩

阿膠 湯燉 一兩

右搗為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二

十九不拘時用粥飲送下

止血湯 治霍亂下焦虛寒或便利後見血

當歸 切微 桂心 去粗 續斷 各三 生地黃 焙

乾薑 炮裂 各 阿膠 湯燉 蒲黃 甘草 各

右搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服日三

赤石脂湯 治霍亂下焦熱結或利下膿血煩痛

赤石脂 四兩 升麻 白朮 各半 烏梅 炮裂

乾薑 炮裂 各 陳廩米 微炒 梔子 仁 各半

右搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓空心溫服

人參散 治霍亂身體疼痛四肢逆冷脈理中四順不效者

人參 去蘆 白芍藥 當歸 切碎 高良薑 炒

附子 炮去 陳皮 湯燉 桂心 白朮 各一

右搗篩每服四錢用水一中盞紅棗三枚煎至六分去滓

不拘時熱服

吳茱萸湯 治霍亂多寒手足厥冷脈絕

吳茱萸 洗半升 當歸 切焙 桂心 去粗 芍藥 各三

細辛 去苗 木通 甘草 各

右剉如麻豆大每服五錢七用水二盞入生薑一棗大切

碎紅棗二枚煎至一盞去滓不拘時溫服如氣痞去棗加

葛根半兩一方無木通有木香

附子散 治霍亂腹滿嘔氣逆手足俱冷

附子 炮裂去 草豈菟 去殼 陳皮 湯燉 高良薑 炒

桂心 <small>各半</small> 甘草 <small>一分</small> 右咬咀每服三錢用水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時熱服	四順附子湯 治吐瀉過多手足逆冷六脉沉細氣少不語急服及治霍亂轉筋肉冷汗出嘔啞 附子 <small>生用</small> 白薑 <small>炮</small> 人參 甘草 <small>各一分</small>	右劉碎每服四錢用水二盞煎至一盞去滓空心服如服痛如桂小便不利加茯苓仍用炒鹽熨臍中一方附子炮去皮臍下甚者加龍骨服痛不止者加當歸	四陽散 治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服此藥四肢漸煖神識便省 右用天南星為末每服三錢入生薑五錢紅棗三枚同煎至八分溫服未省再服	胡椒湯 治霍亂煩悶欲死 胡椒 <small>三十</small> 陳皮 高良薑 桂心 <small>各半</small>	麥門冬 <small>去心</small> 木瓜 <small>各兩</small> 右搗篩每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服	活命散 治男子婦人小兒上吐下瀉霍亂不止面色青黑命欲臨死者宜服此藥 防風 羌活 獨活 乾薑	細辛 <small>各一分</small> 官桂 <small>去粗皮</small> 草薺 <small>各一分</small> 肉苳菴	川芎 <small>各半</small> 吳茱萸 乾木瓜 <small>各一分</small> 右為細末每服三錢濃煎木瓜湯空心調連滓服	抵聖散 治霍亂宿食不消心腹疼痛 白木 <small>二兩</small> 良薑 <small>半兩</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 吳茱萸 <small>湯泡</small>	人參 木香 枳殼 <small>去穢炒</small> 草薺 <small>去皮</small>
---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

陳皮 <small>去白</small> 甘草 <small>各一分</small> 厚朴 <small>去粗皮</small> 生薑 右為細末每服二錢七不拘時用沸湯調服	桃葉飲 治霍亂吐利不止心腹俱痛 右用桃葉秋冬用枝搗二升以水五盞煎取汁每服一盞不拘時溫服肘後方用桃葉三六千金方用桃葉煎汁服一升立止冬月用桃皮	鹽熨法 治霍亂吐瀉心腹作痛 右用炒鹽二握紙包護頭其背前并腹肚上一截以熨斗盛火熨令氣透則甦仍續以炒鹽熨其背鹽湯飲之即止	木香散 治霍亂下利氣脹飲食不消 木香 丁香 白木 <small>炒</small> 山查子	人參 桂心 <small>去粗皮</small> 石菖蒲 吳茱萸 <small>湯泡</small>	陳皮 <small>湯浸</small> 良薑 肉苳菴 <small>去殼</small> 草薺 <small>去皮</small>	白苳菴 <small>仁</small> 甘草 <small>各一分</small> 右為細末每服二錢七不拘時木瓜煎湯調下	白苳菴 <small>丸</small> 治霍亂及脾胃氣虛腹脹妨悶不思飲食 白苳菴 <small>去皮</small> 訶梨勒 <small>去核</small> 人參 <small>去蘆各三分</small> 乾薑 <small>炮裂</small>	甘草 <small>各一分</small> 桂心 <small>各半</small> 白木 厚朴 <small>去粗皮</small> 生薑 <small>各一分</small> 陳橘皮 <small>去白</small>	右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二十丸不拘時生薑湯送下日進四五服	珍珠散 治喜怒不常愛思兼并致臟氣鬱結留聚涎飲胃腹滿悶或腹疼痛增寒發熱吐利交作 附子 <small>生用</small> 半夏 <small>湯浸</small> 辰砂 <small>三錢</small>	成鍊鍾乳 滑石 <small>各半</small> 辰砂 <small>三錢</small> 右為末每服二錢水二盞生薑七片藿香二三葉蜜半匙
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--------------------------------------	--	--

煎七分食前冷服小便不利加水通茅根煎

吳茱萸餅 治霍亂昏塞不利

吳茱萸湯 治霍亂吐瀉 厚朴 薑 陳皮 白朮 高良薑

人參 胡椒 香薷 木瓜

右為細末用生薑汁半升和藥捻作餅子曝乾臨時炙

燥再碾為細末每服二錢七水一盞煎至七分溫服

乾霍亂 附論

夫霍亂者多吐利也乾霍亂者冷氣傳於胃飲食不消但腹滿

煩亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐利名為乾霍亂也

厚朴湯 治乾霍亂

厚朴 去粗皮生薑自然 枳殼 去穢炒 高良薑

檳榔 朴硝 已上各 大黃 二

右搗篩每服三錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服

治命散 治脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹如鼓心胃痰壅

丁香七粒 葛根半兩 甘草炙 生薑半兩

鹽一合

右剉碎用童子小便一盞半煎至一盞去滓分二次溫服

冬葵子湯 治乾霍亂大小便不通手足心俱熱悶亂

冬葵子 滑石 碎 香薷 二 木瓜 一枚 細切

右搗篩每服五錢七水二盞煎至一鍾去滓溫服大小便

通利心中快立 日四五服

中惡霍亂 附論

夫中惡霍亂者客邪內干正氣暴亂使胃中食物不化氣道否

結不得宣通令人心腹卒痛吐利煩悶甚則精神胃味靡所知

識此得之鬼氣所作也

十香丸 治霍亂中惡不識人心痛腹脹不思飲食

一丁香 蘇合香 白檀香 香附子 去

沉香 安息香 研 蒼朮 香 麝香 研

木香 高良薑 龍腦 研 白木 剉 碎

丹砂 研 碎 葶藶 炒 訶梨勒 取 犀角 銹 屑

厚朴 去粗皮生薑汁 右除別研藥外碾為細末入別研藥同研令勻煉蜜和丸

如梧桐子大每服五丸不拘時用溫酒送下老少加減服

甚者溫酒研下日四五服以瘥為度此藥以磁盒貯之

桃枝湯 治中惡霍亂心痛胃膈疔痛喘急

桃東行枝 白皮 切 碎 官桂 去 粗 當歸 三 兩

梔子 仁 樹 四 丹 砂 碎 附子 炮 裂 去 吳 茱 萸 湯 泡

豆 豉 略 一 右剉如麻豆大每服四錢七用水二鍾生薑三片煎至一

鍾去滓不拘時溫服日三夜一

丹珠丸 治中惡霍亂垂死

丹砂 研 半 附子 炮 裂 去 皮 煎 雄 黃 三 兩

右用巴豆七粒去皮心別研出油後入丹砂雄黃附子末

同研令勻煉蜜和丸如麻子大每服三九不拘時米飲下

若下利未止加三九至五九與少冷粥食之即定

白薑蔻丸 治霍亂後脾胃尚虛穀氣未實津液內燥食人煩

躁勝臥不安 白薑 蔻 去 皮 陳 橘 皮 去 白 草 薑 蔻 去 皮 厚 朴 去 粗 皮

官桂 去 粗 乾 木 瓜 白 木 瓜 半 夏 湯 七

人參 去 上 各 高 良 薑 炒 縮 砂 去 皮 陳 麩 炒

麥 蘖 炒 白 茯苓 乾 薑 炮 木 香

桃 仁 去 皮 尖 炒 甘 草 炙 四 兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九至四十九空心用米飲送下

人參散 治霍亂吐利汗出心煩

人參去蘆 麥門冬去心 茯苓各三 白朮

黃耆 乾薑 桂心 甘草各半兩

右搗篩每服四錢用水一中盞生薑半分煎至六分去滓

頻頻溫服

竹瀝飲 治霍亂狂悶煩渴吐瀉無度氣欲絕者

竹瀝一合 粳米一合以水二盞

右二味和勻頻服之

木香湯 治霍亂煩躁懊懣不得安卧

木香 乾木瓜 紫蘇各一兩 草薹各二兩

右搗篩每服三錢七水一盞入黑豆半合許生薑三片煎至八分去滓溫服日二

竹葉湯 治霍亂利後煩熱躁渴卧不安

右用竹葉濃煮汁飲五六合佳

藿香散 治霍亂逆滿開胃口

藿香葉 人參 丁香各十 訶梨勒 煨去核

糯米 石蓮心 甘草 煨去核

右為細末每服一錢用煨和皮生薑一塊棗二枚去滓煎

湯調下早晚食前服

麥門冬湯 治霍亂逆滿不下食食即吐出煩卧不安

方見嘔吐門

白朮散 治霍亂胃氣虛乾嘔不止

白朮 人參去蘆 藿香 枇杷葉 煨去毛

草薹 法皮高良薑 兩各

草薹 法皮高良薑 兩各

右搗篩每服三錢用水一中盞入生薑三片煎至六分去滓不拘時溫服

薤白湯 治霍亂乾嘔不止

薤白 生薑 陳皮 去白

右用水二大盞煎至七分去滓分溫二服

橘皮湯 治霍亂嘔噦不止

橘皮 甘草 枇杷葉 去毛

右搗篩每服三錢七水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服如人行五七里再服

治霍亂轉筋方

附子 白礬 桃枝 葱根 切細

垂柳 川椒 生薑 切細

石以水三斗煎三二十沸已來看冷暖淋多時為妙如急

即加醋五升同煎用之

附子湯 治霍亂轉筋淋足

附子 生椒 生薑 切細

右以水一斗煎三兩沸入磁盆中瀝去滓以鹽漿解之冷

熱得所淋洗立瘥

鹽塌方 治霍亂轉筋入腹

右用鹽三合以水五升煎取三升浸青布塌轉筋上一方

煮令灼灼爾漬手足在胷者湯洗之入腹者倒攪病人

令頭在下腹中平乃止劇者引陰陰縮者必死一方用極

鹹鹽湯 治霍亂中暖瀆之

裏足法 治轉筋入腹氣急煩渴

右用木瓜二箇切破以水五升煎取三升取青布浸湯中

用裏轉筋上如無木以用枝二兩煎亦得或木瓜煮汁服

亦可

治轉筋不止

右用吳茱萸木瓜等分為末溫酒調服

治沙于絞腸危急之甚

右用黑神散以童子小便調服如不止再服立愈

絞腸沙方 有一證心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂之絞腸

沙今考此證乃名乾霍亂此亦由山嵐瘴氣或因飢飽失

時陰陽暴亂而致急用吐法此法救人不一

右用鹽半盞以熱湯數碗泡鹽令患人飲盡後却以鷄翎

掃咽喉間即時吐所飲鹽湯出盡其證即愈

糯米薑水 治上吐下瀉心腹疴痛水食不下

糯米十粒 生薑一塊

右作一處搗細用新汲水解服如倉卒無藥極地坑投水

攪之時渣取清飲之亦可名地漿

灸法 霍亂已死腹中尚有殘氣

右用鹽內臍中灸二七壯仍灸氣海穴

洗法 治霍亂轉筋

右用麥一把去兩頭水煎薰洗一方用陳麥

漬法 治霍亂轉筋入腹

右以菹多用煎湯漬之

大醫經驗奇效良方卷之二十一

諸虛通治

論曰諸虛難經所謂五損因虛而致損也一損損於皮毛皮聚

於肌肉肌肉消瘦飲食不為肌膚四損損於筋筋緩不能自收

持五損上於骨上痿不能起於床反此者至脈之病也從上下

者骨痿不能起於床者死從下上者皮聚而毛落者死損其肺

者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫

損其肝者緩其中損其腎者益其精夫人有五臟要在乎心與

腎而已二者何蓋心屬火火降則血流通四肢和暢腎屬水水

升則精滿神氣盛而肢體和則病不生素問云恬澹虛無真氣

從之精神內守病安從來人能保惜適知固養之道或失調理

或心腎有虧左陽升而不升右陰降而不降稟賦素弱寒暑勞

役或色慾過度俱能損耗真氣以致肌體羸瘦腰膝無力小便

頻而又眩目眩耳聾遺精自汗甚則虛炎上攻面紅喘滿遇熱

難禁或下部濕熱兩腿變生諸證此皆虛勞之病盡力謀為勞

傷乎肝應乎筋極曲運神機勞傷乎心應乎脈極意外過思勞

傷乎脾應乎肉極預事而憂勞傷乎肺應乎氣極矜持志節勞

傷乎腎應乎骨極此五勞應乎五臟之勞極然精極者五臟六

腑之氣衰形體皆極眼視無明齒落髮落體重耳聾行履不正

邪氣入於六腑厥於五臟故成精極大抵虛損勞極之脈多弦

治療之法隨其虛實冷熱而調之精極者當補其精素問所謂

形不足者溫之以氣精不足者補之以味各分門類大略如此

若能保養不妄作勞精神俱備所以天年度百歲乃去不能謹

守不知符滿難保天年臨病之際在乎詳審

諸虛通治

十全大補湯 治男子婦人諸虛不足五勞七傷此藥性溫補
常服生血壯脾胃

人參去蘆 肉桂去粗 熟地黃酒焙 白芍藥

川芎 茯苓去皮 川當歸去蘆 黃耆去蘆

白朮 甘草各二分

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾食前服

黃耆建中湯 治男子婦人諸虛不足羸乏少力此藥大生氣

血補益榮衛

黃耆去蘆 白芍藥四錢 肉桂去粗 甘草二分

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食遠服

三建湯 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脈沉微大小便

滑數凡中風涎潮不省人事傷寒陰證皆可服之

大川烏炮去毒附子炮去毒 天雄炮去毒

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服自汗

加肉桂浮麥各一錢氣逆者加沉香一錢胃冷者加丁香

胡椒各半錢

十四味建中湯 治榮衛失調血氣不足積勞虛損形體羸瘦

短氣嗜臥欲成勞瘵

當歸去蘆 白芍藥 麥門冬去心 黃耆去蘆

人參去蘆 肉桂去粗 熟地黃酒焙 茯苓去皮

肉桂去粗 附子炮去毒 川芎 白朮

半夏湯洗 甘草各一分

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾空心服

人參養榮湯 治積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦而少顏色及

及短氣飲食無味

人參去蘆 當歸去蘆 陳皮去白 黃耆去蘆

桂心去粗 白朮 甘草一分 白芍藥二分

熟地黃酒浸 茯苓去皮 五味子各七分 遠志去心

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前

服遺精者加龍骨一錢咳嗽者加阿膠一錢

鹿茸大補湯 治男子諸虛不足婦人一切虛損

鹿茸酒炙 黃耆蜜炙 肉桂酒浸 杜仲酒炙

白茯苓去皮 當歸酒浸 白芍藥 附子酒

肉桂去粗 石斛酒浸 五味子 白朮

半夏湯洗 人參各七分 甘草一分 熟地黃酒浸

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾空心服

九子丸 強陽補腎益精氣壯筋骨

肉苁蓉酒浸 陽不興女子陰冷不孕五臟虛弱

仙茅 兩錢 補腎壯陽 補虛損 補氣血

無子 兩錢 補腎壯陽 補虛損 補氣血

遠志 兩錢 補腎壯陽 補虛損 補氣血

鹿茸 兩錢 補腎壯陽 補虛損 補氣血

續斷 兩錢 補腎壯陽 補虛損 補氣血

蛇床子 兩錢 補腎壯陽 補虛損 補氣血

巴戟 兩錢 補腎壯陽 補虛損 補氣血

懷香子 兩錢 補腎壯陽 補虛損 補氣血

車前子 兩錢 補腎壯陽 補虛損 補氣血

右為細末用鹿脊髓五條去血脈筋膜以無灰酒一升煮

熬成膏更硬極爛同煉蜜少許和丸如梧桐子大每服五

十九空心用溫酒送下

固陽丹 養氣守神固精壯陽補益真氣常服有效

黑附子三兩 川烏二兩 白龍骨一兩 補骨脂一兩 川練子各一兩

右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服五十九空心

用溫酒送下

固真丸 治諸虛不足常服補益五臟接助真陽潤澤肌膚強

壯筋骨

川烏去鹽 熟乾地黃焙 秦椒 肉桂去粗

茴香炒 五味子 威靈仙 仙靈脾

山藥酒浸 附子炮 白茯苓去皮 當歸酒洗

牛膝酒浸 石菖蒲 草薢各半

右為細末煉蜜和杵千餘下丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒送下

還少丸 大補真氣益損肌解瘦悴目暗耳鳴氣血凝滯脾胃

怯弱飲食無味並皆治之

牛膝酒浸 乾山藥各一兩 白茯苓去皮 山茱萸去核

肉蓯蓉酒浸 遠志去心 茴香炒 杜仲薑汁和酒

楮實子 五味子各一兩 石菖蒲去毛 枸杞子

熟乾地黃酒洗 右為細末煉蜜同蒸熟棗肉和搗三二百杵丸如梧桐子

大每服五十九空心溫酒送下

山九 療元氣虛損血氣不足耳鳴目暗腰膝酸疼肌體羸

瘦飲食無味

肉蓯蓉酒浸 牛膝酒浸 天麻酒浸 木瓜去穢酒浸

附子炮 當歸酒洗 鹿茸酒洗 麝香二錢

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒送下

十精元 升降陰陽既濟水火四補心腎

遠志去心 青鹽炒 破故紙炒 白茯苓去皮

益智仁 兔絲子酒浸 川當歸酒浸 牛膝酒浸

石菖蒲九節 山茱萸去核

右為細末用楨猪腰子一箇去膜切細和酒碾爛同白麩

打糊丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒送下如

小便赤少車前子煎湯下心虛精神不定換神湯下如夜

間煩躁不得睡用酸棗仁末調湯下如心氣盛濃煎麥門

冬湯下一方去石菖蒲加熟地黃一兩用羊腰子為丸

八味丸 治下元冷憊心火炎上渴飲飲水或腎水不能攝養

多吐痰唾及男子消渴小便反多婦人轉胞小便不通

附子炮 桂心去粗 牡丹皮 茯苓去皮

澤瀉酒浸 山茱萸去核 山藥酒浸 熟地黃八兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

湯送下

安腎丸 治腎經積冷下元衰敗目暗耳鳴四肢無力夜夢遺

精小便頻數常服補元陽益腎水

桃仁去皮 白蒺藜炒 巴戟去心 肉蓯蓉酒浸

破故紙炒 茯苓去皮 石斛炙 山藥

草薢 白木略 肉桂去粗 川烏炮

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前用溫

酒或溫酒送下

無比山藥丸 治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦目暗耳鳴常

服壯筋骨益腎水

赤石脂煨 茯苓去皮 山茱萸去核 熟地黃酒浸

巴戟 <small>去心</small>	牛膝 <small>去酒</small>	澤瀉 <small>一兩</small>	杜仲 <small>去皮切生</small>
兔絲子 <small>酒浸</small>	山藥 <small>二兩</small>	五味子 <small>六兩</small>	肉蓯蓉 <small>酒浸</small>
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒送下			
小免絲子丸	治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精常服補益心腎		
兔絲子 <small>酒浸</small>	石蓮肉 <small>二兩</small>	白茯苓 <small>去皮</small>	山藥 <small>二兩</small>
右為細末用山藥黃糊和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒送湯任下			
還少丹	補虛勞益心腎生精血		
牛膝 <small>酒浸</small>	白茯苓 <small>去皮</small>	山茱萸 <small>去核</small>	舶上茴香 <small>炒</small>
山藥 <small>酒浸</small>	兔絲子 <small>酒浸</small>	肉蓯蓉 <small>酒浸</small>	遠志 <small>去心</small>
北五味子	楮實子	巴戟 <small>去心</small>	熟地黃 <small>酒浸</small>
川續斷	杜仲 <small>去皮切生</small>	山藥 <small>二兩</small>	
右為細末煉蜜和丸如梧桐大每服五十九用鹽湯送下食前服			
黃耆 <small>十兩</small>	補虛勞養血氣		
黃耆 <small>各半</small>	當歸 <small>酒浸</small>	熟地黃 <small>洗</small>	茯神 <small>去皮</small>
沉香 <small>各半</small>	木香 <small>各半</small>	麥門冬 <small>去心</small>	天台烏藥
肉桂 <small>去粗皮</small>	北五味子	半夏 <small>薑制</small>	酸棗仁
白朮	人參 <small>去蘆</small>	白芍藥	陳皮
甘草 <small>一兩</small>			
右作一服用水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾食前服			
黃耆 <small>六一湯</small>	治虛勞自汗		
黃耆 <small>各半</small>	甘草 <small>一兩</small>	加白朮	白芍藥 <small>各二</small>
右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾不為			

時服	黃耆益損湯	治諸虛勞倦
黃耆 <small>各半</small>	白芍藥	白朮 <small>煨</small>
當歸	川芎 <small>各一</small>	肉桂 <small>去粗皮</small>
半夏 <small>薑製</small>	甘草 <small>各一</small>	木香 <small>四分</small>
右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服有熱加柴胡一錢		
大建中湯	治諸虛不足小腹急痛脇肋脹骨酸疼短氣喘咳痰嗽潮熱多汗心下驚悸腰背疆直多卧少起	
黃耆 <small>去蘆</small>	附子 <small>炮去</small>	鹿茸 <small>去毛</small>
石斛 <small>去根</small>	人參 <small>去蘆</small>	當歸 <small>酒浸</small>
續斷	川芎	小阜 <small>各一</small>
右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服咳嗽者加款冬花蜜血者加阿膠便精道泄者加龍骨怔忡者加茯神		
鹿茸 <small>四斤</small>	治肝腎虛極熱淫於內致筋骨痠弱不自勝持起君無力足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生	
氣力諸虛不足		
鹿茸 <small>去皮毛</small>	肉蓯蓉 <small>酒浸</small>	天麻 <small>去蘆</small>
牛膝 <small>酒浸</small>	熟地黃 <small>酒浸</small>	杜仲 <small>酒浸</small>
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用溫酒或米湯送下		
葫蘆巴丸	治虛損之疾不可醫者極能開鎖精氣升降陰陽功效如神	
葫蘆巴	附子 <small>炮去</small>	川烏 <small>炮去</small>
當歸 <small>去蘆</small>	巴戟 <small>去心</small>	天雄 <small>炮</small>
		川芎

酸棗仁 補子仁 夫鼓破故紙 牡蠣煨
龍骨 赤石脂 鹿茸 酥炙 茴香

澤瀉 半兩 硫黃 七錢半

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服五十九空心用
鹽湯或米飲送下日二

雙芝丸 治諸虛補精氣填骨髓壯筋骨助五臟調六腑久服
駐顏不老

熟地黃 取末 石斛 去根 肉蓯蓉 酒浸 兔絲子 酒浸
牛膝 酒浸 黃芪 四兩 杜仲 酒浸 五味子 焙
薏苡仁 二兩 沉香 二錢 麝香 二錢 藥鹿角 霜半斤
白茯苓 去皮 天麻 酒浸 乾山藥 覆盆子
人參 木瓜 秦艽 已上各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三四十
丸用溫酒下鹽湯米飲亦得九年五十已者加入

黑附子 以青鹽湯 鹿角 一對 去硫黃 半斤
右用麻油盆中以水同煮常令微沸勿大急其水耗只旋
添溫水預用水以備添之煉令角膠汁盡其角如霜以手
捻如膩粉乃盛之取用勿令穢汚着也一方無山藥

玉關丸 治諸虛不足勝脫腎經痛敗陰陽不交致生多病水
欲升而沃心火欲降而溫腎如是則坎離既濟陰陽協和
火不炎而神自清永不紊而精自固久服閉精補益永無
膏淋白濁遺精之患功效難述

鹿茸 去毛切 栝子仁 別 遠志 各二兩 兔絲子 水淘研
杜仲 酒浸 五味子 各一兩 石斛 酒浸 牛膝 酒浸
茯神 去木 肉蓯蓉 酒浸 黃耆 酒浸 當歸 酒浸
巴戟 去心 沉香 一兩 砂 一兩

附子 七錢 重者四錢 去皮切下頂刺去心
木瓜 二兩 大者去皮切下頂刺去心
石為細末用木瓜膏拌和入少酒糊為丸如梧桐子大每
服七十九空心溫酒鹽湯米飲任下一方無當歸

沉香續斷丸 治骨體傷敗補虛益
沉香 對 續斷 石斛 去根 牛膝 去苗
懷香子 煨 補骨脂 微炒 蘇澄茄 山茱萸 去核
防風 去叉 熟地黃 焙乾 白茯苓 肉蓯蓉 酒浸
杜仲 各三兩 官桂 去粗 鹿茸 去毛 兔絲子 酒浸
附子 去皮 石龍芮 澤瀉 巴戟 天 去心
桑螵蛸 炒 五味子 苦窮 覆盆子
木香 二兩

右為細末用酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服三十九空
心用溫酒或溫鹽湯送下

直菴香湯 治脾胃諸虛百損氣血重傷陽氣久衰下寒陰
汗中脫停痰心腹痞悶疼痛嘔噦食困倦泄瀉腸滑因
病虛損正氣不復婦人月信不調或產前產後一切陰虛
陽虛之證並皆治之

肉苳蔻 縮砂仁 益智仁 人參 各
藿香葉 桂花 甘松 茯苓 去心
五靈脂 紅豆 官桂 枇杷葉
芍藥 各半 川芎 白芷 白朮 各二
桔梗 半兩 當歸 三兩 厚朴 薑製 四兩 陳皮 去白
乾薑 五兩 甘草 炙 五兩 蒼朮 半斤 木香 半斤
右為細末每服二錢食前用生薑紅棗煨煎湯調下日進

二服或用薑棗煎和津服亦妙如因產病後氣不復常
虛勞損弱者久服見效

水芝丸 補虛益損
運實去皮不以多少酒浸一宿大於指

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服五七十九食前
用溫酒送下

牛髓丸 通治百病虛癯羸乏

牛髓研 羊髓研 棗膏 白蜜

酥一升 麥門冬去心 桂心 當歸

苦菊 茯苓一升 羌活 甘草各三

生地黃 乾薑各三十 五味子 人參

防風各一 細辛各一 白朮四十

右以麥門冬等十四味為細末別研棗膏和散次與牛髓

等和攪令相得內銅鉢中於釜沸湯中煎待堪為丸如梧

桐子大每服三十九粒加至四十九粒空心溫酒下日再服

參香散治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情思不樂夜多異夢

盜汗失精恐洩遺精喜怒無時口乾咽燥渴飲飲水飲食

減少肌肉瘦悴漸成勞瘵常服補精血調心氣進飲食安

神守中功效不可盡述

人參 黃耆 白茯苓 連肉去心

白朮 山藥各一 縮砂仁 烏藥

橘紅 乾薑各半 甘草各三 南木香

檀香 丁香各一 沉香

右對散每服三錢水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾去
滓食前服一方用炮熱附子半兩或為細末每服一匙
前用蘇益湯調服亦可

接氣丹 治真元虛憊陰邪獨盛陽氣暴絕或大吐瀉久痢虛

脫等病除同黑錫丹治伏此藥尤佳

沉香 硫黃如黑錫丹法 黑錫法

牛膝酒浸 白朮 茯苓酒浸 丁香三錢

川練子去核 木香 茴香 肉苳蔻煨

破故紙炒 桂心去粗 附子炮 胡蘆巴炒

陽起石煨

右藥并砂子四兩並為細末和勻用糯米粉煮糊為丸如

梧桐子大每服五十九粒空心用溫酒或益湯送下

枸杞煎丸 補虛益氣為誌

枸杞根葉花 皮不 以多少於木臼中搗爛水煮一伏時

肉蓯蓉切 附子炮 白朮各二 熟地黃煨

何首烏切 附子炮 補骨脂炒

右為細末以煎膏和丸如梧桐子大每服三十九粒空心用

溫酒送下

天真丸 治先曾損血及脫血肌瘦行步不得手足痿血氣枯

槁形神不足如滑腸絕不入食守死無法可治者如咽候

窄下食不得只能五七粒漸漸服之粒數多便可養起久

服令人面色紅潤無血者便生血并津液大便燥者服之

自潤實中有虛虛中有實皆可服之

羊肉七斤 精者去筋膜 肉蓯蓉 濕山藥去皮

當歸洗淨 天門冬煨 加一升

右四味置肉內裹定用麻縷纏用上等糯米酒四瓶煮令

酒盡再入水二升又煮直候藥肉爛搗如泥再入

黃耆末五兩 人參末三兩 白朮末二兩

右以熟糯米飯焙乾為末一十兩前後藥末同劑為丸

樂難丸入宿蒸餅五七枚焙乾為末同搜和入臼中搗千
百杵丸如梧桐子大空心用溫糯米酒送下一日約服三百
粒初服百粒旋加九數服之定覺有精神美飲食手足添
力血脈使行輕捷如久瘖不言者服半月語言有聲或血
下咳嗽行步不得服之必効

交感丹 夫世人中年精耗神衰蓋緣心火少而火不能下降
腎氣憊而水不能上升至心中隔絕榮衛不和所苦者上
則心多驚怖中則寒瘕飲食減少下則虛冷遺泄瀉醫徒
知峻補下田非惟不能生水滋心而徒傷其真氣見衰悴
夫折之由當自此始此方志心服之半年漸弄去一切燥
藥不可恃此而馳嗜慾然後力習秘固流之術其神効
不可殫述俞通奉遺訓子年五十一歲遇鐵籠申先生授
此秘術酷志行持服大補而飲食嗜好不減壯歲乃此藥
方之功大矣今年八十五享天然之壽瞑目無憾猶此藥
耳晉示群生固登壽域

扶神四兩 香附子 一斤搗去毛用新
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九空心細嚼用後
降氣湯藥下

降氣湯 益氣清神
扶神二兩 甘草一兩 香附子半斤搗去毛用新
右為細末熟湯煎二錢送下交感丹

肉桂藥丸 治下部虛損腹內疼痛不喜飲食此藥平補
右用肉桂藥二斤酒浸三日細切焙乾為末分一半用醇
酒煮作膏和一半末入臼中搗五百杵丸如梧桐子大每
服二十九加至三十九空心用溫酒或米飲送下
雙和湯 治男子婦人五勞七傷血氣不足面色萎黃四肢倦

老得為虛勞之證常服養氣益血
當歸酒洗 熟地黃酒洗黃耆去蘆薑黃各三兩
川芎二兩 甘草炙 肉桂去皮不剝各半
白芍藥七兩

抱殘丸 治男子諸虛不足氣弱吐痰及脚氣腰疼下元虛冷
右吹咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎空心服
女人頭風並皆治之

大附子炮裂去皮臍 蒼朮三兩用米泔水
南木香不見天麻酒洗 大川烏各半兩
右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服三十九空心
用溫酒或溫益湯送下頭風食後葱酒下
沈香赤壽丸 大補元陽滋益脾胃調順血氣添補精髓不問
老壯年少並宜服之甚有功效不備不燥大梁郭文卿尚

書常服此藥年過八十精力倍加得其方者服之俱効
蓮肉一斤先用酒浸一日後裝入磁瓶內燒令熟
茅山蒼朮一斤分作四分一分酒浸一分水浸一分
好者剉去粗皮代之 白茯苓四兩 沉香

熟地黃 木香 五味子 小茴香
川練子炮取 西狗祀 山藥 栝子仁炒另
破故紙用老麻已上各二兩同研為末 青蘆半兩
右為細末用酒煮糊和丸如梧桐子大每服五十九加至
七十九空心用溫酒或溫湯送下以乾物壓之

十精丸 大補虛冷接引真氣
巴戟天酒洗 人參 菊花精 肉桂藥丸酒洗
五加皮酒洗 石斛酒洗 栝子仁 兔絲子酒洗
鹿茸酒洗 白木香

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前用米湯送下

天雄丸 補峻元陽添益精氣利腰脚強筋力

天雄炮裂去肉桂皮去茯苓酒浸一宿去乾姜二兩附子炮裂白朮四兩

破故紙酒浸雄雞一隻兔絲子酒浸三日鹿茸酒浸各一兩

右為細末以雀卵并少煉蜜和丸如梧桐子大每服十九加至二十九空心用溫酒送下

秋蓮丸 治諸虛百損壯筋骨健脾胃去痰涎除風濕添精益氣和血駐顏年牙齒為髭髮理腰疼瘰癧氣功不可具述

蓮肉一斤先用酒浸一宿特選入於豬肝內煮

蒼木一斤用酒浸一宿特選入於豬肝內煮

木香五分 五味子一分 枸杞子一分 熟地黃一分

牛膝五分 肉桂一分 鹿茸一分

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒送下

一烏二木三茴香 更加椒棟牡香蓋

善治耳聾并日暗 能調榮衛壯元陽

元陽壯後精神爽 又服令人壽命長

又療婦人脾血疾 空心日午用溫酒

何首烏酒洗 茴香酒洗 川椒酒洗 川棟子酒洗

牡蠣酒洗 白薑酒洗 蒼木酒洗 香附子酒洗

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫酒送下

用溫酒送下小腸氣用溫酒送下

玉霜丸 治男子元陽虛損五臟氣衰夜夢遺泄小便白濁

下冷痛陽事不舉久無子息漸至羸瘦變成腎勞眼昏耳鳴腰膝酸疼夜多盜汗並宜服之自然猜元開固內施不

泄留濁去清精神安健如婦人子宮久冷月水不調赤白

滯濁而生點睛髮退不生肌肉乾黃容無光澤並宜服之

大川烏酒洗 附子酒洗 川椒酒洗 川棟子酒洗

破故紙酒洗 巴戟酒洗 茴香酒洗 各一兩

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服三十五九空心用溫酒或益湯送下一名張走馬玉霜丸

補精膏 壯元陽益真氣助胃潤肺

牛髓一斤 胡桃一斤 杏仁一斤 桑葉一斤 共搗成膏入煉熟蜜一斤與牛髓和勻入磁罐內沸湯煮一日每日空心服一匙

法製蝦米起陽補腎

蝦米一斤 去衣用青蓋其蛤蚧青蓋酒炙鹿

右酒須用澄濁美酒二升帶浮蛆曬酒最佳攪入青蓋製

用先製蛤蚧椒皮茴香乾却製蝦米以酒盡為度候香熟

取前三味同和勻用南木香粗末二兩同和乘熱收入以

器內四圍封固候冷取用每服一勺空心細嚼益酒下

藥角霜丸 補峻元陽壯元陽

藥角一斤 內以水浸一日去其皮更添蜜直在一銀瓶

右為細末蒸棗肉和丸如梧桐子大每服十五九至二十

九空心用温鹽酒送下一方煉蜜為丸

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈似足陽

虛氣弱之證並皆治之

人參 半兩 附子 一兩

右剉散分作三服水二盞薑十片煎七分去滓食前温服

鹿茸酒 治虛弱陽事不舉面色無光小便頻數不思飲食

嫩鹿茸 半兩 乾山藥 一兩

右以生薄絹裹用官酒一瓶浸七日後開瓶飲酒日三盞

為度酒盡再埒酒一瓶浸喫了却將鹿茸焙乾留為補藥

內用之極妙

沉香既濟丸 滋補下元調順諸氣能令陽事壯健飲食加進

其功異乎諸藥其方得於桑奇丞相家人所傳用無不効

沉香 木香 青鹽 川棟子

八角茴香 肉桂 杜仲 小茴香 青鹽 胡椒 胡椒 胡椒

右為細末入別研藥末和勻酒煮麪糊和丸如梧桐子大

每服五六十丸空心用好酒送下以乾物壓之大有神効

忌食生葱蘿蔔豆粉諸血恐泄其真氣也

加味青蠟丸 補諸虛不足陰陽道衰滋陰氣悅容顏

杜仲 三兩 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒

小茴香 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服三十九空心用温

酒送下以乾物壓之

益中丹 益真氣補虛德下元傷竭臍腹疝痛兩脇脹滿飲飽

益氣調中耐飢強志

益精氣強志意以利耳目

右以雞頭實三合黃令熟去殼研如膏入粳米一合煮粥

空心食之

益氣調中耐飢強志

減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步艱難目視眩紅

夜夢鬼交遺泄失精神氣不舉陽事不舉小便滑數氣虛

腸鳴大便自利虛煩盜汗津液內燥並宜服之

鹿茸 酥炙 丁香 木香 茴香 炒

黃耆 蜜炙 山藥 石斛 乾薑 炮

木通 油炒 青鹽 天雄 炮 附子 炮

官桂 去皮 肉苁蓉 川牛膝 酒浸 鴉管 石 酒 炮

箔薑 巴 炒 覆盆子 克絲子 酒浸 陽起石 酒 炮

全鈴子 去核馬蘭花 熟地黃 酒浸 破故紙 炒

肉苁蓉 酒浸 韭子 酒浸 筆澄茄 炒 麝香 三字

沉香 火 不見 人參 絡

右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十九加至

五十九空心用温酒送下昔宋孝宗賜新安郡王只珍傳

吳武穆傳送義有提轄兼備合藥局官周禮被罪放罷

押付興化府中軍入隊使喚吳彥是時任中軍統制年三

十七患虛憊冷病為飲酒過多食牛凍所傷服此藥三十

五年間服養氣丹今鬢髮不白皆此藥之功

鹿血酒 服之令人血氣充盛

右以生鹿血和酒服之昔有人服鹿血酒云得於射生者

因採捕入山失道數日飢渴將獲頃獲一生鹿刺血數升

飲之飢渴頓除血充盛異常人有効其服解刺鹿

血酒和飲之更佳

益精氣強志意以利耳目

右以雞頭實三合黃令熟去殼研如膏入粳米一合煮粥

空心食之

益氣調中耐飢強志

益精氣強志意以利耳目

益氣調中耐飢強志

右以葡萄酒釀酒服取藤汁釀酒亦佳狗肉汁釀酒大補
補骨脂煎丸 補虛益血脈

補骨脂 附子 炮製去 葫蘆巴 微炒 白檳榔 炮製

巴戟去 心各 沉香 半兩 桃仁 升去 別皮 尖 及 雙仁 以酒

中藥五 七 沸 吹 入 白 蜜 二 兩 又 煎 五 七 沸 入 交 息 香 半

兩 以 酒 半 盞 研 細 入 煎 內 煎 入 糖 骨 脂 末 熬 成 膏 半

右五味為細末以前膏和丸如梧桐子大每服三十九空

心用生薑鹽湯送下

全鎖丹 凡人中年之後急務建助秘真之術以代殘年不衰

矣每日一服至盡無廢之理其功不可具述

桑螵蛸 微炒 晚蠶蛾 微炒 蛇床子 微炒 紫稍花

鹿茸 煎炙 川茴香 炒 遠志 半兩 各 川山甲 炙黃

乳香 半錢 續斷 三錢 木香 半錢 麝香 研 錢

黑牽牛 頭 兩 微 炒 取 石 燕 子 醋 對 炭 火 燒 赤

右為細末用酒煮薄麪糊和丸如梧桐子大每服五十九

空心用溫酒送下及晚食前各一服其功不可言也如作

末酒調服亦可

洞陽丹 補真氣去風冷通血脈

附子 天雄 烏頭 醃 一 鍾乳粉 一分

右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三

兩丸空心用溫酒送下

金櫻丸 補血益精

金櫻子 各 山 石 榴 乾 了 以 草 鞋 穿 內 縮 砂 二 兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒或鹽湯送下

秋石丸 益精生血補心腎

秋石 一兩 白茯苓 人參 當歸酒浸

龍骨煨 山藥 半兩 各 鹿茸 二兩 大附子 炮製

沉香 半錢 辰砂 半錢 別研 入 茶

右為細末鹿角煮酒為丸如梧桐子大每服三四十九空

心用溫酒或鹽湯送下

茸附煎丸 治諸虛百損生精補血

鹿茸 炮製 肉苁蓉 牛膝 洗 熟地黃 洗

當歸 洗 巴戟 去 心 續斷 炮製 上 七 味 各 四 兩 作 乾

茯神 去 木 川練肉 苜香 炒 各 大附子 炮製

破故紙 炒 官桂 去 粗 皮 五味子 沉香 不見

杜仲 炒 去 皮 碎 生 薑 汁 拌 川 椒 炒 木香 各 一

蒼朮 炒 入 兩 米 泔 水 浸 一 宿 洗 去 沙 上 切 片 用

壳絲子 炒 入 兩 洗 去 沙 土 酒 浸 一 宿

右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十九食前

用溫酒或鹽湯送下日進二三服常服甚妙

藥角鹿茸丸 治真陽不足脾胃虛寒下焦傷德臍腹疼痛兩

脇脹滿手足麻痺目視眩暈遺泄失精七神不爽陽事虛

弱小便滑數氣虛腸鳴大便自利耳內常鳴久服益脾元

壯腎氣助真陽補虛損散寒濕養氣血大補元陽

藥角餅子 鹿角霜 各 半 鹿茸 酒 浸 石 菖 蒲 九 節

鍾乳粉 覆盆子 石斛 蛇床子 酒 炒 香

當歸 洗 肉桂 去 皮 山 藥 金 鈴 子 酒 炒

山茱萸 柘子 仁 研 細 續 斷 葶 藶 去 殼 炒

附子 炮製 去 皮 以 地 澤 瀉 二 兩 上 各 杜 仲 三 兩 炒

白茯苓 去 皮 天 雄 去 皮 五 味 子 炮 製 人 參 去 蘆

檳榔 葫蘆巴 酒 浸 另 研 防 風 去 蘆

細辛 炮製 各 破 故 紙 酒 浸 另 研 天 門 冬 去 心

九空心用溫酒送下

椒紅丸 壯筋骨益血味悅顏色

蜀椒去目并合口者 牛膝去苗用酒浸

石斛去根 巴戟去心 吳茱萸湯洗 硫黃細研

桂心去粗 木香已上各 附子炮去 羌活去蘆 赤小豆炒

鹿茸去毛 茯苓酒浸去 磁石飛已上各二兩

生地黃五兩取汁

右為細末入別研藥和勻煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐

子大每服三十丸空心用鹽湯送下

補骨脂丸 煖下元壯筋骨又服令人強健悅澤顏色及治因

感濕陽氣衰絕並宜服之

補骨脂五兩微炒香 白蜜白兩 胡桃肉二兩研

右將蜜胡桃肉同熬如稀飴後入補骨脂末和丸如梧桐

子大每服三十九空心用溫酒送下一方煉蜜和勻如飴

盛磁器中旦日以溫酒化服一匙熱水亦得又服延年益

氣忌芸薑羊血

刪繁本草注云補骨脂今多以胡桃合服此法出於唐鄭

相國自序云予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於

內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥百端不應元

和七年有訶陵國舶主李摩訶知予病狀遂傳此方其藥

予初疑而未服摩訶稽顙固請遂服之經七八日而竟應

驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸錄傳之

破故紙十兩湯浸去皮細研如泥即入前藥更以好酒

和攪令勻如錫糖盛於磁器中旦日煖酒二合調藥一

匙服之便以飯壓之不飲酒人煖熱水調服亦可彌久

則延年益氣悅心明目補添筋骨但忌食芸薑羊血餘

無所忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人

地仙丸 治風氣補元陽活血壯筋骨潤肌膚聰耳目延壽

黃耆對炒 天南星炮 羌活去蘆 懷香子炒

地龍去土 骨碎補炒 防風去叉 赤小豆炒

狗脊去毛 白蒺藜炒 烏藥去木 白附子炮

附子炮去 草薢已上各 牛膝酒浸 肉蓯蓉酒浸

何首烏皮去 覆盆子去蒂 蜀椒出汗已上各一兩

木鱉子三分

右為細末酒煖麩糊和丸如梧桐子火每服二十九空心

鹽湯或茶酒任下男子又冷元氣虛憊脚手疼痛等疾皆

可服之

茯苓丸 治腎虛補元陽除諸風益脾胃

烏頭一斤炮裂去皮入米泔浸七日取出

片如錢大 黑豆一斤 石菖蒲切 黃芩切

三兩同搗為末 牛膝酒浸 白朮切 熟地切

右以烏頭牛膝士入後藥膏并和丸如兩君子大每服一

九細嚼溫酒下日二三服永絕脾胃冷氣

代灸膏 治男子下焦虛冷真氣衰弱泄痢腹痛氣短不食老

人元氣衰弱虛冷臍腹虛滑腰脚冷痛沉重飲食減少手

足逆冷不能忍者此灸方其功不賦盡述

附子一兩 吳茱萸 馬蘭花 蛇床子分

肉桂二錢 木香一錢

右為細末每用一匙以生薑自然汁入少麩調藥在

一書一第 升 八日 反之內

上貼臍并臍下覺腹中熱為度一方用大附子一箇馬蹄
花一两木香等四味冬半兩如腰痛依前法製貼腰腹一
方煎成膏攤於紙上臨睡貼臍以油紙覆其上綿衣繫之
自夜至明刀去每夜如此貼之其腰腹如灸百壯除寒積
腰疼貼腰服

肉蓯蓉丸 沿下元火冷水臟傷意風屋勞損不思飲食久服
駐容顏烏髭髮益精神生氣血

肉蓯蓉 酒浸三日 巴戟 酒浸三日 蛇床子 炒
熟地黃 鍾乳粉 天雄 炮炙 五味子

桂心 人參 去蘆 乾薑 炮炙 白朮
遠志 去心 杜仲 去粗皮 已乾 去心 牛膝 去苗

山茱萸 去核 覆盆子 川椒 炮炙 各一兩
甘草 兩半 天門冬 去心 小半

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十
丸空心用溫酒送下

雀附丸 治脾胃久虛冷氣腹痛時自泄痢水穀不消飲食少
進宜服之

雀附 三十隻 附子 四兩 生用 去皮 草薢 二兩

懷香子 白蕪荑 乾薑 炮炙 胡椒

川椒 炮炙 各一兩 半 青橘皮 湯浸去白 搗
艾葉 四兩 用蠟一斗 以艾葉同入鍋中 煎

右為細末以雀附膏和搗三五百杵丸如梧桐子大每服
三十丸空心用溫酒送下

金髓丸 補虛 益元 臟消 脾胃 積
牛膝 炮炙 附子 炮炙 懷香子 炒 楮實 已各
荆三棱 炮 石斛 桂心 已各

羊脊骨 一條 去肉 以酒炒 未半兩 醋半 搗化 研
右為細末同羊脊骨末和勻用酒煮麩糊為丸如梧桐子
大每服三十丸空心用溫酒送下

治虛冷短氣 川椒 三兩 去目 并合口者

復老還童丸 補下元烏髭髮 肉蓯蓉 酒浸 巴戟 酒浸 蛇床子 炒
鹿絲子 酒浸 牛膝 酒浸 川練子 益炒 五味子

山藥 茯苓 續斷 橘實 檳榔 人參 乾薑 已上各
乳香 木香 沉香 母丁香

白檀香 半兩 右為細末煉蜜和劑先入并華水一盞同和藥杵千餘下
丸如梧桐子大每服三五十丸空心用溫酒送下

真人換白丸 治血氣不榮髭髮衰白 甘菊 花 苴藤子 旋覆花 白茯苓 去皮
桂心 白芷 三兩 各 牛膝 酒浸 草薢 茄 各半

覆盆子 一分 蓮子 草 一兩 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心用溫酒下三十丸
晚食前再服二十九飲少酒引藥力兼治風疾一名烏銀

丸用酒煮麩糊和丸 加減仙茅丸 壯筋骨益精神明目 黑龍 仙茅 對 斤 米 酒 浸 三日 天 亦 水 煎 剉 車 前 子 十二
蒼朮 二斤 米 酒 浸 五日 剉 枳 子 一斤 枳 子 仁 一斤 熟 地 黃 各 四 兩

白茯苓 炮炙 茵香 入 生 地 黃 熟 地 黃 各 四 兩

右為細末酒煮麩糊和九如梧桐子大每服五十九漸加至八十九食前用溫酒送下日二服

何首烏丸 治男子元臟虛損髮白再黑填精補髓

何首烏 半斤肉桂 六兩牛膝 四兩

右將何首烏用棗一層何首烏酥內蒸棗軟用竹刀切焙同為末用棗肉和九如梧桐子大每服五十九嚼為糜子服酒下食前一服加一九日三服至四十九九即止却減九數服其效如神

神仙一井金丹 補益真元大壯腰脚久服髮鬢不白牙齒牢固進美飲食聰明耳目行步輕捷

牛膝 酒浸 川椒 出汁炒 黑附子 炮去木鱉子 煨去

白附子 肉蓯蓉 酒浸 何首烏 炮去木鱉子 煨去

狗脊 炮去毛 南星 炮

地龍 炮去土 防風 去蘆

赤小豆 骨碎補 炮去毛 白茯苓 炮去 綿黃耆 蜜炙

五味子 炒 覆盆子 炒 青鹽 火炒 全蝎 已上各

右為細末用無灰酒煮麩糊和九如梧桐子大每服五十丸煎五味子湯送下空心日午各一服此藥大有功效服至百日逢火日摘白為黑余在淳安主簿李潤云乃祖通判公少服一井金丹至老髮鬢不白後在都城訪揚五倅

聞先和王晚年髮鬢不白所服何藥答曰某未嘗知遂呼老藥僮叩之云先和王常服一井金丹後廬陵見前掛守

趙鼎六十餘歲髮鬢皆不白衆以為潤色者僕子而視之非是染者渠云自然如此繼過豫章其子作酒官托立倅

叔獻詢叩渠云大人平生只服一井金丹方知此藥之妙皆得其方但其間有小不同今併載之一方減川椒白附

子木鱉子黑附子何首烏俱減一兩每服二十九五味子

泡湯下其他方五味子煎酒下一方黑豆半攪水二攪開

羌活華蘇何首烏一處煮豆熟為度去豆不用只用三味

藥一方華蘇黑豆同何首烏一處煮

椒紅丸 治元臟傷德目暗耳聾

蜀椒 炮去目并合口者炒出并膠

右先將生地黄搗絞取自然汁入銅器中煎至一升許住火候稀稠得所即和前椒末為丸如梧桐子大空心用煖酒送下三十九令藥時勿令婦人雞犬見服百日覺身輕少勝足有力是藥効也服及三年心腎爽悟目明倍常面色紅悅髮光黑

更生丸 療男子五勞七傷陰衰消小囊下生瘡腰脊疼痛不得俯仰兩膝麻冷時時熱瘥或時時浮腫難以行藏目風淚

出遠視眩暈 咳逆上氣身軀痠黃繞臍弦急痛及膀胱小便尿血莖痛按傷時有遺瀝汗衣赤黃或夢驚恐口乾舌

強渴欲飲水飲食不常筋力不足氣逆胃脘坐犯七忌以

成勞傷此藥主之甚驗良方春三月宜服之

茯苓 四分若身熱 石菖蒲 四分若耳聾

山茱萸 四分若身熱 兔絲子 四分若腰痠

括蕒根 四分若熱渴 牛膝 利三分若熱渴

赤石脂 四分若內傷 熟地黃 七分若煩熱

細辛 四分若目昏 防風 四分若風邪

薯蕷 四分若陰虛 續斷 四分若骨痛

蛇床子 四分若少氣 栝實 四分若少

巴戟天 四分若弱 天雄 四分若風

遠志 四分若心驚 石斛 四分若

不安 四分若

杜仲 <small>四分若陽性</small>	肉苁蓉 <small>四分若性</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大先食服三十九丸用溫酒送下日三不知漸增以知為度亦可作散服方寸匕日知十日愈三十日餘氣平長服老而更少忘猪羊肉鷓鴣冷水生菜蕪荑等物	補腎茯苓丸 療男子內虛少食忽忽喜忘悲憂不樂恚怒無常身軀浮腫小便赤黃精泄淋瀝有絞勝肚脛痛冷痺屈伸難當渴飲飲水腹脹滂七皆犯七忌記其悉詳治療之法隨病度量夏三月宜服之	茯苓 <small>二兩加一倍</small>	附子 <small>二兩炮有風</small>	山茱萸 <small>二兩加一倍</small>	杜仲 <small>二兩炮有風</small>	澤瀉 <small>三兩有風</small>	桂心 <small>六兩顏色不</small>	黃蘗 <small>三兩加一倍</small>	石斛 <small>三兩加一倍</small>	黃芩 <small>四兩加一倍</small>	肉苁蓉 <small>三兩加一倍</small>	細辛 <small>三兩加一倍</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大先食服七丸用溫酒送下日二服忌生菜葱猪肉冷水大酢胡荽等物	補腎茯苓丸 療男子腎氣虛冷五臟內傷風冷所苦身軀羸厄足胫困乏難以行藏飲食無味目視無光偏身拘急腰脊痛僵遺精白濁日漸萎黃心胃懊悶逆氣上撞轉側須入不能起床鍼灸服藥療治傍惶乘馬觸風醉以入房不自特讓飲食不量用力過度口乾舌強流涎出口夜夢飛揚尿血淋瀝陰下濕痒心中動悸痛掣勝脫四肢酸困氣息不長身軀浮腫人易能當為醫不識妄處他方秋三月宜服之	茯苓	防風	桂心	山茱萸
-------------------------	-------------------------	--	---	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--	---	----	----	----	-----

白朮	細辛	薯蕷	乾地黄	附子炮	澤瀉	紫苑	牛膝	芍藥	丹參	黃耆	沙參	茯苓	乾薑	玄參	苦參	人參	獨活 <small>二兩上各</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸食前用溫酒送下忌生菜葱酢物桃李雀肉鷓鴣蕪荑等物	垂命茯苓丸 療男子五勞七傷兩目眩迎風淚出頭項急僵不能回顧心腹滿脹上干胃腸下引勝脫表裏疼痛不得平康飲食漸減面目痿黃小便淋瀝陰痿不強五心煩熱盜汗如漿四肢拘急夢寐驚惶狀如消渴忽忽喜忘悲憂不樂此藥最良令人肥壯氣力倍常飲食加進百病潛藏冬三月宜服之	茯苓 <small>三兩</small>	白朮	澤瀉	杜仲	石長生	薯蕷	杜仲	牡蠣炮	石長生	附子炮	人參	天雄炮	兔絲子	乾薑	巴戟	天門冬 <small>去心</small>	肉苁蓉 <small>二兩上各</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大先食服五丸溫酒送下忌海藻菘菜鯉魚生葱猪肉酢物等項	補真丹 接真養氣健脾胃升降陰陽調順三焦常服快利胃腸消導飲食此藥性平不燥	沉香	丁香	白芷	檀香	薑黃	沒藥 <small>另研</small>	肉苁蓉	補骨脂 <small>炒</small>	縮砂 <small>已上各</small>	茴香 <small>微炒</small>	川山甲 <small>炙</small>	牛膝 <small>酒浸</small>	肉苁蓉 <small>酒浸</small>	乳香 <small>另研</small>	白朮 <small>已上各</small>	青皮 <small>去白</small>
----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------------	--	--	----------------------	----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	----	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	----	----	----	----	----	----------------------	-----	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

香附子 木香 甘草 巴戟 山藥 桂心 右為末酒浸蒸餅糊和丸如梧桐子大每服八十九至百丸空心用溫酒或鹽湯送下

補真丸 大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不効者亦有謂焉人之有生不善攝養勞過度元陽衰虛真火不溫不能上蒸脾土沖和失布中州不運是致飲食不進胃膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消大腑滯泄此皆真火衰虛不能蒸蘊脾土而然古人云補腎不如補脾補脾不如補腎之氣若牡丹田之火上蒸脾土脾土溫和中焦自治

隔開能食矣 附子 肉苳菟 兔絲子 肉苳菟 兔絲子 肉苳菟 兔絲子

陽起石 川烏 肉苳菟 兔絲子 肉苳菟 兔絲子 肉苳菟 兔絲子

五味子 鹿茸 川巴戟 鍾乳粉 右為細末用羊腰子二對細切製如食法入葱椒酒煮爛

搗如泥入少酒糊同和藥末再搗三五百杵丸如梧桐子大每服七十九空心用米飲或鹽湯任下

神助丹 一名二虎丹 補益元臟強壯筋骨進美飲食 附子 川烏

右二味同於磁器內用好醋五升浸或三五日或半月每日一攪浸至通心軟透為度取出切作片子將浸藥醋傾於無蟲處恐傷生其磁器亦勿別用止可再浸藥別用好醋五升浸藥却搗一土坑深闊約七八寸以木炭火燒令通赤傾藥片并醋在內以新瓦盆蓋合四圍用黃土封固勿令透氣待一晝夜取出藥片曬乾去泥土以青鹽四兩

先搗為末同藥片炒令香黃色同碾為細末用醋煮麩糊和丸如梧桐子太每服十五丸至三五十九丸如氣虛弱或冷物所傷可倍九數空心用溫酒送下或鹽湯亦可婦人淡醋湯下百無所忌如久服真氣壯實充宜節慎 神仙巨勝子丸 安魂定魄改易容顏通神延壽命添髓駐精補虛益氣壯筋骨潤肌膚髮白再黑齒落更生目視有光心力無倦行步如飛寒暑不侵能除百病

巨勝子 生地黃 熟地黃 何首烏 枸杞子 兔絲子 五味子 酸棗仁 破故紙 柏子仁 覆盆子 雞頭實 廣木香 蓮花藥 巴戟天 肉苳菟 牛膝 天門冬 酒浸 官桂 人參 茯苓 猪實子 韭子 天雄 蓮肉 川續斷 山藥

右為細末春夏煉蜜為丸秋冬蒸棗肉入胡桃肉一十箇搗如泥同藥末和更搗千餘杵丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下鹽湯亦可日二如久服去天雄用鹿茸亦得此藥耳聾復聰眼昏再明服一月元臟強壯六十自髮白變黑一百日容顏改變目明可黑履穿鍼冬月單衣不寒若將白鷄用藥拌飯喂六十日則變為黑鷄矣

金鎖丸 補虛損壯元氣益精髓 龍骨 附子 肉苳菟 蓮花藥 沉香 雞頭實

右為細末以金櫻煎膏和丸如無即以煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十九空心用溫酒送下

附子 肉苳菟 蓮花藥 沉香 雞頭實 右為細末以金櫻煎膏和丸如無即以煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十九空心用溫酒送下

延壽丹

治腎經不足添精補髓益氣壯陽久服輕身耐老

栢子仁

其菊花

扶苓

松脂

白

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心用溫

溫或鹽湯送下日三服能愈諸疾

靈芝丸

治脾腎氣虛添補骨髓通利耳目

蒼水

一用米泔水浸三日去其水

右於木臼內搗為細末蒸棗肉和丸如梧桐子大每服三

十九加至五十九食前用棗湯送下

秋石方

世之煉秋石者但得火煉一法而已此藥須兼用陰

陽二石方為至藥凡火煉者陽中之陰故得火而凝入水

則釋然消散歸於無體蓋算去但有味在此離中之虛也

水煉者除中之陽故得水而凝遇暴潤千歲不變味去而

算留此坎中之實也二物皆出於心腎二臟而流於小腸

水火勝蛇玄武正氣外假天地之水火凝而為體服之還

補太陽相火二臟上為養命之本今具二法于後

陽鍊法

右用小便不拘多少約兩桶一擔先以清水投好皂角濃

汁以籠布濾去滓每小便一擔入皂角汁一盞用竹篋急

攪令轉百千匝乃止直候小便澄清白濁者皆定底

徐碎去清水不用只取濁脚併作一蒲桶又用竹篋急攪

百餘匝更候澄清又碎去清者不用十數擔不過取濃汁

一二斗其小便須先布濾過勿令有滓取得濃汁入淨鍋

中熬刮下搗碎再入鍋內以清湯煮令化乃於篋內布

筋紙兩重傾藥入紙篋其內淋過取淋下清汁再入鍋熬

乾又用湯煮化再依法淋直候色如霜雪即止乃固濟

砂盒內歇口火煨成汁傾出如藥未成更煨一兩遍候

白土色即止細研入砂盒內固濟頂火四兩養七晝夜

養火尤善再研每服二錢空心溫酒下或用棗肉為丸如

梧桐子大每服三十九亦得空心服陽鍊日午服陰鍊各

一服一名還元丹昔有人得瘦疾且嗽萬方不効服此輒

愈又有病顛眩腹鼓日久漸加喘滿困者亦服此即瘥

此法極省力只一小鍋便可鍊體如金石永不暴潤與常

陰鍊法

右用小便三五石夏月雖腐敗亦堪用分置大盆中以新

水一半以上相和旋轉攪數百匝候澄清碎去清者留濁

脚又入新水同攪水多為妙又澄去清者直候無臭氣澄

下秋石如粉即止曝乾刮下如膩粉光白粲然可愛再研

以乳男兒乳和如膏烈日中曝乾如此九度須揀好日色

乃和蓋假太陽真氣也第九度即以棗肉和丸如梧桐子

大曝乾每服三十九空心用溫酒送下

保命延齡丸 安神養氣補填骨髓起弱扶衰潤澤肌膚聰明

耳目久服烏髭髮固牙齒能夜讀細字心刀不倦

巨勝子 補骨脂 酒浸 酸棗仁 栢子仁 去殼

其菊花 肉蓯蓉 酒浸 楮實子 天 雄 炮 炙

枸杞子 天門冬 去心 五味子 牛膝 酒浸

覆盆子 白茯苓 去皮 巴戟 去心 人參 去蘆

兔絲子 酒浸 一宿 竹 作 餅 山 藥 一 兩 各 肉 桂 去 粗 皮

生薑 地黃 瓦 上 焙 乾 熟 地 黃 瓦 上 焙 乾

右為細末春夏白沙蜜秋冬蒸棗肉八胡桃肉十枚去皮

同藥末於白內搗千餘杵丸如梧桐子大每服三十九加

至五十九空心用溫酒送下

陳體常先生傳兔絲子丸

兔絲子酒浸一宿備作 遠志法心一兩 乾山藥

白茯苓肉蓯蓉 龍骨源 牛膝去苗

韭子已上各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心用鹽

酒或鹽湯送下日進三服

枸杞子丸一名延年丸 育神養氣強力益志及治風勞氣冷萎

顏色烏髭髮

枸杞子焙 覆盆子 車前子 甘菊花去梗

生地黄焙 地骨皮 何首烏 巴戟天去心

續斷 白木 細辛去苗 遠志去心

石菖蒲洗曝牛膝酒浸 兔絲子酒浸一宿搗作餅焙

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九加至三十九

空心用溫酒送下

治五臟虛損羸瘦益氣力堅筋骨

右以巨勝子蒸九次曝九次每取二合用湯浸布裹投去

皮再研水瀝取汁煎飲和粳米煮粥食之

薯蕷丸 治風虛益顏色令人體健氣力強壯

薯蕷 熟地黄 肉蓯蓉酒浸一宿刮

附子炮裂去皮 兔絲子酒浸三日搗 赤石脂已上各

牛膝去苗 山茱萸去核 白茯苓去皮 五味子

栝子仁 巴戟去心 人參去蘆 乾薑炮

澤瀉 白木 桂心已上各

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服十九

加至四十九空心用溫酒送下

骨補丸 治下元傷憊駐顏悅色

黃狗脊骨一條兩頭去兩節或為五段用明沙一兩

在汁中浸三宿用炭火炙乾而用 鹿茸毛酥後

肉蓯蓉切細官桂皮 附子炮裂去皮 牛膝酒浸

蛇床子炒 乾薑炮 五味子 陽起石火煨研

胡椒已上各

右為細末和前狗脊骨末用棗肉五兩酥一兩和搜搗

一二月其精溫煖兩月精結實三月精秘不泄益顏色壯筋

骨百病不生

容顏不老方

一斤生薑半斤棗 二兩白鹽三兩草

丁香沉香各半兩 四兩茴香一處搗

煎也好 煎也好 脩合此藥勝如寶

每日清晨飲一盃 一世容顏長不老

枸杞煎 去萬病通神明安五臟延年駐顏

枸杞子取汁 生地黃取汁 麥門冬取汁 杏仁去皮尖研

人參搗為末 白茯苓去黑皮搗 為末三兩

右以銀鍋內慢火先熬前四味如稀飴後入人參茯苓末

待煎候如膏以磁器盛之每服半匙空心溫酒化服日

駐春丹 縮小便美顏色

白茯苓去黑皮四兩 白麩一斤 青鹽一匙

人參不切細碎 川椒木白切碎

右為籠未用水二大攪煎至一攪與茯苓白麩和勻如臂

大文武火燒熟三日服一料半年之後當減三料每月止

服七料又半年再減三料每月止服四料若兩日一次見

小便足効也如此不必常服

蒼木丸 烏髭髮駐顏色壯筋骨聰耳目除風濕潤肌膚冬服

令人身輕體健百病不生

蒼木 用米泔水浸三日取出刮去黑皮切

茯苓 蒸過去黑皮

右和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服十五九空心或臨卧

白湯送下別用白木末六兩甘草末一兩和勻作湯點之

令人好顏色

右以百花上露飲之

令人肥白美顏色

右以麋鹿骨煮汁釀酒飲之

悅顏色令人肥澤

右以桃蠶食之

益顏色

右以小麥苗作蘆汁與

令人好顏色

右以井華水研硃砂未服之

應驗打老丹

強壯筋骨滋補丹田安定魂魄溫暖下元添精

補髓悅色駐顏祛除百病身輕體健長生不老益壽延年

不問男子婦人並宜服之

白茯苓 去皮 栢子仁 另研 乾山藥

雲母石 火煨 覆盆子 密蒙花

井菊花 去梗 鍾乳粉 另研 蛇床子 五味子

山茱萸 去核 赤石脂 另研 金鈴子 生地黃

蔓荊子 去萼 天門冬 去心 麥門冬 去心 枸杞子 熟地黃

川芎 續斷 去蘆 石斛 去根 白芍藥

桂心 玄參 去蘆 藥木 去苗 肉蓯蓉 酒浸

華撥 紫苑 去蘆 遠志 去心 牡丹皮

沙參 升參 去蘆 牛膝 去苗 鹿茸 去毛

苗香 黃菁 去蘆 巴戟 去心 附子 炮去

澤瀉 人參 去蘆 乾薑 炮 天樞 泡如無用

白木 獨活 去蘆 牡蠣 煨 烏藥

苦參 杜仲 鹽炒 甘草 已上各

右為細末煉蜜和搗千餘杵丸如梧桐子大每服三十九

不拘時溫酒送下日進三服至六十日見効按方云薛侍

即使經泥川見一女子將一老人捶之因詰其故女子曰

乃妾之子也薛問汝年幾何答曰一百六十七歲昔有伯

父隱於華山一日歸見妾夫婦年老無子手足不遂令服

此藥至一百日身體輕健氣力加倍手足頓愈變為童顏

一昨乃有此子薛曰願聞此方女子遂以此授之

既濟丹 升降水火育神益血久服延年令人不老

嫩鹿茸 酥炙 附子 去皮 栢子仁 別研 茯神 去木

牛膝 酒浸 枸杞子 酒浸 肉蓯蓉 酒浸 當歸 去蘆 酒

酸棗仁 微炒 熟地黃 酒浸 沉香 別研 山藥 炒

遠志 用甘草同煮去心不用

右為細末蒸棗肉和丸如梧桐子大每服五六十丸空心

用溫酒或鹽湯送下

藥角丸 聰耳目補心神安臟腑填骨髓理腰脚能立髮白

更黑毫者還少諸藥角丸方凡有一百一十方此特出衆

方之外容成子羔服而羽化

藥角取當年新角連腦頂者為上看角根着痕處亦堪

用退角根下平者不堪夫造此藥取角五具或四具三

具二具一具為一劑先失一大寸即各長七八寸取

截斷量把鏽得即於長流水中以竹器盛懸浸十宿如無長流水鏽即於淨盆中滿着水浸每夜易換即將出削去鏽皮以利鏽鏽取白麤至心即止以清粟米泔浸兩宿初經一宿即乾擿去舊水置新絹上曝乾淨擇去惡物麤骨皮及鏽不勻者即以無灰美酒於大磁器中浸經兩宿其酒及器物隨藥多少其藥及酒俱入淨釜中初用武火煮一食久後即又着火微煎如鱗目沸以柳木篋長四尺濶三指徐徐撓不得住手因則易人時時更添美酒以成煎為度煎時皆須平且下手不得經兩宿仍看有如稀膠即以牛乳五升酥一片以次漸下後項藥仍以麤角一條炙令黃為末與諸藥同製之

檳榔 通草 秦艽 肉桂 菴蓂 人參 兔絲子 別搗待乾 甘草 已上各

右搗為末如不要補即不瀆此藥共煎又可一食時候藥似稀稠粥即止火少時歇熱氣即投諸藥末相和撓令相得仍待少時漸稠粘堪作丸即以新器盛貯以衆手一時九就如梧桐子大若不衆手九就旋煖漸九亦得如粘手着少酥塗手其服餌之法空腹以酒下之初服三十九日加一九加至五十九為度日二服初服一百日內忌房室服經一月腹內諸疾自相驅逐有微利勿怪漸後多泄氣能食患氣者加枳實青木香唯前各一大兩若先嘗服丹石等藥即以三黃丸食上履令宜泄如飲酒食麪口乾鼻中氣麤眼澀即以蜜漿飲之即止如不止加三黃丸使微利如此一度發動已後方始調暢服至二百日面皴自展光澤一年齒落更生強記身輕若風日行數百里二年常令人肥飽少食七十已上服之却成後生三年楊條筋

續預見未明四年常飽不食自見仙人三十已下服之不輟頰一定而不變修合時須在淨室中勿令陰人鷄犬等子等見婦人服之尤佳昔道士戴寧古於城市中遇一醉人召飲遺一詩曰尾閭不禁滄海竭九轉靈丹徒用說惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下血約九月於我眉山相見寧古如期而往果於太虛巖下見之授以脩養之術曰子血氣動蕩虛且竭矣宜先服麋角丸使血氣有補筋骨壯盛乃可用此術寧古始悟斑龍之句服之踰年體輕色潤壽至一百七十歲故留此方以諭後人

金髓煎

右用枸杞子不拘多少逐日旋採擇紅熟去嫩華子揀令淨淨便以無灰酒於淨甕內浸至兩月為度用蠟紙封固

緊密勿令透氣候日數足滲出於新竹器內盛貯旋於砂盆內研令爛細以細布瀝去滓不用即同前清藥酒與藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作番次慢火熬成膏切須不住手用物撓恐粘底不勻候稀稠得所傾出用淨磁器貯之勿令泄氣每日早晨用溫酒半盞化開二大匙服夜卧再服至百歲身輕氣壯積年不廢可以羽化

三僊丸 一名長壽丸 詩曰

一鳥二木三茴香 久服令人壽命長 善治耳聾并眼暗 調理脾胃及膀胱 順氣搜風輕腰膝 駐顏悅色鬢難蒼 空心溫酒鹽湯下 誰知世上有僊方 川烏 用鹽半兩同炒如飛子大 蒼木 用鹽半兩同炒如飛子大 二兩用米泔水浸一宿用竹刀刮去 黑皮切片用鹽白一握同炒黃去蒸

餘者益黃久之忽遇金華山張先生謂予曰予今半百容貌衰甚可不為門戶計進補治氣血以強色身之藥乎慨然傳一方云初得之異人予拜而受之遂合服逾百日覺前時之白者黃者皆返黑矣見者以為異予遂名之曰神仙不老丸以其藥品瑩括為詩曰

不老神方功効殊 駐顏全不費工夫

人參牛膝川巴戟 蜀地當歸杜仲俱

一味地黃生熟用 兔絲栢子石菖蒲

更添栢杞皮兼子 細末蜜丸栢子如

早午臨眠三次服 鹽湯溫酒任君須

忌食三白并諸血 能使髭烏髮亦烏

人參洗去蘆結重實新羅者兔絲子以水漂去淨用取沉

栢杞子浸一宿焙乾去蒂栢子仁一色紅蒸乾去殼取仁

石菖蒲去毛節米泔浸一兩川牛膝長而細者去蘆酒浸

杜仲刮去粗皮切碎生薑地骨皮色黃者刮去淨

地黃以水浸重者用以浮者為味甘熟研一兩又用生泥

竹刀切忌鐵器川當歸煉大者去

川巴戟色黃細者除去心酒浸焙一兩

右件揀選精製如法勿曬用慢火焙乾若大燥則失藥味

待乾即於風前略吹令冷熱相激便燥淨秤碾為細末煉

蜜擇火日搜和於木臼內搗千餘杵丸如梧桐子大每日

空心日午臨卧各一服每服七十九鹽酒鹽湯任下忌食

葱白韭白蘆菔豆粉及藕諸般血蓋諸血能破血又解藥

力若三白誤食亦無他說止令人髭髮反白耳合時切勿忌

穢濁婦人孝子鷄犬等見此方非特烏髭髮大能安養榮

衛補益五臟和調六腑滋充百脉潤澤三焦活血助氣添

精實體最要節色慾使藥力効之速也

續髓全陽骨 元體氣虛弱感動疾病羸瘦少食似無大害積

久可愛不慣服藥者用之

小牛犢一雙未知陰陽者臘八日宰過去毛

黃耆淨皮一斤和官桂良薑陳皮

甘草批上各川椒四兩去月各食鹽二兩好酒二斗

右以藥并酒同入鍋內用水浸至八分鍋慢火熬肉爛如

泥取骨搥髓盡化濾去肉骨藥但有稠汁待冷入甕內蓋

覆極土深藏露甕面如法遮蔽凡遇喫飯麪食諸物即取

肉汁任意調和食用以盡為度

三才丸 滋陰養血溫補下元

天門冬去心生地黄各三兩二味用柳甕單以酒酒

人參去蘆

右為細末用蒸棗肉和丸如梧桐子大每服三十九食前

溫酒送下日進三服一方用蜜麪糊和丸米飲下亦可

封髓丹 降心火益腎水

黃藥三兩縮砂半兩甘草一兩

右為細末稀糊為丸如梧桐子大每服五十九用肉苁蓉

半兩切碎用酒一大盞浸一宿次日早空心煎三五沸去

滓以清酒送下

大沉香丸 辟山嵐瘴氣進飲食厚腸胃令人肥白填精補髓

去渾身走注活經脉輕身健體百病不生

沉香 白檀香 胡桃肉 栢杞子

木香 大茴香 小茴香 丁香

破故紙用酒半盞白湯一匙半盞上項藥在內

胡椒全錫川山甲酥炙川練子去核

遠志 <small>去心</small>	非子 <small>酒浸</small>	木通	肉蓯蓉 <small>去心</small>
巴戟 <small>酒浸</small>	乾山藥 <small>不蛀</small>	知母 <small>去心</small>	山茱萸 <small>去心</small>
白茯苓 <small>去心</small>	黃精 <small>酒浸</small>	天門冬 <small>去心</small>	麥門冬 <small>去心</small>
羌活 <small>酒浸</small>	熟地黃	乳香 <small>別研</small>	細墨 <small>燒灰</small>
北五味	生地黃	巨勝子 <small>另研</small>	人參 <small>已上各</small>
蓮花藥	陳皮 <small>各二</small>	仙靈脾 <small>酥炙</small>	牛膝 <small>酒浸</small>
青皮 <small>去白各</small>			
右為細末好酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服三五十丸			
空心溫酒送下乾物壓之忌諸般血豆粉等物			
萬應延齡丹 補諸虛不足			
麥門冬 <small>去心</small>	天門冬 <small>去心</small>	熟地黃 <small>酒蒸</small>	生地黃 <small>酒洗</small>
人參 <small>去蘆</small>	澤瀉	枸杞子 <small>酒洗</small>	杜仲 <small>薑汁炒</small>
白茯苓 <small>去心</small>	遠志 <small>去心</small>	赤石脂 <small>煨</small>	覆盆子
山茱萸	地骨皮 <small>酒洗</small>	車前子	石菖蒲
栝子仁 <small>各一兩</small>	巴戟 <small>去心</small>	山藥 <small>各二兩</small>	五味子 <small>二兩</small>
兔絲子 <small>酒浸</small>	牛膝 <small>酒浸</small>	各川椒 <small>七錢</small>	肉苳蓉 <small>酒浸</small>
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒			
送下初服一日三服常服只一服漸加至五十九老者加			
至百丸服至百日百病皆散身體榮潤初服三日小便或			
下雜色惡物是腎間病出五日間氣痞是臍間寒熱氣			
出至七日唇口生津液覺腹痛勿怪至十日全體漸肥潤			
至二十日鼻頂辛酸去頭風除一切痛證四十五日語			
言雄壯胃膈微痛或吐微血去積滯鬱結至百日身體強			
健至誠修合服之其効不淺也			
脛膈癆丸 補益丹田固濟水臍安神益智明目駐顏壯腰膝			

元氣補虛冷安臍臍	附子 <small>炮去心</small>	牛膝 <small>去心</small>
脛膈癆丸 補益丹田固濟水臍安神益智明目駐顏壯腰膝	沉香	薯蕷
覆盆子	檳榔	麝香 <small>另研</small>
石斛 <small>去根</small>	木香 <small>一兩</small>	山茱萸
桂心	巴戟 <small>去心</small>	蛇床子
白木	芍藥	石龍芮
肉苳蓉	芍藥	澤瀉 <small>三兩</small>
右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十		
丸漸加至四十九空心用溫酒送下		
正氣補虛湯 治憂悲思慮善怒不常失飢勞力或飲食不調		
肌肉成耗榮衛虛弱外邪所襲入於經絡頭痛昏悶拘攣		
增寒壯熱身疼腰倦脚弱轉筋自汗手足冷四肢麻痺五		
臟諸虛百損並皆治之		
人參	藿香葉	黃耆
茯苓	熟地黃 <small>酒洗</small>	川芎 <small>二兩</small>
白木	五味子	附子 <small>炮</small>
丁香	附木香	乾薑
甘草 <small>已上各</small>	白芷 <small>半兩</small>	
右對散每服五錢用水一盞半生薑三片紅棗二枚煎至		
八分去滓空心溫服		
巨勝丸 治男子筋瘦少腹不利小便頻數腰悶疼不能久		
立則腿膝麻冷難以承任以意多忘耳作蟬鳴久服滋血		
氣壯元陽烏髮添精補髓益壽延年婦人尤宜服之		
巨勝子	甘菊	旋覆花
車前子	覆盆子	熟地黃
牛膝 <small>酒浸</small>	遠志 <small>去心</small>	白芷 <small>一兩</small>
		早蓮子 <small>七錢</small>

當歸 茯神 云木 茴香 磁石 遠志 去心

山茱萸 去核

右各一兩裝在一斗批內着童子小便五七升將破袋懸胎掛瓶內如煮酒法於鍋內着水亦懸藥瓶於鍋內桑柴或間松柴煮五日夜火不要急小便不住時添煮令乾日足取或將砂袋以溫水滌十餘次又換溫水浸半日棄藥不用衣砂又洗三二次糯米團子和丸空心用棗湯下立粒或十粒

既濟丹 治心腎不交

靈砂 陽起石 鍾乳粉 磁石

茯神 去木 鹿茸 一兩 沉香 半兩 硃砂 一錢

右為細末麪糊和丸如菘豆大每服二十九空心用棗湯送下

茯苓酥 除萬病久服通仙方

右用白茯苓三十斤取山之陽者其美取山之陰者味苦去皮薄切曝乾蒸之以湯淋云苦味若淋不止其汁當甜則曝乾編羅為末用酒三石蜜三升和酒相得內茯苓末於大甕中攪之百匝封之勿泄氣冬五十日夏二十五日酥浮酒上掠取其味其美作餅子如手掌大於空室中陰乾色赤如棗飢食之此為茯苓酥也忌食米醋

真人餌茯苓法

右用白茯苓三斤細剉以絹袋盛之懸於甕中用小麥細麪七斤糯米五斗炊為爛飯和麪未經宿入蜜一升和令勻入甕中又經一宿炊糯米二斗投之不得令熟入水六斗即封其甕口春秋三七日冬五七日夏一七日當出其藥袋可隔宿不食清旦取茯苓半斤服之其酒即旋旋飲

之勿令勝藥若服此藥多時者亦不飢渴無燥熱身如碧玉令人身輕走如奔馬真天地相與矣其藥氣懸於空中勿令著地恐繩繫袋頭取木橫枕之仍以紙袋封旋取服之勿令泄氣忌食米醋

鍊茯苓方

取茯苓上黨者去黑皮剉作塊如鴉子大任多少置甕中其甕底鑽作竅以木塞之即下水令沒得藥每兩日一換水七日後數以筋道却水取茯苓蒸候熟及熟出之置盤中揉搗去膜控乾仍入盤中以木推研極細更下熱水攪和先結生絹為袋以藥汁傾袋中以盆器盛汁澀盡餘滓更研復取前汁攪淨傾袋中如前法候澀盡澀之更傾去清汁取稠汁納絹袋中垂澀之候水盡取茯苓曝乾是為茯苓粉可入諸藥若不如此即膜膜換人令人大折或作瘦瘠

服地黃延年不老方

用地黃淨洗隨多少搗絞取汁煎令小稠內蜜再煎可丸即丸如梧桐子大每日食前以溫酒下三十九日三服如此十年白髮再黑力如二十時令人多子神効無此創地黃治病長生

用生地黃十斤擊碎於一大銅器上安炊單上安地黃入甕蒸之汁當下流於銅器中候清地黃汁盡即止將銅器內汁置於重湯中煎之可丸即丸如半鷄子大每服一九以溫酒化開服之日三服服至百日與天地相保白子高從太上受此方

作熟乾地黃法

採地黃去其積葉及細根搗絞取汁以漬肥者著甕中如

上米蒸飯以益覆蒸之一時出曝燥更內汁中又蒸
止便乾之亦可直切蒸之半日數以酒洒之使周匝至夕
出曝乾可搗蜜丸如前法服之

黃精膏 神仙延年補益療萬病

用黃精一石去鬚毛洗令淨紫打碎蒸熟壓得汁後煎去
遊水得一斗內乾薑末三兩柱心末一兩微火煎者色醬
鬱然欲黃便去火待冷盛不律器中酒五合和服二合常
未食前日三服舊皮脫顏色變光花色有異鬚髮更政欲
長服者不須和酒內生大豆黃絕穀食之不飢渴不老

二精丸 助氣固精保鎮丹田

黃精六分 枸杞子六分
右各於八九月間採取先用清水洗黃精令淨控乾細切
與枸杞子相和杵碎泮勻陰乾再搗羅為細末煉蜜為丸

如梧桐子大每服三五十九空心溫酒下常服助氣固精
補鎮丹田活血駐顏長生不老

服黃精成地仙方

黃精者是芝草精也一名萎蕤一名仙人餘糧一名芍洛
一名魁竹一名鬼子一名重樓一名垂珠一名馬前一名
白芨一名黃精其葉如竹其莖如桃其花白四月莖長五
六尺本黃末赤其花如小豆其實如黍其根似薑昔隨羊
公神仙常服此藥言與天地相異常以二月三月採根入
地八九寸為上取一石五斗淨洗切細以水二石五斗煮
令苦味盡滌出以布袋盛壓取汁澄清再煎如膏即止然
後炒黑豆黃棉羅為末相和得所攪作餅子如錢許大每
服二枚日漸加之百日知驗也一石內即變老為少氣力
倍增亦焙乾篩末每服二錢溫水調服食前功與上等

鍊雲母粉服餌法

雲母取上好白澤者細尋以水淨淘漉出蒸之一日夕下
之後更淨淘如前法去水令朝九雲母二斤用鹽三斤消
石一斤和雲母搗之一日至暮取少許掌上泚著不見星
光為熟出安盤甕中以水漬之全相得經一宿次久澄去
上清水徐徐去之盡更添水如前凡三十遍易水令淡如
水味即漉出其法一如研粉澄取淀然後取雲母液徐徐
生絹袋中濾著單上曝乾即成粉矣每日空心以酒調下
一錢或水下亦得久服輕身延年強筋填髓可以負重登
山不覺渴澤不老耐寒暑志高神仙此非古法近出東海
買益女子年三百貌同并女自負益重五百餘斤如斯得
効之者其數不一可驗神功矣

服天門冬法

如居山遠行碎粒不飢服至十日身輕月明二十日百病
愈顏色如花三十日髮白更黑齒落更生五十日行及奔
馬百日服之延年矣
天門冬二斤熟地黃一斤
右搗羅為末煉蜜和丸如彈子大每服三九以溫酒化破
服之日三忌食鯉魚

服天門冬分

強筋髓駐容顏
用天門冬曝乾搗下篩食方寸七日三可至十服小地服
尤良與松以崖蜜丸服之益善彌佳
又搗取汁微火煎取五斗下白蜜一斗胡麻炒末二升合
煎搗勿息手可九即止火下大黃黃末和為餅徑三寸厚
半寸一服一枚日三百日已上得益此方最妙

一法釀酒服如傷多無若多即吐去病之劇道入年近二
 百而少告皇甫隆云但取天門冬去心皮切乾酒釀方
 寸七日三令人不老補中益氣愈百病也天門冬生奉高
 山谷在東嶽名陽羊食在中嶽名天門冬在西嶽名管松
 在南嶽名百部在北嶽名無不愈在源陸山阜名靈芝雖
 然康上有之異名其實一也在陰地者佳取如切細日乾
 之久服令人長生氣力百倍治虛勞絕傷年老衰損瘦
 偏枯不隨風濕不仁冷痺心腹積惡癆瘵瘰癧痰瘵者
 過身膿壞鼻柱敗爛服之皮脫露出顏色肥白此無所不
 治亦治陰痿耳聾目暗久服白髮黑齒落生髮年益命入
 水不濡二百日後恬泰疾損拘急者緩劣者強三百日身
 輕三年走及奔馬又三年心腹痼疾皆去矣忌食鯉魚頂
 常以七八九月採其根亦云五月過此求也

解木法

用蒼木一石揀擇令身捷碎又從平旦裝入甕中蒸至午
 時即止以盆中湯淋三七遍取汁却入釜中微火煎令可
 九神丸如彈子大每服一九以溫酒化開服之日二服治
 百病輕身益氣能去風寒不飢渴延年忌桃李雀肉
 服枸杞養神延年不老地仙方

用枸杞不限多少常以十一月十二月正月採根二月三
 月採莖四月採葉五月六月採花七月八月九月收子已
 上採者並搗羅為末每服二錢以溫酒調下日三服能治
 一切風火服諸疾不生矣

服槐子法

取槐子去皮內牛膽中令滿陰乾百日取出每服一匙
 心新汲水下日既而服月內身輕百日內白髮變黑久

齒落更生走及奔馬

杏仁酥

治万病及風歷勞冷
 右用家杏仁一石揀完者湯去双仁皮尖搗令爛用好酒
 二石研瀝取汁一石五斗入蜜一斗五升內兩磁甕中搗
 令勻封之勿泄氣三十日看酒上酥出掠取內甕中貯之
 取其酒滓團如棗大置空屋中按格安之候成餠餅狀每
 日且服一枚以前酒下其酒亦任性飲之

夏姬服杏仁法

右用杏仁三斗湯去皮尖双仁早朝蒸至午時即便慢火
 微烘之至七日即止每日空心不約多少隨意食之延駐
 治病必效矣須五月採

吳真君服椒方

椒性稟五行其葉青其皮赤其華黃其膜白其實黑煖丹
 府通血脈助元氣消酒食辟溫毒祛邪氣安五臟調三焦
 而熱不上蒸芳草之中功皆莫及每金州椒一斤揀去浮
 及合口者并目錄器內炒令透地上鋪紙兩重傾在紙上
 用新盆合定周回以黃土培半日許其毒成汗自出曬乾
 末白內輕搗取紅皮四五兩再入鉢臼并為末以煉察和
 丸如梧桐子大候乾紗袋盛掛通風處每日空心酒下十
 九至十五九半年加至二十九一年後加至二十五九百
 无所忌 詩曰

其椒應五行	其仁通六義	欲知先有功
夜間且不起	服之半年內	脚心汗如水
四時去煩勞	五臟无風氣	明目眼不疼
身輕心健記	別更有異能	三年精自秘
顏兒若嬰童	精爽又少睡	但服此神妙

一生元壽劑 若能志心服 三屍自然奔

更有九龍蟻 各七自飛避 備此也

第一須傳意 雖未遇神仙 初緣已得地

服雄黃法 凡雄黃千年化為雄黃雄黃千年化為黃金黃金

者若真人餌法微妙難可知輕身益氣真過雄黃之効

右用雄黃一斤細研以酒三升和着銅器置炭火上微

煎令沸勿令大熱以好漆二升去滓合着其中籠令相得

漆成如黃金或作紫色丸如梧桐子大常食含化一九

熱津日三服十日諸疾即愈二十日肌肉中藥氣備行能

耐寒暑寒熱則涼服之百日腸中肌皮層厚筋骨堅

耳目聰明元復諸患行步如飛服之二百日顏色有光白

髮再黑齒落更生返老成少身形堅固真人所貴神仙所

保勿示非人恐招謫論

服兔絲子方

用兔絲子一斗酒浸良久漉出曝乾又浸令酒盡為度搗

為細末每服二勺以酒調下日三服後吃三五匙水飯壓

之至三七月更加至三勺服之令人光澤惟服多甚好三

年后老變為少此藥治之勝去風冷益顏色兼明目久服

延年神秘勿示非道

服鹿角液

鹿角屑 十兩附子 三兩去皮

右搗羅為細末每服二勺用溫酒調服日三令人少睡益

氣力通神明但力速矣出彭祖傳中

服乳香法

用乳香上好者三斤白蜜三升空銀器中合煎如无好蜜

好酒亦得以柳木篋數搗令如餅每日空心及晚食前服

一粟殼法凡益顏色神効

服人參方 開心肥健人

用人參一分猪脂十分酒拌和服一百日滿體體益目通

千言肌膚潤去熱風痰

服甘肅法 駐顏色延年明目去風氣通開竅安神益智

凡節甘肅不以多少惟生山澗日上東流水中者採取為

妙若是少得時只石上水中生者亦得不可破澤中生者

於八月間採取得去根鬚淨擇子以淘米泔浸三日三夜

每日換米泔取出控乾以硬竹削為片子如錢厚以布袋

盛貯長流水中浸三復時更用井花水淨洗擇如蒸飯九

度每蒸候醒一日候數足不得犯鉄器於木石臼內搗為

細末煉蜜為丸如梧桐子大初服三十九漸加至五十九

用煎湯下茶酒亦得忌羊血若有余者以紙袋子盛貯掛

通風心知服及更將末合或酒糊丸亦可

服柏實法

柏子仁 二斤 搗羅為末 棗肉 三斤 白蜜

乾地黃末 白朮 一斤 各

右和令勻丸如棗大每服三九以水研服之日三服一月

百病愈久服延年

服柏實方

用柏實於八月合房取乃暴令折其子自脫用清水淘洗

沉者控乾輕輕搗取仁搗羅為細末每服二錢七酒調下冬

月溫酒下早晨日午近晚各一服稍增至四五錢若絕穀

者取飽為度渴即飲水令人悅澤一方用煉成松脂及白

蜜丸如梧桐子大每服十九或二十九日三服久方與松

子等分松脂和丸酒下又方加菊葉等分與松子等分

子太每服十九至二十九酒下日三服

解百花法
以三月三日五月五日七月七日九月九日採百花陰乾

搗為細末每服二錢以水調下日二服百日身輕面目光

澤三年通神忽熱與真人同位如春採百草枝陰乾搗末

每服二錢用溫酒調食後服之以水亦得輕身長壽一名

草精也

服百花香

桃花三月三日 芙蓉花七月七日 甘菊花九月九日

枸杞葉春採 枸杞花夏採 枸杞子秋採

枸杞根冬採

右並陰乾各等分搗為細末每服二錢以水調下日三服

百日自知其功二百日力加百倍久服令人輕身長壽

碎殼松蠟水

松脂一斤 白蠟一斤 酥半斤 蜜一斤

白茯苓去黑皮搗末

右先取松脂白蠟酥蜜四味入磁器內盛蜜封坐於二斗

黍米甕內同蒸候黍米熟取出內茯苓末以杖撓和之再蜜

封如前經五日即開搗和為丸如梧桐子大每服五九酒

下早晨近晚服十日後即服一九若肌加至二九三九服

此藥時不得食一切物服不即不食亦可延年

辟穀方 若遇荒年穀貴死以充糧應須桑濟命者

用粳米一斗酒三升漬之出暴之又漬酒不飢食之湯飲

之弊三十日足一斛三升可辟周年

地黃酒 補益變白

肥地黃一斤 新糯米五斗 麩麩五斤

右相并於盆中熱揉納入水三斗於不津器中蜜封秋夏
三七日秋冬五七日滿替之當中有一盞銀汁是玄精也
宜先酌飲之餘生布紋取別置器中任性飲之續釀使其
相接不過三劑髮黑若以新牛膝搗絞取汁三升用酒釀
即變白更愈矣

黃精酒 主萬病延年補壽髮白再黑齒落更生

黃精 蒼朮各四斤 枸杞根五斤 松葉六斤

天門冬去心

右都到以水三石煮取汁一石浸麩十斤炊米一石如常

法釀酒候熱任性飲之忌桃李雀肉

天門冬酒 補五臟調六腑令人無病

天門冬三十斤 去心搗碎以糯米 淘淨

細麩一斤

右炊米熟相并入甕蜜封三七日候熟壓漉出冬溫夏冷

日飲三五

枸杞酒

用枸杞一百二十斤切以東流水四石煮一日一夜取清

汁一石漬麩一如家釀法熱取清貯不津器中內乾地黃

末二斤半桂心乾薑澤瀉蜀椒末各一升商陸末二升以

絹袋貯內酒底緊塞口埋入地三尺堅覆上三七日沐浴

整衣冠再拜平曉向甲寅地日出處開之其酒赤如金色

且空腹服半升十日萬病皆愈三十日癩瘕瘵疾人以

水一升和酒半升分五服愈千金翼又云若欲服石者取

河中青白石如棗杏大者二升以水三升煮一沸以此酒

半合置中須臾即使可用

藥酒 治頭風眩不能食補益氣力

薯蕷 山茱萸 五朱子 白木八兩

防風祛風 人參 丹參 生薑

右細劉生補袋盛用清酒三斗入磁甕中浸七日開每度

溫飲一盞日三

菊花酒 壯筋骨補精髓延年益壽耐老

菊花 生地黃 枸杞根

右搗碎以水一石煮取汁五斗炊糯米五斗細麴碎拌令

勻入甕密封候熟澄清每飲一中盞日三

葛蒲酒 主大風十二痺通血脈調榮衛治骨立痿黃腎所不

治者服一劑服經百日顏色豐足氣力倍常耳目聰明行

及奔馬髮白更黑齒落再生晝夜有光延年益壽久服得

與神通

右用葛蒲前治薄切燥乾一斗生補袋之以好酒一石入

不津器中安藥囊在酒中密封泥之百日發視之如綠葉

色復炊一斗秫米內酒中復封四十日便漉去滓溫飲一

盞日三其藥滓曝乾抽羅為細末酒調一錢服之尤妙一

切三十種風有不治者悉効

葡萄酒 駐顏煖腰腎

乾葡萄末 細麴末 糯米 五斗

右炊糯米熟候冷入麴并葡萄末水三斗攪令勻入甕蓋

覆候熟即時飲一盞不拘時

地黃煎 補五勞七傷長肌肉填骨髓

生地黃 取汁生薑 取汁 酥 一斤 蜜 一斤

杏仁 一升 湯洗去皮

右先取地黃汁於銀器中煎如稀飭內薑酥杏仁等和

更煎令稠於不津器中盛每服以溫酒調一匙服之

三慶服之

九仙薯蕷煎 治腰脚疼痛腹內一切冷病服之令人肥白頭

色悅澤身體輕健骨體堅牢行及奔馬久服可通仙矣

薯蕷 杏仁 皮尖湯浸去 生牛乳 三升

右爛研杏仁入牛乳絞取汁以杏仁盡為度後取薯蕷相

合都入新磁甕盛之密封瓶口安於釜中以重湯煮一復

時乃成每日空心以溫酒調一匙服之

顏梅湯

半黃梅 一百枚 搗 青椒 揀淨 甘草 四兩 炙

生薑 一斤 皮研

右於淨盆中一處拌勻安烈日中曬半月以色變稍紫為

度更約稀稠得所為佳安淨器中每用少許沸湯點

梅橙湯

橙 子 十箇 乾山藥 兩 鹽白梅 四兩 搗破去

鹽 四兩 甘草 二兩

右先用橙子山藥甘草白梅一處研細搗成餅子焙乾研

為細末入檀香半兩尤佳二方入生薑二兩百沸湯調

醃醃湯

神麴 官桂 乾薑 煨各 烏梅 八兩 碎

甘草 乾兩 鹽 三兩

右將前五味焙乾為細末後入炒鹽袋令作一處用新淨

磁器貯白湯點下

特香湯 清神爽氣

香附子 一兩 搗大而 縮砂仁 半兩 木香 一分

檀香 一錢 胡椒 一錢 甘草 二兩

右件同為細末入鹽點服不拘時

檀香湯

治精神不爽頭目昏眩心忪煩躁志意不定

檀香三兩

川芎三兩

白芷各二兩

桔梗三兩

甘草六兩

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服常服調中順氣安

神定志清爽頭目

金粟湯

粟米一升

生薑十兩

甘草四兩

荳蔻肉二兩

右先將粟米淘淨同生薑研碎一宿作餅子焙乾却同

將甘草荳蔻搗羅為末若更入白朮二兩絕妙每服二三

錢入鹽少許沸湯點服不拘時

荔枝湯

荔枝肉

甘草各二兩

百藥煎一兩

白芷半兩

白朮各二兩

右為細末用百沸湯點服一二錢食前服

橄欖湯

百藥煎三兩

檀香坐

白芷各半

甘草各一兩

右為細末每服一二錢以百沸湯不拘時點服

桂花湯

桂花三兩

桂枝三兩

乾薑各一兩

甘草各一兩

右為細末同桂花打勻量入炒鹽少許磁器盛貯莫令漏

氣如常法點服

鳳池湯一名造化湯

造化湯

肥馬梅各一兩

甘草各一兩

鹽

右每合時三味各以一斤為準炒鹽為等分不焙先以

烏梅甘草枳殼為粗末次以鹽一處拌勻入罐子夾板收乾

近侍湯

官桂半斤

丁香各一兩

檀香各一兩

甘草各一兩

縮砂仁四兩

鹽三兩

右先將鹽炒令乾次入縮砂仁草慢火炒黃色乘熟用淨

器先入一半在底次下丁香檀在中又以一半蓋之密封口

俟冷入桂急碾為細末拌勻磁盒密塞五日沸湯點一錢

洞庭湯

青橘一斤

檀香半斤

甘草一兩

右為細末每服一二水入鹽少許點服不拘時

經進過院湯

草薹三兩

益智仁各一兩

蓬朮各半

粉草

右為細末以沸湯點服一二水食前服

冠相入朝湯

沉香

木香

人參

肉苁蓉

右為細末以沸湯點服一二水食前服

沉香湯

沉香

草薹各一兩

蓬朮各半

甘草各一兩

右為細末以沸湯入鹽少許點服一二水不拘時服

香橙湯

橙子二斤

生薑五兩

甘草各一兩

右件於盆中攪研如泥次入炙甘草末二兩檀香末

半兩並攪和作餅子焙乾為細末每服一水用沸湯入鹽

少許點服不拘時

少許點服不拘時

白濁膏

用烏梅一斤搥碎餅水四大碗煎至一椀濾去滓由沙蜜
五斤砂仁末半兩八砂石器內慢火熬成赤色膏為度取
下放冷加白檀末二兩麝香一字攪勻於磁石器內盛頓
封口一宿夏月冷水調八月沸湯

急梅化痰止煩渴 蜜生津液潤心肺
白檀大能解暑毒 麝香通竅辟邪氣

奇效良方二十一條

夫人生於天地以生而以心為主宰腎為根本心既病則

附論

精神不進志意不治故病不可愈謂其精壞神去則榮衛不可
復收榮泣衛除故病不可愈也夫腎藏精與志為生性之本元
氣之根精神之所舍也靈樞經云精全神此之謂也且人身
有精而後有神今精神既壞則心不濟而盜汗遺濁等病矣
可無焉蓋精者腎之液也汗者心之液也心之所藏者神也腎
之所藏者精也而心有病則神不守舍而日患怔忡恍惚失志
夜多異夢登高涉險火發追捕或與鬼交睡出盜汗而腎受病
則髓海枯竭而日為精神倦怠脚膝軟弱遺精白濁諸虛百損
莫不由是心既而致也至如人病有至如是尚或致上於財氣
然心於色慾不知節制禁忌愈傷其元氣而元氣既虛則諸
疾若曰五勞六極六損七傷五尸九蟲十疰諸骨蒸之證是也
蓋五勞者志勞思勞憂勞心勞瘦勞此五臟之病也六極者氣
極血極筋極骨極肉極精極此六腑之患也七傷者心肝脾肺
腎并內外所傷或為五臟并骨脈所傷為七傷也五尸者為五
尸遁尸寒尸喪尸尸疰也九蟲者曰伏蟲蟄蟲白蟲蠹肉蟲肺蟲
胃蟲腸蟲赤蟲蟻蟲也十疰者為風疰氣疰寒疰生人疰涼疰
酒疰食疰水疰尸疰土疰也諸骨蒸者為心肝脾肺腎膽胃大
腸小腸膀胱三焦兩宗筋回腸玉房腦骨髓筋脈血肉是也然
勞極損傷尸疰諸蒸之名既以聞矣其所感之因所患之狀又
果何如哉曰矜持志節勞傷於脾應乎肉極盡力謀慮勞傷於
肺應乎氣極意於思慮勞傷於脾應乎肉極盡力謀慮勞傷於
肝應乎筋極曲運神機勞傷於心應乎脈極勞極精氣變生諸

腫腫先後脚起肉變黑臍內時痛八曰水疰手足腫百日熱肉
 變髮落日失明一年後難治三年身腫轉成癰生蟲死九曰尸
 疰熱寒牽掣七日後熱肉變白駁咽喉中吞如有物兩脇痛也
 十曰土疰人之五臟配合五行土內主於脾胃氣為五行五臟之
 主其所禁忌尤難觸犯人有居住穿鑿地上不擇便利觸犯禁
 忌土氣與人血相成更致疾病其狀土氣流注皮膚骨連腑臟
 骨節沉重遍身虛腫其腫自破故謂之土疰夫蒸之在心少氣
 煩悶古必焦黑蒸在小腸腹內腸鳴大便或秘或泄蒸在肝目
 昏暈躁恚無時蒸在膽耳聾口苦脇下堅痛蒸在腎耳輪焦枯
 腰脚痠疼蒸在右腎情意不定精泄如白絮蒸在肺喘嗽咳血
 声音嘶遠蒸在大腸右鼻乳疼大腸隱痛蒸在脾唇口乳腹脇
 脹痛畏寒不食蒸在胃鼻口乾燥肚脹自汗睡不寧蒸在膀胱
 小便黃赤凝濁如膏蒸在三焦或寒或熱中腕腹中時覺煩悶
 蒸在兩心胃噎塞疼痛不舒蒸在宗筋之脈緩緩小腹急痛蒸
 在回腸肛門澀澀傳道之時裏急後重蒸在五房男子遺精女
 子白淫蒸在腦眼眩頭眩口吐濁涎蒸在肌肉鱗起毛折髮落
 蒸在骨肢齒黑燥大行痰涎蒸在髓有骨倦疼折骨痠痛蒸在
 筋眼昏痛痛瓜甲焦枯蒸在厥心煩熱痛如針刺蒸在肉自
 瘡身熱多不柰何四肢動蒸在血毛髮焦枯時有鼻衄或復
 承血此為諸般骨蒸也大凡醫工遇此諸疾其人血氣未收精
 神未散尤可施治若血氣精神已壞形骸肌肉俱削及日久發
 熱咳嗽大便作泄斷不可療雖有神丹聖藥亦不能作効也
癆瘵通治方
 樂人建中湯 治臟腑虛損身熱消瘦潮熱自汗時成癆瘵此
 藥大能退虛熱生血氣
 前胡去芦 細辛去葉 當歸去土 白芍藥

人參去芦 槲皮去白 桂心去皮 麥門冬去心
 黃耆 蜜炙 茯苓去皮 甘草炙各 半夏湯洗
 右作一服水二鍾生姜五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服
黃耆湯 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減
 食多渴咳嗽有血
 黃耆 蜜炙 鱉甲去醋 桑白皮 半夏湯洗
 秦艽去芦 地骨皮 白茯苓去皮 天門冬去心
 人參去芦 赤芍藥 生地黄 熟地 桔梗去芦
 紫苑去芦 知母已上各 肉桂半枝 柴胡去芦
 甘草炙各
 右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾食後服
秦艽鱉甲散 治氣血勞傷四肢倦怠面黃肌瘦骨節煩疼潮
 熱盜汗咳嗽痰喘並皆治之
 秦艽 鱉甲去醋 荆芥去葉 天仙藤
 青皮 貝母去心 前胡去芦 柴胡
 白芷 陳皮去白 乾葛 甘草炙各
 肉桂去皮 羌活各半
 右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服
秦艽扶羸湯 治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或熱声啞不出脉
 虛自汗四肢倦怠
 秦艽 鱉甲米醋 人參去芦 當歸洗焙
 紫苑 半夏湯洗 甘草炙各 地骨皮半
 蛇胡二升
 右作一服用水二鍾生薑五片烏梅紅棗各一枚同煎至
 一鍾食後服
龜甲地黃湯 治虛勞手足煩熱心下怔忡身熱羸瘦飲食不

為肌膚

驚甲 醋炙

熟地黃 酒浸

蛇胡 去芦

石斛 去根

秦光 去芦

茯苓 去皮

麥門冬 去心

白木 各半

人參 去芦

肉桂 不見火

甘草 炙各

右作一服水二鍾生薑五片烏梅一枚煎至一鍾食後服

黃耆飲子 治諸虛勞氣四肢倦怠骨節痠疼潮熱之力自汗

怔忡日漸黃瘦胃膈痞塞不思飲食咳嗽痰多甚則唾血

黃耆 蜜炙

當歸 酒浸

紫苑 去土

地骨皮

石斛 去根

人參 去芦

鹿茸 酒炙

桑白皮

附子 炮去

款冬花

半夏 湯泡

甘草 炙各

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

參香散 治勞瘵嗽喘咯血声嘎潮熱盜汗

人參

北五味子

杏仁 去皮

防風

羌活

款冬花

桑白皮 湯泡

明阿膠 炒

芫胡

白茯苓

黃耆 蜜炙

紫苑 茸

當歸

川芎

半夏 製

貝母 去心

枳殼 炒

秦光 洗

桔梗

甘草 炙各

鱉甲 去裙米醋

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食後服

劫勞散 治心腎俱虛勞嗽時復三四聲潮熱熱過即有盜汗

四肢倦怠身瘦恍惚異夢嗽中有血名曰肺痿

白芍藥 半斤

黃耆 蜜炙

人參

白茯苓

熟地黃 酒洗

當歸 去芦

半夏 麩

五味子

阿膠 炒

甘草 炙各

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食後服

旋神飲子 治勞瘵增寒發熱口乾咽燥自汗煩鬱咳嗽甚重

唾中血絲瘦劇倦

人參

當歸

白芍藥

茯苓 去木

白木

黃耆

半夏 麩

蓮肉 去心

桔梗

麥門冬 去心

熟地黃 酒浸

五味子

白茯苓

甘草 炙各

右作一服水二鍾烏梅紅棗各一枚煎至一鍾食後服如

嗽加阿膠極極曾兩加木香溫紙裹煨加沉香亦可如不

思飲食加扁豆

阿膠丸 治勞瘵并救血唾血

生地黃 洗

卷柏 藥

阿膠 炒

生地黃 洗

卷柏 藥

大薊 根

五味子

雞蘇 藥

山藥 湯泡

栝子仁 炒另

麥門冬 去心

人參

阿膠 炒

何風 各半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼濃煎小麥

湯或麥門冬湯煎下

青蒿散 治虛勞骨蒸咳嗽声嘎皮毛乾枯四肢倦怠夜多盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱

青蒿

秦光

香附子 炒去

桔梗 去芦

天仙藤

鱉甲 醋炙

前胡 去苗各

烏藥 半兩

川芎 半斤

甘草 炙半

右為末每服三錢水一盞生薑三片紅棗一枚煎至六分

瀝去且食後服

清骨散 治男子婦人五心煩熱欲成勞瘵

北芫胡

生地黃 洗

熟地黃

人參 去芦

赤茯苓

防風 去芦

秦光 炒

薄荷 藥七分

胡黃連 五分

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

參子 治憂思喜怒飢飽失宜以致氣不安咳喘膿血 增寒壯熱肌膚消瘦成勞瘵	人參 紫苑 <small>去土</small> 阿膠 <small>炒</small> 細辛 <small>去葉</small>	杏仁 <small>去皮</small> 欵冬花 天門冬 <small>去心</small> 經霜桑葉	半夏 <small>湯泡</small> 五味子 百合 <small>各</small> 甘草 <small>炙</small>	右作一服水二鍾生薑五片煎至七分食後服	因氣而成嗽者加木香	吐血有絲者加生地黃	咳而唾血有寒者加鍾乳粉	因痰極而咳嗽者加黃耆	因損嗽而吐血者加沒藥藕節	咳而嘔逆腹滿不食者加白朮仍倍加生薑	咳而小便多者加益智仁	咳而大便溏者去杏仁加鍾乳粉	咳而氣逆者加沉香橘皮同煎	地仙散 治骨蒸肌熱一切虛勞煩躁並皆治之	地骨皮 防風 <small>各</small> 薄荷 <small>各</small> 甘草 <small>各</small>	右為末每服三錢水一盞生薑三片竹葉七片煎至六分	去生薑竹葉食後服一方加入參半兩雞蘇一兩倍甘草	白朮黃耆散 治五心煩熱自汗四肢痿弱飲食減少	白朮 黃耆 當歸 黃芩	芍藥 <small>各</small> 寒水石 茯苓 <small>各</small> 人參	川芎 <small>各</small> 官桂 <small>各</small> 石膏 甘草 <small>各</small>	右為末每服三錢水一盞煎至六分食前服一日三服	當歸地黃湯 治咳血衄血大小便血或婦人經候不調月水 過多喘嗽
---	---	--	---	--------------------	-----------	-----------	-------------	------------	--------------	-------------------	------------	---------------	--------------	------------------------	--	------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	---	---	-----------------------	-------------------------------------

當歸 芍藥 川芎 白朮	黃藥子 槐子 <small>各</small> 生地黃 白龍骨	茯苓 <small>各</small> 黃芩 甘草 <small>各</small>	右為末每服三錢水一盞煎至七分食前服	地骨皮散 治骨蒸勞熱肌肉消瘦少力多困夜多盜汗	地骨皮 秦艽 訶胡 枳殼	知母 當歸 鱉甲 <small>炙</small>	右等分為末每服三錢水一盞訶胡枝頭各七箇生薑三 片烏梅一箇煎至七分去桃枝等四味臨睡服	神効取蟲青桑枝散	青桑枝 柳枝 梅枝 <small>各</small> 鬼臼 <small>各</small>	青蒿 <small>各</small> 石榴皮 赤箭 鬼臼 <small>各</small>	右用童子小便一升半葱白七莖去頭葉煎至一半去滓 另入安息香阿魏各一分再煎至一盞去滓調夜砂末半 錢檳榔末一分麝香一字分作二服調下五更初一服五 更三點一服至巳時必取下蟲紅者可救青黑色者不治 見有所下即進軟粥飯溫煖將息不可食硬物及生冷等 物合時須擇吉日不得令猶犬孝子穢惡婦人等見一方 不用赤箭鬼臼	雄黃丸	雄黃 鱉甲 <small>炙</small> 木香 <small>各</small> 天靈蓋 <small>各</small>	兔糞 <small>各</small> 輕粉 <small>各</small>	右為細末用法酒一升大黃半兩整膏充如彈子大珠砂 為衣凡遇此疾先燒安息香煙吸之不嗽非傳尸也不可 用此藥若煙入口咳不止乃傳尸也宜用此藥五更初 勿令人知童子小便同酒一盞化一丸服之如人行二
----------------------	--	--	-------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------------	--	----------	---	---	--	-----	--	--	--

十里即吐虫或如燈心或如爛瓜李或如蝦蟆未効再

服以應為度所出虫用紅火燒之或用油煎埋於僻地

再生丹 治一切勞瘵黃瘦虛損諸藥不能治者此藥大効

大茴香 益妙不通 穿山甲 酥炙

全蠲 微炒 通草 已凡各沉香 木香

檳榔 燈草 已凡各 紅花 半

右為細末其草膏和丸如梧桐子大每服三四十九空心

用溫酒送下以乾物壓之

考歸血餘散 治瘵疾

川芎 當歸 三味 桃仁 水浸去 木香 各二

室女頂門生髮 一宿日中細乾燒火燒存性

全蠲 二枚 安息香 江上大鯉魚頭用 鐵餅

雄黃 各一

右為末分作四服每服井水一大椀淨室中煎七分入紅

降真香末半錢服此藥燒北斗符入藥月初五更向北目

天呪曰察神察神害我生人吾奉帝勅服藥保身急已如

律令念呪五遍面北服藥畢面南吸生氣一口入腹中燒

降真香置床下薰半時再一服後以醫甲生犀角散取蟲

北斗符 勅 咒

醫甲生犀角 治瘵疾殺瘵蟲取出惡物

醫甲 一枚去 生犀角 降真香 阿魏 酒浸

乾漆 存性 妙 耳遂 木香 三味 穿山甲 醋炙

雞心 檳榔 批仁 水浸去 安息香 各半 紅粉 十粒

全蠲 三個 雷丸 二枚 虎骨 二斤 結實 十斤

天靈蓋 一具 男者色不赤可用女者赤色勿用

應急之如神令明 七通火用研末

右為末每服半兩先用歧心四十九粒東向桃李桑梅小

稍各二寸長七寸生藍青七葉青蒿一小撮豕白連振洗

五根石臼內同研用井水一椀半煎至一盞入童子尿一

盞并藥煎取七分入麝香一字月初旬五更空心溫服即

以被覆汗恐汗有細虫軟帛拭之即焚其帛少時必瀉虫

以桶盛急餅取虫付烈火焚之并收磁器中瓦片付雄

黃蓋之泥和灰扎埋深山絕人行處

五技散 取下傳尸勞虫

桃枝 李枝 梅枝 石榴枝

桑枝 並取東向小枝 青蒿 一小 葱白 洗七片

生薑 七片 苦楝根 拍破 右以童尿一升半煎取其半去滓入安息香蘇合香阿魏

各一錢煎至一盞濾清調殊雄黃雷丸枯白礬硫黃末

各半小雞心檳榔末一各半射香一字分二服月初五更

空心進一服五更五點又進一服至午前取下蔡虫淨桶

盛急餅入油餅內煮仿傾冲虫入磁器封扎埋深山僻處

代勞鬼哭欲子

紫胡 秦光 阿魏 各半 東引 桃枝

青蒿 各一 甘草 各半 攪碎 作三服 煎未分

右各細剉以童子小便二升浸一宿至明早煎至一升去

滓分作三服每服入前檳榔末和勻空心溫服人行數十

里又進一服男病女病而病男而病一二服或吐或瀉即

不用服第三次若未吐即再進第三服病在上即吐病在

下即瀉出惡物或異色虫或如亂絲髮忌食肥脂煎菜

等物合及煎時忌等子雜婦雞犬見藥淨藥長流水併

龍九 治勞瘵虛熱喘嗽

貝母去心 杏仁去皮 知母略一 芫胡二刀

川芎一刃 阿膠炒 當歸略半

右龍載入厚磁器中用中等活籠一箇生宰去頭以籠肉并血并藥用醇酒五升同浸一宿密紙封次以慢火同煮候香熟取籠令病者隨意食之只留籠甲并骨并藥焙乾為末以浸藥酒汁調米粉為糊丸如梧桐子大每服七十丸不拘時米飲下

藍汁方 殺瘵虫惡虫皆化為水

生藍青葉研取自然 雄黃 枯白礬

安息香 紅硬降真香各 射香少許

右以雄黃等同研入藍汁內月初五更空心服此方通治虫毒及解諸毒

潤神散 治勞瘵增寒發熱乾咽燥自汗疲劇煩躁

人參 黃耆 疾竹葉 麥門冬

桔梗 甘草炙

右各等分為末每服五小水一盞煎七分去滓不拘時服如自汗入小麥同煎服

雞白散 治久患咳嗽肺虛成勞瘵及吐血咯血等證

雞甲炙 阿膠炒 鹿角膠三分 甘草炙

右為散每服三小水一盞入雞白一盞長二寸煎至八分去滓食後服先嚼雞次服藥一日三服

治患勞人燒香法

玄參一斤 并松六刀

右同為細末每日代香焚之佳

神傳膏 治勞瘵吐血妄行

右用剪草一斤發台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又

如細辛淨洗為末入生蜜一斤和為膏以銀器盛之不得

犯鐵器九蒸九曝一日一蒸曝病人五更起而東坐不得

語用匙挑藥如粥服之每服四匙良久用稀粟米飲壓之

藥於服粥亦不可大熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯

血只一服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙神効

有一貴人其家將病瘵其尊人常以此方視之九日而瘵

成前一夕病者瘵人戒令翌日勿令服藥次日將服之為

屋土壘器中不可服再合既成又將服為貓履器又不可

服又再作未就而是人卒矣此瘵之異如此若小小血妄

行一啜而愈或云是陸農師夫人鄉人艾孛先常親說此

事渠後作大觀本草亦取入集中但入未識不苦信爾

太上延年方勝追魂散 治勞瘵垂死方

人參 杏仁去皮 芫胡 天靈蓋炙

川椒一分去目 桃心 柳心各一握

右以童子小便一升入藥末一兩煎令熟每日空心日午

各一服

神授散 治諸傳尸勞氣殺蟲

右用川椒二斤擇去子并合口者炒出汗碾為細末每服

二錢空心用米湯調下須痺暈悶少頃如不能禁即以酒

糊丸如梧桐子大空心服三五丸昔人嘗與病勞婦人

交婦人死遂得疾遇一異人云勞氣已入臟遂令急服二

片其病當去如其言服之幾盡大便出一蟲狀如蛇遂安

續與人服之獲安濟者多矣

夏貴公薰勞法 治骨蒸發熱咳嗽不已

雄黃明者 玄參 百部 厚朴已上各

右同為細末每日代香焚之佳

欵冬花

菡萏各二

艾葉

雷丸各一

信石

雌黃各半

右為未用香爐有益者入藥燒煙止留一小孔出煙患入以紙塞鼻以口吸其煙又則飲少清米飲日三次蟲死軟愈一方加百部蕪荑仁蘇木焙為末鑄鐵和攤紙上貴公在蜀作宣撫甚秘寶之已膏肓之疾藥不能及蒸之有效

治勞瘵

右三月四日取桃葉五升熟搗脫衣避風密室中坐其上從旦至暮尸蟲悉出

治勞瘵

右於空心食榧子百箇諸勞瘵悉化為水

治傳尸勞瘵羸瘦者

右以鼈甲一箇炙令黃色為末酒服方寸七日二服

治五蒸方夫蒸者乃附骨熱毒之氣皆是死證庸醫不識熱蒸形狀或妄稱神祟以相疑惑致使蒸盛變為痺而致死者

今具各方于後

一曰骨蒸

右用芒硝水服方寸七日再服或搗苦參蜜和丸如梧桐子大每服七丸米飲下日再服無忌以禮涼為度

二曰脉蒸

青箱子

苦參各二

艾葉

甘草各一

右切以水四升煮取一升半分為三服用羊胞盛之以葦筒灌下部中若不利用芒硝一方寸七和冷水合和服之日再服忌海藻菘菜

三曰皮蒸

右用芒硝一兩以水一升半和分為二服三日服訖以冷

水浸手以熨脇下并臂上及痛處亦可掌臂指灸側腋下第三肋間腋下空中七壯立止

四曰肉蒸

右用大黃一兩半到如小豆大以水一升浸一宿明日絞取汁一服五合許微利即止若熱不定亦可服芒硝一方寸七日三服以体凉為度

五曰內蒸

所以言內者必外寒內熱附骨也其根在五臟六腑之中必因患後得之骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸作之時四肢漸細足跌腫者

右用石膏細研如粉凉水服方寸七日再体凉為度

加減青高丸

治男子女人一切勞瘵骨蒸風氣此藥有七名一名杏仁九能治嗽二名木香九能治尸產鬼氣九種心痛三種蟲咬心痛三名犀角九能治時行熱疾瘧疾四名

虎骨丸治小兒無辜疳痢五名万病丸治一切虛傷六名丹砂丸治毒邪瘴瘴氣等七名青高丸治男子女人一切

勞氣若常帶行山林曠野坑穽塚墓前後鬼神不敢近若彼毒蛇惡物所傷爛嚼一丸傳之必効

青高心三枚童子小便二大

東引挑枝半握細搗甘草各四

右以上藥用新甕一口用小便浸一七日入鍋內同煮三五

五百沸湯出藥曬乾搗研為末然後將小便三升又釜中以棗柴火煉之以篋撻勿住手煉至三升用不淨器乘和

後藥

杏仁去皮 桃仁去皮 桔梗炒 蒼木屑一方

枳殼去核 白茯苓皮去黑 養性 天靈蓋鹿角代

升麻	大黃	地骨皮	貝母	去心
完莖	當歸	防風	續斷	去心
桂心	橘皮	黃耆	厚朴	去粗皮
吳茱萸	丹砂	射香	甘草	炙
木香	犀角	羚羊	羊角	各一分

右為細末用前小便煎和勻入白內湯五百下如不黏可入煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後溫水下疾重日再服通三焦安五臟四時常服永無虛勞之疾時行瘴癘常不能害上氣欬嗽無問涕唾并乾咳嗽後有血水名肺熱上毒氣壅轉成鼻塞重者中結痛若不速除當成肺癆勞瘦服此藥五兩其疾乃平手足熱如火口生瘡舌爛夜夢驚恐口中膿齒牙痛咽痺服五兩墜子根本從大腸出如朽筋爛肉又如蝦蟆衣櫻桃狀異腥臭者若瘰癧當發不治根本必攻五臟狀如藤蘿繞木葉枯不相捨冷頰頰破損必死服此五兩當効若患時氣頭痛欲死身熱大小便秘澀復不識人不下食新汲水下五十九即瘥丈夫婦人曾服熱藥過度近雖藥力猶有往七發來衝人頭面致眼痛昏熱心胃燥煩口臭生瘡溫水下二丸不過一二兩嬰孩無辜病與大人勞病同惟胎中受精血致令唇口焦乾或瀉或痢腹中漸結眼生白膜服之可愈若孩漸大準大人例服之女人月經不勻或前或後多少不定青黑雜色或凝或散漸成勞瘦服一二兩當愈

春加	竟膽草	竟骨	芫胡	去苗
夏加	石菖蒲	麥門冬	白茯苓	去粗皮
秋加	秦光	旋覆花	訶梨勒皮	各一分
冬加	紫苑	去土	五味子	為藥

加減黃芪建中湯	治男子婦人五勞骨蒸者世用神効
黃耆	一分
當歸	去芦
熟地黃	地骨皮
縮砂仁	檳榔
白茯苓	白朮
黃芪	一兩或為末蜜湯調服臨期斟酌
麥門冬	湯
遠志	去心
甘草	炙

右判知麻豆大每服三三水一盞半棗二枚煎至半盞去滓溫服未瘥再服以瘥為度甚益心力胃經吐血者服之尤佳若畏藥者去紫石英

芫胡	前胡	知母	貝母
杏仁	各等	團魚	

右將藥同魚煮候魚熟提起團魚除去魚頭不用取肉連汁服之却將藥焙乾為末就用團魚裙甲及骨更煮汁一盞和藥為丸如梧桐子大每服三十九空心煎黃芪湯下病安仍服後黃芪益氣補理

黃芪益損湯 治男子婦人童男室女體虛不足榮衛虛弱五勞七傷骨蒸潮熱腰背拘急百節酸疼夜多盜汗心驚驚悸場咽燥唇焦嗜睡少力肌膚瘦悴咳嗽多痰咯血絲寒

熱往來煩赤神昏全不思食服熱藥則煩躁衝滿上焦進
涼藥則膈痛而腹痛及治大病後除衛不調及婦人產後
血氣未復宜服此藥

黃芪

人參

石斛

木香

白朮

當歸

肉桂

茯苓

芍藥

半夏

川芎

熟地黃

山藥

牡丹皮

麥門冬

五味子

甘草各等分

右劉散每服三升水一盞半生薑五片棗二枚小麥五十
粒烏梅一箇煎七分食前服

此胡梅連散 治骨蒸勞久而不痊三服除根其効如神又治
五勞七傷虛弱皆治

前胡 烏梅 胡黃連各三

訖胡

前胡

烏梅

胡黃連各三

右吹咀每服八升用童子小便二盞搗磨一箇猪脊骨髓
一條韭白半升同煎至一盞去滓服无時

陽病開關散 治證同前

北訖胡 桔梗

麥門冬

木通

桑元 地骨皮

桑皮

芍藥

木香

澤瀉

當歸

甘草

右吹咀每服三升水一大盞生薑二片煎至六分去滓空
心服小便多即病去矣

陰病開關散

赤芍藥

當歸

肉桂

白芷

甘草

枳殼

木香

南星

右吹咀每服二升水一大盞生薑三片煎七分入無灰酒
三分盞又煎七分溫服先服起胃散一二日後不問退否

三升盞又煎七分溫服先服起胃散一二日後不問退否

兼玉龍膏服

起胃散 陰陽二證皆用

黃芪

白朮

山藥

白芷

人參

木瓜

右吹咀每服三錢水一大盞煎七分去滓不拘時服一方
加沉香茯苓甘草各半兩

玉龍膏

青蒿子

北訖胡

白檳榔

肉蓯蓉

生地黃

虎頭骨

人參

龍甲

地骨皮

赤茯苓

白朮

牡蠣

木香

當歸

珠砂

豆豉心

右加烏梅肉枳殼同為細末却以肥實杏仁五升用童便
浸春夏七日秋冬十日和批日中晒每日一換新者候日

數足以清冰淘去皮尖焙乾別以童便一升於銀石器內
文火煎至隨手爛傾入砂盆內用柳木槌研爛為膏細布
濾過入酥一兩薄荷自然汁二合攪勻和藥用搗搗五百
下丸如梧桐子大空心白湯下十五丸加至三十丸如覺
熱減丸數服熱少還添加減經月日諸疾悉退進食安卧
面有血色乃藥力也當勤服忌食生冷水生血雀鴿等

天門冬散 治骨蒸心肺煩熱氣息喘促唾不去唇漸加羸瘦

天門冬 赤茯苓 枳殼

訖胡 百合 白前 前胡

川升麻 黃苓 杏仁

甘草 桑根 白皮 杏仁

右判為散每服四錢以水一中盞生薑半分煎至六分去
滓食後溫服

滓食後溫服

滓食後溫服

滓食後溫服

滓食後溫服

滓食後溫服

醫甲丸 治骨蒸脇下痞癖及婦人月水不通

醫甲去毒 訶梨勒去毒 琥珀各二 牛膝去毒

京三稜煨 大黃剉炒 土瓜根切帶 官桂去毒

牡丹皮各一 桃仁湯浸去尖及

右為細末和勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食前

用桃仁煎湯送下

檳榔散 治骨蒸腹中痞癥脇下痞悶漸加瘦劣

檳榔 赤芍藥 訶梨勒去毒 木香

桃仁湯浸去尖及 赤芍藥 桔梗去毒

京三稜煨 醫甲去毒

右劉散每服三錢水一中盞入生姜半分煎至六分去滓

食前溫服

甜葶藶散 治骨蒸肺痿咳嗽上氣不得眠卧涕唾稠粘

甜葶藶二兩 陳皮去白 枳殼去核 紫苑去土

赤茯苓各一 桑根白皮三兩

右劉散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎三枚煎至

六分去滓不拘時溫服

生犀散 治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五心煩

犀角鎊 地骨皮 秦元去毒 麥門冬去心

胡胡去毒 枳殼炒 茯苓去皮 赤芍藥

桑皮去赤 黃芪蜜炙 人參去芦 醫甲去毒

知母去毛 大黃各等

右劉散毒服三錢水一盞入陳青蒿一根煎或桃枝亦可

同煎至八分服及治小兒疳病熱似骨蒸者及久病後時

作潮熱并瘧疾有痰加半更熱輕者去大黃加黃芩

益母草煎丸 治骨蒸勞瘦

益母草一兩 丹砂三分 桃拔一兩 長老一兩 已上三

胡內煎丸三兩 丹砂三分 麝香半兩 桃仁去尖及

此胡五兩 天靈蓋一枚 醫甲去毒

甘草一兩

右除煎外搗為細末用益母草煎和為丸如梧桐子大空

心烏梅湯下三十九漸加至四十九初服竟心熱減丸數

如不熱依法服服後以四五匙軟粥壓之

紫苑散 各紫苑湯 治傳屍骨蒸復連殭躄肺氣咳嗽

紫苑去土 桑根白皮炙 桔梗炒 生地黃酒浸

續斷各半 五味子 甘草各 赤小豆一合

右劉散每服五升七水一盞半入青竹茹彈子大煎至一

盞去滓食後溫服良久再服若熱甚加麥門冬去心一兩

石膏一兩 五升

天門冬丸 治骨蒸勞熱潤心肺上咳嗽

天門冬去心焙 桑根白皮炒 白茯苓去皮

杏仁湯浸去皮尖 貝母去心 葶藶炒

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸綿裹蒸淫煎麥

門冬湯得下亦得不拘時

雄黃丸 治諸屍癘瘕及中惡心痛瘰癧瘰癧

雄黃細研 真珠細研 白礬細研 附子炮去

藜蘆去毒 牡丹皮 桂心已上各 蜈蚣一枚

巴豆半兩 去毒心細

右為細末入別研藥令勻煉蜜和綿五七百件丸如梧桐

子大每服三九不拘時以粥飲下

又方 雄黃細研 酥各一

右相和丸如彈子大每服一九用熱酒二合化開服之須
史再服瘥已有屍症者常當以此藥甚良

五香丸 治諸毒死症鬼氣心腹脹滿大小便不通及鬼注心
痛不可忍者

沉香 藿香 青木香 麝香研
當歸 桂心 鬼箭羽 雄黃研

巴豆法炭 珠砂研 訶梨勒去核 吳茱萸
檳榔 乳姜 肉苳蔻 甘草炙

升麻配壯各 犀角屑 牛黃三分 桃仁去皮
附子各五分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大以煖水下三九至五九
如不利更服以利為度此方甚驗已海藻菜猪肉冷水
生葱薑芽生血等物

鷓鴣丸 治死症邪氣流傳忽然悶絕時發寒熱或腹痛脹滿
鷓鴣酒炙 雄黃研各 官桂去粗 大黃三分

丹砂研一分 麝香研半刀 赤足蜈蚣一條酒
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食前用桃
枝煎湯送下

還魂湯 治卒感忤鬼擊飛屍諸症奄忽氣絕無復甦或已死
咬牙口禁不開去齒下湯入一不下者分病人髮在左
捉踏有引之藥下後增取盡一升頂更立進金匱云云

沉而滑沉則為實滑則為氣突氣相搏血氣入臟則死入
胃則愈若卒厥唇口青身冷入臟則死身和汗出愈

麻黃三刀 桂心二刀 杏仁七刀 甘草一升

右咬咀水八升煮取三升分三服一方無桂心

蜜陀僧散 治臨屍哭位死氣入腹沉滯臍間有時發動取勞

精神効

蜜陀僧散 治臨屍哭位死氣入腹沉滯臍間有時發動取勞

右和令勻每服二錢用煮粥濃湯調下當晚不食臨卧一
服餘時勿服併服三夜當下惡物如不下第三夜加生牽
牛頭末一錢同調下

漸羸瘦 額肝丸 治傳屍勞病并諸冷熱勞疾白月將久面色萎黃漸

額肝丸 治傳屍勞病并諸冷熱勞疾白月將久面色萎黃漸

黃連 木香 肉苳蔻 訶胡去苗各
附子 官桂去粗 地骨皮 桃仁去皮炙

當歸 甘草炙 天靈蓋炙 陳皮炙
澤瀉已升 黃耆研半 生地黃 知母

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心酒下四十九

烏鷄丸 治傳屍勞病骨蒸眼目昏澀面色青黑咽候噎塞
痰涕咳嗽或痰癆攻刺疼痛骨蒸眼目昏澀面色青黑咽候噎塞

傷情思不樂夢寐虛驚精滑泄世失血增寒潮熱盜汗有
背拘急腰脊肢節煩疼四肢少力不喜飲食小便黃赤大
便或瀉乍進乍退服取藥後宜服此藥

附子 炮去 黃連 炮去 訶胡去苗 白附子 生

當歸 切 秦艽 去苗 槐膠 肉苳蔻 酒浸

遠志 去心 陳皮 焙 巴戟 續斷 上各

乳香 研 雄黃 研 丹砂 研 甘草 炙 各

丁香 研 乾姜 炮 各
右搗研極細先養烏雞一隻以酒黃三兩為末分作三
十分每日拌飯食一月日用大麻子一升製盡穿治去毛

及嘴瓜并腸留心肝將前藥末入在鷄腹內以麻線纏定
再用無灰酒一斗銀石鍋內用文武火煮令雞熟取出除
去雞骨將雞肉并藥同研更將雞骨焙乾亦研為末同搜
和入臼中搗千餘下丸如梧桐子大每服二十九用溫酒
送下空心日午臨卧各進一服

犀角紫河車丸

治傳勞服三月平復其餘勞只數服愈

紫河車

一具是百生我身之髓本以
水調亦在一宿洗淨焙乾用 鼈甲 群炙

胡黃連

枳椇

為藥

大黃

龍膽草

黃蘗子

貝母

敗鼓皮心 甜炙

知母

鐵半蓬木

犀角

芒硝 已上各
錢半

珠砂

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大以珠砂為衣每服二十
九空心用溫酒送下

天靈蓋丸 治傳勞
天靈蓋 即腦髓有十字縫者取中心一片先
以茅香湯洗以安息香酒塗炙黃色
紫河車 一具頭首至尾胞衣是也於石上用新草煎
存性勿令火燥通赤 石蛻 蛻四十九條和陽壯補丸
瀨肝 一具薄切用 赤足蜈蚣 一條用酒
蛤蚧 一對酥炙令黃 金線蝦蟆 一條用酒
黃鷹糞 一錢 金線蝦蟆 一條用酒

天靈蓋丸

治傳勞

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

天靈蓋丸

牡蠣粉 治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗
牡蠣 三合 麻黃根 三味 白米粉 三合 羨藥 抄去刺為
丹砂 半兩 研 胡燕屎 一兩

牡蠣粉 治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗

牡蠣粉 治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗

牡蠣粉 治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗

牡蠣粉 治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗

牡蠣粉 治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗

右同研勻以生絹袋盛夜卧汗出以粉身時之用之

天門冬大煎 治男女五勞七傷八風十二痺傷中六極一氣

極則多寒痺腹痛喘息驚恐頭痛二肺極則寒痺腰痛心

下堅有積聚小便不利手足不仁三脉極則顏色苦青逆

意恍惚失氣狀似悲泣之候苦舌強咽喉乾寒熱惡風不

可動不嗜食苦眩喜怒妄言四筋極則拘攣小腹堅脹心

痛膝寒冷四肢骨節皆疼五骨極則肢節痠逆黃疸消

渴癰疽妄發重病浮腫如水病狀六肉極則發疔如被擊

不復言甚有至死復生衆醫所不能治此皆六極七傷所

致非獨房室之所為也憂患積思喜怒悲歡復隨風濕結

氣欬時嘔吐食已亦化大小便不利時泄利下重溺血上

氣吐下作寒乍熱卧不安席時上惡夢与死人共飲食入

塚神室魂飛魄散筋極則傷肝傷肝則腰背相引難可俛

仰氣極則傷肺七則小便有血目不明髓極則陰痿不

起往而不交骨極則傷腎七則短氣不可久立陰痿惡

寒甚者如縮陰下生蒼溫瘰癧手搔不欲住汗出此皆腎病

甚者多遺風毒四肢頑麻手足浮腫名曰脚弱一名脚氣

醫所不治此悉王之常服尤佳

天門冬 切三升半 生地黃 切三升半

白蜜 三升 酥 三升 枸杞根 切三升半

麝香 一具 鴉片 五升 升麻 一升 二升

已上並用大斗銅器中微火先煎門冬地黃汁減半乃合

煎取大半二斗下後件散藥煎取一斗內銅器重合煎令

引手可丸如梧桐子大平旦空心酒服二十九加至五十

九日二服忌生冷醋滑滑雜魚蒜油麪等漬釋相相

合今具散藥方于後

合今具散藥方于後

茯苓	桂心	白木	五加皮
羌活	遠志	澤瀉	石菖蒲
薯蕷	人參	石斛	栝子仁
牛膝	杜仲	細辛	覆盆子
獨活	川芎	黃芪	肉桂蓉
續斷	蓮藕	茯神	胡麻仁
橘皮	巴戟	狗脊	大豆黃卷
石楠葉	楮實	白芷 <small>二兩上各</small>	蔓荊子 <small>二兩</small>
薏苡仁	蜀椒 <small>一兩</small>	阿膠 <small>十兩</small>	鹿角膠 <small>五兩</small>
甘草	大棗 <small>一百枚</small>	黃作膏	

右治下節內前中牛髓鹿髓各加三升大佳小便澀去栝子仁加秦尤二兩乾地黃六兩陰痿失精去萎蕤加五味子二兩頭風去栝子仁加菊花防風各二兩小便利陰氣弱去細辛防風加山茱萸二兩腹中冷去防風加乾姜二兩无他疾依方脩合九此煎九月下旬採藥立冬日合服至五月上旬止若十二月臘日合者經夏至七月下旬止若停留不壞當於舍地陰處人地深六尺填沙置藥中上加沙覆之則經夏不損女人先患熱者可服患冷者勿服填骨丸 治五勞七傷補五臟除万病

石斛	人參	當歸	石長生
石菖	白木	遠志	肉桂蓉
紫苑	乾姜	天雄	蛇床子
茯苓	牛膝	附子	栝子仁
牡蠣	薯蕷	阿膠	牡丹皮
杜蒙	巴戟	五味子	乾地黃
甘草 <small>二兩</small>	蜀椒 <small>二兩</small>		

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九用溫酒送下不拘時服日三

鍾乳白澤丸 治丈夫諸虛百損五勞七傷真氣不足元臟不固神志俱耗筋力頽衰頭目眩暈耳內虛鳴心腹急痛氣逆嘔吐痰嗽喘促胃腸脹悶脾泄下痢遺精便濁厥冷自汗脈微欲絕婦人血海虛冷崩漏不止赤白帶下經候不調臍腹時痛面無顏色飲食不進但是虛勞之疾宜服

白檀香取末 乳香別研 附子切去 陽起石研各

鍾乳粉二兩 麝香別研

右和勻滴水搜成劑分作六十九每服一丸水一盞煎化及七分盞空心熱服如急病不拘時又服補益精血助陽消陰安心神定魂魄延年增壽起死回生一方用益酒或益湯送下

石斛萬病散 療五勞七傷大風緩急濕痺不仁甚則偏枯筋縮拘攣胃脇支痛引身僵直或頸項腰背疼痛四肢酸煩元陽衰弱下部癢濕卧便盜汗心腹滿急小便壅中疼痛或時使血咽乾口燥飲食不消往來寒熱羸瘦短氣肌肉損壞或無子息若生男女總欲及入便死此皆極勞傷血氣心神不足所致此藥慈主之令人康健多子

石斛	菊花	萆薢	石菖蒲
白木	天雄 <small>炮</small>	附子 <small>炮</small>	雲母粉
細辛	桂心	杜仲	肉桂蓉
續斷	遠志 <small>去心</small>	牛膝	乾地黃
防風	茯苓 <small>二兩</small>	蜀椒 <small>出汗</small>	乾姜 <small>炒</small>
蛇床子 <small>三分</small>	兔絲子 <small>三兩</small>		

右隨病陪其分綿篩為散先食以酒服方寸七日三以

為慶神良忌猪羊肉冷水桃李雀肉生葱生菜大酢錫等
聚寶丹 治五勞七傷諸虛不足溫中正氣祛風活血逐寒除
濕填精益髓強陰壯陽聰耳明目開心益智暖胃化食消
痰寬中殺九蟲通九竅補五臟秘精氣止夢遺除咳嗽養
肌膚治腰膝疼痛輕身

白茯苓去皮 山茱萸去核 五味子 乾山藥

石蓮肉 鷓鴣肉 金櫻子 破故紙

石菖蒲 熟地黃酒浸 肉蓯蓉酒浸 狗杞子酒浸

牛膝酒浸 遠志去心 杜仲去粗皮 茴香炒

龍骨 仙茅 楮實 巴戟去心

沉香已上各

右為細末用棗肉和丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五
十九空心用溫酒或鹽湯送下

金櫻子 治男子去血失精婦人半產漏下五勞七傷三尸百

疰肌肉陷下形色俱脫傳尸骨蒸虛勞衰損諸風變易瘦

劣難痊或因嘔吐或從汗出痢積久律液耗散婦人崩漏

無停色肉衰朽男子精滑不固筋力消痿傷寒累經勞復

瘡漏方在淹延大肉減削下血過多心氣不足健忘成狂

肝血衰虛昏暗作瞋陰陽衰廢飲食忘思常服充實肌肉

堅填骨髓悅澤面目長養精神秘精固氣壯力強筋冲和

百脉正理三焦定神魄安尸蟲烏髭髮牢牙齒男子全精

使婦人妊娠通神明不老能健捷其藥之功不可具述

金櫻子 養木 生地黃 仙靈脾四味並

肉桂酒浸 人參 牛膝酒浸 生鷓鴣肉乾

乾山藥 丁香 陳皮去白 生蓮子肉

栝子二別研 木香 茯苓去皮 虎絲子酒浸

石菖蒲 麝香別研 甘草炙

右將人參已下同為細末入栝子仁和勻以白紗蜜入銀

石器中於天地爐中置熟火五斤煉微解入男孩兒乳汁

二并以木篦攪次入上項膏汁同攪令勻勿令手住傾入

藥末一處攪熬之火消續續旋添熟火勿令大緊熬至可

丸即止取出却於銀石器中候稍溫入麝香末一處攪和

成劑更於石臼中杵千餘下每兩作十九每服一九空心

細嚼用溫酒送下

人參 五味子散 治男女老稚諸虛百損氣血勞傷涎喘欬體

或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一切虛損

人參 五味子 桔梗 當歸焙

白朮 白茯苓 熟地黃 甘草炙

黃芪 桑白皮炒 枳殼去穢 訶胡去苗

前胡去苗 地骨皮 陳皮已上各

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片煎至五分去滓食

後溫服日三服如煩渴加烏梅青蒿同煎咳膿血加知母

阿膠同煎尤妙

玉龍軟金丹 治男子諸虛百損五勞七傷下元又冷腰腿膝

痛婦人赤白帶下添精補髓活血駐顏

沉香二錢 檀香 安息香 八角茴香

益智仁略半 麝香 蓮子心 仙靈脾酥炙

硃砂 穿山甲 犀角 乳香

丁香已上各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九空心以溫酒

送下以乾物壓之

又方治證同前

右用烏雌鷄一隻治如食法以生地黃一斤切飽糖二斤
內腹中急縛銅器貯既中蒸五升米久須更取出食肉飲
汁勿噉鹽三月三度作之神良并止盜汗

補勞核神散 補一切氣虛勞疾

茯神 白茯苓 人參 遠志 去心

龍骨 肉桂 陳皮 甘草 炙 一兩

麥門冬 去心 五味子 當歸 一兩 黃芪 二兩

右為未分作八服每服用水一升半生薑五片紅棗七枚

煎至一升起前藥後空心服之

延齡膏 治一切勞

蝦蟆 鶴骨 鱧鱗 猪牙皂角

藜蘆 木香 丁香 梔子 各 麝香 少許

右為細末用羊腸大者盛之纏定兩頭於飯甑上蒸熟為

度取出候冷以竹刀割開刮下同腸表裏盡研細便入麝

香一處同研令勻丸如梧桐子大每服一百丸服藥時須

辰巳間用茅香熟湯吞下更看病人壯劣旋之服之須得

一度喫盡一百丸後以衣被蓋出汗病甚者略露面其蟲

從汗出口蟲如麥麩大餘者皆微狀用出盡汗後病人其

身便輕快候汗乾即換却元着衣服及卧物等初服藥覺

當時藥便盡吐並不住即難療或一百丸存六七十丸

猶可醫別以初藥補數如藥便生痰無不退服藥忌一切

發勞物甚者進兩服至三服即求除根本一服後別用喫

無觸忌治勞瘵散三五服為妙初出汗頻換手帕措之約

兩頭飯又勞瘵隨藥瀉下一度用盆盛之其蟲微狀浮在

面上動服藥後如不吐其妙也一生永忌觸犯者藥苦參

人參空青麥門冬烏頭等切忌服之

治五勞七傷用目益筋力宜而復補

右於八九月採仙茅竹刀刮去黑皮切如豆粒米泔浸

兩宿陰乾為末煉蜜和丸如梧桐子大每旦空心酒飲任

便下二十九禁食牛乳及黑牛肉大減藥力本西域道人

所傳開元元年岐羅門僧進此藥明皇服之有效當時禁

方不傳天寶之亂方書流散上都空三藏始得此方傳

與司徒李勉尚書路嗣恭給事齊抗僕射張建封服之皆

得力路公久服金石無効及得此藥其益百倍齊給事守

緇雲日少氣力風癢繼作服之遂良愈

酸筋湯 治風勞氣虛咳嗽發熱

敗龜板 醋炙 虎骨 醋炙 防風 去芦 海桐皮

當歸 切焙 芍藥 木通 半斤 牛膝 切焙

官桂 去粗 酸棗仁 炒 麻黃 去節 大腹皮

木香 黃芪 各一

右咬咀每服二升水一盞入青蒿烏梅各少許同煎至七

分去滓溫服一方加此胡熱地黃各半兩

治男子婦人風勞熱毒攻注四肢顏色枯瘁筋脈疼痛瘰癧

赤咽喉不利痰唾膠粘非時寒熱宜服此方

辰砂 連翹 貝母 去心

秦艽 升麻 麻黃 去節 麥門冬 去心

鱉甲 醋炙 旋覆花 牡丹皮 蔓荊子

荆芥 防風 各

右先研辰砂為末餘藥細碎為末却相和每服三升水一

盞煎三兩沸去滓臨臥徐徐熱服頂銀石器煎

木香湯 治氣勞身倦瘰癧四肢乏力面色萎黃飲食減少嘔

逆痰味咳飲胃滿

木香	沉香	山芋	枸杞子
附子 <small>切去</small>	天麻	半夏 <small>湯洗</small>	當歸 <small>切焙</small>
牛膝 <small>切焙</small>	龜甲 <small>切焙</small>	秦元 <small>去苗</small>	黃芪 <small>已上各</small>
羌活 <small>去毛</small>	枳殼 <small>去穢</small>	芍藥 <small>去皮</small>	巴戟 <small>去心已上</small>
芫胡 <small>去苗</small>	人參	甘草 <small>各一兩</small>	肉苁蓉 <small>已上各</small>
右以咀每服三升水一盞生薑二片葱白一寸煎至七分			
去滓不拘時溫服			
天門冬丸 治氣勞咳嗽喘促不焦虛損上焦煩熱四肢羸瘦			
天門冬 <small>去心</small>	麥門冬 <small>去心</small>	鱉甲 <small>切焙</small>	熟地黃 <small>二兩</small>
人參	黃芪	牛膝 <small>酒浸</small>	杏仁 <small>去皮尖</small>
白茯苓 <small>去皮</small>	五味子 <small>炒</small>	石斛 <small>去根</small>	枸杞子
山芋 <small>已上各</small>	肉苁蓉 <small>酒浸</small>	紫苑 <small>去苗</small>	訶梨勒皮
沉香 <small>已上各</small>			
右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十			
丸食前用棗湯送下			
真澄茄散 治氣勞心腹冷痛飲食減少四肢羸瘦			
真澄茄	附子 <small>切去</small>	草薢 <small>去皮</small>	黃芪
蓬朮	牛膝 <small>去苗</small>	當歸 <small>已上各</small>	芫胡 <small>去苗</small>
白朮 <small>略一</small>	桂心	川芎	吳茱萸 <small>湯洗</small>
木香	甘草 <small>各半已上</small>		
右以咀每服三升水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分			
去滓不拘時稍熱服			
治一切童男室女未有房室之勞却有思想之志因而感得勞			
氣五心煩躁夜夢不祥唇口乾焦發寒發熱小便多少赤			
白不定精神不足口無滋味			
犀角	芫胡 <small>去苗</small>	前胡 <small>去苗</small>	麥門冬 <small>去心</small>

黃芪	貝母 <small>去心</small>	鱉甲 <small>切焙</small>	桑寄生
茯神	人參	茯苓	桔梗
沉香	木香 <small>各半</small>		
右為細末每服二錢水一盞煎一二沸急瀉出食後臨卧			
和滓徐七熱喫			
此胡散 治虛勞熱心煩不食四肢無力			
芫胡 <small>去苗</small>	杏仁 <small>炒去皮</small>	紫苑 <small>已上各</small>	秦元 <small>去苗</small>
生地黃	赤茯苓	鱉甲 <small>已上各</small>	鱉甲 <small>已上各</small>
施子仁	甘草 <small>炙</small>	犀角 <small>屑</small>	桔梗 <small>去苗</small>
桑根白皮	養氣	人參	知母 <small>已上各</small>
右以咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時服忌			
猪肉菘菜菹菜醋物			
胡黃連丸 治熱勞骨節煩疼心膈燥悶亦治虛勞骨熱			
胡黃連	鱉甲 <small>切焙</small>	犀角 <small>屑</small>	訶梨勒皮 <small>半生</small>
赤茯苓	甘草 <small>炙</small>	黃芪	地骨皮
知母	桔梗	升麻	芫胡 <small>去苗</small>
人參 <small>二分</small>	枯薑 <small>一枚</small>		
右為細末用猪膽二十枚取汁同蜜四兩攪勻慢火熬成			
膏攪和丸如梧桐子大每服二十九食後用烏梅煎湯童			
子小便下如腹瀉用糯米飲下忌菹菜			
地黃煎丸 治熱勞			
生地黃汁	青蒿汁	薄荷汁	童子小便
好酒 <small>肥</small>	芫胡 <small>去苗</small>	鱉甲 <small>切焙</small>	
秦元 <small>去苗</small>	芫胡 <small>去苗</small>	犀角 <small>屑</small>	
右將後五味研為細末入前煎攪和丸如梧桐子大每服			
十五丸至二十九溫酒送下			

犀角丸 治熱勞無不效

犀角屑

龍膽草 去芦

秦元 去脂

升麻 三分

烏梅肉 三分

黃連 去骨 一分

黃芩 去骨 一分

升陽散火湯

治男子婦人四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱

發困熱如煉捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過

食冷物抑遏陽氣於脾上火鬱則發之

此胡 八水

白芍藥 人參

升麻

獨活 羌活 各 防風 半

甘草 炙 三 水 生甘草 二 水

右咬咀每服半兩水三盞煎至一盞去滓稍熱服忌食寒

涼之物

愚魯湯 治勞熱

此胡 去苗

人參

右各等分咬咀每服三錢水一中盞生姜三片棗一枚煎

至六分去滓不拘時服

犀澄茄散 治冷勞臟腑虛弱心腹氣脹不能飲食四肢無力

犀澄茄

龍甲 去殼 一分

附子 炮去 一分

厚朴 去粗皮 一分

白茯苓 去皮 一分

荆三稜 炮

陳皮 去白

木香

沉香

桂心

吳茱萸 湯泡 一分

甘草 炙 一分

右為細末每服二錢食前米飲調下忌葷菜生冷

燒肝散 治冷勞補五臟通血脈和脾胃止泄瀉

山茵陳

石斛 去灰

當歸 加 一分

赤芍藥

紫苑 去苗

白蕪荑

防風 去芦

人參

犀角 鎊

吳茱萸 湯泡 一分

木香

白木 各 一分

右為細末每用猪肝一具細切入藥末十五錢葱白五莖

細切鹽三錢與肝拌和令勻分作三服每服用荷葉包更

以濕紙三五重裹於慢火中煨令肝過熟食前喫用米飲

送下患冷勞面色萎黃者不過十服愈

神效太乙丹 治冷勞大腸轉泄不止

禹餘糧 四兩 火燒令赤於米醋內

烏頭 一兩 於冷水中浸一宿剉

右和勻用醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服五丸食前用

溫水送下

治一切男子女人虛冷勞證大腑滑泄面色青黃飲食減少行

步無力元臟虛須小便頻數肢節沉重精源不固常因

倦並宜服之

巴戟 牛膝

石斛

五味子

川芎 杜仲

草薢

藿香

白木 各 三

羌活

肉苁蓉

官桂 茯苓

人參

木香

右為細末以好酒少許化阿魏二銖同煉蜜和丸如梧桐

子大空心用鹽湯送下四十九

前胡飲 治暴急成勞虛感喘嗽

前胡

人參

官桂

白茯苓 去皮

此胡

桔梗 炒

黃芩 去心

生地黃

太醫院經驗奇效良方大全

卷二二

四八九

玄參 旋覆花 甘草各已上 麥門冬去心
 半夏洗七 白木已上 厚朴去心 茯苓去心
 右咬咀每服四錢用水一盞半生姜七片煎至七分去滓
 不拘時溫服

退熱湯 治急勞四肢煩疼手足心熱增寒飲食不得口乳
 芫胡去苗 龍膽草 青蒿 知母焙

麥門冬去心 甘草炙
 右咬咀每服五錢用童子小便一盞半葱白三寸薤白三
 莖桃柳心各五枝同浸經一宿平旦煎至一盞去滓空心
 頓服之至夜再服

芫胡當歸湯 治虛勞寒熱日漸羸瘦行步艱難飲食不進狀
 如瘧疾

芫胡去苗 當歸切焙 防風去叉 牡丹皮

官桂去粗 附子炮裂 白芷 天仙藤
 白木 秦艽去苗 桔梗 麻黃去根

芍藥 人參 木香已上 知母切焙
 甘草炙

右判如麻豆大每服三錢水一盞生姜三片棗一枚擘開
 同煎至七分去滓空心服

治一切男子女人卒中急勞驟然咯血吐血不數日間肌肉容
 貌清瘦如鬼眼無光彩一切勞候百般病證無所不具并

治一切男子女人久患勞疾心膈受邪發為喘嗽因而咯
 血當合三方藥以主療之先與心藥次與肺藥後與腎藥

以清其源流而復其真氣如此然後可以圖其全功第一
 方下心藥取其火毒者也第二方下肺藥保安金氣而去

其病者也第三方下腎藥仍欲清其病之源流而復其真

氣也日午中飯後與心藥一盞至晚食後與肺藥兩方每
 日各一服若肺咳偏大與肺藥心脈偏大與心藥與肺
 氣病候服餌如此服經數日病勢衰減即須與腎藥以去
 病之根而復其真氣後之服餌者果有此病證即不可單
 服一方以圖其全功也

第一方 治心火之威來錄金精金得火邪喘嗽不安血氣逆
 行上為咯衄宜先服收火毒方

茸松 沉香 芫胡去苗 麥門冬去心
 人參 木香 麻黃去根 犀角屑

黃芩 玄參 貝母已上 天靈蓋研末
 鼈甲研末

右為末每服三錢半水一盞煎兩沸便瀉出和滓去滓任
 意服食後道遠片時方與或日午中飯後若遠大腑虛

第二方 順氣化痰咯血方
 黃連四銖 鼈甲去裙 麻黃去根 貝母去心
 前胡去苗 黃芩 黃芪 牡丹皮

桔梗 人參 杏仁 防風已上
 蛤蚧酥炙

右為細末每服二錢水一盞生姜一片同煎一二沸急瀉
 出和滓溫服

第二方 清其病源以復其真氣宜服解腎邪復真氣固元丹若
 大腑秘熱即與前兩方候臟腑調和方進此藥

葶藶 續斷 巴戟去心 茯苓
 杜仲 木香 羌活 天靈蓋研末

鼈甲研末 甘草炙
 右為細末炒熟麪與藥末相滾滴水丸如梧桐子大每服

三十九空 心前痰 湯入益 少許送 下	天門冬 散 治虛勞 寒熱四 肢痠痛 黃芪 無功	天門冬 去心 焙乾	黃芪 去根	地骨皮 當歸	白木 熟地黃	白茯苓 甘草各一 兩白芍藥	龜甲 去殼 酥炙 桂心 枳殼 桑根 白皮 木香 各三	右咳 咀每服 五錢水 一鍾生 姜三片 煎七分 食遠服	地骨皮 散 治血風 氣腫虛 發渴煩 熱	地骨皮 桑白皮 訖胡 前胡	枳殼 黃芪 比紅 白茯苓 五加皮	人參 桂心 白芍藥 甘草 肥 肚各	右咳 咀每服 三錢水 一中盞 生薑三 片煎至 七分去 滓食 遠溫服	冷湯飲 主冷痰 虛熱諸 勞寒熱	沉香 附子 炮各	右咳 咀煎露 一宿空 心服	遊胡湯 治虛勞 榮衛不 順潮熱 黃瘦筋 骨疼痛 多困少 力飲 食進退	訖胡 去心 秦艽 去苗 一盤 甲去 根炙 知母	甘草 炙各 兩	右咳 咀每服 三錢水 一盞入 棗二枚 擘開煎 至六分 去滓 不拘時 熱服	人參 黃芪 散 治虛勞 客熱肌 肉消瘦 四肢倦 怠五心 煩熱咽 乾頰赤 心忪潮 熱盜汗 成食咳 嗽膿血	人參 去心 生地黃 桔梗 肥 肚各 桑白皮	半夏 湯洗 紫苑 已 酥炙 各 茯苓 已 酥炙 各
--------------------------------	---	-----------------	----------	-----------	-----------	---------------------	--	--	------------------------------------	------------------------	------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------	----------------	------------------------	--	--	---------------	---	--	---	--

此胡 黃芪 三兩	知母 已 酥炙 各 兩	天門冬 去心 焙乾	黃芪 去根	地骨皮 當歸	白芍藥 黃芪 各二 人參	白茯苓 甘草 各一 兩	肉桂 去皮 半夏 湯洗 各一 兩	右咳 咀每服 三錢水 一盞半 生薑三 片大棗 一枚去 核同 煎至七 分去滓 食前溫 服	胡黃連 丸 治虛勞 骨熱四 肢羸瘦 少力不 思飲食	胡黃連 天靈蓋 酥炙 赤茯苓 川大黃 微炒	川升麻 地骨皮 麥門冬 去心 人參 去心 各二	犀角 屑 知母 已 酥炙 各 兩	黃芪 各二	防風 去心 木通 到 桔梗 已 酥炙 各 兩	甘草 炙各 兩	右為 細末煉 蜜和搗 三五百 杵丸如 梧桐子 大每服 三十 丸不拘 時溫水 送下忌 葷菜	猪骨煎 治男子 婦人癸 熱有多 等若虛 勞癸熱 從脊骨 上 起此藥 有神効 更宜細 審病狀 服之	猪骨 脊骨 一條去 尾五寸 細剉用 好酒六 升煮一 日去滓 入棗十 枚此胡 一兩去 苗秦艽 一兩去 苗	白茯苓 當歸 去心 各一 兩	人參 去心 川芎 肉桂 去心 酒浸 巴戟 酒浸 各一 兩	牛膝 去心 酒浸 芍藥 微炒 破故紙 炒 五味子 已 酥炙 各一 兩	龜甲 去殼 酥炙 沉香 各半 鹿茸 酒浸 附子 已 酥炙 各一 兩	右為 細末用 前猪骨 煎和丸 如梧桐 子大每 服三十 九漸加 至五十九 不拘時 米飲下
----------------	-------------------------	-----------------	----------	-----------	-----------------------	----------------------	---------------------------------	--	---	--------------------------------------	---	------------------------------------	----------	--	---------------	---	--	--	----------------------------	---	---	--	---

五蒸湯

通治骨蒸壯熱

膏三分 生地黃

葛根

茯苓七分 知母七分

人參 黃芩

竹葉

甘草七分

分作二貼每貼用水二鍾白粳米一錢半煎至八分不拘

時服二滓并煎亦可以煮小麥湯煎藥忌海藻菘菜蕪蕪

清肌十全飲

涼心解勞熱使藥調和

羌活 防風

茯苓

人參七分

生地黃

地骨皮

桔梗七分

當歸

秦艽

甘草七分

分作二服每貼用水二盞煎至七分去滓不拘時服

太上混元丹

夫河車者天地之先陰陽之祖乾坤之橐籥鉛汞之匡廓

車歷驗篇中名曰混元皮非金石草木夜露曉霜之所比

倫服之不輟誠以返本還元補益之道誠得其要

紫河車 水一升用少婦首生男子者良帶子全者於東流

異懸故砂細內入無灰 珠砂 水一升 沉香 另研各

酒五升 浸火蒸成膏子 肉苁蓉 酒浸 乳香 另研 安息香 酒蒸 人參 七分

白茯苓 三分

右為細末用河車膏和藥末許千百下丸如梧桐子大每

服七十九空心溫酒送下沉香湯尤佳久服可以輕身延

年補損扶虛若有病之人詳證有增添之法詳具于後

男子真陽氣衰榮衛虛耗腰背疼痛自汗怔忡痰多喘

遺白濁潮熱心煩脚膝無力宜於內加

鹿茸 酒蒸 川巴戟 去心 鍾乳粉 陽起石 版

附子 炮去 黃芪 七分 生鹿角 桑寄生 續以

龍骨 紫苑 七分

右為細末同前膏為丸服如前法

婦人血海虛損榮衛不足多致潮熱心煩口乾喜冷腹痛

刺痛腰腿疼痛痰多咳嗽驚悸怔忡經候不調或閉不通

宜於內加

鹿茸 酒蒸

龍甲 醋炙

當歸 酒浸

紫石英 火服

栝子仁 微炒

石斛 三分

卷栝葉 一分

川牛膝 酒浸

嗽加紫苑 二分

右為細末同前膏為丸服如前法

牛膝丸 治腎損骨瘦不能起於床宜蒸精氣肝損筋緩不能

自收持宜緩中

牛膝 酒蒸

章解

杜仲 炒

沙苑 蒸

芫絲子 酒浸

胡蘆巴 炒

補骨脂

肉苁蓉 酒浸

防風 七分 官桂 半斤

右為細末酒煮猪腰子為丸如梧桐子大每服五十九空

心用溫酒送下腰痛不能起動者服之甚効

雞絲丹 又名神珠用 治下焦陽虛膝冷痛足脛寒而逆

巴戟 酒浸

補骨脂 炒

杜仲 炒

訶子肉 五箇

章解 二分

龍骨 一分

縮砂 半斤

胡桃 一百二十

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大味鹹為衣每服五十

九空心溫湯下溫酒亦得

蛤蚧散 治虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不思飲食

蛤蚧 一對

人參 去黃

百部 去心

款冬花 去枝

紫苑 七分

貝母

阿膠 炒

龍甲 醋炙

肉桂 去粗

訶胡 去黃

黃芪 炙

杏仁 湯浸去

半夏 生製

甘草 七分

右為末每服三錢水一盞二十生薑三片煎至一盞不拘時
溫服肉桂錐去風寒有熱不可服則當改用細辛

鹿髓煎 治虛勞傷中脉絕筋急 肺痿咳嗽
鹿髓半升 蜜二升 酥二升 生地黃汁四合

桃仁 三升湯浸去皮尖雙 杏仁以酒一斗浸之取汁

右先以桃仁杏仁地黃汁於 銀鍋內慢火煎令減半火下

鹿髓蜜酥同煎如錫每於食 後含嚥一匙

焚香透膈散 治一切勞嗽壅滯 胃膈痞滿
雄黃 佛耳草 鵝管石 欵冬花 各等分

石為細末每用一斗安在香 爐上焚着開口吸煙入喉効

治勞嗽虛證 鼻流清涕耳作蟬 鳴眼見黑花一切虛證男子
婦人皆可服之

龍田 地骨皮各三 此五味子二升

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九至五十丸
空心用溫酒或鹽湯送下婦人斥醋湯送下

天竺黃散 治虛勞心肺煩熱吐血
天竺黃 川大黃 鹿角膠 各等分

犀角骨 白茯苓 馬兜鈴 生乾地黃

麥門冬 治心 黃芪 知母 各等分 甘草 炙

右咬咀每服三升水一中煮 煎七分去滓不拘時溫服

地黃金粉散 治虛勞心肺熱吐血
地黃 自然汁 飛羅麩 各四升

右同調成糊攤於漆盤內候 乾取下搗為細末每服二升

不拘時以陳米飲調下一 方酒服方寸匕

大前飲 治內損吐血
右用大前搗汁半盞調飛羅 麩二升服神効

治虛勞上氣脾胃氣弱胃膈多痰飲食無味神思昏
悶肢節痠疼體虛乏力

沉香 批把葉 白木 陳皮 去白

白茯苓 人參 批把 前胡 去苗 訶梨勒皮

黃芪 批把 五味子 半夏 湯泡 細辛

桂心 甘草 炙 批把 各等分

右咬咀每服三錢水一中盞 生薑半分棗三枚煎至六分

去滓不拘時稍熱服
紫苑湯 治虛勞上氣胃中煩滿寒熱食不得安卧

紫苑 五味子 前胡 陳橘皮 去白

麥門冬 批把 人參 白木 批把 官桂 去粗皮

甘草 炙 批把 各等分

右咬咀每服三錢水一盞入 生薑三片棗二枚擘破煎至

七分去滓不拘時溫服日三
鹿角膠散 治虛勞少氣羸損

鹿角膠 批把 肉桂 各等分 批把 炙 熟地黃 三兩

黃芪 當歸 各半 五味子 石斛 去根 各

麥門冬 批把 各半

右為細末每服二錢食前生 姜湯調下溫酒亦得

拘杞湯 治虛勞骨肉痠疼吸上 少氣少腹拘急腰背強痛心

中驚悸咽乾唇燥面無顏色 飲食減少憂愁嗜卧

拘杞根 黃芪 批把 官桂 去根 麥門冬 批把 各

甘草 炙 批把 各等分

右咬咀每服三錢水一盞半 生薑一分切碎煎至一盞去

滓空心服夜卧再服
頭骨萬金煎 治內勞少氣寒病裏急腹中喘逆腰脊痛

肉桂參	阿膠	甘草 <small>已上各一斤</small>	生地黃 <small>取汁一斤</small>
麥門冬 <small>去心</small>	乾地黄 <small>絡二</small>	乾姜	桑根白皮
白茯苓	桂心 <small>已上各一斤</small>	附子	五味子
桔梗	人參 <small>已上各五兩</small>	石斛 <small>一斤</small>	牛髓 <small>三斤</small>
白蜜 <small>一斤</small>	清酒 <small>四斗</small>	麻子仁 <small>三斤</small>	大棗 <small>一百五</small>
當歸 <small>十四</small>	乾漆 <small>十兩</small>	蜀椒 <small>四兩</small>	
右先以清酒二斗六升四桑根白皮麻子仁棗膠為刻識之又加酒一斗四升蒸取至刻絞去滓內蜜髓地黃汁湯入銅器煎內諸藥未半日許合可丸入大甕盛飲吞如禪丸一枚日三若夏月暑熱煮煎轉味可以密地黃汁和諸藥末為丸如梧桐子大服十五丸不瘥加至三十九			
人參補虛湯 治虛勞少氣不足四肢困弱嗜卧少力心中悸動夜多盜汗常服補諸虛不足建中進食			
人參	黃芪	陳皮 <small>去白</small>	白芍藥
當歸	官桂 <small>去皮</small>	細辛 <small>去葉</small>	麥門冬 <small>去心</small>
前胡	半夏 <small>湯泡</small>	甘草 <small>炙</small>	白茯苓 <small>去皮</small>
熟乾地黄 <small>已上各二兩</small>			
右為細末每服三錢水一大盞生姜五片棗二枚煎至七分食前稍熱服			
清神甘露丸 治男子婦人虛勞不足骨枯肉陷並皆治之			
生地黃汁	白蓮藕汁	牛乳汁 <small>生用</small>	
已上各等分入砂石器內以文武火熬成膏和後藥			
人參	白朮	黃連	胡黃連
黃芪	五味子 <small>各等</small>		
右為細末用前膏和丸如梧桐子大每服五十九用人參煎湯送下			

半夏飲	治虛勞胃弱氣寒中脘痞悶嘔吐多痰不思飲食
半夏 <small>二兩</small>	同湯洗去滑用生薑
沉香	白朮
草薺 <small>五枚</small>	丁香
右吹咀每服五錢水一盞半生薑半分煎至一盞去滓不拘時溫服	
附子湯	治虛勞脾胃冷弱胃滿氣逆嘔吐咳嗽腹痛腸鳴
附子 <small>炮去</small>	甘草 <small>炙</small>
半夏 <small>二兩</small>	同湯洗去滑用生薑
右到如麻豆大每服三錢水一盞半棗二枚擘破生薑半分煎至一盞去滓分為二服	
紫金丸	治虛勞咳嗽膿血口苦咽乾咯血痰涎壅盛
新綿灰	漢防已 <small>兩</small>
乳香 <small>另研</small>	甘草 <small>已上</small>
右為細末研勻滴水和丸如梧桐子大每服二十九加至三十九用臘茶清下食後臨卧時服	
治一切男子女人虛勞發嗽涕唾膠粘乍寒乍熱毛髮焦枯脉氣微細宜服此藥	
括梗	黃芪 <small>去芦</small>
橘皮	北胡 <small>去苗</small>
白朮	防風
右為細末每服二錢半水一盞生薑一片煎一二沸非時徐徐熱喫	
葶藶湯	治虛勞不思飲食中滿寒大腸或秘或泄
白葶藶 <small>去皮</small>	白朮 <small>剉炒</small>
乾姜 <small>炮</small>	甘草 <small>炙</small>
丁香 <small>半兩</small>	檳榔 <small>二</small>
陳皮 <small>去白</small>	人參 <small>已上各</small>
天露 <small>生</small>	酥 <small>炙</small>
蛤蚧	黃連

厚朴 <small>去粗皮</small>	右以咀每服三錢水一盞生姜三片棗二枚擘破同煎至七分去滓不拘時溫服	川椒九 <small>治虛勞百病七傷六極少氣羸弱不能飲食百節痠疼神思昏沉四肢無力宜服補益元氣令人肥健</small>	川椒 <small>合口者煨出汗</small>	白茯苓	柏子仁	當歸	乾姜 <small>炮</small>	附子 <small>炮</small>	枸杞子	黃芪 <small>剉</small>	薯蕷	茯苓	紫石英 <small>研細水</small>	遠志九 <small>治虛勞驚悸神氣不足多忘不安</small>	遠志 <small>去心</small>	石菖蒲	熟地黃	人參 <small>去芦</small>	麥門冬 <small>去心</small>	龍齒 <small>細研</small>	右為細末研勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服十五丸不拘時人參湯送下	千里水湯 <small>治虛勞悶不得眠</small>	麥門冬 <small>去心</small>	半夏 <small>湯泡</small>	桂心 <small>已上各</small>	酸棗仁	人參	甘草 <small>炙</small>	葶藶	黃芪 <small>已上各</small>	茯苓	生薑 <small>炙</small>	秫米 <small>一升</small>	右剉以千里流水一斛煮米令蟹目沸揚萬過澄清一斗	菱諸藥聖 <small>升分三服忌海藻慈菜羊肉生葱錫酢物一</small>	方有遠志 <small>兩</small>	蘇米 <small>一合</small>	生薑 <small>半</small>	分前服各半夏湯
-----------------------	---------------------------------	--	--------------------------	-----	-----	----	---------------------	---------------------	-----	---------------------	----	----	------------------------	----------------------------------	----------------------	-----	-----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----	----	---------------------	----	-----------------------	----	---------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------

酸棗仁散 <small>治虛勞煩熱不得睡宜調順氣</small>	酸棗仁 <small>微炒</small>	白茯苓	杏仁 <small>湯浸去皮尖</small>	當歸	甘草 <small>炙</small>	右以咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服	忌蒜菜醋物	棟實九 <small>治虛勞心腹撮痛不思飲食補益元臟平和脾胃</small>	棟實 <small>炒</small>	厚朴 <small>去粗皮</small>	白木 <small>已上各</small>	補腎脂 <small>水淘去</small>	藥香子 <small>炒</small>	烏藥 <small>剉</small>	木香 <small>半兩</small>	右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九空心用溫酒或鹽湯送下日三服	綠雲九 <small>治虛勞心下積聚元氣虛癯膝下冷疼</small>	硃砂 <small>研</small>	硫黃 <small>研</small>	攢柳 <small>剉</small>	銅綠 <small>研</small>	木香 <small>半兩</small>	三棱 <small>剉</small>	附子 <small>炮</small>	右為末研勻酒煮麩糊和丸如小豆大每服十九丸用炒生薑酒送下日午夜臥服婦人血風當歸酒下	解勞散 <small>治虛勞積氣堅硬噎塞胃膈引背微痛</small>	白芍藥 <small>半兩</small>	枳殼 <small>去核</small>	鱉甲 <small>醋炙</small>	存胡 <small>去苗已上</small>	赤茯苓 <small>去皮</small>	甘草 <small>半兩</small>	右以咀每服五錢水一盞半入生薑三片大棗一枚煎至七分去滓食後溫服	完花九 <small>治虛勞癯瘦久不瘥臍肋有塊形如歪或如鷄子透隱皮膚或經年不消或疼痛如刺或堅硬如石常服此藥令自消化</small>	完花 <small>醋半</small>	鱉甲 <small>去粗</small>	葶藶	蓬木	三棱 <small>剉</small>	麥蘗 <small>剉</small>	神麩 <small>炒</small>	白木 <small>已上各</small>
----------------------------------	-----------------------	-----	-------------------------	----	---------------------	------------------------	-------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--	------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------	---	----------------------	----------------------	----	----	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

<p>麝香 一分</p> <p>右為細末醋煮麩糊和九如梧桐子大每服十九空心及晚食前用溫酒送下忌蔥菜生冷</p> <p>二神煎 治虛勞癆瘵結塊不消者</p> <p>桃仁 一千二百粒<small>去尖及雙</small> 蟄甲<small>去骨</small></p> <p>三稜 三兩</p> <p>右為細末於鐺中先煎桃仁汁耗一半却下二味藥末以水煎不住手撻煎良久又下好酒三味煎如稀餲收磁器中空及晚食前以熱酒一中盞調下一茶匙忌蔥菜生冷</p> <p>陳橘皮丸 治虛勞心胃虛悶帶促大小便不利四肢浮腫</p> <p>陳橘皮 二兩<small>去白</small> 紫蘇子 三兩<small>炒</small> 漢防已 井遂 棗</p> <p>甜葶藶 隔紙 桑根白皮 赤茯苓 木通 已上各</p> <p>郁李仁 皮火<small>兩</small> 湯浸去</p> <p>右為細末煉蜜和搗三二百杵九如梧桐子大每服二十</p> <p>九空心及晚食前用姜棗湯送下</p> <p>磁石丸 治虛勞腎臟之弱耳聾或常聞鑿鑿風雨之聲宜服此藥補腎益</p> <p>磁石 二兩<small>燒令赤以醋淬</small> 鹿耳<small>去毛</small> 指實子<small>已上各</small></p> <p>熟地黃 白茯苓 石斛<small>去根</small> 牛膝<small>去苗</small></p> <p>人參<small>去芦</small> 黃芪<small>已上各</small> 五味子<small>半兩</small> 肉苁蓉<small>酒浸刮</small></p> <p>牡蠣<small>燒為粉</small> 附子<small>炮去</small> 防風<small>去芦</small> 遠志<small>去心</small></p> <p>薯蕷 巴戟<small>去心</small> 桂心<small>三分</small></p> <p>右為細末煉蜜和搗三五杵九如梧桐子大每服三十</p> <p>九空心及晚食前用溫酒送下</p> <p>補腎湯 治虛勞腎臟之損耳聾體瘦脚膝少力疼痛</p>	<p>磁石 二兩<small>燒碎水</small> 牛膝<small>去苗</small> 白茯苓<small>去皮</small></p> <p>桂心 人參<small>去芦</small> 白茯苓</p> <p>川芎 當歸 獨活 漢椒<small>口炒出</small></p> <p>白芍藥 澤瀉 白朮<small>已上各</small> 黃芪<small>半兩</small></p> <p>右為細末每用羊腎一對切去脂膜以水一盞半煎去腎至一盞去腎下藥末半兩更煎至六分去滓空心及晚食前分為二服</p> <p>白羊肉湯 治虛勞羸瘦脚膝無力耳聾盜汗心多忪悸</p> <p>白羊肉 二斤<small>去脂膜以水</small> 桂心<small>三分</small> 杜仲<small>去粗皮</small></p> <p>白茯苓 熟地黃 牛膝<small>去苗</small> 人參<small>去芦</small></p> <p>白朮 遠志<small>去心</small> 黃芪<small>剉</small> 龍骨<small>已上各</small></p> <p>磁石 三兩<small>燒碎水</small></p> <p>右咬咀每服四錢用羊肉汁一中盞煎至六分去滓每於食前溫服之</p> <p>麻黃根散 治虛勞盜汗口乾心煩不欲飲食四肢少力</p> <p>麻黃根 牡蠣粉 枸杞子 白龍骨</p> <p>白茯苓 熟地黃 人參<small>已上各</small> 麥門冬<small>去心</small></p> <p>黃芪 二兩</p> <p>右咬咀每服四錢以水一中盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服</p> <p>牡蠣散 治虛勞盜汗</p> <p>牡蠣粉 麻黃根 敗蒲扇灰 杜仲<small>去粗皮</small></p> <p>白茯苓 去皮 黃芪 剉 二</p> <p>右咬咀每服四錢以水一中盞煎六分去滓不拘時溫服</p> <p>輕骨湯 治虛勞身體倦怠百節痠疼羸瘦發熱神思不爽</p> <p>知母 煨 人參 白朮 天仙藤</p>
---	--

此胡	驚甲 <small>去毒</small>	秦光 <small>已上各</small>	黃芪 <small>去毒</small>
當歸	白茯苓	前胡	紫苑 <small>洗焙</small>
川芎	常山	甘草 <small>生已上</small>	
右吹咀每服三錢以水一盞半入為梅半箇同煎至八分			
去滓不拘時溫服			
治男子婦人勞極虛損遍身筋骨拘緊腰背脚手疼痛及痛風			
打傷跌損勞風寒溫證疼痛或時卒發不可忍若無問年			
遠日近悉皆治之			
羌活	細辛 <small>各二</small>	草烏 <small>半生</small>	赤芍藥
白芷 <small>已上各</small>	當歸	麝香 <small>真者</small>	肉桂 <small>已上各</small>
防風	獨活	藿香	川烏 <small>剉碎米泔</small>
甘草 <small>已上各</small>			
已上除麝香另研外餘藥俱要道地好者陳註者不用均			
碎研為細末用絹篩過分作五服每服入麝香末半錢用			
後染浸酒調服			
生地黃	韭菜根	木瓜	松節 <small>不用</small>
右不拘多少搥碎用好酒浸經一宿次日可用			
大補摩腰膏	治五勞七傷腰膝疼痛髮髮早白面色痿黃水		
臟久冷疝氣下墜耳聾目暗痔瘻腸風九百疾病悉能除			
癩兼治女人子宮久冷頭髮疎薄面生黧黯風勞血氣產			
後諸疾赤白帶下並皆治之			
木香	丁香	沉香	零陵香
附子 <small>炮去</small>	乾姜 <small>炮</small>	官桂 <small>去粗</small>	吳茱萸
膩粉 <small>另研</small>	白礬 <small>火煨</small>	麝香 <small>另研</small>	舶上硫黃 <small>另研</small>
右時前八味為細末入後四味同研勻用煉蜜和丸如鷄			
頭實大每用生薑自然汁一合煎令沸投水一盞入藥一			

九同煎良久化破以指研之就溫室中藥摩腰上藥盡			
為度仍加綿裹肚繫之少頃腰上熱如火久用之則血脈			
舒暢容顏悅澤			
牛膝散	治虛勞損腰脚疼痛		
牛膝	熟地黃	赤茯苓	赤芍藥 <small>已上各</small>
附子 <small>炮去</small>	酸棗仁 <small>微炒</small>	當歸	羚羊角 <small>骨</small>
桂心 <small>已上各</small>	五加皮	防風 <small>去毒</small>	
右吹咀每服三錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服			
五味子九	治五勞七傷虛損腰膝疼痛腎氣不足		
五味子	兔絲子 <small>酒浸</small>	肉桂 <small>已上各</small>	巴戟 <small>去心</small>
車前子 <small>半兩</small>	白茯苓 <small>去皮</small>	巴戟 <small>去心</small>	
右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十			
丸食前用溫酒送下			
治虛勞腰脚無力久服令人強健			
藥角 <small>為角入醋少許浸</small>	附子 <small>炮去</small>	白	
右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十九空心			
用溫酒送下			
酸棗仁散	治虛勞口舌乾燥心神煩渴少得睡卧		
酸棗仁	烏梅 <small>微炒</small>	麥門冬 <small>去心</small>	白
黃芪	人參 <small>已上各</small>	覆盆子	甘
右吹咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服			
括蕞根九	治虛勞煩熱口乾舌燥煩渴		
括蕞根	杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small>	烏梅 <small>微炒</small>	
甘草 <small>各一兩</small>			
右為細末蒸棗肉入少許蜜和丸如彈子大每服以綿			

<p>一丸含熱津日四五服 治虛勞湯無不効</p>	<p>天門冬 五兩 白茯苓</p>	<p>兔絲子 山茱萸</p>	<p>五味子 麥門冬</p>	<p>肉蓯蓉 當歸</p>	<p>牛膝 附子</p>	<p>巴戟 石膏</p>	<p>石韋 人參</p>	<p>桂心 大黃 黃卷</p>	<p>右為細末取生地黃括蕞根各十斤搗絞取汁於微火上煎減半便作數分內藥并下白蜜二斤牛髓一升微火煎如藥食如鷄子黃大日三亦可飲服之</p>	<p>治虛勞 右用白羊肝一具去肥膩於柳木砧上以竹刀細切後於砂盆內以柳木槌研傾於淨磁器中以冷熱水三升浸經一日一夜取其汁渴即漸飲之</p>	<p>紫芝丸 治虛勞短氣胃弱苦傷唇口乾燥手足逆冷或時煩躁目視暈眩腹內時痛不思飲食此藥安神保精</p>	<p>紫芝 一兩 山茱 一兩 天雄 炮去 柏子仁 炒香</p>	<p>秋實 去殼 巴戟 去心 白茯苓 去皮 白朮 一兩</p>	<p>生地黃 洗焙 麥門冬 去心 五味子 炒 半夏 湯洗去</p>	<p>附子 炮去 牡丹皮 人參 三分 遠志 去心</p>	<p>麥實 一兩 瓜子仁 炒香 澤瀉 各半</p>	<p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸加至三十丸用溫酒送下空心日午夜卧各一服</p>	<p>續命丸 治虛勞久病真氣欲絕喘滿自汗四肢厥逆面色青白全不入食</p>	<p>牛膝 酒浸焙 附子 炮去 官桂 去粗</p>	<p>蜀椒 去目并合口者炒 出汁已上各一兩</p>
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---	--	--	---	--	--	--	---	---	--	---	---	--

<p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸用溫酒或鹽湯送下空心服</p>	<p>椒紅丸 治虛勞元氣虛久冷小便數利精神恍惚四肢無力骨節痠疼</p>	<p>蜀椒 去目 補骨脂 炒 川棟實 去炒</p>	<p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九丸加至二十九丸空心用溫酒送下</p>	<p>堅固丸 治虛勞極冷陽道衰弱小便滑數遺瀝</p>	<p>烏頭 炮去 麝香 子炒</p>	<p>右為細末姜汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九丸空心溫酒送下婦人赤白帶下醋湯下</p>	<p>王不留行散 治虛勞小腸熱小便淋瀝莖中痛</p>	<p>王不留行 生地黃 滑石 已上各 子芩 半兩</p>	<p>榆白皮 赤芍藥 當歸 木通 已上各</p>	<p>右為細末每服二錢食前用米飲調下</p>	<p>八靈散 治虛勞補不足利小便</p>	<p>赤茯苓 去皮 天門冬 去心 石菖蒲 冬葵子</p>	<p>白芥子 官桂 去粗 椒紅 澤瀉</p>	<p>右為細末每服二錢不拘時用溫湯調下</p>	<p>茅根散 治虛勞小腸熱小便出血水道不利</p>	<p>茅根 一兩 赤茯苓 生地黃 瞿麥</p>	<p>黃芩 滑石 已上各</p>	<p>右以咀每服三錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服</p>	<p>五柔丸 治虛勞不足飲食不生肌肉三焦不調大便閉結并瘵癯飲百病</p>	<p>大黃 炒 前胡 去粗 赤茯苓 去皮 細辛 去葉</p>
---------------------------------------	--	---	--	---	---------------------------------	---	---	---	---	------------------------	-----------------------------------	---	---	-------------------------	--	--	-------------------------------	------------------------------	---	---

一第... 冊... 2 反正內

肉痿痿酒浸芍藥	當歸一兩	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九至二十九食前用溫酒送下食後生薑湯送下亦可忌食生菜羊肉酢物及錫等
萹散	治虛勞大腸久冷泄痢不止	肉苳蔻 去殼 細砂 去皮 厚朴 去粗皮 薑汁 炙 去
人參	去芦 龍骨 三分 白茯苓 去皮 陳皮 湯浸 去 丁香 乳 兩 各	阿膠 去黃 桂心 當歸 甘草 炙 赤 一分
赤石脂丸	治虛勞泄痢腸胃虛冷飲食不消腹內雷鳴疼痛	赤石脂 石斛 去根 乾姜 炮 肉苳蔻 去殼
白龍骨	人參 去芦 附子 炮 白茯苓 去皮	鍾乳粉 當歸 去芦 川椒 去月及合口者 微炒
訶梨勒	皮 用 肉桂 各一兩	右為細末以神麴末酒煮糊和搗三二百杵丸如梧桐子大每服三十九不拘時米飲送下
附子丸	治五勞及飽食房室傷胃令人大便數至澀而不能便日數十行劇者下血及治婦人產後餘疾腹內絞痛	附子 大 一枚 以 猪 脂 煎 如 雞 子 黃 大 熱 服 煎 去 上 黑 皮
右為細末煉蜜和丸如豆大每服三九先食服用溫白湯下日三稍加至十九常服之永不劑忌豬肉	下日三稍加至十九常服之永不劑忌豬肉	
羌活散	治虛勞痿痺肢節疼痛	羌活 附子 炮 去 牛膝 去 苗 單薺 已 上 各 枳殼 炙 炒 白羨黎 去 根 甘菊 花
防風	枳殼 炙 炒 白羨黎 去 根 甘菊 花	

沉香 半兩 各 當歸	白茯苓	肉痿痿酒浸芍藥
桂心 已 上 各	右咬咀每服三錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服	
防風散	治虛勞筋脉拘攣腰膝疼痛	防風 五加皮 薏苡仁 赤芍藥
萹散	海桐皮 枳殼 炙 炒 熟地黃	黃芪 桂心 已 上 各 杜仲 去 粗 皮 牛膝 各 一 兩 續斷 羚羊角 屑 已 上 各
右劉散每服四錢水一盞生薑三片煎服	蔓荊子散	治虛勞傷筋風引筋脉拘攣疼痛肢節浮腫手指不可拳
蔓荊子 酸棗仁 微 炒 防風 去 芦 枳實 炙 炒	桂心 已 上 各 木通 半 兩 百合 二 兩 薏苡仁 半 兩	牽牛 微 炒 三 兩
右咬咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前溫服	食前溫服	石斛散
石斛散	治虛勞手足煩疼羸瘦無力不能飲食小便數	石斛 半 兩 桑螵蛸 微 炒 黃芪 人參 去 芦
牛膝 去 苗 鷄脰 脰 微 炒 熟地黃 當歸 已 上 各	麥門冬 去 心 赤芍藥 白龍骨 已 上 各	右咬咀每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服
川椒丸	治虛勞膝冷陰痿四肢羸弱	川椒 去 目 并 合 口 山茱萸 肉痿痿酒浸芍藥
附子 炮 去 蛇床子 續斷 已 上 各 兔絲子 湯 浸 去 白 鹿茸 二 兩 各 牛膝 去 苗 一 遠志 去 心 防風 去 芦		

桂心三分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫

酒送下

附子丸 治虛勞膝冷

附子半斤以新汲水浸一日一度換水補骨脂微炒

肉蓯蓉酒浸一宿刮去皮石斛去粗已上

右為細末煉蜜和搗千餘下丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下

奇效良方卷之二十二

奇效良方卷之二十三

咳逆門 附論

內經云歲金太過咳逆金鬱之發咳逆少陰二氣咳逆恬人書云咳逆仲景所謂咳是也胃寒所生傷寒本虛攻其熱必熾難知云夫咳逆證恬人斷為熾逆其說似是而非蓋熾者乾濕也若有物直出則為吐也物旋出則為嘔也嘔無物出則為噦也咳逆者或水漬於肺而心下痞或連續不已而氣逆或喜笑過多而氣噎或熱飲而錯喉而氣搶或急食乾物而氣塞皆能作咳逆之聲連續不絕俗謂之吃忒是也大抵咳逆者不順之義吃忒者差錯之義二者皆氣不得下為火熱托之而使上至咽喉中噎而止也人或以紙撚鼻嚏而止或詵寃盜賊因恐而止或鼻熱頰食香而止皆抑之駭之而使氣下也千金以咳逆上氣者為病肺脈散者死是心火刑於肺金也格致餘論云吃病氣逆也氣自膈下直衝上出於口而作聲之名也書曰火炎上東垣謂火與元氣不兩立又謂元氣之賊古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等劑治之未審孰為降火孰為補虛人之陰氣依胃而養胃土傷損則木氣侮之矣此土敗木賊也陰為火所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病人見此以為危證然亦有實者今以治驗略言之有一弱人暑月因大飢大怒得滯下疾渴飲蜜水滯下緩而吃你倦甚知其因下久而陰火盛以人參白朮煎湯調益原散與之數日而止又有一膏梁老人又喘病而作止不常新秋患滯下食大減至五七日後吃你厥大瘕以為難心形瘦觀之尚可以人參白朮湯下大補丸以補血不數日獲安此二人虛之為也又一女子性躁味厚暑月因大怒而吃你每你則舉身跳動神昏不知問之乃暴病視其形氣俱實

遂以人參煎湯飲一椀大吐頑痰數椀大許昏睡一日而安
 此暴怒氣上肝主怒肺主氣經曰怒則氣逆因怒逆肝木乘火
 侮肺故吃大作而神昏參善吐痰蓋氣降而火衰金氣復位
 胃氣得和而解矣難知云活人以咳逆為徵謂可下之宜調胃
 承氣湯是邪氣在胃故斷之為是則然矣抑不思咳逆者是
 足陽明失下傳手太陰活人但言其火之本不言其火之標炎
 上至極高之分而逆也合而觀之咳與咳逆同一熱也分而
 言之咳為本為標為胃為中咳逆為標為心為肺為上若標病
 應急上當治標不必多疑若言作咳使後人只見膽胃本而不
 見心肺標也三因云咳逆之病古人心為咳耳多因吐利之後
 胃中虛寒遂成此疾亦有胃中虛膈上熱熾至八九聲相連收
 氣不回者大抵傷寒久病後老人虛人及婦人產後多有此證
 者皆病深之候也亦有熾而心下痞者有痰水所謂別無惡
 候者也丹溪云吃病者氣逆也氣自膈下直衝上出於口而作
 聲也書曰火炎上內經曰諸逆衝上皆屬於心朱奉議首論熱
 降而已下豈無超額之士而極言者孰不謂之熱而有此乎至
 於海藏深發前人所未發故猶有陰證發之說但形證少差耳
 大抵治法虛則補之補中須分寒熱或因汗吐下誤服寒涼過
 劑當以溫而補之如脾胃陰虛火逆衝上當以平而補之挾熱
 者涼而補之若夫實者如傷寒失下地道不通因而咳逆當以
 下之如痰飲停蓄心下暴怒氣逆痰厥此等必形氣俱實別無
 惡候皆當隨其邪之所在而瀉之泄之瀉之利之也諸論具詳
 皆前人所述學者當守規矩以治之

咳逆通治方
 橘皮竹茹湯 治吐利後胃虛膈熱而咳逆
 橘皮 三錢 竹茹 二錢 人參 二錢 甘草

右作一服水二鍾生姜五片紅棗三枚煎一鍾不拘時服
 柿蒂湯 治胃膈痞滿咳逆
 柿蒂 五錢 丁香 三錢
 右作一服水二鍾生姜五片煎一鍾不拘時服
 半夏生薑湯 治熾欲死
 半夏 湯洗 生薑 五錢
 右作一服水二鍾煎至一鍾分作二服不拘時服
 桂苓白朮丸 治痰逆止咳嗽散痞滿壅塞開堅結痛悶進飲
 食調和五臟
 辣桂 乾生薑 各半 半夏 湯洗 茯苓 去皮 各
 白朮 陳皮 去白 澤瀉 肥土 各
 右為細末麩糊和丸如小豆大每服二三十丸生薑湯下
 日三服病在膈上食後服病在下食前服病在中不拘時
 服一方用黃蘗黃連各半兩水九服効
 小范胡湯 治傷寒熱證咳逆嘔噦
 方見傷寒門加柿蒂煎服
 灸咳逆法
 其法於患人乳下一指許正與乳相直骨間陷處如婦人
 即屈乳頭下乳頭齊處是穴灸之艾炷如小豆大灸三壯
 男左女右只灸一處火到肌即瘥如不瘥不可治也其穴
 當取乳下骨間動脈處是穴
 丁香柿蒂散 治吐利及病後胃中虛寒咳逆至七八聲相連
 收氣不回者難治
 丁香 柿蒂 人參 茯苓
 橘皮 良姜 炒 半夏 七兩 各生薑 一兩
 甘草 三分

右為末每服三錢水一盞煎乘熱頓服或用此藥調蘇合香丸服之亦妙	治久患咳嗽連咳四五十聲者	右用生薑自然汁半合入蜜一匙同煎令熱不拘時溫服如此三四服立効	治寒氣攻胃咳嗽	右用黑豆二合炒熱內於瓶中以熱醋沃之紙封開小孔子令患人以口吸其氣入咽喉中即定	橘皮乾薑湯 治胃中有寒咳逆	橘皮 乾姜 甘草 通草 桂心	人參 甘草 各等	右為散每服四錢水一盞半煎六分溫服日三服	羌活附子散 止咳逆	羌活 附子 乾姜 芍藥 木香	丁香 乾姜 良姜 甘草 各等	右為末每服二錢水七分盞盛少許煎數沸空心服一方無丁香一方用丁香不用木香	丁香散 治咳逆噎汗	丁香 柿蒂 良姜 甘草 各等	右為末每服二錢不拘時用熱湯乘熱點服	丁香柿蒂散 治諸種吃噎嘔逆痰涎	丁香 柿蒂 青皮 陳皮 各等	右以鹿髓和熱酒服之良	治寒氣攻胃咳嗽	右以蘇合香丸用丁香柿蒂煎湯化下噎逆即咳逆也乃胃寒所致良藥為要藥人參白茯苓佐之蓋良姜能溫胃能解散胃中風邪
------------------------------	--------------	-------------------------------	---------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------	---------------------	-----------	----------------	----------------	------------------------------------	-----------	----------------	-------------------	-----------------	----------------	------------	---------	---

章豆蔻 去皮益智 去破各 乾柿蒂 二兩	右以蘇合香丸用丁香柿蒂煎湯化下噎逆即咳逆也乃胃寒所致良藥為要藥人參白茯苓佐之蓋良姜能溫胃能解散胃中風邪	香飲子 治咳逆不止	右用乾柿蒂十五枚為末用水一盞加白塩梅少許煎至六分不拘時溫服	華澄茄散 治噎氣咳逆亦治傷寒咳逆日夜不定	華澄茄 良姜 各二	右為末每服二錢水一盞煎六分沸投醋半盞取出呷之	治諸吃噎	橘皮 法三兩湯浸 枳殼 法一兩去	右剉碎以水二升煎至五合去滓通熱頓服	治寒氣攻胃咳嗽	吳茱萸 更半兩湯浸 青橘皮 半兩湯浸	右以咀每服三錢水一中盞入生薑半分同煎至五分去滓不拘時熱服	硫黃 治咳逆服藥無効者	硫黃 乳香	右各等分為末用酒煎急令患人飲之	又方 雄黃 二錢	右為末用酒一盞煎七分急令患人飲其熱氣即止	奇効良方卷之二十三
---------------------	---	-----------	-------------------------------	----------------------	-----------	------------------------	------	------------------	-------------------	---------	--------------------	------------------------------	-------------	-------	-----------------	----------	----------------------	-----------

頭痛為病甚重云厥頭痛取足六經乎少陰真頭痛其腦盡痛
 則名厥頭痛入連在腦者各真頭痛內經云寸口脈中短者曰
 頭痛脈經云陽弦則頭痛又云寸口脈浮中風發熱頭痛脈緊
 浮滑風痰皆易除內經云東風生於春病在肝俞在頭項故春
 氣者病在頭又謂陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目內
 眦上額交巔上入絡腦還出別下項病衝頭瘖又足少陽膽之
 脈起於目銳眦上抵頭角病在頭角額痛夫風從上受之風寒
 傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池
 風府調其陰陽不足則補有餘汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛
 耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病
 在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上而不下頭痛
 顛疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也
 如頭半寒痛者先取手少陽上明後取足少陽上明此偏頭痛
 也有真頭痛者甚則入連於腦手足寒至節者且發夕死夕發
 且死有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓者以腦為至腦逆
 故令頭痛齒亦痛東垣云凡頭痛皆以風藥治之者揔其大体
 而言之也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地
 升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脈浮緊川
 芎羌活獨活麻黃之類為多少陽頭痛脈弦緩桂末寒熱芫明
 為多少陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根石膏
 白芷為多少陰頭痛必有痰體重腹痛為痰癰其脈沉緩蒼木
 半夏南星為多少陰頭痛三陰三陽經不流行兩足寒氣逆為

寒厥其脈沉細麻黃附子細辛為多厥陰頭痛項痛或痰吐涎
 沫厥冷其脈浮緩吳茱萸湯主之諸血虛頭痛當歸川芎為多
 諸氣虛頭痛人參黃芪為多為多者主治實藥也兼見何證以
 佐使藥治之此立方之大法也氣血俱虛頭痛者用調中益氣
 湯中少加川芎蔓荊子細辛其效不可盡述半夏白朮天麻湯
 治痰厥頭痛藥也清空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治
 厥逆頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治所論
 頭痛大法甚詳著矣世之方論又言頭痛病名何以此不見發
 明請言其略凡邪令人頭痛者其邪一也但有新久去留之分
 耳流而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速安也深而遠
 者為頭風其痛作止不常愈後遇觸復發也皆當驗其邪所從
 來而施治之觀於試效方載梁古老人壯歲時病頭痛每發時
 兩頰青黃暈眩自不欲開懶於言語身體沉重兀欲吐食數

日方過乃曰此太陰厥陰合而為病名曰風痰以水養金花丸
 更灸俠谿二穴各二七壯不旬日愈以是觀之豈非頭風乎於
 此不言風者是言經之本也世言風者是言經之標乎何不明
 少陽厥陰頭痛者令人偏頭痛其經肝膽風木為邪也後人遂
 以此而各頭風可謂不求其本欤索古云夫大頭風證者是陽
 明邪熱太甚資實少陽相火而為之也多在少陽或在陽明或
 傳太陽視其腫勢在何部分隨經取之濕熱為腫木盛為痛此
 邪見於頭風在兩耳前後所主其病也治之大不宜藥速止則
 過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病自外支內者
 是血病况頭部分受邪見於無形迹之部當先緩而後急先經
 者謂邪氣在上着无形之分部既着无形无所不至若用重劑
 速下過其病難已雖用緩藥若急服之或食前或頭服皆失發
 軀則藥不能除病當徐上浸漬无形之邪也或藥性味形体不

離緩躄是也且緩急者謂緩劑已過邪氣入於中是到陰部藥於有形質之所若不速去則損陰也此終治却為客邪當急去之治客以急也且治主病當緩者謂陽邪在上陰邪在下本家病也若急治之不能解分而益亂也治客以急者謂陽分受陰邪陰分受陽邪此客氣急除去之也假令少陽上明為邪出於耳之前後也陽明為邪者首大腫也先以黃芩黃連甘草湯通炒煎少上不住服上畢不愈用新瓦上炒鼠粘子待香同大黃煎去滓內芒硝俱各等分亦時上呷之無令飲食在前得微利則邪氣去若陽明行經之藥非麻葛根芍藥甘草太陽行經者治防風之類是也又以東垣治驗其所論製方自有未矣天之四時民多疫癘初竟增寒體重次傳頭面腫盛百不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問慮其傳染之故得此病者五六日醫以承氣加藍根下之稍緩翌日其病如故再下之又緩終莫能愈索古謂之曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭目而為腫或以承氣下之瀉胃中之實熱是誅罰無過殊不知適其所至為故遂處方用藥黃芩黃連味苦寒瀉心肺熱以為多極紅苦平玄參苦寒生甘草甘寒人參甘溫瀉火補氣以為臣連翹鼠粘子薄荷味辛平板藍根苦寒馬勃白僵蠶味苦平散腫消毒以為佐升麻訶胡平行少陽上明二經不得伸結梗味辛溫為舟楫不令下行其為細末一半用白沸湯調時上呷下一半用蜜為丸嚮化之服盡良愈如大便硬者加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者宜砭刺之是皆深得病機之道詳盡立論處方以為後人之規焉

芎朮湯 治濕頭痛眩暈痛極

頭痛頭風大頭風通治方

川芎 附子生去 白朮已上各桂心去

甘草各一

右作一服水二鍾生薑七片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

小辛湯 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不止

川芎三 細辛生去 白朮 甘草各

右作一服水二鍾生薑五片芽茶一撮煎至一鍾食後服

川芎散 治風感膈壅鼻塞清涕熱氣上攻眼目多淚生眵及偏正頭痛

川芎 羌活各 防風 半夏麩

人參 前胡 防風 甘菊花

甘草各 薄荷少許

右作一服水二鍾生薑三片煎至一盞食後服

菊花散 治風熱上攻頭痛不止

甘菊花去 旋覆花去 防風去 枳殼去

川羌活去 蔓荊子 石膏 甘草各

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

通關散 治感風發熱頭痛鼻塞

羌活各 川芎 白芷 薄荷

甘草各 川芎一 細辛半兩

右為細末每服二錢食後煎茶調下薄荷湯亦可

三生丸 治痰厥頭痛

天南星 白附子 半夏各

右為細末用生薑自然汁浸蒸餅和丸如菉豆大每服五

十九食後生薑湯送下

天香散 治年久頭風不得愈者

天南星 半夏湯泡 川芎去 白芷各

天南星 半夏湯泡 川芎去 白芷各

天南星 半夏湯泡 川芎去 白芷各

天南星 半夏湯泡 川芎去 白芷各

天南星 半夏湯泡 川芎去 白芷各

天南星 半夏湯泡 川芎去 白芷各

右作一服水二鍾入生姜自然汁小半煮煎一鍾食遠服
藿香散 治体虛傷風傳聚痰飲上厥頭痛或偏正頭疼及治

諸風等證

草烏炮去 藿香洗去土 川烏炮去 乳香如皂角子

右為細末每服一錢食後薄荷湯調下

辛道痰湯 治痰厥頭痛

川芎 細辛 南星 陳皮去白

茯苓已上各 半夏二升 枳實炒 甘草各一

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾食後服

如聖餅子 治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風去芦 半夏生用 天麻已上各 南星湯泡

川烏去皮 乾姜炮已上 川芎 甘草炙各

右為細末滴水和捻作餅子每服三五餅食後同荆芥穗

細嚼茶酒任下一方加細辛

加減三五七散 治風寒入腦太陽頭痛

方見風門

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞舌重

方見風門

普濟消毒飲 專治天行大頭累試神効

方見傷寒門

大川芎丸 治新沐感風名曰首風旋暈昏眩偏正頭疼

川芎四兩 天麻一兩

右為細末煉蜜和丸每兩作十九每服一九細嚼茶酒任

下不拘時服

大追風散 治久新偏正頭疼肝臟久虛血氣衰弱風毒上攻

頭目眩運心煩百節痠疼鼻塞舌重項背拘急皮膚瘙

面上遊風狀若蟲行一切頭風兼治婦人血風攻注此藥
消風化痰清利頭目

川烏炮去 防風 川芎 荆芥

僵蚕炒去 石膏 甘草炙已上 白附子炮

全蝎炒去毒 羌活 地龍炒去土 南星

天麻 白芷已上各 乳香研 沒藥研

草烏炮 雄黃已上各

右為細末每服半錢痛時用細茶湯調服

急風散 治男女偏正頭疼夾腦風太陽穴痛坐卧不安

川烏生用 辰砂研各 南星生用

右為細末用酒調塗痛處小兒貼顛門

清空膏 治偏正頭疼久不愈善療熱損目腦痛不止

羌活 防風 黃連已上各 甘草炙半

羌活 防風 黃連已上各 甘草炙半

右為細末每服三錢用茶清少許調如膏抹口內少用白

湯送下臨卧服頭疼甚加細辛二錢痰厥頭疼多加半夏

偏頭疼不愈減羌活防風川芎一半加羌胡

神應散 治一切頭風

光草烏炮裂細辛 細辛去土各 好茶半

右為細末每服半錢臨卧濃茶點服

星鳥散 治諸般頭風二三十年不愈者只二三服効

天南星 川烏生去皮

右為細末每服二錢入細茶二錢薄荷七葉鹽梅一个同

煎一二沸入生薑汁些少温服

通頂煙 治諸頭風如斧劈痛不可忍著

川烏生

右為末燒煙薰枕內熱茶清泡枕內煙氣服之大効
點頭散 治偏正頭疼
川芎二兩 香附四兩

右為細末每服二錢食後用茶清調服

石膏鼠粘子散 治偏正頭疼連睛疼
石膏 鼠粘子特妙各

又方 白芷須經日曬香 草烏特妙分炒冷黃

又方 半錢細末葱茶點 此是頭疼快捷方

又方 老少頭風總一般 良薑細辛特妙蠶蠶

白梅湯點三分許 絕發之時服便安

等犀丸 治偏正頭疼一邊鼻不聞香臭常流清涕或作臭氣
一陣服等獨非藥不効者服此十服愈及治噴嚏稠濃

川芎 碎砂特妙內一 石膏特妙 片腦特妙上各

人參 扶苓 甘草特妙 細辛特妙上各

犀角生用 梔子各一 阿膠特妙 麥門冬去心

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九或二丸食後細嚼茶酒任下

青火金鍼 治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴
煇硝一兩 青黛 川芎 薄荷各一

赤火金鍼 治證同前
右為細末口含水用此藥吹小指鼻
益硝一兩 椎黃 乳香 沒藥

神聖餅子 治證同前
右為細末依前法搗鼻又治暴赤眼及治蜈蚣蛇蝎傷

玄胡索 猪牙皂角煨存性取淨 青黛半兩
右為細末滴水和捻作小餅子如前以水化開用竹筒吹入鼻內男左女右吹之

白附散 治腦逆頭疼牙亦疼
白附子一兩 麻黃蘇去 南星 川芎特妙上各

右為細末每服二錢用溫酒調服去枕卧片時

葱附丸 治頭風寒痛
附子去皮 葱白特妙

右為細末用葱涎和丸如梧桐子大每服五十九食遠用茶清送下

升蒼荷葉散 活法機要云夫雷頭風者震卦主之諸藥不効與證不相對也宜用此方

升麻 蒼木特妙 荷葉特妙 細煎調

右劉散每服五錢水一盞半食後煎服或燒荷葉一个研細煎調

上清散 治頭痛有骨痛眼痛不可忍若
川芎 鬱金 芍藥 荆芥穗

芒硝特妙 薄荷葉 乳香 沒藥特妙上各

右為細末每用一字鼻內搗之

麝香茶芽散 治諸般頭疼百藥不効者
麝香少許 茶芽一兩 川芎 細辛

荆芥 川芎 甘草特妙上各

右吹咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

大芍辛湯 治一切頭痛但發熱者不宜服其餘發熱飲厥腎

氣氣厥等證偏正頭疼不可忍者只以此藥并如聖餅子服之但多服自能作効如氣虛年高之人仁服養正丹黑錫丹并用此藥調鍾乳粉間服諸證頭疼緊捷之法元以踰此但頭疼多用石膏蓋取其能墜痰飲然恐性寒故以鍾乳粉代之腎厥頭疼尤得其治或疑鍾乳粉煨煉之藥則以軟石膏煨過為末服之亦驗

生附子 生烏頭 天南星 乾姜

細辛 川芎已上各甘草三分 右咬咀每服四錢水二盞生姜七片茶芽少許煎至六分去滓食前服

如中脫素寒者不用茶芽 若氣壅盛只用川芎一兩細辛半兩甘草二錢煎如前法

一方治頭疼細辛二錢川芎白芷減半為細末搗鼻

一方高良姜曬乾不見火碾為細末口含水少許搗鼻中如此數次即愈又患頭疼尤能作効

一方治氣虛頭疼附子一隻生去皮臍切作片用生姜自然汁一大盞浸一宿慢火炙乾再蘸再炙候滲盡姜汁為

度以高良姜等分為末臘茶調服名必効散 一方白芷四錢生烏頭一錢為末每服一字茶清調服有

人患眼疼先令含水以此藥搗鼻其効尤驗

川芎羌活散 治頭痛 川芎 蔓荊子 葉本已上各

羌活二刀 防風半刀 白芷半刀 右咬咀每服二兩水煎去滓臨卧旋服

烏嬰散 治諸般頭疼不可忍者 川烏炮法 御米殼去殼 甘草已上各

右咬咀每服三錢水一盞半煎七分去滓不拘時溫服 又方治頭痛不止

丁香一末 白芷半刀 瓜蒂一末 右為細末每用半字吹入鼻中即差

葫蘆巴丸 治氣攻頭痛如破 葫蘆巴炒 三稜炒 乾姜炮各

右為細末每服二錢不拘時溫生姜湯或溫酒調服及治瘴瘧後頭痛服之即愈

韭根丸 治頭疼眼晴如刀刺 全蠲炒 大川烏炒去皮尖各

右為細末用韭根取汁和丸如梧桐子大每服十五丸食後用薄荷茶清送下

止痛太陽丹 天南星 川芎各等分

右為細末用連翹葱白同搗爛作餅貼於太陽痛處 治氣攻頭疼不可忍者

草麻子 乳香 右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急去頂上解開頭髮

出氣即去藥一方先乳香 治頭痛不可忍者

右用蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰卧垂頭以銅筋點少許滴入鼻中急令搐入腦眼中決出瘴

治頭痛 右用水調决明子末貼太陽穴一方作枕去頭風明目

苦辛丸 治頭痛面赤煩悶咽乾上膈風痰頭目昏運百節疼

痛項背拘急

川芎	防風	獨活 <small>已上各</small>
桔梗 <small>三又</small>	細辛	羌活
甘草 <small>已上各</small>	天麻 <small>四又</small>	薄荷
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後茶酒化下		荆芥 <small>各半</small>
龍珠丹	治頭痛目暈及喉痺纏喉風	
右於五月五日取長蛇蛻不拘多少以片腦麝香各少許		
相和同研丸如麻子大每用一九以生薑汁塗鼻中逐邊		
各內一九立愈		
黑錫丹	治真頭痛	
茴香 <small>炒</small>	附子製	葫蘆巴
川練子	巴戟 <small>已上各</small>	肉苳菴 <small>製</small>
沉香	桂心 <small>已上各</small>	錫硫砂 <small>四又</small>
右為末同研勻酒煮麪糊和丸如梧桐子大陰乾以布袋		木香
擦令光瑩每服四十九空心姜鹽湯送下一方有陽起石		
順氣和中湯		
黃芪 <small>半錢</small>	人參 <small>一錢</small>	白芍藥 <small>使</small>
陳皮 <small>佐</small>	白木 <small>各五分</small>	升麻 <small>引</small>
細辛 <small>使</small>	蔓荊子 <small>使</small>	川芎 <small>使各</small>
內經曰陽氣者衛外而為固也今年高氣弱又加發汗衛		炙甘草 <small>分</small>
外之氣愈損故以黃芪甘溫補衛實表為君人參甘溫當		
歸辛溫補氣補血芍藥酸寒收衛氣為臣白木陳皮炙甘		
草苦甘溫養胃氣生發陽氣上實皮毛肥腠理為佐此胡		
升麻苦平引少陽陽明之氣上升通百脉灌漑周身者也		
川芎蔓荊子細辛溫體輕浮清利空竅為使也		
右劉如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去滓食後溫服		
服之減半再服而愈明年春赴		
詔至六盤出曹郎中		

以古風贈云東垣李明之嘗以能醫鳴易水得其訣為獨
 黃金籬一燈靜室窮內經黃帝拊掌岐伯驚曰諸月積不
 易售半世豈得三折肱所長用藥有活法秘方堆案白魚
 生不聞李延同居且同病一汗一下得其平乃知古人一
 證處一方後世以方合證此理殊未明公心審是者誰子
 直以異已喧謗聲先生飲恨卧黃壤門生賴汝卓卓醫中
 英活人事業將與相一旦去已權非輕連年庶召天策府
 廉臺草木皆欣榮好藏漆葉青粘散莫之樊阿獨植名
 清上瀉火湯 燕京溫官人年小時氣弱常於氣海三里灸之
 節次約五七千壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜
 寒風其頭痛則愈微來暖處或見烟火其痛復作五七年
 不愈此皆灸之過也

羌活根 <small>三錢</small>	知母 <small>酒浸</small>	黃芪 <small>酒浸各</small>	黃蘗 <small>酒浸</small>
炙甘草	黃芪 <small>已上各</small>	防風	升麻 <small>各七</small>
生地黃	羌胡根	甘草根	黃連 <small>酒浸</small>
蘆本 <small>已上各</small>	蔓荊子	當歸身	蒼木 <small>已上各</small>
荆芥穗	川芎 <small>各二</small>	細辛	紅花 <small>各少</small>
右劉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去滓稍			
熱食後服			
中書左丞姚公茂年六十七宿病時至元戊辰春因酒			
再發頭面赤腫而痛耳前後尤甚胃中煩悶咽嗑不利身			
半已下皆寒足筋尤甚由是以床炕相接身半已上卧於			
床身半之下卧於炕飲食減少精神困弱脉得浮數按之			
弦細上熱下寒明矣內經云熱勝則腫春氣者病在頭難			
經云熱在頭身宜破刺之取其易散故也遂於腫上約五			
十餘刺其血紫黑如露珠之狀頃時腫痛消散又於氣海			

一第... 丹... 3

穴中大艾炷灸百壯乃助下焦陽虛退其陰寒次於三里
 二穴中各灸三七壯治足筋冷亦引氣熱氣下行故也遂
 慶方云熱者寒之然病有高下治有遠近先越度其側度
 君以黃芩黃連苦寒酒炒亦為固用以瀉其上熱倍梗并
 草辛甘溫上并佐諸苦藥以治其熱龍胡并麻若平味之
 薄者陰中之陽發散上熱以為臣連翹苦辛平以散結消
 腫當歸身辛溫和血止痛大黃苦寒酒煨引苦性上行至
 巔驅熱而下以為使也投劑之後腫痛全減大便利再服
 減大黃慎言語節飲食不旬日良愈
 既濟解毒湯 治上熱頭目赤腫而痛胃膈煩悶不得安卧身
 半已下皆寒足筋尤甚大便微秘
 升麻 去苗 蛇胡 去苗 當歸身 連翹 已上各
 黃芩 酒炒 黃連 酒炒 甘草 炙 大黃 利勿用

桔梗 二紅 蘇方 辛 四卷 十一
 右劉如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去滓食後溫服
 忌酒濕麪大料物及生冷硬物
 治偏頭痛不可忍方
 單麻子 半斤 大棗 十五枚
 右共搗令熟塗於紙上用筋一隻捲之去筋內在鼻中良
 久取下清涕即止
 治偏頭疼方
 鬱金 一兩 苦葫蘆子 一合
 右為細末用白絹子裹藥末一錢於新汲水內浸過滿向
 患處鼻中得黃水出即瘥
 神效方 治偏頭風疼
 右用生蘿蔔汁仰卧注鼻中左痛注右右痛注左若頭

兩鼻皆注數十年病者用之皆効
 仙靈膠酒方 治偏頭風手足不遂皮膚不仁
 右用仙靈膠一斤細剉以无灰酒二斗浸之春五夏三秋
 七冬十日取出藥每日隨性暖酒飲之常令醺上不得大
 醉酒盡再合無不効合時忌鷄犬見之
 一字散 治偏頭疼不可忍
 乳香 別研 延胡索 益硝 研已上 川芎 二分
 雄黃 別研
 右為細末每用一字左疼搗左右疼搗右
 飛虎散 治偏正頭疼
 白附子 香白芷 荆芥穗 石膏 煨研
 川芎 天麻 薄荷 防風 已上各
 蒼朮 煨研 兩頭尖 肥心者不
 右為細末每服一錢臨卧溫茶清調服忌食熱物
 千金散 治偏正頭疼
 川芎 細辛 防風 甘菊花
 全蝎 藁本 芽茶 石菖蒲
 青藤根 甘草 各一兩
 右咬咀每服五錢水一盞半葱白一根同煎至七分去滓
 食後服滓再煎如眼目疼加貫仲一兩
 去落湯 治偏正頭疼頭風
 麻黃 去根 歸人參 五分 陳皮 七分 甘草 八分
 御米殼 去殼 炒黃 三分
 右咬咀每服五錢水一盞半生薑七片同煎至七分去滓
 食遠溫服
 抽刀一字散 治偏正頭痛頭風

馬頭生去皮蓋水浸一月取出切作片再炒生
細辛 指炒乾如急用只炒去皮尖
川芎 各半錢

右為細末每服一字食後茶清調下一方有權黃半兩

盧香散 治頭風頭痛

防風 去義 丹砂 研
龍腦 研已上
白附子 炮 白芷 白朮 已上各
天麻 白朮 已上各

右為細末每服半錢食後葱白薄荷茶清調下

沐頭方 治風頭痛或頭眩目眩四肢煩痛坐卧不安

蔓荊子 苦藟 玄參 已上各 石膏 伴
甘菊花 葛根 各三

右搗篩分作三度用每度以米泔水一斗二升煮取八升
去滓於暖室中稍熱沐頭如汗出宜避風

惡寒入篋中方 治風頭及腦掣痛不可忍者以此膏摩之

右用牛蒡並搗取濃汁二升無灰酒一升並花一匙慢火
同令稠成膏以摩痛處其風毒自散亦治時行頭痛摩時

須極力令熱乃速効冬月無苗以根代之亦可

都梁丸 一名芷彈丸 王定因因被風吹項背拘急頭目昏眩太
陽并腦俱痛自山陽擗舟至泗州求醫揚吉老即診脉即

與一丸便服王因欬詰經一時再作併進二丸病若失去

王甚喜問為何藥答云公如道得其中一味即傳此方王

思索良久自川芎防風之類凡舉數種皆非但一味白芷

耳王益神之此藥曰初無名王曰是藥處自都梁名人可
名都梁丸也大治諸風眩暈婦人產前產後傷風邪頭

目昏重反血風頭痛服之令人目明并沐浴後服一二丸
甚佳暴寒不暖神思不清頭目昏暈並皆治之

香白芷 去大塊用佛手洗四五次

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九多用荆芥照臘
茶細嚼下食後常服百無所忌只乾嚼亦可一方如熱風

冷酒調冷風熱酒調下一方細嚼川芎葱白茶清送下

大蒜搗鼻法 治頭風痛不可忍亦可搗小兒驚風

右用蒜七箇先燒地通紅掃出火將蒜去皮逐箇於紅地
上磨成膏子在地上却將蠶蚕一兩去嘴足安在蒜上用

枕覆定四邊勿透氣來日取出只用蠶蚕為末先含水一
口將藥末一豆許搗於鼻內立効

枕頭方 治風頭痛百藥不差者
右用食茱萸葉細剉灑酒拌勻以絹袋盛之於甑中蒸熟

乘熱分作二包更換枕之取差為度
仙方如聖餅子
草烏 苦藟 半夏 天花粉

細辛 薄荷 何首烏
防風 羌活 蒼朮 赤小豆
松香 甘松 藿香 晚蠶沙
菊花 白芷 甘草 赤芍藥

蔓荊子 各等

右為細末用炒麩作糊和為餅赤土為衣每服一餅食後
細嚼茶清送下

一字輕金散 治偏正頭風寒夾腦風眉稜骨痛牽引兩眼抽
掣疼痛并或生翳膜視物不明

藿香葉 荆芥穗 防風 石膏 研
旋覆花 香白芷 川芎 已上各 川烏 去尖

南星 各半 草烏 半錢

右曬乾研為細末每服一字食後淡茶調下

清神散

麝香

片腦

雄黃

青黛

全蝎

乳香

沒藥

各等

右為細末每用少許口含水滴入鼻中

一滴金丸

治首風及偏正頭風

人中白

地龍

右為細末用羊膽汁和丸如芥子大每用一丸用新汲水

一滴化開滴入兩鼻中

治頭風百藥不効者

右用天南星一兩以白礬湯泡去毒水五七次焙乾為末

分作三分每分水二盞入白梅三個同煎至一盞當發時

食後服

考齋丸

治頭風化痰

川芎

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸不拘時細嚼用

茶清或酒送下

羌活散

治頭風

羌活防風旋覆花

獨活川芎細辛

蔓荊子

甘草石脂各半加

中風作到煎為妙

尋常只得點清茶

大師留下羌活散

選盡仙方不及他

治雷頭風發

雷頭風發聽斯言

羊糞將來不用錢

細搗羅為極細末

溫酒調下便安然

通關散

治八般頭風

右用半夏為末同百草霜少許以紙一條入藥半錢作燃

燃子焙極乾每用藥時先含水一口將紙燃子燃着吹滅

就鼻中搐之如有涎即吐出再含水再搐如此用三五次

見効

太一膏香湯一名為膏龍治風邪客於腦頭痛至甚及偏正頭

疼夾腦風連眉骨項頸上徹腮頰疼痛不可忍者

草烏生用一分 新茶芽 細辛去毒各一分

必捷散 治腦風頭痛甚者

白芍去毒二分 蔓荊子酒浸一分 蘇合去毒一分 蘇合去毒一分

右為細末每服一錢用薄荷自然汁和溫酒半盞食後調

服忌發風之物

湖南押衙類思退傳頭風擊疼

黃蠟二斤 鹽半斤

右二味相和於錫羅中鎔令相入捏作一坨盛熱可合腦

大小搭頭至額頭痛立止

全蝎散 治頭風攻注口眼不正

全蝎去毒一分 赤足蜈蚣一條

右為細末同研勻每服一字食後溫酒調服

治眉心并肩梁骨疼者

右用二陳湯煎飲下青州白九子立驗

大醫院經驗奇効良方卷之二十四

太醫院經驗奇效良方大全卷之二十五

眩暈門 附論

丹溪論曰眩暈分之為二皆由痰火為病以此分為二哉眩暈雖屬痰火未嘗不由腎虛兼風邪所得蓋痰者本流動之物又因火動而助其愈感火性炎上得風則愈熾風火兩動痰之愈作經云諸風掉眩皆屬肝木原病式云風火皆屬乎陽多為兼化陽主乎動而兩動相搏則為旋轉也若入患此頭旋目眩卒然惡心欲吐眼花視物不的如屋旋轉起則運倒其病所苦何經所受而致此曰靜順清謐水之化也動亂撓擾火之用也腦者地氣之所生故藏陰於目為瞳子系腎水至陰所主二者喜靜謐而惡動擾靜謐則清明內持動擾則掉搖散亂故腦轉目眩此之謂也靈樞經云五臟六腑之精氣皆上注於目為之睛也筋骨氣血之精與脈并系於目上屬於腦出於項中故邪之中項者乘其身形之虛深則隨目系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則目系急目系急則目眩也乃心腎不交風火兼化而致然也夫風者有內外之分風從外入者則蒸化也由內之散者乃火之生風也醫者察審內傷外感之由脈浮自汗項強不仁為傷風脈紫無汗筋掣痛為感寒脈虛煩悶者為暑脈沉滯吐逆者為濕寸脈俱沉此為異耳至於七情內傷者使氣不和平鬱而生涎結而為飲隨氣上攻令人頭暈目眩骨痛目不可開其證婦人得之蓋婦人性多偏怒經曰天之氣曰風人之氣曰怒則致傷肝木心動生風令人頭目旋運皆由此哉婦人本陰血王之因產難崩漏虧損過極使陽氣無依為眩暈也男子患此或因金瘡吐衄便利之損或酒醉行房勞傷精血腎氣不能歸元而諸氣逆上是為頭目眩暈也學者於此當分標本別其盛衰用藥施治如鼓應桴無不效矣

眩暈通治方

半夏白朮天麻湯 治頭旋惡心煩悶氣喘短促心神顛倒兀兀欲坐目不敢開如在風雲中苦頭痛眩暈身重如山不得安卧並皆治之

半夏一錢 白朮二錢 天麻 茯苓去皮

橘皮 蒼朮 人參 神麴炒

麥藥炒 黃芪 澤瀉已上各 乾薑

黃蘗各半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

仙木芎散 治風熱壅塞頭目昏眩消痰飲明耳目清神

川芎 連翹 黃芩 山梔子

菊花 防風 大黃 藿香葉

當歸 芍藥 芍藥 桔梗七分 石膏

滑石各半 蒼朮 甘草各 薄荷葉

縮砂仁 荊芥已上各

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

芎水湯 治胃兩中濕眩暈嘔逆頭重不食

方見頭痛門

羚羊角散 治風邪乘於陽經上注頭目遂入於腦或痰水結

聚骨脯上衝頭目一切眩暈並皆治之

羚羊角鎊 茯神去皮 枳殼炒 甘草炙

芎藭已上各 半夏湯泡 防己 白芷已上各

附子泡去皮

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

三五七散 治陽虛風寒入腦頭痛即眩運轉如在舟車之上

耳內蟬鳴風寒濕痺脚氣緩弱等疾並皆治之

三五七散 治陽虛風寒入腦頭痛即眩運轉如在舟車之上

天雄 <small>炮去</small>	細辛 <small>洗去土</small>	山茱萸 <small>去核</small>	乾薑 <small>炮</small>
防風 <small>去蘆</small>	山藥 <small>炒</small>		
右為細末每服二錢食前用溫酒調服			
小芩辛湯	治風寒在腦頭痛眩暈欲倒嘔吐不定		
方見頭痛門			
川芎散	治風眩頭暈		
川芎	甘菊花	人參	茯神 <small>去皮</small>
山藥 <small>炮</small>	山茱萸 <small>去核</small>		
右為細末每服二錢用溫酒調下不拘時服日三服			
人參前胡湯	治風痰頭運目眩		
人參 <small>去蘆</small>	前胡	南星 <small>湯炮</small>	半夏 <small>麩</small>
木香	枳殼 <small>炒</small>	橘紅	赤茯苓
紫蘇葉	甘草 <small>炙</small>		
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服			
川芎散	治眩暈惡風自汗或身體不仁氣上衝胃戰搖如在舟車之上		
川芎	白木 <small>各三</small>	北細辛	白茯苓
粉草 <small>已上各</small>	桂枝 <small>半錢</small>		
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服有痰兼			
青州白丸子服之			
加味二陳湯	治痰壅或因冷食所傷嘔吐不止		
陳皮	白茯苓	半夏 <small>已上各</small>	胡椒
丁香 <small>各一</small>	甘草 <small>炙</small>		
右作一服水二鍾生薑三片烏梅一箇煎一鍾不拘時服			
芎木除眩湯	治感濕感寒頭重眩暈		
方見濕門			

香橘飲	治氣虛眩暈		
木香	橘皮 <small>去白</small>	白木	半夏 <small>麩</small>
白茯苓	縮砂 <small>已上各</small>	丁香	甘草 <small>炙</small>
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服			
川芎石膏湯	治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴		
方見風門			
蔓荊子散	治風頭旋運悶起則欲倒		
蔓荊子	甘菊花	半夏 <small>湯泡</small>	羚羊角 <small>屑</small>
枳殼 <small>炒</small>	茯神 <small>去木</small>	芎藭	黃芩
防風 <small>已上各</small>	麥門冬 <small>去心</small>	石膏 <small>各一</small>	地骨皮
赤箭	細辛	甘草 <small>炙</small>	
右咬咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服忌熱麪糖羊肉			
漢防已散	治上焦風痰攻注頭目旋運心神煩亂		
漢防已	麥門冬 <small>去心</small>	前胡 <small>已上各</small>	半夏 <small>湯炮</small>
旋覆花	防風	細辛	甘草 <small>炙</small>
赤茯苓	人參	芎藭	羚羊角 <small>屑</small>
枳實 <small>炒</small>	荆芥 <small>已上各</small>		
右咬咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服忌熱麪糖羊肉			
芎藭散	治諸陽受風頭目旋運目視昏暗肝氣不清		
芎藭	甘菊花 <small>各一</small>	白僵蠶 <small>炒</small>	細辛 <small>去葉</small>
防風 <small>去</small>	羌活 <small>已上各</small>	旋覆花	草決明
蟬蛻 <small>洗</small>	天麻	蜜蒙花	荆芥穗
甘草 <small>炙</small>			
右為細末每服二錢水一盞煎七分食後溫服湯點亦可			

花九 治風頭旋目運欲倒胃中痰逆兼治筋骨疼痛

井菊花 天麻 酒浸 羌活 赤茯苓 去皮

枸杞子 防風 去義 獨活 天竺黃 另研

蔓荊子 藁本 去土 芎藭 木香 各等分

右為細末煉蜜和搗三五百杵九如梧桐子大每服五七

十九不拘時用荆芥湯送下

療風邪氣未除發即心腹滿急頭旋眼運欲倒

羚羊角屑 黃芩 各一 杏仁 尖妙 枳實 妙

芎藭 獨活 防風 白朮 已上各

茯苓 三兩 生薑 四兩

右咬咀以水九升煮取三升去滓分作三服日三次服之

忌菹葷雀肉并蒜大酢麪等

羚羊湯 治暗風頭旋眼黑昏眩倦怠痰涎壅盛骨節疼痛

羚羊角屑 旋覆花 紫苑 去苗

甘草 炙已上兩細辛 半兩 前胡 三分 犀角屑 一分

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去

滓食後溫服

人參丸 治風頭旋目眩痰逆惡心胃膈痞滯咳嗽痰涎喘滿

嘔逆不飲飲食

人參 白朮 旋覆花 妙 甘草 炙已上

麥門冬 去心 枳殼 麩炒 前胡 已上各 木香 半兩

右為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十九食後

溫生薑湯送下

芎藭散 治風頭旋眼目昏痛眩運倦怠心忪

芎藭 前胡 白朮 各一兩 人參 已上各

蔓荊子 天麻 酒浸 防風 去義已上

右為細末每服二錢食後溫酒調下

白木飲 治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆

白朮 厚朴 去皮 甘菊花 各半 防風 去義

白芷 人參 已上各

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片煎一盞食前溫服

防風飲子 療風痰氣發即頭旋嘔吐不食

防風 人參 橘皮 已上各 白朮

茯苓 各三 生薑 四兩

右剉碎以水六升煮取三升去滓分溫四服一日令盡忌

醋桃李雀肉蒜麪等物

祛痰丸 治風頭旋痰逆惡心胃膈不利

南星 生 半夏 生 赤茯苓 去皮 陳皮 去白

乾薑 炮各

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服五十九不拘時用

溫米飲送下

松花浸酒方 治風頭旋腦皮腫痺

右以松花并薑春三月取五六寸如鼠尾者不拘多少蒸

細切一升用生絹囊貯以酒三升浸五日每日空心暖飲

五合晚食前再服

增損黑錫丹 治陰陽不升降上熱下冷頭目眩暈病至危篤

或暖上潛愈甚者

黑錫丹 兩 肉苁蓉 附子 炮去

蒟蒻 巴 官桂 去皮 茴香 已上各 青皮 炮

川練子 陽起石 木香 沉香 已上各

烏藥 破石 火煨 碎 各一分

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服五七十九濃煎

<p>人參茯苓生薑棗湯送下空心服一方無磁石</p> <p>羌活湯 治風頭眩筋脉拘急痰涎壅滯肢節煩疼</p> <p>羌活 前胡 去苗 石膏 碎 白茯苓 去皮</p> <p>芎藭 根 麩炒 黃芩 去黑 甘菊花</p> <p>防風 細辛 去葉 甘草 炙 蔓荆子</p> <p>麻黃 去根節黃掠去沫 焙已上各一兩</p> <p>右咬咀每服三錢水一盞生薑三片鷄蘇三葉同煎至七分去滓不拘時服</p> <p>沉香磁石丸 治上感下虛頭目眩運耳鳴耳聾</p> <p>沉香 別碎 蔓荆子 青蘆 別研 甘菊花 已上各</p> <p>巴戟 去心 胡蘆巴 山藥 炒 磁石 火煨醋淬</p> <p>川椒 去目 山茱萸 去核 陽起石 火煨 附子 炮去皮</p> <p>右為細末用酒煮米糊和丸如梧桐子大每服五十九加</p> <p>至七十九空 心用益湯送下</p> <p>菊花散 治一切風頭目昏眩面浮腫</p> <p>菊花 旋覆花 牛旁子 羌活</p> <p>獨活 甘草 炙 各</p> <p>右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服</p> <p>人參湯 治風頭眩但覺地登俱轉目閉不開</p> <p>人參 白朮 當歸 酒洗 麥門冬 去心</p> <p>防風 已上各 獨活 去苗 官桂 去皮 黃芪 切焙</p> <p>芍藥 已上各 一兩半</p> <p>右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫服</p> <p>守中丸 治風頭眩腦轉目系急忽然倒仆</p> <p>人參 白朮 甘菊花 枸杞子</p> <p>山芋 已上各 白茯苓 去皮 麥門冬 去心 生地黃 切焙</p>	<p>右為細末先用生地黄汁於銀器內入酥三兩白蜜三兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得五升許於銀器內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入白蜜同搗數千杵丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒送下服百日後五臟充滿肌膚滑潤此藥須擇四季旺相日或甲子日將合亦名五芝地仙金髓丸</p> <p>瓜蒂神妙散 治頭目昏眩偏正頭痛等疾</p> <p>瓜蒂 煨硝 雄黃 道人頭 即蒼耳</p> <p>川芎 薄荷 藜蘆 已上各</p> <p>天竺黃 一錢半如無 以鬱金花代之</p> <p>右為細末口含水鼻中搐一字神驗</p> <p>小三五七散 治頭風目眩耳聾</p> <p>天雄 三兩一方 山茱萸 去核 薯蕷 七兩</p> <p>右為細末每服五分不拘時溫酒調下如不見効稍加一分或煎薑棗湯調服亦可</p> <p>芎歸湯 治去血過多頭重目昏眩運不省舉頭欲倒惟脉獨弱預見崩疾</p> <p>大川芎 大當歸 去尾 各</p> <p>右咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服</p> <p>治風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似認一身動搖</p> <p>右以烏驢頭一枚搗洗如法蒸令極熱細切更於鼓汁內煮著五味調點少酥食之効</p> <p>天南星丸 治風虛痰頭目旋運肢節拘急</p> <p>天南星 炮 附子 炮 白附子 炮 華陰細辛</p> <p>旋覆花 半夏 湯炮 苦菊 已上各 天麻 一兩</p> <p>右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服三十九加至五十</p>
---	--

九不拘時用荆芥薄荷煎湯送下

麝香天麻丸 治風痰氣厥頭疼目眩旋運四肢倦怠精神不

爽睡臥不寧

麝香二錢 天麻酒浸 防風 芩藷一兩 上各

甘菊花三分 南星一枚重一兩者先用白礬湯浸洗

右為細末煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九不拘時細嚼

荆芥湯送下

大芩辛湯 治氣虛痰飲腎虛諸厥頭痛及眩暈舉頭似屋宇

旋轉如在舟中此乃風痰虛三證宜服此藥

方見頭痛門

欒金散 治頭痛眩運

欒金 滑石 川芎各等分

右為細末每服一二錢空心用藥汁調服此木欒金之

法也若胃中有宿痰宜瓜蒂散吐之

神芩散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞并牙關悶痛

川芎 欒金 荆芥 薄荷

紅豆各等分

右為細末入盆研勻鼻內搗之力慢加藥

愈風餅子 治風眩運或先服吐藥次服此藥

川芎 白芷 防風 甘菊花

細辛 羌活 天麻 荆芥穗

薄荷 甘草各一兩 川烏兩半 兩

右為細末湯浸蒸餅和捏作餅子每服三五餅食後細嚼

用茶清或白湯送下

玉液湯 治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩運心嘔目眩

悸眉稜骨痛

半夏肥者六錢湯

右作一服水一鍾半生薑十片煎至八分去滓入沉香末

少許不拘時溫服

芩藷散 治風頭眩發則心腹滿急服運欲倒

芩藷 赤茯苓去皮 枳殼三分 羚羊角屑

獨活 防風 白朮 黃芩

杏仁湯浸去皮尖雙仁

右咬咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

不拘時溫服

天麻羌活丸 治頭目風眩邪氣鼓作時或旋運

天麻 羌活 白芷 藜蘆去苗

芩藷 細辛 麻黃已上各

牛黃別研 麝香別研各

右為細末煉蜜和丸如皂角子大每服一二九不拘時研

薄荷酒下

太醫院經驗奇効良方大全卷之二十五

一第... 升... 反... 文...

太醫院經驗奇效良方大全卷之二十六

心痛門 附論

內經曰五臟卒痛何氣使然曰寒氣客於背俞之脉則血脈泣
脉泣則血虛血虛則痛其命注於心故相引而痛按之則熱氣
至則痛止矣感於寒則痛久矣病幾要曰諸心痛者皆少陰厥
陰氣上衝也其脈浮大而洪當灸太谿及崑崙謂表裏俱瀉之
出知為熱也其脈浮大而洪當灸太谿及崑崙謂表裏俱瀉之
是謂熱病汗不出引熱下利表汗通身而出者愈也灸畢服金
鈴子散則愈痛止服枳朮丸去其餘邪也有大實心中痛者因
氣而食卒然發痛大便或秘久則注悶心胃高起按之愈痛不
能飲食急可利之利後以薑本湯去其邪也有寒厥心痛者手
足逆而通身冷汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急
以木附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知

久病無寒暴病非熱也以其論寒厥厥與夫大實心痛治法
已詳又有病久氣血虛損及素作勞羸弱之人患心痛者皆虛
痛也故錢氏心虛者妙益補之圖經衍義中具蠲治心痛則蠲
粉與鹽實得之矣大意治病必求其本究其本究其虛實正謂
紫之奪紅相去一間耳而毫釐疑似實霄壤焉夫心為五官之
王百骸之所以聽命者也心之正經果為風冷邪氣所干果為
氣血痰水所犯則其痛掣背脇脹胸煩咽乾兩目赤黃手足俱
青至節朝發而暮殂矣然心之包絡與胃口相應往來脾痛連
心或陽虛陰厥亦令心下意痛或他臟之邪亦有客乘於心者
是則心之別脉受焉如所謂九種心痛一曰蟲二曰疰三曰風
四曰悸五曰食六曰飲七曰冷八曰熱九曰來去者皆是也真
心果痛不知能愈否乎若手足俱青至節不治陳無擇論心痛
又分三因云寸二經絡外感六淫則其氣閉塞鬱于中焦氣鬱

邪氣發為疼痛足厥陰心痛兩脇急引小腹連陰股相引痛手
心主痛微背心煩掌中熱咽乾目黃赤脇滿足太陰心痛腹脹
滿膈上然大便不利腸閉咽塞手太陰心痛短氣不得尚息季
脇空痛遺失無度胃滿煩心足少陰心痛煩劇面黑心懸若飢
胃滿腰脊痛背俞諸經心痛心與背相引心痛微背脊痛微心
諸腑心痛難言以俛仰小腹上衝卒不知人嘔吐泄瀉此皆諸經
諸俞諸腑涉邪所致病屬外所因若五臟內動以七情則其
氣痞結聚於中腕氣與血搏發為疼痛肝心痛者色蒼如死
狀終日不得太息真心痛者且發夕死夕發旦死脾心痛者如
針刺刺其心腹蘊上然氣滿肺心痛者若從心間起動作痛益
甚不變色腎心痛者與背相引善棄如物從後觸其心身偃痿
胃心痛者腹脹滿不下食上則不消皆臟氣不平喜怒憂鬱所
致屬內因飲食勞逸觸忤悲類使臟氣不平痞滿于中食飲道

注變亂腸胃致為疼痛或飲啖生冷菓實中寒不能消散結而
積遇食遂散各積心痛及其臟寒生就致心痛者故有九種
之名除風熱冷為外所因餘皆不外因更婦人惡血入心脾
經發作疼痛尤甚於諸痛更有卒中客忤鬼擊尸疰使人心痛
亦屬不外因因丹溪先生曰凡心膈之痛須分久新若知身受
寒氣口食寒物而病初得之時當用溫散或溫利之藥病得稍
久則成鬱矣鬱則蒸熱上久必生火原病或曰若欲行溫利溫
散寧無助火添病耶九治此病必先問平日起居何如假如
心痛有因平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛者用桃仁
承氣湯下之脉經曰厥心痛者乃寒氣客於心胞絡也諸蟲痛
如心腹痛懊惱發作腫聚性來上下行痛有休作心腹中熱
渴沁出面色乍青乍白赤嘔吐清水者就咬也以手緊按
堅持之無令得移以針刺之久持之蟲不動乃出針也心痛之

脉陰弦為痛微急為痛微大為心痺引背痛短數為痛瀉則為痛浮大弦長者死沉細者生且古人論諸心痛皆因六淫七情所致有寒厥熱厥有大實者有內因有外因有不內外因以成前證是以古人立論置方後之學者當以誠心切脉熱者京之寒者溫之感受風邪者散之順氣調血逐水豁痰此其要略耳

心痛通治方

加味七氣湯 治喜怒憂思悲恐驚七氣為病發則心腹刺痛不可忍者或外感風寒濕氣作痛亦宜服之

半夏湯泡洗 桂心不見火 玄胡索炒去皮已上 甘草已上各

人參去蘆 乳香已上各

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食遠服

加味四七湯 治風冷寒邪客搏心腹作痛

桂枝 白芍藥 半夏製 人參

紫蘇已上各 白茯苓 厚朴製 枳殼炒

甘草已上各

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食前服

七氣湯 治七情之氣鬱結心腹疼痛不可忍

半夏 人參 肉桂 甘草各二

右作一服用水二鍾生薑三片煎一鍾不拘時服

妙香散 治心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補

益氣血安鎮心神 山藥薑汁 茯苓去皮 茯神去木 遠志去心

黃芪已上各 人參 桔梗去蘆 甘草已上

木香已上各 辰砂別研 麝香別研

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服

卻痛散 治心氣冷痛不可忍者

五靈脂去砂 蒲黃炒各 肉桂去皮 石菖蒲

當歸 木香 胡椒已上各 川烏炮

右作一服用水二鍾煎至一鍾入薑米醋少許食前服

鷄舌香散 治心卒痛安胃進食調冷熱定泄瀉

丁香一百 高良薑一兩 白芍藥 甘草各半

右為細末每服二錢食前米飲湯調服

玄胡索散 治卒心痛久不愈者

玄胡索一兩 甘草二錢

右作一服用水二鍾煎一鍾服如吐逆分作三五次服

勝金散 治卒心痛

桂枝 玄胡索炒 五靈脂 當歸各一

右作一服用水二鍾煎至一鍾去滓入鹽少許食前服

括痛丸 治九種心痛

五靈脂 蓬朮木 木香 當歸各半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食前用橘

皮煎湯送下

豨莶飲 治心刺痛

良薑 辣桂各等

右為細末每服二錢米湯調不拘時熱服

生薑枳殼湯 治中脘氣滯心下引痛

生薑七錢 枳殼三錢 辣桂五錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

九痛丸 治九種心疼及腹脇氣脹不欲飲食

附子炮去皮 吳茱萸炒 人參去蘆 乾薑炮

狼毒已上各 巴豆去殼油

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三九不拘時用熱

酒送下

愈痛散 治急心痛胃痛

五靈脂去砂 玄胡索炒 蓬莪術煨 良薑剉 當歸去蘆

右各等分為細末每服二錢不拘時用熱醋湯調服

薑附湯 治胃涉風邪入腹拘急切痛或吐或瀉狀如霍亂

附子一隻去皮臍切作四片以蜜煎令 桂心黃芩以湯洗去蘆切作片 芍藥三錢 甘草炙

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食前服
加味麻黃湯 治惡氣發熱外因心痛內攻五臟拘急不得轉

側宜服之

麻黃去節 白芍藥 桂心 半夏湯洗 乾薑炮 香附子炒 細辛已上各 甘草炙

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

三薑丸 治心脾冷痛煖胃消痰

乾薑炮 良薑去皮各 右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服三十九食後橘皮煎湯送下

沒藥散 治一切心腹疼痛不可忍者

沒藥 乳香各三錢 川山甲五錢 木鼈子四錢 右為細末每服一錢用酒同煎不拘時服

大沉香丸 治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香 乾薑炮 薑黃 辣桂 檀香配 甘松洗焙 白芷 天台烏藥 甘草已上各 香附一斤 白豆蔻仁二兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九食前細嚼用生

薑湯送下

蘇合香丸 治卒心痛用生薑橘皮湯化下

方見氣門 沉香降氣湯加乳香

方見氣門治陰陽不和心腹刺痛

燒脾散 治食啖生冷菓菜寒留中焦心脾冷痛不可忍及老

人霍亂吐瀉 乾薑炮 厚朴薑製 麥蘖炒 草菓仁 神麴炒 良薑剉 橘紅 縮砂仁 甘草炙

右為細末每服三錢不拘時用熱薑湯調服

紫沉煎丸 治虛寒積冷伏滯陰氣膨脹心腹疝痛兩脇刺痛

妨服用之如神重者紫服

沉香一兩 阿魏一兩 巴豆霜 硃砂別研 沒藥一兩 石入巴豆 木香不見 青橘皮去白 人參去蘆 胡椒一兩 官桂去皮 良薑水炙 丁香不見 硃砂別研 檳榔一兩 乾薑三分 丁香不見 硃砂別研

右除硫黃硃砂外先將諸藥為末次入二味研勻入煎膏

搜和入臼杵二三十下丸如梧桐子大每服二三九橘皮

湯送下如卒暴心痛嚼破醋湯吞下立効

靈脂酒 治熱氣乘心作痛

五靈脂去砂 加玄胡索 沒藥炒 右為細末每服二錢溫酒調下

蕪荑散 治大人小兒蛇咬心痛經云蕪荑心則殺人欲驗之

蕪荑炒 治大人小兒蛇咬心痛經云蕪荑心則殺人欲驗之

大痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此是蛇心痛也宜速療之

蕪荑 雷丸各半 乾漆燒碎炒大

右為細末每服三錢溫水七分盪調和服不拘時甚者不過三服小兒每服半錢

金鈴子散 治熱厥心痛或發或止久不愈者宜先灸太陽

金鈴子肉 玄胡索各一

右為細末每服二錢溫酒調下白湯亦可愈後服

木附湯 治寒厥心痛手足逆冷通身冷汗脈微氣弱

白朮九錢 附子四錢 甘草炙半

右咬咀作二貼每貼用水二盞煎食前溫服

蠶沙散 治男子婦人心氣痛不可忍者服之立止

右用晚蠶沙為末滾湯泡過濾清汁服之不拘時候

立應散 治婦人血刺心痛

玄胡索炒一兩

右為細末每服二錢不拘時用熱酒調服米湯亦可

神保丸 治心膈氣痛甚者

方見氣門

鐵刷湯 治心脾積痛婦人血氣刺痛中酒惡心腸滑泄瀉

良薑炒二 茴香炒七 蒼朮製 甘草炙各二

右為細末每服二錢空心薑盪湯調服

辰砂一粒金丹 治一切厥心小腸膀胱痛不可忍者

附子炮 麝香金 乾薑

右各等分為細末醋煎糊和丸如梧桐子大硃砂為衣每

服三十九丸男子溫酒下婦人醋湯下食遠服

神効散 治遠年近日一切脾疼或陰寒作痛引入背脊疼

葶澄茄 丁香各四 補骨脂炒 玄胡索

白芍藥 官桂 香白芷 神麴炒

蓬朮煨 三稜煨 枳殼炒 麥蘖炒

陳皮 木香 青皮 甘草炙已上

右咬咀作二貼每貼用水二盞生薑三片紅棗一枚煎空

心日午臨卧各一服

神聖代鐵散 治心痛不可忍者

乳香 沒藥 川芎 當歸

白芷已上各 羌青翅一兩去

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次

糝藥末在茶上不得吹攪沉底細急呷之心驚欲死者

小腸氣痛得如角弓勝脫腫硬一切氣刺虛痛并婦人血

癖血刺迷悶血暈血衝心胎衣不下難產痛疾服之神驗

治心疼 詩曰

薑黃共玄索 乳香同沒藥 心疼如手捉 一方用水煎

好酒用一盞

石各等分為末每服二錢不拘時溫酒調服

治心脾痛 此藥極奇葉石林遊山見一小寺頗整潔學徒亦

衆問僧所以仰給者答云素無田產亦不苦求於人只貨

數藥以贖其閒脾疼藥最流布有詩云

草菓玄胡索 靈脂并沒藥

酒調一二錢 一似手拈却 一方有乳香

右各等分為細末每服三錢不拘時溫酒調下

治男子婦人急心氣疼禁了牙關欲死者可急救

右將隔年老葱白三五根去皮薑葉搗為膏將病人口乾

開用銀銅匙將葱膏送入咽喉中用香油四兩灌送葱膏

油不可少用但得葱膏下喉中其人即甦少時將腹內所
停蟲病等物化為黃水微利為佳除根永不復發

海上方 治一切心痛不問新久服之良久當利即愈
右用生地黃隨人所食多少搗絞取汁搜麩作餅或於

淘食良久當利出蟲長一尺許頭似守宮後不復患矣昔
有人患此病三年不瘥深以為恨臨終戒其家人吾死後

當剖去病本果得蟲置竹篋中每所食皆飼之因食地黃
餅能亦與之隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其

事云正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣欲絕遂作
地黃冷淘食之便吐一物可方一寸以來如蝦蟆狀無目

足等微似有口蓋為此物所食自此遂愈食冷淘不用鹽
治暴心痛不可忍男子婦人小兒皆可服及治小腸氣

右用荔枝核為末每服一錢水醋各半蓋煎至七分稍熱
服一方燒灰存性為末每服二錢用鮮粉湯下良或熱酒

調下集驗方用醋湯調下一錢
神捷丸 治急心疼不可忍渾身手足厥逆嘔吐冷沫

吳茱萸 湯泡 乾薑 炮 肉桂 去粗 蓬朮 煨
附子 炮 川芎 各 各

右為細末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服五十九食前
熱醋湯送下

雷丸 鶴虱 貫衆 狼牙
雷丸 當歸 檳榔 各八

右為末空心煮蜜水半鷄子許服方寸匕日二服若重不
過三服瘥息生慈生冷油膩猪魚小豆大蒜等

煖胃散 治心脾疼不可忍

右用蒼朮四兩黃泥和漿水煮令透洗淨焙乾碾為細末
每服貳錢空心米飲調下或酒煮麩糊和丸如梧桐子大

米湯下五十九立効史丞相奉內祠偶患此疾不可忍宜
百般治療得此藥服愈

香附散 治心脾疼不可忍
香附 炒 良薑 炒 各

右為細末每服二錢米飲入鹽調服二味須各炒同炒即
不効一方治吐疼腹脹及婦人脾血痛用麩糊和丸如梧

桐子大每服五十九空心用溫酒送下一方為細末用陳
米飲調下

吳升內翰宣和壬寅得此方即備合次日登舟人妻患心
痛欲死以半椀飲之即愈

獨毒丸 治九種心痛
巴豆 去油 丁香 七 胡椒 四 斑貓 一 枝 去

右為細末搗爛飯和丸如小菘豆大硃砂為衣每服三五
丸不拘時用溫醋湯送下

必効方 治心痛
右用熊膽如大豆和水服大効一方療心痛細研溫水服

又方治同前
右取鱧魚淡炙令熱與患人食一二枚永瘥飽食彌佳

玄胡散 治冷氣心痛及疝氣心腹疝痛
玄胡索 炒 胡椒 各 等

右為細末每服二錢食前用溫酒調服

治心氣冷痛
良薑 四兩 切碎 分作 四分 一兩 用 陳 薑 土 半 兩 同 炒 黃
一兩 用 巴 豆 三 兩 用 雞 子 黃 三 兩 同 炒 黃
去 豆 渣 兩 用 雞 子 黃 三 兩 同 炒 黃
去 豆 渣 兩 用 雞 子 黃 三 兩 同 炒 黃

陳菜黃用一兩揀淘淨

右將菜黃同四色炒過良薑再同炒令乾碾為細末用浸
菜黃酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服五十九更看病人
腹中冷熱加減空心用生薑湯送下

中湯 治心製胃中少氣善欬善泄痢

赤茯苓去黑皮當歸切焙乾薑炮人參

白朮已各一兩官桂去粗皮五味子各甘草炙

右劉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓稍熱
服日三夜二

大醫院經驗奇効良方大全卷之六

大醫院經驗奇効良方大全卷之二十七

腰痛門 附論

六元正紀論曰太陽所至為腰痛又曰巨陽即太陽也虛則腰
背頭項痛夫腎肝為病則腰帶而痛故經云腰乃腎之腑轉搖
不能腎將憊矣蓋諸經皆貫於腎而終於腰脊腎氣一虛邪氣
易入或風寒暑濕客之或血凝氣滯鬱上悶悶而不伸積水沉
重則小腸不得宣通其證遂作刺問刺腰痛論云分六經之病
且如太陽腰痛引項脊尻骨始重狀陽明腰痛不可以顧顧則
如有所見者善悲少陽腰痛如針刺皮循循然不可俯仰不可
以顧太陰腰痛令人而熱熱甚則勞腰下如有橫木居其中甚
則遺洩少陰腰痛引脊內蕪厥陰腰痛如張弓弩弦善言嘿
嘿然不慧解脈是足太陽之別脈令人腰痛引有眈眈然特遺
洩又云痛如引帶當折腰狀善恐同陰之脈是足少陽之別

絡也令人腰痛痛若小鑄居其中佛然腫陽維之脈是太陽之
所生奇脈也令人腰痛上佛然腫衛絡之脈是太陽之外絡
令人腰痛不可俯仰恐仆得之舉重傷腰衛絡絕惡血歸之會
陰之脈是足太陽之中經也令人腰痛上深上然汗出汗乾
令人欲飲上已欲走飛揚之脈是陰蹻脈也令人腰痛上引膺目
佛然其則悲恐昌陽之脈是陰蹻脈也令人腰痛上引膺目
眈眈然其則反折舌卷不能言肉里之脈是少陽所生則陽維
之脈所發也令人腰痛不可以效上則筋縮急挾脊而痛至頭
几几然目眈眈欲僵仆刺足太陽腰痛上寒刺足太陽上明上
熱刺足厥陰不可俯仰刺足少陽中熱而喘刺足少陰少腹滿
刺足少陰腰痛引小腹控臍不可俯仰刺腰尻交者兩髀腫上
刺熱篇云脾熱病者熱爭則腰痛不可俯仰腹滿泄腎虛則
先腰疼肝瘦舌渴且人之腰者乃一身之人關節六經所系之

絡其經多虛少實或勞勞之過度或四氣之所襲因虛則邪相搏以為痛也巢氏與千金方二家之論腰痛有五所感不同一曰陽氣不足少陰腎衰是以腰痛二曰風痺風寒濕着腰而痛三曰腎虛勞後傷腎而痛四曰腎腰墜墜傷腰而痛五曰寢卧濕地而痛此論受病各因陳無擇云又有三因而分之蓋太陽少陰多中寒少陽厥陰多中風陽明太陰多中燥濕若此六經腰痛者為外之所因也若失志傷腎驚怒傷肝憂思傷脾若此腰痛為內之所因也大抵此病未常不由腎虛而致以內經推足三陰三陽十二經八脉有貫絡於腰脊而痛者則經中各有利法治之或風寒濕蓄熱與失志勞勞及墜傷閃肭氣滯血滯而痛者當於五種三因而推之不過從其所由用汗下補瀉之法以療之若脉浮弦為風弦緊為寒沉細為濕沉實為熱沉澀為氣與血也治法誠六經五種三因之病則心胃了然用藥收十全之功豈不美歟

腰痛通治方

獨活寄生湯 治風傷腎經腰痛如掣久不治流入脚膝為偏枯冷痺緩弱之患及婦新產腰脚擊急疼痛除風活血

獨活

桑寄生無心川

白芍藥

細辛

桂心

防風

人參

熟地黃

川當歸

秦艽

牛膝

茯苓

杜仲去皮切 甘草炙 各

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

獨活湯 治因勞役腰痛如折沉重如山

獨活

羌活

防風

肉桂

大黃

澤瀉已上各連翹

當歸稍

防己

酒拌

黃柏酒拌 甘草炙 各 紅桃仁五箇

右作一服水二鍾好酒半盞煎至一鍾食前服

五積散 治寒濕傷于腎經腰痛不可俯仰

木香流氣飲 治氣滯腰痛

方見氣門

木附湯 治濕傷腎經腰重冷痛小便自利

白朮四錢

附子炮去

杜仲去皮炒 各三錢

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾空心服

人參順氣散 治氣滯腰痛

人參

川芎

桔梗

白朮

白芷

陳皮

枳殼

麻黃去節

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服或為細末食前用

草湯調服一方加五加皮一錢

烏藥順氣散 加五加皮治氣滯腰痛

方見風門

右為細末每服二錢食前用甘草湯調服

生附湯 治受濕腰痛

附子生用

白朮

茯苓

牛膝

厚朴

乾生薑

甘草炙 已上

蒼朮炒

杜仲去皮薑製

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前服

通氣防風湯 治有背痛不可回顧者此手太陽氣鬱而不行

以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔者足太陽經不通

羌活

獨活各半

蒼朮

防風

甘草炙 各

蔓荊子

川芎各二

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服如身重腰沉也然總中有寒濕也更加酒浸漢防已一錢輕者加附子一錢重者加川烏一錢

當歸拈痛湯 治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胃脘不利及

遍身疼痛下注於足經痛腫不可忍

當歸身

知母 酒洗 茯苓 去皮

澤瀉 人參 去步

猪苓

白朮 已上各 苦參 酒浸

黃芩 酒浸

葛根

升麻 已上各 茵陳 酒浸

蒼朮 各八

羌活

甘草 炙 防風 去蘆

蒼朮 各八

右作一服水二鍾煎至一鍾不狗特服

舒經湯 治臂痛不能舉有人常苦左臂痛或以為飲或以為風為濕諸藥悉投繼以鍼灸俱不得効用此方而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致非風非濕腰以下食前服腰以

上食後服

片薑黃

二升如無則以嫩木代之

赤芍藥

當歸

海桐皮

去粗皮 白朮 已上各 羌活

甘草 炙 各

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓磨沉香汁少許食前服

許食前服

青鐵丸

治腎經虛腰腿疼痛常服壯筋補虛

杜仲 去絲

破故紙 炒 一斤 生薑 十兩

右為細末用胡桃一百二十箇湯浸去皮研成膏入少熟蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心鹽酒薑湯任下

立安丸 治五種腰痛常服補腎經壯健腰脚

破故紙

乾木瓜 杜仲 去皮 薑 牛膝 酒浸

續斷 已上各 草薢 二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒或薑湯送下

牛膝酒 治腎受風毒攻刺腰痛不可忍者

牛膝 地骨皮 五加皮 薏苡仁

川芎 羌活 甘草 已上各 海桐皮 二兩

生地黃 十兩

右咬咀用綿帛袋盛藥入無灰酒一斗裝於罈內浸春五夏三秋七冬十日每服一盞一日三四次長令酒氣不絕一方加杜仲

酒或薑湯送下

牛膝酒 治腎受風毒攻刺腰痛不可忍者

牛膝 地骨皮 五加皮 薏苡仁

川芎 羌活 甘草 已上各 海桐皮 二兩

生地黃 十兩

右咬咀用綿帛袋盛藥入無灰酒一斗裝於罈內浸春五夏三秋七冬十日每服一盞一日三四次長令酒氣不絕

一方加杜仲

杜仲酒 治風冷傷腎腰痛不能屈伸

杜仲 一斤 切 生薑 杜仲 汁 製 炒 法 藍

右用無灰酒三升浸十日每服二三合日四五服一方研

為細末每服二錢空心用溫酒調服

蒼朮湯 治濕熱腰腿疼痛

蒼朮 五錢 去 蘆 防風 一錢 半 去 黃蘗 一錢 半 始 得 之 特 寒 也 久 不 愈 寒 化 為 濕 除 濕 止 痛

右作一服水二鍾煎至一鍾空心食前服

麻黃蒼朮湯 治寒濕所客身體沉重腰痛面色萎黃不澤

麻黃 澤瀉 炒 麴 白茯苓

橘皮 已上各 半夏 桂枝 草薢

猪苓 已上各 黃芪 三錢 杏仁 十箇 蒼朮

甘草 炙 已上 各 二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

二至丸 治老人虛弱腎氣虛損腰痛不可屈伸

附子 炮 去 桂心 不見 杜仲 去 皮 剉 補骨脂 炒 已上

鹿角 鎊 藥角 鎊 已上 鹿茸 酒 炙 青鹽 各 半 兩

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服七十九空心用

胡桃肉細嚼用鹽湯或鹽酒送下如惡熱藥者去附子加肉桂各一兩

橘香丸 治腰痛經久不瘥

橘核炒 茴香炒

破故紙炒 附子炮各

右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服三四十九食前用鹽湯送下

腰重痛方

右用八角茴香炒為末每服二錢食前用溫酒調下

治腰痛牽引足膝脚腫屢用如神

杜仲薑汁炒 續斷 黑牽牛 破故紙

桃仁炒去 玄胡索各等

右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服五七十九食前溫酒白湯任下或加胡桃肉同丸尤妙

治腰痛方 官桂 玄胡索 杜仲去皮剉炒去

右為細末每服三錢空心用熱酒調服

速効散 治男女腰痛不可忍者

川練子取肉巴豆五粒去 茴香益炒香 破故紙各一兩

右為細末每服三錢空心用熱酒調服

治腰痛 一方去川練子加官桂

降真香 檀香 沉香共一

右用煎湯空心服便不疼

治腰痛方

胡桃肉 補骨脂 杜仲各四

右為細末入胡桃肉再研細酒煮麩糊和丸如梧桐子大每

散滯丸 治腰痛不可忍者

右用黑牽牛不以多少碾取頭末去滓不用取六錢每

辨入巴豆肉一粒在內以濕紙裹定煨令香熟去巴豆將

醋茶湯下量虛實服一方無巴豆以硃砂為衣每服二十

丸酒下只一服便安

神麩酒 治挫閃腰痛不能轉側

右用陳久神麩一大塊燒通紅淬老酒去神麩通口吞青

鐵丸兩服頓愈一方不用青鐵丸只服酒後仰臥片時未

又方治證同前 右以茴香根同紅麩搗爛好熱酒調服

一方只用茴香根搗爛好酒下立愈靈溪傳甚妙

章薛酒 治五種腰痛連脚膝筋脉拘急痠疼

章薛 牛膝各三 羌活 附子炮各

狗脊 杜仲剉炒 桂心 桑寄生各

右細剉用生絹袋盛以酒二斗浸密封七日後開每於食

前溫服一盞

復春丸 治腰脚風濕勞損手足麻痺筋骨疼痛不得屈伸此

藥活氣血駐顏色補虛損

草麻四兩 甜瓜子三兩 破故紙炒 杜仲剉炒

巴戟去心 牛膝酒浸 葫蘆巴炒 木通各

虎骨酥炙 骨碎補去毛 乳香另研 檳榔

沒藥另研 木香各 黑附子一兩 胡椒一百粒

右為細末入胡桃肉再研細酒煮麩糊和丸如梧桐子大每

服四五十丸食前溫酒送下

附子散 治腰痛強直不能俯仰及筋脉拘急

附子炮 當歸剉 防風剉 杜仲去皮剉

玄胡索 羌活已 桂心半 牛膝三分

右咬咀每服四升水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

食前溫服

張走馬家飛步丸 此係第一去筋脉骨節手足

腰背諸般疾痛挛縮不伸之患神効

乳香另研 白芍藥 川烏生去 草烏生去

白膠香 木鼈子取肉別研去油

右為細末用赤小豆末煮糊為丸如梧桐子大每服十五

沉香丸 治腎臟風塵冷帶腰間久痛連腿膝麻痺或時疼痛

乏力羸瘦

沉香 桂心 華薺 熟乾地黄

白茯苓 海桐皮 槲柳 杜仲去粗皮

石斛去根 牛膝 羌活 漏蘆已

防風剉 附子炮 補骨脂微炒 白木

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十

丸空心用溫酒送下晚間食前再服

牛膝丸 治腰膝疼痛四肢少力不能飲食

牛膝 訶梨勒煨用 附子炮 當歸剉

乾薑炮 芎藭各半 桂心 白芍藥

白木 羌活已 厚朴去粗皮 生薑汁

右為細末酒煮糊和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三

十九食前用溫酒送下

獨活散 治冷帶風氣攻刺腰膝疼痛

獨活 附子炮 牛膝二 赤芍藥

桂心 芎藭 當歸微炒

右咬咀每服三升水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

食前溫服

虎骨散 治腰膝連脚膝曉夜疼痛

虎脛骨酥炙 敗龜酥炙 當歸 芎藭

草薺 牛膝 桂心 羌活已

右為細末每服二升食前溫酒調服

補骨脂丸 治腰脚疼痛不止神効

補骨脂微炒 牛膝已 骨碎補 桂心半

槲柳二 安息香仁

右為細末煉蜜入安息香和搗百餘杵丸如梧桐子大每

服十九至二十九空心用溫酒送下

百倍丸 治男子婦人腰膝疼痛筋脉拘急

敗龜板 虎骨各 肉苁蓉酒浸

牛膝酒浸 乳香別研 沒藥別研 木鼈子

右為細末以浸菴蓉牛膝酒煮麩糊和丸如梧桐子大每

服三十九食前溫酒送下

養腎散 治腰脚筋骨疼痛不能步履其効如神

蒼朮去 全歸半 天麻三 黑附子炮

草烏去 天麻三 黑附子炮

右為細末每服一升林黑豆酒調下藥氣所至麻痺少時

頑更疾隨藥氣頓愈知是骨髓中痛用桃酒調此藥去
 積聚癥瘕傷寒中風皆治百一選方載中州太守陳達原
 因暑中取凉食瓜至秋忽然右腰腿間疼痛連及膝脛曲
 折不能經月右脚難於牽動凡治腰脚藥服之无効乃此
 養骨散總一服移刻牽身麻痺不敷服脚能屈伸再一服
 即康寧又本州監酒年四十歲虛損兩脚不能行步進此
 藥二服迺遷可行三服馳走盧祖常易簡方糾繆位有子
 弟者忽兩足拳挛連腰疼楚脉弦緊甚此證兩感寒多於
 風只投百一選方養骨散隨効惠倅李奉議亦嘗位余曰
 其家曾有婦人腰脚不能轉動用此藥即効皆風寒刃感
 腎着湯 治居处卑濕或雨路所衣濕傷腎經腰重冷痛如帶
 五千不冷如冰洗熱物着痛方少寬不渴小便自利
 茯苓 乾薑各五 白朮半斤 甘草炙

右作二貼每貼用水二盞煎不拘時服
 神應丸 治腎經不足風冷乘之腰痛如折痛引背脊俯仰或
 勞役傷於腎或墜濕地或墜墮傷損風寒客搏皆令腰痛
 威靈仙 桂心 當歸各二
 右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二三十九食
 前用溫酒送下或茴香湯下婦人桂心煎湯下
 如神湯 各舒筋湯 治男子婦人腰痛閃肭血滯腹中疝痛產
 後服之更妙
 玄胡索 微炒 當歸 桂心各等
 右為細末每服二錢不拘時用溫酒調服一方加杜仲或
 加桃仁牛膝續斷亦可
 牽牛丸 治冷氣流注腰疼不可俯仰
 黑牽牛 玄胡索 微炒 補骨脂 各等分

右煨蒜研膏丸如梧桐子大每服五十九食前葱酒鹽湯
 住下一方不用玄胡索補骨脂用麩炒為末酒糊丸
 立安散 專治腰痛
 杜仲 炒 桐核 炒
 右等分為細末每服二錢不拘時用鹽酒調服
 補骨脂丸 治腰痛不可忍
 補骨脂 用麩炒為末入 杏仁 湯泡去 桃仁 湯去
 右和勻以浸藥酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服五十九
 空心鹽湯或鹽酒送下
 養簡丸 治墜墮閃肭血氣凝滯腰痛
 養簡子 當歸 威靈仙 破故紙 炒
 杜仲 炒 桂心 已上各 乳香 別研 沒藥 別研
 右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服七十九空心
 用鹽湯或鹽酒送下

治腰痛如神方
 杜仲 炒 杜仲 炒 杜仲 炒
 右為細末每服二錢空心溫酒調下此藥活血化氣
 太醫院經驗奇效良方大全卷之二十七

大醫院經驗奇效良方大全卷之二十八

脇痛門 附說

素問藏氣法時論曰肝病兩脇痛引少腹善怒何謂夫肝厥陰
 脈自足而上環陰器抵少腹又上貫肝膈布脇肋故兩脇下痛
 引少腹刺熱筋云肝熱亦令脇痛手足躁不得安卧效論云肝
 效之狀效則兩脇下痛甚則不可以轉也則兩脇下滿脾效亦
 能右脇下痛陰陰引有背肢亦脇也舉痛論寒氣客於厥陰之
 脈故脇引少腹而痛以歲運論之歲木太過金反勝之則脇痛
 歲火太過水反勝之胃中痛脇支滿痛歲金太過病兩脇下小
 腹痛木勝金復則胃脇暴痛下引少腹六元正紀曰木鬱之發
 病胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下至真大要曰
 陽明在泉心脇痛不能反側繆刺篇云邪客於足少陽之絡令
 人脇痛不得息效而汗出邪客足太陽之絡令人拘攣背急引
 脇而痛標本論曰心病先心痛一日效傳肺三日肺傳肝脇支
 痛而滿肝病頭目眩脇支滿痛也且夫左右脇者陰陽之道路
 也故肝生於左肺藏於右以左屬肝而藏血肝陽也血陰也乃
 為外陽而內陰也右屬肺而主氣肺陰也氣陽也乃為外陰而
 內陽也或謂肝血蓄於左脇作塊而痛者為肝積名肥氣也肺
 氣鬱於右脇痞硬而痛咳喘為肺積名息賁也而脾所系於右
 其經濕勝故痰飲濕能化之隨經流入於右左脇痛者多因留
 血而作右脇痛者悉是痰氣兩脇痛者豈可一槩而言哉論病
 之由當分外之六淫內之五邪若暴怒傷觸悲哀氣結飲食過
 度冷熱失調癩仆傷形者或因痰積流注於左與血相傳皆能
 為痛張仲景論傷寒少陽耳聾脇痛甚者是肝膽之氣鬱而
 作痛且脇痛之病諸經論之詳矣其脈弦滑者順洪太者逆治
 法當推其歲氣分其左右辨其氣血痰積量其形證虛實用藥

施治無不取效收十全之功矣

脇痛通治方

苦葛湯 治脇下痛不可忍者

川芎 乾葛 桂枝 枳殼 麩炒

細辛 芍藥 麻黃 人參 去蘆

防風 紅芍 甘草 炙半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

分氣蘇飲 治腹脇疼痛氣促喘急

紫蘇葉 桑白皮 五味子 去梗 桔梗 去蘆

草薺仁 大腹皮 白茯苓 陳皮

甘草 炙半

右作一服水二鍾生薑三片入鹽少許煎至一鍾空心服

枳殼黃散 治悲哀傷肝氣引兩脇疼痛

枳殼 麩炒 細辛 川芎 乾葛

防風 甘草 桔梗 炙

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

推氣散 治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃 枳殼 麩炒 桂心 不見火 甘草 炙二

右為細末每服二錢薑棗湯調下食遠服

枳殼散 治左脇刺痛不可忍者

枳殼 川芎 各半 枳殼 炙

右為細末每服二錢薑棗湯調下酒調亦可食遠服

枳殼散 治脇間痛如有物刺是氣痰也

枳殼 麩炒 二 甘草 炙七

右為細末每服二錢薑煎葱白湯調下不拘時服

香橘湯 治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附子 <small>炒</small> 橘紅 半夏 <small>各</small> 甘草 <small>各</small>	右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食遠服	枳實散 治兩脇疼痛	枳實 <small>各</small> 白芍藥 川芎 人參 <small>各</small>	右為細末每服二錢薑棗湯調空心服	異香散 治腹脇脹滿痞悶壅塞一切氣逆腰脇刺痛	方見氣門	流氣飲子 治五臟不和三焦氣壅心胃痞悶噎塞不通腹脇脹痛嘔吐不食	方見氣門	加味小茈胡湯 治傷寒脇疼	茈胡 黃芩 <small>各</small> 人參 半夏 <small>各</small>	牡蠣粉 枳殼 <small>各</small> 甘草 <small>各</small>	右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食遠服	氣鍼丸 治久積風壅心胃築痛兩脇心膈似有鍼刺疼痛叫聲徹日六脉沉伏按之手不可近此藥靈驗神驗常服踈通滯氣止刺痛極効	木香 檳榔 青皮 陳皮	大黃 <small>四兩</small> 牽牛 <small>半兩</small> 半生半炒	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九用生薑湯送下食前服量虛實加減	治脇痛如打	羌花 躑躅花 <small>各</small>	右用布囊貯蒸熱以熨痛上冷復易之	木通散 治男子婦人脇肋苦痛	木通 <small>去青</small> 青皮 <small>去白</small> 蘿蔔子 <small>炒</small> 茴香 <small>炒</small>
---	------------------------	-----------	--	-----------------	-----------------------	------	--------------------------------	------	--------------	---	---	-----------------------	--	-------------	--	----------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	---------------	--

川練子 <small>取肉用已豆半兩同炒黃</small> 滑石 <small>另研</small>	右為細末每服三錢不拘時用葱白湯調服即愈甚者不過三服	芍藥散 治婦人脇痛	白芍藥 玄胡索 <small>炒</small> 肉桂 <small>已</small> 各	香附子 <small>二兩</small> 同煎 <small>一升</small> 薑	右為細末每服二錢不拘時白湯調服	白木丸 治息積病脇下滿逆妨悶喘息不便呼吸引痛不可鍼灸宜導引服藥	白木 枳實 官桂 <small>已</small> 各 人參 <small>二兩</small>	陳皮 桔梗 <small>醋炒</small> 甘草 <small>各</small> 已	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九不拘時溫酒送下日三服	芳歸芍藥湯 治肝積氣滯在左脇下遇發作手足頭面昏痛	川芎 當歸 芍藥 桂枝	防風 枳實 羌活 側子 <small>二</small> 各	乾葛 <small>四分</small> 麻黃 側子 <small>二</small> 各	右咬咀分作二貼每貼用水二鍾生薑五片煎至七分去滓不拘時服有汗避風	大醫院經驗奇效良方大全卷之二十八
--	---------------------------	-----------	--	--	-----------------	---------------------------------	--	---	------------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------------	---	---------------------------------	------------------

太醫院經驗奇效良方大全卷之二十九

秘結門 附錄

人之秘結大腸為得道化物而出為凡人五味以養五臟糟粕皆入歸於大腸大腸所司主出而不納或停蓄蘊結腎主人膀胱之腑水滿於膀胱而泄於小腸矣相通也然小腸獨應於心者何哉蓋陰不可無陽水不可無火水火既濟上下相交榮衛流行且水道熱不通冷不禁難經云謂七衝門者為飛門齒為戶門會厭為吸門胃為賁門大倉下口為幽門大腸小腸會為闌門下極為魄門此為七衝門也易老云魂門對飛門其證為狐惑以下衝上故曰七衝門也而幽門不通則上衝吸門不開則噎塞燥秘不便氣不得上下者治在幽門宜以通幽湯潤腸去燥之劑因體虛之人攝養乖理三焦氣滯運掉不行而壅滯於腸胃之間遂成秘結之患有風秘氣秘濕秘寒秘熱秘風秘為病風痰秘於大腸結而不通也氣秘者因氣滯後重迫痰煩悶脹滿大便結燥而不通寒秘者年高腸冷及痰癖冷氣結滯大便秘結又有虛秘與夫積滯秘結虛秘者年若血少腸胃枯澀且古人論此病證有方全在醫者看其虛實隨證治之若婦人因產後失血耗氣大便秘者不可妄用疎利之劑恐傷元氣病之反重大抵秘結治法燥則潤滋則滑秘則通寒則溫熱則涼風則散氣則順此為一定之法學者誠心鑒之

秘結通治方

大黃飲子 治身熱煩燥大便不通
 大黃二錢 枳殼二錢 枳殼二錢 枳殼二錢
 川升麻一分 生地黃五分 人參七分 黃芩七分
 甘草五分

右作一服用水二鍾生薑五片豆豉二十一粒烏梅一枚

煎至一鐘不拘時服

潤腸丸 大便秘結通用

杏仁炒去尖 枳殼炒 麻仁炒 陳皮七上各

防風 阿膠炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五七十九食前用

紫蘇子煎湯送下吐者荆芥湯送下

脾積丸 治飲食不化腹脹痛嘔惡吞酸大便秘結

蓬莪朮三刀 京三稜二刀 青皮二刀 南木香半刀

良薑半刀 米醋炒 皂角三刀 燒存性

右為細末用巴豆半兩去殼研如泥漸入藥末研和得所

麩糊和丸如麻子大每服五九加至十九用橘皮煎湯送下食遠服

一香丸 治積滯氣秘心腹刺痛中滿

南木香 丁香 青皮去白 五靈脂香獨者

草菓仁 橘紅半斤 蓬朮半斤 縮砂仁半斤

右為細末用巴豆半兩研如泥漸入藥末研和麩糊和丸

如麻子大每服三九加至五七九食前生薑湯下

疎風散 治風毒秘結

枳殼炒 防風 羌活 獨活

檳榔 白芷 威靈仙 蒺藜炒赤

麻仁 杏仁 甘草各

右為龜末每服二錢半生薑五片蜜一匙慢火煎服無時

三和散 治七情之氣結於五臟不能通流以致脾胃不和心

腹痞悶大便秘澀

方見氣門

脾約麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結

脾約麻仁丸

治腸胃熱燥大便秘結

治腸胃熱燥大便秘結

<p>蘇仁<small>五另</small> 大黃<small>一</small> 厚朴<small>去皮</small> 枳實<small>黃炒</small></p> <p>芍藥<small>心</small> 枳實<small>黃炒</small></p> <p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九臨睡用溫白湯送下大便利即止</p>	<p>滋腸五仁丸 治津液枯竭大腸秘澀傳道艱難</p> <p>桃仁<small>各</small> 杏仁<small>各</small> 柏子仁<small>半</small> 松子仁<small>二</small></p> <p>郁李仁<small>炒</small> 陳皮<small>四</small> 枳實<small>黃炒</small></p> <p>右將五仁另研為泥入陳皮末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三五十丸空心用米飲送下</p>	<p>潤腸湯 治大便秘澀連日不通</p> <p>麻子仁<small>調</small> 澤瀉<small>去</small> 厚朴<small>去</small> 枳實<small>黃炒</small> 芒硝<small>炒</small> 杏仁<small>炒</small> 蘇子仁<small>炒</small> 荆芥穗<small>炒</small></p> <p>右作一處入鹽少許同煎食前代茶飲之以利為度</p>	<p>續柳丸 治大腸積熱氣壅不通心腹脹滿大便秘結</p> <p>大黃<small>黃</small> 黃芩 枳實<small>黃炒</small> 麻子仁<small>炒</small> 牽牛<small>炒</small> 檳榔 羌活<small>去</small> 杏仁<small>炒</small> 白芷<small>七</small> 升麻<small>各</small> 人參<small>半</small></p> <p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五七十九空心用白湯送下</p>	<p>掩臍法 治大便秘不通</p> <p>右用連根葱一二根帶土生薑一塊淡豆豉二十一粒鹽一匙同搗碎作餅子焙熱掩臍中以綿帛扎定良久氣透自通</p>	<p>牛黃散 治上焦熱肺腑秘結</p> <p>大黃<small>一</small> 白牽牛<small>取</small> 右為細末每服三錢如厥冷用溫酒調服手足煩者用蜜</p>
--	---	---	--	---	--

<p>湯調服不拘時候</p> <p>潤燥湯 治大便秘結不通</p> <p>生地黃 升麻<small>各</small> 當歸尾 麻仁<small>去</small> 熟地黃 大黃<small>煨</small> 桃仁<small>另</small> 甘草<small>生</small> 紅花<small>三</small></p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾食前服一方有黃柏無紅花穿結藥 治大實大滿心胸高起氣塞不通者為結也</p> <p>蟾酥 輕粉 麝香<small>各</small> 巴豆<small>別</small></p> <p>右研極細用孩兒乳汁和丸如黍米大每服二三九不拘時薑湯下</p>	<p>三仁丸 治大腸有熱津液竭燥裏急後重大便秘結</p> <p>柏子仁 松子仁 火麻子仁<small>各</small></p> <p>右研令勻用黃蠟半兩鎔化和丸如梧桐子大每服二十丸食前用米飲送下未快加丸數服之一方以白蠟和丸用黃片湯下治老人虛秘</p>	<p>小提益散 治大便秘結服轉藥久不通</p> <p>龜突墨<small>一</small> 滄鹽<small>三</small></p> <p>右研勻每用一錢竹筒吹入肛門立透</p>	<p>敷藥 治秘結至極昏不知人</p> <p>右用生大蠟一二枚以鹽一七連殼生搗碎置病者臍下一寸三分用寬帛繫縛之即大便如朱効烏柏木根三寸研并水服亦効流多研爛敷臍下亦可</p>	<p>枳殼丸 治三焦約證調順氣脈消痞滯利胃腸治風氣通利大小便</p> <p>枳殼<small>二</small> 陳皮<small>一</small> 檳榔<small>半</small> 木香<small>二</small> 黑牽牛<small>取</small> 枳殼<small>七</small></p>
--	--	--	--	--

右為細末煉蜜和九如梧桐子大每服十五丸不拘時生薑湯送下日三服

皂角丸 治老人屢入風秘乃大腸經有風大便秘結宜服之

皂角炙去 枳殼去核

右等分為細末煉蜜和九或飯飲丸亦可如梧桐子大每服七十九不拘時米飲下

六磨湯 治氣滯腹急大便秘澀

沉香 木香 檳榔 烏藥

枳殼 大黃各等分

右各件熱湯磨服

太醫院經驗奇效良方大全卷之二十九

太醫院經驗奇效良方大全卷之三十

咳嗽門 附論

天咳嗽者古人所謂欬是也蓋皮毛肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也欬非肺一臟受之五臟六腑皆令人有欬經曰秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣清肅而反動必氣上衝經曰逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿而為咳嗽之分蓋咳謂有聲而無痰肺氣傷而不清也欬謂無聲而有痰由脾濕動其痰也咳嗽者有聲而有痰也因邪傷於脾脾濕痰動以致有聲有痰且肺五臟之華蓋專主於氣也之清濁既分則無欬清氣不分濁氣上干於華蓋加以協水停飲肺不得清則為欬矣素問欬論云五臟各有其時受以風寒而咳嗽各異凡臟腑百脈皆取氣於肺因而咳嗽始自本經且傷風為證增寒身熱自汗惡風而欬傷於寒者增寒身熱無汗惡寒而欬傷於暑者煩渴引飲而欬傷於濕者骨節煩疼四肢重着而欬傷於心有喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺謂之心欬怒傷於肝兩脇下痛甚則兩脇下滿謂之肝欬思傷於脾右脇下痛引肩背甚則不可以動動則欬劇謂之脾欬恐傷於腎者腰背相引而痛甚則欬謂之腎欬憂傷於肺者喘息有音甚則唾血謂之肺欬臟欬不已則腑受之心欬不已小腸受之咳與氣俱失肝欬膽受之欬嘔膽汗脾欬不已胃受之欬而嘔也甚長蟲出肺欬不已大腸受之欬而遺矢腎欬不已膀胱受之欬而遺溺久欬不已三焦受之欬而腹滿不欲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又况勞傷過度氣體虛弱形寒飲冷最易得寒燥氣鬱蒸最易生熱或傷風寒或風熱相搏夫肺金生水腎為肺之子蓋人不能保養腎水其元耗散因于虛以泄母氣而成嗽

者若脈浮緩為風宜以散之弦緊為寒宜以溫解沉澀為濕宜以燥之弦滑在胃口者以滌其痰浮盛在氣口者為氣則當疎之微細者為虛則當補之細數者為虛勞宜以滋養血氣沉實有力為氣實心則當瀉濡弱無力者為肺氣耗散則當收斂各從其類醫者詳審考證用藥則無差失可為上工矣

咳嗽通治方

華蓋散 治肺受風寒咳嗽痰壅

麻黃去節 紫蘇子炒 杏仁炒 桑白皮炒

赤茯苓去皮 橘紅已上各 甘草一分

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗一箇煎至一鍾去滓不拘時服

加減麻黃湯 治肺感寒邪咳嗽

麻黃去節 杏仁炒 半夏薑製 陳皮已上各

甘草一分

右作一服用水二鍾生薑四片紫蘇半錢同煎至一鍾去滓不拘時服

溫肺湯 治肺虛感冷咳嗽嘔吐痰沫

乾薑 辣桂 半夏薑製 五味子

杏仁 陳皮 甘草已上各 細辛

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一箇煎至一鍾去滓不拘時服

三拗湯 治寒燥不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃不去 杏仁不去 甘草不去

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

金沸草散 治傷風上壅熱嗽

方見傷寒門

杏子湯 治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷及痰飲停積

悉皆治之

杏仁炒 人參 茯苓 細辛洗

半夏湯泡 官桂不見 乾薑炮 白芍藥

五味子 甘草炙

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服此藥味多辛熱之劑若冷嗽則可服

橘蘇散 治傷風咳嗽身熱有汗惡風脈浮病人挾熱服杏子湯不得者此藥穩當

橘紅 紫蘇葉 杏仁去皮 五味子

半夏湯泡 桑白皮炒 貝母去心 白朮已上各

甘草一分

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

白朮湯 治五臟受濕咳嗽痰多上氣喘急身體重痛脈濡細

白朮三 白茯苓去皮 半夏湯泡 橘紅已上各

五味子 甘草炙

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

團參飲子 治病因抑鬱憂思喜怒飢飽失宜致臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿增寒發熱羸瘦困倦將成勞瘵

方見勞瘵門

參蘇飲 治上膈有熱咳嗽聲重

方見傷寒門

人參紫苑湯 治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

人參 紫苑茸 桂枝 五味子

杏仁 甘草已上各 縮砂 罌粟殼去殼

右作一服用水二鍾生薑五片烏梅二箇煎一鍾食遠服

五拗湯 治感寒咳嗽肺氣喘急

麻黃不去 杏仁不去 甘草生用 荆芥穗

桔梗各二 右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服咽喉痛

者煎熱後加朴硝少許一方去荆芥桔梗用枳實半夏

玉液丸 治風壅化痰涎利咽清頭目止咳除煩熱

寒水石水飛過二十刀 半夏湯洗為末 白礬各十刀

右研和勻用麩糊和丸如梧桐子大每服三十九食後用

淡生薑湯送下

玉之丸 治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽膈不利

人參去蘆 白茯苓去皮 白礬各 天南星米泔

薄荷各三十刀 半夏各六十

右為細末生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服三十九

食後生薑湯送下如痰感燥熱薄荷湯送下

鍾乳補肺湯 治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥

臭喘走不止

鍾乳粉碎如 桑白皮各二 肉桂去 白石英碾末

五味子 欬冬花去梗 紫苑洗去 麥門冬去心

人參去蘆

右除鍾乳粉白石英同為粗末拌勻右作一服用水二鍾

生薑五片棗一枚粳米三十粒煎至一鍾食後服

人參養肺丸 治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰肺咳嗽喘急胃

中煩悸涕稠粘勞傷肺胃吐血嘔血並皆治之

人參去蘆 黃芪各 瓜蒌根

白茯苓去皮 杏仁炒去皮

皂角子三十箇 炒去皮 半夏各 四兩炒

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九食後細嚼用紫

蘇湯送下如喘用桑白皮湯送下

溫中化痰丸 治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈咳嗽涎唾或

飲酒過多嘔噦惡心

良薑各 青皮去白 乾薑各 陳皮去皮

右為細末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九食後

用米飲送下

人參潤肺丸 治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成虛勞及

療風壅痰實頭目眩暈口舌乾燥涕唾稠粘

人參 欬冬花 細辛去葉 杏仁炒去

甘草各四 官桂去皮 桔梗各 知母各

右為細末煉蜜和丸如雞頭實大每服一九食後細嚼用

淡生薑湯送下

人參清肺湯 治肺胃虛寒咳嗽喘急坐卧不安年久勞嗽唾

痰腥臭

人參 阿膠給粉 杏仁炒去 豐粟殼去

知母 桑白皮炒 烏梅去核 地骨皮

甘草各

右作一服用水二鍾烏梅一箇紅棗一箇煎一鍾食遠服

八味欬花散 治肺經寒熱不調痰涎不已

欬冬花洗培 紫苑各 五味子 甘草各

桑白皮洗培 麻黃去節 杏仁各

右作一服用水二鍾煎一鍾入黃蠟如皂角子大食後服

人參丸 治遠年日近咳嗽諸藥不効者

人參 桔梗 甘草各 阿膠各

五味子各半 肉桂去皮 杏仁湯泡去 烏梅肉二
 右為細末煉蜜和丸每兩作十五丸每服一丸用新綿裹
 定於湯內溫過噲化嚙津

大降氣湯 治上盛下虛胸壅痰喘喉乾不利

紫蘇子微炒 川芎 細辛去土 當歸洗焙
 白茯苓去皮 桔梗去蘆 厚朴去皮 陳皮去白
 半夏麩炒 前胡 肉桂去粗 甘草炙各

右作一服用水二鍾生薑五片紫蘇五葉同煎至一鍾去
 滓食後服

平肺湯 治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾口燥

陳皮半 半夏湯泡 苦梗炒 薄荷
 紫蘇 烏梅去核 紫苑 桑白皮蜜炒 五味子 聖粟殼

甘草炙各 杏仁湯泡 桔梗炒 細辛
 右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

人參荆芥散 治肺感風邪上壅痰嗽頭目不清語言不出咽
 乾項強鼻流清涕

人參 杏仁去皮 桔梗炒 細辛
 麻黃節去根 陳皮已 半夏湯泡 荆芥穗
 通草 甘草炙各

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

桔梗湯 治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴大便難小便赤色

桔梗 貝母去心 薤白仁炒 桑白皮蜜水
 當歸 枳殼炒 瓜蒌仁 防己已
 黃芪半 甘草節生用 杏仁湯泡 百合蒸各
 右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

秘加大黃小便少加木通
 紫苑茸湯 治飲食過度或食煎燻邪熱傷肺咳嗽咽癆痰多
 唾血喘急脇痛不得安卧

紫苑茸 經霜桑葉 款冬花 百合蒸
 杏仁去皮 阿膠綿粉 貝母去心 半夏湯泡
 蒲黃炒已 犀角鎔屑 人參去蘆 甘草炙已

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

杏仁煎 治老人久患喘嗽不已睡卧不得者服之立効

杏仁去皮 胡桃肉各等
 右共碾為膏入煉蜜少許搜和得所丸如彈子大每服一
 丸食後細嚼生薑湯送下

祛痰丸 治風痰喘嗽
 人參去蘆 陳皮去白 青皮去白 茯苓去皮
 白木 木香 天麻已 槐角子
 半夏湯泡 猪牙皂角去皮 蘇
 右為細末生薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服五七十
 丸食後溫酒送下生薑湯亦可

紫苑半夏湯 治喘嗽痰涎

紫苑 半夏湯泡 紫苑茸 陳皮去白
 五味子各 杏仁去皮 桑白皮各

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾日進三服

人參平肺散 治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胃
 膈痞滿咽隘不利

人參 青皮 茯苓 天門冬去心
 陳皮去白 地骨皮 甘草炙已 紅五味子三十
 知母半 桑白皮炒

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服如熱加黃芩紫蘇半夏各一錢	寧肺湯 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰涎	人參 去蘆 當歸 白朮 熟地黃	川芎 白芍藥 五味子 麥門冬 去心	桑白皮 白茯苓 去皮 甘草 炙 已上 阿膠 一 各半	右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服	補肺湯 治肺虛氣之久嗽	阿膠 炙 紫蘇子 桔梗 半夏 裂	甘草 炙 已上 款冬花 砂仁 紫苑	杏仁 炙 去 五味子 細辛 陳皮	桑皮 炙 石菖蒲 草菓 青皮 炙 已上 各	右作一服用水二鍾生薑四片紫蘇五葉煎一鍾食後服	人參飲 治咳嗽痰飲通用	人參 桔梗 半夏 翅 五味子	細辛 枳殼 赤茯苓 去皮 杏仁 已上 各	甘草 炙 半	右作一服用水二鍾生薑五片烏梅半箇煎至一鍾食後服一方無杏仁不用烏梅煎服咳嗽加紫苑添甘草	人參潤肺散 治咳嗽氣急痰壅鼻塞	人參 二 炙 麻黃 去根 杏仁 去皮 具母 去心 各	阿膠 炙 桔梗 去蘆 甘草 炙 已上 橘紅 五分	右作一服用水二鍾紫蘇三五葉煎至一鍾食後服	知母茯苓湯 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗	知母 白朮 各八 茯苓 去皮 五味子	人參 半夏 炙 已上 地胡 甘草 炙 已上
---------------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------------	------------------------	-------------	----------------	----------------------	--------	--	-----------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------

薄荷 川芎 阿膠 炙 已上 各 款冬花	桔梗 麥門冬 黃芩 炙 已上 各	右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服	人參款花散 治喘嗽久不已者	人參 款冬花 棗殼 炙 已上 知母	貝母 半夏 炙 已上 各	右作一服用水二鍾烏梅一箇煎至一鍾臨睡服	貝母散 治暴發咳嗽多日不愈	貝母 杏仁 炙 桑皮 炙 已上 各 五味子	知母 甘草 炙 已上 各 款冬花 半	右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服	人參散 治諸咳嗽喘急語言不出年久者多服見効	人參 知母 貝母 馬兜鈴 用皮	麻黃 去節 杏仁 生用 半夏 炙 已上 各 天仙藤 一 各	右作一服用水二鍾烏梅一箇蜜一匙煎至一鍾臨睡服	人參養肺湯 治肺痿咳嗽有痰午後熱并聲嘶者	人參 去蘆 阿膠 炙 已上 各 貝母 杏仁 炙	桔梗 茯苓 桑皮 枳實	甘草 炙 已上 各 地胡 二 各 五味子 半	右作一服用水二鍾生薑三片棗子一枚煎一鍾食遠服	星香丸 治諸氣嗽生痰	南星 半夏 炙 已上 各 白礬 一 兩 研 同 水 浸	陳皮 炙 五 兩 研 同 水 浸 香附子 三 兩 研 同 水 浸	右四味俱不見火碾為細末用生薑汁煮麩糊和丸如梧	桐子大每服五十九食後用淡生薑湯送下	加減應白散 治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐痰喘
---------------------	------------------	---------------------	---------------	-------------------	--------------	---------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	-------------	------------------------	------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------

桑白皮	地骨皮	陳皮	去白	人參
甘草	杜仲	白茯苓	青皮	各半
五味子	半斤	右作一服用水二鍾加粳米一百粒煎至一鍾臨睡服		
人參	肺湯	治日久咳嗽不止者		
陳皮	各二	栗殼		
烏梅	各半			
桑皮	甘草	各一		
右作一服用水二鍾煎至一鍾入蜜一匙臨睡服				
清金湯	治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎聲胃			
滿氣逆坐臥不寧飲食不下				
陳皮	去白	薏苡仁	五味子	阿膠
炒				
茯苓	去皮	紫蘇	桑白皮	杏仁
去心				去皮
貝母	去心	欵冬花	半夏	麴
炒				
粟殼	蜜炒	人參	甘草	各半
右作一服用水二鍾生薑三片棗子二枚烏梅一箇煎至一鍾食後服				
紫蘇飲子	治脾肺虛寒痰涎咳嗽			
紫蘇葉	五味子	青皮	去白	杏仁
桑白皮	麻黃	陳皮	半夏	
人參	甘草	各一分		
右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服				
人參潤肺湯	治肺氣不足喘急咳嗽不已并治傷寒壯熱頭			
疼身痛				
人參	桔梗	白芷	麻黃	去節
乾葛	白朮	杜仲	甘草	各一分
右作一服用水二鍾生薑三片杏仁三根煎至一鍾不拘時通口服				

等靈散	治肺氣喘滿痰咳眠臥不安			
苦葶藶	炒	蛤粉	絡一	桑皮
山施				
赤茯苓	杏仁	去皮	人參	荊芥
薄荷	陳皮	桔梗	炒	甘草
右作二貼每貼用水二鍾生薑三片煎至七分不拘時服				
欵花散	治寒熱交壅肺氣不利咳嗽喘滿痰涎盛喉中呀			
呷宜服之				
欵冬花	桑根	白皮	半夏	知母
				去心
貝母	炒	阿膠	炒	粉
甘草	各二分	麻黃	各一分	杏仁
				去皮
右作二貼每貼用水二鍾生薑三片煎七分不拘時服				
杏仁煎	治嗽失音不出			
杏仁	去皮	破酥	生薑	汁
桑皮	貝母	去心	木通	各一分
五味	各一分			
右剉碎用水三升熬至半升去滓入前杏仁等四味再熬				
成膏每服一七合化一方加欵冬花知母各一兩				
治嗽得効方	治諸嗽久不瘥			
人參	欵冬花	白礬	枯	佛耳草
甘草	各一分			
右剉碎作一服用水二鍾生薑三片棗一枚烏梅半箇煎至七分食後服				
治嗽方				
半夏	杏仁	蛤粉	白礬	
南星	白薑	薄荷	藿香	各一分
右剉碎作一服用水二鍾生薑三片棗一枚同煎至七分				

食後服

含化上救丸 治肺氣不和咳嗽常服潤養心肺及治大人小

兒一切咳嗽服之皆効

欽冬花炒 杏仁去尖 貝母各一 凡上

吳白芷 甘草一 凡上

右為細末煉蜜和丸每兩作十五丸每服一九或二九不

拘時醫化

治救補虛方

牛骨一斤 白沙蜜八 杏仁四 凡上

乾山藥研去皮 胡桃肉另研 凡上

右將牛骨髓沙蜜砂鍋內煎熬沸以絹帛濾去滓盛在磁

瓶內將山藥杏仁胡桃三味亦入瓶內以紙密封瓶口重

湯內煮一日一夜取出每日早晨用白湯化一匙服

訶梨勒散 治咳嗽

右用訶梨勒實者炮熟去核為末每服二匙者服一枚

去脂膏劈開摻藥在內入打破烏梅一枚合定以芭蕉葉

包之外用濕紙重裹煨令香熟去紙并蕉葉烏梅止將藥

并猪脂慢火煎日三兩服

平肺湯

右用猪猪精肉三兩起皮薄切作三片以皂角三寸按水

浸後熬去水用膩粉二匙摻在肉內以濕紙裹煨至五更

時爛嚼以淡生薑湯或桑白皮煎湯送下至日午時瀉下

痰涎是病根也

法製溫半夏 治咳嗽

齊州半夏二斤 用河水 白礬一斤 川升麻

縮砂仁 丁皮 草薹薹仁 甘草配 凡上

生薑切五月好酒

右除半夏洗去滑將別藥焙乾龜到以大口井或生薑

并諸藥及半夏以酒浸春夏三七日秋冬一月取出只將

半夏用水洗焙乾其餘藥不用每服嚼二三枚不拘時

雌黃丸 治暴嗽久嗽勞嗽皆可服

右金粟丸葉子雌黃一兩研細用紙筋泥固濟小合子一

筒令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口

更以泥封之候乾坐合子於地上上面以未入窰瓦坯子

攤合子令作一尖子上用炭十斤簇定頂上着火一熨斗

籠起令火從上漸熾候火消三分去一看瓦坯通紅則去

火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研

湯浸蒸餅和丸如粟米大每服三九五丸食後用甘草湯

治咳嗽 訶曰

一兩清油二兩蜜 半兩生薑自然汁

紫苑麻黃及杏仁 桔梗細辛再添入

訶子栝菴等二錢 慢火煎熬如黑漆

臨睡每服三五匙 明朝咳嗽無蹤跡

青州白丸子 治咳嗽

大半夏湯泡 白附子洗淨 川烏略泡 去天南星 洗淨

右為細末用生薑自然汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服

十九至二十九丸食後用茶清或熟水送下如癱瘓風用溫

酒下日進三服常服永無風痰膈壅之疾小兒散風服二

丸用薄荷湯化下

因初青州謝家有老人遊山見異人對奕老人傍觀久之

奕者曰汝飢否曰然遂指桃樹汝食此老人摘一顆食已
 腹飽少頃欲歸異人曰汝家已更兩世今雖還家子孫亦
 不能識且為我守門若有變恠切不可開異人逃起不見
 良久但聞絲竹之聲塵上而來老人開戶視之則異人已
 對坐於門外曰吾固戒汝不得開不從吾言是無分也今
 有數方授汝歸使子孫售于世可以致富遂將老人推出
 墮於老人之宅子孫敬惟奔告隣里上 人曰汝家八十年
 前大父入山尋不見即此老人也子孫方信以方嚮之果
 為潤至至仁宗時有旨令其家上白九子方其家深恐其
 問藥不便於至尊服食遂易之以進其後子孫有為房陵
 宰者親與番易余端奉言其事且傳真方余時職教房陵
 辛丑歲中秋王少愚以郡檄至傳其所聞因筆之余得之
 今制漕葉景夏服之果異於常者

人參款花膏

多年咳嗽變為癆

去節麻黃桔梗加

粉草杏仁葶藶炒

知母貝母款冬花

人參烏梅各等分

搗羅為末莫教差

煉蜜和丸如彈大

含化一粒去根芽

鳳髓湯

治咳嗽能潤肺

松子仁一刃胡桃取肉去皮

蜜煉熟

右研和勻每服一匙食後用沸湯點服

滴油散

治痰嗽面浮

右以真蛤粉一味新瓦炒令通赤地上出火毒拌青黛少許同淡蘆水滴麻油數點服即愈

紫金散

治一切痰嗽日夜不得眠服此藥神效

天南星法去皮白礬

耳草半刃烏梅取肉

右為龜散用慢火於銀石器內炒令紫色放冷研為末
 每服二錢臨臥時身體都入鋪臥內用蘆汁七分溫湯三
 分燉令稍熱調前藥末服之嚥下便仰臥低枕想藥入於
 肺中須臾得睡其效立止

黑金散

治久咳喘急

猪蹄合子法黑者四十九

天南星大者一枚款冬花帶葉者

右用瓶子一拔鋪猪蹄合子在內上以天南星勻蓋之合

子鹽泥赤石脂固濟火煨白煙出為度候冷取出入款冬

花末并麝香一分龍腦少許同研每服一錢食後前桑根

白皮湯調下若年少即用生草中年即用羚羊角末半兩

代猪蹄合子

青金丹

治肺虛壅咳喘滿咯痰血

杏仁去皮尖一兩用杜蠟燻成粉與

青黛一兩

右研勻用黃蠟一兩鎔化攪和丸如彈子大壓扁如餅每

用軟柿餅一箇去核入藥在內濕紙裹煨約藥乾方取出

去火毒細嚼糯米飲下

一方名甲乙餅治咳出血片兼痰內有血絲不問年深日

近但只在一服取効右用青黛一分杜蠟二錢杏仁七粒

去皮尖研蠟丸湯使同上

治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不瘥者

右以蝙蝠去頭燒令焦為細末每服二錢不拘時用米湯

調下

治上氣咳嗽胸妨悶氣喘

右用鯉魚一箇切作鱗以薑醋食之蒜蘆亦得

治久咳嗽上氣心胃煩熱唾膿血

紫蘇子微炒龍角煨杏仁湯泡去皮尖雙仁炒

生薑汁一合 白蜜一甲 生地黄汁一合

右前三味都搗令熟入生薑汁地黃汁蜜相和以慢火熬成膏於不津器中密封之每服半匙許用溫粥飲調下一

日三四服

蘇子煎 治上氣咳嗽

紫蘇子 生薑汁 生地黄汁 白蜜

杏仁格一

右搗蘇子以地黃汁薑汁澆之以綸絞取汁更搗以汁澆之絞令味盡出去滓漿令杏仁微黃黑如脂又以汁澆之綸絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸七日三夜一一步無地黃汁

救急燥上氣咳嗽肺氣胃痛病源咳嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒則成咳嗽肺主氣氣有餘則喘咳上氣此為邪搏於

氣氣壅滯不得宣通是為有餘故咳嗽而上氣也其狀喘咳上氣及多涕唾面目浮腫則氣逆也

杏仁三升去皮尖又 白蜜升一大 牛酥二升

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升淨磨銅箔勿令脂膩先傾三升於鍋中刻本記其深淺又傾汁二升以緩火煎減至於所記處即內白蜜牛酥還至本記處藥乃成貯於不津磁器中每日三度以煖酒服一大匙不能飲酒

和粥服亦得服至一七日唾色變白二七日唾稀三七日咳斷此方非獨治咳兼補虛損去風冷悅肌膚白如皤婦人服之尤佳

百合湯 治肺氣壅滯咳嗽喘悶膈院不利氣否多渴腰膝浮腫小便淋瀝

百合 赤茯苓 陳皮湯浸 心水蘇莖葉

人參 大腹皮 猪苓去黑 桑根白皮

右龍搗每服四錢水一盞半入生薑一棗大同煎至八分去滓不拘時溫服

其散散 治咳嗽面自浮腫不得安卧涕唾稠粘

甜葶藶炒 郁李仁湯去 桑皮一升 紫苑去百

旋覆花 檳榔 木通半升 大腹皮三分

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

天門冬丸 治肺寒外內合邪咳嗽語聲不出口中如含霜壅傳飲寒痰咽喉妨悶狀如梅核噎塞不通膈氣噎氣皆可服之大効

天門冬去心 紫苑去土 百合 杏仁湯浸去皮

麥門冬去心 貝母去心 人參 半夏湯洗

桔梗炒 桂心去粗 阿膠炒 生乾地黄

橘皮湯浸 甘草炙已 右為細末煮糯米粉并黃蠟一兩成粥更入蜜再熬勻和

前藥未丸如櫻桃大每服一九同生薑細嚼下嗽時服咳嗽膿血者服之大効

通舌煎 治咳嗽氣促胸中滿悶語聲不出

杏仁去皮尖及雙仁炒 木通 五味子

人參 桂心去粗 細辛 款冬花

菖蒲 竹茹 酥三兩 白蜜

生薑汁格一棗肉 右前九味剉如麻豆大以水五升微火煎五七沸去滓內

酥蜜薑汁并棗肉再煎令稀稠得所每服一匙用溫酒一

小盞化下一方無酒入煎之

羊肺湯 治咳書夜無間息氣欲絕肺傷喘血

牡蠣 桂心 生薑六兩 鍾乳粉

白石英 半夏各五兩 五味子 百部根

貝母 橘皮 桃仁 射干 厚朴

厚朴 款冬花 甘草各二兩 羊肺四兩

右先以羊肺用水二斗三升煮至一斗去肺內諸

取三升分作四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉飴生葱

滋養散 治肺壅咳喘膿血喘嗽不得睡卧

甜葶藶 二兩 半兩 醋炒

右為細末每服二錢水一盞煎至六分不拘時溫服

治一切肺疾咳喘膿血不止

右用猪脰一具削薄竹筒盛於糖火中炮令極熱食上喫

之一方以苦酒煮食令盡不過二服

桑白皮煎 瘵咳經年不瘳氣喘欲絕傷肺見血

桑白皮 切五 麥門冬 去心 杏仁 去尖 欬冬花 已上各

茯苓 貝母 升麻 黃芩 已上各

芍藥 十分 白羊肺 切 蜜 一升 生地黃 汁 一升

右切以水一斗煮取三升去滓內杏仁脂地黃汁蜜等微

火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成靜綿夾布

濾過每食後含一合日夜三四度老小以意減之微含之

佳忌生冷油醋麪魚蒜蕪菜

蛤蚧湯 治咳吐血膿血及肺癆羸瘦涎沫稠粘

蛤蚧 酒浸 知母 貝母 鹿角膠 炙 令

枇杷葉 去毛 葛根 桑皮 炙 人參

甘草 炙 杏仁 去尖 炒 黃芩 一兩

右剉碎每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

栝萎湯 治咳嗽吐血喘滿肺癆

栝萎 一斤 取心 炙 馬兜零 炒 杏仁 湯浸去皮

防己 葛根 貝母 去心 甘草

阿膠 剉入 糯米 二合 同炒

右剉碎每服三錢水一盞入蜜半匙煎至七分去滓不拘

時溫服日三夜一

阿膠散 治肺破嗽血喘血

阿膠 剉 炙 白芨 各二 天門冬 去心 北五味子

生地黃 人參 茯苓 已上各

右除白芨別為細末餘藥剉散每服三錢水一大盞入蜜

二匙林米百粒生薑五片同煎臨熱入白芨末少許食後

溫服

杏仁膏 治咳嗽帶急喉中似有物唾血不止

杏仁 二兩 湯浸去皮尖 雙末 三兩 阿膠 二兩 湯浸

白蜜 五合 生薑 汁 一合 紫蘇子 研如膏

右件相和於銀鍋內以慢火熬成膏每服一匙不拘時以

溫粥飲調下日四五服

黃芪散 治咳嗽喘血

黃芪 標米 阿膠 等分

右為細末每服二錢不拘時用米湯調下

治一切肺病咳喘膿血及唾血不止

右用好醋二十斤三遍鍊俾取凝當取醍醐一合日三服

鑿正一切藥皆不出此神方

天門冬丸 治肺癆羸瘦咳喘痰稠粘

天門冬 剉 炙 百合 前胡 貝母 炙

半夏湯洗 桔梗 桑白皮 防己

紫苑 赤茯苓 杏仁湯洗 黃芩炒 石膏碎

生乾地黃三斤 右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十

元不拘時生薑湯送下日三服

前胡 桑白皮 貝母各一兩 麥門冬去心

杏仁半兩 煎法 甘草一分 右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓不拘時溫服

聖氣湯 治肺氣不利咳嗽聲重咽嗑乾燥痰唾稠粘不得眠

栗殼二兩 陳皮去白 桑皮炒 紫蘇葉

半夏薑洗 甜亭陸 五味子 人參一兩

杏仁去皮 桔梗 紫苑 甘草炙

右咬咀每服五錢用水一大盞生薑七片煎至六分去滓

後稍熱服

又方 調肺止咳順氣消痰如咳嗽不得息者服之便安

佛耳草 白茯苓去皮 款冬花 陳皮去白

知母 貝母 桔梗二兩 漢防己

猪牙皂角去皮 各一兩半

右為細末每服三錢水一大盞入黃蠟為梅各少許同煎

至五分去為梅和滓溫服

安眠散 治上喘咳嗽久而不愈者

款冬花 麥門冬去心 烏梅肉 佛耳草二兩

陳皮法酌 栗殼七錢 甘草半 打草三

右為細末每服三錢水一盞入黃蠟如棗核許同煎至八

分去滓臨睡溫服

秘方煙筒兒 治遠年近日一切咳嗽婦人胎前產後嗽皆治

佛耳草各二 艾葉三 款冬花

右為細末以蠟紙厚紙潤四寸長八寸長捲一眼裝藥在

內燒煙薰喉

款花散 治年深日近咳嗽肺虛寒熱

右用款冬花不以多少於密室中如香焚之煙起以筆管

吸其煙則熱之或於坐卧處如香焚之不吸亦妙重病數

日見効輕者便効一方因乾口燥用茶清送下

連年咳嗽人難治 休要胡醫枉使錢

細鴉款冬花作末 燒煙口吸奔猴咽

三奇散 治一切嗽不問新舊喘頻不止日夜無度

款冬花二兩 佛耳草五兩 熟地黃二兩

右焙乾碾為末每用二錢錢裝猛火於香爐中燒之用紙

作筒子一頭大一頭小如粽子樣安在爐上以口吸煙盡

為度即以茶清熱下有涎吐之經驗方陳氏云予家一僕

久苦此疾數令醫治如水澆石偶在曲江置得沅州一婢

新製此藥兩服而愈

大醫院經驗奇功良方大全卷三十

諸法論痰飲為病有因氣脈閉塞津液不通水飲停留結成痰者有胃氣虛弱不能運行水穀成痰者有因酒後飲水停滯於脾胃成痰者有風寒濕入脾相搏成痰者此證之始所感不同

脾之類也人之脾胃為倉廩以納穀因脾弱不能運行致氣血失於滋養故不周流氣道壅滯中焦不能腐熟遂其停滯或有喜怒哀樂之過情飲食起居之不節濕熱肉蘊風寒外搏皆為痰飲變則為寒為熱為喘為嘔吐為反胃為腫滿為眩暈為風痼為噎氣為吞酸為嘈雜為痞膈為疼痛為怔忡此皆痰之為病內經有云從脾胃濕土太過為積飲痞膈與飲發於中者數條未有痰之名也自張仲景分飲名曰痰飲懸飲溢飲支飲後人遂增留飲謂之五飲一曰懸飲者飲水流於脇下咳飲引痛二曰溢飲者飲流於四肢當汗不汗身體疼重三曰支飲者飲逆倚息短氣不得卧其形如腫四曰痰飲者其人素虛腸間漉漉有聲五曰留飲者背惡寒或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下滿引缺盆咳嗽轉甚龐安常云人身無倒上之痰天下無逆流之水誠哉斯言且如頭風眉棱角疼累以風藥不効後以痰藥收功如患眼赤蓋明而痛與之涼藥勿膠用之痰劑獲愈凡此證以脈理推之至朱丹溪各分其因以施吐利燥潤溫散升降消導動達開軟提補之方法而治之最得其當劉張又論痰飲其文詳一也東垣云脾土上應於天亦屬濕化所以水穀津液不行即停聚而為痰飲也是以五痰之分言其濕熱相乘如濕在心經為之熱痰結而如膠其色紅濕在肝經為之風痰其色青如沫濕在脾經為之濕痰濕久而熱其色黃濕在肺經為之氣痰其色白咯出如米粒濕在腎經為之寒痰其

色黑如唾由此言之歲氣陰邪乘於脾胃津液不布積為痰飲也亦必從其所乘之氣無化而為五痰也且如人之氣道貴乎順也則津液流通快無痰飲之患診其脈偏弦為飲浮而滑亦為痰治法或下或汗或溫或利莫若順氣為先分導次之氣順流通痰飲自下臨病診視在乎詳審

痰飲通治方

橘皮湯 治胸膈停痰

橘皮 茯苓

青皮 枳殼

人參 已紅各甘草一各

右作一服用水二鍾生姜五片煎至一鍾食遠服

前胡半夏湯 治痰盛

前胡 半夏 枳殼 茯苓 已紅各 陳皮

木香 紫蘇 枳殼 甘草 已紅各

右作一服用水二鍾生姜三片烏梅一箇煎一鍾食遠服

蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

方見氣門

人參飲 治痰嗽

方見咳嗽門

俞山人降氣湯 治上盛下虛痰涎壅盛或喘或滿咽乾不利

并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡 去蘆 黃芪 厚朴 薑製 五加皮 薑製

當歸 去蘆 桔梗 羌活 半夏 麩

人參 去蘆 陳皮 已紅各 乾薑 附子 已紅去

官桂 已紅各 紫蘇子 一各

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

痰丸 治頑痰壅盛

南星 三升 半夏 二升 天南星 一升 白礬 三升 五靈脂 一升 白礬 三升

白附子 五靈脂 礬炭 白礬

細辛 一升 全蝎 半升

右為細末用皂角研碎投水熬麩糊和丸如梧桐子大每服三十九食後用生薑湯送下

辰砂化痰丸 治風痰安神定志利咽膈清頭目

辰砂 一升 白礬 半升 天南星 一升 半夏 三升

右為細末生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大用辰砂為衣每服三十九食後生薑湯送下

桔梗湯 治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎沫

桔梗 一升 半夏 一升 陳皮 三升 枳實 一升

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

一陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或因食生冷或飲食過度脾胃不和並皆治之

方見脾胃門

四七湯 治七情之氣鬱聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出噎不下并治中脘痞痛痰涎壅盛上氣喘急

方見氣門

參蘇飲 治痰飲停積胸膈咳嗽氣促言語不能相續者

方見傷寒門

導痰湯 治一切痰涎壅盛胃膈留飲吞塞不通

半夏 湯泡 天南星 枳實 赤茯苓 去皮

橘紅 二升 甘草 一升

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾食後服

大人參半夏丸 墜化痰涎止咳定喘治諸痰不可盡述

人參 去蘆 茯苓 去皮 天南星 薄荷葉 一升

白礬 生用 乾生薑 寒水石 半夏 一升

右為細末麩糊和丸如粟豆大每服五十九食後用生薑湯送下白湯亦可一方加黃連半兩黃柏二兩取効愈妙

又治酒病調和臟腑尤宜服之

海藏五飲湯 一留飲心下二潏飲脇下三痰飲胃中四溢飲

隔上五流飲腸間凡此五飲酒後飲冷過多故有此疾

旋覆花 去梗 人參 去蘆 陳皮 去白 枳實 一升

茯苓 去皮 白朮 厚朴 薑製 半夏 湯泡

猪苓 澤瀉 前胡 桂心

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服或因

飲酒多加乾葛砂仁

丁香 木香 不見 陳皮 去白 青皮 一升

白朮 乾薑 炮 茯苓 去皮 良薑 一升

右為細末用神麩一兩大麥蘖二兩同研取麩煮糊和丸

如梧桐子大每服二十九不拘時用熱水送下此藥常服

溫脾順氣

半夏利膈丸 治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利津唾稠粘并

治酒過停飲嘔逆惡心胸脇引痛腹內有聲

半夏 湯洗 白附子 二升 白茯苓 去皮 白礬 生用

人參 去蘆 白朮 滑石 貝母 一升

天南星一用半

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服三十九食後用生薑湯送下

茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於脾胃之間常先實於脾胃

茯苓 白朮 半夏 炒麩七上各

大麥蘖半 陳皮 天麻各三

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

范胡半夏湯 治風謔不敢見風眼澁頭痛有痰眼黑惡心兀欲吐風來竟皮肉緊手足重難舉唇暖處有微汗便感

如見風即復作一名補肝湯

范胡 蒼朮各半 半夏二 白茯苓二 炒麩七 黃本各一 升麻半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

半夏白朮天麻湯 治頭目眩暈惡心煩悶氣短促上喘無力心神顛倒兀兀欲吐目不敢開如在風雲中痰厥頭痛如裂身重如山脾胃虛損痺痿並皆治之

方見眩暈門

黑錫丹 治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭下虛之證及治婦人血海久冷無子赤白帶下

方見頭痛門

破痰消飲丸 治一切停痰留飲

陳皮去白 川薑炮 京三棱炮 草菓炮 良薑炮 蓬朮炮 青皮七 半夏湯 右為細末水煎麩糊和丸如梧桐子大陰乾每服五十九食遠用生薑湯送下

控涎丹 治痰飲停積胸膈或結為塊喘滿不安痛連胸脇走注不定決不可誤作風痛癱瘓等證治之

并遠去心 紫大戟去皮 白芥子真者各

右為細末水煎麩糊和丸如梧桐子大曬乾每服三十九臨睡用淡生薑湯或熱水送下以下痰飲為愈

化痰鐵刷丸 治男子婦人風痰酒痰茶痰食痰氣痰一切痰逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如拽鋸並皆治之

白附子炮 南星炮 半夏洗 白礬生用已上

寒水石煨 乾生薑七 硃砂研 輕粉各一

皂角去子 右為細末水煎麩糊和丸如梧桐子大每服二三十丸食後用淡生薑湯送下此藥墜痰止咳定喘

沉香墜痰丸 治宿飲不消咽膈不利咳嗽痰涎頭目昏暈嘔逆惡心胸膈不快

沉香各二 半夏炮 青皮去白

右為細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大每服二十九不拘時用生薑湯送下

快活丸 常服消食化痰養生之家不可缺

枳殼半 官桂一 半夏湯 桔梗各二

右為細末用生薑汁煎麩糊和丸如梧桐子大每服二十丸不拘時用生薑湯送下日進一二服

茯苓丸 一名指迷茯苓丸 本治臂痛具指迷方中云有人臂痛不能舉手足或左右時復轉移由伏痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脈沉細者是也後人為此臂痛乃痰證也但治痰而

臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此而愈

半夏二刀

茯苓一刀

枳殼炒一兩

風化朴硝一分

右為細末生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服三十九

生薑湯送下風化朴硝一時未易成但以朴硝撒在竹盤

中少時盛水置當風處即乾如芒硝刮取用亦可

累有人為痰所苦夜間兩臂常覺有如人抽牽兩手戰掉

至於茶盞亦不能舉隨服隨愈痰藥方多立見功效者者

有如此神效

人之氣脈常欲周流以衛護榮養其身也凡一日一夜呼

吸出入計一萬三千五百息血行於身八百一十丈管周

不息五十而復大會如環無端焉是以習禪者跌坐究意

觀想李仙者吐納引導暗摩其知道者不為血氣所使反

所以運其血氣也其或喜怒哀樂不中節起居飲食失其

常皆令榮衛否阻氣血敗濁為痰為涎為飲諸證生焉結

伏於胸膈則脈運嘈忪忡悸癢閉塞喘急停滯於

關節則筋脈挛急肢節疼痛手足痺曳寒熱往來三者同

源而具治痰則伏於包絡隨氣上滯客於肺經因嗽而發

涎則伏於脾源隨氣上溢口角流出唯飲則生胃腑為嘔

為吐宜詳辨別也

神仙墜痰丸

治痰飲胸膈痞塞此藥下痰

皂角

無色者刮去皮張煎炙

白礬一斤二

黑牽牛一斤取頭

右為細末滴水如梧桐子大每服三十九漸加至百

丸空心用溫酒送下看病輕重者五日十日愈重者半

月一月愈久服永無癱瘓之疾

搜飲丸

治證同前

右用木瓜一箇切下頂作罐兒去穢用生白礬半夏麩等

分為細末填在木瓜內却用原頂蓋定用麻縷扎縛於飯

甑上炊兩次爛研以宿蒸餅和丸如梧桐子大每服三五

十丸不拘時用生薑湯送下

二賢湯 治痰

摘皮用真洞陳者溫水一斤甘草四刀 鹽四刀

右用水五掬慢火煮焙乾搗為細末白礬煎

一方用橘紅四兩甘草一兩為細末湯點服治痰

驗世醫但知用半夏南星枳實茯苓之類何足語此

史均外舅莫強中服之腹痛利下物數塊如鐵彈子臭不

可聞胸滿之疾豁然頓愈

半星丸 治痰

右用半夏南星各四兩生薑半斤共搗作餅以楮葉包縛

却於草中如蒸麩法候乾入去皮香附子四兩同為細末

以生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服四十九食後用生

薑湯送下

烏巴丸 治胸膈間久年頑痰為害積成痰氣面目青白色無

時浮腫全不進食遍身疼痛夜間上壅不得睡臥寒熱往

來手足疼痛不能轉側用南星半夏黑錫靈砂不計服數

墜之則不下則之則不出此是痰母堅滯宜服此藥須更

利下頑痰如魚噎如未利再服失然洞利可除終身之疾

大烏梅取肉巴豆五枚去

右用水二掬於瓦石器內將烏梅慢火煮爛候水稍乾入

巴豆在內將竹筒撻乾直候如乾糊方住火攤冷研爛就

丸如棗豆大每服七九九九十五九二十一丸不拘時用

生薑湯送下

<p>醉鄉寶膏 寬中化痰止嘔解酒醱後雅宜隨意服之</p> <p>陳皮 縮砂各四 紅豆六切 甘草四各二</p> <p>生薑一斤 丁香一各 檳榔一各 白芷蔻仁半</p> <p>右為糲末每用少許細嚼嚥下</p>	<p>治懸飲心腹氣滯兩脇多疼</p> <p>半夏二切 皂角六切 三切去黑皮 蘇合令黃 爲末</p> <p>去滓煎成膏將半夏末以膏和作餅以酒一升後取汁</p> <p>青蒿蓋出青衣如造物法強羅爲細末旋覆花一各</p> <p>木香 檳榔各二</p> <p>右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九食前</p> <p>用生薑湯送下</p>	<p>破飲丸 治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩脇脹滿氣促胸</p> <p>膈結為癥癖支滿胸脇傍及兩脇搶心疼痛飲食不下及</p> <p>胃吐逆九種心疾積年宿食不消久瘕久疝疝疔疔疔疔</p> <p>癩厥運心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉能治之及</p> <p>服尤妙且不傷臟氣</p> <p>葶撥 丁香不見 縮砂仁 蝎梢</p> <p>胡椒 木香不見 烏梅肉 青皮</p> <p>巴豆各半切</p> <p>右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日漉出同炒青皮焦</p> <p>去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久細研爲膏入藥末和勻丸</p> <p>如菴豆大每服五七丸臨睡生薑湯送下</p>	<p>九寶丸 治留飲宿食腹脹胸滿吞酸嘔逆</p> <p>桂心三分 木香 肉苳蔻 厚朴去粗皮</p> <p>丹砂 麝香半各 乳香一各 檳榔二各</p> <p>半夏一各 兩半生薑汁</p> <p>右為細末和勻生薑汁和丸如菴豆大每服七丸食後用</p>
--	---	--	--

<p>橘皮煎湯送下</p> <p>溫胃散 治留飲順氣消宿食</p> <p>生薑半斤洗切燥乾用鹽二兩燒一宿 陳橘皮白湯去</p> <p>半夏同法作餅以生薑汁 草薺蔻仁大者三枚不去</p> <p>丁香一分 甘草二</p> <p>右為細末每服二錢如茶點服覺脾胃寒加附子半兩炮</p> <p>去皮臍半夏一兩湯泡去滑切片焙</p>	<p>枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃可思飲食</p> <p>青皮去白 草薺蔻仁半前胡 枇杷葉去毛</p> <p>半夏湯泡 茯苓去皮 人參 大腹皮</p> <p>白木 厚朴去粗皮薑汁炙</p> <p>右吹咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不</p> <p>拘時熱服</p>	<p>檳榔散 治胸中痰逆嘔逆不納飲食四肢乏力腹鳴</p> <p>檳榔 桂心各三 杏仁一分湯浸去尖</p> <p>半夏湯泡 赤茯苓 陳皮去白 人參一各</p> <p>白木 二各</p> <p>右吹咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不</p> <p>拘時溫服</p>	<p>御愛紫宸湯 解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食</p> <p>木香半切 砂仁 葛花 檀香</p> <p>茯苓 官桂 藿香一各 陳皮</p> <p>乾薑 良薑 丁香 并草各二各</p> <p>右吹咀每服四錢水一盞煎至八分去滓不拘時服</p>	<p>驅痰飲子 治痰飲如人頭痛背疼飲食嘔惡皆痰飲之證</p> <p>天南星湯洗切片 半夏湯洗切片 青皮去白</p>
--	--	---	--	---

陳皮 <small>去白各</small> 赤茯苓 草薢仁 甘草 <small>半兩</small>	右咬咀每服四錢水一盞生薑七片紅棗一枚煎至七分去滓不拘時通口服如遇飲酒先進一服後再一服或以日夜醒又一服永無痰飲	八珍丸 治膈痰結實胸膈不利常救嘔逆	丹砂 <small>兩半</small> 犀角 <small>兩</small> 羚羊角 <small>兩</small> 茯神 <small>去木</small>	牛黃 <small>研</small> 龍腦 <small>各一分</small> 牛膽南星 鵬砂 <small>各一分</small>	右為細末研勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九食後嚼細用人參荊芥湯送下	銀粉丸 治膈痰結實胸膈閉塞	鉛白霜 白礬 <small>各一分</small> 水銀 鉛 <small>結水銀</small>	粉霜 <small>兩</small> 天南星 <small>兩</small> 半夏 <small>湯泡</small> 丹砂 <small>一兩</small>	右各研為細末和勻麩糊和丸如梧桐子大每服三九食後用薄荷送下小兒丸如麻子大	鵝梨煎丸 治熱痰涼心肺利胸膈解熱毒補元氣	大鵝梨 <small>用二十枚去皮核</small> 皂角 <small>不蛀者十枚去黑皮子</small>	薄荷 <small>研汁</small> 蜜 <small>半斤</small> 生地黃 <small>半斤研取汁同上</small>	人參 白茯苓 <small>去皮</small> 白茯苓 <small>刺去</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸</small>	牛膝 <small>酒浸</small> 半夏 <small>湯泡</small> 木香 <small>兩</small> 檳榔 <small>兩</small>	防風 <small>去叉</small> 青橘皮 <small>香</small> 桔梗 <small>炒</small> 羌活	白木 山芋 <small>已上各</small> 甘草 <small>兩半</small>	右除前五味熬膏餘藥搗為細末同前膏拌和杵令得所丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九食後用荊芥湯送下日二服	麝香丹砂丸 治痰熱咽膈不利頭目昏痛	麝香 <small>一分</small> 丹砂 <small>一兩</small> 龍腦 <small>一分</small> 麥門冬 <small>三兩</small>
--	--	-------------------	--	--	---------------------------------	---------------	---	--	-------------------------------------	----------------------	--	---	--	---	--	---	---	-------------------	--

木香 丁香 犀角 甘草 <small>各一分</small>	人參 藿香 <small>去梗</small> 天南星 <small>牛膽</small> 防風 <small>去叉</small>	黃芪 <small>半兩</small>	右為細末煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九食後嚼破用荊芥湯送下	旋覆花散 治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下	旋覆花 甘草 <small>半兩</small> 枳殼 <small>去核</small> 石膏 <small>細研</small>	赤茯苓 麥門冬 <small>去心</small> 羌胡 <small>去苗</small> 人參 <small>一兩</small>	犀角 <small>研</small> 防風 <small>去叉</small> 黃芩 <small>三分</small>	右咬咀每服五錢一大盞生薑半分煎至五分去滓食後良久溫服	化涎散 治熱痰利胸膈止煩渴	凝水石 <small>研</small> 鉛白霜 <small>研</small> 馬牙硝 <small>研</small> 雄黃 <small>各一分</small>	白礬 <small>研</small> 甘草 <small>各一分</small> 龍腦 <small>一分</small>	右為細末研勻每服一錢不拘時水調下小兒風熱痰涎用砂糖水調下半錢此藥大涼不可多服	金珠化痰丸 治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸膈煩悶涕唾稠粘咳嗽咽嗝不利	皂角子 <small>仁炒</small> 天竺黃 <small>另研</small> 半夏 <small>湯泡</small> 羌活 <small>七次</small> 生薑 <small>二兩</small>	白礬 <small>已上各四兩</small> 龍腦 <small>半兩</small> 辰砂 <small>二兩</small>	右將皂角仁半夏為末與諸藥研勻生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十片為衣每服十五丸加至二十五丸食後用生薑湯送下	法製紅半夏 治風熱止咳救清頭目利咽膈消痰降氣	飛珠砂研末於半夏為衣先鋪長燈草一重約厚一指
--------------------------------	--	----------------------	-----------------------------	--------------------	--	---	---	----------------------------	---------------	--	--	--	-------------------------------------	--	---	---	------------------------	-----------------------

一第... 冊... 頁...

豨薟半夏在燈草上再以燈草蓋約厚一指以焚五培之
候乾取出於器內收貯每服一二粒細嚼食後用溫水或
冷水送下

高良薑散 治胸膈痰飲冷氣口中清水自出脇急服滿不欲
飲食此由胃氣虛冷

高良薑 赤茯苓 半夏湯泡 橘皮湯浸
桂心三分各 訶梨勒一用 椒厚朴各二兩
細辛三分 人參 桔梗兩半 甘草一分

右以咀每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分
去滓不拘時服

丁香茯苓湯 治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐痰沫或有酸
水不思飲食

丁香 茯苓去皮 木香二兩各 乾薑炮半
附子炮去 半夏湯泡 內桂去 陳皮各一兩

右以咀每服四錢水二盞生薑柴片棗一枚煎至七分去
滓不拘時服一方無肉桂

奇效湯 治冷痰壅盛胸膈不利胃寒脾氣弱嘔吐痰涎

木香半兩 附子炮去 半夏湯泡 各二兩

右以咀每服三錢水一盞半生薑半分紅棗二枚煎至一
盞去滓空心服

二生湯 治胃冷有痰

附子炮去 半夏湯泡 各一兩
右以咀每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓空心
溫服加水香少許煎無佳一方去半夏用南星名南附湯

省風湯 治痰厥

半夏八兩 防風四兩 甘草二兩

右為細末每服三錢水一大盞生薑二十片煎至七分去
滓不拘時服一方用南星代半夏

水五湯 治肩痠背痛不可忍若此痰厥也

半夏不拘時服 水五湯
右每服三錢水一盞半生薑十片煎至八分去滓食後溫
服

奇效良方卷之三十一終

奇効良方卷之三十二

喘門 附論

諸喘為熱夫火熱為陽主乎急數而火動於上喘急乃作若夏熱甚則息數氣發喘之屬熱無疑矣經云諸逆衝上皆屬相火者此也蓋肺主氣為陽止氣流行通榮臟腑故肺為五臟之華蓋喜清虛不欲窒礙若陰氣在下陽氣在上與氣之有餘者則發咳嘔而喘急也聖濟方云呼隨陽出氣於是升吸隨陰入氣於下降一升一降陰陽乃和苟有乖和則氣上不行升而不降不蒙膈中氣道奔迫喘息有聲也又風寒暑濕邪氣相干肺脹滿而喘者或喜歎之氣傷於五氣鬱而生痰作喘者或脾胃俱虛由體弱不能攝養一身之痰而喘者或脾濕腫滿水氣乘肺而喘者或本臟虛風和所干於肺葉氣壅遏而上衝者豈可一槩而論之內經靈樞篇所論諸喘而各不同所感各異若言喘喝與言喘息言喘迫言喘致言喘喘言上氣者雖名不同而病之皆出於肺內經又云則喘者水氣之容經脈篇云夜行則喘出於腎溢氣病肺有所隨恐喘出於肝溢氣害脾有所故恐喘出於肺溢氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨痺論篇云肺痺者中氣喘爭火奇篇云肺之喘而刃腫滿至真大要篇論太陰司天為客勝則首面腫呼吸喘氣陽明篇云謂邪入六腑身熱喘呼不得卧也此各藏所感之異乎仲景云髮汗如油汗出如珠不流喘而不休者此為不治其脈滑而手足溫者生脈滑四肢厥者死而又婦人喘急為病尤亟因產後所下過多榮氣暴竭衛氣天依獨聚於肺故發喘也此名孤陽絕陰為難治上法外感者以祛散之氣之內鬱者以調順為先腎虛者宜以溫補痰盛者當以疎導有陰血虛少而上喘者宜以滋陰養津之劑所論前證臨期用藥在手消息治之無不愈矣

喘急通治方

人參定喘湯 治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸膈緊痛及

治肺感寒邪咳嗽聲重

人參 去芦

麻黃 去節

阿膠 炒粉

半夏 麴

五味子

罌粟殼 去蒂 甘草 已上各桑白皮 二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

團參散 治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參

紫苑 茸 各三錢 欬冬 花 二錢

右作一服用水二鍾烏梅一枚煎至一鍾食遠服

蘇子降氣湯 治虛陽上攻喘促咳嗽

方見氣門

分氣紫蘇飲 治脾胃不和氣逆喘促

方見氣門

杏參散 治墜墮致恐或度水跌仆痰極喘息

杏仁 炒去尖

人參 去芦

橘紅

大腹皮

檳榔

白木

訶子 炒用

半夏 湯泡

桂心 炒不見

紫苑 洗

桑白皮

甘草 炙各

右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇七葉煎至一鍾去滓

不拘時服

四磨湯 治七情鬱結三氣喘急

沉香

檳榔

人參

天台烏藥

右各濃磨水共取七分盞煎三五沸不拘時服

紫蘇子湯 治憂思過度和傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴

紫蘇子

有聲大小便不利脈虛緊而瀉

氣走瀉

紫蘇子

木通

大腹皮

木香 炒

陳皮

人參

草薺仁

木香 炒

陳皮

人參

草薺仁

木香 炒

陳皮

人參

草薺仁

<p>枳實 麥炒 白朮 厚朴 姜製 甘草 炙已上</p> <p>右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾去滓不拘時服</p>	<p>五味子湯 治喘促脈伏而數者</p> <p>五味子 二升 人参 去芦 麥門冬 去心 杏仁 去皮</p> <p>橘皮 去白已上</p> <p>右作一服用水二鍾生薑三片紅棗三枚煎至一鍾去滓不拘時服</p>	<p>人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已及治傷寒頭疼瘧寒壯熱四肢疼痛</p> <p>方見咳嗽門</p>	<p>杏仁半夏湯 治肺痿涎帶不定咳嗽不已甚者寒熱往來</p> <p>杏仁 去皮 半夏 桔梗 陳皮 去白</p> <p>茯苓 去皮 漢防己 各半 薄荷 半分 猪牙皂角 二升</p> <p>白礬 甘草 各一</p> <p>右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服</p>	<p>華蓋散 治過食煎炒或飲食過度致肺壅喘不得卧及肺癰咽燥不渴唾腥臭</p> <p>甜葶藶 秋 桔梗 去芦 瓜蒌仁 川升麻</p> <p>葱豉仁 桑白皮 炙 葶根 已上各 甘草 炙</p> <p>右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服</p>	<p>華蓋散 治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不得睡卧或聲音不出者</p> <p>方見咳嗽門</p>	<p>華蓋散 治肺氣喘滿痰嗽睡卧不寧不思飲食</p> <p>方見咳嗽門</p>
--	--	---	--	--	---	---

<p>肺湯 治上氣喘嗽</p> <p>紫苑 橘紅 去白 杏仁 去皮 五味子</p> <p>枳殼 麥炒 半夏 姜製 桑白皮 炒 紫蘇子 炒</p> <p>右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇五葉煎至一鍾食後服</p>	<p>杏蘇飲 治上氣喘嗽得腫</p> <p>杏仁 去皮 炙 烏梅 去核 紫蘇葉 二升 五味子</p> <p>大腹皮 烏梅 去核 紫苑 甘草 炙已上</p> <p>陳皮 去白 麻黃 去節 桑皮 炙 阿膠 炒</p> <p>桔梗 已上 七分</p> <p>右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服</p>	<p>五華散 治咳嗽上喘調順肺經清利咽喉安和神氣</p> <p>甜葶藶 桑白皮 炙 半夏 姜製 貝母 炮</p> <p>天門冬 去心 馬兜零 杏仁 去皮 紫苑 洗</p> <p>合蒸 人参 已上 各 百部 甘草 炙 各七</p> <p>右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食後服</p>	<p>人參理肺散 治喘不止</p> <p>人參 杏仁 炙 炒 粟殼 各二升 麻黃 去節 炒</p> <p>木香 當歸 已上 各</p> <p>右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服</p>	<p>麻黃散 治傷風喘急坐卧不安痰涎壅盛涕唾稠粘手足冷</p> <p>麻黃 去節 欬冬花 三升 肉桂 四分 杏仁 去皮 炙 炒</p> <p>訶子肉 二升 甘草 炙 一</p>
---	---	---	--	--

右作二貼每貼用水二盞好茶一錢食前煎服
九寶湯 治經年喘嗽通用

麻黃 去節 陳皮 肉桂 紫蘇

桑皮 杏仁 去皮 大腹皮 薄荷

甘草 各一分

右作二貼每貼用水二盞生薑五片烏梅一箇食遠煎服

神秘湯 治上氣喘急不得卧者

陳皮 桔梗 紫蘇 五味子

人參 各三

右作二貼每貼用水二鐘煎至一鐘食遠服卧則喘者水

氣逆上乘於肺也一方無桔梗五味有桑白皮木香茯苓

生薑煎服

安神散 治遠年近日喘嗽不已

粟殼 實炒 人參 陳皮 各三 甘草 各一分

右為細末每服一二錢食後烏梅湯調服

加味控涎丸 治風熱上攻壅盛中脘停痰留飲喘急四肢浮

腫脚氣入腹及腹中諸氣結聚服之得利即効

大戟 芫花 各一分 坤蓬 苦葶藶 各三分

巴豆 去油 牽牛頭末 各一分

右為細末滴水和丸如粟米大每服三九茶清下湯亦可

千縉湯 治痰喘

半夏 七片 加作四片 皂角 去皮 各一寸

甘草 節一寸

右作一服用水二盞生薑如指大一塊煎至半盞去滓頓

服數貼瘥

陳皮湯 治痰喘

陳皮湯 浸去明礬二兩半內飛揚 甘草 二分
大半夏 五片 湯煮每箇切四片用明礬湯
右為細末每服二錢不拘時用米湯調下

清氣散 專治喘急 五味子 桑白皮 紫蘇

栗殼 去節 欬冬花 枳殼 陳皮 各等

青皮 甘草 各半

右用慢火炒焦色急傾水中煎服加半夏生薑煎尤妙

五味子湯 治肺癰

五味子 紫蘇 麻黃 細辛

赤茯苓 紫苑 黃芩 陳皮

桑白皮 官桂 葶藶 半夏

甘草 各半

右吹咀每服五錢水二盞生薑半分煎至一盞食後服

消腫散 治肺癰有膿腥氣上衝喉而咳嗽

兩星 半夏 知母 生地黃

川芎 防風 貝母 桑白皮

阿膠 射干 桔梗 天門冬

薄荷 杏仁 去皮 紫蘇 白芷

烏梅 白芩 各等 甘草 減半

右吹咀每服一兩水二盞生薑五片煎一盞食後服

五味子散 治肺虛寒喘下氣去痰飲務觀即中姊忽發喘

嗽服諸藥皆不効得此三服遂愈

五味子 官桂 各一分 茯苓 已上各 陳皮 三分

乾姜 炮 甘草 各半

右吹咀每服五錢水一大盞煎至六分食遠熱服

神秘方 治喘

右以猪爪甲二枚燒灰研細入麝香當門子一枚同研細

用臘茶清調下

皺肺丸 治喘

欵冬花

知母

秦花

百部 去心

紫苑茸

貝母

阿膠

糯米 炒已上

杏仁 去皮尖別

右為末將羊肺一介先以水灌洗看容得水多少即以許

水更添些莫杏仁令沸瀝過灌入肺中繫定以糯米泔煮

熟研細成膏攪和前藥末杵數千下如梧桐子大每服

五十丸食前用桑白皮煎湯送下

定喘化痰方

右用猪蹄甲四十元介淨洗控乾每個指甲內半夏白紫

各一字入罐子內封閉勿令烟出火煨赤去火細研入麝

香一糸人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒服半糸

平氣散 治盛則為喘已未歲初秋三日奉召至六盤山至八

月中霖雨時承

上命治不濟吉吳元帥夫人年踰五十身體肥盛因過飲酒及

澶乳腹脹喘滿声文合外不得安卧大小便澀滯氣口厥

大刃倍於人迎關脉沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之

熱濕熱太盛上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實

則宜下之故制平氣散以下

白牽牛 半生半炒 大黃 七糸 陳皮 半片

青皮 去白 檳榔 三糸

內經云肺苦氣上逆急食苦以瀉之故曰牽牛苦寒瀉氣

分濕熱上攻為喘故以為君陳皮苦溫體輕浮理其肺氣

青皮苦辛散肺中滯氣為臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣
大黃苦寒瀉滯滿實故以為使右于細末每服三糸煎生
薑湯一大盞調下無時一服減半再服喘愈止有胸膈不
利煩熱口乾時上咳嗽以加減瀉白散主之

加減瀉白散

青皮 去白

桑白皮 一刃 知母

地骨皮

陳皮

桔梗 半刃 甘草 三糸

右劉如麻豆六每服半刃水二盞煎至一盞去滓食後溫

服數服良愈

華陀云盛為喘喘減則為枯活人云發喘者氣有餘也凡

看文字須要會得本意盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣

有餘者亦非肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作

不足肺氣果盛又為有餘當清肅下行而不喘以其火入

於肺衰與不足而為喘也故言盛非言肺氣盛也言肺中

之火盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中火有餘也

故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺中之火也補肺氣用者不可

不知也

潤降湯 治喘嗽

枳殼 一刃

半夏 製

桔梗

青皮

陳皮

紫蘇子

檳榔

茯苓

葶藶 上細末

細砂仁

白芷 薤仁

紫蘇葉 二糸

甘草 三

分

右劉散每服三糸生薑五片水一盞煎至七分不拘時服

八仙丸 治喘嗽神効

天南星 一刃 半夏 洗

欵冬花

小皂角 煨去

白礬 搗

甘草 三

杏仁 三十五

去

聚三箇去核果已 右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服二三十丸食後用溫薑茶汁送下或細嚼蘿蔔栗子生薑湯下

沉香 定喘止咳

沉香 阿膠各 人參 紫蘇 陳皮半 桑白皮各 甘草分

右為細末每服三杯水一大盞生姜三片煎至七分去滓通口服元方只以棗湯調下

白雲換肺丸 治遠年近日喘嗽不止

款冬花一 寒水石 半夏 明礬各

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服三四十丸不拘時用生薑湯送下

治遠年近日喘嗽方

治遠年近日喘嗽方

右用皂角不姓者三大莖刮去黑皮刀切開去子每子倉內入巴豆肉一粒合就以麻皮縛定用生薑自然汁和蜜塗令周匝慢火炙之又塗又炙以焦黃為度劈開去巴豆不用又以好明礬一兩枯過葶麻子七粒生姜汁和蜜再塗炙前皂角三味同為末却以杏仁二兩去皮尖研成膏却與前藥和勻每服一水用柘子乾炙過候冷點入藥內

細嚼臨睡服忌熱毒魚鮓鮓油麪酒米醋煎燻熱物

定喘丹 治男子婦人久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡卧艱

豁久嗽亦宜服之累年不瘥漸致面目浮腫者神效

杏仁去皮 馬兜零 蟬蛻洗去土 各一

右為細末蒸棗肉為丸如蔡子大每服六七丸臨睡用葱茶清放冷送下忌熱物半日一名定喘瑞應丹

右為細末蒸棗肉為丸如蔡子大每服六七丸臨睡用葱茶清放冷送下忌熱物半日一名定喘瑞應丹

人參方 治咳嗽上氣喘急救血吐血者宜服

右用揀去穢為末每服三水用鷄子清調之五更初服既睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌腥膩醬麪等并勿過醉飽悻息

百花膏 治喘嗽不已痰中有血

百合蒸 款冬花各

右為細末煉蜜和丸如龍眼大每服一丸食後細嚼生薑湯送下噙化尤佳

七七散 治喘嗽

右用長皂莢三條去黑皮破開兩邊去子一莢入巴豆十粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十粒用生薑汁製杏仁麻油製巴豆蜜製半夏各製三樣皂莢畢

又將皂莢火炙黃色為細末每服一字安在手掌中臨睡用生薑汁調古紙喫神效

內金丸 治喘嗽

鷄內金二十 信石二 黃丹半

內金丸 治喘嗽

右各研細露星七宿再入白牽牛末半兩葶麻末半兩半夏末二水半共研勻用蒸棗肉為丸如麻子大露星二宿以硃砂末為衣每服七丸臨睡用冷茶清送下

紫金丹 治喘嗽

信石半 淡豉一 水調去

右共研和丸如粟豆大每服七丸或十九丸臨睡用冷茶清送下只一服二服後不可喫一應物湯水之類今以信入

分豉一兩每服二十九丸一法二件成膏搽枕內文薰入生

珠末丸有一親戚婦人患此年逾求醫皆不効忽有一道人貨此藥護贖一服是夜減半數服頓愈遂多金巧乃

此方予屢用以救人特為神異

鯽魚丸 治肺經久受寒邪喘急初發則寒從背起冷如冰霜

漸漸喘促氣不相續痰涎壅塞咯吐不出坐卧不得莫可

支吾兩者聳豎曲背弩目困憊欲死宜服或未効再服即

愈其効如神

右用鯽魚重一斤者不去鱗腸只於肚下近頭處開一空

入信石一錢今深入在內却以魚入竹筒內外以青蒿搗

泥固際候乾火煨竹筒通紅候冷去泥取魚去燒不過者

研細入蛤粉三錢研和得所丸如菽豆大珠砂為衣每服

三五丸臨睡用冷沙糖水送下忌熱物一方正喘急時宜

服不可多過丸數欲試此藥用猪肺一枚吹脹入此藥數

丸於肺院內頃刻漸萎方表其功

奇効良方卷之三十二終

奇効良方卷之三十三

消渴門 附論

內經陰陽別論曰二陽結為之消厥要攢微論曰痺成為消中

調逆論曰心移熱於肺傳為膈消也凡治消痺偏枯痿厥氣滿

皆飲食青梁之病也岐伯曰脈實病久可治脈弦細小病久不

可治後分為三消膈消者舌上赤裂大渴引飲脈經云堅數相

搏則為消渴脈軟散者常病消渴病機云消渴之疾三焦受病

也上消者肺也多飲水而少食大便如常小便清利知其燥在

上焦也治以流濕潤燥消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱

能消穀知熱在其中胃也臣下之消者者初發而為膏淋謂淋

下如膏油之狀至病成而色焦黑形瘦而耳焦小便濁而有脂

候治法宜養血以分其清濁而自愈也是以河間三消之論

始言天地六氣五味以配養人身六位五藏而究乎萬病之源

然引內經論渴諸證以辨乎或熱藥之誤此證反復要在詳明

非深探陰陽造化之機者孰能知之詩陳其畧經云有言心肺

氣厥而渴者有言肝脾而渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而

渴者有言胃與大腸熱結而渴者有言脾痺而渴者有言小腸

痺熱而渴者有言因病癢而渴者有言因肥甘石藥而渴者有言因醉

飽後入房而渴者有言因行勞倦大熱而渴者有言因傷胃乾而渴

者有言因風而渴者有言五臟部分所感不同之病皆因燥熱云

液一也三消之疾本濕寒相搏陰氣極衰燥熱陽氣太甚亦皆

飲食服餌失宜腸胃乾涸而氣液不可宣平或耗亂精神過遠

其度或因大病陰氣損而液衰極陽氣悍而燥熱亦甚或因久

嗜鹹物恣食炙博飲酒過度亦有下火服金石丸散久積金石

之毒熱結於胸中下焦虛熱蒸其因而骨水不能制金石熱燥

甚於腎故渴而引秋若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食

多而不甚渴小便數而消瘦者名曰消中若渴而飲水不絕肌
 消瘦而小便有脂膏者名曰消渴此三消者其燥熱同也治此
 疾者補腎水除寒之盛而導心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚
 水升火降津液充則無危矣此則三消之渴明矣東垣云大飲
 食不節勞役所傷以致脾胃虛弱既虛不能滋養氣血所生
 宿主口中津液不行故口乾咽燥也病人自以為渴醫者治以
 五苓散謂止渴燥而反渴燥乃重竭津液以至危云經云虛則
 補其母當於心與小腸中以補脾胃之根蒂也其溫之藥以為
 多苦寒之藥為之使以酸味為之臣佐以其心食苦急食酸以
 收之心火旺則肺金受邪金虛以酸補之火以甘溫及其寒之
 劑於脾胃中瀉心火之亢盛治其本也所勝妄行者言心火旺
 能令母實母者肝水也肝水旺則缺火之勢無所畏懼而妄行
 也故脾胃先受之又如胃氣不行內亡津液而乾咽求湯飲以
 自救非渴也乃口乾也非熱勝也乃血病也當以辛甘益之後
 膠五零散之類所當禁也又謂胃虛不能食而大渴不止者不
 可用淡滲之藥止之乃胃中元氣必故也用七味白朮散補之
 世見渴甚者不求所因例用淡滲之劑重竭其液故也今推其
 所因合而分之夫渴本乎熱也而熱有內外虛實之分若傳經
 之熱七甚耗液而為渴者氣分而受邪也當與寒涼淡滲之劑
 速清其熱七去而陰生陰生而渴止矣若胃虛亡液除虧而為
 渴者血受病也當與其溫辛酸之劑滋益其陰七生而燥除燥
 除而渴已矣豈可一禁而治哉且消渴之疾三焦之病火炎其
 心則危邪熱薰蒸漸漬日深氣血凝滯有患難疽瘡愈渴止則
 生瘡潰湯甚則危叔和云消渴之脈大者活盛小病深厄難脫
 此之謂也古人論三焦者消渴消中消腎是也渴有虛實之分
 皆立其論以啟後人之學當以誠心鑒之

消渴通治方

地黃飲子 治消渴咽乾而赤煩燥

生地黃 熟地黃 天門冬去心 麥門冬去心

人參 黃芪 石斛去根 枇杷葉去毛

枳殼去穢 澤瀉 甘草炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

麥門冬飲子 治膈消胸滿必煩津液短少多為消渴病

麥門冬去心 瓜蒌實 生地黃

人參 茯苓 茯神去木 乾葛 知母

甘草炙各

右作一服水二鍾竹葉十四片煎至一鍾不拘時服

烏梅五味子湯 治消渴生津液

烏梅 五味子 百藥煎 巴戟酒洗

甘草炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

加味錢氏白朮散 治消中消穀善飢

人參 白茯苓去皮 白朮 枳殼去穢

芫胡 藿香 乾葛 此五味子

木香 甘草炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

人參石膏湯 治膈消上焦燥渴不欲多食

人參 石膏 知母 甘草

黃芪 杏仁各

右作一服水二鍾粳米一撮煎至一鍾不拘時服

六神湯 治三消渴疾

枇杷葉 瓜蒌根 黃芪 乾葛

運秀 甘草各二

右作一服水二鐘煎至一鐘空心服小便不利加茯苓

止渴湯 治霍亂煩渴

瓜蒌散 治壯盛之時不自謹惜恣情縱慾年長腎氣虛弱不

能房事多服丹石真氣既盡石氣孤立唇口乾燥精液自

泄小便赤黃大便乾實小便日夜百十行頭當除熱補虛

天花粉 宜黃連 白扁豆 白茯苓 去皮

寒水石 甘草節 人參 去芦 白朮 去芦

石膏 猪苓 各等 右為細末每服二錢不拘時用白湯調服

人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者

人參 去芦 砂仁 白朮 山梔子

桔梗 去芦 瓜蒌 連翹 澤瀉 各半

葛根 黃芩 大黃 白茯苓 寒水石

井草 生用 薄荷 一錢 石膏 滑石 一已上各

右作一服水二鐘入蜜少許煎至一鐘不拘時服

加減八味丸 治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能既濟心

煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不多肌膚漸漸如削

或腿腫脚先瘦小宜降心火生腎水其煩頓止

白茯苓 去皮 牡丹皮 去骨 澤瀉 酒洗 五味子 微炒 一

山茱萸 取肉 桂 去粗皮 熟地 黃 熟地 山藥 微炒 各

右各研末和勻煉蜜為丸如梧桐子大五更初溫酒送

湯任下三五十九午前晚間空腹再服此藥不惟止渴亦

免生癰疽久服求除渴疾氣血加壯

茯神丸 治消中煩熱消穀小便數

茯神 去木 人參 去芦 枳殼 去穢 生地黃

麥門冬 去心 杜鵑粉 黃連 一已上各 遠肉 去心

黃芪 去芦 知母 半兩 瓜蒌根 七寸

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服五十

丸食遠用米飲送下

加減腎氣丸 治腎氣不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肢

體消瘦並皆治之 山茱萸 去核 白茯苓 去皮 牡丹皮 去心 熟地黃 酒蒸

五味子 山藥 炒 鹿角 鎊 澤瀉 一已上各

官桂 不見 沉香 各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九米飲送湯

任下弱者加附子一兩煎常服黃芪六一湯

黃芪六一湯 治諸虛不足胸中煩悸時常消渴或先渴而欲

發瘧或病癰疽而後渴者宜服之 黃芪 去芦 蜜 井草 各半

右作一服水二鐘煎至一鐘不拘時服

降心湯 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

天花粉 二錢 人參 去芦 當歸 遠志 法心 生薑 乾

白茯苓 去皮 黃芪 蜜炙 川芎 此五味子

熟地黃 井草 一已上各

右作一服水二鐘紅棗二枚煎至一鐘食前服

黃芪湯 治諸渴疾

黃芪 蜜炙 茯苓 去木 瓜蒌根 麥門冬 去心

生地黃 五味子 井草 各半

右作一服水二鐘煎至一鐘食遠服

天花散 治消渴

天花粉 生地黃 麥門冬 乾葛

五味子 甘草

右作一服水二鍾梗米百粒煎至一鍾食遠服

止渴劉散 治消渴

批把葉 生薑 乾葛

淡竹葉 苧草 草菓

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

鹿茸丸 治失志傷腎七虛消渴小便無度

鹿茸 熟地黃 黃芪 雞脰胫 燻炒

肉蓯蓉 山茱萸 破故紙 五味子

人參 川牛膝 白茯苓 去皮

地骨皮 麥門冬

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九食前用米

湯送下

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三

焦化痰延祛煩熱除驚悸瘵咽乾口燥育養心氣

人參 丹參 白茯苓 酸棗仁 洗

遠志 百部 石菖蒲 栝子仁

桔梗 玄參 天門冬 五味子

茯神 當歸 熟地黃

右為細末煉蜜為丸每兩作十九以金箔為衣燈心為湯

化下食後臨臥服或作梧桐子大九吞服亦可

雙補丸 治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠 白茯苓 人參 薏苡仁 炒

熟地黃 肉蓯蓉 鹿茸 覆盆子

五味子 石斛 當歸 黃芪

木瓜 沉香 澤瀉 麝香

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五十

九空心用棗湯送下

玉泉丸 治煩渴口乾

麥門冬 人參 茯苓 黃芪

烏梅肉 苧草 天花粉 乾葛

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九不拘時細嚼用

白湯送下

川黃連丸 治諸渴

川黃連 麥門冬 天花粉

右為細末以生地黃汁并牛乳汁夾和搗杵為丸如梧桐

子大每服五十九食前用粳米飲送下

天花粉丸 治消渴飲水多身體瘦弱

天花粉 人參

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九食前用麥

門冬煎湯送下

栝子丸 治消腎久渴困乏小便滑數

栝子 白茯苓 牛膝 鹿茸 兔絲子

麥門冬 熟地黃 黃芪 牡蠣粉

鷄內金 桑螵蛸 瓜蒌根 山茱萸

右為細末煉蜜和搗三五百杵為丸如梧桐子大每服五

十九食前用米飲湯送下

平補丸 治消腎不渴肌肉瘦削小便澀數而瀝如欲添之狀

兔絲子 山茱萸 當歸

鹿角膠 肉蓯蓉 鹿茸 覆盆子

川練子 <small>去核</small> 牛膝 <small>去芦</small> 葫蘆巴 <small>炒</small> 杜仲 <small>去粗皮</small>	肉苁蓉 <small>燉爛</small> 巴戟 <small>法</small> 乳香 <small>二兩</small>	右為細末用糯米糊為丸如梧桐子大每服五十九食前用棗湯或鹽湯送下	茯苓丹 治三消渴通亦治白濁	白茯苓 <small>五兩</small> 兔絲子 <small>酒浸三宿</small> 五味子 <small>七兩</small>	石蓮肉 <small>三兩</small>	右為細末用山藥末六兩打糊搜和搗三百五杵丸如梧桐子大每服五十九食前用米飲湯送下	和血益氣湯 治消渴消中諸方只止燥渴殊不知足陽明胃主血所生病手陽明大腸主津所生病此方治口舌乾小便數舌上赤脈生津液除燥長肌肉	生地黃 <small>酒浸</small> 升麻 <small>二兩</small> 杏仁 <small>去皮</small> 炒	防己 <small>酒浸</small> 知母 <small>酒浸</small> 羌活 <small>一兩</small> 桃仁 <small>去尖</small> 炒	石羔 <small>半斤</small> 黃連 <small>酒浸</small> 當歸 <small>酒浸</small> 麻黃 <small>六分</small>	紅花 <small>三分</small> 柴胡 <small>六分</small> 甘草 <small>炙用五分</small>	右交咀作二貼每貼用水二鐘煎至七分不拘時溫服	黃連膏 治證同前	黃連 <small>一斤</small> 牛乳汁 白蓮藕汁 生地黃汁 <small>各一</small>	右將汁熬膏搗黃連末為丸如小豆大每服二十九食前湯下日進十服	生地黃膏 治證同前	生地黃 <small>一兩</small> 冬蜜 <small>一兩</small> 人參 <small>半兩</small> 白茯苓 <small>去皮</small>	右先將地黃洗搗爛以新水一大盞調開同蜜煎至一半	次入參苓末拌和以磁器密封用匙挑服	和井露飲 大治消渴有此證者每日須進一二服
---	--	--------------------------------	---------------	---	-----------------------	--	--	---	---	---	--	-----------------------	----------	--	------------------------------	-----------	---	------------------------	------------------	----------------------

滑石 <small>六兩</small> 石膏 <small>四兩</small> 知母 人參	白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 <small>一兩</small>	甘草 <small>一兩</small>	右咬咀分作二貼每帖用水二盞煎至一盞食遠溫服	三消丸 治消渴骨蒸	宣黃連 <small>去蘗</small>	右為細末搗冬瓜自然汁和末成餅陰乾再研為末用冬瓜汁為丸如梧桐子大每服三五十九不拘時用冬瓜煎湯送下或大麥煎湯亦可	疎砂黃連丸 治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴	辰砂 <small>一兩</small> 宣黃連 <small>三兩</small> 生地黃 <small>二兩</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用燈心棗湯送下	加減三黃丸 治消渴及治服丹石毒致成此疾	黃芩 <small>春四兩</small> 夏六兩 秋六兩 冬三兩	黃連 <small>春四兩</small> 夏七兩 秋三兩 冬二兩	大黃 <small>春三兩</small> 夏一兩 秋二兩 冬四兩	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心用白湯送下服一月愈	黃連諸肚丸 治消渴強中	黃連 梨漿 瓜蒌根 茯神 <small>各四</small>	麥門冬 <small>去心</small> 知母 <small>各二</small>	右為細末內豬肚中縫兩置甌中蒸極爛取出藥搗豬肚為膏丸或再入蜜杵千餘丸如梧桐子大每服五十九用	人參湯送下米飲亦得一方加生地黃乾葛一方去知母	梨漿用小麥
---	-------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------	--------------------------------	--	--	------------------------	-------

爛金丸 治熱中消渴止後補精血益諸虛解勞倦去骨節間

熱寧心強志安神定魄固臟腑進飲食免生瘡瘍

大猪肚一箇黃連三兩 生薑研 蜜各二

右先將猪肚淨洗控乾復以葱椒醋麩等同藥以水酒入

銀石器內煮半日漉出黃連洗去蜜酒令盡剉研為細末

再用水調為膏入猪肚內以線縫定仍入銀石器內水煮

爛研如泥搜和下項藥

人參 五味子 山藥 杜仲去皮切姜

石斛 山茱萸去核 車前子 新蓮肉去皮

鼈甲醋炙 熟地黃 當歸已上各 磁石煨

白茯苓 梔角子炒 川芎已上各 兔絲子酒浸蒸

黃芪四兩 沉香半兩 麝香研入

右為細末用猪肚膏搜和得所如膏少則添熟蜜搗數千

杵丸如梧桐子大每服五十九食前用溫酒或糯米飲送

下一方有白朮二兩陽起石一兩

真珠丸 治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣飲過多以致

煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不利

鉄胤粉研 牡蠣煨 知母 玄參已上各一

苦參一兩 磁砂研 黃連一兩 麥門冬去心

天花粉各二 金箔二百 銀箔二百

右為細末煉蜜入生芪蔓根汁少許丸如梧桐子大以金

銀箔為衣每服二十九至三十九先用瓜蔓根汁送下

服次用麥門冬熟水下病退日二服忌炙燥酒色一方有

蘆薈二兩半白扁豆二兩炒

天花丸 治渴通用

消渴消中消腎病 三焦五臟生虛熱

惟有膀胱冷似水 意中飲水無休歇

小便日夜不記行 骨冷皮焦心脾裂

本因飲酒炙燥多 四肢肌骨轉枯竭

莫交便利白如泔 口苦咽乾舌似血

若如此狀病雖危 遇此神仙真妙訣

夫花粉 白茯苓去皮 牡蠣粉 知母

鐵胤粉 苦參 辰砂已上各 白扁豆生製

黃連三兩以童子小 蘆薈一分 金銀箔各二

右為細末用生瓜蔓根汁和生蜜丸如梧桐子大每服三

十九用麥門冬湯送下一方無茯苓

梅花聚香湯 又名蘇龍射子手 治消渴飲水至石斗病極者可

服之即愈

天花粉 烏梅肉 枇杷葉 麥門冬

五味子 瓜蒌實 人參 黃芪

乳葛已上各 檀香半兩

右為細末水調隨意不時服之

子童桑白皮湯 治三消渴病或飲多利少或不飲自利肌膚

瘦削四肢怠惰常服補虛止渴然渴有三消渴為心內積

煩熱心火炎上與暑熱或飲食相挺而動消中屬脾有陰

勝陽蔚成寒中者有陰不勝陽成熱中者有強陰與盛不

交精泄成強中者消腎屬腎少不謹惜壯乃腎衰多服丹

石以致發動唇乾咽竭精溢自泄不飲而利亦曰內消不

亦危矣

童根桑白皮去心 人參 麥門冬去心

白茯苓 乳葛 山藥 桂心已上各

甘草生用

右到碎水一盞半煎至七分去滓不拘時溫服

參湯 治消渴 人參 桔梗 天花粉 甘草已上各

綿黃芪湯 白芍藥各 白茯苓 北五味子各

右到碎每服四錢水一盞半煎至八分日進四服留滓合

煎一方有乾葛木瓜烏梅

龍鳳丸 治飲酒多發積為酷熱薰蒸五臟津液枯燥血泣小

便併多肌肉消鍊專治物寒漿

鹿茸酒浸 兔絲子酒浸 山藥各

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食前用米

飲送下濃煎人參湯亦可一方用麩糊為丸鹽酒鹽湯任

下一名龍肝鳳髓丸

冬瓜飲 治消渴熱勝心神煩亂及飲水多小便如脂麩片日

大冬瓜一枚 黃連半斤

右先搗黃連為末將冬瓜三停中截去一停取二停去淨

瓠子內黃連末於冬瓜中却取截下一頭蓋搜白麩子裹

冬瓜令過即更以黃土硬泥裹一重候微乾坐冬瓜在灰

火中四面簇炭火燒令泥赤即止候冷打去泥土并剝去

麩揭開冬瓜裏面有黃連汁不限多少濾過每服一盞湯

即飲之立瘥未瘥更作一服冬瓜皮肉曬乾兼治骨蒸勞

熱及酒黃多年者為末每於食後溫水調下二錢甚効

醍醐膏 治消渴

右用烏梅一片搗碎餅水四大碗煎至一碗濾去滓白砂

蜜五斤砂仁末半兩入沙石器內慢火熬赤色成膏為度

取下放冷加白檀末三錢麝香一字攪勻以磁石器盛密

封口夏月冷水調冬月沸湯調服 詩曰

烏梅化痰止煩渴 蜜生津液潤心肺

白檀大能解暑毒 麝香通竅辟邪氣

右用煮蜜纒絲湯任意飲之頗効如非時以絲或綿煎湯

服亦可有一人苦渴疾日飲斗水服此有効

浴消渴方

右用香水梨或好鵝梨或江南雪梨取汁用蜜相停同熬

瓶盛不時用熱水或冷水水調服大有功効止嚼梨亦妙

東坡家藏方載消渴日飲水數斗飲食倍常而頻渴連年

服藥不愈者可用麝香當門子一箇酒浸之作十小丸以

拘把熬湯送下隨愈此病脾脈實而腎原衰初因飲酒瓜

菓過度熱在脾胃而停積生冷雖飲食過人而多飲水飲

水既多不得不溺非消渴也言其當理服者審之

珍珠龍腦丸 治小渴鎮心安神

珍珠 辰砂 人參 黃連已上各

龍腦一末 天花一及 銀箔五十

右為細末煉蜜為丸如雞頭實大每服一丸空心日午及

臨睡時細嚼用麥門冬湯送下

天門冬丸 治初得消中食已如飢手足煩熱背膊疼悶 小便

白濁並宜服之

天門冬去心焙乾 雞內金三錢 桑螵蛸十枚

土瓜根乾者 熟地黃 瓜蒌根 肉蓯蓉酒浸一

知母焙 鹿茸用炙 五味子 赤石脂

澤瀉已上各 牡蠣煅 苦參一及

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九用粟飲送

下食前服

豬腎薺菀湯 治消中日夜尿八九升者 豬腎一具 大豆一升 薺菀 石膏 <small>二升各</small>	人參 茯神 <small>一作</small> 知母 葛根	黃芩 磁石 <small>碎裝</small> 瓜蒌 甘草 <small>二升各</small>	右咬咀用水一斗五升先煮豬腎大豆取一斗去滓下藥 煮取三升分作三服渴急飲之下焦熱者夜輒服一劑病 勢減渴即止	薺菀丸 治強中為病莖長興盛不交精益自出消渴之後多 作癰疽皆由過服丹石所致 薺菀 大豆 <small>去皮</small> 茯神 <small>去木</small> 磁石 <small>煨研</small>	玄參 石斛 <small>去根</small> 瓜蒌根 地骨皮 <small>去木</small> 鹿茸 <small>已上各</small> 沉香 <small>不見人參</small> 熟地黃 <small>酒蒸</small>	右為細末用豬腎一具煮如食法爛杵和為丸如梧桐子 大如難丸入少酒糊丸或煉蜜丸亦可每服七十九空心 用鹽湯送下	止渴潤燥湯 治消中大便燥澀燥硬兼喜溫飲陰頭退縮舌 白乳燥唇口乾眼澀黑處見浮雲 升麻 <small>半</small> 黃蘗 <small>酒浸</small> 當歸身 荆芥穗	桃仁泥 麻仁泥 知母 防風 <small>已上各</small>	芫花 石膏 <small>各七</small> 杏仁泥 <small>六箇</small> 熟地黃 <small>三分</small>	甘草梢 小椒 <small>各二</small> 細辛 <small>一分</small> 紅花 <small>少許</small>	右咬咀作一服水二椀煎一椀去滓食遠溫服忌辛熱物	腎瀝散 治消腎氣虛損發渴小便數腰膝痛 雞脛脰 <small>炙</small> 遠志 <small>去心</small> 人參 桑螵蛸 <small>微炒</small>	黃芪 澤瀉 桂心 熟地黃	白茯苓 龍骨 當歸 <small>已上各</small> 麥門冬 <small>去心</small>
---	-------------------------------	--	---	--	---	---	---	----------------------------------	---	--	------------------------	--	--------------	--

川芎 <small>各二</small> 五味子 甘草 <small>炙</small> 玄參 <small>已上各</small>	磁石 <small>碎裝</small> 右剉碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一盞半煮腎 至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑半分煎至五 分去滓空心溫服晚食前再服	金銀箔丸 治消腎口乾眼澀陰痿手足煩疼小便多 金箔 <small>一百片</small> 銀箔 <small>一百片</small> 丹砂 <small>細研</small> 瓜蒌根 <small>各二</small>	巴戟 <small>去心</small> 五味子 澤瀉 <small>已上各</small>	天門冬 白茯苓 <small>去皮</small> 生地黃 <small>焙</small> 葛根 <small>已上各</small> 麥門冬 <small>去心</small> 右除別研藥外槩為細末再研勻煉蜜和丸如梧桐子大 每服二十九加至三十九不拘時用糯米飲送下	白茯苓丸 治消腎因消中之後胃熱入腎消燥腎脂令腎枯 燥遂致此疾即兩腿漸細脚無力 白茯苓 覆盆子 黃連 瓜蒌根	葶藶 人參 熟地黃 玄參 <small>已上各</small>	石斛 <small>去根</small> 蛇床子 <small>各三</small> 鷄脛脰 <small>三十枚</small>	右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十 丸食前煎磁石湯送下	梅蘇丸 治消渴膈熱煩燥生津液 白梅肉 紫蘇葉 烏梅肉 <small>各半</small> 麥門冬 <small>去心</small>	百藥煎 <small>三</small> 訶梨勒 <small>炙</small> 人參 <small>各一</small> 甘草 <small>炙</small>	右為細末煉黃蠟汁拌和為丸如雞頭尖大每服一丸不 拘時含化燕津路行解渴	雞脛脰 治久渴旬日見効 雞脛脰 <small>各五</small> 白龍骨 渴虛 <small>去心</small>
--	---	---	--	---	---	---------------------------------	---	-------------------------------------	---	--	--------------------------------------	---

鹿角膠 炙 鹿 白石脂 各一 土瓜根 三 及 不燥 銷 二 七

牡蠣粉 黃連 苦參 各二

右為細末每服一錢至二錢米飲調下日三夜一

神仙滅水法名斬龍劍子手治三焦重熱三消渴疾 日夜飲

水無度此藥主之不可輕用其効如神

人參 天花粉 知母 宣黃蘗

苦參 麥門冬 浮萍 白芎豆

黃芪 黃丹 黃連

右為細末每服一錢新汲水調下妙不可言

生津甘露飲子 治腸消大渴飲水無度舌上赤虛上下齒

枯舌根強梗腫痛食不下腹時脹痛渾身色黃目白精黃

甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛善噎善怒健忘

腎腰背寒兩尻冷甚

石膏 黃連 桔梗 木香 各

黃蘗 薑黃 山梔子 炙甘草

升麻 人參 全蝎 杏仁 各

葶藶 生甘草 連翹 白芎豆

白芷 麥門冬 當歸 白葵

蘭香 知母 藿香 各

消渴之疾燥熱之氣勝也內經曰熱淫所勝佐以甘苦以

甘濕之熱則傷氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之劑不

能故以石膏甘草之甘寒為君啓玄子云滋水之原以制

陽光故以黃蘗黃連梔子知母之苦寒瀉熱補水為臣以

當歸人參杏仁麥門冬全蝎連翹白芷白葵蘭香甘草之

辛寒和血潤燥為佐以升麻苧乎苦平行陽明少陽二經

白芎菟木香葶藶茄藿香反佐以取之又為因用桔梗為

舟楫使浮而不下也

右為細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作餅子曬半乾將杆碎

篩如米大食後每服二錢抄於掌內以舌舐之隨津唾下

或以白湯少許送下亦可此治之緩也不惟不成中滿亦

不傳瘡瘍下消矣

東垣嘗謂余曰潔古老人有云能食而消渴者白虎倍加

人參湯主之大作湯劑多服不能食而渴者錢氏白朮散

倍加葛根大作湯劑廣服之

赤茯苓湯 治消渴飲水太過胃氣不和腹脹不思飲食

赤茯苓 赤芍藥 枳殼 甘草 各

人參 白朮 前胡 檳榔

桂心 厚朴 各

右咬咀每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六

分去滓食前溫服

肉苁蓉丸 治消渴尿脂小便如泔

肉苁蓉 地骨皮 澤瀉 五味子

巴戟 當歸 韭子 熟地黃

牡丹皮 白龍骨 甘草 磁石 各

赤石脂 人參 禹餘糧 桑螵蛸 各

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九以牛乳或

白湯送下日進三服

鐵粉丸 治消渴臟腑枯燥口乾引飲小便如脂

鐵粉 雞脛 各

黃連 杜鰾 各

右再汗勻煉蜜和劑以酥塗杆熟丸如梧桐子大每服三

十九加至四十九食前煎粟米飲送下

紫蘇湯 治消渴後遍身浮腫心膈不利

紫蘇葉 桑白皮 赤茯苓 一 郁李仁 三 皮炒

羚羊角 檳榔 各三 桂心 枳殼 各炒

獨活 木香 各半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑半分煎至八分去滓不

拘時溫服

瞿麥湯 治消渴飲成水氣面目并足膝脛浮腫小便不利

瞿麥 澤瀉 滑石 各半 防己 三分

黃芩 大黃 各一 桑螵蛸 四枚

右咬咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓空心溫服良

又再服

葶藶丸 治消渴後成水病浮腫

甜葶藶 瓜蒌仁 杏仁 各一 雙仁 去尖 又

漢防己 各一

右為細末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服三十

丸食前赤茯苓煎湯送下日進三四服

填骨煎 治消渴後虛乏

白茯苓 去皮 兔絲子 酒洗 山茱萸 去核 麥門冬 去心

附子 炮去 石斛 作石 煎 牛膝 酒洗 巴戟

當歸 二 刀半 大豆 炒去皮 芍藥 去土 桂心 各一

五味子 遠志 去心 人參 已上各 肉蓯蓉 三 刀

天門 刀 三分

右為細末用生地黄黃生瓜蒌根各三斤搗絞取汁以銀石

器慢火煎減半然後納藥并下白蜜十兩牛髓五兩再煎

令如糜丸如雞子黃大米飲下日三葉末不必盡入惟看

稀稠得所甚佳一方無遠志

藍葉散 治渴利口乾煩熱背生癰疽赤爛疼痛

藍葉 升麻 玄參 麥門冬 去心

黃芪 葛根 沉香 赤芍藥

犀角屑 甘草 生用 大黃 二兩

右咬咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

玄參散 治渴利煩熱生癰疽發背爛腫疼痛

玄參 芒硝 大黃 炒 犀角屑

羚羊角屑 沉香 木香 黃芪 各一

甘草 生用

右為細末每服二錢不拘時用溫水調下

忍冬丸 治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草 不多少 少根 花 葉 皆 可 用 一 名 老 公 贊 一 名 金 銀 花 一 名 左 纏 藤 水 洗 淨 用

右用米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草

少許為末即以所浸酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十

丸至百丸酒飲任下不拘時服一方用忍冬草煎服此藤

凌冬不凋三月開花五出黃白相間微香帶紅外科精

要又以煮酒膏服取時不犯鐵器服至大小楊通利此藥

到得力用乾者不及生者効速仍治五種飛尸酒研傳瘡

亦好但留一口泄毒氣真經効奇藥也此藥不特治癰亦

能止渴并五疔諸漏

奇效良方卷之三十四

遺精白濁門 附論

蓋謂精之主宰在心精之藏制在腎經云精者身之本生氣之原髓之化也又曰腎主水受五臟六腑之精而藏之曰陰陽之要會也陽密乃固故陽強不密為陰氣乃絕陰平陽秘精神乃冷陰陽離決精氣乃竭此之謂也然五臟六腑皆有精氣而腎為精之司又聽命於心人能法道清淨則精氣內持蓋謂腎藏精右為命門為其所舍三焦為其府庫二若皆謂相火相火者即水中真火也然而所舍不可以失守府庫不可以受傷而如守受傷之由莫不在心也為君火右腎為相火而相火奉行君火之命令焉故其病雖在腎而責本在於心上主乎神神有所惡動則神馳不返致君火傷而不能下降腎主乎智有所勞則智亂於中智亂不已俾腎水虧而不能上升降者不

下升者不上上下下不交水火不濟是由君火失其令相火失其守府庫不能制藏真精自漏固不交而遺泄也夫遺泄之證非惟一種有夢中交而遺者乃心虛神交也有下元虛敗精不禁而遺者乃腎虛精泄故也有壯年氣盛久節陽慾經絡壅滯而遺者乃臟夫滿而溢也有情動於中所願不得而遺者乃為情不遂欲而泄也經云天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故生之來謂之精兩精相搏謂之神往來者謂之魂並精而出入者謂之魄所以任物者謂之心上有所慮謂之意意之所存謂之智因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮因慮而康物謂之智故智者謂之養生也如是者皆因心神情之所感變而分之若怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流淫而不止喜恐懼則傷精傷則骨瘦痿厥而不舉喜樂者神憚散而不藏思慮者氣閉塞而不行盛怒者眩惑而不治則所主

之精亦從神之所交隨處與合而精自下是曰遺精也且夫五歲各得歲其精神次行其用也若一臟之變不得其正則一臟病作矣若一臟精神傷之甚則必害豈不虧於心腎蓋精神乃心腎之所主也而遺精者豈非心腎不交之致哉金匱要略云虛勞為病脈浮大手足煩陰寒精自出又謂脈弦而大者曰華男子則遺精女子則失血又謂小腹弦急陰頭寒脈動微緊皆為失精夢交之證由是變為五勞七傷諸蒸之病也至於白濁白濁自是一病而赤濁由腎虛膀胱火盛故小便便去澀所以成濁也此濁因腎水不能升運以制火則停凝自敗而成濁或思慮過度勞勞無常俾心腎不交精元失守以為赤白二濁之患焉赤濁者為心腎有熱由思慮而得之白濁者為腎虛有寒因勞怒而得之孫真人曰流水不腐戶樞不蠹謂其運動而然也劉河間又謂赤白濁與夫白濁皆是熱也如清水作湯則有白

脚又如夏則土燥而水濁渾冬則土堅而水清潔此理最當然遺精白濁皆本由心腎不交而得惟所出之路非為一途其可一洩言之蓋遺精則自精氣道中而出淫濁等則於小便竅中而出淫定脚有渾濁其狀旋面或如油或如膏糊或有五色光彩多則漸久令人虛損成勞也王冰以白濁為白物如精之狀因洩而下雖云如精將化沫成其精而竟出者何以言之蓋精有謂生來之精者身乃先生之精也有謂食氣入胃散精於五臟者有謂水飲自脾腎輸腎氣四布五經並行之精者此水穀日生之精也然飲食日生之精皆從生來元精之所化而後分布其藏盈溢則輸之於腎乃元氣之本生成之根此始終化之養之道也遇一臟有邪則其精受傷不能化之而不得入與元精俱藏而竟走泄也若夫脾熱於腎小腹寬熱而痛則出白者義亦知之為義者必究其本細推其處明辨詳的然

後施治至若癆遺者治其心精滑者固其真滿者寧其情滿而赤黃清其心濁而白者溫其經白濁者調其勞能攝生者其神養其心心安神寧腎氣自升火來以水到而為水火交養遺濁皆清母以我為過認惟達道者以自明

遺精白濁前治方
加味清心飲 治心中客熱煩燥赤濁肥

白茯苓 去皮 石蓮肉 各半 益智仁 遠志 水浸去心

麥門冬 去心 人參 去皮 石菖蒲 車前子

白朮 澤瀉 甘草 炙

右作一服水二鍾燈心二十莖煎至一鍾食前服有熱加薄荷少許

蓮子六一湯 治心熱赤濁

石蓮肉 連心 甘草 炙

右為細末每服二錢空心用燈心煎湯服下

龍齒補心湯 治諸虛不足昏熱潮來心神驚惕睡臥不寧小便油濁

龍齒 煨 人參 去皮 熟地黃 洗焙 當歸 酒浸

桔梗 去皮 酸棗仁 炒 白茯苓 去皮 茯神 去皮

肉桂 去皮 麥門冬 去心 綿黃芪 炙 遠志 水浸去心

枳殼 炒 半頁麩 白朮 炙 甘草 炙

右作一服水二鍾生薑三片梗米一撮煎一鍾不拘時服

分清飲 治思慮過度清濁相干小便白濁

益智仁 酒浸 石菖蒲 去皮 白茯苓 去皮 天白烏藥

川草薢 炙 甘草 炙

右為細末每服二錢食前用鹽湯調服

益智湯 治腎經虛寒遺精白濁四肢煩燥時發蒸熱

鹿茸 去毛 巴戟 去心 肉蓯蓉 酒洗 熟地黃 酒浸

附子 炮 桂心 山茱萸 白芍藥

防風 拘杞子 牛膝 酒洗 甘草 炙

右作一服水二鍾生薑五片鹽火許煎一鍾空心服

鹿茸益精丸 治心益腎冷漏精白濁

鹿茸 去毛 煎 藥膠 酒洗 肉蓯蓉 杜仲 去皮切薑

巴戟 去心 兔絲子 酒浸 益智仁 川練子 去皮切薑

禹餘糧 酒洗 當歸 酒洗 韭子 微炒 破故紙 炒

山茱萸 赤石脂 龍骨 炙 各滴乳香 二分

右為細末酒調糯米末煮粥為丸如梧桐子大每服已

丸食前用白茯苓煎湯送下

固精丸 治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢遺白濁

肉蓯蓉 酒洗 陽起石 酒洗 鹿茸 去毛 川巴戟 酒洗

赤石脂 酒洗 白茯苓 去皮 附子 炮 鹿角霜

龍骨 生用 韭子 炒 各

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服七十九空心用

益湯送下

瑞運丸 治思慮傷心便下赤濁

白茯苓 去皮 石蓮肉 洗 龍骨 生用 天門冬 去心

麥門冬 去心 柏子仁 炒 紫石英 酒洗 遠志 水浸去心

當歸 酒洗 酸棗仁 炒 龍齒 炙 乳香 炙

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以珠砂為衣每服七十

九空心用溫酒或棗湯送下

遠志丸 治小便赤濁如神

遠志 水浸去心 茯神 去皮 益智仁 炙

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用

用藥湯送下

心腎丸

治水火不既濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

牛膝酒洗

熟地黃

茯苓酒洗

鬼絲子酒洗

鹿茸酒洗

附子炮炙

人參去芦

黃芪去芦

五味子

茯神去木

山藥炒

當歸酒洗

左骨煨

遠志用甘草水煎去心

右為細末酒蒸糊為丸如梧桐子大每服七十九空心用藥湯送下

秘精丸

治元氣不固遺精夢泄

大附子炮炙

龍骨煨

肉桂酒洗

牛膝酒洗

巴戟去心

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心用鹽酒或鹽湯送下

鐵精丸 治小便白濁

破故紙炒

青鹽略

白茯苓

五倍子略

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十九空心用溫酒或鹽湯送下

固精丸 治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂腰重少力並宜服之

牡蠣煨

白茯苓

桑螵蛸酒洗

白石脂

韭子炒

五味子

鬼絲子酒洗

龍骨酒洗

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服七十九空心用鹽湯送下

地黃丸 治心腎水火不濟或因酒色遂至以甚謂之士淫

脾有虛熱而腎不足故土邪干水先緊常言夏則土燥而水濁冬則土堅而水清此其理也醫者往七峻補其疾以

甚此方中和水火既濟而土自堅其流清矣

熟地黃

九蒸九

鬼絲子酒洗

鹿角霜

茯苓去皮

柏子仁各三

附子炮炙

右為細末另用鹿角膠煮糊為丸如梧桐子大每服一百九空心用鹽酒送下

四精丸 治白濁煩渴

鹿茸

肉桂酒洗

山藥

茯苓去皮

右為細末米糊為丸如梧桐子大每服三十九空心用藥湯送下

小兒絲子丸

治腎氣虛損五勞七傷小腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳聾心忪短氣夜驚驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味卒動乏力心腹脹滿脚膝痠緩小便滑數房室不卒股內濕癢水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之入服填骨髓補五臟去百病明耳目益顏色延壽

鬼絲子酒洗

石蓮肉二

白茯苓去皮

右為細末用山藥末打糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒或鹽湯送下如腰脚無力木瓜湯送下

五鎖固真丹 治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固

有遺瀝小便經歲白濁或淡赤或如膏膏寐精泄甚則身麻拘倦骨節酸疼飲食不進面色黧黑密枯肌瘦唇口乾燥虛煩盜汗卒動乏力多服取効

白龍骨半斤

磁石煨

遠志其草水

白茯苓去皮

川椒去

官桂去

肉桂酒洗

桑螵蛸酒洗

桑寄生真者

香炒

附子炮炙

右為細末用山藥末打糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒或鹽湯送下如腰脚無力木瓜湯送下

有遺瀝小便經歲白濁或淡赤或如膏膏寐精泄甚則身麻拘倦骨節酸疼飲食不進面色黧黑密枯肌瘦唇口乾燥虛煩盜汗卒動乏力多服取効

白龍骨半斤

磁石煨

遠志其草水

白茯苓去皮

川椒去

官桂去

肉桂酒洗

川練子去核 長菜羹少 當歸五方 蒼朮研炒
 木香不見 黃芪去毛 硃砂已化 紫稍花半
 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒
 酒或鹽湯送下
 子午丸 治心腎俱虛夜寐驚悸體常有汗煩悶短氣悲憂不
 樂消渴引飲液下赤白停滯滿甚四肢無力面黃肌瘦耳
 鳴眼昏頭暈惡風怯寒並皆治之
 桂子去殼 蓮肉去心 枸杞子 白龍骨
 川巴戟去心 破故紙炒 真琥珀另研 苦楮實去殼
 白礬去 赤茯苓去皮 白茯苓去皮 蓮花去心 鹽炒
 芡實 白牡蠣煨 文蛤已上各 硃砂已化
 右為末用肉桂容一斤一兩酒蒸爛碾為膏和丸如梧
 桐子大以硃砂為衣每服五十九空心濃煎草薢湯下已
 勞力房事專心服即渴止濁清自有奇效
 桑螵蛸丸 治下焦虛冷精滑不固遺瀝不斷
 桑螵蛸炒 附子炮去 五味子 龍骨各半
 右為細末糯米糯米糊為丸如梧桐子大每服五十九空
 心用鹽酒送下
 仙方固真丹 專治精泄不禁
 禹餘糧 石中黃 赤石脂 紫石英
 石燕子已上各一 附子炮去 白茯苓去皮
 入參一 青鹽一
 右為細末再研勻用無灰酒煮糊和丸如小指頭大以硃
 砂為衣每服二三丸用溫酒或鹽湯送下空心臨睡服
 鎖陽丹 治脫精不禁

白茯苓去皮 龍骨一 研各 桑螵蛸三 研各
 右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服七十九食前用
 茯苓煎湯入鹽少許送下
 辰砂妙香散 治夢中遺精每服二錢震者溫酒調熱者麥門
 冬去心濃煎湯調服
 方凡心痛門
 顯精丸 治精滑不禁
 川獨活 川續斷 穀精草 石蓮肉去殼
 乳麥米 金櫻子 白茯苓 川練子研炒
 木猪苓 小茴香 乳藕節 生雞頭去壳
 蓮蕊 緊龍骨五色者
 右為細末用雞子清為丸如梧桐子大每服四十五丸空
 心用鹽湯送下以乳物壓之
 芡實丸 治思慮傷心夜勞傷腎心腎不交精元不固面火頭
 色驚悸健忘憂寐不安小便赤澀遺精白濁足脛痠疼耳
 聾口昏口乾脚弱
 芡實去 蓮花去心 茯苓去皮 山茱萸取肉
 龍骨生用 五味子 磁石炒 肉苁蓉酒浸
 熟地黃焙 紫石英煨 牛膝去苗酒 枸杞子各
 右為細末酒煮山藥糊為丸如梧桐子大每服七十九空
 心用鹽湯或鹽酒送下
 水中金丹 治元臟氣虛不足夢寐陰人走失精氣
 陽起石 木香 乳香研 青鹽各一
 白龍骨一 兩聚 研各 磁石七 牛膝去苗酒 枸杞子各
 骨碎補炒 茴香炒 黃芩研 熟地黃焙 附子炮去 白茯苓去皮
 白茯苓一 研各 磁石七 牛膝去苗酒 枸杞子各

石為細末酒煮麩糊為丸如皂子大每服二丸空心用溫酒送下忌房事

八味丸一名腎氣丸治腎氣虛之下元冷憊心火炎上渴欲飲水或腎水不能攝養多吐痰唾或脾虛不能克制腎水亦吐痰唾而不咳者臍腹疼痛夜或澀澀弱肢體倦怠面色萎黃或驚黑及虛勞不足渴欲飲水腰重疼痛小便不利脚氣上攻小腹不仁男子消渴小便反多婦人轉胞小便不通並皆治之元服壯元陽益精髓活血駐顏強志身脾惡溫腎惡燥如硫黃附子鍾乳丹砂之類皆剛劑也用以助陽補接真氣則可若云補腎則正腎所惡者古人制方益腎皆效腎之藥故仲景八味元本謂之腎氣丸以地黃為玉王補腎經也用附子為佐以助脾元也熟地黃八兩山茱萸去核山藥略四白茯苓去皮

牡丹皮 洋酒各二 附子炮 官桂去皮各 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九至七十九空心食前用溫酒或鹽湯送下婦人用淡醋湯下陽衰陰痰依全方夏減桂附一半春秋三停減一痰去精走全減桂附只附六味地黃丸血虛陰衰熱地黃為君精滑山茱萸更為君小便或多或少或以赤或黃白茯苓為君小便淋瀝澤瀉為君心虛腸間熱積熱心火盛心氣不足牡丹皮為君皮膚燥澀乾山藥為君已上但言為君者其分兩用熟地黃分兩其乾地黃却依立為君分兩同或曰八味丸久服可為地仙今老耆服之而腹痛少者服之而發瘡或小便頻數或大便結澀或眼昏或精滑泄其故何哉蓋八味儲事失製度非方之罪今貨地黃以綠紫豆豉浸蒸飲其易乾也地黃本性涼加以紫性冷此老人所以腹痛附子

多是重三四錢此是漏蓋側子大熱有毒此少者所以發瘡小便頻數澤瀉生也小便結澀山茱萸不去核也今具八味儲事于后

地黃 生者去土水中淨者為天黃中者為人黃潤者為長其汁中眼今如北首三山藥竹刀括去皮布中階曬乾以酒浸一宿蒸曬乾山藥竹刀括去皮布中階茯苓 為末水煎過 澤瀉 研作餅子用酒 山茱萸 酒水洗去肉久去核 黑附子 紫實重七手者熱炭 牡丹皮 以酒浸一宿 官桂 削去粗皮 右搗為末不可犯銅器如是修合服之而仙復何疑哉久服去附子以揀淨五味子代之 丹 補虛守神滋精固陽道男子服之有奇功非筆可盡述其作用非至神不能處之遂無名可稱其效故曰無名 茅山蒼朮 一斤不浸入草白以麩炒香令

龍骨 別研 川烏頭 大者各一兩 川練子 三兩去 破故紙 三兩 赤石脂 二兩 茴香 一兩半 右為細末合和勻煮酒麩糊為丸如梧桐子大每服五十九至七十九空心食前用溫酒或鹽湯送下婦人用淡醋湯下陽衰陰痰依全方夏減桂附一半春秋三停減一痰去精走全減桂附只附六味地黃丸血虛陰衰熱地黃為君精滑山茱萸更為君小便或多或少或以赤或黃白茯苓為君小便淋瀝澤瀉為君心虛腸間熱積熱心火盛心氣不足牡丹皮為君皮膚燥澀乾山藥為君已上但言為君者其分兩用熟地黃分兩其乾地黃却依立為君分兩同或曰八味丸久服可為地仙今老耆服之而腹痛少者服之而發瘡或小便頻數或大便結澀或眼昏或精滑泄其故何哉蓋八味儲事失製度非方之罪今貨地黃以綠紫豆豉浸蒸飲其易乾也地黃本性涼加以紫性冷此老人所以腹痛附子

秘真丹 治思想無窮所願不協意溢於外作勞筋絕發為筋

痿及為白法遺洩而下故為勞弱

羊脛炭燒紅厚朴三兩各硃砂一兩

右為細末用酒煮糊和丸如梧桐子大每服五十九空心

食前用溫酒送下

煨腎附子散 治腎臟虛憊遺精盜汗

續猪腎一隻附子一兩

右將猪腎批開入附子末在內以濕紙裹煨熟稍熱空心

服之即飲酒一盞送下

心腎丸 治心腎不足精少血燥心下煩熱怔忡不安或口乾

生瘡目赤頭暈小便赤濁五心煩熱多渴引飲但是精虛

血少不受峻補並宜服之

兔系子淘酒麥門冬二兩各

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九空心食前

用鹽湯送下

固真散 治總睡著即泄精

白龍骨一兩韭子一合

右為細末每服二錢七空心用酒調服此二味藥大能壯

精固真氣煖下元

枸杞丸 補精氣

枸杞子各半黃精

右各等分為末二味相和搗成塊埋作餅子乳復搗為細

末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心溫水送下

韭子丸 治腎臟虛冷腰膝痠疼脚膝冷痺夜多小便遺精

精日漸羸瘦面無顏色及治女人惡露赤白帶下

右用韭子七升淨揀以醋湯煮千百沸取出焙乾旋炒如

油麻香搗羅為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九

加至三十九空心用溫酒送下

烏金散 療虛夢泄精滑不禁

右用九肋龍甲不以多少去裙襴淨洗過燒灰存性研為

細末每服一字用清酒小半盞童子小便小半盞陳葱白

七八寸同煎至七分去葱白和滓日西特服須臾得粘臭

汗為度次日進粟米粥忌食他物

葛玄真人百補交精丸 治夢泄精滑不禁

熟地黃酒浸一兩切山藥二兩五味子去梗

杜仲去粗皮剉碎肉蓯蓉一段一兩切

牛膝去酒對碎酒浸澤瀉一兩切山茱萸去核

茯神去木遠志去心巴戟去心石膏火煨令赤

栝子仁微炒赤石脂各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心用酒

送下男女並宜服之

主荆公妙香散 安神閉精定心氣

龍骨五色益智去皮人參已上各白茯苓去皮

遠志去心茯神去木各硃砂研甘草炙各

右為細末每服二錢空心用溫酒調服

既濟丹 治水火不濟心有所感白濁遺精虛敗不禁腎虛不

攝精隨久而不治若更多服熱藥遂致日增其病腰脚無

力日漸羸弱

天門冬去心桑螵蛸蜜炙黃連去須雞脛炒

麥門冬去心海螵蛸蜜炙遠志去心牡蠣煨

龍骨五色澤瀉已上各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十九

空心用燈心裏湯吞下日進二三服

固真丹 治證同前

沉香

丁香

木香

茴香

人參

當歸 微炒

滑石

乳香 別研

沒藥 別研

琥珀 別研

全蝎 微炒

乾脂 別研

山藥

川山甲 炒

木通 頭末

血竭 別研

破故紙 酒浸

地龍 去土

扶神 去木子

燈心 三寸

軋蓮心 微炒

桑螵蛸 炒或麝香 別研

蛤蚧 酥炙

足脰 臍臍 酒浸

酥炙

右為細末於辰火日合醋浸蒸餅為丸如櫻桃大每服二三九空心用溫酒送下忌諸羊血蒜騎馬服訖乾物廢之

呪曰 北海冷上 雪浪如銀三江四海盡入藥中能實骨髓能養精神誅殺鬼魅永保遐齡

香茸丸 滋補精血益養真元治下焦陽竭臍腹疝痛飲食減

少目視茫上夜夢鬼交遺泄失精肌肉消瘦

鹿茸 麋茸 五味子 白茯苓 去皮 白龍骨 火炙

肉蓯蓉 酒浸一宿切焙

右為細末和勻用熟地黃三兩焙乳為細末以酒二升熬

成膏子搜藥入白內搗千杵如硬更入酒以許九如梧桐

子大每服五十九空心溫酒鹽湯任下

麋角既濟丸 治水火不濟精神恍惚憂寐紛紛腸道不與耳

內虛鳴小便白濁遺泄失精常服能使火不上炎而神自

清水下滲而精自固壯陽固氣益血駐顏功效特異

藥角 藥角 藥角 藥角

藥角 藥角 藥角 藥角

藥角 藥角 藥角 藥角

藥角 藥角 藥角 藥角

藥角 藥角 藥角 藥角

藥角 藥角 藥角 藥角

角內乳藥三指以刺大藥只刺指大小藥

石葛蒲 赤石脂 五味子 珠砂 別研

龍骨

補骨脂 微炒

柏子仁 別研

右為細末用藥角膏子搜和搗一千搗丸如梧桐子大每

服一百九空心用溫酒送下

黃鹿角膠法 須用兩鍋一鍋常用溫酒準備用

鹿角 去粗皮自煎三寸許

右將鹿角於河水內浸七日其水每旦易換日足洗淨鍋

中黃每鹿角五斤用桑白皮半斤楷實一斤船上硫黃二

兩味砂二兩同煮之如水盡即換添湯及一伏詩自然已

軟或火不相繼未軟再煮一伏時如軟故冷取出風扇

掛起仁可入藥用黃藥水濾去諸藥慢火再煮使可為膏

既濟固真丹 治水火不既濟精神恍惚頭目昏暗陽道痿弱

陰虛多汗遺泄失精脾胃虛怯心腎不寧凡腎水欲升而

沃心心火欲降而滋腎則坎離既濟陰陽協和火不炎上

則神自清水不滲下則精自固常服壯陽固氣溫脾益血

白茯苓 沉香 肉蓯蓉 酒浸一宿切焙

北五味子 附子 龍骨 已上各川巴戟 去心

當歸 酒浸 川椒 半兩 各 柏子仁 炒 酸棗仁 炒

金鈴子 炒 羌活 子 益母草 仁 去皮 補骨脂 炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大辰砂末三錢為衣每服

五七十九空心用溫酒送下行左王師中錄傳與右司

大柳暨服之果是奇絕

石斛散 治虛勞虛管失精多驚發衛耗奪形體毀沮大補益

兼治不足乏力少食

石斛 去根

肉蓯蓉 酒浸去殼皮切

兔絲子 酒浸

遠志 去心

續斷 各一分

天雄 炮去皮三分

枸杞子 各二兩

熟地黃 焙

右為細末入棗肉研和勻每服二錢空心用溫酒調服食

後再服一方無棗肉

人參湯 一名棗仁湯

人參

治虛勞失精便溺白濁形體枯瘦腰脚疼

白龍骨

官桂 去粗

芍藥 各三分

酸棗仁

澤瀉 各一分

甘草 各半兩

右粗搗每服三錢水一盞入生薑半分拍碎煎至七分去

滓空心溫服

斐子丸 治虛勞漏精

斐子 炒

車前子

兔絲子 酒浸

龍骨 已上各

鹿茸 酒浸去毛

乾薑 三分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心用黃

芪煎湯送下

固氣丸 治清精自下

天雄

兔絲子

五味子

桑螵蛸

山茱萸

龍骨 已上各

斐子 二兩

乾薑

巴戟 已上各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三四十九空心用

溫酒任下或乾薑減半亦可一方有木賊一兩半

內固丸 滋精健陽

天雄

龍骨

鹿茸

牡蠣

斐子 各半

右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服三十九空心

用冷酒送下臨卧時再服

茯神散 治虛勞無力驚與鬼交心神虛煩宜服

茯神

黃芪

人參 已上各

桂心

牡蠣

龍骨

甘草 各三分

右為散入麝香令勻每服三錢水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓溫服日三四服

紫石英丸 治虛勞衰與鬼交失精虛竭至甚

紫石英 水細研

桑螵蛸 微炒

人參 去蘆

栝子仁 去殼

龍骨 已上各

水飛

肉蓯蓉 酒浸一宿刮去殼

麝香 細研

右為細末八別研藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐

子大每服二十九食前用溫酒送下

牡蠣散 治虛勞衰泄乏力盜汗

牡蠣 煨

蒼朮 炒

龍骨 各三

桑螵蛸 微炒

白芍藥

棘刺 微炒

桂心

栝子仁

車前子

甘草 各一兩

右為細末每服二錢食前用粥飲調服

栝子仁丸 治虛勞夢泄

栝子仁

枸杞子 炒

地膚子 一兩

新韭子 三兩

酒浸十日

微炒

右為細末以黃棗肉和搗百餘杵丸如梧桐子大每服三

十九空心及晚食前以粥飲下

桑螵蛸散 治虛勞夢泄

桑螵蛸

微炒

栝子仁

微炒

桑螺蚶一兩 莊子二兩

右為細末每服二錢空心用溫酒調下晚食前再服

真珠九 治虛勞夢泄鎮精

真珠六兩以牡蠣六兩煎取汁為末

右為細末却入水於乳鉢內研三五日後寬著水飛過

乾用蒸餅和丸如梧桐子大每服二十九食前用溫酒調下

鷄腸散 治虛勞腸脫寒小便數而精出宜服

赤雄鷄腸 鷄脰脛各二兩 熟地黃一兩

牡蠣粉 赤石脂 白石脂 桑螺蚶微炒

龍骨三分 黃連三兩 肉從蓉一兩半酒浸一宿

右為細末每服二錢食前溫酒調服

拘祀子散 治虛勞小便精出口乾心煩宜服

拘祀子 龍骨 五味子 覆盆子

白芍藥 絡三 麥門冬 去心 焙

右為細末每服一錢不拘時用溫酒或粥飲調下

鍾乳酒 治陰痿不起遺精清精

鍾乳粉 附子 當歸

前胡 人參 牡蠣 生薑切

枳實 生用 甘草 炙 五味子 薯蕷 各三

石斛 桂心 各一 兔絲子 五合 乾地黃 五兩

石斛碎用絹袋盛以清酒二斗浸之春夏三日秋冬七日

量性飲之忌海藻菘菜猪肉冷水葱白蒜薤粘食等物

安中湯 治腎經虛寒遺精白濁四肢頹倦時發熱熱精不禁

熟地黃 川巴戟 龍骨 茯苓

遠志 天雄 五味子 山藥 已上各

肉從蓉 酒浸 川續斷 各四 羌活 子 鹿 茸

右為細末每服二錢食前用酒調服

金鎖玉關九 治遺精白濁心虛不寧

鷄頭肉 蓮子肉 蓮花蕊 藕節

白茯苓 白茯苓 乾山藥 各三

右為細末用金櫻子二斤去毛茨批碎水一斗熬至八分

去滓再熬成膏仍用少麩糊同和為丸如梧桐子大每服

五七十九不拘時溫米飲送下

治便濁方

右用生白礬如圓眼大一塊須細先用板猪油熬熱安放

令冷次用童子小便或自己小便一小盞用瓦罐盛火止

煩待沸入礬在內又挑熟猪油一塊候溫得所食前服之

晚下空心又進每日一服甚者三四服便清

天茴香九 治小便白濁出膿條

大茴香 酸棗仁 炒 破故紙 炒 白木

白茯苓 牡蠣 煨 火 煨 為 度 益智

人參 各等

右為細末用青蓋酒糊丸如梧桐子大每服二十九食前

用溫酒或米飲送下

蓮肉散 治小便白濁遺泄精痔疾

石蓮肉 益智仁 龍骨 各等分

右為細末每服二錢空心用清米飲調下

威喜丸 治精氣不固夢泄白濁

白茯苓 去皮切作塊以酒一分月乾末四兩

黃蠟 四兩

右將黃蠟熔化攪和茯苓末為丸如彈子大空心細嚼滿

口生津徐徐嚥津服以小便清為度仍忌食醋

通靈散 治心氣不足小便滑赤白二濁

益智仁 白茯苓 白木各等

右為細末每服二錢不拘時用白湯或溫酒調服

治震憊便濁滴地成霜方

蓮肉去心 藕節乾者 龍骨 遠志已上各

白礬枯 靈砂各一

右為細末糯米糊為丸如梧桐子大每服十五丸食前用

白湯送下

玉鎖丸 治夢遺失精小便白濁

敗荷葉乾者不見 白茯苓 牡蠣去頭首

龍骨用五色者 另研三分

右為細末研勻防蟻膠和丸如梧桐子大如無敗蟻以

蠟糊代之每服三五十九空心用麥門冬湯送下日進二

服如真陽道衰微小便清濇遺止即住服忌酒并熱麪動

風等物如欲陽道如故即以麝香酒解之此藥治大衰痿

陽道止妄心惟備真養性之士宜服之

二參丸 治虛勞小便餘瀝尿精

人參 兔絲子酒浸一宿別 麥門冬去心

澤瀉各一 官桂去粗 牡蠣乾者 黃蘗去粗皮

細辛去苗 附子炮去 苦參 山芋三分

生地黃各 乾薑各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫

酒送下如痺痺加附子炮裂去皮臍一分婦人血傷加生

地黃焙半兩黃蘗去粗皮蜜炙一分一方用熟地黃治虛

勞失精小腹弦急隱上頭赤目痛髮落

振腎丸 治虛勞內傷腎氣衰冷小便餘瀝精氣滑泄宜服

漢椒去目并合口 鹿茸去毛 鷄頭生用

龍骨已上 肉桂去粗 桑蝶乾者 白礬乾者

乾薑各 白木已上 補骨脂各

右為細末入藍花二兩研令勻用獾猪腎十枚切用脂膜

研令爛以酒三升漸入熬成膏次入漂末和搗二三百杵

丸如梧桐子大每服三十九食前溫酒送下

益智子湯 治遺精虛瀉小便飲瀝益氣安神補不足安三焦

調諸氣夜多小便者

益智仁二十

右研碎用水一中盞入鹽少許同煎服有奇効

韭子丸 治房室過度精泄自出不禁腰背不得屈伸食不生

肌肉兩脚若弱此藥治之

韭子一斤 桂心 當歸 紫石英

遠志 天雄 紫苑 山茱萸

薯蕷 細辛 人參 禹餘糧

川芎 白朮 附子 石菖蒲

杜仲 乾薑 石斛 白茯苓

狸蠶 天門冬 甘草已上 肉苁蓉

兔絲子 乾地黃 蛇床子 黃芪已上

乾漆 牛髓已上 大棗五十

右為細末以白蜜入牛髓棗膏合搗三五十杵丸如梧桐

子大每服十五丸加至二十九空心溫酒送下

治夢中遺泄精方

右用乳香如大梅指一塊臨卧時放口中爛嚼至半夜即

吞下不二三次病愈

搏金散 治便濁之疾皆緣心腎水以不濟或因酒色過度至以

甚謂之士濟蓋心有虛熱而腎不足故土邪干水史載之
常言夏則土燥而水濁冬則土堅而水清此其理矣醫者
往往峻補其表及其此方中和服之使水火既濟而土自
堅其流清矣

人參

龍骨

白茯苓

結石

坎離丹

既濟水火滋補心腎止白濁夢遺

酸棗仁

附子

乳香

附子

右為細末每服二錢空心用米飲調下臨睡再服
右為細末研勻煉密和丸如鷄頭實大每服一九空心用
溫酒送下須是臘日合以磁器收之

三僊丸

治夢泄

益智仁

烏藥

山藥

右為細末用山藥末煮糊和丸如梧桐子大每服五十九

空心臨卧用益湯送下以磁砂末為衣凡病精泄不禁自

汗頭眩虛極或寒或熱用補瀉之藥不効其味浮軟而散

蓋非虛也亦非房室過度此無他心有所觀因有所慕意

有所樂慾想方與不遂所欲而致斯疾既以藥補且固不

効將何治之緣心有愛則神不歸意有想則志不寧當先

和榮衛榮衛和則心安次用其脾氣和則志舍定心腎

交媾精神內守其病自愈其法用人參三朶當歸一錢洗

焙為末作三服糯米飲調服畢自汗止而寒熱退頭眩

末除川芎三錢人參一錢焙為末作三服沸湯調服頭眩

遂瘥精不禁者用白芍藥半兩丁香三錢木香三錢剉散

每服用生薑五片棗二枚以水同煎空心服即心神安定

精固神悅

水陸二僊丹

治白濁

金櫻子 去子洗淨入甌中蒸令熟用湯淋之取
汁入銀絲內燻火製成膏將鷄頭末和丸

鷄頭實

去殼研末

右為末以前膏同酒糊為丸如梧桐子大每服三十九食

韭子方

治遺泄失精及溺白

右用新韭子二升須十月霜後採好者用酒八合漬一

宿明且日色好童子向南擄一萬杵平旦用溫酒五合服

方寸七日再一方微炒為末食前酒服一方用生韭子空

心益湯下三十粒

赤脚道人龍骨丸

治白濁

龍骨

牡蠣

右研為末同入鯽魚腹內用紙裹入火內炮熟取出去紙

將藥同魚肉攪和丸如梧桐子大每服三十九空心用米

飲下每用鯽魚不拘大小只着盡上件藥為度服時看藥

効如何更加入茯苓遠志各半兩尤佳

蓮實丸

治下元虛冷小便白濁

蓮實

去殼

巴戟

去心

附子

炮炙

山茱萸

覆盆子

各一

龍骨

研末

補骨脂

炒已上

右為細末煮米糊和丸如梧桐子大每服二十九加至三

十九空心用益湯送下

龍骨湯

治小便便白澀及遺泄精無故自出

龍骨

研末

牡蠣

研末

官桂

去粗

熟地黃

白茯苓

去皮

人參

甘草

炙

各

等

右為散每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心服

秘真丸

治小便白澀不止精氣不固及有餘瀝或夢與陰人

通泄

龍骨一兩 縮砂半斤 訶黎勒五分 丹砂一分 右為細末煮糯米糊為丸如綠豆大以丹砂為衣每服一丸空心熱酒送下夜臥服三丸冷水送下不可多服或太秘欲通用葱湯煎服之即

太醫院經驗奇功良方卷之三十四

太醫院經驗奇功良方卷之三十五

謂之血淋證也原病式曰淋小便澀痛也因熱結膀胱鬱結不能滲泄故也以其熱甚客於腎肝陰分血受熱也下焦有熱則熱鬱膀胱膀胱為津液之府胞為受納之司故熱入膀胱胞中外熱陰絡內澀故不得小便而溺血也諸方論有五淋之名所感不一病則大同小異皆由熱鬱之所致或謂有冷淋者誤也殊不知冷下淋澀痛忍之身必戰慄而增寒故似乎冷若遂以為冷此不明矣氣運變化之機元則害承乃制戰慄似寒經屬於火反兼水化之象乃熱甚而鬱結不開或熱出沙石者或如脂膏者亦非冷澀也是若熱在腑中煎熬日漬輕則凝如脂膏甚則結如沙石且如湯瓶煎煉日久熬成湯醃又如清水煎湯熱甚則沸溢自蒸渾濁也脈經曰少陰脈數婦人則陰中生瘡男子則氣淋熱結下焦令人淋閉不通淋之為病小便數而澀小腹痛引臍中京病式又曰淋小便澀而不通也為熱遺尿不禁者為冷宜知熱甚客于腎部于於厥陰之經鬱結極甚而氣血不能宣通則癢痺神無所用故液滲入膀胱而液溺遺失不能收禁也經云目得血而能視臟得血而能液腑得血而能氣夫血隨氣運氣血宣行則其中神自清利而應機能為用矣靈樞又曰腎主二陰然水衰虛而悞理客其部二陰鬱結則癢痺神無所用便遺失而不能禁止然則熱證明矣痺論云胞痺者少腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便上為清涕夫膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪客於胞中則不能化出故胞澀水道不通其證小腹膀胱按之內痛若

沃以湯澀於小便足太陽經其直上行者交額入絡腦氣下
 瀕於鼻竅則為清涕也發代有五淋之分氣石血膏勞是也氣
 淋為病小便澀常有餘澀石澀莖中痛尿不得卒出膏淋尿似
 膏出勞淋勞倦即發痛引氣衝血淋過熱即發甚則溺血候其
 鼻頭色黃者小便難也大抵此證多由心腎不交積蘊熱毒或
 酒後房勞服食熱燥七情鬱結所致癰閉淋閉皆一類也世之
 所用黃芩山梔茯苓瞿麥通草生地黃郁李仁之類寒藥治之
 則已其方乃是也或謂患淋而服而香益智滑石之藥而愈者
 然則非冷致殊不知此皆利小便之要藥也又云足少陰腎脉
 傷則病澀血又論曰熱在下焦則溺血詳此澀血者諸方所謂
 尿血病也若此与淋血同狀異狀淋痛而澀不痛得無異乎本
 雖出於熱淋血者腎虛有熱也法當補益不痛為虛宜補之謂
 也此則多因憂勞房室過度腎虛有熱而致疎無擇治之髮及
 散髮乃血之餘以爲補陰甚捷審此二說切其所感之由治之
 亦足以有攷云

諸淋通治方

八正散 治心經蘊熱臍膀胱結小便赤澀癰閉不通及熱淋

血淋並皆治之

方見火門

清心蓮子飲 治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小

便赤澀或欲成淋

石蓮肉 去心 白茯苓 去皮 人參 去蘆 黃芪 蜜炙

黃芩 已上各 車前子 麥門冬 去心 地骨皮

甘草 炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服如發熱加羌胡薄荷

各一錢

五苓散 治伏暑積熱小便赤澀如淋

方見暑門

石菖散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出脘腹急

痛者作有時勞倦即發或尿如豆汁或出沙石並皆治之

石菖 夫毛 葵子 木通 瞿麥

芍藥 白朮 滑石 已上各 王不留行

當歸 夫蘆 甘草 已上各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服如作末每服二錢小

麥煎湯調服

導赤散 治心虛蘊熱小便赤淋或成淋痛

生地黃 四各 木通 三各 甘草 二各

右作一服水二鍾竹葉十片煎至一鍾不拘時服

地膚子湯 治諸病後體虛腸熱熱結下焦遂成淋疾小便赤

澀數起少或澀痛如刺或尿出血並皆治之

地膚子 猪苓 各一 海藻 洗去 甘草 稍

瞿麥 夫核 通草 黃芩 知母

枳實 炙炒 升麻 葵子 各一

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不止脘腹急痛或尿如

豆汁或如沙石膏淋尿血並皆治之

山茵陳 淡竹葉 各一 木通 滑石

甘草 炙各 山梔子 仁 炒 赤芍藥 赤茯苓 各二

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

琥珀散 治小便不通或尿血

琥珀 炙少

右為細末每服二錢食前燈心煎湯調服

通草湯 治諸淋

通草 葵子 茅根 王不留行

蒲黃 桃膠 瞿麥 滑石 各半

甘草 右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

立効散 治小便淋閉作痛有時尿血下焦結熱

瞿麥 山梔子仁 炒甘草 各三

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子 淡竹葉 赤茯苓 荆芥穗 各二

燈心 右作一服新汲水二鍾煎至一鍾食前服

瞿麥 赤茯苓 桑白皮 石葦 去毛 生乾地黄 甘草 各二

海金沙散 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或五種淋疾

海金沙 木通 滑石 瞿麥 穗

通草 右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

小蓊飲子 治下焦結熱尿血成淋

小蓊根 滑石 通草 淡竹葉

當歸 蒲黃 藕節 山梔子仁

甘草 生地黄 二各

琥珀散 治五淋澀痛小便有膿血出

琥珀 海金沙 沒藥 蒲黃 各

右各等分為細末每服三錢食前通草煎湯調服

葵子散 治小便不通

葵子 茯苓 去皮 各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

火府丹 治心經蘊熱小便赤少及五淋澀痛

木通 黃芩 生乾地黄 二各

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心用木

通煎湯送下

清肺飲子 治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓 去皮 猪苓 去皮 澤瀉 各

琥珀 木通 瞿麥 菖蒲 各

通草 右作一服水二鍾煎至一鍾食遠熱服此證入正散五苓

散多宜服之

木通湯 治小便不通小腹痛不可忍

木通 滑石 各半 牽牛 取頭末

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

猪苓湯 治五淋

猪苓 赤茯苓 阿膠 澤瀉

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

木香湯 治冷氣凝滯小便淋瀝作痛身體

木香 木通 檳榔 舶上管 各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

木香 木通 檳榔 舶上管 各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

木香 木通 檳榔 舶上管 各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

木香 木通 檳榔 舶上管 各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

木香 木通 檳榔 舶上管 各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

木香 木通 檳榔 舶上管 各

當歸	青皮 <small>去白</small>	澤瀉	赤芍藥
辣桂	橘紅	甘草 <small>炙</small>	
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服			
二神散	治諸淋急痛		
海金沙 <small>七分</small>	滑石 <small>五分</small>		
右為細末每服二錢半用燈心木通麥門冬用新汲水煎入蜜少許食前調服			
神膏散	治血淋		
右用乾柿蒂燒灰存性為末每服二錢空心米飲調服			
蒲黃散	治心腎有熱小便不通		
蒲黃 <small>生用</small>	木通	荊芥	車前子
柔白皮 <small>炒</small>	滑石	燈心	赤芍藥
赤茯苓	甘草 <small>炙</small>		
右為細末每服二錢食前煎白蜜蘇煎湯調服			
醫金黃連丸	治心火炎上腎水不升致使水火不得相濟故		
火獨炎上水流下淋膀胱受心火所熾而膀胱中積熱或			
脛閉不通或遺泄不禁或白濁如泔水或膏淋如膿或如			
花子汁或如沙石或如粉糊相似俱為熱證此藥治之			
醫金	黃連 <small>酒洗</small>	琥珀	大黃 <small>酒洗</small>
黃芩 <small>已上各</small>	白茯苓	滑石 <small>各四</small>	黑牽牛 <small>炒取頭末三兩</small>
右為末滴水為丸如梧桐子大每服五十九空心白湯下			
淡竹葉湯	治諸淋		
淡竹葉	車前子	大棗	烏豆 <small>去</small>
燈心	甘草 <small>炙</small>		
右作一服用水二盞煎至七分去滓不拘時溫服			
通心散	治心經有熱唇焦面赤小便不通		

木通	連翹
右各等分為細末每服一二錢不拘時用麥門冬煎湯調服或燈心煎湯亦可	
內菝菹丸	治稟賦虛弱小便數亦不禁
內菝菹 <small>入兩</small>	熟地黃 <small>六兩</small>
	五味子 <small>四兩</small>
	克絲 <small>搗餅</small>
右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服七十九空心用鹽酒送下	
草薢丸	治小便頻數
川草薢 <small>一斤</small>	
右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服七十九食前用鹽酒送下	
縮泉丸	治脬氣不足小便頻多
烏藥	益智仁 <small>各等</small>
右為細末酒煮山藥糊和丸如梧桐子大每服五十九空心用鹽酒送下	
鷄腸散	治腎與膀胱虛冷不能約制故遺尿失禁或睡自出
鷄腸 <small>燒存</small>	牡蠣 <small>粉</small>
	白茯苓
	桑螵蛸 <small>各三</small>
辣桂	龍骨 <small>各半</small>
右作二貼每貼用水二盞生薑三片棗二枚煎至八分去滓食前服	
補脾飲	治婦人生產傷動尿脬破終日不能小便但漏濕不能乾宜服
黃絲綉 <small>生用</small>	白牡丹皮 <small>末千葉者可</small>
白茯苓	
右用水一椀煮至稠爛如飴空心頓服時時不得作一聲如作聲無効	

琥珀茯苓丸 治膀胱經積熱以致小便癃閉淋瀝	琥珀另研 赤茯苓 <small>去皮</small> 滑石 <small>挂附者</small> 知母 <small>去毛</small>	黃蘗 <small>皮去粗</small> 蛤粉 <small>另研</small> 川木通 <small>去皮</small> 當歸	澤瀉 <small>二兩</small> 人參 <small>各</small> 赤芍藥 <small>各</small> 山梔子仁	黃連 <small>去鬚</small> 大黃 <small>蒸</small> 黃芩 <small>去腐</small> 白朮	瞿麥 <small>各</small> 扁蓄 <small>各</small> 猪苓 <small>一兩</small> 木香 <small>半兩</small>	右為細末入另研藥研勻滴水和丸如梧桐子大每服四十九早晨用溫白湯送下	引水散 治小便澀滯不快或不通及腫痛脚氣一切濕證	海馬 海蛤 赤茯苓 川木通	琥珀 滑石 忘憂根 白丁香	通草 猪苓 <small>去皮</small> 昆蟲針 苦苣蕒 <small>然煎</small>	篇蓄 車前子 <small>微炒</small> 越桃 <small>即山</small> 瞿麥 <small>然煎</small>	澤瀉 茵香 <small>微炒</small> 木香 <small>已配</small> 石燕 <small>子</small> 附子 <small>微炒</small>	右為散每服五錢水一盞半燈心三十莖同煎取清汁八分內麝香末一字拌勻放溫食前服	沉香琥珀散 治諸淋不通皆可服	沉香 琥珀 <small>各</small> 通草 忘憂根	篇蓄 小茴香 <small>炒</small> 木通 麒麟竭	滑石 海金沙 木香 <small>各</small> 半	右為散每服一兩水二盞半燈心一祀竹葉十片連根葱白三枚同煎至七分去滓空心食前溫服如便塊加大黃半兩水道澀痛加山梔子半兩淋血加生地黃一兩濕流水煎極驗	海金沙散 治五淋澀痛	海金沙 肉桂 甘草 <small>炙</small> 紅赤茯苓
-------------------------	--	---	--	--	---	----------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---	---	--	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------	---------------------------------------

猪苓 白朮 芍藥 <small>已配</small> 澤瀉 <small>五兩</small>	滑石 <small>七兩</small> 石菖蒲 <small>一兩</small>	右為細末每服三錢水一盞燈心三十莖同煎至七分去滓空心溫服	琥珀散 治五淋	琥珀 滑石 <small>各</small> 二 木通 當歸	木香 鬱金 篇蓄 <small>各</small> 一	右為末每服五錢水一盞蘆薈葉五片同煎食前日三服治淋痛方	滑石 <small>四兩</small> 茯苓 白朮 具母	通草 芍藥 <small>各</small> 二	右為末酒服方寸匕日二服十日瘥	五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宜出少起	多麻腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如沙石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之	山梔子仁 赤芍藥 <small>去鹽</small> 各 <small>二十兩</small> 當歸 <small>去蘆</small>	甘草 <small>生用</small> 各 <small>五兩</small> 赤茯苓 <small>用白茯苓</small>	右為細末每服二錢水一盞煎八分空心食前服或以五苓散和之用竹園葉門冬草葱頭燈心煎湯調服	葵子散 利小便	葵子 <small>半升</small> 地榆 <small>三月</small> 滑石 <small>二兩</small> 石菖蒲 <small>去毛</small>	石楠葉 通草 <small>各</small> 一	右為散飲服方寸七日三服良	瞿麥膏 治諸淋疼痛不可忍及沙石淋皆治	右用大羅菊切一指厚四五片以好白蜜二兩浸少時安淨鐵鏟上慢火炙乾再曬蜜再炙者覆灸令香軟不可焦
---	--	-----------------------------	------------	---	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	--	---	------------	--	------------------------------	--------------	-----------------------	--

待安毒為度候溫細嚼以益湯一盞送下立効

銹刀散 治一切淋瀝服藥末効

右用生鐵刀一口多年者最佳用石一塊磨以盆內攪盛

水磨之澄清每服半盞或一盞不拘時服一方磨剪刀交

服水一盞服之即通

治尿淋痛

益原散 三水 茴香 二水 鐵粉

右為細末水一鍾半煎至一鍾不拘時服

車前子散 治諸淋閉澀不通大抵諸淋由腎與膀胱熱也腎

與膀胱為表裏俱屬於水水入小腸下脬中行於陰為小

便也腎氣不通於陰水液之道路膀胱為津液之府津液

內溢流於腎水道不通停積於脬腎熱而氣澀故水道不

利小便淋澀故謂之淋其狀小便數而出以小腹引脬急

痛又有氣淋石淋血淋形證殊異主療不同今以俗之

車前子 滑石 各一

右為細末每服半錢食前米飲調服日三服一方塗臍四

畔約四寸水和調服亦可

地龍湯 治五淋小便不利莖中痛欲死

右用牛膝濃煎汁飲極効酒煎亦可一方以根煮服之一

方提碎一兩用水二盞煎至一盞去滓一日五服

有葉朝議親入患血淋流下小便益內凝聚如藥藕久而

愈而血漸淡久乃獲舊後十年其病再作又服此藥雖未

矣經驗方陳氏云予在臨汀妻黨方守夷吾以其編類集

要方見示遂刊于郡齋後鄂渚得九江守王南強書云老

人又苦此淋疾百藥不効偶見臨汀集要方中用牛膝者

服之而愈乃致謝云嘗聞郡士有苦此者再試亦驗因檢

本草有載治小便不利莖中痛欲死却將煮飲今再檢出

表其神驗

通草散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝沙石痛不可

忍或出鮮血並皆治之

通草 二兩 切作片以酒洗 白芍藥 石菖蒲 各半

蒲黃 炒 桂心 一兩 王不留行 滑石 各半

葵子 半兩 甘草 二錢

右為細末每服三錢食前用沸湯調服

麥冬琥珀湯 治小便淋瀝莖中痛不可忍相引臍下痛

人參 五分 茯苓 四錢 琥珀 當歸 稍

芫胡 澤瀉 各一分 玄胡索 七分 川練子 炒 去黃

甘草 一主 錢各

右吹咀作一服長流水三盞煎至一盞去滓食前溫服數

服大効中統三年六月黃明之小便淋瀝莖中痛不可

忍相引臍下痛制以麥冬琥珀散治之

中書右丞相合刺合孫病小便數而欠晝夜約二十餘行

臍腹脹滿腰脚沉痾不得安卧至元癸未季春一日奉

勅治之遂往診脈得沉澀時時帶數嘗記小便不利有三不可

一緊而論津液偏滲於腸胃大便泄瀉而小便澀少者一

也宜分利而已熱搏下焦隨濕而不行者二也必滲泄而

愈脾胃氣澀不能通調水道下輸膀胱者三也可順氣令

施化而出右丞相公平素膏梁濕熱內蓄不得施化膀胱竅

澀是以起數而見少也非滲泄分利則不能快利遂處一

方名曰茯苓琥珀湯內經曰甘澀而淡滲熱搏津液內蓄

臍腹脹滿當須澀之泄之以甘澀為主是以茯苓為君

滑石甘寒滑以利尿澀者琥珀之淡以滲泄以利水道
故以三味為臣脾惡濕濕氣內蓄則脾氣不治益脾勝濕
必以甘為助故以甘草白朮為佐醜入腎醜味下泄為陰
澤瀉之鹹以泄伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行以
辛散之桂枝味辛散濕以潤燥此為因用故以二味為使
煎長流甘爛水使不助其腎氣大作湯劑令直達於下而
急速也兩服減半旬日良愈

茯苓琥珀湯

茯苓 琥珀 猪苓 白朮 澤瀉 滑石 桂心 甘草

右為細末每服五錢煎長流甘爛水一盞調下空心服待
少時以美膳壓之

瞿麥湯

瞿麥 黃連 羌活 木通 延胡索 桔梗 大腹皮 射干 桂心 牽牛

右以咀每服四錢七水一盞半生姜七片煎至入分去滓
不拘時溫服

石菖散

石菖 赤芍藥 白茅根 木通 瞿麥 川芒硝 葵子 木香

右以咀每服四錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

榆枝湯

榆枝 石鷲子

治氣淋膝下滿急切痛

右搗篩每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時服

肉桂散

肉桂 熟地黃 山芋 石斛 牛膝 官桂 檳榔 附子 黃芪 黃連 細辛 甘草

澤瀉散

澤瀉 雞蘇 石菖 赤茯苓 蒲黃 當歸 琥珀 檳榔

右為細末每服二錢七不拘時用冬葵子煎湯調服或木
通煎湯調亦可

沉香散

沉香 石菖 滑石 當歸 土不宿行 瞿麥 葵子 赤芍藥 白朮 甘草

右為細末每服二錢食前用大麥煎湯調服以利為度

檳榔散

檳榔 木香 當歸 母丁香 桂心 龍腦 檳榔 附子

右為細末每服一錢不拘時生薑蔥湯調服

生附散 治冷淋小便澀數起不通竅中疼痛清寒凜凜
因飲水過度或為寒泣心虛氣耗皆有此證

附子 滑石 瞿麥 木通

右為末每服二大錢水二盞生姜七片燈心二十莖蜜半匙煎七分空心服	榆白皮湯 治熱淋小腹脹滿數澀疼痛	犀角屑 山梔子 木通 瞿麥	滑石 枳實 川芒硝 一兩	右為散每服三錢水一盞煎至五分去滓食前溫服	瞿麥湯 治心經熱小便淋澀赤痛	瞿麥 三分 冬瓜子 茅根 各半 黃芩 去黑心 木通 一兩 竹葉 一握 滑石 二兩 研為細末 葵子 二合	右除滑石外餘搗篩分作三劑每劑用水三盞煎至二盞去滓入滑石末一貼攪勻食前分溫服	麥門冬散 治心熱氣壅澀滯成淋脐下妨悶	麥門冬 去心 木通 赤芍藥 葵子 已上各二兩	滑石 二兩 川芒硝 半兩	右為散每服四錢水一盞生姜半分葱白二莖煎至六分去滓食前溫服	四汁飲 治熱淋小便赤澀疼痛	蒲葯 煎汁 生藕 煎汁 生地黃 煎汁 白蜜 各五	右和勻每服七分一盞銀石器內慢火熬沸不拘時溫服	治熱淋方	右用大田螺十五箇以淨水養待田螺口中吐出泥澄去上面清水以底下濃泥入膩粉半錢調塗脐上呆立通將田螺便拔長江如留田螺或殺其病則不効	治熱淋方	右用白茅根切四斤以水一斗五升煮取五升服一升日
-------------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------------	----------------	---	---------------------------------------	--------------------	------------------------	--------------	------------------------------	---------------	--------------------------	------------------------	------	---	------	------------------------

三夜二服又方用泉水飲之	王不留行散 治熱淋疼痛不止	王不留行 車前子 木通 已上各葵子	滑石 各一兩 當歸 煨炒 蒲葯 赤芍藥	甘遂 煨 桂心 各半	右為細末每服一錢食前用粥飲調服	當歸湯 治血淋及五淋等疾	當歸 去蘆 淡竹葉 燈心 竹園筴	紅棗 麥門冬 烏梅 木龍 蒲葯 甘草	右各等分剉碎煎湯作熱水患此疾者多渴隨意飲之	羚羊角散 治血淋小便熱結澀痛	羚羊角屑 梔子仁 葵子 已上各二兩 青葙子	紅藍花 麥門冬 去心 大青 大黃 炒 各	右搗篩每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服	鷄蘇飲子 治血淋不絕	鷄蘇 一握 石膏 八分 竹葉 一握 生地黃 一兩	蜀葵子 為末	右先將四味以水五升煮取二升去滓下葵子末分溫二服如人行五里久進一服忌蕪荑蒜麪炙肉等	金黃散 治小便血淋疼痛	木黃 煨 人參 蛤粉 黃蜀葵 花 煨	右各等分為細末每服一錢七燈心煎湯調服日三	車前草方 治小腸有熱血淋急痛	右用生車前草洗淨白內搗細每服準一盞許并水調服清汁食前服若沙石淋則以寒水石火煨研為細末
-------------	---------------	-------------------	---------------------	------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------	--------------------------	--------	--	-------------	--------------------	----------------------	----------------	--

新水調服一方用蜜調服

神効方 治血淋

海螵蛸 生乾地黃 赤茯苓各等

右為細末每服一錢用栢葉車前草煎湯調下

髮灰散 治血淋若單小便出血如尿

右用亂髮燒灰入麝香少許每服一錢用米酢溫湯調下

治淋以葵子等分為末米飲調服亦治婦人胞轉不尿

神効琥珀散 治石淋水道澁痛頻下沙石

琥珀 桂心 滑石 川大黃微炒

葵子 膩粉 木通 木香

磁石燒紅酒洗七次細研水飛過各半兩

右為細末每服二錢食前用燈心葱白湯調服

如聖散 治沙淋

馬蘭花 麥門冬去心 白茅根 車前子

甜葶藶 苦葶藶 枳殼 連翹各等

右為末每服四錢水煎服如渴加黃芩同煎臨熟入燒鹽

少許服之

石驚丸 治石淋多因憂鬱氣注下焦結所食鹹氣而成令人

小便疼痛不可忍出沙石而後小便通

石驚子燒令通赤水中淬一二 石葶去毛

瞿麥穗 滑石各一

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服十丸食前用瞿麥

燈心煎湯送下日二三甚即以石葶去毛瞿麥穗木通各

四錢陳皮茯苓各三錢為末每服三錢以水一盞煎至七

分去滓服

獨聖散 治沙石淋

黃蜀葵燒子俱用

右為細末每服一錢七食前用米飲調服

治沙石淋痛不可忍

鹽甲九以者一箇

右為細末每服一匙酒調服當下沙石以効為度

下石淋方

右用雄鵠燒灰淋取汁飲之石即下若燒作灰以石投中

散解者是鵠鵠也又燒毛作屑內水中沉者是雄也又其

翼左覆右是雄也其雄鵠一名飛駁鳥也

又方 治石淋小便時沙石下流塞其水道疼痛不可勝忍經

及時日水道不通其氣上攻頭痛面目浮腫重則四肢六

節俱腫其石大者如梅核堅硬如有稜角其石小者惟碎

右相結通下即碎宜服此取石方

冬葵子 滑石 射干 知母已切

通草三分

右為細末每服二錢半水一盞半苦竹葉十片同煎取一

盞去滓食前熱服又大腑熱頭痛若林氣壯健先進後方

藥兩三盞然進取石方

治石淋水道不通却頭痛腸脊先宜服此藥

麻黃去節 羌活 射干 荊芥穗

紫苑去土 防風 知母 蔓荊子

牽牛已切 半夏二錢

右為細末每服二錢水一盞煎九分去滓食後熱服

治石淋導水

右用錢蛭七枚以鹽一兩同於新瓦上鋪蓋焙乾研為細

末每服一錢七溫酒調服即愈

沉香散 治膏淋膝下妨悶不得快利

沉香 陳皮湯浸去黃芪三各 瞿麥三各

榆白皮 韭子 滑石七兩上各 黃芩

甘草半兩 右為細末每服二錢食前用清粥飲調服

沉香丸 治膏淋

沉香 內從葵酒浸荆芥穗 磁石三火燒醋淬

黃芪 滑石各一 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九不拘時用

溫酒送下

磁石丸 治膏淋小便肥如膏

磁石三火燒醋淬 澤瀉 內從葵湯浸

滑石各一 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九不拘時用

溫酒送下

海金沙散 治膏淋

海金沙 滑石各一 甘草一分

右研勻每服二錢食前用麥門冬煎湯調服燈心湯亦可

兔絲丸 治膏淋

兔絲子去塵土水淘淨 桑螵蛸炙各澤瀉一分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心用清

木飲送下

地黃丸 治腎虛勞膀胱結淋

生地黃切焙 黃芪各半 防風去叉 遠志去心炒

茯神去木 鹿茸酥炙 黃芩去黑 枯薑一兩上各

人參一分 石菖去毛 當歸酒洗 赤芍藥

戎鹽研 蒲黃 甘草各三各 車前子

滑石各二 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食前用溫

酒送下或鹽湯亦可

黃芪湯 治腎虛變勞淋結澀不利

黃芪二兩 人參 五味子 白茯苓去皮

旱蓮子 磁石火燒醋淬 滑石七兩上各 桑根白皮三分

枳殼去核 黃芩去黑心 右搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓不拘時服

白芍藥丸 治勞淋小腹疼痛小便不利

白芍藥 熟地黃 當歸 鹿茸各一

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九不拘時用

阿膠湯送下

止夜起小便多方

益智子皮剉碎 赤茯苓三各

右用水一椀煎至六分臨睡熱服

當歸散 治本淋瀝小便痛澀

當歸 猪苓去黑 海蛤研 漢防已

甘遂黃 赤芍藥 滑黃泥上各亂髮灰一分

右為細末每服一錢食前用水通葱白煎湯調服

榆皮飲 治小便暴淋澀不通

榆白皮 瞿麥穗 梔子仁 郁李仁湯浸去

赤茯苓去皮 雞蘇葉 木通各半

右咬咀每服三錢七水一大盞煎七分去滓不拘時溫服

八珍散 治大人小便澀去潮熱

大黃 木通 滑石 山梔仁

黃芩 瞿麥 荊芥 粉草各等

右為細末每服一錢不拘時用薄荷湯調下小兒加減服

通利小腸治小便赤澀 滑石研末 朴硝研 甘草末各 琥珀研末

右研勻每服二錢七空心燈心煎湯調下

通滑散 治熱結小便赤澀不通水道中痛尿即瀉

滑石一兩 通草半 冬葵子 赤茯苓

車前子 黃芩各半

右為細末每服半錢或一錢食前溫熱水調下

治尿血方

淡竹葉 麥門冬 白茅花 車前子

陳柳枝 天門冬去心 地榆 香附子

鬱金 燈心絡半

右以水二椀煎八分去滓調四苓散空心服

三苓散 治尿血

茯苓去皮 猪苓去皮 白朮 澤瀉各等

右為細末每服二錢空心用煎前藥調

蒲黃丸 治虛損膀胱有熱尿血不止

蒲黃 葵子 赤茯苓 黃芪已上各

車前子 當歸微炒 荆實已上各 麥門冬去心

生地黃各二

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十

丸食前用米飲送下

壯腰散 治勞損傷中尿血

牡蠣煨 車前子 白龍骨煨 熟地黃

黃芩 桂心略

右為細末每服二錢食前未飲調下

如神散 治心膈有熱熱乘於血血滲小腸故尿血也

阿膠二兩 山柰二 車前子 黃芩

甘草各半

右為細末每服半錢或一錢并花水調下日三服

鹿茸酒洗去毛 生地黃倍 當歸各二兩

蒲黃一合 冬葵子兩半

右為極細末每服三錢七空心用溫酒調服日二一方治

下元虛憊尿血煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九食前

用炒鹽湯送下

治小便出血方

當歸酒洗

右以酒三升麥取一升煎服亦治遺尿小便澀

治小便頻數卒然下血不止並不疼痛此緣心中積惡穢謀殺

險長懷嫉妬多積忿乾傷損肝心正氣又因色傷小腸氣

虛血承虛妄行故有此疾宜服此方

桑寄生一兩 熟地黃 茯苓各半 人參

川芎 獨活 蒲黃各一 甘松

沉香各二

右為細末每服三錢七水一盞煎一二沸便瀉出去滓非

時與服此藥後其血已安按覺丹日元氣之虛腰膝沉重

多困少力者宜用桑寄生為細末每服一二錢非時點與

以補之

犀角地黃湯 治小腸淋瀝出血疼痛難忍及治心火妄行

血等疾食後臨臥服之川芎茅根煎服余癸丑夏嘗苦

瀉之疾出血不已得黃應明受此方數服而愈

犀角半兩如無以 芍藥二兩 牡丹皮半兩

生地黃二兩

右劉碎作一服水一盞煎八分空心服

石菖散 治小便利

石菖去毛 瞿麥穗 冬葵子酪 滑石研五

右為細末每服三錢七空心用溫水調服

治小便利莖中疼痛小腹急痛

蒲黃 滑石各等

右為末酒服方寸七日三服大驗

治小便利

沒藥 木香 當歸各等

右為細末以刺薊心取自然汁和丸如梧桐子大每服五

七丸食前用溫湯送下

治小便利

小便不快為何緣 不用鍼醫用藥灸

扁竹水煎連口嚙

神聖聖德不虛傳

治忍小便胞轉方

右以自瓜甲燒灰水服

治男子婦人過忍小便胞轉

右以滑石末蒸湯調下

通關瞿麥湯 治膀胱積熱小便不通

瞿麥穗 芍藥 大黃炒 梔子仁

楡白皮 葵子 當歸焙 火麻仁

石菖去毛 木通 甘草炙 各

右劉碎每服五錢七水一盞半燈心少許煎至一盞去滓

不拘時溫服

治小便利不通數日欲死者神効

桃枝 柳枝 木通 旱蓮子

漢椒 白礬各一兩 葱白一握 燈心一束

右細劉以水三斗煎至一斗五升用瓷瓶一所熱盛一半

藥汁薰外腎週迴以被圍繞轉不得外風入良久便通如

赤豆汁若冷即換之其功甚大一才無旱蓮子

獨蒜塗臍方 治小便利不通

大蒜獨顆者 梔子仁三 藍花少許

右搗爛攤紙花子上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

牛膝湯 治小便利不通莖中痛及治文入血結腹堅痛

牛膝根生用 當歸焙 黃芩去黑心

右劉碎每服五錢七水一盞半煎七分去滓溫服日三

猪肚丸 治小便利頻數

猪肚一個以蓮子一升同煮一月 舶上茴香

破故紙 川棟子 母丁香各一

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒送下

鷓鴣脰丸 治小便利數而多

鷓鴣脰二兩 麥門冬去心 熟地黃 黃連去鬚

龍骨已炙 土瓜根半兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十

丸食前用米飲送下

川方五子丸 治小便利夜多脚弱老人匿入多有此證

兔絲子酒蒸 家韭子微炒 益智子去灰 蛇床子炒

茴香炒 各

右劉碎每服五錢七水一盞半燈心少許煎至一盞去滓

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十九食前

糯米飲或鹽湯送下

治小便數氣少走泄

水芝丸 治下焦真氣虛弱小便頻多日夜無度

蓮實去皮不以多少用特選二宿用者則一個并酒

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服三十九食前用溫酒送下

雙白丸 治證同前

白茯苓去皮 鹿角霜各等

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十九空心用鹽湯送下

太醫院經驗奇效良方卷之三十五

太醫院經驗奇效良方卷之三十六

遺溺失禁門 附論

夫以方論其小便遺失者為腎與膀胱虛冷不能約其水也今乃以為熱有所據乎曰此劉河間深得其旨乃作原病云云熱客膀胱鬱結不能滲泄故也或曰小便澀而不通者為熱遺溺不禁者為寒豈知熱甚而氣血不能宣通則痿痺而神無所用故液滲入膀胱澀溺遺失不能收禁也內經則謂腎虛生病為遺溺又曰膀胱不禁為遺溺蓋謂肝所生病亦遺溺蓋因二經精陰器禁廷孔病則氣行不至氣血虛勞莫能約束水道之數故遺失不禁也又曰水穀入于口其味有五各注其海津液各走其道故三焦出氣以溫肌肉充皮膚為其津液流而不行者為液天熱衣厚則腠理開故汗出也寒氣留於分肉聚沫則為痛天寒衣薄則腠理閉氣濕不行水下留於膀胱則為溺與氣也靈樞又云手太陽虛小便遺遺者觀之則人不獨病在陰廷孔而已夫如是者乃是三焦決瀆之失常何以足三焦之手少陽從足上入絡膀胱故不約也肺手太陰從上焦通調水道下輸膀胱腎又上連肺故將兩臟更是子母臟也母虛子亦虛此非上下三焦氣虛皆足以致其遺溺乎肺屬金腎與膀胱屬水所以金乃水之源膀胱者乃滲泄之府腎者水之竅今慮不禁病何止于熱極鬱結痿痺腎部而已又有內經所謂太陰在泉客勝濕客下焦澀便不時太陰之復甚則入腎竅泄無度者觀之但濕主于否况是於勝之邪其不為鬱結痿痺者乎從而思之聖人之言舉一隅便當以三隅反前謂肝腎膀胱之病不言其邪可見諸邪盡能病之也故言手太陰別之虛者為子母藏氣者之安也可見折生折復不勝之玉邪亦不是能挾之也大抵人之遺溺蓋心屬火與小腸為表裏二氣所以受盛是為傳

送又腎為水合膀胱為表裏膀胱為之府水注於膀胱而泄也
 小腸實相交通也若心腎氣弱陽道衰冷傳送失度必遺尿失
 禁經云膀胱不利為癃不約為遺矣夫水火不濟陰陽不調下
 焦蓄冷腎與膀胱受尅故不能制水水道滑則因水挾寒而不
 禁也又曰下焦蓄血虛勞內損則便溺自遺而不知下焦虛寒
 不能溫制水液則便溺數出而不禁乃心不與腎交通或冷或
 熱而滑泄隨之也不然若不觀於色不辨於脈不審所兼之病
 狀獨指為冷指為熱獨務滋水道之竅不求邪所自之本者五
 味所從也傷寒論脈法有曰寸口脈微而滑微者胃氣不行膈
 者榮氣不足榮衛不能調則三焦無所伸而歸其部上焦不歸
 變而吞酸中焦不歸者不能消穀引飲下焦不歸者則遺溺失
 禁也治之之法當溫補下元清心寡慾宜用秘元丹家韭子丸
 分清飲之類又有產後所傷及小兒胞冷皆有遺溺失禁者臨
 證察脈究其所因度其遺禁對病用藥服解効矣

遺溺失禁通治方

二氣丹 治內虛寒勝膀胱積冷陽氣漸微小便不禁

硫黃 細研 桂心 各二兩 附子 一枚 炮去

乾薑 二兩 未 殊砂 各二兩

右件拌勻麩糊和丸如梧桐子大以殊砂為衣每服五十

丸空心用益湯送下

家韭子丸 治下元虛冷小便不禁或成白濁常服補養元氣

進美飲食

家韭子 兩 鹿茸 兩 牛膝 酒浸

熟地黃 兩 當歸 二兩 巴戟 去心

杜仲 去粗 石斛 去根 乾薑 炮

右為細末酒黃稠為丸如梧桐子大每服一百丸空心

溫酒或益湯送下

茯苓丸 治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁

赤茯苓 白茯苓 各等

右為細末以新汲水投洗澄去新沫乾後研為末別取

地黃汁與好酒同於瓦石器內熬成膏和丸如彈子大

每服一九細嚼空心用益酒送下

鷄內金散 治遺尿失禁

鷄胙 一具 并腸等洗燒灰

右為細末每服二錢空心溫酒調服一方加猪膽燒灰存

性焙乾同為末依前法調服

兔絲子丸 治小便多或致失禁

兔絲子 酒洗 肉蓯蓉 酒浸 各

附子 炮去 牡蠣 煅 各

桑螵蛸 酒炙 鹿膠 一兩

右為細末酒黃稠和丸如梧桐子大每服七十九空心用

益酒或益湯送下

桑螵蛸散 治小便頻數如稠米泔色此由勞傷心腎得之服

此藥不熱劑而愈大能安神定志

桑螵蛸 酒洗 遠志 去心 龍骨

人參 去蘆 茯神 去木 鼈甲 醋炙 當歸 各等

右為細末每服二錢臨臥時用人參煎湯調服

益智仁湯 治疝氣痛連小腹叫呼不已小便頻數是腎經積

冷所致

方見氣門

治小便遺失方

阿膠 鹿茸 酒炙 桑螵蛸 酒炙 各

右為細末糯米糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用
溫酒送下

鹿角霜丸 治上熱下焦寒小便不禁

右用鹿角帶頂骨者不以多少鋸作錠子長三寸洗了用
水桶內浸夏三冬五晝夜用浸水同入鐵內煮之竟湯少
添溫湯日夜不絕候角絲索為度輕漉出用力刮去皮如
雪白放在篩子上候自乾微火焙之其汁慢火熬為膠候
角極乾為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十九加
至四十九空心用溫酒或鹽湯送下

牡蠣丸 治小便不禁

牡蠣白者三兩鹽磁器盆子內更用鹽末一兩蓋
鋪底以炭火燒五斤燒半日取出研如粉
赤石脂三兩碎磁器盆內更用鹽末一兩蓋
鋪底以炭火燒五斤燒半日取出研如粉

右同研勻酒煮糊和丸如梧桐子大每服十五九空心用
鹽湯送下

鹽湯送下

鷄腸散 治小便不禁日夜無度

黃鷄腸雞首四具切破 黃連去須 肉蓯蓉酒洗
赤石脂別研 白石脂別研 若家各五

右為細末更研勻每服二錢食前酒調服日二夜一

治少小睡中遺尿不自覺方

雄鷄肝桂心各等

右同搗爛如泥丸如小豆大每服十粒溫酒送下日三服

燕屎床方

右用羊脾盛水貯令滿繫兩頭煮熟開取水頓服之即差

固脾丸 治小便不禁

兔絲子二兩 茴香一兩 附子指末 桑螵蛸炙 鹿角各
戎鹽一分

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十九空心
用米飲送下

治小便不禁方

益智仁

兔絲子酒蒸

右各等分為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十九
食前溫酒或鹽湯送下

澤瀉散 治遺尿小便澀

澤瀉

赤茯苓

右為細末每服二錢食前用酒調服

治小便遺失

阿膠

牡蠣

右為細末糯米糊和丸如梧桐子大每服五十九空心
鹽酒送下一方治遺尿小便澀無桑螵蛸有桑耳以水七
升煮取二升分作二服一方以粥飲下

阿膠散 治遺尿不禁

阿膠

牡蠣

右對散每服四錢水一盞煎七分空心服或為細末米飲
調服二錢亦可

治小便失禁方

右用鷄腸一具以水三升煮取一升分三服一方用雄鷄
燒灰為末用三指一撮溫漿水調一錢向北斗服之更良

白接散 治小便不禁

白接

右為細末每服二錢食前以粥飲下

白接

白芍

右為細末每服二錢食前以粥飲下

白茯苓散 治小便不禁日夜不止

白茯苓 龍骨 乾姜 附子去心續斷

桂心 甘草各一兩 熟地黄 桑螵蛸二兩

右剉碎每服四錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

鹿茸散 治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸二兩去毛 韭子微炒 羊躑躅酒拌

附子皮法 澤瀉 桂心各一

右為細末每服二錢食前以粥飲調服漿水調服亦可

鹿茸散 治腎臟虛腰膝冷疼夜遺小便

鹿茸去毛 烏賊魚骨去甲 當歸

白芍藥 桑寄生 龍骨研 人參已上各

桑螵蛸火炙令黃

右為細末更入龍骨同研令勻每服一錢用溫酒調服空

心日晚臨卧各一服

鹿絲子散 治小便多或不禁

鹿絲子二兩酒浸三日曝 牡蛎燒為 附子炮去

五味子各一兩 雞脛胫兩 內菴蓉二兩酒

右為細末每服二錢食前以粥飲調下

治小便多或不禁

右用雄雞喉嚨及矢白脰脰裏黃皮燒為末麥粥清盡服

之亦可以赤鷄翅燒末酒服三指撮日三

治遺尿及小便多或不禁

益智一兩 龍骨四兩 牡蛎半兩 川烏去殼

右為細末酒煮稠和丸如梧桐子大每服五十九空心用

川草薢煎湯送下

太醫院經驗奇效良方卷之三十六終

太醫院經驗奇效良方卷之三十七

五疸門

五疸之病諸書所載甚繁其證不過有五一日黃汗二曰黃疸
三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸黃汗為病身體俱腫汗出不
渴其汗能染衣黃如葉汁此由脾胃有熱汗出或風所閉熱結
其汗黃也黃疸食已即飢遍身俱黃卧時身體帶青帶赤增寒
壯熱此飲酒食過度臟腑熱水穀併積於脾胃風濕相搏熱氣
薰蒸發於陰部其人必嘔發於陽部其人必振寒而後熱穀疸
之證食畢即頭眩心中憊管不安遍身發黃此脾胃有熱因大
飢過食所傷胃氣所致也酒疸之病身目發黃心中懊痛足脛
滿小便黃面發赤此由飢中飲酒大醉當風入水所致女勞
疸者身目俱黃發熱惡寒小腹滿急小便不利此由過於勞傷
極於房室之後入水所致多渴腹脹者難治丹溪論云不必分

其五等皆濕熱而成因然審辨清濁濕與熱搏氣不得透而
生黃五疸之分皆是前人之所註且如張長沙謂陽明病無汗
小便不利心中懊憹身必發黃脈來浮滑緊數乃熱畜於脾胃
經可作陽明實發黃朱肱云病人寒濕在裏不散熱畜於脾胃
而腰理不開寒熱與宿數相搏鬱蒸而發黃也且如傷寒當汗
不汗當利小便不利亦生黃夫脾為土而受水濕發黃者有之
脾來沉細而無力身冷而黃為寒熱搏於大陰脾經當作陰證
治之又有畜血一證小便自利大便黑色其人發狂乃為瘀血
蓄在下焦而發黃也若嗜酒之人多致發黃蓋酒性大熱熱與
濕搏於胃中而黃發於外其證外無熱內則小便不利胃中如
吹蒸蒸狀當心足下皆熱又遠則成黑疸狀若浮滑腹滿欲嘔
吐者必先吐之脈若沉滑腹滿大便必先下之又有本然
發黃心滿而喘命在頃刻者為之本黃但心戰發熱是也大便

五升

痘病湯者難治不渴者易治痘毒入腹喘滿者危脈洪大大便
利而渴者死脈微小小便利不渴者生寸口無脈鼻氣冷者亦
不治又有口淡怔忡耳鳴脚弱或微寒熱小便赤白濁又當作
厘證治之不可妄用涼藥愈傷血氣治法分利濕熱尿為切當
臨病之際在乎脈證辨之入命醫之所繫可不謹乎

五痘通治方

加減五苓散 治飲食伏暑鬱發為痘煩渴引飲小便不利

茵陳 猪苓 去皮 白朮 赤茯苓 去皮

澤瀉 各二

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服一方有桂心

葛根湯 治酒疸

乾葛 三升 梔子仁 枳實 去穢 豆豉 已炒

甘草 炙

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

當歸白朮湯 治酒疸發黃心胃堅滿不進飲食小便黃赤其

脈弦濇

當歸 黃芩 茵陳 甘草 炙 已炒

白朮 二升 半夏 湯洗 杏仁 去皮尖 枳實 去穢

前胡 已炒 茯苓 二升

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

白朮湯 治酒疸因下後變為黑疸目青面黑心中如啖蒜蒜

狀大便黑皮膚不仁其脈微而數

白朮 桂心 絡二 豆豉 枳實 去穢

乾葛 杏仁 甘草 炙 絡

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

秦朮 斂子 治五疸口淡咽乾發熱微寒

秦朮 去蘆 當歸 酒洗 芍藥 白朮

官桂 去皮 茯苓 去皮 陳皮 熟地黃 須蒸

小單 川芎 半夏 湯洗 甘草 炙 絡

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

山茵陳散 治痘證發熱大小便秘澀

山茵陳 梔子 絡二 赤茯苓 枳實 絡半

葶藶 甘草 絡一

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

加味四君子湯 治色疸

人參 白朮 白茯苓 白芍藥

黃芪 炙 白扁豆 炒 甘草 炙 絡一

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

一清飲 治痘證發熱諸熱通用

北胡 三升 赤茯苓 去皮 桑白皮 炒 川芎 絡一 甘草 炙 絡一

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾食前服

茵陳湯 治時行赤熱在裏鬱蒸不散通身發黃

茵陳 二兩 大黃 四兩 梔子仁 二升

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

金黃丸 治酒積食積諸積面黃痘積硬塊

荆三 棗 牽牛 絡半 巴豆 炒 泔水 黍米粉

香附子 醋半 澤瀉 半

右為細末用梔子煎湯和丸如菜豆大每服三九至五九

食遠用白湯送下

較痘丸 專治較痘

苦參 三兩 龍膽草 一兩 牛膝 炙 絡一

右為細末用牛膝汁入少煉蜜和丸如梧桐子大每服三

五九

五九二

十九空心熱水或生薑甘草煎湯送下
滑石散 治女勞疸
滑石半兩 白礬粉兩

右為細末每服二錢用大麥粥清食前調服以小便出黃
水為度

黃連散 治黃疸大小便秘瀉臟腑壅熱

黃連 川六黃 各三兩 用
甘草一兩

右為極細末每服二錢食後用溫水調服日三

必効散 治黃疸通用

葶藶 龍膽草 山梔子 茵陳

黃芩 各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘服

嗜藥瓜蒂散 治黃疸遍身如金色累効

瓜蒂二錢 母丁香一錢 黍米四升 赤小豆半錢

右為細末每夜吹兩鼻孔內入便曉明日取下黃水次
服黃連散

桂枝加黃芪湯 治黃汗身腫汗出已輒輕久久必身潤胃

中痛腰已下無汗其腰弛痛如有物在皮中劇者不能飲

食煩燥小便不利

桂枝二兩 芍藥三錢 甘草一錢 黃芪三錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗三枚煎至一鍾食遠服

仍飲熱粥以助藥力

梔子丸 治時行病急黃久瘵瘵痲癘

梔子仁 茵陳 芒硝 大黃 各一兩

杏仁 法以鐵豆豉別煎軟散甲 常山 各半兩

巴豆祛痰
右為細末傷寒為尤如梧桐子大每服三九食遠用米飲
送下吐利是効未効加一丸

茵陳散 治黃疸食已即飢身體面目瓜甲牙齒及小便悉黃
寒熱或身體多赤多青皆由酒食過度為風濕所搏熱氣
鬱蒸而成

茵陳 木通 大黃 梔子仁 各一兩

石膏二兩 桔蘘一箇 甘草半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片葱白一莖同煎至
八分去滓不拘時溫服大小便秘加枳實赤茯苓葶藶又
有傷寒瘀血不解醫發於表發為黃疸其脉浮緊當以汗
解獨煎好麻黃湯飲之

黃芪湯 治黃汗身體腫發熱不渴汗出染衣黃色

黃芪 赤芍藥 茵陳 石膏 各四兩

麥門冬 去心 淡豉 甘草 各半兩

右咬咀每服四錢用水一盞生薑五片煎七分去滓食前
服一方入竹葉十四片不用姜一方無甘草

黃芪苦酒湯 治黃汗身體腫發熱汗出而不渴狀如風水汗

出沾衣色黃如藥汁脉自沉此由汗出入水中浴水入汗

孔中從外而得之

黃芪 芍藥 官桂 各三兩

右劉如麻豆大每服五錢匕用苦酒一盞半同煎取七分
去滓不拘時溫服服之當心煩苦酒助故也一方用苦酒
三合水一盞半同煎服

犀角散 治急黃心膈煩躁目赤痛

犀角屑 黃芩 升麻 梔子仁 各一兩

茵陳 朴硝略二

右咬咀每服四錢水一盞竹葉三七片煎至六分去滓不

拘時服

治陰黃汗染衣涕唾黃
右用蘆薈子搗末平旦以井花水服一匙日再加至兩匙
以知為度每夜小便中屢少許帛子各書記日色漸退白
則瘥不過服五升而愈

秦朮湯 一名秦朮散 治陰黃不欲聞人言小便不利

秦朮 去苗土 旋覆花 赤茯苓 去皮 甘草 剉炙各

右咬咀每服四錢七以牛乳汁一盞煎至六分去滓不拘
時溫服

瞿麥散 治黃疸小便赤澀心神煩悶

瞿麥 麥門冬 去心 茵陳 黃芩 剉各

梔子 二兩 大黃 半兩

右咬咀每服四錢用水一盞煎至六分去滓不拘時服以
小便利為度

大醫院經驗奇效良方卷之三十七終

大醫院經驗奇效良方卷之三十八

五痺門 附論

素問云痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為痺也其
風氣勝者為行痺寒氣勝者為痺痺濕氣勝者為著痺其各有
五皆由此三氣客於五臟而成過春得者為筋痺中於肝則筋
痺不通心下鼓氣暴上逆喘噎乾喜噫過仲夏得者為肌痺中
於脾則四肢怠惰發咳唾汗過秋得者為皮痺中於肺則皮無
所知煩滿時唯氣奔痛過冬而得者為骨痺中於腎則骨重不
可舉善脹尻以代踵脊以代頭大抵風勝則游走上下無所留
止隨其虛邪與血氣相搏聚於關節為弛縱筋脈不收也此各
風痺寒勝四肢重痛關節浮腫為膏痺濕氣留而不發汗多四
肢酸軟皮膚不仁精神昏塞為著痺風寒濕合而為痺則皮膚

痿痺或肌肉痠痛此為邪中周身搏於血脈積年不化則成癱
瘓風痿者之不痛頭髮脫落為本痺其中又有胞痺腸痺血痺
熱痺者之異名胞痺者小腸膀胱按之內痛而滿水道不化
上為筋痺腸痺者三氣乘虛客於大腸其病數飲中氣喘急時
作珍泄小便不通血痺者邪入於陰血之分其狀體常如被微
風所吹骨弱勞瘦汗出則不時搖動熱痺者蓋臟腑移熱後
遇風寒濕三氣雜至而客搏經絡留而不行湯遺其陰故痺痺
熾然而問也肌肉熱極體上如鼠走之狀唇口反壞皮膚色變
經曰痺之為病或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕凡痛
者寒多也不痛不仁者病久邪深榮衛行溢經絡不通皮膚不
營因而痛不仁也若陰氣多陽氣少與病相益故寒也若陰
氣少陽氣多病氣勝陽勝陰故熱也至於汗多而濡者其濕甚
也痺而不痛者在骨則重著在脉則血凝在筋則屈不伸在內

痺不仁在皮則寒此五者皆不痛也外有支飲亦令人痺支飲之病飲之為痰故也治之之法當辨其三氣留不何經部分或表或裏虛實偏勝推其因詳其結果因三氣為病隨經治之或不因三氣從他痺而為病者當隨他病而治之又有水痺與白虎歷節風之證豈可一藥施之在乎醫者誠心究治則庶幾不差矣

五痺通治方

獨痺湯 治冷痺手足腰痛沉重及身體煩疼背項拘急

常歸 治風濕 赤芍藥 黃芪去蘆 片姜黃 羌活 二升 甘草 一

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾去滓不拘時服一方加防風二錢

五痺湯 治風寒濕之氣客留肌體手足酸弱麻痺不仁

片姜黃 羌活 白朮 防已 二升 甘草 一

右作一服用水二鍾生薑七片煎至一鍾病在上食後服病在下食前服

羌活湯 治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

羌活 二升 秦艽 去蘆 當歸 去 附子 炮去 防風 去蘆 骨節補 木香 桃仁 去皮尖 牛膝 去蘆 川芎 桂心 一升 甘草 五分

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

防風湯 治血痺皮膚不仁

防風 二升 赤茯苓 去皮 川獨活 桂心 去皮 秦艽 去蘆 赤芍藥 杏仁 去皮 黃芩 甘草 各一升 川當歸 一升 半

甘草 各一升 川當歸 一升 半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服一方有葛根麻黃無獨活赤芍藥

附散 治五 痛身 骨間發作不定者

川芎 附子 炮去 黃芪 去蘆 白朮 當歸 羌胡 去蘆 防風 去蘆 熟地黃 桂心 甘草 各一

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾空心服

烏頭湯 治歷節風痛不可屈伸

烏頭 五錢 炮碎以蜜二盞 麻黃 去節 黃芪 芍藥 甘草 各二

右作一服用水二鍾煎至一鍾去滓入前蜜再煎一二沸不拘時溫服

附子入物湯 治白虎歷節身痛如錐不可忍

附子 炮去 乾薑 炮 芍藥 一升 白朮 二錢 茯苓 去皮 桂心 去皮 人參 去蘆 甘草 一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服一方去桂用熟地黃二錢

茯苓湯 治停畜支飲手足麻痺多胸腹胃

半夏 湯洗七 赤茯苓 去皮 陳皮 各一兩 枳實 去殼 枳殼 去殼 甘草 半兩

右作咀每服四錢水一盞半姜七片煎七分去粗溫即不拘時

三痺湯 治血氣滯滯手足拘攣風痺等疾皆瘳

川續斷 杜仲 去皮 防風 桂心 人參 白茯苓 當歸 白芍藥 川獨活 各半 黃芩 川牛膝 細辛 各一

川獨活 各半 黃芩 川牛膝 細辛 各一

甘草 兩各一 素尤 生地黃 川芎

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾去滓不拘時服

舒筋散 治臂痛腰下疼痛

當歸 赤芍藥 海桐皮 白朮 三錢

羌活 片薑黃 甘草 各錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾腰上疾食後服腰下疾食前服一方知防也名增味五痺湯

茯苓川芎湯 治著痺流注不去四肢麻拘挛浮腫

赤茯苓 桑白皮 防風 官桂

川芎 麻黃 芍藥 當歸

甘草 各等分 右作一服用水二鍾紅棗二枚煎一鍾空心服飲汗

益薑粥投之汗出為度

虎骨散 治白虎風肢節疼痛發則不可忍

虎骨 二兩 全蠲 去毒 甘草 各半兩 麝香 一分

川牛膝 酒洗去毒 防風 去毒 白殭 蠶 去毒 川當歸 酒洗去毒

桂心 不見 乳香 另研 天麻 已上各 白芍 兩 酒洗

右為細末每服三錢不拘時用巨淋酒調服

續斷丸 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

川續斷 當歸 草薢 附子

防風 天麻 一兩 各 乳香 沒藥 各半

川芎 七錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四十九空心用溫

酒或米飲送下

獨痛丸 治諸風壅聚痲痺

川烏 三錢 全蠲 去毒 麝香 另研 黑豆 七錢

地龍 半兩

右為細末酒糊為丸如菰豆大每服十五丸至二十九臨睡用冷酒送下微汗不妨

升麻湯 治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱筋脈變急

升麻 二兩 茯神 去皮 犀角 剉 羚羊角 剉

人參 防風 羌活 已上各 官桂 一條

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓入竹瀝少許不拘時服

五積散 治寒濕麻痺

方見寒門

薤苳仁湯 治手足流注疼痛麻痺不仁難以屈伸

薤苳仁 當歸 芍藥 肉桂 去皮

麻黃 甘草 各一兩 蒼朮 四兩 去粗皮 黃

右咬咀每服五錢水二盞生薑五片煎至七分去滓食前

溫服若病人汗出者去麻黃若病人有熱者去肉桂虛實

加減服之

尋痛舒筋丸

兩頭尖 五靈脂 膠 半草烏 乳香

沒藥 各三

右為細末搗生葱汁和丸如梧桐子大每服三五丸臨睡

時用溫酒送下溫湯亦可忌熱物

人參補氣湯 治兩手指麻木

人參 生甘草 歸 半炙甘草 升麻 各二

黃芪 八錢 白芍藥 三錢 羌活 半 五味子 十粒

右咬咀分作四貼每貼用水二鍾煎至一鍾不拘時服

羌活散 治風痺手脚不仁	羌活	漢防已	防風	酸棗仁
道人頭	川芎	附子	麻黃	蘇子
天麻	黃松節	薏苡仁	荆芥	
右為細末每服二錢不拘時用溫酒調服				
循絡丸 治風痺氣滯血脉凝澀筋脉拘攣肢節腰膝強痛行步艱難	沒藥	乳香	虎骨	敗龜板
	五靈脂	當歸	白附子	天麻
	全蝎	南星	附子	川烏
	杜仲	地龍	牛膝	威靈仙
	烏蛇	肉桂	硃砂	續斷
右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服三十九食前用溫酒送下				
巴戟天湯 治冷痺脚膝疼痛行履艱難	巴戟天	附子	五加皮	牛膝
	石斛	甘草	草薢	白茯苓
防風散 治風寒冷濕搏於筋骨使筋攣掣痛行步艱難但是諸筋攣縮疼痛悉皆治之	松節	治風寒冷濕搏於筋骨使筋攣掣痛行步艱難但是諸筋攣縮疼痛悉皆治之		
去滓空心溫服一方無生薑				
右到如麻豆大每服五錢生薑三片水一盞半煎至一盞				
石斛萬病散 治風濕痺腰脚不遂	石斛	防風	細辛	甘菊花

蜀椒	乾薑	人參	雲母石
附子	杜仲	牛膝	羌活
白朮	薯蕷	天雄	熟地黃
續斷	巴戟	遠志	肉桂
茯苓	烏朮	草薢	蛇床子
桂心	山茱萸	五味子	
右為細末每服二錢食前用溫酒調服			
黃芪酒 治風濕痺身體頑麻皮膚癢癢筋脉攣急言語寒澀手足不遂時覺不仁	方見風門		
乳香宣經丸 治風寒濕痺四肢拘攣筋骨疼痛行步艱難脚氣諸疾並皆治之	乳香	附子	木香
	黑豆	草烏	川椒
	防風	陳皮	黑牽牛
	烏桑	草薢	
右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服三十九漸加至五七十九空心用溫酒送下			
透骨通氣驅馬丹 治風寒濕痺四肢拘攣筋骨疼痛行步艱難並宜服之	黃木香	草薢	川烏
	穿山甲	虎骨	細辛
	乳香	沒藥	當歸
	附子		赤芍藥
右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服三五九加至十五九空心用溫酒一盞送下			

烏頭粥 治風寒濕痺麻木不仁

川烏頭生研末

右每用香熟白米半碗入藥末四錢同米以慢火熬熟作稀薄粥不可稠下生薑汁一茶脚許白蜜三大匙攪勻空心溫服之為佳如是中濕更入葱豉仁末二錢增米作一中掩煮服此粥大治手足四肢不隨及重痛不能舉者有此證者預服防之左氏云風濕末疾謂四肢為四末也脾主四肢風邪客於脾則滯脾脾為肝冠故疾在末穀氣引風溫之藥徑入脾經故四肢得安此湯劑極有功予常制此方以授人服者良驗

獨痛丸 治風寒濕痺筋骨重疼走注攻刺腰脚無力

草烏四兩去皮尖

南星生用 地龍去土

破故紙炒 五靈脂炒 白膠香炒 乳香炒 沒藥炒 乳香炒 京墨炒

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服十九用溫酒送下漸加丸數服之

木瓜虎骨丸 治風寒濕客於榮衛合而成痺脚重不仁疼痛

少力足下癱痛不能踏地腰膝筋變不能屈伸及項背拘急手臂無力耳內彈鳴頭眩目眩及諸脚氣行步艱難並宜服之

方見濕門

烏頭湯 治風寒濕痺留於筋脉拘攣不能轉側亦治脚氣

川烏 細辛 川椒 白芍藥

附子 秦艽 官桂 甘草已上各

防風 乾薑 當歸 白茯苓已上各

獨活已上各

右咬咀每服二錢水一盞半棗二枚同煎至八分去滓空心服若熱毒多服亦佳凡中風用續命散風引竹瀝諸湯及神精丹茵芋酒之類更加以灸無不愈者然此疾積習之久非一日所能攻皆大劑久而取效唐書載王太后中風喑然不語醫者蒸黃芪數斛以薰之得瘥皆此類也今人服三五盞求效責醫也亦速矣孟子曰七年之病求三年之艾久而後知爾

浴腰脚不隨方

右取虎腰脊骨一具細剉訖更以斧於石上搥碎又取前兩脚全者如前細剉之兩件並於鐵床上以大炭火勿冬翻轉候待脂出甚則以濃美無灰酒中窰封春夏一七日秋冬三七日每日空心隨飲性多則多飲少則少飲未飲前三度溫飲之大戶以酒六七斗止小戶二斗止惡十年

以上者不過三劑七年以下者一劑必瘥忌如藥法一方以虎脛骨六七寸淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃熟細搗以絹袋盛用酒一斗置袋於磁瓶中然後以糠火微煎等七日後任情飲之當微利便瘥

防風丸 治熱痺

防風去叉 羌活去蘆 茯神去木 五加皮

枳殼炒 牛膝酒浸 桂心去粗 麥門冬去心

人參 玄參 薏苡仁 生地黃焙

芍藥 丹參已上各 檳榔二兩 磁石煅

大黃剉炒 松子仁 木香已上各

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九漸加至四十九空心用溫酒送下

石補散 治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反壞皮膚色變

兼治諸風

石楠葉 兩 山芋

黃芪 別

天雄 炮去

升麻 已上各 黃芪 別

桃花 生用

菊花 未開

甘草 炙已上 石膏 另研

珍珠 別研

山茱萸 去核一

丹砂 青末一分 別研仍與珍珠同研

心用溫酒調服

右為細末入別研藥更研令勻每服一錢漸加至二錢空

久參散 治肝痺氣逆胃腸引痛眠外多驚筋脉變急此藥鎮

肝去邪

入參 二兩 杜仲 皮去粗

黃芪 炙

酸棗仁 微炒

茯神 去木各 五味子

細辛 去苗

熟地黃

秦朮 去苗 羌活 去蘆

丹砂 細研

芎藭 半兩

右為細末入丹砂再研令勻每服一錢不拘時用溫酒調

下日三服

補肝湯 治肝痺兩脇下滿筋急不得太息疝瘕四逆搶心腹

痛目不明

烏頭 四枚炮 附子 二枚炮

山茱萸 去核 官桂 去粗皮

薏苡仁 去皮 甘草 炙

獨活 半兩

白茯苓 去皮一

栝子仁 另研 防風 去叉

細辛 二兩

右劉如麻豆大入研藥拌勻每服五錢水一盞半大棗二

枚去核同煎至八分去滓不拘時溫服

單解丸 治肝痺筋脉去邪毒調榮衛

草薢 羌活 去蘆

天麻 酒浸一宿

附子 炮去皮

右為細末入乳香沒藥同研勻煉蜜為丸如彈子大每服

一丸空心用溫酒化下日再服

犀角散 治心痺精神恍惚恐畏悶亂不得勝卧志氣不定語

言錯誤

犀角屑

牛黃 別研

麝香 別研

羚羊角屑

白鮮皮

茯神 去木

沙參 去蘆

天竺黃 別研

防風

天麻

獨活

人參

升麻

老齒

遠志 去心

甘草 炙已上

麥門冬 去心

丹砂 別研各

龍腦 別研

門冬湯調下

右為細末入別研藥再研令極細每服二錢不拘時用麥

扶神湯 治心痺神思昏塞四肢不利胃中煩悶時復恐悸

茯神 去木

羌活 去蘆

麻黃 去根

麥門冬 去心

龍齒 已上各

遠志 去心

犀角屑

薏苡仁

人參 去蘆

黃芩 子

防風 已上各

赤芍藥

甘草 半兩

右以咀每服三錢水一鐘生薑五片同煎至七分去滓不

拘時溫服

枳實散 治心痺胸中氣堅急心微痛氣短促欬喘亦痛不能

飲食

枳實 麩炒

桂心

細辛

桔梗 已上各

青皮 去白

右以咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時溫服

黃芪丸 治脾痺肌肉消瘦心腹脹滿水穀不化食即欲嘔飲

食無味四肢怠墮或時自利

黃芪 別

石斛 去根

附子 炮去皮

肉蓯蓉 酒浸

益智 夫皮

白朮

人參 已上各

厚朴 去皮

桂心 <small>一已耐各</small> 五味子	當歸	白豆寇 <small>去刺</small>
枳實 <small>炒</small> 沉香	良薑 <small>已上各</small> 訶梨勒 <small>二法</small>	
吳茱萸 <small>湯泡</small> 丁香 <small>已上各</small>		
右為細末煮棗內和搗五百杵九如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下		
溫中法麴丸 治脾痺發欬嘔汁	法麴 <small>炒</small> 枳實 <small>炒</small> 白茯苓 吳茱萸 <small>湯泡</small>	
桂心 厚朴 <small>法皮薑當歸切焙</small> 甘草 <small>已上</small>		
麥蘗 <small>微炒</small> 細辛 <small>去苗</small> 乾薑 <small>炮</small> 麥門冬 <small>去心</small>		
附子 <small>炮去</small> 桔梗 <small>炒</small> 人參 <small>已上各</small>		
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九食前用熟水送下日三服		
當歸湯 治肺痺上氣閉塞胸中脇下支痛乍作乍止不得飲食	食香乾 <small>口燥手足冷痛</small>	
當歸 <small>切焙</small> 防風 <small>去叉</small> 黃芪 <small>已上各</small> 杏仁 <small>去皮尖</small>		
黃芩 <small>去腐</small> 細辛 <small>去苗</small> 麻黃 <small>去根節水浸二三次</small>		
人參 <small>已上各</small> 桂心 <small>三兩</small> 芫切 <small>去苗</small> 半夏 <small>湯泡去</small>		
右吹咀每服四錢水一盞入生薑七片棗二枚煎至七分去滓不拘時溫服日三夜二		
五味子湯 治肺痺上氣發欬	五味子 <small>三兩</small> 麻黃 <small>法</small> 細辛 <small>去苗</small> 紫苑 <small>去苗</small>	
黃芩 <small>去腐</small> 甘草 <small>已上</small> 當歸 <small>焙</small> 人參		
桂心 <small>已上各</small> 紫蘇子 <small>炒</small> 半夏 <small>湯洗七</small>		
右吹咀每服四錢水一盞入生薑五片同煎至六分去滓不拘時溫服上氣病亦單煮紫蘇子及生紫蘇葉冬月煮乾枝莖葉服		

紫蘇子湯 治肺痺胃心滿塞上氣不下	紫蘇子 <small>炒</small> 半夏 <small>湯洗</small> 陳皮 <small>去白</small> 桂心 <small>已耐各</small>
人參 白朮 甘草 <small>已上</small>	
右吹咀每服四錢水一盞入生薑五片棗二枚煎至七分去滓不拘時溫服	
白附子丸 治腎臟中風脚膝麻痺腰背強直痲痛言語不利	白附子 <small>炮</small> 乾蠶 <small>炒</small> 防風 <small>去叉</small> 肉桂 <small>炮</small>
百步痲黑肌體羸瘦	海桐皮 獨活 <small>去蘆</small> 天麻 補骨脂 當歸 丹參 草薢
天雄 <small>炮</small> 黃芪 <small>已上各</small> 安息香 白朮 <small>酒浸</small>	
牛膝 <small>酒浸</small> 桂心 <small>已耐各</small> 雄黃 <small>研</small> 麝香 <small>研</small>	
右為細末煉蜜和搗三五百杵九如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下日再服	
牛膝酒 治腎氣虛冷復感寒濕為痺	牛膝 秦艸 <small>去苗</small> 川芎 白茯苓 <small>去皮</small>
防風 官桂 <small>去粗</small> 獨活 丹參 <small>已上各</small>	
五加皮 <small>五兩</small> 薏苡仁 <small>一兩</small> 火麻仁 <small>炒</small> 麥門冬 <small>去心</small>	
石斛 <small>去粗</small> 杜仲 <small>去粗</small> 附子 <small>炮</small> 地骨皮	
乾姜 <small>已上各</small>	
右劉如麻豆大以生絹袋盛用酒一斗浸春夏三日秋冬五日每服半盞空心溫服日再一方無附子用側子	
舒筋丸 治筋骨不能屈伸	海桐皮 沒藥 血竭 木香 <small>已上各</small>
肉桂 牛膝 虎骨 防風	
木瓜 天麻 <small>已耐各</small> 乳香 <small>三</small> 甜瓜仁 <small>半兩</small>	

沈香	猪鬃子格半自然銅	常歸各一
右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用溫酒送下忌熱物未服藥先飲酒半盞後服藥		
五加皮酒	治筋痺多悲思顏色蒼白四肢不營諸筋拘攣伸	
動縮急腹中轉痛		
五加皮	枳刺各	猪椒根皮 丹參各一
川芎	乾姜炮各	白鮮皮 赤椒各一
木通	天雄炮各	甘草各一
火麻仁	三升 官桂各	當歸各一
右劉如麻巨大以次細袋盛用清酒三斗浸之春夏三四宿秋冬六七宿初濕服二三合稍加之以知為度		
羚羊角湯	治筋痺肢節束痛	
羚羊角	薄桂	附子
獨活配	上各一	
白芍藥	防風	川芎各一
右劉碎每服三大錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓		
溫服日一二服		
導痺湯	治脉痺血道壅塞	
半夏	湯洗 官桂各	黃芪 四兩
當歸	切倍 遠志各	龍齒
甘草	炙三升 茯神各	枳實 各一
右以咀每服先以水二盞煮粳米半合米熟去米入藥五錢生薑五片棗二枚煎數沸去滓取一盞不拘時濕服		
人參丸	治脉痺運行血脈	
人參	麥門冬各	茯神各
龍齒	石菖蒲	遠志各
熱心黃	二兩	黃芪 一兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食後良久以清酒飲送下		
天麻丸	治肌內痺痺肢體怠墮腰弱惡風頭疼舌本強言語	
天麻	官桂各	附子炮去
獨活	烏蛇酒浸去皮骨酥炒	牛膝去苗酒
白朮	南星炮各	細辛去苗
茯神	去木 羚羊角 鑄	蕙苡仁
全蠍	去毒 芎藭各	防風去義
丹砂	半兩 牛黃 別研	麝香 別研
右為細末入別研藥更研勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服十九加至十五丸不拘時用溫酒送下		
羌活湯	治皮痺皮如蟲行腹脇脹痛太腸不利語聲不出	
羌活	去蠶 沙參	蒺藜子 炒去
細辛	去苗 白朮	五加皮
枳殼	炒 官桂各	五味子
附子	炮去 麻黃 煎	赤茯苓 去皮
丹參	草薢	柏杏仁 湯浸去皮炒
木通	橫柳 各半	
右劉如麻巨大每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓不拘時濕服		
蔓荊實丸	治皮痺不仁	
蔓荊實	三分 枳殼 炒	蒺藜子 炒去
白附子	炮 桔梗 炒	羌活 去蠶
皂莢	不蛀者半斤劉碎用新水浸一宿以鹽水入少許同煎成膏和藥	防風 各半兩
右為細末以皂莢膏和丸如梧桐子大每服二十九食後		

用熱水送下

石斛九 治腎虛骨痺肌體羸瘦腰脚痠疼飲食無味小便頻

數並宜服之

石斛 去根

牛膝 酒浸

續斷

肉蓯蓉 酒浸

防風 去叉

杜仲 皮去粗

白茯苓

熟地黃 切焙

茴香 微炒

補骨脂 微炒

葶藶 炒

山茱萸 去核

沉香 三分

巴戟 去心

覆盆子

桑螵蛸 炒

五味子

川芎 半兩

石龍芮 炒

兔絲子 酒浸

鹿茸 去毛

官桂 皮去粗

附子 炮炙

薏苡仁 炒

澤瀉 一兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十

九空心用溫酒送下日二服

附子獨活湯 治腎臟中風寒濕成骨痺腰脊疼痛不得俯仰

兩脚冷痺痺痿弱不遂頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重

附子 炮炙

獨活

當歸 切焙

官桂 皮去粗

天麻 一兩

丹參

防風 去叉

石菖蒲

枳殼 炒

白木

細辛 去苗

山茱萸 去核

牛膝 酒浸

黃芪

草薢

甘菊花

芍藥

甘草 各半兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞生姜三片煎至七分去

滓不拘時溫服

黃芪酒 一名小黃芪酒 治血痺及諸痺甚者四肢不遂風濕寒

痺舉體腫滿疼痛不仁兼治風虛痲痺四肢偏枯兩脚軟

弱手不能上頭或小腹縮痛脇下掣急心下有伏水脇下

有積飲夜夢愁怨不寐恍惚善忘由風虛五臟受邪所致

或又坐腰痛耳聾卒起眼眩頭重或舉體腫疼飲食惡冷

積冷不除者

黃芪

獨活

防風 去叉

牛膝

川芎

附子 炮炙

蜀椒 去目并合口者炒

川烏 炮炙

山茱萸 去核

秦艽 土炒

葛根 二兩

官桂 皮去粗

大黃 生剉

白木

乾姜 炮炙

右剉如麻豆大用大絹囊盛貯以清酒一斗浸之春夏五

日秋冬七月初服一合日二夜一漸增之以知為度虛弱

者加茯苓二兩下利者加女萎三兩多忘加石斛菖蒲紫

石英各二兩心下多水加茯苓入參各二兩山藥三兩酒

盡可更以酒二斗重漬服之不爾可曝滓搗下篩酒服方

寸七不知稍增之服一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風

冷神妙少壯人服勿焚煉老弱人微焚之

單蘇九 治血痺手足痲痺不仁遊走無定風痺等證

草薢 炒

山茱萸

牛膝 酒浸

熟地黃 炒

澤瀉 一兩

拘芥 去毛

白木 半兩

乾漆 炒

天雄 炮炙

鱗鱒 各三分

茵芋 去皮

車前子 炒

右除鱗鱒生研外搗為細末和令勻煉蜜為丸如梧桐子

大每服十九至十五九空心用溫酒送下日二夜一

吳茱萸散 治腸胃寒濕內搏腹痛氣急大便穢泄

吳茱萸 炒

乾姜 炒

甘草 炙半兩

宿砂仁

陳麴 炒

白木 一兩

陳皮 去白

良姜 二兩

厚朴 去皮生

右為細末每服一錢食前用未飲調服

黃芩散 治腸痺風寒濕內攻腹疼發泄

草豆蔻 陳皮去粗皮 白芷去粗皮

肉苳蔻 當歸切焙 木香 白朮

丁香 良姜已上各

右為細末每服一錢食前生薑棗湯調服

巴戟丸 治胞痺腹痛水不利

巴戟去心 桑螵蛸切破 杜仲去粗皮 肉苳蔻酒浸去

生地黃焙 附子炮去 續斷 山芋已上各

遠志去心 石斛去根 鹿茸酥炙 兔絲子酒浸一

山茱萸去核 五味子 龍骨 官桂已上各

右為細末入別搗藥研和令勻煉蜜為丸如梧桐子大每

服三十九空心用溫酒送下日再服

腎瀝湯 治胞痺小腹急痛小便赤澀

麥門冬去心 五加皮 犀角兩各 杜仲去粗皮

桔梗炒 赤芍藥 木通已上各 桑螵蛸切碎炙

右吹咀每服五錢水一盞半入羊腎一隻去脂膜切細竹

瀝少許同煎至一盞去滓空心煎服日再服一方用桑白

皮無桑螵蛸

利膈散 治胃痺喘息不通

人參去蘆 赤茯苓 前胡已上各 乾姜炮

桂心 甘草炙已上各 陳皮去白 訶梨勒去核

白朮已上各

右吹咀每服五錢用水一大盞生薑三片煎至五分去滓

不拘時頻頻溫服

半夏湯 治胃痺心下堅痞急痛徹背短氣煩悶自汗出

半夏湯洗切焙 瓜蒌實一枚 蘇白切

右剉如麻豆大每服五錢水二盞生薑三片煎至一盞去

滓食前溫服日三服

吳茱萸散 治胃痺咽喉噎塞不能下食

吳茱萸湯浸 半夏湯洗 赤茯苓去皮 豨莶去粗皮

荆三棱 前胡去蘆 青皮焙 厚朴去粗皮

檳榔 白朮 桂心已上各 枳殼半兩

右吹咀每服五錢水一大盞生薑三片棗三枚煎至五分

去滓不拘時稍熱服

荳蔻湯 治胃痺心下堅痞

白芷去皮 官桂去皮 木香 人參已上各

荆三棱煨 神麴炒 陳皮去白 麥蘖炒

右吹咀每服三錢水二盞生薑三片鹽少許煎至七分去

滓食前溫服

枳實散 治胃痺心下堅痞胃背拘急心腹不利

枳實炒 赤茯苓去皮 前胡去蘆 陳皮去白

木香半兩

右吹咀每服五錢用水一大盞生薑三片煎至五分去滓

食前溫服

半夏湯 治胃痺短氣

半夏湯洗 訶梨勒半兩 前胡去蘆 赤茯苓去皮

官桂去粗皮 人參已上各 甘草炙

右吹咀每服五錢水二盞生薑五片棗三枚擘開煎至一

盞去滓不拘時溫服

枳實蘇白白酒湯 治胃痺之病喘息欬噎胃背痛短氣寸脈

沉而遲關脈小緊數者

括箕實一錢 薤白切半
右用白酒七升 煮取二升 去滓 溫服 肘後方加半夏四兩
洗去滑同煮之

獨活散 治胃痺心背疼痛氣悶

烏頭 細辛 附子 羌活

蜀椒 桂心 配上一各 川芎六錢

右搗篩以少醋拌帛裹微火炙令燬以熨背上取瘻乃止
忌生冷如常法

枳實散 治胃脘及疼痛

枳實 炒 官桂 祛粗破一

右為細末每服二錢用溫酒調服 橋皮湯調亦可空心日
午臨卧各一服

防風湯 治脚氣痺弱神驗

防風 防已 蜀椒 細辛

桂心 麻黃 石膏 獨活

黃芩 茵芋 葛根 芍藥

芍藥 甘草 已上各 生薑 茯苓 去皮各

烏頭 二枚

右以咀以竹瀝一斗 煮取四升 分作六服 令一日一夜服
盡其間可常作赤小豆飲 有人脚弱先服常用竹瀝湯四
劑未覺增損作此方後竟得力 又云脉沉細 厥風在內者
作此湯也 一方無竹瀝 赤小豆每服三錢 水一大盞 生薑
三片 煎至七分 去滓 不拘時溫服

擒虎丹 治風寒濕走注脚痺腰膝重痛

五靈脂 荆芥 川烏 炮去 當歸 切焙
白膠香 自然銅 火煅 研 各二兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二十九用熱酒
送下食後服日進二服

羌活散 治腰脚冷痺及諸風麻木不仁骨節疼痛不欲飲食
漸加瘦削

羌活 五加皮 酸棗仁 桂心 已上各

防風 去叉 當歸 炒 赤芍藥 丹參 已上各

茵芋 二分 牛膝 去白 附子 炮去 漏蘆 已上各

石咬咀每服三錢水一大盞生薑三片同煎至六分去滓
食前溫服

草薢丸 治腰脚冷痺沉重無力

草薢 一兩 熟地黃 石斛 去根 白芍藥 已上各

牛膝 二兩 五加皮 桂心 酸棗仁 炒

羌活 已上各 附子 去皮 兩枚

右為細末煉蜜和棗三五百粒元如梧桐子大每服三十
丸食前用溫酒送下

薰蒸方 治腎氣衰弱脾胃肝三經受風寒濕停於腿膝使經
絡凝而不行變成脚痺故發疼痛此藥和菜荷通經絡

小椒 一匙 葱 三匙 鹽 一匙 小麥 麩 約四五

酒 一盞 醋 不粘多 少只 攪拌上

右於良器炒令極熱攤即褥下將所患腿脚就卧薰蒸薄
衣被蓋得汗出勻褊約半箇時辰撤去炒麩止就鋪褥中
卧待一兩時辰覺汗稍解再用收陽粉撲傳汗孔畢然後
出鋪褥中勿見風

通痺散 治腰以下至足風寒濕三者合而成痺兩足至膝冷
如水不能自舉或因酒熱立冷水中又成此疾

獨活 川芎 天麻 當歸

白木各等

右為細末每服二錢食前用好酒調服

六生散 治週痺身腫痲痛腰脚痲痺

生石菖蒲九節者去毛切焙

生地黃焙

生商陸根洗淨切焙

生枸杞根切焙

生藥法皮切生為頭去皮

石先焙了各秤分兩復以醇酒一斗五升浸一宿漉出

曝乾復內酒中令酒盡再曝乾搗為細末每服半錢以清

酒一盞調下漸加至一錢空心臨卧各一服

天雄丸

治風寒濕痺皮肉不仁骨體痲痛不可忍者

天雄炮去皮附子炮去皮官桂法法一乾姜炮二

防風去三兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食前用溫

酒送下

茯苓湯

治風寒濕痺留著不去四肢痲麻拘攣浮腫

赤茯苓去皮桑白皮略二防已 官桂去皮

川芎 芍藥

麻黃桂去節洗乾

當歸已上各甘草酸三

右咬咀每服六錢水二盞煮三枚去核煎至一盞去滓空

心臨睡服如欲出汗服藥了以生桑熱粥投之汗出慎外

風一方去防已用防風

太醫院經驗奇效良方卷之三十八

太醫院經驗奇效良方卷之三十九

脚氣門 附論

夫脚氣者有南北之分孫真人云凡四時之中皆不得久坐久
立濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣洗足當風取涼皆成脚
氣若暑月久坐久立濕冷之地者則濕熱之氣蒸入經絡病發
必熱而四肢痲痺煩悶若寒月久坐久立濕冷也者則濕冷之
氣入入經絡病發則四肢皆冷轉筋世有勤工學之士久坐久
立於濕地冷風來入經絡不覺成病也內經曰當風取涼醉以
入房能成此疾也東垣云千金外臺總錄所錄皆係南方平濕
露露所聚之地其民腠理疎陽氣不能外固因而獲之則青濕
襲重病起於下此由血氣衰弱受清濕之邪氣與血併行膏腠
邪氣盛正氣少故血氣溢溢則痺痺則弱故令痺弱也後人名
曰脚氣針經云有道以來有道以去治之多以艾燻為佳以導

引濕氣出外及飲醪醴以通經散邪所製之方寒藥少熱藥多
用麻黃川烏薑附之屬內經云濕流于內以苦發之麻黃苦溫
發散者也川烏辛熱走而不能守通行經絡薑附辛甘大熱助
陽退陰亦散清熱之邪又察足之三陰三陽是何經絡所起以
引用藥為主治復審六氣何氣客之治以佐使之藥醫學發明
曰異法方宜論云北方者其地高陵居風寒水冽其俗飲醪醴
而肉食凡飲醪醴者以飲多速飲為能經曰因而太飲則氣逆
又云食入於陰行氣為陽乃反陰道是為逆也夫乳酪醪酒者
濕熱之物飲之屬也加以奉養太過亦強其濕水性潤下氣不
能收故下注於足脛積火而成腫痛痺痛此飲食下流之所致
也通評虛實論曰穀入多而氣少濕居下也况醪醴醇酒之濕
熱甚於穀者也至真要大論云太陰之勝太氣內流流散於外
足脛腫脹飲發於中附腫于下此之謂也被飲入於胃遊溢精

氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以爲常也若飲食自倍脾胃乃傷則胃氣不能施行脾氣不能四布故下流乘其肝腎濕流於足脛加之房事不節陽陰盛遂成脚氣孫真人云古人少有此疾自永嘉南渡衣冠之人多有之亦此意也東垣云夫脚氣之疾實水濕之所爲也蓋濕之害人皮肉筋脉而屬於下然亦有二焉一則自外而感一則自內而致南方之疾自外而感者也北方之疾自內而致者也其治法自應不同故諸公詳析而論之嚴氏曰古無脚氣之說內經各厥兩漢名緩風後謂之脚氣名雖不同其實一也初得不覺因他病乃始發或奄然大悶經三兩日方覺之先從脚起或緩弱痺痺或行起忽倒或兩脛腫滿或足膝枯細或心中忪悸或小腹不仁或舉體轉筋或見食吐逆惡聞食氣或胃痛氣急或偏體痠疼此其候之

不同也其脉浮而弱者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱透而濡者起於寒凡此皆由腎虛而生然婦人亦病脚氣者必因血海虛乘七情遂成斯疾且婦人病此者衆皆因血海虛而得之與男子腎虛相類矣男女用藥固無異但兼以治憂悲之藥無不効也須量人盛衰微加滋補不然則氣血日衰必使年年過蒸熱而作理之必然陳無擇曰脚氣不專主一氣亦不專在一經故與中風寒暑濕爲異耳兼有所雜生諸病未易分別須尋三陰三陽病所在後察脉虛實爲治發明曰內經論南方者其地下去土弱露露之所聚也江東嶺南太率如此春夏之交山川蒸鬱風濕毒氣爲甚感之遂成瘴毒脚氣外臺秘要云第一忌嗔嗔則心煩煩則脚氣發又禁大語大語則傷肺肺傷亦發動又不得露足當風冷水洗足雖夏月常須閉護慎之慎之發明曰第一凡酒及醴酪勿使過度過度則損傷脾胃

下注於足脛附腫遂成脚氣第一然不可縱嗜慾則脚氣發凡飲食之後宜緩行經云逸者行之又云病在脾忌溫食飽食濕地濡衣揚大受云脚氣之疾自古皆當踈下爲疾瘳故也然不可太過則損傷脾胃使營運之氣不能上行反下注爲脚氣也又不可不及不及則使氣壅不得消散立方于後詳虛實而用之羌活導滯湯導水丸除濕丹此藥如脚氣在表在氣血之分而踈下隨宜而用之活人書云凡脚氣服補藥及用湯洗者皆醫之太禁也揚大受云脚氣是爲痼疾當以宣通之劑使氣不能成壅也壅既成而盛者破惡血而去其重勢經白養則腫熱攻射之也夫前代各人所論其脚氣所感不一有在表而得之有在氣血之分而得之或從風寒暑濕得之或因虛實而得之在乎醫者診視果決而治之

脚氣通治方

羌活導滯湯 治脚氣初發一身盡疼或肢節腫痛便溺阻滯先用此藥導之後用當歸拈痛湯

羌活 獨活 當歸 防己

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

神效左經湯 治風寒暑濕流注足三陽經手足拘攣疼痛行步艱難增寒發熱自汗惡風頭眩腰重關節掣痛大小便秘澀或腹痛嘔吐下利兩腿頑麻並皆治之

麻黃 羌活 防己 細辛 厚朴 枳殼 茯苓 去皮 防己 羌活 枳殼 防風 去毒 麥門冬 去心 黃芩 一錢 肉桂 去皮 此胡去毒 半夏 湯泡 小草 白薑 甘草 各五分

井草 各五分

右作一服水一鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾空心服
 自汗加牡蠣白朮去麻黃腫滿加澤瀉木通熱甚無汗加
 乾葛橘皮前胡腹痛吐利去黃芩加芍藥及炮附子大便
 秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇凡有此病參詳
 逐一加減無不愈者

加味敗毒散 治三陽經脚氣流注脚踝上攣熱赤腫寒熱如
 瘡自汗惡風或無汗惡寒

羌活 獨活 花胡去蘆 前胡去蘆
 枳殼去穢 桔梗去蘆 人參去蘆 茯苓去皮

川芎 甘草各七錢上鐵蒼朮米泔水大黃二錢
 右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服皮膚搔癢
 赤疹加蟬退煎服

五續散 治風濕流注兩脚酸疼

方見寒門 獨蘇散 治風濕脚氣疼痛踈通氣道

檳榔 木瓜 香附子 紫蘇各三

陳皮 甘草各一 右作一服水二鍾生薑五片葱白二枚煎至一鍾食前服

大黃左經湯 治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚赤腫痛不
 可行大小便秘惡聞食氣喘滿自汗

大黃 細辛去蘆 茯苓 杏仁去皮尖
 羌活 前胡 黃芩 枳殼去穢

厚朴炮製 甘草各一分 右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾空心服
 痛加芍藥喘急加桑白皮紫蘇小便秘加澤瀉四肢瘡癩
 加升麻並各等分

為藥平氣湯 治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步艱苦氣
 不和喘滿迫促並皆治之

為藥 茯苓去皮 白芷 當歸去蘆
 白朮 五味子 川芎 紫蘇子

人參去蘆 乾木瓜 甘草各一分 右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服

木通散 治脚氣小便不通淋閉脹痛

木通 當歸 施子仁 赤芍藥
 赤茯苓 甘草各一分

檳榔湯 治一切脚痛 右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

檳榔 香附子去毛 陳皮去白 紫蘇葉
 木瓜去皮 五加皮 甘草各一分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服婦人脚氣
 多由血虛加當歸一錢室女脚痛多由血實加芍藥一錢

半如大便秘結虛弱者加枳實壯盛者加大黃
 麻黃左經湯 治風寒暑濕流注足太陽經腰脚痺閉節重

痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭疼眩暈

麻黃 乾葛 茯苓 蒼朮水浸
 防己 羌活 防風 桂心不見

細辛 甘草各一分 右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾空心服

自汗去麻黃加肉桂芍藥重着加白朮陳皮無汗或桂加
 杏仁澤瀉等分 半夏左經湯 治足少陽經為風寒暑濕流注發熱腰脚疼痛
 嘔吐不食

半夏湯泡	乾薑	細辛	麥門冬法心
桂心 去皮	白朮	茯苓	乾薑
防風	黃芩	此胡	甘草炙
右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾空心服			
熱閉加竹瀝喘急加杏仁桑白皮			
當歸拈痛湯 治濕熱為病肢節煩疼有背沉重胃弱不利及遍身疼痛下注足脛腫痛不可忍			
方見腰痛門			
神鳥丸 治遠年近日乾濕脚氣			
川烏 炮去皮醋切作	虎胫骨 酥炙海桐皮		
川草 薛各一	川牛膝 酒浸去蓋肉從蓉 酒浸各一兩半		
金毛狗脊 半兩			
右為細末用木瓜膏子和丸如梧桐子大每服七十九空心用溫酒送下			
獨活寄生湯 治腎經虛弱坐卧當風者濕所傳腰痛若不速治流入脚膝乃為漏枯冷痺緩弱重疼或腰疼脚重濕痺並宜服之			
方見腰痛門			
四蒸木瓜丸 治肝腎脾三經氣虛為風寒暑濕相搏流注經絡治療不痊丸遇六化更變七情不寧必至發動或腫滿或頑痺增寒壯熱嘔吐自汗			
黃芪 同入各半兩	蒼朮 同入	威靈仙 去土與同入	
為藥 同入各半兩			
右以大木瓜四箇切蓋去穢入前件藥仍以蓋簪定酒灑蒸熟三蒸三曬取藥出焙乾為末張木瓜為膏搜和搗千杵和丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒鹽湯任下世			

傳木瓜丸最多准 有功效當敬之黃松節即茯苓中木			
十全升 治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小便不仁煩渴小便或秘或利關節疼痛痺痺神効不可盡述			
肉從蓉 酒浸	狗脊 炒去	草薢	茯苓 去皮
牛膝	遠志 炒心	地膚子	石斛 已上各
熟地黃 酒浸杜仲 炒去			
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用溫酒鹽湯任下			
入味丸 治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自汗此證最急以腎乘心水尅火之證			
方見諸虛門			
神應養真丹 治厥陰經為四氣逆襲肝臟左癱右瘓延潮昏塞半身不遂手足頑麻語言蹇澀頭眩目眩牙開緊急氣喘自汗心神恍惚肢體緩弱上攻頭目下注脚膝榮衛凝滯遍身疼痛兼治婦人產後中風角弓反張墜車落馬打撲傷損瘀血在內並宜服之			
當歸 酒浸	天麻	川芎	白芍藥
羌活	熟地黃 各等		
右為細末煉蜜和丸如鷄子黃大每服一丸木瓜兔絲子浸酒下脚痺薏苡仁浸酒下中風溫酒米湯下一方無羌活有木瓜炒何膠			
紫蘇子湯 治脚氣虛弱上攻陰陽交錯清濁不分上實下虛中滿喘急嘔吐自汗			
紫蘇子	半夏 湯洗	前胡	厚朴 去皮薑
當歸	甘草 炙已下	桂枝 炒	桔梗 炒
右作一服水二鍾生薑七片紅棗二枚煎至一鍾食前服			

盛其者加炮附子黃芪各一錢

秘方換腿丸 治腎經虛弱下注脚膝或骨痛取涼冷氣折乘

沉重少力移筋脈疼痛不能屈伸脚心隱痛有效

腰地大冷乾濕脚氣赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣痛

喘促舉動艱難面色黧黑傳送秘流並皆治之

薏苡仁 石楠葉 肉桂 天麻 去苗

當歸 附子 去核 羌活 防風 去蘆

天南星 湯泡 右斜 去膜 草薢 炙 川牛膝 酒浸

黃芪 續斷 已上各 橫柳 半兩 蒼朮 米泔浸

乾木瓜 四兩

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服三十九至五十九

空心用溫酒或木瓜湯送下日二三服常服舒筋輕足永

無脚氣之患

木瓜牛膝丸 治寒濕脚氣冷濕下注脚弱無力及腎經虛弱

腰膝沉重腿脚腫急筋挛或時疼痛步履艱難大小便不

利日見倦乏

木瓜 川牛膝 去蘆 當歸 去尾 石楠葉

烏藥 肉桂 去皮 乾杏仁 去皮 熟地黃

陳皮 去白 黑牽牛 續斷 去蘆 赤芍藥 各等

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九空心用木

瓜煎湯送下鹽湯亦可未効用羌活木瓜酒浸或加牛膝

同浸溫暖一盞許送下

蒼朮散 治一切風寒濕熱令足膝痛或赤腫骨間作熱痛及

腰膝骨解大骨疼痛令人癢癢一切脚氣百用百効

蒼朮 用米泔洗 黃蘗 去粗皮 各四兩

右剉碎每服一兩水一鍾煎至一鍾食前服日進二三服

透骨丹 專治脚氣

川烏 羌活 沉香 乳香 另研

川芎 橫柳 木瓜 已上各 木香 半兩

白茯苓 去皮 二兩

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服六十九食前用生

薑湯送下

活絡丹 治諸般風邪濕毒之氣停滯經絡流注筋骨疼痛

脚沉重或發赤腫以及脚筋吊痛上衝心一切痛風走

注並皆治之

川烏 炮去皮 草烏 去皮 地龍 去上 乳香 另研

續斷 另研 南星 炮各二錢

右為細末入另研藥和勻酒糊為丸如梧桐子大每服二

十九空心用冷酒送下

五方丸 治筋血不足腰脚痠弱行步艱難一切寒濕脚氣

沒藥 另研 川烏 炮去皮 虎骨 酥炙令 山茱 已上各

天麻 切焙 牛膝 酒浸 肉桂 去皮 木瓜 已上各

右為細末將木瓜爛蒸研作糊和藥末如不就更用原浸

牛膝酒行糊搜和并一二千下丸如梧桐子大每服五十

丸食前用溫酒或薑湯送下

竹瀝湯 治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腰脹起如腫按之脩

心中惡不欲食

竹瀝 秦朮 葛根 黃芩

麻黃 防已 細辛 桂心

乾薑 防風 升麻 杏仁 去皮

茯苓 附子 甘草 各一

右作一服水二鍾竹瀝半合煎至一鍾不拘時服取汗為

劫一方無扶苓杏仁有白朮

獨活湯 治脚痺

獨活 二錢 乾薑 錢半 大豆 粒十 附子 炮去

當歸 防風 茯苓 芍藥

黃芪 葛根 人參 甘草 各一

右作一服水二鍾半酒半盞煎至一鍾食前服

風引湯 治兩脚痿痺腫或不仁拘急不得行

麻黃 石膏 獨活 茯苓 去皮

乾薑 杏仁 白朮 各一錢 吳茱萸

附子 炮去 杜心 祛在 人參 去管 秦朮

細辛 防風 去薑 川芎 防已

甘草 八分 各

右作一服水二盞煎至一鍾不拘時服取汗

木瓜湯 治脚氣

乾木瓜 大腹皮 紫蘇 木香

羌活 甘草 各二錢 扶苓 陳皮 各半

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

四斤丸 治腎經虛寒下攻腰脚筋脉拘挛掣痛不已履地艱

辛脚心隱痛及風寒濕痺並皆治之

木瓜 去蒸 天麻 去薑 牛膝 去根 肉苁蓉 各半

已上四味用無灰酒五升浸春秋各五日夏三日冬十日

取出焙乾再入

附子 炮去 虎骨 酥炙

石同為細末用浸藥酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服五

十九空心煎木瓜酒益湯任下常服補虛除濕大壯筋骨

四介丸 治肝腎俱虛精血不足足膝酸疼步履不隨如

受風寒濕氣以致脚氣疼痛最宜服之

虎脛骨 酥炙 肉桂 各兩 乳香 另研 沒藥 各半

川烏 炮去 兩 牛膝 兩 天麻 一斤 木瓜 煨新土

右為細末入木瓜膏和酒糊杵爛為丸如梧桐子大每服

七十九空心用溫酒或鹽湯送下

經効立應散 治風濕脚氣

獨活 錢半 麻黃 二兩 各 丁香 一錢 乳香 另研

沒藥 另研 各

右為細末和勻每服三錢用酒一盞溫熱調服取醉蓋覆

得汗即愈

不老地仙丹 治腎臟風毒輕脚壯筋

牛膝 酒浸 虎骨 酒炙 當歸 酒浸 肉苁蓉 酒浸

羌活 去 川椒 炮去 草薢 蒸水 川芎 二兩 各

赤小豆 木鱉子 去油 地龍 去土 茴香 炒

乳香 另研 防風 血竭 各兩 杜仲 薑汁炒

沒藥 另研 羌活 獨活 各半 天南星 炮

白附子 何首烏 黃芪 各七錢

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服四十九空心煎木

瓜陳皮湯送下

導氣飲 治寒濕脚氣腫赤疼痛心腹膨脹頭面手足浮腫身

體腰背疼痛並皆治之

羌活 獨活 木瓜 薏苡仁

青皮 陳皮 枳殼 桑白皮

紫蘇 檳榔 木通 大腹皮

赤茯苓 大腹子 青木香 甘草

右作一服水二鍾煎一鍾食前服熱加大黃寒加蒼朮

洗藥分應散 治脚氣

羌活

獨活

樟葉

石楠葉

藜香

藜本

大蓼

紫荊皮

杉木

白芷

荊芥

紫蘇葉

苦參已上各 花椒半兩

右用水一斗葱一握煎至七分置盆內令病者以足用厚

衣蓋覆薰蒸痛處候溫熱可下手令他人淋洗

脚氣止痛方

右用草麻子七粒去殼碾爛如泥阿蘇合香丸和勻成膏

敷貼脚心其痛即止

搜風丸 治脚氣

大黃

檳榔

枳殼已上各

黑牽牛生取頭

右為細末米糊丸如梧桐子大每服五十丸食前飯後下

木香行氣散 治脚氣風氣走注風寒濕氣及脚生黃泡瘡形

如濕瘡此藥止痛去濕除風行氣

木香半兩

黃芪

木通

桑白皮

白木已上各 黑牽牛半兩

右為細末每服二錢更初酒調服作九子服亦可

黑虎丹 治脚氣筋骨軟弱步履不隨

五加皮

肉桂

白木

羌活已上各

熟地黃

附子

烏藥

檳榔已上各

白茯苓

川烏

黃芪

杜仲已上各

赤芍藥

牛膝

白蒺藜

虎脛骨碎

當歸已上各 蒼朮已上各 黑豆半升

右為細末水煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心

用鹽酒送下

從蓉牛膝丸 治脚氣

肉從蓉燒 州牛膝燒 天麻州者洗

木瓜已上各 到碎用酒三升入瓶內密封春

枸杞子洗淨 黃芪洗淨 虎骨酒浸 青益各二兩

右為細末和勻以前浸藥酒煮麩糊和丸如梧桐子大倍

乾每服三五丸食前溫酒白湯任下

枳實大黃湯 醫學發明云昔有人體充肥脚氣始發頭面

身支節微腫皆赤色足脛赤腫痛不可忍不敢扶策手近

皮膚其痛轉甚坐而復臥臥而復起晝夜苦楚難以名狀

乃此土高寒故多飲酒積久傷脾不能運化飲食下流之

所致投以當歸粘痛湯一兩二錢其痛減半再服腫痛悉

除止有右手指微赤腫以三稜針刺手爪甲端多出黑血

赤腫全去不數日因食濕麩肢體覺痛宜服此藥

枳實半兩

大黃三錢

羌活半錢

當歸身一錢

右以咀作一服水一盞半煎至一盞去滓空心溫服利下

兩行痛止

夫脚氣之疾皆水濕之為也麩滋其濕又添肢節煩疼內

經云風能勝濕活辛溫透關節去濕故以為主血流不

行則痛當歸之辛溫散壅止痛枳實之苦寒治痞消食故

以為臣大黃苦寒以導麩之濕熱治諸血留結取其駿

故以為使也

振囊 治脚氣

僕丁酉歲在臨安約發女親戚吳寬夫泛湖是時劇暑見

其用火膝上實一布囊烘足巾其所以答云其舊有脚氣

之疾近得一方用川椒二三斤實於疎布囊中實火踏

上跌足踏振囊蓋振氣性熱辟去寒濕氣言甚有理用之月

餘亦漸見効度子歲在淳安寬夫經過因問其疾云愈之
已久乃極囊之力也不特其用之効傳之數親之皆無恙
矣真奇方也壬寅再來臨安適於賓次中邂逅王成之時
為都司見其用火踏亦有一布囊問之豈非極乎云又添
破開攢柳并熱艾各三之一且云果是奇妙大抵足膝之
病若下屬陰又加寒濕陰益甚矣血氣微冷凝結非至熱
不可除今用川椒極性熱復加以火蒸之自然寒濕去矣
信乎處方之効也

乳香木瓜丸 專治遠年近日脚氣

乳香另研 血竭另研各

右和勻用木瓜一箇竹刀去皮心批取頂蓋將藥末攪勻
將滿却用批下頂蓋合續以麩裹之約半指厚於砂鍋內
煮熱極爛為度連麩於石臼內杵如泥丸如梧桐子大每
服三十九漸加至四十九空心溫酒木瓜湯任下乾物壓
之忌動氣生冷濕膩硬物

甘龍散 治脚氣

連珠甘遂 一兩

木龍子 去殼一箇好者

右為細末用猪腰子二箇批開以藥末一錢搽勻紙裹
數重火煨熟放溫五更初細嚼末飲湯下如左脚患則用
左腰子右脚患則用右腰子藥末只須一錢

神效方 治脚氣神効

右用木龍子每箇作兩邊麩炒炒畢切碎再炒用皮紙塗

鹽油為度每一兩用草桂一兩同為末用熱酒調服以得
醉為度蓋覆得汗即愈一方藥中神效方

木瓜丹 治脚疼重不能遠行久立常服補腎氣調血脉

右用宜州木瓜一箇杜木大者亦可用取去穢陽切去
蓋子用好艾填在木瓜內須滿實却用蓋子覆竹簽之飯
既蒸爛吹下入羌活一兩獨活二兩附子半兩炮同為末
先搗木瓜今爛吹下藥末搗成丸如梧桐子大每服三
五十九食前用溫酒或鹽湯送下

烏藥丸 治脚氣微骨痛不能行履者不過三服見効

草烏 不去 白芍藥 威靈仙 北細辛

沒藥 木龍子 去殼各等分

右為細末薄糊為丸如梧桐子大每服七丸至十九食後
臨卧木瓜湯下酒下亦可以身上覺麻痺即是効或末効
加至十五九量度實不可安者丸數亦不可於食前服之
有草烏頭在其間最忌服藥後食熱物衝動烏頭之毒則
昏不知人矣

鷓鴣散 治脚氣第一品藥不問男女皆可服如人感風濕流

注脚足痛不可忍用索懸吊叫聲不絕筋脉腫大

檳榔 七枚 陳皮 木瓜 兩各一 吳茱萸 二錢

生薑 連皮 桔梗 各半 紫蘇 莖葉 三錢

右為粗末分作八服隔宿用水三大椀慢火煎至掬半去
滓再用水二椀煎取一小椀兩次以煎汁相和安頓末頭
次日五更分二三服只是冷服冬月略溫亦得服了用餅
餅壓下如服不盡留次日漸漸與亦可服此藥至天明大
便當下一梳許黑糞水即是原腎家感寒濕毒氣下來也
至早晚前後痛住腫消但即是放遲遲藥物候藥力過此

藥不足宜藥並無所忌

治脚氣風氣諸惡氣

右用鯉魚大者洗去泥開肚以糠米半兩切大蒜三兩顆
內無腹中縫令并和小豆一升煮之臨熱下蘿蔔三五顆
如指大切葱一握煮熱空腹食之并豆等強飽盡食之至
夜即泄氣無復三五日更一頓下一切惡氣

川膝煎 治肝腎虛為風寒濕毒所中流注腿膝節疼痛如

錐刀銳刺不可名狀

牛膝二兩去毛頭紅者叶散碎袋盛高豆一斗同

右不要銅鐵器及大興日見於木臼搗碎牛膝再以石磨
中磨為末酒糊和丸如梧桐子大每服四十九丸用無灰酒
一瓶中樣木瓜一箇切作片入瓶中煨木瓜爛為度用此
酒下不拘時熱肝氣惡鐵忌則有之不見火日此妙藥者

安忌且如高頭牛膝時堂一向陰乾也

舒筋丸 治寒濕在經絡腰脚腫痛行步艱難

當歸酒洗 赤小豆生用 地龍去土 甜瓜子生用

木瓜去皮 威靈仙去土 白膠香另研 骨碎搗末

海桐皮去粗 烏藥 草烏頭去皮 五靈脂炒

芸薹子炒各

右件為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服十五丸至
二十九空心用溫酒或薑湯送下日進二服

御愛忘枕丸 治乾濕脚氣

古文鐵計文 海金砂 虎骨酒炙 肉桂不見火

斑貓去頭 乳香另研 沒藥另研 硃砂研為衣

右為細末和勻酒煮麩為丸如棗豆大以硃砂為衣每服
七丸空心用麝香酒下三服見効

桑花散 治濕脚氣及腰腎膀胱宿水并痰飲不下食

右用桑花陰乾量取一大升但隨虛痛不須按搗搗為散
紗羅下之溫清酒和服令盡通利為度空腹服之須臾
當轉可六七行但宿食不消化等物總瀉盡若中間覺飢
用少許軟飯及糜粥補之極安穩不似轉藥虛人但覺
腰脚輕快使人踴躍食味倍佳脚先腫者一宿頓消如囊
中貯物傾却相似又無毒意易將息惟忌葫菜猪肉三月
內腹虛大都消慎生冷酸滑五辛酒麪及粘食肥膩四五
日外諸食復常

桑白皮散 治脚氣上攻坐卧不得咽喉不利四肢煩疼

桑根白皮剉赤茯苓 芫胡已上各 生乾地黄二兩

天門冬 赤芍藥 貝母研 枳殼去穢

射干 白前 檳榔 百合已上各

甘草炙 右咬咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓不拘時溫服

獨活酒 治腰脚屈弱兼頭眩氣滿

獨活去蘆 石斛去根 生薑乾 白茯苓去皮

白木已上各 牛膝 丹參 側子皮

草薢已上各 薏苡仁 防風去叉 桂心去粗

當歸切 山茱萸 人參 天維皮

素尤去土 甘菊花 芎藭已上各 生地黄四兩

右細剉用絹袋盛內淨磁甕中以清酒三斗漬之密封春
夏五日後冬七日取問量清飲之日五六服常令酒力不
絕如冷加蜀椒一兩去目并合口者少出汗脚弱痛甚者
作散每服三錢酒調下

五獸三厘丹 治因氣血耗損肝腎不足兩脚痿軟

鹿茸 補腎壯陽 麒麟竭 破血 虎骨 補腎 牛膝 祛風

狗脊 補腎 等分 附子 生薑 去心 附子 生薑 去心 附子 生薑 去心

附子 生薑 去心 附子 生薑 去心 附子 生薑 去心 附子 生薑 去心

木瓜酒 或降氣湯下 葵傳貴家多効患不再發若無脚氣

只手脚弱而無力服之尤佳更以分脚氣之要言之風寒

濕三毒各隨所喜而入風寒入肝病多在筋濕喜在脾病

多在肉寒喜入腎病多在骨推類治之亦思過半矣吁願

為良醫力學者當在乎致知致知當在乎格物上不格則

知不至若曰則循世俗殺人耳聞目見謂之知君子謂之

不知也

松葉酒 治脚弱十二風痺不能行服更生散數劑及漿治不

得力服此一劑便能行遠不過兩劑

右用松葉六十斤咬咀以水四石煮取四斗九升以釀五

斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日

發溢飲之取醉得此力者甚衆神効

立効丹 治脚緩弱及膝弱甚者○紹興府戒珠等一僧病數

十年不能行服此藥而愈亨老亦傳此方

右以附子用麩裹煨熟去皮臍搗取葱自然叶和凡如梧

桐子大每服五六十丸空心葱白煎酒下喫少蒸餅溫粥

壓之一方用生附子以葱涎和丸溫酒鹽湯任下十五丸

至二十九

又方 治久年脚氣或老年膝疼不能行步者可用局方木附

湯倍加附子加木香一錢用水三盞生薑五片木瓜三片

煎取一盞二分去滓送下局方石楠丸五十九數服立愈

或元氣弱者煎前引子送下震靈丹十粒

又患脚氣不曹寧 膝痛筋寒步履痿

木附木香加倍飲 石楠數服有神靈

辰砂丹 治足掌疼

辰砂 鐵精 去毒 各 乳香 生膏 各半

右研為末用鐵皮草烏去皮尖三錢為末一半入藥一半

以米醋調煮熟取起和丸如菘豆大每服五十九空心用

溫酒送下

五加皮丸 治脚氣皮膚不仁發軟不定

五加皮 剉 人參 去蘆 惡寒 吳茱萸 湯洗

官桂 剉 杜仲 剉 羌活 剉 獨活 剉 桑寄生 剉 牛膝 剉 薏苡仁 剉 木瓜 剉 杜仲 剉 羌活 剉 獨活 剉 桑寄生 剉 牛膝 剉 薏苡仁 剉 木瓜 剉

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫

酒送下不飲酒者橘皮湯下

沉香丸 治風毒脚氣上攻臍散入四肢腫無力

雄黑豆 小者 附子 去心 吳茱萸 湯洗 青橘皮 湯洗

生薑 剉 附子 去心 吳茱萸 湯洗 青橘皮 湯洗

其餘 剉 附子 去心 吳茱萸 湯洗 青橘皮 湯洗

用更 剉 附子 去心 吳茱萸 湯洗 青橘皮 湯洗

沉香 剉 附子 去心 吳茱萸 湯洗 青橘皮 湯洗

羌活 剉 獨活 剉 桑寄生 剉 牛膝 剉 薏苡仁 剉 木瓜 剉

羌活 剉 獨活 剉 桑寄生 剉 牛膝 剉 薏苡仁 剉 木瓜 剉

生地黄 剉 附子 去心 吳茱萸 湯洗 青橘皮 湯洗

右除前四味不用外搗為細末拌勻煉蜜和丸如梧桐子

大每服二十九空心溫酒送下近晚再服

沉香大煨散 治脚氣腫滿沉重疼痛筋脈不利此證皆由

溫氣鬱滯經絡所致服之宜通經絡使上下無礙血氣和平
平腿脚輕利為效

沉香 檳榔 烏藥 桑白皮
木通 茴香 甘草 紫蘇子

陳皮 洗焙 白茯苓 荆芥穗 紫蘇葉
運皮大腹子 枳殼 乾木瓜 去穢

右吹咀每服五錢水一盞生薑五片蘿蔔五大片同煎至七分去滓食前溫服日進二服十日後日進一服病愈即止如無蘿蔔用蘿蔔子一錢微炒搗碎同煎代之如亮大便乾燥即服加減神功丸

甘豆湯 治脚腫此乃脚氣 黑豆一兩 甘草半兩

右同煎湯服之郭鎮廷主知縣云昔年大李士人圍閉中多患脚腫至瘦則死前後如此者非一人後即施此方服之皆愈益神方也

旋覆花九 治風毒脚氣壅熱生痰頭項強痛 旋覆花 微炒 薤苳仁 炒 地骨地 赤茯苓 去黑

升麻 一兩 白檳榔 五 麥門冬 去心 火麻子 仁 別研 前胡 去蘆 防風 去蘆 羌活 去蘆 馬牙硝 別研

芍藥 一兩 枳殼 去穢 羚羊角 鎊 白蒺藜 炒去 黑參 三分

右為細末八別研藥相和煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九食後用溫漿水送下日二夜一

細辛散 治脚氣發動心膈痰壅頭項惡聞食氣宜服之 細辛 羚羊角 鎊 旋覆花 枳殼 去穢

半夏 湯泡 防風 去蘆 蔓荊子 羌活

黃芩 甘草 各半兩 紫蘇葉 檳榔 乙兩

右吹咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不狗時溫服

豆効散 療苦脚氣攻心此方甚散腫氣極驗及治一切暴腫 枳殼 大者 生薑 仁兩 橘皮 吳茱萸

紫蘇 木瓜 一兩 右切碎以水三升煮取一升三合分再服忌如藥法

沉香湯 治脚氣衝心煩悶氣促脚痠疼 沉香 一兩 赤芍藥 二兩 木通 半兩 紫蘇葉 一兩

檳榔 七錢 吳茱萸 湯洗焙乾 右吹咀每服五錢水一盞半入生薑半分切碎煎至八分去滓不拘時溫服

杉節湯 治脚氣攻心痛悶脹滿不食 乾杉木節 青皮 陳皮 天台烏藥

雞心檳榔 半夏 枳殼 剉 宣木瓜 赤茯苓 縮砂 半兩 茴香 微炒 大腹皮

紫蘇子 微炒 蘿蔔子 微炒 桔梗 丁香 甘草 各一分

右剉碎每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓不拘時溫服

高良薑九 治脚氣心腹脹滿兩膝疼痛 高良薑 威靈仙 當歸 檳榔

羌活 三分 陳皮 去白 桂心 半兩 蘿蔔子 牽牛 微炒 各

右為細末煉蜜和搗二百杵丸如梧桐子大每服三十

九不拘時用溫酒送下以利為度

松節湯 治脚氣入腹心腹脹急煩躁腫痛

松節湯 桑根白皮 紫蘇葉已切各

檳榔三分 甘草兩半

右剉碎每腹三錢水一盞入灯心二十莖生薑三片童子

小便三分同煎至七分去滓食前溫服

吳茱萸湯 許仁則曰此病有數種有飲氣下流以成脚氣飲

氣即水氣之漸亦有腎氣先虛暑月承熱以冷水洗脚溫

氣不散亦成脚氣亦有腎氣既虛諸事不節有因居卑溫

濕氣上衝亦成脚氣此諸脚氣皆令人脚脛大脚跌踵重

悶甚則上衝心腹滿悶短氣中間有乾溫二脚氣溫者脚

腫乾者脚不腫漸查枯燥皮膚甲錯須細察之若先查腸

腸心腹刺痛背滿悶與食之後此狀彌如時時氣短手

脚沉重骨髓疼多喝氣每食諸粘膩陳敗臭物即諸狀轉

劇此即飲氣下流而成脚氣有此候者自宜依前療飲將

成水氣細辛等八味湯葶藶子等十五味丸療之若先無

前狀但查脚腫疼悶沉重有緩弱乍衝心腹滿悶小腹下

不仁有時急痛宜依後吳茱萸等五味湯桑根白皮等六

味丸側子等十味酒細細服之

吳茱萸 桂心各二 橘皮三兩 生薑五兩

檳榔大者十枚

右剉碎以水七升煮取二升半去滓分溫三服相去如人

行七八里久一服查諸狀可欲重合服亦佳服湯後將息

經三四日即服後桑根白皮等六味丸忌生葱

桑根白皮丸

桑根白皮五兩 生薑六兩 蜀椒炒出 五味子

桂心 升麻各四

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大初服十五九日再服稍

加至三十九以飲送下覺熱食前服覺冷食後服忌生葱

側子酒 至九月以後宜合側子等十味酒服之兼將下丸方

側子 牛膝 續斷已切各 五加白皮

丹參已切各 細辛 桂心已切各 桑根白皮

白木 生薑已切各

右剉碎以絹袋盛用無灰酒五升浸五六日初服一鷄子

黃許日再服稍稍加之以知為度必用前數法不覺可宜

依舊脚氣方用之忌猪肉冷水桃李雀肉生菜生葱

茯苓丸 治脚氣心腹脹急不思飲食

赤茯苓去黑 枳殼去穢 人參已切各 訶梨勒皮

陳橘皮去白 高良薑 乾薑 吳茱萸湯洗

官桂去粗 木香 白木已切各 木瓜半切

右為細末先將木瓜飯上蒸熟研如膏次入諸藥末和勻

煉蜜為丸如梧桐子大每服三寸九空心人參茯苓煎湯

送下兼治乾濕霍亂泄瀉轉筋

草薺散 治脚氣發動嘔逆胃中滿悶不欲飲食

草薺去皮 前胡 紫蘇葉 赤茯苓

檳榔 木通已切各 枳實炒 半夏湯泡各

吳茱萸湯洗 右吹咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

不拘時服

蓬莪木散 治風毒脚氣吐逆

蓬莪木兩半 蛤粉三兩 延胡索炒 陳橘皮去白

右為細末每服一錢用炒黑豆五十粒生薑三片以水一

蓋同煎至七分去滓調藥溫服不拘時候
止瀉湯 治脚氣嘔吐泄瀉轉筋

大八風湯 治脚氣上攻心脾語言蹇澀
右用宣木瓜細剉每服四錢新水煎服神効

當歸 切焙

大豆 各三

烏頭 泡去

黃芩 去黑

遠志 去心

芍藥

獨活 去蘆

五味子

防風 去蘆

羌活

麻黃 去節

乾薑 炮

秦艽 去苗

桂心 去粗

石斛 去根

杏仁 去皮尖

人參

白茯苓 去皮

黃芩

紫苑 去上

升麻

甘草 已上各

右剉如麻豆每服五錢水一盞酒半盞同煎至八分去滓
不拘時溫服

桂心湯 治風毒脚氣痺麻不仁語言蹇澀

桂心 去粗皮當歸切焙

麻黃 已上各

防風

檳榔 各二

黃芩 去黑

生犀角 鎊

赤茯苓 去皮

升麻 已上各

右剉如麻豆每服三錢水一盞棗二枚煎至七分去滓不
拘時溫服

大腹皮散 治諸證脚氣腫小便不利

大腹皮 三兩

木瓜 去蘆

紫蘇子 炒

荆芥 穗

烏藥

檳榔 已上各

羅漢子 炒

紫蘇葉

橘紅 已上各

沉香 不見

枳殼 去穢

桑白皮 已上各

右吹咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓溫
服予謂有熱者去沉香橘紅加大黃半兩不拘時服

麻仁湯 治脚氣大腸結澀不通

麻子仁 炒升麻 三兩

豉 二兩

大黃 炒

射干散 治脚氣 陳皮 去白 甘草 炙

右剉碎每服五錢水一盞半生薑 棗大煎至八分去滓

下芒硝末半錢七更煎一二沸空心溫服

澤瀉散 治脚氣大小便秘澀膀胱氣 雅上攻心腹妨悶

澤瀉

赤茯苓

枳殼 已上各

猪苓 去黑

木通

檳榔 已上各

牽牛 炒

右為細末每服二錢用生薑葱白煎湯調下不拘時服日
二三服以利為度

沉香羌活散 治脚氣大小便秘或入腹衝心疼痛腫滿

沉香

羌活

木香

白芍藥

檳榔 已上各

川芎

枳殼

青皮

右吹咀每服四錢水二盞生薑三片煎至八分去滓食前
溫服

海蛤散 治脚氣變腫水腫小便不通喘息

海蛤

澤漆 葉 新者 防已

木通

百合 已上各

桑白皮 炒

檳榔

牽牛 炒

郁李仁 炒 已上各

右剉碎每服三錢水一盞煎至六分去滓日午溫服

猪苓湯 治脚氣熱水氣膈氣通身腫滿氣急小便不通坐臥
不得者服之

猪苓

赤茯苓

防已 已上各

桑根白皮 五兩

郁李仁 炒 澤瀉

木香 已上各

大腹皮 炒

枳殼 炒

右吹咀每服六錢以水二盞煎至七分去滓食前服當利
小便立初日三服

整子丸 治脚氣成水腫兼上氣喘急咳嗽大小便苦澀所

整子 凡

治脚氣成水腫兼上氣喘急咳嗽大小便苦澀所

服利水瀉交利大便惟小便轉澀者

葶藶子別名炒別 防已 甘草已上各

杏仁去尖炒 貝母去心各

右為細末入葶藶杏仁拌身以棗肉和丸如梧桐子大每服三十九空心用大棗桑白皮糯米煎飲下如小便水快即加至四十九

五加皮散 治江東嶺南春夏不免暑濕蒸熱臟腑虛弱羸瘦

毒毒攻擊脚氣發動兩脚枯痿或即浮熱腫滿或即皮肉焦燥不能久立筋急掣痛或氣衝心悶亂胃膈痰逆四肢不仁腹脹壅悶目眩頭旋並宜服之

五加皮 麻黃去根節 防風去蘆 枳殼去穢

獨活 丹參 桂心已上各 石膏二兩

川升麻 赤茯苓 牛膝去首 防已

羚羊角錢 黃芪已上各 薏苡仁已上各

右吹咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

知母散 治瘡毒脚氣增寒壯熱頭痛脚膝煩疼腹中妨悶不能飲食則無味口乾多渴

知母 川升麻 赤茯苓 瓜蒌根

黃芩已上各 木香半兩 芫胡已上各 龜甲已上各

檳榔已上各

右吹咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

漏蘆丸 治脚氣腫盛生瘡久不瘳膿血且流疼痛發欬不常

漏蘆 葶藶 秦光已上各 川大黃已上各 獨活

黃芩已上各 五加皮 赤芍藥 黃芪已上各

烏蛇皮屑去 右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時溫酒送下

治脚氣風毒壅盛生瘡腫痛不歇

牛旁子微炒 枳殼去穢 檳榔已上各 防風半兩

獨活一兩 赤芍藥 玄參 薏苡仁已上各

烏蛇皮屑去 右剉碎每服三錢以水一中盞煎六分去滓不拘時服

道氣除濕湯 淋濕脚氣內受濕氣不能外達此藥淋濕開導

越其邪 葶藶仙 防風 當歸 荆芥穗

地骨皮 升麻 白芍藥 胡蘿蔔

右件等分剉細水二斗煮至一斗五升去滓熱薰洗無時是踏丸 治脚氣腫滿痛連骨髓

烏頭三兩生去皮 樟腦二兩

右再研令勻醋為丸如彈子大置藥一丸於臚子上中心踏之衣被蓋覆汗出如涎為効

蕪洗方 治脚氣

防風半兩 蛇床子 黃芪略 木通半兩

荆芥 莽草各二

右為粗末濃煎湯極滾沸圍腿在桶上薰令通手時即洗之須是露出脚指不可洗

烏鴉藤散 烏鴉藤 蘇方木

右件各等分吹咀入定粉少許每用一兩水五匙煎數沸

先薰候通手即洗

沉香散 治脚氣春夏妨發或肝腎風虛脾氣之弱但竟昏明

不致飲食並宜服之

沉香

黃芪

牛膝

白茯苓

白木已上各羌活去蘆

防風去蘆

酸棗仁湯炒

羚羊角屑 人參去蘆

桂心

甘草炙 附子已上

木瓜乾者 附子皮

熟地黃

訶梨勒皮

石斛去根

右剉碎每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不拘時溫服

袪發散 治脚氣春夏妨發或稍心腹壅悶脚膝煩疼大便不

利小便赤少

枳殼炒 紫蘇葉

赤茯苓各三 川大黃剉散

赤芍藥

獨活已上各

五加皮

羚羊角屑

木通

獨活

黃芩

甘草炙 附子已上

右剉碎每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓食前溫服

加味香蘇散 治腿脚痠疼足面赤腫步履艱辛

濕氣週遊脚腿疼

香蘇散煮鴨鶩藤

木香方 藥仍加入

功效如神喚得應

紫蘇散 治風毒脚氣脚重虛腫

紫蘇

桑白皮

茴香炒 木通已上各

枳殼三錢

羌活

獨活

荊芥

甘草炙 青皮

木瓜已上各 大腹皮二錢

右吹咀分作二貼用水二盞生薑三片葱白二莖煎至八

分去滓食遠服

桑白皮散 治脚氣壅發兩脚浮腫小便赤澀腹脹滿氣急

坐卧不得

桑白皮

郁李仁各二 赤茯苓四錢 大腹子

防風

木香已上各 紫蘇子炒 木通

檳榔

青皮已上各 甘草炙

右吹咀分作二貼用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

獨活湯 治脚氣

獨活

麻黃去節 川芎

牛膝

黃芪炙 人參 熟附子

木香

當歸 白芍藥 生乾薑

辣桂

杜仲薑炒 白木 甘草炙

右吹咀每服三錢水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾去

滓食前溫服仍吞活血定痛丸

活血定痛丸

治風濕客於腎經血脉凝滯腰腿重疼不能轉

側皮膚不仁遍身麻木上功頭目虛浮耳內常鳴下注脚

膝重痛行步無力亦治項背拘急不得舒暢常服活血脉

壯筋骨使氣脉宣流

蒼朮炒

香附炒 威靈仙一兩 陳皮五兩

沒藥炒

狗脊去毛 草烏頭去皮

右為細末稀麪糊和丸如梧桐子大每服二十九空心溫

酒熱水任下或用前獨活湯下藥治腎受風冷脚氣痠痛

及久刺登側風冷入于腸胃以致兩脚削小成鼓捷風而

刺又不止用此藥主之

太醫院奇效良方卷之三十九終

醫家類 驗方大全四十卷

水起於胃先自四肢腫而至通身及腹脹滿八曰石水根於膀胱其狀起於臍下面腹獨大者是也九曰裏水起於小腸先小腹而漸至腫也十曰氣水起於大腸其狀下赤下白或下赤或下白其候也皆因上下不通關竅不利氣血居隔陰陽不調而致此也素問云面腫為風足腫為水然此當分陰水陽水少壯者弱而治之若陰水為腫脈未沉伏色多青白不煩渴小便澀而清大便自泄治宜尖膠陽水為腫脈未沉數色多赤黃或煩渴小便赤而難去大便多秘治宜疎氣滂滌凡膏水腫之病先要者治宜發汗其腰已下腫者當利小便大抵治法強健脾胃元壯則能運化運化則血氣充血氣充則陰陽和和則水歸元矣若少壯充實患此脈未浮大有力當導去其水年老虛弱得此補中行溫為先若氣下陷者即當提之蓋脾胃者養命之本腎者

乃生氣之源也不可不一究二臟之虛實慎不可輕用大戟羌花甘遂巴豆牽牛之藥大利其水暫取其效水去則脾土愈敗名則危殆若五傷路見則難治之肝傷者則唇黑脾傷者則唇白肺傷者則背平心傷則缺盆平腎傷則足心平此證若一二發見皆難治秦守者蓋之

水腫通治方

澤瀉水香散 治暑濕傷脾水腫腹脹小便赤大便滑

葶藶

木香

茯苓

肉桂

猪苓

澤瀉

木通

滑石

白朮

甘草

右作一服水二鐘煎至一鐘食前服

皮瀉皮湯 治溫內攻心腹脹滿并水腫小便不利大便滑泄

方見溫門

葶藶丸

治肺氣咳面自浮腫喘促不安小便赤色

甘草

木通

杏仁

防己

桑白皮

煎湯送下

右為細末用棗肉和丸如梧桐子大每服五十九食前用

桑白皮煎湯送下

白朮大香散 治喘嗽腫滿變成水病者不能食不能臥小便

秘者宜服

白朮

藜蘆

橫柳

赤茯苓

澤瀉

滑石

官桂

木香

甘草

陳皮

右作一服水二鐘煎至一鐘食前服

水丸 治十種水氣四肢腫滿面目浮浮以手按之少時方

起喘惡不得安臥小便赤澀

起喘惡不得安臥小便赤澀

起喘惡不得安臥小便赤澀

遠志 去心 高濟 一十九 椒目 神效	羌活 去蘆 大戟 一已上 各指茶 去之 神效	白牽牛 心 澤瀉 半斤 神效	右為細末 麩糊和丸 如梧桐子大 每服三十丸 食前用米湯送下	分氣補心湯 治心氣鬱結 癆為四肢浮腫 上氣喘急	木通 川芎 前胡 去苗 大腹皮	青皮 白朮 枳殼 甘草 各一已上	香附 炒去 白茯苓 桔梗 一已上 各細辛	木香 各五分	右作一服水二鍾 生薑三片 紅棗二枚 煎至一鍾 食前服	香蘇飲 治上氣喘嗽 面目浮腫	方見喘門	蘿蔔子 治水病浮腫	半夏 川芎 青木香	商陸 青皮 一已上 各 葶藶 赤茯苓	陳皮 牽牛末 檳榔 甘草 一已上 各	官桂 七分	右作一服水二鍾 生薑五片 煎至一鍾 食後服	調藥飲 治痰血留滯 血化為水 四肢浮腫 皮肉赤紋 各血分	蓬朮 川芎 當歸 延胡索	白芷 檳榔 陳皮 赤芍藥	桑白皮 大腹皮 赤茯苓 葶藶	瞿麥 一已上 各 大黃 半斤 細辛 官桂	甘草 一已上 各	右作一服水二鍾 生薑三片 紅棗二枚 煎至一鍾 食前服
--------------------	------------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------	------------------	----------------------	--------	----------------------------	----------------	------	-----------	-----------	--------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------------------------	--------------	--------------	----------------	----------------------	----------	----------------------------

神功散 又名神效散 治十種水疝 兩日四肢浮腫 以手按之 隨手而起 咳嗽喘急 不得安卧 小便赤澀 大便不利	黑牽牛 頭項 研碎 澤瀉 各二 指茶 椒目 各二	葶藶 炒香	右作一服水二鍾 葱白三根 煎至一鍾 入酒半盞 絕早向東立服 如人行十里 又以漿水 葱白煮稀粥 候葱爛 入酒五合 量人所飲 多少 須發一汗 許自早至午 當利小便 三四升 或大便微利 喘定 腫減 隔日再服 忌食麪粉 房事	五皮散 治風濕 容邪 於脾 經氣 血凝滯 以致 面目 虛浮 四肢 腫滿 心腹 膨脹 上氣 喘促	五加皮 地骨皮 大腹皮 茯苓皮	生薑皮 各二	右作一服水二鍾 煎至一鍾 食後服 勿忌生冷 油膩 堅硬之物 湯藥 方去 五加皮 地骨皮 加陳皮 桑白皮	當歸散 水腫之疾 多由腎水 不能攝養 心火 心大 不能溫養 脾土 故土 不制 水氣 盈溢 氣脈 閉塞 遂經 絡 癆 為 浮腫 之 證 心腹 膨脹 喘滿 不安	當歸 桂心 木香 赤茯苓	木通 檳榔 赤芍藥 牡丹皮	陳皮 白朮 各一分	右作一服水二鍾 紫蘇五葉 木瓜一片 煎一鍾 不拘時服	實脾散 治陰水 於腹 用此 見實脾土	厚朴 炒 木瓜 米香 炒 附子	札薑 草果仁 大腹皮 各半 甘草 一	右作一服水二鍾 生薑五片 煎一鍾 不拘時服	疎鑿子飲 治水氣 通身 浮腫 喘呼 氣急 煩躁 多渴 大小便
--	--------------------------	-------	--	---	-----------------	--------	---	--	--------------	---------------	-----------	----------------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------------

不利服熱藥不得者	老活去蓋	商陸	澤瀉	赤小豆
秦尤去蓋	木通	檳榔	大腹皮	
茯苓皮	椒目三分			
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服				
太香流氣飲	治面目虛浮四肢腫滿喘急水道赤澀			
方見氣門				
消腫丸	治水腫喘滿小便不利			
滑石	木通	白朮	黑牽牛炒	
茯苓	茯神去木	半夏湯泡	通草	
陳皮	二斤各半	木香一分	二瞿麥	丁香各半
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九食前用燈				
心麥門冬煎湯送下				
柳李仁散	治小便不利浮腫			
柳李仁	陳皮	檳榔	茯苓	
白朮	二斤各半	甘草		
右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服				
烏鯉魚湯	治水氣四肢浮腫			
烏鯉魚一箇	赤小豆	桑白皮	白朮	
陳皮	三斤	葱白	五莖	
右用水三椀同煮不可入鹽先喫魚後服藥不拘時候				
無碍丸	治脾病洪流四肢浮腫			
大腹皮	二斤	木香	半斤	檳榔
蓬朮	三棱	已吐		柳李仁
右為細末用炒麥麩麩糊為丸如梧桐子大每服七八				
十九食前用生薑湯送下				

導滯通經湯	治脾氣有餘氣不宣流面目手足浮腫			
桑白皮	茯苓	陳皮	去白朮	三斤
木香	半斤	霖雨時加澤瀉	二斤	
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服				
神功丸	治十種水氣面目四肢偏身俱腫			
十種水腫病證根源狀方法				
一青水	先從左邊脇腫起根在肝			大戟
二赤水	右根腫起一云脚根腫起根在心			葶藶
三黃水	腰腹腫起根在脾			甘遂微炒
四白水	從脚腫起根在市			桑白皮
五黑水	從外腎腫起根在腎			連翹
六玄水	從面腫起根在外腎			羌花
七風水	從四肢腫起根在骨			澤瀉
八石水	從腎腫起根在膀胱			桑本
九蒿水	從小腹腫起根在小腸			巴豆
十氣水	或感或衰根在腹			赤小豆
右十味用研主藥一兩餘者各半兩研為細末煉蜜為丸				
如梧桐子大每服十九茯苓湯下一日三服忌食百日外				
忌魚蝦麩食一切毒房事病痊後便服				
鴨頭丸	治濕熱面目肢體悉腫腹脹喘急二便秘澀			
鮮茅蘆	微炒	防己	各	
右為細末取綠鴨頭血和丸如梧桐子大每服七十九食				
前白湯送下				
三仁丸	治水腫喘急二便不通			
柳李仁	去皮	杏仁	去皮	薏苡仁
右為細末米糊為丸如梧桐子大每服七十九不拘時用				

米湯送下

海金沙散 治脾濕太過通身腫滿喘不得臥腹脹如鼓

海金沙 二升 甘遂 半升 黑牽牛 一升 共一升 取末

右為細末每服二錢食前用倒流水煎湯調服

雄黃木香散 治男子婦人十種水氣取水法

大鯽魚 一枚 去腸肚入大雄黃 半斤 研 黑牽牛 半斤

木香 各半 土狗 一箇

右以大戟同甘遂一半入魚肚內煨令焦取出焙乾同煎

藥研為末每服二三錢冷水調下

半邊散 治諸般水腫

芫花 醋浸 大戟 甘遂 大黃 三升 各

土狗 七枚 飛五月內

右先以蒸搗爛為餅攤新瓦上却將土狗安葱上焙乾去

翅足嘴每箇剪作兩片分左右成對記之再焙乾為末欲

退左邊腫即以左邊七片為末入煎藥調服右邊依前四

味末每服二錢入土狗末和勻用淡竹葉天門冬煎湯調

五更服候左邊退至第四日服右邊如或末動只以大黃

三錢煎至一半助至如更不動茶清助之

雄黃神金散 治十種水腫瘰癧

一從脚腫根在心 葶藶 以糯米同

二從肚腹腫根在腹 椒目

三從陰腫根在腎 澤瀉

四從膝腫根在肝 芫花 醋炒

五從面腫根在肺 桑白皮

六從心腫根在肋 雄黃

七從四肢腫根在脾 甘遂

八從口腫根在小腸 已戟去心

九從腰腫起根在腎 大戟

十從四肢腫起根在胃 茯苓

右為細末所主藥加倍餘各等分每服二三錢空心用井

水調服以利為度量入虛實加減服食忌如法

塗臍膏 治水腫小便澀少

地龍 猪苓 絨砂

右等分為末葱涎調敷臍中寸高末之

病水寒不得宜行成濕腫證脈來沉遲色多青白不煩不

渴小便澀少而遊大便滑泄

一頭黃頭八鬚魚 綠豆同煎一合餘

蒸作濃羹成頓服 自然水腫漸消除

退腫集賢方 治諸腫

商陸 猪苓 漢防己 苦苣蕒

椒目 滑石 海金沙 黑金牛 取末

大腹皮 續隨子 去油 赤茯苓 各一已豆 煎去油

黃連 半斤

右為細末煨蒜搗爛為丸如梧桐子大每服二十五丸五

更溫服兩日服一次初服商陸湯次服赤小豆湯三服用

木瓜湯下

木香分氣湯 治氣滯帶四肢腹急中滿胸膈脇肋膨脹虛氣

上樹小便失濁

木香 猪苓 澤瀉 赤茯苓

半夏 枳殼 檳榔 燈心草

蘇子 各等

右剉碎每服一兩水二盞煎入麝香末少許同服

沉香海金沙丸 治一切積聚脾腫脹肚大青筋瀉

沉香 三斤 海金沙 一斤 牽牛末 一斤

右研獨頭蘇九如梧桐子大每服三五十九空心用燈心木通湯送下

三白散 治膀胱熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛 二斤 桑白皮 微炒 白木 木通

陳皮 各半

右為細末每服二寸空心薑湯調服小兒服半寸

治男子陰腫大如升核痛

右以馬鞭草搗爛塗之

治婦人陰腫硬

右用枳實半斤剉碎炒熱布包熨之冷即易之又灸

蟬蛻散 治痔瘻腫小兒坐地為風或蟻咬者

蟬蛻 半斤

右用水一椀煎湯洗痔溫再洗仍与五苓散加燈心煎服

神效木香散 治二十四種瘧病

木香 沉香 各二 砂仁 若香 各炒

益智 連翹 三斤 桑皮 白牽牛 半炒

椒目 枳殼 炒 木通 黑牽牛 半炒

陳皮 青皮 澤瀉 大黃 半炒

檳榔 胡椒 各一 甘遂 四

右為細末米醋糊為丸如梧桐子大每服五寸空心五更

初嚼葱白湯下消上 次服橘皮湯下消中 第三服桑白皮

湯下消下 尚有餘腫沉香湯下忌鹽醬

導水茯苓湯 治水腫頭面手足偏身腫如爛衣之狀手按而

塌陷手起隨手而高突喘滿倚息不能轉側不得着床而

睡飲食不下小便秘澀澀出如割而絕少雖有而如黑豆

汁者服喘嗽氣逆諸藥不效用此即愈亦嘗驗其病重之

人煎此藥時要如焚阿刺吉酒相似約水一斗止取藥一

盞服後小水必行時即漸添多直至小便變清白色為愈

赤茯苓 麥門冬 去心 澤瀉 白木 三斤

桑白皮 紫蘇 檳榔 木皮 七斤

大腹皮 陳皮 砂仁 木香 七斤

右吹咀每服半兩水二盞燈草二十五根煎至八分去滓

空心服如病重者可用藥五兩再加去心麥門冬二兩燈

草半兩以水一斗於砂鍋內熬至一大椀再下小銚內煎

至一大盞五更空心服滓再煎服連進此三服自然利小

水一日添如一日

沉香琥珀丸 治水腫一切急難證小便不通者

琥珀 杏仁 去尖 紫蘇 赤茯苓

澤瀉 半斤 華蓋 炒 郁李仁 去皮 沉香 已兩半

陳皮 去白 防已 已兩半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以麝香為衣每服二十

五九加至五十九空心用人參煎湯送下量虛實加減

葶藶丸 治腹中有濕熱氣目下微腫如新卧起之狀兩足脛

微腫病在腎上以陰也標在肺上以陰也故滿氣急咳嗽

喘息有音每就卧則右脇有氣上衝有腹与缺盆相牽引

不快少思飲食

葶藶 桑牛 半生 白木 半斤 桑白皮

赤茯苓 漢防已 羌活 陳皮

澤瀉 郁李仁 湯浸去皮炒 桑白皮

右為細末研勻煉蜜和杵二三百下九如梧桐子大初服

十九加至三十九空心及晚食前用生薑橘皮湯送下日
送二服以知為度

治氣虛水腫浮脹 昔陳州公使酒庫積司陳通志此一病垂
死醫者已不下藥偶一婦人云是醫人所投服之病自小
便而下幾數桶遂愈

右用大蒜一箇爛研以蛤粉和可為丸即止丸如梧桐子
大每服十九白湯送下若氣不升降即以大蒜一箇每辨
切開逐瓣內入茴香七粒濕紙裹煨香熟爛嚼白湯送下
不以多少若臟腑不止即以丁香如茴香法煨服每辨蒜
用三粒煨服

治腹中水癖水腫
右用黃雌雞一隻理如食法和赤小豆一升同煮候豆爛
即出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣

若瘦者亦漸漸食之良先患骨熱者不可食也

鯉魚方
右用大鯉魚一尾去頭尾及骨椎取肉以水二斗赤小豆
一大升和魚肉煮可取二升已上汁生布絞去滓頓服盡
如不能盡分為二服後服溫令暖服說當下利利盡則差
一方療水腫滯下氣用鯉魚白煮食腹有宿瘕者不可食

大腹皮散 治風水身體浮腫發欬不定肢節疼痛上氣喘急
大腹皮 桑白皮 川芎 各一兩 漢防已 一兩

羌活 青皮 去白 大黃 枳榔
桂心 一兩 甘草 兩半

右咬咀每服五錢水一大盞煎五分去滓不拘時溫服

諸白皮散 治水毒氣滿身腫滿
諸白皮 猪苓 去白 木通 二兩 紫蘇莖葉

右除積柳外用水二大盞煎至一大盞去滓五更初分作
二服每服調積柳末一分至平明當利如未利再服

漢防已散 治皮水腫如黍水在皮膚中四肢習習然動
漢防已 桑白皮 黃芪 桂心 各一兩

赤茯苓 甘草 兩半
右咬咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓不拘時溫服

木香丸 治皮水身體面自悉浮腫
木香 苦葫蘆子 乳香 已上各一分 枳榔生一枚一炮

甘遂 硃砂 各半兩
右為細末以爛飯和分作四十九瓦用麩裹於銚子內以
水煮熟令患人知汁香之以盡為度從早晨服藥至午時
其水便下不計行數水盡自止

木香丸 治水腫腹內堅脈喘促大小便澀
木香 澤瀉 各三兩 防已 二分 巴豆 去心膜切
臍粉 各一分 甘遂 生用 青皮 去白 蘿蔔子

鹽麥 水銀以火煮肉研
右為細末糯米飯和丸如黍豆大每服三九空心用木通湯送下

人參木香散 治水氣病

人參 木香 茯苓

滑石 琥珀 檳榔

猪苓 甘草各等分

右為細末每服五錢生薑三片水一盞煎至七分不拘時溫服日進三服

治水氣方

右用宣州木瓜一箇竹刀切下蓋子去子并穢入吳茱萸在內却將蓋子用竹簽簽定蒸熟各研細焙乾為末以紫蘇熱水調下不拘時候

治水氣方

右用商陸根白者去皮功如小豆許一大盞以水三升煮取一升已上爛即取粟米一大盞煮成粥空心服若一日兩度服即恐利多每日服一頓即微利不得食生冷一方取汁半合和酒半升服利下瘥不可雜食

治脾胃受水喫轉藥了后服此藥以補之

白木 巴戟去心 羌活 山茱萸去核

陳皮 乾薑 草薹寇 吳茱萸

水通 牽牛焙乾 肉薑寇 檳榔已上各

川芎半兩 半夏二錢 椒目一錢

右為細末每服二錢水一盞煎至九分去滓空心服或煉蜜為丸如梧桐子大每服四十九空心米湯送下
補脾胃香散 治脾胃受水氣喫轉藥了便服此藥以補之

霍香 丁香 羌活 紅苴寇

川芎 獨活 木香 草薹寇去皮

甘草各一分 乾薑三錢 陳皮半兩

右為細末每服二錢水一盞煎二三沸空心服

加味枳木湯 治氣為痰飲所隔心下堅脹名曰氣分歌云氣分中滿并胸痺三者雖殊皆此類胸痺氣實中滿虛氣分

枳殼為異狀陽微遲寸遲澁兩處推求病端的陰氣不通則骨疼陽氣不通身冷劇陰氣前通痺不仁陽氣前通惡寒慄陰陽相得氣乃行氣轉即散分虛實實則失氣虛

遺尿腹滿脇鳴何以察心下堅大似旋盤桂附木湯為最妙

枳殼 白木 辣桂 紫蘇葉

陳皮 檳榔 桔梗 五靈脂

木香已上各半兩 茯苓 甘草已上各

右以咀每服五錢水二盞生薑三片煎至一鍾去滓食前溫服

批發氣寶丸 治腰脇俱病如抱一甕肌骨堅硬按之如鼓兩脚腫滿曲膝仰臥不能屈伸自頭至頸中脊瘦露骨一切

氣積食積并脚氣走注大便秘結寒熱往來狀如傷寒悉皆治之

黑牽牛二兩 大黃半兩 青皮去白 檳榔各一分

木香 羌活 川芎 陳皮

當歸 茴香炒各半兩

石用細末用皂角膏為丸如梧桐子大每服五七十九加

至百九空心生薑心湯送下

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

大就散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

紅羊大戟主

續隨子主

甜菜慈主 黑牽牛主

右各為一兩觀其五臟病證主其病之藥加一兩共二兩並為細末煎心湯五更初面東方服一錢七刀須相老少虛實加減至天明其水下三五次其腫即消却用生薑葱煎粥止之隔日服平胃散一貼如亂虛不堪再下者只用前藥麩糊為丸三日一服二十九謂之磨化丸發效食忘如後

堯花丸 治女人脾元虛憊水氣腫滿

堯花主 牽牛主

右為細末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服三十九相虛實茶清煎下五更初面東方服天明其水即下用前法粥藥補之婦人止用二味用手捺有蜜深者可醫忌生薑油

醬鼓麩醋羊鷄等毒食生冷只可食精肉如欲食鹽炒鹽食之以少為貴不食尤好服藥之日須忌以甘草

又方用鯉魚長一尺五寸以酒醃漬一宿平旦以木篋從口貫至尾微火炙令熟去皮隔宿勿食空腹頓服之不能者分再服勿与葱

沉附湯 治腫病大凡腫病因積而得先用積藥積既除而腫再作小便不利到此束手矣若用利小便藥性寒而小便愈不通故小便不利則中焦下焦不升降痞膈為寒氣所結故水凝而不通但用沉附湯

附子主 生薑主 右用水三盞入生薑十數片同煎至八分次以沉香濃磨二錢許加入藥再煎三五沸去滓空心服如此則小便自通常備自去美沉附湯一向喫三五片附子無碍男子

婦人皆可服之

大半夏湯 治脾土受濕不能制水水漬於腸胃益於皮膚漉漉有聲怔忡喘息名水脹

半夏湯 陳皮 茯苓 桔梗

右剉碎每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓食前溫服

鯉魚湯 治平身面浮腫小腸澀大便難上氣喘促

鯉魚湯 澤瀉 赤茯苓 桑白皮 紫蘇一兩 杏仁半兩 去皮

右剉細先用水五升煮魚取汁三升去魚內藥煮至二升去滓食前溫服一中盞魚亦食之

甜葶薈丸 治平身面四肢浮腫腹脹滿小便不利

甜葶薈二兩 薈二兩 澤瀉一兩 赤茯苓一兩 桑白皮一兩 杏仁半兩 去皮

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸以後藥煎湯送下日三服

木通 桑皮 百合一兩 郁李仁半兩 去皮

右剉碎每服三錢水一大盞煎至六分去滓下前九藥

治卒腫痛身面目浮大方 右用商陸根一斤刮其皮薄切之煮令爛去滓內羊肉一斤下葱豉豉如食法隨意食之腫消後亦宜作此或常搗商陸与米中煮作餅子食之

防已湯 治膜外氣水病不限年月深淺浮腫大喘

防已 大戟 木香 赤茯苓去皮 海蛤 胡椒 白木 犀角屑

葶藶	防風	木通	訶梨勒 <small>去核</small>
陳皮	牽牛	檳榔	郁李仁
桑皮	紫蘇 <small>一已上各</small>	大黃 <small>二已上</small>	麝香 <small>少許</small>

右判碎分作二劑以水三升隔宿浸明日五更用火煎減去一升絞取飲可三盞平旦空心先飲一盞如人行五里更服一盞又如人行五里更服一盞至第三服如藥冷用重湯煖之不可冷服若久病腹中脹服至第三盞即微利三兩行若腹中突者至日午即轉瀉宜用盆盛驗之必有惡濁黃水或惡濁青黑物出三五升並氣化為之瀉若不甚困慎勿止之必自往若覺力乏即服漿水粥補之後隔三五日更服一劑還依此法服之按徒都先生云服芽一劑則病減半至第二劑則去根本前後悉試重者朝服一劑而暮已瘥本派者服藥當日腫消能起但覺小腹

內有塊結則須後利其真津慎勿拋棄布囊盛懸於風中他日或有微覺發動則更煎可更治兩人徒都先生云人家有此藥津懸於戶上一家終不患瘧氣此飲不獨治水氣凡是氣病皆治之若患肺氣不限年月深淺於此藥二十味中減去大黃及訶梨勒加貝母人參以童子小便煎每日空心服之當去病根有患肺氣困重者因建惠水氣人服此藥偶得一盞服之便常永瘥有人一生患脚氣時時衝心服此飲亦除根本以此推之但是氣皆治不獨治水氣而已婦人有頑服之亦無妨小兒及老人隨意加減服之皆瘥

甘遂餅 治腹外水氣

甘遂 大麥麩各半

右為末以水和作餅子燒熱食之如不利以熱飲投之

如利以冷水洗手面即止一方治十腫水氣為末空心以葱白湯調二錢服之

炮腎散	治水氣腫滿	巴戟 <small>去心</small>	甘遂 <small>炒黃</small>	木香	苦葶藶 <small>炒</small>
沉香	澤瀉 <small>已上各</small>	膩粉 <small>一已上</small>	檳榔 <small>一已上</small>	陳皮 <small>去白</small>	芫花 <small>醋拌</small>
芫花	麥蘗 <small>已上各</small>	右為末每服二錢用猪腰子一枚以竹刀割開去筋膜切作三片膠藥末在內用溫紙裹慢火煨令香熟先煮葱白三莖令熟細切將葱白與粟米同煮粥一椀先食粥一半方食腰子藥後再食粥令盡臨卧時服至五更大小便下赤黃惡物是效			

赤黃惡物是效

李命丸 治水氣腫病

大戟 <small>炒</small>	甘遂 <small>炒</small>	苦葶藶 <small>生</small>
澤瀉 <small>半</small>	澤瀉 <small>半</small>	澤瀉 <small>半</small>

右為細末煮棗肉和丸如梧桐子大若四肢腫者名為順水溫漿水下三九星月上時服至天曉利下惡物若曰腹瘦腹腫者名為逆水以苦葫蘆子陳麩煎湯送下二九小便頻快是效

商陸互方 治水氣腫滿

生商陸切如豆赤小豆 各等 鯽魚肚存鱗

右將二味裝魚腹中以線縛之用水三升慢火煮豆爛去魚只取二味空心食之就以魚汁送下甚者過二日再為之不過三劑瘥

檳榔散 治水氣脚膝浮腫大小便不利上氣喘急

檳榔 <small>二已上</small>	木香	桂心 <small>各半</small>	紫蘇 <small>葉</small>
牽牛 <small>炒</small>	陳皮 <small>去白</small>	苧根 <small>各半</small>	木通 <small>已上各</small>

<p>柳李仁<small>去皮</small> 每服二錢空 心煎桑白皮湯調下臨卧服</p>	<p>右為細末每服二錢空 心煎桑白皮湯調下臨卧服</p>	<p>治腫從脚起稍上進者入腹則殺人亦治水腫</p>	<p>右用赤小豆一斛煮令極爛得四五斗汁溫以漬麩以下 日日為之數日消盡若已入腹者不必漬但煮小豆食之</p>	<p>莫雜喫飯及鮭魚鹽</p>	<p>其甜九 治水腫腹脹</p>	<p>其甜九<small>水</small> 甜葶藶<small>一</small> 及細辛<small>六</small> 苗<small>一</small> 川椒<small>二</small> 月</p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸用白湯送</p>	<p>下空心日午臨卧各一服</p>	<p>猪苓散 治水氣偏身浮腫宜利三焦通水道</p>	<p>猪苓<small>去皮</small> 茯苓<small>去皮</small> 大黃<small>炒</small> 赤茯苓</p>	<p>陳皮<small>去白</small> 狼毒<small>醋</small> 乾薑<small>炮</small> 五味子</p>	<p>大戟<small>炒</small> 椒目<small>炒</small> 澤瀉</p>	<p>桂心 白木<small>各</small> 等</p>	<p>右為細末每服二牙食前用葱白湯調服大小便利為度</p>	<p>海蛤九 治水氣偏身浮腫上喘小便不利</p>	<p>海蛤<small>細研</small> 甜葶藶<small>炒</small> 昆布<small>洗</small> 赤茯苓</p>	<p>海藻<small>洗</small> 澤瀉<small>已</small> 木通 桑皮<small>各</small> 二</p>	<p>漢防已<small>三</small> 刀</p>	<p>右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十 丸不拘時米湯送下</p>	<p>續隨子九 治通身虛腫喘悶不快</p>	<p>續隨子 漢防已 赤茯苓 海金沙</p>	<p>人參 續隨子 木香<small>已</small> 各 苦葶藶<small>已</small> 四</p>	<p>右為細末用棗肉和丸如梧桐子大每服二三十丸食前</p>
---	----------------------------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	---	-------------------------------	-------------------	---------------------------	---	--	---	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------	--	-----------------------	------------------------	--	-------------------------------

<p>桑白皮煎湯送下</p>	<p>大沉香重九 治虛脹腹滿水腫遍身腫滿氣逆嘔喘喘乏 小便赤澀大便不調一切中滿下虛危困之病其效如神</p>	<p>沉香 丁香 人參 車前子</p>	<p>葶藶 續隨子 青皮 白牽牛</p>	<p>枳實 木通 胡椒 海金沙</p>	<p>鐵稍 木香 茯苓 肉苁蓉<small>已</small> 各</p>	<p>白丁香 蘿蔔子 滑石 柳李仁<small>已</small> 各</p>	<p>右為細末用生薑自然汁煮糊為丸如梧桐子大每服二 十九不拘時用生薑湯送下日進三服忌鹽魚菜肉麩食 只可食米粥</p>	<p>無比九 治水古通身腫滿</p>	<p>京三稜 牽牛 膽礬 羌花<small>醋</small> 并</p>	<p>續隨子<small>已</small> 瓜粉<small>一</small> 分 硃砂<small>研</small></p>	<p>木香<small>已</small> 鐵粉<small>三</small> 分 大棗<small>三十</small> 枚<small>湯</small> 內<small>各</small> 研</p>	<p>右除膽礬硃砂棗肉外同為細末用醋醋二大升於銀石 器內先下膽礬硃砂棗肉煎五七沸次下諸藥末一匙搗 勻慢火熬候可丸如梧桐子大每服十九丈夫用溫酒下 婦人醋湯下</p>	<p>大醫院經驗奇效良方四十卷</p>
----------------	---	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------	---------------------------------------	--	--	---	---------------------

太醫院經驗奇效良方卷四十一

脹滿門 附論

活人書謂腹脹滿者由陰陽不和蓋天之陰陽寒暑也人之陰陽血氣也其有不和必致偏勝則寒暑不調人之偏勝則氣血不和氣血不和則變生百病夫脹滿者豈不由偏勝之所致乎六元正紀論云太陰所至為中滿又云濁氣在上則生脹脹又云諸濕腫滿皆屬脾土蓋心肺為陽居上腎肝為陰居下脾屬土居中州亦陰也為倉廩之官主納水穀灌漑四臟經曰飲食入胃游溢精氣上通於肺下輸膀胱水精四布五經並行陰陽自和心脾之陽降腎肝之陰升以成交泰而為无病或六淫七情之侵擾又飲食失節房勞致損脾王之陰傷胃雖納穀不能運化則腸自升而陰自降陰陽不和則為否隔矣遂使清濁相混氣道壅塞氣化濁血蒸鬱為熱也留而久氣化成濕也熱相搏遂成脹滿是曰鼓脹外雖堅滿而脹中空无物腹之虛大經曰腹脹大鼓之如鼓者此之入也又有單腹蠱脹者蠱之一字從虫似有虫食於內之入其謬因氣之盤結於腸間固難治也靈樞經論云五臟六腑皆有其脹各已不同然脹者皆因厥氣在下寒氣逆上榮氣留止真邪相攻兩氣相搏合而為脹或為臟腑之間或為氣血之分或為胸脇或為皮膚各有其病各有其狀蓋營氣循脈衛氣逆則為脈脹衛氣逆脈循分則為膚脹此病皆由人之臟氣所致或四氣七情之所乘襲至於飲食飢飽致使三焦虛實而為脹者治法不同發冬感寒胸中痞滿脈未沉細為寒脹治宜溫解寒邪夏月傷熱胸腹堅滿脈未虛弱為暑脹治宜清熱除濕若飢飽傷脾也氣若虛運於克化少愈若其不升降痞結胸中三焦相混大小便不通卒然脹滿脈

未沉伏為三焦脹也又有虛實之分虛者皮膚鼓也然而堅不痛而氣滿治以升降氣道溫補脾元即復矣實者內積宿食邪實於內按之堅痛當以疎氣滌實可也至以久病而脹脾土已敗最為危證治難取效諸脹當推其原而察之實者滌之虛者補之寒者熱之熱者清之結者散之留者行之在血分則通其血在氣分則行其氣始可万全不致殆矣

脹滿通治方

中滿分消湯 治中滿寒脹寒疝大小便不通四肢厥冷食入反出下虛中滿腹中寒心下痞燥寒厥奔豚不收並治之

益智 半夏 湯泡 木香 茯苓 去皮

升麻 七 杜 各 人參 去 芦 青皮 川烏 炮 去 脂

當歸 乾薑 黃連 六 分 各 黃芪 黃蘗 去 皮 吳茱萸

草薺 厚朴 澤瀉 各 右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服大忌房勞酒溫麪生冷硬物

消脹丸 治諸脹

木香 大黃 茯苓 去 皮 厚朴 薑製

澤瀉 七 杜 各 黑牽牛 取 末 滑石 各 六

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服五十九丸食前用生薑湯送下

寒氣丸 治諸痞塞閉格不通腹脹如鼓大便結秘小腸腎氣等疾功效尤速

青皮 用水 輕 等 分 同 我 木 用 蜜 虫 等 分 同

胡椒 用 香 妙 三 棧 花 漆 妙 檳 榔 妙 赤 芍 藥 妙 川 椒 妙

乾薑 用 香 妙 附 子 妙 青 薑 妙 萊 萸 妙 石 菖 蒲 妙 桃 仁 妙

右各等分剉碎與所製藥炒熟去水煙等不用抵以青皮等十味為細末酒糊為丸如梧相子大每服五十九加至七十九空心用紫蘇湯送下

沉香散 治腹脹氣喘生即不得
 沉香 本香 各半 枳殼 蘿蔔子 各三錢
 右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服
 順氣水香散 治氣不升降嘔逆惡心胃時痞問脇肋脹滿及酒食所傷噎氣吞酸心脾刺痛人便不調面色萎黃肌肉消瘦不思飲食兼治婦人血氣刺痛一功冷氣並皆治之方見氣門

七物厚朴湯 治腹滿發熱陽盛陰虛陽盛則外熱陰虛則內熱脈必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宣導飲食如絞致脹滿者為熱脹
 厚朴 薑 枳實 黃芩 芍藥 桂心 茯苓 芒硝 各三錢
 甘草 一分

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服
 嘔者加半夏利者去大黃
 中滿分消丸 治中滿熱脹鼓腹氣脹
 厚朴 薑 枳實 黃芩 芍藥 桂心 茯苓 芒硝 各三錢
 乾生薑 知母 茯苓 砂仁 各四錢
 澤瀉 練皮 各三錢 各猪苓 去皮 黃連 去皮 各二錢
 白本 甘草 各半

廣茂濟堅湯 治末滿腹脹內有積塊堅硬如石冷入坐卧不安大水使澀滯上端氣促面色痿黃通閉虛腫
 右為細末和自湯水蒸餅和丸如梧相子大每服一百丸
 焙熟以熱水送下食遠服量病大小加減

廣茂濟堅湯 此胡去薑 甘草生用
 神麴 澤瀉 已上各陳皮 去白 兵菜黃湯泡
 青皮 去白 升麻 已上各 黃芩 去黑 軍莖 燒
 厚朴 薑 當歸 稍 益智 已上各 紅花 二分
 半夏 七分 乾葛 二分

石一依服水二鍾先浸藥少時煎至一鍾食遠服忌酒濕
 麴中滿服後漸減積塊未遺再服後半夏厚朴湯
 半夏厚朴湯 半夏 一錢 厚朴 八分 神麴 六分 桃仁 十五箇
 黃芩 生用 澤瀉 紅花 白茯苓
 橘紅 蘇木 青皮 吳茱萸
 蒼朮 草苴 蔥 黃連 已上各 當歸 稍
 猪苓 京三稜 升麻 已上各 乾生薑

內桂 生甘草 昆布 乾葛 已上各
 右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服
 三稜煎丸 治心腹堅脹脇下滿硬胃中痞塞喘滿短氣常服
 順氣消積滯除膨脹
 京三稜 生半斤 枳實 為末 以酒三
 乾添 炒 麥蘖 炒 已上 青皮 去白 羅布子 炒
 神麴 炒 已上 枳實 炒 已上 各 二兩

右為細末以三稜膏和丸如梧相子大每服二十丸食後
 溫米飲送下
 木香 氣飲 調藥術利三焦行滯消脹滿
 方見諸氣門

五疇寬中散 治七氣沉滯飲食不下氣滿膨脹

方見翻胃門

溫胃湯 治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸與胃氣不平

脹滿上衝飲食不下脈虛而緊滿

附子包去 厚朴去皮 當歸 白芍藥

人參 甘草炙 橘皮已上各 乾姜一分

川椒去合口者炒

右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾食前服

人參芎歸湯 治煩躁喘急汗厥逆小便赤大便黑名血脹

人參 木香 陳桂去皮 五靈脂炒

烏藥 蓬朮煨 甘草炙 縮砂仁已上各

川芎半 當歸半 半夏湯泡

右作一服水二鍾生姜五片紅棗二枚紫蘇四葉煎至一

鍾食前服

木通飲 治脇肋刺痛膨脹小便赤澀大便不利或浮腫

木通 陳皮去白 茶蘇莖 甘草炙

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚灯心十莖煎至一

鍾不拘時服

參香散 治一切氣脾虛作脹痞氣

人參 官桂 甘草各七分 桑白皮

桔梗 陳皮 枳實炒 麥門冬

青皮 大腹皮 半夏已紅 紫蘇子

茯苓 香附子 木香各一分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前服

大半夏湯 治肝氣太盛勝於脾脾不運化結聚涎沫閉塞

臟氣胃冷中虛遂成脹滿之病其脈多弦逆

半夏湯泡 附子包去 枳實炒 厚朴姜炒

枳心已上各 當歸 茯苓 川椒炒出

甘草各一分 人參五分

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食後服

平肝飲子 治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭眩

樞逆脈來浮弦 防風去芦 枳殼炒 桔梗去芦 赤芍藥

桂枝已紅 木香燈見 人參 檳榔

川芎 當歸 陳皮 甘草炙

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

紫蘇子湯 治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶腸鳴

氣走鹿瀝有聲大小便不利脈虛緊滿

方見喘門

強中湯 治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成脹滿兩妨

飲食甚則腹痛

人參 青皮去白 陳皮去白 丁香已上各

白朮半 附子炮去 草菓仁 乾薑炮已上

厚朴姜製 甘草五分

大正氣散 治脾胃怯弱為風寒濕氣所傷遂致心腹脹滿有

妨飲食

白朮 陳皮各二 半夏湯泡 藿香葉

厚朴姜製 桂枝不見 枳殼炒 檳榔

乾薑炮已上 甘草半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

枳實湯 治腹脹發熱大便結實痰多洪數病名熱脹

枳實炒 大黃酒洗 厚朴姜製 桂心去皮不見

甘草炙

枳實炒 大黃酒洗 厚朴姜製 桂心去皮不見

甘草炙

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾去滓不
拘時服嘔者加半夏一錢

沉香交泰丸 治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不伸為臌脹

沉香 陳皮 去白 白木 三紅 枳實 炒

澤瀉 當歸 洗 白茯苓 去皮 吳茱萸 湯泡

青皮 去白 木香 三紅 各 大黃 酒浸 厚朴 姜製

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服七八十九食

前用白湯送下微利為度

木香塌氣丸 治中滿腹脹下虛損者

木香 胡椒 草豆蔻 炒 青皮 各三紅 上

羅蔔子 炒 陳皮 五紅 各 全蠍 稍 去毒 二

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服三十九不拘時用

米飲送下小兒用桑白皮煎湯送下

大異香散 治失飢傷飽痞悶停酸且食不能暮食病名穀脹

三稜 蓬朮 青皮 半夏 炒

陳皮 藿香 桔梗 枳殼 炒

香附 炒 益智 一紅 各 甘草 炙 半

右分作二貼每貼用水二盞生薑三片棗一枚煎至一鍾

去滓食後服

氣 九 治氣膨脹

薑黃 青皮 三紅 各 全蠍 去毒 肉荳蔻 炒 煨

木香 丁香 胡椒 一紅 各 羅蔔子 炒 去皮

右為細末研勻用酒生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服

五十丸紫蘇湯下陳皮湯亦可

萬金丸 治諸食積氣積血鼓脹之類

石菖蒲 斑蝥 炒 黃連 炒 去毒 不用

右用籠布袋盛起兩人牽製去盡貓毒骨子却將菖蒲為
細末以醋煮糊和丸如梧桐子大每服三十五丸溫酒或
白湯送下如治蠱脹加香附子末一二錢為末調服此藥

遇仙如意丸 治氣積氣脹痰癖水蠱宜服

白茯苓 青皮 陳皮 一紅 各 白荳蔻

石菖蒲 人參 丁香 三稜 炒

白朮 砂仁 官桂 蓬朮 炒

遠志 木香 三紅 各 山藥 半 及 香附 五 及

牽牛 取頭末 甘草 五分

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服一百二十九臨

睡溫白湯送下看老幼虛實加減服忌一切生冷硬物

鼓水蠱每服三百丸立消若風病加地骨皮一兩婦人月

事不調產後腹中有惡物並宜服之利後服水水一口即

止住利後可服甘露散補之

甘露散 人參 白朮 茯苓 猪苓 半 及

滑石 六 及 澤瀉 甘草

右為細末每服三錢食前白滾湯調下

撞關飲子 治關格不通氣不升降脹滿

丁香 不見 沉香 不見 砂仁 去殼 白荳蔻 去殼

三稜 炮 香附 去毒 烏藥 一紅 各 甘草 炙 半

右作一服水二盞煎至七分食遠溫服

數藥 治腹滿緊硬如石或陰囊腫大先用甘草嚼後用此

大戟 芫花 甘遂 海藻 各 半

右為細末用醋醃調麩和藥攤於綿紙上覆貼腫處仍以

欽綿裹住

華澄茄丸 治痞滿脹痛殺脹氣脹

華澄茄 砂仁 青皮 白豆蔻

羅蔔子 木香已上各 茴香油 肉豆蔻煨

辣桂 丁香已上各 陳皮三分

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服三十九空心用陳

皮湯送下

十全九 治心腹痞悶脇肋脹痛食少多傷

丁香 木香略一 枳殼麩炒 京三稜去毛

蓬木 青皮去白 陳皮去白 縮砂仁去殼

檳榔已上各 香附子炒四

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九食前用米

飲送下

木香化滯散 破滯氣治心腹痛悶

木香 薑黃 青皮去白 縮砂仁去殼

人參 檳榔 白木已上各 白豆蔻去殼

藿香 橘皮 大腹子 白茯苓去皮

白檀香 桔梗已上各 甘草炙四

右為細末每服三錢水一盞半煎至一盞食前稍熱服滯

湯點服亦可忌生冷硬物

治腹脹方

腹裏胃間久痞疼 多因氣食動脾經

縮砂三和同煎服 調理中湯效最靈

治久患腹脹脾疼中滿痞悶不食大小便或澀小腹脹急

用芍方三和散二貼縮砂仁二十粒搥碎用水三盞生薑

十片燈心十莖同煎至一盞平去滓分作三次每服用藥

藥調理中湯半貼立効

治腹脹方

腹脹脾疼怎抵當 枳實之外有丁香

三般等分羅敷細 次入白鹽和白湯

脾疼之疾皆因寒氣停滯積於胃膈或時嘔吐酸水不思

飲食用胡椒良薑丁香三味等分為細末每服一大錢或

二錢入鹽少許不拘時白湯點服

消脹丸 治久患腹脹

丁香 木香 檳榔 羅蔔子

牽牛各等

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服十九空心用紫蘇

湯送下

又方九治腹脹經久患泄瀉數升晝夜不止服藥不驗者乃氣

脫也宜用此

右用益智子煎濃湯服立愈

木香順氣湯 治濁氣在上則生腹脹

木香 草豆蔻炒 蒼朮米泔浸 厚朴薑製

當歸五分 青皮去白 益智仁 白茯苓去皮

陳皮 澤瀉 乾生薑 吳茱萸湯泡

半夏已上各 升麻 羌胡各一

內經曰留者行之結者散之以此胡升麻之若平行少陽

陽明二經發散清氣運行腸分為君以生薑半夏草豆蔻

益智仁辛甘大熱消散中寒為臣以厚朴木香蒼朮青皮

若辛大溫通順滯氣以當歸陳皮人參之辛甘溫調和榮

衛滋養中氣濁氣不降以若泄之吳茱萸之苦熱泄之者

也氣之薄者為陽中之陰發於肝草澤瀉平氣導引

渠濁陰之氣自天而下故以為佐氣味相合散之泄之上
之下之使清濁之氣各安其位也范天驛夫人先因勞役
飲食失節加之憂思氣結病心腹脹滿且食則不能養食
兩脇刺痛診其脈弦而細至夜濁陰之氣當降而不降腹
脹尤甚大抵陽主運化飲食勞倦損傷脾胃陽氣不能運
化精微聚而不散故為脹滿先灸中脘乃胃之募穴引胃
中生發之氣上行陽道又以前藥助之使濁陰之氣自此
而降矣

右件咬咀都作一服用水二盞煎至一盞去滓食前溫服
忌食生冷硬物

鷄矢醴 治心腹脹滿且食不能暮食由脾元虛弱不能剋制
於水水氣上行浸漬於土土濕不能運化水穀氣不宣流
上下痞塞故令人中滿且陽氣方長穀氣易消故能食暮
陰氣方健穀不得化故不能食其味甘滑病名穀脹
右用鷄矢白半升以好酒一斗漬七日每服一盞食後臨
卧時溫服

奇効良方四十一卷

奇効良方卷之四十二

積聚門 附論

鍼經云夫積者蓋厥氣生足燒七生腫寒胫蹇則血脈凝滯疑
凝則寒氣上入於腸胃入於腸胃則腹脹腹脹則腸外之汁沫
迫聚不得散日以成積卒然多飲食則腸滿起君不節用力過
度則絡脈傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內
溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於腸外有寒汁沫與血
相搏則併合凝聚不得散而成積矣或外中於寒內傷於憂怒
則氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裹不散津液凝滯滯
著而不去而成積矣且如見於五臟者各有名焉肝之積曰肥
氣以季夏戊巳日得之何以言之肝病傳於肝上當傳脾上季
夏適王王者不受邪肝復欲還脾上不肯受故留結為積故謂
之肥氣以季夏戊巳日得之心之積名曰伏梁脾之積名曰痞
氣肺之積名曰息貫腎之積名曰奔豚此其五積之名積者陰
氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣
之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所成其始發者有
常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣
也其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚故以是
別知積聚也又有七癥八瘕又有石瘕腸覃陳無擇論癥瘕屬
肝部積聚屬肺部夫癥者證也瘕者假也假物以成形然有七
癥八瘕之名經論亦不詳出雖有鈇鉞血肉髮氣米等七證物
非定名偶因食物相感而致患尔若婦人癥瘕則由內外不內
外因動傷五臟氣血而成古人謂為癥疾以蛟蛇等為生瘕然
亦不必泥此並屬血病蛇髮等事皆出偶成但飲食間誤中之
留聚假血而成自有活性亦猶未微中僧病噎者腹中有一物
其狀如魚即生瘕也又有石瘕岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客

于子門子門閉塞惡血當滯不瀉血留止日以益大狀如懷
子月事不以時下皆生於女子可導而下實鑑曰夫膀胱為津
液之府氣化則能出矣今寒客於子門則必氣塞不通血壅不
流而衄血以止之結硬如石是名石瘕也此氣先病而血後病
故月事不來則可宣導而下出者也故雜經云任之為病其內
苦結男子為七疝女子為瘕聚此之謂也非大辛之藥不能已
又有腸覃岐伯曰此病寒氣客於腸外與胃相搏不得榮養因
有所繫聚而內著惡氣乃起瘕肉乃生其始生者大如鷄卵稍
以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月
事以時而下此其候也夫腸者大腸也覃者延也大腸以薄道為
事乃肺之府肺主衛上為氣上得是則泄寒則凝令寒氣客於
大腸故衛氣不榮有所繫止而結瘕在內貼著其延久不已是
名腸覃也氣散則清氣聚則濁結為瘕聚所以惡氣乃起瘕肉
乃生小漸益大至期而鼓其腹則如懷子狀也此氣病而血未
病故月事不斷以時下此非妊娠在乎脉辨原病式曰瘕者腹
中堅硬按之應手謂之瘕也聖惠方謂瘕猶證也然水脉柔順
而今反堅硬如地者亢則害承乃制也瘕者腹雖硬而忽聚忽
散無有常準故聖惠方云瘕猶假也以其病瘕未及瘕也經曰
血不流而寒薄故血內凝而成瘕也腹內結痛也經曰小腸移
熱於大腸為瘕瘕謂小腸熱移入大腸兩熱相搏則血溢而為
瘕瘕血溢不利則月事沉滯而不行故云瘕瘕為沉瘕與伏同
若瘕為疝誤矣然則瘕病亦有熱者或陽氣鬱結佛熱壅滯而
堅硬不消者非寒瘕瘕也以脉別之王氏謂脉沉伏者瘕也跌
堅者瘕也故難經乃言五積為病且如肝之積曰肥氣在左脇
下如覆杯久不已令人發欬逆痰壅連歲不已心之積曰伏梁
起脐上大如臂上至心下久不已令人病煩心脾之積曰痞氣

容胃院獲大如盤久不已令人四肢不收發黃瘦飲食不為肌
膚肺之積曰息賁在右脇下如覆杯久不已令人洒淅寒熱喘
嗽發肺癰腎之積曰奔豚發於小腹上至心下若豚狀或上或
下先時久不已令人喘逆骨疼少氣此五積之狀各隨五臟之
經發病故不同也東垣云且積之為病或因暴怒七情之氣或
六淫之邪其初甚微導引去之可也留而不去遂成五積治當
五臟之法經言積之注於陰者蓋憂思傷心重寒傷肺忿怒傷
肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房汗出浴則傷腎
積之所成由自來矣有言積聚有言瘕瘕雖名異而
病同東垣先生隨經用藥制立五方治五積各有所主論當察
其所痛以知其應有餘不足可補則補可瀉則瀉先逆天時詳
藏府高下如寒者熱之結者散之客者除之留者行之堅者削
之消者安之摩者鹹而更以苦瀉之全真氣節飲食慎起居和
其中外可使畢已若以大毒之劑攻之積不能除反傷其氣終
難治矣許士解其要畧大抵治積以所惡者攻之以所善者
誘之則愈且如礪砂阿魏治肉積葛根麥蘗治酒積木香檳榔
治氣積桃仁紅花治血積南星半夏治痰積牽牛甘遂治水積
三稜蓬朮治癖積礞石巴豆治食積雄黃膩粉治延積各按其
類而封證治之若用群藥之藥分其勢則難取効須是認得分
別是何積聚兼見何證然後增加佐使之藥不尔反有所損要
在臨時消息也脉經曰脉來細而附骨者積也寸口積在胃中
微出寸口積在喉中關上積在臍傍上關下積在心下微下關
積在少腹尺中積在氣街脉出在右積在右脉出在左積在左
脉兩出積在中央各以其部處之脉來小沉而實者胃中有積
聚下食上即吐肺積脉浮而毛按之辟易心積脉沉而乳上下
先常震肝積脉弦而細腎積脉沉而急脉沉重而中散者因寒

食成酸味左轉而沉重者氣積在胃中右轉出不至寸口者內
有肉積也案古云養正積自除譬如滿座皆君子縱有一小人
自無容地而出今其真氣實胃氣強積自消矣案古之言豈欺
我哉內經曰大積大聚衰其大半而止痛實中有積氣大毒之
劑尚不可過况區中有積者乎此乃治積之一端也邪正虛實
宜詳審焉此皆古人論脈病證治實後人之龜鑑為醫者能體
古人之心為心治證无不効矣

積聚通治方

散聚湯 治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞

痛攻刺腰脇小腹脹大小便不利

半夏湯炮 檳榔 當歸 杏仁湯炮去衣

附子炮去 陳皮 茯苓去皮 枳殼去核

厚朴姜製 桂心 川芎 吳茱萸湯炮

甘草炙 右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服大便不

利加大黃

息實湯 治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病洒七寒熱氣

逆喘欬發為肺癰其脈浮而毛

半夏湯炮 桂心 人參去芦 吳茱萸湯炮

桑白皮炙 葶藶 甘草炙

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食前服

奔豚湯 治腎積於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時

久不愈病喘逆骨疼心氣其脈沉而滑

甘李根皮湯 乾薑 川芎 當歸

白芍藥 黃芩 甘草炙 半夏湯炮

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

枳殼散 治五種積氣三焦痞塞胃膈滿悶嘔吐痰涎口苦吞

酸常服順氣寬中除痰癖消積聚

枳殼 益智 陳皮 京三稜

我木 檳榔 肉桂已 肉苳蔻

厚朴 青皮 木香 乳蘆

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

大七氣湯 治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹

疼痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

益智 陳皮去白 蓬朮 京三稜

青皮去白 桔梗去芦 香附炒 藿香葉

肉桂已 桂枝已 甘草炙

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

廣茂漬堅湯 治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不

能大小便滯滯上氣喘促面色痿黃通身虛腫

方見脹滿門

木香化滯湯 治因憂氣食濕凝結於中脘腹皮微痛心下痞

滿不思飲食食之不散常上痞氣

木香 訶胡 橘皮 草苴蔻已

當歸 枳實炒 半夏湯炮 紅花

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

溫白丸 治心腹積聚癥瘕積塊大如杯椀心膈脹滿如有所

礙十種水腫痞塞翻胃吐逆並皆治之

皂角去皮 巴豆去心 厚朴姜製 吳茱萸湯炮

紫苑去 茯苓去 人參去 蜀椒去

肉桂去粗 乾薑炮 芫胡去芦 桔梗去芦

葛蒲各一 川烏炮去皮

右為細末入巴豆再研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸食前生薑湯送下

勝紅丸 治脾積氣滯胃隔滿悶肚腹疼痛氣促不安嘔吐清

水丈夫酒積婦人血積小兒食積並皆治之

青皮 陳皮 三稜醋炙 蓬木醋炙

乾薑炮 良薑炮 香附炒去毛

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十九食前用生薑湯送下一方用蘿蔔子一兩炒

香稜丸 治五積破痰癖消微瘕塊散積聚

木香不見 丁香不見 青皮夫白 川棟子

苗香各半 三稜炮 枳殼去穢

蓬木炮 右為細末醋糊為丸如梧桐子大以硃砂末為衣每服五十九不拘時用炒生薑湯送下溫酒亦可

妙應丸 治老人虛人一切虛寒痰癖積塊攻脹痰痛

黑附子炮 木香不見 破故紙炒 草撥各一

右將飛過硃砂末入在附子罐內仍用附子末蓋口用麩

和成裹約半指厚以慢炭火內煨令黃色去麩同木香等

藥為細末却將厚裹附子麩麩為細末醋調煮糊為丸如

菘豆火每服十五丸至二十九食後用生薑湯送下

肥氣丸 治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鼈狀久不

愈發咳逆嘔其脈弦而細

當歸 蒼木各半 青皮炒 蛇含石醋炙

三稜 蓬木 鐵孕粉各三兩 三炒各一

右為細末醋煮米為丸如菘豆大每服四十九用當歸

浸酒下食遠服 伏梁丸 治心積起膈上至心大如臂久不已病煩心身體

股皆腫環臍而痛其脈沉而乳

伏苓去皮 厚朴去皮 人參去芦 枳殼去穢

三稜炮 半夏湯洗 白木各等

方為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九食遠用米

飲湯送下 化氣湯 治息積癖於腹脇之下偏脹膨滿不妨飲食諸藥不

能取及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣痛

方見氣門

赤石脂炮 川椒炒 乾薑炮 桂心

附子各半 大烏頭炮去皮 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大以硃砂末為衣每服五十

丸食遠用米湯送下 積氣丹 治一切新久沉積氣塊面黃羸瘦瘕積聚口吐酸

水並皆治孕婦勿服

檳榔二箇 芫花 三稜 樟柳根

牛膝 黃連 廣茂各一兩 白牽牛

大戟 大黃 甘遂 青礞石

乾漆炮 硃砂一兩 肉苳蔻二箇

巴豆 木香半 青皮 石苳蒲

陳皮各半

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服一九臨卧用紅蜜煎湯送下有積者肚內作声病退為度
木香通氣丸 治痰癖氣滯心腹痞滿嘔逆咳嗽此藥順氣消痰進飲食散痞氣

木香 人參 兩半
陳皮 黑牽牛 六分
兵部 丁香 各半
三稜 炮 廣茂 炮 各
木通 半夏 姜製 茴香 炒 神麩
麥蘖 青皮 二兩 玄胡索 二兩

右為細末米糊為丸如小豆大每服三十四丸食後生薑湯送下日進二服

天南星丸 去酒積酒毒

南星 一斤 端正者淨洗先於半地土極處置五日深一
淨以黃酒一斗浸之將南星置其中浸以酒火灰令
土泥益封縫勿令透氣一宿取出用酒并水各二

升和洗淨切作片 硃砂 一兩 細研
右研勻用生薑汁煮糊和丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五十九至百丸不拘時生薑湯送下

妙功丸 專治赤衛失調將理飲食不節冷熱所傷或飲醉酒狂陽流蕩強為傷損或大飽暴怒傷氣或憂驚而氣結不升或悲痛而氣消不聚或鬱結而氣不散或傷重而力不生或乘喜而氣散不斂七情所感眾事冗繁起居失常動勞不一四時乖戾觸冒天地之司氣留積於榮衛之中胃值風寒濕氣疑滯絡之間或五臟中各生蓄積之恙或六腑中各長留結之聚或生癥瘕癖塊或留聚而為腫為癰瘡瘍疥癬風痺痿厥及黃疸水濕蠱毒鼓脹等疾功効不可俱述

大黃 滑石 各四 黃連 鬱金

蓮木 檳榔 黃芩 已上各 黑牽牛末 八分
輕粉 硃砂 各 川芎 二分 白芷 三
沉香 木香 各半 粉霜 一分

右除輕粉硃砂粉霜別研外為細末和勻滴水為丸或稀糊和丸如梧桐子大量虛實加減丸數食遠白湯送下
磨積丸 治腸胃虛寒氣癖流於兩脇氣逆喘急久則榮衛凝滯黃為腹脹多致不效

胡椒 一百五 木香 二兩 全蠍 十
右為細末粟米飲為丸如菉豆大每服三十九丸食遠用橘皮湯送下

二香化積丸 治諸食積

丁香 木香 各一 胡椒 大者五 大烏梅 八
巴豆 炒去刺青皮 陳皮 砂仁 各半

右為細末用米醋煮糊為丸如梧桐子大每服九九食前生薑湯送下

化鐵丹 治氣塊等疾

香附子 四及去毛通刺用四豆三十粒去殼膜研細
五冬十取出用米泔水浸巴豆同浸香附子三夏一
只用一半香附子用後陳皮杏仁去皮 高良薑 多年
三稜 醋炙 蓬朮 醋炙 半夏 醋炙 青皮 去白

陳皮 各一 丁香 半及 肉荳蔻 炮裂煨

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服二三十丸空心用生薑湯送下

消痞丸 治心下痞滿及積年久不愈者

薑黃 白朮 各一 枳實 炒 半
人參 橘皮 各 黃連 黃芩 各六
縮砂 澤瀉 厚朴 各 猪苓 各

神麴炒 乾生薑 甘草

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服七八十九至百丸食前用白湯送下

消積聚進飲食止嘔吐

荆三稜 蓬木 枳殼 茴香 木香

右為細末生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服五十九食後用溫水送下生薑湯下亦可

鷄瓜三稜九 治五臟痲痺氣塊

青皮 石三稜 荆三稜 木香 檳榔

右為細末生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服二十三十九生薑湯下

二稜煎丸 消癥瘕積聚化痰飲寬中順氣治心腹堅脹腸下

緊硬喘滿短氣不進飲食大便或泄或閉

荆三稜 麥蘖 杏仁 乾漆 蘿蔔子

右為細末以三稜膏和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食前米飲下加阿魏半兩名阿魏丸

歸露丸 治寒傷於內氣凝不流結於腸外久為癥瘕時作疼

痛腹不得伸乃臌脹結瘕之候

荆三稜 蓬木 枳殼 茴香 木香

乾漆 川烏 硃砂 經粉

右為細末研勻生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯送下溫酒下亦可

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上捨心痛及繞臍腹痛不可忍

大黃 薑黃 枳殼 木香 檳榔 附子

右為細末用三年米醋一升先煮去四五合後和藥丸如梧桐子大每服二十九空心醋湯溫酒米湯皆可送下取

下積如魚腸爛肉膿血青泥是効

三聖丸 治積年癥瘕癱瘓諸藥不瘥者用此至効

舶上硫黃 水銀 硃砂 雄黃

右三味於乳鉢內研如粉却以生鐵銚內文武火溶成汁以火筋攪令勻停冷刀刻下以紙裹置地坑內一宿取出復研細次以

赤芍藥 當歸 蓬木 紅花

並細剉以好酒一升煎至一半濾出砂盆內研生布濾取汁再熬放冷入飛羅白麩煮糊為丸如粟豆大消磨癥塊

空心溫酒吞下三九至五九婦人產後傷於飲食結伏腹脇間時發疼當歸浸酒下七九至十九

軟金丹 治血積食積及治婦人心腹胃脘急痛或淋秘產後

經病刺痛乾血氣勞倦寒熱夜多盜汗

當歸 乾漆 枳殼 木香 檳榔 附子

綱砂 輕粉 粉霜
右研為末研棗肉膏旋丸如小豆大每服一九空心用新水送下

神麴 治酒積癖不消心腹脹滿噯噯逆不食脇肋疼痛
神麴 炒 麥蘖 炒 黃連 炒 黃連 炒 黃連 炒 黃連 炒

生薑湯送下
右為細末沸湯搜和丸如梧桐子大每服五十九食前用酒釀丸 治飲酒過度頭旋惡心嘔吐酒停遇酒即吐久而成癖者宜服

堆黃 如皂角 巴豆 不去 繳稍 各十五个同研
右研細水和丸如豌豆大候稍乾入麩炒香將一九放水

狀元丸 治膈氣酒積涎嗽腹滿吐逆
中淨即去麩每服二九溫酒下茶下亦可

方見隔壅門
破塊丸 治瘡氣結成氣塊腹中不消服之立効

葦朮 大黃 各一 鹿茸 炒 以許
右為細末研勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心用冷酒送下冷湯下亦可

秘傳掌中金丸 凡真氣衰弱飲食多傷停於胃膈往往用感
應丸如聖膏理中丸之類又不能剋化任意取轉致傷真

元臟腑別生他疾惟此藥能消酒食化痰飲寬中利膈久服永無胃膈不快之疾不動臟腑不損真元加檳榔木香
各一兩名檳榔丸又調氣

陳皮 一斤 去白 薑 半斤 炙 甘草 半斤 炙 白豆蔻
炒仁 各一 半夏 三升 湯洗 七次 生薑 甘草 各二

麥蘖 炒 甘草 各二

麥蘖 炒 甘草 各二

右為細末生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服三四十九食前生薑湯送下

法制檳榔 治酒食過度胃膈脹滿口吐清水一切積聚
雞心檳榔 一兩 切 縮砂 一兩 白豆蔻 一兩 丁香 一兩 切 粉草 一兩 切 橘皮 一兩 切 生薑 一兩 切

右件用河水兩碗浸一宿次日用慢火砂鍋內煮乾焙乾入新瓶收每服一撮細嚼酒下或為細末湯調服亦可

流氣丸 治五積六聚癥瘕癖塊留飲已上此積皆係寒氣客搏於腸胃之間久而停留不去變成諸疾此藥能消導滯

氣通和陰陽消宿飲雖年高氣弱者亦皆可服

木香 川茴香 微炒 蘿蔔子 補骨脂 微炒 青皮 去白 紅橘皮 去白 石菖蒲 蓬萊木 炮

神麴 微炒 葦朮 微炒 縮砂 仁 枳殼 去穢 麥蘖 微炒 檳榔 一兩 牽牛 兩半

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九食後細嚼白豆蔻一枚白湯送下

綱砂煎丸 治積聚久不散腹脹滿面無顏色四肢不和
綱砂 一斤 炙 石菖蒲 一斤 炙 蓬萊木 一斤 炙 羌活 一斤 炙 木香 一斤 炙 桂心 一斤 炙 蓬萊木 一斤 炙 川烏頭 一斤 炙 荆三稜 一斤 炙 當歸 一斤 炙 川大黃 一斤 炙 蓬萊木 一斤 炙 青橘皮 一斤 炙 乾漆 一斤 炙

右為細末以綱砂膏入少蒸餅和搗二三百杵丸如梧桐子大每服十五丸食前溫酒送下

取積妙應丸 家傳經驗專取男子婦人小兒諸般積氣多因茶酒生菓肉麩所傷又為悲憂喜怒之氣鬱結心懷積成

取積妙應丸 家傳經驗專取男子婦人小兒諸般積氣多因茶酒生菓肉麩所傷又為悲憂喜怒之氣鬱結心懷積成

取積妙應丸 家傳經驗專取男子婦人小兒諸般積氣多因茶酒生菓肉麩所傷又為悲憂喜怒之氣鬱結心懷積成

脾腹癥瘕大如杯碗不消諸種蟲積及治黃腫水腫遍身浮腫翻胃吐食九種心疼一切風證婦人血瘦淋帶經脈不通腹膨如懷胎孕及成鬼胎小兒脾疳積滯並皆治之此藥不動元陽真氣服後肚腹消平亦不疼痛雖年幼氣弱小兒加減服之有利無害

檳榔 大黃 各一 牽牛 二斤 蕪荑 仁

貫衆 雷丸 各半 鶴虱 錫灰 各四

阿魏 酒化開

右為細末用皂角去皮弦子淨一斤半熱水泡浸槌搥水汁濾去滓與藥末皂角水再入糊為丸如梧桐子大每服稱四錢重作一服五更用葱白七根煎湯送下仍以棗三五枚食之壓藥以早天明候臍疳一行後取下惡積之物如有積者去盡數行如止見稀水無積物却以溫薄米粥

補之

沉香海金砂丸 治一切積聚脾溫腫脹肚大筋青羸瘦惡證

沉香 二錢 海金砂 半錢 輕粉 一錢 牽牛末 一兩

右為細末研獨頭蒜如丸為泥如梧桐子大每服二十九加至五十九煎百沸燈心湯通草湯空心服更量虛實加減丸數取利是効

驚病無憂散 治諸般氣積腫脹

檳榔 半兩 大黃 一兩 甘草 半錢 黑牽牛 半兩

右為細末每服三錢不拘時茶清調服日進二服

治酒食積水病

石榴雙用又建皮 三稜 巴豆 五靈脂

瞿麥杏仁車前子 大戟 羌活 甘遂 宜

石為細末醋糊為丸如菉豆大每服七十丸前用溫白湯

送下

三稜丸 治五積六聚七積八積破一切血下一切氣

三稜 兩 大黃 一兩 乾漆 兩 巴豆 法去

研砂 兩

右為細末醋糊和丸如菉豆大每服三九至七九空心用米湯送下量虛實加減服

剪紅丸 追蟲取積利五臟不損六腑遠年近日諸般蟲積及

血塊宿食不消滯人赤白痢疾並皆治之

檳榔 六錢 巴豆 一兩 土硫 三錢 白牽牛 取頭末

蕪荑 六兩 雷丸 五兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大硃砂為衣每服一九食前每水送下取下病積為驗白粥補之

馬家五積丸 治諸般積聚

硝砂 仁 紅豆 赤小豆 黑牽牛

蘿蔔子 丁皮 各一兩 香附子

荆三稜 青皮 陳皮 乾漆 各一兩

大戟 枳殼 各一兩 枳殼 慢火炒令變紫色黑色

右共為細末如碾剝得藥滓再炒令黑色再碾為末以好米醋煮麩糊和丸如菉豆大每服十五九至二十九不拘時淡生薑湯送下

消堅丸 治五積六聚氣結成塊食積癖瘕心腹脹滿瘦悴少

食宜服

醋甲 醋甲 醋甲 醋甲 醋甲 醋甲 醋甲 醋甲 醋甲 醋甲

乾漆 乾漆 乾漆 乾漆 乾漆 乾漆 乾漆 乾漆 乾漆 乾漆

肉桂 肉桂 肉桂 肉桂 肉桂 肉桂 肉桂 肉桂 肉桂 肉桂

乾薑 乾薑 乾薑 乾薑 乾薑 乾薑 乾薑 乾薑 乾薑 乾薑

胡椒 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒 胡椒

木香 木香 木香 木香 木香 木香 木香 木香 木香 木香

研砂通明者為末用湯內乳香另研粉霜另研

輕粉二錢半

右件為細末研勻用好醋煮薄糊為丸如小菴豆大每服

二十九淡醋煎生薑湯送下日進二服夜間一服如未

漸加九數服微利即減

驚甲丸 治肥氣體瘦無力少思飲食

驚甲黃一錢可用重四兩爭先以醋和

川大黃二兩枳殼二兩用酒炒

桃仁一兩黃芩一兩細研如膏一兩半

右除驚甲外搗為細末後泥一風爐子上開口可安得驚

甲取前藥末并桃仁膏內驚甲中用好米醋二升時時旋

取入驚甲內以慢火熬令稠取出藥却將驚甲淨洗去泥

焙乾搗為細末與前藥同和搗為丸如梧桐子大每服二

十九空心用溫酒送下晚食前再服

肝之積肥氣丸 治積在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人

發欬逆痰瘧連歲不已

厚朴半兩

黃連七錢

川椒四錢

茯苓一錢

甘草半兩

芫胡二兩

乾薑五錢

人參去芦

昆布洗

川烏炮去皮一

皂角去灰

右為極細末入巴豆霜研勻煉蜜和丸如梧桐子大初服

二九一日加一九二日加二九漸加至大便微溏再從兩

九加服周而復始積減大半勿服在後積藥依此法服春

夏秋冬另有加減法秋冬加厚半兩減黃連一錢半治

風瀰於一料中加入人參茯苓神葛蒲各三錢黃連即依春夏

用七錢雖秋冬不減空心用淡醋湯送下

半夏散 治伏梁積心下硬急滿悶不能食胃背疼痛

半夏一兩

桂心一兩

前胡一兩

木香一兩

檳榔一兩

拘時稍熱服

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時稍熱服

乾漆丸 治伏梁氣橫在心下堅牢不散胃中連背多疼

乾漆一兩

桃仁一兩

雄黃一兩

右為細末入別研藥令勻醋煮麩糊為丸如菴豆大每服

十九食前用溫酒送下

心之積伏梁丸 起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心

黃心一兩

桂心一兩

巴豆霜一兩

右為極細末入巴豆霜研勻煉蜜和丸如梧桐子大初服

二九一日加一九二日加二九漸加至大便溏再從兩

九加服食遠黃連湯送下周而後始積減大半勿服秋冬

厚朴半兩減黃連半兩黃芩全不用

蒜紅丸 治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不得者

丁香一兩

青皮一兩

草菓一兩

白茯苓一兩

研之積痞氣丸 在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發

當歸一兩

青橘皮去白

荆三稜各一兩

乾漆丸 治伏梁氣橫在心下堅牢不散胃中連背多疼

乾漆一兩

桃仁一兩

雄黃一兩

右為細末入別研藥令勻醋煮麩糊為丸如菴豆大每服

十九食前用溫酒送下

心之積伏梁丸 起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心

黃心一兩

桂心一兩

巴豆霜一兩

右為極細末入巴豆霜研勻煉蜜和丸如梧桐子大初服

二九一日加一九二日加二九漸加至大便溏再從兩

九加服食遠黃連湯送下周而後始積減大半勿服秋冬

厚朴半兩減黃連半兩黃芩全不用

蒜紅丸 治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不得者

丁香一兩

青皮一兩

草菓一兩

白茯苓一兩

研之積痞氣丸 在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發

研之積痞氣丸 在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發

研之積痞氣丸 在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發

研之積痞氣丸 在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發

研之積痞氣丸 在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發

研之積痞氣丸 在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發

研之積痞氣丸 在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發

黃疸飲食不為肌膚

厚朴去皮四

黃連去心

吳茱萸洗

川烏頭炮裂去

川椒炒

白茯苓去皮

澤瀉去

茵陳酒炒

乾姜炮

砂仁已上各

巴豆霜

官桂各四

黃芩

白朮各二

右為細末入別研藥和勻煉密為丸如梧桐子大初服二

丸一日加一九二日加二九漸加至大便溏再從二九加

服淡甘草湯送下食前周而後始積減大半勿服秋冬加

厚朴五錢半黃連一錢減黃芩一錢

半夏湯 治肺積息責效嗽

半夏湯炮去

桑根白皮炙

前胡去芦已上

桔梗炒

貝母去心

訶梨勒根去

人參去芦

白朮

甘草炙各

右吹咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破同煎至

七分去滓溫服食後夜卧各一服

積實散 治息責氣腹脹硬效嗽見血痰粘不利

積實炒

木香

檳榔

赤茯苓去皮

五味子

訶梨勒去核

甘草炙各半兩

杏仁一兩湯洗去尖

雙仁炒黃

右吹咀每服三錢水一中盞生薑半分同煎至六分去滓

不拘時溫服

右為細末以生熟蒜研如膏生絹細取汁和藥為丸如梧

桐子大每服五七九加至十五九食後淡鹽湯送下忌鹹

酸魚酢茶醬醃藏鷄鴨生冷馬牛雜肉之類只可食淡白

粥一百日 此三行係前蒜紅丸尾的

氣湯 治脾積痞氣胃脹不安肌瘦減食

陳麴炒

麥蘖炒

桂心去粗

郁李仁半生

厚朴去粗皮

白朮已上各

大腹子連皮牽牛生半兩

良薑兩半

甘草兩

石吹咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎至

七分去滓食遠稍熱服日三

鼈甲丸 治痞氣當胃腕結聚如杯積久不散腹脇疼痛體瘦

成勞不能飲食

鼈甲三兩去裙以米醋一盞化

荆三稜炮

乾漆為末

川大黃二兩剉碎

乾漆為末

木香已上各

右為細末醋煮麴糊為丸如桐梧子大每服二十九空心

用溫酒送下

沉香飲子 治痞氣升降陰陽

沉香

木香

羌活

桑白皮微炒

人參

獨活

白茯苓

紫蘇葉各等

右吹咀每服三大錢水一盞半生薑五片大棗二枚煎至

七分去滓食前溫服二洋又作一服

肺之積息責丸 治右脇下覆大如杯久不已令人洒浙寒熱

喘效發肺壅

厚朴八錢

人參二錢

巴豆霜四分

黃連去心

乾薑炮

川椒炒出

白茯苓去皮

川烏頭炮裂

紫苑去苗

陳皮

天門冬

白芷冠

桂心去皮

桔梗

三稜各一錢

青皮五分

右為細末入巴豆霜研勻煉蜜為丸如梧桐子大初服二

丸一日加一九二日加二九漸加至大便溏再從二九加

服淡生薑湯下食遠服周而後始積減大半勿服秋冬加

厚朴半兩咸黃連七錢

沉香石斛湯 治腎臟積冷奔豚氣攻少腹疼痛上衝胃脇

沉香 石斛 陳麴 赤茯苓 五味子

人參 巴戟 桂心 肉苳蔻

白朮 芎藭 木香 肉苳蔻

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破煎至六

分去滓食前熱服

木香檳榔散 治積氣不散結伏奔豚發即上衝心胃令人喘

逆骨痠少力

木香 檳榔 磁石 訶梨勒

沉香 牡蠣 桂心 懷香子

芎藭 白芷 陳橘皮

右為細末每服二錢炒生薑湯下

沉香丸 治奔豚氣小腹痛積聚疼痛或時上衝心胃墮悶

沉香 檳榔 懷香子 桃仁

阿膠 木香 胡椒 吳茱萸

硃砂 青橘皮 吳茱萸

右為細末入硃砂研勻酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服

二十九食前生薑湯送下

苗香金鈴丸 治奔豚氣

苗香 金鈴子 馬蘭花 石茱萸 吳茱萸

青皮 山茱萸 陳皮

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三五十九食前溫

酒鹽湯任下醫家發明各苗香練突丸有完花一兩用醋

炒以糊丸量人虛實加減以利為度

腎之積奔豚丸 發於小腹上至心下若豚狀或上或下無特

父不已令人喘逆骨痠少氣及治男子內結七疝女子瘕

聚帶下

厚朴 黃連 石菖蒲 白茯苓

澤瀉 附子 全蠍 獨活

川烏頭 丁香 肉桂 苦練實

巴豆霜 玄胡索

右為細末入巴豆霜末研勻煉蜜和丸如梧桐子大初服

二九一日加一九二日加二九漸加至大便溏再從二九

加厚朴半兩如積勢堅大先服前藥不減於一料中如瘕

存性牡蠣三錢煎丸帶下病勿加

解鈴丸 治奔豚氣腹痛手足拳縮不可忍

苗香 胡椒 蓬莪朮 木香

右為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服三十九空心用

溫酒或鹽湯送下

白苳蔻散 治積聚心腹脹滿宿食不消氣刺疔痛泄瀉善噫

香酸食即嘔吐手足逆冷

白苳蔻 肉苳蔻 高良薑 木香

桂心 附子 枳殼 陳橘皮

人參 丁香 甘草

右為細末每服二錢食前用木瓜生薑煎湯調服

檳榔散 治積聚氣腹脇堅急心胃脹滿不能飲食

檳榔 荊三稜 桃仁 青橘皮

桂心 郁李仁

右咬咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

異香紅丸子 治一切積聚心腹疼痛婦人血氣攻注常服消酒食破積氣

沉香 硃砂另研 木香 荆三稜 史均子去殼蓬莪朮

檳榔大者一枚 母丁香 五粒 黑牽牛 兩 肉荳蔻 六者

右為細末研勻麩糊為丸如菜豆大以硃砂為衣每服三九食後用茴香湯送下欲微利加至五七丸

仙方內消丸 治酒食過傷脾胃等疾 青皮 陳皮 去白 薑木 浸炒 百草霜

香附 三稜 芫花 破故紙 皂角 蓬木 乾漆 官桂 各三兩

黑牽牛 生半斤 右為細末醋糊和丸如梧桐大每服三十九白湯子送下一方有半夏三兩

七星丸 化氣消食 巴豆 用油煎令黃色 硃砂 細研 肉荳蔻

檳榔 丁香 木香 乳香 右為細末研勻以麩糊為丸如麻子大每服五丸用溫酒或湯水下

醫甲丸 治久積癥瘕 醫甲 用大者一枚淨洗去筋膜麩裏外面二三分厚上面

兩斤去尖雙仁研以風炒麥蘖甲在上一兩別子入研三兩同攪拌旋入向醫甲中煎為膏取出盛盛即將同藥

沉香 剉 神翅 沙 大黃 生用 荆三稜 煨 檳榔 半生 丁香 木香 厚朴 去粗皮剉

右為細末研勻用桃仁煎并煉蜜和丸如桐梧子大每服二十九空心用米飲送下

蓬莪朮散 治久積癥瘕氣不消散脇下如覆杯多吐酸 水面色痿黃或腹中疝痛

蓬莪朮 肉桂 去皮 枳殼 熟炒 荆三稜 煨 大黃 炒 當歸 炒 檳榔 木香 已上各

右咬咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

麝香丸 治久積癥瘕氣不瘥或於脇肋作塊形大如杯或如

鷄子透隱皮膚或時疼痛堅硬如石宜服 麝香 別研 乾漆 炒 神翅 炒 麥蘖 炒 黃已上

醫甲 醋炙 芫花 炒 蓬木 煨 荆三稜 煨 葶藶 各二

右為細末研勻用醋煮糊為丸如梧桐子大每服十九食前用溫酒送下

三稜草煎方 治癥瘕及鼓脹 右用荆三稜一石細切以水五石煮至一石去滓更煎三

斗汁於銅器中重金煎如稠糖取出內密器中每服一匙七酒一盞溫服之日二服常令酒氣相續

檳榔湯 治癥瘕腹滿如鼓坐臥不安食即吐氣悶喘急 檳榔 二兩 赤茯苓 去皮 荆三稜 煨 陳皮 去白

芍藥 已上各 食棗 黃 三分 郁李仁 皮 湯浸 兩

右咬咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓溫服空心午
後各一服

乾漆丸 破癥塊消積氣

乾漆四兩 附子泡去

青皮去白

懷香子炒

大黃炒 芫花

陳皮去白

白牽牛炒

蓬朮煨 木香不見

檳榔

荆三稜用醋

桂心已上各 五靈脂用瓦

冷熱

取灰二兩

皂角長五寸許以麻

右剉碎每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服空心日
午臨卧各進一服

取積一塊氣丸 治男子婦人氣積

檳榔末 杏仁末

羌活末

黃芩已上各

神麴炒 麥蘗炒

雷丸已上各

牽牛末二兩

江子去皮油取

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大硃砂為衣每服火
人十九三歲服三九五歲服五九臨睡時用溫白湯送下
以利為服

當歸切焙 桔梗炒

木香

鼈甲用醋

桂心 桃仁湯浸去皮尖雙仁炒

右除桃仁外為末却入研勻每服三錢水一盞煎至七分
去滓溫服逐日空心日午夜各一服

麥蘗湯 治食癥燕酸吐津胃膈疼痛氣噎食飲進退

麥蘗炒 神麴炒

紫苑去苗

厚朴去粗皮生

大黃炒 當歸切焙

鼈甲用醋

檳榔各半

右剉碎每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服空心日
午臨卧各進一服

八靈丸 治食癥氣塊痰癖等疾

木香 荆三稜

石三稜

鷄爪三稜

檳榔已上各 肉荳蔻半兩 巴豆去心膜

右為細末研勻醋糊為丸如小豆大每服五七丸丈夫生
薑湯下婦人醋湯下痰癖氣木香湯下

新功良方卷之四十二

奇效良方卷之四十三

宿食內傷門 附論

夫脾胃者水穀之海也水穀入海而胃以納之脾以剋之脾胃氣旺則穀肉菜粟俱能消化為精粕矣經云飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也蓋脾土宜暖而不宜生於若人之原稟脾胃怯弱氣血虛憊兼以不善調攝或恣其飲食或寒溫不適飢飽失宜愈傷脾氣凡百飲食入於胃中不能消化以致停蓄遂成宿滯變生諸疾東垣因以內傷論為證名也至若又謂榮氣穀氣元氣清氣運氣衝氣之六者斯皆胃氣之別名其實為一也且人身五臟皆稟於胃胃和則穀氣上升而穀氣者乃足少陽膽手少陽三焦元氣始發生長萬化之用者也胃傷則中氣不足中氣不足則不能滋養元氣

元氣不充則厥府真氣皆為不足而心火獨盛矣心火者陰火也起自下焦其繫於心心不自主相火代之相火者下焦心胞之火乃為元氣之賊也然火與元氣不兩立必一盛則一負矣而脾胃氣衰則下流於腎肝陰火得以乘其土位於是元氣受病繫於上焦心肺之氣蓋心主榮血肺主衛氣榮衛失守則諸病生焉夫人之真氣衰旺豈不由乎飲食之致然哉凡諸飲食所傷當各以消氣之藥以剋其所傷之物俾脾氣愈旺而五穀之精華上騰應乎天而為清氣也彼神氣強盛七神衛護生氣不乏增益大旺氣血周流百病不能侵矣雖有大風奇毒豈能為害耶是以易水張先生嘗戒停滯不可峻用利藥下咽少頃其藥味施化標皮之方始開便寬快及致所傷之物已去稍過兩三時辰其藥品盡化性味大作而其停滯雖去不知脾胃又傷矣脾胃一傷則真元之氣敗壞致生諸虛百疾而天壽

此醫之過歟而東垣論其內傷皆由喜怒勞役飲食飢飽破傷脾胃而然也劉雨潤又謂天真者為造化之元氣在人身得以執天機而行六氣分地紀而運五行是故人身也天地也一而二二而一者也若人調理適宜邪勿能傷而血脈壯盛精氣增蓋周身生化則一疾無矣或於憂愁思慮飢飽勞役大驚卒恐致真氣耗散血氣分離其五行六氣遂有愆隔則百病作矣故經曰飲食勞倦則傷脾形寒飲冷則傷肺也原夫宿食為病由積氣虛弱寒在脾胃之間致穀食不能消化停積於中也且舊穀未消新穀又入脾胃已弱不復能剋而新舊相積故經宿不消則令人腹脹氣急噎氣醋心食臭惡心時復憎寒壯熱或頭痛似瘧也且噎氣醋心者由上焦有停痰積飲胃中有宿冷食積脾氣不能磨剋其食故腹脹而氣逆所以好噎氣吞酸氣息食臭也惡心者緣心下有停水積飲之故也而心主火脾主土

土性剋水今脾虛不能剋消水飲水飲不散上乘於心復令冷氣所加致令火氣不宣則心中淡淡然欲吐也其脉右寸浮而大按之及濡尺脉亦微而濡假若脾胃有伏熱亦因食積不消者身則發熱狀似傷寒惟身不痛為異也大抵宿食所傷則皆惡食然當分上中下三脘治之若物之停於中下脘者重則依仲景法大小承氣湯備急丹類用之輕則以東垣枳朮等丸消之在上脘而食物其氣反壅塞於上其脉氣口緊盛於人迎兩三倍者必以吐之經云上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死宜以瓜蒂散吐去其物若去不盡以消導藥磨之若物已去而脾胃元氣或被傷者以東垣內傷所論補益法中一氣湯等是有如先食熱物而不傷繼用寒物因後寒食致前食亦不消化而傷者當詢問其寒食熱食熱多熱少斟酌以藥如其寒物一分熱物二分則當以寒藥二分熱藥一分相合投之或先飲

酒而後食寒令及傷熱物水等物者當詢其次序多寡所傷
量其寒熱之劑分散可也職於醫者宜臨證察脉看人虛實老
幼以施治療庶不致切不可便用辛燥峻利等藥服之求愈
而反為害也則當慎之

宿食內傷通治方

香蘇散 治宿食留飲積聚中脘噯臭腐氣心腹疼痛或臍臑

殮泄並皆治之

香附子炒去毛 紫蘇去根 蒼朮米泔浸 陳皮已上各

甘草半錢

右作一服水二鍾生姜五片葱白三根煎至一鍾不拘時

服如頭痛加川芎香白芷

縮砂香附湯 治噯宿腐氣心膨臍滿或時令冷疼

香附炒去毛 烏藥五兩 縮砂去殼 粉草炒各

右為細末每服二錢用紫蘇三葉益少許煎湯調下不拘

時服大便秘用橘皮湯調下

殺神丸 消食健脾胃益氣進美飲食

人參 縮砂 神麴 香附子炒去

青皮 陳皮 麥蘗 枳殼炒

三稜煨 蓬朮煨各

右為細末粳米糊為丸如桐梧子大每服五十丸空心用

米飲送下鹽湯下亦可

三稜煎丸 治膨滿消食積氣塊及傷食夾臍痛甚

方見積聚門

紅九子 磨化宿食止腹痛

荆三稜煨 蓬朮煨 青皮去白 陳皮各五兩

胡椒 乾薑

右為細末米醋煮米粉糊為丸如梧桐子大糞紅為衣每
服五十九丸淡生薑送下或二陳湯下不拘時服

無九子 治中脘有宿食吞酸惡心口吐清水噯宿腐氣或心

腹疼痛及中虛積聚殮泄赤白痢下並皆治之

烏梅肉七箇 百草霜三錢 巴豆去殼 杏仁研三七枚

半夏湯泡七枚 縮砂炒三七

右件為細末和勻薄糊為丸如黍米大每服十五丸加至

二十九熟水送下薑湯亦得更看虛實增減丸數或因食

生冷魚膾腥腐用治中湯送下亦可

如意丸 治虛中積冷氣弱有傷不能博化心下墜痞兩脇脹

滿心腹疼痛噯宿腐氣及治霍亂吐瀉米穀不化久痢赤

白膿血相雜久病黃色羸瘦及腹中一切食積之疾

枳殼炒 檳榔 橘紅 荆三稜

半夏湯泡 乾薑炮 黃連去蘗 蓬朮已上各

巴豆三七枚

右件除巴豆外剉如豆大用好醋煮乾去巴豆餘藥焙乾

為末薄糊為丸如菉豆大每服十九丸加至十五丸用茶清

薑湯任下食後臨臥服孕婦不可服

阿魏丸 治脾胃怯弱食肉食麩或食生菜停滯中焦不能尅

化致令脹滿肚腹疼痛嘔吐不食或利或秘

阿魏酒浸 官桂不見 蓬朮炮 蘿蔔子炒

麥蘗炒 神麴炒 青皮去白 乾薑炮

白朮已上各 百草霜三錢 巴豆去殼

右件為細末和勻薄糊為丸如菉豆大每服二十九用薑

湯送下麩傷用麩湯送下傷生菜用麩香送下

丁香脾積丸 治食積心腹膨脹不得尅化

丁香 木香不見 巴豆去殼 高良薑米醋浸

蓬莪朮三兩 三棱二兩 青皮一兩 皂角燒存性

右入百草霜三匙同碾為末麪糊為丸如麻子大每服十

丸至二十九止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡薑湯下嘔

吐藿香甘草湯下小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡

醋湯送下

感應丸 治男子婦人小兒停積宿食冷物不能消化有傷脾

胃或泄瀉臭如抱鵝鷄子或下痢膿血並皆治之

杏仁湯泡去尖 百草霜用細村人家細底上

巴豆腰油研細如粉 乾薑炮 肉蓯蓉二十

木香半兩 丁香半兩

右除巴豆百草霜杏仁三味外餘四味杵為細末同研勻

用錫匱先將蠟六兩溶化作汁以重綿濾淨更以好酒一

升於銀石器內煮蠟溶滾數沸頃出候酒冷其蠟自浮於

上取蠟稱用丸春夏修合清油一兩秋冬用清油一兩半

於冷鉢內熬令香熱次下酒煮蠟四兩同化作汁託錫內

乘熱拌和前項藥末成劑分作小錠子以油單紙裹衣旋

丸服餌每服三十九空心生薑湯送下

五百丸 治宿食留飲積聚中脘噎臭吞酸心腹刺痛

丁香 砂仁 胡椒 烏梅取肉

巴豆去殼 右件各一百箇研為細末和勻蒸餅糊為丸如菉豆大每

服五七丸食前用白湯送下

丁香 廣茂 荆三棱 木香已上各

甘松去上 益智仁 砂仁已上各 香附子半兩

丁香皮 甘草炙各

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服三十九不拘時

用白湯送下或細嚼下亦可

木香 枳實炒 白木二兩

右為細末荷葉煨飯為丸如梧桐子大每服五十九食遠

白湯送下

神麩 枳實已上各 白木二兩

右為細末荷葉煨飯為丸如梧桐子大每服五十九食遠

白湯送下

三黃枳木丸 治傷肉食溫麩辛辣味厚之物填塞悶亂不快

黃芩二兩 黃連酒洗 大黃煨 神麩

白木 枳實已上各 枳實半兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九食遠

白湯送下

葛花解醒湯 治飲酒太過嘔吐痰逆心神悶亂胃膈痞塞手

足戰搖飲食減少小便不利

葛花 白芷錢 砂仁已上各 乾生薑

青皮 白木已上各 澤瀉 神麩已上各

人參 白茯苓 猪苓 橘紅已上各

木香半錢

石為細末每服三錢食遠白湯調下得微汗酒病自去矣

大枳殼丸 治一切酒食傷胃膈痞悶疼痛飲食不消兩脇刺

痛嘔逆惡心並皆治之

方見嘔吐門

集香丸 治傷生冷宿食不消

丁香 茴香 益智 荆三棱

青皮 蓬木 陳皮 川練子

巴豆 半兩和皮米炒焦

右為細末醋糊為丸如菘豆大每服五七十九食前用生

薑湯送下

茶沉消積丸 治久積伏滯胃膈膨脹心腹刺痛飲食不化及

治婦人血氣疼痛

沉香 阿魏 巴豆 硃砂

同研用蜜一升酒二盞共 丹砂 硫黃

熬成膏以每盞時之和藥 良姜 枳椇 官桂

青皮 去白 木香 胡椒 丁香

乾姜 炮 各

右將前四味蜜酒熬成膏餘藥搗為細末以膏和搗千百

斤丸如菘豆大每服五七丸不拘時溫搗皮湯送下如心

痛溫酒下婦人血氣常歸湯下一方有沒藥一兩

法製生薑散 治飲酒過多或生冷停滯嘔逆惡心不欲飲食

生薑 切作片子用薑汁炒 官桂 去皮

青皮 去白 陳皮 半夏 白朮

萼澄茄 丁香 木香 白荳蔻

白茯苓 砂仁 甘草

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

仙方內消丸 治酒食過傷脾胃等疾

方見積聚門

木香丸 治積聚氣肝胃虛冷宿食不消心腹氣滯脹滿

木香 桂心 白朮 赤茯苓

人參 乾薑 桔梗 吳茱萸

當歸 大黃 神麩 訶梨勒

陳皮 去白 麥藥 枳椇

右為細末煉蜜和搗三五百斤為丸如梧桐子大每服三

十九食前溫酒送下

小分氣丸 治久積氣塊宿食不消胃膈痞悶痰逆惡心不思

飲食膈腹刺痛醋心噎塞

木香 雄黃 青皮 陳皮

乾薑 炮 煉實 枳椇 巴豆

蓬朮 醋炙 半夏 湯炮 枳椇 半兩 巴豆 研成油

右為細末醋煮麩糊和丸如菘豆大每服五九加至七九

食後生薑湯送下

益智散 治脾胃虛冷積聚沉結宿食不化消

益智 去皮 青皮 去白 陳皮 去白 荆三棱

白茯苓 去皮 蓬朮 厚朴 去皮生薑汁塗

木香 一分 人參 甘草 半兩

右為細末每服一錢入鹽少許用沸湯不拘時點服

快活散 治宿食不消致傷脾胃

大黃 生用 檳榔 陳皮 青皮

三棱 醋炙 雞茴子 香附 蓬朮

黑牽牛 半斤 麥藥 半斤 枳椇 半斤

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服七九食前用淡生

薑湯送下

破積導飲丸 治宿食不消心腹痞悶及治積塊堅硬

犀角 木香 檳榔 青皮

陳皮 去白 枳椇 枳椇 荆三棱

升九一

蓬朮煨 半夏湯洗 茯苓去皮 乾生薑
 神麩炒 麥蘖炒 澤瀉 甘草炙
 右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服二十九食
 前用溫生薑湯送下

奇効良方卷之四十三

汗而濡者其濕甚也陰氣有餘為多汗身寒陽氣有餘為身熱
 無多勞則氣耗喘且汗出飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出
 於心待重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出
 於脾或人有熱飲食下胃其氣未定汗則出或出於面或背或
 身其不循胃氣之道出此因傷於風內開腠理毛蒸理泄衛氣
 走之固不得循其常道此氣慄悍而出故不得從其道名曰漏
 泄驚怖房勞虛極痰飲亦成此證診法尺脈瀟滑謂之多汗男
 子平人脈虛細微者善盜汗也茶之表裏虛實之異其藥條例
 諸家方論者察其所宜而用之經言有病身熱解墜汗出如浴
 惡風少氣名曰酒風長沙言太陽病頭痛發熱汗出惡風者大
 陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者
 太陽中熱者渴是也汗出惡寒身熱而渴諸且太陽此五證全
 在手醫於本經內藥治之常涼反熱當熱反涼醫之過歟金匱

奇効良方卷之四十四

自汗盜汗門 附論

內經云汗者心之液又云陽加於陰謂之汗由此推之是陽熱
 加於陰血散於外而為汗也然有自汗盜汗之別焉成無已云
 自汗者不因發散而自汗出也盜汗者睡而汗出也因而息之
 自汗盜汗其一液也其出異也盜如盜竊之盜竊人息而潛出
 行於陰也自汗如自然之自居常有而明顯見於陽也皆陰腠
 理空疎衛護氣虛不能緻密收斂於表虛則陽熱泄焉陽主動
 而散津液走於肝若陽蒸陽分而液出者為自汗陽蒸陰分而
 液出者為盜汗由是內分陰陽之虛外閉腠理之氣乃得其源
 也皆由心腎俱虛以致此陰虛陽必發熱自汗陽虛陰必乘
 發厥而自汗陰陽偏勝有傷風中暑故經云風從外入令人江
 出頭暈身重惡寒天熱衣厚則為汗天寒衣薄則為弱病痺多
 汗而濡者其濕甚也陰氣有餘為多汗身寒陽氣有餘為身熱
 無多勞則氣耗喘且汗出飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出
 於心待重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出
 於脾或人有熱飲食下胃其氣未定汗則出或出於面或背或
 身其不循胃氣之道出此因傷於風內開腠理毛蒸理泄衛氣
 走之固不得循其常道此氣慄悍而出故不得從其道名曰漏
 泄驚怖房勞虛極痰飲亦成此證診法尺脈瀟滑謂之多汗男
 子平人脈虛細微者善盜汗也茶之表裏虛實之異其藥條例
 諸家方論者察其所宜而用之經言有病身熱解墜汗出如浴
 惡風少氣名曰酒風長沙言太陽病頭痛發熱汗出惡風者大
 陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者
 太陽中熱者渴是也汗出惡寒身熱而渴諸且太陽此五證全
 在手醫於本經內藥治之常涼反熱當熱反涼醫之過歟金匱

妻曰風濕脉浮身重汗出惡風者除濕固腠理為先東垣云飲食勞倦皆自汗當用却溫之劑滋溢皮毛之氣不合自汗損其元氣也暑邪干衛故身熱自汗當用清暑益氣治之試効方云濕熱大作汗出不休勝濕之劑最為穩當王海藏云太陽自汗桂枝湯湯明自汗白朮湯少陰自汗四逆湯陽明發熱自汗多者大承氣湯此皆內傷外感之邪干衛而出也北方論皆前人註立後之學者識經絡用之取効不明麻理錯認經絡用之反禍不輕其於盜汗非若自汗猶有實者此則陽熱侵行於蒸出陰液復越於表是陰虧而表亦虛也其汗因寢而至寢則衛氣亦行於裏覺則氣散於表而汗上矣故經曰太陽所至為寢汗東垣謂太陽老陽也太陽標有陽之名無陽之實以膀胱之真寒為純陰之氣也蘭室秘藏治療之證以黃連黃芪生地黃當歸之屬滋陰以制陽熱靜而汗止此其論也

自汗盜汗通治方

桂枝湯 治傷風脉浮自汗惡風

方見傷寒門

木附湯 治中濕脉細自汗體重

方見心痛門

黃芪建中湯 治男子血氣不足體常自汗

方見諸虛門

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥也

當歸

黃芪 黃連 一錢 黃芪 二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

黃芪湯 治善怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥自汗或盜汗不止並宜服之

黃芪 去蘆 二錢 白茯苓 去皮 熟地黃 酒蒸 肉桂 不見 天門冬 麻黃根 龍骨 一錢 五味子 浮小麥 防風 八分 各 當歸 酒洗 甘草 七分 右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服發厥自汗加熟附子發熱自汗加石斛

三建湯 治真氣不足上盛下虛面赤自汗小便頻數如汗不飲加肉桂黃芪

方見諸虛門

建中湯 治表虛自汗

芍藥 五錢 官桂 甘草 各二錢

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食前服本方加黃芪二錢名黃芪建中湯治虛勞自汗加當歸名當歸建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不止者加桂一錢

熟附子半箇名桂枝附子湯煎空心服

防風散 治盜汗

防風 五錢 川芎 半錢 人參 分錢二

右為細末每服二錢臨卧米飲調下

白朮散 治盜汗極驗

白朮 不拘多少剉作 浮麥 一升

右用水煮乾如白朮尚硬又加水一二升煮軟取出去麥不用切作片焙乾研為細末每服二三錢不拘時另用浮麥煎湯調服

麥煎散

治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食進退面黃肌瘦並皆治之

乾漆 炒 人參 茯苓 乾葛

乾漆 炒 人參 茯苓 乾葛

川烏炮去 玄參已上各

右為細末每服二錢先用小麥三七粒煎湯一盞去麥入藥再煎三五沸食後服

大建中湯 治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體倦怠日漸羸弱

口舌舌澁心怔短氣

綿黃芪去心 遠志去心 當歸酒洗 澤瀉已上各

白芍藥 龍骨煨 人參已上各 甘草炙

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服氣弱加炮

附子二錢腰痛筋急加官桂去皮一錢

止汗溫粉

川芎 白芷 藥本已上各 米粉三兩

右為末每用綿包裹撲於身上

止汗紅粉

麻黃根 牡蠣煨 赤石脂 龍骨各半

右為末以絹袋盛如撲粉用之

牡蠣白木散 治漏風證飲酒中風汗多食則汗出如洗久不

治必為消渴

牡蠣煨 白木錢一兩二防風半兩

右剉碎每服五錢水二盞煎至七分食遠溫服惡風倍防

風白木汗多面腫倍牡蠣

芪附湯 治氣虛陽弱虛汗倦怠

黃芪蜜炙 附子炮去心

右剉作一服水二盞生薑三片煎至七分去滓食遠服

撫芎湯 治自汗頭眩痰逆惡心

川芎 白木炒 陳皮已上各 甘草炙

右剉作一服水二盞生薑三片煎至七分不拘時服

牡蠣散 治諸虛體常自汗驚惕不安

左顧牡蠣用米泔水 黃芪蜜炙 麻黃已上各

白木半兩 甘草炙 小麥百粒

右剉每服三錢水三盞煎一盞半服一方為細末每服三

錢入紅棗三枚同煎分三服

止自汗方

右用川鬱金研為細末臨臥以唾津調乳上

周衛方 治自汗

麻黃根 黃芪各 生甘草稍 當歸稍

生黃芩各半 生地黃 麥門冬各三 五味子七箇

猪苓二分 羌活七分 蘇木 紅花各一分

右剉作一服水二盞煎至七分食前服

四白散 治男子婦人血虛發熱夜多汗羸瘦脚痛不能行

白木 白扁豆 薤香 益智

厚朴 黃芪 陳皮已上各 白茯苓

人參 半夏 烏藥 白芷各

甘草已上各 芍藥 檀香 沉香各半

右剉碎每服三錢水二盞生薑三片棗一枚煎至一盞去

滓食前溫服

又方 治盜汗夜臥床蓆衣被並濕

麻黃根 牡蠣煨 黃芪

龍骨打碎 狗根白皮 大棗七枚

右切以水六升煮取二升五合去滓分溫六服如人行八

九里外中任食一日令盡忌蒜熱麪等物

止汗粉

麻黃根 牡蠣粉 敗扇灰 瓜蒌已上各

白木二兩 米粉三升

右為末和粉攪勻以絹袋盛用粉身體日三兩度忌桃李雀肉仍灸大椎五六百炷日灸二七五七任意灸亦得汗即漸止

加腦子收陽粉 治一切虛汗盜汗自汗及漏風等證汗泄不禁服諸藥不能止者並宜用之

麻黃根

葉本

白芷

牡蠣殼

龍骨已上各

米粉二兩

腦子半錢

右為細末研勻以紗帛包藥於汗處撲敷之汗止為度

椒目散 治盜汗日久不止

椒目

麻黃根各等

右為細末每服一錢用無灰酒調食後服

團參湯 治大人小兒麻汗大人乃心血液盛面常發赤者是也小兒因驚而得宜服珍珠散史丞相苦常盜汗不止氣弱身羸治之不愈一日供舍人相見一醫人云心血液盛亦為汗非虛也宜用藥收斂心經遂傳此方服之而愈

人參新羅

川當歸去芦焙

右咬咀用猪心一箇切作三片藥三分服每服用水一椀猪心一片煎至一盞去滓服食前二次服一方加黃芪

可効良方

十四卷終

奇効良方卷之四十五

廢門 附論

蓋人身之有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓而成其形內有肝心脾肺腎以主之若喜怒不節勞役兼致內之精血虛耗榮衛失調發為寒熱使皮膚骨筋肌肉痿弱無力以運動故致痿瘓狀似柔風脚弱相類以脉證并所因別之不可混作柔風脚氣論此乃外所因凡痿瘓乃內藏氣不足之所為也大抵痿弱之由因肺熱脾虛弱薄着足痿瘓其色白而毛敗名皮痿曰肺熱葉焦曰五臟因肺熱發為痿瘓也心下熱其膝樞紐如折去而不相提挈肢筋緩緩不能任地也色赤而絡脉溢名脉痿由悲哀太甚陽氣內傷故尿血曰大筋空虛發為肌痺傳為脉痿病肝熱口苦筋膜乾筋急而紫色者而爪枯曰筋痿由思慮無窮所頭不得意溢於外房勞太甚宗筋弛緩及為白淫曰筋痿者生於

肝也病脾熱胃乾而渴肌肉不仁色黃而肉蠕動曰肉痿由漸於濕地居處下澤濡漬痺而不仁曰肉痿也病腎熱腰脊不舉骨枯髓減色黑盜精曰骨痿因所遠行勞倦遇天熱而渴陽氣內乏熱舍於腎致水不勝火則骨枯而髓虛故為之曰骨痿生於大熱者也難經曰骨痿不能起於床者是也大抵諸痿生於肺熱此一句便見治法大意經曰東方實西方虛鴻南方補北方此因是就生就制而言補瀉大經大法不外於此東方木肝也西方金肺也南方火心也北方水腎也五行之中惟火有二腎雖有二水居其一陽常有餘陰常不足故經曰一水不勝二火理之必然肺金體燥而居上主氣畏火者也脾土性濕而居中主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛意馳受熱則金失所養火寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一

身脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作焉南方者則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方水則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此

痿通治方

東垣清燥湯 治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源絕則腎虛痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動

獲者宜服

方見濕門

養香養胃湯 治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明虛

宗筋無所養遂成痿瘓

養香

白朮

神麴炒

白茯苓

烏藥

縮砂

半夏炒

薏苡仁

人參已上各半錢

甘草炒

右作一服水二鍾生薑五片棗一枚煎至一鍾不拘時服

補肝湯 治前陰如冰冷并陰汗兩脚痿軟無力

黃芪錢半

人參錢半

乾葛

白茯苓去皮

猪苓

升麻已上各錢

苧胡去苗

當歸身

羌活

連翹

黃蘗炒

澤瀉

香木

神麴

知母

防風

陳皮

甘草半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心熱服忌酒濕麪

溫腎湯 治面色痿黃脚痿無力陰汗出

麻黃

苧胡各六

白朮

酒黃蘗

猪苓

白茯苓

升麻已上各錢

防風

蒼朮

澤瀉二錢

右作一服水二鍾煎至二鍾食前熱服候一時終飲食

芎藭散 治四肢痿痛腰弱行步不便

川芎半兩

桂心

乾薑炮

甘草各一兩

川烏頭入兩切作片水浸一宿切作餅子條更以米泔洗日乾炒赤為度乾了研

右為細末每服二錢溫鹽酒調下日進三服

加味四斤丸 治腎熱肝虛熱淫於內致筋骨痿弱自不勝持

起居須人扶足不能任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味

不生氣力諸虛不足

肉蓯蓉酒浸

天麻

木瓜乾

鹿茸酥炙去毛

熟地黃

五味子酒浸

兔絲子酒浸

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用溫

酒或米飲任下一方不用五味子有杜仲

藥角丸 治五痿皮緩毛痒血枯筋弱筋骨痿弱飲

食不美庶事不興四肢無力不枯髮落眼昏唇燥痿痺不

能支持

麋角酥炙去毛

熟地黃

大附子生去皮

白朮半兩

右用大麥米二升以一半籍底以一半在上以二布巾隔

覆炊一日取出藥與麥別焙乾為末浸藥酒清酒煮麥

粉為糊搜和杵三千下丸如梧桐子大每服五十九食前

用溫酒或米湯送下

健步丸 治膝中無力屈伸不得腰背腿脚沉重行步艱難

酒防已一兩

防風

澤瀉各三

川烏炮

酒苦參各一兩

肉桂

滑石炒

瓜蒌根酒洗

苧胡

羌活

甘草半錢

白朮半錢

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九空心食前

温酒送下

龍骨九 治勝脫腎冷坐起欲倒日晡眩氣不足骨痿

龍骨 柏子仁 防風 乾地黄

甘草五分 禹餘糧 白石英 白茯苓

桂心 黃芪七分 五味子 羌活

附子 人參六分 山茱萸 玄參

芎藭四分 磁石 杜仲 乾薑

右為細末煉蜜為丸如桐梧子大每服三十九加至四十

九空心用温酒送下日二服

起痿丹 治諸痿法當養陽明與衝脉陽明主胃乃五臟六腑

之海主潤宗筋束骨之利機關衝脉者諸經之海主滲灌

谿谷與陽明合養於宗筋會於氣衝屬於帶脉絡於督脉

故陽明虛則宗筋緩弱不引故足痿不用也治之各補

其榮而通其輸其氣和其逆順至筋脉骨肉各得其

時病乃已矣腎經虛憊遂成骨痿腰脚難舉日加困乏

附子 沉香 硃砂 枸杞子

母丁香 木香 陽起石 肉蓯蓉

熟地黄 麝香 天雄 白丁香

官桂 硫黃 膩粉 白丁香

右為細末煉蜜為丸如彈子大每用一九以薑汁火入

藥溶化却用手點藥於腰眼上磨擦至藥盡用至二十九

大有神效若有他處癱瘓風疾加皂角一片去筋搥爛薑

汁浸一宿瓦上焙乾為末入前藥內依前法用

又方治筋痿兩手握固無力兩脚行動無力急飢食少此名筋

痿其證候口舌生瘡忽生痰涎忽然睡中涎溢身上躁熱

忽然增寒項項強急小便赤白不定大腑忽冷忽熱不調

連翹

防風 荆芥穗 蔓荊子

羌活 獨活 牡丹皮 山茱子

秦艽 麻黃去根 木香 路

右為細末每服一錢食後用白湯調下

金剛丸 治腎損骨痿不能起於床宜服此益精

萆薢 杜仲 菴蓉 兔絲子

右為細末酒煮猪腰子搗和丸如梧桐子大每服五七十

九空心用温酒送下

牛膝丸 治腎肝損骨痿不能起於床筋弱不能收持宜益精

緩其中 牛膝 萆薢 杜仲 白蒺藜

防風 兔絲子 菴蓉 官桂

右為細末酒煮猪腰子搗和丸如梧桐子大每服五七十

九空心用温酒送下

煖腎丸 治腎肝損及脾損不化宜益精緩中消穀

牛膝 萆薢 杜仲 白蒺藜

防風 兔絲子 菴蓉 茵蘆巴

破故紙 官桂 成半

右為細末將猪腰子製如食法搗爛煉蜜和并丸如梧桐

子大每服五 九空心用温酒送下如腰痛不起甚効

方見書明

龍齒丹

治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

龍齒

遠志 草水心并 酸棗仁 炮去官桂 去皮不

當歸

附子 炮去皮研切作片

南星

沉香 火洲研 木香 火

紫石英

熟地黃 各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五十

九不拘時用棗湯送下

參乳丸

治心氣不足怔忡自汗

人參

乳香 另研 當歸 二兩

右為細末研勻山藥煮糊和丸如梧桐子大每服三十九

食後棗湯送下

小定志丸

治心氣不足恍惚多忘常服安神定志

遠志

菖蒲 各一 人參 去皮 白茯苓 去皮 各

右為細末煉蜜為丸以硃砂為衣每服二十九食後用米

飲送下

壽星丸

治心膈被驚神不守舍每際迷心竅恍惚志健

天南星

一斤先用炭三十斤燒一地坑通紅去炭火以

右各為細末和勻用生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大每

服三十九加至五十九食後煎人參石菖蒲湯送下

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

人參

木香 各一 茯苓 去皮 龍眼肉

黃芪

去皮 酸棗仁 白木 已上各 甘草 錢半

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

寧志膏

治心神恍惚一時健忘

人參

去皮 茯苓 去皮 龍眼肉

加味茯苓湯

治痰迷心胞健忘失事言語如癡

白茯苓

去皮 陳皮 去白 半夏 湯泡 人參 去皮

辰砂

研細 乳香 另研 各 酸棗仁 炒去 人參 去皮 各一兩

右為末和勻煉蜜為丸如彈子大每服一丸空心用溫酒

或棗湯送下

人參遠志丸

治心氣不安驚悸恍惚神思不寧

人參

遠志 去心 酸棗仁 黃芪 各

桔梗

去皮 官桂 去皮 丹砂 已上各 天門冬 去心

白茯苓

去皮 菖蒲 各七

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食後用米

湯送下

朱雀丸

治心神不定事多健忘心火不降腎水不升

沉香

半兩 茯苓 去皮 木

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服三十九食後用人參

湯送下

二丹丸

治健忘養神定志和血安神外華腰理

天門冬

去心 熟地黃 丹參 已上各 白茯苓 去皮

麥門冬

去心 甘草 已上各 遠志 去心 人參 去皮 各

右為細末煉蜜和丸以硃砂半兩研極細為衣每服五十

九加至百九空心煎愈風湯送下愈風湯方見風門

菖蒲益智丸

治善忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳目

菖蒲

炒 遠志 去心 薑 炒 川牛膝 酒浸 桔梗 炒

人參

各三兩 桂心 三錢 茯苓 三兩 附子 去皮 兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食前用溫

酒或米湯送下

加味茯苓湯

治痰迷心胞健忘失事言語如癡

白茯苓

去皮 陳皮 去白 半夏 湯泡 人參 去皮

香附子

炒 去 益智 已上 各 甘草 錢一

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食前用溫

酒或米湯送下

右作一服水二鍾生薑三片烏梅一箇煎一鍾不拘時服
十味溫膽湯 治心膈虛怯觸事易驚夢寐不祥異象感感迷
致心驚氣鬱生痰涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或
後自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安

半夏湯 枳實 炒 陳皮 去白各 白茯苓 去皮一
酸棗仁 炒 遠志 去心 五味子 熟地黃 酒洗
人參 去芦 各 粉草 炙半

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服
溫膽湯 治痰涎氣搏觸事易驚或短氣悸之心虛不安
方見傷寒門

加味四七湯 治心氣鬱滯豁痰散驚
半夏 姜製二 厚朴 薑製 茯苓 去皮 各 紫蘇 葉
茯苓 去皮 遠志 去心 石菖蒲 甘草 各 炙

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服
養心湯 治心虛血少驚悸不寧
黃芪 炙 茯神 去木 白茯苓 去皮 半夏 炮
當歸 川芎 已上各 遠志 去心 酸棗仁 去皮 炙
桂枝 柏子仁 五味子 人參 已上各 炙

甘草 炙半
右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服
加檳榔未茯苓治停水怔悸

茯苓 去皮 桂枝 炙 生薑 半兩 甘草 二錢
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

寧志丸 治心虛血少多驚
人參 去芦 茯苓 去木 白茯苓 去皮 酸棗仁 去皮 炙
茯苓 去皮 桂枝 炙 生薑 半兩 甘草 二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

柏子仁 遠志 心虛 去 當歸 琥珀 已上各
石菖蒲 珠砂 另研 乳香 各 炙
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後用棗
湯送下

十四友丸 治心血俱虛怔忡驚悸
柏子仁 研 遠志 去心 薑 紫石英 研 酸棗仁 去皮 隔
熟地黃 當歸 去芦 白茯苓 去皮 白茯苓 去木
人參 去芦 黃芪 炙 阿膠 炒 桂枝 去皮

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸食後用棗
湯送下
遠志丸 治因事有所大驚夢寐不祥登高涉險神魂不安驚
悸恐怯

遠志 去心 薑 石菖蒲 各 茯苓 去皮 白茯苓 去皮
人參 去芦 龍齒 各
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服七十丸
用白湯送下食後臨卧服

妙香散 治心氣不足志意不定驚悸恐怖悲憂忪感虛煩少
睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩常服補益氣
血安神鎮心

方見心痛門
天地煎 治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍惚小便黃
赤或生瘡瘍

天門冬 去心 熟地黃 各 炙
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸不拘時用
人參煎湯送下

人參煎湯送下

人參煎湯送下

治膈虛眠不安心驚悸

酸棗仁炒

右為細末每服二錢不拘時竹葉煎湯調服

秘傳酸棗仁湯 治心腎水火不交精血虛耗痰飲內蓄怔忡

恍惚夜卧不安

酸棗仁炒 遠志製

黃芪

白茯苓

蓮肉去心

當歸酒浸

人參

茯神已上各

陳皮

粉草炙

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚以瓦器煎

七分日二服臨卧一服

俞君士選奇方 治心常忪悸行險懼往忘前失後不定

白檀香

白茯苓

桂心北 石菖蒲

天竺黃

熟地黃

蘇合香

犀角已上各

天門冬

遠志

人參已上各 甘草十分

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一九食後嚥化或米

飲嚥下

養味丸 治心恙

猪心取血

酸花一匙

硃砂為末

右先將青酸花裹乾次入猪心血同研爛次入硃砂末為

丸如梧桐子大每服二十九不拘時茶酒任下

養金丸 治失心及心恙風

蟬肚養金

白礬三兩

右為細末薄糊為丸如梧桐子大每服六十九湯水任下

不拘時服有患顛狂數年者服之皆愈至人授此初服心

智間有物脫去神氣洒然再服而甦此經憂感痰結於心

竅所致也

朱雀湯 治心氣勞傷發生者疾

雄雀一雙

赤小豆

人參去毛

赤茯苓去黑

大棗去核

紫石英

小麥已上各

紫苑去土

遠志去心

丹參已上各

甘草炙

右細剉拌勻每服三錢用水一盞煎六分去滓食遠溫服

奇効良方四十六卷終

奇效良方卷之四十七

疝門 附論

暴氏病深論疝者痛也其名曰厥曰癢曰寒曰盤曰氣曰附曰
狼此七者疝之名也其厥逆心痛足寒諸飲食吐不下曰厥疝
腹中氣下痛心下盡痛氣積如腎曰癢疝因寒飲食即脇下腹
中盡痛曰寒疝腹中下滿下減而痛氣疝者腹中痛在臍旁曰
盤疝腹中臍下有積聚曰附疝小腹與陰相引而痛大便難曰
狼疝其發則可驗又有石疝血疝陰疝妬疝氣疝此五者有
名而無形也外有心疝寒疝飢疝疝疝數者其名不同病則大
同小異世俗呼為小腸氣勝眺氣奔豚氣蟠腸氣積弦豎弦偏
墜木腎腎餘陰腫由疝之為病其名別也至於張子和論七疝
曰寒疝水疝筋疝血疝狐疝氣疝癩疝名與諸論不同且如癩
疝者外腎堅腫也痛者為陰腫不痛者為木腎一墜墜下者為

偏墜疝名諸論立雖多且異靈樞經云邪在小腸連系屬腎
貫肝絡肺系心氣盛厥氣上衝也內經又云任脈為病男子內
結七疝女子帶下瘕聚衝脈逆為氣裏急然則任脈雖稱病有
七疝之名而無七疝之狀而任脈者是疝病之本源各經是病
疝之支流也又云厥陰脈滑為狐疝少陽脈滑為肝風疝太陰
脈滑為脾風疝少陰脈滑為心風疝太陽脈滑為腎風疝陽明
脈滑為肺風疝此風非外入之風乃肝木陽氣動之風也此
六疝者應乎六經在於五臟何謂疝病皆屬肝病生於陰起於
下陰者內之太陰脾厥陰肝少陰腎皆足之陰經也下者地之
寒氣也足常履地蓋天之風寒皆入於地人之風濕皆從足起
或因經虛聚於胞囊小腹兩陰相併二氣相搏則為疼痛矣或
冷飲過情水所歸腎或坐卧寒濕寒搏留陰以寒攻陰則為疝
痛經曰痛者通也疝氣作痛宜通不宜塞宜溫不宜寒通謂瀉

其實不瀉其虛塞謂補其虛不補其實實者邪氣也虛者正氣
也若正氣虛極則先溫而後瀉若邪氣盛極則先瀉而後補溫
者必無於氣瀉者必無於寒寒則入於經而導其邪溫則疎其
氣養其正也大凡內外之氣交入於腎者為腎氣入於膀胱者
為膀胱氣入於小腸者為小腸氣腎與膀胱為截府其氣相通
運為外腎系於辜丸此三經乃相連相會者也其際當以弦緊
弦則為寒緊則為痛從寒則痛從溫則腫疝而不愈邪氣留滯
結成積聚而為疼痛或脇左右如杯或臍上下如臂或腹大如
盤令人羸瘦少氣洒淅寒熱嗜卧飲食不為肌膚腹滿嘔吐腎
者當臨期審察若因七情而得者當調其氣安五臟外邪相干
者散濕祛寒為先去邪之實補肝之虛則亦愈矣

疝氣通治方

聚香飲子 治七情所傷遂成七疝心腹脹痛痛引腰脇連背

不可化仰

方見氣門

疝意散 治男子脾胃虛寒氣滯不行攻刺心腹痛連胃脇勝

疝小腸腎氣及婦人血氣刺痛並皆治之

方見氣門

五積散 治體虛冷勝脫小腸氣作痛不可忍每服一兩入盞

炒吳茱萸茴香各一錢生薑三片葱白五寸煎空心熱服

方見寒門

桂枝烏頭湯 治風寒疝腹中痛逆冷手足不仁身體疼痛風

入腹五臟拘急不得轉側

大烏頭湯

桂枝 附子 白芍藥

甘草 芍藥

右作一服用水二鍾 薑七片紅棗二枚入蜜半匙同煎

奎一鍾去滓食前服
益智仁湯 治赤痢連小腹疼痛叫呼不已診其脉沉緊是腎
經有積冷所致

方見氣門

玄附湯 治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗

玄胡索 三錢 附子 二錢 木香 二錢 不見火各

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

金鈴子散 治七疝寒注下焦小腹引外腎疼痛大便多閉

金鈴子 去殼取肉一兩用巴豆七粒

右為細末每服二錢空心用熱鹽酒調服

狼毒丸 治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬疼痛

狼毒 剉炒 川烏 剉炒 羌活 剉炒 各散紅

乾薑 炮 乾漆 炒 三棱 醋炒 臈甲

沒藥 醋半 全蝎 去毒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服四十九空心用生

薑湯或溫酒送下孕婦不可服

木香散 治心疝小腹痛悶不已者

木香 陳皮 良薑 乾薑

訶子 去核 枳實 已上各 草薹 薤 黑牽牛

川芎 已上各 右作一服水二鍾煎至一鍾食前服或為細末每服二錢

空心用白湯調服

沈附湯 治腎虛無陽小腸氣痛小腹外腎時冷熱治溫證

附子 生用 香附 各二 沉香 華澄茄

辣桂 甘草 一錢 右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

註薑湯 治無陽厥冷疝氣熱治溫證

辣桂 川白薑 具茱萸 用酒醋浸一宿焙
良薑 茴香 華澄茄 縮砂仁 錢

木香 茯苓 益智仁 甘草 各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

金鈴丸 治膀胱腫痛小腸氣陰囊腫水出不乾

金鈴子 取肉 茴香 炒 海蛤 馬蘭花 炒

破故紙 炒 海帶 木香 羌活 子

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒或鹽湯送下

川練子丸 治疝氣一切下部之疾腫痛悉皆治之

川練子 取淨肉一斤 法 四分 兩 用 麩 一 合 用 麩 四 十

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九用鹽湯送

下甚者日進三次空心食前服

立効散 治疝氣

川芎 青皮 去白 川練子 舶上茴香 炒

桃人 黑牽牛 炒 各

右作一服水一鍾酒盞煎至一鍾空心服

三乘丸 治小腸氣痛外腎腫墜

山不莫 去核 吳茱萸 去核 食茱萸 去核 各 二 錢 已 上

川練子 取淨肉一斤 法 四分 兩 用 麩 一 合 用 麩 四 十

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十九用桃仁十

五箇炒煎酒送下或茴香酒亦可空心服

葫蘆巴丸 治大人小兒小腸氣疝腸氣奔豚氣疝氣偏墜陰

破故紙 炒 一 兩 七

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十九用桃仁十

<p>色變去巴班二藥研為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒送下</p> <p>荔枝散 治疝氣陰核腫大痛不可忍</p> <p>荔枝核<small>十四箇</small> 青鹽<small>一錢</small> 沉香<small>一角</small> 茴香<small>炒</small></p> <p>木香<small>一錢</small> 青鹽<small>一錢</small> 食鹽<small>一錢</small> 川練子<small>二錢</small></p> <p>小茴香<small>各二錢</small></p> <p>右為細末每服三錢空心用熱酒調服</p> <p>安息香<small>丸</small> 治陰氣下墜腫脹如核偏火堅硬如石痛不可忍</p> <p>安息香 阿魏 硃砂<small>已上各二錢</small> 青皮<small>去白</small> 玄胡索<small>微炒</small></p> <p>石再<small>用酒醋各一盞</small> 海藻<small>洗</small> 昆布<small>洗</small> 茴香<small>炒</small> 川練子<small>去核</small></p> <p>馬蘭花<small>炒</small> 木香<small>不現火</small> 大戟<small>酒浸</small> 沒藥<small>另研</small></p> <p>麝香<small>另研</small></p> <p>右為細末研勻以前膏和丸如粟豆大每服十九至十五</p> <p>九空心用綿子灰調酒送下</p> <p>寸金丸 治奔豚諸症作痛</p> <p>富歸 玄胡索 舶上茴香<small>炒</small> 葫蘆巴<small>炒</small> 桃仁<small>去皮</small> 桑螺蛸<small>酒蒸</small> 川練子<small>取肉</small> 川五靈脂<small>另研</small></p> <p>白芍藥<small>各半</small> 華澄茄 木香<small>各半</small> 全蠍<small>十個</small></p> <p>右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服五十九用溫酒送下</p> <p>迷下有熱小便秘車前子赤茯苓<small>前湯送下</small></p> <p>天雄<small>沈香煎丸</small> 治下元傷憊陽事不能或成下墜及小腸氣</p> <p>痛腎臟風攻注脾胃不和腰脚重疼</p> <p>天雄<small>生用</small> 附子<small>生用</small> 草烏<small>生用</small> 漢椒<small>四兩</small></p> <p>防風<small>生用</small> 牛膝 黑豆<small>生用</small> 天麻<small>四兩</small></p>	<p>朱以無天好酒一斗於銀鍋內慢火肉菘菘酒浸</p> <p>官桂<small>三兩</small> 紫巴戟<small>二兩</small> 沉香 丁香</p> <p>木香 羌活 乾薑<small>已上各</small></p> <p>石為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心用溫酒送下</p> <p>廣茂黃散 治心疝心痛肢體虛冷</p> <p>蓬莪木<small>根</small> 檳榔<small>生用</small> 官桂<small>去粗</small> 附子<small>炮去</small></p> <p>甘草<small>半兩</small> 各 考蕪 白朮<small>各三</small></p> <p>右到碎每服二錢水一盞煎至七分不拘時溫服</p> <p>山茱萸丸 治厥疝上搶心腹冷痛</p> <p>山茱萸 吳茱萸<small>湯洗</small> 川練實<small>炒</small> 馬蘭花</p> <p>覆香子<small>炒</small> 青皮<small>去白</small> 陳皮<small>去白</small> 荆三稜</p> <p>乾薑<small>三分</small> 附子<small>炮去</small> 柴胡<small>半兩</small></p> <p>右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服一十九空心用溫酒或溫湯送下</p> <p>木香丸 治卒疝腹痛不可忍</p> <p>木香 官桂<small>去粗</small> 蓬莪木<small>根</small></p> <p>桃仁<small>去皮</small> 檳榔<small>各三</small> 青皮<small>湯洗</small> 萊菔子<small>炒</small></p> <p>厚朴<small>去粗皮</small> 生薑 小</p> <p>右為細末入桃仁泥和勻酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服二十九食前用溫酒送下</p> <p>四製朱黃香煉丹 治小腸疝氣陽事衰敗下元虛冷</p> <p>吳茱萸<small>一分</small> 朱砂<small>一分</small> 黃連<small>一分</small> 香附<small>一分</small></p> <p>澤瀉<small>四兩</small> 枳殼<small>去核</small> 木香 右首蒲</p> <p>青皮 陳皮 茴香<small>炒</small> 白茯苓</p> <p>檳榔 葶藶 三稜<small>炒</small> 桃仁<small>去皮</small></p>
---	--

蓮木根 乳香另研 官桂已上各荔枝核四枚

川練子四十九箇入已豆不用

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒或薑湯送下常服陳利邪氣進美飲食專治腎經虛弱

寒腫痛諸種疝氣

木香湯 治寒疝攻注胃脇痛汗出

木香三分 檳榔 細辛去苗 赤茯苓去皮

人參去蘆 芍藥 當歸切焙 官桂去粗

前胡去蘆 青皮去白 石劉碎每服三錢水一盞煎七分去滓不拘時溫服

三增向香丸 治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成寒疝伏留

不散臍腹痛陰核偏大腎囊墜腫重墜流長有妨行步墜

乘不止時以黃水浸成膏或長怪肉累治不痊致令腎

經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸大皆由頻服熱

藥內攻或因兜取以至如此用藥溫導陽氣漸退寒邪補

屋消疝腰痛腎經能使復元一應小腸氣寒疝之疾久新

不過三料

第一料藥 舶上茴香用鹽半兩同炒 川練子已上 沙參洗到

木香各一兩

右為細末水薑米粉稠糊為丸如梧桐子大每服二十九

空心用溫酒或薑湯送下日進三服小病此一料可安纏

盡便可服第二料藥

第二料藥 加下項藥

事發一兩 檳榔半兩

右加入前藥內通共六味重五兩半為細末依前糊丸

數湯使亦如前若病未愈便服第三料藥

第三料藥 又加下項藥

白茯苓四兩 黑附子半兩 陳皮去粗

右通前八味重十兩並依前糊丸湯使丸數服加至三十

丸新火大病不過三料可愈小腸氣發頻及三十年者寒

疝氣至如栲栳大者皆可消散神効

吳茱萸丸 治寒疝心腹痛面目青黃不下飲食縱食嘔逆肌

體羸瘦 吳茱萸湯泡 乾薑炮 赤茯苓去皮 甘草炙

白朮 桂心 半夏湯泡 赤芍藥

前胡去蘆 當歸切炒 陳皮 川椒去目

附子炮 人參去蘆 木香已上各

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十

九生薑湯送下日四五服

蜀椒散 治寒疝心痛如刺統脘腹中疼痛目汗出氣欲絕

川椒一錢 附子一個 乾薑炮

半夏湯泡 桂心 甘草炙

右咬咀每服五錢以水一中盞入粳米半合生薑半分棗

三枚煎六分去滓不拘時稍熱服一方無粳米

羌花丸 治寒疝積聚動搖大者如蟹小者如杯米去在

於胃脘大腸不通感風寒則腸鳴心下寒氣上搶胃脇滿

羌花二兩 川椒炒 川大黃剉 川烏頭炮

細辛 赤芍藥 桂心 赤茯苓

木香已上各 吳茱萸湯泡 半夏湯泡 桔梗去粗

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服七丸

溫酒送下日三服當下如泥

昆布丸 治陰疝腫大偏墜

昆布洗去 海藻洗去 燕菜仁炒 蒺藜子炒

橫柳各一 枳殼炒 大麻子研 訶梨勒炮

黃底木香 陳皮去白 桃仁炒

兔絲子研 右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心

用溫酒或鹽湯送下

雄黃洗方 治陰疝腫痛不能忍及陰腫大如斗核痛者

雄黃研 甘草各一 白礬研

右為細末每用藥一兩熱湯五升通手洗腫處良久再洗

洗至冷候汗出差

治陰忽疼痛

桃仁去皮尖 苦練子 藜香子

改藥

右為細末每服二錢食前熱酒調服

宜胞丸 治外腎腫痛

黑牽牛頭末 青木香炒

川木通炒 右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九用溫酒或

鹽湯送下

治鉅刺吹腎囊腫方

右用鹽湯洗之又以炒鹽包熨痛處

神効方 治腎囊腫大

右用黑牽牛一兩淨炒黃色香熟為度次將船上硫黃研

末拌牽牛頭末入內不見硫黃將牽牛紙纏於池上一宿

碾末用酒蒸餅糊為丸每服三十九空心鹽湯下

大香導氣丸 治男子小腸氣肚疼一切氣積以補下元虛冷

脾胃不和並宜服之有効

木香 乳香 川練子 八角茴香

丁香 香附子 荊三棱 年草已 杜仲半

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九加至五十

九空心用溫酒或鹽湯送下日進三服

加味通心飲 治諸疝脹痛及小便不利

木通去皮 枳殼去核 黃芩 瞿麥穗

運翹 右吹咀每服五錢水一盞半丁心二十莖車前草五莖同

煎七分空心溫服

鳴起丸 治小腸氣及腰痛

杜仲去 葫蘆巴炒 小茴香炒

單薺已 胡桃仁研 右為細末入胡椒肉和勻為丸如梧桐子大每服三十九

或五十九九空心用蒸酒或鹽湯送下

拾金散 治奔豚小腸諸氣痛不可忍

玄胡索 川練子炒 全蠍炒 船上茴香炒

附子去皮 右為細末每服二錢痛所熱調下甚者再服効

以香內消丸 治小腸疝氣陰囊腫大或在右漏腎結核疼痛

難忍下元虛冷久不愈者並治之

沉香 不香研 葫蘆巴研 小茴香炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心鹽

湯送酒任下

奪命丹 治遠年近日小腸疝氣偏墜痛脹下脹痛以致阻

亂交外腎腫硬日漸滋長陰間溫瘰疔之成癰瘡皆治之

吳茱萸 一斤去核切半寸四兩酒浸四兩焙乾四兩

澤瀉 二兩去灰酒浸一伏

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九食前鹽酒

或鹽湯送下馮仲柔苦奔豚寒氣攻衝小腹引痛一日只

一服散府微動痛若失去遂安

救痛散 治小腸疝氣熱心疼痛不可忍者

肉苳菴 煨 木香 半兩 荆三稜 煨 馬蘭花 醋炒

金鈴子 去殼 茴香 一兩

右為細末每服一大錢痛時熱酒調下服之立効

尋氣丸 治小腸疝氣偏墜疼痛

甘遂 炒 石鷲子 煨 疝瘻 三個

右為細末酒煮糊為丸如菉豆大每服三九齋者溫酒送

下空心臨卧食前服忌熱物一時忌甘草一日

神効胡桃酒 治小腸氣

右以胡桃一枚火內燒成炭細研以熱酒調服絶妙

葱白散 治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣攻刺疼痛及治

婦人產後腹痛或血刺痛及治臟腑宿冷百節倦痛怯弱

傷勞滯痺久服盡除但婦人一切疾病宜服

川芎 當歸 枳殼 厚朴 姜製

青皮 官桂 去灰 乾薑 包 川練子 炒

茴香 炒 神麴 炒 麥蘖 炒 乾地黄

三稜 煨 人參 茯苓 芍藥

蓬朮 煨 木香 醋

右為末每服三錢水一盞葱白二十煎七分入鹽少許熱

服如大便秘澀加大黃煎大便澀利加訶子煎食前服

茴香散 治膀胱痛

甘草 半兩 蓬朮 荆三稜 金鈴子 肉 各一

右為細末每服二錢熱酒調服又云每發痛甚連日只二

三服立定項在微城數射末荀甫膀胱氣作疼不可忍醫

者以剛刺與之疼愈甚小便不通三日矣臍下虛脹心悶

予候之見其面赤黑脉洪大予曰投熱藥太過陰陽痞塞

氣不得通為之奈何適有五苓散一兩許分三服用連鬚

葱一朮茴香一揀鹽一錢水一盞半煎八分服中夜下小

便如墨汁者一二升臍下寬得勝翌日診之脉已平矣大

抵此疾因虛得之不可以虛而驟用補藥經云邪之所湊

其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所畜之邪然後

補之是以諸方多借巴豆氣者益謂此也

小腸氣方 治一切丈夫元陽虛弱小腸虛冷非時氣痛忽衝

心膈疼痛難忍宜服

益智 去灰 蓬朮 各半 茴香 山茱萸 去核

牛膝 續斷 川芎 葫蘆 已

防風 牽牛 炒熟 甘草 已上各

右為細末每服三錢水一盞二分煎兩三沸空心連滓服

白湯調下二錢匕亦得

治奔豚氣

川山甲 炒 破故紙 炒 香附 去各 土狗 十箇 去頭

海藻 焙 茴香 各一 全蠍 去毒 黑牽牛 頭末

木香 一兩 吳茱萸 半兩

右為細末用菜蕪一箇大者剝去心肉入茱萸在內用

丹黃參日全書第 3 頁反下

米一挽同萊蕪煮飯爛為糜以將萊蕪細切入米飯搗
細菜蕪晒乾同前藥為末與萊蕪同搗先如梧桐子大每
服二十九加至三十九食前鹽酒送下

代灸膏 治證同前
木香 附子 吳茱萸 蛇床子

馬蘭花 各等

右為細末同薑搗熱麪攤開貼痛處

腰子散 治腎氣作痛

黑牽牛 炒熟 白牽牛 炒熟

右為細末每用三錢以猪腰一付薄切開縫入川椒五十

粒茴香一百粒以牽牛末徧搽九腎中線繫溫紙數重裹

煨香熱出火氣燈后空心嚼碎好酒送下少頃就枕天明

取下惡物即愈

治腎氣疼痛方 治丈夫腎氣婦人血氣疼痛不可勝忍面青

唇黑發於不效丈夫則攻緊臟腑腰背拳曲婦人則腹中

成塊結為癥瘕驟然疼痛便至危困經年累月痛無暫停

者並宜服之神驗不可具述

當歸 芍藥 沒藥 其莽甲

蓬水 玄胡索 三稜 牽牛 醋炒

木香 半斤 羌活 四兩 狼毒 半斤 碎同羌活於

右先修製羌活狼毒乳鉢內研如泥又將蘇合香葉亦作

一處研如飛塵所餘炭葉共作一處搗為細末方將羌活

狼毒蘇合香葉等末相和令勻更爛研子過每服一錢

半氣痛時葱酒調下和脾喫不用飽食後喫也若是大腑

秘熱出後不通吞皮煎赤口中涎溢喫此藥一盞見効

八仙丸 治育腸氣

木香 青皮 高良薑 桃仁 去尖三分
阿魏 臍脂 桂心 各半 乾蝦 一分
右為細末用醋浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二十九食
前以熱酒送下

桃仁丸 治育腸氣疼痛不可忍

桃仁 湯洗去尖雙 木香 各三 阿魏 去尖一分

乾蝦 一分 羌活 醋炒 苦練子 桂心 五分 各

橫柳 一兩

右為細末以醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服十九不拘

時熱生薑酒送下

摘核丸 治四種癩病如核腫脹佈有大小或堅硬如石或引

腐膜絞痛甚則層囊腫脹或成瘡毒輕則時出黃水甚則

成癰潰爛

川練肉 海藻 昆布 桃仁 去尖

和實 炒 桂心 不見 木香 不見 木通 半兩 各

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服六十九空心溫酒

鹽湯任下虛寒者加川為一兩腎腫久不消加硃砂二錢

醋煮旋入有熱氣滯者加黑牽牛大黃各半兩

療超越癰重卒得陰癰

地膚子 十分 白木 五分 桂心 一分

右為細末以飲服一刀圭日三忌生葱桃李雀肉等物一

方用溫酒調下

蜘蛛散 治陰狐癩氣備有大小時時上下脹人

蜘蛛 十四個 桂心 半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九空心用米飲

送下為散取八分飲和服亦可

香附散 治癩疔及小腸氣

右用香附不拘多少為末每用酒一盞入海藻一錢煎至

半盞先將海藻嚼細用煎酒調香附末二錢服一方以海

藻為末以熱酒調尤妙甚者灌之一方熱酒下荆芥末

秘傳茱萸內消丸 治腎虛為邪所襲留伏作痛陰癩偏大或

生瘡出黃水

吳茱萸半斤 酒洗 山茱萸蒸去 馬蘭花醋浸

黑牽牛炒取 延胡索略炒 川練子蒸去 柏上茴香益炒

海藻洗去 橘皮 青皮去白 官桂已上各

桃仁去皮 白蒺藜炒并 木香各半

右為細末酒煮稀糊為丸如梧桐子大每服四十九食前

用溫酒或益湯送下

大醫院經驗奇效良方卷之四十七

大醫院經驗奇效良方卷之四十八

續熱門 附論

張子和云李屏山素飲酒一日得病醫用酒癥丸熱藥後目觀

天地但見紅色遂成龍火之證卒不能救崇漢李濟之常病目

及君省採每服補肝散以致睛脹但見窓檻橫排幾至喪明令

痛泄五七次繼服涼劑方始如故丹霞朱僧人魯病三陽蓄熱

常君靜室不敢見明明則頭疼如錐每置冰於頂上不能解其

熱歷諸醫莫能辨其病后治之七日而愈其用汗吐下三法而

已後用涼物清鎮之平復如故夫人陰平陽秘神氣以寧蓋味

者狗情縱慾因致積熱之證非一朝一日故也皆出於心熱甚

則能傷血故出於心積熱者熱毒蘊積於內也或有缺氣素實

一時感觸熱毒之氣鬱積臟腑之間或在心肺之內令人口苦

咽乾逆嘔稠粘眼淚多淚心氣通於舌脾氣通於口熱燥相合

無所受制故口舌上生瘡小便秘澀非傷寒之熱非風證之熱

此乃積聚之熱也又有酒麪煎煉雜附峻補皆能有熱謂之積

熱也何哉一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾若偏者皆致成

疾過於熱者積溫成熱蘊積於內遂成前證經云偏勝則有偏

害偏害則有偏絕不可不察也王安道曰人之所賴以生者氣

也氣者何陰陽是也夫陰與陽可以和平可以乖而否善攝

與否吉凶於是乎不能善者故偏寒偏熱之病莫過乎乖否之

餘雖然寒也熱也粗工為之不難設積熱良工猶弗能以為計

且以積熱言之始而涼和次而寒取寒取不愈則因熱而從之

從之不愈則投窮矣王太僕故曰益火之源以消陰氣壯水之

主以制陽光又曰取心者不必齊以熱取腎者不必齊以寒吁

千言萬語之間殆猶和璧之在璞也積熱之病由此來矣入處

中和偏陰不可以無陽偏陽不可以無陰惟在冷暖得中而已

矯枉過正識者憂焉治法以三黃丸凡熱皆出於心熱甚則欲傷血或以洗心散四順清涼散子之類此皆前人立論處方後之學者不可將陰陽虛盛之熱又有血分氣分之熱陰盛格陽之熱一例作積熱證治之反誤多矣今開積熱之方條具于後

積熱通治方

涼膈散 治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘澁便溺不利一切風熱並皆治之

方見火門

洗心散 治風熱痰滯心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便秘結小便赤澀

白朮一錢

麻黃

大黃

芍藥

甘草

右作一服用水二鍾生薑三片薄荷少許同煎至一鍾不拘時溫服

三黃湯 治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

黃蓮

黃芩

大黃

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

甘露飲 治胃中客熱牙宣齩腫咽乾燥吐氣腥臭或胃經受濕伏熱在裏身黃如疸亦能治之

枳殼

石斛

枇杷葉

熱地黃

黃芩

麥門冬

山茵陳

生地黃

天門冬

甘草

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服

消毒犀角飲 治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅滯或腮項結核

遍生瘡癩已潰未潰並宜服之

防風

鼠粘子

荆芥穗

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服

八正散

治大人小兒心經熱咽乾口燥目赤睛痛臟腑秘結小便赤澀

方見淋門

荆黃湯 治風熱結滯或生瘡癩

荆芥

大黃

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

清氣散 治風壅痰涎上膈煩熱

枳殼

川芎

羌活

獨活

白朮

人參

右作一服用水一鍾煎至一鍾不拘時服

黃連解毒湯 治熱毒煩悶口燥呻吟畜熱內甚諸藥不能退

黃連

黃芩

梔子

枳殼

薄荷

連翹

杏仁

桑白皮

大黃

桔梗

甘草

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後通口服

天門冬散 治肺壅腦熱鼻乾無涕大腸秘澀眠臥心躁

天門冬

大黃

升麻

桑白皮

枳殼

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

四順清涼飲子 治血熱蘊結壅滯

方見火門

黃連湯 治心勞實熱口瘡心煩腹滿小便不利

黃連

芍藥

甘草

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

黃連解毒湯 治熱毒煩悶口燥呻吟畜熱內甚諸藥不能退

黃連

黃芩

梔子

枳殼

薄荷

連翹

杏仁

桑白皮

大黃

桔梗

甘草

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

天門冬散 治肺壅腦熱鼻乾無涕大腸秘澀眠臥心躁

天門冬

大黃

升麻

黃芩	澤瀉	梔子仁	生乾地黃
木通	黃連	麥門冬	甘草
右作一服用水二鐘生薑五片煎至一鐘食前溫服			
利膈湯	治脾肺有熱壅煩上壅咽生瘡		
雞蘇葉	荆芥穗	防風	桔梗
牛蒡子	炒	人參	甘草
右為細末每服二錢不拘時沸湯點服如咽痛口瘡甚者加鹽釐一兩			
防風通聖散	治一切風熱疥癩等疾		
方見風門			
三黃丸	治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩躁小便赤澀大便秘結		
黃連	去蘊	黃芩	去蘊
文黃	十兩		
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四十九丸熱水送下一方以腦麝為衣丸如大豆夜間含化一二丸亦可			
薄荷煎	治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛		
薄荷	末三兩	甘草	二兩
片腦	半兩	甘草	二兩
右為細末和勻煉蜜成劑不拘時任意嚼嚥和劑和無片腦有桔梗			
天竺黃散	治臟腑積熱煩躁多渴口舌生瘡咽喉腫痛		
山梔子	去殼	連翹	各三
瓜蒌根	六兩	雞冠雄黃	半兩
右為細末每服一錢食後臨卧新汲水調服			
龍腦雞蘇丸	消煩渴涼上膈解毒除邪熱并治咳嗽吐血鼻衄吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腫脾疸口甜唇瘡		

口若並宜服之			
此胡	州者二兩	木通	以湯半
黃芪	去蘊	麥門冬	四兩
蒲黃	炒	阿膠	各二兩
甘草	兩半		
右除別破藥外餘藥為細末用好蜜二斤先煉一二沸然後下生地黃末不住手攪令勻取木通此胡汁慢火熬成膏勿令焦然後入餘藥末同和為丸如豌豆大每服二十丸嚼破熱水下虛寒煩熱消渴驚悸人參湯下咳嗽吐血鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟諸淋車前子煎湯下			
噲化三黃丸			
大黃	黃芩	黃連	各二
白藥子	兩半	黃藥子	兩半
右為細末用猪膽汁調勻攤在椀內既上蒸三次露一宿後入腦麝研砂為丸如豆大每服一九食後噲化冬加知母一方有甘草			
大金花丸	治中外諸熱癰汗咬牙勝語驚悸溺血淋閉咳吐血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加梔子名曰梔子金花丸又名既濟解毒丸		
方見火門			
神芩丸	治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癩咽膈不利大小便閉澀一切風熱之證並宜服之		
大黃	生用	黃芩	各二
黃連	生用	牽牛	生用
右為細末酒水和丸如梧桐子大每服五十九食後用溫			

水送下

年黃涼膈丸

治上焦壅熱口乾咽痛煩躁逆瀾

牛黃

片腦

麝香

紫石英

各一分

馬牙硝

寒水石

硬石膏

牛膽南星

各二分

甘草

一兩

右為細末煉蜜為丸每兩作四十九每服一九食後溫薄

荷人參湯下

酒蒸黃連丸

治膈熱解酒毒厚腸胃

黃連

半斤淨用酒二升浸以瓦器

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十九食前用溫

水送下

碧雪

治一切積熱咽腫痛口舌生瘡心中煩燥燕物妨悶

或喉閉壅塞冰漿不下天行時疫發強昏憤並皆治之

芒硝

青黛

石膏

寒水石

研粉

朴硝

硝石

馬牙硝

甘草

各等分

右將甘草煎湯二升去滓却入諸藥再煎用柳木篦不住

手攪令消燂得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝

成霜研為細末每用少許含化燕津不拘時候如喉閉壅

塞不能燕物者即用小竹筒吹藥入喉中即愈頻吹効

既濟清神散

益腎水降心火清上實下

桔梗

黃芩

川芎

山梔子

各一分

當歸

羌活

白朮

茯苓

各一分

知母

甘草

薄荷

各一分

右吹咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓入蜜調服

玄明粉

治邪熱所干膈上氣滯五臟秘澀

右用朴硝煎過澄濾五七遍至夜於月下露至天明自

然結成青白塊子用礮礮子按實於炭火內從慢至紫自

然成汁煎沸直候不響再加頂火一煨便取出於淨地上

倒下用盆子合蓋了以去火毒然後研為細末每二斤入

生熟甘草末二兩一處攪勻臨用時量用之或一錢二錢

以桃花煎湯或葱白湯下此藥本性寒燒過性溫無毒且

諸般魚及毒物等

地黃煎

治積熱

地黃汁

三升

茯苓

知母

各一分

枯藁根

五兩

生薑

汁

各一分

白蜜

各二升

石膏

兩

竹瀝

右吹咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝

地黃麥門冬汁慢火煎四五沸下蜜薑汁微火煎取六

升初服四合日三夜一加至五七合四五月作散服之

海仙丸

治諸伏熱頭目不清神志昏塞解諸大毒以取水之

精漬於船板木中累見風日久則日炙變為青色以取太

陽之氣而燕燥中有陰陽之氣結而不散聚而成青服之

分陰陽去邪熱調臟腑聖人處治以度物之氣味所用且

如東壁墻土取之以新水調化取清衣服之治臟腑不調

謂脾主於土脾受濕滯瀉取以太陽真火其土引入於脾

藉太陽真火之氣以除去濕而吐瀉得止又以魚骨入喉

中肉內不出燒魚網灰新水調服其魚骨即時便出又有

月蝕瘡不愈者令人燒救月鼓杖燒灰乾搗瘡上立已此

聖人取其物類相感故也且船板青與上同意

船板青

五兩

酥油

餅末

各一分

右為細末稀麩糊和丸如梧桐子大每服四五十九不拘

時溫酒送下

珠砂膏 治心臟驚熱至甚不省人事

珠砂

礞砂

鐵硝各半

金銀箔各五

腦子一字

寒水石

石膏兩半

粉章三錢

右為細末每服二錢麥門冬二十粒去心煎湯調下

大醫院經驗奇效良方卷之四十八

大醫院經驗奇力良方卷之四十九

痼冷門 附論

夫痼冷者痼為年久長回者也冷為寒極至甚者也不因方云
人以臟腑稟賦不同亦有將理失宜遂致偏冷偏熱故方中有
痼冷積熱之說痼冷者中寒也多因真氣既微胃氣不實復啖
生冷冰雪之屬致腸胃虛寒陰既停凝陽不能正大便澀泄小
便頻數鼻多清涕嘔吐涎沫水谷不化腸胃絞痛肚腹如冰於
酒酒淋淋皆陽虛陰盛之所為也張長沙有陰毒一症雖不為
痼冷即冷寒所傷令人為手足冷腰背強臍腹築痛咽不利
嘔吐下利身如被杖脈細欲絕此由腎氣虛寒外傷風冷或因
冷物傷脾蓋脾為太陰內外皆陰則陽氣不守遂成陰毒四肢
逆冷額上手背冷而汗出不上或眼痛不堪任唇口手足爪甲
俱青黑氣止衝心而厥沉細伏匿者或多煩渴者精神如失故
曰陰勝則身寒汗出身必鼓慄而寒也則厥宜溫藥以復其陽
氣或於氣海關元灸之醫律云冷者陰之至盛陽之至衰陰過
曰寒經曰寒者熱之服以熱劑乃治冷之正法內則飲以至燥
至剛之藥外則灼以數百艾炷逐其陰而助其陽斯又治冷夾
攻之道也大抵人身貴乎陰陽升降平和無偏則無疾矣若有
偏勝是即有沈寒痼冷之證乃真陽耗散脾胃虛弱失於調理
以致胃寒食啖冷物粘膩難化生硬之類經年累月久積而成
痼冷漸被其傷脾胃因而積積成痼以成痼疾矣但有寒冷等
輩觸犯速然而作以致手足厥逆畏冷增寒飲食不化或嘔吐
涎沫或大便澀米較不消或小便頻數或肚腹絞痛或途寒
咳嗽或癩疔大作是其證也內經曰寒淫所勝平以辛熱又內
經舉痛篇云經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而
不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛岐伯

曰寒氣客於脈外則脈寒脈寒則縮縮則脈急急則外引小絡故卒然而痛得吳則痛立止因重中於寒則痛久矣寒氣客於經脈之中與氣相薄得脈滿則病而不可按也寒氣積留氣從上則脈充大而血氣亂故痛甚不可按也寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按之痛止寒氣客於俠脊之脈則深按之不能及故按之無益也寒氣客於衝脈衝脈起於關元隨腹直上寒氣客則脈不通脈不通則氣因之故喘動應手矣寒氣客於脊俞之脈則血脈泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈者絡陰器於肝寒氣客於脈中則血泣脈急故脇肋與少腹相引痛矣厥氣客於陰股寒氣上及少腹血泣在下相引故腹痛引陰股寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血停不得注於大經血氣積留不得行故宿昔而成積矣寒氣客於五臟取逆上世陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也寒氣客於小腸小腸不得成聚故後世腹痛矣然寒則脈理閉則氣道不行故氣收欬冷精於中遂為痼冷之疾也直指方云人之處世飲食為上湯藥次之惟其口暖不充嗜慾無節所以腸中停寒而為之沉痾也故有沉寒痼冷之名耶男子遺精女子帶下骨寒腦冷氣乏血衰嘔吐惡心久泄暴下皆其證耳療治之法在乎溫補不可用剛劑惟於滋血養氣之中或佐以薑桂則可古人所謂精不足者補之以味若執剛燥之劑亟欲陽氣頹回猶恐腎水易涸心人獨盛亢則害承乃制也內經曰陰氣有餘多汗身寒陰陽應象云陰盛則身寒汗出身常清數燥而寒寒而厥調經篇云陰盛生內寒岐伯曰厥氣上逆寒氣積於胃中而不可瀉瀉則

溫氣去寒獨留故為寒中東垣解云此脾胃不足勞役形體中焦不能營運病傳為寒中宜補陽以附子理中湯為末用葱白煎羊肉湯取清汁調進數服而愈前人立論至詳凡為醫者深探其意依經用藥則無天關之禍也

痢冷通治方

附子理中湯 治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐泄利霍亂轉筋體

冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不

進一切沉寒痼冷並皆治之

附子炮去 人參去蘆 乾薑炮 白朮

甘草炙

右為細末煉蜜為丸每兩作十九每服一九用水一鍾化

開煎至七分空心服

三建湯 治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背痠

因自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風逆潮不省人事

傷寒陰證厥逆脈微皆可服之

方見諸虛門

薑附湯 治證同前

方見寒門

沉附湯 治上盛下虛氣不升降陰陽不和胃膈痞滿飲食不

進肢節倦痛

沉香半兩 附子炮去

右作一服水二鍾生薑十片煎至一鍾食前服

芪附湯 治氣血陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪去蘆 附子炮去

右作一服水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短眩暈但是

虛氣弱之證並宜服之

人參五錢 附子炮三錢

右作一服水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服

茸附湯 治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸肢體倦

乏但是一切虛弱之證並皆治之

鹿茸酒炙 附子炮去皮

右作一服水二鍾生薑十片煎至八分食前服

桂附湯 治虛汗不止及體虛失血大効

官桂三錢 附子炮去皮

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食前服

訶子四柱散 治元臟氣虛衰陽耗散兩目常鳴臍腹冷痛頭

旋目暈四肢倦怠小便滑數洩瀉不止並皆治之

方見泄瀉門

沉香單澄茄散 治內挾積冷臍腹弦痛引腰背面色痿黃臍

腑自利小便滑數小腸氣痛並皆治之

沉香 華澄茄 附子炮去皮 葫蘆巴炒

肉桂皮去粗 補骨脂炒 川練子去核 巴戟去心

茴香炒 木香已上各 桃仁去皮尖 川烏炮去皮臍

右作一服水二鍾入鹽少許煎至八分空心服

附子茴香散 治氣虛積冷心腹絞痛

附子大者一枚炮 茴香炒 肉苳菴煨

乾薑炮 人參 白木 白茯苓去皮

木香已上各 丁香 甘草炙

右作一服水二鍾入鹽少許煎至八分空心服

黑錫丹 治元臟虛冷喜陽不固三焦不和上熱下冷耳內虛

鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷夜多小便頻

人月事愆期血海久冷赤白帶下及陰毒傷寒四肢厥冷

不省人事急用棗湯吞一二百粒即便回陽此藥大能調

治榮衛升降陰陽補虛損益元陽返陰

方見頭痛門

十補湯 治諸虛百損 人參去蘆 白木 肉桂皮去粗 白茯苓去皮

黃芪蜜炙 川芎 當歸 熟地黃

白芍藥 甘草炙

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾空心服

加熟附子濕之

八味丸 治下元冷憊腰脚痠重虛勞消渴

方見諸虛門

金鎖正元丹 治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠有節痠疼頭

目眩痛目暗耳鳴面色黃黑髮髮脫落頭皮腫癢精神昏

困手足多冷心胃痞悶繞臍切痛脛痠疼不能久立或

脚弱隱痛步履艱難腰背拘急不得俯仰腹痛氣刺兩脇

虛脹水穀不消大便不調嘔逆惡心飲食減少恍惚多忘

氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑數遺精白濁一切

元臟虛冷並皆治之

方見泄瀉門

來復丹 此藥配類二氣均調陰陽奪天地中和之氣乃水火

既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交滋養心腎

氣不升降上實下虛氣閉厥厥心腹冷痛臍虛滑不問

男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損扶虛救陰

助陽為効殊勝

舶上硫黃燒明不 硝石各一兩 硫黃燒明不

石各一兩 硫黃燒明不 硫黃燒明不

石各一兩 硫黃燒明不 硫黃燒明不

石各一兩 硫黃燒明不 硫黃燒明不

石各一兩 硫黃燒明不 硫黃燒明不

石各一兩 硫黃燒明不 硫黃燒明不

用柳籠子不以手攪令陰陽氣相入
不可用太過恐傷藥力兩便全極細入
陳皮 去白 五靈脂 須擇五靈脂者研細用水洗
去沙石雜物已上各二錢

太陰玄精石 飛

右將五靈脂青皮陳皮為細末入玄精石末及硝石硫黃末拌勻以好酒醋煮麩糊和丸如豌豆大每服三十粒空心粥飲吞下甚者五十粒新生嬰兒一粒小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用五粒碾碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下婦人產後血迷上搶悶絕并惡露不止及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰濕止腸腸冷痛立効諸疾不辨陰陽證者並宜服之

灸法

腎與膀胱俱虛灸腎俞百壯穴在對臍兩邊向後夾脊相

去各一寸五分兼治便濁失精五臟虛勞痲冷小腹弦急

憂遺泄精三陰交穴灸七壯在內踝上大脉並四指是

諸虛極灸膏肓俞氣海穴壯數愈多愈妙

保无丹 治老弱諸沉寒痲冷小便滑數大便時泄腰腿臍腹

疼痛因倦瘦虛食減

附子 炮去 白木 山藥 肉苁蓉

赤石脂 乾薑 肉桂 半兩

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服二三年九空心用

温酒送下

浴體法 治下元虛寒腰腹冷痛崩漏帶下一切冷病

椒目 川烏 細辛 乾薑

官桂 各等

右為粗末水黃燥洗下部為妙

洞陽丹 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脉細羸瘦傷寒陰

證並皆治之

川烏 炮去皮 天雄 炮去皮 附子 炮去皮 鍾乳粉 各二

陽起石 火煅 硃砂 各一兩

右為細末酒煮神麩糊丸如梧桐子大每服五十九空心

用温酒或鹽湯送下

接真湯 治陰病手足厥冷腰腹疼痛真氣不足衰憊欲絕

沉香 丁香 各二 藿香 一兩 附子 炮去皮

右剉碎用水二鍾生薑七片棗二枚去核煎至七分去滓

空心温服

太醫院經驗奇効良方卷之四十九

大醫院經驗奇效良方卷之五十

諸血門 附論

內經曰諸血者皆屬於心又云肝藏血夫血錯經妄行者豈無因而致哉又曰陽明厥逆喘歎身熱善驚衄吐血濕淫汗出軌衄脾移熱於肝則為驚衄陽氣者大怒則形色絕而血死於上使人薄厥怒則氣逆甚則嘔血肺欬之狀欬而喘息有音甚則嘔血暴痺內逆肝肺相搏血溢鼻口可於手太陰經內求穴以瀉之足少陰腎之脈從腎貫肝入肺中循咽喉其病則飢不欲食而黑欲唾則有血金匱要略曰夫酒客欬者心至吐血此因極飲過度所致也原病式曰衄者湯熱拂鬱干於足陽明而上熱則血妄行鼻衄也又云血溢者上出也血有餘而妄行也看方發揮論口鼻出血皆係陰虛陽盛有升無降血隨氣上竅法當補陰益陽氣降則血歸經東垣云雜病見血者多責其熱也

夫血者陰也氣者陽也氣主煦之血主濡之今血妄行上出於口鼻者皆氣逆也分之則各有所屬治之則各有所主如衄血出於肺嘔吐血出於胃其經有虛實之分當以脈理究治唾血出於胃血證上行或衄或吐或嘔或唾者皆逆也若血下行者為順內經又云榮者水穀之精氣也和調於五臟洒陳於六腑乃能入於脈也心主之肺藏之脾裹之肺營之腎泄之生化於脾總上於心藏諸於肝宣布於肺隨氣運行灌溉一身夫人目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也寒則凝澀暑則氣流澤熱則生通為脈滿則血少充則血實血虛常以飲食滋胃乃中焦受氣所汁變化而赤為血也故經云水入於經其血乃成又曰血者神氣也持之則存失之則亡且人身皆藉氣血所養可不謹哉諸經有

云陽道實陰道虛陽易亢陰易乏陽道常饒陰道常之陽常有餘陰常不足可見人之生也故氣常有餘血常不足年至四十陰氣自半起君衰矣男子十六歲而精通至六十四歲而精絕女子十四歲而經行至四十九歲而經斷而陰血之難成易虧也如此陰氣一傷最難調治以其陽虛陰虧妄行於上則吐衄衰涸於中則虛勞志返於下則便紅移熱於膀胱則癃溺血滲透腸間則為腸風陰虛陽搏則為崩中溫蒸熱痰則為滯下熱極腐化則為膿血熱極色紫黑者熱勝於陰發於瘡瘍濕滯於血則為脾痛癰疹蓄之在上則人喜妄蓄之在下則人喜狂前證諸論至詳其脈沉細者順滋大弦數者逆治法病在何經何病隨經而治之對證之方條具于後且如長沙公言少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻耳目中出是名下厥上竭為難治又不可不知也

諸血通治方

茯苓補心湯 治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五心煩

熱咳嗽唾血及婦人懷娠惡阻嘔吐亦宜服之

白茯苓 去皮 人參 去蘆 前胡 去薑 半夏

陳皮 枳殼 去穢 紫蘇 白芍藥

桔梗 乾葛 當歸 熟地黃

川芎 甘草 右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾食前服

必勝散 治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血並皆治之

小蘇 荆芥 人參 去蘆 蒲黃 炒 熟地黃

當歸 去蘆 烏梅 去核 川芎 炒 右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

諸根散 治鼻衄不止

苦根	黃芩	側柏葉	阿膠 <small>炒粉</small>
生地黃 <small>絡二</small>	甘草 <small>錢一</small>		
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服			
天門冬湯	治思慮傷心吐血衄血		
天門冬 <small>去心</small>	遠志 <small>去心</small>	黃芪 <small>去蘆</small>	白芍藥
麥門冬 <small>去心</small>	藕節	阿膠 <small>炒粉</small>	生地黃
當歸 <small>去蘆</small>	人參	沒藥	甘草 <small>錢各</small>
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服			
大蘇散	治食啖辛物傷於肺經嘔吐出血名曰肺疽		
大蘇根 <small>洗</small>	犀角 <small>鎊</small>	升麻	桑白皮 <small>去皮</small>
蒲黃 <small>炒</small>	杏仁 <small>去皮</small>	甘草 <small>錢各</small>	桔梗 <small>炒各一</small>
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服			
鷄蘇散	治勞傷肺經喉內有血咽喉不利		
鷄蘇葉	黃芪 <small>去蘆</small>	阿膠 <small>炒粉</small>	生地黃
白茅根	貝母	桔梗	麥門冬 <small>去心</small>
蒲黃 <small>炒</small>	甘草 <small>錢各</small>		
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服			
犀角地黃湯	治主脉浮客脉乳停乳相合血積胃中熱之甚		
血在上焦此藥主之			
犀角	大黃 <small>錢各一</small>	黃芩	黃連 <small>錢各二</small>
生地黃 <small>四錢</small>			
右作一服水二鍾煎至一鍾食後服			
麥門冬飲子 <small>一名清</small>	治衄血吐血久不愈		
麥門冬 <small>去心</small>	五味子 <small>三十</small>	當歸身	人參 <small>錢各半</small>
黃芪 <small>三錢</small>	生地黃 <small>二錢</small>		
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服以三稜針於氣衝			

出血立愈			
人參飲子	治脾胃虛弱氣促氣虛精神短少衄血吐血		
人參 <small>去蘆</small>	五味子 <small>二十</small>	黃芪 <small>去蘆</small>	麥門冬 <small>去心</small>
白芍藥	當歸身 <small>錢各半</small>	甘草 <small>錢一</small>	
右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服			
是齋白朮散	治積熱吐血咳血若因飲酒過度負重傷胃而		
吐血者最宜服之忌濕麪煎燻之物			
白朮 <small>三錢</small>	白茯苓	黃芪 <small>炒</small>	人參 <small>去蘆各</small>
百合 <small>去心</small>	芫胡	山藥	前胡 <small>去蘆各</small>
甘草 <small>錢七</small>			
右作一服水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾食遠服			
龍腦雞蘇丸	治膈熱咳嗽或吐血衄血		
方見積熱門			
黃芪芍藥湯	治衄血多噦面黃眼澁多眩手麻木		
黃芪 <small>三錢</small>	芍藥 <small>錢一</small>	升麻	羌活
葛根 <small>錢一</small>	甘草 <small>錢二</small>		
右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服			
人參救肺散	治咳吐血		
人參	黃芪	當歸尾	熟地黃 <small>二錢</small>
蒼朮	升麻	白芍藥	芫胡 <small>已上各</small>
蘇木	陳皮	甘草 <small>各半</small>	
右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服			
升陽去熱和血湯	治腸癖下血作瀉其血唧出有力而射四		
散腹大作痛乃陽明氣衝熱毒作也當去濕			
白芍藥 <small>二錢</small>	生地黃	牡丹皮	生甘草
橘皮 <small>錢一</small>	炙甘草	黃芪 <small>錢半</small>	當歸身

<p>熟地黃 蒼朮 秦朮 肉桂</p> <p>升麻 各半</p> <p>右作一服水二鐘煎至一鐘空心服</p>	<p>犀角地黃湯 治傷寒汗下不解鬱于經絡隨氣涌泄為芤血</p> <p>或清道閉寒流入胃腕吐血如鼻吻吐血不盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之</p> <p>犀角 剉 生地黃 白芍藥 牡丹皮 去木各</p> <p>右作一服水二鐘煎至一鐘食遠服如潮熱發狂加黃芩</p>	<p>涼血地黃湯 治飲食不節起君不時陰受之則入五臟填滿閉塞下為癉泄久為腸癰水穀與血作一瓜唧出</p> <p>熱地黃 青皮 槐花 炒 當歸 各</p> <p>黃蘗 去皮 知母 各</p>	<p>右作一服水二鐘煎至一鐘食遠服</p> <p>雞絲元 治虛熱昏胃倦愈下虛上壅吐血衄血</p> <p>雞絲葉 八兩 黃芩 防風 去蘆 荆芥 各</p> <p>菊花 三錢 片腦 半錢 川芎 生地黃</p> <p>桔梗 甘草 各半</p> <p>右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼麥門冬去心煎湯下不拘時服又治肺損吐血日漸乏力行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯嚥下</p>	<p>圓參丸 治吐血咳嗽服涼藥不得者</p> <p>人參 黃芪 飛羅麩 各一百合 五錢</p> <p>右為細末滴水和丸如梧桐子大每服三五十九丸用茅根湯下食遠服</p>
--	--	--	--	---

<p>當歸地黃湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候不調月水過喘嗽</p> <p>當歸 川芎 芍藥 黃蘗子</p> <p>白朮 槐花 各一 茯苓 去皮 生地黃</p> <p>黃芩 白龍骨 甘草 各半</p> <p>右作一服水二鐘煎至一鐘食後服</p>	<p>生地黃湯 治上熱衄血</p> <p>生地黃 四錢 阿膠 炒 二 川芎 桔梗</p> <p>蒲黃 炒 甘草 一錢</p>	<p>麥門冬散 治鼻血</p> <p>麥門冬 去心 生地黃 各一 白芍藥 蒲黃 各二</p> <p>右作一服水二鐘入生薑汁二匙煎至一鐘食後服</p>	<p>藕汁飲 治吐血衄血不止</p> <p>生藕汁 生地黃汁 大薊汁 各三 生蜜 半匙</p> <p>右件藥汁調和令勻每服一小盞細細冷啣之不拘時服</p>	<p>犀角湯 治吐血酒客溫疫中熱毒乾嘔心煩者</p> <p>犀角 蒲黃 瓜蒌根 甘草 各二</p> <p>葛根 桑寄生 各三</p> <p>右為咀以水七升煮取三升分三服不拘時</p>	<p>天門冬丸 治吐血咯血大能潤肺止咳</p> <p>天門冬 二兩 貝母 杏仁 各七 白茯苓</p> <p>阿膠 甘草 各半</p> <p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一九含化嚥津</p>	<p>綠雲散 治吐血</p> <p>栝葉 百合 人參 阿膠 各</p>
--	--	--	---	---	---	-------------------------------------

右為細末每服二錢不拘時糯米飲調下

雲雪散 治吐血

雲雪食即寒 蒲黃各一

右俱生研勻每服二錢冷水調下

地黃煎 治吐血憂恚絕傷胃膈疼痛及虛勞吐血

右用生地黃五斤絞取汁於銀鍋內微火煎一二沸後白

蜜一升再煎至三升每服半升日三服主胃痛百病久服

佳一方治吐血不止用生蜜和調服之一方用生地黃汁

一升生薑汁一合相和溫服日四五服一方治虛勞吐血

生地黃五升搗酒一升煮去滓服

掌中金 治吐血

真蒲黃 黃蘗子各等

右為細末用生芝麻油於手心內調以舌舐之

人參湯 治吐血咯血

右用人參一兩為細末五更時用雞子清調如稀糊匙抄

服若服人參末盡甚效或服半兩亦可服訖却卧一方用

烏雞子清以手磨成水須磨千百次自然化成水然後以

人參末二錢調勻約五更服服藥時不得語仰啜自下自

然覺心肺俱涼滿口津液

治傷力吐血方

右用豬肝煮熱蘸白芨末服之

四生丸 治吐血

生地黃 栝菜 艾葉 荷葉各等

右四味俱生爛搗團成雞子大每服一九水三盞煎至一

盞去滓不拘時服

生乾地黃散 治卒吐血皆因心經暴熱毒入胃致吐不止

生地黃 阿膠炒令 甘草各二 黃芩

犀角屑 栝菜 刺薊各一

右到碎每服三錢水一中盞入青竹茹如雞子大同煎至

六分去滓不拘時溫服

雙荷湯 治卒吐血

藕節七箇 荷葉頂七箇

右以蜜少許搗細用水二鍾煎至八分去滓溫服或為細

末調服亦可

松花散 治吐血久不止

松花半兩 生地黃 鹿角膠炒黃 薯蕷已上各

艾葉一分 茜草根 白茯苓 紫苑去苗

人參 百合 刺薊 甘草炙亦各

右為細末每服二錢不拘時米飲調下

百花煎 治吐血不止咳嗽補肺

生地黃汁 藕汁各一 黃牛乳半升 胡桃仁十枚 研

生薑汁半升 乾柿五枚 刺薊 大棗二十一枚 研

研如 清酒一升 將已上七味一處同酒

黃明膠炙 秦光各半兩 杏仁湯浸 去皮尖雙仁 炒研

右相次下煎減一半却入好蜜四兩徐火 養成煎後

入磁盆中盛每日三度每服一匙糯米飲調下酒亦可

又方 治丈夫婦人吐血連日不止粥食湯藥不能下者

右用五靈脂不夾土石揀好精者不拘多少研為末以狗

膽汁和丸如鷄頭大每服一九煎生薑酒磨令極細更以

少生薑酒化以湯攪藥令極熱須足先做下粥溫熱得所

左手與患人藥與不得嗽口右手急將粥與患人喫不可

太多

石膏 治心音煩熱吐血不止口若乾燥頭眩

石膏 麥門冬 熟地黃

升麻 青竹茹 葛根 瓜蒌根

甘草 右吹咀每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

杏仁散 治心肺客熱吐血唇口乾燥

杏仁 黃連 枳子仁

黃芩 大黃 桂心 瓜蒌根

右吹咀每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

加味理中湯 治飲酒傷胃遂成吐血

人參 乾薑 白朮 乾葛

甘草 右吹咀每服三錢水一大盞煎六分去滓不拘時溫服去

乾葛 加川芎治鼻衄理中脘分利陰陽安定血脈

白朮 治傷胃吐血

白朮 乾薑 伏龍肝

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九不拘時用

米飲送下

鷄子白丸 治吐血衄血

鷄子白 三箇 好香墨 右和丸如梧桐子大每服十九不拘時生地黄汁送下

茅花湯 治吐血衄血

右用茅花煎湯服之

蘿蔔飲 治諸血熱吐血衄血

右用生蘿蔔取汁半盞入白鹽少許服之立効如無生蘿蔔

菊只用蘿蔔子一分微炒紫蘇葉半分對碎用煎亦効

一方用蘿蔔汁滴入鼻中

門冬散 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

麥門冬 當歸身 人參 紫苑

芍藥 甘草 黃芪 五味子

右吹咀作二服每服水二盞去滓食後稍熱服

三奇散 治衄血不止

亂髮灰 人中白 麝香

右為細末鼻內噴少許立止一方不用麝香髮灰垂困者

焙乾為末湯調服即止

白芨散 治鼻衄及嘔血咯血肺損或食飽負重者服之愈

右用白芨為細末用冷水調紙花貼鼻中効一方用雪

水調如無以新汲水調兩肩際傳至鼻上以綿子緊繫

摺紙按令緊時熱冷水把藥上飯頃即止去藥

吹鼻方 治鼻衄吐血

右用栝菜石榴花為細末每用少許吹鼻中亦用花辦塞

鼻內立止

刺薊散 治鼻衄出血經日不止

刺薊 苦參 黃連 枳子仁

生地黄 側栝菜 大黃

右吹咀每服五錢水一大盞入青竹茹半鷄子大煎至五

分去滓不拘時服

十針散 治鼻衄不止

刺薊 木賊 白麩

右為細末每服一錢研青蒿心七枚新汲水調下併二服

三花散 治鼻衄不止

三花散 治鼻衄不止

酸石榴花一分

黃蜀葵花一錢

右到每服一錢水一盞煎至六分不拘時溫服

山梔散 治鼻衄不止昏悶欲死

右用山梔子不拘多少燒存性為末每用少許吹入鼻中

立止一方用竹刀破作兩邊一邊用濕紙裹煨令熟一邊

生用同研為末酒調服一方會服燒煉藥方致鼻血者生

用煎湯解之蔡子涯云同官無錫監酒趙無疵凡切血甚

多至危殆血尚未止一醫人過其門聞其家哭詢問其由

醫人云曾服丹或燒煉藥予有藥用之即活囊問出藥半

錢七吹入鼻中立止良久得活

扎指法 治鼻衄不止

右用線緊扎中指中節如左鼻孔出血扎左手手中指中節

右鼻孔出血扎右手手中指中節兩鼻出血左右俱扎之

大蒜貼足方 治鼻衄不止諸藥不驗者

右用大蒜一枚去皮研細攤作餅子如錢大厚一瓦許若

左竅出血貼於左腳心下以帛繫定右竅出血即貼左腳

心下兩竅出血俱貼之 止即以溫水洗腳心令去蒜氣

一方以摩手心亦効

刺薊湯 治熱氣上行衄血汗血

刺薊 雞蘇葉各二 黃連 生地黃

犀角一兩 右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

當歸湯 治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起或因

熱損發或因酒發悉皆治之

當歸 乾薑炮 黃蘗 熟地黃

小薊 羚羊角 阿膠各三錢 白朮

芍藥各半 黃芩

甘草各

右咬咀每服三錢水二盞入竹茹如指大煎至八分去滓

入伏龍肝頭髮灰蒲黃各半錢再煎至七分不拘時溫服

一方無白朮

竹茹散 治嘔血久不瘥心神煩悶臟腑勞傷

竹茹 白芍藥 生地黃 當歸各半

芍根二兩 羚羊角 麥門冬去心 鹿角膠各半

甘草一 右咬咀每服三錢以水一中盞生薑三片煎至六分去滓

不拘時溫服

麥門冬汁 治嘔血吐血及鼻衄血

麥門冬 生地黃 生藕取汁 冷熟水送

白藥末

右和令勻每服二盞略前沸不拘時溫服

治嘔血方 黃蘗以蜜塗

右為細末每服三錢不拘時用麥門冬煎湯調下瘥

治咯血方 趙君猷云屢用効

右以薏苡仁不拘多少為末熟煮猪胰切片雜藥食後微

空時取食之蓋薏苡仁能補肺以猪胰導入經絡耳陳敏捷

云治肺癰唾膿血薏苡仁為末米飲調下一方搗碎用水

煎服亦効

聖餅子 治咯血

青黛一錢 杏仁四十粒去尖以黃明

右同研勻却以所煎藥少許焙開和之捏作錢大餅子每

服用乾柿一箇中破開入藥一餅合定以濕紙裹慢火煨

熟取出以糯米粥嚼下

黑散子 治諸竅出血

蓮蓬粉年 敗機欄

頭髮性等分

右為細末每服二錢用南木香煎湯調下或只用棕櫚燒灰用米湯調下亦可

治九竅出血方

右用刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頓服之如無青汁只搗乾者為末冷水調三錢服

南天竺飲 治血妄行九竅皆出服藥不止者

南天竺草

生薑 大棗 牛草 右對入磁器中水一大碗煎至半碗去滓不拘時溫服

燈草

如小指大棗五枚 牛草 右對入磁器中水一大碗煎至半碗去滓不拘時溫服

神白散 治血汗從膚腠出及鼻衄五七日不止

右用人中白不以多少刮在新瓦上用火逼乾研令極細每服二錢入麝香少許溫酒調下一方治鼻衄不止不用麝香每用少許吹入鼻孔立瘥

生血地黃百花丸 治諸虛不足下血咯血衄血腸澀內痔虛勞寒熱肌肉枯瘦

生地黃

生薑 藕四斤 白沙蜜四兩

無灰酒一升 已上五味用銀器或砂鍋內熬至二梳許漸成膏一半磁器收之一半入乾山藥末三兩再熬一二十沸次入後藥

當歸焙

熟地黃焙 肉蓯蓉 破故紙

阿膠 炙 黃芪 炙 石斛 炙 覆盆子

遠志 去心 麥門冬 去心 白茯苓 去皮 枸杞子 去蒂

右為細末以山藥膏子和丸如梧桐子大每服五十九丸

濕酒調地黃膏子送下空心食前日進三服

蓮心散 治勞心吐血

蓮心 五十 糯米 五十

右研為末用溫酒調服不拘時候

側柏散 治內損吐血下血或飲酒太過勞傷於內其血妄行

出如涌泉口鼻皆流須臾不救即死

側柏葉 一兩半 荆芥穗 燒灰 人參 各一

右為細末入飛羅麩一錢新汲水調如稀糊不拘時服

生地黃

熟地黃 枸杞子 地骨皮

天門冬 黃芪 芍藥 黃芩

甘草 各等

右對碎每服一兩水二盞煎七分食後溫服如脈微身涼惡風加桂半錢吐血者多有此證

大薊飲 治吐衄血

大薊汁 地黃汁 生薑汁 麥門冬汁

刺薊汁 各三

右用白蜜半匙相和勻冷服

麝香散 治鼻衄不止

麝香 研碎 明礬 研碎 龍骨 研碎

右如勻每用一字先以冰水洗淨鼻內血涕然後吹入鼻中或以濕紙蘸藥塞鼻中亦可

凡九竅出血皆可用

燒頭苔 可以塞 車前草汁 可以滴 火燒蓮房 用水調

燒鹿黑煤 可以吹 石棉花片 可以塞 生薑薑汁 可以滴

火燒龍骨 可以吹 水煎茅花 可以吹

太醫院經驗奇效良方卷之五十一

腸痔痔漏門 附論

經曰風客淫氣其精乃亡邪傷肝也因而飽食筋脈橫解腸痔
 為痔蓋風氣通於肝肝生風生熱風客則滯氣傷精亡
 則邪熱傷肝因飽食行房則筋脈橫解而腸痔漏生焉夫痔
 者而巢氏病源論有五曰牡痔牝痔漏痔血痔也又古諸
 方又有酒痔氣痔虫痔番花蠅結等痔之名不一且痔於肛門
 生癰或在內或在內有似鼠乳者有似櫻桃者其形不一其
 病有痛有癢有硬有軟有膿潰者有不潰者有腫痛便難者有
 隨大便下清血不止者有穿腸血出如線者至於失治而成漏
 者或漏而穿聲者又有穿腸成孔糞從孔中出者或肛門四圍
 生瘡數枚膿血浸淫若蓮花者詳此諸證大凡肛邊生乳鼠痔
 出膿血者為牡痔肛邊生瘡腫痛出血者為牝痔肛邊生瘡且
 瘻五瘻者為痔痔肛內結核寒熱出血者為腸痔肛門腫大
 便難強力則肛出不收者為氣痔肛門瘡腫流血飲酒即發者
 為酒痔肛邊有竅血出如射線者為血痔肛門浸淫濕爛內有
 蟻虫蝕腸穿穴遂成漏者為虫痔也然此諸證皆本之於大腸
 也大腸者庚金也本性燥清肅殺之氣本位主收所司主行津
 液以從足陽明中州土之所化若旺則能生化万物而衰則損
 傷万物故云万物生於土而歸於土此之謂也然手足之陽明
 同司其化焉若人醉飽行房精氣脫泄其脉空虛酒熱之毒流
 着於脉或因醉飽淫極而致忍泄或用藥固其精弗能泄越等
 積於脉歸注大腸以致木乘火勢而侮燥金以火就燥則大便
 閉而痔漏作矣治宜苦寒瀉火辛溫和血潤燥疎風止痛之劑
 也靈樞經云足太陽膀胱之脉乃筋皆抵腰中入絡腎其支者
 貫腎足故主筋為病則生此疾由是推之足厥陰之脉環繞前

後二陰故亦能為痔矣每見人患痔其發則色青痛甚蓋謂肝
 苦急而然也且夫痔與漏初致之由雖同所患之病實異初生
 肛邊成漏不破者曰痔破潰而出膿血黃水浸淫林瀝久不止
 者曰漏也原此受病者燥氣也為病者濕者也胃行大腸則化
 燥火以乘濕熱之實也若夫腸頭成塊者濕也作痛者風也膿
 血潰出者熱勝血腐也潰成黃水者濕熱風燥也大便閉作大
 痛者風熱鬱滯弗能通泄氣逼大腸而作也大腸結燥者主病
 兼受火邪也凡此疾者皆由濕熱風燥四氣相合而致也而腸
 痔者為大便下血也蓋因人之不避風毒恣飲醇酒炙博之物
 縱慾喜怒無常臟腑鬱抑飲食自倍腸胃乃傷陰陽不和關格
 壅滯熱毒下注血滲大腸其腸痔痔漏不可得而無矣經云筋
 脈橫解腸痔為痔者此也至於膿毒腸風痔漏而名雖殊其源
 實一大抵腸痔之病有可治不可治者若便血身寒則可治身
 熱則不可治腸痔下白沫淋瀝者生肌痔者死如下膿血脈滑大
 者生脈懸絕則死腸痔脾脉外鼓沉久自已而肝脉小緩則易
 治腎脉搏沉身熱則死也醫療之法惟宜祛風消毒解熱涼臟
 和血潤燥隨宜施治無不獲效

腸痔痔漏通治方
 秦元白木丸 治痔疾并漏有膿血大便燥硬作疼痛不可忍
 秦元 去蘆 桃仁 去皮 大皂角 仁 祛火 破存
 枳實 麩炒 當歸尾 酒製 澤瀉
 地榆 三錢 白木 杞 兩
 右為細末與桃仁泥碾勻湯煮麩糊和丸如梧桐子大令
 藥光滑焙乾每服一百九白陽送下空心服待少時以美
 膳盛之心生冷硬物冷水菜之類并濕麩酒及五辛辣熱
 大料物之類犯之則藥無驗矣數服而愈

秦尤蒼木湯

秦尤去苗 蒼米 皂角仁洗 桃仁去 杏仁各

黃蘗酒製 澤瀉 當歸尾 防風已上各

積柳半斤 大黃少許

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服待少時美膳壓之忌

生冷硬物冷菜之類及酒溫麪乾薑之類如有膿加白朮

花五朵去萼青皮半錢同煎去滓入木香末三分服

秦尤防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛非痔漏

也此藥主之

秦尤 防風 當歸 白朮各半

黃蘗 橘皮 芫胡 大黃各

澤瀉各一 紅花 桃仁 升麻各五

甘草分六

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服避風寒忌房事及酒

溫麪辛熱之物

當歸郁李仁湯 治痔漏大便結硬大腸下墜多血苦痛不能

忍者

當歸尾 郁李仁 澤瀉 生地黃

煨大黃 枳實 蒼朮 秦尤已上各

麻子仁半斤 皂角仁一 升麻各

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服忌風寒處大小便

秦尤羌活湯 治痔疾成塊下垂疔瘡其痒難忍

秦尤 羌活 黃芪各一 麻黃

防風 升麻 芫胡 甘草各

藜蘆 細辛 紅花各五

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

紅花桃仁湯 治痔疾經年因飽食筋脈橫解腸瀉為痔常去

其筋脈橫解破血是也治法當補北方瀉中央

紅花 桃仁 麻黃各半 生地黃

黃蘗各半 猪苓 漢防已 當歸尾

澤瀉 蒼朮 防風各一

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

秦尤當歸湯 治痔漏大便結燥疼痛

秦尤 枳實各半 當歸 皂角仁去皮

桃仁 澤瀉 白朮各一 大黃各五

紅花半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

地榆散 治痔瘡腫痛

地榆 黃芪 枳殼 檳榔

川芎 黃芩 槐花 赤芍藥

羌活各一 白朮 蜂房炒 甘草各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

槐角丸 治諸痔及腸風下血脫肛

槐角去梗 防風 地榆 枳殼各

當歸 黃芩各半

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用米

飲送下

釣腸丸 治久新諸痔肛邊腫痛或時痔瘡有膿血

瓜蒌二 蠟皮二 白礬各 綠礬各

白附子生用 天南星 鶴冠花炒 半夏各五

胡桃仁十五 枳殼炒 附子炮

訶子各

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三五十九臨臥月
溫酒送下遠年不瘥者服十日効久服除根

皂莢刺二刀燒煙 防風 槐花各七

蛇床子 白礬煨 枳殼 白蘘藘煨

右為細末醋調菜豆粉糞糊為丸如梧桐子大每服五十
丸食前以苦練根煎湯送下仍用童子熱尿入白礬末淋
洗肛門

皂角煎丸 治內痔腸頭裏面生核寒熱往來

蒲尺皂角三錢去弦 白礬煨 刺蝟皮多黃

薏苡仁 白芷一兩各 桃仁去皮 甜葶藶炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用桑
白皮煎湯送下

考歸丸 治痔下血不止

川芎 當歸 神麴炒 槐花子炒

黃芪 地榆炒 刺芥穗 頭髮燒存

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九食前用米
飲送下

乾葛湯 治酒痔

乾葛 枳殼炒 半夏薑製 生地黃

右作一服水二鍾黑豆一百粒生薑五片白梅十個同煎
至一鍾食前服

橘皮湯 治氣痔

橘皮 枳殼炒 槐花炒 川芎炒

桃仁炒 木香 檳榔 紫蘇葉

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食前服

香附 甘草一分 荆芥穗 枳殼炒 槐花 紫蘇葉

右為細末每服二錢空心用米湯調下

神功散 治洗痔凡富貴之人多因嗜慾酒色過度喜怒不常
致生痔漏或如鼠乳連珠或糞門腸頭腫流膿流血其痛
如割不可忍者但是諸腫瘡痔漏及腸風漏血此藥治之

若參 川椒 苦葫荻 芫荽子

槐花 枳殼 荊芥 金銀花

白芷 連翹 獨活 小茴香

右攻咀每用五升水六七椀葱白二莖煎五七沸去滓以
盆盛藥水上坐先蒸後洗其驗加黃老茄子二箇尤妙

黑丸子 專治久年痔漏下血用之屢驗

有草霜 白薑炒 木燄頭三 烏梅

敗櫻 枳殼 亂髮燒存

右為細末研勻醋糊為丸如梧桐子大每服三五十九空
心用米飲送下

逐瘀湯 通利大小腸取下惡物凡痔漏熱証用之有瘀血作
痛服之見効

川芎	白芷	赤芍藥	乾地黄
枳殼	阿膠	茯苓	五靈脂
蓬朮	茯神	木通	甘草
桃仁 <small>去油</small>	大黃 <small>各半</small>		
右作二服每服用水二鍾生薑三片蜜三匙同煎食前服以利為度			
蝸牛高膏敷痔瘡極効			
蝸牛一枚	片腦	麝香 <small>各小</small>	
右同研爛用磁盒盛次早取汁傳瘡上			
蝸皮丸	治諸痔出血裏急疼痛		
蝸皮 <small>炙</small>	槐花 <small>微炒</small>	艾葉 <small>炒黃</small>	白芍藥
枳殼 <small>炒</small>	地榆	川芎	當歸
白礬 <small>炙</small>	黃芪	貫衆 <small>各半</small>	頭髮 <small>三匙</small>
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用未飲送下			
蝸皮散	治五痔		
蝸皮 <small>炙</small>	龍甲 <small>醋炙</small>	當歸 <small>剉碎</small>	大黃 <small>各三</small>
槐花 <small>炒</small>	黃芪 <small>各二</small>	蛇皮 <small>炙</small>	露蜂房 <small>炙</small>
藥本 <small>去油</small>	桂心 <small>各一分</small>	猪後懸蹄甲 <small>十四枚</small>	
右為細末每服三錢七空心煮白粥飲調服日三服			
拔毒散	敷痔腫毒處		
大黃	黃藥	白艾	右高
黃芩	黃連	白歟	搗子
朴硝	右為末用井花水調塗		
洗諸痔方			

黃連	黃芩	荆芥	地床子 <small>各一</small>
饒面草	何破草	槐條 <small>各一</small>	側柏葉 <small>各一</small>
右用新汲水煎傾盆內乘熱先薰後洗			
七物湯	薰痔		
皂莢 <small>三枚</small>	艾 <small>一握</small>	龍甲 <small>二枚</small>	乾蝦蟆 <small>一枚</small>
樹黃 <small>一握</small>	麝香 <small>一分</small>	草烏 <small>二枚</small>	
右搗篩拌勻穿地坑內着熱火一升方燒一片中心鑽一孔蓋坑口放入藥一撮披衣坐上熏			
加味四君子湯	治五痔下血面色痿黃心忪耳鳴神弱氣乏口淡食不知味		
人參	白朮	茯苓	白扁豆
黃芪	甘草 <small>各等</small>		
右為細末每服二錢白湯點服一方有五味子無甘草			
五洗方			
槐花 <small>半斤</small>	蓮房 <small>一個</small>	荆芥 <small>五文</small>	五倍子 <small>三匙</small>
地榆 <small>半斤</small>			
右為末每用半刃水一煎以瓦器煎了入白錢乘熱先熏後洗			
五聖丹	治痔		
雄黃	綠礬	朴硝	葉子 <small>雌黃</small>
明白礬 <small>各半</small>			
右件各礬碎以銀鍋一入雄黃二入雌黃三入朴硝四入綠礬五入白礬圓瓦片蓋之炭火煨一日夜看青煙出不有紅煙方可候冷取出紙精頓地上用盆服出火毒一日夜入乳香沒藥末各一木同研極細每抄一匙煎甘草湯調敷外用鷄羽搽藥末蓋之日二次夜一次自然乾硬而			

脫逐日須用葱白煎湯入朴硝流洗軟高試乾然後傳藥

治痔猪膽膏
右用猪膽七枚取汁以建盞盛炭火熬成膏用單紙攤傳

寬腸丸 治內外痔
積殼 黃連 百藥煎各等

右為細末水糊為丸如梧桐子大海服三十九食前用米湯送下

熊膽膏 治痔極切
熊膽 片腦

右各等分研細用井花水調以鷄羽搗痔上

治痔穀道中虫痒不止及正發疼
水銀 棗膏各二

右研和搗如棗核狀薄綿片裹內下部明日虫出若痛加韶粉三大分作丸內之

熏洗方
右用韭菜不以多少先燒熱湯以盆盛湯在內以器具蓋

之止留一竅却以韭菜於湯內泡之以谷道坐竅上令湯氣熏蒸候湯溫冷却引韭菜輕上洗瘡上數次自然可

又方
右用韭菜汁一椀蒼耳子葉汁一椀調勻日曬溫洗絕根

半夏散 治諸痔疾初生急以此藥治之

右以半夏生為末先以生薑自然汁浴敷道後以半夏末

泡湯洗之不週三兩日即自消
九腦散 治痔瘡熱痛
鯽魚一枚破開去腸肚入

右為細末入鹿胎少許用蜜調傳之

厚朴煎 本方云腸胃本無血緣氣虛腸弱自榮衛滲入

神麴 麥藥三末各一

右為細末水糊為丸如梧桐子大夜作空心米飲下百丸

平時服三五丸厚朴厚腸胃麴藥消酒食白木導水血

自不作也五痔諸下血論不及此是亦以脾胃為主也

治痔方
右以鰻鱧魚燒熏下部痔虫尽死

鷄峯烏金散 治痔漏
黃牛角心 猪牙皂角 刺蝟皮 穿山甲炮上同

皂角刺 槐子 枳殼 貫衆

阿膠炒各

右為細末每服一錢半用胡桃肉研爛併酒調食前服大

腸有熱荆芥泡湯調下漏血不止當歸煎湯調下

臭痔皮散 治痔漏下血及膿不止
臭痔皮 微炒 酸石榴皮 黃連 去鬚 地榆

何膠各一兩艾葉三分

右為細末每服二錢食前粥飲調下
葱青散 治痔漏
右用葱青內刮洗對停入蜜調勻先以木鼈子煎湯熏洗

然後傳藥其冷如水唐仲冬云常有一更人苦此渠族弟

親合與之早飯前傳午後來謝拜於庭下云疾已安矣
雙金散
黃連 麴金各等

右為細末蜜調敷之痔痔好用欬口龍骨散

龍骨散

龍骨煨 白芷 黃丹 寒水石煨各分

右為細末摻瘡口上小便赤色服導赤散

導赤散

生地黃 木通 甘草各等

右為細末每服三錢白湯調下

積殼散

積殼 貫衆各二 荊芥 大栢皮各一

黃連 蛇床子 地骨皮 無名異

乾薑炮各半兩 蒼耳根 冬青葉 薤頭

栢枝把各一 黑豆半升

右吹咀每用一大合用水三大椀煎至二椀先熏後洗日三五次

能消丸

治痔疾疼痛如錐刀刺不可忍

威靈仙一名靈消去 卷栢去根 蛻皮煨灰

防風去叉 阿膠炙燥各 糯米一合

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九加至二十九不拘時用人參湯送下日二服

試虫散

治五痔痛甚

臭椿皮 景天陰乾即地骨皮名 二馬牙硝一及

右為細末用精猪肉一大片摻藥末三錢七在肉上就上坐一二時起看有虫即出無即已

烟熏方

治痔漏痛

白鱗魚骨 熟艾各等

右對碎細勻用新盆子一箇盛藥在內用紙封盆口上通一竅以火燒藥候烟出竅上坐熏之烟尽即止

白金散

治久新痔瘡如神

右用海蝶蛸去鱗皮為細末每用二三錢生麻油調成膏以鷄翎拂上每日夜用之日久瘡自消

乳香散

治牡痔生瘡

乳香 猪牙皂角 鱧鯉甲各二 蓍葉去頭

黃牛角尖長二寸者一對 蛇蛻俱全者

右入砂罐內蓋口鹽泥固濟曬乾用十斤炭火煨候碧烟出去火放冷取出細研每服二錢匕以胡桃一箇取肉細研拌藥空心酒調下五服見効

猪蹄灰丸

治牡痔生瘡乳肛門癢痛觸着有膿血出不絕

猪懸蹄甲火燒存性 水銀三大

右先取水銀用熬煮肉二枚研勻次入猪蹄灰和為丸如鷄頭尖大先以鹽湯洗下部內一丸夜卧再用以瘡為度

積柳散

治風氣積留下部結成乳痔生瘡下血腫痛

積柳對燒 澤瀉酒浸 瞿麥 甜葶藶隔紙

防已 藁本去苗 陳皮去白 郁李仁與陳皮

滑石半斤 羌花燻 木香各一 乾漆炒

右為細末每服二錢匕不拘時溫酒調下日三服

槿藤散

治痔下血不止生瘡腫痛

槿藤子取仁 龜甲醋炙 黃芪 槐子炒

川大黃煨 蛇蛻煨 藁本 桂心各半

當歸剉炒 蜂房炙各 猪後玄蹄甲七枚

石為細末每服二錢食前用粥飲調服

赤小豆散

治酒痔大腸中久積熱毒下血疼痛

赤小豆炒熟 生地黃 黃芪各 赤芍藥

白欬 桂心各半 當歸剉炒 黃芩各三

右為細末每服二錢食前用槐子煎湯調服

麝香散 治乳疔及一切內外疔瘡疼痛不可忍者

右用瓜蒌新黃大者一枚以刀開下頂子不去穢選不蛀皂莢子填滿却取開下頂子蓋別用紙筋泥固濟約三指

厚以炭火簇合燒令紅放一坩內出火毒一宿取出入麝香末一錢研令極細以磁盒盛每服一錢七米飲調下

溫酒亦可服一劑永除根本

桑木耳散 治疔疾疔邊疼痛

桑木耳散 槐木耳散 蝎皮炙黃 羌活

當歸 各一兩 枳殼 各二兩

右為細末每服二錢食前粥飲調下

神効方 治疔疾下血日夜不止

白礬 五兩 綠礬 二兩 黃丹 伏龍肝

蝟皮 各二兩

右搗碎入磁罐子內用炭火五七斤燒炭盡為度候冷取出研如粉以麪糊為丸如梧桐子大每服十九食前用米飲送下

地榆散 治血疔

右用地榆為細末每服二錢七食前米湯調下日三服

治血疔疔

右用苦練子肉為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二

十九空心吞吞耳子煎湯送下日三服

止血方 治疔瘡血山不止

右用明血竭為末傳之

治疔疾便血方

右用活鱔魚一箇八兩重者洗淨鱗毛腸肚皆不去用摻

步二兩洗淨寸截先將摻一兩鋪在瓦罐子內次安魚上

面却將摻一兩蓋之即閉罐口黃泥固濟火畔炙乾量罐

子開一地坑先安小磚一片後坐罐子四面用熟炭火六

七斤燒煨候烟絕取罐子於淨地以瓦盆合定淨土謹勿

今透氣經一宿出火毒開取藥細研每服一錢食前用米

飲調下忌動風之物

威靈仙 治氣疔大便澀

威靈仙 去土乳香另研 枳殼 各

右為細末以粟米飯和為丸如梧桐子大每服十五丸食

前用米飲送下日三服

熏熨方 治氣疔脫肛

枳殼 各一兩 防風 去土 白礬 各一兩

右咬咀拌勻水三碗煎至二碗乘熱熏之仍以軟帛蘸湯

熨之通手即淋洗

洗藥 治疔瘡久不愈者

桃條 柳條 槐條 萱草根

桑條 艾葉 荆芥 蒼耳根

茄根 各三兩

右咬咀水五碗煎三十沸去滓溫洗次貼後藥

香白芷 輕粉 各二錢 黃丹 三錢 五倍子 五箇 炭

麝香 少許

右為細末研勻塔乾葱白汁調搽濕則乾貼之

神驗熏藥方 治疔漏積年不愈者

鱧魚 半斤 五月五日 蟻 三枚 研

右件藥取成熟艾和藥末以青布捲之安磁瓶中着火燒

坐向瓶上熏之其虫及惡汗並出不復再發

槐角散 治脾胃不調腹滿下血

槐角二兩 枳殼 當歸 蒼朮

陳皮 厚朴各一兩 烏梅 甘草各半

右咬咀每服五錢水一盞煎七分去滓食前服

結陰丹 治腸風臟毒大便下血

枳殼去穢 威靈仙 何首烏 椿根白皮

陳皮去白 荆芥穗 黃芪各等

右為細末酒煮糊同蜜少許和丸如梧桐子大每服五十

丸加七十九食前用米飲送下一方不用蜜以醋少許同

陳米飲煎湯下

治腸風臟毒方

一兩菜萁半兩蓮 二味同炒不同研

糞前菜萁調酒下 糞後却用酒調蓮

猪臟丸 治大人小兒大便下血日久多食易飽腹不痛裏不

急先用海螵蛸炙黃去皮白者為末以木賊草煎湯調下

服之三日後効

黃連 嫩猪臟二天

右以黃連塞蒲猪臟繫兩頭煮十分爛研細添糕糊丸如

梧桐子大每服三五十九食前米飲送下

鯽魚方 治腸風血痔及下痢膿血積年瀉血面色萎黃

大活鯽魚一箇不去鱗鱗不穿 白礬一塊如

右用敗壞皮重包外用厚紙裹先煨令香熟去紙於熨斗

內燒帶生有性為細末每服一錢空心溫米飲調下一方

瓦瓶內蓋定炭火燒為灰軟飯和丸如梧桐子大每服二

十九食前粥飲下

治腸風及脫肛不收有血下部腫悶疼痛

右用不蛀皂角五莖搥碎水一椀揉令皂角消盡縮二重

濾過取十分清汁將脫肛腸浸在藥水中其腸自收不用

手按如大腸收了更用湯燙其腰腹上下令皂角氣行則

不再作一方皂角去黑皮塗酥炙為末東肉和丸如梧桐

子大每服十五丸食前粥飲下

勝金丸 一名百藥散 治腸風下血瀉血不止及臟毒或便血

百藥煎三兩一兩生用一兩

右為細末軟飯和丸如梧桐子大每服五十九空心用米

飲送下一方為細末米湯調二錢服

四季側柏散 治腸風臟毒下血不止

側柏燒存性春採東夏採

右為細末每服二錢糯米飲調下一方用菜一斤洗炙為

末每服二錢食前枳殼湯調下

腸風黑散 治臟毒下血

荆芥燒 枳殼各二兩 亂髮 槐花

槐角 蠟皮各一 甘草各一

右同入磁瓶內泥固濟燒存三分性出火氣同枳殼炙木

饅頭為末每服二錢食前溫酒調服水煎亦可

黃連散 治腸風下血疼痛不止

黃連 貫眾 雞冠花 烏梅肉

大黃各一 甘草各三

右為細末每服二錢不拘時米湯調下

神應丸 治腸風臟毒

黃連 六錢八分一分一分一分一分一分一分一分一分

右為細末糕糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用米

湯送下

蒜蓮丸 治腸風臌毒

黃連研為獨蒜煨熟

右同搗為丸如梧桐子大每服五十九空心陳米飲送下

香桃丸 治腸風臌毒

香白芷 烏梅煨 百藥煎

右等為末米糊和丸如梧桐子大每服七十九空心用米

飲送下

透皮丸 治痔漏下血疼痛

東行栲根白皮

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服七十九空心用米

湯送下

猪臟丸 治痔瘻下血

猪臟一具洗淨花柳毒末填入腸內兩頭

右搗和丸如梧桐子大每服五十九食前當歸酒下

卷栢丸 治臌毒神效

卷栢生石上高四五寸根黃如系

右為細末每服二錢空心米飲調服

治腸風臌毒方

山裏果曬乾

右為細末每服二錢空心米飲調服

山裏果曬乾

山裏果曬乾

山裏果曬乾

山裏果曬乾

山裏果曬乾

山裏果曬乾

太醫院經驗奇效良方卷之五十一

太醫院經驗奇效良方卷之五十二

脫肛門 附錄

脫肛之證難經云虛實出焉出者為虛入者為實肛門之脫非虛無故然哉蓋實則溫溫則內氣充有所蓄虛則寒則內氣餒而不能收况大腸有稟薄與肺為表裏肺虛則開虛則脫三因之論且婦人有此疾者產育用力過多小兒此疾皆因久利大腸虛冷所為也肛門為大腸之候大腸傷於寒利而用力努腰其氣下衝肛門脫出也用香附子劑芥等分煎湯洗之或以五倍子煨為細末放於紙上托入肛緩緩揉入若或長久男子變成腸疝痔漏腸出不收至於出數寸者以五倍子朴硝等分煎湯洗之亦用木賊燒灰不令烟盡入麝香少許大便了貼少許効又有久痢膿血皆能令入肛門突出有腸頭作瘻即腹中有虫丈夫由此酒色過度大腸者傳道之官腎者作強之官蓋腎虛而洩母氣因肺虛是以大腸氣無所主故自肛脫治法安原氣去蘊熱之劑外用煎藥洗之醫治无不愈矣

脫肛通治方

蛻皮散 治肛門脫出不收

蛻皮一箇曬乾兩燒 磁石半兩煨於蒜

辣桂三錢 龍頭炙一枚煨火

右為細末每服三錢食前米飲調下用鞋底灸熱熨按肛

上托入

文蛤散 治大腸虛寒肛門脫出不收或用力太過及小兒斗

文蛤不附多子

右為細末水煎汁浸洗更入白礬蛇床尤佳洗後用赤石

脂末少許搽在芭蕉葉上頻用托入或脫出有長尺許

瀉風門 附論

內經云風氣與太陽行諸脈俞散於肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉腠理而有瘍衛氣有所礙而不行故其肉有不仁也瀉者有榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘡瘍潰風寒客於脈而不去名曰瀉風以其酷熱暴悍可畏耳夫

人患此病者先分在上在下所感之處古方治以在上者以醉仙散取其臭惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳虫於穀道中出然此邪毒藥雖攻出其源尚在經絡受病於陽明一經凡治此病先觀患人身上疣瘡與瘡若先見於上者或下體多者或上下同得者或下而復在上者乃陽明胃經也其以無物不受此其濕熱浸漬經絡久則虛使風入於人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受甚重非醫之神手能起此病者鮮矣有或從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見其病勢緩多怒之若能保養保和得宜鮮有不愈者也若不能絕滋味遠色慾皆不免再發則終於不能救矣前

人患此病者先分在上在下所感之處古方治以在上者以醉仙散取其臭惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳虫於穀道中出然此邪毒藥雖攻出其源尚在經絡受病於陽明一經凡治此病先觀患人身上疣瘡與瘡若先見於上者或下體多者或上下同得者或下而復在上者乃陽明胃經也其以無物不受此其濕熱浸漬經絡久則虛使風入於人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受甚重非醫之神手能起此病者鮮矣有或從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見其病勢緩多怒之若能保養保和得宜鮮有不愈者也若不能絕滋味遠色慾皆不免再發則終於不能救矣前

曹治五人中間惟一婦人得免而疾安以其貧甚無物可喫欲啖無從所覓餘四人不能禁忌妄作者三二年後皆再發而危孫真人云吾常治四五百人終無一人免於死非孫真人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此一婦人本病外因又服三五百貼加減四物湯半年之上方得月經行十分安愈若人患此鼻柱壞爛肌肉瘍潰者是知陽明經分受風木之邪也明矣不可泥於風寒而已內有臭惡血陳虫惡物之類者又何為而致然也蓋謂厥陰主生五虫其相火熱甚而制金金衰故木未侮肺受熱而氣不清矣况血隨氣運逆隨氣降氣既不能施化則血聚而凝積矣血聚久則所惡逆積久則臭濁濕熱血相為

熏蒸久則肌肉潰爛而生虫治之使邪出於齒縫大腸之間者乃是陽明經之道路也蓋其土敗木賊之證宜乎况又不能守戒忌者欵此丹溪先生所以痛言之深也大風病是受天地間殺物之風右為瀉風可不畏哉三因方之所載此其惡疾若是也雖名曰風未必因風所得大抵多嗜色慾勞動氣血熱發汗泄不避邪風冷濕使淫氣與衛氣相干致肌肉皮膚瘡潰鼻梁塌壞千金方云所謂自作不仁極猥之業雖有悔言而無悔心亦可嘆也然亦有傳染者原其所因皆夫婦不知禁忌因而不避風寒暑濕之氣因虛邪入經絡久則漸成斯疾又有勞役飲食滯結於胃流入經絡風涎相搏致使風痺不可一例作瀉風治之則誤矣內經云脈風成為癘俗云癘病也先禱皮散從少至多服三五七日灸承漿穴七壯灸瘡輕再灸瘡愈三灸之後服二聖散泄熱祛血中之風邪戒房室三年病愈藥灸同止此類石形此治肺風之法也靈樞云瀉風數刺其腫上已刺以銳針上其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食勿食他食以犯其病且癘病古今以為難治之證前八救生民之病苦置諸方論詳備于象後之學者誠心鑒諸

瀉風通治方

通天再造散 治大風惡疾

鱗金半兩 大黃一兩 白牽牛取頭末六分

皂角刺一兩

右為細末每服五錢日未出而東以無灰酒調下盡量為度晚利黑頭小虫病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌食發毒之物半年但食稠粥軟飯漸止調理自然頭尾皮膚如常甚者不過三兩次須將理不可妄有勞動及終身不得食牛馬驢騾等肉犯者死不可救矣

神功進命散 治大風

北大黃 半兩 川礬金 半兩 大皂莢刺 一兩

右為細末每服二錢用真大獨子油入好酒溫調臨睡服

隔兩日再服直候瀉下無虫方瘥

皂辣湯 治大風

皂莢刺 二兩 北大黃 一兩 輕粉 半兩

右為細末每服二錢空心酒調服取下惡物服藥數日齒

出毒血甚臭

皂魚丸 治大風諸癩

肥長皂角 二十條 先炙後

右以皂角肉多用酒慢火煎得稠粘瀝去清者候冷入雪

糕并為丸如梧桐子大每服五十九不問飢飽酒送下

硫黃酒 殺癩風虫

右酒調空心飲清汁明日添硫黃再研入酒如前服或添

六獨子油更好

天靈蓋 三兩 蝦蟆 二兩 桃仁 去尖

人中白 二兩 麝香 一分 硫黃 各一

穿山甲 炮炙 老皂莢刺 各半兩 輕粉 二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九月初五更

米飲湯送下連日取虫盡則愈殺瘵虫通用

烏蛇丸 治風癩殺虫

烏蛇肉 酒浸 蜂房 各一 桃仁 去尖

皂角刺 炮炙 貫仲 獨活 檳榔

苦參 猪牛 蕪荑 雷丸 雄黃

硫黃 各半 珠砂 二錢 胡椒子 四兩 蝦蟆 二箇 去頭

右為細末以長皂角十條水三升煎成膏和藥末丸如梧

桐子大每服三十九空心溫酒送下

治大風

右用烏蛇三條草治令淨熬熟去骨取肉焙乾為細末

用宿蒸餅丸如米粒大以喂烏鷄其鷄食盡烏蛇三條後

却烹鷄取肉為末或為丸或作散酒服之丸時仍用宿蒸

餅每服三五十九甚者不過三五鷄即愈

雷丸散 風癩取虫

雷丸 阿魏 實叢末 各二 麝香 半兩

水銀 硫黃 雄黃 各二兩 乳 半兩

右為極細末每服一錢天明溫酒調下明日再服

蝦蟆丸 治大風殺五虫

乾蝦蟆 炙 兩 肥長皂角 一條 先炙後去

右為細末以竹管引入羊腸內繫兩頭用麩二升鋪饒內

置麩上蒸熟去麩入麝香半錢同搗丸如梧桐子大每服

二十一丸空心溫酒送下

蔓荊丸 治大風

蔓荊子 蒼耳子 枸杞子 牛蒡子 炒

黑牽牛 炒 胡椒子 香白芷 何首烏

威靈仙 荊芥穗 白茯苓 炒 去 直 蠶 炒 去

細辛 卓角刺 苦參 大草烏 去尖

獨活 各一

右為細末大風油和丸如梧桐子大每服二十四丸食前

用茶清送下

胡麻散 解風熱毒氣癰疹瘰癧

方見風門

行効第一方 治癘風即大風惡疾癩是也雖名曰風未必皆因風大率多嗜慾勞動氣血熱發汗出不避邪風使淫氣相干則肌肉不仁勞氣逆濁則肘熱不利故色敗皮膚癢潰鼻泉塌壞或自作不仁極張之業所致久則或遍身白皮脫落如蛇蛻狀

右用桑枝灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及菽豆漿添熱水三日一浴一日一洗面却用側柏葉蒸曝乾白膠香各等分爲細末滴水爲丸不拘時溫水下三七粒日三服

仙方

治大風惡疾雙眼昏咫尺不辨人物髮眉自落鼻泉崩倒肌膏瘡如首薛數若不可救此方特効

右用皂角刺三斤炭火熬久曬乾爲末濃煎大黃湯下一

浴洗

治大風頑麻癩風紫癩白癩

麻黃根 地骨皮 草烏頭各二

右到碎破朴硝二兩和勻每用藥一兩水一桶瓶一合葱三十根艾葉一兩同煎十沸用米醋一中盞又打勻去滓坐溫室中自用手巾搭四肢候湯可浴即浴令汗透面上如珠出更坐室中或曠片時尤佳汗解方着衣避風而出五日再浴如此浴二次浴罷便服換骨丹

換骨丹

九肋鼈甲 大蜈蚣各

右以鹽泥固濟候乾火煨存二分性爲末巴豆半兩去皮膜順手揆青州棗七枚去核入巴豆膏在棗中大燒令焦存巴豆五分性將棗巴豆碾爛如泥入煎二味末碾

醋艾糊和丸如棗豆大每服七丸虛人四五丸用溫薑汁下俟利惡物如膿血爛腸即住三兩服未利更加三九次服遇仙丹

遇仙丹

人參 紫參各一 苦參 白殭蠶各二兩
右爲細末麪糊和丸如梧桐子大每服三十九食前溫鹽湯送下日二服次服疎風散

山柅仁半兩 大黃 滑石 熟地黃各一

右爲細末入朴硝半兩研令勻每服一錢食後淡茶清調下次用佛手膏

佛手膏

去黑紫瘡核 杏仁二十枚 紅娘子二十枚

批霜八兩 韶粉 黃蠟各半 槐角三條

菴豆 盆硝 瀝青 膩粉炒

右先將油煎令乾髮化次下紅娘子次下巴豆槐角等逐味下焦者濾出方下硫黃盆硝粉蠟等以單子不住手攪令勻滴水中成珠不散爲度以磁器貯之用時先將針刺瘡核用藥一粟米大故針處次日瘡瘡有惡臭黑膿血出三兩日血漸少次服去毒丹

去毒丹

赤芍藥 白石 甘草各半 朴硝

右爲細末麪糊爲丸如棗豆大每服十大丸加至三十九臨臥時用金銀薄奇

甘草散

甘草 滑石各半 大黃一分 山豆根一兩
右為細末每服一錢漿湯調下日二服次服解毒丸

解毒丸

瓜蒌根三兩 大黃半生 朴硝二兩 甘草半斤
右為細末麪糊為丸如菴豆大每服二十九加至三十九
白湯下次服黑神丹

黑神丹

訶子四箇 黑牽牛生 巴戟炒各 甘遂一兩
赤小豆九 右為細末麪糊和丸如菴豆大每服十九加至十五九不
勻時用薄背湯送下次用水膏藥

傳貼破處及面脚上瘡令生肉

陳米半升 馬蹄香 藿香各一 麝香二兩
陳皮去灰土半斤 右為細末入麝香用冷水調掃付瘡上有膿瘻如損破即
煎槐枝湯洗再上藥此十方迺秘傳有驗大要病人須能
如法將息理會敬而信之

三濟丸 治大風惡疾

川芎 當歸 熟地黃 荆芥穗各二
細辛去葉 防風各一 桂心半兩
右到碎先以醋一升浸一宿漉出焙乾再以生地黃一斤
搗汁浸一宿焙乾再以酒一升浸一宿焙乾旋入乳香半
兩以餘酒醋地黃汁浸蒸餅為丸如梧桐子大陰乾收貯
後用好鳥頭一箇炮裂剉荆芥穗半兩浸酒三升旋溫熱
下藥五十九食送服

八氣湯 淋瀝大風瘡

桑葉 荷葉 地黃葉 皂角葉
荊葉 蒼耳葉 葛蒲葉 何首烏葉

右等分曬乾燒存性為細末如面藥用洗手面身體大風
惡疾瘡癩茶毒膿汁淋漓眉髮墮落手足指脫頑痺痛痒
顏色枯碎鼻塌眼爛齒豁唇揭病語之惡無越於斯負此
病者百無一生

額顛腫破不至踰月取効如神

白花蛇酒浸 黑烏蛇酒浸 沙苑蒺藜

蔓荆子 威靈仙 荆芥穗 甘菊花

苦參 紫參 沙參 天門冬

不賊 不灰木 赤芍藥 石菖蒲

川芎 定風草 何首烏 胡麻子炒

草烏去灰 蒼朮去灰 木鱉子 甘草各三兩

當歸 細辛 香白芷各一 天麻二兩

右為細末每服五錢七酒調下食後服酒多為妙

如聖散 治大風疾洗瘡藥大有神効

苦參 玄參 紫參 荆芥穗

沙參 陳皮 厚朴 頑荆子

麻黃去節 防風 白芷 蔓荆子

威靈仙各二 右為細末每用三錢柳枝各一把水五升同煎臨睡

時熱洗忌五辛物

黃精煎 治大風癩病面赤疹起手足攣急身發瘡癩及諸脚
已落者

黃精生者十斤 白蜜五斤 生地黃四斤

右先將黃精生地黃洗淨細剉以木石杵臼搗碎復研入水三斗絞取汁置銀器中和蜜攪勻煎之成稠煎為度每用溫酒調化二錢七或三錢七三夜一久服風癩瘡平而如童子如年不老

治大風瘡

右用楓木子不以多少燒存性灰研與輕粉等分用麻油調敷瘡上極妙如濕則乾擦之經驗方云昔章貢有鼓角匠生肉瘰因詰之云曰害大風得道人傳此藥今遂愈

蒿艾酒 治癩疾

右取白蒿十束如芥大煮取汁以麴糯米亦如護酒法去熟稍飲之但是惡疾補體面目有瘡皆可服

治大風

雄黃

雌黃

硫黃各二錢 斑貓

黑皂角刺焙七錢半

右為極細末每服一錢天明溫酒調下明日再服

白花蛇造酒方 治大風

每白花蛇一條蒸米一斗缸底先用酒麴次將蛇用絹袋盛之類於麴上然後槩和勻類於蛇上用紙封缸口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨為末每服酒一盞溫服蛇末少許仍將酒脚并糟做餅食之尤佳

治身上癩瘡

右以蒼耳子葉煎湯洗之

太醫院經驗奇效良方卷之五十三

太醫院奇效良方卷之五十四

論

夫醫之用藥如將之用兵諺云千軍易得一將難求決勝者良將也良醫者良醫也知兵之勝出於良將之機謀知人之病出於良醫之診視有軍無將則軍不能自勝有方無醫則藥不能自効蓋醫者人之司命也脉者人之大要也蓋醫家苟不明脉則如真行索途動致顛覆矣人生其間雖病萬有不齊究其所以莫非運氣之所為也故醫之運氣猶儒之論理工之規矩鑑之光衡之權舍之將何以焉蓋其道博其旨玄其法精其機妙知其要則一言而盡不知其要則流散無窮且如醫之十三科其中大方脉婦人科小兒科風科必先診脉後對證處方獨瘡科之流多有不診其脉候專攻治外或有證候疑難別刀方脉診於瘡科之輩甘當淺漏之名噫其小哉夫瘡腫之生皆有陰陽不和血氣壅滯若不診視何以知陰陽勇怯氣血聚散耶由是觀之治瘡瘡腫診候之道不可闕也是以素問難經靈樞甲乙及扁鵲仲景華佗叔和千金外臺聖惠總錄古今各醫諸家方論中診候瘡科之詳至矣盡矣今遵前人之書略其瘡科之脉開列于後

浮脉之診浮於指下按之不足舉之有餘再尋之狀如大過散者心也浮而短濡者肺也浮而數者熱也浮數之脉應發熱其不發熱而反惡寒者瘡疽之謂也
洪脉之診似浮而大按舉之則泛泛然滿三部其狀如水之洪流波之湧起其主血實積熱瘡腫論曰脉洪大者瘡疽之病進也如瘡疽結膿未成者宜下之膿潰之後脉見洪大則難治若自利者不可救治也

滑脈之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然滑也其
主或為熱或為風此陽脈也瘡疽之病膿未潰者宜內消
也膿潰之後宜托裏也

數脈之診按之則呼吸之間及六至其狀似滑而數也若浮
而數則表熱也沉而數則裏熱也又曰諸數為熱仲景曰
數脈不時見則生惡瘡也又曰肺脈俱數則生瘡也診諸
瘡洪數者裏欲有膿結也

散脈之診似浮而散按之即散而欲去舉之則大而無力其
主氣實而血虛有表無裏瘡腫膿潰之後而煩痛尚未痊
退者診其脈洪滑者散難治也以其正氣虛而邪氣實也
又曰肢體沉肺脈大即整謂散者也

乳脈之診似浮而軟按之中央空兩邊實其主血虛或為失
血瘡腫之病診得乳脈潰膿後易治以其脈病相應也

長脈之診按之則洪大而長出於本位其主陽氣有餘也傷
寒得之欲汗出自解也長而緩者胃脈也百病皆愈謂之
長則氣治也

牢脈之診按之則實而弦且沉且浮而有牢堅之意若瘰癧
結腫診得牢脈者不可內消也

實脈之診按舉有力而類結曰實經曰邪氣勝則實又病則
虛人得此最忌瘡疽之人得此宜急下之以其邪氣與歲
府俱實也

弦脈之診按之則緊而弦其似緊者為弦如按弦而不移緊
如繩而轉動以此為異春脈浮弦而平不時見則為飲為
痛主寒主虛瘡疽論曰弦洪相搏外緊內熱欲發瘡疽也
緊脈之診似弦而緊按之如切繩而轉動其至切痛積癰也
瘡腫之氣血沉滯也亦主痛也

細脈之診按之則微而細其主虛也其氣復者生邪氣
而欲變證也

微脈之診按之則軟小而微其主虛也其氣復者生邪氣
瘡者危瘡腫之病潰後微而勻舉自瘥也

疾得之則善新疾得之則正氣虛憊瘡腫得之潰後自瘥
脈之診按之則遲而稍駛於遲仲景曰陽脈浮大而濡陰
脈浮大而濡陰脈同等謂之緩脈見長緩百疾自瘥凡諸

瘡腫潰後其脈濡遲者皆易愈以其脈候相應是有胃
氣者也若乳則瀉血瀉堅大實按之不減而有力者中焦
有結伏在胃也微浮者積不消動心悸也

尺主下焦腰腎膝胫足中事也尺脈浮者風熱小便難也沉
者腰背痛而腎氣不足數者膝下熱痛小便赤色而惡寒
也遲者下焦寒而陰虛也緊者膝下小腹急痛也緩者脚

弱下腫而痿痺也伏者小腹痛而疝瘕較不化也細者溲泄
而下冷也沉者小便澀而而下注也牢而小者足膝寒痺
脚下隱也而痛也細者急者筋攣不能行也來而絕者

男子小腹有滯氣也婦人月水不利也

瘡瘍當分歲府

經曰諸痛痺瘡皆屬心火又云營氣不從逆於肉理乃生癰

腫以云膏梁之變足生大方又云熱脈血則為癰膿又云地之
濕氣感則害人皮肉筋脈東垣謂濕氣外傷則營氣不行榮衛
者皆營氣之所經營也營氣者胃氣也運氣也營氣為本此逆
不行為濕氣所壞而為癰也但癰論中多言二熱相搏熱
化為膿有言熱化為膿者有言濕氣生癰寒化為熱而為膿者
此皆瘡疽之源也當者是何部分所發所用之藥引經而先兼
見次之以脈別之是陰是陽用藥在乎王治宜以先瀉其榮治
瘡之本若不次序本逆而助火濕熱相合敗壞肌肉而為膿血
者當分而治之且如一歲之中火熱無過四五月之間是時諸
物皆不壞爛者六七月之間濕令大行之際近取諸身濕熱在
身豈不敗壞肌肉此理明矣大抵瘡瘍之疾經云六腑不和而
結為癰要分臟腑之屬經絡之異六陰六陽之經有多氣少血
者有多血少氣者有多氣多血者不可一槩論之經言癰者榮
衛稽留於經脈之中則凝而不行則衛從之而不通壅遏而不
得行故熱天熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然此不能隨骨
髓不為焦枯五臟不為傷故曰癰疽者熱氣純盛下陷肌膚筋
骨髓枯內運五臟血氣竭其毒下陷筋骨及良肉故曰疽疽者
皮堅上如牛領之皮癰者皮薄上以澤之是知癰者壅也六府
不和之所生淺而大也疽者阻也五臟不調之所致深而惡也
六府主表其氣淺故癰皮薄而腫高五臟主裏其氣深故疽皮
厚而腫堅皆滲着厥府見於肌肉管氣不從氣血壅阻而生也
其所出之道有異者邪毒從虛而出也假令太陽經虛從背出
少陰經虛從腹出陽明經虛從鼻出督脈經虛從腦出餘者從
經所出取焉今富貴之人不知其節以飲食炙煖高梁厚味醇
酒辛辣之物日久大過其氣味俱厚乃陽中之陽不能走空竅
先行其道反行隊隊適於肉理則濕氣六勝則令子母實火乃

大旺打火一度必冠腎水腎既受火積火水之則從濕熱
之化而上行其膏爰出背出腦此為六府之最重者也若毒氣
見於肺部之分或脾胃之分次也或見於他經又其次也或患
濕毒流注止處無不潰爛故經曰高粱之變足生大疔受火持
虛如持虛器以受物也無不受治大疔之法必當瀉其營氣以
標本言之先受病為本非苦寒之劑為多則不能除其苦楚疼
痛也諸瘡瘍性性多以乳香沒藥加以熱劑治之此理未為穩
當若使經絡流通去其毒府之壅滯佐以寒涼之劑其瘡自愈
是以河間論瘡毒者火之屬須分內外以治其本若其脈沉實
當先疎其內以截其源也其脈浮大當先托裏恐邪氣入內也
有內外之中者邪氣至盛過截經絡故發癰腫此因火於托裏
及失疎通又失和其榮衛治瘡之要須以疎利為先次以托裏
和其榮衛此三法乃內外之攻也若脈沉實發熱煩躁外无瘡
赤疹痛其邪在內氣以深矣當疎其厥府以絕其源又謂喉
心煩脈沉而實腫硬不開而皮肉不變根深而病大邪亦在內
若厥府秘結急當疎利宜以黃連內疎湯加大黃服後以次序
調理若脈浮數癰腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托
裏宜以復煎散此為治法
一瘰癧馬刀經同證吳丹溪云夫瘰癧初發必起於少陽經不
守禁戒延及陽明經大抵食味之厚營氣之積曰毒曰風曰熱
皆此三端招引變換治之須分虛實若實者依法調治速厚味
發氣之物亦有愈者虛者誠為可慮以其屬膽經主決斷有相
火而且氣爰血少婦人若患此疾月經不調便作寒熱稍久變
為潮熱其證漸危自非斷慾息氣速疎味神仙不能治本草言
夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脈之功能透寒熱在
之以行散之葉加之以艾炙取其隨經之穴自然取效若何

之論瘰癧者經謂結核者是也或在耳前後連及頤頰下連頰
 盆背為瘰癧或在胃及胃之側下連兩脇皆為馬刀手足少陽
 主之此經受氣少血故多堅而少軟膿白而稀如米泔狀世俗
 治馬刀求其水清者可治殊不知此經多氣少血之故在乎診
 其虛實以調治之是以東垣治瘰癧馬刀以救若化堅湯或散
 腫潰堅湯主之外以臨泣穴灸二七壯此證並屬手足少陽經
 也惟瘰癧延及陽明之經故用藥有出入加減不同耳詳載於
 試効方中瘰癧馬刀皆形質發於部分而命名也巢氏病源載
 之三十六種千金聖惠所論瘰癧九漏總論說有風熱氣之三
 毒之異瘰癧結核寒熱之殊其本皆由熱氣逆憂思過甚風
 熱邪氣內搏於肝肝主筋故令筋畜結而腫或見於是何部分
 先以五香連翹湯或壯筋大黃湯疎下兩三行後服前藥調治
 外用十香膏馬刀膏貼之如或將瘰癧求瘰其將護忌慎治瘰之

法無造次焉

一肺癰肺痿內經云肺之癰喘而兩脇滿金匱要略又以肺癰
 肺痿並論辨之所謂熱在上焦者因熱為肺痿肺癰之病何從
 得之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被
 陳利之藥重亡津液故得之若寸口脈數其人欬口中反有濁
 唾涎沫者為肺痿之病共口中碎碎燥欬又胃中隱上痛脈反
 滑數此為肺癰欬唾膿血脈數虛者為肺痿數實者為肺癰夫
 肺者五臟之華蓋也處於胸中主於氣候於皮毛勞傷血氣虛
 理虛而風邪乘之內感於肺也則汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項
 強胃膈脹滿久久不瘥遂成前證若則瘰癧甚則癰聖惠曰中府
 隱隱而微痛者肺直也止肉微起肺瘵也中府者穴也在雲門
 下一寸六分乳肋間動脈應手陷中也是以候始萌則可救膿
 成則多死若欲知有膿者但診其脈若微緊而數者未有膿也

緊甚而數者已有膿也內經又曰血熱則肉敗榮衛不行必將
 為膿大凡肺瘵當咳嗽短氣胃滿時唾膿血又如粳米粥者
 難治若嘔膿而不止者亦不可治也其嘔膿而自止者自愈其
 脈短而濇者自瘥瘳大者難治面色當白而反赤者此火之尅
 金皆逆為不治治法此證不得則者葶藶大棗瀉肺湯千金方
 黃芪湯並皆主之全在脈理分之若毫釐之差千里之遠慎之
 慎之

一湯癰胃脫癰孫真人云率得腸癰而不曉其病候愚醫治之
 結則殺人腸癰之為病小腹腫而強抑之則痛小便便澀似淋時
 時汗出後惡寒其身皮甲聳然腹皮急大如腫狀其脈數者小
 有膿也其脈遲緊者未有膿也甚者腹脹大轉側聞水聲或透
 脐生瘡或膿從脐中出或大便如膿血故治之以大黃牡丹皮
 之類選而用之或外以灸法此腸癰之形證蓋可知矣胃脫癰
 者何以別之內經云人病胃脫癰者診當何如當胃脫沉細沉
 細者氣逆逆者人迎反盛則熱聚於胃口而不行故胃脫為癰
 也諸書少論此病惟孫真人言此後學以此論乃胃熱為邪治
 之初以疎利為先次以消毒托裏退胃熱此為良法不識病者
 誤人不淺可不慎之

一乳核失治必成癰疽丹溪云乳房所屬陽明乳頭厥陰所屬
 乳子之母或忿怒或厚味以致氣不流行竅不得通汗不得出
 則結為腫為痛陽明之經血熱則化為膿又有兒之口氣吹而
 吹熱次結成核初起時便煩忍痛條散令軟血脈通和自然消
 散失此不治則成癰癰精要以神効瓜蒌散治乳癰癰癰固是
 奴捷村落之靈藥恐未易得用蒲公英草此草在露田野路則有
 之三月開花黃似菊味甘解毒散滯氣入陽明大陰二經流
 淨細碾以忍冬藤濃煎入少酒佐之服之即効若疎厥陰之滯

氣以青皮清陽明之熱以石膏行瀉火以生甘草消腫毒以
 妻子或加青橘皮皂角刺金銀花當歸頭或湯或隨宜加煨佐
 以少酒仍加艾火兩三壯於腫處甚効切勿妄用針刀引惹抽
 病又有婦人積憂結成隱核有如驚棋子大不痛不痒或一年
 二年三五年者為瘡破陷名曰如癰以其似癰也似癰不可治
 矣若初起之時便須消釋病根更宜清心遠慮薄滋味全莫急
 怒調理自有可安之理若婦人經行得此輕若六十歲左右味
 至鬱結而形實七情所干性急不調結核前證自覺神思不佳
 不知食味便可用人參湯調青皮甘草末等分少入生薑汁細
 細呷之一日夜五七次其核自消若不早治隱至經年以後如
 勢不痛不痒必於乳下潰一穴出膿或經三五年雖飲食如舊
 洞見五內乃死惟無夫婦人生者多若有夫婦人生者蓋積氣
 之所流滯也故婦人夫乃婦之天得夫則陰陽和此證雖有而
 治自愈無夫婦人得其瘡者以其穴之最深其可畏哉此者
 必須早治必經歲月九死一生有一初嫁之婦患此只以青皮
 耳草煎湯常服立安又一婦人十八歲得此證者性急脈實所
 難者姑且與青皮一味煎湯與之間以加城四物湯服之不月
 而安學者前人用青皮乃厥陰之藥四物湯行血分之功信有
 理哉又有五發及諸瘡十三疔痔漏陰瘡時毒等證精義備載
 其詳今略癰疽治醫之法條列于後

瘡科通治方
 內托羌活湯 治疔瘡生癰堅硬腫痛大作
 羌活 黃蘗 酒釀各 防風 當歸尾
 藥本 連翹 蒼朮 陳皮
 甘草 灸 肉桂 三分 黃芪 五分
 右作一服水一鍾酒半鍾煎至八分食前服

白芷升麻湯 治臂上生癰

白芷 五分 升麻 桔梗 各一 生黃芪 三錢

酒黃芩 四錢 紅花 甘草 半錢

當歸枯痛湯 治一切風濕熱毒漫漉瘡瘍下注濕毒脚膝
 生瘡赤腫裏外糜瘡膿水不絕或痒或痛

方見脚氣門

內托升麻湯 治婦人兩乳間出黑頭瘡項隔下作黑眼并
 乳癰初起亦治

升麻 葛根 連翹 當歸身
 黃蘗 各二 黃芪 三錢 肉桂 五分 牛旁子

甘草 灸 各一
 右作一服水一鍾酒半鍾煎至一鍾食後服

羌胡通經湯 治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀

羌胡 當歸尾 生甘草 連翹
 黃芩 牛旁子 京三稜 桔梗 各一

黃連 一錢 紅花 少許
 右作一服水二鍾煎至一鍾食後服亦治瘰癧此是攻裏

內消之劑

郭氏升麻牛旁子散 治時毒瘡發於頭面胃膈之際

升麻 牛旁子 桔梗 葛根
 玄參 蘇黃 甘草 各一 連翹 二錢

中和湯 治時毒瘡腫

羌活 川芎 葛蒲 牛旁子
 防風 荆芥 漏蘆 麥門冬
 前胡 甘草 各一

附子 <small>炮去皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 羌活 <small>錢各半</small> 益智	丁香 沉香 木香 茴香	陳皮 甘草 <small>錢各</small>	右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服	內疎黃連湯 治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便閉脈洪實者	黃連 當歸 芍藥 橫柳	木香 枳實 枳殼 枳實	右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服	托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈洪弦實數腫甚欲作膿者	大黃 <small>三錢</small> 當歸 <small>二錢</small> 瓜蒌根 皂角刺	牡蠣 朴硝 連翹 <small>錢各半</small> 金銀花	赤芍藥 黃芩 <small>錢各</small>	右作一服水酒各一鍾煎至一鍾食遠服	破棺丹 治諸熱腫一切風熱瘡證發熱多汗大渴便閉澀	語結陽之證	大黃 <small>生一兩半</small> 芒硝 甘草 <small>各一</small>	右為細末煉蜜和丸如彈子大每服半丸病重者一九至二九食後童便入酒化服或白湯入酒化服亦可	瀉心湯 治瘡毒癰腫發燥煩渴脈實洪數者	大黃 <small>四錢</small> 黃連 山柰 漏蘆	澤蘭 連翹 黃芩 蘇木 <small>錢各半</small>	犀角 <small>一錢</small>	右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服	五香連翹湯 治諸瘡腫初覺一二日便厥逆寒發寒熱
--	-------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	-------------	-------------	--------------------	------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------	--	---	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------	------------------------

乳香 木通 大黃 <small>錢各半</small> 連翹	沉香 木香 獨活 桑寄生	丁香 射干 升麻 麝香	甘草 <small>錢各</small>	右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服	清涼膏 治初患癰腫瘡癤熱焮疼痛消腫毒	大黃 <small>不消</small>	右為細末用漿水調攤貼之醋摩亦得	三香湯 治毒氣入股托裏若有異證於內加減	丁香 木香 沉香 乳香 <small>錢各二</small>	麝香 <small>三分</small>	右作粗末作一服水一鍾半煎至七分空心服若嘔者去麝香加藜香一錢湯者加入參一錢	托裏護心散 治諸疔腫發背曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐而痛可服二三服	乳香 <small>明淨者</small> 真萊豆粉 <small>四兩</small>	右研細和勻每三錢不拘時甘草湯調服	定痛托裏散 治一切瘡腫疼痛不可忍如年久氣實先用疎利後服藥	粟殼 <small>去筋膜</small> 川芎 當歸 白芍藥	乳香 沒藥 <small>錢各半</small> 官桂 <small>一錢</small>	右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服	乳香止痛散 治一切瘡腫疼痛不止	乳香 沒藥 <small>錢各</small> 丁香 <small>五分</small> 粟殼	白芷 陳皮 甘草 <small>錢各</small>	右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服
--------------------------------	--------------	-------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------	-----------------	---------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--	------------------	------------------------------	---------------------------------	---	----------------	-----------------	---	----------------------------	----------------

黃芪人參湯 治諸瘡破後食少無味及有惡熱穢氣所觸者 黃芪二錢 人參 白朮 麥門冬	蒼朮 陳皮 升麻 五味子	當歸身 黃柏炒 甘草各一 炒麵五分	右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服	竹葉黃芪湯 治疔腫諸瘡發熱而渴 淡竹葉 黃芪 人參 麥門冬	生地黃 川芎 當歸 芍藥	黃芩 石膏 半夏 甘草各一	右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服	聖愈湯 治諸瘡血出多而心煩不安不得眠睡此亡血也 川芎 當歸身 生地黃 熟地黃	人參 黃芪各二	右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服	內補黃芪湯 治諸瘡腫發背已破後虛弱無力體倦懶言語 食無味少腫脹滯自汗口乾並宜服之 黃芪 人參 茯苓 麥門冬	川芎 當歸 白芍藥 熟地黃	官桂 遠志 甘草各一	右作一服水二鍾煎三片紅棗一枚煎一鍾食遠服	羌活散 治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥者 羌活 獨活 明礬 白蘚皮	硫黃 狼毒各一 輕粉二錢 白附子	黃丹 蛇床子各半	右為細末油調成膏搽之	烏蛇丸 治一切風癬多年不瘥者
---	-----------------	----------------------	----------------	-------------------------------------	-----------------	------------------	----------------	--	------------	----------------	--	------------------	---------------	----------------------	---	---------------------	-------------	------------	-------------------

烏蛇酒浸 白附子炮 附子 天麻各二	全蠍炒 羌活 乳香 殭蠶各一	苦參十兩 槐花半斤	右為細末用生薑汁一斤蜜一斤二味同熬成膏入藥和 凡如梧桐子大每服三四十九空心厚溫酒送下夜晚荆 芥湯送下	內托升麻湯 治婦人乳中結核 升麻 連翹 青皮 甘草節各二	瓜蒌仁 三錢	右作一服水二鍾煎至一鍾食後細細呷之	連翹 川芎 瓜蒌仁 皂角刺	橘葉 青皮 甘草節 桃仁各二	右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服	牡丹湯 治腸癰小腹腫痞按之痛小便如淋時時發熱自 汗惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血淋數者已成 不可下 牡丹皮 瓜蒌仁各一 芒硝 桃仁各二錢	大黃 五錢	右作一服水二鍾煎一鍾去滓入硝再煎數沸不拘時服	薏苡仁湯 治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不食小便澀 婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服 薏苡仁 瓜蒌仁各三 牡丹皮 桃仁各一	右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服	神仙蠶藥丸 治腸癰內托神妙此藥不問老幼皆可服之無 不作效最止痛不動臟腑
----------------------	----------------	-----------	--	------------------------------------	--------	-------------------	---------------	----------------	----------------	---	-------	------------------------	---	-----------------	---

黃蠟 <small>半兩要黃色者</small>	白礬 <small>者如研</small>	右熔化黃蠟和礬為丸如梧桐子大每服二十九漸加至三十九食遠用溫白湯送下
雙鮮散	治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼痛	川大黃 <small>三錢</small> 澤瀉 牽牛 白芍藥
桃仁 <small>去尖</small> 辣桂	甘草 <small>各</small>	右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食前服
復原通氣散	便毒初發用此	南木香 延胡索 天花粉 <small>酒浸</small> 船上茴香 <small>炒</small>
白牽牛 <small>炒</small> 白芷	當歸 甘草 <small>各一兩</small>	青木香 <small>半兩</small> 穿山甲 <small>酒浸炙</small>
敷藥方	治便毒腫痛	右為細末每服二錢食前溫酒調服木香湯亦可
雄黃	乳香 <small>各二</small> 黃柏 <small>一兩</small>	右為細末用新汲水調敷腫處自消
牡丹散	治肺癰胃乳間皆痛口吐膿血氣作腥臭	牡丹皮 赤芍藥 地榆 若梗
薏苡仁	川升麻 黃芩 生甘草 <small>各半</small>	右作一服水二鍾煎至一鍾食後服
排膿散	治肺癰吐膿後宜服此排膿補肺	嫩黃芪 川白芷 北五味 <small>炒</small> 人參 <small>各等分</small>
香白木散	寬中和氣滋益脾土生肺金進美飲食	沉香 木香 乳香 丁香 白茯苓 白扁豆
薏苡仁	山藥 桔梗	

太醫院經驗奇效良方大全 卷五四

蓮肉	縮砂 粉草 <small>各一兩</small>	右為細末每服一錢空心用紫蘇鹽湯調服或淡亦可有汗加浮麥煎湯調服
單方	治面目身體生斑或痒或癢子僅起不即治甚殺人	右用羚羊角燒為灰研令極細以鷄子清和塗之極神驗無鷄子水和塗亦妙
治諸瘡腫不散者	右取白藥根爛搗傅貼乾則易之無生者用末新水調塗之亦得	牛旁粥方 治瘡腫
將軍鐵箍膏	治諸惡毒瘡紅腫突起用藥箍瘡四圍不令滋蔓走疔毒氣	南星 大黃 蒼耳根 鹽霜白梅 <small>各一</small>
草烏	白欬 防風 川芍 <small>各半</small>	右為細末先以蒼耳根搗碎爛和餘藥調成膏如乾入醋調得所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留瘡高突處如藥乾以鷄子蘸水掃之日換二三次大妙
治諸瘡腫馬毒瘡	右以馬齒莧水煮冷服一升及塗瘡止治濕癬白禿以馬齒莧和灰塗之効治緊唇面腫搗汁塗之各用乾末水調塗治丹毒發背腫搗傅之不任者以藍靛和之更佳治多年惡瘡搗爛傅之尤良治三十六種風結瘡取馬齒莧一石水二石一釜煮之澄清內蠟三兩重煎之成膏塗瘡上	

并服之	加味當歸飲子 治諸瘡瘍諸疔瘡皆為心火火鬱則發之
當歸	生地黃 升麻 防風
荆芥穗	何首烏 此胡 白芍藥
川芎	羌活 黃芪 紅花
蘇木	甘草
右吹咀每服五錢水二盞生薑三片煎至八分食遠服冰	
浴取微汗効速使血氣通和服之應効	
麝香輕粉散 治血疔瘡陰蝕瘡耳疔瘡一切惡瘡皆治	
麝香	輕粉 乳香 沒藥
白礬 飛過各	
右為細末量瘡乾貼	
葵花散 治一切瘡	
葵花	鬱金 黃連 黃蘗
硫子仁 各等	
右為細末冷水調成膏貼瘡痛處神効	
神秘方 治一切瘡已潰者及炎貼之無痂生肉去膿	
右用地黃汁一升松脂二兩薰陸香一兩羊腎脂及牛酥	
各如鷄子大先於地黃汁煎松脂及香令消即內羊腎酥	
更用蠟半鷄子大一同相和以慢火煎令水盡膏成去滓	
塗帛貼瘡日一二易	
當歸和血散 治瘡瘍未發出內痛不可忍及治婦人產前產	
後腹痛	
當歸 二錢 乳香 半錢 沒藥 半錢 白芍藥 三錢	
右為細末每服一錢水一中盞煎七分和滓溫服日二婦	
人酒煎瘡既發不須用瘡痒者加人參木香婦人服之加	

赤芍藥	百合散 治頤頰瘡一名揭背瘡
百合	黃蘗 白芨 單麻子
右為末用朴消水和作餅貼之日三五次	
迴瘡金銀花散 治瘡瘍瘡甚色變紫黑者	
金銀花	黃芪 甘草
右吹咀用酒一升同入壺瓶內閉口重湯煮三兩時夜取	
出去滓頓服之一方無黃芪	
二金散 治大人小兒蝕透頤頰初生如末豆名含頤瘡	
鷄內金	鬱金
右等分為末先用鹽漿盪漱了貼之	
芙蓉傳方 治頤頰腫痛或破成瘡	
芙蓉葉	
右為細末每用乾貼之如神	
拾時從證 至元壬午有人王伯祿年五十有七右臂腫盛	
上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微脈證俱寒	
藥湯醫醫和視之曰此乃附骨癰開發也運以熾起之	
膿清稀解待日肘下再開之加吃逆不絕步和與丁香柿	
蒂湯兩服稍緩待日咳逆尤甚自利臍腹疼痛腹滿飲食	
減少時發昏憤於左乳下黑蒸露灸三七壯又處以乾姜	
治蛇纏瘡	
右用雄黃研為末以醋調塗仍用酒調服凡為蛇傷及伴	
蠶蜈蚣毒虫類大所傷皆可用之	
鷄內金散 治敷道邊生瘡久不愈者	
右用鷄內金不拘多少即是鷄內去下黃皮燒灰存性	

1. 續修四庫全書 第 16 版 反內

附子木香沉香茴香羌活類藥吹咀一兩半欲與服或者
 曰諸痛痒瘡皆屬心火又當益暑之時用乾薑附子可乎
 予應之曰理所當然不得不然內經曰脉細皮寒瀉利前
 後飲食不化此謂五虛吃逆者胃中虛極也諸腫瘡瘍皆
 屬心火是定理也此證內外相反須當捨時從證非大方
 辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲食進
 蒼勢溫膿色正彥和又與五香湯數服月餘平復憶守常
 者按人之見知變者大事知常而不知變知事因而取敗
 者亦多矣况醫乎守常知變豈可同日而語哉

毛裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下
 痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短促吃逆不絕不得
 安卧時有昏愈

丁香 沉香 茴香 蒼智仁

陳文 木香 羌活 乾薑 附子
 甘草 黑附子 羌活 附子 乾薑 大辛
 內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫以附子乾薑大辛
 熱溫中外發陽氣自裏之表以為君羌活苦辛溫透關節
 炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐吃逆不
 下食益智仁丁香沉香大辛熱以散寒為佐瘡氣內攻氣
 聚而為滿木香茴香陳皮苦辛溫治痞散滿為使也
 右吹咀作一服水三盞生薑五片煎至一鐘去滓不拘時
 溫服心一切冷物

連翹散聖湯 治耳下至缺盆或至有上生瘡堅硬如石動之
 無根名曰馬刀從手足少陽經中來也或生兩脇或已流
 膿作瘡未破者皆治之

連翹 黃芩 生用 芍藥 當歸尾

京三棱 切到 廣茂 切到 月三發氣製一草龍膠 製四
 黃芩 酒製 黃連 酒製 蒼朮 酒製 上瓜根 酒製
 此胡 二錢 甘草 錢三

石件一半為末煉蜜和丸如粟豆大每服一百丸或百五
 十九一半咬咀每服半兩水一盞八分浸半日煎至一盞
 去滓臨睡熱服頭下脚高去枕而卧每口作十次嚥留一
 口送下丸藥畢如常

此胡連翹湯 治男子婦人馬刀瘡

此胡 連翹 知母 酒製 黃芩 各半兩
 黃蘗 酒製 生地黃 甘草 各三錢 當歸尾 一錢
 中桂 三分 牛勞子 二錢 瞿麥穗 六錢

右剉如麻豆大每服三錢或五錢水二大盞煎至一盞去
 滓食後稍熱時服之

消腫湯 治馬刀瘡

此胡 黃芩 生用 各黃連 牛勞子 炒各
 黃蘗 瓜蒌根 各一連翹 三錢 當歸尾
 甘草 錢一 紅花 少許

右吹咀每服半兩水二大盞煎至一盞去滓食後稍熱服
 忌酒濕麵

重洗方 凡諸發及癰疽瘰癧瘡湯鹽火燒等疾或有別作
 一種穢臭氣息不堪聞者最是惡證或已破未破或小或
 大皆當作急治之可用忍冬藤一握細細用無灰酒濾汁
 服之以俾傳瘡四圍用雲母膏別研亦可剪開大口以護
 其瘡之上埃其瘡出膿便以穢指蹄湯等十分淨洗久洗
 為妙洗一二時辰不妨次用後藥蒸之

好降真香末 楓香末

右二味於鉢中攪熔丸如彈子大却取香爐一枚依爐口造紙煙筒一箇如燒龍涎香樣慢火燒之煙以煙筒口熏瘡上不拘丸數稍倦暫止然後更熏未出膿者即出已出膿者即乾直候生肌合口然後止向後有赤腫脚癩又再熏大藥效丹去穢氣也

四生散 治風氣上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下症陰濕四肢燥癢遍體生瘡及婦人血風瘡

羌活 黃芪 白附子 沙苑蒺藜

右等分為細末用猪腰子一枚切開去筋膜入藥少許於內濕紙裹炮熟再入藥三錢浸酒調藥并腰子嚼碎令盡服三五服後只用益酒調亦可或腰子一枚分兩次用羊腰猪腰皆可推猪羊者為妙

千金托裏散 治一切瘡腫發背疔瘡

黃芪 厚朴 防風 桔梗 各二錢

連翹 木香 沒藥 乳香 各二錢

當歸 川芎 白芷 芍藥 各二錢

官桂 人參 甘草 各一兩

右為細末每服三錢酒一大盞煎三二沸和滓溫服

治疔瘡

黃連 羌活 青皮 白僵蠶

防風 獨活 蟬蛻

細辛 赤芍藥 甘草 各等分

右吹咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許薑十錢重同搗爛熟酒和服然後用酒水各半盞薑三片煎服病勢退減後再加大黃少許煎服略下一二行筋去餘毒更用白梅蒼耳子研爛貼瘡上按去根脚

返魂丹 治十三種疔瘡

珠砂 膽礬 各一兩 血竭 銅綠

蝸牛 生用 各一兩 雄黃 白礬 各一兩 沒藥

蟾酥 各半 麝香 少許 輕粉 半

右將蝸牛蟾酥研爛餘藥研為細末同研和丸如鷄頭實大每服一九令病人先嚼葱白三寸吐在手心內將藥丸裹在葱內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即瘡如不能嚼將葱研爛裹藥服之極有功效

破棺丹 治疔黃走胤不止

當歸 赤芍藥 山梔子 牽牛 各一兩

連翹 牡蠣 金銀花 紫花地丁 各一兩

京三稜 甘草 各二兩 加大黃 三兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九食前用童子小便

便化開服忌酒生冷硬物

內托連翹散 疔瘡出時皮色不變及不疼痛按搖不動身發寒熱便是此瘡有水疔魚臍疔紫燕疔火疔諸般疔瘡如瘡黃於黃上用針刺仍服內托散自然消散

連翹 白芷 生地黃 赤芍藥 各一兩

大黃 去皮 黃芩 去頂 薄荷葉 各七錢 朴硝 二兩

黃芩 半兩 甘草 半兩

右為粗末每服一兩水一椀燈心竹葉煎七分其人喘加人參少許大病只三四服愈如服了心煩嘔用不二散止

不二散

右以甘草半兩豆粉一兩分作二服酸澀水下

立馬回疔丹 治疔瘡走胤不止

金脚信 蟾酥 血竭 珠砂

改藥記 各經粉 龍腦 麝香 一錢 右為細末用生草為頭汁和作錠如麥子大用時將瘡頂刺破將藥一錠放瘡口內第二日瘡腫是効	走馬疔 疔瘡 乳香 蓮砂 硃砂 雄黃 輕粉 三錢 片腦 分 麝香 少許 右為細末蟾酥汁和為丸如黃米大每服一九溫酒送下奪命返魂散治一切疔瘡增寒發熱昏悶不語腫遍皮膚不思飲食並皆治之	大黃 連翹 山柘子 巴豆 杏仁 苦丁香 右為細末研勻每服半錢病重者服一錢用新汲井花水調下一服見効如病重無脈者與下藥約一頓飯時吐了藥便醫不得吐不了藥即活	滴滴金 治疔瘡 硃砂 輕粉 人言 雄黃 右為細末每用些少先以針刺開瘡頭貼藥黃水出効	疔瘡錠子 硃砂 白芷 雄黃 蒼耳子 右為細末用蟾酥汁和作錠子如前法用須五月五日合	回瘡錠子 治疔瘡大効 草烏頭 蟾酥 七粒 巴豆 七箇 麝香 一字 右為細末麪糊和就捻作錠子如有惡瘡透丁不痛無血
---	--	---	---	---	--

者用針深刺至痛處有血出以此錠子紮之上用膏藥貼之疔瘡四畔紮之其疔三二日自然拔出此藥最宜緊用此證大抵與傷寒類類其中亦有可針錄砭射出血者亦有久而敗爛出膿者其間變異百端不可不慎也	日本國傳治疔瘡塗方 巴豆 十粒 半夏 一枚 附子 半枚 蟻蛭 一枚 右各研為末以人糞相和者瘡大小作紙圈子圍瘡口以藥泥瘡上綸貼之一日三易	五聖散 治疔瘡 皂角 針 二兩 瓜蒌 一箇 大黃 金銀花 生薑 甘草 一 右吹咀用好酒二升同煎至八分去滓不拘時溫服又方以鐵衣末用人乳汁和傳之立可	玉山韓光方 治疔腫 右以艾蒿一擔燒作灰於竹筒中淋取汁以一二合和石灰如麪漿以針刺瘡中至痛即點之點三次其根自拔亦大神効正觀中用治三十餘人得瘥	蟾酥膏 治疔瘡 右取蟾酥以白麩黃丹搜作劑凡如麥顆狀用指甲搗動瘡上挿入重者針破患者以一粒內之仍以水沉膏貼之水沉膏 右以白艾末半錢水盞內沉下澄去水却於皮紙上攤開貼在瘡上	治一切疔腫懸癰 右用蒼耳根莖苗但取一束燒為灰醋汁藍靛和如泥洗以針刺瘡上及四邊數下令血出度藥氣可以入針孔中
---	--	--	--	---	---

即去血傳藥乾即易之不過數度即拔根出其未結膿者即內消也已結膿破潰者再用針刺只以藥塗之餘以忍口角上生疔腫造其子板家母為貼藥經十日不瘥餘以此藥塗之得愈常作此藥以救人無有不瘥者故特以傳後嗣丁腫方始有十首皆不及此雖齊州朱姥方亦不能勝此物造次易得也

治一切疔腫

右用蒼耳草又名羊負來草只用根紅嫩者搗爛無灰白酒調勻服次用鹽梅肉研爛以猪膽汁和塗瘡頂上其毒即散又先用好京墨以薑汁研爛用薑片蘸墨塗四圍腫熱處即効一方用蒼耳根菜童子小便絞取汁令服一兩日三或燒灰和臘月猪脂傳一方用苗葉搗汁飲之一方川子或葉或根研爛以米醋調塗腫處立散仍研汁服以瘡為度

治疔瘡

右於九月九日採芙蓉花葉陰乾研細用時以井花水調銀盒打成膏厚紙攤貼瘡上次日用蜘蛛螺即鬼丁螺一箇用銀器盛打破依前調藥却將蜘蛛螺放在瘡上貼待過週日揭起其疔自出立効其藥不要雜潤

治疔瘡

右用多年牆內或泥土中秀釘洗淨以炭火內煨紅醋淬待冷用刀刮去秀又入火內煨紅入醋淬仍前刮末再煨再淬再刮下末研為細末用時將瘡口撥開挑藥末在內以膏藥貼之少時如病深取疔如病淺即取出黑紫色血其瘡自愈

飛龍奪命丹 治一切惡疔瘡

半夏洗淨 珠砂 南星洗淨 人言二末
黃丹 血竭 乳香 沒藥
蓬砂 硃砂 巴豆十二粒 斑蝥十二粒
麝香半分

右為細末用猪膽汁和為丸如紅豆大五分中一分加斑蝥二箇人言少許為成錠子如半粒小麥大凡遇瘡針破見血下錠子一粒以飯粒白紙封護用藥一丸窩在舌上覺麻冷水下忌熱物片時重者隨服藥不必盡劑衝病即止一伏時貴水流山為病深先奔後疾先寒後熱如傷寒病狀忘方事并諸毒物魚腥凡病人眼見紅火光者難治如婦人胎乾用此兒乳汁化開為度
立馬回疔奪命散 治疔瘡及喉痺乳蛾腫痛大効
杜蠟 當歸 牛旁子 白蠟各半

大黃一兩

右咬咀每服半兩用青石磨刀水酒各一盞煎去滓連進二服疔瘡服後出汗者生無汗者死
治疔走了黃疔瘡將死者

杜蠟 大黃 山柰子 金銀花
木通 蓮翹 牛旁子 地骨皮
乳香 沒藥 皂角刺 瓜蒞

右各等分剉碎每服半兩氣壯者加朴硝用水一椀酒半椀煎一服定愈效命仙方也

芫花根膏 治魚臍疔瘡久治不瘥者

芫花根 二兩 黑豆 三合 猪牙皂角 五根 白礬 三兩
右用醋一斗將前三味先浸三日於釜中以火煎至二升去滓却入醋中煎至一升入白礬末攪令勻去火成膏但

是魚臍丹惡瘡粘於帛上貼日二易之

治魚臍疔瘡

韭菜

連翹

絲瓜葉

右八右鉢內搗爛如泥以酒和服以滓貼臍下如病在左手貼左臍下右手貼右臍下在左脚貼左臍右脚貼右臍如在中貼心臍並用布帛縛住臍內下紅線處皆白則可如有潮熱亦用此法却用人抱住恐其顛倒則難救

治疔瘡陰證脈沉四肢冷瘡不發

右用五香散去大黃加蒼耳蓮肉酸棗仁藿香茯苓黃芪

肉桂當歸防風白芷附子生薑半水半酒煎服以發藥性

如潮熱皮膚受毒加生大黃並胡地骨皮

如嘔逆脾胃受毒加丁香

如喘嗽肺經受毒加杏仁去皮知母桑葉紫苑

如眼花心經受毒加礞砂雄黃麝香

如脚冷腎經受毒加木瓜牽牛炒

如毒渴自汗肝經受毒加黃芩山梔

如大小便秘腹脹滿加枳殼炒木通苦葶大黃生用

治疔瘡陽證潮熱心間霍亂或瀉語六脈洪大

右用五香散熱不退而渴用不二散蛇床子大黃生為末

以冷酒或冷水調二錢止二服使微利

救生丹 治諸種疔瘡服內火光出昏迷不醒

右於三月辰日採桑葉葉用竹針穿成孔用紙裹風內

陰乾至端午日研為細末用蠶酥和為丸如小豆大用特

再以雄黃同藥一丸研細放右中汗出効

腫脂散 治反花瘡

具 胡粉各一 蓬砂

沒藥各半

右研細先以溫漿水洗拭後傳藥

甘草塗傳方 治反花瘡

甘草半生

礬石灰

人中白

蜜陀僧各半

右為細末以童子小便半盞以無灰火熬用竹篾攪成膏

取塗瘡上日五次

惡實根塗傳方 治反花瘡並諸瘡積年不瘥者

惡實根研末 猪脂二兩

右調和如糊塗瘡上日三四次

升麻湯 治心有風熱生浸滂瘡偏體

升麻

大黃剉

黃芩去黑

枳實炒

芍藥各一 當歸切

甘草半兩

右剉碎每服五錢七水一盞半燈心一握煎至一盞去滓

空心溫服

香攤瘡方 治面上耳邊生浸滂瘡有黃水出久不愈

殺羊鬚

荆芥

乾棗去核

右燒灰存性研勻入膩粉半錢同研極細每用少許清油

調塗先以溫湯淨洗拭乾塗藥二三次効亦治大人小兒

兩吻生瘡

鷄冠血塗方 治卒得浸滂瘡不早治則連身周圍能殺人外

蓋云浸滂瘡轉廣有汁多起於心

右以雄鷄冠上刺血塗傳日三五度

猪骨膏 治諸瘡口氣冷不瘥

猪筒骨二箇 松脂二錢 乳香另研 黃連去鬚

白芨研末 鉛丹別研 黃蠟各半

右搗研熔蠟和為膏不拘時傳之

乳香膏 治諸瘡久不瘥

乳香 另研 食鹽 松脂 杏仁 各一兩半

黃蠟 三兩 生地黄 三合 白羊腎 脂 半斤

雄黃散 治冷瘡暖瘡口

雄黃 研 百合 乳香 黃蘗 各去

墙上爛白虱子 小蚌 蛤子 是各一合

右為紙末研勻先用漿水煎甘草柳枝湯溫洗拭乾傳之

附子散 治冷瘡日夜發歇疼痛

附子 半兩 炮 川椒 去目 雄黃 細研 各一分 白礬 三分 火

膩粉 二錢

右為細末研勻每用清麻油調傳瘡上日二換

黃芪湯 治諸瘡退風熱

黃芪 剉 黃芩 去黑 麥門冬 去心 芍藥

甘草 炙 剉 各半 生地黄 四兩 半夏 薑製 當歸 切 焙

大黃 剉 炒 石膏 碎 芎藭 人參 各一

右剉如麻豆每服五錢七用水一盞半竹葉七片煎至一

盞去滓空心溫服日乾拜服

白蒺藜散 治熱毒瘡 疔 疔 心 神 墮 躁

白蒺藜 剉 去 白鮮皮 方風 去 蘆 川大黃 剉 炒

赤芍藥 梔子仁 子芩 麥門冬 去 心

玄參 桔梗 去 蘆 前胡 去 蘆 甘草 炙 剉 各一兩

右為細末每服二錢食後用薄荷湯調服

密陀僧散 治熱毒瘡臭爛久不生肌

密陀僧 雄黃 雌黃 定粉 各半

膩粉 三錢

右研為細末先用柳枝一握生甘草一兩槌碎以漿二升

煎六七沸去滓稍熱淋洗瘡淨拭乾傳之

白金散 治風毒攻注遍身及手足生熱瘡疼痛出黃水

右用桂府滑石為細末先用虎杖甘草豨豆各等分約半

兩許二桃煎上項藥至一桃去滓微熱淋洗瘡水冷拭乾

玉粉散 治熱汗浸漬成瘡腫痒焮痛

定粉 一兩 蛤粉 半兩 白石脂 白龍骨

石膏 各半 滑石 半兩 寒水石 燒通赤於淨地上

粟米粉 二兩

右為細末研勻每用此少乾察患處

七寶散 治熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃芪 當歸 防風 荆芥穗

地骨皮 木通 剉 二 白礬 一兩

右為倉末每用藥一兩水三大椀煎五六沸濾去滓稍熱

淋深患處拭乾避風少時東垣老人云此方城北獨柳在

之客舍有推江軸者皮膚皴裂不任痛兩手不能熱棘足

不能履地而輒止宿因製此藥與傳之即効明日遂行自

此累用要効

赤石脂散 治瘡子瘡破成瘡用此止痛生肌

赤石脂 細研 黃蘗 去 蘆 臘茶末 各半 白麩 二兩

右為細末研勻每用時綿搥之

龍腦粉方 治瘡瘡痒痛

龍腦 一錢 粟米粉 五兩

<p>玉女英 治癩瘡痒痛 滑石<small>半兩</small> 荳蔻粉<small>四兩</small> 右研勻以綿搥撲之一方有棗葉一兩</p>	<p>棟花粉傳方 治癩子癢痒 右用若棟花不拘多少焙乾為末入蚌粉滑石末各少許 研勻日頻搥之</p>	<p>治暑月汗漬腋下赤腫及癩瘡 右以膩雪水和蛤粉傳之立瘥</p>	<p>皂莢子<small>七枚</small> 大蝦蟆<small>乾者</small> 胡椒<small>十五</small> 右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火燒烟盡取出研細每 用藥先以溫漿水洗瘡口拭乾搽藥次以別膏藥貼之良</p>	<p>鉛丹散 治破傷入水腫潰不愈 鉛丹 蛤粉<small>等分</small></p>	<p>連翹 治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人血血風斑圓 點開爛成瘡痒流黃水汁 瓜蒞根 主乾地黃</p>	<p>荆芥 黃芩 赤芍藥 麥門冬 防風 木通 牛蒡子 山梔子 川芎 粉草<small>各等</small></p>	<p>秦縹菊散 治諸惡瘡 右吹咀每服四錢水一盞半燈心二十莖煎至八分去滓 不拘時服</p>
---	--	--------------------------------------	--	---	--	---	--

<p>桑縹菊 地龍 貝母 黃蘗<small>各半</small> 雄黃 乳香<small>一分</small> 糯米粉<small>二錢</small> 麝香<small>半錢</small> 雄黃 輕粉<small>各一</small></p>	<p>洗瘡藥 治諸般惡瘡 右為細末以新汲井水和沙糖調傳</p>	<p>貫衆 川芎 茵陳 地骨皮 荆芥 獨活 防風 地扁黃</p>	<p>甘草<small>各二</small> 當歸<small>三錢</small> 右吹咀水三椀煎三椀去滓連手洗之</p>	<p>黃芪 當歸 芍藥 瓜蒞根 甘草<small>各一兩</small> 瓜蒞<small>一對</small> 金銀花<small>二兩</small> 熟地黃<small>不拘</small> 皂角<small>棘為引</small></p>	<p>右吹咀每服半兩無灰好酒一升同引子裝入磁瓶內瓶 頭用茅葉封將瓶坐於鍋內上以火盆覆鍋口盆外以黃 泥封之勿令出氣蓋外開藥香為度取出瓶澄定飲清 將藥滓再添酒一升依前煎服若酒少若酒水各半煎服 瘡在上後臨臥服在下空心服此藥治病萬無一失神 驗如谷應聲常於五月五日脩合</p>	<p>托裏金銀地丁散 治諸惡瘡腫毒疼痛服之如神 金銀花 黃連 當歸 紫花地丁 赤芍藥 黃芪 人參 甘草節 桔梗 大黃<small>各半</small> 乳香 白檀香 連翹<small>各三</small> 子芩 梔子仁 女參<small>各二</small> 麥門冬<small>去心</small> 前胡 甘草<small>各一兩</small></p>	<p>右吹咀每服五錢水一盞酒一盞煎至八分去滓隨病上</p>
---	-------------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	--	-------------------------------

下濕服

紫花地丁散 治諸惡毒瘡腫癰如神

紫花地丁 當歸 大黃 赤芍藥

金銀花 黃芪各半 甘草節二錢

右咬咀每服一兩用水一盞酒一盞同煎至一大盞去滓

隨病上下服

桃花散 治一切惡瘡生肌活血治金瘡去風

烏魚骨 虎骨 龍骨各一 寒水石半斤

白石脂 赤石脂 白欬各半 黃丹少許

右入白芨半兩同為細末量瘡大小敷貼

洗藥

白芷 荆芥 姜蕤 何首烏

茯苓 苦參 川芎 白牽牛

防風 蔓荊子各一

右為細末用漿水四碗煎五七沸臨臥時洗淨塗後藥

塗藥

輕粉 白礬 舶上硫黃各等

右為細末用酥油調臨睡塗三次

增益四物湯 治一切惡瘡

川芎 當歸 芍藥 地黃

防風 荆芥 甘草各等 鳳尾草加入

右剉碎每服三大錢水一盞半煎八分去滓食前溫服

龍葵散 治諸惡瘡多出膿水不乾

龍葵子 景天 黃連 去毒 天靈蓋各一

龍骨 木鱉子 乳香 黃蜀葵花各半

右為細末入膩粉少許蜜調隨瘡大小紙攤貼之

萬寶代針膏 治諸惡瘡腫核赤暈已成膿不肯用針刺膿此

藥代之但用小針點破瘡頭却貼上膏與膿即自潰此秘

妙良方

蓬砂 血竭 輕粉各一 金頭蜈蚣一箇

蟾酥半錢 雄黃一錢 片腦少許 麝香一字

右為細末用蜜和為膏有瘡有頭處用小針挑破以藥些

小在然花上封貼次早其膿自出如腋下有要核兒名暗

疔瘡或有走核可於腫處用針挑破如前用之忌鷄羊魚

酒麪等物喫白粥三日為妙

初効方 治一切惡瘡醫所不識者

水銀 黃藥 黃連 松脂黃明

瓜粉 土蜂窠 有之或云關鑪窠甘草各等

右將水銀放掌中以唾津浸為泥入磁器中以生麻油和

研生絹濾如棉錫和藥末再研如稠飴先溫水洗瘡帛拭

乾塗之一切無名瘡塗一次即瘡有黃水者塗之隨手便

乾痒不堪忍有塗之立止痛甚者塗之立定治疥尤佳批

破傳藥

拔毒散 治諸惡瘡消腫去毒

天花粉 無名異 黃藥 黃芩

木鱉子 大黃 杜蠟各等

右為細末好醋調敷貼立効

為金膏 治一切惡瘡

桑枝 槐枝 榆枝 枸杞枝

桃枝 柳枝 右各長一尺粗如小指俱一寸截劈四破用油四兩炒令

焦黑濾去滓入蛤丹半兩蠟一兩後熬令黑色傾在磁合

內候冷以新汲水浸出火毒用塗瘡

熊膽膏

治一切惡瘡

熊膽一錢

膩粉半斤

雄黃研

麝香研各半錢

續柳研一

右研勻於蠟日用續柳膏一箇取汁和藥仍入在膽內用

綿繩繫定捺勻以松明黑烟熏過黑掛於陰處如惡瘡有

稍面大者用如黍米大貼之如錢大者用如菜豆大貼之

恐藥乾難貼薄以唾唾調如掃柳塗之仍用薄棗皮蓋貼

以帛子繫之藥不可多用

錢子

治惡瘡透不覺疼痛

銅綠一兩

桐砂二錢

煨酥一錢

右為細末軟米飯一盞擦勻煎作餅子如粳米樣每用針

刺之不覺痛者但有血出餅一錢子在內以膏藥貼之或

作散以紙蘸藥塗之

治蛇頭瘡

其形生時在手足上瘡傍一塊開如蛇口之狀痛

而流血不止者此藥治之

雄黃

蜈蚣

全蠍各一

右為細末者瘡濕癢開入藥搽在瘡上却以小油抹裁帛

栓住如乾小油調搽

一切惡瘡及沙虱水弩甲疽疼痛不可忍者

右用燒銀十枚端午日收搗為細末以油調傳之即易一

方取末以盞水調塗四圍如進葉潤一方用燒銀二枚取

腸肚安在紙中心四面以醋糊貼瘡上

乳香散

治遠年惡瘡

乳香

膩粉各半

黃藥去粗

龍骨

大黃

麝香一字

三錢

右為細末先以苦竹瀝洗瘡拭乾後上

水銀膏

治月蝕瘡多在兩耳上及癩傍隨月重蓋

水銀一分

胡粉研

松脂

黃連去粗為末

猪脂四兩

右先熬猪脂令沸下松脂諸藥末及水銀攪令勻磁盆盛

先以盞湯洗淨瘡塗傳日三五度

治膿瘡方

鼠糞

苦參

桃枝

杉樹刺

柳枝

松枝

麩醬

鷄子殼

皂角

雀糞

芍藥

木綿子

芝蔴

桑枝

蛇殼

鍋底煤

此當歸類

松明少

右并各四錢俱為細末先將松明燒碎和諸藥於瓦鉢中

搗一地坑將藥鋪安坑中四圍用火焚燔取出再研令勻

傳香自然蓋可忌一切發熱物

隔紙膏

治內外膿瘡

當歸

白芷

黃連

五倍子

雄黃

沒藥

血竭

海螵蛸

白芨

白飲

黃藥

厚朴半兩

黃丹六分

乳香半斤

輕粉一兩

右為細末研勻用清油調成膏用油紙貼藥傳瘡上絹帛

縛定有膿水解開刮去不潔再貼藥如此數次即愈須先

用燒湯洗淨片帛拭乾待片時水氣乾然後貼藥

治膿瘡久不愈

龍骨半斤

輕粉少許

檳榔半兩

乳香

沒藥各一

乾猪糞半兩

研碎

右為細末先以燒盡湯洗磨以軟絹吊拭乾清油調傳磨濕則乾膠之

白石脂 龍骨各半 白礬一斤 五倍子二兩 煇

黃丹三斤 雄黃少許

右為細末先將葱薑湯洗磨見赤肉然後將前藥傳磨上用藥如法厚者却用帛子包縛看不要動直候乾自脫去

治膿瘡

黃丹 輕粉 白芨 樟腦

敗船灰各等

右研細末以桐油調成膏攤在油紙袋內先煎溫葱湯洗淨以帛拭乾將藥置瘡上扎住用了一面番轉如前洗貼

一方無輕粉若用糞船灰亦妙

治膿瘡方

白芨 白欬 黃藥 黃丹另研各

右為極細末入輕粉些少研勻以煉蜜和成劑捏作餅貼瘡上無者填滿以帛片包扎一日一換後未瘡漸乾或有裂處只須乾膠以瘡為度

驅毒散

驅毒散 治腎虛風毒下注生瘡

右研極細末以帛拭去膿用些少乾膠日三四次瘡

翠玉膏

經青一兩 銅綠研 黃蠟各二 乳香研

右將銅綠以油調勻將蠟火上熔隔下紙燒勻次入乳

後末仍攪勻傾在河水盆內拌勻以油紙裹口嚼旋捏作餅子貼瘡以絲絹包直候瘡好其藥自脫

治血注脚

桑樹蘇 牛屎蘇又名石炭或生地上如有

肥棟樹蘇 胎髮男用男髮 女用女髮

右將三蘇焙乾各五錢胎髮燒灰存性三錢並為細末研勻濕則乾膠乾則清麻油調塗

治膿瘡方

冬青葉 臘猪膽 百草霜和勻

右將冬青葉與本人嚼爛先以葱椒湯洗淨瘡口以膽霜傳後却傳嚼藥在上三四次即可

奇妙梳子散

山梳子不拘多少洗淨 乳香另研各 輕粉少許

右研勻以磁器盛每用時先以葱白花椒煎湯洗淨瘡口候溫再洗但瘡口無膿水血絲清水各盡又用粉帛片拭

乾然後傳藥如乾者香油調濕者乾膠但將瘡口實滿軟絹帛護之堅硬不作膿者末可用腫如軟有膿者依前法再洗後傳貼之三二次即愈乃一藥二洗之功也

治足瘡方

趙子固母劉氏年八十左足而一瘡下連大指上延外踝以至膝骨每歲數發必兼旬累月昏暮甚甚

根搔癢時出血如泉流呻吟痛楚殆不可忍夜分即漸已明日復然每一更藥則瘡轉大而劇百試不驗如是二十

餘年洋熙甲辰仲冬之末先生為太府丞一夕母病大作相對悲泣無計因極能睡夢四神僧默坐一室傍有一長

榻子固亦坐因而發嘆一僧問其故子固答之以實僧云

可服牛黃金虎丹又一傳云砂亦好既覺煩驚異錢取
藥半粒強服之良久大痛舉家相相泣且悔俄而下福現
物如鐵石者數升是夕瘡但微痒不痛而無血數日成痂
自此遂愈殊砂之說竟不復試先生因圖僧像如坊夢者
而記其事金虎丹出和劑局方本治中風痰涎壅塞所用
牛黃龍腦腦粉金箔之類皆非若人所宜今乃取奇効意
熱積臟腑而發於皮膚歲久根深未易洗滌故假涼劑以
攻之不可以常論也神僧之夢蓋孝感云

牛黃金虎丹

牛黃 兩半 龍腦 五兩 膩粉 五兩 雄黃 五兩
白礬 五兩 金箔 八十片 天雄 炮去皮 兩
天南星 湯洗焙乾 二十五兩 研為末 用牛膽汁和作餅
天竺黃 五兩 子焙乾如無牛膽即用法同 蒸七晝夜 研

石馬細末煉蜜搜和每一兩半作十九以金箔為衣每服
一九新以水化下有孕婦人不可服

治瘰癧方

右用鱈魚數條黃色者尤佳打死先用油塗其腹下置瘡
上盤盞令過湯子繫定食頃覺瘡痛不可忍然後取鱈魚
看瘡下有針狀大瘻子皆也如未盡再以數條依上再
縛待魚去盡却用死人脛骨燒灰麻油調傅瘡上或以骨
灰一兩入好茶末二錢同糊亦可

治瘰癧方

右先以蔥白煎水敷湯洗淨瘡口筒布拭乾徐以輕粉末
搽上瘡口却用五靈脂黃藥各等分碾為細末涼水調貼
敷瘡上紙蓋定二三次即平復

治湯火傷

大黃 黃芩 黃連 山梔子
黃藥 知母 貝母 蜜陀僧
乳香 沒藥 輕粉 甘草
右為細末用鷄子清加蜜調不住手時掃之
清涼膏 治湯火燒此藥止痛解毒潤肌生肉
梔子仁 黃連 去鬚 白芷 各一
葱白 對 黃蠟 半兩 清麻油 四兩
右細判於油罇中煎地黃焦黑色綿濾去滓澄清却於罇
內入蠟慢火熬候蠟消傾於磁盆內用時以鷄羽搵少許
塗瘡上以塞為度
麻子膏 治火燒人肉爛壞
麻子仁 合取 柏白皮 柳白皮 山梔子
白芷 甘草 各二
右到細以猪脂一斤煎三上三下去滓以塗瘡上日三
黃藥散 治湯火傷
黃藥 大黃 朴硝 鷄子殼
寒水石 各等
右為細末用水調塗極効
止痛膏 治炎瘡及湯火傷日夜啼呼此藥止痛滅癢
松脂 羊脂 猪膏 黃蠟 各一
右取松脂破鉢中切脂嚼蠟膏松明上少項鉢內燒諸物
皆消以杯盛汁傅之松明是肥松節也
神效當歸膏 治湯火瘡初起癢癢熱毒侵展嫩赤痛毒氣壅
盛腐化成膿此藥斂口生肌拔熱毒止痛
當歸 黃蠟 各一 麻油 四兩
右將當歸入油煎令焦黑去滓次入黃蠟急攪化放冷以

磁盒盛用時以故帛子攤貼一方用白麩
栢葉散 治湯火傷

栢葉 梔子仁各一 胡粉研半

右為細末以羊髓五大合燉化和藥以木椎研三五百遍
一日三次塗之

鉛粉散 治湯火傷

右以鉛錫殼不拘多少炙焦黃色搗為細末用生油調如
膏傳之如水仍無痕一方以蜜水調傳之疼止不膿不
痂吳內翰君卿中隣家釜翻一小兒自頭至踵背傷急以
傳之啼立止遂無恙唯總傷隨手用即効少緩即不及當
預先合以備用耳

紫雪 治湯火燒疼不可忍或潰爛成惡瘡

右用松樹皮燒灰二錢澄青一分研為細末清油調傳濕

則乾慘忌冷水洗日三一方不用澄青以松樹皮陰乾為
細末入輕粉少許生油調傳如傳不佳細帛縛定即生肌

治湯火燒瘡

右以側栢葉入臼中溫搗令極爛如泥冷水調作膏傳傷
處以帛子繫定三二日瘡當斂仍成痂一方燒灰存性為
末以鷄子清調傳如乾再上或蜜調亦可或搗末以脂調
塗瘡上乾即易一方以山栢子葉爛搗塗傳

治湯火傷

右用霜后芙蓉葉桑葉等分陰乾研為細末用蜜調塗傳
之溫則乾瘡

鷄黃油 治湯火傷

右用鷄子煮熟去白用黃於銀石鍋內炒乾再炒直待都
化作油去火毒毛翎掃下入韶粉夜明沙為末香油調傳

川大黃二兩慎火草五兩	右各搗空之乾即再換	治遊腫流徧身赤色入腹即死方	右用生猪肉傳上數數換之其肉虫鳥俱不食矣惡甚也	玄參散 治癰腫始發熱毒氣盛寒熱心煩四肢疼痛	玄參 甘草半兩 石膏二兩 麥門冬三枚	前胡去蘆 枳實炒 人參去蘆 赤芍藥	黃芪 芎藭 生乾地黃	黃芩兩	右吹咀每服四錢水一中盞入竹葉二七片小麥一百粒煎六分去滓不拘時溫服	生地黃散 治發癰腫熱毒夾痛心神煩悶	生地黃二兩 川大黃兩 川升麻 地骨皮	當歸 黃芪 木通 赤芍藥	右為散每服四水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不拘時溫服	玄參 甘草一兩 赤茯苓半兩	連翹散 治癰腫瘡癤疥膿	連翹 防風三兩 羌活 白芍藥	黃芩去黑 玄參兩 人參 白茯苓去黑	桔梗炒 前胡去蘆 甘草一兩 黃芪兩	桑根白皮兩 右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日二	內消散 治癰腫結硬疼痛	人參去蘆 瞿麥 白欬 川升麻	當歸炒 黃芪 防風 黃芪
------------	-----------	---------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	------------	-----	----------------------------------	-------------------	--------------------	--------------	-----------------------------	---------------	-------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	-------------	----------------	--------------

沉香 甘草一兩 生薑各赤小豆一合	右為細末每服二錢不拘時溫水調服	解毒散 治癰腫瘡癤便宜服	犀角屑 川升麻 川朴硝 赤芍藥	木通一兩 石膏二兩 玄參 麥門冬去心	甘草半兩	右剉碎每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服	水澄膏 治癰腫	雄黃水飛 麝香拾二 黃連 黃丹水飛	黃藥 大黃兩	右為細末量所腫處用藥多少以新汲水半盞炒藥在內須更藥沉澄去其浮者水盡然后用槐柳枝燒藥數百餘轉如麪糊相似勻以小紙花攤藥貼腫處更以鷄翎蘸藥	水不住掃之	天南星膏 治風毒癰瘡	天南星一兩 厚黃藥半兩 赤小豆一分	皂角燒灰存性	右為細末以新汲水調成膏皮紙貼之已結即破未結即散之豈効	牡丹散 治腸癰冷證腹痛而痛時時利膿	牡丹皮 人參 天麻 白茯苓	黃芪 木香 當歸 川芎	官桂 桃仁各三分 白芷 蘇合仁	甘草二兩	右為細末每服三錢用水一鐘煎至七分食前溫服	梅仁湯 治腸癰寒急腹痛大便閉結
------------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------------	------	------------------------	---------	-------------------	--------	--	-------	------------	-------------------	--------	----------------------------	-------------------	---------------	-------------	-----------------	------	----------------------	-----------------

梅核仁四十九箇 大黃二兩 牡丹皮三分

冬瓜仁四兩 芒硝半兩 犀角磨半

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服以

利下膿血三兩行為度

大黃湯 治腸癰少腹墜硬腫大如掌而熱按之則痛其上色

或赤或白小便稠數汗出增寒其脈遲緊者未成膿如脈

數則膿已成

大黃剉碎 牡丹皮 硝石研 芥子

桃仁湯浸去皮尖雙 右剉碎每服五錢水二盞煎至一盞去滓空心溫服以利

下膿血為度未利再服

四聖散 一名神效瓜蒌散 治腸癰疔疽生於腦鬚背腋乳便

毒服之神効

生黃瓜一箇 粉草研末 沒藥研末

乳香研末 右用好紅酒二大碗慢火煎至一椀分作兩服兩日服盡

大便順導惡物妙若乾瓜蒌則用兩枚一方若病在上食

後服病在下食前服毒已結成即膿化為水毒未成即於

小便中出爽甚再合服以退為妙

桔梗湯 治男子婦人欬而胃膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥煩

悶多渴時出濁唾腥臭名曰肺癰小便赤黃大便多澀

桔梗 貝母 當歸酒浸

瓜蒌仁 枳殼炒 薏苡仁炒

桑白皮 甘草節 百合葉

防己去粗皮各一兩 北五味子

黃芪各一兩半

甜葶藶 地骨皮 杏仁各半兩

知母 右剉碎每服四錢水一盞半生薑三片煎七分不拘時溫

服咳者加百藥煎熱加黃芩大便秘利加煨大黃少許小

便澀甚加木通車前子煎煩燥加白茅根煎咳而寒甚加

人參白芷煎

四順湯 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶咳嗽

貝母去心 紫苑去苗 桔梗炒各

甘草半兩 右搗篩每服三錢水一盞煎五七沸去滓不拘時稍冷月

如咳甚加去皮尖杏仁三枚同煎小兒量減

治肺癰方 右用薏苡米為末糯米飲調下或入粥內煮喫亦可一方

用水煎服當下膿血便愈

瓜蒌散 治便癰等惡毒 金銀花 牛旁子炒各

瓜蒌一箇 甘草各半兩

生薑 右將藥不犯銅鐵器搥碎用酒一大升煎數沸空心溫服

微利為度

三物湯 治便癰 大黃 山梔子各等

牡蠣 右為末酒水一大盞煎七分露一宿空心溫服

治外腎癰瘡 枳殼炒 輕粉各等

抱鵝卵殼 右為細末用煎過清油調塗

治腎癰

右為細末用煎過清油調塗

枳殼炒 輕粉各等

抱鵝卵殼

右為細末用煎過清油調塗

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

內托黃芪柴胡湯 治附骨癰

黃芪 二分 柴胡 一分 羌活 半升 連翹 三分

官桂 三分 黃藥 二分 生地黃 一分 土瓜根 酒製

當歸尾 七分

右咬咀作一服水三盞酒一盞同煎至一盞去滓熱服宿

食消盡服一服而愈昔賈德茂男年十歲丁未四月十一

日於左腿近膝股內出附骨癰不辨肉色漫腫皮濇木硬

瘡勢甚大其左脚乃肝之脾土也更在足厥陰肝經之分

少便足太陰脾經之分其脉左三部細而弦按之緩而微

有方一亦無黃藥

右用黃芪酒煎湯 治附骨癰

黃芪 當歸尾 柴胡 升麻 七分

連翹 肉桂 黍粘子 絡黃藥

甘草 右咬咀好糯米酒一盞半水一大盞半同煎至一大盞去

滓溫服空心有食消盡服之待少時以早饑壓之使不令

大熱上攻中上二焦也丁未季春二十二日蒲度主老羊

七十因寒濕地氣得附骨癰於左腿外側足少陽膽經之

分微侵足陽明分闊六七寸長一尺堅硬漫腫不辨肉色

皮濇深但行步作痛以指按至骨大痛與藥一服立止再

日堅硬腫消

犀角湯 治石癰熱毒三盛腫硬疼痛口乾煩悶

犀角 水香 連翹 梔子仁

射干 當歸 升麻 亦為藥

玄參 枳殼 甘草 大黃

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右用石解熱水磨服

右劉碎每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時溫服
黃連散 治石癰結硬發熱赤色毒氣攻衝未定日夜疼痛
宜用此消腫化毒止痛

黃連 川大黃 生 白欬 馬牙硝

黃藥 駢麟竭 青藍 赤小豆 炒

杏仁 四十九粒 湯

右為細末蜜水調塗乾即易之

大黃散 治石癰腫硬疼痛心腹煩悶不得宣腸

川大黃 炒 兩 川芒硝 黑豆皮 枳殼 去穢 炒

牛蒡子 微炒 當歸 芎藭 甘草 半兩

右劉碎分作三服每服水半盞煎至五分去滓不拘時溫服以利為度

治石癰堅如石未作膿者

右用生商陸根不拘多少熟搗傅之乾即易取軟為度及

治溫漏諸癰癩疔人用此方取効者多

為藥湯 治胃院積熱結聚為癰

赤芍藥 石膏 犀角 麥門冬

蒼朮 木通 枳殼 升麻

玄參 甘草 生

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓不拘時溫服

雄黃散 治癰疽赤腫疼痛未得膿潰貼成膿

雄黃 細研 黃藥 檳榔 川大黃

麒麟竭 麝香 黃連 白芷 二分

木香 芎藭 桂心 當歸 三分

右為細末用臘猪脂調令勻塗於綿上貼腫處候膿潰后即用膏藥搜膿生肌

玄參散 治癰腫成膿水不能下食心煩口乾煩渴飲水多四

版麻 玄參 黃連 去鬚 五瓜根 麥門冬 去心

赤芍藥 白鮮皮 升麻 三分 川大黃 劉炒

火麻仁 川朴 硝 兩

右劉碎每服三錢水一中盞入生地黄一分細切同煎至

六分去滓不拘時溫服

葛根散 治癰腫熱盛口乾煩渴或時乾嘔

葛根 黃芩 升麻 麥門冬 去心

瓜蒌根 赤芍藥 梔子仁 生地黄 劉炒

黃芩 三分 甘草 半兩

右劉碎每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

沉香散 治癰膿潰已絕肌肉內腫尚有餘熱

沉香 劉 柴胡 去苗 黃芪 麥門冬 去心 兩

白朮 二分 熟地黄 二兩 黃芩 瓜蒌根

甘草 半兩

右劉碎每服四錢水一中盞入竹葉二七片小麥五十粒

煎至六分去滓不拘時溫服

人參散 治癰疽內虛不足

人參 白朮 白茯苓 枸杞子 劉

熟地黄 黃芪 劉 桂心 白芍藥

當歸 微炒 甘草 半兩

右劉碎每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不拘時溫服

黃芪散 治癰潰后補虛去客熱 黃芪 石膏 劉 知母 麥門冬 去心

白芍藥 白茯苓 桂心 熟地黃
人參去蘆 川升麻各一 甘草炙各半兩

右判碎每服四錢水一中盞煎六分去滓溫服日三四服
猪蹄湯 治一切癰疽腫毒消毒氣去惡肉凡瘡有口便須用
此湯洗

香白芷 不見火 黃芩 去心 赤芍藥 露蜂房 取有蜂
當歸 去蘆 羌活 生甘草 各等分

右為粗末看疽大小用藥如疽大加料用先將積猪前蹄
兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分作二次盞去面上
油花盡下面滓肉每次用藥一兩投於汁中再用文武火

煎十數沸去滓以故帛蘸藥湯溫上徐薄攤瘡上死肉惡
血隨洗而下淨洗訖以帛乾乾仍避風忌人口氣吹之有
狐臭人并月經見行婦人猶犬血不許入病人房洗瘡勿

勿以手觸着洗疽之方所傳甚多唯此方極效其用露蜂
房有理蓋以毒驅毒也

去水膏 治癰疽破穴后誤入皂角水及諸毒水以致疼痛
糯米粉 砂糖各三 甘草生末

右為膏攤在絹上貼毒水而出膿馬及尿糞一切毒水並
皆治之

麥門冬湯 治癰疽潰后膿水不絕
麥門冬 去心 黃芪 剉 五味子 炒 白茯苓 去黑皮

人參 去蘆 官桂 去粗皮 當歸 切 遠志 去心

芍藥 剉 甘草 炙 三分

右次咀每服五錢水一盞半入生薑半分碎大棗二枚
芽破同煎至一盞去滓空心溫服

清水膏 治癰疽及一切毒腫堅硬腫痛攻衝四畔嫩腫抽熱

毒散腫氣 羊桃根 川大黃 黃芩 蔓豆粉

黃藥 各一 赤小豆

右為細末用芸薹菜取自然汁入蜜少許相和調藥令稀
稠得所即看四畔腫赤處大小煎生絹上勻攤可厚一錢
貼之乾即易

水調膏 治癰疽毒熱赤嫩疼痛
川大黃 研生用杏仁去皮 藍花 各三分

右為細末研勻以新汲水和令稀稠得所旋即塗腫上乾
即易之

乳香 治發背及一切疽瘡潰爛痛不可忍
乳香 別研 沒藥 別研 羌活 五靈脂

獨活 各三 川芎 當歸 真桑豆粉

交趾桂 川白芷 白膠香 各半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯送
下手足損痛不能起者加草烏用木瓜煎湯細嚼下

漏蘆湯 治疔作後二日服此退毒下膿可與五香連翹湯相
間連日服之

漏蘆 有白 連翹 大黃 微炒 黃芪 生用

沉香 剉 甘草 生用 兩

右為細末每服二錢水一盞半生薑三片棗一枚煎湯食
前調服

四虎散 治發疽腫硬厚如牛皮按之痛
天南星 草烏頭 半夏 生用 狼毒 各等分

沉香湯 治石疽腫毒結硬口乾煩熱四肢拘急不得卧

沉香 防風去義 水香絡三 麥門冬去心	當歸切焙 枳殼麩炒 獨活去蘆 羚羊角屑	升麻 玄參 地骨皮 赤芍藥	甘草一兩 生剉各 大黃二兩	右剉碎每服四錢水一盞半煎至七分去滓不拘時溫服	漏蘆湯 治附骨疽 漏蘆去蘆 升麻 連翹 麻黃各一兩	防已 木香 白斂 沉香各二	大黃兩半 兩半	右剉碎每服五錢水一盞半入竹葉七片煎至七分入芒硝一錢攪勻去滓空心溫服取利三兩行未利再服	應痛丸 治走注疼痛疑是附骨疽者 蒼朮去皮 當歸 黑牽牛 草烏頭一兩	丹砂膏 治瘰癧 右為細末醋糊為丸如小豆大每服三十九空心醋湯下	丹砂細研 射干 天黃剉炒 犀角屑	前胡去蘆 升麻 芎藭 黃芩去黑心	沉香 木香各一 生地黄二兩 麝香研分	豬脂半斤 右除丹砂麝香豬脂外剉碎以醋半升和勻浸一宿先熬脂令沸次下諸藥煎候地黃赤黑色以綿絞去滓入丹砂麝香末以枚心攪勻效盒盛傳患處日三五上又取棗大以溫酒調空心日午服一方溫水調下半匙	枳實湯 治瘰癧 枳實 升麻 射干 熟地黃	黃芩 升麻 射干 前胡三分 大黃一錢
-----------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------	--	---	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---	----------------------------------	--------------------------------

犀角六分 麝香二分	右咬咀每服以水九升煮取三升下大黃一沸去滓內麝香分三服	射干散 治瘰癧皮肉中忽生點子如麻豆大或如桃李腫痛不可忍 射干 川升麻 枳實麩炒 川大黃剉微	甘草一兩 生剉各 麝香細研 前胡去蘆 羚羊角屑 三分	右剉碎入麝香令勻每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服	防風湯 治風毒中人留血脈不散與榮衛相搏結成風疽身體煩熱昏冒腫痛 防風去義 柴胡去苗 白芷 麻黃去根節煎	木通剉 當歸切焙 羌活去蘆 附子炮去心	桔梗炒 甘草炙略	右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後臨臥各一服如欲出汗空心併兩服後以熱薑稀粥投蓋覆取汗慎外風	海桐皮散 治熱毒風結成疽腫痛不得安 海桐皮剉 五加皮剉 獨活去蘆 慈苳仁炒	防風去義 乾蟬炒 杜仲去粗皮 牛膝去苗酒浸	生地黄三兩	右咬咀生絹囊貯以好酒一斗五升浸於磁瓶中密封秋夏三日春冬七日取食前溫酒三合或四五合不拘時甚者常氣相續	松脂膏 治頭瘡經年不瘥 松脂 黃連三兩 黃芩 苦參略
--------------	----------------------------	---	--	-----------------------------	---	------------------------------	-------------	--	---	--------------------------------	-------	---	--

<p>蛇床子 一分 大黃 白礬 半兩 水銀 半兩</p> <p>胡粉 半兩 研合水入山 水 右為細末研勻用臘猪脂調傳瘡上大効</p>	<p>貝母 半夏 生 南星 五倍子</p> <p>白芷 黃蘗 苦參 各半 魏丹 半</p> <p>椎黃 一合</p> <p>右為細末先以蜂房白芷若參大腹皮荆芥煎湯熏洗拭乾即用蜜水調傳兩三次後乾修藥</p>	<p>加味平胃散 治一切惡瘡頭上瘡</p> <p>右平胃散入酥粉清油調傳之甚妙</p>	<p>標頭散 治頭上生瘡俗曰粘瘡絕妙方</p> <p>海標頭 二兩 白膠香 輕粉 各半</p> <p>右為細末研勻先用清油潤瘡后修藥只一上可</p>	<p>治頭極痒不痛生瘡方</p> <p>鷄鳴膏 五合</p> <p>右以好醋和膏煮三兩沸日二三次塗之</p>	<p>搜毒散 治脚爛瘡</p> <p>竹蛀屑 搜燒灰 紅棗 性存 黃丹</p> <p>白礬 粉</p> <p>右等分為細末修之</p>	<p>龍骨散 治脚疽并久遠惡瘡他藥不効者</p> <p>白龍骨 二斤 輕粉 半斤 檳榔 研 錢</p> <p>須猪糞 不以多少新瓦上焙乾入火中燒</p> <p>右研和勻先以口含蓋水或溫盪湯洗令瘡淨見肉却以真麻油調藥隨瘡大小傳之未愈再傳三五日可</p>
--	--	---	--	--	---	---

<p>百草膏 治脚面惡瘡如相流浸延漫及治一切惡瘡不問乾濕痛痒日近年深百藥不瘥者</p> <p>右用羊糞二三十粒留瓦上四畔炭火燒烟住火筋餅於地上以盞覆存性羅城白灰研細以紗片篩去沙土麻油調敷瘡入輕粉痛入麝香少許即効</p>	<p>神效散 治足大指角急為甲所入肉便刺作瘡不可着履靴脚指濕爛婦人有此</p> <p>右用礬石一物燒汁盡取末着瘡中令惡肉生好肉細細割去甲角旬日即差一方加黃少許同研修之</p>	<p>治脚指縫爛瘡</p> <p>右用鴉掌皮燒灰存性為末傳之</p> <p>治男子兩足癢痒生瘡連年累月俗為腎風瘡宜服此藥</p> <p>黃芪 牛膝 各半 羌活 獨活</p>	<p>川芎 防風 木香 白附子 各一</p> <p>白茯苓 去兩</p> <p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心益湯送下仍以後方藥傳之</p>	<p>搗搗 木香 防風 白芷 各一</p> <p>白芨 一錢 龍骨 五分 煨 麝香 另研 蛇退 燒灰</p> <p>臘粉 筒 五</p> <p>右為細末研勻先以鱈魚一條燒碎百部一兩切碎南極三銖油一兩煎令得所去藥只以油搽瘡口却傳末藥上以油繼搽之三日一換每上藥時先用柳枝并草煎湯洗瘡淨拭乾傳藥</p>	<p>雄腦膏 治諸凍瘡久不瘥年年發歇先痒后痛然右腫破出黃水及血出不止</p>
---	---	--	---	--	--

雄雞腦 <small>一兩</small> 黃蠟 <small>各等</small> 清油 <small>燻半</small>	右同於慢火上熬成膏去滓磁器盛每用塗瘡上
柏葉膏 治瘰癧手足指欲墮以耳欲落	柏葉 <small>枝</small> 乾葛 <small>兩</small> 杏仁 <small>四</small> 天皮 <small>研</small> 頭髮 <small>一</small> 黍 <small>食</small> 益 <small>兩</small>
乳香 <small>研</small> 分 黃蠟 <small>一兩</small> 油 <small>一升</small>	右先煎油沸次下前五味藥待藥盡再下黃蠟燒勻磁盒
收先以熱小便洗瘡以綿拖乾後以藥塗即以軟帛裹勿令寒氣侵入每日一換如瘡漸痊三四日一換	橄欖散 治脚凍瘡
右用橄欖核燒灰存性為末入輕粉油調塗	拔毒散 治毒瘡生於手指赤腫堅硬俗呼為發指撒骨疼痛不可忍者
乳香 <small>少許</small> 泥蜂窠 <small>壁間採</small>	右為末用醋調塗乾則以醋潤之痛立止
治惡指諺云天蛇頭	銀鈿 <small>一條</small> 燒
右以烟熏病指一二次即安	松脂膏 治肉刺
松脂 白膠香 <small>各一</small> 黃蠟 <small>半兩</small>	右於火上燒成膏冷貼用物繫定
無食膏 治肉刺	無食子 <small>三枚</small> 肥皂 <small>一</small> 梔 <small>一</small>
右燒令烟盡細研以醋醋於砂盆內別磨皂莢如糊和末傳之立效	薰硫散 治肉刺
薰陸香 石硫黃	

雄雞腦 <small>一兩</small> 黃蠟 <small>各等</small> 清油 <small>燻半</small>	右等分研勻塗肉刺上以燒銀烙之效
雄雞腦 <small>五</small> 酥 <small>半</small> 湯 <small>一</small> 酥粉 <small>一</small>	右將雄雞腦於盆子中以酥粉同和令勻先用針撥破頭邊然後塗藥裏裏之
雄雞腦 <small>一</small> 黃蠟 <small>一</small> 油 <small>一</small>	治甲疽疔皮厚腫痛
雄雞腦 <small>半</small> 黃連 <small>研末</small> 酥粉 <small>各半</small> 蚌蛇膽	右研勻用臘猪脂調先以針刺破皮煎湯洗瘡乾傳藥以油紙外裹更以綿帛裹之三日其刺肉刺甲皆當自落三日一換
白礬散 治男子婦人血風毒氣攻手足指生甲疽瘡久不瘥	若勞肉暴指甲疼痛出血不定用此藥肉乾瘡
白礬 石脂 <small>各半</small> 麝香 麒麟竭	朱紅 <small>各</small>
右將白礬石脂於鐵器內以炭火煨過入後三味同研令細每用少許乾瘡瘡上以帛子纏定日兩三更換之	蛇黃散 治甲疽腫爛脚指甲邊肉出時瘡時發又治嵌甲生入肉常出血疼痛
雄黃 <small>半兩</small> 雄雞皮 <small>燒灰存</small>	右同研細先以溫泔洗瘡上軟以尖刀割去甲角乾傳藥以軟帛裹半日許藥濕即易一日即除痛便止一方用漿水洗淨以棉刺撥破患處藥洗貼藥
雄雞腦 治瘡疔	雄黃 <small>通明</small> 雄雞 <small>三箇</small> 煎 <small>末</small>

右研勻濕者乾修乾者用津入輕粉少許調塗
黃蠟膏 治冬月手足折裂

右用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎熔入光
粉五倍子末少許燻令稠紫色為度先以熱湯洗火上烘
乾即用藥傅以紙貼之其痛立止入水亦不落若合藥入
粉多則硬而成塊旋以火炙動挑傳不妨一方無五倍子
治脚跟皸裂痛不可忍

右用五倍子為末同牛骨髓調破器盛埋地中七日取出
填縫中即安

遇仙無比丸 專治瘰癧

白朮 防風 黑牽牛 半炒

密陀僧 郁李仁 湯泡斑蝥 同炒去米不用

甘草 五錢

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服二十九早晚煎甘
草檳榔湯送下服至一月覺腹中微疼於小便中取下瘰

子毒物有如魚目狀已破者自合未破者自消

連翹湯 治馬刀瘡

連翹 瞿麥 各一兩 大黃 三兩 甘草 二兩

右剉碎每服五錢煎服十餘日可於臨泣穴灸二七壯服
五六日效一方加

大黃 水通 貝母 各五兩 雄黃 七錢

檳榔 五兩 不用甘草

右為細末每服二錢食遠調服

編蝠散 治瘰癧多年不瘥

編蝠 一箇 貓頭 一箇

右同燒作灰撒上黑豆煨其灰骨化碎為細末濕即乾搽

乾則油調傳內服五香連翹湯効

白花蛇散 治九漏瘰癧發於項腋之間或痛或不痛

白花蛇 酒洗去皮 生犀角 二兩 牽牛 半炒

青皮 五兩

右為細末每服一錢入臍粉半水研勻五更糯米飲調服
已時下惡物乃瘰癧之根也更候十日再服一服忌發風

熱毒物已成瘡者一日可効

四聖散 治瘰癧服白花蛇散轉利后服此調之末去其根

海藻 洗 石決明 煨 羌活 瞿麥 穗 各等

右為細末每服二錢茶湯調下清水盡為度

螺灰散

大田螺 連殼燒

右為細末破者乾貼未破者香油調傳

散腫潰堅湯 治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或至
肩上或於肋下皆手足少陽經中及瘰癧通於頰或至頰

車堅而不潰在足陽明經中所出或二瘡已破乃流膿水
並皆治之即時服藥斟酌病人飲食多少大便硬以意料
之則可

知母 酒洗 黃柏 酒炒 瓜蒌根 酒洗 昆布

桔梗 半兩 廣茂 洗炒 京三稜 酒洗 連翹 三兩

升麻 六分 黃連 白芍藥 葛根 二兩

當歸 稍 柴胡 甘草 半兩 草龍膽 四兩

黃芩 稍 酒洗 半兩 生

右吹咀每服六錢水二盞先浸多半日煎至一盞去滓熟
服於臥處伸足在高處頭微低每啜一口作十次嚥至服
畢依常安臥取藥仕胃中停畜也

畢依常安臥取藥仕胃中停畜也

畢依常安臥取藥仕胃中停畜也

另積半料作細末煉蜜為丸如棗豆大每服一百丸或百五十丸此藥湯留一口送下更加海藻半兩炒

荔枝膏 治瘰癧

荔枝肉 一兩 輕粉 麝香 白豆蔻

川芎 砂仁各半 硃砂 龍骨

白竭 乳香各一 全蠍五分

右將荔枝肉搗爛軟米飯和為膏者瘡大小攤貼如有三五箇者止去點為頭者妙

治瘰癧

右先於瘡上灸三壯然後用藥漬作瘡口用新活鱧魚截長一指大批開就掩在瘡口上少時覺瘡內痒急揭起魚鮓魚上有細蟲如馬尾一節蟲出如搗三五次取盡蟲子后用飲瘡口藥

龍腦 乳香各一 麝香 粉霜

雄黃 輕粉各半

右為細末水糊為丸如小麥大每用一九二丸紐在瘡口內覺腫痛是効

瞿麥散子 治瘰癧馬刀並治

瞿麥穗 半斤 連翹 一斤

右為粗末水煎臨臥服此藥經効多不能速驗宜待歲月之久除也

治鼠瘻

貓兒頭 一箇 麝香 一水

右為細末清油調傳

海藻丸 治瘰癧生於頭項上交接各蛇盤瘻宜早治之

海藻菜 燒麥 白蠟 蘇合 蘇合

右等分為細末海藻菜燒炒研篩湯包白梅取肉城半用所泡湯為丸每服六七十丸食后煎米飲送下其毒自大便內泄去若與淡菜連服為妙蓋淡菜生於海藻上亦治此病忌食腐鷄羊酒麪日五六服

治瘰癧不問有頭無頭者

右用大蜘蛛五箇曬乾細研酥調如面脂日二度傳之蜘蛛用屋簷頭結網者其他不可用

又方 用黃鯢魚破開入草麻子二三十粒在肚內以綿線定於廁坑內放冬三月春秋二月夏一月取出洗淨用黃泥固濟文武火煨帶性爛研為末香油調傳及治瘰癧

治瘰癧結核

黃芪 七分 玄參 八分 苦參 牛房子 各九

枳實 大黃 羚羊角屑 麥門冬 各五分

連翹 人參 青木香 蒼耳子

升麻 茯苓 甘草 桂心

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大以酒下十九日夜三四漸加至二三十丸以知為度忌生冷猪肉海藻菘菜生葱

酢蒜陳臭等物 琥珀膏 治頸項瘰癧初發如梅子腫結硬強漸若連珠或穿穴膿潰肌汁不能經久難瘥漸成瘻疾並皆治之

琥珀 細研 丁香 木香 各三 桂心 半兩

硃砂 細研 白芷 當歸 木鼈子 去殼

防風 去蘆 木通 各半 黃丹 七兩 垂柳枝 三兩

右除琥珀丁香桂心硃砂木香為細末餘藥細剉以酒浸

一宿入鍋中以慢火煎候白芷焦黃漚出次下松脂末漚
去滓再澄清油却入鍋中慢火熬下黃州以柳木篦不住
手攪令黑色滴水中成珠不散有軟硬得折入琥珀等末
攪勻磁器盛用時膏大小用火增紙上勻攤貼

蜂房膏 治熱毒氣毒結成瘰癧
露蜂房 灸 蛇退 灸 玄參 蛇床子
黃芪 劉各 杏仁 半 兩 亂髮 雞子 卵 子

右先將前五味劉細綿裹用酒少許浸一宿勿令酒多用
油半斤內杏仁亂髮煎十五沸待髮消盡即綿濾更下鍋
中然後下丹蠟又煎五七沸即瀉出於磁盆中盛取點膏
上一日一換

鷄鳴散 治氣癰瘰癧及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者
牽牛 一 兩 胡粉 一 兩 大黃 二 兩 朴硝 三 兩

右為細末每服三次鷄鳴時并花水調服以利為度如未
利再服

祛風丸 各有首烏丸 治風毒瘰癧
何首烏 乾薄荷葉 玄參 各 四 兩 精羊肉 半 斤
皂角 三十 餅 用 十 挺 火 燒 去 骨 十 挺 塗
右以皂角水煮肉使爛細研和藥為丸如梧桐子大每服
二十九空心溫酒或薄荷湯送下 一 方 煉 蜜 丸 無 羊 肉 食
右溫水下

橫痃散 治氣毒瘰癧心膈壅悶不下飲食
橫痃 前胡 去 薑 赤茯苓 牛蒡子 各 一 兩
人參 去 薑 枳殼 炒 白 沉香 防風 各 一 兩
甘草 劉 分

右劉碎每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓
空心及晚食煎溫服

水紅花飲 治瘰癧腫核結硬不消及膿汁滲穿不瘥
右用水紅花不以多少一半炒一半生用粗槓篩每服二
錢水一盞煎七分去滓溫服食後臨臥日三好酒調亦可

又方 治瘰癧已破未破或膿血淋漓其效如神
牡蠣 火 煨 不 以 多 少 用 更 煎 若 上 以 三 斤 甘草 二 兩
右研勻每服二錢食后以建茗同煎日二服忌魚酒鮮醬
油薑海味等物

射干 連翹 玄參 赤芍藥
木香 升麻 前胡 山梔仁
當歸 甘草 炙 略 大黃 炒 二 兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓入芒硝少許食后
溫服日再服

瓜蒌子散 治瘰癧初腫疼痛寒熱四肢不寧
瓜蒌子 微 炒 連翹 何首烏 皂莢子仁 微 炒
牛蒡子 微 炒 大黃 微 炒 白螺殼 蛇子仁
漏蘆 牽牛 微 炒 甘草 生 兩

右為細末每服二錢已食後溫酒調下

黑靈散 治漏瘡
牡蠣粉 號丹 硫黃 研 各 露蜂房 劉 二

右同炒令烟盡為細末入髮灰一分麝香少許和勻傳之
馬齒莧膏 治一切瘰癧
馬齒莧 陰 乾 臘 月 燭 燻 臘 月 臘 灰 一 斤
右為細末以臘猪脂和先以溫酒清洗淨拭乾然后以藥

傳之日三

治漏瘡

右以五倍子末和血竭末塞之

治腸下生漏瘡如牛眼之狀膿水不止

右以鹽少許安白牛耳內然後取耳中垢以傳瘡上即瘡

如不用鹽即牛耳不痒難取垢

海藻无 治瘰癧通用

海藻洗晒 川芎

當歸

官桂

白芷

細辛

藿香

白欬

昆布洗晒

明礬

海蛤

松蘿

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後含喉下

守嬰丸 治瘰癧結硬

通草 杏仁

牛旁子 昆布

射干

訶梨勒

海藻

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後含化日三

海藻酒方 治頸下卒結核漸大欲成瘰癧

右用海藻洗去鹹一斤酒二升漬一宿取一二合飲之酒

盡將海藻曝干搗末酒調一錢七日三日差如浸用絹袋

盛了漬春夏二日秋冬三日

木通散 治頸下卒生結囊欲成瘰

木通

松蘿

桂心

蛤蚧

白欬

琥珀

海鹽

昆布

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

治忽生瘰疾及一二年

右用萬州黃藥子三斤頂緊重者為上如輕蓋即是他州

者力須加一倍以無灰酒一斗投藥在內固瘰口以

燉火燒一伏時待酒冷即令患者時飲一盞勿令絕

酒氣經三五日常把鏡自照覺消則停飲不尔令人項細

也用火時不可多惟燒酒氣香出瓶頭有津即止火不待

經宿也已酸如神忌毒食

五嬰丸

菖蒲

海蛤

白欬

續斷

海藻

松蘿

桂心

倒掛草

蜀椒

半夏

神麴

羊靨

右為細末以牛羊脂隨為丸如芡實大每服一丸食後及

臨卧含化服

白頭翁丸 治氣瘰氣瘰

白頭翁

昆布

通草

海藻

連翹

玄參

桂心

白欬

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸用酒送下忌

蒜麪生葱猪肉

針砂方 治氣瘰

右用針砂浸於水缸中一日飲食皆用此水十日一換針

砂服之半年自然消散

昆布散 治瘰氣結腫胃膈不利宜服

昆布

海藻

松蘿

半夏

細辛

海蛤

白欬

甘草

龍膽草

土瓜根

檳榔

右為細末每服二錢食后溫酒調下

治瘰氣膈壅塞頸項漸羸宜服此方

商陸

昆布

射干

羚羊角

木通

海鹽

杏仁

牛房子一及半

右吹咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

治癩氣神驗方

琥珀

桔梗各半

烏賊魚骨

昆布洗各

赤小豆

酒浸小麥

酒煮各

右為細末煉蜜和丸如小彈大綿裹一丸常食燕津

水黃散 圓腫毒

犀角屑

大黃

白芨

草烏皮尖

白欬

麝香

朴硝各等

右為細末蜜醋調薄攤油紙上貼之稍乾揭下再添潤溫貼之即消

外用潰毒藥 治諸腫毒堅硬不消

升麻

薑根

黍粘子

地骨皮

金銀花

黃花地丁

甘草各等

右為細末每用五七錢水一升煎十沸於腫處四畔熱用冷則再煖

加味消毒飲子 治唇腮腫

防風

荆芥

連翹

牛房子

羌活

甘草各等

右為細末水煎三兩服散毒然後用藥塗腮腫處切勿不可便用藥塗毒氣入喉中不救

圓腫方

草烏

白芨

白欬

黃柏

朴硝各等

右為末用藥醋調圓腫外即便收起

內托散 治諸腫毒惡瘡一服立愈

大黃

牡蠣各半

瓜蒌子二箇山煎

甘草三錢

右剉碎每服三錢水一大椀煎七分去滓溫服無名腫毒或背疽治法腫圍定名鐵井欄

芙蓉葉重湯

蒼耳端午前收

燒灰存性

右為末以蜜水調敷之

神効方 治疔腮及癰疽發背瘡癤等證並皆治之

右以赤小豆為細末以新汲水調敷瘡上及四邊亦腫處乾則再傳之

乾則再傳之

犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱口唇頰車髮鬢腫痛及鼻額間連頭痛不可開口雖言語飲食亦相妨

犀角七錢

川升麻半兩

防風

黃芩各三錢

香白芷

白附子

川芎各半

羌活三錢

生甘草半錢

右吹咀都作一服水五盞煎至三盞半去滓分作三服一日一服訖其證必減如臟腑有些滯不妨足陽明胃經也經云腸胃為市又云陽明多血多氣胃之中脘瘦五味無所不納如市廛無所不有也六經之中血氣俱多腐熱飲食之毒聚於胃故此方以犀角為主飲食之毒陽明經絡環唇狹口起於鼻交頰中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙昔王公患此一經亦以升麻佐之餘藥皆除風熱升麻黃芩專入胃經故用有効

如水設 治風邪熱毒壅滯肌肉榮衛不宣蘊積成腫血溢膚

腫如丹之狀風隨氣行遊無定處邪毒攻衝嫩赤熱痛

朴硝五兩 寒水石 蛤粉各三 白芷一兩

太醫院經驗奇效良方大全 卷五四

七三三三

片腦另研 右為細末研勻每用新汲水調稀稠得所以雞翎塗掃不令藥乾

治一切赤腫但癰毒結未成者並可消

右用黃蜀葵花子不拘多少研細滴水令稀稠得所將蒲帕子裹定旋把所餘汁撲腫所四畔數撲之

犀角飲 治諸風腫

犀角一錢 玄參 連翹 柴胡去苗各

升麻 木通通各 芒硝生用 麥門冬去心各

沉香 檀香 射干 甘草炙各

右對碎每服五錢七水一盞半煎至八分去滓食後溫服及夜食後各一服利多即減一名犀角湯無檀香

發風散 治諸瘡因風致腫

羌活 防風 白芷 吳茱萸

細辛 當歸 芍藥 羌花

官桂各等

右為齋末作二劑赤皮葱連鬚細切半斤同醋醋拌勻炒令極熟帛裹於瘡上熨之稍冷即換藥熨之上下痛止

紫沙製方 治風腫

紫沙 鹽各不拘

右相和炒熱布裹熨之冷即再炒或入醋少許尤佳

接毒散 治熱毒丹腫遊走不定

石膏生用 寒水石生用 黃藥 甘草略

右為細末以新水調掃之或紙花子小貼尤妙凉水潤之

水登膏 治熱腫痛大効

大黃 黃藥 麝香 天南星

白發 朴硝 黃蜀葵花略

右為細末每用新水一盞半藥末二錢攪調勻候澄底者去浮水以紙花子攤於腫處貼之如急燥津唾潤之此藥除熱毒赤腫神効如皮膚白色者勿用之

十二件車方 治丹毒或得一物瘡

水荅 生地黃 生松葉 胡蘆葉

慎火草 浮萍草 豆豉水和 大黃水和

拖子水和 黃芥水和 硝石 豆葉

右一十二味但得一味搗以貼之即瘡赤小豆末和鷄子塗之無鷄子水和用之

瘡竈丹從兩脚亦如火燒

右用五加葉燒作灰五兩取煨鐵家槽中水和塗之

治丹毒瘡

蜈蚣乾 白礬炒 雷丸一箇 百部二錢

右為細末醋調塗之

除濕散 大治一切風毒疥癬癩瘡狀如風癩

苦參 何首烏 荆芥穗 蔓荊子

薄荷略 白芷 天麻 川芎

防風生 烏蛇酒浸一宿

右為細末每服三錢茶酒調下無時日進三服六日一浴令汗出血氣宣通一月膚澤如故

苦參丸 治遍身瘙癢疥癬瘡瘍

苦參四兩 玄參 黃連去須 大黃剉碎

獨活去蘆 枳殼炒 防風去叉 黃芩去黑

右為細末煉蜜為丸楊千餘下丸外括桐子六每服三十

丸食後漿水下日進三服茶酒任下亦得

八仙散 治遊風腫痒疥癬或因洗頭遊風癢痒生瘡

細辛 荆芥 白芷 川芎

黃芩 防風 地骨皮 甘草各等

右為粗末每用藥二兩水二椀煎十沸去滓熱湯患處

一掃散 治疥癬

防風 荆芥 苦參 地骨皮

薄荷 甘草各等

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九空心用

茶清送下或為散涼蜜水調下不過三五服即瘥可大人

用每服三錢

治遊身癢痒明目爽神

威靈甘草石菖蒲 苦參胡麻何首烏

藥末二錢酒一椀 渾身癢痒一時無

四生散 治腎臟風疥癬等瘡及眼目昏花視物不明

白附子下注生瘡 黃芪 沙苑蒺藜

羌活附子

右為細末每服二錢空心盪酒調下若於猪腰子切開夾

藥在內合定拴住紙裹煨熟尤妙又有患赤眼睛痛不可

忍臨睡一服目及大痛至二鼓時乃得睡更三四服太愈

再有頑癬經年服藥貼藥俱不効後得此藥三四服盡除

此方治人腎臟風及眼疾頑癬無不効

赤藥神効散 治乾濕膿瘡諸種疥癬等證有効

檳榔 蛇床子附子 全蠍半兩 倭硫黃半兩

右化開硫黃入荆芥末三錢滾數沸候冷加輕粉二錢冷

再碾末加三柰半兩妙右為細末先將小油滾過候冷調

上藥擦瘡上仍以兩手搓藥團藥氣神効

一上散 治諸般疥癬必効

雄黃明手熟硫黃 黑狗脊 蛇床子附子

寒水石 六錢斑猫三箇去翅

右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入斑猫和勻蛇床子黑狗

脊另為細末同研勻洗疥癬令湯透去加油調手中擦熱

鼻中嗅三兩次擦上可一上即愈如痛甚腫滿高起者加

寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如

瘡孔中有蟲加雄黃如喜火炙湯盪者加硫黃只嗅不止

亦可愈

治一切男子人女人渾身疥癬一家染易經年癢痒不効者

百部碎細 亂髮 木香碎切 檳榔

苦參碎切 川椒三錢 鯽魚一箇不要見

右以油五兩煎藥得所去藥却用蒜香一分膩粉十錢

硫黃雄黃各半兩同研令勻入在油內更煎攪五七沸瀉

出礬器盛之非時使也

五龍膏 治疥癬

硫黃 白礬 吳茱萸

川椒各等

右為細末煎油調塗之

赤小豆散 治乾濕疥

赤小豆三合炒乾內醋 升麻 薏苡仁

黃芪三錢 人參 白朮 瞿麥穗

當歸切剉 黃芩去黑 猪苓去黑 防風去叉

甘草炙

右為細末每服三錢七空心粥飲調下日二夜一

當歸飲子 治心氣滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或痒

或痛或膿水浸淫或發赤疹癩

當歸 川芎 白芍藥 生地黃

防風 白茯苓 荆芥穗 何首烏

黃芪 甘草

右為細末每服四錢水一盞半生薑五片煎八分去滓不

拘時溫服若於浴室內服此藥就用胡桃七箇去皮細嚼

下飲酒一盞出汗神驗

一笑散 治渾身疥癩癢痒生惡瘡

檳榔 藁本 硫黃 蛇床子

枯礬 五倍子 白膠香 各等

右為細末濕者乾傳乾者香油調傅如頭上瘡便搽上不

用刺甚者不過三五次平復如故

神捷散 治諸疥瘡

吳茱萸 白蒺藜 白無名仁 輕粉 各半

赤小豆 九粒 石硫黃 研

右為細末研勻每用半錢化生油調於手心內摩熱後偏

指周身有疥處便睡覺其疥自愈

殺疥藥

羊蹄根 生切草烏頭 一箇 硫黃 一錢 白礬 半錢

生薑 一分

右以米泔淹一宿研極細入醋和勻入浴時抓破瘡傳

之邊頃以溫湯洗去絕妙

治疥神効

振毒 細辛 水銀 輕粉 各半錢

右為細末油蠟和劑作兩凡綿裹兩手將於周身疥多處

擦之

備急萬氏瘰癧方

右取棟根削去上皮切皂角去皮子等分熟搗下篩脂膏

和瘰癧去毒以塗之謹風勿使女人小兒鷄犬見

無疥方

明信 雄黃 各半 椒末 一錢

右研細用紙以方尺熱艾攤平攪勻捲成長缺瓦兩口合

紙捲于火點慢慢烟熏被下緊纏衾被油塗眼耳目鼻小

見只空木蓋被卧亦効宜淨室溫床牢纏衾被無令透烟

以熏至其人口鼻為効

丁香散 治一切癬

丁香 研 蝦蟆灰 各一 麝香 研 一分 白礬 研 令汁

五倍子 研 膩粉

右研勻乾傳瘰癧上以瘰癧為度

胡粉散 治一切癬瘡癢痒甚者

胡粉 別研 雄黃 別研 硫黃 別研 各 大草烏 一箇

斑蝥 一錢 硃 半 蠟 稍 七枚 麝香 少許

右為細末先用羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

銀粉散 治一切頑癬

輕粉 黃丹 瀝青 白膠香 各等

右為細末麻油調拭淨或搽破竹篋桃搽二次便乾數次

剥去殼也治牛皮癬如神

水銀膏 治一切癬

水銀 二分 蘇莢仁 研末 薑黃 研末 各 酥 二兩

右先煎酥和水銀以柳椎研攪候水銀散印下蘇莢薑黃

末攪勻破盒盛旋取塗瘰癧上日三兩次

三神丸 治一切癬

蕤蔞 步 海桐皮 剉 草烏頭 益少 乳 夫 益

右為細末 麩糊和丸 如菜豆大 每服十九至十五丸 溫酒

益湯任下

治癬神効

藜蘆根 半兩 輕粉 二錢

右為細末 凉水調搽癬上

治癬積年不瘥者

右用斑蝥一箇 去頭翅 足以針刺燈焰上 燒米醋內 淬如

此三兩次 就燒成 存性 黑灰 研為細末 用紅棗一枚 湯泡

剥去皮 核與斑蝥一處 同研爛 先以手帕或布擦動癬

然後搽藥 不可侵好肉 恐有毒

平夏散 治一切癬

右以半夏三兩 搗為末 以陳醬汁調和 如糊 摩塗癬上 日

兩三度 即瘥

治頭項及面上白駁 浸淫漸長 有似癬 但無瘡 可治

右以鰾鱧魚脂 傳之 先拭剝上 則使燥痛 後以魚脂傳之

一度 便愈 甚者不過三度

東坡先生家藏方

决明子 益少 益少

右用水銀 輕粉 少許 與藥末 同研為膏 散以物擦 破癬上

用藥傳之 立瘥

一林散 治乾癬不瘥

天南星 草烏頭 益少 益少

右為細末 用羊蹄根 搗絞取汁 調塗 不過三上 瘥

治乾癬積年 生痂 癢之 黃水 出每逢陰雨 即痒方

巴豆 附散

右於炭上 燒之 令油出 盡即於乳鉢內 以少許 酥和 研如

再薄塗之 不過一二度 愈

治濕癬方

黃連 明礬 各半兩 胡粉 黃丹

水銀 各二

右為細末 用猪脂油 一两 夾研 令水銀星 盡散 磁盒收用

螺殼散 治濕癬 痒不可忍

螺殼 一兩 亂髮灰 龍腦 胡粉 各半兩

右為細末 研勻 以油 旋和 塗之

荆芥穗 不拘多少 以老礬子 盛鹽 泥 固 濟 尺 哥 一 處 用

煎取 出 研 香 一 錢 膩 粉 五 分

荆芥穗 不拘多少 以老礬子 盛鹽 泥 固 濟 尺 哥 一 處 用

煎取 出 研 香 一 錢 膩 粉 五 分

右研勻 先以口 含 鹽 漿 水 拭 洗 瘡 令 破 帛 子 搵 乾 了 以 生

油 調 藥 傳 之

八寶散 治風癩 松皮 頑癬 久不瘥者 神効 子一 鄉人 患此疾

數年 不愈 後忽有 舊親 傳此方 試用 有効

麝香 破故紙 檳榔 大腹皮 硫黃 白礬 各一兩

右為細末 小油 調 搽 日 上 三 五 次 痒 則 搽 之

定粉膏 治乾濕癬 風癬 不拘 年月

定粉 水銀 燕窩 胭脂 各一

右同研勻 用陳猪脂 一两 同研 成膏 先用湯 洗後 以膏 子

暗 塗 之 一 上 便 瘥 本 法 猪 脂 須 用 三 年 以 上 者 今 若 無

但 陳 者 亦 可 仍 用 後 方 淋 洗

棟實 以 研 皮 代 之 棟 葉 及 嫩 枝 細 剉

<p>瘰癧花及藤<small>一各</small> 地榆 右同煎濃汁熱洗患處</p>	<p>枳殼<small>去穢</small> 皂莢 苦參<small>各三兩</small></p>	<p>五倍子<small>一兩</small> 黃蘗<small>對</small> 白礬<small>各</small> 當歸<small>對炒</small></p>	<p>膩粉 右為細末先用盞漿水洗拭乾傳之</p>	<p>黃連<small>去須</small> 黃蘗<small>去粗</small> 豉<small>細研</small> 蔓菁子</p>	<p>杏仁<small>湯浸去皮尖</small> 水銀<small>一錢</small> 右先以水銀於掌中研如泥次入乳鉢內下生油一合和勻次入藥末同研成膏磁盒盛日三五度塗瘡上</p>	<p>浴毒湯 治小腸風陰瘡痒痛 木通 藥本 枳殼 貫莢 白芷 荆芥 甘松 薄荷 右到碎用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升去滓熱洗浴瘡</p>	<p>陰瘡膏 治男女陰瘡 朱粉<small>一匙</small> 芍藥 黃芩 牡蠣 附子 白芷<small>各</small> 右吹咀以不入水猪膏一斤微火上煎三上三下俟白芷黃膏成絞滓去內白粉和傳瘡上</p>	<p>七寶橫柳散 治下元玉莖上或陰頭上有痒瘡漸至食透久不愈者 橫柳 雄黃 輕粉 蜜佗僧</p>
--	--	---	------------------------------	---	---	---	---	---

<p>黃連 黃蘗 朴硝 右為細末和勻先以葱白燒水洗淨軟帛捲乾如瘡濕乾擦如乾小油調塗</p>	<p>玉粉散 治下陰瘡疼不止 滑石 密佗僧 寒水石<small>各</small> 膩粉</p>	<p>瘡膏<small>各少</small> 右為細末油調傳或乾貼患處</p>	<p>全蠍散 治腎臟風發瘡痒 全蠍<small>三枚</small> 明硫黃<small>二錢</small> 生熟丹<small>一錢</small> 輕粉<small>半錢</small></p>	<p>鷄心橫柳<small>一</small> 大箇<small>一枚</small> 在內<small>以好黃丹</small> 瘡膏<small>少許</small> 右為細末研勻磁盒裝每用少許麻油調抹兩掌先以鼻嗅男以兩掌拊外腎女以兩掌拊兩乳各腫至醒次日依前再用藥發効</p>	<p>牡蠣散 治陰囊兩傍生瘡或陰濕水出其痒甚苦夜則拭之無足後必自痛或兩脚汗脚板心汗濕無可奈何此藥主之予親得此證受苦數十年得此方隨用二三日如法擦之二十年餘不發實為神効</p>	<p>牡蠣 黃丹<small>各</small> 枯白礬<small>四兩</small> 右為細末過夜時用手捏藥於陰痒處痛擦之不一時又搽之三四次後頻減次夜再搽雖大減又搽後自然平復如腋汗亦有頻搽方可脚汗先搽後裝菜靴或鞋底上脚板上塗藥纏脚裹之亦可</p>	<p>紅刺散 治陰莖瘡 紅刺<small>一分</small> 豆粉<small>一分</small> 右用水研塗上乾又傳之一方用豉一分</p>	<p>石灰散 治腎漏陰囊先腫後穿破出黃水者如魚口能致命</p>
---	--	---	--	--	--	--	--	---------------------------------

右用五倍子同石灰炒黃色去灰攤地火毒砂盆內研細末不犯銅鐵乾糝瘡上五七次可

丹胞散 治玉莖上生瘡臭爛者
右以猪肚一箇連尿去一半留一半用新磚兩口炭火煨新磚將猪胞連尿於磚上焙乾不住手一向移放於兩口磚上輪流不致莫與火煨過胞以尿乾為度研為末入黃丹一錢先用葱湯以鵝毛抹洗以舊綿帛透乾此藥搽三五次立見効

地連散 治玉莖上生瘡
右用地骨皮煎湯洗以訶子連核燒存性為不乾糝川連散 治不部注瘡

右以宣連為細末漿水調成餅攤於梳面上內用艾及穿山甲三片燒烟覆碗熏成黑色再取下如是者五次以黃連餅黑色為度地上出烟毒再研細濕則乾塗乾則清油調塗三四次先用黃柏膏香茵陳煎湯濕洗

神妙方 治莖頭三五孔小漏瘡出血微膿
右用油髮燒作灰存性研細傳之乾則津唾調傳仍以米湯調髮灰食前服

治穀道中瘡
右以水中葶葉細搗綿裹內下部日三

小浴方 治虛勞陰濕痒生瘡
川椒 苦參 蛇床子各半香附子

白礬 白芷 狗脊 細辛各一

桂心三分
右咬咀每用藥一兩以水三升煎至二升去滓傾入盆子內但乘熱氣坐盆子上熏之良久通身便洗患處甚者不

過三兩度
沐浴長春散 治男子下元陰濕火冷陰囊左右夜痒抓之則喜住之則痛或瘡流水為害甚苦此藥見効及治婦人下部陰濕胎元火冷

壯鱗 蛇床子 破故紙 紫稍花
官桂 乾荷葉
右咬咀每用一兩半水一小鍋入葱白數莖煎至八分去滓先熏後洗却用後藥

括藥一兩 黃丹 蛤粉各半
右研細末熏洗後以手捏藥末搽濕痒處

銅綠散 治男子婦人陰部濕海瘡
銅綠少許 白礬一錢 乳香半錢 輕粉一字 五倍子細研

青黛散 治下部生濕瘡熱痒而痛寒熱大小便澀食亦減身面微腫因多食魚蝦發風熱物得之
右用馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗上立有神効仍服八正散日三服

麝香散 治妬精瘡痒而濕者
麝香 黃礬 青礬各等

右為細末小便後用此少傳之

治陰濕生瘡黃水流注
白礬 不以多少

右研為末先以冷水洗瘡淨然後傳之
津調散 治妬精瘡膿汁淋漓臭爛
黃連 款花各等 麝香少許不用

右為細末先以地骨皮蛇床子煎湯洗軟帛拭乾津潤傳之忌生湯洗

洗毒湯 治陰蝨瘡

苦參 防風

露蜂房

甘草 各等分

右吹咀水煎濃汁洗瘡

胭脂散 治陰瘡

坯子胭脂 真菜豆粉 各等分

右同研勻傳之

蝦蟆散 治陰濕欲盡瘡痛甚者

蝦蟆 燒灰 兔糞 一兩

右同研細每用少許傳瘡上日三四度

截疔散 治年深疔瘻瘡大効

白芨 白欬 黃丹 密陀僧 各一

黃連 半兩 輕粉 一分 片腦 麝香 各半

右為細末和勻每用或摻或縫瘡中以膏藥貼之

甘石散 治下部疔瘡

爐甘石 密陀僧 各半 輕粉 一分 椽斗子 燒灰 存

龍骨 半錢 麝香 少許

右為細末先用荆芥杜仲川椒煎湯放溫浴洗罷然後用

藥一檢乾貼

金銀花散 治下疳瘡

金銀花 荆芥 朴硝 蛇床子

甘松 白芷 檳榔 各一

右吹咀每用五錢水五椀加葱白二根同煎數沸盆盛水

先熏後洗却上藥

梳子散 治下疳瘡

右用梳子一箇去穢裝入明礬末麩粉合口火燒存性為末洗淨乾瘡上隨効

銀粉散 治下疳陰頭生瘡

右用牆上白螺蛸不以多少火內煨酥為末於水內飛過

去土不愈者次用輕粉隨分兩入在藥內每用少許乾貼

在瘡上

治下疳瘡

右以孩兒茶研為細末先洗淨乾則小油調傳濕則乾瘡

之神効

消毒膏 治五發惡瘡消腫散毒

黃芪 當歸 川芎 杏仁

白芷 白欬 零陵香 槐白皮

柳枝 樹者 木鼈子仁 甘松 各半 乳香

沒藥 各三 麝香 朱紅 硃砂 各半

黃丹 炒 黃蠟 各半 芝麻油 一斤 輕粉 一錢

右將藥對碎油浸七日木炭火上煎杏仁焦色濾去滓下

黃蠟候熔開出火下丹急攪百十轉下乳沒藥等六味不

住手攪至凝磁器內收貯白光綸攤貼之

烏龍德生膏 治一切惡瘡腫毒及治小兒脾癰堅硬等疾

黃芪 青木香 連翹 木鼈子 油 去殼

玄參 生地黃 桃仁 去皮 金銀花

防風 川芎 白芷 羌活

白芨 白欬 各二 亂髮 燒灰 草麻子 去殼

桂花頭 半兩 五香連翹 散 人參 散 毒 散

樓元通氣散 十奇內補脾膜散 各半兩

右將前藥吹咀用小油三斤半入鐵鍋內先浸五日知用

第一冊 續修四庫全書 醫家類 七四〇

侵火煎至藥黃黑色以槐柳條一握不生手攪再用鹽
濾去滓和淨油三斤先將黃丹一斤半炒黑色下小油一
處於慢火上再熬得所滴入水中不散成珠下後藥

雄黃 血竭 乳香 蜜佗僧

沒藥 輕粉 龍骨 楓香

麝香 一錢 加蘇合油

右研為細末入煎膏內化開攪干餘適令勻又拭水中得
所成膏藥可攤為度如堅少加小油如軟加黃丹須要攪
勻成膏切忌鷄犬婦人孝子見須誠心靜意脩合如小兒
諸癰疔疳等證並病堅硬大小用紙或緋絹攤貼候藥力
盡自脫下再換小兒疳瀉痢證貼在肚上咳嗽貼芥梁中
心其病自愈

摩風膏 摩風止痛消腫定疼治頭面唇鼻諸瘡肌肉裂破

當歸 去黃 白芷 杏仁 桃仁

麝香 去土 檀香 零陵香 川芎

沉香 木香 白附子 天麻

獨活 白芩 白欬 黃芪

防風 茅香 白芍藥 甘草

木通 瓜蒌 龍腦 黃蠟

右剉藥用清油二斤二兩浸七日淨石器銀器中慢火煎

候白生微黃綿濾去滓於淨磁罐內密封燈一宿再濾過

於磁碗中慢火再輕溫熬動次下黃蠟攪勻放溫次下研

細龍腦參商於磁盒內盛每用少許摩擦患處

太乙靈應膏 治諸般惡毒惡瘡並不外貼內服一丸如櫻桃

大蛤粉為衣各隨後項飲子服之亦治杖瘡

玄參 大黃 官桂 生地黃

卅五

白芷 赤芍藥 血竭 乳香

紅花 黃藥 地榆 防風

沒藥 槐花 黃芩 猪牙皂角

羌活 四錢 劉寄奴 杏仁

當歸尾 一兩 當歸 赤芍藥

右剉碎以香油一斤浸春五夏三秋七冬十日浸畢用文
武火熬藥枯焦如炭然後退火令其自冷將蠶布一幅濾
去滓將油再入鍋內熬先以黃丹十兩新瓦上炒丹紫色
研細每熬油一沸入丹二兩熬至五沸入丹畢前後俱用
柳條攪之待油水中凝而不散方成膏待藥溫用磁器盛
貯下用水浸三兩日去火毒然後攤貼患處內服藥引子
見神仙太乙膏下

神仙太乙膏 治八發腫疽及一切惡瘡軟癩不開年月深淺

已未成膿並宜治之蛇虎傷螫犬咬傷湯火刀斧所傷

皆可內服外貼如發背先以溫水洗淨軟帛拭乾却用

緋帛攤膏藥貼瘡即用冷水下血氣不通溫酒送下赤白

帶下當歸酒下咳嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹膏藥置

口中含化一切風赤眼用膏捏作小餅貼太陽穴後服以

小梳子湯送下打撲傷損外貼內服補皮湯下腰膝痛者

患處貼之內服益湯送下嗜血者桑白皮湯下諸漏先以

益湯洗淨諸瘡並量大小以紙攤貼每服一丸如櫻桃大

蛤粉為衣其膏可收十年不壞愈久愈烈一方以遠癩癰

同上癩癰益湯洗貼酒下一丸婦人血脈不通甘草湯下

一切瘡癩并腫痛瘡及疥癩別煉油少許和膏塗之

玄參 白芷 當歸 赤芍藥

肉桂 桂枝 大黃 生地黃

右剉碎用麻油二斤浸春五夏三秋七冬十日火熬黑色
瀝去滓入黃丹一斤青柳枝不住手攪候滴水中成珠不
粘手為度傾入磁器中以磚蓋口搗罈子埋陰樹下以土
覆三日日出火毒欲服丸如鷄頭大

透骨金絲萬應膏

木鱉子 牛膝研各 自然銅 紫花地丁切

白龍研 當歸各半 川烏二枚 草麻子二兩

金剛骨切

已上藥用小油一斤浸一宿慢火煎復入桃柳槐枝同熬

葉焦綿瀝去滓入黃丹六兩熬二沸次入

白膠香半兩 乳香研 雄黃 白丁香

密佗僧 沒藥研

右研細同熬勻再以綿瀝過看硬軟取之收貯用時隨瘡

大小紙上攤貼

青龍五生膏 治癰疽疔瘰惡瘡膿血出者

生桑白皮 生青竹茹 生柏白皮 生梧桐白皮

生龍膽草各五兩 蜂房 銅皮

蛇蛻皮 雄黃 雌黃各一兩 附子

芎藭 蜀椒各五

右吹咀以三年苦酒二斗浸一宿於炭火上炙乾搗篩以

豬脂一升半微火煎攪令相得如飴著冷水中新白磁器

盛稍稍隨病深淺傳之并以清酒服棗核大日一服

白龍膏 治五發惡瘡及湯火燒凍破潰爛上痛生肌清血

吹消毒散腫通氣脈如神可無般痕

白薇 白欬 白芷 桑白皮

黃芪 商陸根 柳白皮各一兩 乳香研

輕粉研半兩 定粉研半斤 黃蠟研半斤 杏子油一斤如元

右藥油內搗浸三日於木炭火上煎白芷黃色瀝去滓
於油內下黃蠟乳香候熔開出火再瀝候微冷下輕粉急
攪至冷磁器收每用絲絹攤貼

膏藥方 治諸瘡腫毒

一丹二油巴三五 輕粉麝香加浸乳

琥珀珠砂石腦油 七味將來同少許

文武火上用心熬 若杖槓來如狼虎

不問諸瘡并腫毒 貼上如同神鬼取

膏藥方

桃柳冬青淡竹黃 狗杞松槐更及桑

當歸柴胡香白芷 二十四氣為正量

黃丹二兩油加倍 湯火之中要相當

乳香波菜加此子 切莫輕信亂傳方

神異膏 治癰背癰疽諸般惡毒瘡癤其效如神治疔疾先以

麥飯石膏塗付俟其瘡相脫漸收止於徑寸大却用神異

膏貼之收口此藥隨其入病深淺取效合時不可與婦人

鷄犬狗厭穢物見之

玄參半兩 綿黃耆三分 杏仁去皮尖 全蛇蛻焙半兩

男子亂髮統半兩 露蜂房研見者為妙

黃丹研 真麻油一斤

右將麻油同髮入銀鉢中文武火熬候髮焦燬盡以杏仁

按入候變黑色用好綿瀝去滓再將所熬清油入鉢內然

后入玄參黃芪慢火熬一二時取出鉢子安冷爐上半時

又火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝急攪却移鉢

於火上不住手攪慢火熬至紫黃色用綿瀝過後入清油

以火煎撓令黑色較硬得所貯磁器中少許塗於椒葉上
貼日二易之
核毒膏 治腫瘡漏瘡一切惡瘡

右用膏丹不拘多少以苦竹園中地龍泥裹包火煨令紅
取出放冷去泥細研和以輕粉麻油調如膏藥攤在油紙
上貼之毒中父傳發用効

太乙膏 治癰子瘡神効

沒藥 四兩

麝香 三兩

乳香

輕粉 各二

片腦 一兩

黃丹 五兩

清油 一斤

右先將油丹熬以柳枝撓又用熬葱七根先熬一服令焦
再下一根葱蓋為度下火不住手撓看冷熱入腦等撓勻
磁器盛用時旋攤貼

駝駝膏 治入癰疽一切惡瘡軟癰不同年月深淺已未成

臘者貼之即効及湯火傷皆可內服外貼神効

白芷

白欬

川芎

甘草 四兩

當歸 二兩

丁香

乾蟾 各半

木鼈子 二十

沒藥 別研 一兩五

乳香 別研 二兩半

片腦 一兩

杏仁 九十

鼠頭 二兩

駝駝 兩

真絲絹 一尺

黃丹 十兩

清麻油 二斤

室女油 頭髮 如拳

右到細以好酒拌濕一宿入鋪內用油煎候藥深赤黑色
濾去滓別入淨鋪慢火煎少頃即入別研者及黃丹蠟以
柳枝不住手撓時時滴入水試看軟硬得所即是成膏癰
背未膿者半入銀石器慢火熬及半盞許去滓次入乳香
碾碎先入又熬之候如一茶脚許將藥去滓放冷却
入煎藥者管子及表末撓勻再熬候金漆狀乃成入不化
水磁器內收之每用少許點六効

五枝膏 治一切惡瘡腫毒等疾

香油 一斤 黃丹 五兩 槐枝 各長一兩

右先將油同枝入鍋內文武火煎藥黑色濾去滓次下

黃丹不住手撓候黑色收磁器內納布攤貼

可馬溫公解毒膏 治諸瘡久不收瘡宜貼之

杏仁 四十 葶麻子 四十 筒巴豆 四箇 木鼈子 箇二十箇

槐枝 四兩 柳枝 二兩 桃枝 三兩 乳香 三兩

黃丹 膏用 四兩 冬用 三兩 夏用 二兩 麻油 半斤

右將油入鍋內下藥熬焦黃色綿濾去滓再熬滴水成

珠不散為度下乳香木鼈勻每用紙攤貼

神功回生膏 治癰疽疔毒遠近腫瘡打撲損傷腫毒發背力

斧所傷箭頭在內燒火所傷並皆治之

槐枝 槐枝 各長一兩

桑枝 狗肥枝 二十條 狗者則取皮

白芷 白欬 當歸 赤芍藥

天芥 黃藥 杏仁 輕粉 三錢

草麻子 去殼 一兩半 血竭 半兩 槐黃 半兩

黃丹 兩 沒藥 半兩 乳香 半兩 椎黃 半兩

右先將六枝皮用清油三斤於砂鍋內文武火煎令滓液
盡為度濾過却將白芷等九味剉碎下油內浸透又用慢
火煎焦去滓再濾過却將黃丹分作三次下熬令黑色滴
水中不散為度却將血竭等末待油微溫下於油內磁罐
盛之蓋口埋土內三日以火毒任意攤貼
萬金膏 治癰疽發背諸般瘡癤從高墜墮打撲傷損脚膝生
癰連年膿瘡五般毒漏一切惡瘡又云專治發背神妙不

可具言右初覺或做瘡用牛皮膠熬令稀稠得折如藥化攤在毛頭紙上於初覺處或有做瘡處貼次用軟布帕子二條於醃未醋內夾令熱漉出互相於膠紙七乘熱蒸熨不可令布帕冷布帕二條不可都齊漉出常留一條在醋內熨候蒸熨得一條冷却於醋內取熱布蒸冷布却入醋內熨候幾常得熱布替換熨蒸即易見効若瘡深乃是藥攻其病頑忍痒不止蒸熨直候膿出將盡即濃煎貫漿湯候溫洗去膠紙次日依前更洗若尚有膿又如前法蒸熨雖連數日蒸熨不妨但要瘡中膿盡瘡乾為度然後用生肌紅玉散搽在瘡上即以萬金膏貼每日一上或兩上每用再蒸熨並如前法鋪膠紙於瘡上熨了亦如前用貫漿湯洗去膠紙

龍骨

慈甲

苦參

馬賊魚骨

黃藥

章烏

黃連

猪牙皂角

黃芩

白芩

白欬

木鼈子

當歸

白芷

川芎

厚朴去粗皮

槐枝

柳枝俱到年 乳香別研

沒藥別研

黃丹半

清麻油肉

右除乳收丹外餘藥入油內慢火煎候白芷焦色去滓入黃丹一半不住手攪令微黑色更入黃丹仍攪待滴入水中成珠不粘手為度攪溫下乳沒末亦攪勻磁器盛用特量瘡大小攤紙貼之治諸惡瘡加自然銅肉桂各一分方無當歸

活絡內炙膏 治閃胸筋骨但是一切無名腫毒疼痛

當歸

黃芪

白芷

芍藥

半夏

木鼈子

銅青酪

白膠香半

乳香

沒藥各一 麻油二斤

右將前六味剉碎入油內熬至白芷焦色漉去滓下白膠香煎至黑色次下乳沒銅青末攪勻用時隨病大小厚紙攤貼患處

金絲萬應膏

治損撲傷損手足有背并寒濕脚氣痰涼不可忍小兒脾疳瀉痢咳嗽不肯服藥者

瀝青半斤

威靈仙二刀

草蘇子二百枚

皮殼研

黃蠟二刀

木鼈子二刀

沒藥

乳香各一

麻油三刀

沒藥

右先將瀝青同威靈仙下鍋熬化以槐柳枝撻候焦黑色重綿漉過以瀝青入水盆候冷成塊取出秤三斤淨再下鍋鎔開下麻油黃蠟草蘇木鼈子泥不住手槐柳枝撻勻頭慢火滴入水中不粘手撻如金絲狀方可如硬再撻

加油少許如軟如瀝青試得如法却下乳沒末起鍋在灰火上再用槐柳條撻數百次又以簾布灑膏在水盆內撻被如金絲頻換水浸二日却用小匙盛頭如落馬墜車於被傷疼痛處火上炙熱貼透骨肉為驗連換熱水數次烙之則熱血聚處自消小兒脾疳貼患處瀉痢貼肚上咳嗽貼背心上

無比神應膏

治諸般惡毒瘡腫疔瘰癧瘰癧瘡脚氣打撲傷損刀斧傷湯火燒馬犬蛇虫蜈蚣蜂蟻多年咳嗽口內吐血貼背取毒愈心疼腹痛小腸疝氣赤白痢瀉不止於臍下貼即痊牙疼貼腮上止痛流膿頑癬腰痛疔瘰癧瘡杖瘡重者再貼即安

白芩

白欬

白芷

木鼈子仁

官桂

杏仁

當歸

桂花

乳香 沒藥各一 蘇合香二 九黃丹二斤

真麻油五斤 槐柳枝各半

右劉碎除乳香沒藥黃丹蘇合香九另研外其餘藥於瓶內浸春秋五日至三日冬十日遇冬減黃丹二兩新鐵鍋內浸至日期用文武火熬一順撓槐柳枝黑色去滓待溫下乳沒蘇合香九再熬不住手撓微滾三兩沸放溫一兩撓一箇下黃丹文武火熬滾起火再滾如此五七次不住手撓至數千次煙盡黑色為度滴水中不散方可切不可用火辰日熬忌鷄犬婦人見

飛丹法 凡膏藥中鮮有不用號丹其貨賣者多用硝與鹽雜和在内重秤若不飛過而用反有害方法于後

右用號丹即黃丹先以冷水漂過去其鹽硝水再用水漂再去其水澄乾微火炒紫色將紙攤地上出火毒用時再

研至無聲研用

熬膏藥法 凡用乳香沒藥須用燈心同於乳鉢內研細不然

雜為研細候發藥成膏提起藥鈹仍撓無烟起去燈心節末入油內不住手撓勻

右熬藥用磁器或銅鐵鉢內盛油浸藥一宿慢火煎熬諸藥黑色用生絹帛濾去滓留下一兩重藥油復將所濾油於慢火上再熬却將黃丹入油內用長槐柳枝不住手撓候有微烟即提起藥鈹就柳條點藥油滴在水面上凝結成珠不散方成膏矣如油散珠不成再熬直待成膏提起藥鈹撓無烟出却入乳香沒藥撓勻傾出磁器內將原留下油洗鈹一件收拾器內用新汲水一日一換將藥器坐水內浸三日出火毒方可用如膏藥硬約量加芙蓉清油入膏內撓勻得所其芙蓉等油減半用

熬膏藥極難於火候須耐煩者火緊慢火猛則藥中火發不特失藥性之熱傷製藥人面目

大醫院奇效良方卷之五十四

鍼之法毫鍼最微然是一寸六分包含妙理雖細擬於毫髮而
 貫多岐可平五臟之寒熱能調六腑之虛實是以岐伯分九鍼
 九鍼者天地之大數也始於一而終於九故曰一以法天二以
 法地三以法人四以法時五以法音六以法律七以法星八以
 法風九以法野素問曰以鍼應九之野九而九之九九八十一
 以起黃鍾數焉以鍼應數也一者天也天者陽也五歲之應天
 者肺肺者五臟之華蓋也皮者肺之合也人之陽也故為之治
 針必以大其頭而銳其末令無得深入而陽氣出二者此也人
 之所心志土者肉也故為之治鍼必審其身故負其末令無得
 傷肉 功則氣竭三者入也人之所以生成者血脈也故為
 之治針必大其末令其末令可以按脈勿陷以致其氣令邪氣
 獨出四者時也時者四時八風之客於經絡之中為癘病者也
 故為之治針必審其身而鋒其末令可以寫熱出血而癘病竭
 五者音也冬夏之分分於子午陰陽別寒與熱爭兩氣相傳
 合為癘膿者也故為之治鍼必令其末如劍鋒可以治大膿六
 者律也律者調陰陽四時而合十二經脈虛邪客於經絡而為
 暴痺者也故為之治鍼必令其末如蠶且負且銳中身微大以取
 暴氣七者星也星者人之七竅邪之所客於經而為癘痺舍於
 經絡者也故為之治鍼令尖如蚊虻喙靜以徐往微以久留正
 氣因之真邪俱往出鍼而養者也八者風也風者人之股脈八
 節也八正之虛風八風傷人內舍於骨解腰脊節理之間為
 深痺也故為之治鍼長其身鋒其末可以取深邪遠痺九者野

也野者人之節解皮膚之間也淫邪流溢於身如風水之狀而
 滯大能過於關節大節於關節者也岐伯又云九鍼之長短一
 白鋒鍼長一寸六分主熱在頭身也二曰食鍼其鋒長一寸六
 分主治分間氣三曰鈹鍼長三寸半主按脈取氣令邪出四曰
 鋒鍼其身鋒其末長一寸六分主癰熱出血五曰鈹鍼黃三分
 半長四寸主大癰膿兩熱爭者長一寸六分主取癰痺者也七
 曰毫鍼法於毫毛長一寸六分主寒熱痛痺在絡者也八曰長
 鍼長七寸主深邪遠痺者也九曰大鍼其鋒微負長四寸主取
 大氣不出關節者也岐伯又云身形之應九野左足應立春左
 脈應春分左手應立夏膺喉首頭應夏至右手應立秋右脇應
 秋分右足應立冬腰尻下竅應冬至六腑膈下三歲應中州凡
 所應之處不可不察靈樞云形樂志苦病生於脈治之以灸刺
 形苦志甘病生於筋治之以熨引形樂志樂病生於肉治之以
 鍼石形苦志苦病生於咽膈治之以其藥形數驚恐經脈不通
 病生於不仁治之以按摩醪藥是謂形志為病又有人之五勞
 七傷也治當隨經而取之且如前人所權刺肩井曲池臂痛而
 復射華佗刺懸鐘環跳躡足而立行秋夫刺腰俞而鬼免沉疴
 王築鍼交俞而妖精立出徐文伯瀉死胎補手陽明合谷瀉足
 三陰交應鍼而殞因前人仁術之妙載清名而不朽今已去聖
 逾遠此道罕明後之學者當究古人之心術以惠生之術明經
 絡識虛實行子午之術且如左有病右畔取非交經絡刺用進
 氣之法使鍼之氣安能到於病所者不明經絡妄以長鍼其獨
 豈小小哉今將前人立法各經治痛之穴并用鍼之法鍼經備
 載其詳所有缺略者開列于後

指法一十四條

動者如氣不行得鍼動伸提而已伸提者即非鍼出入引氣也
 搖者凡行赤鳳搖頭之法即搖之撥動其經以愈疾詳見本法
 進者行瀉法進鍼至穴得分寸令病人呼氣一口即用鍼進至
 入一五許停鍼少時得氣即退鍼行瀉法
 退者行補法之時進鍼至穴得分寸令病吸氣一口即用鍼退
 出一五許停鍼少時得氣却行補法
 擡者凡鍼要寒熱者以為擡之或外或內如擡線之貌勿轉之
 大緊恐入肉纏鍼難進退左撚則熱右撚則寒亦出入之理
 慎當忌之
 彈者凡瀉時用指輕彈使其氣速行則氣至也易至也補則不
 用氣實自至者不用此法
 努者凡用大指以指撚鍼名曰飛鍼引其氣至也如氣不至令
 病人閉氣一口着力努之外以飛鍼引之則氣至矣氣自至
 者不用此法
 循者凡下鍼於所部分經絡用手上下循按之使氣往來推之
 則行引之則止
 捫者如痛處未除即於痛之處捫摩使痛散也復以飛鍼引之
 除其痛也
 攝者如鍼下氣滯滯隨經絡上下用爪甲攝之其氣自通攝與
 捻者同
 按者如補出鍼時令病人吸氣一口急用手指按閉其穴上此
 補法也如瀉出鍼時令病人呼氣一口則勿按鍼孔此乃瀉
 法也
 爪者以手爪甲搗穴令氣血散也方下其鍼刺入也
 切者以手爪甲極搗其穴氣血散開方下針切與爪同
 撚者以手大指次指撚針來去上下即飛鍼之法也

行鍼法

黃帝金鍼法最奇 短長肥瘦在臨時 但將他手橫紋擡
 分寸尋來審用之 身體心胃或是短 身體心胃或是長
 求穴看紋還有理 醫工此理要推詳 定穴行鍼須細認
 瘦肥短小豈同群 肥人鍼入三分半 瘦體須當用二分
 不肥不瘦不相同 如此之人但著中 只在二三內取
 用之無失且收功 大飢大飽宜避忌 大風大雨亦須容
 飢傷寒氣飽傷腑 更看人神俱避之 妙鍼之法世間稀
 多少醫工不得知 寸寸人身皆是穴 但開筋骨莫胡疑
 有筋有骨傍鍼法 無骨無筋須透之 見病行鍼宜子細
 必明升降關開時 邪入五經隨早過 崇優六脈浪翻飛
 烏鳥獲稷空中墮 靜意真真起發機 先補真陽元氣足
 次瀉餘邪九度噓 同身逐穴歌中取 捷法昭然不迷
 百會三陽頂之中 五會天滿字相同 前頂之上寸五取
 百病能祛理中風 灸後大燥衝雙目 四畔刺血令宣通
 井泉要洗原鍼穴 鍼刺無如灸有功 前頂寸五三陽前
 甄權曾云一寸言 積鍼出血頭風愈 益油指根疾自痊
 願會頂前寸五深 八歲兒童不可鍼 顛門未合那堪灸
 二者須當記在心 上星會前一寸對 神庭星前髮際尋
 諸風灸庭為最妙 庭星宜灸不宜鍼 印堂穴並兩眉攢
 素膠面正鼻柱端 動脈之中定禁火 若燃此穴鼻軒癢
 水溝鼻下各人中 兌端張口上唇宮 斷交二斷中間取
 承漿下唇內際 姓父分半懸漿灸 大則陽明脈不降
 廉泉腕上定結喉 一名舌本立重樓 同身捷法須當記
 他日聲名播九州
 春夏刺淺秋冬刺深

內經曰病有浮沉刺有淺深各正其理然春是為陽其氣在外
入氣亦浮凡刺者故淺取之秋冬為陰其氣在內人氣在肅凡
刺者故當深取之又言春夏各致一陰秋冬各致一陽秋冬各
致一陽者謂春夏為陽謂陰所養故刺之各致一陽春夏溫必
致一陰謂下鍼深刺至腎肝之部得其氣鍼便出之是以引特
之陰也秋冬寒必致一陽致一陽者謂下鍼淺則刺至心肺之
部得氣推而內之良久出鍼是推內之陽也素問曰春夏養陽
秋冬養陰故也

三才法

凡欲下鍼先以左手大指指於穴上指令多時令患人呼十
息然後用右手持鍼用力插之取穴則有進入穴既定撒手
停鍼十息號曰天才持少時再進鍼五分依前得鍼住手十
息號曰地才不可便起少待一二時方可出鍼號曰人才乃

可滿也

赤鳳搖頭

凡下鍼待氣要上行閉其下要下行閉其上進鍼從辰至巳
退鍼巳至午未進鍼則左撚退鍼則右撚動也

歌曰 下水船中之櫓

猶如赤鳳搖頭

別辨迎隨逆順

林時慢法徒求

蒼龍擺尾

凡下鍼氣至關要去處回撥者將鍼散慢伏之如船中之
舵左右隨其氣輕而撥其氣自交週身遍體流通不失其所
矣如氣不行將鍼動伸動提

歌曰 蒼龍擺尾氣交流

血氣奪流通體週

任他身上十般病

一掃教他即便瘳

龍虎交戰

夫用鍼時先行龍左行右撚九得九數却行虎右行左撚得
六數乃先龍後虎而轉之得氣補之故陽中有陰陰中有陽
乃得及之道使邪氣和其正

龍虎升騰

夫用鍼法以手大指自前撚入左大指向後撚入經得氣向
前推轉以手指彈其鍼引其陽氣按而提之其氣自行如氣
不應依前再施

手午鴉白

天下鍼時調氣得勻以鍼上下九入六出之數按陰陽其病
自愈矣

陽中隱陰

夫用鍼之時先入五分之中乃得九陽之數如竟熱便進入
一寸行六陰之數以得氣為應夫如是可治先寒後熱之病

陰中隱陽

夫用鍼之時先進入一寸之中行六陰之數如患人自意微
涼即退鍼漸出五分之中却行九陽之數故得陰中隱陽可
治先熱後寒之病

燒山火

夫用鍼時先行九陽之數入於五分之中得氣便進之漸進一
寸之內三慢出三緊入如竟熱緊閉其穴即時熱氣復生其
冷病自除如不效依前再施

透天涼

夫用鍼時先進入分寸之內行六陰之數若得氣便進仰漸
退至五分之中三慢入三緊出其鍼自緊徐徐奉之得冷氣
漸至其熱自愈不功再施

音氣法

夫用鍼之時先進七分之中行純陽之數若得氣便深刺微伸提之却退之至原處又得氣依前法可治痲癢癢之病

進氣法 夫用鍼之時先行純陽之數若氣滿便倒卧其鍼令病人吸氣五口其氣上行此乃進氣之法也可治肘臂腰脚身疼走注之病

提鍼法 夫用鍼之時先行陰數自氣來然轉輕提其氣即行可治冷麻之病

鍼解法 凡刺手足欲使氣上行以指下抑之使氣下行以指上抑之用鍼頭按住少時其氣自然行也此即赤鳳搖頭之法

盤鍼法 盤鍼法且如鍼中腕關元之穴先刺入二寸五分退出一寸只留一寸五分在內盤之且如要取上焦胞中之病用鍼頭迎向上刺入二分補之使氣攻上若臍下有病退出二分

逐日入神所在不宜鍼灸 足大鼻柱手小指 外踝髮際外踝求 股內牙齦肝及足

五口邊身足陽明 六手背中在曾莖 內踝氣衝七膝上 在腕股內八陰收 九尻足跌及膝脛 腰背內踝足跌休

尻神 一歲又踝坤 二震齒牙腭 三巽頭口乳 四中看尾尻 五乾背面耳 六手膊兌川

七艮腰項上 八膝助肱處 九坎肘脚肚 尻神上下傳 且如人年十歲除九不筆零一歲便起又踝坤餘皆倣此

人身血忌不宜鍼灸出血 正丑二未三在寅 四申五卯酉六親

七辰八戌九巳上 十亥一子二午真 凡醫者若不能知此諸般禁忌趨吉避凶妄亂鍼灸非惟不能愈疾甚者或致病人傷生喪命為害非輕若逢病人年命

厄會慶男女氣怯下手致難通人達士若是卒急暴患何暇選擇避忌即不可拘此若是候犯禁忌諸般醫藥不瘥以意詳之

鍼灸瘧瘧神 正羊二戌三君辰 四寅五午六蛇行 七酉八猴九在亥 十子十一丑中行

十二月當看卯位 犯着瘧瘧必殺人 午時補瀉歌曰 每日午前交上揚 有似燒湯煎備熱

若要寒時皮底尋 不在交人皮破裂 午時前後歌曰 午前要知寒與熱 左機為補右為瀉

提鍼是熱揮鍼寒 此是先賢真妙訣 午後右補左為瀉 志生此法寒與熱 孫人及此

揮鍼為熱提鍼寒 女人及此要分別 順入為左逆為右 不是知人休與說

補法凡用九陽數行四九三十六也 瀉法行六陰數也行三六一十八也 補瀉提鍼 此法用之大有效

補法 假令此六合鍼五分先鍼入二分候得氣再入二分至四分

候得氣便鍼一分擡五分止然後急出其鍼便以左手六指按其鍼穴勿令出血是為補法

瀉法

假令此穴合鍼五分便鍼入五分候得氣便起鍼二分少停又起二分少停候得氣又起鍼慢出不用左手閉鍼孔令其氣出是為瀉法

禁鍼穴法

禁鍼穴俞古今留

顛會神庭腦戶由

神道靈臺膈中穴

石門神闕水分休

氣穴陰會手五里

陽絡青靈承泣收

橫骨承筋若有病

禁鍼用灸疾須廖

孕婦休鍼合谷穴

三陰交鍼墮胎憂

關元胎死不能出

子巧俱亡切莫投

禁灸火法

痲門風府及承光

撥竹睛明與少商

天牖頭維下関穴

灸堂天府及迎香

素膠鳩尾陽關定

心俞經渠陰市當

淵液白環并五會

當陽伏兔脊中臑

禁灸人迎條口穴

乳中駁門解閉姆

避灸穴中二十九

用鍼補瀉即安康

榮衛回避八法

風 凡用鍼刺天氣風盛令病人避風之處刺之無傷也

穴 凡用鍼刺天氣寒冷令病人向溫暖處先飲湯液體

暑 凡用鍼夏月熱盛血淖而多脫其血以新水洗其面於風涼處堅而然後刺

濕 凡用鍼刺令病人致於高涼之處先服辛燥之物然於刺

陰 凡用鍼刺遇陰風重氣血不行先服溫補之藥然後刺

燥 凡用鍼刺遇夏月煩燥令病人於風涼處先服宣通氣血之藥然後刺之

車 凡用鍼刺若病人乘車而來其人經絡解休不可便刺氣血定後後刺之

馬 凡用鍼刺若病人乘馬而來必血氣亂而困於身候氣足然後刺之

八證 勿刺鍼之無功

便黑 不拘傷寒雜病若大便黑色皆是真氣絕矣俗云換腸死證勿刺之

吐異 其病臨食之間吐出異色之物後日必死勿刺之

失聽 不拘傷寒雜病暴然耳聾失音不語乃腎氣絕也必死勿刺之

失明 其目暴然而不見者乃是肝氣絕也必死慎勿刺之

失志 經云便志安寧詩云在心為志心無所存俗言改志後日必死慎勿刺之

失便 病人不竟大小便自出者乃是大小腸無氣也後日必死慎勿刺之

失神 若子云氣來入身謂之生神去於身謂之死所謂不離其身自遺其咎得神者昌失神者亡

失溺 病人不竟小便自出者乃是小腸經無氣也後日必死慎勿刺之

醫與病者作用

悅愉 樂也和也病者發其信心所刺之處

祝由 自言已病之過從今鍼後再不取犯也

正已 醫流臨病之處目無邪視心無邪念

數神 醫與病者各有正已之神

視服 視婦入室女之病度其穴俞方寸然後備衣而刺之

嚴禮 凡請命醫流志誠信意如待賓客

矜目 醫凡用鍼之時心專務一目無他視靜意觀適之變

呪語 凡用鍼之時醫人默誦其呪語曰大哉乾元成統成

天神鍼到慶萬病如拈急急如律令勅靈

停鍼待氣病人作用

起君 停鍼待氣之間令病人平直坐卧而已

存想 凡用鍼刺病人心無邪念其邪氣易除耳取穴之時令

病人坐卧平直其用鍼順快矣

調噴 凡停鍼待氣之間令病人忘憂絕慮勿暴喜怒動其心

絕慮 若停鍼待氣之間令病人忘其憂絕其慮者也

鍼畢病人禁忌八法

喜 凡病人鍼畢數日切忌暴喜則傷神神既有傷舊疾不

除新病又生矣

怒 凡病人鍼畢數日勿令暴怒怒則傷肝其魂無定血無所

歸何疾不生

憂 凡病人鍼畢數日勿令暴憂憂則傷心心既有傷則勞倦

損於脾胃損則精粕不化真氣日衰榮衛之道溢矣

恐 凡病人鍼畢數日勿令暴恐恐則傷腎腎既傷則損其志

志損則無養生之道矣

思 凡病人鍼畢數日勿令苦思思則傷氣氣竭血泣則肌肉

不滑澤矣

勞 凡病人鍼畢數日勿令勞役勞役則傷氣氣耗則舊疾不

除新病又生矣

醉 凡病人鍼畢數日忌大醉醉則血氣盛衛氣竭氣竭則榮

血必脫矣

飽 凡病人鍼畢數日忌大飽飽則傷筋脈橫解血溢脈滿也

定尺寸法

岐伯明堂經云以八寸為一尺以八分為一寸緣人有長短肥

瘦不同取穴不準扁鵲明堂云取男左女右手中指第三節為

一寸為緣人有身長手短身短手長取穴不準孫思邈明堂云

取患人男左女右手大拇指節橫文為一寸以意消詳巧拙在

人亦有差互今取男左女右手中指第二節內度兩橫紋相去

為一寸自依此寸法與人著灸療病已來其病多得獲愈此法

有準今以為定

定灸多少法

凡灸頭與四肢皆不令多灸緣人身有三百六十五絡皆歸於

頭頭者諸陽之會也若灸多令人頭眩目眩遠視不明緣頭與

四肢肌肉薄若併灸則氣血滯絕於注下宜歇火氣少時令氣

血遂通再使火氣流行候炷數足自然除病宜詳察之

點灸法

凡點灸時須要身體平直四肢勿令拳縮坐默勿令俯仰立點

勿令傾側灸時孔穴不正無益於事徒燒好肉虛忍痛楚之苦

有病先灸於上後灸於下先灸於少後灸於多宜詳審之

發灸瘡法

凡著灸瘡病歷春夏秋冬不較者灸炷雖數足得瘡發膿壞

所患即瘡如不得瘡發膿壞其疾不愈甲乙經云灸瘡不發者

故覆底灸令熱熨之三日即發膿出自然愈瘡今用赤皮葱三

五莖去其葱青於糖灰中煨熟拍破熱熨灸瘡十餘遍其瘡二

日自發立壞膿出瘡愈

奇穴

內迎香二穴在鼻孔中治目熱暴痛用蘆管子搐出惡血効
鼻準一穴在鼻柱尖上是穴專治鼻上生酒酢風宜用三稜鍼

止血立効

耳尖二穴在耳尖上捲耳取之尖上是穴治眼生醫膜宜灸七

壯不宜灸多

聚泉一穴在舌上當舌中吐舌出直者有縫陷中是穴治哮喘

咳嗽及久嗽不愈者灸則不過七壯灸法用生薑薄切一片

搭於舌上穴中然後灸之如熱嗽用雄黃末少許和於艾炷

中灸之如冷嗽用款冬花為末和於艾炷中灸之灸畢以茶

清運生薑細嚼嚥下又治舌胎舌強亦可治用小鍼出血穴

在舌上當舌中吐舌出有直縫陷中是穴也

左金津右玉液二穴在舌下兩傍紫脈上是穴捲舌取之治重

舌腫痛喉閉用白湯煮三稜鍼出血

海泉一穴在舌下中央脉上是穴治消渴用三稜鍼出血

魚腰二穴在眉中間是穴治眼生垂廉醫膜鍼入一分治皮何

兩傍是也

太陽二穴在眉後陷中大陽紫脉上是穴治眼紅腫及頭宜用

三稜鍼出血出血之法用帛一條緊纏其項紫脉即見刺見

血立愈又法以手緊扭其領令紫脉見却於紫脉上刺見血

立愈

大骨空二穴在手大指中節上屈指當骨尖陷中是穴治目久

痛及生醫膜內障可灸七壯

中腕二穴在中指第二節骨尖屈指得之治五噎反胃吐食可

灸七壯宜瀉之

八邪八穴在手五指歧骨間左右手各四穴其一大都二穴在

手大指次指虎口赤白肉際極拳取之可灸七壯鍼入一分

治頭風牙痛其二上都二穴在手食指中指本節岐骨間極

拳取之治手臂紅腫鍼入一分可灸五壯其三中都二穴在

手中指無名指本節岐骨間又名液門也治手臂紅腫鍼入

一分可灸五壯其四下都二穴在手無名指小指本節岐骨

間一名中渚也中渚之穴本在液門下五分治手臂紅腫鍼

入一分可灸五壯兩手共八穴故名八邪

八風八穴在足五指歧骨間兩足共八穴故名八風治脚背紅

腫鍼入一分可灸五壯

十宣十穴在手十指頭上去爪甲角一分每一指各一穴兩手

指共十穴故名十宣治乳蛾用三稜鍼出血則大効矣

五虎四穴在手食指及無名指第二節骨尖極拳得之治五指

拘攣可灸五壯兩手共四穴也

肘尖二穴在手肘骨尖上是穴屈肘得之治瘰癧可灸七壯

有柱骨二穴在肩端起骨尖上是穴大治瘰癧及治手不能舉

動可灸七壯

二白四穴即郄門也在掌後橫紋中直上四寸一手有二穴一

穴在筋內兩筋間即間使後一寸一穴在筋外與筋內之穴

相並治久痔脫肛

獨陰二穴在足第二趾下橫紋中是穴治小腸疝氣又治死胎

胎衣不下可灸五壯又治女人乾嘔嘔吐又治經血不時

內踝尖二穴在足內踝骨尖上是穴可灸七壯治下片牙疼及

脚內廉轉筋

外踝尖二穴在足外踝骨尖上是穴可灸七壯治脚外廉轉筋

及治寒熱脚氣宜用三稜鍼出血

囊底一穴在陰囊十字紋中治腎臟風瘡及小腸疝氣腎家一

切證候悉皆治之可灸七壯艾炷如鼠矢大

鬼照四穴在手大姆指去瓜甲角如並葉兩指並起用帛縛之

當兩指歧縫中是穴又二穴在足大趾取穴亦如在手者同

治五癩等證當正發時灸之大效矣

髓骨四穴在梁丘兩傍各開一寸五分兩足共四穴治腿疼可

灸二七壯

四縫四穴在手四指內中節是穴用三稜鍼出血治小兒猢猻

勞等證

中泉二穴在手背腕中在陽谿陽池中間陷中是穴可灸二七

壯治心痛及腹中諸氣痛不可忍者

四開四穴合谷並行間是穴手足共四穴

奇効良方卷之五十五

大醫院經驗奇効良方卷之五十六

正骨兼金錄門 附論

內經云人有所墮墜惡血留內腹中脹痛不得前後先飲利藥
此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝下然谷之前出血
刺足肘上動脈不已刺三毛各一痛見血立已左刺右右刺左
靈樞云有所墮墜惡血留於內若有所大怒氣上而不下積於
脇下則傷肝又中風及有所擊打若醉入房汗出當風則傷脾
又頭痛不可取於胸有所擊墮惡血惡血在於內痛不已可側
刺不可遠取之也內經又云肝脈搏堅而長色不青當病墮若
搏因血在脇下令人嘔逆金匱云寸口脈浮微而澁皆當亡血
設不出汗者其身有瘡亡血故也子和云諸落馬墜井打僕傷
損閃肋傷折杖瘡腫散瘀痛不止者可峻下之痛止腫消宜以
通經散等藥治之此墮墜之病內經靈樞金匱子和所論其詳

獨正骨兼金錄科惟危氏言其整頓手法折傷手尾各有六出
曰四折骨背脊骨折法下不治并用藥法則至矣盡矣後田馬
騎啓發前人之書補其闕略經義大同小異此科之書當重危
氏今之學者專攻治外不行診視不明其脈焉知內傷輕重因
此之慢不淺淺哉若能識折傷出白出白處搦入其窠折傷處
依法夾縛明脈理的在何經受證用後項次序之藥終無天關
之禍可不謹乎今將人之周身總三百六十五骨節開列於後
人身總下三百六十五骨節以一百六十五字都開列之百
自鎖骨之上為頭左右前後至髌骨以四十九字共開七十
二骨者中為節顯骨者一節及有液以顯為髌骨者一節
隨體前為項威骨者一節及有液以顯為髌骨者一節
隨體左為枕骨者一節及有液以顯為髌骨者一節
之本蓋骨之後為天柱骨者一節及有液以顯為髌骨者一節

復合於腰骨言下為舌本骨者左右共二無勢前為頤骨者一無勢頤下為伏委骨者一無勢伏委之下為後骨者一無勢分也無勢者一無勢眉上左為天賢骨者一無勢眉上右為天真骨者一無勢眉上左睛之上為智宮骨者一無勢右睛之上為命門骨者一無勢鼻之前為梁骨者一無勢梁之左為顛骨者一無勢梁之右為糾骨者一無勢梁之端為高柱骨者一無勢左耳為司正骨者一無勢右耳為納邪骨者一無勢正邪之後為完骨者左右共無勢正邪之上附內為噤骨者一無勢噤後之上為通骨者左右前後共四無勢噤上為嚶骨者一無勢其嚶後連屬為領也左領為乘骨者一無勢右領為車骨者一無勢乘車之後為轆骨者左右共二無勢有勢乘車上下出齒牙三十六事無勢下為頤骨者一無勢頤骨之下為脰中左右前後至襟以四十字關九無勢

十七骨轆骨之下左右為鈐骨者二無勢鈐中為會骨者一無勢鈐中之下為咽骨者左中及右共三無勢咽下為喉骨者左中及右共三無勢喉下為嚶骨者環次共十事無勢龍下之內為肺系骨者累累然共十二無勢肺系之後為谷骨者一無勢谷下為備道骨者左右共二無勢龍外次下為順骨者共八無勢順骨之端為順隱骨者共八無勢順下之左為洞骨者一無勢順下之右為洞骨者一無勢洞骨之下中央為隔骨者一無勢隔骨直下為天樞骨者一無勢鈐下之左右為鈐盆骨者二無勢鈐盆前之下為下股骨者一無勢右鈐盆前之下為分節骨者一無勢分節之後附下為倉骨者一無勢倉之下左右為樞骨者共八無勢樞骨之下左為胃骨者一無勢胃骨之下左右為湯骨者一無勢湯骨之下為臆骨者一無勢

鈐中之後為脊脊骨者共二十二無勢脊脊之下為大動骨者一無勢大動之端為歸下骨者一無勢歸下之後為纂骨者一無勢纂骨歸下之前襟骨者一無勢次鈐盆之下左右至觀以二十五字關六十骨無勢支其鈐盆之後為偃甲骨者左右共二無勢偃甲之端為甲隱骨者左右共二無勢甲隱之前支鈐盆為飛動骨左右共二無勢飛動之左為龍膈骨者一無勢飛動之右為虎膈骨者一無勢龍膈之下為龍本骨者一無勢虎膈之下為虎端骨者一無勢本端之下為腕也龍本上內為進賢骨者一無勢腕骨者一無勢腕骨之上為及爵骨者一無勢及爵骨之上為力骨者共八無勢力骨之上為駢骨者左右共十無勢駢骨為擗骨者左右共十無勢擗骨為助勢骨者左右共十無勢助勢骨為甲爪甲之下各有觀骨左右共十無勢

下左右前後至初步以五十一字關一百三十六骨此下至兩乳下分左右自兩足心裏骨所會處也髌骨之下為心蔽骨者一無勢髌骨之左為脇骨者上下共十二無勢脇骨之端各有脇隱骨者分次亦十二無勢脇骨之下為季脇骨者共二無勢季脇之端為季隱骨者共二無勢季脇骨者共十二無勢季脇助骨之下為助骨者共二無勢助骨之端為助隱骨者共十二無勢助骨之前為大橫骨者一無勢大橫骨之前為白環骨者共二無勢白環之前為內輔骨者左右共二無勢內輔骨之後為骸關骨者左右共二無勢骸關之下為捷骨者左右共二無勢捷骨之下為胛骨者左右共二無勢胛骨之下為膝蓋骨者左右共二無勢膝蓋骨之外為外輔骨者左右共二無勢外輔骨之下為二無勢

立骨者左右共二... 立骨左右各有內外踝骨者共四... 少滿踝骨之前各有下力骨者左右共十... 有京骨者左右共二... 仆骨者共十... 平助之前各有觀甲骨者左右共十... 骨者左右共二... 又男子女人一百九十骨或隱或觀或無髓勢餘二百五十... 六骨並有髓液以藏諸筋以會諸脉... 之四大此骨度之常也... 論手有四折骨六出曰凡手臂出曰此骨上段骨是曰下段骨... 足杆四邊筋脉鎖定或出曰亦到指筋所以出曰此骨頂挽手... 直一人拽頭用手把定此間骨... 片夾定一邊不用夾須在屈直處夾纒服藥後不可... 或時又用拽屈拽直此處筋多喫藥後若不屈直則恐... 後曲直不得... 肩胛上出曰只是手骨出曰歸下身骨出曰歸上或出左或出... 右頰用春杵一枚... 之處或低用物墊起杵長則墊短起念一人把住手按去... 人把住春杵令一人助患者... 効若不用小凳則兩小梯相對木棒穿從兩梯股中過用手把... 住木棒正... 然歸曰矣... 脚六出曰四折骨或脚板上交... 手摸其骨節或骨突出在內用手正從此骨頭拽歸外或... 穿

向外須用力... 筋脉最多... 筋不可疎慢

正骨金... 處淺命脉... 有實有去... 或傷至死... 轉動急急... 脉不要洪... 脉欲洪大... 內科脉不... 此等切勿治之

中不治證

損撲損傷或破傷入於肺者... 透內者... 登候繁多者... 者 血出者... 者 肚上破傷... 皆可治... 縱之莫待... 線或推柔... 不可縫... 用藥加減法

凡損若不折骨不碎骨則不可用自然銅於藥內除去無效

不用洋夏 老人有傷者骨脈冷每用加當歸川芎川烏
一香入參半兩去白芍藥生地黃此亦是二十五味藥內加威
老人服此 或傷臟腑者不問老少如有血并發從口中出者
黑清心藥加丁皮川芎半夏入二十五味內同服 或皮膚熱
黃柏皮皂角半兩入二十五味藥內同煎服

用麻藥法

頭撲傷骨內疼痛整頭不得先用麻藥服待其不識痛處方
可下手或服後麻不倒可加曼陀羅花及草烏五錢用好酒調
如少與服若其人如酒醉即不可加藥
被傷有老有幼無力有血出甚者此藥逐時相變入用不可過
多亦有重者若見麻不倒者又旋添此更未倒又添酒調服少
許已倒便住藥切不可過多

用漆藥法

瘡口血出不止則用方中止血藥傳之如既開後瘡孔大其且
先用降真香龍骨浸藥搽之內即生瘡孔上以用油魚脂特膠
血汗出莫待散塞如夏月用藥以薄荷葉貼瘡孔一日一度湯
洗又用藥搽如肉上兩瘡口用手搦不痛如好肉一般即用收
瘡口藥傳上却莫貼特風稍瘡口立收若未生實肉切不可先
收瘡口裏面恐為患也

傷破肚皮用藥法

如傷孔大肚腸與脂膏俱出放入內則縫如孔小只有膏出
先用清心藥與服用手擊去膏不用縫此膏出者已無用了不
可復入肚中反成禍只須擊去不妨此是開肉但放心去之肚
肉破傷者專用退利大小腸不可待秘恐成重患

打擗及樹木壓傷身痛者

打擗樹木壓或自高處擗下者此等傷皆驚動四肢五藏必有

惡血在內專怕惡心先用清心藥打血藥及通大小腸藥次
先服臨服加童子小便入藥內立効專用大小腸洗利恐作隘
塞利害之甚清心藥加前方通利大小腸藥服之自然俱通無
悶煩無惡血汚心以次用止痛藥服之即止

去惡血法

擗撲傷刀石傷諸般傷損至重者皆先服清心藥次服清小便
三服去血藥或被傷者血未結打從瘡口出或結在內用藥打
入大腸時即泄或被打破木壓惡血未積者用藥打散四
肢或歸臟腑者或歸上膈者打後口中吐出或歸中膈打入
腸泄出先用此急救次服止痛藥即二十五味藥中加減用

用藥湯使法

凡藥皆憑湯使所使方先但用清心藥煎後用童便一盞同服
或止痛重傷者則用姜湯燈心湯調二十五味藥服之薄荷湯

亦可

凡傷或刀傷及損內臟腑恐作煩悶崩血之患如折骨者用姜
酒服接骨藥傳之如骨碎被重打重擗重木及石壓者皆用先
服湯使法並未用酒服如輕擗撲損傷則用姜湯調下二十五
味藥立効

正骨通治方

傷原活血湯 治從高墜下惡血流於脇下疼痛不可忍

大黃 五錢 柴胡 當歸 各二 桃仁 五十箇

紅花 半兩 天花粉 川山甲 炮 甘草 各一

右作一服用水一鍾酒半鍾煎至八分食前服

補損當歸散 治墜馬落車及打傷折傷

當歸 芍藥 各七 附子 炮去 澤蘭 各一

桂心 四錢 蜀椒 三錢 甘草 各五

右為細末每服一錢食前用溫酒調服日三服忌海藻菜
菜生葱冷水

沒藥乳香散 治打撲傷損痛不可忍者

沒藥 別研 乳香 別研 內桂 去皮 當歸 焙

白芷 甘草 各一兩 白木 兩五

右為細末研勻每服二錢不拘時溫酒調服

二十五味藥 治癩瘻損傷骨碎骨折筋斷刺痛不問輕重並
皆治之

香白芷 附炒 紫金皮 附炒 劉寄奴 川當歸 鹽炒

赤芍藥 米泔 黑牽牛 川牛膝 鹽水 生地黃 鹽水

川芎 乳香 沒藥 破故紙 醋炒

木通 自然銅 骨碎不用 草烏 骨碎不用

木香 川烏 骨碎不用 骨碎補

木賊 官桂 羌活 獨活 各一兩

熟地黃 杜牛膝 各半兩

金刀傷挫白者去自然銅骨碎骨折者用之然頂於此方
內去自然銅臨好時却入用之如早服以成他疾同研為

末用蜜為丸如彈子大用黃丹為衣或被損撲傷金刀
箭鏃不問輕重每服一丸溫酒磨化服或細嚼酒送下如

被刀傷全斷內損重者以薄荷湯或木瓜湯姜湯燈心湯
皆可服病在上食後病在下食前在中者不拘時服

沒藥降聖丹 治打撲傷損筋斷骨折擊急疼痛不能屈伸及
榮衛虛弱外受風邪內傷經絡筋骨緩縱皮內刺痛有背

拘急身體倦怠四肢少力

沒藥 別研 當歸 酒洗 白芍藥 骨碎補 焙去

川烏頭 生去 自然銅 米泔 草烏 骨碎不用

川烏頭 生去 自然銅 米泔 草烏 骨碎不用

川烏頭 生去 自然銅 米泔 草烏 骨碎不用

川烏頭 生去 自然銅 米泔 草烏 骨碎不用

川烏頭 生去 自然銅 米泔 草烏 骨碎不用

川烏頭 生去 自然銅 米泔 草烏 骨碎不用

生地黃 川芎 各一兩

右為細末以生薑自然汁與煉蜜和丸每一兩作四丸每
服一丸搥碎用水酒各半鍾入蘇木少許煎至八分去蘇

木空心服

花蕊石散 治一切金刀折傷打撲身體血出急於傷處搽藥
如有內損血入臟腑熱煎童子小便入酒少許調二錢服

之立効若牛舐腸出不損者急送腸入用細絲或桑白皮
為線縫合肚皮縫上搽藥血止立活如無桑白皮用麻線

縫之亦可並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤
之然後搽藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死胎衣不

下並用童子小便調服

花蕊石 一兩 硫黃 上白明者四

右二味和勻先用紙筋和鹽泥固濟罐子一箇候乾入藥

於內再用泥封口候乾安在四方磚上上書八卦五行字

用炭一秤籠壘周圍於巳午時從下着火令漸漸上徹直

至經宿火冷炭消又放經宿鐵冷取出細研破瓶內盛依

前法

加味芎藭湯 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血如豆汁

芎藭 當歸 白芍藥 百合 水服

荊芥 各二

右作一服水一鍾半酒半鍾煎至八分不拘時服

導滯散 治重物壓傷或從高墜下或吐血不能禁止或瘀血
在內胃腹脹滿喘促氣短

當歸 大黃 各二

右為細末每服三錢不拘時溫酒調服

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

洗藥劑藥散	治從高墜下及一切傷折筋骨瘀血結聚疼痛	萬金膏	治癰疽發背諸般瘡癤從高墜下打撲傷損脚膝生
紫金皮	降真香	龍骨	龍骨
川續斷	琥珀	黃柏	黃柏
當歸	蒲黃	白芨	白芨
右為細末每服二錢食前濃煎蘇木當歸酒調服	大黃	草烏	草烏
沒藥丸	治打撲內損筋骨疼痛	沒藥	沒藥
芍藥	乳香	川芎	川芎
右為細末用黃蠟二兩微開入藥末不住手攪勻丸如彈	當歸	自然銅	自然銅
子大每服一丸用好酒一鍾化開煎至五分乘熱服之隨	右用藥豆粉新鐵銹內炒令紫色用熱酒同熱醋調令成	膏傳貼損處用磁花蓋貼將杉木一片或二片縛定其效	如神
活血散	治打撲傷折手足	黃芩	黃芩
右用藥豆粉新鐵銹內炒令紫色用熱酒同熱醋調令成	膏傳貼損處用磁花蓋貼將杉木一片或二片縛定其效	白芨	白芨
如神	如神	草烏	草烏
萬金膏	治癰疽發背諸般瘡癤從高墜下打撲傷損脚膝生	龍骨	龍骨
紫金皮	降真香	龍骨	龍骨
川續斷	琥珀	黃柏	黃柏
當歸	蒲黃	白芨	白芨
右為細末每服二錢食前濃煎蘇木當歸酒調服	大黃	草烏	草烏
沒藥丸	治打撲內損筋骨疼痛	沒藥	沒藥
芍藥	乳香	川芎	川芎
右為細末用黃蠟二兩微開入藥末不住手攪勻丸如彈	當歸	自然銅	自然銅
子大每服一丸用好酒一鍾化開煎至五分乘熱服之隨	右用藥豆粉新鐵銹內炒令紫色用熱酒同熱醋調令成	膏傳貼損處用磁花蓋貼將杉木一片或二片縛定其效	如神
活血散	治打撲傷折手足	黃芩	黃芩
右用藥豆粉新鐵銹內炒令紫色用熱酒同熱醋調令成	膏傳貼損處用磁花蓋貼將杉木一片或二片縛定其效	白芨	白芨
如神	如神	草烏	草烏
萬金膏	治癰疽發背諸般瘡癤從高墜下打撲傷損脚膝生	龍骨	龍骨

太醫院經驗奇效良方大全 卷五六

紫金皮散	治打撲傷損金刀箭鏃傷處浮腫用此	紫金皮	紫金皮
黃柏	草烏	川芎	川芎
右為細末每服半錢如發熱茶清調下發寒溫酒調下不	拘攣服	金頭蜈蚣	金頭蜈蚣
如聖散	治破傷風止血定痛	蒼朮	蒼朮
防風	防風	白芷	白芷
右為細末每服一錢不拘時酒調下如損骨折乳香五錢	一字散	治破傷風	一字散
玉真散	治諸瘡口入風為破傷風項強牙關緊急欲死者	防風	防風
急風散	治新舊諸瘡破傷中風項強背直腰反折口噤不語	手是抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之	急風散
手足抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之	手是抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之	麝香	麝香
右為細末研勻破傷風以酒調一錢不拘時服如出箭頭	先用酒調一錢就將此藥貼上箭瘡上	生黑豆	生黑豆
如聖散	治破傷風止血定痛	蒼朮	蒼朮
防風	防風	白芷	白芷
右為細末每服一錢不拘時酒調下如損骨折乳香五錢	一字散	治破傷風	一字散
玉真散	治諸瘡口入風為破傷風項強牙關緊急欲死者	防風	防風
急風散	治新舊諸瘡破傷中風項強背直腰反折口噤不語	手是抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之	急風散
手足抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之	手是抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之	麝香	麝香
右為細末研勻破傷風以酒調一錢不拘時服如出箭頭	先用酒調一錢就將此藥貼上箭瘡上	生黑豆	生黑豆
如聖散	治破傷風止血定痛	蒼朮	蒼朮
防風	防風	白芷	白芷
右為細末每服一錢不拘時酒調下如損骨折乳香五錢	一字散	治破傷風	一字散
玉真散	治諸瘡口入風為破傷風項強牙關緊急欲死者	防風	防風
急風散	治新舊諸瘡破傷中風項強背直腰反折口噤不語	手是抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之	急風散
手足抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之	手是抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之	麝香	麝香
右為細末研勻破傷風以酒調一錢不拘時服如出箭頭	先用酒調一錢就將此藥貼上箭瘡上	生黑豆	生黑豆

七五九

川芎 烏藥 破故紙 川白芷

劉寄奴 川牛膝 桑白皮

右為細末生薑薄荷汁兼水調傳腫處或傷處皮熱甚加

草烏散 治傷骨節不歸案者用此麻之然後下手整頓

白芷 川芎 木鼈子 猪牙皂角

烏藥 半夏 紫金皮 杜當歸

川烏 船香 草烏 木香

右為細末諸骨碎骨折出臼者每服一錢好酒調下麻倒

不知疼處或用力割開或用剪去骨鋒者以手整頓骨筋

歸元端正用夾板夾縛定然後醫治或箭鏃入骨不出亦

可用此藥麻之或鐵鉗拽出或用鑿開取出若入昏沉後

用鹽湯或鹽水與服立醒

白膠香散 治皮破筋斷

右用白膠香為末傳之又方金沸草根搗汁塗筋封口便

可相續止痛

應痛丸 治折傷後為四氣所侵手足疼者

破故紙 骨碎補 蒼木 草烏

川山甲 起為度炭灰亦可 船香

右除草烏半片用生薑一片搗爛同草烏一處淹兩兩宿

乾為末酒蒸麪糊為丸如梧桐子大每服五十九用酒或

米湯送下忌熱物

乳香散 治打傷損手足疼痛不可忍者

乳香 沒藥 白芷 肉桂

右為細末研勻每服二錢不拘時酒調下

破血散 治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其疼若楚不

可轉側

羌活 防風 肉桂 水蛭

柴胡 當歸 連翹 麝香

右作一服水一鍾酒一鍾前至一鍾去滓入水輕麝香末

調勻不拘時溫熱服

地龍散 治腰脊痛或打撲損傷從高墜下留在太陽經中令

人腰脊或脛膈臂腰中痛不可忍

地龍 官桂 蘇木 麻黃

黃柏 當歸 甘草 桃仁

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

調經散 治跌撲損傷踈利後用此藥調理

川芎 當歸 芍藥 黃芪

青皮 烏藥 陳皮 熟地黃

乳香 另研 茴香 右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

治金瘡白藥

黃柏 黃芩 當歸 赤芍藥

黃芪 牡丹皮 生地黃 木鼈子

黃連 地骨皮 桑白皮 甘草

白芷 馬藜 右用桐油二兩煎黃色濾去滓再煎油稍熟入細白反松

香一片慢火煎須臾柳枝攪勻却入乳香沒藥麝香

七錢煎數沸出火頃時以少綿鋪於前憑藥洋布上憑過

先用毛鉢滿盛清水八分却憑藥於鉢水中將去清水中

如細麪狀細三二百度愈細愈白故名白藥常以清水浸

傾於冷地上用物遮蓋勿令塵入五七日一換水刀斧一
燕金傷量傷孔大小取一塊填於傷孔中以白紙護之隨
手不疼一日一換五日生肉筋斷加杜仲續斷各二錢同
煎收瘡口加龍骨半錢碎了煎入藥內打損只敷於油紙
上貼之即愈却不須入接筋龍骨等劑

定痛乳香散 專治金傷非折骨打撲傷損

乳香 沒藥 各二 敗龜板 一兩 紫金皮 二兩

當歸 續斷 骨碎補 虎骨 各穿山甲 炒 炮

半兩 錢 五箇 如無以自煎

右為細末每服一錢如病沉服二錢以好酒調服損上者

食後服損下者食前服

生肌止血立効方 治全瘡碎一切風冷續筋骨

石灰 二升 搗生地黃清膏汁 狗頭灰 細研

艾葉 地松 蜜陀僧 各半

黃丹 一兩 麒麟竭 細研

右為細末研勻密封之每遇金瘡傳之

太乙膏 治金瘡箭鏃不問輕重并癰疽瘡毒用此傳之

白芷 蒼朮 石膏 醋炒 白膠香

乳香 沒香 黃丹 各五

右為末用真麻油四兩桐油亦可以黃蠟一兩先煎油柳

枝撿次入白芷等煎少頃却入白膠香石膏得同煎試欲

成珠却入蠟同煎片時用生布濾過瓦器收藏用油單紙

攤之損傷傳瘡口自然肉不痛速愈

百草散 治金瘡

右五月五日辰旦使四人出四方各於五里內採一方草

木葱葉每種各半把勿令漏脫一事日正午時細切曬乾

并石灰極令爛熟一石草筋一斗石灰先盤大實中藥
令可受藥取藥納孔中實緊令堅仍以桑樹皮蔽之用煎
油搗石灰極粘密泥之令不泄氣又以桑皮纏之使堅牢
至九月九日午時取出陰乾百日藥成搗之日曬令乾更
搗細篩貯放凡一切金瘡出血傷折即時以藥封裹治使
牢勿令動轉不過一二日即差不腫不膿不畏風若傷後
日始得藥須暖水洗令血出然後傳此藥大驗平時無事
宜多合以備倉卒金瘡之要無出於此一方云採時不得
回顧任意摘取方回入梓白內爛搗如泥量藥多少以意
入石灰和勻取出拍成膏日中曝乾遇用旋取搗碎若刀
斧傷乾傳取血止為度湯火傷冷水調開塗傳蛇蝎大鼠
咬傷先以溫水洗以津液調傳疥瘡先孤損以藥末乾貼
濕癬以醋調傳其効如神

凡殺傷不透膜者

右用乳香沒藥各一皂子大研爛以小便半盞好酒半盞

同藥通口服然後用花蕊石散或烏賊魚骨或龍骨為末

傳瘡口上立止

殺傷氣偶未絕

右取葱白熱鍋炒熟通傳傷處頃即再易其痛自止但青

葉亦可

灰彈散 治刀斧傷血出不止及多年惡瘡

右用多年石灰細研鷄子清調成團煨過候冷再研細若

刀斧傷瘡之患處若多年惡瘡以薑汁調傳一方單用石

灰搽患處表定並瘡

神仙刀箭藥

右取桑葉陰乾為末乾貼如無旋乾乾為末傳之一方用

新桑葉研取白汁塗之能合金瘡

治刀斧傷破及破傷風浮腫者

右用平胃散以薑汁調傳若急卒只以生薑和皮爛搗卷患處止痛截血且無死瘕

又方

用海紅縫內久年油灰研碎搽之佳

藥方 治金瘡內爛生蛆者

右以皂礬飛過乾貼其中即死

池榆縮煎

治刀刃所傷內損大腸及兩脇肋并腹肚傷破大便從口中出并中大箭透射傷損腸胃及治產後傷損小腸并尿囊破小便出無節止此方神效餌至一服其藥直至損處補定傷痕隔日開瘡口看之只有宿舊物出即無新惡物出瘡口內用長肉散子作熨子引散藥入瘡裏面

候長肉出外其痕即有合

地榆 入兩洗淨 綳一尺小 綳薄者

右用清水洗淨綳糊以炭灰淋清汁二斗煮綳灰汁盡為度綳以爛熟擊得成片段五寸至三寸即取出壓盡灰汁於清水內洗三五度令去灰力盡重入鍋內以水二斗入地榆末煎煮熱爛以手攪着不作綳片取入砂盆研之如麪糊得所分為二服片白粳米粥飲調空心服之服了仰臥不得驚動轉側言語忌一切毒食熱爛黃雌雞白米軟飯餘物不可食之其餘一服至來日空心亦用粥飲調服其特養一月由切須慎護如是產後所傷服一疋分作四服每服粥飲一中盞調服日一服

治刀傷及竹木刺出血

右急以自已小便淋洗三二次立止不妨入水

治金瘡

右以牛蒡葉貼之末不畏風亦不潰膿及搗傳之

麒麟竭散 治刀箭傷筋斷骨止痛定血避風

麒麟竭

白芷

白欬

當歸

白芷

白欬

當歸

甘草

右為細末每用少許乾搽瘡上立効

敗勢筋散 治金刃刀斧所中筋急不得屈伸

敗勢筋

秦芫

杜仲

熟地黃

附子

當歸

大棗

熟地黃

右為細末每服二錢七温酒調下空心日午夜卧各一服一方有續斷無大棗

治傷筋骨續筋方

右取旋伏根搗汁滴瘡中仍用滓傳瘡上封文二十日即

筋骨便續更不用易

磁石散 治金瘡腸出宜用之

磁石

磁石

滑石

鐵精

右為細末研勻每服一錢七温酒調下空心日午晚間各一服仍以針砂塗腸上其腸自收入一方用白米飲調服一方無鐵精

治破傷腸出不断腸出欲燥而草土看腸者

右作大麥粥取汁洗腸拒內之常研米粥飲之二十日

稍作強藥百日後可瘥草土當取在皮外

治金瘡中腸出不能入者

右以小麥三升用水九升煮取五升綿濾過候冷舍噴瘡

上漸入以冷水噴其背不宜多令人見亦不欲令病人語

又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

身搗頭更腸自入十日內食不可飽類食而少勿使病人驚亡則殺人

治金瘡腸出者

右以桑白皮作線縫之更以熟鷄血塗上立愈唐六藏割腸用此法効

雄黃散

治藥毒箭頭在身未出

雄黃一分 粉霜一分 燒根四分 研

巴豆三粒 去皮生用 別

右同研勻以銅筋頭取乳汁塗點瘡上頻頻用之七日瘡熱箭頭自出

藍汁飲

治毒箭折中

右搗藍汁一升飲之滓傳瘡上若無藍取青布漬絞汁服之并淋瘡中鐵不出搗鼠肝塗之鼠腦亦出

貝子散

治毒箭

右以貝子搗為末每服一錢七溫酒調下不拘時日三四服此方治中毒并金瘡止痛

紅散子

瘡金瘡上

草烏尖 麒麟竭 茄子花 蔓陀羅子

右為細末好酒調如膏瘡口上塗摩之箭頭自出

牡舟散

治金瘡箭頭在骨遠年不出

牡丹皮去心 白欬各一分 桑白皮二兩 麝香一分

右為細末每服二錢七溫酒調下日三服淡者十日深者二十日箭頭自出

蟾蜍丸

治金瘡箭鐵在骨中遠年不出者

蟾蜍五枚 蜈蚣三枚 赤小豆一分 赤鯉魚鱗一分

石研細以鮮研和丸如菜豆大每有瘡口只於瘡口內紅

動輕搖即出

出箭頭方

蟾蜍十箇 土狗子三箇 婦人髮灰少許

右將蟾蜍去殼取白肉與二味同研如泥用生塗中箭處如膏塗後內微痒即以兩手蹙之其箭頭自出

解骨丸

治箭鐵不出

雄黃研 蜈蚣研 象牙末各等

右為細末煉蜜和丸如黍米大內瘡口內後細嚼羊腎脂貼之覺痒箭頭自出

治箭鐵入骨取不出疼痛宜用此方

巴豆三枚 蜈蚣三枚

右研塗所傷處候痛定微痒忍之極痒不可忍即撼動拔出以用生膏藥傳之以黃蓮貫衆湯洗畢以牛膽製風化石灰傳之兼治惡瘡

夏候邨云初在潤州得方箭鐵出後速以生肌膏傳之說者云兼治瘡邨得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟邨遂用此方試之愈

治箭頭不出方

磁石極細 雄黃三分

右同研勻每服二錢七空心菜豆汁調服十日後輕撥便出手足上用此藥貼之自出

取箭鐵方

右用天水牛一箇獨角小者尤妙用小瓶盛之用研砂一錢研細用水少滴在內浸自然化水以藥水滴在傷處箭頭自然出也

准西總管趙領衛名高毅殺密之子云仇防禦方張循王囊求不得因奏知德壽宣取以賜之有奇効與楊氏方中用巴豆燒蝦者大率相似

治箭頭在咽喉中或胃膈中及諸處不出者

右用鼠肝五具細切爛研傳之兼以鼠腦髓或鼠頭血塗之並良亦治人針折在肉不出并刀刃傷

牛膝膏 治箭頭在咽喉中或胃膈中及諸處不出者

右搗牛膝不拘多少為末以熱水調塗箭頭即出若火瘡灸瘡不瘥者塗之亦効

治箭頭在肉不出方

右以白項蚯蚓十四條內銅器中次入鹽一兩於日中曝並化作汁塗有箭鏃并刀傷處須臾則出

又方 治箭頭及諸刀刃在咽喉胃膈諸處不出者

右嚼杏仁不限多少塗之一方研杏仁細傅之

又方 治箭鏃中傷在咽喉胸膈不出及針刺不出者

右用蟻姑即土狗虫乾者濃煎汁滴上三五度箭頭自出

鼠油膏 出箭頭

鼠取嫩髮 蟻蝦 皂角 燒灰 定粉

龍骨 乳香 少許

右為細末以鼠油和成膏點塗在瘡口內其上更用礞石末蓋之箭頭自出

神聖膏 取針浸入皮膚

車脂鈺鈔

右成膏子者好攤在紙上如錢許二日一換三五次其針自出大有神効

當歸散 一名內補散 治金瘡去血多虛竭此藥內補

當歸 微炒 川芎 乾薑炮 川椒 味炒出并合

桂心 黃芩 桑白皮 吳茱萸 湯浸炒

白芍藥 甘草 肉桂 各兩 酒浸一

人參 黃芪 厚朴 各兩 薑汁炙

右為細末每服二錢食前溫酒調下日三四服一方有白

艾無黃芩桑白皮

內塞散 治金瘡去血多虛竭或痛羸弱內補

黃芪 當歸 白芷 芎藭

乾薑 黃芩 芍藥 續斷 二兩

附子 半兩 細辛 一兩 鹿茸 三兩

右為細末每服五分七食前酒調下日三服稍增至方寸

七一方無芍藥

蒲黃散 治金瘡血出腹脹欲死

蒲黃 生地黃 各兩 黃芪 當歸

芎藭 白芷 續斷 各兩 甘草 三分

右為細末每服三錢七空心酒調下日三四服血化為水

而下若口噤幹開口與之仍加大黃一兩半

如神散 治一切刀斧所傷血出不止并久患惡瘡

虎骨 炙研 鉛丹 火炒 龍骨 研各 乳香 炒另研

膩粉 研 丹砂 研 麝香 少許

右研極細勻一切瘡以黃連湯或益湯洗拭乾搽藥在瘡

上不得衣粘著瘡口

金傷散 治金刃箭鐵所傷血出不止及落馬打傷內破血出

白芨 黃欬 乳香七兩 各石灰半斤 研碎

龍骨半兩 黃丹少許

右為細末入黃丹研如淡紅色每用乾摻患處上用軟紙

更以絹帛裹護忌風水乾亦為妙

定血散 治一切刀傷血出不止收斂瘡口

南星生 槐花炒 鬱金四兩 各半夏二兩

乳香研 沒藥各二錢半

右為細末研勻每用乾摻患處忌水洗

神仙止血散

龍骨五兩 訶子去核各兩 苧麻葉煎用五月五日午

白石脂兩

右為細末每服一錢半食遠水調服之如修合時忌婦人

鷄大見

治金刃或打傷血出不止

降真香末 五倍子末 銅末是削下鏡面銅於

右拌勻傳損處昔安豐手擊朱蒿碎首用此而愈

治金瘡傷損血出

右用生牛膽入石灰末候乾摻上即止以臘月牛膽入風

化石灰懸當風處候乾用

五倍散 治金瘡血出不止亦治疔瘡

右以五倍子生研為末乾貼血立止

神奇散 治刀斧傷并箭傷血出不能止者

麒麟竭研 沒藥研 自然銅研 南星炮

乾薑燒灰 鉛丹炒黑 膩粉 瓦蘇各一

麝香少許

右為細末和勻先以盪湯洗瘡却以燒葱搗汁塗於患處

搽瘡上三二次

軍中一捻金散

金櫻葉 嫩葶藶各二兩 桑葉一兩

右搗爛傳若欲致遠陰乾作末用綿縛上血止血合名草

蝎經進方以五月五日或閉日收藥良

治金瘡出血內漏

右用蝙蝠二枚燒煙盡為末以水調服方寸七令一日服

盡當下如水血自消也

治諸傷瘀血不散

右於五六月收野苧葉搗爛塗金瘡上如瘀血在腹用順

流水搗爛服即通血皆化水以死猪血試之可發吹目於

無藥可早收之

生乾地黃散 治金瘡煩悶

生乾地黃 白芷 當歸炮 桃仁去皮炒

續斷 黃芩 赤芍藥 羚羊角研

甘草炙各 芫花各 桂心各三

右為細末每服二錢食前溫酒調下日三四服

白薇散 治金瘡煩悶不得眠卧疼痛

白薇 枳實炒 辛美仁 瓜蒌根

赤芍藥 甘草炙各 酸棗仁微炒

右為細末每服二錢食前溫酒調下日三四服

琥珀散 治金瘡弓弩箭中悶絕無所識

右用琥珀研如粉以童子小便調一錢服三服瘳高祖特

寧州貢琥珀枕碎以賜軍士博金瘡

蒲黃方 治金瘡中風寒水露腫痛入腹

蒲黃

右為細末每服一錢食前溫酒調下日三四服

治金瘡中風寒水露腫痛入腹

治金瘡中風寒水露腫痛入腹

治金瘡中風寒水露腫痛入腹

治金瘡中風寒水露腫痛入腹

治金瘡中風寒水露腫痛入腹

治金瘡中風寒水露腫痛入腹

治金瘡中風寒水露腫痛入腹

治金瘡中風寒水露腫痛入腹

右用蒲黃并荷青布內在小口瓶中燒取煙薰發汗出愈
虎骨散 治金瘡中風症肢節筋脈拘急

虎脛骨酥炙當歸微炒 敗龜板酥炙 桃仁去尖 杏仁去尖 乾蟬微炒 芍藥已上各 黑豆五合 松脂二兩

桂心三分

右先將松脂并黑豆炒令熟後和諸藥搗為末每服二錢不拘時溫酒調下

豆淋酒 治因金瘡中風反強者

大豆六合 鷄矢白一合

右炒令大豆焦黑次入鷄矢白同炒乘熱滿於三升酒中密蓋良久瀝去滓每服五合如人行五里更一服汗出佳末瘥即更作服之汗出為度服後宜喫熱生薑粥投之

聖封方 治金瘡中風角弓反張
生鷄子一枚 烏麻油三兩

右先將鷄子打破與麻油相和煎之稍稠待冷塗封瘡上又方 治金瘡中風症欲死者及諸大脉皆血出多不可止血

冷則殺人

右用生葛根一斤剉碎以水五升煮取三升去滓每服熱飲一小盞日三四服若乾者搗為末每服二錢溫酒調服

若口噤不開但多服竹瀝即止

葫蘆方 治金瘡得風身強口噤不能語或因打破而得

及刀斧所傷得風臨死服此並差

右取末開葫蘆一枚長柄者開其口隨瘡大小開之令瘡大小相當可繞四邊閉塞勿使通氣上後開一孔取麻子油燭兩條並燃以葫蘆口向下薰之燭盡更續之不過半日即瘥若不止亦可經一二日薰之以瘥為度若燭長不

得內葫蘆可中折用之

必效酒 治金瘡中風角弓反張者

右用蒜四破去心頂一升以无灰酒四升煮蒜令極爛并滓每服五合頓服之須臾得得汗瘥

豆淋酒 治金刃傷破見骨中風口噤

右用大豆炒去腥半熟勿使太熟五升粗搗篩蒸一籠頃傾出金中以酒一斗五升淋之絞去滓每溫服五合至七合日二夜一夜蓋覆微汗出別研生杏仁膏傅於瘡上若腦髓出者難救

治金瘡因風水腫

右取蠟不以多少溶化入鹽少許滴在瘡上或先以鹽糝瘡上後溶蠟令熟得所灌瘡中亦可

艾葉方 治金瘡中風製痛并手足不仁

右用艾葉生熟者令揉團得所內瓦甑中塞諸孔獨留一目以通氣蒸熟患處良久身體自知立愈

龍骨散 治金刀箭傷生肌長肉定痛止血諸瘡效口

龍骨 滑石 枯礬 寒水石

乳香 沒藥 黃丹炒 輕粉

右為細末每用乾摻外用膏藥貼之效

金傷散 治刀斧傷碎風生肌止痛

白芨 黃丹 陳石灰風化 桑白皮酒

龍骨 南星 白附子酒

右為細末每用乾貼之

完肌散 治金瘡

陳石灰二兩 黃丹半兩 龍骨 密陀僧

桑白皮酒 麝香另 磁

右為細末乾搽患處
生肌膏 治金瘡及一切打損瘡

胡粉 白芍藥 薑蔞香 乾薑炮略
油四兩 黃蠟二兩

劉寄奴效散 飲金瘡止痛
右取劉寄奴為末搽患處一方治湯火瘡以劉寄奴為末

先以糯米漿糊搽傷處後搽藥末在上並不痛亦無痕
大凡傷者急用炒鹽末搽之護肉不壞然後藥傳之

朱氏集驗方云宋高祖劉裕微時伐狄見大蛇長數丈射
之傷明日復至聞有祈白聲往視之見青衣童子數人於

榛中搗藥問其故答曰我王為劉寄奴所射合藥傳之帝
曰吾神何不死答曰寄奴王者不死不可殺帝叱之皆散

收藥而反每遇金瘡傳之良驗寄奴高祖小字也

治金瘡生肌肉
右生搗雞白以火封之更以火就炙令熱氣徹瘡中乾即

易之白色者好亦治金瘡中風水腫痛

止血收瘡口方
右以鷄內金焙為末傳之立止

雙鐵散 治刀斧傷止血定痛生肌
右用晚雙鐵不以多少為細末每用乾貼於瘡口上以綿

裹不須再動一止便可

定血散 治刀斧傷止血定痛生肌
密陀僧半斤 烏賊魚骨 龍骨 白礬末各

桑白皮一斤 黃丹一兩
右為細末每用乾搽患處定血如神

綠藥散 治竹草刺瘡發腫作疾傷時不曾出血蓋被惡毒氣
注痛不止夜則不安初破時其瘡紫赤黑色較時起三五

重皮是也
綠藥散內取小使燒熟投藥丹參二錢 麝香一分
馬地鈴根半錢

右為細末漿水洗淨瘡口上敷貼立效

又方 治被刺入肉或鐵棘竹木等多日不出疼痛
人參一兩 龍葵根洗一匙 醋炒

臘月猪脂一兩
右為末和搗令勻每用少許傳瘡上其刺自出

治手足卒中刺中水毒方
莖 藍青
右搗置瘡上以火炙熱微即愈

又方
右嚼鼓不以多少塗之良若治狐兔刺人者當看鼓中有

毛為度如無再傳之

治竹刺不出者
右擗研草麻以絹帛襯傷處然後傳藥時時看視若刺

出即拔恐藥太繁并好肉努出也一方不用絹襯

牛蒡藥散 治一切金木竹所傷
右用牛蒡藥惡實是六七月收者風乾為末每用乾搽不

得犯別藥如經暑月蠅虫下蛆在瘡上或因肌肉生合有

成癢子者即用杏仁研成膏手搽作條子入在瘡內其蛆

虫自出
治刺傷中風水腫
右用鯉魚目燒灰研傳患處汁出即愈諸魚日皆用鯉

魚目尤佳
松脂方 治刺入肉疼悶百理不差

右以松脂傳瘡上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自落甚良

治針入肉方

右刮指甲末同酸棗仁搗爛噉調塗上次日定出一方用酸棗核燒為末服之

又方

治烏雞尾刺在肉中不出者及治竹木針刺

右用烏雞尾翎二七垂燒作灰以乳男子乳汁和封瘡口其刺即出

桂蠟丸 治惡刺入肉

右用桂去粗皮搗為末熔黃蠟丸看病大小置瘡內四五三五重搭蓋以火煖候藥丸熔入肉其刺自出如無刺所

傷者尤見愈速

孔香膏 治金瘡杖瘡神効

乳香 沒藥 川芎 自然銅已上各

當歸 羌活 獨活 川牛膝

石膏 劉寄奴 黑牽牛 黃柏皮

破故紙 白膠香 生地黃 熟地黃

赤芍藥 白芍藥 紫金皮 黃丹

白芷 黃蠟一兩 清油四兩

右除膠香外餘藥為末入油內煎以柳枝不住手攪試將成膏却入三味更試成膏以生布濾淨以瓦器盛水

傾在水中用草攤開貼瘡孔深者搗成膏條穿入孔中不問淺深按瘡上如作熱加輕粉片腦扑硝入膏內貼之

治杖瘡

片膠 鮮香粉五 龍骨 密陀僧

胭脂 輕粉 乳香 沒藥

寒水石 煅

右為細末乾搽瘡上四邊以生麪糊圍定次用緋紅絹帛

貼之

乳香散 治杖瘡腫痛

大黃 黃連 黃柏 黃芩已上各

乳香另研 沒藥另研各片腦少許

右為細末研勻冷水調攤緋絹上貼之

治杖瘡

血竭 輕粉 乾胭脂 密陀僧

乳香 沒藥各等

右為細末先以冷水洗淨拭乾以猪脂調搽紅紙貼之愈

龍腦潤肌散 治杖瘡熱毒痂疔

龍腦一字 輕粉半錢 麝香半錢 密陀僧二錢

黃丹一兩

右為細末每用乾搽上用青帛貼之內留一孔

生肌桃花散

輕粉 血竭 密陀僧 乾胭脂各一

乳香二錢

右研細每用乾搽仍以膏藥貼之

靈異膏 治杖瘡金瘡癩瘡皮破湯火傷久年惡瘡

川礬金三兩 生地黃二兩 粉草一兩 臘猪板脂一斤

右剉細入脂內煎焦黑色濾去滓入明淨黃蠟四兩熬化

攪勻以磁器貯之水浸久去水收用時先以冷水洗瘡拭

乾却敷藥在瘡上外以白紙貼之止血定疼且無痕瘡湯

燙火燒不須水洗治凍瘡尤妙

圍藥

治腫未破用此消腫定疼

無名異炒

木耳炒土

大黃炒

右為極細末用蜜水調圍四邊腫處

松皮散

治金刀箭鏃傷用此生肌

老松皮

一兩石

灰二兩者以毛盛之上用

一匙

右為細末和勻傳之止血收瘡口立効

太醫院經驗奇効良方卷之五十六