




《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇一一・子部・醫家類

鼎鑿幼幼集成六卷（卷三至卷六）〔清〕陳復正撰……………一

聞人氏痘疹論四卷〔宋〕聞人規撰……………一七九

痘疹世醫心法十二卷 痘疹格致要論十一卷〔明〕萬全撰……………二四七

活幼心法九卷〔明〕聶尚恒撰……………四二五

救偏瑣言十卷備用良方一卷〔清〕費啟泰撰……………六一七

鼎鑊幼幼集成卷之三

羅浮陳復正飛霞氏 輯訂

廬陵劉 勤案孟氏 校正

遂陽周宗頤虛中氏 參定

○咳嗽證治

帝曰肺之令人欬何也岐伯曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也又曰邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背○夫肺為華蓋口鼻相通息之出入氣之升降必由之路故專主氣經曰形寒飲冷

幼幼集成

卷之三

一

則傷肺由兒衣太薄及冷飲之類傷於寒也經曰熱傷肺由兒衣太厚愛養過溫傷於熱也又曰皮毛者肺之合皮毛先受邪氣邪氣得從其合使氣上而不下逆而不收克塞咽嗑故令咳嗽也凡有聲無痰謂之咳肺氣傷也有痰無聲謂之嗽脾濕動也有聲有痰謂之咳嗽初傷於肺繼動脾濕也小兒由風寒乳食不慎而致病者尤多矣經曰五臟六腑皆令人欬然必臟腑各受其邪而與之要終不離乎肺也但因痰而嗽者痰為重主治

聰明按程正字通俗說字規集韻研計功寄也批也

在脾因咳而動痰者咳為重主治在肺以時而言之清晨咳者屬痰火午前嗽者屬胃火午後嗽者屬陰虛黃昏嗽者火浮於肺五更嗽者食積滯於三焦肺實者頓嗽抱首面赤反食肺虛者氣逆虛鳴面自殭泄肺熱者痰腥而稠身熱喘滿鼻乾面紅手捏眉目肺寒者嗽多痰清面白而喘惡風多涕故治者各因其虛實寒熱而調之斯無誤矣因於寒者則氣壅喘促聲濁而無汗鼻塞聲重宜參蘇飲微汗之

幼幼集成

卷之三

二

咳而氣逆喘嗽面白有痰此肺本經病宜清肺飲咳甚葶藶丸微利之咳而喉中介介有聲面赤發熱心煩或咽喉痛聲啞者此肺病兼見心證宜清寧散咽喉痛沈滌丹咳而面黃體倦痰涎壅盛或吐痰或吐乳食此肺病兼見脾證大抵咳嗽屬脾肺者居多以肺主氣脾主痰故也宜橘皮湯咳而面青多怒痰涎壅盛而發搐者蓋因咳嗽聲不能轉所以瞪目直視此肺病兼見肝證宜集成金

粟丹

咳而面色闇黑，人咳而吐痰水，此肺病兼見腎虛，宜

六味地黃丸加麥冬五味。

咳而聲不出，口鼻出血者，此氣逆血亦逆也，須順氣

寧嗽為主，宜人參冬花膏。

咳而人不止，並無他證，乃肺虛也，只宜補脾為主人

參五味子湯。

咳而胸高骨起，其狀如龜者，謂之龜胸，此肺熱之極

陽火熏蒸而致也，清燥救肺湯。

幼幼集

卷之三

三

咳而日人胸前疼痛，口吐膿血腥臭者，此肺火壅盛

已成癰也，桔梗湯治不如法，其證多死。

凡咳嗽痰涎壅塞，逆氣冲併而作搐者，多難治，故頭

搖目上視及閉目呻吟，手足擺舞，肩息胸突喉中

痰鳴口噤不乳，喘而手足冷，皆死證也。

○入方

人參敗毒散

此方辛平升散為咳門第一神方，舉世少有知者。

凡有咳嗽無論內傷飲食外感風寒夾濕夾毒不

拘男婦大小胸緊氣急咽痛口苦痰不相應，即用

此方升散之，或感日重者服此，其咳愈甚，不知者

以為藥不相符，棄而勿服，不知正是升散之力佳

兆也，再服之，漸次輕減，不拘劑數，只以痰應為度

聲嚮痰出，是其效也，枯燥之人數劑之後，略加沙

參玉竹當歸白芍生地麥冬之類以滋其陰，無不

愈者，再有叮嚀，凡咳嗽初起，切不可誤用寒涼及

滋陰之藥，閉其肺竅為害不小，但以辛散為先，着

俟痰應之後，漸加滋陰則得矣。

幼幼集

卷之三

四

官揀參五七分不

非桔梗錢

正川芎錢

白雲苓錢

陳枳殼錢

信前胡錢

川羌活七分

川獨活五分

北柴胡錢

南薄荷錢

荆芥穗錢

北防風錢

淨連翹錢

炙甘草五分

生薑一片為引，水煎半饑服，每日二劑。

參蘇飲

治四時感冒頭痛發熱咳嗽痰盛，此方不如前方

用之多不效，姑存之。

官揀參五分

白雲苓錢

陳枳殼錢

法半夏錢

信前胡錢一 芽桔梗錢一 老蘇葉錢一 粉乾葛錢一

真廣皮錢一 炙甘草分五

生薑三片葱白三寸水煎溫服取微汗

清肺飲

治氣逆而咳面白有痰

信前胡錢一 北柴胡分七 桑白皮分五 陳枳殼錢一

淨知母錢一 川貝母錢一 南薄荷分七 白雲苓錢一

白桔梗錢一 金井膠錢一 大麥冬錢一 荆芥穗錢一

炙甘草分五

幼幼集成

卷之三

五

水煎熱服切忌油膩

葶藶丸

治乳食衝脾傷風咳嗽面赤身熱痰多喘嗽

甜葶藶去土隔紙罌炒 黑牽牛炒 光杏仁去皮尖炒黃色另研

漢防已炒

右藥等分爲細末入杏仁泥和蒸棗肉爲丸棗豆

大每五七丸薑湯化下量兒大小加減

此丸因乳食傷脾痰甚者及壯實小兒可用之苟

不因乳食所傷并怯弱者本方去牽牛易家蘇子

等分炒研爲丸效

清寧散

治心肺有熱而令咳嗽宜從小便利出

桑白皮蜜炒 甜葶藶微炒 赤茯苓酒炒 車前子炒

炙甘草半減

右爲細末每服五分生薑大棗煎湯調服

集成沈瀆丹

方見二卷胎疾門

橘皮湯

幼幼集成

卷之三

六

治咳嗽痰甚嘔吐

法半夏錢一 白雲苓錢一 真廣皮錢一 旋覆花錢一

北細辛分五 官揀參分五 芽桔梗錢一 陳枳殼錢一

炙甘草分五

生薑三片大棗一枚水煎徐服

集成金粟丹

方見二卷類搐門

六味地黃湯

方見二卷胎疾門

人參冬花膏

治氣逆咳血痰中見血

官揀參 天門冬 麥門冬 欵冬花 川貝母

桑白皮 金井膠 片枯芩 白當歸已上各一錢

北五味 炙甘草各五分

右為細末煉蜜為丸龍眼核大每一丸燈心湯下

人參五味子湯

治火嗽脾虛中氣怯弱面白唇白此神方也

官揀參 漂白木錢五分 白雲苓錢一 北五味錢五分

幼幼集成

杭麥冬 炙甘草八分

生薑三片大棗三枚水煎溫服

清燥救肺湯 喻嘉言製

治諸氣積鬱諸痿喘嘔皆屬肺之燥也

鮮桑葉經霜者得金氣而柔潤不凋取之為君用二錢 炙甘草和胃生

熟石膏稟清肅之氣極清肺熱用一錢二分 官揀參生胃之津養

胡麻仁炒研一錢 真阿膠八分 杭麥冬去心一錢二分

北杏仁泡去皮尖炒黃七分 枇杷葉一片刷去毛蜜塗炙黃用

水一碗煎六分頻分二三次服痰多加川貝母

瓜蒌血虛加生地黃熱甚加犀角羚羊角

桔梗湯

治肺癰出膿血

牙桔梗錢二 白當歸錢一 川貝母錢一 瓜蒌皮錢一

漢防己錢一 光杏仁五分 陳枳殼錢一 薤白仁錢一

生黃耆錢一 鮮桑葉錢一 潤玄參錢一

用蘆茅嫩根三錢為引水煎熱服

○百晬嗽論

凡乳子百日內有痰嗽者謂之百晬嗽或出胎暴受

幼幼集成

風寒或浴兒為風所襲或解換襦裳或出懷喂乳

而風寒得以乘之此病由外來者或乳汁過多吞

嚥不及而噎者或啼哭未定以乳哺之氣逆而嗽

者此病由於內生者皆能為嗽第前汗下之劑難

於用之以其胃氣方生不能勝藥故也故曰百晬

嗽難醫然雖曰難醫正未嘗曰不醫予之治此未

為不多其用藥之治有案在後復有不治之治更

為捷徑而又百治百愈但須乳母聽戒治之無難

凡遇百晬嗽先用荆防敗毒二小劑母子同服服

完止藥惟令乳母忌口凡葷酒油膩醃醋鹹薑  
椒辛辣青菜麪食之類一舉屏絕惟用香茶白飯  
少佐橘餅橙片以清其乳雖兒嗽至重者不過十  
日八日得備清乳嗽自愈矣倘不聽戒復不擇醫  
徒然服藥有名無實竟何益哉

○附案

遼陽明經高君作梅翁與令翁雲軒翁同於甲寅五  
月舉子然皆膏梁之稟胎元怯弱於七月間兩兒  
同患百啞嗽予謂雲翁曰公郎面白眼淡白眼帶

幼幼集成

卷之三

九

青嗽聲連續痰不相應此肝風有餘肺氣不足雖  
有喘嗽未可以常法治之設投疎風清肺適足益  
燥傷陰不特嗽不能愈而證必加重雲翁深以為  
是乃投人參五味子湯其應如響四劑全瘳計用  
人參二錢八分作翁者其體更弱外候面白眼青  
自汗多嗽滿頭青筋頤門寬大因謂之曰令姪正  
同此證已服補脾保肺之劑愈矣公郎中氣更虛  
速宜用參始不費手適有老嫗專挑馬牙者從內  
阻之復有醫者從外阻之力言不可用參服參則

明按天  
六自詳

不可治且云未見百日之兒敢用參者老嫗更囑  
其母曰道翁九藥切不可服其中多有人參服之  
為害不淺其母聞之以為誠然於是視予藥如砒  
毒矣作翁因素艱嗣息莫能張主於予言似有陽  
是陰否之意予見其遲疑不決亦不敢強姑聽之  
此醫日一診視自七月下旬治起直至十月初旬  
作翁往府考其病愈治愈危竟至於奄奄一縷  
而逆證叢生無可救藥醫者束手乏策老嫗緘口  
無言皆絕迹不至矣夫人輩無所倚仗復懇於予

幼幼集成

卷之三

十

予嘆曰早聽予言何有今日乃入診視見其面目  
如藍形體惟皮束骨聲啞無音咳嗽氣促兩汗淋  
漓四肢搐掣逆證全具毫無生機因不忍釋手詳  
為審視惟兩目神光尚存予曰生機或在是乎遂  
以大參一錢天員五粒蒸湯與服初服小半予為  
抱之環步室中審其呼吸之息氣雖未減而亦不  
見其增即與服完良人覺氣稍順予喜曰得之矣  
遂用大參二錢天員肉七粒蒸湯服之竟獲大效  
是夜汗搐俱止喘嗽畧亦輕減第苦於人小體弱



卽二錢之參湯亦須一夜方能服完幸予此時行功習靜數載未嘗設榻終夕無眠竟與抱之晝夜不一釋手醒卽予服服後仍睡數日之後則鼾聲如雷睡眠極穩呼吸極長予知爲氣復神歸之效如此者十晝夜諸證已愈八九惟形色未復音聲未亮予曰功程雖半未敢暫停參須倍之於是每日大參四錢天員十四如前調理計前後二十晝夜共用官揀六兩有零始奏全績於是聲音清亮面色紅融肌肉復生精神勝舊今已長成儼然丈夫矣

幼幼集成

卷之三

十一

夫夫矣而且聰明特達經史皆通他日翺翔奚能限量如此之證如此之治不特世人未見醫家未聞卽諸書亦所未載半週孔子而用六兩之參起沉痾於萬難之日苟無定識者未必有成故非懇同道但須認證真確不必拘泥古方神而明之存乎人耳或問二證皆百晝嗽何以前證用藥而後證獨用參者何也曰各有理焉前證在七月間正肺金旺特爲風邪衝併但傷其中氣他臟無涉故以四君

子補脾生脈散保肺收其耗散之金得返清肅之令中氣一回應手而愈後證自七月起至十月金已退氣正當木旺木相之時山腎水無源所以肝木失養誠母病子傷故面目俱青手足搐掣此非肝強實肝敗也內經有善則不見惡則見之言顯然可證在常俗之輩見其搐掣又必爲之鎮驚化痰截風定搐矣誰復爲之保固真元維持竭絕哉不知此等之證陰陽兩敗臟腑俱傷苟非大力之品莫可挽回所以屏去雜藥獨用人參之甘

幼幼集成

卷之三

十二

溫天圓之甘潤味極純正創之兒喜况人參之力在陰益陰在陽益陽榮衛氣血精神意智無不補者而且晝夜不徹則真元陰受其長養之功烏得不效又曰初服卽效而必待三七之日始奏全績者何也曰剋制過傷枯燥已極如旱苗焦壤暴雨無裨必滌滌潤澤始可盈科至於三七之人天地來復之機業已三至人身榮衛已周一千五十度升降有恒神氣已足不藥之慶夫復何疑此等之治非謂世之嬰兒一有咳嗽便當用參第稟受先

虧胎元怯弱者有不得不用之勢獨惜前醫偏執已見卽數分之參斷不肯用孰知用至六兩之多始收全效可見辨證不真誤人非淺故筆此以爲擇醫者勸

○咳嗽簡便方

小兒咳嗽聲不出者紫苑微炒研末杏仁去皮尖研如泥等分煉蜜爲丸芡實大每服一九北五味七粒煎湯化服

肺實咳嗽痰喘葶藶子隔紙炒爲末棗肉爲丸龍眼

幼幼集成

卷之三

十三

核大每一九白湯化服

咳嗽多痰葶藶子隔紙炒知母微炒各五錢研末砂糖爲丸芡實大每一九白湯化下

小兒喘嗽發熱自汗吐紅脈虛無力人參切片焙乾天花粉切片酒炒等分爲末每服五分蜜湯調服以瘥爲度

秋天肺燥咳嗽無痰北沙參一味每服五錢淨水濃煎熱服

小兒百晬嗽痰壅喘咳川貝母五錢淡薑湯潤濕飯

上蒸過甘草半生半炒二錢五分研細末沙糖爲丸龍眼核大每一九米飲化服

熱痰咳嗽痰出稠濃或咽喉痛製南星製半夏各三錢半枯黃芩七錢焙燥爲末砂糖爲丸芡實大每用一九薑湯化服

○哮喘證治

經曰犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六府入六府則身熱不得臥上爲喘呼又曰肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出○夫喘者惡候也肺金清肅之令

幼幼集成

卷之三

十四

不能下行故上逆而爲喘經曰諸氣臏鬱皆屬於肺喘者肺之臏鬱也

吼者喉中如拽鋸若水鷄聲者是也喘者氣促而連屬不能以息者是也故吼以聲嚮言喘以氣息名凡喉如水鷄聲者爲實喉如鼾聲者爲虛雖由於痰火內鬱風寒外束而治之者不可不分虛實也

有因外感而得者必惡寒發熱面赤唇紅鼻息不利清便自調邪在表也宜發散之五虎湯

微下之

有因宿食而得者必痰涎壅盛喘息有聲先用山楂神麩麥芽各三錢煎湯與服消其食次下緡湯

素有哮喘之疾遇天寒暄不時犯則連綿不巳發過

自愈不須上方於未發時可預防之有一發即能

吐痰者宜服補腎地黃丸加五味故脂多服自愈

有發而不吐痰者宜痰喘方

凡哮喘初發宜服蘇陳九寶湯蓋哮喘為頑痰閉塞

非麻黃不足以開其肺竅放胆用之百發百中

幼幼集成 卷之三

十五

或胸膈積熱心火凌肺熱痰壅盛忽然大喘者名馬

脾風蓋心為午火屬馬言心脾有風熱也小兒此

證最多不急治必死用牛黃奪命散下之效

凡大病久病之後或久服寒涼剋削之後或久吐火

瀉之後忽然氣急似喘非喘氣息短促名為短氣

短者斷之其氣將脫也速宜挽救人參五味子湯

效

又有虛敗之證忽然張口大喘入少出多而氣息往

來無滯此腎不納氣浮散於外大商之兆速投貞

晚明按給 約產約集 見七

元飲不效理陰煎加人參鹿茸或可挽救

如汗出如油髮潤而喘者肺絕也汗出如油張口大

喘者命絕也直視謔語而喘者肝絕也凡大病正

氣欲絕無根脫氣上衝必大喘而絕矣

○入方

五虎湯

治寒邪入肺而作船軀蓋船軀為寒痰固結非此

方不能解散

淨麻黃七分 光杏仁一錢 陳細茶一錢 熟石膏五錢

幼幼集成 卷之三

十六

炙甘草四分

淨水煎空心服

葶蘆丸

方見三卷咳嗽門

千緡湯

治痰閉肺竅喘息有聲

法半夏二錢 大皂角五分 老生薑一錢 炙甘草一錢

水煎服 已上皆素無哮喘而暴發者用

補腎地黃丸

治先天不足肝腎虛者通用

熟地黃 懷山藥 山茱肉各一兩 嫩鹿茸

淮牛膝各二兩 粉丹皮 白雲苓 宜澤瀉各一兩

北五味 補骨脂各一兩

右為末蜜丸菜豆大每服三錢淡鹽湯空心下

痰喘方

治哮喘無痰者蓋痰入於肺竅不能出故也

官棟參 製南星 製半夏 瓜蒌霜 香付米

皂角灰 真廣皮炒 羅藟子炒 俱等分

幼幼集成

卷之三

十七

其為末薑汁煮神麴糊丸麻子大每服一錢薑湯

化下

蘇沉九寶湯

治風寒閉肺而作哮喘

淨麻黃 紅雲皮 南薄荷各五分 青化桂取心

紫蘇葉 桑白皮 大腹皮 光杏仁各四分

炙甘草六分

生薑三片水煎臨服加童便少許沖服

牛黃奪命散

治胸膈有痰肺脹大喘

黑牽牛半生半炒取頭末五錢 錦莊黃酒潤

陳枳殼炒各一兩

右為細末每服一錢五分白湯調下量兒大小加

減臨服加蜜數匙以氣平為度

人參五味子湯

方見三卷咳嗽門

貞元飲景岳新方

治氣短似喘呼吸急促提不能升噤不能降勢甚

幼幼集成

卷之三

十八

垂危常人但知為氣急其病在上而不知元海無

根肝腎已敗此子午不交氣脫證也

大熟地五錢 白當歸三錢 炙甘草一錢

水煎熱服 如兼嘔惡或惡寒者加煨薑五片氣

虛脈微至極者速加人參如肝腎陰虛手足厥冷

加肉桂一錢

理陰煎景岳新方

治腎肝虧敗不能納氣浮散作喘

大熟地三錢 白當歸二錢 炮薑灰五錢 炙甘草一錢

手足冷者加熟附子一錢青化桂一錢  
水二鍾煎七分熱服

○哮喘簡便方

治痰氣壅塞雪梨汁一杯生薑汁四分之一蜂蜜半  
杯薄荷細末一兩和勻器盛重湯煮一時之火任  
意與食降痰如奔馬

化痰丸絲瓜燒存性為細末棗肉為丸如彈子大每  
服一九薑湯化下化痰最捷兼能止嗽

墜痰丸治一切風痰濕痰老痰痰火胸痞滿氣壅塞

幼幼集成

卷之三

十九

黑牽牛四兩炒止取頭末一兩大皂角去皮弦及  
子酥炙黃四錢生白礬三錢共為細末米糊丸每  
服一錢兒稍大者二錢空心薑湯服痰涎從大便  
出火病之人五日十日一服病緩者半月一服  
治醋噎成吼用甘草二兩去赤皮每段切二寸長兩  
半劈開用猪膽二枚取汁浸甘草三日取起火上  
炙乾為末蜜丸紫豆大每晚臨卧服二錢茶湯送  
神效

哮喘久不止不拘老小一服即止并治小兒奶噎石

明按竟  
成

膏半夏瓜蒌仁陳皮黃麻各一錢五分枳實杏仁  
各一錢甘草七分生薑五片水煎熱服

清金丹治一切吼疾或痰或食遇厚味即發者尤妙  
蘿蔔子蒸熟晒乾為末猪牙皂燒存性等分共為  
細末薑汁打麪糊丸紫豆大每服一二十九薑湯  
送下

○諸疳證治

夫疳之為病亦小兒惡候十六歲以前其病為疳十  
六歲以下其病為癆皆真元怯弱氣血虛衰之所

幼幼集成

卷之三

二十

致也究其病源莫不由於脾胃蓋胃者水穀之海  
也水穀之精氣為榮悍氣為衛榮衛豐盈灌溉諸  
臟凡人身克皮毛肥腠理者氣也潤皮膚美顏色  
者血也所以水穀素強者無病水穀減少者病水  
去穀亡則死矣凡病疳而形不魁者氣衰也色不  
華者血弱也氣衰血弱知其脾胃必傷有因幼少  
乳食腸胃未堅食物太早耗傷真氣而成者有因  
甘肥肆進飲食過食積滯日人面黃肌削而成者  
有因乳母寒熱不調或喜怒房勞之後乳哺而成

者有三歲後穀肉菓菜恣其欲啖因而停滯中  
焦食人成積積人成疳復有因取積太過耗損胃  
氣或因大病之後吐瀉瘧痢乳食減少以致脾胃  
失養二者雖所因不同然皆總歸於虛也其證頭  
皮光急毛髮焦稀腮縮鼻乾口饒唇白兩眼昏爛  
操眉擦鼻脊聳體黃鬪牙咬甲焦渴自汗尿白瀉  
酸肚脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜果鹹炭水泥者皆  
其候也然治寒以溫治熱以涼此用藥之常法殊不知疳之為病皆虛所致即熱者亦虛中之熱寒

幼幼集成

卷之三

二十一

者亦虛中之寒積者亦虛中之積故治積不可驟  
攻治寒不宜峻溫治熱不可過涼雖積為疳之母  
而治疳必先於去積然遇極虛者而迅攻之則積  
未去而疳危矣故壯者先去積而後扶胃氣衰者  
先扶胃氣而後消之書曰壯人無積虛則有之可  
見虛為積之本積反為虛之標也如惡食滑瀉乳  
食直下牙齦黑爛頭項軟倒四肢厥冷下痢腫脹  
面色如銀肚硬如石肌肉青黑肛門如筒口吐黑  
血吐利蛔蟲並為不治

一初病者以集聖丸為主入病者但以肥兒丸調之  
以補為消可也

凡疳之初起者集聖丸為主方其有五臟兼證從權  
加減不必多求方法

○入方

集聖丸

治冷熱新久一切疳證以此為主

真蘆薈酒蒸

五靈脂炒

夜明砂炒

真廣皮酒炒

杭青皮醋炒

蓬莪朮煨

使君肉炒

南木香屑

幼幼集成

卷之三

二十二

白當歸炒

正川芎酒炒已上  
俱各二錢

官揀參三錢切  
片焙乾

正川連姜製

乾礬餘三錢  
酥炙俱

西砂仁酒炒  
二錢

右為細末用公猪膽一枚取汁將前末和勻粟米

糊丸龍眼核大每服一九米飲調下

○各證加減法

一病有咬牙舒舌舌上生瘡愛飲冷水唇紅面白喜  
伏地臥此心疳也本方去莪朮砂仁青皮陳皮川  
芎木香六味加生地茯苓膽星各二錢朱砂甘草  
各一錢

一 面青目生白膜泄瀉夾水或青色此肝疔也本方去莪朮砂仁陳皮木香四味加膽草槐仁防風天麻蚬蛻各二錢青黛一錢五分

一 瘦食泥土冷物飲食無度身面俱黃髮稀作穗頭大項小腹脹脚弱間或泄瀉肌瘦晝涼夜熱不思乳食此脾疔也專用本方

一 鼻下赤爛手足枯細口中腥臭或作喘嗽右腮晃白此肺疔也本方去莪朮砂仁青皮川芎木香五味加桑皮桔梗蘇葉阿膠炙草各二錢外用澤蘭

幼幼集成 卷之三 二十三

葉銅絲輕粉等分爲末貼爛處

一 兩耳內外生瘰脚如鶴膝頭縫不合或齒縫臭爛變成走馬疔此腎疔也本方去莪朮砂仁青皮陳皮木香靈脂六味加熟地茯苓山藥煎肉各三錢丹皮澤瀉各二錢

一 食積人而成疔其證形瘦腹緊時發潮熱羞見生人見之則哭本方去蘆薈靈脂二味加人參黃耆白朮茯苓半夏枳實厚樸炙草神麴麥芽驚甲三稜各二錢

稜各二錢

一 人泄不止胃虛成疔此疔瀉也本方去蘆薈莪朮靈脂三味加白朮茯苓肉蔻柯子各二錢加人參三錢

一 人痢不止胃虛成疔此疔痢也本方去蘆薈莪朮青皮靈脂四味加柯子肉建連肉各三錢

一 癰人未已胃虛成疔此必有癰謂之疔癰本方去蘆薈靈脂二味加黃耆驚甲柴胡半夏神麴三稜各二錢倍人參三錢

幼幼集成 卷之三 二十四

一 腦疔皮毛光急滿頭瘡併腦熱如火髮結如穗遍身多汗腮腫顛高令兒眼痛其病在肝本方去莪朮砂仁青皮陳皮五味加膽草川芎升麻羌活防風各二錢

一 脊疔蟲食脊骨發熱黃瘦積中生熱煩渴下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘰類疔指甲宜安蟲九蓋五疔或有停食成積積人生蟲或如絲髮如馬尾多出於頭項背腹之間蟲色黃白赤者

可治青黑者難治也安蟲九即本方去莪朮砂仁青皮陳皮當歸川芎六味加苦練根白皮買眾燕

黃檳榔各二錢各安蟲丸

一蛔疝腸胃多哭嘔吐清沫腹中乍痛痛時腹中結

聚成塊摸之梗起滿肚青筋唇口紫黑腸頭嗜癢

者是也蛔從口鼻出者難治宜安蟲丸即上方

一丁奚疝手足極細項小骨高尻削體瘦腹大臍突

號叫胸膈者是也集聖丸本方

一哺露疝虛熱往來頭骨分開翻食吐蟲煩燥嘔噦

者是也集聖丸本方

一無辜疝因浣衣夜露被無辜鳥落毛所汚小兒服

幼幼集腋

卷之三

二十五

之身體發熱日漸黃瘦腦後項邊有核如彈丸按

之隨動軟而不痛其中有蟲如米粉宜刺破其核

以膏藥貼之內以本方去莪朮砂仁靈脂三味加

黃耆鱉甲檳榔各二錢

一疝熱由於脾胃虛弱陽浮於外氣不歸元只以補

脾為主使陽氣收斂熱自退矣用參苓白朮散多

服為妙或兼脾陰虛者間服六味地黃丸

一疝渴由胃氣下順津液不生故也宜補其胃使清

腸上升津液漸生渴自止矣七味白朮散

一走馬疝蟲病也齒屬腎腎主虛總受熱邪直奔上

焦初起口臭名曰臭息次則齒黑名曰崩砂甚則

齒爛名曰潰積有血迸出名曰宜露甚至齒皆脫

齒者曰腐根縱得全活齒不復生外證腦熱肌瘦

手足如冰寒熱時有滑泄肚痛口臭乾渴齒齦破

爛灰甲焦黑身多瘡疥痘疹之後多有此證不可

救治毒歸於腎故也初起者清胃散另有治法在

齒牙本門

一魘病兒將週歲母復有娠兒飲其乳謂之魘音乳

幼幼集腋

卷之三

二十六

以成此證或有母患別病兒飲其乳以類母病者

有之蓋母之血氣若調乳則長養精神血氣一病

乳則反為病根母既妊娠精華下蔭衝任之脈不

能上行氣則壅而為熱血則鬱而為毒小兒神氣

未全易於感動其候寒熱時作微微下利毛髮擊

鬚意殊不悅甚則面色痿黃腹脹青筋瀉青多吐

日漸心虛竟成疝證俗以孕在胎中因兒飲乳其

魄識嫉而致兒病故謂之胎如龍膽湯

一骨蒸之病多起於胃其始也邪火上冲而能啖火



消燦而善饑蓋胃為氣血之海氣血不足邪火殺  
穀水穀之精氣不足濟之漸成口穢煩燥夜熱到  
涼毛焦口渴氣促盜汗形如骨立謂之消瘵若大  
便日十餘行肢瘦腹大類食多饑謂之食併此皆  
邪火為害耗傷津液而致者大肥兒丸

○入方

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進或嘔吐瀉痢及大病之後  
補救脾隊此方為神

幼幼集成

卷之三

二十七

官揀參切

漂白朮土

白雲苓乳

懷山藥炒

五錢 芽桔梗焙

薏苡仁炒

建連肉心

炙甘草各一

其為細末每服一二錢薑棗湯調服

六味地黃丸

方見二卷胎疾門

七味白朮散

方見三卷泄瀉門

清胃散

治走馬牙疳

雅黃連 白當歸 綠升麻 懷生地 粉丹皮

白芷稍分 北細辛減

淨水煎滾熱服

龍膽湯

治小兒魘病

草龍膽 鈎藤鈎 北柴胡 芽桔梗 赤芍藥

正川芎 官揀參 白雲苓各一錢 炙甘草五分

井水煎服外以夜明砂不拘多少以紅紗作一小

幼幼集成

卷之三

二十八

袋盛之繫兒胸前

大肥兒丸

治小兒脾胃虛弱泄瀉骨蒸

官揀參切 山楂肉炒 漂白朮土 真廣皮炒

蓬莖蓮炒 川厚樸製 六丁麴炒 雅州連製

胡黃連炒 杭青皮醋 白雲苓乳 杭白芍酒

地骨皮酒 宣澤瀉炒 肉豆蔻煨 尖檳榔

正川芎炒 北柴胡酒 史君肉炒 乾蟾蜍煨

炙甘草各五錢 五穀蟲一兩

共為末煉蜜為丸彈子大米飲化下  
加減肥兒丸

治一切人病成疔總歸虛處不可以前法治之只  
宜以此丸人服以補為消無不愈者

官揀參切 嫩黃耆蜜 漂白朮土 白雲苓乳

廣陳皮酒 杭青皮醋 白歸身酒 大鱉甲醋

正川連草 南木香屑 使君肉炒 乾蟾蜍酥

炙甘草各等分

右為細末另以山藥打糊為丸量兒大小加減日

幼幼集成

卷之三

二十九

日服之以米湯調下病愈藥停

○疔證簡便方

小兒疔積肚大黃瘦骨立頭上瘡痂髮如麥穗用乾

蟾蜍三五隻去四足以香油塗之炙焦為末蒸黑

棗去核取肉搗碎和蟾末為丸龍眼核大每日三

服積垢自下多服之形容自變其病如失

又方買天漿蟲四兩洗極淨晒乾微炒為末甘草

細末五錢米糊為丸彈子大每服一九米飲下

小兒諸疔日久身肉生瘡爛成孔口如大人楊梅瘡

樣用蒸糯米飯時既盡四邊滴下氣水以碗盛取  
掃瘡上數日即效百藥不驗者此方如神

疔蝕口鼻用蠶蚶洗漂極淨晒乾微炒為末衲衣燒  
灰減半共研勻頻吹口內效

小兒口疔被爛人中白煨過厚黃檗蜜炙焦二味等  
分少加水片共研末以鹽茶洗口後以藥搽之

走馬牙疔及齒齦腐爛黑臭者用溺壺內多年積垢  
名人中白煨紅一兩兒茶五錢黃檗薄荷青黛各

一錢水片三分共研細末先以溫水漱口然後吹

幼幼集成

卷之三

三十

藥於疔上每日六七次吹藥之時涎從外流者為  
吉涎收向內者毒入裏也不治

牙疔鼻疔人中白煨一錢五分毛褐灰枯白礬各一  
錢為細末濕者乾搽乾者先以香油潤濕然後搽

藥

急疔蝕爛口鼻欲死海中紫貝子煨過俗名南蛇牙  
齒又名研螺齒南稱狗交螺者是也炭火煨過為

末臘猪油調塗

牙疔潰爛穿唇破舌併治口瘡胡黃連五分膽礬兒

茶各一錢五分其為細末搽之

○嘔吐證治

經曰諸逆衝上皆屬於火諸嘔吐酸皆屬於熱又曰寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔○夫嘔吐者陽明胃氣下行則順今逆而上行故作嘔吐其證有聲有物謂之嘔有物無聲謂之吐有聲無物謂之噦又曰乾嘔人病見此者死蓋小兒嘔吐有寒有熱有傷食然寒吐熱吐未有不因於傷食者其病總屬於胃復有溢乳嘔乳嘔噦皆與嘔吐相似

幼幼集成

卷之三

三十一

而不可以嘔吐治之更有寒熱拒隔之證又有蟲痛而吐者皆當詳其證而治之凡治小兒嘔吐先宜節其乳食節者減少之謂也凡嘔吐多渴不可與之茶水水入復吐終不能止必強忍一二時久而後以米湯與之吐自止矣

寒吐者乳片不消多吐而少出百日眼慢氣緩神昏額上汗出脈息沉微宜溫中消食輕者藿香正氣散不止理中湯加藿香又不止參香散再若不止此陰盛格陽謂之拒格急以理中湯一劑用公猪

膽汁和童便少許將藥潤濕炒熟煎服其法經熱因寒用之法也蓋陰寒太過陽熱之藥拒而不納故以猪膽童便為鄉導其始則同其終則異下咽之後陰體漸消陽氣乃發也

熱吐者面赤唇紅吐次少而出物多乳片已消色黃遍身發熱而煩躁夏月多此證宜五苓散加藿香不止藿連湯再不止用理中湯煎熟調六一散冷服即止此寒因熱用也

傷食吐者眼胞浮腫面色微黃足冷其熱日輕夜重

幼幼集成

卷之三

三十二

或吐醜酸之氣或吐黃水或吐青痰其脈弦實而滑此有宿食也宜下去其積乃止消積丸

傷乳吐者纔乳即吐或少停而吐此因乳食無度脾胃嬌嫩不能運化此滿則噎也各噎乳但宜節其乳則吐自止

嘔乳者時時吐乳而不多似吐非吐皆胃虛所致也宜參香散

有乳多而吐出者非真吐也苟不知禁即成真吐也百日內小兒多有之蓋身小身軟必待乳母擁抱

之苟有傾側乳即溢出此人事也不須用治

嗽吐者兒有咳嗽必待其嗽定方可與乳若嗽未定

以乳哺之其氣必逆乳不消化而為痰痰氣壅塞

嗽不得轉而吐乳也枳梗二陳湯

小兒初生三日內吐乳者用丁香三粒陳皮三分生

薑三片煎服自止又不若煨薑湯更妙此予用

此多者蓋三四日內總皆寒吐也

初起見乳即當調治如嘔不已即成吐吐不已即成

嘔嘔不已即成噦至此胃氣太虛精神漸脫矣若

幼幼集

卷之三

三十三

嘔吐不已日漸沉困頰陷頰青筋大露者併類

吐不食昏沉語塞喘急大熱常吐腥臭者皆死

噦者有聲無物最惡之候凡火病之後而見此者皆

為不治

予按為醫者臨診治病貴能體貼病情能用心法大

凡嘔吐不納藥食者最難治療蓋藥入即吐安能

有功又切不可強灌胃口愈吐愈翻萬不能止予

之治此頗多先將薑湯和黃土作二泥丸塞其兩

鼻使之不聞藥氣然後用對證之藥煎好斟出澄

清冷熱得中止服一口即停之半時之久再服一

口又停之良久服二口停之少頃則任服不吐矣

斯時胃口已安焉能得吐愚人不知明見其吐藥

不納偏以整杯整碗強灌之則一吐傾囊而出又

何藥力之可恃乎此等之法不但幼科可用即方

脈亦當識此倘臨證不體病情全無心法即如嘔

吐一證雖能識病雖能用藥其如不納何哉

○入方

藿香正氣散

幼幼集

卷之三

三十四

方見二卷類搐門

理中湯

方見二卷乳子傷寒門

參香散

治小兒胃虛作吐諸藥不止

官棟參切

上沉香銼

公丁香研

藿香梗焙

南木香銼

已上俱等分

共為細末每服五七分木瓜煎湯調服

五苓散

方見二卷中暑門此加藿香

藿連湯

治小兒熱吐不止

真雅連 七分薑汁炒

紫厚樸 一錢薑汁炒

藿香葉 一錢

生薑三片大棗三枚水煎熱服

六一散

方見三卷痢疾簡便方

消積丸

治食停胃口而作吐

幼幼集成

卷之三

三十五

西砂仁 十二箇酒炒

公丁香 九粒

烏梅肉 三箇蒸去核取淨肉

巴豆仁 二粒煨去油

其研細末米糊為丸菜豆大每服三九白湯送

枳桔二陳湯

治小兒胸膈有痰咳嗽作吐

陳枳殼 一錢

芽桔梗 一錢

白雲苓 五錢

法半夏 一錢

真廣皮 一錢

炙甘草 五分

生薑三片大棗三枚水煎熱服

○嘔吐簡便方

小兒嘔吐外證不熱不渴面自唇淡神慢氣怯寒吐

也用生薑一大塊直切薄片勿令折斷層層摻鹽

以葶藶繫於外用草紙七層包之水濕慢火煨令

熟取起去麻紙將薑搗爛和早米煎湯服立止

小兒卒嘔不止生薑取自然汁一盞煎淡聽用 蜂

蜜四兩煉熟聽用每服用薑汁一匙蜜二匙白湯

調服每日五六次效

小兒胃熱嘔吐外證面赤煩燥身熱作渴手足心熱

者熱吐也黃連一錢薑汁炒熟石膏一錢共為細

幼幼集成

卷之三

三十六

末每服一錢白湯調下吐止後服

又方用枇杷葉火上炙之刷淨毛每用葉三片煎湯

熱服立止

小兒乾嘔極惡之證用甘蔗取汁聽用 生薑取汁

聽用 臨服用蔗汁六匙薑汁二匙和勻溫熱服

不用湯水調

凡嘔吐服藥不納者內有蛔蟲在膈間聞藥氣則

動動則藥出而蟲不出但於嘔吐藥中加入川椒

十四粒則不吐矣蓋蛔得椒則伏矣

治小兒一切吐逆不拘冷熱及人吐諸藥不效者用  
硫黃五錢水銀一錢同研至不見星薑汁打米糊  
爲丸小豆大三歲者三九大人則三四十丸以陰  
陽水送下 此二味加增分兩入陽城礮內封固  
以炭火升煉之即是靈砂爲仙家所用之物最能  
升降陰陽交濟水火乃扶危濟困之神丹也

○泄瀉證治

經曰水穀之寒熱感則害人六府又曰虛邪之中人  
也留而不去傳舍於腸胃多寒則腸鳴飧泄食不  
化多熱則泄出糜○夫泄瀉之本無不由於脾胃

幼幼集成

卷之三

三十七

蓋胃爲水穀之海而脾主運化使脾健胃和則水  
穀腐化而爲氣血以行榮衛若飲食失節寒濕不  
調以致脾胃受傷則水反爲濕穀反爲滯精華之  
氣不能輸化乃致合汚下降而泄瀉作矣

凡泄瀉腸鳴腹不痛者是濕宜燥滲之飲食入胃不  
住或完穀不化者是氣虛宜溫補之腹痛腸鳴瀉  
水痛一陣瀉一陣者是火宜清利之時瀉時止或  
多或少是痰積宜豁之腹痛甚而瀉瀉後痛減者

爲食積宜消之體實者下之如脾泄已久大腸不  
禁者宜澁之元氣下陷者升提之

泄瀉有五寒熱虛實食積也但宜分別所瀉之色凡  
暴注下迫屬火水液澄清屬寒老黃色屬心肺  
實熱宜清解淡黃色屬虛熱宜調補青色屬寒宜  
溫白色屬脾虛宜補紫色屬濕氣宜燥濕酸酸氣  
屬傷食宜消

脾土虛寒作瀉所下白色或穀食不化或水液澄清  
其候神疲唇口舌俱白色口氣溫熱宜理中湯或

幼幼集成

卷之三

三十八

六君子湯

熱證作瀉瀉時暴注下迫謂其出物多而迅速也便  
黃溺赤口氣蒸手煩渴少食宜五苓散加梔仁  
有傷食及滯瀉者其候口噤酸氣吞酸腹脹一痛即  
瀉一瀉痛減保和丸消之

如食已消痛已止而猶泄瀉不止者乃脾失清升之  
氣氣虛下陷補中益氣湯

有風瀉瀉而色青稠黏乃肝木乘脾宜六君子湯加  
防風柴胡白芍

有濕瀉腹內腸鳴肚不痛身體重而瀉水或兼風者水穀混雜宜升陽除濕湯

凡大瀉作渴者其病不論新人皆用七味白朮散生其津液凡痢疾作渴亦然蓋白朮散為渴瀉之聖藥倘渴甚者以之當茶水不時服之不可再以湯水兼之則不效矣

人瀉不止多屬虛寒宜參朮白朮散加肉苳菟煨熟為丸服之自止

人瀉未止將成疳者參朮白朮散加肉苳菟煨倍加

幼幼集成 卷之三

三十九

懷山藥其為未每日服之則泄瀉自止津液自生不致成疳矣

經曰五虛者死一脈細二皮寒三少氣四泄瀉不止五飲食不入五虛悉具者死能食者生

凡瀉不止精神好者脾敗也吐瀉而唇深紅者內熱也色若不退者死面黑氣喘者死遺尿不禁者腎氣絕也

○入方

理中湯

方見二卷乳子傷寒門

六君子湯

五苓散

方見二卷傷暑門此加梔仁

補中益氣湯

方見一卷保產門

升陽除濕湯

治風濕作瀉

幼幼集成 卷之三

四十

綠升麻 錢一

北柴胡 錢一

六神麴 錢一

北防風 錢二

宜澤瀉 錢一

結猪苓 錢一

漂蒼朮 錢五

真廣皮 錢五

炙甘草 分五

生薑三片大棗三枚水煎熱服若胃寒腸鳴加益智子半夏各一錢

七味白朮散

治泄瀉津液下降煩燥大渴

官揀參 錢一

漂白朮 錢一

白雲苓 錢一

南木香 分三

藿香葉 錢一

粉乾葛 錢二

炙甘草 分五

錢一

錢二

分五

分三

水煎當茶飲

此方治小兒陽明本虛陰陽不和吐瀉而下津液煩渴口乾以參朮甘草之甘溫補胃和中木香藿香辛溫以助脾茯苓甘淡分陰陽利水濕葛根甘平倍於衆藥其氣輕浮鼓舞胃氣上行津液又解肌熱治脾胃虛弱泄瀉之聖藥也兼治久瀉不止口渴無度並痢疾口渴幼科之方獨推此為第一後賢宜留意焉

參朮白朮散

幼幼集成

卷之三

四十一

方見三卷疴證門

○泄瀉簡便方

治水瀉或飲食過度或飲冷水胃暑而發用生薑搗爛三錢陳細茶三錢濃煎湯飲立止蓋泄瀉由臟腑陰陽不和薑能和陰茶能和陽是以多效體素者加連子去心二錢

泄瀉因傷濕而起米穀不化不思飲食困弱無力用白朮土炒白茯苓各三錢水煎食前服腹痛者加炒白芍一錢炙甘草五分

泄瀉因於寒者腹痛手足冷用胡椒十四粒生薑三錢淡豆豉二錢煎湯熱服

泄瀉腹痛奇方用鷄蛋一枚將小頭打一小孔入胡椒七粒在內以紙封頂紙包煨熟酒送更效胡椒吞與不吞不拘

脾虛久瀉用白朮土炒山藥酒炒蓮肉去心蒸熟砂仁酒炒各一兩共為細末以白砂糖二兩和勻每服一二錢米飲調下

又方用早米造飯鍋巴取四兩研末連子去心蒸晒為末四兩白糖四兩共和勻每服二三錢白湯調下每日三服

幼幼集成

卷之三

四十二

集成止瀉散治久瀉如神此方經驗最多用車前子以青鹽水炒七次秤過二兩白茯苓炒二兩山藥炒二兩炙甘草六錢共為細末每服二三錢炒米湯調烏梅湯更效其神方也

○傷食證治

經日飲食自倍腸胃乃傷○東垣云飲者無形之氣也食者有形之血也由此推之乳為血液飲之類



也穀有精粗食之類也乳之與食原非同類豈可不辨乎哉

凡小兒飲食傷脾之證非可一例而論有寒傷有熱傷有暫病有久病有虛證有實證但熱者輕者實者人皆易知而寒者久者虛者人多不識如今之小兒以生冷瓜果致傷胃氣而為腹痛瀉利者人猶以為火熱而治以寒涼是不識寒證也有偶因停滯而為脹痛人皆知其實也然脾胃之素強者即滯亦易化惟其不能化者則恒有脹滿之證又

幼幼集成

卷之三

四十三

或有不食亦知饑少食即作脹或有無饑無飽全不思食或因病有傷胃氣久不思食本非有餘之證時醫遇此無論有餘不足鮮有不用開胃消導之劑者是不知虛證也蓋脾胃原有運化之功用今既不能化食則運用之職已失其權而何可專意剋制以益其困乎故凡欲治病必先藉胃氣以為行藥之主若胃氣強者攻之則去而疾常易愈此以胃氣強而藥力易行也胃氣虛者攻亦不失此非藥不去病以胃氣本弱攻之則益弱而藥力

愈不行可愈傷病亦愈甚矣若乃體質貴賤尤有不同凡藜藿之兒壯健之質及新暴之病自宜消伐惟速去為善如以弱質弱病而不顧虛實樂施欲速攻治之法則無有不危矣

凡素喜冷食者內必多熱素喜熱食者內必多寒故內寒者不喜寒內熱者不喜熱然熱者嗜寒多生中寒寒者喜熱多生內熱內經所謂久而增氣物化之常氣增而火天之由也凡治病者又當於素稟中察其嗜好偏勝之弊

幼幼集成

卷之三

四十四

凡飲食致病傷於熱者多為火證而停滯者少傷於寒者多為停滯而全非火證大都飲食之傷必因於寒物者居多而溫平者次之熱者又次之蓋熱則易於腐化流通所以停滯者少

馮楚瞻曰凡小兒傷食皆由胃氣怯弱今時之醫以平胃散為脾胃之準繩孰知平胃者胃中有高阜則使平之一平即止不可過劑過則平地反成坎矣又不若枳實丸為勝方為藜藿老人所製用枳實一兩白朮二兩補多於消先補而後消也但此

丸原爲傷食者設今若指以爲補脾藥又誤矣夫  
根實有推牆倒壁之功用之不啻能無剋劑即如  
山楂神麴麥芽舉世所常用者然山楂能化肉積  
凡多年母猪肉煮之不爛但入山楂一梳登時皮  
肉卽糜又產婦兒枕痛以山楂煎服兒枕立化可  
見其破滯之功豈可輕用麴麥者以米飯在磁缸  
中必藉麴以釀酒必藉藥以成糖脾胃在人身中  
非磁缸比原有化食之功今食不化因其所司者  
病也只補其運用之能而食自化何必用此消剋

藥哉

大凡小兒原氣完固脾胃素強者多食不傷過時不  
饑若兒先因本氣不足脾胃素弱者多食易傷如  
攻伐一用飲食雖消而脾氣復經此一番消伐愈  
虛其虛後日食復不化猶謂前藥已效湯丸登進  
展轉相宜羸瘦日增良可悲矣故醫有貧賤之醫  
有富貴之醫膏粱子弟與藜藿不同太平之民與  
瘡痍自別鄉村里巷頑夫壯士暴有所傷攻伐之  
劑一投可愈倘膏粱幼穉稟受怯弱嬌養柔脆一

例施之貽害不小矣

楚瞻曰人之脾胃雖能化食實由於水火二氣運用  
其間非脾胃之所專能也內火盛則脾胃燥水盛  
則脾胃濕皆不能健運乃生諸病如消渴證火偏  
盛而水不能水腫證水偏盛而火不能化惟制其  
偏而使之平則善矣制者非謂去水去火之意人  
身水火本自均平偏者病也大偏多者補水配火  
不必去火水偏多者補火配水不必去水譬之天  
平此重則彼輕一邊重者只補足輕之一邊夾不

幼幼集成

卷之三

四十五

擊去馬子蓋馬子一定之數今人見水利水見火  
瀉火是擊馬子者也

小兒之病傷食最多故乳食停滯中焦不化而成病  
者必發熱惡食或噎氣作酸或惡聞食氣或欲吐  
不吐或吐山酸水或氣短痞悶或腹痛啼叫此皆  
傷食之候也便宜損之損之者謂姑止之勿與食  
也使其自運經謂傷之輕者損穀則愈矣損之不  
減則用胃苓丸以調之調之不減則用保和丸以  
導之導之不去則攻下之輕則木香檳榔丸重則

消積丸

傷食一證，最關利害。如遷延不治，則成積成癖，治之不當，則成疳成癆。故小兒之強壯者，脾胃素實，恃其能食，父母縱之，以致太過，停滯不化，此食傷脾，胃真傷食也。可用前法治之。如小兒之怯弱者，脾胃素虛，所食原少，或因畧加，即停滯而不化，此乃脾虛不能消穀，轉運遲耳。非真傷食作傷食治，則誤矣。惟宜六君子湯助其健運，多服自愈。

凡小兒脾胃實者，倘縱其口腹，不知節制，則飲食自

幼幼集

卷之三

四十七

傷脾胃乃傷而實者，必致為虛矣。其體之虛怯者，能節其飲食，則腸胃不傷，穀氣漸長，而虛者終變為實矣。

凡傷食吐瀉後，則其所傷之物俱去，只與和其胃氣，或異功散或六神丸。

○入方

紫古枳實丸

治小兒傷食，脾不運化，以致面黃肚大，此方補多消少，誠為傷食運化之良方。

漂白朮

二兩黃土拌炒 小枳實 一兩酒炒

胃虛不思飲食者加

藿香葉 五錢焙

西砂仁

五錢酒炒

名香砂枳實丸

小兒體質肥白，有痰者加

真廣皮 五錢酒炒

法半夏

五錢焙

名橘半枳實丸

右依炒製，以鮮荷葉包飯煨熟，去荷葉，將飯同煎。

末搗勻，為丸，極小，每一二錢，半饑白湯下。

胃苓丸

方見二卷傷濕門

幼幼集

卷之三

四十八

保和丸

治飲食停滯，胸膈痞悶，腹脹等證。

六神麴 炒

真廣皮 炒

法半夏

白雲苓 炒各一兩

京查肉 三兩

淨連翹 炒

蘿蔔子 炒各五錢

其為細末，煉蜜為丸，每服一二錢，薑湯下。

木香檳榔丸

治傷食消之不去，以此下之。

黑牽牛

炒取頭末五錢

尖檳榔 炒五錢

錦莊黃 五錢酒蒸晒乾

南木香 三錢

六神麴 炒一兩

細末薑汁打米糊為丸，量兒大小加減用之。  
亦不峻厲，白湯送下。

消積丸

方見三卷嘔吐門

六君子湯

方見二卷類搐門

異功散

專治脾胃虛弱吐瀉之後，大病之後，以此調理。

官棟參切

漂白木土炒

白雲苓乳蒸

真廣皮酒炒

幼幼集成

卷之三

四十九

炙甘草俱等分

生薑大棗水煎服為末，薑棗湯調服亦可。

六神丸

與異功散主治同，實脾之功勝之。

官棟參切

漂白木土炒

白雲苓乳蒸

懷山藥乳蒸

白扁豆炒

炙甘草等分

共為末，煉蜜丸，彈子大，每服一丸，薑湯化下。

○食積證治

經曰：新積痛可移者易已也，積不痛難已也。○夫飲

曉明按此  
當作散

食之積必用消導，消者散其積也，導者行其氣也。

脾虛不運，則氣不流行，氣不流行，則停滯而為積。

或作瀉痢，或成癥痞，以致飲食減少，五臟無所資。

稟血氣日愈虛衰，因致危困者多矣。故必消而導。

之輕，則和解常劑，重必峻下湯丸。蓋濁陰不降，則

清陽不升，客垢不除，則真元不復。如勘定禍亂，然

後可以致太平。若積因脾虛不能健運，藥力者或

消補並行，或補多消少，或先補後消，潔古所謂養

正而積自除。故前人破滯削堅之藥，必假參朮贊

幼幼集成

卷之三

五十

助成功。經曰：無致邪，無失正，絕人長命，此之謂也。

夫食者有形之物，傷之則宜損其穀，其次莫若消之。

消之不去，則攻之。此治初傷乳食之法也。倘治之

不早，以致成積，滯聚乃成積也。其候面色黃白，或

青黃腹大，或噤食少，腹痛發則數日不止，而醫者

治積不問平日所傷之物，是寒是熱，并不察兒之

形氣，或虛或實，可攻不可攻，竟用偏寒偏熱峻下

之藥，而犯虛虛之戒，其害豈勝言哉！如先傷熱乳

熱食者，則為熱積，傷冷乳冷食者，則為冷積。五穀

之類為食積禽畜之類為肉積菓菓之類為冷積  
故用藥宜分寒熱冷積應用消積丸熱積木香檳  
榔丸仍用原傷之物作湯送之謂之遡源湯

凡用攻下取積之藥必先補其胃氣如六君之類預  
服數劑扶其元神然後下之免傷胃氣也

如小兒體質素怯者雖有積必不宜下當以補為消

六君子湯加菘蓮木香共為細末薑汁打神麴糊

丸每一二錢米湯下久服自消今兒稟受怯弱者

眾有積皆當識此攻積之藥慎勿輕用

幼幼集成

卷之三

五十一

○入方

消積丸

方見三卷嘔吐門

木香檳榔丸

方見三卷傷食門

六君子湯

方見二卷類攝門此加菘蓮木香

○食積簡便方

消積丸

消食消水消氣消痞消脹消腫消積其功甚捷惟  
人病虛羸者不宜用 此比前消積丸藥力輕緩  
不甚峻厲

香附米

酒炒

五靈脂

淘淨

黑牽牛

炒取頭末二兩

其為細末醋打麴糊丸菘豆大每服一二十九食

遠薑湯送下

治傷冷食及難化之物用生薑紫蘇煎濃湯置浴盆

內令患者乘熱坐湯內以手揉其腹胸以熱湯淋

之氣通即化矣

幼幼集成

卷之三

五十二

又方以生薑搗爛紫蘇搗爛炒熱布包熨胸腹如冷

再炒再熨神效

治傷食停積不消用白酒麴即醱酒小老麥芽取

淨末一兩共為細末每服二錢白湯調下治粽傷

及糯米所傷更效

治飲食停滯飽悶不消以糯米一升炒熱以布包之

分作二包於臍腹上輪換熨之助其脾氣轉運也

立消

因食肉停滯不消用山查子三十粒搥碎煎濃湯飲

之自化

因食大肉成積不治則殺人用山查肉二十四粒杏仁去皮尖二十四粒煎濃湯飲自化

因食牛肉腹脹不消用乾稻草一把煎濃湯滾熱飲之自消

因麪食腹脹生薑搗汁冲好酒熱服即消又方以生蘿苣取汁温熱服神應凡食麪必用醋斷不作脹

因食菱角腹痛作脹生薑搗取自然汁以滾湯冲服

立消

幼幼集成

卷之三

五十三

因食瓜菓生冷太多以致腹脹氣急用真青化桂去麤皮取肉研細末以飯搗和為丸菜豆大小兒每服五丸稍長者十九水送病愈藥停

凡小兒病醫認證不確錯用反藥或煩燥不寧或嘔瀉不止欲與解去其藥用黑豆一杯甘草二錢煎濃湯服之自解倘無黑豆菜豆亦好

○發熱證治

經曰陽勝則熱陰勝則寒重寒則熱重熱則寒寒傷

形熱傷氣又曰氣實者熱也○小兒之病多有發

熱然幼科論證太繁來學眩目莫得其要予謂小

兒之證惟宜明顯簡切有神於治療足矣今以小

兒發熱分為四大證一日表熱一日裏熱一日虛

熱一日實熱表裏虛實既明則大綱在手然後逐

證辨認又豈能逃其水鑑乎

一小兒無故發熱多由外感風寒其證喜人懷抱畏

縮惡風寒不欲露出頭面而帶慘色不渴清便自

調吮乳口不熱或鼻塞流涕或噴嚏渾身拘急此

幼幼集成

卷之三

五十四

表熱也初起時一汗可解桂枝湯加柴胡粉葛熱服取微汗效若元氣怯弱者四君子湯加防風柴胡粉葛

一發熱時喜露頭面仰身臥揚手擲足揭去衣被渴

欲飲水吮乳不休者口渴也吮乳口熱小便赤大便閉此裏

熱也宜解利之導赤散煎送瀉青丸

一虛熱者多從大病之後或温熱或潮熱如潮汐有定期也

或渴或不渴大小便如常宜補之竹葉調元湯

一實熱者面赤腮燥鼻孔乾焦喜就冷或合面卧或

仰面臥露出手足揭去衣被大渴不飲大小便秘宜微下集成沆瀣丹

已上四熱為綱其下雜證為目有綱有目而猶不能辨別者未之有也

傷風發熱其證自汗身熱呵欠目赤多睡惡風喘急此因解換襦裳受風所致治宜解肌柴葛桂枝湯熱退之後畧宜滋陰

傷寒發熱其證無汗身熱呵欠頓悶項急面赤喘急惡寒口中氣熱此因脫換受寒所致治宜醒暈散

幼幼集成

卷之三

五十五

熱退後微服沆瀣丹以防內熱

既傷風寒發熱又兼吐瀉者不可發散此脾胃虛怯也但以五苓散煎送理中丸

傷熱發熱多在夏月其證身熱自汗作渴昏睡手足俱熱此因天氣過熱而包裹過厚受其熱也人參白虎湯以解其熱次以調元生脈散補之

傷暑發熱夏月有之其證身熱自汗作渴昏睡手足冷此由高堂廣廈陰冷太過中氣受傷所致先以調元生脈散補其氣次服四君子湯以防吐瀉

心熱者渾身發熱面青自汗心悸不寧脈數煩躁狂叫恍惚此心熱也導赤散加黃連

夜熱者夜間作熱日則退去此血虛也六味地黃湯加龜板當歸白芍斂納陰氣

傷寒無汗服表藥而汗出其熱不退又復下之熱仍不退乃表裏俱虛氣不歸元陽浮於外此為虛熱不可誤用寒涼即當和其胃氣神陽氣收斂其熱自退四君子湯加炮薑

疳熱者形色黃瘦食不長肌骨蒸盜汗泄瀉無恒肚

幼幼集成

卷之三

五十六

大脚小多起於大病之後失於將息又或傷饑食飽脾氣受傷六君子湯加當歸白芍

壯熱者一向熱而不已由氣血壅實五臟生熱鬱蒸於內則睡卧不安精神恍惚蒸發於外則表裏俱熱燥急喘急甚則搐搦以導赤散煎湯送瀉青丸大小便秘者集成沆瀣丹

煩熱者燥擾不安五心煩燥四肢溫壯小便赤澀此心經有熱宜導赤散加麥冬梔仁

積熱者面赤口瘡大小便黃赤此表裏俱實或因內

一第... 丹... 仁... 以... 一

傷酒麪煎炒炙燻或誤投峻補之藥或外因厚棉  
爐火溫暖過度皆能生熱此人事所致宜沉瀝丹  
清解之

虛熱者或汗下太過津液枯焦或大病之後元氣受  
傷皆能生熱其證困倦少力面色青白虛汗自出  
神慢氣怯四肢軟弱手足厥冷此氣虛發厥血虛  
發熱大虛證也四君子湯加炮薑甚則加附子熱  
退以平劑調之

客熱者乍有乍無熱邪干心則熱形於額故先起於

幼功集戊

卷之三

五十七

頭面而後身熱恍惚多恐聞聲則惕此正氣虛而  
熱邪勝故邪正交爭發熱無定乍進乍退如客之  
往來莫測也導赤散先徹其邪後以團參散護其  
正氣  
血熱者每日巳午時發熱過夜則涼此心經血熱也  
輕則導赤散重則四順散

○入方

柴葛桂枝湯

治小兒傷風自汗發熱

嫩桂枝錢一 杭白芍錢五 北柴胡錢一 粉乾葛錢一  
炙甘草分八 老生薑錢一 大紅棗枝五

淨水濃煎熱服

惺惺散

方見二卷孔子傷寒門

集成沉瀝丹

方見一卷胎疾門

五苓散

方見二卷傷暑門

幼功集戊

卷之三

理中湯

方見二卷孔子傷寒門

人參白虎湯

方見二卷傷暑門

調元生服散

治夏月傷熱發熱以此扶其元氣

官揀參分六 炙黃耆錢五 杭麥冬錢一 北五味分五

炙甘草分五

生薑三片 大棗二枚 水煎溫服



四君子湯

方見三卷瘧疾門

導赤散

方見四卷啼哭門

六味地黃湯

方見一卷胎疾門

六君子湯

方見二卷類搐門

瀉青丸

功效集茂

方見四卷啼哭門

四參散

方見二卷非搐門

四順清涼散

方見四卷腹痛門

○神奇外治法

疎表法

小兒發熱不拘風寒食飲時行痘疹並宜用之以

葱一握搗爛取汁少加麻油在內和勻指蘸葱油

卷之三

五十九

摩運兒之五心頭項背諸處每處摩擦十數下  
運完以厚衣裹之蒙其頭畧疎微汗但不可令其  
大汗此法最能疎通腠理宣行經絡使邪氣外出  
不致入羈榮衛而又不傷正氣誠良法也

清裏法

小兒發熱至二三日邪已入裏或乳食停滯內成  
鬱熱其候五心煩熱睡卧不寧口渴多嘔胸滿氣  
急面赤唇焦大小便秘此為內熱以雞蛋一枚去  
黃取清以碗盛之入麻油約與蛋清等再加雄黃

功效集茂

卷之三

六十

細末一錢攪極勻復以婦女亂髮一團蘸染蛋清  
於小兒胃口拍之寒天以火烘煖不可冷用自胸  
口拍至臍輪止須拍半時之人仍以頭髮敷於胃  
口以布荷之一炷香人取下不用一切諸熱皆能  
退去蓋蛋清能滋陰退熱麻油雄黃拔毒涼肌故  
也此身有熱者用之倘身無熱惟啼哭焦煩神志  
不安者不必蛋清專以麻油雄黃亂髮拍之仍敷  
胃口即時安卧此法多救危險之證功難殫述  
解煩法

曉明按水  
粉即水銀

凡小兒實熱之證及麻疹毒盛熱極其候面赤口渴五心煩熱啼哭焦擾身熱如火上氣喘急揚手擲足一時藥不能及用水粉一兩以鷄蛋清調勻界稀塗兒胃口及兩手掌心復以釀酒小麴十數枚研爛熟酒和作二餅貼兩足心布帛之少頃其熱散於四肢心內清涼不復啼擾

開閉法

凡小兒風痰閉塞昏沉不醒藥不能入甚至用艾火灸之亦不知痛者蓋因痰塞其脾之大絡截其

幼幼集成

卷之三

六十一

陰陽升降之隧道也原非死證用生薑蒲生艾葉生薑生葱各一握共入石臼內搗如泥以麻油好醋同前四味炒熟布包之從頭項背胸四肢乘熱往下熨之其痰一豁倏然而醒此方不特小兒凡閉證皆效

引痰法

凡小兒痰嗽上氣喘急有升無降喉中牽鋸之聲須引而下行用生白礬一兩研末少入麩粉米粉亦可蓋生礬見醋即化成水入麩粉取其膠黏故

也好醋和作二小餅貼兩足心布包之一宿其痰自下

痰法

凡小兒胸有寒痰不時昏絕醒則吐出如菜豆粉濃厚而帶青色此寒極之痰前法皆不能化惟以生附子一枚生薑一兩同搗爛炒熟布包熨背心及胸前熨完將薑附捻成一餅貼於胃口良人其痰自開

納氣法

凡小兒虛脫大證上氣喘急真氣浮散不得歸元諸藥莫效用吳茱萸五分胡椒七粒五楸子一錢研極細末酒和作餅封肚臍以帶帛之其氣自順通脈法

凡小兒忽爾手足厥冷此蓋表邪閉其經絡或風痰阻其榮衛又或大病之後陽不布散於四肢速用生薑煨熟搗汁半小杯畧入麻油調勻以指蘸薑油摩兒手足往下碾擲揉振以通其經絡俟其熱回以紙拭去之凡小兒指紋滯澀推之不動

急以此法推豁之。蓋此法不論陰陽虛實用之。皆效  
定痛法

凡小兒胸中飽悶，臍腹疼痛，一時不能得藥，用食鹽一碗，鍋內炒極熱，布包之，向胸腹從上熨下，蓋鹽走血，分能軟堅，所以止痛。冷則又炒，又熨，痛定乃止。男婦氣痛，皆同此法。

已上九法，非古書所有，實予異授心傳，經驗既入，神應無方，筆之於書，以公世用。

○治病端本澄源至要口訣

幼幼集成

卷之三

六十一

凡臨病家診視小兒，無論病之輕重，證之順逆，稍長者令其本身忌口，乳子即令乳母忌口，嚴禁葷酒油膩酸鹹辛辣，但可香茶白飯，稍用密饒糖食而已。蓋乳房為胃經所主，飲食入胃，腐化精微而為榮血，貯於衝脈，衝脈載以上行，遂變赤為白而為乳汁。小兒賴此以為命，與乳母氣候相關，言內其際，是以母食熱子受熱，母食寒子受寒，母食毒子中毒，又惟葷酒油膩甘肥凝滯之物為尤甚。故凡小兒有病，但得乳母忌口，即不藥亦能自愈，不觀

窮鄉僻壤，藜藿單寒之家，所育之子，肥實壯健，而且少病，病亦易愈。人但云他人之子何以易育，不知他家無甘肥凝膩，口腹清淡，所以病少而易育。自家乳母縱口飲啖葷酒，不忌醫雖用藥得法，其如乳汁不清，胃口油滯，不能宣布藥力，所以多病難醫也。此至緊至要關頭，醫者不為切戒，其咎在醫。至於病家，每多自誤。凡乳子有病，其母於房勞食飲寒暑喜怒，一毫不慎，惟責效於醫之草根樹皮，詎知刀頭圭角，能勝其無情之相火，能制其有

幼幼集成

卷之三

六十四

質之油膩耶。徒合醫者勞心，病兒受苦，深可悲憫。復有婦人姑息之愛，切要提防。昔予一堂弟年八歲，因病傷寒，幾死，得遇明者保全，稍能步履，醫囑嚴忌葷腥。予伯母覲面承諾，私以爛蹄花一碗與之。病人見肉登時食盡，時予目覩其事，夜即變證。四肢厥冷，口吐白沫，喉內痰鳴，兩目直視而絕。予伯與醫者驚惶無措，莫測其由。因詢曾食何物，伯母堅辭無有，微風不露。予亦莫敢直言。醫者無可下手，遂辭去。予取山查肉炒研細末，以濃薑湯調

灌數次蓋山查多服最能通利五更大瀉數行所  
下油膩膠滯之物內有精肉猶存人事倏清伯見  
所下之物始知食肉生變痛嘗其母幾至反目幸  
予在側開解之令予調理予為暢脾而安此等曖  
昧苟非予之自贖伯母必不直告即至真死彼亦  
不言醫者亦不知其何以變證而死可見婦女悞  
事為禍如此其烈也凡類此者以天下之大又豈  
特一人而已故凡遇膏粱宦室不可不諄切言之  
以杜其姑息之害

幼幼集成

卷之三

六十五

小兒在胎之時衝脈運血以養之及其產下衝脈載  
血以乳之乳為血化所以兒之脾胃獨與此乳汁  
相融合其他則皆非所宜矣凡小兒一週二歲止  
可飲之以乳切不可備以穀食蓋穀食有形之物  
堅鞭難消兒之脾氣未強不能運化每多因食致  
病倘乳少必欲借穀食調養者須以早米炒熟磨  
粉微入白糖滾湯調服不致停滯至於肉食尤為  
有害凡小兒五歲之內能忌肉食終身無脾病無  
柰愚夫愚婦莫可理喻見兒病稍愈即以肉食飼

之謬云虛補不如實補謂藥補為虛肉補為實不  
知此語出於何經妄誕無知直堪唾罵及其脾胃  
凝滯兒病復作始為倉惶懊悔是誰之咎故小兒  
病後必不可妄用葷腥只可素食調理或一月半  
月待其脾氣已健始可畧與清湯仍不得過用甘  
肥蓋甘肥之物非但不能益兒適足以致病醫者  
能知此意治病必不掣肘病家能依禁忌斷無反  
復之虞此非摸擬之辭實知之深見之確端本澄  
源莫切乎此予雖末學臨證有年病家之弊無不

幼幼集成

卷之三

六十六

周知故不得不剖心相告庶後賢知所提備云  
○痢疾證治  
經曰飲食不節起居不時陰受之則入五臟填滿閉  
塞下為殄泄久為腸癖○夫殄泄者水穀不化也  
腸癖者下痢是也小兒之病傷食最多內有宿食  
停積更受外感則成痢矣古今方書以其閉滯不  
利故又謂之滯下其證裏急後重或垢或血或見  
五色或多紅紫或痛或不痛或嘔或不嘔或為發  
熱或為惡寒此證之陰陽虛實最宜詳審庶不致

誤以當以脈證辨之凡身熱作渴脈數有力而能食者為熱身涼不渴脈沉無力而不能食者為寒初起腹中苦痛裏急後重者為實宜急下之集成沉瀉丹集成三仙丹二藥同服立應

如兼外感者必身有寒熱不可遽下凡痢由外感而發者最多急宜發散若下之早必致引邪入裏而為綿延之證以倉廩散疎解之

因傷風得之者則純下清血蓋風傷其陰絡致血不循經所以血妄下宜胃風湯

幼幼集成

卷之三

六十七

赤白相兼者心主血因傷熱得之則心移熱於小腸故赤者從小腸來肺主氣因傷熱得之則肺移熱於大腸故白者從大腸來皆以芍藥湯治之調血則便膿愈行氣則後重除此治痢之要法也又法以黃連阿膠丸加當歸木香治血痢於血中行氣以胃苓丸加當歸白芍治白痢於氣中養血有積者治痢保和丸

痢久不止名休息痢切不可止瀉和中丸最妙後有集成至聖丹專治久痢百不失

有泄瀉變痢者有痢變泄瀉者先瀉後變痢者脾傳腎也為賊邪難治先痢後變瀉者腎傳脾也為微邪易治蓋初瀉變痢者此氣病傳入血中宜養血為主加調氣之藥不可誤下以傷胃氣初痢變瀉者血病傳入氣中以調氣為主加養血之藥不可收瀉恐毒氣留而不去復成痢也瀉變痢者加味四物湯痢變瀉者加味四君子湯

痢人不止脾胃受傷中氣下陷則為脫肛熱毒上逆則食入便吐不思乳食謂之禁口人痢陰傷

幼幼集成

卷之三

六十八

腎氣虛敗則兩膝紅腫謂之鶴膝脫肛者胃氣下陷後重不除努掙太過故腸頭脫出宜養血調氣微加升提之品則痢止肛自收矣升麻湯外用洗法托法

禁口者乃胃虛逆氣上衝而吐也有不思飲食皆虛損也宜參苓白朮散米湯調服凡痢疾能食者皆不能食者凶  
鶴膝者兩膝紅腫如鶴之膝小兒痢後多有此證乃腎虛之極宜補腎地黃丸加半膝鹿茸

痢疾腹脹中氣虛也胃芥丸調之倘因毒氣未盡而流誤服瀉藥而致腹脹者為實也不可作虛治保和丸消導之

痢疾不治證 痢見五色五臟俱敗 痢如煙塵水

如屋漏水 下痢人肛門如竹筒 如魚腥

人痢唇紅舌燥氣促心煩坐卧不安大渴飲水而容似朱者皆死證也

○入方

集成沈瀝丹

幼幼集成

卷之三

六十九

方見一卷胎疾門

集成三仙丹

方見二卷類搐門

倉廩湯 即人參敗毒散加陳倉米

方見二卷小兒傷風門

治傷風痢疾及時行疫痢大小相似者宜先服此

即人參敗毒散加陳倉米煎服即名倉廩湯喻嘉

言以此方為治痢之聖藥無論新人必用此藥升

散之深得逆流挽舟之法也予每用之輕者三四

劑即愈矣不必另方重者服藥後外證悉去惟腹  
痛裏急後重未除者以沈瀝丹三仙丹同服推去  
積滯無不愈者蓋倉廩湯治痢與用四逆散治痢  
同意後賢宜深究焉

胃風湯

治風冷客於腸胃泄下鮮血及腸胃濕毒下如豆  
泔或下瘀血

官揀參錢一 漂白朮錢五 白雲苓錢一 白當歸錢一

正川芎錢五 杭白芍錢一 上桂心錢五 陳粟米撮一

幼幼集成

卷之三

七十

薑一片棗一枚水煎溫服

河澗芍藥湯

調血便膿愈行氣後重除此方是也

杭白芍錢五 大當歸錢一 雅川連錢五 實黃芩錢八

錦莊黃錢五 尖檳榔錢一 南木香錢三 上桂心錢三

淨水濃煎熱服

黃連阿膠丸

治血痢於血中行氣

正雅連錢一 東阿膠錢二 白雲苓錢一 當歸身錢一

南木香一錢

共為細末水丸每二錢米飲下

胃苓丸

方見二卷傷暑門

治白痢於氣中發血本方加當歸白芍白朮

治痢保和丸

治痢疾積滯未盡或在先原未得下今已脾虛不可下者宜服此

廣陳皮 法半夏 白雲苓 陳枳殼 川厚樸

幼幼集戊

卷之三

七十一

正雅連 京查肉 六神麴 老麥芽已上諸味各一錢

南木香 尖檳榔 炙甘草各五分

共為細末另以神麴煮糊為丸每二錢米飲下

和中丸

治休息痢及疳痢

官揀參 炙甘草 當歸身 正川芎 車前子

結猪苓 宣澤瀉 六神麴 老麥芽 建連肉

已上各二錢 漂白朮 白雲苓 真廣皮 杭白芍

南木香 炮薑灰 肉苳蔻各一錢

共為細末酒煮麴糊丸每二錢米飲下

加味四物湯

治先水瀉而變痢者

當歸身 正川芎 杭白芍 懷生地 白雲苓

正雅連 南木香等分

水煎空心熱服

加味四君子

治先痢而變瀉者

上管揀 漂白朮 白雲苓 當歸身 杭白芍

幼幼集戊

卷之三

七十一

炙甘草各一錢

生薑三片 大棗三枚 水煎溫服

升麻湯

治虛痢脫肛仍調氣養血微帶升提

綠升麻錢五 官揀參 漂白朮 白雲苓 芥穗

真廣皮 當歸身 杭白芍 北防風已上各一錢

炙甘草五分 肥鳥梅一粒

水煎食後服

脫肛洗藥

五構子錢五 白芒硝錢一 荆芥穗錢五

煎湯熏洗仍以五構子研末敷之方以軟帛扎入

參苓白朮散

方見三卷疳證門

補腎地黄丸

方見三卷哮喘門此加虎脰牛膝鹿茸

胃苓丸

方見二卷傷暑門

保和丸

幼幼集成

卷之三

七十三

方見三卷傷食門

○痢疾簡便方

治痢疾用乾馬齒莧煮爛紅痢以蜂蜜拌白痢以砂

糖拌紅白相兼蜂蜜砂糖各半拌食一日二次連

湯服之更妙 按馬齒莧名五方草其葉青梗赤

根白花黃子黑五行俱備所以寒熱赤白皆治

六一散

此方取天一生水地六成之之義為北方壬癸之

精以其清暑毒去濕熱分陰利小便瀉丙水從

小水而出故為治痢妙方

白滑石研細末以清水調飛其重濁滓質不用待

其水清去水晒乾每滑石末六兩加甘草細末一

兩研勻聽用

白痢用六一散七錢乾薑末七分 紅痢用六一散

七錢紅麴末七分 各用薑汁打麩糊丸梧桐子

大每服一二錢白湯下

人痢不止用紅糖白糖飴糖各三錢甘草一錢陳茶

葉二錢同煎熟露一宿次早溫熱服神效

幼幼集成

卷之三

七十四

禁口痢不思飲食以臘猪肉去肉取骨鍋內煎濃湯

徐徐服之百發百中

治赤白相兼用山查肉不拘多少炒研為末每服一

二錢紅痢蜜拌白痢紅砂糖拌紅白相兼蜜砂糖

各半拌勻白湯調服空心下更妙此藥不分虛實

不分久近皆效甚穩甚驗

集成至聖丹 新出

治冷痢久瀉百方無驗者一服即痊凡痢之初起

實熱實積易知而易治惟虛人冷積致痢醫多不



以為意蓋實熱之證外候有身熱煩燥唇焦口渴  
肚疼窘迫裏急後重舌上黃胎六脈洪數證候既  
急治者亦急輕則疎利之重則寒下之積去而和  
其陰陽無不愈者至於虛人冷積致痢外無煩熱  
燥擾內無肚腹急痛有赤白相兼無裏急後重大  
便流利小便清長此由陰性遲緩所以外證不急  
遇此切不可姑息但以集成三仙丹下之以去其  
其積倘不急下必致養虎貽患其積日久漸次下  
墜竟至大腸下口直腸上口交界之處有小曲摺

幼幼集成

卷之三

七十五

隱匿於此為腸臟最深之處藥所不到之地證則  
乍輕乍重或愈或發便則乍紅乍白或硬或溏總  
無一定任是神丹分毫無濟蓋此積不在腹內而  
在大腸之下諸藥至此性力已過盡成糠粃安能  
去此沉匿之積所以冷痢有至三五年十數年不  
愈者由此故也古方用巴豆為丸下之者第恐人  
病神虛未敢輕用今以至捷至穩鴉膽子一味治  
之此物出閩省雲貴雖諸家本章未收而藥肆皆  
有其形似益智子而小外殼蒼褐色內肉白而有

曉明按章  
恐草字

油其味至苦用小鐵錘輕敲其殼殼破肉出其大  
如米敲碎者不用專取全仁用之三五歲兒二十  
餘粒十餘歲者三十多粒大人則四十九粒取天  
圓肉包之小兒一包三粒大人一包七粒緊包空  
腹吞下以飯食壓之使其下行更藉此天圓包暴  
可以直至大腸之下也此藥並不峻厲復不肚痛  
俟大便行時有白凍如魚腦者即冷積也如白凍  
未見過一二日再進一服或微加數粒此後不須  
再服服藥時忌葷酒三日戒鴨肉一月從此除根

幼幼集成

卷之三

七十六

永不再發倘次日肚中虛痛用白芍一根甘草一  
根俱重三錢紙包水濕火內煨熟取起搥爛煎湯  
服之立止不忍隱秘筆之於書以公世用

○瘧疾證治

經曰瘧瘧皆生於風又曰夏傷於暑秋必瘧瘧○夫  
風與暑陽邪也寒與水陰邪也然風為陽中之涼  
氣暑為熱中之寒邪合是四者而言無非皆屬乎  
寒故俗號為脾寒謂病邪客於肌肉之間而脾應  
肉也及瘧之將發必先手足厥冷以脾主四肢也

經言暑者言時氣也寒者言病氣也雖邪氣自淺而深鬱寒成熱然終不免寒為本熱為標耳人而不解縱實亦虛非大補真氣大健脾胃莫能瘳也瘳必有寒有熱蓋外邪伏於半表半裏正在少陽所主之界出與陽爭陰勝則寒入與陰爭陽勝則熱即純熱無寒為溫瘳純寒無熱為牝瘳要皆自少陽而造其極偏故補偏救弊亦必還返少陽之界使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不成其為瘳矣瘳之不離

幼幼集戊

卷之三

七十七

乎少陽如咳嗽之不離於肺也

凡小兒觸冒風寒暑濕客於皮膚積於臟腑邪正相攻陰陽偏勝發為寒熱往來陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒寒多熱少者陰勝陽也熱多寒少者陽勝陰也陰陽互攻則寒熱相半其初也必內有痰食致臟氣不流故發而為瘳瘳之止發有定期其間有一日間日二三日者此臟氣有盛衰邪之輕重不等也發於夏至後處暑前者三陽受病傷之淺而暴也發於處暑後冬至前者

曉明按項當作頰

者三陰受病傷之遠而深也發在子後午前者陽分受病易愈發在午後子前者陰分受病難愈尤當以寒熱多寡稟受強弱而參之則得矣

瘳疾之證始而呵欠繼而足冷面色青黃身體拘急戰慄鼓項腰脊俱痛寒去未已內外皆熱頭痛而渴但欲飲水嘔惡煩滿而不嗜食者皆其候也由小兒脾胃素弱邪氣得以乘之雖有寒熱虛實之不同然要不離乎脾胃其證亦有五乃風寒暑濕食也治法之要宜分初中末而治之初則截之謂

幼幼集戊

卷之三

七十八

邪氣初中正氣未傷畧與疎解即驅之使去不可養以為患也中則和之謂邪氣漸入正氣漸傷或於補中加截藥或於截中加補藥務適其中以平為期末用補法謂邪人不去正氣已衰當補其脾胃為主使正氣復強則邪不攻自退矣一風瘳因感風得之惡風自汗煩渴頭疼風陽也故先熱後寒初時宜發散桂枝白朮湯不退小柴胡湯加常山檳榔烏梅截之人而不退補中益氣湯多服自愈

一寒瘧因感寒得之無汗惡寒，瘧急而慄，寒陰也，故先寒後熱，宜發散寒邪，養胃湯加桂心，不止，平胃散加檳榔、草葉截之，人不止，六君子湯加薑桂。

一暑瘧因傷暑得之，陰氣獨微，陽氣獨發，但熱不寒，煩渴少睡，嘔惡時見，肌肉消爍，宜解暑毒，柴胡白虎湯，不止，去石膏加貝母、常山、檳榔、草葉截之，人不止，補中益氣湯。

一濕瘧因冒襲雨濕，汗出澡浴，坐卧濕地得之，身體重痛，肢節煩疼，嘔逆脹滿，胃苓湯，不退，平胃散加

幼幼集成 卷之三 七十九

茯苓、檳榔、常山截之，久不止，參苓白朮散。

一食瘧一名痰瘧，由飲食不節，饑飽有傷，然也，凡食哺生冷、魚肉、油膩之物，以致中脘停痰，皆為食瘧。其候饑不欲食，食則中滿嘔逆，腹痛，宜去其食，四獸飲，不止，以二陳湯送紅丸子，久不止，六君子湯加青皮、薑桂。

有瘧痢並作者，初用小柴胡加當歸、白芍、檳榔以解表導滯，不已，六君子湯加桂枝。

瘧後腫，此病極多，胃苓、九五皮湯，下不消，六君子湯。

曉明按脫  
當作脫下

加薑桂砂仁，四肢冷者加附子。

瘧後食少黃瘦，不長肌肉者，將欲成疰，但以平瘧養脾丸調之，多服自愈。

有夜瘧，此邪在血分，宜麻黃桂枝湯加地黃、紅花，不止，以四物湯合小柴胡，加升麻、提出陽分，用四君子湯加常山、烏梅、檳榔、草葉截之。

〇入方

桂枝白朮湯

治感風而發熱瘧

幼幼集成 卷之三 八十

嫩桂枝 錢一  
杭青皮 錢一  
真廣皮 錢一  
正川芎 錢五

香白芷 錢五  
法半夏 錢二  
白雲苓 錢一  
漂白朮 錢六

家蘇葉 錢七  
芽桔梗 錢五  
尖檳榔 錢五

生薑三片，大棗三枚，水煎於未發前二時服。

小柴胡湯

方見二卷傷寒門

補中益氣湯

方見一卷保產門

養胃湯

治感寒發瘧

草菓二錢 薑製五分 藿香葉錢五分 真廣皮薑汁炒一錢

上桂心錢一分 炙甘草五分

生薑三片 烏梅一粒 水煎熱服

平胃散

治寒瘧不止以此截之

漂蒼朮錢二分 紫川樸錢五分 真廣皮錢二分 炙甘草錢一分

尖檳榔錢一分 草菓仁薑汁炒極熟一錢

生薑三片 大棗三枚 水煎清早空心服

功効集成

卷之三

八十一

六君子湯

方見二卷類指門

柴胡白虎湯

治傷暑發瘧但熱不寒

官揀參錢一分 北柴胡錢二分 片黃芩錢一分 法半夏錢一分

熟石膏錢五分 淨知母錢一分 炙甘草錢一分 晚粳米一撮

生薑三片 大棗三枚 水煎未發前服

胃芥湯

方見二卷傷濕門

參苓白朮散

方見三卷疴證門

四獸飲

治食瘧和胃消痰

官揀參錢一分 法半夏錢二分 白茯苓錢二分 真廣皮錢一分

漂白朮錢二分 老生薑錢一分 大紅棗一枚 肥烏梅三粒

炙甘草五分

淨水濃煎半饑服

二陳湯

功効集成

卷之三

八十二

方見三卷泄瀉門

紅九子

治食瘧食積氣滯腹脹

京三稜 蓬莪朮 杭青皮 真廣皮 真胡椒

白乾薑已上各三錢

共為細末 早米粉煮糊為丸 棗豆大 黃丹為衣 每服一二十九 二陳湯煎送

五皮湯

方見二卷傷濕門

平瘧發脾丸

不問遠年近日此藥不發不截誠治瘧之王道又擅去瘧之良能也

官棟參切 漂白木土 白茯苓乳 真廣皮酒

杭青皮醋 法半夏焙 漂蒼朮炒 紫川樸薑

北柴胡酒 嫩黃耆密 結猪苓炒 宜澤瀉炒

嫩桂枝焙 小常山焙 大驚甲醋 白當歸酒

正川芎酒 粉甘草炙 草菓仁薑

右藥一十九味俱等分共為細末酒煮麩糊丸米

幼幼集成

卷之三

八十三

粒大每服一二錢米飲下有痞塊者加三稜莪朮人瘧體虛者非此莫愈

麻黃桂枝湯

治夜瘧血分有邪宜用此發散其血中風寒

淨黃麻錢一 柳桂枝錢二 片黃芩錢一 光桃仁錢五

炙甘草錢一 大生地錢一 鮮紅花錢五

葱白一莖水煎熱服

四物湯合小柴胡湯

治夜瘧以此提出陽分

大熟地錢二 大當歸錢五 杭白芍錢一 正川芎錢一

官棟參錢五 北柴胡錢一 片黃芩錢一 法半夏錢一

炙甘草錢五 綠升麻錢一

生薑三片大棗三枚水煎熱服

加味四君湯

治夜瘧已出陽分以此截之

官棟參錢一 漂白木錢二 白雲苓錢五 炙甘草錢一

小恒山錢一 尖檳榔錢一 肥烏梅錢三

生薑三片大棗三枚水煎發日微明服

幼幼集成

卷之三

八十四

○瘧疾簡便方

小兒凡有瘧疾多有病氣須常燒檀速之香以辟其

邪更常熏其衣襟等物氛穢去而邪易除矣

凡瘧藥必露者瘧乃暑邪之因露為肅殺之氣性理

大全謂霧屬陽露屬陰霧生物露殺物則知暑邪

逢露即解矣

凡瘧疾口渴切不可飲冷水冷茶併生冷之物犯之

其病益甚惟以薑湯乘熱飲之此良法也

凡瘧疾熱未全退切不可令其飲食必俟其熱已退

盡方可食之不然終成癖積、

凡服止截之藥必須俄過發時不發方可喫粥食早

瘡必再作下次截藥無靈矣、

清邪止瘡方 李士材製

升麻柴胡各二錢提陽氣上升使遠於陰而寒可

止黃芩知母各一錢五引陰氣下降使遠於陽而

熱自已生薑三錢却邪歸正甘草五分和其陰陽

二三劑自止、

四神酒治人瘡不止一服即住永不再發用常山一

幼幼集成

卷之三

八十五

錢五分檳榔一錢丁香五分烏梅一箇好酒大半

碗畧煎露一宿發日空心冷服、

無痰不成瘡所以瘡家多蓄痰涎溢飲常山能破涎

逐飲故有截瘡之功然須用於發散表邪之後及

提出陽分之時則發無不中矣凡服常山切勿熱

服須露一宿為妙熱服則吐生用亦吐與甘草同

服亦吐凡大虛之體切宜斟酌未可遽投、

小兒邪瘡其發無時日期不定乍早乍晚或有或無

者名為邪瘡以麝香五釐同好京墨同研書去邪

辟魔四字於額上效

小兒熱瘡不寒者用穿山甲一兩大紅棗十箇同精

存性為末每用一錢發日五更白湯調服、

小兒人瘡不止用大鱉甲小者不用以醋炙枯研末

每一錢或錢五隔夜一服清晨一服將發時一服

無不斷者、

瘡來寒多熱少飲食不思用良薑一兩麻油炒炮薑

一兩共為末每二錢用猪膽汁調成膏臨發時熱

酒調服或以猪膽汁和丸如芡實大每服七丸酒

幼幼集成

卷之三

八十六

送亦佳膽屬甲木取其引入少陽也、

○消渴證治

經曰心移熱於肺傳為膈消又曰二陽結謂之消○

夫消渴者枯燥之病也凡渴而多飲為上消肺熱

也多食善饑為中消胃熱也渴而小便數膏濁不

禁為下消腎熱也雖為火盛水衰之證然由虛熱

者多實熱者少若作有餘治之誤之甚矣、

始而心肺消渴脾胃消中或腎虛消濁傳染日人則

腸胃合消五臟乾燥精神倦怠以致消瘦四肢將

為不起之候初起治之得法必不至是

一消渴由心火動而消上上消乎心移熱於肺渴飲

茶水飲之又渴名曰上消小便最多由其水不能

停所以飲水無厭若飲一澗一者可治飲一澗二

者不可治宜蓮花飲為主次以生津四物湯滋其

陰庶幾有濟

一消肌脾火動而消中中消於脾移熱於胃喜多食

食無足時小便色黃名曰中消宜人參白虎清胃

保中

幼幼集成

卷之三

八十七

一消濁乃上消之傳變肺胃之熱人不清乃致動而

消腎移熱於膀胱小便渾濁色如膏脂名曰下消

宜加味地黃湯滋其真陰久服可愈

已上渴證初起者宜用前法倘日久不愈津液枯

焦其渴愈甚若仍用黃連花粉苦寒之類未有不

致危殆者惟七味白朮散對證之藥放膽用之非

此不愈

○入方

蓮花飲

治上消日渴飲水不休

白蓮鬚 粉乾葛 白雲芥 大生地已上各一錢

真雅連 天花粉 官揀參 北五味 淨知母

炙甘草 淡竹葉已上各五分

燈心十莖水煎熱服

生津四物湯

治上消已服蓮花飲後用此

白歸身 大生地 杭白芍 淨知母 大麥冬

官揀參已上各一錢 正川芎 正雅連 天花粉

幼幼集成

卷之三

八十八

川黃蘗 炙甘草已上各五分 肥烏梅一粒

燈心十莖水煎熱服

人參白虎湯

治中消消穀易饑食無厭足

官揀參一錢 熟石膏二錢 淨知母五錢 炙甘草一錢

加晚粳米一兩為引水煎以米熟為度澄清熱服

加味地黃湯

治下消小便渾濁色如膏脂

大懷地二錢 正懷山五錢 山茱肉二錢 宜澤瀉六分

粉丹皮錢一 白雲苓錢二 建蓮肉分七 淨知母分五  
芡實米錢一 大麥冬錢一 北五味分十  
淨水濃煎清晨空心服

七味白朮散

治小兒人病消渴口乾不止惟此是神放膽用之  
方見三卷泄瀉門

○消渴簡便方

蠶繭湯通治三消之證用蠶繭殼或取絲綿結塊者  
取來煎湯時時當茶飲飲至一二七無不愈者蓋此

幼幼集成

卷之三

八十九

物與馬同氣皆屬午火在人為少陰君火善伏勝  
膀胱火引陰液上潮於口而渴自止昧者以為勝  
膀胱之火作祟不知膀胱之火不能收攝已隨小便  
而去惟其不能上潮所以津液不生而口作渴不  
觀仙家運用三昧真火以心為君火命門相火勝  
膀胱火起火必自膀胱始而後相火君火三火齊  
發煨煉陰魔真火熏蒸甘露自降何渴之有  
消渴日夜飲水無度用猪肚一個洗極淨入淡豆豉  
五錢在內以線縫之煮極爛取汁飲之肚亦可食

又方煮猪血清湯不入油鹽多飲極效此物善能滋  
陰降火專走血分脾氣虛者間日飲之恐防作泄  
故也

○諸血證治

經曰營者水穀之精也調和於五臟滲陳於六腑乃  
能入於脈也生化於脾總統於心藏受於肝宣布  
於肺施泄於腎濡潤宣通靡不由此○凡吐血者  
榮衛之氣逆也蓋心者血之主肺者氣之主氣主  
喘之血主濡之榮養百骸溉灌筋脈升降有常自

幼幼集成

卷之三

九十

然順適或外干六淫內傷飲食氣留不行血壅不  
濡是以熱極湧泄不無妄動之患且氣有餘便是  
火火乘於血得熱妄行上奔而為吐血也故小兒  
吐血因傷食者最多蓋陽明多氣多血若蓄熱內  
逼必致榮血妄行所以小兒吐血屬胃者十之七  
八更有尙在襁褓而吐血者多由重帷煖閣火氣  
熏逼或過啖辛辣流於乳房兒飲之後積溫成熱  
熱極上崩或吐血或衄血或尿血或便血者有之  
矣若人嗽血者是又肺虛所致宜保肺滋陰



肝朝百脈之氣肝統諸經之血脾胃有傷榮衛虛損  
故血失常道而妄行倘氣虛神倦唇無紅色者切  
勿寒涼宜四君子湯先救其脾脾實血止矣  
血虛者精神如舊唇舌如常以四物湯加參朮補氣  
即所以生血也

吐血者胃中積熱火逼其血而妄行故從口吐出宜  
清其胃火使血歸經蓋血屬陰陰主降凡血證從  
下出者順從上出者皆逆也清胃散

鼻血者脾熱傳肺虛火上炎血行清道故血從鼻出  
勿勿集戍 卷之三 九十一

宜加味四君子湯

有咳嗽而吐血者此心腎水火不升降火炎無制肺

胃枯燥宜滋陰降火湯切不可作童子癆治

有大便下血者糞前見血者為近血蓋血自大腸來  
也黃連解毒湯

糞後見血者為遠血從胃腕小腸來也清胃散止之  
人不止者補中益氣湯加胡連

○入方

四君子湯

方見三卷瘧疾門

四物湯

方見三卷瘧疾門此加人參白朮各一錢

清胃湯

治吐血并糞後血

黑梔仁 懷生地 粉丹皮 大當歸已上四味各一錢

雅州連五分

淨水濃煎滾熱服

加味四君子湯

勿勿集戍 卷之三 九十二

治脾傳肺血從鼻出

官揀參錢一 漂白朮錢一 白雲苓錢一 粉甘草八分

芽桔梗錢一 大麥冬錢二 黑梔仁錢一 片黃芩錢五

燈心十莖竹葉七片水煎熱服

滋陰降火湯

治小兒咳嗽見血升水降火

大生地 當歸身 杭白芍 淨知母 建連肉

潤玄參 大杭冬已上七味各一錢 真雅連 天花粉

炙甘草已上三味各五分

淨水濃煎清晨空心服

黃連解毒湯

治吐血併便前下血

正雅連五分

川黃蘗錢一

小條芩錢一

黑梔仁錢一

燈心十莖水煎滾熱服

補中益氣湯

方見一卷保產門

○諸血簡便方

凡吐血鼻血低頭掬損肺臟而吐血以及上下一切

幼幼集成

卷之三

九十三

血證用百草霜掃下研為細末以糯米煎湯大人

每服三錢小兒每服一錢米飲調服三服立愈百

草霜須鄉間燒茅草鍋底取之燒柴炭者不用

凡鼻血如注頃刻流至數升無藥可解急將患者頭

髮解開將髮梢浸新水盆內良人血即止止後仍

服涼血清火之藥至浸髮亦不可太人只問病者

心內覺有涼氣即止人則涼冷入心恐生別證至

神至奇此可治稍大之兒乳子無髮可浸

又治鼻血不止用大蒜一枚去皮研如泥作餅子如

錢大左鼻出貼左足心右鼻出貼右足心兩鼻俱

出貼兩足心立時即止即以溫水洗去之

又方以亂髮燒灰吹鼻以線扎中手指根左鼻出

一扎左右鼻出扎右以梔子燒灰研末吹鼻內

又方治鼻血以韭菜搗汁一杯童子小便一杯和勻

溫暖服之血散火降立時即止蓋韭菜散血童便

降火故也

大便瀉血用亂油髮雞冠花側柏葉俱燒灰三味等

分研極細末每服一錢水酒調服

幼幼集成

卷之三

九十四

又方用霜後乾絲瓜燒灰存性研為細末每服一錢

酒調空心服

下血危篤不可救者用乾絲瓜一條燒灰存性研末

聽用槐花燒灰存性研末聽用每以絲瓜末一

錢槐花末五分共研勻米飲調空心服

小兒小便血淋用鷄屎尖白如粉者炒極焦研末每

五分酒調空心服

小兒尿血烏梅燒灰存性研為細末每次一錢米飲

調下

幼幼集成三卷終

鼎鑠幼幼集成卷之四

羅浮陳復正飛霞氏 輯訂

廬陵劉 勳宋孟氏 校正

滋陽周宗願虛中氏 參定

○腫滿證治

經曰膚脹者寒氣客於皮膚之間腹大身盡腫皮厚按之窅而不起腹色不變此其候也又曰諸濕腫滿皆屬於脾又曰水病下為跗腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病

幼幼集成 卷之四

夫腫滿之證悉由脾胃之虛也脾土喜燥而惡濕因中氣素弱脾虛無火故水濕得以乘之而脾愈不運則乳食凝而不化停積於中而腫滿作焉治腫者當以脾胃為本而以浮腫為標斯庶幾矣若以消伐剋削為能事未有不致危殆者

治腫當分上下經曰面腫者風足腫者濕凡腫自上而起者皆因於風其治在肺宜發散之參補飲合五皮湯

腫自下而起者因於腎虛水汎或因於脾氣受濕宜

滲利之故仲景云治濕不利小便非其治也宜五苓散加防已檳榔

一身盡腫者或胎稟不足卒冒風寒或因癰痢脾虛皆能作腫輕者胃苓丸重者加味胃苓丸當與末條參攷

凡小兒之腫在表者頭痛身熱此風寒在表宜微汗之五苓散少加麻黃葛根蘓葉杏仁以發之若身無熱五苓散加肉桂膀胱氣化小便利而腫消矣陽水腫身熱大便秘小便赤澀煩燥口渴以五皮湯

幼幼集成 卷之四

作煎送沉瀝丹微下之

陰水腫身不熱口不渴身冷怯寒二便自調平胃散加白芍草菓木香藿香

凡腫證先起於腹而散於四肢者可治先起於四肢後歸於腹者不可治

若小兒元氣本虛復遇大病之後而渾身浮腫四肢冷不渴小便清長大便滑泄不思飲食此陰寒之極脾胃將絕治腫之方俱不可用惟以四君子湯加青化桂炮薑砂仁白蔻以救其脾胃斯可矣昧

者但見其腫不知元氣之竭絕而猶消導利水復以舟車禹功暨大戟芫花甘遂劫奪之者此殺人

○入方

參蘓飲

方見三卷咳嗽門

五皮湯

方見二卷傷濕門

五苓散

幼幼集成

卷之四

方見二卷傷暑門

胃苓丸

方見二卷傷濕門

加味胃苓丸

即胃苓丸本方加後藥

頭面腫初起畧加麻黃 作喘加桑白皮杏仁

小便黃赤加木通 身腫加五加皮

腹脹加砂仁白蔻丁香枳殼

脚冷不溫加附子上桂防已

平胃散

方見三卷瘧疾門

加味四君子湯

治脾收胃傷陰寒作腫多服自消

官揀參

漂白木

白雲苓

上青桂

黑炮薑

西砂仁

白荳蔻

公丁香

炙甘草

大棗三枚水煎半饑溫服以愈為度

○水腫簡便方

幼幼集成

卷之四

凡小兒患腫切須忌鹽鹽助水邪服之愈甚必待腫

消之後以鹽煨過少少用之

治水腫從脚起入腹則難治用紅飯豆五升水煮極

熟取湯四五升溫浸兩膝之下冷則重煖若已入

腹以紅豆煮湯日日服之亦消蓋紅豆之功專於

行濕利小便故也

治脚腫掘杉木根切斷而內色紅者為油杉方可用

若切開白色者不堪以紅根切碎煎濃湯將腫脚

先熏後洗一二次自消

又方以紅糟一大碗加入生薑生葱三味同煎湯先熏後洗

又治頭面手足俱腫用苦苧塵一兩隔紙炒熟研細末以大紅棗蒸過去核取肉和前末杵勻為丸如小大豆每服七粒白湯下日三服五七日則小便多腫自消也忌鹹酸生冷

曉明按大豆恐倒

傷寒傷濕腫以羌活切片萊菔子二味等分同炒香取起揀去萊菔不用只以羌活為末每服一錢初日一服二日二服三日三服效

幼幼集成

卷之四

五

曉明按熟當作熟

腫證氣喘男婦大小腫因積得既取積而腫再作小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者至此束手蓋中下二焦氣不升降為陰寒否隔水遂凝而不通用熱附子三錢生薑二錢沉香二分同煎濃湯冷服大人附子一兩生薑六錢沉香磨濃汁以附薑湯對服不拘服數以愈為度身面浮腫坐卧不得取向東棗枝燒灰淋汁煮紅豆數升每饑即食之不得別飲湯水水腫本於脾虛不能制水水積妄行而為腫當以參

朮補脾為主使脾氣實則能健運而水自行切不可下

○脹滿證治

經曰足太陰虛則鼓脹又曰胃中寒則脹滿又曰濁氣在上則生脹脹○夫脹滿者腹脹氣滿也出於脾肺氣虛不能健運所以作脹也有虛脹實脹熱脹寒脹大抵虛脹冷脹十之七八實脹熱脹十之二三蓋實熱之證人所易見或因傷食或因傷寒入裏所以易知而易治虛冷之證由中氣虛衰脾氣不化而脹所以難見而難醫若以虛冷之脹而

幼幼集成

卷之四

六

誤以為實熱之脹治之其變不可勝言矣

虛脹者或因吐瀉之後或因服藥攻下太過致成腹脹者宜溫中調氣厚樸溫中湯若虛而兼寒者加附桂

實脹者腹中原有食積或飲食過飽固結於中外證則胃口胸前高脹身熱口渴倦卧不語腹痛微喘目閉不開儼然虛極之象小兒此證最多而難識昧者不為詳審見其四肢不舉目閉不開誤以為慢驚而用寧神導痰之藥千中千死無一活者不

知大實有羸狀即此是也。急宜下之。集成沉瀝丹。集成三仙丹同服。

熱脹者或傷寒熱邪入裏大便閉結小便短赤渾身壯熱面赤煩燥。集成沉瀝丹。

寒脹者由中氣素寒冷滯鬱結無身熱口渴唇青手足厥冷氣喘腹脹先以塌氣丸消之後以異功散調其脾胃。

凡遍身瘡疥因淋洗塗搽逼毒歸內而腹脹者輕則荆防敗毒散升散之重則集成沉瀝丹微利之瘡。

幼幼集成

卷之四

七

出脹消者吉瘡不出者凶。

經謂臟寒生脹滿蓋脾為陰中之至陰因脾濕有餘無陽不能施化如土之入於雨水則為泥矣豈能生奇萬物必待和風暖日濕去陽生自然生長也。凡此宜以辛熱之藥運用之可也。

經謂下之則脹已此以濕熱飲食有餘脾胃素實形體氣質壯實者言之也若脾虛內寒而氣不能運精微以成脹滿者只宜以甘溫補脾為主少佐辛熱以行壅滯之氣庶使脾土健旺脹滿運行斯可。

愈矣此經之所謂塞因塞用從治之法耳醫者不察乎此惟執下之脹已急於獲效病者喜行利藥以求通快不知暫快一時則真氣愈傷脹滿愈甚去死不遠矣。

諸家治脹治腫但知行氣利水剋劑並行輒用猛劑下之此速死之道不知脾氣虛極而腫而脹愈下愈虛惟劫目前之快而陰損真元禍不旋踵後賢幸加意焉。

○入方

幼幼集成

卷之四

厚樸溫中湯

治胃寒心腹脹

紫厚樸錢五

真廣皮錢一

黑薑灰錢一

白雲苓錢一

草薢仁分五

南木香分五

炙甘草分五

虛兼寒者加熟附子分五

青化桂分五

生薑三片大棗三枚水煎半饑服

場氣丸

治寒氣鬱結肚腹虛脹

胡椒仁兩一

全蝎尾五錢揀去鉤子洗淨炒乾

右以胡椒畧去皮取淨一兩炒過和蝎尾研末麩糊丸極小每服一二錢陳皮湯送下

集成沉瀝丹

方見二卷胎疾門

集成三仙丹

方見二卷顛搐門

異功散

方見二卷傷食門

荆防敗毒散

治瘡疥毒氣內陷肚腹作腫

荆芥穗 北防風 淨連翹 陳枳殼 綠升麻

南薄荷 川羌活 川獨活 粉乾葛 川木通

金銀花 片黃芩 正川芎 黑梔仁 炙甘草

每味各一錢

上身腫加葱三莖下身腫加燈心十莖水煎服

○腹脹簡便方

治氣脹水脹用羯鷄糞乾者一升炒焦黃色出火毒

研細末以百沸湯三升淋汁每服一盞調木香檳

曉明按類  
當作類下  
同

椰末各五分此中滿蟲毒脹有一無二之方也

治食脹氣脹用蘿蔔子一兩研細末水調濾汁用砂

仁一兩以蘿蔔子汁浸一宿炒乾又浸又炒共七

次為末每服一錢米飲調下

○黃痺證治

經曰身痛而色微黃齒垢黃瓜甲上黃黃痺也又曰

溺黃赤安臥者黃痺已食如饑者胃痺○夫黃痺

之證古人多言為濕熱及有五痺之分皆未足以

盡之予謂黃之大要亦惟有二曰陽黃曰陰黃而

功効與此

寒熱虛實總括二者之中無餘義矣

一陽黃證因濕多成熱熱則生黃此則所謂濕熱證

也其證必身熱煩渴或燥擾不寧或消穀善饑或

小便熱痛或大便秘結其脈實而有方此證不拘

外感風濕內傷食飲皆能致之但察兒之元氣尙

強脾胃無損而濕熱果盛者直宜清火邪利小便

茵陳五苓散最穩胃苓湯加茵陳亦佳若大便秘

結熱甚者集成沉瀝丹

一陰黃證全非濕熱而總由氣血之敗蓋氣不生血

所以血敗而不華色所以色敗凡病黃而絕無陽證陽脈者便是陰黃或因大病之後或脾胃久虧故脾土之色自現於外其證喜靜惡動喜暗畏明神思困倦言語輕微畏寒少食四肢無力或大便秘不實小水如膏此皆陽虛之候與濕熱發黃者反如水炭使非速救元氣大補脾胃終無復元之理且此證最多而昧者不察遂云黃瘧同是濕熱而用茵陳梔子清火利水則無有不隨藥而斃者如四君子五君煎溫胃飲是其宜也

幼幼集成

卷之四

十一

凡小兒脾胃素弱常有積滯面色多帶黃白不可消積惟以集成肥兒丸多服使脾胃健食自消灌漑臟腑流行榮衛自然五色脩明何黃之有  
小兒黃病昧者一槩呼為濕熱無非除濕利水清熱退黃除此之外無別法矣豈知濕熱發黃者少脾虛發黃者多蓋脾土强者足以捍禦濕熱必不生黃惟其脾虛不運所以濕熱乘之治此者無非暫去濕熱茵陳五苓散亦佳黃稍退即速健脾不得屢用消耗而謂有是病用是藥也

若面目俱黃而帶虛浮唇白舌淡口不渴身不熱夜無煩熱小便不澀不可認為濕熱而分利之速救脾胃四君子六君是其宜也

凡服分利之藥黃久不退以致口淡心慌四肢軟弱憎寒發熱小便帶濁皆為虛甚宜四君子煎送八味地黃丸不可再行分利以致脾敗腎絕而死矣

○入方

茵陳五苓散

方見二卷傷濕門

胃苓湯加茵陳

方見二卷傷濕門此加茵陳一錢

集成沉瀝丹

方見一卷胎疾門

四君子湯

方見三卷瘧疾門

五君煎

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼濕者

官揀參一錢 漂白朮二錢 白雲苓一錢 炮薑灰一錢



炙甘草一錢

水一鍾半煎服

溫胃飲

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食

官揀參一錢 漂白朮二錢 白扁豆一錢 廣陳皮五分

炮薑灰一錢 大當歸一錢 炙甘草六分

水一鍾煎七分服

集成肥兒丸

治小兒脾胃虛弱飲食不消肌膚瘦削多服能令

幼幼集成

卷之四

十三

兒肥此丸久經效驗比諸家肥兒丸功獨勝

建連肉二兩四錢 西砂仁六錢 漂白朮一兩

官揀參一錢 切焙 京查肉四錢 杭白芍四錢

廣陳皮四錢 酒炒 法半夏四錢 白雲苓一兩乳

真雅連二錢 薑製 苡仁米六錢 六神麴六錢

炙甘草二錢

共為細末煉蜜為丸彈于大每日早午晚各服一

丸米飲化下

六君子湯

方見二卷類摘門

八味地黄丸

方見一卷保產門

○黃痺簡便方

小兒急黃以絲瓜連皮帶子火燒存性研末每服一

錢米湯下連進數服愈

小兒黃如金色因積滯凝於脾家以糯稻草煎濃湯

飲之數次效

治小兒黃瘡如金取山間薏苡仁根洗極淨煎湯服

幼幼集成

卷之四

十四

之自愈

治濕熱發黃用生薑半觔茵陳半觔同搗爛以布包

之時時周身擦之其黃自退

○腹痛證治

帝曰願聞人之五臟卒痛何氣使然岐伯對曰經脈

流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行

客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而

痛○凡病心腹痛者有上中下三焦之別上焦者

痛在膈上此即胃腕痛也中焦者在中腕脾胃間

病也下焦痛者在臍下肝腎病也然有虛實之分不可不辨辨之之法但察其可按者為虛拒按者為實久病者多虛暴病者多實得食稍減者為虛脹滿畏食者為實痛徐而緩莫得其處者為虛痛劇而堅一定不移者為實虛實既確則治有準則夫腹痛之證因邪正交攻與臟氣相擊而作也有冷有熱有蟲痛有食積辨證無訛而施治必效

挾冷痛者面色或青或白冷甚者面色開淡唇口爪甲皆青此脾氣虛寒之極輕者當歸散重者燒脾散有吐瀉者保童丸

幼幼集成

卷之四

十五

挾熱痛者面赤壯熱四肢煩手足心熱宜四順清涼散加青皮枳殼大便秘者木香檳榔丸大便調者芍藥甘草湯

食積痛者口中氣溫面黃面白目無精光或目睛多眵多眠惡食大便酸臭宜三稜丸甚者消積丸下後六君子湯調之

蟲痛者面白唇紅六脈洪大心腹疼痛口中涎沫及清水出腹內結聚成團摸之梗起一條小兒脾胃

虛者甚多此證宜烏梅丸

凡腹痛喜手按及熱熨者為虛為寒速宜溫補如手不可按者為實速宜下之

○入方

當歸散

治腹痛有寒無熱

大當歸錢五

南木香分五

青化桂錢一

大揀參錢一

炙甘草分五

生薑三片大棗三枚水煎溫服

幼幼集成

卷之四

十六

燒脾散

治傷生冷菓菜停積中焦心脾冷痛

黑炮薑錢一

紫厚樸錢一

草薢仁分五

西砂仁錢一

六神麴錢一

老麥芽錢一

真廣皮錢一

高良薑分五

炙甘草錢一

或丸或散或水煎俱可

保童丸

因傷風冷食積肚疼泄瀉嘔惡

官揀參切

漂白朮土炒

紫厚樸薑炒

正廣皮酒炒

白雲芥炒 結猪芥焙 宜澤瀉炒 藿香葉焙

公丁香搗 法半夏焙 白乾薑炒 青化桂粗去

白蔻仁炒 杭青皮醋炒 肉荳蔻煨 南木香屑

炙甘草俱等分

共焙燥為細末神麴糊丸彈子大每服一九米飲化下

四順清涼散

治挾熱腹痛面赤壯熱四肢煩手足心熱

杭白芍二錢 白當歸一錢 錦莊黃一錢 炙甘草五分

幼幼集

卷之四

十七

淨水煎滾熱服

芍藥甘草湯

此方無論寒熱虛實一切腹痛服之神方

白芍藥一錢 根重 粉甘草二錢 根重

右二味俱要整的用紙七重包之水濕慢火煨熟

取起杵爛煎湯服寒月畧加肉桂數分更妙

三稜丸

治食積胃腕痛心腹痛小腹痛癖痛蟲痛

京三稜煨 蓬莖莖煨 半夏麴 小枳實炒

正川連姜炒 吳茱萸泡 正廣皮酒炒 杭青皮醋炒

南木香屑 尖檳榔炒 川厚樸薑製 川練肉炒

小茴香酒炒

共為末神麴糊丸量兒小大加減米飲調服

木香檳榔丸

方見三卷食積門

烏梅丸

治胃冷蟲痛攻心嘔吐四肢冷

官揀參 川黃檗 北細辛 青化桂 川熟附

幼幼集

卷之四

十八

已上各 川黃連五錢 正藜椒 大當歸 黑薑灰

已上各 肥烏梅三十個蒸去核

共為細末酒蒸烏梅肉搗膏和藥少加煉蜜為丸

如芡實大每服一九水送每日二三服以十分之一水煎服亦可

○腹痛簡便方

治一切胃痛胸痛腰痛疼如錐刺不可忍者花

椒不拘多少研為細末和少麴粉醋和成餅貼於痛處上鋪艾絨用火灸之疼立止

曉明抄妙  
當作炒

一切腹痛不問虛實寒熱皆效用小麥稗燒灰地上  
出火毒將布包之滾水淋汁一服立止

一切疼痛或寒或熱或積食或積血證莫能辨藥不  
能施有起死回生之妙用生薑一劬搗爛畧擠去

汁入鍋內炒熱用布分作二包先以一包慰痛處

冷即換熱者勿令間斷如薑已乾畧加前汁拌之

又妙又慰痛止乃已

凡小兒腹痛摸其肚有一塊硬起者蟲痛也不須服

藥惟令大人以手擦揉其塊處久久搓之半日許

其蟲將死皆從大便而出痛立止

小兒腹痛啼哭不止用南木香明乳香黑沒藥俱去

油各五分水煎溫服

小兒胎寒腹痛啼哭吐乳大便青色身出冷汗用薑

黃一錢南木香乳香沒藥俱去油各三錢共為細

末蜜丸芡實大每服一九薑湯調下

小兒盤腸氣痛月內之兒多有之其證腹內如蛙聲

啼哭不止者是也蓋寒熱不和臟氣不行用梔仁

五錢附子三錢同炒極枯取起揀去附子不用單

曉明按  
木州細目  
乾漆附方  
以恐當作

取梔仁加入白芷一錢為末每五分小茴香湯下  
小兒腹痛啼哭不止用乳香一錢去油燈花七枚同  
為末每二分乳汁調服

小兒蟲痛口流涎沫使君子取肉微炒為末五更時

米飲調下

小兒腹痛一痛即死者名為蟲痛以痛用乾漆燒灰

白燕蕪二味等分為末每五分米飲調下證重者

每服一錢

小兒盤腸腹痛濃煎葱湯澆洗兒腹仍以葱搗爛炒

熱作餅貼臍上良久尿出痛止

○癖積證治

經曰新積痛可移者易已積不痛難已也又曰胃之

大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應衣

脈宗氣也結而橫有積矣

凡飲食之積其漸積者不過以飲食偶傷必在腸胃

之內故可行可逐治無難也惟飲食無節以漸留

滯者多成癖積於左脇膈膜之外此陽明宗氣所

出之道也若饑飽無論飲食疊進以致陽明胃氣

一有所逆則陰寒之氣得以乘之而脾不及化故  
餘滯未消併腸外汁沫搏聚不散漸成癥積矣然  
其初起甚微人多不覺及其既久則根深蒂固而  
藥餌難及今西北小兒多有此疾而尤於食麩之  
鄉為最正以麩性多滯而留積於皮裏膜外所以  
不易治也惟當以漸消磨求法治之幸毋孟浪欲  
速妄行攻擊徒致胃氣受傷而積仍未及以速其  
危也

癥者血膜裹木側癥脇傍時時作痛時發潮熱或寒  
熱往來似瘧故瘧家多有此證凡瘧疾發過之後  
必令其熱退極盡方可飲食若熱未盡而飲食之  
則中腕多蓄黃水日久而成癥積

小兒臟腑和平脾胃壯實則榮衛宣暢津液流通縱  
使多飲水漿不能為病惟脾胃不勝乳哺失調三  
焦不運水飲停滯冷氣搏之結聚而成癥也體素  
弱者消癥丸氣壯實者赭石揆癥丸大約有癥之  
兒虛者居多攻下之藥非可常用即不得已而用  
之待其畧減用消癥丸緩緩消之至為良法

消癥丸

消癥丸

治癥在脇下而黃肌瘦午後發熱似瘧

官揀參焙切 漂白朮上炒 正廣皮酒炒 白雲苓蒸乳

杭青皮醋炒 川厚樸薑製 小枳實炒 法半夏焙

西砂仁酒炒 六神麴炒 陳麥芽炒已上俱各二錢

九肋鱉炙三錢 京三稜煨 蓬莪朮煨 南木香已

俱各一錢 青化桂 炮黑薑各一錢 正雅連薑汁炒二錢

共為細末早米粉糊為丸每服一二錢量兒大小

加減米飲下以癥消藥止

加減米飲下以癥消藥止

赭石揆癥丸

治腹中癥塊或生寒熱或時作痛小兒壯實飲食

素強者方宜用之脾胃素虛者切不可服惟以前

消癥丸攻補兼施久之自愈

代赭石火煨醋淬至酥研末水飛過用 杭青皮醋炒 蓬莪朮煨

南木香銼屑 青化桂各三錢 巴豆霜去油極淨取霜一錢

川大黃二錢

右為細末醋煮麩糊丸蘿蔔子大每服五九淡薑

湯送下

○癖積簡便方

治癖積心腹內結如拳及臍腹痛不可忍用莊黃一兩酒蒸炮薑五錢熟附子三錢九肋鱉甲八錢用  
好醋將鱉甲煮一時久取起酥炙黃色為度共為  
細末用三年老米醋一升熬至半升和前末為丸  
菘豆大每服十九空心米湯下取下積如魚腦敗  
血爛肉青泥即愈後用補脾調理 按此方藥廉  
功大比按癖丸方勝十倍尤稱神妙

幼幼集成

卷之四

二十三

小兒好食茶葉成癖用鮮樵子一觔空心晚午黃昏  
每服十四粒喫完即愈樵子京菓舖有賣

小兒食積結痞塊用大紅棗一觔皮硝一兩同煮以  
水乾為度晒乾每日食此棗徐徐服之自消

小兒積久而成鱉腹內有形搖頭掉尾犬者如杯小  
者如錢上侵人喉下蝕人肛或附脇脊或隱腸腹  
用生硫黃研極細末每日老酒調服一錢空心下  
久服自化硫黃須色如初出鵝雛者方可用帶青  
帶赤帶黑色者皆不堪此物最平穩任多服無礙

蟲痛證治

經曰腸中有蟲瘕蛟蚘皆不可取以小鍼又曰飲食  
者皆入於胃胃中有熱則蟲動蟲動則胃緩胃緩  
則涎出

夫蟲痛者虻蟲也蓋由小兒脾胃虛弱多食甘肥生  
冷留而為積積化為蟲動則腹痛發則臃聚塊  
痛有來去乍作乍止嘔惡吐涎口出清水久而不  
治其蟲長至一尺則貫胃傷心殺人矣外證瘕瘕  
唇紅六脈洪大是其候也凡腹內有蟲必口乾好

幼幼集成

卷之四

二十四

甜或喜食泥土茶葉火炭之類宜攻去之檳榔丸  
小兒蟲痛凡脾胃怯弱者多有此證其攻蟲取積之  
法却又未可常用及取蟲之後速宜調補脾胃或  
集成肥兒丸或烏梅丸或六君子湯多服之以杜  
蟲之復生

○入方

檳榔丸

治小兒一切蟲積能殺諸蟲

小檳榔

南木香

鶴虱子

光貫仲

廣錫灰五錢 陳漆渣燒 正輕粉二錢 白雷丸二錢

巴豆霜一錢

以漆渣灰五錢同衆藥研為細末醋煮麩糊丸麻

子大每服二十九五更時苦練根皮煎湯下

集成肥兒丸

方見四卷黃痺門

烏梅丸

方見四卷腹痛門

六君子湯

幼幼集成

卷之四

七十五

方見二卷顛搐門

○下蟲簡便方

凡小兒甘肥過度或糖食甜物太多乃致濕熱久停

而成積積久生蟲時發腹痛以手摸之腹內有塊

或一條梗起外證面白唇紅六脈浮洪其痛時作

時止痛止即能飲食者蟲痛無疑又有腹痛一痛

即死者亦是蟲證欲去此蟲無如苦練根皮誠天

下打蟲第一神方其法於月初旬蟲頭向上之時

行之先夜掘苦練根須取每年結子者方是母樹

其根浮於土面者有毒不可用專取土中者淨洗

泥土以刀刮其紅皮止取白皮四五錢兒大者六

七錢切碎聽用次早以油煎雞蛋令兒嗅之以引

其蟲頭向上而求食另於別室以水一盞濃煎苦

練皮湯一小杯不可使兒聞其藥氣一聞其氣蟲

即潛伏矣俟藥熟以雞蛋與兒食即服藥半日不

可飲食俟蟲下後方飲食之服藥後兒似困頓萬

萬放心蟲下後精神如舊仍當急為健脾庶蟲不

復生永無患矣

幼幼集成

卷之四

七十五

○諸汗證治

經曰陽之汗以天地之雨名之又曰陽加於陰謂之

汗又曰心為汗○夫心之所藏在外者為血在外

者為汗蓋汗乃心之液而自汗之證未有不由心

腎兩虛而得之者然陰虛陽必溼之故發熱而自

汗陽虛陰必溼之故發厥而自汗是皆陰陽偏勝

所致也

小兒臟腑嬌嫩膚腠未密或重衣厚被致內臟生熱

熱搏於心故心液不能自藏而額汗出也額為心

之位宜收斂心氣團參湯

大病後氣血兩虛津液自汗或潮熱或寒熱發過之

後身涼自汗日久令人黃瘦失治則變蒸疳宜黃

耆固真湯

睡中汗出醒來則止此心虛盜汗宜斂心氣養心血

用團參湯

睡中遍身有汗覺來久不乾者此食積盜汗脾冷所

致益黃散

脾虛泄瀉自汗後而遍身冷有時遇瀉則無汗不瀉

功効集戾

卷之四

則有汗此為大虛之候急當補脾理中湯待瀉止

黃耆固真湯

凡自汗上至胸下至臍此胃虛也當補胃四君子湯

加黃耆

肺虛自汗面白唇白六脈無力蓋因久嗽脾虛故令

自汗四君子湯加麥冬五味

傷風自汗宜實表桂枝湯傷寒汗出自頭至頸而止

者欲發黃也茵陳湯

如有實熱在內煩燥汗出不止者胃實也宜集成沈

瀉丹微下之

諸汗服藥久不止者用五構子一個研細末醋和作

一小餅貼肚臍以帶帶之效

○入方

團參湯

收斂心氣固心血能止自汗

官揀參切焙各當歸身切焙各

右二味分作二服用臘猪心一個切作二片用前

藥二錢猪心一片水一鍾煎湯空心服

功効集戾

卷之四

黃耆固真湯

治氣虛自汗

嫩黃耆錢一官揀參分五漂白朮分五當歸身錢一

炙甘草分五

天圓肉三枚水煎服

益黃散

治食積盜汗

正廣皮錢五杭青皮錢四柯子肉錢四粉甘草錢四

公丁香錢二



共為末，大兒二錢，小者一錢，如感冒吐瀉，加薑棗同煎服。

理中湯

方見二卷乳子傷寒門。

四君子湯

方見三卷瘧疾門。

桂枝湯

方見二卷小兒傷寒門。

茵陳蒿湯

身功集

卷之四

三十九

治頭汗至頸而還，將欲發黃。

茵陳蒿

錢五

川黃蘗

錢一

黑梔仁

錢一

燈心十莖，水煎滾熱服。

○汗證簡便方

凡男婦小兒及產母一切虛證，偶然大汗，諸藥莫能止者，蓋由立府太開，一時難閉，所以服藥不能止。先將五構子末醋調作小餅子，納入臍中，以布帛之，然後以舊蒲扇燒灰，多加糯米粉和勻，以夏布袋裝之，自頭至足，遍身輕撲之，使其粉入毛竅，立

府自閉，虛汗即止，神治也。

○疝氣證治

經曰：邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛。又曰：病在小腹痛，不得大小便，病名曰疝，得之寒。○故疝氣者，寒邪結聚而成也。內則臍腹絞痛，外則卵丸腫大，專屬肝經，與腎無涉。蓋肝主怒，小兒性急，多叫哭而得之者，此氣動於內，謂之氣疝，應行氣開鬱。初宜柴苓湯升散之，次宜加減二陳湯，或木香內消丸。

身功集

卷之四

三十九

如因久坐濕地得之者，此冷氣入腹，謂之寒疝，宜溫中散寒，加減當歸散，茱萸內消丸。

有腫而不痛，由中濕所致，卵雖腫而無熱，復不痛，宜行濕消腫，加減守病丸。

小兒素有疝氣，或一年半年發者，發則有形，外連臍丸，內貫小腹，腫硬一條，如小杵，約長五六寸，大小便不通，宜當歸木香湯。

小兒木腎腫大，不痛，連年不消者，不早治，便為終身痼疾，宜茱萸內消丸，加牽牛子半生半炒，取頭末。

用更灸臍傍章門穴大效取穴法以本兒手掌第五指本節橫紋對臍中心其中指頭盡處是穴小兒濕地上坐或有蚯蚓吹其卵腫大而垂者以鹽湯浸洗之蓋鹽能殺蚯蚓毒也或以蒼朮煎湯加鹽少許洗之效

小兒陰囊生瘡癢爛者謂之脫囊用紫蘇葉研末敷之以荷葉包之或用生荷葉火烘令軟包之雖囊丸露出亦可治也

小兒外腎燥臭時復濕癢柴胡龍膽湯癢甚不可止者胡椒煎湯洗之

○入方

柴苓湯

治少陽膽經有邪而病痢

官揀參錢一 北柴胡錢五 枯黃芩錢一 法半夏錢一

漂白朮錢一 白雲苓錢一 結猪苓錢一 宜澤瀉錢一

青化桂分五 炙甘草分五

生薑一片大棗一枚水煎熱服

加味二陳湯

治性急多哭卵腫痛連小腹謂之氣疝

正廣皮 法半夏 白雲苓 小茴香 正川芎

已上各一錢 青化桂 炙甘草各五分

生薑三片水煎溫服

木香內消丸

治證如前

南木香屑 京三稜煨 結猪苓焙 宜澤瀉炒

川練肉炒 正廣皮酒炒 香附米酒炒已上各七錢

杭青皮醋炒二錢

幼幼集成 卷之四

其為末酒煮米糊為丸每服一二錢空心鹽湯下

加味當歸散

治受寒濕之氣小腹絞痛外腎紅腫並腹痛啼哭

等證

當歸身錢五 吳茱萸分三 青化桂分五 正川芎分五

黑薑灰錢一 南木香分五 小茴香錢一 炙甘草分五

水煎臨服加鹽七分空心溫服

茱萸內消丸

治寒濕所襲留伏作痛癩疝偏墜

吳茱萸醋浸一宿 焙乾炒過 青化桂去皮 淨棗皮核搗

元胡索炒醋 大茴香炒醋 化橘紅炒 杭青皮炒醋

已上各一兩 光桃仁炒 白蒺藜炒 南木香已

五錢上各 共為細末酒煮麪糊九龍眼核大每服一九淡鹽

湯送下

加減守病丸

治卵腫不痛此濕氣也又名木腎

漂蒼朮鹽炒 製南星炒 香白芷焙已上各一兩

身幼集成 卷之四 三十四

京楂肉炒 正川芎炒 廣橘核炒 法半夏煨

六神麴炒 吳茱萸炒已上各二錢五分

共為細末酒煮麪糊九龍眼核大每服一九小茴

香煎湯化下

當歸木香湯

治小兒久疝不愈

京楨核 全當歸 正川芎 川木通 小茴香

川練肉 杭青皮 結猪苓 宣澤瀉已上各一錢

南木香 黑梔仁各五分

右用淨水濃煎空心熱服

龍膽湯

治小兒外腎臊臭時復濕癢

北柴胡二錢 宣澤瀉一錢 車前子八分 川木通一錢

懷生地一錢 當歸尾六分 龍膽草五分

水煎空心服以飲食壓之

○疝氣簡便方

治小兒疝氣腫痛用荔枝核炒焦五錢大茴香酒炒

二錢五分共為細末每服一錢溫酒調下

身幼集成 卷之四 三十四

又方不論小兒及男婦一切疝氣以及諸般氣痛用

荔枝核四十九箇炒焦留白陳皮九錢生硫黃四

錢共為末鹽水打麪糊為丸菉豆大遇痛時空心

酒研送九九良久再進一服不過三服全安

小兒腎腫硬痛橄欖核荔枝核山查核三件等分俱

燒過存性研末每服一錢空心小茴香湯送下

小兒疝氣痛全蝎不拘多少炒焦為末每三分小茴

香煎酒送下

小兒冷疝作痛陰囊浮腫川練子去核五錢吳茱萸

二錢五分炒研爲末酒打麩糊爲丸小豆大每服十九鹽湯化下

小兒疝久陰囊堅硬如石名爲木腎川瓜蒌連皮帶子二錢葦撥二錢生薑二錢葱白二錢酒煎熱服被覆煖卧取汗效

○啼哭證治

小兒初生百日一周之內神安意靜不妄笑多哭者易養如日夜啼哭不止爲母者心誠求之渴則飲之饑則哺之痛則摩之癢則抓之其哭止者中其

幼功集成

卷之四

三十五

意也如哭不止當以意度之蓋小兒初生性多執拗凡有親狎之人玩弄之物一時不見其心不悅而哭謂之拗哭意與之勿使怒傷肝氣致病也假如又不止請醫視之如大哭晝夜不止者肝熱也瀉青丸如日夜啼哭身熱煩燥者心熱也導赤散俱用燈心湯服

○入方

瀉青丸

此肝經之主藥凡幼科中截風定搐之方多用金

石腦麝無益有損惟此方清心平肝疎風涼血凡小兒作熱不退將成風搐或已成風搐但服此丸其應如響方雖古方人不知用予昔遊潭州遇師指授始能用之凡幼科中抱龍保命至寶新安金藥蘇合香丸一槩不取惟此丸爲幼科截風定搐之第一神方也

川羌活 正川芎 黑梔仁 龍膽草 全當歸 北防風 已上俱各一兩 錦莊黃 五錢

幼功集成

卷之四

三十六

黛爲衣如大豆大每服一二丸茶清化下

導赤散

治心經有熱一切煩啼不安皆效

懷生地 二錢 川木通 錢 枳黃芩 錢 生粉草 五分 淡竹葉 四 燈心十根水煎熱服

○夜啼證治

小兒夜啼有數證有臟寒有心熱有神不安有拗哭此中寒熱不同切宜詳辨

臟寒者陰盛於夜，至夜則陰極發燥，寒甚腹痛，以手按其腹則啼止，起手又啼，外證面青，手冷，口不吮乳，夜啼不歇，加減當歸散。

心熱煩啼者，面紅舌赤，或舌胎白，滿無燈則啼稍息，見燈則啼愈甚，宜導赤散加麥冬、燈心，甚則加川連、膽草。

神不安而啼者，睡中驚悸，抱母大哭，面色紫黑，蓋神虛驚悸，宜安神丸定其心志，有吐瀉後及大病後夜啼，亦由心血不足，治同上。

幼幼集成 卷之四

凡夜啼見燈即止者，此為點燈習慣，乃為拘哭，實非病也，夜間切勿燃燈，任彼啼哭，二三夜自定。

○入方

當歸散

一方見四卷疳證門

導赤散

方見四卷啼哭門

十味安神丸

治神虛驚傷，至夜則啼。

官揀參 白茯神 大杭冬 懷山藥 正龍齒  
煨已上 鏡面砂飛水 寒水石飛水 粉甘草已上各  
各二錢 梅花片一分 赤金箔十片

共為細末，煉蜜為丸，芡實大，每服一九，燈心湯下。

○夜啼簡便方

小兒心熱，面赤，夜多啼泣，朱砂五分，牛黃一分，共為末，每一二分，犀角磨湯調下。

又治同前證，夜啼，青黛研篩過，每服二分，燈心十莖煎湯調服。

煎湯調服

幼幼集成

卷之四

三十九

小兒一百二十日內，夜啼用蟬蛻四十九箇，剪去前半截，用後半截焙乾燥，研末，每服四分，鈎藤湯下。又方用蟬蛻十四箇，去翅足，焙乾，入朱砂一分，共研末，蜜調塗母乳頭上，令兒吮之，納兒口中亦可。

小兒夜啼，不論有餘不足，皆有效，用五構子研末，口中津唾和作餅子，納肚臍，以帶帶之效。

又方以龜心土研末二錢，朱砂飛過一錢，麝香少許，共為末，蜜丸，菉豆大，每服五丸，水調下。

二便證治

共為末，蜜丸，菉豆大，每服五丸，水調下。

二便證治

二便證治

經曰北方黑氣入通於腎開竅於二陰○夫二陰者前陰竅出小便後陰竅出大便又云前陰主氣後陰主血蓋膀胱之津液血所化也由氣而後能出太陰之傳送氣之運也由血而後能潤此便溺之流通見氣血之依附而人之所以爲生者以其有此出入關竅耳清陽出上竅謂呼吸也濁陰出下竅謂大小二便也倘一息不運則機緘窮而死矣故二便不通加以腹脹氣喘嘔噦煩燥者不可治也凡二便秘宜八正散外用掩臍法蜜導法則前

幼幼集成

卷之四

後俱通矣

○入方

八正散

治熱聚下焦二便不通

淮木通 白滑石 黑梔仁 車前子 瞿麥穗

錦莊黃 白芒硝俱等分看兒大小加減之

除大黃芒硝在外將六味水煎極熟加入大黃再煎十數沸取起斟出澄清以芒硝冲服

掩臍法

治中下二焦積熱大小便秘  
連鬚葱七莖不洗生薑一大塊淡豆豉三錢食鹽三錢同搗爛作一餅銚子烘熱掩臍以帛背定良久氣通二便自利

蜜導法

治二便不通以此通其大便則下焦氣行而小便自通矣

用冬蜜八兩煉至滴水成珠不散入皂角細末二錢和勻稍冷捻如小指大一條外以葱涎塗上輕

幼幼集成

卷之四

輕插入穀道中氣通則便利矣

○二便不通簡方

大小便不通經二三日危急者以皂角燒灰研末米湯調下一錢立通

又方以蜂蜜一盞皮硝一錢白湯一盞空心調下另以皂角於桶內燒煙令兒坐桶上熏之即通

又方用草烏一個削去皮畧以麝香搽上抹以香油輕插穀道內名霹靂箭至捷

二便不通百方不效肚腹脹痛咽喉窒塞或痰壅氣

喘水米不下死在須臾宜急救之用甘遂五分麩包煨熟取出為末入麝香三釐搗飯為丸小兒服二分大人五分薑湯送下

又方以小竹筒抹以葱涎挿入穀道以芒硝五錢研細香油半盞皂角末少許令人口含灌入穀道中少時即通

○小便不利證治

經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣又曰膀胱不利為癃不約為遺溺又曰肝有熱則小便

功効集成

卷之四

四十二

便先赤○凡小便赤澀為熱小便自遺為寒熱者

火有餘水不足治宜瀉心火滋腎水加味導赤散

寒者火不足水有餘治宜溫腎水益心火益智散

小便不通乃由臟氣虛受熱壅滯宜化不行非塞非

痛但閉而不通腹脹緊滿宜五苓散加車前燈心

大病之後氣虛津液不足而小便閉者不可利之利

則中氣日虛津液愈涸宜人參散

小兒患淋小便淋瀝作痛不必分五種然皆屬於火

熱宜清利之海金沙散

小兒久病氣虛而淋病者不可利小便宜六味地黃丸滋其化源

小便自出而不禁者謂之遺尿睡中自出者謂之尿床此皆腎與膀胱虛寒也益智散加附桂龍骨

小兒初便黃赤落地良久凝如白膏者謂之尿白傷脾所致久而成疳胃芥丸鹽湯下

小兒小便出時色白渾濁隨尿而來謂之白濁此心經虛熱宜清心蓮子飲

○入方

功効集成

卷之四

四十二

加味導赤散

治心熱肝熱小便赤澀

淮木通 懷生地 炙甘草 枳黃芩 黑梔仁

宜澤瀉 淨前子 北柴胡已上各一錢

淡竹葉七片燈心十莖水煎空心熱服

益智散

治水有餘火不足而遺溺

益智仁五錢鹽水炒 稍骨脂三錢鹽水炒 白雲苓五錢酒炒

共為細末每服一錢鹽湯調下

五苓散

方見二卷暑證門

人參散

治氣虛津液不足小便不通

官揀參錢一 大麥冬錢二 川黃蘗分五 炙甘草錢一

生薑三片水煎服

海金沙散

治小兒諸淋皆屬於熱

香附米酒炒 正川芎酒炒 赤茯苓酒炒已上各五錢

幼幼集成

卷之四

四十三

白滑石水飛各一兩 陳枳殼炒 宣澤瀉炒

陳石葦焙 尖檳榔炒已上各二錢五分

共為細末每服一錢淡鹽湯調下

六味地黃丸

方見一卷胎疾門

胃苓丸

方見二卷濕證門

清心蓮子飲

專治白濁

建蓮子

白雲苓錢五 益智仁錢一 遠志肉桂

大麥冬錢一 官揀參分五 石首蒲分五 車前子分五

漂白朮分六 宣澤瀉分四 生甘草分三

燈心十莖水煎空心服

○小便簡便方

凡小便不通服藥無效用商陸五錢研末入麝香少許先以舊夏布蓋於臍上將藥放布上待藥氣入

腹一時即通

小便數日不通遍身手足腫滿諸藥不應者用蘇葉

幼幼集成

卷之四

四十四

一筋煎濃湯入脚盆內令患者坐盆上熏之冷則

又添熱湯外用炒鹽熨臍上及遍身腫處良久便

通腫消而愈

又方用連鬚葱白一筋搗爛炒熱分作二處各以布

包輪留熱熨臍下即通

小便閉結不通藥不能效用食鹽一兩調溫水服之

良久以指入喉中探吐一吐即通蓋上竅不通下

竅閉也

又方以皂角研末吹些微入鼻中令其噴嚏亦是上



升之意如水注閉其上竅則下竅不通稍升提之  
即時通矣

○大便證治

經曰太陰司天陰痺大便難陰氣不用病在於膝又  
曰太陽之勝隱曲不利互引陰股○夫飲食之物  
有入必有出也苟大便不通出入之機幾乎息矣  
急宜通之使舊穀去而新穀得入然有實閉有虛  
閉最宜詳審如形實氣實脈實又能食者的有可  
下之證則下之如八正散承氣湯木香檳榔丸之

幼幼集成 卷之四

類擇而用之中病即止不可過也而形虛氣虛脈

虛而兼食少者雖有可下之證宜緩不宜急但用

保和丸加枳實微利之如平素便難者血不足也

宜潤腸丸蜜導法

○入方

八正散

方見四卷二便門

承氣湯

方見二卷傷寒門

木香檳榔丸

方見三卷傷食門

保和丸

方見三卷傷食門

潤腸丸

治老人虛人小兒產婦大便閉結

火麻仁去殼 光杏仁去皮 光桃仁去皮 當歸尾酒

陳枳殼已上各七錢五分 金井膠炒 蘿蔔子炒

家蘇葉已上各三錢

幼幼集成

卷之四

四廿六

其為細末煉蜜為丸每服一二錢量人加減白湯

送下

蜜導法

方見四卷二便門

○頭項顛證

經曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也○小兒頭  
顛之證多有由脾胃而得又頭為六陽所會七竅  
居焉故小兒之頭四時宜涼但見頭熱即有病生  
宜預防之

解顛者謂頭縫開解而顛不合也是由稟氣不足先天腎元大虧腎主腦髓腎虧則腦髓不足故顛爲之開解然人無腦髓猶樹無根不過千日則成廢人其候多愁少喜目白睛多面眦白色若成於病後者猶凶宜久服地黃丸外用封顛法

顛腫者顛門腫起也脾主肌肉若乳哺不常饑飽無度或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調其氣上衝爲之填脹顛突而高如物堆塚毛髮短黃骨蒸自汗然亦有寒氣衝上而腫者則牢斬堅硬熱氣衝

幼幼集成

卷之四

四十七

上而腫者則柔軟紅色然寒腫者十之一熱腫者十之九更有因包裹嚴密蓋覆過厚陽氣不得外出亦令赤腫皆用封顛法熱腫者瀉青丸寒腫者參蘇飲

顛陷者有因泄瀉久而氣血虛弱不能上克髓腦故下陷如坑此乃胃虛脾弱之極宜急扶元氣若與枕骨同陷者百無一救此中有稟受父精不足母血虛羸而陷者有因久病而陷者然枕陷尤甚於顛陷二者皆腎元敗絕之證也俱參蒼白木散或

八味地黃丸

天柱骨倒小兒有體肥容壯不爲瘦悴孰知形體過肥中氣愈弱是盛於外而歉於內也忽然項軟傾倒者此肝經風熱也小柴胡加粉葛當歸白芍有因久病之後或泄瀉日久忽然頸項傾側名天柱骨倒最爲危候速救真元十全大補湯加鹿茸有小兒生下頸便軟者胎氣不足也由稟受之腎元虛敗峻補先天其庶幾矣補腎地黃丸與六君子湯間服

幼幼集成

卷之四

四十八

天柱骨倒之證雖則三條總係真陽大敗之候爲小兒之惡證保救真元是其大要外以生筋等藥貼之可也

○入方

六味地黃丸

方見一卷胎疾門

封顛法

治頭縫不合名曰解顛

天南星不拘多少以薑汁炒枯研細末醋調塗於

絹帛上烘熱貼顛門上以合為度

瀉青丸

方見四卷啼哭門

參蘇飲

方見三卷咳嗽門

參苓白朮散

方見三卷疳證門

八味地黄丸

方見一卷保產門

幼幼集成

小柴胡湯

方見二卷傷寒門此加粉葛當歸白芍

十全大補湯

方見一卷保產門

補腎地黄丸

方見三卷吼喘門

六君子湯

方見二卷類搐門

生筋散

治筋軟無力天柱骨倒

木鱉子六箇 蓖麻子六十箇  
並去殼

以藥研如泥先抱頭起以手摩其頸令熱津唾調

藥塗頸項

又方貼項軟生附子去皮二錢生南星去皮臍二錢

共研末薑汁調攤貼患處

○頭項簡便方

小兒解顛或因病後忽然顛門寬大頭縫四破此腦

髓不克大虛之候用鹿茸防風白芨栝子仁四味

幼幼集成

各五錢共為末乳汁調作餅貼顛門上一日一換

以合為度

治小兒顛陷如坑由久病真元不足氣血兩虛大凶

之候速宜十全大補加鹿茸薑棗煎服外用狗頭

骨炙黃為末鷄蛋清調敷之效

○目病證治

經曰諸脈者皆屬於目又曰東方青氣入通於肝開

竅於目○夫目雖為肝竅而五臟俱備神之所托

故白珠屬肺黑珠屬肝瞳仁屬腎兩角屬心上下

眼胞屬脾五臟五色各有所司心主赤赤甚者心實熱也赤微者心虛熱也肝主青青甚者肝熱也淡青者肝虛也脾主黃黃甚者脾熱也淡黃者脾虛也目無精光及白睛多而黑睛少者肝腎俱不足也

目內赤色心經積熱上攻宜瀉丙火從小便而出導赤散加黃連防風

目內黃者脾熱也宜瀉黃散上下眼胞腫者脾經風熱亦同上治

幼幼集成

卷之四

五十二

目連劄者肝有風也凡病或新或久肝風入目上下左右如風吹兒不能住故連劄也瀉青丸

目直視者肝有熱也熱氣入目障其筋脈目之兩角俱緊不能轉運故直視也瀉青丸

小兒初生目閉此胎熱也內服生地黄湯外用膽草煎湯洗目上一日七次恐延纏則損目

小兒生下眼胞赤爛者由產時拭洗不淨以致穢惡侵潰兩目角故兩胞赤爛至長不瘥真金散

小兒人嗽其目兩眦腫黑如物傷損白珠紅赤如血

謂之血眼內服瀉白散外用貼法

小兒生下數月之內目不見物謂之雀目由肝虛也六味地黃丸常以猪肝煮熟壓藥

小兒熱痲其目羞明喜暗者風熱也宜疎散風熱清陽散火湯

○入方

導赤散

方見四卷啼哭門

瀉黃散

幼幼集成

卷之四

五十二

治脾經積熱白珠生黃

藿香梗二錢 黑梔仁錢 熟石膏一錢 北防風一錢

炙甘草五分

淨水煎半饑服

生地黄湯

治小兒胎熱初生眼閉不開

懷生地五錢 赤芍藥錢 正川芎五分 大當歸一錢

天花粉酒炒 炙甘草各五分

燈心十莖長流水煎熱服

真金散

治小兒眼胞赤爛

雅川連 川黃檗 大當歸 赤芍藥已上各二錢

光杏仁去皮尖五分

右剉碎以乳汁浸一宿飯上蒸過取濃汁點眼內  
瀉白散

治小兒久嗽兩眶黑腫白珠如血

芽桔梗 炙甘草 廣陳皮 桑白皮 地骨皮

四味等分水煎熱服

幼幼集成

卷之四

五十三

貼藥

大生地一兩 大黑豆一兩

二味川水同浸一夜取起搗為膏貼眼皮上其血

自散血淚既出腫黑即消

六味地黃丸

方見一卷胎疾門

清陽散火湯

治小兒風熱眼疾羞明喜暗

小條芩 荆芥蕙 正川芎 北防風 淨連翹

黑梔仁 當歸尾 熟石膏已上各一錢 川羌活

炙甘草各五分

燈心十莖水煎食後服

○眼日簡便方

治日生弩肉赤脈貫瞳白膜遮睛諸般雲翳用白丁香印麻雀屎也倒者為雌雀屎不用取豎立者雄雀屎也不拘多少取來研末水飛過如飛朱砂樣

渣滓不用俟藥澄底傾去清水晒乾每以此微同

乳汁研化點翳上其翳自去神方也取麻雀屎寺

幼幼集成

卷之四

五十四

院中暨城樓上有

赤眼腫痛用樸硝一撮以碗張豆腐一塊將硝放豆腐上飯上蒸之俟硝已化去豆腐不用取汁點眼

自愈

敷火眼及風熱眼生南星五錢紅飯豆五錢共為末

取生薑自然汁調作二餅貼兩太陽穴

又敷火眼痛極用大紅棗取肉五六枚葱三四根共

搗如泥作二小餅閉目貼之令其發散蓋眼無風

寒必不疼痛以此疎散立時見效昧者以為火眼

必用涼藥敷點而用黃連黃檗之類不知抑遏其  
火邪不能外出必變眼珠疼痛久不能愈慎之  
治爛弦風眼百藥不治此方最神用鮮色銅絲三錢  
研細末以生蜂蜜濃調塗粗碗內要調略乾稀則  
少時流出矣用艾燒煙將碗覆艾煙上熏之須熏  
至銅絲焦黑為度取起冷定以乳汁調勻飯上蒸  
過搽眼皮上爛弦處百不失一  
治眼毛倒睫不起用五構子為細末蜜調敷眼皮上  
其睫自起

幼幼集成

卷之四

五十五

又方以無名異為末紙捲作撚點燈吹滅閉目熏之  
睫自起

赤眼腫痛不消以精猪肉切一片如指甲大以水洗  
淨其血貼於眼皮上良久易一片即消

○耳病證治

經曰北方生寒在臟為腎在竅為耳又曰腎氣通於  
耳腎和則耳能聞五音矣○故耳本屬腎耳珠前  
屬少陽膽經小兒有因腎經氣實其熱上衝於耳  
遂使津液壅而為膿或為清汁亦有因沐浴水入

耳中灌為聾者內服蔓荊子散外用龍骨散搽之  
耳珠前後生瘡浸淫不愈者名月蝕瘡俗謂以手指  
月則令耳之前後生瘡皆用外治之法黃檗散搽  
之

若耳中忽作大痛如有蟲在內奔走或出血水或乾  
痛不可忍用蛇蛻散

有忽然氣塞耳聾此由風入於腦停滯於手太陽經  
宜疎風清火導赤散加防風或通竅丸

耳傍赤腫者熱毒也若不急治必成大癰外用敷毒

幼幼集成

卷之四

五十六

散內服消毒飲

○入方

蔓荊子散

治小兒腎氣上衝灌為聾耳

蔓荊子 粉乾葛 赤芍藥 信前胡 桑白皮

淮木通 懷生地 杭麥冬 赤茯苓已上俱各一錢

綠升麻 小甘草各五分

燈心十莖水煎服

龍骨散

治小兒聾耳流膿出汁以此吹之

石龍骨煨 明白礬煨 真鉛丹炒已上各三錢

胭脂一錢 當門子五釐

共為末以綿展乾耳內膿水用小竹筒吹藥入耳

黃礬散

治小兒耳珠前後生瘡滲漉不愈

川黃礬 白枯礬 海蝶蛸 白滑石 石龍骨

已上五味皆等分共為末瘡濕用乾搽瘡乾用猪

油調搽

幼幼集成

卷之四

五十七

蛇蛻散

治耳中痛不可忍或出血水或乾痛

蛇蛻燒存性為細末鵝毛管吹入耳中取蛇之善

蛻以解散鬱火也

導赤散

方見四卷啼哭門

通竅丸

治小兒耳忽暴聾

雄磁石煨一錢 真麝香五釐

共為細末以棗研爛和為一九如棗核大綿裹塞耳中又以生鐵一小塊熱酒泡過含口內須與氣即通矣

敷毒散

治小兒耳傍赤腫熱毒也恐防作癰

用棗豆粉不拘多少以老醋調成膏敷腫處乾則

易之

消毒散

治小兒耳傍赤腫內服之藥

幼幼集成

卷之四

五十八

川羌活 北防風 片黃芩 淨連翹 芽桔梗

官揀參 正川芎 當歸尾 北柴胡已上俱七分

小甘草四分

生薑一片燈心十莖水煎服

○耳病簡便方

治小兒無故耳聾取龜尿滴入耳中效或以生麻油

日滴三五次數日即愈

耳內腫痛流膿出水用虎耳草又名倒垂蓮搗取汁

多灌入耳中常常用之此治耳聾之妙藥略加枯

替更妙

耳內膿水不乾用千層石榴花焙乾為末以小竹筒吹入耳內

耳外生瘡用黃丹一錢松香八分輕粉一分共為細末香油調搽

小兒耳後生瘡為腎疔以地骨皮研末篩出嫩末香油調搽粗末煎水洗

諸蟲入耳取猫尿滴入耳中其蟲自出若用麻油滴之則蟲死難出取猫尿法以生薑擦其鼻則尿

自出

幼幼集成

卷之四

五十九

一切惡蟲入耳用稻草燒灰淋汁瀝入耳中其蟲即死而出也

○鼻病證治

經曰西方白氣入通於肺開竅於鼻又曰五氣入鼻藏於心肺有病而鼻為之不利也○蓋鼻為肺之竅鼻塞者肺氣不通於竅然肺主皮毛風寒外感則肺氣壅閉而鼻塞川芎膏

鼻涕者肺為寒風所襲而津液不收則為鼻涕細辛

散疎之

鼻絕者肺受風寒久而不散膿涕結聚不開使不聞香臭則絕矣萬金膏已上三證皆宜疎利俱用通氣散

鼻乾者心脾有熱上蒸於肺故津液枯渴而乾當清熱生津導赤散加麥冬

如病已極鼻乾而黑竅張長出冷氣者肺絕也不治之證

鼻淵者流涕腥臭此膽移熱於腦又名腦崩宜用辛夷散

幼幼集成

卷之四

六十

夷散

凡小兒初生三朝一七忽然鼻塞不能吮乳不得呼吸者因乳母夜臥之時不知迴避鼻中出氣吹兒顛門或因洗水未避風寒所以致兒鼻塞通關散鼻衄者五臟積熱所致蓋血隨氣行得熱而妄動溢出於鼻宜涼血降火加減地黃湯外用吹鼻散

○入方

川芎膏

治小兒外感風寒肺氣壅閉而鼻塞



正川芎 北細辛 小蘗木 香白芷 炙甘草  
以上各三錢 梅花片一分 當門子一分 光杏仁去皮尖一錢  
共為末煉蜜為丸龍眼核大每服一九燈心湯化服

細辛散

治小兒風寒所襲鼻流清涕

官揀參 信前胡 北細辛 北防風 正川芎

炙甘草俱等分

共為末每服一錢薑葱湯調服

幼幼集成

卷之四

六十一

萬金膏

治小兒風熱侵肺鼻鼾不聞香臭

川羌活 正川芎 北細辛 淮木通 淨麻黃

石膏各一錢

共為末每服一錢以蜜和勻薑湯化服

麗澤通氣散

治小兒鼻塞鼻涕鼻鼾

川羌活 川獨活 漂蒼朮 北防風 綠升麻

荆芥穗 粉乾葛 香白芷 正川芎 淮木通

以上各一錢 淨麻黃 北細辛 炙甘草以上各五分  
生薑三片大棗三枚水煎食後服

辛夷散

治小兒鼻流濁涕而腥臭

辛夷仁五錢 蒼耳子炒二錢 香白芷一錢 薄荷葉

雅黃連各一錢

共晒乾為末每服一錢葱湯調下

通關散

治孔子鼻塞不能吮乳

幼幼集成

卷之四

六十二

香附米 正川芎 荆芥穗 直殭蠶 北細辛

猪牙皂已上各五錢

共為細末以葱白搗成膏每用藥末五錢與葱膏

和勻攤軟帛上臨臥烘熱貼兒額門上早晨取去

加減地黃湯

治小兒鼻中出血

懷生地二錢 片黃芩 黑梔仁 赤芍藥

川鬱金 白茅根各一錢

水煎空心熱服

吹鼻散

治小兒鼻中出血

黑梔仁炒 亂油髮燒存性 俱等分

共為極細末以些微吹鼻中

○鼻病簡便方

鼻疳破爛用杏仁去皮尖搗碎以紙包壓去油以成  
白粉為度每杏仁粉二分對真輕粉一錢和勻吹  
患處

鼻流濁涕不止名曰鼻淵乃風熱在腦故也用蒼耳

幼幼集成

卷之四

六十三

子炒辛夷仁白芷薄荷等分為細末每用一錢臨

卧葱湯調服不以數拘以愈為度

鼻中流臭黃水名控腦沙用紫貝子俗名商蛇牙齒

粵人呼狗屐螺取二三枚火煨醋淬為末紙包放

地上去火毒每服一錢大人二錢以絲瓜藤煎湯

調藥空心服以愈為度

鼻被破傷或擦落急以貓兒頭上毛剪碎以口中津

唾調敷之自愈

疔瘡蝕鼻破爛不堪用五構子燒灰存性研末以臘

猪油和塗之

口瘡證治

經曰中央黃色入通於脾開竅於口又曰脾氣通於

口脾和口能知五味矣○故口者脾之外候凡鵝

口者口內白屑滿舌如鵝之口此肺熱而心脾為

甚故發於口也內服沉瀝丹外以保命散吹之

口瘡者滿口赤爛此因胎稟本厚養育過溫心脾積

熱熏蒸於上以成口瘡內服沉瀝丹外以地鷄搗

水搽瘡上地鷄即扁蟲人家傳下有之

幼幼集成

卷之四

六十四

口糜者滿口生瘡潰爛乃膀胱移熱於小腸腸腸不

便上為口糜以導赤散去小腸之熱五苓散去膀

胱之熱當以二方合服

口瘡服涼藥不效乃肝脾之氣不足虛火泛上而無

制宜理中湯收其浮遊之火外以上桂末吹之若

吐瀉後口中生瘡亦是虛火理中湯味者以為口

瘡悉為實熱槩用寒涼必不救

上脘有脹起如懸癰者此名重膈由脾胃挾熱氣血

不能收斂而成用針刺去惡血內服沉瀝丹外以

碧雪吹之

小兒兩頤流涎浸漬胸前者此名滯頤蓋涎者脾之液口為脾竅脾胃虛寒不能收斂津液故涎從口出而滯於頤宜溫脾丹

小兒口頻撮者氣不和也蓋唇應乎脾氣出於肺脾虛不能生肺故口頻撮異功散補脾生肺愈矣

小兒口撮面青多哭此陰寒之至肝脾虛冷臍下痛也理中湯溫之

小兒急欲吮乳而口不能吮者心脾有熱舌不轉運

幼幼集成

卷之四

六十五

瀉黃散清之

○入方

集成沈瀝丹

方見一卷胎疾門

保命散

治小兒鵝口口瘡

箭頭砂 枯白礬

明牙硝

三味俱五錢

共為細末吹之

導赤散

方見四卷啼哭門

五苓散

方見二卷傷暑門

理中湯

方見二卷乳子傷寒門

碧雪散

治小兒懸癰重脬

葶藶黃 洋青黛 白礬砂 明牙硝 生甘草

五味俱等分共為細末吹之

幼幼集成

卷之四

六十六

溫脾丹

治小兒脾冷流涎浸漬頤間

南木香

法半夏

各五錢

黑炮薑

漂白朮

各二錢

廣陳皮

杭青皮

各一錢

右為末煉蜜為丸龍眼核大每服一九米飲下

異功散

方見三卷傷食門

瀉黃散

治小兒心脾有熱舌不轉運不能吮乳

赤茯苓 片黃芩 川黃檗 川黃連 黑梔仁

宜澤瀉 茵陳藁各一錢

燈心十莖 水煎熱服

○口瘡簡便方

口瘡破爛并治咽喉喉癰喉癰用鳳凰衣即伏鷄子

殼內皮也微火焙黃橄欖燒存性兒茶三味俱等

分共為末以一錢為則加水片五釐口瘡搽患處

喉病吹入之即能進飲食

口瘡久不愈虛火也川生附子一箇切焙為末醋和

幼幼集成

卷之四

六十七

作餅男左女右貼脚心引火下行自愈

小兒口角生瘡名燕口瘡以亂髮燒灰存性米飲調

服外即以此敷之 又方蒸飯時收甑蓋上流下

氣水搽之即愈

口唇腫黑癢痛不可忍先以磁鋒砭去惡血以古銅

錢磨猪油塗之

治走馬牙疳及各樣口疳多年口野中白螺螄殼研

爛少加兒茶共為細末吹患處即愈

治口疳瘡及咽喉疼痛川吳茱萸二兩研末少加麩

粉醋調作二餅貼兩足心以布帶之過夜即愈

○舌病證治

經曰南方生熱熱生火火生心心主舌在竅為舌又

曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣○夫舌為

心之苗胃之根小兒多生舌病以心脾之積熱也

故有重舌木舌弄舌舌胎等證宜辨其虛實而治

之

重舌者心脾有熱蓋脾之大絡出於舌下有熱則氣

血俱盛附舌根下忽重生一舌而短小內服沈瀝

幼幼集成

卷之四

六十八

丹外以針刺去惡血用蒲黃黃檗末敷之

木舌者心脾積熱之氣上衝故令舌腫漸漸長大塞

滿口中若不急救必致害人內服沈瀝丹外以針

刺去惡血以碧雪散竹瀝調勻敷之

弄舌者脾臟虛熱令舌絡緊時時舔舌妄人稱為蛇

絲驚者是也切勿以涼寒攻下治之少與瀉黃散

服之不效四君子湯或湯飲飲水而無紅赤色此

脾胃津液不足不可誤認為熱宜七味白朮散

面黃肌瘦五心煩熱而弄舌者此疳證也須從疳證

門參攷宜集聖丸

大病後精神困憊飲食少思而弄舌者內候益氣血

兩虛精神將脫速以十全大補湯挽救之

舌上黑胎其熱已劇急以薄荷煎湯洗之如舌轉紅

色者可治涼膈散下之洗不紅者不治

泄瀉後舌上白胎此津液不榮不能上潮於口為虛

熱也理中湯

○入方

集成沈瀼丹

幼幼集成 卷之四

六十九

方見一卷胎疾門

碧雪散

方見四卷口瘡門

瀉黃散

方見四卷口瘡門

七味白朮散

方見三卷泄瀉門

集聖丸

方見三卷疳證門

十全大補湯

方見一卷保產門

涼膈散

治心脾有熱舌上黑胎

淨連翹 壹錢

黑梔仁 六分

錦大黃 五分

薄荷葉 六分

片黃芩 六分

芒硝 五分

生甘草 四分

竹葉七片燈心十莖水煎臨服加生蜜十匙對服

○舌病簡便方

幼幼集成 卷之四

七十

治重舌木舌腫滿強鞭或疼不止不能言語宜用粗

鍼線帶筋頭上刺患處甚者數十刺為妙只鍼舌

尖及舌兩傍舌中 及舌下切不可鍼犯之令出

血不止其刺出之血以紅色者毒輕紫色者為重

黑色者最危仍以蒲黃研末擦舌上即消

舌或脹大腫鞭即時氣絕名為嬰舌嬰衫入聲用皂礬不

拘多少新瓦上以火煨變紅色為度放地上候冷

研細搽舌上立愈重舌木舌皆效嬰被棉之筋謂如嬰之破於棉

也上

舌腫滿不能出聲以梅花冰片研爛敷之或以食鹽

百草霜共為末井水調敷即效

絆重者舌根下有筋一條絆其舌尖令舌短縮不能

吮乳細視之明見舌根之下有筋如線牽絆其舌

用針輕輕挑斷之挑時但挑此筋不可誤傷舌根

為禍不小曾見愚婦以刀割斷之誤傷舌根流血

不止而死

舌斷能重生用活蟹一隻炙乾為末敷之此方至神

至驗

幼幼集成 卷之四

○齒牙證活

經曰天有列星人有齒牙又曰手陽明之脈入下齒

中足陽明之脈入上齒中○故知上牙屬胃下牙

屬大腸齒屬腎凡齒生遲者腎氣不足也蓋腎主

骨齒者骨之餘腎不足則髓虧不能克手齒所以

齒遲宜地黃丸○上下牙牀腫者此手足陽明實

熱也涼膈散為君加知母石膏升麻為佐頻頻含

嚙

重齟者腎臟積熱附齟而腫痛也以鍼刺去其血用

監湯洗淨黃檗為末敷之

小兒有多食肥肉齒牙臭爛下可近者名為鼻息此

胃膈實熱也內服沆瀣丹外以荆瀝和薑汁含漱

牙疳者初作臭氣次則齒牙黑甚則齟肉爛而出血

名為宜露此由腎熱其氣直奔上焦故以走馬為

喻宜速治之若上下唇破鼻穿齒落者名曰崩沙

氣喘痰潮飲食減小則不可治內服沆瀣丹外以

如聖散敷之

夢中咬牙風熱也由手足陽明二經積熱生風故冷

幼幼集成

卷之四

七十三

相擊而有聲也必任夢中者風屬陽動則風行於

陽靜則風歸於裏也宜風散

咬牙一證惟痘疹見此為危候餘則皆無大害亦有

因病戰慄肢項而鬪牙者治其本證則自止矣

牙齒落後不復生者由於舌舔之故其內頑厚用鍼

刺去其以鼠骨散搽之錙

○入方

六味地黃丸

方見一卷胎疾門

涼膈散

方見四卷舌病門

如聖散

治小兒走馬疳并崩沙宜露

○用婦人尿桶中白垢刮下瓦上煨至烟盡壹錢

銅綠二分

麝香半分

○共為末先以蠟樹葉浸米泔水洗淨後搽此藥

宜風散

治小兒夢中咬牙

幼幼集

卷之四

七十三

尖檳榔 五錢

廣陳皮 壹兩

五錢

炙甘草 五錢

五錢

○共為末每服一二錢蜜湯調空心服

鼠骨散

治小兒齒落不生

用雄鼠一隻爛去皮取骨炙枯研細末加麝香

十分擦刺處良久以薑湯漱之

○齒病簡便方

牙齦潰爛諸藥不效者用鹽欖二三個連皮帶核火

中煨過存性加冰片半分搽之神效

走馬牙疳臭爛出血紅棗三枚去核以明雄研末填滿棗內新瓦盛之火煨存性研末搽之

又方鳳凰衣未見水者焙黃少加枯礬共為細末搽之

○咽喉證治

經曰咽喉者水穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也又曰一陰一陽結謂之喉痺○蓋咽者胃管主

納水穀而居後喉者肺管專主呼吸而居前為人一身之總要若胸膈鬱積熱毒至生風痰壅滯不

幼幼集成

卷之四

七十四

散發於咽喉病名雖多無非熱毒速宜清解緩則

有難救之患輕則甘桔湯重則化毒湯

如痘瘡咽喉痛者毒氣上攻也加減甘桔湯喉中生

瘡不能吮乳化毒湯

小兒為諸骨所哽骨大難嚥者以鵝毛掃咽吐之骨

小者用海上方治之

○入方

甘桔湯

治小兒胸膈積熱致生風痰而患喉痺

粉甘草四錢 牙桔梗四錢

以淨水煎細細嚙之、

化毒湯

治小兒咽喉證危迫者、

牙桔梗 南薄荷各二錢 荆芥穗 炙甘草各二錢

白芒硝一錢 山豆根五錢 馬牙硝 白礬砂各二錢

明雄黃 鏡面砂各二錢

共為細末、每服一錢、白湯調下、仍以此藥吹喉中、

海上方

幼幼集成

卷之四

七十五

治小兒諸骨所哽

用金鳳花根搗碎、以米醋濃煎、用有嘴瓶盛之、口

啣瓶嘴、仰而吸藥吞之、其骨即下、吞藥勿令露牙

又或以玉簪花根亦可、如上法煎嚙、

○咽喉簡便方

治喉閉乳蛾、用鷄內金勿洗陰乾、燒過存性、研末以

小竹筒吹入、即破而愈、鷄內金即鷄臍脰內之黃皮也

咽喉內生瘡、鼻孔內亦爛、若作喉風治立死、用白霜

梅一個、燒存性、枯帶一錢、穿山甲炙枯一錢、共為

細末、吹喉中神效、

喉瘡已破、瘡口疼、痛難進乳食、用猪腦髓蒸熟、薑醋

調和、服之自愈、

咽中結核、不通水食、危困欲死、用百草霜以蜜和為

丸、如芡實大、每一丸、白湯化開灌之、甚者不過二

次愈、

慎吞針、用磁石研末、以黃蠟鎔化、和丸如豆大、吞下、

針共丸藥同從大便出、

慎吞銅錢、金銀釵環之類、只以米糖多服之、人之自

出、

慎吞銅錢、生慈茹搗汁多飲、自然消化、生菽薺搗汁

飲更妙、

慎吞竹木及魚骨、哽咽不下、用象牙磨濃汁水調服

若吞鐵釘子、以沙糖拌象牙末服、

治諸骨哽咽不下、用葦靈仙三錢煎湯、頻頻嚙之、其

骨即軟如綿而下、

諸骨哽咽、用狗一隻、倒吊取口涎、徐徐與嚙、即化、又

或以狗涎半盞、沙糖半盞、調服立消、



凡悞吞金銀銅鐵之類以鹽樅燒灰研末水調下其物即出此方經驗極多

凡諸骨哽咽穀樹葉搗爛取汁服其骨自軟而出蓋歲靈仙穀樹葉楮實子皆能軟骨故也

○龜胸龜背

龜胸者胸高脹滿形如覆掌多因乳母多服五辛酒麪炙燂之類或夏月熱乳宿乳與兒蓋兒肺氣最清為諸臟華益日久痰滯則生風熱肺受火邪則胸骨脹起麻痘之後多有此證宜清肺降火杏仁

幼幼集成

卷之四

七十七

龜背生下不能保護以客風入於骨髓或兒坐早勞傷氣血或咳嗽人以致肺虛而腎亦無所生矣腎主骨風寒乘虛而入於骨髓致精血不能流通故成龜背宜松蘿丹外以龜尿塗法此從前所論證治也

予按龜胸有治龜背乃不治之證前人證治猶有未善雖曰客風入骨坐早勞傷咳嗽肺虛然未窺其病源無非以現在者言之也凡小兒稟受真元足者嘗見其赤身裸體當風露坐半週之後坐以座

榻從未聞有客風入骨坐早勞傷嗽久而病龜背

之說此證蓋由稟父母精髓不足元陽虧損者多有之不觀小兒龜背正在命門之間漸次骨節浮

露其腰如弓實因骨痿不能支撐之故豈風邪為患哉此證百不一救原無治法而前人強立松蘿

丹反用麻黃大黃獨活防風一派攻伐之藥適足以速其殤也若以鄙見但當以六味地黃丸加上

桂鹿茸救其先天復以四君六君之類扶其胃氣或可以十中保一除此之外並無治法若謂松蘿

丹能治龜背吾不信也

○入方

杏仁煎

治小兒肺受熱邪而患龜胸

錦大黃好酒九蒸九晒 天門冬去心 真杏仁去皮尖取淨仁

淮木通各一錢二 桑白皮 甜葶藶 熟石膏各八分

水煎臨卧時服 加增分兩以蜜為丸徐服更妙

松蘿丹

治小兒龜背姑存之可也

黃松花 陳枳殼 北防風 川獨活 已上各一兩

淨麻黃 信前胡 川大黃 青化桂 已上各五錢

為末蜜丸菘豆大每服十九米飲下

六味地黄丸

方見一卷胎疾門

四君子湯

方見三卷瘧疾門

六君子湯

方見二卷類搐門

幼幼集成

卷之四

七十九

○鶴膝證治

小兒鶴膝因稟受腎虛血氣不克以致肌肉瘦削形

如鶴膝外色不變膝內作痛屈伸艱難若掀腫色

赤而作膿者為外因可治若腫靨色白不作膿者

是屬本性難治屬外因者十全大補湯加蒼朮黃

蘗防已屬本性者以六味地黄丸加鹿茸補其精

血仍須調補脾胃以助生化之源

○入方

十全大補湯

方見一卷保產門 此加蒼朮黃蘗防已

六味地黄丸

方見一卷胎疾門

○五軀五軀

小兒生後有五軀五軀之證乃胎元怯弱稟受先天

陽氣不足不耐寒暑少為六淫所犯便爾五軀見

焉五軀者頭項軀身體軀口軀肌肉軀手足軀是

為五軀然頭項軀肝腎病也肝主筋腎主骨肝腎

不足故頭項軀而無力手足軀脾胃病也脾主四

幼幼集成

卷之四

八十

肢脾胃不足故手軀而懶於擡足軀而慵於步也

身體軀陽衰髓怯遍身羸弱而不能強立口軀者

虛舌出口而懶於言肌肉軀者肉少皮寬肌體虛

疴之象也總之本於先天不足宜地黃丸以補肝

腎而更所重者在胃蓋胃為五臟六腑之化源宜

補中益氣升舉其脾氣倘得脾胃一旺則臟氣有

所稟諸軀之證其度幾矣

五軀者手軀脚軀腰軀肉軀頸軀也仰頭取氣難以

動搖氣壅疼痛連於胸膈手心脚心冰冷而靨此

陽氣不榮四末也為獨陰無陽難治若肚筋青急乃木乘土位俱宜六君子湯加蒼桂升麻柴胡以補脾平肝若面青而小腹硬者不治

○入方

六味地黄丸

方見一卷胎疾門 此加鹿茸上桂

補中益氣湯

方見一卷保產門

六君子湯

幼幼集成

卷之四

八十一

方見二卷類搐門 此加乾薑上桂升麻柴胡

○丹毒證治

小兒赤遊丹毒皆由心火內壅熱與血搏或起於手足或發於頭面胸背遊移上下其熱如火痛不可言赤如丹砂故名丹毒凡自腹出四肢者易治自四肢入腹者難治治丹之法先用辛涼解表使毒漸消方可搽敷若先不解毒遽用搽敷必逼毒入腹以致不救小兒一歲以外者易治未週歲者難治治之得法無論大小予嘗治百日內外火丹

從陰囊下起按法治之三日後陰囊蛻去一殼而愈

小兒十種丹毒如三日不治攻入腸胃則不救宜逐一辨認依方治之百不失一

凡治丹毒俱宜先服防風升麻湯以解毒發表次用磁鋒針去其血則毒隨血散至神至捷百發百中

○入方

防風升麻湯

總治十種丹毒

幼幼集成

卷之四

八十二

北防風 綠升麻 黑梔仁 大麥冬 荆芥穗

淮木通 粉乾葛 南薄荷 潤玄參 牛蒡子

粉甘草 已上十味各一錢甘草減半 便閉加大黃利之

燈心十莖水煎熱服

磁鍼砭法

用上清磁器輕輕敲破取其鋒銳者一枚將筋頭劈破橫夾磁鍼露鋒於外將線紮緊以磁鋒正對丹毒之處另以筋一條於磁鋒筋上輕輕敲之其血自出多刺更妙毒血出盡立時見功治丹若

不砭去惡血專用搽敷十不救一

○十種丹證

一飛竈丹從頭頂起腫然後散開先用葱白搗取自然汁塗之效

二走竈丹從頭項起紅腫痛苦異常用紅飯豆研末鷄蛋清調塗

三鬼火丹從面部起紅腫用竈心土研為細末鷄蛋清調塗

四天火丹從背上起赤點用桑白皮切碎焙乾為細末羊油調塗

末羊油調塗

五天竈丹從兩臂赤腫黃色起用柳木燒炭研末淨水調塗

六水丹先從兩脇起赤腫用多年繡鐵磨濃汁猪油調塗

七葫蘆丹先從臍下起用尖檳榔切碎焙乾研末米醋調塗

八野火丹先從兩脚起紅腫用乳香去油研末以羊油調塗

九煙火丹從脚背上起紅腫用猪槽下土研末麻油調塗

調塗

十胡漏丹從陰囊下起紅腫用門檻下干脚土研末羊油調塗

更有胎毒重者遍體皆是速用芸薹子即油菜子也秤過一兩酒一大壺和研濾去渣取酒復煎數沸不拘時溫服一盞

又方芸薹菜即油菜也取菜葉搗爛敷之隨手即消如無生菜乾者為末水調敷凡丹毒遍身或連腰

幼幼集成

卷之四

周匝百方不能治者惟此最神

○水痘露丹

水痘似正痘外候面紅唇赤眼光如水咳嗽噴嚏涕唾稠黏身熱二三日而出明淨如水泡形如小豆皮薄痂結中心圓暈更少易出易靨溫之則痂難落而成爛瘡切忌薑椒辣物并沐浴冷水犯之則成薑疥水腫自始至終惟小麥湯為準

小兒生後百日內外半歲已上忽然眼胞紅腫面青黯色夜間煩啼臉如胭脂此因伏熱在內發之於

外初則滿面如水痘脚微紅而不吐出發無定次至頸項赤如丹砂名爲露丹以三解散疎散之

○入方

小麥湯

治小兒水痘

白滑石 地骨皮

生甘草 各五分

官揀參

川大黃 淨知母

川羌活 各四分

葶藶子 五分

小麥一十四粒引水煎熱服

三解散

幼幼集成

卷之四

痘疹

治露丹

官揀參 北防風

明天麻

川鬱金

節白附

錦莊黃 枯黃芩

直殭蠶

北全蝎

陳枳殼

南薄荷 京赤芍

小甘草

隨宜加減

燈心十莖水煎熱服

○破傷風證

小兒或因跌撲或刀斧破傷風邪暗襲傷處發腫謂之破傷風速宜治之不然則發瘳矣內服疎風活血散外以紫金錠塗之

疎風活血散

治小兒破傷風已瘳未瘳者皆治

全當歸 懷生地

赤芍藥

北防風

已上各一錢二分

鮮紅花 大川芎

廣藜木

炙甘草

已上各六分

生薑三片大棗一枚水煎熱服

紫金錠

山慈菝

三兩

五構子

三兩

芽大戟

一兩五錢

明雄黃

鏡辰砂

各一兩

真麝香

三錢

共爲細末糯米飲和藥爲錠磨水塗之

幼幼集成

卷之四

痘疹

○癩疹癰疹

小兒癩與疹宜別證候陰陽其掀腫於外者屬少陽相火謂之癩其證發於面部或背部或四肢極其稠密色如錦紋紅赤者胃熱也紫黑者胃爛也宜消癩青黛飲

其紅點發於皮膚之內不出者屬少陰君火謂之疹其證發於胸腹手足稀而少者此由無根失守之火聚於胸中上蒸於肺隱於皮膚而成小疹其狀如蚊跡蚤斑而非錦紋也理中湯

癩疹自吐瀉者慎勿止之因其毒氣從上下出宜調

中氣若吐瀉後遍身發熱斑如錦紋者恐防熱氣

乘虛入胃其夏月多有此證化斑湯

癩疹多屬於脾以其隱隱在皮膚之間發而多癢或

不紅者俗人名為風丹加味羌活散

○入方

消斑青黛飲

治陽毒發斑

正雅連 熟石膏 淨知母 北柴胡 黑梔仁

幼幼集成

卷之四

八十七

潤玄參 綠升麻 懷生地 片黃芩已上俱各一錢

官棟參 洋青黛 炙甘草各五分

生薑三片豆豉二十一粒水煎熱服

化斑湯

即人參白虎湯治陽明胃熱發斑

官棟參一錢 熟石膏四錢 淨知母二錢 炙甘草一錢

淡竹葉一錢

粳米一撮水煎熱服

加味羌活散

治癩疹作癢世俗謂發風丹者是也

川羌活 信前胡 芽桔梗 蘇薄荷 陳枳殼

明天麻 香白芷 正川芎 淨蟬蛻已上俱各一錢

官棟參 炙甘草各五分

生薑三片水煎熱服

擦藥方

芸薹菜搗爛取汁生鐵繡生大黃等分研末以芸

薹汁調塗之

○諸瘡證治

幼幼集成

卷之四

八十八

經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火○世間瘡瘍癢疥惟小

兒最多豈其稚陽純氣易與歲運火政相乘耶抑

不識不知而寒溫動定之乖其道耶復有父母之

遺毒為兒終身之害者可不有以治之乎

小兒初生遍身蟲疥與乎流水風瘡一皆胎毒也切

勿外治宜內服胡麻丸倘誤用擦洗逼毒入腹以

致腹脹危候也急服解毒湯為佳

凡頭面遍體有瘡原未擦洗而瘡忽自平更加痰喘

氣急者切不可下宜連翹丸解托之

小兒未過週歲無論一切瘡疥皆不宜搽洗總以胡麻丸為主治至穩

小兒生癰毒腫癩皆氣血凝而火熱乘之內服大補湯外以紫金錠塗之

頸上結核腫脹發熱者內服胡麻丸外以五楮子為末醋水調敷一日二易為妙

○入方  
胡麻丸

治小兒風瘡疥癬

幼幼集成 卷之四 八十九  
嫩苦參五錢 何首烏蒸 胡麻仁炒 蔓荊子炒

葳靈仙炒 荆芥穗焙 皂角刺炒已上各三錢

石菖蒲炒 白菊花各二錢  
右為細末酒打米糊丸每一二錢量兒大小竹葉煎湯調下

解毒湯  
治小兒瘡疥誤用搽洗逼毒入腹以此托之

潤元參 淨連翹 綠升麻 片黃芩 京赤芍  
全當歸 川羌活 北防風 懷生地 荆芥穗

淮木通已上各一錢 炙甘草五分 大便秘加酒大黃  
燈心十莖水煎熱服

連翹丸  
治小兒瘡疥毒陷入裏以此托之

淨連翹 桑白皮 白頭翁 粉丹皮 北防風  
川黃蘗 青化桂 淡豆豉 海螵蛸 輭秦艽

川獨活已上各三錢  
右為細末煉蜜為丸龍眼核大每一丸燈心湯下

大補湯  
幼幼集成 卷之四 九十

治小兒或生癰疽出膿之後或頑瘡破爛久不收口凡一切癩癧皆屬不足切不可再用寒涼

官揀參一錢 嫩黃耆 正川芎 淨連翹 香白芷  
白雲苓 大歸身 漂白朮 懷生地 赤芍藥

炙甘草已上俱錢二分  
每日一劑生薑三片大棗三枚水煎半饑服

○瘰癧證治  
小兒瘰癧由肝膽二經風熱血燥而成蓋二經常多

氣少血倘怒則肝火動而血熱腎陰虛則不生木

而血燥燥則筋病累累然結若貫珠其候多生於耳之前後連及頤頤下至缺盆及胸腋之側又謂之馬刀初起如豆粒漸如梅李或一粒或數粒按之則動而微痛不甚熱人之則日益以甚或頸項強痛或午後微熱或夜間口乾飲食少思四肢倦怠或堅而不潰或潰而不合皆由氣血不足往往變成疔癩此證本非外科切忌刀針爛藥取去其核昧者不識病源誤用爛藥取核不知肝膽二經內有相火抑鬱不伸而生癰癰爲之益氣養榮舒筋散鬱猶恐不暇何敢用刀針爛藥以致破爛不收膿血交併耶予日擊其誤治致死者不可勝紀凡小兒患癰不可妄治只宜內服單方切忌取核慎之戒之

凡小兒頸項結核或三五粒十數粒或痛或不痛或熱或不熱用墻根下鳳尾草梗如鐵線而黑葉似鳳尾本草內名石長生即墻縫中所生小蕨其也單取其根水洗淨每用一兩以糯米濃酒一碗瓦瓶濃煎去渣服酒每日一服勿求速效多則一月

幼幼集成

卷之四

九十一

少則二十日其核全消再不復發此藥氣味平淡更不苦寒實爲神授藥賤而功弘誠仙方也

凡小兒耳之前後忽有瘡作核如杏核大小不一名馬刀瘡爲癰癰之根用桃樹白皮切三指大一塊刮去外皮留內一層貼瘡上以艾炷於桃皮上灸之覺熱痛即止毋令傷皮明日又灸不數次而核消矣

治小兒癰癰未潰者令內消已破者能收口服此一月全愈用直羅羅半觔先用清水洗三次去石灰淨晒乾炒枯另將晚米半觔炒熟共研細末米糊爲丸重一錢一顆每日空心時以夏枯草煎湯兒大者二丸小者一丸研爛調服常須以甘肥輩潤之物滋澤之

紫霞膏

治癰癰初起未成者貼之自消已成者貼之自潰已潰核存者貼之自脫并治諸色頑瘡破爛不愈疼痛不已者俱皆神效

用明淨松香一觔研末鮮色銅絲一兩研末以真



麻油四兩入鍋內先煎數沸滴水中不散方下松香熬化次下銅絲煎至白煙將盡其膏已成退火傾入磁罐收之凡用時於熱湯內頓鏝旋攤旋貼集成白玉丹

專治瘰癧破爛多年不愈連及胸腋

老子曰下士聞道大笑之不笑不足以爲道此則世人聞方大笑之不笑不足以爲方藥則至賤不堪功則神丹莫並專治瘰癧破爛連及胸腋臭穢難聞三五載十數載不愈者藥到病起用新出窰礦

幼幼集成

卷之四

九十三

石灰一塊滴水化開成粉用生桐油調勻乾濕得中先以花椒蒸煎湯洗淨其瘡以此塗之不數日全愈真奇事也昔予道門一友患瘰癧爛及胸腋十數載不愈一愚人傳此方用之立應後以治人無不愈者誠仙方也

○楊梅瘡證

夫梅毒一證以其腫突紅爛狀如楊梅故爾名之西北人名天泡瘡東南則名棉花瘡蓋小兒患此者實由於父母胎毒傳染而致也然非尋常胎毒之

可比蓋青樓艷質柳巷妖姬每多患此而少年意興誤墮術中山洩精之後毒氣從精道乘虛直透命門以灌衝脈所以外而皮毛內者筋骨凡衝脈所到之處無不受毒此其爲毒最深最惡設初起之時治不如法去毒未淨而隨至敗壞殞生者有之矣或遺毒兒女以致生而不育者有之矣世人見此惡道而不寒心知避者愚亦甚矣

小兒亦有不因遺毒而成蓋因偶傷濕熱卽或患此亦不過在皮膚肌肉之間而已治之者能知清熱

幼幼集成

卷之四

九十四

解毒除濕自必全愈無足慮也

○附案

予高友少年不慎嘗發梅毒治不如法以致毒氣內伏外雖愈而內成結毒每夏月則手心多現紫疹如鵝掌風樣及其生子皆於月內二十七日必發此毒初從陰囊之下紅腫數點似火丹之狀不數日則延及遍體皮肉潰爛形類火燒晝夜啼號諸藥莫救延至半月則精神竭脫而死連生三子有如一轍友悔恨無及乃懇於予予雖感其誠敬而

實不得其法因靜思熟計恍然有得蓋此毒從洩  
精後乘虛透入命門直灌衝脈已爲負隅之虎矣  
而且盤踞多年根深蒂固何可動搖倘勦捕不得  
其法反致蹂躪疆場損我民物古人云多笑勝少  
算不勝苟非攻堅破壘搗巢覆穴不足以絕其根  
株因自製一方名鼠毒丸以鱗鯉甲頭尾胸脊以  
及四足各川鱗甲數片取其穿山透穴率領諸藥  
直趨毒巢則內而臟腑外而經絡凡衝脈所行之  
地無處不到以之爲君用刺蝟皮仍依上法各取

幼幼集成

卷之四

梅瘡

其刺雖搜毒之功不如鱗鯉而以毒攻毒力則過  
之故以爲臣用蟬蛻蛇蛻雖爲解毒清熱之需實  
所以取其蛻脫之義以之爲佐以芩連梔檉清其  
雷龍之火用皂刺土荅槐花領毒外出不使久留  
精竅以之爲使復略加人參護其胃氣使之宣行  
藥力庶無潰亂壅遏之虞以爲四路救應製而服  
之誠所謂得心應手鍼芥相投藥未盡而毒出忽  
於左腳臙發一惡瘡皮肉紫黑痛苦異常號呼牀  
第一月方痊嗣是手掌如故所生子女不特不發

梅瘡而得毫無疥癩可見瘡有甚妙理無一致予  
素未諳外科而能拔茲社鼠城狐之毒恃此理也  
倘無其理而欲邀天之幸吾未能信

小兒梅瘡最爲惡候倘發於一二月間或半週之內  
最難救治以其毒稟先天來路既遠力藥難及卽  
日服數匙之藥杯水車薪終難有濟味者但以搽  
洗之法治之適足以阻其出路反致內攻不救只  
當緩以圖之庶能保全先以胡麻丸修製精細每  
日服之三七之後內毒將盡方用點藥不三日而

幼幼集成

卷之四

梅瘡

瘡盡愈矣此法至神至捷第不可用之太早恐內  
毒未盡也

梅瘡點藥

杏仁一兩熱湯泡去皮以絹紙包之木槌緩緩搥  
去油此物極難得乾必數十換紙方得油淨以成  
白粉爲度謂之杏霜每杏霜一錢加入真輕粉八  
分明雄一分共研勻先以槐花煎濃湯將瘡洗淨  
瘡濕則以藥乾搽之瘡乾則以公猪膽汁調搽三  
日全愈百發百中此方不特治小兒梅瘡凡外科

下疳瘡蠟燭瘡藥到病除久經效驗

○瘡疥雜方

凡半週一歲乳子偶患瘡癩忌外治必先服解毒之藥數劑然後稍用外治無不愈者倘不先解毒而妄用搽敷必致逼毒入內反為大害慎之

治疥神方大風子肉三錢輕粉明礬各五分共為末聽川先以臘猪油二兩入麻黃五錢同入鍋內熬之以麻黃色黑為度瀉去渣退火冷定調前末搽之

幼幼集成

卷之四

九十七

治瘋癩白禿頭瘡方用鷄蛋十個去殼攪勻入小鍋香油盪成一餅乘熱蓋兒頭上一時許蛋冷取下又將上面用油煎熱再覆頭上數次全愈妙不可言

黃水頭瘡即肥瘡也其瘡黃水流下即治生漸至眉耳不治則殺人用黃連五錢輕粉三錢共為細末麻油調成膏塗粗碗內須乾濕得中將碗覆轉下燒艾煙熏之緩緩燒煙熏至黑色為度放地上出火毒次加水片三分研勻香油調搽數次即愈

一切無名腫毒諸般火丹熱癩濕瘡取陰地蚯蚓糞四兩皮硝二兩共研末新汲井水濃調厚敷患處乾則易之

治熱毒瘡疥用生石膏生硫黃陳細茶各二錢共為末以生猪油和藥搽勻搽之

小兒諸般疔瘡生於面上遍身爛成孔曰儼如大人梅瘡於蒸糯飯時甌蓬四邊滴下氣水以碗盛取掃瘡上數日即愈百方不效者此法如神

神治小兒熱瘡用鷄蛋五枚者熟去白專取蛋黃再

幼幼集成

卷之四

九十八

以亂髮一團如鷄子大同入鍋內以炭火熬之初甚乾次則髮焦乃有液出久熬則液漸多而黃髮盡化而成液以黃髮盡為度收起冷定取塗瘡上即以此苦參末滲之此神方也

神治小兒頭上軟癩此癩愈而復發至難除根用枳殼一個剝去穰磨令口平以麪糊塗抹枳殼四圍安貼於癩上於一邊安一燈心以通膿水則膿自出愈後枳殼自脫更無痕跡枳殼鮮者更妙即臭橘子是也樹名鐵籬色多刺而觀人家園壟多

植之以禦臂人者此方不獨治軟癩凡人年頑瘡  
膿瘰不能收口依法用之無不愈者

○湯火簡方

凡湯火傷初起卽以食鹽研末用米醋調勻敷患處  
頻塗不絕暫時雖痛却能護肉不壞然後用藥敷  
貼切不可用冷物搨冷水洗并涼藥敷貼予每見  
以冷水冲擊者使熱氣不得出必致內攻而不救  
慎之

凡湯火傷悶亂不省人事急以蜂蜜調湯灌之若至  
幼幼集戒

重者急以煮過好熟酒數十壺入浴盆內以患兒  
浸酒中雖至重者不死

一女兒火燒手且駸駸至掌卽以酸醋升餘浸之出  
醋尙痛少時痛止不瘡不膿不疤痕奇方也

神治湯火傷人經效驗者凡湯火傷爛皮已脫去惟  
有鮮肉或臭爛不堪諸藥不治者用猪毛一籃以  
破鍋炭火煨紅入猪毛在內煨之少時猪毛消化  
而成黑液取起冷定略加大黃數錢共研細末再  
加水片一分研勻香油茶油蠟燭油俱可調搽至

神至靈之方也

凡遭火藥燒壞者先以好酒洗淨次用鷄蛋黃熬油  
聽用以大黃研末鷄蛋油調搽卽愈

馮鏗幼幼集成卷之五

羅浮陳復正飛霞氏 刪

萬氏痘麻

廬陵劉 勳宋孟氏 校正

遂陽周宗願虛中氏 參定

○天元賦

痘本胎毒俗曰天瘡傳染由於外感輕重過於內傷  
初起太陽壬水尅乎丙火次歸陽明血水化為膿  
漿所喜者紅活鮮潤可畏者黑陷焦黃勢若燃眉  
變如反掌皮膚臭爛血氣虛危若救焚兮徒薪何

幼幼集成

卷之五

卷之五

二

如焦額似拯溺兮落井不及寬裳原乎一元肇化  
二索成祥慾火動而妄作胎毒熾而流殃啼聲驟  
發機毒深藏命門養火胞戶收儲待四時之疫癘  
動五臟之皮囊榮氣逆於腠理惡血發於胸臆二  
火相煽四大成瘡毒之輕者發則微貴乎調養毒  
之重者發則密急於隄防至於運氣推遷有於勝  
復升降時令乖異無非寒熱溫涼苟陰陽之逆理  
為氣候之反常五行斂而災見九曜室而變彰厲  
氣流行無論郡邑鄉黨惡毒傳染豈分黎庶侯王

此則不形於診貴在能制其亢先事解散兮十全  
八九臨時區處兮止日尋常

天抵氣運先歲痘疹屬陽春夏為順兮樂其生長秋  
冬為逆兮惡其收藏暴寒兮恐邪毒之鬱遏暴熱  
兮慮腠理之開張膿胞春而莫瘳黑陷夏以為殃  
秋斑實惡冬疹非祥此逆四時之令休誇三世之  
方且如證候殊形臟腑異狀肝主淚而水泡肺主  
涕而膿漿心斑紅艷脾疹赤黃惟腎經之無證惟  
變黑而可妨所以觀乎外候因而辨其內臟呵欠

幼幼集成

卷之五

二

頓悶兮肝木之囚咳嗽噴嚏兮肺金之相手足冷  
而昏睡兮脾土困於中央而目赤而驚悸兮心火  
炎於膈上耳聾屬腎溫暖如常二處燦熱兮下極  
火炎而必斃四肢厥冷兮中州土敗而傾亡  
先分部位次察災祥陽明布於面中太陽行於頭上  
心肺居胸膈之要肝膽主脇腋之効手足司於脾  
胃腰背統於膀胱泄瀉者邪甚於下嘔吐者邪甚  
於上氣逆而腹痛隱隱毒深而腰痛皇皇心熱甚  
而搐搦胃邪實而顛狂鼻燥咽乾肺受火邪而液

竭便溺澀腎由火旺而精亡氣弱減食者不任其毒神強能食者不失其常

欲決重輕但觀發熱如占順逆須認其瘡毒甚分身如炎火熱微兮體或清涼若寒熱之來往定徵兆之佳祥數者施出兮春回陽谷一齊湧出兮火烈峴峴蚊跡蚤斑刻期而爲鬼錄蛇皮蠶殼引日而返泉鄉不喜珠紅更嫌灰白最宜蒼蠟切忌紫黃常要明潤兮恐溽嫩之易破不宜乾枯兮防搔癢之難當惡候如此上工審詳面頰稀而磊落清安

幼幼集成

卷之五

三

可保胸膈密而連串凶吉難量頂要尖圓不宜平陷漿宜飽滿切忌虛空則顏色喜老而惡嫩皮膚變糙而怕光燄起根窠終防墮塌丹浮皮肉必主天癆頭而預腫兮三陽亢甚手足厥冷兮五臟推傷瘡堆喉舌毒纏頸項咽喉痛而呼吸則難飲食少而吞吐則噎此天命之安排豈人力之可使煩燥悶亂兮七神離散謔語眩冒兮五毒猖狂鼓項戰慄兮肺敗咬牙口噤兮腎傷渴不住兮焦脈瀉不止兮滑腸失聲兮咽爛吼氣兮腹脹晝夜搔爬

必將榮衛之外脫乳食斷絕兮必胃氣之受戕腫忽消毒歸於裏色反黑疔起於瘡食穀則噎兮在嬰兒之命促飲水則噴兮較醫工之短長

輕重反復調理乖張輕變重而可畏重變輕而莫慌風寒素慎飲食如常出入禁乎男女蓋覆適其溫涼內無妄動治不乖方此則變輕之候實爲保命之良若當犯乎禁忌或誤投乎丸湯徒肆房室不順陰陽外感不正之氣內傷不時之糧平人且病患者敢當是以順則逆而逆則險宜乎輕變重而

幼幼集成

卷之五

四

重則亡發自肺經相連脾臟氣熱味辛燥金受尅形寒飲冷華蓋先傷浩飲則水來侮土而成泄痢過食則脾不運化而作痞脹皮毛虧損肌肉虛起發遲而不胖壯收磨緩而作膿瘡輕則延綿乎時日重則泣送於郊邇奈愚夫之不曉致生命之天亡不信醫而禱諸神鬼枉殺牲而號乎穹蒼藥貴中病醫不執方喜行溫補者動稱平文中專用涼瀉者祖述乎仲陽貴其因人而治相時而行正

氣為先，戒開門延寇，解毒為急，休視虎如狼，首尾不可汗下，法之固執，緩急各有權宜，治之經常，拘其繩墨者，如守株之待兔，惑於方書者，似多岐以亡羊。

且如紅揪紫腫，分涼血為上，灰白平陷，分補氣最良，出不快，分責表實而發散可用，便或秘，分責裏實而疏利何妨，毒不能速解，毒甚者，令微汗之散越，熱不可盡除，熱劇者，使小便之清長，三陰多寒，分必投辛熱，三陽多熱，分無過苦涼，安可惡寒而喜。

幼幼集成 卷之五

五

熱莫知貴陰而賤陽。

是故補氣者，參耆白朮，養血者，歸芍地黃，發散表邪，輕葛根而重官桂，疎裏實，微枳殼而甚大黃，解毒分，苓連梔子，快斑，分荆防牛蒡，連翹藥內之要領，甘草方中之君相，咽痛求諸甘桔，頭腫取乎羌防，木通利其小水，人尿攻其黑瘡，氣逆分青皮陳皮，胃寒分丁香木香，泄瀉無如蒼朮嘔吐莫若生薑，麥冬乾葛而止渴，厚樸腹皮而消脹，望月砂退翳有準，穿山甲折毒無雙，枳實麥芽山檀子消宿。

食而尅化，大黃乾葛地骨皮解餘熱，以清涼咳嗽，以枳桔又用杏仁，痢疾以黃連，再同木香，苦參主平熱，毒溺自治其疔瘡，用之合宜，工可稱良。

其諸藥物各有主張，春夏桂枝而少服，秋冬苓連而莫嘗，瘡若乾枯，白朮非其所貴，色如紅艷，黃耆豈可入方，裏虛少食者，勿投枳實，表虛多毒者，休使生薑，汗自出，分用乾葛重虛，其表溺本數，分加木通，再損其陽，泄瀉酸臭，分柯薏不宜輕用，嘔吐清冷，分連梔安得作湯，凡用苓連，必資炒製，如加丁。

幼幼集成 卷之五

六

桂須假寒涼，應制伏而不誅，無過保和平而萬壽無疆。

大勢若平，餘邪須講，熱毒流肝，分雙睛生翳，火邪入脾，分四肢成瘡，口内生瘡，分爛齦破舌，腹中作痢，分腐胃敗腸，皮膚嫩而洗浴太早，因以溼熱臟腑虛而甘肥太過，遂致內傷，若中風寒，凝痰作嗽，如逢搏指，灌蝕歸瘡，嗟夫，罹此證候，其苦非常，外纏皮肉，內連肺腑，改換形容，如蛇蛻皮，龍蛻骨，淋漓膿血，若蚓在灰，蟻在。

湯軒岐置而未言秦漢棄而無方古無此證或云  
起於建武今有是疾相傳得於南陽拘於日數者  
不知輕重之貴執其偏見者在增虛實之防本溫  
再熱已寒又涼徒自膠而必固反致惡而見殃洩  
骨髓之真詮非其人而不授宣肺腑之秘奧牢記  
誦而莫忘

○痘疹西江月 凡四十九首

痘疹毒從何起母胎火毒流傳生來穢物下喉咽藏  
在命門裏面一旦天行時氣感令相火熬煎毒從

幼幼集成

卷之五

七

骨髓見皮間彼此一般傳染

五臟各有形證認時須要分明往來寒熱睡脾經呵  
欠頓悶肝證咳嗽噴嚏受肺面紅驚悸屬心惟腎  
清靜忌邪侵手足耳尻俱冷

五臟各有一證其問治法難同肝為水泡肺為膿大  
小瘡形異種脾證發為疹子心經現作斑紅腎為  
黑陷病多凶縱有靈丹何用

痘疹要知順逆天時人事相隨大端陽火是根基若  
遇陰寒不喜春夏發而多吉秋冬逆以何疑如逢

稠密必凶危稀少方為平易

治法而今不定清涼溫補分明各持一見論紛紜目  
口予為神聖解毒喜行涼瀉補中愛使辛溫不明  
時令與元神枉自捕風捉影

假令天時暄熱辛溫助為災殃嚴凝涼解雪加霜病  
者何如抵禦壯實再行溫補虛厄又使寒涼虛虛  
實實伐元陽無異隔靴爬癢

看取時行疫厲天時熱氣炎炎精神肥健食能兼解  
毒清涼甚便若是風寒太甚虛羸連綿此宜

幼幼集成

卷之五

八

溫補法為先又在醫人活變

痘疹要知輕重吉凶順逆精通毒輕瘡少順家風湯  
藥不宜妄用瘡密毒重為逆皮膚寸寸成膿此般  
形證例多內仔細扶持休縱

輕者三四次出頭面胸背稀疎小便清利大便稠飲  
食如常充足重者遍身齊出狀如麻子麥麩咽疼  
泄瀉悶悠悠飲食不思可惡

多有先輕後重只因觸冒風寒房勞不避穢腥干食  
飲偏於冷暖閒雜人帶穢厭諸般禽獸盤桓庸工



術淺誤湯丸反使痘瘡變換、

重者變輕何以常常和暖衣衾房中謹密少人行飲

食隨時添進未見誤投湯藥不曾妄啖酸腥此為

人事奪天靈安可歸於有命

要識痘瘡死證無過五證分明紫黑喘渴悶何寧瘡

塌咬牙寒噤灰白頂陷腹脹皮嫩易破成坑泄瀉

氣促見鬼神聲啞頭面足冷

既識五般死證其間吉病如何磨頭飽滿作膿窠任

是推磨不被四畔根盤紅活安眠靜臥平和光壯

幼幼集成

卷之五

九

收靨不蹉跎管取介疾勿藥

黑陷乾枯腎敗咬牙寒戰肝傷失聲喘氣肺摧創泄

瀉脾虛腹脹癢塌悶亂心死狂言見鬼神亡皮嫩

易破氣無陽便血陰崩模樣

首尾不可汗下汗時腠理開張風寒易入透斑瘡收

靨不齊火旺候下必犯脾胃無事自取內傷泄瀉

黑陷致傾亡枉使冤靈飄蕩

大抵痘瘡未出先須升葛參蘓如斯不出汗忙疏紅

點見時藥住大便若還秘結輕輕四順相符假饒

自利伐無辜定與闍羅掌簿

調痘無過二法補中解毒兼行補中參木草者苓枳

實山楂有應解毒苓連梔櫟連翹枳實防荊芎歸

養血妙如神加減消詳前定

血氣要分虛實但於瘡色推求紫腫紅掀血實由四

物內加解毒灰白中陷氣弱四君子是良謨畧加

解毒藥相符補氣實脾無誤

但是痘瘡初出如逢熱盛昏醒解毒發散藥先行莫

待臨渴掘井桔梗升麻乾葛連翹甘草黃芩牛蒡

幼幼集成

卷之五

十

梔子木通荆蟬蛻防風作引

若是如常潮熱只消乾葛升麻苓連甘草赤芍加牛

蒡連翹無價或用參蘓飲子青皮木香內加煎來

一服勝靈砂痘見表疏纔罷

初熱多生搐搦急將導赤疎通木通甘草與防風生

地黃連同用再着辰砂調服須臾救護朦朧此方

端的有神功管取行之必中

壯熱不曾出現大便秘結難通顛狂唇裂眼珠紅此

證凶危堪慟急與苓連梔櫟大黃酒炒疎中連翹

牛蒡與木通貫衆射干俱用。

自此出而稠密認他虛實調醫虛家泄瀉色如灰大補十全堪取若是腫掀紅綻芩連梔蘘芎歸翹芎升葛桔甘奇此個真機妙秘。

灰白不能起發又加泄瀉頻頻溫中妙藥不宜停急急扶危濟困當歸黃芩芍藥甘草乾薑人參木香梔子及青陳官桂丁香靈應。

毒甚常生咽痛可憐飲食難嘗射干甘桔最相當連翹升麻牛蒡若是痘堆頸項此名鎖膈悽惶一朝

幼幼集成

卷之五

十一

破爛命將亡變作啞水瘡。

起發狀如蠶殼乾枯不見水漿此名血竭毒歸藏不治必然命喪當歸地黃養血參耆甘草溫良連翹牛蒡與木香桔梗青皮發旺。

起發常將撚視切防黑陷來攻若然黑陷現其中藥點許多妙用豌豆七粒燒過亂髮火煨和同珍珠水浸胭脂紅針破搽之自腫。

藥點反加黑陷喪門吊客怒怒百祥牛李與宣風總是脫空賣美不如人貓鷄犬四股屎煨和同木香

湯引妙無窮妙法半文不用。

起發初生搔癢比於癢場爭差傷寒身癢表留邪痘亦同茲休訝治用疎風涼血荆防翹芎芎地黃歸葛效堪誇竹葉木通無價。

大抵痘宜脹痛最嫌虛癢相干只因飲食濕邪攢心火尅而悶亂外宜茵陳艾炬內宜參朮湯丸若還癢止證方安孤破面皮凶斷。

何為正而怕癢面含五臟精華假如破損實堪嗟氣散魄飛魂罷尤忌先傷正額心經火帶虛邪幾番

幼幼集成

卷之五

十二

試驗不爭差寄語明人體察。

人相火居正額出現胖壯休先果然額上痘蟬噪大抵凶而不遠喜是兩頤口鼻始終都在其間任教稠密勢纏綿到底終無傾險。

起發成漿欲靨忽然泄瀉來攻此時脾胃不宜空變出百端可憫多是內傷飲食只求藥有神功若還消腫泄淋膿父母比泣送。

先用人參白朮黃耆炙草煨薑茯苓山藥及木香大劑煎來溫養不效次求荳蔻木香芡實良方三番

只有異功良此實盡頭酌量

記取成漿欲醫最防厥穢腥類大黃蒼朮共燒烟可

解一切穢厥內服調元飲子黃耆炙草人參當歸

蒼朮酒芩連犯着荆防即變

到得成漿痘發依時都要成痂若還腐爛臭腥加此

是表虛堪誅急進參耆歸朮荊防蒼葛升麻連翹

牛蒡密蒙花休得弄真成假

若是痘瘡發爛皮破膿血淋漓內服歸朮與參芪牛

蒡連翹官桂外用多年敗草晒乾研細成灰鋪開

幼幼集成

卷之五

十一

床席任施為甚解火邪毒氣

痘發不能收較反行破爛成瘡一時焦痛甚難當請

問如何發放但取甘草滑石辰州豆粉清涼蜜調

塗上便安康此法不留書上

有等痘瘡純正緣何日久難收請君仔細問根出不

可臨時差謬或是會傷冷水或因秘結熱留兩般

治法各推求不枉青囊異授

傷冷水濕傷脾胃皆虛脾應肌肉主中區無

怪血膿流注可用參耆蒼白青陳甘桔無拘丁香

官桂有方書收裏收表妙處

如是大便秘結三朝一七未通此為熱氣內蒸烘因

此毒難開縱內服歸黃麻子大黃畧入相攻再行

膽導妙無窮管取成痂去壅

收後許多餘證醫家須要分明毒留肝臟目生赤翳

障瞳人隱隱毒入肺脾癰腫責歸手足陽明內傷

外感要調停免致多生怪病

兩目忽然腫痛痘末毒入肝經輕為浮翳掩瞳睛重

則終身廢病去翳菊花瓣蛇紫花蕪藜穀精各為

幼幼集成

卷之五

十四

細末共和勻湯煮猪肝作引

雖毒發於肢節常常膿血不乾不知調理早求安廢

疾終身為患內服千金托裏外塗太乙金丹排膿

長肉未為難任是千金不換

痘後不宜澡浴痘死皮嫩易傷不知禁忌受寒涼遍

體熱生痛僵此因傷寒勞復不宜官桂麻黃只須

九味羌活湯次以補中調養

痘後或傷飲食致令腹痛非輕不宜轉下損脾補瀉

導方為對證白朮人參枳實黃芩大麥青陳山查

白苻與砂仁積化痛痰俱定

痘爛不齊收靨正而瀉痛流膿急防兩目毒來攻解毒清涼好用酒炒苻連梔葉連翹蟬蛻木通升麻牛蒡苦參同細研酒九酒送

大凡痘瘡一證名為百歲聖瘡如龍蛻骨換心腸又似蟬蛻殼樣出現光壯收靨落痂顏色相當飲食寒暑順陰陽自此精神長旺

○痘有順險逆并五善七惡之證

順證○氣血冲和痘毒宣暢精神素健飲食如常不

幼幼集成

卷之五

十五

必施治

險證○氣血不舒痘毒壅遏或雜證攪擾開落失期速宜施治

逆證○痘毒凝結氣血乾枯怪證叢生病不對藥治之無功

五善○一飲食如常 二大小便調 三瘡色紅活 皮厚堅實 四脉靜身涼手足溫暖 五聲音清亮動止安和五者不能盡得得一二亦自清吉  
七惡○一煩燥悶亂譫妄恍惚 二嘔吐瀉利飲食

不能三黑陷焦枯癢塌破爛 四頭面預腫鼻塌

肩擡目張唇裂 五喉舌潰爛食入即嘔飲水則

噎 六寒顛咬牙聲啞色黯 七腹脹喘促四肢

厥冷七者不必皆有有一二亦自難為

七惡之外又有渾身血泡心腹刺痛伏陷不起便

溺皆血尋衣撮空是又卒死而不可救者

○一痘疹總畧歌凡一十一首 共一十五方

痘雖火毒肇胚胎 不遇天行不見災

郡邑若逢疔癘日 預施靈藥解將來

幼幼集成

卷之五

十六

凡痘疹之證皆由父母胎毒蓄於命門之中命門者下極丹田也為人身生化之源或遇冬溫陽氣暴泄人則感之觸動和火至春夏生長之時即發傳染相似是謂天行疫癘也未出痘疹者但覺冬溫宜先服解毒之藥如辰砂散三豆湯代天宣化丸之類使毒氣無傾伏留連之患如脾胃素弱者更宜調其胃氣間以四君子湯加陳皮木香之屬與之使胃氣和暢榮衛流通疫癘易出易  
子按代天宣化即韓氏之五瘟丹也苦寒剋削損

胃敗脾縱能解疫癘之毒未必能預解先天之毒  
即使能之亦只可行於藜藿稟實之兒倘膏粱稟  
怯不察妄投吾恐毒未解而胃先損痘未至而中  
已寒預伐無辜暗傷真氣及出痘時反不能救天  
枉相仍咎將誰諉蓋藜藿稟實而毒輕無俟於解  
膏粱稟薄而毒重勢不能解豈有先天之毒深藏  
潛伏於命門之中毫末發覺而敢用此沉陰沍寒  
之品預伐其生機誠為危道必不可行即欲解之  
又不若三豆湯之為得也

幼幼集成

卷之五

十七

欲知痘疹吉凶機 察色觀形在細微

年壽山根猶緊要 鮮明可喜黯青非

痘疹未出之先欲知吉凶輕重但於面部推之其色

紅黃明潤者吉青黑昏黯者凶相書以山根管命

宮年壽管疾厄所以二處猶為緊要也

汗下雖然謂不宜 刺舟求劍豈通醫

能分虛實知權變 可越乾坤造化維

首尾不可汗下誠痘科固執之言然亦自其平證語

之耳若遇風寒外襲應出不出則汗劑仍不可少

如大便連日不通煩悶狂燥不與下之寧不夭人  
生命是下劑在所必用但能消息虛實與時權變  
斯可謂之通醫

始終便溺自調嘉 便若艱難事可嗟

腹脹喘呼多壅遏 急行疏導免留邪

此言可利則利者也大抵豆疹始終小便清利而大

便滋潤者為順若小便或秘或澀宜利其小便宜入

正散若大便秘結速用通幽湯滋潤之

痘家脈證喜中和 徐疾由來不可過

幼幼集成

卷之五

十八

弦急浮洪為實候 微遲短瀉屬虛多

夫人以胃氣為主脈亦當以胃氣為主脈有胃氣則

氣象中和所謂弦不弦石不石者是也太過為實

不及為虛最宜消息

痘疹傷寒證一般 上工臨證貴詳端

休將汗下輕相試 解表和中病自安

痘疹發熱與傷寒相似但傷寒只見一經形證若痘

疹則五臟之證皆見如呵欠頓悶肝證也乍冷乍

熱手足稍冷好睡脾證也面燥腮赤咳嗽噴嚏肺

證也驚悸不寧心證也尻涼耳涼腎之平證也若

尻耳俱熱則邪伏腎經也

痘疹雖然本屬陽 往來微熱始相當

倘逢晝夜身如火 解毒須教小便長

凡痘疹屬陽非熱不成故治痘不可盡除其熱如熱

太甚毒未發盡只宜解毒兼利小便宜連翹升麻

葛根湯

食飲能多胃氣充 自然榮衛兩豐隆

休言食少無他慮 但恐脾虛毒內攻

幼幼集成

卷之五

十九

痘疹始終能食者其人脾胃素強自然氣血充實易

壯易盛若一旦食減即宜詢問或咽喉腫痛宜甘

桔湯傷食者橘皮湯若非已上二證因脾胃氣弱

不能消食者宜參苓白朮散運用之

最宜安靜癩和平 表裏無邪心自清

忽爾燥煩宜審諦 更防神爽欠分明

痘疹以安靜為貴此表裏無邪不必服藥但有煩燥

必毒氣壅併表裏不寧宜審諦之如搔爬不寧瘡

癢也心神不寧裏熱也呻吟不止瘡痛也非折肱

之手莫能識其病情已上治療見後

四時分治證須真 暑濕風寒各有因

異氣莫教輕觸犯 災危反復立纏身

大凡治病之道春夏養陽秋冬養陰故春病治在肝

夏病治在心秋病治在肺冬病治在腎不可逆也

治痘之人切須識此如天有烈風暴雨酷暑嚴寒

常要謹其帷幙適其寒溫寒則蓋覆欲厚熱則居

處欲清苟傷熱則血氣淖澤瘡易腐爛偏寒則血

氣凝滯瘡難起發若有觸犯輕則變重卒生異證

幼幼集成

卷之五

二十

是謂災怪如暴風連日病見傷風之證治以桂枝

葛根湯如寒威凜烈病見傷寒之證治以正氣散

若酷暑熏蒸病見熱證治以人參白朮湯倘值久

雨侵淫有受濕之證泄瀉身重治以胃苓湯

治痘皆言在補脾 補中有害少人知

虛虛實實休輕放 審證施方貴合宜

凡痘疹始終以脾胃為本若飲食如常六腑充實不

須服藥若補其脾反增煩燥為害匪輕倘不能食

常多泄瀉此氣虛也宜四君子湯助之可也

○入方

辰砂散○預解時行痘毒

鏡面砂

一錢研末水飛

乾絲瓜

近帶三寸連皮帶子燒灰存性

右研末蜜水調分三次服

三豆湯○預解痘毒不損元氣

紅飯豆一升

黑大豆一升

鮮菜豆一升

生甘草三兩

右以三豆淘淨甘草切碎入雪水八升若無雪水

以長流水代之同煮豆熟為度去甘草將豆晒乾

又入原湯內再浸再晒汁盡為度逐日取豆與兒

幼幼集成

卷之五

二十一

食之最解痘毒

代天宣化丸 即五癩丹

預解時行痘毒傳染相似併治痘毒

人中黃

屬土甲巳之年為君

片黃芩

屬金乙庚之年為君

川黃蘗

屬水丙辛之年為君

黑梔仁

屬木丁壬之年為君

雅黃連

屬火戊癸之年為君

鮮苦參

佐 荆芥穗 佐

北防風

佐 淨連翹 佐

山豆根 佐

牛蒡子 佐

家蘓葉 佐

前五味視年之所屬者以為君其餘四味以為臣

為君者分兩倍之為臣者半之為佐者如臣四分之三冬至之日修合為末取雪水煮升麻湯加竹瀝在內煮神麴糊為丸龍眼核大用辰砂明雄為衣每服一九竹葉湯下

製人中黃法取大甘草不拘多少納於新竹筒中

繫塞其口放在糞缸中浸七七取出晒乾聽用

八正散○治痘疹小便秘澀宜清心火利膀胱

淮木通 白滑石 小甘草 淨連翹 綠升麻

結猪苓 赤茯苓 陳瞿麥 淡竹葉 已上各一錢

幼幼集成

卷之五

二十二

燈心十莖水煎熱服

通幽湯○治痘疹天便秘結宜潤腸涼血降火

紫草茸 當歸尾 懷生地 火麻仁 陳枳殼

酒大黃 尖檳榔 鮮紅花 桃仁泥 俱等分

生薑一片為引水煎熱服

連翹升麻葛根湯○治痘毒不能盡發宜升托之

淨連翹 綠升麻 粉乾葛 京赤芍 芽桔梗

酒黃芩 黑梔仁 淮木通 麥門冬 牛蒡子

白滑石 灸甘草

曉明按下  
枳當作梗

淡竹葉七片燈心十莖為引水煎熱服

加味甘桔湯○治痘疹不能飲食由咽喉作痛

大甘草 芽桔梗君 牛蒡子 鮮射干 綠升

麻 荆芥穗

燈心十莖水煎熱服

橘皮湯○治痘疹不能飲食由傷食所致

廣陳皮 杭青皮 陳枳殼 南木香 生甘草

山楂肉 白雲苓

麥芽一撮為引水煎空心服

幼幼集底

卷之五

二十三

參苓白朮散○治痘疹脾胃虛弱不思飲食

官揀參 漂白朮 白雲苓 粉甘草 京植肉

真廣皮 芽桔桔 南木香

砂仁三粒為引水煎半饑服

桂枝葛根湯○治痘疹初起傷風咳嗽自汗

柳楊桂 京赤芍 粉乾葛 北防風 炙甘草

生薑三片大棗三枚水煎熱服暑煖蓋覆

正氣散○治痘疹初起因傷於寒作熱無汗頭身痛

肢強

漂蒼朮 廣陳皮 川厚樸 南木香 淨麻黃

柳楊桂 炙甘草

生薑三片大棗一枚水煎溫服

人參白虎湯

治痘疹初起夏月傷暑大熱煩燥作渴

官揀參 淨知母 熟石膏 陳香薷 大麥冬

藿香葉 白扁豆 淡竹葉 炙甘草

粳米一撮為引水煎熱服

胃苓湯○治痘疹初起傷濕泄瀉身重

幼幼集成

卷之五

二十四

漂蒼朮 廣陳皮 紫厚樸 漂白朮 白雲苓

結猪苓 宣澤瀉 嫩桂枝 炙甘草

燈心十莖水煎熱服

四君子湯○治痘疹脾胃虛食少更多泄瀉

官揀參 漂白朮 白雲苓 炙甘草

生薑三片大棗三枚引水煎服

四物湯○治痘疹能食大便秘瘡紅腫

白當歸 正川芎 杭白芍 懷生地

生薑一片引水煎熱服



○一發熱證治歌凡二十五首  
共二十五方

痘疹初起身先熱 輕重吉凶何以別

熱輕毒淺吉堪云 熱重毒深凶可說

凡發熱不進不退與微熱者其痘必稀而輕毒亦淺

不必服藥若蒸蒸作熱煩燥昏眩其痘必密而重

毒亦深宜發表解毒托裏加味葛根湯

初逢熱湯邪穢裏 切忌冰瓜兼冷水

生津止渴是良圖 小渴任之而已矣

凡發熱作渴因痘毒內蒸銷其津液故令口乾而渴

幼幼集成

卷之五

五十五

微者類以炒米湯與之切不可冷水凍柿柑梨

西瓜菱角之類食之反傷胃氣亦不可以椒薑湯

飲之恐生瘡毒而有他變渴甚不止宜解毒葛根

湯

如痘已出齊或起發或收靨而渴不止者宜人參麥

冬散

如泄瀉不止而作渴者此脾胃虛弱津液枯也宜七

味白朮散

腹痛剛逢發熱時 毒攻於裏報君知

大腸秘結須攻下 莫待臨危悔已遲

書云發熱腹中痛痘疹毒內攻發多生不久發少更

防癰可見痘疹腹痛即是毒氣內攻便當托裏化

毒為上不可逡巡以生他變若飲食如常而腹痛

者宜化毒湯

如大便秘結煩燥作渴而腹痛者宜三黃解毒湯若

泄瀉而腹痛者宜建中托裏湯

發熱腰疼毒伏留 幾人逢此得優游

人參敗毒真奇絕 痛減瘡稀病可瘳

幼幼集成

卷之五

三十六

凡痘疹發熱腰痛其證最惡速用人參敗毒及托之

服藥後痛止者吉不止者凶

初時發熱多風搐 要識病源屬肝木

木能勝土又歸心 風火相爭脾不足

凡痘瘡發熱有作搐者因木邪盛而侮土以導赤散

加辰砂服之即止此痘甚好以搐搦發散於四肢

故也

如痘應出不出而搐搦不止宜瀉青導赤散解之服

藥後搐止但心煩啼叫用麥冬導赤散清之

若痘已收靨餘熱不退而作搐此大虛之候多不可救但父母不忍坐視強而治之當以寧神湯合抱龍丸倍加人參服之輕者可愈

熱時吐瀉相兼作 上下毒伸無鬱遏

三焦火盛熱中求 日久須防脾胃弱

凡痘瘡發熱有嘔吐者有泄瀉者有吐瀉兼作者不可驟止令毒上下得出但痘瘡現形吐瀉即止者吉兆也如久不止先以理中湯和之如仍不止以豆蔻丸止之服藥後吐瀉既止更服調中湯使脾胃

幼幼集成

卷之五

二十七

氣實其豆易壯易靨也

狂言燥擾疑逢鬼 神識昏迷熱在裏

凡痘疹平期 謔妄不休應不起

凡痘疹平期 謔妄不休應不起

凡痘疹平期 謔妄不休應不起

凡痘疹平期 謔妄不休應不起

之服藥神情復舊者吉不止則凶不可治也

渾身發熱四肢寒 脾胃虛衰陰冷干

益氣補中應令暖 仍前瘡盛急尋棺

凡痘瘡渾身宜熱獨耳尻二處宜涼所以痘疹之證

頭宜涼手足宜溫若反冷者此脾胃虛弱也四肢

脾胃所司宜補中益氣狀其中氣斯可矣

發熱熏蒸血妄行 不知何道血如傾

但從鼻出方無忌 別道來時禍立萌

人身之血不可妄動痘疹之火熏熾於內迫血妄行隨火而動或從口出或從大小便出皆死證也但從鼻出者或有可救之機宜玄參解毒湯清之若煩燥悶亂出血不止此陽痘出血之證多不可治

幼幼集成

卷之五

二十八

晨昏發熱渾無歇 口舌生瘡唇破裂

咽喉塞痛食難嘗 方用黃連及甘桔

凡痘未出而熱不止晝夜煩燥口舌生瘡唇裂咽痛

此毒火熏蒸其熱甚急治不宜緩急以黃連解毒

湯合甘桔湯治之服藥不效者不治

微微熱汗言之機 膜理疎通毒發稀

但恐汗多陽氣弱 調元固胃效無違

凡痘疹發熱自汗此不必治蓋膜理疏通毒氣發越無鬱遏也所以古人喻如庖人蒸籠之法但欲其

鬆耳如恐汗出太多衛氣反弱痘瘡不能成就用調元湯以止之

惡熱憎寒且戰競 表虛邪正兩相凌

但將柴葛加官桂 升散餘邪吉可稱

痘疹所忌者寒戰如發熱之時憎寒振戰動者其人表氣素虛痘疹欲出不出留連於肌腠之間邪

正交爭振戰火之象也宜柴葛桂枝湯升散之

發熱綿綿不現形 其間凶吉費調停

解肌托裏須斟酌 施治詳明內外寧

幼幼集成

卷之五

二十九

凡痘發熱三日便出者常期也如過四五日猶不出

熱勢綿綿無休歇者吉凶之兆未可卜也急與解

肌托裏分內外治之疎者吉密者凶

如勞苦之人皮膚粗厚腠理閉塞及風寒外感瘡為

外邪所遏不易出者此外因也宜麻黃解毒湯

如因虛吐瀉毒氣內陷而不出及傷飲食陳物菀莖

腸胃之間與毒合併鬱而不出者此內因也體虛

者以托裏十補湯托之體實者以枳實導滯湯微

利之

發表之時少定方 古人專用葛根湯

能通權變知增減 何必勞勞問短長

時師治痘方其發熱但知用葛根湯一見紅點便禁

而不用此乃不知權變者也如痘見熱除表裏無

邪所以不可再用葛根湯若痘已見熱甚不退此

毒深於內尚恐葛根力小不足勝任寧可止而不

飲耶

解毒升麻湯最良 紅斑雖見飲何妨

時師膠柱無通變 一見紅斑未敢嘗

幼幼集成

卷之五

三十

凡痘發熱初用解毒之劑詳見各條之下此不重贅

但附葛根湯加減之例於後俾臨證擇用可也

○入方

加味葛根湯○治痘初熱毒氣深重大熱眩暈

綠升麻 粉乾葛 京赤芍 炙甘草 荆芥穗

北柴胡 牛蒡子 白桔梗 淨連翹 淮木通

北防風

水一碗淡竹葉七片為引如大便結加紫草紅花

作湯加麥冬花粉腹痛加酒大黃或秘結亦用酒

大黃解之

解毒葛根湯○治痘疹初熱口渴不止

粉乾葛 天花粉 綠升麻 杭麥冬 懷生地

酒黃芩 粉甘草 茅根汁

水煎眾藥漿以茅根汁對服

人參麥冬散○治痘已出或收或靨而渴不止

官揀參 杭麥冬 粉乾葛 漂白朮 天花粉

酒黃芩 炙甘草

水煎以竹瀝乳汁對服

幼幼集成 卷之五

三十一

七味白朮散○治痘因泄瀉津液不足而作渴者

官揀參 白雲苓 漂白朮 南木香 藿香葉

炙甘草等分粉乾葛君

水煎徐徐代茶飲

化毒湯○治痘初起飲食如常別無他證而腹痛

粉乾葛 杭白芍 杭青皮 廣木香 陳枳殼

京樞肉 淨連翹 炙甘草

水煎熱服

三黃解毒湯○治痘初熱煩燥作渴大便秘結腹痛

酒黃芩 酒黃連 紫草茸 鮮紅花 小枳實

淮木通 小檳榔 酒大黃

水煎淡熱服

建中托裏湯○治痘初熱因泄瀉而腹痛

官揀參 炙甘草 綠升麻 粉乾葛 白雲苓

陳枳殼 芽桔梗 小川芎 北柴胡 川獨活

水煎薑引加竹瀝對服或五苓散加獨活亦可

導赤散○治痘初起發熱作搐

大生地 淮木通 蘼薄荷 北防風 炙甘草

幼幼集成 卷之五

三十二

鏡辰砂另研

燈心十莖引水煎以辰砂末調服

瀉青導赤散○治痘應出不出而作搐

當歸尾 淮木通 黑梔仁 川羌活 北防風

小川芎 酒黃連 生甘草

淡竹葉七片燈心十莖引以竹瀝對服

麥冬導赤散○治痘搦後心煩啼叫不寧

淮木通 杭麥冬 黑梔仁 生甘草

燈心引水煎服

寧神湯○治痘後作搐至危之候

石菖蒲 白茯苓 黑梔仁 川雅連 淮木通

官揀參 炙甘草

燈心十莖為引水煎入竹瀝人參湯對服

抱龍丸○合前寧神湯治痘後搐搦

膽南星四錢 天竺黃五分 真牛黃三分 明雄黃五分

鏡辰砂二分

共為末甘草煎濃湯煮麩糊為丸不用麝香以痘瘡忌麝故也

幼幼集成

卷之五

三十三

理中湯○治痘已現形而吐瀉不止

官揀參一錢 漂白朮二錢 炙甘草一錢 綠升麻一錢

煨薑三片大棗三枚水煎服

荳蔻丸○治痘出吐瀉服理中湯不止者

南木香三錢 西砂仁二錢 石龍骨五錢 白枯礬七錢

肉荳蔻五錢 麩包煨 赤石脂五錢 煨過七 柯子肉五錢 淨肉

共為末米糊丸如胡椒大三歲兒十九四歲以下

二十九陳米飲下

調中湯○治吐瀉既止速調中氣

官揀參 炙黃耆 漂白朮 杭白芍 南木香

廣陳皮 炙甘草

大棗三枚為引水煎服 若三焦火盛者又當甘

涼之劑解之不在此例

辰砂導赤散○治痘毒內攻神室不消或譫妄狂惑

官揀參 正雅連 黑梔仁 漂白朮 淮木通

大麥冬 辰砂另研

燈心十莖水煎入竹瀝調辰砂末服之

補中益氣湯○治痘初熱四肢厥冷中氣弱也

幼幼集成

卷之五

三十四

官揀參 炙黃耆 漂白朮 廣陳皮 當歸身

青化桂 炙甘草

煨薑大棗引水煎服服藥後手足暖者生逆冷不

回者死

玄參解毒湯○治痘初熱毒火熏蒸而見鼻血

潤玄參 枯黃芩 炒梔仁 芽桔梗 懷生地

粉乾葛 荆芥穗 炙甘草

水煎入茅根汁加京墨磨濃調服

黃連解毒合甘桔湯○治痘煩熱不止口舌生瘡咽

喉痛

酒黃連 酒黃芩 黑梔仁 煆石膏 芽桔梗

淨連翹 南薄荷 荆芥穗 牛蒡子 生甘草

水煎和竹瀝服

調元湯○治痘證自汗過多衛氣反傷宜止之

大官揀 炙黃耆 條黃芩 漂白朮 杭白芍

杭麥冬 炙甘草

水煎服 如汗不止加地骨皮麻黃根以猪心肺

煮湯對煎藥服更妙

幼幼集成 卷之五

三十五

柴葛桂枝湯○治痘將出而憎寒振戰此毒氣出逆

於腠理間也

北柴胡 粉乾葛 川羌活 大揀參 北防風

嫩桂枝 牛蒡子 炙甘草

淡竹葉十片水煎熱服

麻黃解毒湯○治痘未形發熱不退腠理閉塞及風

寒外遏不出

陳麻黃去根節用 川羌活 綠升麻 荆芥穗

粉乾葛 北防風 淨蟬蛻 芽桔梗 牛蒡子

炙甘草

水煎入燒過人尿調服

托裏十補湯○治痘因泄瀉毒氣內陷而不出

官揀參 炙黃耆 當歸身 紫川樸 芽桔梗

青化桂 正川芎 北防風 香白芷 炙甘草

水煎調牛蒡子末服

枳實導滯湯○治痘因傷飲食鬱滯而不出

小枳實 淨連翹 法半夏 酒黃連 山檀肉

炙甘草 紫草茸 酒大黃

幼幼集成 卷之五

三十五

水煎調檳榔末服

升麻葛根湯○治痘證初熱將出未出以此助其升

生 絲升麻 粉乾葛 白芍藥 炙甘草

口渴加 天花粉 杭麥冬 絲茅根汁

腹痛加 小枳實 淮木通 山檀肉

腰脚痛 漂蒼朮 川黃蘗 川羌活 淮木通

頭痛加 小藁本 香白芷

搗搗加 淮木通 水竹瀝 蘓薄荷 淨連翹

泄瀉加	官揀參	潔白朮	白雲苓	懷山藥
譫妄加	石菖蒲	黑梔仁	淮木通	辰砂末
四肢冷	官揀參	炙黃耆	黑薑灰	青化桂
嘔吐加	潔白朮	白雲苓	法半夏	廣陳皮
衄血加	潤玄參	黑梔仁	枯黃芩	茅根汁
咽痛加	芽桔梗	牛蒡子	鮮射干	
咳嗽加	廣陳皮	家燕葉	陳枳殼	信前胡
大便秘	懷山藥	紫草茸	鮮紅花	當歸尾
多啼哭	淮木通	黑梔仁	正雅連	大麥冬

幼幼集成 卷之五 三十七

吐舌弄舌證並加 正雅連 北防風 黑梔仁

已上皆用淨水煎服隨證加味用之

○一見形證治歌凡一十八首 共一十八方

發熱三朝痘出稀 方為毒淺吉之機

先期痘甚渾無制 過此多因血氣微

凡痘發熱三日而出常期也出而稀者不須服藥如

發熱一二日即出者此毒氣太甚沖擊榮衛一齊

湧出難以制服大肉之象必欲治之不過消毒救

裏使無陷伏耳宜消毒快斑湯

如過期四五六日始出此血氣本虛不能載毒使出

當補中托裏發表宜增損八物湯

痘出遲遲有數般 皮膚閉塞屬風寒

裏虛吐瀉宜分治 痘壅三焦治却難

凡痘出有常期若應出不出或外感風寒六腑閉塞

不能即出其證頭眩身痛發熱無汗喜蓋覆猥倚

懷中此惡風寒之象也當發散之宜加味參蘇飲

若曾經吐瀉裏虛不能快出宜加減調中湯

如發熱煩燥狂妄大渴唇燥舌裂此毒氣壅併留而

幼幼集成 卷之五 三十八

不洩毒火鬱於三焦榮衛不行上下不通而死矣

應期不出事如何 發表諸方切忌訛

腹脹便堅煩燥甚 消斑承氣理沉疴

凡痘疹應出不出或外感風寒內虛吐瀉治各不同

如前參蘇飲調中湯敗毒散葛根湯之類皆良法

也若熱甚腹脹氣粗煩燥悶亂大便秘結此毒火

內蓄急以消斑承氣湯解之

痘出身涼吉可期 如逢熾熱履明夷

終朝漸密無空隙 怪證叢生必定疑

痘瘡之熱毒火為之未出之先毒火在內故發熱於外既出之後其毒發外熱當盡退毒本輕而痘亦稀也若痘既出熱仍不退是毒積於中未可為輕急用解肌化斑升托之服藥後熱漸退方可言吉更不退其痘壘壘而出痘空中始雖稀而終朝漸密最怕生出他證或狂妄或泄瀉或腹痛或搔癢或失聲或錯喉乾嘔或喘促黑陷皆不可治

出現先觀面部中其間凶吉最難通  
透唇夾頰方為吉額上眉心未可逢

幼幼集成

卷之五

三十九

人之面部五臟精華皆見於此故左頰屬肝木右頰屬肺金頰屬腎水鼻屬脾土又正額太陽脉之所會唇頰陽明脉之所經兩耳旁少陽脉之所過痘為陽毒故隨陽位而見於面但陽明胃與大腸積陳受汚氣血俱多先於其部出現者吉若太陽則水火交戰之位少陽則木火相併之衝若於其位出現者凶不但出形忌於正額眉間耳之前後凡起灌收斂但從此處先者皆逆象也

頭為元首至稱尊更有咽喉闔關門

若使痘瘡多出此蒙頭鎖項受災也

經曰頭者精明之府五臟精華皆現於面至尊至貴不可凌犯者也咽者胃腕水穀之道路主納而不主出喉者肺管呼吸之往來主息之出入人非此則水穀絕呼吸廢而死矣故謂闔關之門痘瘡最要頭項稀少如頭面多者謂之蒙頭咽喉多者謂之鎖項蒙頭則視聽昏廢神明失居鎖項則內者不出外者不入正所謂神出則機息氣止則化絕死之兆也

幼幼集成

卷之五

四十

頭面胸前痘欲稀四肢雖盛毒猶微

渾身碎密多惆悵疏解當知發散機

頭面諸陽之會胸前諸陽之聚臟腑受氣之區陳氏曰痘疹輕者作三四次出頭面稀少胸前無以清陽之分不可濁亂也至於四肢雖為陽之本乃身之役使卒伍卑賤之職故不畏其多也若遍身稠密瑣碎急為解毒疎通榮衛令氣得其均血得其活一齊起發發乾枯黑痿之變用疏毒快斑湯隨證加減而調之



痘瘡磊落不須防 叢聚相黏定見傷

蠶殼蛇皮生不久 蚤斑蚊跡禍難量

凡痘瘡初出須看相去遠近若相去三五寸一粒者

輕證也一二寸者頗密如二三成叢者必密而重

其候多變癢場如蠶之殼蛇之皮者此氣至而血

不隨也當行氣補血宜祛風勻氣散如蚤之斑

蚊之跡者此血至而氣不隨也當涼血補氣宜參

耆和氣飲

一出形來艷色嬌 定知皮嫩氣虛榜

幼幼集成 卷之五

四十一

溶溶破損生難久 個個成漿喜氣饒

痘瘡出形如平日正色者吉痘色帶艷而赤其後多

皮嫩易破癢不可救但見帶艷即防後日癢場之

變早用疎風固表消毒之藥使血氣充實邪火漸

退正氣不虧光壯乾收如期不亂可也宜固陽散

火湯解毒固表

最怕頭焦黮色封 又愁皮嫩水溶溶

頭焦變黑多歸腎 皮嫩須防癢場攻

痘瘡初出所喜明潤而鮮堅實而厚若頭焦帶黑此

毒在血分不急治之則變黑歸腎而難救矣宜涼

血解毒湯解散血中之邪 黮音晦青黑色也

若皮嫩醫薄此毒在氣分不急治之則癢場而死宜

加味固陽散火湯

痘瘡切要解咽喉 喉痺咽瘡毒火浮

但恐一朝封管籥 鎖喉聲啞枉營謀

凡痘瘡未有咽喉不痛者如煙窓之狀火焚於下餓

升於上宜乎作痛宜鼠粘子湯外用一聖散吹之

惟恐斑瘡入眼中 膏煎黃檗妙無窮

幼幼集成 卷之五

四十二

但觀眼內多紅赤 急瀉心肝免損瞳

痘瘡之毒第一防眼所以古人用護眼之法其慮深

矣宜黃檗膏塗之

若眼內有紅筋縈纏或眼腫閉多生眵淚急瀉心肝

之火宜蟬花散清解之

痘瘡只出一般奇 斑疹相參最不宜

消疹化疹宜急解 倘仍不解勢傾危

錢氏曰痘只一樣為善若已現形間有碎密如芥子

者此夾斑也皮內鮮紅成塊此夾疹也皆毒火熏

燦於內故使斑瘡夾出於外，急宜解毒使斑瘡消散，痘得獨成，宜荆防解毒湯消散之。

痘標纔見兩三窠，爬搔渾身癢癢多。

此是火邪留腠理，急清風火證應差。

凡痘初出之時，遍身作癢，爬搔不止，此火邪留於肌肉皮膚之間，不能即出故耳，與傷寒不出汗作癢同，非癢塌之例也，宜瀉心肝火邪，其癢自除，宜清風去火化毒湯升散之。

口中腥臭氣衝衝，邪毒炎蒸肺作癰。

幼幼集成

卷之五

四十三

瀉火清金須急用，淹延七日禍相從。

凡痘初出若口中之氣腥臭衝人，此肺中邪火熬煎炎燥，故令腥臭出於口，急與清金瀉火湯解之，倘淹延不治，至七日而死矣，經曰肺絕者七日死，此證之變，或失聲或喘或乾嘔皆其候也。

皮中簇簇如寒粟，肉腫隆隆似熱瘤。

如此豈能延日月，哀哉不久返瀛洲。

凡痘初出欲其顆粒分明，皮肉柔潤，若簇簇生於皮間，似風寒粟子之狀，此痘變於反掌，不待起發即

隱而不見，啼叫煩悶而死矣，或有正面腰背胸膈手足腫硬成塊，似丹瘤之狀，此證俟起發之時，其處瘡先黑陷破爛，不能漿乾較而死，皆為不治。

出形未定先涵水，起發之時便戴漿。

膿水未成收靨急，休誇妙術有青囊。

凡痘初出一點血，血化為水，水化為膿，膿成而毒解，此自然之序，若初出之時，半為水泡，或將起發便戴白漿，或膿水未成，忽然收較，此毒火太甚，失其自然之序，不應至而至，謂之太過，不久倒陷入裏。

幼幼集成

卷之五

四十四

而死無有治矣，蓋不應至而至，所謂早發還先萎也，比之應至不至者，因其氣血不充，尚有補救，所謂人奪天功，此則不相侔矣。

鼻如竈突面烘煙，皮似塗硃或槁然。

唇舌咽喉痘叢聚，任教和緩莫回天。

凡痘瘡之證，始終歸重於太陰陽明，手太陰肺，手陽明大腸，足太陰脾，足陽明胃者是也，蓋鼻者肺之竅，貴於滋潤，鼻乾黑燥如竈突之狀，火刑金也，面者陽明經所聚，貴於鮮明，面黑而枯，精華散矣，皮

者肺之合欲其色紅白如常色若塗硃火之象也  
或如橘柚火極如土則黃矣咽喉肺胃之管齋唇  
吻脾之竅也舌者脾之絡也痘甚於此其毒極矣  
安可治哉

○入方

消毒快斑湯○治痘末期而出毒氣太甚

芽桔梗 荆芥穗 北防風 京赤芍 炙黃耆

牛蒡子 當歸尾 潤玄參 淨連翹 信前胡

淮木通 天花粉 炙甘草

幼幼集成 卷之五

四十五

水煎熱服

增損八物湯○治痘過期而出氣血虛弱

官棟參 漂白朮 炙黃耆 白當歸 正川芎

牛蒡子 荆芥穗 京赤芍 淨連翹 北防風

芽桔梗 粉乾葛 炙甘草

水煎不拘時熱服

加減參蘓飲○治痘應出不出由外感風寒玄府閉

塞

官棟參 家蘓葉 粉乾葛 廣陳皮 信前胡

香白芷 芽桔梗 陳枳殼 川羌活 北防風  
炙甘草

竹葉十片為引水煎服

加減調中湯○治因吐瀉內氣痿弱痘出不快

官棟參 漂白朮 炙黃耆 南木香 上薄桂

白雲苓 法半夏 廣陳皮 炙甘草

生薑一片為引水煎服

消斑承氣湯○治痘因毒火鬱遏應出不出大便秘

結宜下之

幼幼集成 卷之五

四十六

錦莊黃 陳枳殼 川厚樸 片黃芩 川黃蘗

黑梔仁 淨連翹 淮木通 炙甘草

熱甚者加芒硝紫草

生薑三片引水煎滾熱服

解肌化斑湯○治痘出熱仍不退由毒氣未盡也

綠芎麻 粉乾葛 淮木通 牛蒡子 芽桔梗

天花粉 地骨皮 荆芥穗 片黃芩 川黃蘗

大便結加紫草茸

水煎熱服

疏毒快斑湯。治痘出渾身瑣碎稠密。

官揀參 北防丰 荆芥穗 淨連翹 牛蒡子

當歸稍 芽桔梗 赤芍藥 炙甘草

熱甚加 酒黃芩 酒黃連 地骨皮

渴者加 粉乾葛 天花粉 太麥冬

氣虛加 炙黃耆 南木香

便堅加 紫草茸 陳枳殼

溺赤加 車前子 淮木通

食少加 漂白朮 京楮肉 廣陳皮

幼幼集成

卷之五

四十七

瘰者加 上薄桂 南薄荷

腹脹加 川厚樸 大腹皮

喘咳加 淨知母 桑白皮

泄瀉加 上薄桂 柯子肉 黑薑灰

作痛加 白芍藥 酒黃芩

俱燈心引水煎熱服。

瘧風勻氣飲。治痘出如蠶殼如蛇皮由氣至而血

不隨也。

官揀參 正川芎 大當歸 赤芍藥 杭麥冬

北防風 杭青皮 荆芥穗 南木香 上薄桂

炙甘草

水煎半饑服。

參者和氣飲。治痘出如蚤之斑蚊之迹由血至而

氣不隨也。

官揀參 炙黃耆 淨連翹 牛蒡子 酒黃芩

粉乾葛 淨蟬蛻 當歸身 淮木通 芽桔梗

炙甘草

水煎服服後氣血均隨者吉如舊者凶

幼幼集成

卷之五

四十八

固陽散火湯。治痘出色艷而赤切防癢塌。

官揀參 炙黃耆 炙甘草 綠升麻 當歸尾

北防風 懷生地 淮木通 荆芥穗

大棗三枚為引水煎服。

涼血解毒湯。治痘出頭焦帶黑血分有毒防變黑

陷

京赤芍 當歸尾 懷生地 淮木通 牛蒡子

淨連翹 紫草茸 芽桔梗 鮮紅花 山豆根

生甘草

水煎入燒過人屎一錢調服。

固陽散火湯

方見前此加 漂白朮 白雲苓 減去生地黃

鼠粘子湯。治痘出咽喉作痛。

鮮射干 芽桔梗 淨連翹 牛蒡子 生甘草

水煎入竹瀝和勻服。

一聖散

苦參不拘多少切片畧焙乾研為細末每用一二

分吹之甚效若不早治咽喉癢煩燥吸門腫塞水入

幼幼集成

卷之五

四十九

則噎食入則嘔咽啞失聲救之遲矣。

黃壁膏。治出痘預護其眼免致痘瘡入目。

厚川槿兩 粉甘草兩

二味研為細末用新菜豆五合汲新水三碗浸豆

一晝夜去豆入紅花一兩煮之其水約減二盞又

去紅花然後入前二末慢火熬成膏每用敷眼胞

上下厚塗之則痘瘡不入眼矣

蟬花散。治痘出兩目腫閉多生賸淚此非封眼之

時急治。

淨蟬蛻 密蒙花 酒黃連 當歸尾 淮木通

草龍膽 北柴胡 正川芎 黑梔仁 北防風

白豆蔻

淡竹葉十片為引水煎熱服。

荆防解毒湯。治痘出夾斑夾疹。

官揀參 北防風 荆芥穗 枯黃芩 牛蒡子

淨知母 川黃蘗 生甘草 潤玄參 綠升麻

煨石膏 淨連翹

淡竹葉為引水煎服服此斑疹仍不消者不治。

幼幼集成

卷之五

五十

清風去火化毒湯。治痘初出風熱作癢表未解也。

非癢場之謂。

北防風 綠升麻 杭白芍 柳桂枝 荆芥穗

粉乾葛 牛蒡子

淡竹葉為引水煎服。

清金瀉火湯。治痘出口中腥臭之氣衝人謹防肺

癰。

淨知母 懷生地 枯黃芩 煨石膏 芽桔梗

黑梔仁 杭麥冬 紫苑茸 淮木通 天花粉

生甘草

鮮桑葉七片為引，水煎竹瀝對服。

○一起發證治歌凡二十六首  
共五十方

起發由來無定期，庸常計日強猜疑。  
不知毒氣分深淺，妄執方書只補脾。

時俗醫云：三日發熱，三日出形，三日起發，此鄙論也。蓋毒氣有深淺，元氣有厚薄，出之先後，壯亦因之。大抵不出五六日間，彼毒淺氣厚者，其起發常易；毒深氣薄者，至五六日始壯者有之，未可以常期

幼幼集成

卷之五

五十一

準也。俗醫見其起發之遲，不認毒之淺深，槩謂五氣不足，妄用補脾之劑，殊不知曾因吐瀉不能食者，補脾以助長可也。若無吐瀉能食六根堅固，復用補藥，不免黨邪為害，非徒無益而反害之。

起發如期貴遠從，過猶不及類皆凶。  
先期痘出充膚腠，過後斑磨腹裏壅。

凡痘磨起發，只在六七日，謂之得中。蓋自發熱算起，正當六七日也。如未及期而驟發，此毒火太甚，榮衛氣虛，直犯清道而出，謂之邪氣太過。法當因表

解毒以防廢場之變，宜黃耆芍藥湯。

如過六七日不起發，此臟腑虛弱，毒留於中，壅塞不出，謂之正氣不及。法當托裏解毒，以防倒陷乾黑之變，宜內托護心散。

出形已定視根窠，紅活充肥氣象和。

倘若青乾兼紫黑，急宜解托勿蹉跎。

凡痘出現已盡時，當起發，僅視根窠以決輕重。如形充瀟色紅潤，此氣血和暢，毒氣發越，大吉之兆，不須服藥。若形扁而塌，色枯而黑，此氣血多乏，毒氣

幼幼集成

卷之五

五十二

壅遏不能起，急用解毒托裏之藥，用十宣散內托之。

痘出稀疏正得宜，如斯平順不須醫。

若然稠密休輕易，解毒常常慮險危。

凡痘出稀少，不須服藥。若稠密，其毒必盛，防氣血不足，起發不透，漸生變易。當服解毒托裏散。服藥之後，紅活光壯，此氣血內實，毒不能留，即止後服。如服後病勢淹延，此邪氣盛，正氣虛，不能成就，宜屢服之。如服此藥當起不起，此必有變，不可治之。反

取怨尤也。

郭郭充肥完且堅，色多蒼蠟或紅鮮。

如逆破損多鬚薄，縱有良方恐莫延。

凡痘郭郭充實皮囊堅厚以指擦之堅實不破其色

蒼蠟而紅活皆順證也，不喜乾燥淫濕若瘡雖紅

鮮反乾燥而不充肥此火甚而血不足宜輕清之

劑退火涼血用四物快斑湯。

如瘡充肥而帶濕浮此濕盛而氣不足宜利濕補氣

兼風藥治之蓋風能勝濕故也四物快斑湯。

幼幼集成

卷之五

五十三

如瘡紅活充肥以指擦之隨破此各皮嫩易破後必

癢塌不可治宜大補快斑湯。

如當起發如浮囊空殼如蠶之殼麥之麩皮中無水

色者此血氣俱虛用大補快斑湯治之服藥後若

轉而潤澤中涵水色者可治否則癢塌悶亂叫哭

而死矣。

形色須教着意觀，紫紅實熱白虛寒。

倘然錯認分毫處，咫尺雲泥禍害端。

凡痘瘡起發須諦觀形色以定重輕吉凶如根窠紅

潤頂蒼蠟色者上吉根窠紅頂灰白色者次之根

窠赤頂亦赤而帶艷者此火勝用解毒瀉火湯清

之服藥色退者生不退者凶。

如純白色者作寒論此血寒氣虛也虛則補之十全

大補湯加丁香鹿茸回其陽氣四肢冷者加附子

如純紫赤色者作熱論此血熱氣實者瀉之黃連

解毒湯加犀角之類以平為期服藥瘡色回者十

死一生。

四圍起發陷居中，陽氣虧衰尚未通。

幼幼集成

卷之五

五十四

若是中枯成黑子，此名疔痘類非同。

痘瘡起發其形不一有緊小而充實者俗呼珍珠痘

此痘易壯易靨在粗大而飽滿者俗呼天痘此痘

早壯遲靨有四圍起中心落陷者俗呼茱萸痘此

痘有吉凶有輕重稀者輕而吉密者重而凶蓋因

中氣不足時日未到但四圍起發而中心尚是好

肉未得起發耳時日既到自然充括而成血漿輕

稀者不須治重密者用解毒化斑湯若先有水忽

然乾枯黑陷此名疔痘不可與中氣不足同例論

中心微起四圍乾，不久焦枯變一般。

毒火熏蒸津液竭，開關啟竅治應難。

凡痘有中心微起舍水色，四畔乾枯者此毒火熏蒸津液枯竭，急以疔痘之法治之，否則盡枯，又復煩躁，叫哭喘渴者不治。

痘疔只為火傷陰，濟急無如砭與鍼。

解毒透肌兼發散，胭脂四聖效應深。

大抵痘之初出一點血，此一點屬正氣，被毒氣衝擊，隨腠理而出，現其後毒與血化為水，水化為膿，膿

幼幼集成

卷之五

五十五

成毒解若毒太甚，熬煎陰血其血乾枯而變黑色，不得化休，反閉塞毒出之路，以致毒氣陷伏，不得出，此名倒陷，其人煩燥腹脹，喘滿口渴，多不可救。故古方外以鍼刺破，吮出其血，或用燈火焯之，無非欲其開關啟竅，而使毒氣得出也。宜四聖珍珠散治之，用藥後其瘡便回者吉，如不回，反添黑陷，死證也，不可妄治。內服之藥有用穿山甲燒人牙者，藥既非解毒發表之藥，又無托裏快斑之能，愚者執而用之，適足悞，又不若四聖快斑散，屢多

奇效

審齋曰：錢氏用百祥丸，牛李膏，必其人大小便秘結，煩燥作渴，故宜服之。若其人大便自調，身無大熱，則必不可用。今改去百祥丸，牛李膏，以宣風快斑散代之。服此以通為度，通後瘡回，以四君子湯徐調之。若或因泄瀉，其瘡由灰白而變黑陷，此名倒陷，宜木香快斑散治之。

予按痘中壞證，惟黑陷最惡。凡見黑陷者，大便未必自調，身體未必不熱，神情未必不擾攘，宜風快斑

幼幼集成

卷之五

五十六

散，或可治其輕者。若大便秘結，煩燥悶亂，大熱口渴，舌上黃黑者，捨百祥無以挽回。蓋黑陷凶危之證，非峻厲之方不足以制其猖獗。今仍加入百祥丸，及棗變百祥丸，無價散，胡荽酒，併外治，忍冬湯五方，以便臨證酌用。萬氏錢氏兩存可也。黑陷瘡為壞證先，此名惡候，古今傳。若教出現渾身上，盧扁無功莫怨天。凡黑陷用以前治法，其瘡紅活，依期光壯，吉兆也。倘服藥如故，則不可治。若痘本稀，其中起發者多，畧



有數個黑陷此則可治假如稠密又不起發或灰白或紫赤或青乾又加黑陷者治之無功

灰白遲延頂復平 紫紅掀腫候須明

且將氣血分虛實 莫棄圓機執一行

凡痘瘡喜紅活充實若不紅活充實虛也紅腫大過實也假如灰白色當起不起而頂平陷者此氣虛也必問其人初起證候如初因此瀉不能飲食其後瀉止而灰白頂平者此正氣虛弱宜大補快斑湯以補之

湯以補之

幼幼集成

卷之五

五十七

如泄瀉一向不止用異功快斑湯兼荳蔻丸如服已

上之藥泄瀉仍甚用附子理中湯以溫其中

若其人素日虛怯而吐瀉不止此元氣不足用補元

快斑湯如誤服解毒寒涼及快飲冷水者用調中

快斑湯

若灰白色又加癢塌頂陷腹脹此不治之證假如紅

掀紫腫血熱也宜涼血快斑湯

若其人素實初起快服熱藥以致紅掀紫腫宜三黃

解毒湯清解之若紫赤變黑喘渴不寧者不治

起發猶如錫餅鋪 皮膚光若水精壺

其人能食方無慮 不食將為鮑肆枯

凡痘瘡稠密要依次起發紅活尖者吉一齊起發遍身白色如錫餅形頭目浮腫此惡候也但看其人之飲食何如若能食大便堅小便清無他證往往延至日久渾身皮脫而愈若不能食後加吐瀉熱渴搔癢必死之證能食者宜服解毒之藥用助脾快斑湯扶其中氣

起發之時未試藥 口唇瘡色早焦黃

幼幼集成

卷之五

五十八

如斯惡候無人識 慢自矜誇強立方

口唇脾之候也脾司運化以養血氣所以痘瘡不宜

脾胃受傷如初出起發之時漿水未試口唇瘡色

內帶黃漿此惡候也時人不識喜其成漿便呼為

吉不知六七日間其瘡先靨剝落一層而死矣

瘡頭起發漿先白 不問何經皆是賊

慢誇妙手有仙方 七日應為泉下客

凡痘由紅點而水泡由水泡而膿泡而結痂有自然之序初起發時頭帶白漿此疫癘也不可治

發時磊落最堪誇，相串牽連事可嗟。

若又四圍添小粟，定然搔癢證來加。

凡痘起發，顆粒分明，尖圓磊落者吉。若彼此牽連成

一片者凶。如上分氣血虛實，用解毒快斑治之。或

本痘起發，或於根窠四畔，又旋出小者，攢簇本瘡

成叢似粟者，不待養漿，即加搔癢而死矣。

起發時常驗四肢，發而不透，或凶危。

此緣脾胃多虛弱，發散還須當補脾。

凡痘瘡宜視手足何如。若手足循序起發，此脾胃素

幼幼集成

卷之五

五十九

強，毒氣得越，不必憂慮。若遍身俱起，手足起不透

此脾胃本弱也。蓋脾胃主灌溉四肢，今既虛弱，不

能行其津液，使毒得越，所以手足起發不齊，宜補

脾快斑湯助長可也。

起發之時，貴謹扶，調和何必問醫巫。

暑寒，飲食須當慎，後悔噬臍莫可圖。

痘瘡有輕變重者，犯禁，或誤醫藥，或犯風寒，有重變

輕者，反是然。輕重吉凶之變，存乎起發之時，調護

不可縱弛也。或遇暴風驟雨，迅雷閃電，即當以密

布幃幙，緊飾房戶，以防客風怪氣之侵。如失調護

為寒涼所驚，不能起發，宜正氣快斑湯。

凡痘起發之時，遇久陰雨，不能起發，宜平胃快斑湯

以燥其濕。

凡痘當起發，遇天氣暄熱，俗人不知，謂痘欲溫暖，蓋

覆太厚，以致毒火鬱遏，不得發越。此壯火食氣，反

虛其氣，宜白虎快斑湯。

凡痘當起發，悞傷生冷，以致脾虛不能起者，用理中

快斑湯。

幼幼集成

卷之五

六十

凡痘瘡起發，內傷飲食，腹中飽悶或痛，以致中氣鬱

遏，不能起透者，宜寬中快斑湯。

自此常宜大便堅，如常調理，保安然。

若逢泄瀉，無休歇，寒熱須教仔細研。

痘瘡自起發之後，大便要堅，雖三四日一次亦無事。

小便常要清利。若見小便赤少，宜四苓新加湯。

或有忽然泄瀉，宜分寒熱治之。視其所泄之物，或焦

黃酸臭，此內熱也。或傷飲食，宜胃苓和中湯。

若泄山之物，清白澄冷，裏寒也。用附子理中湯。方見

如久泄不止，用理中湯吞送薏苡丸。方見前

其人能食，素脾強，大便雖溏也不妨。

但用補中消導藥，六君加味信良方。

其人能食，雖有泄瀉不能為害，當用補中之藥，宜六

君子湯固其中氣。

起發預防頭面腫，大頭時氣可兼醫。

瘡宜磊落色宜潤，反此傾危命必隨。

凡痘瘡起發，有頭面由漸而腫，此毒氣發越聚於三

陽，欲作膿血，故皮肉掀腫，此雖正病，亦當解毒護

幼幼集成 卷之五 六十一

日救咽喉而兼治之，宜清毒化斑湯。

若頭面不腫，必瘡本稀疏磊落，痘根輕淺，雖作膿血

却不占處，故宜不腫不必治之。

若痘稠密，應腫不腫，此毒鬱於內，不能起發，急服托

裏快斑湯，服藥後瘡起者吉，不起者凶。

至於腫時，又要觀其皮色何如，磊落紅活者吉，模糊

黑黯灰色者多不可治。

亦有痘將起發，便頭目先腫，此天行疫癘之氣，名大

頭瘟者是也，急解其毒，宜苦參散。

面腫頭浮眼不開，如斯惡候實堪哀。

未應開處偏開早，搔癢頻加凶禍來。

痘瘡起發，頭面浮腫，有不閉目者，但觀其痘之輕重

疎密，若疎輕者，目雖不閉亦不防，重密者，其目要

閉，宜閉不閉者凶，蓋眼封鼻塞，神氣內固而不外

馳，吉兆也，但遇封眼之時，必待其收靨之時而後

漸開可也，若未及收靨，漸生搔癢，而腫消目開者

大凶。

痛癢原來有實虛，癢虛痛實載於書。

幼幼集成 卷之五 六十二

都來痛者終為吉，諸癢難言吉自如。

大凡諸痛為實癢為虛，謂之實者，邪氣實也，謂之虛

者，正氣虛也，蓋痘瘡始終氣以載之，血以養之，氣

血充實則禁固其毒不得橫行，所以緊實而為痛

也，痛乃美事，不須服藥，苟欲治之，宜涼血芍藥湯

痘瘡作癢，邪氣橫行，泛濫皮肉，不任條約，侵蝕是為

癢也，蓋痘瘡惟回頭作癢，容或有之，此否極泰來

之兆，若發熱及養漿時作癢，皆危證也，內宜托裏

解毒之藥，外用熏洗之法，令無致於癢塌破陷可

矣仍要分虛實治之若能食稀扶便秘者此邪氣  
內實正氣外虛宜加味四聖解毒湯外用洗法  
若有泄瀉而作癘者乃疰氣裏虛邪氣外實宜調元  
托裏湯外用熏法

起發之時消又臨火邪內迫熱偏深

急宜解毒生津液休得俄延向外尋

凡痘疹起發身上作熱不可除其熱若不熱則痘不

發如熱太過甚於常時唇焦口燥小波短少不可

不治宜導赤解毒湯微解之

幼幼集成 卷之五 六十三

若痘疹作渴此是常事蓋由胃中津液不能滋養本

元內則熾於毒火外則灌潤於疹故宜渴耳凡一

切瓜菜生冷之物不可與食惟炒米湯飲之為宜

若渴太甚看其人虛實而治

若飲食如常大便堅實而渴者此內熱也宜生津地

黃湯潤之

若泄瀉而渴此內虛津液不足不能上潮於口宜七

味白朮散滋之

聲啞無音更咬牙憎寒燥擾亂紛譁

錯喉乾嘔多昏悶 形氣俱傷最可嗟

痘疹始終要聲音清閉人事安靜五臟堅實飲食如

常若起發之時忽然失聲咬牙寒戰煩燥昏迷嗜

水錯喉乾嘔痰氣喘急泄瀉不止腹痛悶亂俱皆

凶證古人云痘出而聲不變者形病也痘未出而

聲變者氣病也痘出而聲不出者形氣俱病將欲

治之誠難為力咳嗽而失聲者非此論

痘兒嘔噦不堪聞 不是寒邪是火焚

妄進湯丸如拙匠 內傷臟腑匪妖氛

幼幼集成 卷之五 六十四

凡痘疹乾嘔無物或時常噦逆此臟腑內傷衝任之

火上犯清道故為嘔噦之惡聲經曰絃敗者聲必

嘶木陳者葉必落臟敗者聲必噦鍼灸無功湯藥

無效此之謂也若飲食而嘔當分寒熱而治

如曾傷冷物受寒氣此寒嘔也宜二陳理中湯如未

傷冷物及寒氣此熱嘔也宜二陳一運湯和之

若飲食哽塞而嘔噦者咽中有瘡必作痛閉塞而嘔

宜加味鼠粘子湯外用控涎散吹之

渾身痘密精神耗 補瀉無功煩復躁

狂言啼哭見鬼神 臟腑敗傷天命到

凡痘稀少自然易壯密者切防氣血虧損起發不透

即是病之所在如前法治之虛則補之實則瀉之

在氣補氣在血補血隨機應變每中權衡不可執

方以悞人命若補瀉無功反增沉重或啼哭不止

日夜呻吟煩躁悶亂狂言妄語如見鬼神此臟腑

傷敗神魂離散復何為哉

○入方

黃耆芍藥湯○治痘起發太快毒火作祟

幼幼集成 卷之五

六十五

官棟參 炙黃耆 生白芍 酒黃芩 淨連翹

北防風 牛蒡子 芽桔梗 粉乾葛 荆芥穗

炙甘草

淡竹葉十片為引水煎服

內托護心散○治痘起發太遲正氣不足

官棟參 大當歸 北防風 酒黃連 酒黃芩

酒黃蘗 牛蒡子 荆芥穗 淮木通 青化桂

淨蟬蛻 炙甘草

水煎入燒過人屎調服 便秘加大黃紫草

十宣內托散○治痘起發之時形扁塌色枯黑

官棟參 炙黃耆 全當歸 正川芎 芽桔梗

荆芥穗 牛蒡子 北防風 炙甘草

大便秘加酒大黃紫草 小便澀加木通

渴加花粉麥冬葛根

水煎入燒過人屎同服 燒人屎痘科之聖藥也

解毒托裏散○治痘出過於稠密防起發不透

芽桔梗 牛蒡子 荆芥穗 鮮紅花 北防風

當歸尾 淨蟬蛻 綠升麻 粉乾葛 赤芍藥

幼幼集成 卷之五

六十六

淨連翹 炙甘草

水煎入燒過人屎同服令易壯易靨

四物快斑湯○治痘發乾燥形不充肥

全當歸 正川芎 京赤芍 懷生地 綠升麻

粉乾葛 淨連翹 鮮紫草 荆芥穗 牛蒡子

水煎和燒過人屎服

四君快斑湯○治痘雖充肥而帶淫濕

官棟參 炙黃耆 白雲苓 柳桂枝 荆芥穗

香白芷 北防風 廣陳皮 杭白芍 炙甘草

淨水煎熱服

大補快斑湯。治痘起發皮嫩易破防廢塌。

官揀參 炙黃耆 全當歸 大川芎 赤芍藥

懷生地 牛蒡子 炙甘草 北防風 連翹殼

柳楊桂

水煎入燒過人尿同服。

解毒瀉火湯。治痘出根窠紅赤頂赤帶艷。

酒黃芩 牛蒡子 當歸稍 黑梔仁 淨連翹

山荳根 生甘草 芽桔梗 綠升麻 粉乾葛

功效集成 卷之五

地骨皮

水煎入燒過人尿調服服後色退者生不退者凶。

十全大補湯。治痘出純白色此血寒氣虛也。

官揀參 漂白朮 白雲苓 懷生地 青化桂

當歸身 大川芎 杭白芍 炙黃耆 公丁香

嫩鹿茸 炙甘草

煨薑三片大棗三枚引水煎服。

黃連解毒湯。治痘出純紫赤色血熱氣實也。

正雅連 川黃蘗 枯黃芩 黑梔仁 懷生地

牛蒡子

燈心十根為引水煎熱服。

解毒化斑湯。治痘四圍起發中心陷下不起。

官揀參 炙黃耆 生甘草 當歸稍 正川芎

牛蒡子 北防風 淨連翹 荆芥穗

冬月加 上薄桂

水煎入燒過人尿服。

四聖珍珠散。治痘疔。

新豌豆 新菜豆 各四十九粒 油頭髮一握 燒灰存性

功效集成 卷之五

海蚌珠 七粒 研末

右將四味研為細末用胭脂取汁和上四末調勻。

以鍼挑破其疔納藥於中更以胭脂汁塗四圍其

瘡色回者吉不回反漆黑陷者死。

四聖快斑散。治痘瘡黑陷解毒托裏。

淮木通 淨連翹 生黃耆 鮮紅花 鮮紫草

炒麻黃 人中黃 鏡辰砂 另研 絲瓜連蒂燒灰

燒過人尿分。

共為細末白湯調服二三錢。

宣風快斑散○治黑陷而身無大熱大小便調者

淮木通 陳枳殼 尖檳榔 川大黃 牽牛末

生甘草俱等分

水煎服以大小便通利為度

木香快斑散○治由灰白而變黑陷

官揀參 南木香 炙黃耆 青化桂 杭青皮

柯子肉 炙甘草 當歸身 漂白朮 廣陳皮

薑棗引水煎服中病即止不可多服恐增熱證

百祥丸○治痘黑陷大小便秘煩燥悶亂喘急者

幼幼集成

卷之五

六十九

紅芽大戟不拘多少水煮極軟去骨日中晒乾復

內原汁中煮汁盡焙乾為末水丸如粟米大每一

二十九研赤脂麻湯下

棗變百祥丸○治證如前方稍緩

紅芽大戟去骨一兩 青州大紅棗三十個去皮核

右用水一碗以前二味同煮水乾為度去大戟不

用將棗肉搗爛為丸從少至多木香湯下以利為

度

無價散○治黑陷由疫毒而致

用人豬狗糞等分於臘月內燒灰磁餅收貯用

時以沙糖水調服二三錢

胡荽酒即芫荽也○治痘疹倒陷不起

胡荽四兩切碎以好酒入瓶內先煎一二沸入胡

荽在內蓋定勿煎勿令泄氣放冷每吸一口微噴

患者從背至足勿噴頭面病人常令聞此胡荽氣

外浴忍冬湯○治痘疹倒陷黑陷不起皆良

忍冬藤俗名金銀花是也春冬用枝夏用枝葉剉

碎以長流水一大盆煎七分將三分之一置浴盆

幼幼集成

卷之五

七十一

內以手試之溫熱得中先服宜用湯藥然後浴洗

漸漸添湯以痘起光壯為度不拘數次

予按忍冬湯治痘焦枯倒陷不起誠為良法第嚴寒

時令深為可慮予嘗見寒月當風浴洗痘未起而

作摘死者矣蓋傷於寒也愚意必於帳中捲去被

褥用小盆盛湯抱兒入帳中垂帳以洗則暖氣熏

烝斷不致受寒生變此法有益無損不可不知

大補快斑湯○治痘起發由吐瀉不能飲食而灰白

官揀參 炙黃耆 漂白朮 炙甘草 杭白芍

全當歸 正川芎 南木香 上薄荷 廣陳皮 藿香葉

大棗三枚為引水煎半饑服

異功快斑湯○治痘證久瀉不止

官揀參 炙黃耆 炙甘草 漂白朮 南木香

全當歸 青化桂 廣陳皮 公丁香 白雲苓

柯子肉

大棗三枚為引水煎半饑服

豈蔻九○治證同前服異功不愈者

幼幼集成

卷之五

七十一

肉苳蔻 煨 南木香 煨 西砂仁 炒 石龍骨 煨

柯子肉 煨 赤石脂 煨已上各五錢 白枯礬七錢五分

其為末麩糊為丸胡椒大每服十五丸米飲化下

附子理中湯○治痘證中寒泄瀉燕色青白

官揀參 漂白朮 黑炮薑 蘇川附 炙甘草

並兒大小加減分兩水煎溫涼服

補元快斑湯○治痘兒脾胃元氣素弱而吐瀉不止

官揀參 炙黃耆 漂白朮 全當歸 炙甘草

當歸土拌炒薑棗引水煎服

調中快斑湯○治痘疹誤服寒涼及冷水以致泄瀉

官揀參 漂白朮 白雲苓 法半夏 炙甘草

青化桂 南木香 廣陳皮 漂蒼朮 川厚樸

藿香葉

生薑三片引水煎服

涼血快斑湯○治痘疹紅掀紫腫血熱故也

淨連翹 當歸尾 懷生地 鮮紅花 綠升麻

牛蒡子 生甘草

大便秘加紫草甚者加大黃小便秘加木通

幼幼集成

卷之五

七十二

燈心十莖為引水煎熱服

三黃解毒湯○治痘初起誤服熱藥以致紅掀紫腫

酒黃芩 酒黃連 酒川槿 淮木通 生甘草

黑梔仁 綠升麻 淨連翹 牛蒡子

淡竹葉為引水煎熱服

助脾快斑湯○治痘稠密一齊起發形如錫餅

廣陳皮 山楂肉 荆芥穗 牛蒡子 南木香

杭青皮 陳枳殼 淮木通 炙甘草

水煎服一二劑不宜多



補脾快斑湯○治痘疹手足起發不齊

大官棟 炙黃耆 北防風 漢防已 柳楊桂 炙甘艸

水煎服若手足痘見而復隱起而復塌此本根已撥枝葉先萎之象必死不治

正氣快斑湯○治痘犯暴風疾雨寒涼所鬱不能起發

川羌活 漂蒼朮 北防風 芽桔梗 當歸身 粉乾葛 香白芷 正川芎 炙甘艸

幼幼集 卷之五

七十三

冬月加上薄桂

生薑為引水煎服

平胃快斑湯○治痘值天時久雨濕滯不能起發

漂蒼朮 廣陳皮 川厚樸 川羌活 北防風 上薄桂 結猪苓 白雲苓 炙甘草

淨水煎半饑熱服

白虎快斑湯○治痘值炎天暑月誤用蓋覆以致毒火鬱遏閉其腠理不能起發

官棟參、煖石膏 大麥冬 粉乾葛 綠升麻

淡竹葉 生甘艸 昏迷者加辰砂末

小便赤者加木通 大便堅者加生石膏 粳米一撮為引以米熟為度熱服

理中快斑湯○治痘誤傷生冷寒凝不能起發

大官棟 漂白朮 白雲苓 青化桂 黑薑灰 南木香 炙甘草 嘔加半夏 泄瀉加懷山

生薑三片大棗三枚引水煎服

寬中快斑湯○治痘誤傷飲食中氣抑遏不能起發

廣陳皮 法半夏 漂白朮 陳枳殼 六神麴

幼幼集 卷之五

七十四

山楂肉 西砂仁 正雅連 南木香 川紫樸

杭青皮 淨連翹 炙甘草

生薑一片為引水煎熱服

四苓新加湯○治痘已起發小便赤少

結猪苓 宜澤瀉 赤茯苓 淮木通 白滑石 淨連翹 甘草梢

燈心淡竹葉為引水煎服

胃苓和中湯○治痘已起發忽然泄瀉或傷飲食

結猪苓 宜澤瀉 漂白朮 白雲苓 廣陳皮

柯子肉 炙甘草 川黃連 南木香 綠升麻  
藿香葉

粳米一握為引水煎服

六君子湯。治痘起發能食而泄瀉雖無害亦宜調  
其中氣

官揀參 漂白朮 白雲苓 廣陳皮 法半夏

炙甘草 炙黃耆 六神麴 南木香 綠升麻

西砂仁

生薑大棗為引水煎服

幼幼集成

卷之五

痘疹

消毒化斑湯。治痘疹起發頭面作腫

芽桔梗 牛蒡子 淨連翹 北防風 紫草茸

綠升麻 淨蟬蛻 密蒙花 草龍膽 人中黃

水煎食後服

托裏快斑湯。治痘稠密頭面應腫不腫

川羌活 北防風 牛蒡子 芽桔梗 綠升麻

荆芥穗 淨連翹 粉葛 當歸梢 上海桂

炙甘草

竹葉十片為引水煎服

苦參散。治痘疹初起頭面未應腫而腫天行瘟疫  
也

川羌活 北防風 牛蒡子 芽桔梗 淨連翹

酒黃芩 荆芥穗 人中黃 嫩苦參

水煎入竹瀝薑汁調勻徐徐服

四聖解毒湯。治痘疹作癢能食而大便秘

紫草茸 淮木通 爛枳殼 炙黃耆 柳桂枝

錦天黃酒炒

水煎空心熱服

幼幼集成

痘疹

痘疹

洗法。治痘疹作癢

綠升麻 漂蒼朮 全麻黃 槐樹枝 柳樹枝

煎濃湯乘熱拭之

調元托裏湯。治痘疹作癢而兼泄瀉

大官揀 炙黃耆 炙甘草 南木香 廣陳皮

柯子肉 嫩柳桂 北防風 川羌活 赤芍藥

荆芥穗

生薑為引水煎服

熏法。治痘疹作癢泄瀉內虛者

茵陳藁 蘄艾葉

二味燒烟熏之。如用上二法而癢止者吉。反甚者凶不治。

導赤解毒湯。治痘起發時身熱太甚唇焦口渴。

淮木通 北防風 大麥冬 淨連翹 地骨皮

綠升麻 白芍藥 粉乾葛 懷生地 天花粉

炙甘草

燈心十根為引水煎服。

生津地黃湯。治痘起發大便堅實而渴。

幼幼集

卷之五

七十七

懷生地 大麥冬 淨知母 天花粉 炙甘草

竹葉十片為引水煎熱服。

七味白朮散。治痘起發泄瀉而渴。

官揀參 漂白朮 南木香 藿香葉 白雲苓

粉乾葛 炙甘草

生薑大棗為引水煎服。

二陳理中湯。治痘會傷冷物受寒氣而嘔者。

官揀參 漂白朮 廣陳皮 法半夏 炙甘草

生薑三片為引水煎服。

二陳一連湯。治未傷冷物寒氣而嘔者熱也。

廣陳皮 法半夏 白雲苓 酒川連 炙甘草

竹茹生薑為引水煎熱服。

加味鼠粘子湯。治咽喉中生瘡閉塞而嘔者。

芽桔梗 牛蒡子 新射干 北防風 山豆根

廣陳皮 荆芥穗 淨連翹 炙甘草

水煎熱服。

控涎丹。吹咽中生瘡。

辰砂

明雄黃

兒茶

川槿

幼幼集

卷之五

七十七

共為末吹喉中。

馮鏗幼幼集成卷之六

羅浮陳復正飛霞氏 刪潤

萬氏痘麻 廬陵劉 勳家孟氏 校正

滋陽周宗頤虛中氏 參定

○一成實證治歌 凡二十一首 共二十六方

起發之時漸作膿 毒隨膿化語無凶

或成空殼兼清水 毒氣留連慮晚攻

凡痘瘡自起發之後血化為水水化為膿至此膿已

成毒已化矣飲食如常不亦吉乎若當起發殼中

幼幼集成 卷之六

出清水此氣至而血不隨也治之當益其榮宜四

物化毒湯

或內含清水平場不起此血至而氣不隨也當益其

衛宜保元化毒湯

或窠囊浮腫中含清水如水泡之狀此氣血俱虛不

能制毒反為毒逼漸變癢塌治之當托其毒固其

榮衛使無癢塌以十全化毒湯主之

亦有飲食如常六腑充實若見空殼清水之證雖能

收斂未免發為癰毒不可不早治之

膿成毒化笑顏開 猶慮形生變證來

莫謂清安無個事 風雲不測霎時災

痘瘡至成膿胞此收功之時手足常要和暖過熱過

寒者變也人事常要安靜煩燥悶亂者變也六腑

常要充實忽吐利者變也聲音要常响亮忽暗啞

者變也飲食要漸進忽不食反作渴者變也色要

蒼蠟形要飽滿忽灰白平塌者變也瘡要安和忽

癢痛者變也或觸風寒或犯禁忌或傷食或悞服

湯丸醫者當詳察其所因而治之

幼幼集成 卷之六

四肢溫暖始相宜 寒熱垂常勢漸離

補瀉無偏能謹慎 折肱端的信良醫

凡痘瘡手足常要和暖不宜太熱太寒寒熱太甚則

水火偏勝而殘矣假如病人六腑閉結狂妄煩躁

口乾作渴其脉洪數沉緊者實也手足熱本病也

若手足冷陽極似陰謂之陽厥下之勿疑宜承氣

化毒湯

若曾經吐瀉其脉沉細微弱者虛也手足冷本病也

若手足熱乃陰極似陽謂之陰躁宜補之回陽化

毒湯溫之

養樂安靜吉堪誇 賊傷鳴牙禍必加

痛癢躁煩雙足冷 縱教仙手枉誼譁

凡痘瘡已成漿或寒戰或咬牙單見一證者可治蓋

寒戰因瘡出太甚表虛而振振搖動者有之宜養

衛化毒湯

若咬牙者必肝火甚其牙相戛而鳴也宜清神化毒

湯涼解之

若寒戰咬牙並作者此陽脫神喪不可治矣若因瘡

幼幼集成

卷之六

三

痛由膿血稠惡而脹痛者宜導神化毒湯

若吐利而手足冷者宜回陽化毒湯方見前更兼寒戰

咬牙悶亂煩躁癢塌者不治

有膿有血毒歸瘡 端的其人正氣強

莫遇中虛生吐瀉 功虧一簣費消詳

凡痘瘡成漿之時不宜吐瀉如吐而無物惡證也因

衝任之火上冲於胃直犯清道而逆出之為不治

若吐而有物者用養胃化毒湯和之

凡泄瀉視其所出之物何如若色黃而臭小便黃赤

熱也宜香連化毒湯

若瀉出之物清冷不臭小便清長舌上無苔寒也宜

理中化毒湯

如瀉入不止不論冷熱皆宜止之通用理中化毒湯

吞荳蔻丸方見前

若吐瀉不止手足厥冷此脾胃之氣將絕急宜附子

化毒湯

其有無時溇泄手足和暖飲食如常雖治之不止亦

可言無事也

幼幼集成

卷之六

四

身外諸瘡膿血成 咽喉自此貴寧清

反加瘡水聲音啞 咽喉喉穿鬼伴行

凡痘瘡初出失於調解以致毒火熏蒸喉舌生瘡又

失於解毒其瘡稠密然外瘡未熟至於養水之時

則先發者又先醫矣所以咽喉宜漸和平聲音清

亮飲食不難此吉兆也若當此時飲水則瘡食穀

則噤甚者失聲此內瘡糜爛舌上成坑咽門腐爛

肺管壅塞以致呼吸皆廢飲食卒絕而死矣亦有

先本無瘡因誤食辛熱之物或誤投辛熱之藥其

後旋生是證者可急用甘桔化毒湯服藥後病退者吉不退者凶

或咽門無瘡而暴暗者此少陰之血不榮於舌也宜養心化毒湯

若有聲而不清此火毒乘於肺也宜瀉白化毒湯中病即止不中勿治

陷起平尖脚潤紅 窠囊飽滿蠟漿充 自然氣色咸如式 畧見差池便不同

凡痘養漿之時若平日中陷者盡起頂平者盡尖根

幼幼集成

卷之六

五

脚紅活窠囊飽滿其色蒼蠟氣如蒸豆自然安吉蓋灰白雖為膿之正色亦由氣之不足宜大補化毒湯若因泄瀉而灰白者宜固本化毒湯

若其氣腥臭此有濕熱宜解其標用解肌化毒湯外以益元散薄敷瘡上勿令至於潰爛可也

正值成漿忽癢搔 用心調護莫辭勞 不分乾濕皆凶候 能食神清福自高

凡痘至成漿切防搔癢抓破以洩其氣俗云抓破出血者吉不出血者凶殊不知起發之時其瘡未發

而內是血抓破宜出血若養漿之時其瘡已發而內是膿抓破有血無血何足以定吉凶大抵不宜作癢如作癢而人清爽自知其候抓破或言其癢欲人拊之者吉若癢而悶亂煩躁語之不聽禁之不止搖頭扭項手足舞亂者凶也如其人清爽癢癢不住者當視其形體虛實未曾吐瀉者宜四聖化毒湯如元氣素弱而有吐瀉宜參歸化毒湯又要看其抓破處復灌成瘡則吉破而不灌皮肉焦黑者不可治也

幼幼集成

卷之六

六

正面將膿早破傷 依然腫灌復成瘡 莫嗟敗面留殘喘 腫若消時愈斷腸

凡視痘瘡以正面為主蓋五臟精華皆聚於面如他處痘瘡破損正面完全可言無事若正面成片破損別處雖完全亦何益哉若破處復得腫灌成瘡膿血淋漓却又無事面雖敗穿鼻破唇但留殘喘耳豈不愈於死耶若破處不灌不腫或腫而又消煩躁悶亂此毒氣倒陷決不可治矣

眉心鼻準耳輪邊 唇口諸瘡貴活鮮

但有焦枯兼黑靨，慢求醫卜命難全。

凡痘欲成膿之時，眉心鼻準耳輪兩頰若先有焦枯

黑靨，此名倒陷，醫之不能禱之無效凶矣哉。

正待行漿漿濯濯，惟愁乾塌成空殼。

倒陷由來證本乖，勞君着意毋偏駭。

凡痘自出現而起發，自起發而至養漿之時，便要成漿，如常養漿而反不成漿，依舊平塌，與未起發相似，或起發內有空虛，乾枯無水者，名倒伏，謂之倒者，膿根在裏也，謂之伏者，毒伏而不出也，謂之陷

幼幼集成

卷之六

七

者，毒出而復入也。此等之時，人事清爽，飲食如常，別而治之，小便大便秘結，壯熱煩渴，宜下之，以承氣化斑湯方見前。若吐瀉頻數，六脈虛弱，宜溫之，以回陽化毒湯方見前。若人事昏悶，寒戰咬牙，足冷腹脹喘促者，死。

額上渾如沸水澆，落落破爛氣殘凋。

漸延兩頰多虧損，泄盡元陽魂魄飄。

凡痘瘡起發，養漿額上似沸湯所澆之象，皮容易破不成顆粒，大片損爛，此因失下之過，毒火熏蒸，漸

延兩頰破損水出而乾，似靨非靨則陽脫陰留，徒增煩悶呻吟而死矣。

瘡頭有孔出膿腥，結聚成堆雉屎形。

此個未聞人救得，徒教醫禱恐無靈。

凡痘最要皮囊堅厚，包裹完全，若瘡頭有孔，膿水淋漓，或清水非膿，無事自破，水出乾黑，未有能治者矣。

雖然痘密黏床久，瘡好皮堅無敗朽。

幼幼集成

卷之六

八

如逢擦破更焦枯，任彼天人應費手。

凡痘稠密最難為醫，膊腰臂之間，其處久着床席，展轉挨磨，若非堅厚，鮮有不破者。但破須要腫滿，若焦乾，鰲黑如火燒湯滌之狀，必死。又見其人手足破爛成片而不灌者，亦死。

畧見漿膿起發時，休教人物往來馳。

邪風穢氣相侵觸，變亂無常悔却遲。

凡痘瘡起發之後，漸漸養漿，即當謹飾房戶，禁止人物內者，伏出外者，休入，謹防穢氣觸犯其瘡，輕者

作痛作癢變而為重者，癢塌振破煩悶而死矣。故房戶內外常須燒蒼朮、大黃以避不正之氣。但二味氣味惡劣，不可使痘兒聞之，更不可焚燒諸香。蓋香能助火透入關節，所以禁之。其諸穢厭房事最毒，酒次之，五辛又次之，死屍之氣烈於糞穢。狐狸之氣甚於犬羊，烈風暴雨亦能為害。飲食之偏寒偏熱者，勿恣於口。天氣太熱則薄其衣衾，常令涼爽。太寒則溫其蓋覆，常令溫暖。皆調理切要之法，不可不知。凡用僧道灑水滌穢，與醫家用藥。

幼幼集成

卷之六

九

必用老誠之人，既能清心寡慾，而且經驗復多，自能司人之命。凡被房事生產，月經所厭，以大棗燒烟解之。被酒所厭，以葛根茵陳燒烟解之。五辛所厭，燒生薑烟解之。被死屍疫厲厭，以蒼朮、大黃烟解之。狐狸犬羊厭，燒楓樹、穠烟解之。凡遇風雨，須燒楓樹、穠以避濕氣。膿血淋漓，心臆虛，令空神亂者，邪居睡中，妄語難甦，養血安神病自除。凡痘稠密成漿之時，或昏昏而睡，呼之不醒，口中喃

喃妄語，如被邪祟之狀，時人不知，多生驚怪，殊不知此由膿血出多，心臟空虛，神無所依，而然當養血安神，病當自退。宜寧神化毒湯，與安神丸相間服之。

瘡成腹痛，果何因，便秘腸中火燥津。

又恐誤傷生冷食，消詳補瀉貴情真。

痘出之初腹痛，乃為毒氣瘡成，無膿而腹痛，未可以為毒也。當審其人便解飲食何如耳。向若未得大便，此燥屎在裏而痛，宜大黃化毒湯微利之，不可

幼幼集成

卷之六

十

拘於首尾不可下之說，坐以待變也。

若因誤傷生冷，或飲冷而痛，宜溫中化毒湯煖之。效

瘡毒無邪證，適中，忽然腹脹氣腫，鴉。

此因食飲多生變，消導天然不用攻。

凡痘順正，表裏無邪，膿血已成，可無苦矣。忽然腹脹氣喘，色變而煩悶者，必傷食得之也。何以知之，以其瘡正故也。宜消導之用，助脾化毒湯。

膿成盡說毒將升，誰料其間未足憑。

飽滿堅牢誠可愛，塌平滲濕最堪憎。



世俗之見但知痘瘡已過一七發起作膿便言無事不知膿成之時尙未可憑信若郭郭堅厚膿漿飽滿言其無事信矣若平塌不飽滿淫濕不堅厚莫言無事至於十二三日之後尙有變異延綿日久而有死者矣

險逆諸瘡且勿云 耶將順證語諸君

緣何業已成漿口 尙有凶危不可堪

凡痘分三等有順有險有逆順者不須治險者治之吉逆者無可治今除險逆不必論然順者亦有成

幼幼集成 卷之六

漿之日反變爲險逆者此何故也蓋有失調理觸犯禁忌悞服湯丸恃其輕少而不調護故令輕者變重此人事之害也又有只出一二粒而殞命者厲氣使然也豈人能逆料者哉

○入方

四物化毒湯○治痘已起發氣至而血不至殼中出清水

全當歸 正川芎 懷生地 白芍藥 大麥冬 牛蒡子 淮木通 生甘草分 上薄荷減

燈心爲引水煎熱服

保元化毒湯○治痘血至而氣不至內涵水色平塌不起

官揀參 炙黃耆 全當歸 正川芎 荆芥穗 上薄荷 牛蒡子 北防風 赤芍藥 炙甘草 粳米一批爲引水煎服

十全化毒湯○治血氣俱虛窠囊浮腫中涵清水如水泡

官揀參 漂白朮 白雲苓 炙甘草 正川芎

幼幼集成 卷之六

當歸身 白芍藥 懷熟地 炙黃耆 上薄荷 牛蒡子 粉乾葛 生薑大棗爲引水煎溫服

承氣化毒湯○治痘陽極似陰手足厥冷

小枳實 紫厚樸 川大黃酒炒 尖檳榔 生甘草

生薑三片爲引水煎滾熱服

回陽化毒湯○治痘陰極發躁手足大熱 官揀參 青化桂 漂白朮 白雲苓 川附片

炙甘草

大棗為引水煎溫服

養衛化毒湯○治痘出太甚表虛而振戰

官棟參 炙黃耆 柳桂枝 當歸身 炙甘草

生薑三片大棗三枚引水煎服

清神化毒湯○治肝火太甚而咬牙

綠升麻 懷生地 杭麥冬 淮木通 北防風

炙甘草

燈心十莖為引水煎服

幼幼集成

卷之六

十三

導神化毒湯○治痘瘡太甚膿血稠急而痛以致咬

牙

淮木通 杭棟冬 黑梔仁 炙甘草 炒棗仁

鏡辰砂研

燈心十莖為引水煎熱服

養胃化毒湯○治成漿時嘔吐而有物胃虛也

漂白朮 廣陳皮 白雲苓 西砂仁 薑炒連

生薑一片為引水煎服

香連化毒湯○治泄瀉色黃而臭熱也

南木香 炒黃連 結猪苓 漂白朮 炙甘草

燈心十根為引水煎服

理中化毒湯○治泄瀉所出之物清冷不臭寒也

官棟參 炙甘草 漂白朮 白雲苓 黑炮薑

大棗三枚為引水煎服

附子化毒湯○治吐瀉不止手足厥冷脾胃將絕也

熟川附 官棟參 漂白朮 炙黃耆 炮薑灰

炙甘草

炒米一撮大棗一枚引水煎溫冷服

幼幼集成

卷之六

十四

甘桔化毒湯○治誤食辛熱之物或誤服熱藥以致

咽喉破爛

大粉草 芽桔梗 鮮射干 淨連翹 牛蒡子

水煎入竹瀝和服

養心化毒湯○治咽中無瘡而暴瘡

大當歸 懷生地 大麥冬 綠升麻 天花粉

川黃蘗 漂蒼朮 荆芥穗

生薑一片引水煎服

益元散

白滑石一兩研細水飛 粉甘草五錢

共為細末，蜜水調敷，瘡焦痛，胭脂浸汁調敷。

四聖化毒湯。治成漿之時，忽然搔癢，無吐瀉者。

淮木通 當歸尾 赤芍藥 北防風 柳楊桂

淨水煎服

參歸化毒湯。治元氣素弱，又兼吐瀉而作癢。

官揀參 大當歸 炙黃耆 赤芍藥 桂枝梢

漂白朮 炙甘草

水煎服 已上二證俱用熏洗法熏洗二方俱見前

幼幼集成 卷之六

寧神化毒湯。治成漿後，膿血去多，心虛神無，所至

口中嚙語。

官揀參 當歸身 懷生地 大麥冬 淮木通

石菖蒲 赤芍藥 黑梔仁

燈心引水煎服

安神丸。治證如前

炒川連一錢 當歸身五錢 白茯苓一錢 炙甘草五分

遠志肉一錢 石菖蒲一錢 炒棗仁五分

共為末，猪心血搗勻為丸，如天寶大辰砂為衣，每

二三九燈心湯下

大黃化毒湯。治漿成大便秘結而腹痛，內有燥糞。

綠升麻 當歸身 懷生地 火麻仁 光桃仁

鮮紅花 陳枳殼 錦大黃 尖檳榔

生薑為引水煎空心熱服

溫中化毒湯。治悞傷生冷冷水而腹痛。

官揀參 公丁香 南木香 漂白朮 青桂心

炙甘草 炒白芍 西砂仁 小枳實 廣陳皮

炮薑灰

幼幼集成 卷之六

大聚生薑引水煎服

助脾化毒湯。治飲食過傷，抑遏脾氣，所以腹脹而

喘 廣陳皮 法半夏 川厚樸 陳枳殼 家燕子

蘿蔔子 尖檳榔

生薑為引水煎服

○一收靨證治歌凡一十五首共一十六方

收靨難拘日數文，但憑稀密實虛分。

緩收循序多堅穩，太急須防餘毒熏。

痘瘡收靨不可以日數拘也。大抵痘稀元氣實者易出易靨，痘密元氣虛者難出難靨。只要循序緩收，倘收太急，乃毒熬煎血氣枯焦，非正收也，必發癰毒怪證，甚則喪軀，微則殘形矣。

人中上下別陰陽，收靨先於此處見。

若是足顛先靨黑，多凶少吉早隄防。

人中者督任二脉交會之衝，痘疹先從此處出，壯收靨為陰陽和暢。若於額顛手足心先靨，乃邪氣攻心莫救。

幼幼集成

卷之六

十七

收靨從來貴整齊，鼻腥煩爛便蹉跎。

其間順逆宜詳審，慎勿遽巡當局迷。

痘瘡收靨貴於整齊，乾如螺靨者上也，頂破膿出，結

如雞屎者次也，破爛無痂者下也。凡遇此等收靨

便須詢察會犯何逆，如血氣本實，誤投補藥，以邪

得補反饋，正氣如火，燥爛宜天水散解之，則邪火

退而收靨齊矣。

如初飲冷水，浸淫脾胃，以致收靨不齊，以除濕湯滲

之，則內滲其濕，外燥其表，令好收靨。

若頭面潰爛，其氣腥臭，及遍身手足和皮脫去，宜分順逆。果膿成毒化，飲食如常，更無他苦者，順也。膿水未成，是各倒靨，未可量。

痘到收時膿自乾，封藏收服穀團關。

莫教腐爛和皮脫，此個還將倒陷看。

痘瘡成膿之後，結為螺靨，此毒從外解。若不能結痂，反成腐爛和皮脫去，此倒陷毒氣入內也。

但逢倒陷毒深潛，復腫翻生始不嫌。

頭面腫消空未補，剝膚穴近易前占。

幼幼集成

卷之六

十八

凡痘倒陷，係中氣不足，急用溫中托裏湯托之，服藥後破者，復加腫，無痘處又復出一層，謂之補空。俗云翻生痘是也。此正氣不虧，邪氣不出，雖過期延日，不為害也。如頭面不腫，空處不補，即易所謂剝以膚，切近災矣。安可為哉。

靨時自利忽然侵，順逆中間仔細尋。

膿血痂皮為順候，不分水穀定歸陰。

收靨之時，忽然瀉痢，若膿血痂皮之物，此脾強腎弱為順候，痢盡自愈，不可強治。若不分水穀，此腎強

脾弱為逆候，炒米湯送芫薺丸，痢止則吉，不止則凶。芫薺丸方見前

過期不靨，事踈蹊，臭爛，渾身靨不齊，

黏席黏衣何所治，白龍散草指群迷，

凡痘成膿之後，過期不靨，渾身潰爛，以致黏席黏衣，

用白龍散散草散觀貼鋪床最佳，

收靨遲延須治急，勞君察證毋拘執，

縱意遺師徒自傷，臨危施濟終難及，

凡痘當靨不靨，須要詳審不可忽畧，如冬寒之時，蓋

幼幼集成

卷之六

十九

覆少薄，被寒風，鬱遏不能靨者，宜桂枝解毒湯疏解之，

如夏月衣被太厚，熱氣熏蒸不能靨者，宜去其衣被，

少令清涼，用甘露解毒湯清之，

倘一向大便秘結，裏熱太甚不能靨者，宜當歸解毒

湯微利之，膽導法尤妙，

如泄瀉氣虛不能靨者，此只收靨不齊，俗呼坐漿乾

也不須妄治，如元氣素弱以致難靨，宜參歸化毒

湯解之，

膿水將乾結靨時，休教愚昧失支持，

不知禁忌多翻變，却似為山一簣兒，

世俗於痘收靨之時，即殺雞食之，或薑椒之類，謂其

和暖，殊不知雞屬巽，能動風，辛能助火，脾胃強者

無害，弱者反助火邪，以致發癰傷胃，口舌生瘡，則

至壞病者有之矣，又或宜溫而過熱，宜涼而過寒，

皆為犯禁，亦能生變，切宜慎之，

一向渾身涼且和，靨時忽熱事如何，

微微發熱乾膿水，太甚焦枯病轉多，

幼幼集成

卷之六

二

痘疹始終要有微熱不可盡去，若收靨之時反大熱，

作渴煩躁，此毒在內，更防陷伏，急用生津涼血葛

根湯以清之，

破瘡復灌依然爛，及至收成功愈慢，

淋漓膿血苦難當，大補湯丸君莫憚，

凡痘瘡犯着皮嫩，易破本不治之證，但破損之後重

復腫灌，此正氣尚強，毒不能入而發於外，亦當依

期收靨，設不能靨，乃正氣被邪氣剝削，雖能逐邪

出外不能逼邪成痂也，急宜大補湯溫之，不可因

循反生災變

數個頑瘡不肯收，犯時鮮血却長流。

如逢此證休輕易，破膜傷筋命必休。

痘瘡破損灌腫作痛，不能乾水，一名疔，一名陽

瘡，犯着即出血不止，乃難治之證，內服大補湯，方

前外以綿繭散敷之，若遂巡不治，以致灌傷筋骨

穿膜破空，天人生命者多矣。

灌瘡滿面血膿多，敗面傷睛奈若何。

却在良醫施妙手，調和中外起沉疴。

幼幼集成

卷之六

二十七

如面瘡破爛，反復腫灌，膿血侵淫，却防壞眼，殘形宜

升麻解毒湯清之。

痘瘡抓破狀多般，出血成坑水更乾。

搔癢焦疼微小事，傷筋潰肉使形殘。

其痘瘡抓破之證非一，有破而流血者，陽瘡也，宜當

歸涼血散解之。

有破而無水便乾枯者，此陷伏也，要瘡復灌，肉復腫

者為佳，內服托裏回生散，有破而成坑者，此內陷

也，內服托裏回生散，外用白龍散敷之，方見若下

詳審已上三證治之，被則殘形，甚則傷命。

收靨依期更着痧，或時戰慄或言邪。

三元正氣將回復，不必巫醫不必嗟。

凡痘欲收靨之時，面皮圓靜，但時或戰慄，語言妄談

此為正氣將復，不能自持，不必憂疑，須臾自定。

○入方

天水散○治痘候投補藥反饋正氣而不收靨

白滑石木飛 粉甘草細末

共研勻，蜜水調，以鵝毛蘸藥拂拭瘡上。

幼幼集成

卷之六

二十七

除濕湯○治脾胃受濕收靨不齊

川羌活 漂蒼朮 北防風 淮木通 結猪苓

宣澤瀉 漂白朮 赤芍藥 上薄荷

淨水煎服。

溫中托裏湯○治痘瘡尚未收靨，忽然倒陷，中氣虛

也。

官揀參 炙黃耆 炙甘草 牛蒡子 當歸身

淨連翹 上薄荷 杭青皮 南木香

大棗三枚為引，水煎服。

白龍散○治痘瘡渾身破爛不能懷抱者、

用乾牛屎燒灰取中間白者研末篩過敷爛處

敗草散

用茅屋上爛茅燒灰研細篩過鋪於席上在其展

轉此草多受霜露功能解毒故也、

桂枝解毒湯○治痘為風寒鬱遏不能收靨、

上薄桂 赤芍藥 牛蒡子 北防風 淨蟬蛻

生薑大棗引水煎服、

甘露解毒湯○治夏月天令炎熱暑氣熏蒸不能收

幼幼集成

卷之六

二十一

靨

結猪苓 宜澤瀉 大麥冬 淮木通 小條苓

地骨皮 上薄桂 淨連翹 炙甘草

水煎熱服、

當歸解毒湯○治裏熱太甚大便秘結不能收靨

懷生地 大當歸 火麻仁 陳枳殼 淨連翹

酒大黃 紫草茸

淨水煎空心滾熱服、

脂導法

治大便結燥血不潤腸以此通之不損元氣

用大猪膽一個以小竹管插入膽內以線扎定吹

氣令滿另以線打活結收在其氣以竹插入穀道

內解去活結捏其膽令膽汁射入腸中直待氣透

然後去膽便即通矣、

參歸化毒湯

官揀參 炙黃耆 當歸身 牛蒡子 炙甘草

水煎服 世人不知此等關係視若泛常不早求

治待斃而已悲夫、

幼幼集成

卷之六

七十四

生津涼血葛根湯

治收靨忽然大熱煩渴此裏有毒也、

粉乾葛 天花粉 地骨皮 當歸梢 淮木通

淨連翹 牛蒡子 酒黃芩 北柴胡 淡竹葉

大揀參 炙甘草

水煎熱服、

大補湯○治痘破爛復灌元氣傷殘不能收靨

官揀參 炙黃耆 當歸身 淨連翹 上薄桂

牛蒡子 炙甘草

大棗為引水煎服。

蠶繭散○治痘瘡破爛水不能乾犯之血出。

用出了蠶蛾綿繭不拘多少以白生礬搥碎納入

繭內炭火煨之待礬汁乾研末乾搽瘡上即安。

升麻解毒湯○治面瘡破爛復灌膿血不乾。

綠升麻 香白芷 酒黃芩 淨連翹 淨蟬蛻

淮木通 牛蒡子 密蒙花 白蒺藜 荆芥穗

北防風 大當歸 炙甘草

燈心為引水煎熱服。

幼幼集成

卷之六

三十五

當歸活血飲○治痘瘡抓破而出血者。

當歸尾 鮮紅花 酒黃芩 淨連翹 炙黃耆

官揀參 地骨皮 牛蒡子 生甘草

燈心為引水煎熱服。

托裏回生散○治痘瘡破而無水即便乾枯者。

炙黃耆 大當歸 淨連翹 上薄荷 牛蒡子

炙甘草

水煎入燒過人屎調服。

○一落痂證歌凡五首 共三方

痂皮應落偏遲落，但恐斯時還作惡。

補脾實表有奇功，未可遂巡輕棄藥。

收靨之後痂殼自殘若黏着皮肉不脫乃表虛也尤

當禁忌不可因循恐生他變宜調元固本湯治之

收靨之時不落痂，昏昏喜睡莫咨嗟。

只因脾胃多虛弱，調治專從戊己佳。

此證乃脾胃虛而好睡也胃屬戊土脾屬己土宜健

脾開胃調元清神湯醒之。

落痂之後瘡癩<sub>音</sub>癩<sub>音</sub>平整紅鮮日漸安。

若是凸凹兼黑黯，好將敷藥補形完。

其瘡落痂之後癩痕平整紅活者吉若癩肉凸起或

凹陷紫黑吉凶未可知也用滅痕散敷之。

瘡痂自落何勞急，擗指須防邪氣襲。

他年終作血風癩，此際侵淫空涕泣。

痂落依期不必憂，緣何頭足更遲留。

陰陽孤獨如鯨寡，安得同時取次收。

凡陽生者以陰成之陰生者以陽成之經曰孤陽不

生孤陰不成其瘡收靨自人中平分上下髮際以

幼幼集成

卷之六

三十六



上陽之陽也謂之孤陽足膝以下陰之陰也謂之孤陰所以瘡之收靨至此二處每每遲留不能便乾不可服藥聽其自然則吉

○入方

調元固本湯○治痘痂黏肉不脫

官棟參 炙黃耆 當歸身 淨蟬蛻 炙甘草

生薑大棗引水煎服

調元清神湯○治痘痂黏肉不脫而昏沉好睡

官棟參 炙黃耆 大當歸 杭麥冬 廣陳皮

幼幼集成

卷之六

二十七

炒棗仁 炒川連 炙甘艸

大棗為引水煎服

滅痕散○治痂落痂肉凸凹紫黑

密陀參研為細末以乳汁調搽驗如無乳汁蜜

調亦可若此藥搽上凸凹者自平紫黑者自退應

効者吉不應効者凶

○一痘後餘毒證治歌

凡三十一首 共四十六方

借問何為痘後癰 只因平場少成膿

毒邪蘊聚難消散 透節尋關出要衝

凡痘初出一點血由血而化至膿膿成而毒解矣若

出形之後應起發不起發應成膿不成膿一片空

殼狀如蛇皮或平場破損都無膿水本為死證緣

其人脾胃素強又能飲食亦可以引日收斂只是

毒邪蘊蓄於裏必尋出路於關節之間而為癰腫

但發一二處可治若流注於手足發之不止腫瀧

不愈久而死矣

痘癰先要明經絡 解毒調元兼裏托

決膿去毒急施功 莫待殘形變為惡

幼幼集成

卷之六

二十七

凡癰之發先看何經絡分氣血多少而治之次看

人之虛實以解毒托裏為先不可亂施敷藥以致

毒不得出內炎筋骨而成壞證如腫而未成膿者

用必勝膏貼之已成膿者將銀針決破其膿以

生肌散敷之若腫毒而元氣素弱者以十六味

流氣飲流通之若氣血虛而泄瀉者加附子以

溫之若元氣素強者用連翹解毒湯主之如

癰毒日久膿血去多者以十全大補湯扶元解毒

惡證無如痘後丹 皮膚蘊火毒相干

看他所發歸何部、心腎之經治亦難、

赤火丹瘤惡候也、流移紅腫、其痛手不可近、痘瘡之

後、有發丹瘤者、因蓄火太甚、不能發洩、鬱於肌肉

之間、故發而為丹、從頭上起過心即死、從足下起

過腎即死、內服玄參化毒湯解之外、用鐵鋒砭法

癰疹何為痘後呈、肌膚蘊毒未全清、

若教發盡無停滯、免得重重怪證生、

癰者皮膚間隱隱成疔瘡也、俗人謂之風丹疹者皮

膚點點狀如蚊蚤咬迹也、痘後發癰疹因毒火未

幼幼集成

卷之六

二十九

發盡藏於皮膚之間、或搔癢因抓而成、或因受風

火相搏而成、皆吉兆也、正欲其發洩、無使停留以

變他證、如發太甚、內服防風敗毒散、外以益元散

拭之、

益元散方見前

痘已收成、靨不乾、或時出血、病難安、

從前毒氣藏肌表、蝕肉傷肌、不忍看、

此與前頑瘡不收相同、凡覺痘瘡當靨不靨、即防此

證、當內服大補湯、外以綿繭散敷之、

綿繭散方見前

翳膜為何、眼內攢、怪他熱毒壅於肝、

還睛去翳多奇術、點洗徒招廢棄端、

小兒出痘之時、即用黃藥膏和胭脂塗眼、防斑瘡入

眼也、但斑瘡入眼、本不在初、多在收靨之時、或滿

面破爛、重復腫灌、膿血膠固、毒火鬱蒸在內、其斑

瘡入眼、或痘出已甚、成就遲緩、醫用辛熱之藥、發

之、亦令斑瘡入眼、又或收靨之時、喜啖辛熱、謂之

乾漿、以致二火相煽、亦令斑瘡入眼、但在白珠上

不必治、久而自去、惟在黑輪上者、或掩蔽瞳人、急

用密蒙花散治之、

幼幼集成

卷之六

三十

兩目今朝乍畏明、肝虛邪火暗傷睛、

涼肝養血功無比、解使雙眸炯炯清、

凡痘後雙目見明不開、暗則開者、謂之羞明、宜涼肝

明目散治之、若向暗處亦不開者、却妨目中有瘡

當如上法治之、

收後緣何便下紅、多由倒陷毒歸中、

利完膿血應須愈、強治翻為聚怨叢、

膿血痂皮一路來、任他自止莫疑猜、

和中清熱施殘者、却澁輕投病轉乖、

痘後忽利膿血待其自止然後用和中清熱之劑不可便用止瀉但痢勢甚者宜黃連解毒湯清解之膿血盡後宜和中湯

痘證從前無倒陷 緣何膿血利無時

大腸鬱火多潛毒 解毒通腸貴早施

痘無倒陷之證却有膿血之痢由於平日食煎炒素有積熱今因痘後氣血虛不能勝積故痢膿血也此各滯下必然腸鳴作痛裏急後重或因痘出之後飲食太多水停作泄熱毒乘虛入裏便下膿血

幼幼集成

卷之六

三十一

此名腸垢宜調胃承氣湯以微其毒次用黃芩湯調其陰陽

最怕收成嘔噦類 咽疼胃弱毒潛溼

錯喉哈水宜施治 乾噦無聲鬼作鄰

有聲有物謂之嘔有物無聲謂之吐有聲無物謂之噦食穀即吐謂之錯喉飲水而嘔謂之哈水今痘後凡有此等由熱毒壅塞胃口故令嘔吐咽門澀塞故令錯喉哈水也惟乾嘔乃胃腐爛不能納穀故時時張口似吐不吐乃不治之證亦有咽噦

作痛而嘔吐失聲者乃咽喉腐爛亦不可治惟但嘔吐陳皮竹茹湯咽喉痛甘桔湯

身已清安熱不除 或因毒甚或元虛

調元解毒分投用 寒熱分明効自如

痘既收靨則毒解而熱當除矣如熱一向不已非毒氣之餘烈必元氣之素虛惟以脉辨之如脉數形剪煩燥而熱此邪氣實也宜知母解毒湯如脉遲形怯熱而喜睡此正氣虛也宜黃芩調元湯

收後渾身一向溫 乍然發熱細評論

幼幼集成

卷之六

三十二

內傷外感須分治 此個真機妙法門

痘靨之後一向溫和平並無餘熱今忽發熱不可以餘毒未解正氣之虛同論必因外感風寒其證頭目昏痛惡寒脉浮宜桂枝湯

或因內傷飲食其證肚腹飽悶不喜飲食其脉弦滑以補中益氣湯加消導藥而運用之

食飲如常腹裏疼 益由脾弱化難能

看他虛實行消導 方顯明良三折肱

收靨之後忽然腹疼或嘔或泄不思飲食此傷食之

證虛則用上補中益氣湯治之如無吐利腹痛氣急宜丁香脾積丸下之若腹滿而痛煩悶不寧此毒火入中急用雄黃解毒丸利之不然漸加喘急手足厥冷則難治矣

收後緣何食不思 偶然傷食少人知

補脾消導為良法 強忍成疴悔是遲

一向能食收後反不能食聞食氣即嘔逆此必食傷甚可以脾積丸治之

方見前微則以保和丸調之若

隱忍不急求治久則消瘦漸成疴癆矣

幼幼集成

卷之六

三十三

寒熱纏身似瘧侵 不分早晚應期臨

只緣脾胃多虛弱 補氣升陽貴酌斟

此因痘後氣血兩傷陰虛則內熱陽虛則外寒乍寒乍熱儼然瘧疾切不可以為瘧治但以補中益氣

湯升舉之其病自愈

收後渾身手足寒

好將氣血作虛看

六經脈細如將脫 急早回陽病自安

凡痘收靨之後手足厥冷六脈沉細元氣大虛急用

調元生脈散以溫之稍用寒涼必取敗亡也

強打精神睡思昏 終朝何事不惺惺

此因毒解神虛倦 氣血和平體自寧

收靨而好睡乃毒解神虛此常事也不必調治有等

苟且之流氓人不知而取利庸下之徒妄用湯丸

而致禍者戒之戒之

睡思沉沉不識人 恍惚中酒妄言頻

只因熱伏心包絡 保護心君妙入神

凡收後昏睡連日不醒口中妄語或有醒時亦似醉

人每多錯語此熱邪攻心心君不肯受邪傳於包

幼幼集成

卷之六

三十四

絡宜導赤解毒湯清之或用安神丸亦佳

收靨之餘搖擗紫 責其火毒未全清

清心散火風應退 發作無休命必傾

痘出發熱作搐此常候也若收靨之後反發搐者乃

瘡發未透毒火內侵故也然此候發於收靨之餘

血氣已衰治之甚難宜清神散火湯如藥對病者

可治若連發不已死證也

身已康寧手足攣 分明血少致斯愆

補脾養血誠仙訣 不過知音莫浪傳

凡痘後手足忽然攣拘不能屈伸轉運乃血少不能養筋又或外被風寒水濕以致然耳不可用發散併疎風之藥以耗其血只宜當歸桂枝湯補脾養血則手足自和

痘後還愁咳嗽多 總由毒火肺中磨

消金降火兼調氣 肩息胸高若命何

痘疹之後惟肺受傷至於收靨毒解宜乎寧矣若反

咳嗽喘急乃毒火流入肺中也當消金降火宜寧

肺湯保肺解毒服藥嗽不止胸高龜殼肩息者不

幼幼集成

卷之六

三十五

治

忽爾渾身腫脹形 或風或水食偏停

腫因肺受宜清表 脹屬脾家利解寧

痘收之後或面目浮四肢腫此屬於肺因表虛而受

風寒仍宜汗解用加味五皮湯

若腹脹如鼓眼胞微腫此屬於脾由脾胃虛飲水過

多蓄濕於內所食過多積熱於中仍宜利解宜厚

樸湯倘屬虛脹不可妄攻但宜萊菔子丸

小便宜清偶澁遲 膀胱蓄熱少人知

不將導赤為良法 只恐遷延有變時

凡痘疹小便始終宜清若收後不利此熱積膀胱宜

加減導赤散以清其心

便貴滋榮乍覺難 誰知腸胃液津乾

潤腸膽導宜兼用 縱有餘邪便後安

凡大便始終須宜潤澤一二日一次為佳若至於收

靨後而大便秘結乃痘出太多血枯氣不潤腸宜

潤腸丸兼膽導法方見前

腠理疎通雨汗傾 衛虛榮弱兩無情

幼幼集成

卷之六

三十六

建中自汗湯偏勝 盜汗歸黃六味平

經曰衛氣者所以溫肌肉充皮毛肥腠理司開闔也

痘瘡之後衛氣受傷故收靨之後衛弱而汗出也

醒時常出為自汗宜建中湯睡着而出者為盜汗

當歸六黃湯

血在身中本自寧 火邪迫血血違經

鼻中細出堪調治 便尿中來命不停

痘收靨後忽見血譏大為危候蓋鼻血出於脈吐血

出於胃湧血出於小腸便血出於大腸皆由毒入

於內迫血妄行急宜原血地黃湯止之服藥後血不止者不治

忽吐蛇蟲證已非 要知內熱又常饑

但聞食臭蟲斯出 嘔吐心煩躁作威

傷寒吐蛇貴之胃寒痘證吐蛇貴之裏熱由熱毒拂

鬱於裏又不能食蟲無所養但聞食臭即湧出者

宜黃連止蛇湯

炎炎胃火成疔蝕 辛熱煩冷陽毒熾

牙眼鼻爛怕穿腮 藥有神功休論值

幼幼集成

卷之六

三十七

凡痘瘡後牙齦生瘡時時出血謂之牙宜呼吸息臭

謂之息露此走馬疔也由熱在陽明少陽宜內服

洗心散外以蠶蛇散敷之

如舌上生瘡赤者謂之赤口瘡此熱在心脾二經內

服洗心散外用陰陽散敷之

其瘡白者名白口瘡又名鴉口瘡此熱在心肺二經

亦服洗心散外以硃礬散敷之

食飲緣何不發肌 多因氣血兩相虧

和平丸散常宜服 偏熱偏寒愈見離

凡兒素常肌肥痘後羸瘦雖能飲食而不為肌膚乃氣血虛故也治之須兼陰陽不可偏勝偏陽則傷血偏陰則傷氣愈見乖離矣陰日宜服參苓白朮散陽日宜服當歸益榮丸

痘後分明皮肉嬌 切宜保護在昏朝

風寒暑濕常宜避 洗拭搽搨莫莫饒

痘後中虛食易傷 辛香生冷莫輕嘗

若貪口腹渾無忌 犯却中和變內傷

此二條言收後調理之法在外也皮膚薄嫩易於感

幼幼集成

卷之六

三十八

冒若不避風寒暑濕梳洗搽拍則至於癰腫者有

之生瘡癰者有之在內也腸胃並弱難於消化若

不分生熟輒鞭寒熱涼溫任意食之則成脹滿者

有之至於瀉痢者亦有之可不慎歟

○入方

必勝膏○治痘癰初腫而未膿者

馬齒莧取汁 公猪肪熬油 好冬蜜

三味等分同入砂鍋內熬成膏厚塗腫上

生肌散○治痘癰已成膿破爛不能收口

香白芷錢一 石龍骨分五 浙貝母錢二 赤石脂錢一

新白芨錢一

共為極細末敷之

六味沉氣飲○治痘癰腫痛元氣素虛者

官揀參 大川芎 當歸身 赤芍藥 北防風

南木香 炙黃耆 上薄荷 香白芷 芽桔梗

尖檳榔 川厚樸 台烏藥 紫草茸 陳枳殼

炙甘草 氣血虛而瀉利者加熟附子 大便秘

結者加酒蒸天黃

幼幼集成 卷之六

淨水煎半饑服

連翹解毒湯○治痘癰腫痛能食而元氣強者

淨連翹 香白芷 大川芎 當歸尾 赤芍藥

牛蒡子 穿山甲 炙甘草

淨水煎服

屬太陽經者本方加 川羌活 漢防已

屬陽明經者本方加 綠升麻 粉乾葛

屬少陽經者本方加 北柴胡 枯黃芩

屬太陰經者本方加 青化桂 北防風

屬少陰經者本方加 川黃連 淮木通

屬厥陰經者本方加 北柴胡 杭青皮

予按但云六經加味而不指明處所未免闕畧今

分晰之以便治療

太陽經所屬 項背腰脊足外膝足臑

陽明經所屬 額眉眶面胸兩乳牙齦

少陽經所屬 左右頭角耳前左右兩脇腋

太陰經所屬 中腕四肢兩足胻

少陰經所屬 臍腹手足心手足內膝足跟

幼幼集成 卷之六

厥陰經所屬 頭頂小腹男婦陰器

十全大補湯○治痘癰破爛膿血去多速救元氣

官揀參 正川芎 當歸身 赤芍藥 懷熟地

白雲苓 炙黃耆 青化桂 香白芷 金銀花

淨連翹 炙甘草

生薑大棗為引水煎服仿照以前加入引經藥凡

見癰毒以上法治之不可因循恐成大患微則殘

形甚則殞命

玄參解毒湯○總治痘後餘毒十種火丹

潤玄參 當歸尾 懷生地 鮮紅花 淨連翹  
地骨皮 煖石膏 赤芍藥 北防風 淮木通  
荆芥穗

淡竹葉十片為引水煎熱服

磁鋒砭法

法見四卷丹毒門

防風敗毒散○治痘後身發癰疹出而過多者

北防風 赤芍藥 綠升麻 粉乾葛 生甘草

水煎燈心引熱服

幼幼集成

卷之六

大補湯○治痘屬而不乾犯之出血

官揀參 炙黃耆 當歸身 淨連翹 上薄桂

牛蒡子 正川芎 杭白芍 香白芷 炙甘草

大棗三枚為引水煎服

密蒙花散○治斑瘡入眼翳障瞳人

密蒙花 酒洗 穀精草 淨蟬蛻 去翅足洗脚

望月砂 一兩 炒

共為細末用膽猪肝一兩竹刀剖開每用末藥一

錢擦在肝內水煮肝熟飲汁食肝神效不可輕用

點洗之藥反成廢棄

涼肝明目散○治痘後雙目蓋明怕日

當歸身 草龍膽 北柴胡 正川芎 北防風

密蒙花 酒黃連

川膽猪肝煎湯煮藥服之

黃連解毒湯○治痘後患痢其熱甚者

酒黃連 酒黃芩 陳枳殼 當歸尾 酒大黃

生甘草

水煎滾熱服

幼幼集成

卷之六

和中湯○治痘後患痢膿血既清以此和之

官揀參 大當歸 陳枳殼 淮木通 炙甘草

薑棗引水煎溫服

調胃承氣湯○治痘後熱毒作痢腹痛裏急後重

陳枳殼 錦莊黃 尖檳榔 生甘草

生薑三大片為引水煎滾熱服

黃芩湯○治痘後痢以經下後以此調其陰陽

酒條芩 酒黃連 當歸身 大川芎 淮木通

南木香 赤芍藥 炙甘草



水煎服 久不止加綠升麻 腹痛加酒大黃

陳皮竹茹湯○治痘後嘔吐有聲有物

雅黃連用吳茱萸同炒 去萊萸用連 正廣皮 白雲苓君

竹茹一九為引水煎熱服

甘桔湯○治痘後餘毒不清咽喉塞痛

芽桔梗君 大甘草君 牛蒡子臣

燈心為引水煎服

知母解毒湯○治痘後餘邪作熱

淨知母 懷生地 煅石膏 地骨皮 酒黃芩

幼幼集戊 卷之六 四十三

牛蒡子 綠升麻 天花粉 生甘草

淡竹葉為引水煎熱服

黃芩調元湯○治痘後元氣怯弱虛熱身倦

官揀參 酒炒芩 大麥冬 當歸身 炙甘草

生薑大棗為引水煎服

桂枝解肌湯○治痘後熱已盡除忽因外感作熱

柳楊桂 赤芍藥 片黃芩 官揀參 粉乾葛

北柴胡 炙甘草

生薑大棗竹葉為引水煎服

補中益氣湯○治痘後久已無熱因傷食發熱

官揀參 炙甘草 漂白朮 廣陳皮 小枳實

杭青皮 南木香 六神麴 老麥芽 炙黃耆

生薑大棗為引水煎服

丁香脾積丸○治痘後傷食腹痛氣急

京三稜去毛醋浸 煨 蓬莪朮去皮如 上製 公丁香

南木香已上各 五錢 杭青皮去 穢 肥烏梅連核燒 存性

猪牙皂燒存性已 上各三錢 巴豆仁四十九粒煨 搗去油極淨

共為細末醋煮麩糊為丸如菜豆大每三九或五

幼幼集戊 卷之六 四十四

九七九量兒大小白湯送下

雄黃解毒丸○治痘後傷食腹滿而痛煩悶不寧

明雄黃一錢 另研 川鬱金二錢 巴豆霜一錢

共為末米糊丸菜豆大小茴香煎湯下三五丸

保和丸○治痘後一向能食今不思食聞食氣即嘔

官揀參焙切 漂白朮各三錢 白雲苓五錢 炙甘草

山楂肉 老麥芽 六神麴各一錢

共為細末米糊丸極小每服一二錢米飲下

補中益氣湯○治痘後脾虛寒熱似瘧非真瘧也

官揀參 漂白朮 北柴胡 綠升麻 廣陳皮  
上溥桂 當歸身 南木香 炙甘草 虛甚者  
加熟附子

生薑大棗為引，水煎服。

調元生脉散。治痘後手足冷脈沉細，虛極之徵。

官揀參 炙黃耆 炒白朮 全當歸 大麥冬

北五味 青化桂 虛冷甚者，加熟附片。

生薑大棗為引，水煎服。

導赤解毒湯。治痘後神昏妄語，餘熱未除也。

幼幼集成 卷之六

淮木通 懷生地 大麥冬 白茯苓 黑梔仁

上揀參 石菖蒲 炙甘草

燈心為引，水煎服。

安神丸。治證同前。

真吐黃五分 正雅連炒三錢 當歸身 黑梔仁各二分

錢五

共為細末，以猪心血和勻為丸，如菉豆大，硃砂為衣，每五七丸，燈心湯下。

清神散火湯。治痘後毒邪未盡，忽然作搐。

淮木通 潤玄參 大麥冬 正川連 大當歸  
官揀參 白茯苓 炙甘草

水煎去渣，以辰砂末調服。大便秘者，微加酒，大黃自利者，倍人參。

當歸桂枝湯。治痘後血少，手足拘攣，不能轉運。

官揀參 當歸身 正川芎 白芍藥 炙黃耆

漂蒼朮 川黃蘗 炙甘草 氣虛肢冷，加附片

感冒風寒，以致筋骨痛，加羌活防風，血氣大虛者，

加鹿茸虎脛，淮牛膝。

幼幼集成 卷之六

薑棗為引，水煎微加好酒一杯對服。

寧肺湯。治痘後邪火未退，侵擾肺臟，致令咳嗽。

淨知母 牛蒡子 北沙參 懷生地 地骨皮

大麥冬 煖石膏 生阿膠 信前胡 杭白芍

炙甘草

新桑葉七片，枇杷葉一片，引水煎入竹瀝對服。

加味五皮湯。治痘後面目浮四肢腫。

川羌活 五加皮 漂蒼朮 桑白皮 上溥桂

北防風 淮木通 漢防己 結猪苓 炙甘草

生薑皮

燈心為引水煎熱服

厚樸湯○治痘後腹脹如鼓眼胞腫由水濕飲食所致

漂蒼木 川厚樸 廣陳皮 結猪苓 大腹皮

茯苓皮 因於食者加 六神麴 山楂肉

京三稜 蓬莪朮 小枳實

生薑大棗為引水煎熱服

萊菔子丸○治痘後虛脹面唇白四肢冷者

萊菔子炒五錢 另研

洋胡椒厚樸煎湯浸過 晒乾用二錢

漂白木土炒 二錢

共為末蜜丸每一錢陳皮湯下

加減導赤散○治痘後餘熱鬱積膀胱小便赤澀

淮木通 車前子 瞿麥穗 白滑石 赤茯苓

黑梔仁 淡竹葉

燈心為引水煎熱服

潤腸丸○治痘後大便秘結血枯氣弱也

當歸尾 懷生地 火麻仁 光桃仁

萊菔子為引水煎熱服

建中湯○治痘後陽虛自汗醒眼而出者

柳楊桂 白芍藥 當歸身 炙黃耆 炙甘草

生薑大棗為引水煎熱服

當歸六黃湯○治痘後陰虛盜汗睡着而出者

當歸身 懷生地 懷熟地 炙黃耆 片黃芩

酒黃連 酒黃蘗

小麥一撮為引水煎熱服

涼血地黃湯○治痘後毒火流行傷陰動血

真雅連 當歸尾 懷生地 黑元參 炒梔仁

生甘草

鼻血加 絲茅根 新桑葉

吐血加 煅石膏 淨知母 乳童便 香附米

尿血加 淮木通 白滑石

便血加 北秦艽 槐角子 荆芥穗

不止加 蒲黃茸 生藕節 生栝葉

蓮蓬殼燒灰為引水煎服

黃連止嘔湯○治痘後吐衄此即仲景烏梅丸之變

黃連 烏梅 芍藥 枳實 桂枝 茯苓 甘草 乾薑 附子

制

官揀參 漂白木 川附片 川黃連 川黃蘗

肥鳥梅 真黎椒

淨水濃煎人參湯對服

洗心散○治痘後走馬牙疳并赤口瘡白口瘡

川黃連 當歸尾 懷生地 錦莊黃 淮木通

南薄荷 淨連翹 牛蒡子 生甘草

燈心十根為引水煎熱服

蠶蛇散○治痘後走馬牙疳以此吹之

蠶蛇紙燒灰

一錢 枯白礬二錢 人中白取久年者

五倍子二錢

共為末洗淨敗血以此藥搽之

陰陽散○治痘後赤口瘡

正川連二錢 黑炮薑一錢

共炒研細末用茶洗淨敗血以此藥敷之

硃礬散○治痘後白口瘡

鏡辰砂二錢 枯白礬一錢

共研為末茶洗口瘡以此敷之

參朮白朮散○治痘後飲食不為肌膚

官揀參二錢 漂白木三錢 白雲苓二錢 真廣皮二錢

懷山藥五錢 南木香一錢 六神麴一錢 杭青皮一錢

共為末米飲調服一錢陰日服此

當歸益榮丸○治證同前

當歸身 正川芎已上俱 正川連薑汁炒

真蘆薈二錢二分 使君肉一錢二分

共為末蜜丸米飲下陽日服此

○婦女痘疹證治歌凡十二首

痘疹集成

女人痘疹最難醫 陰層從來血易虧

待得疹瘡將發日 只愁天癸有常期

正理論云嬰兒女子益以滋甚以女人陰質血常不

足痘疹始終以氣血為主一或不足則變生焉故

女子十四歲已後有出痘疹者常恐天癸之行血

走氣虛每成伏陷

發熱經行非正時 火邪迫血血奔馳

急須涼血停為美 莫待中虛悔却遲

痘疹發熱經水妄行却非天癸之期此毒火內蘊

亂血海迫經妄行月事不以時下宜玄參地黃湯  
或因物合黃連解毒湯以涼血為主必欲其止如  
久不止中氣虛弱致生陷伏者有之

發熱時逢經水行 毒邪已解汚方消

過期不止須當慮 補氣溫經熱自平

發熱之時經水至其期此積汚得去毒亦輕解不  
須治之若過四五日尚不止以熱邪乘血室之虛

迫血妄行宜先服小柴胡加生地黃湯以清血室

之熱後用十全大補湯以補氣血之虛令其出旬

易壯易廢

適逢發熱經斯斷 血室空虛怕煩慮

若然謔妄神不消 熱入子宮醫莫緩

發熱時經水適斷宜早服柴胡四物湯以防血室空

虛毒邪乘虛而入致生他疾若已憎寒壯熱神識

不清妄誕見聞言語錯亂此為熱入血室宜四物

湯合導赤散與安神丸相間服之

女子居經日已除 豈堪痘疹證來加

却愁血海停汚垢 猶慮胞門隱毒邪

女子經閉謂之居經滿而不瀉病在心脾經曰二陽

之病發心脾女子不月痘疹之毒發於心又以脾

為主心脾先病血室不行衝任之間已多積垢一

日痘疹之火鬱於命門胞戶之中當出不出毒邪

留伏致生乖戾者有之故發熱之初即當滌除停

垢以桃仁承氣湯主之後以四物湯合勻氣散調

理之

崩漏多時血已枯 瀉而不滿有餘無

豈堪當此天行病 濟弱扶傾在吸呼

女子一向崩漏未止氣血已虛若當天行痘疹必不

能任其毒惟宜大補氣血為主十全大補湯痘出

灰白平陷難發難磨者更加鞅附一二錢

起發成漿忽動經 氣隨血散豈能停

食多胃足無他慮 不食須防陷伏形

痘既出現已後最宜表裏俱實飲食能多若當起發

胞漿之時天癸忽動人但知恐被穢氣觸犯正氣

不知自身之血不足為厭但血出而氣亦虛毒邪

乘虛陷入於裏惟元氣素壯能食者必無是變如

氣虛食少，遂人未有不成，陷伏者，宜早益火補湯  
主之，虛甚者加熟附鹿茸。

經行暴嘔，毒邪侵，血出津枯，失音。

養血通心，言語出，一朝聲價，值千金。

女子出痘，經水忽行，暴嘔不能言，蓋心重血，舌力心  
之苗，血去則心虛，心虛則少陰之脉不能上榮於  
舌，故卒失音不語，先以當歸養心湯，養其心血，利  
其心竅，自然能言，以十全大補調之。

起發經行證已垂，內虛伏陷，早安藥。

幼幼集

卷之六

五十二

藥靈中病終須吉，證逆違師事不諧。

月事大行，其瘡不起發，不光壯，不飽滿，不紅活，頂平  
陷，灰白色，或青乾黑陷，此裏虛之候，痘復陷入也。  
宜十全大補湯，與奪命散，相間服之，其痘壯紅  
綻，或痘空中再出一番，大吉之兆，若加腹脹喘滿，  
譫妄悶亂，寒顛咬牙，手足厥冷，必死也。

妊娠出痘，有真傳，惟有安胎法最先。

不可令胎輕觸動，胎元觸動，命歸泉。

孕婦出痘，始終以安胎為主，不可觸動其胎，其初發

熱以參蘇飲發之，痘出現後，多服安胎飲為佳，起  
發收靨遲，十全大補湯去肉桂。

痘正豐時，產正臨，幾人得法，有規箴。

滌除惡露，休輕易，補益元神，功效深。

孕婦出痘，正當盛時，忽臨正產，只以大補氣血為主，  
十全大補湯，若腹中微痛，此惡露未盡也，宜滌去  
之，生化湯。

產後如逢出痘瘡，此時胎去，免憂惶。

只憑補益收功效，莫犯寒涼生氣傷。

幼幼集成

卷之六

五十三

婦人產後出痘，只以大補氣血為主，十全大補湯，其  
白芍用好酒炒，我不可妄用寒涼，以傷生發之氣  
也。

○入方

玄參地黃湯

治婦女痘疹作熱，經水不依期而至，此妄動也。

懷生地 潤玄參 粉丹皮 綠升麻 黑梔仁

炒蒲黃 生甘草

燈心十莖，水煎熱服。

四物合黃連解毒湯○治證同前火盛毒重者用此

當歸身 懷生地 杭白芍 正川芎 正雅連

川黃檗 條黃芩 黑梔仁

淨水濃煎熱服

小柴胡加生地黃湯

治婦女痘初作熱正值經期若四五日不止宜清血熱

官棟參 輭柴胡 小條芩 法半夏 懷生地

炙甘草

幼幼集成

卷之六

五十五

生薑一片大棗一枚水煎熱服

十全大補湯

治婦女痘疹發熱經行之後當補之以免陷伏

官棟參 漂白朮 白雲苓 當歸身 正川芎

杭白芍 懷熟地 炙黃耆 青化桂 炙甘草

生薑一片大棗一枚水煎溫服

柴胡四物湯

治婦女經血方淨適逢痘疹作熱宜升提

官棟參 軟柴胡 小條芩 當歸身 正川芎

懷生地 杭白芍 地骨皮 杭麥冬 光知母

淡竹葉

生薑一片引水煎熱服

四物合導赤散

治婦女經後出痘熱入血室神識不清謬妄

全當歸 正川芎 杭白芍 懷生地 川木通

懷熟地 炙甘草

燈心十根水煎熱服

安神丸○治證同前與前方間服

幼幼集成

卷之六

五十六

真川連 全當歸 杭麥冬 白雲苓 炙甘草

已上各五錢

鏡辰砂一錢

梅花片二分

共為細末以臘猪心血搗和少加煉蜜杵千餘下

為丸芡實大每一丸燈心湯下

桃仁承氣湯

治婦女經閉日久正值痘臨宜疎去垢穢免留伏

大桃仁

二十個去皮尖研泥

川莊黃二錢酒潤

鮮紅花一錢

生甘草

五分

桂枝尾五分

先煎大黃桂枝紅花甘草湯成去滓入桃仁泥化

開空心服

四物合勻氣散○治疏通經水之後以此調其氣血

當歸身 川芎 京赤芍 懷生地 南木香

京檀肉 炙甘草

水煎不拘時服

十全大補湯○方見前

當歸養心湯○治婦女痘疹經行之後忽然暴啞

官揀參 大棟冬 綠升麻 全當歸 懷生地

炙甘草

幼幼集成

卷之六

五十四

燈心十二根為引水煎熱服

奪命丹○治痘方起發正值經期其血大下以致陷

伏以此與十全大補間服之

淨麻黃密酒炒黑 綠升麻各三錢 山豆根 鮮紅花

牛蒡子 淨連翹各二錢五分 淨蟬蛻 紫草茸

人中黃各三錢

共為細末酒蜜和丸芡實大每二九薄荷葉煎湯

化服

參蘓飲○治孕婦出痘發熱之初以此疏通腠理

官揀參 紫蘓葉 芽桔梗 粉乾葛 信前胡

廣陳皮 白雲苓 陳枳殼 南木香 炙甘草

生薑一片紅棗一枚水煎服

安胎飲○治孕婦痘已出現以此固其胎氣

揀人參 漂白朮 寶條苓 懷熟地 正川芎

全當歸 杭白芍 四砂仁 老蘓葉 廣陳皮

炙甘草

生薑三片紅棗三枚水煎溫服

生化湯

幼幼集成

卷之六

五十八

治孕婦出痘道逢正產產後腹痛惡露未盡

當歸身五錢 正川芎二錢 光桃仁十二錢 黑炮薑一錢

炙甘草一錢

淨水濃煎服

痘疹卷終



麻疹骨髓賦

麻雖胎毒多帶時行氣候寒溫非命男女傳染而成其發也與痘相似其變也比痘匪輕愚夫愚婦每視爲泛常若死若生總歸於天命不知毒起於胃熱流於心始終之變腎則無證臟腑之傷肺則尤甚閉戶問途何若出門尋徑揚湯止沸不如去火抽薪

初時發熱儼似傷寒目出淚而不止鼻流涕而不乾咳嗽太急煩躁難安以火照之隱隱皮膚之下以

幼幼集成

卷之六

五十九

手抹之亭亭肌肉之間其形若疥其色若丹隨出隨沒乍隱乍現根窠若塵兮麻而兼癩皮膚若毒兮麻以夾斑似錦而明兮十有九吉如煤而黑兮百無一痊

麻毒最重治法不同微汗常出熱勢越而不留清便自調毒氣行而無壅腠理拂鬱兮即當發散腸胃秘結兮急與疎通苟視大而若細恐變吉而爲凶故衄血不必憂邪從衄解利血不必止毒以利鬆所喜者身中清涼可畏者咽中腫痛飲水不休法

在生津養血飲食若減方須清胃和中

又如出之太遲發表爲貴出之過甚解毒堪宜母伐天和常視歲氣寒威凜凜毒勢鬱而不行火熱炎炎邪氣乘而作癘或施溫補勿助其邪若用寒涼休犯其胃制其過但取其平誅其暴必欲其正遠寒遠熱陰陽之勝負不齊責實責虛人稟之強弱或異

麻疹既出將息尤難坐臥欲暖飲食宜淡風寒若襲兮爲腫爲熱鹹酸不禁兮爲欬爲喘異氣縱感變

幼幼集成

卷之六

六十一

證宜泰便多膿血兮倉廩血熱欬多涎沫兮華蓋易寒口爛唇裂心火未退皮焦髮稿榮衛將枯苟不詳於臨證何以見其折肱

麻痘西江月 九二十首

麻痘俗呼麻子蓋因火毒熏蒸硫砂紅點徧身形發自胃經一定切忌黑斑死證最宜赤似朱櫻人都治法喜涼清不許辛甘犯禁  
麻疹因何欬嗽蓋由肺胃相連肺金被火苦熬煎以致欬嗽氣喘治法清金降火不宜誤用辛甜蒸籠

包子譬如然，只要氣鬆火過。

麻疹如何辨認，分明狀似傷寒，此多欬嗽有紅斑噴

嚏，眼中水現，或見腹疼陣陣，或時吐瀉相兼，疹麻

吐瀉不須嫌，正要毒除熱滅。

麻與痘瘡異治，二家不可同方，痘宜溫解，疹宜涼，又

要現形為上，若受風寒不出，其間凶吉難量，急宜

發散保安康，最怕神昏腹脹。

大凡麻痘未出，詳看天令如何，假如日暖又風和，敗

毒荆防堪可，若是時行疫厲，芩連消毒宜多，用心

幼幼集成

卷之六

六十一

調理收沉痾，坐井觀天莫學。

且論荆防敗毒，真為發散仙方，荆防生地要相當，酒

炒芩連二樣，桔梗人參甘草連翹牛蒡無雙，玄參

酒漿妙真良，竹葉升麻停當。

又有芩連消毒，散火解毒尤佳，芩連梔子及升麻桔

梗石膏多把，甘草人參知母連翹牛蒡紅花引尋

竹葉要多加，此個方兒無價。

發散仍前不出，令人真個憂疑，麻黃酒蜜炒如煤梔

槩芩連一例，更着大黃酒炒連翹芎子相宜，石膏

蟬蛻最為奇，不效命難再立。

如見出時紫黑，此般自古多凶，急求人尿路朝東，火

煨成灰取用，研碎酒調吞下，須臾黑變為紅，若還

依舊黑朦朧，縱有神丹何用。

麻已現形發熱，化斑湯用為先，石膏甘草及人參桔

梗連翹靈驗，若是毒多熱甚，芩連消毒真傳，大腸

秘結大黃漆務用，微通數遍。

麻疹類多咽痛，火邪熏燥無他，連翹甘桔要多加，牛

蒡射干同下，外用十宣妙散吹喉，休要吁嗟，假如

幼幼集成

卷之六

六十二

藥後有爭差，消毒芩連妙也。

麻疹再兼瀉痢，預先用藥調醫，瀉時減桂五苓宜加

上甘草滑石，如是痢兼赤白，香連九子相隨，大端

痢止便為奇，不效令人疑忌。

麻欬聲氣促，只消降火清金，赤苓梔子併黃芩，桔

梗石膏靈應，知母人參地骨，瓜蒌杏子玄參麥冬

牛蒡妙如神，竹葉將來作引。

麻後切防四證，因循多致悞人，遍身久熱欠清寧，欬

嗽連聲牽引，牙齒疳生走馬，麻下赤白難禁，各求

方法貴精純始是醫中絕品。

為甚身中壯熱只因餘毒連綿金花九子用芩連龍

膽梔仁地黃鬱金雄黃解毒燈心地骨湯煎若還

脾弱熱長延集聖胃芥任選。

欬嗽頻頻不止或因不忌酸鹹又加火毒肺家延尤

恐胸高氣喘體質兼行葶藶神虛清肺為先如斯

調理保安痊莫向風波美險。

葶藶丸除肺熱杏仁防已為奇牽牛葶藶棗相隨萊

服共研成劑清肺神丹降氣鹽湯煮焙陳皮芩連

幼幼集成

卷之六

六十三

甘草杏仁泥燕子同丸甚美。

口齒生瘡臭爛此名走馬克疳金花九子好求安外

用除疳妙散先取尿缸白垢火燒白色如鹽更將

五楸銅綠漆砒棗燒灰靈顯。

赤痢下時鮮血黃連栝葉槐花枳殼荆芥穗同加痢

止血除方罷白痢吳萸滑石檮榔根枳殼升麻烏梅

取肉作丸佳赤白香連可下。

四疾更防死證臨門休要殊差兒多體熱瘦如豚款

蚊面青聲啞走馬唇穿齒落痢多禁口吁嗟此證

即是死冤家任是神仙也怕。

○麻疹證治歌 凡二十五首 共二十九方

麻為胎毒發於心 胃腑相連熱毒侵

欬嗽鼻中清涕出 且觀雙目淚淋淋

痘麻皆胎毒所為毒者火也痘為少陽相火陽道常

饒故痘大而掀腫麻乃少陰君火陰道常乏故麻

小而碎密心火旺則肺受之故治麻當以肺為主

凡欬嗽者火炎於肺也鼻流清涕者以火鑠金而

液自流也目中淚出乃肺熱移於肝也凡手指眉

幼幼集成

卷之六

三十四

目鼻面者肺熱證也

凡遇冬溫最不祥 民多瘦癯發瘡瘍

若逢斑疹相傳候 可用湯丸預解良

春溫夏熱秋燥冬寒此四時之主氣也冬應寒而反

溫陽先暴泄火令早行人感其氣至於來春必生

瘡疹未出痘麻者必感而發雖曰胎毒未存不由

天行厲氣故一時傳染大小相似但見麻疹之出

宜服代天宣化丸 方見前痘疹總畧 以預解之可使毒微

不為已甚也。

麻出須明歲氣先，忽輕汗下致顛連。

察人虛實施方法，暗損天和壽不堅。

麻初發熱與傷寒相似，但麻疹則面頰赤，欬嗽噴嚏

鼻清涕流，目中淚出，呵欠喜睡，或吐瀉，或手拍眉

目鼻面，宜升麻葛根湯。方見前。痘疹發熱條不可

作傷寒妄用汗下也。汗之則增其熱，為衄血為欬

血，為口瘡咽痛，為目赤痛，為煩燥，為大小便不通

下之則虛其裏，為滑泄，為滯下。經曰：必先歲氣毋

伐天和，此之謂也。

幼幼集成

卷之六

六十五

麻喜清涼痘喜溫，須知麻痘不同門。

麻苗痘實無人解，寒熱宜分未可渾。

麻喜清涼，痘喜溫暖。此法人皆知之。然麻疹初發亦

宜和暖則易出，所以發苗之初，只要發出得盡，則

毒便解矣。若痘必苗而秀，秀而實，毒斯解也。然成

實之時，若太溫熱，則反潰爛不收，是痘後亦宜清

涼。故治痘麻，無過熱無過寒，溫涼得宜，陰陽和

是為得之。

麻毒從來不可出，出完毒解便無憂。

腹中脹痛邪猶伏，喘促昏迷命必休。

麻疹只怕不能得出，若出盡毒便解矣。凡麻疹發熱

之時，當審時令寒暄以藥發之。如時令大寒，以桂

枝葛根湯發之。大熱以升麻葛根湯合人參白虎

湯發之。不寒不熱，以荆防敗毒散發之。如兼痰癆

時行，以人參敗毒散發之。外以胡荽酒用苧麻蘸

酒遍身搽之。務令亟出。若發而不出，反加腹中脹

痛，氣上喘促，昏悶，請妄者死證也。

過期不出勢淹延，毒伏身中未得宜。

幼幼集成

卷之六

六十六

急用透肌休息丸，豈堪臟腑受熬煎。

發熱六七日已後，明是麻證，却不見出，此皮膚堅厚

腠理閉塞，又或為風寒釀之，曾有吐瀉乃伏也。急

用發表之劑，麻黃湯去杏仁，加蟬蛻升麻，外以胡

荽酒散麻刮之。如一向未更衣者，毒甚於裏，伏而

不出，涼膈散加牛蒡子，發而解之。再不出者，死證

也。更云：謂大便也。

肺為華蓋臟稱嬌，毒火炎蒸津液消。

喘嗽連聲痰唾少，急須清潤救枯焦。

麻疹初發熱時未見出現欬嗽百十聲不已上氣喘急面浮目胞腫時臥時起此火毒內蒸肺葉焦燥宜柑桔湯加石膏知母牛蒡主之

火熱熏蒸汗不停 毒邪併迫血遺經

汗多衛表邪從解 血去榮中毒少寧

麻疹發熱自汗或鼻血出不須止之亦發散之義故汗者毒從汗散則毒從解但不可太過如汗太多人參白虎湯合黃連解毒湯清之則太甚玄參地黃湯涼之

幼幼集成

卷之六

六十七

發熱乍然生吐瀉 由他類出不須怕

腸胃停滯自此消 胞胎之毒全消化

麻疹發熱吐瀉純是熱證不可作寒論乃火邪內迫毒在上焦則吐毒在下焦則瀉毒在中焦則吐瀉並作單瀉黃芩湯吐而兼瀉黃芩加半夏湯自利裏急後重黃連解毒湯合天水散

毒火熏蒸氣上騰 咽喉自此痛煩增

從來麻痘多斯證 解毒清咽效自能

麻痘咽痛本為常候乃火毒熏蒸而痛也勿與喉痺

同論妄用鍼刺蓋喉痺之證內作癰腫故宜以鍼決去惡血麻痘只是咽乾作痛宜柑桔湯或鼠粘子湯細細嚥之自愈

麻毒如焚飲水饒 炎邪未許一盃澆

咽喉急燥心家熱 津液類枯胃腕焦

麻疹渴喜飲水純是火邪肺焦胃乾心火內亢故也初發熱作渴乃麻葛根湯方見前加天花粉麥門冬湯甚人參白虎湯合黃連解毒湯方見前

一齊湧出莫驚惶 頃刻渾身朱錦莊

幼幼集成

卷之六

六十八

似痘出時還又沒 如麻紅處却成瘡

痘疹貴三四次出謂出勻麻疹貴一齊湧出謂出盡麻疹只要得出便輕減以火照之遍身如塗朱之狀此將出之兆出形細密與痘疹密者相似但麻疹粒粒成瘡非若癰之皮紅成片如蚊咬之迹也

痘瘡赤艷瘡來攻 麻見紅鮮毒得鬆

白色血虛猶可瘳 黑斑惡證莫相逢

痘麻之色不可同論大抵痘怕太紅皮嫩易破必生瘳癢麻喜通紅麻發於心紅者火之正色若麻色

淡白、心血不足、宜養血、化斑湯主之、色太紅、艷或微紫、或出太甚、並宜大青湯、黑者死證也、

麻之出沒合陰陽、出以溫和沒以涼、

連出不收、陽氣盛、遲遲間出是陰強、

麻疹出沒、常以六時為準、假如子後出、午時即收、午

後出、子時即收、乃陽生陰成、陰生陽成、造化自然

之數、凡此旋出旋收者、輕若一出連綿三四日不

收、乃陽毒太甚、大青湯解之、方見前、遠巡不出、乃

風寒外束、皮膚閉、宜荆防敗毒散、方見前

幼幼集成

卷之六

六十九

麻出渾身似火燒、毒邪壅甚急難消、

解肌只許皮膚暖、救裏還期便溺調、

麻疹欲出、則遍身發熱、或煩躁、或頭眩、或身拘急、及

既出、則身即清涼、諸病悉解、此一層麻疹隨收矣、

如麻既出、熱甚不減、此毒壅遏、宜大青湯、方見前

以解其表、小便濇、大連翹湯以解其裏、大便秘涼

膈散加牛蒡、方見前

麻瘡出盡得安和、毒未清時奈若何、

拂拂熱煩邪尙熾、頻頻嘔瀉毒猶多、

凡麻疹只要出得盡、則毒邪解散、正氣和平、如拂拂

發熱、煩悶不寧、如蛇在灰、如蚓在塵之狀、或嘔吐

或泄瀉、此毒邪壅遏、尚未出盡、煩熱黃連解毒湯

嘔瀉黃連橘皮湯二者並用、胡荽酒以苧麻蘸

酒蘸之、方法見前、待麻出盡、則煩熱自除、嘔瀉自

止矣、

麻毒流殃為伏邪、幾經惡候致嗟呀、

雖然痲癘由天降、也是因循人事差、

麻疹欲出未出之時、即當早為發散、以解其毒、痰無

幼幼集成

卷之六

七十

餘災若不預解、使之盡出、以致毒蓄於中、麻後必

為壯熱、日久枯瘵、或成瘡、或為痢疾、或致血喘

促、或作疔、惡而死、此雖一時痲厲之染、未有不由

人事之未盡、

麻後留連熱不除、蒸蒸烙手髮毛疏、

肉消骨立成疔瘻、幸有良工藥可茹、

麻疹收後、身有微熱、此虛熱也、不須施治、待氣血和

暢、自然清涼、若熱太甚、或日久不減、以柴胡麥冬

散清之、如髮枯毛豎、肉消骨立、漸漸羸瘦、柴胡四

物湯王之

發熱無休神漸昏 忽然瘵疔不驚魂

莫將瘵疔同調治 退熱涼心命可存

麻後熱不除忽作搐搦不可稱為驚風而用風藥宜

導赤散加入參麥冬煎湯送安神丸方見女人疔疹條

小便清者可治短少者不可治

麻毒流殃走馬疔 牙齦潰爛藥空含

穿喉漏頰聲音啞 早賦歸歎疾似驟

凡麻後牙齦黑爛肉腐血出息臭冲人曰走馬疔馬

幼幼集成

卷之六

七十一

鳴散王之若面頰浮腫環口青黑頰漏齒脫唇崩

鼻壞者死證也宜從四卷齒牙門參攷

麻後洩瀉各麻痢 晝夜無停真可異

勿輕劫瀉圖霸功 禁口毒深凶莫避

麻後洩痢日久不已曰休息痢不可妄用瀉劑以圖

霸功宜黃芩湯合六一散煎送香連丸若嘔吐不

能食謂之禁口更加腸滑不止或下鮮血或如烟

塵水者死證也

炎炎胃火金遭迫 欬嗽百聲痰阻隔

胸高肩息目虛浮 擺手搖頭泉下客

麻疹收後微欬此肺氣未平不須調治若欬轉甚喘

氣上逆發則連綿不已此肺中伏火宜人參清肺

散主之身熱門冬清肺湯主之若欬久不止面浮

目胞腫胸高而喘息則稔肩血自口鼻中出面色

或青或赤鼻燥昏悶搖頭擺手者死證也

麻收禁忌切須防 鹽醋鷄魚慎勿嘗

欲莫從心終是福 物多爽口定為殃

麻後通禁鷄魚炙博鹽醋之類須過七七之後方可

幼幼集成

卷之六

七十一

食之惟宜食淡不可縱口以遺後患也

麻收無恙將平復 飲食如常未縱欲

心胸絞痛忽傾亡 痲癘侵凌名中毒

曾見痘麻收後動止出入飲食如常忽然心胸絞痛

而死者還是元氣怯弱痲癘之毒乘之正不能勝

邪伏於中外若無病內已虧損故一中而死謂之

中惡

嬰穉初離胎殼中 遍身斑駁似珠紅

胎中熱毒於今現 莫作時行麻疹攻

凡小兒初生未滿月者遍身紅點俗呼奶麻子是也此胎中受熱故生下即發現於皮膚不可作時行麻毒論治妄用湯劑蓋臟腑嬌嫩不能勝湯丸也宜選源解毒湯與乳母食之

○入方

桂枝葛根湯○治嚴寒時令麻毒難出以此發之

柳楊桂 粉乾葛 赤芍藥 綠升麻 北防風

炙甘草

生薑三片淡豆豉一錢為引水煎服

幼幼集成

卷之六

七十三

升麻葛根合人參白虎湯

治炎天暑月毒為熱隔以此涼解之

綠升麻 粉乾葛 白芍藥 炙甘草 淨知母

煖石膏 上揀參

糯米一撮水煎服

荆防敗毒散○治天時不寒不熱以此平解之

上揀參 北柴胡 正川芎 芽桔梗 荆芥穗

白雲苓 陳枳殼 信前胡 川羌活 川獨活

北防風 炙甘草

薄荷五片為引水煎服

人參敗毒散

時逢疫癘流行適值麻疹以此涼解之

官揀參 川羌活 川獨活 信前胡 北柴胡

川芎朮 白雲苓 陳枳殼 芽桔梗 炙甘草

生薑三片水煎服

胡荽酒 俗名羌荽 ○治麻疹不出以此發之

胡荽四兩切碎先以好酒二盃壺內煎滾方入胡

荽在內蓋定勿煎勿令洩氣以淨麻藤酒遍身浸

幼幼集成

卷之六

七十四

之使麻易出真神法也

麻黃湯○治麻疹六七日應出不出或風寒閉寒

淨麻黃 煖石膏 淨蟬蛻 綠升麻 炙甘草

葱白三寸為引水煎服

涼膈散○治麻毒深重裏氣不通而應出不出

錦莊黃 白芷硝 淨連翹 黑梔仁 南薄荷

淡竹葉 甘草稍

水煎去渣加生蜜三匙和服

甘桔湯○治麻疹胃火炎肺金欬嗽同浮應出不出



生甘草 芽桔梗 煖石膏 淨知母 牛蒡子  
生薄荷葉五片為引水煎服

人參白虎合黃連解毒湯

治麻疹自汗太過恐防衛弱以此止之

官揀參 淨知母 煖石膏 生甘草 正雅連

川黃藥 片黃芩 黑梔仁

糯米一撮為引水煎熱服

玄參地黃湯○治麻疹動血太過恐防傷陰

潤玄參 懷生地 粉丹皮 黑梔仁 綠升麻

幼幼集成

卷之六

杭白芍 生蒲黃 生甘草

茅根七莖為引水煎熱服即經茅根也

黃芩湯○治麻疹發熱自利

枯黃芩 白芍藥 炙甘草

大紅棗一枚為引水煎熱服

黃芩加半夏湯○治麻疹發熱吐瀉

即前黃芩湯加半夏生薑

黃連解毒合天水散

治麻疹自利裏急後重欲作痢也

正雅連 川黃藥 枯黃芩 黑梔仁 飛滑石  
炙甘草

淨水濃煎空心滾熱服

甘桔湯○治麻疹咽啞痰痛飲食艱難

生甘草君 芽桔梗臣 牛蒡子使

燈心十莖為引水煎服

鼠粘子湯○治證同前稍重者用此

鼠粘子炒 綠升麻 鮮射干 生甘草

燈心為引水煎熱服

幼幼集成

卷之六

七十六

養血化斑湯○治麻疹色淡白心血不足

官揀參 當歸身 懷生地 鮮紅花 淨蟬蛻

生薑大棗引水煎服

大青湯○治麻疹色太紅或微紫或出太甚

鮮大青 潤玄參 懷生地 煖石膏 淨知母

川木通 地骨皮 荆芥穗 生甘草

淡竹葉十二片為引水煎熱服

大連翹湯○治麻疹既出熱盛不減小便短澀

淨連翹 北防風 瞿麥穗 荆芥尾 淮木通

車前子 當歸尾 北柴胡 淨蟬蛻 赤芍藥  
枯黃芩 白滑石 黑梔仁 紫草茸  
燈心十莖水煎熱服。

黃連解毒湯○治麻疹出後仍發熱煩燥麻出未盡也。

川雅連 川黃蘗 黑梔仁 枯黃芩  
淨水煎滾熱服。

柴胡橘皮湯

治麻疹熱邪未盡麻未出完而兼吐瀉。

幼幼集成

卷之六

七

官揀參 軟柴胡 廣陳皮 枯黃芩 法半夏

白雲苓

竹茹一團生薑一片為引水煎服。

柴胡麥冬散○治麻疹收後大熱不退毒未出盡也。

官揀參 軟柴胡 北沙參 大揀冬 潤玄參

草龍膽 炙甘草

燈心一團為引水煎熱服。

柴胡四物湯○治麻疹收後發熱不退毛焦肉削。

官揀參 北柴胡 枯黃芩 當歸身 正川芎

懷生地 杭白芍 地骨皮 杭揀冬 淨知母  
淡竹葉

桑葉三片為引水煎服。

導赤散○治麻疹後熱不除而作痛。

懷生地 淮木通 麥門冬 生甘草

淡竹葉七片為引水煎送安神丸方見女人痘疹

馬鳴散○治麻疹後牙齦潰爛臭氣衝人。

馬鳴散 即蠶蛇也火燒 人中白 即尿管垢括取

五楸子二錢 白明礬二錢將礬打成塊裝入五楸子內火煨以礬枯為度

幼幼集成

卷之六

七十八

共為極細末以米泔水洗日然後敷此。

黃芩湯合天水散

治麻疹後患痢日久不已仍宜清解。

枯黃芩 杭白芍 白滑石 粉甘草

大棗二枚為引水煎熟去滓送後香連丸。

香連丸○治證同前。

真雅連 一兩以吳茱萸五錢 南木香 五錢銖

廣陳皮 五錢 建蓮子 去心皮二錢五分

共為細末醋打神麴糊丸如菜豆大每服一錢。

人參清膈散○治麻後欬嗽日久連綿不已

官揀參 北柴胡 當歸身 杭白芍 淨知母

鮮桑葉 漂白朮 白雲苓 炙黃耆 地骨皮

枯黃芩 白滑石 煅石膏 生甘草

生薑一片為引水煎服

門冬清肺湯○治麻後欬喘不已身熱而煩

天門冬 麥門冬 淨知母 鮮桑葉 懷生地

枯黃芩 地骨皮 信前胡 北沙參 炙甘草

遼源解毒湯

幼幼集成

治乳子出胎後遍身奶麻

大當歸 懷生地 正川芎 杭白芍 北沙參

正川連 廣陳皮 上揀參 淮木通 淨連翹

生甘草

水煎乳母服之不可令兒服

勢州 池田曉明順節

男 恒成犬 校訂

幼幼集成卷之六終

跋

嶺南羅浮修士陳公天生

靈敏學窮樞要於河洛疇

範天人理數之際確有心

得其網羅百氏淹貫羣言

則自宋五子書及叅同契

要

以下皆能折衷而論定之

嘗因侍塵座進質易義剖

晰詳明發揮曉暢覺先聖

微旨後人疑團不無了然

心口之間就教日久乃悔

向之僅羨公為高曠玄妙

者、殆淺之乎、視公也、公於  
醫事、頗嘗究心、所經治全  
活無筭、迺以幼科驚風法  
門傳習、貽害、將以掃除而  
廓清之、著爲幼幼集成、凡  
六卷、計數十萬言、凡例十  
有二、論辨證治治案、及痘  
麻正變總賦雜歌、共百數  
十條、蓋自胎稟護持、迄於  
甫生稍長、諸凡病因治要、  
罔不備具於冊、可謂無義  
不周、無隱不到矣、又其言

明白顯易、雖山農野老、皆  
得習其讀而用之、將以消  
造化夭折之憾、全天地生  
物之心、是書之行、良非小  
補、而公之天根淨徹、學識  
周通、其所以取精而用弘

者、亦於此窺見一端云、昔  
乾隆十六年一陽月廬陵  
後學劉勳謹識於幼幼集  
成六卷之末





重刊痘疹論序

醫家素難如士人本經至矣備矣獨見  
不經見本草號稱古書亦無明著方錄  
漢末時始言痘疹以為得自征羌豈  
生人無此疾耶又迤北諸虜苟南近長城  
即出痘疹多死亡似又繫於地氣矣江南  
水土溫熱凡嬰兒必痘死生雖異無一得  
有長大始出者所生育子女多  
此年因運接死傷至為禁  
不致憾於醫藥之無工也嘗聞宋有聞人  
規者著書專論痘疹具有條理往在館  
多方尋訪而未獲表弟顧世安氏素  
業收蓄古書甚富每與論此而託焉歸  
之又明年汾州栢山劉先生蒞松之且  
以此書為惠展卷讀之殊快夙心乃為手  
訂數字因命黃甥標校勘山甥立抄方以

成一家之言嗚呼使窮鄉下邑家置而戶  
藏之稍識文義決不至謬誤其所保全者  
可勝道哉乃重翻朗刻庶便覽觀經云如  
保赤子蓋言保赤子之難尤難於保民之  
難也栢山以才御史出副郡車觀於斯舉  
可謂先其所難者松民坐享仁壽之福必  
矣世安授官太醫院為御醫供事

意欲廣先生之意因請為序以傳

是歲嘉靖甲辰上元日儼山陸深序

刊小兒痘疹論序

夫痘疹論者聞人氏規所著也規素業儒而久不得志以故銳意于岐黃之術而為是書其說雖出于張從道百二十篇然考變分論因症分治因治應方而於病之緩急輕重寒溫補瀉攻擊保養罔不具載確而當簡而備視從道尤詳焉往歲余偶得其抄本遇痘疹者試之輒效因訪之醫家冀得刊本而無見者尋余擢御史遊京師又博訪之醫與縉紳而亦無見者豈元季之亂而或失耶夫醫藥以濟其夭死是書良術使湮沒而不傳則痘疹之兒罔藉以生而聞人氏窮矣今歲余尹朝邑因思古人遺愛不可使斬而嬰孩之瘍不可不恤乃於簿委之暇畧為校正今匠人氏刊之縣齋庶布而傳之使家得一書而痘疹者

胥藉以生而聞人氏其延也但原本殘毀而字有脫誤幸有刊本者是正之

嘉靖壬寅仲秋六日前進士汾州劉尚義識

聞人氏痘疹論目錄

卷之一

小兒必患瘡痘者何第一

四臟各有證腎獨無證者何第二

名狀不同者何第三

瘡痘之熱與諸熱不同者何第四

諸熱失治皆能作瘡痘者何第五

潮熱者何第六

其勢輕重不同者何第七

有先發驚搐者何第八

有先作腹痛或腹中有塊者何第九

古人升麻湯治未發已發者何第十

戒失饑及冒風冷者何第十一

必令避穢惡雜氣者何第十二

防備入日方法者何第十三

春夏為順秋冬為逆者何第十四

始末日數有定論者何第十五

出不快者何第十六

出未勻者何第十七

出大盛者何第十八

卷之二

以藥發之微盛不同者何第十九

不可妄發及妄下者何第二十

非微汗則表不解者何第二十一

非微下則裏不解者何第二十二

大便如常者何第二十三

戒輕用利藥者何第二十四

有可下證者何第二十五

有發出有溫出有解毒者何第二十六

六

有令大便過者有當溫者有當下者

何第二十七



已利而瘡痘出則不可再利者何第

二十八

大熱當利小便小熱當解毒者何第

二十九

誤服熱藥則損日服冷藥則天傷者

何第三十

有正瘡痘有膚疹者何第三十一

傷寒熱毒發疱瘡相似者何第三十二

二

冬溫發斑溫毒發斑者何第三十三

當先知節候陰陽臟腑虛實者何第

三十四

身疼者何第三十五

身痒者何第三十六

瘡毒入大腸者何第三十七

攻咽疼者何第三十八

治入目方法者何第三十九

卷之三

面青為逆者何第四十

徧身發青紫紋者何第四十一

狀如蚊蚤所嚙而色黑者何第四十二

二

既出而腹脹者何第四十三

小便赤澁心腹脹滿者何第四十四

四

出遲而朝夕啼哭者何第四十五

煩躁或虛煩不得睡者何第四十六

或吐或瀉而不能食者何第四十七

便血或下黑糞睡不醒者何第四十八

八

當下當救裏不同者何第四十九

鬱毒不散者何第五十

斑爛者何第五十一

濃汁不乾者何第五十二

陷伏倒靨者何第五十三

黑陷而耳尻反熱者何第五十四

瘡黑有逆順者何第五十五

黑靨而發寒者何第五十六

既出而狂叫喘呼者何第五十七

熱盛則出愈難其證大便不通小便

如血或為癩瘡身上破裂者何第

五十八

不結痂疔者何第五十九

誤以巴豆丸藥下之則內虛而熱不

除者何第六十

百祥丸證第六十一

猪尾膏證第六十二

卷之四

已結痂疔欲不作癩痕或已成癩痕

欲消者何第六十三

瘡痂起而能食者何第六十四

病後解利當觀虛實者何第六十五

餘毒作嘔吐者何第六十六

病後忽徧身青黑色手足瘳瘳口噤

涎聲如鋸者何第六十七

病後非時發搐搦者何第六十八

作痘癰結核腫毒者何第六十九

病後目翳忌用點藥者何第七十

病後大小便不通或便膿血者何第

七十一

餘毒咳嗽脇疼者何第七十二

餘毒作煩渴者何第七十三

天氣暄熱即與疎利者何第七十四

疎利與轉下不同者何第七十五

用藥不可執一者何第七十六

用緩慢藥及致害人者何第七十七  
貴賤不同用藥亦異者何第七十八  
方宜不同用藥亦異者何第七十九  
乳下嬰兒與能食童子不同者何第  
八十  
董汲方指迷論錢氏朱氏所論不同  
者何第八十一

目錄終

聞人氏痘疹論卷一

小兒必患瘡痘者何第一



此由在胞中受穢濁故也凡小兒瘡痘或  
作於幼年或發於壯歲古人預療之術載  
在方策千金方云兒初生用綿裹指急拭  
去口中汚血不爾則啼聲一發噴下入腹  
致生諸疾又令飲以甘草湯吐出胃中之  
惡仍服生地黃汁一規殼許利下惡物至  
如今之人用黃連淡豉亦所以革惡穢也  
穢惡既革則可使瘡痘不作雖作亦稀少  
也

四臟皆有證腎獨無證者何第二

小兒在胞中食穢濁以養五臟生下則其  
毒當出故瘡痘發作之時悉見其證呵欠  
頻悶者肝也乍涼乍熱手足冷多睡者脾  
也時發驚悸者心也面赤痰嗽打嚏者肺

也。惟腎無候，但見平證耳。尻涼耳涼，腎之平證也。蓋尻耳俱屬於腎，其象配水，腎又居臟下，不受穢濁，所以無其證。若瘡黑陷而耳涼反熱者，乃變壞歸腎，其證為大逆。視瘡痘者不可不知。

名狀不同者何第三

四臟之瘡名狀不同。肝為水疱，以肝之液為淚，淚出如水，其色微青，而小肺為膿疱，以肺之液為涕，涕如膿，其色微白，而大心主血，其瘡為斑色，而小脾主裏血，其瘡為疹，色赤黃而淺，惟腎不受穢濁，不發見耳。此言其初發之狀不同如此也。及五七日之後，不問其初出自何臟，當悉成血疱，血疱成膿，膿之後結痂，痂則愈矣。或人疑之曰：肺之狀既為膿疱，而血疱之後又成膿疱者何耶？蓋膿疱之出於肺者，言其初

時淡淡如膿，其色白而非黃，俗稱白豆者是也。若血疱之後所結膿疱，則是其瘡已熟，譬果之成實，飽足充滿，包裹黃膿，其色黃而非白，當是之時，或有瘡破而膿出者，所言膿疱雖同，而所以為膿疱則不同，學者不可不辨。

瘡痘之熱與諸熱不同者何第四

似是而非，若同而異，此病之所以能惑人也。小兒瘡痘，其初不免乎發熱，然必須見四臟之證，呵欠頓悶，時作驚悸，乍涼乍熱，手足冷多睡，面赤痰嗽打嚏，惟腎不受穢濁，獨無證耳。若他病之熱，種種不同，如手足稍微冷，惡寒而無汗，面色青慘而不舒，左額有青紋者，傷寒之熱也；手足稍微溫，發熱有汗，面赤而光者，傷風之熱也；目胞腫而右額有青筋，發熱而頭額腹肚最甚

或兼嘔吐腹疼傷食之熱也面色青紅額正中  
有紋手掌心有汗時作驚惕手絡脉微動而發熱者此驚熱也身熱而倍能食唇紅頰赤大小便秘脇下汗者此風熱也又有潮熱者發渴有時壯熱者一向熱而不已如懵然不分一槩調治鮮不敗事呀臨病之際可不審哉

諸熱失治皆能作瘡痘者何第五

瘡有初異而後同者要當早為之所宜且瘡痘之毒蘊伏在裏非熱蒸則無自而出是以古書云熱蒸三日而斑生往往其間已見瘡痘之證今也不同傷寒傷風傷食之熱與夫驚熱風熱或潮熱壯熱之類久而不去內外感發則所蘊瘡痘之毒亦能乘間而出用藥者既先知熱之所以異又能慮熱之不解亦將為瘡痘之證斯可謂

之良工矣嘗觀傷寒有胃爛發斑溫毒發斑二者其初均發熱也方其熱作之初就謂其有發斑之證耶然則諸熱失治而能為瘡痘者斯言信矣

潮熱者何第六

谷空而響答形動而影隨舉此而得彼也瘡痘未有不因發熱而出者觀其熱之有時便可先知自何臟發出寅卯辰時潮熱者屬肝當出水疱巳午時潮熱者屬心當出斑瘡申酉戌時潮熱屬肺當為膿疱亥子丑時潮熱屬脾當屬疹子獨腎在腑下不受穢濁故無證耳

其勢輕重不同者何第七

小兒所受穢濁多寡不同加之乳哺飲食衣服居處護養之法多不得其平一旦瘡痘之出故有輕有重觀其形狀即可知之

若一發便出盡者必重也。瘡夾疹者半輕半重也。出稀者輕。裏外肥紅者輕。外黑裏赤微重也。外白裏者至重也。瘡端裏黑點如針孔者勢劇也。青乾紫陷昏睡汗出煩躁熱渴腹脹喘喘大小便不通者困也。善用藥者能使輕者易安重者不致大困。斯可謂之十全矣。

有先發驚搐者何第八

挾熱而吐利者不可誤投燥藥。蘊瘡痘證而先發搐者不可遽投驚藥。經云諸痛痒瘡皆出於心火。今瘡痘之出雖四臟各有證。要其心實爲之主。毒氣始作未形見之間忽發驚搐是毒氣自心經而出也。苟不以內外證辨明之不爲瘡痘防備之。使用銀粉腦麝青黛等藥則心寒而肌斂。毒氣內陷。往往瘡痘之初似驚風發搐者多每

因誤服寒藥而死者。氣絕之際或隱隱斑出已無及矣。蓋心竅一寒則毒氣閉伏。表裏不透。又况心主一身之血。心寒則血凝而不行。瘡子欲出不可得也。且瘡痘發驚必有他證相雜。又有小兒平居安樂。素無疾苦而忽爾作搐者。必是瘡痘。尤當審諦。但用發散毒氣如惺惺散升麻湯紅綿散兼快氣利小便等藥服之。雖未能即効。決不敗事。待其熱氣得洩。心神亦自安矣。或有風寒與內熱相搏而致此者。則各有其證。治之亦如前法。但加勻氣藥爲妙。張氏云瘡痘氣勻卽出快。蓋氣勻則榮衛無滯。有寒亦散。大抵治驚惟平肝利小便最爲第一。志於醫者試思之。

惺惺散

苦桔梗

細辛 去葉

人參

甘草 炙

白茯苓

白朮

括萎根

已上各壹兩五錢

右每貼二錢用水一盞加薄荷葉三片煎三分不拘時溫服若身熱而大便自利者不可服

升麻湯

升麻

乾葛

芍藥

甘草 各等分

右每貼二錢用水一盞煎五分不拘時服若覺煩熱溫服覺寒即熱服

紅綿散

天麻 炮壹分

荆芥 壹分

甘草 炙貳錢

麻黃 去節貳錢

全蝎

全者柒箇

右為末每服壹錢用水一盞薄荷參片酒四五滴煎四分帶熱服如瘡子未出再進一服若傷風服亦不妨此藥大抵解表之藥也

有先作腹疼或腹中有塊者何第九小兒臟腑先有伏熱而適外感風寒或內傷生冷以致陰陽相拒發作腹疼或腹中作塊攻 若手足稍冷尻陰俱冷而腹

中硬痛者是瘡疹證無疑矣更參以其他證候為詳審但與平和勻氣兼發散藥為妙苟不知此便投巴豆大黃輩殘賊胃氣使毒氣不能宣發立致危殆其間縱有能發見者往往中道而廢為倒靨為陷伏終歸不救嗚呼古人有言曰用藥如用兵可不慎哉

古人升麻湯云治已發未發者何第

十

道有經有權。兵有正有奇。病有常有變。病之常者。可必。病之變者。不可必。古人立升麻湯。治小兒瘡痘。為一定之論。豈固而不通哉。嘗思古人之意。升麻湯一方。蓋治瘡痘之常。不治瘡痘之變。常者何也。未有斑點之前。均發熱者。常也。已結痂疔之後。均有餘熱。拂鬱而肌表未清涼者。亦常也。是

天麻湯

十

以升麻湯方狀云。治瘡疹未發已發未發者。謂未見斑點之前。已發者。謂已作痂疔之後。此升麻湯所以為治瘡痘之常者也。若夫斑點既見。與夫痂疔未結。其候千變萬化。治法在隨證。洩會非定論。之可拘。猶如傷寒之變異不一也。當此之際。安可執藥以應無窮之變哉。且升麻湯所用之藥。不過涼肌解表而已。未見斑點之前。已

結痂疔之後。則可以涼肌。可以解表。古人處方之意如此。曷嘗令用之於瘡疹正作之時耶。今昧者不能究此。既見斑點。尚令兒服餌。致肌寒表弱。陷伏而危殆。吁。讀古人之書。而不能探古人之妙。不可以言醫矣。

升麻湯方見前第八條下

戒失饑及冒風冷者何第十一

天麻湯

十

不

食者人之天。風冷者害人之邪氣。凡人一日不食。則饑觸風冷。則病况。小兒當瘡痘之際。正欲賴穀氣以助其內。避風寒以護其外。苟穀氣虧少。風寒侵襲。則為患可勝言哉。乳下嬰兒。宜常令其母飲食充足。居處避風。能食童子。專令老成耐事人。時時管顧。雖然。事亦貴得其平。或者以失饑冒風寒為戒。遂致過飽極溫。非徒無益。而又



害之其識瘡痘之家宜備知之

必令避穢惡雜氣者何第十二

木得桂則枯雖黃遇胡粉則黑柑得脯則壞物之相畏有如此者瘡痘之畏穢惡雜氣其理亦如是也仲景云瘡痘欲出之間宜燒蒼木猪甲二物仍令人謹伺門戶勿使生人輒入亦忌勞力人狐臭人若行房觸犯最為大害婦人經水適來尤當迴避

本草

本草

床帳左右前後宜掛胡荽以酒噴之或常燒乳香尤妙蓋榮衛得香則運行甚速可使瘡痘易出苟防備一不如法則禍患踵至欲出者使之不出已出者斑爛成片甚者瘡黑陷伏加以爛臭痛如刀剗悶亂而死其中縱得安者亦令瘰癧經年黑色或久成疥癬不可不戒

防備入目方法者何第十三

痘瘡方出之時使不入目以臘脂塗眼四邊或傳以水調黃蘗末或以白芥子末水調塗足心仍抱兒投菉豆七粒於井中五七歲兒令時時觀井欲得陰冷之氣相感此皆養護之良法也又有忌食之法如釀厚滋味牛雞鵝鴨皆不可食往往食雞鵝鴨卵未有不為目害者雖去後數月猶未可食但令食和淡之物或入少鹽亦無害

本草

本草

如湫隘之家不可煮雞鵝鴨卵其氣相襲亦能損目不可不知

春夏為順秋冬為逆者何第十四

經云春夏陽氣在上人氣亦在上秋冬陽在下人氣亦在下今瘡痘之發自裏達表當春夏之時則氣血隨陽氣而上其行也疾秋冬之際陽氣既下則血氣亦陷下而行遲是以發於春夏者為順秋冬者為逆

然而論時令之逆順，又當觀兒之虛實，何以言之。凡兒之資稟厚者，堪耐寒暑，節候變遷，不以爲事。故雖瘡痘發於秋冬，初不爲害。若受氣怯弱者，則凡遇寒暑易節，便生疾疚。故雖瘡痘發於春夏，亦未爲順。是知古人分別逆順，雖以時言之，而知逆順之大者，又不專泥於此。錢氏方云：春膿疱，夏黑陷，秋斑疹，冬疹子，皆不順也。茲併及之。

始末日數有定論者何第十五

熱蒸三日，則紅斑生。紅斑生至足心爲齊。不拘多少，重者遍身，輕者數枚而已。紅斑生血疱，血疱起如豆，在肌皮之上，故以痘名焉。血疱結膿疱，膿疱結痂疔，方爲愈也。紅點見，慎不可用升麻湯。蓋升麻湯寒

胡荽酒，如證候平和者，勿妄服藥，惟愛護安養之。紅點出齊之後，作血疱，七日結膿窠，膿窠結疔，七日悉成痂疔。此皆大畧之言耳。病人虛實不等，不可一切拘以日數。且古人云：熱三日而生斑，今有熱七日或數日而方生者，亦有熱一二日而卽生者。自紅斑出齊之後，當盡成血疱。若血疱之中，又尚有紅斑點相雜，則亦不可拘定日

數待其皆作血疱爲齊。如紅斑出齊，生血疱，血疱七日結膿疱，膿疱七日結痂疔。此乃榮衛調和，內外無諸傷犯，方能如期。或正作之際，遇氣候乖變，遲速因而失序，又豈可必拘以日數哉。其有當結膿疱而不結者，是以毒氣彌盛而不斂。用猪尾膏以解之。猪尾膏是治毒氣大盛，血疱脹不結，膿窠膿已成，不結痂疔，熱極毒熾，恐復入

於心令兒昏悶而死故也非若外感風寒而倒厯內虛吐瀉而陷伏者之比今將猪尾膏証別立一篇在後見慎之至也不可審宜詳證用之

紫草飲治毒疹三四日既出將出未出

真紫草茸貳兩須仔細辨認勿用偽根假者細

制沃以百沸湯一大盞用紙密封

勿令紫草氣走泄量兒大小溫服

不瘡雖出亦輕若大便利者不可用

胡荽酒治毒疹已發未發噴之立出

胡荽參兩細切以酒貳大鍾煎沸

用紙密封不令氣出候冷去滓從

頂至頤頰微微塗之更噴背脊骨

腹及兩脚皆遍再用滿房壁門戶

遍灑之

猪尾膏

龍腦半字許研細旋滴猪心血為丸辰砂為衣紫草湯化下龍腦即薄荷

出不快者何第十六

有數證不同不可不辨自紅斑出齊之後

當漸有紅斑方出或內虛或因犯胃氣臟

腑自利虛弱不食遂陷而不出者宜用溫

寒之藥甚者雖疏黃薑附靈砂伏火丹砂

等亦可用大抵用藥治病或冷或熱所以

救一時之不及不可拘以常制或將成膿

疔之際一半尚是紅斑點者此毒氣發越

未透故也當此必不能乳食大便如常者

宜半溫裏半助養之劑其或內虛甚而生

寒大便利者宜理中薑附輩以溫之裏溫

則氣不消削氣不消削則不伏陷矣又有

內實之人皮厚肉密毒氣難於發越至服

大黃梔子乾葛厚膏之類而得平順者或

或

有適當炎月觸冒暑邪煩躁喘急大渴昏  
迷而發作不快用白虎石膏湯抱龍五苓  
之類而得安靜者此皆臨病識證隨時審  
諦不可執泥也

理中湯

人參

白朮

乾薑炮

白茯苓

甘草節炙

已上各等分

本草卷中

木

右用水一盞煎五分不拘時服如

惡寒加附子名附子理中湯

白虎湯

石膏四兩

人參五錢

甘草節五分

知母壹兩五錢

右為齏末每服抄參錢水一盞粳

米或十粒同煎至半盞去粗溫服

不拘時

抱龍丸

膽星貳兩

天竺黃五錢

辰砂另研水飛

雄黃各貳錢五分另研水飛

麝香五分

右為細末和勻煎甘草汁丸如芡

實大薄苛湯化下不拘時服兒兩

三歲者一九作三次服五六歲者

每服一九

本草卷中

木

五苓散

澤瀉去毛貳兩五錢

猪苓去皮壹兩五錢

白茯苓壹兩五錢

白朮壹兩五錢

官桂壹兩

右為末每服貳錢百沸湯調下

出末勻者何第十七

凡平居安樂則心神調暢氣體和平

且有病則陰陽偏盛衰不同瘡痘已出而

不遍勻者前人治法惟透肌解毒而已肌透毒解既無壅塞之患則自然出勻宜必勝散快毒丹紫草飲胡荽酒之類張氏云瘡疹氣勻即出快誠哉是言也

必勝散

牛蒡子不限多少炒熟杵碎每貼

貳錢加荆芥穗少許用水一盞煎

四分不拘時溫服如瘡疹已出更

八卷卷一 二 六

服尤妙

快毒丹

黑牽牛 畧炒

木香 各壹分

肉果 五錢 剉裹煨

青皮 各兩 半生半熟

右為細末滴水和丸如黍米大每

服七丸至十九量兒大小加減濃

煎紫草葱白湯乳前服

紫草飲 治瘡疹

紫草茸 須真

白芍藥

麻黃 去節

甘草 各等分

右每貼貳錢用水一盞煎四分不拘時溫服

胡荽酒方見前十五條下

出太盛者何第十八

出大盛而面黃大便色黑煩躁喘渴或腹脹者此為有瘀血在裏宜犀角地黃湯及

大瘡疹論 主 不

治病瘡疹中衄吐血毒氣彌盛者若大盛之際不能解利則其害尤速如抱龍丸至寶丹生犀磨汁紫雪之類皆可選而用之若大便不秘實小便不黃赤恐外熱而內寒又當別求治法

犀角地黃湯

生犀角 壹兩

升麻 一方不用

生地黃 壹兩

牡丹皮 壹兩

芍藥

右每貼參錢用水一盞煎五分不

拘時温服

抱龍丸方見前十六條下

至寶丹治痘瘡心熱卒中客忤不眠煩

躁搐搦狂語嘔吐等證

生犀角 為末

生玳瑁 為末

琥珀

辰砂 研細水飛

雄黃 研細水飛

龍腦 末分研

麝香 壹分研

牛黃 五錢研

金箔 五十片

銀箔 五十片

安息香 壹兩五錢好酒研過去

右為細末拌勻以安息膏和成爲

劑如乾加蜂蜜少許如梧桐子大

兩三歲兒每服九七八歲者更

加一二九人參湯化下

生犀汁

右用生犀角於麤底磁器中帶水

磨汁

紫雪

黃金 壹百兩

寒水石 叁斤

石膏 叁斤

犀角 叁兩

羚羊角 叁兩

玄參 壹斤

沉香

木香

丁香

甘草節 各八兩

升麻 六兩

右用水五斗煮金至三斗去金不

用入諸藥再煎至一斗瀝去滓投

好芒硝貳斤八兩微火煎以柳條

快攪勿停手候欲凝入盆中更下

研細辰砂參錢磨碎壹錢或分五

厘急攪勻候冷貯磁器中勿令見

風每用壹錢溫水化下小兒量其  
年歲三分至六七分如咽喉危急  
拾少許乾嚥下

痘疹論卷一

聞人氏痘疹論卷二

以藥發之稀盛不同者何第十九

是瘡疹證熱數日而不發見者進退皆難  
便欲大發之懼其本稀而成斑爛不發之  
又無以出其毒氣古人立論始以藥微發  
之微發不出則加藥加藥不出則又發之  
又發之後所出不多氣候和平無他證者  
即是瘡本稀不可更發也以此言之發不  
至太過守不至不及乃用藥之圓活也

不可妄發及妄下者何第二十

嘗觀傷寒邪在裏則不可妄發汗邪在表  
則不可妄下瘡痘之不可妄發妄下者尤  
甚於傷寒雖然治瘡疹之家有云非微汗  
則表不解非微下則裏不解者何也予應  
之曰此說微汗則在表熱方熾斑點未見  
之先微下則在病之始及病之末裏熱壅

實之際何嘗於瘡痘正發作之時而輒施汗下哉是故非通達有識之士不足以言醫蓋妄發之則成斑爛妄下之則成虛脫不可不審如治傷寒之法表和裏病下之則愈汗之則死表病裏和汗之則愈下之則死亦此理也

非微汗則表不解者何第二十一

瘡痘之源雖是蘊毒然必因天氣暄暖或感冒風寒及諸熱不解然後斑生方其發熱斑未見之時得微汗解散則雖為瘡痘其熱亦輕此所以言非微汗則表不解也蓋其證身熱頭疼鼻塞咽壅痰涕咳嗽面目赤色皮膚緊而脉數此皆熱極之故當此之際毒氣亦不輕若得微汗少解則可以折其方來之勢升麻湯等主之如斑點已出則慎不可用又有因服發散藥邪毒

之氣隨汗作白珠子或出小紅瘡應手而解者不可不知也

升麻湯方見前第八條下

非微下則裏不解者何第二十二

病有始有終有末三者不同不可一槩用藥且身熱脉數大便秘而腹脹此熱毒壅遏未見形狀者當微下之非微下則熱不減此是始者熱在裏斑未出之時也若斑點隱隱在肌膚中者是已發越在表瘡正發時則不可妄下也又有結膿窠痂死之際脉尚洪數能食而大小便秘此表已罷裏有熱毒宜微利之大抵臟腑有熱往往利大小便者以其主出而不納故也

大便如常者何第二十三

胃中主腐熟水穀大腸主傳送已化之物此平居察虛實冷熱之處蓋飲食進退則



知人穀氣之虛實大便滑澀則知人臟腑之冷熱今大便如常則是其中平和無過冷過熱之患不必溫補亦不可妄攻擊然則大便如常是亦瘡疹者之一順也

戒輕用利藥者何第二十四

病勢自有遲速用藥者當度其宜可速則速可緩則緩凡瘡痘非合下證但當以平和藥持之乳食調之避風寒以溫之如已

六氣卷三

四末

見三五日而尚未快出者可微發之微發不出則加藥加藥又不出無他證者即是瘡本稀不可更發也今人纔見發之不出往往便下使其人內虛欲出者因利而不出已出者為陷伏為倒靨變壞歸腎以脾土弱而腎水反勝故也錢氏論以百祥丸下膀胱毒則脾土再實瘡痘復出要之與其下膀胱毒於黑靨之後莫若保脾土於

未下之先則不下為愈亦有三證一疥癬二痘癰三日赤故前人論曰斑點未見蘊熱癰盛毒在臟腑宜預下之又牛黃丹證云瘡痘出定大便不通膿汁不乾者可以下之以此觀之當下是病之始未出之前及病之未已出定之後非正出之時可下也大抵用藥治病能隨證殮洩斯為良法至於或用下藥者實出於不得已如傷寒有承氣之戒皆慎之至也雖然有當下證而不即下又為失下之患所貴乎審變細察耳

六氣卷三

五末

百祥丸

用紅牙大戟不以多少陰乾漿水煑軟去骨日中曬乾復入元汁煑汁盡焙為末水丸如粟米大每服一二十九丸赤芝麻湯下

有可下證者何第二十五

瘡疹出得太盛當結膿疱痂疔而不結者此是毒氣內外貫注若不速解之毒內入攻心為害極大治法宜猪尾膏其有不結膿窠痂疔及能食而喘腹脹譫語不大便者當以承氣湯下之如熱甚而渴面赤悶亂大小便澀或大吐者合利其小便通關散主之或瘡疹已出定膿汁不乾而大便不通者宜牛黃丹或有瘡疹證而未見斑點胃熱潮作氣腫腹脹大小便秘驚悸煩渴脈沉滑而數者此是毒氣盛而不得泄亦當藥下之則內無滯塞榮衛升降其勢將自出皆合下證也

猪尾膏方見前十五條下

承氣湯方亦見前十五條下

手足心腹下有汗目睛黃赤喘急

者宜用之

厚朴 八兩

大黃 四兩

枳實 壹兩 麩炒

右為麩末每貼五錢用水半盞煎

貳分温服以利為度如不利加芒

硝壹字

通關散治斑瘡水痘心悶煩躁發熱及

便便赤瀉口舌生瘡此藥通心

天行瘡毒

七

經利小便

山梔 壹分

大黃 壹分

木通 叁分

甘草 叁分

車前子 叁分 炒

瞿麥 叁分

赤茯苓 叁分

人參 叁分

滑石 叁分

扁蓄 五錢 炒

右用水一盞燈心二十根煎半盞

温服

牛黃丹治瘡子出定大便不通瘡中勝

水不乾

牛黃

壹兩

大黃末

壹兩生用

粉霜

壹兩

真珠末

壹兩

右研勻煉蜜丸如黍米大每服十

粒人參湯下量兒大小加減

有發出有溫出有解毒者何第二十

六

本草卷之

八

病有輕重善治者能令重者輕輕者安和

仲景論治傷寒謂隨證發洩是也且身煩

躁脉促喘滿有瘡疹證而斑點不見其熱

未退者以麻黃湯等發之若斑點纔見即

止後藥此謂表發而出之也或稟受怯弱

胃虛冷大便自利而手足厥逆者炮乾薑

甘草湯益黃理中輩可選而用之此理使

之自出也或瘡疔正出有毒入大腸下利

黃赤膿血身熱而渴者以薤白湯三黃熟

艾湯解之此解其大毒而使之自出也於

斯三者或發或溫或解其毒其證不同再

審而用之也

麻黃湯治瘡疹煩喘甚者主之

麻黃

去節

杏仁

去皮尖

甘草

炙

桑白皮

蜜炙各壹錢

右剉為散用水七分煎四分溫服

本草卷之

九

若脉數有熱未退者入竹瀝少許

咽喉痛或嗽者煎熟入麝香少許

服之

乾薑甘草湯治瘡疹服冷藥太過咳嗽

手足冷脉遲者自利嘔吐

不食

乾薑

炮

甘草

炙各四錢

右剉為散水一升二合煎至四合

去滓温服

益黃湯 治痞疹因煩燥渴水飲冷過多

暴傷脾胃或吐或瀉宜服之

丁香

訶子

青皮 去穢

陳皮 去白

木香 各等分

右為細末每貼壹錢用水半盞煎

參分去查温服

六方卷十一

十一

理中湯 方見前十六條下

薤白湯 治痞疹下利黃赤膿血及身熱

薤白 切半盞

豆豉 壹盞

山梔子 十枚

右用水五盞同煎薤白爛為度去

滓量大小服之解去惡積也

三黃熟艾湯 治痞疹止出似收未收下

利黃臭膿血身熱大渴宜

解其毒

黃芩

黃柏

黃連

熟艾 各等分

右用水一盞煎五分温服加糯米

壹撮甘草壹分紫草參分

有令大便過者有當温者有當下者

何第二十七

痞疹傷寒傷食等病身有熱者如大便六

六方卷十一

十一

七日不通須令潤過非取其峻快也然亦

當以外證參之如仲景論陽結陰結期十

四十七日方劇若其人不腹滿不裏急後

重則亦不必攻之今言六七日令潤過者

得氣道升降則無壅遏之患緣小兒脆弱

身熱而大便不通者則易實大便自利者

則易虛惟令得所最為要法其有忽然瀉

瀉者須與理中湯丸輩以温之又有出正

盛喘促腹滿小便赤手掌心并腋下有汗或譫言妄語而大便不通者當投小承氣之類以下之下後瘡子紅活諸證悉退者更不須再服也

理中湯方見前十六條下

小承氣湯痘瘡昏其譫語妄言大便不

通手心腋下汗目睛黃赤

喘急者宜用之

八厘天冬二 三一 天

厚朴 五錢

大黃 壹兩

松實 六錢

右剉散用水一鍾煎五分量兒大

小溫服以利為度如不利下芒硝

一字

已利而瘡痘出則不可再利者何第

二十八

飲食滋味雖能益人食之太過亦能害人

况烈毒慄悍之藥在已下之後其可再用乎且當其未出因熱勢大盛曾利臟腑今瘡痘既出則內無壅滯明矣縱其熱尚熾但當解毒切不可更用利藥蓋實實虛虛古人之深戒雖然若使果令再利亦當更用但小其劑可也

大熱當利小便小熱當解毒者何第

二十九

八厘天冬三

三一 天

大熱謂身熱脉實大小便秘津液燥而渴氣滿於胸中能食而不結膿疱痂疔當此之際懼其變生他疾故利小便使心火有所導引則雖不用冷藥熱亦自減去矣瘡痘不至熱過不為冷誤甚為良法小熱解毒之說謂小熱不解大熱必生利其小便則慮損氣故但可解毒而已利小便之藥導赤散為上解毒之劑如玳瑁湯獨聖散

如聖紫草散犀角飲皆可選而用之嘗謂  
古人治病其謹審如此彼不顧邪氣淺深  
而輒妄下者得無愧乎

導赤散治瘡疹心經蘊熱睡臥不寧煩

燥而小便不利面赤多渴小兒

貪食乳者渴也

人參

木通

麥門冬 去心

生地黃

本草卷三

前

天

甘草

炙 各等分

右為麤末每服抄貳錢水一小盞

煎半盞去渣不拘時溫服

玳瑁湯瘡疹未發者令內消已發者解

利毒氣令不太盛

生犀

生玳瑁

各以冷水磨濃汁二合

右同攪令勻每服半合微溫服一

日四五服為佳又治出而未快者

又云毒氣內攻紫黑色出不快用

玳瑁水磨濃汁壹合入豬猪心血

一卓子大以紫草濃煎湯作一服

服之取瑁犀角性微寒治熱毒又

皆治瘟疫蠱瘴解百毒通血脉消

癰腫故用之以解蘊毒

獨聖散治瘡疹早微熱晚大熱日黃脇

動身熱手冷發甚如驚 即牛蒡 僵蠶散

本草卷三

主

天

牛蒡子 半兩

白僵蠶 壹分

右為麤末每服一大錢水六分紫

草二寸同煎至四分連進三服

其痘便出此藥用牛蒡子出癰透

肌白僵蠶治遍身癰疥疼痛成瘡

為水酒調服之立瘥又以紫草煎

之令利竅是瘡疹證無虛寒證者

服之立出也

如聖湯治瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗 炒壹兩 甘草 炙壹兩

牛蒡子 壹兩 麥門冬 去心半兩

右為細末每服貳錢沸湯點細細

呷服入竹葉煎尤妙

紫草散發斑疹消毒

鈞藤鉤子 紫草茸 各等分

右為末每服一字或五分溫酒調

下不拘時服

犀角飲解熱毒去風疹

犀角 五錢 甘草 炙五錢

防風 貳兩 黃芩 壹兩

右為麤末每服五錢用水一小盞

煎至半盞去渣溫服不拘時候

又獨聖散治瘡疹陷入不發黑色而氣

欲絕服此漸蘇紅潤

穿山甲 湯洗淨炙

右為末每服五分入麝香少許煎

木香湯調下或紫草湯入酒少許

調服

又紫草如聖散瘡疹初出急服方喫乳

嬰兒與乳母兼服之四

五歲已外只令兒服

紫草 貳兩 陳皮 去白壹兩

右為細末每服壹錢水一小盞入

葱白三寸煎至五分去粗溫服量

見大小與服妙選方云瘡疹氣勻

即出快紫草滑竅去心腹邪氣陳

橘皮快氣葱白發散而開泄腠理

也

誤服熱藥則損目冷藥則天傷者何

第三十

五臟平和能相資養一有太過不及則病  
從而生况人身難任非常之熱亦不堪非  
常之冷今瘡疹者是表裏俱熱而發出或  
助之以熱藥則其勢太過輕為咽喉癰瘍  
之疾甚則熱感生風風熱之毒炎上不已  
無不害目矣或抑之以冷藥則脾土無溫  
煖之氣腎水反勝為黑靨為陷伏遂致天  
傷不可不戒

有正瘡痘有膚疹者何第三十一

臟腑不同表裏有異膚疹瘡痘分別淺深  
六腑屬陽有熱則易出是以作膚疹一出  
即遍滿肌皮之上如癩瘡細孢子見而便  
沒其所受氣淺故也五臟屬陰有熱則難  
出其為瘡痘在肌內血脉之間必先發紅  
斑而後如豆故名瘡痘其所受氣深故也  
大抵暴熱而便出者必膚疹久熱而難出

者必是正瘡痘瘡疹非正瘡痘也

傷寒熱毒發痘瘡相似者何第三十

二

傷寒熱邪在表裏未能作汗或當汗不汗  
熱鬱於肌膚故發痘瘡色白或赤如火丹  
頭作漿白膿者輕根下紫色隱隱在肌  
內者重甚者五內七竅皆有之其形亦如  
豆小兒肌肉嫩薄尤多此證亦非正瘡痘

也

冬溫發斑溫毒發斑者何第三十三

活人書云冬月溫煖觸冒寒氣至春始發  
病初在表或已汗或未汗表證未罷毒氣  
未散故發斑黑膏主之又冬月溫煖人感  
乖戾之氣冬末即病至春或被積寒所折  
毒氣不得洩至天氣暄熱溫毒始發則肌  
肉斑爛癰疹如錦紋欬而心悶但嘔清汁



葛根橘皮湯主之小兒常多此病醫人不識妄亂調治寧不敗事此亦非正瘡痘也

黑膏

生地黄 四兩

淡豆豉 八兩

右二味以猪脂油壹斤合煎至濃汁入雄黃五分麝香壹分攪勻丸如彈子大白湯化下未効再服

葛根橘皮湯治瘡痘始發肌肉斑爛

癩疹如錦紋而咳心悶

但嘔吐清汁服此

葛根

橘皮 去白

杏仁 去皮尖

知母

黃芩

麻黃 去節

甘草 各等分

右件剉散每服抄參錢用水一盞同煎半盞去粗溫服不拘時候

當先知節候陰陽臟腑虛實者何第  
三十四

稟氣實者夏酷暑而不甚畏熱冬嚴寒而不甚畏冷稟氣怯者易寒易熱天寒陰雨則感寒濕而濡瀉天氣稍炎則伏熱而中暍是故先知節候者能辨陰陽寒暑之盛衰經云陽盛人耐冬不耐夏陰盛人耐夏不耐冬此亦知人稟受之不同且自立夏氣變純陽萬物盛大治藥者用熱遠熱如桂枝麻黃大青龍之輩必加知母升麻石膏等藥服之立冬氣合純陰治藥者用寒遠寒如用諸涼劑服湯中病即止不必盡劑治瘡疹之法亦當知此又如冬溫煖則虛者安而實者病夏寒涼則實者安而虛者病冬溫煖則夏寒涼非節之氣來暴而去速在人將攝之如何耳錢氏論瘡痘之

發以春夏為順秋冬為逆亦是以陰陽盛衰言之也

身疼者何第三十五

經云痒為虛痛為實內快外痛為外實內虛外快內痛為內實外虛又曰諸寒為痛今瘡痘若身痛者是發作之時皮膚厚肉理密或為外寒相搏故也投以勻氣去寒解肌透毒之劑為妙不必外此而他求也

身痒者何第三十六

此有二證一則氣血不足其痒為虛活血散或四君子湯加黃耆枳殼主之一則不能食淡以致發痒蟬蛻一物湯主之瘡痘作痒深為可慮能調和愛護勿令有此乃為上策

活血散

白芍藥不拘多少炒為細末

右用溫酒調下凡瘡疹不出或出而遲或倒靨者並宜服之

四君子湯加黃耆枳殼

人參 白朮炒

白茯苓 甘草炙

黃芪加 枳殼加

右用水一盞生薑三片煎四分溫服

蟬蛻一物湯

用蟬蛻二十一箇洗去泥為末水一盞慢火煎至半盞去滓量兒大小溫服之如覺瘡疹已出便依前服三五次不是瘡疹亦無害小兒瘡疹欲發出加甘草壹錢五分煎一盞旋旋與服以効小兒伏所蘊積熱毒蟬蛻味鹹寒可以制況有

暴感風作熱客於表者蟬蛻亦治  
風毒充於皮膚癢痒不止驚癇夜  
啼癩疾寒熱驚悸皆宜服之

瘡毒入大腸者何第三十七

常發作之時其人或臟氣自脫或因服寒  
藥致令瘡毒陷入大腸瀉下如豆汁或  
便膿血或便黑汁殮赤如錢口內臭氣唇  
焦目閉加腹脹者必死之證當急用實脾

煖胃之劑救之得大秘固瘡痘紅活亦死

中求生也

攻咽疼者何第三十八

心胃有熱上攻於咽乾澀而疼如兼口舌  
生瘡齒浮齦腫者宜甘露飲水漿不入者  
紫雪最妙如聖湯抱龍丸消毒飲皆可選  
而用之已上證候須能令臟腑亦熱方可  
用如上焦雖熱却覺小便清大便溏薄飲

食不進者當以清上溫下藥調下

甘露飲解胃熱及小兒瘡疹已發後餘

毒後餘熱溫壯齒斷宜腫牙疼

不能嚼物餓而不欲食煩熱面

黃及病後瘡癩乳母俱可服

甘草 山茵陳

石斛 枳殼 炒

黃芩 枇杷葉

生地黃 麥門冬 去心 各等分

右為麤末每服抄貳錢水壹盞同

煎至八分食後溫服牙齒動搖牙

斷腫熱含嗽并服

紫雪方見前十八條下

如聖湯方見前二十九條下

抱龍丸方見前十八條下

消毒飲治瘡疹已出未能勻透毒氣蒸

渴出不快壯熱狂躁咽膈壅塞

睡臥不安大便秘澁及治大人

小兒上膈壅熱咽喉腫痛胸膈

不利治造與鼠粘子同但加

防風為鼠粘子湯

牛蒡子一名惡實 甘草炙貳兩

荆芥在兩

右為麤末每服壹錢水七分煎四

分去滓食後臨臥服之此藥治大

便秘澁是治裏熱故也况本草云

惡實味辛平其中治證治風腫治

暴食熱肉生風解丹石毒治咽喉

四肢風腫此性稍涼也為瘡疹所

宜服者能透肌出癰瘡是以瘡疹

亦出也大便利則不可服

治入目方法者何第三十九

治入目方法者何第三十九

心熱盛則生肝風肝主目熱毒薰之故為

目患治以涼肝丸洗以秦皮散或因食毒

物睛突出者宜僊靈脾散暴赤腫毒者宜

導赤散患半年一年餘者宜蟬蛻散成翳

者宜瓜蒌散葳靈仙散目睛疼痛者宜浮

萍散者宜大黃散貼之赤脉

侵睛者宜羚羊角丸昏暗者宜金花散已

上各隨證見之

涼肝丸治肝經熱盛急驚潮搐此藥去

其痰熱驚風自散慢驚不可服

龍膽草叁錢

當歸五錢 大黃煨五錢

羌活五錢 川芎五錢

山梔仁五錢 防風五錢

右為末煉蜜為丸如黃豆大每用

一丸砂糖竹葉湯化下

一丸砂糖竹葉湯化下

羊肝丸附 治痘瘡入目

羯羊肝 壹具生用 黃連 去鬚沙為末

右先將羊肝去筋膜於石器內搗

爛入黃連末杵為丸如桐子大每

食後量服二三十丸清茶下

秦皮散治大人小兒風毒赤眼痛痒澀

眵淚昏暗羞明

秦皮 滑石

黃連 各等分

右每用半錢湯泡乘熱洗

僊靈脾散治痘疹入眼

僊靈脾 葳靈仙 各等分

右為末每服半錢米湯調食後下

導赤散方見前二十九條下

蟬蛻散治痘瘡入目半年已過者一月

取効

蟬蛻 去土取末

猪懸蹄甲 貳兩瓦罐內鹽泥

右二味研細入羚羊角末壹分每

服一字乳後溫水調下百日外兒

每服半錢二三歲已上一二錢日

三服夜二服如患一年難治

瓜蒌散治心生熱熱則生風風屬肝二

臟相博風火相爭故發搐眼不

仁當瀉心肝宜用之

瓜蒌根末 貳錢 白甘遂末 壹錢

右同於慢火炒焦黃研勻服一字

煎麝香薄荷湯調下不拘時

葳靈仙散即仙靈脾散

浮萍散治痘疹入眼痛楚不可忍

右浮萍草陰乾為末每服一二錢

用羊肝半片入盃內以竹杖刺碎

投水半盞絞汁調藥食後服之已  
傷者十服九効

大黃散

用大黃末水調貼

羚羊角九治小兒腎虛宜肝腎明目

羚羊角 取末五錢 虎脛骨 醋炙黃五錢

生地黃 焙不見鐵 酸棗仁 去皮五錢

肉桂 去皮不見火 防風 五分

當歸 五分 黃芪 五分

右為末煉蜜丸如阜子大每服一  
丸食前溫水化下日進三服

又羚羊角散治肝臟實熱眼目昏暗時

多熱淚

羚羊角 鎊五錢 羌活 去蘆五錢

玄參 五錢 車前子 五錢

黃芩 五錢 山梔仁 五錢

瓜蒌 五錢

菊花 叁分

胡黃連 叁分

細辛 去苗壹分

右為細末每服貳錢食後竹葉煎

湯調服

羚羊角飲子治黑翳如珠外障

羚羊角 壹兩 五味子 壹兩

細辛 壹兩 大黃 壹兩

知母 壹兩 芒硝 壹兩

防風 貳兩

右剉每服五錢水一盞煎五分去

滓食後溫服此方宜斟酌用

又蟬殼散治眼目風腫及生翳膜等疾

蟬殼 壹兩 地骨地 壹兩

黃連 壹兩 牡丹皮 去心壹兩

白朮 壹兩 蒼朮 米泔浸切焙

菊花 壹兩 龍膽草 五錢

甜瓜子 半升

右為細末每服壹錢五分荆芥煎湯調下食後臨臥各一服治時疾後餘毒上攻眼目甚効忌熱麪炒豆醋醬等物

金花散 開

聞人氏痘疹論卷二

聞人氏痘疹論卷三

面青為逆者何第四十

瘡痘以心血為主身熱煩燥驚悸面赤皆心經形見也所以面赤者為順者今反見青色是色不與病相應安得不謂之逆當更察他病隄防之實必生風虛必下利厥逆各宜思所以預制之庶幾治未病之意也

遍身發青紫紋者何第四十一

此由外感風寒與內熱相距故也瘡痘之出蓋熱邪內外蒸發其有當熱作之時忽遇天氣大寒熱氣方運出而暴寒折之外寒為內熱拒而不得入內熱為外寒閉而不能出毒氣壅於肌皮之間如癰疹如疔點或青或紫俚俗云鬼捻青者是也往往壯年出者皮膚厚肉理密尤多此證宜用

透肌散牛蒡僵蠶散紫背荷葉僵蠶散凡  
是却寒溫肌透表之劑皆可選而用之也  
透肌散即化毒湯治瘡疹出不快

紫草茸

升麻

甘草 炙各五錢

右件如麻豆大小水貳盞糯米五十  
粒煎至一盞去滓放溫分作數服  
劉氏傳云麩豆瘡欲出渾身壯熱

不思飲食若服此一服即內消已  
有一兩顆出即解其半若令出即  
當日頭焦只三服瘡

牛蒡僵蠶散即獨聖散見前二十九條

紫背荷葉僵蠶散即前全效治瘡疹已

出而復顯其勢甚危  
諸藥不効者萬無一

尖出奇効良方

紫背荷葉

霜後塔水  
紫背者

白僵蠶直者炒  
去絲

右為細末各壹錢七小兒半錢研

胡荽汁和酒下米飲亦得本家在

處貼印施人其全活者甚衆蓋藥

有用龍腦人牙齒者卒難得之唯

此藥無毒而効速荷葉卒難得可

於鹽鋪內尋之

狀如蚊蚤所齧而色黑者何第四十

二

此榮血不能流行內外毒氣壅遏欲散而  
未散故也瘡痘屬血熱血活則其色如丹  
砂如雞冠若毒凝血聚則遂成黑色有是  
證者甚為危困其人必大小便秘喘急煩  
躁宜用山梔子湯宣毒膏治黑瘡子無比  
散莊氏云斑瘡倒靨而黑色者謂之鬼瘡



子宜獷猪尾血調腦子最佳猪尾血調腦子證其人自利不食者難用不可不審

山梔子湯治痘疹及斑毒狀如蚊蚤所

嚙毒感黑色者

山梔子仁 壹兩 白藜皮 壹兩

赤芍藥 壹兩 升麻 壹兩

寒水石 五錢 甘草 五錢

右為細末每服壹錢水八分入紫

草薄荷各少許同煎至五分去滓

放温服

宜毒膏治毒氣感毒疹已出不快倒靨

急服此藥曾經大効

積猪血 先將六日取後尾血

好硃砂 細研壹兩 揀乳香 細研壹兩

甘草 炙為末五錢 馬牙硝 五錢

片腦 麝香

右件一處同猪血拌勻用一寬新

竹筒底節一箇盡入諸藥在筒內

用密紙數重繫定於大糞坑屋梁

上至清明日取出曝乾更入腦麝

各壹錢細研勻滴水丸如皂角子

大煎人參湯化下一丸若毒感瘡

黑勝服之者瘡疹紅活再長神驗

無比散治瘡子惡候不快及黑瘡子應

一切惡候

辰砂 壹兩 研細水 牛黃

片腦 麝香

膩粉 各壹分 研

右為末一歲兒服一字大兒服壹

錢以獷猪尾血三五點白湯調下

安睡取下爛魚腸或如葡萄穗之

狀涎臭惡物乃効用乳汁調下亦

好此藥專治瘡痘熱毒太盛經痧  
榮衛不行外不得泄而內不得通  
毒氣在裏外則瘡疹黑色裏則腹  
脹喘急譫語大小便不通昏困者  
宜服之此其有毒則用其藥無不  
効者或瘡黑靨裏無腹脹無喘  
急無譫語無大小便不通無昏困  
大便反如常或反利者則無比散  
不可用也

既出而腹脹者何第四十二  
腹脹有二證一則陰陽不和一則毒氣陷  
伏入裏瘡痘正作熱毒既盛則必生煩渴  
或飲冷過多或誤投涼劑熱為冷所激欲  
出而不能冷熱相拒毒不發越故令腹脹  
甚者氣喘發厥瘡白而無血色多致不救  
急當以溫中藥疎逐冷氣冷氣散則腹脹

自消昧者莫不又用藥宜瀉致令重困且  
傷於冷者必不能食大小便利腹中虛鳴  
此傷於陰陽氣不和也若毒氣陷伏入裏  
者但用溫平解毒快氣之劑如人齒散活  
血散之類大抵毒氣陷伏者必又有他證  
相雜或煩躁大渴或大小便秘或啼哭不  
止萬一腹脹而目閉口中如爛肉臭者其  
證為大惡

人齒散治瘡疹已出而不快既出而倒

靨患瘡疹作寒熱而脉反遲者  
或攻皮膚而出遲或面額赤脉  
不洪大者或服涼藥過多血凝  
氣弱或出未快隱隱在皮膚間  
以酒調服之錢氏附方治瘡疹  
倒靨入膚者酒調服之尤佳又  
六瘡疹倒靨不出加赤小豆七

粒薄苛酒調服之若黑色者名

曰鬼瘡子用猪猪血調下或錢

移時再服之

人齒 壹箇燒存性

右用人齒脫落者以筩瓶固濟大

火煨令通赤候冷取出為末用薄

許酒調服半錢良久脉平毒氣散

瘡如粟米而出

活血散方見前三十六條下

小便赤澁心腹脹滿者何第四十四

伏熱在胃則中有所隔上為心氣不降故

小便澁少而赤下為陰氣不升故腹中脹

滿董氏用四聖散發出其毒得胃中熱散

則邪氣自然冰釋詳其藥味紫草發散黃

耆養瘡痘解毒枳殼和氣寬中木通導心

氣而利小便又以甘草調和之古人用一

藥必有理存焉可不以意推之

四聖散治痘瘡出不快倒靨毒氣入腹

小便赤色心腹脹滿

黃芪 紫草茸

木通 甘草 各等分

右用水一盞煎五分溫服

出遲而朝夕啼哭者何第四十五

凡人五臟平和則精神安靜有病則不然

今瘡痘是五臟蘊毒當內外蒸鬱發作之

時朝夕啼哭者由不安舍察其毒氣在表

在裏若虛若實隨證殮泄大抵榮衛流通

則神宇清快昧者不知見其朝夕啼哭或

以為心熱或以為腹疼妄亂投藥以致冷

熱偏勝變生他證可不審哉

煩躁或虛煩不得睡者何第四十六

調護瘡痘當審次序盛作之時必令心火

有所導引苟或不然毒氣已出而未盡遂生煩躁宜以生黑豆煎湯令徐徐飲之渴者冷飲可以解散熱毒召復陰氣抱龍丸生犀磨汁等皆可選用甚者新汲水調沙糖少許飲之又有津液不足虛煩不得眠者活人書酸棗仁湯最佳

抱龍丸方見前十六條下

酸棗仁湯治痘疹虛煩驚悸不得眠

酸棗仁

甘草

知母

白茯苓

麥門冬

川芎

乾薑各等分

右剉散用水一盞煎五分溫服不

拘時

或吐或瀉而不能食者何第四十七

此有冷熱二證吐而不渴瀉而手足冷面

色青白此冷證也益黃理中輩主之既吐且渴雖瀉而手足心熱面戴赤色居處喜冷此熱證也五苓散竹葉石膏湯加橘皮等主之不食亦有實虛之異脾胃怯弱精神慢而不食者為虛當溫養之身熱中滿渴而不食者為實當清利之臨病之際貴在熟察之而已矣

益黃湯方見前二十六條下

理中湯方見前十六條下

五苓散方見前十六條下

竹葉石膏湯治痘疹表裏俱虛胃中煩

悶小便赤濇多渴成赤斑

點者又宜服犀角散

石膏貳兩

知母貳兩

麥門冬壹兩

甘草壹兩

橘皮加

右為剉散每服抄參錢水一盞淡  
竹葉一握煎半盞溫服不拘時

便血或下黑糞睡不醒者何四十八  
瘡痘雖是溫毒而發所以為之運者實血  
也今大便下血是裏毒大盛 下黑糞者  
其理亦同加之睡不醒者證候為甚惡蓋  
一身之血心為之主便血下黑糞而又睡  
不醒則是心之神昏矣犀角地黃湯抱龍

丸小柴胡湯加生地黃主之

犀角地黃湯方見前十八條下

抱龍丸方見前十六條下

小柴胡湯加生地

柴胡

人參

黃芩

甘草

半夏

生地黃

右為麤末每服三錢水一盞生薑

三片棗子一枚同煎至半盞去滓  
溫服

當下當救裏不同者何第四十九

瘡子半未出此裏毒未盡也若其人大便  
不通喘息腹脹煩燥作渴謔語不安者當  
急下之蓋毒氣彌盛內外皆熱當令大便  
稍稍潤過若其人虛弱自利四肢厥冷腹  
脹發噦者以裏氣虛也宜薑附理中輩急  
救之一則言當下者毒氣大盛昏悶而死  
故也當救裏者恐裏虛胃氣脫絕故也虛  
實之證相反如此投藥之際可輕易也耶  
理中湯方見前十六條下

鬱毒不散者何第五十

瘡痘之初斑點未見者惟當用平和藥如  
升麻湯惺惺散鼠黏子湯紫草飲子等解  
利之或有不問虛實便以胡荽酒灑之衛

苟酒飲之又火煨人齒酒調服之施之處者猶庶幾焉若盛實之人則禍害至矣熱毒之氣須臾灌注耳目口鼻咽中閉塞大便堅閉小便如血是謂鬱毒不散毒氣無所從出反攻臟腑瘡凹而不起遂成倒靨當此之際不能解利至於斃者多矣是陽盛熱熾無陰氣以感之也如猪尾膏犀角地黄湯犀角玳瑁湯皆可選而用也得毒氣解散榮衛流通瘡子將自出矣且初覺頭疼發熱或兼微寒煩燥咽痛者宜升麻湯如聖湯療痒或癢疹者宜荆芥湯面赤黃大便澁小便少而或嘔者宜小柴胡湯不惡寒但煩燥而渴作赤斑點者宜竹葉石膏湯犀角飲子大便難通者宜四順飲子如譫言昏迷者宜承氣湯或大便自利黃赤而渴者宜三黃熟艾湯黃連解毒湯

服湯中病即止後服不必劑也

升麻湯方見前第八條下

惺惺散方見前第八條下

鼠黏子湯治瘡痘以出稠密身熱急與

此藥以防青色乾黑倒靨

鼠黏子 炒香壹錢 當歸 壹錢

甘草 炙壹錢 黃芩 五錢

柴胡 五錢 連翹 五錢

黃芪 五錢 地骨皮 壹錢

右剉散水一盞煎五分溫服不拘

時

紫草飲子治瘡痘出被風吹復不見入

皮膚內鬱熱不散者

紫草茸 人參

白芍藥 蟬蛻

甘草 穿山甲 土炒 各等分

右用水一盞煎五分作三四次温服

猪尾膏方見前十五條下

犀角地黄湯方見前十八條下

犀角玳瑁湯即玳瑁湯方見前二十九條下

條下

升麻湯方見前第八條下

如聖湯方見前二十九條下

荆芥散治麻痘子兼癢痒或癩疹大便

自過

右用荆芥少許爛研以新井水將

布帛裂過入一滴許麻油打勻令

飲之便不亂悶麻痘已出用黃蠟

煎青膠水飲即安青膠水乃牛皮膠也

小柴胡湯

柴胡參兩

人參參兩

黃芩參兩

甘草貳兩

半夏貳兩湯泡七次

右剉散每服參錢生薑參片棗壹

枚水一盞煎五分温服

竹葉石膏湯方見前四十七條下不加橘皮

犀角飲子方見前二十九條下

四順散治瘡疹至四五日不大便瘡子

又盛出却喘麤氣急腹脹小便

赤澁須用此方

大黃

甘草參兩

芍藥

當歸各等分

右為麤末每服抄三錢水一盞煎

至六分去粗温服不拘時候若得

氣通不喘腹不脹便休與此藥若

初覺有赤點子大便如常小便赤

澁須用藥通大便要出快也若出

得色紅而快更不須通也

大承氣湯方見前二十五條下

小承氣湯治法煎法俱同大承氣湯

厚朴 五錢

大黃 壹兩

枳實 六錢

右二方宜臨時斟酌用之

三黃熟艾湯方見前二十六條下

黃連解毒湯治發斑熱甚心煩不得眠

黃連

黃芩

黃蘗

山梔 各等分

右水二鐘煎五分溫服若斑毒甚

者加青黛壹錢調入湯內服之凡

脉弦數內外熱甚謔語者合小柴

胡湯主之若脉洪數內外熱甚舌

燥煩渴者合化斑湯主之

斑爛者何第五十一

病當發散而不發散則毒氣閉塞喘促悶

亂不當發散而誤發散則熱毒隨陽氣暴

出遍身皮肉潰爛此不善表之過治法宜

調脾進食令大便秘得所安養榮衛生肌解

毒則無目赤咽痛口瘡吐衄等證解之不

至於冷調養不至於熱方為良法斑爛作

膿痛甚者用乾黃土羅細末傳之輕者則

研芒硝猪膽汁調塗勿令動著直候痂死

自落大段不眠臥者用麥麩襯之又有因

發表過甚外為斑爛而內虛陽氣不守

臟自利此又急當救裏宜理中荳蔻之類

臟腑既平則解外亦不可緩也

理中湯方見前十六條下

膿汁不乾者何第五十二

瘡痘出得大盛膿汁淋漓不可著蓆疼痛

者用乾黃土羅細末傳之欲不成癩痕者



火煨乾牛糞研細以綿撲之大段甚者麥  
麩攪臥如暑月熱盛當藉之以芭蕉葉為  
佳

陷伏倒靨者何第五十三

內虛不能出者謂之陷伏外感風寒被惡  
衝觸而不得出者謂之倒靨然有始末輕  
重不同若一槩用藥必致天橫瘡痘以出  
斑點為始血疱為中結膿窠痂疔為末且

斑點之始熱毒方運出亦有陷伏亦有倒  
靨者若外感風寒肌竅閉塞血凝而不行  
必身痛四肢微厥斑點不長或變黑色或  
青紫癢疹此為倒靨也宜溫肌發散如紫  
草蟬退人齒僵蠶紫背荷葉之類須令溫  
散寒邪然後熱氣復行則其斑自出矣若  
胃虛而不能副榮衛者出而復沒斑點白  
色或黑色其人必不能乳食大便自利或

嘔或厥此胃虛而不出謂之陷伏也宜用  
溫中之劑令其胃煖榮衛復行則當自出  
矣宜理中湯丁香煑散之類甚至薑附疏  
桂亦可用血疱為中者是紅斑出齊之後  
其狀如豆起於肌皮之上乃未結膿疱痂  
疔之前證也血疱七日當結膿窠痂疔當  
此或風寒襲而為倒靨或胃虛吐利而為  
陷伏者治之亦如前法又有房室等雜氣  
觸犯而然者當用蒼朮猪甲乳香胡荽等  
法薰解之良方腦子猪血酒治毒氣入臟  
而不出者本方用猪尾膏治瘡子倒靨而  
不出者皆非前項證候乃血熱毒盛之藥  
耳學者宜詳辨之

理中湯方見前十六條下

丁香煑散治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香 不見火

紅豆

甘草 炙

乾薑 炮

青皮 去白

川烏 去皮

陳皮 去白

良薑 炮

胡椒

益智

右用水一盞生薑三片煎六分加

鹽一捻不拘時服

黑陷而耳尻反熱者何第五十四

瘡痘之疾惟腎無證以其不納穢也當其

發作之初及血疱之際一身熱而尻耳

自涼此即腎之平證也蓋尻耳皆屬於腎

今一旦黑陷是變壞歸腎使尻耳亦為之

熱其證為大逆錢氏立論用百祥丸瀉勝

胱毒謂腎邪既衰脾土復旺身熱氣溫欲

飲水者可治以脾能勝腎寒去而溫熱也

百祥丸之意即活人書論厥陰傷寒土敗

木賊急用承氣湯皆是不得已而用之僥

倖十救一二而已往往此證必先作寒慄

今兒禁齒要之與其下百祥丸於已變之

後孰若保脾土於未變之先是故治病者

要當早為之所也

百祥丸方見前二十四條下

瘡黑有逆順者何第五十五

大凡黑靨陷伏本是逆證然亦有順者謂

脾強可以勝腎雖黑靨而忽瀉膿血

者為順此必舊服補脾藥故令脾氣不

衰毒須入腹皆瀉出也經云脾病則五臟

危今脾土既盛他恙無慮矣黑靨而逆者

謂脾虛不能制腎乳食不消水穀雜下脾

虛受毒四臟皆因而危殆然古人云病在

腑者易治在臟者難治瘡黑乃變壞入臟

雖得脾胃強盛是亦九死一生之證耳

黑靨而發寒者何第五十六

瘡痘黑靨有四證一則感風寒二則毒氣大盛毒復入裏三則內虛無陽氣應之四則房室等雜氣觸犯所得之證既不同用藥救療豈得不異感風寒則宜溫散毒氣盛則宜利小便解毒內虛宜溫裏觸犯宜煎解大抵黑靨而發寒者為重不發寒者為輕發寒之證是脾弱反為腎水所勝錢氏用百祥丸以瀉膀胱之毒令陽氣復還脾土溫煖所謂瀉膀胱經水必令脾土自勝也

百祥丸方見前二十四條下

既出而狂叫喘呼者何第五十七

瘡痘已出熱毒自裏而達表狂叫喘呼者臟腑熱燥而無津液也今五臟皆熱無陰氣以和之故令陽氣獨盛於上為狂叫為喘呼宜犀角地黃湯抱龍丸竹葉石膏湯

之類更看大小便何部不利利之則平

犀角地黃湯方見前十八條下

抱龍丸方見前十六條下

竹葉石膏湯方見前四十七條下不加橘皮

熱盛則出愈難其證大便不通小便

如血或為癰瘡身上破裂者何第

五十八

物之盛者皆失其中况病勢太過者乎瘡

痘本因熱而出熱勢甚則其出愈難蓋勢

盛則榮衛為之閉塞毒氣彌蔓裏毒盛者

大便不通小便如血表毒盛者或為癰瘡

身上破裂此由不曾解利之故救之法宜

犀角地黃湯小柴胡加生地黃湯四順飲

牛黃散紫雪之類皆可選而用之也

犀角地黃湯方見前十八條下

小柴胡湯加生地黃方見前四十八

條下

四順飲方見前五十條下

牛黃散治便血由瘡疹陽毒入胃便血

致日夜無度腹痛啼哭

牛黃 壹分

鬱金 壹兩

右為細末每服半錢以漿水半盞

煎至三分和滓溫服量兒大小以

此增減日二服

又牛黃散治法同前

鬱金

桔梗

天花粉

甘草 炙

葛根 各等分

右為細末每服五分量兒大小薄

苛湯入蜜調下

紫雪方見前十八條下

不結痂疔者何第五十九

血疱既成當結膿窠痂疔而愈痂疔者作  
靨子是也當結而不結者由內外極熱毒  
氣散漫無陰氣以斂之古方以宣風散導  
之生犀磨汁以解之或飲之以水調沙糖  
當隨手而愈然用沙糖不可失之太早恐  
使瘡子入目切宜忌之又有血疱脹起毒  
氣彌盛而不結痂疔用猪尾膏者其詳於  
猪尾膏證見之

宣風散治身熱煩渴腹滿而喘大小便

赤澁面赤悶亂大吐當利其小

便不瘥者宜服之

檳榔 真箇半兩

陳皮 去白半兩

甘草 炙半兩

牽牛 四兩半生用半炒熟

右為細末蜜湯調下乳食前服三

兩歲以外者每服一錢未及兩歲

者每服五六分

猪尾膏方見前十五條下

誤以巴豆丸藥下之則內虛而熱不

除者何第六十

腸胃有熱而須蕩滌者宜湯液之劑飲食

成積而須下者宜丸子藥令瘡疹合下

證誤用巴豆丸藥則徒損胃氣熱毒反得

以深入其熱愈不除或致便膿血或為癰

疽或為腫毒變生諸證用藥者宜當知之

百祥丸證第六十一

瘡痘紫而乾陷以百祥丸下之不黑者慎

勿下然陷下有數種當以外證參詳感風

寒而黑陷者宜溫散之內虛自利而黑陷

者宜溫之誤下之後毒氣入裏而黑陷者

則宜溫養而表出之被雜穢惡氣衝觸而

黑陷者則宜熏解之若夫毒至重內外蒸

鬱不結痂疔大小便秘腹脹而黑陷者當

以百祥丸瀉膀胱經毒服之身溫欲飲水

者可治是脾強勝腎陷者當復出矣若加

以寒戰身冷汗出耳尻反熱死要之錢氏

論瀉膀胱毒於已陷之後不若保脾土於

未陷之先乃為上策學者試思之

百祥丸方見前二十四條下

猪尾膏證第六十二

虛汗實汗皆汗也虛熱實熱皆熱也瘡痘

倒靨亦有虛實之不同可分析而辨正

之哉如瘡痘始發或斑點或血疱未結痂

疔之際因久不食或自利或感風寒至不

能出者雖名倒靨則宜溫之其或心煩狂

躁氣喘妄言如見鬼神大小便秘渴而能

食毒盛而倒靨者此證為實與前諸證倒

靨霄壤相遠宜猪尾膏又有血疱六七日

當結膿窠痂疔而不結者是毒氣盛實心

火獨燥當此亦宜用猪尾膏會用之進一服隨手結痂死神速特異以意思之人遇寒暄不常之時脫著衣服必先呷冷水一二口卽不感冒者是心涼腠理閉而斂則風寒不能侵之也今用猪尾膏正以血能歸心引腦子以涼之心涼則毒氣消釋榮衛流通於是血疱結膿窠膿窠結痂死而餘證自退矣如傷寒厥陰證土敗木賊以承氣湯下之脾間毒去則脾土和水升火降寒熱作而大汗解猪尾膏之意得心竅開通熱毒解散則氣和神甦自結痂死蓋當結而不結者恐毒氣復入於裏昏悶而死故也以此言之瘡痘至血疱欲作膿疱之際毒氣已盡在外矣昧者見斑點之後血疱出遲便用猪尾膏殊不知毒氣未出盡而使心胃寒涼則毒氣內閉殺人甚速

然則猪尾膏一藥是實熱證方可用也茲特出此一項正欲明白使人無惑也學者宜盡心焉

猪尾膏方見前十五條下

聞人氏痘疹論卷三



聞人氏痘疹論卷四

已結痂疔欲不作癍痕或已成癍痕  
欲消者其法何如第六十二

纔結痂疔卽以真酥潤之用手搔破或剥  
去又更潤之稍遲則乾硬深入肌肉經久  
方脫遂成癍痕此理昭然人多不曉反謂  
剥落早則成癍痕何其誤也然既剥去之  
後却不得早見風冷須當愛護其成不能  
剥去而又出風太早以致癍痕更甚  
僧爲末水調塗之疾藜散  
莧散青金散皆可選而用之也

疾藜散

右白疾藜子一升炒黃爲末以麻油  
和如泥炒令焦黑塗傳如無疾藜赤  
小豆末和雞子調用亦妙

鷹屎白散

人精 鷹屎白

馬齒莧散  
右等分和白敷于瘡其癍痕自消

右用馬齒莧菜搗汁煎濃傳之或  
以渣薄傳其上

青金散

白疾藜 五錢 山梔 五錢

青黛 五錢 膩粉 壹錢

右爲末每用些少生麻油調傳

瘡疔起而能食者何第六十三

人身安健爲常稍有疾病則精神氣血爲  
之不安况小兒瘡痘自斑點發見至結痂  
疔日數雖有遲速之不同其精神氣血勞  
耗多矣大率瘡疔既起則中氣暴虛多不  
能食必藉參苓輩調養之其間或有瘡疔  
起而能食者是胃中宿有蘊熱故也蓋胃

熱則消穀所以能食其人更大便秘或大便難當用三黃丸利之否則恐胃熱不去鬱爲口臭齒腐生風之證流散四肢則發爲癰疽瘡腫之毒是說也惟善治未病者知之然亦有一等脾胃素壯實者亦自能食大便亦不至有秘結之患此又不可不知也

三黃丸

黃芩 五分

大黃 五分

黃連 五分

右爲末煉蜜爲丸麻子大每服十五丸或二十九丸食後米湯下

病後解利當觀虛實者何第六十四稟受有虛實病有虛實病後亦有虛實不可一槩而論瘡疹後須當解利此世俗通議然觀虛實可也且小兒稟受既實榮衛

充壯病後有熱者宜與解利其證大便難小便赤能食而渴大段熱甚者宜大黃散熱留胃經嘔吐而口舌生瘡或下利黃赤者宜黃連散煩渴而小便少者宜五苓散餘熱溫壯齒疼或腫者宜甘露飲咽疼者宜抱龍丸如聖湯肝有熱毒多怒叫而不得眠者宜調肝散大腸下血疼痛者宜牛蒡散三黃熱艾湯生痘癰者宜小柴胡加生地黃湯犀角地黃湯無熱證者但當隨宜安養而已或其所稟素弱瘡痘既出之後榮衛大虛坐立振搖大便不秘小便不赤飲食不甚進者宜胃愛散異攻散雙和散之類以扶持之候其飲食如故起居稍盛榮衛既充然後微微解利未爲之晚或至虛之人不必解利也嘗見虛怯小兒不應解利而強與解利遂爲寒中爲下利



生病多端事敗於已成可勝惜哉

大黃散即川黃散

大黃微炒壹兩 川芎壹兩

黃芩五錢 枳殼五錢

右剉每服壹錢水一小盞紫草少

許煎半小盞溫服不拘時但腹脹

滿心胃悶喘急面赤睡中譫語即

可下若大便如常此又不可下熱

在表故也

黃連散

右用黃連壹兩去鬚為末每服壹

錢水一盞煎五分不拘時量兒大

小虛實與服瘡痘初發亦宜服之

五苓散方見前第十六條下

甘露飲方見前第三十八條下

抱龍丸方見前第十六條下

如聖湯方見前二十九條下

調肝散

黃耆五錢 石膏五錢

大黃貳錢 生犀末壹分

桑白皮壹分 鈎藤即鈎子壹分

麻黃去節壹分 瓜蒌仁去皮壹分

甘草壹分 草龍膽五分

右剉每服貳錢水一盞煎半盞食

後時時溫服少許

牛蒡散

右用牛蒡子炒為末水煎一盞服

之小兒冬月有非節之暖及春月

天氣暄暖或肥甘之過或重衣溫

厚幃帳周密傷皮膚害血脉瘡瘍

發黃是生多疾宜預常服之

三黃熟艾湯方見前二十六條下

小柴胡加生地黄湯

柴胡 壹錢 半夏 五分

人參 伍錢 甘草 五分

黃芩 貳錢 生地黄 叁錢

右為麤末每服叁錢水一盞煎六

分服

犀角地黄湯方見前十八條下

胃愛散

糯米 壹兩 乾淡木瓜 叁分

甘草 壹分 丁香 拾陸箇同炒

藿香葉 壹分 紫蘇葉 壹分

右件乾為細末每服壹錢或五分

粟米棗子湯下

異攻散

人參 貳錢 白朮 伍錢

白茯苓 壹錢 甘草 壹錢或分

陳皮 叁錢或分

右判每服貳錢水一盞煎五分温

服

雙和散

白芍藥 貳兩五錢 黃耆 壹兩

熟地 壹兩 川芎 壹兩

當歸 壹兩 甘草 七錢五分

官桂 七錢五分

右為麤末每服叁四錢水一盞半

棗貳箇生薑叁片煎至五分食前

温服

餘毒作嘔吐者何第六十六

脾胃主納而不出大小腸主出而不納瘡

疹後嘔吐者是餘毒在胃也然有冷熱之

不同如心煩作渴食乳甚急聚滿於胃中

然後吐出如射其人必面色帶赤手足心

熱居處喜涼此熱吐也如乳食水漿隨吐面色青白手足冷大小便自利此冷吐也熱吐者竹茹湯五苓散竹葉石膏湯加橘皮之類以主之冷吐者益黃散理中湯九輩主之要之病後餘毒多是熱邪其間冷證十有一二也

竹茹湯

橘紅 貳錢

半夏 貳錢

白茯苓 貳錢

甘草 五分

竹茹 壹圓

黃連 壹錢 薑炒

葛根 壹錢五分

右水一鍾生薑參片煎五分不拘

時溫服

五苓散方見前十六條下

竹葉石膏湯方見前四十七條下 不加橘皮

益黃散方見前二十六條下

理中湯方見前十六條下

病後忽遍身青黑色手足瘳瘳口噤

涎聲如鋸者何第六十七

此名中風也小兒瘡痘方愈榮衛正弱忽作前項證候者由節令氣交八方不正之氣乘虛中入宜和劑方消風散二錢入蟬蛻末一錢分為三服投生薑薄荷汁及酒各數點溫湯浸之連二三服當隨時少進或作癩癬或再出膚疹而愈京師醫官宋鑑嘗用此藥無不愈者後傳此方用之如神或小續命去桂附加荆芥亦可也

消風散

人參

羌活

川芎

甘草 炙

荆芥

防風

茯苓

蟬蛻

厚朴

薑蠶

陳皮 去白

藿香 已上各五錢

右為末每服貳錢茶清調下

小續命湯 去桂附加荆芥

麻黃 去節

人參

黃芩

芍藥

防已

川芎

杏仁 已上各壹兩

甘草

防風 壹兩伍錢

荆芥 加

右剉每服五錢生薑五片水一鍾

煎五分食前溫服

病後非時發搐搦者何第六十八

一則心熱留而不去熱盛生風風火相搏

其人必喉中有痰目直上視面赤引飲居

處喜冷宜導赤散抱龍丸小柴胡加生地

黃之類一則病後多食胃弱不能勝穀謂

之食蒸發搐其人必潮熱大便酸臭秘洩

不調或嘔吐腹疼宜紫霜丸小承氣湯輩

以利之用藥之際要在加審

導赤散 方見前二十八條下

抱龍丸 方見前十六條下

小柴胡湯 方見前四十八條下

紫霜丸

代赭石 貳錢水飛

杏仁 貳拾壹粒去皮尖

巴豆 貳拾壹粒去油心用膜

右為末飯丸如粟米大每服三五

丸至十九阜角仁湯下

承氣湯 方見前二十五條下

作痘癰結核腫毒者何第六十九

此由毒氣留藏經絡故於肌肉虛處或關

節動搖處偏盛而成癰又或既平之後失

於解利餘毒大盛外不得泄於皮膚內不

得入於臟腑聚而不去遂為之癰如毒氣淺者止生結核腫毒瘡癤而已甚者至頭頂腦脇手足肢節盡燼腫作痛治法惟小柴胡加生地黃最妙如升麻湯消毒飲犀角地黃湯皆可選而用也

小柴胡湯加生地 方見四十八條下

升麻湯方見前第八條下

消毒飲方見前三十八條下

犀角地黃湯方見前十八條下

病後目翳忌用點藥者何第七十

瘡痘毒氣之為目翳也蓋自臟而達外治之之法但活血解毒而已活血不至於熱解毒不至於冷五臟平和則翳當自去或誤用點藥則非徒無益而又害之不可不慎

病後大小便不通或便膿血者何第

七十一

此由失解利之故熱氣併於小腸則小便不通併於大腸則大便不通如前後部俱不通者熱勢為甚四順飲承氣湯五苓散導赤散之類可選而用也其有熱毒入大腸而便膿血者牛黃散犀角地黃湯黃連解毒湯三黃丸等宜斟酌量用之

四順飲方見前五十條下

承氣湯方見前二十五條下

五苓散方見前十六條下

導赤散方見前二十九條下

牛黃散方見前五十八條下

犀角地黃湯方見前十八條下

黃連解毒湯方見前五十條下

三黃丸方見前六十三條下

餘毒咳嗽脅疼者何第七十二

經云左右者陰陽之道路左右兩脅之謂也瘡疹後咳嗽脅疼由餘毒在中陰陽之氣不能升降也脅居一身之左右陰陽二氣之所行也脅病是氣不能升降之故但解毒氣毒氣去則真氣行所苦自平赤茯苓湯小柴胡加五味子桔梗枳殼等療之

赤茯苓湯

赤茯苓

甘草炙

大青

升麻

枳殼

梔子

右水一小盞

苦竹葉七片

豆豉三十粒煎五分分爲三服看兒大小

加減

小柴胡湯加三味

柴胡壹錢

半夏五分

人參貳錢

甘草五分

枳殼五分

黃芩貳錢

五味子加

桔梗加

枳殼加

右爲麤末每貼參錢水一盞煎六分

餘毒作煩渴者何第七十三

心胃二經受邪熱故也五苓散竹葉石膏湯黃連散燈心散等主之

五苓散見前十六條下

竹葉石膏湯方見四十六條下

黃連散方見六十五條下

燈心湯

燈心壹把

鱉甲貳兩醋煮黃

右剉每貼壹兩水一鍾煎四分

天氣暄熱卽與疎利膿疱之後亦當

疎利者何第七十四

經言上工治未病嬰兒童子雖虛實不同

經言上工治未病嬰兒童子雖虛實不同

畢竟純陽當瘡痘未出之先或遇天氣暄熱當與疎利庶幾發作之日其勢必輕又膿抱之後毒氣大盛未結痂疔能食而大便秘面赤引飲者亦當疎利之疎利之說非是轉下不必用峻藥也如三豆飲子升麻湯消毒飲導赤散之類是也

三豆飲但時有天行痘瘡宜預服此

赤小豆 黑豆

菜豆 各壹升 甘草節 五錢

右淘淨煮熟任意食豆飲汁七日

自不發雖發亦輕快

升麻湯方見前第八條下

消毒飲方見前三十八條下

導赤散方見前二十九條下

疎利與轉下不同者何第七十五

瘡痘已出即不可疎利未出之時可疎利

之疎者疎散熱氣利者滑利肌竅使無壅遏之患而已曷嘗令轉下也疎利用輕清之劑彼轉下者非猛浪不可疎利轉下相去甚遠不可不辨

用藥不可執一者何第七十六

前輩言老人之病必先助火以其陰盛而陽微當預溫之治小兒當先瀉火謂其陽多而陰少須用導引勿令生熱然或有老

而實幼而虛者此又當隨時變通又五實

當瀉謂身熱脉大大小便不利能食悶瞢

為五實之證五虛當補謂身寒脉細不食

前後利汗出為五虛之證或曰用利藥者

候大小便秘而利則利之愈用溫藥者候

大小便利而溫則溫之愈二者合利而利

合溫而溫也其或外證合利大小便已自

利何必利合溫大小便既自溫何必溫大

抵治病最嫌陰陽偏勝用藥者但令陰陽不偏則是常有生意又况小兒臟腑嬌脆易寒易熱易虛易實尤難調和所以用藥不可執一也

用緩慢藥反致害人者何第七十七  
病有外同而內異者又有病中遇天時節令變遷因而感異氣者又有病中氣血不定宿有蘊藏之疾隨之發動者其證未易辨識凡用藥之際須當識證切中病源但欲治熱當令熱去而不冷治冷當令冷去而不熱則無不愈者治風以治風藥治溫以治溫藥治癆治氣用治癆治氣藥今人不能究其病因一槩用不急之藥如四君子參苓之類其意止欲逃差誤耳殊不知縱令病勢滋蔓誤人極多要之用和緩之藥亦各從其類而和緩耳何嘗謂不切病

情而徒能和緩耶

貴賤不同用藥亦異者何第七十八  
富貴之人形樂而志苦加之以奉養既過風雨寒暑之邪易於侵襲故方暑而傷熱多陰則中寒喚荆芥薄荷而腹痛服桂附丹石而不知其熱貧賤之士其形雖苦其志則安服薑橘蒼朮則熱發而大便秘狎風雨霜露而習以為常用藥之際安可一

槩論哉其他又有形志俱樂形志俱苦之不同學者各併知之

方宜不同用藥亦異者何第七十九  
經云一病而用藥各不同然皆愈者何也答曰此地勢使然爾於是悉論五方地勢與夫風土受病治病之異如張仲景論治傷寒用桂枝麻黃大青龍證云西北二方四時行之無不應驗惟江淮地暖處須用



加減法此亦言方宜之不同也雖然西北風土剛強外邪不能侵襲病生於裏其治宜毒藥設有陰證亦須用理中四逆之類以復陽氣東南方陽精拱上其地下水土弱霧露之所聚證有陽盛之證如大黃芒硝輩寒涼之劑亦當用之治小兒瘡痘亦當知方宜之說又當知變通之理是故非圓機之士不足以言醫

理中湯方見前二十六條下

四逆湯

甘草

查兩

乾薑

朱錢

附子

或錢五分

黃連

五錢

右剉作一服水一盞煎五分溫服

乳下嬰兒與能食童子不同者何第

八十

乳下嬰兒榮衛未足胃氣未全風冷易入

乳食易傷如水之泡草頭之露一但遇疾不得已而用藥須精確審諦蓋藥性非寒則熱不表則下嬰兒多服藥乃是反為之累不若常令乳母服餌間以少許與兒始為良法彼能食童子自絕乳之後酒麪甘肥魚肉滋味無不備矣但有疾疾與大人治法一回但小其劑耳

董汲方指迷論錢氏朱氏所論不同

者何第八十一

董汲方謂瘡疹證候已明便用大黃青黛等藥指迷論謂切不可投以溫劑錢氏仲陽立說戒不可妄發及妄下朱奉議活人書中云小兒身熱耳冷尻冷輒用利藥則毒氣入裏殺人四人之見不同皆局於一方非通論也大抵臨病之際要在隨證商確安可執一定之說以應無窮之變哉古

人有言曰醫也者意也其有旨乎

附三豆飲見前七十四條下

雞子方

冬月養童子雌雞於靜室中飼以米

穀不令食毒穢蟲豸等物守其生卵

記取次第自一至七完足以稀網袋

盛第一卵投糞廁中廁中不可有六畜糞次日

乃投第二卵餘次第如之至第八日

則第一卵七晝夜足矣取起埋土中

一晝夜去穢氣次日晝棄空心與食

乃取起第二卵如前去穢棄食餘漸

次如之

右雞子每年冬月與食七枚可使

痘疹輕者不發重者輕快試之有

驗

痘疹論卷四終

痘疹論卷四終



附錄

阮氏序

大學曰若保赤子心誠求之醫以小兒為

痘科難療而療瘡疹尤為難也可不懷惻

隱之心乎欽惟 聖朝頒降聖濟總錄其

論瘡疹曰小兒稟受純陽腑臟蘊熱或遇

時疫遂變瘡疹速宜疎利臟腑然亦須詳

審若大便已利或瘡疹已出皆不可疎亦

不可汗既瘥之後尤宜利去餘毒倉公扁

鵠常用油劑草劑其法最妙此總論本乎

素問為通治之大法天下後世所當遵而

用之詎有南北之間乎孫思邈千金方以

黃連苦參猪膽青黛大黃等藥除熱解毒

聖惠方治法亦云疎利與總論無異焉其

間名醫世出錢氏董氏王子亨丁道濟陳

良甫龐安常諸家皆主疎利獨朱奉議之

論 疎轉首尾皆不可下其方中却有  
洗心散治 麻黃若要澹轉

則熱服又有水解散治痘瘡未出煩躁或  
出尚身體發熱及出不快大黃麻黃

得汗則便瘥又有無比散用水銀膩粉腦  
麝取轉下如爛魚腸之類涎臭惡物便安

若此則可轉可下利矣識者疑其一家方  
論自相冰炭者何歟及觀陳文中援黃帝

歧伯曰陽盛陰虛冰雪不知寒陰盛陽虛  
沸湯不知熱治之何如陽盛則補陰木香

散加丁香官桂陰盛陽虛異攻散加木香  
當歸識者評其陰盛陽盛一藥俱用熟藥

本非黃歧之經旨類乎實實虛虛抱薪救  
火若曰皆屬心火又不可與素問同日而

語也又觀其本方治痰實壯熱胸滿喘急  
大便堅實用柴胡枳殼湯亦有大黃其諸

方之用柴胡黑參知母黃芩石膏滑石之  
劑亦未嘗專於熱藥也奈何世人喜熱而

畏寒致有陰陽偏盛之患終不省悟瘡瘍  
心火之平鄭端友曰首尾證平下之者

誤首尾實熱不下者誤首尾虛寒不補者  
誤誠哉是言也劉守真論瘡疹未出誤以

熱藥致陽熱轉甚則重密出不快多致黑  
陷而死世俗云恐是斑疹不敢服藥以誤

小兒諸病多矣亦不知古人雷涼瀉之藥  
使熱勢稍退而稀少出快早得痊愈若用

涼膈散最為妙耳此劉守真未出時用張子和云斑  
疹之作多於五寅五申歲相火故也世人

多以熱藥發之其失甚多紫黑青色大小  
不齊此蓄熱在內必生喘脹十死八九善

治者莫若先用承氣湯疎藥使大開門戶  
自然出快更宜預 白虎湯加人參或

涼膈散之類先 也此證 不疎瀉斑

必生別證或痢或癰也又云朱奉議

首尾不可下使人戰戰兢兢不敢用藥死

者塞路矣此證 相火豈有寒歟又

云有人棄瘡疹死兒於水中熱得水涼而

解遂因以活者至於羅謙甫所集潔古東

垣海藏三家一宗之書論世俗相傳之害

有三首尾不可下一也朱奉議之為此戒

者蓋必有下而失之者爾自首至尾果有

當下之論通利之可也又云必温煖覆蓋

不令通風氣二也若發於凝冬之時病體

涼而惡風寒不使通風氣則變生他證也

又云瘡初生即以驢乳紫草葡萄胡荽之

類併發之三也如其瘡須出而不漸次長

發則必安其裏而發其表其瘡日生而日

長如循循如度其又以疊疊以雜藥諸物

發之使毒併出不爾小兒難禁此北方良醫東垣潔

古海藏三先生生論 或因通今審思明辨

寒者温之熱者涼之虛者補之實則瀉之

不偏倚而致中和同登仁壽之域是誠老

拙之所願望也其總錄千金聖惠等書與

大諸家方論部帙繁多醫家無力可收民

間鮮有見者僕今撫其瘡疹類書附以日

用得効方法本草類要良方集成夫婦補

益男女生育等方陸續刊行以奉聖朝生

生之大德云

時至治三年歲次癸亥中秋月太平路醫

學教授宛陵阮桂榮宗華謹書

聞人氏自序

士生斯世窮達兩途孟軻氏有言曰窮則

獨善其身達則兼善天下雖然窮而未達

者能學為良醫亦豈獨善其身而已哉規

素業書卷今茲從事後木嘗謂自昔聖賢  
閔生民之疾苦著書立言汗牛充櫛晚觀  
唐孫思邈千金方其次序深有旨意三十  
卷之首觀之以婦人嬰孺護養拯救之說  
寧不以生育為重乎規因念婦人之有乳  
免小兒之疾苦惟瘡疹皆不可免而治療  
之間毫髮一差生死隨異仁人君子所尤  
當審慮者世傳產方 論其利人也甚

博雖小兒痘瘡諸書止看其大畧倉卒之  
際何所憑藉焉規輒不揆量廣求古人之  
議論證以已所聞見撰成問難八十一篇  
凡三卷目曰小兒痘疹論每施以濟人隨  
試輒効所活者亦多使家有是書則豈曰  
小補之哉此論之成久矣欲鈔諸梓而力  
未克遂邇來幸甚獲登繡使煥章吳公門  
牆一日迨暇因有請言公即慨然捐金以

成其事吁公之賜豈私於規者實與衆共  
之其有訛舛改而正諸以俟同志紹定壬  
辰仲夏携李待補國學進士聞人規叙待  
僕攜此書抄本宦遊南北二十餘年尋  
印本校正未得叨教太平獲的本於天  
門王氏帙後寫紹定壬辰聞人伯園見  
贈於右瀾泉臺之石壘湯熙伯誌贈王  
仲安惜不見其原板何在謹重刊以廣  
其傳誠幼幼之活法也月溪阮桂榮識

又自序

嬰孩之疾莫危於瘡痘形色變異應於呼  
吸之間生死關係可不謹歟昔之名醫非  
不立論按證授方散在篇帙無統紀臨  
危往往失錯蓋不素講故也獨張君從道  
著書一百二十篇發明前人所不到此醫  
家之秘藏童孺之司命也其板刊於務章

帥府人亦罕見縱得其書其中玉石混散又不能窮其旨趣可勝浩歎規家世儒也

甲場屋二十年僅得一國庠書生之効取是遂取黃帝仲景諸書晝夜誦習乃與意合轉從於金石草木庶可以遂其平日濟人之志此蓋先之所愿也得張君之書每以其拯疾無不脫手而愈益知其幹旋之妙然其文意繁冗惜乎後學未可

天全書集

卷三

六

遽推究規細繹百數大窺閫奧撫其精華切於治療者八十一篇作三卷始則論將發之證中則論已發之證末則論

之證并附益以他說於張君書畧有增損非敢改革也書成吳先生持繡節

於西澗一見遂捐金勉之刊梓先生愛人利物使嬰孩無夭折之患則張君之書與規之名布之四方皆先生隱德也端平乙

未上元後五日待補國學生聞人規序

僕嘗因公趨杭聞一老醫善治瘡疹勉其施方未從僕刊行此書示之乃出印本校對字字相同但無紹定壬辰之序而有端平乙未者因知聞人氏之八一論本於張從道百二十篇之精華也月溪阮桂榮識

右序三篇頗多闕誤今悉仍其舊以

俟知醫君子是正之

附錄終

重刊痘疹論後序

痘疹上古所無漢末傳自西羌說者謂中國之氣澆薄而裔夷不正之氣得以乘之歷魏晉及唐至宋始盛猶未若今日之甚也其何也世道愈降嗜欲愈多則火疾愈熾驗諸近歲之楊梅毒可見矣正德初元以前江浙以北未之有也近自嶺南傳至展轉相染日漸以多殆不為怪安知百年之後其染人也不若今之痘疹乎噫人自始小以至壯室斃于痘者殆過半矣或垂老不能免焉其危害生靈誠慘酷哉而世間胞胎之毒人無庸力遂付之無可奈何亦何謬耶夫痘疹之作有三道焉胎氣之毒也地氣之毒也時氣之毒也內外相須而發也何以言之百疾皆再發而痘疹止于一焉謂非胎氣可乎迤北韃虜海島

倭夷其在本土無之而入中國則發謂非地氣可乎時而輕也十不失其二三時而重也十常喪其八九謂非時氣可乎是知胞胎之始父母飲食嗜欲之火固已蘊毒于中及有外邪觸之則忽焉盡發而輕重隨所感矣故毒之為字从生从母蓋言生自母腹乃為至毒正今痘疹之謂也聖人制字之始雖未有痘疹而已逆知後世胞胎之毒必至是矣標兩女皆慧甚而皆以痘夭嘗深恨之竊謂虛羸不足之疾真元耗削固非醫藥所及也而痘疹乃有餘之毒能解利其毒宜無不愈矣奚為而遂委諸天耶蓋由上古聖賢如岐黃虛扁既皆未之發明近古醫工雖或立方著論亦未詳切則今之庸醫本以鹵莽之學苟圖朝夕之利而又以躁妄嘗試之心濟之其多

失誤理固然矣此孔子所以戒無恒也我  
舅氏做山先生嘗聞宋有聞人氏八十一  
餘最為周悉而世無傳本求之未得今春  
侍御柏山先生來佐吾郡首以是書為舅  
氏贈蓋用今朝邑時所刻也舅氏得之如  
獲拱壁咳抄方附焉命傑覆校朗書分為  
四卷再刻以傳誠欲幼吾幼以及人之幼  
也嘻是音行而天下遂鮮夭折之患生齒  
日益繁謂位天地而育萬物者孰有  
大於此耶是二先生及物之功固當與禹  
稷並也乃拜手以序其末簡

嘉靖甲辰夏四月己巳朔門生黃標謹序







痘疹心法序

隆慶紀元予轄楚藩以女病諸醫用藥皆不効聞羅田有萬生療小兒有神驗亟延至之命之診治女病果愈予政暇時時與萬生卮談乃萬生非如他醫但了一方一脉自售其術其爲業自素難下及近代醫書靡不究悉源委剖別是非又能溯諸六經性理根於吾儒之道信有本矣蓋萬生少嘗從事科舉以不得志而遂隱於醫宜其世之爲醫者不能望而及也

萬生著有痘疹心法一書予爲梓之俾表見於世以予愛女求醫之心推言之則爲父母之保赤子者斯心大略皆同而赤子之最難保莫過痘疹得是書審察之劑量調攝之萬生之術溥而大行安謂其不得志耶

淮海山人孫應鰲書

世醫心法敘

予嘗謂仁者以天地爲一體孔子之志在安老信友懷少聖人豈能必天下無一物不得其所哉願其心欲使天下物各得所苟可以安老信友懷少聖人所必爲也此其心天地萬物一體之心也予友父岡秦君新元初年予多痘疹不育後得楚黃人黃蘆痘疹書閱其實實虛虛之辨解毒補療之法分門別症因病用藥井然有條因錄以歸遍授諸兒醫多所全活已巳夏予守黃過梓里以書黃本且素與予同志以其詳語予欲得原本廣傳斯固仁人一體之念也予以郡事未逮今年夏覲田得羅田萬全痘疹心法數卷即其書也較前者更加詳焉予覽之果可察風氣洞病情脈視有法藥療有方不直極濟童稚神而明之雖措之內外科率是道也遂命梓而廣之徧授諸醫使因病溯源隨方投劑海内生得其少而壯壯而老其

補於世豈淺上哉予治黃踰二年即未能撫庶教  
育悉除民苛毒出民疾苦得是盡而傳布之俾黃  
少有長壯有養老有終以復於隆古之治則是刻  
也所以體懷少之仁者在是而於夫子之教可撫  
悖矣遂漫筆書之令業醫者知取衷云

歲癸酉秋九月黃守四明孫光祖書于懷古草堂

重刻痘疹心要序

益有不知而作者自用自專愚執甚為孔子表章六經垂憲萬  
世猶曰述而不作信而好古示不敢專以自用也予為孔子徒  
亦惟多聞多見擇而識之雖百家衆技之書可以利諸人者靡  
不玩索况醫術之仁為斯民立命者乎又乃先子專門之業所  
當繼述者乎竊思方脈之中保嬰最難嬰孺之疾痘疹最酷不  
敢自用自專考諸前言往行廣詢博訪不拘偏見迂說務約於  
中間亦附以已意著為痘疹心要凡三易其初本擇為未精  
語為未詳意淺辭俚有好事者剽竊以為已述刻之南贛次乃  
改作

撫治鄖陽右中丞孫公淮海取其改本刻於行都司

黃州太守孫公懷堂又取鄖本刻之載歸四明其書既出視初本  
雖頗精詳然猶有未盡之證未立之法恐不足以活天殤廣仁  
愛垂久遠也於是補其闕略附以醫案屬望有力者鑿諸梓為  
庶天下後世之習幼科者無滄海遺珠之歎為得魚兔之筌蹄  
云爾若夫不知而作者之罪予弗敢辭

痘疹心要改刻始末

一贛本痘疹骨髓賦及西江月乃嘉靖丙午丁未二年所作以教諸子故其意淺其辭俚使之易曉且易於記誦也

○其世醫心法歌括又嘉靖己酉庚戌二年所作欲以傳後未敢示人

○右前四年所作乃吾長男萬邦忠私授於喻朝憲憲授於王漁毛漁得之以為已述刻於贛州軍門

一鄖本痘疹心法格致要論吾於嘉靖壬子癸丑二年所作其書雖成久藏於篋未敢示人恐為木災至隆慶己巳年

欽差撫治鄖陽等處右僉都御史孫 取而刻之於行都司臨刻

特予取骨髓賦改之曰碎金賦

一黃本乃隆慶辛未年

○黃州府太守孫 所刻與鄖本同重刻也

一今本吾因刻過世醫心法尚有未盡之證未立之法關略頗多未為全書况吾歷年已老嘗事且久故取其往日所治之證經驗之法因案以立括因括以附案補其關略凡百餘條非曰盡之如有未備者以俟後之君子

痘疹心要目錄

痘疹碎金賦 二篇

一卷

治痘總括 凡一十八首

二卷

發熱證治歌括 凡一十九首

三卷

出見證治歌括 凡二十二首

四卷

起發證治歌括 凡三十五首

五卷

成實證治歌括 凡三十四首

六卷

收靨證治歌括 凡一十九首

七卷

落痂證治歌括 凡一十一首

八卷

痘後餘毒證治歌括 凡三十六首

九卷

疹毒證治歌括 凡二十六首

十卷

婦女瘡疹證治歌括 凡一十二首

十一卷

古今經驗諸方 凡八十五方

十二卷

古今經驗諸方 凡六十一方

目錄畢

格致要論目錄

一卷

原痘論

胎毒論

瘡疹惟腎無候論

腎主痘中之水論

痘疹五臟證見論

臟腑主證治

六氣十二經所主證治

二卷

氣運

瘕痛

部位

脉候

氣血

陰陽

標本

形色

疎密

輕重

順逆

痘有性變

虛實

動靜

痛痒

老嫩

榮枯

善惡

始終

三卷

發熱

渴

腰痛

腹痛

驚狂

謔妄

吐利

嘔吐噦

洩利

大小便

咳嗽

喘急

自汗

失血

煩燥

夾疹

夾塊

痘疔

痘癩

痒痛

陷伏

壅腫

潰爛

厥逆

寒熱

暴啞失聲

澆水吐食

四卷

驗頭面

驗耳目鼻

驗唇口牙齒	驗喉舌	驗頸項	驗齒
驗手足	驗腹肚	驗飲食	
五卷			
治痘要略	攻補利害		
巫醫得失	雜證宜攻		
壞病不治	飲食所禁		
異氣所害	起發不透		
收靨不齊	差後餘證		
痘後餘毒			
六卷			
瘡疹證似傷寒辨	痘瘡首尾不可汗下辨		
痘瘡不可以日期論辨			
大人小兒富貴貧賤不同辨			
升麻葛根湯辨	瘡疹順逆辨		
瘡疹變黑歸腎辨	痘瘡變黑有順逆辨		
諸痛痒瘡皆屬於心辨			
過飲冷水變生諸證辨			
錢氏陳氏立法用藥同異辨			
補脾土瀉腎水辨	瀉膿血茄皮水穀辨		
斑疹論	五行生死論		

七卷	先哲格言 凡一十八家
八卷	或問 凡三十七問
九卷	治痘凡例 凡四十三條
十卷	藥性主治及修製法
氣類	凡四十五品
血類	凡十七品
十一卷	藥性主治及修製法
解毒類	凡六十八品

胎毒金賦一

痘本胎毒俗曰天瘡雖厲氣之傳染實殺機之顯彰變遷莫測酷  
惡難當肌肉潰脫若蛇蛻皮龍蛻骨精神困頓若如到在灰  
蟻在湯瘡有疎密若疎者輕而密者重毒有微甚若微則祥而  
甚則殃笑彼拘於日救者未達遲速之變悲夫惑於鬼神者不  
求醫藥之良

乾坤妙合震巽分張受氣於父方得陽精而凝結成形於母方賴  
陰血以培養民多嗜慾氣匪厚醴滯火熾於柢席食穢蓄於膏  
梁精血真其毒氣若甚於射罔形體負其殺氣若陰於鋒鏃或  
謂去其口血方不過脫空之語或謂解其胎毒方未見抵聖之

五運統於南北方有大有少六氣分於主客方曰陰曰陽變化各  
正勝復靡常得其序而氣治方國無疔癘失其序而氣亂方民  
有疹癘應至而不至方其氣徐貴迎之以奪其勢未應至而至  
方其氣暴姑持之以避其強不知此而妄作方違時者敗能審  
此而慎動方順天者昌

春令溫和而升生夏令暑熱而浮長秋令清涼而降收冬令寒冽  
而沉藏是得四時之正不為萬物之傷冬反煥燠方勾萌早發  
春反栗烈方蟄虫且藏夏反清肅方涼風襲肉秋反蒸溽方暑  
汗沾蒙若此逆氣方染之者即成疫癘又有虛風方中之者必  
致天傷

受父母之穢毒方隱於胎俯觸天地之病氣方發其大哉胃內而  
出方布於四體自外而散方根於五臟肝主淚而為水肺主  
涕而作膿囊心則斑而且赤脾則疹而又黃腎乃封藏之本變  
則黑陷之象可害者由而秀秀而實如鳥之脫距所惡者枯而  
陷陷而伏如虎之負岡

東赤南白西黃北黑各分布而有定春生夏長秋收冬藏自流行  
而無疆初出血點方紅鮮得生之氣次化水液方白莖漸長之  
狀膿成而色黃方欲收之候死結而色黑方已藏之象謂腎無  
證者似去冬不能成歲謂黑為逆者如癩北何以調陽

方其發生方春夏為順而秋冬非吉及其收斂方秋冬為順而春  
夏不藏應發生而反收斂者謂之陷伏應收斂而反發生者謂  
之爛洋順者不必治方待其平復逆者不可治方避其怨謗若  
逢險謗必在奇方治不乖方方險交順而春回幽谷藥不對病  
方險變逆而火烈崑岡

病似順而反逆方認之要慎病似逆而反順方察之貴詳似粟堆  
聚堅硬方孰若磊落而稠密如丹艸赤嬌嫩方不如淡白而老  
蒼初出現而函水乍起發而戴葉膿未成而乾黑囊未滿而萎  
黃早發先萎方如園林之花榮暴長遽消方似澆潤之潦黃是  
謂命之謚休誇折肱之良

輕或變重方誤服藥而或犯禁忌重或變輕方得逆醫而且善調

疹或受於熱方為煩躁為赤為痛或受於寒方為凝滯為白  
班夾疹疹班疹消而足喜頂平頂陷者平陷起而莫惶切戒臨  
病揮霍最宜用藥審詳病有標本方視急緩以立法藥有補瀉  
方因虛實而立方

憲嗜方醫無定法迷亂方藥無定方大率賤攻而貴補故多喜溫  
而惡涼設若病遇虛寒方溫補有效假如益屬實熱方辛香散  
嘗辛熱下咽陽之盛者必困苦寒入胃陰之盛者乃戕戒汗下  
於首尾方惡攻之說補脾土以制腎水方喜補之常不識補者  
之短奚論攻者之長

形尖圓而光壯方氣之充拓色鮮明而潤澤方血之涵養可以勿  
藥是謂無恙灰白平陷方氣血虛而補之以溫紅艷掀腫方氣  
血熱而瀉之以涼氣至而血不足方雖起發根窠不肥血至而  
氣不足方雖明潤郭郭不長泥章句以舉一隅者守株安可得  
兔馳辨說而執兩端者多岐必然亡羊

脾為水穀之本固不可以不補腎為津液之源尤不可以不恃土  
雖為水之坊水能制火之亢腎主骨髓方倒陷入於骨髓者莫  
救腎司閉藏方變黑至於閉藏者可防是皆歸腎之字豈可謂  
腎之強毒火熾灼方腎水且涸營氣敗壞方脾土亦傷故補腎  
不如救腎而養陰所以濟陽

良則氣血淖澤而不飲聚則氣血凝滯而不章氣血失養痘疹之

傷或受於熱方為煩躁為赤為痛或受於寒方為凝滯為白  
疹順時令之寒喧禁人畜之來往勿動涸刺之具勿燒極毒  
香恐乘虛而易入反助毒以為致痘雖吉而犯多凶屢經性交  
證雖惡而調則善終見安惠

若夫瘡疹之熱相似內外之傷邪火炬赫方正石俱焚真水靜順  
方波浪不揚噴嚏咳嗽方肺金流鑠項急頓悶方肝木披剝呵  
欠驚悸方心雖君主而不寧吐瀉昏睡方脾則倉廩而不藏各  
臟有溢惟腎無象不受穢毒之火獨見耳聾之涼

熱微方毒少熱甚方火旺大熱安靜方毒隨熱出而無慮小熱煩  
躁方毒與熱蓄而可防凶災莫測方又熱又渴輕疎可許方乍  
執乍涼吐瀉勿止方使毒得越而無過驚悸不定方恐毒深入  
而反藏血妄洩於空竅方死期速於禪指詭妄涉於鬼神方發  
候易於返掌

形證定其疎密部位決其存亡如豆紛布方且顆粒而其疎已定  
如麻堆聚方更模糊而其密堪傷換頰透口方庚戌陽明之  
額間額上方壬子太陽之額頭為元首之尊最忌蒙頭項乃關  
津之要偏燃鎖項鼻準初出方淫毒犯於天根耳輪先現方便  
火侵乎玉堂

漸次出方吉兆齊湧出方凶狀痘將出而熱減方藥勿妄收痘正  
出而熱劇方醫宜早防解其火毒方恐傳過而乾枯者其



欲流行而舒暢遠寒熱之化兮損之益之而必使和平功  
夏之令方達之發之而必使長生治其未亂兮微柔土於迨雨  
知其必漸方戒堅冰於春

出欲盡而不留發欲透而長苗漸成寒方氣之所向血漸化水  
方血之所養疎則毒少方頭面不腫而休怕密則毒多兮氣血  
不充而莫荒時日既足兮自翹翹而雜起表裏無邪兮勿汲汲  
以作湯所謂良將用兵善攻不如善守又云上農治田勿助生

於勿志

咽喉急痛兮勿違時而早治頭面預腫兮但引日以必亡小便赤  
清兮大便却欲其堅實淡味可食兮厚味不可以啖膏如淡者

胃氣不損養厚之尤邪益丸或見黑點兮點之速以臙脂或過

沾方浴之貴以水楊瘡痒忽生兮取茵陳以熏燎肥極不寧  
今雖虛漏而傍徨

洋欲知透真不透兮於手足而細察欲知足與不足兮於輔頰  
以端詳設四末之未透取脾胃而服藥如一方之未足視經絡

以求方譬如為山兮勿功虧於簣土又如執熱兮寧濯先於探湯

面頰最嫌破頂骨尤怕焦囊腫忽消兮氣脫請忽妄兮神亡食  
殺則嘔兮胃爛飲水則嗆兮咽傷咬牙兮肝火熾而腎敗藥

兮陽氣弱而陰強膿反乾兮倒陷膿不成兮伏藏叶哭不止兮

毒攻腸胃悶亂不寧兮火烈而骨舍廩不藏兮魂魄歸於瀟瀟  
水泉不止兮姻親泣於北邙

膿血已化收醫相當兆自唇吻兮漿吐結如珠粒斷自人中兮部  
默以意蓋令行秋冬兮依先後而不亂氣應陰陽兮循上下而  
有常類上平乾兮慮乎倒醫額間先收兮謂之不祥痲不著而  
壅腫兮由榮血之淖溢瘡盡裂而皺揭兮此衛氣之殘傷

膏醫不醫當戒不戒便秘未通兮裏氣熱而涼導使溘不實兮中  
氣虛而溫養熱傷皮毛兮惟肺金不收餘氣濕傷肌肉兮黃脾  
土不燥殘漿頭瘡堆膿不平兮孤陽似鯨而不生足瘡包水不  
乾兮純陰如寡而不長飲食減少兮地避引日而整煩熱增劇

今倏忽絕命而亡

若問痲皮之不脫其間病氣之相妨痘若敗壞兮補空痘勿疑番  
次瘡如潰爛兮成潰瘡莫厭膿漿遍身浸淫兮粘被席而最苦

正而腫灌兮息腥臭而再妨利多水液兮此蓄水之病也水去  
盡而自止便多膿血兮此倒靨之證也膿去盡而可詳瘡痕凹

凸兮陷者虛而突者實痲皮嫩薄兮裏則困而外則瘍  
邪氣盡而正復痲皮脫而身康苟幼軀之多病定餘毒之有藏出

或未盡兮無空痘須防卒暴發或未透兮無潰膿必發痘瘍不  
及期兮早收毒火陷而可怕或過期兮不靨邪氣留而堪悵身

熱審其虛羸咽腫觀乎嘔哈忽洒浙而肌熱兮知風寒之外感

是吐瀉而腹痛兮必飲食之內傷

病有苦而眩暈兮凶多吉少之占身無邪而昏瞶兮否夫恭來之

象聲音不出兮求諸肺腎之經非疹復現兮責其心脾之臟非

頰出血者難治洞泄完敗者莫辨勿謂痘收而縱馳勿謂毒去

而怠遲正氣浸長而未復邪氣方消而未央特犯禁忌兮今即

生變恣食肥甘兮後必有殃

疥癩癩潰兮一面癩癢而似鬼癰疽流注兮四肢殘廢而如炬目

腫赤痛兮冷疽入而成醫齒宜黑爛兮熱毒浸而潰牀雖曰餘

毒之為害抑若定數之莫防形容頓改兮令人駭愕調治悔遲

兮空自惆悵謂人不能勝天兮何以立乎醫藥謂醫不如用巫

今安能格乎穹蒼

但逢出痘之歲多求解毒之方重者必輕兮輕者不出凶者變吉

兮吉者何妨其方則有其效未嘗與其先事而輕妄執若臨時

以消詳審歲氣之變祥兮必解其毒視形氣之勇怯兮各平其

臟欲避厲氣傳染兮必先擇地之善故伏藥力調護兮尤要識

醫之良

惺惺參蘇乃參散之妙劑惺惺散參蘇散人參通聖誠疫癘之奇

方人參散毒散防風通聖熱而驚悸兮導赤瀉青合用導赤散

瀉青丸熱而焦渴兮柴胡葛根作湯小柴胡湯升麻葛根湯自

利兮黃芩黃芩芍藥湯不便兮清涼四順清涼散腹痛毒攻兮

勻氣散再加枳實散病劇兮敗毒散更入木香調元可補兮

表裏實者勿飲調元湯承氣可攻兮脾胃弱者莫寧小承氣湯

養正兮黃耆人參甘草解毒兮連翹山豆牛蒡咽喉苦痛兮甘桔

湯中加大力斑疹夾出兮防風散內去硝黃防風通聖散小便

赤澀兮連翹連赤連翹散導赤散大便清洩兮豆蔻木香豆蔻

丸木香散瘡若乾枯兮四物合乎涼膈四物湯東垣涼膈散痘

如黑陷兮奪命助以水楊奪命丹水楊湯浴法赤艷掀腫兮解毒

入生黃歸芍黃連解毒湯灰白平塌兮異攻用桂枝蒼防錢氏

異攻散

氣虛而毒感者無價四君子無價散四君子湯血虛而毒感者

無價四物牛蒡四物湯氣血兩虛兮十全無價十全大補湯便

溺俱阻兮八正三黃八正散三黃丸再用解毒之法以洩毒氣

之滅黑陷審其虛實虛者大補而實者涼膈十全大補湯河瀾

涼膈散痒癩分其急緩急者異攻而緩者調陽陳氏異攻散

元即調元湯昏悶諸毒兮龍腦膏龍腦膏知其妙處煩迷亂兮抱龍

丸莫及其良

滿面燥癩兮百花調水百花清遍身潰爛兮敗草鋪牀敗草散

蛇去目中之層翳蛇散苦參治身上之淫瘡苦參丸虛熱多

汗兮調元湯引用浮麥食積常痛兮脾積丸飲以涼湯飢不喜

食兮異攻宜父錢氏異攻散渴欲飲水兮白木可常白木散

毒通聖丸矣衝陣之先鋒 人參敗毒散防風通聖散 調元異攻

信乎歿後之大將 期元湯錢氏異攻散

大抵醫要識證藥不執方專科溫補者則宗乎文中喜用涼瀉者則師乎仲陽不辨其書分似替冥行於駭徑未會其神分如矮仰望乎宮牆嘆吾年之老分欲深造而力不足惧斯道之海分特發明而言不章嘔盡心肺分非欲立異勞費類舌分豈敢恃長幸取正於具眼徒見咲於大方

類修世醫心法

疹為君火氣本少陰傳於其子今故為脾胃之證乘於其妻今現

乎皮毛之分亦胎毒之所發因疫腐而後成咳嗽噴嚏今辛金

煉於丁火頓悶泣出今君主御乎於軍迎而奪之分其鋒易挫

隨而擊之今其銳難勝如折勾萌今斧斤不用苟待燎原今臣

石俱焚

其色如斑今摸之有迹其形似痘今視之無津朝出暮收今發之

於陽暮出朝收今發之於陰變化莫測出沒靡定大抵愛赤而

惡黑治者喜涼而忌溫赤如點朱今火明彰頭之象黑如灑墨

今火燄曛昧之甚制以酸涼今收炎光於麗澤投以辛熱今縱

赫曦於重明

敗毒防風開發斬關之將 人參敗毒散防風通聖散 解毒連翹制

伏降虜之兵 黃連解毒湯連翹散 如錦爛熳今服化斑而艷欵

化斑湯 以火熏蒸今欵涼膈而熱清 東垣涼膈散 咽痛今甘桔

牛勞止咳嗽更能潤肺 甘桔湯 瀉泄今導赤為藥定驚悸又可

凉心 導赤散一名火府湯 便秘今承氣膽導 調元承氣湯胆導

便洩今黃芩猪苓 黃芩為藥湯猪苓湯 大渴今膈焦置瓜瓞於

白虎 白虎湯 苦煩今裏熱加山梔於安神 安神丸 無伐天和分

使陰陽之適調勿犯胃氣今雖攻補之不盡

痘欲盡發而不晉疹欲盡出而無病或邪氣之鬱過今留而不去

或正氣之損傷兮因而未伸毒歸五臟遂有四證毒歸脾胃兮  
泄瀉不止而變痢毒歸心肝兮煩熱不退而發驚咳嗽久而血  
出兮毒歸於肺牙齒爛而疳蝕兮毒歸於腎輕者從制以嚮善  
平之有功重者拒敵而肆惡攻之不勝

熱不除者調元湯加麥冬知母作箇兮兼以抱龍溫驚抱龍丸

九錢氏溫驚丸 咳不止者阿膠散小阿膠散加杏仁惡實帶血

今專以補肺太平錢氏補肺阿膠散十藥神膏太平丸注下兮

吳攻猪苓澤瀉錢氏異攻散虛滑者大作參苓參苓白朮散滯

下兮異攻當歸芍藥休息者少與真人真人養臟湯惟有牙疳

之病原呼走馬之名初息食而腐肉漸血出而穿齦內服地黃

今制其火性地黃丸外擦蚊合兮殺其蠶精蚊合散牙若脫落

今崩砂之狀可畏聲若啞頃兮孤惑之謠難明

憲出不出兮發之初惺惺次通聖奪命大發而有準惺惺散防風

通聖散奪命丹 應收不收兮解之初葛根次化斑涼膈大解而

最靈升麻葛根湯化斑湯河間涼膈散色淡白兮為虛四物去

川芎加紅花桂枝四物湯色紫黑兮血熱化斑去人參加玄參

燒糞化斑湯奪命發斑疹之聖奪命丹無價解疫癘之神無價散

發不出而煩躁兮屢不能臘黑不變而諸妄兮食不及新熟蒸

蒸兮色赤痢滴滴兮氣腥羸瘦骨肉之脫癢癢神識之昏喘急

今胸高有登痺爛兮漏腮缺唇休飲三世之妙手難帶一息之

遊魂

豈不聞誤服湯丸兮不如勿藥又不見特犯禁忌兮可以自肯發

吃鹹酸兮咳嗽連綿而未止喜啖辛燥兮火熱熾灼而不寧耳

甜過而齒齲生冷多而糞清則生風之畜魚則動火之鱗鰻

魚食而亂食風火併而啓疊邪反激甚兮為斑疹而不息毒反

深入兮值疫癘而再經斯則疹之遺毒亦若疽之餘證

欲決內傷須詳外證目常赤痛兮青童抱火鼻常翹切兮素女卧

薪病牙齒以終身兮玄武困於湯鑊發癩癩而連年兮朱雀驚

於燒林波數短澁兮乃州都之遭火便溇垢壘兮必含廩之被

焚哮喘炎上之象丹瘤赤標之形唇舌多瘡兮門戶殘煙未熄

咽喉常腫兮管籥餘燼猶存苟求其故兮則一言之可盡敬撰

其本兮豈一旦之能乎噫此賦之作效蛙之鳴詞雖鄙俚兮積

如累石法則珍秘兮故曰碎金

嘉靖丙午予嘗手作小兒及痘疹賦西江月以教豚犬至己

酉冬又著痘疹心要久藏於家不知有交相傳錄者更剽竊

為已作刊之彼特見亦未定信筆草草安可示人今特改正

以補前之罅漏耳

隆慶戊辰秋九月全自述

碎金賦畢

痘疹世醫心法卷之一

羅田 密齋 萬全 集

○痘疹節要總括論

治痘節要諸家論之已詳大抵臨病應變因時制宜其用歸於使人正氣不損邪氣得釋而已後世不知古人制方一以中和為貴曲學偏見滯於一隅喜行溫補者既味乎解毒之巧專用涼瀉者又失其和中之旨妄投湯餌僥倖成功設遇脈證乖常時勢差異惟束手待斃焉耳况虛實實令人夭折者又紛然乎其間哉予因此懼乃蒐輯往哲診治之法及先君經驗之方彙成歌括凡百九十四首序次成書庶臨病之工閱而取之參詳

審諒斟酌施治以收十全之功幸無得魚而忘筌也

○治痘總括 九一十九首

痘疹原因胎毒成

發生須是行天行

如逢疫癘將成候

預解湯丸最可憑

痘疹之病皆由父母胎毒蓄於命門之中命門者右腎相火也為人身生化之本故毒藏焉如過冬令溫和陽氣蒸漫人則感之觸動相火至春夏生長之時其毒適發傳染相似是謂天行疫癘也未出痘疹者但覺冬溫即當預防宜服解毒之藥如辰砂散八十消毒保嬰丹十一代天宣化丸十二皆可用也頻頻與之使疹疹之毒輕減自然易出易收無陷伏轉過留連之患其辰砂散消毒

亦代天宣化丸以解時行疫癘之毒則可或因父母精血不足者或其人素有他疾者或發熱之特別臟形證發見者並宜煎而治之不可徒恃解毒而竟忘其本也

如脾胃素弱者宜以養脾為重解毒次之養脾丸一百六服三之二解毒三之一

如因父母奉養過厚精血畜毒素多胎病者宜二毒併解以溯源解毒湯一百八代天宣化丸十二相間服之

吾邑黃鳳山為陳晉縣丞時得生一子及歸甫五歲邑中出痘乃請予託以預解痘毒之法予曰觀令嗣氣色明潤胎稟壯實

痘出必疎若更服解毒之藥則益疎矣乃與代天宣化丸服之後果輕疎未藥而安

未病先知是上工

能言輕重吉和凶

不離氣色分清濁

臟腑精微阿堵中

經云上工治未病者或望而知之或聞而知之或問而知之或切脈而知之是謂神聖工巧疹疹之毒發於五臟而心主之故曰諸痛痒瘡皆屬於心心之華在面吉凶輕重可望見其氣色之清濁而知之○如青氣見者此肝之色肝木生心火為實邪宜先瀉肝活活湯主之十○如赤氣見者此心本經之色為正邪宜瀉心導赤散主之三十五○如黃紅氣見口唇燥者此脾之形色心火生脾土為虛邪宜先瀉脾瀉黃散主之一百九弄舌者亦脾熱以導

赤散瀉黃散合治之如白色見帶燥鼻中乾或清涕出者此肺之  
色心火尅肺金宜瀉肺中之火邪瀉白散五十四加黃芩山柅仁  
天花粉桔梗主之

如黑氣色見者此腎之真臟色見水尅火為賊邪不治

預知瘡疹吉凶機 氣色都於面部推

年上山根尤緊要 紅光可喜黯青疑

五臟皆屬於面左頰為肝右頰為肺額上為心頰為腎鼻為脾又  
目為肝之竅鼻為肺之竅口為脾之竅耳為腎之竅舌為心之苗  
若未出瘡疹之先面部諸位明潤者吉暗燥者凶又相書分山根  
為命宮年上管疾厄若二宮紅黃光晶者吉青黑昏暗者凶故二處

尤緊要也

○凡天行痘疹之時傳染流布男女大小有未出痘疹者視其形  
色情性可以預言輕重吉凶也此吾家傳秘訣賢於命卜遠矣  
五臟精華皆見於面而臟氣獨盛者色亦應之故肝氣盛者色  
青心氣盛者色赤脾氣盛者色黃肺氣盛者色白腎氣盛者色  
黑但欲明潤不欲枯槁吉凶之兆於此決矣  
一觀其色紅白明潤與平日同無改變者吉如紅赤而太嬌眊白  
而無采頰然改變異於平時者凶又如額有青紋目有赤脉口  
有黑氣耳有塵痕者大凶之兆也  
二觀其形精神爽暢動止便利言語清亮者無病也吉如精神萎

弱動止遲留言語低微異如平時者凶又原具壽相者吉如

天相頭破顛僻項小 不能任元脚細不能任身 目無精采或睛

露神啼聲斷續笑語無情 不由喜引自笑語也 聰慧太早肉浮

骨軟者凶之兆也

三觀其情性未發熱時忽生喜心若與父母愛戀不忍捨者及聞

見性異言語妄誕者凶之兆也

吾邑大尹雲閣朱公義男一子甫周歲尹心愛之問全曰此子  
可養全曰其笑無情恐出痘耳尹問何謂全曰訣云喜引繞左  
笑此子不待喜引自笑謂之無情笑者心之聲火之象也經曰  
諸痛痒瘡瘍皆屬心火故恐出痘也尹疑之次年果出痘頭面

預腫癢痒而死尹謂全曰爾言驗矣

吾友胡三溪中年再生一子項小聲小託吾調理予告之曰項  
者頭之莖也名曰天柱項不任元天柱頹矣聲者氣之發也聲  
微不揚元氣弱也誠恐出痘不勝其毒果九歲出痘乍見乍隱  
鼻中滴血而卒

邑人李新芳長子方四歲得驚風請吾醫治得愈乃曰吾見託  
在門下賴得保全愚夫婦之幸也敢不厚報予曰令嗣胎稟怯  
弱精神短少若調理數年胃氣充實出痘無妨但恐來得太急  
也次年果出痘稠密不能成膿而卒  
吾邑周柳溪惟一子五歲未出痘癸丑正月二十三日發熱請

予視之見其面上多青黑氣色目視無神元氣怯弱予告之曰當亟治之彼不喜吾言及詰予曰不亟治若何予曰邪氣有餘正氣不足若不亟治後發血泡不可為也彼更請醫張鵬作外感治且汗且下至二十八日果發血泡而卒柳溪今猶無子惜哉

蕪水縣金谷山周惠長男婦魯氏新寡二男二女皆未出痘聞吾在周望峯家醫痘因其父魯希賢嘗有舊好特在女家請予視其男女以决痘之輕重予往觀之見其二男長女而色雖嬌赤光太露額有青紋惟小女形實氣充面色明瑩乃告之曰幸無出痘惟小女吉也可預解之魯性太直不聽預解之說半

後長女二男相繼死於痘厄小女獨存

蕪水縣徐長溪生三子癸丑春出痘季子先病痘卒次子又卒惟長子存亟請吾往治之時未發熱吾觀長溪其色甚憂其情甚苦蓋在危險中無可為解救者觀其長男而告之曰令嗣當出痘之時精神爽健氣色光晶年壽明潤印堂黃光此乃壽相又順候也其痘必疎不須醫治勿疑慮也數日後果發熱出痘甚疎未曾服藥而安長溪謝曰先生預料之神敢忘厚報

發散為陽收斂陰 始終一氣自流形  
試觀春夏多蕃秀 繞到秋冬少繁榮  
嘗論痘瘡之證乃人身中一陽之氣始於發生終於收斂流行

變以至於盡譬諸草木春生夏長秋實冬藏皆此一陽之氣自始始終者也故治痘者先要識得此氣其來不可禦其序不可紊盡其裁成輔相之道以左右民然後謂之良醫也所謂道者明於陰陽和於術數也蓋天以五氣寒熱溫涼平也地食人以五味

辛甘酸苦 故溫熱為陽而寒涼為陰地有陰陽故

辛甘為陽而酸苦鹹為陰一物之中亦有陰陽故氣薄者陽中之陽厚者陽中之陰味薄者陰中之陽厚者陰中之陰清陽升浮發腠理而實四肢濁陰降沉走五臟而歸六腑所謂明於陰陽者此也至於立方之旨如辛甘發散為陽則用辛涼甘寒之劑味雖陽而氣則陰也酸苦湧泄為陰則用酸熱苦溫之劑味雖陰而氣則

陽也氣味相和陰陽相濟必使陽毒之氣順其流行之勢而不失其運變之序始於春夏終於秋冬所謂和於術數者此也今之醫症者辛甘溫熱之群聚偏於陽而不知濟之以陰酸苦寒涼之合劑偏於陰而不知濟之以陽使痘毒之氣有春無秋有冬無夏是皆昧於陰陽之理不知術數之奧以天人命醫云乎哉

首尾汗下謂不宜 尋常執着豈通醫  
若分虛實能權變 可奪乾坤造化機

首尾不可汗下古人必不所為而發今徒拘執不可汗下之言設遇外感寒邪腠理閉密者其出不快其發不透不與辛甘發散之劑寧無壅遏之患乎又如大小便秘結者不與苦寒洩利之劑

無脈滿煩躁乎但察其虛實動靜權交可汗即汗可下即下中病則已勿過其制然後謂之通醫

吾縣學訓導馬公順蜀人也一孫男五歲出痘至八九日膿成將醫時忽腹中痛煩躁叫哭大便又秘舉家驚惶予曰莫憂此結糞也當急下之馬公曰痘疹首尾不可下今當收斂中氣要實豈敢下耶予思若不急下轉加腹脹氣喘悶亂則不救矣乃作桂枝湯暗入酒蒸大黃煎服後取下燥糞腹痛即止痘亦收斂而安馬公知之謝曰非子通變幾誤此孫

痘疹無病勿服藥

實實虛虛不可錯

幾多狂替昧經文

壁中安鼠翻成惡

痘疹一科自始至終如無病者不可服藥古人云無病服藥如壁中安鼠誠確論也蓋治病之工只有補瀉二法果虛而補之可也若元氣素厚穀氣素強者而復補之則有實實之變果實而瀉之可也若元氣素薄穀氣素弱者而復瀉之則有虛虛之變如此之類豈不為壁中安鼠者乎今之業醫者但思醫不用藥何以為功而取利也不論虛實妄投藥餌幸而中病則大言以彰其功一有誤焉則掩飾其過而推託於命矣

痘疹傷寒疑似間

古人分證可相參

莫將汗劑先輕試

發散惟令表裏安

痘疹發熱與傷寒相似但傷寒只見一經形證若痘疹則五臟之

證皆見如呵欠頤悶肝證也乍涼乍熱手足稍冷多睡脾證也燥腮赤咳嗽噴嚏肺證也驚悸心證也能涼耳涼腎之平證也如初發熱疑似之時不可遽用發汗之劑如麻黃桂枝湯類蓋疹表裏俱熱苟輕發汗則腠理開張表氣益虛臟腑陽盛其熱轉增但以升麻葛根湯一人參敗毒散二羌活湯十參蘇飲三之屬解之使表裏氣和

凡痘疹五臟見證要察何臟之證惟甚即主其臟之毒多○如肝證毒多者必發水泡生癢痒成目疾宜預解肝之毒羌活湯十加青皮柴胡○肺證毒多者必增喘嗽煩渴不止手插眉目鼻面宜預解肺之毒瀉白散五十四合井桔湯七加牛旁子天花粉○心

證毒多者必伏不起謔妄飲水煩哭咬牙宜預解心之毒導赤散三十五加黃連辰砂○脾證毒多者必成灰白色痒癩吐利宜預保養脾胃以解其毒四君子湯二十調元湯十八加白芍藥防風運翹○腎不見平證耳聾但熱者死候也

痘疹主治解表和中解毒三法也解表兼發散之義使邪氣盡出於外不使留伏於中如防風白芷荆芥穗升麻葛根柴胡桂枝之屬和中專主脾胃熱助血氣使裏氣常實血氣不虧功養痘疹而待其成不致殫瀉倒陷如昔著人參白芍藥當歸木香陳皮之屬解毒只瀉火涼血清氣使毒邪有制不為正害如山豆根大力子紫草連翹芩連梔子之屬



瘡發熱疑似時

傷寒傷食宜之

試將解發真良劑

入口能令解却疑

痘疹發熱與傷寒傷食相似疑似之間可以解發之藥服之若是痘證則痘子即出不是痘證則熱退而解矣如證似傷寒者面赤紫肩敗毒散以主之 二附方 證似傷食者面黃香蘇敗毒散主之 二附方

始終清便自調佳

便溺阻艱事可嗟

腹脹喘煩多壅遏

急施疎導解留邪

痘疹始終要小便長而清大便疎而潤謂之裏氣和若有阻艱即毒邪留伏於裏腸胃壅遏不得運化但見少有阻澁須微利之小

便澁者導赤散 三十五

連翹湯 八十八

大便鞭二三日不更衣者

柴胡飲子良 九十九

胆導法 五十一

大小便俱不通者胆導法 五十一

柴胡飲子良 九十九

附方

如逡巡隱忍不能早治以致腹脹

滿喘氣煩躁者治無及矣

瘡疹為陽待熱成

微微發熱始和平

假如大熱身猶火

解毒常教小便清

瘡疹屬陽非熱不能成就故治不可盡除其熱但微發熱不渴大小便自調此肌表瘡本之熱非裏熱也謂之表裏無邪不可妄治身熱如火瘡勢稠密其毒必盛宜解毒兼利小便連翹升麻湯 六 連翹湯 八十八 主之

始終能食最為良

平日其人脾胃強

食少却防中氣弱

滯留引日變為瘡

痘疹始終以脾胃為主故人能飲食者氣血充實自然易壯易盛食少者起發收靨不能快易治痘之工於食少者必須詳審若平日能食今因痘出而食頓減或咽痛飢欲食而不能宜解利咽喉耳枯湯 七 加牛旁子或咽痛或咽不飢不欲食又看大便何如大便鞭此賴平日穀氣以為主雖數日不便無妨不可妄補以增內熱亦不可妄解毒以損脾胃大便一日一行則內之穀氣有限而氣血易衰須用和中四君子湯 二十 加多黃耆木香青皮不可解毒者脾胃虛也大便瀉則裏虛宜急止其瀉四君子湯 二十

蓄蓄建中湯 三十一

理中湯 三十四

並加訶子肉合肉豆蔻九 四

或錢氏異攻散 四十四

益黃散 四十五

甚則用陳氏木香散 二十五

異攻散 二十六

此二藥太峻非內虛瀉甚不可輕用也若

向能食一旦食減不咽痛但腹中滿或痛此必傷食以養脾九 一百六

木香大安丸 九十一

消導之甚則以丁香脾積丸 三十三

原

物湯下以微利止復食以四君子湯 二十 合勻氣散 十三 或養脾九 一百六 調養之

最宜安靜號和平

表裏無邪志自寧

忽然煩擾宜詳審

外怕神亡轉悶昏

痘疹以安靜為貴飲食坐卧如常此表裏無邪號曰和平忽然煩

痘疹本宜審視瘡形色如瘡起發光壯不渴大小便調者

疹正發毒邪散佈氣血稠急而痛謂之痛煩不須施治待膿

化痛止而煩去矣如瘡正色間之不痛但覺心煩不安此內熱也

心惡執謂之執煩以導赤散三十五加梔子仁麥門冬或以牛黃

清心丸三十六燈心湯下如瘡紅紫乾燥壯執口渴狂亂昏悶嚴

語如見鬼狀者退火回生丹主之一百五附方如瘡痒癢此欲陷

也瘡乍見乍隱此有伏也目閉言妄謂之神喪不治

吾邑汪我溪次女乃胡三溪次孫之媳丁卯冬出痘請吾長兄

和忠醫之起發貫臍時嘿嘿昏睡不來飲食予適過其家聞之

乃謂忠曰此心血不足邪火內熏神昏證也不亟治恐有變命

以龍腦安神丸與服神清氣爽甦醒而安

又程雙泉之孫希文次子辛未春出痘發熱現形時便煩躁謔

語雙溪聞吾在縣來告以病證且乞一方予授一方用木通山

梔仁麥門冬牛勞子連翹耳草燈心作引水煎調辰砂末服之

連進三劑病退痘出如期收較而安

痒癢方將倒陷時 急馮妙劑強扶持

空中痘出無番次 損處多膿功可施

痘疹喜厚實堅牢尖員飽滿若頂平皮薄色淡忽然癢痒損痛者

此脾胃弱肌肉虛欲變倒陷也宜十全大補湯三十八加防風荆

芥穗服之外用陳薰法八十一如痘空中原無痘處復出大小

疹作三四番出其破損處復加腫灌成膿能食大便調者

疹痒不止皮脫斑乾或利或大便秘悶亂者此已陷也不可

治

陷伏須分實與虛 莫於臨證更躊躇

死生倏忽如翻掌 幽谷赤回慶有餘

凡痘疹內者不出謂之伏外者復入謂之陷陷伏之證有實有虛

如大熱渴大小便不通煩躁謔妄有見聞狂亂腹脹者此實也

實者邪氣壅遏侵蝕正氣宜內服百祥丸五十二牛李膏五十三

或宣風散九十二毒藥百祥丸一百二十六外用水楊湯七十五

浴之得利瘡出者佳更以仙聖散六十二加味四聖散六十四並

加燒人屎調之如因吐瀉不止渴喜飲水腹脹手足冷或寒戰咬

牙者此虛也虛者正氣虛弱不能制伏邪氣令得反覆宜內服

班湯十五合勻氣散十三奪命丹十七甚則陳氏木香散二十五

異攻散二十六外用水楊浴之七十五得泄止瘡出者佳更以

全大補湯三十八加燒人屎調之此上二證並用神應奪命丹

七附方 如法施治瘡不出反加煩躁昏不知人者死證也

大抵看痘之法其出欲盡出不盡者伏也其發欲透發不透及乎

塌者倒陷也其收欲淨膿潰皮破收不乾淨者倒靨也陷伏之

謂之逆證非衝擊猛峻之劑安能成起死回生之功故時醫欲以

尋常之藥治陷伏之病其猶放雀搏鷄驅羊敵虎其弗克也

命丹 甚者神應奪命丹主之 十七附方 如倒懸 氣實者解表內托散 一百二十一附方 氣虛者調元湯 十八加白

芷桂防風當歸主之服藥之後有三驗法原於後腫以成膿者一

驗也原瘡已乾別於空中復出一層起發寒膿但如疔痘收醫者

二驗也不腫不出只變有利下膿血者三驗也有此三驗者吉無

四時分治候須明 暑濕風寒不可輕

異氣莫教相觸犯 致令翻變亂其真

古人養生或治病者常順四時之氣謂之勿伐天和如春夏養陽

秋冬養陰飲食起居各有攸宜凡瘡疹發熱之時其初發表解肌

四時各有主方春用羌活湯 夏用五苓散 二十八 秋用參蘇飲

冬用五積散 八十六 四時通用人參敗毒散 二 又如春肝旺風

木主事調養之法宜四物湯 十九 加防風黃芩木香青皮羌活以

折風木之勝又以四君子湯 二十 加白芍藥桂心以補脾之受制

相間服之 〇夏心旺熱火主事宜黃連解毒湯 八十九 合天水散

九十四 以清熱火之勝又以調元湯 十八 加麥門冬五味子以補

肺之不足 〇秋肺旺燥金主事宜瀉白散 五十四 合甘桔湯 七加

牛蒡子馬兜鈴以散肺中之邪又以四物湯 十九 去川芎加大棗

門冬天花粉以潤其燥 〇冬腎旺寒水主事宜五積散 八十六 以

散表之寒理中湯 三十四 加黃耆炙木香丁香以勝裏之寒此四

〇如天有暴風連日不止恐有風邪桂枝湯 五

寒四君子湯 二十 加桂枝生薑炙兩濕盛五苓散 二十八 加蒼朮

此四候者必瘡變色有異證可依其法治之苟無他候不可妄治

也惟謹惟慎遠風寒毋令大熱毋令大寒但常和緩更常服理

膏 一百五 蓋此方能禦風邪辟惡氣透肌快斑疹也房室之中常

燒辟穢香 九十三 勿得間斷

治痘皆言要補脾 補中有害少人知

一朝陽盛陰先絕 到此臨危悔却遲

痘瘡雖以脾胃為主但謂不可攻擊以損中和之氣然亦不可妄

補而使之太過也若果吐利飲食少者四君子湯 二十 聖藥也苟

能食大便鞭此裏本實復以四君子與之則為實實陽勝陰虧不

久而生變矣况白木燥津液枯者滋液氣盛血枯者其貽害豈

小哉吾見世人習用補藥者或增煩躁或成潰爛往往不悟良可

慨夫 痘瘡脈候貴和平 胃氣悠長最要清

弦數浮洪為實候 微沉短澀是虛因

痘瘡之脈中和安平為貴不可躁疾微小故曰脈靜身涼者生脈

躁身熱者死又陽病得陰脈者死夫四時以胃氣為本胃氣者弦

不弦石不石也故弦數浮洪為太過為實實者邪氣實也沉澀微

瀉為不及為虛者正氣虛也皆死候之脉所以人無自氣則死也

痘逆證逆色脉逆

此候未聞人救得

但觀色脉有可為

對病真藥須詳細

治痘之法色脉為本病證為標若痘逆如陷伏之類證逆如煩躁悶亂腹脹足冷之類色逆如氣色昏黯皮肉黧黑之類脉逆如躁疾鼓搏謂之陽盛陰虛沉微濡弱謂之陰盛陽虛四逆俱全標本同病表裏皆傷不可治也若只痘逆證逆六脉調勻五色明潤者此標病本不病也急治其標以救其本對病之藥良工得之

鄭陽撫治右僉都御史孫公只一女七歲已巳四月初七日發

痘疹世醫心法

卷一

十一

十一

熱全在某下見其面赤顯燥知是痘證初八日口角傍便見紅點如蚊跡狀不成顆粒一逆也腰痛腹又痛二逆也昏睡謔語三逆也乾嘔四逆也初九日公見其狀撫膺大慟全以色脉無恙再二慰之不信但垂淚言曰爾痘疹書明言不治何又相誑耶全告曰此病在經絡猶可治也但因中氣又虛不能驅毒外出耳只要保全無事公曰固所願也乃命進藥予用保元湯以補其中氣加羌活防風荆芥柴胡以為發散表邪之用木香山查以為驅逐裏邪之用調辰砂末以為解毒之用初九初十日連進三劑十三日午時忽然昏暈目閉口禁神色俱變公與夫人皆哭全急告曰此有汗來也汗出痘亦隨出謂之胃

痘乃吉兆也須更視之果得大汗而痘證以矣復用錢氏異功散加黃耆白芷調理而安公喜謝曰吾為爾刻痘疹書今有用矣

壬申二月朔黃州府王蒸湘一子一歲半出痘請予往治其痘毒以備其詳時有童醫在谷曰正月二十七日發熱二十八日現形自額上起今三日矣予思重者一齊湧出額上初出者重三五成叢者重五心俱有者重鎖項者重乃逆痘也及審其証腹脹大而緊腸中汨汨有聲大便如黃金色乃脾敗逆證也因其一子託治甚切設法調治腹脹不減腸鳴如故起發之初心窩中有一痘鼓漿者隨即破滅背脊盡成水泡目中淚出兩拳

痘疹世醫心法

卷一

十一

十一

緊握予甚恐此脾土敗而肝木勝之候也蓋肝為水泡其為變也握不泣而淚出肝絕也自後若作癢痒則劇矣未五日而唇瘡乾黑背脊盡破診其脉濡弱沉細其脉又逆六日而痒作揉頭扭項逆證也且求粥食且急病名除中又逆證也予急進保元湯合桂枝湯調獨聖散服之復見紅點蒸湘喜曰此有生意矣予曰幸以漸出一層小痘則吉只恐膏之將滅也必大明而後滅果紅點復隱加喘而壞痛哉

惟痘形容有數般

上醫臨證盡須諳

慢誇君有如神術

縱療何能得保全

惟痘者乃逆痘中之最甚者也形證不一宜辨之

一痘子初出時面胸手足已見紅點却不起發不成膿水隨即收斂若加悶亂氣喘者即死此內陷證也若無喘煩之證名曰試痘過五七日復發熱出痘者其痘必重

一痘子出現三兩成叢根脚堅硬成塊者此名痘母不治六七日死

一痘子將出身上有紅腫結硬處似癩非癩似癰非癰亦名痘母不治三五日死

一痘子初出便成血泡或是水泡隨即破壞此名爛痘不治二三日死

一痘子出後遍身都是空殼不作膿水者此名空痘不治八九日死不死者亦終難毒難調

一痘子出現起發之時中有乾墨者此名鬼痘宜用臘脂水塗勿使蔓延若不急治當醫不醫乍起乍塌多作番次而出綿延日久而死

一痘子出現起發之時中間有痛如刀刺者叫哭不止此名痘疔不治五六日死

一痘子起發之時枯燥不潤塌伏不起皮膚皺揭者此名乾痘不治五六日加煩滿喘急而死

一痘子起發之時皮膚易破摸之濕手者此名濕痘不治六七日痒癩而死

一痘子起發之時瘡色嬌艷皮肉緋紅者此名嫩痘八九日後不能成痂痒癩而死

一痘子起發養漿之時瘡頭有孔漿水漏出者此名漏瘡不治五六日後痒癩而死

一痘子膿水將成之時其瘡自破有孔而深此名倒陷不治

一痘子將醫之時不能成痂皮脫肉黑者此名倒靨不治

一痘子收靨之初不能成痂皮肉潰爛膿水淋漓者此名痘癩能食則生不能食則死

發熱證治歌括 凡一十

痘疹發熱似傷寒

疎解透肌斑毒出

傷風寒腠理閉密陽氣拂鬱而發熱其證惡寒假人怕露頭面以

溫熱之刺發之邪氣去陽氣舒暢汗出而解再傳入於裏為痞

滿燥實也痘疹發熱於裏陽氣蒸而熱其證惡熱喜露頭面以

溫涼之劑解之使榮衛疎通陰陽和暢毒由筋骨腠腑而達於肌

肉皮毛漸化而解之不留連轉過於裏也

吾邑大尹雲閣朱公一子九歲庚申三月發熱嘔吐召全視之

告曰痘證也公曰不然昔在四川任所出過乃指面上痘跡示

之全曰此水痘癍跡非正痘癍也公堅執是傷食證不是痘證

全辨之曰瘡疹發熱與傷寒傷食相似傷寒發熱則面紅手足

微溫傷食發熱則面黃白手足壯熱痘疹發熱男則面黃體重

女則面赤顯燥其足俱涼今公子身熱面黃足涼痘證諦也經

云痘乃胎毒五臟各具一證發熱呵欠驚悸心也項急頓悶肝

也咳嗽噴嚏肺也吐瀉昏瞶脾也耳涼飢涼足涼腎也以此論

之乃痘證非傷食也公又駁曰未見五臟諸證只嘔吐足涼且

在蜀中出過痘跡可驗是傷食證非痘也全曰公子脾胃素弱

痘毒乘虛故發在脾但見嘔吐一證熱纒三日姑俟明日再議

次日以燈視之皮下隱隱紅點而唇邊已報痘矣公惟一子心

甚憂懼全告曰吉顆粒分明部位正當此順痘也公問宜服何

藥全曰痘疹無病不宜服藥但適其寒溫調其飲食期十三日

而安公喜親書儒醫二字立扁謝之

發表時師少定方

古人專主葛根湯

能通權變知增損

何必多方立紀綱

古人治痘以葛根湯為主後世好奇多立方法法愈多而治愈難

矣苟能變通自發熱以至收靨葛根湯皆可增損用之不特發表

解肌而已今葛根湯一為主治隨證立增損法于後

○初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風○口乾渴內熱也加

葛粉天花粉麥門冬○自利加條實黃芩生用○嘔吐加半夏

生薑○腹中痛加木香青皮枳殼山楂肉○腰疼加獨活北細

辛○頭疼加羌活藜蘆本薑荆子○驚搐加木通生地黃熾心○

小便少加木通車前子瞿麥○大便秘加大黃○衄血加山梔

仁玄參生地黃○發熱三四日熱甚不減加解毒藥大力子連

翹紫草桔梗○瘡不出加防風蟬蛻荆芥穗紅花子○眼痛加

蜜蒙花柴胡龍膽草○瘡出後太稠密加人參當歸木香紫草

大力子防風桔梗○咽痛加桔梗連翹○瘡乾或帶紫或色大

赤者血熱也加當歸稍生地黃紅花地骨皮牡丹皮○瘡灰白

色平陷者氣虛也加人參白朮防風木香官桂○手足瘡不

脾胃不足也加防風官桂人參黃耆○瘡太密起發不透又渴者此津液不足加人參麥門冬天花粉○泄瀉者裏虛也加人參白朮訶子白茯苓○瘡不着痂者濕熱也加黃耆防風官桂白芷

解表升麻湯最良

紅斑雖見飲何妨

時師膠柱無通變

纔見紅斑不敢嘗

古人謂但見紅點便不可服升麻葛根湯恐發得表虛也此蓋為痘疎毒少者言後人不達立言之旨遽謂凡出痘于纔見紅點真不可服殊不知升麻葛根湯四味乃發表解毒疎通血氣升降陰陽之劑痘出太密正宜常服以解之令陷者升之燥者潤之鬱者疎之過者平之陰精不衰而陽毒不亢也苟謂痘疎毒少者雖他藥不可服豈葛根湯乎

瘡疹未形先發熱

吉凶輕重如何別

熱微毒少古堪言

執甚毒多凶可決

瘡疹發熱熱氣微者其毒必少痘出自疎易發易醫不須服藥熱氣甚者其毒必多痘出自密難發難醫且多他變宜預解之宜連翹升麻湯六或如聖湯一百解毒快班湯一百四並合代天宣化丸十二主之○或向熱微痘出反密者其人必口渴渴唇焦裂小便赤少大便秘身雖不大熱却蒸蒸然此毒深熱亦深故表不大熱而裏熱也宜急解之柴胡飲下二十○或有熱甚痘出反疏者

人必不渴唇潤目中無赤脉大小便調身雖大熱但焮焮然此毒淺執亦淺故表熱裏氣和也只以升麻葛根湯

發熱大渴執在中

舌燥唇焦毒火攻

莫比尋常此小渴

養陰解毒有神功

此心經出痘證也痘疹發熱有不渴者執在表不在裏也有小渴者痘疹之執生於內心主執心移執於肺故渴此常候耳切不可與冷水紅柿西瓜之屬恐冷傷脾損肺但與陳癩菜作湯飲之若大渴益乾唇焦古燥此心火大炎腎水不升毒火妄蒸血枯液耗宜急解之葛根解毒湯二十大劑飲之不止更加黃連以瀉心火之有餘黃柏知母以滋腎水之不足舌潤則生舌如芒刺則死蓋舌乃心之苗少陰之脉榮於舌也○如發熱自利而渴者此津液不足也黃芩湯四十加人參白朮麥門冬主之

執時腹痛陣難禁

臟腑之中毒氣侵

發散疎通如痛減

切妨陷伏變非輕

此脾經出痘證也訣云發熱肚中痛班瘡腹內攻發多防不透發少更防難可見瘡疹腹痛乃惡候也凡發熱腹中便痛者此毒氣內攻也宜發表疎裏枝大黃湯主之二十若原無腹痛發熱二三日後大便不通而痛者此燥屎與毒相併而痛也膽道法五十宣風散九十擇而用之有謗妄狂亂者內服退火回生丹五十外用膽道法五十原無腹痛或因飲冷水而痛者此冷痛也理中湯

三十加桂心或因多食而痛者此食積痛也微則木香大安丸  
一甚則承氣湯 二十丁香脾積丸 三十原物湯已上諸可下者若

脾胃素弱之人不可與下及傷脾胃宜補中順氣湯主之附方  
原無腹痛自利後痛者此虛痛也黃芩建中湯加木香青皮發熱

自利又腹痛者此亦毒也黃芩湯四十加木香青皮或化毒湯主  
之三十如瘡乍出乍隱此伏也防風通聖散四瘡出盡者丹以神

應奪命丹十七大發之瘡不出者勿治  
黃岡縣索希文在吾縣作椽庚申一子十三歲染痘發熱腹中

痛煩躁而渴先請萬世喬作傷食治熱不除腹痛轉甚復請予  
治予曰此痘也腹痛者毒氣內攻也煩躁而渴者神不得安津

液乾也法當解毒耗裏不可緩也世喬堅執為傷食證五日後  
其痘一齊湧出未及起發乾枯內陷而卒其母泣曰悔不用家

齋先生之言  
發熱腰疼最可訝 膀胱傳腎變凶邪

急宜發散陰中火 莫待流殃却痛嗟  
此腎與膀胱二經出痘證也痘疹初發熱便腰痛其後多不可治

之證蓋由太陽膀胱而傳小腸乃自上而內而外為順今由  
膀胱傳入於腎乃陷於至陰之下而不得升伏於骨髓之中而不

能出故瘡疹歸腎者死但竟腰痛宜急發散令毒化解復出於本  
陽而行陽道也人參敗毒散二或五苓散加獨活細辛主之三十一

英山縣一富家子年十六患痘發熱甚痛米請予治予問曾  
配否曰未也乃用人參敗毒散連進二服痛止痘出而安若曾  
有房室者不可治也

腰痛雖云大不祥 女輕男重更消詳  
未婚可許真元固 已娶堪憂相火狂

經曰腰者腎之府也乃人身之樞紐諸骨之根抵痘疹腰痛最為  
大忌女子抱陰而生其中有陽男子抱陽而生其中有陰陽道常

饒陰道常乏故男重女輕也男子未婚者腎中之真陰未損已娶  
者則陰水虧而陽火熾矣此又男子輕重吉凶之辨不可不知

惟有班疹能作搗 要識病原屬肝木  
木能勝脾又歸心 風火相爭多不足

此肝經出痘證也班疹發熱之初多有作搗者蓋疹為脾所生脾  
虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜為熱神氣不

安因搗成癩班子為心所生心生熱則生風上屬於肝二臟相  
搏風火相爭故發搗也以道赤散五十加神砂未與瀉青丸十一

合而治之如再不止小便利者可治以道赤散三十送下牛黃清  
心丸六十或粉紅丸十一小便不利者勿治其有不作搗只多叫

哭者肝熱也目必直視瀉青丸十一目不直視煩渴多哭者心熱  
也道赤散五十加黃連梔子仁主之

本邑胡元溪惟一子甚珍愛之未出痘託予調護之心甚切予



曾之曰令嗣五岳端立三關明潤骨堅肉實神俊氣清乃壽相也出痘必疎壬寅五月末旬發熱作搐元溪夫婦憂惶無措予曰此佳兆也以辰砂散投之搐止痘出予又曰凡痘起服未有頭面不腫者此痘顆粒緊小必不大腫面貌如常期十一日而安元溪舉手加額曰公之福也

予次男邦孝辛卯春方四歲發熱卒驚而絕其母大哭予曰勿惶此痘疹也乃指合谷得匙與道赤散瀉青丸一服而搐止痘出甚密幸無他病十三日而醫予時在制中服滿起復同輩阻陷乃趨崔宗師至棗陽訴辨往反半月抵家又出疹予完矣

發熱吐利如併作

上下毒出無壅遏

三焦火邪熱中求

日久不休脾胃弱

此脾胃二經出痘證也疹疹發熱吐利非寒證經曰諸嘔吐暴注皆屬於熱三焦者水穀傳化之道路為熱所迫則傳送失常吐利併作上焦多吐下焦多利中焦吐利俱多不須驟止吐利中有通之義邪氣上下得出無壅遏也如欲止之自利者黃芩湯吐利者黃芩加半夏湯吐者柴連散橘皮湯更詳審吐利所出之物如吐酸水者利色黃或青綠者其氣臭者皆也若吐清淡之水利下清白不臭未可作熱治之乃內虛也四君子湯加訶子肉益黃散利久不止四君子湯送下肉豆蔻丸

吾邑胡王率第三子方二歲庚申四月染痘自利三日不止予治之彼欲進理中湯加訶子肉豆蔻予曰不可此協熱利也宜用黃芩芍藥湯但觀其形色利當自止不必服藥次日痘出利果止

一小兒發熱時自利清水大孔如竹同狀清水流逆瀝也予思乃火甚於內肺金不行收令也以黃芩芍藥湯加烏梅一服而利止

發熱譫妄如見鬼

神識不清毒在裏

鎮神解毒以平期

一向不休病不起

此純陽無陰之證初發熱便妄有所見聞妄言如見鬼狀此為惡候蓋毒攻於裏心志昏惑神識不清而然况小兒神氣怯弱鬼易侵又厲鬼常乘疫氣而行乘人之虛而疰之故凡痘疹妄見妄聞妄言如見鬼者不可治也須審發於何臟如目直視手尋衣領亂捨物此發於肝為亡魂悶亂喘促手指眉目鼻面此發於肺為亡魄上竅咬牙多叫哭驚悸或不能言此發於心為喪神困睡手足痠癢不思飲食此發於脾為失意目無精光畏明欲墜下而驚身此發於腎為失志故曰真臟見者不治或發熱時無此證因大便秘結却有之此內熱也先以三黃丸八胆導法解利其熱後以道赤散送下牛黃清心丸或粉紅丸以鎮其神病已者可治連作不已者勿治

○胡三溪有子丙午生者已酉冬染痘發熱時常以手自掩其面其身下縮頰呼曰我怕若有所見者請予視之予曰逆證也經曰腎敗者失志目中見鬼死不治錢氏云腎病則下厥此痘發於腎不可為也果然

一婦人年二十餘發熱五日痘不出常走起摸壁或摸牀昏不知人口中喃喃語不休請予視之曰死證也此吾新水表弟婦

○本邑周璜吾德友也長子年十三庚子冬染痘發熱五日痘不出發狂濇語請予治之予往見其族兄周尚貴在亦明醫也乃問曾服藥否曰連進保元湯三劑矣予曰誤矣犯實實之戒也凡治痘者發熱之物驚者平之渴者潤之吐利者和之便秘者

利之熱盛者解之如無他證不須服藥今觀此子元氣素厚飲食素強乃以保元湯助火為邪毒氣鬱遏至於狂妄熱已劇矣宜急下之與三黃湯得利狂止痘出至十七日而愈

新水縣北汪沙溪家癸丑年出痘敬請魯家湖黑神降童云爾家十八人有六人不可救也初出痘一婢死亟請予往又一婢發熱昏昧裸體頰狂予見之曰熱劇矣當速解之沙溪夫婦曰專為吾孫請先生來非為此賤婢也且神言有不吉者六人數亦定矣予曰人有賤貴醫無分別楊寶救雀宋郊渡蟻况於人乎如吾之心所治悉活神言不足信也乃作三黃湯大劑與之

得利熱減 痘出而安其後一十七人吾悉活之

身上蒸人手足厥 曾多吐利脾虛怯

補中發表要兼行 莫向人前浪饒舌

此純陰無陽之證痘瘡發熱手足却宜和緩雖云足屬腎要宜涼非冷也只與常人同遍身皆熱而此同常人故稱涼亦和緩之意非真冷也若手足冷由其人曾多吐瀉脾臟虛怯脾主四肢所以冷冷為惡候不可單用發表反損脾胃宜和中發表兼用痘出以脾胃為主又宜急與大作湯以飲之不可因循空談廢事也先以黃耆建中湯三十加防風羌活或四君子湯二十加黃耆桂枝芍風以發之發後以四君子湯二十加黃耆白芍藥當歸桂心以補脾胃養氣血而助痘瘡之成就也

發熱之時血妄行 不知何道血先奔

但從鼻出宜涼解 別道來時可痛心

人身之血不可妄動痘疹發熱有失血者由毒火壅遏於裏煎熬薰灼迫血妄行血亦隨火而動但從鼻出者此火刑於肺鼻為肺之竅宜瀉火涼血清肺以玄參地黃湯六十調鬱金末加茅根自然汁磨京墨汁飲之衄止者佳衄出不已者勿治若從口出者從大小便出者皆卒死之候

予義女婿林霄年二十餘染痘初發熱小便下血予聞之嘆曰不可救也或問其故予曰昔乙未春新水桃樹坳徐宅出痘死者十八人皆小便出血故知不可救也果三日而卒

晝夜如蒸熱不已 消詳內外分調

假如咽喉食難嘗 急解咽喉無後悔

中涼乍熱痘疹常候若遍身如火晝夜不休此心火亢甚脾土益燥為失其常宜消詳表裏證候以施治也如口燥渴目赤唇焦大便不利此表裏俱熱也雙解散四柴胡飲子九十九胆導法五

一知咽喉痛其枯湯七加牛旁子或射于胤粘子湯六十加桔梗使咽喉爽快胸膈開豁失今不治他日咽喉閉塞水入則噎殺入則嘔暴啞失音悔之無及

發熱渾身汗熱上 陰陽和暢宜沾濕 熱從汗成毒從出 汗泄不休須早治

痘疹發熱有自汗者此榮衛氣和腠理疎通以熱上然身常潤濕為貴蓋熱以汗成而無拂鬱毒從汗出而無壅遏也不須治之若汗大出則陽氣暴泄衛氣反弱痘必難發難發宜急止之調元湯十八 聖藥也熱甚汗泄者當歸六黃湯主之六十八

壯熱惡寒形似瘧 邪正交爭榮衛弱 莫將寒戰妄猜疑 發熱何曾聞此惡

如初發熱時時惡寒身振振搖動如瘧之狀其人衛氣素虛榮血亦弱不能逼毒快出使毒邪留連於經絡之中欲出不出與正相爭故振振者火之象也以柴葛桂枝湯八十五加黃耆主之瘧也即愈不可錯認作寒戰妄投陳氏辛熱之劑以誤人也

吾長孫祖善乃邦孝長子方二歲染痘發熱三日內忽寒戰以

瘧孝泣曰死證也予笑曰爾為醫救病知稍工駕舟渡人忽

遇風浪自先荒亂何以渡人哉此元氣充盛毒氣微少邪不勝正故作寒戰而退試觀其痘必少也果只出五七粒七日而安

發熱之物便咬牙 心肝熱壅勢堪嗟 早分形證施方法 莫向東風恨落花

痘疹咬牙乃惡候也如發熱之初便咬牙者此與痒癩吐瀉脾胃弱者不同須審形證分治之若多欠咬牙頓悶者肝臟風熱也羌活湯十目上窺咬牙者心臟熱也導赤散三十五不可妄用陳氏辛熱之劑

胡三溪一子戊申生者已酉冬出痘初發熱便咬牙身上有聲精神昏噴予見之嘆曰逆證也乃腎虛證益腎主骨齒者骨之餘腎水不足則毒火無制火氣翕動故上下相戩而有聲陳氏所謂齒稿者是也果卒

發熱之時喘息類 喉中涎響勢堪驚 急宜解散真高火 勿使炎威燦肺金

此肺經出痘證也經曰臟真高於肺又曰諸氣逆喘急皆屬於火如發熱之初便喘急氣逆喉中涎響此惡候也故云喘無善病此毒火內蒸上熏於肺肺焦葉舉所以喘息而涎響也火鬱則發之宜清金散火湯主之六十七若眼閉口張有息足冷者不治

家店程旋溪次男未滿一週時值家中出痘聞言  
彼地蔡三請子視之蓋預防未安之意予見此兒多笑知其心  
火有餘乃令蔡朝服用黃連一錢山梔仁七分辰砂五分水為  
丸服之三日後笑漸少特辛未三月十九日也二十一日發熱  
忽作喘喉中涎響汨汨有聲旋溪驚憂然有吾在不其荒也予  
曰此肺熱證幸不有息足冷乃作清金散火湯一劑而減半再  
劑而喘定

未發痘瘡先發癰

根窠堅硬色鮮紅

此名痘母不輕視

縱有靈丹也不中

凡發熱三五日內痘形未報胸背手足先有團聚成塊者堅硬紅

腫似癰非癰此名痘母乃逆證也十發九死真人解毒湯以主之

附方

蘇城縣新店周愚齋長子之媳寡惟一女劉安峯之外甥女也

癸亥春出痘來請予治予問其狀請者曰發熱五日餘未見痘

出但背上一腫毒予曰不可治也非癰乃痘母也汝當亟

早辦後事期三日後有變果卒

發熱時辨生死訣

一發熱三日之內用紅紙條蘸麻油點火照心窩間若有一塊紅

者或遍身有成塊紅者八九日後決死勿治

一發熱三日之內遍身一齊出紅點如蚕種樣摸之不碍手

死勿治

一發熱三日之內腹內大痛又腰痛及痘出乾枯壅滯不止者決

死勿治

一發熱三日之內面上有一片紅者色如胭脂六日後決死勿治

一發熱三日之內不問口鼻大小便但失血者三日後決死勿治

一發熱三日之內妄見妄語昏不知人者三日後決死勿治

一發熱三日之內腹脹而痛大吐不止者三日後決死勿治

一發熱三日之內其熱忽退煩躁悶亂坐卧不安外雖清涼內却

熱也若見悶亂腹脹手足氣喘者即死勿治

痘疹世醫心法卷之三

出見證治歌括 九二十二首

執蒸三日痘現形

此為常候不須評

過期不及多乖氣

論治先分虛實因

痘疹之毒蘊伏在裏非熱蒸則無自而出是以古書云執蒸三日

而斑生發熱三日痘瘡以漸旋出者不論疎密皆吉得常候也疎

者不須服藥密者以和中解毒之劑審而調之如纔發熱一二日

間痘瘡便一齊湧出者須問其會數日前有熱否如會數日前進

退熱以過期論惟原未發熱至今纔熱便現此表氣虛榮熱衝

諸腠理不容肌肉不實不能約束於外使毒火冲擊故出大驟也

用實表之劑可以無痒癩無潰爛實表解毒湯主之一百一十

如發熱四日至五六日後始出者須審視曾有外感內傷否蓋傷

風寒傷食之熱久而不去則所蘊瘡痘之毒亦能乘間而出不可

以過期論惟無內傷外感之因一向熱而不出此裏氣虛不能驅

逐其毒使之即出而毒邪得以留連停伏於臟腑腸胃之間宜先

用托裏之劑令其快出次以和中之劑多服之可以無伏無陷無

倒靨托裏宜托裏快斑湯一百一十三或十宣散三十七和中宜四

君子湯二十加黃耆或調元湯十八合勻氣散十三主之

發熱微上報痘疎

未曾起發早先收

此名試痘休空喜

一湧齊來甚可憂

痘曰聖疹謂變化莫測也有等身無大熱報痘又疎也不貫膿也

不結靨三五日後痕跡不見者此名試痘不可誤作輕看再過三

五日忽作大熱其痘一齊湧出此有險逆二證宜密治之

蕪水縣華桂山李雙溪家戊申春出痘長子病痘死次子出二

三粒未起發而次身亦無熱在外馳騁是時予尚未與結靨也

及吾婿病乃請予往予謂雙溪曰小令嗣神采明潤形體充實

出痘必輕次令嗣氣色昏黯精神倦怠出痘必重發皆曰已出

過二三粒而收也予曰不然痘出雖有輕重未有不戩膿結如

者先者試痘其證為逆身雖無熱伏在內也特一替者談是謂

有大災聚共笑之過數日復作大熱一齊湧出身無空膚予用

參香歸芍甘草節以養氣紅荆防木通青皮牛旁子連翹金銀

花酒炒茶梔桔梗以解其毒作大劑一日一服調理至十三日

後適身潰爛不即收靨予改用十全大補湯去桂加白芷防風

服之外用敗毒散貼襯前後三十餘日而安意不有予在安知

不知替者之言

瘡出遲遲有數般 皮膚閉密屬風寒

內虛自利須分辨 毒伏三焦治却難

痘疹之出自有常期如過期應出不出有數證不同不可不辨

內素實之人皮厚肉密毒氣難於發越一旦恃其體厚不法風寒

又為外邪所襲或脾素弱者風寒易感以致腠理閉密氣血凝滯

不出也其證頭痛四肢拘急假倚益惡風寒此類宜

發之氣強者用雙解散三氣弱者用參蘇飲三或性性散

或內虛者脾弱食少宜用補脾之劑加行氣發表藥四君子湯

調元湯十八並加木香青皮黃耆桂枝或臟腑自利宜用溫裏之

劑黃耆建中湯三十一益黃散四十五並與奪命丹十七合進利

未止者豆蔻丸四十三合進蓋裏溫則氣不消削氣不消削則不

陷伏美若依上法分治猶不出者此毒塵伏於三焦不久而發生

焉

本邑王芸野子二歲庚申四月發熱出紅點一二粒先請偷醫

未經歷其事者呼為順痘再請予視之見其類以青氣年上赤

光乃告之曰此險痘也先出者名試痘中氣不足毒氣隱伏故

出不快也以調元湯加防風木香服後其痘旋出喜無他證十

三日而安

數日蒸蒸出不齊 欲行疎發竟生疑

按方加藥觀瘡勢 表裏平和痘本稀

聞人氏規云是瘡疹證熱數日而不發見者進退皆難便欲大發

之懼其本稀而成斑爛不發之又無以出其毒氣古人立論始以

藥微發之微發不出則加藥加藥不出則大發之大發之後所出

不多氣候和平無他證者即是瘡本稀不可更發也以此言之發

不至太過守不至不及乃用藥之貴活也愚按古方用發表者升

瘡為根湯輕劑也惺惺散重劑也謂微發謂加藥者或生用微發

後用重劑或只用本劑先小作湯少飲之後漸加大多飲之非謂

於本方之外再加辛熱大發之藥也

應出不出却如何 發表和中良驗多

腹脹屎鞭煩躁甚 通腸解毒救沉痾

凡痘疹過期應出不出者或因外感風寒依上發表之法或因內

虛泄瀉依上和中之法如按法調治猶不出快熱反甚大渴腹脹

滿大便鞭結不通煩躁不安者此毒邪壅伏於內三黃丸八柴胡

飲子九十九擇而用之甚則三心承氣湯主之三十並用胆導法

五十一 聞人氏云且身熱脈數大便秘而腹脹此熱毒壅遏未見

形狀者當微下之非微下則熱不減此是始者熱在裏斑未出之

時也若斑點隱隱在皮膚中者是已發越在表瘡正發時則不可

妄下也又有結膿窠痂死之際脈尚洪數能食而大小便秘此表

已罷裏有熱毒宜微利之大抵臟腑有熱往往利大小便者以其

主出而不內故也

本邑余龍泉只一子光庭庠生也年十九染痘發熱五日不出

請予及韓兩峯治之兩峯明醫與予素厚予問其證未更衣三

日診其脈細而數雖有下證元氣怯弱不可下也乃謂兩峯使

作照導法不得通病者煩躁家人惶惶予思發熱日久毒留其

也自立一法取猪朮胞一枚以猪胆汁半杯清油半杯蜜半杯  
三物攪勻入胞中如作胆導法取下燥屎二十餘枚氣血熱解  
神清而痘亦出矣予笑曰此法外之意可以垂法於後矣韓亦  
心服

胡三溪初生二子于酉年往監乃以長子托予次子托萬紹紹  
名醫也戊戌春長子先出痘予守治十一日而安次子續出痘  
紹不知小兒痘證強以為知予聞其子乍熱乍退兩足俱冷數  
日不大便痘先出者猶是紅點亦不起發乃急三溪之好往視  
之驚曰此逆痘也紹曰順痘何以驚為予詰之曰何謂順痘紹  
曰熱微毒亦微熱甚毒亦甚今熱不甚故云順也予曰不然痘  
本火毒待熱而發如發熱而不煩不渴大小便如常精神清爽  
者此熱在表其裏無邪毒火發越而痘易出易發也若煩躁不  
安大小便難昏昏喜睡此毒火內蘊不得發越表熱雖微內熱  
則甚何謂熱微毒亦微也此子乍熱乍退者毒火之往來也大  
便不通者毒火之鬱遏也痘見紅點而不起發者毒火之隔伏  
也足冷者火極而蕪水化謂之厥逆也紹不以為然至次日紅  
點俱沒煩躁轉甚紹曰此內收也予笑其狂家人惶惶請予治  
之予嘆曰醫貴同心彼執偏見以致誤人非此兒之數醫之咎  
也翌日死

痘出常須令氣勻

更宜和緩氣如春

氣勻出快無滯滯

偏熱偏寒氣不行

張氏從道云瘡痘氣勻即出快蓋氣勻則榮衛無滯勻氣之藥如  
桂枝防風荆芥穗薄荷葉所以行在表之氣而使之無滯也故凡  
發表之劑多用之木香青皮枳殼木通所以行在裏之氣而使之  
無滯也故凡和中之劑多用之又瘡出之時常宜和緩如三春發  
生之氣則氣血和暢自然其出快其發透其醫齊若偏於太熱則  
狂火食氣其氣反匿而不能行偏於太寒則氣凝滯而不得行矣  
瘡出熱退毒已盡 蒸蒸不減毒尤甚  
瘡出常出漸加多 外邊只怕乖形證

痘瘡之證其初不允於發熱者未出毒邪在裏煎熬氣血薰蒸臃  
腫而然瘡既現形則毒洩而熱解所以瘡出熱退者瘡本必疎若  
瘡已出熱不少減此毒蘊於中其勢方張其瘡必密宜急解其毒  
運翹升麻湯 六加防風荆芥穗地骨皮或解毒防風湯 一百一  
升麻或東垣黍粘子湯 一百七 服湯之後瘡或不出或再出其熱  
頓減者為氣和也熱若不減瘡漸加多再消詳大小便何如大便  
不通柴胡飲子 九十九 小便利連翹湯 八十八 大小便俱不通  
八正散 四十六 自利者黃芩湯 四十一 加白頭翁酒黃連調赤存  
脂末裏氣和解毒矣如更加渴煩躁不已或譫妄或腹脹滿氣促  
或自利不止手足厥冷此乖戾之證勿治

麻城橫河鄭清溪之妻劉松石之外甥女也嘗生數子皆死於

痘戊午冬一子甫五歲出痘先請傳醫治之服保元湯熱發  
又請李醫至曰險痘也清溪夫婦不安乃託吾邑汪王虹敦請  
王虹乃清溪之妹夫也予往視之曰此順痘也期十八日而安  
不須服藥往皆曰今自發熱日計已六日矣何以又要十八日  
况痘不服藥何以得痊今進保元湯三劑矣尚有一劑未服予  
告之曰痘瘡不可以日期算只看痘出已盡發已透膿已滿而  
後收靨可期也今痘出而熱轉甚者出未盡也由服保元湯犯  
實上之戒故令出遲靨亦遲矣吾聞善攻者不如善守本無他  
病何以藥為吾為尔保全是予無憂也清溪聞其言撫掌大笑  
曰早聞金玉之論使吾夫婦有賴矣傅李二醫未去皆深服之

出現先於面部中

其間凶吉妙難通

遠唇夾頰方為吉

額角眉心總是凶

經曰諸痛痒瘡皆屬心火心之華在面痘瘡之火其出先在於面  
但觀其出之部位可以知其候之凶吉如先在唇四畔出者吉蓋  
太陽之邪下傳陽明陽明者胃與大腸積陳受朽氣血俱多又口  
為水星頰頰屬腎水火為水制不能作虐也如在額角眉心先出  
者凶蓋太陽足壬膀胱水手丙小腸火丙火独旺不受壬水之制  
其毒併於膀胱之經而先自病膀胱多氣少血又正額屬心火火  
不務德妄行無忌心為君主之官主危則十二官皆危矣凡起發  
成漿結痂亦如此論

頭面呼為元首尊

咽喉喉嚨為關津

莫教瘡子多稠密

鎖項喉頭總不應

經曰頭者精明之府又曰春氣者病在頭可見頭乃人真元會聚  
之所為發生之本又面列五官分五行而五臟之華皆見於面是  
頭面者人君之象至貴至尊不可凌犯者也咽者胃院水穀之道  
路也主內而不出喉者肺院呼吸之往來也主出而不內在人之  
身譬猶關津要路也瘡痘之出最要頭面稀少項項無方是吉兆  
若頭面多者謂之蒙頭諸陽獨亢五官俱廢神明失守精華自萎  
經云神去則机息氣止則化絕者此也項項多者謂之鎖項內者  
雖出外者難入上者不升下者不降經云一息不運則机滅窮一  
毫不續則腎寒判者此也故皆不治又五心有痘者重謂心火而及  
兩手兩足心也 即勞宮湧泉二穴

胸前頭面總宜疎

手足雖多不用憂

若是遍身都密甚

却愁氣血不能周

陳氏文中曰痘瘡輕者作三四次出頭面稀少胸前無蓋頭面者  
諸陽之會腦者諸陽之所受氣此救處痘子宜少不宜多以清湯  
之分不可洩乱也手足雖諸陽之本乃身所役使卒伍卑賤之戚  
非若頭面為元首也又曰 凶未非若齟齬心肺之君神明之舍也  
故雖稠密不必憂也若頭面腦項手足稠密瑣細一樣者却愁氣  
血衰微脾胃虛弱不能周流灌注起發不透收靨太遲而生他毒



矣

最宜磊落如珠豆

偏怕相粘聚作堆

蚤殼蛇皮生不久

蚤斑蚊跡死相隨

凡痘瘡之出不論疎密而論磊落若磊落落如珠如豆顆粒分明尖員緊實雖密無妨此謂出盡無留毒也如粘聚成叢模糊作塊不分顆粒恰如紅瘤雖只一二處未可言疎此謂之伏出未能盡若待後者再出則先者或陷而復隱或痒而俱潰成壞瘡矣此猶淹延引日久而後斃若如蚤之殼如蛇之皮此氣至而血不榮也謂之乾枯如蚤之咬如蚊之嘍此血至而氣不充也謂之隔伏不能引日奄忽而死矣

初出形來艷色嬌

定知皮嫩不堅牢

溶溶破損添愁緒

箇箇成漿喜氣饒

痘初出與未病時皮色一般者善若瘡太赤根下皮色通紅此血熱氣不能管束也後必起發太驟皮嫩易破痒瀉而不可救宜急解血分之熱四物湯十九加升麻地骨皮紅花紫草或消毒飲十六活血散十四合而飲之待色少淡急補氣分之不足四君子湯十加黃耆防風木香或調元湯十八參苓白朮散二十三合而飲之仍用血氣二方相間而服若成漿不破損吉服藥不劫反增瘡痒者命也

本邑胡近城次子未出痘先兩頰赤燥請予八子邦靖醫

靖曰傷寒論云面色緣赤者陽明熱也若不預解至出痘時

此處必甚稠密而亦貫串難壓最以升麻葛根湯加防風牛蒡

子連喬三服而紅色盡去痘出亦疎時庚午冬也

汪懷江次子五歲辛未二月出痘甚密且紅艷懷江恐其不吉

請予四子邦治醫予謂治曰陰痘也氣實血熱可治也教用當

歸稍赤為藥生地黃防風荆芥穗牛蒡子連翹桔梗甘草以解

其毒連進三劑紅色盡退根未起發得透也再教用黃耆防風

甘草赤芍藥牛蒡子桔梗青皮山查肉連翹調理十五日而靨

最怕頭焦烏焮焮 更愁皮嫩水溶溶

膚中寒粟工知避 皮上針頭治罔功

痘瘡初出有四善紅活明潤緊實堅厚尖圓布散磊落稀疎蓋痘

子賴血以潤之血活則其色如丹砂如雞冠若毒凝血聚則遂成

黑色今頭焦黑者乃榮血不能流行內外毒氣壅遏此證甚危其

人必大小便秘喘急煩躁宜用柴胡飲子九十九當歸丸一百通

關散一百十五三乙承氣湯三十看輕重緊慢用之以解裏之熱

得利後以紫草飲六十三加味四聖散六十四調無價散七十二

以解表之毒仍用臘脂塗法七十六瘡變紅活以漸起發者吉若

更乾黑者凶莊氏云斑瘡倒靨而黑色者謂之鬼瘡○痘子賴氣

以束之脾胃強氣實則肌肉厚皮膚堅今痘皮嫩薄溶溶如淫濕

之狀乃脾胃氣虛其人必少食或自利宜用十全大補湯三十八

去生...加防風白芷外用天水散九十四蜜水調拂疹...以解  
表之濕熱疹若起發成瘡者吉漸變痒癩者凶四人氏云瘡痘作  
痒深為可慮能調和愛護勿令有此乃為上策痘子初出不成類  
粒但皮膚間濟濟簇簇如寒風粟子之狀或雖出形與針頭相似  
稠密無縫此皆惡候良工避之勿與施治也

痘疹初出解咽喉 喉痺咽瘡毒火饒

祇恐後來封管齋 錯喉聲啞治徒勞

凡瘡疹未有咽不痛者心胃有熱上攻於咽乾澀而疼宜於發熱  
初出之時預解之甘桔湯七加牛旁子甚者東垣涼膈散一四  
加牛旁令毒入解散不停晉於咽喉之間致生他變也若初時隱

忍不即解之以致毒音咽喉發而為瘡腫脹潰爛水谷不入呼吸

不能聲啞難言却欲呼醫悔無及矣所以甘桔湯七瘡出之後常

宜飲之利咽喉寬胸膈清肺金解毒火也如無口舌生瘡齒浮齲

腫者宜甘桔湯七合黃連解毒湯八十九加牛旁子水漿不入者

射干鼠粘子湯六十加桔梗荆芥穗山豆根已上證候須能食臟

腑亦熱方可用如上焦雖熱却覺小便清大便溏飲食不進者只

用甘桔湯七不須加牛旁子蓋其性涼為瘡疹所宜服者能透肌

出癰瘡是以瘡疹易出也大便利則不可服

英山縣馬四衢一子年五歲乙巳春出痘痘不起發開吾在孔

家坊鋪鄭宅教書其兄馬鳴山自來迎請予往視之曰此順痘

也馬氏兄弟曰不起發何如曰毒甚者則頭面腫毒微者則

面不腫非不起發也又呼咽痛四循憂之予曰此痘家一痛

喉舌無瘡頸項間痘稀不足怪也乃以甘桔湯加牛旁子水煎

細細嚥之咽痛即止飲食無阻十三日而安四衢曰向吾小豚

咽痛服藥輒效何神也予曰痘疹者火毒也火氣上熏咽喉豈

不作痛故用桔梗之苦以開其結甘草之甘以瀉其火牛旁子

之辛以解其毒是以效也若喉舌有瘡則壅塞潰爛項項多痘

則封鎖熏灸必為瘡水失聲之證令嗣無之故曰不足怪也馬

氏兄弟曰吾邑有是神醫請見得免橫天

若恐斑瘡入眼中 古方護目有神功

眼多眵淚睛多赤 急瀉心肝免毒攻

痘瘡方出之時使不入目以神應膏六十六塗眼四周或只以臘

脂取汁塗之或傳以水調黃蘗末或以白芥子末水調塗足心此

皆養護之良法也若眼中流淚或多眵或目中紅赤此肝火大旺

宜早解之洗肝明目散九十五加蟬蛻又有忌食之法如醃厚滋

味牛鷄鷄鴨皆不可食往往食鷄鷄鴨卵未有不為目害者但令

食淳淡之物或少入鹽亦無害如湫隘之家不可煮鷄鷄鴨卵其

氣相襲亦能損目不可不知

痘瘡只出一般奇 夾疹夾斑都不宜

消疹化斑令毒解 若還不解勢傾危

痘疹只出一般者善凡痘初出其間碎密若芥子者夾  
 也或肉紅腫成片者夾斑也疹由心熱斑由胃熱宜急解其毒  
 疹用黃連解毒湯八十九合消毒飲化斑用人參白虎湯二十四  
 合消毒飲六或以升麻葛根湯之夾疹者加防風荆芥穗本  
 通麥門冬黃連夾斑者加石膏人參大青玄參淡竹葉如疹散斑  
 解現出正痘疎密停勻者吉痘被斑疹夾雜不能起發者凶  
 靳水縣羅良制之妻魯六姐與陳之南之妻姊妹也丙申冬出  
 痘時年二十七遍身紅斑如蚊跡衆醫視之皆曰不治而去乃  
 託陳之南備書請予往予觀其神識精明語言清亮診其六脉  
 調勻問其飲食如常大小便調不煩不渴但遍身紅斑稠密無  
 縫色且帶艶予曰此夾斑痘證也魯畏死乞救之言甚哀予以  
 言解之曰此病非吾不能治也斑痘相雜故難識耳解去其斑  
 則痘自見汝切勿憂亟作荆防敗毒散加玄參升麻作大劑只  
 一服次早視之則斑跡不見痘粒可摸矣再進一服其痘起發  
 喜無他疾調理半月而安  
 靳水縣汪白石一小義女方二歲出痘遍身紅點大小相雜經  
 有空處白石曰此女難治予曰此夾斑夾疹夾痘證也乃  
 次男邦孝以升麻葛根湯加防風荆芥玄參連翹牛蒡子  
 葉木通一服減十之三再服減十之七三服痘子落  
 不甚密也白石曰先生神術有回天之力也

執病相傳發痘疹 須臾周匝盡成漿  
 見而便沒為膚疹 相類斑疹折後殃  
 聞人氏云傷寒熱邪在表裏未法作汗或當汗不汗熱鬱於肌膚  
 故發泡疹色白或赤如火丹頭作漿白膿者輕根下紫色隱隱在  
 肌肉者重其者五內七竅皆有之其形亦如痘小兒肌肉嫩薄在  
 多此證非正瘡痘也又云六腑屬陽有熱則易出是以作膚疹一  
 出即遍滿肌皮之上如沸瘡細泡子見而便沒其所受氣淺故也  
 五臟屬陰有熱則難出其為瘡痘在肌肉血脉之間必先發紅斑  
 而後如豆故名瘡痘其所受氣深故也大抵暴熱而便出者必屬  
 疹久熱而難出者必是正瘡豆膚疹非正瘡豆也愚按痘疹初出  
 五臟不同肝水疱其色微青而小肺膿疱其色微白而大心為斑  
 色赤而小脾為疹色赤黃而淺及五七日之後不問其初出自何  
 臟悉成血疱血疱成膿疱正如豆樣膿疱之後結痂死則愈此方  
 是正瘡痘也或人疑之曰肺既為膿疱而血疱之後又成膿疱者  
 何耶蓋膿疱之出於肺者言其初時淡淡如膿其色白而非黃俗  
 稱白豆者是也若血疱之後所結膿疱則其瘡已熟譬諸果之  
 成實飽足充滿包裹黃膿其色黃而非白也  
 點點紅斑出復收 曾將形證細推求  
 若無變證無他苦 折過天瘡不用憂  
 人有恒言自少至老有不出痘者乃天赦日生不出也予初不信

大赦日生便不出痘者痘乃胎毒一名百歲癩謂其自少至老不能免也或在痘疹大亂中曾發熱來但見一二三四粒而不覺也此痘之最輕者近見有出紅斑者數日盡收痘亦不出更無陷伏惡證癰疥餘毒自後痘瘡再不出者或是之類歟益胎受之毒在心為斑在脾為疹在肝為水痘在肺為膿痘惟腎無病故痘疹膿痘水痘俱同一類但受毒甚者四病悉具受毒微者平生只見一病矣

本邑官衙出痘先二衙一子一女出過惟一長子後發熱見紅斑予疑是夾斑證三四日後其斑盡收熱退身涼而痘不出矣又四衙小男女正出痘有公子發熱亦出紅斑與前證同後亦

無恙乃信平生有不出痘者或發斑或發疹或發水痘皆可太過也必在正出痘時方論

執甚從來出亦難 平和湯劑解煩究  
莫將辛熱輕催併 猛虎何當有翼添

瘡疔本因熱而出熱勢甚則其出愈難故斑點未見之時惟當用平和藥如升麻葛根湯一參蘇飲三東垣鼠粘子湯一百七惺惺散一百十四等鮮利之或有不問虛實便以辛熱之劑大發之施之慮者猶庶幾焉若盛實之人熱毒亦甚榮衛閉塞裏毒甚者大便不通小便如血是謂毒不放毒無所從出及攻臟腑表毒甚者瘡凹而不起遂成倒陷或為潰爛或為癰瘡當此之際不能

至於斃者多矣是陽盛熱熾無陰氣以感之也用消毒飲六

痘子依稀略見形 渾身癢痒若難禁

皮膚拂拂宜疎解 莫作肌虛一類評

凡痘瘡初出之時便身痒爬搔不寧者此毒火晉於肌肉之間應出不出游散往來故作痒也與傷寒太陽證身痒汗不出者同論桂枝葛根湯五加荆芥穗牛旁子主之不可作肌肉虛痒也

英山縣鄭斗門丁酉年始得一子辛丑年春出痘將放標見形時便作痒爬搔不能禁亟請予往治之其弟七山迎謂曰吾兄只此一子今痘出作痒言凶如何予曰起發時作痒者逆也貫

膿時作痒者逆也特醫時作痒者險也險者可治逆者不可治出現使痒經待中原無是證待吾思之斗門夫婦惟撞頭捶胸而哭家人惶惶予謂七山曰吾得之矣請令兄斗門同議斗門明醫也予謂斗門曰吾思仲景傷寒正理論云太陽經病身痒者此邪在表欲出不得出也桂枝麻黃各半湯陽明經病皮中如虫行者此肌肉虛也建中湯令嗣身痒正是痘欲出不得出與太陽證同非陽明肌肉虛證也乃以各半湯方內去桂杏加赤麻葛根牛旁子一服而痒止痘出甚密留予守治半月而安斗門謝曰非先生識見高明安能達仲景之妙

夾斑夾疹利清水 妄見妄言復牀被

煩渴唇裂眼珠紅 不遇明醫病不起

此險痘也夾斑夾疹眼紅唇裂者表熱也煩渴利清水妄見妄言  
循被摸林者裏熱也其利清水者內有燥屎所飲之水自腸中滲  
泄而下也謔妄摸林神識不清也表裏俱熱不與發表攻裏其病  
難痊雙解散四不去芒硝主之若加悶亂足冷腹脹氣喘决不可  
治

壬戌三月間吾第七子婦徐患痘大熱大渴眼紅唇裂自利清  
水妄見妄語循衣摸林遍身紅斑俱如蚊跡皆逆證也諸子  
之予與四男邦治議曰此毒在三焦表裏俱熱非大發大下之  
劑不可救也乃以通聖散全料大劑與之總一劑而前證悉去

痘亦出現十分稠密復用十全大補湯去桂加防風金銀花連  
翹桔梗調理而安其痘自下收起亦異事也

發熱過期痘未彰 紅斑隱七肉中藏

忽然大汗人昏倒 胃痘誰知是吉祥

此發熱至五六日痘應出不出以燈照之只皮膚中隱隱有紅點  
其人色脉平和精神奕暢雖煩不燥雖渴不消雖腹痛而不苦雖  
便實而不鞭忽然眩冒大汗出者此名胃痘證也毒氣一齊從汗  
而出再無瘰過之患乃吉兆也

○出痘時辨生死訣

一痘出時心腹大痛不止口中出臭氣唇出紫黑色者决死勿治

一痘出色白皮薄而光根窠全無紅色或根下帶一點紅三五日  
後如菜豆樣此痘决不能成膿只成一泡清水抓破即死勿作  
好痘治之

一痘出色紅帶艷皮肉盡紅者必不能成膿痒癢而死勿治

一痘出瘡頂焦黑根窠枯燥者必不能起發四五日死勿治

一痘出全不起頂如湯潑及燈火焯者六七日後决痒癢而死勿  
治

一痘出都是紫黑血泡者即死勿治

一痘出不快乍見乍隱口鼻血出者即死勿治

一痘出就是清水皮薄脚太紅者五六日後痒癢而死勿治

一痘應出不出只見紅斑如蚊跡者即死勿治

一痘出都是空殼不成膿水者死勿治

一痘出便是黑斑如瘰狀又肌肉有成塊黑者即死勿治

一痘未出胸背手足後有一塊紅腫處如癰者即死勿治

痘疹世醫心法卷之四

起發證治歌括 凡三十五首

五六日間起發時

俗師計日豈曾知

不分虛實論輕重

偏執方書只補脾

瘡痘之證熱三日出三日後方起發此常論也蓋先出者先起後出者後起痘疎毒輕氣稟厚者自易出易發易盛痘密毒重氣稟薄者自難出難發難盛未可拘定日數時師不知虛實補瀉之理但於起發之物便用補脾果內氣不足少食者用之允當若內氣便秘能食之人寧不黨邪為惡乎非徒無益而反害之

蕪水縣羅野松年十六時出痘其父月湖翁嘗聞吾治其姪婦

魯氏之驗請予視之予往先有一醫張姓者在因月湖只一子

虛張誑言以恐嚇之曰凡出痘者春夏為順秋冬為逆今冬出

痘犯時逆也痘瘡起發頭面要腫今被寒氣鬱遏毒不得出故

頭面不腫犯證逆也奈何予曰不然春夏為順秋冬為逆非以

時言以痘證言也蓋春夏者發生長養之令也秋冬者收斂閉

藏之令也痘本陽毒自出現而起發自起發而成膿如苗而秀

秀而實故曰春夏為順如應出不出應發不發謂之陷伏故曰

秋冬為逆頭面不腫者順痘也頭面浮腫者險痘也頭面預腫

者逆痘也今痘本磊落尖圓堅突其毒輕微故起發而頭面不

腫若頂平根闊肌肉鮮紅此為毒甚不待起發而頭面先腫矣

張曰起發太遲由虛寒始溫補之藥可與服之予曰痘瘡無病

不須服藥吾觀此痘紅潤鮮明氣爽也大小便調裏氣安也

無熱無渴無他病也於此補之謂之實上先生且止吾計十數

日必收靨而安矣月湖深信予言果如期而安並未進藥

大抵瘡標只要稀

毒輕瘡少不須醫

若逢稠密毒邪甚

解毒和中早燭機

凡痘瘡疎則無毒密則有毒痘疎毒少者邪不勝正其氣和其勢

順不須服藥痘疎密佈散邪正相持其氣病其勢險此宜抑邪扶

正使邪氣亟奪不為正氣之賊痘稠密無縫正不勝邪其氣乘其

勢逆善治者什可救其二三不善治者束手待斃而已故順者不

必治逆者不可治險者貴治此以下專言險逆者之證治也

幾多先密後稀疎

更有先疎後密稠

不是良工曾見慣

也將性變問師巫

凡看痘瘡有先密後疎者此夾斑夾疹也初出看之一片紅點斑

疹相雜難以分辨至起發時斑疹盡散惟痘獨在故先似密而後

實疎也有先疎後密者此一順一逆也痘科云輕者作三四次出

大小不一等故先似疎而後漸密此順痘也吉若初出看時只而

上胸前有三五處顆粒模糊根脚腫硬待至起發則一齊湧出故

先雖疎而後尤密此逆痘也凶

先後大小盡出齊

以漸起發適如期

尖圓紅活都光壯 表裏無邪獨所歸

痘子輕者作三四次出大小不一等其起發亦先後循次大小分明不相連串顆粒尖圓根窠紅活光壯肥澤此表無病飲食如常小便清大便潤此裏無病表裏無病大吉之兆不須服藥

起發如期貴適中 太遲大驟類成凶

誰知驟發不壞胎 發若遲時毒復壅

發子起發只以出勻為期不可拘定日數疹出以漸其發亦以漸謂之適中若已一齊湧出便皮肉虛腫一齊掀發者此表氣虛毒氣奔潰而出表虛不能收斂必生痒癩或成潰爛急宜救表十宜散三十七調無價散 七十三活血散 十四合消毒飲 十六相間服

之若山已盡當起不起或起不透此裏氣虛毒氣潛伏壅遏而不

出必增煩躁腹滿喘促或後為癰毒急宜救裏十全大補湯三十一合勻氣散 十三或參苓白朮散 二十三調無價散 七十三服之

痘子而今出已勻 可知形狀重和輕

莫將湯液求奇中 治不乖方藻鑑明

瘡痘之出有輕有重觀其形狀即可知之如一發便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏赤微重也外白裏黑者至重也瘡端裏黑點如針孔者勢劇也青乾紫暗昏睡汗出煩燥熱渴腹脹喘喘大小便不通者因也善用藥者能使輕者易安重者不致大困斯可謂之十全矣

變輕變重轉移間 莫道人為不勝天

堪笑愚夫多不曉 空談氣數益前愆

古人云輕變重重變輕者指出稀者裏外肥紅者人見其輕運生怠忽之心不避風寒不節飲食不慎禁戒不擇醫巫以致感風寒則生外熱傷飲食則生內熱熱氣壅聚或翻出瘡痘稠密者或痘後目盲發癩者或腹脹或煩燥或吐利犯禁戒則為癰痒為潰爛醫之誤則補所不當補瀉所不當瀉巫之誤則呪水洒之以傷其表令之飲水以傷其裏往往變為重疾設有不幸歸之氣數抑何愚哉重者指出密者外黑裏赤者外白裏黑者人知其重能存憂懼之心適其寒溫慎其飲食禁戒必守醫巫必擇自然易移醫故能變為輕也如此者非人能勝天乎

聞人氏云稟氣寒者夏酷暑而不甚畏熱冬嚴寒而不甚畏冷稟氣怯者易寒易熱天寒陰雨則感寒溫而濡瀉天氣稍安則伏熱而中陽是故先知節候者能辨陰陽寒暑之盛衰經云陽盛人耐冬不耐夏陰盛人耐夏不耐冬此亦知人稟受之不同且自立夏氣交純陽萬物盛大治藥者用熱遠熱如桂枝麻黃之輩必加知母升麻石膏等服之立冬氣合純陰治藥者用寒遠寒如用諸涼劑中病即止不必盡劑又如冬溫煖則虛者安而實者病夏寒涼則實者安而虛者病冬溫煖夏寒涼非節之氣來暴而去速在人將攝之如何耳

錢氏云凡瘡疹當乳母慎口不可令飢及受風冷聞人氏云凡人一日不食則飢觸風冷則病况小兒當瘡豆之際正欲賴穀以助其內避風寒以護其外有穀氣虧少風寒侵襲則為患可勝言哉乳下嬰兒宜常令其母飲食充足居處避風能食童子專令老成耐事人時時會顧雖然事亦貴得其平或者以失飢冒風寒為戒遂致過飽極溫非徒無益而又害之瘡豆之家宜備知之

聞人氏云瘡痘之出益熱邪內外蒸發其有當熱作之時忽遇天氣大寒熱氣方運出而暴寒折之外寒為內熱拒而不得入內熱為外寒閉而不得出毒氣壅於肌皮之間如癰疹如疔疔或青或紫俚俗云鬼捻青者是也壯年出者皮膚厚肉理密多有此證凡

是却寒溫肌透表之劑皆可選而用之也  
凡冬春之間常有暴寒忽為寒氣所侵其痘色變或青或灰白頑水凝凍不能起發者桂枝葛根湯五麻黃湯六十七去杏仁石膏各服待瘡子累起再以十宣散三十七發表托裏也外用胡荽酒七十四

凡春夏久雨為寒濕之氣所害不能起發者五苓散二十八加蒼木防風主之多服更佳

聞人氏云嬰兒童子畢竟純陽當瘡痘未出之始或遇天氣暄熱當與疎利庶幾起發之日其勢必輕疎利之說非是轉下疎者疏散熱氣利者滑利九竅使無壅遏之患而已疎利用輕清之劑

轉下者非猛浪不可疎利轉下相去遠甚不可不辨

凡夏秋之間常有酷熱忽為熱氣所蒸其痘色變或大赤掀發或糜嫩不堅實先以五苓散二十八合黃連解毒湯八十九或升麻葛根湯一合人參白朮湯二十四以解其熱次以調元湯十八加麥門冬五味子以補其氣外用天水散九十四合百花膏九十八遍塗之

凡傷冷水沙糖西瓜紅柿菱於柑橘水梨一切生冷之物腹痛者丁香脾積丸三十三原物湯下有瀉者錢氏異攻散四十四加丁香香薷子主之如傷油膩肥甘滋粘一切熱物腹痛者備急九原湯下此上二證得利後並用四君子湯二十加陳皮木香或錢氏異攻散調之四十四

凡食過飽稍寬不快者木香大安丸主之九十一損穀則愈不可妄下錢氏云惟用溫涼藥治之不可妄下及妄攻發又云瘡疹始出未有他證不可下也此言常候戒人猛浪若有前外感內傷之證安可徇常

聞人氏云木得桂則枯雌黃遇胡粉則黑枳得脯則壞物之相畏有如此者痘疹之異穢惡雜氣其理亦如是也仲景云瘡痘欲出之間宜燒香木猪甲二物仍令人謹伺門戶勿使生人輒入亦忌勞力人狐臭人若行房觸犯最為大害婦人經水適來尤當迴避床帳左右前後宜掛胡荽以酒噴之或燒乳香尤妙益榮衛得宜



則運行甚速或可使瘡毒易出苟防備一不如法則禍患隨至欲出者使之不出已出者班爛成片甚者瘡黑陷伏加以爛鼻痛如刀刺悶亂而死其中縱得安者亦令癩痕經年黑色或反成疥癬不可不戒

凡痘瘡起發即當禁戒房事室中常燒辟穢膏九十三令煙不絕更多燒硬石以水澆之若有觸犯瘡或色變或作痒者以茵陳煎法解之八十一

徽州鋪吳印墩抱養一子出痘胡三溪善醫邀予同往視之落紅活順痘也其兒脾胃素弱起發畧遲時日未足貴順其常也復請醫萬世喬見不起發謂其氣虛妄投陳氏木香散一劑

痘轉平不起又投陳氏異攻散一劑其家荒忙再請予同三溪視之曰噫死矣不可救也此輕變重者醫藥之誤

浙水縣一屠家子出痘正貫廳時請一巫者誦呪喚水解厭後忽加瘙痒痘形溶塌其色青白而氣腥臭予在羅月湖家請往視之曰此犯房室穢氣也急令買膠棗一斤燒煙熏之瘡轉紅活而痒亦止問其故原請老道其父他往而予代之有房事

痘瘡起發辨形色 人身之中惟氣血 虛實寒熱此中求 仔細消詳行補瀉

痘瘡之毒必氣以吮之血以濡之而後可得成熟也故於起發之時尤壯者氣有餘也肥澤者血有餘也氣血有餘表裏俱和

服藥如形長大而色枯燥者此氣至而血不榮也宜四物湯十四

加人參麥門冬色紅潤而形平陷者此血至而氣不充也宜四君子湯二十

加黃耆官桂川芎形平陷色枯萎者此氣血俱不足也宜十全大補湯三十八

合無價散七十三主之色灰白者氣虛也四君子湯二十

加黃耆當歸官桂色紅紫者血熱也四物湯十九

加紅花地骨皮牡丹皮

起發遲遲頂又平 色多灰白氣屢論

紫紅血熱須清解 枯萎還從不足云

凡痘瘡起發遲滯頂平色灰白者氣虛也其人平日食少脾胃不足人參白朮散去葛根加桂二十三十全大補湯三十八

去地黃八

加木香主之如曾有吐瀉以致氣弱者四君子湯二十合益黃散四十五

主之瀉未止者四君子湯二十吞肉豆蔻丸四十三甚者陳氏木香散主之二十五

若紅紫色掀腫者血熱也四物湯十九合消毒飲十六

加紅花外用臘脂塗法解之七十六乾枯者血虛也四物湯十九

加人參麥門冬地骨皮外用臘脂塗法七十六水楊湯浴法七十五

痘瘡起發視根窠 紅活充肥血氣和

若是乾枯青紫黯 急宜養血莫蹉跎

起發之時根窠紅活形色潤澤者此血隨氣行灌注諸瘡自然紅活肥澤不須服藥如雖起發乾枯無水謂之不肥澤帶青紫黯色

活肥澤不須服藥如雖起發乾枯無水謂之不肥澤帶青紫黯色

之不紅活其變為黑陷乃血虛也四物湯如人參麥門冬  
紫草紅花開進調無價散七十三或吞服奪命丹十七外用麻油  
塗法七十六

漸長尖圓厚且堅 其形光壯色紅鮮  
無克血旺無虧欠 平陷浮驚氣不完

起發之時不徐不疾以漸長大尖圓磊落光壯堅實根脚紅活此  
氣充足載血而行透徹諸瘡自然尖圓光壯不須服藥如雖紅活  
頂平中陷不成尖圓色嫩皮薄不能堅厚其變為痒痛為留伏瘰  
過乃氣虛也四君子湯二十合勻氣散十三加黃耆官桂或人參  
白朮散二十三加黃耆官桂防風或調元湯十八加官桂防風白

生荆芥穗或十全大補湯三十八去地黃加防風白芷或十宣散  
三十七皆可選用若瘡皮薄色嫩淫淫而溫者此氣不勝血宜補  
氣涼血四君子湯二十四物湯十九去川芎地黃加黃耆官桂防  
風荆芥穗如浮囊起殼中無水者此氣不依血血不附氣其變  
為痒痛為癰腫十全大補湯三十八去白朮加大力子連香防風  
燒人尿

本邑胡半峯長子年五歲出痘起發時頂平而陷請予視之予  
曰順痘也半峯問其諸予曰凡出痘者以氣血和平為主尖圓  
堅實者氣也紅活明潤者血也紅活平陷者血至而氣不足也  
圓實而色淡者氣至而血不足也平塌灰白者氣血俱不足也

掀腫紅綻氣血俱有熱也令即痘出既密時日未到氣血未盡  
以漸起發得其常也故曰順痘不須服藥半峯喜晉子守安

四圍沸起陷居中 胃氣虧虛發未通  
外白中心成黑點 是名鬼痘急宜攻

痘瘡起發尖圓為貴如四圍起中心平陷者此有二種有血化成  
水四圍高起中心畧低凹者俗呼為茱萸痘此中氣不足發未透  
徹故耳能食者至養漿之時盡充滿而起矣不能食者宜扶中氣  
人參白朮散主之二十三有四圍沸起中心落陷無水猶是死肉  
其形如錢宜急攻之若待漸變黑點不可為矣此名鬼痘四君子  
湯二十九合九味順氣散一百二加燒人尿或紫草散六十三或紫

草飲子一百十七連進服之外更用臘脂塗法七十六

中心凸起四沿平 外黑裏紅一例論  
此是表邪多壅遏 疎邪發表令調勻

痘瘡起發有中心凸起四圍乾平無水者或裏紅外黑者此由平  
日感受風寒皮膚堅木以致痘毒鬱而不散宜桂枝葛根湯五十  
宣散三十七以散表邪外用水楊湯浴之七十五

發時磊落最堪誇 三五粘連便不佳  
若是糊塗成一塊 切妨瘰癧又來加

痘瘡起發貴於顆粒分明如痘彼此相串皮腫肉浮或於本痘四  
傍旋出小痘攢聚胖長漸成一塊此候最重宜以快班湯十五

消毒飲 十六加燒人屎服之更宜禁忌以防觸犯

自此常宜大便堅 如常調潤更清安

莫將湯劑輕投試 偏熱偏寒變易生

痘瘡自起發之後大便常宜堅實緣小兒脆弱身熱而大便不通者則易實大便自利者則易虛雖四五日不大便無憂也不能食者聽其自便賴舊穀氣為養至五日後則膿成毒化解利之劑可用也能食者三日後不通不腹滿不裏急後重則亦不必攻之可用胆導法 五十一導之不通以當歸丸 一百微令潤過使氣道升降無壅遏之患不可妄下

其人能食素脾強 大便雖澇也不防

切莫湯丸將峻補 反增裏熱作餘殃

凡能食者大便喜潤賴新穀以為養而舊渣之不留自然臟腑流利血氣和平不可妄用溫補反增裏熱之謬

忽然暴泄勢堪驚 毒入大腸亦有因

勿待內厯成倒陷 上工治病貴能迎

胃主腐熟水穀大腸主傳送已化之物故食多少可以知人穀氣之虛實大便滑澁可以知人臟腑之冷熱大便如常是亦瘡疹之一順也如起發之時忽然泄瀉此宜急止之恐腸胃虛真氣脫也須辨冷熱虛實如瀉而足手冷面色青白瘡不紅綻者冷證也聖中湯丸 三十四 豆蔻丸 四十三 益黃散 四十五 甚則陳氏木香散

十五異攻散 二十六皆可用也瀉下之物黃又酸臭滂手足心

熱面赤瘡紅綻掀發者熱證也黃芩湯 四十一 五苓散 二十八 主

之脾胃怯弱精神慢而不食者為虛當溫養之益黃散 四十五 身

熱中滿渴而不食者為實當清利之五苓散 二十八 其人或臟氣

自脫或因服寒藥致令瘡毒陷入大腸瀉下如豆汁或便膿血或

便黑汁口內臭氣唇焦目閉加腹脹者必死之證也

起發時常驗手足 發如不透多翻覆

此宜脾胃弱中求 尚怕差時作癰毒

痘瘡起發欲透惟四肢稍遠難得均齊必脾胃素強能食多者不須慮此若脾胃素弱又食少者手足上瘡常發不透益脾主四肢

脾虛則不能行其津液澆灌四肢所以發遲以補脾為主快斑越

婢湯 一百十九 如不令透其後手足必作癰毒又手足痘瘡多發

水泡者此肝乘脾也先瀉肝羌活湯 十加柴胡後補脾人參白朮

散 二十三 去蒼根加桂如見而復隱起而後塌色紫黑者此腎乘

脾不可治

斬水懸滑石鋪汪元士沙溪之子白石之弟也一子癸丑耳出

痘至成膿時頭面腹背皆飽滿惟手足自肘膝至掌指猶未起

發予驚曰脾主四肢此子脾胃何其甚弱也祖母華氏曰吾孫生

下三日母即死是吾嚼粥飯養大也予用建中湯加黃耆防風

只一服而疹盡起腫作膿矣時沙溪夫婦信奉魯湖黑神於家

此子寄名於神未出痘先神降童云壇保吾老黑承管只恐痘子出得少至是痘出十分相察予等朝夕笑玩以計逐之使去後有詛言沙溪夫婦終不自安後竟無害

頭面斑疹總屬陽

升生浮長類相當

微微漸腫瘡紅潤

驟腫瘡平可預防

頭面屬陽瘡疹亦屬陽以類相從故出現起發收靨自頭而始升生浮長陽之性也痘瘡起發頭面以漸腫大升生浮長之性不須憂恐只要瘡子落紅活光壯肥澤待至成膿之後毒化結痂而腫亦漸消矣如瘡粘連通串模糊成餅者又要紅活潤澤以快班湯十五消毒飲十六合而飲之或消毒化班湯八十四以解其毒更以甘桔湯七加牛旁子相間與之以利咽喉寬胸膈令飲食無阻也又以神應膏護目六十六若灰白青黃乾燥瘡面腐起者皆死證也其頭面腫有不閉目者毒淺而輕有閉目者毒深而重亦待瘡熱腫消而目自開若瘡未成腫消目開者此隔也勿治詳見後頭面預腫條○凡將起發頭面預腫者此時行疫癘之氣名大頭瘟其毒最酷急用羌活救苦湯解之八十三

起發之初未試漿

口唇瘡色早焦黃

如斯惡候無人識

待得收時作禍殃

口唇者脾之外候人以脾胃為本不宜受傷如初發熱唇焦裂者此毒發於脾便宜解之瀉黃散一百九不知早治痘子之出叢集

水唇及至起發其瘡先熱內帶黃漿此惡候也待諸痘成漿此毒已靨唇皮揭脫漸變嘔食嗜水昏睡而死矣

起發瘡頭帶白漿

不分何處便非祥

謾誇國手移天力

空自叨叨說驗方

痘瘡由紅班而水疱水疱而膿疱膿疱而結痂有自然之序若初起發瘡頭便戴白漿者不分何處並非佳兆不特口唇然也

出形未定先瀉水

起發之初便戴漿

膿水未成收靨急

不堪有此命終亡

痘瘡初出一點血血化為水水化為膿膿成而毒解此自然之序也若初出之時半是水疱或線起發便有帶漿者或未成膿即收者火性躁急失其自然之序不應至而至所謂早發還先萎也此毒火所為倏忽之間氣息盡而死矣  
新水縣陸沉港李望松在監時其子方一歲家中出痘其內請吾往視之起發時都是水痘予曰痘乃胎毒五臟各其一證肝為水疱肺為膿疱心為斑脾為疹腎為黑陷此乃肝臟之證喜皮厚肉堅而色蒼臘若皮薄色嬌不可治也乃以四君子湯加黃耆防風牛旁子母子同服十三日收靨而安  
本邑大尹梁厚村公子出痘起發時多成水泡請予治之予告曰此險痘也治太晚矣公曰有數但盡爾術予不敢違過二日瘰癧大作而不能救

英山縣鄭兩川一子九歲乙巳春出痘予正在彼處教書此子亦在門下起發時額上兩頰皆成水泡予曰逆痘不可治也或問其故予曰痘疹之證自有次序初出一點血血化為水水化為膿膿成而毒解矣如苗而秀秀而實今方苗而秀吾恐早發還先萎也故云不治七日後更論未及七日大瘳而死

最愛尖圓成個個 生憎堅硬作堆堆

非癩非核非癰腫 恠事令人嘆幾迴

凡痘瘡起發之時磊落分布者乃表裏疏通上下發泄而毒氣解散頭痘也若顆粒叢聚根窠堅硬者乃氣血凝滯肌肉敗壞而毒氣鬱積逆痘也癰者丹瘤也似癰之紅而不痛核者結核也似核之堅而不動癰者癰疽也似癰之腫而不潰此榮血不流之病什無一生不出四五日必癢拜悶亂而死

起發渾如湯火傷 粘連成泡水洋洋

皮膚潰爛真元散 鶴唳猿啼到北郊

凡痘瘡初出細密模糊不成顆粒至於起發之時蓋成水泡清水虛汗此衛氣不斂之病逆痘也不出二三日皮膚肉乾悶亂而死此上二證乃惡毒之氣須於出現起發之時候之若到成膿則無之矣

起發一齊如鋤面 皮膚浮腫形容變

其人能食乃為佳 食減氣虛作凶斷

痘疹最惡以漸起為毒落紅活如一發都起無復顆粒模糊也此不紅活帶灰白色面上浮腫如鋤餅形此惡候也其人能食大小便如常無他惡候者吉若食頓減或原不能食者凶

一男子年二十餘出痘甚密起發時掀腫異常面如鋤餅形狀可畏人皆危之予所喜者飲食如常大小便調安靜而腫一醫欲投木香散予曰痘疹無疾不須服藥色白者痘出太多氣血未能周遍也數日之後自然成熟收靨矣果二十餘日而安

一婦人二十四五出痘甚密起發時面如鋤餅身無完膚七八日後眉心唇上有成白漿者或謂正當作膿之時予曰未也面瘡赤猶是血色未曾化水連爾成膿此惡候也後必潰爛而死果然

熱有大小治不同 古人取譬似蒸籠 不知邪氣分深淺 妄治何能得適中

錢氏云有大熱則當利小便小熱者當解毒大熱謂身熱脈實大便秘津液燥而渴懼其變生他疾故利小便入正散

附散一百十五 大便潤者連翹湯八十八 導赤散三十五 加人參 麥門冬使心火有所導引則雖不用冷藥熱亦自減去矣瘡痘不

至熱過不為冷誤甚為良法小熱解毒之說謂小熱不解大熱必生利其小便則慮損氣故但可解毒而已其枯湯七加牛旁子荆芥穗

發時痛痒是何因

痛實痒虛理自明

大凡痛者終多吉

諸痒曾無一吉云

經云痒為虛痛為實內快外痛為外實內虛外快內痛為內實外虛又曰諸寒為痛痘瘡起發痛者有二一則毒邪欲出氣血隨之肌肉稠急而痛九味順氣散一百二合活血散十四主之一則皮膚厚肉理密為外寒相搏而痛桂枝葛根湯主之五身痒亦有二證一則氣血不足其痒為虛十全大補湯主之三十一則不能

食淡以致發痒蛇蝎膏主之一百五凡痘瘡作痒深為可慮

一小兒痘起發時作痒予曰諸痒為虛此非虛也乃火邪也人以湯沃火多而痒者可以例推乃用升麻葛根湯加防風荆芥紫背浮萍只一服而痒止

一小兒痘起發時痘子作痛呻吟予曰痘脹作痛者佳膿成痛自止矣今痛太甚者血熱也升麻湯加紅花連翹牛旁子忍冬花服之即止

腹脹之候最不佳

痘瘡有此可傷嗟

氣和自爾無煩滿

毒氣雍留勢漸加

痘瘡起發而腹脹者有二證一則陰陽不和蓋瘡痘正發熱毒方

感必生煩渴宜以葛根解毒湯二十一 人參麥門冬散二十二 人參白朮散二十三 之類與之不知此理或飲冷過多或誤投涼劑

熱為冷所激欲出而不能冷熱相搏毒不發越故令腹脹且傷於

冷者必不能食大小便利腹中虛鳴此傷於陰陽氣不和也急當以溫中藥疎逐冷氣散則腹脹自消益黃散四十五 六其草

加姜制厚朴甚者氣喘發厥瘡白而無血色多致不救陳氏木香散二十五 聖方也味者反用峻下之藥致令重因而死一則毒氣

陷伏入裏必有他證相雜或煩躁大渴或大小便秘或啼哭不止但用溫平解毒快氣之劑紫草飲子主之一百十七 若腹脹而目

閉口中如爛肉臭者其證為大惡

出盡方將起發期

箇中乾黑令生疑

此為黑陷休輕視

漸變加多不可為

凡痘瘡以起發尤壯紅活肥澤為順若將起發之時中間有乾黑不起者須急治之不可因循以致傳變加多不可救藥矣

本邑大尹朱雲閣公子出痘致起發時項後手背有二痘變黑者摸之則痛此痘疔也急取臙脂數貼水浸取汁塗之盡此汁而止次日視之已轉紅瑩起發亦不再延也時庚申三月

本邑汪我溪一子庚申四月出痘發時有變黑者予以雲閣公子之事語之教取臙脂汁塗其內周氏不聽予謂我溪曰不用

吾言若待蔓延不可為也後果一身盡成黑痘而場復出一層

又塌如此三番而卒我溪至今悔之

又王思泉之子出痘至起發時漸漸變黑急請予治已延莫一

身矣其兄少峯議曰吾聞痘瘡變黑歸腎者不治公謂何如予

曰黑痘有二證一則乾枯變黑者此名倒陷乃邪火太熾真水

已涸故曰歸腎不治一則痘色變黑未至乾塌此疫毒之氣所

謂火發而燥味者也令姪之痘正是此類吾能治之乃用當歸

稍生地黃赤芍藥酒紅花以涼血黃耆人參生甘草以瀉火補

元氣酒炒芍連牛旁子連翹升麻以解毒防風荆芥以疎表每

劑入燒人屎一錢連進十三劑痘色轉紅膿成而收靨矣少峯

曰吾未見能治黑痘者人奪天巧信哉

李良臣乃萬石蘭之妹夫也一子出痘至起發時變黑而乾亟

請予治乃問其大小便何如乳母答曰自初發熱到今未大便

曰此熱盛於內宜急解之因制一方用麻黃酒蜜拌炒焦黑紅

花子紫草人中黃連翹酒蒸大黃燒人屎水煎服外用膽導法

取下燥屎痘轉紅活後以四物湯去川芎加紫草木通枳殼生

甘草調理收靨而安

陷伏惡候古今傳 變黑誰知有數般

痘疹不宜輕見此 徒誇五色大還丹

痘疹自內不出謂之伏自外復入謂之陷瘡痘黑陷當分四證○

一則感風寒肌竅閉塞血凝而不行必身痛四肢微厥斑點不長

或變黑色或變青紫應疹此為倒伏也宜溫肌發散桂枝葛根湯

五加麻黃蠶蛻或以紫草飲 六十三吞奪命丹 十七外用胡荽酒

噴之 七十四水楊湯浴法 七十五須令溫散寒邪然後熱氣復行

則其斑自長矣○二則毒氣太盛內外蒸燥毒復入裏必心煩狂

躁氣喘妄言如見鬼神大小便秘渴而腹脹此為倒陷伏也病邪

輕者宜利小便解毒連翹湯 八十八通閉散 一百十五甚者以百

祥丸 五十二牛李膏 五十三以瀉膀胱之毒令陽氣復還脾胃溫

煖服之身溫欲飲水者可治是脾強勝腎陷者當復出矣若加以

寒戰身冷汗出耳尻反熱死然百祥丸太峻今以宣風散 九十二

三乙承氣湯 三十麥蘖百祥丸 一百二十六代之外以水楊湯浴

之 七十五○三則內虛而不能使陽氣以副榮衛者出而復沒斑

點白色或黑色其人必不能乳食大便自利或嘔或取此胃虛而

不出謂之陷伏也宜用溫中之劑令其胃煖榮衛復行則當自出

矣宜調元湯加丁香官桂 十八理中湯 三十四加黃耆官桂甚則

陳氏木香散 二十五異攻散 二十六皆可用也外用胡荽酒噴之

七十四或因誤下之後毒氣入裏而黑陷者則宜溫養而表出之

先以理中湯 三十四溫養其裏後以桂枝葛根湯 五疎解於表也

不出再加麻黃○四則被房室等雜穢惡氣衝觸而黑陷者則宜

重解之內服紫草飲子 一百十七外用胡荽酒噴之 七十四茵陳

煎法 八十一

痘疥治法古多方

只要疎通解散

不使毒邪常陷伏

得行權處勿泥常

痘疹之毒自內而出冲突氣血發散腠理初出一點血乃身中氣血被毒驅逐現於皮膚之外其成形者氣也成色者血也毒火太甚煎熬氣血先至之氣則削矣血則枯矣氣削血枯腠理反閉毒不得出未免復入於裏遂成陷伏時人以黑瘡子為痘疔又曰見痘者深惡而畏之詞也此乃毒氣鬱遏非外感風寒內虛吐利雜氣觸犯者可比古人立方如大小便秘腹脹煩躁者則下之但大小便秘者則利小便解毒自利者以瀉膿血為順水穀為逆却不立方以毒雖入腹皆瀉出也攻之則無所攻補之則不可補昏悶不醒者用龍腦膏一百五以去心中之邪枯黑不起者或內用無價散七十三以解在裏之邪或外用水楊湯七十五四聖散七十四臙脂塗法七十六以解其表使邪氣得出皆良法也為工者合下印下合利印利合發即發或解其裏或解其表應變出奇勿泥常法可也

蘄水縣汪白石乃沙溪之長子也庚子冬出痘方八歲請予往調治起發時有黑枯者予曰此痘疔也乃用四聖散臙脂汁調銀簪撥開瘡頭塗之印轉紅活亦不延蔓數日後應收不收問其大便不更衣七日也知其腸內燥結其家信佛事斷葷禁殺予強取饋猪肉爛煮和汁與食果腸潤便通而痘收靨矣

英山縣鄭師一子三歲出痘請予往治起發時有脾腰腎間有

數箇乾黑者亟以臙脂計調四聖散銀簪撥開痘頂入藥於中

須臾起發紅活亦不延蔓時鄭斗門師之從堂叔父也善醫同

在調理因問予曰痘瘡變黑猶可治者有不可治者何也予曰

痘瘡變黑其證為逆治之貴早不可緩也緩則延蔓傳變倏出

倏沒迤邐而死矣治此證者亦有效法如四圍有水中心黑陷

者只用臙脂塗法須頻頻作之直待轉紅起胖而止如痘子乾

黑根脚堅硬者可用四聖散即今之治法也若皮肉不活根脚

不腫者决死勿治若起發有水頂平而黑者宜內服涼血解毒

藥加燒人屎外用臙脂塗法若大便不通者此裏熱熏蒸得之

宜內服四物三黃湯外用胆導法得利後而變紅活也若泄瀉

者此虛寒也宜用保元湯加木香桂如盡乾黑煩燥悶亂者决

死不可治也斗門拱手稱謝曰名下無虛士敢不拜教

幾經發瘡多凶惡 原有瘡癩休認錯

痘集成叢肌肉敗 色多青紫宜敷藥

痘瘡發泡亦與黑陷相類外出入雖不同而毒氣壅鬱則一也

或發水泡或發血泡或赤或紫或黑但見此證十無一生然亦有

似是而非者不可不辨其人身上有灌瘡或破傷瘡未痊或雖

痊癩痕尚嫩一旦痘出則瘡癩四圍痘必叢集者物從其類之理

也發生之後必然作瘡者腐敗皮肉氣色先變宜與完膚有別也



治此者先以針刺破吮去惡血後以臙脂塗法七十六合百枚九十八傳之此瘡又易作痒起發之後常宜以茵陳薰法八十一

薰之勿令孤傷若被肥搔則反覆灌爛淹延不愈變為疔蝕壞瘡以致不治者多矣

瘡多平陷發未透

時日已過增煩躁

帝哭呻吟不忍聞

何堪謔妄又狂叫

瘡起發散透磊落尖圓光壯肥澤者上也根脚橫開皮起水漲

者次也頂皮不起根脚不開猶是先出之形不見新生之水此謂

起發不透審察証候如氣本實者必曾感風寒以桂枝葛根湯五

合奪命丹十七發之如氣本虛必不能食或吐利以人參白朮散

二十三合奪命丹十七以補中氣而發表邪如散成陷伏者依前

四法治之若時日已多發猶不透或煩躁不安者此毒熱在裏心

惡熱以導赤散三十五送服牛黃清心丸三十六以解散熱毒其

引心火也或啼哭者凡人五臟平和則神宇安靜今五臟蘊毒內

外蒸鬱神不安舍以導赤散三十五送服安神丸四十七通閉散

一百十五使熱解散神宇清快也若謔言妄有見聞時狂叫者

此五臟熱毒蘊積陽氣獨盛無陰氣以和之退火回生丹一百五

大便必不利以當歸丸一百微利之再行膽導法五十一使無置

滯易快利也甚則防風通聖散主之四若昏不知人腹脹喘呼死

證也

發熱推來幾日經

時時煩躁未嘗停

如狂屎黑知瘀血

不爾還為燥屎論

凡痘疹出不快發不透醫不齊有煩燥者此有二證如面黃大便

色黑煩躁喘渴或如狂或喜忘腹脹或痛此為有瘀血在裏也宜

當歸丸一百或四順清涼飲二十七並加桃仁泥紅花甚者桃仁

承氣湯主之一百二十如便血下黑糞而又睡不醒心為血之主

睡不醒則心之神昏矣玄參地黃湯六十五加水通麥門冬若無

面黃屎黑如狂喜忘之證只大便不通煩躁腹脹者此有燥屎也

此却真狂謔妄以三黃丸八四順清涼飲三十七三乙承氣湯三

當歸丸一百膽導法五十一看病輕重擇而用之如偏執不可下

之說以致陷伏而死者醫之咎也

口中氣出臭冲人

飲食俱難又失聲

寒戰咬牙多悶亂

體寒嘔瀉總歸冥

凡起發之時痘疹稠密又見陷伏煩躁狂叫之證或口中出臭氣

者此毒火薰煎肺爛胃敗之氣也或不飲食失聲者此咽喉腫爛

也寒戰咬牙者邪傳腎也或悶亂者神已喪也或寒寒者陽脫也

或嘔或瀉者腸胃俱敗也經云五臟氣絕於內者利不止六腑氣

絕於外者手足厥凡見已上諸證者皆不可治

痘疹起發腫為奇

頭面預腫又不宜

五臟精華從此散

真人獨步彩鸞歸

凡痘瘡起發時頭面不腫者毒微上吉之兆也痘以漸長頭面以漸腫待至膿成收靨而後腫漸消者常候也如痘未起發頭面先腫皮光色艷如瓠瓜之狀者此惡毒之氣上浸清虛之府與大頭瘟病同况五臟精華皆聚於頭面而泥九官者又元辰真人出入之處也惡毒上侵則五精俱喪元辰亦亡喪精亡神其後必痒癢而死矣初腫之時急以羌活救苦湯八十三多服有功

○痘瘡起發辨生死訣

一起發時根窠太紅頭面皮肉紅腫如瓠瓜之狀者七日後死勿治

一起發時遍身痘頂皆黑其中有眼如針孔紫黑者三日後死勿治

治

一起發時兩腮虛腫成塊有膊腰脊者有成塊堅硬者五日死勿治

治

一起發時有痘變黑乾枯者延及遍身俱乾黑者七日後死勿治

一起發時先出痘形以漸不見者三日內死勿治

痘疹世醫心法卷之四終

痘疹世醫心法卷之五

成實證治歌括 凡三十四首

痘瘡成實作膿窠

只要膿成飽滿多

根脚紅鮮色蒼膩

刻期收靨保元和

痘瘡初出一點血只成小小血疱起發則漸長大血化成水為水

胞至水疱轉作膿疱始成實矣成實之時却要箇七成膿肥澤飽

滿根脚紅活又蒼膩色如此者可以刻定日數而知收靨日期

陷起平尖根脚紅

寒襲血水盡成膿

自然表裏無邪毒

莫使湯丸又妄攻

痘瘡初出或中心陷下者或頂平者或根窠白色者其人能食或

治不乖方以致起發之後陷者盡起平者復尖白者皆難經活窠

中血水已化為膿夫陷起平尖起發可謂透矣紅活飽滿氣血可

謂足矣水化為膿亦解矣表無痒痛之證裏無吐瀉之證是表

裏又無病矣如此者坐待收靨不可妄投湯劑

一面起發如初出

一面成膿有後先

發已透時膿又熟

毒隨膿化病除根

痘子輕者當作三四次出有大小有先後起發亦作三四次先出

者先起後出者後起大者自大小者自小亦如初出之樣待至養

漿則先長者先作漿後長者後作漿大小亦如之磊落分明不相

粘連者上也痘子密者長大胖壯以至作漿未有不相串者只要

伏矣 瘡者盡起無處不透轉成膿漿次也膿成之後毒氣以解無礙

痘熟渾如吳熟形 外無嬌色內多津

膿漿飽滿迴蒼膿 可許如期結靨成

凡痘瘡發熱三日出現三日起發三日養膿三日結靨三日共三

五一十五日乃大率常數也惟痘家毒甚者常過其期痘疎毒微

者常不及期雖不可以日期計猶當以常數為定則也初出現時

其形小其色紅乃是一點血至起發其形圓其色紅白乃血化為

水也養膿則其形大而堅其色紅而黃乃水化為膿也結靨則其

形大而軟其色紅而黑謂之蒼膿此膿熟欲靨之狀如果之熟自

然外皮軟而肉肉爛也假如十日以後正當成膿結靨之時其形

平陷其色紅紫外不胖壯內無膿水此名生痘血至而氣不至乃

倒陷也不出十三日內腹脹氣喘悶亂而死

李廷讓吾次男邦孝妻弟也一子四歲辛未春出痘至十日後

予往視之見其痘頂平陷根窠紅紫昏睡不食予曰不可救也

次日死

起發圓上不作膿 一身匡郭總成空

如斯空痘真凶險 若不傷殘也發癰

痘瘡起發小者漸大平者漸高陷者漸起外帶紅色內涵清水以

至養膿則皆胖壯紅潤膿漿飽滿此順痘也若形色灰白膿水

薄膿水清淡滲漏滲濕易於破損此猶凶也惟瘡久熟時日已過

淺者險痘也雖不傷殘亦發癰毒外若虛脹內無水漿此名空痘

待到成漿却要漿 切防清水及空囊

囊空無水和猶伏 清水非漿瘳莫當

凡痘瘡出欲盡發欲透至於養膿便要成膿飽滿者膿已成也渾

濁者膿之形也黃白者膿之色也若當作膿之時猶是空殼此氣

載毒行血不附氣毒者血也血既不至則毒猶伏於血中而不出

四物湯十九合紫草飲六十三加蟬蛻主之如已成水清淡灰白

不能作膿此氣血俱虛所有之水乃初時一點血氣解而為水非

自內潮起之水十全大補湯主之三十八此二證者為瘳瘳為癰

不可不知也

舊時張月山之妹出痘起發只是空殼請予視之予曰此氣有

餘血不足證也責在肝經用四物湯合小柴胡湯服之雖作膿

亦未飽滿而收予曰凡痘瘳不成膿或膿少者皆發癰毒此足

厥陰肝病必發頂疽果然

痘瘳只說待膿成 誰曉成膿未足慮

飽滿堅牢誠可喜 溫淫軟薄又堪驚

人言痘瘳只到成膿則毒氣化解便稱無患不知膿亦有凶有吉

如瘳皮堅厚膿漿渾濁約束完固無少破損此真吉兆若瘳皮軟

薄膿水清淡滲漏滲濕易於破損此猶凶也惟瘳久熟時日已過

當醫不醫者則膿後化為水皮亦易破勿依此論

正作膿時不作膿 此於黑陷理相同

但將四證分虛實 那得多方指指實

痘疹起發之後正待作膿却不作膿者此與不起發而黑陷者分

四證同論如感風寒則當溫散桂枝芍藥湯五加黃耆白芷防風

毒氣盛則宜托裏解毒利小便紫草飲子一百七十連翹湯八十

相間服之大便秘者宜風散九十二內虛宜溫裏十全大補湯

十八陳氏木香散二十五觸犯宜薰餅內服紫草飲六十三外用

茵陳薰法八十若煩燥昏悶者龍腦膏一百五

膿漿方作謹看承 勿比初時一例論

毒氣從今將解散 病人到此戒精神

痘疹起發之初已當避風寒遠人物節飲食守禁戒也到此養漿

之特比之起發尤加謹焉可也蓋前此人病未久氣血猶強足以

禦非矣之變至此則氣耗血虧精神減損少有乖戾不能任之况

瘡始成就尤易觸犯不可不加謹矣如天大熱則徹去衣被令常

清涼但謹門窗帷帳勿使邪風透入天大寒則添厚蓋覆令常溫

煖更用親人左右夾之房室中可明亮勿絕燈火常燒辟穢膏九

十三加乳香令香氣襲人日夜常用一人看視互相更待勿令疲

倦恐或作痒為之撫摩莫使誤破以致灌爛結痂不美

遍身瘡痘欲成漿 只要其人脾胃強

食少便堅中氣足 便清能食却無傷

痘疹已長膿漿欲成之時專以脾胃為主脾胃強則氣血充實自

然膿漿易成飽滿堅厚不須服藥脾胃弱則氣血衰少不能周灌

於身使之作漿虛軟清淡雖有漿亦水而矣宜十全大補湯三十

去地黃加木香或人參白朮散二十三去葛根加黃耆官桂多服

乃佳然脾胃強弱於食多少大便堅利求之食少大便堅者脾胃

之氣猶足也若泄瀉則脾胃益虛四君子湯二十送下豆蔻丸四

十三利止復以人參白朮散二十三去葛根加黃耆官桂服之便

清要能食不能食者亦依上法加能食大便堅數日未更衣者用

瀉導法五十一通之使氣得疎通榮衛和暢不致斑爛也

先時泄瀉總非佳 到此非佳尤可嗟

津液已衰脾胃弱 豈堪泄利又來加

痘疹出形起發並不宜泄瀉恐重氣虛毒邪不出反成陷伏故以

泄利非佳兆也若成漿之時尤不宜泄比之於前殆有甚焉蓋前

此為病未久脾胃尚強足以任之今則病久津液已衰脾胃已弱

若復泄瀉則僅存之氣重竭於內方張之毒不能成於外或為痒

癢或為倒靨或寒戰咬牙虛憊而死輕則人參白朮散二十三去

葛根加木香官桂黃耆甚則陳氏木香散二十五異攻散二十六

肉豆蔻丸四十三可以並進

子長男邦忠方三歲戊子年出痘先翁年八十始得一孫與

母珍愛甚篤祈禱之事靡日不舉至膿成將醫時忽作泄瀉  
變灰白色先君曰此虛寒證命作木香散服之未盡其劑泄止  
瘡後紅活○特御居民會顯宗長子出痘甚密將醫時亦作泄  
瀉瘡變灰白而又作痒亟來請藥先翁即以前未盡之劑姑與  
服之亦泄止而瘡變紅活不痒矣

泄瀉古人原有別 腸垢驚瀉分冷熱

痘中洩水洩血膿 勿使湯丸輕止瀉

經云協熱而利者其腸必垢協寒而利者其瀉似驚寒則溫之瀉  
之熱則清之通之此古人之治法也痘瘡養膿收靨之時有泄瀉  
者此為大忌恐中氣虛而毒復陷也故專以溫補止瀉之法為正

然有利清水者有利膿血者又不可與匪寒者交交同論治也蓋

利清水者曾有大渴飲水過多畜聚於中瀉灌腸胃今乃作利此  
畜水泄也水去盡則止利膿血者因痘不收以成倒靨中氣充實  
毒不得留乃自大便而下此倒靨泄也泄盡膿血自愈若不知此  
二證待其自愈妄投止瀉之劑則根蒂未除枝蔓滋長源泉欲塞  
決潰更多吾見其誤死者多矣

黃州府管糧通判蕭壬峯乙丑冬有小姐年七歲出痘先請杜

近林治之黃岡小兒科也連日服保元湯公因瘡密憂形於色

吾懸壺堂教許厚峯以予為公即差人請去診視畢告曰小姐

表裏俱實痘雖密順痘也不必服藥公江西贛州府永豐人

屢出痘者專食雞子以重其苦雞不可食公不聽日取大嫩雞  
爛煮以汁飲之而小姐嬌養若非雞汁不飲也予不能禁揣必  
有變幸痘正順無傷也至膿成將醫時忽大泄日夜五六次所  
下皆清水公命止之全曰裏氣太實正要泄無餘毒也次日泄  
益甚予視其痘飽滿紅潤不與葉服公怒曰吾女好痘莫有失  
也予曰保全無失杜亦心疑欲進肉豆蔻丸予止之至第三日  
大泄水一行予告公曰泄止矣公問未服藥何以得止予告曰  
小姐飲雞汁太多汁水留滯腸胃之間今作泄者名畜水泄也  
水盡泄自止始與四君子湯加陳皮調理而安公喜謝曰真良  
醫也命縣立牌扁書醫右楚黃四字以賜之

失氣原來足太陰 腸中實響足陽明

相同泄瀉休差誤 穀氣消亡大限臨

按靈樞經足太陰脾經是動則病得後與失氣則快然而表足陽  
明胃經是動則病腹脹音響可見失氣者脾敗而穀氣下脫也腸  
鳴者胃敗而中氣下陷也病痘之人不宜有此與泄瀉同皆是死  
證泄瀉者水穀糟粕之物腸鳴失氣腸胃生養之氣也

痘瘡手足最宜溫 熱甚須知毒亦深

若是四肢多厥逆 此為惡候必歸冥

痘瘡手足和暖為貴養兼之時手足發熱手足必有汗此毒熱發  
於中必大小便不通脉沉滑數疾宜利之三乙承氣湯

硝主之手足厥逆者此陽氣欲脫必自利不止或吐脉沉細微弱  
或浮大而虛宜急温之理中湯三十四加熟附子或陳氏異攻散  
二十六服藥後手足和煖者生厥者死若大便秘小便不通煩躁  
狂妄腹脹喘而渴脉沉滑數瘡不起者此陷伏之證為陽厥百祥  
九五十二三乙承氣湯主之三十

漿成毒解貴安寧 臟腑平和神宇清  
煩躁不眠何以辨 但從瘡痘認分明

痘瘡始終貴於安靜膿成之時毒已化解臟腑平和神宇爽快尤  
宜安靜也若忽加煩躁不得眠者但就痘子上辨之如膿多清淡  
尚不滿足此毒猶在裏未得盡出也龍腦膏主之一百五 如膿已

成又飽滿因發熱乾漿而煩者此宜利小便道赤散主之三十五  
如瘡子太密膿成之後心血虧虛煩不得眠者四物湯十九去  
川芎加人參麥門冬梔子仁又酸棗仁湯一百二十一主之

幾見成漿飲食難 錯喉嘔噦病相干  
語言清亮終須吉 暴瘡無聲瘰癧痊

凡痘瘡密咽中亦有之成漿之時咽瘡早熟肉虛皮薄易致破損  
瘡癢新嫩觸之即痛痂皮沾滯痰涎纏裹所以堵塞飲食難入勉  
強吞嚥則為痰痛所苦痰涎所膈是以水入則瘡穀入則嘔也如  
語言清亮者可治甘桔湯七加牛旁子天花粉利咽膈化痰涎惟  
多飲之自然平愈若聲啞啞語言不出者咽喉潰爛不可治矣

一小兒痘疹輕疎因傷食腹痛而嘔用平胃散加砂仁藿香  
煨生姜而嘔止

一小兒因食生冷傷脾胃而嘔瘡變灰白用錢氏異攻散加砂  
仁下芥子而嘔止

一小兒痘疹出太密喉舌都是至痒發時冷水嘔食雜膿血痂皮  
痰涎而出用甘桔湯加牛旁子頻頻叩之調理而安

一小兒膿成將靨時忽作乾嘔雖不飲不食常自嘔噦予視其  
痘不作膿不滿頂曰此逆證也乃瀉水陳葉落絃絕聲嘶之吉  
以告之後失聲悶亂而死

痘瘡皮嫩色嬌紅 待到成膿瘡又攻

調理勿令今有此 除非腫灌痘重重

凡痘瘡皮嫩色嬌者到成膿時多生瘡瘡先當調理勿令有此可  
也若失於早治而發瘡者內服消風化毒湯八十二外用首陳葉

去八十一破者以白龍散七十九 傳之大抵痘瘡作瘡乃是惡候  
吉少凶多如其人能食或大便堅抵破之處復灌成膿原無這處

續出大小不等雖盡弄破可治內服十全大補湯三十八 苦參丸  
七十二 間而與之外以戒癢救苦散七十三 合百花膏九十八 塗

之若瘡瘡之時其人顛倒悶亂抵破之處不復腫灌或成坑窩或  
即乾黑或皮自脫又加以冷水嘔食水漿不入或泄瀉或寒戰或  
牙或失聲或手足厥逆或狂叫皆死證也

待到成膿結靨時

最燥癢并又相催

苗而不秀空惆悵

兩打梨花落樹枝

痘瘡始終所忌者癢痒也到得成膿將靨十分凶險已過大半若無癢痒可計口以求安矣如作癢痒吉凶猶未可知必視其所發觀其所因察其情狀以施治法以決生死可以謂之良工也視其所發者或發於手足或發於胸背拂之則止禁之則聰者吉若發於正面癢痒不止皮脫肉乾者凶視其所因者或因吐瀉少食脾胃既弱氣血不榮者虛痒也可用陳氏溫補之法則痒可止或因穢惡之氣觸動邪火者暴痒也惟用董解之法即止或因痘瘡已熟邪氣盡解正氣漸生氣血調和而痒者此美疾也不須服藥若無所因自生癢痒者原是惡痘不得善成察其情狀者如癢痒之時乍作乍止精神清爽不自抓搔欲人撫摩者生若癢痒無時神識昏沉胡抓亂舞搖頭扭項者决死勿治

胡三溪幼女今與王小亭之子結姻者年七歲庚申夏出痘初發熱時兩手如攢物狀時喻正甫亦在予曰此肝病也經云其為病也握宜平其肝以瀉青丸方去太黃加甘草柴胡青皮一服而握止予欲再進一劑其母匡氏不喜喻順其情呼曰好痘沮其用藥予曰噫凡肝病者多水痘而作痒者欲止之於未發之前既不肯聽七日後再議予但言用心守護時喻即稱好痘以沮之果至第六日夜面癢盡抓破美匡乃大哭請予治之

或曰何變之速耶予曰向欲預防此變爾等不信今何嘆哉請勿憂歎予能治之乃用保元湯加防風日正一服而痒止再服而者加面癢亦平

正面諸瘡不可傷

略傷一處便非祥

當時即止渾無忌

破盡須教口下亡

凡視痘瘡以正面為主五臟精華皆萃於面故也身上瘡有痒者或至抓破不能為害惟正面瘡不可犯動一處苟於眉目鼻面之間抓破一處此肺有熱也急用甘桔湯七加牛旁子以解之其痒即止乃佳兆也若痒不止浸淫漸開氣愈泄而痒愈急必至滿面抓破而死

額上瘡如沸水洗

添上破爛不堅牢

漸延面頰都如是

洩盡元陽限到頭

凡痘瘡起發養漿之時額上瘡如火燒湯燒之狀潰爛破壞無復完膚或兩頰之傍亦如是樣不待爬搔而自破爛者以漸而開沙崩之勢莫之能禦穀焦水去似腐而非腐陽氣脫而死

準頭唇上與眉心

耳畔諸瘡不可輕

膿未得成先黑爛

莫將乾較語時人

痘瘡作漿之初面上諸瘡未盡成膿或鼻準頭瘡先乾如橘子色者或眉心瘡自乾黑者或唇上瘡焦黑者或兩耳上瘡自收者或兩頰瘡如餅中間乾陷者此名倒陷乃死之候不可認作正收對

本邑庠生胡近濱吾先師柳溪仲子也與予有兄弟之好乙丑歲二女出痘請予調治長女順吉次女痘將養膿時面上有乾靨者犯倒陷逆證原無治法奈夫婦平日相敬托重何乃主一方用黃耆人參耳草節當歸赤芍藥生地黃金銀花牛蒡子連翹麻黃蜜酒拌炒黑紅花子水煎調穿山甲末且告之曰此藥服後若瘡先乾者復起作膿未乾者胖壯飽滿痘空地上再出小痘上也痘不作膿不補空或發癰腫次也否則無所為計矣連進三服已乾者不腫未乾者飽膿空中補痘不多手足發癰後以十全大補湯加金銀花連翹調理而安

新水縣丘蓮塘李子出痘其母珍愛之痘正作膿發痒煩哭亟請予往治之見其面瘡落紅綻膿未熟兩頰先乾皮肉木硬因其珍愛之心難以凶告但曰左頰屬木肝也肝主血藏魂右頰屬金肺也肺主氣藏魄兩頰木硬氣血不榮魂魄不靖所以頰哭也蓮塘夫婦固請用藥許酬百金予辭不能治欲解其毒則中氣不傷欲補其中則邪火正盛固而告退是夕加煩而死

手足諸瘡要飽漿 尤肥蒼臘喜脾強  
淡清虛熱多灰白 縱得乾收有後殃  
手足痘瘡最要膿漿飽滿乃脾胃強氣血足也若灰白色或

得收靨後必手足腕膝及關節之處發癰毒也 一百十九 如此者

兩臂有背諸瘡子 瘡轉指摩最受虧  
惟有正瘡能耐久 不然粘着便無皮

痘瘡初出起發邪氣雖旺正氣亦強足以任之至於成漿則氣漸耗精神漸弱有不勝之狀起止艱難多喜仰臥惟肩膊背脊瘡最轉摩擦最受虧若痘子好者自然堅厚耐久不破其次則收靨稍遲膿自潰最可惡者如湯火之疱水去皮脫又瘡自破清水非膿黑乾焦是皆不治之證

依然團聚封瘡孔 洩去直津毒氣藏  
瘡頭有孔漏膿漿

痘瘡作膿集之時最要皮厚包裹完固若膿未成忽於瘡頭有孔其水漏出或結聚成團堆於孔外者或水去窠空自乾黑者俗名漏瘡必死若膿熟之後窠皮亦熟漿水沸出因而結靨此頭額正而之間多有之俗謂之堆屎收不可以漏瘡例論蓋漏瘡膿未成堆屎收膿過熟也

遍身瘡痘作膿集 涕唾稠粘必紅多  
強忍直當收靨後 自然毒解得平和

瘡痘者每至作膿集之時咯唾痰涎稠粘濃結或有膿血夾雜者咽喉不利飲食亦少此肺受大邪津液不足故多粘痰喉舌



之問瘡潰血出惟用其桔湯七加牛旁子天花粉法肺化痰利

膈直待收壓之後自然逆和不可妄用大涼之劑

瘡疽膿漿賴血成 幾何津液受薰蒸

含空血耗神明亂 睡裏呢喃喚不醒

痘內之膿皆身中之血薰蒸而成瘡疽稠密膿血周遍津液消耗

心主血血虛則含空故心熱者虛煩不得眠酸棗仁湯主之一百

二十一 心虛者喜睡夢中呢喃如與人言者多怪誕之事喚之不

醒安神丸主之 四十七 若昏悶甚者先以龍腦膏一百五開其心

數後以安神丸 四十七 人參麥門冬湯下

斬水懸徐桂山子文植年十七辛卯冬出痘請予調治至膿成

將醫時忽發狂妄語起舞或毆人或罵人皆平日警慎者一身

之瘡盡迸破矣父母恐有廢屯亟請田道讓之田師者一時高

明法士也殫盡其術病者越宿不少寧乃問予予曰信巫不信

醫待巫無驗吾方治之田亦自知非魔乃告予曰請用藥治勿

相拘也吾用安神丸一百粒作二次服良久始省問其所為嘉

也

起發成膿未失期 渴而飲水不須疑

氣虧血少無津液 潤燥生津法更奇

痘瘡之出全資氣血之養以致成就今痘出太密取用過多氣不

期而自虧血不期而自少故津液不足咽乾膈焦而渴也

血益津潤燥人參麥門冬散 二十二 葛根解毒湯 二十一 主

之切不可以冷水西瓜紅柿梨蔗漿藕生冷之物及寒涼之藥損

其胃氣則津液不生煩渴不止而變生焉

麻城鄒清溪子出痘至養膿時大渴不止予議用人參麥門冬

散傳醫即依本方修合予謂之曰此乃瘡出太甚津液不足之

證白木燥津液茯苓漆津液皆所禁也吾借古方而行已意教

以本方去白木升麻加生地黃天花粉知母淡竹葉只一服而

渴止

吾邑萬寶蘭長子癸丑年出痘至養膿時大渴不止予用人參

麥門冬散去白木升麻加生地黃天花粉作大劑代湯飲之一

服而止

膿果已作中無毒 腹痛多因燥屎攻

若是便清胃受冷 好將湯散急溫中

痘瘡初出腹痛者毒在裏也桂枝大黃湯 二十九 起發不透腹痛

者陷伏也三乙承氣湯 三十 宣風散 九十二 作膿腹痛者毒已出

又無陷伏其人大便者必燥屎也當婦丸 一百 膽導法 五十一

以通之便清者必受毒也急與理中湯 三十四 加桂或黃耆建中

湯 三十一 加木香主之

表裏無邪一向安 忽然腹痛又加煩

痘瘡色變成灰木 此候曾因飽食干

其出已盡其發已透其膿已成表無邪也飲食小便清大便  
稠裏無邪也一向平安忽然腹脹作痛煩燥喘促痘疹色交如灰  
木之狀此必傷食得之先以丁香脾積丸三十三原物湯下去其  
宿食後以人參白朮散三十三去葛根加青陳橘皮與養脾丸一  
百六相間調之

蕪水縣陸沉港李宅一女出痘與策湖景氏結親至膿成將癒  
時忽腹脹且痛氣喘呻吟予適在彼縣請予治之予視其病容  
既胖壯膿又飽滿診其脉弦滑予曰此非痘毒乃傷食也因問  
曾食鷄肉糯米飯予曰宜亟下之文之祖曾為教官知醫乃曰  
痘疹首尾不可下恐慮其裏未得膿也予曰病不執方藥貴對  
證有是病則投是藥下之無妨遂以原物作湯吞丁香脾積丸  
得利而安

英山縣南門金宅一子出痘成膿時忽腹脹作痛氣喘煩悶予  
在馬四衛家請予視之其痘光壯飽滿非毒也必曾傷食來問  
之果因麵食過飽乃用原物湯送下丁香脾積丸得利病稍定  
再用錢氏異功散加青皮山查只一服而愈

未得成膿先潰爛 此候得之輕發散  
除非脾胃本來強 曾見幾人成倒陷

夫痘瘡膿熟潰爛者常候也若未成膿先即潰者此名班爛班爛  
之由病當發散而不發散則毒氣閉塞喘促悶亂不當發散而發

發則熱毒隨陽氣蒸出遍身皮肉潰爛此不善表之過治之  
調脾進食令大便得所安養榮衛生肌解毒解之不至於於調養  
不至於熱方為良法宜十全大補湯三十八去桂加防風荆芥穗  
多服佳大便秘以膽導法五十一潤之膿水不乾以敗草散八十  
觀之班爛作膿痛甚者以天水散九十四和百花膏九十八塗之  
又有發表過甚外為班爛而內虛陽氣不守臟腑自利此又急當  
救裏解表陳氏木香散主之二十五厥逆者異功散二十六

本邑二尹雷省齋次孫五歲辛未正月出痘請予第四男邦治  
調治此孫嘗結拜萬東泉世喬號也作恩父世喬恃熟專恣無  
忌邦治用藥必力沮之其孫衣以厚綿圍以厚被日夜向火使  
抱任其飲酒未七日而膿子開日期未足其叔太急親往視之  
見其自面至腰潰爛平湯無作痂者乃告之曰此非正收是倒  
厥也亟用托裏解毒之藥解去衣被再勿近火飲酒可保無事  
因立一方以黃耆白芷排膿托裏防風蟬蛻以疎其表青皮精  
梗以疎其裏牛蒡子甘草以解其毒只一服而潰瘡後脹大便  
膿涎此毒氣中外無留矣予辭歸又告曰勿再服藥恐生他病

痘瘡毒落本無多 到得成膿不結窠  
不是脾虛常食少 定知倒伏認差訛

曾見痘瘡初出磊落起發亦透只待結膿窠之時却不作膿往往  
變為壞證者或因其人不能食脾胃虛又自利不知調理者或

未發未透毒氣陷伏妄談稀疎者此皆人事之不修非干時病而然也

失聲四證要端詳

肺瀉心微聲不揚

哭語無聞因腎怯

啞啞不出是咽傷

失聲之證痘疹所忌當於養膿結靨之時候之有吉有凶不可一

槩作凶斷也此有四證如聲濁不清響者此毒火上薰肺先受之

肺主五聲肺熱則脈孔竅閉奉命書云金空則鳴金實無聲是也

其枯清金散主之七附方如聲小氣短近聽則聞者此心火太亢

血稿氣消故雖有聲而不遠揚叔和云聲言爽氣清是也導赤通

氣湯主之三十五附方此上二證可治○若啼哭無聲而見其戾

出語無聲而見其口動者腎敗也其聲啞啞如破如硬者此咽

喉潰爛也此上二證不可治

三長子邦忠李媳已酉冬年十八歲出痘居經未行至成膿時

經水忽行所下血塊且多善妻錢氏以告夫逾日李媳猝失聲

不言問之但搖頭垂淚自知必死家人惶惶以辨後事予思痘

疹交黑婦腎宜有猝失聲之證今痘已成膿飽滿紅潤何以有

是逆證也沉吟良久亟呼邦忠曰勿亂吾得之矣內經云婦人

重身九月而啞者少陰之脈不榮於舌也手少陰者心也心生

血諸瘡皆屬於心瘡毒之火內起於心迫血下行故經血來也

舌者心之苗血去則心血虛不能上榮於舌故舌萎縮而

聲不能言也乃以生肌散去五味子加當歸身生地黃厚夏

李媳乃言曰參參此藥靈丹也後以十全大補湯加麥門冬調

理

蕪水縣蕭家有一子三歲癸丑春出痘請吾長兒邦忠治將臨

時忽失聲邦忠以問予予乃示以四證忠曰啼哭有聲但言語

重濁不清響也予曰此肺熱也教以甘桔清金散服之而安

寒戰咬牙雖不祥 養膿結靨更宜防

能將形證分凶吉 可許嬰童司命良

痘疹所忌者寒戰咬牙二證也單見且凶况雙見乎養膿結靨之

時尤不可見然亦有吉有凶不可不辨也如掀腫紅紫大小便秘

煩渴飲水此表裏俱實之證戰者瘡痛而振搖也咬牙者忍痛而

咬其牙也乍作乍止宜四順清涼飲二十七加連喬木通金銀花

主之○如青乾黑陷大小便不通煩燥大渴不止者此純陽無陰

之證宜防風通聖散四合棗麥百祥丸一百二十六主之若腹脹

氣喘喘足者倒陷也不治○如潰爛灰白泄瀉不止者此純

陰無陽之證宜陳氏木香散二十五異攻散二十六主之若瘡癩

悶亂腹脹氣喘足冷者倒陷也不治

本邑胡玉峯第三子庚申夏出痘甚密請予調理予曰此兒脾

胃素弱當用補脾之劑使氣血旺而痘易成就也玉峯不聽至

成膿後過期不靨遍身潰爛寒戰咬牙失聲悉具玉峯恐不

三請匠合木而吾三逐之王峯問其故予曰戰者通身清冷坐  
卧艱難不能自任非鼓領寒戰也咬牙者齧瘡作痒相尋而喘  
非神昏閉齒也失聲者欲得肉食公不肯與日夜啼哭得之非  
咽爛瘡水也公不用吾言以致此極若肯進補脾之藥則即瘳  
矣乃從吾言予用調元湯加防風白芷暗入熟附一片連進三  
劑而安

效逆原知有幾般

此名惡候古今傳

若逢嘔噦須同論

莫作尋常小病看

效逆嘔噦三者皆惡候也諸病深者不宜有此况痘疹乎效逆者  
如噎食噫氣之狀俗呼吃逆者是也效逆之聲小且短其氣似入  
而非入嘔噦之聲大且長其氣似出而非出嘔者聲清噦者聲濁  
皆有聲無物也大抵諸病之證曰火曰痰曰虛惟痘疹專主火主  
虛也經曰木陳者葉必落絃絕者聲必嘶病深者聲必噦由此觀  
之其為死證明矣

本邑庠生余光應龍泉之子也十九歲出痘請吾與韓鳳岐治  
之十日後膿成將醫忽作效逆診其脉促而代予謂韓曰效逆  
者惡證也促代者瘵脉也痘疹順正飽壯明潤何以得此脉證  
也韓亦憂疑龍泉子母惶惶也予思效逆三證一曰胃寒二曰  
水逆三曰胃敗皆不相干經曰諸氣逆衝上皆屬於火此火氣  
炎上之象乃問其大便傳如曰自出痘到今七日未更衣也予

曰燥屎壅塞下竅不通毒火炎上出於上竅故效逆也促代者  
脉得之效逆氣逆脉亦逆也又取猪胞導之取下燥屎效逆即  
止而脉亦調勻也故治病之工不可不思

痘瘡正色喜紅鮮

到得膿成又不然

曰白曰蒼皆正色

若猶紅嫩轉成愈

邵堯夫曰東赤南白西黃北黑此正色也驗之於曉午夜  
之時見之矣此一陽之氣色色之遞變也故東赤者乃一陽發生  
之氣如木之始萌也遞而變南白者乃長養之氣如火之大明也  
謂之白者非素白之白乃潔白之白也遞而變西黃者乃收斂之  
氣如金之從革也遞而變北黑者乃閉藏之氣如水之潛伏也故  
痘瘡初出一點血東赤也血化為水南白也水化為膿西黃也膿  
乾為死北黑也亦一陽之氣色色遞變皆正色也假如痘瘡膿成  
將滿之時猶帶紅鮮之色反為逆證故以灰白蒼臘為得秋冬之  
正氣也

靳水縣徐淑道乃吾縣蕭桂屏之外甥也十三歲丁亥年在蕭  
宅出痘請先君菊軒翁醫治一日歸家而嘆全問曰父有何事  
嘆惜先君曰靳水徐某在此出痘父喪母寡今不可治矣全聞  
其證先君曰痘已成膿只待收膿今變黑歸腎故不可治全曰  
我能治之先君曰信能治之徐氏不絕乃以全語告桂屏親請  
予往視之痘子磊落膿漿飽滿神識清爽語言清亮自告曰

先生救我頤酬五十金問其大便五日未通全告先君曰此正宜收醫藥實熱蒸故潰爛也其色蒼黑亦正色也但解其熱則即醫矣先君問以何方全曰四順清涼飲與之一服下燥屎二十餘枚痘隨收醫而安先君問全曰汝向志在功名未曾習醫何以知其變黑為正色非歸腎也全曰此在邵子呈極經世中乃誦其東亦南白西黃北黑之言而詳解之先君喜曰吾聞醫出於儒爾能承吾之業吾有後矣

本色汪汝愚乃大賓之次子大川之姪也大賓早被雷厄有三子長子小子皆死於痘汝愚痘將醫灰白潰爛神昏不醒大川亟請予往大川蓋嘗妬害吾者乃焚香對天告曰昔日倡謀害某者乃胡明履蔡惟心惟孝也協和之罪川不敢辭予笑曰惟

蜚雌伏是亦有數吾安敢忘人哉川曰先二姪者非不請公因此嫌疑故不敢請此姪之病與前相似又不得不請也幸而得生吾弟有後矣但恐不可治也予請視之曰無傷也不必服藥但與公同守三日收醫也川問若不服藥何以能痊予曰疥白者乃熱太過而白如果熱潰爛之狀非虛也神昏者乃邪盡正迴不極泰來之光非昏腎也再待三日則正氣復而病瘳矣川既聞予不必用藥之言又見予頤守保全之意所以前疑盡釋而收勿藥之功

○痘瘡養膿決生死訣

- 一養膿時只是清水皮薄如水泡者三四日後決瘰瘳抓破而死設不瘰瘳亦發癰而死勿治
- 一養膿時乾枯無水却是空殼決作瘰瘳或發癰而死勿治
- 一養膿時未成膿漿猶是血水忽然乾收者決死勿治
- 一養膿時忽然作痒正面抓破皮脫肉乾黑者決死勿治
- 一養膿時忽然泄瀉日夜無度湯凡不效足冷者決死勿治
- 一養膿時忽然大小便出血者決死勿治
- 一養膿時發狂謔語大便不通腹脹氣喘足冷者決死勿治
- 一養膿時或瘡色青紫或帶灰白寒戰咬牙失聲者決死勿治
- 一養膿時腹脹氣喘足冷悶亂者決死勿治

痘疹世醫心法卷之六

收靨證治歌括 凡一十九首

膿窠結就正鮮肥

瘡頂微焦欲靨時

漸次乾收無急慢

茄皮圓淨轉春輝

痘瘡成膿之後鮮明肥澤飽滿堅實以手拭之瘡頭微焦硬者此欲靨也大小先後以漸收靨不失太急不失太緩已靨者茄皮圓淨無有突凸陷凹者乾淨無滲濕破潰者此為正靨否極未之象也

痘瘡收靨有真訣

面上身中要合格

面上吐漿頂聚珠

身中結疔堅如墨

凡痘瘡收靨之時面上是一樣收身上是一樣收謂之合格乃正靨也若面上如身上收身上如面上收謂之不合格乃倒靨也面上吐漿收格痘頂吐膿結聚如珠子樣滿面皆然磊落可觀惟兩耳與身上同身上痘瘡收格皮膿乾結如螺靨樣索淨堅厚易自脫落

收靨如將日救拘

幾曾等得不差殊

但憑本痘公疎密

更向其人論實虛

俗謂幾日發熱幾日出形幾日起發幾日作漿幾日收靨此大略之言耳痘有疎密毒有微甚人有虛實豈可一切拘以日數如痘未疎者其毒微其人中氣實又能食自然易收靨固不待於自

者如瘡本密者其毒甚其中人中氣實又能食常衛和內外無諸傷犯至十二三日可以刻期收靨也若其中人中氣虛少或內外曾有傷犯或遇氣候乖變因而難靨豈可必拘以日數哉

痘瘡收靨已無邪

不疾不徐乃更佳

大疾却防餘毒毒

太遲清爛不成痂

先痘瘡收靨之時毒邪已解只要先後有次疾徐得中如收太急者毒邪未盡煎熬津液以致速枯必為日病為癰毒為諸疔瘰癧至橫夭宜微利之以微其毒當歸九主之一百 如收太遲者中氣

已虛脾胃太弱不能養肌肉使之完就以致潰爛內服十全大補湯 三十八 外用敗草散 八十 觀之

英山縣沈瀚乙丑春一女年十九出痘其婿魁宗義之子也因痘收靨不齊予在孔家坊教書請予視之起發未透膿漿未脫

收靨太急非正靨也適占得渙之巽卦予曰痘証既逆卦象又凶病不可救矣果死一子十歲出痘將靨時亦與其婿前証同

蓋厲氣傳染也及問卜又得渙之巽卦人皆憂懼亟請予治予曰勿憂此病可治其婿曰同一病證同一卦象在吾妻則不可

治吾舅可治者何也予曰以病言之今正收靨太急面無完瘡故曰不治令舅面瘡半靨膿腫尚存故曰可治以卦言之先以

夫占妻用財為主卦中無財兄弟發動又尅妻財所以凶也後以父占子用子為主子孫旺相兄弟發動能生其子為子之保

以吉也後果然無事論曰密齋不但善醫而又善治

當收不收瘡潰爛 內外審候是何變

以法求之要着痂 痂不得成為倒靨

痘瘡過期不收遍身潰爛者此與收爛不同乃熱太過也其候不

同或於天寒失於溫燥便發受凍而不收者宜膠五積散八十六

外用乳香燒烟於被內薰之或因天熱過求溫燥使發被蒸而不

收者宜內服人參白朮湯二十四或五苓散二十八外戒去衣被

少清涼以天水散九十四撲之大便秘結內外極熱毒氣散漫

無陰氣以秘之而不收者宜內服宣風散九十二或三黃丸八四

順清涼飲二十七外用膈單法五十一以敗草散八十觀之或泄

瀉氣虛脾胃弱津液少肌肉虛而不收者宜內服陳氏木香散二

十五外用敗草散八十或因渴飲冷水過多以致水漬脾胃濕滯

肌肉而不收者內服五苓散二十八如因食少氣虛而不收者人

參白朮散二十三去葛根加桂枝之已上諸證以法治之已清者

結薄痂未潰者結痂方為佳兆若痂皮俱不結者成倒靨矣

本邑庠生胡小山長女汪四竹之妻未嫁先出痘甚密膿成過

期不靨請予調治此女平日脾胃虛食少性不肯服煎劑予乃以

錢氏異攻散加木香青皮煉蜜作丸米飲送服調理而安

又庠生胡仁山小山之子也幼時出痘甚密膿成不靨漸變

予調治予自起發以來未得大便甚密膿成不靨

議欲下之小山曰此了素勇恐不可下時有一法士王克廉

符水甚靈乃書一符焚而服之少頃腹中鳴而利下清水

皆稱謝予亦喜之但思許久未便豈無燥屎今附下清水乃一

氣成符之驗待至次日痘益潰爛予作膈單法取下燥屎三十

餘枚如彈子大衆又笑曰此法更妙痘即收靨齊發又不收大

便自燥屎初下一次又未利也予曰作符乎作膈單法乎王師

亦曰不如膈單法再取下燥屎十四五枚後皆澹糞痘亦收靨

而安王克廉氣字特法自此大行

小兒因渴飲水過多濕傷脾胃不能收靨以四君子湯以人

參補中白朮燥濕茯苓滲水甘草解毒加防風以勝皮毛之濕

白芷以逐肌肉之水桂以利關節而去寒水之邪砂仁以溫胃

理而安

一小兒大便不寬熱蒸於內而生其濕以致浸淫不能成痂用

當歸稍生地黃以涼血麻子仁以潤燥酒大黃以瀉熱開結生

耳草以和中得利而安

一小兒泄瀉不止食少此重虛不能收靨用陳氏木香散合肉

苳菴丸服之而安

遍身潰爛少完膚 膿血淋漓勢已痛

坐臥不能惟用檜 癢痕欲戒却宜敷

成膿之後過期不醫以致潰爛膿汁淋漓不可着席若着  
痛者用敗草散八十或蕎麥粉一百二十三以絹袋或於身軀上  
撲之更多佈席上觀臥尤佳面上欲不成癩野者用癩癩散七十  
和百花膏九十八敷之

本邑民蔡承盛一子出痘甚密先請吾妾兄甘大用醫吾所傳  
者至膿成後過期不醫面瘡潰腫起止呻吟啞水吐食語音不  
清耳謂不治而去後請予治予視其病面瘡腫起正在貫腦遍  
身皆然非倒靨也啞水啞食者口唇腫硬吞嚥不便非咽喉潰  
爛也語音不清者鼻中壅塞氣不得通非失音也瘡毒盡出表  
病裏和可治也乃製一方用苦參酒浸牛旁子白藜藜何首烏

荆芥穗各等分為細末酒糊為丸淡竹葉煎湯下調理一月而  
安矣

特鄰居一小兒病證相同亦請視之予曰不可治也或問何故  
予曰證不同也彼痘過期痘熱宜醫此痘猶生未得成膿不宜  
醫者一也彼痘腫脹猶貫膿血此則面平日開皮脫肉乾二也  
彼痘喉舌無瘡此則咽舌潰爛啞水失聲三也彼家私與蔡氏  
求藥服之無效而死

胡三溪長女十二歲庚申夏出痘甚密請喻南麓醫其母匡氏  
之意翁先學醫於我不知治痘之法只以參耆大補之劑服之  
二十日後過期不醫予往視之念三溪之好也見其瘡已潰

幸非倒靨乃犯溫補藥多裏和盡出表毒不鮮急宜鮮表勿使  
皮肉腐爛喻猶強執為是匡亦深信不悟又過五日不收後請  
吾長男萬邦忠予教用防風荆芥升麻以鮮表勝溫白芷以鮮  
膿逐水連喬牛旁子甘草以鮮止鬱蒸之毒肺主皮毛因參耆  
之補肺熱且甚時值夏火正旺用黃芩酒炒以瀉肺中之火鮮  
時令之熱調理至一月而安

但到收時膿自乾 收藏飲東貴周圓

莫教潰爛痂皮嫩 至此還將倒靨看

痘子初出磊落成箇後來長大作膿始相連串外雖相串皮下猶  
一箇是一箇至結痂消膿乾現出初來本形所以收藏飲東  
要完全堅厚復成箇數為真或根脚相通皮肉盡串者結痂之時  
亦要乾淨無有滲濕及濺破者次也若未成痂者潰爛已成痂者  
只是嫩皮此倒靨也

蘄水縣株林鋪董希周一女十九歲辛丑十二月中旬出痘請  
醫江萬吉治延至歲終不得收靨精神已昏飲食俱廢江不能  
治而去時予在沙吸徐淑道家治痘強晉過歲壬寅元旦希周  
自來懇請予往視之僵卧如死人任其開余詳看而不知也乃  
診其脉洪實調勻其祖父廷憲在素知醫者予告之曰此痘倒  
靨逆證也不可治惟脉洪實調勻不疾不遲予今棄證從脉治  
之若得壞瘡復起新痘復出人事清爽飲食如常則無事矣乃



升陽散火湯如黃耆當歸木香青皮連進三劑初三日復進  
一層新痘舊者盡乾初五日出盡周匝一身病者亦漸甦省能  
言語求飲食矣依期起發養膿至十三日而膿後以十全大補  
湯調理希周父子拱手謝曰此病平生罕見皆曰不可救矣非  
國手回生起死之力此女之病決不能保予曰痘疹倒靨必塌  
於脊今幸得愈猶當慎目疾也宜預解之希文不聽半月後右  
目痛不能開果表明矣

痘臭須知有幾般

特師莫把混同談

養膿有奇為凶兆

結靨總知作吉看

難經云心之臭焦肝之臭臊脾之臭香肺之臭腥腎之臭腐五臭  
皆屬於心故曰臭從火化也內經云諸痛痒瘡瘍皆屬心火故痘  
瘡之證心火主之凡論痘瘡到結靨時總有臭者此痘子成熟之  
氣和氣自內而出也吉若養膿之時即有臭者此毒火薰蒸之氣  
積於中而見於外也凶又或瘡痒抓破及潰爛腫潰之時其臭焦  
者心火盛也危其臭臊者肝火盛也死其臭腥者肺火盛也危其  
臭腐者腎火旺也又為腐痘之氣必死不治惟臭香者脾也水穀  
之府無所不受故吉

收靨元來貴整齊

臭腥潰爛事生疑

過期見此還為順

未及收時作逆推

痘瘡收靨圓淨堅厚如螺靨者上也頭穿膿出堆聚成痂如雞矢

一次也皮破膿出如薄如紙者又其次也皮爛膿潰不成痂皮爛  
汁腥臭者斯為下矣如已過期譬如瓜菓熟矣則爛此造化之常  
還作順看若未及期則為斑爛乃逆候也變倒靨而死

本邑庠生盧半然予之弟也前妻李氏出痘甚密未及  
成膿面瘡自破皮腫膿聚氣多腥臭過期不靨飲食漸少錯猴  
嗆水請予視之曰形證俱惡恐不得痊延至二十餘日而卒

倒靨誰知毒入裏

死中求活治得理

便秘腹脹急下之

自利則將來物取

痘毒當靨不靨復入於裏者謂之倒靨此死證也元氣素怯又不  
食常自利者陳氏木香散二十五 異攻散二十六 死中求活聖藥  
也如原無泄瀉大便久秘今添腹脹喘呼此毒感薄蝕元氣復入  
於裏宜急下之排毒散一百二十二 若不急下則腸胃不通榮衛  
不行益加喘滿躁悶而死矣若毒入裏忽然自利者此人脾胃素  
強毒氣難留故自利須看利下之物如利而皮膿血者毒氣得出  
為順不可止之待利盡膿血自愈如利水穀者此毒氣反驅水穀  
脾虛不能制之其證為逆不可治也

原瘡潰爛復成瘡

痘出重且漸作漿

此候未曾成倒靨

便堅能食得為良

如痘瘡破損潰爛者復腫潰作瘡不致乾枯原無痘瘡處復出一  
層如初出之狀亦以漸起發作膿者此裏氣充實毒不得入猶在

毒未成倒靨逆中之順證也但瘡子重出一番必其人能食大便堅足以勝其再作之毒如食少大便溏者用十全大補湯  
六人參白朮散 二十三 相間服之自利者陳氏木香散 二十五 異  
攻散 二十六 肉豆蔻 四十三 主之蓋病久氣虛惟利溫補不可再  
解毒也

一小兒痘靨後復出一層小痘其家驚憂請予予見之曰此佳兆也痘科云輕者作三四出大小不一等重者一齊湧出此痘最輕且無餘毒發得盡也其家喜而酬之

本邑胡若泉一子三歲出痘請予長男邦忠醫請予視之予曰毒氣有餘穀氣不足此兒食少故不靨也問服何藥予謂邦忠

曰無藥可解能食則生不能食則死次日思食所食且多予聞之嘆曰死亟矣邦忠亦疑曰父親云向能食則生不能食則死

今能食而曰死亟人皆笑之子教之曰謂之能食者一向不食而今思食自少加多胃氣復也今忽多食者乃胃敗火盛和火

殺穀名曰除中况膏之將滅必大明而後滅死在旦夕矣次日果死

一痘將靨忽作泄瀉口渴飲水小便短少其痘解壯紅潤此內熱也用五苓散加黃芩芍藥煎調益元散服之而安

一痘起膿成能食一向溏泄未止用錢氏異攻散加木香訶子肉服之而安

一痘成膿而部將靨因渴引飲過多以致自利用白朮青服之渴泄俱止而安

一痘成膿少食忽作泄瀉不止瘡變灰白用木香散豆蔻丸服之而安

一滑泄不止食少腹脹足冷痘灰白色脉細無力此犯五厘不治果死

靨時表解裏當和 忽爾通腸洩奈何 不是裏虛元氣脫 必然倒靨毒邪多

痘子初出以來表裏俱病收靨之時表邪已解裏氣當和大便宜潤小便宜利忽爾洞泄水穀者此中氣暴虛不能禁固水穀或毒

氣乘虛入裏欲作倒靨宜陳氏木香散 二十五 異攻散 二十六 肉豆蔻丸 四十三 主之利止者佳利不止者陽脫而死

清瘡最毒面居先 陽毒從陽心火炎 能食便調無別苦 可投良劑保傷殘

痘瘡潰爛先傷於面者面乃諸陽之會痘乃純陽之毒以類相從如水就濕火就燥也又心之華在面諸瘡皆屬於心心火上炎之

象如面瘡已破腫消目開者此不着邪先以乾燥病為倒靨死在旦夕如已破復灌滿面成餅焦裂起膿血淋漓食谷則嘔飲水

不啻粘涎語音啞喎口中氣臭者此臟腑敗壞故諸證盡見絕而死如瘡潰腫飲食無阻大小便調更無他苦如上

則可治內用十全大補湯三十八升陽解毒湯一百二  
相間服之外用滅癩救苦散七十八百花膏九十八合而敷之

陰陽限在人中 任督分來上下通

宜向此間漸收斂 陰陽相濟得和同

人中為任督交會之衝督乃陽脉自人中而上任乃陰脉自人中  
而下故自準頭至印堂與額至鳩尾相應印堂至髮際以上與膝  
以下相應痘疹收斂但觀面上收到之處則知身上收到之處矣  
凡痘子自人中上下左右先出先斂者吉陰陽配合相濟之理也  
若自額角先斂者孤陽不生足下先斂者孤陰不長皆凶兆也

新水縣柴家壩柴大愚之妻乃金谷山周望華女也二十七歲

痘疹起時請予治之予見其先乾曰此凶証

戊戌年出痘甚密膿成時請予治之予見其先乾曰此凶証  
也不可治矣或問此痘將收而謂不治先生誤耶予曰起發未  
透膿漿未熟不當斂也况痘疹收斂自有次第形色亦殊先自

口唇兩傍收起漏漿堆膿而瘡皆然自項而下則成死殼今痘

未熟而斂乃倒陷也自鼻先收失其序也不漏漿者乾枯也予

不能治遂辭去後三日而卒

陰陽相濟得相成 陰寒陽孤勢不行

不信但觀頭與足 痘疹難斂自分明

造化之理生於陽者陰成之生於陰者陽成之痘疹收斂頭自髮  
際以上陽氣獨盛謂之孤陽足自膝以下陰氣所聚謂之寡陰所

以謂斂皆斂之後此一處難斂乃造化自然之理不可作倒斂

會見傷犯灌成瘡 待到收時不斂漿

膿汁淋漓多痛楚 急宜治療免殘傷

痘瘡結膿瘰之先或會傷犯破損者潰爛成瘡至於收斂此獨不  
斂膿汁不乾更多痛楚若不急治漸成疔蝕瘡損骨傷筋以致橫  
天宜內服十全大補湯三十八外用滅癩散七十八和百花膏九  
十八傳之

幾箇頑瘡不肯收 無時痛楚血常流

此成疔蝕難調理 日久堪嗟一命休

痘子已成疔蝕瘡者若在肢節及諸虛怯軟弱血氣俱少之處色

青紫黑腫痛潰爛以漸涎開血自出者難治若所生之處在於陽

分不痛不爛色不變血不出者以綿散主之一百二十五

一向渾身只煖溫 忽加煩熱減精神

乾漿焦斂宜如是 只怕生來內外因

痘疹常宜溫煖有熱不可盡去如一向身溫今反發熱者俗名乾

漿此亦常候只怕內傷飲食外感風寒以致發熱又當別論然病

久氣虛一輕用汗下因外傷者桂枝葛根湯五加人參因內傷

者木香大安丸九十一主之並宜用蓮香飲凡痘出太密身有壯

熱可嫌者蓮香飲聖藥也八十八

待到渾身膿水乾 紛紛時俗急心生

不知禁忌多翻變 一 簣雞成九仞山

收醫之時人心息忽若厥飲食不知禁忌以致變生異證消消皆  
是也

○痘醫辨生死訣

一痘醫時面上遍身臭爛不可近目無神采者死勿治

一痘醫時遍身瘙痒抓破無水皮卷起如豆殼乾者决死勿治

一痘醫時兩腮乾硬按之如石者决死勿治

一痘醫時泄瀉不止遍身潰爛足冷者决死不治

一痘醫時癩痒不止寒戰咬牙失聲者决死勿治

一痘醫時嗜水失聲或乾吐者决死勿治

一痘醫後痂皮不脫不思飲食昏憤悶亂者决死勿治

痘疹世醫心法卷之七

落痂證治歌括 凡十一首

痂自脫痘痕明

無山無凹皮肉平

容貌不殊原未病

泰來否去一番新

收醫之後其痂亦先後以漸自脫其痕鮮明光瑩平整無赤黑無

凸凹容顏依舊五官四肢並無傷殘此大順大吉者人生過此又

一番新也

滿面天點黑點漆

形容亦盡髮毛更

傍人乍見應難識

恰似重來生一般

痂後痂落滿面癢或赤或黑五官廢缺四肢傷殘毛髮盡脫形

容大改此險中得生者又如再生一般也

落痂之後癢赤黑

愛養能教癢自滅

突起還將風熱論

凹陷却因虛裏得

落痂後其面癢或赤或黑者用四白戒癢散 一百二十七 臨睡

以清蜜水調搽面上至曉以水滌去之自然白瑩脫去更宜愛養

不得早見風日經年不滅如癢癢突起成凸者此熱毒未盡解毒

防風湯主之 一百一 外用用蠅子內水摩之如陷下成凹者此脾

胃虛不能長肌肉也人參白朮散 二十三 加黃耆主之

醫後痂皮令自脫

日久不脫脾胃弱

莫教搗損又傷膚

番覆成瘡膚似剝

收後其病自脫者佳不脫以百花膏潤之九十八令其速脫  
稍遲則乾硬深入肌肉經久方脫遂成癩痕然久而不脫者脾胃  
虛也人參白朮散二十三加黃耆官桂主之不可擗搗刺去若不

禁手及傷皮膚後泄作赤白痢一時難愈其後多成疥癩也

一小兒壓後痂皮不脫問予予曰此脾肺二經不足也益肺主

皮毛脾主肌肉其氣不足故難脫也乃用錢氏異攻散加黃

耆桂服之愈

一小兒痘後一身盡瘡痂皮盡脫惟頭與足不瘡其家甚憂請

予治之予曰此常候也何勞吾治蓋天地間物以陽濟陰以陰

濟陽陰陽相濟而成造化人之一身諸陽皆聚於頭乃陽中之

陽謂之孤陽諸陰皆會於足乃陰中之陰謂之寡陰孤陽不生

寡陰不育所以頭瘡不收者孤陽無陰也足瘡不收者寡陰無

陽也又當自痊但遲遲耳不須服藥亦無方也請者喜而退

痂皮不脫日時深 陷入肌膚必作癩

胸背四肢由自可 面頰豈可著癩痕

凡瘡痂日久當脫不脫者胸背手足無妨惟面上不脫必成癩胎

未脫者以百花膏潤之九十八令其易脫脫盡之後癩痕黑黯皆

以四白癩散塗之 一百二十七

痂脫癩痕黑黯多 勸若未可許無疔

毒邪歸腎誰知得 只要其人表裏和

凡瘡癩頭面渾身並黑黯者未可便說無事尚恐日前未甚作膿  
收靨太急此倒靨歸腎也但察其表裏如壯熱之為未除煩悶昏  
睡少食或大便不通或自利此真倒靨歸腎也若身溫煖爽快食

漸加大小便調者此瘡癩本無慮也

一小兒痂落後其癩白色或以問予予曰此氣虛也肺為氣之

主其色白當用參耆大補之劑否則有變其人曰痘已收完何

變之有至一月後大喘而死

收靨遲遲不脫痂 神昏善睡此無他

只因氣弱神先倦 緩治未痊不必嗟

如收靨既遲瘡痂不落昏昏善睡者此邪氣已退正氣未復脾胃

虛弱宜調元湯 十八加麥門冬合安神丸 四十七 或只用酸棗仁

湯一百二十一 緩緩調理待氣血平復榮衛和暢而安矣

脫痂胃氣未全舒 飲食安能便有餘

若使食多林浪喜 胃中邪熱不曾除

瘡痂既落中氣暴虛多不能食必藉人參白朮散 二十三 去葛根

加陳皮木香以調養之其間或有瘡痂起而能食者是胃中宿有

蘊熱故也蓋胃熱則消穀所以能食其人必大便稍秘或大便難

當用三黃丸 八利之否則恐胃熱不去鬱為口臭齒腐生風之証

流散四肢則發為癰疽腫之毒然有一等脾胃素壯實者于素壯

食大便亦不至有秘結之患此又不可一藥論也凡痘瘡自成膿

後是四五日未大便者惟瞻導法為最 五十一

痂起渾身一掃空

癩痕凸腫盡成膿

依然箇箇如先樣

形證輕微却不同

痘瘡收靨之後痂皮盡脫曾見癩痕凸起復作膿窠依舊結一層  
死子者或因收靨太驟毒氣未盡或因誤服溫補之藥多啖肥甘  
之物飲酒喜食煎炒辛辣或因出風太早榮衛鬱而不通皆能復  
成此證亦與前日一般但無苦耳若此者毒邪外散決無留毒之  
患

本邑二尹雷省察次孫出痘落痂後一月有餘面癩凸腫如梅  
李大請予視之予曰此原日所犯辛辣之毒今始發世也凡毒

自內而外者宜用當歸稍赤芍藥防風荆芥連喬牛旁子玄  
參蟬蛻升麻作散淡竹葉煎湯調服而安

一小兒落痂後癩肉凸起且作痒請予予曰此風熱也用人參  
敗毒散加防風荆芥一服而安後有患此者用荆防敗毒散加  
入參服之外用水楊湯浴之皆效

一小兒落痂後癩毒不平人問予予曰痘家不可食姜葱蟹不  
齊癩不平也問之果然

一小兒落痂後癩腫復成瘡久不愈請予治之予曰此痘毒滲  
也由犯以手搔損不得自脫故皮肉受傷而復作瘡也以苦參  
丸與之而安

癩起處落紛紛

幾處猶然膿水浸

硬疹齒膿原毒蘊

空襲停水裏肌平

痘瘡潰爛不結痂者倒靨也或三五處腫潰潰爛不結痂者其  
瘡也若已正靨痂起自脫或面上或手足成片結硬瘡頭雖中  
毒膿漿者此是原出瘡子之初其處太密糊塗成片無復顆粒  
以毒蘊於裏不能起發作膿結痂也但用戒癩散散 七十八和  
百花膏 九十八 塗之待膿盡痂起自愈或手足腕膝之間瘡粟  
串作太一塊膿化作水停蓄於中恰如囊袋皮不破水不去且  
只如是者此裏面肌肉已好原日瘡皮刺在外也宜用針決去其  
水自乾脫矣

差後心虛氣未平

更宜調護保安寧

皮膚嫩薄風寒襲

腸胃殘傷水穀停

瘡痘新差之後氣血未復視之未靨尤加調護可也蓋痂皮起落  
肌肉新嫩不宜澡洗增減衣服則表已虛寒暑之氣易襲也瘡毒  
內作臟腑傷毒雖外散腸胃已弱不宜飲冷傷飢飽則裏氣  
虛飲食之物易傷也時俗不知此理謂之已痊再無他交怠玩縱  
疏致生後災一旦病生悔之晚矣

七卷終

痘後醫心法卷之八

痘後餘毒證治歌括 凡三十六首

痘瘡醫後善無難 人漸清寧食漸加

若比痘中還更苦 莫言無事便矜誇

或問痘後餘毒可前知乎曰痘未醫時毒氣未除正氣未舒如雞在湯如劍在灰之狀痘已醫後毒氣已盡正氣將復如因魚入水囚鳥出籠之狀但察其身無熱口不渴大小便調腹中無痛精神漸壯飲食漸加此真安樂之時豈有餘毒哉若身熱而渴腹痛吐泄或小便赤澀大便堅秘精神昏憤四肢倦怠飲食減少坐卧不安此有餘毒伏藏必生後災以此決之可前知也

痘瘡輕者自無乖 逆重從來有後災

不是毒邪根裏得 或因調治悞中來

凡痘瘡輕者其本疎其毒微其證順自然易醫無餘毒也重者其本密其毒盛其證險自難出難醫有餘毒也逆者或伏或倒陷或倒靨幸脾胃素強調治又早不至大困亦作餘毒錢氏云其病有三一者疥二者癩三者目赤以證求之尚不止此亦有出已盡發已透靨已齊者復作餘毒此由溫補之過飲食之失而得之故治痘後餘毒或補或發散或解利要在分表裏論虛實不可一槩投湯劑也

痘瘡醫後難調理 表裏俱虛勿縱施

此與傷寒復病同 補虛為本而已矣

痘瘡之後表裏俱虛要避寒暑戒癩洗以養其表節飲食遠房室以養其裏傷寒賦云勞食再復病名內傷言其虛也又云諸食皆復飲酒則甚諸勞皆復御女必死言犯其虛者不可治也如小兒則在父母之調護大人宜自保而勿失焉治其病者惟以補虛為本所因之病以不治之

古云痘毒只三門 自我推求未足憑

五臟有邪皆有證 各隨形證審來因

痘科云痘後餘毒一者疥二者癩三者目赤夫疥者心病也癩者脾病也目赤者肝病也胎毒之發五臟各有一名如心為斑脾為疹肺為膿泡肝為水泡腎為黑陷是也發熱之初五臟各具一證如何欠驚悸屬心項急煩悶屬肝咳嗽噴嚏屬肺吐瀉昏睡屬脾上京能涼足京屬腎是也何以餘毒只心肝脾三臟有之乎况三臟之證又不止於此乎或者舉其重而言之欲人推廣之耳○如毒歸於心則為斑疹為驚悸為痺痛為壯熱為咽乾而渴為汗為丹瘤○毒歸於肝則為悶亂為水泡為腰痛為目病為卵腫為乾嘔為手足拘攣為吐衄為寒戰咬牙○毒歸於脾則為吐為泄為喘為衄血為瘡乾燥皺揭為有臂痛○毒歸於肺則為吐為泄為腫為脹為腹痛為唇瘡破裂為舌本強為手足病為不食○毒歸於腎為黑陷為猝失聲為手足逆冷為咽中乾痛為飢不欲食為多渴

○毒歸於腸胃為泄為利膿血為腸鳴失氣為大便不通○毒歸  
膀胱為小腹滿痛為溺血為遺尿為頭腫痛為目上視已上五臟  
之證舉其槩臨病之工不可不審

黃州府管糧通判蕭壬峯小姐乙丑冬出痘請全調治緣小姐  
嬌惜太過非雜煎熬厚味不食而彼處風俗有病者必服附  
子食雄雞灸閃元全請戒之不聽全嘗告曰不肯慎口他日高  
毒作病必廢調理公不肯信自丙寅年後兩目出淚眼弦亦翳  
全曰此毒發於肝肝火旺也公曰目上下臉屬脾脾有熱乎全  
曰此因淚出不止浸淫爛潰也乃用瀉青丸方去大黃加柴胡  
黃本家蒙花煉蜜為丸服半年後而目不出淚眼弦平復矣丁  
卯夏又小便如澀水點滴着肉處皆爛成瘡泡全曰此亦肝火  
也公曰膀胱之熱全曰肝色青乃肝移熱於膀胱也又用瀉青  
丸方去大黃加柴胡木通車前子煉蜜為丸服之而安公曰不  
聽爾言及勞爾力

痘後留邪作腫癰

或為結核論相同

但將毒氣分深淺

莫使餘邪透骨縫

此已下二條言癰毒也此由毒氣潛藏經絡故於肌肉靈交或閃  
節動搖處紅腫而成癰又或既平之後失於解利餘毒大盛外不  
得洩於皮膚內不得入於臟腑聚而不去遂為之癰如毒氣淺者  
止生結核腫毒癰癤而已甚者至頤項腦脇手足肢節盡掀腫癰

癰癤發一二處或根淺者可治若流注起伏根深蔓引者小則潰  
筋脫骨必為殘廢之疾甚則綿延日久而死

本邑庠生胡近濱長女出痘不甚密亦不十分光壯飽滿藥  
治之點滴不入口蓋平生不肯服藥也收醫時一片薄殼逆痘  
也足膝發癰毒與藥一飲而盡近濱夫婦皆喜予曰勿喜病不  
可為也近濱問其故予曰脾主味開竅於口經云口和則知五  
味矣今愛素不肯服藥今肯服藥且盡是不知味而脾敗矣况  
膝膕之屬脾實主之脾敗則亦不能成膿及請方士蔡谷陽針  
之果皆清水次日卒

新水縣夏佐南長子痘後手足發癰請予視之見其面色黎黑

精神疲困飲食且少予曰令嗣之痘未得光壯收醫太急今發  
癰毒乃倒陷歸腎證也必不能成膿而死

一小兒痘後發癰請予治之予用十全大補湯加連翹金銀花  
治之而愈蓋其癰已潰故用是方凡潰癰者以是治之未有不  
愈者

一小兒痘後發癰即請予治予用解毒內托散調理而安

黃岡係三家店蔡丹泉一子痘後卵腫吾男邦正醫治作厥陰  
肝經病是也丹泉不自安使人問予予曰非癰乃厥陰肝病因  
寄一方用小柴胡湯加青皮木通山查肉調理而安

看任何經用引經

腫時不與潰時論



情中托裏分虛實 決毒排膿視淺深

凡治痘癰先看何經絡分氣血多少用引經藥如太陽經者活防風陽明經升麻白芷少陽經柴胡少陰經獨活太陰經防風厥

陰經柴胡若初紅腫硬痛者以針刺之口吮去惡血以拔毒膏九

敷貼解毒內托散 一百二十二 氣實能食大便堅者用排毒散 一百二十二 疎利之氣虛食少者用十宣散 三十七 或流氣飲

三百二十八 毒淺而小者只內服小柴胡加生地黃湯 一百二十

外用神功散或拔毒膏貼之 九十七 此治腫瘍之法也若已成膿而未潰者以銀針尖去其膿勿使內潰已潰者用十全大補湯主

之 三十八 此治潰瘍之法也○大抵痘毒發癰在手肘腕足膝脛中者多若在手腕發者屬手太陰肺經在足脛發者屬足太陰脾經並用解毒托裏散主之 一百二十二附方

遍身疥癩候何寧 敗面殘形亦可矜 搗拍瘡傷為毒淺 薰蒸肉爛受邪深

此一條言疥毒也痘後遍身瘡癩如疥如癩膿血浸淫皮膚潰爛日久不愈此毒氣彌漫散於皮膚宜升麻葛根湯一防風解毒湯

一百一 苦參丸 七十七 主之若因搗拍成瘡者只以百花膏塗之 九十八

疳蝕頑瘡亦可嫌 時時流血不置乾 穿皮銷肉成癰附 腐骨傷筋作天殘

此毒在脾也痘後疳蝕瘡者毒壅肌肉內透筋骨外連皮膚出血日久不痊亦惡候也內服十全大補湯 三十八 外以

毒散皮膚有數般 或為癰疹或成丹 丹癰凝結從深論 癰疹分疎作淺者

此毒在心肺二經也痘後毒氣散於皮膚肌肉者病有數般或為癰皮上起如疣瘰癧瘰癧更多內服解毒防風湯 一百一 外以

葶衣湯洗之 一百三十 或為疥皮上如蚊蚤所咬之迹或如小疥子即麻子也升麻葛根湯一加防風荆芥穗主之熱甚渴者與人

參白虎湯 二十四 相合服之或為丹癰紅腫作痛手不可近流移上下過心腎者即死宜內服小柴胡加生地黃湯 一百二十九 外

用銀針法吮去惡血自消 一百三十一 或用砭法若但紅不腫不痛者斑也人參白虎湯 又名化斑湯 二十四 加玄參大青生地黃

主之 眼中翳膜忽遮睛 癰澁難開若霧雲 但用湯丸頻解毒 勿輕點洗反傷明

此下二條言目病毒在肝也瘡痘毒氣之為目翳也蓋自臟而外治之法但活血解毒而已活血不致於熱解毒不致於冷五臟

平和則翳當自去不可輕用點藥及致損睛宜蟬蛻散 九十六 四

物湯 十九 加柴胡主之

暗中強視淚盈腮

略見陽光不敢開

此是羞明差別法

莫將層翳混同猜

痘後目閉淚出不敢見明者此羞明證也惟於黑睛處則能開經見明則陽光燥之淚自溢出癰溢難開宜洗肝明目散九十五加

家蒙花目中赤者洗肝明目散九十五主之

本邑二尹雷育齋一孫出痘七日倒靨往視發出首翁問曰

再服何藥予曰既發出毒猶太甚欲解其毒中氣素虛恐傷

中氣又致倒靨欲補其中恐助毒火又傷其目不如節飲食適

寒溫以待自安時萬世喬正與首翁父子厚禮夜公辭不出欲

進補中藥聞予言而止偶因傷食發熱予不在焉世喬言於

曰昔欲用藥密齋阻住今病既矣密齋不得辭其責首翁父子

皆有恠心乃作參耆溫補之劑服之韓風岐與吾見邦治任其

所為不敢止也予聞其事又往問之人皆曰二公正恠爾不必

往予曰吾無所失何恠哉徑入問之予先告曰勸勿服藥恐其

傷目何大求效之速首翁曰但得生雖帶疾何妨蓋謂必不得

生也予又告曰令孫必無事他日損目切記吾言今果兩目俱

盲首翁父子始悔不信予言而疎世喬矣

本學掌教王月山公子痘後兩目畏明予曰肝火太旺宜服瀉

肝散加柴胡蟬蛻黃芩初一劑用酒製大黃公子不喜苦藥

服果成內障兩目盲諸醫不效

本邑徐少柳一子痘後兩目不開請吾見邦治醫不效乃請

視之予曰兩胞高腫而不流淚決非痘醫乃脾經濕熱也遂

一方用蒼朮重便浸黃連酒炒防風升麻生甘草為末蜜水調

服而愈

本邑湖田蕭天秩一子痘後目有白翳請予視之予曰此痘

也治之無功果有

斬水縣徐淑道在吾縣出痘不靨先君命全治之許謝數多蕭

桂屏欲悔其議再請團風鎮醫李姓者至用陳氏木香散一服

予曰誤也必須目矣果損一目

斬水金谷山一女出痘後目閉不開是予調治予曰金

愛之痘順症也不失常期有何餘毒必羞明證也乃試之向暗

則開兩目不赤向明則閉又不流淚此肝經火邪未去也乃用

羌活防風當歸稍川芎柴胡蔓荊子家蒙花生甘草淡竹葉一

服而目開遍身痘癩腫凸而起再用四物湯加防風荊芥公

連喬生甘草服之平復

本邑多雲山周宅一小兒九歲痘後出外忽頭腫兩目不開

吾妾兄甘大文亦吾所傳者大文問吾求方予教曰此非痘

乃風熱也口授一方用羌活防風升麻柴胡當歸川芎藥水

荊子細辛甘菊花黃芩酒炒往治之而安

熱毒乘虛入腹中

大腸乾澀便難通

如逢熱結膀胱裏 溲不來時又病瘰

此言毒在大腸膀胱也痘後毒入腹中熱氣併小腸則小便不通併於大腸則大便不通如前後部俱不通者勢愈甚小便不通者五苓散二十八導赤散三十五大便不通者三黃丸八四順飲二十七三乙承氣湯三十大小便俱不通者八正散四十六通關散一百一十五斟酌用之凡屬後餘毒未盡有諸熱證者並宜大連膏湯多服佳八十八

而今泄利又何如 治法難得一例拘 能食渴多知是熱 脉微食少又為虛

此下皆毒在腸胃證也痘後泄瀉其證有一如能食而渴脉盛者此熱入大腸也渴者內熱也食能多者邪熱殺也脉盛而熱證諦也宜黃芩湯四十一加黃連如食少不渴脉微小者此裏氣虛不能禁固水穀也宜四君子湯二十加訶子肉豆蔻或理中湯九加熟附子三十四甚者以肉豆蔻九止之四十三

泄利煩煩見膿血 此是大腸多蘊熱 莫將倒陷一般論 只宜解毒不宜瀉

痘後便膿血者此熱毒入大腸也宜四物湯十九加黃芩黃連枳殼荆芥穗或黃連解毒湯加生地黃八十九勿作倒陷及用劫瀉藥也

本邑多雲鎮張國重一子痘時面赤腫膿水浸淫泄下膿

血後重不食先請醫問是南名醫也作噤口痢治不效請予治之予察其證乃是倒靨非痢也在痘科中則曰利下膿血痂皮者生水穀不化者死在傷寒厥陰經病論則曰熱而於裏當便膿血勿治利盡膿血自愈予思此疾不死不可亟治乃買藥製藥故延緩以待之數日後度其膿血將盡乃用四君子湯加白芍藥枳殼黃連木香一服而後重除利畧止再服而能食三服而痘靨

胃家有熱難音食 胃冷無緣納水漿 若是痘家多為熱 嘔家聖藥是生姜

此言毒在胃也胃主納而不出大小腸主出而不納痘後嘔吐者是餘毒在胃也然有冷熱二證如心煩作渴食乳甚急聚滿於胸中然後吐出如射其人面色帶赤手足心熱居處喜涼此熱吐也如乳食水漿隨吐面色青白手足冷大小便自利此冷吐也熱吐者橘皮湯四十九加黃連竹茹冷吐者益黃散四十五痘後餘毒多是熱邪其間冷證十有一二也亦有傷食而嘔者但聞食臭即吐不能食木香大安丸九十一或養脾丸一百六並用生姜湯下有飲水多而吐者必吐清水名水逆五苓散主之二十八

一向蒸蒸熱未除 治宜詳審勿差殊 便難煩渴方為實 清便飢疲本是虛

此毒在心經也痘瘡自初以來一向發熱至於差後猶不少減者

此有虛實二證如大便難小便赤能食而煩渴者此實熱也以三黃丸或四順飲二十七先解利裏熱後用升麻葛根湯一加地骨皮解表熱也益升麻葛根湯治瘡疹未發之先已發之後身熱藥也如大便不秘小便不赤坐立振搖飲食不甚進者此虛熱也以調元湯十八加知母麥門冬虛甚者加炒乾姜或熟附子少許以調之

一小兒痘後發熱大小便難瘡癩帶赤他醫言虛欲用保元湯予曰不可此實熱也因食辛熱之物得之果因食雞而得以蓮喬飲服之愈

一小兒痘後發熱不止食少喜睡請予視之瘡癩黑黯乃知痘

毒有陷也予問此兒痘瘡膿水必清痂皮必薄否其家答曰果然不成膿不結疔但水出皮脫而乾也予告之曰凡痘初出壯熱昏睡乃常候也痘既收後則邪氣已盡正氣當復執漸退食漸加精神漸爽亦常候也今皆不然吾恐術無用矣遂辭歸半月後忽昏冒而死

本邑染匠徐姓者一子痘後發熱諸醫或用小柴胡湯或用竹葉湯或用黃連解毒湯皆不效熱益甚請予治之予用保元湯加當歸炒黑乾姜只一服而熱去

遍身青黑色非常 口噤涎潮身久張  
手足時時顫瘳 不逢識者少安康

此毒在肝經也此中風也瘡痘方愈榮衛正弱不知避忌忽遇風令氣交八方不正之氣乘虛而入故為此證宜消風散一百三十二錢入蟬蛻末一錢分為三服投生薑薄荷汁及酒各數點溫湯漫之連二三服或作癩疹或再出瘡疹而愈後以抱龍丸調理十四

摘搦非時俗曰驚 只因執毒內歸心  
若由傷食增潮熱 腹滿多煩乃食蒸

此毒在心肝二經也痘後非時摘搦者有二證一則心熱晉而不去熱盛生風風火相搏其人必喉中有痰目直上視面赤引飲居處喜冷宜導赤散三十五瀉青丸一百十清心瀉肝後以抱龍丸

四十調之一則病後多食胃弱不能勝穀謂之食蒸發搦其人必

潮熱大便酸臭秘澁不調或嘔吐腹痛先以備急丸九九丁香脾積丸三十二利之後用木香大安丸九十一錢氏異攻散調理取愈四十四不如只用抱龍丸更佳四十

手足拘攣不得伸 起君艱苦只呻吟  
要知養血真良法 莫誤終身作廢人

此毒在肝脾二經也痘後手足拘攣屈伸不便者乃血耗氣虛不能榮養於筋宜十全大補湯三十八去地黃白茯苓加川續斷多服乃佳氣虛者少加川烏炮過行經不可誤作風治妄行發散反耗陰血也

本邑大尹唐尚峯次公子十二歲戊辰正月出痘時肖峯要音

相伴往京為已多疾也乃請予四男邦治八男邦靖同韓鳳煥醫治痘醫後右有發一紅腫非癰也韓以針刺之其手不飲藥三月未肯舉自京歸至上蔡聞之甚憂予慰之曰勿憂待全到縣必治好也及至縣察之其手不痛但軟弱無力不能自舉必用左手托之乃能舉也肯舉問是何故予曰此肝熱血虛證也蓋肝主筋資血以養寒則要縮熱則弛長要短為抱弛長為痿惟補其氣養其血則病自痊乃製一方用人參黃耆當歸川芎白芍藥川續斷甘草節白木桔梗木香薏苡仁防風為末山藥作糊為丸服至半月而安

終日昏昏似醉人

口中妄語若邪侵

誰知熱入心包絡

解毒安神恭字清

此毒在心也痘後昏昧不解識人口中常妄言如邪祟狀此熱移入心包絡宜導赤散三十五吞安神丸四十七待醒後以調元湯加麥門冬生地黃十八四物湯十九加石菖蒲木通山梔仁相間服之以抱龍丸調理而安四十

卒然昏暈不知人

飲食俱忘喚不醒

邪毒從今都解散

精神自此漸和平

此差後虛病也痘後卒然喜睡狀如眩暈身無熱口中無妄語其人痘出必重又少食今毒氣已解正氣未復故邪退而喜睡乃至極泰來之象不須妄治遂巡甦醒矣用抱龍丸調理四十

新水縣汪元士之子沙溪之孫也癸丑四月出痘至收醫後熱悶絕目閉口合一家大哭予曰勿哭吾固知有此病也乃令煮粥湯與藥相間進之須臾平復如故沙溪曰神哉先生之術吾小孫之福也敢問何以預知有此病予曰正氣素弱邪氣方盛壯火食氣氣益弱矣今邪氣既退正氣將生乃否極泰來之兆所以戒勿擾亂待其自蘇時人不知此意猝見悶絕便將抱動呼喚號哭神散氣散其不救者多矣時有二醫在家一姓周者汪兩人乃曰向者起病日犯太乙天符尚恐有變予曰運氣之論岐黃之秘旨專論其年非謂起病日也傷寒鈐法以日

起病歸號

方不惟失軒岐之意而且亂長沙之法矣况主客

之氣勝復之變一歲之中難以逆料豈可以是料病吉凶也信

如爾言太乙天符日起病者凶然則太乙天符年有病者皆不可治也一姓向者麻城人乃曰尚有餘毒予笑曰取錢氏小兒書來痘後餘毒有三一者疥二者癰三者目赤未言有昏瞽也蓋痘疹或出不盡或發不透或盛不齊或空殼無水或清水非膿此則有餘毒也今此痘者起發壯膿水飽滿有何餘毒哉

一朝手足冷如水

蓋覆重加不得溫

痘正盛時為逆證

病今差後作虛論

厥逆者痘疹逆候也若在正盛之時十無一生今病已愈氣血

風膠胃大困宜有此厥逆也田調元湯十八加當歸身熟附子以主之

效嗽聲多不得安

更蕪涕唾盡稠痰

莫拘死局輕調理

好肥推宜用散丸

此下皆毒在肺證也效嗽者痘疹常證也有熱有虛有實不可拘泥一定之法如自初出效嗽到今未愈者此肺中餘邪未盡也宜甘桔湯七合瀉白散五十四加牛旁子馬兜冬主之如效而熱大便難小便赤者此熱毒也宜人參瀉肺湯主之五十五大便瀉者人參白虎湯二十四合甘桔湯七主之如效而大便溏小便清無大熱渴者此虛也宜人參清膈散主之六十一如效而血出者其枯湯七加牛旁子軟石膏茅根汁主之如何不效今始效者此風寒外感也麻黃湯主之六十七

黃岡縣陶前墩一子戊辰年出痘將靨時咳嗽喘急吾見邦正

醫用甘桔湯加牛旁子麥門冬服之未效時吾在府請視之子

謂正曰汝用方是此證肺有火邪火鬱宜發之即於前方去麥

門冬加蘇葉地骨皮服之即效

效嗽之時兩脇疼

陰陽左右被邪干

不能升降多壅滯

鮮毒和中病早安

經云左右者陰陽之道路左右兩脇之謂也瘡疹後效嗽由餘毒在中陰陽之氣不能升降也脇居一身之左右陰陽

所行也脇疼是氣不能升降之故但鮮毒毒氣去則真氣行所養自平宜小柴胡加枳桔湯主之一百三十三

未出腹疼斑毒攻

而今毒鮮已無壅

不因燥屎或傷食

必是中虛要建中

此毒在脾也瘡疹未出而腹痛者乃斑毒內攻也今毒已鮮無後壅道腹中痛者一則因大便未通燥屎作痛備急丸主之九一則因食過多胃虛不能消穀腹痛者便秘丁香脾積丸三十三便利木香大安丸九十一主之但燥屎痛者病在下焦傷食痛者病在上焦手不可按若原食少又便常潤忽爾作痛此虛寒證也病在中焦喜用手按摩黃耆建中湯主之三十一

餘毒留居心中

膈焦咽燥渴未攻

若是脾虛津液少

自然形證不相同

此毒在脾胃也痘家作渴亦是常事如痘後不宜有渴忽然渴欲引水心胃二經受邪熱故也其人必能食大便秘小便赤舌燥咽乾宜人參白虎湯二十四加黃連主之若食少大小便自調雖好飲湯咽舌不燥此脾胃虛津液不足也宜人參白朮散二十三不愈人參麥門冬散二十二加天花粉主之

病後邪堪碎失音

語言不出意沉沉

咽傷舌痛痰多結

心熱留邪舌不榮

此毒在腎也痘後失音有二咽痛不能言者此毒氣結於咽喉之

問痰壅作痛而不能言天花散主之一百三心熱不能言者心中邪熱未徹腎虛不能上接於陽雖有聲而不能言四物湯十九去川芎加麥門冬白茯苓主之

正氣將回食漸加 緣何惡食却堪訝 或因食壅脾重困 或是中虛病未差

此下毒在脾經也痘後邪氣盡退正氣將復脾胃暑絀宜漸能食也若原不食今因喜食太過或原能食今又驟加以致惡食不食者此皆內傷有餘證也宜木香大安丸主之九十一如向未食全循不喜食者此脾胃中氣不足宜人參白朮散三十三去葛根加陳皮木香研末取二兩另用糯米二兩菜豆二兩各炒研末相和

棗子湯調服稍能食更進養脾丸一百六抱龍丸四十

寒熱往來形似瘧 不拘早晚如期作 只因調護少疎遠 故惹風寒相擊搏

痘後忽發寒熱如瘧狀至後如期即發者此脾虛氣弱失於將息重感風寒宜先以柴葛桂枝湯八十五發去新受表邪後以調元

湯十八加當歸陳皮白朮調之

面目虛浮忽改形 腹中脹滿喘聲頻 邪風入肺疎通去 宿垢傷脾解利行

此毒在脾肺二經也痘後面目虛浮或久則一身皆腫者此表氣不足出風太早風邪乘虛而入其治在肺宜五皮湯一百三十四

先加桂枝微汗之後只服本方若遍身皆腫以胃苓湯一百三十五五皮湯一百三十四主之○痘後腹脹腫脹滿或氣喘粗者此

有宿垢在裏不問餘毒食積皆宜先利之宜塌氣丸一百三十五利後以胃苓湯去耳草一百三十六加人參黃耆大腹皮調之其

治在脾如因新食作脹不腫者只木香大安丸九十一

一小兒因痘後洗浴面目一身盡腫請予治之予曰此水氣也用四君子湯以補脾去濕加黃耆以實表防風以勝肌表之濕麻黃以逐皮間之水一服而腫減後以錢氏異功散加猪苓澤瀉調理而安

熱熱渾身汗未休 膚濡髮潤亦堪憂

衛中氣弱榮中熱 若到亡陽治不瘳

此毒在心也痘後自汗盜汗皆衛氣弱榮血熱肌肉虛也宜調元湯十八當歸六黃湯六十八相間並調敗蒲散七十服之如汗出

盛再用溫粉撲之六十九若渾身如水髮潤者或汗出如珠者皆亡陽證不治

血在身中怕妄行 火邪迫血血離經

鼻中衄出堪調理 便溺中來禍匪輕

此毒在心肝二經也痘後失血證乃餘毒熱邪迫血妄行也自鼻出者玄參地黃湯主之六十五外用梔子炒焦研末吹之自鼻出者八正散主之四十六自大便出者桃仁承氣湯主之十一百二

自汗證同為熱也。上是熱在衛，故汗出。此是熱在榮，故血出。二證大便秘者，並與四順清涼散主之。二十七

蛇動如從吐利中

必然腸胃熱邪冲

若聞食臭重後出

此證虛寒勿妄攻

此毒在肝也。強後或吐或利，下統者皆熱毒入裏也。熱在胃則吐，熱在腸則利。下統利者，黃芩湯。四十一

吐蛇熱在腸則利。下統利者，黃芩湯。四十一。加桃仁艾葉吐者，黃芩半夏湯。四十二

加烏梅川椒若不吐利，但聞食即吐，統者此胃久罷，虫無所食，故聞食臭即吐。食已易飢，宜理中湯。九。三十四

烏梅肉黃連川椒主之

狐疝之證聲啞

唇口生瘡誠可訝

蠟根潰爛疳瘡

息臭血出名走馬

此毒在腎也。痘後吐利，蛔出者，此虫為熱所蒸而出，為蛔厥。若不吐利，內蝕臟腑者，為狐惑。狐惑之證，其人好睡，默默不欲食，上唇有瘡，虫蝕其肛，下唇有瘡，虫蝕其臟，其聲啞，上下不定，故名狐惑也。此候最惡，麻疹後尤多。化愚丸主之。一百三十九

者以桃仁承氣湯。一百二十。加槐子利之，或只牙齒齦肉潰爛者

此痘死脫去痰水浸漬，為疳蝕瘡，用錦囊散。一百二十五。傳之若

氣臭血出者，又名走馬疳，瘡內以黃連解毒湯。八十九。加雄黃為

丸竹葉湯下外，以馬鳴散傳之。一百三十八。或口舌生瘡者，並

洗心散。一百四十七。心上諸證大便秘者，並用四順飲利之。七

病後宜行解利良

勿令熱毒得為殃

若逢餘毒為諸證

緩藥安能得早康

瘡疹後須當解利，勿使餘毒或在表或在裏，變生諸證也。解利之劑如三黃丸、四順飲。二十七

之類若失於解利，致生諸證，須當用切中病源之藥以急治之，不可緩治。令病勢滋蔓，又害人也。人不能究其病因，一藥用不急之藥，如四君子之類，其意但欲逃

差謬耳。何常實能究其致病之由而藥之耶？急治之中，惟在識其

虛實。苟稟受既實，榮衛充壯，病後有熱者，即與解利緩治不可也。

所稟怯弱，病後榮衛大虛，坐立振搖，飲食少者，却宜和緩之藥以

扶持之。候其飲食如故，榮衛既充，然後微微解利，未為之晚。或至

虛之人不必解利可也。

能醫惡痘是良工

善痘何勞爾費功

錯認石頭作作虎

盜名欺世立家風

此嘆世之業醫者不能治其惡痘而治其善痘者不難於治，可以

盜名欺世也。

痘之家氣要清

不宜恠異及屢驚

若然乍見成凶兆

枉請師巫禱鬼神

積者者福之基，妖孽者禍之萌。出痘之家最宜內外肅靜，大吉之

兆也。若有鴉鳴鼠鬧，屋響火光，蝙蝠入室，葱蒜撲人，夜生恠夢，病



胡松山一子五歲出痘其母黃氏偃抱坐後不知在地下睡  
又蕭楚梧一子四歲出痘日中時忽聞一陣赫氣過胡三溪一  
子出痘有鴉日日聒噪胡淑卿一子出痘近晚時樓上忽一聲  
響如棹倒之狀視之却無王來樓一子出痘有蝙蝠飛入房中  
後皆不吉

痘疹世醫心法卷之九

疹毒證治歌括 凡二十六首

疹為胎毒發於心

肺與相連熱毒侵

效嗽鼻中清涕出

且觀雙目淚盈盈

痘疹皆胎毒所發毒者火也故痘子大而掀腫者少陽三焦火也  
陽道常饒故大而腫疹子小而碎密者少陰心火也陰道常乏故  
小而密三焦水穀之道路脾胃主納水穀治痘專以脾胃為主心  
肺屬陽而位乎上心火旺則肺受之治疹專以肺為主觀其效嗽  
者火炎則肺葉焦舉也鼻流清涕者鼻為肺之竅以火燥金而液  
自流也目中淚出者肺熱則移於肝肝之竅在目也或手搥眉目  
昏鼻及面者肺熱證也

凡遇冬溫最不祥

民多疫癘發瘡瘍

或逢斑疹相傳候

可用湯丸預解良

春溫夏著秋清冬寒此四時之王氣也冬應寒而反溫陽氣蒸洩  
火令早行人感之者至於來春必發瘡疹未出痘疹者必感而  
雖曰胎毒未有不由天行者故一時傳染大小相似但見疹痘之  
出宜先服消毒保嬰丹 十一代天宣化丸 十二以預解之可使  
徹不為已甚也

瘳疹須明歲氣先

勿輕汗下作傷寒

察人虛實施方法

莫犯天和損壽元

疹之證其初發熱與傷寒相似但疹子則面頰赤效嗽噴嚏  
 流清涕目中淚出呵欠喜睡或吐瀉或手搦眉目鼻而宜用升麻  
 為根湯一不可作傷寒妄用汗下也汗之則增其熱為喘為咳血  
 為口瘡咽痛為目赤痛為煩燥為大小便不通下之則虛其裏為  
 滑泄為滯下經曰必先歲氣毋伐天和言不可妄汗下也如手足  
 稍微冷惡寒而無汗面色青慘而不舒左額有青紋者傷寒之熱  
 也手足稍微溫發熱有汗面赤而光者傷風之熱也並宜惺惺散  
 一百一 發散之目胞腫而右頰有青筋發熱而頭額腹肚最甚或  
 兼嘔吐腹疼者傷食之熱也備急丸下之九 面色青紅額正中有  
 紋手掌心有汗時作驚惕手絡脈微動而發熱者此驚熱也瀉  
 九 一百十 牛黃清心丸 三十六 主之身熱而倍能食唇紅頰赤  
 小似秘脇下汗者此風熱也宜風散之 九十二 已上諸熱久而不  
 去內外感發則所蘊瘡疹之毒亦能乘間而出矣

疹喜清涼痘喜溫 能知疹痘不同倫

疹苗痘實無人解 謹始慮終用意斟

疹喜清涼痘喜溫煖此法人皆知之然疹子初出亦須和煖則易  
 出所以發苗之初只要發出得盡則毒便解若痘必苗而秀秀而  
 實而後毒解也痘子成實之時若大溫熱則反潰爛不收是痘之  
 後亦喜清涼也故治痘疹者無過熱無過寒溫涼適宜陰陽自和  
 是為得之

疹毒從來解在初 出形毒解却無憂  
 腹中脹痛邪猶伏 喘促昏沉命必殞

疹子只怕不能發出若出盡則更毒解故治疹子者發熱之時當  
 察時令寒暄以藥發之如特大寒以桂枝湯發之 五 太熱以  
 升麻葛根湯一合人參白虎湯發之 二十四 不寒不熱以荆防敗  
 毒散發之 七十一 如兼疫癘之氣以人參敗毒散發之 一 如盡一  
 劑不出再作本湯發之外用胡荽酒 七十四 以苧麻醪酒遍身塗  
 之務令亟出如三四作更不出加腹中脹痛氣上喘促昏悶諸妄  
 者必死證也

本色胡道松遺腹子也年四歲六月間病疹先請醫甘大文治  
 三日疹不出煩躁甚乃請予文又作荆防敗毒散予止之曰  
 此皆發散之藥無解毒之用况天大熱又無時令之藥一二味  
 在內則陽愈勝陰愈虧陰陽不和此疹子所以不出也吾命大  
 文作東垣涼隔散加玄參升麻一服疹出三日安

過期不出勢淹延 毒伏身中出見難

急用透肌休息玩 豈堪臟腑受熬煎

發熱六七日已後明是疹子却不見出此皮膚堅厚腠理閉密又  
 或為風寒襲之曾有吐利乃伏也急用托裏發表之劑麻黃湯  
 十七 去杏仁加蟬蛻升麻外用胡荽酒 七十四 散麻刮之如一向  
 未更衣者毒甚在裏伏而不出河間涼隔散加牛蒡子主之 九十一

七 發之解之再不出者死證也

吾妾兄甘大文嘗從吾學醫其術頗行而未能精長男發熱于  
鬼之曰疹也三日不出身涼神倦坐卧不安予謂大文曰汝子  
疹毒不出外雖涼而內則熱毒火內伏故令煩而坐卧不安也  
若不急治此子難保文乃泣而求醫予曰何不自治必嬰我也  
乃用葛根湯加麻黃石膏以發之一服疹子盡出白色不紅予  
曰此血虛也用四物湯加防風只一劑而盡變紅也予笑曰尔  
若愛人之子亦如愛己之子恐其誤也必用吾醫治己之子亦  
如治人之子恐其遲也而自為之斯善矣

蒸蒸發熱欬聲頻

目脹面浮氣上行

坐卧不安痰唾少

肺焦葉本熱邪蒸

疹子初發熱時未見出現欬嗽百十聲不已上氣喘氣面浮目胞  
腫時卧時起此毒火內蒸肺葉焦舉宜其桔湯七合人參白虎湯  
去人參加牛旁子薄荷葉主之二十四

火執薑蒸汗潤身

毒邪併迫血遠經

汗多衛表邪從散

血去榮中毒少輕

疹子發熱或自汗出或鼻衄者不須止之亦發散之義故汗者毒  
從汗散衄者毒從衄解但不可太過如汗太多人參白虎湯二十  
合黃連解毒湯八十九主之衄太多玄參地黃湯主之六十四

發熱之時吐利并

任他所出不須驚

胞胎畜毒從今解

腸胃停汚自此清

疹子發熱吐利純是熱證不可作寒論乃火邪內迫上焦多吐下  
焦多利中焦吐利並多自利宜黃芩湯四十吐利宜黃芩加半夏  
湯四十二自利裏急後重者宜黃連解毒湯八十九合天水散九  
十四主之

毒火薰蒸氣上炎

咽喉自此正煩疼

從來痘疹多咽痛

莫作尋常喉痺看

痘疹咽痛亦是常候乃毒火上薰而痛也勿作喉痺同論妄用針  
刺喉痺內作癰腫故宜針尖去惡血痘疹只是咽乾作痛宜其桔  
湯七加牛旁子或射干鼠粘子湯六十細細嚥之

疹毒如焚引水饒

炎邪未許一杯澆

咽喉乾燥心家熱

津液枯虛胃腕焦

疹子渴喜飲水純是火邪肺焦胃乾心火內亢故也初發熱渴者  
升麻芍根湯一加天花粉麥門冬渴甚者人參白虎湯二十四合  
黃連解毒湯八十九主之

一癩湧出莫驚惶

頃刻渾身朱錦裝

似痘出時隨又沒

如班紅處却成瘡

痘瘡貴三四次出謂出勻瘰瘡貴一癩湧出謂出盡麻子只要得  
出便輕減以火照之遍身如塗朱之狀此將出之兆出形細密與  
痘瘡者相似但疹子粒粒成瘡非若斑之皮紅成片如蚊蚤之

迹也

痘疹赤艷痒来攻

疹子紅鮮毒待鬆

白疹血虛猶可療

黑斑候惡莫相逢

疹痘之色不可同倫大抵痘子怕大紅皮嫩易破必生瘙痒疹子

喜通紅疹發於心紅者火之正色也若疹色淡白者心血不足養

血化斑湯主之一百四十色大紅酸或微紫者血熱也或出太甚

者並宜大青湯主之一百四十一黑者死證也

疹家出沒合陰陽

出以溫和沒以涼

連出不收陽氣盛

遲遲間出是陰強

疹子出沒常以六時為準假如子後出午時即收午後出者子時

即收乃陽生陰成陰生陽成造化自然之數也凡此旋出旋收者

輕若一出連綿三四日不收者乃陽毒太甚宜大青湯一百四十

解之遂巡不出者乃風寒外束皮膚閉密也宜劑防敗毒散主之

七十一

疹出渾身似火燒

毒邪壅甚急難消

鮮肌只許皮膚煖

救裏宜令便滑調

瘡疹非熱不出疹子欲出則遍身發熱或煩躁或頭眩或身拘急

及既出則身便涼諸病悉解此一層疹子隨收矣如疹子既出熱

甚不減此毒壅過宜大青湯解其表一百四十一便澀者以黃連

解毒湯八十九合白虎湯二十四或大連翹湯八十八解其裏大

便不通者河間涼膈散加牛蒡

一百四十七

疹出盡得安寧

邪未盡時氣未平

拂拂熱煩邪尚熾

煩煩嘔洩毒猶蒸

凡疹子只要出得盡則毒邪解散正氣和平如拂拂發熱煩悶不

寧如地在灰如刺在塵之狀或嘔吐或注洩此毒邪壅遏尚未出

盡煩熱者黃連解毒湯八十九嘔洩者柴胡梔皮湯一百四十二

並外用胡荽酒七十四以葶麻煎酒遍身身之待疹子出盡則煩

熱自去嘔洩自止矣

疹毒餘邪最作殃

幾經惡候致張皇

時行厲氣傳相似

瘦鬼勾魂赴北邙

疹子欲出未出之時宜早發散以解其毒則無餘災若不預解使

之盡出以致毒畜於中或為壯熱日久枯痺或成驚癇或為泄瀉

或欬血喘促或作痺癩而死此雖一時戾氣之染未有不由於人

事之未盡者

瘡後流連執不除

蒸蒸烙手髮毛枯

肉消骨立成痺瘦

得遇良工病可甦

疹子收後身有微熱者此虛熱也不須施治待氣血和暢自然退

去若熱太甚或日久不減以柴胡麥門冬散五十七甚則以黃連

解毒湯八十九合人參白虎湯二十四與前方相間服之如髮枯

毛豎肉消骨立漸漸羸瘦者柴胡四物湯一百四十三主之

發熱無休神漸昏

忽然變飛事堪驚

莫將風癘同調治

小便宜多患早寧

疹後熱不除忽作搐者不可與驚風同論用道赤散三十五加

人參麥門冬送服安神丸四十七小便清者可治短少者不可治

宜服抱龍丸四十

疹毒流殃走馬瘡

牙齦潰爛食難嘗

唇赤降唾成孤感

漏頰穿喉旦夕亡

凡疹後牙根黑爛肉腐血出臭息冲人者曰走馬疳馬鳴散主之

一百三若面頰浮腫環口青黑頰漏齒脫唇崩鼻壞者死證也如

唇口多瘡其聲啞啞者曰孤感以化蟻丸主之一百四十更煩躁

昏悶失聲者死證也

疹毒漸成休息痢

晝夜不停多窘急

勿輕劫澁圖霸功

切忌禁口成惡疾

疹後洩利日久不已者曰休息痢不可妄施澁劑以成霸功宜黃

芩湯四十一合天水散九十四煎香橘丸五十相間治之若嘔吐

不能食者名禁口更腸滑不止或下鮮血或如糜水者皆死證也

隆慶已巳予在鄖陽有楊舉人一子病疹後利下鮮血請予

方予口授一方用當歸稍生地黃白芍藥條芩炒黃連炒人參

生甘草枳殼烏梅肉調理而安時府中出疹但病利血者皆

人授以其方與之皆效

疹後連綿上氣欬

發作百聲終不歇

胸高有息目震浮

握手搥頭泉下客

疹子收後微欬者此肺氣未平也不須調治若欬轉甚喘氣逆氣

發則連綿不已者此肺中伏火金匱葉焦故欬也宜人參清肺散

主之六十一身熱者門冬清肺湯主之四十四若欬久不止面

浮目胞腫胸高而喘息則聲有血自口鼻出面色青或赤鼻燥昏

悶搥頭搥手者皆死證也

隆慶戊辰予在黃州府有周小川族中一小兒病疹後咳失

聲託小川請予方予授一方以甘草湯加炒牛蒡子炒枯芩

天花粉作散薄荷葉湯調再煎一沸果安

疹家禁忌法須防

鹽醋雞魚不可嘗

歎莫從心終是福

物多爽口定為殃

疹家通禁雞魚炙燥薑醋之類直過七七之後方可食之惟宜食

淡不可縱口致生他疾也

瘡疹收還幸平復

飲食如常無馳就

心腹絞痛忽傾亡

還是氣虛中惡毒

曾見痘疹收後動止出入飲食如常忽然心腹絞痛而死者還是

元氣怯弱乘以疫厲之氣正不能勝邪伏於中外若無病內已虧

損故一中而死謂之中惡

嬰稚初離胎中

遍身斑駁似此

胎中熱毒皮由現 莫作時行斑疹同

凡小兒物生未滿月者遍身紅點俗呼奶麻者是也此由胎中受熱故生下發見於皮膚不可作時行疹子論妄用湯劑益臟腑嬌脆氣血怯弱不能勝湯尤也宜用迴源解毒湯八 與乳母服之

發熱蒸便已鞭 皮紅似錦是名斑

莫將疹毒雷同論 笑煞時人醜類看

凡天行若病大便鞭結熱留胃中故發斑不可以疹子同治妄用發表之劑又增危劇宜白虎湯二十四 去人參加大青玄參生地黃主之大便秘者以三黃丸八微利之

痘疹世醫心法卷之十

婦人疹疹證治歌括 凡一十二首

女人疹疹最難醫 陰虛從來血已虧

待得疹瘡將發日 只愁天發又當期

正理論云嬰兒女子蓋以滋甚以女人陰質血常不足也痘疹始

終以氣血為主一或不足則變生焉故女子十四已後有出疹疹

者常恐天發之行血走氣虛而成陷伏也

發熱經行非正時 火邪迫血血奔馳

急須涼血停為美 莫待中虛悔却遲

痘疹發熱經水忽行却非天發之期此毒火內蘊擾亂血海迫經

妄行月事不以時下以玄參地黃湯 六十五 或四物湯 十九 合黃

連解毒湯 八十九 以涼血為主必欲其止如久不止中氣虛弱致

生陷伏者有之

發熱期逢經水行 毒邪得解免煩蒸

過期不止須當慮 補氣溫經令出勻

發熱之時經水適來如期此積毒得去毒亦輕解不須治之若過

四五日猶不止者此熱邪乘血室之虛迫血妄行宜先服小柴胡

加生地黃湯 一百二十九 以清血室之熱後用十全大補湯

以補氣血之虛令其出勻易發易盛也

發熱適逢經水斷 血室空虛防他變

若然謔妄神不清 熱入血宮治勿緩

發熱之時經水適斷宜早服柴胡四物湯 一百四十三 加桂枝以

防血室空虛毒邪乘虛而入致生他疾也若已增寒壯熱神識不

清妄誕見聞言語錯亂此為熱入血室血室者衝脈是也肝主之

肝藏血肝為血海天癸之後血室既空熱乘而入宜四物湯 十九

今導赤散 三十五 加麥門冬與安神丸 四十七 相間服之

女子居經日已賒 豈堪瘡疹病來加

却愁血海停滯垢 更怕胞門伏毒邪

女子經閉謂之居經滿而不瀉病在心脾經云二陽之病發心脾

女子不月瘡疹之毒屬於心又以脾為主心脾先病血室不行衝

任之間已多積垢一旦瘡疹之火鬱於命門胞戶之中當出不出

毒邪留伏致生乖疾者有之故發熱之初即當條除停垢桃仁承

氣湯主之 一百二十 後以四物湯 十九 合勻氣散 十三 加紅花

通治之

崩漏無時血已枯 瀉而不滿臟中虛

豈堪當此天行病 濟弱扶危救幻軀

女子一向崩漏未止氣血已虛若當天行瘡疹必不能任其毒惟

宜大補氣血為主十全大補湯 三十八 瘡出灰白平陷難發難

者更加熟附子一二片

起發泡漿忽動經 血虛氣弱事堪驚

七上他慮 不爾須防陷伏臨

痘子出現以後最宜表裏俱實飲食法多若當起發泡漿之時天

癸忽動人但知恐被穢氣觸動正氣不知自身之血不足為厭但

血去而氣亦虛毒邪乘虛陷入於裏惟元氣素壯又能食者必無

是變如氣虛食少之人未有不成陷伏者宜十全大補湯主之 三

十八 虎甚加熟附子

經行甚昏猝無音 血去津枯舌不榮

養血通心言語出 一朝聲價重千金

女子種痘經水忽行暴昏不能言語者心主血舌乃心之苗血去

則心虛心虛則少陰之脈不能上榮於舌故猝失音不語也先以

當歸養心湯 一百四十五 養心血利心竅符其能言以十全大補

湯調之 三十八

月事如行變壞瘡 內虛陷伏已乖常

藥靈中病終須苦 證逆遺師條忽亡

月事大行其瘡不起發不光壯不飽滿不紅活頂平陷色灰白或

青乾黑陷者此裏虛之候瘡復陷入也宜十全大補湯 三十八 奪

命丹 十七 相間服之其瘡胖脹紅綻或瘡空中再出一番者大吉

之兆若加腹脹喘促謔妄悶亂寒顫咬牙手足厥逆者必死也

姪瘡疹治應難 惟有安胎法最難

不可令胎輕觸動 胎元觸動命將殘

孕婦出痘始終以安胎為主不可犯動其胎其初發熱以參蘇飲  
三發之瘡出現後多服安胎飲為佳 一百四十六 渴者人參白朮  
散 二十三 泄者黃芩湯 四十一 合四君子湯 二十 加訶子色灰白  
起發收較遲者十全大補湯 三十八 去桂

本邑庠生程文遠丙戌年與吾同案補廩早卒止有一女與汪  
大川翁大中作親年二十出痘且有娠五月矣請予治之診其  
脉男胎也惟以清熱解毒和中安胎為主乃用黃芩白朮為君  
人參生甘草當歸身生地黃白芍藥紫蘇葉佐之一日一服自  
初出以致成漿無他苦也予聞家中被盜而歸適有斬水俗醫  
郭姓者至程咸器而使之進藥一服而胎墮果男胎也亟請予  
到痘變灰白平塌成倒陷裏虛故也詢其所用之方乃獨聖散  
予曰意穿山甲麝香皆墮胎藥胎去氣血益虛瘡毒內陷不可  
救也遂辭歸三日後卒

瘡正甚時臨正產 幾人束手功莫展  
滌除惡露相時行 補益元神休忌憚  
孕婦出痘正當甚時忽臨正產尊者只以大補氣血為主十全大  
補湯 三十八 若腹中微痛此惡露未盡也宜去之四物湯 十九 用  
熟地黃去為藥加乾姜桂心木香黑豆  
產後如逢出疹瘡 此時胎去免憂惶  
只憑補益收功效 莫犯寒涼生氣傷

婦人產後出痘疹者只以大補氣血為主十全大補湯 三十八 白  
芍藥用桂酒炒用不可妄用寒涼恐損發生之氣



痘疹世醫心法卷之十一

古今經驗諸方

一升麻葛根湯解發痘疹之良方

葛根 升麻 白芍藥 甘草 各等分

右剉細水一盞煎七分去滓溫服無時

二人參敗毒散解發痘疹之良方又主腰痛四時通用

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼

白茯苓 桔梗 人參 各等分 甘草 減半

右剉細加生姜三片水一盞半煎至一盞去滓溫服無時

方加薄荷少許

附方柴葛敗毒散疑似傷寒以此解發

柴胡 葛根 人參 羌活 防風 荆芥

桔梗 甘草 紫蘇葉

生姜三片水煎服

附方香蘇敗毒散疑似傷食以此解發

香附子 紫蘇葉 蒼朮 厚朴 青皮 山楂肉

甘草

生姜一片水煎服

附方升陽散火湯

升麻 葛根 獨活 羌活 防風 柴胡

人參 甘草 赤芍藥

水煎服

三麥蘇飲解發痘疹之良方

人參 三分 紫蘇葉 桔梗 乾姜 前胡 各四分 陳皮

茯苓 各五分 枳殼 三分 半夏 二分 木香 一分

右剉細加生姜三片水一盞煎七分去渣溫服無時

四雙解散即防風通聖散益元散二方也痘疹表裏俱實非此不

解

防風 川芎 當歸 白芍藥 大黃 薄荷葉

連翹 各五分 石膏 桔梗 黃芩 各八分 白朮 桂枝

荆芥 穗 各二分 滑石 二錢四分 甘草 二錢

右剉細加生姜三片水二盞煎至一盞去渣溫服無時

五桂枝葛根湯

葛根 桂枝 赤芍藥 升麻 防風 甘草 各一錢

右剉細加生姜三片淡豉一錢水一盞煎至七分去渣溫服

無時

六連翹升麻湯

連翹 一錢 升麻 葛根 桔梗 甘草 各七分

白芍藥 五分

薄荷葉 少許

右剉細加淡竹葉燈心水一盞半煎一盞去渣溫服無時

七 甘桔湯解咽喉之良方

甘草 二錢 桔梗 一錢

右剉細水一盞煎七分去渣食後溫服

附方甘桔清金散治肺熱聲不清響者

桔梗 一兩 甘草 五錢 牛旁子 炒七錢 連翹 去心五錢

訶子皮 三錢

共為細末每服一錢薄荷葉少許同煎服

八 三黃九鮮毒裏實者可用

黃芩 五錢 黃連 大黃 各二錢半

右為細末空水搗丸黍豆大朱砂為衣每服五七丸食前燈

九 備急丸

心湯下

木香 二錢半

大黃 牽牛末 各五錢

右為細末神麴糊丸黍豆大每服五七丸食前山查煎湯下

十 活活湯解發痘瘡兼治肝熱

羌活 川芎 防風 山梔子 龍膽草 當歸 各分

甘草 減半

右剉細加薄荷葉少許淡竹葉水一盞煎至七分去渣溫服

無時

十一 消毒保嬰丹

經豆藤 或黃豆或黑豆梗上纏連細紅線者是於八月福生

黑大豆 三十粒 赤小豆 七十粒 新升麻 七錢半

山查肉 一兩 荊芥 連穗五錢 防風 去芦五錢

生地黄 酒洗一兩 川獨活 五錢 甘草 生五錢

當歸 酒洗五錢 赤芍藥 七錢半 黃連 去枝梗五錢

桔梗 五錢 辰砂 別研水飛一兩 牛旁子 炒一兩

老絲瓜 隔年經霜者二箇取連藤蒂五寸燒存性

右一十七味各研細末和勻用淨沙糖拌丸如李核大每服

一丸濃煎甘草湯化下○其藥味預備須待春分秋分或

正月十五日七月十五日十月十五日酒掃靜室至誠修舍

痘疹世醫心法

忌婦人帶孝服人猶大見之合畢焚香叩齒日出時望東吸

氣一口吹布藥上向太陽密呪曰 神仙真藥 體合自然

嬰兒吞服 天地齊年 吾今奉 太上老君急急如律

敕一氣七遍

十二 代天宣化丸 即韓氏醫通五瘟丹也

甘草 甲巳年為君土 黃芩 乙庚年為君金 黃蘗 丙辛年為君水

山梔 丁壬年為君木 黃連 戊癸年為君火 連翹 佐 山豆根 佐

牛旁子 佐

先視其年所屬者為君次四味為臣君藥倍用臣藥減半佐

視臣又減半共為極細末於冬至日修合取雪水煮升麻汁

打麩糊為丸辰砂為衣竹葉煎湯下

嘉靖甲午春痘毒流行病死者什八九乃一厄也時有預服

三豆子湯絲瓜辰砂散者凡方書所載預解痘毒之法靡不

用之未見效者予竊思痘疹之毒因歲運災疔之變難

以藥解而人事未盡又不可諉之天數也於是檢閱古方乃

於韓氏醫通得五瘟丹以五運為主喜曰此解毒神藥也依

方術合施售與人但服之者莫不輕疎人皆神之因命之曰

代天宣化丸

十三 勻氣散

木香 青皮 各五錢 山查肉 二錢半

十四 活血散

右為細末每服一錢甘草湯調服

當歸 川芎 各等分

右為細末每服一錢紅花湯調服

十五 快斑湯治起發遲

人參 五分 當歸 防風 木通 各一錢 甘草 三分 木香

紫草 蟬蛻 各二分

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

十六 消毒飲解痘毒

牛蒡子 連喬 甘草 綠升麻 山豆根 紫草 各等分

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

十七 奪命丹

麻黃 酒蜜炒焦 升麻 各五錢 山豆根 紅花子

大力子 連喬 各二錢半 蟬蛻 紫草

人中黃 三錢

右研細末酒蜜和丸辰砂為衣薄荷葉煎湯下

附方 神應奪命丹

辰砂 擇瑤瑤鏡面者白紗裝成之用升麻麻黃紫草連喬四味

砂研細末將黃砂藥汁重酒洗去滓取末待乾所用二錢 麻黃 黑色八分

蟬蛻 水洗淨去足 紫草 酒洗五分 紅花子 五分

穿山甲 酒炙拌炒五分 真瞻酥 三分

共研細末用醋酒并丸分作十粒周歲者半丸二歲者一九

服止三丸熱酒化服厚蓋取汗汗出痘隨出也擇天醫生氣

日脩合 此方與三酥餅同

十八 調元湯痘科良方氣壯實者不宜 即保元湯

人參 二錢 黃耆 三錢 甘草 一錢

右剉細加生姜一片水一盞半煎至一盞去渣溫服不拘時

十九 四物湯養血

當歸 川芎 芍藥 地黃

右剉細水一盞煎七分去渣溫服無時

二十四君子湯補氣

人參 白木 茯苓 甘草

右剉細水一盞煎七分去渣溫服無時

三十一葛根解毒湯痘中止渴良方

葛粉 天花粉 麥門冬 生地黃

升麻 各等分 甘草 減半

右剉細取糯米泔水一盞煎七分去渣入茅根自然汁一合服之

三十二人參麥門冬散治痘中湯

麥門冬 葛粉 各二錢 人參 甘草 升麻

白木

右剉細加糯米一合淡竹葉七片水一盞煎米熟去渣溫服

三十三人參白木散治痘泄又渴又名參苓白木散

人參 白木 藿香 木香 甘草

白茯苓 各一錢 乾姜 二錢

右剉細加生姜一片水一盞煎七分去渣溫服無時

二十四人參白虎湯解斑疹良方又名化斑湯

人參 一錢 知母 三錢 甘草 一錢 石膏 五錢

糯米 一各

右剉細水二盞煎待米熟去渣溫服無時

二十五陳氏木香散治虛寒證純陰無陽者

木香 大腹皮 人參 肉桂 半夏

青皮 炒 赤茯苓 前胡 訶子肉 甘草 炙

丁香 各等分

右剉細加姜錢三小片水一盞煎如虛加黃耆等分糯米一撮同煎

二十六陳氏異攻散治虛寒證純陰無陽者

木香 當歸 茯苓 各三錢 肉桂 二錢 人參

肉豆蔻 陳皮 丁香 半夏 各二錢半

白木 厚朴 附子 各一錢半

右剉細每服三錢加生姜三片棗二枚煎先服去附子亦可若裏虛瀉甚又不可無附子豈見歲歲加減服之

二十七四順清涼飲治裏熱證大便結

當歸 白芍藥 大黃 甘草

右剉細水一盞煎七分去渣食前服

二十八五苓散治表裏有熱小便不利

澤瀉 一錢半 白木 赤茯苓 猪苓 各一錢

肉桂 五分

右剉細加生姜一片棗一枚水一盞煎七分去渣溫服

二十九桂枝大黃湯治腹痛大便不通良方

右剉細水二盞煎待米熟去渣溫服無時

桂枝	白芍藥 <small>各二錢半</small>	甘草 <small>五分</small>	大黃 <small>一錢半</small>
右剉細加生姜一片水一盞半煎至一盞去渣食前溫服			
三十承氣湯治實熱証陽無陰者			
大黃	厚朴	枳實 <small>各一錢</small>	甘草 <small>五分</small>
右剉細水一盞加生姜一片煎七分去渣食前熱			
三十一黃耆建中湯治裏虛腹痛良方			
黃耆	人參	桂枝	白芍藥
甘草 <small>各等分</small>			
右剉細加生姜三片棗二枚水一盞煎五分去渣溫服			
三十二化毒湯治疔未出度痛者			
肉桂 <small>五分</small>	白芍藥	甘草 <small>各一錢</small>	青皮
枳殼 <small>各七分</small>	山查肉	連翹 <small>各五分</small>	木香
右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時			
三十三丁香脾積丸治痘中傷食良方			
三棱 <small>去毛醋浸</small>	義木 <small>去皮如上製各五錢</small>	丁香	
木香 <small>各五錢</small>	青皮 <small>去穢</small>	烏梅肉 <small>燒存性</small>	猪牙皂角 <small>燒存性</small>
巴豆 <small>去殼取肉四十九粒</small>			
右為細末醋調神麩糊為丸如菉豆大每服五七丸原物湯下			
二十四理中湯丸治虛寒			
人參	白朮	甘草	乾姜 <small>各等分</small>

右剉細水二盞煎一盞去渣溫服若欲為丸研細末 <small>與棗丸如</small>			
彈子大每用一九白湯化下			
三十五導赤散治心熱發痛			
生地黃	木通	甘草 <small>各等分</small>	
右剉細加淡竹葉七片水一盞煎七分去渣溫服 <small>一方加人參</small>			
附方導赤通氣湯治心虛聲不揚者			
木通	生地黃	甘草	人參
麥門冬	石菖蒲	當歸身	
燈心作引水煎服			
三十六牛黃清心丸治心執神昏			
黃連 <small>五錢</small>	黃芩	山梔仁 <small>各三錢</small>	鬱金 <small>二錢</small>
辰砂 <small>一錢半</small>	牛黃 <small>二分半</small>		
共研細末臘雪調麩糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯送下			
二十七十宣散治痘癰			
黃耆	人參	當歸 <small>各二錢</small>	厚朴
桔梗 <small>各一錢</small>	桂心 <small>三分</small>	川芎	防風
甘草	白芷 <small>各一錢</small>		
右為細末每服一錢或二錢木香湯調下			
附方真人解毒湯治痘母			
忍冬花 <small>半斤</small>	甘草節 <small>一兩</small>	木通	防風
			荊芥

連翹 各三錢

分作三劑用水酒各半煎服以腫消疔出為度

三十八十全大補湯補養氣血痘科中之良方

黃耆 人參 當歸 白芍藥

白朮 生地黃 白茯苓 川芎

甘草 各五分 官桂 三分

右剉細加生姜三片棗二枚水一盞半煎一盞去渣溫服不拘時候

三十九寧神湯

人參 當歸身 生地黃 麥門冬 各一錢

山梔仁 黃連 甘草 石菖蒲 各五分

辰砂 末二分

右剉細加燈心半錢水一盞煎七分去渣調辰砂攪勻食後溫服

四十抱龍丸治痘驚 又名琥珀抱龍丸

真琥珀 天竺黃 白檀香 人參

白茯苓 各一兩 粉草 去節 枳殼 炒 枳實 炒 各一兩

辰砂 水飛五兩 山藥 去黑炒熱一斤 牛膽南星 一兩

金箔 一百片篩

各取細末再篩和勻每藥一兩取新汲水一兩重入乳鉢內

月九如○大陰乾勿用日晒則燥裂矣每服一九薄荷葉煎湯化下

四十一黃芩湯治協熱而利

黃芩 一錢半 甘草 炙一錢 白芍藥 六錢

右剉細加大棗二枚水一盞煎七分溫服食前

四十二黃芩加半夏湯

即前黃芩內加半夏二錢生姜一錢

四十三肉豆蔻丸治協寒而利

木香 砂仁 白龍骨 訶梨勒 肉五錢

赤石脂 白枯礬 各七錢半 肉豆蔻 五錢

右為末麩糊丸黍米大一歲服三五丸九米飲下

四十四錢氏吳攻散補脾胃

人參 白茯苓 白朮 甘草

陳皮 各等分

右為末每服二錢生姜五片棗二枚水一盞煎七分去渣食前

溫服

四十五益黃散補脾虛寒

陳皮 一兩 青皮 訶子肉 甘草 炙各半兩

丁香 二錢

右為末每服二錢水一盞煎至六分去渣溫服

四十六八正散治大小便不通

滑石 瞿麥 大黃 木通 扁蓄

車前子 梔子仁 各一錢 止草五分

右剉細加慈心一錢水一盞煎七分去渣食前服

四十七安神丸

黃連 當歸身 麥門冬 白茯苓

甘草 各半兩 朱砂一兩 龍腦二分半

右為末湯浸蒸餅和積猪心血搗勻丸如黍米大每服十九粒

心湯下

四十八菜油散治乾嘔

黃連 吳茱萸 二錢 青竹茹 一團

右二味同炒研細末每服半錢生姜湯調服

四十九橘皮湯

橘皮 半兩 白半去白炒 半夏 一錢 白茯苓 一錢半

右剉細加生姜五分水一盞煎七分去渣溫服

五十香連丸 一名香橘丸

黃連 一兩 以吳茱萸五錢同炒 木香 半兩

石蓮子 取肉二錢半 陳皮 半兩

右為末醋調神麩糊為丸如麻子大每服二三十丸陳倉米湯

送下

五十一膽導法此通大便秘結之良法也不損中氣強如用藥

用大猪膽一枚以我錫筒兩頭截齊一頭入膽中線穿扎定

吹令氣滿納入穀道中直待氣通取去

又猪胞導法

用猪尿胞一箇以竹管插放胞口中吹起又取猪膽汁生蜜

清油各半杯攪勻灌入胞中又吹起以線扎定氣如上膽導

法尤捷 此因治余光鹿新立法也

五十二百祥丸 一名南陽丸

紅牙大戟不拘多少漿水煮極軟去骨日中曬乾復內原汁

中黃汁蒸乾研為末水丸如粟米大每服二十九粒

芝麻湯下

五十三牛李膏 一名必勝膏

牛李子不拘多少取汁石器中熬成膏牛李子野生道邊至

秋結實黑丸成穗每服皂子大煎香膠湯化下此上二方

治疔瘡黑陷便秘裏實證

五十四瀉白散治肺熱而喘 又名瀉肺散

桑白皮 地骨皮 各一兩 甘草 炒半兩

右為末每服一二錢加粳米百粒水一盞煎六分食後溫服

五十五黃芩瀉肺湯治肺熱裏實證

黃芩 梔子 枳殼 甘草 薄荷

連翹 杏仁去皮尖 大黃 桔梗炒

水煎食後服

五十六前胡枳殼湯

前胡 枳殼 茯苓 大黃

甘草各五分

右剉細每服三錢水煎如身溫脉微瀉者不可服

五十七柴胡麥門冬散

柴胡半錢 龍膽草三分 麥門冬八分 甘草二分

人參 玄參各半錢

右剉細水煎服

五十八葛根麥門冬散治斑疹毒大熱而渴

乾葛 麥門冬各一錢半 石膏 升麻

赤芍藥 甘草 茯苓 人參各半錢

右剉細加淡竹葉七片水一盞煎七分去渣溫服

五十九生地黄散治斑疹肺熱喘咳

生地黄一錢 麥門冬五分 杏仁 款冬花

陳皮各八分 甘草

右剉細水煎服一方加桔梗五分

六十射干鼠粘子湯治咽喉痛

鼠粘子四兩 甘草 升麻 射干各一兩

右剉細散每服二錢水一盞煎服

六十一人參清膈散治肺熱鼻乾喉嚨稠粘

人參 柴胡 當歸 白芍藥

知母 桑白皮 白朮 黃芩炙

紫苑 地骨皮 茯苓 甘草

桔梗各五分 黃芩二分半 石膏七分 滑石七分半

右剉細加姜錢三片水一盞煎七分去渣食後溫服

六十二仙聖散治痘疹不起發因內實者

紫葳 木通 北草 黃耆炙

枳殼各等分

右剉細加糯米一百粒水一盞待米熟去渣溫服

六十三紫葳飲治痘瘡黑陷不起

紫葳 芍藥 麻黃 當歸 甘草各等分

右剉細水一盞煎不拘時服

六十四加味四聖散治痘瘡黑陷倒陷

紫葳 木通 木香 黃耆炙 川芎 甘草

人參各等分 蟬蛻十箇

右剉細加糯米百粒水一盞煎服

六十五玄參地黃湯治痘疹衄血

玄參 生地黄 牡丹皮 梔子仁各一錢半 甘草



升麻 各錢半 白芍藥 一錢

右剉細加炒蒲黃半錢水一盞煎七分去渣溫服

六十六神應膏護目方

黃蘗 一兩 真桑豆粉 一兩半 甘草 四兩 紅花 二兩

右為細末用臘脂水和蜜水調塗兩眼四畔之瘡痘上

六十七麻黃湯

麻黃 杏仁 甘草 各等分 石膏 倍用

右剉細加臘茶葉一錢水一盞煎七分去渣不拘時服一方無石膏有桑白皮

附方清金散火湯此上二方治痘疹初發熱而喘

麻黃 蘇 桔梗 甘草 牛旁子炒

水煎服 腹脹加厚朴大腹皮大小便秘加葶藶炒梔子仁炒

六十八當歸六黃湯治自汗盜汗

當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 各一錢 黃芩

黃連 各半錢

右剉細水一盞煎服

六十九溫粉撲法治汗出太多不止

黃連 牡蠣粉 貝母 各半兩 粳米粉 一升

右為細末傳於身上

七十敗蒲散止汗 一名止汗散

用故蒲扇燒灰每服三錢溫酒調下無時服

七十一荆防敗毒散疹子痘子之發散藥也

柴胡 甘草 人參 桔梗 川芎 茯苓

枳殼 前胡 羌活 獨活 荆芥穗

防風 各等分

右剉細加薄荷五葉水一盞煎七分去渣溫服

七十二聖散痘不起發變黑而痛者痘疔也 一名鬼痘

菘豆 四十九粒 豌豆 各燒存性 珍珠 一分

油頭髮 一分燒存性

右為細末臘脂水調先以簪子撥開黑瘡以此塗之

附方治痘疔

雄黃 一錢 紫草 三錢

共為細末臘脂汁調銀簪撥開黑疔入藥在內此上二方皆治痘疔

痘疔

七十三無價散治黑陷解瘡毒之良方

用人猫猪大糞臘月內燒為灰沙糖水調服

七十四胡荽酒治倒靨

胡荽四兩切以好酒二盞煎一兩沸入胡荽用物蓋定再煎

勿令洩氣放冷每吸一口微噴從背至足遍勿噴頭面病人

常令聞荽氣

七十五 水楊湯治倒順之良方

水楊即忍冬藤也春冬月枝秋夏用枝葉剉斷用長流一大盆煎六七沸先將三分中一分置浴盆內以手談不甚熱亦不可太溫先服宜用湯藥然後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯為度不拘次數

七十六 懸脂塗法治黑痘之良方

先以升麻一味煎濃湯去渣却用懸脂於湯內揉出紅汁就以木綿醮湯於瘡上拭之

獨聖散治痘瘡倒順

牛勞子 炒五錢 白僵蚕 二錢半

右味入紫草三莖同煎連進二錢

七十七 苦參丸治痘後潰爛成疥

苦參一兩 白羨黎 何首烏 牛勞子 各半兩

荆芥穗

共為末酒調麵為丸竹葉湯下

七十八 痘瘡救苦散治爛痘以此傳面如誤抓破者用之傳貼最良

密陀僧 滑石 各二兩 白芷 半兩

右為細末溫則乾搽之乾則好白蜜調傳

七十九 白龍散治爛痘及抓破者

用乾黃牛糞在風露中多炙者火煨成灰取中心白者為末薄綿裹裝於瘡上撲之

八十 敗草散治爛痘不成痂者用此鋪攤被席

多年屋上爛茅草擇淨為末搽之牆上爛草亦佳以多受風露之氣故能解痘瘡毒

八十二 茵陳湯法治痘瘡瘙癢

用乾茵陳研末搗囊膏和丸如雞子大晒乾裂火燒煙薰之

八十二 消風化毒湯

防風 黃耆 白芍藥 荆芥穗 桂枝 牛勞子 升麻 各等分 甘草 減半

右剉細加薄荷葉七片水一盞煎七分去渣溫服無時

八十三 羌活救苦湯

羌活 白芷 川芎 蔓荊子 防風 桔梗 黃芩 大力子

連翹 升麻 人中黃 各等分

右剉細加薄荷葉七片水一盞煎七分去渣食後溫服

八十四 消毒化斑湯

升麻 柴胡 桔梗 甘草 龍膽草 牛勞子 連翹 防風 蟬蛻 蜜蒙花

蟬蛻 蜜蒙花

右剉細加淡竹葉十斤水一盞半煎一盞去渣食後服

八十五紫葛桂枝湯 柴胡 葛根 甘草 桂枝

防風 人參 白芍藥 各等分

右剉細加生姜三片水一盞煎七分去渣溫服不拘時

卷終

醫心法卷之十二

八十六五積散冬月痘出不快用此發之

白芷 川芎各三分 桔梗一分半 芍藥 茯苓

甘草 當歸 桂枝 半夏各二分 陳皮

枳殼 麻黃各五分 蒼朮一錢 厚朴四分

右除桂枳殼二味別為粗末外一十二味剉細慢火炒令轉色

攤冷次入二味末令勻水一盞半生薑三片煎至一盞去渣溫

服無時

八十七辰砂散預解痘毒

好辰砂一錢 絲瓜好 近葉三寸連子燒灰存性此物發痘毒最

右研末蜜水調服云多者可少少者可無或以紫草甘草湯

服尤佳

八十八連翹湯此解裏熱之良方痘疹通用

連翹 防風 瞿麥 荆芥穗

木通 車前子 當歸 柴胡

赤芍藥 白滑石 蟬蛻 黃芩

山梔子 甘草各五分

右剉細加紫草五分水一盞半煎一盞去渣食前溫服

八十九黃連解毒湯此解火毒痘疹通用

黃連 黃芩 黃蘗 梔子各等分

右到細水一盞半煎至一盞去渣熱服

九十桂枝芍藥湯

桂枝 白芍藥 防風 黃耆 甘草 各等分

右到細加棗子二枚水一盞煎十分去渣溫服

九十一木香大安丸治傷食

木香 二錢 黃連 陳皮 白木 各三錢 山查肉 枳實

萊服子 炒 連翹 神麩 炒 麥蘗 炒 砂仁 各一錢半

右為末神麩糊為丸陳廩米湯下

附方補中順氣湯

人參 當歸 木香 青皮 山查肉

厚朴 甘草

右到細水煎服

九十二宣風散治黑腫裏實以代百祥丸牛李膏

檳榔 二箇 陳皮 甘草 各半 牽牛 四兩用半生半炒取頭末一兩

右為末三二歲蜜湯調下半錢已上一錢食前服

九十三辟穢香疽家宜焚之

蒼朮 一斤 大黃 半斤

右到細研放火爐中燒之不可間斷

九十四天水散治痘乾燥而痛

白滑石 四兩 甘草 一兩

共為細末白湯調服或用塗痘子甚佳以蜜水調刷之

九十五洗肝明目散治痘後目疾

當歸 川芎 羌活 防風 山梔仁

龍膽草 柴胡 木賊 密蒙花 各等分

右到細為末每服一錢淡沙糖水調服

九十六蟬蛻散治痘後目疾良方

蟬蛻 密蒙花 黑豆 明月沙 各等分

共為細末每用一錢以猪羊肝一片批開入藥末在內麻札定

米泔煮熟頓與食肝飲湯

九十七拔毒膏治痘腫一名必勝膏

馬齒莧 并汁 猪膏脂 石蜜 生葉豆末

赤小豆末

右以三味共熬為膏塗腫處如乾以水潤之

九十八百花膏治痘燥痂皮濺起作痛

石蜜不拘多少各用湯和時時以鷲翎刷之痂亦易落無痕

痕

九十九栗胡飲子治痘瘡表裏俱實良方

防風 當歸 白芍 柴胡 黃芩 炒

人參 甘草 大黃 各等分 滑石 焙用

生薑一片水煎服

百四歸九治便堅三五日不通者

當歸 半兩 黃連 一錢半 炒 大黃 二錢 甘草 各一錢 紫草 三錢

先以當歸紫草熬成膏以下三味研為細末以膏和為丸如胡椒大三歲以下凡十九七八歲兒二十九食前清米飲下漸加以和為度

百一解毒防風湯

防風 一錢 地骨皮 生黃耆 白芍藥 荆芥穗 鼠粘子 各半錢

右剉細水煎服或加升麻半錢

百二九味順氣散 又夕夕氣散

白朮 白茯苓 青皮 白芷 陳皮 烏藥 人參 各半 甘草 各二分半 木香 一分半

右剉細水一盞煎七分去渣溫服

百三馮氏天花散治痘失聲

天花粉 桔梗 白茯苓 訶子肉 石菖蒲 甘草 各等分

右為細末用水調半匙在碗內外以小水竹七莖黃荆七條縛作一束點火在碗內煎臨臥服

百四如聖湯

芍藥 升麻 乾葛 各一錢 甘草 紫草 木通 各五分

右剉細加生姜一片水一盞煎七分去渣溫服不拘時

解毒快斑湯

羌活 防風 升麻 葛根 柴胡 川芎 白芷 麻黃 炒 紫草 桔梗 甘草

右剉細生薑葱白作引水煎服取汗解去熱毒則痘自易出湯醫也

龍腦安神丸治痘中驚風謔妄良方

大辰砂 一錢 龍腦 五厘 牛黃 五厘

共研為細末取豬心中心血小豬尾尖血和丸如菜豆大每服用一丸新汲水化下燈心煎湯亦可

附方退火回生丹治痘中狂妄神方

滑石 一錢 辰砂 一錢 水片 三厘

共為細末冷水調一分服得睡少時神安氣寧痘轉紅活矣

百五蟬蛻膏

蟬蛻 去毒 當歸 防風 甘草 川芎 荆芥穗 升麻 各等分 加白芍藥 人參

右為末煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下

百六養脾丸

人參 白朮 當歸 川芎 各一錢半

木香 青皮 黃連 陳皮 各一錢

砂仁 山查肉 神麩 炒 麥芽 炒 各半錢

右為細末水調神麩糊丸如麻子大每服三五十九陳倉米飲

送下

一百七東垣鼠粘子湯

鼠粘子 炒香 當歸身 甘草 各一錢 柴胡

連翹 黃耆 黃芩 各一錢半 地骨皮

右剉細水一大盞煎至六分去渣溫服腹空服藥畢日休與乳

食

一百八鮮毒湯解胎毒之良方 又名溯源鮮毒湯

當歸身 川芎 生地黃 白芍藥 人參

連翹 黃連 甘草 生 陳皮 木通 各等

右剉細加淡竹葉十片水一盞煎半盞去渣溫服無時

百九瀉黃散治脾熱 一名瀉脾散

蘘香葉 七錢 山梔仁 一兩 石膏 半兩 甘草 七錢半

防風 二兩

右剉細用蜜酒微炒香為末每服二錢至三錢水一盞煎七分

溫服

百十瀉青丸治肝熱作瘡良方 一名瀉肝丸

羌活 大黃 煨 川芎 當歸 防風

山梔仁 龍膽草 各等分

右為末煉蜜和丸雞頭子大每服半丸至一丸竹葉湯同沙糖

水化下

一百十一粉紅丸 一名溫驚丸

牛膽南星 四兩 朱砂 一錢半 天竺黃 半兩

龍腦 半錢 坏子脂 一錢

右為末用牛膽汁和丸雞頭子大每服一丸小者半丸沙糖湯

水化下

一百十二寶表鮮毒湯

黃耆 人參 當歸稍 生地黃 白芍藥

地骨皮 甘草 酒片苓 柴胡 玄參 升麻

右剉細加薄荷葉少許淡竹葉十片水煎溫服無時

百十三托裏快斑湯

當歸 黃耆 川芎 木香 青皮

牛旁子 紫草 連翹 木通 防風

桂枝 蟬蛻

右剉細加淡竹葉十片水煎溫服無時

百十四惺惺散解發痘疹良方

桔梗 人參 甘草 炙 白茯苓 白朮

瓜蒌根 各等分 細辛 少許  
右為末每服二錢水一盞入薄荷五葉煎七分溫服不拘時候  
一方有防風川芎

一百十五通關散此藥通心經利小便良方

山梔仁 大黃 妙各一分 木通 甘草 各

車前子 妙 赤茯苓 瞿麥 人參 滑石 各三分

扁蓄 妙五分

右剉細用水一盞燈心十根煎半盞溫服

一百十六蟬殼明目散治痘後目病

蟬殼 去足翅 地骨皮 黃連 牡丹皮 白朮

蒼木 半斤浸 菊花 各一兩 龍膽草 五錢 甜瓜子 半斤

右為細末每服一錢半荆芥煎湯調下食後臨卧各一服治痔

疾後餘毒上攻眼目甚效忌熱麪炒豆醋醬等物

一百十七紫草飲子治倒靨腹脹大小便秘

紫草茸 人參 山查肉 蟬蛻 枳殼

穿山甲 土拌炒各等分 木通

右剉細用水一盞煎五分作三四次溫服

一百十八經驗方治痘眼

白菊花 菘豆皮 藜精草 去根作半兩

右為細末每服抄一大錢乾柿一個生粟米泔一盞熬米泔盡

將柿去核食之一日可食三枚無時病淺者二十日遠者一月  
必效

百十九快斑越婢湯治痘瘡手足不起發者

黃耆 炙 白芍藥 桂枝 防風 甘草 炙

右剉細加生姜一片棗二枚水煎服不拘時

百二十桃仁承氣湯

桃仁 二十箇去皮尖 大黃 二錢 官桂 紅花 各一錢

甘草 半錢

右三味研細水一盞煎七分去渣入桃仁泥化開食前服

百二十一酸棗仁湯

酸棗仁 去殼取仁 甘草 炙 生地黄 梔子仁

麥門冬 人參 當歸身 各等分

右剉細加燈心水一盞煎七分去渣溫服不拘時

百二十二排毒散治痘毒發癰

大黃 一兩 白芷 沉香 木香 各半 穿山甲 七片土炒

當歸稍 一兩

共為細末看虛實大小加減長流水煎沸調服

附方解毒內托散治痘癰

金銀花 黃耆 當歸 防風 甘草節

赤芍藥 荆芥 連翹 木通

水煎入酒少許服

百二十一 蒼麥粉治痘瘡潰爛以此傳之

蒼麥一味磨取細麵痘瘡破者以此敷之潰爛者以此搗撲之絹袋盛撲以此視卧尤佳

百二十四 升陽解毒湯

當歸 升麻 柴胡 桔梗 牛旁子  
甘草 蟬蛻 連翹 防風 蜜蒙花  
荆芥穗 各半分

右剉細水一盞煎七分去渣食後溫服

百二十五 綿蠻散治痘後疔蝕瘡

出蛾綿蠻 不拘多少 白礬 搗碎入礬內以炭火燒令礬汁盡

共研極細末每用乾貼疔瘡口內

百二十六 棗變百祥丸此可代百祥丸牛李膏用之

紅牙大戟 去骨一兩 青州棗 三十箇去皮核

右用水一盞同煎至水盡為度去大戟不用將棗搗爛為丸從少至多木香湯吞以利為度

百二十七 四白戒癩散治痘後面瘡以此傳之

白芷 白附子 白僵蚕 鷹矢白  
蜜陀僧 各等分

共研極細末以水調搽面點神效

百二十八 流氣飲治痘癰

川芎 當歸稍 白芍藥 防風 人參  
紫蘇葉 木香 甘草節 黃耆 桂心  
桔梗 雞心檳榔 白芷 厚朴 烏藥  
枳殼 各四錢

右剉細水一盞煎七分服氣血虛而自利者加熟附子大便實加大黃

百二十九 小柴胡加生地黄湯治痘癰

柴胡 人參 黃芩 各三錢 甘草 炙二兩  
生地黃 半斤 各二兩湯泡七次

右為粗末每服三錢水一盞生姜三片棗一枚煎至半盞去渣溫服

百三十 筆衣湯治癰疹疔瘡作痒

炊飲筆衣煮水洗癰起疔瘡者神效如無以炊筆煮湯亦好

百三十一 蟬針法治痘癰及丹瘤  
取水煙大者五六條放腫處吃去惡血可以消丹瘤大癰腫

附方砭法治丹瘤  
用細毫器擊碎取有鋒銳者以筋一根劈開頭夾之用線縛定兩指輕捉筋稍令毫鋒正對患處懸寸許再用筋一根彈擊筋頭令毒血遇擊刺之皆出



一百三十二消風散

人參 羌活 川芎 甘草

防風 荆芥穗 白茯苓 蟬蛻去毒

厚朴 白僵蚕炒 陳皮去白 藿香葉各半兩

右為末每服二錢茶清調下

一百三十三小柴胡加枳桔湯

柴胡一錢 半夏 甘草各半錢 人參

黃芩各二錢 枳殼 桔梗各一錢

右為粗末每服三錢水一盞生姜一片煎六分溫服

一百三十四五皮湯治痘後面腫

桑白皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮

五加皮各等分

右剉細取長流水一盞燈心十二莖煎七分溫服

一百三十五場氣丸治腹脹

木香半兩 鷄心檳榔一雙白者 黑牽牛二兩半生炒取頭末一兩

共為末神麩糊為丸如黍米大姜湯下

一百三十六胃苓湯治痘後遍身浮腫

猪苓 澤瀉 白朮 白茯苓 蒼朮

厚朴紫油者姜十炒 陳皮 桂心 甘草

右剉細水一盞煎七分去渣溫服無時

一百三十七洗心散治口舌生瘡之良方

當歸 生地黃 木通 黃連 麻黃

大黃 薄荷葉各等分

右剉細水一盞加燈心為引煎七分去渣溫服

一百三十八馬鳴散治走馬疳良方

人中白即研紅底白逆也以物刮取用新瓦盛之火煨過如白鹽乃佳半兩 馬鳴退即委退紙也火燒過 五倍子生一錢另用一錢同

白礬二錢搥碎另取五倍子一錢入礬於內用火煨枯

共為極細末先以米泔濃汁浸洗以此傳之

一百三十九化癍丸

黃連半兩 蜀椒去閉目者炒去汗 苦棟根白皮茹二錢

右共研末用烏梅肥者七箇艾湯浸去核搗爛和丸艾湯下

一百四十養血化斑湯治白疹

當歸身 生地黃 紅花 蟬蛻

人參各等分

右剉細水一盞生姜一片煎六分去渣溫服無時

一百四十一大青湯解斑疹大毒良方

大青 玄參 生地黃 石膏 知母

木通 甘草 地骨皮 荆芥穗各等分

右剉細水一盞淡竹葉十二片煎七分去渣溫服無時

百四十二 柴胡橘皮湯

柴胡 橘皮 黃芩 半夏 人參

白茯苓 各等分

右剉細加竹茹一團生姜三片水一盞煎七分去渣溫服不拘時候

百四十三 柴胡四物湯治疹後餘熱

柴胡 人參 黃芩 當歸身 川芎

生地黃 白芍藥 地骨皮 麥門冬 知母

淡竹葉

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

百四十四 門冬清肺湯治疹後咳嗽不止

天門冬 去心 麥門冬 去心 知母 貝母 桔梗

款冬花 牛蒡子 甘草 杏仁 去皮尖研

馬兜苓 地骨皮 各等分

右剉細水一盞煎七分去渣食後溫服

百四十五 當歸養心湯

當歸身 麥門冬 升麻 炒 甘草 炙 人參

生地黃 酒洗

右剉細加燈心十二莖水一盞煎七分去渣食後服

百四十六 安胎飲娠婦痘疹常宜用之

條實黃芩 沉水者二錢 白朮 當歸身

白芍藥 人參 各一錢 川芎 陳皮

大腹皮 黑豆浸酒洗淨 甘草 連殼砂仁 炒研五分

紫蘇葉 八分

右剉細水一盞半糯米一撮煎一盞去渣溫服不拘時

百四十七 河間涼膈散解痘疹表裏俱熱純陽無陰之證

大黃 朴硝 甘草 各半錢 連翹 一錢

梔子 黃芩 薄荷 各二分 淡竹葉 五片

右剉細作一服水一盞煎八分去渣入蜜一匙和勻服

附方東垣涼膈散解痘疹裏熱良方 即前方去大黃朴硝加桔梗

此上諸方藥品修製法並見於要論中

痘疹格致要論卷之一

羅田 密齋 萬全 著

○原痘論

上古之時未聞痘症之證素難之文鮮有及者豈其人淳樸朴野  
 精精全神虛邪苛毒莫之能害歟或云自建武征虜遂染其毒流  
 布中國謂之厲瘡或曰聖瘡言其變化莫測也或曰天瘡言為天  
 行疫癘也或曰百歲瘡言人自少至老必作一番也或曰豌豆瘡  
 言其形之相似也故病此者如蛇蛻皮如龍蛻骨死生存於呼吸  
 之間夫上古所無而末世有之抑時世異邪抑人將失之邪予思  
 其繇天地之氣春夏生養之紀也其物熙熙秋冬殺戮之紀也其  
 物黜黜時速末世已非泰和之景不可謂非時世之異然人日習  
 偽不知持滿御神之道七損八益之數務快其心以散其真不可  
 謂非人自失之也有論穢毒者有論淫火者有論時行正病者靡  
 有定論將謂穢毒淫火邪則一歲之中大而郡縣小而村落病者  
 相似而死相繼比屋哭聲穢毒淫火未必人人若此之甚也將謂  
 時行正病邪何以自少至老但作一度厥後再無傳染也益父母  
 於子一體而分精血之毒已首於陽施陰化之始顧不待誕生之  
 頃嚙其血而後有是毒也况男子惜其氣以養其精女子耗其氣  
 以養其血苟失所養即貽他日之患子之受於父母者雖殊其為  
 毒則一也豈有男子淫火起於氣為陽毒而妨治女子淫火起於

血為陰毒而難治之理邪至於天行正病亦有其時也  
 所加及有四時不正之氣即知有是正病也然則待時而終者胎  
 毒也或速而老或徐而持或暴而死者氣之微甚所使也然則其  
 毒洩矣所以終身但作一度後有其氣不復傳染焉

痘為胎毒胎毒矣其間或疎或密而重或重變輕或輕變重  
 變化叵測是又有說也疎而輕者始終如一審而重者變性自出  
 或因父母相傳而然或因疫癘相染而然或因鬼疰相着而然查  
 冥恍惚出於聞見思慮之所不及此與智者道之癡人前不必說  
 夢也何者益疹痘之毒父母原自有之雖嘗作過一番而臟腑經  
 絡皮毛肌肉骨髓之間餘毒猶有存者一旦分形化氣注之於子  
 其毒亦隨之洩矣所以子之瘡癩多肖親也加之調攝失宜放恣  
 無忌其毒益甚瘡痘之候沉困危篤者未必非父母之所致也凡  
 子之侏儒跛躄必肖於親况疹痘之毒乎且人受天地之氣以生  
 天地之氣變人之氣亦變或遇遷正失守淫勝變後之紀德令乖  
 常皆留迭見自然厲氣傳染證候相似所以輕則俱輕重則俱重  
 若有主之者是則疫癘之所為也故人之癘疾而死者精靈不散  
 游魂往來隨氣而行常以其氣注於平人而為之疾如祭癩之傳  
 染然形質厚福澤悠遠者不能相及苟體虛福薄之人陰陽并  
 亂之歲則膏肓之堅臺駘之崇互相染著反復變化術不能禁工  
 不能治也此非鬼疰之害乎夫治此三者當奈何曰必為之

其毒平其氣遷其處庶乎可免矣

○胎毒論

易曰大哉乾元萬物資始又曰至哉坤元萬物資生夫乾稱父資始者氣之始也坤稱母資生者形之始也人之有生受氣於父成形於母是以毛髮皮膚肌肉筋骨四肢百骸其來固有自矣然則胚胎造化之始精施血受之候輔翼調養抑豈無道邪奈何為父者以酒為漿以妄為常以飲竭其精以耗散其真命門衰敗陽道弗興乃服助陽之劑至於陽火益熾陰水益枯失其乾道此父遺毒於氣之始也為母者褻急妬忌以致衝任氣逆月事不時乃服暖宮之劑煎熬真陰血中伏火失其坤道此母遺毒於形之始也

痘疹格致要論

卷一

三

且古之男子必待婦人月水時下之後與之交媾以成其胎婦人有娠則居側室以保其胎而又不妄作勞飲食必謹今之夫婦不知此理情欲妄動飲食妄嗜此父母之遺毒又不特一朝一夕而已也况子喘息呼吸氣通於親故毒於胎胎毒於膜皮毛筋骨之間待時而發或為瘡癤或為驚悸或為丹瘤疔毒之中惟痘最酷加以天地肅殺之氣歲運乖戾之夾水土之不齊疫癘之交作則夫昏雜殪難以枚舉是雖氣數抑人之所自致誠使為父母者以繼嗣為重以無後為慮節其嗜慾守其禁忌父之有疾責而治之母之有疾責而治之必使精血和平則陽施陰化氣清形粹子亦不嬰其毒復何天殤之恫耶

或曰鬼在胎之時其母不畏禁忌恐意所欲加添滋味好啖辛酸

或食毒物其氣搏於胞胎之中所以鬼受此毒發為瘡疹也殊不知人之有生受氣於父成形於母胞胎之毒父當分任其咎未可專責母也

如東垣所論紅絲瘡是也又曰胎在腹中食母微液至生之時啼聲

一發口中所含惡血隨吸而下寄於右腎胞絡之中瘡疹之發乃

下焦相火熾也蓋鬼在胞中賴母氣以養其形母懷胎之時天食

以五氣各有所稟也如脾氣稟肝氣稟心氣稟肺氣稟腎氣稟地食以五味

五味各有所入也如酸味入肝苦味入心甘味入脾辛味入肺鹹味入腎至於五志之動

各有所傷如怒傷肝喜傷心思傷脾憂傷肺恐傷腎鬼之受病於母者不特始生

嚙血一事而然也又曰小兒瘡疹五臟之中惟腎無候以在腑下

不能受穢故也夫腎有兩枚左為腎右為命門男子以藏精女子

以繫胞胚胎之初精血混合設有其毒腎先受之豈有腎在腑下

而不受毒者哉况肝生筋心生血脈脾生肌肉肺生皮毛腎生骨

髓使腎無所受何以能生骨也既瘡疹諸證起於右腎之下行足

太陽之經足太陽膀胱腎之腑也安得謂腎無候乎或曰諸痛痒

瘡瘍皆屬心火今謂起於右腎何也經曰顯明之右君火之位也

退行一步相火治之君火在相火之右但立名於君位而天氣不

加相火者守位而奉天之命以宣行君火之氣所以心者君火也

欲彰其德右腎為命門相火代君之令而行之耳故曰起於右腎

之下也

昔人謂兒在胞中飢則食母之血渴則飲母之乳予獨謂其不然蓋兒始受氣之時一月胎二月胎不過一點精血凝結中涵生意也至三月以後其形漸成在胞之中譬諸禽鳥之雛在卵殼中渾融變化薰蒸滋養惟所受太初之氣漸自生長日月既足乃破其胎卵而出矣何以能飲食耶必謂有所飲食則胎胎之初形象未具何飲何食邪且血者渣滓之物入則有出十月之前所飲所食之血又從何道出邪若生下口含惡血乃母臨蓐之時血穢流溢入兒口中未必便是先在腹中所食之血也但云兒在胞中滋養形體長育變化培根蒂者則在母之血液也

○瘡疹性腎無候論

錢氏曰痘疹始出之時五臟證見惟腎無候但見平證耳能也錢氏曰涼耳涼是也能耳供屬於腎其居北方主冷也後人不知腎獨無候之理還謂腎在府下不受穢毒所以無候欲專補脾土以制腎水又欲虛其腎以免黑陷之變內經曰君火之下陰精承之五氣不可以偏勝苟失其平則為災孽今瘡毒之火起於三焦煎熬於腑燔灼皮肉非腎水有以制之則慄悍之勢莫之能禦惟腎無候者所以存生生之源見陰陽造化之妙也又腎在下而上骨腎獨無候者此瘡疹之毒升浮發散而出於外不然則反陷伏入於內矣觀其但見平證謂之平者乃耳能如常不似渾身之熱非謂其冷也益腎主骨能者骨之本也腎通於耳故能涼耳涼為腎水

病若反熱則火炎水涸真陰敗絕而死不旋踵矣或欲用四君子湯專補脾土以制腎水者殊不知白朮之燥腎之所惡茯苓淡滲腎中津液腎本無候而又伐之所謂誅罰無罪也或見錢氏用百祥丸以下腎之實者又欲虛其腎以防黑陷之變不知百祥丸正謂黑陷為毒氣入腎故以百祥丸下若不煩燥大小便秘安可下之乎謂之實者邪氣實也苟無黑陷而下之寧不反虛其稟自取陷伏之變乎或云以瀉勝脫非瀉腎者此文飾之詞不足信也然則保脾土以制腎水者非歟曰察其虛實如果內虛泄瀉則補脾土使裏氣實瘡疹不致於陷伏若內實則補脾之說正犯實實之戒但云補脾土使毒不陷伏而歸於腎則可謂補脾土以制腎水則不可

○腎主痘中之水論

論者皆曰痘瘡惟腎無證腎不可實腎實則為黑陷有欲虛其腎之意是未知五行正化之理也蓋心肝脾肺腎五行之所屬也聲色臭味液五行之所化也難經云肝色青其臭臊其味酸其聲呼其液泣心色赤其臭焦其味苦其聲言其液汗脾色黃其臭香其味甘其聲歌其液涎肺色白其臭腥其味辛其聲哭其液涕腎色黑其臭腐其味鹹其聲呻其液唾此五臟之中各具一五行也然肝主色五色之變在乎木也心主臭五臭之變在乎火也脾主味五味之變在乎土也肺主聲五聲之變在乎金也腎主液五液之

變在乎水也此一臟之中統統一五行也既曰肝為水泡以液為  
如水淚則腎之液也肺為膿泡以涕出稠濁涕則腎之液也心為  
班以血色赤而小血則腎之液也在內為血在外為汗夫五臟之液皆奉於  
腎如此然則痘中之水腎乃主之至於結痂則土來制水而乾較  
所以脾主結痂其色微黃也腎又為封藏之本痘之加盛腎又主  
之觀乎此不可謂腎無證亦不可使之虛也雖曰腎主黑而乃火  
太過水不能勝津液枯萎而變矣

○痘疹五臟證見論

凡病發於一臟惟痘疹之證五臟悉見蓋兒受父母之氣以成形  
屬毛離裏喘息畢通肝氣通於筋心氣通於血脉脾氣通於肌肉  
肺氣通於皮毛腎氣通於骨髓至發痘疹之時內連臟腑外達百  
骸所以五臟悉具也故發熱之初呵欠頰悶肝證也乍涼乍熱手  
足稍冷多睡脾證也面燥腮赤欬嗽噴肺證也驚悸心證也恍  
涼耳涼腎之平證也其證之多寡可以知其臟之主病矣自是  
之後初出一點血心也諸瘡屬心其毒斬關而出血先受之也血  
化為水肝也肝主淚水泡者淚出如水也水化為膿肺也肺主涕  
膿泡者似涕稠濁也膿成毒解而結痂者脾也脾屬土萬物功成  
於土痂皮微黃者土之色也其所以收斂閉藏者肺與腎也肺主  
收斂腎主閉藏也如初出一點血隱伏皮下不成顆粒者毒伏於  
心其死至速出於水珠皮肉染丹者毒伏於肝必加痒癩而死亡

如麩片皮枯不潤者毒伏於肺必喘呼悶亂而死出於皮下肉先  
浮腫者毒伏於脾必至灌爛嘔瀉不食而死出多血泡黑陷者毒  
伏於腎必血妄行而暴死矣如初出或漸漸者玄府閉塞毒  
無從出其血先乾轉添悶亂而死者心之病也血化為水浮腫嫩  
薄者肌肉已敗必至痒癩肝之病也脾主肌肉肝木尅之脾敗者  
死皮破復灌飲食能進此脾土尚強肝木不能犯之也水化為膿  
膿未及成忽然收較痂皮焦黑肺之病也未至而至是謂太過反  
蕪火化也若於空中再出一番此腎不受和復還於肺從下上者  
順也以痘形言之果束於外者脾也脾虛則易破充拓於裏者氣  
也肺主氣肺虛則不起發榮於根脚者血也肝主血肝虛則色不  
榮痘中之水腎也腎虛則乾枯黑陷痒痛者心也心主火實則痛  
虛則痒以痘之色言之紅活者心也惡其嬌脆中黑者腎也惡其  
焦陷漿白者肺也惡其灰褐者脾也惡其青乾淡黃者脾也  
惡其肉爛臨病之工審察五臟以施方治無不效矣

○臟腑主證治

肝者罷極之本魂之居也主風惡風其色青屬木其味酸其臭臊  
其華在爪其充在筋其液為淚其聲為呼在變動為握開緩於  
目○實則目直大叫呵欠頰悶項急○虛則咬牙多欠○熱則  
手尋衣領及亂捻物○諸風振掉皆屬於肝  
肝者急也食其以緩之甘草散急食辛以散之川芎以辛補

之生姜以酸瀉之芍藥

心者生之本神之變也主驚熱其色赤傷火其味苦其臭焦其

華在面其充在血脉其液為汗其聲為笑在變動為噫閉竅於

舌○實則斗哭發熱飲水而播○虛則則吐悸動不安○熱則

合面轉口中氣溫上竅咬牙○諸痛痒瘡瘍皆屬於心

心苦緩急食酸以收之五味子款軟急食鹹以軟之芒硝以鹹

補之炒鹽以甘瀉之甘草

脾者倉廩之本營之居也上因惡濕其色黃屬土其味甘其臭香

其華在唇四白其充在肉其液為涎其聲為歌開竅於口在變

動為噦○實則困睡身熱飲水○虛則吐瀉生風○諸溫腫滿

皆屬於脾

脾苦濕急食苦以瀉之白朮欲緩急食甘以緩之甘草以甘補

之人參以苦瀉之黃連

肺者氣之本魄之寓也主喘惡寒其色白屬金其味辛其臭腥其

華在毛其充在皮其液為涕其聲為哭開竅於鼻在變動為欬

○實則悶亂喘促○虛則噎氣長出氣○熱則手搖眉目面○

諸氣腫鬱皆屬於肺

肺苦氣上逆急食苦以瀉之訶子皮一作黃芩欲收急食酸以收之

白芍藥以辛瀉之桑白皮以酸補之五味子

腎者主藏之本精之處也主虛惡燥其色黑屬水其味鹹其

腐其華在髮其充在骨其液為唾其聲為呻開竅於二陰又

開竅於耳在變動為慄○虛則目無精光長明然骨重○腎怯

則猝失音○諸寒收引皆屬於腎

腎苦燥急食辛以潤之知母黃蘗欲堅急食苦以堅之知母以

苦補之黃蘗

○六氣十二經所主證治

太陽所至為要痛○太陽病發熱腰痛脊強項几几頭痛小便赤

澀○足太陽膀胱經○氣病則腎痛腰似折○血病則狂顛疾

○手太陽小腸經○氣病則噎痛頰腫○血病則頰腫

寒淫於內治以辛熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之

○寒淫所勝平以辛熱佐以苦甘以鹹瀉之

足太陽經麻黃桂枝澤瀉黃蘗○手太陽經生地黃赤茯苓○

二經通用羌活防風藁本

陽明所至為皴揭○陽明病身熱目赤作渴譫妄大便秘○足陽

明胃經○氣病則喜呻數欠驚妄發狂○血病則唇唇喉痺○

手陽明大腸經○氣病則頭腫○血病則衄衄喉痺

燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下之○燥淫所勝平以苦

溫佐以酸辛以苦下之

足陽明經半夏蒼白朮防風○手陽明經連翹秦艽麻仁○二

經通用升麻葛根白芷石膏大黃

少陽所至為嘔嘔瘡瘍惡病暴死○少陽病乍寒乍熱胸脇痛乾  
嘔心煩○足少陽膽經○氣病則口苦善太息○血病則腋下  
腫○手少陽三焦經○氣病則噎腫喉痺○血病則目銳背痛  
頰痛○火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之○  
火淫所勝平以鹹冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之  
○足少陽經半夏龍胆連翹○手少陽經升麻芍藥地黃附子  
細辛黃耆○二經通用柴胡青皮

大陰所至為中滿吐下○大陰病自利四肢逆冷○足太陰脾經  
○氣病則舌本強食則嘔善噦○血病則溇泄○手太陰肺經  
○氣病則喘欬○血病則渴煩心○濕淫於內治以苦熱佐以  
酸淡以苦燥之以淡泄之○濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以  
苦燥之以淡泄之○足太陰經防風蒼白朮當歸白芍藥吳茱  
萸黃耆人參甘草砂仁○手太陰經升麻白芷桔梗麻黃黃芩  
梔子石膏天麥門冬桑白皮杏仁

少陰所至為癆瘵○少陰病咽痛口舌燥○足少陰腎經○氣病  
則善恐○血病則舌乾咽腫嗜卧○手少陰心經○氣病則噎  
乾渴而欲飲○血病則衄蟻血汁○熱淫於內治以鹹寒佐以  
甘苦酸以收之以苦發之○熱淫所勝平以酸寒佐以苦甘以  
酸收之○足少陰經附子丁香桂黃耆○手少陰經麻黃桂心  
生地黃黃連當歸○二經通用獨活細辛

厥陰所至為嘔泄○厥陰病四肢厥冷時作搐搦舌卷○足  
厥陰肝經○氣病則腰痛盜乾○血病則嘔逆衄洩遺溺閉塞  
○手厥陰心包絡○氣病則臂肘掣急腋腫脇痛○血病則煩  
心掌中熱○風淫於內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散  
之○風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之○足  
厥陰經羌活吳茱萸甘草當歸龍胆草○手厥陰經熟地黃牡  
丹皮○二經通用柴胡青皮

凡痘疹發於三陽者可治發於三陰者不可治



痘疹格致要論卷之二

○氣運

瘡疹之候或間數年而發或發則連年不已何也經曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以為工矣蓋司天者主行天之令上之位也歲運者主天地之間人物化生之氣中之位也在泉者主地之化行乎地中下之位也一歲之中有此上中下三氣各行化令氣偶符會而同者則通其化其中於人則病矣所以瘡疹必待其年而發也六十年中天符十二年戊子戊午巳丑巳未戊寅戊申乙卯乙酉丙辰丙戌丁巳丁亥其中又四年為太乙天符巳未乙酉謂之天符者司天與運同也太乙天符者司天與運及辰之同也歲會八年丙子巳丑丁卯甲辰甲戌戊午謂之歲會者運與支同也同天符六年甲辰甲戌庚子巳未乙酉謂之同者謂歲運與在泉合其氣化陽年曰同天符陰年曰同歲會也五者雜而言之共三十六年合而言之止有二十六年經曰天符為執法歲位為行令太乙天符為貴人邪之中人則執法者其病速而危行令者其病徐而待貴人者其病暴而死也又于午之歲少陰君火主之寅申之歲少陽相火主之經曰少陰所至為嘔眈少陽所至為嘔嘔瘡癘暴死凡此數年剛柔失守升降窒抑舊者不退新者不遷則瘡疹發而不已也

○疫癘

瘡疹雖胎毒必待時令不正之氣相傳染而發蓋春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣寒冷此四時正氣之序若春應燥而反寒夏應熱而反清秋應涼而反熱冬應寒而反溫此非其時而有其氣乃不正之令也夫人感之或為寒熱或為瘧痢或為痰痺或為腫或為斑疹謂之天行正病又云疫癘是以一歲之中彼此傳染大小相似又若冬溫陽氣蒸泄至於來歲必發瘡疹何也蓋小雪以後為終之歲太陽寒水主之水德不彰使厥陰少陰木火之氣反來乘之陽氣早發奉生者少故來春民多病也况瘡疹之毒藏於至陰之下發於太陽之經當其時而動其氣毒乃發矣此冬溫之後必發瘡疹也凡此不正之氣發之泄之解之毒之勿犯歲氣是謂良工故治疫癘者以解毒為急

○部伍

諸瘡皆屬心火心之華在面瘡病之候但以面之部伍占之思過半矣且痘疹陽毒諸陽皆聚於面吉凶善惡尤易見也額屬心火如印堂以上髮際以下橫兩日月角位先見紅點先作漿先結膿者此惡候也蓋心為君主毒發於心故先見於其位君危則十二官皆危其死速矣左臉屬肝木右臉屬肺金如兩臉先見紅點落者吉如相聚作塊其肉硬腫者死蓋肝藏魂肺藏魄生意既絕魂魄將離故不治也頰屬腎承漿橫抵兩頰先見紅點先發先醫者吉此位雖屬腎然三陰三陽之脈皆聚於此陰陽和故可治也

脾為脾土者準頭先出先醫者凶蓋脾為土四臟稟命於脾毒於脾土敗則四臟相隨而敗故綿延日久後斃也腎之竅在耳云心開竅於耳心腎皆少陰君火也又少陽相火之脈行耳之前後凡在耳輪先現紅點者凶蓋君相二火用事燔灼之勢難可撲滅也惟口唇四圍先出先起先醫者大吉蓋陽明之脈俠口環唇胃與大腸主之無物不受故也

○脈候

瘡疹有形之證無所用診又歲氣主之似不必診經曰微妙在脈不可不察上之有紀從陰陽始是則不可不診也先哲有言曰瘡疹脈靜身涼者生脈躁身熱者死可見瘡疹亦用診矣故小兒七歲以上四至為平脈七歲以下六至為平脈或云八至者非也大抵小兒之脈多帶緊數王丞經云自然緊數甚分明都緣未散精華氣又瘡毒之脈多浮大而數傷寒論云浮為風虛大為氣強風氣相搏必成癰疹又云數脈不時則生惡瘡也脈六至也數如過於本脈為大數邪氣實也不及本脈為遲則正氣虛也診脈之法浮以候表沉以候裏浮而數表熱也浮而遲陽氣衰也沉而緊裏熱也沉而細元氣脫也瘡疹之陽脈浮沉宜帶洪實弱而無力為陽病見陰脈仲景曰陽病見陰脈者死九診得浮而無根腎脈如羹上之肥數而急疾連來如雀之啄細而欲散如珠之旋遲而欲絕滴上如牽之漏沉而時見如魚之躍皆死脈也

○氣血

人之一身本乎榮衛衛者陽氣所以開闢竅竅運動樞機者也榮者陰血所以充溢臟腑灌溉肢體者也故氣虛則神機息血虛則化源絕二者不可偏勝也痘疹之毒本於五臟之液各隨經絡部位直犯榮衛而出氣血從之觀其裏東堅厚窠囊充長者氣之足也根芽紅活形色潤澤者血之足也氣血既足則痘疹發揚醫不須施治以昭實上之戒如平陷嫩薄者氣之病也乾枯不黑者血之病也責而治之不可因循以貽後悔然脾胃者氣血之父也心腎者氣血之母也肝肺者氣血之舍也脾納水谷其悍氣注於腎而為氣腎舍於肺而為衛以溫分肉充皮毛肥腠理司開闢也衝氣虛則瘡不起發其毒乘氣之虛而入於肺肺受之則為陷伏而歸於腎矣脾納水谷其精氣注於心而為血心舍於肝而為榮以走九竅注六經朝百脈也榮血虛則瘡不光澤其毒乘血之虛而入於肝肝受之則為痒癩而歸於心矣凡治此者氣病治氣血病治血寒則溫之熱則清之虛則補之實則從之仍以脾胃為主不可犯之也

○陰陽

內經曰陰在內陽之守也陽在外陰之使也陰者血也陽者氣也難經曰氣以响之血以濡之言氣以行其血血以濡其氣也痘疹之出其浮沉聚散使於外者陽之德也灌注滋潤守於內者陰之

陽守乎陰陰使乎陽互為其用所以易發易收也若陰不  
則陽不長而枯萎之變出焉陽不足則陰不生而陷伏之變出焉  
必陰陽相濟毒化而解矣故治此者春夏養陽秋冬養陰辛止發  
散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味泄為陽陰病治陽  
陽病治陰從陰引陽從陽引陰寒之而熱者取之陰熱之而寒者  
取之陽形不足者溫之以氣陽也精不足者益之以味陰也皆  
素難之所秘能陰陽之理可以為人司命矣

○標本

病有標本治有後先有從標者有從本者有先標後本者有先本  
後標者有標本兼治者視其急緩其法不同也痘疹之候自入身  
而論氣血為本疹疹為標自疹疹而言疹疹為本別證為標如疹  
子稠密在標之病也視其氣之不勻血之不周以勻氣活血兼行  
解毒此則標本兼治也疹若起發氣或虛者補其氣血或虛者補  
其血此緩則專治其本也氣血充實疹或壅遏者單行托裏解毒  
之劑此急則專治其標也疹勢太甚咽喉腫痛者以治咽喉為主  
此心則治其標也疹勢太甚自利不止者以自利為主此急則治  
其標也利久不止漸成壞疹救裏發表兼而行之此亦標本兼治  
也先救其裏後攻其表此則先標後本也大小便秘煩躁喘呼者  
急利之此急則治其標也疹勢太甚煩渴不止以解毒為主兼  
其渴此先本而後標也凡此之類擴而充之以盡其餘則治不

○形色

或云痘疹之候無以脉診言形色可辨也謂之形者痘之形也故  
尖圓堅厚始出之形發榮滋長欬壯之形飽滿充足成漿之形欬  
束完固收靨之形與大豆豌豆莢豆相似者皆正形也或平或陷  
形之變也如初出時空若黍種之脫隱如蚊蚤之迹薄如麩片密  
如針頭若熱之糜聚之粟者不能起發而死粘聚模糊肌肉虛浮  
溶軟嫩薄皮膚潰爛者不能收靨而死謂之色者痘之色也喜鮮  
明而惡昏暗喜潤澤而惡乾枯喜蒼膩而惡嬌嫩紅不欬啖上則  
易破白不欬灰灰則難留由紅而白而黃黃而黑者此出形起  
發成漿結痂之正也出形而帶紫起發而灰白此色之變能辨  
痘之形色可知死生之期

○疎密

痘欬其疎疎則毒少不欬其密密則毒甚此古今確論也疎密之  
分各有喜忌如頭面欬疎元首不可犯也頭項欬疎管蓋不可寒  
也胸背欬疎臟腑俞募之所附也若夫手足不忌其密矣謂之疎  
者非但稀少也鋪排磊落大小勻淨亦可以言疎謂之密者非必  
盛多也摺聚粘連片復亦片雖只數處一可以言密疎而凶者亦  
有數等如初出時緣見紅點三兩處其熱便退可以語其疎也苟  
大熱不解唇口燥裂大小便秘煩躁不寧或身無熱但增煩渴

一兩點頂尖焦黑或三四粒作一堆者僅見數處他無所出者  
不食煩渴大小便澀此由毒伏於中加謔妄者不待起發而死  
若能起發後必發癰毒也二也亦有出現實跡遂生玩忽之心禁  
忌不守風寒不避飲食所傷湯丸之試變生不測三也設有容而  
吉者治之早行之嚴寒無病而瘡悉成也

○輕重

痘有輕重輕者不須服藥但加保護而已重而未成壞瘡者可急  
治之重而且壞不可治也何謂之輕者作三四次出大小不一  
等根紫紅肥澤文滿頭面稀少眼中無喉舌無瘡能食大小便如

常此毒之輕也重者一齊出起發收斂如期能食此重之可治者  
若頭面頸項胸背喉舌皆瘡稠密無縫或灰白色或青紫陷下或  
外白裏黑或外黑裏赤食谷則噎飲水則澀或有不利不止或大便  
不通此重之不可治者也然有輕變重者以犯房室觸穢汚食生  
冷胃風寒感於鬼神誤投湯藥此人事之失也有重變輕者以避  
風寒節飲食忌生冷速人物醫不乖方此人事之得也吁本輕本  
重者諉之於命變輕變重者非人所自致歟

○順逆

古人謂瘡疹春夏為順秋冬為逆春三月謂之發陳萬物以生夏  
三月謂之蕃秀萬物以長得其時所以順也秋三月謂之容平草

冬三月謂之閉藏蟄蟲蟄戶違其時所以逆也此亦語其  
長收藏之理豈有春夏皆順而吉秋冬皆逆而凶者乎如春生  
長則春夏亦逆秋能養收冬能養藏則秋冬亦順也惟豆出一  
般疎密得所不愆其期證之順也痘出夾雜帶斑帶疹稠密無縫  
常失其期證之逆也意春夏為順秋冬為逆古人之言豈真拘上  
於時令之說邪益春夏發生之令也秋冬殺伐之令也痘疹之出  
起發者得春夏之令所以為順陷伏者得秋冬之令所以為逆其  
斯之謂歟春膿泡金灶木夏黑陷水克火秋斑火克金冬疹土克水為之逆  
者此不經之談黑陷一證四時不治何但在於夏邪故非其時而  
有是證者氣血和平臟腑充實莫不皆順如其時而有是證者氣  
衰血弱臟腑虛損者莫不皆逆

○痘有怪變

夫痘之變者謂其變化莫測也若正而順者自然苗而秀上而  
實以成造化之功彼邪而逆則有許多怪變焉  
一曰証痘初發熱兩三日面上報出紅點磊落稀疎十分可喜也  
不起發也不灌膿至五六日後都不見了其人面多青黑精神  
困倦再過兩三日後遍身發熱其痘一齊湧出善醫者能保其  
一二其實不可治者多矣  
三曰痘母初發熱四五日後其痘不出或有背上或胸前忽然腫  
起一塊小者如盃大者如盤又有發熱二三日後面上遍身

毒出至起發時中間有痘疹三五糊塗根脚頑硬但見此  
多不可治

三日鬼痘發熱三日出痘又三日磊落稀疎十分可喜至起發時

痘頂作膿如菘豆色根脚紅圍戴至六七日後其瘡自破箇

箇深孔如錢鑿中心之狀必不可救又有一等起發之時忽有

瘡頂變黑拊之則痛者急以法救之以待傳開不可治矣

四日爛痘初出之時十分可喜至於起發作膿之時自然潰爛破

損此病甚危

五日乾痘出形之後細密混雜如疹如疥皮膚乾燥瘡頭焦黑不

能起發而死

六日空痘出見時好起發時好只到灌膿之時却不作膿一片空

殼此證若不死必發毒大抵不可治者多矣

七日生痘痘瘡之出即如枝頭之果以漸成熟今起發之時中心

平陷再不滿頂至枯作膿之時四圍紅紫猶是生血不化膿水

其期已過不見成熟之色此證必死

○虛實

不知虛實者不可以為工經曰無虛上無實之虛實之分不可不

知也經曰必先度其形之肥脊以調其氣之虛實此以形體別虛

實也又曰穀盛氣盛穀虛氣虛此以飲食別虛實也又曰脉實則

實脉虛血虛此以血脉別虛實也又曰邪氣盛則實精氣奪則虛

以邪正別虛實也大抵實者邪氣實也虛者正氣虛也經曰邪

之所湊其氣必虛而不去其邪則實是也又云五實死者謂邪

氣之實也五虛死者謂正氣之虛也凡人之虛實之證其人形體肥

健飲食能多六脉洪實素無疾病大便如常瘡色紅潤者此表裏

正氣俱實也不須服藥若形體羸怯素多疾病飲食減少六脉微

弱吐利頻上瘡色淡嫩者此表裏正氣俱虛也陳氏溫補之法可

用如瘡勢太盛掀腫痛脹大熱不退煩渴昏睡大小便秘此表裏

邪氣俱實也錢氏涼瀉之法可用如瘡本稠密掀發紅活吐利不

食者此表實裏虛也於補湯中加解毒藥如瘡色淡白發不透滿

大小便秘活飲大瀉者此裏實表虛也於解利中加發藥又如瘡

痛者邪氣實也當活血以開其鬱若痛如刀刺悶亂大吐者勿治

瘡痒者正氣虛也當補氣以燥其濕如爬搔不定破爛皮脫者勿

治灰白者氣虛也參耆之功為大乾燥者血虛也歸芍之力宜多

虛則補之實則瀉之中病即已無過其制此治之權衡也若本實

而反瀉之則毒氣彌盛或為潰爛或為癰腫或為目病或為咽瘡

或為失血皆補之過也如本虛而反瀉之則正氣益虛或為吐瀉

利為厥逆皆瀉之過也經云毋致邪毋失正絕人長命其此之謂

歟

○動靜

凡物得其平則靜失其平則動經曰陽氣者靜則養神柔則養筋

入曰陰氣者靜則神藏躁則消亡夫患痘者陰陽俱病息欲其  
語欲其少寐欲其定寤欲其寧饑則索食渴則少飲觸其瘡則吟  
拂其欲則鳴此平人之候神清氣定謂之靜而吉也如呻者身有  
苦也自語者神不清也喘粗者內熱也腸鳴者洩也坐臥不定者  
心煩也啼叫不止者痛也搖頭者風也指欲搔者痒也嘔物難者  
咽痛也咬牙者心肝熱也若悶亂躁擾譫妄昏眩如見鬼狀搖頭  
扭項手舞足擲目睛上翻寒戰咬牙語音不出則皆死候矣如病  
何靜忽作擾動者異也以法求之如瘡色變無他候者此戾氣所  
觸也如瘡色不變又無他證此必有因但俟自定其有目瞋息微  
四肢僵直口禁瘡壞昏睡不醒者此真氣將脫魂魄欲離之兆又  
痘疹論  
不可作靜診也

### ○痛痒

諸痛為實諸痒為虛謂之實者邪氣突也謂之虛者正氣虛也又  
瘡疹為火火盛則痛火微則痒故常作痛者此邪氣之實也蓋痘  
瘡之毒發於皮膚肌肉之間氣以束之血以潤之醞釀其毒以抵  
於化正氣周旋而不含毒氣變化而未成毒而作痛此其常也毒  
化膿成其痛自止若肉如刀刺膚如錐刺一向痛而不止大呻  
哭此則皮傷肉敗不勝其毒又痛之變也常作痒者此正氣之虛  
也經曰胃者水穀之海六腑之大原也五味入口藏於胃以養五  
臟胃氣既虛則水穀不化津液內竭不能輸精於皮毛氣失其衛

血失其榮不能醞釀毒氣以至於成使毒氣浮沉隱伏聚散條忽  
灼於皮毛所以痒也此其為異補其氣血和中托裏其痒必止若  
一向癢痒時甚一時爬抓破壞皮脫肉坑者此毒氣內陷正氣外  
脫不旋踵而告變矣如先痛後痒此常候也益先則毒未解化其  
火正盛宜爾作痛厥後膿成毒解火氣漸微宜爾作痒也

### ○老嫩

管觀朝華之草夕而零落松柏之堅凌冬不凋夫以草木堅脆不  
同堅者難壞脆者易傷况於人質有厚薄氣有強弱耶彼瘡痘之  
毒喜老而惡嫩蒼嫩嬌紅色之老嫩也緊實虛浮形之老嫩也濃  
濁清淡漿之老嫩也堅厚軟薄茄之老嫩也老嫩之故衛氣主之  
經曰衛氣者所以溫分肉充皮膚腠理司開闔者也故衛氣  
強則分肉堅皮膚厚腠理密而開闔得也所以收斂禁束制其毒  
而使不得以放肆故色蒼而膩形緊而實漿濃而濁茄厚而堅自  
然易壯易醫雖有邪風穢毒弗能害也如衛氣弱則分肉脆皮膚  
薄腠理疎而開闔失也所以不勝其毒而毒得以恣其猖狂之性  
故色嬌而紅形虛而浮漿清而淡茄軟而薄易破難醫不待邪風  
穢氣而先敗壞矣夫瘡之老嫩則氣不可不養也

### ○榮枯

夫物濕則潤澤燥則乾枯榮枯之分血實主之故血者所以榮陰  
陽濡皮毛流關節也瘡本疎者血不在多而易充足瘡本稠者貴

乎血之有餘矣苟血有餘則經脈流行淪於肌膚然於皮色鮮紅  
潤肥澤長養自然形色鮮明根葉紅活也如血不足則經脈無  
通窠囊空虛黑燥而不鮮明也枯萎而不肥澤也皮膚皴揭而啓  
裂也經曰諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥又曰燥勝則乾由其人  
血常不足加以毒火薰灼反無燥金之化精血並竭是以有此  
澁也法宜活血養液散熱解毒清金潤燥則乾涸可回觀夫瘡之  
榮枯而得養血之理其或溫氣太過瘡本浸淫犯之則破潰爛難  
磨者此又火極而蕪水化也脾強則生脾弱則死

○善惡

夫良工者必知瘡之善惡善則就之惡則去之瘡疽之證有五善  
有七惡五善者飲食如常一善也大小便調二善也瘡紅活堅實  
三善也脉靜身涼手足和煖四善也語聲清亮動止安寧五善也  
五善之證不能悉具但得一二自然清吉七惡者煩燥悶亂謔妄  
恍惚者一惡也嘔吮洩利飲食不能者二惡也瘡青乾黑陷深腐  
破爛者三惡也頭面預腫鼻塞目閉唇裂者四惡也喉舌潰爛  
入則碗水入則澆者五惡也寒戰咬牙聲啞色黯者六惡也腹脹  
喘促四肢逆冷者七惡也七惡之中但見一證勢不可為七惡之  
外復有渾身血泡心腹刺痛陷伏不出便溺皆血尋衣撮空者皆  
又卒死之候也

○始終

瘡疽之法貴乎謹之於始而慮其所終庶無後日之悔經曰上工  
治未病中工治將病下工治已病未病施治十全八九治將病者  
十全四五治已病者功莫能施發熱之初大熱渴煩大便秘腹痛  
腰痛鼻乾唇燥驚悸譫妄此毒氣鬱於內即當防其伏而不出  
也吐利不止即防其中氣虛弱不能助瘡成就或致倒陷也故熱  
則解之便秘則利之驚則平之吐利則止之且如初出一點血此  
春之氣發生之令也至於起發此夏之氣長養之令也水化為漿  
此秋之氣成實之令也膿就結膿此冬之氣閉藏之令也初出而  
便有水將發而便戴漿膿未成而便收膿此未至而至謂之太過  
必有陷伏發表托裏解毒切不可緩應出不出應起不起應收不  
收此至而不至謂之不及必責以氣衰血微而勻氣活血解毒之  
法不可不急施也又如初出色艷者皮嫩皮嫩則易破當防其痒  
痛也相聚成塊者不可謂之疎此有伏也殼空無水者後必發膿  
膿而預腫者防其易消而倒陷咽痛者急解之防其失聲瘡候也  
中多水泡者後必自利目溢淚出者防其有腐翳也類更衣者  
其倒鑿瘡破不結痂此倒鑿也堯夫云與其病後總服藥孰若  
前能自防其此之謂歟

○發熱

瘡疹發熱與傷寒相似但傷寒只見一經形證若瘡疹則頭燥腮赤呵欠頭悶乍涼乍熱多睡欬嗽噴嚏驚悸吐利手足指冷而耳涼也然發熱者瘡疹常候也不可盡除之但熱微毒亦微熱甚毒亦甚

○初發熱時精神清爽鼻滋潤更無他證者此熱在表其瘡必疎不須施治

○初發熱時渾身壯熱熾然不渴消便自調此邪在表拂鬱於皮膚之間宜以輕揚之劑發之升麻葛根湯主之一甚則羌活湯主之十

湯主之十

○初發熱時其熱烙手目赤鼻乾唇燥小便赤大便秘煩悶不安此表裏俱熱毒氣壅遏宜發表攻裏雙解散主之四

○初發熱時表不大熱其人煩躁不安此熱在裏也以三黃丸微利之八

○初發熱時腹中痛者此毒氣與穀氣相併宜利之去陳宛使便毒氣得洩穀氣得消備急丸主之九

○初發熱時咳嗽甚者參蘇飲主之三

○初發熱時或乘疫癘之氣人參敗毒散主之二

○初發熱時或為風寒所襲出不快者桂枝葛根湯主之五

去大黃主之

○如瘡既出其熱便退瘡本必疎若一向熱不衰者此瘡必發其毒連喬升麻湯六代天宣化丸十二主之

○如瘡已出但微發熱不須治之蓋瘡疹屬火非熱不能成就也

○如瘡漿膿已成毒氣已盡又復發熱者俗呼為乾漿者是也必須施治

○如結痂之後其熱不退者此邪氣未盡正氣未復熱微者不須治之熱甚者當視其虛實

○渴

瘡疹渴者裏熱也益三焦者水穀之道路津液者水穀之精華亦

化流行以灌溉乎三焦也瘡疹之火起之於內銷燦水穀不得以

變化津液灌溉臟腑故渴也又瘡本稠密津液外洩化為膿漿不

能滋養其氣亦渴也小渴者常病也不須治之大渴者視其虛實以法治之切不可以冷水瀉梨柿西瓜等物與之恐損脾胃致生災異也

○如發熱時便大渴者此熱在裏也葛根解毒湯二十一主之

○如瘡已出或起發或收醫一向渴不止者人參麥門冬散二十主之

○如能食而渴者肺熱也經曰心移熱於肺傳為膈消由心火上炎乘於肺金薰蒸燥膈耗津液故渴也治在上焦人參白虎



湯二十四 加黃連

○如不能食而渴者脾虛也叔和云口乾饑飲水多食亦飢重由脾素弱不能為胃行其津液故渴也治在中焦參苓白朮散二

○如自利而渴邪傳腎也正理論云自利而渴者屬少陰虛故引

水自救蓋腎主五液其脉絡於肺繫舌本邪傳於腎則開闔不

司故自利自利則津液不走腎水乾不能上潤於舌故大渴也

治在下焦宜溫之陳氏異攻散二十六 主之

○如渴而大便秘者宜利之四順清涼飲二十七 主之

○腰痛

瘡疹發熱先腰痛者最宜忌之經曰腰者腎之府也又曰太陽所

至為腰痛蓋足太陽膀胱經為十二經之首其脉俠脊入循脊絡

腎瘡疹之毒起於右腎之下循足太陽膀胱散於諸經乃邪由裏

傳表也如初發熱其腰即痛此邪由膀胱直入於腎故關節不利

而腰痛亟解毒以泄少陰之邪發表以通太陽之經使邪氣不得

以深入瘡雖稠密或可愈也治若少緩則太陽之邪由表以傳於

陽少陰之邪由裏以傳於陰表裏受病陰陽俱傷榮衛之脉不行

臟腑之氣皆絕或為黑睛或為疔瘡終莫能救

凡發熱便腰痛者先服人參則毒散二次服五苓散加獨活主

之二十八

○腹痛

內經腹痛者屬於寒惟一證為熱瘡疹腹痛皆屬毒熱也訣云

發熱肚中痛斑痧腹內攻發多防不透發少更防離是已或有食

食積者

○如初發熱便腹痛者此毒氣內攻須急治之不可逡巡以貽後

悔便調者四君子湯二十 去白朮加青皮木香山楂肉枳殼便

秘二三日未行者承氣湯三十 主之

○如發熱腹痛大渴煩躁大便秘狂妄者三乙承氣湯三十 主之

○如發熱腹痛大便如常者化毒湯主之 三十二

○如發熱腹痛大便自利者黃耆建中湯主之 三十一

○如瘡已出至收醫時原無腹痛忽然作痛此必有飲食也消息

審問會因飲冷水者五苓散主之 二十八 或用黃耆建中湯加

白朮乾姜人參三十一 會傷食者問傷何物丁香脾積丸主之

三十三 用原物湯送下

○如瘡已出至收醫原無腹痛忽然作痛亦未傷飲食但觀其太

便何如若便秘者此燥屎也以三黃丸微利之大便秘利者

此虛痛也黃耆建中湯三十一 主之

○如因寒而痛者理中湯三十四 加白芍藥桂主之

○如發熱時心腹絞痛煩悶叫呼或瘡陷伏脹滿疼痛喘促者此

惡毒之氣攻刺腸胃燔灼臟腑必不可治

○驚狂

驚者口眼喎邪手足搐搦隨發隨止狂者手足擾亂言語乖越發而不止驚者心主火而惡熱肝主風而善動瘡疹之火內生於心移熱於肝風火相搏故發為驚搐也此其常候俗呼驚痘最吉者以牽引伸縮骨節開張腠理疎解中存發散之義瘡出而驚即止若一何發而不已此則可惡乃毒內伏於心故耳狂者心為火而主神腎為水而主志火起於內濁亂擾動心神不守腎志不寧故發為狂也亦有大便秘鞭而狂者此謂有燥屎為陽明病但數日不更衣是以難經所謂重陽者狂也如昏不知人起臥不定又為不治之證

○如初發熱驚搐者導赤散三十五加辰砂燕老活湯主之十若

發不休小便利者可治小便不利者難痊以導赤散三十五牛

黃清心丸三十六相兼治之

○如瘡疹收靨之後又發驚者此真氣虛弱火邪內攻宜急治之

恐久成癩以貽終身之害寧神湯三十九抱龍丸四十主之

○如初發熱大便自調狂亂者五苓散二十八加辰砂主之

○如大便秘者輕則三黃丸八甚則承氣湯三十主之

○謔妄

謔多言也妄虛妄也謔妄者妄有見聞而語言無倫也皆邪氣熾盛正氣虛弱神識不清之所致夫言為心聲心熱則多言睡中

謔之微也寤而語言差謬熱則甚矣亦有胃熱而謔語者大便必鞭數日不更衣方是妄有聞見而謔語者其候難治蓋腎主志開竅於耳在目為瞳子毒邪入腎則志喪志喪則耳目妄有聞見故曰失志者死難經云脫陽者見鬼

○初發熱時謔語者此毒邪犯心心為熱胃其神浮越宜瀉火鎮神導赤散三十五牛黃清心丸三十六兼而治之

○如胃中有燥屎三五日未更衣者宜滌腸解毒宜四順清涼飲二十七三黃丸八主之

○如起發成漿欲靨之時忽然神昏謔語此由瘡本稠密精血外耗不結養神宜養血瀉火安神丸四十七主之

如昏不知人語言無倫者死經曰衣被不歛言語不避親疎者神明之亂也故不可治

如初發熱便妄有聞見狀如見鬼而恐怖者不治此證自始至終皆不可有乃神志俱喪軀殼徒存不過引身而已

○吐利

瘡疹吐利常候也經曰諸嘔吐暴注皆屬於熱蓋三焦為水穀傳化之道路熱火內迫則傳化失常而吐利併作火性燥動水欲飲也邪在上焦但吐而不利邪在下焦但利而不吐邪在中焦則上吐下利又裏氣上逆而不下則吐氣下而不上則利瘡疹的發時有吐利者不可驟止令邪氣上下得出也吐利久不止方可

之更宜消息

○如初發熱自利青綠水或黃色者皆熱也黃芩湯主之 四十一

○熱吐者黃芩加半夏湯主之 四十二 不可誤用理中湯又增內

熱也

○如初發熱自利一日夜只三四行者此不必治痘出利自止矣

○如初發熱自利清白色者此裏有寒也理中湯 三十四 主之

○如自利久不止此有濕也宜分利小便固澁腸胃恐虛裏氣致

生陷伏也以五苓散 二十八 豆蔻丸 四十三 相兼治之

○如初發熱暴吐不止此火氣上逆也茱萸散 四十八 主之

○嘔吐噦

仲景云聲物兼出為嘔物獨出為吐聲獨出為乾嘔乾猶空也明

其無物也然乾嘔與噦皆聲之獨出者乾嘔其聲輕小而短噦其

聲重大而長嘔吐噦瘡疹最惡候也蓋胃為水穀之海上通乎

內而不出如初發熱有是證此火邪犯胃其氣上逆治之則易

條若自出現以致收醫有是證者乃瘡集於咽門攻於胃脘吞

不利治之則難由於不知預解咽喉之法漸變為失音嗆水而不

可救矣

○如因飲水過多而嘔吐者此水逆也五苓散 二十八 主之

○如因傷食而嘔吐者以丁香脾積丸微利之 三十三

○如無上證而嘔噦者人以胃氣為本胃者土也土敗則木來侮

之木挾相火之勢上乘乎胃其氣自騰下直犯清道出於

胃門也微則乾嘔甚則噦土敗之象也太素曰絃絕者其聲

嘶敗木陳者其葉落病深者其聲噦短針無取毒藥無效謂不

治也

○洩利

凡瘡未出而利者邪氣併於裏腸胃熱甚而傳化失常也 治見瘡

已出而利者邪氣併於表正氣方逐邪氣主乎表而不主裏則裏

氣虛不能停納水穀故亦自利也宜從氣虛而治瘡疹所忌內虛

泄瀉凡覺腹疼或瀉上響趨小腹者皆欲作利宜先以法治之治

之不止此開腸洞洩惟澁劑可以收之聖濟經曰滑則氣脫欲其

收者是已如服澁劑而利不止經曰倉廩不藏者是門戶不要也

金匱要略曰六府氣絕於外者手足寒五臟氣絕於內者 利不止

五奪之中此為最甚但正氣內脫者淹延而死邪氣內陷者煩渴

而死此為異耳

○自起發以至收醫大便常宜堅實忽然自利者理中湯丸 三十四

主之

○如因飲冷水自利者所謂濕勝則濡泄也宜溫中利小便以理

中丸 三十四 理中氣勝水寒五苓散 二十八 利小便去水也

○如因傷食自利者所出必酸臭乃飲食自倍腸胃乃傷也宜先

去其積丁香脾積丸 三十三 後補脾胃益黃散 四十五 主之

○如利文不止先服陳氏木香散 四十五 兼豆蔻丸主之 四十六

更甚者陳氏異攻散主之 二十六 此藥太峻不可猛浪

○如結痂之時暴泄不止者消息所出之物如皮膿血者順水穀不分者逆如利膿血不止者此熱毒下流也香連丸主之 五十一

○大小便秘

凡病瘡疹者小便欲其流而長大便欲其潤而實則邪氣不伏正

氣不病經曰小便數者大便必鞭雖二三日不更衣無苦也如竟

小水少則病增進蓋心主瘡而屬火心移熱於小腸小腸移熱於

膀胱膀胱為津液之府氣化則出氣為火食不能傳化而津液不

出故小便秘也瘡疹發熱大便欲潤若二三日不行宜急利之恐

腸胃不通榮衛不行瘡出轉密也惟瘡起發之後大便却宜堅實

如能食而大便常行者不須忌之若過四五日不行則熱感生濕

難醫亦宜微利之設使大小便俱不通則邪毒內畜三焦阻

滯曰一息不運則機緘窮故大小便不通者死

○凡瘡疹小便少者熱微導赤散 三十五 加山梔仁熱甚八正散

主之 四十六

○如發熱時大便不行熱微者三黃丸 八甚則承氣湯主之 三十一

○如起發至收靨大便不行者用膽導法 五十一 不可遽用利藥

○但瘡乾黑陷大便秘煩躁者以百祥丸 五十二 牛李膏 五十三

主之如無此藥以承氣湯代之 三十一

○咳嗽

肺主氣其變動為欬欬者肺證也瘡疹發熱之物便有欬嗽者肺

為五臟之華蓋瘡疹之火挾君相二火之勢上薰乎肺肺氣焦舉

故氣逆而欬也瘡疹既出其欬更增者此喉龍有瘡滯淫如痒尋

尋如梗故欬也瘡疹收後而欬者此衛氣虛弱腠理疎開風寒外

襲肺氣逆而不收故亦欬也

如初發熱欬嗽甚者先以參蘇飲發之 三十一 次以甘桔湯 七合濕

白散 五十四 加牛蒡子治之

如瘡已出欬甚者甘桔湯 七加牛蒡子主之

如瘡光壯收靨身熱欬甚者人參清膈散主之 六十一

如瘡已靨欬嗽者不問形寒飲冷所致宜人參清膈散主之 六十一

如斑瘡欬嗽身熱而渴者生地黃散主之 五十九

○喘急

諸喘皆屬於火肺者藏之長也為心華蓋心火炎上則肺焦葉舉

氣逆不利而喘也有因風寒而喘者有因傷食而喘者惟瘡疹之

喘獨屬於火若加洩利腹脹煩躁則不可治

如初發熱便喘者前胡枳殼湯主之 五十六 大便秘者可用服

此不止以亭陸丸治之 五十五

如喘而大便自利者黃芩湯 四十一 加五味子人參主之

如瘡正盛忽然喘急者此惡候也當詳審如因傷食穀氣鬱而

為熱上乘於肺作喘者宜利之丁香脾積丸主之三十三金匱  
熱除喘自定也

如因感冒風寒而喘者麻黃湯主之六十七

如泄瀉內虛腹脹而喘者陳氏木香散主之二十五利止喘定

者生滑利不禁喘滿增盛者此氣脫候也

如瘧內伏不出或已出復陷腹脹悶亂而喘者必死

○自汗

自汗者不因發散而自然汗出也衛氣者衛護皮膚肥實腠理禁

固津液使不得妄洩也瘡疹之火由裏達表干於衛氣皮膚薄之

緩腠理為之疎津液外洩故自汗也凡病自汗不宜遽止之瘡疹

自汗實為美證乃陰陽氣和榮衛通暢邪氣不留易出而解也又

心主汗諸瘡皆屬於心自汗出者毒氣外洩也雖然熱之甚者亦

為汗解身復清涼此毒散也若汗出不止其熱反劇此邪氣併於

陽而陽虛宜斂汗固表清熱解毒使衛氣充實無痒瘍潰爛之患

如瘡已收較痂皮脫落自汗者此氣虛也宜補陽救陰使氣無洩

瘡中汗出心有熱也其汗上至頭下至頸不過胸者乃六陽虛汗

也不須治之上至頸下至腋者此胃虛也手足皸皸者胃熱也宜

止之如汗出如油髮潤如洗喘不休者此為肺絕之候

如汗大出不止身壯熱者當歸大黃湯主之六十八

如瘡收後汗出不止者十全大補湯主之三十八若更不止調

瘡毒散七十同服外用溫粉撲法六十九

胃虛自汗者調元湯十八不止調敗蒲散七十同服

胃熱手足自汗多者人參白虎湯二十四加黃連主之

○失血

氣為陽血為陰陽主動陰主靜人身之血不可妄動也經曰陽絡

傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血今

瘡疹之火薰灼於裏迫血妄行血亦隨火而動陽絡傷則血從上

焦出或衄血或嘔血陰絡傷則血從下焦出或溺血或便血陰陽

俱傷則血上下出也諸失血惟從鼻出者或有可治之理其餘皆

死證也亦有痘疹灌爛不能收較出血不止者此陽瘡出血亦不

可治

凡瘡疹衄血內熱也玄參地黃湯主之六十五衄止者佳一向

不止者勿治

○煩躁

煩者擾擾而煩躁者憤躁之躁合而言之煩躁皆熱也析而分之

煩陽也熱之輕者躁陰也熱之甚者難知集曰火入於肺煩也火

入於腎躁也瘡疹煩躁須宜忌之若吐利厥逆腹脹喘促而煩躁

者昏不知人謔妄狂擾而煩躁者謂之悶亂皆不治之證

如肺熱而煩者坐卧不安審於何時若初發熱便煩者此毒火

內鬱人參白虎湯二十四加梔子仁主之若瘡發見煩者此

毒伏於內未盡出也消毒飲十六奪命丹十七合而服之若毒出盡又已起發猶煩者此內熱也牛黃清心丸主之三十六

○如腎熱而躁者必曾自利輕則陳氏木香散二十五甚則陳氏異攻散三十六主之

○如揚手擲足欲出衣被者此熱甚於表也羌活湯主之十

○如神識昏迷反覆顛倒者此熱甚於裏也導赤散三十五牛黃清心丸三十六合而治之龍腦膏甚妙

○吐利不食而煩躁者正氣虛也陳氏木香散二十五主之

○如六七日不大便腹滿而煩者此內實有燥屎也輕則用三黃丸八微利之甚則承氣湯三十下之

如晝日煩躁夜則安靜者此陽甚於晝至夜則陽氣退而安靜也人參白虎湯加梔子仁主之二十四

如晝日明了夜則煩躁者此陽陷入於陰夜則陰盛陰陽交爭故煩躁也四物十九加梔子仁主之

○夾疹  
疹一名麻子君火神為也或曰脾為疹經曰少陰所至為瘍疹在人則

心火主之夫心火亢甚則制已所勝焚灼肺金肺主皮毛故疹毒見於皮膚之間如蚊蚤所咬之狀瘡痘只出一般者善若並發毒

並出謂之夾疹其候極惡惟痘本稀疎而夾疹者庶乎可治瘡本稠密與疹並出彼此相混瑣碎莫辨急用辛涼之藥發而解之如

痘疹格致要論 卷三

疹毒漸消瘡本磊落者亦可治也疹痘相併者不少或此危惡之疾孰能料其生乎

瘡出夾疹者荆防敗毒散主之七十一疹毒消者可治如瘡收

靨後復出疹者此餘毒解散之兆不須治之

○夾斑  
活人書云傷寒下之太早熱氣乘虛入胃然斑下之太遲熱留胃

中發斑胃爛亦發斑斑者乃熱毒鬱遏煎於陰血血得熱而不能

浮於肌肉為斑足陽明胃主之痘瘡初出皮肉紅腫片片如錦紋

者此夾斑也以辛涼之藥解之其斑漸退瘡本堅實者吉否則皮

膚斑爛瘡易癢痒所謂皮嫩易破者是也如赤斑成塊其肉浮腫

結硬者又名丹瘤其毒最酷瘡未成就此先潰爛工不可治

瘡出夾斑者荆防敗毒散主之七十一斑退可治

○痘疔  
痘疔者熱毒畜積氣血腐壞而成也狀有數種乃疫毒之氣最為

惡候宜謹察之有肌肉微腫狀如堆粟不分顆粒者此氣滯血凝

毒氣鬱結也有初出紅點漸變黑色其硬如石者此肌肉已敗氣

血中虛不能載毒而出反致陷伏也有中心黑陷四畔突起者此

者此血隨毒走氣不為用也有中心戴漿四畔乾陷焦黑者此氣

附毒出血不為便也有頭戴白漿自破潰爛者此氣血不充皮膚

敗壞也有為水泡溶溶易破者此大濕併行氣虛不能斂聚也有

痘疹格致要論 卷三

三七一

為血泡色紫妨破者此血熱妄行不能自附於氣也有瘡頭針孔  
漿水自出者此衛氣已敗其液外脫也此數證者於五六日間候  
之但見一證即不可治

凡痘疹起發之時但見乾燥其根焦黑者即內服奪命丹十七  
外用四聖散七十二塗之

如原有瘡疥或潰瘡未愈或瘡將較癢嫩者至痘出之時其處

痘本攢聚形色黑潰急以針刺破之吮去毒血外以四聖散七  
二塗之內服加味四聖散六十四調無價散七十三併奪命丹

七十主之

如瘡焦黑渾身皆是者看大便何如若大便秘者內服承氣湯

三十調無價散七十二外用水楊湯浴法七十五大便利者內

服十全大補湯三十八陳氏木香散二十五調無價散七十三

合奪命丹十七外用水楊湯浴法七十五

○痘癩

痘癩者熱毒拂鬱氣血虛弱肌肉敗壞經云熱勝則肉腐者是也

正理論曰脉浮而大為風虛大為氣強風氣相搏必成癩疹身體

為痒痒者名為泄風又為大癩凡氣血充實者外無虛風內無

強邪必無是病惟氣血素虛者不能榮衛於身易感天地肅殺之

氣皮肉之內虛風居之蒸以痘疹癩惡氣擊搏燔灼流散四布

隨空而出所以瘡本稠密身無完膚瘡痒難任肌肉潰爛而痘癩

成矣急用大補氣血清熱解毒之法庶可求全若待敗面癩癩

崩自育肢體殘傷不至殞命亦為瘡人矣

凡瘡破成癩者用十全大補湯三十八苦參丸七十七合而服

○痒癩

訣云虛則痒實則痛此大聖言之痘瘡之痒其候不同有方出而

身痒者初見紅點遍身作痒此邪氣欲出皮膚閉密其火將移往

來故痒也與傷寒太陽經病身痒者同論可發之使皮膚縱緩

理開通邪氣得洩瘡出而痒去所謂火鬱則發之者是已有將收

較而痒者其膿已成其瘡將回邪氣散而正氣復榮衛和暢故

也與癩癩瘡瘡而痒者同論不須服藥但謹護之勿令搔搦以致

腫灌所謂美疾者是已有起壯泡漿而痒者當血已化水水未成

腫之時其毒未化渾身癢痒爬搔不寧此惡候也血傷寒陽明經

病皮中如虫行者同論所謂風外搏和氣內強痒而不止為泄

風者是已此視瘡之乾濕以風藥佐之必令痒去方為佳兆若痒

甚不休瘡壞皮脫其毒復陷謂之痒癩必不能治矣大抵出形而

皮肉紅艷起發而皮嫩多水者其後常致痒癩也

○如初出身痒者可發之桂枝蒼根湯五加制麻黃牛旁子主之

○如起發養漿而痒者通用十全大補湯三十八加防風牛旁子

主之

○如瘡乾而痒者宜養血潤燥以四物湯十九合消風化毒湯  
十二 奪命丹十七 主之外用茵陳重法八十一

○如瘡濕而痒者宜養氣去濕以四君子湯二十合消風化毒湯  
八十二 奪命丹十七 主之外用茵陳重法八十一

○如瘡痒清爛粘衣被席難任者以十全大補湯三十八加防風  
合奪命丹十七 主之外用敗草散八十

○如瘡將收而作痒誤犯破損不肯乾較者用白龍散貼傳九  
○陷伏

伏者毒蓄於裏而不出也陷者毒出而復陷入也此皆惡候伏惟  
一證陷有數種伏候於見形之時其人瘡出熱不少減煩渴悶躁

此有伏毒未得盡出也陷則見形之後其血漸乾而變黑者謂之  
黑陷漿水未成破損痒癢者謂之倒陷膿成復化為水不肯結痂

者謂之倒靨亦陷類也其瘡黑色皆謂之黑陷凡疔疹黑色皆不  
治之以腎為水其色黑乃腎之真臟色也粗工不知交黑歸腎

之理妄謂腎不可實欲瀉腎而使之虛不知人之一身大言陰與  
陽小言心與腎即方家所謂真水真火也瘡疹之火發於中賴此

一點真水以制其亢苟欲瀉之則火無所制本先撥矣豈治之要  
哉然謂歸腎者以腎主骨髓又主閉藏也蓋瘡疹穢毒由骨髓透

於筋肉皮毛之間乃自內而外其毒得洩今既陷伏則自外而復  
入於內藏於骨髓謂之歸腎也又初出形之時春氣發生之令也

形而黑是春行冬令矣起壯之時夏氣長養之令也起瘳而黑  
是夏行冬令矣養氣之時秋氣成實之令也膿乾而黑是秋行冬  
令矣故皆謂之逆結死之時冬氣閉藏之令也此腎之正候若不  
著加膿水浸潤此冬行春夏之令亦謂之逆惟知造化之機可以  
語歸腎之說其色黑者火化也觀物之乾者其色黑出於大者色  
亦黑豈可謂之水乎經曰火發而曠昧知此可以語黑陷矣

○凡瘡伏而不出者雙解散主之四  
○如倒陷者看其六腑何如大小便秘四順清涼飲二十七合奪  
命丹主之十七 泄利氣弱者十全大補湯三十八合奪命丹主  
之十七 並外用胡荽酒七十四 水楊湯七十五

○如將起發瘡亦有水但色黑黯者以十全大補湯三十八 調無  
價散七十三 主之或以快斑湯十五 奪命丹十七 合而服之

○如倒靨者亦視其大便何如大便秘宜利之三黃丸八四順清  
涼飲二十七 泄利者宜補之輕則十全大補湯三十八 甚則陳  
氏木香散二十五 並外用敗草散八十主之

○癰腫

經曰熱勝則腫大抵毒之盛者必腫毒微者不腫凡瘡出盡應斯  
起發頭面以漸浮腫者此毒火發起聚於三陽之分欲作膿血故  
宜皮肉掀腫也該當起發之時頭面不腫者必瘡本磊落毒氣輕  
淺雖爾作膿根不占處所以不腫不須治之如瘡本模糊起發不



此毒伏於內不即發洩不可以毒輕論也如起發腫大皮肉  
如常瘡尖而圓粒上分明者此佳兆也若皮色鮮紅紫黑或帶粘  
聚平塌者若瘡色灰白成餅如錫面者若瘡焦紫無水者皆凶兆  
也有先起發頭面預腫者此蕪疫毒之氣名大頭瘟者是也腮頰  
預腫者此名蝦蟆瘟也須蕪疫氣而治多凶少吉大凡瘡腫者至  
至乾燥結痂之時毒化而腫消矣故應腫不腫應消不消者謹防  
防之

凡瘡腫脹面浮目閉者急盪解毒護目救咽喉相蕪治之內用  
消毒化斑湯八十四外用神應膏六十六護目

凡瘡腫脹切防瘡疔正面之中不可少有破損者苟生瘡破沙  
崩之勢漸不可為邪氣內陷真氣外洩腫消而死矣但得破者  
復灌消者復腫飲食如常大小便自調者變凶為吉用十全大

補湯三十八苦參丸七十七合而治之  
○如瘡色灰白面腫如錫餅者但看其人臟腑何如若能食大便  
調小便長無他苦者多吉若不能食吐利併作或生瘡疔者多

凶  
○如頭面預腫或腮頰預腫者此時行疫毒也並用羌活救苦湯  
主之八十三

○潰爛  
痘瘡所貴者堅實不破裂身成痂也其有潰爛者火勝也經曰熱

勝則肉腐火之為用猛雲陰暴近之則燥痒不寧迫之則焦腐難  
忍灼之則糜爛成瘡故敗物者莫如火也火生於空非虛不然米  
之以風其酸益烈痘瘡潰爛由肌肉素虛邪風侵襲風者善行數  
變行諸脉俞散於榮衛之間一旦毒發於裏風應於表風火相扇  
肌肉憤脹皮膚決裂而瘡壞矣如膿成而潰則毒已化但粘衣漬  
席不能乾較古方以敗草散主之誠良法也膿未成其毒未化  
痒破潰爛者則衛氣暴洩津液不榮警諸草木剝削其皮枯萎而  
死矣經曰根於中者命曰神機神去則機息根於外者命曰氣立  
氣止則化絕此之謂也

○厥逆

逆者四肢逆而不溫也厥者冷也又甚於逆四肢者諸陽之本常  
宜和煖如指頭微寒者陽氣衰也陽氣起於十指之端足心冷者陰氣勝也  
陰脉集於足下如瘡焦黑煩渴頰頰喘促而厥逆者此陽毒內陷  
熱氣逆伏手足為之冷所謂熱深厥亦深火極似水者如瘡本灰  
白泄利而厥逆者此元氣虛陰陽不相順接而手足為之冷也  
瘡疹之候頭常欲涼足常欲溫故頭溫足冷者不治厥逆乃瘡家  
惡證也

如因熱深而厥者大便不通三乙承氣湯主之三十瘡黑者百

祥丸五十二牛李膏主之五十三

如因泄利氣虛而厥者陳氏木香散二十五異攻散二十主之

○但十指頭微寒者四君子湯二十理中湯三十四並加桂主之  
○如瘡始出手足便冷者其人先有吐利四肢者皆稟氣於胃脾  
胃氣弱不得至經理中湯三十四加桂主之

○寒戰咬牙

戰者森然若寒振振然搖動也咬牙者上下片牙相磨而鳴也經  
曰諸風振掉皆屬肝木寒戰而振振搖動風之象也火氣冲物亦  
然錢氏曰肝主風虛則咬牙多欠又曰上竅咬牙心熱也然則寒  
戰咬牙心肝二臟主之或以寒戰為氣虛咬牙為血虛或以咬牙  
為齒稿謂津液不足者皆不知此意痘疹所惡者寒戰咬牙或單  
見一證或二證並見若瘡已壞加之喘促悶亂者死無日矣

○如瘡初出而寒戰者此邪氣將出外與正爭故振振搖動火之  
象也瘡出乃定柴胡桂枝湯主之八十五

○如瘡本稠密掀發腫痛經脈動搖時時振動者不可謂之寒戰  
待膿成痛去而解

○有筋惕肉瞤者經絡之血為瘡所耗不能榮養肌肉主持筋脉  
故惕惕然而手足自跳瞤瞤然而膚肉自動也不可謂之寒戰  
但養其氣血十全大補湯三十八主之

咬牙呵欠者肝虛也肝屬木臨官於寅寅為相火火盜木之氣  
故肝虛之謔形為陽引而上陰引而下則開而欠也陽上極而  
下陰下極而上則合而嚙也十全大補湯主之三十八

上竅咬牙者心熱也諸瘡皆屬心火上竅者火炎上之象也  
牙者火氣動搖之象也導赤散三十加酒炒黃連牛勞子主之  
○如寒戰咬牙併作者則少陰專主之觀其瘡本

○如瘡本潰爛寒戰咬牙者此手少陰心火也經曰熱勝則肉腐  
寒戰咬牙火氣動搖之象也

○如瘡本焦黑寒戰咬牙者此足少陰腎水也腎色黑為主證封  
藏之本乾黑者真臟色見也腎氣寒在變動為慄寒戰者腎水  
病也腎主骨牙者骨之餘寒戰則鼓頰而兩牙相軋咬牙者腎  
寒所發也此二證者在心熱則清之在腎寒則溫之其病已壞  
治之何益

○甚啞失聲  
痘疹要語聲清則有聲失音者凶兆也先哲有言曰瘡已出  
而聲不交者形病也瘡未出而聲交者氣病也瘡出而聲不出者  
形氣俱病也其候有三須要識得

○有心刑肺而失音者肺屬金主聲中有二十四空凡發諸語言  
者皆其空中之氣鼓動也五行金空則鳴實則啞瘡疹之火起  
於心上薰於肺肺氣脹鬱故竅塞而無聲也以導赤散五十五  
合其桔湯七加炒牛勞子主之或其桔湯加炒牛勞子天花粉  
蘇葉主之

有心虛而語聲低小不出者叔和心臟歌云聲言萎氣清益心

主血疽瘡稠密其瘡都要貫串得到血為虧損故也血去舍空故聲不揚以導赤散加人參麥門冬石菖蒲王之

○有毒歸腎而失聲者經曰足之少陰上繫於舌絡於橫骨終於會厭會厭者音聲之戶也舌者音聲之機也橫骨者神氣所使主發舌者也瘡出而伏則毒入腎邪氣上客於厭則厭不能發發不能出開闔不利故符啞也

○有喉舌潰爛而失聲者咽喉者所以司呼吸納飲食發音聲循管帶也毒火上薰咽喉先受責門會厭舌腭之位皆瘡所聚初出之時失於調治以致咽喉腫塞管帶窄狹舌本強硬呼吸不能飲食不入音聲不出矣此上二證治之則難

○谷水吐食

難經云會厭為吸門胃為責門病痘之人毒火上薰於肺灼於胃肺與胃之上口皆有瘡而傷美水入則瘡者責門傷則水不得入溢入會厭會厭掩而不內故氣逆噴出而瘡也食入則吐者責門傷則門戶隘塞食物不能直奔於胃緩則汨汨而下急則阻而吐出矣此其惡候鮮有生者其或舌上有瘡爛破如蜂窠之狀舌痛強硬不能為用延納水穀亦使水入則瘡食入則吐待舌瘡平則安矣

瘡疹格致要論卷之四

○驗頭面

論曰輕者頭面稀少又胡荽酒法不欲噴頭面以諸陽之會在於頭心之華在於面痘為陽毒而心主之故痘瘡頭面稠密者重頭面預腫者凶頭面瘡破爛腥臭者凶欲占瘡之輕重吉凶莫如頭面也

人之一身內則心為君主外則頭為元首病有真心痛其頭痛以見不可輕犯也經曰精明之府頭傾視深精神棄矣故占人之生死者亦莫如頭凡瘡初出從他處先見漸登於頭起發收斂皆然他處皆有瘡而頭獨稀此佳兆也若於頭額之間先出先

戴粟先乾收先砂損其瘡稠密無縫肉下浮腫皮上濺起粗屑者皆凶惟瘡遍身俱收而頭上不收或熱自破或膿出結如堆積者不須惟蓋天地之化孤陽不生孤陰不長陽變陰合彼此相成頭者諸陽之會無陰相濟所以難收也又病閉目搥頭者死此陽脈不治謂心絕也

經曰十二經脈三百六十五絡其氣皆上走於面而走空竅又肝開竅於目肺開竅於鼻脾開竅於口心腎開竅於耳又修直家云面有七竅內應乎心又相附但觀人之面以知禍福可見面不可敗也凡瘡稠密七竅閉塞敗面者凶以臟腑經絡之氣皆病也又諸陽皆聚於面痘為陽毒初出之時必先於面然面有

部位其候不同額屬心離火之位火性急烈不可輕犯凡瘡出  
現泡漿乾收先從額上起者凶左頰屬肝震木之位右頰屬肺  
兌金之位二處不論先後但瘡欲磊落堅厚若模糊成塊浮嫩  
易破潰爛灌腫者凶蓋肝藏魂肺藏魄也肺俱敗魂魄以離故  
凡病兩腮冷或木硬者死頰屬腎坎水之位此處先出先壯先  
瘡者吉蓋瘡疹出於腎則吉入於腎則凶也鼻屬脾坤土之位  
亦不論先後但不欲模糊早乾收也若不成葉鼻頭先乾黃色  
凶此脾土將敗真臟色見

人中為陰陽之分故南村輟耕錄以泰卦象之人中而上分為三  
部人中而下亦分為三部髮際之上陽之上也兩眉之間陽之  
中也山根以下陽之下也自口至兩乳間陰之上也自心窩骨  
至陰毛際陰之中也自陰而下陰之下也凡瘡之出現起發收  
斂自有入中而分上下循序陰陽和暢雖多且密亦可言吉若或  
舛差雖是稀少亦可言凶此有伏也

發熱之時面色明瑩者吉面赤者重此邪氣拂鬱於陽明  
胃與大腸也陽明之經上循於面故面赤也宜以清涼解毒之  
藥少通利之面垢慘黯者凶瘡疹之火發自少陽面垢者少陽  
候見也針經云少陽病甚則面微塵宜表裏雙解蓋少陽從中  
治也

○驗耳目鼻

總曰腎通竅於耳耳者腎之外候也腎之為臟水臟也美也  
受氣之初先生兩腎而一陰歲焉又有相火存乎命門之中  
疹發熱耳獨涼者瘡疹為火腎不受邪存水之主以制陽元也  
如耳反熱則水不勝火將有歸腎之變痘疹之候先觀耳後有  
紅縷者蓋少陽三焦之脈從膈中上出缺盆繫耳後直上出  
耳角紅者火色也此瘡疹之火發自少陽自見於其經也凡瘡  
自耳先出未及成葉耳輪先壓者漸明歸腎之勢矣

目者心之使也神所寓焉發熱之初觀其兩目神倦不欲開者痘  
也目中汪汪若水者疹也諸瘡皆發於心故候見於目也目赤  
者熱也心惡熱急解之經曰肝通竅於目瘡疹發熱目連翳  
者肝有風也風入於目上下左右如風吹不輕不重兒不能  
故目連翳也且目視者肝有熱也熱入於目牽其筋脉兩目俱  
緊不能轉睛故目直也得心熱則指者風火相搏也痘疹發熱  
此其常候但瀉心肝之火指止則吉指不止則凶針經曰五臟  
六腑之氣皆上注於目而為之精七之竅為眼骨之精為瞳子  
筋之精為黑睛血之精為絡氣之精為白睛肉之精為鉤末  
翳障瘡之毒發於五臟六腑毒之甚者眼必受之古人留護眼  
之法其意深矣凡瘡出太甚兩眼常出淚者肝熱也此時眼中  
無瘡但內服瀉肝火之藥蓋眼中之痘當在收靨不齊之後  
之如瘡入目成層翳者切不可用點藥損睛破瞳成廢

瘡收後目不可開者肝熱則目眩不敢開明皆然心熱見明則合暗處則開謂之羞明此有餘熱在心肝也如瘡未成膿腫去日開者瘡已過期收斂不齊目閉不開者瘡壞欲變目上睛者心絕也直視不轉者腎絕也非泣而淚自出者肝絕也微瞋者氣脫也血貫瞳子者火勝水竭皆死候也

經曰肺通竅於鼻瘡疹發熱之初噴嚏者火邪上干於肺外應於鼻而痒則嚏鼻乾黑燥者火刑於金金體本燥得火又甚急宜清金瀉火以解其毒鼻衄者血得熱而妄行故衄出於鼻急與涼血瀉火以解其毒鼻流清涕者疹也疹發於心心肺相連以火煉金熱極而反化為水也瘡出之後鼻塞不通者熱也火主

瘡疹發熱論

四卷

六

膜脹瘡已成漿收斂之時鼻塞不得息者此鼻內有瘡膿涕粘結可用金銀小卷子以通之如瘡未成漿鼻端先乾者凶經曰臆直高於肺以行榮衛陰陽也和火刑肺肺敗不能輸精於皮毛故皮毛焦枯先見於鼻榮衛不行陰陽不續以漸變身皆乾枯而死矣凡瘡變壞鼻中血出者涕自流出者鼻孔開張喘急者肺絕之候皆死證也

○驗唇口牙齒

脾之竅通於口其華在唇四白脉訣云應唇通口氣瘡疹發熱之初口中和唇色紅潤者吉如口燥唇裂其毒必甚急解之亦難稠密唇口瘡子相粘諸瘡未發此瘡先已就家諸瘡未收此瘡

先已焦黑者凶面瘡腫灌唇上瘡裂成塊乾澀者重如瘡出大密口中臭氣者臟腑敗壞故息出於口也瘡散變壞唇上縮者脾絕也唇下自呷者魚口也口中涎如膠粘者脾津竭也皆不可治瘡家唇口生瘡聲啞者狐或證也不急治之殺人

上片牙隸於坤土乃足陽明胃脉之貫絡也下片牙隸於乾金乃手陽明大腸脉之貫絡也瘡疹發熱之初口開前板齒燥者裏熱也宜以清涼之劑微解之咬牙者牙乃骨之餘腎主骨寒戰咬牙毒歸於腎必死如發熱咬牙者有欠則為肝熱有上窠則為心熱此欲作搖也瘡已收斂牙齦潰爛者此內瘡未得平復也勿作走馬疳瘡治之瘡後牙齦潰爛血出肉黑氣臭者此方是走馬疳也

瘡疹發熱論

四卷

五

○驗喉舌

咽者胃之系主內而不出所以司飲食也喉者肺之系主出而不內所以司呼吸也人之因喉乃緊要靈鑰門戶也經曰一陰一陽結謂之喉痺一陰者手少陰君火心主之脉氣也一陽者手少陽相火三焦之脉氣也二脉並絡於喉瘡疹之毒君相二火主之其火上蒸咽喉最為先受故發熱與出形之初必問其咽喉痛與不痛先與發散解利之令毒得出不留連於咽喉也若不知此義以解利於先則咽喉腫塞飲食不入呼吸不能死在旦夕矣如瘡出太甚審察咽喉若內無瘡又不痛者此毒已

盡出不須慮之如內多瘡又加痛苦者切方收勝之時必死  
食失聲之變如病益甚喉中氣響汨汨如水聲者死

舌者心之候脉訣曰外應舌將榮又脾之脉絡於舌舌之在人延  
納飲食主持聲音其用亦大矣瘡疹發熱其舌紅潤者吉舌燥  
如芒刺者裏熱甚也急解之針經曰熱病口乾舌黑者死吐舌  
者脾有熱也脾臟微熱則舌絡微緊時時舒舌勿用冷藥及下  
之或飲水者腎疑為熱而下之誤也飲水者脾胃津液少故  
耳瘡出之後舌上稠密出如堆粟破如蜂巢者危更加飲水則  
瘡食物則噦聲啞不出者必死之証瘡出太甚美舌者凶

○驗頭項

經曰東風生於春病在肝俞在頸項項者生氣之本也又曰天  
氣通於肝地氣通於嗑天食人以五氣喉者氣之所由也故喉  
主天氣地食人以五味咽者味之所由也故咽主地氣項者  
咽喉之管束也又三陽之脉自頸而上三陰之脉自頸而還  
項者陰陽之道路也痘瘡之候頸項欲疎若纏項而出則  
甚者謂之鎖項廢其管束阻其道路上不得降下不得升內者  
不出外者不入經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立絕  
此死之徵也凡病深項軟者死骨收也

○驗腦腹

經曰凡刺胸腹者必避五臟胸腹者臟腑之郭也又曰背脊之上

中有父母益言心肺也故痘瘡輕者腦前無腦腹出太甚者必  
重也其中於臟各有期日凡病深喘急腦骨動者肺焦脈也  
左乳下動脈空出者宗脉絕也皆不可治瘡疹腹脹者毒未盡  
也更宜詳審

○驗手足

四肢者諸陽之本瘡出欲疎其發欲透其醫欲齊如應出不出應  
發不發應收不收此脾胃氣虛不能旁達四肢也發熱手尋衣  
領亂於物者肝熱也手拍眉目鼻口者肺熱也手足搖擗者心  
肝風火相搏也各隨其臟而瀉之足涼者此常候也瘡疹腎不  
受邪腎主足故足宜涼手足冷者脾臟怯也四肢皆稟氣於胃  
而不得至經必因於脾乃得稟也脾怯不能為胃行其津液故  
冷耳宜溫之瘡已出現手足多水泡者此肝勝脾衰為鬼賊宜  
急治之不久便生痒癩也如遍身皆發手足不透是空殼者此  
脾胃虛弱津液耗竭榮衛凝泣故其毒亦鬱而不發也不能食  
者死能食者必發難疽瘡勢太甚手足冷者不治瘡未成癩手  
足皮脫者必死瘡已正壓惟足不收者足為純陰無陽相濟所  
以收遲王函經曰孤陽寡陰即不中譬取鰥夫及寡婦如瘡始  
成兼他處未收手足心先壓者其後必生疔疾也瘡壓之後手  
足關節腫痛者必發難也瘡痒手足搔亂者凶

○驗寢卧

夫陰者書則行陽夜則行陰行陽則寤行陰則寐人之常也  
疹發熱便昏睡者心主熱脾主困心受氣於脾故發熱昏睡此  
常候也起卧不時者內有熱也必多隨伏之變合面卧者裏熱  
也大抵瘡疹始終安寢者吉蓋氣血強盛榮衛流行邪氣出於  
表而不在裏則神安神安則志定是以得安寢也若氣血衰弱  
榮衛滯澁邪在於裏而熱心惡熱則神不安神不安則志不寧  
是以煩躁悶亂譫妄而不得眠也亦有毒伏於中神喪氣脫偃  
卧如尸呼之不應飲食不知者不可以嗜卧論乃死證也

○驗飲食

經曰人以水穀為本故人絕水穀則死仲景曰水入於經其血乃  
成穀入於胃脈道乃行可見水穀之悍氣為衛精氣為榮水去  
則榮散穀消則衛亡矣凡痘疹能食者雖重亦吉不能食者雖  
輕亦危也然有不能食而生能食而死者何也蓋不能飲食者  
臟腑內實大便不行有平日之穀氣以為之主瘡成之後自消  
穀氣而思食矣其能飲食者邪氣殺穀即和所謂口乾饑飲  
水多食亦肌虛者也將不久而變生焉惟疹家多不能食以口  
中不和不思食也

痘疹格致要論卷之五

○治痘要略

嘗讀漢史高祖踞洗以待英布而輟洗進鄴其武帝登廁以召衛  
青而不冠不見汲黯蓋於甲冑之士狎嫚以折其猛悍之氣於縉  
紳之士謙恭以厉其清介之操甚有似於醫之治病也故毒藥攻  
邪武夫之狎嫚也昌陽引年文士之謙恭也抑其過裨其不及約  
之於中而已矣夫治痘者必先視其人之勇怯次審其邪之盛衰  
又參以時之寒燠逐日淺深臨時消息而施方治無不效也黃帝  
興四方之問岐伯奉四治之能厥旨淵矣經曰形不足者溫之以  
氣精不足者補之以味此因人之勇怯而施方治者也蓋形者氣  
之充也形不足者氣必虛氣為陽而以之補氣如參耆之屬是已  
精者血之化也精不足者血必弱味為陰而以之補血如歸芎之  
屬是已經曰其在皮者汗而發之其實者散而瀉之此因邪之盛  
衰而施方治者也蓋邪在表則留連肌肉壅塞經絡以輕劑發之  
輕可去實麻黃芎根之屬是已邪在裏則三焦凝滯五內鬱遏  
洩劑瀉之洩可去閉如大黃牽牛之屬是已經曰春夏養陽秋  
養陰此因時之寒燠而施方治者也蓋春夏乃歲半之前天氣  
之治在心肺心肺為陽故宜心肺之藥為多如芩連荊防之屬是  
已秋冬乃歲半之後地氣主之治在腎肝腎肝為陰故宜腎肝之  
藥為多如丁桂姜附之屬是已此亦論其凡例耳故用寒涼

熱遠熱者語其常也發表不遠熱攻裏不遠寒者語其變也治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之虛則補之實則瀉之折其鬱氣滋其化原以平為期治之要也世俗治痘者偏執首尾不可汗下之說喜補而畏攻取溫而合涼不知形之盛衰邪之表裏時之寒燠而妄施治習以成俗莫之救正也久矣經曰諸痛痒瘡皆屬心火又曰少陽所至為湯疹則痘為火毒昭昭矣苟皮膚閉密應出不出非用汗劑以微發之則瘡子何以得出耶火鬱則發之是汗劑亦可用也毒伏於裏焚灼腸胃六腑閉結大小便不通非用洩劑以微利之則毒氣何以得解耶是下劑亦可用也夫何權貴之家拘忌汗下之說任已而不任人無異於教玉人雕琢玉者庸醫之流恐其逆人之意而不已用不若順人之心而可獲利亦任人而不任已無異於僕廝以听人之役使者幸遭輕疾乃貪天功以為已有病或不救委之於數良可恫哉夫調瑟者必移其柱圍棋者務求其生攻補之法合宜而用繩墨不拘權衡自執則桂附硝黃何妨於合飲參苓遂無嫌於並進所以能致中和育萬物參三才也其功豈小小哉

○攻補利害

經曰毒藥攻邪謂之攻者發汗吐下三法也又曰虛則補之實則瀉之謂之虛者正氣虛也謂之實者邪氣實也瀉即攻之謂也瘡痘輕疎更無他苦不須服藥攻補皆勿用也設若邪氣方盛正氣

未衰不知攻邪為急而反補之貽禍非淺誠以攻補利害言之如發熱之時煩燥驚妄目赤唇焦大便秘小便不利不以輕劑發其表涼劑攻其裏而反用參朮之類以補之則增悶亂昏情毒伏於內而不出矣如瘡出太甚掀腫紅艷煩渴不止大小便秘結不以涼劑解其表寒劑攻其裏而反補之則增潰爛癰腫目病之變凡若此者醫害之耳世俗補者喜用四君子湯不知白木燥津液枯參漆津液瘡子乾燥寧不為害耶惟內吐瀉瘡色灰白者則補為利而攻則有害內實能食瘡色紫赤者則攻為利而補之害不小矣譬諸暴寇侵我却鄙擾我人民掠我府庫則必驅而逐之雖至殘害其民亦不為震寇退之後吊死問孤撫綏其民未為晚也痘疹之毒猶暴寇也人之元氣猶民也攻即驅逐之也補即撫綏之也治痘疹之法必欲發表攻裏使之盡出然後補而調之如元氣素弱者當未出之先補之可也俟其出而補之如寇之來而修城池何濟於事耶今之世不知攻補之理喜補其虛畏攻其實聞其用補藥則曰此王道也多飲之而不知戒聞其用攻藥則曰此霸道也寧遂巡就死而不敢飲吁知攻之害而不知補之害知補之利而不知攻之利俗之不美抑如是哉故為工者虛實在人攻補在已應變而施合於權衡斯得矣

○巫醫得失

醫為人藥所以寄死生也巫為人祝所以交鬼神也禮曰庖人雖



不治庖尸祝不越尊俎而代之言所職不同也今之治疔者迷信巫而不信醫猶以庖人代尸祝之事豈不嘖嘖也哉曾有龍樹王禁咒科為人治諸疾者彼乃移精變氣之術以我正氣攻彼邪氣非若今之所謂禱也又如葛仙翁許真君嘗以符水救人疾者彼乃全精御氣謂之天人者能奪造化於呼吸之間亦非若今之所謂巫也今之為巫者秘篆靈文不曉其義曾有如龍樹三許旌陽之術者乎今之禱者不過殺牲以通告於淫祀之神曾有自陳過失昭然惕悟者乎噫作善降之百祥作不善降之百殃福而可祈則富者可以徵福貧者不得以蒙其福利矣况痘疹之毒稟於父母有生之物藏於五臟百骸之內必飲之以湯液攻之以藥石然後能驅而出之使之鮮化豈尋常符水所能治耶符水且不可治徒以牲殺益見其謬也或曰周禮季冬大雉旁磔季春九門磔穢皆用牲殺以驅疫癘然則彼皆非欤曰季冬之月日經匿危穢穢四司之氣能為疫癘以害乎民故大雉旁磔以穢除之季春曰從冒歷昂有大陵積尸之氣厲鬼隨之而行九門磔穢以畢春氣此君相之事所以燮調陰陽參贊化育為生民立命也又豈若今之所為矯誣上帝藝竇神明者耶經曰拘於鬼神者不可與言至德惡於針石者不可與言至巧其斯之謂歟

○雜證宜攻  
或謂病痘之人臟腑動搖血氣虧損如有雜證戒其峻治殊不知

痘之為病貴於榮衛流通血氣充養也調護保愛常恐有雜證以介乎其間人之氣血只有許多苟添一證則虧一分虧一分則於痘上增一分病矣謂之雜證者不過內外傷而已故天地之氣感則害人皮毛謂之外傷外傷則表病表病則或出不快或發不透或醫不齊是因外傷而貽患於瘡也須從外傷之證攻之但發散中無救表解毒之法水殺之氣感則害人腸胃謂之內傷內傷則裏病則或吐或利或腹痛或喘滿以致為伏為陷是因內傷而貽患於瘡也須從內傷之證攻之但消導中無補中托裏之法亦有不因內外傷而生異證者此則毒之所為專從痘證論之亦須急治勿使毒氣滋蔓以成大矣也

○壞病不治

痘之法常須識證苟有雜病迎而奪之勿使滋蔓致成壞病也病至於壞治之無及如發熱吐利併作者此毒火內攻令其上下得出也勿驟止之瘡出而吐利不止宜急止之恐其內虛毒伏而不出也自此以後吐利不止者壞病也發熱驚妄者內熱也急止之瘡出之後反加諸妄者壞病也發熱腹痛者毒也急攻之攻之不止其瘡乍見乍隱者壞病也瘡出模糊者急攻之顆粒不成但加虛腫者壞病也瘡出皮紅者急解之紅艷不退瘡皮嫩薄者壞病也瘡出焦黑者毒深也急攻之紅潤不回反見乾沒者壞病也瘡出帶水者肝病也急解之若生瘰癧壞病也瘡痒破損急治之

破者不灌空中無痘壞病也瘡敗成癰急救之加皮不結深潰出  
血者壞病也頭面頂腫疫毒也急解之其腫忽消者壞病也又如  
喘急而悶亂不寧者肺絕也直視搖頭心絕也泄利水穀不化脾  
絕也手足搐搦肝絕也溲便遺失腎絕也寒戰咬牙手足厥冷咽  
啞失聲皆壞病也

○飲食所禁

經曰飲食自倍腸胃乃傷言平人也病痘之人腸胃先困飲食可  
不謹歟故五味之入各有所宜各有所禁如芳草之氣美酒氣盛  
而慄悍肥者令人內熱甘者令人中滿魚者使人熱中食毒百毒  
者其毒必發乘氣伏氣者其氣則靈以至偏熱偏寒動風動火三  
虛格致要論 五卷 六  
切辛酸多燥油膩之物不知噤口若貪食之則腸胃僅存中和之  
氣不但為之傷而乖戾之渣滓又能助毒為虐夫所可食者糜粥  
淡菜開以饋猪精肉飼之使腸胃常實血氣常充以助痘之成就  
仍無太飽無太飢熱無灼灼寒無滄滄以傷脾胃也吾見痘中喜  
飲酒者多目疾喜食甘者多齒疾喜酸鹹者多喘欬之疾貽禍  
身詩曰爽口物多終致疾邵子豈欺我哉

○異氣所害

夫痘者天行正病也所居欲靜所御欲索但見真候即當洒掃房  
室修飾帷帳避風寒遠人物調護保養以待收成若犯異氣之感  
條忽變化留連及覆未免為壞病也故保痘之法毋太寒寒則必

疑滯而氣滯母太熱熱則血淖澤而氣淫母熱諸香香氣實而  
火母動諸穢穢氣臭而敗元母令男女往來恐帶淫穢狐馬之氣  
母掃地母掘溝恐動塵草蕪濁之氣母使犬豕得入母使喪者  
近如遇天地卒有風霾雷雨之交宜謹護之母使乖戾之氣乘  
而入也如有病痘死者宜遠避之母使厲氣得相傳染也所居之  
室常要明亮毋得太暗使幽陰之氣勝也西山記曰近穢氣而觸  
真氣親諸幼孩氣血未定有客忤之證破傷癰疽少犯風寒穢  
之氣即增變異况痘家乎

○起發不處

痘疹所害者起發成癰斯無留毒也瘡出疎者亦易起發若稠  
密則難起發矣然應起發而不起發者氣虛也應作膿而不作膿  
者血虛也曾起發作膿一向空虛者謂之伏將欲起發作膿而  
忽平塌者謂之隔遍身起發手足獨遲者脾胃不足也起發將半  
不能充頂者元氣素弱也此皆留毒於內日後必有餘毒也惟皆  
瘡平塌不須責之

○收靨不齊

痘瘡膿成之後應結痂而不結痂者氣虛也蓋氣主外虛則不能  
約束皮毛收斂津液也或因內實便秘不能成痂者或因內虛便  
洩不能成痂者或因飲水太多濕傷脾胃不能成痂者或因蓋覆  
不謹冲冒寒熱不能成痂者或因掃地及復灌爛不能成痂者

候各不同也惟頭足收緊過後此帶證也蓋天地之化生於陽也成於陰生於陰者成於陽頭為諸陽之會自額以上陽之陽也陰氣不達諸陰皆集於足自膝而下陰之陰也陽氣不盈所以收遲如遍身收緊不齊不能成痂者此倒置也日後必有餘毒手足不能成痂彼此串連成泡此膿已化毒已解外泡未破內膚已生用針破之無妨也間有不能收較反增潰爛膿水不乾者此疔蝕瘡也久而不愈必成陷癰爛見筋骨而死如正面潰爛膿血痂皮結成一片焦裂濺起者能食則吉不能食則凶

○差後餘證

痘疹已壓其痂不脫此脾胃弱也其人少食血氣不充不能填補肌肉滋益皮毛令痂得脫也如痂已落發熱作渴者陰陽俱虛也蓋陽虛則外熱陰虛則內熱由瘡出太甚氣耗血虧津液枯涸故熱而渴也微熱不可妄治甚者以補藥求痊亦不可妄用涼藥也痘疹差後臟腑未實血氣未平瘡癢未老肌肉尚嫩腠理尚疎風寒易感若出風太早或因涼洗則風寒乘虛而入為寒熱為喘為咳為腫於補藥中微發之可也如內傷飲食腸胃新虛不勝水藥救氣留滯或因內傷或勞悶或煩躁或吐或利或腹中痛於補藥中消導之可也戒勿因循釀成壞病此大虛之後不任病者也

○痘後餘毒

凡瘡不分疎密但要其出必盡而無留伏其發以漸而透其收以

期而爭若出不能盡發不能透收不能齊未免有餘毒也出之盡者作三四次出大小不一等至成漿收緊之時於瘡空中猶出未已若只始出一層後無補空之痘此有伏也發之透者謹於手足候之充拓飽滿可以謂之透蓋手足位遠若只平塌不能成膿此毒雖出不能旁達四肢必復陷而入也收之齊者自面而下痂皮緊淨中無潰爛可以謂之齊若收太急或不成痂此必有陷收之急者火逼之也凡若此者皆有餘毒須看部位分經絡別臟腑補之利之解之以平為期治之不已此壞病也不須再攻

如毒留於肝則為目病或目腫痛或翳障或羞明癢澁難開

如毒留於心則為驚搐癩癩為斑瘡為諸血症

如毒留於脾則為癰腫出於手足節之間

如毒留於肺則為喘為咳

如毒留於腎則為敗瘡而死為骨病

如毒留於腸胃則為利膿血

要論五卷

痘疹格致要論卷之六

○痘疹證似傷辨

傷寒之邪自表入裏也前三日在表可汗而散後三日在裏可下而解疹之邪自裏達表也本與傷寒不同先賢謂其相似者蓋恐人審候不明誤作傷寒失於汗下也不特傷寒相似內傷發熱亦相似凡外感之熱熱在表也內傷之熱熱在裏也疹毒裏俱熱也外感則汗之得汗熱自平矣內傷則下之物去熱亦去矣疹則不可妄汗下雖汗下熱不少減然三者發熱雖同證亦自別外感發熱面赤惡風寒頭疼身重腰重呵欠煩悶昏睡嘔噦喘咳驚悸內傷發熱面黃紅惡飲食腹痛昏睡煩躁則手足熱吐利則手足冷疹發熱腮赤昏睡呵欠嘔噦欬吐瀉身重腰痠煩悶煩躁驚妄耳涼骹涼手足時冷熱乍進乍退也如值疹疹大行之時不問外感內傷但發熱不退皆作疹疹也惟挾外感者兼發散而治挾內傷者兼消導而治無內外因者只從疹疹治也

○痘疹首尾不可汗下辨

今之治痘者曰首尾不可汗下聽者和之曰痘宜溫補汗下不可也此亦喜補惡攻之遺弊殊不知治痘之法莫要於解毒或攻或補務使毒氣得解而已如其氣血和暢榮衛流通表裏無邪其出則盡其發則透其收則時非但不可汗下雖溫補亦不可用也若使外感風寒約束皮膚閉塞膿瘡出不快此當汗之令陰陽

榮衛通而瘡易出毒得解者十日之內則毒無從得出留伏於內未免閉門留寇之禍矣如大熱不退煩渴轉增譫妄昏沉便溺阻寒此毒蓄於腸胃之間與熱氣併宜急下之使臟腑疎通陳莖滌去可也苟不下之則毒留而毒更甚於中寧無養虎遺患之悔乎故大要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疎其血氣令其條達而致和平此之謂也

○痘疹不可以日期論辨

或曰痘發於前七日自現紅點至泡漿也結於後七日自泡漿至結痂也前後以十四日為限此其大略耳蓋人稟賦有厚薄之殊毒氣有淺深之別時有寒燥治有工拙也如壯實之人瘡本稀疎能飲食常和煖守禁忌固有八九日而愈者不待十四日也虛弱之人瘡本稠密飲食俱廢氣候乖常調理失度起發不透收靨不齊或延至一月而愈者又不止十四日也治痘之工不可拘於日數苟拘日數則出現未定而先戴髮者有之不可謂其成膿也起發未透而先乾陷者有之不可謂其結靨也有收太亟而凶者有收遲而吉者有綿延日久而斃者是豈日數可限耶或者取傷寒傳經之日數謂十二日已過其邪傳盡自愈不知傷寒之邪或在表汗而已者或在裏下而已者或過經復傳而不解者亦未可以日期限也痘瘡之邪初出一點血血化成水水化成膿膿成毒毒

○痘疹格致要論

而收矣何必拘以日數也然欲知其易發易斃者莫如以瘡為

如形紫焉落色潤紅活尖圓厚實者自然易發易愈也如稠密  
連平塌灰白嫩薄淫濕者難發難愈更有餘毒也經曰知其要者  
一言而終不知其要流散無窮故醫莫貴於知要也

○大人小兒富貴貧賤不同辨

瘡疹之證自王公以至庶民莫之能免者天下之人莫有不本於  
父母均是人則均是毒矣有輕有重有疎有密何也蓋失精血者  
治合異乎嬰孩飢膏染者瘳莫同於藜藿且如小兒變蒸米週之  
時臟腑高脆氣血尚少其疔多胎毒也至於能食則有傷食之  
證矣大人天癸方動之時慾火未淫天真未耗其疾則多內傷也  
至於相感則有陰虛之證矣飯藜藿者負饑渴勞役之傷飲食  
者挾痰火積鬱之病一旦有瘳疹之證當相無而治之也故治嬰  
孩則急於解毒常恐其不勝而大人則蕪氣血之虛以治夫治貧  
賤則急於解毒常恐其難出而富貴則蕪表裏之虛以治夫虛  
補之實則瀉之不虛不實守以待之此治痘之要也

○升麻葛根湯辨

或因痘瘡一見紅點便忌葛根湯恐發得表虛也人皆信之愚獨  
謂其不然按本草升麻解毒又升陽於至陰之下以助發生之  
氣痘乃疫毒得此解之令其升發決無下陷歸腎之證矣葛根  
解熱毒疎通榮衛之氣使瘳易起發無伏無陷為藥養陰陽勝則  
陰虛痘本陽毒真陰受傷非此不可其草能解諸毒瀉邪火尤不

可缺是皆症家切要之藥宜常用之豈有發得表虛之理遂  
弗用也耶但謂一見紅點忌落輕疎者為老少不須再服有痘  
密其毒太甚安可棄之不用歟

○瘳疹順逆辨

古者著書有泛語其弊者有直道其實者以意逆志不以詞害意  
可也錢氏小方脉之祖醫中之聖無出其右者宜若所著之論更  
無可議矣然亦有未可盡信者或泛語其弊或後人補之者也如  
云先發膿後發疹子者順脾肺相生也先疹子後斑子者順心  
脾相生也先發水泡後發疹子者逆肝脾也先發膿泡後發斑  
子者逆心脾也先發膿泡後發水泡多者順少者逆肝多肺少  
木乘金衰也先水泡後斑子多者逆少者順子衰母旺則順火乘  
木衰則逆也此皆泛語其弊耳其曰凡瘳疹只出一般者善此則  
直道其實者也夫四毒之發各有其時膿泡最酷疹次之水泡又  
次之斑為輕分作四番其毒則微一併夾出其毒則甚矣如云春  
夏為順秋冬為逆春膿泡金克木也夏黑陷水剋火也秋斑子火  
剋金也冬疹子土剋水也此亦泛語其弊耳其曰黑者無問何時  
十難救其一二此則直道其實者也蓋四者之毒常乘天地不正  
之令而發乃疫癘之氣傳染相似時亦不得主之也又云久月  
旺又感寒病多歸腎變黑此則後人因秋冬為逆而杜撰以補  
者也錢氏謂春夏為順秋冬為逆者益以瘳疹屬陽春夏為陽

冬為陰從其氣則順遠其氣則逆不過欲人常和煖而從春夏之  
化未常拘定其證必其時為順也即如冬月變黑之說則凡冬月  
出瘡疹者不分輕重皆變黑而死天地之氣必不如是之隘錢氏  
之意亦不如是之拘也但曰冬感寒腠理閉塞氣血凝滯非和煖  
瘡難成就可也何必以夏黑歸腎而主於冬乎彼夏感熱腠理開  
張氣血淖澤亦有夏黑歸腎而死何不云夏有黑陷乎設云夏火  
旺腎不主事則夏黑陷為逆之言又何自而取乎况黑陷為逆四  
時皆然亦不独在於夏也吾固知非錢氏之言孟子曰盡信書不  
如無書信哉

○瘡疹交黑歸腎辨

水火者陰陽之迹也坎離者水火之位也心腎者坎離之配也故  
水陰也而生於陽離中之陰乃真水也火陽也而生於陰坎中之  
陽乃真火也陰根於陽陽根於陰互為其根此所以能交合而生  
萬物也孔子贊易以坎為血卦為赤離為蟹為螺為蚌為龜  
其義可見以人身言之血陰也氣陽也心配離而生血陽中有陰  
乃真陰也腎配坎而生氣陰中有陽乃真陽也故心中之血即腎  
中之真水也灌溉滋濡水之德也腎中之氣即心中之真火也响  
噓鼓動火之象也然水善而火惡老子曰上善若水水善利萬物  
而居下惡如火善  
思之分也况人之兩腎左為水右為火經曰七節之旁中有小心  
小心者命門相火也以其為君之相故云小心行君之令故云

門也夫以一水立乎二火之間其不勝也明矣運之於中而使火  
不赫熾水不涸流者有神以主之也所謂神者何物也太虛之中  
神之棲也然水火不並立各有所勝盛衰之變此其常也故感則  
薄所不勝而乘所勝也命曰氣淫衰則所勝妄行而所生受病所  
不勝薄之也命曰氣迫瘡疹之火起於命門之下二火相合所謂  
得助者強也相火復挾君火之勢肆其猖獗銷燬燔燹無所不至  
可恃者心中之真水尚有以制之奈何陽道常饒陰道常乏赫熾  
者其氣淫涸流者其氣迫并真水亦亡而已矣經曰成敗倚伏生  
乎動動而不已則變作焉真水既亡津液暴絕其氣滯其發燥枯  
不能潤乎皮毛滋乎腠理而瘡中之血亦乾而黑矣是則交黑者  
血色本赤而乾則交黑也謂之歸腎者血本腎中之陰血乾則腎  
水亦乾矣此腎虛之證豈有腎實為邪之理乎

○痘疹交黑有逆順辨

邵子觀物篇曰東赤南白西黃北黑此正色也驗之於曉午夜  
之時可見之矣由是推之嬰兒始生而赤長稍變而白病則黃老  
死而黑物生地下而赤稍長而白萎落則黃枯槁而黑凡物皆  
一陽之氣以生此四色者乃一陽之氣色之逆變者也夫痘疹由  
出現而起發起發而成漿成漿而結痂亦人身中一陽之氣之流  
行也其出現而赤起發稍變而白成漿則黃結痂則黑此亦色之  
逆變自然而然者乃證之順未可全以交黑為

變黑為逆者以四時言之春主生夏主長秋主收冬主藏此自然之序通相成功者也痘疹之出猶春之生也起發猶夏之長也成漿猶秋之收也結痂猶冬之藏也亦自然之序苟出現而黑色是春行冬令矣起發而黑色是夏行冬令矣成漿而黑色是秋行冬令矣不循通變之次故謂之逆黑者腎之色也為啓蟄封藏之本故以變黑為歸腎也又肺主皮毛心主血脉脾主肌肉肝主筋腎主骨髓瘡疹之毒由內而外為順內者不出曰伏已出復入曰陷不能成漿謂之倒陷不能結痂謂之倒靨曰伏曰陷曰倒皆由外而內入於骨髓故曰歸腎為逆也

○諸痛痒瘡皆屬於心辨

經曰少陰所至為陽疹又曰諸痛痒瘡皆屬於心夫瘡疹之毒發於五臟六腑之液各隨其經絡部位而出視其味密知其毒之多寡不但少陰心臟專主之而經專以心言者何蓋火之為物微則痒近則痛灼之則成瘡心者火也故諸痛痒瘡惟心主之又心為君主之官經曰主不明則十二官危使道閉塞而不通形乃火傷瘡疹之毒雖出於五臟六腑而其能為形病者矣君不務德使刑火得逞也周禮曰夏時有痒疥疾亦此意也

○過飲冷水變生諸證辨

痘疹發渴切不可與冷水俗夫不知謂水可勝火習以與之病者適中其欲亦貪而不止設值天時喧熱氣血強盛者猶或可勝

精神痿弱脾胃虛微者水寒相搏未有不成績病者矣有飲水而黑陷痒痛者脾虛不能勝水水氣寒反從腎化故歸腎也有飲水而不發不壓者脾惡濕為水所淫不能主肌肉布散血氣也有飲水而渴轉增者水停心下而不行則腎氣燥腎惡燥故咽乾渴不止而死也有飲水而喘或效者飲冷傷肺故也有飲水而吐者胃本虛屋寒相搏介入不內也有飲水而利者胃為倉廩之官水清入胃濕多成五洩也有飲水而腹痛者腹為陰水寒犯之故痛也有飲水而喫逆者中焦虛寒又得冷水使中焦之氣不行故氣逆而喫也其病曰餉凡若此者皆飲水之過臨病之工常須識此勿令誤也

○錢氏陳氏立法用藥同異辨

世之論治痘者皆曰錢氏治痘專用涼瀉陳氏治痘專用溫補遂喜用陳氏之方不惟不知錢氏立方之意而陳氏救急之法亦井不知而已矣姑摘取二公之言參互考察而後知二公之治未嘗不同也嘗觀錢曰凡瘡疹當乳母慎口不可令飢及受風冷陳曰子母當須慎口首尾不宜與喫是同一調養也錢曰瘡疹始出未有他證不可下也陳曰若無他證不宜服藥是同一禁忌也錢曰瘡疹屬陽故春夏為順陳曰遇春而生發至夏而長成乃湯氣薰蒸自然易出易靨是同一喜好也錢曰惡寒不已身冷出汗耳聾反熱者腎氣太旺脾虛不能制也陳曰其瘡痒痛寒戰咬牙是脾

便肉虛也是同一歸重於脾也然曰惟用溫涼藥之是也  
用溫補之時矣陳曰如六七日身壯熱不大便與三味  
微得利即住是陳亦有用涼瀉之時矣錢曰更看時月  
表裏虛實是二公之法因特制宜未必如今人一偏之說也其不  
詞者惟於黑陷疔瀉錢則主大戟之寒以下之陳則主丁桂之熱  
以補之人見其偏寒偏熱之不同即謂錢專用涼瀉陳專用溫補  
殊不知錢之所下者乃邪氣在裏裏實之證也觀其煩躁大小便  
不通是已陳之所補乃邪氣在表裏虛之證也觀其泄瀉手足冷  
是已虛則補之即錢所謂惟用溫涼藥治之法也實則瀉之即陳  
所謂與三味消毒散得微利即住法也各因一證而發其言未嘗  
相左也然錢急於解毒攻邪氣也陳重於和中補正氣也邪氣解  
則正氣自平正氣實邪氣未有不去者矣是又二公之異而同也  
一公立法之善未始不同如此至用二公之法乃有效者有不效  
者此不善用法者之過非制法者之弊也噫醫者意也為工者不  
惟其法惟其意則二公法外不傳之意自得於神會之下矣

○補脾土瀉腎水辨

楊氏曰痘疹毒根在裏妄下之則毒氣得以深入土不勝水而成  
黑陷胡氏曰若其救瘡痘於黑陷之後執若保脾土於未下之先  
由二公之言觀之因其妄下而虛其裏以致黑陷此醫責虛  
之過非腎之疾也故戒之若救黑陷於妄下之後執若保脾土

下之為善耶錢氏曰凡瘡疹當乳母慎口不可令飢及受風冷  
必歸腎而變黑難治也又曰治之宜解毒不可妄下下則內虛多  
歸於腎上言即保脾土之法下言即不可妄下而成黑陷之說也  
蓋痘疹始終以脾胃為主經曰脾者土也治中央常以四時長四  
藏各十八日寄治若飲食失節寒溫不適脾胃乃傷所以不可令  
飢及受風冷也瘡疹之邪自內而外苟壯熱煩燥大渴大小便不  
通目赤唇焦此毒伏在內而不即出下之可也若瘡疹發於外清  
便自調不煩不渴此裏無邪不須服藥如妄下之則誅罰無過反  
戾其重所以歸於腎矣然則變黑歸腎皆由外受風冷內傷飲食  
及妄下之所致非腎本有之疾也其曰土不勝水者經曰谷氣通  
於脾六經為川腸胃為海又曰飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾  
氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行可見  
水入於胃必待脾為轉化而達於川海也今脾虛則不能傳化使  
之四布而滯蓄於胃脾惡濕為水所漬則土益敗故曰土不勝水  
也腎雖主水乃天元真一之氣道之本也非此水則天地之生意  
息矣若土所不勝之水乃飲食形質之物非腎之真水也既非腎  
水而曰歸腎者腎主骨髓又主閉藏言妄下則裏氣虛瘡疹之毒  
復自外陷入於裏其外黑陷者腎之化也其裏入於骨髓腎之主  
也汗汗之則亡陽亡陽則心先受之下之則亡陰亡陰則腎先受  
之所以歸於腎也其曰保脾土於未下之先者謂不可妄下也謂



適其寒溫節其飲食也特俗不識此理乃謂四君子湯保脾胃之  
要藥宜常服之以防交黑歸腎之證陳氏曰凡瘵瘵先公表裏  
虛安若虛實不分則無所治又曰若無他證不宜服藥如裏氣  
虛四君子湯要藥也裏實可以服之乎蓋參木補陽言歸補陰陰  
陽不可偏勝偏陰偏陽則病矣經曰久而增氣物化之常也氣增  
而久天之中也又曰無感感無虛虛而遺人天殃脾胃素實又服  
安補之藥正所謂感感也常服之則久而增氣兩實相軋而變生  
為謂之變者經云陽感則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘渴又  
曰陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂又曰陰氣少而陽氣勝故熱  
而煩滿也又曰兩陽相得而陰氣虛少水不能滅勝火而陽獨治  
獨治者不能生長也又曰陽勝則身熱腠理閉喘衄為之僥仰汗  
不出而熱齒乾以煩寃腹滿死又曰營氣不從逆於肉理乃生癰  
腫又曰脾移熱於肝則為驚劬凡若此者皆妄補之過也夫妄下  
則脾虛而歸腎妄補則脾實而乘腎經曰歲土太過兩溫流行腎  
乃受邪乘之謂也惜乎人但知妄下之則脾虛變黑而歸腎不知  
妄補之則脾實又增潰爛倒鑿而亦歸於腎也然則百祥丸之所  
下者何邪也錢氏曰青乾紫陷昏汗出不止煩燥熱渴腹脹喘  
喘大小便不通者困也若黑紫乾陷者百祥丸下之不黑者慎勿  
下蓋左腎水也右腎命門相火也相火相挾君火之勢以侮腎相  
相者腎水之賊也水火不並立一勝則一負瘵瘵之火起於命門

之下因相火之勢假君火之威煎熬真陰津液內涸腎不能制  
為所勝毒邪雷連於裏而不肯出所以黑紫乾陷也其證昏睡汗  
煩燥渴腹脹喘喘大小便閉皆裏實之證故宜以百祥丸下之苟  
無是證必不可下也錢氏曰所用百祥丸以瀉膀胱之府府若不  
實自不感也何以不瀉腎曰腎主虛不為瀉噫錢氏一則曰不可  
妄下一則曰腎主虛不受瀉其倦倦立命之心抑何深長也哉夫  
腎主虛不受瀉如此安得妄補脾土以為腎水之賊與其瀉膀胱  
之府又有深意存焉蓋脾輸精於肺肺下輸於膀胱膀胱之水乃  
平日所飲渣滓之物非腎之真水也膀胱又足太陽之經為十二  
經之屬四通五達之衝也凡有邪氣必先經此而傳瘵瘵之邪由  
膀胱之經上風府至顛下額會手太陽小腸之經於面小腸者丙  
火也亦挾君主丁火之勢而不受邪其毒毒於足太陽膀胱之經  
而不得散膀胱者壬水也為火所迫不免自附於腎引癸水以自  
救錢氏恐其毒歸於腎先於膀胱中瀉之迹迎而奪之之意二服  
不效而作寒戰則毒入於腎矣腎變動為慄真臟證見故知死也  
曰府不實者邪氣去也臟自不感者不入於臟也不實不感悉邪  
氣也豈有瀉正氣之理乎可見由膀胱受邪而黑陷者裏實也宜  
以百祥丸下之由脾受邪而黑陷者裏虛也不可以百祥丸下之  
不審虛實之證驟以百祥丸下之謂之裏虛經曰候邪不審大氣  
已過瀉之則真氣脫此之謂也其曰下之復惡寒不已身冷出汗

耳能反熱者死腎水太旺脾虛不能治也此即所謂無裏證而妄下之者也無裏證而下之則脾土無故而轉下之藥腎未受濕脾已先傷陰氣內盛陽氣外絕故惡寒不已身冷汗出耳能反熱也腎何以旺陰氣盛也陰陽相離則受傷之脾安能復為之主而使之再合耶故曰脾不能治也其曰下後氣溫身熱欲飲冷水者可治以脾旺勝腎寒去而溫熱也治之宜解毒此即所謂有裏證而宜下之者也蓋先則煩躁熱渴腹脹喘大小便不通今下之身熱氣溫者大氣去也欲飲冷水者餘邪未盡也故又曰治之宜解毒脾旺勝腎者大戟主行十二水脾土本強能運其物注於下焦以洩下焦之邪此脾旺勝腎也寒去而溫熱者太陽寒水之邪已去佈散於經小腸熱火承之故溫熱也大抵陽并於陰則陰實而陽虛外寒內必熱也陰并於陽則陽實而陰虛邪自內而外也熱裏必平也故曰可治不但痘疹惡變黑如陽毒發斑內傷發斑黑者皆不可治抑豈腎水為邪乎故病瘡病重者惡黑者北方屬水其色黑入通於腎居亥子之位萬物生於子而死於亥腎者生死之戶也變黑而死歸根復命之時也此天也之道陰陽之化生長收藏之機非知道者不足以語此噫此實出吾肝肅之要非有識者亦非好辨以亂人聽但恐世之曲幸者不知虛實之理補所不當補瀉所不當瀉盛亡虛亡遺人天殤無異於操刃之殺人借使錢氏復生必謂吾言為信規此者不主先入之言亦必

言之不誣也

○瀉膿血痂皮水穀辨

錢氏曰瘡黑而忽瀉膿血痂皮者順水穀不消者逆夫痘瘡自內而外謂之正出自外而內謂之倒陷從外收者謂之正醫從內收者謂之倒醫倒陷倒醫內穿筋膜壞臟腑皆惡候也倒陷者十無一生倒醫者十或救其三錢氏謂瘡黑而忽瀉其倒醫之類乎蓋瘡黑本是死證裏實者可下之忽然作瀉則不必下毒氣由外入內臟腑之氣不通禁衛之氣不行表裏俱病不急下之轉增煩悶而死故主百祥九下之若自利則火性急速不少停於腸胃之間腸胃熱甚亦有失其轉化之常故暴注而瀉也則毒從利戒亦若下之義當時暴瀉未必便膿血痂皮也抑將漸延數日而後有是膿血痂皮也何以有是膿血痂皮也痘瘡內陷則臟腑筋膜之間亦如外出之狀瀉膿血者內潰之證也瀉痂皮者內陷之證也瀉膿血痂皮為順者邪在府也在府得由腸胃而出故順瀉水穀者藏也邪在藏不得由腸胃而出所去者腸胃之水穀耳人絕水穀則死故逆然其水穀不化不可誤認為寒仲景曰邪熱不殺穀水穀不化者火迫而出也錢氏謂瀉痂皮者是脾氣得實腎雖用事脾可制之瀉水穀者是脾虛不能制腎故自洩也讀者不識此義即謂脾土可以制腎水有欲專補脾土之意殊不知脾胃者倉廩之官以納水穀者也腎開竅於二陰以司開泄者也水穀不化

腎必受之開闔不利不能禁固便溺所以暴瀉也曰腎用事者腎為火所役也若自用事則能封閉約束而不瀉矣脾可制之者言門戶雖弛倉廩猶藏能制其水不為泄所勝也至於水穀不化則泌別無統幽闔不閉脾亦不能自勝其濕故自洩也然五虛之中泄瀉為甚痘瘡自利不止鮮有痊者予以一言斷之曰能食者吉不能食者凶故經云漿粥入口泄住止則虛者活此其驗也

○斑疹

斑疹之證布在方冊者或謂心為疹或謂心為斑脾為疹或謂胃為斑者何也經曰少陰所至為湯疹少陰者心與腎也心配離七中之陰巳土也丁巳同生於酉酉者肺金帝旺也腎配坎七中之陽戊土也戊癸化火而生於寅七者三焦火長生也斑隱七在於皮膚中大者成片小者狀如蚊蚤所咬點七赤色疹則成顆粒見於皮膚之外如疥子然有形可模俗名麻子者是巳斑之方萌又與蚊迹相類發斑多見於胸腹病人昏憤先紅後赤者是也傷寒熱病多有之蚊迹只在於手足病人安靜先紅後黃者是也內傷熱病多有之此二證發斑人常有之非由胎毒乃時行熱證也至於疹子則與痘瘡相似彼此傳染但發過不再作也乃心移熱於脾七移熱於肺發而為疹凡病疹者必效嗽火形肺也丁心火也脾土辛肺金皆隸於酉造化之理同一位謂疹為心者語其本也謂疹為脾者語其標也語心脾而肺在其中矣腎主二陰司開闔

三焦之火亢甚妻從夫化合於胃而為斑凡病斑者必自利或大便結燥也癸腎水戊胃土與寅三焦相火同位者亦造化之理語三焦而心在其中矣故發斑見於胸腹者三焦之位也蚊迹見於手足者胃主四肢也疹者母傳子也斑者妻從夫也知造化之理而治斑疹不难矣

○五行生死論

按五行之理生於陽者死於陰生於陰者死於陽抑隔損益之數欤夫五臟六腑者所以配五行也府為陽藏為陰府生於陰藏生於陽根陰根陽之義也府死於陽藏死於陰分陰分陽之義也陽之所死陰之所生陰之所死陽之所生陽極則生陰極則生陰陽之義也自子至巳為陽而統乎足自午至亥為陰而統乎手亦陰陽互為其根也以府言之水火者南北之對也壬膀胱水生於申申者手少陽三焦位也經曰三焦者決瀆之官水道出焉故壬水生於申死於卯者水月象也生於西死於東矣丙小腸火生於寅七者足少陽膽位也膽為甲木甲祿在寅故丙火生於寅死於酉者火日象也生於東沒於西矣金木者東西之對也甲膽木生於亥者風木之分經曰風生木故甲木生於亥死於午者水陽也午則陰生而陽死矣庚大腸金生於巳巳者六陽之位卦應乎乾乾為金故庚金生於巳死於子者金陰也子則陽生而陰死矣此四府生死之理也然木主於東而生於北者水流趨東以生木也

火主於南而生於東者鑽木取火木所生也金主於西而生於南者金曰從革火所出也水主於北而生於西者水西而東金所生也以五藏言之丁心火生於酉酉者肺旺位也坎中之陽乃火之原坎位於子辛金所生不能再生丁火故丁火乘辛金生旺之氣而生於酉所以心與肺相連而位乎上也死於寅者寅乃顯明之地丁為陰火其光自伏夫癸腎水生於卯卯者肝旺位也離中之陰乃水之原離位於午乙木所生不能再生癸水故癸水乘乙木生旺之氣而生於卯所以腎與肝相連而位乎下也死於申者申手少陽相火所謂一水不能勝二火也又水生於一一者天元物動之氣也於卦為震在卯之中所以癸水生於卯而震初爻為子

痘疹格致要論 卷六

水也火生於二二者地元初動之氣也於卦為巽陽自下而上陰自上而下兌為少陰巽之反也在酉之中所以丁火生於酉而先初爻為丁火也乙肝木生於午者乙震太也青龍之象寄生於午龍從火裏出也死於亥者午為一陰至於亥而極陰老不能生乙水也辛肺金生於子者辛兌金也白虎之象寄生於子虎向火中生也死於巳者子為一陽至巳而極陽老而不能生辛金也又肝在下陰也陰生於午肺在上陽也陽生於子此四臟生死之理也夫陽則順者陽道常饒故左行而有餘此六腑之氣常盛而病在腑者易已也陰則逆者陰道常乏故右行而不足此五臟之氣常弱而病在臟者難愈也若夫脾者已土也離中之陰是已故離

已胃土戊土也坎中之陽是已故坎納戊已土生於酉死於寅心象離而生已土故已與丁同生死也戊土生於寅死於酉者腎配坎腎有二枚左為水不能生土右為相火能生土故戊與相火同生死也然脾得心之氣多而喜熱從火化也胃得腎之氣多而喜寒從水化也食熱則損胃食寒則損脾養生之道所以貴適其寒溫熱無灼灼寒無滄滄也故傷風冷則胃強而脾弱脾不主事胃與右腎相火相合而同歸於火所以戊癸化火也傷熱則脾強而胃弱胃失清化之令脾與心火相得而致敦阜所以火炎則上益燥也苟得其養則脾胃中和之氣而陰陽無偏勝之疾苟失其養則脾氣歸於心而成潰爛疔瘡之瘡胃氣歸於腎而成陷伏

痘疹格致要論 卷六

青黑之變知乎此可以語瘡疹之治矣

卷之七

先哲格言

凡予所論，非不知而杜撰者，稽諸往哲之言，未有不合。謹攝其要條，補於左，以實吾言之足徵。幸毋曰無稽之言，不足取信也。

錢氏仲陽曰：疹僅候面燥，腮赤目胞亦赤，呵欠頻，悶乍涼，乍熱，咳嗽噴嚏，手足稍冷，夜卧驚悸，多睡並疹證，此天行之病也。惟用溫涼藥，治之，至不可妄下及妄攻發。

凡瘡疹若出，所視輕重者一發便出盡者必重也。瘡夾疹者半輕半重也。出佈稍重者，輕裏外肥紅者，輕外黑裏赤者，微重也。外白裏黑者，大重也。瘡端端裏黑點如針孔者，勢劇也。青乾黑陷，睡昏汗出不止，煩燥，熱渴，腹脹，喘喘大小便不通者，困也。

凡瘡疹當乳，母慎口，不可令穢及受風冷，必歸腎而變黑難治也。有大熱者當利小便，便有小熱者宜解毒。若黑紫乾陷者，百祥凡下之不黑慎，心下重更看時，月輕重大抵瘡疹為陽出則為順。

治之宜解毒，不可妄下。下則內虛多歸於腎，若能食而加頭焦起，或未焦而喘實者，可下之。

身熱煩渴腹瀉，兩而出喘大小便澀，面赤悶絕大吐，此當利小便，不瀉者宜風散。下之，若五七日，痧不焦是內發熱，熱氣蒸於外，痧不得焦，痧也。宜宣風散導之用，生犀磨汁解之，使熱不至。

着痧矣

惟斑疹能作搐疹為脾所生，脾虛而肝旺乘之，木來勝土，熱氣相擊動於心神，心喜為熱，神氣不安，因搐成痲，痲子為心所生，心生熱熱則生風，風屬於肝，二臟相搏，風火相爭，故搐也。治之當瀉心肝。

瘡疹始出未有他證不可下也，但當用平和藥類與乳食，不受風冷可也。如瘡疹三日不出或不快，即微發之，發之不出即加藥，加藥不出即大發之。如大發後及脈平無證者，即瘡本稀不可更發也。有大熱則當利小便，小熱者當解毒。若出快勿發，勿下。陳氏文中曰：小兒瘡疹已出未出之間，有類傷寒之狀，其瘡疹病證忽然增寒壯熱，身體疼痛，大便黃色，此乃是正病也。若無他疾，不宜服藥。

凡瘡疹先分表裏虛實，不分則無所治。小兒神氣軟弱，瘡疹自初出兩三日，至十三日當忌，外人恐有卒暴風寒穢惡之氣，觸兒瘡疹。

小兒瘡疹始出一日至十日，渾身壯熱，大便黃稠，是表裏俱實也。其瘡必光澤，必起發，必肥滿，必易醫，而不致損傷也。其瘡不光澤，不起發，根窠不紅，或腹脹或瀉，或氣促，是表裏俱虛也。其瘡不光澤，不起發，根窠不紅，謂之表虛也。或瀉渴，或脹，或氣促，謂之表虛也。

若濕熱多津液內耗血氣不榮其瘡雖起發亦不能醫也

龐氏安常曰若身疼壯熱頭痛不與小汗何由表散大腑久閉

攻腰脇或心腹脹滿不與微利何由釋去故當消息汗下然則

寒藥固不當行溫藥又增熱毒若熱勢太甚脈候洪數涼性之

藥不阻表裏氣者亦可通用或寒氣阻碍脈候浮遲則溫性之

藥不阻表裏之氣者可冀水釋云不可于下寒熱之藥只可紫

草一味者乃滯隔之流

天行發斑瘡瀆更遍身皆戴白漿此惡毒

凡覺冬溫至春夏必發斑豆

此患小便澀有血者中壞也瘡黑厭無膿十死不治

斑豆已出不可正爾發表更增斑爛以表虛故也

河間劉氏曰斑疹之病其狀各異瘡發於外者屬少陽三焦

相火也謂之斑小紅蘆行於皮膚之中不出者屬少陰君火也

謂之疹凡頭斑證若自吐瀉者慎勿亂治則多吉謂和氣上下

皆出也

大凡瘡疹首尾皆不可下恐妄動而生變此謂少陽通表裏宜和

之也當先安其裏以解毒次微發之如大小便不秘者雖微發

之大更過秘宜微利之

首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若已吐利不可下也便宜安

裏藥三五服如能食大便秘者宜微疎利之若內虛而利者

宜微利之

安裏藥三五服末後一服調微發之藥服之大抵安裏之藥  
發表之藥少秘則微疎之令邪氣不壅併而能作番次使兇易  
禁也

大凡小兒斑疹已發有瘡有聲者乃形病氣不病也無瘡無聲者

乃氣病形不病也有瘡而無聲者是形氣俱病也

斑于者是相火行命三焦真陽氣之所作也若氣入肺變膿泡入

肝為水泡自病為斑心乃君心入於脾作癰疹為肺主皮毛心

不害肺金此乃君之德也

已發便稠密形勢如針頭者當輕發其表涼其內連喬升

若斑已發稠密甚而微喘飲水有執滯當以去風藥微下之若

出不快清便自調知為在表不在裏當微發之升麻葛根湯若清乾

黑胎身不大熱大小便澀則知熱在內大黃湯下身表大熱者

表證未罷不可利大便若斑疹已出見小熱小便不利者當利

小便已發後有餘毒不散為復有身熱離瘡之類當用解毒之

藥也

劉提點曰疹痘最要大小腑分曉所以錢氏四聖散用木通枳殼

極妙若大小腑自流利則不必苦泥

疹痘發未透宜用四君子湯加黃耆紫草煎九賢云百病不可損

其胃氣故多用四君子湯及糯米等助其胃氣

劉涓子小兒瘡子訣中云疹子發如膿粟不肯腐者但調沙糖水與

突亦曾試用但與沙糖水後多是爬搔了瘡子成一片去結痂  
不好發斑用人齒散但錢氏方中用射香及酒調難用蓋瘡痂  
家怕射香與酒氣觸了若用只是紫草煎湯自好

東垣李氏曰其子在腹中十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而  
生動作滋益精氣神兒隨日長皮肉筋骨血脉形氣俱足十月  
降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞  
中僻於一隅伏而不發直因內傷乳食溫熱之氣下流合於腎  
中二火交攻致營氣不從逆於肉理惡血乃發諸斑疹皆出於  
膀胱壬水其劫後聚肉理歸於陽明故始頭之證皆足太陽壬  
膀胱經丙小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱化為膿

痘疹發論

七卷

五

者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆從足太陽傳變中來  
也當外發寒和使令消散內瀉二火不令交攻其中令溫氣上  
歸後其本位此內經之法覽者詳之

夫斑疹出者皆因內傷必出斑營氣逆故也大禁牽牛巴豆

諸大膿胞小水斑疹癰三色皆營氣逆而寒後其表宜以四味升  
麻湯中加當歸身連翹此定法也○如肺成膿斑先嗽喘或氣  
高而喘促加人參少加黃芩以瀉伏火而補元氣○如心出小  
紅斑必先見噤乾驚悸身熱肌肉腫脈弦洪少加黃連○如命  
門出癰疹必先骨疼身熱以加生地黃又加黃蘗  
如斑已出時時與桔梗湯  
胸膈利咽喉不可計服數

海虞王氏曰夫斑之為病皆由于在母腹中時浸清食母血液  
而成毒皆太陰濕土壅滯君相二火之所作也因而直氣既盛  
正氣又旺邪無所容或因傷寒或因傷食斑由是而生焉治當  
何如外者外治內者內治中外皆和其斑自出至於惡寒者發  
之表大執者奪之渴者清之大便秘結者下之小便不通者利  
之驚者安之瀉者分之可以執一為哉

前人言首尾俱不下者何也曰首不可下者為斑未顯於表下則  
邪氣不得伸越此脈證有表而無裏故禁首不可下也尾不可  
下者為斑毒已顯於外內無根蒂大便不實無一切裏證下之  
則斑氣陷故禁尾不可下也又如所言溫煖蓋覆不令通風以

痘疹發論

七卷

木

其斑未出或身表涼而惡寒或天令寒而惡冷溫煖蓋覆不令  
通風可也斑若已出身熱天暄何必用蓋覆而不使之通風乎  
後人執此二句首尾俱不可下溫煖不令通風不知天令之所  
加人身之所感致使誤人多矣噫首尾不可下者以其終始臟  
腑原無疑滯也若有一切裏證及大便結者安得不下溫煖不  
使之通風以其發在冬時故如此也若發夏時斑雖未出亦不  
用於此也

丹溪朱氏曰調護之法首尾俱不可汗下但溫涼之劑煎而濟之  
解毒和中安表而已虛者益之實者損之冷者溫之熱者平之  
是為權度借喻而言亦如庖人籠蒸之法但欲其鬆耳蓋毒發

於表如苟妄汗則榮衛一虛重令開泄轉增熱由是風邪乘  
間交證者有之毒根於裏如苟妄下則內氣一虛毒不能出而  
反入焉由是土不勝水交黑歸腎身體振寒耳聾反熱眼合肚  
脹其瘡黑陷十無一生

凡熱不可驟退但輕解之若無熱則瘡又不能發也

初起時自汗不妨蓋溫熱薰蒸而然故也

疎則無毒密則有毒宜涼解之雖數貼亦不妨無害眼之患

爐灰色白淨者作寒看齊勇者燥者掀發者作熱看黑傷血執涼

血為主白為氣虛補氣為主中黑陷而外白起得遲者則相兼

而治

痘疹致論

七卷

七

凡痘疹分表裏虛實吐瀉少食為裏虛不吐瀉能食為裏實裏實

而補則結癰毒陷伏倒靨為表虛灰白者亦表虛紅活綻凸為

表實表實而補則潰爛不結痂

痘疹分氣虛血虛用補藥氣虛者人參白朮加解毒藥血虛者四

物湯中加鮮毒藥

調解之法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑兼而治之溫

如當歸黃耆木香葶涼如前胡乾葛升麻葦佐之以川芎白芍

枳殼桔梗羌活木通紫葍之屬則可以調適矣

黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃耆紫葍人參葦葍

陷甚者亦用燒人參

瘡乾者宜退火止用輕劑荊芥升麻葛根之類○濕者用瀉濕乃

肌表間熱宜用風藥白芷防風之類○上引用升麻葛根下引

用枳榔牛膝助以貝母忍冬草白芷瓜萎之類

顏色正者為上將欲成就却色淡者宜助血藥用當歸川芎酒洗

芍藥之類或加紅花○將成就之際却紫色者屬熱用涼藥鮮

其毒升麻葛根酒炒芩連及連翹之類

將成時如豆殼者蓋因初起時飲水多其壓不齊俗呼倒靨不好

但服安表之劑消息他大小便秘通大便小便秘通小

便

痘疹用藥固有權度大小二便不可不通其大便自所下黃黑則

毒氣已成不必多與湯劑若大小二便一或秘焉則腸胃壅遏

脈絡凝滯毒氣無從排泄眼閉聲啞肌肉黧黑不旋踵而告變

矣

近時小兒痘疹止宗陳文中木香散異攻散殊不知彼立方之時

為運氣在運水司天時令又值嚴冬大寒為寒氣鬱遏痘疹不

紅綻故用辛熱之劑發之今人不分時令寒熱一際施治誤人

多矣



氏亦可謂善求病情者矣大率歸重於太陰一經蓋以手太陰  
 屬肺主皮毛足太陰屬脾主手足肺金惡寒而易於外感脾土  
 惡溫而無物不受其用丁香姜桂所以治其脾之寒用附子半  
 夏所以治其脾之溫使脾與肺果有寒與溫而蓋有虛也中病  
 則已何傷之有今徒見出遲者身熱者泄利者驚悸者氣急者  
 渴思飲者例與木香散異攻散間有偶中之效不思一偏之禍  
 若錢氏方固未常麻細辛丁香白木參耆董率有監制輔佐之  
 藥但其用寒涼者多而於補助一法畧示端緒錢氏意深矣亦  
 將俟觀者而擴充之夫渴者用溫涼藥痺瀉者用補藥自陳氏  
 發之迥出前古然其間多用燥熱或未適中恐其造方之際必

有挾寒而痘者

痘疹諸書

七卷

九

滄洲呂氏曰凡乳嬰之與童壯當歧為兩途以治之乳嬰當兼治  
 乳母俾其氣血清和飲食有節投以調氣通榮之劑以釀其乳  
 使兒飲之則其瘡必肥滿光澤無陷伏之憂童壯之子必當備  
 切其疎審其表裏虛實以汗下之苟不爽不虛則但保其中和  
 使脾氣流暢則肺金藉母之助易於灌膿速於成痂無倒陷之  
 患或至壯盛而膚腠厚密尤須預為汗解或大便結與溲澀者  
 尤宜下之利之庶無患也

足脛熱兩腮紅大便秘小便澀渴不止上氣急脈洪數者

已上七證不  
痘疹諸書

足脛冷腹虛脹蒼青色而眈白嘔乳食日晴青脈沉微者  
已上七證不  
痘疹諸書

肺主氣氣不足則致後三證○自汗聲不出○瘡頂陷塌○不綻  
 肥○並宜十奇散自汗倍黃耆聲不出倍桔梗

心主血血不足則致後三證○灰白色○根窠不紅○不光澤○  
 正宜芎歸湯加芍藥紫草紅花良驗

凡值天時不正却痘瘡盛發宜服禁方不出方  
 凡覺痘瘡欲發當先解利與傷寒相類似之間兼用解毒胡氏  
 云非微汗則表不解解表當於紅斑未見之時宜用

凡痘瘡出不快者有五證臨病審而調之  
痘疹諸書

七卷

一證天時嚴寒為寒所折不能起發宜散寒溫表

一證炎暑隆感煩渴昏迷瘡出不快

一證服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣

一證或成血泡一半尚是紅點此毒氣發越不透必不能食大  
 便如常者宜半溫裏半助養之劑

一證外實之人皮膚厚肉腠密毒氣難以發泄因出不快

身體溫煖者順寒涼者逆能食大便實者順不能食大便利者逆

夫痘瘡之毒最凶穢惡之氣觸犯切不可信僧道看經解穢况無

纖毫之力而反恐被其穢惡之氣觸犯亦不可恃其能解而不

預防戒之戒之

預防戒之戒之

預防戒之戒之

張氏煥曰痘子氣勾則出快蓋血隨氣行氣逆則血滯

石壁胡氏曰小兒難任非常之扶亦不可任非常之冷如熱藥太

過輕則吐利腹脹重則喘伏何處宜溫涼適中可也

仁齋楊氏曰諸熱不可驟去宜輕解之蓋痘疹無熱則不能起發

痘疹發於肌肉陽明胃氣主之脾土一溫胃氣隨暢決無陷伏之

患

李氏曰比之種痘值天時暄煖則易生

節齋王氏曰若痘疹虛淡白色痒癢此屬虛寒宜用陳文中方

若發壯盛齊勇紅紫色燥痒此屬熱毒急宜涼血解毒自陳文

中方盛行後屬虛寒者率得生焉熱毒者悉不救痘是胎毒五

痘疹格致要論

卷七

十一

人治法只解毒然氣血虛則送毒氣不出及不能成就故陳文

中之法亦千載妙訣補前人之未備者但溫補之法既行而鮮

毒之旨遂隱故故得一邊又害了一邊痘是胎毒自內出外一

二三日方出齊毒氣尚在內出至六日則當盡發於表七八九

日成膿而結痂矣若毒氣盛不能盡出過六日毒及內入臟腑

故須於六日以前毒氣該出之時急服涼血解毒之藥以驅出

之六日以後醫無及矣

痘疹多者是毒氣多便先宜解毒然多則恐氣血周貫不足故隨

後亦宜蕪補藥以助成膿血

教書龍氏曰人有虛實之不同病有淺深之各異壯實之人病無

諸疔或癩發而輕者皆得依期而愈倘氣候乖常寒痘失毒毒

氣亦盛當作血泡而不泡當結膿窠而不結遂生諸證審延口

救難以定期矣

慈溪趙氏曰痘瘡灰白不發者作寒看紅凸齊綻者作熱看其要

在解毒和氣活血溫中安表而已寒者溫之熱者減之減不可

多蓋痘瘡非熱則不能發也宜以溫和之劑扶而濟之

桂若魏氏曰夫氣血盛斯毒易解氣血損則毒難愈惟血氣少弱

者雖毒不能煩解然生意未始不固乎其中故必加以補益扶

持之功治所當治順所當順斯其悔吝無不平矣

先翁翁軒高氏曰痘瘡不怕稠密只要能食無不痊者凡用藥不

可化其胃氣蓋人以胃氣為本

痘疹格致要論卷之七

疔瘡發要論卷之八

或曰疔瘡之名何義曰古人謂之斑瘡後人因其形似豆核曰瘡瘡又曰腫且瘡今又呼為珍珠且者以其形員緊而小也又呼為大豆者以其形員寬而大也有呼為紫黃且者以其二三成叢中心落陷也有呼為蛇皮者因其空殼無水如蛇蛻之皮也有呼為錫面者以其成餅帶灰白色也是皆因象取名無別義理但珍珠且最輕大豆次之紫黃且最重蛇皮錫面則死證也或曰疔瘡發熱何以能預識其輕重而解之耶曰凡發熱者進乍退氣色明望精神如常大小便調能食不渴目清神潤此毒輕也疔必稀疎縱出多亦自易發易醫也如壯熱不減氣色慘暗精神昏悶大便或秘或瀉不能食自赤唇焦此毒甚也疔必稠密宜預解之其出疎者防其有伏未可便許為疎但看熱減渴止精神爽快清便自調能食更無他苦是真疎且輕也或曰既識其候知疔稠密何以解之曰諸瘡皆屬於心心之華在面如初發熱青筋現露目中淚出此毒發於肝肝木生心火從後來者為實邪肝為水泡風火相扇必作瘡瘡宜先解肝之毒面赤如錦額上紅筋露現諸妄驚此毒發於心心火自旺為正邪君主不明必有陷伏不治口乾唇焦面黃而燥此毒發於脾心火生脾土從前來者為虛邪脾為斑心為疹必有夾斑夾疹又脾主肌肉為火所灼必作潰爛宜先解心脾之毒而也

白鼻中乾燥或流清涕或吐出此毒發於肺心火刑肺金乘其所勝為微邪宜略解肺之毒面色黑氣如煙浮目中見鬼頭熱足冷此毒發於腎七水尅心火為微邪必成黑陷不治或曰疔子出形輕重吉凶何以別之曰疔子出形其熱便退三五焉落相去位遠其瘡員淨以火燭之皮中無復紅點此候必疎而輕如瘡大出熱不少減細碎叢聚無有空膚以火燭之皮下通紅此必密而重也或曰古方預解疔毒謂重者能令出疎輕者能令不出其言信乎曰疔之疎密本於毒之多寡毒之所受本於父母始生之初區區藥石豈能解之而使重者必疎輕者不出耶但謂解之使無鬱迫陷伏之患則可謂解之使重者必疎輕者不出則吾不知也或曰解毒之方若是不必用欬曰何可廢也蓋解毒之法要分三治一則視其父母平日有餘不足之病而解之一則視其年氣運疫癘之變而解之一則視其所見氣色所稟虛實而解之稱物平施因時制宜豈有定方耶如代天宣化九只解得氣運疫癘之變或曰疔瘡始終何以能吉何以能凶請詳言之曰瘡子之出不開疎密但其出必盡其發必透其醫必齊不徐不疾適如其期能食大小便調此可言吉如一齊湧出其發不透其醫不齊或大急或太遲不能如期食少大便自利此可言凶與之期日出不

能盡而伏者四五日死起發不透而枯委拜病者七八日死

或曰何謂其出必盡曰作三四次出大小不一等收斂之時空中

猶有出者俗呼為毒必有此候方無餘毒

或曰何謂其發必透曰洩出一點血以斬長大血化為水水化為

膿其頂負其脚潤其膜稠充實飽滿審察手足莫不皆然可謂

透矣蓋手足位遠一時難透脾主四肢脾胃氣虛者手足瘡子

常發不透至於醫後多成癩毒也

或曰何謂其醫必齊曰自上而下循次收較無有潰爛痂皮堅厚

是也

或曰何謂不徐不疾適如其期曰自出現而起發起發而成癩而

收斂先後循次上下周匝輕者七八日重者十二三日此其期

也若出未定而先瀉水將起發而便或漿膿未成而就乾收此

失之太疾由毒火併迫氣血奔騰未至而至謂之太過也如應

出不出其發不發應收不收此失之太緩由毒火鬱遏氣血即

當至而不至謂之不及也過與不及皆死證也

或曰痘疹何以取法食與大小便曰痘子之出惟資氣血以助其

成欲表裏無邪也人能食則氣血自充大小便調則裏無邪

或曰亦有不能食而愈者何曰大便必實數日不更衣賴平日之

穀氣以養之雖不食無苦也然起發收斂落痂終不及法食者

之易焉耳

或曰痘疹痛痒何以別之曰出現之初無有痛痒至於起發癩

其痛如痛痛者毒欲出也膿成毒解其痛則痒痒者邪去而正

氣復也如此痛痒渾家常候若當出現起發膿水未成之時忽

然癢痒者此惡候亦須分其虛實如欲發紅嫩大熱煩渴大便

秘小便少此邪太甚而痒也形色灰白平腫大便自利此正氣

不足而痒也其云諸痒為虛諸痛為實者亦大略之言耳

或曰凡視瘡子先法識其作痒否曰凡瘡子初出色嬌皮嫩肉紅

者瘡子起發多成水泡者其後皆痒癩而死

或曰瘡子皮嫩色嬌必作痒何曰皮膚者皮在內約束經脈而在

外分佈營理皮深厚而膚淺薄瘡子之出皮厚色老者皮膚堅

者毒有約束不得肆其猖狂之性故法漸次成熟以致收斂也

皮嫩色嬌者皮肉已虛但覺薄膚以包於外不能約制毒邪風

火相扇游散往來故痒易破也

或曰嘗見瘡子有乾痒者有濕痒者何也曰乾痒者火甚也其治

在心濕痒者火濕併也其治在脾譬之火炙湯沃皆能作痒然

癢乾而痒者必死心為君主不可犯也瘡濕而痒者或有可治

脾為土無定位故也

或曰瘡子作痒爬搔潰爛而不死者何也曰其人能食營之破者

復加腫灌膿血稠濁痂皮潤澤原無虛處補出一番語音清亮

此為裏實表虛毒不能入故潰爛而不死也若不能食飯入  
嘔水入則瘡聲啞言微面紫鼻爛痂皮焦起大便不固此為表  
裏俱虛滲延引日而盡矣

或曰何謂陷伏曰內者不出謂之伏外者復入謂之陷如應出不  
出應發不發伏也謂毒氣留伏於中而不出也陷有二種起發  
有水不能成膿而燥乾者或已成膿復化成水皆謂之陷陷膿  
已成就不即結痂而潰爛者謂之倒靨皆陷也謂裏虛毒氣乘  
虛而陷入也

或曰痘瘡何以祛發渴曰初發熱便渴者火邪內蒸焦爛蒸盛故  
渴也宜以清涼之劑解之痘出稠密而渴者此氣血分散津液

痘疹發熱論

卷五

虛耗故渴也宜以滋補之劑救之自利渴者此脾胃虛津液少  
宜以補中之劑升而潤之若瘡細密不起發不光澤不收靨好  
飲冷水不能食或大便瀉邪火益熾其水已枯不治之證也

或曰痘疹咽痛者何曰火性炎上瘡疹邪火薰灼於中咽候先受  
宜急解之不然咽候受傷腫塞灌爛嘔食冷水暴啞失聲治之  
無及矣

或曰痘瘡食失生者有死者何也曰瘡子之出失於早治  
咽候都有外者未成內者先熟一旦收靨飲食則責而出乃咽  
傷痛不能直入也語音不清乃咽乾而語不能出也但觀瘡子  
是屬正靨則生非正靨則死能食則生飲食俱廢則死

或曰痘疹自利者何曰腸胃之熱傳化失常也大便瘡瘡  
多吐瀉不須止令毒邪上下得出也待毒出定裏氣和而利  
止利不止者中氣被傷不能禁固也宜急止之恐表裏俱他  
變

或曰痘瘡煩躁者何曰痘家喜靜毒氣外出中無留邪臟腑和平  
心神安泰如多寤少寐啼哭不止此內熱也心惡熱不能安眠  
而哭謂之熱煩痘瘡掀發光壯欲待成漿而哭此瘡作痛不能  
忍謂之疼煩皆常候也待瘡平熱退而安若昏憤躁擾循摸眼  
此謂之昏憤皆神志十無一生

痘疹發熱論

卷六

六

或曰痘瘡寒戰咬牙有生者有死者何也曰以瘡為主無變候則  
生瘡壞則死若瘡出密甚掀腫身軀動搖者此轉後艱難主皆  
不定不可謂之寒戰特渴思飲吞嚥牙為者不可謂之咬牙  
或曰痘後發癰毒者何曰瘡至成膿則毒化而解如未成膿收靨  
乾收則毒不化故重發癰毒也

或曰痘後目中屑翳此初出現便有痘子乎曰初出那符便有只  
緣收靨不齊面瘡腫爛毒氣攻眼而後有之也或因誤辛熱之  
藥喜食炙博之物亦能令目腫痛今人但見瘡子初出目中流  
淚便謂眼有痘殊不知肝熱則淚出於目肺熱則涕出於鼻脾  
熱則涎出於口心熱則汗出於面火熱液出造化之理也目中  
屑翳乃瘡癩也惟內服藥久自退去不可妄用點劑自取損睛

之志

或曰痘子收後表裏無邪復作昏暈者何曰邪氣已去正氣方生乃否極泰來之兆

或曰痘子收後忽無故而暴死者何曰非正厲也乾收太速太迫之耳毒氣復入真氣先敗不死何為

或曰瘡毒內陷亦有不死者何曰或發難腫則毒得洩更審毒歸何臟也如毒歸脾肺則為癰腫甚則爛見筋骨而死毒歸肝則為目痛甚則筋骨不用而死毒歸心腎則無疾而暴死

或曰痘疹治法皆言發和中解毒而已不識三者何先曰發表最先大凡瘡疹只要發出得盡不使留伏於中發表須兼解毒

痘疹格致要論

卷八

七

非發表自發表解毒自解毒也瘡疹已出表裏無邪不須服藥如瘡疹太甚裏實能食者解毒之法可單用也瘡出已甚裏氣不和或吐或利於和中法內畧兼解毒可也若瘡疹無邪惟裏氣虛者只用和中不必解毒

或曰發表和中解毒以何藥為主治曰發表須辛甘清陽之劑如羌活防風升麻白芷桂枝之類蓋辛甘發散清陽發騰理也和

中須甘溫濁陰之劑如人參當歸甘草芍藥之類蓋中不足者以甘補之又濁陰走五臟歸六腑也解毒須苦寒之劑如牛蒡連翹葛根芩連梔枳之類蓋毒者火也苦能瀉火故耳但解毒藥須酒炒而用之令勿犯胃氣也

或曰古人云痘瘡首尾不可妄下信乎曰不可妄三字最宜詳味蓋治痘之方當時必有不問虛實一槩輕用巴豆牽牛之屬以下之故戒之首尾不可妄下苟可下而下之非妄也可下之證巴豆牽牛亦不可輕用况不可下者乎如曰首尾不可汗下乃拘泥之見非通變之術矣

或曰疹愛清涼痘愛溫其然乎曰此亦拘泥之說疹愛清涼設使天氣大寒氣血凝泣不用溫覆何以能出痘瘡愛溫設使暑熱之時氣血淖澤更加溫煖寧不潰爛乎故治疹于者宜專用清涼解毒之劑治痘于者宜溫涼解毒之劑兼用之可也

痘疹格致要論

卷八

八

或曰陳文中治痘之法行之久矣人或喜而取之或畏而舍之何也曰舍之不敢用者固不知文中立法之善取而用之者亦不知文中制方之本旨胥失之矣文中有言曰熱則氣血和暢自然出快又曰表裏俱實則不致痒癩此發前人所未發乃千古不刊之秘也觀其痘疹引證或因泄瀉或因寒戰咬牙足指冷或因痒癩或因瀉渴不止皆脾胃肌肉虛氣血衰津液少故用木香散異攻散再加丁香官桂以治之今則不審虛實於起發光壯表裏皆實者驟而用之可乎

或曰人有終身不出痘者何也曰痘乃胎毒又名百歲瘡天下之人豈有無父母而生能逃於造化之外者哉但云受天地之氣稟父母之清氣氣清質粹無有穢毒當天令種痘之年

出一兩點而不覺也竟直終身不出乎

或曰世俗保養痘子者習用僧道洒水誦呪以解厭可乎曰世俗已久不能遷改用與不用從其所好不可阻止設有變怪歸咎於醫而悔僧道之未用矣

痘疹格致要論卷之九

治痘凡例

凡發熱疑似之間宜用人參敗毒散一劑以發之是與不是一發便明大抵瘡疹只要發盡不使留伏於中也

凡初發表要看天時如時大寒則應理閉密氣血凝滯防其發泄得遲有毒氣壅遏之變以辛熱之藥發之宜桂枝葛根湯五

積散八去乾姜主之如時太熱則應理開張氣血滯滯防其發泄太急有潰爛之變以辛涼之藥解之宜升麻葛根湯一雙

解散四主之如不寒不熱天氣溫和只人參敗毒散二甚佳凡初發熱二三日間有驚搐者以導赤散五羌活湯十辰砂散

八主之太便秘者三黃丸八微利之小便澀少者導赤散五渴甚者葛根解時湯二十腹中痛者桂枝大黃湯九腰痛者

人參敗毒散二自利者黃芩湯四吐利者黃芩加半夏湯如脾胃素弱自利清白者理中湯九或四君子湯十肉豆蔻

丸三合而服之

凡痘子出現疎則毒輕不可妄治密則毒甚却要磊落大小分明不相粘連略與托裏解毒之劑快斑湯五消毒散六主之使之

易發易靨如出太密粘連模糊其毒尤甚托裏解毒之劑宜多飲之以防痒癢黑陷之變更察外證可治則治不可則勿治

凡痘子出形皮肉如常根苗明潤此毒輕也不可妄治如皮肉昏

黑或赤腫根苗乾枯青紫成灰白者此毒甚也以消毒散六木命丹七合服

凡痘子已出自放標之日等起如當起發不應有某先有或變者如當作漿不應收醫便有乾收者此皆惡候治之無功

凡痘子之出最要唇潤舌潤紅鮮如常其毒則輕如唇焦破裂舌燥有芒為毒火太甚表裏鬱遏急宜解之黃連解毒湯八加大力子東垣涼膈散更妙

凡痘子已出頭面要稀磊落頰項上宜少不宜多胸前要少而疎如此者其毒則輕如面上模糊一片未發先腫頰項稠密胸臆亦密此毒甚也慎勿治之

凡痘子物出磊磊落落似稀疎之狀其後旋加日多一日此毒伏於裏裏氣虛弱不能使之即出要大補兼解毒或什可救其二三也十宣散三十加無價散七十主之

凡痘子物出便自手足先出者也處未起而手足先起他處未收而手足先收者此陽火大旺宜用解毒抑陽扶陰之劑四物湯九合黃連解毒湯八十主之如他處俱起而手足起遲他處俱收而手足不收者此脾胃虛弱不能行其氣血達於手足宜補脾胃十全大補湯八十桂枝芍藥湯九十主之

凡痘子出盡正漿起發其中有發血泡者此毒伏於心即死有發水泡者此毒伏於肝旋見痒癢而死

凡痘子始出須問咽喉痛與不痛但有微痛急與解之令得疎瀋其枯湯七加牛蒡子主之大抵痘家要以解咽喉為急務不知此義以致失聲乾噤水谷不入噴衄而出悔無及矣

凡痘子不渴者裏無熱也不須妄治渴者有熱此亦常候切不可與冷水瓜梨柿糖漿之屬恐損脾胃致生他變小渴者以炒米湯與之大渴者人參麥門冬散二十主之痘子稠密津液少者補中用十全大補湯八十解毒用葛根解毒湯二十相間服之自利而渴輕則白朮散三十甚則陳氏木香散五十主之

凡痘子大便小便自調則裏氣和無留邪也故小便宜長而清如小便赤澀導赤散五十小便短少八正散六十瘡出太密小便不通者連翹湯八十蓋瘡子發熱不可驟去惟利小便以折其

鬱如痘稠密小便少者此氣血衰少津液虛耗非熱也不可利之反損真陽之氣十全大補湯八十主之能食者大便宜潤有入必有出也不能食者大便宜實存舊各氣以養氣血也如四五日不行大便結燥者用膽導法五十導之不通以三黃丸微利之八如大結腹脹者以三乙承氣湯三十下之如大便泄瀉即止之蓋痘瘡要裏氣實恐瀉得脾胃虛也輕則理中湯九十

益黃散四十五菟丸四十甚則陳氏木香散五十異攻散六十主之

凡痘子大便出血者看其血來何如又看是何時如瘡子正壯大



便數日未行血從衄出者此肛門傷血出也如瘡已收大便  
血者此倒靨之血也非此二類但溺血便血者乃臟腑敗壞陰  
血妄行必死之候

凡痘子腹中嘗宜寬舒為裏無邪若腹脹滿瀉其傷食否及大  
小便何如如增傷食微瀉不瀉者木香大安丸九 脹滿腹痛  
甚者丁香脾積丸三 小便不通百祥丸二 大便不通者宜

風散九 主之此上諸證皆實脹者也故宜利之若自利腹脹  
乃虛脹也陳氏木香散五 主之

凡痘子手足常宜和暖頭宜涼故頭熱手足冷者不治如因泄瀉  
手足冷者此脾胃虛弱也陳氏木香散五 異攻散六 聖藥

也如大熱者大便秘煩躁手足冷者此陽極似陰也三乙承氣  
湯主之三 凡手足冷者惡候也手足諸陽之本陽脫故冷也

凡痘家能食者不問稠密皆吉不能食痘雖疎亦難發難發者  
者危蓋人絕水穀則死表裏皆病則困也有欲食而不能食者  
必喉舌有痘作痛艱於吞嚥也宜以爛粥米飲頻頻與之以助

脾胃之氣更以甘桔湯七 加牛旁子以解咽喉利胸膈也

凡痘瘡飲食之間毋令太饑毋令太飽毋太寒毋太熱以損脾胃  
但與糜粥爛飯淡薄滋味以養之切忌肥甘煎炒五辛一切動  
風動火之物

凡痘子出得稀疎者自然易發易靨不可妄治若瘡稠密常患其

此氣血俱虛也用十全大補勿三 加燒人屎牛旁子與之如  
有青乾者內服快狂湯五 加燒人屎合奪命丹七 與之外內四  
聖散七 合臘脂塗法七 或用胡荽酒七 或用水楊湯八

法七 務求光壯紅活而後已如中間有成水泡者防其痒癢  
宜先補脾胃疎風瀉火使肌肉實不作痒可也十全大補湯八

加防風大力子主之

凡痘子貴在調養如天大寒蓋覆常宜溫煖勿使受寒恐毒氣為  
寒所觸而不得出也如天大熱不可蓋覆却宜清涼勿使客熱

與毒相併致增煩躁使瘡潰爛也如時有迅雷烈風暴雨之變  
宜謹帷帳添蓋覆多燒辟穢香九 以避一時不正之氣勿掃  
房室勿動溝渠勿溷廁恐穢氣觸瘡而增痒痛也勿燒諸香

恐其動火也

其門戶常須關閉伏事之人選其謹厚潔淨者無狐臭者使之看  
守保護內者勿出外者勿入恐有不潔觸犯其瘡也痘家所忌

男女房事及氣氣最毒其他則婦人月事酒氣五辛之氣遠行  
染帶之氣皆宜避如夜房室中有靈響此不祥之兆也

其病者外處常要無風又要通明切忌幽暗夜靜不斷燈火不雜

人看守恐要飲食一時得其或右疔痛與之無摩恐他人未必盡心也

凡痘子膿成漿熟或痒誤犯破者只從灌爛不能成痂若膿漿未成之時不可犯破半箇必然痒瀉而死

凡痘子勢重者以脉候之脉洪實者舌浮數虛小者凶故云脉靜身涼者生脉躁身熱者死又云陽病得陰脉者死

凡痘子痒痒者須於形色上詳審如瘡一向起發紅活光壯肥滿忽然痒痒者此穢氣所觸也宜內服十全大補湯三十外用茵陳蒿湯八十其破者以白龍散七十如瘡本乾枯又添

痒痒者火甚也如瘡原帶木皮肉嫩薄又痒者此濕熱也擺頭扭項手動作昏悶者死證也

凡痘子已熟忽作痒痒者此脾胃虛弱不能榮養肌肉也內服四君子湯十加黃耆廿桂枝外以敗草散十主之如因自利脾胃虛致痒者陳氏木香散二十具攻散二十主之

凡痘子出盛軟軟者此肺中有火或咽喉有瘡作痒也只用其精湯七加牛旁子多服良如涎唾帶血此咽中瘡或齒縫中出也

不須妄治

凡痘子黑陷古方用穿山甲者以其穿腸透膜而善走也用人牙者取牙齒乃骨之餘賢主骨可以入腎也此二物者但借為向導鮮毒之劑以施治則可若單用之何濟於事哉有用燒人

者蓋尿大解痘毒痘乃時疫所發故宜用之若加入發表紅鮮毒湯內尤良

凡痘子已出之後最怕泄瀉恐脾胃虛寒氣弱不能助瘡成就反致倒陷以理中湯三十肉豆蔻丸三十合而治之如泄久不止瘡痒癩手足冷寒戰咬牙者陳氏木香散二十具攻散二十主之

凡痘子寒戰咬牙足冷者惡候也急用陳氏之法救之瘡壞者勿治

凡病痘者瘡本稠密轉動之間身體振搖者此一身被瘡所困不能支持轉動艱難之狀不可便作寒戰妄投熱藥也有只咬牙者此心肝二經火旺也蓋肝虛咬牙心熱者亦咬牙勿便作不治論

凡痘子已熟不肯結痂潰爛者其人必不能食或曾吐瀉脾胃虛弱也內服十全大補湯三十外用敗草散十主之如大便不通此內熱也用膈導法五十以去其結糞外以天水散九十蜜水調刷以解肌表之熱

凡痘子收後目癰澁羞明或淚出者此肝火虛旺也瀉肝明目散五十如目中膈膜遮睛者蟬蛻散九十主之

凡痘子收後發癰毒者要分經絡論氣血多少而治不可妄用利藥宜大補氣血蓋此時氣血已虛十全大補湯三十加忍冬

痘疹格致要論 卷九

主之外用敷貼後毒膏九十主之

凡痘子用藥須分氣血虛實毒氣甚微而治故灰白者不起者

疔瘡乾者不紅活者膿水少者皆血虛也宜用補血之劑稠

者掀腫者皆毒甚也宜用解毒之劑陷伏者蒸氣血解毒治之

凡用補氣宜四君子湯如瘡帶溫或有白利用之可也若瘡乾者

白木糠液茯苓漆津液或便秘實者不可用也

凡用補血宜四物湯如瘡乾或色大嬌用之可也若不能食者生

地黃泥隔白芍藥以飲腸胃不可用也

凡解毒不過黃連黃芩黃柏梔子連翹牛蒡子升麻之屬俱用酒

煎恐其寒涼反損脾胃也若欲行表須少加桂枝他如紫

豆根葛根之類則不必用酒制矣

凡用解毒藥要別臟腑分陰陽而治之如黃連解毒心火黃芩解毒

火梔子解毒肝火黃柏解毒腎火三焦火石膏解毒脾胃火木通解毒

若疔瘡寒戰咬牙渴不止痘紫黑色喘渴不寧灰白色頂陷

腹脹頭溫足冷悶亂飲水氣促泄瀉渴如此候者不必服藥雖

強治之亦無功也

凡治痘瘡善攻不如善守表裏無邪不須妄治有等貪利之人不

分虛實妄投湯丸謂曾治某病治某病貪天功以為已有者以

致虛虛實實致生變異其性命此醫之罪也

時俗出痘子者謂是天瘡不肯請醫看治但謂僧道呪水解毒

以成風毒之輕者能食者幸以痊愈設或變證一出不可救療

護之於命而不知省此時人之罪也

凡治痘子要識證候如痘根紫紅潤不渴乳食不減四肢

肢溫和身無大熱如此者不須服藥惟善調護以待成就而

多用之

痘疹格致要論卷之十

藥性主治及修製法

痘疹之法其要在分氣血虛實及發表和中解毒三治而已經曰辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰又曰清陽發腠理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰歸六腑又曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味味歸精氣歸神可見藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味浮沉升降補瀉之用各有所宜不可不知也本將痘疹合用之藥分氣血解毒三類各具性味主用修製於下以便觀覽檢閱之暇未必無小助也

氣類

人參味甘氣溫氣味俱薄浮而升陽也入手太陰肺經足太陰脾

經

補上焦元氣升麻為之使補下焦元氣瀉腎中之火邪茯苓為

之使主補五臟生津液止渴治脾肺陽氣不足胃中冷吐利

擇堅實白淨者佳去蘆用肺熱咳甚者少用以苦茶湯浸過

無妨

黃耆味甘氣溫平氣薄味厚可升可降陰中陽也入手少陽三焦

手太陰脾經足太陰脾經○性畏防風黃耆得防風其功愈大

蓋相畏而相使也

補肺氣實皮毛蓋治脾胃虛弱瘡瘍血脈不行內托必用之藥

也止虛汗去肌熱又治消渴腹瀉泄利

擇柔韌皮微黃肉中白者佳瘡家宜生用補虛宜炙用痘子不發宜酒炙透用手足瘡不起以桂枝煎酒浸過炙用

白朮味甘氣溫味厚氣薄可升可降陰中陽也入手太陽小腸手少陰心

主足陽明胃足太陰脾足小陰腎足厥陰肝經

主溫中強脾胃進食止下洩利小便和中益氣生津止渴

擇內白而堅者去蘆刮去外黃皮用有油者中腐者勿用蒼乾者禁用燥溫故也止洩用東陳壁土炒過用

蒼朮味苦甘辛氣溫味厚氣薄可升可降陰中陽也入足陽明胃

足太陰脾經

主除惡氣辟疫癘氣健胃安脾寬中進食發汗故蒼朮發汗白

止汗

擇堅實中白淨者刮去外粗皮令白切片以糯米濃泔浸透

攤出晒乾取向東陳壁土炒黃色用瘡溫痒者及不結痂宜

用之痘家常宜燒之以辟不正之氣勿製

陳皮味辛苦氣溫氣薄味厚浮而升陽也

導滯氣止嘔欬吐逆去白理肺氣降痰癩白理脾胃消食

擇紅黃色陳久者佳用溫水洗淨去白者去白留白者略去

筋膜切晒乾用止吐者以東向陳壁土炒過用

苦味以苦辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也入手少陽三焦經是也  
陰肝經

散滯氣瀉肝氣消食破積

擇小而皮薄者陳久者佳用溫水洗浸切開去中穢與白令  
淨剉碎晒乾此痘瘡必用之藥能瀉肝令不成水泡而作痒  
也又起發遲者痒癩者並不可缺

石菖蒲味辛苦氣溫

通九竅出音聾主癰腫疥癩遍身熱毒痛痒

於山澗中取之不聞人聲及不露生者擇節密者佳刮去外  
粗皮齋麥粉搗神昏者必用之瘡後不着痂潰爛成瘡

疥者宜入丸用

五味子味酸氣溫味厚氣輕陰中微陽降也入手太陰脾足少陰

腎經

主欬逆上氣生津止渴

擇肥大潤澤者佳去梗酒洗淨晒乾痘家欬甚者宜用

貝母味辛苦氣平微寒

主欬嗽上氣消痰又敷惡瘡能飲瘡口

擇白而肥大生者佳去心溫水洗過切晒乾用

細辛味大辛氣溫氣厚於味陽也少陰經藥

散水寒治內寒消死肥又主喉痺

擇細莖氣烈者佳去蘆并葉以溫水洗過晒乾宜少用  
初發表及痒癩者用之良

乾姜味辛氣大熱氣味俱厚半沉半浮可升可降陽中陰也

能溫脾理中止吐瀉去臟腑沉寒生用發諸經之寒其餘炮用

擇新者溫水洗浸火灸令胖鬆用惟內虛泄利不可缺內實  
者戒用

生薑味辛氣微溫氣味俱輕陽也

益脾胃散風寒治痰嗽止嘔吐能殺半夏之毒

擇老者水洗去泥勿去皮用痘瘡不起發灰白色者宜用之  
如起發光壯紅綻者不可用若止嘔吐須去皮紙包慢火中

煨過用

麻黃味苦甘氣溫氣味俱薄陽也輕清而浮升也手太陰肺之藥

入足太陽膀胱手少陰心陽明大腸經榮衛藥也

發散風寒泄衛實去榮中寒又消赤黑斑毒

衍義云病瘡痘倒靨黑者麻黃去節半兩以蜜一匙同炒良久  
以水半升煎去上沫再煎去三分之一乘熱盡服之避風同其

瘡復出一法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效

擇陳久者佳摘去根節先用沸湯泡過三次晒乾細切又以

蜜酒各半浸良久再晒乾用瓦器炒令焦黑色凡痘疹出後

及痘子黑陷者倒靨者並宜用之

白芷味辛氣溫氣味俱輕陽也通行手足陽明經

主一切瘡疥排膿止痛內托生肌

擇白而堅實者去蛀者內青黑者不用凡痘瘡發表及潰爛者手足發癰毒者並宜用之

附子味辛其氣大熱其性走而不守可升可降陽也

補助陽氣不足溫熱脾胃治四肢厥逆

擇頂平而圓重實兩者佳先以童便浸過紙包慢火中炮令極熱去皮嚼切片再用防風甘草煎湯乘熱浸過曬乾用之惟痘瘡世瀉內虛手足冷寒戰咬瘡灰白色或痒癢者可用之其餘不可妄用

半夏味辛苦氣平沉而降陽中陰也入足陽明胃太陰脾少陽膽

經化痰止嘔吐益脾胃之氣

擇白淨脰正而圓者佳用沸湯泡洗令滑盡切片曬乾若止欬化痰再用生姜自然汁浸過凡渴者禁用燥津液故也

承氣味辛苦氣溫味厚於氣陰中之陽沉而降也

主邪氣辟毒瘴能調氣和胃散肺中滯氣止瀉瀉

傷寒類要云天行熱病若發赤黑斑木香二兩水二升煮取一升頓服

升頓服

擇形如枯骨粘牙者佳不宜見火諸湯中宜磨服之此

皮乃痘瘡切要之藥以其能行氣也惟泄痢惡疔煎服

肉且斃味辛苦氣溫入手陽明大腸經

擇油色肥實者佳用麩包裹慢火中煨熟乘熱以重紙包起去油入丸藥內用乃內虛泄瀉之要藥非此勿用

砂仁味辛苦氣溫入手足太陰經陽明經太陽經

主虛冷瀉痢治脾胃氣結滯不散

擇無殼米堅實者佳研碎入藥凡痘瘡內虛泄利者宜用傷食者不可缺若婦人妊娠出疹痘者又宜用帶殼者炒過研碎入藥乃安胎之聖藥也

桂枝味辛甘氣熱氣味俱薄體輕而上行浮而升陽也入手少陰經

桂枝入足太陽經

通榮衛開腠理和氣血散風寒

痘瘡不起發不光壯非此不可乃發表之要藥也

擇薄而味厚者佳刮去粗用手足痘子發不透者宜此引經

若瘡痒癢寒戰咬牙者宜加用之若內虛腹痛用厚而味辛者刮取內肉名桂心惟妊婦出瘡不可用以桂能墮胎故也

茯苓味甘淡氣平氣味俱薄能亦能降陽也白者入手太陰足太

陽少陽赤者入手太陰足太陰手少陽少陰經

抱根生者名茯神

調胃氣伐腎邪降肺火益氣力止瀉利小便生津液凡補中

不足用白欬利小便用赤蓋白者能補赤者能利也並剝去

皮用如心熱神昏者用枳殼去皮與水中用

丁香味辛氣溫純陽入手太陰肺足陽明胃少陰腎經主溫脾胃

止嘔逆去胃中寒

凡痘瘡泄瀉脾虛弱不足者必用之若瘰癧癰疽咬牙足冷

者此與桂並宜加用之蓋丁香救裏官桂發表也非此訂不

可用

藿香味辛氣微溫氣厚味薄浮而升陽也入手足太陰經

助脾胃開胃溫中快氣治吐逆為最要之藥

葉擇取其者帶芳香之氣佳去桂莖以水洗去晒乾用入烏

藥順氣散則理氣入黃耆四君子湯則理脾

檳榔味辛苦氣溫氣厚味厚沉而降陰中陽也

消穀逐水除痰癖破滯氣泄胃中至高之氣能合藥口

擇形若雞心正稜尖長心不虛中有錦文者佳痘疹家性轉

利藥內用之研細末入藥能墜諸藥至於極下也

枳殼味苦酸辛氣微寒氣厚味薄浮而升微降陰中陽也

主胸膈痞塞散結氣逐水消脹滿安胃化痰涎消食又治通身

風疥大風在皮膚中如麻豆苦痒通利關節主皮毛胸膈之病

擇陳久堅厚不爛不蛀者佳以溫水洗浸刮去穢白麩炒

熟用此痘瘡必用之藥故四聖散有枳殼以能治通身

苦痒又能開胃消食利五臟通關節也

枳實味苦酸氣寒大抵與枳殼同○殼大性詳而緩治高者主

氣治在胸膈實小性酷而速治下下者主血治在心腹故有高

下緩急之分

消食散敗血化心胸痰主風痒麻痺通利關節逐停水消脹滿

擇陳久肉厚不蛀不爛者佳以溫水洗浸去穢白麩炒令熟

可用

厚朴味苦辛氣溫氣厚味厚體重濁而漸降陰中陽也溫中益氣

厚腸胃走冷氣消宿食治腹痛脹滿散結之神藥

擇肉厚紫色者佳刮去粗皮以生姜自然汁塗慢火上炙令

透對用凡痘瘡腫非此不除

烏藥味辛氣溫

主中惡心腹疝毒疔疔疝氣宿食不消天行疫瘴治一切惡

擇肉白者佳刮去外粗去蘆用乃發表中藥

巴豆味辛氣溫○此斬關奪門之將不可輕用

每條五臟六腑開通閉塞利水殺道

去殼擇取肉白者去皮膜與心以銀石器慢火炒令黃色搗

爛如膏又以重紙搗去油自散如霜入丸藥中惟傷食積

作痛可用

大腹皮味辛氣微溫

下一切氣健脾胃

鴉鳥多棲此樹上細分開先以酒浸洗去濁仍以大豆汁洗之晒用

吳茱萸味辛苦氣溫大熱氣味俱厚陽中陰也入足太陰少陰厥

陰經

主溫中下氣治脾胃傷冷嘔逆胸滿

擇粒小者去枝梗先以沸湯浸去苦汁凡六七遍晒乾於瓦

器內慢火炒過惟痘瘡飲冷傷胃嘔逆不止者用之

紫蘇味辛甘氣溫

鮮肌發表治心腹脹滿開胃下食

痘疹發時論

卷一

用葉惟發表湯藥用之手授令碎

大棗味甘氣平溫氣厚陽也

安中養脾助十二經平胃氣補少氣少津液身中不足

擇肉厚味甘者佳水洗過劈去核凡補藥不可缺若用作丸

去皮核搗爛如膏用之

牽牛子味苦氣寒火善走

主下氣利大小便以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血大

瀉元氣用者戒之不張滿不大便秘者勿用

取黑者炒過研取頭末入丸藥內用痘疹黑陷大小便不通

煩躁者宜用之非此證不可妄用也

烏梅味酸氣平陽也

收肺氣止下痢遊腸止洩去痰止渴

擇多肉者以溫水浸洗去核令淨用

杏仁味苦氣溫入手太陰經

主欬逆上氣下氣定喘潤心肺散肺經風咳救消心下急滿癰

散結潤燥

擇取雙仁者以湯浸去皮尖炒令黃色研爛如泥用

梗米味甘氣平微寒入手太陰少陰經

王益氣止煩渴止洩平和五臟補益胃氣其功莫及杵令精潔

為藥粥常用之良其泔水者煮溫止渴尤佳

痘疹發時論

卷一

陳原米味甘鹹酸氣溫

除煩渴開胃氣止洩

取多年倉庫中香黃者佳凡痘瘡泄渴甚者可用此炒熟煮

湯飲之

酒味苦甘辛氣大熱 行藥勢能行諸經

凡痘瘡解毒藥酒浸洗炒用可以通行一身之表

赤石脂味甘酸氣溫陰中之陽

止洩痢遊可去脫赤石脂為收斂之劑也

擇赤色細膩者佳研極細入丸藥內用痘疹泄利者非此不

可



梓白礬味酸溢氣寒

止洩利與赤石脂同功又治痔瘡

擇白淨光明者以瓦礮盛之固濟火煨過用入凡藥中單以

止洩

漿水味甘酸氣涼微溫

主調中引氣開胃止渴解煩去睡

以熟棗米入水洗新鮮白花者佳陳久者不可用痘疹大渴

宜飲之

骨味辛氣平微寒腸也

主脫固氣遊腸

真格散

擇白者研極細入丸痘疹惟滑洩者用之

麝香味辛氣溫

取當門子痘疹惟黑陷者用此引發表解毒之劑直入骨髓透

臟腑拔除毒氣使之發散也非黑陷與伏切忌妄用

穿山甲氣微寒

取嘴瓜上甲以東向陳壁土拌炒令焦黃色研極細此與射香

同功痘疹陷伏者借此引導諸藥非陷伏者勿用反耗氣血也

血類

當歸味辛甘氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手少陰心足

脾厥陰肝經○頭止血身和血尾破血全用無效

治血通用能使氣血各有所歸故名當歸和血補血破惡

補不足 擇肥軟者去蘆以酒洗淨晒乾如痘子血熱者用尾血虛者

用頭身

川芎味辛氣溫氣厚味薄浮而升陽也少陽引經入手足厥陰經

上行頭目下行血海通肝經血中之氣藥也散肝經風頭面風

不可缺溫中散寒開鬱行氣燥溫

擇形塊重實如雀腦色白者佳凡頭面瘡不起發或作痒者

非此不可白芷為之使

芍藥味苦酸氣微寒氣薄味厚陰也降也陰中之陽入手足太陰

經

抑肝緩中扶陽收陰補血散惡血脾經之藥白者補赤者瀉赤

者利小便下氣白者止痛散血冬月減芍藥以避中寒

凡痘疹初發表或血熱或小便不利並用赤如氣血虛脾胃

弱及和中並用白俱酒浸透切片晒乾炒過用之如瘡痒癩

或手足不起發者此脾虛也只用白者以桂煎酒浸炒用

地黃味甘苦氣寒氣薄味厚沉而降陰也

生者火寒入手太陽經少陰經涼血生血補腎水真陰不足瀉

脾中溫熱及血熱○熱者微溫入手足少陰經厥陰經大補

衰

衰

擇肥嫩大者水浸驗沉者乃佳陰乾生者名乾地黃死瘡  
血熱者瘡乾枯者身大熱者宜用之酒蒸黑爛者名熟地黃  
凡血虛者宜用之並酒洗浸晒乾用

天門冬味苦耳氣寒氣薄味厚陰也入手太陰肺足少陰腎經  
瀉肺火療熱侵肺吐衄妄行定肺氣欬逆喘息促急潤燥止消  
渴

擇肥大者湯浸去皮去心晾乾用肺火甚者非此不除  
麥門冬味甘微苦氣平微寒陽中微陰入手太陰肺經  
治心肺熱瀉肺中伏火及治血妄行主口乾燥渴病後虛熱能  
潤經復脉益血除煩

擇肥大者去枝梗湯浸去心用不則令人煩痘疹燥渴最宜  
多用  
蓮花味辛甘苦氣溫陰中之陽  
多用則破血少用則入心養血和血與當歸同功  
子吞數粒主天行瘡子不出○汁及臘脂能點黑斑凡痘瘡色  
紅紫者血熱也用花以酒洗晒乾入藥瘡子黑陷用子以酒浸  
晒乾慢火微炒研爛入藥

牡丹皮味辛苦氣寒陰中微陽入手厥陰經足少陰經  
主驚癇和氣瀉陰中火除衄血吐血  
擇肉厚去心用痘瘡血熱者宜之

牛膝味苦酸氣平

主四肢拘攣不可屈伸活血生血能引諸下行腰腿之疾不可  
缺

擇長大而柔潤者佳去蘆酒洗陰乾用  
蒲黃味甘氣平  
主利小便止血消瘀血治一切吐衄腸風血痢尿血若破血消  
腫即生用補血止血則炒用

續斷味苦辛氣微溫  
主傷寒補不足調血詠止痛生肌  
擇節節斷皮黃皺者加酒浸晒乾用

茅根味甘氣寒  
補中益氣利小便除瘀血止消渴解腸胃熱  
掘取新者擇肥大白淨者搗碎絞取自然汁入藥

天小薊根氣甘苦氣溫  
主養精保血止吐血衄血下血  
婦人豈痘疹經血妄行者非此不可

香附子味甘氣微寒陽中之陰  
能下氣開鬱又逐去疑血炒黑能止血凡血氣藥必用之能引  
血藥至氣分而生血婦人之仙藥也

石臼中杵淨勿犯鐵以童便浸晒乾炒黑杵末用

苦氣寒陰也入是少陰手少陽

主五內邪氣熱中消渴及去肌熱涼血涼骨

擇肉厚者溫水洗淨去骨晒乾用此與牡丹皮同為解肌熱之劑但牡丹皮解無汗骨蒸地骨皮解有汗骨蒸

蘇木味辛酸鹹氣平陽中之陰

主破血非膿止痛消癰腫

劉碎酒浸復取濃汁入藥

桃仁味苦甘氣平陰中陽也入手足厥陰經

主瘀血血閉血結血燥通利大腸

擇去雙仁者以湯浸去皮尖研如泥用此與杏仁同潤大腸

但杏仁治氣秘桃仁治血秘

痘疹格致要論卷之十一

解毒類

耳草味甘氣平生寒熱溫陽也無毒入足厥陰太陰少陰經

主五臟六腑寒熱邪氣解毒溫中止渴解百藥毒緩能解諸急

熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒○生用大瀉熱火消瘡道

中積熱去莖中痛節生用消腫導毒

刮去皮凡痘疹常用取小者生用惟大補取大者炙熟用若

欲解痘毒氣於冬至日將耳草刮去皮以竹筒一頭留節

盛一頭以物塞定置廁缸中四十九日取出用名人中黃餅

痘疹惡毒最佳

黃芩味苦氣平寒味薄氣厚陽中陰也可升可降入手太陰肺經

主諸熱解在肌風熱世肺中火邪及胃中濕熱主天行熱疾利

小腸

枯蘗者名宿芩入肺經酒炒上行○圓實者名子芩入大腸除

熱

刮去外粗切細以酒浸晒乾再浸再晒酒盡為度瓦器慢火

炒佳用如孕婦出瘡疹者擇條突黃芩以水浸試沉水者佳

生用勿以酒炒清熱降火為安胎聖藥也

黃連味苦氣寒味厚氣薄陰中陽也可升可降入手少陰心經

黃連味苦氣寒味厚氣薄陰中陽也可升可降入手少陰心經

熱毒瀉心火止驚降止消渴調胃厚腸除脾胃中濕熱主熱氣目痛及諸瘡腫毒必用之

梅師方云傷寒病發豌豆瘡未成膿黃連四兩水三升煎一升去滓分服

擇肥大堅實者刮去鬚毛切細以酒浸晒乾再浸再晒酒及為度瓦器慢火炒焦用着月出疹子生用

黃蘗味苦微辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也足少陰經藥太陽引經藥

主五臟腸胃中結熱瀉膀胱熱清小便降相火  
擇紫厚鮮黃者刮去皮切細酒製如上法連法

梔子味辛氣寒氣薄味厚輕清上行氣浮而味降陽中陰也入手太陰經

主五內邪氣胃中熱氣善除心中客熱虛煩不得眠又大病後亡血亡津液臟腑無潤養內生虛熱非此不除又能屈曲下行降火

擇七稜及肉鮮紅者去內熱用仁以酒製如上法連法去肌表熱和皮用亦以酒製如上法

連翹味辛氣平微寒氣味俱薄陽也可升可降乎足少陽經陽明經藥入手少陰心經

瀉心火降脾胃濕熱除心經客熱主諸毒惡瘡有神功

去穢去穢以酒浸過晒乾研細用

小豆根味苦甘氣寒  
主解諸毒消瘡腫治咽喉腫痛尤解痘毒

經驗方患瘡豆瘡水研山豆根少許服  
凡用研水入瘡內服

牛旁子一名惡實一名氣粘子一名大力子味辛苦氣平  
主療風毒腫瘡疹喉脾風熱痰壅咽隔不利頭面浮腫

王氏博濟治瘡泡將出以牛旁子炒令熟杵為末每服一錢入荆芥穗水一盞同煎至七分放溫服如瘡疹已出更服亦如以酒淘去沙土又擦去浮面者不用取沉重者晒乾瓦器上

炒令聲盡研細用此痘疹必用之藥  
羌獨活味苦甘辛氣平微溫氣味俱輕浮而升陽也

紫色而節密者為羌活手足太陽引經藥又足厥陰少陰經藥黃色而作塊為獨活足少陰行經之藥

俱透關利節乃撥亂反正之主  
擇去腐爛者痘瘡發表必用之二活皆不可缺

升麻味苦甘氣平微寒味薄氣厚浮而升陽也陽明經引經藥亦走手陽明太陰經

王鮮百毒辟瘟疫邪氣時氣瘡家之聖藥脾胃解肌肉間熱及發散本經風邪若元氣不足陽氣下陷者用此升提陽上行

聖惠方治小兒斑瘡及豌豆瘡心躁眠卧不安用川升麻一味不許多少細剉水壹盞煎去滓取汁以綿沾汁洗拭瘡上

外臺秘要比歲有病天行時病發斑瘡頭面及身須臾周匝狀

如火燒瘡皆戴白漿隨生不治數日必死差後癩癧彌歲方瘵

此惡毒之氣所為以水煮升麻綿沾洗之

擇形輕而黑堅實者第一細小皮青綠色者亦佳謂之雞骨

升麻去黑皮及腐爛者如瘡出遲起發遲者以酒洗過用

葛根味甘氣平性輕浮陽也足陽明胃行經藥

主消渴身大熱解毒解肌發表出汗治脾虛而渴能升提胃氣

除胃熱治天行時病壯熱煩渴熱毒

擇白淨多粉者佳削去皮凡發表解肌熱切細用若止渴搗

碎以糯米泔瀝取粉用

防風味甘辛氣溫純陽脾胃二經行經藥太陽經本經藥乃卒伍

卑賤之職隨所引而至者也

馮肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥

擇實而脂潤頭節堅者佳去蘆并又頭又尾者不用發表不

可缺如瘡痒者與黃耆同用如手足瘡不起發者與白

桂枝同用瀉以酒洗之瘡太濕者用之風勝濕也瘡乾者

用之又樂中潤劑也

荆芥穗味辛苦氣溫

辟邪氣通利血脉傳送五臟能發汗動渴又主瘡癩疥結毒瘰癧

按取花實成穗者去灰土用凡痘子出發不快不透者不

缺

桔梗味辛苦氣微溫味厚氣輕陽中之陰

治鼻塞咽喉痛及喉痺利咽胸膈之氣治肺熱嗽逆消痰延

肺癰又能開提氣血能載諸藥不下沉故各舟楫

擇白淨堅實者截去頭及兩畔附枝切片以米泔浸一宿陰

乾用

柴胡味辛氣平微寒氣味俱輕陽也升也少陽經厥陰經行經之

藥

主寒熱邪氣推陳致新又能引清氣行陽道升提胃氣上行素

令

擇獨根柔軟者去蘆又尾者發表退熱用之

前胡味苦氣微寒

主心腹結氣治時氣發熱推陳致新去痰實下氣最要

擇肥實柔軟獨根者佳去蘆又尾者

石斛味甘氣平

治胃中虛熱有功平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱癰痛及脚氣

弱

擇取新者去枝節酒洗蒸過用

味并鹹氣寒

主利水道小便淋瀝雖利小便而不走氣療肝中風熱衝目赤痛

擇去沙土研細入藥凡痘疹小便不通最宜

白蒺藜味苦辛氣溫微寒

治身體風痒去惡血長肌肉明目輕身

擇白者炒先搗去刺後研細入藥痘疹癢癩者宜此

玄參味苦鹹氣微寒足少陰經君藥

此乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁治空中氤氳之氣

無根之火此乃聖藥也

擇肥大者去蘆稍勿犯鐵

爵金味辛苦氣寒純陽

主血積下氣凉心止血破惡血此芳草也因輕陽之性古人以

治鬱遏

擇圓而長如蟬肛色赤如姜黃者痘疹陷伏須此發之

草龍膽味苦澁氣大寒氣味俱厚沉而降陰也

除胃中伏熱時氣溫熱止驚惕治兩目赤腫睛脹疼痛不可忍

去蘆酒洗淨再浸晒乾用瘡疹目赤痛非此不除

防已味辛苦氣平寒陰也通行十二經

主肺氣喘嗽殺癰腫惡結諸蝎疥癬垂瘡除邪利大小便

漢主水氣木主風氣

擇文如車輪堅解者佳如治欬生研末入丸用如治痘疹陷

伏瀆酒洗浸晒乾用

瓜蒌根味苦氣寒味厚陰也

主消渴身熱煩滿大熱惡乾口燥排膿消腫毒生長肌肉

新取入地深大而有粉白者佳凡痘疹潰爛削去皮用如

天花粉陰乾用

苦參味苦氣寒沉純陰

治時氣惡病大熱及遍身熱細疹痒痛治大風有功削去皮切

細酒浸蒸再浸再蒸酒盡為度陰乾凡痘疹癢癩潰爛如類以

此作丸效如咽喉痛生研細末用

茵陳味苦辛氣平微寒陰中微陽入足太陽經

解傷寒煩熱行帶氣化痰利濕

擇陳久者佳凡夏月瘡疹熱甚小便不利者宜用如痘子癢

痒可為薑藥以能去濕熱也

知母味苦辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也足少陰經本藥

主消渴熱中補腎水瀉腎中火消痰止咳潤心肺患人虛而口

乾多用

擇取肥實肉白者去皮毛勿犯鐵性疹子多用之

馬兜鈴味苦氣寒

主肺熱咳嗽氣上逆痰結喘促

只取向裏面子去殼膜炒用

大黃味苦氣大寒氣味俱厚沉而降陰也入手足陽明經

蕩滌腸胃推陳致新通利水穀性走而不守瀉諸實熱不通心腹脹滿下大便結燥號稱將軍取其蕩滌峻快也

擇堅實錦紋者佳切以酒浸蒸九浸九蒸晒乾用痘瘡惟大便不通腹脹煩躁者宜之不可妄用

聖惠方治時氣發疏豆瘡用川大黃半兩微烘以水一大盞煎服

葶藶味辛苦氣大寒

治肺壅上氣欬嗽喘促痰飲通利水道走泄為功大降氣病人宜遠之

擇味甜者以酒淘淨晒乾紙上微炒研入丸用惟疹子咳不止宜之

猪苓味苦甘而淡氣平氣味俱薄升而微降入足太陽少陰經解傷濕度大熱除溫利水道治渴

擇堅實肉白者佳去黑皮痘瘡惟小便澀者用之

澤瀉味甘鹹氣寒氣味俱厚沉而降陰也入足太陽少陰經治淋閉眩勝脫三焦停水瀉腎邪除澀行水為最要之藥

紫草味苦氣平味薄陽也

除脾胃寒熱通利九竅血脉閉結治五淋利小便導小腸熱

音聲癢耳聾治鼻塞散腫腫諸結不消

擇小者去皮用凡痘疹小便不利者最宜之如痘後發癰毒者用水通餘酒洗浸晒乾

瞿麥味辛苦氣寒陽中微陰

主關格諸癢結小便不通決癰腫排膿明日去翳

摘去枝梗取實用凡痘疹小便不利與木通同功

紫草味苦氣寒

治傷寒時疾發疹不出者利九竅通水道

經驗後方治嬰兒童子患疹痘疾用紫草二兩細剉以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣漏放如人體溫童兒大小服半合至一合服此藥雖出亦當輕減

擇肥嫩者去蘆用之如痘瘡大便滑利者勿用

大戟味苦甘氣太陰中微陽

主行十二水伐腎邪

去蘆澁水浸洗晒乾惟痘瘡黑陷婦腎大小便不通腹脹煩躁者宜此以瀉勝脫之邪非此者不可妄用

大青味苦氣大寒

主時氣天行熱疾解一切斑疹熱毒

凡出疹子用之痘子不用

味苦氣平微溫

止喉疼咽痛不得消息散結氣消腫毒行太陰厥陰之積痰使

結核自消甚捷勿久服令人虛

搗取新者去根切片以甘草水浸晒乾瘡疹咽痛用之

菊花味苦甘氣平寒

明目養目血去翳膜

擇花黃味甘應候開者佳去枝葉用主痘後目病

木賊味苦微苦

主目疾退翳膜明目益肝膽

摘去節以酒潤溫火上烘用治痘後目疾

藜蘆草味辛氣溫

主明目出膚翳

淡竹葉味辛甘氣寒

節間有白粉者是不可  
以山谷中生者為之

涼心經除煩熱止渴

桑白皮味甘辛氣溫入手太陰經

瀉肺氣有餘喘嗽唾血消痰止渴去肺中水氣

新搗取入土深東行者佳出土上者殺人割去青黃薄皮

令皮上涎落細剉以蜜水浸透晒乾再浸如此三次

根

蔓荆子味苦辛甘氣微寒溫陽中之藥太陽經藥

主風頭痛腦鳴目淚出散風邪除目睛內痛

擇淨以酒浸晒乾痘瘡頭面太腫者宜用

密蒙花味甘氣平微寒

主青盲翳赤澁多眵淚消目中赤脉小兒疳豆及疔氣攻眼

擇淨花以酒浸一宿候乾又以蜜合調蒸之晒乾痘後目病

用之

訶梨勒味甘酸氣溫性急善降

開胃瀉腸止瀉瀉又治肺氣因火極鬱過脹滿喘急咳嗽味酸

苦故有收斂降火之功

擇六棱黑色肉厚者佳去核痘瘡內虛泄瀉必用之藥也

馬齒莧味酸氣寒性滑

對後方療豌豆瘡馬齒莧燒灰傳瘡上根須更逐藥出若不

更傳良用葉小者節葉根有水銀入藥去莖節燒灰不去

胡荽味辛氣溫

療沙疹豌豆瘡不出作酒噴之立出

經驗後方小兒痘疹不出欲令速出用胡荽二三兩切以酒二

大盞煎令沸沃胡荽便以物合定不令洩氣候冷去渣微

項以下噴一身令遍除面不噴



氣微温

治暑除煩熱調中温胃利小便肺得之則清化行而熱自下

用莖穗葉去根以上半夏月出痘疹不可缺清者故也

薄荷味辛苦氣凉氣味俱薄浮而陽也入手太陰經厥陰經

主賊風傷寒發汗通利關節又小兒風涎驚風壯熱乃上行之

藥能引諸藥入榮衛

擇葉小如金錢者佳去莖用葉痘疹發表藥用之

山查子一名糖子味甘酸氣温平陰中之陽也

消食行結氣健胃又催瘡瘍消滯血

擇色紅肉厚無莖者佳蒸去核用

胡麻一名巨勝子味甘氣平

補五內益氣力長肌肉堅筋骨療疥癬及浸淫惡瘡

擇如油麻紫黑色者佳酒淘浸晒乾炒用痘後成爛瘡者最

宜

生大豆味甘氣平

解諸毒除胃中熱散五臟結積

子母秘錄治小兒斑疹痘熱煮大豆取汁服之佳

擇黑而小者其殼去目中麩腎

淡豆豉味苦氣寒

治傷寒時疾發汗主寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶

痘疹發表解表宜用之澤新者無益者佳

亦小豆味辛甘酸氣温平陰中之陽

主下水排癰腫膿血熱中消渴止瀉利小便解諸熱毒

小兒未出痘疹者宜常食之瘡疹中渴宜以此煎湯飲之佳

蒙豆味甘氣寒皮寒肉平

主治消渴丹毒煩熱風疹解諸熱毒

小兒未出瘡疹者宜煮服之勿去皮其皮水浸脫去目中腎

膜

丹砂味甘氣微寒

痘瘡將出密調服之解痘毒令出少

擇大塊色光明者佳細研水飛用此物鎮養心神但宜生用

朴硝味苦辛鹹氣寒氣薄味厚沉而降陰也

主百病寒熱邪氣逐六腑積聚破留血停痰瘡滿大小便不通

推陳致新治天行熱疾消腫毒排膿軟堅

梅師方傷寒發疏豆瘡未成膿研芒硝用猪膽相和金瘡上立

效

非大小便秘結煩悶欲死者不可輕用

滑石味甘氣寒性沉重入足陽明經

主燥濕實大腑化食毒行積滯逐凝血解燥渴補脾胃降妄火

之要藥

白如琥珀軟滑者佳青黑色及粗者不可用研細水

用痘瘡潰爛宜此傳之良疹毒發渴宜用

石膏味辛甘氣微寒氣味俱薄體重而沉降陰也入手太陰少陽  
足陽明經時氣肌肉壯熱大渴引飲清金制火潤肺除三焦火  
熱瀉胃火解肌化斑毒

擇細理白澤者佳研極細用惟疹痘最宜痘家少用

臘雪味甘氣寒

解一切毒治天行時氣瘟疫

臘月取以瓶壘收貯封固埋土中候用

密陀僧味鹹辛甘氣平

金瘡口瘡一服研

潭氏小兒方療豆瘡癩面醫以密陀僧細研水調夜塗之明早  
洗去平復矣

龍腦味辛苦氣溫傷陽

經後方治時疾發既且瘡及赤瘡心煩狂躁氣喘妄語或見

鬼神取一盞細研旋滴猪心血和丸如雞頭肉大每服一丸


草湯下少時心神便定得睡瘡後發透依舊將息取安

犀角味苦酸鹹又云甘辛氣寒

主百毒療傷寒瘟疫煩悶大熱



重刻活幼心法序



醫之道甚難嬰兒謂之臣科，疾痛疔瘡  
不能自達於人，甚難允有甚焉者也。至於痘疹，傷  
觸發於候，忽之頃，結毒在自，日之間，體氣有厚  
薄，形勢有重輕，慣用寒涼，剋肌膚，冰凝而痘苗  
不能透，貴偏於沒，補恐毒火，潛伏而儼，裝有

所不行故皆表列表皆下列下皆法列法皆  
補列補稍若一差生死之判近見業瘵科  
者或守一卷之書或執泥祖傳或方而斤以  
為秘笈遇有疑難棘手之症而了無卓識輒  
委之他惡不療也嗟乎順逆之教始發可徵

而幹旋之功端在人刀按圖索驥既病於拘  
牽依樣葫蘆又失之膠柱鼓瑟甚矣其難之也  
甲寅仲夏赴金陵御試訪友玉涇山見明菴  
歷時清江轉火吾先生活初心法、書不立  
厭括不着圈說論症察方無非以休惕入井

之心施燉煉凡還之妙竅嘆其構焉而精  
務焉而詳此淺見狹識者所可同日語也  
鴛鴦繡出瓊兒君看不把金針度與人活  
仙心比而難讀之而金針不若三書度與余  
保原本刻而遠之得度傳於世嬰兒

言不能言者庶誠求之可得也兒之學亦樂  
之樂而大吾先生於是乎不朽矣是為序  
乾隆五十九年歲次甲寅夏仲月  
皖江遊湖李長根書



續修四庫全書 子部 醫家類

第一冊 續修四庫全書 卷八

活幼心法原序

善矣先輩陳邦瞻之叙活幼心法集曰世之不得已而用者二兵之於敵業之于病是也世之者其道皆以攻伐為事以克為功以速為巧而世學不信病積損之則疑實而急之則疑虛燥之則疑陽而冷之則疑陰於是曲為調停之論以圖持久之計而嘗處于不見功不見害之間久之而功愈遠害愈近此猶庸將握兵智勇俱困齟齬自保而徒界詞重幣乞盟於敵冀其自退敵脆可也敵堅蔑不覆矣蓋凡病盡然而至死症之有痘則受毒自胎生其伏不可窺其發不可留生死在呼吸變化在俄瞬而亦御以調停持久之法此其


謬尤甚譬之古者齊晉秦楚相遇中原強弱已形勝負可決苟非  
摩壘而進昂嘗交綏而退若借言中制暗于事機昧於戰守失其  
先發制人之策則其受害頃刻向矣此吾之所以獨重吾友久吾  
明府之論痘也曰毒可毒而不可解也治可急而不可緩也於是  
創為一書盡破近世似是而非之論庶幾提抱中物不至枉死蒼  
其見卓矣即倉扁復生不能易也兩郵讀之因為三復起曰昔孫  
子不云乎解雜亂紛糾者不控捲救聞者不搏撻批亢搗虛形格  
勢禁則自為解耳然則久吾先生之所謂可逐而不可解者是固  
所以深解之也夫是治痘之說也而亦治兵之說也又其於痘症

之沒後附有痲瘋驚痲疔毒以根諸病方論其主說也簡以詳其  
製方也精以備是其所以活幼者甚全該而備余嘗按書施活百  
身一失遂不忍自秘已笥而梓行於世俾世間幼者得無失其為  
幼與世間司幼者并不至以活幼者而誤至殺幼則夫成一父母  
之心所以共成此天也大父母之心矣夫吾先生豫之清江人壯  
耳聃名尚恆於嘉慶時以鄉進士出知福建汀州府寧化縣事卓有  
政聲惜當時以儒官類不列名於藝林故其姓字不傳于今世岐  
黃之學原有活幼心法一書亦不傳于今世岐黃之口至其活男  
婦諸病也則甚著有奇效醫述四十九篇俱失年久湮沒噫世代

湮失於先聞不及者証止一聶久吾著述已哉此古人之懸金購書良有以也且其考其自叙創著於丙辰而余之聞發此書後合歲紀又在今之丙辰聞之世運以六十載必為一更為其中子通也今此刊也其久吾先考獨著之精神有不可終為湮沒者歟而故藉運會之甯然以假手於余之簡校復救斯世赤子於襍褻中也歟時

康熙十五年歲次丙辰嘉平望日尚山堂夕惕主人周京雨郵氏叙

活幼心法目錄



卷之一 痘症

論受病之源

折諸家之衷

闡時醫之謬

辨虛實寒熱之異

晰氣血盈虧消長之理

精炮製用藥之法

卷之二 痘症

初發起至痘出齊數日內調治法

備載數日內各變症方論治法

卷之三 痘症

痘出齊後起發灌膿數日內調治法

備載數日內各變症方論治法


卷之四 痘症

漿足回水至結痂還元數日內調治法

備載數日內各變症方論治法

卷之五 痘症

備用緊要諸症方論



夾斑丹

夾麻疹

倒靨

癢

痛

內脹

發疔

發癰

臭爛

衄血

水疱

口瘡

咽喉

失聲

噎水


小便不利

患眼

以上各症治法

并附古今治痘要方

卷之六 痘症





痘症或問六條

卷之七 痘症

治痘醫案十一條

卷之八

痧症 麻疹同。惜心法止論發熱見形留毒 三方因  
詳補孟氏諸症治法以成全卷

痧疹治法總論

初發熱欲出未出時用治法

已見形一二日內用治法

已出而紅腫大甚用治法

痧症四五六日回時各症用治法

卷之九 雜症

雜症論

急驚風

即陽癇

慢驚風

即陰癇

吐瀉

疳

腹痛

發熱

小兒三歲以下。看男左女右。虎口三瀆。第一節寅位風瀆。二節卯位氣瀆。三節辰位命瀆。俱仄看三節。風瀆脈見易活。氣瀆脈見為病深。命瀆脈見為命危。其脈紋曲直不同。如驚則紋<sup>赤</sup>。寒則紋<sup>青</sup>。表深紅必主傷寒。痘疹紋亂則病久。紋細則腹痛多啼。乳食不消。紋粗直射指甲。必主驚風。惡候。紋黑如墨必困危。脈紋入掌

為內鉤。紋淺衰為風寒。紋變外為食積。紋白疳疾。脈紋黃院院為常候也。

入門審候歌

觀形察色辨因由。陰弱陽強髮硬柔。若是傷寒双足冷。要知有熱肚皮未。鼻冷便知是瘧疹。耳冷應知風熱症。澤身皆抱是傷寒。上熱下冷病傷食。

十二經絡手太陰肺臟辛足太陰脾臟己手少陰心臟丁足少陰腎臟癸手厥陰心胞絡任足厥陰肝臟乙手太陽小腸腑丙足太陽膀胱壬手少陽三焦庚足少陽胆腑甲手陽明大腸腑庚足陽

明胃腑哉

凡人臟病少。腑病多。臟病緩。腑病急。凡諸病皆居腑。故曰。臟病由腑病。腑通臟自安。

王應震曰。見痰休治痰。見血休治血。無汗不發汗。有熱莫攻熱。喘生毋耗氣。遺精勿瀉泄。

瘧疾二者。俱胎毒。而瘧出五臟。陰陰主閉臟。其毒深而難散。臟陰少虛寒。故瘧可溫補。麻疹則出六腑。腑屬陽。陽主發散。其毒淺而易散。腑陽少實熱。故麻疹宜解散。

續修四庫全書 子部 醫家類

四四二

活幼心法卷之一

清江蘇久吾先生著

東吳周雨邨先生編

皖江熙湖仙源李氏重刊

論受病之源

痘疹之源。有謂兒在胎時。令母血穢而致者。有謂父母慾火所致者。慾火之說。出於臆測。固全無據。無嘗見孕婦飲食法淡者。生子出痘。多稀少而平順。恣食厚味者。生子出痘。多稠密而險危。則其病源。受毒于母胎。血穢似有以驗。蓋飲食淡。則血氣清。而胎毒輕。飲食厚。則血氣濁。而胎毒重。受毒輕。故出痘少。受毒重。故出痘多。

若因諸痛癢癩瘍皆屬心火。謂火由慈生。致毒因火結。故其為害  
獨勝于諸癩。此其說未為全非。而總之瘡毒一胎毒耳。惟其為胎  
毒。則潛伏于五臟。有觸則發。無觸則不發。故其發有遲速。皆其未  
發時形氣俱旺。無可端倪。若未燼之火。何處尋覓。又何可解釋。古  
立預解瘡毒諸方。若在故而亟寇于通都。不近理也。及其有觸而  
發。則勃然不可禦。卷其毒氣。當自五臟實動五臟真氣。全賴血氣  
送毒氣。而出於外。運化之而成癩。收結之而成癩。而向臟腑可安。  
若血氣送毒氣不出。則毒氣反攻臟腑。如寇作于都城中。王者不  
能操謀奮武逐之於外。故令操戈內攻。安得不危。故用藥猶如用

兵不可不遠此理也。

### 折諸家之衷

人之治痘，以解毒在活痘之家多矣。劉何間，意用寒涼偏害不小。至於柯仲陽之方，亦

前逐毒在以解毒為主。而多用寒涼，少用溫補。張潔古王海藏咸崇之。此其

在後此中意俱本於曰從。諸疾痛屬心火之一言。故以寒涼得火也。厥後陳

非晚人不文仲之方，力矯其偏，專主溫補。凡痘疹已出未出之間，諸症，意用

易知宗不十一味木香散已出之間，諸症，意用十二味異攻散。其意能重于

易得也此太陰一經，後三或向卷以手太陰肺，主皮毛。且太陰脾，主肌肉。肺金惡寒，脾

又不可少土惡溫，故用丁香、官桂以治肺之寒，用木附、半夏以治脾之溫。



方用之得其常。其效固大。然不令寒熱虛實。而一概用之。則直於  
虛寒。不宜於寒熱。其偏害又可知也。若丹溪辨之是矣。至丹溪至  
論。矯陳氏之偏。而取錢氏之長。至於解毒和中安表。似為的當。舉  
世宗之。數百年來。無敢議其失者。予知以為丹溪治他病。妙論  
獨於治瘧。則吾浪而未盡其妙。僅亦千慮之一失耳。蓋其矯偏于陳  
氏。而不較輕用木香丁香桂附等熱劑。似乎因噎而廢食。德美而  
吹整。其取長于錢氏。而必用若連牛黃連名之類。以監製參花眼  
木等補劑。似乎任將而中制。用兵而外望也。其失亦起於泥內任。  
瘧瘍屬心火之言。而未透其理也。不知瘧瘍雖屬心火。却與諸瘧

不同。諸瘡之毒，皆其初發而未成形，可用藥解毒，因消而愈。及其

既得成形而未成膿，又可用藥逐散，若成膿而愈，瘡毒自五臟必藉

血氣而運出于皮膚，運化之而成膿，收法之而成痂，而消收全功

也。可因消而愈乎。可未成膿而愈乎。故諸瘡以解毒為主。能解毒

於早則輕，不能解毒於早則重。瘡瘡以血氣為主。血氣能逐毒以

灌膿，結痂，則生。血氣不能逐毒，以灌膿，結痂，則死。解毒之藥，身損

血氣，不顧血氣之虧損，而急于解毒，是猶不慮我兵之羸弱，而急

于殺敵也。故毒有不必解者，又有不可解者。若以克稟賦強壯，胃

氣好，飲食為常者，其血氣自旺，自能逐毒，氣血成功，其瘡自能至

解

此言不可解

經少順症。此不必解毒者也。若兇稟賦素弱。脾胃不弱。出痘時飲食又少。或渴或瀉。或腹脹。或手足冷。或氣短促。或失聲。痘或出不快。或痘窠不紅活。或色白而頂陷。或背灌膿。或背結痂。不結痂。皆由血氣不能透毒氣。此不可解毒者也。皆速用溫補以扶胃氣。而助血氣。若用考茂燥木等。而力不及。即加木志。丁火入桂附等。佐之。忌不為過。又何可參入考速旁以等。涼品以監制溫補之力。而損血氣乎。所謂丹溪未盡其妙者。此也。丹溪又教人用犀角地黃湯以解毒。及人沿其說。失其初意。相習用之。以為奇妙。而不知其害。養心者。血之主。心之所以能主血者。以其居火也。痘

瘧瘧屬心火。正藉心火以運用。一身之血而成功。豈心火可得而去  
 之乎。蓋人身之血。溫則流行。寒則凝滯。犀角地黃湯。涼心經而得  
 心火。心經既涼。心火既清。則一身之血。俱凝滯不行。何以運化瘧  
 毒。而成膿結痂乎。創內攻之患。作而竟以告斃者。得心火之藥。實  
 殺之。而人竟不知也。醫者亦竟不悟也。可慨也。故予謂瘧已出之後。  
 未痂之前。凡一切涼心之藥。以犀角生地之類。粘滯危不用。直待  
 結痂後。用之。解毒毒可也。或曰。若愈則未收結之毒。毒俱不可解  
 矣。曰。奚為皆不可。若其血氣與毒氣俱感者。脈必洪數。瘧或初出  
 即帶紫黑。或既出而相密紅紫。內症則煩燥渴。必係未盡。大便必  
 甚。此二特妙  
 不可洗  
 又甚用後  
 後虛弱或  
 權用結痂  
 毒甚亦可  
 瘧前想甚

秘結。此則屬寒積。宜速用清涼之劑。以解毒。且大便以秘者。量入酒炒大黃。微利之可也。若其毒氣難感。而血氣未旺者。以解毒為主。而兼活血養氣。則芍藥散等之類。亦不可離也。

近世瘧方。以崇黃西丘其書自始至終。俱分脈達陳。而立三圖說。其為順者。不必服藥是也。謂險者。宜以佛元湯加減調治。猶近徑也。但謂逆者。俱不可治。治之徒勞無益。是教人袖手待斃矣。其言不仁之甚。而貽害于世不少也。此為俗醫用利計。則甚便。而於救濟生靈之術。則甚乖也。蒼醫者仁術。聖人以之贊助造化之不及。所貴者扶危救困。起死回生耳。若治甚易治者。而棄其難治者。則

何以醫者惟俗醫意在圖利。又恐懷名。見病有不順者。輒棄之。

彼誠恐利未必得。而徒冒不識症之名。若仁人君子。肯為之死裏

求生。豈忍斷其必死。而生視不治。故曰。西正之言。便於俗醫。而非

所以濟世也。且其所指逆症。多端。瘧瘡。相家者多有之。如初起而

驚悸。吐瀉。振瘧。而先發于印堂。司空。天庭。等处。初出而根葉全暈。

既出而色自灰陷。或發水泡。或瘡塌。或背行漿。而不行漿。或痂未

落而寒戰。咬牙等症。皆其圖說所謂逆而不治者。予每治之而得

生者多矣。奈何悉謂治之無益。而戒人勿治乎。惟初出。形如蠶種。

既出而紫黑乾枯者。難以灌漿。多不可救耳。豈寧救之而不活。不

初起為急  
醫者多吉

吐瀉一二  
次不妨毒

反得吐瀉  
而越也

各種紫黑  
乾枯少不  
活

忍坐視而不救也。

瀾時醫之謬

瘧症與他症不同。自初發起。以至于佳。限日限時。救用甚危。當  
用之藥。宜及時而用。其救莫拯。溺不可復也。蓋瘧毒發自五臟。實

一字一珠

劫五臟之真氣。其出瘧多者。真氣發洩而多。當此之時。人之血氣  
我絕。岌岌乎殆哉。如油盡之燈。不速為之增油。則燈焰熄。如風中  
之燭。不速為之蔽風。則燭光滅也。時醫則不然。輕視人命。而坐視  
財利。其愚而不知用藥者。如冬禱已。即稍知用藥者。亦不肯及時  
用藥。欲因禍大而顯功。直待諸惡症出。然後乘人父母之驚懼。而

要重利。遲延至於血氣已絕。不可復續。雖有對症之藥。後不及事。因而悞人性命者多矣。嗟嗟天地鬼神。昭布森列。不可欺罔。此輩以貪利而悞人。心術不善。豈在幽責。豈在冥誅。殃必及身。必及子孫。不可逃也。此醫家之害。而病家不可不知也。又時醫識見淺陋。未諳物理。執泥祖傳舊方。不知通變。遇瘧疾之輕者。猶可動手調治。而自以為功。一遇危險重症。便束手無策。不能救療。甚至治一家十人。而不活者七八人。刻以為瘧疾原惡。而不自咎其術之拙。病家亦以為瘧疾本惡。而不咎醫之拙。殊不知瘧疾常數。若年甚惡之症。而調治得宜。十可十生。間有極惡之症。必不可救療者。



十不過一二。今治十人而死者七八。何惡症之多也。至六銜之不  
精。予深憫之。故不得不為之著論。立方也。

辨虛實寒熱之異

此緊至論凡治病。必先辨虛實寒熱。四症。望聞問切。全非辨此。回者而已。四  
者。了無於胸中。刻用藥。取效。其應如響。四者不能分辨。而執成方  
以用藥。鮮有不悞者。即或中病而愈。亦幸而偶中也。至於症瘥之  
虛實寒熱。尤為緊要。辨之不明。用藥少及致事。何以成功。奈何歷  
代治症之家。著論立方。互相異自。至於虛實寒熱。少異而不辨。或  
辨而不明。致令檢方者。漫無下手處。竟不知某症屬虛屬寒。皆用

某方。某症屬實屬虛。皆用某方。別雖有千百別方。千百別論。年登  
於用也。年怪乎自古至今。治虛者之多。迷途而意切之術。踈也。且  
瘧瘧之虛實寒熱。與諸病之虛實寒熱。其異同因自有辨。諸病有  
虛者。元氣自虛也。宜補也。瘧瘧有表虛。有裏虛。亦元氣自虛也。宜  
補也。此其相同者也。諸病有實者。邪氣實也。可瀉也。瘧瘧有表實。  
有裏實。此知元氣先固。而毒氣不能為害。不可瀉。亦不必瀉也。此  
要看其不同者也。諸病有虛之甚者。陰有解。陽不長。則寒自虛生。宜溫  
表實熱。宜利補之也。瘧瘧有虛之甚者。亦陰有解。陽不長。而寒自虛生。  
亦宜溫熱。宜利補之也。此其相同者也。諸病有寒自外入者。外感

是也。皆其本表。宜發散之。火而入裏。則鬱而為熱。宜清解之。痰出而風寒外襲。宜溫而散之。或外寒入內。而為吐瀉。諸病亦宜溫之而已外不可發汗。內不可清解也。諸病有虛熱者。元氣虛津液弱。而火從虛中起。補之則熱自除也。不必解也。瘧疾亦有虛熱者。元氣虛而毒氣肆也。當以補元氣為主。而累兼解毒可也。二者皆同。而有不同者也。諸病有實熱者。血氣未虧。而邪氣壅盛。單用涼藥得之可也。瘧疾亦有實熱者。稟氣強。血氣盛。而毒氣亦盛。此單用清涼解之可也。此又其相同者也。今自發熱之初。以至還元之

後。俱先辨病之虛實寒熱。而處之方於其後。令人細心審病而後

此即是看  
症法不違

李問曰切  
四字耳

用藥。度不至於虛虛而實實乎。不至於損不品而補有餘乎。不至  
於以水養寒。而以火益熱乎。此症之虛實寒熱。較之他病。猶顯明。  
而易察。蒼自見黑。以至結。其形其色。既昭。無可觀者。又听其聲  
者。觀其聲。燥。視其飲食之多。少。審其大小便之利。澀。三歲以上者。  
診其脈。三脈。數。洪。微。其辨虛實寒熱。備。各。思。白。之。台。明。而用藥。取  
效。易。易。矣。

斷氣血盈虧消長之理

瘵瘵。全。流。氣。血。成。功。而。氣。血。之。盈。虧。消。長。其。理。精。微。不。可。不。透。悟。  
也。蒼。氣。體。天。而。親。上。血。體。地。而。親。下。瘵。之。出。也。其。高。氣。之。耗。氣。之。

位也。上也。氣宜充焉。其四暈根脚血之位也。下也。血宜附焉。死尖而色白潤。是氣充而居其親上之尊也。四圍有暈。而色紅活。是血附而安其親下之分也。氣居其尊。血安其分。氣血和順。而載毒出外。此最吉之兆。注。可勿藥而愈也。頂陷則氣反親下。此氣虧而不能充也。注皆補氣。四圍根脚年紅暈。此血虧而不能附也。注皆補血。此其理猶易明也。甚有通頂紅色成疱者。是血反親上也。此最危險。必不能成漿。至八九日後。則瘡塌而死。然此非血之獨盈。乃由氣虧而失其居尊之權。故血得以妄行。而潛居其位也。急宜大補其氣。氣充則能統血。血自不得泛溢妄行。而疱結白矣。世人不

識此理。是其宛仁。則謬認為血熱。而用涼血行血之劑。致令氣愈  
 虧而氣愈速也。不亦悲乎。故氣血盈虧之理。微妙而難識也。至於  
 調治瘵癯氣血。其氣有虛者。固宜專補氣。而不宜補血。蓋陽不能  
 從陰。陰愈長。則陽愈消也。其有血虛者。多由胃氣損傷。元氣不足。  
 補氣者之所及。若陰必從陽。陽生則陰長也。蓋此言脈醫雜著乃謂血虛而  
 用參芪以補氣。則陽旺而陰血愈消甚矣。其不誤於陰陽消長之  
 理。而謬至此言。為世大害也。予每治便血之虛滑者。婦人產後去  
 血過多。而大發熱者。婦人血虛崩漏而下血不止者。俱用參芪等  
 藥。蓋血為氣長夫何也附為主。而佐以血藥。此外桂枝湯皆獲效。奇。安在血病不可補氣乎。  
氣陽血陰  
專補其氣  
則陽生而  
陰必隨之  
蓋血為氣

之子也

若小兒瘰癧以胃氣為主。則補血必先補氣。以氣血消長之理。不可不深明也。

### 精炮製用藥之法

凡用寒涼藥品。除陽痿傷寒。熱積。痢症及諸實熱等症外。其餘若用之降炎上之火。用之清血分之火。俱有寒因熱用之義。須依酒

是不可不  
深不可不  
慎也  
脈寸寸間

炒酒製之法。最為緊要。同一寒藥。依法用之。則取效。不依法用之

尺以定經  
絡部位也

則為害。若瘰癧中肯。及所用解毒諸寒藥。皆因毒火燥血。而用入

不外於字  
沉遲散四

血。分以涼血活血者。是以芩連梔柏花粉大黃等味。必用酒拌濕

字誤其寒  
其虛寒也

炒燥。牛蒡子必炒香研碎。皆以白芨生地紅花紫葦牡丹皮地骨

症自夏然 皮之類必以酒臨時洗用。此豈行也。而時醫苟簡粗率。每每不依  
至起服時 表信內出 汗灼製。而生用寒涼。不惟于益。而反以受害者少矣。此其失非小  
陽正傷也 而致不宜 而人不知也。不惟病家莫之知。而醫家亦竟不悟也。僥悟其失。豈  
歸生淨也 沉細而遂 其省此微勞而貽此大害哉。予故表而出之。以訓將來也。製之大  
有以厚心 後毒送外 藥。有起者甘草黃芪白芍俱生用。虛寒者甘草炙熟黃芪寒矣。白  
解陰之條 也所宜和 芍酒灼  
後不宜送 救



續修四庫全書 子部 醫家類

四六一

活幼心法卷之二



清江壽久吾先生著

東吳周雨邨先生編

皖江熙湖仙源李氏重刊

初發熱至瘧出齊數日內調治法

大凡調治瘧瘧。自發熱之初。見熱之時。即須思及何如起發。何如灌漿。何如收結。一動手用藥。便步顧首顧尾。慎其初以善其後。然後次第調治。可保萬全也。

一發熱之初。若身熱和緩。或熱或遲。神清氣爽。飲食如常。則不必用藥發汗。但戒葷禁風。調護而已。若瘧有脈。而不必治者。不輕治。

歲在癸戌  
溫和尻冷  
耳後有紅  
傷

即所以調治之也。其或憎寒壯熱。頭疼壯熱。頭痛咳嗽。鼻流清

涕者。多因於外感。不可不審。散也。皆視兒強弱。而用藥發汗。兒體

氣素壯實者。用加味升麻葛根湯。汗之。體氣素怯弱者。用加味參

蘇飲。汗之。然皆不可出汗太過。恐發虛其表。後難起。脹滿疑也。

此所謂顧  
首顧尾慎  
其和者也

既經發汗。而身熱漸復。兒頗安靜者。其痘出必稀少。此為順候。

且勿服藥以待之。

亦有發熱和後復  
痘多者。血氣虛也

加味升麻葛根湯

壯實服

此方即是傷感而非  
痘症服之。發汗亦在焉

白粉葛 升麻 芍藥 甘草 桂枝 防風

麻黃桂枝  
并煎藥一  
堅不用  
有加厚法  
者

蘇 葉 桑 心 芎 藭 山 查 肉 半 牛 黃 子 五 分

生药三斤同煮热服取汗

加味参苏饮

怯弱服

人参

三钱

苏叶

五钱

山川芎

桔梗

七钱

骨胡

各分

茯苓

或

甘草

或

白茯苓

去反

粉葛

各分

紫葳

各分

牛膝子

切研

各分

山萸肉

各分

生药三斤

同煮热服

取汗

发汗之反。或身热不退。而烦躁者。且可峻攻。姑少待之。其或烦闷

燥渴而妄语者。用救毒和中散法之。切不可轻用伤寒家柴胡类

药。乾葛花粉等法解之。利。此药若用差一剂解虚其表。至七八日

及。浆必不行。虽极力補助。莫能救疗。其瘡枯焦。瘵竭而死矣。盖疫

若起先表  
屋後恐有

淺淵志

瘡以裏為根。以表為基。一履其表。是猶築室而圮其基也。是以治瘡與治傷寒。大不同也。近時管梅著書。不知此理。而首以膏表解表。主說。豈謂瘡疥可與傷寒同治乎。惑世誤人。為害甚大。姑舉其一。以闡其餘。

敗毒和中散

連翹 苦平

牛蒡子 苦寒 薄荷 辛平 黃連

陳枳壳 苦平 防風 辛平

腹痛腫痛俱可服

荆芥 辛平

桔梗 苦平

紫草茸 苦平

蟬退 苦平

小兒參 苦平

大便閉以普善劑

枳實

木通 苦平

升麻

甘草 甘平

麥門冬 甘平

且詳他石道不通

大便閉澀者加枳實大黃。為微利。不秘者勿加。服此藥煩渴少解。即止白

服。所其瘡出外。劑中自安也。

浮葉方製  
過劑性使  
而有效

或有腹痛脹痛而煩悶者。此其毒氣穢至。然只肯用此效毒和中  
散。主之。大便秘劑加枳實大黃微利之。所其瘡毒出外。劑內痛自  
止。然以看其瘡。或稠密。或紅紫帶黑。又議解毒可也。切不可純用  
寒涼以阻遏其毒出之勢。主致內攻苦變。世人不知此理。多用寒  
涼解毒。或用硝黃峻下。因而速斃。而卒不悟者多矣。 當時令  
眾人出瘡時。小兒或有發熱稍緩。其熱或作或止。其紅黑或未見。  
或微見而未脫。或是出瘡。或非出瘡。正在疑似之間。肯此之時。不  
必且勿服藥。以待其自定。但禁風禁藥。常調護之而已。庶不輕治。

甚矣毒之不可妄行  
解也如是

正所以深治之者此也。有等官宦之家。所愛太過。見其如此。屢投以清涼解毒之劑。不知若是症候。則其毒氣發劫於五臟。勃勃欲出外。其勢決不可阻遏。屢用清涼阻遏其勢。即所以迫之而攻。而禍遠矣。故犯此者。少有報痘救日。即煩悶驚搐而死。此解毒之劑。殺之也。由及寇在宮牆之內。不逐之出外。近過其出路。圍而攻之。宮中之人。有不遭殘害者乎。然醫者曰。吾用解毒藥。何至於殺人。既不自任其咎。病家亦曰。彼用解毒藥。何至於殺吾人。亦不知若於鑿殺人於冥冥之中。而已不悟也。人不知也。噫。亦可悲也。予叔表而出之。以戒世之愛而反害者。語曰。以勝者毒必厚。痘毒重

婆心婆語  
反復唱明  
德教公此  
天地將生  
之心以成  
此於人大  
父母之心  
而已

於胎元伏於五臟其輕者年論已其重者深藏久蓄不為不厚矣  
一旦觸發於候能忽生之頃其勢極銳欲出斷不可禦是以必藉  
氣血載毒出外成漿倍加也心毒散而功成此病極亦化機也此  
豈若諸瘡之毒可以驟然而解散者故解之於既出之心是順其  
欲散之勢猶為近理解之於未出之先是過其極銳欲出之勢其  
禍甚速如初決之堤水勢排山而欲捧土塞之有是理乎奈何自  
古治瘡之家其卑者固不足道其高者亦未深悟此理每每於瘡  
瘡發起之初欲出未出之際輒以解毒為之且曰服某某藥則毒可  
解而瘡出必稀不知瘡之稀由其初受毒之輕耳豈將出之時所



能驟解手。致啟後之庸醫。視心永訛。見瘧疾欲出未出之間。毒氣  
 熾盛。刻多用寒涼以解之。或妄下以解之。彼自以為對症三好利。  
 而不知反致內攻之奇禍。至於殺人而後不悟。昔虞而後不鑒。其  
 禍又年窮也。予親近時庸醫治瘧。以犯此失。以致重切數日而死  
 者甚多。刻皆茫茫。委於症惡難救。而舉世莫覺其致死之由。殊可  
 矜惻也。故不得不再三發明其理。以救將來。發瘧之際。有偶感風  
 寒。飲食停滯而腹痛者。用外消平胃散一劑。其痛立止。

毒氣厥痛  
 用前方

外消平胃散

小川芎

知母附

蒼朮

紫蘇

藜蘆和左

藿香

砂仁研

白芷 香白芷反各三錢 炙甘草一分 炮姜一分 山萸肉二錢  
生薑三片 同煎服

無停食作腹痛。與喜氣作腹痛。其症不同。停食痛者。其痛多急疾。而啼叫必甚。多在脘以上痛。面必青白。唇淡。手足冷。毒氣痛者。痛稍延緩。而有作有止。多在脘以下。或連腸而痛。面或紅色。而唇紫。手足不冷。此兩者必分辨。服白。方可用藥。

熱吐或多或少 寒吐或少 症不可不察  
散熱之際。有嘔吐者。有泄瀉者。有吐瀉交作者。全另辨虛寒寒熱。而用藥。或吐瀉交作而胸腹痛甚者。此感寒。而停食也。仍用升消平胃散。一服立效。或胃氣弱而有寒。嘔吐不思飲食。

或食下即吐。其吐可順快。而全聲面青白。唇淡。發神倦。宜用參  
和胃散至之。或脾氣虛弱。飲食不化。而泄瀉者。其泄滑利。面  
色常白。宜用木苓調脾散至之。

參和胃散

治虛寒嘔吐

人參

砂仁

製半夏

白朮

白芍

藿香

陳皮

炙甘草

煨薑去皮三片同炙

木苓調脾散

治虛泄

白朮

茯苓

多分

白芍

神麩

炙甘草

多分

白扁豆

多分

砂仁

香附

製厚朴

多分

煨薑

三片

大棗一枚

同煎

或加人參

多分

有毒或熱  
症有虛寒  
症有虛而  
不寒者有  
毒或而血  
氣弱者不

或有毒氣作吐瀉者。其吐必酸刺而有聲。神氣不支困倦。其泄必  
黃色臭穢。雖或吐泄交作。胸腹以不痛。此則毒氣由吐泄而發洩。  
所謂吐瀉為順候。而不必止者。惟此一症耳。若虛寒吐泄。與此迥  
異者。亦以矣。張潔古等乃一概謂瀉可以瀉。慎勿亂治。而少毒並  
不分虛實寒熱。何其差謬浪云甚耶。

身熱至二三日後。痘欲出不出。或煩悶驚搐。或狂言譫語。切不可  
驚惶失措。惟詳審虛實寒熱而治之。要知此等皆由毒氣在內。不  
得宣發於外而作。然毒氣不得宣發。症有不同。不可不辨。有毒  
氣壅感於內。不能驟發於外。而驚搐狂躁者。宜用法解散以宣之。

知其症候  
人非淺

有內毒本感。外為風邪所束。醫治不得出。而毒播狂燥者。宜刺  
解毒散之。又有血氣虛弱。送毒氣不出。而醫指狂燥者。宜用湯

中養氣湯以托之。辨此等狂語者。最宜詳察。親視察色。審聲音。症

痘影或淡  
白或紅紫  
以此為憑

又參之以脈。脈反可以分別。察其痘影紅紫。面赤唇紫。聲音亮  
口氣粗。手長熱。脈洪數。此毒氣壅盛者也。或形色多同前。但聲

重鼻塞。或鼻涕。脈浮數者。此毒感而為風寒所束者也。無此者少

在寒涼之月。或不謹避風寒者。無不有之。察其痘粒。淡淡在皮

下。不見紅活。唇淡面白。或紫舌。脈又遲緩。雖煩燥。發狂語。亦是

血氣虛。而送毒氣不出者也。三者分別。以而用藥。皆一利之。後症

出而驚狂定者人謂症出之前驚搐為脈而皆不必治。豈其然乎。

清解散 毒氣重感用之

防風 荆芥 蟬退 桂枝 山豆根 薄荷 乾薑

升麻 薄荷 紫草 木通 牛黃 連翹

山萸肉 甘草 生芩 長同美

蘇解散 為風寒所束者服之

前方去苦連加紫蘇白芷各五分 羌活 生芩 長同美

常服

後調元化 毒湯沙參 羌歸芍紅 花生地足 去升葛其 餘十四味 皆同

痘影淡白 溫中益氣湯

治痘前虛症三四日內用此托之 痘影淡白者宜

用倦不食 外面痘稀

人參

白朮

去皮切五分

黃芪

歸身

酒洗

茯苓

去分

炙甘草

乃血氣弱

送痘不出

川芎

各五分

防風

各五分

木香

官桂

各五分

山查肉

宜服此托

生芎一大片大棗一枚去核同煮一服中病即止

脈緩弱痘

淡白而語 幼兒初出痘有發熱二三日全在痘點形影而忽然驚搐狀與急

狂者亦可

驚風一樣者此亦痘氣壅盛不能宣發所致宜用前法解散以定

不可作急

驚治要留 之。痘出即驚宜矣。若醫者不知是痘而誤作急驚施治。或單以寒

涼投之。或以驅痰藥峻下之。其兒必死何者。阻遏其毒。使不得出

而回也。故未痘之兒。若遇此等症。即當驚疑。恐是出痘。不可作

急驚法

法解散

見前

又有發熱稍輕。至三四日而痘尚隱。不出者。最易詳察。不可一

際。認為毒輕。痘少。而漫不加意。若覺推和。便精神清爽。飲食亦常

此說要  
看

出痘少。而熱較收。頭粒尖漸。長火紅活。此為毒輕。痘少。至疑矣。

若身熱雖輕。至三四日而怠倦嗜臥。不思飲食。所出之痘。數。其

白。點粒不紅。此非痘輕毒少。而是血氣虛弱。送毒氣不出也。急宜

用前溫中養氣湯以托之。甚者必連服二三劑。痘始出齊。其痘必

此毒感而  
血氣弱者  
多。若因其安靜。袖手玩視。而不急托痘出外。延至五。不日後毒氣



內攻，須臾告變。不可救療，甚且畏也。昔人輕劑瘧，輕之說可盡信乎。而六日以前，瘧未出齊，勿用溫補之說，可盡拘乎。

溫中養氣湯 見前

自有方書治瘧以來，其時不啻二千年。其人不啻數百家。然皆詳於已出之後，畧於未出之前。深言出達而相瘳之危，不言留中而不出之禍。不知已出之毒外寇也，未出之毒內寇也。出達而相瘳者外攻也，留中而不出者內攻也。內寇與外寇勢孰急，內攻與外攻禍速烈，故瘧已出而死者，多在由日之外。瘧不出而死者，多在由日之內。徒知禦外寇而不知逐內寇，自古以來，諸賢之為計疏。

一章大有

也。蓋其失計安在。惟在瘧未出而急於解毒。遂毒也。不知未  
 出之毒。不可解。說亦曰。但當汲汲逐之出外也。予深悟其理。而於  
 其失。故長顧却慮。為未出以前。諸症說法。惟以辨其虛實。寒熱。以  
 施治。寒熱者。宜散其壅滯。以逐毒出外。虛寒者。補助其氣血。以逐  
 毒出外。至於急用寒涼。過毒內攻等弊。則諒之。防戒。不厭再三。一  
 自信之甚。自要人之。以救者。哲之失。一以問後人之迷。雖歧黃復起。不易吾言矣。  
 也。然實當一者。熱至三四日。報瘧形如瘧疾。口鼻腮耳年壽之間。先為數息。  
 道當信者。此等重症。淡紅潤澤者最吉。不必服藥。若身熱一二日。即出瘧。先發於天庭  
 印堂印堂等處者。或一齊出而稠密者。乾枯而紫黑者。或成片不  
 記之。

分類粒者。皆血氣凝滯。而毒氣則行。最為可憂。宜活血養氣而送毒。用

調元化毒湯

此時誰敢

即下參芪

沈毒又成

耶

寒涼藥用

好酒洗之

此方裁酌

于清解過

中二方之

洞而兼用

之之意

去參芪減

生佛芪 分

人參 分

白芍 分 生酒洗

當歸 分 生酒洗

牛黃 分 研末

連呂克 分

防風 分 生酒洗

芍藥 分

枳殼 分

桔梗 分

紫葳草 分

木通 分

紅花 分

生地黃 分 生酒洗

牡丹 分

山查肉 分

梓葉 分

青胡 分

生芎 一分 同黃芩服

腹痛去參芪加

切呂克 分

大便久秘者去參芪加枳殼

子微利之大便通仍除之

若血氣具

毒氣俱旺而脈倍數者宜減三之一去參芪

此方以參芪養氣但芍紅花生地黃白芍生芎芍連  
枳殼青胡紫葳木通山查肉解毒如山查既上乾

用清解之  
意

若瘧出不快者。其症不同。最宜分別。有瘧色紅紫乾枯。或瘧如  
蚕種。或一片不分顆粒。身熱大便祕。而出不快者。此毒氣鬱滯。血  
氣不流行也。用青調元化毒湯。去羌活加山芎。治之。

調元化毒湯 按前方除參芪加山芎

有瘧色淡白。飲食減少。身涼手足冷。小便清。大便滑。而出不快者。此

氣血怯弱。不能載毒出外也。用青溫中養氣湯托之。

溫中養氣湯

照前方以有鼻塞聲重咳嗽惡寒而出不快者。風寒

蔽之也。宜當發之。用

加減參蘇飲

出不快有  
四症宜詳

蘇葉 芍 人參 芍 茯苓 芍 山芎 芍 蒼朮 芍 防風 芍  
荆芥 芍 桔梗 芍 白芷 芍 甘州 芍 冬加麻黃 芍

生芎三片同黃芩煎服但不可出汗

或有因邪穢所觸伏隔而出不快者其渣必養宜用平和湯解之。

外以蒼朮紅芍沈檀等燒之辟其氣。

平和湯

四味保元湯加桔梗。如芍改芍蘇。改朴。四者。取木者。即是。芍花實表湯。

人參 芍 青芎 芍 桔梗 芍 白芍 芍 紫蘇 芍 黃芪 芍  
防風 芍 白芷 芍 甘州 芍 官桂 芍 沈香 芍 檀香 芍  
乳香 芍 藜朮 芍 生芎三片同黃芩煎服

瘧病出時。有忽坐傳風。眼直視。牙間緊者。此禍。獲不謹。而為風邪。所襲也。且勿輕用驅風峻藥。宜用

美附湯

白附子 老生寫之切何

二味濃黃湯灌下。一二酒盞出微汗即愈

瘧<sup>正</sup>症出時。身微冷。而不寒不寒者。為佳。或極輕和後。向身物。惟大。抱者可憂。若出齊。黃抱尤可憂。其瘧必稠。必紅紫。必乾枯。仍用調元化毒湯。十參芪。主之。

調元化毒湯

羌活 白芍 陳參 芪

看瘡出齊與否。以脚心為驗。脚心有瘡。則出齊矣。若瘡稀少者。不  
必拘此。以身不熱為出齊。

固食不可太早。必待瘡出齊而身不熱。方可食粥。若瘡未出而  
食肉。以助火邪。必成大患。鷄肉首尾俱不可食。惟起脹時怯弱者。  
可食以助行漿。壯盛者。亦忌之。諸魚皆腥。牛羊豕類。瘡家最忌。並  
宜禁絕。

活幼心法卷之二

法江壽久吾先生著

東吳周雨卯先生編

痘出齊後  
起發灌膿

此一節最  
為緊要

要飽滿為  
主終年後

患  
頭面頸項

稀少為佳

痘出齊後起發灌膿數日內調治法

板痘三日後。痘已出齊。身體溫和。精神清爽。顆粒尖圓潤澤。根脚  
紅活。胸背稀疏。飲食如常。二便不澀。此膿候也。不必服藥。但常飲  
食。避風寒。防穢氣而已。

痘出齊後三日內。其時日十分緊要。其形色症候最宜審察。若好  
痘全平膿漿濃濁。其次高而不平。膿漿方。可保無虞。痘一出齊。  
形色類此。其膿之成與不成。皆與不足。皆可逆視矣。除以上順候



自生膿足。不必服藥。外其有不順者。後必生膿。或膿少而淺。急於  
不可  
時刻  
此三日內。觀形察色。分別寒熱虛實。用藥調治。以為灌膿。可猶可  
緩  
及也。失此不治。少有後不及事。而竟不成膿者矣。瘡之生死。判於  
膿之有無。有膿則毒從外散。故生。無膿則毒留內攻。故死。是以膿  
濃而流者上。膿未滿而流者次也。其下者。遍身俱水疱。  
血水疱七八分。而間有二三分膿疱者。猶可生也。其最下者。密不  
成類。串為一片。而其皮下有膿漿。又或疱密而淺。膿水混淡。猶可  
生也。惟乾枯在膿漿。或為漿不油二三分者。必瘻塌而死。生  
妙抄  
意矣。是以出齊而調治灌膿。如極漏救焚。不可緩也。

氣血流暢則毒化為膿。膿之不成其病有二。毒氣熾盛則血燥而凝。故不能運化而成膿。元氣虛弱則血寒而凝。亦不能運化而成膿。故瘰癧色紅紫乾枯。或帶焦黑者。毒熾而血凝者也。必不成膿。急宜清毒活血湯。

瘰癧色淡白。疔不尖圓。根無紅暈者。氣虛而血偏者也。必不成膿。急宜用參歸鹿茸湯。或千金內托散。

清毒活血湯

治紫陷一二劑其瘰癧立得消滅時  
六七日不大便亦此方起脹時同

體壯而瘰癧  
紫陷者即  
服一二劑  
其瘰癧立起

紫葦葦 各 骨節 各 骨胡 各 牛膝 各 木通 各 生地黃 各 甘竹 各  
山查 各 白芍 各 連花 各 桔梗 各 人參 各 歸身 各 連花 各

紫江本草  
者亦可服

生薑茂公 生芎一尺 同煎 煨過去麩 茂公 加姜 生芎 末粉

考歸鹿茸湯

治白胎 胎不先溜 產後 胎行 胎二三日尚不先溜 皆可服 以托胎

鹿茸

汪氏勿用高珠

炙佛茂 芎

當歸身 歸

炙其下 芎

取漿第一

人考 芎

生芎一尺 好就服用 三仙 同煎 去渣 入好酒一盞 俟

兒有能飲酒者 濃美 兼可與酒相半 和服 亦好 虛弱未甚者

服此一二劑 其症即轉 紅活 行漿 困倦 手足冷 飲食少者 加木

六三分 丁 岳 官 桂 各五分 寒戰 咬牙者 再加 官 桂 各五分 藥 附子 各

四分 湯者 去 附 加 蘇 炒 白 木 正 切 白 芎 白 云 苓 各 分 木 正

丁 桂 各 分 另 用 考 木 散 止 渴

白木 茯苓 有 燥 濕 之 功 恐 灌 膿 時 亦 宜 此 處 寒 症 故 用

参木散

白木 去芦切女

薏苡仁 草

白茯苓 青草

人参 草

砂尔 草

柯子 根去核

山查肉 草

家蓬子 草

茯苓皮 草

白豆蔻 碎去油

南木香 草

真神粉 切草

桑叶 草

以上共研细末。每用一茶匙。清酒调服。余皆浸服。兎有石皆服。入粥内和服亦。  
托腰之功。莫妙於此方。以鹿茸补血力峻。与草木诸补药不同。

然恐鹿茸未必得。故又録千金方备用。

千金肉托散

舊方有桔梗治白陷  
反陷等與鹿茸湯同

人参 草

骨归身 草

桑叶 草

白芍 根切

大川芎 草

巖俗加糖  
米等失亦

官桂 五分 炙甘草 五分 山查肉 五分 南木香 三分 防風 二分

白芍 三分 切厚朴 三分 生芎 一片 就服用三分 同吳好酒和服。

隨症加減法同上。 有用人乳和藥服者。雖於灌膿有理。但人乳性涼。脾胃弱而大便滑者忌之。泄者尤忌之。

出齊後十  
分要原志  
急為所促  
子計

出齊後。皆治不治。劑漿不行而五陷之症作矣。五陷者。白陷、灰陷、紫陷、黑陷、血陷也。

痘稠密紅紫而頂陷者紫陷也。甚則轉而為黑陷也。此毒熱熾盛。蔽其氣凝其血而陷也。仍用前法。毒法血湯治之。其隨症加減法。亦各之。無皆其紫陷時。不過一二劑。而痘立起。其效如神。及至黑

隨劑受毒已深。雖用此方救治而不活者。十常八九矣。

法毒活血湯 見前

痘雖稠密。其色淡白。根赤紅暈。而頂陷者。白陷也。甚則轉為灰陷也。此血氣虛寒。不能運化毒氣以成膿。故陷也。宜用前參茸鹿茸湯。或千金白朮散治之。甚隨症加減。以心裁之。

參茸鹿茸湯 見前

千金白朮散 見前

又有一種痘疹。頭粒通紅。成血泡而不成漿者。此氣虛不能統血。而血滲妄居氣位也。詳見前論氣血條。宜用參茸鹿茸湯大補其氣。

# 參芪湯

人參五錢 炙傷芪五錢 炙甘草二錢 官桂一錢 生薑五片 同煮  
溫服服此泡即轉白而成漿

血危失法。則氣愈虛。而為血脂。血脂之六不外此矣。血脂與紫脂

辨在紅紫  
二色以分相類。但血脂雖紅。其淡而不紫也。紫脂居在氣在身熱。血脂居

虛寒虛。氣少身涼。不可不辨。身熱身涼  
虛寒類並

何正丘論五脂。說從朦朧不明。管稱論云。右并錯可惡。症出齊

二三日後。毒熱化為膿漿。漸充滿起頂。先消膿。消。身體溫和。飲食能進。小便清利。大便二三日一次。此順候也。不必服藥。但

節飲食。護風寒。避穢氣而已。

犯五隔者。治已見前。其或雖不隔頂而痘不光潤。或亮虛而漿不  
過三四分。或雖有漿而清薄。或行膿至二三日尚不充滿。此皆難  
以收靨。宜用參朮鹿茸湯。催足其漿。  
氣根葉不能灌漿不能  
待屬此時毫漿為主

參朮鹿茸湯

見前

膿漿不滿。鷄冠血。法亦可。用三五年以上大雄鷄。先將好法一  
盃。盪洗。次刺鷄冠血。滴入和勻。仍頓溫服之。服後或燥痛一時。全  
好。其鷄不可殺。

又有一種出痘稠密。毒火既盛。血元氣虛。血氣弱。津液枯竭。不能



制火。以致虛火炎蓋。或煩或渴。或咽喉痛。或鼻時出鼻難任溫補。

毒感而體弱者難治

症必不能成癥。結痂。大凡年長之男女。嗜慾久間。血氣俱耗者。多

用清涼劑

損血氣弱

有此症。最為難治。時醫見其多熱。候率用清涼。以犀角地黃湯之

胃若溫

補又助毒

類。不知原因血氣不能勝毒氣。而致有此症。今又徒用寒涼。則血

而助邪

不救溫補

血氣愈虧損。而毒氣愈劇行。豈後有可生之理。是以此等癥症。時

而用若補

醫治之。十生一生。殊可哀憐。今特製參麥清補湯以潤之。

參麥清補湯

與後清脾湯不同此兼補耳

人參 一分 麥白冬 三 白朮粉 二 生薑 茂 二 前胡 素 中 萬 加 麥

生 廿 夫 三 初 白 芍 二 生 白 芍 二 骨 節 分 紅 棗 二 分 白 芍 二 分

法

生地 三十分

桔梗 二分

山查 同

生芎 二分

龍眼肉 二分

同炙

湯服遇此症者此藥皆頻服

痘出五不日內。至七八日。若膿漿不行。必當用前參見前鹿茸湯托

之。黃芪生用若膿漿不起。則全生意矣。若有日五分膿。猶可望生。

宜早催足  
膿漿可保  
生虞

參見前鹿茸湯

見前

起者灌膿時。有吐泄者。症各不同。

吐有二端。吐而酸苦有聲。吐花反快者。毒火上騰也。梔連二陳湯

止之。此痘色必紅紫

宜吐服

梔連二陳湯

灌漿則恐  
白芥半夏  
燥液也宜  
少用

黃連苦 白薇苦 芍藥苦 半夏辛  
梔子苦 陳皮苦 炙甘草甘  
生為一服。日美後復服。吐止即勿服。

吐而有物全聲。不酸不苦。吐花困倦。不思飲食者。胃氣損也。參研

和胃散主之。此瘧色必淡。

人參甘 砂仁辛 藜蘆辛 半夏辛 白朮甘 白芍酸 炙甘草甘  
陳皮苦 炙甘草甘 煨薑辛

泄有二端。泄而薰黃臭穢。小便赤澀者。毒氣奔越也。瘧色必紅紫。

加味四苓散主之。泄而薰青白滑利者。虛寒也。瘧色必淡。白朮

煎宜服

散主之。如虛滑不止兼用七味豆寇丸

加味四苓散

此方治熱泄下二方  
治虛寒泄瀉次神

朱苓分 木通分

澤泄七分 赤苓七分

車前子 五分

黃連切五分

黃芩切五分

牛蒡切五分

灯芯 一團

同藥食前服

參朮散

見前

七味豆寇丸

虛泄宜服

肉豆蔻

藥性

柯子

藥性

砂仁

南木香

草

白朮

藥性

赤石脂七兩

柘丸

穀糊為丸。每用法。每飲下卅粒。或二十

凡量兒大小與之。兒有不能吞者。將丸研碎入粥中服之。亦可

此等凡散。治瘧之家。必預製。以防虛滑泄瀉。若瘧起脹。或收結。時驟急泄瀉不止。危在旦夕矣。無止瀉用湯藥。少不效。有服至異。

大便秘

功散而不止者。惟此凡散。可止之。惟毒作瀉者。加味四苓。

不泄不秘

散一二服即可止。起脹瀉膿時。或有又七日不大便。而塞悶作痛。

若佳每以  
要二便出  
皆為順

者。毒盛而秘也。用前法。毒活血湯去芍藥。加淮牛。夕二。切紫葳。皆

師。五和至二。切。若毒熱去。渣入生。寒半酒。吞服之。若不通。用青

菜。加苧。切。大黃。三。切。微利之。若仍不通。用猪胆汁。滴入穀道中。即

通。終不可用硝黃。大下。恐下後。變他症。刻危矣。

加味四苓散 見前

清毒活血湯

紫葳茸 之 骨脂 之 前胡 之 牛蒡 之 延胡索 連名 之

生白芍 之 連名 之 桔梗 之 木通 之

山查 之 淮牛膝 之 生地 之 甘竹 之

身涼而汗不止者，归芪湯主之

归芪湯

、骨脂 之 炙甘草 之 酸枣仁 切研 之 水炙服

有疾用白附子熟水磨服。切不可用之。除湯惡燥。湯成。欲陽氣陰。不能施化也。至收屬時用之。年物。

續修四庫全書 子部 醫家類

五〇〇

活幼心法卷之四

法江壽久吾先生著

東吳周雨邨先生編

漿足回水至結痂還元數日內調治法

痘出八九日。膿漿充滿。顏色蒼蠟者上也。若在他症勿藥可也。或

痘出稠密。而膿不甚滿者。至此時飲食多減。痰液多感。宜用

養胃潤痰湯

人參 芍藥 白朮 桑寄生 桑寄生 桑寄生 山查肉 桑寄生 山藥 芍藥

蓮子 芍藥 陳皮 藜蘆皮 桔梗

灌膿時。忌用木芍。半夏。恐其燥乾津液。膿漿不行也。至此將屬



予孫映辰種痘灌漿

時可用矣

以上十味用生薑一片同煎湯服湯者去半夏加皮

滿時痘痒舌黑子潤

冬令此五味

研碎九粒吐逆者加藜蘆炙初仁各三

此系漿滿為風寒所

此時有咳逆者

既後呼胃氣上越也取真羔土鼻邊聞之立止

皆痘漿黑如紫葡萄

此時漿滿或為寒氣所薄一時痘俱紫黑如紫葡萄色不必驚恐

色用上肉桂磨服立

急以上好肉桂磨湯或黃湯服之立見效舊

特如舊子悟痘黑服

有寒戰咬牙者此真氣外散而內虛寒也宜建中湯大補之

由桂可轉紅潤則吉

建中湯

黑服桂必定可轉紅

人參 芍藥 白朮 當歸身 炙甘草 干薑

潤故用參

肉桂 大附子 吳味 丁香 五苓 生薑

花黃白赤混

重加內桂  
一服舌果  
紅潤也止  
其痒故錄  
出以為後  
人便覽  
黃起楚記

同煎過服。一服立止。甚者不過二服。

收靨後寒戰咬牙者，同此方調治。

或謂寒戰咬牙之症，有熱有寒。其瘧色紅紫，齊勇掀發，身熱煩燥，作渴，大便秘，小便赤澀，脈來紅數者，熱也。蓋胃熱則咬牙，肺熱則寒戰也。其瘧色淡白，及背頂陷身涼惡寒，大小便利，脈來沉遲者，寒也。蓋胃寒則咬牙，肺寒則寒戰也。此說當矣。然此症屬寒者，十丸，屬熱者，十一。見於七八日之前，猶間有屬熱者，見於七八日之後，其屬熱者寡矣。是以不為熱者，五方。九日十日間，膿漿足而色蒼蠟者，必且畏熱薰蒸。此回水之候也。

蓋真陽運化。其水自然消燥而收屬也。其元氣不足者。則不能及時回水。而當屬不屬矣。此虛寒者也。必身涼而手足冷。須大補氣血而助之收結。宜用

溫表調中湯

炙黃芪 五 人參 二 白朮 二 茯苓 二 官桂 二 白芍 二  
當歸身 二 炙甘草 二 乾姜 二 防風 分 白芷 分 丁香 分  
附片 五 生薑 一片 同煎湯服

其有發熱甚甚而當屬不屬者。毒氣未解也。退其熱。則毒自收。

宜用

收屬發熱  
亦是常候  
此必熱之  
甚者也

法表散毒湯

地骨皮 分 表白 分 天花粉 分 半蓮子 分 蓮子 分

黃芩 分 骨節 分 木通 分 木 分 澤瀉 分

生甘草 分 水煎服 或用砂糖半湯匙 百沸湯 煎水

調作一碗溫服。謂之甘露回天飲。能令熱退。痘收而好。但毒盛者。恐未必效。

調治吐瀉。分別寒熱。用藥俱同者。

痘屬時有外淡而膿水淋漓者。謂之水屬。宜用新瓦為末。第令極

細。用絹袋包撲患處。若乾加堆積不蓋。因又害膿。即以此瓦粉用鴨

蛋調敷。立收而愈。

此痰滿熱  
極而潰者

又有中惡  
忽其腹痛  
者死

皆屬時。或忽生腹痛。其痛着在中腕。此毒凝滯。瘀血作痛也。用  
**消毒散血湯**

生白芍 二 牛蒡子 二 杏仁 二 紅花 五分 沒藥 五分 乳香 五分

酒切大黃 二 水黃溫服。一服三愈。

信和厚實。其他症者。不必服藥。

信和後發熱。或煩渴者。皆辨其虛實寒熱。調治。發熱壯感。胸腹手  
足頭面俱熱。大便秘澀。小便赤澀者。餘毒盛也。即當解毒。大連  
飲之。若解毒遲。則病前後。必發癰毒。

**大連飲**

內涼藥多俱可製。過對均用

連呂兮 牛膝兮 常山兮 赤芍兮 防風兮 木通兮  
 車前子兮 柴胡兮 荆芥兮 羌活兮 梔子兮 滑石兮  
 神退兮 甘草兮 生薑兮 同黃六便秘加枳實大黃子  
 若其發熱稍緩。頭熱面不甚熱。手心脚心熱。手背脚背不熱。精神  
 困倦。大小便利者。虛熱也。宜用  
 補中益氣湯

人參兮 白朮兮 升麻兮 炙甘草兮  
 黃芪兮 當歸身兮 陳皮兮  
 白朮兮 柴胡兮 枳殼兮 芍藥兮  
 黃芪兮 當歸身兮 陳皮兮 枳殼兮  
 白朮兮 柴胡兮 枳殼兮 芍藥兮  
 黃芪兮 當歸身兮 陳皮兮 枳殼兮

痲毒還元後。或痲毒一半後。忽至偏身大熱者。餘毒欲發。痲也。或手足四肢頭項胸背有一二處熱更甚者。即癩毒所在也。此在膿漿不滿。而後痲浮者。速收速落者。少有三。急宜用前大連甘飲以退其熱。大便秘者。加酒切大黃微利之。如熱不退。速服散劑。必須熱退身涼。癩毒方可內消。

大連甘飲

見前

此時又有忽至頭項大痛者。餘毒上攻也。或因少服桂枝湯所致。若不急治。其毒必注兩目。而目病大作矣。宜用大連甘飲去木通車前滑石加升麻桂枝各分。以苦下毒。服散劑以解散上攻之毒。庶可免患。

大連呂飲

黑首方內除木通等可滑石加計麻楮楮各五分  
川芎下為各四分

加黃後有精神困倦。飲食減少。胸膈頭項手足心皆熱而煩渴者。曰虛也。仍用補中益氣湯主之。

或有雖不發熱。而倦怠嗜卧。不思飲食。或手足冷。或津液少而渴。或癯白不紅。皆內虛之候也。亦宜用補中益氣湯調治。不致惡生他症。

補中益氣湯 羌青

須知出瘥少者。收結之時。還元之後。五臟真氣皆淡已少。一身血氣耗散已盡。雖或毒氣未淨。而其正氣極虛。是以用涼藥解毒。必



次用酒炒製。其體氣弱者。或時加入參芪地黃之類。以補血氣。切不可因其有熱症。而遽投以生三黃生梔子生大黃生石膏之類。此時正氣微弱。驟用寒涼峻攻。多有悞投而輒斃者。戒之戒之。活瘡之家。既謹其始。又必謹其終。瘡瘻之危險不測者。有二。一曰毒盛。一曰體虛。當其未出之時。或三五日而速斃者。皆因毒盛也。及其倍加還元之時。或候投一藥。候進一飲。一食而輒斃者。皆因體虛也。無毒成瘡。出不出者。能順其勢以導之。出而不妄。死解毒。以阻遏拂逆之。則未必致斃。故昔論再三戒論深為謹始者。慮也。體虛者。能察其虛而補養之。又防其虛而不峻攻之。則可保無虞。

惟玩其收信還元而忽易不加謹者。致快事。故又深為謹終者。  
警也。

續修四庫全書 子部 醫家類

五一二

一  
五  
三  
十  
三  
五  
四  
五  
五

活幼心法卷之五

活江聶久吾先生著

東吳周雨邨先生編

備用緊要諸症方論

症有夾斑而出者，有紅赤點而全頭在，少隨出而隨沒，又有夾丹而出者，紅赤成片，如雲頭而突起，此皆毒火浮游散漫於皮膚之間也。遇此者，不必驚惶，但用元參升麻湯一二劑，散其游火，其斑丹自退。

元參升麻湯

元參 升麻 甘草 防風 芍藥 荆芥 牛膝 羌活 水煎服

快麻 有快麻疹而出者。用前方加桔梗酒炒黃芩。令其麻疹先退。痘疹自嘴起發。

倒靨 痘瘡初見一二日。細小。四五日漸大。頂平。至六七日脚漸潤。頂愈

在內不出為伏出而

平陷。其色全白。形如豆殼者。名曰倒靨。此氣血大虛。而漿不行也。

復入為陷膿時不起

宜用前方參朮鹿茸湯加官桂白朮。芍藥。南木香。分。大便溏泄

為倒靨時不伏亦

者。兼用參朮散。痘瘡者表虛也。此為危症。宜用參芪實表湯。

為倒靨表虛故痒

參朮鹿茸湯

照前方參朮方加官桂白朮芍藥南木香

參朮散

見奇卷三

參芪實表湯

與平和湯表裏相形

矣。傷茂子。人參。二。矣。廿叶。分。官桂。分。消風。分。  
白。分。分。嘴。胆。分。以。考。分。桔。棧。分。厚。朴。分。

木。考。生。分。片。日。黃。溫。服。

一乃外治。瘡。瘰。用。荆。芥。穗。為。末。低。棗。漿。搽。糊。粘。低。頭。令。不。散。仍。煨。  
乾。灯。上。煨。之。却。於。桌。上。敲。去。灰。指。定。瘡。瘰。頭。用。荆。芥。火。點。瘡。處。一。  
下。患者。自。以。為。妙。每。瘡。瘰。瘰。患。患。之。三。止。

瘡。瘰。必。空。屬。虛。管。禱。乃。謂。有。氣。感。血。瘰。而。瘡。者。此。至。稽。謬。說。也。又。  
有。謂。因。血。上。行。氣。分。血。味。本。鹹。醃。整。皮。肉。作。瘡。似。為。正。理。豈。灰。白。  
之。瘡。不。惟。氣。虛。而。血。虛。亦。甚。夫。豈。祇。上。行。而。醃。皮。肉。而。瘡。搗。最。甚。

則此說亦未必然也。有穢氣觸犯而痒者。急燒蒼朮仁棗。或黃茶葉以辟之。甚者內服平和湯。

**平和湯** 見方卷二

表虛之症。膿漿不洩。少有痒者。其在幼兒或兒雖長。而神氣困者。必不能禁其手搔。況令其着舊軟絹衣袖長者。用絹索縛其袖口。令不得爪搔為物。如在絹衣。或作軟絹袋裹兒手亦可。有一不歲女孩。其瘡不正。膿漿淋漓而痒甚。曾用此汁。得不搔破。其後頭面亦多疤痕。若不用此汁。而爪破已多。縱性命能保。惡疤決難免也。

瘡痛為害。此為吉兆。用生白芍為細末。每兩下一錢五分。立止。甚

者不過二服

內脹 痘出齊後。有面目腫脹。而痘不脹者。此血氣虛弱。不能拘攝毒氣。危症。以成膿。故其毒散漫妄行。自分也。此為危候。急大補氣血。以收攝

頭面預腫者亦危

其毒。則痘灌膿而腫脹自消矣。以參歸大補湯主之。 恐難治

參歸大補湯

興和平湯參芪實表湯相似。即實表湯去官桂加山查紫草。

人參 芍 當歸 芍 炙芪 芍 山芎 分 桂枝 分 山查 白 分  
炙芍 分 防風 分 白芷 分 厚朴 分 木香 分 紫草 芍 分  
生芩 一 臣 同 黃連 服

痘疔 痘出齊數日後。其間有紫黑脹硬獨大而全根暈者。痘疔也。用四



聖膏填入或拔毒散點之。

四聖膏

珍珠

碗豆

但燒存性

亂髮灰

三系

冰片

半分

用油胭脂熬成膏。先將金銀簪擦遍疔口。將藥填入瘡內。即符紅法。

拔毒散

雄黃

研末

胭脂濃浸水調點疔頭即時紅法

瘡毒發於肌膚而氣血不能悉運化以成膿結疔。則有醫者不效。赤腫而成癰者。其發於未收以奇者少。而發於既收以後者多。未

收以骨必膠漿少而骨者有之。若膠漿稠者亦有也。既收以後必  
結而厚焉。而速結速骨者有之。若結而厚實。而後結後骨者亦有  
也。此毒氣貴淺盡與不盡之明驗也。又有不虛而服補劑。不寒而  
服熱劑。以及發癰者。醫之悞也。凡此俱大連公飲主之。

大連翹飲 見前卷四

內服大連  
外刷  
三豆漿

但皆其初發時。骨腫時。內外夾攻。急湯散之為上。至於成膠劑  
初小之兒。多難堪。而在頭項胸膈腰背者。甚險也。慎之慎之。外治以

三豆漿塗之。

三豆漿 黑豆 赤豆 赤小豆 各用一合。以酸醋浸。搗碎

醱漿。时时以鷲翎刷之。紅腫退去。其效如神。又方用赤小豆。為細末。清水調敷。乾即易之。

其爛痘瘡原多潰爛。收結後或手足等处。仍作瘡臭爛。出膿水不止者。

生肌散

生肌散

地骨皮 黃連炒 黃柏炒 五倍子 生肌散 等分為細

末。乾摻之。即收退結痂而愈。甚有仍作瘡作膿。而不即愈者。因毒未淨也。仍用大連翹飲解之。

大連翹飲

見前卷四

又有餘毒流注各處。出清水者。綿蠶散搽之。

### 綿蠶散

出蛾綿蠶。不拘多少。用生明凡末。揅在內。燒令干盡成灰。為末乾搽之。

惟有毒虫 痘有鼻中衄血者。毒氣上衝於肺也。此其毒氣外洩。亦非惡候。不可治若他出血者 必驚惶。只用髮灰散。或落肺湯治之。切不可峻用寒涼。如犀角生

危也 用寒涼必地山梔生三黃之類。必為大害。世人不信此理。一遇痘聚研以取 效而手寒。瘡有衄血。咽喉口舌等症。即認為實熱。據投以寒涼。冰凝血脈。以

致痘瘡不得成膿。而變為壞症者多矣。是治末而病其本昧之甚。

者也。

髮灰散

用少壯年病人亂髮，不拘男女，肥皂洗淨，油垢氣，不用溫湯洗淨肥皂氣，焙乾，量髮多少，用新瓦罐一個，將髮填入內，令湯淨瓦片蓋口，蓋和泥封之，又全封瓦罐，極乾，用木炭火圍罐一年，煨一柱香久，取出候冷，其灰成塊，研令極細，每用半錢，童便七分，酒三分，調服之，止。輕者即用法吹鼻，亦止。此方極妙，不惟可用之瘰癧，凡諸血症皆可。

清肺湯

與前方參麥清肺湯不同

花粉

麦白

天门冬

甘州

桔梗

滑石

浸善草

相黄

牡丹皮

炙甘草

生白片

同煮一二服止。如有髮灰入子。调服丸料。

水疱。瘡有水疱。主膿者。血少不能化膿也。急宜用考胆鹿茸湯。峻補其血。

考胆鹿茸湯

見前

若膿死與水疱相半者。在大疔害。以十分中有二三分膿死者。猶有生。惟澤身水疱。全在膿漿。則危矣。然胃氣好而飲食必常者。心可望生。但其毒氣未散。決防發癰耳。其或兒小瘡。則血氣有限。不能盡成膿漿。而水疱與膿死相間。



牛膝如研 桑葉生 甘草生 白芷生 薄荷生 紅花生

川芎生 生地黃生 桔梗生 山查生

生薑生 龍眼肉生 同吳茱萸服。

### 赴筵散

薄荷 黃柏 桑葉生 甘草生 細末入香袋少許。和勻搽之。

或口舌有瘡而腫痛者。瘡屬自愈。不必治。治之而不效。

咽喉 瘡有咽喉痛者。首尾俱用利咽解毒湯。外用玉銀匙吹之。

### 利咽解毒湯

山豆根生 麥冬生 元參生 桔梗生 牛黃生 犀角生 防風生



甘草 生為一片。食後以酒服。每藥一錢。分三起後服。

玉鎖匙

朋砂 二 朴硝 五 薑黃 一 桑 水腫 五 薑 為末以竹管吹之。

失聲 瘧有音啞者。背側癢瘧色以分喉逆。若瘧色在者。行漿而音啞者。此氣喉有瘧也。是以外瘧行漿時。日瘧亦行漿窒礙氣道。而音不亮也。待外瘧厲剋內瘧亦消。而音自亮矣。此不必別加調治也。若瘧色塵陷灰白。而音啞者。乃血氣虛弱。送毒不出。毒留於肺。肺氣受傷。以致失音。此則危矣。宜考麥法補湯。並用千金內托散。

考麥法補湯

見前

千金用托散

先考卷三

噎水 瘰有咽喉噎水者順逆不同。須辨分。辨若瘰灌膿漿時噎水者。喉中有瘰也。外瘰成漿。則內瘰亦成漿。連於會厭門而噎也。蓋是門乃飲食所進之處。既有所壅。則飲水必滯入氣喉而發噎者。若原物有滯。自能咽下。不犯氣道。故不噎也。待外瘰屬。則內自瘰。不藥而瘰矣。並此雖噎水。其喉亦不甚痛也。若瘰未行漿。而喉先噎水。此則毒氣壅塞其喉。必痛。宜用

利咽解毒湯

山豆根一分 藜蘆一分 天冬一分 桔梗七分 牛蒡子七分 薄荷五分 生薑一分

小便不利 瘡有小便赤澀者用

導赤散

赤茯苓 分 生地黃 分 人參 分 甘草 分

春白芍 分 車前子 分 木通 分 灯芯 圓 同黃飯時服

忘眼 瘡毒入眼。有赤腫而痛。不能開者。有翳膜遮蔽而不能視者。自古方書所論。及俗說所傳。皆以為瘡瘡入眼。而不知此非有形之瘡。乃無形之毒也。其遮睛之翳。有似瘡瘡而實非也。蓋有形之瘡。發於咽喉者有之。發於口舌者有之。然皆外瘡起脹時。內瘡亦感。外瘡收屬時。內瘡亦消。惟入眼之毒。必作於收屬之時。或遲克之後。

與咽喉口舌之瘡迥異。此以知其非有形之瘡也。蒼脈者，五臟氣血之精華也。瘡毒之鬱滯於肌膚者，為癰為疔，而其留滯於精華者，則發為疔患矣。毒已留於氣血精華之分，則其受病也深。故患此者，當從容調治，收功於救十劑之後，切不可爾莽躁率。責效於數劑之間可也。瘡內之人，元氣已弱，受毒又深，而其毒火發露在表，又在至高之位，若驟用寒涼峻攻其裏，而疏利其下，則既傷其元氣，又拂逆其病勢，未有不至於喪明者。且或生他症，而為大患者，少矣。用法，毒擦翳肉，從容調治，使其毒氣漸退，而元氣不損。此第不失一之術也。又忌用寒涼之藥點洗，亦少致失既。

法毒撥瀉湯

加減道途散入花粉中。香桔梗白茯苓  
甘菊各花木定生地草決凡九味而已

煨黃連

當歸

花粉

牛蒡

草決明

桔梗

甘草

白芍

菊花

羌活

紫花

谷精

木定

白檀

白芍

紫胡

防風

薄荷

生地

山梔

生藥

同美

命後良火服大便秘澀

者。如任切大黃。五。服。二劑後。仍去。此方毒輕者不滿十劑。而愈。毒重者。服數十劑。至。可獲全效。

再附古今治症之方

十神解毒湯

香附五分 補骨五分 生地黃五分 山仁花五分 牡丹皮五分 桂枝五分 木通五分  
桑赤藥五分 連翹五分 山竹五分 大腹皮五分

此方以涼血行血為主。而佐以桂枝山竹有調提發散之義。引以大腹皮木通有疎利之能。臣以連翹牡丹皮有清解之德。視古方徒用寒涼冰伏者。大不同。症已出者。出二三日。煩渴燥渴。少便赤澀。腫小不寧者。可用之。此方可與和發推條效毒

和中湯散參用

九味神功散

人參

黃芪

牛膝

紅芪

荷胡

紫葳草

白芍

生地

甘州

生薑分水煎服

此方初出而稠密紅紫。或帶生黑毛者可用。

荆防解毒湯

防風

牛膝子如研

叶麻

知母和系

元參

系

荆芥

酒浸系

加黃芩

此方治瘧夾肌夾麻夾丹者俱可用

四聖散

紫葳

黃芪

甘州

木通

水煎服

鼠粘子湯

牛蒡子

滑石

炙甘草

柴胡

連翹

知母

地骨皮

黃芩

各等分水煎服

此方痘稠身熱不退者宜用。

保元湯

黃芪 人參 炙甘草

老生薑二片大棗一枚。去核同煮。有熱者黃芪甘草生用。虛

者黃芪蜜炙。甘草炒熟。更加官桂五分。

異功散

痘灰白 痒搨 咳 牙 寒 戰 泄 瀉 腹痛 宜用此方 此方 四君 之 陳 平 胃 三 方 合 去 甘 竹 葉 桑 葉 加 三 味 方 治 胃 弱 脾 虛 不 化 不 味



人參 白朮 茯苓 當歸 熟地 厚朴

半夏 木香 丁香 肉桂 紫附子 官桂

加黃耆水炙服。

木香散

南布石 用石磨入 大腹皮 連皮 人參 赤茯苓 苜胡

香皮 藜蘆反 丁香 柯子肉 甘竹

官桂 以上各藥 生薑三片 大腹皮 反 香核同煮。

田生丹 瘧疾白瘧寒以浮手是冷者可服此方以應急

丁香丸散 乾姜 水黃耆服

八 正散

小便瀉秘服導藥散不效者用此方

赤茯苓 分 瞿麥 分 山梔仁 分 滑石 二 甘草 分

車前子 分 扁蓄 分 木通 分 灯芯 一團。搗成丸後秘者加方書一和

無價散 黑脂欲死者用此以厚卷

用老病小兒薰陰乾。將傾銀罐二箇。上下合定。裝泥固濟。火煨通紅。取出為末。蜜水調服一帖。一方加麝香些許。

辰砂養元散 治瘧熱甚太甚狂言燥渴欲飲水者

滑石 飛過 甘草 分 辰砂 飛過 二分

右合勻。每服小兒五。大人半。灯芯湯下。

是編治痘諸方。多隨症立法。不拘於易成。而以上三言。皆古今  
活症之最要者。因附錄於後。以備參用。

### 紙摺照法

用學書竹紙。或燒錢草紙。焙乾作摺子。如小指大。蘸油清於灯上。往  
未薰滅。令紙條在泡不漾。又飽蘸。由暑薰滅。令油在泡。即黑摺  
子。將患者房內牕門閉。令黑暗。看其左額。有何色點。右額有何色  
點。中庭有何色點。觀兩額宜以摺子在兩邊。耳及鼻邊。平照。觀中庭  
宜以摺子在兩目角也。平照。看其皮中。厯々可指。是赤。是紫。是塊  
是點。曉然明白。若是麻疹。則浮於皮外。肉內。如林。若是痘疹。根在

由因極深。若以樵子背巖及中庭正照。則照而不見。樵子有灰。即  
搗去令明。以此照之。病情在內者。可以預見。若以天日光觀之。亦  
不見矣。

### 附痘疹避忌

#### 避穢氣

腋下狐臭氣。	房中淫液氣。	行遠勞汗氣。	溝糞濁惡氣。
婦人任候氣。	諸瘡腥臭氣。	砒硫蚊烟氣。	誤燒頭髮氣。
吹滅灯燭氣。	柴烟立骨氣。	葱蒜韭薤氣。	糞烟油烟氣。
醉酒暈腥氣。	麝香燭穢氣。		

守禁忌

生人往來。詈罵呼怒。對梳頭。對搔痒。勿掃地。  
勿對荒言。勿使僧道師巫入房。勿對飲酒歌樂。  
以上諸避忌。謹之則重可受輕。不謹則輕變重矣。

如若痘癩破爛出水用飯蒸散之即愈  
中這毒效麻草葉一把燒灰和水  
片少許研末搽之即愈

活幼心法卷之六

法江蘇久壽先生著

痘症或問六條

或問曰。事貴豫防。醫治未病。古人主豫解痘毒之方。或解之於平時。或解之於臨時。其方何啻數百。子何以知痘毒不可豫解。而不載一方也。曰。以其理知之。又驗其事而知之也。蓋痘毒稟受於胎。而潛伏於五臟。或數年而後發。或十數年而後發。或數十年而後發。當其未發時。深藏潛伏。聲臭俱泯。於何而解之。彼無聲臭之毒。又豈有形質有氣味之藥所能解散。且用藥攻病。猶如用兵誅

寇。故必執兵持竿。然後可以寇誅之。嘗聞周矣。事時。雖有奸。其潛伏其中。而不執兵。不持竿。誰能識其為寇而誅之。今豫解毒藥於聲。其俱混之時。得全類是乎。此以理知其不能解也。予婦產男女十人。皆已出痘。前又人多用豫解毒藥之方。而出痘反有極少者。後四人不用此方。而出痘極少。皆自愈矣。此可驗痘毒輕重。定於稟受之初。而不能豫解也。然服解毒藥於平時。雖全益猶有害也。至於臨時解毒。則有反害者矣。每見貧賤之家。父母珍愛其子。一聞鄰家出痘。則多服解毒之藥。以致損兒胃氣者。有之。或兒已發。將出痘。而多服解毒藥。以帶過其毒氣者。有之。犯此二者。

所謂年差而又言之者也。以是知解之於修時者。尤不可也。或  
問曰。子立論折諸家之衷。若劉河洵妙仲陽張潔古王海藏陳文  
中等。皆古名醫。子後其失。猶之可也。至於朱丹溪集醫道之大成。  
而子亦議其未盡。痘家之妙何也。曰。丹溪之醫。誠精矣。子謂其未  
以盡醫家之妙乎。又且以盡痘家之妙乎。且醫之為道。精微廣大。  
亦難言矣。自古名醫。雖各有精妙。然亦有訛謬。如王叔和著脉  
訣論五臟不腑。謂三焦在空有名。寄在胸中膈相應。夫三焦者。  
右腎命門之腑也。男以藏精。女以繫胞。若其氣形狀。何以藏繫。若  
其寄胸膈。何以右腎之腑。而脉後獨屬右尺也。此其說大謬矣。夫



叔和明鑿。豈無精妙。而錯論臟腑。大失古人之意。有如此者。後人宗其訛誤。習焉不察。至宋張季明著醫說。始論其謬。其言有理有據。然世堯宗叔和之謬。而莫知有季明之辨也。如此之類。何可枚舉。若劉河間詩之治瘧。而專用寒涼解毒。則又宋因循諸瘧瘍。居心火之言。而失其甚者也。蓋因循此言。為諸瘧者。非為瘧瘧者。也。瘧瘧與諸瘧。大不同者也。且黃帝毒白小。於石。知其於瘧瘧。已置之勿論矣。而劉河間抄仲陽藥。乃宗其論。諸瘧之言。已治瘧瘧。此何行車於水。而推舟於陸也。訛謬甚矣。丹溪又宗劉河間而不能止其謬者也。何以無盡醫家之妙也。或問曰。古人治瘧。

一以解毒為名。至丹溪揭解毒和中安表六字。論者以為精當之極。大畧謂症未出而能解毒。則可以免後出。症既出而能解毒。則可以免後出。神效發癰發疔入眼等症。此豈不深有不深有至理。而子獨極言解毒之害。而諄諄以安解毒為戒。此其為說。未之前聞。不亦過高而駭眾乎。曰。此症家第一精深微妙之理。古今高才之士。皆迷而不悟。是以徒知解毒之利。而不知解毒之害也。雖丹溪解毒和中安表之說。亦欠分曉。蓋揭解毒二字。於和中安表之上。後人批而用之。以致悞事。以丹溪之明。而見不及此。况其下焉者乎。蓋毒久伏於五臟。一旦觸動而勃發。其勇悍發烈之勢。斷不可禦。遇又

何可解散。智者惟順其勢。以導之出外而已。昧者當其發。出未出時。而遽投以解毒藥。則拂逆其勢。豈惟不能解散。而適以逼之返戾內攻。宜其禍不旋踵也。故少有瘧。儘見數愈。而兇已斃者。則亦慘矣。近日每見富貴之家。相珍愛其子者。少有罹此病。然而病家與醫家。終不悟其失。且曰。此症最惡。吾先為之解毒。猶不能救。況不解毒乎。噫。迷念甚矣。獨不思使其不處用解毒藥。以逼毒內攻。則毒出外。而自自安。何處至於斃。從其瘧出。或稠密。或紅紫。或乾枯。猶可從容調治。孰與未見瘧。而遽死之慘乎。是以瘧未出之前。除升散微汗一劑外。凡攻裏。清表。寒涼。解毒之劑。皆一切禁之。只此

巴勿令入口可也。古人謂不可汗下。而此理惜其語焉而不詳也。鼻溪亦戒妄汗妄下。庶幾不失古人之意矣。而又教人用犀角把黃湯之類。是徒知汗下之害。而不知當此氣出未出之時。不必汗下而後為害。即少用清涼藥犀角生地之類。亦能過毒而攻而致害也。惟人考效毒發能宣發毒氣出外。猶年害年。若胡氏輩率其愚臆。謬見。而妄謂非汗則表熱不解。非下則裏熱不解。汗下以解表裏則瘧出稀而必亡。遂死。而後之愚儒。若管樞輩。又從而教得其說。使世人不容而誤用之。以致兒童之罹此而夭折者。不可勝計。禍亦大矣。予欲救其禍。安得不詳辨以報其迷也。至於瘧既

出之後。例有不必解毒者。有不可解毒者。而必兼補養者。有可以專解毒。而不必兼補養者。不必解毒與不可解毒者。前說稱之詳矣。若其症出稠密紫暗乾枯。而不起發。不滯膠者。此毒氣盛。而血氣弱者也。或先用清涼藥解散其毒氣。而隨以補血氣藥助其行漿。或於解毒藥中。兼活血養血扶元氣藥可也。此例所謂不可專解毒而必兼補養者也。丹溪所謂解毒和中安表者。惟用之於此為適當乎。若其症出稠密。湧盛紅紫。凸綻而潤澤。然而口渴喜飲。善肌喜食。煩燥不安。大便久秘。小便赤澀。此則可以專用法涼解毒。不必後兼補養者也。大畧既出以後。未收以前。

可以專解毒者。惟此一藥。以其氣與毒氣俱感耳。身重則毒  
多者。其氣最淺。血氣難支。少致虛弱。恐血氣毒氣俱感者。百中一  
二年。專諸解毒者。錯謬不少。惟收後效。覺有解毒。刻急宜解  
散。不可少緩。後刻恐致癰患眼也。

或問曰。若人治症。先辨生死。其症速而必死者。或作為歌訣。或著  
為圖說。戒人不必施治。若妄治。刻反招怨。尤子約不分別。遂症。而  
一藥為之。主方。設法何也。曰。彼以醫之心。主法。而吾以父母之心。  
主法也。世之出症者。孰非人子乎。父母之於子。慈愛其必死。而不  
為之救治乎。况病者雖有服送。而治法豈全工拙。彼前人思之未

精。治之未及其妙。所以可治。其瘥。慮為必不可治。而一藥救後人。棄而勿治。此非人存之心也。予甚惡其說。是以必矯其失。豈非徒以空言矯之也。至於於昔人所指必不可治之症。其嘗活其五六。又未嘗不智昔人之疏於主信。而輕於主言也。是以不忍不為之死裏求生也。其或有求其生而不得。吾未敢言何者。然後於好生之心。至矣。

或問曰。古人之方用大靈丹。無比救小。無比救大。成教人。牙散返靈丹。龍虎丹。之類。皆相傳以為治瘥妙方。而子俱不取用。何也。曰。瘥瘥一以血氣為主。其順者血氣能勝毒氣者也。其險而

不順者。皆血氣不能勝毒氣者也。治瘧者。皆使血氣強弱而得其宜。以解毒氣。乃為穩當。以上諸方。皆用金石腦脂等悍猛之藥。以劫殺毒氣。而損傷元氣。殆甚。用之於元氣弱者。或可以偶中而獲效。用之於元氣強者。一不中而為有解。效矣。前人傳用其方。若計其效。而不計其甚效者也。予所以不取用者。恐未得其效。而反受其效也。惟毒入心經。而狂燥不知人事者。猪尾膏可間用之。而虛弱者。仍忌用也。今錄其方於後。

### 猪尾膏

冰片

五分

刺猪尾魚之目研澄淨調下



或問曰。子之著論之方。自以為得之透悟。前年古人。後年今人矣。子固得心應手。隨試輒效矣。不識依子之術者。亦能與子之妙應否乎。曰。此別難言之也。予惟精思透悟。善通古人之意。而妙用吾心之神。故每能將福為福。起死迴生也。後有能通吾意者。其神妙出吾之右可也。若不能與。別未可必也。何者。得心應手之妙。不可以形之於言。而笔之於書也。予差久精此術。而不輕於著書。忘為其有不可。以言傳者耳。至於近時。屢觀世人。治瘡之迷誤。而兒童少遭夭折之禍。故亟為是編。以正之。雖未必能授意傳神。而亦可。以醒迷救禍也。

活幼心法卷三

活江蘇大司馬先生著

活痘鑿案十一條

予第四兒生四十日即出痘其初頭上并身上不過三五點兒身

不甚熱而  
出之甚後

不甚熱飲乳如常看者皆謂此兒痘極少當不滿百粒予以為未

所以為佳

必愈即令禁風調理再越三日而遍身出痘甚多頭上胸腹腰背

手足俱稠密之甚至於額上面上及陰囊等处俱一片純紅不分

顆粒臍內痘甚多臍因腫大突出舌上痘亦多形如白米濃漿布

置滿舌看者皆以為小兒痘多又有不順諸症此必不可為矣予

紅活能食  
便是佳徵

見其瘡出紅活。又頗能飲乳。以為尚可調治。慮其血氣難支。因以  
人參、薏苡、熟地、甘草、黃連、芍藥。時與乳相間服之。以助其灌膿。起漿。至  
於五日後。其頭上之瘡。少有膿漿。而間有水泡。至於身上及手

不用寒涼

足。別水泡大半。而膿死僅小半耳。予以為兒小而血氣有限。其理  
宜也。不為憂也。獨憂其額上面上一片純紅者。去一黑膿漿。以為  
必得皮下有膿。而後毒氣可散。仍時以參、薏、苡、甘、草、芍、藥。以助其  
灌膿。至第七日一更時分。額上純紅者。忽有一二處轉黑。色不見  
之。而大驚。先大人亦見之。而大驚。以為此毒盛。而將變逆症也。然  
察兒精神。與飲乳。則又未見困憊。是夜三更時。見其陰囊而轉黑。

結痂。予因悟而喜曰。此非惡候。乃瘰癧收而結痂也。緣身小而血氣易於周流。是以七日後即收。不可拘以九日常期也。若而第八日寅卯時分。自上至下。遍身俱結痂。至晚而結先。第九日自上至下。遍身俱瘰癧。至晚而瘰癧先。後遍身復瘰癧大塊。予曰。此瘰癧未殊盡。是以速收速瘰。而後瘰瘰如此。若餘毒感而瘰癧。瘰癧也。即生瘰癧。因以大連只飲濃茶汁。每用半酒杯。以茶匙後挑服之。凡一日一夜。服至三酒杯。而熱退身涼。可至瘰癧盡矣。其鼻上瘰癧一層。又結一層。封閉鼻氣不得出。因以塞洞其瘰。用銀耳挖其間。鼻孔以出其氣。其一片純紅處。瘰癧瘰癧而膿水未乾。以黃

兼必  
聚過

柏美連甘竹地骨皮五倍子為細末。搗之而愈。其陰囊流清水。數日不愈。諸藥不效。用佛手煎膏。搗之而愈。夫以此極小之兒。極少之症。極危之症。而隨症用藥。其應如神。其效甚大。已試之。服驗。章章可觀矣。而古人之著書。與世人之治症。一過兒小瘡。與夫穿臍。伴紅水泡等症。多棄而不治。不亦大悞夫乎。生靈夭折。何可勝計也。雖往者不可何如。而來者猶及救也。有司命之責者。懷慈幼之仁者。急生和之。

柏美連煎飲

先音卷四

佛手煎散

先音卷五

予次女六歲出痘。當痘甚後。至二日。面與手微有痘影。數點。甚。至  
第四日。而痘影仍是數點。且帶白氣。但困倦嗜臥。不思飲食。時醫  
視之。謂其痘瘡甚少。不滿百粒。予心疑之。以為若痘不滿百。其兒  
嗜寤神倦。飲食必少。全困倦嗜臥。不思飲食。而痘影淡白。此其  
證不少。因血氣虛弱。送毒不出故也。因以溫中益氣湯托之。服一  
劑。而皮下紅點隱隱。欲出者甚多。服二劑。痘出大半。一日一夜。連  
服四劑。而遍身出齊。稠密之甚。緣此女未出痘<sup>數日</sup>前。曾患發熱  
嗜臥。稍傷胃氣。是以血氣弱而送毒不出。必待溫中在裏。而後痘  
能出。其時有一婢與之同日發熱。其困倦嗜臥。不思飲食。痘色淡

淡白等症。一一與之相類。但此婢數月前。曾任出赤痘。遍體周密。其父母誤認以為已經出痘。遂謂前症不是痘毒。勿令服藥。但時以蒿菜湯。及粥食與之而已。至於第六日。忽然變症。痰湧直視。淚雙而死。此痘不得出而因攻之禍也。藉令子女不於第四日用藥托出痘毒。而延至第七日。不與此婢同斃乎。以此知痘毒於肯出不出之時。若不能察其虛實。而逐之出外。其不測之變。甚可畏也。

溫中參氣湯

見前卷二

予妹年二十三歲。有娠三四月。夜間傷寒。成疹所驚。因歸寧到家。不數日而半產。又不數日而發熱。二日而痘出頗多。至四五日而

痘出齊。稠密可憂。又兼嘔吐。痘色淡白。諸醫見其稟氣怯弱。半產  
虧損。痘出又少。皆不敢施治。予曰。豈有生而待斃者乎。因以參朮  
陳皮等安和胃氣。止其嘔吐。而痘色亦晝轉紅活。予喜曰。此可溫  
補而潤治也。因以參芪芎歸炙甘草木香等。大補劑。屢投  
之。每服補劑後。其痘色輒轉紅活。若半日不服藥。劑又符而淡白。  
予因一日一夜。必投以兩大劑。至於痘症漸膿時。聞其血脈尚未  
淨。予曰。此注漏危也。急於前補劑中。去官桂木香。加知母乾薑。寒  
切升麻柴胡各一分。阿膠艾葉各八分。服二劑。而血脈三止。  
仍添此五味。依舊補劑。頻投之。其膿漿漸充。滿至二十餘日。



而後收屬獲安。後又患服腫翳頗甚。服法毒撥醫湯數十劑而愈。甯其服大補劑時。每劑用芍藥各三錢。丁桂各一錢。他藥多少。稱是前後二十日服過。十餘劑。遇此極虛之症。若不用此峻補之藥。其殊極危為安乎。而區區常板。何足拘乎。

法毒撥醫湯

黃連 <small>酒炒</small>	當歸 <small>酒洗</small>	黃粉 <small>酒蒸</small>	牛黃	草決	桔核	甘竹
七厘 <small>切研末</small>	菊花	蒙萊	谷精	木定	粉道	川芎
羌活	紫胡	防風	薄荷	生地	山梔	

生藥一斤同藥合皮煎久服。大便秘澀者。加酒炒黃連五錢。服三劑及仍

去。此方毒輕者。不隔十劑而愈。毒重者。服數十劑。血亦可獲全效。

一表第年十五。出瘰遍身稠密至八九日。皆灌膿時。其瘰粒之陷入成窩。諸醫用木点異功等。茶治之。其陷伏愈甚。惟有待斃而已。予往視之。見其瘰色紅紫。而體氣頗旺。予曰。此非虛弱。乃毒氣壅蔽血氣。是陷伏不行漿也。因以活毒活血湯與之。辰時投一劑。至午時而陷伏立起。再投一劑而膿漿充滿。不必服茶矣。及至將屬時。又發推毒之。不屬。投以回天甘露飲。用初種石湯調茶服而收屬獲安矣。

活毒活血湯

- 紫葇葇
- 紫貝
- 骨胡
- 牛黃
- 木通
- 生地黃

生白芍

連召

桂枝

芍藥

甘草

山查

人參

生薑

茯苓

白朮

黃連

茂加麥門汀切花粉五分。

一表第年四歲出痘。至八九日。骨節酸疼。尚有一點膿漿。然其痘色紅紫。予知其毒感血熱。是以聚滯不行。六日法毒活血湯與之。

服完一劑。漿即日充。胸充。獲全安。

方光奇

一表第年十三出痘。身熱三四日後。痘出隱。數點。忽起。驚狂。語語欲走出外。醫欲以涼藥解毒。其家疑而詰予。予診其脈。後弱。而察其痘。色淡白。予曰。此其亦難似陽。蓋因血氣弱而逆毒不

出故發狂謬也。因投以溫中養氣湯一劑。而瘧出遍身。狂謬自解。精神清熱。不必服藥矣。

溫中養氣湯

方見卷二

予妻第十八出瘧。瘧甚稠密。既已收結。而頗向不食。口鼻時微有血。危困之甚。予妻先治之。以為瘧不可為矣。予視其症。知其元氣雖弱。而毒氣壅盛。未解也。治以酒炒蒼朮、連瀉、洗芩、青胡、桔梗、牛蒡、連、白、木、通、紫、葶、之類。服之劑。而精神清熱。能進飲食。可保無虞矣。予因戒令且勿服藥。歸而語予婦曰。汝兄曷於理而奔於藥。彼見吾治汝。弟以法涼取效。必將執泥其方。而施於不曾用者。不知

將誰受其害也。已而越數日。青第瘡痂尚未首尾。而眼欲赤腫。青  
先果謂其熱毒感。而可用清涼也。遽投以生三黃。生梔子。生石膏  
等大寒之劑。午肯投一劑。午後忽生變症。次更死矣。初慮其將  
挑方以候他人。不虞其即以殺其弟也。嗟乎。同一清涼之藥。同用  
之。一人之身。用得甚宜。則可以生之。用得甚宜。則可以殺之。用藥  
者。可以弗慎乎哉。

一表物。幼年十歲出痘。痘極稠密。而頸項甚小。俗謂之環頸痘。又  
有暴脹。痘散在各處。謂之穢豆。又其痘初出。帶紫黑色。諸醫投  
窮束手。以為斷不可治之症也。其家星夜請予視之。予至。時其痘

已出不日有解。正當灌膿之時。而尚年些少膿。醫者因其鬼體氣  
未強。又有燥瘧等疑。尚以解毒藥與之。予曰此但得灌膿充滿。則  
可生。何必拘拘以環頸異感。瘧為疑也。且到此灌膿時。又何可解  
毒也。其兒未驕不肯服藥。而喜飲酒。予曰。此時正宜於飲酒。可因  
之以為用。遂製考必鹿茸湯一六劑。令其濃汁。而以好酒相半和  
勻。與兒頻々飲之。自先日申時分起。至次日辰時分。服完一劑。視  
其頭面各處瘡瘡。已灌膿漿大半矣。是日午刻息。無糖泄二次。知  
其內虛而脾胃也。因製考必木散。方見卷三投入稀粥內服二三劑。而  
泄立止。後再服考必鹿茸湯一劑。而膿漿充滿矣。收膿皮。解毒頗

感。大便秘澀。用大連<sub>以</sub>飲加活州大黃<sub>三</sub>。服數劑而安。

一孩。年四歲。出痘。其痘正起脹時。泄瀉大作。屢投以參朮<sub>柯</sub>。類。竟不能止。勢甚危急。予以參朮<sub>散</sub>投之。服數次。約有五六折許。而泄瀉止。因以獲安。

一幼兒。年三歲。出痘。將屬時。泄不止。諸藥不效。予以七味<sub>豆</sub>冠丸<sub>九</sub>數十粒與之。亦不能止。其丸從大便中得出。予知其虛滑甚也。仍以豆冠丸數十粒。教令以米飲浸軟。研爛如泥。和粥少許食之。其泄立止。痘屬而安。予用此二方。以止痘中虛寒泄瀉。起危救困。不可勝計。姑舉其一二。以藥其餘。





與之一服而泄止。後因其大便濇滯。後加入兵部刻皮切只克等  
藥散劑而安。予用加味四苓散。治瘧中推毒泄兩劑甚效。粘  
漿一以漿其餘。

活幼心法卷之八

清江再火吾先生著

# 疳疔

疳疔形如疔。瘰疬形如痘。皆象其形而名之也。疳疔俱胎毒。而瘰疬出五臟。臟屬陰。陰主閉藏。其毒滯而難散。疳疔入腑。腑屬陽。陽主發散。其毒淡而易散。臟陰少虛寒。故瘰疬可滋補。腑陽少實熱。故疳疔宜解散。魚肝雖屬腑。而其性喜之氣上蒸於肺。肺主皮毛。實受其毒。是以發熱之疔。雖似傷寒。而肺家見悉。弱中咳嗽。噴嚏。鼻流涕。涕。眼胞腫。眼淚汪溢。面脛腮赤是也。身微體汗潮潤。而出最難。若

氣喘鼻乾。作嘔噎狂者。最重。初見此病。多未死。再後成病。紅色者  
輕。紫色者險。黑色者逆。不可視為泛常。不可用藥失療。又不可過  
為攻表。攻表太過。則胃氣受傷。毒氣不能達。反令傳毒攻肺。務宜  
辨寒熱虛實。察淺深而治之。治之之法。惟宜宣散其毒。以盡出之。  
於外雖仁腫之甚。狀如凍瘡。亦不足慮。以其既發於外。即可免內  
攻。不若痘家之必顧其收結也。此症若調治得法。十可十全。而調  
治失宜。則殺人亦足反掌。大抵初發熱時。必帶發表。見形即宜清  
涼。其用藥最宜。飲湯補燥也。古云。痧者清涼。痘者溫。清涼者清肺  
也。溫者溫補也。漿一種不起。眼白赤。聲啞唇腫。作渴。胸疼腹

脹人事不語。口鼻出血。煩亂狂叫不安。此係閉塞不出。名曰閉症。  
最為難治。服藥沒效。若能現出者。或可得生。鼻內流血者。毒重。口內  
出血者。毒尤重。起于。毒必多。火毒非常者。毒亦重。若初時失衣  
法解。以致毒落於胃。口鼻出氣腥臭。則生牙疳。身熱不退。解毒流  
大腸。則成疔症。或過於散放。後末元氣虛弱。皆瘦不堪。則成疔疾。  
疔之壞症。不可不慎。此症日出三次。且日九次為順。後宜出透。毒  
氣得淨。即無他患。又有一種惡癩風疹。此類感風毒而出。乃皮膚  
小疾。服藥聽風。法極而愈。不在此疔疔中論也。正氣癩疹。有兩大  
大忌。病家犯其所忌。則至於殺人。醫家犯其所忌。亦至於殺人。也。

其所處不同。皆屬閉塞其毒。不得發洩也。今先標四大忌于前。令人勿犯。然後繫方於其後。

一忌暈腥生冷風寒。

出痧疹時。大忌食暈腥。食生冷。冒犯風寒。皆能使皮膚閉塞。毒氣抑遏而內攻也。

一忌驟用寒涼。忌重一驟字。

初發時。最忌驟用寒涼。以冰毒。使毒氣抑遏。不得出。則成內攻之患。而若人謂天氣暖熱。宜用辛涼散之。以荏連解毒湯之類。不知天時暑熱。之氣。豈寒涼之藥。所能解。今驟用寒涼。恐不

凡看發症  
須防痧症  
慎之慎之

足以解外毒。而適足以阻內毒。使不得出也。曾先有一宦家孫子。得一男子。甫一歲。出痧發熱。痧未先形。而發極。醫候忽為急驚。而用涼藥以之。遂令痧毒隱之。在皮下不出。後醫以涼藥為主。而用少物等藥。亦不能利。煩悶聲啞。至旬日而死。此可以知涼藥水毒之害也。今因天熱。而驟用寒涼。豈理也哉。

一忌候用辛熱。忌在一候字

初發熱時。最忌候用辛熱。以助毒。如桂枝湯。麻黃湯。羌活湯。木丁香。肉桂。杏仁。三類。能使毒塵蔽而不得出。而致由痧之毒。即有痧痧。起。四肢逆冷。乃火極似水之故。不可妄投熱藥。痧現自然

漸和。而若人謂天氣大寒。宜用辛散。如桂枝湯。類者。不知天氣大寒。只宜置之煖室。謹避風寒可也。且天氣雖寒。而人身之熱毒未必減也。而所以用辛散豈理也哉。

一 忌用補澁。

痲出之時。少有自利不止者。其毒以因利而散。此殊至理。如世利過甚。刻以和味。令散異之。切忌用參朮柯朮補澁之藥。以圖速止。重刻令腹脹喘滿。而不可救。輕刻變為休息痢。纏綿不已也。如痲消陽黃紅色。乃內有伏熱。如木通車前子甚毒可也。化之化之。

加味四苓散 方見卷七

不發根出未出時宜用。

宣毒發表湯

升麻五分 粉葛五分 薄荷五分 桂枝五分 荆芥五分 羌活五分 獨活五分

甘草五分 牛蒡子五分 連翹五分 黃芩五分 赤芍五分 木通五分

淡豆豉五分 天麻五分 羌活五分 大寒和麻黃五分 白中藥服

痲毒已見形一二日內服宜

解毒快疽湯

此條以下除清表導滯二方係心法原  
本經皆在內今在外科各處海附入

連翹七分

牛蒡子五分

荆芥五分

薄荷五分

鮮豨莶五分

山查肉五分



胆尾 冬 生北

栝樓 冬

黃芩 冬 四冬厚 葛根 冬

紫草 冬 白水黃引和觀音柳 三三令更可亦不可

化毒法表湯

牛旁 連呂 茯苓 地骨皮 黃連 黃芩 少梔

知母 葛根 元考 栝樓 荷胡 木通 冬 甘林

蒼術 防風 冬 口開初發冬 椒石 冬 大便溏初起冬 冬

痲症四五六日回時。尚有餘毒留於肺胃。咳嗽氣粗。外熱不退者。

宜服

清肺飲

石膏 牛 生地 之  
 紫胡 之  
 麥冬 之  
 元參 之  
 桔梗 之  
 桑葉 之  
 牡丹 之  
 陳皮 之  
 黃芩 之  
 竹葉 之  
 知母 之  
 白芍 之  
 龍尾 之

痧赤淡面色青白。唇淡氣弱。宜服

調元健脾胃湯 并治痧症弱成痼疾

白茯苓 薑朮 丹白 陳皮 沙參 白芍 甘草  
 人參 滑石 百合 杏仁 麥冬 大棗 棗實 湯白芍

者。此方可加木香、白朮、柯子、少許。如濕甚氣。加枳殼、黃芩、車前子。

有毒氣流注而成痲者宜用。

法按道導滯湯

苓連膏以苦辛子味法按道導滯湯氣壯等  
若榆の味行滯血 此方去毒宜加殺我法痲按成劑

黃連 黃芩

白芍

胡芍芫

山查肉

厚朴

去反

黃芩

骨節

甘竹

牛蒡子

連心

紅芍加紅花

地榆系 秘清苦者加臣初大黃三

痲後口瘡牙痲等患宜服

法胃敗毒散

黃連

丹皮

甘竹

連心

生地

桑皮

以芍

白芍

金銀花

黃芩

石龍犀加白朮

痲後口瘡牙痲法胃敗毒散宜服  
報公志地竹甘竹黃芩黃芩黃芩  
外搽散若去毒中白芍黃芩黃芩

一第1011 丹黃參日...

痧後口澀牙疳搽藥

救苦散

人中白火燉

玄靈飛過

最長

白芍藥

寒水石水飛

共為細末先以苦茶拭過渣搽患處當便之家加牛黃二分研入其效更速  
痲疹咽喉腫痛不拘初起回後有此證者皆可吹之

二聖散

苦參至

白芨至

苦為細末吹入

有一種痧症大吐大瀉而後者見甚輕與作惡心乾嘔者不同。用苦微  
表和平安胃為主。宜服

和平湯

白朮分 白芍分 當歸身分 陳皮分 甘草分 粳米分 白朮分 紫胡分 防風分 白朮分 葛根分 枳實分 枳殼分

生薑一片 紅棗二枚 水二升 煮取 服

有一種病後瘦弱。唇白氣虛。感時氣出痧疹者。宜服

加味道遙散

或輕虛瘦弱。痧出白包。紅腫者。俱可服

白朮 白芍 芍藥 當歸 陳皮 紫胡 枳實 枳殼 白朮 葛根 甘草 粳米 白朮 紫胡 防風 白朮 葛根 枳實 枳殼

痧麻疹咳喘氣喘唇紅結毒在內煩燥不安或口鼻出血不拘骨  
後俱宜服

犀角解毒化痰清火丸

生犀角五分 水尾任 連心五分 赤芍五分 牛黃五分 生地五分

牡丹皮五分 紫草五分 蘇精五分 買母五分 茯苓五分 薄荷五分

蒸車五分

共為細末。煉蜜為丸。每服一丸。竹葉湯化下。

痧疹後失調。體瘦氣虛。或成疔疾。或世法等症。宜服

健脾胃見丸

人參草 黃芪天 神松切 山萸肉切 甘竹草 百合草

扁豆切 黃連切 白朮切 白芍切 橘紅草

青兒草 洋皮草 地骨皮草 玄參草 山藥草

右為個藥。藥室在。以彈子大。每盒遠。白滾湯調服。一丸。

痧疹後。咳嗽。因熱不消。心神慌亂。夜臥不安。脾虛。或生瘰癧。宜服

天真膏

生地黃草 麥門冬草 元參草 白芍草 知母草

桑仁草 沙參草 茯苓草 生薑草 當歸草

丹皮草 桑皮草 生薑草 紫苑草 白朮草

橘 紅 赤 取長流水用沙鍋桑柴文武火煎成珠用土炒白蜜  
收成。或淨器內。每服三五茶匙。白滾水調服。

初起發熱未見時。二三日或四五日。或係涼海風疹。皆宜早服。

防風散表湯

此藥疎風透熱

防風 桑葉根 分 紅花 二分 羌活 桔梗 分

山芎 芍藥 芍藥 芍藥 芍藥 芍藥 芍藥 芍藥 芍藥 芍藥

蘇枳 芍藥 杏仁 二 山芎 芍藥

白水煎。冬月天寒。或加薄荷水炒桑葉。或初起者。引用  
細葱白。半寸。



痲疹癩瘡。陰逆等症。初時難於現形。出不情利。是寒乎。三月用芫  
荇。或紫蘇。宜用礪器將此種隔水蒸。釜中取微之香氣。能助發毒  
現。今忌俗不服。即用藥水。厚食。將以兒方洗大浴。浴後仍加衣被。  
不但多差。且有害。反至推氣。而致多令。小兒間感。多病。啞口難  
言。洗物瘡。見形。即不當下水。知者慎之。初起微。俗手。心。或可  
取其由外通達之意耳。至於痧疹。前以病脈赤紅者。常用生地甘  
菊。養液。以子。藜蘆。以尾。紫胡。紅棗。等味。皆可隨症加減。一種病後。  
面黃白。骨瘦不堪。元氣損傷。肝脾血少。皮膚癢。眼懶。時畏風。似害非  
害。宜服昔方。健脾胃。兒凡。或服八珍湯。不味地黃湯。或不味地黃

丸。廣可漸愈。如清火。疎風。一切治眼。三藥。若不可妄投。不但無益。且此。凡小兒。痛及失視。或痔疾。瘡眼者。俱皆如此。醫治。養血健脾。為主。僕大僕。得世稀水。白色者。歸脾湯。補中益氣湯。皆對症。藥也。

健脾肥兒丸

是奇

八珍湯

人參 白朮 茯苓 芍藥 當歸 川芎 熟地 白芍

生地 甘草

加片 三片 煮 二板 水 三轉 莫 八分 宜 心 服

不味地黃湯

地黃 山藥 山萸肉 芍藥 丹皮 澤瀉

加芎藭三片。水三鐘。煎。分。服。

不味地黃丸

地黃 山藥 山萸肉 芍藥 丹皮 澤瀉

煨。為。丸。每。早。晚。心。用。淡。薑。湯。送。下。晚。服。三。分。

補中益氣湯 芩芩

歸脾湯

人參 白朮 茯苓 芍藥 黃連 黃芩 炙甘草 當歸

遠志之

亦有者不可服

多研之

加行老甘寸

膠香柳一各五何柳乃小兒痢疾之聖藥也。老月用枝。老及取

苗葉。每用二錢湯服。年力大者。少服一次。年壯。能清解毒。發長。

小兒痢症初起。近人多服芩湯。意圖發表。不知止可少少。若用。使

引透肌膚。反其易出。若過用。失宜。反令元氣受傷。脾氣虧損。不能

消化毒氣。以及乾嘔泄瀉。出汗心煩。灌漿疔。每有破爛。遺毒。口瘡

等患。藥內引用芩。尤其所忌。今特摘出。以為習弊。用芩湯之戒。

孟氏介石募施治痢方。并表藥性於左

孟氏介石募施治痢方。并表藥性於左

此方大能  
起發透表  
解毒清熱  
不傷元氣  
是以功有  
神效

石膏 煨赤 以貝 半 葛根 不 紅花 三  
地骨皮 半 胆尾 不 甘州 半 赤芍 半  
桑白皮 不 海皮 半 吳茱 不 半  
牛蒡子 半 薄荷 何 半

右方共為細末。每次用茶三錢或五錢。白水三盞。黃湯流去渣服。

凡遇痧疹不拘。何時皆可服用。信驗有年。等分。藥味勿切。搗減。血氣。施濟。功。出。年。前。

石中味辛色白。透表。淡而利竅。煨用。厚佳。痧症。黃葉。法。法。解。毒。用。以。為。君。

淡反。口。先。枝。梗。疏。氣。消。肺。脹。桑。皮。潤。肺。止。喘。清。花。疔。疾。紅。花。胆。尾。赤。芍。味。辛。清。肺。經。血。

熱。血。活。創。毒。殺。牛。蒡。子。解。毒。發。隱。疹。干。葛。未。羊。葛。表。解。消。透。肌。蒼。朮。清。肺。胃。間。推。通。氣。

舒。毛。孔。地。骨。皮。解。肺。毒。消。積。滯。甘。州。解。毒。和。藥。粉。芍。散。血。分。中。之。風。想。能。開。毛。孔。與。母。味。

辛。此。藥。小。解。毒。者。三。子。服。初。者。不。久。服。即。愈。

活幼心法卷之九

活江蘇久吾先生著

幼兒雜症方論

幼兒之病。自痘疹而外。若驚疳吐瀉等症。固係安危最重。予生平  
經驗。洞悉。頗有得其竅妙者。亦因症書既成。而附刻方論於後。以  
備用。意幼者閱是編。而手到病除矣。

急驚風

古語云：陽病

急驚之候。身熱而赤。搐搦上視。牙關緊。口鼻中氣。痰涎。潮壅  
息。而發。痰過容色。以故。有偶因驚嚇而發者。有不因驚嚇而發

者。然少是身先有熱。而後發寒。搗未有身涼而發者也。此陽證也。蓋在感生疾。疾感生驚生風。宜用涼劑。以除其熱。而化其疾。則驚風自降矣。切不可用辛燥等驅風藥。反助心火。而為害也。皆其搗搗大作時。但可扶持。不可把捉。恐風疾流入佳候。或至于不可掣也。又不可驚惶失措。輒用艾火灸之。燈火燒之。此陽證大不宜於火攻。單見火攻而壞事者多矣。戒之。戒之。此症雖急。若從容服法。涼之劑。謂理有可平安。不可所信。時醫峻用攻擊。如已豆乾粉之類。以取速效。傷害不小。古語云。急驚風慢驚風。此適言之。切當而可用者也。急驚<sup>有</sup>候。不可不知。搗搗擊顛反引竄脫是也。搗者

兩手伸縮。搦者十指間合。擊者勢各相撲。顛者頭偏而面正。反者身仰向後。引者臂若引弓。窳者目直似怒。視者膝露不活。是謂八候也。身仰向後。即所謂角弓反張也。又有一證。欲出疹疹。先身搦擊。或發搦搦者。此似驚風而非驚風也。最宜辨認。皆服發散。此等不可不知。切不可誤作驚風治之。說見痘疹初發摺條。

法煎鎮驚湯

連召 紫胡 地骨皮 龍膽草 鉤 薑連  
 山梔 片苓 麥冬 木通 毒 車前  
 山實 甘竹 蒼朮 滑石 燈心 淡竹



水一茶鐘零五分。至七分溫服。兒四分作散。法服。

加減涼膈散

連呂 五分 片苓 五分 山梔仁 五分 枳實 五分 荷胡 五分 大黃 五分  
芍藥 五分 甘草 一分 水一鐘 煮五分 三匙 以下者分三三

次服之微利一二次。痰積自退。若已通利。則不必盡劑。

宣風散

陳皮 去白 為末 二匙 甘草末 一分 黑牽牛 一分 另半生半炒取頭末

以上四末。初白一匙以下。服二分。二匙以上。服五分。五匙以上。服七分。俱用  
蜜粉調服。微利一二次為妙。服五分而痰積未除者。後二分微利一二。

若骨节已致，刺後三方不必服，辰砂、蒼朮、散花、初九、牛黃、凡等藥，急驚俱可服。若慢驚，切不可用云。

慢驚風 古謂之陰癇

慢驚之候，少因吐瀉，或因久瀉，或因久瘧，而得之，身冷面或白，或黃，不甚搐搦，目微，上視，口鼻中氣寒，大小便皆白，昏睡露睛，筋不必治，風脈拘攣，俗謂之天吊風。蓋由脾土極中虛，中氣不運，故寒疾在風，治驚惟用溫中補脾而風初筋急也。此陰證也，亦危證也。急宜溫中補脾，刺風疾自退。蓋治本原，所以治標，全不必治風。治驚，彼用蜈蚣、金蝎、辰砂、牛黃等藥，皆悞也。

有所謂慢脾風者。即慢驚失法。而甚者耳。其實難大分別。志必  
別之。法代。

溫中補脾湯

白朮用者白朮者  
去濕如

藜蘆半斤七分

黃芪各 炙甘草各

白茯苓

白朮

乾芩

砂仁各五分

官桂

陳皮

甘草各

白芍

覺虛寒甚者加熟附子。素者 去濕如。去核水。去毒種。去痰入

分。服。見小者分數次服。必得展體。除風除神爽。方可止服。

過此症。服此藥。不至於遲後。過此其效。只神。主起回生矣。而若

人謂慢驚。為九死一生之症。何也。得非調治錯悞。而然乎。

慢驚因吐瀉而得者最多。其病勢最危急。予第二兒稟氣頗壯。甫  
二歲時。因脾胃受寒。而泄。小便不利。有一仞科老醫。性莽者。予家  
未信用之。其時予尚未獲醫也。因召蔡法之。蔡用四苓散。加木通。  
車前。以分利小便。不效。第二日。加神珀。磨服。亦不效。第三日。又加  
切黃連服。亦知其法原因感寒。而服分利法。涼藥太多。遂致脾胃  
虛寒。第三日申刻後。不惟泄不止。而又嘔吐。每飲乳。輒吐。至  
一更後。即傳慢驚。目上視。手微搐。身冷昏睡。舉家遺惶。予因光大  
人。檢方以玳瑁。養心散。投與之。終投藥下咽。即吐。因以茶匙每次只  
挑一二匙。少停不挑與之。然積至二三次。又昏吐出。舉家相顧駭

慢以為吐不受藥。不可為何。危名甚矣。予因思此必脾胃虛寒。胸膈胃以有寒痰。是以拒藥不受。惟用辛熱。或可以僞開之。因用人參、黃芪、白朮各一兩。干姜、白朮、砂朮各五分。黃芪、陳皮、辛熱各一兩。茶末、芍藥、不分。加別藥。深茶。以一酒杯。驟灌之。其藥下咽。即受而不吐。舉家大喜。因漸減連服。此藥之劑。而吐得止。驚搖甚。急甚。但至次日。眼皮猶不能開。因用前藥。加熟附子五分。再服一劑。而全愈矣。予因此而知庸醫。治此等病。不知候却。少人。自此遂不仕時醫。而益精心於醫也。

急驚屬實。宜用瀉法。慢驚屬虛寒。宜用溫補。若胃壞。相膈。

治汗若若炭之相反。而諸方如少用一葉。以片之病。何其醫妄之甚也。雖新代服戒之。而諸家又服犯之。若若之方者。且無而又何責於時醫乎。

**嚏洞散**

生薑

生用

皂角

五分

右為末用一小豆許用管子吹入鼻之醒

**稀涎散**

猪牙皂角

水化

各等分

右為末每服二匙白湯調下若牙間緊不可開即從鼻灌之

此二方姑存口備驚風急用

治小兒驚風並退。只是聲啞不能言。并諸病後不能言。頂大天南星一箇。泡去皮臍。為末。量兒大小。每用二三分。或四五分。用猪膽汁調成稀糊。又用淡荑湯小調開。食前服之。即能言。

吐瀉

小兒吐瀉。其證不一。最宜詳審。有因傷食吐瀉者。有因感寒傷食吐瀉者。夏月則有因伏暑吐瀉者。傷食吐瀉者。其吐有酸氣。甚瀉甚狀。如糟粕。亦有酸臭氣。此宜消導之。感寒傷食而吐瀉者。或食<sup>後</sup>感冒風寒。則其食停滯不化。或脾胃先受風寒。而後飲食。則

其食不傳滯不化或飲食後誤食寒冷之物則其食不傳滯不化  
雖及病不同其為感寒停食則一也此宜散而兼消導然此吐  
瀉或身胸腹刺痛即霍亂吐瀉是也然治法不同 伏暑吐瀉者  
小水必不利必兼煩渴皆以暑治之吐甚與者暑散潤養元氣  
得甚者莫四苓散潤養元氣 然而吐瀉之作最是  
小兒危證若甚屢作不止則不瀉何因皆皆用參朮苓急救胃  
氣不惟傷食傳滯食者皆急救之即伏暑者亦當即救之蓋其和  
雖有暑氣而多以瀉之故則熱氣已散而胃氣驟虛若不用溫  
補急救恐中氣頓絕則虛痰上湧而反與者變矣 且少吐胃



氣大虛，氣不化元，而陽浮於外。反有面赤頭花身熱作渴，而似熱症者。俗醫不知其理，誤為熱，而投以涼藥，殺人不少。反掌，甚可畏也。故治以得，而藥不中病者，與其失之寒涼，寧其失之溫補。失之溫補，由可救療。失之寒涼，其禍甚速，身不及救也。

加味平胃散

治傷食吐瀉

如白朮加山查者身三附初不

蒼朮不分厚朴不分山查肉不法反分青皮分芍藥分

六附分砂仁分四香分甘竹一分

用法：水煎半，莫七分，二三次，後下飯。

養香和中湯

治感寒停食吐瀉

加味平胃散去芍藥加養香，不片學後白茯苓而已。

一第... 7

蒙出... 香附... 蒼朮... 厚朴... 山查... 枳實... 枳殼... 蘇合... 沉香... 檀香... 降香... 乳香... 沒藥... 安息香... 蘇合... 沉香... 檀香... 降香... 乳香... 沒藥... 安息香...

香薷散

以下三方，依者以清用

大花... 香薷... 白扁豆... 藜蘆... 朴... 子

水... 候... 微... 溫... 調... 香... 丸... 散... 二... 匙... 服

四苓散

赤茯苓... 白茯苓... 澤瀉... 白朮... 木... 通... 子... 車... 前... 子... 分... 水... 煎... 候... 溫... 調... 香... 丸... 散... 二... 匙... 服

養元散

不用石礞

滑石飛過 石礞

甘竹末五分

右合勻每服四錢二分 水煎服

錢氏白朮散

人參

白朮

芍藥

炙甘草

茵陳

黃芩

南木

末

老薑

水一鐘每服半鐘

養初和胃散

嘔吐不止者宜用

人參

石礞

製半夏

白朮

白芍

茯苓

末

澤瀉

桑寄生

煨薑

赤石脂

白朮

白芍

末

吐得交作  
別以止吐  
為急

# 姜茶湯

吐而胃氣欲絕者用此方

老薑第一塊重山芋根糖薑去皮研爛用水一碗  
淡茶二撮同入瓦罐  
內煮湯候溫用山磁杯少少漸服其嘔自止  
另法茶末合姜末亦可

凡吐得交作者止吐為急吐而不得者治法候自止。

治小兒暑月吐瀉。少候者溫。或全不吐者。

赤茯苓 芍藥 澤瀉 木香 白朮 茯苓

木香 芍藥 澤瀉

呷葱一團水二鐘入藥少許合茶微有鹹味煎時服之少便  
自利其得之止  
姜茶湯之方後以本方

法以兜脾滯。其滯每日只滯蒸一二次。無病由脾虛。久而不流。少不可輕。宜用參朮散。加山藥胡扁全活。

參朮散

人參 辛 白朮 兩子四者切 茯苓 辛 砂仁 辛 芍藥 辛

蒼朮 辛 蓮子 辛 神曲 辛 山藥 辛 肉桂 辛 去甲

枳實 辛 廣濟白 辛 右集 辛 山藥 辛 扁豆 辛

以上各藥細末。每用二平湯。年飲。開食。奇。湯。服。鬼。有。石。皆。服。者。入。稀。粥。內。和。服。

疳

小兒臟腑嬌嫩。飽則易傷。乳食不消。甘肥生節。刻積滯而成疳。是積者疳之本。疳者積之標也。蓋積滯既久。刻生其標。蓋既久。刻生其標。有積有疳。而疳即夫。其感也。感而諸惡症生焉。刻疳深而危矣。

本標二字

說得明白

善治者。當治其有積時。即用藥以消除之。刻極自退。而虫不生。此能治其本者。易為力也。及其既成疳也。仍用藥木。三枝。其亦厚朴等藥。以消導。積用白。蒸連。胡。蒸。連。等。以清熱。用史。君子。等。等。以健。等。等。以殺虫。此治本而兼治其標也。循此治而蚤治之。未有不。得痊安者也。但恐治之既晚。而胸膈腹滿。骨露。遺。張。肌。瘦。目。閉。等。

症交作。則元氣已脫。雖虛扁復生。難為力矣。然消積逐滯。殺毒。此  
古人治疳要法。必用此先除其病。庶可以加補養。此其次也。  
近世治疳者。雜用參朮。柯朮等劑。非其治矣。蓋積疳之源。雖由脾  
胃虛弱。然皆其有積有疳。付而後以補劑。適足以使其積滯。蓋其  
疳積。是助病而非治病也。其有疳得已久。脾胃極虛。而不可單以  
者。當通用不神散。其肥兒丸。相向服之。此以補兼施法也。又  
有一種。母已有孕。免飲母乳。以成積滯。者亦即疳。此病頗多。而  
古今方論不道及何也。無其治法。大異亦同。有疳積感。而身刺  
者。用法甚多。湯去牛。連。加三。被。義。木。有疳癖塊者。治法

亦曰法兼用外貼茶交攻之。海心飛公冷熱惟有清有不清年  
 不瀉者曰想若所發洩故胸腹者熱更甚瀉者鬱熱有所發洩故  
 胸腹不甚熱然亦由積熱作瀉也非冷也。此瀉法之而愈甚清之  
 消之而自愈。著者立方者不知何以有冷瀉之名。而用煎藥等亦  
 祇謂相乘耳。如小兒因疳成瘕。肚大筋露。目睛耳聾。骨瘦如柴  
 甚危重死者用

奇效疳疾猪肝方

此方屢試屢效神方

也不可易視

夜明砂 研末 牡蠣 煨末 以上等分用猪肝一片以竹刀開一口  
 岩慈草 研末 木劍子 用洋煙土拌 史君子 焙干末 蛤粉 用紫包  
蛤粉末 煨末 蛤粉末 蛤粉末



入藥在內係紫少錫煨熟連湯煎疾者吐其茶每服用全或不

肥兒丸

九味消積三味消積三味殺蟲

三核蘇切

藜木蘇切

土及蘇切

神粒和

川連

胡連

君子去毛浸透去片

芒花

長石

赤附切

法反香

麥牙切

和青藥為丸。以粟米炒火。二生以下每服三錢。子生以下每服五錢。宜忌

法未飲下。臨臥自滾水下。有癰塊加阿魏酒浸飛入乾漆和三七

清熱導滯湯

黃連

蒼連亭廿五味法熱朴查充查兵五味導滯氣化苦花楸日味各津血

黃連

蒼心

白芍

白朮

山查

厚朴

芍藥

吉皮 兵部各系 皆能 甘叶 三核 熟木各系

紅者加仁花系地榆系 秘瀉甚者加酒同大苦等

奇效加味消積肥兒

此方神效 同前

人參 白朮 白茯苓 橘紅 金櫻子

去皮 粉草 君子 苦竹 蓮肉

門冬 五苓 山萸肉 雞皮 香牙

以身熱咳嗽加地骨皮百部 肚腹脹大便稀水腸鳴作聲或虫出不和加兵部

本方以蜜為丸 瘡有積塊先用去行一服 存積散常去吉用特寒陰化能瀉去

洋將竹筒筒上鑽小孔入藥仍以竹釘孔隔水煮三五候出初煎藥

此藥專治小兒疳疾肚大青筋骨瘦王進得劑 不止服三服者肥弱者壯壯者神

研為丸。如彈子大。每筒主。不每日午間服一丸。或將身可藥。多細末。以煉蜜。每次和二三匙服之。

### 大盧薈丸

治疴食食積。脊背身。推瀉。痲痺。十指生瘡。頻吐。枯甲等症。

芦薈

苦葶

苦葶

苦葶

苦葶 苦葶 苦葶

君子

木

悻

射

為細末。搗服之。筒取

汁浸糕丸。如麻子大。每服卅丸。茶飲下。

### 苦陳皮煮鷄子汁

治痰輕者用之。厥效。取苦陳皮。潤一斗。其長似鬼身

為度。刮去外黑皮。留白皮。切細入瓦罐。濃煮汁去渣。並放入雞子。切

在內。煮熟去壳。與鬼堂心。食之。

苦陳皮不可用。不信。子者。有毒傷人。

雞蠟丸

治疳積休息痢

用黃蠟一塊。其指大。入杓內火上鎔化。次入生鷄子黃白二斤。切雞與  
臭空心食之。

紅花膏

治癰塊用

紅花料

一捆黃汁去渣

麝香

阿膠

血竭

沒藥

赤芍

皆用五分

為末入膏內攪勻。以青布攤帖患處。

腹痛

小兒驟重腹痛。其症不同。有挾積而痛者。其痛少緩。或一日只痛

數次。甚者或自下而痛上。痛過一陣。則有不痛。良久又痛。宜用涼  
菜加疎利藥治之。有感寒挾食而痛者。其痛多急。連綿。少有停止。  
甚者或為刀刺。欲吐不吐。欲瀉不瀉。手足冷。面色青。宜用針灸藥。  
加清導藥。急治之。外有未痛者。聞其臭。食物香氣刺痛。宜用苦練  
皮。史君子自等。藥以殺其虫。則痛自止。

松連導滯湯

茯苓 黃連 山梔仁 如豆色 赤芍 枳實 連翹

三稜 芍藥 厚朴 甘草 炙

水煎服。覺其感。方便秘者。加枳實。大黃。微利之。

升消平胃散

治感寒挾食痛

方已見前此  
如寒濕滯風各三

川芎

知母

蒼朮

紫蘇

厚朴

藿香

砂仁

白豆蔻

陳皮去白枳實去穢

木香去心

山楂去核

以上藥味。生薑三片同煮。世推服

發熱

小兒發熱。有感寒發熱。有傷風發熱。有傷食發熱。有內熱發熱。有痘疹發熱。有麻疹發熱。有驚風發熱。有疳積發熱。以上諸熱。俱可隨症辨認。各有法。此亦不備載。惟內產發熱。其症難識。獨有張季氏醫說。深得病情。今錄於後。醫說云。有一小兒。感冷身大熱。惡寒。此有

表症。用葶苈菜汗出。遂涼。過一日後。表解裏未解。以大便  
秘知之。服四順法湯。利一行。遂涼。滿一日。又再熱。醫云心驚。熱  
未解。以小便赤知之。服導赤飲。遂涼。過三日。又熱。其家有所持。至  
醫<sup>曰</sup>。和<sup>曰</sup>。非病也。既發汗。又利。大小便。其兒已產。陽氣全。而歸。皆見  
於表。所以身熱。以和胃氣。以<sup>和</sup>神<sup>氣</sup>。加烏梅。全微有酸味。  
收其陽氣。以內。自此全愈。又云小兒積熱者。表裏俱熱。則遍身  
皆熱。頰赤口乾。小便赤。大便焦。先用四順法湯。利初臟腑熱  
則去。既去後。熱者。裏熱已解。而表熱未解。常用葶苈菜微汗。表熱  
乃去。表熱去後。又發熱者。何也。世醫列此。是石炭燒。或再用涼藥。

或再解表或謂不可醫。誤及天傷者甚多。此表裏俱虛。氣不固元。而陽浮於外。所以再發也。非熱症也。只用不神散。入粳米煮。和其胃氣。則收湯氣。使內身體自涼。

此二說。發於虛熱妙理。最為透徹。且此症不惟小兒有之。大人亦多有之。人多不識。遂束手待斃。此說直破千古之感。大有回生之功。予故揭錄於此。以補醫者功之缺。

#### 四 順法涼飲

治裏熱大便秘

薄荷

芍藥

甘竹

大黃

以上同煮服



導赤飲

治心經熱小便赤

生地黃

麥門冬

赤茯苓

木通

各等分

灯心

一團

水煎服

六神散

治下汗後身熱乃虛陽浮

因寒發熱用此

人參

白朮

茯苓

山藥

白扁豆

去壳

生薑

各一枚

有用烏梅收湯氣以內有用糯米和共煎

收湯氣

看小兒面部

左腮屬肝。色青。喉白。逆。若色赤。主肝傷風。熱。發熱。拘急。舌黑。主驚。

風脇痛。淡赤主潮熱。疾嗽。右脇屬肺。白順。黑逆。若色赤甚者。主  
咳嗽喘急。胸孔飲水。傳於胃。則以便赤澀。或淋閉不通。額屬心。色  
赤順。黑逆。若青黑主驚風腹痛。瘧疾啼哭。微黃主盜汗。頭髮乾燥。  
驚瘡骨蒸。鼻屬脾。色黃順。青逆。若色赤屬脾虛。飲食少思。  
淡黃主小便閉。而鼻燥衄血。額屬腎。色黑順。黃逆。若色赤主胃。  
與膀胱有熱。而小便不通。

又看小兒面部

面赤心家熱。面黃脾有積。面白肺家寒。面青肝有風。唇赤心家  
熱。唇黃脾有積。唇白肺虛寒。面青肝有風。唇燥脾有熱。眼赤心

經推。眼去肝有驚。眼蒸脾有積。眼白肺有驚。鼻去主吐泄。人中  
去感風人中赤肺家疾。人中黑腹赤痛。風池紅身喘。風池蒸吐  
逆。山根紫傷食驚。承漿蒸主吐。去主驚。唇紅面赤傷寒。膝去唇黑  
驚風。唇青面白虐疾。面蒸紅土食痰。痢下眉頭皺。驚風面頰紅。渴  
未唇赤。推甚眼勝腫。面蒸紅食積。去色是驚風。面白身成泄。傷  
寒色赤紅。

嘉慶元年冬鐫

吳興費建中著

# 重訂救偏瑣言

金閭惟善堂藏板

叙

予筮卜崇川時即聞建中費子有救偏一書而未之覩也嗣予歷平原涇陽轉而啣

命

山左又轉而視河天中約二十年其書猶未之覩也今年春費子

遠遺如行知必著書甫脫稿即有諸先輩為費子作弁語而授之梓功將半矣嗣限於力不克竣事而費子因更加討論以祈入聖淹遲歲月望其書者如望歲矣如生慈母矣今費子何歎焉乃

猶逡巡而不敢出者費子真  
毫而愈篤哉予與費子交非一日  
而見曹賴費子以金者必能一人  
猶憶曩時予舉一子三歲患痘  
症殊險甚一不語者繩墨是趨幾  
至償事得費子佩數語而乃得

半

全今篇中所載治驗大半類是  
予裁讀久矣而未敢以報也形為  
之叙以表區區而其作書之旨諸先  
輩又言之詳矣予更以言我予河  
使者也清以河喻自古以河為  
必曰大禹至漢而又有賈讓之三

策身食之家遂謂不用疏濬而  
用塞堵偏也抑知自漢而下河不  
堵而南故治之法不宗步而塞  
鯨况今日又用河以資漕不塞  
則河與漕不通而江南數百萬  
石不得堵此天下大利大害之所

三

係也故不得已而用塞是因以偏  
救偏之法耳費子之書之稱是也  
費子曰痘不一局隨大運而遷大  
運在寒水則痘以虛寒為之自  
宜專主固本寒水之後繼以相  
火則痘亦以烈毒應之自宜專

王政解善因運氣不日而治法  
去異其取偏之法真与予有淄澠  
而針灸者予西人考其奇矣哉  
云以書為邇者不盡馬之情以  
古制今者不盡事之變今而  
後者向予而以河者予將出費

四

子之書以正之

順治乙未仲冬年家眷第方大猷  
書於大梁工次



救偏瑣言目錄

小引

卷之一

救偏總論

原痘論

論氣

論血

卷之二

治痘運掌賦

推廣規則錄

治痘須知大運論

論治痘權宜

治痘藥性摘要賦

救偏瑣言 目錄

惠祖堂

卷之三

發熱論 附治驗

升發論 附治驗

疏表 附治驗

達裏 附治驗

痘有首尾疏達訣

痘有不宜疏達訣

卷之四

放點痘治準

稀有內症 附治驗

密有克肥 附治驗

陷有毒滯 附治驗

綻有囊薄 附治驗

薄有浮衣 附治驗

平扁與不懸辨 附治驗

氣拘與毒絆辨

嬌紅非血熱辨 附治驗 血鬱非氣虛辨 附治驗

卷之五

起脹症治準 攻毒總訣

申明毒火深藏等症 自鼻衄至蚤症紀廿有七 各有治驗附後

卷之六

申明貫珠攢簇怪痘

圖狀怪痘惡形 紀十有七種下詳治法 各附治驗

圖狀怪痘惡象 紀十有八種下詳治法 各附治驗

申明惡色并治法 附治驗有五

救偏瑣言

目錄

二 惠理

申明四毒耳 各有治驗 申明痘佳症惡 附治驗

申明痘白確標 附治驗 申明飛漿 附治驗

申明泡湧 附治驗

卷之七

涼血撮要訣 清火窮源論 下有詳明五條

清火症治準

涼血清火不拘首尾論 附治驗

分別毒火論

卷之八

論行漿 論補氣

論補血 論實表

論健胃 附治驗 論安神 附治驗

論血虛咬牙 附治驗 論氣虛寒戰 附治驗

論氣虛作痺 附治驗 論脾虛作瀉 附治驗

卷之九

論痘變症有不常不古

痘症變幻總論 論火毒咬牙

論血熱作痒 論熱劇寒戰 附治驗

救偏瑣言

目錄

三

論熱毒下利 附治驗 胃熱不食

論久擾不寐 論渴有虛實 附一虛渴治驗

論汗有補瀉 附治驗

卷之十

論結痂 附治驗 論落靨

論餘毒 附一氣血兩虛 治驗血熱不養 娠婦痘 附一夫治之戒并附治驗

痘後調護宜謹

痘前諸瘡宜急治 附三治驗 附誤治之戒 附失治之戒

論大黃 論石膏

論猪尾血

論濁陰

項言備用良方

清肌透毒湯

直達透肌散

温肌透毒散

寬中透毒飲

疏肝透毒散

清熱解毒湯

調中湯

涼血攻毒飲

鬆肌通聖散

清涼攻毒飲

清暑透毒湯

疏邪實表湯

必勝湯

既濟湯

救偏瑣言

目錄

四

清金攻毒飲

涼膈攻毒飲

消癰快毒湯

窮源透毒散

錢氏百祥丸

神應奪命丹

散結湯

養榮附氣湯

寶氣飲

瘡榮散

滌邪救苦湯

萬兩黃金散

各無價散  
各四聖散

猪尾膏

養榮透毒湯

蟻針法

散火鬆毒飲

平順清解飲

托裏無憂散

賽金化毒散

保元八珍湯

回陽反本湯

實脾固本湯

納穀散

瀉黃納穀散

補液湯

清金解渴湯

安神散

清宵忘晝飲

硃砂六一散

金蓋散

滑肌散

水楊湯

保元回漿散

活絡透飲

忍冬解毒湯

撥雲散

救偏瑣言

目錄

五

消疳解毒散

加味內托十宣散

回漿合宜散

溫粉撲肌散

百花膏

快肌膏

牛黃八寶丹

奏凱和解飲

參歸化毒湯

和脾宣化飲

雙仙化毒膏



百題瑣 小引

雖小亦 之 究其綱領條目經常變化  
與大道無兩樞軸也 道無名言為糟粕所以至  
教無言言亦引而不發矧一事中之管日而更瑣焉  
頃則贅矣贅不令人厭乎第此道關人生死而日月  
期有限不反覆致詳而簡畧從事虞同志者經  
未必經心過而不入容有之矣昔節菴陶君有  
瑣言諄諄而不憚煩其殆先得我心之所同然者  
去武未能效擲可愧耳

百言小引

惠迪堂

救偏瑣言卷之一

吳興費啟泰建中父著 男

日復暉遠

度文起 英孟育

山東省 濟寧府 臨沂縣 費氏印

救偏總論

太極判而天地分。天地位而萬物育。生生化化。不外  
於陰陽相濟。而成時行物生之令。一有偏勝。兩陽便  
不能時若。四時便不能順叙。而萬物俱為病矣。妙於  
調變者。是在於太過則洩之。不及則補之。偏以偏救  
而後可以救大造之偏。人肖天地。亦猶是焉。元氣即

救偏瑣言

卷一

救偏總論

一

惠迪堂

天地之陽。五液即天地之陰。有是陽則一身之生長  
有源。有是陰則一身之滋養有本。是陽之為陽。非陰  
不成。陰之為陰。非陽不就。猶天地之生化。宜相濟而  
不宜偏勝者也。否則陽勝則陰虧。虧久則竭。竭則陽  
亦隨之矣。陰勝則陽衰。衰久則脫。脫則陰亦繼之矣。  
所謂氣和則物生。氣偏則物病。氣絕則物死。理固然  
也。妙於藥其偏。而還歸於無過不及者。是在醫之衡  
量耳。矧痘之一症。與他症不同。一有偏勝。生死捷於  
反掌。尤非他症之可緩也。蓋痘有順逆險三項。順與

逆無藉於醫矣。至論之一症。亦自有三項焉。有險中之順。險中之險。險中之逆。險之順者。痘原平易。治者何用過求。按日數而循規則。痘自依期而起。依期而脹。貫漿結痂。亦順叙而功成矣。若過求之。反失中和之的。若險之險者。症必偏陷。非氣血虧於不足。卽毒火盛於有餘。若規規焉。峻補虞其太實。重瀉虞其虛。至窮劑之。輕重之間。聽浮沉於其際。何籍乎醫之有哉。至險而逆者。症已偏陷。而勢又猖獗。虛幾不及。幾無可清。所爭在於一線。而間不容髮。其機不

卷一 救偏瑣論

二

惠迪堂

容少待。猶之入虎穴而取虎子。若存畏縮。何能挽造化於人工也。然所謂補救其偏者。亦甚難矣。識見不真。先迷向往之路。膽力不雄。同歸廢弛之地。理障未捐。難神變化之用。是必膽與識俱。心隨理運者。而後可以語此。夫識見何以難真也。有如白者。辨其爲虛。而抑知有血鬱之白。紅者。辨其爲熱。而抑知有嬌艷之紅。密者爲凶。得克肥而何妨於密。稀者爲吉。有肉症而何貴於稀。頂喜其綻。痘不蒼而綻。歸何用。陷則爲虛。色若滯而陷。豈緣虛致。皮薄者。慮其漿清。有浮

衣而非真。薄漿黃者。慶其蒼老。有板黃而非真。蒼。滯不鬆。誤認以爲平扁。根窠毒絀。錯羨以爲能拘。以膿成便爲無恙。以痂落卽快收功。此由識見之不真。形色之莫辨。一也。作痒者。補之於氣。咬牙者。養之於血。寒戰者。助陽。咽乾者。補液。補中健胃。施於食之不思。定志安神。行於夜之不寐。汗多則實表而慮亡陽。解頻則固脾而虞氣洩。夫固用藥之常法。業是者所習熟也。殊不知症有似是而非。僅是毫釐之謬。誤認以非爲是。殆至千里之差。每見養血而牙仍關。助陽而戰適增。開胃而食愈不思。安神而躁愈甚。斂汗止瀉。俱屬抱薪而救火。定痒生津。猶之助桀而爲虐。病自炳於星日。昧者竟是矇聵。此識見之不明。致施治之差訛。二也。膽力何以貴雄也。偏僻之性。固所最忌。設有補不宜重者。重而不覺。伐不必過者。過而不知。此蓋偏之爲害。而誤不淺也。若見爲車薪之欲。而僅以杯水之救。見若江河之潰。而將撮土之防。可乎。不可乎。惜焉。任事病在鹵莽。不若曲謹之爲愈。趨向旣真。而當機畏縮。何如必至之有成也。病故有舉手而

卷一 救偏瑣論

三

惠迪堂

應一 半而功倍者有竭其心思盡其藥力而  
 効者蓋病有淺深功自有難易若概期於速効  
 藥餌未半更端起是何異虧山 篋毒井九仞也  
 哉此膽力未雄卒廢於半途者三也理障何以難  
 捐也凡人出於臆度者猶存疑畏自見為理者居之  
 而不疑蓋理不無障執之為障路舉一二言之如  
 放標時一升發者理也執升發於放標時者障也清  
 解於起張候者理也執清解於起張候者障也補拓  
 於貫漿之際收斂於結痧之時者理也若執於是期  
 救偏瑣言 卷一 故偏總論 四 惠迪堂  
 必拓是期必收者皆理之障也痘有變遷日期難執  
 嘗有痘雖初放功不在於升發時雖起脹寧必事乎  
 清涼寓補於瀉何嫌於貫漿而解利用散為收何病  
 於結痧而疏發入門之始而不循規則無階梯臨  
 症之時而必拘繩墨何以司命往往株守者終身迷  
 而不悟此繇理時之不清至臨症之多乖四也前人  
 處方立論有就症而論症者有因時而制宜者有矯  
 前人之偏而言下不無過激者有慮後人放佚而立  
 而不無拘檢者亦有喜行溫補凡症歸於虛論者有

於清解凡症歸於熱治者總之一隅之見不可拘  
 言塗之迹不可泥於言筌即如春夏為順秋冬  
 為心之說而拘之則春夏無不起之痘秋冬無生全  
 之一矣有是理乎如局於一隅宗文中必致害於血  
 熱信仲陽必致損於氣虛守魏氏而概用溫補者未  
 有不致誤實實而大折生命者也貴在因其法而窮  
 其理彙其紛而歸於一是謂得之至臨症當機其著  
 見明者迎昨日照不必猜疑其隱伏莫測者多似  
 是而非當必細察其形詳驗六色形色未燭復於神  
 政偏瑣言 卷一 故偏總論 五  
 情而釋之容有可疑更於內症而參之則庶乎似虛  
 寒而反實熱者難逃似有餘而反不足者莫掩似平  
 易而實危困者何處似必斃而實有可生者自在調  
 之得當扶元見化毋之工施之不合即為代性之得  
 治之得宜蕩滌即保護之丹用之不當即為腐賜之  
 藥首尾倘徇却與日和而迥合小心曲謹適與敗謀  
 而同事苟非膽與識俱從心所欲者何可以語此  
 原痘  
 痘一加毒其各之曰痘取象形之義也有謂天瘡者

天所種。非後來之毒也。然所謂先者。非懷娠時  
有感七情六慾。辛熱溽炙之毒。當二五妙合。精行血  
就時當下之毒也。何也。孩體以精血而成。精血以情  
慾而媾有是身。則一。是毒矣。精血為成身之本。情慾  
在會合之先。先孰最焉。同一情慾。而痘有順險逆之  
分。何也。精血厚而情慾淡。更得性恬味薄者。合天地  
化生之理。得陰陽和合之宜。其稟旺。其毒輕。痘瘡自  
順。有血旺而精薄。有精強而血虛。或偶為七情所擾。  
或適為辛熱溽炙所乘。或媾時。或男淡而女熱。或  
救偏瑣言 卷一 原痘論 六  
女淡而男濃。是精血不能無病矣。其險至若積  
為七情所擾。或嗜厚味無厭。或久服壯火之藥。  
皆足以致火。沿髓淪肌。更兼男女俱染。及於縱。即  
精血極旺。而精乃毒精。血為毒血矣。以毒精毒血而  
成此孕。其能保痘之不逆乎。又有欲洩而強閉。以貪  
歡會。此又逆之最逆。不終日而可斃。是謂悶痘。此順  
險逆之由分也。究其出也是痘。未出時。果屬何象。由  
則布於周身。未出時。若于何地。古來列說紛紛。皆是  
捕風捉影。不知人身百骸未生。元始之初。先結右腎

謂之命門。以其為受命之門也。其毒如一小櫻桃。印  
結於此臟。如膽之繫于肝者然。內所包孕者。僅氣而  
已。順者其氣清。險者其氣濁。逆者其氣黑。毒惟有膿  
包孕。故未有感觸。藏之若無。一洩而。一判。可見  
稀痘之方。理之所無。藥即刀圭。亦何從而稀之。若可  
以稀。則可以化之。使無矣。有一富翁。晚年得一子。訪  
此道于余。余以此理言之。弗聽。出得意之方。十餘以  
相。據方有巧思。然雖無益。却亦無損者。余亦不之  
禁。彼一一如方而預圖之。及後出痘。最逆無倫。不及  
救偏瑣言 卷一 原痘論 七  
透點而斃。神奇不根于。總屬虛誑。試問清與濁。濁  
與黑之呈見何如。清者其毒輕。感觸其竅。一任氣領  
血載。徐徐而出。出于蘊藏之地。漸而升於脾絡。猶太  
極而分兩儀也。自脾而行於肺。勢猶寬緩。未之分布。  
漸兩儀而分四象也。次第而至于心肺上乘之地。而  
始分布于外。猶之四象變化。庶類自繁。熱故得以和  
緩。越三日而見標。漸漸而出。先於頭面。次及乎身。以  
至四體貫漿結痂。亦自上而下。所以謂之痘為  
上氣濁者。其毒湧盛。遇有感觸。非若清者之從容緩

也。一出本位。燔熱燥渴。經於脾絡。一及乎肝。毒其莫禦。非領毒之氣。受毒即載毒之血。所以熱不

三日而即見。不暇論其形色各症。第驗筋抽。惕之象。而症已非輕矣。所以肝經之痘為險。有未及乎肝

而於脾即發者。勢尤猛烈。一出本位。毒便狂。以周時。痘即一齊湧出。或見點而累日。不知氣血俱受

其困。凡通臟腑。無不見其凶象。第驗其腹痛唇焦。其餘症白惡。此險中帶逆。濁而兼黑者。其象如斯。黑者

一觸其竅。勢若砲烈。未及離乎本位。毒即肆虐。并亦救備瑣言 卷一 痘論 八

不容分布。氣受其剋。血受其瘀。凡通腎臟之地。無不聽其攻擊。即如腰如被杖。屈不能伸。已下其喪無日

矣。要知五臟見症。皆出於腎。第腎為稟受之地。諸臟為分布之所。緩忌關生死之界。緩一步。則毒輕一步

緩而至于心。緩至也。肺則次之。故心肺為順。肝則界于緩急之間。故為逆。然則腎痘之不救。以

急若迅雷之不及掩。故為逆。然則腎痘之不救。以人力之不及施也。腎不受毒。諸臟獨可以受毒

乎。更有變黑歸腎之說。得毋以腎為玄武。其色故黑

耶。若是則赤當歸於心。青當歸于肝。黃當歸于脾。白歸於肺。赤與白。白與黃。痘固宜有之色。青獨非所忌乎。何獨慮腎而不及肝耶。總以血瘀則黑。血為毒聚。其毒自不可解。豈有變黑歸腎之理乎。有因虛而不起者。必其兼毒盛者也。毒得其輕。雖虛何害。毒若猖狂。氣血成何用耶。

論氣

人身之氣。得太極之陽。而神為之主。輕清象天。源於太虛。本於剛健。無形而為形君。無體而能體物。為生救備瑣言 卷一 論氣 九 惠建堂

命之根。今乾道焉。邇有生以前。孩體何肇。如萬物之資始。乾元也。既生以後。長養何從。如萬物之暢茂。於

陽和也。運行不息。無窮不達。如日之經天而行。健也。精形洋溢。潤乎一身。如天喬之敷榮于化口也。衛護

于外。六淫不擾。如乾陽透地。而陰霾莫能晦其照也。克實于內。至老不衰。如悠久成物。而亘古莫能究其

竟也。自孩而少。少而壯。壯而老。旋轉一身。周而復始。宛如一貞。下起元。而太極之乾道也。至於塞天地。入

水火。變化飛升。何莫非真氣之妙用乎。應乎痘瘡。氣

得其正者透必暢快。脹必如期。頂尖而脚圓。頭而先  
身而至。以見痘之非氣非領。升發于陽而輕清上升  
之義明矣。包血成暈。不令脚散。磊落分明。不令細碎  
雖密必成顆粒。以見氣之拘制其毒。而陽剛之義昭  
矣。放點明潤。可觀成漿肥黃。悅目收靨結痂。不乾不  
燥。以見氣之津液外旺。而證敷榮之象矣。紅而得自  
白。而得黃黃。而得老。以見氣之運行不息。成血之功  
而合乾健之體矣。痘從無而至。有見點。以至成痂。靡  
不成形于氣。以見氣之體物不遺之象矣。是氣得其  
救偏瑣言 卷一 論氣 十 惠迪堂  
正之局也。令毒火太盛。而氣爲毒壅。火太盛。而氣爲  
火蝕。氣本輕清。而屬陽也。爲毒火所虐。則不能上升  
而痘必倒置。頂必不能尖綻。或平或陷。而反制于毒  
矣。不能蓄血。定位痘其稠密細碎。而界地不分矣。氣  
主乎神。神被火灼。色自不能光澤。或乾紅。或紫滯。連  
血亦爲不榮矣。氣主動盪。一爲桎梏。氣必不能化毒  
或外剝。或內攻。而成熟無望矣。安冀其終乎。氣若  
不足。則又餒而不振。雖無壅遏侵蝕之患。亦終虧拘  
領成熟之功。邪正不並立。正氣一虛。邪毒 拔。變症

蜂起其殆疾如反掌。故毒制于氣則吉。氣制于毒則  
凶。氣虛而不能馭毒。則從補。毒盛而虐陷乎氣。則當  
攻。或補氣。或攻毒。總不令氣爲毒害。斯明乎太極之  
理。而治氣莫能出其右矣。

### 論血

人身之血。得太極之陰。重濁象地。稟輕清之氣。以成  
其體。而具資生。承剛健之氣。以厚其用。而主長養。有  
乘載之功。柔順之德。合坤道焉。當胎元包孕。孩體何  
成。如萬物之資生于坤元也。自孩至長。長而至壯。如

### 救偏瑣言

#### 卷一 論血

十 惠迪堂

萬物之長養于博厚也。得氣而生。得氣而旺。如土脉  
之賴于陽和也。隨氣運行。周流無滯。如陰柔之以順  
爲德也。灌溉五臟。榮養一身。旺于內。明足以察秋毫  
心足以應萬事。當炎暑而不畏熱。旺于外。則筋強而  
力倍。髮潤而爪華。唇若桃舒。而面若杏吐。如天喬之  
敷榮于地道也。榮極則枯。旺極則衰。髮鬢頰而五色  
眩。精髓虧而天癸絕。類若草木之零落于冬土。而宛  
然一太極之坤元也。至于尸解。蟬蛻。脫化而軀殼如  
生。何莫非真陰之妙境乎。應乎痘瘡初見一點紅。昭

其爲痘以見血之載毒而出同於載物之功矣。紅而能潤色得以呈乎外。以見血不自呈而需輕清之氣明矣。紅而能白。白而能黃。黃而能老。血得以化而成膿。以見血不自化而藉剛健之氣又明矣。歸附周圍得以圓淨。放白眼鼻得以封塞。黃熟周身得以脹滿。以見血隨氣運而象順德之無疆矣。痘本從無而有

點點而逝。至於成痂。以見痘之皆屬血體。而合乎資生之理矣。放點如粟。起脹如豆。漿黃如蠟。以見痘之血體日繁。而合乎博厚之道矣。漿足漸收。成痂落靨。

敢偏瑣言 卷一 論血 主 惠迪堂

以見痘之收斂于陰。如冬令之解葉辭條而歸根于土矣。是皆血之制毒而然也。令反爲毒制。而血失其正。血本爲榮而屬陰也。爲毒火所燦。痘自不能榮潤。輕則焮紅。而重則紫艷矣。血本運行而流通者也。爲臭毒壅闕。痘必血瘀。輕則椒皮紫黯。重則紫背浮萍。黑如灑墨矣。血本賴以滋養者也。爲毒火逼迫。血必妄行而致失血之患矣。尚異其載毒而出。放白成膿。收痂落靨之境哉。此係血被毒害。而非血之不足也。血若不足。則白而不紅。氣縱有領毒之功。而血無載

毒之力。以致有頂而無盤。氣足以包血成圓。血不能以附氣成暈。以致空殼無漿。痘賴血體而成膿。毒賴膿成而毒解。膿乏其本。卽毒得其輕。氣得其旺。亦何能濟其缺陷哉。故血虛之症。必當養于平素。以補氣之功。易補血之功。難也。治血與治氣同參。斯妙于治血。而明乎太極之陰者矣。

救偏瑣言卷之二

治痘運掌賦

病有表裏虛實藥有補瀉溫涼取症不可偏據。谷外  
 內與脈詳。表似虛兮必合內而評論。症似實兮更參  
 脈以相商。理在窮源兮須究其致。不必他求兮豈可  
 悖常。痘更變而莫測。非若他症可傍。有似虛兮反實  
 有似熱兮反涼。變症百出千形萬狀。欲求變幻。先知  
 三項。順若治而多事。逆若治而招謗。險能通變。治痘  
 賢良。有如熱和緩兮體潤。神開爽兮如常。淡紅其色  
 救偏瑣言 卷二 運掌賦 惠迪堂

今。如杏蕊之舒露。尖綻其形兮。如笋芽之透狀。毒火  
 輕淺。氣血兩旺。漸漸光壯兮。紅變為白。氣尊血附兮。  
 白變為黃。膿成始於頭面。終於四體。次第不紊。珠結  
 肇於人中。未及足脛。陰陽和暢。飲食加飧兮。二便調  
 順。痂落滋潤兮。疔色榮光。何用醫林之藥石。何須父  
 母之驚慌。假令面顏青慘兮。涎湧氣促。如畏刀鋸兮。  
 兩目傍徨。腰膝曲而如折。青紫點如萍樣。手足撩亂  
 兮。身無安放。啼聲不出兮。意甚慌張。灑墨兮。四體暨  
 乎胸背。失血兮。口便合乎瘡瘍。腹脹如鼓兮。神情悶

亂額汗如淋兮。厥冷非常。此等逆中最速。悶痘即日  
 能亡。更有立刻可斃。唇舌滿口如霜。設若輕與湯劑  
 反致毀於熱腸。

偏身蚤斑蚊迹。藍癍焦紫如傷。一片兮。蛇皮蠶殼。成  
 粒兮。水泡空囊。根堅硬兮。黠滯。頂嬌嫩兮。油光。面目  
 掀腫兮。痘卒不起。四心泛白兮。面不行漿。額攢聚而  
 如麻。額細碎而平脹。額下糊模。託腮繇來不吉。顛頂  
 盤聚。覆釜自古非祥。功將九仞兮。痰壅氣喘。時方發  
 劫兮。咽啞水噎。目之有翳兮。按之無粒而必敗。形雖

救偏瑣言

卷二 運掌賦

惠迪堂

磊落兮。根無盤助而堪慌。膿未成而泡湧。紫白同歸  
 於盡。漿未行而痒沸。燥溼總屬悲傷。頂破乾赤兮。痘  
 如剛去。頂破乾黑兮。凹似煤坑。地角數點乾黑兮。瘰  
 似內出而圈不斂。暨其鼻準若是兮。兩額平斂而及  
 印堂。紅暈散漫而不附。氣離血散而乖張。徹夜無眠  
 兮。漿後豈容如是。終日不食兮。痂後寧保無妨。漿不  
 成。痂兮。和皮粘去而如剝。硬痂燥黑兮。嵌入紅暈而  
 如鑲。頭搖身拱。足擲手揚。躁亂不寧。猶之發始。熱如  
 炮熾。更甚於曩。痛楚不堪兮。衣衾難動。身如捆綁兮。



困苦着牀。碎唇鼓領。尋衣摸裳。手足振戰而無措。欲  
言無語而皇皇。目閉睛定。口吐涎沫。神情恍惚。身  
身無主張。有本逆而不治。有失治而致戕。凡此同歸  
於逆。謾誇痘內岐黃。

要知何為是險。閱時須要端詳。痘使稠密。今色猶滋。  
潤色或乾滯。今形還稀。明即使密而兼滯。今顆粒分  
明而綻突。其或平而兼陷。今不至脚癢而空洋。間貫  
珠而成形。今餘痘尙得克肥。間堆聚而成象。今諸痘  
猶能光壯。出之太遲。今淹滯而神情不迫。出之太驟

救偏瑣言 卷二 運掌賦 五

分毒湧而勢不猖狂。欲知其密。今四五相連而擁簇。  
欲卜其稀。今單見其形而老蒼。大熱得靜。今毒隨熱  
出而無慮。微熱躁亂。今毒與熱閉而宜防。發必期盡。  
透欲其暢。氣不克拓。今歸附則厚。血不紅活。今郭廓  
則壯。舌刺焦黑。今痘不焦枯而莫慮。臉若塗珠。今紅  
中泛頂而休慌。啖開乾噤。今聲音能曉。空竅失血。今  
不及自與瘡瘍。神若昏憤。今非痰喘而莫棄。狂言譎  
語。今非焦紫而能康。唇腫裂而焦黑。腹絞痛而莫當。  
目下線紅。睜毛若鎗。皮毛若刺。今痛猶膚剝。叫喊不

已。今寢食俱亡。此等惡症。皆毒潛藏。痘若磊落。可與  
無效。若夫腰如被杖。今毒攻本位。遇發始而未可遽  
絕。頭如斧劈。今毒參陽位。初見痘而還宜審量。作瘳  
今禁止能定。搖破。今流血流漿。泄瀉而痘瘡不變。有  
因利而痘反安。康體戰慄。今神不昏。兩齒關。今身安  
靜。痘使陷伏。今囊窠未隱。精神困乏。今飲食方強。漿  
灰白而目未開。膿水薄而痒未作。身不成痂。今有痘  
疤而莫慮。面痂乾薄。今漸堆結。而何傷。漿停燥實。今  
空地復補。而可喜。收靨黑薄。今根窠得泛。而無殃。痂

救偏瑣言 卷二 運掌賦 四

乾絕無腥臭。須知餘毒尚伏。腐爛臭惡如屍。須防生  
蛆。攢痒。發癢發疔。身熱不宜炮熾。發癢發疹。紅潤為  
洩毒。膿窻。浸淫不斂。今土虛不能制水。潰爛不收。今  
火旺燦金之象。疤凸赤。今因風熱所搏。疤凹白。今因  
虛陷成坑。

險居可生。可死之界。得生失死之場。援之得。今罔不  
起。投之一失。罔不亡。險症多般。須挈紀綱。一一求之。  
志無定向。一以貫之。運如反掌。辛溫滋補之症繁多。  
得一真虛。而盡括寒涼攻解之治。不同得一真實。而

俱囊窮其真虛真實之源。達其極熱極寒之變。權其輕重。較其短長。用補用攻。應必如響。勢如寬緩而直。達分必遵常格。勢若急迫而更似是兮。可不窮理而通方。徒據日而定治。尋春於昏夜。第見病而治病。隔靴而撓痒。神理豈規則能定。妙訣惟洞徹陰陽。元陽得足兮。痘無氣虛之患。真陰得旺兮。痘無血熱之防。邪陽旺而五液虧。陰寒盛而真火滅。陽極則厥而似陰。陰極則躁而似陽。氣血得勝兮。毒火退聽。毒火雄烈兮。氣血滅亡。畏矣哉。邪毒之進退。大矣哉。氣血之消長。

救偏瑣言

卷二

痘學賦

五

專題

氣爲陽而毒火侵炙兮。爲餽氣或煩熱。或燥渴。口脈如脂。喉間乾噁。痘色輕則乾而重則滯。極則燥而枯。有舌起芒刺。有唇縮燥硬等象。血爲陰而毒火侵炙兮。爲燥血。或大便燥結。或小便短赤。夜不成寐。唇焦舌黑。痘或乾紅。或紫黯。或板黃。或焦黑。收痧燥硬。爬肌搔肉。痧不能落。毒火衝突氣分兮。熱如火熾。爲亢陽。或顛狂。或叫喊。或大渴不已。或喜冷思涼。有皮肉癢腫。有面目光亮。有口熱如燻。有唇腫如炊。有

痘起浮衣。有發空泡。有水泡。有重頂。有迸裂。或氣湧。或填脹。或頭汗如淋。或面目預腫。過期腐爛。毒火衝突血分兮。爲血熱。或界地不分。鋪紅肆溢。或眼赤如珠。或迫血妄行。有從口鼻而出。有從大小便而出。有從瘍瘡當頂而出。痘或焮紅。或紫艷。或發血泡。或發紫泡。毒火盤據氣分兮。爲氣滯。不能領毒。痘出不快。不能峻頂。或平。或陷。不能化毒。難以成漿。或板或堅。或硬。不能成熟。難以拘毒。或密或細。或堆聚成形。或貫珠成象。不能磊落。一身之氣。均爲毒錮而失。

救偏瑣言

卷二

痘學賦

六

專題

其毒。毒火盤據血分兮。爲血瘀。瘀於內。根窠無暈。有頂無盤。痘色白黯。與肉色無別。難以載毒。瘀於外。根盤紫黯。有發蚤癩。有發蚊迹。有若紫背浮萍。難以成漿。一身之血。悉爲毒錮。而失其附。一毒火外虐兮。輕則抵穿筋骨。頭面潰敗。毀容殘相。重則如失水之魚。削膚之木。毒火內虐兮。輕則便膿便血。如木之有妬。重則潰腑潰臟。如菓之腐仁矣。此非氣血之不足。咸受毒火之傷殘。

至若氣虛不振兮。無能領毒。亦頂平。亦頂陷。有灰有

白為候而不克稿而不澤。無能拘毒。脚不能斂。無能蓄血。盤不圓淨。或皮薄或皺軟。為不蒼老。血虛不榮。今無能載毒。喘附不厚。行樂淡薄。不能發臭。疤不紅潤。面不榮光。終無血色。

知其侵炙兮。則知氣血之燥烈。急清解以制其火。涼血以潤其燥。開其腑而清滲之。不使至於焦枯。知其衝突兮。則知氣血之搏激。急蕩滌以攻其毒。苦寒以制其熱。涼血以救其陰。兼於疏表而令宣暢。不使至於外剝。知其盤據兮。則知氣血之拘囚。急蕩滌

救偏瑣言 卷二 運掌賦

七

以開其閉。破血以導其瘀。兼於疏達。拔其深根。而不使內潰。知其氣虛不振兮。則知毒無駕馭。或溫補以致其旺。或峻補以復其陽。或關鎖以禁其虛滑。不使淪於脫去。知其血虛枯稿兮。則知毒無乘載。或滋養以厚其體。或重補以振其漿。不令流於空殼。百凡變症。惟此推詳。不必以痛為實。以痒為虛。以燥為熱。以戰為涼。出迎之根。宗洞達。隨在得從。心之爽。不求合矩。自不踰方。莫謂參芪非發痘之劑。蕩滌非治痘之方。莫謂行漿無寒涼之法。收斂無疏達之商。

此理若明。尤得豫而克濟。微彼乘土。迨未雨而可防。毒至潰而攻之。覓犬於見兔。元至脫而回之。補牢於亡羊。知微之顯。而得預為之地。知風之自。而悉致病之誰。

痘出不快兮。主乎升發。必究其繇。今寧第蠅蚋蜂蟻。其或表邪外束兮。必解散而毒有出路。飲食停內。必食消而毒無攔擋。毒火熾盛兮。奪其勢而不使。遇氣虛不振兮。助其元而令彼發揚。其源得濬。其流自長。貫漿同於一轍。結痂寧有參商。表如太實兮。難

救偏瑣言 卷上 運掌賦

八

之不徹。毒火仍閉。而為虐。表若太虛兮。固之不實。真氣終洩。而為殃。裏若太實兮。攻之不暢。氣血仍因而受虐。裏若太虛兮。補之不實。真元終乏。而何漿。實必至於內潰。虛必至於亡陽。更若加乎顛倒。何異抵痘於鋒鏑。妄與成膿。求魚毀網。即此一端。可以推廣。膿若成而毒未盡。治毒何能遽止。氣雖足而血未收。涼血何可鬆放。不則竟爾收斂。餘毒必至彰彰。亦有當收不收。脾氣必困中央。此宜實脾燥溼。助痘收斂。何疑口渴不因火炙。生津補液相當。便瀉不因火迫。

固脾實土為良心 不寐今自宜定志胃虛不食  
助納為強膜裡虛 四汗洩還宜實表神不守而多言  
務使神藏邪毒淨盡今悉從乎補餘毒留連今可廢  
平章總歸虛治今不通之論不明剝復今安用彼相  
補必期足攻必期暢藥不勝病今何言九仞治之過  
當今誰云力量酌其虛而溫之補之熱之固之不為  
實實明其實而涼之瀉之寒之解之不為虛虛首尾  
不拘惟理是傍痘若平易好奇必誤痘若偏陷適莫  
宜亡常道不諳今無此庸俗尋常不化今烏得為良

救偏瑣言 卷二 九

推廣規則錄

道有依機階梯必從規則學期自得畫一何能推廣  
孩體初熱今視其溫壯溫則輕而壯則重溫必神爽  
方輕躁亂莫慶壯則痘起猶輕毒滯尤重壯熱按其  
燥潤今潤則水濟猶輕燥則亢陽尤重兩眼昏沉今  
如睡未醒唇口手指閉惕今神情恍恍胃火上衝而  
嘔吐邪熱下注而傾腸此因毒趨百竅是皆出痘之  
象吐不必治今邪從吐洩利不必止今毒以利暢其  
或發搐今惟利關節毋為驚治其或狂躁今惟清煩

熱安神必戕治先疏肌消食升發透毒為良表邪因  
其輕重輕則前胡荊芥重則芫蘇乾葛風寒可用辛  
散風熱惟宜清徹內傷何獨不然食輕麥蘗山查重  
必青皮枳實發痘隨症相宜蟬蛻蘆葦萊蛙咽喉凡  
痘宜清牛旁與夫甘桔惟有內傷嘔吐甘桔亦宜暫  
撤毒盛內伏今攻不宜緩身如火炙今早撲可滅遲  
則養虎貽患致令將來無策無論漿不能化縱發何  
能得出亦有胃寒而嘔脾虛而瀉非因欲痘而然痘  
瘡偶因發洩其必目眶低陷天柱軟側足冷頭溫神

救偏瑣言 卷二 十

情虛怯重語聲輕面顏皓白必先安胃醒脾茯苓車  
全腿木縮砂陳皮甘草扁豆蓮心配合方於痘所宜  
兼並行不悖揀擇令亦疏肌消食何異霜而重雪痘  
若險中帶順率由舊章乃得痘看稀密今稀為輕而  
密為重稀得榮綻為輕密更不鬆尤重察其色之紅  
白今白屬血虛而紅屬血熱白而嫩薄血真虛也血  
虛者慮其凝清紅而壯熱血真熱也熱則防其紫黑  
頂平頂陷有氣虛氣滯之分氣虛者淡白氣滯者板  
赤淡白克拓而可起板赤疏達而勃勃根壯根堅有

毒絲毒鋼之殊壯者圓綻而鬆堅者推而硬結圓綻  
 可以弗藥硬結非透可出活血透毒起服時之工夫  
 涼血清火成藥前之規則活血如紅花紫草透毒如  
 山甲蜂房清火芩連犀角涼血丹皮地黃囊殼得鬆  
 今不必再透色轉紅活今何用再涼痘犯熾熱涼解  
 何拘首尾痘若虛寒溫補何妨巔末淡白而兼色嫩  
 今參芪保元為最淡白而邪發老蒼今芩歸熟地為  
 良小水短赤道赤絲來必用心煩躁亂涼膈散快胸  
 堂疏表以毒透為期涼解以火清為傍咽喉時防阻  
 救偏瑣言 卷二 規則錄 十一

思食分有胃虛火閉之殊夜不成寐今有心虛熱擾  
 之別邪熱迫而液沸膜裡虛而汗洩總令補瀉合宜  
 勿使虛虛實實形不鬆色不活水楊湯和入胡荽而  
 可浴或黑黧或破傷化毒丹調入磁脂而急貼氣血  
 鋼閉猪尾膏透活無雙黑黧乾紅無價散能令紅活  
 未應收而燥斂生地重以兩許應回結而溼潤不收  
 慧米防風苓朮餘毒未盡今審其透伏伏則疏肌透  
 發透則活血解毒體虛而毒未盡參歸化毒湯宜神  
 爽而熱未和地骨小柴亦得肢節腫痛尾牛膝為  
 救偏瑣言 卷二 規則錄 十二

君佐以紅花羌活兩目紅腫癢羊荆芥為先次以甘  
 菊羌活木通赤芍連翹燥熱生地皆合熱蒸不斂細  
 茶末收之而可乾和皮脫去金蓋散敷之而自結種  
 種有實有虛有寒有熱不得以陷為表虛以綻為表  
 實以吐瀉為裏虛不吐瀉為裏實不可以漿後為虛  
 漿前為實痘多疑似毋為其惑欲得其真必詳參合  
 詳其似是實非衡其當務為急症若偏枯宜以偏濟  
 症無定局妙在權宜以補作瀉以瀉作補究不離乎  
 規則合乎日期同乎矩矱原不下於通方五行順敘

卽顛倒之佞機。顛倒佞機卽生剋之常理。

### 治痘須知大運論

天以陰陽而運六氣。運有大小。小則逐歲而更大。則六十年而易。小大有不合。大運於陽。歲位居陰。是陽中之陰。猶夏日之亥子時也。大運於陰。歲位居陽。是陰中之陽。猶冬日之巳午刻也。民病之應乎運氣。在大不在小。不可拘小節。遺其本而專事其末也。譬之星理。以命爲主。流年利鈍。焉能移其大局乎。病而於小。大俱合。無論矣。有於大運則合。歲氣相違者。自從救偏瑣言 卷二 大運論 三

其大而畧變其間也。此常理也。間有於小則合。於大相違。更有於大運歲氣俱違者。偶爾之變。亦當因其變而變。應之如冬溫春寒。更有若夏令飛霜。降冬雷電。時令不無怪異。民病豈無悖常。但不可以常理論也。總以大運爲主。不以歲氣紛更。強合乎病。又不設成見於胸。惟症爲的。與司天不合。而自合。庶乎其近道矣。若概謂當先歲氣。毋伐天和。似非世則之言。嘗稽東垣一以保脾爲主。河澗一以滋陰爲重。子和一以蕩滌爲先。皆能表表於世。總得挈領提綱。故得一

本萬殊之妙。不則當年豈無歲氣。而必各取其一耶。

至於痘症。有獨取于辛熱。有得意于寒涼。有扼要於保元。是亦治痘之明手。何不見有逐年之分別耶。要知大運之使然。非三氏之偏僻也。如曰偏僻。則當年各操其一。以應世。何以得各擅其勝乎。成平以禮樂戡定。以于戈。此世運推遷之理。人事當然之局也。後學不明其故。各效其一。而不通變。亦有畏其偏僻。而第據症按期。有侈談歲氣。以示高卓。皆不知循環之大運者也。余先君養恒。治痘肇於神宗初年。以及謝救偏瑣言 卷二 大運論 四

事。大運寒水。痘多氣虛。卽血熱之症。至行漿時而火無不清矣。漿後而毒無不解矣。卽有變症。悉屬真元不繼。縱有火毒未盡。亦不過強弩之末。總歸虛治。無不響應。昔魏氏之保元。正是時之真訣也。及于於丁巳。至癸亥。尚多氣虛。與曩局較若一軌。自甲子而血熱者漸多矣。其毒亦漸深矣。向補宜從重者。變而宜輕。瀉宜從輕者。變而宜重。始及丁卯。所宜重瀉者。雖極清極鮮。而亦弗靈矣。勢必蕩滌而元臬之勢。始殺然。猶放標起脹時之權宜也。至壬申。後蕩滌之法。向

施於成漿前者。竟有首尾而難免者矣。歷年以來。居然成一定局。間有宜溫補者。不遇百中一二而已。見

大運轉於相火矣。治痘不同。其固如此。試問痘之形色症狀。亦有異於前乎。無以異也。第多內症焉耳。伏

毒焉耳。痘如稀疎者。其熱宜和。乃有非乾焦如炙。卽頭汗如淋。其神宜爽。乃有非啼號不已。卽昏憤如迷

唇有不見。掀腫而口熱如爐。舌膩如脂。自有不見紅赤。而睛毛倒豎。兩頰如珠。色令紫滯。謔妄其宜。每見

肥紅而語言錯亂。色如灰白。厥逆其常。每見嫩紅而故偏瑣言 卷二 大運論 五

愁肢冷。期至漿滿。痛脹何奇。每見放標而卽如膚剝。時方透點。煩熱何妨。每見落痂而熱猶火熾。有時時

而乾嘔者。有頻頻而腹痛者。痘難悉舉。使內無伏毒。何以其若是也。使伏毒而僅以規則治之。毒其能治

否耶。見相火應病怪異。乃爾也。自古氣運靡常。純駁無定。痘故變態靡常。補瀉無定。是知今之非昔。其殆

日後之非今乎。乃見前賢往哲。道雖不同。其趨一也。若使易地則皆然者矣。詎在胸臆者。所可彷彿者哉。

予於當事時。懷冰兢。惟恐偏僻致誤。庶幾屢應屢驗。

稍可自信。亦有莫挽者。明知其逆。不必治。不過熱腸所迫耳。

附乾焦如烙。頭汗如淋。一治驗以證大槩。

故友孫貞老遺一子。四歲。庚寅莫春。出痘甚勻。朗

稀疎而縱突。其熱宜和。其神宜爽。而躁亂如失水之魚。乾熱如紅爐之炙。頭汗卒如雨下。蓋痘梟毒

內擾。則躁亂烈火燔極。則燥炙。痘瘡最惡者也。而况頭汗如淋。頭爲諸陽之首。輕清最上之地。邪毒

不易犯者。而犯之。以下可知。所以先賢謂毒參陽故偏瑣言 卷二 大運論 六

位者死。症屬不治。所幸惟初見。勢雖騰湧。而毒尚未有定位耳。大黃二錢。石膏三錢。黃連六分。生地

三錢。佐以地丁。青皮。荆芥。蟬蛻。木通。山查。連投三劑。而頭汗卽收。熱勢頓減。因減而減。石膏黃連。加

丹皮。滑石。牛旁。餘俱照前。服過四劑。痘五朝仍壯熱。而紅暈如珠。以痘起齊。而毒火儘發於外也。躁

亂如前。而更渴。大便三四次。照前方。復用黃連。石膏倍加。生地。至九朝。漿甚老。而少滋潤。紅暈未淡。

胃氣不開。熱亦未減。寢亦未安。以一。方。至十二朝。

諸邪悉退。寢食俱復。以金銀花貝母甘草山查牛  
旁刺芥木通門冬高豆收痧落靨而愈。

附一稀朗紅潤叫喊不已治驗

驥村嚴五侯兄一子甫一週出痘稀朗。可以數紙  
且紅潤可觀。及其身熱如炮。愁楚不堪。兼窠粒不  
鬆。此內有伏毒也。若以稀疎紅潤而概目之。則誤  
矣。予即以黃六分石膏生地各錢半。佐以荆芥  
丹皮山查蟬蛻葛根青皮。連投二劑。大便去三四  
次。熱與愁楚稍緩。又投二劑。熱和神定。窠囊亦鬆。

救偏瑣言

卷二

大運治驗

七

宛然順痘矣。然此霽色乃藥力強制而來。非天然  
之本質也。藥一不繼。毒勢必復然矣。有一不韻同  
道而讚曰。此痘本順。為其所愚。再用此劑。必然致  
誤。不知重劑妄投。痘即極順。一瀉而即變矣。何能  
反得鬆透而神定也。主人不解其理。遂中止弗藥。  
至八朝。仍復熾熱。徹夜叫哭。而至失聲。頭面擦破。  
身上紫滯。悔聽讒言。傍徨無措。復邀予視。尚喜破  
傷而未乾焦。色滯而髮未隱。仍用前方倍加大黃  
生地黃連減葛根。臨服和八大棗。蟲日以二劑速

以化毒丹調入油胭脂內。將綿紙做如膏藥。貼  
破傷之處。次日痒即止。色轉紅活。叫哭頓愈。又二  
劑。漿足飽滿。頭面復貫。連紙鬆擡。膿漿四溢。壯熱  
亦和。十二朝用金銀花地丁生地牛旁刺芥木通  
甘草連翹山查調治收功。痘後乳食倍進。大便較  
痘前反實。神色甚旺。夫以一歲芽兒。痘且似順。一  
有伏毒。必得如此。而後愈。餘可知矣。

論治痘權宜

治痘百千妙訣。不越補瀉兩途。痘症百千形狀。不離

救偏瑣言

卷二

大運治驗

六

氣虛血熱兩項。氣見其虛。無症是實。血見其熱。無症  
為虛。得補諸邪自解。宜瀉正氣自復。補瀉之法。用於  
常則易。用於變則難。人第知其以補為補。以瀉為瀉。  
之成法耳。不知補瀉之變幻。有用補以成其瀉。有用  
瀉以成其補者。如痘不起發。以之疏表。達裏。是以瀉  
為瀉也。乃有固中實表而痘適以起者。非以補成其  
瀉也。乎如漿不能化。以之保元拓裏。是以補為補也。  
乃有涼解疏達而漿適以足者。非以瀉成其補也。乎。  
此內經瀉東方而以南。補西方而以北也。舉一而言。



三隅可知。知此則補不必拘於時。瀉不必拘於候。時而一以補焉。當不至於助毒。一以瀉焉。當不害於元損。時而依期傍候。蹈矩循規。祇見行其無事。非為胸中無識矣。於此不能權宜。凡可生之痘。皆淪於不起。然痘家喜補而畏攻者多。信攻而畏補者少。醫亦依傍繩墨者多。達權通變者少。往往從補而致斃者。更十居八九也。

附治驗

先君一友孫瞻老。已酉歲。一長公。忽一日內傷而

救偏瑣言

卷二 治痘 權宜

九

吐。次日見痘甚密。自朝至暮。絕無起勢。先君以鬆肌透表二劑。猶之弗瘳。次日便以保元湯。參芪各一錢。加芎歸蟬蛻外。以姜桂少許。以為之使。日進二服。景况依然。三朝以參芪各三錢。餘亦類加。至四五朝。畧起。終頂陷囊薄。七朝以參芪五錢。配嫩鹿茸膏半盞。餘佐如前。仍無沛然之勢。一友從旁論曰。抑邪得補而愈盛耶。先君曰。果爾。則煩熱躁渴。痘色蒼老。蒼紅。今皮薄色白。頭溫足冷。求一熱而不得。是不可以得其故乎。乃以參芪各一兩。鹿

茸膏大半盞。一劑而痘即峻發。綻突如珠。根紅頂白。不一日而漿即肥膿。其後收痂落靨。不假餘力。是以補為瀉之一驗也。今無是症矣。

維城臧佳葵兄。一公郎。八歲。羸瘦如疖。症丁奚。僅存皮膚。寅仲春見痘。若以理論。脾主肌肉。瘦削如此。脾健當何如。耶。况痘賴氣血。終始其功。而氣血之源。根於脾胃。是痘之當以保脾為先。可無再訛而孰知。身熱如炮。目紅如火。躁渴不已。溺血如膏。痘色則椒紅黯滯。此梟毒與烈火發。即內攻。若不

救偏瑣言

卷二 權宜 治驗

十

通變。七日期當內潰矣。余以大黄四錢。石膏七錢。生地兩許。佐以桃仁。赤芍。荆芥。地丁。牛旁。木通。臨服和猪尾膏一盞。日服二劑。或三劑。六朝加黃連。自放點。以至成痂。以一方而終始其局。約用大黃。勸餘。生地。石膏。二十餘兩。猪尾血。十餘碗。而始收功。若此者。以毒火雄烈。首尾如一日也。苟不滌除。淨盡。不免功虧一簣矣。痘後精神煥發。飲食大進。而肌肉生長。是以瀉為補之一驗也。

治痘藥性摘要賦

方不合宜。厥疾何瘳。藥不明性。方從何命。山查寬氣道而鬆痘。消食亦宜。桔梗順肺氣而清喉。藥中舟楫。蟬蛻發痘之必需。甘草解毒之莫缺。前胡清風熱之痰。亦能下氣。葛根散肌表之邪。兼能解渴。薄荷清風痰而散驚。鈎藤利驚搐而散悸。木通導赤除煩。毒從溺解。牛蒡清喉解毒。邪從肌洩。枳殼下氣寬胸。青皮散結消食。枳榔豁痰逐水。殺蟲去積。枳實倍於枳殼。推墻倒壁。澤瀉利水通淋。猪苓連於澤瀉。芎助清陽而升頭角。毒火上炎者宜審。木香理滯氣而溫脾。救偏瑣言 卷二 摘要賦 主 惠迪堂

血毒凝滯而不透。紫草當行。血乾滯而不榮。紅花莫失。羚羊清乎肺肝。犀角解乎心熱。黃芩瀉肺火而涼大腸。失血亦宜黃連。瀉諸火而解熱。毒乾嘔聖藥。赤芍藥破血中之滯氣。療毒壅之腹痛。牡丹皮退陰中之伏火。散血熱之氣結。桃仁佐大黃而退浮萍。血瘀必用地丁。君紅花而散紫黑。毒結尤良。貝母治毒痰。而利心肺。桑皮瀉肺火而治氣逆。滑石利六腑之壅結。溺赤尤宜。杏仁開心氣之閉塞。止嗽亦得連翹。均足瀉火。花粉可以解渴。當歸補血虛之要劑。鹿茸振救偏瑣言 卷二 摘要賦 主 惠迪堂

胃乾紅色滯者何涉。大黃驅鼻毒而不留。破惡癩而不守。不令內潰。石膏解煩渴之如烟。退炎炎之火。裂不使焦黑。姜蠶催漿定痒之一隅。白芷托頂排膿之偏卒。荆芥散風熱而清血中之火。微上微下。防風散風邪而行周身之閉。驅風燥溼。生地黄涼血之聖劑。潤燥無雙。熟地黃補血最良。右莫能出。麻黃發痘而透滯。寒勝則宜。陳皮消痰而開逆氣。燥裂則微。升麻升散而上提。火炎必戒。白芍斂陰而退熱。莫投血熱。山甲力透重圍。其性燥裂。地龍無地不透。最能活

神散血。黃芪振氣虛之不克。排膿托裡而實表。人參補真元之不足。滋助五臟而內益。桂為參芪之使。壯血虛冷。附起虛脫之疴。回陽反本。白朮止吐瀉而健脾胃。茯苓利水道而滲溼。金銀花解痘後之餘毒。地骨皮退痘後之虛熱。茯神酸棗寧毒盡之心虛。訶子肉果塞脾虛之滑瀉。山藥助脾而益腎。米仁收溼而助

脾邪留下部。行走必需牛膝。毒存筋骨。通散無逾羌活。小柴解痘後之潮熱。引藥入肝而主升提。麥冬清心肺之煩渴。生津補液。非虛弗合。位參去浮游之火。解咽痛而快癍。山梔去曲折之火。清肺胃而止衄。木賊草退餘毒之目翳。甘菊花療痘毒之目疾。扁豆蓮肉助脾無噴無喜。竹葉燈心清心可出可入。藥品浩繁。惟貴精擇。純熟其性。泛應不竭。

救偏瑣言卷之二終

救偏瑣言

卷二

摘要

三

救偏瑣言卷之三

發熱論

痘疹未形。熱兆其先。何以其自熱始也。蓋痘本一先天毒火。毒而係乎先天。毒自內出。可知而且濟之於火。其為熱毒。又可知。熱毒發於內。而欲達於外。其有不熱者乎。然熱症繁多。何以別其為痘之熱也。毒一萌動。出乎包孕之地。其勢旁達。細察其毛竅。則聳簇按其肌肉。則矜惕唇口。必濡跳。手指微抽掣。有似驚意。但驚則顯見。而迫彼則隱微。更緩耳。其所以然者。

救偏瑣言

卷三

發熱論

一

以毒尋竅而出故也。其氣腥穢。冲冲而起。眼必昏沉。胃必嘔吐。氣濁而神不清。所以然者。以胃與目。神與氣。屬上焦。而主輕清。目更係五液水會之地。為腥穢所干。自搖動而不得清寧矣。凡發熱而有是象者。痘之熱也。古人驗中指獨自冷者。亦謂其中指通受納之關。胃為穢毒所衝。而故失其常也。又卜其兩耳紅筋必輕。紫筋必重。與夫耳眦冷熱之辨。亦為耳乃腎之竅。水受火之搏也。然有驗有不驗者。必合驗前象之為最確耳。寂無所感。痘自蔚然而萌動者。其象

如斯。若先感寒邪，必鼻流清涕，面頰青慘，翁翁發熱，不免於浙浙惡寒，頭疼拘縮，而無汗，啞兒烏知其疼，驗其眉愁是也。若感風熱，則面赤聲重，涕唾稠粘，氣粗鼻塞而氣熱，太陽筋惕，身有微汗。若傷飲食，胸腹按之必愁，彈之如鼓，口中噉腐酸臭，大便或閉或瀉，閉則轉矢氣極臭，瀉則如注，穢臭倍常，驚則面有青氣，但不惡寒，手足兢跳而不拘縮，卒然啼哭而若有所見，神情恍惚，如人捕捉，緊抱則安，稍動即悸，甚則或斜視或上竄，手足拘攣，角弓反張，四者皆客救偏瑣言 卷三 發熱論 二

順變而吉中不能無凶矣。若夫壯熱煩渴，或大便燥，或小水赤，或不耐衣被者，不必問客邪犯與不犯，熱象如是，痘自匪輕，難乎其為吉矣。至於熱如火，熾體膚更燥，發渴不已，口熱如爐，鼻燥唇裂，目紅頰赤，小便癢而大便閉者，此熱之盛而凶之至也。乃有偏體燔灼，而四肢則冷，體燥如炙，而頭汗如蒸，有靜則燥熱如炙，動即汗洩如油，唇口焦裂，舌起芒刺，口紅而拳毛倒豎，面赤而板硬如臄，鼻衄成流，溺血如膏，置身體于泥水之中，則快，嚙冰雪于咽喉之下，則爽，有一於此，是熱盛之劇窮凶之至，而與死幾鄰者也。又有骨節煩疼，腰如被杖，徹夜無眠，身無安放，靜則昏瞶如迷，躁則如魚失水，筋抽脈惕，甚至手足俱揚，皮毛刺痛，甚至衣衾難動，有叫喊而不休，有欲啼號而莫得，目閉者，終日不開，直視者，終夜不合，舌弄如蛇，天柱倒側，此等惡症，熱如炮烙者有之，頭溫足冷者有之，唇焦頰赤者有之，青慘黧滯者有之，即一體之中，寒熱相判者有之，陰陽殊絕者有之，殆不可以數紀也，所以然者，以毒火有隱見之分，非真

有寒熱之介也。迺若從前所論熱之有溫有壯。壯而有潤有燥。燥而有劇與不劇者。何以故。以毒火有輕重之別。在氣在血之不同耳。火毒初萌。有血當其先者。血當其先。則氣之受毒倍於血。毒所以有在氣在血之症也。血屬陰。以陰遇火。則自熱。火毒得其輕。則熱自透。而能和氣屬陽。以陽遇火。則熱自壯。火毒得其輕。則熱雖壯。而能潤。令重者而血當之。身之賴以滋養者。惟血。血為烈火煎熬。則血失其養。其熱自燥。而

救偏瑣言

卷三 發熱論

四

體不得潤矣。令重者而氣當之。身之賴以運行者。惟氣。氣為壯火所蝕。則氣失其運。而脈絡為之阻塞。遏鬱處則冷。衝突處則熱似火。汗如蒸矣。重極者而血當之。以有限之血。而抵無涯之火。猶杯水而敵車薪。鼎沸於內。則妄行空竅。蓄聚於中。則聚結成瘕矣。血至於瘀。而氣有不受困乎。尚與其能領毒而發見也。耶。不熱自有之矣。外見青紫如傷。藍斑如靨。是其驗也。重極者。而氣當之以陽剛之性。而搜烈毒之火。陽既亢而毒且厲。陽亢則熱極生寒。火極似水。毒厲則

動即攻。未幾欲潰。經絡隊道。悉為毒鋼。尚與其能蒸發而熾熱也乎。凡見悶亂無聲。面顏青黯。是其驗也。所以悶痘之難。不俟終日。總以無所容其發洩焉耳。故熱雖發始之症。而熱之輕重緩急。不可不知。輕者不治而自愈。緩者從容而可圖。重若忽而必敗。急若懈而何追。挽回調劑。古人必按痘之形色。而後推敲。施於緩者則可。其重且急者。痘雖未形。而見體之生命。已在涉春水而蹈虎尾。乘痘未及見。毒雖猛而尚未有定位。火雖烈而尚未及燎原。此誠轉危就

救偏瑣言

卷三 發熱論

五

安之機。起死回生之會也。必俟察形驗色。其勢已成而牢不可破矣。况乎形從氣見。色以血呈。欲卜形色之美惡。即氣血安危之機。而逆睹矣。欲察氣血之機。即發熱時之景象。而昭然矣。誰謂發端非究竟乎。火未至而先烟。雨將至而雲合。由來其機如此。得此攸關。於發熱時之調劑。不必求合于痘。而自中的。若泛以熱治。未有不致悞于重而急者矣。

附治驗

朱吉人兄小公郎甫及百日外。忽一夜身熱如焚。

躁亂不寧。次早舌卽有胎。乾燥如炙。口內如爐。頻頻乾嘔。筋抽脈惕。腹硬如石。而有痘象。余固知其惡痘將萌。烈毒沸湧。故發始便猖獗也。勢雖危篤。幸痘尚未見。挽回惟冀此耳。卽以黃連三分。石膏七分。大黃三分。佐以荆芥葛根地丁赤芍木通丹皮蟬蛻青皮。乘毒無定位時。連投二劑。勢不稍緩。照前方加生地錢許。又二劑而痘見矣。其細密如針砂。色甚乾紅。絕無生理。仍以前方用大黃七分。桑蟲一大枚。又二劑解毒垢甚多。三朝如針砂者。收偏瑣言 卷三 發熱治驗 六 惠迪堂

中。次見將針挑去。照前方調牛黃珠末分許。方得吮乳。諸症稍愈。十六朝予歸。徃視腦後與環跳起一大癰。前方加貝母羌活。減生地石膏乾葛。服至二十朝出膿收功。

又

仲文張兄。二公郎。癸未仲冬。忽身熱如火。神卽昏憤。舌刺如煤。唇口焦黑。身上如針刺血癍。不紀其數。溺血紅鮮。肉瞿筋惕。有若驚悸。固知其痘趨百竅。而然第此惡象。宛然一閻痘景色。斷非輕劑可

救偏瑣言

卷三

發熱治驗

七

挽。卽用石膏一两。大黃五錢。黃連三錢。生地一两。佐以青皮荆芥地丁丹皮。天寒稍配蜜炒麻黃三分。姜一片以行之。大劑灌下。卽嘔。仲老曰。奈何。余曰。毒火上衝。水火搏激。兩不相下。故爾任其嘔逆。彼上而我下之藥。一進。必受納矣。二劑。便覺稍差。漸而得進。直至第八劑。方全受納。如此大劑。服過十餘劑。方始見痘。及其見痘。可以數紀。唇舌猶然焦黑。溺血復然。至九朝後。焦唇始退。舌亦有津。年已八歲。問之方甚。神覺蘇醒。至十二朝後。尿

血得淡胃氣日開十六朝而全愈服過大黃十餘  
兩石膏生地約有二觔得以成功是早圖之一驗  
也。

又

竹溪沈公挹兄。小愛年及週歲。一日身熱如焚  
汗出如雨。兩目傍徨。如畏刀鋸。即用大黃四分。黃  
連三分。石膏二錢。餘佐以丹皮木通山查青皮蟬  
蛻。連進二服。次日神色定。放標數點。磊落分明。熱  
勢復然。又二劑熱和。神爽。痘甚稀疎。色亦頗潤。遂

救偏瑣言 卷三 發熱治驗 八

減苦寒蕩滌。以中和之劑。至八朝漿足回好。

升發論

升者提清氣以上達也。發者開百竅以四播也。世俗  
但知以毒透毒。不知升發之義者也。痘自包孕之地  
萌動而起。達於肌肉。見於皮毛。一皆從竅而出。竅有  
阻塞則毒無出路矣。周於一身。徧於四體。一以頭面  
為主。清氣不升。則元首蒙蔽矣。舍輕淺之痘。不得沾  
沾以逐毒為發也。故古人有以升麻葛根湯。謂已發  
未發俱可用。以葛根能開洩腠理。疏暢百竅。痘得以

縱步而出。升應能提氣上升。透發頭面。痘得以擎領  
提綱。其不專以毒逐毒可知。然成方又不可拘者。愚  
謂痘犯氣虛。腠理不疏而自洩。必用乾葛。則重洩其  
表。神氣愈虛。痘反餒而不振矣。痘犯血熱。毒火不提  
而上竄。必用升麻。則更提其餒。俾毒愈湧。致毒反攻  
頭面矣。又有謂一見紅點便忌升麻。乾葛。愚謂氣虛  
則氣下陷。虛劇者升之而猶未能上達。法必得補而  
可克。并升麻且不敢用。痘將何由而起。血熱則表裏  
壅遏。熱劇者疏之而還虞未瘳。法必攻之而得暢。并

救偏瑣言 卷三 升發論 九

乾葛且不敢用。臭毒何自而鬆。此兩說者。各執一定  
見而不通變學。者不可以概法也。况升發之妙。亦非  
僅以提為升。以疏為發。疏則第可以逐寒邪。散風熱。  
提則第可以助清陽。發真氣。不惟真虛真寒。惡火惡  
毒所不能調劑。即如飲食停滯。暑溼穢氣。孰非阻竅  
脈。而碍氣道者。其得以兼攝否耶。存心於此道者。必  
審其何痘宜疏。當不虛其表。何痘宜升。當不提其毒。  
何痘宜升發。並行兩用。而兩得其效。何痘可以升發  
無籍。即得以無事為工。何痘宜寬中。何痘宜清徹。何

痘以不發為發。不以疏為例。何痘以不升為升。不以提為則。總令氣之得以直達。不為毒鋼。不為火蝕。不為邪鬱。不為穢閉。不使窒礙。不使消阻。得以拘領其毒而出。升發之梗概。庶乎其得之矣。得此機關。苦寒如芩連。辛熱如桂附。補塞如參芪。蕩滌如硝黃。何莫非升發之劑。此竅不得。山甲人牙。施於燥熱之兒。地龍尾血。投於寒凝之痘。桑蛀蟬蛻。隨痘皆宜。據日期而不敢多用。魚蝦雞笋。鑽瘡宜禁。凡遇痘而漫無區別。本透毒之利刃。與不能操刀者。而反割矣。若是則救偏瑣言 卷三 升發論 十

附治驗

先君治一痘憲副馮魯翁之孫。昌老之長公也。兩朝稠密無縫。皮薄色淡。身涼體靜。睡不令眼。神情困倦。而顏皓白。吐蛔數條而俱死。此虛寒而鄰於逆者也。先君即以保元湯加芩歸肉桂山甲數劑。而症僅中止。絕無起勢。仍以前方用參三錢。芪五

錢。外加熟附五分。日服二劑。六朝痘漸起。色漸紅。囊漸蒼老。肌體亦煖。參至四錢。芪六錢。附七分。喜便不瀉。更加推熱地黃半錢。鹿茸膏數匙。至十朝而漿得肥濃。精神漸劇。寢食俱安。十四朝回結收功。因痧乾燥。防其餘毒。以參歸化毒湯。重以忍冬膏調理而安。

又

孝廉嚴蔚翁。一公郎六歲丙戌仲夏見痘。乾紅色滯。頂陷不懸。身熱如烙。煩躁不寧。按其胸膈。愁痛。救偏瑣言 卷三 升發論 十一

口有噯腐氣。累日不起。此毒火伏於內。而中宮有停滯也。以大黃二錢。青皮錢許。兼之蟬蛻荆芥赤芍紅花地丁。外用山查一兩煎汁碗半。以代水。連投二劑。解宿毒甚多。痘即頓起。痘色嫩赤。仍用前方加黃連生地。漸漸放白。成漿。弟壯熱未和。虛餒尚在。前方貫至十二朝。而始收回脫。醫得以成功。又

孺山一故友鍾晉叔。有一小愛痘。值炎天受暑。煩擾非常。壯熱如焚。痘色乾紅。累日不起。海慈井



水不敢多與。僅一碗。便覺爽朗。求之不止。不覺飲及一斗。通身微汗。而神情始快。痘即隨起。色亦紅活。終以清火解毒收功。

又

韓太史一孫子。遽兄之公郎也。甫及週歲。忽一日身熱如烙。昏迷不醒。似驚非驚。而有痘象。余固知其必痘。却屬火裡苗之症。非輕緩之劑。所能取勝者。以大黃錢許。石膏黃連。佐以清透達表之味。連投二服。而痘遂見。勢亦減半。至三朝。痘頗稀朗。自起發以至結痂。無甚風波。而愈向非早為之計。而釀成之。殆有不可知之局矣。

疏表

發痘機關先辨表。表係痘瘡之門戶。表若無邪。莫過求表。若干邪無出路。疏表必等是何邪。不可混同無區別。胃寒清涕在隆冬。密炒麻黃蘇與芩。傷風涕唾必稠粘。羌活荆防可去風。風熱相兼身燥熱。面赤驕。驕口膩渴。前胡荆芥葛根宜。莫用辛香與燥溼。表症雖無痘不鬆。亦宜三味無他藥。痘如起發表邪清。不

救偏瑣言

卷三 痘疹治法

三

可過用。令肌洩。若還表虛。痘必痒。表若留邪。毒閉。亦有表清毒已透。痘出焮紅或紫色。此是血熱火熬。煎血中之火。當俾徹。荆芥一穗妙靈丹。徹始徹終。莫計日。

附治驗

一故友朱漢卿小公郎。痘稠密乾紅。一友以痘色乾滯。便以清火而兼升發。累日不起。予見鼻流清涕。體涼而且靜。時在春初。寒風凜凜。此熱毒輕而感寒重。毒火為外邪所閉也。以溫肌透毒散。陳皮。換荆芥。連投二劑。身體即煖。痘即頓起。次日鼻塞眼封。而痘發。身漸熱。痘日肥。清解治毒。調理收功。

又

韓聖翁五公郎痘。歲在己丑。稠密不鬆。眉愁腹痛。終夜不寐。其毒盛可知。蒼白乾滯涕唾稠粘。頭溫足冷。其毒為風邪阻塞可知。急疏風以開其牖。佐於攻毒以達其滯。至四朝。體漸熱。痘漸起。色漸紅。活。但眉宇不開。筋脈時惕。以活血驅毒。貫漿結。痂

救偏瑣言

卷三 痘疹治法

三

而回。

又

一兒痘在三朝。目紅鼻塞。時或噴涕。而涕甚濃。氣粗壯熱。痘甚稀。却色滯乾紅。無甚內症。呆呆不起。以大劑荆芥穗葛根前胡佐以黃芩牛旁木通丹皮蟬蛻青皮赤芍三劑後。而起勢沛然。六朝肥紅。綻突不假餘力。而順叙收回。

達裡

發痘機關當究裡。痘有未見先傷食。飲食內停中氣

救偏瑣言

卷三 達裡

古

阻轉運。失職脾困苦。縱然痘順亦淹遲。設一痘險尤難布。要識如何為內傷。口中噤腐氣非常。恒有吐瀉交相迫。亦有胸膈難按掌。有轉矢氣甚酸臭。指彈腹聲如悶鼓。此等內傷悉非輕。萊菔陳皮枳實若青皮等味佐桔梗。欲其下降必兼升。有升有降理自然。前胡下氣必推陳。木香厚朴姜砂類。氣味辛香與燥溫。症非燥渴方擬用。不可混作消食論。倘若無多僅帶。山查麥蘖亦足應。輕重寒熱最宜分。若還倒置痘光困。

附治驗

子三兒辛酉生。兩歲出痘。時在孟夏。壯熱昏迷。痘色乾紅。顆粒稠密。然得分珠。亦不脚塌。自放點。以至三朝。絕無起勢。惟氣粗。頰悶。轉矢氣極臭。細審未痘前。曾食何物。却食一苧頭圓子。重以枳實山查桔梗前胡廣皮麥芽。佐以赤芍蟬蛻牛旁。解結糞甚多。而痘即立起。且色亦紅潤。嗣後以痘甚密。功力雖難。而破竹之勢。始由此也。

又

救偏瑣言

卷三 達裡治驗

古

孝廉施禹翁。一季弟。幼時出痘。道中始事之友。極其升發。四朝毫無起勢。狂煩叫喊。至於咽啞。目時一上竄。始事者告辭去矣。子至。舉家號泣。以為必無生理。禹翁昆弟。篤於孝友。懇子甚切。子視痘雖不起。而根窠尚在。第稠密。蟬紅頂陷。乾滯。身體反涼。子按其胸膈。手足皆起。診其右手寸關。洪滑而實。子知其內傷太重。而致痘閉塞也。遂以枳實五錢。青皮前胡各三錢。桔梗五分。佐以荆芥蟬蛻。用山查二兩煎湯代水。是夜連進兩頭汁。次日午候又

一進一劑。下午一解。宿垢極多。痘前縱食雞肉。完而未變。將晚又解一次。仍前極多。痘即頓然起發。神即安靜。身體大熱。但痘色依然未轉。前因中宮停滯。故毒火內伏而不熱。今得通達。則火毒發見於外矣。神故得以安靜。嗣後以至結痂。終以涼血清解。痘漸紅活。漿漸肥濃。痂亦不薄。收功而愈。聊舉一二。以驗內傷阻痘者。

痘有首尾疏達訣

此疏達者。蓋言毒火有表裡俱盛。令首尾得以宣暢。不使壅遏。非指外感內傷也。

救偏瑣言

卷三 首尾疏達訣 共

痘有首尾宜疏達。不可專以痘初發。初發之時。固多宜漿期。斂候尤當察。若使表裏俱實。甚期在行漿正湧盛。疏表達裏不能。權變症百出。趨愈遠。安望成漿。

毒化膿壅。過毒火成內攻。漿期已得此中。痂期在收。痂又當。曉謾道回漿宜斂陰。宜疏反斂。終不清。致毒。暫連難跳脫。紅暈依然。加燥黑。輕則纏擾。重則斃。多因誤斂。少清微。謾道漿後。症無實。猶宜鬆達。反令寒毒。痂抓肉不能落。餘毒般般無休歇。輕發癩疔。重必悶。誤將惡毒為虛論。首尾疏達。痘如何。惡毒為殃。何

用多片雲能令清光。曉前後工夫。湏合符。有一不伴。知未靖。餘氛未殄。得非茶。症一炮熱。尚如曩。餘象。和平。那算康。痛苦神情。仍未釋。痘雖許。可怎無傷。漿信肥濃。形足。羨色猶嫩。亦可云祥。形色神情。俱似可。一惡當頭。未肯降。一惡深藏。根未拔。能虧九。切至淪亡。只此類。推餘可概。可拘末路。不通方。更有一痘。最為奇。痘出稀疎。綻且肥。起脹成漿。猶似順。順中倏爾變。崎蹊逆嫌。一點非虛話。結局雄疔。要害踞。有痘稠密。頗多虞。前局多虞。後轉移。從此遞看。渾似順。順中恒

救偏瑣言

卷三 首尾疏達訣 共

有伏干戈前途。棄甲從旁刺。結局疔癩。徧體羅。早覺尚能謀。治策。昧即攻心。殞刻期。惡毒難靖。猶難測。疏達工夫。可忽微。

附治驗

清溪章繼美。凡幾三旬矣。戊寅季冬。在外家王復之處。忽然腰痛。如杖昏憤。如迷。烈熱如炙。叩之不答。身體振振。肉囁筋惕。痘之象也。但腰如被杖。其痘必逆。猶幸其岳復老。信余甚專。余得即用大黃。山查各六錢。青皮羌活。桃仁各二錢。佐以荆芥。乾

葛佐參。乘痘未見。萌芽甫動。而預爲之地。庶望轉機于萬一。令一見痘。腎已受攻。無及矣。自申至卯。連服二頭汁。次早發出。如芥如砂。色更焦紫。白頭自足。并無容針之地。形色並逆。神情又惡。希與何在。予辭弗藥。主人哀懇甚切。情不容卻。遂用大黃八錢。石膏一兩。黃連二錢。生地兩半。佐以荆芥。羌活。葛根。牛旁。紅花。桃仁。蟬蛻等劑。加白頭地龍。每劑十條。又以猪尾膏半盞。和於藥內。連服二劑。次日其如芥如砂。并焦紫色。卽退顆粒。分明紅活。可

救偏瑣言

卷三

疏達治驗

六

觀竟若改換。但無空隙之地。神情猶然昏憤。身體仍灰如炮。生機却在手矣。翁婿原是甥舅。尊與堂與其兄公瑾皆至。且驚且駭。且信且疑。復老力主其事。云如是之痘。非如是治法。萬無生理。余亦爲熱腸身任。前方不減。不增。服至九朝。圓綻如珠。漿黃如蠟。神情與熱法終復如故。大便日去六七次。而不暢快。自發始以來。水米不沾。內遣老嫗問曰。不食可無恙乎。余曰。安穀則昌。絕穀則亡。寧得無恙。弟是痘不食。非以寒涼太過。非以蕩滌傷胃。而

然胃果受傷。氣血乏本。氣血果虛。漿從何自。此痘一本逆。所賴治於未發。臟腑不至潰敗。氣血得以融通。故得以成漿如此。然藥力僅可以搜刮隱伏之毒。未能驅除燔炙之火。上焦清氣。何能便徹。只恐梟惡之毒。終非藥力能淨爲畏耳。次日十朝。正面有回意。絕不思食。日期漸迫。用大黃石膏各一兩。生地兩半。黃連山查四錢。佐以荆芥。牛旁。甘草。十

救偏瑣言

卷三

疏達治驗

九

一值獻節。渴想年糕。因而無物不思。次日便飯便食。肉十五朝。回到諸症悉愈。痂落如松皮。後又滿口生疔。齒牙幾落。又服牛黃珠末。并黃連解毒湯十餘劑。而漸愈。月外復發。一身血瘋瘡。身無餘膚。將百日始得霍然。是痘疏表達裏。驅毒導痰。涼血清火。自巔至末。不撤一劑。而得收功。當危疑時。議論紛紛。有云平昔斷喪。腎虛而故腰痛者。有云稟氣素薄。而故神情昏倦者。有云從來肥甘不能入口。而胃弱者。有云如此稠密。氣血有限。何能當此蕩滌者。有云痘疹何曾有此治法。深以爲怪誕者。非

復翁明時局專信任亦何能奏效

又

一銓部錢樞翁老先生一愛。平時內熱瘦骨如柴。乙未仲夏出痘熱如炮熾。腹痛異常。身軀不能轉側。口穢噴人。紫滯稠密。但不細碎。惟幸初朝毒火雖惡。尚未有定位。以大黃四錢。石膏七錢。生地六錢。黃連一錢。佐以青皮。山查。荆芥。葛根。赤芍。桃仁。地丁。紅花。地龍。臨服和猪尾膏蓋許。以一方服。及六朝色漸肥。紅放白。腹痛稍緩。餘俱未減。仍用前方。至

救備瑣言

卷三 痘毒治驗

三

九朝漿甚充足。腹痛與熾熱較前尤甚。眼雖封而眼角流血。譫語不寐。飲食不思。前方增犀角倍加。大黃。生地。石膏。減猪尾血。臨服以化毒丹。調入牛黃一分。珠末二分。至十二朝。頭面發臭。方能進粥。碗許。一日三次。腹痛與熾熱依然。至十八朝而始跳脫。疏表達裏涼血導瘀清火驅毒。自始以至終。一方成之。是首尾疏達。又一驗也。如此治驗。難以數紀。聊附一二。以證其大畧耳。

痘有不宜疏達訣

痘有始終忌疏達。不第行漿收靨時。症犯氣虛難振。作發始須當預護持。痘賴氣領方能透。虛更疏。今有何寶。毛竅况以氣為衛。衛已疏洩。何堪再。縱有客感。謂傷氣。非若表實傷風例。疏邪還宜兼實表。竟爾疏邪焉得起。氣能克塞。令毒暢。氣虛裏實猶希旺。藉令通達。混同施。裏若虧。今損何地。即有停滯。謂傷脾。非若脾強傷食例。消食毋使脾受虧。脾氣虛虧痘必危。莫謂放標功有待。始之不謹終何賴。

附治驗

救備瑣言

卷三 不宜疏達訣

三

無奇姚兄。幼時於壬戌之秋。忽一夜吐瀉三十餘次。口不能合。兩目失神。絕不身熱。痘出驀然。若不知何自而致。痘甚細密。而且一齊湧出。僅得分珠。却無空隙之地。顆粒固滿。却似水珠。有頂無盤。乃劇虛劇寒之症。與逆相去幾希矣。症象國危。所希異者。氣血尚未離散。及早圖之。或可挽回。疏表達裏之劑。一不相及。初朝即用保元湯。加白朮。木香。當歸。熟地。訶子。如是之劑。服至六朝。僅得中守而已。倍加參芪。外用鹿茸肉桂。至八九朝。身得溫暖。

窠囊覺厚。漿水及半。但不蒼老。前方減鹿茸肉桂  
訶子。加白芍茯苓金銀花。神日開爽。乳食大進。而  
回。痲終軟薄。可見虛劇之症。首尾溫補。尚不滿其  
分量。其可循規則而疏達也乎。第今無是症矣。

救偏瑣言卷之四

放點症治準

痘未見點。豫卜其為吉為凶。惟於神情症象而求之。  
厥理而參之。然非極美極惡者。未易鏡其將來也。放  
點則有形可察。有色可詳。順逆險三途。昭然而覩矣。  
蓋形成於氣色。根乎血氣。正則拘領其毒。毒有所拘。  
痘雖密。而得定其位。不糊模。不細碎。顆粒分明。而脚  
必周淨。毒有所領。毒易達于外。痘雖密。頂綻矢而囊  
若老。此氣得其正。而形其無間也。血正則榮載其毒。

救偏瑣言

卷四

放點治準

毒有所載。痘雖密。而能安其位。根有盤助。囊厚其藏。  
而饒涵泳。毒受其榮。痘不燥濇。形雖密。淡而不白。紅  
而不嬌。此血得其正。而色其無咎也。反此則氣血反  
受毒制。可知。有表裡俱虛。而出不快者。有表裡俱實。  
而毒壅滯者。有氣血虛。餒皮薄。而色白者。有毒火熾。  
盛形惡。而色惡者。千形萬態。總由此出。詳別證治於  
後。

放點於熱三日後。身涼神爽。顆粒鬆朗。淡紅蒼老。其  
餘可知為順。不必服藥。

放點熱不一日烈熱乾炮帶火而出不論稀密色一  
紫艷或嫩紅其他可知此梟毒烈火及早圍之不  
致日後內潰急以攻毒清火帶清肌透發不可以  
初見而翫忽也

放點有身不見熱神情困倦偶因四旁痘氣相感而  
出見痘色淡皮薄此膜裡不密肌肉不固不能約  
束而然也不宜疏散防日後有痒癩之患以調中  
湯主之

放點有先因吐瀉困倦頭溫足冷適感時行而出色

救偏瑣言 卷四 放點治毒

二

淡囊薄而淹滯不起者此氣虛不振不能透發宜  
以升發中即兼治本免日後有倒陷之患

放點有熱如火熾紫艷嫩紅神情躁亂累日不鬆而  
不起者急宜攻毒涼血清火疏肌以透之

放點有僅數粒色不甚紅亦有甚白身體溫和神情

清爽不語者目之為順不知其囊窠累日不見粗

壯痘色不見光肥浮沈其間名為等伴痘先見數

點者根痘也四五日後身必忽然大熱神昏昏

大隊梟毒一時湧出其痘稠密紫黯大都不起明

者即與桃破吮鬆其毒以藥胭脂貼之內服  
膏通天散活血疏透來勢猖狂法必蕩滌庶可救  
放點有毒火雄烈氣血不能約束一齊湧出火熱如  
焚急宜攻毒涼血清火

放點熱猶火灼乾燥如烟神情躁亂不論稀稠急宜  
攻毒涼血清肌散火緩則毒即內攻無及矣

放點痘色乾滯紫紅身宜壯熱而反涼者以毒火遏  
滯于內非真涼也急宜散火疏肌活血透發俟火  
透而後清涼不宜遽與清火

救偏瑣言 卷四 放點治毒

三

惠迪堂

放點痘其稀疎却聞蚤癩或聞紫般有若紫背浮萍  
或犯貫珠堆簇神情愁悶及諸黯痛楚之類多因  
惡毒盤據于內表裡故不相符不可因其稀而致  
忽也即當攻其伏毒鬆肌活血

放點有唇烈掀腫甚有焦黑如煤或口中穢氣不堪

或舌起芒刺此毒火犯胃急宜重以清火涼血解

毒重必攻之

放點皮毛刺痛衣衾苦動此毒癩于肺急宜重以攻

毒鬆肌透發失治至行漿時膿根不起必至燥痒

而斃

放點筋抽脈嘔叫喊不已者此伏毒在肝宜疏肝毒  
重必宜攻有咬牙者亦如之。

放點諸語狂煩如見鬼祟此毒火迷心宜涼血清火  
兼之身熱如烙或諸般痛楚者尤宜攻毒。

放點骨節煩疼更有腰如被杖此毒在于腎大都  
起攻毒刻不容緩。

放點睛毛倒豎目胞下有血絲如線絆於其處或腹  
痛不已身熱如火股冷如冰此毒伏于脾急宜攻

救偏瑣言

卷四 放點治準

四

惠迪堂

毒兼清肌透發。

放點小水有如醃魚汁有鮮血如紅花膏此毒火下

注小腸急宜攻毒涼血鼻衄成流者亦然。

放點大便欲解不解或解時疾首蹙額所解如漆如  
膠有若瘀血有若羊糞者此毒注大腸急宜攻毒

因勢而利導之。

放點大便暴注如傾有純解清水而躁亂者此火擾

大腸宜分理涼大腸五臟伏火伏毒惟下利稍輕

以大腸為傳送之地雖滯艱塞終得因勢利導

放點顆粒稀疎囊窠飽滿而色有碧紅有紫艷有腹

色此毒火在於血分也宜解血分之毒清血中之  
火。

放點有疔附甚厚而囊窠不鬆或平或陷此血至而  
氣不至也宜寬氣道鬆肌疏透兼他症凶暴者必

下之。

放點有邪殼圓滿而盤助乾滯此氣至而血不至也  
宜清滌活血兼他症猖狂者必攻之。

放點有外感未愈或風或寒或風熱或輕或重有累

救偏瑣言

卷四 放點治準

五

惠迪堂

日不起有起而不快此為表實審其何邪而疏解  
之令毒有出路。

放點有飲食未消中宮阻塞口中噉腐酸臭腹內飽

悶痘出不快者是為裡實急宜消化令得宣暢放

點證治之大畧也由此而推之其餘可概矣。

稀有內症

痘欲其稀稀則毒輕不知稀而有內症非真稀也透

於外其毒則為痘藏於中其毒則見症或躁亂或痛

楚或乾嘔或昏迷或失血或叫喊或洞瀉或艱塞或



大渴不已。或脈惕筋抽。或咬牙弄舌。內症甚多。類此是也。無論氣血不足。即使有餘。亦為毒所錮閉。而陷於無用。於囊窠不能鬆綻。痘色不能紅活。非血鬱而白。即乾紅而滯。或紫艷或深紅。或間痲點。唇黑如煤。面黯如炸。非壯熱如炮。即身涼而躁。痘即可以數紀。亦何貴其稀也。儘有頂綻如珠。光明潤澤。一犯內症。便非真稀。明者燭其故。隨其症之所至。或宜疏。或宜透。或宜清火。或宜攻毒。或宜破瘀。或宜透發。乘毒未張。大及早圖之。容可保全生命矣。

救偏瑣言

卷四 稀有內症

六

惠迪堂

總 外稀尤貴內安和 內不安和稀用何訣 重必內攻輕內擾 蚤圖猶得幸無疔

附一忽視之戒

逢仲老先生。先朝時有一公。即痘止八十三顆。道中始事者。以痘甚稀。僅以輕緩之劑。按日期規則以治之。十六朝。咸以為功成矣。延至廿六朝。逢老意中未能釋然。予適雉城歸。邀予往視。但見兩目傍徨。如臨白刃。乾嘔不止。愁楚非常。陰囊兩傍。俱有一小疔。如桃核大。隱于肌肉之下。色且黑黯。此

餘毒悶焉者也。予辭弗藥。是晚即斃。

又 治驗

一友徐君一愛。未及半週。而痘甚稀。頗紅活。宛然而紅暈。焮赤痲甚。焦燥。腰間與環跳處。發出兩瘡。如掌大。板硬如石。掀腫如拳。其餘小疔。不計其數。痛楚甚慘。以必勝湯日服二劑。外以胭脂調入化毒丹貼之。十朝至十六朝。以一方治之。疔漸起漸退。二瘡潰而成膿。後以忍冬解毒湯。加地丁當歸。

救偏瑣言

卷四 稀有內症

七

惠迪堂

調治收功。

又

一范氏女三歲。痘可以數紀。而且綻突如珠。紅潤可觀。據痘似可弗藥。究其烈熱如炮。晝夜叫喊不已。左目掀腫如桃。以大黄生地荆芥甘菊赤芍黃連木通地丁青皮。自三朝服及十四朝始得身涼。麻靜回好。目亦無恙。如是之痘不能枚舉。聊紀一二。以驗夫畧云爾。

密有克肥

痘畏其密。密則毒盛。不知密得克肥。其毒雖盛。而氣血頗饒。氣血雖饒。而或陷害於毒。亦何能透發于外。而視其克肥。今克肥則氣血不為毒害。可知克肥則氣血又得以制其毒。而化毒又可知。其毒雖盛。何畏焉。外有熱熾如火。或絳紅或紫艷。或煩躁。痘雖克肥。毒亦猛烈。較之深藏隱伏者。彼得發見于外耳。又不待概以克肥而目之也。

總 毒無寒滯痘克肥 痘得克肥正有餘

訣 更得淡紅滋潤色 縱然稠密莫躊躇

救偏瑣言 卷四 客有克肥 八 惠迪堂

附治驗

雒城臧專老銓部明遠公之子也。幼時出痘于壬戌。甚密而得克肥。公以稠密憂虞。余曰。痘雖密。窠粒綻突。色不乾滯。慮不在此。所可虞者。近于紫艷。身體太熱耳。以清熱解毒湯。日進二劑。五朝大解。一次餘無別症。未思飲食。次日而藥即老。紅暈歛。赤大便。又三日不解。恐其成火。禍症謂主翁曰。急宜潤其大便。使毒以利鬆為妙。成一火。禍餘毒太重矣。前方重以生地滑石兩許。更加黃芩。藥未及

熱而燥。痒即發。舉家徬徨。急服之。更餘解。黑糞極臭。極硬。即爽快。熟睡。紅盤漸淡。漸收。飲食大進。以忍冬解毒湯調治而愈。

陷有毒滯

氣不能克。則頂陷。陷則虛無疑矣。然必皮薄色淡。方合虛局。若囊厚色蒼。氣之本體已具。未有氣虛而囊不薄。色不嫩者也。以氣為壯。火所蝕。壅遏不能上達。以故陷而不滿。不惟囊厚而且臃腫。不惟色老而且乾滯。尚有別症可參。與虛陷自是迥別。每見時師不審其由。一見頂陷。便為氣虛。亦不識根脚之如何為。敏如何為。癩如何為。根鬆如何為。毒絆因其頂陷。連脚亦混言之曰。此痘脚癩頂陷。并血亦牽在其中。則曰氣血兩虛。必須大補。買買焉。竟以參芪保元固本。以實投實。致誤者不可勝紀矣。悲夫。

總 痘瘡頂陷若茱萸 囊老乾紅豈是虛

訣 氣因毒滯無能峻 毒得鬆分氣自尊

附治驗

竹溪沈公漸見。四公郎二歲時痘。熱不三日。放標

于足脛。歪斜闊大如螺。屬緊貼皮肉。週身細密無空隙。次日蘇沙登錢。間于通身。惡形不計其數。且痘色與肉色一般。肌膚板實無粒不陷。叫哭不已。脈惕筋抽。是毒滯血鬱之痘也。與逆之相去間不一寸矣。以必勝湯減桃仁生地加當歸。日進二劑。不見起發。乳不及半。大便去五六次。大棗蟲目以四枚。六朝稍起而未鬆。減蟬蛻葛根。倍增大黃。大便日去十餘次。至八朝漸鬆。漸紅。身漸熱。成粒者起。綻成碗者鬆。泛如毬。始成膿。乳食大進。未得安。

救偏瑣言

卷四 首有毒帶

十

惠迪堂

又

驥村錢公劉兄。乃弟東白先生之幼子也。痘及七朝。行漿期矣。通身頂陷紫滯。其環跳處堆聚如燕窩。俱板實不鬆。眼與鼻若未痘者然。并其頭面俱板實。晝夜躁亂。殆無寧刻。時常乾嘔。筋脈抽惕。此毒伏于內。氣壅血滯故耳。始其事者。謝絕去矣。余以大黃四錢。紅花生地。蟬蛻牛旁地。丁荊芥。佻參。

青皮黃連。外加白項地龍五條。服過三劑。大便日去三四次。痘稍有起勢。服及十劑。大便方去十五六次。所解皆是黑垢。如膠漆。臭惡無倫。通身頭面頓起脹。即時眼封鼻塞。而漿其沛然矣。其環跳堆聚者。尚未鬆泛。仍以此方服。至次日十二朝。大解約去二十餘次。僅似清水。一老姬驚惶而問曰。如此頻解。可無害乎。予荅曰。痘今成膿。前躁亂。今安靜。皆便中來也。可許收功乎。予曰。必得環跳穴處成漿結痂。飲食能進。便許無恙矣。至十四朝。醫上。

救偏瑣言

卷四 首有毒帶

十

惠迪堂

收功

綻有囊薄

氣尊於中則綻。綻則氣似足。然綻而不蒼。是空擡虛殼也。綻何取焉。氣虛不能衛護。邪殼隨毒而起。雖若圓滿而實飄薄。其色淡白。雖紅亦嫩。必溫涼。人必懶倦。無論氣虛不實。其血亦自不足。不得日其磊落。而可喜也。其本質與嬌紅同體。薄似浮衣。症自迥別。

乘氣血未至離散及時早圖未始不可以轉移也不則必至痒癩而斃。

總 氣虛頂綻痘空囊 綻若囊空反不祥

訣 浮擡不實成何用 及早扶元免破傷

附治驗

雉城臧君陶兄幼時出痘于庚申甚稠密甫及三朝即起綻如珠囊窠飄薄歸附不厚不甚安靜身體微熱四朝即用保元湯加芎歸熟地六朝漸漸肥紅八朝囊漸蒼老漿未及半大便不實而漿停

救偏瑣言 卷四 按有囊薄 七 惠迪堂

重劑參芪加川芎鹿茸膏木香白芷獎得克足後

調理收功。

薄有浮衣

痘瘡皮薄自是氣虛蓋皮毛屬肺肺主氣痘之囊窠厚薄頂綻頂陷蒼老嫩嫩皆氣主之未有皮薄而氣不虛者也獨有浮衣則不然毒火猛烈衝突皮膚其苦皮隨其炮熾而起如湯火泡燃之象較之氣虛之其薄更有甚焉者孰知其本然囊窠尚伏而未起毒火一清本體自透漸成蒼老然果何以辨其為浮

衣也其道一以貫之氣虛之薄其體自涼其盤自淡其神必倦口不膳渴大小便如常諸凡火象自爾不犯是為真薄若盤暈赤躁渴神煩身熱如焚或小便沁紅大便閉結或傾腸直注不必一一反是有一

二千值確烈火無逃者餘即有似虛似寒問乎其間正其熱劇隱伏之故非雙關兩屬之症也若以氣虛治助其烈火閉其毛竅不得發洩其外浮衣勢必破碎如乾豆皮肉囊肉色燥赤如剝兔并空隙之地亦散漫游紅煩躁擾亂而莫可救藥矣似是而非可

救偏瑣言 卷四 薄有浮衣 七 惠迪堂

不明辯也乎。

總 皮薄身涼屬氣虛 皮毛火逼起浮衣

訣 窠囊毒湧同於薄 一得清肌即轉移

附治驗

後林潘中山兄幼時痘症屬此囊似天泡之薄紅暈紫如霞徹夜無眠身熱如火渠尊公宗老在江右任所內與乳母深以皮薄為不足傍徨無主予力辨其故而始信即用黃連犀角大劑生地佐以荆芥丹皮蟬蛻牛蒡臨服調牛黃一分自第二

朝服至六朝漸漸蒼老散漫遊紅亦漸歸附根盤  
圓淨頂白根紅仍以前方服至九朝膿漿滿足前  
方加金銀花伍參始終以涼血清火解毒收功而  
脾脫痂之後尚多餘火一路清解霍然

又

予一鄉親年十七。功力過人。忽一日身熱昏迷。週  
時即痘一齊湧出。稠密無空地。形與色宛似水珠。  
但根窠結卓。呼吸之氣甚雄。薄之非因虛也。明矣。  
平昔勇力。無論矣。其所以然者。氣與血均為毒閉。

救偏瑣言

卷四 毒有浮衣

齒

惠迪堂

兩不至之故也。以荆芥葛根赤芍紅花木通地丁  
紫草重以青皮。外以山查二兩煎湯代水。日服三  
劑。次日頓然蒼老。第四日即頂白根紅。復用前方。  
七朝漿足飽滿。其體原厚。緣為毒過。種種故爾。一  
開其牖。正氣勃然莫禦矣。兩痘浮衣則同。一為火  
炮氣蝕。故壯熱遊紅。一為毒湧血鬱。故昏迷色白。  
一涼血清火。一鬆毒活血。各究其致。遊紅者歛色。  
白者紅。囊窠均厚矣。

平扁與不鬆辨

何為不鬆。板實而不暢滿也。何為平扁。餒乏而不克  
拓也。其形若似。其致不同。一屬于虛。一屬于實。然實  
亦有不同。一有可生。一有必斃。囊窠板實。氣為毒滯。  
以故不能暢滿。若血猶歸附。受困惟在于氣。治其  
毒。毒殺其勢。氣得以伸。其轉運血。因以佐其流通。氣  
運血隨。而痘自鬆。其可生者此耳。令氣血俱為遏鬱。  
者。囊固不鬆。根亦無暈。所謂痘色與肉色一般。此氣  
血俱不至之痘也。無可救藥。如身涼人靜。囊軟色淡。  
絕無乾燥壅滯之象。是謂平扁。由氣虛而不能峻頂。

救偏瑣言

卷四 平扁與不鬆辨

五

惠迪堂

總 毒滯囊窠謂不鬆 氣虛平扁莫能克

訣 不鬆形色無柔嫩 平扁何曾有板臃

附平扁治驗

烏程陳大尹。乙巳歲。一公孫。痘稠密。乾紅始任事。  
者有三人焉。先以升發。後以涼解。五朝頂平囊扁。  
七朝眼有開意。鼻將有息。三人辭陳侯而去。延先  
君以決生死。先君驗其頭溫足冷。非熱毒可知。而

且身安體靜。毒已盡行于肌表。又可知。曰此氣血虛餒。非毒滯不鬆之謂也。陳侯意中以為必斃。問先君曰。先生可挽回萬一乎。先君荅曰。痘瘡放點。以至落痂。一以氣血終始其功。氣血克達。則得以領毒而起。脹氣血鼓盪。則得以化毒而成漿。氣血還源。則得以解毒而落膿。今痘不起。脹猶之更籌。一籌籌得。依刻而起。非籌日。起也。必需漏水下壺。更籌得起。論及於此。陳侯大悅。先君以參五錢。芪八錢。鹿茸膏半盞。佐以芫歸淮熟地。少加肉桂。連

救備瑣言

卷四

平扁與不鬆驗

共

惠迪堂

不鬆治驗

孝廉王遇老。一小公郎。甫三歲。痘在五朝。通身稠密。全不起脹。人不狂躁。熱亦不甚。有似餒而不克。余按其皮肉。則板。探其口內。如脂。而多乾。嘔。則知其毒壅于內外。故不能起。非氣虛不振之論也。以大黃為君。佐以疏表活血之劑。至臨服時。復特疑而問曰。毒滯攻之固其宜矣。萬一精神亦從而蕩

焉奈何。余曰。妄投則然。對症不惟不損。正以養精神之地也。二劑服後。便有起勢。乾嘔減半。而身反熱矣。是毒透達之象也。前方加黃連生地。服至十二朝後。以忍冬解毒湯而愈。

又

春元馮孝老。一小愛。三歲痘甚密。八朝絕不起脹。頂陷色滯。筋抽脈惕。日夜不寧。頻頻乾嘔。大便日去二三次。宛似一內虛平扁之症。始事者謝絕去矣。舉家哀號待斃。余視之。頂雖陷而板實。色雖不

救備瑣言

卷四

不鬆治驗

七

惠迪堂

榮而紫黯。未有內虛而形板實者也。而况紫黯其色乎。至于種種見症。皆毒火發洩無門之象。余以大黃青皮山查達其裡。荆芥牛旁桑蟲疏其表。紅花桃仁赤芍猪尾膏。以導其瘀。黃連石膏生地以清火涼血。二劑稍有轉機。又二劑更用化毒丹。調入牛黃珠末。以化毒清火。大便日去十餘次。多而且暢。穢垢般般。頂即起。盤即潤。漿亦迅速。餘症未能跳脫。首尾一方。至二十朝而始霍然收功。

氣拘與毒辨

上文平扁與不鬆指痘之窠囊而言此拘與絆指痘之根脚而言也根主盤暈而屬血血隨氣以為通塞氣得其令則毒受制於氣氣能以蓄血定位拘斂其根不使旁溢盤暈能圓壯而紅潤是氣交則圓必周淨之謂也是為氣拘若氣失其令受制于毒氣為毒錮窠囊固不得鬆而盤亦緊束如籬按之結硬則根無盤暈矣是痘神情大都躁亂而體則不熱者此屬不治所謂陽毒易治陰毒難理是症無治驗

總 毒絆根窠似氣拘 氣拘盤蓄痘克肥

救偏瑣言

卷四

氣拘與毒絆辨

六

惠迪堂

訣 絆其緊束根堅硬 并亦無盤淚必揮

嬌紅非血熱辨

紅者血之體也血因火動而呈其色也痘不遇火雖紅必淡紅則為火迫矣故古人有言曰紅屬血熱良有以也蓋指紅深者而言非所云嬌也嬌則氣固不足連血亦虛無幾之血為無根之火遊行於皮膚間故雖紅而實嬌口必不膩熱必不壯囊窠不能厚日後必至敗于痒漏其痘最惡所以謂紅而嫩不若白而老嫩者嬌之謂也

總 痘令深紅是火炎 水紅櫃子又

訣 血虛氣弱嬌似嫩 皮薄漿清痒必纏

附治驗

戊午一沈氏子痘密而紅色嫩而薄身不甚熱察其神情內症絕無隱伏深藏之毒先以疏透四朝而窠囊悉起即以參茸歸淮熟地甘草山查日進二劑七朝漸蒼次日漿行十朝漿頗膩而不能老寢食亦安減血藥加白朮山藥茯苓金銀花調治收功自甲子以來是症百無其一矣

救偏瑣言

卷四

嬌紅非血熱辨

九

惠迪堂

血鬱非氣虛辨

白屬氣虛自古言之何以既白矣而云非虛也蓋血著于外則紅鬱于內則白血受毒鬱則血不能灌輸于痘而潛伏于內所謂血不至之痘也然其空隙之地必有硃砂斑點雜于其中即未必其然或有數點紫滯乾紅而露其朕兆者即痘無可憑或神情躁亂唇口焦裂渴膩如脂或衄血溺血舌弄如蛇之類色雖隱伏端倪自見若以氣虛治接於丁香姜桂之屬不償其而偏體焦紫矣

總 毒壅血鬱不流通 血靜難呈載毒功

訣 白卽似虛機自露 細心參合掩何從

附治驗

孝廉王含叔。三歲一愛痘。方見點。卽便咬牙。周身痘色俱白。宛似氣虛。探其口。膩如脂。背上有三四點。紫黯乾紅者。微露其端。則知其闕。牙者。肝腎之毒火也。色白者。血爲毒鬱而然也。以活血散火。疏肌透發之劑。痘色漸紅。但紅而不潤。顆粒不鬆。頻頻乾嘔。夜不成寐。三朝用黃連生地丹皮牛旁荆

救偏瑣言 卷四 血鬱非氣虛辨 辛 惠迪堂

芥木通紅花青皮蟬蛻山查臨服和猪尾膏半盞。日進二服。色頓礬紅而未活。唇口漸黑如煤。前方倍用黃連生地加滑石地丁。外以牛黃七厘并猪尾膏服至七朝。色方紅潤。頭面放白。乾嘔減半。大便日去四五次。十朝漿亦堪回。唇幾已脫。照前方至十二朝。唇復焦黑。痂老而燥。仍復咬牙。大便日解十餘次。絕不思食。前方大劑生地加石膏。日進二服。牛黃每服一分。珠末二分。猪尾膏亦如前。至十五朝。鉄嘴復退。終不思食。大便約去三十餘度。

痂落八九。四肢強直。仰卧如尸。十六朝。唇口又黑。

咬牙比前更甚。大便無度。俱如膠漆。或如藥汁。點

乳不進。以蓮肉紅棗扁豆煮濃汁。灌入其口。嚥下

而此汁卽出如漏。乳母以寒藥太過。脾氣損傷。如

此皆有怨言。主人明理。謂此藥不投。何能起發。以

至落痂。第痂已落。何復如此。卽余之故。予曰。痘貴

乎終。以餘毒脫卸之難也。若餘毒內攻。事已去矣。

餘毒得透。可無虞矣。其餘毒必結于大腸。而故暴

利如傾。又結于肝。而故咬牙不已。不則何以唇口

救偏瑣言 卷四 血鬱非氣虛 壬 惠迪堂

猶如乾漆。三退而三結也。必得內毒成熟。有膿血

便出。方可保全。然得精神有三四日。可支內毒一

二日。可熟便妙。是日十八朝矣。以牛黃七分。珠末

一錢四分。爲兩服。蜜汁調下。傍晚解紫血甚多。逾

時。夾膿夾血。倍于初次。卽睡去。至夜便尋乳食。咬

牙頓止。唇口鬆退。神卽蘇爽。至天明解一硬黑糞

如石。大便五日不解。乳食大進。收功而愈。



救偏瑣言卷之五

起脹證治準

痘之根透則為起。囊綻則為脹。起居先而脹繼之者也。痘初放點其粒如菽。暹及五朝前後表裏得以無邪。痘瘡不至偏陷。縱步而出。根透囊綻。救而至於如荳。是謂起脹。毒其盡行於肌表矣。以毒達於外。痘故得以起脹也。其象眼封鼻塞氣尊血附頂白根紅白而且肥。紅而能淡。光壯如珠。身體溫和。神清氣爽。飲食二便如常。是起脹之順者。也不須

救偏瑣言

卷五 起脹治準

一

惠迪堂

服藥。

起脹時若表邪未盡。致毒不能盡行肌表。向來痰唾稠粘。或鼻流清涕。或面赤多淚。或面青聲重。或翁翁發熱。或浙浙惡寒。或毫竅直豎。至此猶未霍然。痘必未能起脹。仍必疏肌達表而兼升發。古人言一見紅點便忌升麻乾葛。不可拘也。

起脹時若有宿食未消。致毒阻塞于內。向來胸膈不寬。按之眉愁。口中噯腐酸臭。轉矢氣極臭。至此猶未跳脫。痘必應至不至。仍以寬中化食而兼升發。

古人言治雜症一寸。痘子落後一丈不可訓也。

起脹時表裏無邪。雖無阻礙。氣虛血弱。痘雖起脹而少光壯。淡白而不蒼老。眼不甚封。鼻不甚塞。脚雖不塌。頂不能綻。體靜溫和者。稍稍解毒中。即當漸補氣血。溫中保脾。如保元湯加芎歸木香姜蘇白芷山查。量用解毒一二味。以豫防漿後泄瀉倒陷之患。

起脹時有氣血虛劇。不惟溫而且冷。不但靜而且倦。不惟白而更嫩。不但不老而且皺薄。頂陷而兼脚

救偏瑣言

卷五 起脹治準

二

惠迪堂

痛重。語聲輕。眼不能封。鼻不能塞。淹淹不振。而不起脹者。即當大劑保元湯加芎歸鹿茸。以峻補氣血。或丁香桂附以振作元陽。參芪太重。必須濟以山查。以此味能行參芪之滯。不減參芪之力。此用藥相濟之法。不可不知。桂附量視緩急。參芪鹿茸遲則始無及矣。此偏於不及者大畧治法也。

起脹時至若毒火猛烈。更有伏火伏毒。鬱于皮毛。痛如膚刺。衣衾難動。期雖起脹。竟累日壅遏者。有毒。參陽位。面目焮腫而痘不腫者。有毒滯于頂。根起

而囊不鬆者。有一身之內。通塞不均。衝突處則重。頂甚則湧泡。過薄處。或平或陷。甚至連顆囊亦板實者。亦有窠粒周圍貼抱一圈。狀如珠殼者。有毒擁皮肉。痘雖粗大板而平者。此等梟毒在于氣分。不拘痘色紅與白。紫與黯。必用蕩滌之劑。佐以青皮赤芍荆芥牛旁木通蟬蛻。用山查兩許煎湯代水以治之。重以乘蟲透發。庶氣不爲毒錮。氣得以暢達而痘起脹矣。古人言氣不可虧。不可法也。

起脹時。有諸痘未漿。并有未及放白。數點先已黃熟。收偏瑣言 卷五 起脹治準 三

者。有半爲熱毒燔灼。半爲伏毒錮閉。一則鋪紅肆溢。一則痘若水珠者。有通身或紫黯。或紫艷。或嫩紅。或紫紅。或晦色。或間硃砂斑點。或紫背浮津。或失血空窠者。此等熱毒在于血分。不拘痘之日期。亦必以蕩滌爲主。佐以桃仁赤芍紫草地丁丹皮荆芥木通猪尾膏地龍。以散其凝結之毒。庶血不爲毒瘀。得以通達而痘自起脹矣。古人言補血之功難。須當養于平素之說。不可泥也。假令毒火發見于外。熱如火熾。煩渴不已。口熱如爐。

不拘在氣在血。均以石膏芩連犀角。或四聖散。金汁等類。以剽其陽光烈火。庶氣血兩不受炙。痘其得以起脹而榮潤矣。古人言疹愛清涼。痘要溫。不。得以此痘律也。

起脹時。有根起而囊少脹。起脹而或少克。克而色或少潤。潤而熱。有未和。是毒火未得宣暢。概以疏透清解。固無事于蕩滌。亦不必過以寒涼。尤不宜妄用辛熱。亦不當便用溫補。但以連翹牛旁生地丹皮紅花山查甘草荆芥穗之類。稍以白芷姜蘇。收偏瑣言 卷五 起脹治準 四

蟲古米以催漿。拓頂火雖不熾。清之則熱得以和平。色得以滋潤。行漿而漿得以洋溢。毒雖不盛。解之則囊得以鬆泛。毒得以化漿。至收結而不爲餘毒纏擾。清解之法。常規原以此期。痘至五六日大都起脹。起脹則毒在外。毒既在外。而清之解之。則毒無寒凝之慮。痘方起脹。則漿未及行。而裏未虛。乘未虛而清之解之。則痘無內虛倒陷之患。而孰知過與不及。不可以常理論也歟。

攻毒總訣

問痘如何有川攻伏毒伏火豈堪容毒火鬆透稠無  
喜毒火深藏稀亦凶細究神情暨見症察形驗色皎  
如星上焦衝突如泉噴舌刺唇焦與炙同下迫小腸  
洩是血大腸逼迫苦難禁拂鬱皮毛痛似剝啼號不  
已虐中宮胸堂壅遏躁如噴日夜無眠擾不寧痰  
一囚之迷上竅氣雄煩悶叩無聲靜不靜兮躁不躁  
愁容可掬畏人親骨節煩疼腰似杖筋抽脉惕狀如  
驚徧體炎炎感熱深更呀四體有如冰通身汗湧  
令人畏尤怪身焦首似蒸毒湧肌肉周身板揪腫如

救偏瑣言

卷五 文毒總訣

五

吹痘却平擁突如桃名疙瘩痘瘡未見毒先行痘未  
脹時面頂腫額額未起眼先封赤眼胞下透紅縹  
倒豎睫毛人未知徧軀晦滯如蒙垢口舌無皮穢氣  
噴兩頰焮紅無點粒發始牙爭舌不寧報點歪斜黑  
陷硬一齊湧出細如針紫背浮萍斑似蚤犯一稀稠  
總不論貫珠攢簇又堪嗟蟹爪遊蠶蠟上沙燕蟻  
二窩并鳥跡登錢鼠跡及螺疔雁行珠殼蛇皮類履  
底環珠總象形其在部位亦多名覆釜蒙頭兩截  
分鎖頂纏腰雙鎖口託腮攢背與攢胸披肩囊腹咽

關屬抱鬚蒙眊及鎖唇鱗坐囊毳暨抱膝隨地逢之  
莫覩輕色有紫艷有深紅紫滯乾紅又不同紫類  
雞冠花是艷深其無異絳桃紅滯色猶如花木筆乾  
如紙色有礬紅若比青蓮滯更惡椒皮乾色惡無倫  
有頂平平若烙炮有頂如煤類火燒有頂陷下根  
紅腫有頂尖圓色紫焦痘色頗佳多惡症痘稀色白  
見椎標飛漿迭見黃如蠟發泡看來似葶桃有白有  
紫有色黑或粗或細毒成臬那般痘色那般形見  
症神情總毒伏毒伏于內血受毒毒伏于內氣受鋼

救偏瑣言

卷五 文毒總訣

六

毒輕本受氣血制慘彼氣血亦歸毒是痘生成必內  
潰除却蕩滌無生路縱使不能一一蘇舍此千中無  
一復前人列于不治條後人糊模傍矩矱亦有識者  
謂實病懊歎嬰兒是天命天假千慮之一得殺身惡  
毒容稍滅惡毒驅兮氣血暢氣血融通痘自放氣領  
血載功自全頂白根紅自光壯即使貫珠堆聚類亦  
得鬆擡無敢抗氣煦血化漿自成不藉參芪保元神  
成茄落屬無侵餌胃自開強脾自實此痘不拘兒厚  
薄不拘未痘先病弱不拘眼下便已瀉不因眼下便

閉結不拗成漿宜保脾不拘痘後須調理尋常之法  
治尋常不可將來抵惡酌臬毒不驅是縱虎驩之不  
盡防竊發若使反以補為良可歎適以資盜糧有虛  
見虛且傍穩坐視削削將入井從來有病則病受始  
終細細宜詳究犯此尤當及早圖更須絕頂方駐足  
但憑藥後胃日強夜臥日高猶未足落珈體快與身  
涼咲口歡容無稍楚方是臬毒盡無餘纔得修文偃  
却武。

申明鼻衄

救偏瑣言

卷五

女毒總訣

七

惠迪堂

痘疹鼻衄與雜症鼻衄不同雜症不過迫于肺經浮  
遊之火清之立解縱有為積熱所致勢亦猖獗者有  
之要無內潰之慘痘乃先天毒火不衄則已衄則烈  
毒內亂五臟沸騰致血妄行空竅點點皆毒血也非  
等關邪火可例勢必蕩滌而佐以涼解庶可治其虐  
縱不則毒血內瘀毒瘀于內其有不潰者乎內至于  
潰其有得生者乎若僅以犀角地黄之劑而希止之  
是猶揚湯點沸非鍋底抽薪之法也是症甚多以下  
攻毒之驗總難筆記各附其一以證其概。

附一治驗

余一孫女四歲戊子暮春一晚大熱如炮躁亂不  
寧不逾時而衄如注血紫成條有意亂心慌之象  
是夜即以涼血攻毒飲減紅花紫草加石膏佐參  
地丁連投三劑次日午刻見痘不紅不紫如晦色  
嫩皮象裏不起第二劑衄止熱亦減半叫喊不已  
驟亂如初暫減石膏用大桑螵同宿尾膏益許和  
于藥內日服二大劑服及七朝漸起漸紅大便日  
去七八次九朝藥行漸入佳境藥餌遂懈十朝晚  
身復大熱叫喊仍不絕口滿面搔破猶幸鮮血淋  
漓急用胭脂調入化毒丹貼之前方重以大大黃五  
錢生地石膏俱兩餘三劑後十三朝始定收結而  
痂尚燥寢食僅得其半以忍冬解毒湯減紅花加  
大大黃生地十六朝收功。

申明舌刺咽乾

舌胎如刺咽乾如炙傷寒雜症見之亦陽盛陰虧之  
象然扶陰仰陽其厄可解痘疹若見總以烈毒肆虐  
非僅傳炙而已也輕則乾焦重則焦黑亦必潰而後

口總係咽喉之竅所以咽喉水滄並為逆症舌刺如  
熱者不治欲解其圍非蕩滌不可即使攻之亦必早  
圖乃克有濟不當目之於泛常也

附一治驗

徽州程季老一公郎三歲丙戌殘冬一日大熱煩  
渴口熱如爐舌胎即芒刺而黑則其咽喉乾可知見  
點于肌肉之間隱隱若麻乾紅晦澀彷彿乎逆幸  
在初朝以清涼攻毒飲加蜜炙麻黃二分以隆冬  
也減犀角二劑細碎者悉退顆粒分明又二劑色

政偏瑣言

卷五 申明攻毒

九

惠迪堂

亦稍轉四朝淚流如膽汁唇漸堆結如煤謂之鉄  
嘴大便晝夜約去十餘次一方服至六朝起脹六  
朝行漿胃氣未開神情未快十二朝鉄嘴鬆硬  
食漸安首尾一方收結成痂以忍冬解毒湯至十  
六朝收功

申明溺血

痘疹失血列于不治總以烈毒內攻也况出自小腸  
乎故五淋惟血尤重痘疹犯此可知涼血清毒固是  
症之首務而無斬關之劑以驅逐之縱極清極涼僅

足以緩其流難以澄其源也

附一治驗

七里溫廣心兄大公郎八歲出痘于乙酉仲冬值  
久瘡後精神疲敝飲食不思痘卒溺血如膏胸膈  
閉悶唇黑如煤舌胎如刺兩頰不分界地天庭明  
朗身上稠密乾紅腹更有紫背浮萍痲點如是毒  
火身反不熱內鬱故也以涼血攻毒飲大黃為君  
加桃仁每劑和大桑蟲日服二大劑五朝未見轉  
機前方倍大黃五錢生地兩許七朝兩頰鬆透紅

政偏瑣言

卷五 申明攻毒

十

惠迪堂

活成顆身體大熱餘痘亦俱紅潤腹痲漸淡前方  
減葛根蟬蛻紫草紅花桑蛀加黃連石膏每服調  
牛黃化毒丹一錢日進二服十朝漿足腹痲悉退  
胃氣頓開十二朝唇殼褪脫舌竟紅活頭面堆砂  
收結身上氣足血收寐寐俱安前方減大黃黃連  
石膏桃仁加金銀花貝母攻伐之劑止一劑不及  
便不思食神情仍復不快痘即停止予駭其故豈  
攻之太過而真元不繼耶抑攻力未足而毒火竊  
發也猛省其故失檢其溺取視猶然使內邪淨盡

小腸何猶乃爾也。悉如前法連進二劑。諸毒悉  
捷於影響。服及十八朝。而溺始淡黃其色。以忍冬  
解毒湯始得收功。

申明大腸逼迫

大腸爲傳送之官。通利易結實難。故大便之實與瀉  
中氣之虛實因之。所以古人治痘。用木香異功散。以  
豫防其滑瀉。而孰知梟毒深藏之痘。不爲氣領。不爲  
血載。表裏壅塞。發洩無門。因有傳送之隙可乘。毒其  
騰湧於此矣。腸旣毒湧。下注逼迫。自欲解而仍不得  
救偏瑣言 卷五 申明救毒 十一 惠迪堂  
解。誠能因勢而利導之。俾毒得以宣暢。則氣血融通  
而痘其發皇矣。

附一治驗

孺山鍾晉叔兄。七歲一公郎。甲戌出痘。未見點時。  
腰腹倏爾疼痛。至欲解更甚。及解逼迫異常。急不  
能待。而卒不能解。因艱塞而努力。因努力而愈艱。  
寒不惟不得解。努力之極。氣反上湧。而面頰俱變  
俄頃而惡象復然。此毒深藏于脾腎也。以必勝湯  
去生地。連投二劑。身體壯熱。見點稠密不鬆。乾紅

色滯。痘與皮肉。按之俱板。氣壅煩悶。身無安放。前  
方服及四朝。大便見毒。如漆如膠。紫黯其色。前  
方加黃連。石膏生地。服及七朝。頭面掀腫如毬。眉  
身四體脹滿如吹。有如氣鼓。目之可駭。所幸痘亦  
得脹。十二朝漿行。十四朝漿斂。悉以一方主之。大  
黃用及筋餘。大便日止一次。口內成疔。目睛起瞼。  
身熱未和。以撥雲散。合忍冬解毒湯。調牛黃珍珠  
服至十七朝。所進僅止稀糊。所存惟有皮骨。與參  
湯數匙。卽卽乾膩。嗣後弗藥。惟以牛黃珠末。日服  
救偏瑣言 卷五 申明救毒 十二 惠迪堂  
二分。佐以吹藥。疔與瞼漸愈。飲食漸進。月餘後肌  
肉生長。精神康復。次年患一悶痧。不及進藥而斃。  
惜哉。

申明拂鬱皮毛

痘未分布。而毒先湧。發如癩者。名爲疙瘡。痘未及  
乎肌肉。而毒之鋒穎。先射乎皮毛。謂之類毒。稍一撻  
之。痛如膚剝者是也。此不早圖。任其肆虐。七八朝必  
至燥痒外剝。而斃毒之最惡者也。

附一治驗

復初黃憲副八公郎癸酉孟春。一日身體燥熱肉  
爛筋惕兩目昏沉痘之象也。愁容萬狀。稍動其衣  
被痛楚等于剥膚。是頑毒鬱于皮膚也。即用必勝  
湯減桃仁加桔梗用大黃四錢連進二劑痛不稍  
減。照前方大黃六錢。又二劑透出一身紫滯乾紅  
綿密無縫。痛始減半。大熱如火前方加黃連石膏  
減葛根服二劑顆粒分明。六朝克肥九朝漿勢沛  
然。因痘象可觀藥即懈弛。次日燥痒難禁頭面播  
破血流滿面。猶幸急以藥胭脂貼之。悉如前方。外

救偏瑣言 卷五 申明攻毒 十三

以牛黃二分。珠末四分。勻分三服。調于藥內。日進  
三頭汁。次日復灌。十二朝堆沙漸收。腐爛作臭。胃  
氣日開。神情日爽。十六朝收功。用大黃筋餘。牛黃  
二錢。

申明啼號不已

啼哭嬰兒之常態。至于不已。非煩熱所致。即痛之使  
然而可慮矣。聲必急驟。面必愁容。與常態自是不同。  
即使煩熱痛楚。其因別症。如蛔結食積。瘡瘍癰毒等  
類。亦無事于蕩滌者。惟痘瘡犯此。中藏伏毒而內擾

擾則攻。攻則潰。所以叫喊不已者。不治非不可救藥  
也。正不知有此治法耳。

附一治驗

余戊子一孫。壬辰初夏。一晚大熱如烙。叫喊不已。  
如蚓在灰。次早大小便去血。解後稍緩。俄頃復然。  
急以必勝湯。加石膏連投二劑。日晡即見痘窠粒  
不鬆。痘色紫黯。大解皆紫黑。成片成條。散者成流。  
叫喊愈甚。照前方重以大黃生地石膏。晝夜三大  
劑。每劑和猪尾膏一大盞。并大桑蟲。服及七朝色

救偏瑣言 卷五 申明攻毒 十四

漸紅活。囊漸鬆透。終是叫喊不已。前方減乾葛蟬  
蛻。九朝放白。十一朝行漿。諸症減半。大便日去七  
八次。藥餌稍緩。仍復猖獗。更加燥痒。痘頂穿破。若  
圈。喊不絕口。悉如前日。進三大劑。叫朝得有霽色。  
十六朝叫喊復作。愁楚萬狀。便出紫黑血片。如蟄  
皮散。瘀血有一糞杓。即安睡醒餘便思食。身熱始  
和。大便頓愈。溺猶血水。廿六朝夜半。驟然躁亂。舌  
起一疔。以牛黃分半。珠末三分。蜜湯調服。以忍冬  
解毒湯。加大黃錢許。用地丁煎湯服。及廿八朝。舌

疔卽褪。月餘始得安痊。約用大黃三兩。石膏生地俱二觔半。

### 申明胸堂壅遏日夜無眠

胸堂乃上焦心肺之地。最輕清而邪不易犯者。然六淫惟火上炎而易及。于于心。則以火濟火。而神自不寧。于於肺。則金被火燥。而躁自不覺。况此火更出于毒。病不止于燔灼。輕則內擾眉宇不舒。重則內攻如魚失水。日夜無眠。所必至矣。輕者導赤可解。重者必需攻逐。不則養虎貽患。是症施于未見。使痘可以成。救偏瑣言 卷五 申明攻毒 五

### 附一治驗

一凌姓之兒。僅週歲。身體壯熱。躁亂不寧。如蚓在灰。痘未見而兩目昏眊。是痘象。知其毒壅上焦之故也。卽以涼血攻毒飲。去生地紅花。加山查地丁。一劑而神卽安。日晡見痘如麻。再二劑而細碎者潛消。朗朗分珠。其祖父稱謝不已。照方用生地紅花并大桑蟲。口進二服。以一方服至十二朝。順叙

收功。此僅躁亂一項。更得治于未痘。故朝頭無甚風波。

### 申明痰迷上竅昏悶無聲

心之氣出于肺而爲聲。其竅若管籥焉。竅爲痰迷。痰因氣閉。氣因毒滯。毒氣瀰漫。痰迷心竅。蓋心爲神明之官。迷則神自不清。閉則聲自不出矣。詳其痘瘡皮肉壅腫。紫滯焮紅。壯熱氣粗者。方合是症。

### 附一治驗

孺山鍾去疑兄。年及二旬餘。一日府試。歸見痘。昏救偏瑣言 卷五 申明攻毒 六

沉不語。有疑其爲虛者。有云其爲勞者。五日矣。窠粒不鬆。盤暈焮赤。兩頰通紅。不分界地。且氣粗壯熱之極。此熱毒上湧。清氣阻塞。心竅爲痰所迷。虛勞何與焉。以涼血攻毒飲。減紅花蟬蛻。加貝母地丁。日投二劑。七朝界地漸分。痘漸鬆泛。神情猶然。昏憤。前方減葛根。加石膏黃連。八朝始省人事。方知已之出痘。九朝而漿沛然。十二朝收結。遂弗藥而愈。俱以一方終始其功。

### 申明靜躁無定。愁容可掬



凡靜則病退躁則病進。至于似乎靜而卒不容安。似乎躁而若為所禁。滿面愁容。凡所遇而憎惡焉。較之狂躁者更重。甚至有天柱傾倒。刻不能支者矣。痘瘡犯此。無論熱如炮烙。紫艷深紅。見其熱毒內擾。即身體溫和。痘色黯滯者。尤見其熱毒固閉。而故身無安放也。與氣虛困倦。自是霄壤。

附一治驗

一賀氏子四歲。出痘于仲春。滿目愁容。天柱不舉。神情躁而若倦。身不甚熱。痘點隱躍于皮膚。按之

敢偏瑣言

卷五

申明攻毒

七

惠迪堂

板實板則非不振矣。且多遊鱗。不拘其數。其色乾滯而多白點。點則非真白矣。且有椒色。間乎其中。溺血如膏。口穢若腐。則此天柱不舉。愁容厭倦。全是毒火內擾。而故情緒難支。以必勝湯減桃仁紅花。稍加蜜炙麻黃一二分。和桑蟲一大枚。日投二劑。服及四朝。身漸熱。色漸紅。窠粒亦漸起。時常乾嘔。哈舌。前方加黃連。四劑毒火湧發。驟熱如焚。盤若塗硃。天柱頓起。外加石膏。減乾葛麻黃。自七朝以至十朝。放白成漿。大便日去五六次。皆毒垢。愁

容不轉。壯熱未和。飲食不進。十四朝堆結發臭。飲食得進。諸症平康。惟溺血未止。十八朝仍復壯熱。泛疤口內成疔。一方貫至。念朝外始得全愈。

申明骨節煩疼腰如被杖

痘瘡包孕。在於腎臟。腰者腎之候也。骨亦屬腎。此地若痛。是於發動之地。便即肆虐。烏能歷日期。待朝數而施功于次第也。縱有良法。苦不及施。猶之迅雷不及掩耳。所以腰如被杖者。為不治。惟於痘未見點。萌芽甫動。得以即挫其鋒。庶可挽回于萬一。若一見點。

敢偏瑣言

卷五

申明攻毒

大

惠迪堂

本臟便壞。惟有待斃而已。若清溪章繼美之痘。是一驗也。

又附一症

同袍李季老一幼弟。卒然腰痛。以及兩脇兩肩骨節皆疼。愁楚不堪。次日即報點于左腰。如豆大而色黯滯。又有數點。似痘非痘。隱躍于皮膚。而多晦色。按之板實。以必勝湯四劑後。窠粒稍起。而終不鬆。晦色稍退。而未紅潤。續出者可以數紀。只是痛楚呻吟。晝夜不息。寢食俱廢。以一方服及八朝。累

蕞泛而得半漿服過十二朝痛楚方息稍能寢食將就收結而愈是症幸痘稀疎故得成功而且易若一稠密便如章繼美之歷盡艱難險阻矣腎症之可畏也如是夫。

申明筋抽脈惕

筋抽脈惕者狀若驚也筋屬肝毒在于肝不得尋竅而出筋脈受其衝激以故抽惕如驚而實非驚有發于未痘之先景象凶暴見痘即止此痘發于心世俗所謂驚痘者是也然亦非驚此則未發已發不時抽救偏瑣言 卷五 申明攻毒 九

湯惟懷抱者知之傍觀者不覺此毒不驅肝臟受攻肝為血海血海擾害難于載毒紅暈不著難以成漿囊不克溢首尾類多咬牙終必潰而後已是症輕者疏達活血稍與攻毒重者重與攻毒佐於活血疏達若以驚視誤人多矣。

附一治驗

嚴璞菴老先生一孫歲未滿週一日壯熱昏沉筋脈抽惕以清肌透毒湯加木通青皮一劑次日即見痘頭額如麻身上隱躍以必勝湯減桃仁赤芍

生地加當歸三劑後細碎者漸退隱躍者漸透雖見顆粒却密而不鬆滯而不紅胸背多遊蠶珠發抽惕如故減葛根加丹皮每劑和大桑蟲一枚日服三劑至七日頂白根紅惟遊蠶珠未鬆服及十朝通身脹滿漿勢沛然獨抽惕未已壯熱未和而多愁楚大便自見點晝夜十餘次皆毒垢幸乳食如常一方貫至十六朝諸症平康戲之方笑以忍冬解毒湯念朝外發出紅痧如霞調理收功。

申明徧體炎炎

救偏瑣言 卷五 申明攻毒 十

痘瘡非熱不發非熱不脹非熱不成漿非熱不結痂是元陽制化其毒終始其功故首尾不可無熱然熱宜和體宜潤乃若如火炎炎徧體乾灼肆虐臟腑蝕真氣燥真陰是痘瘡焦紫之媒不論已出未出按之若此者便是窮兇極惡之症不可以泛常之熱而忽之也。

附一治驗

臧比玉兄一大公郎四歲一日徧體燔灼而頰通紅氣壅昏憤以必勝湯減桃仁紅花加石膏三劑

後見痘如麻。又二劑細碎者悉退。顆粒分明。但銷紅若錦。熱不稍減。神思復然。重以<sub>大黃</sub>五錢。生地石膏各一兩。日投二劑。至五朝減蟬蛻。加犀角八朝漿足。大便日去四五次。神思始清。十二朝稍思飲食。有收結意。盤暈猶然。煖赤。十四朝仍復泛疤。轉側愁楚。口内生疳。一方服至十八朝諸症霍然。方以<sub>忍冬解毒湯</sub>收功。

申明四肢獨冷

四肢屬脾。惟宜和暖。固不宜熱。尤不宜冷。冷而皮薄

救偏瑣言

卷五 申明攻毒

主

惠趙堂

色淡身涼。而手足更冷者。此脾臟虛寒。元陽幾脫之象。冷而乾紅色滯。通身火熱。而手足獨冷者。此裂毒壅遏于脾。邪陽莫透。火鬱則寒之象。冷之極。正熱之極也。較之炮熾者而更重矣。在他症則發之而火自散。此係裂毒深藏。非攻不透。失治而脾必潰爛矣。

附一治驗

驢村嚴青字。七歲一愛。壯熱如火。四肢冰冷。下部直過環跳。躁亂如失水之魚。無瞬息寧靜。兩頰一片通紅。不見點粒。胸背乾紅晦滯。皮壅肉極。主人

以為必斃。置之若棄矣。然痘在初見。毒無定位。以必勝湯。大黃五錢。連投二劑。四肢稍溫。即加黃連。石膏每劑。和大桑蟲一枚。又四劑。伏火通透。兩頰紅中泛點。四體頓熱。一方貫至九朝。徧體克肥。粲然可觀。主人喟然嘆曰。前者兒女輩斃于痘者。十數人。口象皆未及此。是痘得痊。往者不堪回想矣。必竟首尾一以攻毒涼血鬆肌。十二朝漿黃如蠟。漸收漸結。十八朝諸症霍然。茄落收功。嗣後口復生疳。兩目腫赤多淚。以撥雲散去水賊。加牛旁佐。

救偏瑣言

卷五 申明攻毒

主

惠趙堂

申明通身汗湧

陽虛則自汗。汗多則亡陽。而有虛脫之患。孰知痘瘡有陽極而汗湧洩者也。人身水火不容偏勝。水勝則火熄。火勝則水沸。烈火燔灼。五液沸騰。液有出于毛竅者為汗。此五液之一也。火擾于內。而汗自洩。是汗之為火逼可知。有汗出如淋者。火之極也。其症通身煖赤。燔熱。氣粗躁亂。是其驗也。火盛即毒盛。故氣虛

而毒盛者有之。未有血熱而毒輕者也。火毒相併。血  
遇必瘀。血至于瘀而內有不潰者乎。其攻自不容緩。

附一治驗

乙未。吾郡張太尊一公子。歲未滿週。一日身熱如  
火。汗如雨下。左眉稜掀腫如桃。愁楚不寧。而有痘  
象。乘痘未見。毒無定位。時卽以必勝湯減桃仁紅  
花葛根地龍。加石膏丹皮羌活。連投兩小劑。外以  
牛黃半分。珠末一分。調入化毒丹三匙。密湯調送。  
分爲兩服。次日見痘。頭額細碎如針頭。悉如前服  
收偏瑣言 卷五 申明攻毒 惠迪堂

又次日。細碎者俱退去矣。而汗亦收。顆粒分明。第  
膚赤如霞。熱仍火熾。愁楚復然。惟喜乳食能進。一  
方服及六朝。頂白根紅。減蟬蛻。八朝漿足飽滿。熱  
勢不減。眉宇未開。九朝迅速收痂。耳能便起。一毒  
如雞卵。照原方用桃仁紅花。十二朝出膿。背上腰  
膀隨起四毒。迥如前劑。并化毒丹。至十六朝亦俱  
成膿。平復相繼。又起大大小小十數餘痘。更多惡  
色。青紫如傷目之可畏。以金銀花赤芍地丁貝母  
羌活牛旁當歸。參甘菊甘草。仍合化毒丹。服至

廿四朝而始收功。是痘熱法。名爲火裏苗。毒先于  
痘。名疔痞塊。令不早圖。痘其焦紫內潰矣。

申明頭汗如蒸

頭汗如蒸者。通身焦燥如炙。惟頭面汗若籠蒸也。緣  
烈毒湧于肌表。壅塞氣道。而致表實。然五液却沸于  
內。滲洩無門。以故身燥如炙。火性炎上。兼之不容旁  
達。餒尤上竄。汗之所以湧若蒸也。頭爲諸陽之首。  
輕清最上之位。邪陽不易犯者。又一身之樞紐。痘瘡  
吉凶之準。邪陽更不宜犯者。而汗若此。五內可知前  
救偏瑣言 卷五 申明攻毒 惠迪堂  
人所以謂毒參陽位者死。是汗居其一也。尚有并頭  
面而不得洩者。面反青黯。兩目徬徨。悶亂喘急。此又  
立刻待斃者矣。

附一治驗

白菴陳老先生。三歲一愛。一日驟熱如爐。燥炙如  
烟。惟頭額汗如雨下。至晚卽見點于太陽。兩頰如  
榴皮。紅而黯滯。連成一片。不見點粒。通身稠密。乾  
紅。口渴煩躁。徹夜無眠。第幸在初朝。毒火雖熾。尚  
可撲滅。以大黄生地黃連紫草地丁。佐以木通劑。

芥丹皮牛旁山查青皮赤芍日服三頭汁次日汗收而熱減半前方減黃連加蟬蛻并大桑蟲服及四朝兩頰紅中泛痘色漸光澤神情未舒胃氣閉塞前方每劑調牛黃半分日投二劑七朝頂白根紅神情半爽身復壯熱仍用黃連減蟬蛻桑蟲守此一方成漿結靨至十六朝邪毒退聽正氣康復癍痕尚燥幾及一月復發血癍瘡以忍冬解毒湯加生地黃連赤芍減紅花又一月而全愈。

申明毒湧掀腫

收偏瑣言

卷五 申明攻毒

五

惠迪堂

痘有毒盛鬆透于外者肉地即腫必因痘腫而腫囊必綻突色必紅潤若郭廓則平痘色則滯肌肉掀腫如吹按之板實此一身領毒之氣悉為毒鏑一任梟毒衝突于身所謂難療肉腫痘不腫者是也此毒不日必至內攻而斃。

附一治驗

復菴慎老先生一長公字其章者九歲時痘烈熱如焚紫滯乾紅菓囊平板無一隙地通身掀腫如吹四軀強直如鑄仰臥而不能轉側猶如捆綁痛

楚非常叫喊不已此梟毒烈火表裏俱狂以大黃八錢石膏兩餘生地兩半黃連三錢佐以清喉鬆肌透表活血更以猪尾膏調入盞餘日投二劑六朝勢不稍緩時值炎天畏熱如爐以藤蓆鋪地以安之猶云背下如火外取三七草搗自然汁用鵝毛以拭之仍以前方服過八朝景色如故計無所施將滯雞矢醬色而有尖頭者和六一散為細丸又用六一散和冰片二釐研勻為衣燈心湯送服逾時身振體戰臭汗如漿霎時湧出大黑螺疔於

收偏瑣言

卷五 申明攻毒

五

惠迪堂

申明疔瘡塊

痘瘡輕淺者萌芽發動氣領血載從容散布不但顆粒分明界地亦不連其色若重而急者朕兆一萌毒鋒如射或上竄或旁湧任其毒之所至擁突如桃形

如癰毒。是謂疔瘡。癰未及是。毒先湧。發驗其身熱。如炮。神情躁亂。哈舌不已。呼喊不止。更合之。兩目昏。眊肉。嚼筋。場是其症也。若以尋常癰毒視之。則誤矣。

附一治驗

宋嘉直兄一公郎。一日熾熱煩躁。愁容萬狀。腦後先起兩毒。如桃。不知其為痘之疔瘡也。嗣即見痘。稠密乾紅。僅不細碎。然窠粒不鬆。以必勝湯。加位參。自二朝服至七朝。大便日去四五次。色漸肥紅。囊漸鬆泛。神情頗安。大有行漿之勢。第壯熱未

救偏瑣言

卷五

申明攻毒

五

惠迪堂

和一老姬譜曰。痘子惟恐脾胃不實。反用大黃宣他。今痘根俱泄出矣。相公當自有至意。果惑于其言。遂中止兩日。漿亦中止。神情復躁。熾熱更甚。頻頻乾嘔。頭面破傷幾半。口穢若腐。唇口焦裂。徬徨之極。復邀余視。余諭之曰。中氣果洩。無論別症。有不瀉溫足冷者乎。何以其熱更熾耶。急以前方加黃連。滅蟬蛻。其破傷處。以藥胭脂貼之。至十一朝。破傷復灌通。身漿亦復行。兩疔瘡併成一大疔。黑硬成坑。亦以胭脂膏貼之。越三日。其疔腐爛。膿漿

旁溢。軟絹拭乾。重貼。十六朝。漸兩收結。胃氣漸復。諸症漸得平復。其疔至廿朝外。收疤首尾。以一方成之。口內生疔。終以清熱解毒收功。

申明預封預腫

痘至五日期。起脹光壯。而因痘脹而腫眼。因而腫而閉。此勢之必然者也。痘若平而不起。板而不鬆。惟皮肉掀腫。目胞擁合。此梟毒騰湧。不受氣領。不為血載。惟毒縱橫。是亦毒參陽位之一症也。前人所以謂面日預腫者。不治。及早攻之。容或可救。

救偏瑣言

卷五

申明攻毒

五

惠迪堂

附一治驗

一友許君。幼時見痘。細如針砂。頭面掀腫。未及兩朝。而眼目睜閉。熱如炮熾。愁楚之聲不絕。以必勝湯加黃連石膏。連投三劑。即大解七八次。而細碎者悉行退去。兩目仍開。熱亦減半。痘雖成顆。尚頂前不鬆。乾紅未潤。前方滅黃連石膏。服及七朝。囊鬆色潤。眼封鼻塞。八朝有放自行漿之勢。未得沛然。大便約去二十餘度。始如膠漆。繼若清水。乃尊疑其虛滑不禁。果爾。痘變灰白矣。尚嫌伏毒鬆而

未暢故下利清水。暢則矢必黃結矣。仍以前方服及十朝。漿足胃氣漸開。十二朝神情開爽。大便頓實。收結而愈。後左小腹發一餘毒。以忍冬解毒湯收功。

申明紅絲遶目倒豎睥毛

紅絲遶目者。有血絲遶于睥毛之下也。睥毛倒豎者。眼睥毛根根如針簇也。此伏毒衝擊于脾之使然。各臟凡有伏毒。即是惡症。至於脾最惡矣。僅在兩腎之上。却居心肺肝部之下。毒愈下而透愈難。脾受衝擊。敢偏瑣言 卷五 申明攻毒 堯 惠迪堂 所屬之地。自失其常。所以睥毛倒豎。血絲遶目。睥也。較之腹痛唇腫等症。殆有甚焉者矣。是屬毒參陽位之一症也。

附一治驗

善溪高翊老。一公郎痘頗勻。朝明潤粗壯。道中一友日之為順。投以平和升發之劑。主人以夜不成寐。身體壯熱為慮。不知更有血絲遶于目胞之下。睥毛倒豎如鎗。可慮更甚。若壯熱不寐。又其次矣。喜僅在三朝之內。猶可攻逐。用大黃三錢。佐以赤

芍紅花地龍大桑蛙。餘不免鬆肌透發之類。服至五朝。血絲漸淡而眼合。壯熱稍和。十朝漿足肥滿。攻發似乎可已。第兩太陽未脹。毒根猶未盡。徹神情未爽。恐虧一篑。大黃與桑蛙。服過十三朝。方得如意而回。

申明痘如蒙垢口穢噴人

痘如蒙垢。色近于灰。灰而囊薄。色白者。此氣血不足。虛之極也。灰而黧。濼囊老板實。此氣血為邪毒壅滯。不能煥發其華。色志黯者。其毒愈深。若兼之于口中。穢氣令人難近。此毒固盛。而烈火尤內。燄者也不可據其似而失其真也。

附一治驗

一宋姓者。三歲一子。痘頗磊落綻突。而根無盤暈。其色則晦滯。灰黯。宛若為塵垢所蒙。體不甚熱。口中穢氣滿。喘躁亂不寧。此係熱毒過鬱于內。故見症乃爾。身體則不熱也。是病在血。而不在氣。以大黃紅花紫草赤芍丹皮地丁荆芥山查牛旁。自三朝服至六朝。色漸紅活。亦漸安。八朝頓熱如火。穢

氣減半。頂白根紅。滅紫草紅花赤芍。加生地黃通  
九朝漿成迅速。寢食漸復。以忍冬解毒湯調治收  
功。

申明發始咬牙

鬪牙有血虛有熱毒大都漿後者屬血虛漿前者屬  
熱毒然漿後而猶因熱毒者有之未有發始而血虛  
者也。往往有痘方二三日而便鬪牙者有見點而即  
犯此者更有痘未及見一發熱而相受作聲者無論  
痘未及見就在放標透點時血初定位縱血虛之人  
救偏瑣言 卷五 申明攻毒 惠趙堂  
血亦何自而虛致齒失其養耶。明是毒火肆虐不必  
參合形色內症自是燎然。

附一治驗

一 張氏之室年十九歲。忽然壯熱如烙。喉間刺痛  
不能嚥津。咬牙不已。神情躁亂。次日即見痘如針  
砂。色似胭脂。道中一望而去者不一矣。其症雖惡  
以其尚在初朝毒無定位。以大黃石膏各五錢。生  
地七錢餘佐以荆芥地丁丹皮赤芍乾葛依參牛  
旁木通甘桔。用蘆筍兩許煎湯代水。日投三劑。次

日三朝。頭面即顆粒分明。前方更用桑蟲一大枚  
五朝色轉肥紅。七朝放白。九朝漿勢沛然。咬牙方  
止。熱猶火熾。僅咽稀粥。碗許猶苦難吞。十朝頭面  
堆結。愁楚未舒。十二朝血收氣足。回膿結。腐發臭  
難近。飲食大進。諸症悉愈。首尾以一方成之。

申明發始弄舌

舌者心之苗。心寧則舌寧。心擾則舌亂。心固象離屬  
火。雖若易動。然下交于腎。得坎水相濟而成。其為火  
者。故為君火。當寂無所觸。其何弗寧者。惟是邪陽烈  
毒。衝突其經。以火濟火。二火相併。其苗自不能寧。痘  
發自內達表。非火不透。痘之順者。其熱溫和。客火不  
熾。於心何犯。即使險者。因逐毒而壯熱者有之。熱因  
逐毒而壯。猶為發揚鬆透之火。於內亦不擾擾。則險  
而逆矣。烈毒內炎。燔及少陰。非躁亂無聲。即叫喊不  
已。非躁熱如烟。即汗出如油。痘隱隱于肌肉之間。非  
紫艷或禁紅。症難悉舉。類多如此。弄舌其能免乎。是  
弄燥熱者攻而涼解。隱伏者攻而散達。斯得之矣。

附一治驗



金友張兄一公郎。二週癸巳季冬忽一晚身熱躁亂。咬牙弄舌。痘象迭呈。以清肌透毒湯。加大黃牛旁青皮。時值初寒。佐以炒黑麻黃羌活。二劑後。鼻毒騰湧。躁亂更甚。兩目徬徨。啼號乾嘔。筋抽脈惕。大便傾瀉如注。此熱毒內亂。下注大腸。不容傳送。而故湧泄也。乘痘未見。勢雖猖獗。毒未內攻。因勢而利導之。是攝萬象于兩儀。關竅在此。前方減羌活麻黃。加丹皮地丁木通。三劑後。瀉即止。諸症未降。以衝突之勢稍緩。不至奔騰。下注耳。所謂大黃救偏瑣言。卷五。申明攻毒。毒。惠應堂。

能止瀉。信不誣也。見標數點于左額。細如針頭。當喉十餘點。犯鼠跡。咽喉關照前方。倍加大黃。暨佐參。每劑和猪尾膏。蓋許。大桑蟲一枚。日服二劑。次日三朝。天庭清楚。但是不鬆地角細密。即以胭脂膏貼之。右額不成點。身幸分珠。其間遊毒珠殼者。不計其數。悉如前方。至五朝。弄舌止。右額方見點。口內脫皮。乳不能吮。食之于熱。紅素不變。而出大便。復去五六次。以全體惡毒湧發。火性奔騰。不暇分消。而故直出。是謂邪熱不殺。殺前方減葛根加白

芷。七朝痘漸肥紅。八朝右額及遊蠶珠殼俱起。服大便去黑垢甚多。如膠如漆。日進米糊二三碗。兩太陽未能起脹。以毒根未盡透也。日服大桑蟲四枚。猪尾膏蓋許。前方減蠅蛇。加山甲生地。十朝通身兼足。次日漸漸收結。大便復止。寢食俱安。聲音不亮。間或咬牙。前方減山甲大黃及半。加金銀花甘菊。外以牛黃半分。日服兩次。十四朝諸邪退。吮調理收功。是症始終以攻毒疏透為主。補拓收斂。毫不與焉。即寒涼之味。亦不相及。以熱毒深藏。隱救偏瑣言。卷五。申明攻毒。毒。惠應堂。

伏也。痘本凶暴。無倫朝頭無甚風波。未路得無餘症。皆得早圖之力也歟。

申明兩頰通紅痘無一點。

兩頰係一身痘瘡之主。氣血領載之會。先於此地透發。後及其餘。見氣得其暢。故領毒而先後不紊。得於此地分根。不連其色。見血得其和。故載毒而盤繞圓淨。若一片通紅。是血被火灼而旁溢。毒不受載矣。不見點粒。是氣被火蝕而退鬱。毒無所領矣。氣血俱為陷害。僅以涼血升透。成何濟耶。

附一治驗

蔡文清兄五歲一愛忽一晚躁亂如涸轍之魚既  
卽昏憤面如土色兩目失神若立刻可斃者以大  
黃羌活青皮紅花蟬蛻薑薑炒黑麻黃荆芥穗木  
通山查連投二劑次日神情稍醒兩頰通紅身上  
見痘數點照前方減麻黃薑薑加丹皮地丁赤芍  
和猪尾膏半盞三朝身體壯熱人卽醒謔兩額隱  
隱見點如針砂頰下稠密近于托腮卽用胭脂膏  
封之身間珠殼甚多喜磊落成顆但嫌乾紅少潤

救偏瑣言

卷五 神朝文毒

毒

惠迪堂

前方去羌活加黃連生地每劑和入一大桑蟲四  
朝額卽清楚五朝色轉紅活鼻塞眼封七朝珠殼  
起頂食薄粥一茶匙大便日去三四次九朝頭面  
堆積身上漿滿壯熱未和腹痛異常愁楚不能轉  
側倍以黃連臨服調入化毒丹二三匙十二朝痛  
漸緩漸得轉側飲食大進以忍冬解毒湯調治回  
好

申明湧出如針

痘疹形成于氣毒受氣制者出必漸次雖密亦分珠

圓綻以毒輕鬆而氣得以拘領也毒若雄猛則氣不  
能領一任毒之奔騰所以湧出而不得漸次氣更不  
能拘一任毒之縱橫所以細碎而不成顆粒痘之蛇  
皮蠶殼皆始于此其痘癢在七朝本無治法惟於放  
點之初見有攢簇不成顆粒者速卽攻之令洶湧之  
勢大挫其鋒遏鬱之氣得伸其令庶乎密者可以轉  
稀疎細者可以轉磊落此真稀痘之秘訣也但當治  
之以早是痘令一越宿毒卽有定位三日內攻已成  
牢不可破矣儘有一見點而攻不遇者必至蛇皮蠶  
殼亡之其命也歟

救偏瑣言

卷五 申明文毒

毒

惠迪堂

附一治驗

錢桑老一公卽忽身熱如烙次日痘卽一齊湧出  
細若針頭自頭至足渾無隙地色滯乾紅時時乾  
嘔徹夜無眠以大黃爲君佐以青皮山查荆芥地  
丁蟬蛻赤芍紅花紫草黃連木通臨服和猪尾膏  
一盞連投三劑第二日兩頰卽成顆粒但界地未  
分至三朝通身亦分珠磊落第壯熱未和乾嘔稍  
稀前方加生地五朝肥紅先澤熱勢減半前方去

蟬蛻黃連加甘草八朝放白成漿稍思飲食去紅  
花紫草猪尾膏加連翹九朝復壯熱大渴時或咬  
牙仍加黃連重以生地石膏十二朝諸症漸退癢  
食漸安方以忍冬解每湯調治收功約用猪尾血  
三碗餘

申明黑陷歪斜

氣得其暢包血成圓而鬆透血得其和附氣成暈而  
紅活反此自平陷歪斜乾紅滯色甚則其黑硬矣以  
見臬毒縱橫氣血瘀滯可知散見且凶况報痘乎希  
救偏瑣言 卷五 申明次辨 美  
真挽回豈徒事升發之謂歟

附一治驗

閔任水兄一公郎報痘于脊黑陷歪斜按之板硬  
餘痘隱躍于皮肉間點粒甚細色滯乾紅躁亂不  
寐體不甚熱速將母痘挑破以胭脂膏貼之用必  
勝湯減生地服四劑後報痘即鬆白盤即紅潤  
中心尚黑餘痘透發成頭能光壯照方用生地  
減桃仁乾葛加姜蚕每劑和桑葉一枚五六朝  
起綻如珠疔痘成漿如爛頭癩神情未快飲食未

進九朝漿足飽滿寢食得半十二朝收結俱得  
然方用解毒養榮調理收功

申明紫背浮萍

痘之色血之色也血和紅而能潤血熱其紅若絳矣  
熱劇則紫紫黯則血瘀矣至如紫背浮萍較之紫黯  
不更甚乎緣為血被火炙榮失其榮致色乃爾更受  
逼迫血失其位致見此疵古人棄之不同若在初見  
其血瘀而未死及時破滌瘀毒得活其疵漸淡漸退  
儘有可活者僅以活血之劑而希治之必至就木而  
救偏瑣言 卷五 申明次辨 美  
已

附一治驗

閔明生兄四歲一愛痘頗稀疎顆粒細結俗呼為  
石痘者是也兩頰界地不清周身乾紅晦滯至胸  
腹間徧滿此疵眉愁腹痛寢食不安身不甚熱以  
必勝湯撤生地加紫草每劑和猪尾膏半盞日服  
二劑至五朝疵色漸淡兩頰漸清前方減葛根蟬  
蛻用生地當歸九朝其疵悉退漿甚克滿腹痛頓  
止照方減桃仁紅花并猪尾膏次日收結甚速身

體反熱。十一朝根盤復泛。兩額疤內纍纍重出。二痘但神情爽朗。不為槁木。仍用六黃蟬蛇赤芍金銀花荆芥當歸牛旁地丁山查。服至十五朝。半漿半糜糊模收結。嗣以忍冬解毒湯全愈。

中明蚤痧

蚤痧者。有聚不成顆。有粒無盤。似乎蚤疤。名為蚤痧。點子雖同。但蚤疤鬆而散。此則斂而結。其色紫。其點細。較若紫背浮萍。其勢畧緩。亦以血為毒。痧外見此痧。內痧不破。必然內潰。是亦不治之症也。

救偏瑣言

卷五

毒

惠迪堂

附一治驗

庚辰。臧比玉。凡三歲。一公郎。一晚徹夜躁亂。兩眼矇矓。次日發出一身蚤痧。按其體膚。頭溫足冷。神情昏憤。是毒伏藏于內。血受其毒。凝結成痧。外呈此象。幸在發始。庶可破發。此痧一活。不惟毒透。并火亦鬆。以必勝湯。生地換歸尾。用大黃五錢。桃仁三錢。服過六劑。痧不見。退痘不見起。更佐猪尾膏。益許。并大桑蠶。和入劑內。以助之。服過十一二劑。痧漸淡。漸退。而痘方見。點三朝。即齊。痘可數紀。蚤

痧悉退。無餘。神情終不開爽。乳食點滴不進。前方減葛根蟬蛇。服至八朝。痘將收結。景况依然。大便日去十數次。如藥水。終是藥力未克。守前方服。及十二朝。痘流悉褪。胃口只是不開。若謂胃氣受傷。何以痘能透發。以至落痂。若謂痂落無恙。豈有絕穀得生者乎。熟思其故。是症本惡。餘邪自未能淨。方主前方。直至十六朝。胃氣頓開。神情始快。大便即止。以三歲小孩。大黃約用筋許。而得收功。以見有病病受如此。

救偏瑣言

卷五

毒

罕

惠迪堂

救偏瑣言卷五

終

救偏瑣言卷之六

申明貫珠攢簇怪痘

痘不在乎稀得勻朗散布雖多何害若連串貫珠有  
形相似而雜乎其間者若堆聚攢簇有象可名而間  
乎其內者有一於此空地雖多亦何取焉須知梟毒  
深藏氣血鋼閉毒無領載痘不得透故多隙地內却  
受其殃其貫珠攢簇者梟毒衝突氣血不能駕馭一  
任毒之縱橫凝結成條者外見連串貫珠團結成塊  
者外見堆聚攢簇誠中形外信不誣也是毒頑而不  
救偏瑣言 卷六 申明怪痘 惠迪堂

鬆伏而不透猶賊之巨魁也此毒不治諸痘皆為抗  
拒治不以攻治之何益巨魁授首前途不戰有倒戈  
之勢然世於貫珠者習矣不察而多忽於攢簇者歸  
咎于命而棄絕焉與言及此亦慘甚矣庶狀其圖象  
或得觸目經心詳其治法或得挽回萬一未必無小  
補云

遊蚕

是痘貫珠成條其形如蚕故  
名遊蚕有稀密有長短身上  
者輕頭面者重身上短而稀  
所見無多者輕長而密者繁  
多者重重則必攻令鬆透如  
一赤豆莢其毒方透

疊錢

是痘則圓攢簇絕不成點錢  
許之大故名之也僅見二三  
者輕多見者重重則必攻亦  
以藥胭脂膏封貼更和猪尾  
膏大桑蟲于洞內透之冷毒  
如蒸餅其毒方透

鼠跡

是痘或四五粒或六七點相  
簇如鼠跡故以是名無多者  
輕見於周身者重重則必攻  
令相併成泡其毒方鬆洞內  
調入化毒丹并猪尾膏

珠殼

珠殼者其痘有頂而不四圍  
貼附一細圈宛如珠殼無多  
者輕及於周身者重重者必  
攻務令圓滿綻突其毒乃透

燕窩

是痘橫簇疊疊象似燕窩而  
名者也單見尚重見而不一  
者不治急攻之務令鬆透如  
餅其毒方化以油胭脂調入  
化毒丹用綿紙攤貼更佐以  
猪尾膏大桑蟲

雁行

雁行者狀似遊蚕僅曲而甚  
長以其排行而若雁字也單  
見者亦重不一者更重矣攻  
之鬆若遊蚕而毒化矣

蘇沙

蘇沙者其痘扁圓歪斜無頂  
無盤有細點如沙攢簇于囊  
宛似蘇沙而名之也可以數  
紀者輕偏及者重重則必攻  
務令高接如茨實其毒纔  
化而成漿

鳥跡

鳥跡者連串三條頭簇脚開  
其痘若鳥之跡也單見者輕  
五六處者重重者必攻亦如  
遊蚕鬆透為準

蟹爪

蟹爪者，貫珠連串，粒細一粒，尖稍有隱隱黑線如髮，竟與蟹爪無異，無幾者輕，繁多者重，重者必攻，其形統脹成條而毒盡洩矣。

蛇皮

叢簇成片，散漫無拘，形似蛇皮而名之也。見此不治，或見點之初，燈下照之，隱隱簇簇，細察無倫，將形未形之際，即便攻之，佐以猪尾膏破之，不使其成，庶可有為。

履底

履底者，形似蛇皮，不若蛇皮散漫耳，隨處皆凶，其形得小，更得早圖，庶可有為。速以猪尾膏和入攻毒劑內，并大藥蟲透之，急以藥脂封貼，令得膿水淋漓，方能慶生。

蟻窩

蟻窩者，較蠶錢而更大也，另別其名者，其形大，其毒亦更重也，即指無多，毒已不淺，攻之自不容已，佐以大桑蟲猪尾膏，外亦以藥脂貼之，得膿泛平，方可成膿。

救偏瑣言

卷六 申明怪痘

三 惠迪堂

螺疔

其毒頭大，根尖，頂黑，形若螺，肉深入于肉裡，有大小，有深淺，按其四圍板硬，治法見於餘毒，若放點時而即見者，最惡，先以挑鬆，即將應服之藥，大人含于口中，吮其痰涎，隨用此法。

紫背

疔之形似萍，其色似萍之背，紫而帶點，有大有小，目之有點，手按無形，無幾便重，繁多者莫救，急宜攻毒破癰，務令漸淡，淡而退去，方可回生，必須早圖。

環珠

是痘連串環透，故以是名，有臂因錫阻，疔即如錫而透者，有項以鬚繫，疔即如鬚而聚者，於臂稍輕，於項則重，因阻猶重，無因更重，不特項臂為然，面身亦有之，凡見宜攻。

遊蚕治驗

吾宗漣漪，四歲一愛，身熱如火，神情昏憤，兩頰通紅，鼻衄成流，身上隱隱數點，色滯乾紅，以必勝湯減紅花地龍加仙參，二劑後，紅中泛點，細碎如麻，周身稠密如鋪而多遊蚕，珠殼亦間乎其間，前方服至三朝，兩頰界地未清，却成顆粒滯色，畧轉每劑和大桑蟲一枚，六朝滯變為紅，色猶如絳，唇口腫裂，前方減蟬蛻葛根，加黃連石膏，七朝放白珠殼泛頂，九朝遊蚕統脹成條，時或咬牙腹痛，熱猶救偏瑣言 卷六 申明怪痘 四 惠迪堂 火熾十一二朝頭收斂而痲燥，身漿滿而盤暈，猶赤，神情尚因而未舒，以一方貫及十六朝發臭，異常二十朝諸症頓愈，寢食得安而收全功，後左眼赤痛多淚，以撥雲散治之得痊。

蟻窩治驗

張又卓兒，一小公郎，方一歲，一日壯熱如烙，徧體如霞，痘不甚密，色滯而平，有蟻窩見於手背，神情愁楚，不時叫哭，是腹痛使然，以消癰快毒湯加大黃，臨服和桑蟲一枚，日服二劑，手背以胭脂封貼。

六朝霞色清。愁眉散。手背鬆浮泛白。七朝氣尊血附。俱放白成漿。熱勢減半。去大黃蟬蛻黃連。加連翹。佐參。日服一劑。十二朝回好。

疊錢治驗

一錢氏子。四歲。痘在五朝。唇裂掀腫。體熱如火。頭面稠無隙地。身上疎朗。板實紫紅。四肢胸脇。疊錢者不一而足。躁亂不寧。以涼血攻毒飲。加山查地丁。減犀角。和大桑蟲一枚。日服二大劑。更以金汁。日服盞餘。外用胭脂膏封貼。至八朝。鬆泛如蒸餅。收偏瑣言 卷六 申明怪症 五 惠迪堂

珠殼治驗

韓尺龍兄。一公郎六歲。乙未仲夏。一日忽體熱如爐。頭面通紅。神情昏憤。見痘稠無餘地。僅不細碎。盤若塗硃。內有珠殼幾半。以涼血攻毒飲。倍生地。大黃。去紅花紫草。加佐參地丁。四朝加黃連。每劑和大桑蟲一枚。五朝神情清爽。七朝珠殼皆透。減蟬蛻葛根桑蟲。九朝漿足。十朝紅暈漸淡。飲食漸

進。頭面收結。十二朝壯熱方和。遂去大黃。減生地及牛。十六朝回足。如此血熱。不致帶火成痂。爬肌抓肉。大黃生地荆芥之力不淺也。後以忍冬解毒湯調治。落痂未久。瘰理未固。餘毒亦未能盡淨。見風太早。忽爾昏暈。急以疏風消毒飲而愈。

鼠跡蕪沙治驗

吾宗個如一子。一日身熱如火。汗出如油。神情困苦。難支。似痘非痘。數點隱隱于頭面。色滯乾紅。痘本是而若非。且熱如火。汗如油。非惡痘不爾。以清

收偏瑣言 卷六 申明怪症 六 惠迪堂

熱透肌湯。未用生地。加大黃。二劑後。次日頭面細碎如麻。身上見點處若集。隱伏處若無。此氣為毒滯而通塞不均也。又二劑。頭面顆粒分明。色亦覺潤。汗印頓收。縮體湧出。內間鼠跡蕪沙。難以數紀。囊窠不鬆。色近于白。此血為毒鬱而未著。非血虛白也。不則有一體兩苟者乎。前劑每服和大桑蟲一枚。五朝窠脚漸鬆。囊頂未起。色轉深紅。神情得定。熱不稍減。前方重以生地。加黃連石膏。至九朝頂綻。食稀粥碗許。十一朝。鼠跡與蕪沙。俱得統脹

如泡而漿俱沸。十四朝盤暈始淡。頭面收結。十六朝身得溫和。胃氣日強。方易忍冬解毒湯調治。至二十朝收功。弗藥。

鴈行治驗

有一段氏子。三歲見痘。三朝兩額細如蚕種。背多雁行。更有蘇沙間乎其間。椒紅其色。叫喊不已。熾熱如焚。以清涼攻毒飲和桑蟲一枚。日服二劑。四朝額卽成顆。六朝色卽紅活。八朝怪象俱統。脹放白。十朝漿足。猶然愁楚。不能進食。一方服及十四朝。眉宇方舒。得進飲食。身體溫和。一朝霍然。收靨落痂而愈。

蛇皮治驗

一女年及十四歲。倏爾身熱如火。神卽昏憤。兩眼如畏刀鋸。徧體如霞。痘未及見。死期若將至矣。卽以大黃石膏一兩。生地七錢。佐以荆芥赤芍青皮。芎根木通牛旁。日投三頭汁。次日午後見痘。細似握沙。色似礬硃。通身無一隙地。前方又服四劑。卽成點粒。却稠密如鋪。方叫腹扁。畧知人事。大渴下

救偏瑣言

卷六 申明怪痘

七

已揭衣棄被。前方加黃連犀角。生地兩半。并大桑蟲服至九朝。始得紅潤。周身起脹。十一朝貫漿連成一片。如松皮。不能轉側。大便日去四五次。水米不沾。十四朝發臭滿室。頭將收結。唇黑如煤。身若寒戰。熱仍如火。一方貫至十六朝。頓思飲食。夜臥得半。熱渴稍減。二十朝外。痂成一片。如蛇一殼。得脫此難。方易忍冬解毒湯。月餘全愈。約用大黃觔半。生地石膏二觔餘。是痘得治于未見之前。更得首尾一轍。庶得挽回。若令見點。其勢便成。牢不可破矣。

救偏瑣言

卷六 申明怪痘

八

蟹爪治驗

中介閔老先生。三公郎。方半週。痘出稠密如鋪。色滯乾紅。窠粒平板。內多蟹爪。身體壯熱。脈惕筋抽。時在二朝。以鬆肌透毒散。加大黃七分。和入桑蟲錢許一枚。日服二頭汁。次日粒數卽磊落。四朝紅潤。八朝鬆泛。九朝行漿。遂減大黃。十朝安睡。乳食如故。大便如常。收回而愈。

燕窩治驗



徐明涵一孫。身熱如火。燥炙如烟。兩頰通紅。頭面  
 胸腹肩背四體。痘密無容針之地。頂陷囊實。乾紅  
 紫滯。叢簇象燕窩者。在于太股。大便日去三四次。  
 始事者。以斷無生理而勇退矣。余取其囊厚色老  
 雖密成顆。可食者此耳。以大劑必勝湯。用大黃五  
 錢。生地兩許。加石膏兩半。每服和一大桑蟲。日進  
 二劑。服及六朝。頭面起脹。眼封鼻塞。八朝。胸背鬆  
 透。色轉紅活。頭面成漿。十朝。燕窩統脹如蒸餅。身  
 漿亦足。第熱猶火熾。愁楚未舒。自膝至脛。猶紫滯  
 救偏瑣言 卷六 申明怪症 九 惠迪堂

鳥跡治驗

吳大雍兄二公郎。八歲患痘。顆粒頗朗。有鳥跡其  
 形于肩背。兼多珠殼。囊窠通身平實。乾紅色滯。烈  
 熱如炮。愁容可掬。云胸膈煩悶難堪。以涼血攻毒  
 飲。重以大黃加石膏地丁山查。四劑後胸膈漸寬

滯色漸活。第紅艷若絳。前方加黃連。并大桑蟲。每  
 服和入一枚。又六劑。頭面通身起脹。鼻塞眼封。惟  
 鳥跡與珠殼未鬆。毒根猶未透也。更倍以大黃地  
 丁加山甲。至八朝。珠殼者圓綻如珠。鳥跡者統脹  
 成條。九朝。膿漿克滿。飲食大進。大便不過三四次。  
 終是燔熱不減。紅暈焮赤。前方減山甲蠟蛻紅花。  
 倍以石膏生地。服及十朝。熱漸減。赤暈漸淡。頭漿  
 歛而身漿徧減。石膏大黃。十二朝。收痂過半。險變  
 順矣。是晚徹夜不寐。氣粗頭悶。腹脹如鼓。變出意  
 救偏瑣言 卷六 申明怪症 十

救偏瑣言

卷六

申明怪症

十

外。若以為伏毒未盡。而囊無不綻。漿無不滿。若以  
 為餘毒歸內。而血收已盡。痂厚而肥。決之于脉。氣  
 口洪滑有力。知其飲食停滯。究之果然。以寬中透  
 毒湯。減陳皮。加萊菔子大腹皮。外用山查二兩。麥  
 芽一兩。煎湯代水。服二頭汁。腹即轉動。隨解而寬  
 嗣以忍冬解毒湯。調治收功。

頭面遊蚤治驗

同袍鍾徽老。九歲一公郎。見痘一朝。體不甚熱。囊  
 窠不鬆。不實。痘色不潤不乾。痘頗疎朗。似乎險中

之順及神情則愁楚異常云胸膈鬱悶目睛昏定  
身無安放此伏火伏毒之兇象也以必勝湯去桃  
仁生地連接二劑次日額上發起寸許血絲兩條  
一橫一直如反手丁字此非尋常血絲路也貫珠  
而未能透耳更以猪尾膏每服和入盞許又二劑  
至晚漸粗如線繼而更粗如芥仍以前方和大桑  
蟲每服一個五朝方透點于血條密排二十餘顆  
遊蚕最惡者也身體大熱紅暈如硃胸膈稍舒原  
用生地減紅花葛根蟬蛻加黃連石膏大便日去  
救偏瑣言 卷六 申明怪症 十一 惠通堂  
五六次飲食未思至九朝諸痘峻頂放白成漿其  
遊蚕亦綻脹成膿纔撤猪尾膏寢食得半熱勢未  
減前方服及十二朝胃氣大開夜臥甚熟體漸溫  
和漸次收結而且嘻笑自若矣前方減大黃石膏  
黃連加金銀花貝母次日忽然昏暈神色俱變按  
脈無影變出意外然以如是收局自非隱毒攻心  
尤非真元虛脫須知遊蚕既見于頭面而第見血  
絲越三日而後見點此毒伏而又深故前局乃爾  
結局亦自宜有此變條毒驟湧一時難以發洩是

胃悶之使然猶傷寒冒汗之象也仍以發始前方  
連接二大劑發出如芥如麻血疹一身即時開爽  
而安又以消痲快毒湯二劑嗣以秦艽和鮮飲調  
理全愈喜主人明理始末信從不則未必不致腐  
于一簣也

履底治驗

有馮其姓者江右一遊客也年踰不惑一日壯熱  
煩渴目紅腹痛沖沖欲嘔疑以感寒烹茱萸湯一  
碗下咽俄頃煩渴倍甚吐出血水碗許內有血絲

救偏瑣言 卷六 申明怪症 十二 惠通堂

邀余診視其太陽有二三點是痘顆粒不鬆乾紅  
色滯余曰足痘矣此翁愕然曰痘果未曾今在客  
館奈何余以無恙慰之連接消痲化毒湯用大黃  
三錢二劑後湧出一身細者半粗者半紅艷如硃  
稠密如鋪熱更如炮倍以大黃又加石膏并生地  
俱兩許臨服和猪尾膏半茶碗日投二劑次日三  
朝痘即疎明細碎者不知從何去矣色亦可觀煩  
渴減半而熱仍熾有履底者三寸長寸餘闊見于  
兩小腹按之板實而痛以胭脂封貼前方配大柴

蟲每一服一枚。六朝眼封鼻塞。八朝行漿履底鬆。擡前方滅蟬蛻兼蟲。加牛膝。十二朝忽思粉食。以糯米水圓食之甘。神情爽朗。自上而下。次第收結。履底成膿。滅大黃石膏。加金銀花貝母。十四朝兩小股腐爛作臭。廿餘朝全愈。

環珠治驗

一兒三歲。忽身熱如炮。膚紅若錦。煩躁啼號。次日痘即湧出。稠無隙地。兩頰如泥砂。乾紅滯色。臂上鐫痕。痘如纍珠纏子。密密環遶。又有錢許大者。一

救偏瑣言

卷六 申明怪痘

圭

惠迪堂

在于肩。一在于脛。窠粒板實。界地連環紫滯。以必勝湯。滅蟬蛻地龍。加黃連。止服二劑。次日頭面周身即疎朗成顆。色俱明潤。痘若改換。惟四處環珠形色如故。症亦未減。以一方服及十二朝。痘得次第應手。症亦逐日平復。以忍冬解毒湯調治收功。其下圖像

指貫珠攢聚或見於頭面或見於周身部位者也

覆釜



是痘盤聚于巔頂。如釜之覆。名曰覆釜。是毒參陽位之一症也。其餘疎朗明潤者。以鬆肌通聖散和猪尾膏化毒丹治之。外用胭脂膏搽貼。更稠密火熱者。必加大黃。令膿水腐爛。其毒方化。是痘上與下。綿密如鋪。中段絕無一點。鼻毒擁于上下。氣血阻于中宮。以致上下隔截。痘之最惡者也。首尾一以攻毒為主。佐以猪尾膏地龍。令氣血疏達。要截處得散。散透點方可挽回。

兩截



救偏瑣言

卷六

申明怪痘

古

惠迪堂





蒙頭







是痘透頭貫頂。有似兜帽。故名蒙頭。毒參陽位之首惡也。餘更稠密火熱者。不治。治則必攻。與覆釜同法。必早圖可挽。有獨聚于天庭者。亦是蒙頭。餘若疎朗明潤。體不熾熱者。不必用大黃。腰者。腎之候也。連串環繞於此。緣毒伏於腎。而有此象。貫珠之最惡者也。餘即疎朗。不得視以為美。治必以攻。得此鬆擡。統成一圍。如豇豆黃。方不為害。不則痘縱可觀。九朝忽

纏腰



背攢	項鎖	口鎖	臆托
			
救偏瑣言 卷六 申明怪痘 惠迪堂			
<p>           領下亦腎經所屬。痘瘡攢成一            片。是為托腮。清氣為其所阻。頭            面必不能起。身更可知。痰湧氣            喘。可立而待。從來不治。若見點            之初。毒勢未成。以治蒙頭之法            治之。亦可救。援一二速宜封貼。            雙鎖口者。兩口角。左右一粒較            旁痘獨大。板實而無盤者是也。            此毒擁于脾。而有此象。口乃脾            之竅。飲食接送之門。可令毒藏            此地乎。治法輕重。與覆釜一轍。            有連串。遠于上下唇畔。亦是。         </p> <p>           項係水穀之路。呼吸出入之門。            痘疹連串環繞于此。是毒鎖咽            喉。與托腮無異。咽啞水滄。皆由            此致。俱屬不救。但得放點之初。            即以清金攻毒飲。并猪尾膏。杜            患于將萌。容有可起。            毒發於背。便關生死。况痘攢簇            隨地皆凶。而可令此地犯及乎。            攢而得鬆者。以鬆肌透毒散。合            化毒丹。猪尾膏治之。外以胭脂            膏貼。攢而更板壯熱如火者。必            攻。須得腐爛。方可慶生。         </p>			

膝抱	咽關	胸攢	腹囊
			
救偏瑣言 卷六 申明怪痘 惠迪堂			
<p>           腹近五內。猶之同室。與他處不            同。一有變症。毒即入裏。捷于反            掌。但此地空隙。而未得為首者            矣。未有此聚如囊。而得無恙者            也。治法攢背同。         </p> <p>           胸與腹。俱逼近臟腑。攢胸猶之            囊腹。調劑之法。亦與攢背同。         </p> <p>           咽關。當喉攢簇。而犯壺錢者也。            若蟻窩。則尤重矣。咽與項。皆水            穀之路。呼吸出入之門。其害與            鎖項無異。鎖項之害。病在環遶。            咽關之害。病在攢簇。治法與鎖            項同。更以胭脂膏貼。            兩膝攢簇如餅。毒聚于此。聚不            能達足脛。而致虧于一篲。餘地            無疵。更無內症。止以鬆肌透毒            散。加牛膝。合化毒丹治之。并用            胭脂膏貼。更多惡象內症者。必            攻。         </p>			

鎖 唇



唇者脾之華。脾臟安和。痘不相及。更得溫潤。不則攢聚于此。有黃熟如蠟。有嘴突如雷。有黑硬燥裂而血逆。皆毒攻于脾。象見于唇。如無他症。瀉黃散合猪尾膏治之。更壯熱如炮者必攻。

蒙 髀



痘攢簇于耳後高骨。是謂蒙髀。亦腎經伏毒之一徵也。頭面餘處皆稀。止此犯忌。以鬆肌透毒散。加依參合化毒丹猪尾膏治之。外用貼法。更稠密而炮熱者必攻。

救偏瑣言

卷六

申明怪痘

七

惠迪堂

披 肩



披肩者。如其肩而兜聚也。較之於背稍輕。然臟腑真氣所聚之處。即鼠跡。蘇沙尚屬可畏。而况攢布成片乎。此毒不鬆。真氣鋼閉。上下阻塞。治與攢背同法。

抱 鬚



鬚接太陽。暴赤起伏。於此取驗。痘症若重。鬚極稀疎。必此地掀腫如蓮瓣。以及正面腫脹如毬。毒根方透。不則此地不脹。即通身光壯。毒根猶伏。厥後終敗。可令犯忌于此乎。治法與蒙髀同。

鱗 坐



鱗坐者。其鬚攢集如鱗也。穴屬環跳部位。又至陰之地。故發漿不過環跳者不治。平而乾滯者。鬆肌通聖散。加牛膝。板而紫滯。且熾熱者。涼膈攻毒散。減豆根。亦加牛膝。俱合化毒丹。并貼法。

囊 毬



痘得陰陽和暢。雖密無咎。陽毬乃下焦陰陽交會之所。故陰上先收者吉。取其下焦和暢也。於此若囊。毒壅交會可知。上下相因。下壅則上閉。治以散結湯。化毒丹。熾熱者加大黃石膏。

救偏瑣言

卷六

申明怪痘

八

惠迪堂

覆釜治驗

歐餘方老先生三歲一公郎。痘頗疎閉。却色滯乾紅。有平有陷。顆粒不鬆。至巔頂盤集。覆釜其形。是毒參陽位之一症也。以鬆肌透毒散。和大桑蟲雖見起發。不能光壯。早欲用猪尾膏化毒丹鬆之。因與一不韻者同事。阻及七日期。滯而更燥。陷而漸板。愁容可掬。不容復緩。前方減羌防。加荆芥當歸。臨服和猪尾膏。并化毒丹。連接二服。外用胭脂膏。搽貼身。即壯熱。頭面掀腫。通身光壯。却徹夜無眠。

以毒火潜伏日久。藥與鏖戰。以故不寧。藥得其勝。氣血暢達。故得煥發。不韻者。不諳是理。第見擾亂。歸咎于生猪血而致變。料不能起。勇退而去。舉家悲泣。孰知猪尾膏最能透伏毒之深藏。毒血內瘀。非此不活。更有化毒丹。潛消默奪而共濟之。毒根自不容藏。次日即安睡。九朝漿行。壯熱如燔。前方減白芷。蟬蛻。蜂房。加黃連。生地。十一二朝。漸漸收。茄。猪尾膏。遂撤。巔頂燥痒之極。仍不能寐。以荆芥穗。金銀花。茵陳。大黃。地丁。甘草。煎湯止浴其頂。拭救偏瑣言 卷六 攻毒治驗 九 惠趙堂

乾復以胭脂膏貼。而痒即止。仍復買漿。堆結甚厚。餘熱未和。痘亦亦燥。前方倍加生地。臨服調牛黃半分。珠末一分。日進二服。至十五朝。日漸回和。口内生疔。以忍冬解毒湯。外用消疔散。又數日全愈。

蒙頭治驗

孝廉王乃老。一公郎。未及三歲。體薄而兼病後。及見痘。蒙頭鎖項。攢胸攢背。兩額細碎。滿腹斑點。皆紫背浮萍。痘色晦滯。宛似蒙垢。痘犯不治。不一而足。所希冀萬一者。惟在初見。毒未有定位耳。以必

勝湯。臨服和猪尾膏。蓋許。外復以牛黃半分。珠末一分。總勻在內。日服二劑。次日色即有紅意。兩額便成顆粒。四朝胸背覺磊落。鬆綻。惟頭與項。布而不清。却亦鬆泛。腹癍漸淡。漸退。六朝浮萍悉退。前方減芍根。桃仁。八朝。漸漸放白。但寢食俱艱。眉宇愁蹙。九朝漿行。未能克溢。時或乾嘔。身熱驟熾。聲音半啞。以毒火湧洩也。以涼膈攻毒飲。十朝。頭面夾紙鬆擦。有膿漿滲漏。身漿幾足。十二朝。收痧少。潤。寢食僅半。眉宇未舒。十六朝。燥痧復泛。口内生救偏瑣言 卷六 攻毒治驗 十 惠趙堂

疔。以消疔解毒散。日吹三四次。二十朝外。方得全愈。是痘始以必勝。繼以涼膈。佐以猪尾膏。化毒丹。總以攻毒導瘀。而保元拓裏腐談。從不講及。痘得保全。而卒無虧于本體。見有病病受如此。

兩截治驗

子一孫。歲未滿週。仲冬一日。忽然發搐。口眼歪斜。周身肉潤筋惕。兩眼傍徨。以清肝透毒散。加羌活。臨服調入牛黃九七分。瀉下逾時。神醒。身即壯熱。次日便見痘頭。而細密如麻。上自肩至乳。下自臍

至足稠無隙地但得成顆中段絕無一點此兩成  
瘡也日夜叫喊不已急以必勝湯減桃仁加當歸  
佐以猪尾膏日進二頭服四劑後大便去毒垢甚  
多頭面便成顆粒身上漸得粗壯大便日頻晝夜  
約去三十餘次繼之清水若湯夜即安睡遂減大  
黃至晚仍復叫喊痘即奄駐不得已而復用晚又  
安睡次日漿勢沛然乳食大進食之以糯米細圓  
甚喜十朝頭面堆結甚厚但欠肥潤神情大快第  
身熱未和不免以大熱一退虛寒繼至為虞大黃  
救偏瑣言 卷六 救毒治驗 主 惠迪堂

橫背治驗

雉城賊以用兄顧渚老先生之孫也幼時出痘犯  
橫背頭面稠密如鋪有背以上紅深如絳以下紫  
甚強痘後精神頗旺

若胭脂身體燔熱神情昏憤以必勝湯用生地  
許減紅花加石膏黃連自三朝服及七朝大便日  
去四五次通身色轉紅潤背得鬆浮減葛根至十  
朝頭面漿足背得腐爛作臭餘亦成漿唇黑如煤  
熱猶火熾一方服至十四朝全愈時有同事日以  
脾胃為慮余曲諭之得不拒有成

鱗坐治驗

一邢姓者六歲一兒痘及五朝全不起發日夜躁  
亂如蚓在灰舉家涕泣以為必斃痘頗疎明按之

救偏瑣言

卷六 救毒治驗

主

惠迪堂

不鬆根窠紫滯頂陷而黑至環跳處贅聚如掌犯  
鱗坐形伏毒深藏抗拒諸痘始事者但知疏肌透  
發而不諳其故毋惑乎暢達無由日奄滯而至猖  
厥也急以窮源透毒散和猪尾膏連接二劑更以  
大桑葉酒漿調服二枚外以胭脂膏貼次日便覺  
鬆泛又二劑七朝痘即峻頂成漿神即安爽但環  
跳處鬆而未腫服及十朝漿湧連紙鬆擡如蒸餅  
嗣以忍冬解毒湯十二朝收結成功

纏腰治驗

一徐氏女四歲痘期兩日甚勻朝稀疎却陷而不  
鬆紫而乾滯身熱如烙兩腰貫珠環遶而犯此症  
是毒伏于堅珠之最惡者也日期尚淺餘痘尚  
疎猶可挽回恐此翁不明是理辭之弗任不期此  
翁止此一女豫為痘計屬意已專以予弗任大慟  
哀懇情甚悲切以必勝湯加牛膝黃連石膏稍用  
炒黑麻黃以行之并和猪尾膏連服二頭汁腰痛  
難忍繼之于汗而欲解解後而痛即止便云爽快  
次日三朝凡服藥後景况亦復如此至八朝而痛  
救偏瑣言 卷六 攻毒治驗 圭 惠迪堂  
不作矣然其所以然者伏毒之症犯幾期敗者日  
期未至毒雖甚烈猶未作難以尚伏也故爾得  
安時師不諳而多忽殆至發已潰而及  
矣見于機先者攻之而不容其  
遷降藥毒糜戰自不能寧至於藥  
矣何痛之有嗣後放白成漿腰間纏毒  
殼豆漿亦滿圓但熾熱未和飲令去  
蟬蛻桃仁荔枝根紅花麻黃服二十二朝  
收結全愈

托腮治驗

吾宗叔澹五歲一愛烈熱如爐不及  
見于地角頰下細如針頭而色近白托  
成托腮之類已露正而周身所見俱不  
紫紅徹夜躁亂將來攢簇惡象皆可者痘鄰於  
逆所集者惟在初見以必勝湯減桃仁加石膏佐  
參日服三大劑頭汁即用胭脂膏封貼次日正而  
與身即成顆粒却無隙地是方和大桑蟲每服一  
箇五朝神情得安七朝圓綻肥紅地角頰下隔紙  
救偏瑣言 卷六 攻毒治驗 圭 惠迪堂  
鬆綻亦得纍纍前方減蟬蛻乾葛十朝漿甚克滿  
惟壯熱未和盤暈焮紅飲食不進大便日解五六  
次皆毒垢十一朝正面堆沙漸次收結以及周身  
十三朝胃氣頓開痘痂尚燥紅暈未得全收服至  
十六朝諸象回春始終以一方成之纔以忍冬解  
毒湯加生地二十朝全愈弗藥約用大黃二十餘  
兩石膏二觔  
囊毬治驗  
一李氏子三歲見痘兩朝色似胭脂頂陷不鬆火



熱如烙。煩渴不已。至陽毬攢簇。宛若荔枝。內求  
瑜惟磊落耳。以消癰快毒湯。加大黃石膏桃仁地  
丁山查。服及五朝得鬆。六朝見色猶然。絳色前方  
減桃仁蟬蛻。九朝漿足。紅暈未淡。熾熱復然。時生  
地已幾十餘兩。黃連一兩餘矣。至十二朝熱得稍  
緩。紅暈畧淡。寢食亦以之而稍安。前方減石膏十  
四朝。先收者。疤赤而多浮皮。後結者。焦赤而紅暈  
猶附。體膚燥熱如初。夫固餘毒之先機也。不越二  
日。神卽昏迷。從頭至足。於空地及疤內。重出一身

救偏瑣言

卷六 攻毒治癩

五

惠迪堂

似痘非痘。不成顆粒。脚地糊模。色如塵垢。無一隙  
地。上則抱鼻而更層繫。以及人中下復囊毬。以及  
小便紫腫痛楚。非常。仍不能寐。稀粥與之。則嘔。不  
與則不思。而痘復始矣。較前局更惡。此名謂禱杓  
痘。禱杓乃惡獸。其性交覆。痘與相類。故以是名。此  
痘古來有之。第罕見耳。窮源透毒散。減山甲歸  
尾。加桔梗牛旁生。地黃連金銀花青橋葉。臨服調  
牛黃化毒丹錢許。四劑後。色漸紅。而猶滯。囊漸壯  
而漸平。服及五朝。仍眼封鼻塞。七日行漿。通身

漸堆沙收結。痂成一片。十餘日而褪。及過半。頭面  
黑硬堅牢。反不能落。其鼻聳抱如螺。拂及則痛。人  
中亦燥裂迸血。其小便龜頭。於中段腫處。頂出陽  
毬。老腐抓肉。爬肌。眉宇不舒。餘熱不解。前方重於  
生地兩餘。黃連二錢。以金銀花湯。服及月餘  
而熱始和。痂始鬆。以熟猪油調。糝粉決其頭面  
而得褪。改形換相。非初褪時面目矣。嗣後寢食俱  
安。調理收功。人中與陽毬。俱陰陽交會之地。惡毒  
上下開鎖。痘故如此。若不開闢于前。亦烏觀其後

救偏瑣言

卷六 攻毒治癩

五

惠迪堂

句若此也。

痘癩治驗

屢君數兄。一小愛歲未滿週。痘鄰于逆。先見於兩  
眉。攢簇如麻。繼而頭面通身。徧及無餘。色近於白  
而窠粒卒不鬆。體不甚熱。而神情卒躁亂。似虛似  
實之間。然虛者偽而實者真也。兼於脉惕筋抽。不  
時乾嘔。兩目預腫。而預合。種種皆伏毒之象。而况  
自驗其形。伏毒已先昭于前乎。一不韻者。認爲氣  
虛。痘反有隱意。勢甚猖獗。急以涼血攻毒飲。以常

歸易生地。減赤芍。加山查。地丁。甘桔。和乘蟲。一枚。日服二劑。四朝頭面有鬆意。根窠稍有紅暈。眼腫減半。閉而復開。生機在此。七朝身體壯熱。頭面起脹。頂白根紅。眼封鼻塞。有行漿之勢。大便日去六七次。身尚復然。餘症未減。前方減蠅蛇葛根。原用生地。加黃連。服至十二朝。身得鬆透。寢食得半。下部痘瘡板實。皮肉擁腫如炊。前藥加牛膝。羌活。更以牛黃化毒丹。日以五分佐之。并大乘蟲。至十八朝。身漿始沛。并及足脛。二十餘朝。上褪下結。前症救偏瑣言 卷六 攻毒治驗 毛 惠應堂

申明惡色并治法

痘之色。血之見乎外也。血和則紅淡而潤。紅深如絳。則血熱之燄昭然。熱若鬱而不透。則火燄不發而紅自乾。乾而至于色類椒皮。榮失其榮而血幾於死矣。是紅之最惡者此也。熱劇則血瘀而色紫。紫而艷。雖

瘀而猶可活。紫至于滯。則血被毒囚。而內攻幾成矣。是紫之不堪者此也。黯滯青連。可無擬治法矣。是紅是紫。皆熱毒肆虐。在所必攻。然攻有不同。當分隱見。其隱與見之分。總以身之熱。與不熱。辨之。身鹹熱者。熱毒燔灼。其血沸騰。攻宜與涼血清火並行。大忌辛燥。即當歸在所宜禁。以血中之辛藥也。體不熱者。熱毒固閉。血如膠漆。攻宜與導瘀活血共濟。大忌寒涼。即生地亦所宜禁。以血中之涼劑也。然辛燥尤不可。攪總令血得其和。歸于紅潤。斯為良法。

救偏瑣言 卷六 惡色治驗 毛 惠應堂

附紫滯治驗

張武老一繼愛三歲。一日熱如炮熾。次早即見痘。一齊湧出。稠無隙地。通身紫滯。神情躁亂。大渴不止。凡毒火燔灼於放標時者。是痘為火裏苗。若不清其源。而但以疏肌透表為發。勢必至焦黑而內潰矣。急以消痲快毒湯。加大黃石膏桃仁。服及六朝。色轉紅活。顆粒亦鬆。熾熱未減。至八朝晨刻。放白午刻。而漿即肥濃。以見血熱之痘。患火不清。一清而轉移之象勃然矣。寢食猶未能復。外以牛黃

一分珠末二分。以佐前方。至十二朝發臭燥熱頭  
和。寢食俱安。漸收漸結。痲似松皮。嗣後又發血瘋  
瘡。終不外涼血解毒之劑。調治而愈。

附絳紅治驗

顧佺仲兄。韻翁老先生之公郎也。六歲時出痘。頗  
勻。則粗綻。却紅艷如絳。燥多如火。腹內時痛。神情  
煩躁。徹夜不寐。此火炮于外。而內又毒伏也。以清  
涼攻毒飲。減紅花加赤芍。服至五朝。痛止肌潤。得  
睡。前方加甘草。至七朝。絳色漸淡。頂白而肥。八朝  
收偏瑣言 卷六 惡色治驗 无 惠迪堂  
藥印肥濃。大便日解五六次。熱亦減半。飲食漸想  
前方。去大黃石膏犀角。加連翹佺參。十朝頭面无  
收。赤燥而白根底。附線紅。至晚身復壯。熱睡不  
甚安。是後求餘毒之漸也。復用石膏。倍加生地。外  
以牛黃一分。珠末倍之。和於劑內。日進二服。至十  
六朝。俱得平復。後用忍冬解毒湯。調治收功。

附礬紅治驗

雉城臧玉老。八歲一孫。身熱如炙。口渴煩躁。痘甚  
稠密。面色礬紅。三日期矣。始事者第以升發為慮。

乾而幾黯。躁亂愈甚。身無安放。以必勝湯用大黃  
三錢。加石膏黃連。日服二大劑。五朝。頭面紅潤。身  
尚未轉。七朝。面部放自行漿。通身乾而得潤。神情  
半爽。八朝成漿。而迅速黃熟矣。漿近板黃。凡血熱  
之痘。烈火一透。漿無漸次。惟嫌太驟。漿無不滿。惟  
慮板黃板黃者。火竭倒靨之象也。倍大黃五錢。石  
膏生地兩餘。三劑後。漿色潤澤。大便日去五六次。  
飲食稍思。熾熱未減。其外祖王氏至。見此藥劑。大  
以為怪。停及一日。是晚躁亂如初。次日炮熱更熾。  
救偏瑣言 卷六 惡色治驗 无 惠迪堂  
身戰如寒。漿殆變而躁實矣。悉如前方。連投二劑。  
振戰即定。再劑而漿色復潤。紅暈亦漸收。漸淡。服  
及十四朝。虐燄將熄。寢食漸安。遂弗藥。聽其自回。  
厥後通身泛痘。環跳處起兩癰如拳。痛楚非常。以  
忍冬解毒湯加羌活赤芍。服及十餘劑。而愈。

附椒皮治驗

小苗黃元澄兒。一公郎。今之長公也。稟賦甚薄。時  
方二歲。出痘於癸酉春。體不見熱。徹夜擾亂。叫不  
絕聲。口脈如脂。痘無容針之地。晦色者。如蒙后。乾

紅者似椒皮。顆粒不鬆。此毒伏于內體。故不熱。或擾亂。以氣血受鋼。神故不著。吻色椒紅。表裏俱關。痘鄰於逆者也。法當攻其伏。不使毒橫於內。制其毒。使氣血發。煌於外。庶得挽回於萬一。若以稟薄為慮。縱毒肆虐。是不知務者矣。以鬆肌通聖散加大黃。減羌活白芷。以其燥也。臨服和猪尾膏半盞。服及三朝。如水交石。大便日去六七次。眼即睜。閉唇口腫硬。亦毒參陽位之一症也。前方佐以大柴。每劑一枚。服及六朝。身體頓熱。唇黑如煤。痘救偏瑣言 卷六 惡色治驗 圭 惠迪堂

色變紅而却燥。仍以前方加生地黃連。減蜂房赤芍。至八朝。滯色悉退。放白而不能肥。須叫依然。而腫若有退意。是伏毒未能淨盡。而氣血一時不能克達故也。權宜之際。減大黃青皮。用參七分。芪一錢。而暫充之。和入大柴蟲一枚。二劑後。痘即肥。泛面即光榮。眼縱推脂。熱却如火。凡熱毒之症。乍虛乍乏。與虛寒之症不同。一喚即醒。醒當即止。今熱如火。確烈仍在。以消癰化毒湯減蜂房赤芍。日投二劑。外以牛黃一分。珠末二分。以佐之。服及十劑。

漿滿十二朝。黑嘴鬆。神情始寧。乳食大進。痘終燥。身熱未和。服及十六朝。發臭。臂與膝生。而毒減。生地加當歸。金銀花貝母。廿朝外。俱得平復。收功。

附紫艷治驗

有一朱姓之子。三歲。痘在五朝。熱如火。痘色紫艷。若花內雞冠。唇裂。迸血。亦紫。躁亂如蚓。在灰厥。父母涕泣。以為必無幸矣。然猶可冀者。面目掀腫。雖紫能肥。速以必勝湯。重以大黃五錢。生地兩許。救偏瑣言 卷六 惡色治驗 圭 惠迪堂

加石膏亦如其數。減紅花蟬蛻。服及七朝。紫變為紅。繼即放白成漿。次日便老。更喜。烈熱漸解。前方去葛根。桃仁紅花。加依參。重劑減半。又四劑。回好。申明四毒頂

痘貴綻而紅活。平平若烙炮者。其頂若礙而平。其色若熱而腐白也。痘貴氣尊而血附。下陷根腫者。頂若菜莖。而脚不鬆也。一平一陷。均氣為毒滯。一毒上壅。而不得榮于葉。一毒下鬱。而不得透于頂尖。治法皆所當攻。其熾熱者。重攻而寒之。無不甚者。輕瀉而

鬆透之如煤類火燒者其色焦黑似乎火焯者然發頂尖圓者本是妙境而色焦紫形亦何足取也斯二者均血被火灼血刺則變也夫都不治得無他症而顆粒磊落者容或可治熾熱者攻而寒之更導其瘀熱不甚者攻而導之兼達其閉。

附頂平腐色治驗

同袍陳宗老止宜老先生長公也。出痘于幼時。顆粒亦明。其頂平平。若為火熨者然。其色白如宿腐。盤暈焮赤。心煩壯熱。以滌邪救苦湯去澤瀉。加地

救偏瑣言

卷六 惡色治驗

三

惠迪堂

丁生地丹皮日服二劑。大便日解二三次。次日三朝佐以大乘蟲。每日二枚。前方服及六朝。頂漸起而根漸活。宗老岳翁舉其族中一同道至。以頂平而白。認為氣虛。拘古法而傍日期。血用保元湯。陳老先生明理。信任弗貳。前方服及十朝。減滑石紅花乘蟲。服至十二朝。亦得次第奏効。十四朝收痂。燥硬身熱未和。根底尚附線紅。此熱毒未盡。將來餘毒之象也。倍用生地兩餘。外加石膏亦如其類。并金銀花仙參貝母。十六朝餘毒聚于頸項。腫痛

非常強直不能俯仰。周身浮起。寢食俱廢。又加地龍五條。一方服及廿四朝。始得脫然全愈。

附頂如煤治驗

王偉之兄紹賓老先生之孫也。一公郎三歲痘密如鋪。邪發紫紅。其頂黑如煤。儼若火焯者。夫都居半。身無安放體不甚熱。以毒伏於內也。以必勝湯每服和猪尾膏半盞。服及三朝。更和大桑蟲以佐之。七朝頂與邪發俱轉紅活。減桃仁乾葛蟬蛻加當歸。八朝身體壯熱。有放白成漿之勢。飲食大進。

救偏瑣言

卷六 惡色治驗

三

惠迪堂

神情開爽。見景象進長。恃為無恐。而藥即懈弛。次日仍復躁亂燥痒難禁。兩額搔破。痘色變而紫滯。悔之無及。速以臘脂膏貼其破傷之處。前方加黃連重以大乘蟲一枚。和於劑內。連接二服。諸症減半。兩頰膿水滲溢。痘色復轉。繼而成漿。結痂。神情寢食俱安。以一方貫之。十六朝而得收功。

附頂陷根腫治驗

有一陳氏子五歲。見痘于隆冬。頂陷且深。時雖嚴寒。却煩渴躁亂。唇裂逆血。頂雖深陷。囊實根腫。而

色乾。此氣血爲熱毒壅遏，不得申其領載之權，以故陷而不起，非寒凝不透，尤非氣虛不峻也。一始事者不諳其理，徒以升發爲事，累日不起。至六朝驟然作痒，手舞足蹈，竭定痒之法，而莫禁。痘色更晦，頻頻乾嘔，此翁計無所施，謝絕去矣。據農未成而痒沸，症固危篤，猶幸兩額擦而未破，更憐其未得對病之劑，而竟棄之，覺爲不忍。先以胭脂膏貼其兩額，以必勝湯減桃仁、地龍，加黃連、錢許、蜜炒麻黃二分，臨服和大乘蟲二枚，日服三頭汁。大便去三四次，俱如膠漆，伏毒一鬆，頭面即脹而痒遂定。上身亦起，又二劑，色轉紅活而渴愈甚，體熱更熾，是毒火發見之象也。下身猶然板滯，減麻黃加石膏，酷好橘，非此不藥。每服必五六粒，至十朝，頭面漿足，下部亦鬆，減葛根。十二朝，頭漿飲而身漿，飲食得進，神情未開。前方減蟬蛻、萊菔，十六朝，諸症脫然，痂落過半。始易恐冬，解毒湯調治未及兩日，身復炮熱，眉宇復愁，肩發一毒，周身泛疤，復加黃連、赤芍，外又以牛黃化毒丹，日服錢許，至

廿四朝全愈

附項與色不伴治驗

朱石公兄，五歲一孫，痘初見點，火熱如爐，悶亂喘急，昏暈如迷，遺尿目閉，正面一片，羸紅，隱隱細如針刺者，目之有黑，按之無粒，身上數點，而色焦紫，勢甚危篤。所與惟在初見，以清涼攻毒，飲重以犬黃、減犀角，加地丁、桃仁、蟬蛻。二劑後，額即透發成粒，通身俱透，點成顆，而且回綻，惟色紫滯，神情半開。又二劑，額即光澤，身猶未轉，外佐以大、乘蟲、四朝，紫漸變紅而未潤，服及七朝，頭面成漿，周身放白，胃氣未開，前方減桃仁、紅花、蟬蛻。九朝，思食而壯熱未減，盤暈焮紅，重以生地兩許，防其成火，禍也。服及十二朝，諸症貼然，漸收漸褪，後易忍冬、解毒湯而愈。

由以痘佳症惡

痘之吉凶，世多選以痘準。如窠粒圓綻，盤暈肥紅，更兼踈朗，八八日之爲順，何虞其有覆敗之患哉？不知痘象雖佳，或凶暴，若以痘美而致忽焉，繼必痘隨

症變秀而不實矣。然症與痘俱由內而發。何意痘症若此。症又若彼耶。蓋痘出于險者。毒恒有隱見不同發見處。則氣血暢達。領載其毒。痘故得以光壯隱伏處。則氣血錮閉。毒無駕馭。橫症所以旁出。即以痘觀之。稀疎處可以數紀。稠密處無以容針。衝突處。至於重頂陷伏處。過期不透。即以症言之。體熱如烙者。肢冷如水。傾瀉如注者。條爾閉塞。毋惑乎痘無可虞。而有可畏之症矣。症不必多。美難勝惡。犯一痘忌。大局隨之。順不嘉多。逆嫌一點。此之謂也。

救偏瑣言 卷六 惡色治驗 三

附一治驗

陳錫甫兄七歲。一公郎痘見三朝。勻朗粗綻。色甚肥紅。而少淡痘象。頗佳。身却熾熱。愁容可掬。徹夜不寐。云胸膈悶而不快。假令傷食。而然。痘其不能煥發矣。今紅而且深。綠毒火湧盛。氣血領載。有及與不及。所不及者。毒在于內。而故有此症。以滌邪救苦湯。減紅花澤瀉。加地丁四劑後。大便去三四次。胸膈便爽。睡臥亦安。熱亦減半。因痘可觀。攻不敢過。前方減大黃三劑。至七朝前。態復然。痘覺停

滯求其故而未得。忽喉間冲冲欲吐。俄頃略出。膿痰干乃尊之手。痰熱如沸。以見攻之未可已也。前方倍以大黃二劑。通身放白。成漿。諸邪復退。惟熱未和。一方服及十二朝。全愈。是痘因形色而忽其症。至變紫變黑而斃者。不可勝紀矣。

申明痘白雄標

痘若稀疎。其毒似輕。淡白則痘似不足。至于標痘。或紫或焦。或盤暈。燼赤。中心黑陷。按之板實。是謂雄標。係一身痘瘡之主。主痘若此。則其稀者。諸痘為臬毒。抗拒也。致伏于內。故若稀。非毒輕也。白者。血為毒鬱。不得外著。故白非不足也。急宜刺之。吮出其毒。用胭脂膏封貼。視其神情。內症輕者。以活血透毒。重則必攻。令毒根一鬆。通身透發。而白變為紅矣。

救偏瑣言 卷六 惡色治驗 三

附一治驗

凌長庚兄一孫。二歲。身不見熱。齋然左額一報痘。脚地痲關。色赤而乾。中心黑陷。按之板實。身有三四點似痘。非痘。俱淡白色。已三日矣。寢食如常。神情如故。所以然者。以痘之所中有淺深。淺者其毒

其出易形圓而色潤深則反是矣機雖萌動全體尚伏于包孕之地而未發故若未痘者然及所報之點却如此形色若不杜患于將來任其自至有越六七日或八九日有十數日外湧出如麻非紫點即椒紅而不可救藥矣有所謂等伴痘者即此是也令將銀針挑破胭脂膏貼之以必勝湯減桃仁生地服及五劑日以大桑蟲一枚而身始熱大便連去三次通身透發痘得踈朗奪其勢於未成也窠囊尚不鬆泛又四劑圓綻光澤標痘根擡

救偏瑣言

卷六 惡色治驗

五

頂腐神情愁楚以全軀毒湧未得成熟也前方減

葛根蟬蛻服及十二朝收功

中明飛漿

痘期十四日自放點以至落痂猶十二卦之陰陽消長也當初出一點紅血初定位純陰坤卦之象陰極陽生潮而復復而臨臨而泰三陽透于頂尖之上陽交于陰氣會乎血痘故紅而變白五朝大壯六朝夫七朝乾六陽呈象血受氣化而至純陽痘故白變為黃所謂七漿八足足則為膿成膿而色自黃是痘之

應至而至陰陽自然之理也若未及三朝諸痘未能收白數點驟然黃熱緣為烈毒所衝故爾漿成迅速是謂飛漿止一二點熱不甚熾者以針挑之用胭脂膏封貼但與涼血清解自放自成漿矣如其迭見不已熱如炮烙者必攻僅與清火涼血終必焦紫不能救接者也

附一治驗

洪崖王老先生一孫三歲漢章兄之公郎也痘紅一如絳熱熾如火徹夜不寐急以涼驅攻毒飲用生

救偏瑣言

卷六 惡色治驗

甲

地三錢大黃錢許日投三劑三朝大解僅二次劑輕不能駕馭頭面起二點飛漿老黃如蠟紅艷漸滯前方用大黃三錢生地七錢石膏兩許連接二劑挑破飛漿點以胭脂膏是晚得臥熱亦稍和重劑減十分之三五朝又起飛漿十數點景色復然仍以重劑服至七朝放白八朝成漿寢食俱安惟熱未減十朝漿老頭面有欬意紅暈未淡十二朝足小脹起一癰如挑夜復不寐以胭脂膏敷其四圍刺出其頂一方至十六朝出膿諸症平復口生



痘疔。佐以消疔解毒散吹之。方易忍冬解毒湯調治全愈。

申明泡湧

痘瘡氣盛則泡。氣盛者毒氣盛也。毒氣雄猛。反成過。過鬱之極。內有衝突。以物極則反也。過鬱處。頂平頂陷。窠粒不鬆。連肉亦有板實者。衝突處。毒鋒如射。磨其鋒者。囊隨毒起。泡之有白來矣。所起乃郭殼浮皮。不為氣領。而囊故飄薄。不受血載。而根故無暈。氣血閉鎖之極者。色白而囊空。氣得浮動者。內涵清水。收偏瑣言 卷六 惡色治驗 聖 惠迪堂

附一治驗

一施氏女十三歲。痘患血熱氣滯。窠粒不鬆。紅盤。

肆溢。徧體如霞。以貧窘不事醫藥。八朝湧泡。幾三分之一。餘俱平板。九朝泡俱破傷。其浮皮有如麥殼破傷之色。乾赤有如膚剝。火熱如炮。痛楚非常。衣衾難動。症在垂斃。厥父母哀號悲切。余憐其坐視以貧而就死地。未免希援於望外。以生地兩半。石膏一兩。大黃三錢。與眾藥同煎。三錢臨起。投下。餘佐以荆芥穗地丁赤芍山查青皮木通。投下二劑。連解六七次。破傷處俱有膿水濕潤。平板者。畧覺鬆浮。又二劑。通身毒化成漿。頓思飲食。再劑而熱減半。漸漸收結。發痘發痂。以忍冬解毒湯全愈。

收偏瑣言

卷六 惡色治驗

聖

惠迪堂

救偏瑣言卷之七一

涼血撮要訣

問痘如何血用涼陰血爲榮畏亢陽陽亢血熱陰難  
 養榮失其榮燥怎當始終滋潤方爲貴色一乾惟痘  
 必殃燔灼放標焉得起煎熬起脹怎榮光貫漿時被  
 炎威炙安得膿漿貫頂囊儘有血旺得催成迅速催  
 成亦板黃紅暈尚熾囊已黑燥硬乾痲總不祥涼血  
 生地必爲君次擇芩連犀與羚羊陰中伏火丹皮徹血  
 分燔炎散必荆重須石膏兼蕩滌由來沸極必抽薪  
 救偏瑣言 卷七 涼血 惠迪堂

輕惟生地與丹皮荆芥連翹紫草宜重可用輕輕勿  
 重輕重惟於痘上憑或紅或紫艷如霞熱如炮重  
 莫加僅若清涼非重劑終歸焦黑斷無差詳明輕重  
 熱爲先熱盛應知血劇焉熱重涼輕何克挽熱輕涼  
 重恐生寒紫有黯滯紅椒色身反溫涼熱又潛毒火  
 潛藏血又瘀血瘀寒苦又非宜破瘀攻毒斯良法火  
 透身燔方可除兒體強弱可無拘弱體當炎更易枯  
 有病病受原無損聽彼熬煎痘可知本體尚爾難固  
 執首尾何須又執迷更有亢極戰如寒面赤瘡紅身

極燔火迫大腸頻下利神煩思冷體炎炎火湧頭面  
 赤騁騁熱血醃皮痒自侵胃難受穀惟思飲舌刺唇  
 焦體若蒸血皆熱極貌皆虛參合端詳顯易知當事  
 幸毋云法古膠持規則誤人見

清火窮源論

問痘緣何用清火只因虐燄獨炎炎不第肺金愁彼  
 燦坎宮五液畏其煎五液所關滋五臟離宮亦藉有  
 丹田萬物化生皆賴水人身資水更何言一生一剋  
 本天成水火依關又獨深木受水生寧第木金爲火

救偏瑣言 卷七 清火 惠迪堂

尅豈惟金試聞坎離生與剋痘宜清火殆非輕

腎主五液一爲涎涎養脾陰已土安胃本陽明爲戊  
 土亦需汁養胃無愆誰道中央無藉水但愁甲乙不  
 愁南 下文詳明

腎之液入脾爲涎土雖得火而生然象中坤無專  
 氣無定位寄旺於四季爲已土屬陰其性中和而  
 喜溫得腎之液生發其涎以滋培其性而始得運  
 化消磨五穀安穀得昌血賴之而統唇賴之而華  
 身賴之而潤肌肉以之而滋長已土乃安胃雖戊

土性固純陽。然脾胃相通。達其液於胃。而胃得有  
 注。以見陽中有陰。得以受納五穀。胃庶無愆。不則  
 俱為燥土矣。燥則失其為土矣。以證土之不能無  
 水可知。痘若火旺。燔灼其液。必口臍如脂。唇裂肌  
 燥。目胞紅腫。渴而喜冷。口穢噴人。凡屬熱症。類多  
 如此。木受水生。而土亦賴水滋培者也。火能生土。  
 火極亦能侮土者也。此論邪火不可容。真水不可  
 涸。則然耳。若真火不及。客水泛溢。水大而土又崩。  
 脾所以有惡寒惡濕之理。此五行反復顛倒。其可  
 救偏瑣言 卷七 清人 三

不知之乎。總以痘之形色神情見症。及信是而非  
 一一而參詳之。無不得矣。  
 腎液輸肝。淚滿滴。長生得水。旺仍然。膽同津液。成為  
 腑。滋養曲直。得成酸。所畏莫道。惟從革。火到燎原本  
 盡焉。下文詳明

腎之液入肝為淚。肝生于腎。還以腎旺肝得液養。  
 則能以藏心之血。而滿血之量。謂之血則目能視。  
 筋能榮。爪能華。手能握。足能步。以之而能定聲。  
 以之而能呼。皆津液外旺之象也。膽為之腑。一氣

相通。同為津液之府。得以發陳而主春升。以遂其  
 直達之性。而總成其為肝。獨端乎淚者。淚尤肝之  
 精華也。淚足則血無不足。人故有過泣。至于淚不  
 能繼。則血矣。以見血即淚。淚即血。木之藉水可知。  
 不則肝為槁木矣。痘若火旺。煎及其液。肝液沸騰。  
 目必多淚。其淚必熱。甚則有如脂計。更有流血。舉  
 一而言。凡肝熱可概。其長生于水固然。而帝旺仍  
 需于水也。固畏金剋。不知受虐于火。更甚于金也。  
 崔真人云。火不出則薪存。火發于外。薪之盡矣。

救偏瑣言 卷七 清人 四  
 潤而從來剋上炎。誰知作苦反根鹹。今無腎液生心  
 血。君宰神煩。漉亦艱。須解象離非燥。火燥炎不輯。白  
 終燔。下文詳明

腎之液入心為血。心為神舍。係一身之主宰。得其  
 液以養。而神始寧。慮事不煩。處喧無惡。外應舌榮。  
 內行血海。以見火亦不能無水可知。有言汗為心  
 液者。此言心之汗也。有心血而有汗。所以奪血  
 者不奪汗。心固屬火象。離下必需坎應。方為水  
 火既濟。而成其為火。是謂坎離交媾。非燥火也。故

分火論云。久而不輯。將自焚矣。痘若火旺。燔其心液。輕則煩躁。重則顛狂。緩則舌燥。急則黑刺如煤。或舒或弄。小腸乃心之腑。本同一氣。輕則短縮如油。重則溺血如膏。舉一而言。其他可知。第知火生于木。何知水足以濟火也。知水能剋火。孰知火還以自剋也。

依武本是兌金生。那曉西方得坎成。涕滋氣主根。何在傳送和調得。任因若遇炎炎尤所畏。由來火熾不容金。下文詳明

救偏瑣言

卷七 清火

五

惠迪堂

腎之液入肺為涕。肺為氣之主。諸臟之華蓋得其液以滋養。通調水道運行百脉。潤乎一身。分布四體以輸降下之令。鼻得之而望。能悉香臭。咽得之而清。聲音察亮。皮毛得之而潤。不至燥澀。大腸為之腑。因之而傳送得以和調。大便無愆。以見肺之賴腎可知。不則肺為燥金矣。燥則不成其為金矣。痘若火旺。銷燦其液。鼻燥咽乾。皮毛燥炙。便閉衄血。咽痛聲啞。甚至便血瀉。則暴注如射。凡屬燥金可概。金木生水。抑知金反資乎水耶。虛火剋金。抑

知助水有以制火也耶

南方本畏北方剋。縱有炎炎當易滅。誰知杯水與車薪。那論相生與相剋。腎主五液。且猶然。餘臟當之何足說。詳明下文

腎為五液之主。諸水發源之地。其為水也。無成各無定液。形其無形。乃為形君。兩目瞳神。其真水也。褚氏云。天地定位。水位乎中。雲興雨降。百物生化。賴有水焉。人肖天地。亦猶是也。以故腎之為腎。木得之而能生。火得之而克濟。土得之而能培。金得

救偏瑣言

卷七 清火

六

惠迪堂

之而能潤。克之本位。而精髓洋溢。耳聰目明。骨力堅強。炎暑而不畏熱。藏精納氣。以待發陳。諸臟均以賴焉。五行之關乎水也如此。若火之為暴也。金遇固燥。木遇則焚。土遇雖生。過而又燥。本位過極而自焚。諸臟之畏其虐也。固如此。其所畏者惟水。此造物相制之權。五行生剋之理。乃若火旺水衰。燔灼其腎。猶之杯水車薪。日受其燔。其臟必至腦髓空虛。遺精盜汗。骨蒸夜熱。軟弱無力。五色眩而五聲聾。人其失志。面色如救。失其閉藏之令。反為

火所竭矣。水且猶然。而何有于他臟也。痘若火旺。煎熬及此。則無臟不銷。無臟不燥。不但重而險。必至逆而莫挽矣。千形萬狀。惡症難悉。大都於色。則灑墨塗硃。於形則迸裂泡湧。於症則空竅失血。腰如被杖。於神情則瞳矇失志。躁亂不寧。其大畧也。人知水能剋火。抑知水反為火竭耶。知五行生剋之常。抑知水火依關之奧也耶。此論邪火則然。如元陽真火。賴以生發。賴以鼓盪。賴以暢茂。賴以成。熟。五行得之。亦豈小哉。

救偏瑣言 卷七 清火 七 惠迪堂

腎無瀉法。是真詮。養病息火。誠秘訣。火之為病。其症暴。火之殺人。其死卒。火有君相。局不同。君火猶容緩。調燮。相火厲局。始其然。客感邪陽。尚難滅。痘瘡毒火。種先天。更使暴令。交相賊。勸君莫把。等閒看。蹉跎因循。令猖獗。猖獗之時。枉用功。生死安危。爭頃刻。

清火症治準

欲明清火之理。不可不窮其源。欲善清火之法。不可不察其症。如痘已發未發。以至成痂落靨。身熱和平。更不見有煩躁乾紅燥烈之症者。此痘瘡應有之火。

而無事清之者也。犯此煩躁數項。身卒不熱。反有溫涼。或有肢冷者。是隱伏之火。先透發以達其鬱。而未可遽清者也。若熱則火發見矣。發見而無甚惡候者。以荆芥連翹丹皮木通牛旁輕以清之。壯熱而煩躁者。前藥加生地滑石甘草。壯熱而乾嘔口膩者。前藥加黃連滑石。壯熱而痘色乾紅。色滯者。前藥加黃連赤芍青皮紅花紫草。壯熱而燥烈者。前藥加黃連生地。壯熱如炮而燥炙者。前藥加黃連石膏大黃生地。壯熱而皮毛若刺者。前藥加黃連桔梗葛根蟬蛻紫。

救偏瑣言 卷七 清火 八 惠迪堂

草大黃。壯熱而叫喊不已者。前藥加大黃青皮赤芍黃連。壯熱而鼻衄如泉者。前藥加大黃生地。角黃連。壯熱而瀉血者。前藥加黃連山梔大黃生地。滑石甘草。壯熱而腰如被杖者。前藥加大黃牛膝黃連地丁。依參。壯熱而大渴不已者。前藥加黃連石膏。生地花粉。壯熱而瀉水如注者。前藥加黃連滑石甘草澤瀉。壯熱而大便欲解不解。所解如漆如膠而愁楚者。前藥加大黃滑石青皮黃連赤芍。壯熱而大便去紫黑血者。前藥加黃連大黃桃仁赤芍。壯熱而筋。

抽脉惕者前藥加大黃青皮黃連稍佐小柴胡羌活壯熱而睛毛倒豎者前藥加大黃赤芍青皮壯熱而目紅如火兩頰如硃者前藥加大黃生地赤芍羚羊甘菊壯熱而狂言弄舌者前藥加黃連生地甘草犀角壯熱而痘色紫艷或焮紅或唇舌無皮者前藥加黃連生地石膏佗參壯熱而痘間硃砂痘或紫背浮萍或紫黯色或發疔者前藥加大黃桃仁赤芍地丁黃連地龍猪尾膏壯熱而痘有貫珠堆聚或面目預腫或窠粒不鬆或皮肉腫硬者前藥加黃連大黃地救偏瑣言 卷七 清火 九

救偏瑣言 卷七 清火 九

者可救壯熱於結痂之後。病情尚楚他不思食者必有餘毒伏而不透前藥加大黃地丁黃連蟬蛻生地壯熱而起牙疔前藥加黃連花粉貝母佗參甘桔調入牛黃珠末。此症治之大畧也。若夫細微曲折筆所難罄推而及之無遺蘊矣。痘症始終不可無熱。尤畏其壯熱。一過當斥屬水位或破煎熬或被沸騰或破燥烈或破焦枯為害可勝道哉。但有緩急輕重之不同耳。因其緩急輕重而因應之。治火無不當也。歎涼血清火不拘首尾論

救偏瑣言 卷七 清火 九

痘瘡涼血清火。於起脹時。人人之能事。至於放點成膿結痂之際。知之者或寡矣。以為痘之出非熱不發。時方見點。以鬆肌透毒為主。遽用寒涼。毒冰不發。發亦不透。如春溫得以生發也。不知正取其溫。不欲其熱。若春行夏令。時便酷熱。萌芽有不稿乎。是拘於熱則行。冷則凝之說。誤之也。化育之妙。在不偏枯。獨陰不生。獨陽不長。毒火旺極。始即炮熾。五液沸騰。痘賴氣血領載而出。氣為壯火所蝕。血為烈火所燔。痘其何自而出。徒以透肌升發。俟其起齊而後涼解。毒已

內攻痘其焦紫矣是謂火裏苗未有能秀者也試比一物其理豁然譬之欲得乳鴨煖其卵則生寒其卵則隱如欲其煖而置之於烈火之中以炙之所欲其可得乎痘之漿非熱不貫以氣响血化而成如夏熱得以成熟也寒涼恐氣失其响血失其化而膿漿何自不知夏熱象離離下必需水濟如亢旱之年惟有烈日萬物亦自焦枯血熱其猶是也亦有疑而相詰曰失治于前者其象如此放點及今清解已多日矣從前功力何在熱毒其猶熾耶曾聞痘毒出一步則

救偏瑣言 卷七 清火

內空虚一步邪熱縱有未盡當亦毒隨漿化即血熱者不至敗於虛寒當無事溫補足矣緣何尚有虞焉吁總不知偏枯缺陷之理者也輕淺者易清重極者難敵血熱之極者偏僻於火期至八九日如日至中天歲當三伏於少陽初起尚即焠熾至此純陽旺極之際烏能使解若從前失治者至此亦無可清解矣火得一分清微漿得一分融化間有平時血旺之人足以禦火不至焦枯迅速催成漿極黃老然絕無榮活滋潤之意項平囊實是謂板黃不諳其故而謂膿

成毒解遂致誤焉終亦必亡而已矣論痘之非非熱不結俗語謂蒸痘回見火不宜熾始終不可無漿得肥濃所冀惟在收斂有生長應有收藏亦天地自然之理痘至於斯用燥濕欽陰實脾利水之劑以助其收斂結痂自是宜然仍復涼血以助其濕清火以寒其胃寒熾太過中氣必虧漿即肥濃不幾始實而終虛乎痘將何以終局也如曰毒火未清漿何能足化毒成漿之謂何而猶云未盡也嗟夫是但聞毒化成膿之說而未知血盡毒解之理化毒成膿蓋言氣化

救偏瑣言 卷七 清火

囊裏之毒也血盡毒解蓋言根盤血分之毒也血有一絲之未收毒有一絲之未解氣之振作易血之成熟難以氣輕清而無形血重濁而有體氣尊於中氣清頂所以陷而能起起而能白白而能黃漿雖血之體而鼓盪之權操於氣氣毒不清血其物而不化矣血附於外血清盪所以紅而能淡淡而能收收而能盡血雖氣之輔而乘載之體在乎血血毒不清氣亦歸於淪喪矣况云化者頑而至化毒將解而猶未盡也解者化而至解毒其盡而無餘也故囊極融化根

底血附線紅。其毒未爲盡解。乃若紅血嫩赤身熱未退。但見漿足。卽與滲濕收斂。毒卽隨火而乾。未盡之毒仍歸于肉。其屬乾焦燥硬。入皮肉。輕則發癩發癩重則發疔。更有悶亂喘急而莫可挽矣。可勝道哉。古人云氣足血收。瘡始成功。斯言不我欺也。

附一治驗以見大意

雒城周葵仲老先生一令郎。卽今之長公也。五歲出痘于初夏。大熱如火。煩渴不止。兩頰通紅。隱隱如針砂。身上稠密如鋪。乾紅滯色。二三同道以危

救偏瑣言

卷七 清火

圭

惠迪堂

疑而推委。幾老憂慮而致廢寢食。余慰之曰。毒火誠烈。可畏。幸得發揚。治之得宜。當無患者。主翁稱謝不已。以涼血攻毒飲。加黃連三錢。生地六錢。連按三頭汁。次日額上壘藥成珠。第燔熱更熾。前方加石膏七錢。黃連四錢。每服和大桑蟲一枚。時有徐培老至。與余甚合。是方服及八朝。色得紅潤。前方減乾葛。蟬蛻紅花。九朝放白成漿。十朝正面便有欬意。及盤量未淡。熾熱未和。恐防火禍。直以生地石膏各兩半。黃連五錢。以制陽光。不令驟斂。毒

復歸于內耳。血熱之症。不慮難收。惟慮熱毒未清。乾收爲患。不得以九回十。同論也。服及十三朝。面痂已老。身屬將半。胃氣漸開。熱亦稍和。有一友用白芍錢許。助其收斂。是晚煩擾不寐。未必因此作祟。見血熱之不可爲收斂計也。次日頭面赤腫。身熱復熾。煩擾如初。是餘毒湧發之象。悉如前方加蟬蛻日服三頭汁。次日十五朝。發出血疹紅癩。自頭至足。無不徧及。夜卽安睡。神復開爽。而熱未和。是方服至十七朝。方得霍然。以忍冬解毒湯加

救偏瑣言

卷七 清火

酉

惠迪堂

分別毒火論

毒與火自有相因。亦自有不同。有火者。必其爲毒。有毒者。未必其皆火也。毒盛而後火者。有之。未有火盛而毒不盛者也。如血熱毒盛者。血屬陰。爲寒。陰且熱矣。有陽而反寒者乎。其爲毒也。自火。故無有血熱而兼氣虛者也。是火卽是毒矣。如氣虛毒盛者。氣屬陽。爲火。陽且虛矣。有陰而反熱者乎。其爲毒也。又寒。故不見有氣虛而兼血熱者也。是毒與火無干矣。然虛



者曰未有不寒即毒之實者未必盡出于火也。是以  
苦寒之劑自無投于氣虛之理。即毒之雄猛者亦還  
宜精察而明辨者矣。有如梟毒而濟烈火並行交迫  
治火治毒在所並進不容偏廢。有如毒重而火輕者  
治必因其輕重而輕重之不得混而無別。有如毒火  
太重而致遏鬱者必先攻其毒而後清其火。宜知先  
後有如無症不實而火無可據者不得以實為火。妄  
投寒劑致毒凝而冰伏甚哉。火毒之不可以不辨也。  
○凡痘囊窠蒼老者其毒為實也。老而踈朗者毒輕

救偏瑣言 卷七 分別毒火 五 惠迪堂

者也。分珠而密者毒盛者也。既密而間貫珠堆簇成  
形成象者盛而尤重者也。密而不成顆粒與稀而形  
象繁多更見要害之地者煩多不起者也。毒雖猛而  
能起能脹者毒其見于外也。痘雖稀陷而板實者毒  
其伏于內也。○凡痘紅而色老者實火也。老而能潤  
者火實而輕者也。老而色乾或紅而絳色紫若胭脂  
者均火之凶暴者也。紅而更黯紫而更滯俱淪于莫  
挽者也。以見毒辨于形。火呈于色。然毒之輕重見伏  
皆在于形。火之輕重見伏全不在乎色也。又當於體

膚之熱與不熱以證其見伏。○如徧體壯熱者火實  
見于外也。色即紅紫而體膚若涼者火其伏于內也。  
身壯熱而肢獨冷者因氣滯而火偏伏也。有身燥熱  
頭汗如蒸者火上湧而毒參陽位也。有靜則燥矣動  
則汗洩者火閃竄而無定也。是火與毒之呈于形色  
昭于體膚者如斯。乃若神情見症亦未始不昭其辨  
也。如愁眉蹙額者痛也。諸痛皆毒叫喊不已。皮毛若  
刺轉側呻吟屈伸甚楚。脈惕筋抽。衣衾難動。便時艱  
塞而容愁。卒然啼號而聲厲。此皆痛之象而毒之徵

救偏瑣言 卷七 分別毒火 六 惠迪堂

也。○如躁亂不寧者煩也。諸煩皆火。不耐衣衾。夜不  
成寐。惡聞人聲。惡見人形。若欲求食。食之而又不欲  
似欲思安。安之而又不樂。此皆煩之象也。如皮壅肉  
腫者滯也。諸滯皆毒鬱悶不舒。身如捆綁。胸填腹滿  
面目頂腫。通塞不均。此皆滯之象也。如唇焦舌黑者  
燥也。諸燥皆火。大渴不已。口內如爐。渴血便紅。憶水  
思冰。狂言譫語。此皆燥之象也。是痛是煩若滯若燥  
總歸於以熱為見。以不熱為伏也。○治毒之法審其  
輕重為先。輕而發見者治之以解散。輕而隱伏者治

之以透發。重而發見者。輕與之攻。而重與之散。既重而又隱伏者。重與之攻。兼透而兼散。治火之法。察其隱見為先。發見而輕者。治之以涼解。發見而重者。治之以苦寒。隱伏而輕者。輕與之攻。而重與之散。隱伏而又重者。重與之攻。而兼與之散。攻毒不嫌于早。治火其於適時。攻毒當厄。可以該治火之効。治火失宜。更有以妨治毒之功。假令失于清火。其必紅變乾焦。紫變焦黑。可勝道哉。外有當然之火。自然之毒。又非一概論也。有如痘脹而頭面發腫。眼封鼻塞。漿滿而

救偏瑣言

卷七 分別毒火

七

惠迪堂

身重難移。肢浮體胖。項大聲粗。回漿發臭。此非自然之毒也乎。氣領血載。非熱何能達表。氣煦血化。非熱何能實熟。漿老成痂。非熱何能收結。此非當然之火也。乎其合行其無事而已。亦何分別之有。

救偏瑣言卷之八

論行漿

痘之體始終一血而已。痘之用始終一氣而已。血之體成漿。氣之用化血。漿之成盤。之化也。血之化。氣之虛也。氣虛血化而漿始成。漿老則為膿矣。血不得氣。則血而不化。氣不得血。則鼓吹無地。氣血虛。則寒凝不振。毒火燔灼。則氣血沸騰。氣為毒。則氣不動。盪囊窠不鬆。平陷乾樵。血為毒。則血不融通。盤暈不活。乾紅紫滯。血足而氣不足。歸附厚而囊薄。漿不

救偏瑣言

卷八 行漿

一

惠迪堂

克溢氣足而血不足。窠粒壯而暈淡。漿不濃厚。以見虛則乏其本。而漿無所化。實則受其虐。而化不得行。是則行漿之理。有當制以洩其過。有當助以補其不足。不可專以保元為則矣。然補與瀉之形色症狀。不可殫詰。何逐一指之。未必無似是之誤。約之於虛實之的。則靡弗齊也。虛則斷無熾熱之理。熱劇似寒。則有之。未有虛而熾熱者也。實則斷無皺濕之象。虛而乾樵。則有之。未有實而皺濕者也。是謂江河一點血。辨別虛實之妙訣。不必拘其便與食。戰與渴。作痒責

以氣交牙賁以血紛紜雜揉之象。悉於此而總括矣。痘無可議。漿忽停駐。此必因調護失宜。飲食失節。起居不時。香穢阻寒。是亦不可不察也。

論補氣

問痘如何用補氣。形色神情症悉虛。氣虛之痘。身不熱。縱熱溫和不非熾烈。胃寒伏火。儘多涼。形色現症是迥別。氣虛之痘。色不紅。縱紅嬌艷不蒼實。血虛血鬱。白恒多。非若氣虛終嫩色。肉虛不振。少克肥。或平或陷。根盤弱。皮薄肉軟。嫩溶溶。到得成漿。漿不濃。漿未收。偏瑣言 卷八 補氣 二 惠迪堂

稠濃頂未滿。進退浮沉。漿忽停。輕不肥。濃不蒼。蠟重。若錫皮如灰白。儘有漿色。亦堪回。到得收回。不能結。儘有漿薄。望堆沙而不堆沙。腫欲髓。亦有當頂如針。刺漏出清漿。頂陷白。亦有痂薄。痘疤凹。疤色淡白。無血澤。神情懶倦。語話慵重。語聲輕音。澁澁。氣虛之症。亦繁多。總無烈火灼皮膚。惟有濕潤無燥烈。脈微緩。弱無數實。此痘若還有別症。種種將來作虛論。不惟寒戰助元陽。痒癢方思固氣分。縱有似熱正由寒。寒極生熱。古論定。毒即雷連總屬虛。治毒亦須還養正。

呻吟不寐。莫猜煩。累日不解。毋虞結。眼封口久。非毒壅。求飲頻頻。豈火渴。推之疑似。且無差。明明虛症。尤易識。知其虛寒。看輕重。重不早圖。必虛脫。

論補血

問痘如何當補血。色不榮。今嫌淡白。囊發僅僅。非空飄囊。竟空。今補何益。盤昂。端附亦不厚。竟若無盤。難轉易。補血之功。較氣難。氣主神。今彼屬體。點點有形。難促致長。養工夫。由平素。放點一見。色欠紅。便慮成漿。漿不濃。漿若不濃。毒不盡。毒一不盡。多別症。即使收。偏瑣言 卷八 補血 三 惠迪堂

收回。騰必薄。痘痂。飄薄。疤亦白。凡見血虛。須預補。根得紅。今漿自足。漿足。收回。痂自厚。疤得榮。今皆血力。始終得血。體無虧。體若虧。今必令實。有孩稟賦。素血虛。有兒本質。多內熱。恒有痘與娘相逢。亦有痘與經相值。又有善。奴。慣腸紅。儘有疹後。痂方歇。此等皆令致血。虧。放點。雖紅。終慮白。血熱宜攻。毋問體。血虛偏宜。顧本質。欲審其虛。人必清。唇口溫潤。無燥烈。痘無點。雜其間。按其皮膚。無熾熱。不則縱使。色不紅。是為痘中血鬱。白的。真虛。芎與。婦。倍用酒蒸。淮熟地。

血鬱用芎反提火歸味辛香反助熱白芍酸欬尤不堪熟地庶幾終賦隔若使血虛兼滑瀉歸地潤腸亦不合惟有嫩鹿茸為良佐以川芎功莫及參芪同用亦相宜由來氣有生血力。

論實表

何為表勝裏是也何為實表固氣是也氣為一身之衛自主克塞外護勝裏氣虛于內則餒而不克衛護無力而致表虛表虛則勝裏不密而氣難存養氣又因虛而致虛而虛愈甚故表虛之痘客感易侵已發救偏瑣言 卷八 實表 四 惠迪堂 未發之時若有表症便當疏邪實表以豫防其起發不振起發之後痘之虛象立見便宜扶元固氣以豫防其痒痛之患藥得過半稍可以回即宜與欬令氣還元以豫慮其虛脫之地不拘痘之首尾兒之厚薄但看神情懶倦身體溫涼面顏皓白一便清利唇口不乾不燥凡此景象按之體膚有汗者是表虛也若有表邪不可專以疏散及見囊薄脚軟色或淡白或嬌紅漿清痂薄絕無燥熱雄猛煩躁乾紅板實壅腫之象即稠密毒盛不宜清涼亦不可專以解毒悉以

固氣實表為先稍兼佐理可也。

論健胃

人以飲食為命經云地食人以五味味有所藏以養五氣氣和而生津液乃成津液者誠資生之源成身之本也是以安幾則昌必得胃氣強健乃能受納故人以胃氣為本痘瘡初放便能食者是為裏實夫固為順即不能食毒尚未透邪害空竅故未之思未足為虞痘若已齊毒其盡行於肌表面而內空矣空則宜思儘有不食者其胃弱也何疑至於成漿則一身之救偏瑣言 卷八 健胃 五 惠迪堂 精神發洩於外一身之氣血耗散於痘其內尤虛矣尤賴飲食相繼濟其空乏庶克有終至此猶未作想即勸勉之而終不知味亦不能多安望其成痂而結局也宜以保元湯加山藥豌豆姜棗陳倉米以開助其胃如身涼躄倦重語聲輕漿清色白者保元湯加白朮木香當歸陳皮姜桂大棗陳冬米以醒豁之更有淡白皺濕如嫩腐皮頭溫足冷痂後目無精彩者前方更加熟附以振之痘若虛之劇者不必待其起齊成漿時方思開胃之地發始之初便當早為之計

者也。必須以痘為準。不見惡形。惡色不見。一切燥烈之象。以症為憑。不因毒侵火擾。不因一切閉塞之故。方可健胃。不則不可以常理論也。

附一治驗

丁巳先君治一痘。十二歲皮薄色淡。頂平脚癩。始以透發。繼而大劑保元湯。加芎歸淮地。膏得以成。兼至十朝不思飲食。主翁疑以過補。先君曰。果爾。漿必蒼老。痴必燥硬。體或煩熱。種種反是。焉得云過。以納穀散。重以參朮各五錢。胸膈豁然。胃氣大開。無物不想。收痴落靨而愈。

救偏瑣言

卷八

痘疹治驗

六

惠迪堂

論安神

心藏神。得血而寧。神寧則睡自安。安睡而神又足。兩相需而兩相輔者。諸病剝而之復。皆以睡中來也。血虛之癩。痘兼稠密。氣虛者。有儘血化漿。而血無餘地。血熱者。有腐爛作臭。而侵淫日久。皆有以致血空。虛而神無所養。恍惚不能收攝。而睡何能安。雖曰靜則神藏。寐固主靜。靜中之神不守。殆不令其藏矣。驗其症於漿必清。於痴必薄。色必淡白。體必溫涼。一

切燥熱之症。自不相涉。即血熱者。未必如是。然人必倦乏。目必少神。重語聲輕。色必乾焦。一切惟烈之象。自是銷鑠。症難悉指。類多如此。一似傾國之兵。一似強弩之末。總歸虛論。法當以安神散治之。兼別症者。隨其症而損益焉。要不外以安神為主。

附一治驗

戊午一錢氏女。年十五。適值經後。痘由甚密。鬆而囊薄。紅淡而乾。身體溫。和。人若失志。睡中時獨語。二三日。氣血兩虛。心神不足之症。始以養榮透毒。

救偏瑣言

卷八

安神治驗

七

惠迪堂

湯四劑後。痘雖起發。形與色俱不振。四朝即以保元托裏。人參每劑二錢。至六錢。黃芪四錢。至一兩。芎歸熟地亦俱重劑。服及十朝。漿僅七分。十二朝。寢食得半。痴不甚厚。疤欠光澤。十四晚徹夜不寐。語言不清。而無頭緒。父母疑以過補。使然。果爾。身必熾熱。氣必雄猛。痴必燥硬。渴而思冷。脈按洪數。有力。如是不寐。方是火毒內擾。種種反是。緣以痘本不足。而又值經後。明屬心舍空虛。以寧神解毒湯。加栝子仁。用參四錢。二劑即愈。

論血虛咬牙

齒者骨之餘。賴血榮養而得安。榮養而欲及其餘。其及亦不易。故其生也。獨後未衰而卽落。况血難盈而易虧者也。是以補血之功難。當養於平素。痘瘡初出。一點紅。卽血之體也。得血而載。得血而榮。血虛之痘。八九日後。其血悉爲漿耗。何能有餘地以榮養其餘。所以齒牙衰劇而相鬪也。此蓋血虛使然。以保元湯大劑。芎歸淮熟地。更用嫩鹿茸煎膏。以補其缺陷。斯爲良法。此必漿後而見。尤無毒火可踪。纔合是症。

救偏瑣言

卷八 血虛咬牙

八

惠趙堂

附一治驗

庚申一兒四歲。痘在八朝。漿色淡薄。而滯根盤紅。淡而乾。神倦而不容安。似躁而不能逞。身涼指冷。咬牙不已。兼有嘔意。寤可立待。厥父母呼天號地。始事者曾以保元。輕而無效。余用參三錢。芪四錢。嫩鹿茸膏。淮熟地膏。各半。蒸熟。附五分。佐以芎歸。外山查三錢。以行其滯。連進二頭汁。更以大桑葉一枚。服後。若時雨之化。薄者厚。淡者濃。滯者潤。冷者溫。咬牙頓止。神情遂開。嗣後去茸附。前劑分量。

減半。十二朝左臂發一痘。以忍冬解毒湯調治。收功。甲子以來。是症不概見矣。

論氣虛寒戰

痘瘡何自而寒戰也。寒則陽虛可知。陽虛則氣自不足。虛劇則戰自作。氣爲體之克。克達於外。則密護。裏所以爲衛。克實於內。則元陽中守。衝寒不冷。所以爲陽。痘故得以領達而出。毒故得以鼓溢而化。漿故得以成熟而黃。亦何寒戰之有。若氣虛而痘客。以有限之氣。而周給一身之毒。發始尚苦于不振。至毒出

救偏瑣言

卷八 氣虛寒戰

九

惠趙堂

一步內虛一步。痘得起齊。而中空矣。漿未稠濃。而發皇已盡。頂未滿足。而力量已虧。其不寒戰得乎。故氣虛之痘。於放點時。細察其無一切躁熱之症。皮薄色淡。頂陷脚癢者。卽宜預防是症。須知三禁。不宜寒涼。不宜疏散。不宜過發。於放白時。便當保元。稍兼解毒。務令養正。以化毒。症若已犯。以大劑參芪。佐以鹿茸。河車。稍加肉桂。寒極而戰甚者。更加熟附。以回陽。然必驗其囊窠。飄薄淡白無神。體倦人靜。甚則錫皮。灰白。鼓領。搥唇。皺濕如濕腐皮者。方合是症。

附一治驗

余荆已酉仲秋忽壯熱如火次日即見痘細如芥子色似胭脂余是時未諳此道先君以升麻葛根湯加蟬蛻山查牛旁而升發之二劑後狂煩譫語先君以犀角地黃湯加荆芥木通蟬蛻以大糸蟲一枚三劑後熱即和神即靜周身起脹而頂即白以見髮時毒火之易退聽如此時懷娠七月惟恐裏虛即以保元湯加芩芎淮熟地白芷姜蚕日投二劑每劑用參二錢其如痘密無縫氣血不繼至救偏瑣言 卷八 氣虛治驗 十 惠迪堂

八朝頭面灰白如錫皮通身渾如嫩腐皮無二搖頭鼓頰寒戰非常危在瞬息先君以參芪各一兩芩芎各五錢熟附二錢肉桂一錢熟地膏二盞傍晚接下戰即稍定沉沉睡去至夜半大有轉機醒來思食與粥兩碗不廢所欲次早又一劑午後通身漿足身體和暖不復戰矣前方去桂附參芪減半十朝腐爛作臭膿水淋漓以敗草散散之約用一斗飲食大進神氣日爽以參芎化毒湯全愈論胎前熱劑在所大忌况特附而重用乎然痘犯大

虛大寒而不權其當務之急勢必不起可有身外之胎乎母安則子安理蓋如此又當究其所以宜爾者以其灰也白也濕也皴也身涼而神蕭索也若是元極作戰而混治焉其害可勝道哉

論氣虛作痒

痘症惟痒最惡禁止能定者猶可以修為若身不自主必搔破而後已者是為外剝毒即入裏不治何以辨其為氣虛耶見點之後三日之間頂陷而兼囊薄身涼而復色嫩者是也然氣虛何以致痒耶蓋氣能蓄血而使歸附圓淨尤能鼓盪而使血化成膿膿成則毒解尚何痒之有哉惟是氣既已虛而血當其旺是血有附氣之能而氣無制血之力致血肆溢而不

救偏瑣言

卷八 氣虛治驗

十

惠迪堂

得歸附焉能化血而令成膿血味且鹹醃蝨皮肉而痒自不能已矣治痒之法一見其象即以保元湯加姜蚕白芷隨症宜加而佐之庶杜患于未萌之策如痒已作倍用黃芪而助氣稍加白芍以制血其痒即止鋪紅如錦者又當重加生地荆芥以清徹之悉用大桑蟲以鬆透其毒面上破傷者急以胭脂膏封貼

肢體難禁者。以荆芥穗研末。捲于紙條內。點火焙之。或以炒黃豆。蒸許一包。乘熱撲之。或以茵陳爲末。與爛紅棗同搗成餅。燒烟薰之。亦治標之法也。

附一治驗

嚴貞生兄。一公郎三歲。出痘于壬戌八朝。清漿未半。而痒沸。禁止不定。面幾破碎。眼將露縫。大便艱塞。糞少垢多。日去三四次。囊窠嫩薄。體不燥熱。紅暈則肆溢如霞。身無安放。所謂氣虛血旺者非乎。至煩解多垢。總氣虛不能化毒。毒不成膿。而故垢

救偏瑣言

卷八 氣虛治驗

上

惠迪堂

從便出也。急以胭脂膏貼其兩額。用淮生地五錢。安置其血。人參三錢。黃芪四錢。振作其氣。姜蚕白芷大桑蟲。爲催漿托頂之佐。白芍五分。束其遊行。山查四錢。木香三分。以行其滯。傍晚投服。即睡着。夜半又一劑。次早盤即歸附。漿即肥濃。眼縫推脂。正而推沙。便亦減半。嗣後收痧落靨。不脫保元清解。易若破竹收功。

論脾虛作瀉

痘犯氣虛。初朝以至七日候。一身之氣血。盡發於外。

內已空虛。嗣後之成漿收斂。所望于將來者。是在人事之調劑。以繼之。須知氣虛者。陽虛。以陽虛之痘。而陽發于外。內乏溫養。可知脾喜溫而惡寒者也。既失其養。宜預防其泄瀉之患。魏氏之保元。陳氏之異攻。宜量度而取之者矣。若已泄瀉。則真元傾洩。毒必乘虛入裏。反攻于內。變症蜂起。危孰甚焉。亦必察其輕重。緩急而因應之。如第不實者。可以參芪茯苓木陳皮。木香甘草姜棗以實之。如滑瀉者。前方加肉蓯訶子。以止之。如不惟囊薄而且皴。不惟色白而且灰。手指

救偏瑣言

卷八 脾虛作瀉

上

惠迪堂

稍冷者。氣血中宮虛劇也。前方重以參芪。加鹿茸。少許鴉片以振之。其或四肢厥冷。搖唇鼓頰而寒戰者。此元陽幾脫之象也。前方加桂附。回陽反本以奪之。是症與治。必詳察真確。而後施無不當。若減次伸之。症是一驗也。其或體熱燥烈。煩渴乾紅。焦紫痛楚。艱寒等症。即次數無度。純利清水。此是熱毒下利。不可言馬馳背也。自甲子以來。脾虛泄瀉之痘。間或有之。不概見矣。情乎知之者寡也。

又一治驗



馮素若一公郎三歲其時丁巳痘出甚密入靜身  
溫囊殼不老頂白而不肥盤紅而乾淡六朝眼合  
不緊鼻塞而鬆起而少脹夫固已見氣血兩虛矣  
七朝滑瀉日去三四次淡黃其色口渴不已停飲  
于中宮水聲漉漉又見土虛不能制水矣始事者  
因燥渴乾紅且囊殼無漿不敢實脾恐益其燥不  
知燥而實者火爍金也宜制陽光而金自平燥而  
虛者土不生金也宜固中央而燥自解况痘賴氣  
煦血化而成漿氣血之源在于脾胃今瀉而身溫

救偏瑣言 卷八 脾虛治驗 齒

渴而停飲紅而乾淡囊薄而靜種種不足見乎其  
間焉可齊其末而不揣其本也以實脾固本湯用  
參二錢加黃芪三錢薑棗連接二劑轉機及半  
又二劑十轉其七漿不甚濃却亦堪回嗣以五味  
異功散加防風白芍收結而愈是症今不概見矣

救偏瑣言卷之九

論痘變症有不常不古

痘於察形驗色之外其虛實寒熱則據症矣然形色  
不一症更繁多一形而數症因之者有之一色而諸  
症出焉者有之症之所以謂變也症因繁多而變又  
有變中之常變中之變常者與形色相符依日期而  
至其症著見明顯變者首尾偏峰與形色兩截其症  
深藏隱伏如痘屬血熱而實症迭乘痘屬氣虛而寒  
症竊發此變症之常也假令痘本實而症若虛痘本

救偏瑣言 卷九 論痘變症 一 惠迪堂

虛而症若實此變症之變也漿前而客症多端漿後  
而本症雜出此漿前為實漿後為虛之常變也放標  
而即餒乏不振結痂而猶熱毒留連此偏枯陷溺之  
異變也暗常不容作聰明變不可傍矩矱氣虛劇  
者無症不虛血熱劇者無症不實常症即愚者易知  
變者即知者當之苟不細細參合一一端詳亦有未  
易明焉者矣虛實寒熱之症自古有之但虛寒多而  
實熱者少實熱之症漿前猶多而漿後尤少至虛實  
寒熱之變似實熱而虛寒者容或有之似虛寒而實

熱者未之有也。自甲子以來。大運在於相火。故標以  
至落癩。虛寒之症。十不一二。臬毒烈火。十居八九。似  
火似實之症。百中無一。似虛似寒之症。無不皆然。症  
至於實熱。而似虛似寒。非至極不爾。以至極之症。工  
力有一未盡。尚棄升於九仞。令是非之界。不之明辨。  
工力先無所施矣。質焉從事。以規則是。傍不幾以非  
爲是。而妄投湯劑也乎。矧誤用溫補。人所易從。不至  
覆敗不已。如此殘害生靈。何其慘毒。總由於是非莫  
辨。余故列似是之症。詳辨于後。庶不至請燕而南向  
救偏瑣言 卷九 論痘變症 二 惠廸堂

痘症變幻總論

症莫暴乎血熱。血熱之症。發見者易知。隱伏變幻者  
難測。色似胭脂。便懶譫語。狂煩躁亂。唇烈掀腫。頰紅  
面赤。發渴不已。皮膚肉腫。痛楚難堪。形圓頂綻。一迎  
睜而莫掩者。至於血熱反常。似虛似寒。人不知之矣。  
有身涼色白者。有皮薄頂陷者。有昏沉如倦者。有四  
肢厥冷者。有寒戰咬牙者。有漿後煩解不食者。有痧  
後而夜不成寐者。有痘後而汗洩不已者。此等皆似

虛寒。而孰知非血熱之劇。不至如此。蓋緣熱伏于內。  
毒藏于中。以故難以測識。所謂陽極似陰。火極似水  
者也。據其色。猶必合其形。驗其外。猶必參其內。內外  
詳辨。容有未悉。更復察其神情。脈理。則其所疑似。而  
隱伏者。自莫能逃矣。氣虛難辨者。亦有之。終不若血  
熱之變幻多端。令人莫得其故。且痘至疑難。人多疑  
其虛。不疑其實。况痘易趨于補者。失補而致誤者。猶  
必惟此慘害生靈。迷而不覺。倍于虛者。十居八九。敢  
以似虛之症。辨之以鳴同患。此成敗之關。生死之界。  
救偏瑣言 卷九 論痘變症 三 惠廸堂  
未必無小補于痘也。

論火毒咬牙

咬牙屬血虛。症固有之。不知毒火潛伏於肝腎者。與  
血虛者更甚。毒火雖盛。暴厲而發揚者。當無是症。即  
伏而在別臟者。亦不患是。惟在肝。肝則藏血而養筋  
骨。在腎。腎則主骨而生肝。還以血養。是猶唇齒之邦  
兩相輔而兩相需者。况肝應春陽。腎應冬藏。升沉之  
臟。兩受其虐。而失其和。齒其妄劇。而自闕矣。猶是闕  
也。虛者聲鬆。彼則聲緊。虛者在於漿後。彼則於放點

時而即相憂痘當初放印血虛者血於何耗而便及此則其受虐於毒火也可知不必辨其形色症狀神情而已昭然矣但察其痘色嫩紅而熾熱者以清涼攻毒飲滅紅花以涼解之痘色乾紅或紫滯而身不熱者以涼血攻毒飲以透達之不拘嫩艷乾滯熱與不熱凡有諸般痛楚及內症凶暴者以必勝湯熨艷者滅桃仁紅花地龍乾滯者加紫草以攻逐之有出而未暢者通加大桑蟲蘆筍以透之成漿後者通以化毒丹調入牛黃珠末以解之至痘之日期體之厚

救偏瑣言 卷九 論痘變症 四 惠迪堂

薄不可執而論也。如王含叔之愛一證矣。不贅治驗

總 毒火深潛腎與肝 升沉二臟擾何安

訣 齒牙相憂聲何慘 透解潛藏自貼然

論血熱作痒

諸痛為實諸痒為虛。又云氣愈虛而愈痒。所以然者以氣本虛。毒原不熾。氣虛則正不勝邪。無以制化其毒而固然也。以故治痒之法。必從補氣。有血熱毒盛而痒者。大相懸矣。蓋熱毒壅於皮肉。氣為遏鬱。血被煎蒸。氣非不足也。鋼之則陷于無用。血非自熱也。灼

之則迫其遊行。血味且鹹。遊行皮肉。痒之所以作也。以清涼攻毒飲。滅紅花。量用大黃。重以石膏。生地。以涼解之。以殺熱毒之勢。庶氣血不受邪虐。氣得以化。血得以成膿。何患乎痒之有哉。是謂實者虛之。正。妙于實者也。今人不審虛實。執古方而泥成說。凡過。痒症。概以參芪投之。不應責以補之力。薄遂思重劑。以勝之。氣不受補。而毒火愈熾。愈熾而痒愈甚矣。嗟。夫。何異抱薪而救火也。然果何以辨其為毒火耶。曷。不觀形與色。內與外之呈見乎。同一色也。虛則白。而

救偏瑣言 卷九 血熱作痒 五 惠迪堂

實則紅。印同一紅也。虛則嬌而實則滯。色之不侔。已較然矣。再觀其形。虛者皮薄而濕。實者皮厚而燥。按其體。膚有溫涼熾熱之殊。察其神情。有倦乏躁亂之異。一殊途種種各別。更或兼之於痛楚。或熱如炮烙。若前方重以大黃。或色若胭脂。諸般失血者。前方加桃仁。正面稍有擦意。不拘破與不破。即以化毒丹。調入油胭脂。內用綿紙貼之。須令嚴防。勿使抓破。破而血得成流者。猶幸無恙。破而乾赤。皮如剝去者。無可生之理矣。凡放點時。熱一如炮。不分界地。或嫩紅。

或紫艷卽當預爲之地重以涼血急以清火內症猖狂者尤宜速與蕩滌不可臨渴而浚井也外有調護過煖助火而致痒者急令撤其重圍或減其衣被處之清爽而痘自安若黃憲副一公郎足證不贅治驗

總 實痒紫艷或焮紅 燥烈皮蒼毒火擁

訣 血被煎熬氣被遏 輕宜涼解重加攻

論熱劇寒戰

痘瘡寒戰似無區別孰知有先後之分關虛實之異

先寒後戰者寒極而戰虛劇之象也先戰後寒者戰

救偏瑣言 卷九 熱劇寒戰 六 惠迪堂

極而寒熱劇之象也故戰不可概以寒視寒不可概

以虛論也氣虛寒戰前已陳其概矣更以熱極作戰

戰極而寒者言之火之爲火其性甚烈其發甚暴喜

散而不受遏鬱火雖熾而發見者徧體皆熱矣雖熱

而身靜以火得順其性也熾而劇則遏鬱矣鬱則拂

其性矣以暴烈之性欲達而不得達則氣血與毒火

五內搏激其能免身之不振戰乎猶之水沸于火也

身雖戰振其而必赤其體自熱戰之不皆出于寒也

明矣火鬱回戰過鬱則寒是熱劇反見水化如強酒

於不能勝者反爲酒所寒矣酒性豈寒者哉夫亦因

其過而致反也身雖惡寒肢雖逆冷其氣必確其神

自躁痘必紫滯脉必沉數有力寒之不皆出于虛也

又明矣凡血熱之痘熱極作戰不問別症不拘首尾

熱如炮烙者以瀉黃散主之量症加減如身體反涼

更喜溫煖者熱毒深藏固閉也以散火鬆毒飲隆冬

加炒黑麻黃二分先達其伏毒火鬆透身必熾熱方

以瀉黃散清之或兼諸般痛楚或空竅失血或熱如

火熾皮肉腫硬者不拘熱與不熱必用大黃以宣暢

救偏瑣言 卷九 熱劇寒戰 七 惠迪堂

之庶不至毒火內擾而至攻潰也

總 寒戰陽虛自古云 熱極水化少知音

訣 若還悞認陽幾脫 火上重油禍匪輕

附一治驗

一兒三歲痘在八朝膿漿滿足盤暈焮赤忽生振

戰衽席皆動按其身熱如炮此亢陽作戰也以清

涼攻毒飲用石膏五錢生地八錢黃連一錢大黃

五分減紅花地龍犀角加姜一小片以行重寒之

劑連接二頭汁其戰卽止又二劑紅暈漸淡至十

二朝熱得和平。收功弗藥。

論熱毒下利

痘出於肌肉而脾為之主。脾氣實則精神內固而外旺。痘必易出易漿易靨。若泄瀉則脾弱而內虛矣。痘必有應至不至之虞。變症由此而出。而脾顧不重哉。以故泄瀉之痘。一切寒涼清解之劑。在所必禁。然非所以概熱毒下利之症也。熱毒太盛。其毒不能盡行肌表。勢必留滯而內擾。喜內實不受邪。侵注於大腸。大腸為傳送之官。不受毒害而第逼迫于中。頻頻下救。偏瑣言。卷九 熱毒下利 八 惠迪堂

火攻毒。使毒火不至內擾。而腸胃清寧。便不止而自正。脾不實而自實矣。若以瀉治毒火。愈熾愈壅。七日。前立見乾枯焦紫。而膿漿無望矣。七日後。餘毒無歸。胃氣閉塞。喘急煩躁。而終斃矣。賢賢焉。見其頻解。而不究其所由。亂施死方。我之所不解也。

總 熱毒衝腸。便自頻頻。喜腸傳送毒難侵。訣 頻頻欲解。仍艱塞。誤認脾虛。終內攻。

附一治驗

朱元卿一長公。幼時痘。犯血熱之症。自放點。以至

救偏瑣言 卷九 熱毒下利 九 惠迪堂

成膿。極其涼血解毒。清火漿甚濃厚。至收靨時。大便忽頻。日去二十餘度。至次日。難以數紀。乳母與婢輩。苦以穢惡不堪。嫌以寒涼太過。而然。烏知熱毒下利之理。果因寒涼。身體不宜熾熱。唇口不宜焦裂。神情不宜煩躁。痂皮不宜燥硬。今種種其然。脾豈虛寒者乎。以瀉黃納穀散。加地丁。金銀花。貝母。服至十四朝。左額頻起一大癰。如桃。大便即止。諸症減半。更以牛黃一分。珠末二分。調入化毒丹。內用貝母湯送服。十六朝。膿自口出。前方減生地。

加連翹甘草十八朝全愈是症難以筆記聊附其一以證其槩耳。

論胃熱不食

痘不思食固有胃弱而不納者。尤有邪熱犯胃而不思者。要其虛與熱之別。總以痘為憑。以症為準。痘屬氣虛為虛。痘屬血熱是熱。更參之於當下之症。與見前脉息一一而詳合之。自無不得矣。不可以日期為則。以漿前為實。漿後為虛。尤不可泥于胃強則納之語。而槩以虛論也。槩以虛論。固不可與語道。拘于日救偏瑣言 卷九 胃熱 十 惠迪堂

期亦非為調元之手也。何也。氣虛之痘。漿雖未行。其中氣已虧于不足。血熱之痘。漿雖克滿。而清氣尚受夫邪迷。又有自放點以至成膿。飲食不減。至漿後而胃氣忽閉者。漿豈未化而毒輕已化而反重耶。蓋痘之始終。合天地四時之氣。前七日其毒升發起脹。自內達表。猶春夏生長之令。毒不太盛者。其毒得盡行肌表。胃氣自清。其故飲食如常。七日後其毒成膿漸斂。自外收內。猶秋冬收藏之令。毒得盡淨而收。胃氣終清。若毒有未盡。痘隨火斂。是謂火褐。非正收也。火

毒內斂。胃得終于思食乎。其痘膿雖老而紅暈未收。痂雖結而焦燥難脫。身多壯熱。脉自洪數。與胃虛不食。遠隔參商。凡痘身熱未和。紅暈未收。漿雖極老。不可與斂。若與斂之。不啻胃受火閉。一項般般餘毒。不可勝紀矣。務宜重以生地。佐以黃連丹皮荆芥牛蒡。木通甘草。熱如炮烙。盤暈焮紅者。更加石膏。俟其火毒清解。聽其自收。自無不開之胃。如以始為熱而終為寒。始為實而終為虛。一以參朮姜棗之類以補之。如火益熱矣。今之不食之症。往往如是。若章繼翁之

救偏瑣言 卷九 胃熱不食 十一 惠迪堂 症。臧比老之即可鑿矣。外有飲食過多。或痰凝氣滯。與夫寒邪阻塞。暑熱干犯者。皆令不食。此痘外之雜症。非氣虛血熱之所致也。然以神情症狀。并日逐調護而審其故。昭然于心目矣。治驗不贅。

總 百凡飲食最為先 不食應知各有緣 訣 胃虛不食身涼靜 胃熱人煩體自炎

論火擾不寐

痘有夜不成寐。在七日前者。人皆知其為邪熱內擾。至成漿後者。皆責以心虛矣。豈不曰。血化成膿。而血

為之虛耗。膿成毒解。而邪熱俱已消融。不知血虛而火毒不甚熾者。理固然也。深藏猛烈者。漿非不足而漿不能盡其毒。火非不洩而洩未能罄其藏。外雖成膿結痂。而內之餘炎未盡。臟腑未得清寧。况心為君火。以火遇火。較之餘賊更不能容。且當收斂之時。非若漿前發揚之候。此蓋心被火灼而然。身必壯熱。人必強揚唇或燥烈。痂或燥黑。症亦不能枚舉。種種皆類是也。較之心虛不寐者。自是迥別。明者察其毒盛則解之。火盛則清之。或透肌。或涼血。俾邪熱得以洩救偏瑣言 卷九 火擾不寐 主 惠應堂

越有發痲疹而安者。有發癩毒而寧者。有於痂內復泛而得熟睡者。是皆毒有所歸。而神自清寧矣。尚何有夜不成寐乎。若以安神藥必收斂。是猶執熱而反令探湯矣。若錦宗兄小愛之症。一證矣。不附治驗。

論渴有虛實

總 火擾不寐始曾聞 漿後猶云論似新 訣 烈火燎原非易滅 莫輕斂志與安神 咽疾乾燥則渴。然乾與燥有虛實之分。乾為虛。而燥為實。均屬肺病。咽喉屬肺。肺屬金。金生水而畏火。金

虛則不能輪降。下之令猶之白露不降。水乏其本。華池乾涸而渴從之。其渴稍飲即止。俄頃又乾。喜熱而惡冷。聲音低小。脉必微緩。法當以補液湯。生其津液而渴自止。實則金被火燬。虛燄如爐。五液可竭。而肺更何言。其渴百杯未足。俄頃又燥。喜冷而惡熱。聲非啞而即厲。脉必洪數。法當以清金解渴湯。制其烈火而渴自解。虛與實之別。辨有未確。更合之于神情。症象。與夫痘之形色。一一而參考之。自無不得其真矣。

總 渴有咽乾肺屬虛 金虛補液自相宜

救偏瑣言 卷九 渴有虛實 主

訣 烈火刑金咽更燥 火清方得救華池

附一虛渴治驗

吾郡吳二公祖。一公孫。四歲。痘稠密而氣血兩虛。五朝以保元湯。加芩歸淮地。而得成漿。終不肥濃。八朝發渴。頻頻思飲。與之蓋許。即拒。俄頃又乾。身熱不壯。神情懶倦。便亦不實。以補液湯。加芪朮姜。棗。服及十朝。渴得漸解。脾氣亦實。減訶子黃芪。加茯苓白芍。十四朝。眼白起紅。疔多淚。以秦凱和鮮飲。減當歸牛旁。加甘菊穀精草。調治收功。

附熱毒發渴

同袍沈岸老一痘症。放點以至起脹。乾紅晦滯。平者半。陷者半。身涼而神却躁。頻頻腹痛。欲解不解。此毒火過鬱。使然以鬆肌活血攻毒。服及五朝。大便連去四五次。火毒一鬆。身即壯熱。而神靜。色轉深紅。發渴不已。重以攻毒清火。八朝放白成漿。險變為順。與一不預者同事。惟恐虛寒。繼至減大黃石膏二劑。前症復然。更多不寐。而渴更甚。仍如前方。十四朝漸安。渴解。十六朝調理收功。

救偏瑣言

卷九

熱毒發渴

古

附首尾燔熱發渴

顧韞翁老先生一公。即今佗老也。痘出四歲。屬血熱毒盛。放點色似臙脂漿。老盤猶燦赤。結痂燥硬。乾俛始終壯熱。煩渴。初朝即以涼血清火攻毒。進藥甚艱。服不及半。致熱毒難清。喜得進牛黃化毒散。不拒。日服錢許。自七朝服至十六朝。熱毒漸滅。幾一月始得全愈。熱渴難解如此。若魏氏論渴云。火非虛不發。一以保元湯加麥門五味。欲壯水之源。以制陽光。理固有之。其可以概施也耶。

論汗有補瀉

汗者。液之派也。腎之液。自毛竅出者為汗。汗之是亦水也。可知其本於肺之通調。四布而得潤乎。一身滋養。四體猶之白露下降。草木敷榮。是水藏則存而為液。疏則洩而為汗。洩則皮毛枯澀。鬱則肢體浮腫。寒則凝熱。則沸。液汗之故也。亦多矣。但以痘瘡之汗而言。症順則存而色潤。氣虛則疏而汗洩。火沸則汗湧如淋。不可專以氣虛論也。痘如淡白無神。身溫體倦。種種合乎氣虛者。當以實表為主。否則氣既已虛。而復汗洩於放標時。發必不振。繼必平陷。痒癢寒戰。灰白。悉如蜂起。當以保元八珍湯。減枸杞。加白芍五味。以收之。如其紫色乾紅。煩渴壯熱者。以其火擾于內。而故水沸于外也。不拘首尾。當以清涼攻毒。飲以清徹之外。有血熱之症。調劑得宜。不為毒害。至痂落時。而有此汗者。是餘毒無所容。以汗而解也。驗其因汗而適快者是也。固不宜飲。亦不宜清。惟以忍冬解毒湯。減紅花。加當歸足矣。不可以過求也。凡火擾而水沸者。七日前而誤飲之。梟毒閉塞。必成內潰。七日後

救偏瑣言

卷九

汗有補瀉

古



而誤飲之。餘毒不解。輕則纏延。疲敝重則一簣之虧矣。

總 痘汗如何云表虛 身溫淡白不克肥

訣 紫艷身燔為火沸 一虛一實少人知

附一治驗

一女七歲痘未見點。壯熱如焚。靜則燥炙如烟。一轉側而汗即沾衣。俄頃即燥。動即復然。次日見瘰。細密如麻。紫艷與紫紅各半。煩渴躁亂。以涼血攻毒飲滅山豆根。加紫草。服及四劑。顆粒分明。而汗

救偏瑣言

卷九

十六

即止。五朝頭面肥潤。七朝通身放白行漿。自上而下。景象頗佳。但烈熱如故。絕不思食。神情尚楚。前方服至十朝。胃氣畧開。夜卧將半。頭面收結。痂色乾燥。身上將騰。而紅暈未收。熱終未滅。前方滅紫草。服及十三朝。通身復汗如蒸。逾時而燥熱等症。與夫寢食神情蒙蔽之象。頓開矣。方易前方以忍冬解毒湯調治收功。然變幻之症。難以悉載。能以數項推類。以盡其餘。庶不為似是者悞矣。

救偏瑣言卷之九 終

救偏瑣言卷之十

論結痂

痘瘡行漿三日後。期至九十朝。其得膿漿飽滿氣足。血收。此陽極化陰為姤。時當收結矣。始于人中。以及兩頤鼻準。漸至地角。以至周身。未及巔頂足脛。次第收結。痂如鎔蠟初凝。厚而滋潤。是謂珠結。毒盡解矣。其餘可知。不須調劑。有等氣虛之痘。得補成漿。漿終淡薄。至此雖云收結。痂皮飄薄。神色枯淡者。謹防精神不繼。鮮克有終。以保元八珍湯。滅川芎。加山藥以

救偏瑣言

卷十

論結痂

濟其匱乏。更有土虛不能制水。濕潤不斂。漿水腐白。頭溫足冷者。前方滅熱地。加河車膏。茯苓白朮。以助其收結。如便不實而胃弱者。前方滅當歸熱地。加茯苓。陳皮白朮。渴者前方滅枸杞。加麥冬五味。睡不熟者。滅黃芪。加棗仁。紅花分許。餘可類推。所謂痘後無實症。總歸虛治者此也。有等血熱之痘。稠無隙地。得力于清解成漿。連成一片。腐爛作臭。煩熱猶在。痂赤猶存。終係邪陽太旺。不得陰氣收斂。而不能成痂者。以消癍快毒湯。滅蟬蛇主之。外以金蓋散。收其熱

毒亦有同于血熱。浸淫日久。至後氣血虛耗。不能收結。驗其煩熱。退聽神情。懶倦。腐爛處。內地與漿水。淡白者是也。以保元回漿散主之。外以細茶末以清其肌表。至有鼻毒。烈火。血熱之極。非不極其清解。其如烈熱未減。紅暈未收。膿囊便有欵意。謹防火。覆以成倒靨。以清涼攻毒飲。重以生地石膏主之。庶不至焦。赤黑靨。令毒復歸于內。更有從前失治。漿未成熟。血暈如霞。竟為烈火。燔灼已成倒靨。焦黑如煤。平者如螺。陷者成煤坑。間有老痂亦黑硬如鉄。如此等象。救偏瑣言 卷十 論結痂 二

者不可勝紀矣。僅記其一。以為觀鑑云爾。

韓人穀兄。去年有一公郎。三歲痘。十二朝。絕不思食。筋抽脈惕。徹夜不寐。始事者以胃弱心虛。以宿夜會受驚恐。藥以安神開胃而愈甚。邀余往視。痘甚磊落。第熱尚如烙。盤暈焮赤。膿囊大半為烈火。燔灼而焦。宛若螺靨。神情散亂。而毒已歸于內矣。其未變者。猶然圓綻肥黃。余曰。是痘熱毒未清。未宜收欵。以故如螺靨黑而又薄。是倒靨而非正收也。奈何。此友毅然曰。君不見其膿之滿足耳。膿救偏瑣言 卷十 論結痂 三

附一治驗

潘梅老五歲。一愛痘。犯血熱。十朝。壯熱未和。膿成未熟。紅暈未淡。而即乾收。宛如火燄。兩頤平欵。痂燥而薄。面猶赤腫。始事者亦知其為熱毒。已清解於前矣。第清而未暢。次日又便利作痒。似乎補瀉難施。謝事去矣。勢在纍卵。但血熱尚熾。症必因之。自無兩局。以滌除救苦湯。減大黃紅花。加地丁生地。外以牛黃一分。珠末二分。即以藥調送。兩頤以

胭脂膏封貼。服二劑而痒定。四劑後平陷俱鬆。燥黑者轉而滋潤矣。減青皮加金銀花。至十四劑。熱和神爽。大便頓止。寢食俱安。遂以忍冬解毒劑治收功。

論落膿

易痂易落。收口之佳境。然易痂有凶有吉。易落有吉無凶。以邪毒盡淨而無餘毒。痂故得一收便落。其犯大都榮潤。肌膚大都滑澤。亦有痂白不榮。陷而凹下者。此因氣血虛乏而然。非因易落而有此象也。

救偏瑣言

卷十 論落膿

四

以保元八珍湯主之。外此有爬肌抓肉。累日不脫者。有擦去痂有血迹者。有褪去兩邊中獨留一線者。有半掀起半咬緊者。有日久不脫。而痂凸起者。有四沿浮皮掀簇者。有身褪而頭面不褪者。或有血痂。或紫黯。或黑黯。或似茄花色者。痂不一。皆為毒火燔灸所致。身熱溫和。無甚惡症者。涼血解毒而清散之。身體壯熱而多惡症者。攻毒清火。重以涼血而散解之。輕則泛痂發癩發疹而愈。重則發癩發疔而解。痂落之際。症亦多端。總以痘為準。餘毒作祟。治毒為主。毒

盡元虛保元為要。縱有實中虛。虛中實。亦權其緩急。輕重而因應之。不可遺其重且急。而反迂務其輕且緩也。若執以痘後無實症。總歸虛治。誤之甚矣。

論餘毒

餘毒者。痘瘡未盡之毒也。痘瘡毒化而成漿。漿老而成膿。膿成血盡而毒解。氣血虛者。血不盡。患漿不成。膿膿成而毒盡矣。熱毒盛者。漿不患不老而患血未收。血收而毒解矣。氣虛之症。行漿時或失于內拒。拓而尚有未足。或人力極盡。而氣血其如虛劇。幸

救偏瑣言

卷十 論餘毒

五

不至灰白平陷。漿蓋不能老而成膿。餘毒有所不免矣。血熱之症。行漿時或失于涼解。或依傍日期。而解之不早。或慮寒涼太過。而工力有未暢。或循規則而反接溫補。或極其周酌。而毒火其如雄烈。幸不至紫陷乾焦。而膿或板黃。即鬆而或燥。即潤而紅暈尚有未收。或收而未盡。帶火收結。餘毒尤有所不免。更有甚焉者矣。痘有氣虛血熱之分。順逆險三途之異。而餘毒亦然。驗其毒不紅腫。身涼體靜。或神情懶倦。其得飲食進。而睡臥安。毒山小而小且軟。痛楚不甚者。

屬虛而順者也。以參歸化毒湯而調治之。

毒若大而白。平而板。不能起發。愁容可掬。靜而忽躁。神情終倦。涼而忽熱。未幾復涼。能食而不能強。能睡而不能熟。兩目有神。神思能定。此屬虛而險者也。以加味內托十宣散治之。庶得以潰而成膿。而毒其化解矣。

毒不拘大小。按之板實。白而帶青。神思昏倦。痛楚難支。兩目無神。口出涎沫。體欲靜而不得。聲欲出而難揚。此虛而逆者也不治。

救偏瑣言 卷十 論餘毒

六

血熱之辨。何如有發癩。有發疹。散于周身。布于四體。一發而即身涼體靜。神情爽朗。此血熱之順者也。其未發之前。熱必不免。睡必不寧。痲必老。色必燥。而血必不全收。神必旺。而氣必粗。此發癩發疹之機也。不請者。以膿成。可以收斂。以收結。可用調補。致毒不得發洩。往往有輕而變重。重則有不可知之患矣。不拘已發未發。均以消癩快毒湯而一清徹之。可無不瘳矣。若癩則毒聚矣。毒併於一處而發。勢必潰而得解。其

毒紅腫發於四肢。面有兩脇。熱不甚熾。寢食如常。亦險而順者也。以活血解毒湯主之。

發於兩額。腦後。胸背。環跳等處。身體壯熱。痛楚殊甚。毒大而且板。則險矣。然得板而不硬。大而紅腫。熱雖壯而體不燥。痛雖甚而不至難支。飲食與夜臥。居半亦無大害。以前方加地丁。白項地龍。并蜜湯調服。寒金化毒丹以治之。

發於百會。太陽。少腹。上下。及穀道。湧泉等處。板而更硬。紅而帶紫。更有凝結成疔。形似螺肉。毒黑而堅。根深入肉。不拘是癩是疔。燥熱如炙。飲食不思。徹夜不寐。此險而逆者也。癩則內服寒金化毒散。疔即以此散調入油胭脂內。以綿紙攤貼。中留一頂。疔則用銀針挑鬆四圍。亦如癩之貼法。不必留頭。次日有膿水來。用軟絹拭乾。將此散糝入四圍。仍以胭脂膏貼好。又次日復如此法。俟其疔褪出。竟以此填滿復貼之。以疔潭長滿而止。二毒通。以必勝湯治之。庶可保全生命。

救偏瑣言 卷十 論餘毒

七

藉令發于咽喉。當心腰脇。不論小與大。疔與癩。癩則

按之硬而青黯或紫黑疔則大如錢聲啞氣促神情躁亂兩目傍惶如畏刀鋸如見狼虎惡聞人聲惡見人形或身涼而乾噤或身熾而肢寒症難枚舉凡此等症痘即屈指可數痂落無遺亦禍不旋踵矣。

外此毒聚于肝則目起翳障或兩目掀腫內背膿血淋漓或有如猪膽汁有過期不開均以撥雲散治之不可點洗外治之法眼科規則之劑以療之毒必不消火必不散而眼廢矣。

畱於脾於上則唇裂掀腫堆結如煤動即血流血即救偏瑣言 卷十 論餘毒 八

燥結於下則注入大腸下利惡垢猶之滯下之疾如漆如膠有純下鮮血痛楚不堪若以瀉治則枉死矣以滌除救苦湯治之便血者加生地血紫滯而堅凝者加桃仁艱塞之極者倍大黃滑石痛極者亦如之更加赤芍。

畱于胃則口内生疔或牙齦腐爛甚則穿腮落齒漸入咽喉名爲走馬疔一日爛一分十日爛一寸以忍冬解毒湯加黃連山豆根佐參桔梗以治之外吹消疔解毒散。

有熱毒上壅巔頂諸陽會集之所時值炎天臭惡蒸潰爛生蛆者以清涼攻毒飲治之剪其髮去其蛆以金銀花煎湯淨之或金蓋散或黃金散研入冰片青黛而外治焉。

有餘火畱于肺津液不能上行咽喉乾燥音啞而發時值隆冬表邪未盡風邪與熱毒鬱于皮毛至收靨時發出如炎天沸子名爲水珠毒以清肌散毒治之。

餘毒般般總不越一虛實中來也虛者真元不繼實者邪毒畱連痘至收痂一身之精神發皇于外兒體之實者且虛况虛者乎此時火清毒解而擬調治詎不晏然即毒有未盡僅屬強弩之末補中帶解亦無難事至若仍然清解復用寒涼猶然蕩滌似屬理之所無而實勢所必至斯亦難矣故治痘難治偏峰之痘尤難偏于虛者難于始偏于毒者難于終漿前恐櫻其毒而孰知不豫則廢漿後防其虛脫而孰知當如除惡者矣人言百日是痘蓋謂惡痘有潛藏之毒也虛實之辨必究其真不令有似是之誤斯爲盡善。

救偏瑣言 卷十 論餘毒 九

如毒色白而身涼者似虛。合之于唇裂逆血非虛也。頻解不食似虛。合之于腹痛乾嘔非虛也。羸瘦日久似虛。合之于氣雄壯熱非虛也。寒戰咬牙似虛。合之于面赤燥熱黑硬乾痂非虛也。毒色紅而時躁時熱者似實。合之于兩眼倦開重語聲輕非實也。便閉思飲似實。合之于唇白而潤不見裏急非實也。多言妄語似實。合之于四肢不舉重語聲輕非實也。餘毒不一。合之于平而塌涼而軟非實也。似是之症非語言所能罄者。惟在于會心者得之。得其真實真虛。而更

救偏瑣言

卷十 論餘毒

寸

權其緩急輕重治餘毒無餘蘊矣。

附一氣血兩虛餘毒治驗

已未有一陳氏子四歲痘甚稠密而且一齊湧出。但得分珠頂平脚塌囊薄色淡。人靜身涼種種犯氣血兩虛之症。四朝乘氣血尚未離散。即以保元湯。人參一錢。芪錢半。加芎歸淮熟地山查。六朝頂起而囊不蒼。盤紅而色終淡。眼欲合而未緊。鼻將塞而猶通。進不勇者防退速。前方倍以參氏加河車鹿茸二膠。方得行漿終不能肥。九朝寒戰漿色

腐白前方重以參四錢。芪六錢。更以熟附六分。肉桂四分。漿轉肥濃。十朝漸收漸結。寢食漸安。見景象得轉。以艱于進藥。姑恤停止。十二朝忽眉宇不開。是晚臥不能安。次日曲池二穴俱發一疔。其色淡白。按之不熱。拂之痛甚。以加味內托十宣散。四劑後方紅活。三日後不潰。亦不退。以參芪錢許而故淹滯。如前重以三錢。一劑即潰。左肩與右肋又起一毒。紅腫且熱。以毒未盡。故復發此。得氣血振作。故熱而紅腫。是期十八日矣。前方減參芪俱半。

救偏瑣言

卷十 餘毒治驗

寸

以胭脂膏塗貼。畱出其頂。漸消平復。聊記其一。以見大意。血熱之餘。已散見于前不贅。

娠婦痘

娠婦出痘。平順輕懸者。以安胎為主。兼治其痘。是百病以未治之之謂也。安法不外于保脾。養血。寬氣道。清子宮等項。然放標時。則以寬氣為重。而帶升發氣。鬆則痘亦易透。升發亦無病于胎。兩全無害之道。寬氣如陳皮。川芎。酒製香附。大腹皮。蘇梗。或蘇葉。升發如蟬蛻。桑蟲。荆芥。牛旁。山查。桔梗。甘草。乾葛。或升麻。

之類起齊候。則以清子宮為重。而帶涼解。清則與痘  
適宜。涼解與胎適合。有並行不悖之妙。如黃芩山梔  
生地。依參甘草清之屬也。如連喬牛旁木通黃連荆  
芥山查涼解之類也。行漿時則以保脾為重。而帶排  
膿痘之成。膿本于血。血之根本出于脾。保脾正催漿  
之地。如茯苓白朮砂仁陳皮甘草保脾之要劑也。如  
人參黃芪木香糯米大棗姜蚕白芷催漿之首藥也。  
回漿時則以養血為重。而帶飲陰胎之所養。全賴乎  
血。血之所有皆耗于漿。補血且得陰收之義。如當歸

救偏瑣言 卷十 痘婦痘 三

白芍丹參以補其不足。如茯苓米仁防風甘草以助  
其收結。擇取金銀花牛旁連翹。依參貝母等味。以稍  
解毒。此蓋語其常。非所以論其變也。藉令痘犯氣虛  
囊薄脚散者。豈得拘於胎前母氣滯。而必以蘇梗蘇  
葉乎。荆芥乾葛無論矣。錫皮皺濕者。豈得拘于子宮  
宜清。而必以黃芩梔子乎。連喬黃連無論矣。更有頭  
溫足冷。灰白寒戰者。豈得拘于胎熱則動。置桂附而  
弗講乎。僅以參芪苓朮何能砥柱也。藉令痘犯臬毒  
烈。火血受其殃者。如紫艷礬紅等色。失血內痰等症。

氣受其虛者。如貫珠攢聚等形。躁亂燔熱等症。勢必  
制其亢。攻其毒。今氣血歸于和暢。乃得化而成膿。若  
泥于百病。且安胎。惟知胎以血養。血以脾統。而不治  
其毒。必得胎前之毒不治。而自解則可。不則妊其燔  
灼。聽其內攻。可有身外之胎乎。痘症本輕。妄投重劑  
胎必受之。胎損而母亦隨之矣。痘症惡極。劑雖極重  
毒其受之。毒解而胎自安矣。凡病權其輕重緩急。重  
在務本。不得專事其末。急在除邪。不得迂務其本。得  
其要領。總歸一道。

救偏瑣言 卷十 痘婦痘 三

附一失治之戒

有一許氏之室。懷娠四月。身忽大熱如火。不一日  
而見痘。稠無隙地。細碎如麻。躁亂不寧。胸膈迷悶。  
痘隣于逆。所可取者。色得微紅耳。猶在初見。余欲  
攻毒導痰。兼清肌疏透。庶幾內赤一鬆。得分顆粒。  
未必非挽回之一機也。厥天惑於不韻者之言。執  
意不欲。予辭弗藥。九朝而斃。而胎卒墮。其所以墮  
者。豈脾虛血弱之故。烈毒內攻。熱血煎熬。臟腑且  
潰。而胎有不墮乎。况小產者亦多矣。何常墮而必

斃則知其豎也以毒而斃亦以毒也歟

附一懷娠山疹治驗

一友朱良老其闈懷娠六月出疹于隆冬躁亂不寧燔熱如火道中一友以寬氣養血安胎為主佐以甘桔牛旁蟬蛻荆芥疏肌透發三朝疹非不透熱終如火熾渴不已嗽而增喘徹夜無眠至五日不惟不寐并不能就枕不惟喘急并不能出聲面如土色目睛直視手指厥冷渴想西瓜六脉絕無影響其娠迫下小腹痛楚難禁身無安放立刻可

救偏瑣言

卷十 娠婦治驗

古

斃舉家但願得母無恙足矣余始弗藥惜其未得一對病之劑覺有不忍為熱腸所迫以大黃五錢石膏一兩滑石生地各七錢炒黑麻黃三分佐以赤芍丹皮牛旁荆芥地丁木通甘桔以蘆筍煎湯代水一劑後諸症稍緩偏覓一大西瓜陸續以濟其渴又二劑其疹又透諸症減半而娠不迫下矣前方減麻黃仍以二劑而頗頓轉喘定而得伏枕熱湯亦殺大半娠即安然但咳嗽不止前方去大黃赤芍丹皮減石膏滑石及半加依參花粉黃芩

金銀花二劑熱渴俱平胃氣大開據垂懸重

而復生尚須調理見安和而遂弗藥越數日後娠

復不安但不迫下飲食減半復有餘熱口内生疳

以消癰快毒湯減蟬蛻丹皮赤芍加金銀花天花

粉佐以消疳散吹之全愈是症所用湯劑據常格

胎前所大忌者而得既保其母并安其娠見有病

受不第無損于胎正見所以安之之妙疹與痘雖

異其所異者惟氣虛痘耳若烈毒之症原同一軌

令是症但留其母猶畏大黃等味利害並存尚費

救偏瑣言

卷十 娠婦治驗

古

惠迪堂

躊躇竟爾子母俱全凡志醫者可不深思而潛玩也耶有懷娠而宜峻補回陽者若余荆之症可徵矣不贅治驗

痘後調護宜謹

痘後表裏俱虛調護悉宜加謹一有疎漏以實接虛病即終身不拔非細故也最要有五一節飲食飲食不節脾氣受傷脾係一身根本之地精神生發之源有因過飽終身不能多食者有為一物所傷終身不能一見者有因偶爾失調致脾氣不實遂成痼疾者



皆能致肌肉不長。面不華色。然此尚屬日後久遠之慮。曾有東林陳九巖兄。當年一公郎痘已收功。喜食。因眼因過愛而不之禁。縱及筋許。遂致腹脹如毯。噦不絕口。一懷抱而更加喘悶。以手扶其肋下。坐于膝上而已。極其撫摩而不稍息。以和脾宣化飲。投及三劑不效。舉家徬徨。追悔無地。余思藥雖對症。賴脾運化。叫噦幾及一晝兩夜。神其散矣。仍以前方加參三分。助脾運化。外以山查二兩煎湯代水。服及逾時。兩眼矇矓。有睡意。因得漸漸懷抱。竟爾睡着。自午及申。收偏瑣言 卷十 痘後調護 六 惠迪堂

醒餘。大解極多。所食未化者幾半。遂得開爽。調理而愈。幾乎有意外之變。飲食不謹如此。一防客感。痘痂初褪。腠裏開洩。直抵筋骨臟腑。六淫易襲。起居一有不謹。輕則傷而重則中。非泛常感冒可例。恒有寢食如常。神情如故。絕無介帶。而卒然昏暈者。其由此也。若韓尺老之長郎。可鑒。不贅治驗。一戒煩擾。痘後精神盡發于外。縱得歡容笑口。僅脫離苦境之象。精神氣血。尚未之復。必得靜養。可致儘有愛而不當者。戲弄而引之。致其喜以爲喜。不知傷

其神矣。卽房闌舉動。亦當以靜爲貴。去年胡漢老。三歲一長郎。痘方初起時。值炎天。以房不寬暢。移于廳後。左右紙窓。日光耀目。痘眼初開。何堪當此照耀也。余令以青紗蔽之。嫌氣悶而弗聽。且頻頻煩擾。非弄其笑。卽以換衣撲粉。殆無寧刻。欲其適體。不知傷神何地矣。苦口論之。全不入耳。次日兩目上竄。率唇鼓頰而斃。

一體寒暄。天時冷熱不常。痘後之體。又難調攝。衣服之間。稍冷卽傷榮。過煖卽傷氣。或驟寒而不之加驟。收偏瑣言 卷十 痘後調護 七 惠迪堂

熱而不知減寒。與煖。大人不覺。痘體受之。較常人十倍矣。有因寒而卽寒。熱似瘧者。有因熱而卽神情昏憤者。難以悉指。由不體寒暄之故也。富貴之家。過煖更什居八九。不知過猶不及也。一戒好潔。房中幃帳。衽席。自是宜潔。至痘兒之體。自頭面及身。以至手足。任其穢則穢。任其臭則臭。究其所以日久而穢臭猶存者。以收斂之局未盡也。收斂未盡。精神猶在于肌表。而未還元。欲滌其穢。而反以滌其神。如之何其可也。更有可畏者。體膚柔嫩。猶蠟

皮蛇骨之餘。輕則皮毛若刺。重則湯氣入裏。當急腫脹。可立而待。有一兒痘將一月。其母愛潔。竟濯之以湯。而且暢其浴。次日徧體浮腫。喘急而莫救。可不慎歟。

### 痘前諸瘡宜急治

諸般瘡瘍。在痘前者。務宜急治。必愈為貴。萬一與痘相值。痘即極順。降而為險矣。險自可知。以痘之最惡。無如外剝外剝。必由于癢。瘡則未有不癢者。痘即可免。而瘡為之招。連痘亦沸然矣。或得蒼老稀疎。間瘡

救偏瑣言 卷十 痘前宜急治 六 惠迪堂

而由者。即瘡或可禁止。設若稍密。其必連瘡四畔。攢集其窠。以瘡為窠矣。水從下流。毒從虛發也。至痘起脹時。浮浮一片。無分瘡痘。一擦而身無完膚矣。雖有善者。何能濟其患哉。世人不諳者多。恒置而不問。有誤認瘡痘。總是一毒。反暢其發。以為稀痘之計。不知痘係交媾。慾火之毒。感于娠之先者。瘡乃成孕之後。受母腹之積熱。或生下後。濕熱流火所發。與痘絕不相侔。累月經年。何能致稀一粒。亦有瘡後而果稀者。適相湊也。與瘡何與。又有無稽之言。云嬰兒體膚柔

嫩。瘡藥一及。滲入骨髓。發痘不出。舉世訛傳。誤人不淺。但治瘡有法。當以漸而施。先於胸腹。次日肩背。又次日四體。結末頭面。治其一。緩其三。周而復始。以愈為度。乃為良法。不則治之太驟。柔體不勝。反致變矣。不可不知。

### 附治驗

余甲寅生一兒。百日內生肥疥瘡。曩時亦惑于人言。而不敢治。漸漸通身布滿。無容針隙地。日夜啼號。乳食減半。余思痘固當慮。尚在日後。而况未確。

救偏瑣言 卷十 痘前宜急治 九 惠迪堂

瘡毒如此。猖獗危在旦夕。孰緩孰急。當務自在。選合掌丸如前法治之。內以忍冬解毒湯。減紅花。加黃栢。生地。玄參。治及半月。而愈。後來出痘頗密。而透發甚易。人言不足憑如此。嚴琢菴老先生。吾宗。備如茅突。故兄諸公。郎俱百。日內生胎毒瘡。其瘡成暈。成圈。中低陷。而圈浮突。宛如梅毒。目之可畏。有透臍者。有在耳畔者。有透肛門者。餘處難以數紀。俱以牛黃八寶丹。五分之一。日進二服。外以化毒丹。調入胭脂內。一一貼之。

週時一換更佐以忍冬解毒湯加羌活依麥黃柏  
桃仁赤芍減紅花與丸間服乳母忌魚腥麵食薑  
椒奕故子幾百日而愈倘如子愈而復發幾及兩  
載而痊惟嚴先生所藏牛黃金光寶色川中亦不  
偶者內服與外治兩倍於二千不及兩月全愈嗣  
復出痘皆收功無恙

臧頤渚老先生孫廣師兄之子也生雙胎先下地  
者三朝便生毒瘡細似針沙赤如紅霞三日後連  
成一片一擦而膚剝去徧體如焚以痘前瘡當任  
救偏瑣言 卷十 痘前宜急治 三 惠迪堂

其生不事醫藥十數朝即斃其次焉者於十朝後  
亦發此瘡與前無異予曰是瘡於母腹中受積熱  
積毒而發名爲血霞瘡治之不早有性命之憂不  
但不利於痘也余言及此追悔無已云初生者昨  
已斃于瘡矣今治之可無恙乎余授雙仙化毒丹  
并牛黃八寶丹二方一治其內一治其外而愈厥  
後出痘何嘗受治瘡之累如此治驗難以筆記聊  
存一二以證焉爾

誤治之戒

吾郡有爵尊望重年逾五旬者一鄉紳止有一  
郎兩月內生胎毒瘡與前三症宛肖竟憑老嫗  
尼之言以痘前瘡宜發不宜醫反令乳母食魚鮮  
雞笋以發之其瘡日盛延一不韻者以是瘡似梅  
毒與大人梅毒同治用川椒一兩全蝎五錢與奶  
母假道于乳亦妄與震拔其毒服及過半其瘡愈  
大因愈突陷愈深隙地復增血點細瘡無不徧滿  
熾熱如火膚赤如霞目紅口燥徹夜煩擾邀予往  
視勢猖獗矣以兩月芽兒如是之毒如是治法不

救偏瑣言 卷十 痘前宜急治 三 惠迪堂

覺爲之愴然予大戒其乳母忌口急錄牛黃八寶  
丹方令速修合將如治三家之法治之容或可挽  
先以消癰化毒湯減蟬蛻二劑後猖獗之勢亦得  
稍緩嗣復聽卜云爻象無咎但別有天醫以余方  
爲廢紙老嫗輩仍復主張將所餘震發之劑罄盡  
當忌之物大啖遂至不救惜哉

失治之戒

姚世所老先生三歲一愛瘡將愈矣惟兩小肢至  
足尚未結靨而痘繼之九朝漿及下部痘與瘡宛

滅一片。浮浮痒泚。十朝愈甚。兩肢交擦。和波刮去。痛狀可慘。惜頭面及身成痂。過半。因兩足作楚。連垂成者亦歸于敗。十一朝而死。瘡之惡也。如是夫。

論大黃

有客過余而問曰。伏火伏毒。非消解之能事。攻之固不容已矣。然大黃之力。斬關奪鎖。爲蕩滌之將軍。元臬毒火。當之尚爾。退聽於氣血。則獨無所憐乎。氣血若磨。孰爲領載。孰爲化解。而能爲其功也。予曰。不然。有病則病受。病受其藥。則銷鎔其邪毒。邪毒銷鎔。則救偏瑣言。卷十。論大黃。三。惠廼堂。氣血不爲邪毒桎梏。而融通灌溉于痘矣。不第於氣血無損。正以救護氣血之地也。邪正相乘。一負則一勝負。既在此。則勝自在。彼但當衡其輕重。所重在補。養正則邪自除。所重宜攻。驅邪則正自復。何虞氣血之受損乎。

蕩滌之法。古來不數見也。問有用者。不過錢許至三錢。一劑至二劑。要不出便閉者方用。便利即止。若錢許以至兩許。自放點以至落痂。甚至瀉利者。用之而便反實。有純利清水而攻猶未已。是豈索

隱行怪好奇。示異哉。奈世運變遷。甲子以來。痘毒迥別于前。是年曾有一痘。磊落粗綻。肥紅光澤。圓滿如珠。目之者咸贊其爲狀元痘。予按其身熱如火。口中乾膩。予思痘象固佳。不宜熱渴如此。謂其父曰。是痘氣血強旺。又得內無伏毒。外象故好。然熱渴太甚。火毒非輕。速宜涼血清火。不可懈也。此人全不之信。不事醫藥。至九朝帶火。乾收燥硬。焦痂。有如瀝青盤。暈肆溢。有似紫霞。喘急躁亂。而莫能挽矣。以如是之痘。縱失醫藥。亦何至於此地。乃

救偏瑣言

卷十 論大黃

三

惠廼堂

竟以一熾熱。一膩渴之嫌。便同於逆。可遁而推之。熾熱而更頂陷者。當何如。頂陷而更紫滯者。又何如。紫滯而更稠密者。又何如。稠密而更加貫珠堆簇者。又何如。貫珠堆簇而更內多惡症者。又何如。是知清解所不効者。當破其凝滯之毒。而佐之以清解矣。至破滯而不能取勝者。當進而攻其伏藏之毒。而佐之以散達矣。放點凶惡。攻之而起脹。得

以清徹則已。起脹未應。攻之而成漿。得以暢遂。即止。乃至有收結而始盡淨者。有落痂而始霍然者。

然其所以然者原非有怪異也。前之毒盛者至起脹時毒盡發于外。所謂毒出一步內虛一步。至行漿時痘稠密者惟有氣血不繼。故必以保元為要。一失內拓必至白陷。灰陷錫皮皴濕氣離血散而敗。今有毒盛者恒多伏藏于內。輕則內擾。重者內潰。內擾者猶可以清解疏達而起。即有不應蕩滌之而自鬆透矣。若內潰者臟腑糜爛。藥即金丹亦為無用。而况清解乎。故內毒甚者無論發始半途即結尾收成。餘殃未殄。當如除惡務本。必期于盡。

救偏瑣言 卷十 論大黃 五 惠迪堂

但盡之之法。又當察其輕重緩急而因應之。不可執成見于我也。純熟於此。不特險之重者得以轉危就安。即鄰于逆者。施功於已發未發時。儘可挽回。若腰如被杖。叫喊不已。空竅失血。蚤癩蚊迹。紫背浮萍。纏腰兩截。托腮鎖項。睜毛倒豎。稠密細碎。面目豫腫等症。前賢往哲。列于不治之條。皆可以起。尤宜治之於早。乘毒無定位。內未受攻。乃克有濟。若至三日期。其內已受攻。亦無如之何矣。

論石膏

石膏名為白虎湯。火池燃桐油。調敷痛即如失。性最何如其寒也。人有言疹要清涼。痘要溫。岑連犀角尚不敢輕投。恐傷脾胃。用之而且兩訐。更有始終不撤。不惟無傷於脾胃。而更得益焉。何也。喜溫之說。前人言氣虛之痘。若犯血熱。熱而且甚者。內煎熬而外沸。騰五內之地。其銷燦重則為其焦枯。蓋以先天毒火。火而出之於毒。不啻一熱而已。毒而濟之於火。其猛烈當何如也。石膏雖大寒。僅足以制其亢寧。有餘寒而傷及于脾胃乎。儘有落痂之後。火邪盡淨。

救偏瑣言 卷十 論石膏 五 惠迪堂

復起牙疳。目生翳障。但有未盡之餘。不見有過寒之症。總不越有病病受。若使中病即已。不必盡劑。容可過乎哉。何為中病。假令身熱如火者。熱和為中。大渴不已者。渴緩為中。紫艷嫩紅者。紅活為中。何為未中。如口熱如爐。空竅失血。唇焦舌黑。狂煩譫語。其勢未殺。病猶未中。雖多何畏焉。藉令泥古方。拘日期論劑。數則誤矣。

論諸尾血

諸血皆補。惟此血最活動。而搜剔凝結之瘀。所以產

婦多有食之取其能破敗惡露也。論痘非血不載。非血無漿。況補血之功不易。何反取其破敗為哉。毒熱透者。血得載毒而出。痘雖稠密。色必紅活。自無凝滯之患。若毒火雄烈。萌動卽熾。血遇之卽凝結而瘀矣。血本載毒者也。瘀則連血亦為毒血矣。不第此。瘀為毒已也。一有瘀毒。并周身之血。悉為此毒攝伏。而不得灌輸於痘。以故痘有空殼。以故有與肉色一般。此痘之最惡者也。如女人懷娠。通身之血。朝毓于娠。上乳下經。皆絕響矣。不則天下有無血之孩乎。其次則救偏瑣言 卷十 論猪尾血 美 惠迪堂 乾紅晦滯。紫艷乾焦。或蚤癩蚊迹種種皆內瘀之符也。然此瘀非猶夫血塊癥瘕之類。無論小大皆係殺瘀攻毒。但小則日期緩。大則日期迫耳。緩則桃仁地丁紅花赤芍亦能取効。迫則必需于此猪尾血。固能破瘀而出自尾尖。尤為活動緊關之處。而且取破血下流之義。得水片為佐。開洩腠裏。通達內外。內結散而外滯疏。此瘀一活。則一身之血皆得灌輸于痘而立轉紅活矣。是以血活血。猶之以血補血。草木之味。烏能及焉。如用之輕必盞許。重則四五盞。或十數盞方

可取効。如方書所云一二點。此亦習聞而未能經驗者也。

### 論濁陰

何為濁陰。無價散。雞矢醴。人中黃。人中白。童便。秋石。金蓋散。金汁。糞青。女人經布。男婦裙襠之類。均為濁陰。辛甘為陽。苦寒為陰。輕清為陽。重濁為陰。此等穢惡。尤為陰中之陰。濁中之濁。痘犯烈火。苦寒所不能勝。非此莫制。予孟兒喉間忽然腫痛。身卽躁熱如焚。俄頃而音聲卽啞。咽傍有兩蛾相對。如圓眼。大先以救偏瑣言 卷十 論濁陰 美 惠迪堂 蘆刀刺之。令出惡血。色甚紫滯。予見勢重。卽以大黄石膏黃連荆芥牛旁生地甘桔木通連服二頭汁。不應。滿腹如火炙。不醒人事。前方用大黃五錢。生地石膏各一兩。日服三頭汁。如此服過三日。勢不稍殺。而且日甚。燈與幃帳相去丈餘。畏明若刺。口中譫語。音啞。不知所訟。如此三日。所服之劑。水之交。石子思陽光烈火。非苦寒所能駕馭也。遂想濁陰以勝之。濁陰之中。無如雞矢。雞矢之中。惟糖而若乾。醬者為最。此又濁中之濁。陰中之陰。能治疔瘡立効。其濁陰無匹。

可見取有尖頭者佳以六一散調為丸如菉豆大男  
以六一散一二匙研入米泔少許為衣以掩其臭且  
得以開洩竅脈用燈心湯送服一二刻後從來燥熱  
如火忽爾身體振戰汗洩如漿發出一身惡疹與牛  
皮癬一般自來疹子無癩及回後偏身脫下痂皮如  
厚油紙而諸症悉愈若非此品斬將募旗以奪之諸  
藥終歸無用一奪其勢諸藥亦與有力焉濁陰能制  
陽光先言堪世則矣人畏大黃為將軍石膏為白虎  
此症用及各有勛餘如水交石賴此開先而始奏效  
救偏瑣言 卷十 論濁陰 天 惠迪堂  
所以藥貴對病寒熱攻補是在用之者何如耳

瑣言備用良方

清肌透毒湯 治痘瘡已發未發為風熱所感

阻塞者此湯主之

荆芥穗 三分 乾葛 八分 前胡 一錢 桔梗 四分

甘草 二分 山查 二錢 蟬蛻 三分 加薑一片

直達透肌散 治痘將出未出無甚外感亦不至內

傷但身熱嘔吐眸子眊焉者此湯主之

蟬蛻 山查 陳皮 前胡 葛根

加薑一片嫩苧頭一個

救偏瑣言 備用良方 一 惠迪堂

溫肌透毒散 治痘已發未發為寒邪固閉者此湯

主之

防風 五分 麻黃 蜜炒黑 三分 川芎 八分 蟬蛻 三分

山查 二錢 桔梗 三分 甘草 二分 陳皮 六分

加薑五分

寬中透毒飲 治痘已發未發而飲食內傷者此湯

主之

山查 三錢 青皮 六分 葛根 四分 陳皮 五分 前胡 八分

萊菔子 七分 桔梗 三分 蟬蛻 三分 麥芽 一錢

加薑三分

疏肝透毒散 治痘前驚跌而發搐者此湯主之

僵蚕炒四分 蟬蛻一分 薄荷二分 鈎藤六分 青皮七分

木通三分 前胡六分 山查二錢 羌活四分 荆芥三分

加燈草一分薑二分

清熱解毒湯 治痘放點乾紅色滯壯熱煩躁者此

湯主之

荆芥穗 紅花 蟬蛻 木通各三分

牛旁一錢 丹皮 青皮各七分 生地二錢 山查二錢

救偏瑣言 備用良方 惠迪堂

滑石三錢 前胡七分 地丁四分 黃連六分

加燈心一分

調中湯 治未痘時先因吐瀉裏虛隨感時行見痘

日晡低陷神情困倦者此湯主之

人參五分 陳皮四分 蟬蛻三分 川芎八分 甘草二分

扁豆一錢 枸杞一錢 穀藥六分

加薑二分大棗二枚此權宜之劑也精神稍

醒即當加減

涼血攻毒飲 治痘毒火肉伏煩渴躁亂身體反涼

救偏瑣言 備用良方

痘色紫滯羸紅徹夜無眠者此湯主之

大黃二錢 荆芥穗五分 木通四分 生地四分 丹皮

紫草各一錢 赤芍八分 葛根七分 蟬蛻四分 青皮七分

生地四分 紅花四分 加燈心一分

慈肌通聖散 治痘腠裏阻塞血凝氣滯窠粒隱隱

於肌肉之間痘色乾紅晦滯神情悶悶者此湯

主之

羌活 荆芥 紫草 紅花 木通

赤芍 地丁 青皮 牛旁 山查

救偏瑣言 備用良方 惠迪堂

蜂房 當歸 防風

加蘆笋胡荽

清涼攻毒飲即黃散 治痘瘡大熱如火紫豔深紅煩

渴顛狂者此湯主之

石膏三錢至一兩 黃連一錢至三錢 大黃三錢至六錢 木通

紅花 荆芥穗各四分 牛旁一錢五分 犀角三分

丹皮一錢 青皮七分 生地五錢至一兩 地丁一錢

加燈草一分

清暑透毒湯 治痘值酷暑神情煩悶不時哈舌大



渴思冷澀然汗出或身涼如暈痘瘡淹滯此因暑氣閉塞故也此湯主之

陳皮 厚朴 各四分 葛根 三分 洋瀉 香薷 各五分

黃連 七分 滑石 三錢 青皮 七分 蟬蛻 三分 甘草 四分

扁豆 一錢 加燈心 一分

疏邪實表湯 治痘屬氣虛皮薄色淡身涼體靜兼

有表邪外束者不拘漿前漿後此湯主之

黃芪 防風 荆芥 甘草 川芎

白芷 桔梗 加薑一片胡荽一錢

救偏瑣言 備用良方 四 惠迪堂

必勝湯 治痘血瘀氣滯窠粒實而不鬆痘色滯而

不活或乾紅或紫黯或癩點諸般痛楚或貫珠

或攢簇毒火兩伏此湯主之

大黃 小劑七分至三錢大劑三錢至一兩

青皮 五分至 桃仁 二錢至 紅花 五分至 赤芍 錢半

木通 三分至 荆芥穗 三分至 葛根 三分至

生地 二錢至 牛旁 七分至 白項地龍 三條至

紫花地丁 小劑三錢中劑七錢 蟬蛻 二分至 六分

山查 大劑一兩小劑五錢 薑根 三兩三味煎湯代水煎

既濟湯 治痘火毒太盛時值隆冬閉塞此湯主之

荆芥穗 麻黃 去根蜜炒將黑 葛根 石膏

黃連 大黃 蟬蛻 牛旁

加薑二片芫荽一錢陰陽水煎

清金攻毒飲 治痘毒壅于肺聲音不清喉間痛楚

煩渴壯熱痘不起者此湯主之

桔梗 甘草 牛旁 大黃 佺參

前胡 枳殼 山查 蟬蛻 僵蚕

山豆根 荆芥穗 加燈草一分

救偏瑣言 備用良方 五 惠迪堂

涼膈攻毒飲 治痘熱毒壅于上焦胸膈煩悶壯熱

發渴揭衣棄被痘色紫艷深紅者此湯主之

大黃 黃連 石膏 荆芥 地丁

佺參 黑山梔 赤芍 生地 桔梗

木通 甘草 牛旁 薄荷 枳殼

加燈草一分竹葉三十片

消癰快毒湯 治痘有夾疹夾痲膚紅如醉者此湯

主之

連翹 佺參 生地 牛旁 木通

蟬蛻 丹皮 荆芥穗 黃連 甘草

地丁 赤芍 極熱者加大黃

加燈心二十莖

窮源透毒散 治痘瘡毒火深潛累日不起色有乾

紅有紫滯或煩躁或昏沉身體不熱者此湯主

之

大黃 青皮 穿甲 紫草 婦尾

地丁 木通 牛膝 羌活 荆芥

紅花 加蘆筍十株

救偏瑣言 備用良方 六 惠地堂

錢氏百祥丸 治痘瘡黑陷便閉裏實者

紅芽大戟不拘多少煮極軟去骨日中曬乾復于

原汁中煮盡汁焙乾研末水跌為丸粟米大每服

十九至二十九研赤芝蘇湯下

神應奪命丹 治痘瘡毒盛透發不起者

劈砂一兩囊于白紗內外配升麻麻黃各五錢紫

草連翹各一兩四味同入紗囊中於砂鍋內用新

汲水將柴柴火煮一晝夜取出辰砂研末仍將煮

砂藥汁將綿瀝清晒乾為末聽用

麻黃不去根節蜜酒拌炒焦色地上出火氣八分

蟬蛻洗淨去足翅一錢紫草酒洗三錢紅花子一

錢五分真蟾酥五分穿山甲酒拌炒一錢五分共

研細末用猪尾血杵為丸桐子大週歲者一九二

歲者二九其餘三九為則酒漿化服厚蓋取汗擇

天醫生氣日合

散結湯 治痘血滯氣滯色乾紅而裏不鬆者

青皮 羌活 赤芍 紫草 地丁

山查 荆芥 升麻 川芎 木通

救偏瑣言 備用良方 七 惠地堂

牛旁 丹皮 加蘆筍十株鮮芋頭三箇

養榮附氣湯 治痘窠囊蒼老婦附不厚而淡白者

當歸 熟地 川芎 紅花 生地

甘草 加薑一片

寶氣飲 治痘血至而氣不至婦附則厚卵殼不長

或平或陷而不克肥者

丹皮 荆芥 青皮 山查 穿甲

牛旁 木通 赤芍 僵蚕 蟬蛻

加蘆筍十株臨服和大桑蟲

瀆榮散 治痘氣至而血不至郭飽滿而根窠

者

紅花 歸尾 紫草 丹皮 荆芥穗

地丁 牛旁 木通 赤芍

加地龍三條臨服和猪尾膏半盞

滌邪救苦湯 治痘毒火下注大腸邪毒逼迫欲解

不解毒垢穢臭無倫者

黃連 大黃 牛旁 紅花 滑石

木通 躡蛻 荆芥 澤瀉 青皮

救偏瑣言 備用良方 八 惠迪堂

赤芍 山查

加燈心二十莖陰陽水煎

萬兩黃金散 一名無價散 一名四聖散 治痘瘡氣為毒滯而陷

血為火灼而黑者

人糞 猪糞 猪糞 犬糞

臘月收取四糞乾結者用礬糠火煨黑存性

為末各等分研細以蜜水調服每服三分至

七分

猪尾膏 治痘瘡細如麻芥實而不鬆黯而不活諸

般惡形惡色惡症累日不起者

取小雄猪尾尖血少則蛤殼多則一盞以絹絞淨

每盞和梅花冰片二厘仰調于煎劑內服以痘轉

為度如小猪不得即大者亦可

養榮透毒湯 治痘瘡血虛淡白并囊窠不起者

桔梗 甘草 當歸 川芎 熟地

紫草 山查 躡蛻 木通 穿甲

加蘆筍十株

蟻針法 治報痘有紫硬有黑陷有歪斜并諸痘內

救偏瑣言 備用良方 九 惠迪堂

色紫黑根腫硬獨大于眾痘者用之

取水蛙大者放于患處將蛤殼合于蟻上用軟絹

束之吮出毒血次以藥胭脂膏封貼如無此物以

銀針挑破令奶母含金銀花汁以吮之

散火糞毒飲 治毒為火鬱不能透發色紫滯而囊

不鬆者

荆芥穗 丹皮 木通 連翹 防風

赤芍 露蜂房 紫草 青皮 牛旁

山查 加燈心半分

平順清解飲 痘至起齊不犯氣虛無甚血熱稍用

清解者以此湯主之。

桔梗 甘草 山查 僵蚕 木通

連翹 紅花 牛旁 白芷 生地

加炒占米百數粒

托裏無憂散 痘至六七日身不熱痘不燥亦不甚

紅。囊不克肥者。以此湯主之。

黃芪 人參 甘草 僵蚕 白芷

桔梗 當歸 川芎

救偏瑣言 備用良方 十 惠迪堂

加炒占米 大棗

賽金化毒散 治痘內有伏毒啼號不已經日不起

并發癰發疔者。以此散用蜜湯調服。痘若受傷

或攢簇堆聚。或報點鼻惡。乾焦紫黑。板硬等象

悉以此散調入油胭脂內。用綿紙做如膏藥樣

以貼之。

乳香 沒藥 各一錢 山汗 川貝母 去心 雄黃

黃連 天花粉 各一錢 生用 大黃 半炒半煎 各二錢

甘草 七分 赤芍 二錢 水片 一分 牛黃 二分

救偏瑣言 備用良方

珠子 四分 研極細 以無聲為度

保元八珍湯 治痘一切氣血兩虛。囊薄色淡。身涼

體靜頂平頂陷。漿清皺軟者。此湯主之。

人參 黃芪 甘草 當歸 淮熟地

川芎 枸杞子 山查

外加薑二片炒糯米百數粒

回陽返本湯 治痘氣血虛劇。皮薄漿清。錫皮灰白。

虛惕寒戰者。此湯主之。

人參 黃芪 鹿茸 酒炙。切片。用當歸 酒煎。有配藥

救偏瑣言 備用良方 十一

川芎 肉桂 甘草 山查 熟附

外加大棗二枚

寶脾固本湯 治痘脾虛滑瀉。此湯主之。

人參 白朮 茯苓 木香 廣皮

訶子 炙甘草 肉桂 完穀不化者 加麩製用

外加薑棗

納穀散 治痘神不煩熱不熾。痘不燥。而飲食不思

者。此湯主之。

人參 白朮 茯苓 廣皮 山藥

七四五

炙甘草 外加陳倉米大棗煨薑

瀉黃納穀散 治痘邪熱犯胃唇口燥烈口中膩渴

甚至舌起芒刺。喉黑如煤。漿後身猶壯熱。種種燥熱而不思食者。此湯主之。

石膏 黃連 生地 丹皮 木通

甘草炙用 生甘草 牛旁 山查 荆芥穗

重者加大黃 外加燈心

補液湯 治痘津液不足而發渴者。以此湯主之。

人參 麥冬 五味 訶子 桔梗

救偏瑣言 備用良方 七

甘草

清金解渴湯 治痘金被火燬而咽乾口渴者。以此

湯主之。

石膏 生地 黃連 桔梗 荆芥

甘草 牛旁 連翹 葛根 天花粉

加燈心 莖竹葉 片

安神散 治痘後邪毒淨盡心虛不寐者。

人參 棗仁 茯神 甘草 當歸

麥冬 白芍 栝子仁

加燈心 蓮肉

清宵忘書飲 治痘邪熱擾亂心神不寧。夜不成寐。

不拘首尾。以此湯主之。

黃連 丹皮 生地 木通 甘草

荆芥穗 黑山梔 加燈心 竹葉

硃砂六一散 治痘出炎天。煩渴不寧。或熾熱紫艷。

心胸煩悶者。

嫩滑石水飛淨 生甘草為末。桑皮紙篩過。一兩 辰砂澄過。五錢

涼燈心湯 調服或雪水梅水俱可。

救偏瑣言 備用良方 七

金蓋散 治痘腐爛不收。和皮脫去。以此散撒在褥

席上。令兒眠上。若以絹袋盛之。通身撲之。亦可。

取黃牛糞尖。晒燥。焙燥。火煨黑。存性。研細用。

滋肌散 治痘漿足半靨。紅暈未收。壯熱未和。以此

散包于絹內撲之。

滑石六兩 甘草二兩 藜豆粉三兩

為極細末用。

水楊湯 治痘板實不鬆。或紫紅或紫黯。八九日不

行漿。甚至作痒者。以此湯浴之。

取水楊柳連枝帶葉剉斷四兩長流水十數杓煎  
 十數滾去查將三分之一傾于脚桶內以手探之  
 不可太熱亦不令太溫先以應服之藥服之而後  
 浴其湯漸漸添下浴後以紬絹收乾逾時以燈照  
 之隱隱鬆浮漿脚動矣冬月宜於帷帳中更備脚  
 爐旺火于兩旁不使寒侵為妙○此柳生於水灘  
 四月間纔有其柳不生旁枝長者三尺許粗者如  
 細篠其葉較垂楊葉尚厚帶有白意至五月葉下  
 開細細紫花者是此名水楊柳非忍冬藤亦非等  
 救偏瑣言 備用良方 古

開柳樹也須預備風乾得用其性最能活血脉利  
 筋骨大人有患拘攣手不能握足不能步者用酒  
 煎服不能酒者水煎其効有靈氣

保元回漿散 痘有身涼體靜漿不滿足膿囊漸稠  
 至收靨自是不齊此湯主之

人參 當歸 甘草 黃芪 白芍  
 米仁 茯苓 加薑棗

活絡透毒飲 治痘收靨時熱毒留連恐容可掬將  
 來餘毒在所不免却不易來者以此湯預活之

救偏瑣言 備用良方

羌活 紅花 荆芥 牛旁 木通  
 當歸 牛膝 蠅蛻 青皮 連翹  
 外加地龍

忍冬解毒湯 治痘痂初褪大局無虞厄少榮潤熱  
 欠清和防餘毒竊發者此湯主之

金銀花 土貝母 甘菊 荆芥穗 牛旁  
 紅花 甘草 木通 連翹 地丁  
 外加胡桃

撥雲散 治痘後熱毒在肝兩目通紅甚至起障生  
 翳者以此湯 備用良方 圭

生地 黃連 木通 荆芥穗 穀精草  
 甘草 赤芍 羚羊角 大黃 一分至三分  
 木賊 甘菊 金銀花 羌活 望月沙  
 加燈心白芙蓉葉

消疳解毒散 治痘後牙疳

薄荷 五分 兒茶 一錢 冰片 一分 人中白 三錢  
 天花粉 一錢 甘草 五分 青黛 水滸 錢 黃連 五分 牛黃 一分  
 珠子 二分 雨前茶 五分 白朮 一錢

研極細以無聲為度先以濃茶拭淨方吹

加味內托十宣散 治痘後餘毒白而不紅平而不

起按之不熱愁容可掬此本氣血兩虛漿不滿

足而致乎毒也以此湯主之

人參 黃芪 當歸 牛膝 金銀花

甘草 白芷 羌活 紅花 木通節

川芎 皂角刺

加胡桃二枚

回藥合宜散 痘瘡血收漿足別無燥熱之症以此

救偏瑣言 備用良方 共

湯飲之

白芍 防風 米仁 甘草 茯苓

山查 扁豆 加大棗

溫粉撲肌散 治汗出不止者

黃連 貝母 牡蠣粉各五錢 粳米粉一升

共磨細末包于絹內撲之

百花膏 治痘收靨燥熱痧皮濺起作痛者

蜂蜜不拘多寡大約四兩配大黃細末一兩和滾

湯攪勻以鷄翎拭之亦易落

快肌膏 治痘值炎天膿漿燥實偏體如霞煩熱如

火身無安放者

生大黃晒燥為末一兩敗草散五錢調入猪膽汁

宜薄不宜厚以鷄翎輕輕間拭之不可通身塗滿

牛黃八寶丹 不拘已痘未痘嬰兒諸般惡瘡惡毒

此丹有靈氣

牛黃二分 珍珠四分 劈砂五錢 川黃連三錢

犀角各三錢 羚羊角各三錢 雄黃五錢 青黛三錢

川貝母炒三錢 水片二分 琥珀二錢 羌活三錢

救偏瑣言 備用良方 七

佞參五錢 乳香各三錢 沒藥各三錢

右十五味如法製為細末聽川外將揀淨金

銀花二兩 甘菊一兩 甘草五錢 胡桃肉二兩

紫花地丁連根帶葉理淨勿雜青苔則斷二兩 長流水五碗 砂

鍋內慢火煎至及半取汁將查絞乾以綿濾

清桑柴火熬膏入煉熟老蜜蓋許再熬至粘

筋將前末和丸每丸三分一歲左右者日服

一九三歲左右者日服二九蜜調服

秦凱和餅飲 痘瘡收靨厚而滋潤寢食俱安可以

非藥而調理和鮮者以此湯

金銀花 七貝母 牛蒡 山藥 扁豆

山查 荊芥 當歸 人參 甘草

加核桃肉蓮肉

麥疴化毒湯 治痘餘毒留連氣血虛弱何以取驗

淡白不振身涼愁困者是也

人參 當歸 黃芪 甘草 金銀花

牛膝 紅花 貝母 山查 皂角刺

白芷 加胡桃肉

救偏瑣言 備用良方

和脾宜化飲 治痘後飲食過傷氣壅飽悶叫噉不

已者

廣皮 萊菔子 半生 前胡 卷舒 炒

大腹皮 去黑 麥芽 山查 煎湯代水

雙仙化毒膏

麻油二兩 錦紋大黃一兩 對片 麻黃 去根 五錢 對斷

將二味入於油內煎至如煤之黑取油去查於水

盆內頓出火氣 將煮熟雞蛋十箇去白取黃於

小銅杓內細細糊碎熬至黃沫泛溢繼而焦黃至

極焦黑青烟將起油將來矣漸有穢道以盡為度

亦於水盆內出火氣與麻油合併濾清聽用

復用大黃一兩一半晒燥一半與風化石灰同炒

炒至石灰如桃花色去灰取黃地上出火氣共為

細末 松香五錢為末入于葱管內用苧絲紮葱

口于銅杓內煮葱黃熟去葱取松香為末 川黃

栢去粗皮淨五錢一半晒燥一半將猪膽汁炙透

共為細末 青黛水飛五錢合煎藥總調于藥油

內其搽法如擦合掌丸以漸而施

青手之方

七