

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一〇〇七・子部・醫家類

- 衛生家寶產科備要八卷〔宋〕朱端章撰……………一
- 女科百問二卷 產寶雜錄一卷〔宋〕齊仲甫撰……………一〇三
- 丹溪先生胎產秘書三卷〔元〕朱震亨撰……………二一七
- 萬氏女科一卷〔明〕萬全撰……………二四七
- 胤產全書四卷〔明〕王肯堂撰……………三二三
- 傅青主女科二卷附產後編二卷〔清〕傅山撰……………四三一
- 女科經綸八卷〔清〕蕭壘撰……………五一七
- 女科輯要二卷〔清〕沈又彭撰……………六七三

衛生家寶產科方目錄

卷一

產圖

入月安產圖

體聖祖御名子借地法

禁草法

禁水法

產前將護法

產後將護法

逐月安產藏衣并十三神行遊法

催生符

符貼式

保生圓

當歸圓

當歸建中湯

卷二

孫真人養胎論

徐之才逐月養胎方

烏雌雞湯

補胎湯

艾葉湯

黃連湯

雄雞湯

茯神湯

菊花湯

調中湯

阿膠湯

安中湯

麥門冬湯

柴胡湯

葱白湯

杏仁湯

芍藥湯

葵子湯

半夏湯

豬石湯

丹參膏

甘草散

千金圓

蒸大黃圓

滑胎令易產方

卷三

論初妊娠

竹茹湯

人參散

地黃圓

阿膠散

保安散

神妙千金圓

論欲產并產後

琥珀散

催生通靈散

七寶散

牡丹飲子

單方黑神散 芍藥湯

定痛散 四順理中圓

玉露散

卷四

二十一論并增入十八論 郭稽中附方

黑神散 蒲黃黑神散

奪命丹 勝金散

清魂散 見現圓

增損四物湯 調經散

七珍散 調中湯

越痛散 麻仁圓

黑神圓 固經圓

巨勝湯 大巖蜜湯

小續命湯 濟危上丹

論臨月將息

論新生小兒 并小兒方肆道

注唇膏 巨蔻散

蝎梢散 治齁喘

累用經効方

大聖澤蘭散 奪命褐散子

地榆降血飲子 大安胎飲子

吳白朮散 滑胎榆白皮方

催生并死胎方 難產方

橫生逆生方 四道

妊娠煩悶胎熱方

妊娠傷墜胎動方

胎動口噤唇青方

胎動下血心腹脹方

產後血暈方 四道

產後中風方

產後發狂方

產前傷寒方

卷五

產科雜方

催生如聖散 救生散

單胎散 二聖散

產前諸方	十二月產卧藏衣吉凶圖	妊娠食忌	難產逆產橫產	產後諸證用藥例	臨產	姙娠	虞氏備產濟用方	卷六	產前所忌藥物	宣經圓	續添產前產後十八論烏金散功效	神散功效	十八論中治產前產後諸疾黑	血竭散	地黃散	薑粉散	養活散
		入月借地法	胎衣不下		產後	入月			烏金散								黃金散
																	香連散
																	香脂散

金花散	桃仁散	地黃散	麒麟竭散	烏金散	又方	燒鹽法	又方	勝金湯	又方	產後諸方	神効催生丹	催生安胎救命散	催生神効聖功散	又方	保生圓	又方	蟹瓜湯	川芎散
當歸散	川芎散	牡礪散	千金散	金黃散	黑散子	百草霜散	漬小便方	又方	又方	又方	催生如聖圓			順元散	五積散	人參圓	又方	枳殼湯

人參散

四神散

香桂散

當歸散

柿湯

荊芥散

陳梅散

難產方十二道

逆產方八道

橫產方六道

胎衣不下方七道

治產前產後痢疾方

許學士產科方

滑胎枳殼散

內補圓

木香圓

白朮散

紫蘇飲

下死胎方

琥珀散

佛手散

愈風散

交加散

蒲黃散

護胎方

又方

麻仁蘇子粥

鹿屑湯

治婦人死胎不下方

卷七

胎孕方

人參白朮散

千金半夏茯苓湯

枳殼散

陳逍遙水酒散

檳榔散

治胎不穩方

治姙娠墜傷胎動方

治胎動已死未死方

千金蟹爪湯 又方

葱白湯

白朮散

治姙娠傷寒大熱胎不安方

治姙娠傷寒大熱令胎不落方

治姙娠小便卒不通方

又方

產前方

榆皮滑胎散 黑神散

催生桂散

治難產或橫倒胎死方

治難產胎衣不下方

又方

又方

易產方

小琥珀散

下死胎方

下鬼胎方

治草蓐或產後血暈五絕中

風方

產後方

牛膝湯

當歸建中湯

聖功川芎湯

琥珀黑神散

通宣圓

八味黑神散

烏金散

劉寄奴飲

當歸一味散

荆芥一味散

秤槌酒

豆淋紫酒

產婦忽患寒熱方

治產後傷寒惡露不行方

傷寒產後惡露為熱搏不行

宜服抵當湯桃仁承氣湯

桂心牡蠣湯

增損柴胡湯

人參散

治產後惡露不絕方

治產後洞泄惡物方

治產後下痢赤白膿血方

產後傷食宜服食藥感應圓

治吹妳腫硬方

治吹妳或兒絕妳後乳腫疼方

萬金散

通用四物湯

追命散

卷八

形初保育

小兒初生將護法

擇乳母法

乳兒法

乳母雜忌法

哺兒法

浴兒法

拭兒口法

斷臍法

灸臍法

裹臍法

甘草法

黃連法

豬乳法

藏衣法 剃頭法

襪謝法 初生不作聲

初生不喫奶 初生吐不止

初生有懸癰病

初生有重舌

葛氏肘後治卒重舌方

初生着噤

翰林醫學差充南康軍駐泊張永校勘

衛生家寶產科方目錄

衛生家寶產科備要卷第一

產圖

八月安產圖

凡產於八月一日貼在卧閣內正北壁上

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布凡逐月安產藏衣避忌神煞方位並隨節氣更換候交得次月節即換次月產圖

凡產訖棄潑穢污不淨之水並隨藏衣之方所向不拘遠近棄之切忌向閉肚之方也

體聖祖御名子借地法

東借十步 西借十步

南借十步 北借十步

上借十步 下借十步

壁方之中四十餘步安產借地恐有穢污或有東海神王或有西海神王

或有南海神王或有北海神王或有
日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅
招搖舉高十丈天符地軸入地十丈
令此地空閑產婦某氏安居無所妨
礙無所畏忌諸神擁護百邪速去急
急如律令勅

禁草法鋪草及氈褥訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之
銅一言得之鐵母子相生俱篋鐵急

急如律令

禁水法欲產時貯水呪曰

南無三寶水 水在井中為井水
水在河中為河水 水在器中為淨水
水在法中為真水 自知非真莫當真水
以淨持濁 以正治邪

日遊月殺 五士將軍

青龍白虎 朱雀玄武

招搖天狗 軒轅女妖

天吞地吞 懸尸閉肚

六甲禁諱 十二神王

土符伏神 各安所在

不得動靜 不得忌干

若有動靜 若有忌干

施以神呪 當攝汝形

阿佉尼阿毗羅莫多梨婆地梨沙訶

產前將護法

按諸家產論去凡婦人妊娠入月不

可沐頭濕冷流于足太陽之經多令

子橫逆不順誠之誠之又切忌飲酒

恐產時心神昏亂臨產之時不可令

傍人喧擾大小倉忙慮致驚動產母

祇可令熟事產婆及穩密謹卓老成

親密三兩人扶持產母初覺腹痛且

宜任意坐卧勉強飲食恐致臨產氣

力虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可

按節次漸服滑胎榆白皮散壹貳服



服藥之法切勿太早須得其時又傍人不得逼迫且須令人扶策徐徐而行若行步稍難即凭物而立須更扶策再行直至腹痛連腰相引作陣痛頻時即服催生丹壹服更且勉強扶行陣痛轉甚難以行立認是產時將至即服催生符畢然後安詳上草上草之時切勿傷早若太早則子在腹中難以轉側又須子細體候直待兒



逼欲生然後令抱腰也抱腰之人不得傾斜則兒得順其理自然易產也又有卧產者亦待卧定背平着蓆體不偃曲則子不失其道苟或不能依此節適必致產難縱或幸免必須變生諸疾


產後將護法

按經云婦人非止臨產須憂至於產後大須將護勿以產時無他乃縱心

恣意無所不犯犯時微若秋毫感病重於嵩岱且才得分免切忌問是男是女看血下多少隨證服壓血運藥良久喫粥服四順理中圓方見第便令人從心下按至臍腹日伍柒次若有疾證即隨證服藥粥藥相間頻頻服餌且閉目而坐背後倚物左右看承常令直立兩膝雖時眠睡頻令喚覺過一伏時方得上床亦須立膝高橫床頭厚鋪衲褥遮圍四向窒塞孔隙以禦賊風一臆之內常聞醋煙以防運悶一臆之後漸加滋味或以羊肉及雌鷄煮取濃汁作糜粥直至百晬常服當歸圓當歸建中湯四順理中圓日各壹兩服以養藏氣補血脉兩臆之後方得食糜爛肉食滿月之內尤忌任意飲食觸冒風寒恣情喜怒梳頭用力高聲作勞工巧之類及







催生符

右件符用水飛朱砂書之
符貼上寫者式

催生治產難靈符每遇產婦將欲上
草時燈焰上燒灰不得飛揚了急投
盞中用淨水溫調服須臾即產

保生圓養胎益血安和子臟治妊娠將
理失宜或因勞役胎動不安腰腹痛重

胞阻漏胎惡露時下子臟挾疾久不成
胎或受胎不能固養痿燥不長過年不
產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨
產節適乖宜驚動太早產時未至惡露
先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛
極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷
口唇青黑吐出冷沫新產惡血上衝運
悶不省喘促汗出及痰血未盡臍腹疔
痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面

黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成尋勞
入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易
產產後常服滋養血氣和調陰陽密膝
理實腑臟治風虛除痼冷

- 甘草 炙微 貝母 剉
- 乾薑 炮剉 秦椒 去目及閉口者微炒出汗
- 桂 去麋皮不見火 黃芩 剉尖如
- 石斛 去根 石膏 細研
- 粳米 大豆黃卷各壹分

當歸半兩去蘆頭酒浸壹

麻子仁壹兩半

右拾貳味為末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓溫酒或棗湯化下嚼亦得空心食前

當歸圓治產後虛羸及傷血過多虛竭少氣臍腹俱急痛引腰背面白脫色嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩倦手足寒熱頭重目眩可思飲食或勞傷衝任內積風冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急痛及治男子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

當歸去蘆頭酒浸壹

芎藭洗剉續斷洗去根

乾薑炮阿膠剉碎蛤粉炒令起

甘草微炙各肆兩白朮切焙

白芷去粗剉附子炮烈去各叁兩

桂去蘆皮剉白芍藥各貳兩

熟乾地黄拾兩酒浸壹宿

真蒲黃叁兩半微隔炒

吳茱萸叁兩湯浸柒炒

右壹拾肆味搗羅為末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓食前以溫酒下漸加至伍拾圓

當歸建中湯治婦人一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹中疔痛吸吸少氣小腹虛急痛引腰背時自汗出不思飲食

當歸肆兩去蘆頭酒浸

桂叁兩去粗剉白芍藥陸兩剉

甘草貳兩炙剉

右為麤散每服叁錢水壹盞半入生

薑伍片棗壹枚擘破同煎至壹盞瀝

去滓熱服空心食前產訖直至滿月

每日叁服令人丁壯如頭痛眼目眩暈加

衛生家寶產科備要卷第

衛生家寶產科備要卷第二

孫真人養胎論

論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鐘鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和情性節嗜慾庶使清淨生子皆良長壽忠孝仁義聰惠無疾斯蓋文王胎教者也論曰兒在胎日月未滿陰陽未備腑藏骨節皆未成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

妊娠食羊肝令子多厄

妊娠食山羊肉令子多病

妊娠食驢馬肉延月

妊娠食驃肉產難

妊娠食兔肉犬肉令子無音聲并

缺唇

妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

妊娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

妊娠食椹并鴨子令子倒出心寒

妊娠食雀肉并豆醬令子滿面多

黥黯黑子

妊娠食雀肉飲酒令子心經情亂

不畏羞恥

妊娠食鼈令子項短

妊娠食冰漿絕胎

妊娠勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才逐月養胎方

妊娠一月名始胎飲食精熟酸美受御

宜食大麥無食腥辛是謂才正

妊娠一月足厥陰脉養不可針灸其經

足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之

時血行痞澀不為力事寢必安靜無忿

畏妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛

熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所
下當預安之宜服烏雌雞湯

烏雌雞湯

烏雌雞壹隻治法如食法

茯苓去黑皮

阿膠剉碎

各貳兩

芍藥白者

白朮去蘆

人參去蘆各參兩

甘草炙

生薑洗去皮切各壹兩 吳茱萸壹升揀去枝梗

麥門冬伍合湯泡去心

右拾味以水壹斗貳升煮雞取
汁陸升去雞下藥煎取參升內酒參
升并膠烱盡取參升放温每服壹升
日三次服

若曾傷一月胎者當預服補胎湯

補胎湯

細辛壹兩高麗者去葉

生薑肆兩洗揀去皮切碎

烏梅壹升搥碎

防風貳兩去蘆

乾地黄洗燉剉

白朮去蘆

各參兩

大麥炒

吳茱萸揀各伍合

右捌味以水柒升煮取貳升半
分參服食前服寒多者倍細辛茱萸
若熱多渴者去細辛茱萸加枯樓根
貳兩若有所思去大麥加栝子仁參
合一方有人參壹兩

娠二月名始膏無食辛臊居必靜

處男子勿勞百節皆痛是為胎始結

娠二月足少陽脉養不可針灸其經

足少陽內屬於膽主精二月之時兒精

成於胞裏當謹護驚動也

娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成

有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍

下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱

艾葉湯主之

艾葉湯

艾葉去梗

丹參洗

當歸洗去蘆須

麻黃不去節各貳兩

人參去蘆頭切

阿膠碎

各參兩

甘草壹兩炙

生薑陸兩

洗擦去皮切

大棗拾貳枚去核

右玖味咬咀以酒參升水壹斗煮減半去滓內膠煎取參升分參服一方用烏雌雞壹隻宿肥者治如食法割頭取血內參升酒中相和雞以水壹斗貳升先煮取汁去雞內藥煎取參升內血酒并膠煎取參升分作參服

若曾傷二月胎者當預服黃連湯

黃連湯

黃連去須

人參去蘆切

各壹兩

吳茱萸伍合揀淨

生薑參兩

洗擦去皮切碎

生地黃伍兩

一方用阿膠

右伍味咬咀以酢漿菜升煮取參升分肆服日參夜壹十日一作若頗覺不安加烏梅壹升加烏梅者不用漿只用水耳一方用當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀

見物而化欲生男者操弓矢欲生女者

弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良

端坐清虛是謂外象而內感者也

妊娠三月手心主脉養不可針灸其經

手心主內屬於心無悲哀思慮驚動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小

便難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頓

仆動於經脉腹滿繞臍苦痛或腰背卒

有所下雄雞湯

雄雞湯

雄雞壹隻治如食法

甘草炙剉

人參去蘆切片

茯苓雪白者去皮

阿膠剉碎

黃芩尖如錐者

白朮去蘆

麥門冬伍合湯浸去心燉焙乾

芍藥肆兩洗

大棗拾貳枚去核

生薑壹兩洗擦

右拾壹味咬咀以水壹斗伍升煮雞

減半出雞內藥煮取半內清酒參外并膠煎取參外分參服一日盡之當溫卧一方用當歸芎各貳兩不用黃芩生薑

若曾傷三月胎者當預服茯神湯

茯神湯

茯神去木

丹參洗

龍骨五色

各壹兩

阿膠剉碎蛤粉炒

泡起去粉用

當歸洗去蘆

須切焙

甘草炙

人參去蘆

各貳兩

赤小豆洗

貳拾壹粒

大棗去核

拾壹枚

右玳味咬咀以酢漿壹斗煮取參外

分肆服先食服七日後服一劑腰痛

者加桑寄生貳兩深師有薤白貳

娠四月始受水精以成血脉食宜稻

粳羹宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而

行經絡

娠四月手少陽脉養不可針灸其經

手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

娠四月有寒心下愠愠欲嘔胃膈滿

不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下

苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身

軀腰背腹痛往來有時胎上迫育心煩

不得安卒有所下菊花湯

菊花湯

菊花壹握如雞子大

麥門冬壹升湯浸去

心焙

麻黃不去

阿膠剉碎

各參兩

甘草炙

當歸洗去蘆

各貳兩

人參壹兩去蘆

生薑伍兩洗擦去

皮切碎

半夏肆兩湯浸七次

大棗拾貳枚去核

右拾味咬咀以水捌升煮減半內清

酒參外并阿膠煎取參外分參服溫

卧當汗以粉粉之護風寒四五日一

方用烏雌雞壹隻煮水煎藥

若曾傷四月胎者當預服調中湯

調中湯

續斷去根洗

芎藭洗剉

甘草炙 各壹兩 白朮去蘆切焙

柴胡去蘆洗 厚朴削去皮生薑搗碎

枳實去穢炒 生李根白皮洗 各叁兩

白芍藥者剉 生薑洗云 各肆兩

當歸壹兩半洗去蘆須 烏梅壹升搗碎

右拾貳味以水壹斗煮取叁升分肆服日叁夜壹八日後復服一劑

產方

九

娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五臟
娠五月足太陰脉養不可針灸其經足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大飢無甚飽無食乾燥無自灸熱無大勞倦
娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒

苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下阿膠湯主之

阿膠湯

旋復花貳合去枝 阿膠肆兩剉碎

人參壹兩去蘆切 麥門冬壹升湯浸去心焙

生薑陸兩洗擦去皮切 吳茱萸柒合揀淨湯洗三次焙

黃芩尖如錐者 當歸洗去蘆須切片子焙

芍藥者剉 甘草炙 各貳兩

產方

十

右拾味以水玖升煮藥減半內清酒叁升并膠微火煎取叁升半分肆服日叁夜壹先食服便愈不差再服一方用烏雌雞壹隻割取咽血內酒中以水煮雞以前藥減半內酒并膠煎取叁升半分肆服
曾傷五月胎者當預服安中湯

安中湯

黃芩壹兩尖如錐者 當歸洗去蘆須切片子焙

芎藭 洗劉

人參 去蘆頭切

乾地黄 洗淨焙乾用

各貳兩

甘草 炙劉

芍藥 雪白者 各參兩

生薑陸兩 洗擦去皮切碎

麥門冬壹升 湯泡去心焙

大麻仁伍合 去殼

五味子伍合 揀去枝梗

大棗參拾伍枚 去核

右拾貳味咬咀以水柒升清酒伍升

煮取參升半分肆服日參夜壹七日

復服壹劑

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微

勞無得靜處出遊於野數觀走犬及視

走馬食宜鷲鳥猛獸之肉是謂變腠理

紉筋以養其力以堅背脊

妊娠六月足陽明脉養不可針灸其經

足陽明內屬於胃主其口目六月之時

兒口目皆成調五味食甘美無大飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹

內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如

欲產手足煩疼宜服麥門冬湯

麥門冬湯

麥門冬壹升 湯浸去心 人參 去蘆切片

甘草 炙劉 黃芩各貳兩

乾地黄參兩 洗擦去皮 阿膠肆兩 生碎

生薑陸兩 洗擦去皮 大棗拾伍枚 去核

右捌味咬咀以水柒升煮減半內清

酒貳升并膠煎取參升分參服中間

進糜粥一方用烏雌雞壹隻煮水以

煎藥

若曾傷六月胎者當預服柴胡湯

柴胡湯

柴胡肆兩 去蘆洗焙 芍藥 雪白者一方作紫葢

白朮 去蘆切 甘草 炙 各貳兩

茯苓壹兩 酒浸宿切碎焙 麥門冬 湯浸去心焙

芎藭 洗 各貳兩 乾地黄伍兩 洗淨

生薑陸兩 洗擦去皮切片 大棗參拾枚 去核

右拾味咬咀以水壹斗煮取參升分

肆服日叁夜壹中間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服壹劑

妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻粳以密腠理是謂養骨而堅齒

妊娠七月手太陰脉養不可針灸其經手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強葱白湯主之

葱白湯

葱白拾肆莖長三寸 麥門冬壹升湯浸去心焙

生薑捌兩洗擦去皮切片 甘草炙剉

當歸洗去蘆頭切片子焙 黃耆洗去蘆頭切片子焙 各叁兩

人參壹兩半去蘆切片 阿膠肆兩剉碎

黃芩壹兩尖如錐者 旋復花壹合去枝梗

半夏壹升湯泡洗七次用生薑製一宿焙乾

右拾壹味咬咀以水捌升煮減半內清酒叁升及膠煎取肆升服壹升日叁夜壹温卧當汗出若不出者加麻黃節貳兩煮服如前法若秋後勿強漬汗一方以黃雌雞壹隻割咽取血內酒中煮雞取汁以前藥

若曾傷七月胎者當預服杏仁湯

杏仁湯

杏仁湯浸去皮尖 甘草炙 各貳兩

麥門冬湯浸去心焙 吳茱萸揀淨湯洗三兩次焙各壹升

鍾乳使煉成者粉尤勝生鍾乳 乾薑炮烈 各貳兩

粳米伍合 紫菀壹兩使并

五味子叁合去梗

右玖味咬咀以水捌升煮取叁升半分肆服日叁夜壹中間進食七日服壹劑一方用白雞壹隻煮汁煎藥

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色
妊娠八月手陽明脉養不可針灸其經
手陽明內屬於大腸主九竅八月之時
兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍
大起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛
乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍
下寒時時小便白如米汁或青或黃或

使寒慄腰背苦冷而痛目眈眈芍藥湯
主之

芍藥湯

芍藥白者

生薑洗淨

各肆兩

甘草炙

當歸去蘆須洗

各肆兩

白朮去蘆

人參去蘆

各參兩

薤白壹升切洗

厚朴貳兩去皮生薑搗

碎卷一宿焙

右搗味咬咀以水伍升清酒肆升合
煮取參升分參服日再夜壹一方用

烏雌雞煮汁以煎藥

若曾傷八月胎者當預服葵子湯

葵子湯

葵子貳升陳洗

生薑陸兩洗淨擦去

芍藥肆兩雪白

白朮去蘆切

柴胡去蘆各參兩大棗貳拾枚去核

甘草貳兩炙

厚朴貳兩去皮生薑搗

右搗味咬咀以水玖升煮取參升分
參服日參十日壹劑一方用烏雌雞

壹隻煮水以煎藥

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百
節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待
之是謂養毛髮致才力

妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經
足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時

兒脉續縷皆成無處濕冷無著灸衣
妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上
衝心腰背痛不可轉側短氣半夏湯

半夏湯

半夏湯泡七次以生薑戴兩晝一宿 麥門冬湯浸去心焙 各伍兩

當歸去蘆須洗切片子煇 吳茱萸揀淨湯泡洗三兩次焙

阿膠用蛤粉炒 各參兩 乾薑壹兩炮烈

大棗拾貳枚去核

右柒味咬咀以水玖升煮取叁升去滓內白蜜捌合微火上温分肆服痢

即止一方用烏雌雞壹隻煮汁煎藥

若曾傷九月胎者當預服豬石湯

豬石湯

豬石壹具剝去筋膜洗淨 白朮肆兩去蘆切焙

茯苓去黑皮 桑寄生揀淨 乾薑炮烈 乾地黄洗淨

芎藭洗焙 各參兩 麥門冬壹升湯浸去心焙

大豆叁合略炒 附子壹枚中者炮烈去皮臍切

右拾味咬咀以水壹斗煮石令熟去石內諸藥煎取叁升半分肆服日叁夜壹十日更壹劑

夜壹十日更壹劑

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神皆備但俟時而生

妊娠一月始胚二月始膏三月始胞四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月諸神備日滿即產矣宜服滑胎藥入月即服

養胎臨月服令滑易產丹參膏

丹參膏

丹參半斤洗熬 芎藭洗焙

當歸須洗去蘆切焙 各貳兩

蜀椒伍合炒少時以椀合定出汗若有熱者以大麻入伍合代

右肆味咬咀以清酒漉濕停一宿以成煎猪膏肆升微火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日取如棗許內酒中服之不可過服至臨月乃可服舊用常驗

舊用常驗

甘草散令易生母無疾病未生二月日預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺

甘草貳兩 炙剉 大豆黃卷 微炒

乾薑 炮烈 黃芩 尖如

桂心 不見 大麥蘖 炒一方

吳茱萸 揀去梗湯洗參次焙 麻子仁 各參兩

右捌味為細末每服貳錢酒調服日

參服白湯調亦得

千金圓主養胎及產難顛倒胞不出服

壹圓傷毀不下產餘病汗不出煩滿不

止氣逆滿以酒服壹圓良一名保生圓

甘草 炙剉 貝母 去心

秦椒 炒出汗 乾薑 炮烈

桂心 去皮不見 黃芩 尖如

石斛 去根 石膏 硬者不煨

粳米 大豆黃卷 炒 各陸銖

當歸拾貳銖 洗去蘆須切片子焙

麻子參合

右拾貳味為末煉蜜和圓如彈子大

每服壹圓日參服用棗湯化下一方

用蒲黃壹兩

蒸大黃圓治妊娠養胎令易產

大黃參拾銖 蒸 枳實 剉去穰

芎藭 洗剉 白朮 去蘆切

杏仁 湯泡 各拾捌銖 芍藥 白者

厚朴 削去皮生薑 乾薑 炮烈 各拾貳銖

吳茱萸壹兩 揀去梗湯洗三兩次焙

右玖味為末煉蜜圓如梧桐子大空

腹酒下貳拾圓日參服未効加圓數

滑胎令易產方

車前子壹升 水淘洗令淨控

阿膠捌兩 剉碎蛤粉炒 滑石叁兩

右參味為細末飲湯調服壹錢日再服如

生月可服之藥利九竅未產不得先服

衛生家寶產科備要卷第二

衛生家寶產科備要卷第三

免乳大故方書浩博自非素習誰能適從危殆之間頗艱應用今採摭諸方論中將護要法及預備經効要用湯藥名曰產科備要務從簡易以救倉卒

論初妊娠

凡女人妊娠若素來虛羸血氣不足體中有風氣心下多痰水者欲有胎喜病阻其狀顏色如常脉理和順但覺肢體沉重頭目昏眩不思飲食惡聞食氣多噉鹹酸心中憤懣不知患之所在以至三四月已後則大劇吐逆不能勝舉如有此證則宜服療阻病竹茹湯人參散

地黃圓

竹茹湯治初有妊擇食嘔逆頭痛顛倒寒熱四肢不和煩悶

橘皮

洗去白

人參

去蘆切片

白朮

切碎

麥門冬

去心

各壹兩

厚朴

去皮以薑汁浸炙

茯苓

去黑皮

各半兩

甘草壹分

炙

淡竹茹

先刮下煎旋入

右為麤末每服肆錢水壹盞半入生薑淡竹茹各壹塊如栗子大拍破煎取捌分去滓微溫服

人參散治初妊娠惡食嘔逆

人參壹兩

去蘆切片

枳殼叁分

去穰剉碎

厚朴

汁塗炙

甘草

炙

各半兩

右為麤散每服肆錢水壹盞半入生薑彈子大壹塊拍破同煎至柒分去滓溫服不拘時候

地黃圓治初懷妊醋心嘔吐腹痛不能食或吐清水

人參

去蘆切片

乾薑

炮

各壹兩

右為末用生地黃汁和圓如桐子大每服伍圓米飲下日再服

又妊娠臟氣皆擁關節不利切不宜多

睡食粘硬難化之物亦不須亂服湯藥

大忌針灸惟須數行步定心神不得悲
憂驚恐刀負重震動若覺胎臟不安腹
中微痛心意煩悶四體昏倦宜服安胎
順氣阿膠散近難月即服順胎保安散
千金圓

阿膠散治妊娠不問月數深淺因頓
仆胎動不安腰腹痛或有所下或胎奔
上刺心短氣安胎

熟乾地黄貳兩酒洗細切

艾葉切炒

當歸洗切焙

甘草炙剉

芍藥洗剉

阿膠剉碎以蚌粉拌和銼內炒

芎藭洗剉各壹兩 黃耆壹兩若虛羸加此

右為養散每服肆錢水壹盞半煎至
捌分去滓溫服若膏中冷逆氣加生
薑伍片棗伍枚同煎

保安散治妊娠胎氣不安心腹疼痛
胎動安胎極妙

當歸壹兩半洗切焙

人參壹兩去蘆須 甘草半兩炙剉

阿膠半兩剉碎用蚌粉炒泡

右為養散每服參大錢水壹盞半入
葱白壹莖拍破煎捌分去滓食前溫
服未定再服

神妙千金圓治產前產後一切風冷

血氣等疾產前胎氣不安腰腹多疼四
肢疲倦妊娠臨月預合下每日空心壹

服臨產五臟不痛易產產中不生諸疾

兼治產後惡血不盡及胎衣不下增寒
壯熱吐逆煩悶皮膚虛腫或血暈狂迷
眼見神鬼能補勻血氣

金釵石斛壹分別搗為末

秦艽洗去蘆根 川椒去子

細辛去葉 防風去苗

貝母麩炒 熟乾地黄切酒

糯米 甘草炙 各壹兩

當歸洗去蘆須

大麻仁去殼取仁

黃芩尖如錐者

乾薑炮剉

大豆旋以黑豆生芽長貳寸培乾用各參三分

石膏半斤

乾者煨

右精擇為末以煉蜜成劑入木臼中杵壹千下分為柒拾貳圓擇除破天德月德月合日合每服壹圓温酒化下產後產前赤白帶下温酒嚼下產前後或心痛血氣用薄荷湯嚼下月信不通當歸酒下臨產艱難或三五日難產及胎衣不下子死腹中橫生倒產死絕不語但心頭有熱氣用藥壹圓京棗湯研化灌之下咽立瘥產後惡血不盡臍腹疼痛嘔吐壯熱增寒煩悶月候不調或多或少肢體倦怠皮膚浮腫產血不止虛勞中風口噤不語半身不遂產前後赤白痢大小便秘澁血暈狂語頭痛面色痿黃

漸成勞瘦飲食無味並温酒化下壹圓產前臨月每旦壹圓至臨產用當歸酒下壹兩圓催生五臟不痛子易生

論欲產并產後

凡欲生產切不得喧鬧產婦房門常須關閉選一年高性和善產婆又選穩審恭謹家人壹兩人扶持切不用揮霍致令產婦憂恐又忌閑雜外人喪孝穢濁之人瞻視若不謹之定是難產兼傷小兒若腹中痛來但令扶行或行不得且立候行得更行或痛作陣眼中如火生此是兒回轉即進琥珀散壹服直至行不得即扶上蓐草務要產婦惜力或心中熱悶取白蜜壹匙新汲水調下或未解即喫生鷄子壹枚

琥珀散臨月縮胎催生兼治產後諸疾
川芎壹兩焙 當歸壹兩半切
右為末每服參錢水壹盞酒半盞煎

捌分去滓不計時候服

大凡生產自有時候痛不甚者名曰弄痛宜須強行熟忍宜食軟飯若食飯不得即宜食粥及飲蜜漿勿令飢渴恐產婦無力困乏若經時不產進通靈散壹服若生畢煖少許醋墨與呷以童子小便調七寶散壹服心中自然開爽不住燒磚石以醋沃之直至柒日要令產婦鼻中常聞醋氣宜燒茅香白木皂莢等物切勿令見穢惡若產訖忽覺心中昏悶或眼花如在舟車中即是血暈急須服牡丹飲子黑神散

催生通靈散

又壹方在下卷產科雜方門

蛇脫皮壹條全者緊卷以蚯蚓泥

裹燒黑近藥處泥此小用不妨

右為末每服壹錢溫酒調下

七寶散初產後勻血和氣補虛厭驚悸

朱砂

研如粉

桂心

去皮不見火對

乾薑

炮去濕氣

當歸

去蘆須切洗焙

川芎

略剉焙碎

人參

去蘆切片

羚羊角灰

茯苓

剉

右件等分杵研為末若產婦平和三臈以前直至滿月每日各取壹字以羌活豆淋酒調下空心服若覺心膏煩熱即減薑桂冷即加之腹痛加當歸心悶加羚羊角心膏虛氣加桂不下食或惡心加人參虛戰加茯苓以意斟酌日貳夜壹服不飲酒者以童子小便調却煖過服之

牡丹飲子療產後血暈悶亂神昏若

口噤即斡開口灌必效

牡丹皮

洗剉

大黃

生用剉碎

芒硝

別研後入

各壹兩冬瓜子半合

桃仁參

參箇皮湯浸法

右為麩散每服伍大錢水參盞煎至壹盞半去滓入芒硝服之凡欲產先

煎下以備緩急

單方黑神散防暈備急

馱護干不計多少以桑柴火燒以刀刮取黑煤更燒更刮令盡研為末入真麝香少許如纔產了及覺血衝心暈悶取壹錢末以熱酒和童子小便調下

若產後心空但時與琥珀散壹服或煎芍藥湯進之更不用它治常進溫粥勿

與熱食如食熱則滯血或三五日內但覺腹中癩痛兒枕未定即進定痛散壹服琥珀散依第三項

芍藥湯治產後虛乏不思飲食四肢疲倦心腹陣痛補虛治氣

當歸壹兩半去蘆須洗切焙乾用

芍藥洗剉 人參去蘆切片

肉桂去皮不見火剉 生薑後入

甘草炙 各壹兩 生乾地黃貳兩洗酒浸焙

右剉杵為麤散每服參大錢水貳盞入棗貳枚煎至壹盞去滓放溫服日參服

定痛散治產後惡血不止腹內熱痛不可忍及兒枕未定

當歸洗去蘆須切焙 芍藥洗 各貳兩 桂心壹兩或體蒸熟以

右為末每服貳錢水酒共壹盞生薑壹塊彈子大擘破同煎至陸分去滓

溫服之

若產後四肢安和亦不用多喫酒藥緣氣虛禁持未得却多昏眩唯飲童子小便無妨勿平身且側臥夜常須壹人看承令屈起兩膝卧睡即須頻喚覺虛羸困乏即空心進理中圓七寶散七日後恐喫粥無味或虛乏無力即爛煮羊肉汁黃雌鷄汁作粥未可喫肉亦不可傷及喫硬物便成積滯之患常以淨黑豆

壹升炒令煙出以酒伍升澆淋入羗活
壹兩槌碎同浸常用此酒下藥或時飲
壹盞大辟風邪令諸疾不生
四順理中圓治新產後臟腑虛不思飲
食補養五臟

甘草參兩炙人參切去蘆

白朮剉焙乾薑炮去氣各貳兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服拾伍
圓至貳拾圓空心溫酒下

七寶散依前項

若三日後覺壯熱頭痛此是乳脉行即
進玉露散貳服或大小便秘澁或發寒
熱頭痛四肢如碎此是蓐勞或產後大
渴胎損吹妳咳嗽別生他疾及帶起宿
患亦宜檢尋別方治之月內不宜多語
笑強起離床行或作針線運動恣食生
硬不避風脫衣洗浴當時雖未覺大損
滿月後或成蓐勞手脚及腰腿酸重冷

痛骨髓間颼颼如風吹縱有名醫卒不
能療大都產婦將息須是百日方可平
復大忌犯觸因此多致身體強直如角
弓反張名曰蓐風遂至不救小可虛羸
失於將補便成大患終身悔不及矣戒
之戒之

玉露散治產後乳脉行煩熱或大腸滯
澁肢體疼痛涼膈壓熱下乳

茯苓剉人參切去蘆

甘草炙各半兩桔梗切去焙

白芷洗剉川芎洗剉各壹兩

川大黃濕紙累慢
火煨熟剉當歸去蘆
須切各壹分

芍藥參分洗剉

右為末每服貳平錢水壹盞煎至柒
分溫服日叁服若臟腑泄瀉即除川
大黃

衛生家寶產科備要卷第三

衛生家寶產科備要卷第四

產育保慶集方余收產論二十一一篇議

論精確無所不究蓋國醫博極方書所

得之妙惜乎有其說而無其方郭君稽

中為時良醫尤長於治產故其切脉用

藥屢取奇功一日願以所收家方附於諸

論之末遂編為一集真濟眾之異書也

古人謂為子子而不學醫者為不孝則

有方論而不傳於世者其可謂之仁哉

大觀三年九月五日濮陽李師聖述

二十一論并增入十八論

李師聖編論郭稽中附方

第一論曰熱疾胎死腹中者何

答曰因母患熱疾至六七日以後臟腑

熱極薰蒸其胎是以致死緣兒死身冷

不能自出但服黑神散煖其胎須臾胎

氣溫煖即自出何以知其胎之已死但

看產婦舌色青者是其驗黑神散

黑神散

桂去麋皮不見火剉碎 當歸洗去蘆須切焙

芍藥洗剉 甘草炙剉

生乾地黄溫湯洗淨剉 乾薑宜用炒生薑代之 各壹兩

附子半兩炮去皮臍 雄黑豆貳兩小者是炒

右為末每服壹錢匕空心溫酒調下

蒲黃黑神散此方十八論云產前產後一切疾皆治之

雄黑豆貳兩小者是炒

當歸洗去蘆并切焙 芍藥洗剉

甘草炙剉 乾薑炮剉

肉桂去皮剉不見火 生乾地黄溫湯洗剉

蒲黃銀石器內微炒令赤或以紙襯銚子內炒紙黃為度 各壹兩

右為末每服貳錢空心溫酒調下若三十已下及生產少婦人不用桂乾薑入炒生薑紅花代之生薑紅花各用貳兩經洗者並焙乾

第二論曰胎衣不下者何

荅曰母生子訖血流入衣中衣為血所脹是故不得下治之稍緩脹滿腹中漸次上衝心腎疼痛喘急者難治但服奪命丹以速去衣中之血血散脹消胎衣自下而無所患

奪命丹

附子半兩炮去皮牡丹皮壹兩洗剉

乾漆壹分搗碎炒

右為末醋壹升大黃末壹兩同熬

成膏和藥如桐子大溫酒下伍茶圓

不以時候

又十論云但服蒲黃黑神散逐去衣中

血即胎下或帶斷亦同

第三論曰難產者何

荅曰胎側有成形塊呼為兒枕子欲生

時枕破與敗血裹其子故難產但服勝

金散逐其敗血即自生成若逆生橫生

並皆主之

勝金散

麝香壹錢先研為末

鹽豉壹兩用舊青布裹了燒令通紅急以乳搗研為末

右為末取秤搥燒紅以酒淬之調下

藥壹錢已

又十八論云但服蒲黃黑神散解其敗血即自生也或橫生逆生胎衣不下此

藥悉治

第四論曰產後血運者何

荅曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣

上迷亂心神故眼前生花極甚者令人

悶絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識

呼為暗風若作此治之病必難愈但服

清魂散自瘥

清魂散

澤蘭葉揀淨人參去蘆各壹分

荆芥穗壹兩洗剉芎半兩洗剉

甘草貳錢炙剉

右為細末每服壹錢匕熱湯溫酒各小半盞調勻急灌之下咽喉即開眼氣定省人事

又十八論云但服蒲黃黑神散自瘥第五論曰產後口乾痞悶者何

荅曰產後宮胃大虛血氣未定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃脘上薰膏中是以口乾煩渴心下痞悶醫者不識認為膏膈壅滯以藥下之萬不得一

但服見現圓自瘥

見現圓

薑黃

片子剉

荆三稜

煨乘熱鐵碎焙乾用

革澄茄

不得用炒

陳皮

去白

高良薑

炒碎

人參

去蘆切片

蓬莪茂

煨乘熱鐵碎焙乾用

右柒味等分為末用細切蘿蔔慢火煮令爛研細將汁煮糊元梧桐子大每服參拾圓蘿蔔湯下不以時候

又十八論云但服蒲黃黑神散自瘥第六論曰產後乍寒乍熱者何

荅曰陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令血敗不散入於肺則熱入於脾則寒醫人若誤作瘡疾治之則繆矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹

又問二者何以別之

荅曰時有刺痛者敗血也但寒熱無它證者陰陽不和也

增損四物湯

當歸

洗去土并蘆須切焙

芍藥

洗剉

人參

去蘆切片

川芎

洗剉

各壹兩

甘草肆錢

炙

乾薑壹兩

上兩生薑代之

右為末每服貳錢匕水壹盞生薑伍片同煎陸分去滓微熱服不以時候

奪命丹見第二論

又十八論云但服蒲黃黑神散自瘥

第七論曰產後四肢虛腫者何

荅曰產後敗血乘虛停積於五臟循經

流入於四肢留滯日深却還不得腐壞

如水故令四肢面目浮腫醫人不識便

作水氣治之血氣與水氣不同凡治水

氣多用導水藥極虛之夫產後既虛又

以藥虛之是謂重虛往往因致夭枉但

服調經散血行腫消即愈

調經散

沒藥令研

琥珀研 各壹錢

桂去產皮不見火剉

芍藥赤者剉

當歸去蘆須切 各壹錢 細辛去葉剉

麝香研 各半錢

右為末每服半錢匕生薑汁溫酒各

少許調勻服之

又十八論云但服蒲黃黑神散後服

藥瀉下惡物自瘥轉藥是黑神圓在第十二論後

第八論曰產後乍見鬼神者何

荅曰心主身之血脉因產傷耗血脉心

氣則虛敗血停積上干於心心不受觸

遂致心中煩躁卧起不安乍見鬼神言

語顛倒醫工不識呼為風邪如此治之

必不得愈但服調經散每服加生龍腦

壹捻得睡即安方見第七論

又十八論云但服蒲黃黑神散自安

第九論曰產後月內不語者何

荅曰人心有七孔三毛產後血虛氣弱

多致停積敗血閉於心竅神志不能明

了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強

矣故令不語如此但服七珍散即瘥

七珍散

人參去蘆切

石菖蒲節密剉

川芎洗剉

熟乾地黄各壹兩

細辛壹錢 去葉 防風 去苗

朱砂 研 各半兩

右為末每服壹錢薄荷湯調下不以

時候

又十八論云但服蒲黃黑神散便安

第十論曰產後腹痛又瀉痢者何

荅曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿

月飲冷當風則寒邪乘虛進襲留於

育膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀

所刺流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或

下赤白腹脇脹或走痛不定急服調

中湯立愈若醫者以為積滯取之則禍

不旋踵謹之謹之

調中湯

高良薑 剉油 當歸 洗去蘆

桂 去皮剉 白芍藥 洗剉

附子 炮去 川芎 洗 各壹兩

甘草半兩 炙剉

右為末每服參錢用水參蓋煎

至壹盞去滓熱服

又十八論云急服蒲黃黑神散後服

調中湯

第十一論曰產後遍身疼痛者何

荅曰產後百節開張血脉流走遇氣

弱則經絡肉分之間血多留滯累日不

散則骨節不利筋脉引急故腰背不得

轉側手脚不能動搖身熱頭痛若醫以

為傷寒治之則汗出而筋脉動手足

厥冷變生他病但服趁痛散以嘿除之

趁痛散

牛膝 切酒浸壹宿控

當歸 洗去蘆須焙乾 白木 剉碎

黃耆 蜜炙 桂 去皮剉

獨活 去蘆剉 生薑 切 各半兩

薤白 洗切 甘草 炙剉 各壹分

右為末每服半兩水伍盞煎至兩

盞去滓熱服壹盞次壹盞續後再煖服不拘時候

又十八論云但服蒲黃黑神散即愈

第十二論曰產後大便祕澁者何

荅曰產卧水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澁不通也若過五六日

腹中悶脹者此有燥糞在臟腑以其乾澁未能出耳宜服麻仁圓以津潤之若

誤以為有熱而投之以寒藥則陽消陰

長變動百出性命危矣

麻仁圓

麻仁 研碎 枳殼 炒去穢劉麩

人參 去蘆 切片 大黃 煨劉 各半兩

右為末煉蜜圓桐子大空心温湯下

貳拾圓未通加圓數

又十八論云產後小便出血大便澁痛

者何

荅曰敗血流入大小腸大小腸澁滯致

小便澁塞大便艱難人多不識作五淋

治之不愈但服蒲黃黑神散後服黑神

圓取下惡物即安

黑神圓 巴豆 去皮以水貳枚煮盡為

黑附子 炮去皮膜細研去油

肉桂 去皮不見火劉

白乾薑 炮劉 各半兩

右為末麵糊圓如蘿蔔子大每服參

圓至伍圓熱茶下再以熱茶投之即

行前第七論中去轉藥者即是此方

切不可服尋常取積藥

第十三論曰產後血崩者何

荅曰產卧傷耗經脉未得平復而勞役

損動致血暴崩下淋瀝不止或因鹹酸

不節傷蠱榮衛氣衰血弱亦變崩中

若小腹滿痛肝經已壞為難治急服固

經圓以止之

固經圓

艾葉 碎抄黃

赤石脂

補骨脂 略炒

木賊 去根

各半兩

附子壹枚 炮去皮

右為末陳米飲和圓桐子大食前温

酒下貳拾圓米飲亦得如陳米飲難

圓即入雪糕少許搜和即易圓也

又十八論云但服蒲黃黑神散及黑神

圓立瘥

第十四論曰產後腹脹悶滿嘔吐不定

者何

荅曰敗血散於脾胃脾受之不能運化

精微而成腹脹胃受之則不得受納水

穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹

止吐藥療之病與藥不相干轉更傷動

正氣疾愈難治但服巨勝湯必瘥

巨勝湯

赤芍藥 洗剉

半夏 湯洗七

澤蘭葉 洗曬

人參 去蘆

陳皮 去白

甘草 炙剉 各壹錢

生薑半兩

右為麓末用水壹椀同煎至兩盞去

滓微熱分參服

又十八論云急服蒲黃黑神散次服黑

神圓吐出惡物即安

第十五論曰產後口鼻黑氣起及鼻衄

者何

荅曰陽明者經脉之海起於鼻交額中

還出挾口交人中左之右右之左產後

氣消血散榮衛不理散亂入於諸經却

還不得故令口鼻黑起及變鼻衄此緣

產後虛熱變生此疾其疾不可治名曰

胃絕肺敗遇有此疾急取緋線壹條并

產婦頂心髮兩條繫兩中指上節即止

無藥可療亦厭禳之一端也

又十八論曰產後口鼻黑氣起者何

荅曰產後敗血入臟腑既滿衝於頭目

却還不得口乾舌焦鼻衄黑氣是產後熱變作此候不可治也名曰敗肺

第十六論曰產後喉中氣急喘者何

荅曰榮者血也衛者氣也榮行脉中衛行脉外相隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無所主獨聚於肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡露不快敗血停凝上薰於肺亦令喘急如此但服奪命丹血去喘息自止奪

命丹方見第二論

又十八論曰產後喉中氣急喘者何

荅曰產後敗血過於心轉於喉中此不可治也

第十七論曰產後中風者何

荅曰產後五七日內強力下床或壹月之內百日之中傷於房室或懷憂發怒擾蕩冲和或因灼艾傷動臟腑得病之初眼澁口噤肌肉攣搐以漸腰脊筋急

強直者不可治此乃人作非偶爾中風所得也

第十八論曰產後心痛者何

荅曰心者血之主人有伏宿寒因產大虛寒搏於血血凝不得消散其氣逆上衝擊於心之絡脉故心痛但以大巖蜜湯治之寒去則血脉温而經絡通心痛自止若誤以為有所傷療之則虛極寒益甚矣心絡寒甚傳心之正經則變為

真心痛真心痛者朝發夕死夕發朝死

藥不可輕用如此

大巖蜜湯方

熟乾地黄

洗酒浸壹宿焙到用

當歸

洗去蘆須切焙

吳茱萸

揀去梗

獨活

洗蜀中者尤佳

芍藥

洗到

乾薑

炮到

甘草

炙到

桂

去皮不見火到

小草

遠志

冬壹兩

細辛半兩

去葉勿用馬蹄香

右為麓末每服半兩用水參大盞煎壹盞去滓再入蜜壹匙又同煎參兩沸微熱服食前

第十九論曰產後熱悶氣上轉為脚氣者何

荅曰產卧血虛生熱復因春夏取涼過多之地之蒸濕因足履之所以着而為脚氣之疾其狀熱悶掣手痲驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也服小續命湯兩參劑必愈若醫者誤以逐敗血藥攻之則血去而疾益增劇

小續命湯

人參去蘆切片

黃芩去節者

桂去麤皮不見火

麻黃去節

防已剉碎

川芎洗剉

芍藥洗

甘草炙

白朮剉 各壹兩

附子壹箇 去皮

防風壹兩半 去苗

生薑伍兩 洗去文切

右為麓散每服半兩用水參大盞煎至壹盞去滓温服

第二十論產後汗出多而變痲風者何
荅曰產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪搏之則變痲風也痲者口噤不開背強而直如發痲狀搖頭馬鳴身反折須臾十發氣息如絕宜速斡口灌小續命湯稍緩即汗出如雨手拭不及者不可治此方不特治產婦凡男女偶中此疾急以此藥灌之無不愈也或服它藥則不及矣

第二十一論曰產後所下過多虛極生風者何
荅曰婦人以榮血為主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目瞑神昏命在須臾此但虛極生風也如此急服濟危上丹神良以風藥治之則誤矣

濟危上丹

乳香

以竹葉盛又以竹葉覆上
熨斗略熨過即研成末

五苓脂

不夾石
者研

硫黃

研如
粉

太陰玄精石

研

陳皮

去穢
劉碎

桑寄生

劉

阿膠

劉碎同蛤粉炒泡
起篩去蛤粉用

卷栢

生用

各壹兩

右將上肆味同研勻石器內微用火炒動勿令焦炒了再研極細後入餘藥末用地黃汁打糊圓桐子大產後溫酒下貳拾圓當歸酒亦得

又十八論曰產後血氣逼肺上氣咳嗽多縱睡者何

荅曰產後滿月血脉未通好食熱麵壅結成痰或有氣塊發時衝心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾背膊痠疼睡夢驚狂體虛無力時有汗出心痛月候不來名曰敗癥腹痛遶臍面色微赤因此不療縱然得較三兩日又發急服黑神散立愈

論臨月將息

凡產婦合要備急湯藥並須預先修合題號恐臨時倉卒難致臨月忌勿多飲酒即依產圖方位擇深靜房室入月一日即用借地法於房內北壁薰令香潔

論新生小兒

凡新生小兒急以綿裹指頭拭兒口中惡物不爾流入腹中後生諸疾斷臍可長參寸臍中若有蟲急撥去恐入腹內綳了取生甘草寸餘搥碎水壹合煎濃汁以綿包子點兒口中當吐出惡汁盡半合無妨又取細研朱砂末壹字許以熟蜜調置兒口中令嘔之去驚邪參日湯煎虎頭骨少許豬膽汁少許和湯浴兒少驚無瘡令無惡疾每日頻就無風明處看兒上腭若有壹點白泡如竹膜起處速以指甲刮破更生更去之除灸臍帶外則勿加火艾恐成驚癇若有冷

熱夜啼臍瘡不乾變蒸諸疾自別有方治之今錄廬江劉寶助教經效小兒名方肆道

注唇膏治初生孩兒衆疾療胎風病

朱砂研細 坯子臙脂各壹錢

白殭蚕朶箇炒去絲

牛黃半錢研 蝎梢半箇

右白殭蚕蝎梢用薄荷汁壹合重湯

煮汁盡為度焙乾為細末研入坯子

朱砂等生蜜和為膏逐日頻與孩兒

注唇令自嘔噦取效

豆蔻散治小兒夏月滑瀉冷痢不已

腹痛瘦瘵食下即噁

肉豆蔻壹箇用餠餅麵壹塊如杏

大果豆蔻灰火中煨不住攪轉候

色赤透熟取出剉焙乾

右為細末每服半大錢朶捌歲至拾

歲者壹錢用溫米飲調下日叁服一

兩日間愈

蝎梢散治小兒胎風及百晬孩兒臍

風撮口無能救療者先用生腦子壹字

填入臍心上用艾炷灸壹朶壯如不覺

灸貳朶壯再添腦子大妙候定服蝎梢散

蝎梢肆拾玖箇用薄荷葉逐箇搗

以絲扎定於砂銚中滾轉炒令薄

荷乾蘇為度

白殭蚕肆拾玖箇生薑汁浸炒乾

去紫

右貳味為末入生腦子抄半錢麝香

少許研勻用紫色雄雞肝煎湯調下

末半錢許併叁兩服愈

治小兒諸般喘疾

烏雞卵壹箇

輕粉少許

右將雞卵於尖小壹頭打小穴子入

輕粉在內用杖子攪轉令勻坐雞卵

於飯上蒸熟訖將與患者小兒喫只壹枚取効

累用經効方 隆興府學諭張世臣方

大聖澤蘭散治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血衝心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾生下便得無恙并治胎墮腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下血運血癖血滯血崩血入四肢應血臟有患及諸種風氣或傷寒吐噦咳嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎崩中不止因此成疾及室女經脉不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏色退風冷消除萬病兼療五勞七傷虛損等病

澤蘭葉去根曬乾 石膏研 各貳兩

生乾地黄壹兩半到用溫湯浴過浪乾焙用

桂肉壹兩壹分對不見火用

吳茱萸湯洗七次炒 厚朴去蘆皮剉碎用薑製壹宿焙乾

白茯苓去皮剉 卷栝去根剉

細辛去苗并葉焙 栝子仁揀去殼別研細

防風去苗剉 桔梗去蘆剉焙

白蕪荑各壹兩 白朮切片焙

白芷去稍剉 丹參洗剉

乾薑炮烈剉 五味子去枝梗剉

藁本去蘆頭洗 人參去蘆頭切

川烏頭炮去皮臍 川椒去目及開口者微炒出汗

黃耆剉去蘆頭 各參分 阿膠剉碎蛤粉炒泡起去粉用

白薇剉 各半兩 當歸去蘆須洗切片子焙乾

白芍藥剉 甘草炙剉

川芎各壹兩 各參分

右為細末每服貳錢空心臨卧熱酒調下若急疾有患不拘時候

奪命褐散子姪娘四五月已上忽然

仆地手足抽掣咽中涎聲衮衮口眼不

闞如小兒瘈瘲之狀名曰胎癇

甜葶藶

紙上微炒

芫花

醋煮乾焙燥

各半兩

郁李仁

湯浸去皮

地榆

剉

各壹分

右為細末每服壹字煎沉香人參鈞

藤鈞子防風湯調下如牙噤者用物

幹開灌下調藥汁不過壹匙不拘時

候沉香但磨藥汁尤妙如醒時只用

防風煎湯調四君子湯服蘇合香圓

及大聖澤蘭散半月餘其病脫然恐

目昏不能視物不必疑慮氣血凝靜

自然光明謹勿服眼藥有三四婦人

皆患此證寸口脉伏自關而下脉弦

蓋伏者氣不上外弦者有飲在內此

必因胎肥流飲不化注入胎宮與血

相搏子不安静故氣不上升乃胎觸

心絡遂有胎癩之證先是醫者用安

胎養血之藥未効遂以此藥緣此證

雖是產前之疾却當作產後治療迺

是血不循經氣不升降氣閉血壅其

狀如癩當導氣而逐其飲氣通飲消

則血循經入養胎安氣則子安静矣

累用經驗

地榆降血飲子治妊娠入月臨草之

時血出三日而子未下手足不收昏瞶

如醉不省人事此迺漏血過多血不養

胎心氣逆上胎氣留連此名胎乾此藥

治之神効甚速

蘇子降氣湯壹貼

乃捌味者是

只作壹

服加地榆壹錢半洗淨麥門冬拾

粒去心水壹盞半生薑貳片煎茶

分去滓入乳香少許透明者鑿開

溫服不能自飲者扶起灌之

大安胎飲子治妊娠胎氣不安腹脇

刺痛經脉適來氣急上喘等疾

當歸

洗去蘆須切片焙乾

乾地黄

剉洗浪乾再焙用

川芎

洗剉

赤芍藥

剉

地榆

各壹兩

阿膠

剉碎蛤粉炒起去粉用

熟艾各半兩 黃芩壹分剉

右為麤末分作拾伍服每服水貳盞

煎至陸分去滓通口服不拘時候

吳白朮散安胎養氣常服十月中胎

氣安定無諸疾苦

白朮去蘆切 片子焙 人參去蘆切 片子焙

白茯苓去黑皮 剉焙 甘草炙剉

阿膠剉碎粉炒 起去粉用 已上各等分

右為咬咀每服參大錢水壹盞半煎

至柒分去滓溫服不拘時候

一滑胎榆白皮為細末每服壹錢空心

白湯調下自入月每日參服令易產

兒生下藥皆塗身上

一催生并死胎不下草麻子參箇巴豆

肆箇研細入麝香少許貼臍心上須

吏間便下

一難產參兩日不生以蚕種紙半張燒

灰熟水調下係已出蚕種紙 亦名馬明服

一治橫生逆生灸產婦右脚小指尖頭

如麥大參壯立產

又方蛇退皮燒灰酒調貳錢面東服

又方鹽塗兒足底急去之

又方車前子末酒服貳錢

一姪娘煩悶胎熱睡卧不得并腹中痛

及難產知母新白者焙乾為末煉蜜

圓如小彈子大每服壹圓溫酒化下

一姪娘偶因所觸或墜高傷折致胎動

不安腹中痛不可忍者縮砂不以多

少和皮炒令熱透去皮為細末每服

貳錢熱酒調下胎即安神効

一胎動日夜叫呼口噤唇青及下痢不

止者熟艾壹兩酒伍盞煮肆盞去滓

再煎至貳盞服口閉者灌之亦治腰

痛下血

一胎動及下血心腹脹者當歸貳兩川

芎壹兩為麤末水肆盞酒伍盞煎至

伍盞分參服若胎未死即安已死即便下

一產後血暈五靈脂炒令煙盡為細末

溫酒調下壹錢童子小便尤佳

又方乾荷葉為細末每服壹錢溫酒

調下

又方生半夏為末壹大豆許吹鼻中

又方紅花或蘇枋木酒水濃煮汁飲

一產後中風眼上視四肢搐搦荆芥穗

為末每服貳錢溫酒調下如不飲酒

只濃煎湯服

一產後發狂每用大香附子去鬚皮淨

為細末每用貳錢入研極細好辰砂

末壹錢以燒通紅秤搥侵好酒調服

一產前傷寒不問陰陽身熱頭疼白朮

貳錢黃芩壹錢龍末水壹盞煎陸分

去滓熱服不計時候

衛生家寶產科備要卷第四

衛生家寶產科備要卷第五

產科雜方

催生如聖散此壹方廬江劉寶助教

經効名方

黃蜀葵花不拘多少

右壹味焙乾為細末每服貳錢熟湯

放溫調下神妙或有漏血胎臍乾澀

難產痛劇者併進參服良久腹中氣

寬胎滑即時產下如無花只用黃蜀

葵子爛研小半合以酒調瀘去滓溫

飲尤佳

救生散安胎益氣易產

人參去蘆切片

訶子濕紙果煨熟去核

白朮對炒

陳橘皮去白炒

大麥蘖炒黃

神麴細對炒黃色各半兩

右為細末每服貳錢水壹盞煎陸分

溫服入月加壹倍用水貳盞煎壹盞

溫溫空心服之能令兒緊小乳母無慮

單胎散治婦人妊娠傷寒遍身大熱
悶亂躁渴痰甚則蒸損胎臟廬江劉寶
助教名方

捲荷葉壹兩嫩者焙乾

蚌粉花半兩好細白者秤

右為細末入粉研勻每服貳錢以新
汲水用蜜調下日進兩服

二聖散產前安胎產後治惡血不盡及
胎衣不下

羌活洗去苗剉 川芎洗剉

右等分為細末每服貳大錢酒少許
水送分煎茶沸溫服

羌活散治妊娠患時疾

羌活去苗剉碎 荆芥穗不見火熬

赤茯苓去皮剉碎 川芎洗剉

宣州乾葛剉焙 陳皮去穢剉

甘草炙剉 川升麻剉 各壹兩

右為細末每服參錢水壹盞半入生

薑伍片薄荷拾葉同煎至壹盞稍熱
服不以時候

黃金散治妊娠患時疾

黃芩尖如錐者 鬱金剉 各壹兩

右為末每服壹錢板藍根地黃水調
下汗出効未得汗再服即瘥又用鷄
卵墜井至泥隔宿取出吞之必無虞矣
薑粉散纔產服此藥蕩盡兒枕除百
病源

當歸洗去須切焙 官桂去皮不見火

人參去蘆切片 茯苓白者去黑皮

甘草炙 芍藥洗淨

知母潤者切炒 川芎洗

大黃略炒 黃耆蜜炙

木香不見火 草豆蔻去殼

白朮剉焙 訶子煨熟

高良薑剉炒 青橘皮去穢

熟乾地黃洗酒浸焙

右除地黄外各等分剉焙乾次用附子壹箇結實半兩者炮裂去皮臍切生薑壹斤研取自然汁於椀器中停留壹食久傾去清汁取下面粉脚攤在蒟葉中入焙籠焙乾同衆藥擣羅為末纔產後用藥末參錢水壹盞薑參片棗子壹箇擘開同煎至茶分乘熱喫如喫藥之後自然產母睡着半日以來睡覺再服全除却腹痛壹日

只可參服至致服不可服恐肚中冷也

香蓮散治產後咳逆

石蓮拾箇炒熟丁香拾箇

右為末用水參合煎拾沸溫服

地黄散治產後血痛如刀刺

熟乾地黄洗酒浸焙橘皮去白剉焙

右件等分為末每服壹錢粥飲調下

尋常痛發可常服

香脂散治產後吐逆不止

狗膽壹箇 硃砂

丁香 五靈脂各少許

右為末以狗膽圓如白豆大每服壹

圓生薑水磨下

血竭散治產後百疾廬江劉寶助教

名方

血竭 沒藥剪碎

右等分輕手研細頻羅再研取盡為

度每服貳錢用小便合和細酒半大

盞煎壹貳沸溫調下纔產下壹服上

床良久再服其惡血自循下行更不

衝上免生百疾

產後發熱名曰褥勞用猪腰子作粥治之

猪腰子壹隻去白膜薄切作柳葉片子

少鹽酒拌之先用粳米壹合入葱椒煮

粥鹽醋調和將腰子鋪椀底用熱粥蓋

之如作盒生粥狀喫之每日空心做喫

極妙

十八論中治產前後患蒲黃黑神

散功效

第一產因熱疾胎死腹中胎死身即冷

口角沫出爪甲青黑色四肢逆冷但

服此藥煖其死胎須臾自出

第二難產或橫生逆生胎衣不下此藥

並治

第三產後衣不下但服此藥逐出衣中

血遂自出如衣帶斷亦同

第四血暈醫人不識呼為暗風但服此

藥立瘥

第五口乾心悶醫人呼為膏膈不利此

名血結但服此藥立瘥

第六乍寒乍熱醫人不識呼為瘥疾但

服此藥立瘥

第七產後四肢虛腫醫人不識呼為水

氣蓋血氣隔四肢寒但先服此藥立

瘥後服轉藥瀉了惡物轉藥謂之黑

神圓

第八產後乍見神鬼醫人不識呼為風

邪但服此藥即瘥

第九產後月內不語但服此藥即瘥

第十產後腹痛兼瀉痢急服此藥後服

調中湯

調中湯是止瀉石
灰散出產乳經中

第十一產後遍身疼痛但服此藥瘥

第十二產後小便出血大便祕澁人多

作五淋治不愈但服此藥瘥

第十三產後血崩謂惡露未盡久不治

之及食鹹酸所致若腹似痛時稍難

治肝家熱背筋急急服此藥後服黑

神圓瘥

第十四產後血氣不通上氣喘嗽多睡

謂滿月後月脉未通食熱麪壅結成

疾或有氣塊發時衝心痛氣急咳

嗽四肢無力乍汗出心痛月候不來

名曰敗癥腹痛逆臍面赤宜服此藥

即瘥

第十五產後心腹脹滿嘔逆不定醫呼為翻胃不愈急服此藥吐出胃中惡物即瘥

第十六產後口鼻黑色氣起及鼻衄不治

第十七產後喉中氣急喘不治

第十八產後中風為無故下床百日之內傷房室或因著灸有驚臟腑中風之

產卷五

八

胡

時眼澁腰背筋急角弓反張牙關閉定不可治也

蒲黃黑神散方已見第一論末

黑神圓方已見第十二論末

產前後十八論烏金散

婦人萬病皆因血氣而生就中產後乖違誠難救療百日之內變證尤多或坐即運絕卧即口乾經日多言還應心悶或傷熱食變作崩中飲冷服涼便成腰

痛敗血入腹則脅脹虛鳴惡露上衝乃成嘔逆脾之受血發則傷寒肝氣有邪即多嗔怒肺之被撓氣悶喘麓胃藏未安多為腹脹敗血流走百節酸疼留滯四肢皮膚俱腫失音不語還因敗血入心散為淋瀝亦是血之入腹大抵虛弱積血所為三焦不調眾疾皆起每尋方卷多不會解就中產前產後之圖難全真訣當貧困之輩或居村中念其急難方當思慮竟勞神悶不知所裁忽見一人形兒非常乃言曰余有秘術子其知乎不覺惕然瞻敬之際復曰子請存於誠信心欲救人事當甚喜吾有產後一術名曰烏金方受於子宜保惜之余即跪受要旨頓覺精神爽易事理照覺在寤中神授乃依方修合普誥神願遂成產後十八方如後

第一論問胎死腹中者何

答曰緣母患染熱疾經六七日間臟腑極熱薰薰其胎是以子死何以知之身死便冷不居子宮乃墜臍下冷痛口角沫出腹冷爪甲青四肢逆冷命在須臾但以此三服令胎熱須臾自下

第二論問產難者何

答曰兒已成形每食母之血候十月當足月血有餘乃結成塊俗呼爲覓

枕子欲生時兒枕先破爲敗血散裹子身上固當難產但服此散三服敗血即散須臾自產或逆產其躰不同悉皆治之

第三論問胎衣不下者何

答曰產訖敗血流入胞衣中被血脹固當難下但服此散衣中血散須臾自出若胞衣帶斷亦宜服此散即下

第四論問血暈產後三日起止不得眼

前自見鬼神或悶絕不識人者何

答曰產後三日血氣未安運走五臟奔於肺上時人不識呼爲暗風以此治之萬無一痊但服此藥立可安痊

第五論問口乾心悶及煩渴者何

答曰產後七日以來血氣未定蓋爲食於熱麵與血結在心即渴時人呼爲膏膈壅悶若以此治萬無一痊但服此散立痊

第六論問產後乍寒乍熱及渴者何

答曰產後虛羸敗血入於肺則熱入於脾則寒乃渴時人不識呼爲瘧疾若以此治萬無一痊服此散立痊

第七論問產後四肢浮腫及寒熱者何

答曰敗血流入五臟將滿即四肢停留日久却還不得乃欲爲腫時人不識呼爲水腫且如水腫與血腫不同何以明之水氣喘而小便澁血氣渴

而四肢寒先服此散次服宣元瀉下惡物自瘥宣元是黑神圓

第八論問言語顛狂無度若見鬼神或寒熱及渴者何

荅曰產後敗血衝心心不受邪觸被敗血薰薰心悶蒸熱煩渴至躁言語顛狂時人不識以為風及神邪所致

若以此治之萬無一痊但服此散愈第九論問產後不語者何

荅曰夫人心有七孔三毛產後敗血上行流入心孔之中被血閉之即使不語時人不先去心孔敗血其病不除但服此藥當漸語也

第十論問產後腹痛及痢者何

荅曰產後未滿月間誤飲冷水水與血相和流入大腸大腸受之血遂成痛水穀不化或泄或脹膿血不定急服此散次服調中湯立効

第十一論問產後遍身疼痛者何

荅曰產後百節開張敗血流入四肢留滯日久不散結聚虛脹是致疼痛但服此散逐去百節間敗血須臾自定第十二論問產後瘀血及小便赤澁大腸痛者何

荅曰敗血流入小腸閉却水道即小便艱澁流入大腸閉却肛門是致大小便俱難醫人不識呼為五淋治之

萬無一痊但服此散次服黑神圓聚結物出其病立愈或用洪氏方中排膿內補散依方服立効

第十三論問產後崩中者何

荅曰敗血惡露未止日久或食鹹酸之物遂變崩中血結變黑狀似鷄肝或時寒熱背膊拘急煩悶名曰崩中宜先服此散次服黑神圓即安

第十四論問產後血氣不調道路閉塞兼咳嗽多驚者何

答曰產後滿月後月經未還不能謹
忌好食熱麵遂即成疾積聚結塊發
即氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾背
膊拘急煩躁夜夢驚悸體全無力
多汗心疼月經不來名爲血癥腹痛
多睡面色多赤因茲不療遂成骨蒸
治須子細看此疾狀或服別藥十無
一應終不得瘥只服此藥其患自退

第十五論問腹肚脹滿吐逆者何

答曰產後敗血停於脾胃之間氣遂
相衝不定即留滯嘔逆胃脇俱脹時
人不識呼爲嘔胃以此治之萬無一存
急服此藥吐出胃中惡物即便喫粥
第十六論問產後口鼻黑色及鼻衄
者何

答曰敗血傳入臟腑臟腑既滿衝於
頭面却還不得焦乾白黑見於面色
衝於鼻即鼻衄黑起綠產後虛熱

甚變成此狀若別治之萬不得一此名
心肺敗血宜服此藥

第十七論問產後喘急喉中如貓兒聲
者何

答曰敗血衝入心肺氣與血併遂結
爲塊入於喉中如有此狀急服此藥

第十八論問產後中風兼有黑血點者何
答曰產後七日內下床衝風百日内傷
房勞或有灸瘡中風取性慢易即中

風也初中之狀氣溢腰痛筋急如角
弓反張牙關緊急若有此狀即是風
邪所入或面色黑遍身赤黑敗血流
入臟腑臟腑皆滿流入皮膚退反不
得變成血點或得此變急服此藥無
有不瘥

宣經圓

巴豆拾伍粒

去皮心膜用生絹袋
子盛以灰汁煮十餘

沸取出研紙
壓油了重研

右件先用烏金散參錢以無灰酒調似糖入瓷瓶中於重湯內熬成膏入巴豆末同和為圓如菜豆大熟水下拾伍圓宣了冷粥補之忌毒物

烏金散

頭髮灰

男子者不須洗燒灰

鯉魚鱗

燒灰

當歸

焙去盡須

延胡索

生用

好墨

煨過

肉桂

不見火去麝皮

麒麟竭

赤芍藥

剉

百草霜

是銅底刮下者煤

右件玖味等分杵羅為末每服貳錢

溫酒調下又用童子小便半盞生薑

壹塊同煎調下入麝香少許更妙

產前所忌藥物盧醫周鼎集以為歌

蚘斑水蛭地膽蟲 烏頭附子配天雄

躑躅野葛蠖蛄類 烏喙側子及蜚蟲

牛黃水銀并巴豆 大戟蛇退共蜈蚣

牛膝藜蘆加意故 金石錫粉對雌雄

牙朴芒硝牡丹桂 蜥蜴飛生更麝蟲

代赭蚱蟬胡粉麝 芫花薇銜草三稜

槐子牽牛并皂角 桃子蟻螬和茅根

欖根硃砂與乾漆 亭長溲疏茵草中

瞿麥蘭茹蟹爪甲 蝟皮鬼箭赤頭紅

馬刀石鱗衣魚等 半夏天南通草同

乾薑蒜鷄及鴨子 驢馬兔肉不須供

切忌婦人產前用 此歌宜記在心宵

衛生家寶產科備要卷第五

衛生家寶產科備要卷第六

備產濟用方序

婦人產褥之事亦有蹉跌為害不細若因而受疾又非尋常疾病之比氣血既虛更難攻治是宜昔人所留意而不敢忽者也予性喜方藥偶得產方甚多蓋嘗用以取効焉今錄其所得之方及平時所聞之說與夫疾證用藥次第共為一書以濟人之急難初虞世嘗謂婦人

生產須使之自能通曉方為盡善斯乃至論然間有素無產難之家不知出於偶然心常易之不以介意故緩急之際至於產婦已困而家人未悟者往往有之此幸其無事則可非萬全之道也紹興庚申重陽日三吳外士餘杭虞沈書虞氏備產濟用方

妊娠

婦人妊娠之後或觸冒風冷或飲食不

節或居處失宜或勞動過當少有不和則令胎動不安重者遂致傷墮臨產之際為患不小豈可不戒也

妊娠三箇月後或疑非胎宜服川芎散
妊娠五箇月後宜服滑胎枳殼湯

八月

入月第一日清旦先書借地法貼產婦房內北壁上須清心志誠書之更須避日遊月支諸神等

入月後每日進保生圓一服臨產五臟

不痛其子易生

凡產閣及藏衣之地並須依方位所利鋪設產閣務要清虛仍須遮塞孔隙無令賊風遊氣可得而入及窻壁仰泥之類並須一一經心照管恐有顛覆種種非意為害不小入月後須便擇好日為之倉卒之際無緣周備也

凡合用湯藥須於未產前一月內修合

足備不可倉卒或市諸藥肆或求之醫
篋產後五臟皆虛藥貴精當恐有雜偽
反致他疾產婦服食貴在誠潔老娘須
擇溫善安詳慣熟之人其妄誕揮霍無
常者去之又有喜驚動人而收已功者
為害尤甚不可不知也大抵有孕婦之
家選擇老娘最為先務既得之則令與
產婦游處情熟入月則令守月不可臨
時倉卒呼喚却致誤事又老娘收生風
俗多有不同閑時宜先令詳說次第或
有未便款曲與之商量不可一切任之
此若選擇得人則上下安心產婦亦免
憂疑省力萬倍腰生只用家中慣熟妮
子為佳若用外人亦須先審問次第然
後用之亦能為害不可不謹也

臨產

產婦覺腹痛他人切不得驚忙及亂報
人知只可令一兩人老成親熟人安慰

相伴亦不得用人多不然則令產婦憂
怕氣血錯亂生理不和而起百疾

產婦腹痛時須低心忍耐不可急性燥
怒起動揮霍皆能令子失道遂致難產
產婦若只腹痛者未產若連腰痛甚者
即產候也

產婦腹痛雖甚且須令人扶持徐徐不
住行動若倦亦且扶立時時令行先脫
產婦常着衣服一件覆竈頭上待子逼

生方得蹲坐切不可蹲坐太早太早則
子在腹中轉動不得遂致難產產婦臨
產須避太歲所在不得面對太歲蹲坐
恐致憂禍深戒深戒產婦蹲坐時須要
四體平正不得稍有偃曲及強嘔氣用
力亦能令子失道致難產也

產婦未蹲坐時先須用五積散肆錢加
順元散貳錢同煎分作兩服用湯煖却
不得令冷候蹲坐時令產婦先進一服

如稍覺產遲即再進一服若一服後便
產即不須再服此藥助氣催生他藥所
不及吾鄉所謂沈家五積散者是也方
出沈存中內翰宅昔有貧者三百一服
号為神藥余家每用之取効但性稍熱
產婦素協熱者服之產後臟腑須微覺
燥澁甚者三兩日不通切不可用利性
藥但調和粥食如後說調養津液生則
自然流利也

說在產後諸
證用藥門

三聖丸
產六
五
六

產後

纔分娩便須急與產婦童子小便一盞
溫服次進勝金湯一服不可飲酒過量
緣酒能引血入四肢作病兼新產後臟
腑虛熱酒入腹中必致昏亂又嘗有人
用醋墨此雖破血有功然亦傷肺服多
則因而成嗽余見蜀醫張宗說說有用
醋墨者下咽疾作此是氣血方虛酸勝
而生痰不可不戒才分娩便須燒磚石

或炭投醋中三日內嘗令聞猛醋煙氣
以防血暈又不得令熟睡須頻喚醒
緣氣血全虛恐生昏亂分娩後不得便
睡且須扶坐移時方可以軟物自腰以
上漸漸撐起及高枕起頭項仍須令仰
卧立起膝時復令人從心上用手按到
臍下如此一日已來方可止恐惡血上
行而致暈也兼須加意遮避賊風不可
不謹

三聖丸
產六
六
六

產後所進粥藥不得犯生水以至碗器
之類並須用沸湯洗火炙乾方可用產
後七日內唯須頻進童子小便及時進
白粥如小便難喫則依法漬之自然易
喫也七日後方可進少醇酒并些小燒
鹽不可用生鹽二七日後漸進些小淡
煮極糜爛膾肉三七日後漸食滋味一
月後漸進麵食一百日後方可食果實
生冷等物產後五臟百脉率皆傷動一

百日後方始如舊常人不自愛惜才到滿月便稱平復或不謹飲食或觸冒風冷或喜怒高聲或勞動用力氣血未定情慾不常此皆致病之由也婦人稟受虛實皆緣生產而能移易若能一一如法將息補養則有平生虛怯多病而遂盛實無病者若不能如法將息補養則有平生盛實無病而遂致虛損瘦瘠成纏綿不可起之疾者當時不覺意謂不

然及歲月成疾又不能推究其由乃謂偶爾故婦人產後往往不能加意將攝噫臨產之際死生所繫及產難既過漸向平復而又不能將息以自保攝遂取困厄豈不至愚哉世之任意輕動不能調養者多故詳言之

產後諸證用藥例

產後惡露或多或少皆能令人暈悶心煩滿急

產後惡血攻心則能令人眼生黑花心悶欲絕產後才覺惡心頭旋頭昏多涕唾身如在舟車中此是血暈之候也便以猛醋煙燻及服保生圓勝金湯百草霜散等治血藥則如熟乾地黃生薑芩藜子當歸蒲黃涼沒藥桂心延胡索赤芍藥牡丹皮牛膝川芎麒麟竭之類產後惡血攻心則荒言亂語驚怕或啼或笑宜服金黃散麒麟竭散等破惡血

養好血藥則如琥珀熟乾地黃當歸蒲黃涼赤芍藥之類安心氣則如遠志茯神朱砂麝香之類

產後惡血不絕為自來經血虛損或產時惡血出不盡留滯腹中先有宿冷遂成淋瀝不止宜服保生圓等如牡礪當歸熟乾地黃艾葉阿膠厚朴乾薑之類性冷藥不可服之

產後因惡物不下或下不盡心腹疼痛

煩悶宜服千金散以黃散桃仁散川芎散勝金湯保生圓筆可又宜服桂心當歸牛膝牡丹皮虎杖澤菽莢延胡索赤芍藥之類產後須常躰問產婦如所下惡物多即不須再三進逐惡血藥恐氣血益虛煩悶暈亂及生疾病如覺比尋常少或不行則須急攻之緣血隨氣上行掩於心故令煩悶而心滿急二者得失甚大切在詳審產後大腸祕澁此是產時走津液多腸胃未和乃常事也切不可亂服通利藥但只依尋常服調氣血藥及調粥食常令溫煖細軟依時漸進不得失飢亦勿傷飽氣血調和則腸胃自然平復矣

產後躰虛切不可妄進湯藥如別無證候但只與保生圓及調養氣血等藥產後三日起坐不得眼見黑花目或暈絕全不見物者是血氣未安運走五臟

奔狂於肝故也有不識者呼為暗風候矣宜服黑散子

產後乍寒乍熱及渴者是產後虛羸敗血入心肺則熱入脾則寒不識者呼為瘡疾候矣宜服黑散子

產後四肢浮腫及寒熱者是產後敗血流入五臟五臟將滿流入四肢停留日久却還不得乃化為水有不識者呼為水氣候矣血與水氣狀候不同何以明之水氣喘而小便澁血氣渴而四肢沉當細辯之宜服黑散子產後言語顛狂乍見神鬼時復寒熱及渴者是產後敗血衝心心不受觸既被蒸燻心臟熱極遂生此疾不識者呼為風邪神祟候矣宜服黑散子

產後一臑非時不語者是敗血上衝陷入心孔中既被蔽之便致不語宜服黑散子

產後遍身疼痛者是百節開張血症結處停留不散結聚虛脹是以疼痛宜服黑散子骨間敗血即去

產後雖滿月血氣不通上氣咳嗽痰涎多者經脉未還便不忌謹多食熱麵糰結成疾聚即成塊散即上衝氣急咳嗽四肢虛熱心悶口乾睡夢多驚四肢無力盜汗心痛月候不調或成血癥環遶臍下或即面赤因變骨蒸但多服黑散

子即瘥須急服之此疾難理故也

產後敗血停在脾胃食衝於胃胃衝於氣氣衝即不安便當吐噦膏脇俱脹有不識者呼為翻胃但服黑散子吐出惡物即瘥

產後中風者是未經七日下午床兼百日內傷房事或灸瘡內中風也初中之狀眼澁腰強筋急如角弓反張牙關緊急若此之狀非中風也有此疾者安能救

療婦人傷犯之後其疾甚多不可不戒產後面色黑及遍身生黑靨子由敗血入皮膚欲出流走熱結便住却還不得遂成黑靨中此者百無一瘥

難產逆產橫產

難產逆產橫產三者皆能立致不測之禍然所得多端或先因漏胎血去臟燥或子臟宿挾疹疾或觸犯禁忌或產時驚動穢露下早子道乾澁產婦疲困或

坐卧未安身體斜曲不正轉動忽遽強

嘔氣暴衝擊或腹有兒枕產時先破遂為敗血散累其子胎中伏熱故致難產也產時未至驚動太早子轉未覺使用力產之故致逆產橫產也產婦面赤舌青者子死母活面青舌赤沫出者母死子活唇口青兩邊沫出者子母俱死身更重而熱舌下脉青黑及胎上冷者子已先死並有方治之在後

枳殼湯

五箇月後服 消胎易生

商州枳殼貳兩去穢炒石州甘草壹兩

右為細末每服貳錢百沸湯點空心

食前一日三服或四服唐胡陽公主

每產則經旬痛楚萬法不効服此藥

遂驗自服藥後忌登高厠此方神妙滑

肉色不及但其胎緊小微帶黑色百日後

寒酌綠多服也性 難服也

蟹爪湯

甚者血從口出逆不得息或注

下血胎不出則寒熨人腹中急如產狀虛

乏少氣困頓欲死煩悶反覆服藥母即得

當產立生神效

蟹爪壹升約伍兩

阿膠貳兩剉碎

甘草炙剉 桂心不見 各貳尺

右以東流水壹升煮取參分去滓內

膠洋盡能一服佳不能一服者食頃

再服若因急不能飲者灌之藥下子

母俱活子死則母活若不經僵仆下

又方娠偶有所觸或墜高傷打致胎

縮砂壹兩炒和皮用淨熨於慢火上

右為細末每服貳錢熱酒調下覺動

處熱即已安矣

又方胎不穩坐卧

木賊草去節 川芎剉 各壹兩

右為細末每服壹錢水壹大盞入金銀

物同煎至陸分去滓空腹食前日三服

人參圓或婦人以尋常治嘔吐不止名為阻病

宜服

乾薑炮烈 半夏麴炒

人參去蓋切 各壹兩

右為細末薄糊圓如雞頭大每服壹

圓米飲下可加至參圓此方出仲景

金匱極妙

保生圓入月後服產前產

金釵石斛壹分別斫

秦椒去目炒 官桂去皮不

貝母

去心

乾地黄

洗乾

防風

去蘆

糯米

甘草

剉炒

大麻仁

去殼

大豆卷

黑豆牙是
不乾晒之

黃芩

剉 各貳分

石膏

明淨
硬者

麒麟竭

沒藥

去石

龍腦各壹錢半

右件藥並須用州土上等好者搗為細末以熟蜜陸兩入水壹分同煉令水盡和藥了却入臼內杵伍百下取出平分柒拾貳圓每服壹圓產前產後血風頭旋身戰薄荷酒下月信不通當歸酒下赤白帶下溫酒下臨產難產胎衣不下子死腹中橫產倒生死絕不語但看心頭熱氣在取壹圓京棗湯化開灌入喉中立甦產後惡血不盡臍腹疼痛嘔吐發熱增寒煩悶月候不調或多或少皮膚虛腫惡露不止虛勞中風口噤不語半身不遂

產前產後赤白痢大便秘澀血渴血

暈狂語見鬼頭痛面色痿黃漸成勞

瘦飲食無味並用溫酒研下催生當

歸酒下產後中風血暈生地黃汁同

煎十沸研藥灌口中禦風但五日壹

服空心熱酒嚼下浴後溫酒嚼下中

風不語身急如板用消梨穰薄荷同

研藥灌口中候汗出了相次揭衣被

當風坐卧立瘥其餘一切諸疾並用

當歸薄荷酒研下清酒亦得小兒天

弔驚風用藥壹圓分作叁服薄荷酒下

五積散

臨產時服
助氣催生

蒼朮貳拾兩

桔梗拾兩

去蘆

陳橘皮陸兩

白芷

去苗

甘草各叁兩

當歸貳兩

去蘆須
洗切焙

芎壹兩半

芍藥

白者

白茯苓

半夏

湯洗

各壹兩

麻黃

枳殼肆兩

麩炒去
穰別杵

肉桂

春夏兩秋冬兩

厚朴貳兩

別煎

乾薑

春夏兩秋冬兩

右拾伍味為麤末分作陸分大鍋內

煖火炒令微赤香熟即止不可過焦

取出以淨紙板藉上攤令冷入枳殼

肉桂厚朴三物和之若產婦難產經

三兩日不生胎死腹中或產母氣乏

委頓產道乾澁用藥末貳錢加順元

散壹錢水柒分酒參分煎至柒分相

繼兩服氣血內和即產胎死者不過

參服當下其順元散亦須量產婦虛

實用之

又方

只用五積散貳錢入附子末壹錢水

壹盞同煎至柒分無順元散則用此

順元散

烏頭貳兩

炮烈

附子

炮去皮

天南星

炮

各壹兩

木香半兩

懷乾

右為末入前五積散同煎服

催生神効聖功散

此藥極滑胎易生其

實切須令強服

榆白皮

取深者去根刮去赤皮取粉

滑石各壹兩

沒藥半錢

研

當歸壹分

朱砂半錢

別研

右件為細末次入朱砂再研和勻每

服貳大錢水柒分盞煎參兩沸及九

箇月以來方可服如臨產覺陣痛亦

依前服自服此藥忌登高劇

催生安胎救命散

烏藥肆兩

別用醋炒黃色

前胡半兩

揀淨

菊花壹兩

去梗

蓬莪茂貳兩

炮乘熱

當歸半兩

去蘆頭

右剉碎用好米醋炒乾為度同為末

如死胎在腹用炒薑豆淋酒調藥參

錢連進參服立下死血衝心炒薑豆

淋酒下貳錢入童子小便半盞安胎

用熱酒下壹錢血山崩熱酒下壹錢
產後一切血疾皆可服尋常催生用
炒薑豆淋酒調參錢只壹兩服立生
藥須用新磁罐收勿令失氣味
神効催生丹

臘月兔腦髓壹枚

麝壹錢別研

乳香末壹分

須黃明者乳鉢內研細末外以冷水浸鉢輕研

母丁香壹錢

為末須辛辣用陳者大者佳不可用

右一處研細用兔腦髓為圓如○此

大慢火焙乾磁合收封糊合口不要

出氣候產婦陣頻以温丁香湯吞下

壹圓產婦不痛其子順生男左女右

手把藥出急洗藥焙令乾凡壹粒可

用三次合時勿令鷄犬婦人孝子見

服時婦人閉目取藥產婦閉目吞之

神効

催生如聖圓

乳香好明淨者研如粉

右以生猪心血和圓如梧桐子大覺
腹痛時濃煎茅香湯下參拾圓嚼破
服端午日合切忌婦人鷄犬見橫倒
生只壹服此方絕妙

產後諸方

勝金湯

才產了便服去惡血止血暈

地黄汁貳分

生 生薑汁壹分

右用童子小便壹分同煎拾餘沸温

服地黄生薑須是淨潔沙盆內研取

自然汁切不可犯生水

又方

治血暈至急

生地黄參兩

碎切 生薑參兩

右貳物相和同炒乾碾為末每服貳

錢研木香酒壹盞同煎三兩沸通口

服壓下血立愈

又方

產後血暈欲死及餘血不盡被風吹即變成寒熱

生地黄肆兩

生薑肆兩

右並薄切新瓦乾之為細末温酒調

下貳錢此二方俱妙

漬小便方小便難喫用此法漬之

烏梅伍箇湯內洗淨炙了甘草末貳錢

炮了乾薑末壹錢

右參味先於椀內用沸湯少許浸少

時候烏梅軟即以熱小便壹盞許就

椀內浸令產婦閉氣作壹服服之如

欲再服即別用烏梅等一依前法重

浸方可服不可更用浸了藥也若產

婦才分娩了即須以童子小便依尋

常與之未可用此法第二次方可用

此法

燒鹽法初食鹽用此法燒之

好淨鹽不拘多少

右以蒟葉裹作粽子樣於炭火內燒候

鹽通紅如火即取出放淨地上一伏

時候火氣盡研用

百草霜散產後血暈可服

百草霜壹錢秤即鍋底上黑煤也

生薑貳錢秤去皮切炒乾薑黃半錢

右為末以生地黄煮濃汁調下貳錢

又方

劉寄奴壹握劉甘草半兩炙劉

右以水壹椀半煎柒分去滓服才覺

血暈契壹服甚者再服無事覺腹痛

即先煎下恐緩急煎不成也

黑散子治療見產後諸證用藥門

琥珀別研細

朱砂別研

京墨煨通赤放冷用

血苗灰即鯉魚鱗灰也

新羅白附子炮

百草霜乃鍋底上黑煤也

黑衣即龍額上煤也倒掛者亦得又謂之烏龍尾薑黃灰亦得各半兩

麝別極細研

白殭蠶劉炒去絲

川當歸洗去蘆須切焙各壹分

右為末每服貳錢炒薑溫酒調下

烏金散產後血暈或惡露不盡死胎不下並可服

大豆

生薑各肆兩

蓬莪莪劉

當歸去蘆須洗切焙

黃連須去各壹兩 椶皮貳兩

右先下生薑大豆炒候薑乾即下當歸莪莪連炒看豆紫色透心即以椶皮點火入藥銚中椶皮盡成黑灰即傾地上以紙襯出火毒為末每服貳錢童子小便調下產後雖無事服之亦佳

金黃散產後惡血攻心發燥可服

蒲黃半兩炒隔紙 延胡索壹兩劉

桂心壹分不見

右為細末每服壹錢用烏梅湯放冷調下

麒麟竭散產後惡血攻心漸次暈悶可速服

麒麟竭壹兩末為 生薑半兩切碎

右用酒壹盞同煎至捌分去滓帶熱通口分兩服立驗

千金散產後惡物不下或不盡腹痛可服

桂心去皮不 葳靈仙鐵脚者去根劉

白芷去蘆劉 當歸去蘆須洗切焙

牡丹皮劉 各壹兩

右同杵為細末每服貳錢煎神麴湯調下

地黃散產後惡物不盡腹痛可服

熟乾地黃壹兩略炒

生薑肆兩細切如蠅頭大於銀器或銅器或新瓦上炒令黑焦煙起

當歸壹兩洗去蘆須切焙

右同杵為細末每服壹大錢用生薑炒寢小便調下

牡礪散產後惡露不絕可服

牡礪半兩燒 龜甲半兩用好醋炙黃

右為細末每服溫酒調下貳錢食後服

桃仁散產後心腹

桃仁貳錢去皮尖并雙

蓬莪莪壹錢半秤用慢火炮取

桂心貳錢不見 當歸肆錢去蘆須劉

右為細末熱酒調下壹錢如不喫酒

只用水壹中盞藥末貳錢煎柒分帶熱服

川芎散 產後心腹

川芎 洗剉

桂心 不見

木香 剉懷

當歸 去蘆須

桃仁 去皮尖并 各壹兩

右為細末每服壹錢熱酒調下如不欲飲酒即用水壹盞藥末貳錢煎至柒分帶熱服不拘時候

金花散 產後血暈一切腹痛

薑黃 片子

熟乾地黃 焙 各貳兩

肉桂 去麤皮

牛膝 去根酒浸一宿

劉寄奴 剉

虎杖 洗剉

芎藭 洗剉

赤芍藥 剉碎

蒲黃 隔紙

乾葛 勿用色 各壹兩

右為細末每服貳錢如疾勢輕者即用水或酒用壹盞煎至柒分和滓溫服重急者以豆淋酒同煎服

當歸散 產後痢

官桂半兩

去皮秤用生薑貳兩取自然汁塗灸令薑汁盡為度

當歸壹分

去蘆須

右為細末每服貳錢米飲調下未止再服

人參散 產後虛汗

人參 片子

當歸 淨洗去 各半兩

右分作兩服每用猪石子壹隻切作捌片以灰去血水用水貳盞蒸貳莖

粳米壹合生薑參片煎壹盞去石子

等溫服早晚各壹服

四神散 產後血氣

當歸 去蘆須

芍藥 白者

川芎 剉 各壹兩 乾薑半兩 炮烈

右為細末每服貳錢熱酒調下

香桂散 產後臍下疼

當歸 去蘆須

川芎 剉 各壹分

官桂半兩 去皮不見火剉

右為末分作叁服每服酒壹盞煎參五沸更入小便少許同煎至柒分温服甚者再服必効如不欲入酒即以水代之

當歸散

婦人產後血氣血刺血暈血崩或如中風或瀉或痢或如瘡疾者其功効如神兼治產後一十八病唯瀉或喘本方不治

肉桂

去麤皮不見火

當歸

去蘆須酒洗焙

芍藥

白者剉

乾薑

炮烈

乾地黄

湯洗剉焙乾

蒲黃

上紙炒

甘草

剉炙

各壹兩

黑豆

貳兩

炒熟去皮

右為細末温酒調下貳錢日進叁服不拘時候甚者叁服愈常服日兩服或壹服

柿湯

產後嘔逆氣亂心煩可服

乾柿壹箇切碎水壹大盞煮熟熱

呷甚妙温即再煖令熱呷喫

荆芥散

治產後一切難治之疾

荆芥不以多少

右為細末每服壹錢或貳錢温酒調下立効有急疾及風候宜速為之此方絕妙家中常用之產婦雖無病每日進壹服只用童子小便調下有急疾用小便酒各半調之尤佳

陳梅散

產後痢可服

多年白梅不以多少

右燒成灰存性研為細末陳米飲調

下壹大錢甚妙

難產諸方

治產難子死腹中又姪兩兒壹生腹中壹死腹中死者出生者安此方神驗萬不失一

蟹瓜壹升約伍兩

甘草肆兩

剉炙

阿膠叁兩

用粉炒

右以東流水壹斗先煮貳味至叁升即內膠膠洋頓服之不能一頓服者食頃再服若至困灌之即活作東向

竈葦薪煮之此方與前蟹爪湯相犯唯不用桂心

治難產

榆白皮壹升切 瞿麥揀淨

木通剉 各叁分 牛膝去苗根酒浸壹宿剉焙乾用

大麻仁去殼 各壹兩

右為麤散每服肆錢水壹中盞煎至陸分去滓溫服頻服佳

又方

當歸貳兩去蘆須洗切焙 芎壹兩剉

右為麤散每服肆錢水酒各半中盞煎至陸分去滓溫服頻服佳若慮胎在腹已死者服此藥胎死即下胎活即安神効

又方

赤小豆壹合炒略 黃明膠壹兩剉

右以水壹盞盞煮豆令熟去滓內膠令消溫溫頓服

又方

取馬嚼壹枚覺痛即令產婦左手把之甚効

又方

取東引槐枝手執之

又方

取桃仁分破書壹片作可字壹片作出字依前還合令母吞之即產此天真法也神効

又方

右收五方氣飲氣書二道用茅香湯吞之子母早生 子母早後

又方

取草麻子肆粒去殼水研取汁少許塗產婦脚心中才產便洗却并貼臍中亦良

又方

取皂角末少許吹母鼻中令嚏其

子便下

又方

取大豆一顆擘破書其夫姓名於上以酒吞之

又方

雄蛇蛻一條大者以頭按產婦臍中自腰後左繞轉却以尾按臍中才匝便下此法極驗蛇蛻在高處者為雄在地者為雌須頭尾全者

逆產諸方

治逆產

半夏湯洗七遍去滑焙乾白斂各壹兩

右為細末每服貳錢生薑酒調下難產壹服橫產貳服倒產參服兒死肆服若胎衣不下母氣欲絕亦宜服之每壹服如人行壹里再進如瞿麥貳兩尤妙小產只壹服愈

又方

急以鹽和輕粉塗于脚底又急以小針刺于脚底即轉覺痛驚製入即順出

又方

以鹽摩母腹即順出

又方

當歸不以多少微炒去蘆鬚洗剉焙

右為細末温酒調下貳錢

又方

艾葉壹兩炒

右以酒壹大盞煎至陸分去滓分作兩次温服立効水煮亦得

又方

車前子不以多少

右為細末温酒調下貳錢

又方

兔絲子不以多少

右為細末温酒調下壹錢

又方

以手中指取釜下墨交畫子足即順生

橫產諸方

葵子貳合

黃明膠坐

滑石末各壹兩

右為細末以水壹大盞半煎至壹盞去滓分作叁服温服

又方

逆產橫產難產胎瘦姙娠產前

百草霜

香白芷各壹兩

右件為細末每服貳錢童子小便壹茶脚許調勻以沸湯肆伍分化開服止壹服甚者再服愈

又方

橫產逆產胎死腹中及胎衣不出母欲絕皆可服

半夏

熱湯寢洗七遍去滑焙乾

白欵

剉碎

瞿麥頭子各半兩

又方

右為細末每服貳錢炒生薑酒調下

瞿麥壹兩

右以水壹大盞煎至陸分去滓分作兩服温服

又方

牛尿不以多少

右塗母腹上即噴出

又方

蛇脫皮不以多少

右用炭火燒作灰研令極細温酒下

貳錢若子死腹中服之立下

胎衣不下諸方

產婦臨產先脫常着衣裳一件覆龜頭即無胎衣不下之厄此法極驗不可不信也

治胎衣不下

大牛膝壹兩去苗葵子壹合

右搗碎以水壹大盞煎至半盞去滓兩服温服

又方

繫要膏帛燒灰酒半升調下

又方

飲洗兒水壹口立下

又方

革麻子叁粒 鼠粘子壹分即牛蒡子

右為細末若子死腹中無藥可下即以醋糊調藥塗在口上以紙貼之立下

又方

當歸壹兩洗去蘆須切焙乾

瞿麥揀淨 芎藭洗 各叁分

右為麤散以水及米醋各壹中盞煎至壹盞分作叁服温服

又方

當歸洗去蘆須切焙乾 鼈甲酥塗炙 各叁分

右為細末先取產多婦人髮半兩燒為灰細研入當歸末以水壹大盞半煎取捌分然後下盡鼈甲末煎伍茶

沸分為叁服若數日不產子死腹中者皆可服服後如人行四五里再服

又方 水銀壹彈子大

右斡開產婦口灌之扶起令坐不食頃扶起令倚立其子即下唯臨產面青舌赤沫出欲死子猶不出并產婦已死而欲令子出者可服

治產前產後痢疾

癩蛇蛟端午日收窸乾

右產前痢用前兩脚產後痢用後兩脚燒灰存性為末米飲調下食前服此藥家中累曾經驗神効

許學士產科方 名叔微字知可

滑胎枳殼散

商州枳殼貳兩去穢剉作小塊麩炒 甘草壹兩炙 右為末每服貳錢百沸湯點服空心食前日叁服凡懷孕六七月以上即

服令兒易生初生胎小微黑百日以後肉漸變白此雖孫真人滑胎易產方然抑陽降氣為衆方之冠

內補圓治妊娠衝任脉虛補血安胎

熟乾地黄貳兩剉當歸壹兩去蘆須洗焙乾

右細末煉蜜和圓如桐子大每服參

肆拾圓温酒下無時

上三方諸集皆載之在人用之如何爾

大率婦人妊娠唯在抑陽助陰素問云

陰搏陽別為之有子蓋關前為陽關後

為陰尺中之脉按之搏手而不絕者妊

子也婦人平居陽氣微感無害及其妊

子則方閉經隧以養胎若陽感搏之則

經脉妄行胎乃不固素問所謂陰虛陽

搏謂之崩也抑陽助陰之方甚多然胎

前藥唯惡群隊若陰陽交雜別生它病

唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助

陰故爾枳殼散差寒若單服之恐有胎

寒腹痛之疾以內補圓佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調勻有益胎嗣此前人未嘗論及也

木香圓治婦人有孕傷食

木香貳錢剉京三稜慢火煨乘熱剉作片子

人參去蘆切白茯苓各叁錢

右細末麵糊圓菜豆大每服參拾圓

熟水下

白朮散治妊娠氣不和調飲食

白朮切作片子焙乾乾紫蘇各壹兩

白芷微炒人參去蘆各叁分

川芎洗剉訶子皮

青皮去白各半兩

甘草壹分炙剉

右細末每服貳錢水壹盞薑叁片煎

柒分不拘時温服之

經云飲食自倍腸胃乃傷又去陰之所

生本在五味陰之五宮傷在五味若任

子飲食不節生冷毒物恣性食噉致脾胃之疾故妊娠傷食難得藥唯此二方最穩

紫蘇飲治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下

紫蘇莖葉壹兩

大腹皮 剪碎

人參 去蘆切片

川芎 劉開

陳橘皮 去白

白芍藥各半兩

當歸參分 去蘆切 甘草壹分 炙

右細剉分作叁服每服用水壹盞半

生薑肆片葱白柒寸煎至柒分去滓

空心服之

曾有婦人累日產不下服遍催生藥不驗予曰此必坐草太早心懷下一懼氣結而然非順不順也素問去恐則氣下蓋恐則精却却則上焦閉閉則氣還還

則下焦脹氣乃不行矣得此藥壹服便產及婦人六七月子懸者予用此數數有驗不拾服胎便近下也

下死胎方

桂末貳錢麝香當門子壹箇同研煖酒服須臾如手推下比之用水銀等此藥不損血氣

琥珀散治婦人月經壅滯每發心腹臍疼痛不可忍及治產後惡露不快血

上愴心迷悶不省氣絕欲死

荆三稜 蓬莪朮

赤芍藥 劉寄奴

牡丹皮 官桂 削去皮不見火

熟乾地黄 劉焙 菊花 揀去枝梗

真蒲黃 當歸 去蘆頭各壹兩

右前伍味用烏豆壹升生薑半斤切片米醋肆升同煮豆爛為度焙乾入後伍味同為末每服貳錢溫酒調下空

心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣痛只壹服產後血衝心貳服便下常服尤佳予前後救人急切不少此藥易合宜多合以救人

佛手散治婦人姙孕五七月因事築磕著胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下此藥催生神妙

當歸陸兩洗去蘆川芎肆兩剉略

右麤末每服叁錢水壹小盞煎候相次欲乾投酒壹大盞止壹沸去滓溫服口噤灌之如人行五七里再進不過叁兩服便生有一方云此藥治傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔齒去血多昏運欲倒者去水煎服愈風散治產後中風口噤牙關緊急手

足瘕瘕

荆芥穗輕焙過壹兩

右為細末每服貳錢溫酒調下

經驗產寶皆有之陳選方中用舉卿古拜貳味蓋切脚隱語以秘之也此藥委有奇効神聖之功大抵產室但無風為佳不可衣被帳褥太暖太暖即汗出汗出則腠理開易於中風便昏冒記有一婦人產後遮護太密閣內更生火睡久及醒則昏昏如醉不省人事其家驚惶醫用此藥依以交加散祝云服之必睡睡中必以左手搔頭覺必惺果如其言交加散治婦人榮衛不通經脉不調腹中撮痛氣多血少結聚為癥產後中風生地黄伍兩研取生薑伍兩研取右交互用汁浸滓壹夕各炒黃漬汁盡為度末之尋常腹痛酒調下參錢產後尤不可關

蒲黃散治產後出血太多虛煩發渴

真蒲黃末每用貳錢以米調飲下

渴躁甚者新汲水調下

護胎方治妊娠時氣身大熱令子不落

伏龍肝為末水調塗臍下貳寸乾

則易瘥即止又取井中泥塗心下

乾則易

又方

浮萍

乾者

川朴消

蛤粉

大黃

剉碎
微炒

藍根各壹兩

剉碎

右為末水調封臍上安胎解煩熱

麻仁蘇子粥治婦人產後有三種疾

鬱冒則多汗汗則大便秘故難於用藥

唯此粥最佳且穩

鹿角湯治妊娠熱病胎死腹中

鹿角屑壹兩水壹碗葱白五莖豆

豉半合同煎至六分去滓溫分貳

服極妙

治婦人生產數日而下及胞衣死胎

不下者方

用草麻柒粒去殼研如泥塗足心

纔下便急洗去此崔元亮海上方

人但未知爾政和中壹鄉人內子

產二日不下子令謾試之一塗俄

頃便下自後常用極驗

衛生家實產科備要卷第六

衛生家寶產科備要卷第七

胎孕方

人參白朮散治婦人經候不來身如病而無病脉滑大而六部俱勻必有孕也精神如故惡聞食臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作他疾治之

白朮壹兩

去蘆切焙

人參半兩

去蘆切焙

丁香

油者剉碎懷乾

甘草

各壹分

右為末每服參錢水壹盞生薑參片同煎柒分盞去滓溫服食前嘗驗之清晨意味佳自午後漸惡者是有孕無疑也

千金半夏茯苓湯治妊娠惡阻病其證心中憤悶虛煩吐噁惡聞食氣頭眩四肢百節煩疼沉重多卧少起惡寒汗出疲極瘦悴

半夏

湯泡七遍

茯苓

去皮剉碎

熟乾地黄

水略洗燉乾剉碎慢火焙

各壹兩貳錢

橘皮

去白

細辛

去華

人參

去蘆切片子焙

白芍藥

剉

旋覆花

揀淨

芎藭

洗剉

桔梗

去蘆剉

甘草

剉

各捌錢

右拾壹味為糞末每服肆大錢水壹盞半生薑伍片煎至柒分盞去滓微熱服

枳殼散

方有隨病加減及相繼合服茯苓圓並見千金本方

枳殼散妊娠至五月以後能順氣瘦胎

易產

枳殼捌兩

去穢麩炒秤

甘草肆兩

剉碎

右為細末湯點貳錢空心晚食前日兩服入月參服

陳逍遙水酒散能治妊娠百疾安養胎氣自任陸箇月以後常服至產時草蓐之間痛當減半

當歸

洗去蘆須切片子焙

槐角

擇淨炒香

枳殼

去穢炒

川芎

洗剉

當歸

洗去蘆須切片子焙

槐角

擇淨炒香

枳殼

去穢炒

川芎

洗剉

貝母 去心薑汁製
壹宿焙乾

右伍味等分為細末每服貳錢水酒

各半盞同煎至柒分盞食空時服臨

月日進兩參服

櫛榔散治姙娠常若胃腹脹滿兩脇

妨悶飲食不下四肢無力頻服能滑胎

益氣

櫛榔 剉碎 赤茯苓 去皮

前胡 去蘆 各壹兩

人參 去蘆切 白朮 去蘆切

芎各半兩 陳皮 去白

枳殼 去穰 各叁分

甘草壹分 炙

右玖味為細末每服貳錢水壹盞薑

叁片棗子貳箇煎至柒分盞溫服日

兩服

治胎不穩坐卧不得安方

木賊 去節 川芎 洗剉

右貳味等分為細末每服肆錢水壹

盞入金銀同煎至陸分盞去滓空腹

溫服日參服取効

治姙娠偶因所觸或墜高傷打致胎

動不安腹中痛不可忍方

縮砂不以多少熨斗中熉火炒令

熱透去皮取仁

右為細末每服貳錢熱酒調下須臾

腹中胎動處覺極熱即胎已安

治胎動若胎已死即下未死即安及

治血下心腹滿者如湯沃雪方即

用聖功川芎湯用大劑酒水各半

煎連參服取効本方在後

千金蟹爪湯治姙娠閃撲僵仆失據胎

動轉上搶心甚者血從口出逆不得息

或注下血壹斗胎死不出母氣欲絕服

此母即安血亦止當產者立下未產者

胎再安

蟹爪半盞以多為佳 甘草炙剉

桂去皮剉不見火 各壹兩

阿膠壹兩剉碎用蚌粉炒炮起絲去蚌粉用

右以東流水拾盞煮前參味至伍盞去滓入阿膠再煮至膠洋盡頓服為佳不能者分減服一時辰間取盡劑已不能飲者斡開口灌之

又方治胎動及難產子死腹中若姪兩子壹子已死壹子尚生服之能

令死者出生者安與前千金蟹爪湯方同唯不用桂耳

葱白湯治姪娠傷寒頭疼發熱不可同常法治之用此藥最穩

大蔥白拾莖去青連鬚用或小者加至貳叁拾莖切碎 生薑貳兩切碎

右用水貳碗煮至壹碗去滓分兩參服熱服之取效快

白朮散治姪娠傷寒

白朮去蘆切片子焙 黃芩剉碎

右等分剉用新瓦上炒香為細末每服參錢水壹盞生薑參片棗子壹枚同煎至陸分盞熱服唯四肢逆冷陰證見者未可服

治姪娠傷寒大熱甚胎不安者方

阿膠壹兩洗剉碎以蛤粉末同炒起篩去粉候冷入碾

右為細末每服貳錢竹瀝調下卒無竹瀝用小麥竹葉同煎湯調亦可

治姪娠傷寒大熱令胎不落方

竈底黃土為末

右用新水調塗臍下周迴伍陸寸乾即復塗頻頻為之熱退乃止方或用酒及泔清調皆可

治姪娠小便卒不通方

果茶藟葉壹兩燒灰研

滑石半兩研細

右同研勻每服壹貳錢用臈茶清調

入生油貳參點服只沸湯調亦得

又方

赤連珠甘遂

右為末每服壹字至半錢湯調下

如喫

了藥且不得服有甘草藥半日或壹日緣二藥相反故也

產前方

榆皮滑胎散妊娠入月宜服之多往往

坐蓐不覺胎下如未入月不可先服

榆白皮貳兩

切焙

義論

產七

七

文

右為細末每服貳錢煎糯米飲調下

空心食前服

黑神散催生及治橫逆生服之即順

百草霜

右為細末每服貳錢用米醋童子小便

各少許調成稀膏沸湯侵至陸分盪溫服

催生桂散有三五日不能產者只壹

服再服神驗

官桂

去皮曬乾不得見火

右為細末每服貳平錢沸湯或童子

小便調下

治難產或橫倒生或胎死不出母氣

欲絕方

半夏

湯泡洗

白欬

右等分為細末每服貳錢酒調下不

能酒者湯調小難壹服橫生貳服倒

生參服胎死肆服加瞿麥壹倍尤良

又方治應干難產胎衣不下只參服

七

產七

八

胡

以蛇皮燒過或以銚子炒微黑

右研細入麝香少許用熟湯調通口

服之每服壹錢

又方

車前子

不以多少

右為細末用熟湯或小便調服貳錢

又方

雲母粉半兩

右以酒調貳錢即產不順者即順下

易產方

當歸壹兩半 去蘆須切片焙

桑寄生半兩 揀淨 川芎壹兩 剉碎

右為麤末每服肆錢水酒各半盞煎至陸分去滓通口服不許時

小琥珀散安胎氣調血脉應是產前產後血氣諸疾俱能療治神効

川芎陸兩 揀顆如核桃肉者生對

川當歸去尖梢蘆頭淨肆兩 好酒浸壹

宿慢火灸令黃色不得焦候冷切細 桑寄生貳兩

右焙乾搗羅為末每服貳錢水捌分

盞煎至陸分却入好酒貳分更煎參

兩沸溫服孕婦臨月空心壹服至卧

蓐時胎滑易生惡物亦少新血便生

臟腑自然不痛

下死胎方

朴消壹兩

右為末每服貳錢溫童子小便調下

嘗因產試之極驗

下鬼胎方婦人稱孕坐產乃不下有經三五日者乃鬼胎也

蜀椒貳兩 去目微炒 葱貳握

桃頭枝拾肆枚

右用水壹斗煮熟乘熱傾盆器中令婦人坐上薰蒸之當自散

治草蓐或產後血暈悶絕兼治魘死卒死溺死縊死等謂之五絕卒中風牙

關緊氣不通用之亦驗

生半夏壹兩

右為細末用壹豆許蘆管吹入鼻

竅中即甦

產後方

牛膝湯治胞衣不出令胞自爛

牛膝 酒浸壹宿控乾切碎焙乾 瞿麥 剉 各壹兩

滑石貳兩 搗碎 當歸叁分 去蘆須切片焙

通草壹兩半 切 葵子貳合半

右陸味用水玖盞煎取參盞分作參

肆服

當歸建中湯治產後虛羸不足腹中
痾痛吸吸短氣或小腹拘急痛引腰背
不能飲食凡產後壹月內服參肆劑為
善令人丁壯古方云產前安胎四物湯
產後補益建中湯者謂此也

當歸貳兩

剉去蘆秤

官桂壹兩半

剉去皮秤

白芍藥叁兩

甘草壹兩

右為麤末每服肆錢水壹盞半生薑

伍片棗貳箇同煎柒分盞去滓入錫

少許再煎微熱服空心食前日叁服

如喜嘔人不用入錫

聖功川芎湯治產後血虛迷悶旋運耳
鳴不省人事胃膈不快惡心嘔逆化惡
血生好血尤治血崩血噤亦治頭疼發
熱如傷寒證者治病甚多此產家之要
藥也

大芎半兩

當歸壹分

去蘆

右貳味細剉作壹劑用水壹盞半好
酒壹盞同煎至壹盞半分貳服如新
產血未定及平常飲酒少人但只用
水貳盞煎兩箇捌分盞却將童子小
便添成兩箇捌分盞服之

琥珀黑神散治產婦十八惡證凡臨產

宜進壹貳服能安神順胎產後雖無疾

柒日內亦日進壹貳服能去諸疾歷驚若

偶被驚恐或變證當連服取効

琥珀別研如麵細

辰砂別研

各貳錢

麝香別研

好墨燒過研

白殭蚕炒各壹錢

當歸末

鯉魚鱗灰

百草霜

白附子末

黑衣即龜額上倒掛黑塵無即以鹽衣燒灰代

各叁錢

右拾味研勻每服貳平錢炒生薑酒
和童子小便調湯盪溫服如產後崩

中狀似雞肝寒熱閉悶或產後四肢浮腫及寒熱當先服此散次服通宣圓

通宣圓
巴豆壹拾伍粒去心膜生絹袋盛於醃灰汁中煮拾沸取出用紙厚裹壓於重物下出油研成霜却取黑散叁錢匕無灰酒調成稀膏入瓷器中於鑊內重湯煮令稠入巴豆霜和令可圓

右圓如菉豆大每服伍圓熟水下婦用
毒藥落胎不能下子爛於腹中臍穿時出小此骨病極朱子東遂用此圓下枯骨一具而愈

八味黑神散治產後百疾唯瀉而加喘者本方不治凡產後雖無疾日進貳服能調血順氣去諸疾服七日止

當歸去蘆頭酒浸焙乾 白芍藥剉

乾薑炮烈 桂去皮不見火剉

熟乾地黄剉焙 蒲黃紙襯銚炒香用

甘草剉炙各半兩 黑豆壹兩炒
右為細末每服貳錢溫酒米飲童子小便任意調服之

烏金散治產後胞衣不下或惡露不快敗血衝心血運狂語不省人事心煩躁渴臍腹疼痛嘔吐發熱增寒腫滿或攻皮膚刺痛凡產後半月內雖無疾宜日服之有疾加進

黑豆肆兩淨擇 黃連半兩去須剉碎

生薑肆兩切作錢子 當歸去蘆頭麤切

蓬莪茂剉各壹兩

椶皮貳兩攤開

右先下生薑黑豆炒直候薑將乾次下黃連當歸同炒更候豆心透紫色即以椶皮點火入藥鑊中與所炒藥同燃至椶皮成燼即傾淨地上盆覆之少頃取為細末每服貳錢童子小便調下

劉寄奴飲治產後惡露不快敗血上攻
心胃煩躁大渴悶乱眼黑旋運或見鬼
神臍腹疼痛嘔噦惡心不進飲食

劉寄奴貳兩擇去梗
草秤

當歸壹兩去蘆頭
切焙 甘草貳錢炙剉

右為麤末每服貳錢水壹盞半生薑
柴片煎至柴分盡去滓熱服凡治血
暈藥須乘開煎下以備急用

當歸一味散治產後諸疾調養血氣子

專指迷論言產後不必
服他藥唯此壹散足矣

當歸參兩去蘆須
切片焙

右為細末每服貳錢童子小便或酒
調下日參服從產下便服之

荆芥一味散治血噤中風等疾取効為
快無疾服之能順氣益血清神

荆芥穗曬乾不
見火

右為細末每服貳錢童子小便調下
七日後沸湯調以當飲甚佳

秤槌酒治產後疾最多尤治兒枕不
散作痛

鐵秤槌燒通赤

右淬壹升醇酒中候酒再溫可飲飲
之調當歸末服尤効

豆淋紫酒治產後中風身痙直或如角
弓反張

黑豆揀緊小者淨篩壹升炒令煙
出以好酒叁升浸即漉出豆不用

右每服壹小盞能飲者加之

產婦忽患寒熱如傷寒時氣狀切不
可用麻黃藥發其汗以亡津液多故也
宜服四物湯加桂服之

四物湯方在後

治產後傷寒惡露不行腹脹煩悶欲
死方

朴消生 大黃生

右等分為細末每服貳錢取桃仁去

皮尖及雙仁者碎之濃煎湯調下以通為度樊彥取妻熱病小產後惡露為熱所搏不行苦腹脹煩悶枯渴舌上如生針刺鑿以朴消煎湯令漱口得稍潤用大黃煮醋調服壹大錢得通快而愈與此略同

傷寒產後惡露為熱搏不行煩悶脹喘狂言宜服抵當湯及桃仁承氣湯龐安常用之驗指迷論亦云龐論云若服之十病十瘥

桂心牡礪湯治產後頭疼身躄壯熱兼治腹內急痛

桂心壹兩半略天皮不見火牡礪燒通赤

白芍藥劉碎熟乾地黄切焙各貳兩

黃芩壹兩劉碎

右件劉如麻豆每服抄肆伍大錢水壹盞半煎至柒分盞去滓溫服

增損柴胡湯治產後虛羸發熱飲食不進少腹脹等疾

柴胡去苗水洗過控乾劉焙人參去蘆切片子焙

半夏湯泡七遍切片子甘草炙

白芍藥劉陳皮去白

芎洗劉

右柒味等分為麤末每服肆伍錢水壹盞半生薑伍片東棗貳箇煎至柒分盞去滓溫服日兩參服不拘時

人參散治產後虛羸脾胃怯弱四肢無力不思飲食心腹氣脹

人參去蘆切片子焙黃耆劉碎用蜜湯拌銚內慢火炒次微焙

草豆蔻略煨去反劉附子炮裂去皮臍切片子

厚朴剉去麤皮薑製一宿次日取出微焙乾各半兩

白朮去蘆切片子焙當歸洗去蘆須切片子焙

木香劉懷川芎洗劉

白芍藥劉桂去蘆皮不見火

白茯苓去黑皮劉甘草炙各壹兩

訶子皮 陳橘皮去白

高良薑劉碎用油透少許炒各壹分半

右拾陸味為麤末每服肆錢水壹盞生薑伍片棗子貳枚煎至陸分盞去滓溫服

治產後惡露不絕方

牡礪煨通赤 龜甲好醋浸炙黃

右等分為細末每服貳錢酒調下

治產後洞泄不禁下青黑惡物神驗方泄瀉者惡露必不行蓋血滲入大腸為瀉也分過則愈

荆芥肆伍穗大者烘乾

右於乾盞中燒成灰不得犯油火入研了麝

香壹米粒許用沸湯壹兩呷調下藥微而能愈大病奇効不可言

治產後下痢赤白膿血方

白芍藥剉 熟乾地黄焙切 各貳兩

阿膠剉用蛤粉末同炒起篩去粉 艾葉揀淨剉碎

當歸去蘆頭切片子 甘草剉 各壹兩

右為麤末每服陸錢水貳盞煎至捌分盞去滓溫服

若產後大便頻腹疼如痢狀者傷於食也宜服食藥感應圓為佳他亦可

用產前飲食不着未久而產後亦成痢狀不必推求產後食飲多少也

治吹妳腫硬須急用手忍疼毒揉之可

散不尔當成乳癰宜服此藥

皂莢燒存性研細 蛤粉

右等分研勻溫酒調下半錢末散稍加服藥次仍以手揉之

治吹妳或兒絕妳後腫痛不可忍方

括蕁壹箇去皮先取子研破殼次同穰爛研

右以酒漬同熬數沸去滓浸冷酒和令可飲隨量飲之令微醉睡醒痛當頓除去

萬金散治妳癰已破兼治發背腦疽

瓜萋壹箇去皮細剉 生甘草半兩

沒藥壹分令研

右同研用酒玖盞石器中熬至叁盞分叁服疾輕者只壹服効本注云已

救活數百人

通用四物湯治婦人女子月事或多或少或少或前或後妊娠腹痛胎氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不行凡婦人之疾無不主治本方及加減法如後

當歸

去蘆須切片焙

川芎

洗剉

熟乾地黄

切焙

雪白芍藥

剉

右等分為麤末每服肆錢水壹盞半煎至捌分盞澄取陸分清汁帶熱服

平

產

乳

服

平常產乳服至參朮虛弱人服至壹月。妊娠下血加艾伍柒葉阿膠末抄

壹錢

此每服也

若疾勢重大小料未効當以

肆味各半兩細剉不搗以水肆盞煎

取貳盞半去滓分肆服壹日之中令

盡為度未効再服隨疾加減用藥。

因虛致熱熱與血搏口舌乾渴加括

萸壹兩麥門冬叁分。腹中刺痛惡

物不下加當歸芍藥各壹分。血崩

加地黄蒲黃各壹兩。因熱生風加

芎壹分柴胡去苗半兩。身熱脉燥

頭昏項強加柴胡去苗并黃芩各半

兩。秘澁加大黃半兩桃仁壹分

去皮尖炒泄瀉加桂附子壹分。嘔加白木人

參各半兩。腹脹加厚朴枳實各壹

分。發寒熱加乾薑牡丹皮芍藥各

壹分。虛煩不得眠加竹葉人參各

壹分。煩躁大渴加知母石膏各半

兩。水停心下微吐噎加豬苓茯苓防

已各壹分。虛寒狀類傷寒加入參柴

胡防風各叁分

此活人書加減法也大抵四物湯

為婦女要藥無所不治稍知藥性

者皆可隨病加減治血方未有不

本此湯因而增損以成者近時名

醫有加香附子功用殊勝又有加

蓬莪茂官桂各半兩名六合湯治

經血凝滯潮熱腹中癢塊疼痛尤

快皆以意加之也

追命散治婦女血癥積聚疼痛漸致

經候隔絕稍失醫治便成勞瘵又治產

婦危惡變證胎死上衝悶運欲絕及產

後血運他藥所不能救者又治打撲傷

損筋斷骨折及破傷風凡此等疾證候

危惡醫工縮手無藥可治此能治之有

起死返魂之功雖其人氣已死但心頭

尚暖者灌之藥下咽可以再生先用前

鼻法然神功異効不可具述

半兩錢肆伍拾文多尤佳乃古文錢

兩字者錢有大小皆火煨通赤淬醮醋

中不計次數於醋底淘取淬下碎

銅末研之窰礪乳錘者去之別以

水淘澄取如粉者紙上滲乾秤貳

錢壹字煨錢之法取小鐵錢壹貫錢

鐵手鉗用一錢出火一鉗夾鎖莖貫錢

再取錢水洗過上鎖莖再煨之如是數

次錢色如銀即無可煨矣本方用銅線

穿殿入火便斷極費力不可用

巴豆去皮殼心膜秤參錢半用酸

大黃錦紋緊實者取捌錢浸茶日

每日壹換日足濕紙裹煨熟

羊脛炭即炭中圓細緊實如羊脛

骨者取參肆寸却作拾餘段別以

着炭同燒通紅淬入醇酒中如是

七遍烘乾為末秤取半兩

右肆味合和搗數千杵乾菴罐子實

築臍紙密封收高燥處每壹服壹字

至半錢濃煎當歸酒和小便調下消

詳之傷折即全用酒多飲不妨若產

婦血未定及素飲酒少人即姑少借

酒力行藥多以童子小便下之可也

此藥累立奇効治者數人皆垂死而

復活已折而復續轉以與人所濟又

不知數難產悶絕而復蘇者余今妻是也故知此藥為最審傳者幸勿疑其眩眩蓋不如此則不足以當奔敗之血且疾勢既危固非平劑之所能愈也服藥後或如霍亂狀勿恠少選當自定下利甚者用前燒荆芥法止之此皆手試而親驗者故併錄以傳

大抵此藥性緊非大危急不可妄服

此藥難成非素備不可得也

每遇有姪娘將產必合宜料

三

五

廿五

月

以備用往往常有餘劑藥成或轉以與親識之喜蓄藥者故此藥所濟為多陸子正題

婦人免蓐命如垂縷臨時濟急全藉藥石之功方書所載雖已詳備倉猝之際非唯泛濫難於檢尋且莫知其孰為効驗者妄投一藥則不可復療余得此本皆撮諸家精要之方累試累驗乃盧倅陸子正

手抄之書也唯親舊間可以傳之他人不可得而見余雖不欲秘藏而傳本未免訛繆其為害豈淺耶今重校證庶幾危急之時閱此方如指諸掌也嘉禾寓菴周澂題

衛生家寶產科備要卷第七



衛生家寶產科備要卷第八

形初保育

小兒初生將護法

巢氏病源小兒始生肌膚未成不可暖
衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若
都不見風日則令肌膚脆軟便易損傷
皆當以故絮著衣莫用新綿也天和暖
無風之時令母將抱日中嬉戲數見風
日則血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒不
致疾病若常藏在幃帳之內重衣溫暖
譬如陰地之草木不見風日軟脆不任
風寒又當薄衣薄衣之法當從秋習之
不可以春夏卒減其衣不則令中風寒
從秋習之以漸稍寒如此則必耐寒冬
月但當著兩薄襦一複裳耳令不忍見
其寒適當佳耳愛而暖之適所以害也
又當消息無令汗出汗出則致虛損便
受風寒晝夜寤寐皆當謹之其飲乳食

哺不能無痰癖當節適乳哺若微不
進切當將護之凡不能進乳哺則宜下
之如此則終不致寒熱也又小兒始生
生氣尚盛無有虛勞微惡則須下之所
損不足言及其愈病則致深益若不時
下則成大疾疾成則難治矣其冬月下
之難將護然有疾者不可不下夏月下
之後腹中常當小脹滿故當節乳將
護之數日間又哺哺之當令多少有常

劑兒稍大食哺亦當稍增若減少者此
是腹中已有小不調也便當微將藥勿
復哺之但當乳之甚者十許日輕者五
六日自當如常若都不肯食哺而但飲
乳者此是有癖為疾重要當下之不可
不下不下則致寒熱或吐而發癩或致
下利此皆病重不早下之所為也則難
治先治其輕時兒不耗損而病速除矣
小兒所以少病癩者其母懷娠時時勞

役運動骨血則氣強胎養盛故也若侍
 御多血氣微胎養弱則兒軟脆易傷故
 多病癩兒背須著帽項衣取燥菊花為
 枕枕之兒母乳兒三時摸兒項風池若
 壯熱者即須熨使微汗微汗不差便灸
 兩風池及背第三椎第五椎第七椎第
 九椎兩邊各二壯與風池凡為十壯一
 歲兒七壯兒大者以意節度增壯數可
 至三十壯唯風池特令多十歲已上可
 百壯小兒常須謹護風池諺云戒養小
 兒謹護風池風池在頸項筋兩轆之邊
 有病乃治之疾微謹不欲妄針灸亦不
 用輒吐下聖惠乃云立夏後疾謹不所
欲妄針灸亦不欲輒吐下
 以然者針灸傷經絡吐下動腑藏故也
 但當以除熱湯浴之除熱散粉之除熱
 赤膏摩之又以臍中膏塗之令兒在涼
 處勿禁水漿常以新水洗新生無疾謹
 不可逆針灸逆針灸則忍痛動其五脉

喜因成癩河洛間土地多寒兒喜病癩
 其俗生兒三日喜逆灸以妨之又灸頰
 以防噤有噤者舌下脉急牙車解急其
 土地寒皆決舌下去血灸頰以治噤江
 東地温無此疾古方既傳有逆針灸之
 法今人不詳南北之殊便按方用之多
 害於小兒是以田舍小兒任自然皆得
 無此疾又云春夏決定不得下小兒所
 以爾者小兒腑藏之氣軟弱易虛易實
 下則下焦必虛益上焦生熱熱則增痰
 痰則成病自非當病不可下也
 千金論生兒宜用其父故衣裹之生女
 宜以其母故衣皆勿用新帛為善不可
 令衣過厚令兒傷皮膚害血脉發雜瘡
 而黃兒衣綿帛特忌厚熱謹之謹之
 聖惠論凡小兒一暮之內造兒衣裳皆
 須用故綿及故帛為之不得以綿衣蓋
 於頭面冬天可以裕衣蓋頭夏月宜用

單衣皆不得著面及乳母口鼻吹著兒
顛凡綿衣不得太厚及用新綿令兒壯
熱或即發癩特宜謹之也

聖惠論凡兒匍匐已後逢物即喫妳母
雖至細意必亦不能盡覺春夏必飲滯
水冷物至秋初便皆疾作初則多啼不
食或好伏地面色青黃或時腹痛既不
解說唯反拗多啼或逢水漿便喫不可
制止或睡中驚啼或大便秘澀常人唯

知與紅雪釣藤飲子此二藥終日在口
然自不見其効况腹中滯結已多必熱
衝擊頗久二藥何能排去所以得秋氣
風吹着背心脚心便成瘡疥庸醫與冷
藥則傷滑不禁與澀藥則氣壅不行傷
損藏腑益令不食遂使虛熱衝上面黃
髮焦滯惡在內手足如火自然風水橫
溢四肢便腫如此將養十無一存但每
經春夏不問有病無病便須與四味飲

子多不三四劑即康強也
嬰孺論凡兒所以風者衣暖汗出風因
而入也

張渙論嬰兒生後兩滿月即目瞳子成
能笑識人乳母不得令生人抱之及不
令見非常之物百晬任脉生能反復乳
母當存節喜怒適其寒温半晬尻骨已
成乳母當教兒學坐二百日外掌骨成
乳母當教兒地上匍匐三百日臍骨成
乳母當教兒獨立周晬膝骨已成乳母
當教兒行步上件並是定法蓋世之人
不能如法存節往往抱兒過時損傷筋
骨切宜謹之為吉

張渙論嬰兒冬月但當着夾衣及衲衣
之類極寒即漸加以舊綿人家多愛子
乃以綿衣過厚適所以為害也
張渙論嬰兒須看稟受南北之殊用藥
蓋地土寒温不同此古人之最為謹也

嬰童寶鑑論孩子春勿覆頂裹足致陽氣亡出故多發熱衣物夜露多生天癩三歲之中勿太飽勿太飢臥須覆肚食須飲水漿若能如此者則子少患而無夭傷矣

萬全方論田舍婦人產育皆不知小兒初生將護之法所養有絕無他疾者譬之凡草凡木生於深山大澤之中容易合抱至於奇材異果縱加培擁間有不

秀實者此豈貴賤之理有異哉蓋天之於物出於自然古人亦云小兒始生肌肉未成不可暖衣即令筋骨緩弱宜見風日若都不見風日即令肌膚脆軟便易傷損皆以絮著衣內勿用新綿天氣和暖無風之時令乳母抱兒日中嬉戲數見風日即血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒以田舍小兒較之此說尤長

擇乳母法

千金論乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉是血氣所生也其乳兒者皆宜謹於喜怒夫乳母形色所宜其候甚多不可求備但取不胡臭癯瘦氣嗽癆疥癩癰白禿癩瘍潘脣耳聾鼈鼻癩癩無此等疾者便可飲兒也但見其故灸癰便知其先疾之源也

乳兒法

聖惠論凡為乳母皆有節度如不禁忌即令孩子百病並生如是自曉攝調可致孩子無疾長壽是以春夏切不得衝熱哺孩子必發熱疳并嘔逆秋冬勿以冷乳哺孩子必令腹脹羸瘦乳母嗔怒次不得哺孩子必患狂邪乳母醉後不得哺孩子必患驚癇天癩急風等病乳母有娠不得哺孩子必患胎黃及脊疳乳母有疾不得哺孩子必患癩癰風病乳母吐後不得哺孩子必令嘔逆羸瘦

乳母傷飽不得嘔孩子必致多熱喘急
乳母雜忌法

聖惠論乳母忌食諸豆及醬熱麵韭蒜
蘿蔔等可與宿煮羊肉鹿肉野雞鴨
鯽魚葱薤蔓菁蒿苣菠菘青莢菘蓮冬
瓜等食若兒患疳即不得食羊肉及魚
又不得油膩手襖裹及抱兒又不得以
火炙襁褓熱時便與兒著令孩子染熱
病始終須謹大抵冬中切勿戒之若天

大寒以火炙衣被且拋向地上良久熟
接之冷暖得所即與孩子襁之無妨如
乳母有夫不能謹卓者切須防備儻新
有過犯氣息未定便即乳兒者必能殺
兒未滿月內所驅使人亦不得令有所
犯到於兒前惡氣觸兒兒若得疾必難
救療也

哺兒法

姚和衆云小孩初生七日助穀神以導

達腸胃研粟米煮粥飲厚薄如乳每日
研與半粟殼

錢乙云小兒多因愛惜過當往三兩歲
猶未與飲食致脾胃虛弱平生多病自
半年以後宜煎陳米稀粥取粥面時時
與之十月以後漸與稠粥爛飯以助中
氣自然易養少病惟忌生冷油膩甜物
之類

浴兒法

千金論凡浴小兒湯極須令冷熱調和
冷熱失所令兒驚亦致五臟疾也凡兒
冬不可久浴浴久則傷寒夏不可久浴
浴久則傷熱數浴皆冷則發癩若不浴
又令兒毛落新生浴兒者以豬膽壹枚
取汁投湯中以浴兒終身不患瘡疥勿
以雜水浴之兒生三日宜用桃根湯浴
桃根李根梅根各三兩枝亦得咬咀之
以水參斗煮二十沸去滓浴兒良去不

祥令兒終身無瘡疥治小兒驚辟惡氣以金虎湯浴金壹斤虎頭骨壹枚以水叁斛煮為湯浴但須浴即煮用之

拭兒口法

千金論曰小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此謂之玉衡若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣千金翼云成痞病死

聖惠論凡兒初飲乳後以髮纏指沾清

水點拭了看齒根上有黃筋兩條便以葦刀子割斷點豬乳便差如兒口繫開但先點豬乳自開

小兒集驗方云小兒初生每日以井華水或微溫水將潔靜舊軟帕子裹乳母手指蘸水撩拭小兒口中因而捺舌及兩頰令稍寬舒即不生口噤積熱風疾等病京畿與山東人多能之謂之捺兒口拭畢仍用少研細入麝者乾坯子烟

脂塗口中令兒美乳食

小兒集驗方云東平有一老嫗善與小兒拭口使不生鍊銀云小兒上下唇與齒斷相連處皆有一筋牽引若上唇筋緊即生上煉下唇筋緊即生下煉上煉生瘡滿頭或生眉間如有癬狀瘙痒不已時復流出黃汁汁至處又生瘡若下煉則起腰背漸至四肢亦如癬狀亦瘙痒黃汁不已若疾盛不治或

頭面上下相通累年不較又咬折或成大疾惟是每日早晨取溫水壹盞令其乳母以故軟潔靜帕子包手第二指蘸溫水拭兒口中渣下又拭又捺使兒口中淨及捺上下筋令寬舒即小兒自美乳食諸疾不生亦永無煉銀惟使筋寬舒是法京畿見小兒失捺變為口噤不喫奶或不解捺而生煉銀者不可勝數

斷臍法

千金論曰凡斷臍不得以刀子割之須令人隔單衣物咬斷兼以暖氣呵七遍然後纏結所留臍帶令至兒足趺上短則中寒令兒腹中不調常下痢若先斷臍然後浴者則臍中水臍中水則發腹痛其臍斷訖連臍帶中多有蟲宜急剔撥去之不爾入兒腹成疾斷兒臍者當令長陸寸長則傷肌短則傷藏若不以時斷及接汁不盡則令暖氣漸微即自生寒令兒臍風

嬰童寶鑑論小兒斷臍去凡小兒生下可先浴而後斷臍及可以衣襯而口齧之不然則刀斷如刀斷者則以剪刀先於懷中厭令暖方用又斷之則臍帶不可令長只如子足長短短即中寒而傷藏長即傷膚先斷而後洗即令水入臍中孩子多天癩痛苦啼叫面青黑為中

水患也臍若短即腹中不調常下痢有中寒之患其臍不可傷動傷動即令久不乾如不乾即傷外風傷外風即口噤小兒不可救也

灸臍法

秘要指迷論曰嬰兒初生剪去臍帶切令剪刀暖不可傷冷及外風所侵

聖惠云小兒生一宿抱近明無風處看臍上有赤脉直上者當時於脉盡頭灸三壯赤散無患矣

裹臍法

千金論凡裹臍法推治白練令柔軟方四寸新綿厚半寸與帛等合之調其緩急急則令兒吐喞兒生二十日乃解視臍若十許日兒怒啼似衣中有刺者此或臍燥還刺其腹當解之易衣更裹臍臍時閉戶下帳燃火令帳中溫暖換衣亦然仍以温粉粉之此謂冬時寒也若

臍不愈燒絳帛末粉之若過一月臍有
汁不愈燒蝦蟇灰粉之日三四度

千金翼六

燒蝦蟇灰治末粉臍中又云若
臍未愈乳兒太飽令兒風臍也若臍中水及

中冷則令兒腹絞痛天糾啼呼面目青

黑此是中水之過當灸粉絮以熨之不

時治護臍至腫者當隨輕重重者便灸

之乃可至八九十壯輕者臍不大腫但

出汁時時啼呼者擣當歸末和胡粉傳

之灸絮日熨之至百日愈以啼呼止為

候若兒糞青者冷也與臍中水同

甘草法

葛氏肘後方小兒新產出未可與朱蜜

取甘草如中指節炙碎以水貳合煮取

壹合以纏綿點兒口中可得一蜺殼止

兒當便吐胃中惡汁此後待兒飢渴更

與之若兩服並不吐盡壹合止若得吐

惡汁兒智惠無病

黃連法

小兒集驗方云凡小兒初生必有惡

汁留於胃次若不消去即胃膈壅塞

易生蘊熱驚癇瘡癩皆由此也故小兒

繞生一臘之內用好肥黃連數塊槌碎

每少許厚以綿包裹如妳頭狀湯內

浸成黃汁時復拈撫一二點在小兒

口內即惡汁自下乳食便美其後或

間以朱蜜與之若見惡汁已下即已

有只用空綿包別浸黃連蘸苦汁與

之者

豬乳法

千金論曰凡新生小兒一月內常飲豬

乳大佳

聖惠法凡取豬乳須令豬兒飲母次便

提豬兒後脚起離乳急持之即得空捋

無由得汁

張渙論嬰兒初生滿月內常時時旋取

豬乳滴口中最為佳矣

藏衣法

外臺崔氏凡藏兒衣法兒衣先以清
水洗之勿令沙土草污又以清酒洗
之仍內錢壹文在衣中盛於新瓶內
以青帛裹其瓶口上仍密蓋頭且置
便宜處待滿三日然後依月吉地向
陽高燥之處入地叁尺埋之瓶上土
厚壹尺柒寸唯須牢築令兒長壽有
智惠若藏衣不謹為豬狗所食者令
兒癩狂蟲蟻食者令兒病惡瘡犬鳥
食者令兒兵死近社廟傍者令兒見
鬼近深水滂池令兒溺死近故竈傍
令兒驚惕近井傍者令兒病聾盲弃
道路街巷者令兒絕嗣無子當門戶
者令兒聲不出耳聾著水流下者令
兒青盲弃於火裏者令兒生爛瘡著
林木頭者令兒自絞死如此之忌皆
須一謹之

外臺崔氏又安產婦及藏衣天德月空法

正月天德在丁月空在丙壬
二月天德在坤月空在甲庚
三月天德在壬月空在丙壬
四月天德在辛月空在甲庚
五月天德在軋月空在丙壬
六月天德在甲月空在甲庚
七月天德在癸月空在丙壬
八月天德在艮月空在甲庚
九月天德在丙月空在丙壬
十月天德在乙月空在甲庚
十一月天德在巽月空在丙壬
十二月天德在庚月空在甲庚
凡藏兒衣皆依此法天德月空處埋
之若有遇反支者宜以衣內新瓶盛
密封塞口掛於宅外福德之上向陽
高燥之處待過月然後依法埋藏之
大吉

外臺崔氏又法甲寅旬日十日不得藏埋兒衣以瓶盛密封安置空處度十日即藏埋之

外臺崔氏又法甲辰乙巳丙午丁未戊申此五日亦不藏兒衣還盛瓶中密塞勿令氣通掛著兒生處過此五日即埋之亦不得更過此日

外臺崔氏又法甲乙日生兒丙丁日藏衣吉丙丁日生兒戊巳日藏衣吉戊巳日生兒庚辛日藏衣吉庚辛日生兒壬癸日藏衣吉

子母祕錄藏衣法先用壹罐盛兒衣先以清水洗次以清酒洗次入大豆壹合次小豆壹合次城門土市門土獄門土葱園中土韭園中土各壹合重重覆之上用五色帛各壹尺伍寸重重繫罐口上用鐵券朱書云大豆某胡去無辜小豆歷歷去子癘城門土

見公卿市門土是人行獄門土辟盜兵葱韭園土剪復生與兒青令兒壽命得長生與兒赤令兒身命皆清吉與兒白令兒壽祿皆千百與兒皂令兒長壽不衰老與兒黃令兒清淨去百殃急急如律令將此令於壹尺貳寸鐵葉上先用淨墨塗遍上以朱砂寫此語令在上置在罐口上且放便處待滿三日然後於月吉向陽高燥之處入地叁尺埋之罐上令土厚壹尺柒寸准須牢築使兒長壽有智慧

剃頭法

外臺崔氏初剃兒頭良日

寅丑日吉 丁未日凶

集驗方京畿初剃小兒頭不擇日皆於滿月日剃之蓋風俗所尚前此產婦未得出房滿月即與兒俱出以謂胎髮穢惡多觸神竈小兒不安故此日

必剃頭而出剃頭於溫暖避風處剃之剃後須以生油杏仁膩粉頭上擦之以辟風邪其後小兒剃頭亦宜用此禳謝法

外臺崔氏禳謝法

軒轅者乾神天丞相使者風伯犯之令兒驚吐可取梨枝陸寸埋生處大吉

雷公者震神太陰使者天馬犯之令

兒煩悶腹滿解之以三屠家肉為餅於產處謝之大吉

咸池者坎神天之雨師使者犯之令

兒啼不止用羊脯酒於生處謝之

豐隆者艮神天之東明使者天僕也

害氣犯之令兒乍寒乍熱大腹以

白魚貳枚於生處謝之又大豆壹

升投井中亦大吉

招搖者坤神天上使者犯之令兒驚

空嚼不止以酒餅生處謝之即愈天候者巽神天一執法使者犯之令兒腹脹張眼以白魚貳枚於生處謝之吉

吳時者离神天一將軍遊擊使者犯之令兒驚腹疼痛用馬脯伍寸於生處謝之吉又以白魚伍枚并棗餅埋其生處吉

大時吉兪神小時北斗使者犯之令

兒腹脹下痢解之以酒脯於生處謝之又以大豆壹升投井中吉

犯月殺者令兒驚啼用丹雄雞血於

生處謝之吉

犯白虎者用稻米壹升雞子叁枚於

生處謝之吉黍米亦得

犯大夫者用羊肝叁枚及稻米壹升

於生處謝之吉又用雞羝羊脾黍

米亦得

犯日遊者令兒口噤色變欲死者用
三屠家肉麥飯於生處謝之吉

初生不作聲

千金論云兒生落地不作聲者取暖水
壹器灌之須臾當啼又云兒生不作聲
者此由難產少氣故也可取兒臍向身
却持之令氣入腹仍呵之至百度啼聲
自發亦可以葱白徐徐鞭之即啼兒始
生即當舉之遲晚則令中寒腹內雷鳴
乃先浴之然後斷臍

初生不喫奶

巢氏病源小兒難乳候凡小兒初生看
產人見兒出急以手料拭兒口無令惡
血得入兒口則兒腹內調和無有病疾
若料拭不及時則惡血穢露兒咽入腹
令心腹痞滿短氣兒不能飲乳謂之難
乳又兒在胎之時母取冷過度冷氣入
胞令兒着冷至兒生出則喜腹痛不肯

飲乳此則胎寒亦名難乳也

初生吐不止

錢乙論初生下拭掠兒口中穢惡不盡
咽入喉中故吐凡初生急須拭掠口中令
淨若啼聲一發則咽下多生諸病

初生有懸癰病

千金論曰小兒出腹六七日後其血氣
收斂成肉則口舌喉頰裏清淨也若喉
裏舌上有物如蘆籜盛水狀者名懸癰

有脹起者可以綿纏長針留刃處如粟
米許大以刺決之令氣泄去青黃赤血
汁也一刺之止消息一日未消者來日又
刺之不過三刺自消盡餘小小未消三
刺亦止自然得消也有着舌下如此者
名重舌有着頰裏及上齶如此者名重
齶有着齒斷上者名重斷皆刺去血也

初生有重舌

巢氏病源小兒重舌候小兒重舌者心

脾熱故也心候於舌而主於血脾之絡
脉又出舌下心火脾土二藏母子也有
熱即血氣俱盛其狀附舌下近舌根生
形如舌而短故謂之重舌

葛氏肘後治卒重舌方

用燒蛇蛻皮為末唾和塗舌上即

差又用釜下土苦酒和塗舌上

初生者噤

巢氏病源小兒噤候小兒初生口裏忽

結聚生於舌上如黍粟大令兒不能取

乳名之曰噤此由在胎時熱入兒藏心

氣偏受熱故也

長樂朱端章以所藏諸家產科

經驗方編成八卷刻版南康郡

齋淳熙甲辰歲二月初十日

衛生家寶產科備要卷第八

衛生家寶產科備要跋

此淳熙二年長樂朱氏取諸家產科方命刻成書中寓艱難字供啟

羊又九皆作因避欽宗嫌名也其所載產育寶慶集方陳直齋謂在

師雖有說無方醫學教授郭稽中為時良醫一方附諸論蓋為完書今

攻師聖自序知郭與李同好是書實感於師也當歸一味散注引之

子身指迷論子身名貶直齋書目載之今已失傳桃仁承氣湯謂產

安常用之驗甚多安時合有傷寒核痛傷身世產育方葉專書

唐志載答殷產寶二卷今祖寶慶集方尚存永樂大典中然已佚借

地法矣猶賴此書傳之而宋虞沆備產瀉田方諸論尤為切要安得

好事重為刊布俾得家置一編則活人之報當不小矣嘉慶辛酉夏

黃君堯圃自都門購歸出以相賞因識數語以為奇書欣悅

頃後陳仲魚處借得敏求記檢閱而家有產科

備要八卷亦載長樂云一與汝同特於十二月

初十日六字向淳熙甲辰歲五字在初板南康郡

齋二字上殆少易魚文入于記中尔曾云楷墨

精好可愛與余所收正同想不是宋板也安重

誌教語以見述古堂中不立亭秘如此

嘉定錢大昕觀時年七十有四

女科百問 產寶雜錄

〔宋〕齊仲甫撰

據中國科學院圖書館藏
明崇禎刻本影印原書版
框高一九九毫米寬二六〇毫米

女科百問

為軒岐之言者曰寧醫十丈夫不醫一嬰兒寧醫
 十嬰兒不醫一女婦夫然則女病之難治也
 此於丈夫之數者百人中不能一也
 大者每遇我等入耳非九十九人之難為治也蓋
 醫之候病止於四脈而脈為下然望聞問三事
 不施諸丈夫嬰兒而每窮於女婦彼朱門鮑質青
 瑣靜妹產咳莫曉色氣誰覲望與聞既以嫌遠矣
 所待問之一道而其受病也不於牀第不可說之
 施則為悒鬱莫能喻之綜其為證候也非關經產
 女科百問
 即屬帶淋可云某事曾否有無某處如何痛癢某
 物若為色狀問之則醫危不問則病危雖然胡可
 問也於是病者擇言而授指妳嫗妳嫗展轉而傳
 語主人主人未言先頰其面欲言更忍其詞烏三
 變而成白尚有真病入於先生之耳哉三指之下
 所得幾許又安能淺深細按如丈夫嬰兒之得從
 容談笑以究其故也無已而為之說曰醫者意耳
 天舍曰術而至求之於意無惑乎其難之也矣南
 宋齊公重閱此情設為百問次以受病之因次以
 治病之法有不可問者百問問之有不便答者直

女科百問 序

答答之使人自曉其因而人自諳其治可無煩
 生之三指也詎不賢於四術也耶是故女科之書
 充棟皆活一人者也百問成而九十九人者生矣
 崇禎庚辰歲三月十日為子懸弧之歲之月之日
 烏程閔齊伋序

女科百問序

齊仲甫先生在宋為醫局教授分治婦人一科嘗撰女科百問二卷。產寶雜錄藥方一卷。往藏於吾鄉少司馬容菴金公家。訥齋翁取而錄之。每遇國中女婦諸證。凡與所問答相合者。即用其方療之。靡不立効。嘗語太保石岡公曰。此書有功濟陰。蓋梓之以傳。太保歷宦南北。宣猷不暇。幾欲成翁之志。不果。茲罔卿小石君疏允乞。因檢故篋。始取而刻之。曰。此吾祖父志也。刻成。持以過我。屬引其端。余惟醫家立論處方。書之種類多矣。自黃帝岐

女科百問

伯。設論反復。詞簡義深。是為醫學之祖。嗣是專門名家。互有誤著。大抵遡其意而推衍之。其實不能外軒岐而別立一說也。顧人生疾病殊科。而婦人所患。比之男子。不啻倍蓰。矧胎產前後。防閑不密。調治失宜。則禍在瞬息。然則先時預待。臨證考求。安得易易圖之。顧其立論處方。散見各書中者。非不明白簡要。而條理節目。或者未詳。以此見聞不廣。學者病焉。仲甫在當時。專領此科。乃深求玄理。廣集舊聞。撰成此帙。用心良苦。觀其借問答而推其致病之繇。據辨論而立以療治之法。論匪無稽。

法咸有據。要之萃前人之意。而間以獨得之見。豈非婦人科中之至寶。至寶者歟。抑余嘗謂自古在昔。婚姻以時。胎教有法。是以胤嗣端良。災疾罕有。乃今未知為人父母之道。而有子。方抱孕在身。罔知禁忌。及免身未久。凡百任情。此則教化不明。無怪乎病之易生。而民之多歿也。昔人謂不治已病。治未病。以論胎產。尤為要語。余覽是書。卓有源流。深探標本。蓋不專恃湯液以為功者。學者能考其答問之意。取其方而斟酌用之。其圖難於易。轉危而安。有補造化。豈其微哉。此固先生所望於

女科百問

後人。而亦訥齋翁濟人之本意也。翁姓王氏。名綸。字廷言。為吾鄉前輩。碩儒。以太保公貴。迭受崇封。饗有遐算。流慶哲孫。克世其家。乃罔卿致位通顯。勇退完名。今惟閉門緝學。日以繩武繼志為心。茲刻亦繩繼之一端也。

隆慶辛未夏六月九日

賜進士出身南京尚寶司卿致仕

詔進朝列大夫前中順大夫南京太常寺少卿改

江西按察司僉事奉

勅提督學政石城居士許穀撰

女科百問序

醫道肇於上古。經論著於在聖。治醫設官始於周。於是聖王好生之心。良醫生生之道。達於天下。後世矣。周末秦越人尤善其事。至邯鄲即為婦人醫。婦室專科。其助於此乎。然未有成書也。濮陽李師聖施郭稽古產論二十一篇。盛行於世。而產前無方。至巢氏病源。證詳而方不具。太平聖惠有方面雜見。外此則未有聞也。史所載錄婦人嬰兒十九卷。楊氏產乳集驗三卷。皆有錄無書。婦人受病。比男子倍多。而難治。况產蓐尤為急務。命繫須臾。可不詳謹。恭惟

不詳謹恭惟

聖朝列聖繼承。念民疾疢。創學設科。釐為十三科。各有專習。回視成周。不惟其官。惟其學。不惟其學。惟其科。於是婦室始專科矣。可無成書乎。仲甫分職其科。醫學不敢怠事。輒忘蒙昧。嘗集眾方。纂成一帙。目曰女科百問。又自孕元胎始。氣形將護。產前後諸雜病證。附為產寶雜錄。雖不敢望古述作之萬一。然剖析酬答。明白易見。庶幾有補萬一。且一病必對數藥。區區本志。本為病家居處。僻左。有是證。用是藥。雖非醫家。亦能愈疾。免致束手無措。

故著為此書。既欲其行於世。豈可不問於朝。借上進。惟是寡陋孤聞。慮考訂未詳。方證訛舛。高明同志。能運而證者。不亦為萬世之幸矣乎。昔嘉泰庚辰春二月吉旦。太醫局教授齊仲甫謹序。

科百問目上

第一問精血以分男女之本源

第二問古法男三十而娶女二十而嫁

第三問婦人感病倍於男子

第四問何以謂之天癸

第五問何以謂之經候

第六問經候或前或後多寡不定

第七問月水依時來不便利

第八問經水欲行先身體痛或腹痛

第九問月水閉絕不通

第十問虛勞之病何以別之

第十一問婦人卦數已盡經水當止而復行

第十二問何謂避年

第十三問室女經候當行不行

第十四問未出閨門女有三病

第十五問婦人多驚

第十六問婦人多因風冷而生諸疾

第十七問婦人多頭眩而冒

第十八問婦人身體疼痛流注不定

第十九問朝食暮吐

第二十問婦人之病多因氣生

第二十一問猝然而死少間復甦

第二十二問病非瘧之邪四時多病寒熱

第二十三問因咳嗽經候不行

第二十四問咳嗽有紅痰

第二十五問吐血衄血齒衄舌上出血汗血

第二十六問婦人偏喜酸物或嗜冷

第二十七問婦人喜少怒多悲泣不止

第二十八問咽中狀如梅核或如炙肉

第二十九問婦人足十指痛如油煎覆之則熱

痛風吹則冷痛

第三十問婦人少年髮少

第三十一問四肢如故但腹脹者

第三十二問病有血分有水分何以別之

第三十三問心腹痛或又有小腹痛

第三十四問下利經水反斷

第三十五問婦人晝則明了暮則譫語如見鬼

第三十六問癲狂之病

第三十七問有一臂痛有兩臂俱痛

第三十八問婦人病渴與三消之病同異

第三十九問腰痛如折

第四十問婦人面多生黑疔與黑子

第四十一問身目黃

第四十二問陰崩陽崩何以別之

第四十三問眠臥多汗

第四十四問左脅痛如刀刺不得喘息

第四十五問積聚之病何以別之

第四十六問身體常癢痒

第四十七問夜與鬼交

第四十八問大小便不通

女科百問

第四十九問帶下三十六疾

第五十問婦人有帶下或淋漓不斷何以別之

女科百問卷上

門生翰林醫證入內內宿壽明慈睿殿應奉

侍衛步軍司醫官兼太醫局教授齊仲甫撰

○第一問精血以分男女之本源者何也

答曰男子以精為本女子以血為源男子為陽陽中必有陰陰中之數八故一八而陽精降二八而陽精溢女子為陰陰中必有陽陽中之數七故一七而陰血升二七而陰血溢陽精陰血皆飲食五味之實秀為男女之本源也方其升也智慮開明齒牙更始髮黃者黑筋弱者強暨其溢也凡充身

女科百問

肢體手足耳目之餘雖針芥之處無有不至凡子形肖父母者蓋其精血嘗於父母之身無所不歷也是以父一肢廢則子一肢不肖其父母一目虧則子一目不肖其父母然雌雞牝雞無天癸而成胎何也鳥獸精血往來尾間也精未通而遇女子通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗小便道澀而為淋精已耗而復竭也女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而為

腫。或雖合而難子。合男子多。則瀝枯虛人。產乳衆。則血枯殺人。觀其精血。思過半矣。

○第二問古法男子三十而娶。女子二十而嫁者。何也。

答曰。天以剛陽為尊。地以柔陰而卑。則乾坤之體定矣。若天不剛陽。地不柔陰。是乾坤之體不定矣。夫乾道成男。男自子位左旋。積三十歲而至巳。所以男及三十而娶。當是之時。天陽已剛也。坤道成女。自子位右旋。積二十歲而至巳。所以女二十而嫁。至斯之際。地陰以順也。故及其時得子。皆強所

謂乾坤之體定矣。不及其時而嫁娶者。則剛陽柔陰。必有所虧也。

○第三問婦人感病倍於男子者。何也。

答曰。夫婦人者。眾陰之所集。常與濕居。十四以上。陰氣浮溢。百想經心。內傷腑臟。外損姿容。月水去。雷前來交互。瘀血停凝。中道絕斷。其中傷墮。不可具論。冷熱臟腑。虛實交錯。惡血內滿。氣脉耗竭。或飲食無度。損傷非一。或胎瘡未愈。含其陰陽。或行步風來。便利於癩。則之上。風從下入。便成十二病。疾。病之作。所以婦人別立其科也。若是四時節氣。

虛實冷熱為患者。故與丈夫治法同也。惟妊娠而挾病者。避毒藥。恐或傷胎耳。大抵婦人以其慈戀憎愛疾妬憂恙。染着堅牢。情不自制。所以為病根深。療之難差。故倍於男子之病者。此也。

○第四問何以謂之天癸。

答曰。謂壬癸北方水干也。壬為陽水。配丁而化木。癸為陰水。合戊而化火。經云。水火者。陰陽之證兆也。且婦人者。眾陰之所集。以陰類陰。故得水之癸干也。女至二七。腎氣全盛。衝任流通。經血漸盈。應時而下。天真之氣。殊降與之。從事。故云天癸也。內

女科百問

經云。二七而癸至。任脉通。太衝脉盛。月事以時下。故有子。然衝為血海。任上胞胎。陰靜海滿。二者相資。故令有子。

○第五問何以謂之經候。

答曰。夫女子十四天癸至。腎氣全盛。衝流任通。血漸盈。應時而下。常以三旬一見。愆期者。病。故謂之經候。然經者。常也。候者。謂候一身之陰陽也。經常之氣。伺候而至。若潮候之應。平時也。天真之氣。與之流通。故一月一次。行平和則不失乎期。所以謂之經候。又名月水也。

第六問經候或前或後多寡不定者何也

答曰夫婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說得是陰勝陽是陽勝陰所以服藥少得有效蓋陰氣盛乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣盛乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當和其陰陽調其氣血以平為福

陽氣勝陰月假多者當歸飲抑陽助陰調理經脉

女科百問

當歸去蘆熟地淨洗酒川芎

白芍微炒黃芩小半白朮各等分

右為麤末每服三錢水盞半煎至八分食前

熱服

沉香降氣湯順氣道通氣脉

烏藥 沉香 香附 甘草

砂仁 各等分

右為細末每服二錢空心鹽湯調下

陰氣勝陽月假少者七物湯治婦人榮衛氣虛經水愆期或多或少而腹痛

當歸 芎藭 白芍 蓬朮

川薑 熟地酒蒸木香 各等分

右為麤末每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時

紫石英圓治婦人病多是月經乍少或在月後時發疼痛

紫石英水研禹餘糧燒醋

人參 龍骨 川烏頭炮去皮

桂心不用杜仲去皮桑寄生

五味子 遠志去心澤瀉 當歸去蘆

女科百問

石斛去根菴蓉酒浸乾薑炮各甘草炙半

川椒去目并合口牡蠣固濟火燒通

右為細末煉蜜為丸梧桐子大空心米飲下

三十九至五十九

已上無求子方

金華散治婦人經血後熱崩漏不止且苦舌乾經候不通宜服之

玄胡索 瞿麥 當歸 牡丹皮

石膏 二兩 乾葛各一兩蒲黃半兩桂心

歲靈仙各三分五分也

右為蠶末。每服二錢水一盞薑三片煎至六分空心服

已上養生席判官方

通經丸治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心不見火 青皮白去 大黃炮 乾薑

川椒炒去目 蓬朮 川烏泡去皮尖 乾漆炒去烟出

當歸 桃仁炒去皮尖已

右為細末將四分用米醋熬成膏和餘六分

末成劑相中治之丸如桐子大陰乾每服二

十丸空心食前米飲湯下加至三十丸溫酒

女科百問

亦得

五靈脂散治經候不止拯濟方

五靈脂為末炒令過熟出盡烟每服二錢當

歸二片酒一中盞煎至六分去滓熱服連三

服立效如血室有乾血用醋一盞煎七分和

滓空心熱服

溫經湯

治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期

不來或崩中去血過多不止又治曾經損孕

瘀血停留少腹急痛發熱下利手掌煩熱唇

乾口燥及少腹有寒久不受胎

丹皮 阿膠碎炒 當歸去蘆 人參去蘆

川芎 甘草炒 肉桂去粗皮 芍藥各二兩

吳茱萸三兩 半夏各湯洗七次二兩半 麥門冬去心五兩半

右為蠶末每服三錢水一盞半生薑五片煎

八分去滓空心食前熱服

○第七問月水依時來不快利者何也

答曰婦人月水有四經之所主一者衝任二脉二

者手太陽少陰二經然衝為氣海任為主胞胎二

者相資故令有子手太陽者小腸之經為腑而主

女科百問

表表屬陽手少陰者心之經為臟而主裏裏屬陰

此二經在上為乳汁在下為月水或勞傷氣血致

令體虛而受乎風冷風冷客於經絡搏於血氣血

得冷則壅滯故令月水不宜利也

養榮湯治婦人血海虛弱心忪恍惚時多驚悸

或發虛熱經候不調

白芍 川芎 當歸 熟地

青皮 薑黃 川薑 丹皮

海桐皮 五加皮 白芷

右為咬咀每服五錢水盞半薑五片烏梅一

箇煎至一盞去滓溫服不拘時候將此藥送下紫桂丸七十粒紫桂丸方見四十九問

○第八問經水欲行先身體痛或腹痛者何也
答曰經脉者行血氣通陰陽以榮周身者也血氣盛陰陽和則形體適平或外虧衛氣之充養內乏榮血之灌溉血氣不足經候欲行身體先痛也或風冷之氣客於胞絡損傷衝任之脉及手太陽手太陰之經故月水將下之際血氣與風冷相擊所以經欲行而腰痛也

趁痛飲子治經脉虛寒身體疼痛

女科百問

虎骨五銖 茯苓 甘草 藁本

防風 白芷各二銖 當歸 白芍

續斷 吳木 附子各三銖

右為麤末每服五錢水二盞薑五片棗二枚煎至一盞去滓溫服不拘時

溫經湯治風寒客搏經絡小腹作痛

當歸 川芎 白芍 官桂

丹皮 蓬朮各半兩 人參 甘草 牛膝各一兩

右為麤末每服五錢水二盞煎八分食前服

沒藥除痛散逐寒邪療腹痛

沒藥除痛散逐寒邪療腹痛

蓬莪茂兩 當歸焙 玄胡索 五靈脂

肉桂 良薑炒 蒲黃炒 甘草 沒藥各半兩

右為細末每服三錢溫酒調下

楊氏謂婦人每經欲行必先腹痛令服撞氣阿魏

圓酒調大聖散下數服愈經行不復痛矣

撞氣阿魏圓 大聖散見宋局方

茴香炒 陳皮去 青皮去 川芎 丁香炒

蓬莪茂炒 甘草 縮砂仁 肉桂去 白芷炒

生薑四兩切 鹽半兩 胡椒二錢 阿魏二錢半 右末阿魏糊為圓雞豆大每藥一筋硃砂七

錢為衣常服一粒嚼爛醋湯茶酒任下

女科百問

滋血湯治血風虛經候澁滯經脉不通四肢麻

木肌體渾身疼痛倦怠將成癆瘵

馬鞭草 荆芥穗各四兩 丹皮

赤芍 枳殼 肉桂 當歸 川芎各二兩

右為麤末每服四錢烏梅一箇水煎食前服

琥珀散治月經擁滯心腹疼痛及治產後惡露

不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死

京三稜煮 蓬朮煮 赤芍藥煮 劉寄奴煮

牡丹皮煮 官桂 菊花 蒲黃

熟地 當歸各一

右將前五味用烏豆半升生薑半觔切片米醋四升同煮豆腐爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調下

○第九問月水閉絕不通者何也

答曰夫月水不通因風冷客於胞絡所以入房或為血枯血瘦血癥或因墮墜驚恐皆令月水不通也病源云血性得溫宜流得寒則澁閉既為冷所結搏則月水不得通行若腸中鳴者則月事不來不來因冷于於胃腑或醉入房者則內氣耗損

女科百問

勞傷於肝經或吐血唾血下血謂之脫血使血枯於中為積塊血瘦血癥名曰血聚使榮結於內心主行血墮墜驚恐神無所倚而血散亦令月水不通也

順榮湯治婦人血積血塊癥瘕腹大內有塊形築築作痛久無寒熱

大黃一兩酒浸 當歸一兩 葶麥半兩

鬼腰帶各一兩 枳殼一兩

赤芍藥半兩 猪牙皂角半兩

右為吹咀每服一兩純酒二盞煎至一盞法

萍食前溫服

滋血湯治勞過度致傷腑臟衝任氣虛不能約制其經血忽暴下謂之崩中或下鮮血或下瘀血或下血片或下五色連日不止淋瀝不斷形氣羸劣倦怠困乏或月水閉絕氣不升降

馬鞭草 牛膝 荆芥穗各四

丹皮 赤芍 枳殼 肉桂

當歸 川芎各二

每服四錢烏梅一箇水煎空心服至半月或一月經脈自通

女科百問

桃仁煎丸治血瘦血積經候不通

桃仁去皮尖 大黃濕紙 川朴硝各一

蟲蟲半兩

右為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取

一升半下大黃桃仁蟲蟲等不住手攪欲

圓下朴硝更不住手攪良久出之圓如桐

大前一不用吃晚食五更初用溫酒吞下

五粒日午取下如赤豆汁雞肝蝦麻衣未下

再服血鮮紅即止續以調氣血藥補之此于

金方出

萬病丸 見六問中

○第十問虛勞之病何以得之

答曰夫有勞役之勞。有勞傷之勞。役之勞。所用太過。臟腑之氣失其常度。所以致疾。虛則已有所虧。勞則因有所損。其積之有漸。成之有日。豈一朝一夕而驟致哉。巢氏云。五勞六極七傷。謂之虛勞也。今尋原指要而論之。若腹脇有塊。大小成形。按之不動。推之不移。久久令人寒熱如瘧。咳嗽。面目浮腫。動輒微喘。日就羸瘦。此繇暴怒驚恐。氣上而不下。動傷於肝。氣聚而不散。結而成形。積久而變勞。又有日頓羸瘦。氣短乏力。腰背牽急。膝脛酸痿。小便或赤。或白而濁。帶下不禁。夢與鬼交。翁翁如熱。骨肉煩疼。此繇房勞過度。精耗氣竭。得之於腎。為勞尤速也。

女科百問

栢子仁 <small>圓。治婦人血閉不通。漸成癆瘵。</small>	栢子仁 <small>別當歸洗。</small>	熟地	白茯苓
丹皮	卷栢	白芍藥	石斛
巴戟 <small>心去。</small>	肉苁蓉 <small>酒浸。</small>	山藥	杜仲
白薇	蒲黃	枳殼	肉桂
京三稜 <small>煨。</small>	蓬朮 <small>煨。</small>	覆盆子	枸杞子 <small>各一兩。</small>

附子

右細木。煉蜜丸。栢子大。每服五十九。溫酒送下。空心食前。

人參。獨散。去熱解勞。調順經水。滋養新血。藥性中和。退熱無大寒極冷之劑。

黃耆三分。 黃芩 赤茯苓 白朮

熟地 赤芍藥 麥冬各一兩。 柴胡半兩。

人參 知母 當歸 甘草炙。各三分。

右竝生剉如麻豆大。焙乾入磁器中收。每服四錢。水一盞半。竹葉燈心三寸長。各七莖。同煎七分。去滓。溫服。不拘時候。日三服。如病退不必服。

女科百問

香煎。治暴怒驚恐。氣逆上而不下。動傷於肝。氣聚而不散。結而成形。

石斛五兩。 川椒炒去。 附子炮去。 秦艽去上。

柴胡去。 沉香去。 木香 鱉甲去。煎。刮。

黃耆二兩。 枳殼各二兩。

右為細末。先用新栢杞十觔。洗略槌碎。法酒二斗。煮取七升。取栢杞根。別用法酒三升。洗拍令淨。與酒一處。更入蜜四兩。煮成膏。和前

件藥末。丸如桐子大。每服一丸。食前服。二服。一方加柴胡二兩。方婦人患脾血病時。覺腹痛惡心。五心煩熱。如勞之狀。或進或退。經候行而食驚恐所致。令服局方四物湯。加吳茱萸同煎。溫服。病愈。

逍遙散

四物湯加柴胡 又正方 白茯苓

白朮 白芍 柴胡 當歸

甘草 人參

每服用煨薑一塊。薄芎少許。不拘時煎服。

女科百問

膠艾湯。治勞傷氣血。衝任虛損。月水過多。淋瀝漏下。連日不斷。腹臍疼痛。及妊娠將攝失宜。胎動不安。腹痛下墜。勞傷胞絡。胎損漏血。腰痛悶亂。因損動胎上捨心。奔衝短氣。因產衝任氣虛。不能約制經血。淋瀝不斷。延引日久。漸成羸瘦。

熟地 白芍 當歸 艾葉 微炒

阿膠 炒 芎藭 甘草 炙 各二兩

右為哎咀。每服四錢。水一盞。酒六分。煎八分。去滓。食前熱服。甚者連服內補當歸丸。見五十二問。

○第十一問婦人卦數已盡。經水當止而復行者。何也。

答曰。經云。男子生於寅。寅為木。陽也。女生於申。申為金。陰也。寅屬木。陽中有陰。男子得八數。故八歲齒更。髮長。骨之餘。生齒。男子以氣為本。八八則卦數已盡。盡則陰精痿。申屬金。陰中有陽。女子得七數。七歲齒更。髮長。血之餘。生髮。女以血為主。七七則卦數以終。終則經水絕。止。內經云。七七任脈虛。太衝脈衰。少天癸竭。地道不通。故形壞而無子也。或勞傷過度。喜怒不時。經脈虛衰之餘。又為邪氣攻衝。所以當止而不止也。

茸附養真湯。補衝任。調血氣。

乾薑 兩 肉桂 當歸 附子 炮 各二兩

鹿茸 酒炙 牡蠣 煨 二兩 防風 兩 龍骨 生 二兩

右為哎咀。每服半兩。水二大盞。煎至八分。去滓。不拘時溫服。

補中芎藭湯。治風虛冷熱。勞損衝任。月水不調。

崩中暴下。產後失血過多。虛羸腹痛。或妊娠胎動不安。血下。

當歸 乾薑 炮 各二兩 川芎 黃芪 蜜炙

芎藭 黃芪 蜜炙

茶黃湯洗白芍

甘草炙 熟地

杜仲炒令人參各一兩

右為咬咀每服三錢水盞半煎一盞去滓熱服空心食前

當歸散天癸已過期經脈不勻或三四月不行或一月再至問云七損七益謂女子七數盡是經候不依時者血有餘也不可止之但令依時不腰痛為善

當歸 川芎

白芍藥各一兩 白朮半兩

黃芩各剉碎炒各一兩 白朮半兩 山茱萸炮一兩

女科百問

右為細末每服二錢酒調下空心服一日三服

第十二問何謂避年

答曰王氏云有一婦人女年十五歲來診言女年十四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰此為是夫人親女非耶若親者當相為說之婦人答言是自女耳師曰所以問者無他夫人年十

後當自下 拱辰丹夫方當壯年而真氣猶怯此乃賦稟素

非虛衰而然也僭燥之藥尤宜速戒勿謂手足厥逆便云陰多如斯治之不惟不能愈疾大病自此生矣滋益之方羣品稍衆藥力微細難見功效但固天元一氣使水升火降則五臟自和百病自去此方主之行在孫琳郎中方葛丞相夫人少時服之極効

鹿茸酥炙去皮 山茱萸新好細

當歸四兩 麝香半兩

右三件為末入麝拌和酒煮麩糊為丸如桐子大每服一百粒或五十粒温酒或鹽湯下

女科百問

第十三問室女經候當行不行者何也

答曰室女者乃未出閨門之女也不以妍醜至十四五歲容貌皆紅嫩者謂之質朴未散莊子云綽約如處子者是也當此之際經脈來時俗呼為紅脈或因驚恐或冷氣擊搏所以當行而不行也通經圓治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕嚴氏方內加玄胡索赤芍減川烏

桂心不見火 青皮去 大黃炮 乾薑炮

蓬朮 川烏炮去 乾漆炒 當歸

桃仁去皮 川椒去目炒出

右為細末。將四分用米醋煮成膏。和餘六分末劑。日中治之。如梧桐子大。陰乾。每服二十丸。用淡醋湯下。加至三十九。溫酒亦得。食前服。

桃仁散。治婦人室女血閉不通。五心煩熱。

紅花 當歸 杜牛膝 桃仁別研

右四味各等分。為細末。每服三錢。溫酒調下。

空心食前。

○第十四問。未出閨門女。有二病者。何也。

答曰。未出閨門女。即室女也。一病者。經水初下。陰

女科百問

上十八

中熱。或有當風。或有扇風者。二病者。太衝脈盛。氣則內熱。以寒水洗之。三病者。或見血下。驚怖。若三病者。有一之所受。後必生帶下之疾也。

神仙聚寶丹。治婦人血海虛寒。外乘風冷。搏結不散。積聚成塊。或成堅瘕。及血氣攻注。腹脇疼痛。小腹急脹。或時虛鳴。嘔吐痰沫。頭旋眼花。腿膝重痛。面色痿黃。肢體浮腫。經候欲行。先若重病。或多或少。帶下赤白。崩漏不止。驚悸健忘。小便頻數。或下白水。時發虛熱。盜汗流瘦。此藥不論胎前產後。室女。並宜服之。常服安心神。去邪

氣。逐敗血。養新血。令有子。亦能除諸病。

木香研令末 琥珀別研 當歸 沒藥別研

滴乳別研 麝香別研 辰砂別研

右研令細。和滴冷熱水。搗為丸。每一兩作一

十五丸。每服一丸。溫酒磨下。胎息不順。腹

內疼痛。一切難產。溫酒和重便磨下。不拘時

候。產後血暈。敗血奔心。口禁舌強。或惡露

未盡。發渴面浮。煎烏梅湯和重便磨下。產

後氣力虛羸。諸藥不效。和童便磨下。室女

經候不調。每半丸。溫酒磨下。

女科百問

上十九

○第十五問。婦人多驚者。何也。

答曰。婦人者。眾陰之所集。而以血為之主。夫心主行血。脾主裹血。肝主藏血。因產蓐過傷。或因喜怒攻損。是致榮血虧耗。內經云。血氣者。人之神。血既不足。神亦不定。所以驚怖。巢氏有風驚悸候云。心藏神。為諸臟之主。若血氣調和。則心神安定。若虧損。則心神怯弱。故風邪乘虛干之。防以驚悸。若久不止。則變為恍惚也。

經濟丹。治婦人血氣不足。榮衛俱虛。心氣不定。夜臥驚怖。夢寐不祥。心虛自汗。乏力倦怠。飲食

減少咳嗽痰實常服補心養血安神定志令人血壯氣實極有神効

白茯苓 白茯神 白芍藥 各一兩

遠志 去心 乳香 半兩 當歸 一兩 酸棗仁 去殼炒 半兩

人參 兩 沒藥 研 一兩 硃砂 別研 半兩

石菖蒲 一兩 真者 只用棗仁九亦得

右十味為末煉蜜為丸桐子大將硃砂為衣每服三十九加至五十九棗湯參湯食前任下食後亦可

坎離丹既濟水火補心滋腎白濁夢遺

女科百問

辰砂 一兩 研 酸棗仁 酒浸去殼 一兩 附子 一兩 去

乳香 半兩 令隔水 乳鉢細研入

右先用附子碾細羅末次入三味和勻煉蜜丸如雞頭大每服一粒溫酒下空心一服須是臘月合磁器盛之

石斛散治虛勞羸瘦乏力少食倦怠多驚畏

石斛 四錢 去根淨 牛膝 酒浸 栝子仁 去皮 研

五味子 遠志 炒 杏仁 去皮 炒 木香

肉苁蓉 酒浸 訶子肉 炮 青橘皮

柴胡 人參 熟地 蒸各 白茯苓 研

甘草 二錢 乾薑 半錢 神龜 研炒 麥蘖 各六錢 右為細末每服二錢米飲調下食前日二三服

○第十六問婦人多因風冷而生諸疾者何也答曰風乃陽邪也冷乃寒氣也風隨虛入冷錄勞傷夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷血氣便致虛損則風冷乘虛而干之或客於經絡則氣血凝滯不能溫養於肌膚或入於腹內則冲氣虧虛不能消化於飲食大腸虛則多利子臟寒則不生或為斷絕或為不通者隨所傷

女科百問

而成病皆不逃乎風冷之氣也

補陰丸治婦人百疾或經不調或崩中漏不止腰腿沉重臍腹作痛潮熱往來虛煩自汗中滿氣短嘔噦不時肢體酸疼不思飲食日漸瘦弱此藥順肌體悅顏色調榮衛逐風寒進飲食化痰涎

熟地 生地 各七兩 白朮 五兩 蒼朮 五兩 半

藁本 去土 牡丹皮 當歸 秦艽 四兩 各

細辛 七兩 肉桂 去皮 甘草 炙六兩 蠶退布 熨七兩

大豆黃卷 炒去 枳殼 炒 陳皮 去白

乾薑炮 羌活各五兩 白芷六兩 白茯苓六兩

糯米三升炒黑

右件細末蜜丸每一兩作十丸每服一丸溫

酒化下醋湯亦得食前

丹鈔丹治一切虛寒冷病

鹿茸 靈砂 白龍骨 川椒

陽起石 牡蠣粉 肉桂 肉蓯蓉

石斛 川巴戟 木賊 澤瀉

天雄酒浸 沉香 兔絲子酒浸 臘臍各一兩

磁石醋 麝香各半兩

女科百問

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服一百丸

溫酒或鹽湯下

○第十七問婦人多頭眩而冒者何也

答曰眩者暈也謂轉運之運世為之頭運者是也

冒者冒蒙之冒世為昏冒者是也明理論曰眊非

毛而見其毛眩非玄而見其玄眊謂眼花也眩謂

眼黑也鍼經云上虛則眩下虛則厥眩雖為虛蓋

風家亦有之者風主運動故也婦人頭運挾痰多

嘔吐者狀若醉頭風也

芎羌散治婦人患頭風者十居其半每發必掉

眩如在車上蓋因血虛肝有風邪襲之其素弱

云狗蒙拈尤目瞑耳聾下實上虛遺在足少陽

厥陰甚則入肝蓋謂此也方比他藥捷而効速

川芎一兩 當歸三錢 羌活 旋覆花

細辛 蔓荊子 石膏生 藥本

荆芥穗 半夏 防風 熟地

甘草各半兩

右為羅末每服二錢水一大盞薑五片煎至

七分去滓溫服不拘時候氣虛者此藥送養

正丹五七十粒

女科百問

玉真圓治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂

之腎厥其脈舉之弦按之石堅一本作不堅

硫黃二兩 石膏硬者不 半夏湯洗七次

硝石一分

右為細末研和生薑汁糊為丸如桐子大陰

乾每服三十九生薑湯米飲湯下更灸關元

穴百壯良方中硫黃丸亦佳

醉頭風餅兒

蠶絲去絲

天南星

右件各等分細末生薑自然汁和作餅如折

二錢大厚五分。陰乾每服一餅同平胃散四味者三錢重。水三大盞薑五片棗二箇先煎平胃散一沸次下餅子槌碎入同煎一二沸通口服

桃紅散治男子婦人氣虛攻注頭目昏眩偏正頭疼夾腦風兩太陽穴疼眉稜骨痛及治風痰惡心頭運欲倒小兒傷風鼻塞痰涎咳嗽並宜服之

川烏兩一草烏錢八天南星半兩以上三

麝香錢一腦子錢一朱砂半兩別研細

女科百問

右為細末每服半錢薄荷茶調下溫酒亦得

第十八問身體疼痛流注不定者何也

答曰身體疼者其證不一太陽證表未解注營身體疼痛太陽中濕一身盡痛若脉沉身體自轉痛者陰也身重背強腹中絞痛咽喉不利身如被杖者陰毒證也若風邪乘虛在於皮膚之間淫淫躍躍若刺一身盡痛傷侵血氣動作如蠱毒之狀者巢氏謂之風蠱也

虎骨散治婦人血風攻注身體疼痛

虎脛骨半兩桂心芎藭

海桐皮 當歸 牛膝 天麻 附子 骨碎補各一兩羌活半兩右為細末每服一錢空心溫酒調下

透經湯治身體疼痛

五積散兩半生附子二錢右件用水二盞薑七片棗二枚煎至八分去滓入麝少許再煎三四沸通口服不拘時候

麝香九治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如蠱蟻晝靜夜劇及一切手足不測疼痛

川烏大八角者三箇生全蠍二十箇生

女科百問

黑豆二十一粒生地龍半兩生右為細末入麝半字同研和糯米糊為丸如

菘豆大每服七丸甚者十九夜令隔空溫酒下微出冷汗一身便差予得此方凡是歷節及不測疼痛一二服便差在歙川日有一貴家婦人遍身走注疼痛至暮則發如蠱蟻其肌多作鬼邪治之予曰此正歷節病也三服愈此云一字者二分半也

第十九問朝食暮吐者何也

答曰嘔吐之病皆緣三焦不調脾胃不和清濁相

下之所致也。大抵嘔吐本二證。嘔者。嘔而有聲。吐者。吐而無聲。所謂嘔是也。吐者。吐而有物。胃中虛冷。則吐。若心下牢大如盂。或時寒熱。朝食暮吐。脉如弦緊。則為虛寒相搏。胃氣日虧。所以不能停留水穀。名曰胃反。

紫金丹治嘔吐心腹疼

丁香 木香 華澄茄 胡椒

五靈脂西肉豆蔻煨乾薑炮半夏末半

附子炮硫黃水 銀砂子二件如靈砂法炒

右為細末。半夏末薑汁打糊丸如桐子大。每

女科百問

服七十九空心米飲下

薑合圓療中脘停寒胸膈結痞嘔吐惡心不思飲食

飲食

木香 肉桂 附子 硃砂紙上飛

陳皮 丁香 沉香 華澄茄

青皮去白各茴香一分

右為細末。次入硃砂研。酒煮麩糊為丸。每一

兩作二十九。每服一九。以生薑一塊。剉如盒

子。安藥在內。濕紙裹煨令香。去紙放溫。細嚼

鹽湯送下

○第二十問婦人之病多因氣生者何也
答曰氣以形載形以氣充惟氣與形兩者相待氣和則生氣戾則病結為積聚氣不舒也逆為狂厥氣不降也宜通而塞則為痛氣不達也宜消而息則為痞嬰之為瘦留之為瘤亦氣之凝耳內經曰怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄勞則氣耗思則氣結驚則氣亂九氣不同故婦人之病多因氣之所生也

大七氣湯治驚恐恚怒相搏而痛

京三稜 蓬朮 青吉皮淨陳皮

女科百問

藿香葉 桔梗 官桂 益智各一

香附子去毛 甘草兩

右為麤末散每服五錢水二盞薑三片棗一

枚煎至一盞去滓溫服

木香順氣散理衛氣順三焦

烏藥 木香 香附子 薑黃

砂仁 甘草

右為吹咀每服半兩水二鍾薑五片棗二枚

煎至八分去滓溫服不拘時

紫金丹治氣癰氣瘕虛脹病天台陳秀山傳

針砂兩 餘糧石 硫黃各二兩
右先用藥三件同好醋入鐵鍋內煑乾碾為末

平胃散十兩 蓬朮二兩 縮砂仁 丁香

木香 獨活 黃芪 枳殼各一兩

白茯苓 大黃 黃連 黑牽牛

甘草 茱萸 檳榔 破故紙各三兩

乾漆一兩須好者生漆二兩亦得

右件為細末同前藥末用酒糊為丸桐子大每日三五服不拘數如病重則多服忌鹽醬

女科百問

油麩生冷等物

○第二十一問猝然而死少間復甦者何也

答曰世言氣逆者雖不見於方書然暴喜傷陽暴怒傷陰亦氣中之源也况憂愁不意氣多厥逆往往多得此疾便覺涎潮昏塞牙關緊急若槩作中風候用藥非止不相當多致殺人經云無故而瘖脉不至不治自已謂氣暴逆也氣復則已故猝然而死少間復甦者正謂此也
蘇合香丸療傳屍骨蒸殭瘕肺痿疰忤鬼猝心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴癘赤白暴利瘀血月

閉 痲 癩 下 腫 驚 癇 鬼 忤 中 人 小 兒 吐 利 乳 大 人 狐 狸 等 病

蘇合香油一兩入安 白朮二兩 丁香二兩

安息香二兩好酒一升蒸膏 朱砂二兩水

木香二兩 白檀香二兩 薰陸香一兩

沉香二兩 烏犀屑二兩 草茺二兩 香附子二兩

訶梨勒皮二兩 麝香二兩 龍腦一兩

右為細末研藥和用安息膏并煉白蜜和劑每服旋圓如梧桐子大早朝取井華水溫冷任意化服四丸

女科百問

○第二十二問病非瘧之邪四時多病寒熱者何也

答曰風者陽之氣也寒者陰之邪也陰氣上升入陽中則發寒陽氣下陷入陰中則發熱陰陽偏勝寒熱互作經曰夏傷於暑秋必病瘧者是也婦人之病證見寒熱邪非暑氣者皆繇榮衛之兆作也且衛者氣也氣為陽陽微則惡寒榮者血也血為陰陰弱則發熱故婦人寒熱多因氣血之所使也或勞傷而體弱或經閉而寒熱若此之類久而不已則成虛損之疾也

必應散治久寒熱如瘧狀

熟地 檳榔 陳皮 草果去皮

當歸 砂仁 甘草炙 柴胡以上各等分

右為蠶末每服三錢水二盞薑五片煎八分

去滓無時溫服合藥時忌雞犬婦人見

神健飲子治婦人寒熱

赤芍 白朮各二兩 赤茯苓 當歸

肉桂 鱉甲 川芎 枳殼

柴胡 黃芪 秦艽 桔梗

橘紅 甘草各一兩 木香

文科百問

右為吹咀每服三錢水二盞薑五片棗一枚

煎至八分去滓溫服不拘時

○第二十三問因咳嗽經候不行者何也

答曰咳嗽之說古書有咳而無嗽後人兼言之大

抵皆從肺出其聲響亮不因痰涎而發者謂之咳

言其聲音聞於人痰涎上下隨聲而發者謂之嗽

如水之嗽蕩能蕩其真氣也况肺主乎氣經云榮

氣之行常與衛氣相隨久嗽損氣則血亦不足遂

致經閉不行時發寒熱久久成勞者氣血俱損之

故也

必應散治婦人熱勞咳嗽月水不週

柴胡去 白朮 青皮去 當歸等分

牛膝 牡丹皮各一兩

右為蠶末每用六兩入蜜四兩燂令焦入酒

并渣便各一匙煎八九沸去滓分作六服空

書

桑白皮炙 木香

貝母 人參 款冬花 亭蘆隔紙炒

檳榔各一兩 杏仁炒 天門冬去心 甘草

右為細末蜜丸桐子大每服三十九清米飲

送下食後服

○第二十四問咳嗽有紅痰者何也

答曰經稱五臟六腑皆令人咳原其至理雖因寒

邪之為患當分內外所傷難經云形寒飲冷則傷

肺肺主皮毛自皮毛而入中者謂之形寒胃脉絡

肺食寒而為嗽者謂之飲冷水飲停積於膈膈所

以為痰痰中有血者乃心肺之相見也肺屬金而

主氣心屬火而行血以五臟而言言心肺皆居膈

上以五行論之金火應乎相制故痰中有血者此

故也

難乎金。心勝乎肺。久而不已。亦變成勞。難經所謂七傳者死。亦此之類也。褚氏遺書云。喉有竅。則咳。血殺人。腸有竅。則便血。瀰人便血。猶可止咳。血不易醫。所以咳嗽有紅痰者。多成虛勞之疾也。

平肺湯定喘治嗽

五味子 紫苑洗去土 陳皮白 甘草炙

杏仁泡去尖 半夏湯洗七次 紫蘇子 桑白皮

右為末。每服二錢。水一盞。薑四片。煎至七分。去滓。溫服。食後。

立驗丸治肺熱而咳。上氣喘急。不得坐臥。身面浮腫。不下飲食。消腫下氣。止咳。

葶藶十分研 貝母三分 杏仁兩半炒

赤茯苓 紫苑 五味子各三分

人參兩 桑白皮一兩

右為細末。蜜丸。梧桐子大。每服十九粒。日二服。

甚者夜一服。加至三十九。漿湯下。腫盛者。食後服。

止紅散治心肺客熱咳嗽吐血

柴胡去苗 胡黃蓮 宣連各半

右為末。入硃砂少許。研和。每服二錢。水一盞。

煎半盞通口服

○第二十五問吐血。衄血。齒衄。舌上出血。汗血者。

何也

答曰。氣屬乎陽。血屬乎陰。陰盛則陽虧。陽盛則陰虧。經所謂陽勝則陰病。陰勝則陽病。諸吐血。衄血。鼻出。皆謂之妄行。其脈洪數者。逆微細者。順。陽明之經。行絡於頤頰。陽明受邪。熱血從齒出也。脾氣通於口。心氣通於舌。心脾二經被傷。血故從舌出也。榮血內通於臟腑。外榮於經絡。藏則舍於肝經。行則出於心臟。又心之液為汗。令肝心二臟俱虛。血隨汗液出也。

內補芎歸湯治婦人血氣羸弱。或崩傷過多。少氣傷絕。腹中拘急。四肢煩熱。面目無色。及唾血吐血。

芎藭 熟地各四兩 白芍五兩 桂心二兩

甘草 乾薑各三兩 大棗四十枚 當歸二兩

右為麤末。每服五錢。水一盞。半煎至八分。去滓。溫服。不拘時。

柔脾湯治吐血。下血。衄血。

柔脾湯治吐血。下血。衄血。

白芍 黃芪 甘草各一兩 熟地三兩

右為改阻每服三錢水酒各一盞煎八分去

滓通口服不拘時

琥珀散治小便出血

琥珀 猪苓去皮 茯苓 澤瀉

滑石各一兩 阿膠炒三兩 車前子一兩

右為麤末每服五錢水二盞煎一盞去渣溫服

服

○第二十六問婦人偏喜酸物或嗜冷者何也

答曰天食人以五氣地食人以五味者酸苦甘辛

女科百問

鹹是也五味各有所入酸入肝辛入肺苦入心甘

入脾鹹入腎是謂五入也肝藏血婦人以血為主

所以偏喜酸物食者酸入肝而養血血得其酸物

所以捨藏也血虛多熱邪熱蓄於上焦煩躁內生

婦人虛煩往往多嗜冷物也

茯苓半夏湯治妊娠惡阻心中憤悶嘔吐惡心

好噉鹹酸物

旋覆花 陳皮 桔梗 白芍

人參 甘草 芎藭各半兩 赤茯苓二分

乾熟地 半夏湯洗十遍

右為麤末每服二錢水盞半薑四片煎八分

去滓食前稍熱服

清平湯治血虛口燥咽乾喜飲

人參 半夏 麥門冬 芍藥

白朮 甘草 當歸 茯苓

柴胡各等分

右咬阻每服二錢水盞半燒生薑一塊切破

薄許少許同煎七分去滓熱服不拘時

○第二十七問婦人喜少怒多悲泣不止者何也

答曰婦人無故悲泣不止象如神靈或以祟祈禱

女科百問

終不應金匱謂之燥臟是也為所欲不稱其意太

棗湯主之

太棗湯治婦人臟燥

甘草一兩 小麥三合

右咬阻每服三錢水盞半棗五枚煎八分去

渣溫服

○第二十八問咽中狀如梅核或如炙肉者何也

答曰有喉嚨有咽門二者各有所司喉嚨者空虛

也肺之系氣之道路也肺應天故屬大氣所生有

九節以通九竅之氣咽者嚙也言可嚙物為胃之

多氣所生謂之隘也。或陰陽之氣。或胸膈痰結。與氣相搏。上逆咽喉之間。結聚狀如炙肉之鬱也。

四七湯治喜怒悲思憂恐驚之氣。結成痰涎。狀如破絮。或如梅核在咽喉。咯不出。嚥不下。此七氣所為。或中脘痞滿。氣不舒快。或痰涎壅盛。上氣喘急。或因痰飲節注。嘔吐惡心。

半夏五兩 茯苓四兩 厚朴三兩 紫蘇葉二兩
右為吹咀。每服四錢。水盞半。薑七片。棗一枚。

煎六分。去滓。熱服。不拘時。

二氣散。治陰陽痞結。咽膈噎塞。狀若梅核。妨礙飲食。久而不愈。即成翻胃。

山梔子炒 乾薑炮各一兩
右為麤末。每服二錢。水一盞。煎五分。去滓。熱服。

服食遠

○第二十九問。婦人足十指痛。如油煎。覆之則熱。痛風吹。則冷痛者。何也。

答曰。孫真人云。有脚氣之人。先從脚起。或先緩弱。起行忽倒。或兩脛腫滿。或膝枯細。或心中忪悸。或

小腹不仁。或舉動轉筋。或見食嘔逆。惡聞食氣。或胸滿氣急。或遍體酸痛。皆脚氣候也。黃帝所謂緩氣濕痺是也。頑弱名緩風。疼痛為濕痺。寒中三陽所患必冷。暑中三陰所患必熱。婦人足十指如熱油煎者。此絲榮衛氣虛。濕毒之氣。留滯經絡。上攻心則心痛。下攻脚則脚疼。其脚指如熱油所煎。亦氣之類。經云。熱厥是也。

換腿丸。治一切脚氣。即石楠丸。
石楠葉 天南星炮 金釵石斛 葶藶
牛膝酒浸 薏苡仁 羌活不蛀 川續斷

天麻剉 防風去 當歸 黃芪
甘草各一兩 檳榔二兩 乾木瓜四兩

右為細末。酒糊為丸。桐子大。每服五十九。漸加至一百丸。溫酒或木瓜湯下。空心食前。

萬靈散。治婦人脚氣。
當歸 赤芍 烏藥 青皮各一兩

白朮 肉桂各半兩 黑牽牛二兩
右為麤末。每服三錢。水盞半。酒少許。煎八分。

去滓。溫服。食前。

活血丹。治婦人脚血久冷。諸般風邪濕毒之氣。

女科百問

經絡流注脚手筋脉拳攣或發赤腫行步艱辛腰腿沉重脚心弔痛及上衝脇腹膨脹胸膈痞悶不思飲食衝心悶亂及一切痛風走注渾身疼痛

川烏兩 乳香一錢半 草烏兩 地龍兩

天南星兩 沒藥三錢半 牛膝兩 木瓜兩

右為細末入研藥酒糊九梧子大每服二十丸空心日午冷酒下或荆芥湯清茶亦得

○第三十問婦人少年髮少者何也

答曰是少陽膽之經其榮在髮足少陰腎之經其榮在髮衝任之脉為十二經之海謂之血海其脉絡上唇口若血盛則榮於頭髮髮美若血海弱則經脉虛竭不能榮潤故髮少而禿或有純赤黃者生髮藥

蔓荊子 青箱子 蓮子草各一兩

附子二兩 頭髮灰一匙

右為末以酒漬納甕器中封閉經二七日藥成以烏雞脂和塗之先以米泔洗髮然後傳之數月生長一尺也

生眉毛

七月七日烏麻陰乾為末烏麻油和塗眉即生妙

滋陰養血丸治勞虛血弱肌肉枯燥手足多煩肢節酸疼鬚髮脫落面少顏色腹拘急痛引腰背去血過多崩傷內竭胸中短氣晝夜不能眠情思不樂怔忡多汗

熟地 當歸各一兩 鹿茸二兩

右為細末蜜丸桐子大每服五十九米飲湯任下不拘時

○第三十一問四肢如故但腹脹者何也

答曰身腫及四肢者本起於水手足瘦削腹大者本起於脾或脹滿或散者氣也然腹脹之狀上下膨亨或鼓之有聲喘息不便錄上者不降下者不升氣痞於中無所歸息三焦渾亂若猝然脹滿餘無所苦此錄脾胃不調冷氣暴折客乘於中寒之則氣收聚壅遏不通是以脹滿內經云臟寒生滿病是也若臍凸者難治大便利者為逆

沉香導氣丸順氣消腫

黑白牽牛各一兩 青皮去白同

陳皮去白同 檳榔半兩 刺碎用巴豆五十粒 去皮膜將三味炒黃色去

巴豆 不用 沉香 全蝎 炒 華澄茄

丁香 胡椒 各半 續隨子 一錢

蘿蔔子 三兩 甘遂 半兩 研

右為細末用葱白研如膏和丸桐子大每服

二十九丸炒酒醇煎湯下醋湯亦得

神助丸治四肢瘦肚大

三稜 草果子仁 川練子 各一兩 醋一

茴香 蘿蔔子 粟子內皮 各一

右為末醋糊丸桐子大蘿蔔湯送下五十九

虛者二十九

女科百問

○第三十二問病有血分有水分何以別之

答曰婦人月經通流流則水血消化若風寒搏於經脉血結不通血積為水故曰血分若先病於後經水或斷名曰水分其病易治去其水經自下也若病人覺腹內脹外視如常大便黑小便赤是其證也

椒仁丸治因經水斷絕後致四肢面目浮腫小便不通名曰血分水化為血血不通則為水矣

五靈脂 吳茱萸 煎洗七次 玄胡索 各半

羌花 醋浸一分 椒仁 甘遂 炒

續隨子 郁李仁 去皮

信砒 研 石膏 一分 附子 炮熟

木香 兩 膽礬 錢

右為細末麩糊為丸如菉豆大橘皮湯下

丸臨臥未通空心加一丸腹未通日午再一

服

葶藶丸治因小便不利後身面浮腫致經水不

通名曰水分其餘逆順並同水氣

葶藶 炒 續隨子 去皮研 乾漆 兩

右為末棗肉和丸桐子大煎扁竹湯下七丸

女科百問

如大便利者減葶藶續隨子各一分加白朮

半兩

○第三十三問心腹痛或又有小腹痛者何也

答曰經云五臟猝痛何氣使然岐伯對曰寒氣積於脉外故猝然而痛也舉痛論中所載痛病共有一十七證皆繇寒氣之所致也巢氏云痛是臟

虛受風冷邪氣乘心也其痛發有死者有不死成

疹者心為諸臟主而藏神其正經不可傷傷之而

痛者各為真心痛朝發夕死夕發朝死若腑臟虛

弱風邪客於其間痛隨氣之上下或上攻於心則

心痛下攻於腹則腹痛。上下相攻則心腹俱痛。或宿有風冷搏於血。血氣停結。小腹痛也。

醋煎散。治婦人血氣腹脇刺痛。及產後敗血兒枕急痛。

高良薑一兩 當歸一兩 肉桂 白芍

橘紅 烏藥各半兩

右為細末。每服三錢。水醋各半。盞煎七分。通

口服不拘時。

木香通氣。治氣刺疼痛。

京三棱 蓬朮 木香

積殼 大腹

右將米醋三觔。同煮令醋盡。獨去芫花。炒令乾。餘五味切片。子焙為末。白麩糊和丸。如磁豆大。桐皮湯下三十丸。以止為度。

玉抱肚。治停寒痼冷。疾心腹刺痛。常繫於臍腹間。甚妙。鄭主簿傳一方。用針砂如上法炒訖。止入硃砂半兩。並不用餘藥。

針砂一兩 鐵銚內炒 用柳條或 小粉霜各二兩 硃砂半兩 白礬

右件白礬等三味。同研為細末。與針砂拌和。

作一服。以水數點。灑。用匙拌。攪令厚。皮紙為

貼。闊二寸以上。長四五寸。貼之外。以帕子繫

疼處。或常繫臍下。如覺太熱。即以衣襯之。若

藥力過再灑水。如。則拌用。其熱如初。可用四

五次。藥力退。則將。針砂再炒過。別入餘藥。仍

可用。

五香拈痛丸

木香 官桂 丁香 乳香

藿香葉 沉香各半 班貓七枚 巴豆三粒

右八味為細末。白麩糊丸。梧桐子大。每服五

丸。薑湯送下。

○第三十四問。下利。經水反斷者。何也。

答曰。穀入於胃。脈道乃行。水入於經。其血乃成。胃

水穀之海也。腸胃虛弱。為風邪冷熱之氣所乘。不

能腐化穀食。先泄後變。成利也。受熱則赤。虛寒則

白。穀氣內虧。津液耗滅。所以下利。而經水反斷也。

經云。利止。經當自下。故宜先治利也。

大斷下丸。治下利不止。

附子二兩 細辛去蘆 乾薑二兩 高良薑五兩

肉豆蔻兩 訶子各二兩 龍骨 赤石脂各三兩

牡蠣醋洗泥固

白礬二兩陽起石火燒赤醋洗

右為細末。麴糊丸。

飲空心下。

滲濕湯。治濕勝濡泄。

白朮一兩蒼朮半兩

丁香各一兩乾薑各一兩

白茯苓各一兩

附子二兩令赤去薑先炮切片

右為麤末。每服四錢。水盞半。薑五片。棗二枚。

煎一盞。食前熱服。

第三十五問。婦人

狀者何也。

答曰。此婦人因傷寒之

之室者。屋室也。謂可以

榮血停止之所。經脈帶

海。玉冰云。陰靜海滿。正

脈盛。月事以時下者。也。

之所搏。則熱入血室。

見鬼狀者。此為熱入血室也。若施治其病者。當無

酸石榴皮去穢醋炙

梧桐子大。每服五十九粒。

厚朴

肉桂

陳皮

細辛

肉豆蔻半兩砂仁二兩

則明了。暮則譫語。如見鬼

病。熱入於血室也。何以明

停止之處。人身之血室者。

會之處。即衝脈也。衝為血

去血。內經云。任脈通。太衝

也。若經水適來。感其寒邪

證。晝則明了。暮則譫語。如

室也。若施治其病者。當無

犯胃氣。及上二焦。必自愈。

地黃湯。治熱入血室。

生地三兩柴胡入人參

甘草炙各半芍藥七兩

右為麤末。每服五錢。水二盞。薑五片。棗一枚。

煎一盞。去滓溫服。

龍齒琥珀散。治產前產後血虛。心神恍惚。語言

失度。睡臥不安。

茯神一兩人參

赤芍黃芪龍齒琥珀

生地各一兩當歸半兩

右為麤末。每服三錢。水盞半。煎六分。去滓溫

服。不拘時。

小柴胡加地黃湯。治傷寒發熱。或發寒熱。經水

適來。或適斷。晝則明了。夜則譫語。如見鬼神。亦

治產後惡露方來。忽然斷絕。

柴胡一兩人參半兩半夏

甘草一分生地各半黃芩

右咀片。每服五錢。水二盞。薑三片。棗一枚。煎

八分。去滓溫服。

復丹亦名正一丹此藥配類二氣均調陰陽
奪天地冲和之氣乃水火既濟之方可
可緩可急善治榮衛不交養心腎不升降
下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑但有胃氣
無不獲安

硫黃一兩 硝石一兩

火炒用木篋子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過恐藥力竭研細名二氣末

太陰玄精石一兩 五靈脂須五臺山者水

陳皮去白各二兩 青皮去白各二兩

右用五靈脂二橋皮為細末次入玄精石末

女科百問

及前二藥末拌勻好醋打糊為丸豌豆大每服三十粒鹽湯下甚者五十粒

第三十六問顛狂之病何以別之

曰入并於陰則為顛入并於陽則為狂皆繇風
之所致也顛者猝然仆地嘔吐涎沫口喎目急
手足撩戾無所覺知良久乃甦狂者或言語不避
親疎或因自高賢或棄衣踰走亦有自定之時又
在有胎之時其母猝大驚亦令子氣發癇其顛有
五一曰陽顛二曰陰顛三曰風顛四曰濕顛五曰
勞顛此皆隨其感病之繇而命名也又有牛馬猪

象之
行顛以其顛發之時聲形狀似於牛馬等故以為
也俗云病顛之人忘食六畜肉顛發之狀悉皆

大聖一粒金丹治諸風驚癇

大川烏頭二兩

黑附子

白附子各二兩

五靈脂

白蒺藜炒去刺各一兩

沒藥半兩

白僵蠶一兩去絲炒

白礬枯半兩

麝香半兩

細香墨半兩

朱砂半兩

金箔二百片

右將前六味同為細末後四味研細合和用井華水一盞研墨盡為度將墨汁搜和杵臼

女科百問

內搗五百下丸如彈子大金箔為衣陰乾每服一粒食後臨臥生薑自然汁磨化入熱酒

服再以熱酒隨意多少飲之就無風暖處臥衣被蓋覆汗出即差病小者每粒分作二服

忌發風物孕婦不可服

牛黃丸治風狂喜怒不常或欲狂走

白龍骨燒研

茯神

人參

黃連

鉛霜

犀角屑

防風

朱砂各一兩

牛黃一錢

遠志一兩

龍腦一錢

甘草半兩

麥門冬一兩

去心

右爲細末如桐子大每服二十九熱水送下不拘時服

祛邪散治顛邪惡候

白礬三兩 黃丹半兩

右爲研細用桑柴於瓦中燒一伏時服半錢以乳香湯下不拘時

小柴胡加地黃湯方見三十五問每服五錢水

二盞薑五片棗二枚煎八分去滓溫服

來復丹治產後熱入血室如見鬼神狂語者方見三十五問以醋湯下十來服

女科百問

第三十七問病有一臂痛有兩臂俱痛何也

答曰臂痛有數證有因寒而得之者或因伏痰者有形寒飲冷傷肺者有汗出傷阻者夫肝主諸筋肝經虛弱風寒入傷與氣血相搏筋寒則急上連兩臂俱痛宜服醒風湯理氣湯主之若或左或右痛不能舉臂者此繇伏痰在內中腕停滯脾氣不能流行止與氣搏流伏於左則左痛在右則右痛若右臂痛深連於骨如斧槌其氣自噬已下至臍左右氣不相通徹其痛發時氣上奔急令人悶絕肌肉日消漿粥不下心中煩問此繇形寒飲冷肺

被寒結留滯於右邊若無故一臂無力痛不能舉襲襲似汗偏阻一邊肌肉時復掣痛或有不仁手不能近頭久成偏枯宜服百風湯主之

百風湯治四肢垂曳骨節疼痛又名省風湯

獨活三兩 芎藭 防風 當歸

桂心各二兩 茯苓 附子 細辛

天麻一兩 乾蝎炒 甘草一兩

右爲咬咀每服三錢水一盞生薑五片煎七分主滓食前稍熱服

茯苓丸治伏痰臂痛

女科百問

茯苓一兩 半夏二兩 枳殼去穰炒半兩

風花桂一分

右爲細末薑汁煮糊爲丸如桐子大每服三十九丸食前薑湯下

理氣湯治痰飲臂痛

半夏湯洗二兩 桔梗一兩 官桂二兩 人參一兩

橘皮洗乾二兩 甘草半兩

右爲麤末每服五錢水二盞薑五片煎一盞去滓食前服

第三十八問婦人渴病與三消之病同異

答曰夫渴之為病一也推其受病之源所得各異
清迷方論消渴之病自來有二多緣嗜慾太甚自
為虛寒服五石湯丸猛烈燥藥積之在臟遂至燥
血枯涸又久飲酒者酒性酷熱薰蒸於臟肺是致
津液耗竭渴乃生焉婦人之渴多因損血血虛則
蒸熱則能消飲所以多渴故與男子之病有異也
栢子仁湯滋養榮衛調心順氣亦治上焦虛熱
煩燥口苦四肢倦怠津液內燥服之効

新羅參 黃芪 茯神 瓜蒌根

天門冬 麥門冬 甘草 北五味

女科百問

栢子仁 熟地

右為麤末每服五錢水一盞半薑三片棗三
枚煎七分去滓溫服不拘時

辰砂聚寶丹治心肺積蘊虛熱口苦舌乾面赤
大便滲泄肌肉瘦瘠四肢少力精神恍惚又治
消渴清中消腎三焦留熱

鐵粉 牡蠣 辰砂 瓜蒌根

黃連 金銀箔 知母

新羅參 瓜蒌根

右件瓜蒌根等五味同前藥末用生瓜蒌

根去皮取汁一盞白沙蜜一小盞同銀等
煉七八沸候冷和藥為丸如栢子仁大每服
三十九煎麥門冬湯放冷送下食後一日之
間三服

○第三十九問腰痛如折者何也

答曰腰者腎之外候足太陽經之所流注若痛連
小腹不得俯仰假假短氣此歸腎氣虛弱勞傷過
度風冷乘之有所不榮故腰痛也內經云腰者腎
之腑轉搖不能腎將憊矣若妊娠腰痛者其胎必
墮也

女科百問

杜仲散

杜仲 官桂 狂丹皮

右為細末溫酒調二錢不拘時服

當歸丸

當歸 水蛭 桃仁

右為細末酒煮糊丸如栢子仁大溫酒下十九

未愈加至三十九

腎着湯治身體重腰冷痺如坐水中狀反不渴
小便自利飲食如故病屬下焦從身勞汗出衣
裏冷濕久而得之腰以下冷痛腰重如帶五貫

錢重者

甘草

乾薑略二 茯苓

白朮各四兩

右為麤末每服五錢水二盞去滓溫服不拘時

○第四十問婦人面多生黑疔與黑子者何也

答曰黑疔黑子者皆生於面上本是二證也五臟六腑之經血華充於面或痰飲清臟或腠理受風致血氣不和或澁或溫不能榮於皮膚故變生黑疔若黑點凝聚謂之黑子者生面有之者非藥可治也

女科百問

洗風散治面止遊風或癩疹或風刺或黑疔

艾草

晚蠶沙

赤小豆

黑牽牛

白芷

藁本

僵蠶

白附子

草烏頭

白欬

蔓荊子

右件等分爲末每一錢澡面用之

○第四十一問身目黃者何也

答曰黃疸之病皆屬於脾脾屬土而色黃濕勝則上氣不流痰熱鬱發則眞色見矣大抵黃疸本得之於濕濕熱相搏身必發黃若先有流熱後有濕氣者先治其熱梔子蘘皮湯茵陳五苓散主之或

先感其濕後加其熱者先去其濕五苓散瓜蒂散主之亦有因冷氣痞結於脾陰濕鬱而爲黃先瀉其痞半夏瀉心湯枳實理中湯主之然後利其小便若病人一身面目悉黃四肢微腫胃滿不得臥汗出如黃蘗汁者此繇大汗出猝入水中所致謂之黃汗宜苦酒湯若非濕熱所鬱婦人面萎黃者此血之過也宜服地黃散滋陰養血丸方見第三十問

苦酒湯

黃芪五兩

芍藥三兩

官桂三兩

女科百問

右爲咬咀每服五錢水盞半苦酒半盞煎一盞去滓溫服不拘時

地黃散治婦人血少氣多寒面色青白

地黃

乾薑各一兩

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時

茵陳五苓散

豬苓去皮

茯苓

澤瀉

白朮各二兩

官桂去皮

右爲細末以茵陳一分水一盞煎七分去滓調服加鹽點妙

瓜蒂散

瓜蒂 赤小豆 秫米 各一兩

右為細末。粥飲調下半錢以吐為度

藥皮湯

藥皮 三兩 梔子 二兩 甘草 一兩

右為蠶末每服五錢水二盞煎八分去渣服

○第四十二問陰崩陽崩何以別之

答曰夫血氣之行外行經絡內榮腑臟皆衝任二脈之所主也倘若勞傷過度致腑臟俱傷衝任經

次科百問

虛不能約制其血故忽然暴下謂之崩下經云三焦絕經名曰血崩

而赤者謂之陽崩受冷而白者謂之陰崩其日者形如涕赤者形如絳黃者

形如爛瓜青者形如藍色黑者形如衄血是謂五崩也當與第六問看

陽崩膠艾湯治婦勞傷血氣衝任虛損月水過多淋漓漏下連夕不斷臍腹疼痛

阿膠 炒 川芎 甘草 各二兩 艾葉

當歸 各三兩 白芍 熟地 各四兩

右為飲子每服三錢水一盞煎六分去滓熱

服空心食前甚者連夜並服之

黃芩散治崩中下血

黃芩為末每服一錢燒秤鎚酒調下崩中多是止血藥此法治乘陰經所謂天暑地熱經

水沸溢者也

陰崩固經丸治婦人衝任虛弱月候不調來多不斷淋漓不止

艾葉 炒 鹿角霜 伏龍肝 各等分 乾薑

右為末溶鹿角膠和藥乘熱丸梧桐子大食前淡醋湯下五十九

次科百問

赤龍丹治崩漏不止餘血作痛

禹餘糧 烏賊骨 鹿茸 龍骨

乾薑 當歸 石燕子 阿膠 炒

右等分為末酒醋糊丸桐子大每服五十九溫酒下艾醋湯亦得

○第四十三問眠臥多汗者何也

答曰盜汗者因眠臥而身體流汗也此緣陽虛所致久不已令人羸瘦心虛不足亡津液故也診其

脈虛弱細微皆盜汗脈也

大建中湯治熱自腹中或從背脊漸漸蒸熱或

婦人經水不調

黃芪 遠志 當歸

龍骨 人參 甘草

吳木

右為麤末 每服五錢 水二盞 薑三片 棗一枚 擘破 人飴少許 煎一盞 食前溫服

黃芪飲子 治婦人血氣不足 夜間虛乏 有汗倦

急者

黃芪 五味子 當歸 白茯苓

白芍 遠志 麥子 一方用麥門冬

婦人百問

人參 吳木 甘草

右咬咀 每服三錢 水盞半 薑三片 煎七分 去滓 溫服 不拘時 神驗

加味理建湯 治男子婦人夜多盜汗 并便濁者

此方昌國州方順齋傳到 經驗

乾薑 吳木 人參 黃芪

白芍 肉桂 甘草 牡蠣

浮麥 當歸

右件咬咀 每服水二盞 薑五片 棗一枚 煎八

分 食前熱服 渣再煎

第四十四問 左脇痛如刀刺 不得喘息者 何也

答曰 肝居脇之左 以藏血 鍼經云 邪在肝 兩脇痛

葉氏云 左脇偏痛者 絲經絡偏邪 客於傍之故也

人之經絡 旋環於身 左右表裏 皆周遍 若血氣調

和 不生虛實痛證 或偏者 邪傷之也 其左脇痛如

刀刺者 則知其邪偏客於左也 甚者 不得喘息也

醋煎散 治婦人血氣腹脇刺痛

良薑 當歸 肉桂 白芍

陳皮 烏藥 右為細末 每服三錢 水醋各半 薑煎七分 通

婦人百問

口服

趁痛散 治血氣刺痛 起於一邊 或左或右 行環

上下 或在肌肉之間 如錐刀所刺 其氣不得息

蓬朮 官桂 檳榔 芫花

附子 細辛

右為飲子 每服三錢 水盞半 煎七分 去滓 溫

服 薑棗同煎

○第四十五問 積聚之病 何以別之

答曰 積聚者 絲陰陽不和 腑臟虛弱 受其風邪 搏

於腑臟之氣 所為也 積者 五臟所生 聚者 六腑所

生。然陽化氣。氣屬於六腑。陰成形。形主於五臟。陽則動而不息。故聚者始發無根本。上下無所留止。其痛無常處。故謂之聚也。陰則定而守住。故積者始發有常處。其痛不離其部。上下有所終始。左右有所窮處。乃謂之積也。積脉陰沉而伏。象陰體之沉靜。聚脉陽浮而動。法陽性之浮高。然積病有五。隨其五臟相傳而生焉。經云。在肝則曰肥氣。在心則曰伏梁。在脾則曰痞氣。在肺則曰息賁。在腎則曰奔豚。故曰積聚之病。此可別也。

女科百問

周旋痛不可忍

鱉甲	官桂	各一兩半	蜂房	半兩	川椒
細辛	人參	苦參	丹參		
沙參	吳茱萸	各十銖	麝蟲	乾薑	
牡丹皮	附子	水蛭	皂角	一本	牛
當歸	赤芍	甘草	防葵	各一兩	
蟻蛸	大黃	黃蟲	玄參	十八銖	

右為細末。蜜丸。桐子大。每服七丸。溫酒下。日三服。加之以効為度。

沒藥散。治婦人一切血氣臍腹撮痛。

血竭	別研	肉桂	當歸	蒲黃
紅花	木香	沒藥	玄胡索	
乾漆	炒令烟出盡	赤芍	各等分	

右為末。每服二錢。熱酒調下。食前。

紫金散。治婦人血氣不和。血塊疼痛。常服煖子宮。通經絡。

女科百問

橘紅	枳殼	肉桂	玄胡索
甘草	各兩	紫金牛	五兩
香附	各三兩	南木香	半兩

右為末。婦人室女月水不調。久閉羸瘦。蘇木煎湯調下。白雞冠花末煎酒調下。亦得。每服一匙。常服安胎養氣。臨產橫逆。葱白煎酒下。血氣脹滿。催生下死胎。煎枳殼酒下。地榆末煎酒下。亦得。產後血運。頭旋中風。口禁。惡露發動。虛腫。豆淋酒下。產後惡血不止。血海衰敗。赤白帶下。胞漏。棕櫚灰酒下。綿灰亦得。胎氣絞刺。肋脇腹肚疼痛。炒薑酒下。心氣不足。陳皮湯下。產後敗血停積。攻刺腰痛。無灰酒下。日午臨睡三服。忌生冷滯藏。毒魚。

○第四十六問。身體常癢痒者。何也。

身癢痒者。是體虛受風。風入腠理。與血氣相搏。而俱往來。在皮膚之間。邪氣散而不能衝擊。故但癢痒也。仲景云。痒者名泄氣風。久久成癩。癩亦繇體虛受風邪之所致也。

胡麻散。治脾肺風毒。攻衝通身。皮膚癢痒。或生瘡疥。或生癩疹。用手搔時。浸淫成瘡。久而不愈。而復作。面上遊風。或如蟲行。紫癩白癩。頑麻等風。或腎臟風。攻注腳膝。生瘡。並宜服之。

胡麻三兩 苦參二兩 何首烏二兩
甘草二兩 荆芥三兩 歲靈仙一兩
女科百問

右為細末。每服二錢。薄荷湯茶點。食後服。或酒調蜜。亦得。服此後。頻頻洗浴。得出汗。而立効。

苦參丸。治心脾積熱。腎臟風毒。攻於皮膚。時生癩癩。癢痒難忍。時出黃水。及大風手足爛壞。眉毛脫落。一切風疾。並皆治之。

苦參四兩 荆芥去梗
右為細末。水糊丸。如桐子大。每服二十丸。好茶吞下。或荆芥湯食後。

○第四十七 問夜與鬼交者。何也

答曰。人有五臟。臟有七神。臟氣盛則神強。外邪鬼魅不能干犯。若攝養失節。而血氣虛衰。鬼邪侵損。故婦人夢中多與鬼魅交通。其狀不欲見人。如有對忤。并獨言獨笑。或時悲泣者。是也。其脉來遲。或如鳥啄。顏色不變。皆邪物病也。說今宮中人。尼師寡婦。曾夢中與鬼魅交通。邪氣懷感。久作癥瘕。或成鬼胎。往往有之。

茯神散。治婦人風虛。鬼神交通。妄有所見聞。語言雜亂。
茯神一兩 茯苓 人參 菖蒲各一兩
女科百問

赤小豆半兩
右取豆。每服三錢。水一盞。半煎六分。去滓。溫服。食前。

治女人與鬼神交通。獨言獨笑。或悲。或思。或謳。或恍惚。
松脂三兩 雄黃一兩
右二味。用虎爪攪勻。丸如彈大。夜內籠中燒之。令女裸坐籠上。彼急自蒙。唯出頭耳。過三薰。即斷。

秦丞相灸法。狐魅神邪。及癩狂病。諸般醫治不

差者以併兩手大拇指用絲繩急縛之灸三壯艾著四處半在甲上半在肉上四處盡燒一處不燒其疾不愈神効不可量也小兒胎癩驚癩一依此法灸之一壯炷如小麥妊癩亦妙黃帝灸法治療神邪鬼魅及癩狂病言語不擇尊卑灸上唇裡面中央肉弦上一壯炷如小麥子大用鋼刀決斷更佳也

○第四十八問大小便不通者何也

答曰大腸者傳導之官變化出焉傳者傳其不潔之物也上與肺合膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣化者化其溲便之泄注也內與腎合或臟腑不和榮衛不調使陰陽二氣失升降之道致大小二腸為秘結之患巢氏云熱則秘結寒則

鴨澹熱搏於大腸則大便不通熱結於小腸則小便不通令大小便不通者是大小二腸受客熱所結也小腸受熱化物不出是致膀胱不能使溲也故便血尿血者皆絲熱之所使也

枳杏丸治臟腑堅秘澀少

杏仁一兩湯泡去皮尖別研 枳殼二兩先研為末
右為細末神麴糊為丸桐子大每服四十或

五十九丸食前米飲薑湯下

麻仁丸治津液虧少大便結秘

麻仁二兩去皮 枳實四兩去白 芍藥四兩

大黃兩 厚朴兩 杏仁兩

右為末蜜丸桐子大米飲下二十九未通加

至三十九

石葦飲子治氣淋小遺澀痛

石葦浸剝皮 瞿麥

木通各一兩

陳皮 茯苓 芍藥 桑白皮

人參 黃芩各三分

文科百問

右為細末每服二錢水一盞半薑五片煎七分去滓溫服咳阻亦得

真珠丸常觀血之流行起自於心聚之於脾藏

之於肝此三經者皆心血所係之處也若三經

守節則血濡養而安和苟一臟有傷則血散溢

而為咎指迷方云小便赤色不痛不澀者非熱

非淋絲經氣乘心心氣散溢無所歸滲入下

經故治之多用心藥宜服真珠丸

真珠母未鑽者三分 栢子仁研當歸各一

人參 沉香兩 酸棗仁皮研

熟地酒浸洗蒸 茯苓去木

右為細末蜜丸桐子大辰砂為衣每服四二九加至五十丸金銀薄荷湯下日午臨臥時各一服

○第四十九問帶下三十六疾者何也

答曰帶下者絲勞傷過度損動經血致令體虛受冷風冷入於胞絡搏其血之所成也諸方說帶下三十六疾者是十二癥九痛七害五傷三因謂之三十六疾也十二癥者是所下之物一者如膏二

女科百問

五六十四

音如青三者如紫四者如赤皮五者如膿痂六者如豆汁七者如葵羹八者如凝血九者如青血血以水十者如米汁十一者如月流十二者經度不悉期也九痛者一者陰中痛傷二者陰中淋痛三者小便刺痛四者寒冷痛五者月氣滿痛七者汗出陰中如蟲嘯八者脇下皮膚痛九者腰痛七害者一者害食二者害冷三者害氣四者害勞五者害房六者害熱七者害睡五傷者一者腹吼痛二者陰中寒熱三者小便急四者藏不仁五者子門不正引背痛三因謂

一本或一者月水閉塞不通其餘二固者文闕不載三因方論云三固者形羸不生肌內斷緒不產經水閉塞各品雖殊無非血病多因經絡失於調理產幕不善調護內作七情外感六淫陰陽勞逸飲生冷遂致榮衛不和新陳相干隨經敗濁淋露凝為癥瘕流溢穢惡痛害傷痼犯時微若秋毫作病重如山岳古人所謂婦人病比男子十倍難治而張仲景所說三十六種疾皆錄子臟冷熱勞損而夾帶起於陰內也條目混混與諸方不同但仲景義最玄深非愚淺者能解恐其文雖異而義同也

女科百問

五六十五

養氣活血丹治勞傷衝任帶下異色

大艾葉炒焦取細末 乾薑炮細末

右二條用好醋二升半無灰好酒二升生薑

自然汁一升艾葉末同調於銀器內慢火熬

成膏方入後藥末

附子三兩 白芍 白朮 椒紅各二兩半

川芎 當歸 紫巴戟去心搗末

人參 五味子各兩

右為細末入前藥膏子并炒熟白麵二兩半

同和勻為劑。入杵臼內搗千下。丸如桐子大。每服五十九。溫酒或米飲。食前任下。紫桂丸。補益血海。治衝任氣虛。經脈不調。或多或少。腰疼腹冷。帶下崩漏。

禹餘糧火煨醋淬 龍骨 艾葉醋炒

牡蠣 赤石脂 地榆各二兩 厚朴

牡丹皮 阿膠蛤粉炒 當歸 白芷

吳茱萸湯洗七次 肉桂各一兩 附子半兩

右為細末。麩糊丸。桐子大。每服三十九。濃煎艾醋湯空心下。常服。

女科百問

上六十六

○第五十問。婦人有帶下。或淋漓不斷。何以別之。答曰。產戶有三門。一曰胞門。二曰龍門。三曰玉門。衝任二脈行於中。已產者屬胞門。未產者屬龍門。未嫁者屬玉門。病源云。陰陽過度。勞傷經絡。故風冷乘虛而入胞門。損衝任之經。傷太陽少陰之氣。致令胞絡之間。穢液與血相稱。兼帶而下。冷則多白。熱則多赤。久而則為淋瀝之病也。大補益當歸丸。治婦人諸虛不足。

當歸 續斷 乾薑 阿膠

甘草 川芎各一兩 吳木 吳茱萸

附子 白芷 芍藥 官桂
地黃各一兩半
右為細末。麩糊丸。如桐子大。每服五十九。溫酒或鹽湯下。食前。

女科百問目下

第五十一問男女受形之始何以別之

第五十二問何以謂之有娠

第五十三問何以謂之居經

第五十四問婦人居經之後心中憤悶不欲執

第五十五問居經之後或復有漏下

第五十六問胎在腹中時時撞動不安

第五十七問何以謂之子滿

第五十八問妊娠三月曾經墮胎至其月復墮

女科百問

第五十九問大小便不通

第六十問妊娠傷寒與常人傷寒治法同異

第六十一問妊娠傷寒差後復發熱

第六十二問時氣溫病皆能損胎

第六十三問妊娠傷熱或因暑氣有不因暑氣而得之

第六十四問下痢與滯痢何以別之

第六十五問喘病何以得之

第六十六問妊娠多痰者緣何而生

第六十七問妊娠霍亂

第六十八問何謂子煩

第六十九問何謂子嗽

第七十問何謂胸痺

第七十一問何謂子癰

第七十二問胎痿過年不在又兩胎一生一死

第七十三問妊娠隨胎或血出不止或血不出

第七十四問何以謂之子淋

第七十五問小便或有利或不利或不通

第七十六問大便或痢或秘

第七十七問妊娠至八九月兩脚俱腫

第七十八問妊娠十月難產之法

第七十九問橫生逆產

第八十問熱疾胎死腹中

第八十一問胎衣不下

第八十二問難生

第八十三問產後血暈

第八十四問產後口乾痞悶

第八十五問產後乍寒乍熱

第八十六問產後四肢虛腫

第八十七問產後乍見神

第八十八問產後不語

第八十九問產後腹痛又瀉痢

第九十問產後遍身疼痛

第九十一問產後大便秘澀

第九十二問產後血崩

第九十三問產後腹脹悶滿嘔吐不定

第九十四問產後口鼻黑氣起及鼻衄

第九十五問產後喉中氣息喘

第九十六問產後中風

第九十七問產後心痛

女科百問

第九十八問產後熱悶氣上轉為脚氣

第九十九問產後汗出多而變虛風

第一百問產後下血多虛弱

女科百問卷下

○第五十一問男女受形之始何以別之

答曰男女之合二情交暢陰血先至陽精後至

開裏精精入為骨而男形成矣陽精先入陰血後

滲精開裏血血入為本而女形成矣陽氣聚面故

男子面重溺死者必伏陰氣聚背故女子背重溺

死者必仰鳥獸溺死者伏背皆然陰陽均至非男

非女之身精血散分駢胎品胎之兆父少母老產

女必羸母壯父衰生男必弱古之良士也者首察

乎此氣受偏疾與之補之補羸女則養血壯脾補

女科下問

弱男則壯脾節色羸女宜及時而嫁弱男宜待壯

而婚此疾外所務之本不可不察也

○第五十二問何以謂之有娠

答曰經云經候一月日後覺不通診其脈理平和

婦無他疾欲作胎也脈經云有一婦人來診自道

經斷不來師言一月為胎二月為始膏三月為居

經今既居經正是為作胎也

人參九養陰生血補虛

人參 鹿角膠 熟地 川芎

白芍 當歸 白朮 各二兩

右爲細末蜜丸桐子大每服三十九空

飲下

○第五十三問何以謂之居經
答曰陽施則別陽者氣也陰化則搏陰者血也二
情交暢血氣和調故令有子也經云肝主藏血故
一月謂之血凝陰氣方始凝結足厥陰肝經養之
肝與膽合二月爲之肝兆未成器猶之肝也足少
陰膽經養之三月陽神爲魂乎心主胞經絡養之
且經者常也天真之氣與之流通故三旬一見今
既三月不行所以謂之居經也

女科百問

白朮散調補衝任扶養胎氣治妊娠宿風有冷
胎痿不長或失於調理動傷胎氣多致損墮懷
妊常服壯氣益血保護胎藏

牡蠣三分

白朮四分

芎藭四分

蜀椒去目及閉口者

右爲細末每服二錢溫酒空心調服

內補當歸丸

熟地酒浸洗九

當歸去蘆洗切焙

蜜丸桐子大

每服五十九溫酒下

予嘗觀許學士論枳殼散四物湯內補當歸丸

丸此三方皆載之在人用之何如耳大率妊
娠惟在抑陽助陰素問云陰搏陽別爲之有
子蓋關前爲陽關後爲陰尺中之脈按之搏
手而不絕者妊子也婦人平居陽氣微盛無
害及其妊子則方閉經遂以養胎若陽盛搏
之則經脈妄行胎乃不固素問所謂陰虛陽
搏謂之崩也抑陽助陰之方甚多然胎前藥
唯惡羣隊若陰陽交雜別生他病惟是枳殼
散所以抑陽四物湯所以助陰故爾枳殼散
差寒若單服之恐有胎寒腹痛之病以內補

女科百問

丸佐之則陽不致強陰不致弱陰陽調和有
益胎嗣此前人未嘗論及也

四物湯

當歸

熟地

白芍

川芎各等分

右咬咀每服四錢水二盞煎八分去滓溫服
不拘時

枳殼散

枳殼二兩

甘草一兩

右爲細末每服二錢百沸湯點服空心食前
三服

○第五十四問婦人居經之後心中憤悶不欲執
作惡聞食氣者何也

答曰妊娠心中憤悶頭暈四肢煩痛懈墮不欲執
作惡聞食氣欲噉鹹酸果實多睡少起者世云惡
食又云惡字是也乃至三四月以上大劇者不能
自勝舉也此緣婦人元本虛羸血氣不足腎氣又
弱兼當風飲冷太過心下有痰水水漬於臟故心
煩憤悶氣挾而嘔吐也挾風則頭目暈此名惡阻
所謂墮者經血既閉痰水積於中阻其臟氣不得
宣通也

女科百問

竹茹湯治初有妊擇食嘔逆頭痛顛倒寒熱煩
悶

陳皮 人參 白朮 麥門冬各一兩

甘草炙一錢 厚朴 茯苓各半兩

淡竹茹先刮下臨煎旋入一本有淡竹一錢

右咬咀每服四錢水盞半入薑竹茹各一塊
如粟大拍破同煎八分頓服去滓溫服

茯苓丸治妊娠阻病心中煩憤頭目眩重惡聞
食氣嘔逆吐悶

葛根 枳殼 木 甘草炙

赤茯苓 人參 乾薑 肉桂

陳皮 半夏各一兩

右為細末蜜丸桐子大每服五十九溫米飲
空心送下

小地黃丸治妊娠酸心吐清水腹痛不能飲食

人參 乾薑炮各等分

右為末用生地黃汁丸桐子大每服五十九
食前服

半夏茯苓湯治妊娠惡阻心中憤悶頭目眩暈
四肢怠惰百節煩疼痰逆嘔吐嫌聞食氣好噉

女科百問

酸鹹多臥少起不進飲食

半夏 白茯苓 熟地酒浸各一兩

陳皮 細辛 人參 芍藥

川芎 紫蘇 桔梗 甘草以上各二兩二錢

右每服四錢水二盞薑七片煎七分空腹服
有熱煩渴口生瘡者去陳皮細辛加前胡知

母腹冷下痢者去地黃入桂心胃中虛熱大
小便秘澀者加大黃一兩八錢去地黃加黃

芩

四七湯治同前方見二十八問中

二陳湯治妊娠惡阻產後飲食不進

半夏

陳皮各五兩

白茯苓三兩甘草二兩

右咬咀每服四錢水盞半薑七片烏梅一枚

煎六分去滓熱服不拘時

白朮散治妊婦宿風冷胎痿不長或失於膝理

動傷胎氣多致損胎等疾

牡蠣

二錢蜀椒去目炒出

白朮各四錢芎藭各四錢

右為細末每二錢溫酒空心服腹痛加白芍

藥心毒痛加川芎心煩嘔吐加細辛一兩半

夏五十粒消渴者以大麥汁調服兼治室女

女科百問

帶下諸疾常服則保護胎藏

人參散治初妊惡食嘔吐痰逆

人參

兩枳殼炒

厚朴半兩甘草半兩

右為細末每服二錢白沸湯調下空心食前

日三服

嚴氏第十三問妊娠頭目眩視物不見腮項結核

者何也曰蓋因胎氣有傷肝臟毒熱上攻太陽穴

痛嘔逆背項拘急致令頭暈生花若加涎壅危在

片時宜急服消風散主之

消風散

石膏

甘菊花

防風

荆芥穗

羌活

熟羊角

川芎

大豆黃卷

當歸

白芷各一兩

甘草各一兩

右咬咀每服四錢水盞半入好茶半錢煎八

分通口服食前

○第五十五問居經之後或復有瀉下者何也

答曰衝任二脈為經血之海皆起於胞中手太陽

小腸手少陰心經互為表裏作胞之際壅之以養

胎既產之後積之為乳汁或衝任氣虛不能制其

經血故妊娠數月經水不調時下者此名漏胞漏

女科百問

不止則驚

止漏散治妊娠漏胞

熟地

四兩

乾薑二兩

右為細末每服二錢空心米飲調下

又方益智不拘多少為細末米飲下次用香附

甘草為末醋糊丸用四物湯去地黃理中湯去

乾薑煎吞下二三十丸甚妙

阿膠散治胎動不安及漏胎腹中痛

阿膠

兩蛤粉

熟地

桑寄生各一兩

龍骨

當歸

甘草

白茯苓

白朮兩一 芎藭錢三 乾薑半兩炮製

右咬咀每服四錢水盞半棗三枚煎六分去滓熱服不拘時

佛手散治婦人妊娠五七月因事築磕着胎或子死腹中惡漏下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則疼止子母俱安若胎損立便逐下安胎者不用酒

當歸兩六 川芎兩三

右為蠶末每服三錢水一盞煎令泣泣欲乾投酒一盞半止一沸去滓溫服口噤灌之如

女科百問

人行七里再進不過兩三服服之便生

膠艾湯 娠不問深淺月數因頓仆胎動不安腰腹中痛通血或從口出或有所下或胎奔上刺心短氣安胎

熟地兩 白艾炒 當歸 甘草炙

芍藥 川芎 阿膠炒各

右咬咀每服水一盞半煎七分去滓熱服中逆冷加生薑五片棗三枚煎服食前若虛人加黃芪一兩

桂枝茯苓湯治宿有癥瘕妊娠經斷未及三月

即動此瘕也經斷三月而漏下不止胎動在臍

上者為癥瘕害當去其癥又論云妊娠六月胎動者前三月經水利時胎下血者後斷三月也所以血不止瘕不去故也

桂心 白茯苓 牡丹皮 桃仁炒

白芍藥

石為細末煉蜜丸如彈子大每服一九溫酒或米飲湯食前細嚼下

嚴氏第三問胎漏經血妄行者何也答曰妊娠或成形胎息未定或因房室驚觸勞力過度動傷胎

女科百問

胞或食毒物致令子宮虛滑經血淋瀝若不急治敗血湊心子母難保月漸胎乾危亾不久

桑寄生散治妊娠胎動不安下血不止

桑寄生 當歸酒浸 川續斷酒浸 茯神去木 芎藭 香附 阿膠蛤粉炒 白朮各

人參 甘草炙各

右咬咀每服四錢水盞半薑五片煎七分熱服不拘時

○第五十六問胎在腹中時時撞動不安者何也答曰懷則以身依也娠則以時動也若腹中不時

撞動者謂之胎動也多因勞役氣力觸冒冷熱飲
食不適居處失宜輕者止轉動不安重者便致損
墜若母有疾以疾動胎者治母則胎安若胎不固
動致母病者治胎則母差若胎不牢固其胎必致
損也

保安散治妊娠胎氣不安心腹疼痛胎動安胎

當歸一兩 人參一兩 阿膠半兩 蛤粉半兩

甘草半兩

右咬咀每服三錢水盞半葱白一莖拍破煎
八分去滓溫服食前未定再服

女科百問

安胎飲治妊娠偶因所觸或從高墮下致胎動
不安腰中疼痛服此藥後覺胎動處熱即胎已
安

縮砂不拘多少 慢火炒令
熱透後去皮取仁尸

右為細末每服三錢熱酒調下不飲酒者煎
鹽艾湯調下食前

摩氏第一問妊娠兩三月胎動不安者何也曰男
女陰陽會通血氣調勻乃成其孕設若下血腹痛
蓋緣子宮久虛致令胎墮其危甚於正產若妊娠
會受此苦可預服杜仲丸

杜仲去皮剉薑汁 川續斷酒浸各
右為細末棗肉丸桐子大每服七十九空心
米飲下。一日三服

○第五十七問何謂子滿

答曰妊娠之人經血擁閉以養其胎或掩水氣血
水相搏以致體腫皆緣脾胃虛弱臟腑之間宿有
停水之所掩也謂之子滿若水停不去浸漬於胎
則令胎壞診其脉浮腹滿兼喘者其胎必墮也

澤瀉散治妊娠氣壅身體腹脇浮腫喘息促急
大小便秘澀

女科百問

澤瀉 桑白皮 枳殼炒 檳榔

赤茯苓 木通各一兩

右咬咀每服四錢水盞半薑五片煎八分去
滓溫服食前稍稍為度效

木通散治妊娠身體浮腫心腹脹滿小水不通

木通一兩 木香三分 訶梨勒皮三分

香薷一兩 枳殼半兩 檳榔半兩

桑根皮一兩 赤茯苓三分 雞蘇一兩

右咬咀每服四錢水盞半薑五片煎六分去

滓溫服食前

商陸赤小豆湯

赤小豆

乾商陸

各等分

右咬咀每服一兩水一盞煎七分去滓溫服

嚴氏第五問論胎冷腹脹虛痛兩脇虛鳴臍下冷痛欲泄小便頻數大便虛滑者何也曰胎氣既全子形成質或食瓜果甘飲冷不時之物當風取涼受不時之氣則令胎冷子身不能安處皮毛疼痛筋骨拘急手足攣拳致使母有危證急宜服安胎和氣散

訶子

白木

陳皮

良薑

女科百問

木香

白芍藥

陳米

甘草

右咬咀每四錢水盞半薑五片煎七分去滓

溫服不拘時忌生冷

○第五十八問妊娠三月曾經墮胎至其月日復墮者何也

答曰陽施陰化則有胎也若血氣和調胎氣乃成若血氣虛損子臟為風冷所乘致虧榮衛不能養其胎故數墮也假令妊娠三月當于心主包絡經養之不善攝生傷經則胎墮後雖再有妊至其月日仍前犯之所以復墮也又有因墜驚恐或

吐血下血者皆能損胎若妊娠常腰疼者喜墮也蓋腰為腎府女子以繫胎也

地榆散治妊娠損動胎胞下血不止

地榆

乾薑

當歸

龍骨

芎藭

艾葉

阿膠

蒲黃

熟地

黃牛骨

烏鰐骨

白木

右為細末每服二錢以粥飲調下不拘時

卷栢丸治妊娠數墮胎皆因血氣虛損子臟受風冷致令胎不堅固故類有傷

女科百問

卷栢

鍾乳粉

鹿角膠

陽起石

紫石英

熟地

禹餘糧

桑螵蛸

芎藭

當歸

桂心

杜仲

芎藭

當歸

桂心

牛膝

桑寄生

五味子

蛇床子

牡丹皮

玄及

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十九空心

溫酒送下

嚴氏第二論胎動腹痛者何也曰胎動腹痛其理蓋緣飲食冷熱動風母物或因再交搖動骨節傷

犯鹿茸其候多嘔氣不調勻或服執藥太過血氣相于急服順氣藥安胎不然變成漏胎則難療矣如聖湯

鯉魚皮 當歸 熟地 阿膠

白芍藥 川芎 續斷酒浸 甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水盞半入葶根少許薑五片煎七分去滓空心服

○第五十九問大小二便秘結不通者何也

答曰陽虛不能運陰故氣無陰以清其陽則陽獨治而為熱陰虛不能運陽故氣無陽以和其陰則

陰獨治而為厥是以二氣和則氣道平二便順則氣道通今二便秘結明陽氣之獨治也夫人有腑臟氣實而生熱者隨其停積之處而成病也若熱結大腸則大便不通熱結小腸則小便不通若大小便俱為熱所結故煩滿而二便秘閉熱盛則腸胃氣逆冷則變為嘔也

檳榔散治產後大小便秘心腹脹滿氣促

檳榔兩 車前子三分 冬瓜子三分 川大黃一兩 木通兩 桂心兩 甘草炙半兩 當歸兩 滑石兩 川朴兩 硝石兩 者入附

右咬咀每服三錢水盞半煎半盞去滓溫服不拘時

木通散治產後大小便秘澁

木通 大麻仁 葵子一本冬

滑石 檳榔各一兩 枳實半兩 甘草炙半兩

右咬咀每服三錢水盞半煎八分去滓溫服不拘時

嚴氏第四論妊娠而赤口苦舌乾心煩腹脹者何曰蓋緣恣情飲酒因食桃梨羊肉雞麵魚腥蠶毒物等致令百節痠疼大小便秘可服歸涼節命散

川芎 苧根 白芍藥 麥門冬去心

當歸 白木各兩 糯米半合 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水盞半煎九分去滓溫服不拘時

大腹皮散治妊娠大小便不通

枳殼 大腹皮 甘草炙各兩 赤茯苓去皮三錢

右為細末每服二錢濃煎葱白湯調下不拘時服

冬葵子散治妊娠小便不利身惡重寒起則眩

及水腫

冬葵 錢三

赤茯苓 錢二

右為細末每服三錢米飲調下不拘時若利則歇服不通是轉胞加髮灰少許神效曾有妊婦腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫脾胃寬氣去脹等藥服之反吐藥食不內轉加脹滿揆心驗之胎在腹中又服諸下胎藥不能解舉家驚惶因得鯉魚湯論曰脚腫俗呼為皺脚亦有通身腫滿心胸急脹名曰胎水遂去妊婦心前衣服看之胸肚不分急以鯉

女科百問

魚湯四五服大小便皆下惡水腫消脹去方得分免死胎可謂生之幸也此證蓋緣懷身腹大妊婦不自知覺人人皆以為身娠如此終不以為胎水病醫人何以得知故書此論病家當自覺察

鯉魚湯

當歸

白芍藥

去皮各

白木

各

右咬咀每服四錢用鯉魚一尾不拘大小破洗去鱗腸白水煮熟去魚每服魚汁一盞半薑五片橋皮少許煎一盞空心服如胎水去

未盡絕再服

第六十問妊娠傷寒與常人治法同異何如答曰四時有不正之氣如春夏亦有寒溫時秋冬亦有陰暑時是故一歲之中病無長幼率相似者此則時行之氣俗謂之天行若春溫煖而清氣折之則責邪在肝夏應暑而寒氣折之則責邪在心秋應涼而反大熱折之則責邪在肺冬應寒而反大溫抑之則責邪在腎仲景云冬溫之毒與傷寒大異蓋傷寒者因冒寒而作也其候發熱惡寒頭疼腰脊痛其脈浮緊無汗者可發汗宜服麻黃湯

女科百問

脈浮緩而有汗者可解肌宜服桂枝湯切詳麻黃桂枝皆能墮胎以此言之則妊娠傷寒常人之治法大不相侔也

十全散即敗毒散又名人參羌活散治傷寒瘧疫

人參

白茯苓

羌活

獨活

甘草

川芎

枳殼

柴胡

白木

桔梗

各等

右咬咀每服三錢水盞半薑五片薄荷七葉煎七分熱服如頭疼發熱連二服汗出即愈

阿膠散治妊娠婦傷寒安胎

阿膠 桑寄生 吳白朮 人參各等分

右為細末每服二錢煎糯米飲調下不拘時

單胎散 捲荷葉一兩焙乾 蚌粉花

右為細末每服二錢入蜜少許新汲水調下食前服

嚴氏第十問妊娠婦外感風寒渾身壯熱眼暈頭眩者何曰蓋因風寒客於皮膚傷於榮衛或洗頭背或當風取涼致令頭目昏痛增寒發熱甚致心

胸煩悶大抵產前二命所以不可輕易妄投湯劑感冒之初止宜進芎蘇飲以發散表邪其病自愈芎蘇飲

川芎 紫蘇葉 白芍藥 白朮

麥門冬 陳皮 乾薑各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水盞半薑二片葱白一寸煎八分溫服不拘時

○第六十一問妊娠傷寒差後復發熱者何也答曰傷寒差後發熱者何此名勞食復也內經云多食則復食肉則復緣病差後氣尚虛津液未復

因勞動生熱氣既還復入經絡名曰傷寒差後更發熱者小柴胡湯主之解脈沉者以下解又傷寒差後勞傷湯主之千金方勞復起死人參麥門復者大病新差脾胃尚弱穀氣未復食過多停積不化因爾發熱名曰食實梔子湯證云若有宿食內加大黃五六枚服之愈

枳實梔子湯

枳實一枚去穢 梔子三枚 豉半升

右以清漿水二盞半煎九分下豉再煎五六沸去滓溫服覆令汗出若有宿食加內大黃如博棊子大五六枚服之日煎服之

○第六十二問時氣溫病皆能損胎者何也

答曰陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣凜冽此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒若傷於寒者凡名傷寒耳其一歲之中長幼之病多相似者故各時行之氣也其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最盛殺厲之氣中而即病者名曰傷寒不

節病寒毒藏於肌膚至春變而為溫病至夏變而為暑病暑病者熱極重於溫也詳此三證皆因寒氣而受邪寒極生熱熱氣薰其胎故損也

單胎散 見六十問中

人參羌活湯治妊娠感冒發熱頭疼身體痛

白茯苓 羌活 獨活 前胡

芎藭 枳殼炒 桔梗 人參各一兩

甘草炙半兩 乾葛 陳皮各一兩

右為細末每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎七分去滓溫服

女科百問

黃龍湯治妊娠瘟疫寒熱頭痛嘔不飲食

脇下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱

如瘧

柴胡 黃芩 甘草 人參各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水盞半煎八分去滓溫服不拘時

治妊娠患時疾

黃芩尖者出錐鬱金

右為細末每服一錢板藍根

出効未愈再服即愈 黃水調下汗

治妊娠患時疾

雞子 陰井底泥上隔宿飯出吞之必無虞矣

○第六十三問妊娠寒熱或因暑氣者有不因暑暑而得之者何也

答曰瘧者寒熱之疾皆緣風寒入中也夫風為陽邪陽化氣而為熱寒為陰邪陰化氣而為寒陰陽上下交爭虛實邪正更作或陰併於陽則陰實而陽虛若陽併於陰則陽實而陰虛或先傷於寒而後傷於風其為候也則先寒而後熱或先傷於風而後傷於寒其為證也則先熱而後寒休作有時

女科百問

與傷寒頗異者故名為瘧也經曰夏傷於暑秋必病瘧者此因暑氣之所傷也若妊娠寒熱者皆緣血氣虛損風邪乘之致陰陽關隔寒熱互見也經云陽微惡寒陰弱發熱若此之類皆緣虛之所致此不因暑氣之作也若熱極不已則傷胎

大安散治脾胃寒如瘧發熱無時

草豆蔻 七箇和皮細切 厚朴 半兩 烏梅 十箇去核仁

甘草 人參 各一分 大棗 十枚 肥薑 一分

陳皮 七箇全者洗淨切 良薑 一分

右共剉拌勻分作五裹先以鹽水蘸紙濕裹

煨香熟第一服一棗水一盃煎一盞溫服第二服用二棗并煎滓以水二盃煎一盞溫服第三服用三棗并煎滓以水三盃煎一盞作兩服並空心食前溫服

常山 竹葉各半 人參 石膏各一兩

糯米一百粒

右為咬咀每服三錢水盞半煎八分去滓通口服不拘時

地黃丸治寒熱類瘧久之為勞

女科百問

生地二兩 柴胡一兩 秦艽 黃芩各半兩

赤芍

右為細末蜜丸桐子大每服三十九烏梅湯下不拘時

清肌湯治頭目昏重不悅頰赤口燥咽乾發熱盜汗飲食減少

甘草炙半兩 草果仁錢五 當歸炒 白朮一兩

白茯苓 芍藥 柴胡各一兩 川芎半兩

右咬咀每服三錢水一盞半櫻薑一塊切碎薄荷少許煎七分去滓熱服不拘時

第六十四問下利與滯利何以別之

答曰春傷於風邪氣運留遇腸胃虛弱風邪因時傷之腸虛則泄故為水穀之痢也或腸虛受熱氣者下痢則赤受冷氣者下痢則白冷熱相交其痢如魚腦鼻涕相雜連滯不已者謂之滯痢也

香連丸治泄痢不止

木香 黃連 吳茱萸 白芍各等分

右為細末麵糊丸桐子大每服二十九濃煎米飲湯下空心日三服

妊娠下痢不止

女科百問

黃蘗 乾薑 赤石脂各二兩 酸榴皮具

右為麤末每服五錢水盞半煎六分去滓食前溫服

赤石脂散治腸胃虛弱水穀不化冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛肢體困倦飲食減少

赤石脂 甘草各二兩 肉豆蔻仁十兩 砂仁五兩

右為細末每服二錢溫粟米飲湯下食前歸連丸治一切下痢無以新久及冷熱膿血腸滑裏急日夜無度臍腹絞痛不可忍

阿膠搗碎炒如珠三兩 黃連以醋四升煮成膏

也

神秘湯。治夜不得臥。臥則喘。此錄水氣逆行。上乘於肺。肺得水則浮。而開使氣不得通流。其脈沉大。

陳橘皮湯洗

生薑

紫蘇葉

人參

桑白皮

各半

右為飲子。每服三錢。水盞半煎八分。去滓溫服。

服

平肺湯。治喘急。

天門冬

去心

馬兜苓

百部各半

女科百問

右為麤末。每服五錢。水盞半煎八分。去滓溫服。

服

○第六十六問。妊娠多痰者。緣何而生。

答曰。痰因飲生也。氣道壅滯。津液不通。水飲氣滯。停於胸膈。結而成痰。人皆有之。少則不能為害。多則成病。乃至嘔吐。妊娠嘔吐甚者。多傷胎也。

細辛五味子湯。治痰飲壅滯。

細辛

五味子

白茯苓

人參

白朮

甘草

乾薑

各一兩

右為飲子。每服三錢。水盞半煎八分。去滓溫服。

後

赤茯苓湯。治妊娠嘔噦。心下滿。胸膈開。宿食不化。水停。水心悸。

赤茯苓

人參

陳皮

芎藭

白朮

半夏

各半

右為飲子。每服四錢。水盞半薑五片煎七分。去滓溫服。不拘時。

○第六十七問。妊娠霍亂者何也。

答曰。陰陽不順。清濁相干。氣射中焦。名曰霍亂。本因飽食豚膾。復啖生冷。或飲寒漿。眠臥冷席。風冷之氣傷於脾胃。諸食結而不消。陰陽二氣壅而不交。錯於中。變成吐痢。邪在於上者。先心痛而吐。邪在於下者。先腹痛而痢。心腹俱痛。吐痢並發。挾風者。身熱頭痛。冒暑者。吐痢冷飲。若不已。則百脈皆亂。榮衛俱虛。冷搏於筋。令人轉筋。邪干於胎。其胎必損。揮霍之間。便成繚亂。故名霍亂也。

白朮散。治產後霍亂。吐痢腹痛。煩渴。手足逆冷。

白朮

麥門冬

陳皮

乾薑

人參

甘草

各一兩

右為麤散。每服四錢。水盞半薑五片煎六分。

去滓溫服不拘時

寒者理中湯治裏寒外熱霍亂吐痢手足厥冷胸脾心痛逆氣結氣

丁香兩 人參 甘草 白木

乾薑兩

右為飲子每服三錢水盞半煎八分去滓空

心稍熱服

丁香散治霍亂吐痢不止

丁香 桂心 白木各半兩 訶梨勒

厚朴 高良薑 附子各三分 木瓜乾者

女科百問

陳皮各一兩

右為細末每服二錢米飲調下不拘時

渴者五苓散治霍亂吐痢躁渴引飲

澤瀉兩 白木 猪苓各三兩 肉桂二兩

赤茯苓兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖

多飲熱湯有汗即愈

參苓白朮散治胃氣不順吐痢止後躁渴不解

乾薑兩 人參 白茯苓各一兩

木香分 甘草分 藿香分

右為麤末每服二錢水盞半煎七分去滓服不拘時

香薷飲治清濁相干霍亂吐痢

香薷兩 厚朴 黃連各二兩

右為飲子每服三錢水盞半煎七分去滓用

新汲水頻頻頓極冷服之藥冷則効速也

○第六十八問何謂子煩

答曰煩有四證有心中煩有胸中煩有虛煩有子

煩諸如此者皆熱也若藏虛而熱氣乘心則冷心

煩但煩熱而已別無他證者名曰虛煩若積痰飲

女科百問

而嘔吐涎沫者謂之胸中煩或血飲停積虛熱相

搏以其妊娠而煩故謂之子煩也

犀角散治妊娠心煩熱悶

犀角屑 地骨皮 黃芩 麥門冬

赤茯苓各一兩 甘草炙半兩

右為飲子每服四錢水盞半煎八分去滓入

竹瀝一合更煎數沸溫服不拘時

當歸飲子治妊娠胎動心煩熱悶

當歸 芍藥 阿膠 豆豉

桑寄生各半兩 葱白七莖

右為飲子每服三錢水二盞煎八分去滓溫服不拘時

竹瀝湯療妊娠常苦煩悶此子煩也

竹瀝二兩 防風三兩 黃芩三兩 茯苓四兩

麥門冬三兩

右為飲子水四升合竹瀝煮取二升半分三服不差重作

○第六十九問何謂子嗽

答曰肺主氣外合皮毛風寒外感入射於肺故為咳也有涎者謂之嗽無痰者名曰咳夫五臟六腑

俱受氣於肺各以其時感於寒而為病也秋則肺

受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之長夏則脾受之長夏者夏末秋初也諸藏不已各傳於

肺出妊娠而嗽者謂之子嗽久而不已則傷胎

天門冬半兩 紫苑半兩 知母各一兩 桑白皮一兩

五味子半兩 桔梗一兩

右為飲子每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服有血者如阿膠半兩大便澀而喘者加葶藶半兩

百合散治妊娠咳嗽心胸不利煩悶不安

百合各一兩 紫苑一兩 麥門冬一兩 桔梗一兩

桑白皮各一兩 甘草半兩

右為散每服四錢水盞半入竹茹一分煎八分去滓入蜜半匙更煎三四沸方可不拘時候溫服

緩息丹治肺氣不調痰壅咳嗽上氣喘滿咳嗽唾痰沫日夕不安止

半夏二兩 橘紅五錢 天門冬半兩 杏仁半兩

右三味為末次拌研細杏仁霜煉蜜和每兩分十五丸每服一丸隨津調之食後服

○第七十問何謂胸痺

答曰胸痺者絲寒氣客於臟腑氣上衝心胸下幅滿如滿噎塞習習痺痛飲食不下謂之胸痺也脾

胃漸弱乃至斃人妊婦為患亦損傷胎也

枳實埋中湯丸治結胸欲絕心膈高起手不可近

枳實一兩 白朮一兩 芍藥一兩 甘草半兩 乾薑一兩

白朮一兩 芍藥一兩 甘草半兩 乾薑一兩

右為細末，覆丸如雞子黃大，每服一丸，熱湯化下。連進二三服，胸中豁然，而開瀉者加括

蒞根二兩，下痢者加牡蠣二兩。

桔梗枳殼湯，治痞氣胸滿欲絕。

枳殼湯洗去穢 桔梗各一兩 右剉麻豆大，分二服，水二盞煎一盞，去滓溫服，不拘時。

沈香理氣湯，治氣滯不和，胸膈虛痞。

丁香 檀香 木香各半兩 藿香二兩 甘草二兩 砂仁兩 白豆蔻兩

沈香 烏藥 人參各一兩 右為末，每服一錢，人鹽一字，沸湯點服，不拘時。

調氣丸，治氣道不順，胸膈壅塞。

青皮炒 陳皮炒 木香各一兩 不見火

右各剉碎，用牽牛末四兩炒，牽牛末焦黃，篩去不用，以三味為細末，蜜丸，桐子大，每服五十丸，空心薑湯送下。

○第七十一問：何謂子癰？

答曰：風是四時八方之氣，常以冬至日候之，風從

其方來者，長養萬物，不從其方來者，乃各虛邪。

風體虛之人中之者，隨其虛而為病也。夫五臟六腑之俞，皆在於背，臟腑既虛，則邪乘虛而入，傷其臟腑，所感而發，時能言者可治，不能言者難治。

若傷太陽之經，復遇寒濕相搏，口噤背強，名之曰瘖。故妊娠而發者，悶冒不識人，須臾則醒，醒而復發，名曰子癰。又名子冒，久則成變瘖。妊娠忽悶，服直不識人，須臾醒，醒復發，似不醒者，名曰瘖病。亦號子癰，亦號子冒，以葛根湯。若有竹近，可速辦。當先作竹瀝湯，其竹遠，不可即辦者，當先辦葛湯。此

二物偏療諸瘖，絕可以起死也。小兒忽癰瘖，與金瘡療之，亦驗。作竹瀝法于後。

取新伐青淡竹，斷之，除兩頭節，作片，以塼竝側，令竹兩頭虛，布列其上，燒中央兩頭，汁出，以器盛之，取服。

葛根湯，療妊娠臨月，因發風瘖，忽悶，憤不識人，吐逆，睡少，醒復發，名為子癰。

良母 葛根 牡丹皮去心 防已 防風 當歸 芎藭 肉桂取脂 白茯苓 澤瀉 甘草各二兩 獨活

石膏 人參

右件以水六升煮取三升分三服其具母人易產若未臨月者以升麻代之忌海藻

藥鮮物

○第七十二問胎痿過年不產又兩胎一死一者何也

答曰陽施陰化精盛有餘者則成兩胎脉經云左右脉俱疾為二子又云俱沉實復生二男俱浮大

復生二女且胎之在胞以氣血滋養若寒溫節適血氣強盛則無傷若冷熱失宜氣血損弱則胎痿

女科百問

燥而不育或過年久而不產若雙胎遇寒經養不周故偏天傷候其胎上冷是胎已死如雞乳子熟者為祿寒者多渴正謂此也

乾地黃丸治妊娠氣血虛弱胎氣不長

熟地黃兩一 芎藭兩一 白茯苓 人參

當歸各三分 柴胡兩半 刺薊 桑寄生各半兩

厚朴兩乙 龍骨 阿膠各三分 白石脂三分

黃芪兩半 甘草一分

右為細末蜜和搗二三百杵丸如桐子大每服三十九清粥飲湯送下不拘時

雄黃丸治妊娠是鬼胎致腹中黑血數下腹痛

雄黃研細 累白去毛一本 莽草 升砂研細

巴豆去皮 獺肝炙黃各兩 蜈蚣一枚 蜥蜴一枚

右為細末煉蜜和搗三百杵丸如桐子大空腹溫酒下二丸日進二服服後當下痢如不

痢加至三丸初下清水次下蟲如馬尾狀無數病極者下蛇蟲或如蝦卵雞子或如白膏或如豆汁其病悉愈

白朮散調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風寒胎痿不長或失於將理動傷胎氣多致損墮懷

女科百問

妊常服壯氣益血保護胎臟

牡蠣三分 白朮四分 芎藭四分 川椒去目炒三分

療妊娠兩兒腹中一死一活令死者出生者安此方神驗萬不失一

蟹爪一分 甘草二尺 阿膠兩三

右以棗流水一斗先煮二味取三升內阿膠

令燉頓服不能頓服分再服若人困拘閉口下藥入即活煎藥宜向東以茅葦薪煮之

○第七十三問妊娠墮胎或血出不止或血不出者何也

若曰血寒則凝溫則散。胎損經血山不止有二。一則因熱而流散。二則血氣虛而不斂。瀉血多者必煩悶而死。或因風冷墮胎者。血冷相搏。氣虛逆上。則血結不出。搶上攻心。則煩悶亦多。致死當溫經逐寒。其血自行也。

膠艾湯治勞傷血氣。衝任虛損。月水過多。淋漓漏下。連日不斷。臍腹疼痛。及妊娠將攝失宜。胎動不安。腹痛下墜。或勞傷胞絡。胞阻漏血。腰痛悶亂。或因損動。胎上搶心。奔衝短氣。及因產乳衝任氣虛。不能約制。經血淋漓。瀝不斷。延引日月。

女科百問 漸成羸瘦

阿膠 芎藭 甘草 當歸 艾葉 熟地 白芍 右咬咀每服三錢。水一盞。酒六分。煎八分去滓。稍熱服。空心日服三次。甚者連服併服。伏龍肝散治血氣勞傷。衝任脈虛。經血非時。忽然崩下。或成豆汁。或成片。或五色相雜。或赤白相兼。臍腹冷痛。經久未止。令人黃瘦。口乾。飲食減少。四肢無力。虛煩驚悸。

伏龍肝 熟地 甘草

芎藭 肉桂 當歸 艾葉 赤石脂 右為散每服四錢。水盞半。棗三枚。煎八分。去渣溫服。食前。

當歸散治妊娠猝驚奔走。或從高墜下。腹痛下血不止。當歸 阿膠 芎藭 艾葉 右為飲子。每服四錢。水盞半。煎至六分。次入生薑汁一匙。地黃汁半合。馬通汁半合。更煎。

女科百問 三兩沸。去渣溫服。不拘時。

○第七十四問何以謂之子淋。答曰。腎者作強之官。伎巧出焉。與膀胱為合。男子以藏精。女子以繫胞。啓玄子云。強於作用。故曰作強。造化形容。故曰伎巧。在女則當伎巧。在男則正當作強。夫淋者。腎虛膀胱熱也。腎虛不能制水。則小便數也。客熱乘膀胱。則水行澀澀。而且數。淋瀝不宜。妊娠之人。繫胞於腎。腎患虛熱。成淋。故謂子淋也。

治療妊娠患子淋。小便數而少。或熱痛酸疼。

地膚草二兩以水四升煮取

療妊娠患子淋宜地膚湯

地膚草 車前子各三

知母

黃芩 赤茯苓 赤芍

枳實炙

升麻 通草 甘草炙各

右吹咀每服四錢水盞半煎八分去滓空心

溫服或無地膚葵根汁亦妙

石葦散治產後小便淋瀝溺血

石葦去毛 榆白皮 木通各一 黃芩三

赤芍 葵子各半

女科百問

右為麤散每服三錢水盞半入生地黃一分

煎六分去滓日三四服

○第七十五問小便或有利者或有不通者何也

答曰小腸為盛受之府膀胱乃州都之官啓玄子

云位當孤府故謂都官居下內空故藏津液若得

氣海之氣則能泄注也或受熱滲於膀胱屈伸而

系轉故使小便不通利也或腎胞有冷不能溫制

於水道故小便日夜十數行甚者至於亂夢恍惚

寒者宜大建中湯菴菴丸熱者琥珀散方見指迷

方

華薺丸益腎固氣小便頻數

華薺青鹽三銖水半盞

金毛狗脊三

益智子梗碎鹽

肉苁蓉一兩

兔絲子半兩酒

巴戟半兩 杜仲半兩

黃芪一錢

右為細末酒糊丸如桐子大每服四十九空

心淡鹽湯米湯下

冬葵子散治妊娠胎不安小便淋瀝小肚疼痛

冬葵子炒 柴胡 桑白皮 赤茯苓

赤芍 當歸各等分

女科百問

右為吹咀每服四錢水盞半薑五片葱白七

一寸煎七分去滓溫服

車前子散除下焦熱小便不通淋瀝作痛

車前子 檳榔 木通 陳皮

赤芍 赤茯苓 當歸 滑石

石葦去毛

右吹咀每服五錢水二盞煎一盞溫服以利

為度未利再服食前

忘憂散治心經蓄熱小便赤澀不通淋瀝作痛

琥珀不拘多少

本為細末每服五分濃煎宜草根湯調下

第七十六問大便或利或秘者何也

答曰大腸者傳導之官變化出焉獨受陰陽之氣

化其糟粕傳不潔之道若三焦不調臟腑不和受

熱則津液竭燥腸胃否滯大便不通有寒則腹痛

水穀併下故熱則宜清而通之寒則宜溫而

建中散治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積

不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰涎逆噫氣吞

酸腸鳴泄痢水穀不化肢體倦怠不思飲食

青皮本無棗子一厚朴一

甘草半半夏湯泡洗陳皮八乾薑炮

已上六味用水三斗煮令水盡焙乾

人參去蘆藿香一訶子炮取白木一

草豆蔻一白茯苓一

右為飲子每服二錢水二盞薑三片煎六分
去渣溫服食前
四味換腸丸治便下覺臟腑疼痛泄痢飲食不
美因多思所致或寒氣積遂成其痢一名息痢

白木三訶子炮去核取肉豆蔻三

鍾乳粉一右為細末入鍾乳粉拌麩糊為丸桐子大每

服五十九空心熱水送下止進三兩服便効

熱者服四順飲子治大便不通而赤身熱

大黃一白芍一甘草一當歸各等

右為麤散每服五錢水盞半煎一盞去滓溫

服不拘時

麻仁丸治腸中受風津液燥少往往大便秘

麻仁去皮研枳實四兩白芍四

女料百問 大黃四兩厚朴二杏仁二

右為細末蜜丸梧桐子大米飲下二十九未

通加至三十九

寒者理中湯治腸胃冷熱濕泄瀉注下水穀不

分腹中雷鳴及傷時氣裏寒外熱霍亂吐痢手

足厥冷胸痺心疼逆氣結氣並皆治之
人參一甘草一白木一乾薑炮

肉豆蔻一砂仁各二
右為飲子每服三錢水盞半煎一盞去滓溫

服食前

煮朴丸治臟寒泄痢

北棗半兩 川芎兩四 生薑切片四兩

已上三味水三椀煎乾將生薑厚杵爛入

棗肉一處再杵令細以麻油塗手担如小

錢慢火焙乾入後藥

蒼朮米泔浸 茴香炒 甘草炙 官桂去皮新者

神曲 麥蘖炒淨 蓬朮煨各四兩 砂仁

良薑炒各二兩 肉豆蔻煨二兩 丁香一兩 川薑二兩

右為細末水煮薄糊為丸梧桐子大每服百粒米飲湯下不拘時

豆蔻橘紅散溫脾養胃消穀嗜食

丁香 木香兩 白豆蔻仁 人參

白朮 厚朴 神麩 乾薑炮

半夏曲炒 陳皮白去 藿香葉去土 甘草炙各半兩

右為細末每服三錢水一盞薑三片棗一個煎七分去滓空心溫服

煎七分去滓空心溫服

○第七十七問妊娠至八九箇月兩脚俱腫何也答曰妊娠至八九月腿脚腫者不可為本病治之恐導其真氣見此狀者則知其易產也蓋胞藏水血俱多不致胎燥故云易產也當服順氣滑胎之

身初起而腫者是水氣過多兒未成體恐壞胎

枳殼散養胎氣安和子臟治胎中一切惡疾能

令胎滑易產

枳殼去穢炒 甘草炙一兩

右為細末每服二錢沸湯調服空心入月日

進三服

榆白皮湯滑胎易產治妊娠曾因漏胎去血臨

產驚動太早產未至穢露先下致胎胞乾燥臨

產艱難

女科百問

冬葵子一兩 木通半兩 榆白皮一兩 瞿麥一兩

牛膝去苗酒浸 大麻仁去殼三分

右為麤末每服三錢水盞半煎八分去滓溫服不拘時

服不拘時

救生散安胎益氣易產

人參 呵子濕紙裹煨熟 陳皮炒

白朮炒 大麥肉炒 神曲炒各半兩

右為細末每服二錢水一盞煎六分去滓人

月加一盞用水二盞煎一盞空心溫服服之

能令兒緊小乳母無患

第七十八問 妊娠十月將養之法何如

答曰陰搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脉動甚者妊子也所謂妊者陽既授始陰妊之也娠則以時而動故曰妊娠也
妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥無食腥辛是謂正才

妊娠一月足厥陰脉養不可鍼灸其經足厥陰內屬於肝肝主於筋及血一月之時血行否溢不為力事寢心安靜無令恐畏

女科百問

下四十五

舉重腰疼腹滿飽急猝有所下當預安之宜服

烏雌雞湯

烏雌雞一隻炙如常法食

茯苓二兩

吳茱萸升一

芍藥

人參

白朮各三兩

麥門冬合五

阿膠二兩

甘草兩

右十味咬咀水一斗二升煮雞取汁六升去

雞下藥煎取三升內酒三升并膠烱盡取三

升放溫每服一升日三服

妊娠曾於第一箇月墮胎者入月預服此藥治

之補胎湯

人參 防風 細辛 烏梅肉

白朮各一兩 大麥合一 熟地兩 吳茱萸洗七次

右為飲子每服三錢水盞半薑三片煎七分

去滓空心服寒多者倍細辛茱萸渴者去細

辛加括婁根若有所思去大麥加栝子仁三

合服之

妊娠二月名始膏無食腥辛之物居必靜處男子勿勞百節皆痛是謂胎藏也少陽者膽之脉也主於精二月之時兒精成於胞裏故足少陽養之足

少陽在足小指間本節後附骨上一寸陷中者是

女科百問

下四十五

妊娠二月陰陽居經若有寒多壞不成有熱則萎

萃怯弱中風寒有所動搖心滿臍下脹急腰背強

痛猝有所下乍寒乍熱服艾葉湯

人參 當歸 艾葉 甘草

麻黃去根 丹參各一兩 阿膠炒一兩

右為咬咀每服一兩水盞半棗三枚薑五片

好酒一盞煎一半盞去滓分為二服食前

妊娠曾於第二箇月墮胎者入月預當養其胎

藏服黃芩湯

黃芩 人參 阿膠各一兩

當歸牛兩 乾 吳茱萸 一分 洗 七次

右為咬咀每服三錢水盞半薑三片煎八分

去滓食前如覺大段不安加烏梅一兩

妊娠三月始胎當此之時血不流通形像始化未
有定儀見物而變欲令見貴盛王公好人端正莊
嚴不欲令見傴僂侏儒醜惡形人及猿猴之類無
食薑兔無懷刀繩欲得見男者操弓矢射雄雞乘
肥馬於田野觀虎豹及走犬其欲得女者則箸簪
珂環弄珠璣欲令子美好端正者數視白璧美玉
看孔雀食鯉魚欲令兒多智有力則噉牛肉心食
女科百問

大麥欲令子賢良盛德端心正生消和虛一坐無
邪席立無偏倚行無邪徑目無邪視口無邪言心
無邪念無妄喜怒無得思慮食無到鬱無邪臥無
橫足思欲瓜果噉味酸菹好芬芳惡見穢臭是謂
外像而變者也手心主養之手心主者脉中精神
內屬於心能混神故手心主養之手心主穴在掌
後橫交者是診其妊娠脉滑疾重以手按之散者
胎已三月也妊娠三月為定形有寒則人便青有
熱則小便赤不赤則黃若猝驚恐懼憂愁嗔恚傷
動於筋脉繞臍痛或腰背痛猝有所不服唯雞湯

人參 麥門冬 白茯苓 當歸

白朮 甘草 川芎 白芍各一兩

阿膠二兩

右為咬咀每服用一兩入煮烏雞汁一盞

棗二枚好酒一盞煎至一盞半去滓分作二

服食前

妊娠曾於第三箇月墮胎者入月宜服茯神飲

子

茯神 丹參 龍骨各一兩 人參

阿膠炒 當歸 甘草各二兩 赤小豆炒

女科百問

右為咬咀每服三錢水盞半棗一枚煎八分

云滓溫服腰痛者加寄生二兩空心服

妊娠四月之時始受水精以成血脉其食宜麥菘
其羹宜魚鴈是謂盛榮以通耳目而行經絡洗浴
遠避寒暑是手少陽者三焦之脉也內屬於腑四
月之時兒六腑順成故手少陽養之手少陽穴在
手小指間本節後二寸是也診其妊娠四月欲知
男女左脉疾為男右脉疾為女俱疾為生二男當
此之時慎勿瀉之必致產後之殃何謂也是手少
陽三焦之脉內屬於三焦靜形體和心志節飲食

妊娠四月若有寒心中欲嘔胸滿不食有熱則小便頻數如淋狀臍下若急卒風寒項頸強痛寒熱驚惕腰背及腹痛往來不定或胎上急迫心頭煩悶不安卒有所下宜服菊花湯

當歸 人參 麥門冬 甘草

麻黃去節 半夏湯洗 阿膠炒二兩 菊花半斤

右為咬咀每服四錢水盞半薑三片棗一枚煎八分去滓空心溫服非風寒項強者當去麻黃半夏緣二藥能損胎

調中湯

女科百問

白芍 白朮 柴胡 甘草炙

烏梅肉 續斷 當歸 川芎

枳實 厚朴 甘李根皮各等分

右為咬咀每服三錢水盞半薑四片煎八分去滓溫服空心

妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏起洗浣衣服淨室必厚其裳朝吸天光以避寒殃其食宜稻麥其美宜牛羊和以菜蔬調以五味是謂養氣以定五臟者也一本云宜食魚鱉足太陰養之足太陰脾之脉主四季五月之時見四肢皆成故足太

陰養之足太陰之穴在足內踝上三寸也診其脈之脈重手按之不散但疾不滑者五月也又其脈數者以向懷脈緊者必胞阻脈遲者心腹滿喘脈浮者必水懷為腫

妊娠五月若有熱頭眩心亂欲嘔者有寒則腹痛小便難猝悸恐四肢疼痛寒熱胎動無常或損仆腹痛有所不安服旋覆花湯

旋覆花 當歸 人參 黃芪一本黃芩

麥門冬 赤芍 吳茱萸洗七次

阿膠炒二兩 甘草炙半兩

女科百問

右為咬咀每服四錢水盞半薑三片好酒三分煎八分空心溫服

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處出游於野數觀走犬及視走馬宜食鷄鳥猛獸之肉是謂變勝齊筋以養其爪以牢其背脊足陽明養之足陽明胃之脉主其口目六月之時見口目皆成故足陽明養之足陽明穴在太衝上二寸是也

妊娠六月猝胎動不安寒熱往來腹痛滿身腫驚怖血下腹痛狀如欲產手足煩熱宜服麥門冬

麥門冬 人參 甘草 黃芩

熟地 阿膠 各二兩

右為咬咀每服四錢水盞半入酒五分薑五

片棗二枚煎八分去滓溫服食前

妊娠曾於六箇月損墮者入月預服柴胡散

柴胡 白芍 麥門冬 熟地

茯苓 川芎 白木 甘草

右為咬咀每服四錢水盞半棗三枚煎八分

去滓溫服空心

女科百問

妊娠七月始受木精以成骨勞躬搖肢無使身安
動作屈伸居處必燥飲食避寒常宜食杭稻以密
腠理是謂養骨牢齒者也手太陰養之手太陰者
肺肺主皮毛七月之時兒皮已成故手太陰養之
手太陰穴在手大指本節後白肉際陷中是診其
妊娠七月脉實大牢強者生沉細者死懷軀七月
暴下斗餘水其胎必傷而墮此非時孤漿預下故
也喘促頸項腰背強服葱白湯

半夏 黃芩 人參 當歸
黃芩 阿膠 旋覆花 甘草

麥門冬 杏仁 各

右為咬咀每服四錢水盞半薑三片葱白三

寸好酒半盞煎至八分去滓溫服空心

妊娠曾於第七箇月傷墮者宜預服杏仁湯

杏仁 鍾乳粉 紫苑 吳茱萸

甘草 乾薑 五味子 麥門冬

梗米 各等分

右為咬咀每服四錢水盞半煎八分去滓空

心服

妊娠八月始受土以成膚革和心靜息無使氣極

女科百問

是謂密腠理而光澤顏色手陽明養之手陽明者
大腸之脉大腸主九竅八月之時兒九竅皆成故
手陽明養之手陽明穴在大指本節後宛宛中是
診其妊娠八月脉實大牢強弦緊者生沉細者死
妊娠八月忽中風寒有所犯觸身體疼痛乍寒乍
熱胎動不安常若頭眩繞臍疼痛有寒小便白濁
或復漏下顏色無定腰背冷痛目視茫茫悉宜服
芍藥湯

厚朴 甘草 當歸 白木
人參 白芍

右為咬咀每服四錢水一盞酒半薑薑五片

薤白七寸煎八分以 妊娠曾於八箇月傷胎者宜服菘子湯

厚朴兩二 甘草 當歸 白朮各一

人參 白芍各一 柴胡兩三 葵子

右為咬咀每服四錢水盞半薑五片棗一枚

煎八分空心溫服

妊娠九月始受右精以成皮毛六腑百節莫不畢

備飲醴食甘緩帶自持而待之時謂養毛髮多才

力足少陰養之足少陰者腎之脈腎主續縷九月

女科百問

之時兒脉續縷皆成故足少陰養之足少陰穴在

足內踝後微近下前動脉是也妊娠九月若猝得

下痢腹滿脹急胎上衝心腰背不可轉側短氣滿

悶宜服半夏湯

半夏湯洗 麥門冬 吳茱萸 當歸

阿膠炒各兩 乾薑兩一 大棗十二枚

右為咬咀每服五錢水盞半煎六分去滓入

蜜少許空心服一方用 雌雞煮汁煎藥

妊娠曾於第九箇月者宜先服茯苓腎

湯

白茯苓 桑寄生 熟地 白朮

川芎 麥門冬去人參各一 乾薑炮半

右為咬咀先以猪腎一對切去脂膜用水一

碗入黑豆一合同煮取汁一盞半入藥入味

五錢煎至一盞去滓食前溫服分爲二服

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田

故使關節人神咸備然可預備滑胎方法也

妊娠十月滿足八月預修正順產理滑胎易產甘

草散

甘草炙 黑豆炒 大麻仁別研 糯米各一

女科百問

乾薑炮半 白茯苓半兩 吳茱萸牛兩洗

右為細末入麻仁末同拌每服二錢溫酒調

下未入月不可調服

第七十九問橫生逆產者何也

答曰將產坐臥須順四時方面拜避五行禁忌若

有觸犯多令產難或因漏胎去血臟燥或子臟宿

挾疹病拜觸禁忌或覺腹痛產時未到便即驚動

穢露下早致子道乾澁產婦力疲又有橫逆不順

者皆難產也或有子上逼心者皆緣妊娠之人夫

於將養也大抵臨產之際腹痛而腰不痛者未產

也若腹痛連腰甚者即產所以然者腎候於腰胸繫於腎故也診其尺脉轉大如切繩轉珠者謂之離經日中覺夜半生右腰痛甚者即產也

愚謂橫生逆產者皆因少母未經生育將產之時不肯怒痛務欲逼下為妙殊不知時候未到胎氣未至其子未能翻身受逼不過只得一任離胎運下以至倒生其有橫生者其子離胎將欲翻身投下半中之間被母逼緊轉身不及以至橫下古人云瓜熟蒂落粟熟自出自然之理凡有橫逆皆繇母不能忍痛也

女科百問

烏金散治橫生難產及催生此方救子母於頃刻

百草霜 香白芷

右等分為細末每服二錢以童便醋各少許調更以熱湯化下未愈再服

乳香丸治難產

乳香一兩研為細末

右用猪心血和作十九丸每服一丸煎乳香湯化下

化下

出衣法治妊娠胎死腹中衣不出及產後猝有別病欲至狼狽

若胎衣未下腹滿宜水一盞半煮猪脂一兩煎

五七沸和脂服下之

寤生丸治難產

枳實六兩一枳殼

桑白皮乾六兩

已上二味入大鍋內以長河水煮半日許

候枳實透軟去桑白皮不用取枳實去穢

薄切作小片子焙乾再入後藥

木香半兩 甘草炙半兩

右三件和為細末煉蜜丸桐子大晒乾每日

空心日午臨臥各用溫米飲送下三十丸加

女科百問

至五七十九日三服懷七箇月後服

第八十問熱疾胎死腹中者何也

因母患熱疾至六日以後臟腑極熱熏蒸其胎是以致死緣兒身死冷不能自出但服黑神散

其胎須臾胎氣溫暖即自出何以知其胎之已

死但看產婦舌青色者是其驗

黑神散

官桂

當歸

芍藥

甘草

乾薑炮

生地各一兩

黑豆炒焦去

皮二兩

附子炮半兩

本作黃

右為細末每服一錢空心溫酒調下
烏金散治產後血迷血運敗血不止淋瀝不絕
臍腹疼痛頭目昏眩無力多汗及治崩中下血
過多不止宜服

麒麟竭 亂髮 松墨 煨研 百草霜

當歸頭 肉桂 赤芍 玄胡索

鯉魚鱗 燒

右等分為細末每服二錢溫酒調服下

黑龍丹治產後一切血疾垂死者但灌藥無有
不効

女科百問

下五十六

五靈脂 生地 當歸 川芎

高良薑

已上各等分入沙合內赤石脂混縫紙筋
鹽泥固濟封合炭火十觔煨通紅去火候
冷開取合子看成黑糟乃取出細研入後

藥

硫黃 研分半 花乳石 煨分一 乳香 別研分半

琥珀 研分一 百草霜 別研分五兩

右同為細末醋煮糊丸彈子大每服一丸炭
火燒通紅投生薑自然汁與無灰好酒各小

一合小便半盞內研開頓服立効

芎藭湯治產後去血過多運悶不省及傷冷
血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多
不止緣虛心煩眩暈頭目痛耳聾滿塞舉頭
倒竝皆治之

當歸 芎藭各等分

右為飲子每服三錢水盞半煎一盞去滓稍
熱服不拘時

○第八十一問胎衣不下者何也

答曰母生子訖血流入衣中衣為血所脹故不得

女科百問

下五十七

下治之微緩脹滿腹中。以次上衝心胸疼痛喘息
急者難治。但服奪命丹以速去衣中之血。血散脹
消胎衣自下而無所患

奪命丹

附子 半兩 牡丹皮 一兩 乾漆 碎炒烟盡二分

右為末醋一盞大黃末一兩同熬成膏和藥

丸如桐子大溫酒送下每服五十九不拘時

牛膝湯治產兒已出胞衣不下臍腹堅滿脹急

疼痛及子死腹中不得出者宜服

滑石 八兩 當歸 木通 各六兩 冬葵子 五兩

牛膝去苗酒

瞿麥各四兩

右為吹咀每服三錢水二盞煎八分去滓稍熱服不以時候

○第八十二問難生者何也

答曰胎側有成形塊別呼為兒枕子欲生時枕破與敗血裹其子故難生但服勝金散逐其敗血即自生逆生橫生竝皆治之

勝金散

麝香一錢 鹽豉一兩舊青衣裏燒令通紅急以乳鉢研為細末

右為細末取秤錢燒紅以酒淬之調藥一錢

女科百問

七服

琥珀黑散治產婦一切疾病產前胎死產難逆橫生產後胎衣不下衣帶先斷遍身疼痛口乾心悶非時不語如血暈眼花誤以為暗風乍寒乍熱誤以為癩疾四肢浮腫誤以為水氣言語顛倒見鬼見神誤以為邪祟腹脇脹滿嘔逆不定誤以為番胃大便秘澀小便出血誤以為五淋及惡露未盡經候未還起居飲食便不戒忌血氣之疾聚即成塊散即上衝氣急心痛咳嗽多嘔四肢虛熱顛驚盜汗崩中敗瘵透臍刺痛

或頭面赤因變骨蒸皆宜多服若產後鼻衄口鼻黑色氣起喉中喘急中風口噤皆為難治須急服之凡產前宜進一二服皆能安神順胎產後雖無疾七日內亦進一二服能散諸疾或因驚恐變生他證當連服取效

虎珀研 朱砂研 松墨 百毒霜

新羅白附子

血苗灰鯉魚鱗

黑衣龜尾塵各半

麝香別研 白殭蠶炒去

當歸去蘆各

右為細末每二錢炒薑溫酒和童便調下食

女科百問

前

○第八十三問產後血運者何也

答曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼花甚者令人迷絕口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治病必難愈但服清魂散

澤蘭葉二分

人參二分 荆芥穗兩

川芎半兩 甘草一分

右為細末每服一錢熱湯溫酒各半盞調下

咽喉即開眼氣定人事省

七寶散治產後調血和氣補虛壓驚悸治虛運

朱砂 桂心 乾薑 當歸

羚羊角 川芎 人參 茯苓

右為細末若產婦平和三日以前直至滿月

每日各取一字以羌活豆淋酒調下空心服

若覺心胸煩熱即減桂薑冷即加之腹痛加

當歸心悶加羚羊角心胸氣短加桂不下食

或惡心加人參虛顛加茯苓以意斟酌日二

服夜一服不飲酒者童便酒少許調下

○第八十四問產後口乾痞悶者何也

答曰產後官胃太虛血氣未定食麪太早胃不能

消化麪毒結聚於胃脘上熏胸中是以口乾煩渴

心下痞悶醫者不識認為胸膈壅滯此宜服見現

九 薑黃 京三稜 華澄茄 人參

青皮 高良薑 蓬朮

右為末用細蘿蔔慢火煮令爛研細將汁煮

糊為丸桐子大蘿蔔湯下不拘時

木香丸治婦人有妊傷食

京三稜 此藥能落胎不可用前胡

木香 五分代之產后用之無礙

人參 茯苓 去皮各

右為細末麵糊丸如菟豆大每服三十九丸熱

水送下

白朮散治氣不調和飲食許學士云妊婦傷食

難得藥惟此二方穩捷

白朮 乾紫蘇 白芷 人參

川芎 訶子皮 青皮 甘草

右為細末每服二錢水一盞薑三片煎七分

溫服不拘時候

六君子湯治胸膈痞塞脾寒不嗜食燥藥不得

服

女科百問

枳殼 陳皮 人參 白朮

白茯苓 半夏

右為咬咀每服五錢水一盞薑五片煎一盞

去滓溫服無時

○第八十五問產後乍寒乍熱者何也

答曰陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍熱產後血

氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽

相勝則或寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宜

越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人

誤作瘧疾治謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血

不散宜奪命丹又問二者何以別之答曰時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也

增損四物湯

當歸 芍藥 人參 川芎

乾薑兩一分 甘草多四分

右為咬咀每服二錢水一盞薑五片煎六分

去滓熱服

增損柴胡湯治婦人產後虛羸發寒飲食少腹脹

柴胡三錢 人參 甘草 半夏

女科百問

白芍 陳皮 川芎

右為咬咀每服四錢水盞半薑三片棗一枚

煎七分溫服食後日三服

猪腎湯治產後日淺久坐視聽言語多或運動勞力遂覺頭項及肢節皮肉疼痛乍寒年熱此是尊勞

猪腎一對去脂膜 當歸 芍藥

生薑兩三分 桂心 葱白一合

右以水八升緩火煮腎汁六升澄清內入諸藥煮取二升分三次溫服

加減八珍湯

當歸一錢 川芎一錢 熟地薑汁炒五錢

白朮一錢 白茯苓一錢 人參三分 益母草一錢

陳皮五分 砂仁五分

右為咬咀水一鍾半煎七分食前溫服二劑

後與益母丸閒服服益母丸川芎歸湯送下

●第八十六問產後四肢虛腫者何也

答曰產後敗血乘虛停積於五臟不行經絡流入於四肢留滯日深却還不得腐環如水故令四肢而目浮腫醫人不識便作水氣治凡治水氣多用

女科百問

導水藥極虛夫產後既虛是謂重虛往往曰致天枉但服調經最自然血行腫消

調經散此方百發百中

沒藥研 琥珀研各一分 官桂 赤芍

當歸兩各一 細辛 麝香研各半分

甘草多此二錢厥氏方中一味藥

右為細末每服五分七生薑汁溫酒各少許

調服

正脾散治大病之後脾氣虛弱中滿腹脹四肢

虛浮狀若水氣此藥治之及產後四肢浮腫

蓬朮 香附 茴香炒 甘草炙

陳皮各等分

右為細末每服二錢煎燈心木瓜湯調下

第八十七問產後乍見鬼神者何也

答曰心主身之血脉因產傷耗血脉心氣則虛敗血停積上千於心心不受觸遂致心中煩躁臥起不安年見鬼神言語顛倒醫人不識呼為風邪如此治之必不得愈但服調經散加生龍齒一捻得睡即安

調經散方見八十六問

女科百問

右件藥如前每服加龍齒一捻

栢子仁散治產後謊言亂語錄內虛少血邪氣攻心

栢子仁 遠志 人參 桑寄生

防風 琥珀研細 當歸 熟地

甘草各半兩

右為咬咀每服以水二盞入白羊心一箇切碎先前七分去心滓須下藥五錢更煎四分去滓溫服不拘時

琥珀散治產後血邪攻心迷悶言語錯亂

琥珀研 鐵粉各一兩 人參 茯苓

乾生地 阿膠各七分半 朱砂研半兩

遠志七錢半 甘草 麝香研各一分

有為細末入研丁藥同和極細每服一錢命銀湯調下無時

第八十八問產後不語者何也

答曰人心有七孔三毛產後血氣多端致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉寒則舌亦強矣故令不語如此但服七珍散

人參 石菖蒲 熟地 川芎各一兩

女科百問

細辛一錢半 防風兩半 朱砂半兩

右為細末每服一錢金銀薄苛湯調下不拘時

交感地黃丸治婦人產前產後眼見黑色或即發狂如見鬼狀臆衣不下失音不語心腹脹滿

水穀不化

生地洗淨研以布絞汁 當歸洗淨研以布絞汁

生薑洗淨研以布絞汁 蒲黃炒

琥珀研 不胡索糯米炒令赤去米

小茴香兩

小茴香兩

右為細末蜜丸彈子大當歸湯化下一丸食前

○第八十九問產後腹痛又瀉痢者何也

答曰產後腸胃虛法寒邪易浸若未滿月飲冷當風乘虛進襲留於胸膈散於腹助故腹痛作陳如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞洩腸鳴或王亦白脇肋膨脹或走痛不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之則禍不旋踵

高良薑 當歸 官桂 白芍

女科百問

附子 川芎各一兩 甘草半兩 人參半兩

右為咬咀每服三錢水二盞煎一盞去滓熱服空心食前

定痛散治產後惡血不止腹內熱痛不可忍及兒未定

當歸 芍藥各二兩 桂心一兩

右為咬咀每服二錢各盞半生 于大拍破煎至六分去滓溫服如洞泄腸鳴者加附子乾薑下服

又方治產後瘀血法病不已

生料五積散加乾薑良薑丁香官桂用煮酒重便各一盞服立效又方獨用肉桂末調好酒服之立效

○第九十問產後遍身疼痛者何也

答曰產後百節開張血脉流走遇氣弱則經絡肉分之間血多留滯累日不散則骨節不利筋脉引急故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若醫以傷寒治之則汗出而筋脉傷手足厥冷變生他病但服趁痛散以嘿除之

趁痛散

女科百問

牛膝酒浸 當歸 官桂 白木

黃芪各半兩 薤白二錢 生薑半兩 甘草二錢

獨活半兩 右為麤末每服二錢水一盞半煎七分去滓溫服本方每服半兩水五盞煎二盞分作二次溫服

透經湯方見十八問中

○第九十一問產後大便秘澁者何也

答曰產臥水血俱下腸胃虛弱津液不足是以大便秘澁不通也若五六日腹中悶脹者有燥糞在

臟腑以其乾澁未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以為有熱而投之以寒藥則陽消陰長變動

百出性命危矣此小柴胡湯之證誤不可不謹

麻仁丸

三因方云去血過多燥大便秘澀則茶為丸次以煎茶下之必通也

麻仁

枳殼

人參

大黃

右為細末蜜丸桐子大空心溫酒下未通加

九數服

滋腸五仁丸治血氣不足大腸閉滯傳送艱難

桃仁

杏仁

各一兩炒去皮尖

柏子仁

女科百問

松子仁

一錢三字

郁李仁

陳皮

別為末

右五仁別研為膏合橘皮同研煉蜜為丸桐

子大每服三十丸至五十九食前米飲下更

看虛實加減

○第九十二問產後血崩者何也

答曰產臥傷耗經絡脉未平復勞役損動致血暴

崩淋瀝不止或因鹹酸不節傷盡榮衛亦變崩中

若小腹滿痛肝經已壞為難治當急服固經丸

艾葉

赤石脂

補骨脂

木賊

附子

一隻泡去皮臍

右為末陳米糊和丸桐子大食前溫酒下

十九米飲亦得 熟乾地黃散治崩中下血不止心神煩悶頭目

昏重

熟地

甘草

蒲黃

蟹爪

白茯苓

伏龍肝

桂心

白芍

當歸

阿膠

熟布

燒灰

右為末每服四錢水盞半入竹茹一分煎

六分去滓溫服不拘時

○第九十三問產後腹脹悶滿嘔吐不定者何也

女科百問

答曰敗血散於脾胃脾受之不能運化精微而致

脹滿胃受之不得受納水穀不化而生嘔逆醫者

不識若以尋常服止吐藥療之病與藥不相干轉

更傷動正氣疾愈難治

匠勝湯三四方名抵勝湯

赤芍

半夏

澤蘭葉

人參

陳皮

甘草

生薑

右為末每服三錢水盞半煎七分去滓熱

服食前

八順理中丸治新產血氣俱傷五臟暴虛肢體

羸乏少氣多汗。纔產直百晷日。每日清服。壯氣補虛。止嘔吐。

甘草 人參 白茯苓 神麴炒各半兩

乾薑炮一兩 砂仁二兩 麥蘖二兩 白木四兩

右為末。蜜丸。每服三十九。食前薑湯下。或加半夏麴一兩。入鹽點服。

○第九十四問。產後口鼻黑氣起。又鼻衄者。何也。

答曰。陽明者。經脈之海。起於鼻。交頤中。入上齒。還出俠口。交人中。左之右。右之左。產後氣消。血散。榮衛不理。散亂入於諸經。却還不得。故令口鼻黑氣起。及變鼻衄。此緣產後虛熱。變生此疾。其疾不可治。名曰胃絕。肺敗。詳此一證。保慶府無方。可急服琥珀黑散。視其病人鼻黑退。衄止者。活方見第八十二問中。

○第九十五問。產後喉中氣急喘者。何也。

答曰。榮者血也。衛者氣也。榮行脈中。衛行脈外。相隨上下。謂之榮衛。因產所下過多。榮血暴竭。衛氣無主。獨聚於肺中。故令喘也。此名孤陽絕陰。難治。若產後惡露不快。敗血停凝。上熏於肺。亦令喘急。如此。但服奪命丹。血去喘急自止。

旋覆花湯。治產後傷風。或風寒暑濕。咳嗽喘滿。痰涎壅塞。如服奪命丹喘不定。可服此藥。

前胡 麻黃 杏仁 五味子

茯苓 甘草 赤芍 旋覆花

半夏麴 人參 玄及各等分

右為飲子。每服四錢。水盞半。薑五片。棗一枚。煎七分。溫服。食前。

○第九十六問。產後中風者。何也。

答曰。產後五七日內。強力下床。或月內傷於房室。或憂怒。擾蕩冲和。或灼灸。傷動臟腑。初眼流淚。口噤。肌肉攣搐。以漸腰脊筋急。強直者。不治。此乃人作非偶。爾中風所得。本集無方。三因方評之。頗詳。

八風湯。治迷惑如醉。狂言驚悸。恍忽見鬼。

天雄 當歸 人參各五兩 附子

防風 大門冬 蜀椒 獨活各四兩

烏頭 秦艽 細辛 白木

乾薑各三錢 山茱萸 五味子 桔梗

香白芷 柴胡 莽草各半兩

右為末。每服二錢。溫酒調下。日三服。以身中覺如鍼刺者。藥行也。

獨活散治產後中風口噤肩項強直四肢拘急

獨活 桂心 甘草 當歸抄一本川芎

麻黃 附子 細辛半兩 防風八分

每服四錢水酒各半盞煎七分拗開口灌之

○第九十七問產後心痛者何也

答曰心者血之主也有伏宿寒氣因產大虛寒搏

於血血凝不得消散其氣逆冲擊於心之經脉故

心痛但以大岩蜜湯治之寒去則血脉溫而經絡

通心痛自止若誤以為所傷療之則虛極寒益甚

矣心絡寒甚傳之正經則變真心痛朝發夕死夕

發朝死不可輕用藥如此

大岩蜜湯

熟地 當歸 獨活 吳茱萸洗

官桂 芍藥 乾薑 甘草各兩

細辛 小草遠志苗也

右為纒末每服五錢水三盞煎一盞去滓溫

服不拘時

四神散治產後留血不消積聚作塊急切疼痛

及心腹酸痛下痢

當歸 乾薑 川芎 赤芍

右為末每服三錢溫酒調下不拘時

○第九十八問產後熱悶氣上轉為脚氣者何也

答曰產臥血虛生熱復因春秋取涼過多地之蒸

濕因足履之所着而為脚氣其狀熱悶掣癢驚悸

心煩嘔吐氣上皆其候也但服小續命湯三兩劑

必愈若醫者誤用逐敗血藥攻之則血去而疾增

益劇

小續命湯此藥不論胎前產後或人風痲虛極

痛香牛夏入每服水二盞候煎熟藥汁後

另以麝入于內再煎一二沸食前服一二服

效科百問

人參 黃芩 官桂 麻黃

防已各一兩 生薑五兩 芍藥 芎藭

甘草 白朮各一兩 附子去皮 防風半兩

右為咬咀每服二錢水二盞煎八分去滓溫

服不拘時

大驅風散治猝中欲死風攻身體及五臟言語

寒澁神思冒昧或履濕氣變為脚氣此方尤妙

麻黃二兩 芍藥半兩 石膏煨 肉桂

白芷 甘草 乾薑 當歸

芩芩 杏仁去皮尖炒

一第1007 冊續修四庫全書 2 頁 59

右為咬阻每服四錢水盞半煎六分去滓不以時候稍熱服汗出為度
同人荆瀝五合
同煎大驗如脚氣加白朮
去乾薑

○第九十九問產後汗出多而變生風者何也

答曰產後血虛內理不腠密故多汗因遇風邪搏變瘧風瘵者口噤不開背強而直如風發癩狀搖頭馬鳴身反折須臾十發氣息如絕宜速斡口灌之小續命湯稍緩即汗出如雨
試不及者不可治三因方云既汗多如何更服
黃桂等不若大

局方大聖散亦良藥

小續命湯方見九十八問

防風湯治產後中如角弓時時反張口噤

防風兩 葛根兩 芎藭 生地

藁本 杏仁去皮尖 獨活二兩

甘草 桂心 防已 蔓荊子各七錢半

麻黃兩

右為咬阻每服四錢水盞半煎六分去滓溫服不拘時

○第一百問產後所下過多虛極生風者何也

答曰婦人以榮血為主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出日瞑神昏命在須臾此但虛極生也如此急服濟危上丹良以風藥治之則誤矣

乳香 五靈脂 硫黃
太陰玄精石研 桑寄生 真阿膠

卷栢生 陳皮各等分

右將上四味同研石器內微火炒動勿令焦炒了再研極細後人餘藥末用地黃汁和糊丸如桐子大溫酒下二十九丸當歸酒下丸妙神授散治產後一切疼痛不論大小以致危篤

者皆可服

百合水浸 乾薑炮 甘草 當歸

川芎各二兩 青皮 桂心 牡丹皮

白芍 陳皮各五兩 神麩炒 麥肉一本麥冬

麥書作 人參各三兩 紅花半兩

右為咬阻每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心去滓溫服妊婦不可服虛者去牡丹皮紅花加附子三兩

女科百問卷之下竟

產寶雜錄目

論元立本

論妊娠分別男女脉法

論十二經隨月養胎

論轉女為男法

論氣形保衛

論胎教

論男女七八之數

分體

論子

產寶雜錄

受胎時日法

灸法

妊娠諸雜病方論

產前預備藥物

產婦雜要

孕婦服藥忌用

產前將護法

日遊圖

產婦十二月吉凶圖

日曆法

臨產將護法

穰謝法

易產法

密公防護產法 又法 又法

產後

產後虛忽悶汗出多不識人

產後將護法

芸窻萬選方一卷

產寶雜錄

產寶雜錄

門生翰林醫證人內內宿壽明慈府殿
侍衛步軍司醫官兼太醫局教授齊仲甫

○論元立本

泰初者凡有氣之本也。天得之以統氣。泰始者凡有形之本也。地得之以統形。故輕清為天。稟陽剛健而立乎上。重濁為地。積陰柔順而處乎下。感坤德而行化。應乾道而經營。默爾而變。鼓萬物而其道惟微。默然而化。凜肅殺而厥功咸著。是以天地相因。生生化化。品物彰矣。易曰：大哉乾元，萬物資始。至哉坤元，萬物資生。故陽施陰化，血氣和調，感而為妊者，亦資始資生之理也。夫兆形之初，命門先具，天一生水，壬為陽水，合丁之陰火而生丙，有命門然後生心，心主血脈，丙為陽火，合辛之陰金而生庚，有心然後生肺，肺主皮毛，庚為陽金，合乙之陰木而生甲，有肺然後生肝，肝主筋爪，甲為陽木，合己之陰土而生戊，有肝然後生脾，脾主肌肉，戊為陽土，合癸之陰水而生壬，有脾然後生腎，腎主骨髓，故五臟合乎五行，本其性情，互相剋制，及其配合，互相生成，且妊娠胚胎懷胞，此六者乃子

在母腹中之事，皆有經之可證者也。所謂妊者，陽既受始，陰壬之也。胞者，已為正陽陰包之也。胚者，未成為器，猶之坯也。胎者，既食於母，為口也。娠則以時而動，動則神氣足矣。懷則以身而衣，衣則形質具也。故天之德主生，地之德主成，陰陽之氣主和平，以生成和平之氣，流傳於一體，然後生育之功備矣。若能順時數，謹人事，勿動而傷，則生育之道得矣。

○論妊娠分別男女脉法

經云：陰陽別，謂之有子。此乃氣血調和，陽施陰化也。王氏云：脉平而虛者，孔子法也。診其手少陰脉動甚者，妊子也。少陰心脉也。心主血脈，又腎為胞門，子戶。大抵少陰之經在手屬心，在足屬腎，腎主乎尺，尺中之脉按之不絕者，法妊娠也。難經云：女子以繫胞三部脉浮沉正等，按之無絕者，有妊娠也。妊娠初時，寸脉微小，呼吸五至，三月而尺脉數也。脉滑疾重，以手按之散者，胎已三月也。脉重手按之不散，但疾不滑者，五月也。婦人妊娠四月，欲知男女，法左疾為男，右疾為女，俱疾為生，二寸又法，得六陰脉為男子，得太陽脉為女子，太陰脉

謂太陽脉浮又法左手脉沉實為男右手脉浮大為女左右手俱沉實猥生二男左右手俱浮大猥生二女又法尺脉左偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如實狀又法左右尺俱浮為產二男不爾則女作男生左右尺俱沉為產二女不爾則男作女生又法遣妊娠人面南行還復呼之左迴首是男右迴首是女又法看上圍時夫從後呼之左迴首是男右迴首是女又法婦人妊娠其夫左乳房有核為男右乳房有核是女婦人懷娠離經其脉浮設腹痛引腰脊為今欲生也但離經者不病也又法婦人欲生其脉離經者夜半覺日中則生也

○論十二經隨月養胎

食氣於母所以養其形食味於母所以養其精形精為滋育氣味為本故天之五氣地之五味母既食之而胎又食之外則充乎形質內則滋乎胎氣皆藉乎氣味之育養也胎之所食始起於厥陰也聖濟經云原四時之所化始於木也究十二經之所養始於肝也故一月血凝足厥陰肝經養之三月乃升之脾二月胎光足少陽膽經養之三月陽神

為魂木生火手心主包絡經養之四月陰靈為魄手少陽三焦經養之五月五行分五臟火生土足太陰脾經養之六月六律定六腑足陽明胃經養之七月七情開七竅通光明也土生金手太陰肺經養之八月八景神具濟真靈也手陽明太陽經養之九月宮室羅布以定精也金生水足少陰腎經養之十月氣足萬象成也足太陽膀胱經養之自肝木為始臟腑相滋各養三十日者此食味於母所以養其精也且手太陽小腸經手少陰心經此二經不在十月經養之數者平居之日在下為

月水有胎之時在上為乳汁故不養於胎也孫思邈曰一月名始胎二月名始膏當胎膏之始真氣方遇如桃花凝聚其柔脆易壞也聖濟經曰胎膏之始食必甘美欲扶其柔脆味必忌辛辣懼散其凝聚作胎之後二氣既凝如泥在鈞如金在鑄惟陶冶之所成子之在母必賴其食之助養故食稻杭苗雍四月以通水精之成血食稻麥牛馬於五月以助火精之成氣食猛鷲於六月以強金精之成筋食杭稻於七月以望木精之成骨八月九月受土石之精以成膚革皮毛則形已備矣此食氣

於母所以養形者也。內則食之於母，外則食之於味，輔其冲和，氣數滿足，子母分娩，然後保衛輔益，各有其道矣。

○論轉女為男法

氣充於中，孕之專精也。形立於外，賦之大鈞也。倘混淪未分，化原未兆，而有胎化之法，可以轉男者，皆因虛而感，感而變也。凡受胎三月，謂之始胎，遂物變化，秉質未定，遂有轉易之術。古人以陽召陽，以陰召陰者，是也。以陽召陽者，如陽燧之取火，以陰召陰者，若方諸之取水也。與夫犀角蚌蛤之感

月星者，皆自然之理也。聖惠方云：妊娠三月，取雄雞尾毛三莖，潛安婦人臥牀下，勿令知之，食牝雞，取精陽以全其天產也。又法：妊娠三月，欲男者，用雄黃半兩，衣中帶之，取雄黃陽精以全其地產也。弓矢禮以為男子之事，斧斤詩以為治民之具，故欲求男子者，操弓矢置斧斤於寢牀下，取陽剛之見於人事也。凡此四物，皆陽類也。以陽召陽，氣類潛通，造化密移，冥冥之中，以其因虛而感，隨感而變也。故妊娠三月，能外資陽物，助以勝陰，則變女為男，信不誣也。

○論氣形保衛

恍兮惚其中有物，惚兮恍其中有象，初融於恍惚之中，豈無得而然哉？夫胚胎之兆始也，受水精而成血脉，受火精而成氣，受金精而成筋，受木精而成骨，受土精而成膚革，五行具而百骸皆備，此所以集萬物之靈也。倘或奇耦之行耗剛柔之強弱，榮衛之虛虧，乃於氣形稟賦之始，有附贅垂疣，駢拇枝指，侏儒跛蹙之不同，或於氣形既得之後，有瘡瘍腫毒，聾盲瘖瘡，疲瘥之不一。夫欲形無所戾，病無所生者，則胚胎造化之始，變氣移精之後，保

衛育養，悉有其道也。經云：天有五氣，各有所奏，地有五味，各有所入。故所奏有節，適所入有度量，凡所畏忌，悉知戒慎，資物為養者，理宜然也。寢興以時，出處以節，可以高明，可以周密，使霧露風邪不得投間而入。因時為養者，理宜然也。以至調喜怒，寡嗜慾，作勞而不妄，而氣血從之，皆所以保攝妊娠。外使諸邪不得干焉。苟為不然，方授受之時，一失調養，則內不足以為中之守，外不足以為身之強，氣形弗充而疾疚因之。若食兔缺唇，食犬無聲，食雜魚而生瘡癬，皆以食物不戒之過也。心氣大

驚而癩疾腎氣不足而解頰脾胃不和而羸瘦心氣不和而神不足皆以氣血不調之過也誠能於飲食知所戒推而達之五味無所傷誠能於氣血知所調推而達之邪氣無所乘茲乃生育相待而成者故曰天

○論胎教

夫胚胎兆蒙雖寂然杳默之中而其耳目心智已備而神者受之矣故可以好德制心厭耳感目調神和性使之先得於自然無間之際固不待於人道之分而後知也賢人君子德行可觀也故示以

賢人君子使知所以好德禮法度數人之防範也故示以禮法度數使之知所以制心使之耳所聞者無淫哇故揚之於聲音之和則若琴瑟鍾鼓者欲足於耳使之目所視者無狹隘故作之以剛毅之氣則若犀象軍旅欲其感動於目觀陰陽之至精足以成純粹之美得言語之至正足以啓篤敬之道以至調心神而使之不亂和性情而使之不乖戒喜怒使之無過度節嗜慾使之無貪愛是因物隨感有益於德者如此所以生子皆良也若乃人有殘廢物有醜惡鳥獸之有毒性者則欲其勿

見若形有不全不正味有異常者則欲其勿食是又防閑忌避無所不用其至夫在母也如此則居然而生明智而信厚端莊而溫恭美好而壽考無足惟矣是以因物而遷因形而革有不期而然者良繇虛而感隨感而變也昔大任之妊文王目不視惡色耳不聽淫聲口不出敖言而世傳胎教者以此

○論男女七八之數

夫黃鍾應律一元之氣斗建於子也聖濟經云元氣孕育皆始於子自子推之男左旋自子位起積三十而至巳女右旋自子位起積二十而至巳巳為正陽陰實從之自已懷妊男左旋十月而生於寅女右旋十月而生於申故男麗乎寅陽生於子至寅為三陽女麗乎申陰生於午至申為三陰難經云男子生於寅寅為木陽也女子生於申申為金陰也夫木者陰中之陽男得乎卦其數八故男子八歲髮長齒更八八則卦氣足金者陽中之陰女得乎卦其數七故女子七歲齒更髮長七七則天癸竭諸七八之數七少陽也八少陰也相感而流通以兆陰陽之始而定男女之數也

○分體

耳目鼻口陰尻竅也臂股指趾肢也雙乳外腎關也齒髮爪甲餘也枝指旁趾附也養耳力者常飽養目力者常瞑養臂指者常屈信養股趾者常步履夏臟宜涼冬臟宜溫胸包心火雖冬宜熱熱作腫而竅寒血不行而肢廢餘有消長無痛疾有疾痛無生死關有生死疾病無消長有消長無生死疾病者疣瘤而已

○論子

褚氏遺書云建平孝王妃姬侍皆麗無子擇良家

未笄女人御又無子論曰求男有道乎褚澄對曰合男女必當其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽氣完實然後交合則交而孕孕而育育而男子堅壯強壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣早洩未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育育而子脆不壽此王之所以無子也然婦人有所產皆女者有所產皆男者大王訪求多男婦人媒致官府有男之道也王曰善未再期生六男夫老陽遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也

○受胎時日法

凡男女受胎法皆以經候絕後一日三日五日為男仍遇月宿黃宿日又以夜半後生氣時瀉精有子皆男必壽而賢明高爵也以經候絕後二日四日六日瀉精者有子皆女過六日皆不成子又遇其旺日元日推旺相日辰法春甲乙寅卯夏丙丁巳午秋庚辛申酉冬壬癸亥子

○灸法

婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸
婦人絕嗣不生胞門寒灸關元三十壯

產寶雜錄

婦人妊子不成若墮落腹痛漏灸胞門五十壯在關元左邊二寸是也右邊二寸名子戶

婦人無子臟有惡血灸右關在陰都下一寸

婦人絕嗣不生灸氣門穴穴在關元旁三寸灸百壯

婦人子臟閉塞不受精灸胞門五十壯

婦人絕嗣不生漏赤白灸泉門十壯其穴在橫骨陰上際

○妊娠諸雜病方論

妊娠諸雜候有謂如中風熱病傷寒等候此雖略

存方華可以備急或有重時即兼取諸方在帙中者如傷寒用青龍散大柴胡散之類是也其病候亦同此通病證論用之但方中無雄黃水銀胡粉針刺大戟巴豆牡丹十滕附子天雄烏頭半夏南星水蛭蟲瞿麥野葛蜈蚣蛇蝎鬼箭薏苡葶歷蝟皮梨蘆牽牛皂角側子硃砂之類其論說病候亦逐諸方為證。

○產前預備藥物

玄胡索	劉寄奴	桑寄生	夜合枝	蒲黃
當歸	赤芍藥	神麩	牡丹皮	枳殼
紅藍末	桂心	蛇蛻	半夏	白朮
茯苓	人參	甘草	續斷枝	羌活
羚羊角	竹瀝	枳實	細辛	麝香
鯉魚鱗 <small>灰</small>	桃仁	狗膽	郁李仁	亂髮 <small>灰</small>
杏仁	童便	瞿麥	黃芪	水銀
沒藥	川芒硝	麒麟竭	防風	豆豉
琥珀	秤鎰	桑白皮	醃醋	木通
芍藥	無灰酒	乾薑	川升麻	虎脛骨
香墨	紫葛	荷葉	紅花子	生地黃
白蜜	羚羊角 <small>灰</small>	羯羊角	蘇枋木	熟硃砂

已上藥妊娠三數月即須求覓州土上好者晒曝收拾一一題記分明置一淨處恐臨時

忙迫不可猝求更宜審細勿令錯用。

生地黄肥好生母薑取生藕和本泥雞子草醋醃煎三四沸黑豆揀之布拭用紙艾生熟右件藥入月一日皆須收足。

○產婦雜要

小石子三五十顆前一籠中臨產燒下置產婦面下代林指頭磚八口每一服下一口止盛衣錐洗兒盆乾竹柴雜席蒲合各一雜用盆

砂盆 慮藥布 絞地黃汁布 新柳木米槌 軟厚氈領煖水釜五斗以上者泥在近處乾蓐草

三十馬皮一張鋪馬銜一具產子乾馬糞一石床下勿令穢每月收赤馬通乾者童子小便貯

產婦切忌入月不得飲酒恐臨產心神昏亂亦不得驚恐動未及產時左右驅使人亦不得吃酒入月門前停留遠客宿忌右已前貯備頗為猥細若言所切無過於斯通誠者方驗不可忽也。

○孕婦服藥忌用

玃班水蛭地蟾蟲烏頭附子酥天雄躑躅野葛螻蛄類烏賊側子及鼠蟲牛黃水銀并巴豆大戟蛇蛻共蜈蚣牛膝藜蘆加薏苡金石錫粉對雌雄牙硝芒硝牡丹桂蟬蜥飛生更蠶蟲代赭蚱蟬礪腦麝芫花薇衡草三稜槐子牽牛并皂莢桃子蟾蟾和茅根檳榔砂與乾漆亭長洩流茵草中瞿麥藺茹蟹爪甲蝟皮鬼箭赤頭紅馬力石蠶衣魚等半夏南星通草同乾薑蒜雞及鴨子驢馬兔肉不須供切忌婦人產前用此歌宜記在心胸

○產前將護法

按諸家產論云凡產婦入月切忌飲酒忌產時心神昏亂臨產之時不可令傍人喧擾大小愴忙慮致驚動產母祇可令熟事產婆及穩審謹卓老成親密三兩人扶持產母初覺腹痛且宜任意坐臥強勉飲食恐致臨產氣力虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可按節次漸服清胎榆白皮散一二服服藥之法慎勿太早須得其時又傍人不得逼迫且須令人扶策徐徐而行若行步稍難即凭物而立須臾扶策再行直至腹痛連腰相引作陣痛頻即

服催生丹一服更且勉強扶行陣痛轉甚難以立認是產時將至即服催生符畢然後安詳上草上草之時慎勿傷早若太早則子在腹中難以轉側又須子細體候宜待兒逼欲生然後令抱腰也抱腰之人不得傾斜則兒得順其理自然易產也又有臥產者亦待臥定背平着蓆體不偃曲則子不失其道苟或不能依此節適必致產難縱或幸免必須變生諸疾

○日遊圖

推日遊法常以癸巳日入宮十六日宜避之至巳酉日出外

癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉
戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅
癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未
戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬戌
癸亥	甲子	乙丑	丙寅	丁卯
戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申
癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑
戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午

右件日遊在內產婦宜外別於空地安帳

午癸未甲申乙酉丙戌丁亥外戊子巳丑庚寅
辛卯壬辰北

○產婦十二月吉凶圖 六壬占產方位

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

巳上六月空在丙壬宜安產婦及胎衣餘凶

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

巳上六月空在甲庚宜安產婦及胎衣餘凶

又六壬靈轄經曰將欲生孟月以功曹仲月以神

後季月以天魁加月建天上丙壬下為月虛地宜

安產。

產寶雜錄

又曰傳送加產婦行年天罡下為懸屍產婦宜避

忌之吉。

又曰傳送加產婦行年天罡下為天推天魁下為

天棒若於此下產憂胎殘落疾病死亡

七十二占曰婦人數失其子者以天罡加月建以

其死兒於神後埋之候娠必得其下子。

○日曆法

凡禍害絕命之地不可令產婦向之亦不可向此

大小便凡生氣產婦向之大吉令母子命長開肚

之地臨月及產後未滿竝不得向此大小便及棄

不淨水犯之母于大惡慎之大吉。

凡入莊之地產婦牀帳開門向之慎之大吉。

凡反支月不得令血露污地或令于死腹中或產

不順皆須先布灰草然後鋪驢馬牛皮於上安產

吉。

凡懸尸之日不可板繩宜懸馬皮轡板之吉。

凡行年本命相值亦可坐馬皮轡攀大吉。

凡產於八月一日貼在臥閣內正地辟。

凡安產藏衣方位竝於臥閣內分布。

凡產訖棄溲污穢之水不淨者竝隨藏衣之方所

產寶雜錄

向不拘遠近棄之切忌向開肚之方。

○臨產將護法

凡產婦既借地并符法又服滑胎藥訖欲產之時

備辦湯藥不得令人雜亂大小倉忙驚動產婦雖

可令屬一兩人及祇承人等看侍若產婦腹痛雖

甚且須令凭人徐行直待兒過欲生方始坐慎勿

坐早則子在腹中難為轉動遂有悞。

○禳謝法

軒轅者乾神天之丞相使者風伯也犯之令兒驚

吐取梨枝六寸埋產處吉。

雷公者。震神。太陰之使者。天馬也。犯之令兒煩悶。腹滿解之用三家屠肉餅於產處謝之吉。

咸池者。坎神。天之雨師。使者。犯之令兒啼不止。用酒脯於產處謝之吉。

豐隆者。艮神。天之東明使者。天漢也。犯之令兒乍寒乍熱。用白魚二頭於產處謝之。以黑豆一掬。投於井中吉。

招搖者。坤神。天上使者。犯之令兒驚啼不止。用酒餅於產處謝之吉。

天候者。冥神。天一執法使者。犯之令兒腹脹弩眼。產實雜錄

用白魚二頭於產處謝之吉。

吳時者。離神。天一大將軍遊擊使者。犯之令兒驚腹痛。用馬脯五寸於產處謝之。更用白魚五枚。飯棗。產處埋之吉。

大時者。兌神。北斗之使者。犯之令兒腹脹下利。解之用脯於產處謝之。又用大豆一升。投井中吉。

狂虎者。犯之令兒驚啼。用雄雞於產處謝之吉。

白虎者。犯之用粳米一升。雞子三枚。謝之吉。

夫人者。犯之用羊脾三枚。粳米一升。產處謝之吉。

天狗者。犯之令兒口噤。面色變。用三屠肉餅。麥餅。

於產處謝之吉。

○易產法

凡欲臨產。先脫尋常所着衣。以籠籠頭及籠口。令至密。即易生。神驗。

○密公防護產法

余因披閱密公調氣方。中見密公北平陽道慶者。有一妹一女。並皆產死。有兒婦臨月。情用憂慮。入山尋余。請覓滑胎方。余報言。少來遊山林。未經料理此事。然當為思量。或應可解。慶停一宿。余輒憶。類生之類。緣何不聞有產死者。姪女偷生。賤婢產實雜錄

產實雜錄

獨產亦未聞有產死者。此當繇無人逼迫。得盡其分理耳。其產死者。多是富貴家娶居婦女輩。當繇兒始轉時。覺痛便相告。傍人擾擾。令其驚怖。畜結生理不和。和氣一亂。痛切唯甚。傍人見痛甚。便謂時至。或有約髻者。或有勒腹者。或有冷水噴面者。努力強推。兒便暴出。畜聚之氣。一時奔下不止。便至運絕。他繇。至日以此意語慶。慶領受無所聞。然繇。必向家。及更與相隨。停其家十餘日。日晡時。云。兒婦腹痛。似是產候。余便教屏除。芥菜。一房地布草。三四處懸繩。作行度。高

下。令得踏當腋得憑當行下敷慢穩恐兒落草誤傷之如此布置託令產者入位語之坐臥任意為其說方法各有分理順之則全逆之則死安心息身怖強此產婦亦解人語語訖閉戶戶外安牀余共慶坐不令一人得入時時隔戶問之何似答曰小痛可忍至一更令爛煮自死牝雞取汁作粳米粥粥熟急手攪渾渾適寒溫勸令食一升許至更五將末便自產聞兒啼聲始聽人入產者自若安穩不異或覺小小痛時便放體長吐氣一口痛即止蓋任分和氣之效也慶問何不與肉答云氣將

下恐肉不消為妨悶又問何故與粥答曰饑則氣下氣下則速產理不欲令氣上故耳慶以此為產術之妙所傳之處無不安也故知密公隱妙思符神理然則日遊反反之類何預哉但以婦人怯弱臨產驚遽若不導以諸法多恐志氣不安所以檢諸家方法備題於左其間取舍各任量裁凡婦人有難必須先檢此書推所接月日知犯忌各須慎不得犯之其應次須帳幕皮醋藏衣等物之類並早經營入月即須使足若不預備臨急周遮事必致舛惟舊經事者始達此言預備不慮古之善教

也

又法

凡產者雖是穢惡然將痛之時及未產已產皆不得令死喪穢惡家人皆來視之必產難若已產者必傷子

又法

凡產法雖須熟忍不得逼迫要須兒子欲出然後抱腰傍人不得驚擾浪作形勢但此事密公法中已經商略無用師巫妄述已能橫相牽挽失其本性今故重述特宜防也

○產後

凡母子纒獲分解速與產婦童子小便一盞令飲不得與酒緣酒引血逆入四肢兼產母臟腑方虛熱酒入在腹中必致昏悶可與墨醋服之不得過多雖醋破血而又傷肺因成咳嗽皆繇此也若產婦分解之時煎燒磚石投醋烟以防運也凡生產畢飲童便了不得便臥且候須臾方可仰臥立據高床頭厚鋪褥褥遮欄四壁使無孔隙免其賊風時時令人從心上至臍下如此一日可止宜食白粥一味時飲童便一盞七日後方可少進醇酒少

許鹽味。半月之後。漸食煮肉。出月之後。方可食麪。仍不得思食他物。以致其傷。亂待敗血。盡臟腑自。然安和。在一百日之內。善加調理。諸疾不生。娠必。生男信矣。

○產後虛忽悶。冒汗出多。不識人。

以雞子三枚。破而吐之。便醒。不醒者可灌。

時時發者。此為有風。因產血氣暴虛。風行脉中。若。虛去血多者。尤甚。

○產後將護法

按經云。婦人非止臨產須憂。至於產後。大須將理。

產後雜錄

慎勿以產時無他。乃縱心恣意。無所不犯。犯時微。

若秋毫。感病重於嵩岱。且纔得分免。切忌問是男。

是女。看血下多少。隨證服壓血運藥。良久喫粥。服。

四順理中圓。便令人從心下。按至臍腹。日五七次。

若有疾證。即隨證服藥。粥藥相間。頻頻服餌。且宜。

閉目而坐。背後倚物。左右看承。常令直立。兩膝。雖。

時眠睡。頻令喚覺。過一伏時。方得上牀。亦須立膝。

高。牀頭厚鋪褥。遮圍四向。室塞孔隙。以禦賊。

風。一臘之內。常聞醋烟。以防運悶。一臘之後。漸加。

滋味。或以羊肉及雌雞。煮取濃汁。作糜粥。直至百。

晬。常服當歸圓。當歸建中湯。四順理中圓。日各一。

兩服。以養藏氣。補血脈。兩臘之後。方得食糜爛肉。

食。滿月之內。尤忌任意飲食。觸冒風寒。恣意喜怒。

梳頭用力。高聲作勞。工巧之類。及上廁便溺。如此。

節養將攝。以至百晬。始得氣血和調。腑臟平復。設。

不依此。即致產餘疾。

凡欲生產。切不可喧闐。產婦房門。常須關閉。選一。

年高性善。產又選穩當家人一兩人。扶持謹慎。不。

用揮霍。致令產婦憂恐。又忌問雜人。外喪孝。穢污。

之人瞻視。若不慎之。定是難產。兼傷小兒。若腹中。

痛來。但令扶持行往。或行不得。且立。候行得更行。

或痛作陣。眼中如火生。此是兒回轉。即進琥珀散。

一服。直至行得。即扶上蓐草。務要產婦惜力。或心。

中熱悶。取白蜜一匙。新汲水調下。或未解。即吞生。

雞子一枚。

○芸臆萬選方

問婦人女子經候不調。潮熱。論曰。婦人經水適斷。

病作少陽治之。傷寒雜病一體。經云。身有病而有。

邪。經脉閉也。又云。月事不來者。胞脉閉也。經閉者。

尺中不至也。胞閉者。生化絕原。二者皆血病也。厥。

陰主之厥陰病則少陽亦病婦累其夫也婦人室
 女質作大熱或變或勞脈有浮中沈之不同故藥
 有表裏和之不一察其在氣在血定其行陰行陽
 舉無不當則可以萬全矣又云若欲理血必先調
 氣故先用小柴胡湯後用四物湯此中事難知內
 治婦人諸病宜四物湯內加吳茱萸等分湯泡七
 次過炒乾最妙但陽臟人少加陰臟人多加
 治婦人天癸已過四十九歲不斷經者經候不勻
 或三四月不行或一月再行腰膝疼痛經云七損
 八益謂婦人七七數盡而經不依時者血有餘也

不可止但令依時不腰痛為善當歸散

川芎

當歸

白芍

白朮

山茱萸

去核兩半

黃芩

兩妙如不特涼藥者去黃芩李知桂心一兩

右為末每服二錢酒調下空心日二服

治女子不行經者是心火不降也胞脈繫於心包
 絡心火不降故月事不來宜降心火則經自行如
 經候來了服衛生湯贊生湯不三月必孕孕必男
 其胞製抑火湯別有贊生丸 又方治婦人久無
 子溫酒下益母丸服至十服二十服後必有孕

人參

黃芩

黃連

麥門冬

去心各兩

甘草

石菖蒲去毛牡丹皮各五錢

茯神

去木

蓮心

錢一

右為末入辰砂末半錢令勻每服二錢臨睡

燈心湯調服

治婦人經候要來之先或腰膝痛或來太多血虛

或頭痛或發大寒因產後發熱頭痛通神散去雲製

益母草

五月五日採

白芍

甘草

錢

陳皮

各二錢

右每服五錢水一鍾半煎至一鍾食前或單

用益母草亦可

產寶雜錄

二十四

治婦人經候欲行未行或行時腰腹膝下疔痛或

探前退後或來四五日或七八日不斷者良香丸

又名通經丸主之又方溫酒下益母丸

良薑

兩兩

香附子

二兩醋

梔子仁

二兩半薑

益母草

三兩

三稜

蓬朮

各五錢

右為末醋糊丸梧子大陰乾每服六七丸醋

湯下食前

治婦人經候不行至一年者臍腹痛腰腿沉重寒

熱往來服芥子散

白芥菜子

六兩

右為末每服二三錢熱酒調食前服

治婦人月事不應期或前或後或來太多或血黑或淡子宮久冷不孕者並皆治之坎宮丸

香附子碎之米醋浸透肉桂去皮白芍三兩

北艾葉半斤吳茱萸半斤川當歸二兩

右為末醋糊丸如梧子大每服七八十九空心醋湯下或有白帶者加白朮一兩白芷二兩

治婦人天癸已上經候不斷者用白茅花燒灰每

服二三錢醋湯調服或醋為丸或四物湯內加服

尤妙又方子芩二兩用米醋浸七日用火炙乾再

蒸醋再炙醋盡為度令乾為末醋糊丸如桐子大

每服五十九空心醋湯下

治婦人勞嗽并血證百合散

人參 白朮 白茯苓 百合

款冬花 官桂 北五味 阿膠炒黃

黃芪 半夏泡七次 天門冬去心 杏仁去雙仁皮尖

白芍 甘草各等分 細辛半

右每服五錢水一鍾半煎至一鍾溫服如麻

熱去桂不去節麻黃去黃芪加桑白皮

治婦人衝任虛損經脈不調積滯流注血閉血塊

血癥血瘕血滯停阻腰脚脘腹久痛寒熱有時面

赤口乾黃瘦困倦四肢顛掉起坐艱難漸成勞疾

喘嗽盜汗便溺頻多髮髮脫落或室女經脈滯結

並皆治之九生丹

牡丹皮去木 頭紅花 肉桂 川歸各一兩

丁香半兩 朱砂二錢 蠶退紙三錢

右末煉蜜丸如梧子大每服十九空心食前

熱酒下日進三服十日病減二十日驗効一

月大効如睡臥不寧加人參看老少輕重加

減

治婦人血海風冷月水不調攻注臍腹腰腿疼痛

面色痿黃寒熱麻木四肢困弱減少飲食

延胡索 川當歸各一兩 沒藥半兩

右末每服三錢水一鍾半薑三片煎七分食

前服增寒加川芎半兩臥不安加乾薑桂各

半兩

治婦人血乾氣滯腰脚脘下痛寒熱血脈阻滯行

經丹

斑蝥頭翅足去 杏仁去皮尖炒

右二味同研麵糊丸如小菘豆大每服一十

丸煎桃仁湯下日未出時服小便內取下血

片覺臍下痛效

治婦人血乾氣久滯腰腿臍腹冷痛寒熱往來血

刺痛血塊痲癩癥瘕四肢無力飲食漸減久成虛

勞痰嗽破經丹

川大黃兩 硃砂半兩 川芎半兩 紅娘子四箇

川當歸六錢 蠶退紙灰二錢

右熬米醋一鍾入大黃末作膏和芎歸等五

產寶雜錄

味末丸如小豆大每服十丸至十五丸煎紅

花酒下食前三兩時間覺臍腹下微痛藥行

已大小便內取下惡血膿帶為度如未覺加

至二十九三五服效要內消只服五七丸每

日常服隨老少更看患輕重以意加減丸數

治婦人血積血塊血氣產後諸血滯寒熱疼痛四

肢困倦腰痛頭麻沉重黃瘦臍腹久冷酌聖丹

巴豆二十粒去殼研細鹽 沒藥半兩 莪朮四錢

右為末將巴豆膏丸梧子大每服三五丸紅

花酒下三兩服積滯惡血自利去肌虛衰婦

人加乾薑一兩

治婦人阻病心中憤悶吐逆惡心惡聞食氣頭眩

四肢百骨節煩疼沉重怠惰多臥少起甚恣論曰

凡婦人受胎五臟六腑百骸之氣血皆養胎氣若

稟受壯實者則無惡阻之證所受弱者則百病迭

出如心中憤悶吐逆此太陰上冲惡聞食氣四肢

骨節煩疼沉重嗜臥者乃脾肝腎血弱經云體重

煩寃者是也頭眩者氣弱也逆也如好食酸者肝

血虛求救也治參朮湯則百病皆除

人參五錢 熟地三錢 白芍三錢 橘紅二錢

產寶雜錄

芎藭二錢 黃芪五錢 甘草三錢 柴胡去蘆二錢

升麻二錢 防風去蘆二錢 白朮一錢 白朮五錢

枳實二錢 川歸五錢 大半夏湯泡洗七次

右每服五錢水一鍾半薑五片先煎半夏令

熟次下餘藥棗二枚去核煎一鍾溫服不拘

時

芸臆又云惡阻者此絲少陽膽火冲上少陽乃發

之原人受胎氣如春之令萬物始生氣本升而不

降令木氣抑鬱於胃土之中不得調達冲火挾其

勢是猶狐假虎威也故食下即吐蓋膽與胃脘相

向。膽火炎上是也。宜服小柴胡湯。亦愈。

柴胡兩一 黃芩 甘草 人參

半夏各五錢

右每服水一鍾半。薑五片。棗二枚。煎一鍾服。

如食入即吐者。衝任陰火太熾也。每服加竹

茹如拇指大。食少者。加白朮一兩。

治婦人阻病。氣攻肩背。兩脇肋腰臍下痛。胎動不安。

人參兩一 阿膠炒一兩 麥門冬去心一兩 川芎五錢

柴胡錢二 升麻錢二 白朮錢五 郁李仁去皮炒一兩半

產寶雜錄

白芍錢五 桔梗半二錢 神麴炒五錢

右每服五錢。水鍾半。薑五片。煎一鍾。稍熱服。

治婦人阻病。頭痛。肩背煩悶。往往氣脹。不思飲食。

宜服厚朴丸。

厚朴薑製一兩 白朮兩一 麥冬去心五錢 陳皮去白二錢

赤茯苓兩一 大半夏錢五 人參半七錢 前胡錢五

右末煉蜜和。搗三百杵。丸如梧子大。生薑粥

飲下二十九。不拘時。

治婦人阻病。不食。心煩微渴。茅根湯。

茅根半七錢 人參兩一 大半夏湯泡兩半

陳皮去白七錢半 白朮兩一 葛根兩半 赤茯苓兩一

藿香兩半 甘草錢二 枳實錢半

右每服五錢。水一鍾半。薑五片。棗二枚。煎六

分服。

治婦人阻病。

白朮 人參 當歸 枳殼炒各五錢

白芍 陳皮去白 甘草錢半

青皮半一錢 升麻

右每服五錢。水一鍾半。薑五片。棗二枚。煎一

鍾。溫服。如胃寒。加良薑五錢。又方。香附末湯

產寶雜錄

調服二錢。

治妊娠傷風自汗。黃芪解肌散。

人參 黃芪 川歸 川芎

甘草各三錢 白芍錢六 加蒼朮生地黄亦可

右每服五錢。水一鍾半。薑三片。煎一鍾。溫服

治妊娠傷寒壯熱。當發汗。葱白湯。

葱白一握。生薑二兩。切片。水二鍾。煎一鍾。熱

服取汗。

治妊娠傷寒安胎。

白朮 黃芪 人參 阿膠

白茯苓各等分 薑棗煎服

治妊娠傷寒自痢腹中痛飲食不下脉沉者太陰病也

白朮各一兩 甘草各一兩 白茯苓各五錢

黃芪五錢

每服一兩水煎去滓溫服

治妊娠傷寒中風表虛自汗頭疼項強身熱惡寒脉浮而弱太陽經病宜表六合湯

四物湯四兩加麻黃細辛各半兩 每服一兩白水煎服

產寶雜錄

又傷寒頭疼身熱無汗脉浮緊太陽經病四物湯四兩加防風蒼朮依上煎服

治妊娠傷寒後下過經不愈溫毒發斑如錦文宜服升麻六合湯

四物湯四兩 升麻各七 連翹各七 如前煎服

治妊娠傷寒汗下虛痞脹滿者陽明本虛也不過服厚朴六合湯

四物湯四兩 厚朴各七 枳殼各七 如前煎服

治妊娠中風頭項強直筋脉掣急言語蹇澁痰涎不消或時發搐不省人事名曰子癰

羚羊角銹 川獨活去木各 酸棗仁炒去殼 薏苡米炒

五加皮去木各 防風去 川芎

川當歸酒浸 茯神去木 杏仁去皮尖 木香

甘草各二分

右十二味共四錢八分水一鍾薑五片煎取

七分服不拘時

治妊娠肝經風熱上攻眼目帶帛失明天門冬飲子

天門冬 知母 荒蔚子各一兩 防風兩

北五味 白茯苓 羌活 人參各七錢半

產寶雜錄

右每服四錢水一鍾薑三片煎七分食後溫服

治妊娠遺尿不禁服白薇散

白薇 白芍各等分

右每服五錢水一鍾半煎一鍾食前服或作末每服二錢酒調服

治妊娠小便澀痛謂之子淋此與臨產同

冬葵子 滑石 木通 白及

葱白七寸同煎服

治妊娠口乾煩渴上焦壅熱知母飲。

黃芪 黃芩 赤茯苓各一兩 麥冬去心一兩

知母兩 甘草二錢 地骨皮五錢

治妊娠胎動不安腹痛下血欲墮者。

芎根三兩 清酒一鍾

右水一碗煎取一大鍾去滓分作二服溫服。

治妊娠臟燥悲傷欲哭象如神靈數欠者此臟燥也宜服大棗湯。

甘草兩 小麥一升 大棗十箇

右每服五錢水一碗煎至一鍾溫服。

產寶雜錄

治妊娠被驚胎動向下不安小腹連腰痛當歸散。

當歸微炒 芎藭 阿膠炒 人參

白茯苓各一兩 艾葉半兩

右每服五錢水一鍾半煎六分溫服不拘時。

治妊娠損胎血下不止或腹痛。

阿膠一兩 甘草一兩 艾葉半兩 雞子二個

當歸一兩

右以水二碗煮甘草艾葉當歸至一碗多些。

去甘艾等却下雞子阿膠再煎候膠消化熱。

攪分三次溫服不拘時。

治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛胸腹如瓦。

覆於上謂之子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下。

紫蘇散

川當歸二兩 甘草二錢 人參 大腹皮

川芎 陳皮去白 白芍各半兩 紫蘇葉一兩

右每服五錢水一鍾半薑三片葱白二個煎七分空心溫服。

治妊娠四月餘氣膨脹夜不得臥者加味四物湯。

四物湯兩 人參五分 枳殼炒 破故紙炒

右每服五錢水一鍾煎八分溫服不拘時子。

產寶雜錄

到西安大洲治一婦人製此方俗謂氣無補法蓋因血虛氣無所依陰不守陽今則補血其氣自安氣血各得其所歸。

治妊娠胎痛乃血不足故胎痛。

熟地二兩 川當歸一兩

右剉作一服水二碗煎一碗頓服出保命集

治妊娠漏胎服二黃散。

生地黃 熟地黃等分

右末用枳殼白朮煎湯調下一兩日二服出保命集

保命集

治妊娠從高墜下。腹肚痛下血。煩悶。益母散。

益母草 生地各一兩 川芎 綿芪各半兩

右每服五錢。水一鍾半。薑三片。煎六分。食前服。

治妊娠偶有所傷。腹痛不安。縮砂湯。

川歸 川芎 熟地各二錢 白芍二錢

縮砂一兩

右將縮砂炒令黑色。杵碎。每五錢。水一鍾。煎至六分。服。或單用炒縮砂末。每二錢。熟酒調下。縮砂炒勿令焦黑。如不飲酒者。米飲調下。

產寶雜錄

三十五

覺胎中熱。則胎安矣。

治妊娠三四月間。心驚膽怯。名曰子煩。麥門冬湯。

麥冬去心 白茯苓去皮 防風各一兩 人參半兩

右每服五錢。水一鍾半。薑五片。淡竹葉十片。名桃枝竹。煎至七分。溫服。不拘時。

治妊娠胎動不安。心神虛損。腹痛。阿膠散。

阿膠一兩 白茯苓七錢 麥冬去心 紫胡七錢

甘草炙半兩 黃芩兩 川歸微炒 芎藭一兩

右剉。每服五錢。水一鍾半。薑五片。棗三枚。煎六分。稍熱服。

治妊娠胎動不安。手足煩疼。竹茹散。

淡竹茹一兩 川歸二兩 芎藭

黃芩各一兩 甘草兩

右每服五錢。水一鍾半。煎七分。食前溫服。

治妊娠腹中覺冷痛。或胎動不安。或不痛。白朮散。

白朮七錢 草薢一兩 甘草炙半兩

川歸微炒 白薑錢五 芎藭五錢 製朴兩

右每服五錢。水一鍾半。薑三片。棗三枚。煎六分。食前溫服。

治妊娠胎上逼心。煩悶。

產寶雜錄

三十六

用葱白不拘多少。濃煮汁飲之。

治妊娠胎上逼心。下血不止。阿膠散。

花銀一兩 阿膠切炒 芎藭

川歸微炒 熟地黃各一兩

右每服五錢。以銀汁一鍾半。煎至六分。溫服。不拘時。

治妊娠下血。疼痛不止。方用家雞毛。燒灰。細研。以

溫酒調下。二錢。約人行五里。再服。以效為度。

治妊娠從高墜下。腹痛下血。面色青黃。阿膠散。

阿膠一兩 木香錢五 芎藭錢五 熟地

川歸妙 白木 桂心各五錢 白薑炮半

右剉每服五錢水一鍾半薑一片煎至六分

溫服不拘時

治妊娠猝驚奔走從高墜下腹痛下血不止當歸散

散

川歸半兩 阿膠二兩 艾葉一兩 芎藭一兩

右每服五錢水一鍾半煎六分次用生薑汁

生地黃汁半合馬通汁半合煎三兩沸溫服

不拘時

治妊娠僵臥胎轉動上搶心困篤蟹爪湯

蟹爪二兩

甘草錢半 桂心五錢 鹿角膠兩

右每服五錢水一鍾半煎至六分溫服不拘時

時

治胎前臍作痛或作聲者溫米飲下益母丸

治胎動出血產門痛以黃連為末酒調一錢日三服

服

治漏胎下血不止胞乾子母俱死急救之

生地黃一斤 酒五鍾

右同煎三五沸作三服或地黃為丸酒調服

治妊娠三四月嘔吐不食此惡胎也視胎大必不產

生蘆竹根兩 青竹茹 橘皮

前胡各四錢 大腹子 枳殼各一錢

右每服四錢水一鍾薑五片煎六分空心溫服

服

治妊娠三四月胎動不安防其欲墮宜預服杜仲丸

杜仲去粗皮 川續斷酒浸各

右為末棗肉爛煮杵丸梧桐子大每服七十丸米飲下食前

丸米飲下食前

治妊娠十月滿足臨月一日為始便服東胎丸此

出保命集至妙至妙服此藥關防多少證候不可盡述

盡述

白木 枳殼各等

右將飯荷葉包於灰火中煨過搗爛細和藥

丸梧子大每服五十九丸空心熱水下臨產了

住服

治妊娠臨到十月以來多有小便不通此乃胎氣

墜下逼壓脬閉不得小便切不可作尋常小便不

通治療如服通利小便藥則死不旋踵止宜服前

東胎丸自愈或藥內加黃芩滑石亦可如胃寒者

不用加此藥。至妙至妙。謹之慎之。

治妊娠第十箇月胎氣逼壓。脬閉不得小便。升胎飲。

升麻分五 柴胡錢三 防風錢三 川歸錢五

黃芪錢五 白朮錢五 白茯苓錢二 枳殼錢五

右每服五錢。水一鍾。半煎至一鍾。食前服。

治胎前臍腹刺痛。胎動不安。血不止。用水煎。蒸芎朮米。或川歸湯下益母丸。

治妊娠心腹痛不可忍者。及腰腿痛者。延胡索二兩。肥者為末。每五錢。溫酒調服。食前。或加熟地末。

一兩。尤妙。

治難產。芸臆論曰。產育之事。出乎造化。造化之妙。豈易言哉。大槩產母稟受天元一氣。有虛衰強弱之不同。或因丈夫醉酒淫慾。觸犯者有之。或有不開產門。或窄狹者。或胎肥者。或初產不能受痛。用力起倒勞倦者。或因穩婆鹵莽。用手觸犯而腫者。此言之不盡。予每每治難產。纔覺腹痛。便投益母四物湯。往往得效。胎衣亦易下。產後亦無餘證。甚妙甚妙。

益母草五月五日午時採

川當歸

熟地 川芎 白芍各五錢 人參五錢

右每服一兩。水二鍾。煎取一鍾。溫服。連進三四服。妙甚。

治難產。或胎動。子死腹中。或孕兩子。一子已死。一兒即活。令死生出者。安。此方神效。

蟹爪一斤 甘草長二尺 阿膠二兩 妙令

右順手取東流水五升。先煮蟹爪甘草。取汁二升。入膠末。令消烱。溫取一小鍾。頻服。人困極。微開口。灌藥入口。即活。宜東向竈。用藥煮之為好。

治婦人欲產時。先用童便下益母丸。一丸。安魂定魄。血氣自然調順。諸病不生。又能致血止痛。養脈息。調經絡。

治難產。以黃蜀葵花子四十九粒。為末。酒調服。亦治橫生倒生。更加好滑石白芷百草霜各三錢。為末。雞子炒酒服。約人行四五里。即下。

又方。以桑樹上蛀蟲糞。燒灰研細。順手取東流水調下。一二錢。難者不過一二服。

治難產。橫逆生者。亦能安胎順氣。以五月五日午時採益母草。陰乾。修合。用石磨為末。煉蜜丸。如彈

于大每服一丸。臨產童便溫酒下。如氣不順用木香人參湯下。此藥忌鐵器。

治難產及橫逆死胎

真芝麻油

蜂糖

右各一兩用新碗二隻各煎令沸傾作一碗再煎令沸候溫作一服未產再如此服。

治產門不開開骨丹滴乳不拘多少為夫必於五月五日午時修合為上吉七月七日為次吉每月上辰日又居次以猪心血和乳香為丸如梧桐子大硃砂為衣日乾每服一丸面向東冷酒吞下丁

產寶雜錄

香煎湯亦可如未下再服一丸更不下以荷葉心蒂七箇水二鍾煎至一鍾溫化一丸此藥靈驗如神後用開關湯洗右以朴硝漢椒煎湯乘熱用舊帛蘸湯薰洗產門及小腹下冷則再溫再盪治因穩婆觸損產門腫痛或母本身骨槽不開或破者解危湯

滴乳

六七

蒼水

七

朴硝

右用大砂餅一箇陳酒一鍾猛火煎令極淡七重紙封瓶口上扎一孔令氣出上薰產門其骨自開腫消硬軟妙甚

產寶雜錄

治產難催生日月餅杏仁一箇和皮擘開作兩片寫日月兩字復合用菜葉包以酒吞下

治產難或橫或倒或胎死爛脹於腹中

生大柞木枝

甘草

右用順流水三升順手取於砂瓶中煮時用紙密封煎至碗半令香去滓覺脹痛便先准備候坐草時溫溫將一鍾令產母服便覺心中開豁如覺再渴再飲至三四鍾便產更無諸苦此方至驗

治難產兼胎衣不下

產寶雜錄

草麻子

十四

硃砂

雄黃

右末用漿水飯和丸如彈子大臨產時先用椒湯淋洗臍下及產門次安藥丸在臍內却用野苧麻根研細貼臍下用油紙遮藥上以闊帛纏定須臾生下急取其藥一丸可用三人

又方以半夏白薇各一兩為細末下胎酒服一錢若產難只一服橫生二服倒生三服或兒死在腹四服或更加代赭石瞿麥各二兩尤佳
芸窓曰予往往遇人難產以八門遁法令產

一一〇一

婦向生門坐即產妙不可言。古聖立法不可測矣。

治產後諸證。芸窓論曰。產之後氣血大脫。或腹痛頭痛發熱。少思飲食。四肢怠惰。語言聲低。而無力氣不相接。目睛不了。此皆血氣虛弱。縱無前證者。是產母本身壯實也。唐俗之醫。以腹痛謂之兒枕痛。反上下血之劑。以熱不可用。補藥謂之熱不可補。用發散之藥。止謂之實實虛虛。變生諸證。錄此始矣。兒枕之說。此說不知從何人立。此論獲罪多矣。且如鄉間積祖醫婦人之家。亦如此說。孟子云。

非助苗者也。掘苗者也。夫兒懷在腹中。踞脚以坐。兒枕放在何處。此等之徒。恣意妄言。以惑世人。識者幾人矣。腹痛者。腎虛也。發大熱頭痛。血逆也。不思飲食者。蓋為血弱也。又有一產之後。便食雞蛋。或軟肉等物。胃血弱不能消化。遂致內傷。大凡產後證候。全賴傷寒敗證。必於四物湯內加減用俗云。生兒無慣熟。予思之。治產後證。亦慣熟難矣哉。治產後腹痛。或發大熱。頭疼。四肢怠惰。不思飲食。益母四物湯。

益母草

四物湯

右每服用水二鍾。薑三片。煎八分。溫服不拘時。

又用補中益氣湯。

人參 川當歸 黃芪 白朮

橘仁 黃芩 升麻 柴胡

蒼朮 益母草

右每一兩水二鍾。薑五片。棗二枚。去核。煎取

八分。溫服。不以時。如胃寒。加良薑五錢。

治產後陰門不開。

蛇牀子 五倍子 白礬

右等分。每一兩水一碗。煎七八滾。乘熱用舊

衣帛蘸藥。漂洗。再溫再洗。

治產後腹痛泄瀉。調中湯。

白朮 川歸 川芎 甘草

良薑 升麻 黃芪 桂心

白芍 熟地 吳茱萸

右每服五錢。水二鍾。薑三片。煎至一鍾。溫服

如脈遲細弦者。或痛瀉不止者。可每服加生

附子半兩。先煮令極熟。次下餘藥。切不可一

齊下。或有因傷風。乃肝木刑肺。亦有之。如此

則加防風五錢。

治產後血暈心悶恍惚如見鬼狀獨聖散此血走

五靈脂炒者六錢半

右為末溫酒調下二錢口噤者幹開灌之入

喉卽愈若用荆芥穗末等分童便調下亦好

治產後血暈古法纒分娩了便用炭火以好醋潑

火令氣薰冲免血暈之患常用得效。

治產後血暈及九竅內出血煩渴不止欲死者此

方可活。

芸薑子

產寶雜錄

川歸各一兩

肉桂各半兩

四十五

益母草

右益母草須倍加用每五錢童便與酒各半

鍾同煎至七分熱服。

治產後風氣在表面目四肢浮腫宜加減七聖丸

每二十九丸白湯下日加三四丸以利為度如浮腫

喘嗽加檳榔木香倍之謂氣多浮則腫如頭目昏

冒加羌活防風川芎謂多風也如浮腫只服七聖

丸

郁李仁去皮大黃各一兩

肉桂去粗

羌活

檳榔

木香

川芎

右末煉蜜丸梧桐子大每二十九丸溫水下食

後臨臥服

治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮腫不可

作水氣治之但調經水腫自消又有因去血過多

心虛易驚加生龍腦葉枝一握煎服

沒藥研肉桂各一錢細辛洗半錢麝香另研半錢

右為末每服二錢生薑湯溫酒任意調下。

治產後中風口噤牙關緊急痰涎角弓反張以荆

芥穗川歸等分為末以豆淋酒每二錢調下童便

尤妙。

產寶雜錄

四十六

治產後百病疼痛一捻金散。

馬蘭草炒麒麟竭

沒藥

乳香各半兩

川歸兩一

右末每三五錢熱酒調下此方產前百病亦

治

治產後因血虛或敗血發熱腹中疼痛煩熱不安

或脹滿飲食不下小便澀多是腸瘕經云血氣不

足逆於內裏亦有生在陰門者宜服瓜仁散

冬瓜仁合薏苡仁合桃仁去皮牡丹皮去木

右每四錢水二鍾煎至一鍾食前服

治產後纔三四日。值盛暑忽發大熱。敗血攻心。狂言叫呼。奔走掣挺不定。診其脈虛疾。而大惡露不行。

乾荷葉 生地 牡丹皮 去木

右濃煎。以真蒲黃二錢作一服。以前藥汁調服惡露即下。遂安。

治小產後惡露淋瀝不斷。將近月餘。服諸藥不效。者用真五靈脂微炒。焦為末。取糊丸。桐子大。每服三四十九。米飲或酒任下。隨手效。

治產後用力太過。陰脫不收。右先用大麥米洗取

產寶雜錄

汁水。入鹽少許。冷洗。令其潤澤。次用桑白皮濃煎湯乘熱薰洗。按上。永不再下。

芸窓論婦人陰脫不收。古方止言坐草用力太過。然莫知其病從何來。愚謂人之五臟六腑。譬如天之星辰。火氣舉之。陰脫不收。皆肝腎虛弱。失守下焦。兼元氣不足。不能升運。故也。醫者不考其源。無法治療。予嘗以男子疝氣藥中。加減。後見效用。請蘆巴黃芪。以補元氣。破故紙。收攝腎氣。川萆薢。川練子。益腎水。小茴香。宣通腎氣。木瓜。御米殼。訶子。皮。酸澁。收固肝腎氣血。河間云。澁可以去脫。升麻

防風能收其氣。經云。下者舉之。或腰膝痠痛。有藥也。加生附子。白薑。或小便淋瀝者。氣弱也。加甘草。稍升陽益氣湯。

黃芪 五錢 胡蘆巴 五錢 鹽炒 破故紙 二錢

小茴香 三錢 川萆薢 三錢 川練子 三錢

木瓜 二錢 訶子皮 二錢 御米殼 二錢

升麻 五錢 防風 三錢 甘草稍 三錢

右分作七服。或八服。每服五錢。水一鍾。半煎。取一鍾。食前服。如腰膝痛。加生附子二錢。乾薑二錢。亦分作八服。如用薑附。先煎薑附。令

產寶雜錄

極熟。次下餘藥。

治產後生腸不收。用枳殼煎湯。溫浸。良久。即入。

治產後子宮脫出。有一老婦云。我昔受此苦。用酸豚草。俗名老鴉酸。又名鴉鵝飯。煎湯。用草坐。就瓶薰。纔薰收半。稍溫。下手洗。即安收。

又方。用荆芥皂角。炙為末。煎湯洗了。用鐵漿塗。用磁石煎湯服之。即收。

又方。濃煎羌活湯。溫服。

又方。荆芥穗 藿香葉 臭椿樹皮 各等

右將前藥煎湯。薰子宮。即入。

又方用草麻葉在子前白礬飛過各

右末以紙攤藥須用手托紙藥於脫處徐徐

用手托入

又方用五倍子白礬為末溫湯泡洗先用淡竹葉

根煎湯洗後用前乾糝立效

又方用黃柏一兩為末浸冷水洗或溫水洗淨用

飛鼠糞燒煙薰入或用草麻子塗頂心吸入仍游

前藥

治產後臍腹刺痛用川歸煎湯下益母丸

治產後胎衣不下落在胎中又橫生不順死胎經

走寶雜錄

日不下者腹脹滿悶心痛炒鹽點湯下益母丸

治產後中風牙關緊急半身不遂失音不語用童

便和酒各半鍾調下益母丸

治產後咳嗽胃膈不利惡心口吐酸水面目浮腫

兩脇痛舉動無力溫酒下益母丸

治產後兩太陽痛呵欠心忪氣短肌體羸瘦不思

飲食血氣身熱手足頑麻百節疼痛溫米飲下益

母丸

治產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼神

狂言不省人事薄苛自然汁如無生者濃煎乾薄

苛湯下益母丸不如和童便與酒相停下

治產後垢面頰赤五心煩熱或血塊臍腹奔痛時

發寒熱有冷汗者童便和酒各半下益母丸或薄

苛自然汁亦可

治產後餘血惡露不盡結滯腸臍刺痛惡物上冲

心胃悶者童便和酒各半下益母丸

治產後大小便不通煩躁口苦薄苛自然汁下益

母丸乾者煎湯亦可下

治產後瀉血者棗湯下益母丸

治產後白帶下膠艾湯下益母丸

產寶雜錄

治產後忽然顛狂者切不可鎮心藥補其心氣

則難治只宜小柴胡湯加生地黃煎服

治產後腸中痒不可忍以針線袋安所臥褥下無

令患者知之

治產後閉目不語孤鳳散用白礬末一錢熱水調

下

治產後因寒氣入產門臍下脹滿手莫敢犯此寒

痛也服仲景羊肉湯用生薑同羊肉煮汁服愈

治逆產脚先出者

馬蛇蛇一 蟬脫十四 血餘小兒胎

右三味燒灰分作二服溫酒調下連進二服
仰臥少時兒即順生或用小絹針於兒脚心
刺竟不必行此法

治婦人難產催生極妙其祕方用路邊夏曆踏板
上泥土以竹篦刮起研篩去砂加麝香少許以米
飯丸如櫻桃大瓦罐封直候產婦坐草時痛甚至
艱難順取長流水送下未至危殆不可服之

治胎死不下以利斧頭燒令通紅置酒中待微溫
令飲之即下

又方川歸一兩 芎藭七錢 瞿麥穗七錢
產寶雜錄

右作一服用米醋一鍾水一鍾半煎八分
作三服溫服

又方朴硝為細末二錢溫童便調下見信
又方胎死不下或胞衣不下用肉桂心二錢 麝香一錢

右研勻酒調服須臾如手推下酒不如童便
然此亦不如煎四物湯一二服之

又方用黃牛糞塗腹上立出

又方用川歸煎湯吞槐子十四粒即效

又方取竈下黃土三指一撮以酒調服立效

又方以丈夫小便一大鍾煖飲之立效

又方以醋二合漱口開灌之即出

又方以蟹爪散方見前

治小產下血至多子死腹中其人增寒手指甲青
白面色黃黑或胎上搶心悶絕欲死冷汗自出喘
滿不食或食毒物或誤服草藥傷胎下血不止胎
尚未損服之可安已死服之可下至妙

牡丹皮 白茯苓 桂心 桃仁炒

赤芍等分 益母草倍加

右末蜜丸如彈子大每服一丸細嚼淡醋湯

下連進二丸危甚者亦可取出

治胞衣不下奪命丹

附子半兩去 牡丹皮去木 乾漆二錢半切
皮臍泡 乙兩細炒煙盡

右為末米醋一升大黃末一兩同熬成膏丸

桐子大每五七丸溫酒下不以時候

治妊娠有他病欲去胎方瓜萋湯

瓜萋 桂心各二錢 豉一升

右以水四升煮取一升半服之

又方附子一箇為末以醃醋調成膏塗右足心即

下

又方瓜萋根四兩 肉桂五兩 牛膝二兩 瞿麥一兩

右每一兩水二碗煎一碗空心服

又方以官桂末一兩入麝少許酒調服又用桂末些少抹入產戶中引氣下行即下

又方以川芎末三錢酒調空心服

又方以肉桂末二錢以童便調服又能下胞衣尤妙

又方麥蘖一升白沙蜜一升

右二味相和煮服之胎即出或只用麥肉末每三錢水一鍾煎至七分服

治婦人欲斷產方

產寶雜錄

以蠶故紙方圓一尺燒灰為末酒調服終身不復孕矣蠶退紙用原蠶者好即五熟蠶也

治鬼胎如抱一甕

吳茱萸 川烏

秦艽 柴胡

白僵蠶直者洗

巴戟生用去心 巴豆去殼不

芫花醋煮各等分

右為末煉蜜丸桐子大每七丸蜜酒吞下取出惡物即愈

治妊娠兒在腹中哭

用多年空屋鼠穴中土一塊令產母噙之即

止

又方用川黃連濃煎汁母呷之

治胎前諸般淋瀝小便不通醫作轉脬他藥不治此方極效

檳榔 赤芍各等分

右為粗末每五錢水一鍾半煎七分去滓空心服尋常男婦血淋及小便淋漓澀滯水道疼痛服此立效

治產後因坐草用力太過陰脫不收刺猬散

刺猬皮一筒燒存性 磁石 桂心各半兩

產寶雜錄

右為末用蠶頭一箇燒灰另研細每服二錢入蠶頭灰半錢匙米飲調空心服仍用後藥薰洗

薰洗

香附子 荆芥穗 五倍子 白礬各等分

右每一兩煎湯薰漂洗再溫再洗

治婦人室女月事不來經四月不來皆脬脉閉也

用茶調散吐之次用玉燭散芎藭湯三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水經水通後服四物湯

茶調散

瓜蒂不拘多少 好茶中停

右為末。每服二錢。薑汁調下。

玉燭散

白芍 川歸 熟地 川芎

厚朴製 枳實炒 大黃 朴硝各等分

右每五錢。白水煎。食前服。

三和湯

川歸兩 芍藥 熟地 川芎

大黃 連翹 甘草 黃芩

薄荷 朴硝各一兩 梔子兩

右每服五錢。白水一鍾半煎一鍾。食前溫服。

桂苓白朮散

官桂 茯苓 白朮各半兩 甘草

澤瀉 石膏 寒水石各一兩 滑石二兩

右末。熟湯調三錢。新水薑湯亦可。食後服。

治婦人氣喘。手足煩熱。骨蒸寢汗。口乾引飲。面目浮腫。

天門冬去心皮 麥門冬去心 生地黃三斤取汁煎膏

右將二門冬為末。不要見鐵石。白杵細用地

黃膏和。九桐子大。煎逍遙散吞下。

川歸微炒 白茯苓去皮 白芍 白朮

柴胡 加人參 荊芥穗 防風各等分

右每三錢。水一鍾。煨薑一小塊。薄荷少許。煎

七分。溫吞前九子。

治婦人遍身生風。丹赤痒。四物湯。加凌霄花一兩。

調袋米一錢。右入酒少許。食後連進二服。即效。

治婦人遍身起冷丹。此俗呼也。北人呼為飯吃搭。

此血熱也。

生益母草 生馬鞭草

又方。以廁等燒煙薰之。永不再發。

治婦人寒邪。手足麻木。

白芷 陳皮 川芎 麻黃不去節

甘草 白朮

右六味剉。每服五錢。薑三片。棗一枚。水一鍾

半。煎至八分。

治婦人血崩。以縮砂末。酒調服二錢。至妙。

又方。紅花 陳棕皮 荔枝殼各等分

右燒灰存性為末。每三錢。陳米飲湯下。

又方。獨聖散。

良薑為末。每三五錢。濃煎艾湯調。食前服。如

老婦人。加大椒一兩。臍下冷痛。加五靈脂二

兩作丸子服

又方。僵殼 艾葉 蓮蓬殼

右燒灰存性為末。每服二三錢。酒調下。

又方。用藕節切片。焙乾燒灰。飯九桐子大。每六七十丸。空心米飲下。又用藕煮熟於菜羹裏。理如食法。隨意如常食之。以悠久為上。自然而愈。更服四物湯妙。

治婦人虛勞百損。內傷血氣。風冷客邪。耗散真氣。臍下久寒。積痛難忍。小便淋瀝。腰背拘急。陰弱盜汗。頭目昏重。不時寒熱。血崩帶下。繞臍撮痛。諸醫產寶雜錄

不差。此方立效。不可具陳。孫氏方。

紫稍花 韶粉 破故紙 炒胡椒

蛇牀子 去土各

右末煉蜜丸。如桐子大。每服二十九。熱酒空心下。食乾物壓。一日三服。至三十九。又將此藥末一兩。酸醋一大升。或好酒一升。煎令大沸。令婦人披衣。於收口瓶兒上薰陰戶。通手淋洗。盆下用火。如冷再溫。如此三五次立效。此方大驗。幸勿輕視。

治婦人脾血痺。經脈不通。即化黃水。水流四肢。則

遍身皆腫。各曰血分。其候與水腫相類。庸醫不識。便作水病治之。只恐喪命。宜服當歸丸。

人參 川歸 大黃 瞿麥穗

赤芍 肉桂 白茯苓 苦苧藤 各等

右末煉蜜丸。梧子大。每三十九。空心米湯下。治婦人身黃額黑。日晡發熱惡寒。小腹急。足下熱。其脈浮緊。謂之女勞疸。腹滿者難治。此病富貴之家。或薄劣之人。男女同室而浴者。多成此病。出千金方

滑石 石膏 分

右末大麥粥飲調下。二錢。名石膏散。

產寶雜錄

治女勞疸

消石 煨汁 白礬 煨汁

右末每二錢。以大麥粥飲調服。日三服。厚衣被覆。取汗。若大便黑。小便黃。是效也。

治婦人白帶。香白芷切作小片。用石灰炒黃色。去灰淨為末。每服二三錢。陳米湯調空心下。

又方。小茴香一兩。炒香為末。每二錢。瓜蒞子煎酒一鍾。調空心熱服。日二服。

治婦人赤白帶。白濁。

黃荊子 煨汁 子 為末。酒調下。二錢。

又方。石菖蒲 欖子等 為末。鹽酒調下。

又方。赤白帶下。及尿水不止。如崩之狀。

赤芍炒紫色鋪地 黃狗頭骨燒存性

右為末。每二錢酒調服。

又方。治白崩 棕櫚燒灰 絲瓜燒灰各

右為末。空心鹽酒或湯調下。

又方。治白崩。以五月蠶沙炒赤。煙盡為度。為細末。

糯米糊為丸。或餅子。陳米湯或酒任下。

又方。治冷帶及無子。用雞子殼五兩燒細綿子 右為末。酒糊丸。每二十九。空心酒下。

治婦人陰中生瘡。如蟲咬痛。用生桃葉搗細。綿裹

入陰中。日三四易之。立愈。

又方。用黃丹。枯白礬。篇蓄。藁本。各一兩。硫黃半兩。

蛇蛻一條。燒灰。荆芥。蛇牀子半兩。右研極細。另用

荆芥。蛇牀子。煎湯溫洗。軟帛挹乾。香油調塗。如瘡

濕乾。糝

又方。青黛 黃丹 輕粉 五倍子等分為

右將賣肉鋪拭肉布。燒灰為末。和前藥。以小

絹袋盛。入陰中。糝乾。用荆芥薄荷栢葉煎湯

洗。用前藥以香油調塗之。

又方。先用黃芩。海桐皮。白礬。韭菜。煎湯洗。後用破

鼓牛皮燒存性。細研入輕粉。在內用雞腸上刮下

膏膩。調藥塗瘡上。如蟲咬入陰內者。用雞子一箇

煮熟去殼。塗藥末於上。綿子兜入陰中。如洗了。向

火炙患處。得痒即蟲行。若身微作寒。服藿香正氣

散二三服。

治婦人陰門痛。用烏賊骨為末。酒調一二錢。食前

服愈。

又方。炙足大拇指當中橫紋處七壯。即愈。

治婦人患臍下小腹連陰。遍生濕瘡。狀如馬瓜瘡。

他處並無。且痒而痛。大小便澁。出黃汁。食減面微

腫。醫作惡瘡治。用鰻鱔魚。松脂。黃丹之類。傅上。其

瘡愈熱愈痛。問此婦平日嗜酒。喜啗魚蟹。動風等

物。急以溫水洗去前藥。以馬齒莧四兩。研爛細。入

青黛一兩。再研勻。傅瘡。即時熱減。痛痒皆去。仍服

八正散。日三服。瘡漸可。二十日全愈。此瘡乃下焦

畜風熱毒氣。若不出。當作腸癰內痔。此婦不能禁

酒及動風物。後果患內痔。

治婦人陰腫。大如升核。痛不問男子。皆可用馬鞭

草搗汁塗之。愈。

又方。治陰腫堅硬。枳殼半斤。打碎炒熱。絹帛裏熨患處。冷則易之。

又方。平胃散。加貫衆為末。熟猪肝拌藥。入陰戶內。數日可痊。

治婦人陰中生痔。凡九竅內有肉突起者。皆名痔。

右用烏頭七箇。燒存性。以小瓦罐盛米醋。淬乘熱薰。候通手。沃之。

治婦人乳癰。

黃色瓜蒞子多者一箇切細 川歸兩 甘草半兩

沒藥二錢半 乳香一錢 皂角刺紫色者一兩

產寶雜錄

右用無灰酒三升。銀石瓦器內入前藥。漫火熬取一升清汁。分作三服。食後服。如已成能化膿為水。疾甚者再修合服。以退為度。

又方。瓜蒞子 忍冬葉 右各一兩。濃煎汁飲。即消。

又方。絲瓜子。即天羅子。燒灰酒調下。立效。

又方。瓜蒞散。

瓜蒞子并核切 皂角刺炒 甘草炒

御米殼細切蜜 白芷炒

右等分為末。每二錢酒調。食後服。日三服。至

子六月。有婦人年及四十。素不生育。忽生此疾。初發如彈子。漸大如拳。山中無藥。予製此

方服之。漸愈。如大便秘。加大黃服。

治婦人乳兒者忽乳痛。紅豆散。

小赤豆為末。食後酒調二錢服。

治婦人女子乳頭生小淺瘡。痒搔之。黃汁出。浸淫。名曰妬乳。又有飲兒乳。皆欲斷。赤龍湯。鱗皮一

二斤。切細。水一斗。煮取五升。夏月冷用。冬溫用之。洗即愈。若深敗爛久瘡。洗亦愈。切莫傳膏散。

又方。益母草。即野天麻。切五升。水一斗。煮取一升。

產寶雜錄

隨寒熱洗。極能殺痒。

治婦人血風攻腦。頭旋悶倒。不知人事。以五月五日午時採蒼耳嫩葉心。不拘多少。陰乾為末。常以酒調二錢服。其功力大。善通頂門。

治婦人氣力衰少。脉澁不利。絕無乳汁。用猪蹄二隻。通草五兩。

右將猪蹄理如法。以水一斗。同通草煮取四

五升。取汁服。乳即通。

治婦人曾用毒藥下胎者。藥毒衝心。外證牙關緊。急口不能言。兩手強直。握拳。頭低自汗。身微熱。外

證與中風相似但以脉浮而軟十死一生醫者不識作中風治之必死無疑用白扁豆為末新汲水調下豆用生者

治婦人小便不通曾有一婦人患此諸醫通用淋藥無非通滑之劑並無效驗忽遇一醫診視云左右尺脉皆沉而微其證乃陰虛小便難故也遂用大附子一箇八錢重去皮臍炮熟放鹽水內浸良久同不蛀澤瀉八錢重水煎服每服用燈心七莖煎服隨通立愈

芸窻論曰淋秘不通俱有寒熱豈可驟言為熱前

證用附子而治愈藥雖是而論非也既陽盛陰虛焉用附子而得愈此不明造化之理蓋水極似土寒極則冰故也所用附子亢陽之劑寒散冰釋則水流矣此謂之陰盛陽虛耳

又方治淋病 白朮二兩炒黃色篩去細屑 右為末每五錢用石葦葉煎湯調下

治婦人急心疼方

真蛤粉為末炒赤色酒調熱服

治婦人血氣刺痛

香附子咀二兩用瓦瓶酸醋煮一伏時取出

炒乾為末每一兩入甘草三錢同末以鹽酒鹽湯任下

又方神麴香附各炒赤為末熱酒調下二三錢

又方治婦人臍腹疼痛不省人事只一服立止禁窻云人謂是心氣痛誤矣蓋木盛則痛肝病也

白芍 五靈脂以其能走肝家血 木通去皮各

右為粗末每四錢醋一盞煎三沸再入水一盞再煎三沸去滓食前溫服

又方治老婦血氣痛不可忍者

老松皮醋炙 玄胡索分

右為末用秤錘燒紅淬酒調下

治婦人血崩

當歸全 熟地黃 白芍 川芎

大葉艾 阿膠炒 黃芩去蘂各半兩

右為粗末每四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓空心溫服

又方治積年血崩用草血竭蒸熟油鹽薑淹曬酒曬下或收為末薑酒調服

又方棕毛 垢膩髮 千里馬即草性後半截

右各等分燒存性為末酒調服

又方。溫酒下益母丸。

又方。治室女血崩。不問冷熱皆可服。

荊芥 蓮房等分

右為末。每二錢。空心米飲調下。

又方。椒目 焙為末 綿子 燒灰各等分

右每服三錢。以鹽酒調服。

又方。陳蘿蔔子炒赤細研一大盞。陳皮湯下。中年

人弱者。用四物湯加茱萸生薑肉桂。

治婦人月水不止。木賊散。

木賊 二錢 赤芍 荷葉 栢葉 各一錢半

神麩 半兩

右為末。每二錢當歸酒下。

又方。用牡蠣火煨為粉。研細用醖醋搜作團。再煨

通紅。候冷研細。用艾葉為末。醖醋熬為膏。和礪粉

丸如梧子大。每四五十九醋艾湯下。

治婦人乾逆。用白芍為末。薑三片煎服。

治婦人臟燥。自歌自笑自哭。紅棗燒灰存性為末。

米湯調下。無時。

治婦人血氣沖心欲死者。

右為末炒薑酒下。 仁三錢 吳茱萸五錢

治婦人經病。每遇立夏後。自覺五心煩熱。手脚懶。舉身體沉重。飲食少進。俗謂之疰夏。此熱傷氣也。宜服解肌散。

人參 川歸 柴胡 黃芩

大黃 芍藥 甘草 各等分

右每服五錢。水一鍾半。薑五片。大棗二枚。去

核。同煎服。宜通血氣。如有熱。倍加人參。以熱

退為度。久病除。新病不生。最補益人。

治婦人冷熱不和。心腹時痛。或水瀉。或乳汁不好。

香附 貝薑 赤芍 烏藥 等分

右為細末。每服一大錢。水一鍾。煎取六分。去

滓。溫服。如心腹痛。入酒煎。水瀉米飲下。

治血淋不止。并赤白帶下。

芍藥 當歸 生地黃 川芎

阿膠 艾葉 黃芩 蒲黃 炒

茯苓 甘草 赤石脂 荊芥

右炒糯米一撮。白水同煎。空心服。

治男婦食冷物停積。胃膈脹滿。大小便不通。危極

者。 大黃 荊芥 各等分 為末。水煎服。

辨傷寒陰症陽症法

傷寒陰症似陽陽症似陰不能別如發熱而吐瀉如無汗而狂者此藥主之

葦莖一味為末用乾麵炒黃居葦莖四分之
一右為細末酸米醋調丸如雞子大令患者
兩手握如陰證則自然緊握汗出而愈如陽
證則自然撒去只此可以隨證用藥

傷寒陰陽二證不分者宜服獨參散一兩作一服汗出即愈

行醫撮要方

雜錄

每患癰疽腐肉不去外科以杖去之不宜宜用芸香降香二味燒煙薰之腐自去甚神妙

應夢人參散治傷寒體熱頭疼及風壅痰嗽咯血

白芷 乾葛 青皮 桔梗炒

白朮 人參各三兩 甘草三分 乾薑炮三字

右為粗末每服二錢水一盞薑三片棗二枚

煎七分通口服如傷寒入鼓數粒同煎熱服

大有效不拘時崇寧癸未米芾為太常博士

始造待漏冒寒得疾痰嗽如膠有血更三醫

不退一日謁太尉蔡元度取人參散一貼并

棗見授繼歸有客承議郎薛道至留食藥熱

進一服良久痰嗽立止而客怪曰公氣色頓

快何藥也為道其由求方蔡公又送一貼越

三日病痊除往見蔡公公曰此藥僧伽也元

佑中泗守劉士彥病八日不汗女求僧伽甚

確夜夢告曰翌日塔中取藥遂於大聖鉢中

取得此藥題印云太平州楊家人參散今太

醫局中亦賣無甘草乾葛兼無分兩疑非真

方

入瘟家令不相染着用雄黃研細水調以筆濃

塗鼻竅中與病人同牀亦不相染初洗面後及臨

臥時點之凡疫家自生惡氣聞之即入上元宮遂

散百脉而成斯病宜即以紙撚探鼻嚏之為佳如

以雄黃點鼻則自不聞并辟諸惡夢神良方

崇禎庚辰季春十日烏程閔齊伋遇五父

閔日觀觀我父全訂

跋

女科百問上下卷產寶雜錄一卷大宋醫官仲甫
齊先生所撰後襍錄有芸窻論是書非惟治婦女
產科及諸病證若男子得病證有與同者除療產
方外亦宜究病源之所致合藥性之所宜診其脉
識其病考其方藥而隨治之無不效也予偶遇是
書於少司馬金公書舍簡閱不捨遂假錄於槐屋
不終月而畢如其間字有訛舛以俟高明同志者
較焉

弘治十八年龍集乙丑仲夏五月望後丙午日江

據上海圖書館藏清道光二十五年刻本影印原書版框高一八二毫米寬二五六毫米

丹溪先生胎產秘書

〔元〕朱震亨撰

道光乙巳重鐫

胎產秘書

正園藏板

胎產秘書目次

卷上

保胎前

保安胎論

補母壽子論

加味大造丸

生化湯主方

耗氣種子方不可服辨

墮胎生子不壽孕後

滋榮易產方

胎產秘書

丹溪安胎飲

孕婦元氣不足倦怠胎氣不安身微熱減食

孕成三月經阻嘔逆惡食頭暈倦怠

孕婦常多怒氣胸腹滿悶或服順氣烏藥香砂耗藥

反滿加悶

面目虛浮四肢有水氣 胎氣上攻心腹脹痛

受孕下血不止或按月去血點滴名曰漏胎

孕婦頓仆動胎下血 孕婦心驚膽怯煩悶不安

孕婦腿膝發腫氣促滿悶足指腫水出

孕婦口噤項強手足攣縮語澀痰壅不省人事

辨胎症名

補母壽子安胎飲

孕婦患病勿妄論

議落胎救母辨

濟坤大造丸 治氣血弱不

瘦胎方不可服辨

孕婦樽節飲食禁忌

目次

治胎氣不安腹痛腰疼飲食不

美孕至五六個月並宜服之

上海

孕婦小便澀少或成淋瀝名日子淋

孕婦形體勞苦或過食炙炒小便中帶血

孕婦臍腹作痛脹或小便淋

孕婦胸滿腹脹便閉遍身浮腫名曰胎水不利

孕婦元氣壯盛孕後有血來幾次乃血盛故也

孕婦咳嗽屬風屬寒 孕婦咳嗽吐血

孕婦霍亂吐瀉心煩腹痛

孕婦瘧疾寒多熱少 孕婦口乾不得臥

孕婦壅熱心神煩燥口舌乾渴

孕婦嘔吐不食胸中煩燥

胎產秘書

目次

二

孕婦熱病斑出赤黑色小便如血氣急欲絕落胎

孕婦熱病骨節痛不急治即落胎

孕婦患吐衄血或因破傷失血驚患口噤項強背直

類中風症 加味益母丸

附載保產經驗仙方 保小產方

卷中

備臨盆

臨產須知 計二條

又臨產須知 計五條

臨盆頻服生化湯 七八個月預備生化湯

從權急救加參生化湯 治產下形色脫暈或汗多脫暈

產下即煎服生化湯 生下服生化湯三四帖

胞水來交骨未開停產 加味加參生化湯 治子宮不閉

催生如神散 加參生化湯 治產下即患氣短症

面黑唇青 霹靂奪命丸 治臨產未產時目翻口噤

口中沃沫 橫生逆產方

橫倒難產方 橫倒先露手足方

催生免腦丸 產婦宜戒 計四條

產婦禁藥 計九條 產後忌物 計九條

附載製猪肚方 七八個月服之健脾助力產無崩暈之患

卷下

胎產秘書

目次

三

治產後

產後血塊痛 計二條 諸凡雜症

凡危急症 產後胞衣不下

產戶因虛感寒產門如生陰毒痛苦難近

產後脫肛或痿症或勞倦昏暗血暈

產後身熱惡寒冒風寒 產後乍寒乍熱脇痛頭痛

產後感寒心痛腹痛 產後身熱夜熱往來寒熱

每日應期寒熱類瘧 產後感寒心下痞滿

產後感寒咳嗽身熱 產後傷食

產後忿怒心膈滿悶 產後日久大便不通

加味生化湯	治產後三日內完穀不化	參苓生化湯	產後血塊散
加減生化湯	治產後七日內患痢	香連丸	治禁口痢
產後諸種瀉痢	計十條	生化六和湯	血塊未除日患霍亂
附子散	治產後霍亂吐瀉手足逆冷	溫中散	治產後霍亂吐瀉不止
加減生化湯	治產後嘔逆不食	溫胃丁香散	治產後七日外患嘔逆不食
石蓮散	治產後咳嗽逆嘔	生津益液飲	產後血少汗多內煩作渴
健脾利水補中益氣湯	治產後水腫	五皮散	產後風濕面目虛喘
養心湯	治產後心驚悸不安	安神丸	與前藥兼服
清骨丸	治產後骨蒸	保真湯	治骨蒸勞熱
胎產秘書 目次 六			
加味生化湯	治產後心痛	加味生化湯	產後風冷乘虛入腹作痛
加減生化湯	治產後小腹痛	延胡索散	
起痛散	治產後身疼痛	養榮壯腎湯	產後感冒風寒傷冷腰痛
茅根湯	治產後諸淋	又方	治產後淋水便痛及血淋
又方	治小便數及遺尿	桑螵蛸散	
參歸生化湯	治產後流注未成已成	神仙迴膿散	產後流注惡露日久成膿
療陰蝕瘡方	治陰戶生瘡	治疳虫食下部及五臟方	
丹溪醫案方	治大便不通	交加地黃丸	血塊半消可服此方
產後空肚痛方		附載保赤須知	計六條

凡例

一 是書法脈取宗於丹溪先生而作者之姓氏湮沒不傳故仍顏之日丹溪秘書

一 是書原本錯雜無次今分為上中下三卷隸以胎前臨盆產後三種諸症款條各從其類使病家便於檢閱並非敢作聰明而亂舊章也

一 原本草錄差訛甚多今揆其理而度其意畧易隻字度免疑義要期無失作者之初心

一 是書之刻欲使販夫牧豎家喻人曉故於病症用方圈於加減用尖圈於句讀用圓圈稍加分別俾凡例

觀者瞭然於心目之間

一 每卷末附載數條皆係經驗良方緊要事宜故錄之以補是書所不逮諒觀者未必以為多贅

衡山周君樂善好施見是書而即有博濟之願今梓成行世裨益良多第恐不能辨字無資搆藥者正不乏人唯望從旁見聞君子共發仁慈或指示以方或相助以藥則隨遇安全福報自有攸歸

紫陽一峯山人識

丹溪先生胎產秘書

紫陽一峯山人校閱

卷上 保胎前

保安胎論

凡孕婦脾胃旺而血氣充則胎安而產正生子精神有壽何須用藥以調氣血安胎耶若稟質薄而氣血衰脾胃弱而飲食少則虛症百出孕成數墮或產子不壽是必資藥力以助母安胎壽子也故丹溪先生册定安胎飲之良方治孕婦元氣虛弱胎氣不安飲食不美或腹冷腰痛隨症加減皆可治胎前諸症後

胎產秘書

卷上

開隨症加減二十餘方按方取用夫精血會凝而成孕精氣蒸胃而嘔逆血少肝虛而愛酸物胃氣受傷而厭飲食若素弱嘔阻本方量加橘半若稟厚吐逆再加竹瀝薑汁下血不止名胎漏胎漏宜涼須加地黃生熟小腹墜痛名胎痛胎痛宜溫少加帶殼砂仁頓仆動胎下血膠艾為佐怒氣冲胎上逆木香為使小便短澁成淋瀝乃子淋之症安樂飲不應本方宜小便帶血流於脬是膀胱之熱逍遙散宜入炒山梔子瘧症多面目虛浮而肢體有水氣全生白朮堪醫子煩症則心驚膽怯而或時加煩悶安胎竹葉無疑

天仙藤散治足指縫內之出水病名子氣虛人多加參朮羚羊角散瘵項強筋搐之拳攣病名子癩痰多竹瀝參歸至於脾胃氣虛而胎壓尿胞則臍腹脹滿而小便淋閉安胎飲服法宜加探吐升提有如脾胃虛弱而轉運舒遲則飲食停滯而腹脹嘔吐安胎飲力緩加參平胃調和又有胸滿腹脹便閉遍身浮腫名曰胎水不利須用鯉魚湯若脾胃虛弱佐以四君五皮又有胎氣上攻心腹脹滿作痛名曰子懸之候必用紫蘇方若食少晡熱兼以加味逍遙柴前梅連為丸治骨蒸之勞熱當歸六和為湯療盜汗而晡熱

胎產秘書

卷上

孕成數墮因母血弱不能分蔭其胎本方須用可保期生婉子無氣由母氣虛僅可滋榮於已安胎之方必須月服若老夫得其少嬾宜寡慾以候經期若壯陽或遇衰陰頻服藥以全胎力其人愛精重施生子精神且壽狂陽妄洩育子清寡無神此造化必然之理後人望嗣之當鑒大抵孕婦素弱又欲分氣血以蔭胎則虛症自然百出是以丹溪先生助母安胎之方以補為主參朮黃芩乃安胎之聖藥佐以順氣清涼務須對症而發芎歸懷地實補血之良劑佐以蘇葉陳皮可為常服之方也夫孕成六月之前其胎尚

未轉運茯苓性降不宜多用黃芪肥胎豈可常加香附惟胎喘宜用無補則虛人反害砂仁可止嘔定痛多服則動血行胎歷考安胎之論不過數言安胎之方不過三四若能加減治療則可十全八九誠後學之準繩也

辨胎症名

諸家巧立病名竹葉湯以治子煩安樂散以治子淋天仙藤散治子氣之方羚羊角散醫子癩之症子腫症用全生白朮子懸症用紫蘇葉方胎前之症非止數名大抵孕婦多因血氣虧虛或由外感致生諸症

胎產秘書

卷上

三

而胎不安豈胎有病母之理耶子煩淋懸腫等名乃後人巧立名色以形容胎前之症耳予隨症立治方法亦遵信丹溪先生安胎飲首方加減治之庶免悞失之尤矣

補母壽子論

凡屢產生子無氣及育而不壽皆父母元氣不足故也夫人愛精重施則髓滿骨堅又得壯盛之婦為配則種子精神而有壽若壯陽弱婦成孕則母無血蔭胎必藉藥補以培胎元斯生子壽又若弱人衰翁必須異床寡慾藥味助神算候經期固真方施斯乾元

資始之本實坤元資生之源厚也因而和之是為聖度若不遠惟薄則相火易動雖不交會亦暗流損壞多矣經云陰平陽秘精神乃治陰陽離決精氣乃絕後立二方實補先天之不足孕成藥宜多服以全胎元生子必精神有壽經驗多故錄以示人

補母壽子安胎飲○治屢產生子無氣或育而不壽氣血虛弱孕成不安或得孕數墮照方每月服十五帖弱甚者日服一帖大益胎而分娩易生子精神而有壽經驗良方也

胎產秘書

卷上

四

人參一錢弱者 懷生地自蒸 白朮 歸身各二條

實黃芩一錢 紫蘇 炙甘草各四分 陳皮去黃連 五分

分川芎八分 棗二枚水煎服

加減法○脾胃弱常泄瀉減地黃加蓮子十枚帶

穀砂仁三分 多怒而瀉再加木香二分 ○口常燥

渴加麥冬一錢 ○怔忡驚怖加棗仁益智各一圓

眼肉十枚

加味大造丸 煎服助胎尤妙

紫河車一具 人參 歸身各一兩 麥冬去心 北五

味五錢 肥懷生地九兩 ○如脾胃弱常瀉減地黃

加白朮懷山藥各一兩 黃柏八錢 ○久瀉不用麥冬

○煉蜜爲丸各藥爲末先將地黃門冬蒸搗如泥
次下諸藥末搗干餘下丸如棗豆大每早空心清
湯送百丸忌蘿蔔

孕婦患病勿妄論

凡孕婦患傷寒或疫症熱入皆能墮胎墮後未免增
熱因熱消陰血又繼產脫血故治者慎勿妄論傷寒
疫熱未除誤投梔子淡豉芩柏等藥或寒熱往來柴
胡不可用也或潮熱大小便閉承氣五苓等方不可
投也宜頻服生化湯時進兩帖不拘帖數服至熱退
停藥如虛脫形色脫或汗多或渴兩帖後卽加生脉

胎產秘書

卷上

五

人參麥冬以防暈厥危急且生化湯有川芎性平散
邪乾薑助血藥能除陰虛大熱其結燥便閉灼熱多
服生化湯自然津液漸生二便通利矣若因熱而用
寒劑反慮中氣

生化湯主方

當歸 八錢 川芎 三錢 炙甘草 五分 黑乾薑 四分 桃
仁 十粒 水二鍾煎七分和酒六七匙稍熱服

議落胎救母辨

凡孕婦患虛損潮熱骨蒸少力或崩漏或少食皆由
氣血不充胎弱日久不能鼓動或胎不安上攻或跌

撲損胎不動疑於死活難辨或患熱病損胎或因誤
服動胎藥及食莧菜雖血行胎逼切不可用落胎之
方妄議去胎以救母也必須滋補母之氣血力健則
形自然漸動卽果是胎死助血自落可保兩全無虞
若攻弱血之胎胎落而母繼殞者多矣慎之慎之
耗氣種子方不可服辨

時人妄立種子方多用香附爲主大損氣血服久則
少力腰疼反成痼疾絕產聞有服交加散而偶得子
者因少壯婦多恚怒服此折氣諧榮侍中耳豈可視
爲良方珍服圖嗣乎且無子多由少血不能攝元或

胎產秘書

卷上

六

墜胎損血及經行作痛或子宮虛寒之故欲求嗣者
須合河車大造丸三四料以助陰血頭胎胞功甚奇
經行痛人丸內用牛膝一兩延胡五錢以補之得孕
數墮者孕成後每月必服丹溪安胎飲十數帖
濟坤大造丸○治氣血弱人不能攝元成孕或數墮
胎及生子不壽或孕後虛熱盜汗食少帶多並宜
服之益氣血溫子宮種子神方也

紫河車 一具 人參 一兩 麥冬 一兩 天冬 去心 牛
膝 酒浸 當歸 各一懷 地 自蒸 熟 山藥 八錢 黃柏 七
鹽水 杜仲 去絲 炒 五味子 各五錢

瘦胎方不可服辨

時用香附枳殼等耗氣藥立斂胎易產方名。非無見也。做古方士。進湖陽公主枳殼瘦胎方。後遂擴增幾味。耗氣藥品。巧立斂胎易產方名。使人信秘而服之。惑世誣人。久矣。且方士因湖陽公主居養厚而形樂。食膏粱而胎肥。過期難產。特進此方。亦倖中耳。其胎之損元不壽不責咎也。常人豈可槩服乎。夫孕至九十兩月。胎形全具。一母之氣分蔭其胎。業已兩用正宜大補娘母。倍於他月。反復耗之。則母故已不暇。奚有餘血分蔭其胎。是以虧損胎元。日漸伶仃瘦弱焉。

胎產秘書

卷上

七

有斂胎易產之效。反無虧元損壽之害乎。其孕母血氣虧損多至臨盆艱澁。後暈厥危症。亦由所致。人不知也。即婦人良方所載。無憂散。保氣散。神寢丸。俱不可服。

滋榮易產方。○孕婦九十兩月服之有益。

人參一錢弱 當歸三錢 川芎一錢 白朮 黃芩

大腹皮 懷熟地 益母草各二錢 茯苓八分 甘草

陳皮各四分

孕婦樽節飲食禁忌

凡孕婦謹守禁忌。可保安正產。若誤服降性藥多。則

胎墜小腹。誤食莧菜。則胎逼欲產。稟弱人。孕至五六月。月腰痛欲墮。三者並服補母壽子方。以安之。胎傷藥食墜下者。少加升麻五分。以提之。腰痛欲墮。一時類服兩帖。方安。弱母成胎後。食減困倦。足腿腫者。日服一帖。以補之。又必謹戒房勞。方保正產。

一丹溪安胎飲。○治孕成之後。覺胎氣不安。或腹微痛。或腰間作疼。或飲食不美。孕至五六月。並宜服之。

人參一錢 白朮 當歸 熟地各二錢 川芎 條芩各八分 陳皮 紫蘇各四分 甘草各四分 砂仁三分 薑棗水

胎產秘書

卷上

八

煎服

二孕婦元氣不足。倦怠或胎氣不安。或身微熱。減食並宜服加味安胎飲。如腰疼腿痛。必一日一夜服兩帖。方安。

人參二錢 白朮二錢 當歸 熟地各二錢 條芩八分

陳皮 紫蘇各四分 砂仁 甘草各三分 ○如煩渴加

麥冬一錢 棗水煎服

三孕成後三個月內。經阻嘔逆惡食。或頭暈倦怠。宜

服加味參橘飲

人參一錢 白朮 當歸各二錢 製半夏八分 橘紅

藿香 甘草各四分 砂仁三分 竹茹一分 如肥人加
竹瀝半盞 薑汁半匙 生薑三片 水煎服

四孕婦常多怒氣胸腹滿悶或服順氣烏藥香附砂
仁耗藥反滿加悶宜服此方

人參 白木 當歸各二分 川芎 條芩各八分 陳皮
四分 木香一分 甘草二分

五孕婦腹中不時作痛小腹重墜多因血氣虛弱間
有兼寒者可服加味安胎飲

人參錢五 白木 當歸 懷地各二分 川芎八分 甘
草 紫蘇 陳皮各四分 薑水煎○如兼寒加吳茱

胎產秘書

卷上

九

黃一錢 或加乾薑 砂仁各五分

六孕婦面目虛浮四肢有水氣多因脾胃氣虛或久
瀉所致宜健脾利水服全生白朮散

人參 茯苓各一分 白木 當歸各二分 川芎八分 大
腹皮 陳皮各七分 紫蘇四分 甘草三分 水煎服

七胎氣上攻心腹脹滿作痛宜服順氣安胎飲

人參一錢 白木 當歸各二分 川芎 黃芩各八分 紫
蘇 甘草 陳皮 砂仁各四分 薑水煎

八受孕下血不止或按月去血點滴名曰漏胎大率
多因勞因氣血虛有因喜食炙博物多宜謹房事

服補中安胎飲
人參 黃芩各一分 白木 當歸 熟地各二分 紫蘇
白芷各五分 甘草四分 薑水煎

九孕婦頓仆動胎下血不止宜先服安胎飲一日兩
帖如不止加膠艾安胎飲

人參五錢 白木 當歸 熟地各二分 條芩 阿膠
各一分 川芎八分 甘草 陳皮 紫蘇各四分 艾葉八
片 薑水煎○如感寒頭痛加帶鬚葱白頭四個○

腹中痛減艾葉加帶殼砂仁四分

胎產秘書

卷上

十

胎飲 方內有白朮二錢

人參 棗仁 麥冬各一分 當歸二錢 懷生地錢五

黃芩 遠智各八分 川芎七分 甘草四分 陳皮三分
竹葉十片 薑棗水煎○如煩渴加竹茹一丸○有

痰加竹瀝酒盞七分 薑汁半匙○虛人加人參錢二三○
脾胃常洩減棗仁地黃

十一孕婦腿膝發腫氣促滿悶不舒或足指腫水出
蓋脾主四肢脾氣虛弱不能制水而發腫肺腎少

血氣滋賴而氣促滿悶諸書名日子氣治宜先服
天仙藤散不效再服補中健脾湯○虛人服天仙

藤散必加參歸白朮補藥乃可服

加味天仙藤散○天仙藤洗畧香附各六分陳皮

紫蘇各四分甘草三分烏藥七分木瓜一錢薑皮三

片亦煎○虛人加人參一錢白朮當歸各二○

脾胃虛弱宜兼服補中益氣湯

十二孕婦口噤頭強手足攣縮言語蹇澁痰涎壅盛

不省人事不可作中風治治以羚羊角散如無痰

言語如常但見似中風症多因血燥類風切不可

一槩作中風論治誤人事也

加味羚羊角散○羚羊角一錢薏苡仁各一

胎產秘書 卷上 十二

當歸二錢茯神川獨活五加皮各八分川芎七

分防風五分木香二分甘草四分杏仁十粒薑水

煎○人虛加人參一錢○痰加竹瀝酒盞七分薑汁半

○脾胃弱加白朮二錢五分

十三孕婦小便澀少或成淋瀝名曰子淋宜服加味

安樂飲

人參當歸白朮麥冬各二錢茯苓皮通草

各一錢甘草四分燈心五分○若有痰侵肺金加黃

芩七分怒動肝火宜用山梔二三

十四孕婦形體勞苦或過食炙炒等物小便中帶血

宜清膀胱之火常服加味道遙散

當歸二錢芍藥柴胡各一錢白朮五錢茯苓丹

皮炒山梔各七分炙甘草四分

十五臍服作痛脹或小便淋此由脾胃氣虛胎壓尿

胞宜服安胎飲加二陳升提

人參一錢白朮熟地各五錢當歸二錢川芎八分

製半夏五分甘草陳皮去白柴胡升麻各四

薑水煎 ○又有空心飲鹽湯探吐則氣升斯

下經行亦一治法也

十六孕婦胸滿腹脹便閉遍身浮腫名曰胎水不利

胎產秘書 卷上 十三

宜服鯉魚湯

白朮五錢白茯苓四錢當歸三錢白芍二錢用鯉

魚一尾重二觔去鱗腸水煮加橘皮少許生薑七

片用水四盞取汁一盞半加前藥四味煎七分溫

服如未盡再煎

十七孕婦元氣壯盛孕後有血來幾次乃血盛故也

若不腰痛酸疼不須服藥如過慮可服安胎飲

十八孕婦咳嗽屬風屬寒宜服寧肺止咳散

天冬知母各一錢桔梗紫蘇甘草各五○寒

嗽加杏仁十粒桑皮八分廣橘紅四分竹瀝薑汁

續修四庫全書 子部 醫家類 卷上 十二

○熱嗽加黃芩八分○虛嗽加紫苑一錢款冬六分
 ○夜喘多嗽加麻黃三分○虛損嗽加瓜蒌一錢
 竹瀝薑汁○心胃不舒加貝母百合各一錢
 又方嗽不止胎不安杏仁甘草紫苑桑皮
 桔梗天冬等分水煎
 十九孕婦咳嗽吐血
 懷生地三錢天冬二錢紫苑知母白木麥冬
 當歸各一錢陳皮甘草黃芩各四分犀角磨
 八分○如喘加瓜蒌仁一錢
 二十孕婦霍亂吐瀉心煩腹痛先服六和湯
 胎產秘書 卷上 三

人參 木瓜各一錢扁豆二錢茯苓八分半夏七分
 砂仁五分陳皮藿香甘草各四分杏仁十粒竹
 茹一丸薑棗水煎○次服安胎飲即第一丹溪方
 ○加服六和安胎不易方
 二十一孕婦瘧疾寒多熱少
 安胎飲減陳皮加半夏七分草果青皮各三分
 烏梅二個人參黃芩各一錢白木當歸各二錢
 蘇甘草各四分藿香五分薑水煎
 二十二孕婦口乾不得臥
 安胎飲即第一丹溪方加麥冬乾薑

又方黃連為末粥飲調下一錢
 二十三孕婦壅熱心神煩燥口舌乾渴
 人參知母梔子仁炒麥冬各一錢甘草條芩
 各五分瓜蒌根犀角各八分棗水煎○夏季加竹瀝
 薑汁
 二十四孕婦嘔吐不食胸中煩燥
 人參麥冬梔子炒知母葛根蘆根各一
 竹茹一丸葱白三寸
 二十五孕婦熱病斑出赤黑色小便如血氣急欲絕
 落胎
 胎產秘書 卷上 十四

梔子黃芩升麻各一錢青黛八分懷生地二錢
 豆豉九粒杏仁十粒石膏各五錢葱白七寸
 二十六孕婦熱病骨節痛不急治即落胎
 葛根石膏升麻前胡青黛各等分○痰
 加竹瀝薑酒薑汁半匙
 二十七孕婦患吐衄血或因破傷失血驚患口噤項
 強背直類中風症皆因失血
 安胎飲加人參二錢當歸白木熟地天麻
 各二錢條芩八分防風荆芥陳皮甘草各四分
 麥冬一錢

加味益母丸。孕婦諸症只宜服之亦可作細丸。

益母草 四兩 白木 一兩 條芩 八錢 煉蜜為丸如彈

子大。清湯送下一丸。孕內常服甚好。多氣人加

木香 三錢。胸滿不舒暢加紫蘇陳皮各二錢。弱

人加安胎飲送下

附載保產經驗仙方

不論孕婦身體強弱於臨月預先服一劑及將產

一二日前再服一二劑自然臨產快易子母安全

此方屢試屢驗甚至五六日難產者一服即產其

胎產秘書

卷上

七

功甚速。或懷孕之日胎氣不安服之即可安胎。願

人共信仙方。遍傳天下。功德不淺。但藥十二味分

兩不可增減。方得功奏萬全。既產之後止服益母

湯。此方不必再用也。

大白當歸 酒洗 真川芎 各錢五分 黃芪 荆芥穗 各八

兔絲子 錢四分 白芍藥 炒錢二分 厚朴 薑汁 真蘆

艾 各七分 枳殼 炒六分 川貝母 去心錢一分 羌活 甘草 各

五分 薑三片 水二鍾 煎八分 空心服

又附載保小產方

白茯苓 二兩 條芩 二兩 於白木 一兩 土炒 延胡索

醋炒紅花 一兩 益母草 一兩 香附 一兩 童便 炒 真沒藥

三錢 雜桃 右藥為細末 蜜丸如桐子大 每日清晨

白湯送下 七丸不宜多 如胎不安 一日間可服三

五次 亦不宜連服 安後仍一日一服 皆以七丸為

度 戒惱怒勞力 并冷水冷物 一切發氣之物 不可

用 并忌房事 無不效驗者

胎產秘書

卷上

六

丹溪先生胎產秘書

紫陽一峯山人校閱

卷中 備臨盆

臨產須知

凡生育之難者皆因坐草太早用力太過遂有橫生倒產之厄且臍腹疼痛之初兒身纔轉產母用力一逼令兒偏生或左腿或右腿雖兒逼門而不能下但云兒已露頂非頂也乃左右頭角也亦不能出當令產母仰臥穩婆輕推兒近上以手正其頭項用力一逼卽下若兒頭之後骨偏在穀道兒頂未正當令穩

胎產秘書

卷中

七

婆熱手急放穀道外輕推兒頭正然後用力一送卽下

又有兒先露手足卽以鹽塗脚底又可急搔之并以鹽塗母腹上又用小針放兒手足心針入一二分三四次刺之以鹽擦之輕輕送入兒痛驚轉一縮當卽回順

又臨產須知

- 一痛陣未緊交骨未開雖胞水來不可試湯
- 二產門兒頭未正不可服催生丹
- 三胞衣破胞水來而交骨未開宜服六料參歸湯

四弱婦宜勉強食物及氣血藥

五不宜服滑胎敗血等方

臨盆之際必須頻服生化湯預燒紅鐵秤錠一個投入醋瓶安產婦枕邊再將醋煎韭菜放產婦枕邊

生化湯○見胞衣一破速煎一帖候兒生下卽服不論正產半產俱服兩帖

當歸 八錢 川芎 三錢 炙甘草 五分 黑乾薑 四分 棗

仁 十粒 水二鍾煎七分和酒六七匙稍熱服直

留次帖并煎兩帖共三煎要在一兩時未進食之

先相繼頻服則下焦血塊速化而新血驟長自無

胎產秘書 卷中 六

胎產秘書

卷中

六

暈厥危症

凡孕至七八個月照方預備川芎二兩當歸五兩

仁五錢甘草五錢黑乾薑五錢以待臨期取用○

若產婦勞甚血崩形脫卽加人參三四錢在內頻

灌無虞○若汗多氣促亦加人參三四錢人參加

於生化湯內血塊無滯

從權急救加參生化湯○治產下形色脫暈或汗多

脫暈

人參 三錢 當歸 四錢 川芎 二錢 桃仁 十粒 黑乾

薑 炙甘草 荆芥 各四分 水煎服

產下即煎服生化湯

人參 二錢 當歸 六錢 川芎 三錢 黑薑 炙草 各四分

桃仁 十粒 去皮 〇如下血多加炒黑荆芥 八分

汗多加麻黃根 一錢 煎好加無灰好酒四茶匙和

藥內止服二帖

凡兒生下即服生化湯三四帖外烘衣煖塊痛處即

散如感寒食冷物冷茶水又失煖腹則塊凝停腹

癍至半月外不消或如腫毒高起寸許或身熱滅

食倦甚必用生化湯加三稜蓬朮肉桂等攻補並

治其塊自消矣如虛甚少食泄瀉只服一帖定痛

胎產秘書

卷中

九

且健脾胃進食止瀉然後服消塊湯

當歸 三錢 川芎 一錢 黑薑 炙草 各四分 桃仁 十粒 去皮

三稜 醋炒 蓬朮 醋炒 延胡 肉桂 各六分 水煎服

臨盆胞水來而交骨未開停產宜服大料加參芎歸

湯以助血氣血氣旺則自然即開分娩

人參 三錢 當歸 一兩 川芎 四錢 益母草 一錢 甘草

四分 水煎服連服二三帖如有合成益母丸用前

四味煎湯送化一丸〇如兩帖服後不開加靈板

醋炙 亂髮 一丸 燒灰 存性 生母髮 不可用

加味加參生化湯〇治子宮不收及產戶不開

人參 當歸 白朮 黃芪 各二錢 川芎 一錢 甘草

四分 升麻 八分 五味 十粒 酸以收之子宮不收再

加半夏 八分 五味 十五粒 醋炒芍藥 八分 補而升之

二症皆元氣不足之甚塊下患產血塊

加參生化湯〇治產下即患氣短症有血塊痛不加

茂木

人參 川芎 各二錢 當歸 四錢 黑薑 四分 炙草 五分

桃仁 十粒 棗 二枚 水煎服 連服二帖三煎

催生如神散〇須候兒頭正頂產門可服未正先服

恐催逼逆

胎產秘書

卷中

十

錫底煤 香白芷 滑白 等分 為末芎歸湯調服

二錢

霹靂奪命丸〇治臨產未產時目翻口噤面黑唇青

口中沃沫母子命在旦夕若兩頰微紅子死母活

急宜用此方

蛇退 一條 煨 蠶故紙 燒灰 髮灰 各一錢 乳香 五分 黑

鉛 二錢 水銀 七分 右藥為末用雄猪心血和丸如

桐子大金箔七片為衣每服二錢倒流水灌下

治橫生逆產方

伏龍肝 者佳 紅色方妙 研細末 酒調下一錢其藥

兒頭戴出

治橫倒難產方

蛇退一條蠶故紙一張入新瓦瓶中。鹽泥固口。燒

存性研末乳香一錢煎湯調下二服即出

治橫倒先露手足方

阿膠蛤粉炒滑石各一兩黃葵子一合每服四錢水

二鍾煎服。又為末溫酒調入蜜和勻服之。

又方以草麻子一粒研爛貼產婦脚底產下即去

藥粒。

催生兔腦丸。治生理不順橫逆難產神效。

胎產秘書

卷中

三

臘月兔腦髓去膜研母丁香取末乳香一錢將兔

腦和藥為丸如芡實大。硃砂為衣。乾油紙包。蜜封

酒送。一丸男左女右。兒手握藥燒下。

產婦宜戒

一戒食鹽。鹽止血令人無乳。且發嗽難治。

一戒勉強起居。及暴喜怒。喜則氣散。怒則氣逆。

一戒貪涼。食冷物。夏月用扇。坐臥當風。

一戒七日內沐浴梳頭。脫換裏衣。

產婦禁藥

一產後氣不順。

禁枳實厚朴耗藥。

二產後傷飲食。

禁枳實大黃蓬稜。

三產後身熱。

禁黃連梔柏。

四產後七日內。

禁地黃芍藥。

五產後血塊痛。

禁牛膝稜蓬蘇木。

六產後大便不通。

禁大黃芒硝。

七濟坤丸。

損氣血不可服。

八瘦胎丸。

損氣血不可服。

九產寶峻藥方。

不可服。

產後忌物

一果忌梨藕橘柑柿西瓜。

停塊作痛。

胎產秘書

卷中

三

二食忌涼粉菜豆冷粥麩蕎麥生冷。停塊作痛。

三肉忌鶩犬猪牛首肉。

停塊痛恐犯藥。

四菜忌莧菜生菜苔菜。

停塊痛。

五忌砂糖酒。

損新血。

六忌獨煎山查湯。

損新血。

七忌多食胡椒艾酒。

行血致崩。

八忌生薑酒。

發汗行血。

九忌濃茶汁。

性寒停塊痛。

附敢猪肚方

人參一錢蓮肉去皮心白扁豆去皮一兩

右用雄猪肚一個洗淨將人參等共入肚中用線紮口又將大砂礪一個底用碎磁碗片鋪一皮防水乾煮焦之患扣水慢火煮爛孕婦七八個月每月服二三個連肚湯藥盡數吃完大健脾胃決不崩暈精神更旺。

胎產秘書

卷中

丹溪先生胎產秘書

紫陽一峯山人校閱

卷下 治產後

凡產後血塊乃孕婦餘血之所積也因產婦送兒送胞勞倦無力或調護之際腹欠溫煖故致血塊作痛日久方散勿輕服峻劑藥及飲薑椒艾酒恐傷太熱則新血未免損失多矣宜頻服生化湯以助血行血外用熱衣以煖腹凡產後血塊痛宜服生化湯為主血塊痛散後加參生化湯為主。

胎產秘書

卷下

三

凡諸雜症必用上二方為主如消食散氣治痰止嗽等藥為佐使庶無失誤如血塊痛芫朮地黃不可用也。

凡危急症必須頻灌藥可保無虞少緩難甦將絕神氣加參生化湯神治危急產症病家無疑生化湯乃治產神方妙在頻服。

一產後胞衣不下宜溫服生化湯兩帖初煎就送益母丸一粒次煎又送一粒外用烘熱衣服煖產婦腹慎不可冬月夜坐桶上及人身上守候胞下嚴寒恐損害產母必須上床被蓋和煖兼服生化湯。

方保無失。

二產後起居太早。產戶因虛感寒。產門如生陰毒痛甚苦楚。手不可近。衣被難着。宜急用驅風定痛方。慎勿悞為生癰。服敗毒散等方。

當歸 懷生地 各二錢 川芎 一錢 獨活 防風 肉桂 茯苓 荆芥 各五分 棗水煎

三產後勞傷。氣血兩虛。及稟弱少食。患脫肛症。或有痿症。宜大補。或勞倦昏暗。血暈。宜頻服生化湯。幾帖。服至產母精神乃止。○如血暈形色脫。或汗多。脫宜加人參三四錢。

胎產秘書

卷下

五

四產後身熱惡寒。雖明知感冒風寒。只宜速進生化湯三四帖。服至熱退痛除乃止。○如三四帖後頭痛如破。加帶鬚葱頭四五個。或用葱放養湯中亦可。

五產後乍寒乍熱。脇痛或頭痛。宜服生化湯三四帖。○如未除。加桂枝七八分。以散寒塊。再用木香磨一分。

六產後感寒。上攻則心痛。下攻則腹痛。且血塊又痛。宜服生化湯。加桂枝一錢。以定痛。○如二帖未止痛。再加吳茱萸一錢。或加老薑三片。必用在生化

湯中。助血。若用熱藥。幾味攻寒。其痛雖止。則未免新血虧損多矣。

七產後身熱。或夜熱。或兼寒熱往來。並宜服生化湯。幾帖。則熱自退矣。

八產後寒熱往來。每日應期而發。類瘧。宜服生化湯。幾帖。則寒熱自除。○如汗多人虛。可服加參生化湯。

九產後感寒。心下痞滿。宜服生化湯。加陳皮 桔梗 白豆蔻 各五分 木香 一分

胎產秘書

卷下

五

冬 各一錢 杏仁 十粒 甘草 四分 桔梗 五分 ○痰加橘

紅 四分 花粉 八分 ○如有汗。可服加參生化湯。十一產後傷食。宜服生化湯。加神麩 一錢 麥芽 五分

以消飯麩。○傷寒傷食。加吳茱萸 一錢 桂枝 五分 ○傷寒食脇痛。加肉桂 七分 ○傷肉食。加砂仁 四分 山查 五分

十二產後忿怒。心膈滿悶。宜服生化湯。加木香磨用二分。

十三產後日久。大便不通。宜服生化湯。加肉苳蓉 二錢。日服二三帖。以助血。血旺自通。○另研芝蔴三

合為末和米一升作粥三餐食之即愈

十四產後血多或汗多小便澀少或不通宜服生化

湯加生脉散人參麥冬五味以通之○如服藥不

通用葱頭十個線縛切一指厚致臍上以艾火熨

之則無不通矣

十五產後氣血虛感寒小便多不禁或多遺溺宜服

生化湯加鹽炒益智六分

十六產後泄瀉宜先服生化湯加茯苓一錢澤瀉七

分○再將蓮子同糯米粳米各等分煮粥食○如

世瀉形昏倦即服加參生化湯

胎產秘書

卷下

去

十七產後失血心神失守妄言妄見宜服生化湯加

茯苓 棗仁 遠志 栝子仁 麥冬 各一錢 橘紅

四分 ○如汗虛脫即服加參生化湯

十八產後手足發厥血塊又痛宜服生化湯服兩三

帖後可服加參生化湯

十九產後痢不分紅白宜服生化湯減黑薑加木香

三分連服二三帖則血塊與痢積推盪盡矣

二十產後血崩大脫宜頻服生化湯加荆芥穗一錢

服十餘帖○如形色脫服加參生化湯

二十一產後霍亂吐瀉多因虛中感寒宜服生化湯

加砂仁 茯苓 藿香 生薑

二十二產後遍身痛多是血氣虛滯宜服生化湯加

肉桂八分韭白二十根

二十三產後癰疽宜服生化湯加連翹天花粉各一

棗豆粉 五錢 和服可用敗毒散大黃等方

二十四產後四肢麻木血虛宜服生化湯加浮萍○

如血崩脫而麻木可服加參生化湯

二十五產後目痛昏熱赤腫宜服生化湯加荆芥

二十六產後因怒或偶吐血宜服生化湯減川芎加

當歸 去尾 荆芥 一錢 犀角 八分

胎產秘書

卷下

去

二十七產後卒然口噤牙緊手足攣縮類中風宜服

生化湯加天麻 羌活 防風 薑一片

二十八產後煩燥口渴宜服生化湯加生脉散

產後有五急症並宜服倍參生化湯加減治之

人參 三四錢 當歸 五錢 川芎 二錢 炙甘草 四分 桃仁

去皮尖 棗二枚

一婉下即時昏暈形色脫宜倍參生化湯加荆芥

穗 五分 人參 倍加

二產後形色脫勞倦宜服倍參生化湯加人參

用黃芪 一錢 熟地 三錢 熟附 四分 ○血塊痛芪地

不可用

三產後血崩形色脫宜倍參生化湯加荆芥穗四

分人參倍加○如血塊痛可服升舉止崩神烏湯

人參四錢白木當歸熟地各二錢黃芪黃連

升麻炙草荆芥穗陳皮白芷各四分熟附

三分棗水煎

四產後汗多形色脫宜倍參生化湯減黑薑加麻

黃根棗仁黃芪各一錢熟地三錢○血塊痛未

止其地不可用加浮小麥粒五十防風八分

五產後氣喘似短宜倍參生化湯加人參二錢沉

胎產秘書

卷下

无

香磨一陳皮一香附各三分

以上五症兼見雜症照後加減

渴加麥冬一錢五味五粒○渴加白茯苓一錢澤

瀉八分○大便燥結加肉苳蓉錢半○驚悸加棗

仁益智各一錢○傷麪飯加神麪麥芽各五分○小便

不禁加益智六分○寒嗽加杏仁十粒桂枝五分

○傷肉食加砂仁山查各五分○痰加花粉八分橘

紅四分○虛嗽加天冬一錢瓜蒌仁八分○食少

加白木二錢○氣虛痰加竹瀝半酒薑汁少許

凡產後危症並用加參生化湯為主對症加減

人參當歸各二錢川芎一錢黑薑甘草各四分

仁去皮尖

二產後頭痛身熱有汗宜加參生化湯加黃芪麻

黃根地骨皮各一錢防風白芷羌活各四分

水煎

三產後感寒身熱頭痛嗽聲重肚疼有汗宜加味生

化湯兼雜症照後開人參天花粉麻黃根

地骨皮各一錢桔梗四分○如頭痛加帶鬚葱頭五

個

四產後先寒後熱或潮熱或夜熱每日應時發作類

胎產秘書

卷下

辛

瘧有汗宜加味生化湯加軟柴胡八分青皮一錢

烏梅二個○汗多加麻黃根一錢○汗多不足加

熟地二錢○食少加黃芪白木各錢陳皮四分

五產後妄言妄見宜加味生化湯加棗仁茯神

遠智柏子仁麥冬各一錢橘紅四分

六產後足冷發厥一日而三四厥去宜倍參生化湯

加白木一錢熟地二錢熟附四分

七產後身熱有汗大便不通宜加參生化湯加麻黃

根地骨皮麻仁肉苳蓉各一錢

八產後身熱脇痛潮熱宜加參生化湯加麻黃根

黃芪各一錢 桔梗七分 柴胡八分 ○臍下痛止可加熟地二錢

九產後大便不通潮熱睡中妄言宜加參生化湯加

棗仁 麻黃根 地骨皮各一錢

十產後有汗小便少宜加參生化湯加麻黃根 麥

冬 葛根 五味 黃芪

十一產後有汗泄瀉宜加味生化湯加肉果一個 蓮

子十粒 麻黃根等分

十二產後有汗泄瀉危困宜用丹溪醫案大補方

十三產後大便不通誤服大黃方

胎產秘書 卷下 三

十四產後傷食誤服消導方

十五產後忿怒誤服耗氣方致成臌脹

以上三症誤下誤消誤耗宜用丹溪醫案方

人參 白木 當歸各三錢 川芎 白芍 茯苓各

錢 澤瀉八分 厚朴 柴蘇各五分 陳皮四分 大腹皮

蘿蔔子各六分 木香三分 ○傷飯麪加神麪麥芽○

傷肉食加山查砂仁○傷怒氣加木香

十六產後傷食痛或脇痛誤服消導方多絕穀食獨

用飯鍋焦為粉再用人參三錢薑一片煎湯調飯

焦粉飲下漸漸引開胃氣

十七產後血崩日久不止宜服升舉大補方

人參 白木 當歸 熟地 川芎 黃芪 麥

冬各二錢 陳皮 甘草各四分 黃連 黃柏各三錢 荊芥

羌活 防風 升麻 白芷各五分 水煎服

十八子宮不收產戶不閉脫症宜服倍參生化湯

十九產後神昏形脫有汗方內宜減乾薑忌薑葱

以上十九症並以補氣為主問無血塊痛可服治

產症方

加參生化湯治產後危急諸症雖有血塊可服隨症

可服如危症參可加至五六錢

胎產秘書 卷下 三

分娩下血崩暈去宜服加參生化湯

分娩下汗多倦甚宜服加參生化湯加參三四錢

分娩下無力送胞倦甚宜服加參生化湯

胎前素弱產後見虛宜服加參生化湯

胎前泄瀉產後倦怠宜服加參生化湯加參四五

錢

汗多加麻黃根黃芪各一錢 防風五分 ○足厥冷加

人參四錢 熟附五分 ○氣短促加人參三四錢 ○渴

加麥冬一錢 五味十粒 ○大便實加肉苳蓉一錢

○煩燥加竹茹一丸 ○寒嗽加杏仁十粒 桔梗五

分○痰加天花粉八分竹瀝半酒薑汁三匙

滋榮養氣復神湯○治產後血崩症汗脫症氣

短促症妄言妄見症血暈症冷厥症俱用

此方若真感寒頭痛發熱惡寒此方不可用

若產後乍寒乍熱類瘧有汗問無血塊痛決宜用

此方

人參看勢加減當歸三錢川芎白木黃芪麥冬

棗仁各一錢生地八分蒸炙草陳皮各四分五味十粒

棗二枚水煎後開加減法

加減法○手足厥冷加黑薑五分或熟附四分○

胎產秘書

卷下

三

妄言妄見加柏子仁益智各一錢○暈厥氣短喘促

加黑薑熟附各四分○口氣冷小便不禁加益智炒

一錢○汗多加麻黃根一錢浮小麥一撮○大便

日仄不通加肉蓯蓉八錢麻仁二錢○泄瀉加白

茯苓錢半肉果一個麵一錢○痰加竹瀝薑汁○傷麵飯

加神麴炒一錢麥芽炒一錢○傷肉食加炒仁山查各

五分

長生活命丹○獨參湯古今通用加鍋焦粉引開胃

氣產後虛甚勞倦胃弱不思穀食脾虛不能轉運

因傷食誤藥消導因受氣悞藥耗散大傷脾胃愈

消耗愈不食穀必用此方必用此方

人參二錢生薑三片麥芽五分蓮子八枚飯鍋焦

研粉二三匙用水煎參薑蓮麥四味至七八分取汁留

渣再煎先用藥汁一酒盞調鍋焦粉二三匙與病

人漸飲少頃再用藥汁送粉三四匙引動胃氣漸

漸思穀弱人三四次就進穀矣不可遽吃厚味及

飯恐胃人虛不能容藥確宜新舊確有藥氣聞之

要吐○一產後悞藥耗氣損胃絕穀宜服此方○一老年

傷食服消導藥不進食此方助補○一氣血虛弱

胎產秘書

卷下

壽

人服此漸漸加食○一胃氣久敗雖納穀良久吐

出如翻胃宜服此方

加味歸脾湯○治產後失血過多發熱有汗睡臥不

安或怔忡驚悸盜汗或妄言妄見神氣不清並宜

服之

人參當歸熟地各二錢白木茯神益智炒

黃芪棗仁炒麥冬各一錢木香三分炙草陳皮

各四分圓眼肉八枚

產後乳癰初起未成膿服瓜蒌乳沒散胎前生癰亦用此方

瓜蒌一個連皮當歸金銀花各三錢白芷一錢青

皮 乳香 沒藥 甘草各五分 水煎服

乳癰已成膿服神仙迴膿散○膿從大便出

大黃三錢四分 白芷七錢二分 乳香 沒藥 沉香各一分 穿

山甲五錢 蛤粉炒 右為末乳香另研每服三錢用人參

二錢煎湯調服

乳癰膿出後服十全大補湯

人參 當歸各三錢 白朮 熟地各二錢 茯苓 川芎

黃芪各一錢 炙草九分 蓮肉八粒 水煎服○泄瀉加

蓮子十粒 肉果一個 煨○渴加麥冬一錢 五味十粒

生化止崩湯○治產後血崩○如半月外崩宜服升

胎產秘書

卷下

三

舉大補湯

當歸四錢 川芎一錢 黑薑四分 炙草 荆芥各五分

桃仁十粒 棗水煎○忌薑椒熱物生冷○鮮紅血

大來加荆芥穗白朮各五分 ○血塊形脫汗多氣促

俱加人參三錢 ○如紫血乃當去者敗血非崩


滋榮益氣止崩湯

人參 川芎 麥冬 黃芪各一錢 當歸四錢 熟地

白朮各二錢 陳皮 炙草 白芷 荆芥穗 升麻

各四分 黃連三分 棗水煎○如老年人血崩宜用升

舉大補湯



人參 當歸各二錢 川芎 一錢 黑薑 炙草各四分
問無血塊痛加白木 二錢 陳皮 三分 ○傷麩飯加
神麩 麥芽 ○傷肉食加山查砂仁 ○寒停脇下
作痛加桂枝 八分

加味人參養胃湯 ○治產後及一月瘧疾宜用此方。
兼服參木膏。

人參 錢半 白木 當歸各二錢 茯苓 半夏各八分
果 三分 甘草 青皮各四分 藿香 五分 烏梅 二個
參木膏 ○用於白木一觔。淨切片。土炒。人參一兩。
用水六碗。煎取碗半。如法再煎三次。去渣。其六碗。

胎產秘書

卷下

三

再煎至一碗。每日半酒盞。白湯送下。

滋榮益氣扶正湯 ○治產後寒熱有汗。每日午後應
期發。

人參 熟地各二錢 當歸 三錢 川芎 黃芪 麥冬
麻黃根各一錢 白木 錢半 炙草 五分 陳皮去白 四分 ○夜
服六味地黃丸七八十九。白湯送下。

加減養胃湯 ○治產後寒熱往來頭痛無汗類瘧。

人參 錢半 當歸 二錢 川芎 茯苓 蒼木各一錢
夏 八分 藿香 甘草 橘紅各四分 薑水煎 ○痰加
竹瀝薑汁半夏麩 ○人弱加河車丸 ○產後人瘧

無汗不愈兼服參木膏。以助藥力。

加味生化湯 ○治產七日內發熱頭痛症。

當歸 三錢 川芎 錢半 甘草 黑薑 羌活 防風
各四分 桃仁 十粒 ○服兩帖後頭痛身熱不除加白
芷 八分 細辛 四分 ○若頭痛如破加帶鬚葱頭五
個 ○虛加人參 一錢

養正通幽湯 ○治產後大便閉類三陰傷寒症。

當歸 六錢 川芎 二錢 甘草 五分 桃仁 十五粒 肉苁蓉
酒洗去甲 陳皮 四分 麻仁 二錢 ○如汗多便實加
人參 黃芪 麻黃根各二錢 ○口燥加人參 麥

胎產秘書

卷下

三

冬 各一錢 ○腹滿液乾便實加人參 二錢 麥冬 肉

苁蓉 各一錢 枳殼 六分 ○汗出譫語便實乃氣血並

竭神衰心主失守宜養榮安神加茯神 棗仁

遠志 柏子仁 黃芪 肉苁蓉各一錢 人參 白

木各二錢

以上大便燥結症。並宜大料歸芎補血。其人參
不可少。非歸芎數觔。難取功效。

滋榮活絡湯 ○治產後血少口噤項強筋掣類中風
症。

人參 二錢 當歸 三錢 熟地 二錢 川芎 錢半 黃芪

茯神 天麻 麥冬各一錢 甘草 陳皮 荆芥
防風 羌活各四分 黃連三分 薑汁炒 ○如有雜症另加
天麻丸 ○治產後中風恍惚語澁四肢不利

人參 茯神 棗仁 遠志 山藥 麥冬 柏
子仁各一兩 當歸二兩 天麻 防風各五錢 川芎 羌
活各七錢 細辛四錢 南星麩 半夏麩 石菖蒲各
錢 蜜丸辰砂為衣

止汗散 ○治產後盜汗
人參二錢 當歸 熟地各三錢 牡蠣一錢 浮小麥一
大撮 麻黃根錢半

胎產秘書 卷下 弄

生津止渴益水飲 ○治產後口燥咽乾而渴或兼小
便不利

人參 熟地 麥冬 葛根各一錢 當歸三錢 川芎
錢半 五味子十粒 茯苓八分 甘草 升麻各五分 加
減同前

加減生化湯 ○治產後多汗出而變類症症口噤不
開背強而直身反氣息如絕

人參 當歸 川芎 甘草 麻黃根 防風
桂枝 羌活 天麻 羚羊角 附子
又方 ○治產後汗類症中風筋脈四肢攣急

川芎 當歸 羌活 防風 棗仁

加減生化湯 ○治產後泄瀉血塊未消宜服此方
人參三錢 當歸 白木各二錢 川芎一錢 茯苓錢半

澤瀉八分 黑薑四分 炙草 陳皮各五分 肉果一個
加味生化湯 ○治生產三日內完穀不化 胎前素弱
人患此症

當歸四錢 川芎 益智各一錢 茯苓錢半 炙草五分
黑薑四分 桃仁十粒

參苓生化湯 ○治產後血塊散可服補方
人參 川芎 茯苓 益智炒 白芍各一錢 當歸三

胎產秘書 卷下 卑

錢 黑薑四分 炙草五分 蓮子八枚 肉果一個 ○瀉
水多加澤瀉 木通各八分

加減生化湯 ○治產後七日內患痢
當歸五錢 川芎二錢 茯苓一錢 炙草五分 木香磨
三分 桃仁十二粒 ○紅痢腹痛加砂仁六分

香連丸 ○治禁口痢木香黃連為末加蓮肉粉為丸
凡產三四日後血塊散痢積少減照後開治法

一產後久瀉元氣下陷大便不禁肛門如脫
六君子湯加木香四分 肉果一個 黑薑五分
一產後瀉痢黃色乃脾土真氣虛

補中益氣湯加木香四分肉果一個

三產後傷麩飯瀉痢

加參生化湯加神麩 麥芽

四產後傷肉食瀉痢

加參生化湯加山查 砂仁

五產後胃氣虛弱瀉痢完穀不化當溫助胃氣

六君子湯加木香四分肉果一個

六產後胃氣虛脾氣弱瀉痢四肢浮腫

六君子湯加五皮散

七產後泄痢無後重但日久不止

胎產秘書 卷下 聖

六君子湯加木香 肉果

八產後赤白痢臍下氣痛

當歸 厚朴 黃連 甘草 肉果

九產後久痢屬血虛

四物湯加荆芥 人參

十產後痢羸瘦心腹絞痛

薤白 石榴皮 當歸 黃連 地榆○腹痛不

止用溫湯醮布煖腹則緩

生化六和湯○治產後血塊未除日患霍亂

當歸四錢 川芎二錢 茯苓一錢 黑薑 炙草 陳

皮 藿香各四分 薑水煎

附子散○治產後霍亂吐瀉手足逆冷問無血塊可

用此方。

人參一錢 當歸 白木各二錢 附子五分 陳皮 黑

薑 丁香 甘草各四分 右為細末。粥飲調下二錢。

又溫中散○治產後霍亂吐瀉不止無塊痛可服。

人參 當歸 白木 厚朴 黑薑 茯苓 草

豆豉 薑水煎○產七日用六和湯下。

加減生化湯○治產後嘔逆不食

當歸三錢 川芎錢半 黑薑 炙草 砂仁各五分

胎產秘書 卷下 聖

水煎

溫胃丁香散○治產后七日外患嘔逆不食

人參一錢 當歸 白木各二錢 乾薑 丁香各四分 陳

皮 甘草 前胡 藿香各五分 薑水煎

石蓮散○治產後咳逆嘔吐心忡目眩

石蓮子去殼 白茯苓一兩 丁香五錢 共為細末。米

飲調服。

生津益液飲○治產後血少汗多內煩作渴不生津

液 人參 麥冬 茯苓各一錢 大棗 小麥 竹葉

甘草 括蕪根○大渴不止加蘆根

健脾利水補中益氣湯○治產後水腫七日外用

人參 白木各二錢 茯苓 芍藥各一錢 木瓜八分 陳

皮五分 紫蘇 木通 大腹皮 蒼朮 厚朴各

四分○大便不通加郁李仁 麻仁各一錢

五皮散○治產後風濕面目虛浮四肢腫脹氣喘

五加皮 地骨皮 大腹皮 茯苓皮 生薑皮

各一錢 水煎服

加減養榮湯○治產後驚悸塊消痛止宜服此方。

人參 白木 茯苓 棗仁 麥冬 遠志 黃

胎產秘書

卷下

聖

芪各一錢 當歸 川芎各二錢 陳皮 炙草各四分 圓眼

肉八枚 水煎服○如血塊未消宜服生化湯加木

香減川芎麥冬即歸脾湯

養心湯○治產後心血不調驚悸不安

人參錢半 當歸 棗仁各二錢 黃芪 麥冬 柏子

仁各一錢 茯苓 川芎 遠志各八分 五味十粒 炙草

四分 薑水煎

安神丸○與前藥兼服

黃連 酒炒 懷生地 歸身各三錢 炙草五分 右為細

末蒸餅糊為丸如菉豆大硃砂二錢為衣每服四

十九

清骨丸○治產後骨蒸作湯更效速。即柴連梅丸。

柴胡 前胡 烏梅去核 胡黃連各二錢 猪脊髓一

條猪膽一個 韭萊白長十二根 上四味藥為末另將

髓膽韭白同搗如泥入童便一盞熬如稀糊入藥

末和勻再搗為丸如菉豆大每服白湯送下。

保真湯○治骨蒸勞熱亦可作丸服

人參 白木 茯苓 知母 熟地 生地 麥

冬 白芍 枸杞各一錢 黃芪 川芎 骨皮各八

當歸 天冬各二錢 甘草四分 黃柏六分 五味十粒

胎產秘書

卷下

醫

棗二枚水煎

加味生化湯○治產後心痛即胃腕痛俗呼心痛如

真心痛即死不救

當歸三錢 川芎一錢 炙草 黑薑各五分 肉桂八分

吳茱萸七分 ○三帖後加茱萸○傷寒物加茱萸

○傷肉食加山查砂仁○傷麪飯加神麪麥芽○

大便不通加肉荳蔻二錢

加味生化湯○治產後風冷乘虛八腹作痛○如有

血塊痛只服生化湯調一笑散鹿角灰散塊消痛

自止。

當歸 四錢 川芎 二錢 黑薑 四分 炙草 五分 桃仁 十粒
桂枝 七分 ○如血塊痛未散加一笑散 二錢 延
胡索末 二錢

加減生化湯 ○治產後小腹痛

當歸 三錢 川芎 一錢 黑薑 炙草 各四分 桃仁 十粒

○問有血塊痛本方調延胡索散一錢 ○亦治寒
氣痛如痛可按屬虛加熟地三錢

延胡索散

延胡索 一錢 肉桂 一錢 共為細末

產後虛勞指節痛不止汗不止

胎產秘書

卷下

巽

人參 當歸 黃芪 生薑 淡豉 確白 猪

腎二個 先將猪腎水煮熟取汁二盞煎藥八分温

服

趁痛散 ○治產後遍身疼痛

當歸 黃芪 白朮 牛膝 獨活 肉桂 甘

草 韭白 薑水煎

養榮壯腎湯 ○治產後感冒風寒傷冷腰痛不可轉

動

當歸 二錢 獨活 桂心 川芎 杜仲 續斷

桑寄生 各八分 防風 四分 生薑 三片水煎服 ○兩帖

後不止痛屬腎虛加熟地三錢

芽根湯 ○治產後冷熱膏石諸淋

白茅根 一兩 人參 葵子 桃膠 各錢 瞿麥 白

茯苓 各五分 滑石 甘草 各四分 紫貝 六分 石首魚頭

四個 生薑 燈心 水煎入齒末空心服

又方 ○治產後淋水便痛及血淋

白茅根 瞿麥 車前子 冬葵子 通草 鯉

魚齒 百個 水煎入齒末空心服

又方 ○治小便數或遺尿

益智仁 三十七枚 炒研為末米飲下二錢

胎產秘書

卷下

巽

又方 ○桑螵蛸散

桑螵蛸 三十個 人參 黃芪 鹿茸 牡蠣 赤

石脂 各二錢 為末空心粥飲下二錢

參歸生化湯 ○治產後流注未成自消已成自潰

人參 馬蹄香 各二錢 當歸 三錢 川芎 黃芪 錢半

肉桂 六分 甘草 五分 ○若漫腫微痛屬形氣病形

氣俱不足者最難治 ○未成膿或已成膿不潰氣

血虛也宜服人參湯 ○增寒惡熱虛也宜服十全

大補湯 ○日晡內熱四物加參木丹皮 ○嘔逆胃

氣虛也六君子湯加黑薑 ○食少體倦脾氣虛也

補中益氣湯加升麻○四肢逆冷小便頻數腎虛也補中益氣湯加益智一錢○用葱一握炙熟搗爛作餅於腫處用布二三層以熨斗熨之初起可消神仙迴膿散○治產後流注惡露日久成膿用此方宜通其膿方見乳癰症○若其人未補血氣未旺此方又不可用

千金療陰蝕瘡方○治婦人陰戶生瘡名曰惡瘡或痛或痒如虫行狀膿汁淋漓

川芎 當歸 地榆 甘草 芍藥 以水五升煎二升去渣洗患處日三夜一

胎產秘書

卷下

舉

又方

蒲黃 一升 水銀 一兩 二味研勻搽之

又方○治疔疔食下部及五臟

取桃東南枝三七條輕打頭使散以綿縛之又研石硫黃為末將綿纏桃枝燃轉之令藥末少厚再截一短竹筒先納下部中以所燃藥桃枝點着入筒中薰之

丹溪醫案方○治產後大便不通候下成臃脹

人參 三錢 當歸 白木 各二錢 茯苓 白芍 木通 各一錢 澤瀉 八分 海金沙 六分 蘇梗 陳皮 厚朴

大腹皮各五 蘿蔔子 四分 木香 二分 薑水煎交加地黃丸○治產後血塊服湯藥已半消可服此方

人參 當歸 川芎 各七錢 白芍 沒藥 各五錢 木香 二錢 香附 一兩 懷生地 四兩 水二大 老生薑 四兩 取汁一先將地黃汁浸薑渣再將薑汁浸地黃渣汁盡晒乾焙燥同諸藥為末醋糊為丸如棗豆大空心溫酒送下四五十丸

產後空肚痛方

歸身 五錢 川芎 二錢 乾薑 錢半 炒半 肉桂 一錢 桃

胎產秘書

卷下

舉

仁 八粒 去皮 紅花 七分 水煎服

保赤須知 附載

一兒初生不可洗浴保全真元此法第一或將頭面洗淨周身以軟帛抹之可也即三朝亦不必浴冬寒尤為不宜恐浴時風入臍中臍風多由此起一斷臍帶必以蘆艾為燃香油浸濕薰燒臍帶令焦方斷其束臍須用軟帛厚綿裹束日開視之勿令兒尿浸濕此預防臍風第一要緊事也一兒生次日口中上脣有白泡及馬牙即以銀簪挑破京墨搽之所挑白點必須刮出勿落入喉中

一兒濕衣不可夜露。恐烏糞水投衣能生毒瘡。難治。
一胞衣瓶。忌安太歲方。三殺方。其器稍大瓶穩者。
一滿月。古以一月爲小滿月。兩月爲大滿月。此兩月
內。不暴怒。少勞碌。禁淫慾。終身無病。且多生子。

胎產秘書

卷下

吳

萬氏女科

〔明〕萬全撰

據上海圖書館藏清乾隆刻
女科備考本影印原書版框
高一七五毫米寬二四四毫米

萬氏家藏女科原本

羅田萬 全齋齋先生著

山陰何應豫立先氏增訂

凡增改者較原本低三字以便分別此書相

傳已於集中一仍其舊不敢擅改然以訛傳

訛不能無疑者附記於後以質明者

第一卷目錄

濟陰賦

立科大概

女科備考 卷一 目錄

二

調經章

總論五條

不及期先行

過期後行

一月再行

數月一行

或前或後行

經候腹痛

或多或少

紫色淡色

經閉不行

石痕 附

腸草 附

崩漏章

崩

漏

經血妄行

赤白帶下

白濁白淫白帶辨

種子章

一十三條

胎前章

論胎養

妊娠惡阻

胎動不安

漏胎 增宿血不運 反類於瘀

女科備考 卷一 目錄

三

妊娠傷寒

增疫症 方論

妊娠中風

增中惡

妊娠中暑

妊娠中濕

妊娠咳嗽

增方論

妊娠瘧疾

增方論

妊娠霍亂

改 增方論

妊娠泄瀉

增方論

妊娠痢疾

增方論

子懸

增方論

子煩

增方論

子癇

增方論

子腫

增方論

子氣

增方

子滿

增方論

子淋

增方

子鳴補

妊娠傷食

妊娠頭痛

妊娠目鼻喉舌諸病

妊娠瘡毒

增孕癰

雜症

壯若邪祟暴暗不語 增諸血

症諛語

臍燥

痘疹

氣喘不得臥

胎死病喘

遺尿

轉胞

子瘡

八月章

增方論

臨產須知七條

論難產

七條 增方論

催生四法

增方論

救逆產

救橫產

救側產

救礙產

女科備考 卷一 目錄

四

子死腹中

盤腸生

胎衣不下

以上各增方論

產子迷悶不啼

分娩禁忌

添

產後章

產後血暈

增方論

產後子宮脫出

產後妄見鬼神

產後心痛增方論

產後脹滿嘔吐

增方論

產後口乾痞悶

產後口乾渴兼小便短少

立增

產後咳嗽

增方論

產後氣急喘促增方論

產後腰痛

產後徧身痛增薄勞

產後腹痛小腹痛

增方論

產後兒枕痛增方論

產後頭痛

產後發熱增方論

產後寒熱似瘧

增方

產後瘧

產後渴

產後汗不止兼變症

增方論

產後中風增方論 附類中風

子癲誤認傷寒

怔忡驚悸煩燥增

女科備考 卷一 目錄

五

麻瞽增

產後傷寒

產後霍亂吐瀉

產後泄瀉增方論 並遺尿

吐衄鼻黑氣舌黑增

三衝論增

產後痢

附利鮮血

產後大便閉澀增方論

產後小便不通

產後淋增方論

產後溺血

產後小便數及遺溺

增方論

產後咳逆增方論

產後浮腫

產後惡露不止增方論

產後惡露不下增方論

產後昏眩

產後脇痛增方論

產後不語蹇澁

產後暴崩

產後血塊血痕

產後玉戶不斂增方論

乳汁不通增乳溢

乳巖增

乳懸增

婦科備考 卷一 目錄

六

萬氏女科卷之一

羅田萬 全密齋著

立科大概

夫男女均稟天地之氣以生。有生之后。男則氣血俱足。女則氣有餘而血不足也。至於受病。外感內傷之症。未嘗不同。但女則別有調經胎前產後之治。此所以更立一科也。調經專以理氣補心脾為主。胎前專以清熱補脾為主。產後專以大補氣血兼行滯為主。此婦人科調治之大畧云。

濟陰賦

陰陽異質。男女殊科。特立專門之證治。以救在室之沈疴。因其血之虧也。故調之必使流通。因其氣之盈也。故抑之不使鬱遏。體本嬌柔。性最偏頗。肥白者多痰。瘦黑者多火。胃太過者氣結。養不足者血涸。專寵愛者。治合異乎孤冷。妖青紫者。察莫同於菘藿。月事

時下兮如潮汐之應期。血海常滿兮似江漢之流波。是皆無病。可以勿藥。或不及期而先來兮。氣有餘而血易虧。或過期而後來兮。氣不足而血本弱。花氣淡淡兮。由血室之水虛。桃浪紫色兮。被胞戶之火灼。經未行而腹痛兮。氣滯血澁而可調。經已行而腹痛兮。和氣養血而勿錯。或一月再行兮。邪火迫而氣血不藏。或數月而一行兮。元氣虧而生化不多。是皆損真之症。貴在調理之和。滿而不洩兮。為經閉。為血枯。為

女科備考

卷一

濟陰賦

二

癥瘕。洩而不滿兮。為崩中。為帶下。為漏濁。常滿者惡。其中滿。常洩者慮其氣脫。脈惟喜於朧濇。診切忌乎洪數。或隱忍而病盛兮。愚婦自速其亡。妄攻補而病增兮。庸醫反助其虐。

經候既調。男女可合。不出三日之期。宜踐應候之約。乾闥坤闔。陽唱陰和。滴秋露於花枝兮。玉粒可結。鼓春風於桃浪兮。金鱗自躍。陰包陽兮。則丹桂發芽。陽包陰兮。則紅蓮吐萼。天地之大義。生民之本始。勿謂

芻蕘之言。作詼諧而笑謔。

震風之喜有徵。妊娠之脈必確。尺數關滑而寸盛。陽搏陰別而雀躍。精神雖倦兮。桃腮更妍。飲食粗惡兮。天癸不落。無防惡阻之害。所慎漏胎之濁。熱常要清。脾不可弱。熱若盛兮。而胎動不安。脾若虛兮。而胎危易墮。惟以安胎為本。其餘雜症。為末。斯先拮之格言。宜後人之守約。

女科備考

卷一

濟陰賦

三

子懸急痛而勿疑。子癇卒倒而可愕。子滿胎肥而氣壅。子瘡脾虛而氣弱。子煩子淋兮。胎熱所為。子腫子氣兮。胎水所作。子嗽子痢兮。病轉劇而胎損。傷寒傷食兮。痰苦多而成惡。常慘常笑兮。肺氣結而非崇。暴啞不語兮。心血虛而勿藥。胎若肥而瘦。胎速進。脈怕微而診脈休錯。

懷胎之後。禁忌不可少犯。臨產之前。戒慎乃為要約。預備藥物。審擇穩婆。禁諱去疑兮。恐產母之心動。居安守靜兮。令產母之氣和。兒身未轉兮。坐草不宜太

早胞漿既破兮。使力未可太過。或逆或橫兮。在穩婆之妙手。若遲若留兮。係催生之聖藥。

醫藥之係匪輕。母子之命所託。差之毫釐。甚於水火。胞衣未下兮。取之有道。惡露未盡兮。去之勿過。血迷血暈兮。死生存乎呼吸。血脹血痛兮。攻擊戒乎揮霍。但以補虛為主。莫因他病而訛。藥喜甘溫兮。切忌苦寒。脈宜和緩兮。最嫌洪數。

惡露各歸於臟腑。諸病若似乎障魔。頭旋而常見黑

女科備考

卷一 濟陰賦

四

花兮。乙木之病。聲啞而乍見鬼神兮。丁火之疴。臍下痛而或淋或秘兮。清瀆塞於汚淤。腹中痛而或脹或腫兮。倉廩積乎陳莖。息逆而喘嗽不寧兮。因犯素天之氣。腰痛而俯仰不利兮。乃衝元海之波。煩熱兮。責其血去而陰虛。羸怯兮。知其蓐勞而氣弱。能詳察夫症候。斯可議乎方藥。

經候不調兮。烏雞可投。天癸或阻兮。蒼莎宜託。地黃補腎兼行。參朮養脾莫却。三補涼血兮。專治崩中之

藥補中煖官能固帶下之脫。安胎胡連兮。在妊娠為最宜。其形症而休鎮。黑神去惡露而可取胎衣。十全而能除陰火。臨病審症兮。請觀設問之辭。舉一該百兮。勿訝吾言之約。吐露靈府之珠璣。掣開醫門之鎖鑰。

調經章

總論 五條

謹按經云。女子二七而天癸至。衝任滿盛。月事以時

女科備考

卷一 調經

五

下。乃有子。故得其常候者為無病。不可妄投調經之劑。苟或不及期而經先行者。或過期而經後行者。或一月而經再行者。或數月而經一行者。或經閉不行者。或崩者。或漏下者。此皆失其常度。不可不調也。大抵調治之法。熱則清之。冷則溫之。虛則補之。滯則行之。滑則固之。下陷則舉之。對症施治。以平為期。如芩連梔柏。清經之藥也。丁桂薑附。溫經之藥也。參朮歸芪。補虛之藥也。川芎香附。青皮元胡。行滯之藥也。律

蠟赤石脂棕櫚灰及栝葉固滑之藥也升麻柴胡荆芥白芷升舉之藥也隨其症而用之鮮有不效者矣婦人經候不調有三一曰脾胃虛弱二曰衝任損傷三曰脂痰凝塞治病之工不可不慎

脾胃虛弱者經曰二陽之病發心脾女子不月夫二陽者陽明胃也胃主受納五穀長養血氣灌溉臟腑流行經隧乃水穀之海血氣之母也惟憂愁思慮則傷心心氣受傷脾氣失養鬱結不通腐化不行胃雖

女科備考

卷一 調經

六

能受而所謂長養灌溉流行者皆失其令矣故脾胃虛弱飲食減少氣日漸耗血日漸少斯有血枯血閉及血少色淡過期始行數月一行之病

衝任損傷者經曰氣以噓之血以濡之故氣行則血行氣止則血止也女子之性執拘褊急忿怒妒忌以傷肝氣肝為血海衝任之系衝任失守血氣妄行也又褚氏以女子血未行而強合以動其血則他日有難名之疾故女未及二七天癸之期而男子強與之

合或於月事適來未斷之時而男子縱慾不已衝任內傷血海不固由斯二者為崩為漏有一月再行不及期而行者矣

脂痰凝塞者蓋婦女之身內而腸胃開通無所阻塞外而經隧流利無所凝滯則血氣和暢經水應期惟彼肥碩者膏脂充滿元室之戶不開據腹者痰涎壅滯血海之波不流故有過期而經始行或數月而經一行及為濁為帶為經閉為無子之病

女科備考

卷一 調經

七

不及期而經先行

如德性溫和素無他疾者責其血盛且有熱也歸

身 川芎各七分 赤芍 生地酒洗 知母 麥冬去心

骨皮各一錢 甘草五分 水煎空心服

如性急燥多怒多妒者責其氣血俱熱且有鬱也

歸身 川芎 白芍 條芩炒 黃連炒 香附浸炒

并以上 生地酒洗 生甘草五分 水煎服

如形瘦素無他疾者責其血熱也四物湯加芩連

內用赤芍 連俱炒各一錢 生甘草五分 水煎食前服兼服

三補丸和之

〔三補丸〕專治血熱 黃芩 黃連 黃柏俱炒 以上各等分

其為細末蜜丸白湯下

如形瘦素多疾且熱者責其衝任內傷也 歸身

白芍 熟地 人參 知母 麥冬去心各一錢 川芎

分炙甘草五分 薑三片棗二枚為引水煎食前服更

宜常服地黄丸

女科備考 卷一 調經不及期先行 八

〔地黄丸〕治女子衝任損傷及胃熱 熟地八兩 山藥

淨山萸肉培以上 白茯苓培以上 牡丹皮去木以上 蜜

九空心白湯下

如會誤服辛熱煖官藥責其衝任伏火也 歸身

赤芍 生地酒洗 黃柏炒 知母 木通去皮以上 川

芎七分 生甘草五分 水煎食前服更服三補丸和之

如形肥多痰多鬱者責其血虛氣熱也 歸身酒洗

川芎 生地薑汁炒 陳皮去半 夏滾水 白茯苓各五分

生甘草各五分 條芩炒 香附童便 黃連炒 薑引水煎服

經過期後行

如德性溫和素無他疾者責其血虛氣少也八珍湯

主之即四物湯合 人參 白朮土炒 茯苓 生甘草

歸身酒洗 地黃酒蒸 白芍 川芎以上各等分 薑三片

大棗三枚去核水煎食前服

如性急燥多怒多妒者責其氣逆血少也八珍湯加

女科備考 卷一 調經過期後行 九

香附主之 前方加香附童便 青皮各等分 水煎服

兼常服蒼莎丸以調之

〔蒼莎丸〕和中 蒼朮米泔 香附童便 浸各一條 芩兩

酒共為細末酒蒸餅為丸白湯下

如形瘦素無他疾者責其氣血俱不足也十全大補

湯主之治氣血兩虛脾胃不足即八珍加 人參

黃耆蜜炒 白朮土炒 白茯苓 甘草炙 歸身酒洗 川芎

白芍酒炒 生地酒洗 肉桂五分 薑棗引煎服如前

如形瘦食少。責其脾胃虛弱。氣血衰少也。異功散加當歸川芎主之。補脾胃。進飲食。養氣血。人參

白朮土炒 白茯苓 炙甘草 陳皮 歸身酒洗 川芎各一錢

薑棗引兼服地黃丸

如肥人及飲食過多之人。責其濕痰壅滯。軀脂迫塞也。六君子加歸芎主之。人參 白朮土炒 茯苓

炙甘草 陳皮去白 半夏湯泡七次薑炒 歸身酒洗 川芎 香附童便浸炒 薑引兼服前蒼莎丸

女科備考 卷一 調經過期後行 十

如素多痰者。責其脾胃虛損。氣血失養也。用參朮大補丸兼服地黃丸。參朮大補丸即參人參五錢 白茯苓

苓 白朮土炒 蓮肉去心 陳皮 歸身各七錢半 山藥一兩 炙甘草三錢 砂仁炒 川芎 石菖蒲各五錢 以上共

為細末。荷葉包米煮飯為丸。米飲下。一月而經再行

如性急多怒者。責其傷肝。以動衝任之脈也。四物加

柴胡湯主之。歸身酒洗 川芎 白芍 生地 柴

胡 人參 條芩 生甘草 黃連 煎服更宜常服補陰丸以瀉衝任之火

〔補陰丸〕 黃柏炒褐色 知母去皮 等分蜜丸每服五十

粒 張純云補陰丸不及六味丸加柴胡白芍

如曾服辛熱藥者。四物湯加黃柏知母。及三補丸主之。

如曾傷衝任脈者。四物湯加人參知母麥冬。及地黃丸主之。

女科備考 卷一 調經一月再行 十一

數月而經一行

瘦人。責其脾胃虛。氣血虛也。十全大補湯及地黃丸

主之。肥人。責其多痰。兼氣血虛也。六君子加蒼莎

導痰丸主之。人參 川芎 半夏泡各七分 甘草五分

白朮 白茯苓 陳皮去白 蒼朮米泔浸 歸身酒洗 香附

童便 枳殼炒以上 薑引

〔蒼莎導痰丸〕 蒼朮米泔浸 香附童便浸焙 陳皮去

白茯苓去皮各一兩 枳殼炒 半夏泡七次 南星炮去 甘草

炙各一兩 生薑自然汁浸餅為丸淡薑湯下

經行或前或後

悉從虛治加減八珍湯主之。人參 白朮 茯苓

歸身 川芎 白芍 甘草 陳皮 丹參

香附童便浸 牡丹皮各一錢 薑棗引水煎服更宜常服

丸藥

烏雞丸專治婦人脾胃虛弱衝任損傷血氣不足經候不調不生有者服之屢驗 白鳥

骨雄雞一隻要未斃者先以粳米餵養七日勿令

女科備考 卷一 調經數行或前或後 十一

食蟲螳野物勒殺去毛去雜細以一斤為率用生

地 熟地 天冬去心各二兩 安放雞腹內甜

美醇酒十碗沙確煮爛取出以桑柴火焙去藥酒

以餘酒淹盡焙至焦枯研羅為末外再加人參

炙甘草 肉蓯蓉酒洗 補骨脂炒 小茴炒 砂仁以上各一兩

杜仲鹽水炒 歸身 川芎 白朮 丹參 白茯苓

以上各二兩 香附醋浸三日焙四兩 共細研和上末酒調麪糊

為丸每空心溫酒或米飲下五十九

經候腹痛

凡經將行腰脹腹痛者氣滯血實也。桃仁四物湯主

之。歸尾 川芎 赤芍 丹皮 香附醋炒 元胡

索各一錢 生地 紅花各五分 桃仁二十五粒研 水煎服如

瘦人責其有火加黃連 黃芩炒各一錢 肥人責其有

痰加枳殼炒 蒼朮水淋浸各一錢

凡經行過後腹中痛者虛中有滯也加減八珍湯主

之。人參 白朮 茯苓 歸身 川芎 白芍

女科備考 卷一 調經經候腹痛 十三

生地 香附醋炒各一錢 青皮一分 炙甘草 木香各五分

薑棗引

經水多少

瘦人經行少者責其血虛少也。四物加人參主之。

人參 歸身 川芎 白芍 生地 香附童便浸

炙甘草各一錢 薑棗引

肥人經行少者責其痰凝經隧也。二陳加芎歸主之。

陳皮 白茯苓 歸身 川芎 香附童便浸 枳殼各

錢一半夏泡七次 甘草五分 滑石二錢 薑引

凡經行太多者不問肥瘦皆屬熱也。四物加芩連主

之。歸身 白芍酒洗 知母 熟地 條芩 黃連

錢各一 川芎 生地各五分 黃柏七分 煎服藥用三補丸

經水紫色淡色

色紫者熱也。四物加香附黃連主之。歸尾 川芎

赤芍 生地 香附童便浸 黃連炒 生甘草

丹皮各一錢 煎服

女科備考 卷一 調經經水多紫淡古

色淡者虛也。八珍湯主之。人參 白朮 白茯苓

歸身 川芎 白芍 熟地 黃耆 香附童便浸各

錢一炙甘草五分 薑棗引更常服地黃丸

已上各方並宜於經行時連進十餘劑則下

次經候自不愆矣。若丸藥則宜久服乃效。

經閉不行

經閉其候有三。脾胃傷損飲食減少氣耗血枯而不行者。法當補其脾胃養其血氣以待氣充血生經自

行矣。若妄用通經之劑則中氣益損陰氣益乾致成

癆瘵而不可救。所謂索千金於乞丐。釜楚日加徒斃

其生而已。有憂思怨怒氣鬱血滯而經不行者。法當

開鬱氣行滯血而經自行。苟用補劑則氣得補而益

結血益凝聚致成癥瘕脹滿之疾。所謂養虎自遺患

也。有軀脂迫塞痰涎壅滯而經不行者。法當行氣滌

痰使經得行。斯謂良工矣。

如因脾胃損傷血枯不行者。加減補中益氣湯主之。

女科備考 卷一 調經經閉 五

人參 白朮各二錢 炙黃耆 柴胡各七分 炙甘草五分

歸身 白芍酒洗 川芎 陳皮各一錢 神麴炒 麥芽炒

錢五薑棗引宜更服前參朮大補丸烏雞丸以經行

為度

如因氣鬱血閉而不行者。開鬱二陳湯主之。陳皮

白茯苓 蒼朮 香附童便浸 撫芎各一錢 半夏泡 青皮

莢茂 檳榔各七分 甘草 木香各五分 薑引更服

四製香附丸以經行為度。

〔四製香附丸〕

香附淨一斤杵作四分酒醋盪水

天台烏藥兩共為極細末醋糊為丸白湯下乃婦

人常用之要藥也。

如因痰者用前蒼莎導痰丸主之更服上開鬱二陳

湯去莪茂加枳殼錢一

有晚嫁之女失寵之妾寡居之婦庵院之尼欲動而

不能遂感憤而不得伸多有經閉之疾含羞強忍

不欲人知致成癆瘵者宜四製香附丸參朮大補

女科備考

卷一 調經經閉

六

丸攻補兼行庶乎可瘳。

立按此七情之變非藥能治其心也。

有經閉不行骨蒸潮熱脈虛者增損八物柴胡湯主

之。人參 白朮洗 歸身 生地 白芍洗 麥冬

去知母 北柴胡錢各一 炙甘草五分 淡竹葉十五片 有

汗加地骨皮洗無汗加牡丹皮錢各一煎服凡婦人

血虛有熱者皆可用如熱甚服此不平者加黑乾

薑錢一神效

有經閉發熱咽燥唇乾脈實者四物涼膈散主之。

歸身 川芎 赤芍 生地 黃芩酒炒 黃連酒炒 山

梔酒炒 連翹 桔梗各一錢 甘草生 薄荷葉各五分 淡竹

葉十片凡血實形盛脈有力者皆可服。

附論異症

石痕

石痕者因行經時寒氣自陰戶而入客於胞門以致

經血凝聚月信不行其腹漸大如孕子狀壯盛者

女科備考

卷一 調經石痕

七

半年後小水長而消矣若虛怯人必成腫病溫經

湯主之。歸身梢 川芎 赤芍 莪朮煨 川牛

膝 補骨脂炒 小茴炒 人參以上各一錢 甘草炙五分 薑

棗引更宜類服香附丸。

腸覃

腸覃者因經行時寒氣自肛門而入客於大腸以致

經血凝滯月信雖行而血却少其腹漸大如孕子

形按之則堅推之則移為胎漏狀壯盛者半年後

氣旺而除。虛怯人必成脹病。桂枝桃仁湯主之。

桂枝 檳榔各一錢 白芍酒炒 生地酒洗 枳殼麩炒各一錢 桃

仁去皮尖 炙甘草五分 薑棗引更宜常服四製香附

丸

以上二症載靈樞經人罕知者特表而出之

崩漏章

崩

崩中之病皆因中氣虛不能收斂其血加以積熱在

女科備考

卷一 崩漏腸單崩 六

裏迫血妄行故令經血暴下而成崩中崩久不止遂

成漏下昔人云崩中日久為白帶漏下時多腎水枯

也治有三法初止血次清熱後補虛未有不全者矣

凡初得崩中暴下病者宜用止血之劑乃急則治其

標也四物湯調服十灰散以血止為度藕節 蓮

房 艾葉 棕櫚 大小薊根 側柏葉 乾薑

油髮 以上十味各燒存性為灰等分和勻每

服三錢不善服者或用醋煮糯米粉為丸梧桐子

大每服百丸血止即服清熱之劑用涼血地黃湯

生地 當歸各一錢 黃連 黃柏 知母 梔木

川芎 升麻各五分 柴胡 羌活 防風各七分 黃芩

炙甘草 細辛 荆芥穗炒 荊子各四分 紅花

一煎服如未盡再服十灰丸

血已止裏熱已除宜用補中之劑加味補中益氣湯

主之 炙黃耆 人參 白朮 陳皮 歸身

白芍酒炒 熟地各一錢 炙甘草 白朮 升麻 柴胡

女科備考

卷一 崩漏 九

知母 黃柏各五分 薑棗引更宜晨服地黃丸夕

服參朮大補丸以平為期

漏

凡崩久成漏連年不休者中氣下陷下元不固也宜

用前加味補中益氣湯兼服鹿角霜丸 鹿角霜

柏子仁去壳 歸身 茯神 龍骨煨 阿膠蛤粉炒成

珠各川芎七錢 香附醋製 炙甘草五錢 川續斷一兩

共為末研山藥五兩 作糊為丸每空心溫酒下五十

經血妄行

如經血妄行。或吐血唾血。口內血腥。用前四物涼膈散。加生地自然汁服之。

赤白帶下

帶下之病。赤者屬熱。兼虛兼火治之。白者屬濕。兼虛兼痰治之。年久不止者。以補脾胃為主。兼升提。大抵瘦人多火。肥人多痰。要知此候。

赤帶用前四物。加芩連湯。再加升麻丹皮主之。兼服

女科備考 卷一 經妄行帶下 三

三補丸

白帶用加味六君子湯主之。陳皮 半夏泡 蒼朮

米泔 人參各一錢 白朮一錢 白茯苓一錢 炙甘草七分

麻 柴胡各五分 薑引兼服蒼朮導痰丸

帶久不止。專以補虛為主。宜十全大補湯。去地黃。加

陳皮半夏乾薑炒 更服參朮大補丸。以補脾胃之

虛。服補宮丸。以固下元之脫。

補宮丸 鹿角霜 白茯苓 白朮 白芍酒洗 白朮

牡蠣煅 山藥

半醋糊丸。空心米飲下

白濁白淫白帶辨

白帶。白濁。白淫。症既不同。治亦有別。白帶者。時常流

出。清冷稠粘。此下元虛損也。用上帶久不止。法治

之。白濁者。隨小解而來。渾濁如油。此胃中濁氣滲

入膀胱也。加味二陳湯主之。陳皮 半夏泡 白

茯苓 白朮 蒼朮米泔 益智仁益炒杵末 炙甘草各一錢

女科備考 卷一 帶下白濁白淫白帶 三

五升麻 柴胡分 薑引 白淫者。常在小便之後

而來。亦不多。此男精不攝。滑而自出。不須治。

白帶治法。用銀杏三升。酒煮熟。去膜去心。晒乾為末

每白湯下二錢

溫經湯婦人行經時連服三劑能成孕 陳皮 半夏 生地各一錢 歸

身尾二錢 香附半錢 川芎 白芍 紅花 秦艽 烏

藥各八分 木通二分 青皮七分 薑引水煎服

種子章

無男女。乾坤或幾乎息矣。男女配匹。所以廣嗣厥係。匪輕。生育者。必陽道強健而不衰。陰癸應候而不愆。陰陽交暢。精血合凝。而胎元成矣。若陽衰不能下應。乎陰。陰虧不能上從。乎陽。陰陽乖離。是以無子。雖天命有定。抑亦人事之未盡與。

種子者。男則清心寡欲。以養其精。女則平心定氣。以養其血。補之以藥餌。濟之以方術。是人事所當盡也。何謂男貴清心寡欲。蓋形樂者易盈。志樂者易蕩。富

女科備考

卷一 種子

三

貴之人。不知御神。則陽必傾。不知御形。則盈必虧。此清心寡欲。為男子第一緊要也。何謂女貴平心定氣。蓋女子以身事人。而性多燥。以色悅人。而情多忌。稍不如意。即憂思怨怒。憂則氣結。思則氣鬱。怨則氣阻。怒則氣上。血隨氣行。氣逆血亦逆。此平心定氣。為女子第一緊要也。藥餌維何。男子宜服地黃丸。以補左腎之陰。加杜仲。菟蓉。巴戟。補骨脂。沈香。以補右腎之陽。女子宜服烏雞丸。以養其氣血。調其經候。斯為得

理。若彼桂附丹石。動氣耗陽。損血消陰之劑。一切遠之。何謂濟之以方術。如種子之歌。素女之論是也。宜博求之。

女人無子。多因經候不調。藥餌之輔。尤不可緩。若不調其經候。而與之合。徒用力於無益之地。此謂經為女人種子緊要也。

如肥盛婦人。稟受甚厚。及恣於酒食之人。經水不調。不能成胎。蓋因軀脂滿溢。閉塞子宮。宜行溼燥痰。用

女科備考

卷一 種子

三

前蒼莎導痰丸。四製香附丸。

如瘦怯性急之人。經水不調。不能成胎。蓋因子宮乾澁無血。不能攝受精氣。宜涼血降火。用地黃三補丸調之。

如素有濁漏帶下之人。經水不調。不能成胎。蓋因下元虛憊。不能聚血受精。宜補虛澁脫。用前烏雞補宮丸調之。

種子歌云。三十時辰兩日半。二十八九君須算。落紅

滿地是佳期。經水過時空。霍亂之時。枉費工。樹頭樹底。覓殘紅。管取芳花能結子。何憂丹桂不成叢。蓋言經水未行之時。血海正滿。子宮未開。不能受精。成孕。經水既行。則子宮開。血海淨。斯能受精。然亦自經初行之時。計算至三十個時辰。足恰兩日。半欲種子。貴當其時。故一日二日三日交。多生男。四日五日六日交。多生女。七日後子宮復閉。徒勞無益矣。婦久陰質。取象於月。若自朔至望。經水行不失其候。

女科備考

卷一

種子

三五

者。結胎易。生子多壽。以月光漸生。月輪漸滿也。若自望至晦。經水行。或失其期者。胎難結。生子多夭。如月光漸消。月廓漸空也。此造化之理。可為知者道耳。素女論中。男有三至。女有五至。如男至而女未至。玉體纔交。瓊漿先吐。雖能下應乎陰。而陰不從也。如女至而男未至。則桃浪先翻。玉露無滴。雖能上從乎陽。而陽不應也。所以無子。此氣至者。亦有先後男女之別。如陽精先至。陰血後參。則精開裏血而成女。陰血

先至。陽精後衝。則血開裏精而成男。故卜書云。陰包陽。則桂庭添秀。陽包陰。則桃洞得仙。此之謂也。何謂男有三至。蓋陰痿而不舉。肝氣未至也。舉而不堅。腎氣未至也。堅而不熱。心氣未至也。肝氣未至而強合。則傷肝。其精流滴而不射。腎氣未至而強合。則傷腎。其精散漫而不粘聚。心氣未至而強合。則傷心。其精冷而不熱。此男子之所以無子。貴乎清心寡欲。以養肝腎心之氣也。

女科備考

卷一

種子

三五

何謂女有五至。蓋交感之時。面赤而熱。心氣至也。目中涎瀝。微暄視人。肝氣至也。嬌聲低語。口鼻氣喘。肺氣至也。伸舌吮唇。以身偎人。脾氣至也。玉戶張開。瓊液流出。腎氣至也。五氣皆至。而與交。則情洽意美。陽施陰受。有子之道也。

男女無疾。交會應期。三虛四忌。不可不避。三虛者。天地晦冥。日月薄蝕。雷電風雨。晦朔弦望。天之虛也。地震土陷。山崩水溢。地之虛也。憂怒悲恐。醉飽勞倦。人

之虛也。犯此三虛則交而不孕。孕而不育。疾病且生。為身之災也。四忌者。一忌本命正衝。甲子庚申滅沒。休廢之日。二忌大寒大暑。大醉大飽之時。三忌日月星辰。寺觀壇廟。竈厠塚墓之處。四忌觸忤煩惱。罵詈擊搥之事。犯此四忌。不惟令人無子。且致死也。

凡種子者。當應候之時。男服補腎益精之藥。女則調飲食。淡滋味。避寒暑。至於夜半生氣乘旺之時。依上三至五至。三虛四忌行之。自然交而必孕。孕必有成。

女科備考

卷一 種子

三

矣。

胎前章

論胎養 十一條

婦人受胎之後。所當戒者。曰房事。曰飲食。曰七情。曰起居。曰禁忌。曰醫藥。須預先調養。不可少犯。致傷胎難產。且令子多疾。悔無及矣。

古者婦人有孕。即居側室。不與夫接。所以產育無難。生子多賢。亦少疾病。今人不知禁忌。縱情恣慾。有則

動胎氣而墮者。有胎肥碩而難產者。有敗精凝裹而礙產者。有生子多疾。痘瘡稠密者。皆由不謹之過也。受胎之後。最宜調飲食。淡滋味。避寒暑。常得清純和平之氣。以養其胎。則胎元完固。生子無疾。今為婦者。喜啖辛酸煎炒肥甘生冷之物。不知脾胃受傷。胎則易墮。寒熱交雜。子亦多疾。況多食酸則傷肝。多食苦則傷心。多食甘則傷脾。多食鹹則傷腎。隨其食物。傷其臟氣。血氣筋骨。失其所養。子病自

女科備考

卷一 胎前 論胎養

三

此生矣。又如食兔肉。則兒缺唇。食羊肉。則兒多白睛。食犬肉。則兒聲暗之類。皆有明驗。所宜禁戒。

古有胎教。凡視聽言動。莫敢不正。喜怒哀樂。莫敢不慎。故生子多賢。此非賢母不能也。蓋過喜則傷心。而氣散。怒則傷肝。而氣上。思則傷脾。而氣鬱。憂則傷肺。而氣結。恐則傷腎。而氣下。母氣既傷。子氣應之。未有不傷者也。其母傷。則胎易墮。其子傷。則臟氣不完。病斯多矣。盲聾暗啞。癡呆顛癇。皆稟受不正之故也。

受胎之後。常宜行動。使血氣流通。百脈和暢。自無難產。若好逸惡勞。貪臥養嬌。則氣停血滯。臨產多難。況行立坐卧之人。為筋骨肌膚之傷。子在腹中。氣通於外。必有傷者。又勿登高。勿臨深。勿越險。勿負重。少有觸犯。其胎必墮。

婦人懷胎。欲其生男。賢則令觀書史。操弓矢。欲其生女。美則令觀鸞鳳牡丹。凡忌食之物。忌用之藥。不可輕犯。逐月胎神所占之物。不可觸犯。以致墮胎。睡臥

女科備考

卷一

胎前論胎養

天

之處。要人護從。不可獨寢。邪氣易侵。虛險之處。不可往來。恐其墜跌。

好娠在於清熱養血。條實黃芩為安胎聖藥。清熱故也。置水中取沉者為佳。俗人不知。以為害而不敢用。又謂溫經之藥。可養胎氣。誤人多矣。

養胎全在脾胃。譬之鐘懸於梁。梁軟則鐘下墜。梁斷則鐘下墜。故曰。充補脾為安胎要藥。胎中痛者。非經破不止。必連壳者。槌碎用之。

萬氏女科

妊娠七箇月以後。須用枳壳大腹皮。則易產。行氣開滯故也。

孕婦有疾。只以和胎安胎為本。所感外傷內傷之症。以未治之。

醫孕婦必擇請專門。平日無失者。若未試之。醫有毒之藥。不可輕用。胎悔。又不可妄用針灸。以致墮胎。

妊娠惡阻

惡阻者。謂有胎氣。惡心。阻其飲食也。其症顏色如故。

女科備考

卷一

胎前惡阻

天

脈息和平。但覺肢體沉重。頭目昏眩。擇食。惡聞食氣。好食酸鹹。甚者或作寒熱。心中憤悶。嘔吐痰水。胸膈煩滿。恍惚不能支持。輕者不服藥無妨。乃常病也。重者須用藥調之。恐傷胎氣。專主行痰。以二陳湯為主。但半夏有動胎之性。不可輕用。

立按。如果痰盛。酌量用之。亦不妨。所謂有病以病受之也。

肥人專主治痰。半夏茯苓湯主之。即二陳湯加砂仁。

二六三

也。陳皮 半夏湯泡七次炒 茯苓 甘草五分

仁八分 薑素引加烏梅半個水煎食遠服再加白朮

錢半尤妙又二陳湯加桂枝甚效

立按再惡阻甚者甘草宜忌

瘦人兼痰兼熱人參橘皮湯主之。人參 陳皮

白朮各一錢 茯苓 厚朴薑炒各錢半 麥冬七分 甘草五分

薑引加竹茹一團水煎食遠服再加黃芩尤佳

惡阻甚不能食者保生湯主之。人參 甘草 砂

女科備考 卷一 胎前惡阻 三

仁炒研各一錢 白朮 香附童便製 烏梅 陳皮各錢半 薑

引水煎食遠服

胎動不安

如脾胃素弱不能管束其胎氣血素弱不能滋養其

胎不拘日月多少而常墮者安胎飲主之更服杜

仲九胡連九尤佳。安胎飲 條實黃芩 白朮

人參 歸身 生地 陳皮 白芍各一錢 砂仁

連壳炙甘草各五分 薑素引食前服

杜仲丸治胎動不安防其墮者宜服之 杜仲薑汁炒 川續斷酒洗各二兩

共為極細末杵熟棗肉和丸每用米飲下三十丸宜與胡連丸同服

保孕丸 杜仲 用糯米炒去絲以山藥糊

丸治妊婦腰背痛苦於小產

胡連丸安胎之聖藥也 條芩沉水者四兩 白朮無油者 蓮肉去心各二兩

砂仁炒炙甘草各一兩 共為末用山藥五兩作糊

為丸米飲下上方一日二服食前服 胡連丸空心服杜仲丸

女科備考 卷一 胎前胎動不安 三

如因房事過度觸動不安者四物去川芎加砂仁阿

膠主之。歸身 熟地 阿膠各一錢 甘草炙 砂仁

炒各五分 加竹茹水煎調男子雞糞灰一錢服更禁房

事免致再墮

如因七情觸動胎氣不安者加味四物湯主之。歸

身 白芍 生地俱酒洗各一錢 川芎八分 上係本方

因怒傷肝者主胞絡本方加黃芩一錢 人參 柴

胡 甘草各一錢

因憂悲傷肺者。本方加黃芩 阿膠 蘇葉各一錢

炙甘草五分 五味子十三粒

因恐傷腎者。主胞胎。本方加川續斷 黃柏炒

杜仲炒各一錢 五味子十五粒 本方內生地改用熟地

因思慮積久不解傷脾者。本方加白朮一錢五分 人參

陳皮 香附各一錢五分 炙甘草五分

因喜樂太過傷心者。本方加條芩 黃連 白朮

麥冬各一錢五分 炙甘草五分

女科備考 卷一 胎前 胎動不安 三

如因跌撲觸動者。安胎和氣飲主之。 歸身 白芍

各一錢 白朮 黃芩 蘇葉各一錢五分 炙甘草 砂仁

各五分 薑棗引食前服

如因犯胎神所占方位。胎動不安者。用上安胎和氣飲。如見血動。可加阿膠艾葉。以上二症同。

立按妊娠血聚而成胎。少暈邪。或觸犯。則所聚之血。將宿而不運。反類癆瘵。予治此症。近日甚多。必生新開陳。然後胎可養也。養胎不

惟在血。必須補腎以固精。調胃以和中。每遇

此症。但用白朮散方藥四味。蓋白朮能調胃。

蜀椒開痺痺開。則陽精至。牡蠣治崩崩止。則

陰精固。川芎入血海。運動胎血。破舊生新。如

或陰血不利。肝木為害。在內抑屈而痛者。搗

以芍藥之酸寒。以通其陰。設或直衝過而痛

者。散以芎藭之辛溫。以通其陽。隨病加減。再

以八物增損調之。

女科備考 卷一 胎前 胎動不安 三

漏胎

漏胎者。謂既有孕。而復下血也。女子之血。在上為乳

汁。在下為經水。一朝有孕。而乳汁經水俱不行者。聚

之子宮。以養胎也。今復漏下。則是氣虛血虛。胞中有

熱。下元不固也。法當用四君子以補其氣。四物以補

其血。黃芩黃柏以清其熱。艾葉以止其血。杜仲續斷

以補下元之虛。未有不妥者矣。增損八物湯主之。

人參 白朮 歸身 白芍 熟地 艾葉 條

芩 黃柏 知母 阿膠 炙甘草各等分 薑棗引水煎食前服兼用前杜仲丸

妊娠傷寒

妊娠傷寒專以清熱和胎為主各隨六經所見表裏之症治之務宜謹慎不可與常病傷寒同治以致損胎誤其母子性命也此予家傳之秘宜珍重之

凡得傷寒勿拘日數但見惡寒頭痛發熱即病邪在表也宜用四味紫蘇和胎飲為主 蘇葉 條芩

女科備考 卷一 胎前傷寒 三五

白朮各一錢五分 甘草一錢 上係本方

如惡寒頭痛項強腰脊痛此病在太陽經本方加羌

活 藁本 川芎 防風各一錢 連鬚蔥三莖 薑引水

煎熱服以厚衣被覆之得汗即解

如惡寒却不發熱只頭痛鼻乾或項強此病在陽明

經也本方加白芷 防風各一錢 蔥白三根 淡豆豉一撮

煎服汗出自解

如寒熱往來頭眩或嘔或心下煩或胸脇滿此病在

少陽經也本方加柴胡 人參各一錢 嘔加半夏七分 胸脇滿加枳殼 桔梗各一錢 頭眩加川芎一錢 薑棗引

如惡熱惡寒咳嗽甚者病在手太陰經也本方加麻

黃去根 杏仁各一錢 蔥白去根 薑引水煎食後服得汗

而解

如惡寒無熱腹中痛吐瀉不渴手足逆冷者病在足

太陰脾經也本方加人參 乾薑 白芍酒炒各一錢

女科備考 卷一 胎前傷寒 三五

薑棗引水煎熱服

如惡寒倦臥發熱手足冷者病在足少陰腎經也本

方加獨活 熟地 細辛各一錢 生薑大棗引熱服

如惡寒手足厥冷唇口青遍身痛如被杖頭項顛頂

痛者病在足厥陰經也本方加歸身酒洗 吳茱萸炒 羌

活 細辛各一錢 連鬚蔥三根 薑引熱服

凡得傷寒勿拘日數但無惡寒無頭痛只發熱口燥

咽乾而渴者此病邪在裏用黃龍湯為主各隨所

見之症加減治之。柴胡 人參 甘草 黃芩
各一錢 上係本方

如發熱口渴小便不利者。此在手足太陽小腸膀胱

腑病也。本方加白朮一錢 豬苓 澤瀉 赤茯苓

木通各一錢

如發熱大渴者。病在手足陽明胃與大腸也。本方加

知母一錢 石膏二錢 淡竹葉十五片 粳米一撮 煎服

如大熱大渴煩燥大便不通者。病在足陽明胃腑也。

女科備考 卷一 胎前傷寒 三

本方去人參加枳實炒 大黃煨 芒硝各一錢 薑引五分

水煎溫服以利為度。

如發熱口渴而渴心煩不得眠。或乾嘔者。病在足少

陽膽腑也。本方加麥冬 天花粉 山梔仁 酸

棗仁各一錢 竹茹一大團 煎去渣再煎一沸服。

如發熱而渴腹中痛自利者。病在足太陰脾經也。本

方加白朮 白芍 阿膠炒 白茯苓各一錢 薑引三

枚食前服

如發熱而渴自利不止手足冷者。病在足少陰腎經

也。本方去柴胡加附子 赤石脂 白茯苓 砂

仁炒各一錢 薑引食前服

如發熱而渴利下膿血手足冷者。病在足厥陰肝臟

也。本方加歸身 白芍酒炒 白朮 白茯苓各一錢 烏梅

一個食前服。

凡傷寒瘧後調理失宜復發熱者。此勞復也。用黃龍

湯加知母 麥冬各一錢 石膏二錢 淡竹葉十五片

女科備考 卷一 胎前傷寒 三

粳米一撮 以汗為度。

立按發熱而渴可用石膏知母之類如調理

失宜僅止發熱別無他症者用黃龍湯本方

主之切不可過用寒涼之藥臨時最宜斟酌

如因飲食失節復發熱者此食復也。四味紫蘇和胎

飲加枳實炒 黃連炒 陳皮 神麴炒 薑引水煎

食遠服更節飲食免致內傷

若天行時氣傳染者只依上法分六經表裏治之無

先或於初病之時用敗毒散加和胎藥解之亦是

妙方。人參 羌活 柴胡 前胡 白茯苓 甘

草 川芎 桔梗 枳殼 黃芩 白朮 蘇葉

葛根 薑引加蔥白三根水煎服蓋覆得汗

自解

凡傷寒熱病不解遍身發斑如錦文者加味化斑

湯主之。人參 知母 甘草 黃芩 生地

梔仁各一錢 石膏二錢 淡竹葉二十片 豆豉半合 水煎食遠

女科備考

卷一 胎前傷寒疫症 三八

服

凡胎前疫症與傷寒陽明腑証內熱便秘須

急通大便方不損胎若大便自利乃正氣下

泄胎必難保惟大小便如常知裏無熱則不

傷胎氣故有塗臍護胎之法其或汗或下各

隨表裏証主治至妊娠熱症亦須急治恐

致落胎千金用蔥白香豉湯取汗即愈又有

用柴葛安胎飲如嘔吐燥煩用生津葛根湯

列甚則斑出黑色用梔子蔥豉湯列密齋用

加味化斑湯前列此皆熱入於裏陽明証之方

藥也醫通治孕婦溫熱時行及傷寒邪氣內

犯熱毒逼胎並宜千金石膏湯列急救庶可

保全遲則不救又有石膏六合湯列立方甚

穩大凡胎孕不得已而用大黃之藥須用酒

製薑桂附子用黃連甘草製之則無害矣

護胎法 妊娠傷寒熱病

女科備考

卷一 胎前疫症

三九

白藥子 不拘多少 為末以雞蛋清調攤於昏

上如碗大貼臍下胎存處故則以濕茶潤之

又法 治孕婦一切有熱內外諸症

伏龍肝 不拘多少 為末井底泥調敷心下令

胎不傷 以上兩方皆審有實熱不得已而

用之

紫葛安胎飲 治孕婦熱病骨節疼痛如不

急治則落胎

柴胡 葛根 青黛各八分 石膏錢五 升麻五分

枝子錢一 知母七分 蔥白三根 水煎服有痰加竹瀝

一小薑汁二

蔥白香豉湯 時疫傷寒三日已內頭痛如

破及溫病初起寒熱

蔥白連鬚一根 香豉三合 右二味水煎入童

便一合 日三服秋冬加生薑二兩 此方藥味

雖輕功效最著凡虛人風熱伏氣發溫及產

女科備考 卷一 胎前疫症中風 甲

後感冒靡不隨手獲效與產後病後月伏龍

肝湯丸不殊正危証解圍良劑也

妊娠中風

太乙者冬至日在坎正北 立春日在艮東北 春分日

在震正東 立夏日在巽東南 夏至日在離正南 立秋

日在坤西南 秋分日在兌正西 立冬日在乾西北 故

太乙移宮之日即八節日天必應之以風雨其風自

所居之鄉而來為正風不能傷人如自衝方而來謂

之虛風中人即病中其皮毛經絡者則發寒熱頭項

身體皆痛或肌肉頑痺中其筋骨者則拘攣直中

其臟腑者則卒倒昏悶口眼喎斜手足痿痺口禁不

語孕婦得此不可用常治中風法以補虛安胎為本

兼用搜風之劑增損八物湯主之 八物內用當歸

身 炙甘草 加黃芩 黃耆 羌活 防風

秦艽各一錢 薑棗引水煎多服以平為期

妊婦中風因體虛則中之但胎前正中風者

女科備考 卷一 胎前中風 甲

少子嗣之証實多與中風見証無異醫者當

審實是中風方可用搜風安胎否則子痼症

治也

中惡心腹刺痛悶絕欲死即俗謂疔腸痧也

因氣血不和精神衰弱邪毒之氣得以中之

防損胎此証當調補正氣為主用金銀藤一

味煎湯飲之或竈心土為末每服二錢井水

調服白湯亦可以散滯湯用散滯湯又煮艾

方治正中惡極 妖

散滯湯 治觸惡胃氣傷胎肚痛手不可近

不思飲食 青皮三錢 黃芩 白芍二錢 歸尾五錢

分川芎一錢 木香五分 炙草少許 先煮苧根兩大片

用水三盞煎至二盞去苧根人前藥同煎一

盞熱服

治孕婦中惡心腹絞急切痛如鬼擊之狀可

按摩或吐衄血者熟艾如拳大煮汁頻服

女科備考 卷一 胎前嵐中暑中濕 聖一

妊婦中暑

凡盛暑時中暑熱之毒者其症發熱而渴自汗精神

昏憤四肢倦怠少氣清暑和胎飲主之 黃耆炙

甘草炙 人參 白朮 黃芩 黃連 知母 麥

冬各一錢 五味子十二粒 水煎服

妊娠中溼

孕婦或早行感霧露之氣或冒雨或人居下濕地或

大汗出浴冷水其症發熱骨節煩痛身體重著頭

痛鼻塞黃芩白朮湯主之 條芩 白朮各五錢 蘇

葉二錢五分 薑片五片 水煎服

妊娠咳嗽

如初得之惡風寒發熱鼻塞聲重或鼻流清涕者宜

發散加減參蘇飲主之 人參 紫蘇 陳皮

白茯苓 甘草 桔梗 枳殼 前胡 黃芩各一錢

薄荷葉少許 薑引水煎食後服得微汗便解

久嗽不已謂子嗽引動其氣恐其墮胎人參阿膠散

女科備考 卷一 胎前咳嗽 聖一

主之 人參 白朮 黃芩 茯苓 炙甘草

蘇葉 阿膠炒 桔梗 烏梅一箇 水煎食後服

久嗽不已多因土虛不能生金宜補中益氣

湯以培土金或肺虛不能生水陰火上炎宜

六味加五味子以生腎水

寧肺止咳散 治孕婦風寒咳嗽 麥冬二錢

法知母一錢 桔梗 紫蘇各五分 杏仁十粒 桑

白芍六分 甘草四分 有痰加橘紅四分 竹瀝薑汁火

嗽加黃芩八分虛嗽加紫苑一分欬冬花六分寒甚

加麻黃虛損加瓜蒌竹瀝薑汁嗽而心胸不

舒加貝母百合錢一紫苑八分嗽不止胎不安加

人參杏仁桑白皮紫苑天冬桔梗烏梅

妊娠瘧疾

孕婦病瘧不可輕用截藥恐致損胎柴胡知母湯主

之柴胡一錢五分知母 人參 黃芩 白朮 歸

身各一錢五分甘草五分薑棗引水煎多服以平為期

女科備考 卷一 胎前瘧疾 四

如瘧久不退轉甚者即宜截七聖散主之經云有故

無殞此之謂也柴胡 黃芩 炙甘草 知母

常山酒炒草果仁一錢五分烏梅三箇水酒各半先煎

露一宿臨發日五更溫服忌生冷雞魚

立按妊娠患瘧無論胎息月數多少總以安

胎為主世之安胎無過黃芩白朮不知黃芩

乃治熱盛胎動不寧白朮乃治脾虛胎氣不

固若氣虛下陷誤用黃芩氣滯壅逆誤用白

朮為害不小善治胎產者必審孕婦形體之

肥瘦氣血之偏盛若形色蒼肌肉脰堅者必

多濕多痰無論何疾必顯濕熱本病脈多滑

實有力絕無虛寒脈弱之候可峻用豁痰理

氣藥治其本質然後兼客邪見証而為製劑

治宜二陳湯隨經加透表藥或合小柴胡用

之蓋柴胡為瘧之嚮導故多用之然有自汗

過多尺中兩脈微弱或熱盛手足清始終不

女科備考 卷一 胎前瘧疾 五

用柴胡而用建中桂芍收功者或見煩渴脈

實大便六七日不通陽明腑實又宜涼膈去

硝黃加鮮首烏調之須知氣質堅固者其氣

多滯內外壅遏但有濕熱絕無虛寒之患如

元氣本弱或病後得之必需理脾行氣惟六

君子湯為合劑有痰食結滯則加枳實草果

內有寒加炮薑外受風加桂枝胎動上逆不

安加子芩胎下墜加柴胡倍人參乃舉胎聖

藥以問有不應又須補中益氣湯升舉之若
中有留滯則枳實理中_方加桂枝柴胡合表
裏而治之大抵病邪初發元氣未耗疎風滌
痰消導飲食在所必需然宜大劑白朮培其
中土其最可慮者在三四發至六七發其勢
漸劇若過半月雖淹纏不止邪熱漸衰可無
胎墮之虞矣六七發後不止即當和營健脾
若秉質柔脆雖有風邪不得純用表藥以風

女科備考

卷一

胎前瘧疾

四六

藥性升能使胎氣上逆而為嘔逆喘脹痞寒
痞滿之患雖有實滯不得過用降泄之味能
引邪氣下陷致胎墜不安而為泄利不食小
腹疼痛重墜之患若疫癘毒盛勢劇急與涼
膈承氣黃連解毒散之瘟瘧憊憊不爽煩熱
大渴或壯熱無寒或先熱後寒者當與桂枝
白虎人參白虎撤其在裏之熱不可與夏秋
疢癘比類而推也惟在速祛邪毒以救胎息

之瘧_方又有氣血虛損其瘧由虛致不因暑
氣而作如經云陽微惡寒陰弱惡熱或風因
虛而乘之若寒熱不已重蒸其胎胎亦受傷
而墜宜輕解表邪兼大補氣血以主之更有
患胎瘧者一遇有胎瘧病即發此人素有肝
火遇孕則水養胎元肝虛血燥寒熱往來似
瘧非瘧以逍遙散_方清肝火養肝血兼六味
丸_方以滋化源寒熱自退世醫治妊娠瘧初

女科備考

卷一

胎前瘧疾

四七

起用散邪飲不愈以截瘧湯截之又有初用
柴胡知母湯以平為期瘧久不退則用七聖
散截之然藥內有常山傷胎萬不得已須用
白朮煎水煮透用之然亦宜少用即尋常治
瘧以白朮製之方免嘔泄又夜明砂單方亦
治孕瘧予常用丹溪安胎飲_方治孕瘧甚覺
穩妥有效從未用截藥
夜明砂_方為末茶調空心服 此藥能行血

且下死，加甚速，非瘀血積聚成瘕及久成瘕母者，不可輕用，慎之。

妊娠霍亂

改

妊娠因肥過度，腐積成痰，或七情鬱結，氣盛為火，停蓄胃中，乍因寒熱之感，邪正交爭，陰陽相混，故令心腹絞痛，吐利並作，揮霍變亂，謂之霍亂。如邪在上，則當心痛而吐多，邪在下，則當臍痛而利多，邪在中脘，則腹中痛。

女科備考

卷一

胎前霍亂

四八

吐利俱多，吐多傷氣，利多傷血，血氣受傷，不能護養其胎，邪氣攻擊，子母俱傷，此危証，不可不亟治。宜香蘇散方列加藿香葉，予治孕婦霍亂，用六和湯方列屢效。又回生散方列或加冰四味紫蘇和胎飲方列服六和湯之後，宜再服加味四味和胎飲為妙。

妊娠泄瀉

孕婦泄瀉，以補中安胎為主，用四君子湯加白芍。

更分寒熱治之。如發熱而渴者為熱，本方加條芩一錢，不渴者為寒，本方加炒乾薑五分，並用烏梅一箇為引水煎食前服。

如渴瀉久不止者，用四君子湯加白芍酒炒訶子肉。

乾薑炒烏梅二箇去核水煎食前服。

如久瀉大渴者，人參白朮散主之。人參 白朮

茯苓 炙甘草各一錢 藿香五分 木香 乾薑二錢 五分作

大劑水煎，類類與之以代湯水效。

女科備考

卷一

胎前泄瀉

四九

孕婦泄瀉，有風寒暑濕之外感，飲食生冷之內傷，當察其所因。又有脾胃二家虛者，夫血統於脾，血擁胎元，則脾陰虛而不運化，下焦壅滯，而清氣難舒，於是水穀難消而作瀉，或因胎繫於腎，胎瀉其氣以擁護而腎氣既弱，命門火衰，不能上蒸脾土，此皆孕婦泄瀉之由也。如脾虛內傷，用加味六君子湯，命門火衰，加益智以助之。至於妊娠久瀉，元氣下陷。

發熱作渴肢體倦怠用補中益氣湯从瀉大
湯者人參白朮散米食穀芽麩食麥芽肉食
山查肝木傷土寒熱作嘔柴胡生薑嘔吐腹
痛手足逆冷薑桂泄瀉黃色木香煨肉果作
嘔不食腹痛惡寒木香薑桂

妊娠痢疾

凡孕病痢以清熱和胎行氣養血為主虛坐努力者
防其損胎當歸黃芩芍藥湯主之當歸 黃芩

女科備考 卷一 胎前泄痢 五十

芍藥 黃連 白朮 枳壳 茯苓 陳皮

生地 甘草各一錢 木香五分 烏梅一個 水煎空心服

痢久不止黃連阿膠湯主之 黃連炒 阿膠炒 人參

白朮 茯苓各一錢 木香七分 乾薑炒 甘草各五分 烏

梅三 薑三 煎引水煎食前服

立按妊娠痢下因傷生冷脾胃不能剋化故
心腹疼痛傷血則赤傷氣則白氣血俱傷則
赤白相雜蓋血屬陰陰傷則受熱居多然又

有陽氣傷不能統陰血而痢赤又不得不從
事於辛溫故治血痢猶當以色之顯晦驗其
虛實寒熱故凡積之瘀晦不鮮皆虛寒之候
即陽不統陰之血急投參薑艾或可保全倘
不審而誤服芩連乃速其斃也惟積之稠粘
紫赤而光澤者合用苦燥以堅腸胃之滑脫
又當佐以調氣之藥則陰邪能釋非若白痢
之不可雜以芩連芍藥等味引瀉滯穢以致

女科備考 卷一 胎前痢 五十一

襲傷陰血也氣屬陽陽傷則受冷居多即有
火汪下急皆陽氣鬱遏本寒於熱之症不可
純歸於熱但當驗其積之稠粘如糊色白如
脂方可暫與清熱以治其標若汗沫如色
晦如塵急須溫理其氣即有熱症皆假象無
疑其虛實寒熱既分而又有三禁三善五審
不可不知

三禁 一禁滌蕩腸胃恐陽氣下陷胎氣愈

墜 二禁滲利膀胱恐陰津脫亡胎失榮養

三禁堯瀉滯氣恐濁氣愈滯後重轉加故

善治孕婦之痢惟以調氣為先使已敗積沫

隨氣而下未傷津液統之而安

夫調氣有三善 一使胃氣有常水穀輪運

二使腹滿腹痛後重漸除 三使濁氣開

發不致侵犯胎元

所謂五審者 一審飲食之進與不進夫痢

乃腸胃受病老幼多甚飲食無妨者易已

故痢以禁口為最劇在初起濁邪全盛之時

不足為慮但要清理積滯飲食自進矣若七

日已後尚不能食脈反數盛此必初時失於

清理之故急需調氣理中則積沫漸下飲食

漸進或初時能食至一旬一氣後反不能食

脈息不振此必滌蕩太過胃氣受傷所致亦

有過用芩連檳朴苦寒破氣而致呢逆嘔噦

女科備考 卷一 胎前痢 五

者胃氣大敗惟峻與溫補始可挽回若脈見

數疾無倫或翕翕虛大或歇止不前或弦細

搏指者皆胃氣告匱百不一生矣 二審瀉

之通與不通下痢清濁不分若痢雖頻而水

道順利者胎必無虞若月數將滿胎壓尿胞

每多溲便頻數轉胞脹悶之患切禁利水傷

津急與開提自通但須察其脈無過壯過硬

之形便宜補中益氣稍加澤泄車前以升清

降濁投之無不輒應非特妊娠為然即平人

久痢津液大傷而溲瀉不通如中老女人小

便頻數小腹脹墜腰膝背痛者亦宜此治法

也 三審腹之痛與不痛下痢腹痛必然之

理然間有濕濁下趨而無鬱沸之火則不痛

但此多見於肥白人之白痢者若血痢與瘦

人多火者罕見也治用調氣運積不可清火

原其腹痛有寒熱之分痛有止歇痛則奔迫

女科備考 卷一 胎前痢 五

下墜至固不及者火也痛自下而攻擊於上者火也痛而脹滿不勝摩按熱飲愈甚者火也實也痛無止歇常時痛而無絞刺者寒也痛自上而奔注於下者寒也痛而不滿時喜溫手摩按飲熱漸緩欲至固而可忍須臾者虛也寒也凡大痢腹痛之脈無論大小遲數但按之漸漸小者並屬虛寒急需溫補慎勿利氣惟急痛脈實久按不衰可稍用炮黑薑

女科備考 卷一 胎前痢 五五

連和之 四審後之重與不重下痢後重濁氣壅滯也夫開導壅滯必以調氣為本在妊娠尤為切要調氣則後重自除而胎息自安但初痢後重首宜開發其滯若久痢後重又當升舉其陽陽升則胃氣運而周身中外之氣皆調達而無壅滯之患矣故治孕婦之後重無論胎之大小但脈見有餘則宜調氣脈見不足便與升提雖血痢亦宜陽藥一切滋

賦血藥總無干預以氣有統血之功則血無妄行之慮也 五審身之熱與不熱下痢為裏氣受病若見身熱表裏俱困元神將何所恃而得祛邪之力哉惟人迎之脈浮數可先用和營透表之法分解其勢然後徐行清理若初痢不發熱數日半月後發熱脈來漸小或虛大少力者此正陰內亡虛陽發露於外在平人或可用辛溫峻補飲之以歸其源若

女科備考 卷一 胎前痢 五五

妊娠則桂附又難輕用惟藉參朮薑黃膠艾之屬非大劑濃煎峻投難愈或痢久衛虛起居不慎而感冒虛風發熱者但當察其左手三部必顯浮數之象又需理中湯加桂枝合表裏而治之以內氣外虛之邪不得參朮則客邪不解又有病後復發或資虛羸之人及秋冬天令寒冷時下痢加以胎孕扼腕豈可與平人之痢同日語哉 各方列後

厚朴去粗薑湯 治妊娠能食腹脹後重積

穢稠粘之白痢

厚朴去皮薑汁炒 陳皮去 茯苓 炙草分

治腹脹後重赤白相兼之痢并胃虛嘔逆病

滯不食

人參不拘 厚朴錢五分 薑汁炒 製半夏錢二分 炙草八分 薑引

黃芩芍藥湯 治伏氣發溫太陽少陽合病

自利

女科備考 卷一 胎前痢 五六一

黃芩 白芍各三錢 炙草二錢 大棗四枚引水煎

服

香連丸 治赤白相兼白多於赤者

川連六兩用吳茱萸黃連去閉口者取淨二兩 同黃連炒去黃用連六兩一兩

共末醋糊丸每服五十丸米湯或砂仁湯任

下前湯送香連丸治妊娠能食後重積穢稠

粘之血痢

運理湯 治胃虛夾食痞滿發熱

人參不拘 白朮錢五分 炮薑 炙草各一分 黃連一分

分茯苓錢水煎服

千金三物膠艾湯 又名膠艾榴皮湯 治血痢

又痢下不止

阿膠 艾 榴皮 三味等分煎服前方合

三物治妊娠少腹疼重瘀胸不鮮或間有鮮

血之痢或膿血清稀胎動不安久泄不止

駐車丸 治陰虛下痢發熱膿血稠粘及休

女科備考 卷一 胎前痢 五七一

息痢

阿膠三兩 黃連炒黑 當歸各五錢 炮薑一兩

右四味搗篩醋煮阿膠為丸梧子大每服四

五十九晝夜三服米飲下治妊娠發熱後重

陰虛畏食之血痢

白頭翁加甘草阿膠湯 治挾熱痢下膿血

及產後痢不止

白頭翁一錢 黃連炒黑 黃柏炒黑 秦皮

一錢 炙草一錢 阿膠三錢 先煮上五味去滓
內膠烱盡溫分三服治妊娠熱毒內攻噤口
不食腹脹後重膿血稠粘之痢

予每用阿膠一味要陳而真者以治孕婦之
痢或阿膠黃連飲甚效

〔阿膠黃連飲〕 治孕婦痢疾若安胎則痢愈
重治痢則胎難安宜服此飲

阿膠能止膿血之痢且止腰痛固胎以之為君 黃連 芍藥 甘
女科備考 卷一 胎前痢 五八

草皆以為 枳壳楚炒少加二三 水煎服一劑
痛痢俱減去枳壳再服

子懸
孕婦五六個月以後胎氣不和上湊心腹脹滿疼痛
者謂之子懸紫蘇飲主之 紫蘇 陳皮 大腹

皮 川芎 白芍 歸身各一錢 人參 炙草各五分
薑五片葱白七寸水煎食前服

並按如飲食不甘加四君子湯 有熱加苓

梔歸芍 內熱脯熱或四石兼逍遙散若多
怒時覺脹滿服順氣藥不應宜用和氣安胎
飲或加味逍遙散胎上攻而作痛宜紫蘇飲

或順氣安胎散若脾虛停滯脹滿安胎飲力
薄宜加參平胃散有因鬱滯者亦宜紫蘇飲

或加味歸脾湯有因痰結聚者紫蘇飲加苓
連貝母有因暴怒者左關必弦洪肝火內動
用小柴胡加茯苓枳壳山梔大抵胎氣上逆

女科備考 卷一 胎前子懸 五九

皆屬火旺急用芩朮香附之類不可服大寒
之藥 子懸症有兩尺脈絕餘脈平和不可

錯認死胎且死胎有面青舌青可辨宜紫蘇
飲治之則胎歸原位脹消脈起如臨月胎上
逼心喉噎欲死急用童便灌之即下或烏梅

肉十枚研爛入生薑三片煎湯漫漫灌之即
下及因坐草太早心懷恐懼氣結不行紫蘇
飲一服便產 圓機胎前妊娠六七個月胸

飲一服便產 圓機胎前妊娠六七個月胸

膈脹滿條內針灸方可用

子煩

孕婦心驚膽怯終日煩悶不安者謂之子煩人參麥冬散主之

人參 麥冬 茯苓 黃芩 知母

炙甘草 生地各等分 竹茹一大團水煎食前服

妊婦因服藥致胎氣不安有似虛煩不眠集

氏謂之子煩醫者不知作虛煩治損動胎氣

宜知母二兩酒焙為細末棗肉為丸彈子大

女科備考 卷一 胎前子煩 六十一

每服一九煎參湯化服

又方加棗仁 遠肉 當歸 白朮 川芎

廣皮 竹葉無知母 湯加竹茹七分

子癇

乃惡候若不早治必致墮胎其症或口禁項強手足

攣縮言語塞澁痰涎壅盛不省人事或忽然眩暈

卒倒口禁不能言狀如中風實非中風也或須臾

即醒醒而復發此名子癇乃氣虛挾痰挾火之症

不可以風治而誤也宜四物養血酒芍清熱二陳

化痰理氣或用清神湯主之 人參 白朮 茯

苓 白芍 炙黃耆 炙甘草 麥冬 歸身各

分 薑棗引水煎食遠服兼服壽星丸

〔琥珀壽星丸〕寧神定志 去風化痰 天南星一斤掘地作坑深二

尺用炭火二十斤於坑燒紅去炭掃淨用好酒五

升澆之將南星趁熱放坑內用瓦盆蓋定以黃

泥封固經一宿取出焙乾為末入琥珀末一兩 硃砂

女科備考 卷一 胎前子癇 六十二

末五錢和勻以生薑自然汁煮麩糊熟再入豬豬

心血三個攪勻和末為丸硃砂為衣每服五十九

人參湯下日三服神效

予謂妊婦子癇至有目昏黑而厥者胎前絕

火但此症即是兒暈屬氣與痰故目昏黑發

厥只服蘇蘇飲在論列方中不可服蘇合丸

及烏藥順氣散至於破傷失血或吐衄血忍

患口禁項強背直類中風症皆因失血所致

用荆防安胎散 人參 當歸 白朮 三錢

生地 天麻 二錢 麥冬 一錢 條芩 八分 荆芥

防風 各三錢 陳皮 甘草 四分

子腫

孕婦面目身體四肢浮腫者此胎水泛溢謂之子腫

加味五皮湯主之 大腹皮 黑豆水洗淨 桑白皮

炒生薑皮 赤茯苓皮 白朮 土炒 紫蘇 莖葉以

燒棗引 去核 水煎服時以木香磨濃汁三匙入藥

女科備考 卷一 胎前子虛 空

內

全生白朮散 治妊婦面目虛浮如水腫脹

白朮 一兩 生薑皮 大腹皮 豆汁製 茯苓皮

陳皮 各五錢 共為細末每服二錢米飲下

此方較滯察五皮散稍善以白朮而易桑皮

功用懸殊未應佐以人參甘草

加味天仙藤散 治孕婦腰脚腫虛人多有

之 天仙藤 即青木香藤 製香附 紫蘇 各

分陳皮 四分 烏藥 五分 木香 二分 薑皮 三片

虛加參朮當歸或兼服補中益氣湯

子氣

孕婦自六七箇月以來兩足腫大行步艱難脚指間

有黃水出此名子氣亦多有之生子之後其腫自

消甚者茯苓湯主之 白茯苓 白朮 陳皮 香

附 烏藥 各一錢 炙甘草 五分 紫蘇 莖葉 五分 木瓜 三片

薑引水煎空心服

女科備考 卷一 胎前子氣 空

孕婦腹大有水氣者亦名子腫千金鯉魚湯主之

白朮 土炒 五錢 白茯苓 四錢 歸身 三錢 白芍 二錢 陳皮

五分 活鯉魚 去鱗一箇 白水煮汁一盞半去魚

用汁入藥加生薑五片煎七分空心服

子滿

孕婦至七八箇月其胎長大腹大脹滿逼迫子戶坐

卧不安謂之子滿東胎飲主之 白朮 黃芩

蘇葉 用莖 枳壳 大腹皮 各一錢 砂仁 連壳 各五分

炙甘草三分 薑引水煎空心服

上海圖書館藏

或胸腹脹滿或遍身浮腫小便艱澀亦名子

滿又胎水不利或胞中漬水以致胎死腹中亦

用鯉魚湯虛弱或脾胃氣虛佐以四君五皮

二湯合煎服之

子淋

孕婦小便少又澀痛者謂之子淋加味火府湯主之

又治溺血 木通 生地 條芩 甘草梢 麥

女科備考

卷一 胎前子滿子淋 六酉

冬 人參 赤芍 各一錢 淡竹葉片十五 燈心寸四十九

水煎空心服

加減安榮散 人參 當歸 二錢 麥冬 二錢

白朮 二錢 通草 茯苓 八分 生甘草 五分 有

痰或怒動肝火加酒炒枯芩七分以清肺金

子鳴補

氣足時子在腹中鳴者此由母或勉強向高處取物

子在腹內失脫口中所含脫胎故啼治法或令母

作男子拜狀或以豆撒地令母拾之子復含者則止矣又方以鼠窟門土取大塊含之

妊娠傷食

孕妊傷食腹滿吞酸惡心不喜食者加味六君子湯

主之 人參 枳實 神麴 炒砂仁 炒半夏 麴各

分 白朮 白朮 陳皮 各一錢 炙甘草 三分 薑引水煎

食後服

妊娠頭痛

女科備考 卷一 胎前傷食頭痛 六五

因外感頭痛者此虛也加味芎歸湯主之 川芎

當歸 各一錢 黃芩 炒酒 白朮 各一錢 細茶 三錢 水煎食

後服

妊娠目鼻咽喉舌諸病

孕婦專以清熱為主有熱病者俱用東垣涼膈散各

隨症加減用之 黃芩 黃連 山梔仁 俱酒炒

翹 桔梗 生甘草 各等 薄荷葉 許上係本方

目赤痛者本方加當歸 川芎 羌活 防風

菊花各一錢 竹葉引

咽喉痛者本方加生旁子炒研碎一錢

口舌生瘡者只依本方引

鼻衄不止者本方加當歸 生地各一錢 菊花大一

團薑引

妊娠瘡毒

孕婦多有病乳難者託裏解毒湯主之 川芎 當

歸 黃芩 白芷 連翹 天花粉 金銀花

女科備考 卷一 胎前諸血症 六

甘草節各一錢 青皮五分 皂角刺

背脊上生者陽明經也本方去青皮加升麻葛

根各一錢

胸前兩頰生者少陽經也本方去白芷加柴胡

膽草 栝仁炒各一錢

肩膊腋下生者太陰經也本方去青皮加陳皮

桔梗 桑白皮 天門冬各一錢

胸內陰旁生者厥陰經也本方去白芷倍加青皮

手足掌内生者少陰經也本方去白芷青皮天花

粉加黃連 黃柏 木通各一錢

孕婦小腹近下處腫脹浮薄發光者孕癰也

千金托裏散方列或薏仁煎汁飲

雜症

妊娠吐血凡七情內傷六淫外感皆足致失

血之患一主火熱者以氣血壅養胎元或有

所感則氣逆而火上乘心煩滿悶血隨而溢

女科備考 卷一 胎前諸血症 六

甚者或致墮胎但火有虛實之分實則清熱

養血虛則滋陰補水血安胎固若泛用行血清

血之劑胎必墮而禍不旋踵矣如肝經怒火

加味逍遙散方列膏粱積熱加味清胃散方列鬱

結傷脾加味歸脾湯方列肺經有火黃芩清肺

飲方列因氣鬱滯紫蘇飲方列氣不攝血補中益

氣湯方列去升麻加煨葛根腎經虛火冬味地

黃湯方列即六味加麥冬五味

鼻衄不止、東垣涼膈散方列加當歸生地各一錢

芎花一大團、生薑引

咳血咳嗽宜涼血、地黃湯、咳嗽咯衄、胎前皆

不宜見、如面赤聲啞、不治、又云凡咯吐血多、

致墮胎、宜紫蘇飲方列加條芩、

尿血乃熱乘血分、流滲於脬、故令尿血、自尿

門而下、若胎漏、則自人門下、血可辨、宜四物

湯、加山梔髮灰、或阿膠熟地、麥冬五味之類、

女科備考 卷一 胎前諸血症 六八

如怒動肝火、加山梔、脾氣下陷、及勞動脾火、

補中益氣方列加 茯苓車前、若厚味積熱、加

味清胃散方列若肝脾血熱、加味逍遙散方列

腸風臟毒下血、平胃散方列去蒼朮、加槐角防

風、當歸烏梅、

識語

妊娠識語為臍膈熱極之候、急宜童便時時

灌之、不應、用生地黃連湯方列清其血中之火、

庶胎得安、脈實者、加酒大黃下之、遲則傷胎

也、亦有傷胎、胎下而下血、心神無主、識語雖

峻補、亦難有效、其治法方藥、俱載產候、乍見

妄言門、若孕婦証見舌青者、其子已死、腹中

急當下之、若雙胎、一生一死者、必腹中半邊

冷半邊熱、如母患熱証、臍膈熱甚、其胎蒸灼

致死、但服黑神湯方列加生蒲黃、以煖其胎、即

出矣、胎未死、并泥塗臍、以護胎氣、多有保全

女科備考 卷一 胎前識語臍燥 六九

者、

臍燥

妊娠臍燥、悲傷欲哭、如神靈所憑、數欠伸、蓋

肺志為悲、胎熱火炎、肺不自持、故悲、屬肺病

燥也、胎前氣血、壅養胎元、則津液不能充潤、

而肺為之燥、當補母、以十棗湯、竹茹湯、主之、

立齋以竹茹湯、佐八珍湯方列其用八珍補

養氣血、更發前人之所未發、又治臍燥悲

與及自笑自哭用紅棗燒存性米飲調下

〔十棗湯〕孕婦無故悲慘哭泣狀若邪祟臍

燥也 甘草三兩 小麥一升 大棗十枚 水六

升煎三升去渣分三服溫飲即效再服竹茹

湯以和之

〔竹茹湯〕孕婦心虛驚恐臍燥悲泣 人參

麥冬 茯苓 炙草 各一錢 小麥一合 青

竹茹一大團薑三片棗五枚水煎食後服

女科備考 卷一 胎前 臍燥出痘 七

孕婦出痘論

凡孕婦出痘熱能動胎胎動則氣血衰敗而

不能起發灌漿矣故始終以安胎為主外用

細軟之膏緊堆肚上切不可用丁桂燥熱之

品及食牛虱毒物之類以致觸犯其條芩白

朮艾葉砂仁之類與痘相宜者採而用之其

初發熱則以參蘇飲列方選用發之痘既出則多服

安胎飲列方選用保之渴則用人參白朮散

加減瀉則用黃芩湯列方合四君子湯列方內加

訶子血虛者則以四物湯列方加托藥色灰白

而起發較遲者則用十全大補湯列方去桂膠

之總之不同輕重悉以清熱安胎為主更有

孕婦之痘正當盛時忽臨正產者勢必氣血

俱虛亦只以十全大補湯以補氣血為主虛

寒者少加熟附若腹中微痛者此惡露未盡

也宜四物湯加乾薑桂心黑豆木香用熟地

女科備考 卷一 胎前出痘 七

黃而去芍藥蓋恐寒涼有傷生氣然有當用

者酒炒用之若寒戰咬牙腹脹不渴而足冷

身熱者此乃脾胃內虛外作假熱也宜參耆

歸附木香之類一二劑而愈者吉不愈者凶

若孕婦肥胖者則氣居於表而慊於內也人

參可多黃耆宜少多加帶壳縮砂切忌脫蒂

菓子之類至有痘將收靨忽作泄瀉口渴飲

水小便短少其痘胖壯紅潤者此內熱也宜

用五苓散方內加黃芩芍藥之類若至滑瀉不止食少腹脹而足冷痘色灰白脈細無力者此犯五虛必死之症也凡婦人方產之後或半月左右適逢出痘者此無胎孕繫累惟氣血為虛治宜大補榮衛為主若痘出多者則加連翹粘子之類大便自利者則用肉果炮薑之類餘則照常一例而治不必多疑反生他誤至於孕婦出痘在於初出之時胎落

女科備考

卷一

胎出痘

七三

者則血氣雖為大虛然熱毒亦因走洩兼之未經起脹灌漿則血氣未曾他耗倘痘非險逆加以大補托裏每多得生至於初屬之時胎落者則毒已出表消散亦多無事但重虛而元氣易脫宜倍加補益耳若正當起脹灌漿而胎落者則氣血衰敗內外兩虛既不能逐毒以外出則毒必乘虛以內攻不救者多矣

妊娠麻疹論

妊娠出疹當以四物加減而加條芩艾葉以安胎清熱為主熱毒蒸胎胎多受傷但胎傷而母實無恙也蓋疹與痘不同痘宜內實以痘當從外解故胎落毒氣乘虛而內攻其母亡疹宜內虛以疹當從內解故胎落熱毒隨胎而下其母存雖然與其胎去而母存孰若子母兩全之為愈也且古人徒知清熱以安

女科備考

卷一

胎前麻疹

七三

胎不思疹未出而即以清熱為事則疹雖出而內熱愈深是欲保胎反足以傷胎也宜輕揚表托則疹出而熱自清繼以滋陰清解則疹胎相不相礙如疹出不快宜白虎湯方合用升麻葛根湯方列倍加元參牛旁治之胎氣上冲急用芩根艾葉煎湯磨檳榔服之再以四物進之熱甚胎不安服固胎散方列數劑如又不愈腹痛腰痠即知胎必有墮之機如胎

墮卽以產後法論治矣

妊婦氣喘不得卧

妊婦氣喘不得卧，有乍感風寒，客邪為害，宜發散，參蘇飲主之。若脾虛，四肢無力，肺虛，不任風寒，腎虛，腰痠短氣，不能行步，猝然氣喘，不息，此脾肺素虧，母虛子弱，腎不歸元，上乘於肺，生脈散，補中益氣湯，去升柴主之。嗽門蘇桔湯，可加減用之。

女科備考 卷一 胎前氣喘不得卧 七五

昔有一婦，胎死於腹，病喘不得卧，診其脈氣口盛於人迎一倍，右關弦動而疾，兩尺俱短，而離經，因毒藥動血，以致死胎不下，奔迫上衝，非風寒作喘也。大劑芎歸湯，加催生藥服之，夜半果下死胎，而喘止。此婦乃為人妄，因正室所嫉，故用藥去之，人不知也。

子淋與轉胞相類

凡婦人秉受弱，憂悶多，性躁急，食厚味者，因

胞不能自轉，為胎所壓，胎若舉起，胞系自疏，

水道自通用。二陳升提飲，又有用補中益氣

湯，服後探吐，以提其氣，通後，卽用黃耆人參

大補，恐墮胎也。如藥力未至，脹痛難忍，令老

嫗用香油塗手，自產戶托起其胎，溺出而脹

除。子淋與轉胞相類，小便頻數，點滴而痛者，

為子淋，膀胱小腸虛熱也。虛則不能制水，熱

則不能通利，故淋。若頻數出，少不痛者，為轉

女科備考 卷一 胎前子淋轉胞相類 七五

胞間有微痛，終與子淋不同。耳論中急痛，乃急欲便而痛，得便則止，間有微痛，與子淋點滴痛者不同。

〔二陳升提飲〕 治孕婦臍腹作痛，小便淋閉

不通，或微痛與淋有別，由氣虛胎壓尿胞，

人參 一錢 白朮 土炒 生地 各一錢 當歸 二錢

川芎 八分 半夏 六分 製或 柴胡 升麻 陳

皮 炙草 各四分 薑 一片 水煎服 探吐只可

救急偶用總須通後服升提之藥

孕婦遺尿

孕婦遺尿不覺胎滿故也白薇散主之

〔白薇散〕 白薇 白芍 等分爲末每服三

錢食前溫酒調服 加味逍遙散 補中益

氣湯 六味地黃湯 鯉魚湯俱可酌用

轉胞

孕婦轉胞乃臍下急痛小便不通凡強忍小

女科備考 卷一 胎前遺尿轉胞子瘕主六一

便或尿急疾走或飽食忍尿或忍尿入房使

水氣上逆氣逼於胞故屈戾不得舒張所致

非小腸膀胱受病而利藥所能利也當理其

氣則愈

子瘕

孕婦至八九個月忽暴暗不語者此少陰之脈下養

乎胎不能上榮於舌十月生子之後自能言非病

也勿信庸醫妄藥

屢受屢墮

婦人受胎不堅屢受屢墮見紅卽服此藥取

舊年新毛青布一丈煨灰存性爲末黃酒送

下

立按如服後仍見紅再服一尺無不止如婦

人屢墮胎者不俟其見紅當常服之此病永

除陳年青布衣服亦可

八月章

女科備考 卷一 胎前屢受屢墮 八章七七

孕婦至八九個月形盛胎肥腹大坐卧不安者防其

難產宜預服瘦胎丸 商州枳壳麩炒四兩 白朮

當歸 甘草各一兩 蜜丸辰砂爲衣食前白湯下五

十丸多服瘦胎滑胎自然易產

如胎氣本怯不可服上瘦胎丸欲防產難達生散主

之 大腹皮三錢 人參 紫蘇葶葉 陳皮 甘草

砂仁各五分 白朮 白芍 當歸各一錢 枳壳七分

青蔥五根 水煎食前服至十餘劑甚得力

無憂散 預服保孕臨產保生若素有難產之患六七個月常服二三帖臨產再服易生神效

全當歸酒浸炒 兔絲子酒浸晒乾 川芎各一錢五分

厚朴薑汁炒 蘄艾醋炒各七分 生黃芪 荆芥穗各八分

羌活 炙甘草 枳壳麸炒各六分 白芍酒炒一錢

川貝母去心研末一錢分兩煎各半調服 生薑一片為引

水二大盞去渣再煎六分澄清入貝母末溫

女科備考 卷一 臨產八月章 七八

服臨產隨時服選料秤准分兩不可增減

臨產須知

凡孕婦未產數日前胎必墜下小便頻數此欲產也慎重之家於合用藥物慣熟穩婆宜預圖之

產婦合用催生湯丸止暈藥物皆須預備如乾漆渣破漆器產時燒之使產母得聞其氣無血暈之疾又取生韭菜一握安放有嘴小瓦瓶中以熱醋澆浸塞其大口以嘴向產母鼻嗅之亦止血暈又取無病童

男小便五六碗淨器收貯臨產時溫一二盃飲之自無血暈

產母房中只令熟練穩婆一二人謹閉門戶勿使雜人往來更禁人無相詢問大驚小怪直待胞漿已動兒身已轉逼近子門可以用力當此之時產母護痛其身傾側護生者不可抱束其腰恐致損兒但扶其肩膊勿令卧倒

臨產時如白蜜沸湯薄粥美膳常要齊具渴則以白

女科備考 卷一 臨產須知 七九

蜜半盃溫湯化開飲之可以潤燥滑胎令其易產即

以薄粥美膳食之令其中氣不乏自然易生如夏月盛暑必用冷水遍洒房內解其鬱蒸之氣四面窓牖大開以薄紙帳遮之使產母溫涼得宜庶新血不妄行以致血暈

如冬月嚴寒必房內四處燃火常使暖氣如春更要閉其戶牖塞其穴隙使邪氣莫入庶免凍產及中風寒之疾

臨產之時。凡合用水火柴炭。銅鑊刀剪麻繩線布。無一不備可也。

產畢未可上牀。須兩人扶坐。令人從心下輕。輕揉按至臍腹。十五六次。此後雖睡。時時按之。血絡不滯。

論難產

一妊娠以血為主。以氣為輔。氣行則血行。氣滯則血滯也。富貴之家。保愛孕婦。惟恐運動。任其坐臥。以致

女科備考

卷一

臨產 論難產

八十

氣滯而不舒暢。血滯而不流通。胎不轉動。臨產固難。甚至悶絕。且以貧家之婦。勤動勞苦。生育甚易。其明徵矣。難產之症。宜服前達生散。去人參白芍。加香附

烏藥 各一錢

二孕婦至六七箇月。胎形已全。不知禁忌。恣情交合。以致敗精瘀血。聚於胞中。子大母小。臨產必難。何以驗之。兒子生下。頭上有白膜一片。滯膩如膠。俗呼戴白生者是也。此宜預服瘦胎丸。

三孕婦之家。間或命卜。妄談禍福。或雜鬼神。倉皇憂戚。使孕婦常懷憂恐。喪神喪氣。又或臨產之時。大小慌亂。間雜往來。交頭接耳。孕婦恐怖。以致產難。試觀不正之女。偷生之兒。既無產厄。子母俱全。可以理推。必杜絕諸弊。但令一二慣熟穩婆。在房扶持。更以好言寬慰。勿令驚疑。自然易生。

女科備考

卷一

臨產 論難產

全一

四孕婦臨產。自覺兒身轉動。胞漿流出。腰腹痛甚。目中如火。手足俱冷。此正產也。若兒身未轉。胞漿未破。腹中陣痛。或作或止。此名弄產。穩婆粗率。便令努力。母力既乏。及至產時。無力轉運。以致產難。若此者。催生湯丸。視其形症用之。

五孕婦臨產。胞漿既破。兒身既轉。著力一送。兒即下矣。穩婆粗率。但見漿破。即令使力。兒身未轉。或轉未順。被母努責。逼其快下。有逆產者。有橫生者。有側產者。極為凶危。此非藥力能及。惟穩婆之良。或可委曲保全。總之穩婆。最忌粗率也。

六少婦初產身體纖軟子戶緊窄當產之時胞漿已破兒欲奔却被其母不耐痛苦輾轉傾側兩足不開兒不得出又有中年之婦生育既多氣弱血少當產之時胞破漿下子宮乾澀生理不下淹延數日若此者人力莫及子母得全亦天幸矣

七產育之時氣以行之血以濡之然後子宮滑溜生理順易蓋子猶魚也胞漿猶水也水行魚行水去魚止若產婦胞漿未破之先不當用力而用力太過及

女科備考 卷一 臨產論難產 全三

胞漿既破之後應用力而力已困乏加以憂恐之甚起臥之勞氣閉血阻漿乾水枯所以產難以催生湯丸救之

古人治產後非惡症不用人參且多以芎歸合用予謂臨產之時預備好參四五錢如中年產婦產育過多或平素瘦弱或生產艱難經日不下或錯過生陣或亂用氣力以致氣力倦及至正產之時反無力送可用人參二

錢煎服自然易產至於尋常生育恐臨產艱難預用人參二三錢煎就重湯溫著俟漿胞破時令產母飲兩三口以助氣力少停再飲二三口頻與漫服不過助其氣力以催生耳生下即已不必多參盡飲以招尤也或用上好人參一枝含口內生津助氣亦妙至於橫逆等生須用手法施治再服參湯以助之蓋人參能補氣升提使產母不至倦乏亦能令

女科備考 卷一 臨產論難產 全三

兒升舉轉身為順若生產之痛陣未來兒先必轉胎腹痛世人不明此理以為將生之時即煎參湯與飲助其氣力未免失之太早如生陣已來腰痠腹痛穀道逆迫目中流火適值兒正出戶方飲參湯且一飲而盡豈不失之過遲而太急及產下之後正欲逐瘀之時其參力方銳瘀血受補凝滯不行勢必上行以奔心等患若壯實歸人並非因虛難產輒

以參湯投之反致提固胎氣上逼心胸脹悶
不下做成難產矣故用參膏及其時用之須
得其法否則有失誤之處慎之

臨產交骨不開乳香不拘多少或遇三月
三五月五七月七研細用猪心血為丸梧子
大硃砂為衣晒乾收藏值難產者以涼酒化
下一丸不產再服

催生四法

女科備考 卷一 臨產催生四法 全

凡初產一二日間艱難者只以加減五苓散主之

豬苓 澤瀉 白朮 茯苓 桂心 車前子

木通 枳壳 檳榔 甘草 各一錢 滑石末 二錢 燈

心 四十九寸 長流水順取煎服連進以子生為度

如過二三日人事強實飲食能進者此胞漿乾澀也

加味四物湯主之 歸尾 川芎 赤芍 生地

桂心 元胡索 枳壳 香附 檳榔 各一錢 順

取長流水煎調下益元散三錢以子生為度

如過二三日人事困頓飲食減少者此中氣不足不
能運動其胎也加味四君子湯主之 人參 白

朮 茯苓 甘草 歸尾 川芎 枳壳 香附

桂心 各一錢 順取長流水煎磨檳榔木香濃汁各

五七匙入內服

如三四五日不產或胎死腹中但觀產母唇舌俱紅

者子母無事唇青舌紅者母死子活唇紅舌青者

母活子死唇舌俱青母子莫保奪命丹主之 蛇

女科備考 卷一 臨產催生四法 全

蛻 全者一條新瓦上煨存性 金銀箔 各七片 母丁香 大者五錢另研 男子

亂髮 燒灰各一錢 黑鉛 五分 水銀 一分 先將鉛

鎔化入水銀急炒結成砂子傾出 另研極細 千里馬鼻

即路上遺棄草草 各研極細和勻用豬心血為

丸如梧子大於靜室中修合勿令婦人雞犬見每

服二丸長流水送下如昏悶者研灌可救

「催生如神散」亦名黑神散治橫生逆產並

沿月水不止崩漏症 百草霜 白芷 各

二九一

等分不見火為末每服二錢以童便醋和如膏加沸湯連進三服能固血又免血涸一方加滑石每服三錢

〔催生如聖散〕 治胞水乾澁兒在腹中不動或漿血來閉塞道路難產之症 黃葵花二錢焙乾為末熱湯調下或有漏血胎臟乾澁難產病劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時順下如無花以黃蜀葵子為末二錢酒服

女科備考

卷一 臨產 催生

六

亦可 若死胎不下紅花煎酒調服 經驗方用子四十九粒或三十粒歌曰黃金內子三十粒細研酒調能備急命若懸絲在須臾即命眷屬不悲泣 伏龍肝治橫逆難產者用對灶心之土須燒百草或柴火多年色紅者更美速研細末溫酒調下一錢兒頭即帶土出矣北方燒煤之土萬不可用

救難產

總論

論難產前已備矣多因產母倉皇坐草太早或胞漿雖破兒身未轉或轉未順被母用力努責以致足先見者謂之逆產手先見者謂之橫生或露其肩與耳與額者謂之側產或被臍帶纏絆不得下者謂之碍產倉猝間三命所繫不可無法而臨為仁之術也

救逆產

女科備考

卷一 臨產 逆產 橫產 八七

令產母正身仰臥務要安心定神不可驚怖求慣熟穩婆剪去指甲香油潤手將兒足輕輕送入又再推入兒身必轉待身轉頭正然後服前催生藥渴則飲以蜜水飢則食以薄粥然後扶掖起身用力一送兒即生矣此在穩婆之良若粗蠢人不可用也切不可使針刺足心及墮塗之法兒痛上奔為害非淺 兒之手足切不可任其久出更不可令其多出若多出時久則手足青硬難以送入萬勿

用刀割針刺恐兒驚縮有傷觸母心之虞不若鹽塗爲便

臀先露者爲坐臀生令母仰臥如前法或於當高處牢繫手巾一條令母以手攀之輕輕屈足舒伸以開生路兒卽順生

脹後產乃兒頭後骨偏柱產母穀道不得下者令穩婆以棉衣炙煖裹手急於穀道外旁輕輕推頭令正然用力卽生矣

女科備考 卷一 胎產 逆產橫產 八

浪臍產胞衣臍腸先出者凡兒出胞時頭必轉向產門若無力轉運脚踏胞衣臍腸先出急令穩婆理清推入稍俟氣平乘勢就其脚下不可推轉久延久則臍腸復下便難收拾矣

救橫產

法如救逆產仍將兒手輕輕送入再推上摸定兒肩漸漸扶正令頭順產門後進催生之藥飲食之物一

切如上扶正兒卽下矣忌用針刺

救側產

亦令母仰臥法如上穩婆用燈審視或肩或額偏左偏右務得其真以手法輕輕扶擦令正仍服藥食如前法起身用力兒卽下矣

救礙產

令母仰臥穩婆用燈審視看臍帶絆著兒之何處仔細以手法輕輕取脫服藥食如前法扶起用力一送

女科備考 卷一 胎產 側產礙產 九

卽下矣

子死腹中

兒當欲下之時被母護痛兩足不開夾其頭而死者或因產母闔閭忍耐當直之人不善扶掖緊抱其腰以致傷胎而死者或因產難胞漿已乾生路漸塞子不得出氣閉而死者或因生路不順若逆側等症穩婆蠢厲用手奔撞反傷其子而死者或被臍帶纏頸氣絕而死者其候但觀其母口青手指青下冷口

中有臭氣者子死的矣。惡用加味五苓散奪命丹取去死胎。以保其母。穩婆善取者尤妙。如母唇面俱青則難救矣。

用烏雄雞一隻去毛細切水煎二三升候湯畧溫用衣帛蘸摩腹中其胎自出。

又方牛糞炒極熱入醋半盞以青布包裹於母臍上熨之立下。

盤腸生

女科備考 卷一 臨產子腹中盤腸生 九

有當產時母腸先出盤露於外子隨後生。生後而腸不即收者。蓋由平日氣虛不能斂束血熱易於流動。下元不固。關鍵不牢。致此苦惡。救治之法。於子下衣來之後。却令產母仰臥。穩婆先將母腸溫水洗淨。惹帶之物。然後托起輕輕送入。推而上之。却令產母兩足夾緊穀道。其腸自收上也。或取蓖麻子四十九粒。去壳搗爛。敷在頂心。待腸收盡而急去之。次也。或用冷水和醋令人噴面。一噴一收。以漸收之。又其次也。

欲免其苦者。宜於此後無孕時多服地黃丸。加五味子。一兩。肉桂。一兩。以固下元之關鍵。及有子時多服胡連丸。加人參。一兩。以補氣。又服三補丸。以涼血。如滑胎瘦胎之藥。不可輕服。於八箇月時再服八物湯。加訶子。瞿麥。粟殼。服十餘劑。庶可免矣。

予意須預服補中湯。升提之藥。於前。庶臨盆可免。

噴貼之法。腸雖可收。予恐誤事。不若鼻角末。

女科備考 卷一 臨產盤腸生 九

吹鼻。嚏作自上。

治子腸不收 枳壳 訶子 五味子 五

倍子 白礬 煎湯熏洗自漸而收。再不收。

灸頂心百會穴數壯即上。

子腸被風吹乾不收者。用磨刀水少許。火

上溫過。以潤其腸。後用好磁石煎湯一盞服

之。

胎衣不下

或因產母力乏氣不轉運。或因血少乾澀。或因子宮空虛。吸貼而不下者。急服加味五苓散甚快。若倉卒無藥。用草紙燒烟熏鼻。卽下。再尋路上破草鞋一隻。近陰處。軟繫臍帶數道而下。務宜仔細緊束繫定。然後斷其臍帶。洗兒收養。產母任其坐卧行立。胎衣自下。有過旬日而爛下者。屢試有驗。若不斷帶。使子氣灌入衣中。衣轉浮脹而不得出矣。血反潮入胞中。攻心則傷。天寒時尤不便於子也。惟慣熟穩婆善取胎衣者。甚不勞耳。

女科備考

卷一 臨產胎衣不下 在二

立按仔細緊束繫定。然後斷其臍帶。二語切記。切記若帶縮入。卽難治矣。

蓋護產母下部。冬月用火於被下。腹中用熱衣。溫之要緊。多服生化湯。益母丸。

產子迷悶不啼

子欲下時。母或護痛。偃僕傾側。兩足不開。扭夾兒頭。氣不得伸。故生下悶絕不啼。謂之寤生。救法待胎衣

來切勿斷臍。急取小鍋燒水。以胎衣置湯中。頻頻用水洗臍帶。仍作大油紙撚。點燈於臍上。往來燎之。亦有用蘆艾爲撚。香油浸潤。薰臍帶至焦。使熱氣內攻。又用燈心。顛門點爆數下。須臾氣煖入腹。兒氣卽回。而啼聲發出矣。若倉猝斷其臍帶。不可救也。

凡兒生下卽死者。急看兒口中。前上腭上有泡。以手指摘破。用帛拭血令淨。若血入喉。卽死。其泡中白米如針嘴尖。亦須拈去。

女科備考

卷一 臨產子悶不啼 在二

分娩避忌

孕婦分娩。必須避忌。豫每見冲犯。則多年不孕。今錄體元子借地法。孕婦臨月。擇天月二德吉日。令善書者。先期齋戒三日。至日汲新水。研硃於黃紙上。焚香書曰。

東借十步。西借十步。南借十步。北借十步。上借十步。下借十步。壁方之中。四十餘步。安產借地。或有污穢。或有東海神王。或有西海神。

玉。或有南海神王。或有北海神王。或有日遊將軍。白虎夫人。遠去十丈。軒轅招搖。舉高十丈。天符地軸。入地十丈。合地空閑。產婦某氏安居。無所妨礙。無所畏忌。諸神擁護。百邪速去。急急如律令。書畢貼產婦牆壁上。則不須避忌矣。

產後章

總論

女科備考

卷一 臨產避忌 產後章九

產後專以補虛為主。雖有他疾。以未治之。今設為問答。以盡病原。以著治法。臨產之工。庶有所憑。司命之寄。亦可無負。

產後血暈

問血暈者何。曰。新產婦昏眩卒倒。不省人事。口噤氣冷。謂之血暈。此惡候也。莫救者多。蓋由坐草之時。不知用前防血暈等方。所以致此。其症有二。當分治之。如血來太多。卒然昏仆者。此血氣兩虛也。急用韭

醋嗅法。以待醒。清魂散主之。澤蘭葉 人參 各一錢 荆芥穗 川芎 歸身 各二錢 炙甘草 八分 酒水 各一盞煎一盞入童便一鐘服。如血去少。惡露未盡。腹中有痛。而昏眩者。同上法。令醒。黑神散主之。黑豆 一合 熟地 當歸 桂心 去皮 炮薑 炙甘草 白芍 酒炒 生蒲黃 各二錢 酒水各一盞煎一盞入童便一鍾服。

急以極軟舊衣緊閉產戶。以知事婦女用膝

女科備考

卷一 產後血暈

九

抵住。勿令下面氣洩。俟稍轉。方用熱水接氣。急服從權急救生化湯。川芎 三錢 當歸 錢 或八錢 乾薑 四分炒 桃仁 十粒去 炙草 五分 荆芥穗 四分炒 黑汗多 棗三枚煎服。勞倦甚。及血崩。或汗多。形氣脫而暈。加入人參 三錢 肉桂 四分 急服二三帖。痰火乘虛泛而上暈。加橘紅 四分 肥人加竹瀝薑汁。產後子宮脫出。

問子宮脫出者何曰其人素虛產時用力勞責太過以致脫出不能自收也補中益氣湯主之外用洗法 荆芥穗 藿香葉 臭椿朮根白皮各等分 碎煎水頻洗子宮即入

產後乍見鬼神

問乍見鬼神者何曰心主血血去太多心神恍惚睡卧不安言語失度如見鬼神俗醫不知呼為邪祟誤人多矣 茯神散主之 茯神 柏子仁 遠志 人

女科備考 卷一 產後子宮出見鬼神 六

參 當歸酒浸 生地酒洗 炙甘草各一錢 桂心五分

續猪心一箇 水煎調辰砂一錢食後服

有如下脹悶煩躁昏亂狂言妄語如見鬼神者此

敗血停積上干於心心不受觸便成此症芎歸瀉

心湯主之 歸梢酒洗 川芎 元胡索 蒲黃

牡丹皮各一錢 桂心七分 水煎調五靈脂末一錢另

研食後服

產後心痛

即胃脘痛心為君主之官血不足有怔忡驚悸之患豈可痛乎

心痛者何曰心者血之主其人宿寒內伏因產後虛寒搏於血血凝不行上衝心之絡脈故心痛也但以大岩蜜湯治之寒去則血脈行而經絡通心痛自止若誤以為敗血而攻之則虛極寒益盛漸傳心之正經變為真心痛而莫救矣 生地酒洗 歸身酒洗 獨活 吳茱萸炒 白芍酒炒 乾薑炮 炙甘草 桂心

女科備考 卷一 產後 心痛 九七

小草各一錢 細辛五分 水煎熱服

產後腹脹悶滿嘔吐惡心

詳論圓機產後氣逆嘔吐不食宜參看

問腹脹滿悶嘔吐惡心者何曰敗血散於脾胃脾受則不能運化津液而成腹脹胃受則不能受水穀而生嘔逆若以尋常治脹治嘔之劑則藥不對症反增其病宜用抵聖湯主之 赤芍 半夏湯 澤蘭葉 陳皮去白 人參各二錢 炙甘草一錢 生薑焙五分 水煎服

亦有傷食而腹脹嘔逆者。以脈辨之。因於血則脈弦

澀。不惡食而嘔多血腥。若因於食則脈弦滑。惡食

而嘔多食臭。加味平胃散主之。蒼朮米泔浸厚朴

薑汁陳皮 香附醋炒人參各二錢 神麴炒 炙甘草

生薑焙各五分 水煎熱服。或用睨皖丸亦佳。

〔睨皖丸〕良薑炒 薑黃炒 草澄茄 陳皮去白 莪朮煨

刑三稜煨 人參各等分 共為細末。蘿蔔慢火煮熟。研

和藥將餘汁打麩糊為丸。蘿蔔湯下。

女科備考 卷一 產後 腹脹嘔吐 九六

〔加味六君子湯〕治產後傷食嘔吐脹滿。人參

枳實炒 山查以上各五分 白朮 半夏湯泡各七分 陳皮一錢

炙甘草三分 白茯苓二分 薑黃二分 薑三片。水煎。食遠服。

一產婦朝吐痰。夜發熱。晝夜無眠。用清痰降

火。肌體日瘦。飲食日少。前証愈甚。蓋早間吐

痰。脾氣虛也。夜間發熱。肝氣虛也。晝夜無眠。

脾血耗也。用六君子湯。加味道遙散。加味歸

脾湯。以次調理而安。

產後口乾痞悶

問口乾痞悶者。何曰。由血氣太虛。中氣未足。食麩太

早。脾胃不能消化。麩毒結聚於胃。上熯胸中。是以有

此症也。慎勿下之。宜用前睨皖丸。

若其人脈氣本虛。宿積積冷。胸腹脹痛。嘔吐惡心。飲

食減少。亦因新產血氣暴虛。風冷乘之。以致寒邪

內勝。宿疾益加。吳茱萸湯主之。吳茱萸炒 一錢

桔梗 薑黃炒 炙甘草 半夏湯泡 細辛 當歸

女科備考 卷一 產後口渴痞悶 九七

酒 白茯苓 桂心 陳皮 生薑引水煎熱服

若因胎衣未下。惡露不來。肚腹脹大。彌急如鼓。嘔吐

黃水。多帶腥臭。加喘者危。

口乾渴兼小便短少

產後亡血。或兼汗多。又加氣虛。不能為胃行

其津液。則化生之氣不運。滲泄之令不行。所

以上無津液流通。而有咽燥乾渴之証。下氣

不升。而小便不通。雖通而亦短少。勿作淋秘。

輕用滲利。使氣益虛。病益甚。治法必當助脾益肺。升舉氣血。則氣化流行。陰升陽降。斯水入經。而為血為津。穀入胃。而長氣行肺。自然津液充而便利矣。初產生化湯。多服數劑。如汗多亡津液。須加人參於內。使血生而津足。若無痛塊。六君子方列倍參芪。或服生津止渴益水方列渴甚兼服參麥飲方列如產後口渴少力。宜生津益液湯。有用四君子湯。加車前

女科備考

卷一

產後口渴便短

百

一錢桂心五分。若認咽乾口燥為火。而用芩連梔柏。認小便秘為水滯。而用五苓。則變生他症矣。予謂小便不通。用加味腎氣丸方列兼口渴生津止渴益水飲。渴甚生脈飲。其炒鹽加射。或有用葱白作束。置鹽射艾炙之類。惟氣閉宜之。產後氣虛忌用。

產後咳嗽

問咳嗽者何。曰產後多因惡露上攻。流入脾經。乃成

萬氏女科

咳嗽。其症胸膈脹悶。宜服二母湯。知母 貝母 白茯苓 人參各一錢 杏仁 桃仁俱去皮尖 各二錢 水煎食後溫服

立按二母性涼。不可治惡露上攻。人參補氣。豈可治惡露流入肺經之咳。方中雖有桃仁杏仁。以瀉肺導瘀。予終不敢妄用。

又曰。肺主氣。氣為衛。所以克皮毛。密腠理也。產後氣虛衛虛。皮毛不克。腠理不密。風寒襲之。先入於肺。

女科備考

卷一

產後咳嗽

百

亦成咳嗽。其症發熱惡寒鼻塞聲重。或多噴嚏。鼻流清涕。旋覆湯主之。旋覆花 赤芍 前胡 半夏 荆芥穗 甘草 白茯苓 五味子 麻黃去根 杏仁以上各等分 薑五片 棗三枚 水煎食後溫服。如有汗去麻黃加桂枝。如咳从不止。涕唾稠粘。加味甘桔湯主之。甘草

桔梗 欬冬 貝母 前胡 枳殼 白茯苓 五味子 麥冬以上各等分 淡竹葉十五片煎服同前

二九九

如產後吃鹽太蚤者難治須待再產月內切記遲用少用方可望愈

產後七日內外感風寒咳嗽鼻塞聲重惡寒

或於生化湯中加杏仁桔梗有痰加天花

粉忌用麻黃動汗卽嗽而脇痛亦不用柴胡

伐肝因共內虛耳尊生用桑貝芎歸清肺

湯列治產後咳嗽甚效

產後咳嗽悉屬胃氣不足胃為五臟之本胃

氣一虛五臟失所外邪易感陰火上炎者宜

女科備考 卷一 產後咳嗽 百三

壯土以生金用異功散去白朮加山藥細辛

桂枝之方或滋水以制火地黃尤加麥冬

五味陰虛感客邪六味丸去黃加桂枝細

辛

乾咳嗽內熱桔梗湯加萎蕤麥冬丹皮蜜煎

薑橘之類

乾咳嗽一証有小兒食乳易治無則成勞

產後喉中氣急喘促

問氣急喘促者何曰榮者血也衛者氣也內外原水

流通榮衛相隨產後血下過多榮血暴竭衛氣無主

獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰最為難治急取

鞋底炙熱於小腹上下熨之次取奪命丹主之附

子炮去皮臍牡丹皮去木乾漆酒炒烟盡以上共

研細末用醞醋一升大黃末一兩同煎成膏和末

丸梧子大每温酒下五十九

因風寒外感邪氣入肺而喘急者必氣粗胸

女科備考 卷一 產後喉中氣急 百三

脹或多咳嗽與氣短似喘上下不接者不同

治當疎散中並補宜金水六君煎或六君子

湯

寒邪入肺氣實氣壅而本無虛者六安煎或

二陳湯加蘇葉

又問產後瘀血入於肺面必赤黑發喘欲死者參蘇

飲主之 人參末 一兩 蘇木 一兩 水二盞煎一盞

去木服人參末隨時加減效難盡述

氣虛血痰泛上者六君子調失笑散

產後腰痛

問腰痛者何曰女人之腎胞脈所繫產後下血過多

則胞脈虛胞脈虛則腎氣虛腎主腰故令腰痛補腎

地黃主之其症隱隱作痛熟地 歸身 酒洗 杜仲 鹽水

炒獨活 桂心 續斷 以上各一錢薑三片棗二枚水

煎空心服

又曰敗血流入腎經帶脈阻塞有腰痛者其症脹痛

女科備考

卷一 產後腰痛

百四

如刺時作時止手不可近加味復元通氣散主之

歸身 酒浸 川芎 小茴 炒 補骨脂 炒 雄 元胡索

牛膝 桂心 丹皮 各一錢 水煎再用木香五分磨

汁和之兼調乳香沒藥末各五分服

有因產時起伏闌閤控閃腎氣及帶脈者亦或腰痛

並用前方

產後遍身疼痛

問遍身疼痛者何曰產時骨節開張血脈流散遇氣

衰弱則經絡肉分之間血多凝滯骨節不和筋脈不

舒故腰背不能轉側手足不能屈伸而痛也勿作風

寒用汗劑宜趁痛散主之 全歸 酒浸 桂心 白朮

牛膝 酒浸 黃耆 獨活 生薑 各一錢 炙甘草

薤白 各五分 水煎熱服

又有因新產氣虛久坐多語運動用力遂致頭目昏

眩四肢疼痛寒熱如瘧自汗名曰蓐勞勿作傷寒誤

投汗劑白茯苓散主之 白茯苓 歸身 川芎 桂

女科備考

卷一 產後蓐勞

百五

心 白芍 酒炒 黃耆 炙 人參 熟地 各一錢 獾猪腰

子一對 去脂膜 切片 煎湯一盞 去腎 薑三片棗二枚同

藥煎服

予按蓐勞之症或因臨產時生理不順憂恐思慮內

傷其氣展轉闌閤外勞其形內外俱傷形神皆瘁或

因新產後血氣未復飲食未克起居無度言語不止

調攝失宜情欲失禁外感風寒內傷飲食漸成羸瘦

百病交作苟非良工妙劑鮮有不成癆瘵而斃者宜

常服十全大補湯。又早用地黃丸。加歸身。牛膝。

肉蓯蓉去甲俱用酒洗。五味子。柏子仁各二兩。日服。

人參白朮散作丸服之。常煮腰子粥以助之。大效。

在腰子粥。法取豬腰子一對去脂膜薄切如

柳葉大川鹽酒拌合一時水三盞。糯米三合。瓦罐

煮粥入蔥花椒末調和得宜食之。

虛証雜見成痔勞者。驚甲湯。方列無痰覺虛當

歸羊肉湯。方列產後骨蒸先服清骨散後服保

女科備考 卷一 產後蓐勞 頁

正湯。俱列方

寒熱如瘧。百節煩痛。頭疼自汗。肢體倦怠。咳

嗽痰逆。腹中絞痛。當扶正為主。六君子加

當歸。脾虛氣弱。咳嗽口乾。異功散加麥冬

五味子。

氣虛頭暈。補中益氣。倍用歸芪。肝經血虛。

肢體作痛。四物加參苓朮桂。肝腎虛弱。自

汗盜汗。往來寒熱。六味丸加五味子。脾虛

血弱。腹痛。月經不調。歸脾湯。倍木香。血虛

有熱。增損柴胡湯。方列骨蒸勞熱咳嗽有紅者

異功散。去白朮。加山藥丹皮。五味阿膠。童便。

熱而無痰。乾咳者。逍遙散。用蜜煎。薑並密

蒸白朮。

產後虛損。不時寒熱。或經一二載。元神不復。

月事不轉。先與千金當歸芍藥湯。方列後與烏

骨雞丸。見上調經門

女科備考 卷一 產後蓐勞 頁

產後腹痛

立按敗血入腹。與傷風冷飲食之辨。在手不

可近。與按之即止。

腹痛者。何曰。女人之血。未有胎時。則為經水。經水

不來。則病。產時。則為惡露。惡露不來。則病。故產婦中

氣多虛。不能行血。血斯凝滯。或閉而不來。或來而不

盡。敗血入腹。則為腹痛。乍作乍止。其痛如刺。手不可

近。黑神散主之。見產後血暈。敗血隨其所止之處。無不成病。

或產後血虛。外受風冷之氣。內傷寒涼之物。以致腹痛者。得人按摩。畧止。或熱物熨之。畧止者。是也。當歸建中湯主之。歸身 酒洗 白芍 酒炒 桂心 炙甘草 各二錢 薑五片 棗三枚 水煎入飴糖三匙 攪勻 熱服。

或小腹痛者。臍下胞胎所繫之處。血之所聚也。產後血去不盡。卽成痛症。其症無時刺痛。痛則有形。須臾痛止。又不見形。黑神散主之。

女科備考 卷一 產後腹痛 一百八

又有因產時。寒風客於子門。入於小腹。或坐臥不謹。使風冷之氣乘虛而入。此寒疝也。但不作脹。且無形影爲異。金鈴子散主之。川練子 去核 小茴 炒 補骨脂 桂心 各一錢 薑引水煎加木香一錢 水磨 汁和勻 食前熱服。

產後腹痛。先問血塊。如有。只服生化湯。甚則

調失笑散。列若風冷乘虛入腹。或內傷寒涼

之物作痛。人按摩畧止。或熱物熨之。畧止。宜

加味生化湯。產後惡露。或因外感六淫。內傷七氣。致令斬然而止。瘀血壅塞。所下不盡。故令腹痛。當審因治之。如產後數朝內。飲食如常。忽作腹痛。六脈沉伏。四肢厥冷。此惡血不盡。傷食裹血。而脈不起也。不可誤認氣血兩虛。而用大補。須兼消導引血之藥。但產後惡露不盡。留滯作痛。亦常有之。然與虛痛不同。必其由漸而成。或大小便不行。或小便鞭實。

女科備考 卷一 產後腹痛 一百九

作脹。痛極不可近手。或自下上冲心腹。或痛極。牙關緊急。有此實症。當速去之。近上者。宜失笑散。近下者。宜通瘀煎。列未效用。決滯煎。列爲善。又有腹痛。定於一邊。及小腹者。此是側臥。敗血留滯所致。亦用決津煎爲當。產後腹中疝痛。蓋緩緩痛也。客寒相阻。當歸生薑羊肉湯。列主之。婦人產當寒月。寒氣入產門。臍下腹痛。手不可犯。此寒疝也。亦宜當歸生

薑羊肉湯密齋云。產時寒氣客於子門。入於小腹。或坐臥不謹。使風冷之氣乘虛而入。此寒痼。但不作脹。且無形影為異。治以金鈴子散。前考金匱密齋之論寒痼不同。金匱云。臍下腹痛。手不可犯。蓋有寒凝瘀滯也。密齋云。但不作脹。且無形影。是無瘀滯也。又有產後脾虛腎虛。而為腹痛者。此不由產。而由臟氣不足。若脾氣虛寒。為嘔吐。為食少。而兼腹

女科備考 卷一 產後臍腹痼疾二章

痛者。宜六子煎及六君子湯。列主之。若腎氣虛寒。為瀉為痢。而兼腹痛者。宜胃關煎。列或理陰煎。列主之。馮氏用六君子湯送四神丸。列若胸膈飽悶。或惡食吞酸。腹痛。手不可按。此飲食所傷。以傷食而發。若食消而仍痛。按之不痛。更兼頭痛煩熱。作渴惡寒欲嘔等証。此是中氣被傷。宜溫補脾胃為主。若發熱。腹痛。按之痛甚。不惡食吞酸。此乃瘀血停滯。失

笑散消之。若止發熱。頭痛腹痛。按之却不痛。此是血虛初產。生化湯之。加四物加炮薑參朮。產後惡露既去。而腹仍痛。四神散。芍芍。各一錢。歸二錢。炮薑五分。蓋白芍炒透而與炮薑合用。故血虛瘀痛可用。也不應八珍湯。列治之。

兒枕痛小腹痛

血塊作痛。俗名兒枕。生化加元胡索。然有產婦小腹痛。服行氣破血藥不效。其脈洪數。

女科備考 卷一 產後兒枕小腹痛 二章

此瘀血內潰為膿也。是因營衛不調。瘀血停滯。宜急治之。緩則腐化為膿。最難治療。若流注關節則患骨疽。失治多為敗証。脈數而洪。已有膿下之愈。若腹脹大。轉側作水聲。或膿從臍出。或從大便出。用蠟燭丸。列太乙膏。列下膿而愈。

問兒枕痛者何。曰腹中有塊。上下時動。痛不可忍。此由產前聚血。產後氣虛。惡露未盡。新血與故血相搏。

而痛俗謂之兜枕痛卽血瘀之類也當歸延胡索湯
主之 歸身尾酒洗延胡索各一錢五靈脂各一錢蒲黃各一錢
赤芍 桂心各七分紅花五分酒水各一盞煎一
盞入童便一杯同服

〔又羊肉湯通治上腹痛小腹痛兒枕痛之神方也〕
專治虛羸 精羊肉四兩當歸酒浸川芎各五錢生薑一兩
水十盞煎三盞分四服

痛後頭痛

女科備考 卷一 產後兒枕痛頭痛 二五

宜服生化加減 感冒參蘇芎歸湯 參

蘇芎 歸 干葛

問頭痛者何以人身之中氣爲陽血爲陰陰陽和暢
斯無病蓋產後去血過多陰氣已虧陽氣失守頭者
諸陽之會上湊於頭故爲頭痛但補其陰血則陽氣
得從而頭痛自止芎歸湯主之 川芎 當歸各五錢
蔥白連鬚五根生薑五片水煎食後服
又有敗血停留子宮厥陰之位其脈上貫頂巔作頂

巔痛者黑神散主之

產後發熱

問發熱者何曰產後血虛則陰虛陰虛生內熱其症
心胸煩滿吸吸短氣頭痛悶亂時轉甚與大病後
虛煩相似人參當歸散主之 人參 歸身酒熟地
桂心 白芍酒炒各一錢五分麥冬一錢水二盞先以粳
米一合淡竹葉十片煎至一盞去米葉入藥並煎
三枚煎七分溫服熱甚加炒乾薑一錢

女科備考 卷一 產後發熱 二五

產後大熱必用乾薑何也曰此非有餘之熱乃陰
虛生內熱也故以補陰藥大劑服之乾薑能入肺
和肺氣入肝引血藥生血但不可獨用必以入補
陰藥此造化自然之妙也

又有發熱頭痛似太陽証或寒熱頭痛脇痛
似少陽証皆由氣血兩虛陰陽不和狀類傷
寒治者慎勿輕產而以麻黃湯治太陽以柴
胡湯治少陽宜辛散生化湯以散之見列方

產後發熱。當分塊痛有無。七日內。倘有塊痛。及初產時發熱。自宜生化湯為妙。其參芪柴。此地方。尚須緩用。若無塊痛。四君子湯。加芎歸炮薑黃芪。亦甘溫除大熱意也。大熱面赤。大渴。脈洪大而虛者。黃芪當歸等分煎服。馮氏用四物湯為君。去川芎。生薑換熟地。加軟苗柴胡。人參炮薑。治熱最效。

產後乍寒乍熱似瘧

女科備考 卷一 產後乍寒乍熱似瘧 頁四

問寒熱似瘧者何。曰敗血未盡。陰陽不和。皆能發寒熱也。何以別之。曰敗血為病。則小腹刺痛。此為異耳。故敗血未盡者。以去滯為主。陰陽不和者。以補虛為主。若作瘧治。誤矣。

敗血不盡。乍寒乍熱者。蓋因敗血留滯。經脈皆閉。榮衛不通。閉於榮。則血甚而寒。閉於衛。則陽甚而熱。榮衛俱閉。則寒熱交作。榮衛氣行。即解矣。惟黑神散。卷荷散。為去滯血之要藥也。初出卷荷。

紅花 歸尾 蒲黃 牡丹皮 生地 各一錢 薑三片 童便一碗 水煎熱服

陰陽不和。乍寒乍熱者。因產後氣血虧損。陰陽俱虛。陰虛則陽勝而熱。陽虛則陰勝而寒。陰陽俱虛。則乍寒乍熱。增損四物湯主之。歸身 白芍 川芎 乾薑 各一錢 炙甘草 五片 薑三片 棗三枚 水煎服。寒多熱少者。加桂一錢。熱多寒少者。加柴胡一錢。乾薑減半。煩渴者。加知母麥冬。

女科備考 卷一 產後乍寒乍熱 頁五

各一錢。食少者。加陳皮白朮各一錢。虛倦甚者。加蜜炙黃耆一錢。

附辨似瘧真瘧

似瘧。寒不凜凜。熱不蒸蒸。發作無時。亦不甚苦。此正氣虛而無邪者也。真瘧。寒則湯火不能禦。熱則冰水不可解。發作有時。煩苦困頓。此正氣虛而邪氣相搏者也。

陰勝寒多。理陰煎。陽勝熱多。三陰煎。陽氣陷。

入陰中。補陰益氣煎。陰陽俱虛。八珍十全俱
可用。敗血不散。而作寒熱。決津煎。殿胞煎。俱見

產後癰疾

問癰疾者何。曰氣血俱虛。榮衛不固。脾胃未復。或外
感風寒。內傷飲食。皆能成癰。又有胎前病癰。產後未
愈者。產後之癰。最難調理。只以補虛扶正為主。正氣
勝。則邪氣自退。不可輕用截藥。重虛正氣。為害甚大。
婦科備考 卷一 產備癰疾 頁六

增損柴胡四物湯主之。北柴胡 人參 半夏 泡

炙甘草 歸身 酒洗 川芎 乾薑 桂心 薑二

片棗三枚。水煎不拘時溫服。凡癰加黃耆蜜炙

煎甲醋炙 各二錢

產後渴

問渴者何。曰胃者水穀之海。津液之府也。產後去血
過多。津液內耗。胃氣暴虛。頓生內熱。故口渴咽乾而
渴也。加味人參麥冬湯主之。人參 麥冬 生地

栝樓根 炙甘草 各二錢 先用粳米一合。淡竹葉
十片煎湯一盞。去米葉加薑三片。棗二枚煎七分
溫服。

產後汗出不止兼變證

問汗出不止。兼變症者何。曰血為榮。行乎脈中。氣為
衛。行乎脈外。相須為守者也。產後去血過多。榮血不
足。衛氣失守。不能斂皮毛。固腠理。故汗洩易出也。宜
急止之。恐風寒乘虛而入。變生他症。宜麻黃根湯主
之。婦科備考 卷一 產後汗出變症 頁七

歸身 酒洗 黃耆 蜜炙 麻黃根 人參 炙甘草

各一錢 水二盞。以浮麥一合。煮至一盞。去麥入藥

再煎至七分。調牡蠣粉 煨 另研二錢。

如眩暈汗出者。此名胃汗虛極也。急用人參 炙甘

草 炙黃耆 各二錢 附子 錢一 水煎。幹開口灌之大

抵此危症。甚難救。

如汗出不止。風邪乘之。忽然悶倒。口眼喎斜。手足攣
曲。如角弓反張者。此瘧病也。急用 桂枝 葛根

白芍 炙甘草 炙黃耆 歸身各二錢 熟附子五分
水煎幹開口灌之此亦危症難救

血塊作痛者尤未可據加如倦甚濺濺汗出

形色又脫速灌加參生化湯母拘泥塊痛俟

汗出參多汗不止必發柔痙用十全大補不

應加附子無塊痛者當用之若服參耆重劑

而汗多不止及頭汗出不至腰足者難治

立按十全大補湯加防風止產後汗出神效

婦科備考

卷一 產後渴汗出變症夏

四君子四物加黃耆肉桂即十全大補湯

盜汗非自汗可比宜止汗散主之 人參二錢

麻黃根一錢 當歸五分 熟地各三錢 有血塊不

黃連五分 浮麥一錢

一方用牡蠣五錢 炒麥麩八兩 二味和服三

五錢猪肉汁調服

產後中風

問中風者何曰產後正氣暴虛百節開張風邪易入

調理失宜風即中之不省人事口目蠕動手足攣攣

身如角弓此風外中者也愈風湯主之羌活 防

風 當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 桂心 黃耆

天麻 秦艽各一錢 薑棗引水煎熱服

又曰諸風振掉皆屬肝木肝為血海胞之主也產後

去血過多肝氣暴虛內則不能養神外則不能養

筋以致神昏氣少汗出膚冷眩暈卒倒手足痲癱

此肝虛生風風自内生者也用當歸建中湯加黃

女科備考 卷一 產後中風 百九

著 人參各一錢 熟附子五分 薑棗引去飴糖

如痰迷心竅神氣不清恍惚昏眩者用琥珀壽星丸

人參煎湯下

產婦少血濡養多有陰虛內熱熱極生風雖

外症如風內實陰虛不足氣無所主卒爾口

噤牙緊唇青肉冷汗出或唇口喎僻手足筋

脈攣搐諸症類於中風者或因血氣耗損膜

理不密汗出過多神無所主致角弓反張此

乃厥陰虛極類痙瘓者在傷寒之家雖有剛柔之分而產後無非血燥血枯之証總宜養陰補血血長而虛風自滅任其痰火乘虛泛上皆當以未治之母執偏門而用治風消痰之方初產當服生化湯以旺新血如見危證三帖後即用人參益氣以救之如有痰有火或少佐橘紅竹瀝薑汁其黃連芩柏不可並用胆星蘇子尤不宜加如產已數日腹無塊

女科備考

卷一

產後類中風

百三

痛即用滋榮活絡湯方列如語澀四肢不利宜天麻湯密齋治語言蹇澀加味生麥散治汗多口噤背反氣微類瘓用止汗生血飲方列治無汗筋攣用歸芍棗仁湯方列昔立齋用十全大補湯方列治口噤空閉灌之不得下令側其面出之仍灌熱者又冷又灌數次即能下而甦矣斷噤則灌入鼻中即甦此古人急救灌法不可不知至於治口噤不能為語峻補之

萬氏女科

中少兼通心氣之藥以七珍散方列通心氣馮氏治產後痙瘓用八珍方列加鈎藤丹皮以生陰血不應用四君子方列芎歸丹皮鈎藤補脾土若肢體惡寒脈微細者為正狀脈浮太發熱煩渴為假象惟當固本為善若無力抽搐戴眼反折汗出如珠兩手撮空不治尊生治產人拘攣不宜補者用舒筋湯方列治之昔有一婦因胎前過月不生忽患子癰醫者

婦科備考

卷一

子癰誤認傷寒

百三

誤認傷寒胎死用承氣調天水散下之及產後惡露即停不行此原非瓜熟自落乃惡露隨胎為藥所逐則一時盡下非有瘀滯不行也所以醫者不問痛塊有無用丹皮澤蘭等藥以致有形之血不生無形之氣更傷是以隨變神脫妄言妄見虛火引痰上升治者猶不知此孤陽浮越之候復不辨脈証仍進逐瘀退熱之劑病勢愈深豈不知辛散消尅則神

三〇九

愈亡而血愈竭。以故心血竭而妄言愈甚。肝血竭而內虛生風成搐。肺氣竭而發喘。鼻孔黑如烟煤。脾氣竭而四肢不為所用。胃中元氣告匱不能散精。痰壅愈甚。治之者仍不識為虛。反用胆星蘇子以化痰降氣。梨汁以清痰降火。僵蠶柴胡天麻以止搐。諸如此等藥類。雜進交攻。罔知顧本。遂致殞命。良可慟也。

怔忡驚悸虛煩燥

婦科備考

卷一 怔忡驚悸煩燥

一百三

產婦憂驚勞倦。去血過多。則心中燥動不寧。謂之怔忡。若惕然而驚。心中怯怯。如人將捕之狀。謂之驚悸。二證惟調和脾胃。補養心血。俾志定神足。氣舒心安。而病自愈。如分娩後血塊未消。宜服生化湯。以補血行塊。連服數劑。則血旺而怔悸自平。不必加定志安神之藥。如塊痛已止。服加減歸脾湯。列如心中驚悸。目睛不轉。而不能動。宜養血佐以安神藥。

養心湯列主之素壯火盛者兼服安神丸

麻替

產後麻替皆因氣血虛少不能充溢乎週身宜十全大補湯列或去血過多手足發麻小腹大痛則遍體麻暈欲死此非惡露疑滯乃虛中挾痰六君子湯列加炮薑香附當歸會治一婦產後右半身麻替而昏暈不省人事發即胸膈痞悶下體重著或時心神動搖若

婦科備考

卷一 產後麻替

一百三

無心肺之狀頃則週身冷汗如瀉大吐痰涎而蘇此產後經脈空虛痰飲乘虛而襲因與六君子湯加歸著肉桂隨手而效復有一婦產後左半身麻替昏暈不省人事發則週身大痛筋脈痠癢肌肉觸動或時頭面赤熱或時腿上振振動搖頃則蒸蒸汗出而蘇此產後營血大虧虛風所襲用十全大補湯治之諸證悉平但麻替不止後與地黃飲子列而

安。

產後傷寒

問產後傷寒者何。曰氣血俱虛。榮衛不守。起居失節。調養失宜。傷於風。則衛受之。傷於寒。則榮受之。而成傷寒也。只以補虛為主。隨証以未治之五物湯。人

參 歸身 川芎 白芍 酒炙 甘草 各等分 薑三片

葱白三根引水煎服。

有汗曰傷風。本方加桂枝。防風。無汗曰傷寒。

婦科備考

卷一 產後傷寒

百五

本方加麻黃 蘇葉 寒熱往來。本方加柴胡。

頭痛。本方加藁本 細辛 遍身痛。本方加羌活。

蒼朮 但熱不惡寒。加柴胡 葛根 發熱而

渴。加知母 麥冬 淡竹葉

產後霍亂吐瀉

問霍亂吐瀉者何。曰脾胃者。氣血之本也。產後血去。氣損。脾胃亦虛。風冷易乘。飲食易傷。少失調理。即有霍亂。心腹絞痛。手足逆冷。吐瀉交作等症。加味理中

湯主之。人參一錢 白朮 土炒二錢 炙甘草一錢 乾薑

炮一陳皮 藿香 厚朴 薑製各一錢 生薑五片。焙水

煎溫服。無時。須用於塊痛已除之後。

痛塊未除。生化六和湯 方列 已除溫中散 方列

無塊痛而手足厥冷。附子散 方列 或加味理中

湯

產後泄瀉

問泄瀉者何。曰產後中氣虛損。寒邪易侵。若失調理。

婦科備考

卷一 產後泄瀉

百五

外傷風寒。內傷生冷。以致脾胃疼痛。泄瀉不止。理中

湯主之。如泄不止者。再加肉豆蔻。麩包煨熟。去麩搗

碎。竹紙包固兩三層。用厚磚二塊燒熱。將包好肉蔻

夾於中間。去油以淨為度。沖入藥內飲之。

產後泄瀉及完穀不化并遺尿

產後中氣虛弱。傳化失職。故泄瀉。不外氣虛

食積與濕。然惡露未除。又難驟補。峻消急燥。

當先用蓮子生化湯三劑。方化舊生新。然後

用健脾利水生化湯方列或補氣或消食或化積或燥濕分利。因證加入對證之藥。始無滯澁。虛虛之失。至產後旬日外。方可與雜證同論。然宜量人虛實而治。如痛下清水。腹鳴米穀不化者。以寒瀉過之。糞色黃。肛門痛。以熱瀉清之。飲食傷脾。噯氣味如敗卵。以食積消之。飲食減少。食下腹鳴。腹急盡下所食之物。方覺暢快。以脾虛食積而消之。丹溪云。產後

婦科備考 卷一 產後泄瀉穀不化遺尿 百六

虛瀉。眼昏不識人。危證。用參苓朮附湯方列救之。又胎前久瀉。產後不止。以致虛脫。須從權服參苓生化湯。以扶虛。仍分塊痛不痛。加減而治。凡瀉兼熱。切勿用芩連梔柏。兼痰。切勿用半夏生薑。如瀉而渴。參麥飲方列以回津液。產後脾瀉不止。參苓蓮子飲見圓机泄瀉門完穀不化。因產後勞倦脾傷。以致衝和之氣不能化而物完出焉。病名瀉瀉。又飲食太過。脾胃

受傷。亦致完穀不化。俗呼水穀痢。然產方三日內。血塊未除。患此脾敗胃弱之症。未可遽加著朮。且服加味生化湯方列俟塊消散。服參苓大補生化湯方列。如胃氣虛。瀉利黃色。用補中益氣湯方列。加木香治之。若久瀉痢虛者。參看散方列。久瀉元氣下陷。大便不禁。肛門如脫。宜加味六君子湯方列。若見完穀不化。色白如糜。此脾胃大虛。元氣虛脫之候。十有九死。惟

婦科備考 卷一 產後泄瀉遺尿 百七

猛進溫補之劑。庶可挽回。卽有煩燥發熱。面赤。脈來數大。皆虛火上炎之故。當並進桂附人參甘草乾薑芩朮之類。伏龍肝煎湯代水煎服。乃得收功。若小便混濁如泔。或大便中有白沫如腸垢者。乃元氣下陷之故。並宜補中益氣湯方列。加桂苓炮薑升舉之。或瀉臭水不止。加藜艾香附吳茱萸。若兼瘀結不通。腹脹喘急。雖神丹亦無濟也。如大便不知爲遺

尿補中益氣湯加肉蓯蓉故紙。

產後吐衄及口鼻黑氣起而衄並舌黑。

產後吐血諸書皆稱難治以其上下脫也。產

後鼻衄乃氣血逆行所致。用紫蘇飲列方入童

便荆芥灰治之。良方以荆芥焙為末童便服

二錢。尊生用犀角生地赤芍合二味參蘇飲。

如口鼻黑氣起而衄者難治。蓋五臟之華皆

上注於面。凡紅赤者陽熱之生氣也。青黑者

婦科備考

卷一

產後吐衄鼻衄氣黑頁八

陰寒之絕氣也。况口鼻為陽明多血多氣之

經。而見陰寒慘殺之氣。則胃中陽和之氣衰

敗可知。復至鼻衄則陽亡陰走。胃絕肺敗。陰

陽兩亡。故不可治。但有禳厭一法。或可望生。

急取緋線一條。並產婦頂心髮兩條。繫繫中

指節上。即止。立齋云。急用三味參蘇飲列方治

之。亦有得生者。如前證再兼舌紫黑者。為血

先死不治。蓋心主血。少陰氣絕。則血不上。廢

耳注石山治一婦。產後血逆上行。鼻衄口乾。

心燥舌黑。因瘀血上升。遂用益母丸二九。童

便化下。衄漸止。血漸通。此條當與三衝門參

看。

三衝論

產後危症莫如敗血三衝。其人或歌舞談笑。

或怒罵坐臥。甚者踰牆上屋。口咬拳打山腔。

野調此為敗血衝心。多死。醫通云。花菴石散

婦科備考

卷一

產後三衝論 頁九

方最捷。但不可如雖悶亂不致顛狂者。失笑

散。列方加鬱金。予謂當於產後乍見鬼神門參

看治療。

若其人飽悶嘔惡。腹滿脹痛者。為之衝胃。醫

通云。用平胃散。列方加薑桂。未可輕予謂當於

飽脹嘔逆門參看治療。

若其人面赤嘔逆欲死。為之衝肺。醫通云。二

味參蘇飲。列方甚則加芒硝蕩滌之。予謂當於

口鼻黑。門參看治療。

大抵衝心。十難救。一衝胃。五死。五生。衝肺

十全一二。其醫通所用各藥。亦無可如何

之思。與其視死。不若救生之意。予謂此等

症。宜用生化失笑。抵聖等。平穩藥為主。各

俱載。當與圓機產後妄言。妄見。斟酌施治。

產後痢疾。詳論圓机。

問痢疾者何。曰。濕多成泄。暴注下迫。皆屬於熱。赤白

婦科備考 卷一 產後泄痢 百三

痢者。乃濕熱所為也。故赤者屬熱。自小腸而來。白者

屬濕。從大腸而來。俗云。赤屬熱。白屬寒。非也。無積不

成痢。蓋由產母平日不肯忌口。傷於飲食。停滯於中。

以致中氣虛損。不能調理。宿積發動。而為痢也。亦有

因子下之時。覺腹中空虛。縱食雞蛋。與雞以補虛。殊

不知飲食自倍。脾胃乃傷。胃強氣弱。難以克化。停滯

而成痢也。務宜詳審斟酌。以施治法。庶不誤人。

如果新產飲食過傷。其症腹中脹痛。裏急窘迫。身熱

口渴。六脈數實。宜下之。用加味小承氣湯。枳實

厚朴。薑製各二錢。酒炒。二錢。檳榔。一錢。炙甘草

錢。薑三片。水煎。熱服。以快便為度。中病即止。後用

四君子湯。加陳皮和之。

如新產後。未有所傷。其症其脈。與上却同者。此宿食

為病也。宜消而去之。用枳實湯。枳實。薑炒。木香

炙甘草。各一錢。厚朴。薑製。二錢。檳榔。一錢。薑三片。水

煎服。以快利為度。後用四君子湯。加陳皮和之。

婦科備考 卷一 產後痢疾 百三

如無新舊食積。下痢赤白。腹痛窘迫。脈沉數者。此虛

痢也。宜行氣和血為主。用當歸芍藥湯。當歸。身

白芍。酒炒。人參。白茯苓。陳皮。各一錢。枳殼。炒。七

炙甘草。木香。各五分。黑乾薑。三分。烏梅。一個。水煎

食前服。

如久痢不止者。此氣虛血少。腸滑不禁也。宜四君子

湯。加白芍。烏梅。罌粟殼。大棗。主之。

又有產後惡露不下。以致敗血滲入大腸。而利鮮血

者腹中刺痛裏不急後不重是也。用枳壳錢五分。

荆芥穗畧炒二錢五分 水煎服神效。

產後大便閉澀不通。

問大便秘者何。曰人身之中腐化糟粕運行腸胃者氣也。滋養津液灌溉溝瀆者血也。產後血虛而不運故糟粕壅滯而不行。血虛而不潤故溝瀆乾澀而不流。大便不通乃虛秘也不可誤用下劑反加閉澀宜潤燥湯主之。人參各五分 甘草各五分 歸身尾 生地。

婦科備考

卷一 產後大便閉澀 二五三

枳壳各一錢 火麻子去壳槌碎 桃泥各二錢 檳榔五分磨汁

先將上六味水煎熟去渣後入桃泥檳榔汁和勻服。

更用蘇木一合 真蘇子一合 火麻子三合 共搗如

泥以水一盞濾汁再搗再濾汁盡為度用和粳米煮粥食之甚妙。老人虛秘尤宜常用。

多服生化湯則血旺氣順自潤而通竟有服至大料芎歸數斤方得取效慎勿執偏門而

輕產倘順之不通用蜜煎成膏入水捏成裹

入肛門或削醬瓜醬薑如蜜煎導法。忌用

猪胆汁導。血虛火燥四物湯加何首烏。

去血過多十全大補湯。氣血俱虛用八珍

湯。數日不通飲食如常腹中如故者八珍

湯加桃仁杏仁治之。

病涉虛損不宜攻擊若勢有不得不用通者

用濟川煎列方主之。此用過於補之劑也。

女科備考

卷一 產後大便閉澀 二五三

產後小便不通或短少

問小便少者何。曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣。產後氣虛不能運化流通津液故使小便

不通雖通而亦短少也。勿作淋秘輕用滲利藥使氣

益虛病益甚宜加味四君子湯主之。人參 白朮

白茯苓 炙甘草 麥冬 車前子各一錢 桂心五分

薑三片水煎食前服。

又有惡露不來敗血停滯閉塞水瀆小便不通其症

小腹脹滿刺痛。乍寒乍熱。煩悶不寧。加味五苓散主之。

豬苓 澤瀉 白朮 茯苓 桂心各一錢 桃

仁去皮 紅花各二錢 水煎服。

產後淋

問淋者何。曰此亦血去陰虛。生內熱。在。蓋腎為至

陰。主行水道。去血過多。真陰虧損。一水不足。二火更

甚。故生內熱。小便成淋。而澀痛也。加味導赤散主之。

生地 赤芍 木通去皮 甘草梢 麥門冬 黃

女科備考 卷一 產後淋 頁五

柏 知母 桂心各一錢 燈心四十九寸 水煎調益元

散二錢服。

問前言小便不通。後言淋秘二症何別。曰不通者屬

氣虛。淋屬內熱澀痛。以此別之。

血虛熱鬱。用六味丸。逍遙散。補陰養血。滋其

本源。佐以導血藥可也。

膀胱陰虛。而小便淋瀝。全科六味合生脈散。

大劑煎成。陸續通之。或補中益氣湯兼服。

六味地黃丸。

產後淋。小便痛。及血淋。加減茅根湯。外濟陰

加減四物湯。方列

產後尿血

問弱血者何。曰小腹痛者。乃敗血流入膀胱。小腹不

痛。但溺時澀痛者。乃內熱也。並用小蘗湯主之。小

蘗根 生地 赤芍 木通 蒲黃 甘草梢

淡竹葉各一錢 滑石二錢 燈心四十九寸 水煎服。敗

婦科備考 卷一 產後尿血 頁五

血加歸梢 紅花各一錢 兼內熱加黃芩 麥冬去

各一錢

大便血。或飲食起居失宜。或六淫七情太過。

致元氣虧損。陰絡受傷。四君子加生地 升

麻 歸身 髮灰 白芍治之 尊生用加

味腎氣方列去桂附加生地髮灰。

產後小便數及遺尿不禁

問小便頻數不禁者何。曰下焦如瀆。所以至滿洩也。

產後氣血虛脫。溝瀆決裂。諸畜不固。水泉不止。故數而遺也。下者舉之脫者澁之。宜用升陽調元湯合桑螺蛸散主之。人參 炙黃耆 炙甘草 升麻

益智子去壳炒各一錢五分 薑棗引水煎調桑螺蛸散服

桑螺蛸散 真桑螺蛸 白龍骨煨 牡蠣左顧者煨各等

分細研末每調服三錢。

又有產前穩婆用手誤拍胞破者。以致小便不禁。宜

用參朮湯。人參二錢五分 白朮二錢五分 炙黃耆一錢五分

婦科備考 卷一 產後小便數遺尿 一頁

陳皮去白 桃仁去皮 茯苓各一錢 炙甘草五分 先用

豬胞或羊胞一箇洗淨水二盞煎至一盞去胞入

藥煎七分食前服多劑乃佳。

或以參朮膏煎以豬羊胞湯極飢時飲之。令

氣血驟長。不過月餘其胞可完。

氣虛不能制水。補中益氣加車前茯苓。遺

尿不知。補中益氣湯。腎虛不固者。六味丸

加益智。膀胱氣虛。小便頻數。補中益氣湯。

加山萸山藥為主。佐以人參螺蛸散。列虛寒以致數遺。益心湯最妙。列小便不禁。補中湯送還少丹。列脾胃虛寒。八味丸。

產後咳逆

問咳逆者何。曰。此氣從胃中出。上衝噴門。吃忒而作聲也。有胃氣虛寒者。有中氣不足。衝任之火直犯清道而上者。有飲水過多。水停而逆者。有大小便閉下焦不通。其氣上逆者。有胃絕者。大約產後咳逆。乃胃

婦科備考 卷一 產後咳逆 一頁

虛氣寒症也。加味理中湯主之。人參 白朮 炙

甘草 乾薑炮 陳皮各一錢 丁香五分 乾柿蒂二錢

水煎服有熱去丁香加竹茹二錢。如虛羸人甚

飲食減少。咳逆者。胃絕也。難治。

醫通云。產後氣血俱虛。風冷搏氣而逆上。乃

胃氣虛寒之極。最為惡候。理中湯加丁香。

古方以丁香豆蔻伏龍肝為末。用桃仁吳萸

煎湯調下一錢。如人行五里。再服。未應。急投

參附遲則不救。

產後浮腫

問浮腫者何。曰產後敗血不盡。乘虛流入經絡。與氣相雜。凝滯不行。腐化為水。故令四肢浮腫。乍寒乍熱。勿作水氣治。輕用滲利藥。但服調經湯。使氣血流行。腫自消也。歸身酒洗 赤芍 丹皮 桂心 赤茯苓 炙甘草 陳皮各一錢 細辛 乾薑名五分

引煎服

女科備考

卷一

產後浮腫

一百天

又有產後虛弱。腠理不密。調理失宜。外受風濕。面目虛浮。四肢腫者。加味五皮湯主之。桑白皮 陳皮

茯苓皮 大腹皮 薑皮 漢防己 枳壳麸炒

豬苓 炙甘草 薑引水煎服

產後惡露不止

問惡露不止者何。曰產後衝任損傷。氣血虛憊。舊血未盡。新血不斂。相併而下。日久不止。漸成虛勞。當大補氣血。使舊血得行。新血得生。不可輕用固澀之劑。

致敗血凝聚。變為癥瘕。反成終身之害。十全大補湯

主之。如小腹刺痛者。四物湯加延胡索 蒲黃炒

乾薑炒主之。血崩門亦可參看同治。

產後月餘淋瀝不止。升陷固血湯 血熱保

陰煎。因傷衝任之絡。固陰煎 肝脾氣虛

壽脾煎。氣血虛。大補元煎。俱載列方

產後惡露不下。不可用大黃等藥。

問惡露不下者何。曰此有二症。治各不同。或因子宮

婦科備考

卷一

產後惡露不下

一百天

素冷。停滯不行者。黑神散主之。此必小腹脹滿。刺痛無時也。或因脾胃素弱。中氣本虛。敗血亦少。氣乏血阻。不能盡下。其症乍痛乍止。痛亦不甚。加減八珍湯

主之。人參 一錢 白朮 二錢 白茯苓 二錢 炙甘草 一錢

歸身 三錢 川芎 一錢 熟地 三錢 延胡索 一錢 香

附一錢 薑棗引水煎食前服。

用生化湯倍桃仁。調失笑散。生新行瘀。類以

黑沙糖沖滾湯。少滴無灰酒服。每每獲效。如

素不用酒不加亦可。

一婦服峻厲之劑惡露隨下久而昏憤以手

護其腹此脾氣復傷作痛故以手護用人參

理中湯加肉桂二劑而愈。

產後眼見黑花昏眩

問眼見黑花昏眩者何曰惡露未盡敗血流入肝經

肝開竅於目故眼見黑花諸風振掉皆屬肝木故為

昏眩用前清魂散加牡丹皮一錢煎服。

婦科備考 卷一 產後惡露眼見黑花 百四十一

產後脇痛

問脇痛者何曰此亦敗血流入肝經厥陰之脈循行

脇肋故為脇痛證有虛實宜分治之不可誤也如脇

下脹手不可按是瘀血也宜去其血芎歸瀉肝湯主

之歸尾 川芎 青皮 枳壳 香附童便製 桃仁

去皮 紅花各二錢 用水煎熟去渣入酒與童便各一

鍾服

有如脇下痛喜人按其氣閃動肋骨狀若奔豚者此

去血太多肝臟虛也當歸地黃湯主之 歸身 白

芍 酒炒 熟地 酒洗 人參 甘草 陳皮 桂心 各

錢五分 薑棗引水煎服。

產後左脇痛小柴胡湯去黃芩加丹皮 製

香附 薄桂 當歸 童便 右脇補中益

氣湯去升麻加 葛根 製半夏 茯苓

枳壳 麩炒 生薑引

產後不語

婦科備考 卷一 產後脅痛不語 百四十二

問不語者何曰人心有七孔三毛產後虛弱敗血停

積閉於心竅神智不能明了故多昏憤又心氣通於

舌心氣閉則舌強不語七珍散主之人參 生地

石菖蒲 川芎各二錢 細辛 三分 防風 五分 水煎調

辰沙五分細研食後服

又有語言不清含糊蹇澁者蓋心主血血去太多心

血虛弱舌乃心之苗血不能上榮於舌萎縮卷短語

不能出也加味生脈散主之 人參 麥冬 當歸

身 生地 炙甘草 石菖蒲各一錢 五味子十三粒
豬豬心一箇劈開水二盞煮至一盞半去心入藥
煎七分食後服 兼治怔忡甚效

產後暴崩

問暴崩者何曰產後衝任已傷氣血未復或恣慾勞
動胞脈或食辛熱鼓動相火或因惡露未盡固澁太
速以致停留一旦復行須要詳審先用四物湯倍加
芎歸再加入參作大劑服之扶其正氣然後隨其所
婦科備考 卷一 產後暴崩 二百三十二
傷加減調治

因房勞者本方加黃耆 甘草 炙阿膠 艾葉

因辛熱者本方加白朮 白茯苓 甘草 黃連炒

因劫澁者本方加香附 桃仁 崩久不止只用

本方調十灰散服之蓋崩本非輕病產婦得之是

謂重虛尤不可忽也

產後瘕塊

問瘕塊者何曰此惡露不盡之害也蓋由新產惡露

不來或來不盡或產婦畏藥雖有痛苦強忍不言或
主人與醫堅執產後虛補之說不可輕用去血之藥
以致敗血停留久而不散結聚成塊依附子宮妨碍
月水阻絕嗣息天其天年欲治此者必用丸藥以漸
摩之非湯散旬日之力 香附醋煮四兩 山萸肉去核

熟地 歸身 川芎各一兩 牡丹皮去木 延胡索

五靈脂 補骨脂炒各一兩 荆三稜 莪朮俱醋

九肋鱉甲去肋醋炙枯 桃仁另研 木香 桂各一兩 蜜丸

女科備考 卷一 產後瘕塊唐級原三

每空心用白朮陳皮湯下五十九

產後玉戶不斂

問前症者何曰女子初產身體纖柔胞戶窄小子出

不快乃至折裂浸淫潰爛日以不斂宜內服十全大

補湯外用敷藥 白芨 白龍骨 訶子 爛蜂壳

黃柏炒 各等分爲細末先用野紫蘇煎洗拭乾

以此藥搽之即效 又方用龜壳入乾夜合草於

內塞滿燒烟薰之自合 原註係補方

產後陰戶脫下。乃元氣不足。及陰挺突出。腫

痛。清水淋瀝。用八珍湯加炙黃耆。防風

升麻各五分。或用補中益氣湯加醋炒白芍

一錢。五味十粒。或肉桂五分。補而舉之。

如無腫痛。或腫既消而不閉者。以十全大補

湯。或補中益氣湯加五味。或加半夏茯苓以

健脾。

產後乳汁不通

婦科備考

卷一

產後至早閉乳不通四

問乳汁不通者何。曰。或初產之婦。則乳方長。乳脈未

行。或產多之婦。則氣血虛弱。乳汁短少。並用加味四

物湯。當歸身。人參。川芎。赤芍。生地。桔

梗。甘草。麥冬。白芷各一錢。水煎食後服。

如因乳汁不行。身體壯熱。胸膈脹悶。頭目昏眩者。前

方加木通。滑石末。更煮豬蹄湯食之。則乳汁

自行。豬蹄淨洗。煮爛。入蔥調和。並汁食之。又方

入香油炒過。穿山甲同煮。去甲。食蹄飲汁良。

水虧火勝而溢。加減一陰煎。陽明血熱而

乳巖

婦人乳巖。原非產後之病。但乳巖乳癰。皆痰

生乳房。治此症者。混同施治。誤世不淺。不得

不分別論明也。其乳癰起於吹乳之一時。非

同乳巖。由氣血虧損於數載。始因婦女。或不

婦科備考

卷一

產後

乳巖

一頁

得意於翁姑夫婿。或諸事憂慮鬱遏。致肝脾

二臟久鬱而成。初起小核。結於乳內。肉色如

故圓棋子。大不痛不癢。十餘年後。方成瘡患。

爛見肺癰。不可治矣。初起之時。其人內熱夜

熱。五心煩熱。肢體倦瘦。月經不調。宜早為治

療。益氣養榮湯。加味道遙散。方列多服。漸散氣

虛。必大劑人參。專心服。其核漸消。若服攻

堅解毒傷其正氣。必致潰敗。多有數年不潰

者最危。潰則不治。周季芸云。乳癰乳巖結鞭未潰。以活鮒魚。同生山藥。搗爛。入射香少許。塗塊上。覺痒極。勿搔動。隔衣輕輕探之。七日一塗。旋塗漸消。若在再歲月。以致潰腐。漸大。難巖色赤出水。深洞臭穢。用歸脾湯列等藥方。可延歲月。若誤用攻伐。危殆迫矣。曾見一婦。乳房結核。如杯數年。諸治不效。因血崩後。日服人參兩許。月餘參盡二斤。乳結霍然。此症

婦科備考

卷一 產後 乳巖懸 一百六

有月經者尚輕。如五六十歲無經者。不可輕易看也。

乳懸 附方

產後瘀血上攻。忽爾兩乳伸長。細小如腸。直過小腹。痛不可忍者。名曰乳懸。乃危證也。速用當歸川芎各一斤。水煎濃湯。不時溫服。再用二斤。逐漸燒烟。安在病人面前。棹子下。令病人屈身低頭。將口鼻及病乳常吸烟氣。如

未甚縮。再用一料。則瘀血消而乳頭自復矣。若仍不復舊。用草蓆子搗爛貼頂上。片時。收即洗去。

婦科備考

卷一 產後 乳懸 一百七

王宇泰先生秘傳

婦人胤產良方

書林喬山堂藏板

胤產全書序

讀本記

世之什襲而藏者金玉玩好
 已耳稍有關於世則烏得什
 襲而藏之關於世者兵農錢
 穀重莫與醫埒也老人弱子
 又莫若妊婦重也蓋人之身
 一而妊婦之身二方兒為胚
 胎性精血而身母腹母寒熱
 為兒寒熱母虛實為兒虛實
 醫於此可少忽乎顧幃幙中

弗知檢也予痛恨甚焉居無
何侄遠文婦一如室人之誤
而弗知救一月之間里婦相
次殞者三四噫是予過也衣
珠而弗之省也過金壇懷之

胤產序

二

編相與咨嗟永夜爲出所藏
付之訂梓噫古今怵惕惻隱
之心能於嬰兒者其於兒之
始基更何如乎証類若干條
方採若干首妊家胎產前後

下缺

胤產全書序

予昔在括蒼其府庫多奇書
守茲土者雲間新宇俞公館
穀不佞得盡閱焉於岐黃別
笥有產便數種子請携歸間

胤產序

一

以試之室人無弗効也試之
親故無弗効也叩之業是又
弗有知也欲梓之以廣其傳
計僭上春官弗逮而室人重
身竟殞於產中過聽庸醫家

乍佩宜男而輒先露草者且
比比然豈妊家固有專門治
驗未多靈劑耶予每慨於斯
一日張孝廉心如過予燒燭
檢書閱數十笥獨胤產無成

胤產序

以質宇泰王公并得王公手
錄遠文梓之名曰胤產全書
談者乃俊曰是書也成可以
贊天地之化育予何敢遠文
亦何敢第吾兩人均傷弓之

烏覩傷弓者不覺故瘡痛如
宋人得不龜手之藥因欲盡
愈夫水戰者耳不敢望封爵
其敢擬天工先哲謂一介之
士苟存心於利物必有所濟

胤產序

吾兩人任斯語已矣若夫雲
間俞公之授是書金壇王公
之叅是書功德不可思議者
也今而後家置一冊乃可

海陽張受孔題



胤產全書凡例

- 一 是編字泰先生考古証今耳聞目覩彙集手錄非
鑿測所能及者
- 一 是編端以胤嗣調經并胎前產後致有雜症在所
不錄
- 一 首列提綱內分四卷便於尋閱
- 一 男婦嗣艱非所乘素弱即斷喪太早故首以男子
聚精次以婦人調經為胤嗣之本
- 一 男女交媾受胎各有其時有過時有不及時雖終
身由之而不知其時者眾也今備婦人翁受之時
於左以開發育之端
- 一 每一症具一論於先令知受病之源按方圖治萬
不失一
- 一 湯藥丸散與外治之法悉經効驗無得增減與其
授命庸常孰若循此醫案
- 一 胎前產後症雖同而用藥殊異故前後一病二類
及方中兼治之劑閱者辨焉幸毋輕忽
- 一 方內藥味逐一對症較其溫涼時令所宜更無酌

烈峻利取効一時遺患後日者

一 婦人懷孕飲食起居一應動作具載錄中以便遷
避

一 編內分九十餘類具三百症其中變症入宋見聞
細細詳贅

一 是編欲其家習戶曉廣嗣育生不事繁縟不綴餘
文令易知也

胤產全書卷一

金壇 王肯堂字泰父纂著

海陽 張受孔心如父參定

海陽 姚學顏伯愚父校閱

求子類

胡氏曰男女交媾其所以凝結而成胎者雖不離乎精血猶為後天滓質之物而一點先天真一之靈氣萌於情欲之感者妙合於其間朱子所謂稟於有形之初而不能不粹養於真斲之後故醫之

上工語男則以精言語女則以血言著方立論男以聚精為要女以調經為先而又參之補氣行氣之說察其脈絡究其虧盈而治之然後一舉可孕天下之男無不父女無不母矣

男子聚精

袁了凡先生云聚精之道一曰寡慾二曰節勞三曰息怒四曰戒酒五曰慎味今之談養生者多言採陰補陽久戰不泄此為大謬腎為精之府凡男女交接必擾其腎腎動則精血隨之而流外雖不

泄精已離宮未能堅忍者亦必有真精數點隨陽之痿而溢出此其驗也如火之有煙豈有復反於薪者哉是故貴寡慾精成於血不獨房室之交損吾之精凡日用損血之事皆當深戒如目勞於視則血以視耗耳勞於聽則血以聽耗心勞於思則血以思耗吾隨事而節之則血得其養而與日俱積矣是以貴節勞主閉藏者腎也司疎泄者肝也二藏皆有相火而其系上屬於心心君火也怒則傷肝而相火動動則疎泄者用事而閉藏不得其

職雖不交合亦暗流而潛耗矣是故當息怒人身之血各歸其舍則常凝酒能動血人飲酒則面赤手足俱紅是擾其血而奔馳之血氣既衰之人數月無房事精始厚而可用然使一夜大醉精隨薄矣是故宜戒酒內經云精不足者補之以味然釀郁之味不能生精惟恬澹之味乃能補精耳蓋萬物皆有真味調和勝而真味衰矣不論腥素淡者之得法自有一段冲和恬澹之氣益人腸胃洪範論味而曰稼穡作甘世得之味惟五穀得味之正

但能淡食穀味最能養精故曰慎味久而精聚神全陽氣自勝一往而孕育且壽

葆真丸

專治九醜之疾言莖弱而不振振而不豐豐而不循循而不實實而不堅堅而不久久而無精精而無子謂之九醜之疾此藥補十二經絡起陰發陽能令陽氣入胸安魂定魄開三焦積聚消五穀進食強陰益子精安五臟除心中伏熱強筋骨輕身明目去冷除風無所不治此藥平補多服常服最

九子金丹

三

妙七十歲老人尚能育生非常之力治五勞七傷無子嗣者

鹿角膠

半斤剉作豆大就用鹿角霜拌炒成珠研細

杜仲

去粗皮切碎用生薑汁一兩同蜜少許拌炒斷絲三兩

乾山藥

去粗皮人乳拌炒晒乾九五七次

熟地黃

各二兩兔絲子酒蒸搗碎

北五味子

牛膝酒蒸

遠志

泔水煮去骨

川練子

去皮核取淨肉酥炙

小茴香

青鹽三錢同炒破故紙

川巴戟

酒浸去心已上各一兩

山茱萸

肉各兩半

益智仁

去殼

胡蘆巴

同故紙入羊腸內煮乾一兩

川山甲

酥炙各三錢

右件各製度為極細末以好嫩肉苳蓉四兩酒洗淨去鱗甲皮垢開心如有黃白膜亦去之取淨二兩好酒煮成膏同煉蜜和前藥末搗千餘下丸如梧桐子大每服五十九丸淡秋石湯溫酒任下以乾物壓之漸加至百丸服七日四肢光澤唇臉赤色手足溫面和面滋潤又能消食理脾輕身和氣語言清亮是其効也

千金種子丹 此方服之令人多子并治虛損夢遺

白濁脫卸

沙苑蒺藜 取淨末四兩如蚕種同州者佳再以前一大碗蒸

蓮鬚 四兩極細末金色者

山茱萸 用鮮紅有肉者去核製極細末淨三兩

覆盆子 去核取細末二兩

雞頭實 去殼取細末四兩

龍骨 五錢入砂鍋內煨通紅去火毒方用

右用伏蜜一斤煉淨滴水成珠止用四兩將前五味重羅過先以蒺藜膏和作一塊再入煉蜜石白內搗千餘下丸如豌豆大每服三十九空心溫湯

送下忌慾事二十日此藥延年益壽多子不盡述

聚精丸 填實精髓助陰扶陽簡而神妙

黃魚鯨膠

白淨者一斤另碎用粉炒成珠以無毒為度

沙苑蒺藜

入兩馬乳浸二宿隔湯蒸一炷香取起焙乾

右為末煉蜜丸如梧子大每服八十九空心温酒

白湯任下忌食魚及牛肉

五子衍宗丸 男服此藥添精補髓該利腎氣不問

下焦虛實寒熱服之自能平和古今種子秘方

井州枸杞子

兔絲子

酒蒸搗成餅各八兩

胤產全書

卷一

五

遼五味子

覆盆子

四兩酒洗去目

車前子

炒二兩

共為細末煉蜜丸如梧桐子大每服空心九十九上牀時五十九白沸湯或塩湯送下冬月用温酒

送下修合日春取丙丁巳午夏取戊己辰戌丑未

秋取壬癸亥子冬取甲乙寅卯忌師尼鰥寡之人

及鷄犬六畜見之

十子丸 四明沈嘉則無子七十外服之連舉子

槐用子

和何首烏蒸七次

覆盆子

枸杞子

去枯者及蒂

桑椹子

冬青子

四味共蒸各四兩

兔絲子

去殼酒蒸

栝子仁

酒浸

沒石子

照雷公製

蛇床子

蒸

北五味子

去枯打碎蜜蒸已上各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五六十丸淡塩湯下乾點心壓之

調經類

經候總論

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸

至任脉通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣

癸謂壬癸之水壬為陽水配丁而化水癸為陰水

胤產全書

卷一

木

合戊而化火故曰水火者陰陽之徵兆也女子陰

類故得癸焉衝為血海任主胞胎二脉流通經血

漸盈應時而下天真氣降與之從事故曰天癸也

常以三旬一見以象月盈則虧不失其期又名月

信也若遇經行最宜謹慎否則與產後証相類若

被驚恐勞役則血氣錯亂經脉不行多致癆瘵等

疾若逆於頭面肢體之間則重痛不寧若怒氣傷

肝則頭暈脇痛嘔血而源癰癢若經血內滲則

竅穴淋瀝無已凡此六淫外侵而變証百出犯時

微若秋毫成患重如山岳奚望其嗣哉且夫血者水穀之精氣也和調五臟灑陳六腑在男子則化為精在婦人上為乳汁下為血海故雖心主血肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之禁禁用苦寒辛散之藥飲食亦然凡婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中而傷衝任之脉心脾平和則經候如常七情內傷六淫外侵飲食失節起居失宜脾胃虛損心火妄動則月經不調矣蓋血生於脾土而實統攝之故凡血病當用苦甘之

亂產全書

卷一

七

劑以助陽氣而生陰血又經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來復作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷而行溫熱之劑則禍不旋踵矣若夫外邪冷症初感入經必痛或不

痛者久則鬱而變熱矣且寒則凝既行而紫黑者故非寒也故用藥當審其虛實寒熱而調血即兼調氣治無不愈如虛中有熱月事不來四物湯加芩常過期者血少也以芩歸參朮與痰藥過期紫黑有塊作痛血熱也以四物湯加香附黃連過期色淡挾痰者二陳湯加芩歸紫黑色成塊者熱極也四物湯加黃連常不及期者血熱血滯也四物湯加芩連香附臨經將末作痛者四物湯加桃仁香附黃連血枯四物湯加紅花桃仁痰多古住血

亂產全書

卷一

八

海地位因而下多者目必漸昏肥人有之以南星蒼朮川芎香附作丸服之肥人經脂滿經閉者導痰湯加芩歸連不可服地黃蓋泥腸故也如用之以姜汁炒肥人子少亦由痰多脂膜閉塞子宮不能受入陽精而施化也宜服前藥瘦人子宮無血精氣不聚可用四物湯養血養陰等藥

調經散 月候不調或前或後服此調經成孕

川當歸 一兩 麥門冬 二兩 吳茱萸 一兩

日沸湯 七次 人參 兩 半夏 一兩 泡七次

白芍藥

一兩

川芎

一兩

牡丹皮

去心一兩

肉桂

一兩不見火

阿膠

炒成珠

甘草

各一兩

右咬咀每服三錢水一盞半生姜五片煎至八分

食前稍熱服之

審多少 婦人病多是月經乍多乍少或前或後將

發疼痛醫家不審一例呼為經病不知陽勝陰陰

勝陽所以服藥無效蓋陰氣勝陽則包藏寒氣血

不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而

在月後若陽乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱

胤產全書

卷一

九

經水沸溢故令乍多而在月前和血氣平陰陽

當歸飲 陽勝陰月候多者此抑陽助陰調理經脉

當歸

微炒

地黃

酒蒸焙

川芎

白朮

白芍藥

黃芩

各等分

每服三錢水一盞半煎八分空心溫服

七沸湯 陰勝陽月候少者治榮衛虛經水愆期或

多或少腹痛

當歸

川芎

白芍藥

蓬朮

熟地黃

川薑

木香

各等分

每服四錢水一盞半煎至八分溫服

紫石英丸 理其陰陽調其血氣使不相乘以平為

期妙甚

紫石英

細研水飛

川烏

杜仲

炒去絲

禹餘糧

遠志

去心

澤瀉

桑寄生

桂心

龍骨

別研

當歸

人參

肉苁蓉

乾薑

炮

五味子

甘草

炙各一兩

牡蠣

川椒

去目炒去汗各半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食前

胤產全書

卷一

十

米飲湯下

四物芩朮湯 經水過多為虛熱為氣虛不能攝血

當歸

川芎

芍藥

地黃

黃芩

白朮

各等分

右水煎服

又經水過多為熱 乃陰挾熱所致當補陰清熱

黃芩

炒

芍藥

龜板

炙各一兩

椿樹根皮

七錢半

黃柏

炒三錢

香附

右為末酒糊為丸空心白湯下五六十九

四物葵花湯 治經水澀少

當歸 地黃 川芎 芍藥 葵花各一兩

一方加紅花血見愁煎服

又方 治經水少而血和

當歸 川芎 生地 熟地 芍藥各一兩

先期後期 王子亨曰經者常候也謂候其一身之

陰陽愆伏知其安危故每月一至太過不及皆為

不調陽太過則先期而至陰不及則後時而來有

乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽盛衰所

亂產全書 卷一 十一

致

先期湯 治經水先期而來宜涼血固經

生地 川歸 白芍藥各二錢 黃栢

知母各一錢 條芩 黃連姜汁炒 川芎 阿膠

艾葉 香附 甘草炙各七分

水二鍾煎一鍾食前溫服 一方加人參五分

過期飲 治經水過期不行乃血虛氣滯法當補血

行氣

熟地黃 白芍藥 當歸 香附各二錢

川芎錢一 紅花分七 桃仁泥分六 蓬莪茂

木通各五分 甘草 肉桂各四分

水二鍾煎一鍾食前溫服

又方 補血行氣

當歸半錢 川芎五分 熟地錢一 白芍錢一

桃仁二十箇 紅花分五 香附錢一 蓬朮錢一

甘草五分 蘇木錢一 木通分二 官桂分五

白水煎空心服

四物芩連丸 治經水如黑豆汁

亂產全書 卷一 十一

當歸 地黃 川芎 芍藥 黃連

黃芩各一兩

右為末醋糊丸服

溫經湯和劑 治婦人血海虛冷月水不調

川芎 當歸 芍藥 蓬朮各一錢五分 人參

牛膝各一錢 桂心 牡丹皮各一錢五分 甘草五分

水二鍾煎至一鍾不拘時服

滋血湯 治婦人血海久冷滋養榮血

當歸半錢 川芎 麥門冬去心 牡丹皮

人參 芍藥 琥珀另研各錢 半夏麩 官桂

阿膠炒 酸棗仁 甘草各五分

水二鍾生姜三片煎一鍾食前服

薑黃散 治血藏久冷月水不調臍腹刺痛

薑黃 白芍藥各二錢 玄胡索 牡丹皮

當歸各一錢半 蓬朮 紅花 桂心 川芎各一錢

右作一帖水一鍾酒半鍾煎一鍾不拘時服

秦艽丸 治婦人極寒者

秦艽 桂心不見火 杜仲姜汁炒斷絲 厚朴各三錢

胤產全書 卷一

乾姜炮 沙參 牛膝酒浸 半夏湯泡各五錢

生附子去皮 白茯苓一兩五錢

細辛一兩五錢

右為末煉蜜為丸菉豆大空心醋湯米飲任下五

十九覺有孕即止無夫之婦不可服以其太熱也

卷栢丸 此藥養血潤燥治婦人衝任本虛血海不

足不能流通經絡月水不調赤白帶下三十六種

疾並皆治之常服和經絡煖五臟潤肌膚長髮去

黥除風令人有子

卷栢根 當歸酒洗 艾葉炒各二兩 熟地黄酒洗

川芎 白芷 栢子仁炒 肉苁蓉

牡丹皮各一兩

右為細末煉蜜和九梧桐子大每服五十九用溫

酒或米飲送下空心食前服

南嶽夫人濟陰丹 治婦人血氣久冷無子及數墮

胎皆因衝任之脈虛損胞內宿挾疾病經水不時

暴下不止月內再行或前或後崩中漏下三十六

疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白帶已上諸疾皆令

胤產全書 卷一

孕育不成此藥兼治產後百病百時常服除宿血

生新血令人有子亦生子克實併治男子凶血諸

疾 木香炮 京墨煨 茯苓 桃仁去皮尖麩

蚕布炮 藥本 秦艽 石斛酒浸 桔梗炒

人參 甘草各二兩 牡丹皮 乾姜炮 細辛

桂心 當歸 川芎各五錢 蒼朮米泔浸

大豆卷炒半升 川椒去目并合 山藥各三兩

澤蘭葉 熟地黄酒浸 香附子炒各四兩

糯米炒一升

右為細末煉蜜丸每兩作六丸如彈子大每服一

丸細嚼溫酒送下淡醋湯化服亦可空心食前服

一方山藥川椒各三兩或以醋糊為丸如梧桐子大每服五十九粒前服亦可

暖宮丸 治衝任虛損下焦久冷月事不調不成孕

育崩漏下血赤白帶下並皆治之

生硫黃兩六 赤石脂煨火 海驪蛸

大附子炮去皮臍各三兩 禹餘糧九兩火煨醋淬

胤產全書卷一 五

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九粒空

心用溫酒或醋湯送下

啓宮散 婦人肥盛者多不能孕育以身中有脂膜

閉塞子宮以致經事不行瘦弱婦人不能孕育以

子宮無血精氣不聚故也肥人無子宜先調理

當歸一兩酒洗 茯苓二兩 川芎七錢 白芍藥

白朮半兩酒洗 香附米 陳皮 甘草各一兩

作十帖每帖姜三片水煎吞後丸藥

啓宮丸

白朮二兩 半夏麩 川芎 香附米各一兩

神麩炒 茯苓各半兩 檜紅四兩

甘草二錢以上 共為末

粥為丸每服八十九丸如熱多加黃連枳實各一兩

服前藥訖却服後蝨斯丸

蝨斯丸

附子製 茯苓各六錢 厚朴 杜仲 桂心

秦朮 白薇 半夏 乾姜 牛膝

沙參各二錢 人參四錢 細辛五錢

胤產全書卷一 二六

右為末煉蜜和丸如小豆大每服五丸空心酒下

加至十九不妨覺有娠三月後不可更服忌食牛

肉馬肉則過月難產累服神應

正元丹 調經種子

香附一斤同艾三兩先以醋同浸一宿然後分開製之酒蒸童便各製四兩

阿膠二兩蛤粉炒 枳殼四兩半生 淮生地酒洗

熟地酒洗 當歸身洗 川芎炒各四兩 白芍藥八兩

半生半酒炒 加白茯苓琥珀治帶

右為末醋糊丸如梧桐子大空心鹽湯吞五六

九

寶嗣丸 龐丞相夫人三十九歲無子服此藥十四日有孕後生九子男婦皆可服

吳茱萸 白芨 白欬 白茯苓 陳皮各一兩

細辛五錢 桂心 五味子各四錢 白附子炒

川牛膝 厚朴製各三錢 人參 當歸

乳香各一錢 沒藥八分

右十五味經盡後一日連進二服交會必有孕見

効不可再服恐生雙胎

胤產全書 卷一

七

大盪胞湯 治婦人全不產育及斷絕久不產三三年者乃汗血積冷宜服

朴硝 牡丹皮 當歸 大黃蒸一飯久 桃仁去皮

尖各三兩 細辛 厚朴製 桔梗 赤芍藥

人參 茯苓 桂心 甘草 牛膝去蘆 陳皮

各二兩 附子炮一兩半 蠶虫去翅足炒焦

水蛭炒枯各十枚

右件以清酒五升水六合煮取三升分四服日三

夜一每相去三時更服如常覆被少時取汗汗不

出冬月着火籠必下積血及血冷赤膿如赤小豆

汁本為婦人子宮內有此惡物或天陰臍下痛或

月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣久弱

大困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可

食酢飲冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得

藥力若能忍服盡大好一日後仍著坐煎藥

坐導藥 治全不產及斷續服前盪胞湯惡物不盡

用此藥

皂角去皮 吳茱萸 當歸各二兩 細辛去苗

胤產全書 卷一

十八

五味子 乾姜各一兩 黃葵花 白礬枯

戎塩 蜀椒各半兩

右為細末以絹袋大如指長三寸餘刺藥令滿縛

定納婦人陰中坐臥任意勿行走小便時去之更

安一日一度易新者必下清黃冷汁若未見病出

無間止可十日安下本為子宮有冷惡物故令無

子值天陰冷則發疼痛須候病出盡方已不可中

止每日早晚用黃菜煎湯薰之

一凌香花婦人聞其氣不孕

香附散 婦人氣盛於血所以無子香附乃婦人之
仙藥不可謂其耗氣而不服

香附 炒四兩 茯神 一兩 陳皮 二兩 甘草 一兩

右為末每服二錢沸湯調服

胤產全書一卷終

胤產全書 卷一

十九

胤產全書卷二

金壇王肯堂素父纂著

海陽張受孔心如父叅定

海陽姚學顏伯愚父校開

發育論

予嘗謂男女受天地之全陽施陰化妙合自然猶
春氣鼓盪萬類一伸葭管之灰即枯荻磽土勾萌
畢達所以然者得陰陽之和而成充氣之體也造
物獨不全於人乎蓋由男精病於斲喪女血苦於

胤產全書 卷二

阻遏日損日虧奚嗣之望故發育之理不斲於人
人自斲於發育耳是以男莫先於聚精精聚則神
全神全則本立女莫先於調氣氣調則血附血附
則經平二者既得其理發必中的而生育矣故云
女不孕咎於經不調交不孕咎於精不射然未達
鼓琴之說欲成音響者必先操縵以和其弦一有
不調曲不成聲蓋亦以其不可偏勝也嗣育一端
何以異此今人不歸咎於精血之不充而謂數奇
之不偶皆不知本者也

候時

袁了凡先生云天地生物必有細縕之氣萬物化
 生必有樂育之時細縕樂育之氣在人與物觸之
 而不能自止耳此天然之節候生化之真機也世
 人種子有云三十時辰兩日半二十八九君須筭
 此特言其大槩耳丹經云一月止有一日一日止
 有一時凡婦人一月經行一度必有一日細縕之
 候於一時辰間氣蒸而熱昏而悶有欲交接不可
 忍之狀此的候也於此時逆而取之則成丹順而
 施之則成胎矣其日三日月出庚又日温温鉛鼎
 光透簾幃皆言其景象也當其慾情濃動之時子
 宮內有蓮花蕊者不拘經淨幾日自然挺出陰中
 如蓮蕊初開內人洗下體以手探之自知也但含
 羞不肯言耳男子預蜜告之令其自言一舉即中
 蓋女人月經方絕金水纒生此時子宮正開乃愛
 精結胎之候妙合而凝之時過此佳期子宮閉而
 不受胎矣

交會旺相日

春甲乙 夏丙丁 秋庚辛 冬壬癸 春秋冬

常忌丙丁 又摘玄云二月乙酉日午北首臥合

陰陽生子必貴

交會禁忌

晦朔弦望 虹霓地震 日月薄蝕 雷電霹靂

天地晦冥 大風大雨大霧大寒暑 日月星辰

之下 神廟寺觀之中 井竈園側之側

塚墓尸柩之傍 此時此地受胎非止百倍損於

父母而所生之子亦必有育聾啞頑愚殘疾天

胤產全書 卷二

折不仁不義不孝不弟之類矣可不慎歟可不慎

歟

男女論

男女之分亦皆有說月候方住一日三日五日交

會者成男雙日者成女又云陰氣先至者成男陽

氣先至者成女蓋陰陽配合二氣交感若陰血先

至陽精後衝縱氣來乘血開暴精陰外陽內則成

坎卦而成男若陽精先入陰血後參兩傍橫氣來

助精開暴血陰內陽外則象離卦而為女故脉訣

云夫乘妻分縱氣露妻乘夫分橫氣助子乘母分
 逆氣參母乘子分順氣護易曰乾道成男坤道成
 女乾坤陰陽之性情也左右陰陽之道路也男女
 陰陽之儀象也父精母血因感而會精之泄陽之
 施也血能攝之陰之化也精成其骨此萬物之資
 始於乾元也血成其胞萬物之資生於坤元也陰
 陽交媾胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系其下
 上有兩岐一達於左一達於右精勝其血及剛日
 陽時感者則陽為之主受氣於左子宮而男形成
 精不勝血及柔日陰時感者則陰為之主受氣於
 右子宮而女形成是知男女之分已定於萬物資
 始乾元之際陰陽交媾之時昧者不悟爰有轉女
 為男之法是不明感交之理矣

變胎類

素問云婦人足少陰脈動甚者姙子也又陰搏陽
 別謂之有子妊娠初時寸微小呼吸五至三月而
 尺數也脈滑疾重以手按之散者胎已三月也脈
 重手按之不散但疾不滑者五月也

候胎

凡婦人妊娠四月欲知男女遣妊人南行呼之左
 迴首者是男右迴首者是女蓋男胎在左則左重
 故回首時慎護重處而就左也女胎在右則右重
 故回首時慎護重處而在右也推之於脈其義亦
 然胎在左則血氣護胎而盛於左故脈亦從之而
 左疾為男左大為男也胎在右則血氣護胎而盛
 於右故脈亦從之而右疾為女右大為女也此男
 女不易之理

神方驗胎散

婦人三兩月月經不行疑是有孕又疑血滯心煩
 寒熱恍惚此藥可驗取之內也外有身病無邪脈
 以素問脈法推之十得八九矣

真雀腦芎

當歸全用重一兩
者只用七錢

右為細末分作兩服濃煎好艾湯一盞調下或好
 酒服可待三兩個時辰間覺腹臍微動而頻即有
 胎也動罷即愈安穩無虞如不是胎即不動所滯
 惡物自行母亦安也如服藥不効再煎紅花湯調

下必有神効

又方 三月後經血不行欲驗是胎

用真別考

細末濃煎艾湯空心調服覺腹中微動則有胎若

在臍下動者乃血癥也不動者血病更看尺脉不

止則是胎

探胎散 婦人胎氣有無疑惑之間以此探之有胎

則吐無胎不吐

皂角去皮 甘草各一錢 黃連半錢

胤產全書

本

右為細末作一服温酒調服

養胎類

婦人妊娠一月名始胚足厥陰脉養之二月名始

膏足少陽脉養之三月名始胎手心脉養之四月

始受水精以成血脉手少陽脉養之五月始受火

精以成其氣足太陰脉養之六月始受金精以成

其筋足陽明脉養之七月始受木精以成其骨手

太陰脉養之八月始受土精以成膚革手陽明脉

養之九月始受石精以成毛髮足少陰脉養之十

月臟腑開節人神俱備此其大略若細推之受胎

在腹七日一變展轉相成各有生相今婦人墮胎

在三月五月七月者多在二四六月者少臟陰而

腑陽三月屬心五月屬脾七月屬肺皆在五臟之

脉陰常易虧故多墮耳如昔曾三月墮胎則心脉

受傷須先調不然至三月復墮昔曾五月墮胎則

脾脉受傷至五月復墮宜先治脾惟有一月之內

墮胎則人皆不知但知不受妊不知其受而墮也

一月屬肝怒則墮多洗下體則駁開亦墮一次既

胤產全書

本

墮則肝脉受傷他次又墮今之無子者大半是一

月墮胎非盡不受妊也故凡初交之後最宜將息

勿復交接以擾其子宮勿怒勿勞勿舉重勿使洗

浴而多服養肝平氣之藥胎可固矣

逐月養胎法

此齊徐之才云妊娠一月名曰始胚飲食精熱酸

美受御宜食大麥無食腥辛是謂纒正

禁忌針灸

妊娠一月足厥陰脉養不可鍼灸其經對大敦行

卦五里中尋 足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行不澁不為力事寢必安靜無令恐畏

妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉

重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之

烏雌鷄湯

烏雌鷄 一隻治 茯苓 阿膠 各二兩 如食法

吳茱萸 升 麥門冬 五合 人參 芍藥

白朮 各三兩 甘草 生姜 各一兩

右咬咀以水乙斗二升煮雞取汁六升去鷄下藥

胤產全書 卷六

煎取三升內酒三升并膠烱化三升故溫每服一

升日三服

補胎湯 若曾傷一月胎者當預服此

細辛 一兩 防風 二兩 乾地黄 白朮 各三兩

生姜 四兩 吳茱萸 大棗 各五兩 烏梅 一升

右八味咬咀以水七升煮取二升半分三服先食

服寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加瓜蒌根

二兩若有所下去大麥加栝子仁三合 一方亦

二月養胎法

妊娠二月名始膏無食辛燥居必靜處男子勿勞百節皆痛是為胎始結

妊娠二月禁針灸

妊娠二月足少陽脈養不可針灸其經如胆竅血

骨外立陽勝 足少陽內屬於胆胆主精二月之時

兒精成於胞裡當慎護驚動也

妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎

痺中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒

有所下乍寒乍熱宜服

胤產全書 卷七

艾葉湯

艾葉 丹參 當歸 麻黃 各二兩 人參

阿膠 各三兩 甘草 一兩 生姜 六兩 大棗 十二枚

右九味咬咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠

煎取三升分三服一方用烏雌鷄一隻宿肥者治

如食法割頭取血內三升酒中相和次以水一斗

二升先煮取汁去鷄內藥煎取三升內血酒并膠

煎取三升分溫三服

黃連湯 若曾傷二月胎者當預服此

黃連

人參各一兩

吳茱萸五合

生姜三兩

生地

五兩一方

右五味咬咀以酢漿七升煮取三升分四服日三

夜一十日一修合若頗覺不安加烏梅乙升加烏

梅者不用漿直用水一一方用當歸半兩

三月養胎法

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化

欲生男者操方矢欲生女者弄珠璣欲于美好數

視璧玉欲賢良端坐清虛是為外象而內感者也

胤產全書

卷二

十

妊娠三月禁針灸

妊娠三月手心主脈養不可針灸其經

如中衝勞宮大陵內

關關使却門曲澤等穴是也

手心主內屬於心母悲哀思慮驚

動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤

即黃卒驚恐憂愁噴怒喜頓仆動於經脈腹滿繞

臍苦痛或腰背卒有所下宜服

雄雞湯

雄雞

一隻治如食法

黃芩

白朮

生姜

各一兩

麥門冬

五合

芍藥

大棗

十二枚

甘草

人參

茯苓

阿膠

各二兩

右咬咀以水一斗三升煮雞臍半出雞內藥煮取

半內清酒三升并膠煮取三升分三服一日令盡

當溫臥一方用當歸川芎各二兩不用黃芩生姜

茯苓湯

會傷三月胎者當預服此

扶神

丹參

龍骨

各一兩

阿膠

當歸

甘草

人參

各二兩

大棗

十一枚

赤小豆

二十粒

胤產全書

卷二

十一

右九味咬咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食

服七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩

深師有註白二

兩麻子一升

四月養胎法

妊娠四月始受水精以成血脈食宜稻粳羹宜魚

鴈是謂盛血氣以通耳目而行經絡

妊娠四月禁針灸

妊娠四月手少陽脈養不可針灸其經

如關衝陽池內關三

陽天井曲垣等穴是也

手少陽內輪三焦四月之時兒五臟

順成當靜形體和心志節飲食

妊娠四月有寒心下愠愠欲嘔胸膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀溺下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胸心煩不得安卒有所下宜服

菊花湯

菊花鷄子大一枚 麥門冬升一 大棗十二枚

人參半兩 甘草當歸各二兩 麻黃

阿膠各三兩 半夏四兩 生姜五兩

胤產全書 卷十一

十一

右十味咬咀水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫臥當汗以粉粉之護風寒四五日一方用烏雌雞一隻煮汁煎藥

調中湯 若會傷四月胎者當預服此

白芍藥 生姜各四兩 厚朴 生柰根白皮

枳實 白朮 柴胡各三兩 續斷 川芎

甘草各一兩 當歸一兩 烏梅升一

右十二味咬咀水一斗煮取三升分四服日三夜一八日後復服一劑

五月養胎法

妊娠五月始受火精以成氣臥必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稍麥其羹牛羊和以菜羹調以五味是謂養氣以定

五臟

妊娠五月禁針灸

妊娠五月足太陰脈養不可針灸其經如隱白大丘三陰交漏谷陰陵泉等穴是也 足太陰內輸于脾五月之時兒

四肢皆成無太飢無甚飽無食乾燥無自炙熱無

胤產全書 卷十一

十一

大勞倦

妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下宜服

阿膠湯

阿膠四兩 人參一兩 生姜六兩 當歸 芍藥

甘草 黃芩各二兩 旋覆花二合 吳茱萸七合

麥門冬升一

右十味咬咀水九升煮藥減半內清酒三升并膠

微火煎取三升半分四服日三夜一先食服便愈
不差再服一方用烏雌雞一隻割取咽血內酒中
以水煮雞汁煎藥減半內酒并膠煎取三升半分
四服

安中湯 曾傷五月胎者當預服此

黃芩兩一 當歸 川芎 乾地黄 人參各二兩

甘草 芍藥各二兩 生姜六兩 麥門冬升

五味子 大麻仁各五合 大棗三十枚

右十二味咬咀水七升清酒五升煮取三升半分

胤產全書 卷二 十四

四服日三夜一七日後復一劑

安胎當歸湯 若妊娠五月舉動驚悸胎不安小腹

痛引腰脇小便下血

當歸 阿膠炒 川芎 人參各一兩

大棗十二枚 艾葉一把

右酒水各三升煮至三升內膠令烊分三服一方

有甘草無參棗

六月養胎法

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜

處出遊於野數視走犬及視走馬食宜鷲鳥猛獸
之內是謂變賤理紐筋以養其力以堅背脊

妊娠六月禁針灸

妊娠六月足陽明脈養不可針灸其經如崩兌豐

等穴是也 足陽明內屬於胃王其口目六月之時

兒口目皆成調五味食甘美無大飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身

體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服

麥門冬湯

胤產全書 卷二 十五

麥門冬升一 人參 甘草 黃芩各二兩

乾地黄三兩 阿膠四兩 生姜六兩 大棗十五枚

右八味以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取

三升分三服中間進糜粥一方用烏雌雞一隻取

汁煎藥

柴胡湯 若曾傷六月胎者當預服此

柴胡四兩 茯苓一兩 白朮 芍藥一作柴 甘草

麥門冬 芎藭各二兩 生姜六兩 乾地黄五兩

大棗三十枚

右咬咀水一斗煮取三升分四服日三夜一中間
進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑一
方有黃芩二兩

旋復花湯 療妊娠六七月胎不安常熨亦治阻病

旋復花兩一 厚朴製 白木 枳殼 黃芩炒

茯苓各三兩 半夏炒一兩 芍藥 生姜各二兩

右水一斗煮取二升半分五服先食服日三夜二

忌羊肉錫醋桃李雀肉

七月養胎法

乳產全書 卷二

十六

妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定

止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食

稻粳以密腠理是謂養骨而堅齒

妊娠七月禁針灸

妊娠七月手太陰脈養不可針灸其經如少商魚

澤天府等 手太陰內屬於肺主皮毛七月之時深列

皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷

脈若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強熱

白湯主之

葱白湯

葱白長三四寸 半夏 麥門冬各一兩

旋復花合二 黃芩兩一 人參一兩 甘草

當歸 黃芪各三兩 阿膠四兩 生姜八兩

右十二味咬咀水二升煮減半內清酒三升及膠

煎取四升每服一升日三夜一溫臥當汗出若不

出者加麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強責汗

一方以黃雌雞一隻割咽取血內酒中煮雞取汁

乳產全書 卷二

十七

以前藥

杏仁湯 若曾傷七月胎者當預服之

杏仁 甘草各二兩 紫苑一兩 鍾乳

乾姜各二兩 麥門冬 吳茱萸一升 糯米合五

五味子合三

右九味咬咀以水八升煮取三升半分四服日三

夜一中間進食七日服一劑一方用白鷄一隻煮

汁煎藥

八月養胎法

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色

妊娠八月禁針灸

妊娠八月手陽明脈養不可針灸其經如商陽二

下廉三里曲池肩井肩髃等穴是也手陽明內屬於大腸主九竅八

月之時見九竅皆成無食燥物無輒失食無忍大起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱

胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便自如

胤產全書卷三

十八

米泔或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目眩疏

芍藥湯主之

芍藥湯

芍藥 生姜各四兩 厚朴二兩 甘草 當歸

白朮 人參各三兩 薤白切一升

右八味咬咀水五升清酒四升合煮取三升分三

服日再夜一一方用烏雌鷄煮汁煎藥

葵子湯 若會傷八月胎者當預服此

葵子二升 甘草 厚朴各二兩 白朮

柴胡各三兩 芍藥四兩 生姜六兩 大棗二十枚

右八味咬咀水九升煮取三升分三服日三九

日一劑一方用烏雌鷄煮汁煎藥

丹溪縮胎丸 八九箇月用之

黃芩夏一兩秋七錢冬五錢炒 白朮二兩 陳皮三兩去白

茯苓七錢半

右為末粥丸桐子大

九月養胎法

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢

胤產全書卷三

十九

備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才

力

妊娠九月禁針灸

妊娠九月足少陰脈養不可針灸其經如湧泉然

信築巔伏溜等穴是也足少陰內屬於腎腎主續縷九月之

時兒脈續縷皆成無處濕冷無着灸衣

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背

痛不可輕側短氣宜服

半夏湯

半夏 麥門冬 吳茱萸 當歸 阿膠 各三兩
乾姜 一兩 大棗 十二枚

右七味咬咀以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火上溫服四服痢即止一方用烏雌鷄煮汁

煎藥

猪腎湯 若會傷九月胎者當預服此

猪腎 具一 茯苓 桑寄生 乾姜 乾地黄

川芎 各三兩 白朮 四兩 附子 一枚 大豆 三合

麥門冬 升一

續修全書 卷二

右咬咀以水一斗煮腎全熟去腎內諸藥煎取三

升半分四服日三夜一十日更一劑

丹溪縮胎丸 九箇月用之

黃芩 一兩宜熱藥不宜涼藥法入減半 枳殼 炒七錢半 白朮 一兩

滑石 七錢半臨月十日前小便多時加此一味

右為末粥丸如梧子大每服二十九空心熱湯下

妊娠十月養胎法

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田

關節人神皆備但俟時而生

妊娠十月形神俱備日滿即產矣宜服滑胎藥入月即服

滑胎散 瘦胎易生湖陽公主每產累日不下南山道士進此方

商州枳殼 二兩 粉草 一兩

右為細末百沸湯點二錢服空心日三服凡懷孕七八個月已上服之令兒易生初生胎小微黑百日以後漸漸變白此雖謂胎易產然抑陽降氣為眾方之冠

續修全書 卷二

懷孕忌服藥

蚘蟹水蛭地胆蟲烏頭附子配天雄躑躅野葛蠮

蛄類烏喙側子及蟲虫牛黃水銀并巴豆大戟蛇

蛻及蜈蚣牛膝藜蘆并薏苡金石錫粉及雌雄牙

硝芒硝牡丹桂蜥蜴飛生及虜蟲代赭蛇蟬胡粉

麝花薔薇荷草三稜槐子牽牛并皂角桃仁躑躅

和茅根檳榔砂與乾漆亭長波流茵草中藿麥

蒲茹蟹爪甲蝟皮赤箭赤頭紅馬刀石蚕衣魚等

半夏南星通草同乾姜蒜鷄及鷄子驢肉蚕肉不

須供切須婦人產前忌此歌宜記在心胸

飲食忌

一受孕之後切宜忌不可食之物非惟有感動胎氣之戒然於物理亦有厭忌者設或不能禁忌非特延月難產亦能令兒破形毋損可不戒哉

食鷄肉糯米合食令子生寸白蟲 食羊肉令子

多厄 食鯉魚鱸及鷄子令子成疝多瘡 食犬

肉令子無音聲 食兎肉令子唇缺 食鱉令子

項短及損胎 食鴨子共桑椹同食令子倒生心

胤產全書 卷二

三十一

寒 食螃蟬令子橫生 食雀肉合豆醬食之令

子面生黥黯黑子 食豆醬合藿香食之墮胎食

水漿絕產 食雀肉令子不耻多淫 食山羊肉

令子多病 食生姜令子多指生瘡 食蝦蟇鱓

魚令兒疳症 食驢騾馬肉延月難產

起居忌

妊後勿亂服藥勿過飲酒勿灸針灸勿向非常地

便勿舉重登高涉險心有大驚犯之難產子疾病

勿多睡臥時時行步體虛腎氣不足生子解顛腦

破不合宜温補脾胃不和榮衛虛怯子必羸瘦白家及鄰家修造動土犯其胎氣令子破形殞命刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣有此等驗如影響切宜避之

惡阻類

治婦人經候不行身無病而似病脉滑大而六脉俱勻乃是孕婦之慶也精神如故惡聞食臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此皆惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生姜煎

胤產全書 卷二

三十一

服

保生湯

人參 甘草各二錢半 白朮 香附子 烏藥

橘紅各半兩

右咬咀每服三大錢水一盞半姜五片煎至七分

去滓温服無時或作末子調服

姜參半夏丸 妊娠嘔吐不止

乾姜 人參各一兩 半夏湯洗去滑二兩

右三味末之以生姜汁糊為丸梧桐子大每服十

九日三服

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食酸鹹多臥少起百節煩疼羸瘦有痰胎孕不安

半夏洗一兩 二錢半 赤茯苓 熟地黄各七錢半 橘紅

旋復花 人參 芍藥 川芎 桔梗

甘草各半兩 細辛三錢

右咬咀每服五錢姜七片水煎空心服兼服茯苓丸

若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知

丸產全書

卷七

母七錢五分若腹冷下痢去地黃加炒桂心半兩

若胃中虛熱大便秘小便赤澀加大黃七錢半去

地黃加黃芩二錢五分

茯苓丸 治妊娠阻病心中煩悶吐痰眩暈先服半

夏茯苓湯二劑後服此藥

赤茯苓 人參 桂心 乾姜 半夏湯泡七次炒黃

橘皮各一兩 白朮 葛根 甘草 枳殼各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九丸

飲下日三服一方加麥門冬 肘後加五味子

集驗方 療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹 橘皮各三兩 生姜 茯苓各四兩

半夏五兩

右細切以水六升煮取二升半去滓分三服不瘥

頻服忌羊肉飴鮮等物

旋復半夏湯 治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多

臥少起

旋復花 川芎 細辛 人參 甘草各七分

當歸 半夏湯泡 赤茯苓 乾生姜

丸產全書

卷七

陳皮各錢半

水二鍾姜五片煎至一鍾不拘時服

右諸方並用半夏蓋取其辛以散結氣瀉逆氣故

嘔惡自止非專為痰設也婁全善曰大全方論半

夏動胎而不用仲景方乃用之予治妊娠阻病累

用未常動胎也經云有故無殞是也

白朮散 治惡阻吐清水甚者害十餘日水漿不入

白朮一兩 人參半兩 丁香二錢 甘草一錢

右為細末每服二錢水一盞姜五片煎七分溫服

人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食酸

心腹刺痛

人參 丁香 藿香葉 各二錢半

右為散每服三錢水一盞煎七分溫服不拘時

醒脾飲 治妊娠阻滯逆不食甚者中滿口守無

味或作寒熱服之神效

草豆蔻 以濕紙裹灰中煨令紙乾取出去皮用 厚朴 薑製各半兩

乾姜 兩 甘草 一兩二錢半

右為細末每服二大錢水一大鍾棗二枚生姜三

片煎八分去滓呷服病輕者只一兩服便能食

右諸方與前茯苓丸並用丁香乾姜惟中寒脈遲

者宜之

人參橘皮湯 治阻痛嘔吐痰水

人參 橘皮 白朮 麥門冬 各一兩 甘草 三錢

厚朴 白茯苓 各五錢

右為粗末每四錢加淡竹茹彈子大姜三片水煎

竹茹飲 妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹 麥門冬 各三兩 前胡 二兩 橘皮 一兩

蘆根一握 如體熱四肢煩熱加地骨皮一握

右切細以水一大升煮半升去渣分兩服食前服

右方用竹茹門冬蘆根皆氣涼而性和有熱無寒

者通用之平劑也

歸原散 治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服

諸藥無効者用此藥理血歸原則愈

人參 甘草 川芎 當歸 芍藥

丁香 各半兩 白茯苓 白朮 陳皮 各一兩五錢

枳殼 去穢炒各二錢五分 半夏 湯洗七次炒黃一兩

右咬咀每服三錢生姜五片棗一枚水同煎

安胎類

丹溪云妊娠因火動胎逆上作喘者可用條芩香

附之類夫黃芩乃安胎之聖藥俗人不知以為寒

而不敢用胃濫熱藥可以安胎殊不知胎前當清

血養血則血循經不妄行故能養胎產後却不可

用黃芩產後宜大補氣血為主雖有雜症以未治

之黃芩安胎乃上中下三焦降火下行之藥砂仁

安胎乃血中之氣藥能治痛行氣阿膠安胎治血

虛胎不安者用之

安胎

安胎有二法因母病以動胎但療母病而胎自安

因胎不堅固致動以病母但療胎則母病瘥若偶

然胎動不安腰痛者須進安胎藥二三服胎安止

安胎飲 治胎寒腹痛胎熱多驚舉重腰痛腹滿胞

急或頻仆閃胸忽有所下或飲食毒物或感時疾

往來寒熱致傷胎脈

當歸 枳殼 粉草 糯米

凡產全書 卷三

熟地黃 川芎

右剉每服四錢水盞半姜五片棗一枚加金銀少

許同煎七分食前服 虛弱加黃芪 下血加炒

阿膠 下血不止加熟艾 腹痛加白芷白芍藥

減食加人參白朮

固胎湯

地黃 川芎 黃芩 歸身尾 人參

白芍藥 陳皮 白朮 甘草

黃柏 葉上羊食藤 糯米

右咬咀水煎服

白朮散 妊娠養胎主之

白朮 芎藭 蜀椒 牡蠣

右四味并為散酒服一錢七日三服夜一服但苦

痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭心煩痛吐不能飲

食加細辛一兩半夏大者二十枚服後更以醋漿

水服之復不解者小麥汁飲之已後渴者大麥粥

服之病雖愈服之不置

二香散 治妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔

吐酸水起坐覺重

香附子 藿香葉 甘草

右為細末每服二錢不拘時沸湯調下

順氣飲 產前服之安胎

紫蘇葉 木香 人參 草豆寇

茯苓 甘草 大腹子

右咬咀每服三錢水一盞葶根三寸糯米少許煎

至七分去滓溫服

阿膠散 治妊娠或因頻仆胎動不安腰痛腹滿或

有所下或胎上捨心

熟地黄二兩 白芍藥 艾葉 當歸 甘草

河膠 黃芪各一兩 一方有川芎

右咬咀每服半兩姜三片棗一枚水同煎服

立効散 治婦人胎動不定如重物所墜冷如冰

川芎 當歸各等分

右為粗末秤三錢水煎食前溫服

產寶方 治妊娠無故胎重腹內絞痛煩悶

當歸 桑寄生各一兩 川芎七錢半 豉八合

胤產全書 卷二 三十一

阿膠五錢 葱十四莖

右水二升煮八合下膠烱溫分二服空心服

養生必用治胎動方 救急療胎動去血腰腹痛

阿膠 川芎 當歸 青竹茹各二錢

右以水十盞內銀一斤煮至五盞去銀入上件藥

三味煮至二盞半去滓入膠再煎膠烱分溫三服

空心自早至暮晝未効再作

葱白羹飲 胎動不安

好銀煮水加葱白作羹食佳

止痛安胎飲 胎動充心煩悶欲死安胎止痛

當歸酒洗 川芎 人參 阿膠炒成珠

甘草炙各一兩 葱白切一升

右水七升煮三升分三服

護胎法 治妊娠胎動不安護胎捷効

鯉魚斤二 粳米一握 葱一握 豉 姜

右作糜食之每月一度

黃芩湯 治婦人胎孕不安

黃芩 白朮各半兩 當歸二錢

胤產全書 卷二 三十二

右作一帖水二鍾煎至一鍾不拘時服

小品止痛湯 療妊娠重下痛引腰背安胎

當歸 阿膠 乾地黄 黃連 芍藥各兩

鷄子一枚 秫米一升

右七味以水七升攪鷄子令相得煮秫米令如蟹

目沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪荑

黃芪湯 胎動不安腹痛下黃汁

糯米一合 黃芪 川芎各一兩

右細剉水二大盞煎至一盞三分溫服

銀芎酒 治妊娠胎動欲墮胎腹痛不可忍

芎根二兩 銀五兩 清酒一盞

右以水二大盞煎至一大盞去滓分二服

地仙煎 治妊娠胎動煩悶不安甚

生地黄杵取絞汁每服一小盞煎令沸入鷄子

白一枚攪令勻頓服

斷芎湯 治妊娠胎動晝夜叫呼口噤唇塞及下重

痢不息

艾葉五兩 以好酒五升同煮取四升去滓更煎

胤產全書 卷二

取一升服口閉者開口噤之藥下即瘥

吳茱萸湯 胎常墮落而不能結實或寒或熱

吳茱萸兩 炙甘草兩 黃芪 熟地 川芎

人參 浙木各一兩

右爲末空心酒調二錢忌菘菜醋

固胎方 胎氣不固常小產

當歸 川芎 芍藥 地黄 阿膠炒 香附

白朮 黃芩 砂仁 糯米煎服

寄生湯 治胎氣不安及五箇月以後者

桑寄生洗 秦艽 阿膠各半 糯米粉

右以新汲水三升先下桑寄生秦艽二味煮至二

升去滓次下阿膠糯米再煮約一升止服三服空

心食前日午服之忌酒醋三五日妊娠胎氣至五

月已後不安者服之必効須見妊婦好飲酒食醢

酸五辛胎必動不可不知

集驗方 妊娠二三月至八九月胎動不安腹痛已

有所見

艾葉 阿膠 當歸 川芎各三兩 甘草一兩

胤產全書 卷二

右細切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分三

服日三

子懸類

紫蘇飲 治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛

之子懸兼治臨產驚恐連日不下

紫蘇葉兩 大腹皮 人參 川芎 陳皮

白芍藥各半 當歸七錢五分 甘草二錢

右細剉分作三服每服用水一盞半生姜四片煎

白七寸煎至七分去滓空心服

當歸湯 治妊娠胎動盪心悶絕煩燥口乾橫生倒
產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保
安散

當歸 阿膠炒 甘草各一兩 人參兩半

連根葱白握

一方無甘草有川芎厚朴產寶有川芎

右細切水二升煮四味至升半去滓下葱再減三

合溫服一劑分為二三服

靈保飲 治妊娠胎上逼心煩悶六七月以後胎動

亂產全書 卷二

三十四

困篤

用葱白二七莖濃煮汁飲之若胎未死即安已

死即出未効再服

保生秘錄 治胎動上逼心痛

取艾葉如鷄子大以頭醋四升煎取二升分溫

服

又秘錄 胎上通心熱痛下血

神麩半觔搗碎和熱水絞出汗三鍾溫服即止

三神湯 治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白朮五兩 黃芩二兩 芍藥四兩

右水六升煮取二升半分作三服緣胎有水致痛

兼易產

葛大仲方 療妊娠卒胎上迫心痛

取弩弦急帶之立愈

子煩類

妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六

月受少陽相火氣以養氣若母心驚胆寒多有煩

悶名曰子煩也妊娠子煩是肺臟虛而熱乘於心

亂產全書 卷二

三十五

則心煩停痰積飲在心胸間亦令煩也若熱煩但

熱痰飲而煩則嘔吐涎沫惡聞食氣煩躁不安均

謂之子煩

竹葉湯 治妊娠心驚胆怯終日煩悶

白茯苓三錢 防風 麥門冬去心 黃芩各二錢

右作一服水二鍾竹葉五片煎至一鍾服

竹茹湯 療妊娠煩燥或胎不安

用淡青竹茹兩

以水一大升煮取四合徐徐服盡為度

麥門冬湯 妊娠心驚胆怯煩悶

麥門冬 白茯苓 防風 各三錢 人參 一錢五分

右作一服水二鍾生姜五片淡竹葉十片煎至一

鍾去滓服

清平飲 妊苦煩悶

麥門冬 茯苓 防風 知母 竹瀝

右水二鍾煎一鍾下竹瀝食後服

子淋類

妊娠小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊

亂產全書卷二

婦胞繫於腎腎間虛熱而成斯証甚者心煩悶亂

名曰子淋也

葵芍湯 尿澀小便不通熱痛

冬葵子 兩 芍藥 各一兩 條黃芩 五錢

車前子 五錢 赤茯苓 五錢

右咬咀每五錢水二盞煎八分食後溫服

地膚大黃湯 療妊娠子淋宜下

川大黃 地膚子 各三兩 知母 黃芩 猪苓

赤芍藥 通草 升麻 枳實 甘草 各二兩 未調服

安榮散 治妊娠小便澀少遂成淋瀝

麥門冬 去心 通草 滑石 人參 細辛 各三錢

當歸 酒浸 燈草 甘草 各半兩

右為細末每服二錢不拘時麥門冬煎湯調服

大腹皮散 治妊娠大小便赤澀

大腹皮 枳殼 去皮 甘草 各一錢

赤茯苓 去皮 三錢

右為細末每服二錢不拘時濃煎葱白湯下

又方 治胎前諸般淋瀝小便不通

亂產全書卷二

檳榔 赤芍藥 各等分

右剉每服五錢煎溫服甚効

轉胞類

妊娠小便不通為小腸有熱傳於胞而不通耳又

胎滿逼胞多致小便不利煩熱不得臥而反倚息

者此名轉胞以胞系了戾故致此病宜腎氣丸主

之

八味地黃丸

地黃 山茱萸 山藥 茯苓 澤瀉 丹皮

大附子 桂

煉蜜為丸梧子大每酒下十五丸至廿九日再服
張遠文曰余室人懷孕五月而轉胞醫投他劑反增
脹劇証諸方書皆用八味丸主之時醫泥於桂附
率不敢用七日而斃後一隣婦症同余力以八味
丸服之小便遂行大便亦下再以前丸加車前子
一劑肚腹頓利而安大悔前為醫誤後識此方之
妙故為志之 如丸劑不能速合遂配煎藥服之
歸母苦參丸 治妊娠小便難飲食如故

胤產全書 卷二

三十八

當歸 貝母 苦參 各四

右為末煉蜜丸如小豆大服三九加至十九

螬蛸散 療小便不通及胞轉

用桑螬蛸一味搗末米飲服方寸七日三服

獨聖散 治妊娠小便不通

蔓荊子為末每服二錢食前酒煎葱白湯調下

葵子茯苓散 妊娠有水氣重身小便不利酒漸惡

寒起即頭眩

葵子 茯苓 各三兩

右二味杵為散飲服方寸七日三服小便利則愈

仙杏丸 治妊娠卒不得小便

杏仁一味去皮尖搗丸棗子大燈心湯吞七丸

立利

遺尿類

白薇散 妊娠遺尿及不知出

白薇 白芍藥 各等分

右為末酒服方寸七日三服空心

又方 治妊娠小便不禁

胤產全書 卷二

三十九

桑螬蛸 二十枚 炙黃

右為細末每服二錢空心米飲調下此藥前以小

便不通今又治不禁蓋兩用之也

尿血類

地黃飲 妊娠勞傷經絡有熱在內熱乘於血血得

熱則流溢滲入膀胱令尿血也

生地黃一斤切

右以酒四升煮取二升分溫三服亦療落身後血

河膠散 治症同前

阿膠 熟地黄各等分

右為細末空心粥飲調下二錢

薑蜜湯 治妊人小便尿血

生姜七片 蜜半盞 白茅根一握

右入水濃煎服

臧躁類

婦人心虛驚悸悲傷不止此名臧躁宜服此

淡竹茹湯

麥門冬去心 小麥 半夏湯泡各二兩半 人參

胤產全書卷三

四十一

白茯苓各一兩半 甘草一兩

右剉每服四錢姜五片棗一枚淡竹茹一團如指

大同煎溫服

又方 治胎臧躁自悲自哭自笑

右以紅棗燒存性米飲調下

耳麥大棗湯 治同前

耳草三兩 小麥一升 大棗十枚

右以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

漏胎下血類

夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由

衝任脈虛不能約制手太陽少陰之經血也衝任

之脈為經絡之海起於胞內手太陽小腸脈也手

少陰心脈也是二經為表裡上為乳汁下為月水

有娠之人經水所以斷者壅之養胎蓄之以為乳

汁也衝任氣虛則胞內泄不能制其經血故月水

時下亦名胞漏血蓋則人斃矣又有因勞役喜怒

哀樂不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有

宿疾子歲為風冷所乘氣血失度使胎不安故令

胤產全書卷三

四十二

下血又因氣虛血虛血熱胎本不固房室不節先

漏而後隨者須作漏胎治不可不密

膠艾湯 不問月數淺深安胎

熟地黄二兩 艾炒二兩 當歸二兩 甘草炙一兩

川芎二兩 阿膠一兩 黃芪一兩

每服三錢水盞半煎七分服

大千方 治妊娠三四月腹痛時時下血

續斷二兩 艾葉 當歸 熟地黄各六兩 竹茹

阿膠 鷄蕪各兩

水一升煎取六合空心再服

濟生如聖湯 治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮 當歸酒浸 熟地黃酒蒸 白芍藥

阿膠蚌粉炒 川芎 續斷酒浸 甘草炙各等分

一方有乾姜竹茹

右咬咀每服四錢水一盞苧根少許姜五片煎溫服

葉寄生散 治胎漏經血妄行淋瀝不已

葉寄生 當歸酒浸 川芎 川續斷酒浸

胤產全書 卷二

阿膠蛤粉炒 香附子炒去毛 茯苓去木

白木各一錢 人參 甘草炙各半分

右作一服水二鍾生姜五片煎一鍾不拘時服

鄭氏人參散 治胎漏敗血癢心日漸胎乾子母危

困

人參 黃芪炙 阿膠炒各五錢 竹茹 木香

炙甘草 附子炮各五錢 川芎 陳皮 苧根各二錢

錢半 生姜炮黑

右咬咀每四錢糯米三七粒水煎熱服忌生冷鷄

鴨魚麵

奇聖散 治妊娠下血不止

鷄肝三個用酒一升煮熟共食之大効

防風黃芩丸 治肝經有風熱致血崩便風尿血

用黃芩炒焦 防風等分為末酒糊丸如梧子大每

服三五丸食遠或食前米飲或溫酒下

地黃湯 治經血妄行及鼻衄不止

生地黃酒搗取汁半兩 薄荷三錢 甘草一錢

右二味為末新汲水合地黃汁調食後服

胤產全書 卷二

乾桃散 治胎血下不止

取桃樹上乾不落桃子燒灰和水服本草云桃奴破血

保命枳殼湯 治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼 黃芩各五錢 白木一兩

右為細末每服七錢水一盞煎七分食前服

大千方 治妊娠忽下黃汁如膠如豆汁胎動腹痛

粳米五合 黃芪六兩

右以水七升煎取二升分為四服

心痛類

妊娠心痛乃風邪痰飲交結若傷心正經為真心痛朝發夕死夕發旦死若傷心支絡則乍安乍作若傷於子藏則胎動而血下

火龍散 治妊娠心氣痛

川練子 茴香炒各三錢 艾葉末鹽炒一錢半

右水二鍾煎至一鍾不拘時服

產寶方 妊娠卒心痛氣欲絕

川芎 當歸 茯苓 厚朴製各一兩

右水六升煎取二升分二服

白木湯 妊娠卒心痛欲死不可忍者

白朮三兩 赤芍藥二兩 黃芩一兩半

右切以水六升煮取二升半分三服半日令盡微

下水令易生忌桃李雀肉等

千金方 療妊娠心痛

青竹茹升一 羊脂八兩 白蜜三兩

右三味合前每服棗核大三枚食前服日三服

心腹痛類

夫妊娠心腹痛者或由宿有冷疾或觸風寒皆由

臟虛而致發動也邪正相擊而并於氣隨氣上下上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也邪正二氣交攻於內若不時差者其痛衝擊胞絡必致動胎甚則傷墮也多是風寒濕冷痰飲與臟氣相擊

當歸芍藥散 妊娠腹中絞痛心下急痛

白芍藥半斤 當歸 茯苓 白朮各四兩

澤瀉 川芎各二兩

右為細末每服二錢食前溫酒調服

葱白飲 療妊娠腹痛并胎動不安

葱白切升 人參 厚朴 阿膠 川芎各二兩

當歸三兩 右水七升取三升分三服一方有甘草無厚朴川芎

薤白飲 療妊娠腹內冷痛忽胎動

薤白升一 當歸四兩

右水五升煮取二升作三服

又方 妊娠忽心腹腰痛不安二三月娠者

當歸三錢 阿膠炒二錢 甘草炙二錢 葱白四錢

右到分二服每服水二盞煎大半盞服

東垣湯 妊娠忽腹絞痛三五月娠

大東十四枚 鹽一錢燒

右為末取一撮許酒調服之愈

茅根酒 妊娠胎動欲落腹中痛不可忍

上等銀一斤 茅根二斤法

以水九升煮銀取五升入清酒乙升同煎茅根取

三升分三服立安

千金方 療妊娠腹中痛

胤產全書 卷二 四十七

生地黄斤二 取汁酒乙升合煎減半頓服愈

小腹痛類

妊娠小腹痛者由胞絡虛風寒相搏痛甚亦令胎

動也

七仙飲 妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下

血

當歸 川芎各八分 何膠炙 人參

艾葉各四分 大棗二十枚 茯苓十分

右水四升煮取二升溫分三服

又方 川芎為細末酒調下

腰腹及背痛類

腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之則腰

痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其

痛不止多動胎氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚

者則胎墮也

通氣散 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神効

破故帛不拘 瓦上炒香熟為末嚼胡桃肉乙

個空心溫酒下三錢

胤產全書 卷二 四十七

五加皮散 妊娠腰痛不可忍或連髀痛先服此藥

杜仲四兩 五加皮 阿膠炙 防風 川芎

金毛狗脊 白芍藥 細辛 草薢各三兩

杏仁八十枚去

右水九升煮取二升去滓下膠作三服

五加皮丸 症同前先服前散後服此丸

續斷炒 杜仲各二兩 芎藭 獨活各二兩

五加皮 狗脊 草薢 芍藥

訶子肉各四兩

右為末煉蜜丸如梧子大空心酒下四十九粒三
紫酒 治妊娠腰痛如折

大黑豆二合 炒令香熱以酒一大盞煮取七分
去豆空心頓服

班龍散 妊娠腰背痛不得番覆

鹿角 長六寸燒令赤酒中淬再燒再淬以角碎為度 取所淬酒飲之
一方鹿角為末酒服亦可

菖蒲飲 卒腰痛不安或腰痛胎轉搶心下血

用菖蒲汁酒乙升服之

胤產全書 卷二

聖水

又方用艾葉乙把如鷄子大以酒四升煮二升
分為二服良

立安飲 療觸動胎以致腰背痛

杜仲 五加皮 當歸 芍藥 川芎

草薺 各等分

右水七升煮取乙升半分溫三服

心腹脹滿類

夫妊娠心腹脹滿者由腹內素有寒氣致令停飲
吐娠重因觸冷發動與氣相平故令心腹脹滿

倉公下氣湯 妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食

羌活 赤芍 甘草 檳榔 青皮 大腹皮

陳皮 赤茯苓 半夏 桑白皮

桂心 各半兩 紫蘇莖 二兩

每服三錢水一盞姜五片棗一枚煎七分服

枳殼湯 治婦人妊娠腹脹

枳殼 三兩 黃芩 一兩

為粗末每服五錢水盞半煎溫服

又方 妊娠心下滿氣急切痛

胤產全書 卷二

聖水

赤茯苓 六分 桑白皮 五分 前胡 四分 郁李仁
檳榔 各三分

右為細末水一升煮取一半去滓夜卧服

胎水滿類

夫妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛土不尅水血

散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀

又或遍身腫滿心腹急脹名曰胎水

天仙藤散

天仙藤 洗畧炒 香附子 炒 陳皮 甘草

烏藥

右等分爲細末每末三錢水大盞姜三片木瓜三片柴胡三葉同煎至七分放溫澄清空心食前服日三小便通氣脉順體輕腫漸消不須服

崔氏方 療妊娠體腫有水氣心腹急滿

茯苓 白木各四兩 旋覆花二兩 杏仁

黃芩各三兩

右細切水七升煮二升半分溫三服忌桃李雀肉酢物

胤產全書 卷二

五十

葶藶子散 療妊娠遍身洪腫

葶藶子一兩 白木五兩 茯苓 葉白皮

郁李仁各二兩

右爲粗末水六升煮二升分三服小便利卽瘥

又方

澤瀉 葶藶子各二兩 茯苓 枳壳 白木各六兩

右細切水六升煮取二升半分溫二服小便利卽瘥

瘥

防已湯 治妊娠脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小

便不利

防已半錢 葉白皮 赤茯苓 紫蘇葉各二錢

木香半錢

右一服水二鍾生姜五片煎一鍾食前服

千金鯉魚湯 妊娠腹大胎有水氣

白木五兩 白芍藥三兩 當歸三兩 白茯苓四兩

右剉細用鯉魚一個不拘大小破洗鱗腹白水煮

熟取汁去魚不用每服四錢入魚汁盞半姜七片

橘皮少許同煎七分空心服以胎水去盡爲度

胤產全書 卷二

五十一

一方加人參澤瀉

又方 妊娠遍身浮腫

山梔子炒一合米飲調服

腎着湯 治妊娠腰脚腫

茯苓 白木各四兩 乾姜 甘草 杏仁三兩

右每服四錢水一盞半煎至七分食前服

五皮散 治胎水尋常脾虛腫滿

大腹皮 葉白皮 生姜皮 茯苓皮 橘皮

右等分每服半兩水二盞半入木香水一呷同煎

至八分去滓空心温服

全生白朮散 妊娠面目虛浮如水腫狀

白朮兩一 生姜皮 大腹皮 陳皮

茯苓皮各半兩

右為細末每服二錢米飲調下

傷食類

經云飲食自倍脾胃乃傷又云陰之所生本在五

味陰之五宮傷在五味若妊娠飲食不節生冷毒

物恣性食噉致傷脾胃故妊娠傷食最難得藥唯

胤產全書

卷二 五十二

此二方最為穩捷

木香丸 治婦人有孕傷食

木香二錢 人參 三稜 白茯苓各三錢

右為細末麵糊丸如菉豆大熱水吞三四十九

白朮散 治妊娠氣不調和飲食易傷

白朮炒 紫蘇各一兩 人參 白芷炒各七錢半

川芎 訶子皮 青皮各半兩

甘草二錢五分

右為末每服二錢水一盞姜三片煎七分温服

積聚類

黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞

亦無殞也帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大

聚其可犯也衰其大半而止過者死

驅積丸 血塊如盤有孕難服峻劑此方主之

香附子醋煮四兩 桃仁去皮尖一兩 海粉醋煮二兩

白朮兩一

右為末麵糊丸服

傷寒類

胤產全書

卷二 五十三

熱病防損胎非時之氣傷損妊娠熱毒之氣侵損

胞胎遂有胎墜漏血俱害子母之命

柴葛散 妊娠傷寒百節痛壯熱不急治即胎落

柴胡 乾葛 知母 石膏各六錢 大青八錢

梔子兩一 升麻八錢 葱白切半

右水七盞煎至三盞分三四服服之

芪朮散 傷寒安胎

黃芪 白朮等分新瓦上炒令香

右為末三錢水一盞姜三片煎七分服

葱姜飲 傷寒憎寒壯熱當發其汗

葱白三兩 姜一片

右每服三錢水一盞半煎八分熱服出汗

卷荷散 傷寒大熱悶亂燥渴恐傷胎

嫩卷荷葉焙乾 一兩 蚌粉半兩雪白極細者

右為末二錢蜜少許同新汲水調下食前服多合塗腹上亦妙

浮萍散 時氣熱病護胎法

乾浮萍草 朴硝 大黃炒 蛤粉炒 藍根

胤產全書 卷二

右為末二錢貼臍上安胎解燥熱和臟腑

又方

井中泥塗心下乾則易之又取窰中心紅土為末

水調塗臍下二寸濶五寸乾復塗之

救急散 妊娠傷寒熱不止發斑或赤黑小便如血

命欲絕胎欲落

梔子仁 升麻 大青 生地黃 石膏

葱白 黃芩

右白水煎忌熱物

二胡散 妊娠傷寒

柴胡 前胡 當歸 人參 生地黃 芍藥

甘草

右姜三片煎服要汗加葱白

妊娠傷寒傷風母輕服藥發熱頭痛惡風身熱用芎

芷香蘇散

妊娠熱痛六七日極者傷胎兒死身冷不能自出須

用暖胎藥服黑神散溫酒調暖胎自出評此不若

催生湯

胤產全書 卷二

蒼木二兩 桔梗二兩 橘紅六錢 白芷 桂心去

炙粉草各二兩 當歸酒洗 乾姜炮 厚朴

芍藥 半夏洗 川芎炒各四兩 南木香

杏仁一錢炒

右每服三錢水盞半姜末煎半盞服

咳嗽類

夫肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之則咳

嗽秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心

受之其嗽不已則傳於腑妊娠患此不已則傷胎
欬冬花散 妊娠心膈痰毒壅滯肺氣不順咳嗽頭
痛

欬冬花 麻黃 貝母煨 前胡 桑白皮

紫苑各半 旋覆花 白朮 甘草各二錢半

石膏兩一

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎七分溫服

紫苑湯 治妊娠咳嗽不止胎不安

紫苑兩一 桔梗兩半 甘草 杏仁 桑白皮各二錢半

龍產全書 卷二

天門冬兩一

右咬咀每服三錢竹茹一團水煎去滓入蜜半匙

再煎一兩沸溫服

百合散 治妊娠風壅咳嗽痰多喘滿

百合蒸 紫苑草洗 白芍藥 赤茯苓去皮

桔梗炒 前胡各去 貝母去心各 甘草五分

右水二鍾姜五片煎至一鍾不拘時服

馬兜鈴散 妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母各半

本板錯謄紙
標次弟回今
標記一二正之

察者拗口噤之得汗即愈

又方 治妊娠因感外風如中風狀不省人事

熟艾三兩

陳米醋炒令極熱以絹帛裹熨臍下良久即省

子癰類

妊娠體虛受風而傷太陽之經終後復遇風寒相
搏發則口噤背強名之曰瘖又云瘖其候目閉不
識人須臾自醒良久復作謂之風瘖一名子癰亦
名子冒甚則反張

龍產全書 卷二

羚羊角散 治妊娠骨間角弓反張名曰子癰風瘖

羚羊角鎊 獨活 酸棗仁炒 五加皮

薏苡仁炒 防風 當歸酒浸 川芎

茯苓 杏仁去皮尖 木香 甘草炙各

右姜水煎服

羌活酒 治妊娠中風瘖口噤四肢強直角弓反張

羌活兩半 防風兩 黑豆一合炒

右二味咬咀好酒五斤浸一宿每服用黑豆一合

炒令熟投入藥酒一大盞候沸即住去滓分兩服

灌之

瘰癧類

瘰者筋脉急而縮也癢者筋脉緩而伸也一縮一伸手足相引搐搦不已大抵與嬰孩發搐相似謂之瘰癧也此證屬風風主搖動心火肝木風熱熾而為瘰癧也

鈎藤湯

鈎藤鈎

當歸

茯神

人參

棗寄生

苦梗

亂產全書卷二

五八

右為粗末每服五大錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時忌猪肉菘菜若煩熱加石膏二兩半臨產月加桂心一兩

眩暈類

消風散

治妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴胞膈涎壅頭旋目暈或腮項腫核

石膏

防風

羌活

甘菊花

川芎

羚羊角

當歸

大豆黃卷

荆芥穗

白芷

炙甘草

賊害萬物人體虛則中之若風邪客於皮膚入經絡即頑痺不仁若入於筋脉挾寒則攣急喎僻按溫容脉馳縱若入臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虛寒邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而為諸病妊娠中風若不早治則令墮胎也

防風散

治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言

四肢急強

防風

葛根

棗寄生

羚羊角屑

細辛

當歸

甘菊花

漢防已

秦艽

亂產全書卷二

五九

右咬咀每服八錢水一鍾半生姜五片煎至一大鍾去滓入竹瀝半合攪勻溫服無時

防已散

治妊娠中風口眼喎斜手足頑痺

防已

羌活

防風

麻黃

黃松木節

羚羊角屑

桂心

荆芥穗

薏以仁

棗寄生

甘草

右咬咀每服五錢水一鍾半生姜五片煎至一大鍾去滓溫服

鍾去滓溫服

白殭蚕散 治妊娠中風口噤心膈痰涎壅滯言語不得四肢強直

白殭蚕炒 天麻 獨活各一兩 麻黃去節

烏犀角屑七錢 白附子炮 半夏湯洗七次姜製

天南星炮 藿香各半兩 龍腦二錢研

右為細末入研藥令勻每服一錢生姜薄荷湯調下日三服

赤箭丸 治妊娠中風手足不隨筋脈緩急言語蹇澁皮膚不仁

赤箭酒浸 草薺酒浸 麻黃去節 獨活 鼠粘子

熱地黃 羚羊角屑兩 阿膠炒 防風

川芎 當歸炒 薏以仁 五加皮 秦艽

漢防已皮 栝子仁 酸棗仁炒 丹參去心

右為細末煉蜜和搗三五百下丸如梧子大每服

三十九丸豆淋酒送下食前服

白朮酒 治妊娠中風口噤語言不得

白朮一兩 獨活一兩 黑豆一合

劉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服日

陳皮去白 大腹子 桑白皮 紫蘇各一兩

五味子二錢 右咬咀每服四錢姜三片水煎服

麻黃散 治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃去節 陳皮去白 前胡各一兩 半夏湯泡

人參 白朮 枳殼炒 貝母 甘草各半兩

右咬咀每服四錢葱白五寸姜三片寒一枚水煎服

苦梗散 治妊娠肺壅咳嗽喘急

桔梗 紫蘇 人參 桑白皮 貝母

甘草各半兩 天門冬去心 赤茯苓各一兩

每服四錢水二鍾生姜三片煎一鍾服

又方 貝母去心并皮炒黃 為末砂糖拌勻丸如芡實大每服一丸嚥化

二冬飲 嗽而痰中見紅

歸身 熱地黃 天門冬 麥門冬 紫苑

桑皮 杏仁 甘草 桔梗 黃芩

中惡類

五味子 阿膠炒
右水煎入小蘇汁同服有痰加竹茹一捻

夫妊娠忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡邪惡之氣中胎傷於人也所以然者血氣養勝而為精神之主若血氣不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之妊娠之病亦致損胎也

當歸散 治妊娠中惡心腹疼痛

當歸 丁香 川芎各三兩 青橘皮二兩

胤產全書 卷二

六十二

吳茱萸半兩去梗湯泡三次炒黑

右為細末温酒調服一錢不拘時服

補遺方 治妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之不可按摩或吐血或衄血者用熟艾如拳大煮汁頻服

服

又方 用鹽一盞水二盞調和服以冷水喫之吐出

即安

中風類

夫四時八方之氣為風也不從其令來者為虛邪

右作一服水二鍾好芽茶半錢煎至一鍾食遠服
犀角散 治妊娠諸風熱困倦時發昏眩

犀角 人參 山梔仁 羌活 黃連 青黛

川芎 吳白芷 茯苓 甘草各一錢

右作一服水二鍾生薑三片竹葉七葉煎至一鍾

食遠服

驚悸類

大聖散 治妊娠心驚悸裏多驚腹脇膨脹坐卧不寧

寧

胤產全書 卷二

六十三

白茯苓 麥門冬 黃芪蜜炙 當歸酒洗

川芎各一錢半 木香 人參 炙甘草各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾服

竹葉湯 治妊娠心驚胆怯終日煩悶

白茯苓三錢 防風 麥門冬去心 黃芩各二錢

右作一服水二鍾竹葉五片煎至一鍾服

竹茹湯 療妊娠煩躁或胎不安

用淡青竹刮茹一兩以水三大升煮取四合徐徐服安為度

九

自是以下

參門冬湯 治妊娠心驚胆怯煩悶

麥門冬 白茯苓 防風各三錢 人參一錢

右作一服水二鍾生姜五片淡竹葉十片煎至一

鍾去滓服

柴胡散 治妊娠心煩頭目昏重心胃煩悶不思飲

食

柴胡兩 赤茯苓 麥門冬各一兩 批把葉去毛

人參 橘皮 甘草各半兩

咬咀每服四錢水一盞姜三片煎七分服

凡產全書卷二

二十四

一母散 治妊娠服藥致胎動氣不安有似虛煩不

得卧

知母二兩 洗焙

右為細末以棗肉為丸如彈子大每服一丸煎人

參湯送下

霍亂類

飲食過度觸冒風冷陰陽不和清濁相干謂之霍亂其間或先吐或腹痛吐利是因於熱也若頭痛體疼發熱是挾風邪也若風折皮膚則氣不宣通

而風熱上衝為頭痛風入腸胃則洩利嘔吐甚則手足逆冷此陽氣暴竭謂之四逆妊娠患之多致傷胎也

人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參 厚朴各二錢 橘紅各二錢 當歸炒 乾姜

甘草各一錢

作一服水二鍾姜三片紅棗三枚煎至一鍾服

益智仁散 治妊娠霍亂腹痛吐利不止

白木炒 益智仁 枳殼炒 橘紅各七錢半

凡產全書卷二

六十五

草薹燒去皮 良姜炒各半兩

右為散每服三錢水煎入姜半分去滓溫服

木瓜煎 治妊娠霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕

吳茱萸湯泡七次 生姜切各七錢半 木瓜切一兩半

一方有懷香七錢 甘草一錢 茱萸半兩

加紫蘇煎

右細剉水二盞煎一盞二分去滓分三服熱服

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後

服熱藥太多致煩躁宜沉井水中候冷頻服

草果仁 烏梅肉各三兩 甘草二兩

右咬咀每半兩水一碗姜十片煎八分沉冷服前

方用乾姜豆寇茱萸俱大溫之劑若發熱煩渴脈

數陽証服之即死宜用後方

竹茹湯 治胃熱嘔吐

乾姜三兩 半夏湯洗七次姜汁半盞漿水一

甘草七錢

右咬咀每服五錢水二鍾姜三片竹茹雞蛋大束

一枚煎至一盞去滓溫服

胤產全書 卷二 六十六

益元散 治症同前

瘧疾類

妊娠病瘧乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛

則熱陰盛則寒陰陽相雜寒熱俱作妊娠而作爰

傷於胎

驅邪散 治妊娠停食感冷發為瘧疾

白朮 草果仁 高良薑炒 礞砂仁 檳榔

白茯苓各一兩 藿香葉一兩 炙甘草五分

右作一服水二鍾姜五片束一枚煎一鍾服

七寶散 治一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或

寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日兩三

發或連日發或間日發不問鬼瘧食瘧似瘧者並

皆治之

常山 厚朴姜製 青皮 陳皮 甘草 續斷

草果去皮各等分

咬咀每服半兩於未發隔夜用水酒各一盞煎一

大盞去滓露一宿再用酒水煎滓一次去滓亦露

一宿來日當發之早盪溫面東先服頭藥少頃再

胤產全書 卷二 六十七

服藥滓大有神効 世醫妊娠瘧疾不用常山等

藥故岐伯曰有故無殞何疑攻治

痢疾類

妊娠痢乃肝木尅脾土宜平肝補脾若黃而兼白

乃子令母虛須補脾胃若黃而兼黑是水反侮土

矣必溫補脾胃若黃而兼赤乃心母益子但補子

益氣若腸胃虛弱風邪客之或胎氣不安急補脾

胃而白安矣

黃連湯 治妊娠下痢赤白膿血不止

黃連二兩 厚朴製 阿膠炙 當歸 乾姜各一兩

右為細末空心米飲調下方寸七日二

當歸芍藥散 治妊娠下痢腹痛見前心

立効飲 治婦人胎前產後赤白痢

生薑年少者百錢老者二百錢取自然汁 鴨子一枚

右將鴨子打破傾入姜汁內攪勻煎八分入蒲黃

三錢再煎五七沸空心熱服立効

丹鳳散 妊娠下痢赤白絞刺疼痛

丸散全書 卷上

六八

鷄子一枚烏鷄者佳破孔預出清苗黃用 黃丹一錢入鷄子壳內同黃攪勻以

厚紙糊空塩泥固濟火上煨焙乾為細末

右每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女

是女

又方 妊娠下痢腹痛小便澀

當歸 黃芪各一兩 糯米一合

右細切和水煎分四服

挾熱方 妊娠下痢

黃連 黃柏各一兩 山梔仁二十一枚

右咬咀每服五錢水二盞浸二時久煮十餘沸頓服若嘔加陳皮半兩 生薑三兩

挾寒方 妊娠白膿痢腹中冷

乾姜四兩 赤石脂六兩 粳米一升炒黃

右用水七升煎取二升溫分三服

厚朴散 治妊娠下痢黃水不絕

厚朴姜炙三兩 黃連三兩 肉豆蔻一枚連皮用

右為粗末水煮頓服

水煮木香丸 治久痢裏急後重日夜無度其効如神

丸散全書 卷二

六九

神

鶯粟殼去穢三兩 青皮去白 甘草炒各二兩四錢

訶子炮去核八兩 當歸 木香各六兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸水煎化空心服

治臨產痢疾方

用梔子燒灰末之空心熱水調下一匙甚者不過五服

五服

又方 治胎前產後痢疾

龜板一箇醋炙末之米飲調下 龍麝二卷終

真傳
書本記

金壇王肯堂字泰父

海陽張受孔心如父泰定

海陽姚學顏伯愚父校閱

大小便類

夫妊娠大小便不通由臟腑之熱所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不通大小腸俱熱則大小便俱不通更推其因而治之

葵子湯 治妊娠得病六七日以上身熱入臟大小

便不利安胎除熱

葵子二升 滑石四兩

右水五升煮取一升去滓盡服須臾下即愈

又方 利大腸

葵子一合 川朴研

每服三錢水煎溫服

六聖散 妊娠大小便不通熱閉心膈腹脇脹悶妨

害飲食

大黃 木通 檳榔各一兩 枳壳七錢

大腹子

訶子四兩 去核

右為末以童便一盞葱白二寸同煎至六分調下

二錢

又方

車前子一兩 大黃炒

右為細末每服三錢空心蜜湯調下

大腹皮湯 治妊娠大小便不通

枳壳 大腹皮 赤茯苓各一兩 甘草二錢

右為末葱白湯調下二錢

吐血衄血咳嘔血類

妊娠吐血者皆由臟腑有傷凡憂思驚怒皆傷臟腑氣逆於上血隨而溢心悶胸滿久而不已心悶甚者死妊娠病此多墮胎也

必勝散 妊娠血妄流溢吐血衄血嘔血咯血

熟地黃 小蘗并根 人參 蒲黃微炒 當歸

芎藭 烏梅肉各一兩

右各藥搗羅為粗散每服五錢水一盞半煎至七

分去滓溫服

又方 治吐血不止

馬氣勃用生布擦為末濃米飲調下

又方 治鼻衄

用白茅花濃煎汁服

胎自墮類

陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因於熱火能消物造化自然病原乃謂風冷傷於子臟而墮此未得病情者也

濟生芩藜補中湯 治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月而墮服此安全

芩藜 五味子 阿膠蛤粉炒 乾姜炮各一錢

黃芪家炙 當歸酒浸 白芍藥 白木各錢

杜仲炒去絲 人參 木香不見火 甘草炙各五分

本作一服水二鍾煎至一鍾服

何膠湯 妊娠數墮胎小腹疼痛不可忍

阿膠炙 熟地黃焙 艾葉微炒 芩藜

當歸切焙 杜仲去粗皮炙判 白木各一兩

右每服四錢水一盞半末三枚劈破同煎至八分去滓食前溫服

杜仲丸 治妊娠三兩個月胎動不安防其欲墮宜預服之

杜仲炙製炒去系 續斷酒浸各二兩

為末煮棗肉杵丸梧子大每服七十九米飲下

四製艾附丸 治婦人數墮胎由氣不升降所以胎氣不固猶宜服此

香附并去毛淨一斤分四分一分酒浸一分醋一分童便一分鹽水各浸七日取去焙乾

右為細末醋煮糊和丸梧子大每服七十九空心

溫酒下肥人只依本方瘦人加澤蘭葉赤茯苓各

二兩

刪繁方 治妊娠數落而不結實或冷或熱百病之源

甘草 黃芪 人參 川芎 白木 地黃

吳茱萸各等分 一方有乾姜當歸

右為末空心溫酒調二錢忌菘菜桃李雀肉醋

安榮湯 治胎氣不固常得小產

當歸 地黃 川芎 芍藥 阿膠 黑香附
白朮 黃芩 砂仁 糯米 水煎服

安胎飲 妊娠五七個月前有小產症者服此可保
全產

白朮 錢一 人參 五分 當歸 錢一 川芎 五分

熟地 錢一 白芍藥 錢一 陳皮 五分 甘草 二分

紫蘇 二分 炙黃芩 五分

右件姜三片水煎食前服 若是八九個月內加

大腹皮黃楊腦七個猶妙

胤產全書 卷三

小產類

夫妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋
由妊娠衝任脈虛不能滋養於胎胎氣不固或擲
撲閃墜致氣血損動或因熱病溫瘧之類皆令半
產俗呼為小產小產不可輕視宜將養十倍於正
產半產重於大產大產如栗熟自脫半產如生採
破其皮殼斷其根蒂故半產肥肉皆腐爛當補其
虛損生其肌肉益其氣血去其風邪養其臟氣故
宜十倍正產將養

人參湯 治半產後血下過多心驚體顛頭目暈
或寒或熱臍腹虛脹疼痛

人參 麥門冬 去心 生地黃 焙 當歸 焙

芍藥 黃芪 白茯苓 皮 甘草 各一兩

右件每服三錢水一盞煎七分去滓食前溫服

生地黃湯 妊娠胎氣損動血氣不調或擲撲閃墜
以致胎墮胎墮後惡滯不盡腹中疔痛

生地黃 兩 炮 女黃 泡 芍藥 白茯苓 皮 去黑

當歸 炒 細辛 去苗 甘草 炙 黃芩

胤產全書 卷三

桂 去粗皮 各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半入生姜大棗拍碎同

煎至一盞去滓服

人參黃芪湯 治小產氣虛血下不止

人參 黃芪 炒 當歸 白朮 炒 白芍藥 炒

艾 各一錢 阿膠 錢二

右作一劑水煎服

又方 治妊娠損動下血不止

甘草 一兩 阿膠 兩 鷄子 一

右以水二大盞煮甘草一盞三分去滓下鷄子膠候膠烱攪勻分三服

又方 妊娠胎墮下血不止

丹參十二兩 細切酒五升煮取三升分三服

止痛飲 小產後心腹疼痛

當歸 川芎 熟地黃 白芍藥 玄胡索

桃仁 紅花 香附 青皮炒 澤蘭

牡丹皮

白水煎入童便酒各小半盞煎服

產全書 卷三 七

當歸酒 治墮胎後血不出

當歸炙令香 芍藥炒各二兩

咬咀每服三錢無灰酒一盞入生地黃汁一合饅

器內慢火煎至七分去滓溫服惡血下為度

羚羊角散 小產後血不出小腹滿痛

用羚羊角燒灰細研如麵每服三錢不拘時以豆

淋酒調下

烏金散 妊娠墮胎後惡血不下兼治諸疾血病

好墨二兩折二寸長子燒通赤用好醋一盞

沒藥研 麒麟竭各二錢半 麝香錢一

右為細末每服溫酒調下一錢七如血迷心用童

便加酒調下二錢

豬膏飲 治墮胎血不出上搶心疼痛煩憤

豬膏七合 白蜜三合 生地黃切二兩

右先將豬膏地黃相和煎令赤色去地黃內蜜膠

攪勻溫分二服相次再服

白蜜湯 墮胎後惡血不出

白蜜二兩 生地黃取汁一盞 酒半盞

產全書 卷三 八

右汁與酒共入銅器中煎五七沸入蜜攪勻分兩

服三劑百病可愈

牛膝湯 治胎墮胞衣不下

當歸切 牛膝酒浸切炒 木通剉

滑石研各二兩 冬葵子炒二合 瞿麥穗一兩

右每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服未下

再服以下為度

澤蘭湯 治墮胎胞衣不下

澤蘭葉切 滑石米各半兩 生麻油少許

右水三盞先煎澤蘭至一盞半去滓入滑石末并油再煎三沸頓服之未下更服

生羊飲 治妊娠胎死腹中胞衣不下及產後卒有別病欲至狼狽

刺熱羊血飲一小盞極効

胎不長類

妊娠不長者因有宿痰或失調理以致胎弱衰損氣血虛弱而胎不長也當治其痰痰益其氣氣阻則胎自長矣

胎自長矣

安胎白朮散 治妊娠宿有冷胎痿不長或失於將理傷胎多墮此藥補榮衛養胎氣

白朮 川芎 各一兩 吳茱萸 湯泡 甘草 炙一兩半

為細末每服二錢食前溫酒調下忌生冷果實

黃芪散 主妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

黃芪 白朮 陳皮 麥門冬 白茯苓

前胡 人參 各七錢半 川芎 甘草 各半兩

右咬咀每服三錢水一盞美三片末一枚煎至七分去滓溫服

人參丸 主妊娠胎不長宜服養胎

人參 白茯苓 當歸 柴胡 刺藜 厚朴

藥寄生 各一兩 枳壳 七錢 甘草 半兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十九食前溫

水吞下

集驗良方 治婦人懷胎不長

鯉魚 長一尺者 去腸肚鱗 以水漬沒內鹽及束者煮熟取汁

稍稍飲之當胎所腹上當汗如牛鼻狀雖有所見胎雖不安者十餘日輒一作令胎長甚平安

產後全書

日月未足欲產過期不產類

婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而

產者有經一年二年乃至四年而後產者各依後

法治之

集驗知母丸 治日月未足而痛如欲產者兼治產

難及子煩

知母不拘多少為細末煉蜜丸如鷄豆大溫酒嚼

下日三服

標子丸 妊娠月數未足而似欲產腹痛者

梔子 蒲黃各等分

為細末蜜丸梧子大溫酒下二十九痛上為度

治過期不產方

生地 當歸 芍藥 香附 菝仁

枳壳 礞砂 紫蘇 水煎服即生

鬼胎類

夫人臟腑調和則氣充實風邪鬼魅不能干之若榮衛虛損則精神虛弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也

胎產全書 卷三

十一

雄黃丸 治妊娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛

雄黃細研 鬼白去毛 莽草 丹砂細研

巴豆去皮心油 獺肝多令黃各半兩 蜥蜴一枚炙黃

蜈蚣一條炙黃

右為細末蜜丸梧子大空心溫酒下二丸兩服當利如不利加至三丸初下清水次下重如馬尾狀無數病極者下蛇虫或如蝦蟇卵鷄子或如白膏或如豆汁其病即除

延胡散 治婦人鬼胎血氣不可忍方

蟹螯去頭足炒 延胡索炒各三錢

右為細末再研如麵溫酒調服半錢胎下為度

補遺方 治婦人鬼胎如抱一甕

吳茱萸 川芎 秦艽 柴胡 疆蚕 巴戟

巴豆不去油 芫花醋煮各二兩

右為末煉蜜丸梧子大每服七丸蜜酒下即出惡物而愈 右方俱犯毒物非鬼胎不可輕用

孕癰類

按孕癰即是腹內患癰

胎產全書 卷三

十二

立安散 治孕癰立驗

烏藥 用五錢水一盞牛皮膠一片煎至七分

溫服

又方 蕙以仁煮汁飲之

子啼並腹內鍾鳴類

是症子在母腹中臍帶上疙瘡兒含口中者因

妊婦登高舉臂脫出兒口以此作聲

一法用空房中鼠穴土或黃連濃煎汁飲之即止

一法令妊婦曲腰就地如拾物狀仍入兒口即止

孕婦腹內鐘鳴

用鼠窟前後土為細末研麝香酒調二錢立愈

臨產須知類

一臨月斷不可洗頭以免橫生逆產

一臨產月須要緊梳頭以候一月之後

一月數滿忌總覺腹痛驚動不可太早太早則大

小霍亂信卜筮禰說神鬼多方恐怖則氣怯氣

怯則上焦閉下焦脹氣乃不行致產不利犯此

宜服紫蘇飲方見子懸條內

胤產全書

卷三

十三

一外來閑雜婦人喪孝穢濁等人預宜杜絕勿令

觸犯胎氣致產不利產後客氣犯兒亦主害子

一未產一月以前忽然臍腹疼痛有如欲產仍却

無事是名試月非正產也但一切產母未有正

產之候即不可令人抱腰產母亦不可妄亂用

力蓋欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之婦

却教產母虛亂用力兒身終方轉動却被產母

用力一逼使兒錯路忽橫忽倒不能正生皆由

產母用力未當之所致也凡產母用力須待兒

子順身臨逼門戶方始用力一送令兒下生此

產母用力之當也若未有正產之候而用力傷

早并妄服藥餌令兒生下譬如握苗而助長無

益有害

一凡十月未足臨產腹痛或止或作或痛不甚各

日弄痛非正產之候或腹痛甚而腰不甚者非

正產之候胎高未陷下者非正產之後穀道未

挺逆者非正產之候水漿未破血未出者非正

產之候漿水雖出而腹不痛者非正產之候凡

胤產全書

卷三

十四

有正產候且令扶行熟忍如行不得或凭物坐

之或安臥之或服安胎藥三服得安即止慎勿

服催生藥餌惶惶令產母憂恐務令安心存養

如覺心中煩悶可取白蜜一匙新汲水調下切

勿妄亂用力先因其母直待子逼門戶腰至痛

極眼中如火穀道挺逆時是正產方爾用力并

服催生藥

一正產十月滿足忽腰腹作陣疼痛相次胎氣頓

陷王於臍腹痛極乃至腰間重痛穀道挺逆繼

之漿破血出兒子遂生名曰正產

一凡催生妊婦欲產漿破血下臍腹作陣來痛極

甚腰重毅道挺逆已見正產之候兒却未生即

可服藥催之或有經及數日產母困苦已見正

產之候但兒難生亦可服藥以助產母之正氣

令兒速得下

一產當盛暑要冷溫涼得所不可恣意取涼傷胎

損氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸

而有發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事

荷葉散 盛暑臨產三日發大熱其脈虛疾而大惡

露不行敗血攻心狂言叫呼奔走拏捉不住

乾荷葉 生地黃 牡丹皮

濃煎湯調下生蒲黃二錢一服即定惡露即下遂

安

一冬月天冷產母經血得冷遂凝以致兒不能生

下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣

不可坐卧寒處當滿房着火常有煖氣令產母

背身向火令臍下腿膝間常煖血得熱則流散

使子易生

羊肉湯 寒入產門臍下脹滿手不可犯此寒疝

當歸 生薑 精羊肉 陳皮

水三碗酒少許煎至二碗分二服或少入葱鹽亦

佳

一腹痛繞作便謂生產坐婆踈狂不候時至便言

試水試水併胞漿先破風入產門以致腫脹門

戶狹小乾澁難產

一及產產母忍痛不肯舒伸行動曲腰眠睡胎元

轉動尋至生門被遮閉又轉又尋至三胎已無

力央主難產

一產母如覺飢餓可進以軟粥飯勿令飢渴恐致

產時困乏無力若不飢渴不須強與飲食

催生類

大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生

滑胎等藥或勢不得已則服之凡服催藥必候

腰痛甚胎陷下漿血破方可服切不可坐早及

令坐婆亂動手

大法用藥滑以流通滯滯 苦以驅逐閉塞

香以開竅逐血 氣滯者行氣 胞漿先破疲

困者固血

佛手散 丹溪云催生只用此散最穩當又効捷

川芎 二兩 當歸 三兩

右為細末每服二錢水一盞酒二分同煎七分溫

服

生如聖散 滑劑 歌曰黃葵子炒七十粒細研酒調

濟君急若遇臨危產難時免得全家俱哭泣

凡產全書 卷三

十七

黃蜀葵子 小半合一 研爛以酒濾去滓溫服神

効或漏血胎乾難產痛極者并進三服良久腹中

氣寬胎滑即產須見正產候方可服之

又方 以香油白蜜小便和勻各半盞調益母草末

服

又方 治橫倒生者

明阿膠 炒 滑石末 各一兩 葵子 二兩

右水一盞半煎至一盞去滓分二服

催干柞木飲子 苦劑 治產難或橫或倒死胎爛脹腹

中此方用之神効

大柞木枝 一大椀長一尺寸 甘草 大者五寸

右用新汲水三升半同入新磁甕中以紙三重封

緊文武火煎至一升半令香候產婦腰重痛欲坐

草時溫飲一小盞腰未重痛勿服便覺心下開豁

如覺渴再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最

穩最驗

乳珠丹 香劑

用通明乳香研細以豬心血為丸梧子大硃砂為

凡產全書 卷三

十八

衣日乾每服一粒催生冷酒化下良久未下再服

一粒若大段難產以蓮葉心蒂 七個 水二盞煎至一

盞放溫化下一粒若久未下再服其驗如神如胎

下胎衣不下者服此便下若胎橫逆不順即先服

神應黑神散再服此藥催之合藥時要五月五日

午時極妙

又方

通明乳香 如皂角子大 為末腰痛時新汲水一小盞入

醋少許同煎令產母兩手提兩石燕坐婆調藥飲

冰須臾坐草便生無痛楚神方

開骨膏 五月五日午時作

乳香研細滴小丸如芡實大每服一粒酒吞下

催生丹 治產婦生理不順產育艱難或橫或逆十

二月兔腦髓去皮膜母丁香一錢乳香二錢半

麝香一錢

右三味持勻以兔腦髓和丸鷄頭實大陰乾油昏

累每服一丸溫湯下即產兒手握藥出

如意散 臨產腰疼方可服之

龍產金書 卷五

十九

人參為木

乳香各一錢

朱砂二錢

右同研臨產急用鷄子清一個調藥末再月生薑

自然汁調開冷服如橫倒等即時端順子母無恙

易產天麻丸

天麻 即益母草六月間帶根

為末煉蜜丸龍眼大臨產熱水嚼一丸能除產後

百病

聖散 專治孕婦難產

紫蘇葉

當歸各等分

右咬咀每服三五錢用長流水煎服如無流水以

水順攪動煎服即下

又方 用紫蘇煎湯調益元散服之即產

無憂散 治胎胞氣逆臨產難產

當歸酒浸

川芎 木香不見火

白芍藥

枳殼去白

甘草炙各一錢半

乳香另研

血餘燒存

右作一服水二鍾煎至一鍾入乳香血餘和服

固血催生方 治胞漿先破惡水來多胎乾不下時

龍產金書 卷五

二十

先與四物湯

當歸 川芎 地黃 芍藥

水煎服補養血氣次更濃煎葱湯放冷令坐婆洗

產戶須是款曲洗令氣上下通暢更用酥調滑石

末塗產戶裡次服神妙乳珠丹或葵子如聖散

催生百靈散 治逆產橫生疲胎

百草霜

香白芷不見火

右二味等分研勻每服二大錢以童便并少米醋

打為膏沸湯調下集驗用酒童便各半盞同煎

沸即熱服不過再服即產

半夏湯破血 治胎乾而不能產

半夏麩一兩 大黃五錢 肉桂七錢

桃仁三十個

右為粗末先服四物湯一二服次服半夏湯姜三

片水煎

勝金散 治難產逐敗血即自生順逆則轉正子死

腹中則胎軟膨寬即產千金不授

王不留行 酸漿草死胎 芫蔚子

胎前產後全書卷三

白茯苓去刺 五靈脂行血宜生

右為散每服三錢取利方水一盞半入白花劉寄

奴子一撮同煎溫服大効

至寶催生丸

何首烏白色者二兩酒洗 川烏四兩溫草

皮苗待草淨去皮搗碎乾末 兩頭尖草藥勿認作鼠蠶

大當歸酒洗 草烏四兩先洗淨去黑毛

一宿刮去可犯鐵器 蒼木四兩米泔水浸切

片酒草去蘆 桔梗 甘草 白芷

白朮川芎 天麻 茴香 麻黃 防風

荆芥已上各 木香 細辛 血竭各一

右製為極細末煉蜜丸如粟子大每重二錢二分

臨產紅花當歸煎酒化服如難產胞衣不下進三

次服三九即下

如聖膏外 治產難併治胞衣不下兼治死胎

草麻子七粒 去殼細研成膏塗脚心胞即下速

洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腹自縮入

萬金不傳遇仙丹

胎前產後全書卷三

草麻子十四粒 硃砂研 雄黃研各一

右為末漿水飯為丸彈子大臨產時先用椒湯淋

深臍下次安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上瀾

帛束之頭生下急取去藥一丸可用三次

立聖丹 治產難危急者

寒水石四兩生用二

右同研細入朱砂同研如深桃紅色每用三分并

花水調如薄糊以紙花剪如杏葉大攤貼臍心候

乾丹易不過三上便產橫逆惡候死胎不下並治

神驗

神丹散 產難經日不生

雲母粉半兩 溫酒調服入口即產萬不失一

神驗散 治催生果効靈妙之理人所難通用實殊

効臨產時令人路上尋破草鞋一隻取耳燒灰溫

酒調下三錢匕得左足者男右足者女覆者死側

者有驚果是神奇用此送催生丸猶妙

交骨不開類

風產全書 卷三

二十三

交骨不開產門不開皆由元氣素弱胎前失於調

攝以致血氣不能運達而然也交骨不開者陰氣

虛也用此湯主之

加味芎歸湯

川芎 當歸各一兩 自死龜板一個

婦人髮生男女勿者一握燒存性

右為散每服五錢水煎約人行五里即生如胎死

亦下灼過龜板亦可

諸產逆類

橫產

橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力

而用之過也兒身未順用力一遍遂至身橫不能

生下當令產母安然傾卧後令看生之人先推其

手令入直止漸漸逼身以中指摩其肩推上之正

之或以指攀其耳而正之須是產母仰卧然後推

兒直上徐徐正之候其身正煎催子藥一盞吃了

方可用力令兒下生此名橫產

倒產

風產全書 卷三

二十四

倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令

兒子不能廻轉便直下先露其足當令產母仰卧

令看生之人推其足入去不可令產母用分毫力

亦不得驚恐使兒自順云

蛇蛻散 治妊婦欲產時不肯伸舒行動多曲腰眠

卧忍痛兒在腹中不能得轉故脚先出謂之逆生

須臾不救母子俱亡

用烏蛇蛻一條 蟬蛻十枚 血餘一握用胎髮

並燒灰存性研分二服溫酒調連進之仰卧少頃

或用小線針於兒脚心刺三五刺用鹽少許塗刺處即時順生母子俱活

又方 橫倒難生

蛇蛻一條全者 蠶故帛一張

右二件皆入新瓦瓶中益泥固濟燒存性為末煎

榆白皮乳香湯調下一錢二服出

又方 橫倒先露手足

阿膠炒 滑石一兩 黃葵子一合 酥一兩

每服四錢水一大盞煎至一盞一二次服

又方

橫逆不順子死腹中

伏龍肝即注心多年土紅者佳

右研細末溫酒調下一錢其藥兒頭戴出妙

偏產

偏產者兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏柱

左腿或偏柱右腿故頭雖露偏柱一畔不能生下

當令產母仰臥次令看生之人輕輕推兒近上以

手正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送

即便生下若是小頭頭後骨偏柱穀道只露其顛

當令看生之人以綿衣炙溫裹手於穀道外方輕輕推兒頭令正便令產母用力送兒生下

礙產

礙產者兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身

回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產

母仰臥令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中

指按兒肩下扒其肚帶仍須候兒身正順方令產

母用力一送使兒生下 以二四產看生人非良

手不可輕用

坐產

坐產者兒將欲生其母疲倦久坐椅褥紙其生路

急於高處繫一手巾令產母以手攀之輕輕屈足

坐身令兒生下非坐在物上也

盤勝產

盤勝產者臨產母勝先出然後兒生產後其勝不

收其法以盆着溫水盛其勝令產母仰臥與說不

妨以安其心却以好米醋半盞新汲水七分調勻

與產母面一嗅一縮三嗅收盡或背側打猛省而

收

又古方

以草昧子仁

四十九粒

研塗產母頭頂腸收上即急洗

去其腸若乾以磨刀水少許濕潤之內用磁石煎

湯飲之即收上磁石須陰陽家用有驗者若以水

濕母面恐驚則氣散

又方 產後腸不收

香油五斤煎熱盛盆中候溫坐油盆中約一食時

以皂角末吹入鼻中嚏作立上妙

風產全書 卷三

三

五十七

又方

半夏為末搐鼻中則腸上矣

又方

以大紙撚蘸香油點癢吹滅以烟薰產母鼻中腸

即收上

又方

腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之腸即上

又方

用枳殼煎湯溫服良久即入

子死腹中下死胎類

產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致

令產難胞胎已破無血養胎枯澀而死故也須驗

產母舌若青黑其胎死矣當下之

大法寒者熱以行之熱者涼以行之燥者滑以潤

之危急毒藥下之

熱劑

烏金散 治難產熱病胎死腹中或因顛仆或從高

墜下或房室驚搐或臨產驚動太早觸犯禁忌或

風產全書 卷三

三

二十八

產時未到經血先下惡露已盡致胎乾子死身冷

不能自出但視產婦面赤舌青是其候也面青舌

赤母死子活唇青吐沫子母俱斃又有雙胎或一

死一活其候難知臨時觀變

濟生散

熟地黃

洗切焙 乾酒炒

真蒲黃

大當歸

交趾桂

楊芍藥

去 軍姜

粉草

冬一

小黑豆

百草霜

錢五

右為末每服二錢半醋半合許沸湯六七分浸起

溫服疑二之際且飲佛手散酒水合煎二三服探之若未死子母俱安若胎已死立便逐下的知其胎死進此藥後更服香桂散須臾如手推下

香桂散 下死胎

桂枝三錢 麝香當門子一個 用研煖酒服須臾

如手推下 一方單用桂末一錢痛時重便調下 各救苦散

寒劑

大腹子飲

胤產全書 卷三

大腹子 赤芍藥 榆白皮各三兩 當歸一兩

滑石末七錢半 瞿麥 葵子炒 茯苓

粉草 子芩各半兩

右為粗末每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

朴硝散 療死胎不出

用朴硝兩半 細研以溫童便調服屢効

又方 子死腹中不出

用辰砂一兩水煮四五沸為末取酒調服立下

滑劑

千金方 治子死腹中

用葵子末酒服方寸匕若口緊不開格口灌之藥

下即活

又方 療妊娠胎死腹中或母疾欲下胎

榆白皮煮汁服三升

回生飲 子死腹中或半生不下或半着脊骨在草

不產血氣上盪母心面無顏色氣欲絕

猪脂斤一 白蜜升一 淳酒升二

右三味合煎取二升分為二服不能飲隨量服

胤產全書 卷三

毒劑

一字神散 治子死胎不下胞破不生此方屢効救

人無量

鬼白黃色者不拘多少去毛碾為末極細如粉不用羅以手指擦之

右每服二錢用酒一盞同煎八分通口服神効

雜方 治生產不順胎死腹中胞衣不下臨產危急

神龍散

蛇退一條全者香油燈上燒研 麝香許小

右為末童便酒各半盞調一服即生下

楊氏方 療有孕月數不足子死腹中毋欲悶絕取

大豆一方三升醋煮濃汁二升頓服立効

又取死胎法

用烏鷄一隻去尾細切以水三升煮取二升去鷄

通手用衣帛蘸磨臍下胎自出

又方 子死腹中不出

用黃牯牛糞塗母腹上立出 熱雀

一方以牛屎炒大熟入醋半盞以青布包於臍上

下熨之立下

亂在書 卷三

三十一

牡丹丸 生子下血過多子死腹中增寒手指甲青

面色黃黑胎上搶心悶絕欲死冷汗自出喘滿不

食或食毒物或誤服草藥傷胎下血胎尚未損可

安已死腹中即下胎死腹中危甚亦用

牡丹皮 白茯苓 桂心 桃仁 赤芍藥

右等分爲末蜜丸彈子大每服一丸細嚼淡醋湯

送下連進數丸

千金神造湯 妊有兩子一死一活服此死者出生

者安

蟹瓜升一 甘草三兩 阿膠三兩

右用東流水一斗先煮蟹瓜甘草得三升去滓次

入阿膠令烺頓服之不能盡分二三服若妊母困

弱仰口納藥藥入即活藥用東向竈以蒿薪煮之

至穩方 胎死不出以此下之

先用平胃散以酒煮二服服之次研細朴硝二錢

以童子小便調服即下

霹靂奪命丹

須至誠修合勿令婦人鷄犬見

蛇蛻一條人尿

千里馬路上拾左腳舊草鞋洗淨燒灰一錢

亂在書 卷三

三十一

金銀箔各七片

髮灰二錢 馬鳴退即垂退燒灰一錢

乳香半錢

黑鉛三錢半 溶開水銀七錢 半共攪炒成研用

右用獾猪心血丸如梧桐子大倒流水灌下二丸

如灌不行化開灌救

產後調養法

一凡生產畢飲熱童便一盞不得便卧且宜閉口

而坐須臾上床宜仰卧不宜側卧宜堅膝未可

伸足高倚牀頭厚鋪茵褥遮圍四壁使無孔隙

免致賊風及以醋塗鼻或用醋炭及燒漆器更

以手從心掣至臍下使惡露不滯如此三日以
防血暈血逆不問腹痛不痛有病無病以童便
和酒半盞溫服五七服妙酒強行血亦不可多
恐引血入四肢且能昏暈宜頻食白粥少許一
月之後宜食羊肉猪蹄仍慎言語七情寒暑梳
頭洗足以百日為度

若血氣索弱不計日月否則患手足腰膝酸痛
等証名曰瘵勞最難治療初產時不可問是男
是女恐因言語而滯氣或以愛憎而動氣皆能

胤產全書卷三

三十三

致病不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐動心氣
不可刷齒恐致血逆須血氣平復方可治事不
可房煮粥煎藥動其虛熱犯時微若秋毫成病
重如山嶽

一凡產後百日乃可會合不爾至死虛羸百疾滋
長慎之

凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也
產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散
乃進羊肉湯

產後調理類

丹溪云產後以大補氣血為先雖有雜症以未治
之產後一切不可發表 產後戒用芍藥以酸寒
伐生發之氣也

加味理元湯 新產之後雖無疾故且將息調理脾
胃美飲食則臟腑易平復氣血自然和調百疾不
生

人參 茯苓 白朮 甘草 陳皮 藿香
確砂仁 黃芪 各等分

胤產全書卷三

三十四

右劉散每服四錢姜三片棗一枚煎溫服
四順理中湯 治新產血氣俱傷脾胃不調百日内
宜服

人參 乾姜 炮 白朮 各一 甘草 炙半兩
右煉蜜丸如梧子大每服五十九丸空心米飲下
四味湯 治產後一切諸疾總方分娩一服尤妙

當歸 心膈煩 加半錢 玄胡索 氣悶喘 加半錢
血竭 惡露不快 沒藥 心腹撮痛 加半錢
右等為細末每服二錢食前以童便一鍾煎至六

分溫服

玉露散 治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏眩大便澁滯此藥涼膈壓熱下乳

人參 白茯苓 甘草 各半 川芎 苦梗 炒

白芷 各一兩 當歸 二錢半 芍藥 七錢半

右為細末每服二錢水一盞煎至七分溫服如煩熱甚大便秘者加大黃二錢半

地仙煎 治產後諸疾

生地黄汁 生姜汁 各一升 藕汁 半升

大麻仁 三兩去壳研

右和勻入銀器內慢火熬成膏溫酒調服半匙更

以北朮煎膏入半匙尤佳

梔仁煎 療產後百病諸氣

梔仁 一千二百枚去皮尖及雙仁熬令黃色

右搗令極細以上等酒一斗五升同研三四遍如

作麥粥法以極細為佳入小長頸甕瓶中密塞以

麵封之納湯中煮一伏時不停火亦勿令火猛使

瓶口常出在湯上勿令浸之候熱取出溫酒服一

合日再服

產後醋墨

松烟細墨

不拘多少用炭火煨通紅以米醋淬之再煨焯如此七度

右研令極細用絹羅過總產了服二錢以產便調

下

琥珀散 治產後一切危急之疾

琥珀 硃砂 麝香 香墨 醋炙 僵蚕

當歸 各二錢半 鯉魚鱗 炒 桂心 百草霜

白附子 梁上塵 炒令烟出篩淨各半兩

細末之炒生姜熱酒調服二錢効

千金增損澤蘭丸 療產後百病理血氣補虛勞

澤蘭 甘草 當歸 川芎 各一兩 附子 炮

乾姜 白朮 白芷 桂心 北細辛 各一兩

北防風 人參 牛膝 各一兩 栝子仁

熟地黄 石斛 各一兩 厚朴 藁本

蕪荑 各五錢 麥門冬 去心二兩

共為細末煉蜜如梧子大溫酒下二十九

黑神散 治產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胞痞

滿或臍腹堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口紫產後
瘀血諸疾並皆治之

又名烏金散治產後十八証 一曰因熱胎死

腹中二日產難三日胎衣不下四日血暈五日口

乾心悶六日乍寒乍熱七日虛腫八日乍見鬼神

九日月內不語十日腹痛泄瀉兼服止瀉調氣藥十一日

徧身疼痛十二日血崩十三日血氣不通咳嗽十

四日寒熱心痛月候不來十五日腹脹滿嘔逆不

定次服殊砂九二三日十六日產後口鼻黑色起

凡產全書卷三

二十二

及鼻衄不可治十七日喉中氣喘急死不治十八日中

風兼荆芥散熟乾地黄 蒲黃炒 當歸 乾姜炮

桂心 芍藥 甘草各四兩 黑豆炒去皮半升

右為細末每服二錢酒童便各半盞同煎服

黑龍丹 治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡

疾垂死者但權藥得下無不全活

當歸 五靈脂 川芎 良姜 熟地黄各一

右細剉以沙合盛赤石脂泥燒紙筋藍泥固濟炭

火十斤煨令通赤去火候冷開看成黑褐色取出

細研却入後藥

百草霜五兩 硫黃 乳香各一錢半 花蕊石

琥珀各一錢

右五味並細研與前五味再研如法修製和勻以

米醋煮糊丸如彈子大每服一丸炭火燒令通赤

投於生姜自然汁與童便入酒漉出控乾研細只

用此酒調下

胞衣不下類

胞衣不下者母生子訖流血入衣中為血所脹故

凡產全書卷三

三十八

不得下治之稍緩腹脹滿以次上衝心胃疼痛喘

急必致危殆急服奪命丹逐去衣中之血血散脹

消胎衣自下又兒產出胎衣不落世謂之息胎由

產初時用力比兒出體已疲憊不復能用方產胞

經停之間而外冷乘之則血道澀故胞衣不出急

須以方藥救治不妨於兒所奈者胞繫連兒臍胞

不出即不得以時斷臍浴洗冷氣傷兒即成病也

舊法胞衣不出恐損兒者急宜斷臍帶以少物繫

墜繫墜切宜用心先繫然後截斷不爾則胎上掩

心而死繫墜則使其子血脉不潮入胞中則胞氣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人須令產母安心

奪命丹

附子半兩 牡丹皮一兩 乾漆二錢半碎

右為細末以醮醋一升大黃末一兩同熬成膏和

藥丸如梧子大溫酒吞五七丸不拘時服

花蓋石散 治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈

惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭煖

產後全書

卷三 三十九

急以童便調一錢取下惡物如猪肝終身無血風

血氣疾膈上有血化為黃水即吐出或小便中出

若先下胎衣則泛泛之藥不能達若先治血悶則

尋常之藥無此功無如此藥有兩全之妙

花蓋石一斤 上色硫黃四兩各

右二味相拌令勻先用紙和膠泥固瓦罐子一個

內可容藥候泥乾入藥在內密泥封口了焙籠內

焙令透熱安在四方磚上磚上書八

用炭一秤籠疊周匝自己午時從下生火漸漸上

微有墜下火放夾火上直至經宿炭消火冷又放經宿冷定取出細研以絹羅至細磁合內盛依法用之

窮歸榆白湯 治胎衣不下

芎藭 當歸各半兩 榆白皮一兩

右為細末每服三錢食前用生地黄汁同溫酒調

下

必効牛膝湯 治胎衣不出臍腹堅脹急痛即殺人

服此藥胞即爛下死胎

產後全書

卷三 四十

牛膝 瞿麥各四兩 當歸三兩 通草六兩

滑石八兩 葵子五兩

右細切以水九升煮取三升分三服若衣不下服

此藥衣即爛出

千金急備丸 治產後惡血衝心胎衣不下腹中血

塊

以錦文大黃一兩為細末用醮醋半升同煎如膏丸

如梧子大溫醋湯吞五丸或七丸須臾惡血即下

愈

下胎丸

半夏 白蘇各半

右為細末丸如梧子大食後半夏湯下三十丸漸加至五十丸

又方 胎衣不出若腹脹則殺人

黑豆三合炒 入醋一盞煎三五沸去豆分三

服酒煮亦可

廣濟治胎衣不出方

用龜突中土三指撮以水服之

九產全書

又方 鷄子一枚 苦酒一合 和飲之立出

又方 紅花兩 酒煮濃汁服

又方 皂角刺燒為末每服一錢溫酒調下

一法 欲產時先脫所着衣以籠灶既易產胞衣易

下

一法 取夫單衣蓋井上立出

血暈附厥逆類

產後血暈者由敗血流入肝經眼黑花頭目旋暈不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血暈細酒調

黑神散家佳庸醫或作暗風中風治之誤矣凡血

暈熱乘虛逆上寒心故昏迷不省氣閉欲絕是也

其由有三有用心使力過多而暈有下血多而暈

有下血少而暈暈雖不同治當詳審下血多而暈

症但昏悶煩亂宜補血清心藥下血少而暈乃惡

露不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人

當用破血行血藥 郭稽中論產後氣血暴虛未

得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者

令人悶絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為

九產全書

暗風若作此治病必難愈宜服清魂散即愈

清魂散表

澤蘭葉 人參各二錢半 川芎半兩 荆芥一兩

一方有甘草二錢

右為末用溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽

眼即開氣定即醒

保命荆芥散 治產後風虛血暈精神昏昧

荆芥一兩 梔子炒

右細末煎水下三錢微喘加杏仁炒 甘草各三錢

又方 產後血暈神妙

用荊芥穗為末童便調下二三錢

右荊芥利氣虛人不可服

來甦散 裏 治臨產用力太過氣血暈悶不省人事

木香 不見 神曲 炒 陳皮 去白 白芍藥

阿膠 蛤粉炒 麥蘖 炒 黃芪 去芦 生姜 炒黑各一錢

糯米 撮 苧根 洗淨一錢半 甘草 炙半

右作一服水二鍾煎至一鍾幹開口灌下即愈

歸元湯 治產後去血過多血暈不省

川芎 當歸 各等分

右作一服水二鍾煎至七分食前服腹中刺痛加

白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加白芍

水停心下加茯苓生姜虛煩不得眠加人參竹葉

廣濟方 治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急

欲絕

芍藥 甘草 各一兩 丹參 七分半並為咀

生地黄 斤 生姜汁 白蜜 各二合

右水二升先煎前藥取八合下二汁及蜜和勻分

兩服

又方 產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷

氣欲絕 新羊血一盞飲之妙日三服

又方 產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也

破鷄子三枚吞之便醒若未醒可與童便一升其

驗若產後去血多者又增此疾與鷄子不醒者可

急作竹瀝汁一服五合須臾不定再與五合頗與

三五服瘥

獨龍散 下血少而暈者宜破血行血 婦人產後血暈此乃虛火載

血漸漸暈將上來

用鹿角燒灰出火毒研極細用好酒童便調灌下

一呷即醒此物行血効

單行散 治產後血暈昏迷不省衝心悶絕

五靈脂 二兩半生薑炒

為細末每服二錢温酒調下口噤者拘開口灌之

入喉即愈

一方加荊芥為末童便調服如崩不止加當歸酒

童便煎不拘時服

復生散 治下胎或血上衝心已死

用鬱金燒存性為末二錢釀醋一合調灌活

奪命散 治產後血暈血入心經語言顛倒健忘

志及產後百病

沒藥 血竭各等分

右研細為末纔產下使用童便細酒各半盞煎一

兩沸調下二錢良久再服其惡血自循下行更不

衝上免生百疾白湯調下亦可

保命紅花散 治產後血昏血暈血崩及月事不勻

胤產全書卷三

卑五

遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮 川當歸 紅花

蒲黃炒各等分

右細末每半兩酒煎和渣溫服如胎衣不下榆白

皮湯調下半兩

花蓋石散 治產後氣欲絕惡血奔心欲死者但以

童便調一錢服之取下惡物為妙見胎衣不下

又方 治產後血暈心悶亂恍惚如見鬼

生益母草汁三合如無根亦可 生地黄汁二合

童便合一 鷄子清一

右前三味煎三四沸後入鷄子清攪停作一服

張氏方 治產後血暈全不省人事危極者

右切韭菜入有嘴磁瓶內煎熱醋沃之便密繫瓶

口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋氣透入須先扶病人

起坐惡血衝心故有此症韭能去血中之滯血加

以醋氣運達之用無不効

血不下類

夫惡露不下者由產後臟腑勞傷氣血虛損或胞

胤產全書卷三

卑六

絡挾於宿冷或產後當風取涼風冷乘虛而搏於

血血壅滯不宜積蓄在內故令惡露不下也

芍藥散 療產後三四日惡露不下

芍藥十分 知母八分 生姜 當歸 蒲黃各四分

紅花二分 荷葉中心蒂七枝 生地黄汁二合

右細切以水二升煎至七合去滓服

荷葉散 療產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉二兩 鬼箭羽 桃仁 劉寄奴

蒲黃各一兩

右為粗末每服三錢以童便一大盞姜二片生地黃一錢搗碎同煎至六分去滓無時熱服

沒藥丸 治產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱

臍腹百脉皆痛如錐刺非常此由冷熱不調或思慮動作氣所擁遏血蓄經絡

當歸一兩 桂心各半兩 芍藥各半兩 桃仁去皮尖炒研

沒藥研各二各半 蜜虫去足炒 水蛭炒焦各三十枚

右為末醋糊丸如豌豆大醋湯下三九

千金保產方 治婦人惡血不下

鳳產全書 卷三 四十七

當歸炒 芫花炒等分

右為細末每服三錢酒下

又方 用好米醋淬末以童便酒下妙

黑龍丸 見前

蒲黃散 治產後血不下

蒲黃三兩 水三升煮取一升頓服

血不止類

夫產後惡露不絕者由產後傷於經血虛損不足或分解之時惡血不盡在於腹中而臟腑挾於宿

冷致氣血不調故令惡露淋瀝不絕也

川芎芍藥湯虛者補之 治產後血崩眩暈不知人事

川芎 芍藥 當歸各等分

右吹咀每服四錢水鍾半煎至七分去滓熱服

又方 療產後七八日惡露不止

敗醬草當歸各六分 芍藥 續斷各八分

川芎 竹茹各四分 生地黄炒乾十分

右細剉以水二升煮取八合空心頓服

神功散熱者清之 治產後忘血過多心腹微痛然後血

鳳產全書 卷三 四十八

下久而不止亦治赤白帶下年深諸藥不能療者

貫眾狀如蠅刺者一個全用只揀去毛花蔓用之不剉斷

右用好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷為細末米飲

調下二錢空心食前服

千金獨聖方陷下者舉之 治產後惡血不盡或經月半

歲者

升麻三兩 清酒五升 煮取二升半分溫再服

牡蠣散脫者澀之 治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四

肢乏弱頭目昏重煩熱不思飲食面黃體瘦

壯礪煨 川芎 熟地黃 白茯苓

龍骨各兩 續斷 當歸 艾葉酒炒 人參

五味子 地榆各半兩 甘草二錢半

右為末每服二錢水一鍾生姜三片棗一枚煎至

六分去滓食前服

豆淋酒汚 產後猶有餘血水氣者

黑豆五升熬令烟盡於磁器內以酒一斗燂之蓋

豆淋酒治汚血又能發表也

廣濟神方 治產後惡血不絕崩血不可禁腹中絞

胤產全書 卷三 四十九

痛氣息急治屢中三十六疾

亂髮燒存性 阿膠二兩 代赫石 乾姜各二兩

馬蹄壳一個 乾地黃四兩 牛角鯁五兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三四十九空心

米飲日二服

秘錄 治胎落下血不止

桑木中蠹虫燒末酒服方寸匕日二服

心痛類

產後心痛為陰血虧損隨火上衝心絡名曰心吻

絡痛宜大岩蜜湯治之若傷寒心痛名曰真心痛

朝發夕死夕發朝死無藥所救

大岩蜜湯

生地黃 當歸 獨活 吳茱萸 芍藥

乾姜 甘草 桂心 小草各一兩 細辛半兩

右為散每服半兩水三盞煎一盞去滓稍熱服

七氣手拈散 治產後心氣攻痛

玄胡索 小茴香 白芍藥 乾漆炒

枳壳各二兩 黃連 石菖蒲 香附子

胤產全書 卷三 五十一

蘓葉各一錢半 沒藥 乳香各一錢 甘草六分

右剉散分作二服每服用水一盞半姜三片煎至

七分空心服

失笑散 治心腹痛欲死百藥不効服此頓愈

五靈脂 蒲黃各等分

右為末先用醪醕調二分熬膏入水一盞煎七分

食前熱服良驗

腹痛類

產後小腹作痛俗名見枕塊兒枕者因母胎中宿

有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患矣若
產婦臟腑風冷使血凝滯在於小腹不能流通則
令結聚痛疼名之曰兒枕也

延胡索散 治產後兒枕腹痛

延胡索 當歸各一兩 真琥珀 蒲黃炒各二錢半

赤芍藥兩半 桂心兩半 紅藍花二錢

右為細末以童便合酒溫溫調三錢食前服

又方 產後三日血塊痛發熱

五靈脂炒 牡丹皮 沒藥 滑石

右研細分五帖豆淋酒調之食前服

失咲散 行散之 見心痛

四汁飲 治血疲痛無定處

童便三升 生地黄汁 生藕汁各一升

生姜汁二升

右先煎三味約三分減二次下姜汁慢火煎如稀

餒每取一合溫酒調下

黑神散 治產後血塊痛經行腹痛經脈不調

熟地黄一斤 陳生姜半斤

右二味同和炒乾為末每服二錢烏梅湯調下常
服酒調經脈不通烏梅荊芥酒調下

又方 用山查濃煎汁入砂糖少許再煎熱服

當歸血竭丸 治婦人產後惡露不下結聚成塊心

胸痞悶及癢下堅瘕

當歸 血竭 芍藥 蓬朮炒各二兩 五靈脂四兩

右細末醋糊為丸梧子大每服五十丸食前溫酒

送下

產寶方 產後血下不盡腹中痛無計

青木香 當歸 牛膝 川芎 黃芪

芍藥各八分 大黃十三分 芒硝十二分

細切水七升煮二升半入大黃更三沸分三服

金匱方 產後腹痛煩滿不得卧

枳實炒令黑 芍藥各等分

右二味杵為散服方寸匕日三服并生癰膿以麥

粥下之

千金桃仁散

治產後腹痛

桃仁半升 芍藥 川芎 當歸 桂心

乾漆碎 甘草各二

細切水八升煮二升半分三服

脇脹痛類

產後兩脇脹滿氣痛由膀胱宿有停水因產後惡露下不盡水壅滯與氣相搏積在膀胱故令脇肋脹滿氣水相擊故令痛也

經効方 治產後血氣脹脇肋痛

當歸十二分 芍藥 苦梗 檳榔 枳殼各八分

桂心 青木香 柴胡各六分

胤產全書 卷三

五十三

右咬咀以水二升煎取八合去滓空心分溫二服

當歸散 治產後腹痛脇肋脹滿

當歸 乾姜等分

右為末每服三錢水一盞煎八分入穀醋少許食前熱服

選勝方

產後惡露不下血氣壅滯脇肋脹痛不食

藕木 紫葛各十分 芍藥 當歸各八分 桂心

蒲黃各六分 生地黃汁三合

右咬咀以水二升煎取七合下蒲黃分兩服

又方 理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥六分 蒲黃 延胡索各四分 當歸六分

荷葉蒂炙三

右水二升煎取七合後入蒲黃空心分作兩服

腰痛類

腎主腰脚產後腰痛者為女人腎位繫胞產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣乘腰故令腰痛也

千金大豆酒 產後中風腰背強痛煩熱苦渴頭身

胤產全書 卷三

五十四

皆重此因風冷及傷寒所致

用大豆五升炒 以酒一升投之密蓋令溫去豆服

一升日夜數服卧取微汗避風有加羌活服尤妙

救急方 療婦人產後餘血不盡血流入腰脚疼痛

胞滿氣急兩脇痛

生姜一斤 淡竹葉一斤

右二味以水二升煮取一升去滓分溫二服

廣濟方 治產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉

敗醬 當歸各八分 川芎 桂心 芍藥各六分

右咬咀水二升煮取八合分温二服忌葱

當歸黃芪湯 治產後腰痛不可轉側自汗壯熱身

體強氣短

黃芪

芍藥

各二兩

當歸

三兩

右剉每服四錢姜四片水煎温服

頭痛類

頭者諸陽之會也產後五臟皆虛胃氣虧弱飲食

不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上奏於頭

實陰虛則令頭疼也

凡產後諸症

卷三

五五

川芎散

行氣

治產後頭痛

真天台烏藥皮

大川芎

等分

右爲細末每服三錢燒紅秤鍾淬酒調服

二奇散

行血

治同前

當歸 川芎

右爲細末每服二錢水一盞煎七分温服

加減四物湯

治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛

蒼朮

一兩六錢

羌活

川芎

防風

香附

炒

白芷

各一兩

石膏

二兩

細辛

一兩 當歸

甘草

各半兩

右粗末每用一兩水煎不拘時服 如有汗知氣

弱頭痛也方中加芍藥三兩桂一兩半生姜煎

如痰癖頭痛加半夏三兩茯苓一兩生姜煎 如

熱痰頭痛加白芷三兩石膏三兩知母一兩 如

寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生姜三片煎

遍身疼痛類

產後百節開張血脉流散遇氣弱則經絡肉分之

凡產後諸症

卷三

五十六

間血多流滯累日不散則骨節不利筋脉急引故

腰背不得轉側手足不得動搖身熱頭痛醫以傷

寒治之則汗出而筋脉動握手足厥冷變生他病

趣痛散 產後氣弱血滯遍身疼痛及身熱頭痛

牛膝

當歸

桂心

白朮

黃芪

獨活

生姜

各半兩

甘草

薤白

各二錢半

右咬咀每服半兩水三盞煎一盞半去滓食前服

又方 治產後遍身青腫疼痛及象疾

牛膝

大麥蘖

各等分

右爲細末以新瓦罐中填一層麥蘖一層牛膝如此填滿用鹽泥固濟火煨通紅放冷研爲散但是產後諸疾熱酒調二錢下

中風類

產後中風者由產時傷動血氣勞損臟腑未嘗平復起早勞動致令氣虛而風邪乘虛入之故中風風邪客於皮膚經絡但痛痺羸乏少氣筋脈挾寒則攣急喎僻挾溫則縱緩虛弱若入諸葢恍惚驚悸隨所傷府藏經絡而治

胤產全書

卷三

五十七

防風湯 治產後中風背項強急胸滿短氣

防風 獨活 葛根各五兩 當歸 人參

白芍 甘草各二兩

右爲咬咀每服八錢水二盞半束子二枚劈破同煎至一盞去滓溫服

經効茯苓湯 治產後風虛頭痛語言蹇澀

茯苓 防風 乾葛各八錢 麥門冬去心一兩

芍藥 黃芩各六錢 犀角屑四錢 甘草炙二錢

右咬咀每服一兩水一大盞半煎一盞去渣溫服

雲岐方 治產後中風半身手足不遂言語蹇澀恍惚多忘精神不定

獨活 當歸 芍藥 防風 川芎 玄參

天麻各五錢 桂心三錢

右咬咀以水八升煮取二升半分爲三服覺効更作一劑又作丸每服二十九如有熱加葛根五錢有冷加白朮五錢若有氣症加生姜一兩半若手足不遂加牛膝一錢半草薢三錢黃芪四錢若腹瀉加當歸芍藥各七錢半若不食加人參五錢玄

胤產全書

卷三

五十八

參一兩若寒中三陰所患必冷小續命湯加生姜煎若暑中三陽所患必熱小續命湯去附子減桂心一半加薄荷煎

保命血氣湯 治產後諸風痿攣無力

秦艽 羌活 防風 白芷 川芎 芍藥

當歸 白朮 茯苓 熟地黃各等分

右爲末一半蜜丸一半散酒調下五七十九妙
華陀愈風散 治婦人產後中風口噤手足痠癱如角弓或產後血暈不省人事四肢強直或心眼倒

築吐瀉欲死

用荊芥穗微炒為末

每服三錢豆淋酒調服或童便服之口噤則挑齒

灌之斷噤則灌入鼻中其効如神大抵產後大眩則汗出而勝理踈易於中風也

乾葛湯 療產後中風口噤不能言

獨活二兩 乾葛一兩 甘草炙半兩 生姜二兩

右咬咀每服一兩水二大盞煎一大盞去滓溫服

天麻散 治產後中風口噤

胤產全書 卷三

天麻七錢 白附子炮 天南星炮

半夏湯洗七遍去滑姜製 乾蠍炒各半兩

右為細末每服一錢生姜薄荷酒調下幹開口灌

當歸散 治婦人產後中風牙關緊急不省人事口

吐涎沫手足瘳凝

當歸 荊芥穗各等分

右為細末每服二錢水一盞酒半盞煎一盞灌之

如牙關緊急幹開微灌之但下咽即生屢用救

人大有神効

羚羊角散 治產後中風身體反張

羚羊角屑 當歸各七錢半 獨活 防風

麻黃去節各一兩 人參 赤芍藥 細辛

桂心各半兩

右咬咀每服八錢水一大盞半生姜五片煎至一

大盞去滓溫服

羌活防風散 中風口噤四肢痺麻不仁或角弓反

張

羌活 防風二兩 大烏豆一升炒

胤產全書 卷三

右以酒五升先浸二味經宿大豆乘熱投中攪勻

密封一日以湯煮瓶良久服八合覆衣取汗畧畧

却急速以豆淋酒服之即愈

醫本記

金壇王肯堂字泰文

海陽張受孔心如父參定

海陽姚學顏伯愚父校閱

痲瘰類

痲者筋脉拘急也瘰者筋脉張痰也經云肝主筋而藏血蓋肝氣為陽為火肝血為陰為水此症因產血過多陽火熾盛筋無所養而然耳

至聖防風湯 治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍惚狂言來去無時不自覺悟亦治脚氣緩弱甚效此藥溫和不虛人

胤產全書卷四

秦艽 獨活 麻黃去節 半夏湯泡七次切片

防風各二兩 升麻 防己 白朮 石膏煨

白芍藥 黃芩 甘草 當歸 遠志

人參各一兩

右為粗末入半夏片令勻每服四錢水二盞生姜七八片煎至一盞去渣取清汁六分入麝香末少許食後臨卧帶熱服

許食後臨卧帶熱服

海藏愈風湯 卽華陀愈風湯 治前症

增損柴胡湯 治產後感異証手足痺搐涎潮昏悶

柴胡三錢 黃芩二錢 人參 甘草炙

半夏各一錢半 知母一錢 石膏一錢 黃芪二錢半

右咬咀分二服水二盞姜三片束二枚煎八分服

秦艽湯 前症已去次服此藥去其風邪

秦艽 芍藥 柴胡各一錢七分 炙甘草一錢二分

黃芩 防風各一錢二分 人參 半夏各一錢

右咬咀分二服每服水二盞姜三片煎八分食遠

胤產全書卷四

服

拘攣類

產後中風筋脉四肢攣急是氣血不足臟腑俱虛勞役虛損正氣未復為風所乘風邪冷氣客於皮膚經絡令人頑痺不仁風氣入於筋脉挾寒則攣急也

芎藭湯 治產後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強

急

芎藭 羌活 當歸 酸棗仁炒 羚羊角屑

各一錢半 防風 牛勞子各一兩 桂心 赤芍藥各半兩

右吹咀每服八錢水一大盞半煎至一大盞去滓

溫服

防已膏 治產後中風口肢筋脈攣急身體麻痺並宜用之

漢防已去皮半斤 茵芋五兩

右吹咀用酒五升浸藥一宿取猪肪脂一斤文武火熬三上三下成膏攤在紙花上貼病人患處以

鳳產全書 卷四

熱手不住摩膏上

不語類

人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語

七珍散

人參 石菖蒲 生地黃 川芎各一兩

細辛一錢 防風 辰砂另研各半兩

右為極細末每服一錢薄荷湯調下無時

孤鳳散 治產後閉目不語

用生白礬末每服一錢熱水調下

參蓮飲 治產後不語

人參 石蓮肉不去心 石菖蒲各等分

右每服五錢水煎

逐血補心湯 治產後失音不語

紅花 赤芍藥 生地黃 桔梗 蘇葉

前胡 茯苓 防風 牛胆南星 黃連

粉葛各二錢 當歸三錢 薄荷 八參

鳳產全書 卷四

升麻各一錢半 半夏二錢五分 甘草一錢

右剉為散分作二服每服水一鍾半姜三片煎至

七分空心服渣再煎

狂言謔語顛狂乍見鬼神類

夫產後語言顛倒狂言謔語如見鬼神產後因驚

敗血衝心昏悶發狂或因產傷血脈心氣既虛敗

血停積上干於心心中煩躁言語顛錯卧起不安

乍見鬼神

荷葉散 產後敗血衝心發熱狂言奔走脈虛大者

乾荷葉 生地黃 牡丹皮分等

三味濃煎湯調生蒲黃末二錢匕一服即定

烏金散 治產後三五日或半月之間忽狂言亂語

目見鬼神等證

當歸 遠志肉 川芎 酸棗仁 白朮

赤芍 香附 辰砂另研 熟地 羌活

防風各二錢 茯神二錢 半夏三錢 全蝎

麥門冬 人參 牛膝 天麻各一錢 耳草九分

陳皮 白芷各一錢半

胤產全書 卷四 五

右剉散作二服水一鍾生姜三片葱三枝入金銀

同煎一碗溫服

四物補心湯 治產後言語恍惚顛倒錯亂

當歸五錢 川芎 生地黃 白芍藥 茯神

半夏 桔梗 白朮各四錢 陳皮三錢 甘草一錢

右剉為散分作六服每服用水一鍾姜三片煎至

七分空心溫服 有熱加酒炒黃連二錢無熱不

用

茯神散 治產後血邪心神恍惚言語失度睡卧不

安

茯神一兩去皮木 人參 龍齒研 琥珀研

赤芍藥 黃芪 牛膝各七錢半 生地黃一兩

桂心半兩

右為末每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

栝子仁散 治產後狂言亂語皆因內虛敗血挾邪

氣攻心

栝子仁 遠志去心 人參 桑寄生 防風

琥珀另研 當歸焙 生地黃焙 甘草各等分

胤產全書 卷四 六

右為粗末先用白羊心一個切片以水一大盞半

先煮至九分去羊心入藥末五錢煎六分去滓服

驚悸恍惚類

產後臟虛心神驚悸由體虛心氣不足心之經為

風邪所乘或恐懼憂迫亦令心氣受於心邪若驚

不已則悸動不定其狀目睛不轉而不能動診其

脉動則為驚弱則為悸令人心神恍惚不定也

白茯苓散 治產後心神驚悸言語失常心神昏憤

白茯苓 熟地黃 人參各一兩 遠志去心

白芍藥 黃芪 桂心 當歸炒 甘草炙

麥門冬各一兩 石菖蒲 桑寄生各七錢半

右為哎咀每服八錢水一大盞半生姜五片束三枚竹葉三七片煎至一大盞去渣溫服

產乳七寶散 初產後服之調和血氣補虛安心神

鎮驚悸

硃砂飛 桂心 當歸 川芎 人參

白茯苓 羚羊角燒存性 各二錢 乾姜一錢

為細末每服一錢用羌活豆淋酒調下不飲酒清

風產全書 卷四

米飲調下

琥珀辰砂散 治血虛多驚及產後敗血諸疾

辰砂 琥珀 沒藥並細研 當歸各等分

右為細末每服二錢空心白湯調下日三服

千金方 療產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆

因心虛所致

茯苓三兩 芍藥二兩 甘草 桂心 當歸各一兩

生姜一兩 麥門冬去心 一升 大棗三十枚

右為散水三升煎取一升去滓分作兩服

天麻丸 療產後中風恍惚語澁四肢不隨

天麻 硃砂飛 防風 羌活各一兩

僵蚕炒七錢半 乾蝎炒 白附子炮

五靈脂炒各半兩 雄雀糞炒 牛黃另研各二錢半

右為細末糯米飯為丸如梧子大每服二三十丸薄荷酒送下日進三服

發熱煩渴類

產後虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂

風產全書 卷四

附若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認為火症投以涼劑禍在反掌

三之一湯 治產後虛勞發熱日久不安

柴胡 黃芪 人參 半夏 川芎 當歸

芍藥 熟地 甘草各一錢半

作一貼水二鍾姜三片紅朮一枚煎一鍾服

三分散 治產後日久虛勞發熱

川芎 當歸 芍藥 熟地黃 白朮

白茯苓 黃芪各一錢 柴胡 人參 半夏

甘草各半

右作一服水二鍾生姜三片紅棗一枚煎至一鍾

食前服

加味逍遙散 治產後發熱口乾作渴唇裂生瘡

當歸 白芍藥 乾薑 各二錢 生地黃

川芎 黃芩 各一錢半 人參 九分 麥門冬 九分

柴胡 一錢 烏梅 二錢 甘草 六分

右剉散分作二服用水一鍾煎七分空心服

一產後發熱多屬虛寒惟乾姜加入補藥中神效

胤產全書 卷四 九

此丹溪法也

沒藥丸 治產後心胸煩躁惡血不快

沒藥 研 薑姜 延胡索 乾漆 炒 當歸

桂心 牛膝 牡丹皮 乾姜 各等分

右爲細末醋煮面糊丸如梧桐子大煎麩湯下十

丸至十五丸

竹葉湯 治產後短氣欲絕心中煩悶

竹葉 切 麥門冬 小麥 升 甘草 兩

生姜 二兩 大棗 十二枚

右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去滓納余藥

者取三升去滓溫服虛悸加入人參二兩少氣加糯

米五合

竹茹湯 治產後內虛煩熱短氣

竹茹 升 人參 茯苓 甘草 各一兩

黃芩 三兩

右咬咀以水六升煮取二升去滓分三服日三

人參當歸湯 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

主內熱令人心悶短氣自汗頭暈

胤產全書 卷四 十

熟地黃 人參 當歸身 肉桂 麥門冬 各二錢

白芍藥 炒 二錢 血熱甚者加生地黃 二錢

水二鍾糯米一合竹葉十片煎一鍾食遠服

產寶方 治產後大渴不止

蘆根 切 瓜蒌 人參 甘草 茯苓 各二兩

大棗 二十枚 麥冬 四兩

右以水九升煮取三升分三服頓服四劑卽瘥忌

菘菜

黃芩散 治產後血渴飲水不止

黃芩 麥門冬各等分

右吹咀每服三錢水盞半煎八分去滓溫服

竹葉歸芪湯 治胃氣虛弱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉一錢 黃芪二錢 白朮 人參

當歸各一錢 麥門冬七分 甘草炒五分

右水煎服

玄胡索散 治產後失血渴不止

鬱金 乾葛 桂心 青皮 枳殼 玄胡索

右等分以好醋浸一宿焙乾末之每服二錢陳皮

亂產全書 卷四 十一

湯調下日三夜一

回津丸 產後虛渴去血多津液少腎氣虛引飲無

度當養血通氣回津補氣則安

白芍藥 澤瀉 茯苓 川芎各一錢 當歸

白朮 五味各二錢 烏梅肉一錢

右為細末煉蜜丸熱水吞下三十九 一方加甘

草二錢 訶子一錢

自汗盜汗類

產後虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之重虛表

實陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是

為陰氣虛也陽加於陰故令汗出陰陽虛弱不復

則汗出不止多產後多汗遇風變成痙縱不成痙

亦虛之短氣身體柴瘦口乾燥久則經水斷絕由

津液竭也

全生活血湯 治發熱自汗盜汗目眩暈四肢無力

口乾頭暈行步欹側

升麻 芍藥炒各三錢 柴胡 當歸 防風

羌活 獨活 葛根 甘草炒各二錢 川芎

亂產全書 卷四 十二

桑木各一錢半 生地 熟地各一錢 細辛

蔓荊子各五分 紅花三錢

右每服五錢水煎熱服

麻黃根散 治產後虛汗不止

當歸 黃芪 麻黃 牡蠣煨為粉 人參

粉草各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

經効方 治產後汗出不止

黃芪十二分 白朮 牡蠣煨 茯苓 防風

麥冬去心 生地黃各八分 大東七枚

右吹咀水二升煮取七合去滓空心分溫兩服

止汗散 治產後盜汗不止一應汗多者皆可服

牡蠣煨研 小麥麩炒令黃色

右等分和勻煮生豬肉汁調下二錢無時服

人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗

人參 當歸各等分

右為末以猪腰子一隻去脂膜切小片子以水三

升糯米半合葱白二條煮米熟取清汁一盞入藥

煎至八分溫服

當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗不止心血不足加

酸棗仁炒

當歸 熟地 黃芪炒各二錢

生地 黃柏炒黑

黃芩炒黑 黃連炒黑各一錢

右水煎服

往來寒熱類

產後血氣虛損陰陽不和敗血不散能令乍寒乍

熱陰勝則寒陽勝則熱陰陽相乘或寒或熱若因

產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於

肺則熱入於脾則寒若誤作癰治之則謬矣

加減烏金散 治產後寒熱似瘧

厚朴 柴胡 黃芩 麻黃各二錢 陳皮

當歸 川芎 桔梗 茯苓各一錢半 桂枝

蒼朮 白芷 枳殼各一錢 羌活 草果

半夏各二錢 甘草九分 白芍藥 熟地黃各一錢半

右到為散分作兩服每服用水一鍾半生姜三片

葱三莖煎一鍾服 有汗加當歸 川芎 白芍

熟地 有脹倍厚朴 陳皮 有熱加柴胡

黃芩 有寒加蒼朮 草果 桂枝 有痰多

半夏 桔梗 茯苓 有頭痛多川芎 白芷

羌活 有瀉去枳殼 甘草不用

增損柴胡湯 治產後虛發寒熱飲食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮 川芎

白芍藥各等分

右每服三錢姜五片水二枚水同煎食後日二服

熟地黃散 治產後羸勞皆由體虛氣力未壯勞復

四肢煩疼時發寒熱不思飲食

熟地黃 人參 白芍藥 白茯苓 白朮

續斷各兩 黃芪 桂心 五味子 當歸

川芎各七錢半

右咬咀每服四錢姜三片枣一枚水煎服

黃芪丸 治產後羸勞寒熱進退頭目眩痛骨節痠

疼氣力羸乏

黃芪 鱉甲 當歸炒各一兩 桂心 白芍藥

續斷 川芎 牛膝 茯苓 沉香 柏子仁

產後全書 卷四

枳殼各七錢半 五味子 熟地黃各半兩

共為細末煉蜜丸如梧子大每服四五十丸食後

粥飲下

瘧類

產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作或因脾胃虛弱

飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏

審証而治

草果飲子 治產後瘧疾寒熱相半者或多熱宜此

半夏湯 赤茯苓 甘草炙 草果炮去

川芎 陳皮 白芷各二錢 青皮去 良姜

紫蘇各一錢半 乾葛四錢

右咬咀每服三錢水一盞姜三片枣二枚同煎至

七分去滓當發日侵晨連進三服無有不妥

生熟飲子 治產後瘧多寒者

肉豆蔻 草果仁 厚朴 半夏 陳皮

甘草 大棗去核 生姜

右八味等分細剉和勻一半生一半用濕綿帛裹

煨令香熟去帛與一半生者和勻每服五錢用水

產後全書 卷四

二盞煎至七分食前一服食後一服

七寶飲 久而不已者用此截之方見胎前瘧

羸勞虛羸類

產後羸勞者此由生產日淺血氣弱飲食尚未平

復日月未滿氣血虛羸將養失所風冷客之風冷

搏於氣血則不能溫於肌膚使人虛乏勞倦顏容

憔悴食飲不消風邪感於肺肺受微寒故咳嗽口

乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛風邪流注臟腑盜汗

顏發寒熱如瘧背膊煩悶四肢不舉沉重着床此

則蓐勞之候也

石子湯 療產後虛羸端乏乍寒乍熱如瘧四肢疼

痛面色痿黃名曰蓐勞

猪石子

一雙去膜 脂四破

香豉

一方無此 有知母

葱白

粳米

當歸

芍藥

各二兩

右咬咀分兩劑每劑用水三升煮取一小碗去滓

分三服

猪腰子粥

治蓐勞發熱

用猪腰子一枚去白膜切作柳葉片以鹽酒拌先

胤產全書

卷四

十七

用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋和將腰子鋪盤底

以熱粥蓋之如作盒生狀空心服

人參驚甲散

治蓐勞血氣虛損勞動成癆其狀虛

羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發欬

無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困在床服

此大効

人參

桂心

當歸

葉寄生

白茯苓

白芍藥

桃仁

麥門冬

熟地黃

甘草

兩

續斷

牛膝

驚甲

黃芪

各兩

右為細末每服先以猪腰一對去筋膜以水兩大

盞生姜半錢東三枚煎至一盞去猪腎姜東然後

入藥末二錢葱白三寸烏梅一個荆芥五穗煎至

七分去澤空心晚食前溫服此藥神効

牡丹散 治產後虛羸發熱自汗欲變蓐勞或血氣

所搏經候不調或寒熱羸瘦

白芍藥

當歸

五加皮

地骨皮

人參

沒藥

桂心

牡丹皮

胤產全書

卷四

十八

右為細末每服二錢水酒各半盞開元錢一枚麻

油蘸之同煎七分去渣通口服煎不得攪吃不得

吹

黃芪煮飲

產後蓐勞肌膚黃瘦面無顏色或憎寒

壯熱四肢痠痛心煩頭痛

驚甲

醋煮

黃芪

各一兩

桂心

當歸

葉寄生

白茯苓

白芍藥

人參

熟地

麥門冬

甘草

各半兩

牛膝

右為細末每服用猪石子一對去脂膜切破先以

水一盞入姜半錢東三枚煎至七分去石子姜寒却下藥五錢更煎至四分去滓空心晚食前溫服

二滓併煎

十全大補湯 治諸臟虧損氣血俱虛惡寒發熱或

自汗盜汗便血吐血或大便不實飲食少思或胸

腹作痛口舌生瘡或耳目不明牙齒不固

人參 白朮 白茯苓 黃芪 當歸

熟地 酒洗 白芍藥 炒 川芎 各一 肉桂

甘草 炙各五分

瓜蒌入小書

十九

右姜末水煎服

黃芪建中湯 治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪 炒 肉桂 各一 白芍藥 炒二 甘草 炙

每服五錢姜末水煎服日二三服虛甚加附子

當歸羊肉湯 治產後雖無疾但覺虛弱兼心腹痛

肥羊肉 一斤去脂水一斗 當歸 五 黃芪 四

煮取八升去肉 生姜 六

右以肉汁煮三味取二升五合分為四服若覺惡

露不盡加桂三兩惡露下多加芎三兩有寒加茱

黃一兩有氣加細辛二兩有熱加生地黃汁二合痞悶類

產後柴衛大虛血氣未定食麵太早胃不能消化

麵毒結聚於胃脘上薰胸中是以口乾燥滑心下

痞悶醫者不識認為膈壅滯以藥下之萬不得

已但服此藥

見現丸

姜黃 炒 三稜 醋 蕪荖茄 陳皮 去 良姜

人參 蓬莪茂 酒炒 等分

瓜蒌全書

二十

右為細末用蘿蔔搗爛絞取汁煮麵糊為丸如梧

子大每服三十九蘿蔔湯下白湯亦可

生地黃湯 產後煩悶虛熱血傷風邪乘之氣乃不

宜而痞塞生熱煩疼口乾悶多好飲水

生地黃 清酒 升 生姜汁 三 當歸 一兩

童子小便 升

右和煎三四沸分四服藥消進食食消進藥

腹脹類

產後腹脹滿悶嘔吐不定此因敗血散於脾胃脾

受則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受
納水穀而生吐逆若與尋常治脹止吐藥治更傷
動正氣但服

抵聖湯入生姜半兩焙乾水煎 方見胎前腹脹

局方 平胃散 加人參亦可

水腫類

產後四肢浮腫者敗血乘虛停積循經流入四肢
留滯日久却還不得腐爛如水故令自黃四肢浮
腫醫人不識便作水氣治之凡治水多用導水藥

胤產全書 卷四

二十一

極虛人產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往多
致天枉但調經散血行腫消則愈

小調經散

沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸 各一錢

細辛 麝香 各半錢

右為細末每服半錢姜汁溫酒各少許調停服

乾漆散 治產後遍身青腫疼痛及產後血水疾

乾漆 大麥蘖 等分

右各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘖一重乾

添如此填滿用益泥固濟火煨通赤放冷研為散
但是產後諸疾熱酒調下二錢

枳木湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作各

日氣分

白朮 三兩 枳實 一兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服

腹中與即當散也

奪魂散 治產後虛腫喘促利小便則愈

生姜 三兩 白麩 三兩 大半夏 七枚

胤產全書 卷四

二十二

右以生姜汁拌麩半夏為七餅子煨熟為末水
調一盞小便利為効

張氏方 治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉 防己 等分

右為末每服二錢溫酒調下不飲者醋湯調亦可

加味八物湯 治產後遍身浮腫氣急潮熱

人參 白茯苓 熟地黃 小茴香 各一錢

白朮 川芎 各四錢 當歸 白芍藥

香附子 各五錢 甘草 黃芩 柴胡 各一錢

右剉散分作六七服每服水一盞半姜三片煎至七分空心熱服盡此藥方服調經丸若臍痛加延

胡索乾漆枳殼各三錢 若嘔吐惡心加良姜砂仁各二錢

若手足麻痺加肉桂一錢 若咳嗽加五味子款

冬花杏仁

積聚類

夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調產後血氣傷於臟腑臍腑虛弱為風冷所乘與血氣相結故成積聚癥塊

胤雅全書

卷四

三十一

芍藥湯 治產後諸疾不可攻宜養陰去熱其病自安

芍藥一斤 黃芩 茯苓各六兩

右剉散每以半兩水煎溫服日三

丹溪心法 產後消血塊

滑石三錢 沒藥 血竭各二錢

右為細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末

麩糊丸白木湯陳皮湯任下

又方 消血塊

香附童便 桃仁去皮留尖等分

右為細末醋糊丸

產寶方 療血痕痛無定處

童便三升 生地黄汁 生藕汁各一升

生姜汁三升

右先煎前三味約三分減二次下姜汁慢火煎如稀餈每服取一合暖酒調下

四神散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹痛

川芎 當歸 乾姜 赤芍藥各等分

胤雅全書

卷四

三十四

右為細末每服二錢食遠用溫酒調服

桂心丸 治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢羸瘦煩疼

桂心 當歸 赤芍藥 牡丹皮 沒藥

檳榔各半兩 青皮 乾漆炒烟盡各七錢半 大黃

桃仁去皮 三稜煨 玄胡索 鱉甲酥炙

厚朴製各一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三四十九食前

溫酒送下

霍亂類

產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消腸胃風冷陰陽不和穢濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下痢故曰霍亂也

立定散 治產後霍亂吐利 煩渴手足厥冷

白朮 橘紅 麥門冬去心 乾姜 人參各一兩

甘草半兩

為粗末每服四錢水一盞生姜五片煎去滓溫服

溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

瓜產全書 卷四

三五

人參 白朮 當歸 草豆蔻仁 乾姜各一兩

厚朴製兩半

右為粗末每服三錢水煎服

附子散 療產後霍亂不止手足厥冷

附子炮 白朮 當歸 吳茱萸洗 桂心

人參 丁香 橘紅 甘草各半兩

右為細末每服二錢粥飲調下

龍肝散 吐逆不受湯藥

以伏龍肝細末三錢米湯調下即受

嘔吐類

夫胃為水穀之海水穀之精以為血氣榮潤臟腑因產傷動臟腑有時氣乘腸胃腸胃燥澁其氣則逆故嘔逆不下食也

開胃散 治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜服此藥

服此藥

訶子肉半兩 人參一兩 甘草半兩

右三味為細末別以半夏半分生姜一分薤白二

七莖水一大盞煎至六分去滓分為兩服

瓜產全書 卷四

三六

立効方 療產後嘔逆不止

橘皮一兩 半夏麩 甘草各半兩 藿香二兩

右為細末每服二錢水一盞半姜三片煎六分溫服

石蓮散 治產後咳逆嘔吐心怔目暈

石蓮子去壳一兩 白茯苓一兩 丁香五錢

右為細末米飲調三錢無時服

又方 內熱嘔吐服前藥不効

枇杷葉去毛蜜炙 茅根各五錢

煎濃湯入蘆根汁半盞和勻服

吃逆類

肺主氣五臟六腑俱稟於氣產後氣血臟腑俱傷而風冷搏於氣則逆上脾虛聚冷胃中伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣逆而不順則吃逆也

丁香散 治產後心煩咳噫不止

丁香 白豆蔻仁各半兩 伏龍肝一兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

亂產全書 卷四

二十七

石蓮散 見嘔吐

產寶方 療產後吃逆三日不止欲死方

桂心兩半 薑汁三合

右同煎取三合以大火炙手摩背熱時塗藥汁盡妙

菴活散 治吃逆

菴活 附子炮 懷香炒各半兩 木香

白薑炮各二錢半

右五味為末每服二錢水一盞盪一捻煎十數沸

熱服一服即止

又方 治產後吃逆

用乾柿一個切碎以水一盞煎六分熱呷之

咳嗽類

肺主氣產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令咳嗽也若產後吃逆太早而咳嗽者難治

旋覆花湯 治產後傷風寒喘咳嗽痰涎壅盛坐卧不寧

亂產全書 卷四

二十八

旋覆花 赤芍藥 荆芥穗 半夏麩 前胡

甘草炙 茯苓 五味子 杏仁去皮尖

麻黃各等分

右以咀每服四錢水一盞半生姜三片葱一枚煎至七分去滓食前溫服有汗者去麻黃

知母飲。治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服

此藥若傷風咳嗽却以尋常傷風藥主治

知母 貝母 白茯苓 人參各二錢 桃仁

杏仁並生去皮尖各一錢

1. 續修四庫全書 子部 醫家類 卷四 二十七

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

經効方 療咳嗽多痰喘若氣急

前胡 五味子 紫苑 貝母各一兩 葉白皮

茯苓各二兩 淡竹葉二十片

右咬咀水二升煎至八合去滓食後分二服

百合散 療產後咳嗽氣急

百部根 苦梗各六分 葉白皮二分 乾百合

赤茯苓各八分

右咬咀水二升煮取七合去滓食後分兩服

胤產全書 卷四

二十九

喘類

產後所下過多榮血暴竭衝氣無主獨聚肺中故

令嗽也此名孤陽絕陰為難治若惡露不快敗血

停凝上薰於肺亦令喘急但服奪命丹血去喘自

定

血竭散 治產後敗血衝必胸滿上喘命在須臾宜

服

真血竭如無紫 沒藥

右等分研細每服二錢用童便合好酒半大盞煎

一沸溫調下方產下一服上床良久再服其惡血

自循經下更不衝上免生百病

參蘇飲 治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參一兩 燕木二兩

右以水兩碗煮取燕木一碗以下去渣調參末隨

時加減服神効

旋覆花湯 見前咳嗽

若傷鹹冷飲食而喘者宜見規丸 見前痞悶類

大補湯 治產後百日常外面色青浮腫唇口氣急有汗

胤產全書 卷四

三十一

乃大虛之症急用服此

當歸頭 大川芎 大白朮 白芍藥

白茯苓多 人參多 黃芪多 五味子

熟地黃 乾薑 甘草少

右剉散水煎服如痰不退加川烏木香另磨入服

有瀉加訶子肉豆蔻粟殼

五味子湯 治產後喘促脈伏而厥

五味子炒 人參 杏仁各二錢 麥門冬去心

陳皮各一兩

右姜三片束二枚水煎服
血崩類

產卧傷耗經脉未得平復勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因酸鹹不節傷靈榮衛衰弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急服固經丸以止之

固經丸

艾葉 赤石脂煨 補骨脂炒 木賊各半兩

附子一枚

胤產全書

卷四

三十一

右為末陳米飯和丸如梧子大每服二十九食前温酒下米飲亦得

瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮百枚燒存性 棕櫚燒存性 當歸 桂心各一兩

鯉魚鱗燒 川芎各七錢 檳榔二枚

右為細末每服三錢煨姜酒調下如未止更進一服或非時血崩無藥可治但進三服即止

白芍藥散 治產後崩中下血淋漓不絕黃瘦虛損

白芍藥 牡朮 乾薑 熟地黃 桂心

黃芪骨 鹿角膠 龍骨各一錢 烏賊血骨

右為末每服二錢食前温酒下

阿膠丸 治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠 赤石脂各一兩半 續斷 一川芎 當歸

甘草 丹參各一兩 龍骨 鹿茸酥 魚骨諸

烏賊骨 鱘甲各二兩 共為細末

右煉蜜為丸梧子大空心温酒一日二三十丸

苜蒲酒 治產後崩中下血不止

苜蒲一兩半

胤產全書

卷四

三十一

以酒二盞煮取一盞去滓分三服食前月水不調類

產後月水不調者由產傷動血氣虛損風邪冷熱

之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故

血或多或少或在月前或在月後故名不調也

琥珀調經散 治產後經脉不調四肢煩疼飲食全

少日漸羸瘦

琥珀 牛膝 生乾地黃 當歸各一兩 桃仁

赤芍藥各半兩

右爲細末每服三錢水一盞姜三片煎六分去滓服

姜黃丸 治產後虛乏不足心胸短氣腹內緊急腰

背疼痛月水不調食少煩渴四肢無力

薑黃 當歸 熟地黃 牡丹皮 厚朴 製

桂心 川芎 續斷 桃仁 白木 各一兩

赤芍藥 木香 各七錢半 羚羊角屑 二錢半

右爲細末煉蜜如梧桐子大每服三十丸食前服

溫酒下

胤產全書 卷四

三十三

瀉痢類

產後腹痛瀉利者皆因產後腸胃虛怯寒邪易侵

若未清月飲冷當風乘虛襲留於胃膜散於腹脇

故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化

洞泄勝鳴或下赤白眩脇填脹或痛走不定急服

調中湯立愈若醫爲積滯取之禍不旋踵

調中湯

高良薑 當歸 桂心 芍藥 附子 炮

川芎 各兩 甘草 半兩

右爲粗末每服三錢七水三盞煎一盞去滓煎服

茯苓湯 治產後泄

茯苓 川芎 黃芩 白木 乾薑 滑石

陳皮 芍藥 各等分

右水煎服之

人參白木散 治產後泄瀉

人參 白木 茯苓 甘草 陳皮 半夏

製朴 砂仁 當歸 神曲 炒

姜三片水煎服

胤產全書 卷四 三十四

歸芎散 治產後身熱腹痛泄瀉

當歸 川芎 白芍藥 玄胡索 砂仁

甘草 白木 神曲 茯苓 乾姜皮

水姜煎服

赤白痢疾類

產後痢疾者由產勞傷臟腑不足勞動大早誤食

生冷風冷乘虛誤入腸胃生冷難化之物傷於脾

胃皆令洞泄水瀉甚者變爲痢也若血滲入大腸

魚腦得熱則赤黃或為驟血若冷熱相搏則下赤
白痢或膿血相雜若下痢青色則極冷也若飲食
不進日夜無度產後本虛久痢不止必至危篤當
慎治之

急救散 治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥 阿膠 艾葉 熟地黃各一兩 甘草

當歸各三兩

右咬咀水煎分二服空心飲

黃連丸 治產後赤白痢腹中攪痛不可忍

麻症全書

卷四

三十五

黃連四兩 阿膠 蒲黃 槐子仁各一兩

當歸二兩 黃芩 黃柏各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服六七十丸米飲

吞下日三夜一

白頭翁散 治產後下痢虛極者

白頭翁 阿膠各二兩 黃連 黃柏

秦皮各三兩 甘草二兩

右以水七升煮取二升半納膠令消盡溫分三服

神馬飲 治產後血痢小便不通臍腹疼痛

用生馬齒莧搗汁二大合煎一沸下蜜一合調頓

服

又方 產後痢日五十行者

取木裏蛙虫糞屑炒黃急以水沃之令稠稀得所

服之即瘥

經効方 治產後久痢津液涸渴不止

龍骨十二分 厚朴 茯苓 黃芪 麥門冬

人參各八分 生姜六分 大棗十四個 並細剉

右以水一大升煮取七合空心分兩服

麻症全書

卷四

三十六

當歸飲 產後痢疾

當歸 川芎 芍藥 香附炒 陳皮

茯苓 甘草 砂仁 澤瀉 白朮 神曲炒

乾姜炒 木香不見火為末餘藥煎熟入末服

右水煎服

神龜散 治產後胎前痢疾

敗龜甲一枚米醋炙研為末醋湯調下

又方 婦人臨產痢疾

山拖不拘多少燒灰為末空心溫服熱水調下

錢甚者不過五服

大便秘澀類

產臥水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹中悶脹者此乃燥糞在臟腑以其乾澀未能出耳宜服麻仁丸以津潤之誤為有熱投之寒藥則陽消陰長變証百出性命危矣

麻仁丸

麻仁研如泥 枳殼 人參各一兩 大黃半兩

胤產全書

卷四

三十七

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十九未通漸加丸數不可太過

四物青皮湯

當歸 川芎 生地 芍藥 青皮去白

水煎服甚効

神應散 產後秘結不通膨滿者氣急坐臥俱難用

大麥蘖炒黃為末酒下一合神効

大小便不通類

產後大小便不通者腸胃本挾於熱因產血水俱

下津液燥竭腸胃痞澀熱氣結於腸胃故令大小便不通也

桃仁散 治膀胱氣滯血澀大小便秘

桃仁 葵子 滑石 檳榔各等分

右為細末每服二錢空心葱白湯調下

車前散 治產後大小便不利下血

車前子 黃芩 蒲黃 牡蠣 生地黃

芍藥各一兩五錢

右為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

胤產全書

卷四

三十八

乳飲 治產後大小便不通諸藥不應者令飲牛乳人乳尤善一日稍通三日而痊

淋瀝類

產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起數熱則小便澀痛故謂之淋有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血即流滲於胞中故血隨小便出而為血淋淋者淋瀝之謂也

茅根湯 治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之

白茅根八兩 瞿麥穗 白茯苓各四兩 葵子

人參各二兩 蒲黃 桃膠 滑石 甘草各一兩

紫貝十枚 石首魚頭中石二十枚燒

右劉散每服四大錢水一盞半姜三片灯心二十

莖煎至七分去滓温服亦可為末木通煎湯調下

二錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調下

滑石散 療產後淋

滑石一兩二錢半研 通草 車前子 葵子各一兩

右為末以漿水調服方寸七至二七為妙

張不愚方 療產後小便不通淋悶

陳皮一兩去白為末 空心温酒調下二錢一服便通

魚齒散 治產後淋小便痛及血淋

白茅根五兩 瞿麥 車前子各一兩

鯉魚齒一百枚為末 通草三兩 冬葵子二合

右水二升煮取一升入魚齒末空心服

灸法 產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未

產之時因積冷氣遂致產時尿胞運動不順

用蓋於產婦臍中填與臍平用葱白剝去粗皮十

餘根作一縛切作一指厚安蓋上用大艾炷蒲葱

并子大小以火灸之覺熱氣直入腹中即時便通

神驗

小便類

產後小便數者乃氣虛不能制或因穩婆不慎以

致胞損而小便淋瀝或因膀胱氣虛而小便頻數

或膀胱陰虛而小便淋瀝隨經補治之

業螺蛸散 治產後小便數及遺尿

業螺蛸三十枚煨 鹿茸酥炙 黃芪各三兩 牡蠣煨

人參 厚朴 赤石脂各二兩

右為末空心粥飲調下二錢

括蕒湯 療產後小便數兼渴

業螺蛸 甘草並炙 黃連 生姜各二兩

括蕒根三兩 人參三兩 大棗五十枚

右細切用水七升煮二升半分三服忌猪肉冷水

又方 治產後小便數及遺尿

益智仁為末米飲調下

小便不禁類

小便不禁類

小便不禁類

婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無禁或因收
生不謹損破尿脬致患此疾

止遺方 產後尿不禁而微浮暑發熱于午後此膀胱為坐婆所傷

黃芪 歸身尾 芍藥 各一錢半 白木 一錢

人參 陳皮 各五分 甘草 炙少許

右水煎熱服之

廣濟方 治產後小便不禁

鷄尾毛燒存性酒調下一七日三服

亂產全書 卷四 四十一

千金方 治產後遺尿不知出

白薇 芍藥 各等分

右為末酒服方寸匕日三

固脬散 治婦人臨產時傷手脬破小便不禁

黃絲絹 以清水洗去灰令淨入黃蠟半兩

案一兩茅根二錢 馬尾勃末二錢

右用水二升再煎至一盞空心頓服服時飲氣服

之不得作聲作聲無驗

補脬飲 治產後傷動脬破終日不小便但淋濕不

亂產全書 卷四 四十二

乾

生絲絹 黃色者 白牡丹皮根木 白茯苓 各一錢

用水一碗煎至絹爛如飴服之勿作聲作聲無效

鷄內金散 治產後溺床失禁

以鷄脰一具并腸洗燒為末酒調服方寸匕

小便出血類

產後小便出血者因氣虛而熱乘之血得熱則流

散滲於胞內故血隨小便出

血餘散 治小便利血

亂產全書 卷四 四十二

亂髮 湯洗垢 膩淨

右燒研為末米飲調服方寸匕

又方

用滑石研髮灰等分每服一錢地黃汁調下

雀氏方 療產後血滲入大小腸

蜜一大 車前子 搗汁 一升

右相和煎沸分兩服

補遺方 治產後小便出血

川牛膝 水煎服

又方

生地黄汁升半 生姜自然汁升半

右相和服之

陰脫產門不開類

婦人趨產勞力勞熱太過致陰下脫若脫肛狀及

陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水續

續小便淋露

硫黃散 治產後勞傷陰脫

硫黃 烏賊魚骨各半 五味子三錢

右為末摻患處

桃仁膏 治產後陰腫妨悶

桃仁去皮尖 枯礬 五倍子各等分

右以下二味為末研桃仁為膏拌勻傳之

硫黃湯 治產勞玉門開而不閉

硫黃四兩 吳茱萸 兔系子各一兩半 蛇床子一兩

右每服四錢水一碗煎數沸濾滓洗玉門日再洗

熨法

單炒蛇床子乘熱布裹熨患處亦治產後陰痛

歸苓散 治陰下脫

當歸 黃芩各二兩 芍藥一兩 蝟皮燒存性

杜礪煨二兩半

共為末每服三錢溫酒米湯任意調下忌登高舉

重

又方 產後子宮不開

補中益氣湯加白芍醋附半夏酒苓熱不絕加酒

類

外治方 治產後陰腫下脫內出玉門不開

凡產後陰腫下脫內出玉門不開

石灰一升炒極熱 湯二升投灰中適溫冷澄清坐水中

以浸玉門斯須平復如故

又方 療產後陰下脫

燒兔頭末傳之

又方 以鐵精粉上推內之

補遺方 治產後生膈不收

用枳殼煎湯坐浸良久即入

又方

草麻子十四粒去殼搗爛塗頂心如收即洗去

又方

五倍子白礬煎湯浸洗良

乳少類

婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱經絡不

調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食之令乳無汁

大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而色帶黃

所生之子怯弱而多疾

漏蘆散

療乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯

凡產全書

卷四

四十五

妳乳脹痛皆蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然肉

消乳汁通行

漏蘆二兩

蛇蛻十條

瓜蒌十個急火

燒焦存性

右為末溫酒調下二錢服藥後即以猪蹄羹投之

又方

葵菜子炒

香

縮砂仁各等

分

右為細末每服二錢熱酒調下滋益氣脈榮衛行

津液極有驗

產寶方

療產後乳無汁

土瓜根

漏蘆各三

甘草二

通草四

右水八升煎取三升分溫三服忌如常法

湧泉散

療產乳無汁亦治乳結癰腫

穿山甲

洗淨一兩

右為細末酒調服方寸匕

鍾乳散

療乳婦氣少血衰脈澁不行乳汁絕少

成煉鍾乳粉研

濃煎漏蘆湯調下二錢

靈苑立効方

粳米

糯米各半

苽苡子一合並

淘淨

凡產全書

卷四

四十六

生甘草半

兩

用水二升煎汁去滓三升直下

羅氏湧泉散

治婦人乳汁因氣絕少

瞿麥穗

麥門冬去

龍骨

穿山甲炮

王不留行各等

分

右為細末每服一錢熱酒調下後吃猪蹄羹少許

吹妳類

產後吹妳者因兒吃妳之次兒忽自睡呼氣不通

乳不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不

通傷結疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳
若不急治腫甚成癰產後吹妳少若緩治結癰致
死時或有之速用皂角散括蕪散傳以天南星散
以手揉之則散矣

括蕪散

乳香一錢 括蕪實一

研勻溫酒煎服

天南星散

南星為末溫湯調以鷲翎蘸塗患處

瓜產全書

卷四

四十七

皂角散

歌曰 婦人吹妳治何如皂角燒灰蛤粉和熱酒

一盃調八字須臾揉散咲呵呵

又方 治妳結腫硬痛

用百藥煎為細末每服三錢酒一盞煎數沸熱服

青葉散

青嫩葉葉研細米飲調攤帛上貼之

妬乳類

妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹

捏其汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯
大渴引飲牢強掣痛手不得近是也初覺即以手
將捏去汁更令傍人助吮引之不爾或作瘡有膿
熱甚必生癰也 輕則為吹乳妬乳重則為癰雖
有專門不可不知

連翹湯 治產後妬乳并癰

連翹 升麻 芒硝 玄參 芍藥 白蘇

防風 射干 大黃 杏仁 甘草

右作一服水二鍾煎一鍾食後服

瓜產全書

卷四

四十八

瓜萋飲 治產後婦乳初結脹不消冷敗乳自退

瓜萋一個半 大粉草一寸半 生薑一塊半

右同剉用酒一碗煮取一盞去滓服之其痛一會

不可忍即搜去敗乳臨卧再一服順所患處乳側

卧於床上令其藥行故也

神應散 治吹乳作癰

葵莖及子 搗篩為散酒服方寸匕即愈

又方 療乳腫將吹結成癰

右以馬溺塗之立愈

赤龍皮湯 凡婦人女子乳頭生小淺熱癢搔之黃
汁出浸淫為長百種瘰不羞者動經年月名為妬
乳

擗皮三升 以水一斗煮取五升夏冷用秋冬

溫之分以洗乳

天麻湯 天麻草五升 以水一斗半煎取一斗隨

寒溫分洗乳以殺痒也洗畢敷膏散

飛鳥膏散 用燒硃砂作水銀上黑烟三兩 煎然令

礬石三兩 燒粉

亂產全書 卷四 孕九

右二味以絹篩細以甲煎和之令如脂以傅乳瘡

日三作

又方 治乳頭破裂痛

苧麻根搗傅之愈

又方 取秋後冷落茄子花裂開者陰乾燒存性水

調塗之

補遺經驗異症治類

婦人無子非藥可療者二若年命相尅墳墓不嗣
是也病夫病婦疾勞傷氣血并侯不調將理失宜

飲食不節乘風取涼冷氣乘虛結於子臟決難有
孕自少有疾多服熱藥天癸早耗終身無子女人
血弱子臟冷滯久不生育丈夫勞傷風虛日暗精
氣不濃精清如水精冷如水不能施化皆宜服藥
產育正治之外更有異症非經圖所載者今廣諸
見聞以備症療治

灸法 女人無子及已經生子久不再孕懷娠不成
者

右以女人右手中指節文一寸五分指向上量之用

胤產全書 卷四 五十

草一條是七寸舒足仰臥以所量草自臍心直垂

下至草盡處以筆點之此不是穴以原草平摺橫

安前點處其草兩頭是穴按之有動脈各灸三壯

如筋杪大極有神効

勝金丸 和血 溫經 治婦人久虛無子及產前後一切病

患兼治男子下虛無力此藥能安胎催生好胎臨

月服五七丸產時減痛婦人無子是子宮冷如服

二十九男女自至又治積年血風脚手麻痺半身

不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結痛吐

逆心痛子死腹中繞臍痛氣滿煩悶失蓋汗不出
月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不禁中
風不語口禁產後痢疾消渴眼目見鬼迷暈敗血
上衝寒熱頭痛面色痿黃淋瀝諸疾血下無度血
痢不止飲食無味產後傷寒虛煩勞悶產後血癖
產後羸瘦凡婦人眾疾不同年深日近並宜服之
一名金不換治婦諸虛不足心腹疼痛

菜本 當歸 石脂赤白皆可 白芍藥 人參

白薇 川芎不見火 牡丹皮 桂心 白芷

乳產全書 卷四 五十一

白朮米泔浸 白茯苓 玄胡各一兩 甘草炙

山藥各五錢

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸溫酒化下
初產了用熱醋湯下食前服此方凡婦人懷身便
服此藥甚有神効常服尤妙

溫中龍骨散治吐脫燥濕 治婦人腹下十二經絕產一日

白帶二日赤帶三日經水不利四日陰胎五日子

藏堅七日藏閉十一日五藏酸痛十二日憂與鬼交

寒十日藏閉十一日五藏酸痛十二日憂與鬼交

並宜服之

龍骨三兩 半夏 黃蘗 龜中黃土 桂心

乾姜各二兩 石膏 滑石各一兩 烏賊魚骨

代赭各四兩 白殭蚕五枚

右治下篩酒服方寸匕日三白多者加烏賊骨殭
蚕各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃柏二
兩子藏堅加乾薑官桂各二兩以上多隨病增之
服藥三月有子即住藥太過多生兩子當審方取
好藥寡婦童女不可妄服

乳產全書 卷四 五十二

小白薇和劑 治婦人衝任虛損子藏受寒久無子

息及斷續不產此由上熱下冷百病滋生或月水
崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因產乳不
能將護路厠太早或久坐濕地或冷風從下入血
藏既虛風邪內乘或月水當行失於調攝傷動胞
絡陰陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪冷結伏致使
胎孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜
汗面上黧黯齒搖髮落脚膝痛重舉動少力並宜
服之

覆盆子 <small>去梗</small>	菖蒲 <small>微炒</small>	遠志 <small>去心</small>	桃仁 <small>去皮尖</small>
白茯苓 <small>去皮</small>	藜蘆 <small>去苗</small>	卷柏 <small>去根</small>	肉桂 <small>去粗皮</small>
人參 <small>各三兩</small>	白龍骨	川椒 <small>去目并合口</small>	
白薇 <small>去苗各一兩</small>	乾薑 <small>炮</small>	細辛 <small>去苗</small>	蛇床子
當歸 <small>去蘆</small>	車前子	芎藭 <small>各半兩</small>	熟地黃
麥門冬 <small>去心各一兩半</small>			

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心用溫酒或米飲送下此藥常服壯筋骨益血氣煖子宮除風冷令人有子

烏鷄煎丸和劑 治婦人胎前產後諸般疾患並皆治之此藥溫經之劑氣血攻補備焉

烏雄鷄 <small>一隻</small>	烏藥	石淋	牡丹皮	人參
白木	黃芪 <small>各一兩</small>	蒼朮 <small>米泔浸切</small>	海桐皮	
肉桂 <small>去粗皮</small>	附子 <small>炮去皮</small>	白芍藥	蓬莪朮	
川烏 <small>炮</small>	紅花	陳皮 <small>各二兩</small>	玄胡索	
肉豆寇	木香	琥珀	熟地黃 <small>洗</small>	草果 <small>各半兩</small>

將上件藥安放鷄肚中用新磁瓶以好酒一斗同

煮令乾去鷄骨以油單盛焙乾爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸

胎前產後傷寒蜜糖酒下 胎前氣悶吐熱炒姜酒下 赤白帶生薑地黃酒下 產後敗血注心童子小便炒薑酒下 產後血塊填築心腹疼痛玄胡索酒下 胎前嘔逆薑湯下 催生炒蜀葵子酒下 安胎鹽酒下 室女經脈當通不通四肢疼痛煎紅花酒下 血氣攻刺心腹疼痛煎當歸酒下 血暈櫻櫚燒灰酒調下 血邪研硃砂

胤產全書 卷四 五十四

麝香酒下 血悶煎烏梅湯研硃砂下 子宮欠冷溫酒或束湯下空心日一服 血風勞人參酒吞下 小腹疔痛炒茴香鹽酒吞下 血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆酒下 常服溫酒醋湯任下並空心食前服

濟陰丹理氣活血消積 治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血冲心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾生下便得無恙治墮胎腹中攻刺痛橫生逆產胎衣不下血暈血癖血崩血滯血入四肢一應血

臟有患及諸種風氣或傷風吐逆咳嗽寒熱往來
遍身生瘡頭痛惡心經脈不調赤白帶下乳生惡
氣胎臟虛冷數曾墮胎崩赤不定因此成疾室女
經脈不通並宜服之當曰煖子宮和血氣悅顏色
退風冷能消除百病

三稜二雨 蓬木一雨切 蒼朮淋浸去皮 枳殼去穢

大艾去梗 劉寄奴 香附子淨 敗薑各一兩半

烏豆三合已上九味以穀醋三升煮乾取出焙乾 當歸身酒蒸

橘皮去白細紅者佳 白芍藥各一兩半 蒲黃酒炒

乳產全書 卷四 五十五

牡丹皮去骨 官桂去粗皮 赤芍藥 片薑黃

青皮去白各一兩 生地黃酒浸 熟地黃酒浸

川芎各七錢半 玄胡索炒 五靈脂酒煮

白朮根各半兩 左為細末以糯米粉穀醋打糊為丸如梧桐子大

每服五十九空心沉香湯送下蘇湯益湯下亦可

莪朮散養氣養血受妊之源 隨証酌量加入

莪朮煨 川芎 當歸 熟地黃酒蒸

白芷 茴香 楊芍藥 甘草各一兩

右為細末每服三錢益酒調下

月水不調勻銀器加灯心 安胎加黃芪生地黃

補虛調氣加生姜紅棗 遍身虛腫加當歸酒

小便不通加滑石末 心虛加硃砂研末調 敗

血冲心腹疼如刀刺燒秤錘紅滓酒如不退五靈

脂酒洗秤遍身疼炒姜酒 吐酸水加丁香七粒

煎湯甚力也空攻眼目浮腫加荆芥 小腹痛加

木瓜艾上惟浮腫用姜湯或葱湯 胃虛惡心加

藿香 冷嗽加葉白皮乾柿 頭痛加川芎細辛

乳產全書 卷四

血風潮熱加生薑紅棗 虛汗加麻黃根 吐不

止加青陳皮 血風腰痛加芸薹子搥碎 女人

血結不通手發變急不知其數薺菜一撮順流水

柳汁下 手足痺痺柳根浸酒 女人血氣成塊

築心銀子灯心 血崩赤白帶真龍骨木好紅酒

調 血風中心狂言亂語渾身壯熱加桃柳枝七

寸 血刺成塊不散菴蒿 女人癖氣膈氣炒茴

香酒 婦人不問虛熱傷風潮熱增寒一切百病

先以三服隨証湯引投之服以他藥調理甚應

冷嗽豬血 心燥豬肝酒 催生順流水滑石禹

徐糧榆白皮坯子乳香葵子酸車草汁煎湯黃炸

葉垂下者 胎衣不下再加茂木地黃竹青 行

血菴蘭生地黃紅花蘇木陳艾減楊芍藥加赤芍

藥 婦人病去經調自成妊娠

溫白丸 治婦人病去繼續而生帶下淋瀝五邪失

心憂愁思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹

中一切疾病有似懷孕連年累月羸瘦因弊或歌

或哭或如鬼所使以上諸証皆令無子服此藥効

凡產全書 卷四

五十二

桔梗 柴胡 菖蒲 吳茱萸 湯泡七次焙乾

紫苑 去苗土 黃連 去毛 肉桂 去粗皮 厚朴 去粗皮姜

炙 人參 茯苓 皂角 去皮子炙 蜀椒 去目并

炒出 巴豆 去皮心膜出油 川烏 炮去皮臍

右為細末研勻煉蜜丸梧子大每服三丸漸加至

五七丸食後臨臥薑湯送下

琥珀澤蘭煎 和 治婦人三十六種血氣八風五痺

七般八般心腹刺痛中風癱瘓手足痲痺乳中結

瘕妊娠胎動胎死不出產永不收血瘵心頭旋

眼花血症四肢渾身浮腫衝任久虛絕產無嗣早

晚服食或因有子經脈不調赤白帶下惡心嘔逆

身體瘦倦懷入月一日一服滑胎易產

琥珀 澤蘭葉 牡丹皮 去心 紫巴戟 去心

茴香 五味子 去梗 五加皮 劉寄奴草 去枝

白芷 川當歸 酒浸 赤芍藥 金釵石斛 酒浸

川芎 白芍藥 生地黃 焙 熟地黃 先

人參 白朮 附子 艾葉 帶炒糯米調成餅焙乾為末各兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前用

凡產全書 卷四

五十三

溫酒磨化服 漏胎刺痛煮糯米飲下 寒熱往

來四肢煩痛煎青蒿酒下 婦人室女經閉煎紅

花酒下 血暈不省人事童子小便和煖酒下

催生鷄子清和酒下 血氣血塊攻刺心腹燒秤

錘淬酒下 傷寒及中風口噤煎麻黃湯下以被

蓋出汗即愈 心驚悸及頭痛薄荷酒下 咳嗽

煎葉白湯下 血氣攻症渾身瘙癢頭面麻痺炒

黑豆浸酒下 產後產前常服不生諸疾甚効

瘡証 孕婦不語非病也問有如此者不須服藥臨

產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則與尋常之藥產後能語則以為醫之功豈其功也哉

黃帝問曰人有重身九月而瘖此為何也岐伯對曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

治婦人生下孩兒但不能發聲謂之瘖生世俗多不知救深為可憫今後有此切不可斷臍將胞衣用

乳產全書

卷四

五九

火炙令暖氣入兒腹內却取貓一隻用青布袋裹其頭足使一伶俐婦人拏住貓頭向兒耳邊以口着力咬破貓耳貓忽大叫一聲兒即省開口發聲遂得生矣

又法兒因難產或逆產下不哭微有氣者即以木父毋真氣度之亦活皆經驗方也



傅青主女科

同治八年湖外
崇文書局開雕

傅青主女科序

序

青主先生於明季時以諸生伏闕上書訟袁臨侯免事
尋得白當時義聲動天下馬文爾義士傳比之裴瑜魏
邵國變後隱居嶺嶠山中四方仰望丰采已未鴻詞之
薦先生堅卧不赴有司敦促就道先生卒守介節

聖祖仁皇帝鑒其誠降

旨傅山文學素著念其年邁從優加銜以示恩榮遂授內閣

中書聽其回籍蓋其高尚之志已久為

聖天子所心重矣而世之稱者乃盛傳其字學與醫術不已

細哉字為六藝之一先生固嘗究心若醫者先生所以

晦迹而逃名者也而名即隨之抑可奇矣且夫醫亦何

可易言自後漢張仲景朔立方書以來幾二千年專門

序

名家罕有窮其奧者先生以餘事及之遽通乎神余讀

兼濟堂文集並脈贖諸書記先生軼事其診疾也微而

減其用方也奇而法有非東垣丹溪諸人所能及者昔

人稱張仲景有神思而乏高韻故以方術名先生既擅

高韻又饒精思賢者不可測如是耶向聞先生有手著

女科並產後書二冊未之見也近得鈔本於友人處乙

酉適世兄王奎章來省試具道李子緝中賢至丙戌冬

果肯贊命付剞劂甚盛德事也故樂為序而行之並述

先生生平大節及

聖朝廣大之典不禁為之掩卷而三歎也道光丁亥夏五月

丹崖張鳳翔題

上海開
書館藏

序

執成方而治病古今之大患也昔人云用古方治今病如拆舊屋蓋新房不經大匠之手經營如何得宜誠哉是言昔張仲景先生作傷寒論立一百一十三方言後世必有執其方以誤人者甚矣成方之不可執也然則今之女科一書何為而刻乎此書為傅青主徵君手著其居心與仲景同而立方與仲景異何言之仲景傷寒論雜症也有五運六氣之殊有中表傳裏之異或太陽太陰不一其稟或內傷外感不一其原或陽極似陰陰極似陽不一其狀非精心辨症因病製方斷不能易危就安應手即愈此書則不然其方專為女科而設其症則為婦女所同帶下血崩調經種子以及胎前產後人

序

雖有虛實寒熱之分而方則極平易精詳之至故用之當時而效傳之後世而無不效非若傷寒雜病必待臨症詳審化裁通變始無貽誤也嘗慨後世方書汗牛充棟然或偏攻偏補專於一家主熱主寒堅執謬論炫一己之才華失古人之精奧仲景而後求其貫徹靈素能收十全之效者不數數觀讀徵君此書談症不落古人窠臼制方不失古人準繩用藥純和無一峻品辨症詳明一目了然病重者十劑奏功病淺者數服立愈較仲景之傷寒論方雖不同而濟世之功則一也此書晉省鈔本甚夥然多秘而不傳間有減去藥味錯亂分量者彼此參證多不相符茲不揣冒昧詳校而重刊之竊願家置一編遇症翻檢照方煎服必能立起沉痾並登壽

域或亦濟人利世之一端也夫

道光十一年新正上元同里後學郝爾誠謹序

序

三

女科上卷目錄 共三十八條 三十一

帶下

白帶 完帶湯

青帶 加減逍遙散

黃帶 易黃湯

黑帶 利火湯

赤帶 清肝止淋湯

血崩

昏暗 固本止崩湯

年老血崩 加減當歸補血湯

少婦血崩 固氣散

交感血出 引精止血湯

女科上

鬱結血崩 平肝開鬱止血湯

閃跌血崩 逐瘀止血湯

血海太熱血崩 清海丸

鬼胎

婦人鬼胎 蕩鬼湯 紅花霹靂散

室女鬼胎 蕩邪散 調正湯

調經

經水先期 水火太旺 清經散 大旺水虧兩地湯

經水後期 溫經攝血湯

經水先後無定期 定經湯

經水數月一行 助仙丹

年老經水復行 安老湯

經水忽來忽斷時疼時止 加味四物湯

經水未來腹先疼 宜鬱通經湯

行經後小腹疼痛 調肝湯

經前腹痛吐血 順經湯

經水將來臍下先疼痛 溫脾化濕湯

經水過多 加減四物湯

經前先洩水 健固湯

經前大便血 順經兩安湯

年未老經水斷 益經湯

種子

身瘦不孕 養精種玉湯

胸滿不思食不孕 井提湯

下部冰冷不孕 溫胞飲

胸滿少食不孕 溫土毓麟湯

少腹急迫不孕 寬帶湯

嫉妬不孕 開鬱種玉湯

肥胖不受孕 加味補中益氣湯

骨蒸夜熱不受孕 清骨滋腎湯

腰酸腹脹不受孕 升帶湯

便澀腹脹足浮腫不受孕 化水種子湯

女科上卷

陽曲傅 山青王手著

白帶下

夫帶下俱是濕症而以帶名者因帶脉不能約束而有此病故以名之蓋帶脉通於任督任督病而帶脉始病帶脉者所以約束胞胎之系也帶脉無力則難以提繫必然胎胞不固故曰帶弱則胎易墜帶傷則胎不牢然而帶脉之傷非獨跌閃挫氣已也或行房而放縱或飲酒而顛狂雖無疼痛之苦而有暗耗之害則氣不能化經水而反變為帶病矣故病帶者惟尼僧寡婦出嫁之女多有之而在室女則少也况加以脾氣之虛肝氣之鬱濕氣之侵熱氣之逼安得不成帶下之病哉故婦人

女科上

帶下

有終年累月下流白物如涕如唾不能禁止甚則臭穢者所謂白帶也夫白帶乃濕盛而火衰肝鬱而氣弱則脾土受傷濕土之氣下陷是以脾精不守不能化榮血以為經水反變成白滑之物由陰門直下欲自禁而不可得也治法宜大補脾胃之氣稍佐以舒肝之品使風木不閉塞於地中則地氣自升騰於天上脾氣健而濕氣消自無白帶之患矣方用完帶湯

白朮 一兩 山藥 一兩 人參 二錢 白芍 五錢
車前子 三錢 蒼朮 三錢 甘草 一錢 陳皮 五分
黑芥穗 五分 柴胡 六分
水煎服 二劑輕 四劑止 六劑則白帶全愈 此方脾胃肝三經同治之法 寓補於散之中 寄消於升之內 開

提肝木之氣則肝血不燥何至下尅脾土補益脾土之元則脾氣不濕何難分消水氣至於補脾而兼以補胃者由裏以及表也脾非胃氣之強則脾之弱不能旺是補胃正所以補脾耳

女科上

帶下

青帶下二

婦人有帶下而色青者甚則綠如菜豆汁稠粘不斷其氣腥臭所謂青帶也夫青帶乃肝經之濕熱肝屬木木色屬青帶下流如菜豆汁明明是肝木之病矣但肝木最喜水潤濕亦水之積似濕非肝木之所惡何以竟成青帶之症不知水為肝木之所喜而濕實肝木之所惡以濕為土之氣故也以所惡者合之所喜必有違者矣肝之性既違則肝之氣必逆氣欲上升而濕欲下降兩相牽掣以停住於中焦之間而走於帶脉遂從陰器而出其色青綠者正以其乘肝木之氣化也逆輕者熱必輕而色青逆重者熱必重而色綠似乎治青易而治綠難然而均無所難也解肝木之火利膀胱之水則青綠

之帶病均去矣方用加減逍遙散

茯苓 五錢 白芍 五錢 甘草 五錢 柴胡 一錢 茵陳 三錢 陳皮 一錢 梔子 三錢

水煎服二劑而色淡四劑而青綠之帶絕不必過劑矣夫逍遙散之立法也乃解肝鬱之藥耳何以治青帶若斯其神與蓋濕熱留於肝經因肝氣之鬱也鬱則必逆逍遙散最能解肝之鬱與逆鬱逆之氣既解則濕熱難留而又益之以茵陳之利濕梔子之清熱肝氣得清而青綠之帶又何自來此方之所以奇而效捷也倘僅以利濕清熱治青帶而置肝氣於不問安有止帶之日哉

按丹元指本體而言濕熱即水不不正之氣所以為邪合者如淨銀傾入於銅便不成正色矣與水混火與一則合為一則不但便矣所以色變原書原無

凡帶症多係脾濕初病無熱但理脾土兼氣其病自愈若濕久清骨火而濕始有去路方用黃柏車前子山藥茯苓尤能清熱生津

黃帶下三

婦人有帶下而色黃者宛如黃茶濃汁其氣腥穢所謂黃帶是也夫黃帶乃任脉之濕熱也任脉本不能容水濕氣安得而入而化為黃帶乎不知帶脉橫生通於任脉任脉直上走於唇齒唇齒之間原有不斷之泉下貫於任脉以化精使任脉無熱氣之繞則口中之津液盡化為精以入於腎矣惟有熱邪存於下焦之間則津液不能化精而反化濕也夫濕者土之氣實水之侵熱者火之氣實木之生水色本黑火色本紅今濕與熱合欲化紅而不能欲返黑而不得煎熬成汁因變為黃色矣此乃不從水火之化而從濕化也所以世之人有以黃帶為脾之濕熱單去治脾而不得痊者是不知真水真

火合成丹邪元邪繞於任脉胞胎之間而化此艸色也單治脾何能痊乎法宜補任脉之虛而清腎火之炎則庶幾矣方用易黃湯

山藥 一兩 芡實 一兩 黃柏 二錢 車前子 一錢 白果 十枚

水煎連服四劑無不全愈此不特治黃帶方也凡有帶病者均可治之而治帶之黃者功更奇也蓋山藥芡實專補任脉之虛又能利水加白果引入任脉之中更為便捷所以奏功之速也至於用黃柏清腎中之火也腎與任脉相通以相濟解腎中之火即解任脉之熱矣

黑帶下四

婦人有帶下而色黑者甚則如黑豆汁其氣亦腥所謂黑帶也夫黑帶者乃火熱之極也或疑火色本紅何以成黑謂為下寒之極或有之殊不知火極似水乃假象也其症必腹中疼痛小便時如刀刺陰門必發腫面色必發紅日久必黃瘦飲食必兼人口中必熱渴飲以凉水少覺覺快此胃火太旺與命門勝三焦之火合而熬煎所以熬乾而變為炭色斷是火熱之極之變而非少有寒氣也此等之症不至發狂者全賴腎水與肺金無病其生生不息之氣潤心濟胃以救之耳所以但成黑帶之症是火結於下而不炎於上也治法惟以洩火為主火熱退而濕自除矣方用利火湯

女科上

黑帶下

本

大黃 三錢 白朮 五錢 茯苓 三錢 車前子 三錢

王不留行 三錢 黃連 三錢 梔子 三錢 知母 二錢

石膏 五錢 劉寄奴 三錢

水煎服一劑小便疼止而通利二劑黑帶變為白三劑白亦少減再三劑全愈矣或謂此方過於迅利殊不知火盛之時用不得依違之法譬如救火之焚而少為遷緩則火勢延燃不盡不止今用黃連石膏梔子知母一派寒涼之品入於大黃之中則迅速掃除而又得王不留行與劉寄奴之利濕甚急則濕與熱俱無停住之機佐白朮以輔土茯苓以滲濕車前以利水則火退水進便成既濟之卦矣

病後常
飲食成
字熱之
調養之
若病後
方病後
服之元
氣交極

赤帶下五

婦人有帶下而色紅者似血非血淋瀝不斷所謂赤帶也夫赤帶亦濕病濕是土之氣宜見黃白之色今不見黃白而見赤者火熱故也火色赤故帶下亦赤耳惟是帶脈繫於腰膈之間近乎至陰之地不宜有火而今見火症豈其路通於命門而命門之火出而燒之耶不知帶脈通於腎而腎氣通於肝婦人憂思傷脾又加鬱怒傷肝於是肝經之鬱火內熾下剋脾土脾土不能運化致濕熱之氣蘊於帶脈之間而肝不藏血亦滲於帶脈之內皆由脾氣受傷運化無力濕熱之氣隨氣下陷同血俱下所以似血非血之形象現於其色也其實血與濕不能兩分世人以赤帶屬之心火誤矣治法須清肝

女科上

赤帶下

本

火而扶脾氣則庶幾可愈方用清肝止淋湯

白芍 一兩 當歸 一兩 生地 五錢 阿膠 三錢 白粉丹皮 三錢 黃柏 二錢 牛膝 二錢 香附 一錢

紅棗 十個 小黑豆 一兩

水煎服一劑少止二劑又少止四劑全愈十劑不再發此方但主補肝之血全不利脾之濕者以赤帶之為病火重而濕輕也夫火之所以旺者由於血之衰補血即足以制火且水與血合而成赤帶之症竟不能辨其是濕非濕則濕亦盡化而為血矣所以治血則濕亦除又何必利濕之多事哉此方之妙妙在純於治血少加清火之味故奏功獨奇倘一利其濕反引火下行轉難速效矣或問曰先生前言助其脾土

不用參朮
若檢妙此
症皆誤認
為血漏也
其久則成
崩漏參朮
之多不見
效亦帶凡
其若年逾
四九公水
將止其煩
頻見此症
崩漏宜
分別治之
五帶症古
方多有不
應者然
未日病原
此書將透

病原故用
無不效

之氣今但補其肝木之血何也不知用芍藥以平肝
則肝氣得舒肝氣舒自不克上脾不受尅則脾土自
旺是平肝正所以扶脾耳又何必加人參白朮之品
以致累事哉

女科上

而下

七

力者用遠
人參三錢
煎成沖服
取炭末一
錢服之待
氣息微旺
然後服此
方仍加首
末不見一
效無不見
用無不見
酒沖服其
炭末三錢
服之待其
氣按神清
始可服此
方人參以
四錢亦加
一錢沖服

若血崩數
日六脈俱
無身中微
微有息不
可遠服此
方恐氣弱
脫不能受
峻補也

血崩昏暗六

婦人有一時血崩兩目黑暗昏暈在地不省人事者人
莫不謂火盛動血也然此火非實火乃虛火耳世人一
見血崩往往用止澁之品雖亦能取效於一時但不
補陰之藥則虛火易於沖擊恐隨止隨發以致經年累
月不能全愈者有之是止崩之藥不可獨用必須於補
陰之中行止崩之法方用固本止崩湯

大熟地一兩 白朮一兩 黃芪三錢 當歸五錢
黑姜二錢 人參三錢

水煎服一劑崩止十劑不再發倘畏藥味之重而減
半則力薄而不能止方妙在全不去止血而惟補血
又不止補血而更補氣非惟補氣而更補火蓋血崩

女科上

血崩

本

而至於黑暗昏暈則血已盡去僅存一線之氣以為
護持若不急補其氣以生血而先補其血而遺氣則
有形之血恐不能遽生而無形之氣必且至盡散此
所以不先補血而先補氣也然單補氣則血又不易
生單補血而不補火則血又必凝滯而不能隨氣而
速生況黑薑引血歸經是補中又有收斂之妙所以
同補氣補血之藥並用之耳

年老血崩七

亦有婦婦
年老血崩
者必係氣
冲血室原
方加杭芍
炭三錢貫
眾疾三錢
補效

婦人有年老血崩者其症亦與前血崩昏暗者同人以爲老婦之虛耳誰知是不慎房幃之故乎夫婦人至五十歲之外天癸匱乏原宜閉關守塞不宜出陣戰爭苟或適興不過草草了事尚不至腎火大動倘與酣浪戰亦如少年之好合鮮不血室大開崩決而墜矣方用加減當歸補血湯

當歸一兩洗黃芪一兩三七根末三錢桑葉十四片

水煎服二劑而血少止四劑不再發然必須斷慾始除根若再犯色慾未有不重病者也夫補血湯乃氣血兩補之神劑三七根乃止血之聖藥加入桑葉者所以滋腎之陰又有收斂之妙耳但老婦陰精既虧

女科上

血崩

丸

用此方以止其暫時之漏實有奇功而不可責其永遠之績者以補精之味尙少也服此四劑後再增入白木五錢熟地一兩山藥四錢麥冬三錢北五味一錢服百劑則崩漏之根可盡除矣

少婦血崩八

妊娠宜避
房事不避
者縱幸不
至崩往不
墮胎即往
亦難養子
之戒之慎

有少婦甫娠三月即便血崩而胎亦隨墮人以爲挫閃受傷而致誰知是行房不慎之過哉夫少婦行房亦事之常耳何便血崩蓋因元氣衰弱事難兩顧一經行房洩精則妊娠無所依養遂致崩而且墮凡婦人之氣衰即不耐久戰若貪歡久戰則必洩精太甚氣每不能攝夫血矣況氣弱而又娠再加以久戰內外之氣皆動而血又何能固哉其崩而墮也亦無怪其然也治法自當以補氣爲主而少佐以補血之品斯爲得之方用固氣湯

人參一兩 白木五錢大熟地五錢當歸三錢白茯苓二錢甘草一錢杜仲三錢山萸肉二錢

女科上

血崩

十

遠志一錢五味子十粒水煎服一劑而血止連服十劑全愈此方固氣而兼補血已去之血可以速生將脫之血可以盡攝凡氣虛而崩漏者此方最可通治非僅治小產之崩其最妙者不去止血而止血之味含於補氣之中也

欲種子者
必待三紅
後即三十
時長兩日
牛也經來
之時數足
三十時辰
便可入房
一日男二
日女三日
男四日女
五日男六
日女七日
男過七日
即不能受
孕矣

交感血出九

婦人有一交合則流血不止者雖不至於血崩之甚而終年累月不得愈未免血氣兩傷久則恐有血枯經閉之憂此等之病成於經水正來之時貪歡交合精冲血管也夫精冲血管不過一時之傷精出宜愈何以久而流紅不知血管最嬌嫩斷不可以精傷凡婦人受孕必於血管已淨之時方保無虞倘經水正旺彼欲湧出而精射之則欲出之血反退而縮入既不能受精而成胎勢必至集精而化血交感之際淫氣觸動其舊日之精則兩相感召舊精欲出而血亦隨之而出治法須通其胞胎之氣引舊日之集精外出而益之以清氣補精之藥則血管之傷可以補完矣方用引精止血湯

女科上

血崩

主

人參 五錢 白朮 一兩 茯苓 三錢 熟地 九錢
山萸肉 五錢 黑薑 一錢 黃柏 五分 芥穗 三錢
車前子 三錢
水煎連服四劑愈十劑不再發此方用參朮以補氣用地黃以補精精氣既旺則血管流通加入茯苓車前以利水與竅水利則血管亦利又加黃柏爲引直入血管之中而引夙精出於血管之外芥穗引敗血出於血管之內黑薑以止血管之口一方之中實有調停曲折之妙故能祛舊病而除陳痼然必須慎房幃三月破者始不至重傷而補者始不至重損否則不過取目前之效耳其慎之哉宜寡慾

鬱結血崩十

婦人有懷抱甚鬱口乾舌渴嘔吐吞酸而血下崩者人皆以火治之時而效時而不效其故何也是不識爲肝氣之鬱結也夫肝主藏血氣結而血亦結何以反至崩漏蓋肝之性急氣結則其急更甚更急則血不能藏故崩不免也治法宜以開鬱爲主若徒開其鬱而不知平肝則用氣大開肝火更熾而血亦不能止矣方用平肝開鬱止血湯

白芍 一兩 白朮 一兩 當歸 一兩 丹皮 三錢
三七根 三錢 生地 三錢 甘草 二錢 黑芥穗 二錢
柴胡 一錢

女科上

血崩

主

妙在白芍之平肝柴胡之開鬱白朮利腰膈則血無積住之虞荆芥通經絡則血有歸還之樂丹皮及清骨髓之熱生地復清膜腑之炎當歸三七於補血之中以行止血之法自然鬱結散而血崩止矣

閃跌血崩十一

婦人有升高墜落或閃挫受傷以致惡血下流有如血崩之狀者若以崩治非徒無益而又害之也蓋此症之狀必手按之而疼痛久之則面色痿黃形容枯槁乃是瘀血作祟並非血崩可比倘不知解瘀而用補溢則瘀血內攻疼無止時反致新血不得生舊血無由化死不能悟豈不可傷哉治法須行血以去瘀活血以止疼則血自止而愈矣方用逐瘀止血湯

生地酒炒一兩 大黃三錢 赤芍三錢 丹皮一錢
當歸尾五錢 枳殼炒五錢 龜版醋炙三錢 桃仁炒十粒 泡
水煎服一劑疼輕二劑疼止三劑血亦全止不必再服矣此方之妙妙於活血之中佐以下滯之品故逐

女科上

瘀如掃而止血如神或疑跌閃升墜是由外而傷內雖不比內傷之重而既已血崩則內之所傷亦不為輕何以只治其瘀而不顧氣也殊不知跌閃升墜非由內傷以及外傷者可比蓋本實不撥去其標病可耳故曰急則治其標

凡跌打損傷我血
如血皆宜
如此治法
若血聚胃
中宜加川
厚樸一錢
半姜汁炒

血海太熱血崩十二

婦人有每行人道經水即來一如血崩人以爲胞胎有傷觸之以動其血也誰知是子宮血海因太熱而不固乎夫子宮即在胞胎之下而血海又在胞胎之上血海者衝脉也衝脉太寒而血即虧衝脉太熱而血即沸血崩之爲病正衝脉之太熱也然既由衝脉之熱則應常崩而無有止時何以行人道而始來果與肝木無恙耶夫脾健則能攝血肝平則能藏血人未入房之時君相二火寂然不動雖衝脉獨熱而血亦不至外馳及有人道之感則子宮大開君相火動以熱招熱同氣相求翕然齊動以鼓其精房血海泛濫有不能止遏之勢肝欲藏之而不能脾欲攝之而不得故經水隨交感而至若

女科上

有聲應之捷是惟火之爲病也治法必須滋陰降火以清血海而和子宮則終身之病可半載而除矣然必絕慾三月而後可方用清海丸

大熟地九蒸一斤 山萸十兩 山藥十兩 丹皮十兩
北五味二兩 麥冬肉十兩 白朮一斤 白芍一斤
龍骨二兩 地骨皮十兩 乾桑葉一斤 元參一斤
沙參十兩 石斛十兩

右十四味各爲細末合一處煉蜜丸桐子大早晚每服五錢白滾水送下半載全愈此方補陰而無浮動之慮縮血而無寒涼之苦日計不足月計有餘潛移默奪子宮清涼而血海自固倘不揣其本而齊其末徒以髮灰白礬黃連炭玉煇子等藥末以外治其幽

凡血崩症
最宜絕慾
避房無辜
少年人欲
此病欲故
服藥往往
不效若三
月後服止
病愈而房
事仍無節
制必復成
勞傷之

隱之處山恐愈澁而愈流終必至於敗亡也可不慎與

女科上

血崩

毒

鬼祟之事
然者非道
然城市鄉
曲往往有
是症不可
不察其勿
以此言為
荒唐也

婦人有腹似懷妊終年不產甚至二三年不生者此鬼胎也其人必面色黃瘦肌膚消削腹大如斗厥所由來必素與鬼交或入神廟而興雲雨之思或遊山林而起交感之念皆能召祟成胎幸其人不至淫蕩見祟而有驚惶遇合而生愧惡則鬼祟不能久戀一交媾即遠去然淫妖之氣已結於腹遂成鬼胎其先尚未覺迨後漸漸腹大經水不行內外相色一如懷胎之狀有似血臟之形其實實是鬼胎而非胎也治法必須以逐穢為主然人至懷胎數年不產即非鬼胎亦必氣血衰微況此非真妊則邪氣必旺正不敵邪其虛弱之狀必有可拘烏可純用迅利之藥以祛蕩乎必於補中逐之為的也方

女科上

鬼胎

末

用蕩鬼湯

人參 一兩 當歸 一兩 大黃 一兩 雷丸 三錢

川牛膝 三錢 紅花 三錢 丹皮 三錢 枳殼 一錢

厚樸 一錢 小桃仁 三十粒

水煎服一劑腹必大鳴可瀉惡物半桶再服一劑又瀉惡物而愈矣斷不可復用三劑也蓋雖補中用逐未免迅利多恐傷損元氣此方用雷丸以祛穢又得大黃之掃除且佐以厚樸紅花桃仁等味皆善行善攻之品何邪之尚能留腹中而不盡逐下也哉尤妙在用參歸以補氣血則邪去而不傷若單用雷丸大黃以迅下之必有氣脫血崩之患矣倘或知是鬼胎如室女寡婦輩邪氣雖盛而真氣未漓可用岐

天師新傳紅花霹靂散紅花半斤大黃五兩雷九兩三水煎服亦能下胎然未免太於迅利過傷氣血不若蕩鬼湯之有益無損為愈也在人臨症時斟酌而善用之耳

女科上

鬼胎

七

此方陰陽大矣見有因此病者憤而蹈於非命於妙而深為可憐此方不靈宜服性香平胃散無不見效愈後宜調養氣血節飲食肉桂去粗皮一錢以上一錢

室女鬼胎十四

女子有在家未嫁月經忽斷腹大如妊面色乍赤乍白六脉乍大乍小以為血結經閉也誰知是靈鬼憑身乎夫人之身正則諸邪不敢侵其身不正則諸邪自來犯或精神恍惚而夢裏求親或眼目昏花而對面相狎或假托親屬而暗處貪歡或明言仙人而靜地取樂其始則驚詫為奇遇而不肯告人其後則羞赧為淫褻而不敢告人日久年深腹大如斗有如懷妊之狀一身之精血僅足以供腹中之邪則邪日旺而正日衰勢必至經閉而血枯後雖欲導其經而邪據其腹則經亦難通欲生其血而邪食其精則血實難長醫以為胎而實非真胎又以為瘕而非瘕病往往因循等待非因羞憤而亡其生即成勞瘵而終不起至死不悟不重可悲哉治法似宜補正以祛邪然邪不先祛補正亦無益也必須先祛邪而後補正斯為得之方用蕩邪散

女科上

鬼胎

本

雷九六錢桃仁六十當歸一兩丹皮一兩甘草四錢

水煎服一劑必下惡物半桶再服調正湯治之

白朮五錢蒼朮五錢茯苓三錢陳皮一錢貝母一錢

薏米五錢

水煎連服四劑則脾胃之氣轉而經水漸行矣前方蕩邪後方補正實有次第或疑身懷鬼胎必大傷其血所以經閉今既墜其鬼胎矣自當大補其血乃不補血而反補胃氣何故蓋鬼胎中人其正氣大虛可知氣虛則血必不能驟生欲補血必先補氣是補氣

中之熱骨中之熱由於腎經之熱清其骨髓則腎氣自清而又不損傷胃氣此治之巧也況所用諸藥又純是補水之味水盛而火自平理也此條與上條參觀斷無誤治先期之病矣

女科上

調經

三

經水後期十六

婦人有經水後期而來多者人以爲血虛之病也誰知非血虛乎蓋後期之多少實有不同不可執一而論蓋後期而來少血寒而不足後期而來多血寒而有餘夫經本於腎而其流五臟六腑之血皆歸之故經來而諸經之血盡來附益以經水行而門啟不遑迅闔諸經之血乘其隙而皆出也但血既出矣則成不足治法宜於補中溫散之不得曰後期者俱不足也方用溫經攝血湯

大熟地一兩 白芍一兩 川芎五分 白朮五錢

柴胡五分 五味子三分 肉桂五分 續斷一錢

水煎服三劑而經調矣此方大補肝腎脾之精與血

女科上

調經

三

加肉桂以祛其寒柴胡以解其鬱是補中有散而散不耗氣補中有洩而洩不損陰所以補之有益而溫之收功此調經之妙藥也而攝血之仙丹也凡經來後期者俱可用倘元氣不足加人參一二錢亦可

經水先後無定期 十七

婦人有經來斷續或前或後無定期人以爲氣血之虛也誰知是肝氣之鬱結乎夫經水出諸腎而肝爲腎之子肝鬱則腎亦鬱矣腎鬱而氣必不宣前後之或斷或續正腎之或通或閉耳或曰肝氣鬱而腎氣不應未必至於如此殊不知子母關切子病而母必有顧復之情肝鬱而腎不無繼繼之誼肝氣之或閉或閉即腎氣之或去或留相因而致又何疑焉治法宜舒肝之鬱即開腎之鬱也肝腎之鬱既開而經水自有一定之期矣方用定經湯

兔絲子 酒炒 一兩
白芍 酒炒 一兩
當歸 酒洗 一兩
大熟地 九蒸 五錢
山藥 五錢
白茯苓 三錢
芥穗 炒 黑 柴胡 五分

女科上

調經

圭

水煎服二劑而經水淨四劑而經期定矣此方舒肝腎之氣非通經之藥也補肝腎之精非利水之品也肝腎之氣舒而精通肝腎之精旺而水利不治之治正妙於治也

宜加蘇葉 一錢有內
傷者宜加 神曲二錢
食積滯者 再加東山
直肉須炒 用之若肝
氣鬱抑又 當以道通
散爲主有 熱加梔子
丹皮即加 味道通散

婦人一年一行 經身健後 經月復 反月或至 行經或至 五月至七 月經止不 等前男皆 成人或以

爲嬰或亦 仙骨之所 致乎亦造 化令人不 測耶

經水數月一行 十八

婦人有數月一行經者每以爲常亦無或先或後之異亦無或多或少之殊人莫不以爲異而不知非異也蓋無病之人氣血兩不虧損耳夫氣血既不虧損何以數月而一行經也婦人之中亦有天生仙骨者經水必一季一行蓋以季爲數而不以月爲盈虛也真氣內藏則坎中之真陽不損倘加以煉形之法一年之內便易飛騰無如世人不知見經水不應月來誤認爲病妄用藥餌本無病而治之成病是治反不如其不治也山間異人之教特爲闡揚使世人見此等行經不必妄行治療萬勿疑爲氣血之不足而輕一試也雖然天生仙骨之婦人世固不少而嗜慾損天之人亦復甚多又不可不

女科上

調經

圭

立一療救之方以輔之方名助仙丹

白茯苓 五錢
陳皮 五錢
白朮 三錢
白芍 三錢
山藥 三錢
兔絲子 二錢
杜仲 一錢
甘草 一錢

河水煎服四劑而仍如其舊不可再服也此方平補之中實有妙理健脾益腎而不滯解鬱清痰而不洩不損天然之氣血便是調經之大法何得用他藥以冀通經哉

年老經水復行 十九

婦人有年五十外或六七十歲忽然行經者或下紫血塊或如紅血淋人或謂老婦行經是還少之象誰知是血崩之漸乎夫婦人至七七之外天癸已竭又不服濟陰補陽之藥如何能精滿化經一如少婦然經不宜行而行者乃肝不藏脾不統之故也非精過洩而動命門之火即氣鬱甚而發龍雷之炎二火交發而血乃奔矣有似行經而實非經也此等之症非大補肝脾之氣與血而血安能驟止方用安老湯

加貫仲炭一錢研細末以藥沖服尤妙

人參 一兩 黃芪 一兩 大熟地 九錢 白朮 五錢

當歸 五錢 山萸 五錢 阿膠 一錢 黑芥穗 一錢

甘草 一錢 香附 五分 木耳炭 一錢

女科上

調經

養

水煎服一劑減二劑尤減四劑全減十劑愈此方補益肝脾之氣氣足自能生血而攝血尤妙大補腎水水足而肝氣自舒肝舒而脾自得養肝藏之而脾統之又安有洩漏者又何慮其血崩哉

經水忽來忽斷時疼時止 二十

婦人有經水忽來忽斷時疼時止寒熱往來者人以爲血之凝也誰知是肝氣不舒乎夫肝屬木而藏血最惡風寒婦人當行經之際腠理大開適逢風之吹寒之襲則肝氣爲之閉塞而經水之道路亦隨之而俱閉由是腠理經絡各皆不宣而寒熱之作由是而起其氣行於陽分則生熱其氣行於陰分則生寒然此猶感之輕者也倘外感之風寒更甚則內應之熱氣益深往往有熱入血室而變爲如狂之症一似遇鬼之狀者若但往來寒熱是風寒未甚而熱未深耳治法宜補肝中之血通其鬱而散其風則病隨手而效所謂治風先治血血和風自滅此其一也方用加味四物湯

加荆芥穗一錢炒黑一錢尤妙

女科上

調經

養

大熟地 一兩 白芍 五錢 當歸 五錢 川芎 三錢

白朮 五錢 粉丹皮 三錢 元胡 一錢 甘草 一錢

柴胡 一錢

水煎服此方用四物以滋脾胃之陰血用柴胡白芍丹皮以宣肝經之風鬱用甘草白朮元胡以利腰膈而和腹疼入於表裏之間通乎經絡之內用之得宜自奏功如響也

經水未來腹先疼 二十一

婦人有經前腹痛數日而後經水行者其經來多是紫黑塊人以爲寒極而然也誰知是熱極而火不化乎夫肝屬木其中有火舒則通暢鬱則不揚經欲行而肝不應則抑拂其氣而疼生然經滿則不能內藏而肝中之鬱火焚燒內通經出則其火亦因之而怒洩其紫黑者水火兩戰之象也其成塊者火煎成形之狀也經失其爲經者正鬱火內奪其權耳治法似宜大洩肝中之火然洩肝之火而不解肝之鬱則熱之標可去而熱之本未除也其何能益方用宣鬱通經湯

白芍 五錢 當歸 五錢 丹皮 五錢 山梔子 三錢
白芥子 二錢 柴胡 一錢 香附 一錢 川鬱金 一錢
醋炒

女科上

調經

素

黃芩 一錢 生甘草 一錢

水煎連服四劑下月斷不先腹痛而後行經矣此方補肝之血而解肝之鬱利肝之氣而降肝之火所以奏功之速

行經後少腹疼痛 二十二

婦人有少腹疼於行經之後者人以爲氣血之虛也誰知是腎氣之涸乎夫經水者乃天一之真水也滿則溢而虛則閉亦其常耳何以虛能作疼哉蓋腎水一虛則水不能生木而肝木必尅脾土木土相爭則氣必逆故爾作疼治法必須以舒肝氣爲主而益之以補腎之味則水足而肝氣益安肝氣安而逆氣自順又何疼痛之有哉方用調肝湯

山藥 五錢 阿膠 三錢 當歸 三錢 白芍 三錢
山萸肉 三錢 巴戟 一錢 甘草 一錢

水煎服此方平調肝氣既能轉逆氣又善止鬱疼經後之症以此方調理最佳不特治經後腹痛之症也

女科上

調經

素

不可減去一味

經後痛不可加減若有別症亦宜此方爲主另加藥味治之原方

經水過多 二十五

婦人有經水過多行後復行面色痿黃身體倦怠而困乏愈甚者人以爲血熱有餘之故誰知是血虛而不歸經乎夫血旺始經多血虛當經縮今日血虛而反經多是何言與殊不知血歸於經雖旺而經亦不多血不歸經雖衰而經亦不少世之人見經水過多謂是血之旺也此治之所以多錯耳倘經多果是血旺自是健壯之體須當一行即止精力如常何至一行後而再行而困乏無力耶惟經多是血之虛故再行而不勝其困乏血損精散骨中髓空所以不能色華於面也治法宜大補血而引之歸經又安有行後復行之病哉方用加減四物湯

女科上

調經

三

別芥穗炭
能引血歸
經方妙極
不可輕易
加減

大熟地

一兩

白芍

三錢

當歸

五錢

川芎

二錢

酒洗

白木

五錢

黑芥穗

三錢

山萸

三錢

續斷

一錢

酒洗

甘草

一錢

水煎服四劑而血歸經矣十劑之後加人參三錢再服十劑下月行經適可而止矣夫四物湯乃補血之神品加白木荆芥補中有利加山萸續斷止中有行加甘草以調和諸品使之各得其宜所以血足而歸經歸經而血自靜矣

經前洩水 二十六

婦人有經未來之前洩水三日而後行經者人以爲血旺之故誰知是脾氣之虛乎夫脾統血脾虛則不能攝血矣且脾屬濕土脾虛則土不實土不實而濕更甚所以經水將動而脾先不因脾經所統之血欲流注於血海而濕氣乘之所以先洩水而後行經也調經之法不在先治其水而在先治其血抑不在先治其血而在先補其氣蓋氣旺而血自能生抑氣旺而濕自能除且氣旺而經自能調矣方用健固湯

人參

五錢

白茯苓

三錢

白木

一兩

巴戟

五錢

鹽水浸

薏苡仁

三錢

水煎連服十劑經前不洩水矣此方補脾氣以固脾

女科上

調經

三

血則血攝於氣之中脾氣日盛自能運化其濕濕既化爲烏有自然經水調和又何至經前洩水哉

經前大便下血二十七

婦人有行經之前一日大便先出血者人以爲血崩之症誰知是經流於大腸乎夫大腸與行經之路各有分別何以能入乎其中不知胞胎之系上通心而下通腎心腎不交則胞胎之血兩無所歸而心腎二經之氣不來照攝聽其自便所以血不走小腸而走大腸也治法若單止大腸之血則愈止而愈多若擊動三焦之氣則更拂亂而不可止蓋經水之妄行原因心腎之不交今不使水火之既濟而徒治其胞胎則胞胎之氣無所歸而血安有歸經之日故必大補其心與腎使心腎之氣交而胞胎之氣自不散則大腸之血自不妄行而經自順矣方用順經兩安湯

女科上

調經

毒

當歸五錢 白芍五錢 大熟地五錢 山萸肉二錢
人參三錢 白朮五錢 麥冬五錢 黑芥穗二錢

巴戟肉一錢 升麻四分

水煎服二劑大腸血止而經從前陰出矣三劑經止而兼可受妊矣此方乃大補心肝腎三經之藥全不去顧胞胎而胞胎有所歸者以心腎之氣交也蓋心腎虛則其氣兩分心腎足則其氣兩合心與腎不離而胞胎之氣聽命於二經之攝又安有妄動之形哉然則心腎不交補心腎可也又何兼補夫肝木耶不知肝乃腎之子心之母也補肝則肝氣往來於心腎之間自然上引心而下入於腎下引腎而上入於心不啻介紹之功也此使心腎相交之一大法門不特

精神即不能照常矣用者辨之

調經而然也學者其深思諸

女科上

調經

毒

牛膝 歸身 鹿膠 鹿角 鹿茸 鹿胎 鹿髓 鹿腦 鹿血 鹿脂 鹿骨 鹿筋 鹿皮 鹿毛 鹿鬃 鹿尾 鹿角 鹿茸 鹿胎 鹿髓 鹿腦 鹿血 鹿脂 鹿骨 鹿筋 鹿皮 鹿毛 鹿鬃 鹿尾

若大便下血過多精神短少人愈消瘦必係肝氣不舒久鬱傷脾脾傷不健能統血又當分別治之方用補血黃芪

年未老經水斷二十八

經云女子七七而天癸絕有年未至七七而經水先斷者人以爲血枯經閉也誰知是心肝脾之氣鬱乎使其血枯安能久延於人世醫見其經水不行妄謂之血枯耳其實非血之枯乃經之閉也且經原非血也乃天一之水出自腎中是至陰之精而有至陽之氣故其色赤紅似血而實非血所以謂之天癸世人以經爲血此千古之誤牢不可破倘果是血何不名之曰血水而曰經水乎古昔聖賢創呼經水之名者原以水出於腎乃癸子之化故以名之無如世人沿襲而不深思其旨皆以血視之然則經水早斷似乎腎水衰涸吾以爲心肝脾氣之鬱者蓋以腎水之生原不由於心肝脾而腎水之

女科上

調經

素

化實有關於心肝脾使水位之下無土氣以承之則水溢滅火腎氣不能化火位之下無水氣以承之則火炎鍊金腎氣無所生木位之下無金氣以承之則木妄破土腎氣無以成倘心肝脾有一經之鬱則其氣不能入於腎中腎之氣即鬱而不宣矣況心肝脾俱鬱即腎氣真足而無虧尚有茹而難吐之勢矧腎氣本虛又何能盈滿而化經水外洩耶經曰亢則害此之謂也此經之所以閉塞有似乎血枯而實非血枯耳治法必須散心肝脾之鬱而大補其腎水仍大補其心肝脾之氣則精溢而經水自通矣方用益經湯

大熟地九兩 白朮一兩 山藥五錢 當歸五錢
白芍三錢 生棗仁三錢 丹皮二錢 沙參三錢

善醫者祇用此而純大藥靈膠

不謂奇者
立效無效
反致百病
藥生凡用
金石爲上
品者戒之

柴胡一錢 杜仲炒黑一錢 人參二錢
水煎連服八劑而經通矣服三十劑而經不再閉兼可受孕此方心肝脾腎四經同治藥也妙在補以通之散以開之倘徒補則鬱不開而生火徒散則氣益衰而耗精設或用攻堅之劑辛熱之品則非徒無益而又害之矣

女科上

調經

素

身瘦不孕二十九

婦人有瘦怯身軀久不孕育一交男子即臥病終朝人以為氣虛之故誰知是血虛之故乎或謂血藏於肝精涵於腎交感乃洩腎之精與血虛何與殊不知肝氣不開則精不能洩腎精既洩則肝氣亦不能舒以腎為肝之母母既洩精不能分潤以養其子則木燥乏水而火且暗動以鑠精則腎愈虛矣况瘦人多火而又洩其精則水益少而火益熾水雖制火而腎精空乏無力以濟成火在水上之卦所以倦忘而臥也此等之婦偏易動火然此火因貪慾而出於肝木之中又是虛燥之火絕非真火也且不交合則已交合又偏易走洩此陰虛火旺不能受孕即偶爾受孕必致過乾男子之精隨種而

女科上

種子

三

隨消者有之治法必須大補腎水而平肝木水旺則血旺血旺則火消便成水在火之上卦方用養精種玉湯大熟地九蒸當歸酒洗五錢白芍酒炒五錢山萸肉蒸熟五錢水煎服三月便可身健受孕斷可種子此方之用不特補血而純於填精精滿則子宮易於攝精血足則子宮易於容物皆有子之道也惟是貪慾者多節慾者少往往不驗服此者果能節慾三月心靜神清自無不孕之理否則不過身體壯健而已勿咎方之不靈也

服藥三月後不受孕仍照原方加杜仲五錢續斷二錢白朮二錢

胸滿不思食不孕三十

婦人有飲食少思胸膈滿悶終日倦怠思睡一經房事呻吟不已人以爲脾胃之氣虛也誰知是腎氣不足乎夫氣宜升騰不宜消降升騰於上焦則脾胃易於分運降陷於下焦則脾胃難於運化人之水穀之養則精神自爾倦怠脾胃之氣可升而不可降也明甚然則脾胃之氣雖充於脾胃之中實生於兩腎之內無腎中之水氣則胃之氣不能騰無腎中之火氣則脾之氣不能化惟有腎之水火二氣而脾胃之氣始能升騰而不降也然則補脾胃之氣可不急補腎中水火之氣乎治法必以補腎氣爲主但補腎而不兼補脾胃之品則腎之水火二氣不能提於至陽之上也方用并提湯

女科上

種子

三

大熟地九蒸巴戟一兩白朮一兩人參五錢黃芪五錢山萸肉蒸三錢枸杞二錢柴胡五分水煎服三月而腎氣大旺再服一月未有不能受孕者此方補氣之藥多於補精似乎以補脾胃爲主矣孰知脾胃健而生精自易是補脾胃之氣與血正所以補腎之精與水也又益以補精之味則陰氣自足陽氣易升自爾騰越於上焦矣陽氣不下陷則無非大地陽春隨遇皆是化生之機安有不受孕之理與

氣愈虛何能受孕妙在立方不礙補腎火所以不用桂附等藥但專補腎氣使脾胃之氣不復下陷則胎氣自無然受孕無難矣

胸滿不孕人每誤爲脾胃虛寒不能飲食用扶脾消滯之藥腎

下部冰冷不受孕 三十一

婦人有下身冰冷非火不煖交感之際陰中絕無溫熱之氣人以爲天分之薄也誰知是胞胎寒之極乎夫寒冰之地不生草木重陰之淵不長魚龍今胞胎既寒何能受孕雖男子鼓勇力戰其精甚熱直射於子宮之內而寒冰之氣相逼亦不過茹之於暫而不能不吐之於久也夫猶是人也此婦之胞胎何以寒涼至此豈非天分之薄乎非也蓋胞胎居於心腎之間上繫於心而下繫於腎胞胎之寒涼乃心腎二火之衰微也故治胞胎者必須補心腎二火而後可方用溫胞飲

白朮一兩 炒巴戟一兩 鹽水浸 人參三錢 杜仲三錢 炒黑
兔絲子酒浸炒 山藥三錢 芡實炒 肉桂二錢 去粗研

女科上

種子

弄

附子製二分 補骨脂鹽水炒

水煎服一月而胞胎熱此方之妙補心而即補腎溫腎而即溫心心腎之氣旺則心腎之火自生心腎之火生則胞胎之寒自散原因胞胎之寒以至茹而即吐而今胞胎既熱矣尚有施而不受者乎若改湯爲丸朝夕吞服尤能攝精斷不至有伯道無兒之歎也

今之種子者多服此方特爲胎前者設若胎前宜服之

胸滿少食不孕 三十二

婦人有素性恬淡飲食少則平和多則難受或作嘔洩胸膈脹滿久不受孕人以爲賦稟之薄也誰知是脾胃虛寒乎夫脾胃之虛寒原因心腎之虛寒耳蓋胃土非心火不能生脾土非腎火不能化心腎之火衰則脾胃失生化之權即不能消水穀以化精微矣既不能化水穀之精微自無津液以灌溉於胞胎之中欲胞胎有溫煖之氣以養胚胎必不可得縱然受胎而帶脉無力亦必墮落此脾胃虛寒之咎故無玉麟之毓也治法可不必急溫補其脾胃乎然脾之母原在腎之命門胃之母原在心之包絡欲溫補脾胃必須補二經之火蓋母旺子必不弱母熱子必不寒此子病治母之義也方用溫土毓麟湯

女科上

種子

甲

毓麟湯

巴戟一兩 去心酒浸 覆盆子酒浸蒸 白朮五錢 人參三錢 懷山藥五錢 神麴炒

水煎服一月可以種子矣此方之妙溫補脾胃而又兼補命門與心包絡之火藥味不多而四經並治命門心包之火旺則脾與胃無寒冷之虞子母相顧一家和合自然飲食多而善化氣血旺而能任帶脉有力不虞落胎安有不玉麟之育哉

中之氣一補命門與心包絡之火藥味不多其君臣佐使之妙宜細參之

少食不孕與胸滿不問一補腎

少腹急迫不孕 三十三

婦人有少腹之間自覺有緊迫之狀急而不舒不能生育此人人之所不識也誰知是帶脉之拘急乎夫帶脉繫於腰臍之間宜弛而不宜急今帶脉之急者由於腰臍之氣不利也而腰臍之氣不利者由於脾胃之氣不足也脾胃氣虛則腰臍之氣閉則帶脉拘急遂致牽動胞胎精即直射於胞胎胞胎亦暫能茹納而力難負載必不能免小產之虞況人多不能節慾安得保其不墜乎此帶脉之急所以不能生子也治法宜寬其帶脉之急而帶脉之急不能遽寬也宜利其腰臍之氣而腰臍之氣不能遽利也必須大補其脾胃之氣與血而腰臍可利帶脉可寬自不難於孕育矣方用寬

女科上

種子

聖

帶湯

白朮一兩 巴戟肉五錢 補骨脂一錢 人參三錢
麥冬三錢 杜仲三錢 大熟地九錢 肉苁蓉三錢
白芍三錢 當歸三錢 五味三錢 建蓮子二十粒
水煎服四劑少腹無緊迫之狀服一月即受胎此方之妙脾胃兩補而又利其腰臍之氣自然帶脉寬舒可以載物而勝任矣或疑方中用五味白芍之酸收不增帶脉之急而反得帶脉之寬殊不可解豈知帶脉之急由於氣血之虛蓋血虛則縮而不伸氣虛則燥而不達用芍藥之酸以平肝木則肝不尅脾用五味之酸以生腎水則腎能益帶似相妨而實相濟也何疑之有

凡種子治法不出帶脈胎二經數言已秘矣

白朮一兩 巴戟肉五錢 補骨脂一錢 人參三錢 麥冬三錢 杜仲三錢 大熟地九錢 肉苁蓉三錢 白芍三錢 當歸三錢 五味三錢 建蓮子二十粒

嫉妬不孕 三十四

婦人有懷抱素惡不能生子者人以爲天心厭之也誰知是肝氣鬱結乎夫婦人之有子也必然心脉流利而滑脾脉舒徐而和腎脉旺大而鼓指始稱喜脉未有三部脉鬱而能生子者也若三部脉鬱肝氣必因之而更鬱肝氣鬱則心腎之脉必致鬱之極而莫解蓋子母相依鬱必不喜喜必不鬱也其鬱而不能成胎者以肝木不舒必下尅脾土而致塞脾土之氣塞則腰臍之氣必不利腰臍之氣不利必不能通任脉而達帶脉則帶脉之氣亦塞矣帶脉之氣既塞則胞胎之門必閉精即到門亦不得其門而入矣其奈之何哉治法必解四經之鬱以開胞胎之門則幾矣方用開鬱種玉湯

女科上

種子

聖

白芍一兩 香附三錢 當歸五錢 白朮五錢
丹皮三錢 茯苓三錢 花粉二錢
水煎服一月則鬱結之氣開鬱開則無非喜氣之盈腹而嫉妬之心亦可以一易自然兩相合好結胎於頃刻之間矣此方之妙解肝氣之鬱宜脾氣之困而心腎之氣亦因之俱舒所以腰臍利而任帶通達不必啟胞胎之門而胞胎自啟不特治嫉妬者也

各格飲 肝小 豆各四 十九粒 高帶五 十五粒

肥胖不孕 三十五

婦人有身體肥胖痰涎甚多不能受孕者人以爲氣虛之故誰知是濕盛之故乎夫濕從下受乃言外邪之濕也而肥胖之濕實非外邪乃脾土之內病也然脾土既病不能分化水穀以養四肢宜其身軀瘦弱何以能肥胖乎不知濕感者多肥胖肥胖者多氣虛氣虛者多痰涎外似健壯而內實虛損也內虛則氣必衰氣衰則不能行水而濕停於腸胃之間不能化精而化涎矣夫脾本濕土又因痰多愈加其濕脾不能受必浸潤於胞胎日積月累則胞胎竟變爲汪洋之水窟矣且肥胖之婦內肉必滿遮隔子宮不能受精此必然之勢也況又加以水濕之盛即男子甚健陽精直達子宮而其水勢滔

女科上

種子

聖

滔泛濫可畏亦遂化精成水矣又何能成妊哉治法必須以洩水化痰爲主然徒洩水化痰而不急補脾胃之氣則陽氣不旺濕痰不去人先病矣烏望其茹而不吐乎方用加味補中益氣湯

人參 三錢 黃芪 三錢 柴胡 一錢 甘草 一錢 當歸 三錢

白朮 一兩 升麻 四分 陳皮 五分 茯苓 五錢 半夏 三錢

水煎服八劑痰涎盡消再十劑水濕利子宮潤出易

於受精而成孕矣其在於昔則如望洋觀海而至於

今則是馬到成功也快哉此方之妙妙在提脾氣而

升於上作雲作雨則水濕反利於下行助胃氣而消

於下爲津爲液則痰涎轉易於上化不必用消化之

品以損其肥而肥自無碍不必用濟決之味以開其

再十劑後
方用桂枝
一錢半炒
打碎炒
袋半炒
必
受孕矣

竅而竅自能通陽氣充足自能攝精濕邪散除自可受種何肥胖不孕之足慮乎

女科上

種子

聖

骨蒸夜熱不孕 三十六

婦人有骨蒸夜熱遍體火焦口乾舌燥咳嗽吐沫難於生子者人以爲陰虛火動也誰知是骨髓內熱乎夫寒陰之地固不生物而乾旱之田豈能長養然而骨髓與胞胎何相關切而骨髓之熱即能使人不嗣此前賢所未言者也山一旦創言之不幾爲世俗所駭乎而要知不必駭也此中實有其理焉蓋胞胎爲五臟外之一臟耳以其不陰不陽所以不列於五臟之中所謂不陰不陽者以胞胎上繫於心包下繫於命門繫心包者通於心心者陽也繫命門者通於腎腎者陰也是陰之中有陽陽之中有陰所以通於變化或生男或生女俱從此出然必陰陽協和不偏不枯始能變化生人否則否矣

女科上

種子

巽

況胞胎既通於腎而骨髓亦腎之所化也骨髓熱由於腎之熱腎熱而胞胎亦不能不熱且胞胎非骨髓之養則嬰兒無以生骨骨髓過熱則骨中空虛惟存火烈之氣又何能成胎治法必須清骨中之熱然骨熱由於水虧必補腎之陰則骨熱除珠露有滴濡之喜矣壯水之主以制陽光此之謂也方用清骨滋腎湯

地骨皮 酒洗 丹皮 五錢 沙參 五錢 麥冬 五錢

元參 酒洗 五味子 炒研 白朮 土炒 石斛 二錢

水煎連服三十劑而骨熱解再服六十劑自受孕此方之妙補腎中之精涼骨中之熱不清胞胎而胞胎自無太熱之患然陰虛內熱之人原易受妊今因骨髓過熱所以受精而變燥以致難於育子本非胞胎

治骨蒸熱所以不用
熱地方極
善用者極
勿加減
凡峻藥
去七分即
止不必拘
泥三十劑
六十劑之
數三元生
人不一條

之不能受精所以稍補其腎以殺其火之有餘而益其水之不足便易種子耳

女科上

種子

巽

腰酸腹脹不孕 三十七

婦人有腰酸背楚胸滿腹脹倦怠欲卧百計求嗣不能如願人以爲腰腎之虛也誰知是任督之困乎夫任脉行於前督脉行於後然皆從帶脉之上下而行也故任脉虛則帶脉墜於前督脉虛則帶脉墜於後雖胞胎受精亦必小產況任督之脉既虛而疝瘕之症必起疝瘕碍胞胎而外障則胞胎縮於疝瘕之內往往精施而不能受雖餌以玉燕亦何益哉治法必須先去其疝瘕之病而補其任督之脉則提挈天地把握陰陽呼吸精氣包裹成形力足以勝任而無虞矣外無所障內有所容安有不能生育之理方用升帶湯

女科上

種子

聖

白朮一兩 人參三錢 沙參五錢 肉桂一錢 去粗研

神麩炒一錢 芩薺粉三錢 鱉甲三錢 茯苓三錢 半夏一錢 水煎連服三十劑而任督之氣旺再服三十劑而疝瘕之症除此方利腰臍之氣正升補任督之氣也任督之氣升而疝瘕自有難容之勢況方中有肉桂以散寒芩薺以祛積鱉甲之攻堅茯苓之利濕有形自化於無形滿腹皆升騰之氣矣何至受精而再墜乎哉

甲以破堅 理氣若無 疝瘕去此 三味加杜 仲多一錢 澤瀉半錢 甘枸杞一 三味服之 腰酸腹脹 自除矣 疝瘕不 可誤服 有疝瘕 宜

使虛腫脹 足浮腫不 症極多不 能受孕 惟不能受 孕抑且漸 添難症久

便泄腹脹足浮腫不孕 三十八

婦人有小水艱泄腹脹脚腫不能受孕者人以爲小腸之熱也誰知是膀胱之氣不化乎夫膀胱原與胞胎相近膀胱病而胞胎亦病矣蓋水濕之氣必走膀胱而膀胱不能自化必得腎氣相通始能化水以出陰器倘膀胱無腎氣之通則膀胱之氣化不行水濕之氣必且滲入胞胎之中而成汪洋之勢汪洋之田又何能生物也哉治法必須壯腎氣以分消胞胎之濕益腎火以達化膀胱之水使先天之本壯則膀胱之氣化胞胎之濕除而汪洋之田化成雨露之壤矣水化則膀胱利火旺則胞胎煖安有布種而不發生者哉方用化水種子湯

女科上

種子

聖

兔絲子五錢 艾黃炒五錢 車前酒炒二錢 肉桂一錢 去粗研

水煎服二劑膀胱之氣化四劑艱泄之症除又十劑虛脹脚腫之病形消再服六十劑腎氣大旺胞胎溫煖易於受胎而生育矣此方利膀胱之水全在補腎中之氣煖胞胎之氣全在壯腎中之火至於補腎之藥多是濡潤之品不以濕而益助其濕乎然方中之藥妙於補腎之火而非補腎之水尤妙於補火而無燥烈之虞利水而非蕩滌之猛所以膀胱氣化胞胎不濕而發榮長養無窮與

女科上卷終

女科下卷目錄 共三十九條四十一

妊娠

惡阻 順肝益氣湯

浮腫 加減補中益氣湯

少腹疼 安奠二天湯

口乾咽疼 潤燥安胎湯

吐瀉腹痛 援土固胎湯

子懸脇疼 解鬱湯

跌損 救損安胎湯

胎漏 助氣補漏湯

子鳴 扶氣止啼湯

腰腹疼渴汗燥狂即子狂 息林安胎湯

女科下

中惡 消惡安胎湯

多怒墮胎 利氣洩火湯

小產

行房不慎 固氣填精湯

跌閃 理氣散瘀湯

大便乾結 加減四物湯

畏寒腹痛 黃芪補氣湯

大怒 引氣歸血湯

難產

血虛 送子丹

交骨不開 降子湯

脚手先下 轉天湯

氣逆 舒氣湯

子死產門 救母湯

子死腹中 療兒散

正產

胞衣不下 送胞湯 補中益氣湯

氣虛血暈 補氣解暈湯

血暈不語 刺眉心穴法 獨參湯

敗血攻心 寧安心湯

腸下 補氣升腸湯 草薢仁提法

產後

少腹疼 血瘀散結定瘀湯 血虛勝寧湯

氣喘 救脫活母湯

女科下

惡寒身顫 十全大補湯

惡心嘔吐 溫腎止嘔湯

血崩 救敗求生湯

手傷胞胎淋漓不止 完胞湯

四肢浮腫 轉氣湯

肉線出 兩收湯

肝痿 收膜湯

氣血兩虛乳汁不下 通乳丹

鬱結乳汁不通 通肝生乳湯

目錄

二

女科下卷

陽曲傅 山青主手著

妊娠惡阻 二十九

亦有肝鬱
氣滯胸膈
膨滿見食
不惡不能
多食雖係
妊娠而非

婦人懷娠之後惡心嘔吐思酸解渴見食憎惡困倦欲
卧人皆曰妊娠惡阻也誰知肝血太燥乎夫婦人受妊
本於腎氣之旺也腎旺是以攝精然腎一受精而成娠
則腎水生胎不暇化潤於五臟而肝為腎之子日食母
氣以舒一日無津液之養則肝氣迫索而腎水不能應
則肝益急肝急則火動而逆也肝氣既逆是以嘔吐惡
心之症生焉嘔吐縱不至太甚而其傷氣則一也氣既
受傷則肝血愈耗世人用四物湯治胎前諸症者正以
其能生肝之血也然補肝以生血未為不佳但生血而

女科下

妊娠

十一

惡阻宜分
別治之後
另有方

方極效但
蘇子一兩
疑是一錢
之誤然國
初上元生
人稟賦最
壯或不非
今當下元
用一錢可
也馮不可

不知生氣則脾胃衰微不勝頻嘔猶恐氣虛則血不易
生也故於平肝補血之中加以健脾開胃之品以生陽
氣則氣能生血尤益胎氣耳或疑氣逆而用補氣之藥
不益助其逆乎不知妊娠惡阻其逆不甚且逆是因虛
而逆非因邪而逆也因邪而逆者助其氣則逆增因虛
而逆者補其氣則逆轉况補氣於補血之中則陰足以
制陽又何慮其增逆乎宜用順肝益氣湯

人參 一兩
熟地 九錢
神麴 一錢

富歸 酒洗一兩
蘇子 炒一兩
白芍 酒炒三錢
麥冬 去心三錢
陳皮 三分
砂仁 炒一粒
茯苓 二錢
水煎服一劑輕二劑平三劑全愈此方平肝則肝逆
除補腎則肝燥息補氣則血易生凡胎病而少帶惡

用一兩
疏肝化滯
湯全當歸
酒洗六錢
杭芍酒炒
三錢
去蘆三錢
白扁豆去
皮四錢
附片二錢
研砂仁炒
分神麴炒
焦錢半廣
皮八分
荷五分
煎服

阻者俱以此方投之無不安最有利益於胎婦其功更勝於四物焉

女科下

妊娠

十二

妊娠浮腫四十一

妊婦有至五個月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身頭面俱腫人以爲溼氣使然也誰知是脾肺氣虛乎夫妊娠雖有按月養胎之分其實不可拘於月數總以健脾補肺爲大綱蓋脾統血肺主氣胎非血不蔭非氣不生脾健則血旺而蔭胎肺清則氣旺而生子苟肺衰則氣餒氣餒則不能運氣於皮膚矣脾虛則血少血少則不能運血於肢體矣氣與血兩虛脾與肺失職所以飲食難消精微不化勢必至氣血下陷不能升舉而溼邪即乘其所虛之處積而成浮腫症非由脾肺之氣血虛而然耶治法當補其脾之血與肺之氣不必祛溼而溼自無不去之理方用加減補中益氣湯

女科下

妊娠

三

人參 五錢 黃芪 三錢 柴胡 一錢 甘草 一分 當歸 三錢

白朮 五錢 茯苓 一兩 升麻 三分 陳皮 三分

水煎服四劑即愈十劑不再犯夫補中益氣湯之立法也原是升提脾肺之氣似乎益氣而不補血然而血非氣不生是補氣即所以生血觀當歸補血湯用黃芪爲君則較著彰明矣況溼氣乘脾肺之虛而相犯未便大補其血恐陰太盛而招陰也只補氣而助以利溼之品則氣升而水尤易散血亦隨之而生矣然則何以重用茯苓而至一兩不幾以利溼爲君乎嗟嗟溼症而不以此藥爲君將以何者爲君乎況重用茯苓於補氣之中雖曰滲溼而仍是健脾清肺之意且凡利水之品多是耗氣之藥而茯苓與參朮合

白朮一味今多以蒼朮充之凡白朮傷者更宜白朮補胎者宜審若恐其傷以白朮代之較安

實補多於利所以重用之以分溼邪即以補氣血耳

女科下

妊娠

四

妊娠少腹疼 四十一

妊娠小腹作疼胎動不安如有下墜之狀人只知帶脉無力也誰知是脾腎之虧乎夫胞胎雖繫於帶脉而帶脉實關於脾腎脾腎虧損則帶脉無力胞胎即無以勝任矣況人之脾腎虧損者非飲食之過傷即色慾之太甚脾腎虧則帶脉急胞胎所以有下墜之狀也然則胞胎之系通於心與腎而不通於脾補腎可也何故補脾然脾為後天腎為先天脾非先天之氣不能化腎非後天之氣不能生補腎而不補脾則腎之精何以遽生也是補後天之脾正所以補先天之腎也補先後二天之脾與腎正所以固胞胎之氣與血脾腎可不均補乎方用安奠二天湯

女科下

妊娠

五

人參一兩 熟地九兩 白朮一兩 山藥五錢 炙草一錢
山萸五錢 杜仲三錢 黑枸杞二錢 扁豆五錢
水煎服一劑而疼止二劑而胎安矣夫胎動乃脾腎雙虧之症非大用參朮熟地補陰補陽之品斷不能挽回於頃刻世人往往畏用參朮或少用以冀建功所以寡效此方正妙在多用也

人參一兩 無方者以 當參代之 無上當參 者以微黃 芪代之

好娠口乾咽痛 四十二

妊娠至三四個月白覺口乾舌燥咽喉微痛無津以潤以至胎動不安其則血流如經水人以為火動之極也誰知是水虧之甚乎夫胎也者本精與血之相結而成逐月養胎古人每分經絡其實均不離腎水之養故腎水足而胎安腎水虧而胎動雖然腎水虧又何能動胎必腎經之火動而胎始不安耳然而火之有餘仍是水之不足所以火炎而胎必動補水則胎自安亦既濟之義也惟是腎水不能遽生必須滋補肺金金潤則能生水而水有逢源之樂矣水既有本則源泉混混矣而火又何難制乎再少加以清熱之品則胎自無不安矣方用潤燥安胎湯

女科下

妊娠

木

熟地九兩 生地三錢 山萸五錢 麥冬五錢
五味一錢 阿膠二錢 黃芩二錢 益母二錢
水煎服二劑而燥息再二劑而胎安連服十劑而胎不再動矣此方專填腎中之精而兼補肺然補肺仍是補腎之意故腎經不乾燥則火不能灼胎焉有不安之理乎

方得妙用 不可不 痛而加 根射可 藥亦不 四調調 加

妊娠吐瀉腹痛 四十三

妊婦上吐下瀉胎動欲墮腹疼難忍急不可緩此脾胃虛極而然也夫脾胃之氣虛則胞胎無力必有崩墜之虞況又上吐下瀉則脾與胃之氣因吐瀉而愈虛欲胞胎之無恙也得乎然胞胎疼痛而究不至下墜者何也全賴腎氣之固也胞胎繫於腎而連於心腎氣固則交於心其氣通於胞胎此胞胎之所以欲墜而不得也且腎氣能固則陰火必來生脾心氣能通則心火必來援脾胃胃雖虛而未絕則胞胎雖動而不墜可不急救其脾胃乎然脾胃當將絕而未絕之時只救脾胃而難遠生更宜補其心腎之火使之生土則兩相接續胎自固而安矣方用援土固胎湯

女科下

妊娠

七

人參 一兩 白朮 二兩 山藥 一兩 肉桂 二錢
製附子 五分 續斷 三錢 杜仲 三錢 山黃 一兩
枸杞 三錢 兔絲子 三錢 砂仁 三錢 炙甘草 一錢
水煎服一劑而洩止二劑而諸病盡愈矣此方救脾胃之士十之八救心腎之火十之二也救火輕於救土者豈以土欲絕而火未甚衰乎非也蓋土崩非重劑不能援火衰雖小劑而可助熱藥多用必有太燥之虞不比溫甘之品也況胎動係土衰而非火弱何用太熱妊娠忌桂附是恐傷胎豈可多用小熱之品計之以錢大熱之品計之以分者不過用以引火而非用以壯火也其深思哉

白朮多偽
肉桂更無
佳者用者
若有真藥
固妙如無
白朮白朮
以白朮
代之故紙
代之故紙

妊娠子懸脇疼 四十四

妊婦有懷抱憂鬱以致胎動不安兩脇悶而疼痛如弓上弦人止知是子懸之病也誰知是肝氣不通乎夫養胎半係於腎水然非肝血相助則腎水實有獨力難支之勢故保胎必滋腎水而肝血斷不可不顧使肝氣不鬱則肝之氣不閉而肝之血必旺自然灌溉胞胎合腎水而並協養胎之力今肝氣因憂鬱而閉塞則胎無血蔭腎難獨任而胎安得不上升以覓食此乃鬱氣使然也莫認爲子之欲自懸而妄用泄子之品則得矣治法宜開肝氣之鬱結補肝血之燥乾則子懸自定矣方用解鬱湯

女科下

妊娠

八

人參 一錢 白朮 五錢 白茯苓 三錢 當歸 一兩
白芍 一兩 枳殼 五分 砂仁 三錢 山梔子 三錢
薄荷 二錢
水煎服一劑而悶痛除二劑而子懸定至三劑而全安去梔子再多服數劑不復發此乃平肝解鬱之聖藥鬱開則木不尅土肝平則火不妄動方中又有健脾開胃之品自然水精四布而肝與腎有潤澤之機則胞胎自乾燥之患又何慮上懸之不愈哉

方加薏仁
三四錢尤
妙

妊娠跌損 四十五

妊婦有失足跌損致傷胎元腹中疼痛勢如將墮者人只知是外傷之為病也誰知有內傷之故乎凡人內無他症胎元堅固即或跌撲閃挫依然無恙惟內之氣血素虧故畧有閃挫胎便不安若止作閃挫外傷治斷難奏功且恐有因治而反墮者可不慎與必須大補氣血而少加以行瘀之品則瘀散胎安矣但大補氣血之中又宜補血之品多於補氣之藥則無不得之方用救損安胎湯

即用尋常白木土炒其能理氣行血也於白木味通

當歸一兩 白芍三錢 生地一兩 白朮五錢
炙草一錢 人參一錢 蘇木三錢 乳香一錢
沒藥一錢 去油

女科下

妊娠

九

水煎服一劑而疼痛止二劑而勢不墜矣不必三劑也此方之妙妙在既能去瘀而不傷胎又能補氣補血而不凝滯固無通利之害亦痊跌閃之傷有益無損大建奇功即此方與然不特治懷孕之閃挫也即無娠閃挫亦可用之

甘不能理氣行血用者知之

妊娠小便下血病名胎漏 四十六

妊婦有胎不動腹不疼而小便中時常有血流出者人以爲血虛胎漏也誰知氣虛不能攝血乎夫血只能蔭胎而胎中之蔭血必賴氣以衛之氣虛下陷則蔭胎之血亦隨氣而陷矣然則氣虛下陷而血未嘗虛似不應與氣同陷也不知氣乃血之衛血賴氣以固氣虛則血無憑依無憑依必燥急燥急必生邪熱血寒則靜血熱則動動則外出而莫能遏又安得不下流乎倘氣不虛而血熱則必大崩而不止些微之漏矣治法宜補其氣之不足而洩其火之有餘則血不必止而自無不止矣方用助氣補漏湯

人參一兩 白芍三錢 黃芩三錢 生地三錢
益母草一錢 續斷二錢 甘草一錢

女科下

妊娠

十

水煎服一劑而血止二劑再不漏矣此方用人參以補陽氣用黃芩以洩陰火洩則血不熱而無欲動之機氣旺則血有依而無可漏之竅氣血俱旺而和協自然歸經而各安其所矣又安有漏洩之患哉

補血不用當歸之香

妊娠子鳴 四十七

妊婦懷胎至七八個月忽然兒啼腹中腰間隱隱作痛人以為胎熱之過也誰知是氣虛之故乎夫兒之在胞胎也全憑母氣以化成母呼兒亦呼母吸兒亦吸未嘗有一刻之間斷至七八個月則母氣必虛矣兒不能隨母之氣以為呼吸必有迫不及待之勢母子原相依為命子失母之氣則拂子之意而啼於腹中似可異而究不必異病名子鳴氣虛甚也治宜大補其氣使母之氣與子氣和合則子之意安而啼亦息矣方用扶氣止啼湯

人參 一兩 黃芪 一兩 麥冬 一兩 當歸 五錢
橘紅 五分 甘草 一錢 花粉 一錢

女科下

水煎服一劑而啼即止二劑不再啼此方用人參黃芪麥冬以補肺氣使肺氣旺則胞胎之氣亦旺胞胎之氣旺則胞中之子氣有不隨母之氣以為呼吸者未之有也

妊娠腰腹疼渴汗燥狂 四十八

婦人懷妊有口渴汗出大飲冷水而煩燥發狂腰腹疼痛以致胎欲墮者人莫不謂火盛之極也抑知是何經之火盛乎此乃胃火熾熱煎胞胎之水以致胞胎之水涸胎失所養故動而不安耳夫胃為水穀之海多氣多血之經所以養五臟六腑者蓋萬物皆生於土土氣厚而物始生土氣薄而物必死然土氣之所以能厚者全賴火氣之來生也胃之能化水穀者亦賴火氣之能化也今胃中有火宜乎生土何以火盛而反致害乎不知無火難以生土而火多又能燥水雖土中有火土不死然亦必有水方不燥使胃火太旺必致燥乾腎水土中無水則自潤不足又何以分潤胞胎土燥之極火勢

女科下

安胎湯
生地 一兩 青蒿 五錢 白朮 五錢 茯苓 三錢
人參 三錢 知母 二錢 花粉 二錢

水煎服一劑而狂少平二劑而狂大定三劑而火盡解胎亦安矣此方藥料頗重恐人慮不勝而不敢全用又不得不再為囑之懷胎而火勝若此非大劑何以能瀾火不息則狂不止而胎能安耶況藥料雖多均是滋水之味益而無損勿過慮也

原方不可加減
妊婦燥狂
每誤有別
症不日痰
甚即云時
或傳經而
不問誤於
不問誤於
多藥數月
不愈甚有
打去胎而
以顯大人
性命為名
者更屬料
卷之極

黃芪用嫩
用前底節
黃芪不可
用前底節
黃芪不可
用前底節

女科下

主

妊娠中惡四十九

婦人懷子在身痰多吐涎偶遇鬼神祟惡忽然腹中疼痛胎向上頂人疑為子懸之病也誰知是中惡而胎不安乎大凡不正之氣最易傷胎故有孕之婦斷不宜入廟燒香與僻靜陰寒之地如古洞幽岩皆不可登蓋邪祟多在神宇潛踪幽陰岩洞亦其往來遊戲之所觸之最易相犯不可不深戒也況孕婦又多痰涎眼目眩目一眩如有妄見此招祟之因痰而起也人云怪病每起於痰其信然與治法似宜以治痰為主然治痰必至耗氣氣虛而痰難消化胎必動搖必須補氣以生血補血以活痰再加以清痰之品則氣血不虧痰亦易化矣方用消惡安胎湯

女科下

妊娠

三

當歸酒洗一兩 白芍酒炒一兩 白朮土炒五錢 茯苓五錢
人參三錢 甘草一錢 陳皮五分 花粉三錢
蘇葉一錢 沉香研末一錢
此方大補氣血輔正邪自除之義也

補正心氣 方極平正 如此可知 用金石之 藥以化疾 者皆奇疾 立與欲速 取效不知 胎耗人之 真氣滅之

妊娠多怒墮胎五十

婦人有懷妊之後未至成形或已成形其胎必墮人皆曰氣血衰微不能固胎也誰知是性急怒多肝火大動而不靜乎夫肝本藏血肝怒則不藏不藏則血難固蓋肝雖屬木而木中實寄龍雷之火所謂相火是也相火宜靜不宜動靜則安動則熾況木中之火又易動而難靜人生無日無動之時即無日非動火之時大怒則火益動矣火動而不可止退則火勢飛揚不能生氣養胎而反食氣傷精矣精傷則胎無所養勢必不墜而己經所謂少火生氣壯火食氣正此義也治法宜平其肝中之火利其腰膈之氣使氣生夫血而血清其火則庶幾矣方用利氣洩火湯

女科下

妊娠

五

人參三錢 白朮土炒一兩 甘草一錢 熟地九錢
當歸酒洗三錢 白芍酒炒五錢 芡實炒三錢 黃芩酒炒二錢
水煎服六十劑而胎不墜矣此方名雖利氣而實補氣也然補氣而不加以洩火之品則氣旺而火不能平必反害其氣也故加黃芩於補氣之中以洩火又有熟地歸芍以滋肝而壯水之主則血不燥而氣得和怒氣息而火自平不必利氣而氣無不利即無往而不利矣

性急怒多 而不用符 肝藥者以 其有胎毒 故也經云 胎毒則母 病胎自愈 所以妊娠 一門總以 補氣養血 安胎為主 則萬病自 除矣

行房小產 五十一

妊婦因行房顛狂遂致小產血崩不止人以為火動之極也誰知是氣脫之故乎大凡婦人之懷妊也賴腎水以蔭胎水源不足則火易沸騰加以久戰不已則火必大動再至與顛狂精必大洩精大洩則腎水益涸而龍雷相火益熾水火兩病胎不能固而墮矣胎墮而火猶未息故血隨火而崩下有不可止遏之勢人謂火動之極亦未為大誤也但血崩本於氣虛火盛本於水虧腎水既虧則氣之生源涸矣氣源既涸而氣有不脫者乎此火動是標而氣脫是本也經云治病必先求其本固而標自立矣若只以止血為主而不急固其氣則氣散不能速回而血何由止不大補其精則水涸不能遽

女科下

小產

毒

長而火且益熾不揣其本而齊其末山未見有能濟者也方用固氣填精湯

人參一兩 黃芪生用一兩 白朮五錢 大熟地一兩

當歸酒洗三七 研末沖 芥穗炒黑二錢

水煎服一劑而血止二劑而身安四劑則全愈此方之妙妙在不去清火而惟補氣補精其奏功獨神者以諸藥溫潤能除大熱也蓋熱是虛故補氣自能攝血補精自能止血意在木也

小產血崩 多由行房 而致若年 適四十參 其宜倍用 熟地宜減 半用以其 氣虛火衰 也否則每 令氣脫不 散凡有妊 娠者須忍 事萬勿自 蹈危途慎 之

跌閃小產 五十二

妊婦有跌扑閃挫遂致小產血流紫塊昏暈欲絕者人皆曰瘀血作祟也誰知是血室損傷乎夫血室與胞胎相連如唇齒之相依胞胎有傷則血室亦損唇亡齒寒理有必然也然胞胎傷損而流血者其傷淺血室傷損而流血者其傷深傷之淺者疼在腹傷之深者暈在心同一跌扑損傷而未小產與已小產治各不同未小產而胎不安者宜顧其胎而不可輕去其血已小產而血大崩宜散其瘀而不可重傷其氣蓋胎已墮血既脫而血室空虛惟氣存耳倘或再傷其氣安保無氣脫之憂乎經云血為營氣為衛使衛有不固則營無依而安矣故必補氣以生血新血生而瘀血自散矣方用理氣散

女科下

小產

毒

瘀湯

八參一兩 黃芪生用一兩 當歸酒洗扶苓三錢

紅花一錢 丹皮三錢 薑炭五錢

水煎服一劑而流血止二劑而昏暈除三劑而全安矣此方用人參黃芪以補氣氣旺則血可攝也用當歸丹皮以生血血生則瘀難留也用紅花黑薑以活血血活則暈可除也用茯苓以利水水利則血易歸經也

胎未墮宜 加杜仲炒 炭一錢續 煎若胎已 墮服原方 血崩不止 加對原炭 三錢若胎 閉心加一 元胡炭一 錢

大便乾結小產 五十三

妊婦有口渴煩燥舌上生瘡兩唇腫裂大便乾結數日不得通以致腹疼小產者人皆曰大腸之火熱也誰知是血熱燥胎乎夫血所以養胎也溫和則胎受其益太熱則胎受其損如其熱久燥之則兒在胞胎之中若有探湯之苦難以存活則必外越下奔以避炎氣之逼迫欲其胎之不墜也得乎然則血陰乎胎則血必虛耗血者陰也虛則陽亢亢則害矣且血乃陰水所化血日蔭胎取給刻不容緩而火熾陰水不能速生以化血所以陰虛火動陰中無非火氣血中亦無非火氣矣兩火相合焚逼兒胎此胎之所以下墜也治法宜清胞中之火補腎中之精則可已矣或疑兒已下墜何故再顧其胞

女科下

小產

七

血不蔭胎何必大補其水殊不知火動之極以致胎墜則胞中純是一團火氣此火乃虛火也實火可洩而虛火宜於補中清之則虛火易散而真火可生倘一味清涼以降火全不顧胞胎之虛實勢必至寒氣逼人胃中生氣蕭索矣胃乃二陽資養五臟者也胃陽不生何以化精微以生陰水乎有不變為勞瘵者幾希矣方用加減四物湯

熟地 五錢 白芍 三錢 當歸 一兩 川芎 一錢

山梔子 炒 一錢 山萸 蒸去核 二錢 山藥 炒 三錢 丹皮 炒 三錢

水煎服四五劑而愈矣

丹皮性極涼血產後用之最防陰凝之害慎之

此方加條
李二錢
妙尤

畏寒腹疼小產 五十四

妊婦有畏寒腹疼因而墮胎者人只知下部太寒也誰知是氣虛不能攝胎乎夫人生於火亦養於火非氣不充氣旺則火旺氣衰則火衰人之所以坐胎者受父母先天之真火也先天之真火即先天之真氣以成之故胎成於氣亦攝於氣氣旺則胎牢氣衰則胎墮胎日加長而氣日加衰安得不墮哉況又遇寒氣外侵則內之火氣更微火氣微則長養無資此胎之不能不墮也使當其腹疼之時即用人參乾薑之類補氣祛寒則可以疼止而胎安無如人拘於妊娠之藥禁而不敢用因致墮胎而僅存幾微之氣不急救氣尚有何法方用黃芪補氣湯

女科下

小產

末

黃芪 二兩 當歸 一兩 肉桂 五分

水煎服五劑愈矣倘認定是寒大用辛熱全不補氣與血恐過於燥熱反致亡陽而變危矣

內桂須用
好的如無
佳者用使
姜代之或
一錢二錢
皆可不可
祇用五分

大怒小產 五十五

妊婦有大怒之後忽然腹疼吐血因而墮胎及墮胎之後腹疼仍未止者人以爲肝之怒火未退也誰知是血不歸經而然乎夫肝所以藏血者也大怒則血不能藏宜失血而不當墮胎何爲失血而胎亦隨墮乎不知肝性最急血門不閉其血直搗於胞胎胞胎之系通於心腎之間肝血來冲必斷絕心腎之路胎因心腎之路斷胞胎失水火之養所以墮也胎既墮矣而腹疼如故者蓋因心腎未接欲續無計彼此痛傷肝氣欲歸於心而心不受欲歸於腎而腎不納故血猶未靜而疼無已也治法宜引肝之血仍入於肝而腹疼自已矣然徒引肝之血而不平肝之氣則氣逆而不易轉即血逆而不易

女科下

小產

丸

歸也方用引氣歸血湯

白芍五錢 當歸五錢 白朮三錢 甘草一錢

黑芥穗三錢 丹皮三錢 薑炭五分 香附五分

麥冬三錢 鬱金一錢

水煎服此方名爲引氣其實仍是引血也引血亦所以引氣氣歸於肝之中血亦歸於肝之內氣血兩歸而腹疼自止矣

產後忌用 白芍因其 酸寒也胎 胎後用白 芍五錢推 上元生人 可若下元 生人萬不 可用必不 得已而用 之將白芍 炒炭用三 錢可也餘 藥如法製

血虛難產 五十六

妊娠有腹疼數日不能生產人皆曰氣虛力弱不能送子出產門誰知是血虛膠滯胞中無血兒難轉身乎夫胎之成成於腎臟之精而胎之養養於五臟六腑之血故血旺則子易生血衰則子難產所以臨產之前宜用補血之藥補血而血不能遽生必更兼補氣以生之然不可純補其氣也恐陽過於旺則血仍不足偏勝之害必有升而無降亦難產之漸也防微杜漸其惟氣血兼補乎使氣血並旺則氣能推送而血足以濟之是汪洋之中自不難轉身也又有膠滯之患乎方用送子丹 生黃芪 一兩 當歸 酒洗 麥冬 一兩 熟地 九蒸 川芎 三錢

女科下

難產

辛

水煎服二劑而生矣且無橫生倒產之患此補血補

氣之藥也二者相較補血之味多於補氣之品蓋補

氣止用黃芪一味其餘無非補血之品血旺氣得所

養氣生血得所依胞胎潤澤自然易產譬如舟遇水

淺之處雖大用人力終難推行忽逢春水泛濫舟自

躍躍欲行再得順風以送之有不揚帆而迅行者乎

生過子婦 人頂心髮 三錢洗淨 用新瓦一 塊置火上 焙成灰 入藥同煎 服下即效

方妙苦頭 產交骨不 關加炙龜 板尾三錢

交骨不開難產 五十七

妊婦有兒到產門竟不能下此危急存亡之時也人以爲胞胎先破水乾不能滑利也誰知是交骨不開之故乎蓋產門之上原有骨二塊兩相屬合名曰交骨未產之前其骨自合若天衣之無縫臨產之際其骨自開如開門之見山婦人兒門之肉原自斜生皮亦橫長實可寬可窄可大可小者也苟非交骨連絡則兒門必然大開可以手入採取胞胎矣此交骨爲兒門之下關實婦人鎖鑰之鍵此骨不開則腸可直下此骨不開則兒難降生然而交骨之能開能合者氣血主之也血旺而氣衰則兒雖向下而兒門不開氣旺而血衰則兒門可開而兒難向下是氣所以開交骨血所以轉兒身也欲生

女科下

難產

圭

產之順利非大補氣血不可然交骨之閉甚易而交骨之開甚難臨產交骨不開者多由於產前貪慾洩精大甚精洩則氣血失生化之本而大虧矣氣血虧則無以運潤於兒門而交骨粘滯不開矣故欲交骨之開必須於補氣補血之中而加開骨之品兩相合治自無不開之患不必催生而兒自迅下母子俱無恙矣方用降子湯

當歸 一兩 人參 五錢 川芎 五錢 紅花 一錢

川牛膝 三錢 柞木枝 一兩

水煎服一劑兒門必响亮一聲交骨開解而兒乃降生矣此方用人參以補氣芎歸以補血柞木枝以活血牛膝以降下柞木枝以開關解骨君臣佐使同心協

方爲子已
臨門救急
而設若子
未臨門血
虛難產宜
服前送子
丹不可遠
服此方

力所以取效如神在用開於補之中也然單用柞木枝亦能開骨但不補氣與血恐開而難合未免有下部中風之患不若此方之能開能合之爲神妙也至於兒未臨門之時萬不可先用柞木以開其門然用降子湯亦正無妨以其能補氣血耳若欲單用柞木必須候到門而後可

女科下

難產

圭

脚手先下難產 五十八

妊婦生產之際有脚先下而兒不得下者有手先下而兒不得下者人以爲橫生倒產至危之症也誰知是氣血兩虛之故乎夫兒在胞胎之中兒身正坐男面向後女面向前及至生時頭必旋轉而向下生此天地造化之奇非人力所能勉強者雖然先天與後天原並行而不悖天機之動必得人力以濟之所謂人力者非產母用力之謂也謂產母之氣與血耳產母之氣血足則胎必順產母之氣血虧則胎必逆順則易生逆則難產氣血既虧母身必弱子在胞中亦必弱胎弱無力欲轉頭向下而不能此胎之所以有脚手先下者也當是之時急用針刺兒之手足則兒必痛而縮入急用轉天湯以

女科下

救順之

人參 二兩 當歸 二兩 川芎 一兩 牛膝 三錢

升麻 四分 附子 一分

水煎服一劑而兒轉身矣再二劑自然順生此方之妙用人參以補氣之虧用芎歸以補血之虧人人皆知其義若用升麻又用牛膝附子恐人未識其妙也蓋兒已身斜非用提挈則頭不易轉然轉其身非用下行則身不易降升麻牛膝並用而又用附子者欲其無經不達使氣血迅速以催生也

若服三劑後以針刺兒手足仍不轉身以針刺產婦合竹穴見下萬不可使感取以手探取俱危戒之

氣逆難產 五十九

婦人有生產數日而胎不下者服催生之藥皆不見效人以爲交骨之難開也誰知是氣逆不行而然乎夫交骨不開固是難產然兒頭到產門而不能下者方是交骨不開之故自當用開骨之劑若兒頭尚未到產門乃氣逆不行兒身難轉非交骨不開之故也若開其交骨則兒門大開兒頭未轉而向下必致變症非常是兒門萬萬不可輕開也大凡生產之時切忌坐草太早若兒未轉頭原難驟生乃早於坐草產婦見兒許久不下未免心懷恐懼恐則神怯怯則氣下而不能升氣既不升則上焦閉塞而氣乃逆矣上氣既逆而上焦必脹滿而氣益難行氣沮滯於上下之間不利氣而徒催生則氣愈逆而胎愈閉矣治法但利其氣兒自轉身而下矣方

女科下

用舒氣散

人參 一兩 當歸 一兩 川芎 五錢 白芍 五錢

紫蘇梗 三錢 牛膝 二錢 陳皮 一錢 柴胡 八分

葱白七寸水煎服一劑而逆氣轉兒即下矣此方利氣而實補氣蓋氣逆由於氣虛氣虛易於恐懼補其氣而恐懼自定恐懼定而氣逆者將莫知其何以定也何必開交骨之多事乎哉

大漏方叫 總感來不 可合產婦 兒面暫護 別室靜待 不可高言 蓋秘名 日收生使 其兩手接 收不欲見 墮地受傷 非穩要別 有妙法也 若穩要來 之即合產 婦見面被 必胡言亂 語用力太 早必致難 產百發難 之生感之 驗

凡臨產三 日前必小 腹痛一試 痛此時萬 勿坐草臨 盆但將包 兒諸物預 備現成不 可早叫穩 婆來過三 日後腹若

子死產門難產 六十

婦人有生產三四日兒已到產門交骨不開兒不得下子死而母未亡者服開骨之藥不驗當有死亡之危今幸而不死者正因其子死而胞胎下墜子母離開母氣已收未至同子氣俱絕也治但救其母而不必顧其子矣然死子在產門塞其下口有致母死之患宜用推送之法補血以生水補氣以生血使氣血兩旺死子可出而存母命也倘徒用降子之劑以墜之則死子未必下而母氣先脫矣非救援之善者也山親見此等之症常用救母丹活人頗多故誌之

入參 兩 當歸 二兩 川芎 一兩 益母草 一兩
赤石脂 一錢 芥穗 炒黑 三錢

女科下

水煎服一劑而死子下矣此方用芎歸以補血人參以補氣氣旺血旺則上能升而下能降氣能推而血能送況益母又善下死胎石脂能下瘀血自然一湧而出無少阻滯矣

方妙不可加減

子死腹中難產 六十一

婦人有生產六七日胞衣已破而子不見下人以爲難產之故也誰知是子已死於腹中乎夫兒死於兒門之邊易辨而死於腹中難識蓋兒已到產門之邊未死者頭必能伸能縮已死者必然不動即以手推之亦必不動如故若係未死用手少拔其兒之髮兒必退入故曰易辨若兒死在腹中何從而知之然實有可辨而知之者凡子死腹中而母可救者產母之面必無煤黑之氣是子死而母無死氣也子死腹中而母難救產母之面必有烟燻之氣是子死而母亦無生機也以此辨死生斷斷不爽也既知兒死腹中不能用藥以降之危道也若用霸道以洩之亦危道也蓋生產至六七日其母之

女科下

氣必甚困乏烏能勝霸道之治如用霸道以強逐其死子恐死子下而母亦立亡矣必須仍補其母使母之氣血旺而死子自下也方用療兒散
人參 一兩 當歸 二兩 川牛膝 五錢 鬼臼 三錢
乳香 二錢 去油

小煎服一劑死子下而母生矣凡兒之降生必先轉其頭原因其母氣血之虛以致兒不能轉頭以向下世人用催生之藥以耗兒之氣血則兒之氣不能通達反致閉闕而死於腹中此實庸醫殺之也所以難產之疾斷斷不可用催生之藥只宜補氣補血以壯其母而全活嬰兒之命正無窮也此方救兒死之母仍大補氣血所以救其本也誰知救本即所以催生

下死胎不
用厚樸炒
當歸產婦
面黑舌青
用補氣養
血活血之
藥而子母
復得皆全
者亦萬中
之一幸也

哉

女科下

難產

三

正產胞衣不下 六十二

產婦有兒已下地而胞衣留滯於腹中二三日不下心煩意燥時欲昏暈人以為胞衣之蒂未斷也誰知是血少乾枯粘連於腹中乎世人見胞衣不下未免心懷疑懼恐其冲之於心而有死亡之兆然而胞衣究何能上冲於心也但胞衣不下瘀血未免難行恐有血暈之虞耳治法仍宜大補其氣血使生血以送胞衣則胎衣自然潤滑潤滑則易下生氣以助生血則血生自然迅速尤易催墮也方用送胞湯

當歸 二兩洗 川芎 五錢 益母草 一兩 乳香 一兩 不去油

沒藥 一兩 芥穗 三錢 麝香 五釐 研另冲

水煎服立下此方以芎歸補其氣血以荆芥引血歸

女科下

正產

天

經用益母乳香等藥逐瘀而下胞衣新血既生則舊血難存氣旺上升而瘀濁自降尚有留滯之苦哉夫胞衣是包兒之一物非依於子即依於母子生而不隨子俱下以子之不可依也故留滯於腹若有回順其母之心母胞雖已生子而其蒂間之氣原未遽絕所以留連欲脫而未脫往往有存腹六七日不下而竟不腐爛者正以其尚有生氣也可見胞衣留腹不能殺人補之而自降耳或謂胞衣既有生氣補氣補血則胞衣亦宜堅牢何以補之而反降也不知子未下補則益於子子已下補則益於母益子而胞衣之氣連益母而胞衣之氣脫此胞胎之氣關通則兩合閉則兩開矣故大補氣血而胞衣反降也

方極效

有婦人子下地五六日而胞衣留於腹中百計治之竟不能下而又絕無昏暈煩燥之狀人以爲瘀血之粘連也誰知是氣虛不能推送乎夫瘀血在腹斷無不作崇之理有則必然發覺今安然無恙是血已淨矣血淨宜清氣升而濁氣降今胞衣不下是清氣下降而難升遂至濁氣上浮而難降然濁氣上升又必有煩燥之病今亦安然者是清濁之氣兩不能升也然則補其氣不無濁氣之上升乎不知清升而濁降者一定之理未有清升而濁亦升者也苟能於補氣之中仍分其清濁之氣則升清正所以降濁也方用補中益氣湯

人參 三錢 生黃芪 一兩 柴胡 三分 炙草 一分

當歸 五錢 白朮 五錢 升麻 三分 陳皮 二分

女科下

正產

无

萊菔子 五分 炒研

水煎服一劑而胞衣自下矣夫補中益氣湯乃提氣之藥也並非推送之劑何以能降胞衣如此之速也然而濁氣之不降者由於清氣之不升也提其氣則清升而濁降濁氣降則腹中所存之物即無不隨濁氣而盡降正不必再用推送之法也况又加萊菔子數分能理濁氣不至兩相扞格所以奏功之奇也

正產氣虛血暈 六十三

婦人甫產兒後忽然眼目昏花嘔惡欲吐中心無主或神魂外越恍若天上行雲人以爲惡血冲心之患也誰知是氣虛欲脫而然乎蓋新產之婦血必盡傾血室空虛止存幾微之氣倘其人陽氣素虛不能生血心中之血前已蔭胎胎墮而心中之血亦隨胎而俱墮心無血養所賴者幾微之氣以固之耳今氣又虛而欲脫而君心無護所剩殘血欲奔回救主而血非正血不能歸經內庭變亂而成血暈之症矣治法必須大補氣血斷不可單治血暈也或疑血暈是熱血上冲而更補其血不愈助其上冲之勢乎不知新血不生舊血不散補血以生新血正活血以逐舊血也然血有形之物難以速生

女科下

正產

辛

氣乃無形之物易於迅發補氣以生血尤易於補血以生血耳方用補氣解暈湯

人參 一兩 生黃芪 一兩 當歸 一兩 洗黑芥穗 三錢

薑炭 一錢

原方極效不可加減

水煎服一劑而暈止二劑而心定三劑而血生四劑而血旺再不暈矣此乃解暈之聖藥用參芪以補氣使氣壯而生血也用當歸以補血使血旺而養氣也氣血兩旺而心自定矣用荆芥炭引血歸經用薑炭以行瘀引陽瘀血去而正血歸不必解暈而暈自解矣一方之中藥止五味而其奏功之奇而大如此其神矣乎

正產血暈不語 六十四

產婦有子方下地即昏暈不語此氣血兩脫也本在不救然救之得法亦有能生者山得岐天師秘訣何敢隱而不宣乎常斯之時急用銀針刺其眉心得血出則語矣然後以人參一兩煎湯灌之無不生者即用黃芪二兩當歸一兩名當歸補血湯煎湯一碗灌之亦得生萬不可於二方之中輕加附子蓋附子無經不達反引氣血之藥走而不守不能專注於胞胎不若人參歸芪直救其氣血之絕聚而不散也蓋產婦昏暈全是血室空虛無以養心以致昏暈舌為心之苗心既無主而舌又安能出聲耶夫眉心之穴上通於腦下通於舌而其系則連於心刺其眉心則腦與舌俱通而心之清氣上升

女科下

正產

三

則痰血自然下降矣然後以參芪當歸之能補氣生血者煎湯灌之則氣與血接續又何至於死亡乎雖單用參芪當歸亦有能生者然終不若先刺眉心之為更妙世人但知灸眉心之法不知刺更勝於灸蓋灸法緩而刺法急緩則難於救絕急則易於回生所謂急則治其標緩則治其本者此也

正產敗血攻心暈狂 六十五

婦人有產後二三日發熱惡露不行敗血攻心狂言呼叫甚欲奔走擊提不定人以為邪熱在胃之過誰知是血虛心不得養而然乎夫產後之血盡隨胞胎而外越則血室空虛臟腑皆無血養只有心中之血尚存幾微以護心君而臟腑失其所養皆欲取給於心心包為心君之宰相攔絕各臟腑之氣不許入心始得心神安靜是護心者全藉心包之力也使心包亦虛不能障心而各臟腑之氣遂直入於心以分取乎心血心包情急既不能內顧其君又不能外禦乎眾於是大聲疾呼號鳴勤王而其迹象反近於狂悖有無可如何之勢故病狀似熱而實非熱也治法須大補心中之血使各臟腑分

女科下

正產

三

取以自養不得再擾乎心君則心君泰然而心包亦安矣方用安心湯

當歸 二兩 川芎 一兩 生地 五錢 丹皮 五錢

生蒲黃 二錢

乾荷葉一片引水煎服一劑而狂定惡露亦下矣此方用芎歸以養血何以又用生地丹皮之涼血似非產後所宜不知惡露所以奔心原因虛熱相犯於補中涼之而涼不為害況益之以荷葉七竅相通引邪外出不能內不害心且佐蒲黃以分解乎惡露也但只可暫用以定狂不可多用以取咎也謹之慎之

服藥後正
定宜服加
味生洗湯
當歸酒洗
一兩一錢
川芎一錢
批半錢
研一錢
炒一錢
丹皮一錢
服四劑妙

正產腸下六十六

產婦腸下亦危症也人以爲兒門不關之故誰知是氣虛下陷而不能收乎夫氣虛下陷自宜用升提之藥以提其氣然新產之婦恐有瘀血在腹一旦提氣並瘀血升騰於上則沖心之患又恐變出非常是氣又不可竟提也氣既不可竟提而氣又下陷將用何法以治之哉蓋氣之下陷者因氣之虛也但補其氣則氣旺而腸自升舉矣惟是補氣之藥少則氣力薄而難以上升必須以多爲貴則腸旺力強斷不能降而不升矣方用補氣升腸飲

人參一兩 當歸一兩 白朮五錢
川芎三錢 升麻一分

女科下

水煎服一劑而腸升矣此方純於補氣全不去升腸即如用升麻一分亦不過引氣而升耳蓋升麻之爲用少則氣升多則血升也不可不知又方用草麻仁四十九粒搗塗頂心以提之腸升即刻洗去時久則恐吐血此亦升腸之一法也

產後少腹疼六十七

婦人產後少腹疼痛甚則結成一塊按之愈疼人以爲兒枕之疼也誰知是瘀血作祟乎夫兒枕者前人謂兒頭枕之物也兒枕之不疼豈兒生不枕而反疼是非兒枕可知矣既非兒枕何故作疼乃是瘀血未散結作成團而作疼耳凡此等症多是壯健之婦血有餘而非血不足也似乎可用破血之藥然血活則瘀自除血結則瘀作祟若不補血而反敗血雖瘀血可消畢竟耗損難免不若於補血之中以行逐瘀之法則氣血不耗而瘀亦盡消矣方用散結定疼湯

當歸一兩 川芎五錢 丹皮二錢 益母草三錢
黑芥穗二錢 乳香一錢 山查十粒 桃仁七粒

女科下

水煎服一劑而疼止而愈不必再劑也此方逐瘀於補血之中消塊於生血之內妙在不專攻疼病而疼病止彼世人一見兒枕之疼動用元胡蘇木蒲黃靈脂之類以化塊又何足論哉

婦人產後少腹疼痛按之即止人亦以爲兒枕之疼也誰知是血虛而然乎夫產後亡血過多血室空虛原能腹痛十婦九然但疼有虛實之分不可不辨如燥糖觸體光景是虛疼而非實疼也大凡虛疼宜補而產後之虛疼尤宜補焉惟是血虛之疼必須用補血之藥而補血之味多是潤滑之品恐與大腸不無相碍然產後血虛腸多乾燥潤滑正相宜也何碍之有方用腸寧湯

當歸一兩 熟地一兩 人參三錢 麥冬三錢

阿膠三錢 蛤粉炒 山藥三錢 續斷 二錢 甘草 一錢
 肉桂二分 去粗研
 水煎服一劑而疼輕二劑而疼止多服更宜此方補氣補血之藥也然補氣而無太鬱之憂補血而無太滯之患氣血既生不必止疼而疼自止矣

女科下

產後

毒

產後氣喘六十八

婦人產後氣喘最是大危之症苟不急治立刻死亡人只知是氣血之虛也誰知是氣血兩脫乎夫既氣血兩脫人將立死何又能作喘然此血將脫而氣猶未脫也血將脫而氣欲挽之而反上喘如人救溺援之而力不勝又不肯自安於不救乃召號同志以求助故呼聲而喘作其症雖危而可救處正在能作喘也蓋肺主氣喘則肺氣似盛而實衰當是之時血將脫而萬難驟生望肺氣之相救甚急若赤子之望慈母然而肺因血失止存幾微之氣自顧尚且不暇又何能提挈乎血氣不與血俱脫者幾希矣是救血必須補氣也方用救脫活母湯

女科下

產後

素

方妙不可加減

人參二兩 當歸一兩 酒洗熟地 九蒸 枸杞子 五錢
 山黃五錢 蒸去核 麥冬 一兩 阿膠 二錢 蛤粉炒 肉桂 一錢 去粗研
 黑芥穗二錢
 水煎服一劑而喘輕二劑而喘減三劑而喘定四劑而全愈矣此方用人參以接續元陽然徒補其氣而不補其血則陽燥而狂雖回生於一時亦旋得旋失之道即補血而不補其肝腎之精則本原不固陽氣又安得而續乎所以又用熟地山黃枸杞之類以大補其肝腎之精而後大益其肺氣則肺氣健旺升提有力矣特慮新產之後用補陰之藥膩滯不行又加肉桂以補命門之火使火氣有根助人參以生氣且能逆化地黃之類以化精生血若過於助陽萬一血

隨陽動痰而上行亦非保全之策更加荆芥以引血歸經則肺氣安而喘速定治幾其神乎

女科下

產後

三

產後惡寒身顛 六十九

婦人產後惡寒惡心身體顛發熱作渴人以爲產後傷寒也誰知是氣血兩虛正不敵邪而然乎大凡人之氣不虛則邪斷難入產婦失血既多則氣必大虛氣虛則皮毛無衛邪原易入正不必戶外之風來襲體也即一舉一動風即可乘虛而入之然產後之婦風易入而亦易出凡有外邪之感俱不必祛風況產婦之惡寒者寒由內生也發熱者熱由內弱也身顛者顛由氣虛也治其內寒而外寒自散治其內弱而外熱自解壯其元陽而身顛自除方用十全大補湯

宜連服數劑不可只服一劑

女科下

產後

素

人參 三錢 白朮 三錢 茯苓 三錢 甘草 一錢
川芎 一錢 當歸 三錢 熟地 五錢 白芍 二錢
黃芪 一兩 肉桂 一錢

生用 內桂 去粗研

水煎服一劑而諸病悉愈此方但補氣與血之虛而不去散風與邪之實正以正足而邪自除也況原無邪氣乎所以奏功之捷也

產後惡心嘔吐 七十

婦人產後惡心欲嘔時而作吐人皆曰胃氣之寒也誰知是腎氣之寒乎夫胃為腎之關胃之氣寒則胃氣不能行於腎之中腎之氣寒則腎氣亦不能行於胃之內是腎與胃不可分而兩之也惟是產後失血過多必致腎水乾涸腎水涸應腎火上炎當不至胃有寒冷之虞何故腎寒而胃亦寒乎蓋新產之餘水乃遽然涸去虛火尚不能生火既不生而寒之象自現治法宜補其腎中之火然火無水濟則火在水上未必不成火動陰虛之症必須於水中補火腎中溫胃而後腎無太熱之患胃有既濟之歡也方用溫腎止嘔湯

女科下

熟地 五錢 巴戟 一兩 人參 三錢 白朮 一兩 產後

山萸 五錢 炮薑 一錢 茯苓 二錢 白冠 一錢

水煎服一劑而嘔吐止二劑而不再發四劑而全愈矣此方補腎之藥多於治胃之品然而治腎仍是治胃也所以腎氣升騰而胃寒自解不必用大熱之劑溫胃而祛寒也

服此方必... 內惡心欲... 上衝宜服... 加味生... 湯全當歸... 一兩酒洗... 川芎二錢... 炮薑一錢... 東查炭二... 錢研用無... 灰黃酒一... 鍾水三錢... 同煎

產後血崩 七十一

少婦產後半月血崩昏暈目見鬼神人皆曰惡血冲心也誰知是不慎房幃之過乎夫產後業踰半月雖不比初產之二三日而氣血初生尚未全復即血路已淨而胞胎之損傷未痊斷不可輕於一試以重傷其門戶無奈少嬌之婦氣血初復不知慎養慾心大動貪合圖歡以致血崩昏暈目見鬼神是心腎兩傷不特胞胎門戶已也明明是既犯色戒又加酣戰以致大洩其精精洩而神亦隨之而欲脫此等之症乃自作之孽多不可活然於不可活之中而思一急救之法舍大補其氣與血別無良法也方用救敗求生湯

女科下

人參 二兩 當歸 三兩 白朮 二兩 九蒸熟地 一兩 產後

山萸 五錢 山藥 五錢 棗仁 五錢 附子 一分或一錢

水煎服一劑而神定二劑而暈止三劑而血亦止矣倘一服見效連服三四劑減去一半再服十劑可慶更生此方補氣以回元陽於無何有之鄉陽回而氣回自可攝血以歸神生精而續命矣

活一二錢... 人參去... 五錢打... 急煎... 氣脫不... 待矣煎... 徐徐... 待氣... 瓶一服... 之其... 法參... 崩門... 後不可... 抗... 及諸... 然此... 係臨... 二日... 房八... 致戒... 之

亦有中氣... 亦產後... 不止... 此至危... 證者八... 惟用... 湯尚... 可救

產後手傷胞胎淋漓不止七十二

婦人有生產之時被穩婆手入產門損傷胞胎因而淋漓不止欲少忍須臾而不能人謂胞破不能再補也孰知不然夫破傷皮膚尚可完補豈破在腹內者獨不可治療或謂破在外可用藥外治以生皮膚破在內雖有靈膏無可救補然破之在內者外治雖無可施力安必內治不可奏功乎試思瘡傷之毒大有缺陷尚可服藥以生肌肉此不過收生不謹小有所損並無惡毒何難補其缺陷也方用完胞飲

人參 一兩 白朮 十兩 茯苓 三錢 生黃芪 五錢
當歸 一兩 川芎 五錢 桃仁 十粒 紅花 一錢
益母草 三錢 白芨末 一錢

聖

聖

用豬羊胞一個先煎湯後煎藥服十劑全愈夫胞損宜用補胞之藥何以反用補氣血之藥也蓋生產本不可手探試而穩婆竟以手探胞胎以致傷損則難產必矣難產者因氣血之虛也產後大傷氣血是虛而又虛矣因虛而損復因損而更虛若不補其氣與血而胞胎之破何以奏功乎今之大補其氣血者不啻飢而與之食渴而與之飲也則精神大長氣血再造而胞胎何難補完乎所以旬日之內便成功也

方妙不可
加減白芨
宜炒炭用

產後四肢浮腫七十三

產後四肢浮腫寒熱往來氣喘咳嗽胸膈不利口吐酸水兩脇疼痛人皆曰敗血流於經絡滲於四肢以致氣逆也誰知是肝腎兩虛陰不得出之陽乎夫產後之婦氣血大虧自然腎水不足腎火沸騰然水不足則不能養肝而肝木大燥木中乏津木燥火發腎火有黨子母兩焚火焰直冲而上尅肺金受火刑力難制肝而咳嗽喘滿之病生焉肝火既旺而下尅脾土土受木刑力難制水而四肢浮腫之病出焉然而肝木之火旺乃假象而非真旺也假旺之氣若盛而實不足故時而熱時而寒往來無定乃隨氣之盛衰以為寒熱而寒非真寒熱亦非真熱是以氣逆於胸膈之間而不舒耳兩脇者肝之部位也酸者肝之氣味也吐酸脇痛皆肝虛而腎不能榮之象也治法宜補血以養肝補精以生血精血足而氣自順而寒熱咳嗽浮腫之病悉退矣方用轉氣湯

女科下

產後

聖

人參 三錢 茯苓 三錢 白朮 三錢 當歸 五錢
白芍 五錢 熟地 九兩 山黃 三錢 山藥 五錢
芡實 三錢 故紙 一錢 柴胡 五分
水煎服三劑效十劑痊此方皆是補血補精之品何以名為轉氣耶不知氣逆由於氣虛乃是肝腎之氣虛也補肝腎之精血即所以補肝腎之氣也蓋虛則逆旺則順是補即轉也氣轉而各症盡愈陰出之陽則陰陽無扞格之虞矣

產後肉線出 七十四

婦人有產後水道中出肉線一條長二三尺動之則疼痛欲絕人以爲胞胎之下墜也誰知是帶脉之虛脫乎夫帶脉束於任督之間任脉前而督脉後二脉有力則帶脉堅牢二脉無力則帶脉崩墜產後亡血過多無血以養任督而帶脉崩墜力難升舉故隨溺而隨下也帶脉下垂每每作痛於腰臍之間況下墜者而出於產門之外其失於關鍵也更甚安得不疼痛欲絕乎方用兩收湯

此方凡腎虛腰痛遺尿皆可治甚勿輕忽

人參 一兩 白朮 二兩 川芎 三錢 九蒸熟地 二兩
山藥 一兩 山萸 四錢 芡實 五錢 扁豆 五錢
巴戟 二錢 杜仲 五錢 白果 十枚
水煎服一劑而收半二劑而全收矣此方補任督而仍補腰臍者蓋以任督連於腰臍也補任督而不補腰臍則任督無助而帶脉何以升舉惟兩補之則任督得腰臍之助帶脉亦得任督之力而收矣

女科下

聖

產後肝痿 七十五

婦人產後陰戶中垂下一物其形如帕或有角或二岐人以爲產額也誰知是肝痿之故乎夫產後何以成肝痿也蓋因產前勞役過傷又觸動怪怒以致肝不藏血血亡過多故肝之脂膜隨血崩墜其形似子宮而實非子宮也若是子宮之下墜狀如茄子只到產門而不能越出於產門之外惟肝之脂膜往往出產門外者至六七寸許且有粘席乾落一片如手掌大者如是子宮墜落人立死矣又安得而復生乎治法宜大補其氣與血而少加升提之品則肝氣旺而易生肝血旺而易養肝得生養之力而脂膜自收方用收膜湯

生黃芪 一兩 人參 五錢 白朮 五錢 白芍 五錢
當歸 三錢 升麻 一錢
水煎服一劑即收矣或疑產後禁用白芍恐伐生氣之原何以頻用之而奏功也是未讀仲景之書者嗟乎白芍之在產後不可頻用者恐其收斂乎瘀也而謂伐生氣之源則誤矣況病之在肝者尤不可以不用且用之於大補氣血之中在芍藥亦忘其爲酸收矣又何能少有作祟者乎矧脂膜下墜正藉酸收之力助升麻以提升氣血所以奏功之捷也

女科下

聖

此方凡腎虛腰痛遺尿皆可治甚勿輕忽

產後氣血兩虛乳汁不下 七十六

婦人產後絕無點滴之乳人以為乳管之閉也誰知是氣與血之兩涸乎夫乳乃氣血之所化而成也無血固不能生乳汁無氣亦不能生乳汁然二者之中血之化乳又不若氣之所化為尤速新產之婦血已大虧血本自顧不暇又何能以化乳乳全賴氣之力以行血而化之也今產後數日而乳不下點滴之汁其血少氣衰可知氣旺則乳汁旺氣衰則乳汁衰氣涸則乳汁亦涸必然之勢也世人不知大補氣血之妙而一味通乳豈知無氣則乳無以化無血則乳無以生不幾向飢人而乞食貧人而索金乎治法宜補氣以生血而乳汁自下不必利竅以通乳也方名通乳丹

女科下

產後

案

人參 一兩 生黃芪 一兩 當歸 二兩 麥冬 五錢

木通 三分 桔梗 三分 七孔猪蹄 二個

水煎服二劑而乳如泉湧矣此方專補氣血以生乳汁正以乳生於氣血也產後氣血涸而無乳非乳管之閉而無乳者可比不去通乳而名通乳丹亦因服之乳通而名之今不通乳而乳生即名生乳丹亦可

產後鬱結乳汁不通 七十七

少壯之婦於生產之後或聞丈夫之嫌或聽翁姑之譁遂致兩乳脹滿疼痛乳汁不通人以為陽明之火熱也誰知是肝氣之鬱結乎夫陽明屬胃乃多氣多血之府也乳汁之化原屬陽明然陽明屬土壯婦產後雖云亡血而陽明之氣實未盡衰必得肝木之氣以相通始能化成乳汁未可全責之陽明也蓋乳汁之化全在氣而不在血今產後數日宜其有乳而兩乳脹滿作痛是欲化乳而不可得非氣鬱而何明明是羞憤成鬱土木相結又安能化乳而成汁也治法宜大舒其肝木之氣而陽明之氣血自通而乳亦通矣不必專去通乳也方名通肝生乳湯

女科下

產後

案

白芍 五錢 當歸 五錢 白木 五錢 熟地 二分

甘草 三分 麥冬 五錢 通草 一錢 柴胡 一錢

遠志 一錢 水煎服一劑即通不必再服也

女科下卷 終

產後編上卷目錄

上海圖書館藏

產後總論

產前後方症宜忌

正產 傷產 調產
難產 死產 下胞
橫產 盤腸產 產後用藥十談
斷胎 新產治法 胎前患傷寒疫症瘧疾墮胎等症
產後寒熱

血塊

血暈

厥症

血崩

氣短似喘

妄言妄見

傷食

忿怒

類瘧

類傷寒二陽症

類傷寒三陰症

類中風

類瘧

出汗

盜汗

口渴兼小便不利

遺尿

產後編上 共四十三症

陽曲傅 山青王手著

產後總論

凡病起於血氣之衰脾胃之虛而產後尤甚是以丹溪先生論產後必大補氣血為先雖有他症以未治之斯言盡治產之大旨若能擴充立方則治產可無過矣夫產後憂驚勞倦氣血暴虛諸症乘虛易入如有氣母專耗散有食母專消導熱不可用芩連寒不可用桂附寒則血塊停滯熱則新血崩流至若中虛外感見三陽表症之多似可汗也在產後而用麻黃則重竭其陽見三陰裏症之多似可下也在產後而用承氣則重亡陰血耳聾脇痛乃腎虛惡露之停休用柴胡譫語出汗乃元弱似邪之症非同胃實厥由陽氣之衰無分寒熱非大補不能回陽而起弱瘳因陰血之虧不論剛柔非滋榮不能舒筋而活絡乍寒乍熱發作無期症似瘧也若以瘧治遷延難愈言論無倫神不守舍病似邪也若以邪治危亡可待去血過多而大便燥結肉菴蓉加於生化非潤腸承氣之能通去汗過多而小便短澀六君子倍加參芪必生津助液之可利加參生化湯頻服救產後之危長生活命丹屢用甦絕穀之人癩疝脫肛多是氣虛下陷補中益氣之方口噤拳攣乃因血燥類風加參生化之劑產戶入風而痛甚服宜羌活養榮湯玉門傷涼而不閉洗宜蠅兒黃硫散怔忡驚悸生化湯加以定志似邪恍惚安神丸助以歸脾因氣而悶滿虛煩生化

湯加木香為佐因食而噁酸惡食六君子加神麩麥芽為良蘇木莪朮大能破血青皮枳殼最消滿脹一應耗氣破血之劑汗吐宣下之法止可施諸壯實豈宜用於胎產大抵新產後先問惡露如何塊痛未除不可遽加參朮腹中痛止補中益氣無疑至若亡陽脫汗氣虛喘促頻服加參生化湯是從權也又如亡陰火熱血崩厥暈速煎生化原方是救急也王太僕云治下補下治以急緩緩則道路達而力微急則氣味厚而力重故治產當遵丹溪而固本服法宜效太僕以頻加凡付生死之重寄須着意於極危欲求俯仰之無虧用存心於愛物此雖未盡產症之詳然所聞一症皆接近鄉治驗為據亦未必無小補云

產後編上

正產

正產者有腹或痛或止腰脇酸痛或勢急而胞未破名弄胎服八珍湯加香附自安有胞破數日而痛尚緩亦服上藥俟之

傷產

傷產者胎未足月有所傷動或腹痛臍痛或服催生藥太早或產母努力太過逼兒錯路不能正產故臨月必舉動從容不可多睡飽食飲酒但覺腹中動轉即正身仰臥待兒轉順與其臨時費力不如先時慎重

調產

調產者產母臨月擇穩婆辨器用備參藥產時不可多人喧鬧二人扶身或憑物站心煩用滾水調白蜜一匙

獨活湯更妙或飢服糜粥少許勿令飢渴有生息未順者只說有雙胎或胎衣不下勿令產母驚恐

催生

催生者因坐草太早困倦難產用八珍湯稍佐以香附乳香以助血氣胞衣早破漿血已乾亦用八珍湯

凍產

凍產者天寒血氣凝滯不能速生故衣裳宜厚產室宜煖背心下體尤要

熱產

熱產者暑月宜溫涼得宜若產室人眾熱氣蒸逼致頭痛面赤昏暈等症宜飲清水少許以解之然風雨陰涼亦當避之

產後編上

橫產

橫產者兒居母腹頭上足下產時則頭向下產母若用力逼之胎轉至半而橫當令產母安然仰臥令其自順穩婆以中指挾其肩勿使臍帶羈絆用催生藥努力即生

當歸 紫蘇 各三錢 長流水煎服即下

一方用好京墨磨服之即下

一方用敗筆頭一個火銀以藕節自然汁調服之即下

一方用益母草六兩濃煎加童便一大杯調服即下

盤腸產

盤腸產者產則子腸先出然後生子其腸或未即收以

草麻子四十九粒研碎塗頭上腸收急急洗去遲則有害又方止用四十粒去皮研為膏塗頂中收即拭之如腸燥以磨刀水潤之再用磁石煎湯服之須陰陽家用過有驗者

難產

難產者交骨不開不能生產也服加味芎歸湯良久即下

小川芎 一兩 當歸 一兩 敗龜版 一個 婦人髮灰 一握 須用生過男女者為末水一鍾煎七分服

死產

死產者子死腹中也驗母舌青黑其胎已死先用平胃散一服酒水各一鍾煎八分投朴硝煎服即下用童便

產後編上

亦好後用補劑調理

下胞

胞衣不下用滾酒送下失笑散一劑或益母丸或生化湯送鹿角灰一錢或以產母髮入口作吐胞衣即出有氣虛不能送出者腹必脹痛單用生化湯

全當歸 一兩 川芎 三錢 白朮 一錢 香附 一錢 加入參 三錢 更妙用水煎服

一方用草麻子二兩雄黃二錢研膏塗足下湧泉穴衣下急速洗去

平胃散

南蒼木 浸炒 厚樸 薑炒 陳皮 炙草 各二錢 共為粗末或水煎或酒煎煎成時加樸硝二錢再煎

一二沸溫服

失笑散

五靈脂 蒲黃 俱研為細末每服三錢熱酒下

斷臍

斷臍必以綿裹咬斷為妙如遇天寒或因難產母子勞倦宜以大麻油紙燃徐徐燒斷以助元氣雖兒已死令

煖氣入臍多得生切勿以刀斷之

滑胎散 臨月常服數劑以便易生

當歸 三五錢 川芎 五七錢 杜仲 二錢 熟地 三錢

枳殼 七分 山藥 二錢 水二鍾煎八分食前溫服如氣

體虛弱人加入參白朮隨宜服之如便實多滯者加

牛膝二錢

產後編下

治產秘驗良方

治橫生逆產至數日不下一服即下有未足月忽然

胎動一服即安或臨月先服一服保護無虞更能治

胎死腹中及小產傷胎無乳者一服即如原體

全當歸 川芎 各一錢五分 川貝母 一錢 荊芥穗

黃芪 各八分 厚樸 薑炒 斷艾 紅花 各七分 兔絲子 二

分 白芍 冬月不用 枳殼 麵炒 羌活 麵炒 甘草 五分

上十三味只用十二味不可加減安胎去紅花催生

去斷艾用井水鍾半薑三片為引熱服渣用水一鍾

煎半鍾熱服如不好再用水一鍾煎半鍾服之即效

不用二劑

催生兔腦丸 治橫生逆產神效

臘月兔腦髓一個 母丁香一個 乳香一錢另研
麝香一分 兔腦爲丸芡實大陰乾密封用時以溫酒
送下一丸

奪命丹

臨產未產時目反口噤面黑唇青口中吐沫命在須
臾若臉面微紅子死母活急用蛇退 蚕故子燒灰
性 髮灰一錢 乳香五分 共爲細末酒下
加味芎歸湯 治子宮不收產門不閉

人參二錢 黃芪一錢 當歸二錢 升麻八分 川芎一錢
炙草四分 五味子十五粒 再不收加半夏八分 白芍
酒炒

新產治法

產後編上

生化湯先連進二服若胎前素弱婦人見危症熱症
墮胎不可拘貼數服至病退乃止若產時勞甚血崩
形脫即加人參三四錢在內頻服無虞若氣促亦加
人參加參於生化湯者血塊無滯不可以參爲補而
弗用也有治產不用當歸者見偏之甚此方處置萬
全必無一失世以四物湯治產地黃性寒滯血芍藥
微酸無補伐傷生氣誤甚

產後用藥十誤

一因氣不舒而誤用耗氣順氣等藥反增飽悶陳皮
用至五分禁枳實厚樸
二因傷氣而誤用消導反損胃氣至絕穀禁枳壳大
黃蓬稜麴樸

三因身熱而誤用寒涼必致損胃增熱禁芩連梔枳
升柴

四因日內未曾服生化湯勿用參芪朮以致塊痛不
消

五毋用地黃以滯惡露

六毋用枳壳牛膝枳實以消塊

七便秘毋用大黃芒硝

八毋用蘇木稜蓬以行塊芍藥能伐氣不可用

九毋用山查湯以攻塊定痛而反損新血

十毋輕服濟坤丹以下胎下胞

產後危疾諸症當頻服生化湯隨症加減照依方論

產後寒熱

產後編上

凡新產後榮衛俱虛易發寒熱身痛腹痛決不可妄
投發散之劑當用生化湯爲主稍佐發散之藥產後
脾虛易於停食以致身熱世人見有身熱便以爲外
感遽然發汗速亡甚矣當於生化湯中加扶脾消食
之藥大抵產後先宜補血次補氣若偏補氣而專用
參芪非善也產後補虛用參芪芎歸白朮陳皮炙草
熱輕則用茯苓淡滲之藥其熱自除重則加乾薑或
云大熱而用薑何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛內
生熱耳蓋乾薑能入肺分利肺氣又能入肝分引眾
藥生血然必與陰血藥同用之產後惡寒發熱腹痛
者當主惡血若腹不痛非惡血也
產後寒熱口眼歪邪此乃氣血虛甚以大補爲主左

手脉不足補血藥多於補氣藥右手脉不足補氣藥多於補血藥切不可用小續命等發散之藥

胎前或患傷寒疫症瘧疾熱久必致墮胎墮後愈增熱因熱消陰血而又繼產失血故也治者甚勿妄論傷寒瘧疫未除誤投梔子豉湯柴芩連栢等藥雖或往來潮熱大小便秘五苓承氣等藥斷不可用只重產輕邪大補氣血類服生化湯如形脫氣脫加生脉散以防血量蓋川芎味辛能散乾薑能除虛火雖有便秘煩渴等症只多服生化湯自津液生而二便通矣若熱用寒劑愈虛中氣誤甚

產後編上

八

產後諸症治法

血塊 第一

此症勿拘古方妄用蘇木蓬稜以輕人命其一應散血方破血藥俱禁用雖山查性緩亦能害命不可擅用惟生化湯係血塊聖藥也

生化湯原方

當歸 八錢 川芎 三錢 桃仁 十四粒 去皮尖研 黑薑 五分

炙草 五分 用黃酒童便各半煎服

又益母丸鹿角灰就用生化湯送下一錢外用烘熱衣服煖和塊痛處雖大暑亦要和煖塊痛處有氣不運而暈迷厥切不可妄說惡血搶心只服生化湯為妙俗有生地牛膝行血山稜蓬木敗血山查沙糖消塊斬艾椒

產後編上

血塊

九

酒定痛反致昏暈等症切不可妄用二三四日內覺痛減可揉乃虛痛也宜加參生化湯

如七日內或因寒涼食物結塊痛甚者加入肉桂八分於生化湯內如血塊未消不可加參芪用之則痛不止總之慎勿用峻利藥勿多飲薑椒艾酒類服生化湯行氣助血外用熱衣以煖腹如用紅花以行之蘇木牛膝以攻之則誤其胎氣脹用烏藥香附以順之枳殼厚樸以舒之甚有青皮枳實蘇子以下氣定喘芩連梔子黃栢以退熱除煩至於血結更甚反用承氣湯下之而愈結汗多小便短濇反用五苓散通之而愈秘非徒無益而又害之也

凡兒生下或停血不下半月外尙痛或外加腫毒高寸

肉桂一作三分

許或身熱減飲食倦甚必用生化湯加三稜蓬朮肉桂等攻補兼治其塊自消如虛甚食少泄瀉只服此帖定痛且健脾胃進食止瀉然後服消塊湯

加味生化湯 治血塊日久不消
半月後方可用之
川芎 一錢 當歸 三錢 肉薑 四分 桃仁 十五粒
三稜 六分 元胡 六分 肉桂 六分 炙草 四分

產後編上

血塊

十

血暈 第二

分娩之後眼見黑花頭眩昏暈不省人事者一因勞倦甚而氣竭神昏二因大脫血而氣欲絕三因痰火乘虛泛上而神不守當急服生化湯二三帖外用韭菜細切納有嘴瓶中用滾醋二鍾沖入瓶內急沖產母鼻中即醒若偏信古方認為惡血搶心而輕用散血之劑認為瘦火而用無補消降之方誤甚矣

如暈厥牙關緊閉速煎生化湯挖開口將鵝毛探喉酒蓋盛而灌之如灌下腹中漸溫煖不可拘帖數外用熱手在單衣上從心採按至腹常熱火煖之一兩時服生化湯四帖完即神清始少緩藥方進粥服至十服而安故犯此者連灌藥火煖不可棄而不救若在冬月婦人

產後編上

血暈

十一

身欠煖亦有大害臨產時必預煎生化湯預燒秤錘硬石子候兒下地連服二三帖又產婦枕邊行醋韭投醋瓶之法決無暈症又兒生時合家不可喜子而慢母產母不可顧子忘倦又不可產訖即卧或忿怒逆氣皆致血暈慎之慎之

加味生化湯 治產後三等血暈症

川芎 三錢 當歸 六錢 黑薑 四分 桃仁 十粒
炙草 五分 荆芥 四分 大棗水煎服

勞倦甚而暈及血崩氣脫而暈並宜速灌兩服如形色脫或汗出而脫皆急服一帖即加人參三四錢一加肉桂四分決不可疑參為補而緩服痰火乘虛泛上而暈方內加橘紅四分虛甚加人參一錢肥人多

痰再加竹瀝七分薑汁少許總不可用稜木破血等方其血塊痛甚兼送益母丸或鹿角灰或元胡散或獨勝散上消血塊方服一服即效不必易方從權救急

加參生化湯 治產後形色脫

人參 三錢有倍加 川芎 二錢 當歸 五錢 炙草 四分

桃仁 十粒 炮薑 四分 大棗水煎服

脈脫形脫將絕之症必服此方加參四五錢頻頻灌之產後血崩血暈兼汗多宜服此方無汗不脫只服本方不必加參左尺脈脫亦加參此方治產後危急諸症可通用一晝一夜必須服三四劑若照常症服豈能接將絕之氣血扶危急之變症耶產後一二日

產後編上

血暈

主

血塊痛雖未止產婦氣血虛脫或暈或厥或汗多或形脫口氣漸涼煩渴不止或氣喘急無論塊痛從權用加參生化湯病勢稍退又當減參且服生化湯加減法血塊痛甚加肉桂七分渴加麥冬一錢五味十粒汗多加麻黃根一錢如血塊不痛加炙黃芪一錢以止汗傷飯食麪食加炒神麪一錢麥芽五分炒傷肉食加山查五個砂仁四錢炒

厥症第三

婦人產有用力過多勞倦傷脾故逆冷而厥氣上胸滿脈去形脫非大補不可豈錢數川芎當歸能回陽復神乎必用加參生化湯倍參進二劑則氣血旺而神自生矣厥自止矣若服藥而反渴另有生脈散獨參代茶飲救臟之燥如四肢逆冷又泄痢類傷寒陰症又難用四逆湯必用倍參生化湯加附子一片可以回陽止逆又可以行參歸之力立二方於左分先後

加參生化湯 治產後發厥塊痛

川芎 二錢 當歸 四錢 炙草 五分 炮薑 四分

桃仁 十粒去皮尖研 人參 二錢 棗水煎進二服

滋榮益氣復神湯 治產後發厥問塊痛已除可服此方

產後編下

厥症

主

人參 三錢 黃芪 一錢 白朮 一錢 當歸 三錢 炙草 四分 陳皮 四分 五味 十粒 川芎 一錢 熟地 一錢 麥芽 一錢 棗一枚水煎服
手足冷加附子五分汗多加麻黃根一錢熟棗仁一錢妄言妄見加益智柏子仁龍眼肉大便實加肉苁蓉二錢大抵產後暈厥二症相類但暈在臨盆症急甚於厥宜頻服生化湯幾帖塊化血旺神清暈止若多氣促形脫等症必加參芪厥在分娩之後宜倍參生化湯止厥以復神並補氣血也非如上偏補氣血而可愈也要知常有塊痛芪朮不可加厥症若無塊痛芪朮地黃並用無疑也

血崩 第四

產後血大來審血色之紅紫視形色之虛實如血紫有塊乃當去其敗血也止留作痛不可論崩如鮮紅之血乃是驚傷心不能生血怒傷肝不能藏血勞傷脾不能統血俱不能歸經耳當以崩治先服生化湯幾帖則行中自有補若形脫汗多氣促宜服倍參生化湯幾帖以益氣非棕灰之可止者如產後半月外崩又宜升舉大補湯治之此症虛極服藥平穩未見速效須二十帖後諸症頓除

生血止崩湯 治產後血崩
川芎 一錢 當歸 四錢 黑薑 四分 炙草 五分
桃仁 十粒 荊芥 五分 烏梅 五分 蒲黃 五分

產後編上

血崩

清

棗水煎忌薑椒熱物生冷

鮮紅血大來荆芥穗炒黑白芷各五分血竭形敗加參三四錢汗多氣促亦加參三四錢無汗形不脫氣促只服生化湯多服則血自平有言歸芎但能活血甚誤

升舉大補湯 滋榮益氣如有塊動

黃芪 白朮 陳皮 各四分 人參 二錢 炙草 一錢
升麻 各四分 當歸 熟地 各二錢 麥冬 一錢
川芎 一錢 白芷 四分 黃連 三分 荊芥穗 四分
汗多加麻黃根一錢浮麥炒一小撮大便不通加肉苁蓉一錢禁用大積氣滯磨木香三分痰加貝母六分竹瀝薑汁少許寒嗽加杏仁十粒桔梗五分知母

一錢驚加棗仁柏子仁各一錢傷飯加神麩麥芽各一錢傷肉食加山查砂仁各八分俱加棗水煎身熱不可加連柏傷食怒氣均不可專用耗散無補藥凡年老虛人患崩宜升舉大補湯
按症虛極註中有身熱不可加連柏云云後三頁復神湯項下註有宜用此湯少佐黃連墜火云云設無火可墜此方內並無熱藥無須反佐恐黃連未可輕用此處最宜詳慎
又註中寒嗽加有知母既係寒嗽知母亦未可擅用此條疑原刊寒字有誤

產後編上

血崩

素

氣短似喘第五

因血脫勞甚氣無所恃呼吸止息違其常度有認爲痰火反用散氣化痰之方誤人性命當以大補血爲主如有塊不可用參芪朮無塊方可用本方去桃仁加熟地並附子一片足冷加熟附子一錢及參朮陳皮接續補氣養榮湯

加參生化湯 治分塊後即患氣短者有塊不可加芪朮

川芎 二錢 當歸 四錢 炙草 五分 黑薑 四分

桃仁 十粒去皮尖研 人參 二錢 引加棗一枚連進二三帖後

再用後方

補氣養榮湯 治產後氣短促血塊不痛宜服此方

黃芪 一錢 白朮 一錢 當歸 四錢 人參 三錢

產後編上

陳皮 四分 炙草 四分 熟地 二錢 川芎 二錢

黑薑 四分 如手足冷加熟附子一錢汗多加麻黃根

一錢浮麥一小撮渴加麥冬一錢五味子十粒大便

不通加肉蓯蓉一錢麻仁一撮傷麩飯加炒神麩一

錢炒麥芽一錢傷肉食加山查砂仁各五分

按麥芽有回乳之害用者慎之

凡止汗用浮麥宜炒

黃芪白朮一作各二錢

妄言妄見第六

由氣血虛神魂無依也治當論塊痛有無緩急若塊痛未除先服生化湯二三帖痛止繼服加參生化湯或補中益氣湯加安神定志丸調服之若產日久形氣俱不足即當大補氣血安神定志服至藥力充足其病自愈勿謂邪崇若噴以法水驚之每至不救屢治此症服藥至十數帖方效病虛似邪欲除其邪先補其虛先調其氣次論諸病此古人治產後虛症及年老虛喘弱人妄言所當用心也

安神生化湯 治產後塊痛未止妄言妄見症未可用芪朮

川芎 一錢 柏子仁 一錢 人參 一二錢 當歸 二錢

茯神 二錢 桃仁 十二粒 黑薑 四分 炙草 四分

產後編上

益智炒 八分 陳皮 三分

棗水煎

滋榮益氣復神湯 塊痛已止妄言妄見服此方即愈

黃芪 白朮 麥冬 川芎 柏子仁 茯神

益智 各一錢 人參 熟地 各二錢 陳皮 三分

炙草 四分 棗仁 十粒 五味子 十粒 蓮子 八枚

元肉 八個 棗水煎服

產後血崩血脫氣喘氣脫神脫妄言雖有血氣陰陽之分其精散神去一也此暈後少緩亦危症也若非厚藥頻服失之者多矣誤論氣實痰火者非也新產有血塊痛並用加參生化湯行中有補斯免滯血血暈之失也其塊痛止有宜用升舉大補湯少佐黃連

1007 子部 醫家類 2 頁三寸

墜火以治血脫安血歸經也有宜用倍參補中益氣湯少佐附子助參以治氣脫攝氣歸淵也有宜用滋榮益氣復神湯少佐痰劑以清心火安君主之官也

產後編上

安言也見

未

傷食 第七

新產後禁膏粱遠厚味如飲食不節必傷脾胃治常扶元溫補氣血健脾胃審傷何物加以消導諸藥生化湯加神麩麥芽以消麩食加山查砂仁以消肉食如寒冷之物加吳萸肉桂如產母虛甚加人參白朮又有塊然後消補並治無有不安者屢見治者不重產後之弱惟知速消傷物反損真氣益增滿悶可不慎哉
加味生化湯 治血塊未消服此以消食

川芎 二錢 當歸 五錢 黑薑 四分 炙草 五分 桃仁 十粒

問傷何物加法如前煎服

健脾消食生化湯 治血塊已除服此消食

川芎 一錢 人參 當歸 各二錢 白朮 一錢半

產後編上

傷食

未

炙草 五分

審傷何物加法如前

如停寒物日久脾胃虛弱恐藥不能運用可用揉按炒神麩熨之更妙凡傷食誤用消導藥反絕粥幾日者宜服此方

長生活命丹

人參三錢水一鍾半煎半鍾先用參湯一盞以米飯鍋焦研粉三匙漸加參湯鍋焦粉引開胃口煎參湯用新確或銅杓恐聞藥氣要嘔也如服寒藥傷者加薑三大片煎湯人參名活命草鍋焦名活命丹此方曾活數十人

忿怒 第八

產後怒氣逆胸膈不利血塊又痛宜用生化湯去桃仁服時磨木香二分在內則塊化怒散不相悖也若輕產重氣偏用木香烏藥枳壳砂仁之類則元氣反損益增滿悶又加怒後即食胃弱停悶當審何物治法如前慎勿用木香枳榔丸流氣引子之方使虛弱愈甚也

木香生化湯治產後血塊已除因受氣者
川芎 二錢 當歸 六錢 陳皮 三分 黑薑 四分 服時磨木香二分在內此方減桃仁用木香陳皮前有減乾薑者詳之

健脾化食散氣湯 治受氣傷食無塊痛者
白朮 二錢 當歸 二錢 川芎 一錢 黑薑 四分

產後編上

人參 二錢 陳皮 三錢

審傷何物加法如前大抵產後忿怒氣逆及停食二症善治者重產而輕怒氣消食必以補氣血為先佐以調肝順氣則怒鬱散而元不損佐以健脾消導則停食行而思穀矣若端理氣消食非徒無益而又害之

陳皮一作三分又有四分存參

類瘧 第九

產後寒熱往來每日應期而發其症似瘧而不可作瘧治夫氣血虛而寒熱更作元氣虛而外邪或侵或嚴寒或極熱或晝輕夜重或日晡寒熱絕類瘧症治當滋榮益氣以退寒熱有汗急宜止或加麻黃根之類只頭有汗而不及於足乃孤陽絕陰之危症當加地黃當歸之類如陽明無惡寒頭痛無汗且與生化湯加羌活防風連翹葱白數根以散之其柴胡清肝飲等方常山草菓等藥俱不可用

滋榮養氣扶正湯 治產後寒熱有汗午後應期發者

人參 二錢 炙黃芪 白朮 川芎 熟地 麥冬 麻黃根 各一錢 當歸 三錢 陳皮 四分

產後編上

炙草 五分 棗水煎

加減養胃湯 治產後寒熱往來頭痛無汗類瘧者

炙草 四分 白茯苓 一錢 半夏 八分 川芎 一錢 陳皮 四分 當歸 三錢 蒼朮 一錢 藿香 四分 人參 一錢

薑引煎服有痰加竹瀝薑汁半夏神麩弱人兼服河車丸凡久瘧不愈兼服參朮膏以助藥力

參朮膏

白朮 一斤 米泔浸一宿到焙人參 一兩 用水六碗煎二碗再煎二次共計六碗合在一處將藥汁又熬成一碗空心米湯化半酒盞

類傷寒二陽症 第十

產後七日內發熱頭痛惡寒母專論傷寒為太陽症發熱頭痛脇痛母專論傷寒為少陽症二症皆由氣血兩虛陰陽不和而類外感治者慎勿輕產後熱門而用麻黃湯以治類太陽症又勿用柴胡湯以治類少陽症且產母脫血之後而重發其汗虛虛之禍可勝言哉昔仲景云亡血家不可發汗丹溪云產後切不可發表二先生非謂產後真無傷寒之兼症也非謂麻黃湯柴胡湯之不可對症也誠恐後輩學業偏門而輕產執成方而發表耳誰知產後真感風感寒生化中芎藭亦能散之乎

加味生化湯 治產後三日內發熱頭痛症
類傷寒二陽
產後編上

川芎 防風 各一錢 當歸 三錢 炙草 四分
桃仁 十粒 羌活 四分

查刊本去桃仁然必須問有塊痛與否方可議去服二帖後頭仍痛身仍熱加白芷八分細辛四分如發熱不退頭痛如故加連翹五個人參三錢產後敗血不散亦能作寒作熱何以辨之曰時有刺痛者敗血也但寒熱無他症者陰陽不和也刺痛用當歸乃和血之藥若乃積血而刺痛者宜用紅花桃仁歸尾之類

類傷寒三陰症 第十一

潮熱有汗大便不通母專論為陽明症口燥咽乾而渴母專論為少陰症腹滿液乾大便實母專論為太陰症又汗出譫語便閉母專論為腸胃中燥糞宜下症數症多由勞倦傷脾運化稽遲氣血枯稿腸腑燥涸乃虛症類實當補之症治者勿執偏門輕產而妄議三承氣湯以治類三陰之症也間有少壯產後妄下幸而無妨虛弱產婦亦復妄下多致不救屢見妄下成膨誤導反結又有血少數日不通而即下致瀉不止者危哉婦人良方云產後大便秘若計其日期飯食數多即用藥通之禍在反掌必待腹滿脹欲去不能者反結在直腸宜用豬胆汁潤之若日期雖久飲食如常腹中如故只用

產後編上

補劑而已若服苦寒疏通反傷中氣通而不止或成痞滿誤矣

養正通幽湯 治產後大便便秘結

川芎 二錢 當歸 六錢 炙草 五分 桃仁 十五粒

麻仁 二錢 肉苁蓉 酒洗去甲一錢 汗多便實加黃芪

一錢 麻黃根 一錢 人參 二錢 口燥渴加人參麥冬各

錢 腹滿溢便實加麥冬一錢 枳殼 六分 人參 二錢

從蓉 一錢 汗出譫語便實乃氣血虛漏補精氣

養榮安神加茯神遠志菴蓉各一錢 人參 白朮 各

黃芪 白芷 各一錢 柏子仁 一錢

以上數等大便燥結症非用當歸人參至斤數難取功效大抵產後虛中傷寒口傷食物外症雖見頭痛

發熱或胸膈腰痛是外感宜汗猶當重產亡血禁汗
惟宜生化湯量為加減調理無失又如大便秘結猶
當重產亡血禁下宜養正助血通滯則穩當矣

又潤腸粥 治產後日久大便不通
芝麻一升研末和米二合煮粥食腸潤即通

產後編上

類傷寒三陰

毒

類中風 第十二

產後氣血暴虛百骸少血濡養忽然口噤牙緊手足筋
脉拘搐等症類中風癰瘕雖虛火泛上有痰皆當以未
治之勿執偏門而用治風消痰之方以重虛產婦也治
法當先服生化湯以生旺新血如見危症三服後即用
加參益氣以救血脫也如有痰火少佐橘紅炒芩之類
竹瀝薑汁亦可加之黃柏黃連切不可並用慎之

滋榮活絡湯 治產後血少口噤
項強筋搐類風症

川芎 一錢 當歸 熟地 人參 各二錢 黃芪

茯神 天麻 各一錢 炙草 陳皮 荆芥穗

防風 羌活 各四分 黃連 八分 薑汁炒有痰加竹瀝

薑汁半夏渴加麥冬葛根有食加山查砂仁以消肉

產後編上

類中風

毒

食神麩麥芽以消飯食大便閉加肉苁蓉一錢半汁

多加麻黃根一錢驚悸加棗仁一錢

天麻丸 治產後中風恍惚語澁四肢不利

天麻 一錢 防風 一錢 川芎 七分 羌活 七分 人參

遠志 柏子仁 山藥 麥冬 各一錢 棗仁 一兩

細辛 一錢 南星麩 八分 石菖蒲 一錢 研細末煉蜜為

九辰砂為衣清湯下六七十丸

一本黃仁
用一錢細
字用四分
存參

類症 第十三

產後汗多即變痙者項強而身反氣息如絕宜速服加減生化湯

加減生化湯 專治有汗變痙者

川芎 麻黃根 各一錢 當歸 四錢 桂枝 五分

人參 一錢 炙草 五分 羌活 五分 天麻 八分

附子 一片 羚羊角 八分

如無汗類痙者中風用川芎 三錢 當歸 一兩 兩

棗仁 防風 俱無分量

一本引用
生薑一片
棗一枚

產後編上

類症

素

出汗 第十四

凡分娩時汗出由勞傷脾驚傷心恐傷肝也產婦多兼三者而汗出不可即用斂汗之劑神定而汗自止若血塊作痛蕪木未可遽加宜服生化湯二三帖以消塊痛隨繼服加參生化湯以止虛汗若分娩後倦甚澀澀然汗出形色又脫乃亡陽脫汗也汗本亡陽陽亡則陰隨之故又當從權速灌加參生化湯倍參以救危母拘塊痛婦人產多汗當健脾以斂水液之精益榮衛以噓血歸源灌漑四肢不使妄行雜症雖有自汗盜汗之分然當歸六黃湯不可治產後之盜汗也並宜服加參生化湯及加味補中益氣二方若服參芪而汗多不止及頭出汗而不至腰足必難療矣如汗出而手拭不及者不

產後編上

出汗

素

治產後汗出氣喘等症虛之極也不受補者不治
麻黃根湯 治產後虛汗不止

人參 二錢 當歸 二錢 黃芪 一錢半 白朮 一錢

桂枝 五分 麻黃根 一錢 粉草 五分 牡蠣 研少許

浮麥 一大撮

虛脫汗多手足冷加黑薑四分熟附子一片渴加麥冬一錢五味十粒肥白人產後多汗加竹瀝一盞薑汁一小匙以清痰火惡風寒加防風桂枝各五分血塊不落加熟地三錢晚服八味地黃丸
山茱萸 山藥 丹皮 雲苓 各八錢 澤瀉 五錢
熟地 八錢 五味子 五錢 炙黃芪 一兩
煉蜜為丸陽加於陰則汗因而遇風變為痙瘲者有

之尤難治故汗多宜謹避風寒汗多小便不通乃亡津液故也勿用利水藥

產後編上

出汗

表

盜汗第十五

產後睡中汗出醒來即止猶盜賊人睡而謂之盜汗非汗自至之比雜症論云自汗陽虧盜汗陰虛然當歸六黃湯又非產後盜汗方也惟兼氣血而調治之乃為得

耳

止汗散

治產後盜汗

人參 二錢

當歸 二錢

熟地 一錢半

麻黃根 五分

黃連 五分

酒炒浮小麥 一大撮

棗 一枚

又方

牡蠣 煨細末五分

小麥 麩炒黃研末

一本牡蠣小麥炒黃各五分空心調服

產後編上

盜汗

表

口渴兼小便不利 第十六

產後煩燥咽乾而渴兼小便不利由失血汗多所致治當助脾益肺升舉氣血則陽升陰降水入經而為血液穀入胃而氣長脈行自然津液生而便調利矣若認口渴為火而用芩連梔柏以降之認小便不利為水滯而用五苓散以通之皆失治也必因其勞損而溫之益之因其留滯而濡之行之則庶幾矣

生津止渴益水飲

人參 麥冬 當歸 生地 各三錢 黃芪 一錢

葛根 一錢 升麻 炙草 各四分 茯苓 八分

五味子 十五粒

汗多加麻黃根一錢浮小麥一大撮大便燥加肉苁蓉

產後編上

口渴兼小便不利

辛

蓉一錢五分渴甚加生脉散不可疑而不用

遺尿 第十七

氣血太虛不能約束宜八珍湯加升麻柴胡甚者加熟附子一片

產後編上 終

產後編上

遺尿

辛

產後編下卷目錄

誤破尿胞

患淋

便數

瀉

完穀不化

痢

霍亂

嘔逆不食

咳嗽

水腫

流注

產後編下卷目錄

膨脹

怔忡驚悸

骨蒸

心痛

腹痛

小腹痛

虛勞

遍身疼痛

腰痛

脇痛

陰痛

惡露

乳瘋

風甚

不語

補編

大便不通

雞爪風

浮腫

產後編下卷目錄

產後編下

誤破尿胞 第十八

陽曲傅 山青主手著

產理不順穩婆不精誤破尿胞膀胱者用參芪為君歸
芎為臣桃仁陳皮茯苓為佐豬羊尿胞煎藥百服乃安
又方云用生黃絲絹一尺白牡丹皮根為末白芨末各
二錢水二碗煮至絹爛如飴服之宜靜卧不可作聲名
補膠飲神效

胞破女科
下卷另有
方極安且
效

產後編下

誤破尿胞

患淋 第十九

由產後虛弱熱客於脬中內虛頻數熱則小便淋瀝作
痛曰淋

茅根湯 凡產後冷熱
淋並治之

石膏 一兩 白茅根 一兩 瞿麥 白茯苓 各五錢

葵子 人參 桃膠 滑石 各一錢 石首魚頭 四個

燈心水煎入齒末空心服

又方 治產後小
便痛淋血

白茅根 瞿麥 葵子 車前子 通草 無分量

鯉魚齒 一百個 水煎服亦入齒末

按齒末疑均是鯉魚齒

一本小註
此方用石
一兩兩無
此治法不
可拘執不
方以致誤
人一本石
一作錢無
滑石
一作各等
分

產後編下

患淋

便數 第二十一

由脾內素有冷氣因產發動冷氣入脾故也用赤石脂二兩為末空心服

又方治小便數及遺尿用益智仁二十八枚為末米飲送下二錢

又桑螵散

桑螵蛸 三十個 人參 黃芪 鹿茸 牡蠣 赤石脂 各三錢 為末空心服二錢米飲送下

產後編下

便數

三

瀉 第二十一

產後泄瀉非雜症有食泄溼泄水穀注下之論大率氣虛食積與溼也氣虛宜補食積宜消溼則宜燥然惡露未淨遽難驟燥當先服生化湯二三帖化舊生新加茯苓以利水道俟血生然後補氣以消食燥溼以分利水道使無滯澁虛虛之失若產旬日外方論雜症尤當論虛實而治也如痛下清水腹鳴米飲不化者以寒泄治如糞水黃赤肛門作痛以熱泄治之有因飲食過多傷脾成泄氣臭如敗卵以食積治之又有脾氣久虛少食食下即鳴急盡下所食之物方覺快者以虛寒泄治之治法寒則溫之熱則清之脾傷食積分利健脾兼消補虛善為調治無失也產後虛瀉眠昏人不識弱甚形脫

產後編下

瀉

四

危症必用人參二錢白朮茯苓各二錢附子一錢方能回生若脉浮弦按之不鼓即為中寒此蓋陰先亡而陽欲去速宜大補氣血加附子黑薑以回元陽萬勿忽視加減生化湯 治產後塊未消患瀉症

川芎 二錢 茯苓 二錢 當歸 四錢 黑薑 五分

炙草 五分 桃仁 十粒 蓮子 八枚 水煎溫服

健脾利水生化湯 治產後塊已除患瀉症

川芎 一錢 茯苓 一錢 歸身 二錢 黑薑 四分

陳皮 五分 炙草 五分 人參 三錢 肉果 一個製

白朮 一錢 炒澤瀉 八分

寒瀉加乾薑八分寒痛加砂仁炮薑各八分熱瀉加

炒黃連八分瀉水腹痛米飲不化加砂仁八分麥芽

山查各一錢瀉有酸噉臭氣加神麩砂仁各八分脾氣久虛瀉出所食物方快以虛寒論瀉水者加蒼朮一錢以燥溼脾氣弱元氣虛必須大補佐消食清熱却寒藥弱甚形色脫必須第一方參朮苓附必用之藥也諸瀉俱加升麻酒炒蓮子十粒

產後編下

五

完穀不化 第二十二

因產後勞倦傷脾而運轉稽遲也名殮泄又飲食太過脾胃受傷亦然俗呼水穀痢是也然產方三日內塊未消化此脾胃衰弱參朮木未可遽加且服生化湯加益智香砂少溫脾氣俟塊消後加參朮木補氣肉果木香砂仁益智溫胃升麻柴胡清胃氣澤瀉茯苓陳皮以利水為上策也

加味生化湯 治產後三日內完穀不化塊未消者

川芎 一錢 益智 一錢 當歸 四錢 黑薑 四分

炙草 四分 桃仁 十粒 茯苓 一錢半

參苓生化湯 治產後三日內塊已消穀不化胎前素弱患此症者

川芎 一錢 當歸 二錢 黑薑 四分 炙草 五分

產後編下

六

人參 二錢 茯苓 一錢 白芍 一錢 益智 一錢

白朮 二錢 肉果 一個製

瀉水多加澤瀉木通各八分腹痛加砂仁八分渴加麥冬五味子寒瀉加黑薑一錢木香四分食積加神麩麥芽消飯麩砂仁山查消肉食產後瀉痢日久胃氣虛弱完穀不化宜溫助胃氣六君子湯加木香四分肉果一個製

一本有蓮子八枚去心藥三枚

一本當歸作三錢有廣一枚

痢第二十三

一本作十數日

產後七日內外患赤白痢裏急後重頻併最為難治欲調氣行血而推蕩痢邪猶患產後元氣虛弱欲滋榮益氣而大補虛弱又助痢之邪惟生化湯減乾薑而代以木香茯苓則善消惡露而兼治痢疾並行而不相悖也再服香連丸以俟一二日後病勢如減可保無虞若產七日外有患褐花色後重頻併虛痢即當加補無疑若產婦稟厚產期已經二十餘日宜服生化湯加連芩厚樸芍藥行積之劑

加減生化湯 治產後七日內患痢
川芎 二錢 當歸 五錢 炙草 五分 桃仁 十二粒

茯苓 一錢 陳皮 四分 木香 磨三分

產後編下

痢

七

紅痢腹痛加砂仁八分

青血丸 治禁日痢

香連為末加蓮肉粉各一兩半和勻為丸酒送下四錢

凡產三四日後塊散痢疾少減共十症開後依治

一產後久瀉

元氣下陷大便不禁肛門如脫宜服六君子湯加

木香四分肉果一個製薑汁五分

二產後瀉痢

色黃乃脾土真氣虛損宜服補中益氣湯加木香

肉果

三產後傷麵食

一本神麩麥芽下有各一錢

瀉痢宜服生化湯加神麩麥芽

四產後傷肉食

瀉痢宜服生化湯加山查砂仁

五產後胃氣虛弱

瀉痢完穀不化當溫助胃氣宜服六君子湯加木

香四分肉果一個製

六產後脾胃虛弱

四肢浮腫宜服六君子湯加五皮散見後水腫

七產後瀉痢

無后重但久不止宜服六君子湯加木香肉果

八產後赤白痢

臍下痛當歸厚樸黃連肉果甘草桃仁川芎

產後編下

痢

八

九產後久痢

色白屬血虛宜四物湯加荊芥人參

十產後久痢

色赤屬氣虛宜六君子湯加木香肉果

霍亂 第二十四

由勞傷氣血臟腑空虛不能運化食物及感冷風所致
陰陽升降不順清濁亂於脾胃冷熱不調邪正相搏上
下為霍亂

生化六和湯 治產後血塊痛
未除患霍亂

川芎 二錢 當歸 四錢 黑薑 炙草 陳皮

藿香 各四 砂仁 六分 茯苓 一錢 薑三片煎

附子散 治產後霍亂吐瀉手足
逆冷須無塊痛方可服

白朮 一錢 當歸 二錢 陳皮 黑薑 丁香

甘草 各四分

共為末粥飲送下二錢

溫中湯 治產後霍亂吐瀉不
止無塊痛者可服

產後編下

人參 一錢 白朮 一錢 當歸 二錢 厚樸 八分

黑薑 四分 茯苓 一錢 草豆蔻 六分

薑三片水煎服

嘔逆不食 第二十五

產後勞傷臟腑寒邪易乘於腸胃則氣逆嘔吐而不下
食也又有瘀血未淨而嘔者亦有痰氣入胃胃口不清
而嘔者當隨症調之

加減生化湯 治產婦嘔逆不食

川芎 一錢 當歸 三錢 黑薑 砂仁 藿香 各五

淡竹葉 七片

水煎和薑汁二匙服

溫胃丁香散 治產後七日
外嘔逆不食

當歸 三錢 白朮 二錢 黑薑 四分 丁香 四分

人參 一錢 陳皮 五分 炙草 五分 前胡 五分

藿香 五分 薑三片水煎服

產後編下

石蓮散 治產婦嘔吐
心沖目眩

石蓮子 去壳去心 一兩 茯苓 一兩 丁香 五分

共為細末米飲送下

生津益液湯 治產婦虛弱口渴氣少由產
後血少多汗內煩不生津液

人參 麥冬 去心 茯苓 各一兩 大棗 竹葉

浮小麥 炙草 括蕒根 大渴不止加蘆根

一本有白
木無曰茯苓
五錢用者
酌之
一本人參
一錢麥冬
茯苓三錢
存焉

咳嗽第二十六

治產後七日內外感風寒咳嗽鼻塞聲重惡寒勿用麻黃以動汗嗽而脇痛勿用柴胡湯嗽而有聲痰少面赤勿用涼藥凡產有火嗽有痰嗽必須調理半月後方可用涼藥半月前不當用

加味生化湯 治產後外感風寒咳嗽及鼻塞聲重

川芎一錢 當歸二錢 杏仁十粒 桔梗四分

知母八分

有痰加半夏麴虛弱有汗咳嗽加人參總之產後不可發汗

加參安肺生化湯 治產後虛弱旬日內外感風寒咳嗽聲重自交或身熱頭痛及汗多者

川芎一錢 人參一錢 知母一錢 桑白皮一錢

產後編下

當歸二錢 杏仁十粒 去皮尖 甘草四分 桔梗四分

半夏七分 橘紅三分

虛人多痰加竹瀝一杯薑汁半匙

按咳嗽論中明示縱有火嗽在半月前猶不得輕用涼藥垂戒甚嚴而第一與第二方中均有知母小註均有外感風寒云云此必於既感之後將蘊而為燄熱不得已而用之小註未及申明如謂不然苟初感即用此涼品豈不與前論顯為枘鑿讀者須會前入微意庶不致用古方而自少權衡耳

加味四物湯 治半月後乾咳有聲痰少者

川芎 白芍 知母 瓜蒌仁 各一錢 生地

當歸 各二錢 訶子 二錢 冬花 六分 桔梗 四分

甘草四分 堯鈴四分 生薑一大片

產後編下



幸

水腫 第二十七

產後水氣手足浮腫皮膚見光榮色乃脾虛不能制水腎虛不能行水也必以大補氣血為先佐以蒼朮白朮茯苓補脾壅滿用陳皮半夏香附消之虛人加人參木通有熱加黃芩麥冬以清肺金健脾利水補中益氣湯七日外用人參白朮各二錢茯苓白芍各一錢陳皮五分木瓜八分紫蘇木通大腹皮蒼朮厚樸各四分大便不通加郁李仁麻仁各一錢如因寒邪溼氣傷脾無汗而腫宜薑皮半夏蘇葉加於補氣方以表汗

產後編下

水腫

韋

又云產後惡露不淨停留胞絡致令浮腫若以水氣治之投以甘遂等藥誤矣但服調經散則血行而腫消矣

此方能調經治腹痛

沒藥 另研 琥珀 另研 各一錢 肉桂 赤芍

當歸 各一錢

右為細末每服五分薑汁酒各少許調服

流注 第二十八

產後惡露流於腰臂足關節之處或漫腫或結塊久則腫起作痛肢體倦怠急宜用葱熨法以治外腫內服參歸生化湯以消血滯無緩也未成者消已成者潰

葱熨法 用葱一握炙熱搗爛作餅敷痛處用厚布二三層以熨斗火熨之

參歸生化湯

川芎 一錢半 當歸 二錢 炙草 五分 人參 二錢

黃芪 一錢半 肉桂 五分 馬蹄香 二錢

此症若不補氣血節飲食慎起居未有得生者如腫起作痛起居飲食如常是病氣未深形氣未損易治

產後編下

流注

韋

若漫腫微痛起居倦怠飲食不足最難治或未成膿未潰氣血虛也宜服八珍湯增寒惡寒陽氣虛也宜服十全大補湯補後大熱陰血虛也宜服四物湯加參朮丹皮嘔逆胃氣虛也宜服六君子湯加炮薑乾薑食少體倦脾氣虛也宜服補中益氣湯四肢冷逆小便頻數腎氣虛也補中益氣湯加益智仁一錢神仙迴洞散治產後流注惡露日久成腫用此宜導其膿若未補氣血旺不可服此方

膨脹第二十九

婦人素弱臨產又勞中氣不足胸膈不利而轉運稽遲若產後即服生化湯以消塊止痛又服加參生化湯以健脾胃自無中滿之症其膨脹因傷食而誤消因氣鬱而誤散多食冷物而停留惡露又因血虛大便燥結誤下而愈脹殊不知氣血兩虛血塊消後當大補氣血以補中虛治者若但知傷食宜消氣鬱宜散惡露當攻便秘可下則胃氣反損滿悶益增氣不升降溼熱積久遂成膨脹豈知消導坐於補中則脾胃強而所傷食氣消散助血兼行大便自通惡露自行如產後中風氣不足微滿誤服耗氣藥而脹者服補中益氣湯

產後編下

膨脹

五

產後編下

膨脹

五

一本人參
白木俱作
一錢當歸
作二錢行
舊一片

人參 五分 當歸 五分 白木 五分 白茯苓 一錢
川芎 四分 白芍 四分 蘇藹子 四分 木香 三分

如傷食誤服消導藥成脹或脇下積塊宜服健脾湯

人參 白木 當歸 各三錢 白茯苓 白芍
神麩 吳萸 各一錢 大腹皮 陳皮 各四分
砂仁 麥芽 各五分

如大便不通誤服下藥成脹及腹中作痛宜服養榮生
化湯

當歸 四錢 白芍 一錢 白茯苓 一錢 人參 一錢
白木 二錢 陳皮 五分 大腹皮 五分 香附 五分
菴蓉 一錢 桃仁 十粒

塊痛將藥送四消丸屢誤下須用參歸半斤大便方通

一本無桃
仁

膨脹方退凡誤用消食耗氣藥以致絕穀長生活命丹
屢效方見傷食條

怔忡驚悸 第三十

由產憂驚勞倦去血過多則心中跳動不安謂之怔忡
若惕然震驚心中怯怯如人將捕之狀謂之驚悸治此
二症惟調和脾胃志定神清而病愈矣如分娩後血塊
未消宜服生化湯且補血行塊血旺則怔定驚平不必
加安神定志劑如塊消痛止後患此宜服加減養榮湯

當歸 二錢 川芎 二錢 茯神 一錢 人參 一錢
棗仁 炒 一錢 麥冬 一錢 遠志 一錢 白朮 一錢
黃芪 一錢 元肉 八枚 陳皮 四分 炙草 四分
薑煎虛煩加竹瀝薑汁去川芎麥冬再加百茹一團
加木香即歸脾湯
養心湯 治產後心血不
定心神不安

產後編下

炙黃芪 一錢 茯神 八分 川芎 八分 當歸 一錢
麥冬 八分 遠志 八分 柏子仁 一錢 人參 一錢半
炙草 四分 五味 十粒 薑水煎服

一本有元
肉六枚

骨蒸 第三十

宜服保真湯先服清骨散

柴胡梅連湯 作湯速效

柴胡 前胡 黃連 烏梅 去核

各二兩共為末聽用再將豬脊骨一條豬苦胆一個
蕪菜白十根各一寸同搗成泥入童便一酒盞攪如
稀糊入藥末再搗為丸如菜豆大每服三四十九清
湯送下如上膈熱多食後服此方凡男女骨蒸皆可
用之不專治產婦

保真湯
黃芪 六分 人參 二錢 白朮 二錢 炙草 四分
川芎 六分 當歸 二錢 天冬 一錢 麥冬 二錢

產後編下

骨蒸

本

白芍 二錢 枸杞 二錢 黃連 六分 黃柏 六分
知母 二錢 生地 二錢 五味 十粒 地骨皮 六分
棗三枚 核水煎服

加味大造湯 治骨蒸勞熱若服清骨
散梅連丸不效服此方

人參 一兩 當歸 一兩 麥冬 八分 石斛 八分
柴胡 六錢 生地 二兩 胡連 五錢 山藥 一兩
枸杞 一兩 黃柏 七分

先將麥冬地黃搗爛後入諸藥同搗為丸加蒸紫河
車另搗焙乾為末煉蜜丸

一本麥冬
石斛俱作
八錢柴胡
五錢黃柏
四分酒炒

一本細麥
冬黃連

心痛 第三十二

此即胃脘痛因胃脘在心之下勞傷風寒及食冷物而作痛俗呼為心痛心可痛乎血不足則怔忡驚悸不安耳若真心痛手足青黑色旦夕死矣治當散胃中之寒氣消胃中之冷物必用生化湯佐消寒食之藥無有不安若綿綿而痛可按止之問無血塊則當論虛而加補也產後心痛腹痛二症相似因寒食與氣上攻於心則心痛下攻於腹則腹痛均用生化湯加肉桂吳萸等溫散之藥也

加味生化湯

川芎 一錢 當歸 三錢 黑薑 五分 肉桂 八分

吳萸 八分 砂仁 八分 炙草 五分

心痛

丸

產後編下

傷寒食加肉桂吳萸傷麵食加神麩麥芽傷肉食加山查砂仁大便不通加肉苳蓉

腹痛 第三十三

先問有塊無塊塊痛只服生化湯調失笑散二錢加元胡一錢無塊則是遇風冷作痛宜服加減生化湯川芎 一錢 當歸 四錢 黑薑 四分 炙草 四分 防風 七分 吳萸 六分 白蔻 五分 桂枝 七分 痛止去之隨傷食物所加如前

腹痛

手

產後編下



一第 1007 册 續修四庫全書 第 4 卷 子部

小腹痛 第三十四

產後虛中感寒飲冷其寒下攻小腹作痛又有血塊作痛者又產後血虛臍下痛者並治之以加減生化湯

川芎 一錢 當歸 三錢 黑薑 四分 炙草 四分

桃仁 十粒

有塊痛者本方中送前胡散亦治寒痛若無塊但小腹痛亦可按而少止者屬血虛加熟地三錢前胡肉桂各一錢為末名前胡散

產後編下

小腹痛

三

虛勞 第三十五

指節冷痛頭汗不止

人參 三錢 當歸 三錢 黃芪 二錢 淡豆豉 十粒

生薑 三片 韭白 十寸 豬腎 二個

先將豬腎煮熟取汁煎藥八分溫服

一本有或
用豬腎一
個先將腎
略煮後再
煎湯煮藥

產後編下

虛勞

三

遍身疼痛 第三十六

產後百節開張血脉流散氣弱則經絡間血多阻滯累日不散則筋牽脉引骨節不利故腰背不能轉側手足不能動履或身熱頭痛若誤作傷寒發表出汗則筋脉動蕩手足發冷變症出焉宜服趁痛散

當歸 一錢 甘草 黃芪 白朮 獨活 各八分

肉桂 八分 桑寄生 一錢 牛膝 八分 薤白 五根

薑三片水煎服

一本無桑寄生

產後編下

遍身疼痛

幸

腰痛 第三十七

由女人腎位繫胞腰為腎腑產後勞傷腎氣損動胞絡或虛未復而風乘之也

養榮壯腎湯 治產後感風寒腰痛不可轉

當歸 二錢 防風 四分 獨活 桂心 杜仲

續斷 桑寄生 各八分

生薑三片水煎服兩帖後痛未止屬腎虛加熟地三錢

一本有川芎八分

加味大造丸 治產後日久氣血兩虛腰痛腎弱方見骨蒸條

青蛾丸

胡桃 十二個 破故紙 八兩酒浸炒 杜仲 一斤薑汁

為細末煉蜜丸淡醋湯送六十九

產後編下

腰痛

幸

胡桃一本作二十個

脇痛 第三十八

乃肝經血虛氣滯之故氣滯用四君子湯加青皮柴胡
血虛用四物湯加柴胡人參白朮若概用香燥之藥則
反傷清和之氣無所生矣

補肺散 治脇痛

山萸 當歸 五味 山藥 黃芪 川芎
熟地 木瓜 白朮 獨活 棗仁 各等分
水煎服

一本山萸 二錢當歸 二錢五味 十粒黃芪 八分川芎 六分熟地 錢半木瓜 白朮各一 錢獨活八 分棗仁一 錢廣一片 無山藥存 參

產後編下

脇痛

毒

陰痛 第三十九

產後起居太早產門感風作痛衣被難近身體宜用祛
風定痛湯

川芎 一錢 當歸 三錢 獨活 防風 肉桂

荆芥 各五分 炒黑 扶苓 一錢 地黃 二錢

棗二枚煎服

又附陰疳蝕陰中瘡曰罌瘡或痛或癢如蟲行狀濃
汗淋漓陰蝕幾盡者由心腎煩鬱胃氣虛弱致氣血流
滯經云諸瘡痛癢皆屬於心治當補心養腎外以藥薰
洗宜用十全陰疳散

川芎 當歸 白芍 地榆 甘草 各等分

水五碗煎二碗去渣薰日三夜四先薰後洗

產後編下

陰痛

毒

一方用蒲黃一升水銀二兩二味調勻搽

一方用蠟蟆兔糞等分爲末敷瘡

一方治疳蟲食下部及五臟取東南桃枝輕打頭散以

綿纏之

一方用石硫黃末將縛桃枝蘸而燃烟薰之按此條宜與上條合看

一方截一短竹筒先納陰中以桃枝燒煙薰之

惡露第四十

即係裏兒汚血產時惡露隨下則腹不痛而產自安若腹欠溫煖或傷冷物以致惡露凝塊日久不散則虛症百出或身熱骨蒸食少羸瘦或五心煩熱月水不行其塊在兩脇動則雷鳴嘈雜暈眩發熱似瘧時作時止如此數症治者欲洩其邪先補其虛必用補中益氣湯送

三消丸則元氣不損惡露可消

加味補中益氣湯
人參一錢 白朮二錢 當歸三錢 黃芪一錢
白芍一錢 廣皮四分 甘草四分

薑棗煎服

三消丸 治婦人死血食積痰三等症

產後編下

黃連 一兩 一兩用吳黃煎汁去渣浸炒

萊菔子 一兩 五錢 川芎 五錢 桃仁 十粒 山梔

青皮 三枝 莪朮 各五錢 俱用醋炒 山查 一兩

香附 一兩 童便浸炒

右為末蒸餅為丸食遠服用補中益氣湯送下五六
十九或用白朮三錢陳皮五錢水一鍾煎五分送下
亦可

此方治產後傷食惡露不盡若初產惡露不下宜服查化湯加每三錢連服四劑

乳瘋第四十一

乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足陽明胃經若乳房腫結核色紅數日外腫痛潰稠膿盡而愈此屬胆胃熱毒氣血壅滯名曰乳癰易治若初起內結小核不紅不腫不痛積之歲月漸大如巉巖山破如熟榴難治治法痛腫寒熱宜發表散邪痛甚宜疏肝清胃膿成不潰用托裏肌肉不生膿水清稀宜補脾胃膿出及潰惡寒發熱宜補血氣飲食不進或作嘔吐宜補胃氣乳岩初起用益氣養榮湯加歸脾湯間可內消若用行氣補血之劑速亡甚矣

瓜蒌散 治一切癰疽並治乳癰癰者六
瓜蒌一個 連皮搗爛 生甘草 五分 當歸 三錢

產後編下

乳香 五分 燈心 五分 沒藥 五分 燈心 五分 金銀花 三錢 白芷 一錢

青皮 五分 水煎溫服

回脈散 治大便未潰時服此毒

大黃 三錢 半 白芷 八分 乳香 五分 木香 五分

沒藥 五分 穿山甲 五分 蛤粉 拌炒

共為末人參二錢煎湯調藥末服

十全大補湯

人參 白朮 黃芪 熟地 各三錢 茯苓 八分

甘草 五分 川芎 八分 金銀花 三錢

瀉加黃連肉果湯加麥冬五味寒熱往來用馬蹄香

搗散凡乳癰服薏苡仁粥好

又方用烏藥軟白香辣者五錢研水一碗牛皮膠一

一本大黃 三錢有 人參三錢 四味各二錢

片同煎七分溫服如孕婦腹內癰此二方可通用
又有乳吹乃小兒飲乳口氣所吹乳汁不通壅結作
痛不急治則成癰宜速服瓜蒞散更以手揉散之

產後編下

乳癰

羌

風甚 第四十二

用山羊血取色新者於新瓦上焙乾研末老酒沖下五
六分爲度重者用至八分其效如神
又用抱不出壳鷄子瓦上焙乾漚調服
如治虛寒危症用藍鬚子根刮皮新瓦上焙乾研末溫
服一錢爲度雖危可保萬全

產後編下

風甚

幸

不語 第四十三

乃惡血停蓄於心故心氣閉塞舌強不語用七珍散

人參 石菖蒲 川芎 生地 各一兩

辰砂 五分 防風 五錢 細辛 一錢

共為細末用薄荷湯下一錢因痰氣鬱結閉口不語

者用好明礬一錢水飛過沸湯送下

一方治產後不語

人參 石蓮子 去心 石菖蒲 各等分 水煎服

婦人良方云產後痞心腎虛不能發聲七珍散脾氣鬱

結歸脾湯脾傷食少四君子湯氣血俱虛八珍湯不應

獨參湯更不宜急加附子蓋補其血以生血若單用佛

手散等破血藥誤矣

產後編下

不語

三

產後編下終

補集

產後大便不通用生化湯內減黑薑加麻仁脹滿加陳皮血塊痛加肉桂元胡如燥結十日以上肛門必有燥糞用蜜棗導之

煉蜜棗法

用好蜜二三兩火煉滾至茶褐色先用溼桌傾蜜在

桌上用手作如棗樣插肛門待欲大便去蜜棗方便

又方用麻油口含竹管人肛門內吹油四五口腹內糞

和即通或豬胆亦可

治產後雞爪風

桑柴灰 三錢 存性 魚膠 三錢 炒 手指甲 十二個

共為末黃酒送下取汗即愈

產後編下

補集

三

保產無憂散

當歸 錢半 川芎 錢半 炒黑芥穗 八分 艾葉 七分

麵炒枳殼 六分 炙黃芪 八分 兔絲子 錢四分

羌活 五分 厚樸 七分 川貝母 去心 白芍 錢二分

甘草 五分 薑 三片 溫服

右方保胎每月三五服臨產熱服催生如神

治遍體浮腫是脾虛水溢之過凡浮腫者可通用俱神

效

真縮砂仁 四兩 萊菔子 二兩 四錢 研末水浸濃取汁

浸砂仁候汁盡晒乾研極細末每服一錢漸加至二

錢為度淡薑湯送下

保產神效方

未產能安臨產能催偶傷胎氣腰疼腹痛甚至見紅
不止勢欲小產危急之際一服即愈再服全安臨產
時交骨不開橫生逆下或子死腹中命在垂危服之

奇效

全當歸一分酒洗 眞川芎一分 紫厚樸七分薑汁炒

兔絲子一分酒泡 川貝母二分 荆芥穗八分

枳殼六分炒 羌活六分 炙甘草五分 白芍一分冬用二錢酒炒

黃芪八分蜜炙 艾醋炒五分 生薑三片水二鍾煎八分渣水一鍾煎六分產前空

心預服二劑臨產隨時熱服

此乃仙傳奇方慎勿以庸醫輕加減其分兩

按保產無憂散保產神效方與編首治產秘驗良方俱相同特引論畧別並存參看可也

產後編下

女科經綸

〔清〕蕭壘撰

據南京圖書館藏清乾隆四十六
年湖郡有鴻齋刻本影印原書版
框高一九八毫米寬二六〇毫米

乾隆辛丑重刊

携李蕭廣六先生纂著



女科經綸

湖隄有鴻齋梓行

自序

兩儀定位陰陽肇分天地即以陰陽化生萬物故經云陰陽者天地之道萬物之綱紀變化之父母而男女其陰陽之始也聖人以六經垂教萬世易始乾坤詩首關雎書

自序一

傳釐降禮者內則春秋載王姬蓋以夫婦為人道之造端而婦人乃孳育化原之本是以撻調燮之術者不可不於婦人之病為獨重也自寇宗奭謂寧醫十男子莫醫一婦人以婦人病四診有所不能盡

而其所患者多隱曲不可述如月經胎產至崩淋帶下俱屬鄙瑣難以言示然而婦人之病惟茲諸症為最要故著書者於茲尤不可不亟講也余纂輯醫學經綸博極群書兼綜條貫凡雜症得一百六十

自序二

有三採摭名賢之論七千條有奇而婦人月經諸症不與焉誠以婦人之病莫重於月經胎產崩淋帶下是以別立標名曰女科經綸凡一切內外虛寔寒熱各有條序按之畧方名詳治論俾學者知所從

事其於婦人病庶毋患治療之倍難於男子也司馬子長稱扁鵲遇趙聞邯鄲貴婦人病帶下即為帶下醫夫婦人病不止於帶下而扁鵲所遇隨以其名聞諸侯間知古人留心於婦人病蓋慎且重也今

自序三

之醫者非如扁鵲遇長素君授上池神術舍昔聖昔賢之論而欲冀為洞垣之見不其難哉苟有志斯其以是編為規架為繩墨為可也康熙甲子歲孟秋七月攜李棘人蕭壘廢六氏漫識

女科經綸目次

萬民望臨先
全參訂
葛天麟受俾

卷之一

月經門 計一百九條

卷之二

嗣育 計六十一條

卷之三

胎前證 計八十三條

女科經綸

卷一 目次

燕貽堂

卷之四

胎前證 計八十條

卷之五

產後證 計一百九條

卷之六

產後證 計一百二十一條

卷之七

崩漏門 計五十一條

帶下門 計三十四條

卷之八

熱入血室證 計十條

血分水分證 計十一條

咽中證 計二條

癥瘕痞癖證 計十二條

乳症 計十四條

前陰諸症 計十九條

夜夢鬼交 計三條

女科經綸

卷一

燕貽堂

女科經綸卷一

樵李蕭 堯廣六纂著

男

鉉律黃 李含漢南溟 薛之屏翰周 全校

金大起旭曙 石 楷臨初 殷 銘子文

薛 珩楚玉 李新枝森若 尹延英樹百

禾郡

賈所學九如 萬人望吉先 葛錫保箕山 全叅訂

懷應聘華臯 江 法樂天

月經門

經論女子月事屬太衝脈盛

女科經綸

卷一

月經門

燕貽堂

素問曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時而下故能有子

經論女子血海屬于少陰一經

靈樞曰衝脈起于胞中出于氣街前行于胸伏行于背上出頰頰滲灌諸陽下入于足注諸路為十二經脈之海其出入皆少陰經以行故為血海

經論女子經水温寒與天地相應

素問曰天地温和則經水安靜天寒地凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波湧而隴起邪之式于脈也

寒則血凝泣天暑則氣淖澤虛邪因而入客亦如經水之得風也

慎齋按已上經論三條序女子月事始本太衝脈盛而衝脈則起胞中即為血海此經水之原也但經水得寒則凝得熱則行嘗與天地寒暑之氣相應而調經者可以知所務矣

女子月事本血室以時而下論

王太僕曰衝為血海諸經朝會男子則運而行之女子則停而止之謂之血室經云任脈通衝脈盛男既運行女既停止運行者無積而不滿動也停止者有積而能滿靜也不滿者陽也氣

女科經綸

卷一

月經門

燕貽堂

也能滿者陰也血也故滿者以時而溢謂之信男子以氣運故陽氣應日而一舉女子以血滿故陰血應月而一下

女子月經本任衝二脈血海有餘論

馬玄臺曰任衝二脈奇經八脈之二也經云任主胞胎衝為血海今二脈俱通月事而下靈樞云衝脈任脈皆起于胞中又云衝脈為血之海又云血海有餘按血海之海雖曰既行而空至七日後而漸滿如月之盈虧相似當知血海之有餘以十二經皆然非特血海之滿也故始得以行耳

女子月事本任督二脈血海之滿論

程扶生曰任脈者起于中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉屬陰脈之海任者妊也此人生養之始故曰任脈中極之下長強之上此奇經之一脈也督脈者起于下極之脛並于脊裏上至風府入腦上顛循額至鼻柱屬陽脈之海督之言都也是人陽脈之都綱也人脈比于水故云陽之海此奇經之一脈也任脈主任一身之陰血太衝屬陽明為血之海故穀氣盛則血海滿而月事以時下也

婦人月水本于四經論

齊仲甫曰婦人月水本于四經二者衝任二者手太陽小腸手

女科經綸

卷一

月經門

三

燕貽堂

少陰心然衝為血海任主胞胎二者相資故令有子小腸經屬腑主表為陽少陰經為臟主裏屬陰此二經在上為乳汁在下為月水

慎齋按已上四條序女子月經本于血室血室即血海而其脈則屬于衝任督三脈心與小腸二經為月水之原也

女子天癸之至各月信論

陳良甫曰經云女子二七而天癸至天謂天真之氣癸謂壬癸之水壬為陽水癸為陰水女子陰類衝為血海任主胞胎二脈流通經血漸盈應時而下天真氣降故曰天癸常以三旬一見

以像月盈則虧不夫其期故名曰月信

○女子月經非天癸之辨論

馬玄臺曰經云女子二七天癸至天癸者陰精也腎屬水癸亦屬水由先天之氣畜極而生故謂陰精為天癸王冰以月事為天癸者非也男女之精皆可以天癸稱今王註以女子之天癸為血則男子之天癸亦為血耶男女當交媾之時各有精而行經之際方有其血未聞交媾時可以血言也至云精開裹血血開裹精者亦非靈樞云兩神相搏合而成形常先身生是謂精者是也但女子之精以二七而至而其月事亦與此時同其候也

女科經綸

卷一

月經門

四

燕貽堂

慎齋按已上二條序女子之月水即為天癸又辨天癸不可以月信名也

○男女精血本五味之秀實論

褚侍中曰飲食五味養髓骨肌膚毛髮男子為陽陽中必有陰陰中之數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子為陰陰中必有陽陽中之數七故一七而陰血升二七而陰血溢皆飲食五味之實秀也

○婦人經血屬心脾所統論

薛立齋曰。經云。飲食入胃。游溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。東垣所謂脾為生化之源。心統諸經之血。誠哉是言也。心脾平和。則經候如常。苟或七情內傷。六淫外侵。飲食失節。起居不時。脾胃虛損。心火妄動。則月經不調矣。大抵血生于脾。土故云脾統血。凡血病當用苦甘之藥。以助陽氣而生陰血也。

婦人經血生于水穀之精氣論

薛立齋曰。血者水穀之精氣也。和調五臟。洒陳六腑。在男子則化為精。在婦人則上為乳汁。下為月水。故雖心主血。肝藏血。亦

女科經論 卷一 月經門 五

皆統攝于脾。補脾和胃。血自生矣。凡經行之際。禁用苦寒辛散之藥。飲食亦然。

婦人月水與乳俱脾胃所生論

程若水曰。婦人經水與乳俱由脾胃所生。經脈別論云。食氣入胃。其清純津液之氣歸于心。入于脈。變赤而為血。血有餘則注于衝任。而為經水。經水者。陰水也。陰必從陽。故其色赤。稟火之色也。衝為血海。任主胞胎。若男子媾精。陰陽和合。而成孕。則其血皆移。蔭于胎矣。胎既產。則胃中清純津液之氣歸于肺。朝于脈。流入乳房。變白為乳。是稟肺金之色也。或兒不自哺。則陽明

之變不通。其胃中津液。仍歸于脈。變赤而復為月水矣。

慎齋按。已上四條。序婦人經血。由于飲食五味。水穀之精氣所化。此調經必先于扶脾胃。保胃為要也。

女子經不調由合之非時論

褚侍中曰。女人天癸既至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年。思男子合。亦不調。不調則舊血不出。新血悞行。或漬而入骨。或變而為腫。或雖合而難子。合多則瀝枯。虛人產乳。眾則血枯。殺入觀其精血。思過半矣。

經不調由陰陽盛衰所致論

女科經論 卷一 月經門 六

王子亨曰。經者常候也。謂候其一身之陰陽。德伏知其安危。故每月一至。太過不及。皆為不調。陽太過。則先期而至。陰不及。則後時而來。其有乍多乍少。斷絕不行。崩漏不止。皆由陰陽盛衰所致。

經候不調有陰陽相勝論

許叔微曰。婦人病多是月經乍多乍少。或前或後。時發疼痛。醫者一例呼為經病。不辨陰勝陽勝。陰勝所以服藥少效。蓋陰氣乘陽。則胞寒氣冷。血不運行。經所謂天寒地凍。水凝成冰。故令乍少。而在月後。若陽氣乘陰。則血流散溢。經所謂天暑地熱。經

水沸騰故令乍多而在月前當別其陰陽調其血氣使不相乖以平為期也

經不調屬風冷乘虛客胞中論

陳良甫曰婦人月水不調由風冷乘虛客于胞中傷衝任之脈以損手太陽手少陰之經也。蓋衝任之脈起于胞中人將息順理則血氣調和六淫不能為害若勞傷血氣則風冷乘之脾胃一傷飲食漸少榮衛日衰肌膚黃瘦皆由衝任勞損故凡遇經行最宜謹慎否則與產後證相類

月水不調屬風冷之邪搏血論

女科經綸

卷一

月經門

七

燕貽堂

王子亨曰婦人月水不調者由勞傷氣血致體虛風冷之氣乘之也衝任之脈皆起于胞內為經絡之海手太陽小腸手太陰心二經為表裏主上為乳汁下為月水若冷熱調和則衝任氣盛太陽少陰所生之血宜流依時而下若寒溫乖適經脈則虛如有風冷虛則乘之邪搏于血或寒或溫寒則血結溫則血消故月水年多年少為不謂也

月經不調屬憂思鬱怒所致論

方紱之曰婦人以血為海婦人從于入凡事不得專行每多憂思忿怒鬱氣思多書云氣行則血行氣止則血止憂思過度則

氣結氣結則血亦結又云氣順則血順氣逆則血逆忿怒過度則氣逆氣逆則血亦逆氣血結逆于臟腑經絡而經于是乎不調矣

慎齋按已上六條序婦人經水不調之由也婦人以血用事故病莫先于調經而經之所以不調者或本干合非其時或屬于陰陽相勝或感于風冷外邪或傷于憂思鬱怒皆足以致經候不調之故此病機之不可不察者也

經水不調有先後多少之分

戴復庵曰婦人每月經水應期而下不使有餘猶太陰之缺其

女科經綸

卷一

月經門

八

燕貽堂

有或先或後或多或少或欲來先病或遇來而斷續皆謂之不調和氣飲加香附

經行先期後期有血熱血虛之分

朱丹溪曰經水先期而至者血熱也四物加芩連香附後期而至者血虛也芩歸參朮加二陳

薛立齋按先期而至有因脾經血燥宜加味道遙散有因肝經鬱滯宜歸脾湯有因肝經怒火宜加味小柴胡湯有因血分有熱宜加味四物湯有因勞役火動宜補中湯如過期而至有因脾經血虛宜入參養榮湯有因肝經血少宜六味丸

蓋血生于脾故云脾統血凡血病當用甘苦之劑以助陽氣而生血也

。月經過期不及期為有火無火論

趙養葵曰經水如不及期而來者有火也宜以六味丸滋水則火自平矣如不及期而來多者本方加海螵蛸柴胡白芍如半月或十日而來且綿延不止此屬氣虛用補中湯如過期而來者火衰也本方加艾葉如遲而色淡者本方加桂此其大略也其間亦有不及期而無火者有過期而有火者多寡不全不可拘于一定當察脈之遲數視稟之虛寒強自伯以滋水為主隨

女科經綸 卷一 月經門 九

證加減凡紫與黑色者多屬火旺之甚亦有虛寒而紫黑者不可不察脈審證若淡白則無火明矣

。月經紫黑屬熱非寒論

朱丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色血為之配氣熱則熱氣寒則寒氣滯則滯為氣之配因氣而行見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也錯經妄行者氣之亂也色淡者虛而有水混之也紫者氣之熱也黑者熱甚也今人見紫黑成塊作痛率指為風冷乘之用溫熱劑禍不旋踵經云亢則害水承制熱甚必兼水化故熱則

紫甚則黑也且婦人性多忿鬱嗜慾倍加臟腑厥陽之火無日不有非熱而何若以風冷必須外感即或有之亦于百而一二也

經黑屬風寒外乘當辨脈證

葉氏曰血黑屬熱丹溪之論善矣然有風寒外乘者十中嘗見一二蓋寒主收引小腹必常冷痛經行時或手足厥冷唇青面白尺遲或微而虛或大而無力熱則尺洪數或寔有力察之脈證為的

準繩按冷證外邪初感入經必痛或不痛者久則鬱而變熱

女科經綸 卷一 月經門 十

且血寒則凝既行而紫黑故非寒也

經水辨色有氣虛血熱痰多之分

朱丹溪曰經水不調而水色淡白者氣虛也宜參朮歸芍黃芪香附之屬經水過期而紫黑成塊者血熱而實也必作痛宜四物加黃連香附經水過多而淡色者痰多也二陳加芎歸薛立齋按經水過期而至有因脾經血虛者宜入參養榮湯有因肝經血少者宜六味丸有因氣虛血弱者宜八珍湯

經水辨色用藥之法

李氏曰心主血故以色紅為正雖不對期而色正者易調其色

紫者風也，匹物加荆防自並，黑者熱甚也，四物加芩連香附淡白者虛也，有挾痰停水以混之，芎歸湯加參芪白芍香附有痰者二陳加芎歸如煙塵水，如屋漏水者二陳加秦朮防風蒼朮如豆汁者四物加芩連或帶黃混濁者溼痰也，成槐作片白不變者氣滯也，四物加香附胡索枳殼陳皮色變紫黑者血熱也，按已上七條序經水有先期過期之候，有屬熱屬寒之分，有血黑色淡之辨，凡此皆經候不調之所屬也。

經論月水來腹痛屬于門有寒

甲乙經曰：女子胞中痕，子門有寒，引臍憚水道主之。

女科經綸

卷一 月經門

二

燕貽堂

。經行腹痛屬風冷客于胞絡

陳良甫曰：經來腹痛由風冷客于胞絡，衝任或傷，手太陽手少陰二經用溫經湯加桂枝桃仁，若愛思氣鬱而血滯，用桂枝桃仁湯，地黃通經丸，若血結成塊，用萬病丸。

經行腹痛屬寒溼搏于衝任

滑伯仁曰：有經行前臍腹絞痛如刺，寒熱交作，下如黑豆汁，兩尺沉澁，餘皆弦急，此由下焦寒溼之邪搏于衝任，衝為血海，任主胞胎，為婦人之血室，經事來邪與血爭，故作疔痛，寒溼生濁，下如豆汁，宜治下焦以辛散苦溫血藥治之。

。經行腹痛屬于血澁

王海藏曰：經事欲行，臍腹絞痛者，血澁也，宜八物湯加水香柝榔胡索苦練。

。經行腹痛屬于氣滯

朱丹溪曰：經將行腹痛，屬氣之滯，用香附青皮桃仁胡索黃連，又用抑氣散，四物加胡索丹皮條芩，又曰：經將來腹中陣痛，年作乍止者，血熱氣實也，四物加黃連丹皮。

。經行腹痛宜調氣

戴元禮曰：經事來而腹痛，不來腹亦痛，皆血之不調故也，欲調

女科經綸

卷一 月經門

三

燕貽堂

其血先調，其氣四物加香附吳茱萸，或和氣飲加吳茱萸痛甚者加玄胡索湯。

。經行體痛屬于血氣不足

產寶百問曰：經水者行氣血通陰陽，以榮于身者也，氣血盛陰陽和則形體通，或外虧衛氣之充養，內乏榮血之灌溉，血氣不足，故經候欲行而身體先痛也，趁痛散主之。

。經水過後腹痛屬于氣血兩虛

朱丹溪曰：經水過後作痛，是氣血俱虛也，宜八珍湯，亦有虛中有熱，經後亦作痛，宜逍遙散，亦有經行過後腹中綿綿走痛者。

是血行而氣滯未盡行也。四物加木香。

準繩按經後腹痛為虛明甚。若脈不數，證不顯熱，未可斷其為熱也。八珍為宜，有熱方以逍遙散主之。

慎齋按已上八條，序經行腹痛有寒熱虛實之分也。主于風冷寒溼者，經文與良甫伯仁之論是也。主于血滯氣滯者，海藏丹溪之論是也。若經行後腹痛，是有虛無實，有寒無熱矣。而丹溪則又兼熱與氣滯論，病機不可不審。

經行潮熱有內傷外感虛實之分。

李氏曰：經行潮熱，有時為內傷屬于虛，潮熱無時為外感屬于

實。虛者大溫，經湯實者四物加柴芩。

經行客熱屬于體虛外熱之加。

大全良方曰：經行客熱者，因體虛而將溫過度，外熱加之，非臟腑自生，故云客熱。其狀上焦胸膈之間，虛熱口燥心煩，手足壯熱是也。

經行後發熱目暗屬血虛。

女科撮要曰：有經後發熱倦怠，兩目如帛蔽，夫脾為諸陰之首，目為血脈之宗。此脾傷而五臟皆為失所，不能歸于目也。用補中湯歸脾湯為主，脾胃而愈。凡發久者，陽氣亦自病，須調補之。

慎齋按已上三條，序經行有潮熱客熱發熱之證也。經行潮熱客熱兼虛實論。若經後發熱，則是血脈空虛陰虛不足，為有虛而無實也。

。經行泄瀉屬于脾虛多溼。

汪石山曰：有婦人經行必先瀉二三日，然後經下，診其脈皆濡弱。此脾虛也。脾主血，屬溼，經水將動，脾血先已流注血海，然後下流為經，脾血既虧，則虛而不能運行，其溼以參苓白朮散服之，月餘而經行不瀉矣。

。經行白帶屬陽虛陷下。

繆仲淳曰：有月水過多，白帶時下，日輕夜重，泄瀉無時，亦屬下多亡陰，宜作血虛論治。服四物益甚，始悟此病正合仲景陽生陰長之法。夫經水多，白帶時下，又兼泄瀉，皆由陽虛陷下而然。命曰陽脫是也。日輕夜重，蓋日陽旺而得健運之職，故血亦無疑滯之患；日故輕夜則陰旺而陽不得其任，失其健運之常，血亦隨滯，故夜重以參朮助陽之藥服之。

慎齋按已上二條，序經行有泄瀉白帶之兼證也。經行中兼見之證不一，而腹痛發熱泄瀉白帶四證，則常有之。四證見其一，皆足以致經候不調之病，故以此序于月經不調之後。

女科經論 卷一 月經門 燕貽堂

女科經論 卷一 月經門 燕貽堂

但月經不調而不加意審治勢必漸至于不月而經閉有血枯之候故即以女子不月經閉血枯諸論集于下此序書之原委也讀者不可不知

經論女子月事不來屬于胞脈閉

素問曰月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也

經論女子不月屬二陽之病

素問曰二陽之病發于心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消為息奔者死不治

女科經論

卷一 月經門

五

慎齋按已上經論二條序女子不月一屬于胞脈之閉一屬于二陽之病也

。女子不月屬心脾病宜治心火養脾血

張潔古曰女子月事不來者先瀉心火血自下也經云二陽之病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消太僕註曰大腸胃熱也心脾受之心主血心病則血不流脾主味脾病則味不化味不化則精不足故其病不能隱曲脾土已虧則風邪勝而氣愈消又經云月事不來者胞脈閉也胞脈屬于心絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑

後服五補丸衛生湯治脾以養其血

。女子不月屬腸胃病及于心脾論

王安道曰二陽足陽明與手陽明脈也腸胃有病心脾受之發于心脾猶言延及心脾也雖然脾胃為合胃病而及脾理固宜矣大腸與心本非合也以大腸而及心何哉蓋胃為受納之府大腸為傳化之府食入于胃濁氣歸心吹入于胃輸精于脾者以胃之能納大腸之能化耳腸胃既病則不能受不能化心脾何所資心脾既無所資則無以運化而生精血故腸胃有病心脾受之則男子為少精女子為不月心脾總男女言之至隱曲

女科經論

卷一 月經門

六

不月方主女子說

。女子不月屬胃病不能運化水穀論

馬玄臺曰二陽者足陽明胃脈也為倉廩之官主納水穀乃不能納受者何也此病由心脾所發耳正以女子有不得隱曲之事鬱之于心故心不能生血血不能養脾始焉胃有所受脾不能運化而繼則漸不能納受故胃病發于心脾也由是水穀衰少無以化精微之氣而血脈遂枯月事不能時下矣王註謂腸胃為病心脾受之何以謂心脾受腸胃之病又以心血不流為女子不月脾味不化為男子少精豈女子無關於脾而男子無

關於心乎况此節專為女子而發未論及男子少精之義學者許推之

女子不月屬胃無生化之原論

張景岳曰二陽陽明也為胃與大腸二經然大小腸皆屬于胃胃與心子母也人之情慾本以傷心母傷則害及其子胃與脾表裏也人之勞倦本以傷脾臟病則連于腑故凡內而傷精外而傷形皆能病及于胃此二陽之病所以發于心脾也不得隱曲陽道病也夫胃為水穀氣血之海主化榮衛而潤宗筋陰陽總宗筋之會會于氣街而陽明為之長然則精血下行生化之

女科經綸 卷一

月經門

七

本惟陽明為最今化源既病則陽道外衰故為不得隱曲其在女子當為不月也

女子不月屬心脾少血論

李太素曰經云二陽之病發心脾二陽指陽明經胃與大腸也此經乃水穀傳化之地而心與脾實係之蓋胃之下口通于小腸上口胃不病而小腸傳化則心氣流通而邪不歸心大腸不病而傳化則飲食運行而脾不勞力今二陽既病則傳化不行心脾烏得不病故曰病發心脾則精血不充蓋精血一物也主于心而生于脾在男子言精不言血故曰少精而不得隱曲在

女子言血不言精故曰少血而不月此心脾受病而然是月經不調之一端也

女子不月屬氣鬱不暢論

武叔卿曰潔古云瀉心火養脾血是從本文之義也愚謂當從隱曲推解人有隱情曲意難以舒其衷則氣鬱而不暢不暢則心氣不開脾氣不化水穀日少不能變化氣血以入二陽之血海血海無餘所以不月也傳為風消者陽明主肌肉血不足則肌肉不榮有不消瘦乎風之名火之化也故當根不得隱曲上看乃有本

女科經綸 卷一

月經門

六

女子不月屬心脾胃三經受病論

李士材曰陽明為二陽胃傷而心脾受病者何也脾與胃為夫婦夫傷則妻亦不利心與胃為子母子傷則母亦不免不得隱曲陽事病也胃為水穀氣血之海化榮衛而潤宗筋厥論曰前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合痿論曰陰陽總宗筋之會而陽明為之長故胃病則陽事衰也女子不月者心主血脾統血胃為血氣之海三經病而血閉矣

慎齋按已上八條序女子不月證也女子不月白內經論二

陽之病發心脾因集潔古以下諸家之論以發明其經旨大

約均主脾胃立論獨叔卿一條作氣鬱解與諸家有異

婦人經閉屬虛積冷結氣

金匱要略曰婦人之病因虛積冷結氣為證經水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡三十六病千變萬端

婦人經閉屬風冷客于胞門

齊仲甫曰婦人月事不來此因風冷客于胞門或醉以入房或因風墮墜驚恐皆令不通病源云血得溫則宜通得寒則凝泣若月水不來因冷于胃府或醉入房則內氣耗損勞傷肝經或吐衄脫血使血枯于中也

女科經綸 卷一 月經門 充 燕貽堂

婦人月水不通屬津液減耗

王子亨曰婦人月水不通病本于胃胃氣虛不能消化水穀使津液不生血氣故也又云醉以入房則內氣竭絕傷肝使月水衰少所以爾者肝臟血勞傷過度血氣枯竭于內也又先吐血及吐血下血謂之脫血名曰血枯亦月水不來所以爾者津液減耗故也但益津液其經自下

慎齋按已上三條序婦人經閉屬於積寒風冷凝泣其血而月水為之不通也

婦人經閉屬火熱有上中下三焦之分

李東垣曰經閉不行有三婦人脾胃久虛形體羸弱氣血俱衰

以致經水斷絕或因勞心心火上行情事不來胞脈閉也胞脈

屬心絡胞中氣上迫肺心氣不得下通故不來宜安心補血瀉

火則經自行此上焦心肺有或病中消胃熱善饑漸瘦津液不

生夫經者血脈津液所化津液既絕為熱所燥肌肉漸瘦時見

燥渴血海枯竭名曰血枯經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血則經

自行此中焦胃有熱或心包絡脈洪數躁作時見大便閉小便

難而經水閉絕此血海乾枯宜調血脈除胞絡中火邪則經白

行此下焦胞脈熱結而經不行也

女科經綸 卷一 月經門 三 燕貽堂

莫全善按潔古東垣治婦人血枯經閉之法皆主于補血瀉

火補血用四物之屬瀉火東垣分上中下三焦如火在上則

得于勞心治以芩連及三和之類火在中則善食消渴治以

調胃承氣之類火在下則大小便難治以玉燭之類玉燭四

物與調胃承氣是也三和四物與涼膈是也

濟陰綱目按東垣之論當有四證如胃熱胞絡熱勞心熱三

證皆有餘宜瀉火養血是矣所言脾胃久虛致經水斷絕一

證又當補脾胃為三豈得捨而勿論蓋水入于經其血乃生

穀入于胃脈道乃行水去榮散穀消衛亡况脾統諸經之血

而以久虛之脾胃致氣血俱衰者可不為之補益乎即此以分虛實明是四證無疑全善乃遺補虛之一證何也

慎齋按經閉主于瀉心火論本潔古而東垣則以熱結分上中下三焦是月水不下專以火熱為病藥用玉燭三和為例夫此方治勞心心火上行致胞脈閉塞月事不來是實熱也若心虛而熱收于內與心虛而土衰者二方又未可妄用也大約婦人經閉由于陰虛火旺日漸煎熬津液乾涸以致血枯經閉當從趙養葵滋水補肝之法純用三和玉燭殊未盡善若東垣三證首言脾胃久虛一段已見經水斷流俱從脾胃受病濟陰綱目議全善之失尤為有見

女科經綸 卷一 月經門 三

慎齋按已上一條序婦人經閉屬火邪熱結而經不行也夫經閉有寒有熱金匱三條主于風冷積寒東垣潔古主于火熱實結是皆指有餘之客邪為病也但寒熱二證宜分內傷外感處治如心火不下降而三焦熱結此是血衰火旺陰不足以配陽故心氣不通熱結三焦而經不下當益陰滋水以培化源若用硝黃芩連則失矣如積冷血寒凝結胞門衝任脈寒而血泣不下是風冷客邪乘虛襲人宜溫經散寒以大辛熱之藥導血下行後用養榮之劑為當也

婦人經閉屬積痰凝滯

朱丹溪曰有婦人病瘧飲食少經脈不行診其脈兩手並無時寒月以虛寒治之四物加附子吳茱神曲丸與之予思處方殊未當次早再求診視見其起居如常並無倦怠驚曰前藥誤矣經不行者非無血也為痰所礙而不行也無脈者非血衰少而脈絕也積痰生熱結伏而脈不見爾當作實熱治之用三花神佑丸六脈俱出

婦人經閉屬痰塞胞門

朱丹溪曰有積痰下流干胞門閉塞不行用厚朴二陳湯又有

女科經綸 卷一 月經門 三

痰多占住血海因而不下者痰多血虛南星二木黃連川芎末丸有肥人脂滿者導痰湯加川芎黃連不用地黃泥隔故也

婦人經閉屬汚血凝滯胞門

妻全善曰婦人經閉有汚血凝滯胞門少腹疼痛有熱有寒如熱而經閉者羅謙甫血極膏一味大黃為末醋熬成膏治婦人乾血氣大便利一二行經血自下是婦人之仙藥也仲景抵當湯亦主婦人經水不利千金桃仁煎治血積月水不行若寒結汚血而不下雲岐紅花當歸散治婦人室女經候不行或積瘀血腰腹疼痛

二第... 丹黃... 5 反之外

慎齋按已上三條序婦人經閉屬於積痰汚血而致經水之不行是有餘之實邪為病也宜導痰逐瘀為主

女子不月為血滯屬心氣不通

內照經曰女子不月血滯病也原其本則得之心氣不通故不治其血而治其心可也

月事不來屬胞脈閉心氣不下通

朱丹溪曰經云氣上迫肺則心氣不得下通而月事不來經云月事不來者胞脈閉也

婦人經閉本執着屬于血虛氣結

女科經論

卷一

月經門

五

燕貽堂

醫錄補遺曰婦人血海滿則行然婦人性情執着比之男子十倍雖有虛證宜補亦當以執着為慮況月閉一證大半屬血虛氣結

婦人經閉屬于肝勞血傷

駱龍吉曰經云有病胸脇肢滿妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先吐血四肢清目眩時時前後血病名曰血枯此年少時因大脫血或醉而人房虧損腎肝蓋肝藏血受天一之氣以為滋榮其經上貫膈布脇肋若脫血失精肝氣已傷肝血枯涸不榮而胸脇滿妨于食則肝病傳脾而聞腥臊臭出清液若以肝

病而肺乘之則吐血四肢清目眩時時前後血出皆肝血傷之證也

婦人經閉屬心血虧腎水涸論

真天民曰婦人百病皆自心生如五志之火一起則心火亦從而燔灼經閉不通之證先因心事不足心血虧耗故乏血以歸肝而出納之用已竭經曰母能令子虛是以脾不磨而食少所謂二陽之病發心脾者此也因食少故肺氣亦失所養而氣滯不行則無以滋腎陰況月水全賴腎水施化腎水既乏則經水日以乾涸或先或後淋漓無時若不早治漸至閉塞不通而

女科經論

卷一

月經門

五

燕貽堂

為勞極之證不易治也

婦人經閉屬于心事不足思慮傷脾論

徐春甫曰心屬陽而主血脾養血以行氣若月經不通未必不由心事不足思慮傷脾有所勞倦穀氣不輸肺金失養腎水無滋經血枯涸以致三五不調漸致閉絕虛損內熱骨蒸勞瘵之證作而幸難以治惟養心則血生脾健則氣布二者和則氣暢血行而調經之要至矣

婦人經閉宜審脾胃論

王節齋曰婦人女子經脈不行多有脾胃損傷而致不可便作

經閉死血輕用通經破血藥凡遇此證須審其脾胃何如若因
飢食勞倦損傷脾胃少食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷
其中氣以致血小不行只用健脾胃藥脾旺則生血而經自行
又有飲食積滯致損脾胃亦宜消積補脾若果脾胃無病有血
塊凝滯方用行血通經之劑

慎齋按已上七條序婦人經閉屬于內傷不足之病也經閉
有心氣不通存血虛氣結有肝傷腎竭脾傷皆足致經閉此
為內傷虛證而與前條風冷寒凝火邪熱結積痰汚血為病
者有餘不足各自不同也

女科經論 卷一 月經門 五 燕貽堂

婦人經閉有血滯血枯之分

李氏曰婦人以血為主天真氣降壬癸水合腎氣全盛脈流
行嘗以三旬一見以象月盈則虧故日月經行與產後一般
若其時有餘血一點未淨或被風寒淫熱暑邪或內傷生冷七
情鬱結為痰為瘀凝積于中曰血滯或經止後用力太過入房
太甚及服食燥熱以致火動則邪氣盛而津液衰曰血枯

婦人經閉血滯血枯有諸變証

陳良甫曰經後被驚則血氣錯亂妄行逆于上則從口鼻出逆
于身則血水相搏變為水腫急怒則氣血逆于腰腿心腹背脇

手足之間重痛經行則發過期則止怒極傷肝則有眩暈嘔血
瘰癧血風瘡瘍等病加之經血滲漏遂成癆血生瘡淋漓不斷
溼熱相搏為崩帶宜結于內變癥瘕凡此變証百出不過血滯
與血枯而已重則經閉不通輕則經水不調不止虛與熱二者
也

經閉血滯血枯有虛熱痰氣之四証

葉以濟曰血滯血枯不越虛熱痰氣四証而已血滯亦有虛熱
血枯亦有虛熱故滯者不宜過于宣通通後又須養血益陰使
津血流通血枯亦不可峻行補益恐本主無力而辛熱之劑反

女科經論 卷一 月經門 五 燕貽堂

燥精血矣

經閉血枯與血隔之証不同

張景岳曰肝病血傷證與血隔相似皆經閉不通之候然枯之
與隔有如冰炭枯者竭也血虛極矣隔者隔阻也血本不虛而
或氣或寒或積有所逆也隔者病發于壅其証或痛或實通之
則行而愈若枯者其來也漸衝任內竭其証無形夫血既枯矣
宜補養陰氣使血自充如用桃紅硝黃稜蓬反加剋伐則枯者
愈枯斃可立俟也

經閉血滯宜破血枯宜補論

陳良甫曰血滯經閉宜破者原因飲食毒熱或暴怒凝瘀積痰直須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生也若氣旺血枯起于勞役憂思自宜溫和滋補或兼有痰火溼熱尤宜清之涼之每以肉桂為佐者熱則血行也但不可純用峻藥以虧陰道調和飲食自然血氣流通苟不務充養氣血性以毒藥攻之是求千金于乞丐必死而後已也

慎齋按已上五條序婦人經閉有血滯血枯二證之辨也血滯為有餘有餘者宜瀉即前條金匱以下所論風冷火熱積痰汚血所感而成也血枯者為不足不足者宜補即前條內

女科經論

卷一

月經門

五

照以下所論心氣不足血虛肝傷脾衰腎涸以漸而致也滯與枯之因不外此數端而調經者可以類通之矣

室女經來復斷為避年

王叔和曰有婦人將一女子年十五來診言十四時經水自下今經反斷何也師曰若是夫人親女必夫人年十四時亦以經水下所以斷此為避年後當自下此真氣猶怯稟賦素弱而然也宜固天元真氣使水升火降則五自和而經脈自通矣

室女月水不通屬任脈為風寒搏

聖濟總錄曰女子二七天癸至任脈月事以時下若稟受不

足或任脈為風寒所搏致令風氣凝結不能應時而下經久不治則致勞疾不可行破血猛性之藥宜通心氣行榮衛滑經絡

室女經脈斷續為血脈未充

戴復庵曰有少女經脈已行一二次復至一二年又不行或有四季一行或有三五復至此本血脈柔弱未充故經脈斷續宜順氣養血氣血旺自通勿攻之

室女經閉成勞屬于積想過度

寇宗奭曰人生以血氣為本人病未有不先傷氣血者若室女童男積想過度多致勞損男子則神色消散女子則月水先閉

女科經論

卷一

月經門

五

蓋憂愁思慮則心傷而血竭且心病則不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發嗽腎水絕則水氣不榮而四肢乾瘦故多怒不可用青蒿葶蟲等涼血行血宜柏子仁丸澤蘭湯益陰血以制虛火也

室女經閉成勞屬于飲食不節

產寶曰經脈不通日久此非細事實為重病若是室女初因食食酸鹹之物遂致血脈乾涸變成勞疾

室女經閉為痰候

危氏曰女子二七天癸至七七天癸竭行早性機巧行遲性魯

純通行則陰陽和合始能有子若年十四至二十歲不行命如風燭朝不保暮有病發則歿間有不歿百無一二亦一生多病然有四季行有一年一次者或一生不循經度而行者晚年有痲疾則難治

慎齋按已上六條是序室女經閉之證也室女經閉與婦人經閉不同室女經閉非先天元氣弱血氣未充即是欲男子不得所願不遂思慮傷心鬱抑傷肝以致月水閉而成病故凡寡婦師尼犯經閉者當與此同法借前人未之論及也

婦人天癸過期不止屬血有餘

女科經綸 卷一 月經門 三 燕貽堂

許叔微曰婦人天癸已過期經脈不勻或三月四月不至或一月再至腰腹疼痛經云七損八益謂女子七數盡而經不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善宜服當歸散

婦人經水當止不止屬邪氣攻衝

產寶百問曰男子生于寅寅屬木陽中有陰故男子得八數女子生于申申屬金陰中有陽故女子得七數男以氣為主八八則卦數已盡盡則陽精衰女以血為主七七則卦數已終終則經水絕衝任虛衰天癸絕而地道不通而無子或勞傷過度喜怒不時經脈衰微之際又為邪氣攻衝則當止不止而復下

婦人年過期經行屬敗血

李時珍曰婦人年過五十而經行不止者作敗血論又婦人四十九後天癸當止不止每月却行或過多用條芩二兩醋煨七日炙乾又浸七次為末醋丸空心溫酒下名芩心丸

慎齋按已上三條序婦人天癸過期而有經行之病也一主于有餘一主于邪傷一主于敗血敗血即屬崩漏當以人之稟賦強弱參之

婦人月水不斷屬衝任氣虛

聖濟總錄曰女人以衝任二經為經脈之海手太陽小腸之經

女科經綸 卷一 月經門 三 燕貽堂

與手少陰心經此二經相為表裏主下為月水若勞傷經脈衝任氣虛衝任既虛則不能制其氣血故令月事來而不斷也

婦人月水不斷屬外邪客于胞內

陳良甫曰婦人月水不斷淋漓腹痛或因勞損氣血而傷衝任或因經行而合陰陽以致外邪客于胞內滯于血海故也若氣虛不能固血但養元氣病邪自愈攻其邪則元氣反傷矣

慎齋按已上二條序婦人月水宜止而不止也婦人經行每

月一至如潮之來故日月信若每月既至或三日或四五日即應止而復淋漓不斷非衝任氣虛不能約制為內傷不足

卽勞傷氣血外邪客胞而外感有餘有餘不足當參以人之強弱也。

婦人經水清血爲居經

王叔和曰婦人年五十數一朝而清血二三日不止何以治之師曰此婦人前絕生經水不止今反清血此爲居經不須治當自止經水下常五日者五日愈。

婦人經水三月一來名居經

王叔和曰脈微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利爲可否者此爲居經三月一來師曰寸口脈微而溢微則衛氣不足溢則

文科經綸

卷一 月經門

三

燕胎堂

血氣無餘衛不足其息短其形躁血不足其形逆榮衛俱虛語言謬戾跌陽脈浮而濇濇則衛氣虛虛則短氣烟燥而口苦胃氣澁則失液小陰脈微而遲微則無精遲則陰中寒濇則血不來此爲居經三月一來。

婦人月水行期不一候

李時珍曰女子陰類也以血爲主其血上應太陰下應海潮月有盈虧潮有朝夕月事一行與之相符故謂之月水月信月經經者常也天癸者天一生水也邪術家謂之紅鉛謬名也女人之經一月一行其常也或光或後或通或塞其病也有行期只

吐血衄血或眼耳出血是謂倒經逆行有三月一行者是謂居經有一年一行是謂避年有一生不行而受胎者是謂暗經有受胎之後月月行經而產子者是謂胎盛俗名垢胎有受胎數月血忽大下而胎不墮者是謂漏胎此雖以氣血有餘不足言而亦異常矣。

慎齋按已上三條序婦人經行不一也婦人經水一月一行其常也而外則有居經有避年有倒經有暗經有垢胎有漏胎之證凡此皆經候不調之故也。

婦人月水不通有因諸證所致

文科經綸

卷一 月經門

三

燕胎堂

聖濟總錄曰婦人月水不通所致不一有氣不化血微不通有先期太過後期不通有大病後熱燥不通有疑寒結滯不通有積聚氣結不通有心氣抑滯不通凡此所受不同治之亦異女人假血爲本以氣爲用血氣稽留則澁而不行其爲病或寒或熱或臍腹堅痛或久肉消瘦久不治則爲勞瘵之證。

婦人月水不調成病

產寶方曰大率治病先論其所主男子調其氣女子調其血氣血人之神也不可不謹調護之然婦人以血爲本氣血宣行其神自清所謂血室不蓄則氣血凝結而水火相刑月水如期謂

之月信其血不來則因風熱傷于經血故血不通或外感風寒內受邪熱脾胃虛弱不能飲食食既不充營衛抑遏肌膚黃燥面無光澤時寒熱腹脹作痛難于子息子藏冷熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忽致崩漏經云腹中如塊忽聚忽散其病為癥血澀不流而搏腹脹時作寒熱此乃成癥或先後期雖通而或多或少究病之原蓋本于此

○ 婦人月經不行成諸病

葉以潛曰婦人經病內因憂思忿怒鬱結不行外因飲冷形寒惡露凝滯此不調不通作痛發熱所由也治者調其氣而破其

女科經綸 卷一 月經門 謹 燕貽堂

血開其鬱而補其虛涼血清熱治血病以行氣為先香附之類是也熱則流通寒則堅凝須以熱藥為佐肉桂是也又有月經不行四肢發腫者屬瘀血滲入脾經也宜辛溫以導之又有月經上行口鼻者是火載血上氣之亂也四物加梔子黃連丹皮犀角

慎齋按已上三條序婦人經不行致病也婦人有因病而致經不調者有因經不調而致諸病者皆宜分別詳審處治

婦人經來行房成癩疾

王叔和曰問曰婦人病如癩疾鬱冒一日二十餘發師脈之反

言帶下皆如師言其脈何類何以別之師曰寸口脈滿而緊濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛氣虛血竭凝寒陰陽不和邪氣合于榮衛疾起年少時經來以合房室移時過度精感命門開經下血則虛虛則百脈皆張中極感陽動微風激成寒因虛合于榮衛令積于丹田發動上衝奔在胸膈津液掩口涎唾溢出口狀如厥氣衝脾裏熱粗醫名為癩疾之因大劇

婦人月水行房病伏梁

陳藏器曰一犯月水行房精血相射入于任脈留于胞中以致小腹結病病如伏梁水瀦頻澁是各積精婦人閨房有三禁此其一也

女科經綸 卷一 月經門 謹 燕貽堂

婦人經來交合成經漏

原病集曰有婦人月經來時交合陰陽致傷血絡多成經漏澗俗云血沙淋是也治當調和血氣使臟腑和平經自止矣

慎齋按已上三條序婦人經行而交合致有癩冒伏梁經漏之三證也凡婦人經行血海淨盡而交合則精凝血聚可以成胎若經適來而不禁房室則敗血不出積滯相射致有諸證此人之最易犯者醫者審察病機不可不曉

慎齋按已上自褚侍中合之非時一論至此其條序分十七

段皆屬經候不調之故以下始序治調經之大法
○○調經莫先于去病論

李氏曰婦人月水循環，纖疴不作而有子，若兼潮熱腹痛，重則咳嗽汗嘔，或瀉有潮汗，則血愈消耗，有汗咳嘔，則氣往上行，瀉則津偏于後，痛則積結于中，是以必先去病而後可以滋血，調經就中潮熱疼痛尤為婦人常病，蓋血滯積入骨髓，便為骨蒸，血滯積瘀與日生新血相搏，則為疼痛，血枯不能滋養百骸，則蒸熱于內，血枯胞絡火盛，或挾痰氣食積，寒冷則為疼痛，凡此諸病皆阻經候不調，必先去其病而後可以調經也。

女科經綸

卷一

月經門

三

燕貽堂

○○經候不調不通有分，因詳證治病之法論

方氏曰：婦人經病有月候不調者，有月候不通者，然不調不通，中有兼疼、癢者，有兼發熱者，此分而為四也。細詳之不調，中有趨前者，有退後者，趨前為熱，退後為虛，不通中有血枯者，有血滯者，血滯宜破血，枯宜補也。疼痛中有常時作痛者，有經前經後作痛者，常時與經前為血積，經後為血虛也。發熱中有常時發熱者，有經行發熱者，常時為血虛有積，經行為血虛而有熱也。是四者之中，又分為八矣。人之氣血周流，忽有憂思忿怒，則鬱結不行，經前產後，忽過飲冷，形寒則惡露不盡，此經候不調

不通作痛發熱，所由作也。大抵氣行血行，氣止血止，故治血病以行氣為先，香附之類是也。熱則流通，寒則凝塞，故治血病以熱藥為佐，肉桂之類是也。

慎齋按：婦人有先病而後致經不調者，有因經不調而後生諸病者。如先因病而後經不調，當先治病，病去則經自調。若因經不調而後生病，當先調經，經調則病自除。李氏一論，可謂調經之要，然備而不全，予故補其未盡之旨。若方氏分因詳證，誠得統論調經大法。

○○調經先以順氣為主論

女科經綸

卷一

月經門

三

燕貽堂

濟生方曰：經云百病皆生于氣，有七氣，有九氣，喜怒憂思悲恐驚七氣也。蓋之以寒熱為九氣，氣之為病，男子婦人皆有之。惟婦人之氣為尤甚。蓋人身血隨氣行，氣一滯則血為氣併，或月事不調，心腹作痛，或月事將行，預先作痛，或月事已行，淋瀝不斷，或作寒熱，或為癥瘕，或疼痛連腰，或引背脊上下攻刺，吐逆不食，肌肉消瘦，非特不能受孕，久不治轉為勞瘵者，多是皆氣之為病也。故調經養血，莫先以順氣為主。

○○調經養血莫先于調氣論
汪石山曰：婦人屬陰，以血為本，但人肖天地，陰常不足，婦人加

乳哺月經之耗是以婦人血病者多夫月經者津液血脈所成
苟榮衛和經候自然應期如月之盈虧不先常度故曰月經苟
氣血一忤則或先或後多寡不勻或閉絕不行而百病生必須
分因而治如真水虧敗陽火內熾血海枯竭經絕不通者宜補
養陰血則經自行如寒客胞門子戶凝泣血不通為癥瘕之候
者宜散寒逐瘀則經自行但血乃氣之配其升降寒熱虛實一
從乎氣是以氣熱則血熱而色紫氣寒則血寒而色凝氣升則
血逆而上出氣陷則血隨而下崩此調經莫先于養血養血莫
先于調氣也

文科經綸 卷一 月經門

三

調經以開鬱行氣為主論
方約之曰婦人以血用事氣行則無病故古人治婦人病多用
香附砂仁木香青及枳殼者行氣故也凡婦人病多是氣血鬱
結故治以開鬱行氣為主鬱開氣行而月候自調諸病自瘥矣
。調經不可專耗其氣論
葉以潛曰女子經候不調多主耗氣益血之說但血為氣配氣
熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣行則行氣滯則滯如
果鬱人氣盛于血而致經不調者力可單用香附九抑氣散加
木香檳榔以開鬱行氣若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女

一般陽生則陰長氣衰則血亦弱豈可專耗其氣但其間有夫
婦不和婢妾志不得伸常有鬱氣而致經水不調又當審順逆
以治之而已

。調經不可耗氣宜養心責脾論

羅周彥曰婦人得陰柔之體以血為本陰血如水之行也陽氣
若風之旋天故風行則水動陽暢則血調此自然之理也攷古
方耗氣以調其經夫太衝者氣也任脈者血也氣升則升氣降
則降血隨氣行若獨耗其氣血無所施正氣既虛邪氣必勝而
百病生焉經安得調乎况心生血脾統之胃為衛之元養其心

文科經綸 卷一 月經門

三

則血生實其脾則血足氣勝則血行安可獨耗其氣此調經之
至要也行經之時當戒暴怒怒則損其衝任遠房室多慾則傷
其血海一有抑鬱宿血必停走于腰脇注于腿膝遇新血相搏
則疼痛不已散于四肢則麻木不仁入于血室則寒熱不定皆
四氣七情之所致也
慎齋按已上五條序調經之法莫先于順氣開鬱而順氣開
鬱則又戒不可專耗其氣當以實脾養心為調經之要法也
經云百病皆生于氣而于婦人為尤甚婦人之病先于經候
不調但婦人以血用事經水雖屬血病若竟從血分求瘥未

得病滋之要者也。若從氣分求責而調經知所本矣。

調經不可誤藥當養氣益血論

初虞世曰：女子十四天癸至，任脈通，月事以時下，其來不可過，與不及多與少，反此皆謂之病，不行尤甚，百疾生焉。血既不能滋養百體，則髮落面黃，身羸血虛，則發熱而水不足，則燥氣燔，燥氣燔則金受邪，金受邪則肺家嗽，嗽則咳血吐血之病成矣。醫見經不行，用直虫水蛭行血藥見熱，則用除熱諸寒藥，經水枯竭，無以滋養其能行乎？但服養氣益血諸藥，天癸自行也。又有一種婦人盛實，月經瘀閉，利之則行，自有證候。

女科經綸

卷一

月經門

完

調經以滋水為主不須補血論

趙養葵曰：或問論調經以滋水為主，不須補血，何也？曰：經云：女子二七而腎氣盛，齒更髮長，天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下。天者天一之真，癸者壬癸之水，月者水之精，以一月而盈，盈則曼女人經水一月以時而下，能有子，不以時下或過期或不及，皆為病，病則不能有子，所以必須調經，調經必須滋水為主。又問曰：同一紅色，非血而何？曰：女人系胞之所，而養經之處，養之一月而行，行則虛矣，以時交感以虛而受人，若有孕，此水即以為養胎不月矣。一生子，此水即化為乳而不月，乳之色白也。

何謂血乎？至四十九而天癸絕，其所絕者，天癸水也。其流行之血，不見其虧，故不須四物湯補血，必以六味丸滋水。滋水必兼補血，補血兼不得滋水，何也？蓋血乃後天飲食八胃游溢精氣而成，以為流行之用。若經水乃衝任所主，人身中有奇經八脈，俱屬腎經無形之脈，其衝任者，奇經之二，其脈起胞中，為經脈之海，與手太陽手少陰為表裏，上為乳汁，下為月水，女人獨稟此水以為生生之原，與男子二八之精同，悉從天一之源而來。精則一月而滿，滿則溢似血而實非血也。

調經滋水必兼養火論

女科經綸

卷一

月經門

完

趙養葵曰：衝任起于胞中，男子藏精，女子系胞，其間又恃一點命門之火為之主宰。火旺則紅，火衰則淡，火太旺則紫，火太衰則白。所以滋水更當養火，甚有乾涸不通者，雖曰火盛之極亦不宜以苦寒之藥降火，只宜大補其水，從天一之源以養之，使滿滿則益，萬無有壽藥可通之理。此調經之法，類如此。

慎齋按：已上三條序調經，莫如養血而養血莫如滋水養火。此趙氏詳詳遺稿，獨發前人所未發也。

調經以大補脾胃為主論

陳良甫曰：婦人以血為主，脾胃虛弱，不能飲食，藥衛不足，月經

不行寒熱腹痛或崩帶證皆脾胃不足所生病故婦人月水不通或因勞役過度或因失血傷損肝脾但滋化源其經自通若小便不利苦頭眩腰痛足寒時痛久久血結于內變為癥瘕若血水相併脾胃虛弱壅滯不通變為水腫若脾氣衰弱不能制水水漬肌肉變為腫滿當益其津液大補脾胃為主

調經必審脾氣生化之源論

武叔卿曰脾氣化液而生血即水入于經其血乃生之意此榮出中焦也故曰生化之源心統血者脾氣化液入心而變為血故雖心之所主亦賴脾氣化生此婦人經血不調必審脾氣化

生之源而健脾為調經之要也

調經宜補養脾胃為先論

何松菴曰乾道成男坤道成女女以坤道用事故治婦人以陰血為主女子二七天癸至陰氣盛盛則溢洩此自然之理也若稟性旺則不及二七而至弱則踰二七而至凡治此證當察脾胃何如女子月事不調因脾胃傷損不能生血所致須以補養脾胃為先脾旺則能統血而經自行切不可遽用攻剋之劑傷其中氣則愈不調矣

慎齋按已上三條序調經以補養脾胃為大法也趙養葵二

條調經主于滋水是補先天真一之源也陳良甫以下三條調經主于補土是培後天元氣之本也固腎扶脾此為調經要道學者審之

治女子經脈不行有三法

楊仁齋曰女子經脈不行有三一則血氣盛實經絡過閉其脈滑實治當通經疎利一則風冷外傷七情內賊以致經絡痺滯其脈浮濇治之當解風散冷去瘀滌熱一則形體憔悴經絡涸竭其脈虛弱治當滋養氣血

慎齋按已上一條序調經之法兼有餘不足外感內傷處治

女子經行宜謹

陳良甫曰女子二七而天癸至經血漸盈應時而下名曰月信若遇經行最宜謹慎否則與產後證相類若被驚怒勞役則血氣錯亂經脈不行多致勞瘵等證若逆于頭而肢體之間則重痛不寧若怒氣傷肝則頭暈脇痛嘔血瘰癧若經血內滲則竅穴淋瀝凡此六淫外侵變證百出犯時微若秋毫成患重于泰山可不畏哉

女子病臨醫宜自說

孫真人曰凡女子十四已上則有月事月事來時得風冷溼熱

四時之病相協者皆自說之不爾與治誤相觸動更增困處方者亦應問之

看婦人病先問經期

寇宗奭曰凡看婦人病入門先問經期

婦人室女諸病須問經事

彭用光曰凡婦人室女病傷寒及諸寒熱氣滯須問經事若何

治病婦當先問娠

張戴人曰凡治病婦當先問娠不可倉猝凡看婦人病脈不可純用破氣行血之藥恐有娠在疑似間也

女科經綸

卷一 月經門

聖

燕貽堂

治婦人病令寬思慮

葛仙翁曰凡治婦人諸病兼治憂志令寬其思慮則病無不愈慎齋按已上六條序女子經行宜謹不可輕忽以致成病而并戒醫者治婦人之病不可不問經問娠為要也若病者諱而不言醫者略而不問勢必處治乖方兩致其誤可不戒哉

婦人之病源難療

千金方曰婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者眾陰所乘常與溼居十四已上陰氣浮溢百想經心內傷五臟月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論或便利

于懸厠之上風從下入便成十二瘡疾婦人所以別立方也然女人嗜慾多于丈夫感病產于男子加以愛憎嫉妬所以為病根難療之難療也

慎齋按已上一條序婦人病之難療也

婦人月水不利之脈

脈經曰尺脈滑血氣實婦人經脈不利尺脈來而斷絕者月水不利寸關如故尺脈絕不至者月水不利當患少腹痛肝脈沉月水不利主腰腹痛

女科經綸卷一終

女科經綸

卷一 月經門

聖

燕貽堂

女科經綸卷二

構李蕭 堉賡六纂著

男 鉉律黃 李含漢南溟 全校
鎡轟濤 薛之屏翰周

葛金聲秋音 顧 炅石霞

禾郡

徐 彬忠可 朱光調梅臣 陳聖謨石經

全參訂

程 林雲來 周士標楚翹 沈鴻翔欽遠

徐 躍道魚 姚 嵩方宋

嗣育門

經論男女有子本于腎氣之盛實

女科經綸

卷二

嗣育門

一

燕貽堂

素問曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下故有子七七任脈虛大衝脈衰少天癸竭地道不通故形壞而無子丈夫八歲腎氣實齒更髮長二八腎氣盛天癸至精氣溢瀉陰陽和故能有子八八則齒髮去五臟皆衰筋骨懈墮天癸盡矣故髮鬢白身去行步不正而無子慎齋按已上經論一條序男女有子本于天癸至而腎氣盛實之候也昔人論種子必先調經故婦人調經一門之後即繼以嗣育之道若良方與濟陰綱目序調經經閉證後遂編入遂于血崩帶下與中風諸疾未免序次不倫矣

合男女必當其年欲陰陽之完實

褚澄曰合男女必當其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽完實然後交而孕孕而育育而為子堅壯強壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣早洩未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育育而子脆不壽

求子在陰陽之形氣寓論

聖濟經曰天地者形之大也陰陽者氣之大也惟形與氣相資而立未始偏廢男女媾精萬物化生天地陰陽之形氣寓焉語

女科經綸

卷二

嗣育門

二

燕貽堂

七八之數七少陽也八少陰也相感而流通故女子二七天癸至男子二人而精通則以陰陽交合而兆始故也

求子須知先天之氣論

胡孝曰男女交媾其凝結成胎者雖不離精血猶為後天滓質之物而一點先天之氣助于情慾之感者妙合于其間朱子所謂稟于有生之初悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子語男則主于精語女則主于血著論立方男子以補腎為要女子以調經為先又參以補氣行氣之說察其脈絡究其盈虧番而治之然後一舉可孕也

求子之脈貴和平論

陳楚良曰人身氣血各有虛實寒熱之異。惟察脈可知。舍脈而獨言藥者。妄也。脈不宜太過而數。數則為熱。不宜不及而遲。遲則為寒。不宜太有力而實。實者正氣虛而火邪乘之。以實也。治法當散鬱以伐其邪。邪去而後正。可補不宜太無力而虛。虛乃氣血虛也。治法當補其氣血。又有女子氣多血少。寒熱不調。月水逾期。皆當診脈。而以活法治之。務使夫婦之脈和平。有力。交合有期。不妄用藥。乃能生子也。

慎齋按已上四條。序嗣育之道。必陰陽完實。形氣相資。兆始。

女科經綸

卷二

嗣育門

三

燕貽堂

于先天有生之初。而再診以脈之和平。始可有子也。

種子必保養心腎二臟論

王宇泰曰。歲冬之後。必有陽春。是知天地之間。不收敛則不能發生。自然之理也。今人既昧收藏之理。縱慾竭精。以耗真氣。及其無子。既云血冷。又謂精寒。燥熱之劑。投而真陰益耗。矣安得而有子。大抵無子之故。不獨在女。亦多由男。房勞過度。施洩過多。精清如水。或冷如冰。及思慮無窮。皆難有子。蓋心主神。有所思。則心馳于外。致君火傷。而不能降。腎主智。有所勞。則智亂于中。俾腎虧而不能升。上下不交。水火不媾。而能生育者。無有也。

種子有聚精之道五論

袁了凡曰。聚精之道。一曰寡慾。二曰節勞。三曰息怒。四曰戒酒。五曰慎味。腎為精之府。凡男女交接。必擾其腎。腎動則精血隨之而流。外雖不洩。精已離宮。未能堅忍者。必有真精數點。隨陽慶而溢。出此其驗也。故貴乎寡慾。精成于血。不獨房室之交。損吾之精。凡日用損血之事。皆當戒。如目勞于視。則血于視。耗耳勞于聽。則血以聽。耗心勞于思。血以思。耗隨事節之。則血得其養。而與日俱積矣。故貴乎節勞。主閉藏者腎也。司疎泄者肝也。二臟皆有相火。其系上屬于心。心君火也。怒則傷肝。而相火

女科經綸

卷二

嗣育門

四

燕貽堂

動動則疎洩。用事閉藏。不得其職。雖不交合。亦暗流潛耗矣。故貴乎息怒。人身之血。各歸其舍。則常凝。酒能動血。人飲酒則面赤手足俱紅。是擾其血也。血氣既衰。之人數月無房事。精始厚而可用。使一夜大醉。精隨薄矣。故宜戒酒。經云。精不足補以味。濃郁之味。不能生精。惟恬淡者能補精耳。蓋萬物皆有真味。調和勝真味。衰矣。不論腥素。淡煮得法。自有一段冲和恬淡之氣。益人腸胃。洪範論味。而曰稼穡作甘。世物惟五穀得味之正。但能淡食。穀味最能養精。如煮粥飯中。有厚汁。滾作一團者。此米之精液所聚。食之最能主精。故宜慎味。

種子之道有四

王宇泰曰。種子之道有四。一曰擇地。地者母血是也。二曰養種。種者父精是也。三曰乘時。時者精血交感之會合也。四曰投虛。虛者去舊生新之初是也。

種子必知細緼之時候

袁了凡曰。天地生物。必有細緼之時。萬物化生。必有樂育之候。猶犬至微。將受娠也。其雌必狂呼而奔跳。以細緼樂育之氣。觸之。不能自止耳。此天然之節候。生化之真機也。凡婦人一月經行一度。必有一日細緼之候。于一時辰間。氣蒸而熱昏而悶。有

女科經綸

卷二

嗣育門

五

燕胎堂

欲交接不可忍之狀。此的候也。此時逆而取之。則成丹順而施之。則成胎矣。

慎齋按。已上四條。序種子之道。有保養聚精乘時之法也。夫保養聚精乘時之法。在男子之調攝。然亦有男子盡其法。而終身不育者。其咎不在男子。之不得其法。而在女子之必有其故也。故以婦人不孕。序之于後。

婦人無子。屬衝任不足。腎氣虛寒。

聖濟總錄曰。婦人所以無子。由衝任不足。腎氣虛寒故也。內經謂女子二七天癸至。任脈通。太衝脈盛。陰陽和。故能有子。若衝

任不足。腎氣虛寒。不能繫胞。故令無子。亦有本于夫病。婦疾者。當原所因調之。

婦人不孕。屬風寒襲于子宮

繆仲淳曰。女子繫胞于腎。及心胞絡皆陰臟也。虛則風寒乘。子宮則絕孕。無子。非得溫煖藥。則無以去風寒而資化育之妙。惟用辛溫劑。加引經。至下焦。走腎及心胞。散風寒。煖子宮。為要也。

婦人不孕。屬衝任伏熱。真陰不足。

朱丹溪曰。婦人久無子者。衝任脈中伏熱也。夫不孕由于血少。

女科經綸

卷二

嗣育門

六

燕胎堂

血少則熱。其原必起于真陰不足。真陰不足。則陽勝而內熱。熱則榮血枯。故不孕。益陰除熱。則血旺。易孕矣。脈訣曰。血旺易胎。氣旺難孕是也。

婦人不孕。屬陰虛火旺。不能攝精血

繆仲淳曰。女子血海虛寒。而不孕者。誠用煖藥。但婦人不孕。亦有陰虛火旺。不能攝受精血。又不可純用辛溫藥矣。

婦人不孕。屬血少。不能攝精。

朱丹溪曰。人之有胎。陽精之施也。陰血能攝之。精成其子。血成其胞。胎孕乃成。今婦人無子。率由血少。不足以攝精也。血少固

非一端。然欲得子者，必須補其精血，使無虧欠，乃可成胎。孕若泛用秦桂丸之劑，薰戕臟腑，血氣沸騰，禍不旋踵矣。又曰：瘦弱婦人，性燥多火，經水不調，不能成胎。以子宮乾澁，無血不能攝受精血故也。益水養陰，宜大五補丸增損三才丸加減，以養血主之。東垣有六味丸補婦人陰血不足，無子服之能胎孕。

婦人不孕戒服秦桂丸熱藥論

朱丹溪曰：無子之因，多起于婦人。醫者不求其因，起于何處，遍閱古方，惟秦桂丸用溫熱藥，人甘受燔灼之禍而不悔，何也？或曰：春氣溫和，則萬物發生；冬氣寒冽，則萬物消隕。非秦桂溫熱

女科經綸

卷二

嗣育門

七

何以得子，臟溫暖成胎。予曰：婦人和平則樂有子，和則氣血勻，平則陰陽不爭。今服此藥，經血必紫黑，漸成衰少。始則飲食漸進，久則口苦而乾，陰陽不平，血氣不和，病反蜂起。以秦桂丸耗損真陰，故也。戒之。

按秦桂丸為婦人子宮虛寒積冷不孕者設。若血虛火旺，真陰不足，不能攝精者，服之則陰血反耗而燥熱助邪矣。慎齊按：已土六條序，婦人不孕有虛寒伏熱，豈成則少此不足之病也。

婦人不孕屬于實交則非

張子和曰：有婦人年三十四，夢與鬼交，及見神堂陰司舟楫橋梁如此一十五年，竟無姙娠。此陽火盛于土，陰水盛于下，見鬼神者，陰之靈，神堂者，陰之所。舟楫橋梁水之用，兩手寸脈皆流而伏，知胸中有寒痰也。凡三湧三泄三汗，不旬日而無夢一月而有娠。

婦人不孕屬脂膜閉塞子宮

朱丹溪曰：婦人肥盛者，多不能孕育。以身中有脂膜閉塞子宮，致經事不行，瘦弱婦人不能孕育。以子宮無血，精氣不聚故也。肥人無子，宜先服二陳湯，四物去生地，加香附久服之，丸更妙。

女科經綸

卷二

嗣育門

八

婦人不孕屬濕痰閉子宮

朱丹溪曰：肥盛婦人，稟受甚厚，恣于酒食，經水不調，不能成孕。以軀脂滿溢，濕痰閉塞子宮故也。宜燥濕去痰，行氣。二陳加木香、二朮、香附、芎藭或導痰湯。

婦人不孕屬于積血

陳良甫曰：婦人有全不產育，及二三十年斷絕者，盪胞湯上之。日三服，夜一服，溫覆汗必下，積血及冷赤膿如豆汁，力弱大困者一二服止。

婦人不孕分肥瘦有痰與火之別

曰松菴曰有肥白婦人不能成胎者或痰滯血海子宮虛冷不能攝精尺脈沉滑而遲者當溫其子宮補中氣消痰爲主有瘦弱婦人不能成胎者或內熱多火子宮血枯不能凝精尺脈洪數而浮者當滋陰降火順氣養血爲主

慎齋按已上五條序婦人不孕有痰飲積血脂膜爲實邪有餘之病也

婦人不孕病情不一論

薛立齋曰婦人不孕亦有六淫七情之邪傷衝任或宿疾淹留傳道臟腑或子宮虛冷或氣旺血衰或血中伏熱又有脾胃虛

女科經綸

卷二

嗣育門

九

燕貽堂

損不能榮養衝任更當審男子形質何如有腎虛精弱不能融育成胎有稟賦原弱氣虛血損有嗜慾無度陰精衰憊各當求原而治至大要則當審男女尺脈若右尺脈細或虛大無方用八味丸左尺洪大按之無方用六味丸兩尺俱微細或浮大用十補丸若誤用辛熱燥血不惟無益反受其害矣

慎齋按已上一條序不孕之理兼男女病情而論之也

成胎以精血先後分男女

褚氏遺書曰男女之合二情交暢陰血先至陽精後充血開裏精精入爲骨而男形成陽精先入陰血後來精開裏血入居

本而女形成

成胎以左右陰陽之氣動分男女

聖濟經曰天之德地之氣陰陽至和流薄一體因氣而左動則屬陽陽資之則成男因氣而右動則屬陰陰資之則成女易稱乾道成男坤道成女此男女之別也

成胎以日數精血之勝分男女

李東垣曰經水斷後一二日血海始淨精勝其血感者成男四五日後血脈已旺精不勝血感者成女至六七日後雖交感亦不成胎

女科經綸

卷二

嗣育門

十

燕貽堂

成胎以子宮之左右分男女

朱丹溪曰易云乾道成男坤道成女夫乾坤陰陽之性情也左右陰陽之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而會精之洩陽之施也血能攝精精成其骨此萬物之資始于乾元也血之行也精不能攝血成其胞此萬物之資生于坤元也陰陽交媾胚胎始凝胎所居名曰子宮一系在下上有兩岐一達于左一達于右精勝其血則陽爲之主受氣于左子宮而男形成精不勝血則陰爲之主受氣于右子宮而女形成孕成而始化胞也

成胎以先天之陰陽相勝分男女

馬玄臺曰。男子先天之氣。方父母媾精時。陰氣不勝其陽。則成男。凡醫書謂陰血先至。陽精後衝。縱氣來乘。血開裹精。陰外陽內。則成男。其義亦渺。大約陰氣不勝其陽。則為男子。先天之氣。方父母交媾時。陽氣不勝其陰。則成女。凡醫書謂陽精先入。陰血後參。橫氣來助。精開裹血。陰內陽外。則成女。其義亦渺。大約陽氣不勝其陰。則為女。

成胎以百脈齊到分男女

程鳴謙曰。信。褚氏之言。則人有精先洩而生男。精後洩而生女。

女科經綸

卷二

兩育門

十一

燕貽堂

者何。與信東垣之言。則有經始斷。交合生女。經久斷。交合生男。亦有四五日以前。交合無孕。八九日以後。交合有孕者。何與。俞子本又謂。微陽不能射。陰不能攝。陽信斯言也。世有疴羸之夫。怯弱之婦。屢屢受胎。而血氣方剛。精力過人者。往往有終身不育。竟至乏嗣。獨何與。丹溪論治。端以婦人經水為主。然富貴之家。侍妾亦多。其中寧無月水如期者。又有經前夫頻育。而娶此以圖易。則不受胎。豈能受于此。而不能受于彼耶。大抵父母生子。如天地生物。易曰。坤道其順乎。承天而時行。知地之生。如不過順承乎天。則知母之生子。亦不過順承乎父而也。如母

之順承乎父。則種子者。果以婦人為主乎。以男。子為主乎。若主

男子。則不拘老少。強弱。康寧。病患。精之易洩。難洩。只以交感之時。百脈齊到為善耳。若男女之辨。不以精血先後為拘。不以經盡幾日為拘。不以夜半前後。交感為拘。不以父母強弱為拘。只以精血各山百脈齊到。者別勝負耳。故精之百脈齊到。勝乎血。則成男。血之百脈齊到。勝乎精。則成女矣。

受胎總論

李東壁曰。易云。一陰一陽之謂道。男女媾精。萬物化生。乾道成男。坤道成女。此蓋言男女生生之機。亦陰陽造化之良能也。齊

女科經綸

卷二

兩育門

十一

燕貽堂

褚澄言。血先至。暴精則生男。精先至。暴血則生女。陰陽均至。非男非女之身。精血離分。駢胎品胎之兆。道藏言。月水止後。一三五日成男。二四六日成女。東垣言。血海始淨。一。二。日成男。三。四。五。日成女。聖濟經言。因氣而左動。陽資之則成男。因氣而右動。陰資之則成女。丹溪乃非褚氏。而是東垣。主聖濟。左右之說。立論歸于子宮左右之系。其說可謂悉矣。切謂褚氏未可非也。東垣亦未盡是也。蓋褚氏以精血之先後言。道藏以日數之奇偶言。東垣以女血之盈虧言。聖濟丹溪以子宮之左右言。各執一見。會而通之。理自得矣。夫獨男。獨女之胎。可以日數論。辨胎品胎

之感亦可以日數論乎。稽之史載一產三子四子。有半男半女。或男多女少。男少女多。則一三五日為男。二四六日為女之說。豈其然哉。豈有一日受男而二日復受女之理乎。此褚氏聖濟丹溪主精血子宮左右之論為有見。而道藏東垣日數之論為可疑矣。叔和脈經以脈之左右浮沉辨猥生之男女。高陽脈訣以脈之縱橫逆順別駢品之胎形。恐亦臆度之見。而非確論也。慎齋按已上七條。序受胎辨男女之分。有不同之論也。經云左右者陰陽之道路。男女者陰陽之儀象。故陰陽和而萬物生。夫婦合而男女形。可見男女之生。未有不本于陰陽之理。

女科經綸

卷二

嗣育門

三

燕貽堂

者也。故褚澄以精血先後分男女。東垣以日數奇偶分男女。鳴謙以百脈齊到分男女。皆為理之未確。故丹溪議褚李二公之論為未融。而以易道之乾元資始。坤元資生為據。婁全善所以嘆為造極精微。發前人未發是矣。若子宮分左右。而以兩岐辨男女。夫子宮為命門。女子繫胞。形如合鉢。何嘗兩岐。而分左右。則是有兩子宮。此說為鑿空無據。聖濟是論左右陰陽之氣分男女。未嘗以子宮有左右之分也。况男女交媾時。均有其精。何嘗有血。褚氏東垣丹溪俱以精血混言。幾見男女媾精。而婦人以血施也。前賢之論多謬。僭辨之。

雙胎屬精氣之有餘

朱丹溪曰。或問雙胎者何也。曰精氣有餘。岐而分之。血因分而攝之故也。若男女同孕者。剛日陽時。柔日陰時。感則陰陽混雜。不屬左。不屬右。受氣于兩岐之間也。亦有三胎四胎五胎六胎者。猶是而已。

成胎有二男二女屬精血之盛

人鏡經曰。精氣盛則成二男。血氣盛則成二女。精血皆盛則成一男一女。或精血散分則成男胎。或精血混雜則成非男非女。男不可為父。女不可為母。皆非純氣。或感邪祟鬼怪之沴氣。則

女科經綸

卷二

嗣育門

四

燕貽堂

成異類矣。

不成男女為陰陽駁氣所乘

朱丹溪曰。或問有男不可為父。女不可為母。與男子之兼形者。若何分之。曰男不可為父。得陽道之虧者也。女不可為母。得陰道之塞者也。兼形者。由陰為駁氣所乘。為狀不一。有女兼男形者。又有下為女體。上具男之全形者。此又駁之甚也。或曰駁氣所乘。獨見于陰。而所成之形。又若是不同耶。曰陰體虛。駁氣易乘。駁氣所乘。陰陽相混。無所為主。不可屬左。不可屬右。受氣于兩岐之間。隨所得駁氣之輕重而成形。故所兼之形。有不同也。

慎齋按已上三條序受孕有雙胎之異，有不成男女之形，此皆陰陽變常，駁氣所感，理之所不可稽者也。

妊娠時月分經養胎之始

巢元方曰：妊娠一月名胚胎，足厥陰脈養之；二月名始膏，足少陽脈養之；三月名始胎，手心主脈養之。當此時，血不流行，形象始化。四月始受水精，以成血脈，手少陽脈養之；五月始受火精，以成氣，足太陰脈養之；六月始受金精，以成筋，足陽明脈養之；七月始受木精，以成骨，手太陰脈養之；八月始受土精，以成膚，手陽明脈養之；九月始受石精，以成毛髮，足少陰脈養之；十月始受木精，以成骨，手太陰脈養之。

女科經綸

卷二

嗣育門

五

燕貽堂

月五臟六腑關節，人神皆備，其大略也。

十二經脈養胎以五行分四時

陳良甫曰：推巢氏所論妊娠脈養之理，若厥陰肝脈，足少陽胆脈，為一臟腑之經，四時之令，必始于春木，故十二經之養，始于肝。所以養胎在二月，手心主心胞絡脈，手少陽三焦脈，屬火而旺，所以養胎在三月，四月，手少陰手太陽，乃心脈也，君主之官，足太陰脾脈，足陽明胃脈，屬土而旺，長夏所以養胎在五月，六月，手太陰肺脈，手陽明大腸脈，屬金而旺，秋所以養胎在七月，八月，足少陰腎脈，足太陽膀胱脈，屬水而旺，冬所以在

腹中受足諸臟之氣，脈所養，然後待時而生。此論微奧，有至此世有明者，未有過于巢氏之論矣。

十月養胎始于足厥陰肝木

聖濟經曰：原四時之化，始于木，十二經之養，始于肝。茲肝之經，足厥陰之脈也。自厥陰次之，至于太陽，自一月積之，至于十月，五月相生之氣，天地相合之數，舉在於是。然手少陰太陽之經，無所專養者，以君主之官，無為而已。是皆母之真氣，血終以養形者也。

慎齋按已上三條序受胎之始，分十二經脈以養胎也。人自

女科經綸

卷二

嗣育門

五

燕貽堂

受胎于胞門，則手足十二經脈其氣而周流，俱以擁養胎元。豈有逐月分經某經養某月之胎之理。馬玄臺已駁之矣。但在巢氏一月二月是論受胎之月數，猶為近理也。至良甫所論，是以年歲之一月二月，而以五行分四時論也。夫人受胎不拘時月，必欲以木火土金水配定某月養胎，則受胎在正月二月者，猶可以本配之也。若在四五月者，何以配之。不經甚矣，當俟正之。

胎疾宜治

聖濟經曰：或者以妊娠母治有傷胎破血之論，豈知邪氣暴良。

正氣衰微。苟執方無權。縱而勿藥。則母將羸弱。子安能保。上古聖人。謂重身毒之有故。無煩衰其大半而止。蓋藥之性味。本以療疾。誠能處以中庸。與疾適當。且知半而止之。亦何疑于攻治哉。

。療母安胎二法不同

王海藏曰。安胎之法有二。如母病以致動胎者。但療母則胎自安。或胎氣不固。或有觸動。以致母病者。宜安胎則母自愈。慎齋按。已上二條。序胎疾不可不療而療之之法。則當分母病胎病以處治也。

女科經綸

卷二

嗣育門

七

燕胎堂

胎前用藥從厥陰經治法有三禁論

張潔古曰。婦人童幼。天癸未行。屬少陰。天癸既行。屬厥陰。天癸既絕。屬太陰。治胎產病。從厥陰者是。祖氣生化之原也。厥陰與少陽為表裏。故治法無犯胃氣。及上中二焦。謂之三禁。不可汗。不可下。不可利小便。若發汗。則同傷寒。下早。證利大便。則脈數而動于脾。利小便。則內亡津液。而胃中枯燥。用藥能不犯三禁。則榮衛和而寒熱止。

。胎前以清熱養血為主論

王海藏曰。胎前氣血和平。則百病不生。若氣旺而熱。熱則耗氣。

血而胎不安。當清熱養血為主。若起居飲食。調養得宜。絕嗜慾。安養胎氣。雖感別證。總以安胎為主。

。胎前清熱養血宜兼順氣為主論

朱丹溪曰。胎前當清熱養血為主。白朮黃芩為安胎之聖藥。俗醫不知。不敢用。反謂溫熱劑可以養胎。不知胎前最宜清熱。令血循經不妄行。故能養胎。黃芩安胎為上。中二焦藥。使降火下行。益母草活血行氣。有補陰之功。胎前無滯。產後無虛。以行氣中有補也。胎至三月四月。忽腹痛。惟砂仁木香能安胎。治痛行氣。八九月必須順氣。用枳殼紫蘇之屬。但氣虛者宜補氣。以行

女科經綸

卷二

嗣育門

太

燕胎堂

滯用參朮。陳皮歸芍。甘草加腹皮。氣實者。耗氣以抑陽。用芩朮。陳皮甘草加枳殼。如將臨月。胎熱以三補丸加香附白芍。或地黃膏。血虛者。四物。若瘦弱人。勿用芍藥。以其伐肝也。

胎前三禁以養血健脾清熱疎氣為主論

汪石山曰。徐之才與巢元方。有十月養胎用藥之法。當逐月詳其所屬之經。氣血虛實。而用是經之藥。虛則補之。壅則疎之。熱則涼之。寒則溫之。不可汗下。及利小便。蓋胎元必賴氣血以養。若汗則亡陽傷氣。下則亡陰傷血。利小便則傷精液。是以三者皆在所忌。凡胎前病。總以養血健脾清熱疎氣為主。

慎齋按十月分經養胎之說創自巢元方病源論夫巢氏為隋代名醫張子和嘆其謬立名色故云支派之分自巢氏始病源之失亦自巢氏始即如受胎始于命門子戶人身十二經氣血俱翕聚以養胎元豈有某經養某月胎之理而陳良甫附會其說以五行分配四時定養胎法尤無理甚矣若徐之才又因元方良甫之謬而以十月分配某月見某證則用某藥立方主治分列條下夫孕婦胎前病邪百出豈有限于某月必見某證執用某方以治之不但膠柱鼓瑟直是齊東之語荒誕不稽者也姑存巢陳二論刪去徐氏十條以正婦

女科經綸

卷二

嗣育門

九

燕胎堂

人良方訛以傳訛之失汪石山見理甚明亦從而稱述之何歟

胎前清熱養血宜開鬱為主論

汪石山曰妊娠必須清熱調血使血循經以養其胎故丹溪用黃芩白朮為安胎聖藥蓋胎之成由母之氣血畜聚以養之氣血既聚則易鬱是以先哲多用黃芩清熱香附開鬱也

胎前不宜服耗氣熱藥論

徐春甫曰世醫安胎多用艾附砂仁熱補為害尤甚不知血氣清和無火煎燥則胎安而固氣虛則提不住血熱則溢妄行胎

欲不墮得乎香附雖云快氣開鬱多用則損正氣砂仁快脾氣多用亦耗真氣况香燥之品氣血兩傷求以安胎適以損胎矣慎齋按香附衣香砂仁世醫謂安胎必用不知此三味性溫而辛久服反致耗氣助火雖曰胎前須順氣但藥性有偏勝宜兼清熱如黃芩知母之屬為當若胎氣虛寒者又不在此例也

胎前體盛不宜補氣論

喻嘉言曰地之體本重然得天氣以包舉之則生機不息若重陰返寒之區天日之光不顯則物生實罕人之體肌肉豐盛乃

女科經綸

卷二

嗣育門

三

燕胎堂

血之榮旺但血旺易至氣衰久而彌覺其偏也夫氣與血兩相維而不可偏氣為主則血流血為主則氣反不流非氣之衰也氣不流有似乎衰耳故一切補氣藥皆不可用而耗氣之藥反有可施綠氣得補則愈細不若耗之以助其流動久之血仍歸其統握中矣湖陽公主體肥難產南山道山進瘦胎方而產得順利蓋肥滿之軀胎處其中全無空隙以故傷胎之藥止能耗其外之氣而不能耗其內之真氣此用藥之妙也

慎齋按胎前宜順氣氣順則不滯枳殼散東胎飲本為氣實肥盛安佚鬱悶者立法耳若氣體虛弱元氣不足或虛無脹

滿或虛寒腹痛。必須參朮大補。豈謂胎前必用耗氣藥乎。宜合春甫一條兼看為得。

安胎用黃芩白朮論

方約之曰。婦人有娠則礙脾。運化遲而生濕。濕生熱。丹溪先生用黃芩白朮為安胎之聖藥。蓋白朮健脾燥濕。條芩清熱。故也。但娠婦賴血養胎。方內四物去川芎。佐之為尤備耳。

辨安胎用黃芩白朮論

張飛疇曰。古人用黃芩安胎。是因子氣過熱。不寧。故用苦寒以安之。脾為一身之津梁。主內外諸氣。而胎息運化之機。全賴脾

女科經綸

卷二

嗣育門

三

燕貽堂

土。故用白朮以助之。然惟形瘦血熱。營行過疾。胎常上逼。過動不安者。為相宜。若形盛氣衰。胎常下墜者。非人參舉之。不安。形實氣盛。胎常不運者。非香砂耗之。不安。血虛火旺。腹常急痛者。非歸芍養之。不安。體肥痰盛。嘔逆眩暈者。非半夏豁之。不安。此皆治母氣之偏勝也。若因風寒所傷。而胎不安。則桂枝湯香蘇散。葱白香豉湯。諒所宜用。伏邪時氣。尤宜急下。此即安胎之要訣。下藥中獨此稍切。不可犯。若有客犯。而用白朮。使熱邪兩戀不解。反足傷胎矣。

安胎宜固腎。不必用黃芩白朮論

趙養葵曰。或問白朮黃芩安胎之聖藥。此二味。恐胎前必不可。缺乎。曰。未必然也。胎莖之繫于脾。猶鐘之繫于梁也。若棟柱不固。棟梁必撓。所以安胎先固兩腎。使腎中和。暖始脾有生。氣何必定以白朮黃芩為安胎耶。凡腹中有熱。胎不安。固用涼藥。腹中有寒。胎亦不安。必用溫藥。此常法也。殊不知兩腎中具水火之原。衝任之根。胎元之所繫。甚要。非白朮黃芩之所安也。如腎中無水。胎不安。用六味地黃壯水。腎中無火。用八味地黃益火。故調經當用杜仲續斷阿膠艾葉當歸五味。出入于六味八味湯中。為捷徑總之一以貫之也。此諸書之所不及。余特表而出之。

女科經綸

卷二

嗣育門

三

燕貽堂

胎前用抑陽助陰方論

許學士曰。婦人妊娠。惟在抑陽助陰。然胎前藥最惡群隊。若陰陽交錯。別生他病。唯南山道士枳殼散。所以抑陽。四物湯。所以助陰。但枳殼散少寒。單服之。恐有胎寒腹痛之患。以內補丸佐之。則陽不至強。陰不至弱。陰陽調而胎孕安。此前人未嘗論及也。

婁全善曰。觀許學士論枳殼四物內補三方。人皆用之。何如大率姪婦。惟在抑陽助陰。經云。陰搏陽別。謂之有子。蓋關前

15507 十 續修四庫全書 6 五五二

為陽關後為陰尺中之脈按之搏手不絕者姪也婦人平居陽氣微盛無他病及姪子則經閉以養胎若陽氣盛持之則經脈妄行胎始不固故貴抑陽助陰但枳殼散少寒內補丸佐之則陰陽調和而胎氣自安矣。

胎前以達生散論

朱丹溪曰世之難產者往往見于鬱悶安佚之人富貴繁養之家若貧賤辛苦者無有也方書止有瘦胎飲一論其方為湖陽公主設也實非極至之言彼湖陽公主奉養太過其氣必實耗其氣使之和平故易產此南山道士進瘦胎枳殼散抑陽降氣

女科經綸

卷二

胎前門

三

燕居堂

為衆方之冠温隱居加木香當歸佐之若形肥人知其氣必虛久坐知其氣不運而氣愈弱兒在胞胎因母氣不能目運故難產當補其母之氣則兒健易產矣遂于大千方紫蘇飲加參朮補氣藥隨母形色稟性參時加減名曰達生散人參白朮白芍當歸腹皮紫蘇陳皮甘草加枳殼砂仁

慎齋按已上五條序胎前用方之大略也胎前用藥清熱養血為主而清熱養血之後惟以補脾為要此培後天元氣之本也若養其則不用芩朮而以地黃飲加杜續以補腎夫胎系於腎腎固則胎自安此補脾不如補腎之要妙也許學士

內補丸已啓其端趙氏從而發明之可謂快安胎之秘旨矣

胎前調理之法

女科集略曰女之腎臟系于胎是母之真氣子所賴也受姪之後宜令鎮靜則血氣安和須內達七情外薄五味大冷大熱之物皆在所禁使霧露風邪不得乘間而入亦不得交合陰陽觸動慾火務謹節飲食若食兔缺唇食犬無聲食雜魚致瘡癩心氣大驚而癩疾腎氣不足而解頰脾氣不和而羸瘦心氣虛乏而神不足兒從母氣不可不慎也苟無胎動胎痛瀉痢風寒外邪不可輕易服藥

女科經綸

卷二

胎前門

三

燕居堂

孕婦起居所忌

便產須知曰勿亂服藥勿過飲酒勿妄針灸勿向非常地便勿舉重登高涉險勿恣慾行房心有大驚犯之難產子必顛倒勿多睡臥時時行步勿勞力過度使腎氣不足生子解頰衣母太濕食母太飽若脾胃不和榮衛虛怯子必羸瘦多病如犯修造動土犯其土氣令子破形殞命刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黧繫縛者相拘攣若有此等驗如影響切宜避之慎齋按已上二條序胎前調理避忌之法也

經綸懷子無邪脈

素問曰何以知懷子之且生曰身有病而無邪脈也

馬立臺曰身有病者經閉也無邪脈者尺中之脈和勻也婦人懷妊一月則陰陽之精尚未變化二月則精氣正變其氣熏蒸衝胃而為惡阻至三四月則惡阻少止脈甚滑疾蓋男女正成形質其氣尚未定也至五六月已後形質已定男女既分及八九月十月其脈平和如無娠然非醫者深明脈理病者肯明其故難以診而知也脈訣云滑疾不散胎三月但疾不散五月母至六月後則疾速亦無矣然始終洪數不變者其氣甚盛不可一例拘也故帝問懷子將生者何以知之

女科經綸

卷二

嗣育門

誼

燕貽堂

正此意耳伯言身雖有經閉之病而無經閉之脈彼經閉之脈尺中來而斷絕或按之全無者是也此則脈體平和勻靜乃無病脈至八月九月十月而然正懷子將生之候耳

經論妊脈屬足少陰一經

素問曰婦人足少陰脈動甚者妊子也又曰陰搏陽別謂之有子

玉太僕曰足少陰腎脈也動者如豆厥厥動搖也陰尺中也搏謂搏觸于手也尺脈搏擊與寸脈殊別則有孕之兆也經論妊脈尺中按之不絕

難經曰女子以腎繫胞三部浮沉正等按之不絕者有妊也

王叔和曰婦人三部脈浮沉以手按之不絕者孕子也娠初時寸微呼吸五至而尺數也脈滑疾重以手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑者五月也此即陰搏陽別之義言尺脈滑數寸脈微小而尺與寸脈別者孕脈也

診胎脈屬心腎二經

齊仲甫曰經云陰搏陽別謂之有子此乃氣血調和陽施陰化也叔和云脈平而虛乳子法也診其脈左少陰動甚者妊子也夫手少陰心脈也心主血足少陰腎脈也腎為胞門子戶大抵

女科經綸

卷二

嗣育門

誼

燕貽堂

少陰經左手屬心右足屬腎下主乎尺尺中按之不絕者有妊也

診胎脈在手足少陰二經

潘碩甫曰女人以血為本血旺是為本足氣旺則血反衰故女人以血勝氣者為貴少陰動甚者手少陰之脈也心主血動甚則血旺血旺易胎故云有子即內經所謂婦人手少陰脈動甚妊子是也尺脈者左尺足少陰腎之脈也腎為天一之水主子宮以繫胞孕胎之根蒂也滑利則不枯澀有替替舍物之象故妊娠即經所謂陰搏陽別謂之有子叔和所謂尺中之脈按之

不絕。全義也。卽此滑利之脈。應指疾而不散。滑爲血液疾而不散。乃血液斂結之象。是爲有胎三月。若但疾而不散。是從虛漸實。血液堅凝。轉成形體。故不滑。此妊娠五月之脈也。

胎孕脈訣

崔紫虛曰。陰搏于下。陽別于上。血氣和調。有子之象。手之少陰。其脈動甚。尺按不絕。此爲有孕。少陰屬心。心主血脈。腎爲胞門。脈應于尺。或寸脈微。關滑尺數。往來流利。如雀之啄。或診三部。浮沉一止。或平而虛。當問月水。婦人有病而無邪脈。此孕非病。所以不月。

女科經綸

卷二

嗣育門

三

燕貽堂

慎齋按。已上六條。亭婦人胎孕之脈也。內經平人氣象論云。婦人手少陰脈動甚者。姙子。又陰陽別論云。陰搏陽別。謂之有子。此兩語。原兼心與腎。三經並論也。手少陰主心。心生血。婦人以血養胎。故血旺則易孕。始受胎時。精與血凝聚不散。故心脈厥厥而動也。陰搏者。太僕註。尺中也。尺脈搏。手搏。卽動甚之義。是少陰屬腎。腎主精。女子以繫胞。而子宮在焉。精射胞門。則子宮之氣。暴血細結。故應手而搏。擊于陽脈之上。內經原兩明其義。自全元起。改手少陰爲足少陰。後人遂有議太僕註。手少陰之誤。有從全本。不從王本之說。豈知王註。

陰搏之陰。謂尺中。則知心與腎原兼診之。而姙孕可推也。予初讀內經。頗惑此句。爲難解。必經文兩句合看。始明。今得仲甫碩甫二論。更瞭如也。因附辨之。

辨男女以左右之脈

王叔和曰。婦人妊娠四月。欲知男女法。左疾爲男。右疾爲女。俱疾爲生二子。又曰。左脈尺內偏大爲男。右尺內偏大爲女。左右俱大。產二子。大者如實狀也。卽陰搏陽別之義。尺脈實大。與寸脈殊別。但分男左女右也。又曰。左脈沉實爲男。右脈浮大爲女。辨男女以左右陰陽虛實論。

女科經綸

卷二

嗣育門

夫

燕貽堂

張景岳曰。以左右分陰陽。則左爲陽。右爲陰。以尺寸分陰陽。則寸爲陽。尺爲陰。以脈體分陰陽。則鼓搏沉實爲陽。虛弱浮澁爲陰。諸陽實者爲男。諸陰虛者爲女。庶爲一定之論。

辨男女以左右氣血論

寒全善曰。按丹溪云。男受胎在左子宮。女受胎在右子宮。推之于脈。其義亦然。始胎在左。則氣血護胎而盛于左。故脈亦從之。而左疾爲男。左大爲男也。胎在右。則氣血護胎而盛于右。故脈亦從之。而右疾爲女。右大爲女也。亦猶經云。陰搏陽別。謂之有子。言受胎處。臍腹之下。氣血護胎。而盛于下。故陰之尺脈。鼓搏。

有力與陽之司脈殊別也

慎齋按難經云腎有兩左為腎右為命門命門男子藏精女子繫胞則知命門即胞門而子宮屬焉腎有左右之分而子宮無左右之分今丹溪云男受胎在左子宮女受胎在右子宮是婦人胞門有兩子宮矣甚為鑿空無據今全善以丹溪之言為證但云氣血護胎而盛于左則為男氣血護胎而盛于右則為女乃可若云盛于左子宮為男盛于右子宮為女猶為附會之謬假如婦人有品胎駢胎則子宮亦有乘乘耶

辨男女以左右之疾勝

女科經綸

卷二

嗣育門

五

燕貽堂

潘頌甫曰舉要云男女之別以左右取左疾為男右疾為女沉實在左浮大在右左男右女可以預剖蓋左脈疾勝于右是為男孕以男屬陽居左胎氣鍾于陽故左勝右脈疾勝于左是為女孕以女屬陰居右胎氣鍾于陰故右勝也又更視其腹如箕為女胎腹如釜為男胎蓋男女孕于胞中女而母腹則足膝抵腹下大上小故如箕男而背母則背脊抵腹其形正員故如釜也又胎有男女則成有遲速男動在三月陽性早也女動在五月陰性遲也

辨劉王論男女脈法之同

楊仁齋曰叔和以左手太陽浮大為男右手太陽沉細為女元實以右手浮大為女左手沉實為男較是二說不無抵牾然即脈經本旨而詳之又有若異而實同者經曰左手沉實為男右手浮大為女又曰左右手俱浮大者生二女俱沉實者生二男元實之所主者此也經曰左手尺中浮大者男右手尺中沉細者女又曰尺脈俱浮淫二男尺脈俱沉產二女叔和之所主者此也何者沉細之說與沉實之義不同右尺浮大之說與右手浮大亦異欲知男女之法大抵沉實者為男沉細者為女右尺浮大者固知其女左尺浮大者大抵皆男沉細為女沉實為男

女科經綸

卷二

嗣育門

五

燕貽堂

即所謂諸陽為男諸陰為女是也左尺浮大為男右尺浮大為女即所謂左疾為男右疾為女是也元實言其詳蓋合左右兩手而別陰陽叔和言其略特不過脈經論尺脈之義尚何有異同之辨哉

慎齋按已上五條序辨男女之脈也男女之脈自叔和而下紛紛聚訟益為支離即明如丹溪而以左右子宮分男女更有以左大順男右大順女此左右以醫者為言猶屬不解前條惟景岳頌甫二說為得其正也

女科經綸卷二

楊李蕭 壘廣六纂著 弟幾仔臨

張 崑嶺嶺 郭士升天階 沈 衍孟嘉

姚 安詰符 薛 尚伙弓 全恭訂

王 朝翼如 祝鄭芳斐卿 葉大年蒼臣

胎前證

妊娠惡阻有絕之之法

女科經綸

卷三

惡阻

一

燕胎集

金匱要略曰婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名
妊娠于法六十日當有此證設有醫者治逆却一月加吐下者
則絕之。

婁全善曰惡阻者謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也絕之者
謂絕止醫治候其自安也予嘗治一二妊婦惡阻病嘔吐愈
治愈逆因思仲景絕之之旨遂停藥月餘自安其大哉聖人
之言也。
徐忠可曰期有未滿六十日則胎未成又加吐利因醫誤治
則脾胃實有受傷處但當斷絕病根為主不得泥安胎之說。

而狐疑致悞也故曰絕之

妊娠惡阻屬經血閉塞胎氣不宜

巢元方曰妊娠惡阻者心中憤悶頭眩四肢懈墮惡聞食氣欲
酸鹹酸果實多睡少起世言惡食又云惡阻是也三四月以上
不自勝舉此由婦人本元虛弱血氣不足腎氣又弱兼當風飲
冷心下有痰水挾之娠後經血閉塞水漬于臟胎氣不宜故心
煩憤悶氣逆嘔吐血脈不通經絡痞澁則四肢沉重挾風則頭
目眩又不知慮之所在脈理和平即是有胎也

妊娠惡阻屬五味不化中氣壅實

女科經綸

卷三

惡阻

二

燕胎集

聖濟總錄曰婦人所食穀味化為血氣下為月水凡妊娠之初
月水乍聚一月為媒二月為胚三月為胎成則男女上食于母
口如鼻在膜胚之時血氣未用五味不化中氣壅實所以脾胃
不思穀味聞見于物即惡心有阻也

妊娠惡阻屬氣血積聚內鬱攻胃

朱丹溪曰凡孕二三月間嘔逆不食或心煩悶此乃氣血積聚
以養胎元精血內鬱穢腐之氣上攻于胃是以嘔逆不能納食
血既養胎心失所榮是以心虛煩悶法當調血散鬱用麥木甘
草補中氣橘紅紫蘇木香生薑散鬱氣茯苓冬黃芩竹茹清

熱解煩名參橘飲

。 娠惡阻屬胃氣虛弱中脘停痰

陳良甫曰、娠惡阻病、產寶謂之子病、巢氏病源謂之惡阻、由胃氣怯弱、中脘停痰、脈息和順、但肢體沉重、頭眩、擇食、惟嗜酸鹹、甚者寒熱嘔吐、胸膈煩悶、半夏茯苓丸主之。

。 娠惡阻屬痰飲血壅停滯肝經

戴復庵曰、惡阻者、婦人有孕、惡心阻其飲食是也、胎前惡阻、見食嘔吐、喜酸物、多臥少起、俗名病兒、蓋其人宿有痰飲、血壅遏而不行、故飲隨氣上停滯、肝經肝之味酸、則必喜酸酸物、金剋

女科經綸 卷三 惡阻 三 燕貽堂

木以辛勝之、小半夏茯苓湯或二陳湯

。 娠嘔吐屬于寒

金匱要略曰、娠嘔吐不止、乾薑人參半夏丸主之。

徐忠可曰、諸嘔吐酸皆屬于火、此言胃氣不清、暫作嘔吐也。

若娠嘔吐不止、則因寒而吐、上出為嘔、不止則虛矣、故以

半夏治嘔、乾薑治寒、人參補虛、而以生薑糊半夏、以下其所

逆之氣

。 娠嘔吐惡阻勿作寒治

大全曰、婦人經候不調、或不行、身無病似病、脈滑大、而六脈俱

勻、是孕婦脈也、精神如故、惡聞食氣、或但嗜一物、或大吐、或時吐清水、此名惡阻、勿作寒病治之、宜服人參、白朮、甘草、香附、烏藥、丁香、生薑、橘紅、保生湯。

按、娠嘔吐、金匱主于寒、大全論勿作寒治、是矣、其用藥、則多辛熱何也。

。 娠嘔吐屬肝挾衝脈之火衝上

羅太無曰、有孕婦三月、嘔吐痰、并飲食、每寅卯時作、時覺少腹有氣上衝、然後膈滿而吐、此肝脈挾衝脈之火衝上也、用沉香磨水化抱龍丸一服、膈寬、氣不上吐止。

女科經綸 卷三 惡阻 四 燕貽堂

。 娠嘔吐屬怒氣傷肝

朱丹溪曰、有娠二月、嘔吐眩暈、脈之左弦而弱、此惡阻、因怒氣所激、肝氣傷、又挾胎氣上逆、參朮補之、大非所宜、以茯苓半夏湯下抑青丸。

。 娠嘔吐惡阻屬少陽之火上衝胃口

趙養葵曰、惡阻多在三四五月之時、相火化胎之候、壯火食氣、上衝胃口、食入即嘔吐、少陰腎水既養胎、少陽之火益熾、須用清肝滋腎湯、即六味飲、加柴胡、白芍、先用逍遙散、止嘔、再用調經滋腎湯、加吐續、嘔甚者加川連、吳茱、妙。

胎前惡阻嘔吐用半夏論

陳良甫曰千金方有半夏茯苓湯。茯苓丸專治惡阻。此二方比來少有服者。以半夏能動胎。胎初結慮其辛燥易散故也。須薑汁炒以制毒。凡惡阻非半夏不能止。是有故無殞也。

婁全善曰。大千方謂半夏動胎不用。今觀仲景用人參半夏乾薑丸。羅謙甫用半夏茯苓湯。朱丹溪用二陳加減。並治胎前惡阻痰逆嘔吐心煩頭眩惡食俱効。獨不知此乎。予治惡阻用之未嘗動胎。正經云有故無殞是也。

薛立齋曰。半夏乃健脾氣化痰滯主藥。脾胃虛弱嘔吐或痰涎壅滯飲食少胎不安。必用半夏茯苓湯。倍加白朮。安胎健脾胃。予嘗用驗也。

女科經綸

卷三

惡阻

五

燕胎堂

惡阻嘔吐用藥大法

薛立齋曰。妊娠若飲食不甘或欲嘔吐。用六君子加紫蘇枳殼。若惡阻嘔吐頭眩體倦。用參橘飲。未應用六君子湯。若惡阻嘔吐不食。亦用參橘散。或飲食停滯腹脹嘔吐。此是脾胃虛弱不能消化。用六君子湯不應。用平胃散加參苓。

慎齋按。已上一十三條。序胎前有惡阻嘔吐之證也。凡婦人妊孕其始。證先見于惡阻。而惡阻自金匱有絕之法而下病。

機。蓋非一端。巢元方以下。主于氣。疑血。聚。陳良甫以下。主于停痰積飲。若仲景金匱以寒治太無養。莫作火論于惡阻。病機可謂詳悉。但胎前無寒。產後無熱。此常法也。故惡阻嘔吐。大抵寒者少熱者多。總屬血壅胎元。臟氣不能宣通。停痰積飲。鬱熱壅滯。變而為火。有熱無寒。致生諸證。故丹溪立齋論治。每以枳殼紫蘇蘇梗木香砂仁為降氣順氣之法。所謂胎前須順氣者此也。

妊娠子煩屬君相二火

陳良甫曰。妊娠煩悶者。以四月受少陰君火以養精。六月受少

女科經綸

卷三

子煩

六

燕胎堂

陽相火以養氣。若母心驚膽虛。多有是證。

李太素曰。煩者心中煩亂不安也。由受胎後血熱干心。心氣不清。故人鬱悶。捺亂不寧。因妊娠而煩。故曰子煩。非子在腹中煩也。古云。四月受少陰君火以養精。六月受少陽相火以養氣。故煩多屬火。今胎受君相之火。豈有母煩之理。況母既以二火養胎。則火瀉矣。又何煩之有。若曰母虛而煩。則當每月皆然。何獨于四月六月而虛且煩。亦不拘于四月六月也。似說不通。

○ 妊娠子煩屬于熱

齊仲甫曰、妊娠煩悶有四證、有心中煩、胸中煩、有子煩、諸屬于熱、若臟虛而熱氣乘心、令人煩者、名虛煩、若積痰飲、嘔吐痰沫者、名胸中煩、或血積停飲、寒熱相搏、致胎氣不安、謂子煩、用犀角散竹瀝湯之類、

。 妊娠子煩屬心肺虛熱痰積于胸

單養賢曰、是心肺虛熱、或痰積于胸、若三月而煩者、但熱而已、若痰飲而煩者、吐涎惡食、煩躁不安也、大凡妊娠既停痰積飲、又寒熱相搏、氣鬱不舒、或煩躁、或嘔吐涎沫、劇則胎動不安、均為子煩也、

文科經綸

卷三

子煩

七

燕貽堂

。 妊娠子煩屬胎元壅鬱熱氣上衝

朱丹溪曰、子煩由胎元壅鬱熱氣上衝、以致煩悶、法當清熱疎鬱、以安胎、犀角散主之、

。 妊娠子煩分證用藥之法

薛立齋曰、前證若因內熱、用竹葉湯、氣滯用紫蘇飲、痰滯用二陳、加條芩枳殼、氣鬱用分氣飲、加川芎、脾胃虛弱用六君子、加紫蘇、山梔、

。 妊娠煩躁屬熱乘心脾津液枯燥

陳良甫曰、妊娠煩躁口乾者、足太陰脾經、其氣通于口、手少陰

心經、其氣通于舌、若臟腑氣虛、榮衛不和、致陰陽隔絕、熱乘心脾、津液枯燥、故心煩口燥、與子煩大同小異、宜知母丸、

。 妊娠煩躁口乾用藥之法

薛立齋曰、前證若胃經實火、用竹葉石膏湯、若胃經虛熱、用人參黃芪散、若胃經氣虛、用補中湯、若肺經虛熱、用紫蘇飲、若肝經火動、用加味道遙散、若脾氣鬱結、用加味歸脾湯、若腎經火動、用加味地黃丸、

。 妊娠暴渴為血凝病

大全曰、有孕婦暴渴、惟飲五味汁、名醫歌、診其脈曰、此血欲凝、非疾也、已而果孕、然古方有血欲凝而渴、飲五味之證、不可不知、

文科經綸

卷三

子煩

八

燕貽堂

慎齋按、已上九條、序胎前有子煩、煩躁口乾、血渴之證也、妊娠煩躁、本屬肺腎二經、有火、仲景云、火入于肺、則煩、入于腎、

則躁、胎繫于腎、腎水養其胎、元則元氣弱、不足以滋腎中之火、火上燥肺、肺受火刑、變為煩躁、此金虧水涸之候、法當滋其化源、清金保肺、壯水滋腎、為主、良甫以君相二火論子煩、產實以停痰積飲論子煩、未悉病機之要、若丹溪以子煩為氣血壅聚、胎元熱氣上衝為病、亦是大概言之耳、

妊娠子懸屬胎熱上衝

陳良甫曰。妊娠至四五月來。君相二火養胎。平素有熱。故胎熱。氣逆上。湊心胸。脹滿痞悶。名曰子懸。法當補氣血。疎壅滯。用嚴氏紫蘇飲。加山梔條芩之類。紫蘇陳皮和氣。大腹斂氣。寬中。芎歸參芍養血補氣。甘草緩急。加生薑葱白名產寶方。

。妊娠子懸屬濁氣舉胎上湊

何松庵曰。本事方云。紫蘇飲治妊娠胎氣不和。懷胎近上。脹滿疼痛。名子懸。子懸者。濁氣舉胎上湊也。胎熱氣逆。心胃脹滿。此證挾氣者居多。疎氣舒鬱。非紫蘇腹皮川芎陳皮無以流氣。非

女科經綸

卷三

子懸

九

燕胎堂

歸芍無以養血。氣血既利。而胎自降。然邪之所湊。其人必虛。故以人參甘草補之。

妊娠子懸屬寒冷與氣相爭

陳良甫曰。妊娠心腹脹滿者。由腹內素有寒氣。致令停飲與氣相爭。故令心腹脹滿也。

妊娠子懸屬命門火衰腹寒就暖

趙養葵曰。有胎從心腹湊上者。名曰子懸。此命門火衰。胎在腹中寒冷。不得已上就心火之溫暖。須理中湯。不應八味丸作湯。慎齋按。已上四條。序胎前心腹脹滿。有子懸之證也。胎氣上

通心胸。正以氣血壅鬱。胎元鬱久則熱。故良甫主于胎熱氣逆。松庵主于濁氣舉胎。是以火熱立論。為當若大全以寒氣冷飲養葵以命門火衰論子懸。證必以人之壯弱。脈之遲數。為憑。如稟厚質壯。脈來洪數。而心腹脹滿者。此子懸之屬火熱為病也。如脾胃素虛。脈來遲細。而心腹脹滿者。此子懸之屬虛寒為患也。則百不失一矣。

慎齋按。命門為男子藏精。女子繫胞之所。胎孕受于命門。命門之火。即是元氣。養胎故有日長之勢。譬如果實生于春而結于夏。夏月熱盛。則果實漸長。至秋冬肅煞。則果實黃隕。而

女科經綸

卷三

子懸

十

燕胎堂

落胎在母腹。若命門火衰。勢必墮殞。豈有上就心火。而為子懸之證。至云不得已三字。尤屬可嗤。若必以桂附八味丸治子懸。夫桂附為墮胎藥。恐火未必益。而胎反可虞。明者辨之。妊娠子滿屬胎中水血相搏。

陳良甫曰。凡妊娠無使氣極。若心靜氣和。則胎氣安穩。若中風寒邪氣。及有觸犯。則隨邪生病。如妊娠經血壅閉。養胎忽然虛腫。是胎中挾水。水血相搏。脾胃惡濕。主身之肌肉濕漬。氣弱則肌肉虛。水氣流溢。故令身腫滿。然其由或因泄流不痢。臟腑虛滑。耗損脾胃。或因寒熱瘧疾。煩渴引飲太過。濕漬脾胃。皆使頭

面手足浮腫。然水清于胞。兒未成形。則胎多損壞。

。 娠子滿屬脾虛停水

齊仲甫曰。娠以經血養胎。或挾水氣。水血相搏。以致體腫。皆由脾胃虛而臟腑之間。宿有停水。所挾謂之子滿。若水停不去。浸漬其胎。則令胎壞。如脈浮腹滿兼喘者。胎未壞也。

。 娠浮腫屬脾胃氣虛經血壅閉

聖濟總錄曰。脾候肌肉。土氣和則能制水。水自傳化。無有停積。若娠。脾胃氣虛。經血壅閉。則水飲不化。濕氣淫溢。外攻形體。內注胞胎。懷妊之始。腫滿必傷胎氣。如臨月而脚微腫。利其小

便病自愈。

女科經綸

卷三

子滿

十一

燕貽堂

。 娠子滿屬脾虛有濕清濁不分

何松庵曰。娠三月後。腫滿如水氣者。俗呼為琉璃胎。是也。古方一主于濕。大率脾虛者多。脾虛不運。則清濁不分。須以補脾兼分利。若夜腫日消。是血虛宜健脾兼養血主之。

。 娠胎水屬胞中畜水

陳良甫曰。婦人胎孕至五六個月。腹大異常。胸腹脹滿。手足面目浮腫。氣逆不安。此由胞中畜水。名曰胎水。不早治。生子手足軟短。有疾。或胎死腹中。用千金鯉魚湯治其水。

。 娠胎水屬氣壅成濕

陳良甫曰。胎氣壅塞成濕。致身體脇腹浮腫。喘急氣促。小便澀法當疎壅。氣行水濕。澤瀉散主之。

濟陰綱目。按子滿在五六個月以後。比子氣與子腫不全。蓋胎大則腹滿。滿則氣浮。遍身腫。邪無所挾。但一瀉氣利水。則愈。 娠有水氣

金匱要略曰。娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起即頭眩。葵子茯苓散主之。

徐忠可曰。有水氣者。雖未大腫脹。經脈中之水道。已不利。衛氣挾水。不能條暢。則周身之氣。為水滯。故身重。水已通調。而順行。逆則小便不利矣。惡寒者。衛氣不行也。頭眩者。內有水氣。厥陽之火。逆陰氣而上蒸。則所見皆眩矣。

女科經綸

卷三

子滿

十一

燕貽堂

。 娠浮腫脹滿分證用藥之法

薛立齋曰。前證若胸滿腹脹。小便不通。遍身浮腫。千金鯉魚湯。脾胃虛弱。佐以四君子。若面目虛浮。肢體如水氣。全生白朮散。未應。六君子湯。若脾虛濕熱。下部作腫。補中湯。加茯苓。若飲食失節。嘔吐泄瀉。六君子湯。若腿足發腫。喘悶不寧。或指縫出水。天仙藤散。若脾肺氣滯。加味歸脾湯。佐加味逍遙散。

慎齋按已上八條。序胎前腫脹。有子滿之證也。子滿有水血相搏。有停水受濕。有經血壅閉。有清濁不分。總因脾土虛不能制水所致。故立齋治法。不外健脾滲濕順氣安胎為主。若濟陰云。但一瀉氣利水。則愈。此謬論也。必兼立齋用藥。乃為求本之要。至良甫以下三條。雖有胎水之名。其因實與子滿異名同證也。

妊娠脚腫名子氣屬衝任有血風

產乳集曰。妊娠自三月成胎後。兩足自脚面漸腫。行步艱難。以至喘悶。飲食不美。似水氣狀。脚指間有黃水出者。謂之子氣直

女科經綸 卷三 子氣 燕胎室

至分婉方消。此由婦人素有風氣。或衝任經有血風。未可妄投湯藥。亦慮將產之際。有不測之憂。故不可不治于未產之前也。

妊娠脚腫屬風寒濕冷

陳無擇曰。凡婦人宿有風寒濕冷。妊娠多脚腫。俗呼為破朋脚。

妊娠脚腫屬脾衰血化成水

陳良甫曰。妊娠兩脚浮腫。名曰脆脚。因脾衰不能制水。血化成水所致。全生白朮散主之。

妊娠脛腫屬中氣壅鬱

朱丹溪曰。妊娠兩足脛腫至膝。甚則足指間出水。此由中氣聚

養胎元壅鬱不得升發。法當疎鬱滯。天仙藤散主之。

妊娠脚腫屬脾經養胎病

何松庵曰。孕婦六七月間。兩足浮腫。足太陰脾經養胎也。脾主四肢。此時胎已墜下。故腫見于兩足。分娩後即愈。

妊娠脚腫不可作水治傷真氣

齊仲甫曰。妊娠脚腫。非水氣也。至八九月。脛及腿俱腫。不可以水病治之。反傷真氣。有此者。必易產。因胞臟中水血俱多。不致燥胎故也。若初妊即腫者。是水氣過多。見未成體。則胎必壞。

妊娠脚腫主男胎之驗

女科經綸 卷三 痛 燕胎室

名醫錄曰。宋少主與徐文伯微行。學鍼法。文伯見一妊婦足腫不能行。少主脈之曰。此女形也。文伯診之曰。此男胎也。在左則胎黑色。少主怒欲破之。文伯惻然曰。臣請針之。胎遂墮。男形而色黑。此妊娠足腫之說也。

齊陰綱目按子腫與子氣相類。然子氣在下。體子腫在頭面。

若子滿大都在五六月已後。比子氣與子腫不同。若胎大則腹滿。滿則氣遍身浮腫也。

慎齋按已上九條。序胎前有子氣脚腫之證也。妊娠有遍身胸腹頭面四肢浮腫者。曰子滿。有止兩足脛腫漸至腿膝者。

日子氣。子氣即子腫也。要皆本于脾虛中氣不運。以致水滲濕熱之氣。浸漬肌肉。流溢四肢。此大全以下三論為見本之治。若產乳三因。是兼外邪論矣。

妊娠腹痛屬子臍寒

金匱要略曰。婦人懷妊六七月。脈弦發熱。其胎愈脹。腹痛惡寒者。少腹如扇。所以然者。子臍開故也。當以附子湯溫其臍。

徐忠可曰。六七月胃肺養胎而氣為寒所滯。故胎愈脹。寒在內。腹痛惡寒。然惡寒有屬表者。此連腹痛。則知寒傷內矣。少腹如扇。陣陣作冷。若或扇之。此狀惡寒之異也。且獨在少腹。

女科經論

卷三

腹痛

五

燕貽堂

因子臍受寒不能合。故少腹獨甚。開者不斂也。子臍即子宮。附子能入腎溫下焦。故宜附子湯溫其經。

妊娠心腹痛屬宿冷風寒

大全曰。妊娠心腹痛。或宿有冷疼。或新觸風寒。皆因臍虛而致發動也。邪正相擊。而併于氣。隨氣上下。上衝于心。則心痛。下攻于腹。則腹痛。妊娠痛邪正二氣。交攻于內。若不差。痛衝胞胎。必致動胎。甚則傷墮。

妊娠心腹痛屬痰飲與臍氣相搏

陳良甫曰。妊娠心腹痛。多是風寒濕冷。痰飲與臍氣相擊。故

令腹痛攻不已。則致胎動。

妊娠胸膈刺痛屬忿怒憂思

大全曰。妊娠四五月後。每常胸膈間氣刺滿痛。或腸鳴。以致嘔逆減食。此由忿怒憂思過度。飲食失節所致。蔡元度龍人有子。夫人怒欲逐之。遂成此病。醫官王師復處以木香散。莪朮木香丁香甘草鹽湯下三服而愈。

方約之按此方所言。婦人忿怒憂思過度。以致胸膈間氣刺滿痛。此言良是。蓋婦人上有舅姑丈夫事觸物件。不能自決。憂思忿怒沉鬱于中。故丹溪云。氣鬱便是火。火載胎上。榮衛

女科經論

卷三

腹痛

六

燕貽堂

不通。則心腹間脹滿痛作矣。慎齋按。已上四條。序胎前腹痛。有風寒客邪。痰飲七情。為有餘之病也。

妊娠腹痛屬胞阻

金匱要略曰。假令妊娠腹中痛。為胞阻。膠艾湯主之。徐忠可按胞阻者。阻其欲行之血。而氣不相順也。四物湯養陰補血。血安行必挾風。而為痰濁。膠以驢皮為主。能去風以濟水煎成。能澄濁。艾性溫而善行。能導血歸經。甘草和之。使四物不偏于陰。此三味之力也。

○ 妊娠腹痛屬脾胃氣虛

薛立齋曰胎或作脹或腹作痛此是脾胃氣虛不能承載用安胎飲加升麻白朮不應用補中湯

○ 妊娠腹痛屬血虛

金匱要略曰婦人懷胎腹中疝痛當歸芍藥散主之又婦人腹中痛小建中湯主之

○ 妊娠胎痛用地黃當歸湯倍熟地

劉宗厚曰潔古地黃當歸湯治婦人有孕胎痛胎痛丹溪以血虛治之故四物去川芎倍加熟地此心法也

女科經綸

卷三

腹痛

七

燕貽堂

薛立齋按妊娠腹中不時作痛或小腹重墜名胎痛用當歸地黃湯即內補丸不應加參朮陳皮或因脾胃氣虛四君加歸地

慎齋按已上四條序胎前腹痛有氣阻氣虛血虛為不足病也胎有脾胃氣虛而腹痛者用補氣調氣之法有陰虧血虛而腹痛者用補血溫經之法與前條風寒痰飲之證迥別臨證審之

妊娠頓仆胎傷腹痛用藥之法

薛立齋曰頓仆胎動腹痛下血用膠艾湯未應用八珍湯加膠

艾若頓仆胎傷下血腹痛用佛手散未應八珍湯下知母丸

胎動不安腹痛辨男女生死之法

王叔和曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不動欲知生死令人摸之如覆杯者男如肘顛參差起者女也冷者為死溫者為生

慎齋按已上二條序胎前腹痛有頓仆傷胎而胎動不安致有腹痛之證此非不內外因一辨用藥治法一辨生死之法也

妊娠心痛屬風邪痰飲

女科經綸

卷三

心痛

六

燕貽堂

大全曰妊娠心痛乃風邪痰飲交結傷心支絡乍安乍作若傷子臟則胎動而血下

慎齋按已上一條序胎前有心痛之證也心痛不止風邪痰飲為外感有餘病妊娠心氣虛而血少亦足致此大全論不過舉其一端耳

妊娠腰痛屬風冷乘虛

大全曰腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之腰痛不止多動胎氣婦人腎以繫胞妊娠腰痛甚則胎墮故妊娠腰痛最為緊要若閃挫氣不行腰痛者通氣散腎虛者青娥不老丸總

以固胎為

以固胎為

汪石山曰有婦人懷娠八月嘗病腰痛不能轉側大便燥結醫用人參等補劑痛益加用硝黃通利之藥燥結雖行而痛如故診之脈稍洪近駛曰此血熱血滯也宜四物加木香乳沒黃柏火麻仁五貼痛減燥結潤復加發熱面赤或時惡寒前方去乳沒加柴岑二帖寒熱除而腰痛復作此血已利矣前方加入參服之安

。 娠腰痛有勞力房事之分

女科經綸 卷三 腰痛 九 燕貽堂

何松庵曰腰者腎之腑足少陰之所留注。 娠腰痛多屬勞力蓋胞繫于腎勞力任重致傷胞繫則腰必痛甚則胞繫欲脫多至小產宜安胎為主胎安而痛自愈若素享安逸而腰痛必房事不節致傷胞繫也若脈緩過天陰或久坐而痛者濕熱也腰重如帶物而冷者寒濕也脈大而痛不已者腎虛也脈濇而日輕夜重者氣血凝滯也脈浮者為風邪所乘脈實者閉挫也若臨月腰痛胞欲脫腎將產之候也

。 娠腰痛分證用藥之法

薛立齋曰前證若外邪所傷用獨活寄生湯勞傷血氣八珍湯

加杜仲砂仁膠艾脾腎不足前藥內加白朮骨脂氣血鬱滯紫蘇飲加枳桔肝火動小柴胡湯加白朮枳殼山梔肝脾鬱結歸脾湯加柴胡枳殼

慎齋按已上四條序胎前有腰痛之證也。 娠腰痛有外感有內傷。 大全主于風冷石山主于血滯此客邪有餘病也。 正宗以勞力房事論。 娠腰痛則又悉病機之要矣。

。 娠小腹痛屬風寒相搏

。 娠小腹痛屬風寒相搏

。 娠小腹痛屬風寒相搏

。 娠小腹痛屬風寒相搏

。 娠小腹痛屬風寒相搏

。 娠小腹痛屬風寒相搏

。 娠經來為激經屬陽微不足

王叔和曰婦人月經下但為微少師脈之反言有軀其後審然其脈何類師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按之則滑浮之則輕陽明少陰各如經法身反洒淅不欲食頭痛心亂嘔吐呼則微數吸則不驚陽多氣溢陰滑氣盛滑則多實六經養成所以月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙妊二胎今陽

不足故令激經也

妊娠經來屬血盛有餘

嬰全善曰。妊娠經來不多。飲食精神如故。六脈和緩。滑大無病。者。血盛有餘也。兒大能飲。自下來矣。

慎齋按。已上二條。序胎前經來。有有餘不足之分也。胎前下血。則名漏胎。妊娠經來。則名激經。漏胎則無時而下。激經則有時而至。叔和主于陽微不足。全善主于血盛有餘。當以人稟之強弱參之。

妊娠胎漏下血為癥病

女科經綸

卷三

胎漏

三

燕窩堂

金匱要略曰。婦人宿有癥病。經斷未及三月。漏下不止。胎動在臍上者。為癥。癥害妊娠。六月動者。前三月經水利時。胎動下血者。後斷三月。經也。所以血不止者。其癥不去故也。當下其癥。桂枝茯苓丸主之。

徐忠可曰。婦人行經時。遇冷則血留而為癥。癥者有形可徵。然癥病。女人恒有。或不在子宮。則行經受胎。經斷即是孕矣。未及三月。將三月也。既孕而見血。謂之漏下。未及三月。漏下不止。則養胎之血傷。故胎動。假使胎在臍下。則直欲落矣。今在臍上。是每月湊集之新血。因癥氣相妨。而為漏下。實非胎

病故曰癥。癥害。癥者。宿疾也。害者。累之也。至六月胎動。此宜動之時。但較前三月。經水利時。胎動不血。則已斷血。三月不行。復血不止。是前之漏下。新血去而癥反堅。牢不去。故須下之。為安藥。用桂枝茯苓湯者。桂芍一陰一陽。茯苓丹皮。一氣一血。調其寒溫。扶其正氣。桃仁破惡血。消癥瘕。不嫌傷胎者。有病病當之也。且癥之初。必因于寒。桂能化氣。消其本寒。癥之成。必挾濕熱。為寒。茯苓清濕氣。丹皮清血熱。芍藥斂肝血。而扶脾。使能統血。養正。即所以去邪也。

妊娠胎漏下血屬榮經有風

女科經綸

卷三

胎漏

三

燕窩堂

產乳集曰。有妊婦。月信不絕。而胎不損。問產利。熊宗古。答曰。婦人血盛。氣衰。其人必肥。既娠。後月信常來。而胎不動。若便以漏胎治之。則胎必墮。若不作漏胎治。其胎未必墮。今推宗古之言。誠有自也。巢氏云。婦人經閉不利。別無所苦。是謂有子。以經血蓄之。養胎。壅為乳汁也。有子後。畜以養胎。矣。豈可復散動耶。所以然者。有妊而月信每至。亦未必因血盛也。婦人榮經有風。則經血喜動。以風勝故也。榮經既為風所勝。則所下者。非養胎之血。若作漏胎治。必服保養補胎藥。胎本不損。強以藥滋之。是實也。其胎終陰。宜矣。若醫者。知榮經有風之理。當以一藥治風。

經信可止或不服藥胎亦無恙然亦有胎本不固因房室不節先漏而後墮者須作漏胎治又不可不審也

按肝經有風致血得風而流散不歸經以一味防風丸若肝經有熱致血妄行條芩炒焦為末酒下

娠胎漏下血屬房室驚觸勞力毒食

產寶百問曰娠娠成形胎息未實或因房室驚觸勞力過度傷動胎或因食毒物致令子宮虛滑經血淋瀝若不急治敗血養心子母難保

娠胎漏下血屬衝任氣虛

女科經綸 卷三 胎漏 三 燕胎堂

陳良甫曰娠娠漏胎謂娠娠數月而經水時下也此由衝任脈虛不能約制手太陽少陰之經血故也衝任之脈為經絡之海起于胞內手太陽小腸脈手少陰心脈二經相為表裏上為乳汁下為月水有娠之人經水所以斷者壅之養胎也衝任氣虛則胞內泄不能制其經血故月水時下名胞漏血盡則斃又有因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有宿疾子臟為風冷所乘氣血失度使胎不安故令下血也 娠胎漏下血屬血熱脾虛不攝 朱丹溪曰胎漏多因于血熱然有氣虛血少者故良方論有下

血服涼血藥而下血益甚食少體倦此脾氣虛而不能攝血也

娠胎漏黃水屬肝脾病

大全曰娠娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛

薛立齋按前澄肝脾濕熱用升陽除濕湯若肝脾風熱加味逍遙散肝脾鬱怒加味歸脾陽脾胃氣虛錢氏白朮散老膠氣下陷補中湯肝經風熱防風黃芩丸風入陽胃用防風湯

娠胎漏下血分證用藥之法

薛立齋曰娠娠下血不止名胎淋血虛用二黃散血去多用八珍湯未應用補中湯若因事而動下血用枳殼湯加生熟地未

女科經綸 卷三 胎漏 三 燕胎堂

應或作痛更加當歸血不止八珍湯加膠艾若因怒氣用小柴胡湯若因風熱一味防風丸若因血熱一味子芩丸若脾氣虛弱六君子湯中氣下陷補中湯若氣血盛而下血者乃兒飲少也不必服藥 千金方治娠娠下血不止名曰漏胎血盡子死方用生地八兩清酒搗汁服之無時能多服佳 慎齋按已上七條序胎前有胎漏下血之證也娠娠胎漏金匱主于癥病痼害巢氏主于榮經有風是屬有餘客邪為病也若產寶以下大全丹溪主于氣虛血虛是屬內傷不足為病也觀立齋用藥一條已分有餘不足證治矣

妊娠尿血屬熱滲入脾

大全曰。妊娠勞傷經絡有熱。在內熱乘于血。血得熱則流溢。滲入于脾。故令尿血。

胎漏下血與妊娠尿血不同之辨

李氏曰。胎漏自人門下血。尿血自尿門下血。妊娠尿血屬胞熱者多。四物加山梔髮灰。又方。阿膠熟地。

慎齋按。已上二條。序胎前尿血之證也。尿血易混于胎漏。得

李氏一辨。已見分晰。但胎漏有無時頻出。尿血是熱入膀胱。本心經有火。移小腸。滲入膀胱。溺時則下。不溺則不下。即是

女科經綸

卷三

尿血

蓋

燕貽堂

小便溺血。但屬妊娠為異耳。

。妊娠小便淋屬腎虛膀胱熱

產寶百問曰。腎者作強之官。技巧出焉。與膀胱為表裏。男子藏

精。女子繫胞。妊娠小便淋者。腎虛而膀胱有熱也。腎虛不能制

水。則小便數。客熱勝膀胱。則水道澀。而數淋。瀉不宜。名曰子淋。地

膚子湯主之。

。妊娠小便澀。宜養血導鬱。

陳良甫曰。孕婦小便澀少。由氣血聚養胎元。不及敷榮。滲道。遂使膀胱鬱熱。法當養血以榮。滲道。利小便。使以導鬱。熱用歸芍調

血入參補氣。麥冬清肺。以滋腎水之源。滑石通草。利小便。以清

鬱滯。各安榮散。方內有滑石。乃重劑。恐致墮胎。若臨月極妙。如在七八月前。宜去此味。加石斛山梔。尤穩。

妊娠子淋須分二證

萬密齋曰。子淋之病。須分二證。一則妊母自病。一則子為母病。然妊母自病。又分二證。或服食辛熱。因生內熱者。或自汗自利。津液燥者。其子為母病。亦分二證。或胎氣熱壅者。或胎形迫塞者。證既不同。治亦有別。大抵熱則清之。燥則潤之。壅則通之。寒則行之。此治之之法也。

女科經綸

卷三

子淋

美

燕貽堂

妊娠淋瀝分經用藥之法

薛立齋曰。妊娠小便澀少。淋瀝。用安榮散。若肝經濕熱。用龍膽瀉肝湯。若肝經虛熱。用加味逍散。若服燥劑。而小便頻數。或不利用生地。茯苓。牛膝。黃柏。知母。苧歸。甘草。若頻數。而色黃。用四物。加知柏。五味。麥冬。元參。若肺氣虛。而短少。用補中湯。加山藥。麥冬。若熱結膀胱。而不利。用五淋散。若脾肺燥。不能生化。宜黃芩。清肺。飲若膀胱陰虛。陽無所生。用滋腎丸。若膀胱陽虛。陰無所化。用腎氣丸。

慎齋按。已上四條。序胎前有小便淋瀝之證也。淋有五。丹溪

一主于熱若妊娠淋病產寶良方以虛熱鬱熱屬之膀胱立
辨則又推原肝經有濕熱虛熱之別正以膀胱為藏溺之器
而出溺之竅則為足厥陰之部分故欲消膀胱之熱者必兼
疎厥陰之氣也

經論轉胞之證

甲乙經曰胞轉不得溺少腹滿關元主之又曰小便難水脹溺
出少胞轉曲骨主之

轉胞病為胞系了戾宜利小便

金遺要略曰婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也

女科經論

卷三

轉胞

毛

燕貽堂

師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則
愈宜腎氣丸主之

轉胞病屬飽食用力因合陰陽所致

聖濟總錄曰胞受水液氣不轉行則小腸滿脹或飽食用力或
因合陰陽令胞屈辟小便不下遂致胞轉其候水道不通小腸
急痛煩悶汗出氣逆奔迫甚至于死名曰胞轉宜速治之

轉胞病屬忍尿疾走飽食入房所致

楊仁齋曰有胞系轉戾不通不可不辨胞轉證候臍下急痛小
便不通凡強忍小便或尿急疾走或飽食忍尿或忍尿入房使

水氣上逆氣逼于胞故屈戾而不得舒張也胞落即殞

轉胞病屬強忍房事所致當治氣

王叔和曰轉胞小便非小腸膀胱厥陰受病蓋因強忍房事或
過忍小便以致此疾非利藥所能利法當治其氣則愈以沉香
木香湯主之

轉胞病屬飽食氣傷胎系

朱丹溪曰有婦妊孕九月轉胞小便不出下急脚腫不堪活診
脈右瀦左稍和此飽食氣傷胎系弱不能自舉而下墜壓着膀
胱偏在一邊氣急為其所閉故水竅不能出轉胞之病大率如

女科經論

卷三

轉胞

毛

燕貽堂

此方用參朮陳皮炙草歸芍半夏生薑補血養氣氣血既旺胎
系自舉則不下墜方有安之理頓飲之探喉令吐藥如是四服
小便通下皆黑水再服腹皮枳殼砂仁青葱二十劑以防產而
安

轉胞有四證所致宜舉其胎

朱丹溪曰轉胞病胎婦稟受弱者憂悶多者性急燥者食厚味
者大率有之古方皆用滑利疎導藥鮮有效因思胞為胎所壓
展在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起懸在中央胞系得疎水
道自行然胎之墜下必有其由也

轉胞病胎為熱所迫

徐春甫曰轉胞病由胎為熱所迫或忍小便俱令水氣迫于胎屈辟不得充暢外水應入不得入內液應出不得出內外壅滯脹滿不通故為轉胞其狀小腹急痛不得小便甚者致歎

○轉胞病屬血少氣多有飲

朱丹溪曰有妊婦患此脈之兩手似澀重取則弦此得之憂思澀為血少氣多弦為有飲血少則胞弱而不能自舉氣多有飲則中焦不清而隘胞胞知所避而就下故墜以四物加參朮半夏陳皮生薑空心飲之隨以指探吐藥汁少頃又與如是八帖

女科經綸

卷三

轉胞

无

燕貽堂

而安此法果為的確否恐偶中耳後有數人歷効未知果何如也

○轉胞病屬血氣虛弱不能上載其胎

朱丹溪曰有妊娠七八月小便不通百醫不能利轉急脹診之脈細弱此血氣虛弱不能上載其胎故胎重墜下壓住膀胱下口因此溺不得出若服補藥升扶胎起則自下因藥力未至愈加急滿遂令老婦用香油塗手自產戶托起其胎溺出如注服急頓解以大劑參芪服之三日後胎漸起小便如故

轉胞病屬中氣虛怯宜用升舉

趙養葵曰有妊婦轉胞不得小便由中氣虛怯不能舉胎胎壓其胞胞系了戾小便不通以補氣加升舉之藥令下竅通補中湯加減是也

轉胞與子淋有痛不痛兩證不全

證治要訣曰轉胞之說諸論有之以胎漸長且近下逼迫于胞胞為所逼而側故名轉胞胞即膀胱也然子淋與轉胞相類但小便頻數點滴而痛者為子淋頻數出少不痛者為轉胞間夜微痛終與子淋不同並宜生料五積散五苓散敬如可膠

慎齋按已上十二條序胎前有轉胞之證也妊娠轉胞甲乙

女科經綸

卷三

轉胞

手

燕貽堂

金匱二條是詳轉胞證候也而病機所屬則有虛實之分仁齋以下四條主下忍尿飽食房事胎熱此實邪為病也丹溪以下三條主于血少氣虛此不足為病也胎前轉胞大抵丙氣虛血少血少則胎無以養氣弱則胎不能舉因下墜而壓于膀胱胞為之轉而溺不出備觀丹溪所論雖有憂悶性躁厚味諸因其立方處治自探吐推托二法外惟以補氣補血為主故立齋云此證悉如丹溪治法為當推廣言之又以脾肺氣虛不能下輸膀胱者有氣熱鬱結膀胱津液不利者有金為火燥脾土濕熱甚而不利者當詳審施治也

卷三終

女科經綸卷四

樵李蕭 璵廣六纂著 男 銓律黃 全校

周茂英開吏

朱麟世遜庵 成 琰瓊荃 黃 銘素愚 全泰訂

禾郡 胡吉士祥甫 屠 堡衛公 朱 英雲拔

王 沈宋臣

胎前證下

經論妊娠舌瘡屬胞之絡脈絕

女科經綸 卷四 子瘡

素問曰人有重身九月而瘡此何為也曰胞之絡脈絕也曰何以言之曰胞絡者繫于腎少陰之脈腎繫舌本故不能言曰治之奈何曰無治也當十月復

妊娠不語名子瘡不須藥

大全曰孕婦不語非病也問有如此者不須服藥臨產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫者不說與人臨月以尋常藥服之產後能語以為醫之功豈其功也哉 博陵醫之神者曰郝翁士有一婦人妊暗嘿不能言郝曰見胎大經壅見生經行則言矣不可毒以藥

薛立齋曰內經窮理之言人有患此當調攝以需之不必驚畏而泛用藥也

娠娘子瘡以降心火清肺金為治

張子和曰婦人重身九月而瘡者是脾之絡脈不相接也經曰無治雖有此論可煎玉燭散二兩放冷入蜜少許時呷之則心火下降而肺金自清故能作聲也

娠娘子瘡治當補心腎

馬玄臺曰經云婦人重身九月而瘡者胞之絡脈絕也無治當十月復按論人之受孕一月肝經養胎二月膽經養胎三月心

女科經綸 卷四 子瘡

經養胎四月小腸經養胎五月脾經養胎六月胃經養胎七月肺經養胎八月大腸經養胎九月腎經養胎十月膀胱經養胎先陰經而後陽經始于木終于水以五行之相生言也然以理推之手足十二經之脈晝夜流行無間無日無時而不共養胎氣也必無分經養胎之理今日九月而瘡時至九月兒體已長胞絡宮之絡脈繫于腎經者阻絕不通故問有之蓋腎經之脈下貫于腎上繫舌本脈道阻絕則不能言故至十月分娩後自能言不必治治之當補心腎為宜大奇論以胞精不足者善言為死不言為生此可驗九月而瘡非胞精之不足故十月而復

也

張嶷按瘖謂有言而無聲。故經曰不能言。此不能二字非絕然不語之謂。凡人之音生于喉。喉發于舌本。因胎氣肥大。阻腎上行之經。以腎之脈入肺中。循喉嚨繫舌本。喉者肺之部。肺主聲音。其人切切私語。心生有言而人不能聽。故曰瘖。肺腎子母之臟。故云不必治。若大全解作不語。則為心病。以心主發聲為言也。與子瘖了不相干。若子和有降心火之說。玄臺有補心腎之言。如果腎之脈絡絕而上干心。則其病不治。豈有產後自復之理乎。故經云胞之絡脈絕。此絕字當作

女科經綸

卷四

子瘖

三

阻字解

慎齋按已上四條。序胎前有子瘖之證也。妊娠不語。遵內經之旨。固無治法。故大全而下。後人不敢強立方論。獨子和以降心火為治。玄臺以補心腎立法。則以胞之絡脈屬手足少陰二經故也。但產後不語。屬敗血之入心。中風舌瘖。屬痰涎之滯絡。則胎前子瘖。亦必有所感。更當詳證。參治以補張馬二公之未盡。若子瘖用玉燭散似屬無理。

薛立齋曰。按機要云。風本為熱。熱勝則風動。宜靜勝其燥。是養

女科經綸 卷四

血也。治法宜少汗。亦宜少下。多汗則虛衛。多下則損榮。雖有汗

下之戒。而有中腑中臟之分。中腑者多着四肢。則脈浮惡寒。拘急不仁。中臟者多着九竅。則唇緩失音。耳聾鼻塞。目瞽便秘。中腑者宜汗。中臟者宜下。表裏已和。宜治在經。當以大藥養之。妊娠患之。亦當以此施治。佐安胎之藥為主。勿過用治中風藥。

妊娠風痙為子癇屬體虛受風

陳長甫曰。妊娠體虛受風。傷足太陽經絡。復遇風寒相搏。則口禁背強。甚則腰反張。名曰痙。其候胃悶不識人。須臾自醒。良久復作。謂之風痙。一名子癇。

女科經綸

卷四

中風

四

子癇分諸證用藥之法

薛立齋曰。前證若心肝風熱。用鈞藤湯。肝脾血虛。加味道遙散。肝脾鬱怒。加味歸脾湯。氣逆痰滯。紫蘇飲。肝火風熱。鈞藤湯。鬱痰滯。二陳加竹瀝薑汁。

妊娠痙屬心肝二經風火相熾

薛立齋曰。痙者筋脈急而縮。痙者筋脈緩而伸。一伸一縮。手足相引。搐搦。此證多屬風。蓋風主搖動。駱龍吉云。心主脈。肝主筋。心屬火。肝屬木。火主熱。木主風。風火相熾。則為痙。治法若因風熱。鈞藤湯加梔柴芩木。以平肝木降心火。養氣血。若風痰上

五七三

湧加半夏南星竹瀝若風邪急搐加全蝎天虫若氣血虧損八珍湯加鈞藤山梔若無力抽搐戴眼反折汗出如油者肺絕也不治

慎齋按已上四條序胎前有中風證而風痙子痛痰癱其類及也中風證多因治法亦不一立齋以潔古一論為妊娠中風治法惟靜勝其燥養血為主斯為療胎前中風之要夫胎之賴以養者血也血虛則易于感邪血行風自滅丹溪于胎前惟清熱養血為主立齋祖之引機要一條為証論誠有不安矣

女科經綸

卷四

痰癱

五

慎齋再按胎前中風此正河間所謂將息失宜腎水衰而心火旺肝無所養是非外中風邪急當滋其化源瀉南補北壯水制火則肝木自平胎氣可安恐養血猶屬第二義也

妊娠感寒咳嗽為子嗽

陳自明曰肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之入射于肺則咳嗽夫五臟六腑俱受氣于肺各以其時感于寒而為病秋則肺受之冬則腎受之春則肺受之夏則心受之長夏則脾受之嗽不已則傳于腑妊娠而嗽謂之子嗽久嗽不已則傷胎。妊娠咳嗽屬肺燥鬱熱

朱丹溪曰胎前咳嗽由津血聚養胎元肺乏濡潤又兼鬱火上炎所致法當潤肺為主天冬湯主之

。妊娠咳嗽分證用藥之法

薛立齋曰前證若秋間風邪傷肺金沸草散夏間火邪剋金人參平肺散冬間寒邪傷肺人參敗毒散春間風邪傷肺參蘇飲若脾肺氣虛六君子加歸芎桔梗若血虛四物加桑皮杏仁桔梗腎火上炎六味九加五味脾胃氣虛為風寒所傷補中湯加桑皮杏仁桔梗蓋肺屬辛金生于巳土嗽久不已多因脾虛不能生肺氣腠理不密致外邪復感或因肺虛不能生水致陰火

女科經綸

卷四

子嗽

六

上炎治法當壯土生腎水以安胎為要

慎齋按已上三條序胎前有咳嗽證也咳嗽屬肺病大全主于外感寒邪丹溪主于內傷肺燥若立齋則分四時所感五臟均受有風寒火之不全外感內傷之各別雖不尚屬胎前咳嗽論而治法無殊總兼安胎為主也

。妊娠傷寒以清熱安胎為主

萬密齋曰妊娠傷寒專以清熱安胎為主或汗或下各隨五臟表裏所見脈證主治勿犯胎氣

妊娠傷寒不可犯胎

吳蒙齋曰。妊娠傷寒六經。治法皆同。但要安胎為主。凡藥中有犯胎者。不可用也。如霍香正氣散。十味芎蘇散。參蘇飲。小柴胡湯之類。有半夏能犯胎。如用。須去之。如桂附硝黃等藥。皆動胎。凡用。必須斟酌。大抵妊娠傷寒。各用湯劑。必加黃芩。白朮。能安胎。或與此二味煎湯與之。如妊婦素稟弱者。藥中四物佐之。不可缺。如用小柴胡。去半夏。加白朮。合四物湯用之。可以保胎除熱。其効如神。餘倣此用之。則妙矣。

慎齋按。白朮黃芩。為安胎之聖藥。此丹溪之妙論也。丹溪以胎前須清熱。故用黃芩。胎前須健脾燥濕。故用白朮。若妊娠

女科經綸

卷四

傷寒

七

傷寒為三陽經病。如頭痛惡寒發熱。白朮可濶用之乎。而謂其保胎除熱。是關門趕賊矣。

妊娠傷寒用六谷湯法

醫聖元戎曰。胎前病。惟當安胎順氣。若外感四氣。內傷七情。以成他病。治法與男子無異。當于各証類中求之。但胎前病。動胎之藥。切須詳審。當以四物湯加減六谷湯。

慎齋按。已上三條。序胎前有傷寒證也。傷寒六經傳變。婦人與男子無殊。惟妊婦患此。其用藥。汗下溫之中。當以保胎為主。其一切犯胎之藥。當酌之。不可云有故無殞。而毒藥亂投。

以致傷胎。天枉也。

。妊娠瘧疾。寒熱屬氣血虛損所致。

產寶百問曰。瘧者寒熱之疾。皆因于風寒也。風為陽邪。化氣而為熱。寒為陰邪。化氣而為寒。陰陽相反。邪正更作。或陰併于陽。則陰實陽虛。若陽併于陰。則陽實陰虛。或先傷于風。後傷于寒。則先熱後寒。或先傷于寒。後傷于風。則先寒後熱。作止有時。故名為瘧。經云。夏傷于暑。秋必病瘧。此因暑氣所傷也。若妊娠寒熱。皆因氣血虛損。風寒乘之。致陰陽并挾。寒熱互見。經云。陽微惡寒。陰弱發熱。此皆虛之所致。不因暑氣所作。若寒熱不已。熏

女科經綸

卷四

瘧疾

八

蒸其胎。胎必傷。人參羌活湯主之。

妊娠瘧疾用藥以安胎為主

何松庵曰。妊娠病瘧。寒熱俱作。氣為陽。陽虛則惡寒。血為陰。陰虛則發熱。蓋懷胎最怕寒戰。筋骨皆振。易動其胎。用藥者必以安胎為藥務。蓋脾胃虛弱。飲食停滯。或為暑邪所感。六君子加桔梗。蒼朮。藿香。若外邪多。飲食少。藿香正氣散。外邪少。飲食多。人參養胃湯。去半夏。熱多。寒少者。清脾飲。去半夏。虛者用四獸飲。四君子加陳皮。半夏。草果。大棗。若久不愈。六君子為主。佐以安胎藥。

妊娠卽瘧屬肝虛血燥

趙養葵曰有患胎瘧者一遇有胎瘧病卽發此人素有肝火遇有孕則水養胎元肝虛血燥寒熱往來似瘧非瘧也以逍遙散清肝火養肝血兼六味丸以滋化源

慎齋按已上三條序胎前有瘧疾證也妊娠瘧疾或有風寒暑熱之邪或有氣血虛損之候寒熱交作頷戰股慄百節振搖墮胎最易故古人用藥先以安胎爲急但邪不去則胎亦未必安故安胎莫先于去邪而去邪如常山草果檳榔厚朴麻桂大黃又未可投浪惟發表之中兼補氣清熱之中兼養

女科經綸 卷四 痢疾 九

血爲當耳

妊娠痢疾屬飲食生冷

陳良甫曰妊娠飲食生冷脾胃不能剋化致令心腹疼痛若血分病則色赤氣分病則色白血氣俱病則赤白相雜若熱乘大腸血虛受患則成血痢矣

妊娠痢疾屬相火上炎

壺仙翁曰有婦妊娠病痢不止診其脈虛而滑兩關若滿此由胎氣不和相火上炎而有熱似痢實非痢也用黃芩白朮以安胎四物生地以調血數劑而安

妊娠痢疾屬下元氣虛

薛立齋曰有婦妊娠久痢用消導理氣之劑腹內重墜胎氣不安又用阿膠艾葉之類不應此腹重墜下之氣虛也胎動不安內熱盛也用補中湯而安又用六君子湯全愈

妊娠下痢黃水屬脾虧氣陷

薛立齋曰妊娠下痢黃水乃脾土虧損真氣下陷也當升補中氣若黃而兼青乃肝木剋脾土宜平肝補脾若黃而兼白乃子令母虛須補脾肺若黃而兼黑是水反侮土必溫補脾腎若黃而兼赤乃心母益子但補中益湯若腸胃虛弱風邪客之用胃

女科經綸 卷四 痢疾 十

風瀉或脾氣不安急補脾胃自安凡安胎之藥當臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類

慎齋按已上四條序胎前有痢疾證也胎前痢亦有暑邪濕熱外感致病不可尚主飲食生冷爲患但妊娠痢疾本于脾胃不和因而氣血受病氣傷則白血傷則赤若守河間之法降氣後重自除行血便膿自止不知胎前之氣果可降乎氣降則胎下墜胎前之血果可行乎血行則胎必墮莫若多用木香以調氣多用當歸以養血此二藥乃爲胎前痢疾妙劑再以四物倍白朮黃芩丹溪所謂先托住正氣以固其胎而

後順氣和血。佐以消積導滯。此治妊痢之要法也。

娠霍亂屬飲食風冷

大全曰。飲食過度。觸胃風冷。陽陰不和。清濁相干。謂之霍亂。其間或先吐。或腹痛吐痢。是因於熱也。若頭痛體疼。發熱。是挾風邪也。若風折皮膚。則氣不宜通。風熱上衝。為頭痛。若風入腸胃。則泄痢嘔吐。甚則手足逆冷。此陽氣暴竭。謂之四逆。娠患之多。致傷胎。

立齋按前證。若因內傷飲食外感風寒。用藿香正氣散。若因飲食停滯。用平胃散。若果脾胃頓傷。陽氣虛寒。手足逆冷者。

女科經綸

卷四

霍亂

十一

須用溫補之劑。治當詳審。毋使動胎也。

娠霍亂吐利邪氣易傷胎元

萬密齋曰。霍亂者。陽明胃經之病名也。因平日五味肥醲。腐積成痰。七情鬱結。氣盛為火。停畜胃中。乍因寒熱之感。邪正交爭。陰陽相混。故令心腹絞痛。吐痢並作。揮霍變亂。如邪在上。胃脘則當心而痛。其吐多。邪在下。胃脘則當臍而痛。其利多。邪在中。脘其腹中痛。吐痢俱多。吐多則傷氣。利多則傷血。血氣受傷。不能護養其胎。邪氣鼓擊胎元。母未有不殞者。此危證不可不亟治。宜香蘇散。加藿香葉主之。

慎齋按。已上二條。序胎前有霍亂證也。娠霍亂吐利絞痛。最易傷胎。故胎前霍亂。宜辨飲食生冷。暑濕風寒。四氣之感。隨其邪之所湊。治之。而以保胎為主也。

娠泄瀉見證用藥治法

大全曰。娠泄瀉。或青或白。水穀不化。腹痛腸鳴。謂之洞泄。水穀不化。喜飲嘔逆。謂之協熱下利。並以五苓散利小便。次以黃連阿膠丸。或三黃熱艾湯以安之。若瀉黃有沫。腸鳴腹痛。脈沉緊數。用戊己丸和之。愛腐不食。胃脈沉緊。感應丸。下之後調和脾胃。若風冷水穀不化。如豆汁。用胃風湯。寒冷。臍下陰冷。洞泄。

女科經綸

卷四

泄瀉

三

用理中湯治中湯。伏暑煩渴瀉水。用四苓散。傷濕泄瀉。小便自利。用不換金正氣散。胃苓湯。此四證之大略也。

慎齋按。泄瀉之證。多因有內外之合邪。有虛實之不全。况胎前泄瀉。尤宜審因詳證。豈四證足以盡之乎。抑四證可執。定數方以施治乎。

娠泄瀉分因用藥之法

薛立齋曰。泄瀉若米食所傷。六君子加穀芽。麩食所傷。六君子加麥芽。肉食所傷。六君子加山查。若兼寒熱。作嘔。乃肝木侮脾。土六君子加柴胡。生薑。兼嘔吐腹痛。手足逆冷。乃寒水侮土。六

君子加薑桂不應錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢體倦急補中湯若泄瀉色黃乃脾土真色六君子加木香薑桂若瀉在五嘔不食腹痛惡寒乃脾血虛寒六君子加木香薑桂若瀉在五更侵晨飲食少食乃脾腎虛弱五更服四神丸日間服白朮散如不應或愈而復作或飲食少思急用八味丸補命門火以生脾土為善

慎齋按已上二條序胎前有泄瀉證也。妊娠泄瀉必原其由。大抵不外脾腎二臟虛者居多。夫血統于脾。血擁胎元。則脾陰虛而食不運化。水穀難消。而作瀉。胎繫于腎。腎氣弱。命門

文升經論

卷四

泄瀉

三

火衰胎竊其氣以擁護而腎間之陽不能上蒸脾土則為瀉。此妊娠泄瀉之由也。雖其間不無風寒暑濕之外感。飲食生冷之內傷。而屬于脾腎有虧者其本也。大至漫序四證為妊娠泄瀉大略已屬草率無理。立齋又以大概泄瀉證候分配其證用某藥為治。此膠柱鼓瑟。印定後人眼目。予不能無議者也。

妊娠傷食屬于飲食不節

大至曰。經云。飲食自倍。腸胃乃傷。又云。陰之所生。本在五味。陰之五官。傷在五味。若妊娠飲食不節。生冷毒物。恣性食啖。致傷

脾胃故妊娠傷食最難用藥。惟木香九白朮散二方最穩。

妊娠傷食分證用藥之法

薛立齋曰。東垣云。脾胃之氣壯則過時而不飢。多食而不傷。蓋胃主司納。脾主消化。五臟之本也。食倍而傷者。脾氣虛而不化也。若投以峻劑。則脾胃復傷。而胎亦損。當審所因。調治。若飲食停滯。或腹痛。平胃散。嘔吐惡心。加枳殼砂仁。吞酸噯腐。加黃連吳茱。腹滿泄瀉。六君子湯。停肉食。加山查麩食。加麥芽卜子。糯食。加白酒麩米食。加穀芽魚腥傷。倍陳皮。傷辛熱之物。加黃連。傷生冷之物。加砂仁木香。大凡脾胃虛弱。飲食難化。以白朮陳

女科經論

卷四

傷食

七

皮為未神曲丸最穩。枳殼丸可暫用。枳實峻厲。能耗真氣。治者慎之。

慎齋按已上二條。序胎前有傷食證也。妊娠傷食。多由脾胃虛弱。不能運化。况胎以脾胃為主。脾胃強。則胎系如懸鐘。而不墜。若傷食不化。則脾困而胎不能固。故凡消食導滯。先以補脾健胃為主。則飲食自化。一切峻厲剋伐之藥。未可浪投。以傷胎氣。觀立齋一條。得其本矣。

妊娠吐血屬臟腑有傷氣逆于上

大至曰。妊娠吐血者。皆由臟腑有傷。凡憂思驚怒。皆傷臟腑氣。

逆于上血隨而溢心悶滿煩久而不已多致墮胎

妊娠吐血分證用藥之法

薛立齋曰妊娠吐血若肝經怒火先用小柴胡山梔生地次用四物加味逍遙散若肝經風熱者防風子芩丸心經有熱者朱砂安神丸心氣不足者補心湯思慮傷心者妙香散胃經有火者犀角地黃湯膏粱積熱者加味清胃散肺經有火者黃芩清肺飲氣不攝血用補中湯腎經虛火者加味六味丸

慎齋按已上二條序胎前有吐血證也吐血證或七情內傷或六淫外感皆足致失血之患而妊娠吐血一主火熱者正

女科經綸 卷四 吐血

五

以氣血壅養胎元或有所感則氣逆而火上乘此立齋分證獨主火論也但火有虛實之分實火當清熱以養血虛火當滋陰以補水則胎安而可固若執以尋常治血之法用行血消血之劑胎必墮而禍不旋踵矣

妊娠喘息屬肺隘氣爭

產寶百問曰胎前喘息皆由榮衛之氣流行失度氣經于臟不能受諸氣上併于肺肺隘而氣爭故令喘其始得之或因恐墜則精却却則上焦閉而氣不行則留于肝肝乘于肺此喘出于肝也或因驚恐驚則心無所依神無所歸氣亂于中心乘于

肺此喘出于心也或因墮水跌仆腎氣暴動傷而不通氣留于腎腎氣上乘于肺此喘出于腎也或因飽食過傷動作用力穀氣不行脾氣逆肺此喘出于脾也諸臟相乘為喘名各不全

。妊娠胎逆作喘屬于火。朱丹溪曰妊娠因火動胎逆上作喘急者用條芩香附為末水調服。

妊娠作喘屬毒藥傷胎

呂滄洲曰有婦胎死于腹病喘不得臥醫以風邪傷肺治之診其脈氣口盛人迎一倍左關弦動而疾兩尺俱短而離經因曰

女科經綸 卷四 喘息

六

病蓋得之毒藥動血以致胎死不下奔迫而上衝非風寒作喘也大劑芎歸湯加催生藥服之夜半果下一死胎而喘止其夫曰病妾誠有懷以室人見嫉故藥去之眾所不知也

慎齋按已上三條序胎前有喘證也內經論喘屬于肺經為病若妊娠氣喘有乍感風寒而不得臥者客邪勝也發散自愈參蘇飲主之三拗湯在所斟酌若脾虛四肢無力肺虛不任風寒腎虛腰痠短氣不能步猝然氣喘不息此脾肺素虧母虛子亦虛腎氣不歸元而上乘于肺也生肌散補中湯去升柴加沉香補骨主之產寶一條是泛論喘證有五藏相乘

非論胎前病也丹溪火動作喘此胎前最多至于毒藥傷胎
喘喘時俗往往有之病機之不可不察者也

婦人無故悲傷屬于臟燥

張仲景曰婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘草小
麥大棗湯主之

婦人臟燥悲傷治驗

許學士曰有一婦人數次無故悲泣不止或謂有祟祈禳請禱
備至終不應予憶金匱有此證急治藥盡劑而愈古人識病制
方種種妙絕如此

女科經綸

卷四

臟燥

七

妊婦臟燥悲傷治驗

陳良甫日記管先生治一妊娠四五月臟燥悲傷遇晝則慘慄
淚下如有所憑與仲景大棗湯而愈

妊婦悲哀煩燥證用藥法

薛立齋曰有一妊婦悲哀煩燥其夫詢之云我無故但欲自悲
耳用仲景方又用淡竹茹湯佐八珍湯但前證或因寒水攻心
或肺有風邪者宜審察治之

慎齋按已上四條序臟燥悲傷證仲景學士二條是概病機
也良甫立齋二條方主妊婦見證無故悲傷屬肺病臟燥者

肺之臟燥也胎前氣血壅養胎元則津液不能充潤而肺為
之燥肺燥當補母故有甘草大棗以補脾若立齋用八珍湯
補養氣血真佐前人未盡

妊婦腹內鐘鳴

大全曰孕婦腹內鐘鳴用鼠窟前後土為細末研麝香酒調下
立愈

妊婦腹內兒哭

產寶曰腹中臍帶上疙瘩兒含口中因妊婦登高舉臂脫出兒
口以此作聲令妊婦曲腰就地如拾物狀仍入兒口即止又云

女科經綸

卷四

鐘鳴

六

孕婦腹中兒哭治法亦用空房中鼠穴土全川黃連濃煎汁飲
之即止

慎齋按孕婦腹內鐘鳴即是兒哭證全類故大全治法亦無
異立齋云黃連性寒麝香開竅當酌用究竟此作何證凡病
能有靈素不載而後人以意治之不可淺解者此類是也

妊婦胎動腹痛諸因

產寶百問曰胎動腹痛其理不一緣飲食冷熱動風毒物或因
交接動搖骨節傷犯胞胎其候多嘔氣不調和或服熱藥太過
氣血相干急服順氣安胎藥不然變成胎漏難安矣

。 娠胎動不安由衝任經虛諸因所感

陳良甫曰。娠胎動不安者。由衝任經虛受胎不實也。有飲酒房室過度。損動不安。有忤觸傷。仆而動不安。有怒氣傷肝。或鬱結不舒。觸動血脈不安。有過服煖藥。并犯禁之樂。動而不安。有因母病而胎動者。但治母病。其胎自安。有因胎不堅固。動及母病者。但當安胎。其母自愈。

娠胎動不安辨子母死生之法

大全曰。娠胎動。或飲食起居。或衝任風寒。或跌仆擊觸。或怒傷肝火。或脾氣虛弱。當各推因治之。輕者轉動不安。重者必致

女科經論

卷四 胎動

无

傷。隨若面赤舌青。是兒死也。面青舌赤。吐沫。是母死也。唇口色青。兩邊沫出。是子母俱死。須察治之。

慎齋按。已上三條。序娠有胎動不安證也。娠胎動不安。必有其由。產寶二條。原其因也。良方三條。是驗胎動有死生之法也。

。 娠胎動與胎漏之辨

女科正宗曰。胎動與胎漏。皆下血。胎動則腹痛。胎漏無腹痛。故胎動宜行氣。胎漏宜清熱。蓋緣子宮久虛。致令墜胎。其危同于風燭。非正產可比。急以杜仲丸預服。

娠墜仆傷胎

大全曰。娠驚胎者。乃懷娠將滿。胎神已具。墜仆傷胎。甚至下血不醒。若欲驗子母安否。當參前論治之。

娠熱病傷胎

陳良甫曰。凡娠忠熱病。臟腑熏灼。其胎致成。身冷而胎不自出。服黑神散。煖其胎氣。溫即自下。藥用附子。桂心。乾薑。當歸。生地。白芍。黑豆。

娠挾病傷胎

大全曰。娠羸瘦。或挾疾病。臟腑虛損。氣血枯竭。既不能養胎。

女科經論

卷四 胎動

无

致傷胎氣。不固。終不能安者。可下之。免害妊婦。

慎齋按。既云。臟腑虛損。氣血枯竭。而遽云下之。以免害妊婦。獨不顧披枝傷根之患乎。

娠築碯傷胎

大全曰。娠五七月。因事築碯着胎。或于小腹中。惡露已下。疼痛不止。口噤欲絕。用神妙佛手散探之。若不損。則痛止。子母俱安。若損胎。立便逐下。又名芎藭湯。又云。此藥治傷胎去血。多神効。

娠毒藥傷胎見證不可作中風治

捷徑方曰治毒藥攻胎藥毒衝上外證牙關緊急口不能言兩
手強直握拳自汗身微熱與胎前中風相似但其脈浮而軟十
死一生醫多不識若作中風治之必死用白扁豆二兩生去皮
爲末汲新水調下即効

妊娠毒食傷胎

捷徑方曰妊娠或食毒物或悞服草藥傷動胎氣下血不止胎
尚未損服之可安已死服之可下用桂桃仁丹皮赤芍茯苓名
奪命丸淡醋湯下丹溪亦稱其妙

慎齋按已上七條序胎前有傷胎證也妊娠懷胎或飲食不

女科經綸

卷四

傷胎

三

慎起居不時則有傷胎之患而胎之傷也不一有驚恐墜仆
有熱病諸疾有築碓毒藥毒食種種均足致胎之傷此非脈
之可憑必須醫者數問以悉其情而後可以審證施治也

子死腹中分寒熱用藥下法論

聖濟總錄曰胞衣未下急于胎之未生子死腹中危于胎之未
下蓋胞衣未下子與母氣通其呼吸若子死腹中胞臟氣寒胎
血凝滯氣不升降古方多以行血順氣藥及硝石水銀礞砂之
類若胎已死軀形已冷血凝氣聚復以至寒之藥下之不惟無
益而害母命者多矣古人用藥淡于用意子死之理有二端用

藥寒溫各從其宜有妊娠胎漏血盡子死者墜墮頗仆有內傷
子死者有久病胎萎子死者以附子湯進三服使胞臟溫煖凝
血流動蓋附子能破寒氣墮胎此用溫藥之意也有因傷寒熱
病溫瘧之類胎受邪熱毒氣內外交攻因致胎死留于胞臟古
人慮胎受毒氣必脹大故用朴硝水銀礞砂之藥不惟使胎不
長又能使胎化爛副以行血順氣之藥死胎即下也

妊娠胎病宜下

陳良甫曰人之胃氣壯實冲任榮和則胎得其所如魚處淵若
氣血虛弱無以滋養其胎終不能成宜下之以免其禍

女科經綸

卷四

傷胎

三

妊娠死胎用牛膝

證治要訣曰有胎漏不止欲因其勢遂下之惟佛手散可安即
安不可安即下順其自然醫者檢方用牛膝一兩酒煎服謂牛
膝補下部藥用之何害服之未下又進桂香散血遂暴下如決
煎獨參湯未成而卒或問牛膝補藥而能墮胎何也曰生則宜
而熟則補故破血之與填精如箭鋒相射豈獨牛膝哉鹿角亦
墮胎破血煎爲白膠則安胎止血因其熟而信其生此之謂粗
工者以爲世戒

慎齋按已上三條序胎傷用下恐有誤下之戒也妊娠胎傷

宜下下法最宜謹不可輕議如胎死腹中必先驗舌青腹冷口穢的確方可用下亦必先固妊婦本元補氣養血而後下之若偶有不安未能詳審遠用峻厲攻伐能免不測之禍此要訣云順其自然四字最妙立齋亦云胎果不能安者方可議下慎之慎之前賢之垂戒深矣

妊娠墮胎分月數調養

巢元方曰妊娠受胎在腹七日一變今婦人墮胎在三月五月七月者多在二月四月六月者少臟陰而腑陽三月屬心五月屬脾七月屬肺皆在五臟之脈陰常易虧故多墮耳如在三月

女科經綸

卷四

墮胎

三

曾墮後受孕至三月亦墮以心脈受傷也先須調心五月七月亦然惟一月墮胎人皆不知也一月屬肝怒則多墮洗下體則竅開亦墮一次既墮肝脈受傷下次亦墮今之無子者大半是一月墮胎非盡不受孕也故凡初交後最宜將息勿復交接以擾子宮勿令勞怒勿舉重勿洗浴又多服養肝平氣藥則胎固矣

妊娠墮胎屬中衝脈傷

孫千金曰凡女人受孕經三月而墮者雖氣血不足乃中衝脈有傷中衝脈即傷明胃經供應胎孕至此時必須節飲食絕慾

戒怒庶免墮胎之患

妊娠墮胎屬心包脈虛

潘碩甫曰巢氏論諸經脈養胎各三十日而十二經中獨心與小腸不養胎何也心為牡臟小腸為腑主生血而合脈經曰臟真通于心心藏血脈之氣也有孕則經脈不通許學士所謂閉經以養胎是也是知胎以血為本始終皆在于心自不當以輸養分次第矣三月之時心包絡養胎靈樞云心包主脈若分氣及胎脈必虛代經云心合脈蓋心與包雖分二經其實原屬一臟故也若至期當養之經虛實不調則胎不安甚則下血而墮矣

女科經綸

卷四

墮胎

三

妊娠墮胎屬風冷乘子宮

齊仲甫曰婦人血氣調和胎氣乃安若血氣虧損子宮為風冷所乘致榮虧衛弱不能陰養其胎而墮假令妊娠三月當手心主包絡養之如不善攝生傷其經則胎必墮後有娠至其時復墮如妊娠腰常痛須防墮胎腰為腎腑女子以繫胞故也

妊娠墮胎屬血虛內熱

朱丹溪曰陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足以榮養其胎則自墮辟如枝枯則果落藤萎則花墜或勞怒傷情內火便動亦

能墮胎。正如風撼其樹，人折其枝也。火能消物，造化自然。病源乃謂風冷傷子臟而墮。此未得病情者也。有孕婦至三四月必墮，其脈左手大而無力，重取則澀，知血少也。止補中氣，使血自榮。以白朮濃煎下黃芩末，數一則而安。因思胎墮于內熱而虛者為多。曰：熱曰虛，當分輕重。蓋孕至三月上屬相火，所以易墮。不然黃芩熟艾阿膠，何為安胎妙藥耶。

妊娠墮胎屬性躁少陽火動

汪石山曰：有婦性躁急，常患墮胎，已七八，診其脈皆柔軟無力，兩尺雖浮而弱，不在循按。此因墮胎太多，氣血耗甚，胎無滋養。

女科經論

卷四

墮胎

三

故頻墮也。譬之水涸而禾枯，土削而木倒。况三月五月正屬小陽火動之時，加以性躁而急，故墮多在三五七月也。宜大補陰湯去桂，加芩栝蜜丸服之。

妊娠胎墮屬相火傷精

朱丹溪曰：有婦經住，或成形未具，其胎必墮。察其性急多怒，色黑氣實，此相火太盛，不能生氣化胎，反食氣傷精故也。

妊娠胎墮屬子宮真氣不全

朱丹溪曰：有婦經住三月後，尺脈或澀或微弱，其婦却無病，知是子宮真氣不全，故陽不施，陰不化，精血雖凝，終不成形。至產

血塊或產血胞也。惟脈洪盛者胎不墮。

妊娠胎墮之因有五，由氣血虛不能榮養胎元。

王海藏曰：墮胎皆由氣血虛損，不能榮養胎元而墮。或七情太甚，內火發動，火能消物而墮。或過傷勞役，飢飽動胎而墮。或過于房事，觸動其胎而墮。或勞力跌撲，閃挫傷動其胎而墮。或大怒悲哀，傷動心肝之血而墮。然小產重于大產，由于胎臟損傷，胞繫腐爛故也。治宜補虛生肌肉，養臟氣，生新血，去瘀血為主。或素有墮胎之患者，宜按證治之。

妊娠墮胎先補脾胃

女科經論

卷四

墮胎

三

王節齋曰：婦人墮胎多在三五七月，除跌撲損傷外，若前次三月而墮，則下次亦必如期而墮。故于產後須多服養氣血之劑，以固胎元而補其虛。如養胎全在脾胃，譬猶鐘懸于梁，梁軟則鐘下墜，折則墮矣。故白朮為補脾安胎之要藥也。若因氣者多，加砂仁、少佐木香以行氣。

慎齋按：已上十條，序胎前有墮胎證也。妊娠墮胎，有客邪外傷而墮者，有氣血虛弱而墮者，有勞力房事動火而墮者，有條已備病機之要，而保胎之法，節齋之論在養脾胃，其本也。

莫若千金保胎丸，用白朮、黃芩、熟地、當歸、杜仲、續斷、阿膠、香

附益母川芎陳皮砂仁艾葉棗肉丸一方為最妙趙養葵得
其意以六味丸加杜仲續斷阿膠五味急滋腎水以固胎元
正以胎繫于腎腎氣壯則胎固而可安此正補脾不如補腎
之要妙也

○墮胎後有下血不止血凝不出二證

齊仲甫曰血寒則凝血溫則散若墮胎損經其血不止或不
一則因熱而行一則氣虛不斂瀉血多者必煩悶而死或因風
冷墮胎血冷相搏氣虛血逆上則血結不出搶上攻心則煩悶
而死當溫經逐寒其血自行若血淋瀝不止是衝任氣虛不能

女科經綸

卷四

墮胎

三

約制故也宜膠艾湯加伏龍肝散

○墮胎後下血不止宜補胃氣

陳良甫曰墮胎後復損經脈下血不止甚則煩悶至死皆以調
補胃氣為主

慎齋按已止三條序墮胎之後有下血不止有血凝不出二

證也墮胎而血出過多不止者經脈損而衝任之氣虛而不
攝是不足病也法當大補氣血以固其脫墮胎而血凝不行
作痛者外邪乘而敗濁之血閉而不流是有餘病也法當導
瘀消畜以溫其經不特墮胎為然也即產後見是證亦宜以

此治之

○半產屬衝任氣虛胎元不固

武叔卿曰妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋由妊
婦衝任氣虛不能滋養胎元胎氣不固或顛撲閃墜致氣血損
動或因熱病溫瘧之類仲景謂虛寒相搏此名為革婦人則半
產漏下是也

○小產由于慾動火擾

產寶百問曰驢馬有孕牡者近身則蹄之名為護胎所以絕無
小產人之胎係胞中氣血養之靜則神藏慾火一動則精神走

女科經綸

卷四

半產

三

泄火擾于中則胎墮矣種玉者知慾而不知忌可不慎哉

戴景元曰婦人覺有娠男即不宜與接若不息主半產蓋女
與男接慾動情勝亦必有所輸泄而子宮不閉固多致半產
女科書俱無此論可謂發前人未發

小產有三因之感戒服熱藥

便產須知曰半產俗呼為小產或三月四月或五月六月皆為
半產以男女成形故也或因憂恐悲哀暴怒或因勞力打撲損
動或因觸冒風寒暑熱大忌黑神散熱藥轉生他病宜玉燭散
和經湯之類蓋小產不可輕視將養十倍于正產可也

慎齋按妊娠有三因之感，黑神散固在所忌，而玉燭散亦未便可服也。

婦人半產誤用寒藥，損治宜活血升舉論

李東垣曰：婦人分晚半產漏下，昏冒不省，瞑目無知，蓋因陰血暴亡有形血去之後，則心神無所養，心與包絡者君火相火也。得血則安，亡血則危，火上熾故令人昏冒，火乘肺故瞑目不省。人事是陰血暴亡不能鎮撫也。血已虧損，醫反用滑石甘草石膏辛甘大寒之藥，瀉氣中之熱，是血虧瀉氣二者俱傷，反成不足虛勞病。夫昏迷不省者，上焦心肺之熱也，為無形之熱，而用

文科經綸 卷四 小產

完

寒涼之藥，驅令下行，豈不知上焦之病，悉屬于表，乃陰證也。汗之則愈，今反下之，暴瀉氣血，生命豈能久長？又不知內經有云：病氣不足宜補，不宜瀉。瞑目合眼之病，悉屬于陰，宜汗不宜下。又不知傷寒鬱冒得汗則愈，是禁寒涼藥也。分晚半產本氣不病，是暴去有形之血，亡血則補血，又何疑焉？補血則神昌，血下降，亡當補而升舉之心，得血則能養而神不昏，血暴降下是秋冬之令，太旺今舉而升之，以助其陽，則目張而神不昏迷矣。今立方生熟地四物，加紅花細辛，芎藭羌防，升柴葛根，藁本甘草，補血養血，生血益陽，以補手足厥陰之不足，名全生活血湯。

慎齋按東垣先生之論至妙，但半產病昏迷不省，謂上焦心肺表病，而曰汗之則愈，引傷寒鬱冒證，以得汗為愈，作半產證治法，豈不知亡血家不可發汗之義？且立方風藥倍多于血藥，且云升舉其陽之意，又不用一味氣藥，以益血之脫，是不能無疑于此論也。俟正之。

小產用藥之法

薛立齋曰：小產重于大產。大產如栗熟自脫，小產如生採破其皮殼，斷其根蒂也。但人輕忽，致死者多。治法宜補形氣，生新血去瘀血。若未足月痛而欲產，芎歸補中湯倍加知母止之。若產

女科經綸 卷四 小產

三

而血不止，人參黃芪湯補之。若產而心腹痛，芎歸湯主之。胎氣弱而小產者，參珍湯固之。

續按：已上五條，序胎前有半產證也。妊娠半產，非七情六淫勞役房室，則無是患。故用藥與正產無殊，總不外丹溪大補氣血為主一論也。然墮胎與半產證有別。如一月二月三月四月胎未成形而下者，名曰墮胎。至五月六月七月八月胎已成形而下者，名曰半產。墮胎總屬妊婦氣血虛弱，衝任經虛，以致胎元不固。故千金保胎丸一方最妙。而趙養葵以六味飲加杜續五味阿膠為安胎之聖藥，此傳心之秘典也。

婦人懷胎有未足月而產有過期而不產

婦人良方曰婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而產者有經一年二年乃至四年而後產者各依法治之

婁全善曰先期欲產者涼血安胎過期不產者補血行滯

妊婦胎孕遲速論

虞天氏曰或問娠婦有按月行經而胎自長者有三五個月間其血大下而胎不墮者或及期而分娩或踰月而始生其理何典曰按月行經而胎日長者名曰盛胎其婦血氣充盛養胎之外其血有餘故也有數月之胎而血大下謂之漏胎因事觸胎

女科經綸

卷四

胎孕不長

三

動其妊脈故血下而不傷子宮也然雖孕中失血胎雖不墮氣血亦虧多致踰月不產曾見有十二三月或十七八月或二十四五個月生者往往有之俱是氣血不足胚胎難長故耳凡十月之後未產者當服大補氣血之藥以培養之庶無分挽之慮也

慎齋按妊娠十月而產其常也其有踰期者如唐堯之與漢昭是也若云二年四年則怪誕不經矣尚得謂胎孕乎虞花溪又從而附會之無稽之言勿聽可也

婦人胎孕變常記

李時珍曰女子二七天癸至七七天癸絕其常也有女年十三而生子如褚記室所載平江蘇達卿之女年十二受孕有婦人年五十六而生子如遼史所載巫普妻年六十生二男一女此又異常之尤學醫者宜留心焉

慎齋按已上三條序胎孕育產有遲速變異之證也

妊婦胎萎燥屬于所稟怯弱

聖濟總錄曰人受氣于有生十二經脈迭相滋養凡胎處胞中或有萎燥者由孕婦所稟怯弱不足自周陰陽血氣偏勝非冷即熱胞胎失于滋養所以萎燥不長也惟宜資母血氣則胎從

女科經綸

卷四

胎孕不長

三

而有養矣

妊婦胎氣不長屬脾胃飲食減少

聖濟總錄曰妊娠將理無方脾胃飲食減少不能行榮衛化精微養衝任故令胎臟內弱子氣不足生化稍虧稟元方謂母病療母則胎安是也若使脾胃和而能食飲水穀化而運氣血何慮胎氣不長也

慎齋按已上二條序妊娠有胎萎不長證也妊娠以十二經脈養胎全賴氣血以充養胎元而氣血之旺惟以脾胃水穀之氣化精微而生血氣雖有宿疾失調總以健脾胃為長

養胎元之本此聖濟一條為知要也

鬼胎屬于榮衛虛損精神衰弱

婦人良方曰人之臟腑調和則血氣充實風邪鬼魅不能于之若榮衛虛損精神衰弱妖魅鬼精得入于臟狀如懷娠故曰鬼胎也

鬼胎屬女人之思想所結

虞天民曰或問婦人懷鬼胎者何歟曰晝之所思為夜之所見凡男女之性姪而虛者肝腎相火無時不起故勞怯人多夢與鬼交所謂鬼胎者偽胎也非實有鬼神交接成胎也古方有云

女科經綸

卷四 鬼胎

三

思想無窮所願不遂為白淫白濁流于子宮結為鬼胎本婦自己之血液姪精結聚成塊胸腹脹滿儼若胎孕耳非偽胎而何滑伯仁醫驗有楊天成女薄暮遊廟廟廡見一黃衣神覺心動是疾夢與交腹漸大如孕邀伯仁診之曰此鬼胎也女道其故遂與破血墜胎之藥下如蝌蚪魚目者二升許遂安此非遇神交乎曰有是事實無是理豈有土木為形能與人交而有精成胎耶此非神之惑于女乃女之感于神耳度此女必年長無夫正所謂思想無窮所願不遂也

鬼胎屬元氣不足以補元氣為主

薛立齋曰鬼胎證因七情相干脾肺虧損氣血虛弱行失常道衝任違乖致之乃元氣不足病氣有餘也若見經候不調就行調補庶免此證治法以補元氣為主佐以雄黃丸斬鬼丹之類行散之

鬼胎屬鬱怒傷肝脾所致

薛立齋曰一婦人經閉八月肚腹漸大而色或青或黃用胎證藥不應診視之而青脈滿寒熱往來肝經血病也面黃腹大小食倦體脾經血病也此鬱怒傷脾肝之證非胎也不信仍用治胎散不驗用加味歸脾逍遙二藥愈

女科經綸

卷四

鬼胎

三

慎齋按已上四條序孕婦有鬼胎之證也

婦人腸覃似孕屬氣病論

羅謙甫曰有女子月事不下腹如懷子狀醫者不知內經有腸覃石瘕之病名而疑為姪孕經云腸覃者寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫瘕而內着惡氣乃起瘕肉乃生其始生大如雞卵稍以益大至其大如懷子狀久則離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也夫腸者大腸也覃者延也大腸以傳導為事肺之腑也肺主衛衛為氣得熱則泄得寒則泣今寒客大腸故衛氣不榮有所繫上而結瘕在內貼着延久

不已。是名腸覃氣散。則清氣聚。則濁結。為瘕聚。所以惡氣發。起
瘕肉。乃生。小漸益大。至期而散。其瘕如懷子狀。此氣病而血未
病。故月事不斷。應時而下。本非胎孕。可以此為驗。辨木香通氣
散主之。

婦人石痕似孕。屬血病論。

羅謙甫曰。經云。石痕生于胞中。寒氣客于子門。子門閉塞。氣不
得通。惡血當瀉。不瀉。則以留。止口以益大。狀如懷子。月事不以
時下。皆生于女子。可導而下。夫膀胱為津液之腑。氣化則能出。
今寒客子門。則氣塞不通。血壅不流。血以留。止。結硬如石。是名

石痕。

此先氣病而後血病。故月事不來。可宣導而下。非大辛熱

之劑不能已。可服見現丸。和血通經湯。

婦人畜血似孕宜大下法

折肱漫錄曰。予媳申氏。多鬱怒。忽患不月。腹漸大。疑有妊。醫視
之。亦以為妊也。十餘月。勿產。諸證漸見。疑之。醫者亦疑為畜血。
欲下之。以體弱不勝。可暗消。久用行血調血藥。不敢用下血藥。
竟至不起。後閱盛啓東治東宮妃一案。大悔悼。永樂中東宮妃
張氏。經不通者十閱月。眾醫以為胎也。脹愈甚。上命啓東診。一
一如見。方皆破血之劑。服藥下血數斗。而疾平。予媳病正與此。

合當十月外。既確知非妊。宜大膽下之。可得生。惜醫無膽。不亦
傷乎。

慎齋按。已上三條。序胎孕有腸覃石痕畜血之疑證也。前條
鬼胎本之榮衛虛弱。精神恍惚。則妖魅鬼邪得乘虛感入。臟
腑故立齋一以補元氣為主。若內經腸覃石痕一犯大腸為
氣病。一犯子門為血病。幾與鬼胎相似。鬼胎與妊孕在疑似
間。非醫者有洞垣之見。往往誤治。故附畜血一案。以為宜下
之法。但下法必見證不疑者。始可與議此也。

女科經綸卷四

石痕

石痕

石痕

石痕

女科經綸卷五

構李蕭 撫廢六纂著 男 綏律黃 全校

陳士奎煥文 張鴻遠麟友

沈德敷日巖 吳桂允舒秀

王祚昌平川 黃金綬爾錫 今泰訂

沈廷翰維馨 陳奇猷爾卿

產後證上

臨產將息之法

女科經綸 卷五 臨產

婦人良方曰：妊娠至臨月，當安神定慮，時常步履，不可多睡飽食，過飲酒醴雜藥，欲產時不可多人喧闐惶惶，若見漿水腰間痛甚，是胎已離經，方用藥催生坐草，不可早服催生藥，早坐草慎之。

臨產調護用藥之法

薛立齋曰：欲產時覺腹內轉動，即當正身仰臥，待兒轉身向下，時作痛，試握產母手中指中節，或本節跳動，方臨盆，即產。若初覺不可仰臥，以待轉胞，或未產而水頻下，此胞衣已破，血水先出，必有逆生難產之患，若胞衣破不得分娩，用保生無憂散以

固其血如血已耗損，八珍湯加益母草濃煎時飲之，凡孕婦止

腹痛未產也，連腰痛者將產也，腎候于腰，胞繫于腎，故也。凡孕

有生息不順，宜囑穩婆，只說未產，或過雙胎，只說胞衣恐驚，則

氣散愈難生息，大抵難產多患鬱悶，安佚富貴之家，治法雖云

胎前順氣，產後補血，不可專執。若脾胃不實，氣血不充，宜預調

補之。

臨產預備必用之藥

婦人良方曰：花蓋石散為血入胞衣，脹大不能下，或惡露上攻，佛手散治血虛危證，加味芎歸湯入龜板治交骨不開，草蓀子

女科經綸 卷五 臨產

治胎衣不下，失笑散治惡露腹痛，不醒人事，兩油調滑石塗入產門，為滑胎之聖藥，清魂散治血暈諸證，平胃散朴硝水銀為腐化死胎之劑，皆為臨產時緊要之藥也。若氣血虛損，以八珍十全湯加減。

臨產腹痛宜辨弄胎試胎二候

便產須知曰：臨月或腹痛，或作或止，或一二日，三五日，胎水已來，腹痛無已時，名曰弄胎，非當產也。又有一月前忽然腹痛如欲便生，名曰試胎，非當產也。凡腹痛胎水來與不來，俱不妨事，但當寬心候時，若果當生，痛極不已，腰間重脹，數道挺併，柴水

淋下其見遂生。蓋產自有時。如菓熟香飄。瓜熟蒂落是也。

慎齋按已上四條。序臨產時有將息調護之法。有預備必用之藥。若弄胎試胎一條。亦臨產或有之事。不可愴惶。鹵莽反致有害也。

難產由于安逸氣滯

大至良方曰。婦人以血為主。惟氣順則血和。胎安則產順。今富貴之家。過于安逸。以致氣滯而胎不轉。或為交合。使精血聚于胞中。皆致難產也。

難產由于恐懼氣結

許叔微曰。有產累日不下。服催生藥不驗。此必坐草太早。心懼而氣結不行也。經云。恐則氣下。恐則精怯。怯則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。氣乃不行。得紫蘇飲一服便產。

難產由于胞中敗血壅滯

郭稽中曰。產難者。因兒轉身。將兒枕血破碎。與胞中敗血壅滯。見身不能便利。是以難產。急服勝金散。消其血。則見易生矣。

難產由于胞破血乾

陳無擇曰。難產多因兒未轉順。坐草太早。或努力太過。以致胞衣破而血水乾。產路滯而見難。下宜先服催生如神散。以固其

女科經綸 卷五 難產

三

難產由于妊孕房事不謹

虞天民曰。或問丹溪所謂難產之婦。多是八九個月內。不能謹慎。以致氣血虛故也。其旨何與。曰。婦人有娠。不宜與丈夫同寢。今人未諳此理。至八九月內。猶有房室。夫情慾一動。氣血隨耗。胎孕全賴氣血培養。氣血既虧。則胎息羸弱。日月既足。即欲分娩。拆胞求路。而出胞破之後。胞中漿水沛然下流。胎息強健者。即隨漿而下。此為易產。胎息倦弱者。轉頭遲慢。不能隨漿而出。胞漿既乾。汚血閉塞。生路子無所向。遂致橫生逆產。急服催

女科經綸 卷五 難產

四

生藥逐去惡血。道路通達。庶速產也。

慎齋按已上五條。序臨產時有難產之患也。難產之由。在平時。則有安佚氣滯。有心恐氣結。有房室不謹。在將產。則有敗血壅滯。有胞漿乾涸。大要不外此數證。

治難產胞漿乾令通上下之氣

大至曰。胞漿先破。惡水來多。胎乾不得下。先與四物補養氣血。次前濃葱湯。令穩婆洗產戶。令氣上下通暢。更用酥油滑石塗產門。次服神妙乳砂丹。或葵子如聖散。

治難產以順氣和血為主

女科正宗曰難產有因母氣血盛胎肥而難產者有因母氣弱血枯澁而難產者。悉是平時下善調攝。或七八月犯房室致汚濁凝滯不得順生。大法以順氣和血為主。如漿乾不下者滋潤為主。汚血阻滯者逐瘀為主。如坐草用久。胞水乾者滑胎散。申應散。連進大劑。如魚骨水自順矣。

治產難子於腹中不下法

陳良甫曰產難子於腹中者多因驚動太早。或觸犯禁忌。致令產難。胞漿已破。無血養胎。枯涸而致故也。須驗產母之舌。若舌青黑者。其胎已死。當下之。平胃散加朴硝。

女科經綸

卷五

難產

五

薛立齋曰若胎死服朴硝下穢水。肢體倦怠。氣息奄奄。急用四君子為主。佐以四物。加姜桂調補之。

慎齋按已上三條。序治難產之大法也。難產治法。或開滑子宮。或通上下之氣。或滋養氣血。當隨機應變。若胎死腹中。惟有下法。下後當從立齋之論。為要。不可不知。

交骨不開產門不開子宮不收三證

薛立齋曰三者皆由元氣素弱。胎前失于調理。致氣血不能運。而然交骨不開者。陰血虛也。佛手散加龜板。產門不開者。氣血也。十全大補湯加五味子。收之。子宮不收者。補中益氣加醋。

炒白芍五味如。產腫脹痛而不閉者。加味逍遙散。若腫既消而不閉者。補中湯加半百蒸。以健脾使元氣復而諸疾自愈。切忌寒涼之劑。又曰交骨不開者。陰氣虛也。龜為至陰。板則交錯相解。故用之。又有開骨膏。明乳香一兩。五月五日研細。者血為丸。如雞豆大。朱砂為末。加味佛手散送下。

單養賢曰產後見此三證。總服生化湯。如交骨不開。加龜板一枚。

盤腸生

便產須知曰盤腸生者。臨產子腸先出。然後產子。則腸不收。名

女科經綸

卷五

交骨不開

六

曰盤腸產。穩凌以醋水各半。蓋默噴產婦之面。腸即收上。又古方用草蓀子仁。四十九粒。研塗產母頭頂。腸即收上。急洗去其腸。若乾不收。以磨刀水少許。溫潤之。若以水噴而恐驚。則氣散愈難收也。腸乾者。濃煎黃芪湯。浸其腸于漆盤中。溫暖熏之。即

李太素按盤腸生。是必母氣血虛弱。因而下脫。當用補氣補血之藥。兼以升提。則腸自收矣。大劑參芪。歸加升麻。

慎齋按已上二條。序交骨不開。盤腸生。是難產中之見證也。難產不止此二證。橫逆產法在穩婆妙手。其用藥亦不外後

條諸法

寒月凍產宜燥

楊子建曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝致兒不能下此害最廣故冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處使滿房圍爐常有暖氣令產母背身向火臍下腿膝間常煖血得熱則散兒易生也

夏月熱產宜涼

楊子建曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣不可人多熱氣逼襲產母心煩熱血沸騰有驚丹冲

量之患

女科經綸

卷五

東產 熱產

七

慎齋按楊子建有十產論俱不可不知但八條悉屬產母與穩婆之事故不盡錄其凍產熱產二條惟在醫者用藥調護因節取之予謂古方臨產用藥最多丹溪云只用佛手散最穩當又效捷後清華養賢產寶新書有生化湯一方為產後加減今當以一方為主如寒月凍產多加肉桂乳香曼丹熱產多加辰砂益元散均用童便半盞冲人人參量產婦元氣虛實多寡加之可也

催生藥宜助氣血為主

楊子建曰催生者言欲產時兒頭至產門方服藥催之或經日久產母困倦難生宜服藥以助血氣令兒速生也

催生大法

大全曰大法滑以流通滯澁者以驅逐閉塞香以開竅逐血氣滯者行氣胞漿先破血乾者固血

慎齋按大全云滑以流通滯澁者如車前滑石鳳仙子蜀葵子蘇油香油白蜜牛乳猪脂之屬皆滑劑也苦以驅逐閉塞者如桃仁乾姜赤芍厚朴朴硝大黃之屬皆苦劑也香以開竅者如乳香麝香白芷肉桂之屬皆香劑也氣滯則香附枳

女科經綸

卷五

催生

八

殼陳皮身葉青皮皆順氣之劑也血乾則當歸川芎益母紅花丹參之屬皆固血之劑也

催生用藥諸方

女科正宗曰催生多用滑利迅速之藥古方有兔腦蛇蛻筆尖弩牙急性子之類皆一時妙用惟佛手散為至當不易至如手攥石燕足貼草藤子道乾澁則用葵子榆白皮猪脂葱油蜜牛乳以潤之天寒風冷使氣血凝滯則用乳香射香之類以香能開竅逐污也

慎齋按已上三條序催生用藥之大略也催生古方甚多有

不甚穩者概刪之

產後脈

叔和曰產後寸口洪疾不調者死。沉微附骨不絕者生。又曰沉小滑者生。實大堅弦急者死。

朱丹溪曰胎前脈當洪數。既產而脈仍洪數者死。又曰胎前脈小產後脈洪大者多死。

產後之脈貴虛

產後之脈貴虛。胎前之病其脈貴實。產後之病其脈貴虛。胎前則順氣安胎。產後則扶虛消瘀。此其要也。

文科經綸

卷五

產脈

九

產脈辨生死之法

脈要曰欲產之脈必見離經。或沉細而滑。夜半覺痛。來朝日中必婉。新產之脈緩滑為吉。若寔大弦急。近乎無胃。凶危之候。或寸口澁疾不調。惡證立見。惟宜沉細附骨不絕。雖劇無恙。

潘碩甫曰臨產氣血動盪。胞逆裂。與常經離異。必有水先下。俗謂之胞漿養胎之液也。水下則胞裂而產。及已產氣血兩虛。脈宜緩滑。緩則舒徐。不因氣奪而急。促滑則流利。不因血去而枯澁。均吉兆也。若寔大弦。非產後氣血兩虛所宜。寔為邪寔大為邪。進弦為陰斂。宣布不能。平為堅著。皆相逆

之脈也

慎齋按已上三條。序新產之脈。有吉凶之別也。婦人良方自臨產將息一條至此。序難產催生用藥。立齋云產難既明。須知產後疾病。因遵良方之法。序產後諸證于下。

新產下有調理之法

大全曰凡產畢。飲熱童便一盞。不得便臥。宜閉目而坐。須臾上床。宜仰坐。不宜側坐。宜豎膝。不宜仰足。高倚床頭。厚鋪褥。遮圍四壁。使無孔隙。免致賊風。以醋塗鼻。或用醋炭。更燒漆器。頻以手從心。擦至臍下。以防血暈。血逆。如此三日。不問腹痛不痛。

文科經綸

卷五

新產

十

以童便和酒。溫服五七次。酒雖行血。亦不可多。恐引血入四肢。能令血暈。宜類食白粥。漸食羊肉。豬蹄。少許。仍慎言語。七情。寒暑。梳頭洗足。以百日為度。若氣血素弱者。不計月日。否則患手足腰腿痠痛等證。名曰蓐勞。最難治療。初產時不可問是男是女。恐因言語而泄氣。或以愛憎而動氣。皆能致病。不可獨宿。恐致虛驚。不可刮舌。恐傷心氣。不可刷牙。恐致血逆。須氣血平復。方可治事。犯時微若秋毫。成病重如山。不可不戒哉。

慎齋按已上一條。序新產下調理之法。古人垂誠周詳。後人守此調護。安有產後諸疾。此在人事。宜慎。非醫者所有事也。

新產婦人有三病

張仲景曰。問新產婦人有三病。一者病瘧。二者病鬱。三者大便難。何謂也。師曰。新產而虛。多汗。出喜中風。故令病瘧。亡血復汗。寒多。故令鬱。胃亡津液。胃燥。故大便難。

產後十二癥病

于金方曰。婦人產後十二癥病。帶下無子。皆是風冷寒氣。或產後未滿百日。胞絡惡血未盡。便利于懸。及久坐寒溼入胞。裏結在小腹。牢痛積聚。小如雞子。大者如拳。按之跳手。隱隱然。或如虫嚙。或如針刺。氣時搶心。兩脇支滿。不能食。食飲不消。

女科經綸

卷五

產後

十一

產後十八證

大全曰。產後十八證。一曰。因熱病胎死腹中。二曰。難產。三曰。胞衣不下。四曰。血暈。五曰。口乾心悶。六曰。乍寒乍熱。七曰。虛痛。八曰。乍見鬼神。九曰。月內不語。十曰。腹痛泄瀉。十一曰。遍身疼痛。十二曰。血崩。十三曰。血氣不通。咳嗽。十四曰。寒熱心痛。月候不來。十六曰。口鼻黑氣。及鼻切。十七曰。喉中氣喘急。十八曰。中風。

產後危證有三冲三急

張飛疇曰。產後諸證。非行血則邪不去。卽諸虛證。亦須血行。其

氣乃復。第行之有方。不可過峻。凡產後危證。莫如三冲三急。三冲者。敗血冲肺。冲心。冲胃也。三急者。新產之嘔吐泄瀉多汗也。其用藥。則有三禁。弗手散。以川芎能發汗也。禁四物湯。以地黃能作瀉也。禁小柴胡湯。以黃芩能阻惡露也。然皆產後常法。設有風寒發熱。喘脹下痢。危急證候。亦將守此。致令坐斃乎。古人未嘗不用汗下。不用寒涼。而暴病勢緊。不得不猛治者。下手稍軟。畏縮逡巡。去生便遠。惟病氣久衰者。非但不可峻攻。亦不可峻補。必緩劑輕劑。以俟胃氣之復耳。

產後諸證其源有三

方約之曰。產後之證多端。其源有三。一曰。血虛火動。曰。敗血妄行。曰。飲食過傷。何以明之。氣屬陽。血屬陰。產後去血過多。血虛火動。爲煩躁發熱之類。一也。虛火上載。敗血妄行。爲頭暈腹痛之類。二也。經云。少火生氣。壯火食氣。東垣云。火爲元氣之賊。產後火傷元氣。脾胃虛弱。若飲食過傷。爲痞滿泄瀉之類。三也。治法。血虛火動。則補之。敗血妄行。則散之。飲食過傷。則消之。但人元氣有虛實。疾病有淺深。治療有難易。又不可一概論也。

慎齋按。已上五條。序婦人新產後有諸證之變現也。產後見證多端。仲景下三條。其大略也。約之一條。尤切要。而產後犯

之者眾但云壯火食氣產後火傷元氣致脾胃虛弱飲食過傷為痞瀉證夫產後之火虛乎寔乎况痞滿泄瀉亦不專主壯火為害也立論不能無弊

產後戒食湯

孫真人曰產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進肉湯有痛甚者不在此例候二三日消息可服澤蘭丸

產後戒飲酒

產寶曰纔產不得與酒緣酒引血送入四肢產母臟腑方虛不藥酒力熱酒入腹必致昏悶不可多飲時呷少許可以避風邪

女科經綸

卷五

產後

三

養氣血下惡露行乳汁也

產後戒服童便

胎產須知曰新產後童便不宜亂服大全云產畢可飲熱童便一盞卸一熱字或與藥同服或與酒同服童便有益陰降火之功無寒涼凝滯之患則童便不宜單服明矣况童便必擇清白無臭味者佳若黃濁不堪則氣既混雜味亦腥羶此時產母氣血已虛胃氣甚薄飲之必至嘔惡泄瀉非徒無益而反害之

產後戒食雞子

朱丹溪曰初產之婦將護之法不可失宜肉汁發陰之經火易

成內傷先哲具有訓戒何以羊雞濃汁作糜服之乎若見初產母腹頓克便啖雞子且吃夥鹽不思雞子難化夥鹽發熱必須却去夥鹽諸肉食與白粥將理以養魚淡煮食之半月後方與少肉雞子豁開淡煮大能養胃却疾也

產後戒早行房

孫千金曰凡產後滿百日乃可會合不爾至死虛羸百疾滋長慎之凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由早行房故也

慎齋按已上五條序產後有飲食起居之戒也新產調理已載大全一條之內而飲食之不節起居之不慎此五者猶所

女科經綸

卷五

產戒

市

易犯故再序以示人節戒之意

產後戒用發表一切不可用風藥

朱丹溪曰產後一切病皆不可發表產後病多是血虛故不可用風藥發表出汗

產後戒服黑神散熱藥論

張子和曰婦人產餘之疾皆是敗血惡物發作寒熱臍腹撮痛食飲稍減醫者不察謂產後氣血俱虛便用溫熱之劑養血補虛止作寒治舉世皆然豈知婦人之孕如天地孕物以陰陽和合而後生人亦陰陽和合而後孕偏陰偏陽豈有孕乎此與

禾黍瓜果之屬何異。水旱不時則華之與寔俱落矣。此又與
孕而不育者何異。七月立秋後十八日寸草不結者天寒故也。
婦人妊娠終十月無難而生。反謂之寒。何不察理之甚也。竊嘗
之治磚者。炎火在下。以水沃審之。遂成磚矣。磚既出審。審頓
寒耶。世俗竟傳黑神散治產後十八證。非徒不愈。經脈閉。酒前
後淋瀝。嘔吐痰嗽。凡百熱證生矣。若此。悞死者不可勝計。曷若
四物與涼膈散對停。大作湯劑。下之利。以數行。惡物俱盡。後服
甘淡之劑。自愈。

慎齋按。子和以產後不可服熱藥。而以治磚為喻。夫磚未出

女科經綸

卷五

產戒

五

審其熱為寔。熱既出審。則熱為虛。熱矣。胎在腹。當用清熱
養血。胎既產。惡露行。而氣血虛。虛則生寒。黑神散固不可多
服。久服。而任以涼膈散。大黃連。喬之。苦寒。則誤矣。矯枉之論。
殊未盡善。

。產後戒服黑神散致病論

朱丹溪曰。或問初產之婦。好血已虧。汚血或留。彼黑神散。非要
藥乎。荅曰。至哉。坤元萬物資生。理之常也。初產之婦。好血未必
虧。汚血未必積。臟腑未必寒。何以藥為。飲食起居。勤加調護。何
病之有。誠有汚血體怯。而寒服之。或可。若有他病。當求病起。何

因病在何。經氣病治氣。血病治血。寒者溫之。熱者清之。疑者行
之。虛者補之。血多者止之。何用海制。此方例。令服餌。不恤無病
生病。彼黑神散。用乾姜。當歸之溫熱。黑豆之甘熱。地之厚。以補
血之虛。佐以炒蒲黃。防出血之多。芍藥之酸寒。有收有散。為四
藥之功。肉桂大辛熱。以行滯血。和以甘草之緩。其取用。似乎精
密。然驅逐與補益。似難同方。施治。設有性急者。形瘦者。本有怒
火者。夏月坐蓐者。時在火令。姜桂皆為禁藥。雖是補劑。並有偏
。臟腑無寒。何處消受。必教却去黑神散。後富貴之家。驕恣之
婦。卒有白帶頭風。氣痛。膈滿。痰逆。口乾。經事不調。髮禿體倦。皆

女科經綸

卷三

產戒

六

是陽盛陰虛之候。天生氣血。本自和平。曰盛曰虛。又烏知非此
等迷謬。有以兆之耶。

張嘯瑣按。產婦有稟質瘦熱。素有鬱火。積熱多產。冲任血枯
脈澀。一經產後。兒枕作痛。粗工膠執古方。妄投肉桂。鴉不旋
踵。故必嚴寒凍產。風冷兼虛。血瘀不行。方投肉桂。以通行血
脈也。

產後戒服五積散論

朱丹溪曰。局方五積散。言治產後餘血作痛。方中以蒼朮為君。
麻黃為臣。厚朴枳實為佐。雖有芍藥當歸之補血。僅及蒼朮三

分之一。且方中言婦人血氣不調，心腹撮痛，閉而不行，並宜服之。何不思產後之婦，有何定耶。血氣未充，似難發汗，借曰推陳致新，藥性溫和，豈可借用麻葛與之散，附以蒼木枳殼，虛而又虛，禍不旋踵矣。

。產後用白芍藥宜製妙論

虞天民曰：問婦人產後諸疾，古方多用四物湯加減，而丹溪獨謂芍藥酸寒，伐生發之氣，禁而不用，何歟。曰：新產之婦，血氣俱虛，但存秋冬肅煞之令，少春夏生發之氣，故產後諸病多不利。于寒涼之劑，大宜溫熱之藥，以助資始資生之化源也。先哲制

女科經綸

卷五

產戒

七

四物湯以芎歸之辛溫，佐以地芍之寒，是寒溫適中，為婦人諸疾妙劑。若用于產後，必取白芍藥以酒重復製炒去其酸寒之性，但存生血活血之能，胡不可用也。後人傳寫既久，脫去製炒註文，丹溪慮俗醫鹵莽不製而用之，故特舉其為害之由以戒之耳。

。產後宜用芍藥論

張景岳曰：按丹溪云：芍藥酸寒，大伐發生之氣，產後忌之。此亦言之過也。夫芍藥之寒，不過于生血藥中稍覺其清耳，非若芩連輩之大苦大寒也。使芍藥猶忌如此，則他之更寒者，猶為不

可用矣。予每見產家過慎，或因太煖，或因年方壯，飲食藥餌大補過度，以致產後動火病熱極多。若盡以產後為虛，必須皆補，豈盡善哉。且芍藥性清微酸，而收最宜于陰氣散失之證，豈不為產後要藥乎。不可不解也。

。產後戒不可遠用參芪

單養賢曰：凡產後服生化湯，加入人參，須血崩血暈，形色俱脫者，加之。若無虛脫形證，不可加。若有血塊痛甚，不移處，止加紅花肉桂，切不可用參芪，補氣天人命也。

慎齋按：已上七條，序產後有用藥之戒也。產後病，慎治者多。

女科經綸

卷五

產戒

六

用藥之際，不可不詳慎。

。新產後先消瘀血為第一義

葉以潛曰：良方云：產後以去敗血為先，血滯不快，乃成諸病。夫產後元氣既虧，運行失度，不免瘀血停留。治者必先逐瘀，瘀消然後方可行補。此第一義也。今人一見產後有內虛證，遽用參芪甘溫之劑，以致瘀血攻心而死，慎之。

慎齋按：已上一條，序產後有先消瘀之治也。產後證虛者固多，而虛中見寒，莫如瘀血停滯一證，為與緊。此條最宜留意。產後不可作諸虛不足治。

張子和曰產後慎不可作諸虛不足治之必變作骨蒸寒熱飲食不入肌膚瘦削經水不行經曰寒則衰飲食熱則消肌肉人病瘦削皆粗工以藥消燬之故也嗚呼人之死者豈為命乎慎齋按產後證虛者多寔者少子和以為慎不可作諸虛不足治是必以攻伐峻厲為法矣產後而亦可任汗吐下之三法乎趙嗣真嘆子和之書其詞直其義明顧其一不顧其二知言哉

產後以大補氣血為主
朱丹溪曰產後有病先固氣血故產後以大補氣血為主雖有

女科經綸 卷五 產後 九

雜證以末治之

汪石山曰產後百日之內縱有雜證必遵丹溪之法以末治之當大補氣血為主不可攻擊此正論也

產後先補氣血兼用消散

陳良甫曰產後元氣大脫新血未生概以大補氣血為主如惡露未盡補藥中入行血藥如感冒風寒停滯亦須先補然後發散消導勿得泛用峻厲傷氣血之藥

產後去邪必兼補劑

何松庵曰產後氣血大損諸事必須保重切不可恃健勞碌致

內傷外感六淫七情而證為患莫測故產後證先以大補氣血為主雖有他證以末治之或欲去邪必兼補劑為當不宜尚用峻厲再損血氣

慎齋按已上四條皆治產後有攻補之法也和之論尚主攻邪丹溪之論尚主補虛兩賢之法各自有見而丹溪之說為長故必合良方正宗二說以參之乃攸當也

辨丹溪主末二字即標本論

虞天民曰或問產後證丹溪云當補大氣血為主雖有雜證以末治之又云產後中風切不可作中風治用風藥然則產後不

女科經綸 卷五 產後 十

問諸證悉宜大補氣血乎曰詳主末二字其義自明虛而無他證者合宜大補氣血自愈或因虛而感冒風寒者補氣血藥帶驅風之劑或因脾虛而食傷太陰者補氣血藥加消導不劑或因瘀血惡露未盡而惡寒發熱者必先逐去瘀血然後大補經曰有本而標之者有標而本之者又曰急則治標緩則治本丹溪主末二字即標本之意也

產後攻補二法辨疑論
葉以潛曰或問產後氣血大虛縱有雜證以末治又謂產後須以去惡露為主二說孰是不知古人之言各有攸當假如產後

去血過多，有血暈之狀，脈必弦浮大散，乃陰血既亡，陽無所依。宜大劑芎歸加熟附乾，姜嶺服補虛，或有滯血作痛，兼用行血藥。此大補為本，他證為末也。若產後三四日餘，痰卒止，腰腹疼，漸生潮熱，咳嗽，脈洪，寔而數，乃是敗血停積，上冲心肺，惡露與血得搏，留結不行，非用行血破氣以消痰，何以得安？若徒知當補不當瀉，病必益劇。故產後雖為不足，亦有有餘之證，不當泥產後無熱胎前無虛之說。如胎前惡阻，少食腹脹，二便清滑，經水時下，胎動不安，不用溫補，何以起病？非胎前亦有虛乎？如產後傷寒熱病煩渴，秘結不用苦寒，何以解利？非產後亦有熱

女科經綸 卷五 產後

三

乎。今人但見產後六脈浮洪弦緊，便說有熱，不知產後脈與別病脈不全。產後洪大是氣血耗散，內無存畜，故顯是脈。如別涼劑殺人，反掌不可不知也。

慎齋按：已上二條，序產後辨攻補之法也。產後用藥攻補，最難調劑。虛則補，是則攻，其定法也。惟虛證而兼寔邪，在產後見之者甚多。丹溪之論專為世醫不顧產後大虛，惟務攻邪者立誠也。豈知守丹溪之法，亦不無峻補之害。此虞天民葉以潛兩論所宜急玩也。

○產後懷藥成病論

單養賢曰：丹溪先生云：產後當大補氣血為主。雖有他證，以水治之，恐人用消耗之劑，以虛其虛也。予見世醫但知傷食當消氣，滿當順惡露，常攻不顧產虛，遂下消耗，不知產婦服消耗藥，胃氣反傷，滿益增，氣不亦降，鬱積既久，遂成腫脹危證。誰之咎哉？予于傷食氣滿證，微加消導于補中湯內，則脾強而所傷食氣消，散助血行，氣氣行而惡露自行矣。又于快用消食耗氣下藥，以致絕設日久者，先用參湯送錫糞粉，引開胃口，以救絕穀。然後漸加補脾藥，助以消導，又于快用消耗等藥，成脹滿者，仍用大補氣血之劑，不致夭枉。後之學者，須遵丹溪方案，毋

女科經綸 卷五 產後

三

私心自用，以天人命也。

○產後諸證不可誤治論

單養賢曰：凡病起于氣血之衰，脾胃之弱。至產後而虛又甚焉。故丹溪論產後當大補，已盡醫產之旨。若能擴充用藥，治產可無過矣。產後氣血暴虛，諸證乘虛易襲。如有氣不行，母專耗氣，有食不消，母專消導，有熱不可用芩連，有寒不可用桂附，用寒涼則血塊停滯，用辛熱則新血崩流。至若虛中外感，見三陽表證，似可汗也。在產後而用麻黃，慮有亡陽之誤。見三陰裏證，似可下也。在產後而用小氣，恐致竭陰之患。耳聾脇痛，乃腎虛惡

露之停休用柴胡。諸汗出乃元弱似邪之證。母加宜導厥由陽氣之衰。難分寒熱。非大補不能回陽而起弱。產因陰血之損。母論剛柔非滋陰不能活絡而舒經。有如乍寒乍熱。發作有期。證類瘧疾。若以瘧論病。甚難痊神。不守舍言語無倫。病似邪侵。如以邪論。危亡可待。去血多而大便燥結。蕤蓉加于生他。莫投潤下之湯。汗出甚而小便短澀。六君倍用參芪。更加生津之劑。人參生化湯類。灌可救產後之虛危。長生生活命丹。屢用能甦絕穀之人。脫肛久瀉。多是血虛下陷。補中益氣正宜。口噤筋攣。乃因血燥。煩風加入人參。生地為最。產戶入風而痛甚。服宜羌活養

女科經綸

卷五

產瘵

三

築方玉門傷冷而不閉。先須床免茶硫。因氣而滿。胸中虛生化湯。加木香為佐。因食而酸。惡食六君子加神曲為良。蘇木峻達大能破血。青皮殼實最惡。虛中一切耗氣破血之劑。汗吐下之策。可施少壯之人。豈宜胎產之婦。大抵新產之婦。先問惡露。何如。塊痛未除。不可遽加參朮。腹疼若止。補中益氣無疑。至若汗出亡陽。氣虛喘促。頻用加參生化湯。固是從權。如因大熱陰虛。血崩厥暈。速煎生化原方。乃為救急。言雖未能盡證。大略如斯而已。

慎齋按已上二條。序產後用藥之失。而有悞治之戒也。

產後證先調脾胃
婦人良方曰。新產之後。雖無疾。宜將息調理。脾胃進美飲食。則臟腑易平復。氣血自然和調。百疾不生也。加味四君子湯。四順理中丸。百日之內。宜常服之。

產後服生化湯論

產寶新書曰。產後氣血暴虛。理當大補。但惡露未盡。用補恐致滯血。惟生化湯。行中有補。能生又能化。真萬全之劑也。如血物湯。產後候人多矣。地黃性滯。白芍酸寒。伐生氣。生化湯除此二味。加以溫中行血之劑。如產後見枕作痛。世多用消塊散血之

女科經綸

卷五

產瘵

話

劑。然後議補。又有消與補混施。不知舊血雖當消化。新血亦當生養。若專攻舊則新血轉傷。世以回生丹治產。用攻血塊。下胞衣。落死胎。雖見速效。其元氣未免虧損。生化湯因藥性功用而立名也。產後血塊常消。而新血亦當生。若專用消則新血不生。專用生則舊血及滯。考諸藥性。多芎歸桃仁三味善攻舊血。驟生新血。佐以黑姜炙草。引三味入于肺肝。生血利氣。五味其方。行中有補。寔產後聖藥也。

產婦胞衣一破。速煎一帖。候兒頭下地。即服。不掄半產正產。雖平安少壯婦。無恙者。俱宜服一二帖。以消血塊。而生新血。

自無血暈之患。若胎前素弱，至產後見危證，不厭煩服病退。即止。若照常日服一帖，豈能扶將絕之氣血也。如血塊痛加肉桂三分，紅花三分，益母草五錢。如產後勞甚，血崩形色虛脫，加入參三四錢，如汗出氣促，人參倍加。

慎齋按：生化湯一方，載之產寶新書。凡產後一切證，俱以是方為加減，頗穩當。可法，故錄之。與婦人良方所載用加味四君子四順理中一治產證一治脾胃可並參之。

產後胞衣不下屬冷乘血溢

大全曰：兒產出，胞衣不落，謂之息胞。由初產時用力，兒出體已

女科經綸

卷五

產瘵

謹

疲憊不復能用。力產胞經停之間，外冷乘之，則血道澁，故胞衣不出。急以藥治之，庶不妨害于兒。所奈胞系連臍帶，胞不下，即不得以時斷臍，浴洗冷氣傷兒成病。舊法胞衣不出，恐損兒，依法截臍而已。

產後胞衣不下屬血入胞中

郭稽中曰：胎衣不下者，何曰？母生子訖，流血入衣，中衣為血所脹，故不得下。治稍緩，脹滿腹中，上冲心胸，疼痛喘急者，難治。服奪命丹，逐去衣中之血，血散脹消，胞衣自下。牛膝湯亦効。

產後胞衣不下有虛寔之分

薛立齋曰：胞衣不下有二。有因惡露入衣服而不能出，有因元氣虧損虛而不能出。惡露流入衣中者，腹必脹痛，用奪命丹或失笑散以消瘀血，緩則不救。元氣虛弱不能送下者，腹中不脹痛，用保生無憂生散以固元氣。

產後胞衣不下急斷臍帶法

寶慶方曰：婦人百病莫甚于生產。產科之難，臨產莫重于催生。既產莫甚于胞衣不下。惟有花蕊石散一藥，最為緊要。更有一法，產訖胞衣不下，停久，非特產母疲倦，又血流胞中，必致危篤。宜急斷臍帶，以物繫墜，使血不潮入胞中，則胞衣自痿縮而下。

女科經綸

卷五

產瘵

三

只要產母安心，以物繫墜之時，宜用心先繫，然後截斷，不爾胞上掩心而死。慎之。

慎齋按：已上四條，序產後有胞衣不下之證也。胞衣不下有冷乘血疑有血，流衣服有元氣虛脫三證。當分因用藥，急治。如天冬嚴寒，風冷乘虛而入胞，冷血凝而不下，則當用奪命丹、牛膝散、桂附熱藥以下之。如血入胞衣服滿，惡露不下，則當用失笑散、花蕊石散逐血消瘀，藥以下之。若元氣弱，氣血虧損不能下，則當用無憂生散、生化湯以溫補之。寒熱虛寔之際，不可不詳審施治也。

產後血暈屬敗血流入肝血熱逆上

大全曰產後血暈者由敗血流入肝經眼生黑花頭目旋暈不能起坐昏悶不省人事謂之血暈此血熱乘虛逆上湊心故昏迷不省氣閉欲絕也服童便最好

產後血暈屬瘀血奔心虛火炎上

陳良甫曰產後瘀血奔心因分娩後不飲童便以致虛火炎上也用鹿角燒灰童便調下即醒此物行血極効又用五靈脂半生半熟名獨行散又用返魂丹即益母丸也

產後血暈屬惡露乘虛上攻

女科經綸 卷五 血暈

三

家醫醫錄曰產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神昏口噤或痰壅盛急用失笑散主之若血下多而暈或神昏煩亂大劑芎歸湯補之加重便

慎齋按已上三條序產後血暈之屬有餘也敗血入肝惡露

上攻此瘀血為患當用行血逐瘀之藥

產後血暈屬陰血暴亡心虛火炎

李東垣曰婦人分娩昏暈目因陰血暴亡心神無所養心與包絡君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火乘肺故瞑目不省人事是陰血暴亡不能鎮撫也經云病氣不

足宜補不宜瀉暈目合眼病悉屬陰暴去有形之血則火上熾但補其血則神自安心得血則能養而神不昏迷矣

產後血暈屬血隨氣上

郭稽中曰產後血暈者向曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上逆亂心神故眼前生花或悶絕不省口噤神脫但服清魂散即醒

產後血暈屬虛火載血上升腹中空虛所致

朱丹溪曰婦人產後血暈乃虛火載血漸漸上暈也又崔氏云凡暈皆是虛熱血氣奔送腹中空虛所致

女科經綸 卷五 血暈

三

慎齋按已上三條序產後血暈之屬于不足也陰血暴亡虛火上炎皆由腹中空虛所致當用補血滋陰降火之藥但陰不可用地芩降火不可用苦寒

產後血暈分下血多少治法

陳良甫曰產後血暈其由有三有使力過多而暈有下血多而暈有下血少而暈其暈雖同治之則異如下血多而暈者但昏悶煩亂當以補血清心藥如下血少而暈者多惡露不下上搶于心心下滿急神昏不省當以破血行血藥按下血多而暈名為血脫當大劑人參可以回陽何云補血

又加清心。若下血少而暈非血滯即屬血竭。未便以破血行血為妄投也。良甫晰證最明治法尤未盡善。

產後血暈用醋漆法

崔氏曰：產婦分娩訖，將秤錘或黃石子入炭中燒令通赤，置器中于床前，以醋沃之，可除血暈。時作為佳，或先取醋醋以塗口鼻，仍置醋于傍，淬火炭使聞其氣，又一法燒乾漆令烟熏產母之面，即醒，如無乾漆舊漆器燒烟亦妙。

慎齋按：已上二條序產後血暈分血之多少而用治法也。產後血暈總屬陰血暴亡，虛火上炎所致。夫心主血，肝藏血，肝

女科經綸

卷五

血暈

羌

虛則魂無所附而目暈，心虛則神不守而火乘，東垣丹溪已悉病機之要。若良甫又分血下多少為治，如云惡露不下，上搶心而暈，此在壯寔婦人新產下恒有此患，當用行血破血之劑。若氣血虛弱人血脫過多，當大補氣血為主。如大劑芎

產後惡露不下屬風冷乘虛搏血

大全曰：惡露不下，由產後臟腑勞傷，氣血虛損，或胞絡挾于宿冷，或產後當風取涼，風冷乘虛而搏于血，滯而不宣，積畜在內，故不下也。

立齋按：前證若惡露不下，用失笑散氣滯血凝，用花蕊石散慎齋按：已上一條序產後惡露不下之證也。彭用光有云：凡看產後病，須問惡露多少，有無此要語也。夫新產惡露屬養胎餘血，雜濁漿水，見既產如氣血旺者，惡露隨之而下，如氣血弱者，阻滯小腹為病。上攻則為血暈，悶絕蓄瘀則為兒枕痛，心腹痛，癥瘕積聚，四肢腫滿，血鼓諸證。大全以風冷乘虛搏血，不宜所致，此在秋冬寒月多有犯之。但大全既云風冷搏血，矣何療三四日惡露不下，方中獨加芍藥、知母、廣濟方內更用大黃、芍藥、生地、汁、夫以寒藥治寒凝之血，有是理乎。

女科經綸

卷五

惡露不下

辛

準繩獨首載之，不可解。

產後惡露不絕屬虛損臟腑挾冷

大全曰：產後惡露不絕，由產後傷于經血，虛損不足，或分娩之時惡血不盡在于腹中，臟腑挾于宿冷，致氣血不調，故令惡露淋瀝不絕也。

產後惡露不止屬血滯不化

戴復庵曰：婦人服固胎藥太多，或正產或半產，胎雖下而惡血不去，或經二三月惡露猶點滴不盡，此非敗血之比，正緣當來有固經藥在內，致血滯不化，藥宜順血通氣，不宜蓄血閉氣也。

產後惡露不絕屬肝脾經病

薛立齋曰前證若肝氣熱不能生血六味丸若肝氣虛不能藏血逍遙散若脾氣虛不能攝血六君子湯胃氣下陷不能統血補中湯若脾經鬱熱血不歸源加味歸脾湯若脾經怒火血妄行加味四物湯若氣血兩虛十全大補湯若肝經風邪其血沸騰一味防風丸

慎齋按已上三條序產後有惡露不絕之證也婦人產下其血不止大約一月為期如不及一月而止者氣血虛也如踰一月二月而淋瀝不絕非氣虛不能攝血即立齋所論肝脾

女科經綸

卷五

惡露不止

三

二經有虧大全云經血虛損不足是矣又主于臟腑挾宿冷所致夫血得熱則行得冷則凝豈惡露不絕反為寒冷致病之理立齋以為肝脾鬱熱怒火此誠善悉病機者也但產後血脫當用益氣升提之法如千金方治惡露不絕經月半歲用一味升麻酒煎服正是此意至下多亡陰則有寒無熱姜桂亦所宜用臨證審之

產後頭痛屬陽虛陰虛

大全曰頭者諸陽之會也產後五臟皆虛胃氣虧弱飲食不充穀氣尚乏令虛熱陽氣不守上湊于頭陽虛陰虛則令頭痛又

有產後敗血頭痛不可不知

薛立齋曰前證若中風虛補中湯加蔓荊若血虛四物加參木氣血俱虛八珍湯若風寒所傷補中湯倍加川芎

產後頭痛屬風寒用生化湯

單養賢曰產後頭痛身熱惡寒雖是感冒風寒只宜服生化湯一二服慎不可用柴胡麻黃等藥以表虛其汗劑中川芎乾姜其味辛溫亦能散邪退熱如頭痛不解加連翹葱白三枚

慎齋按已上二條序產後有頭痛之證也頭痛有三陽三陰經之分屬風寒外感者居多若產後頭痛雖有風寒而本之

女科經綸

卷五

頭痛

三

血虛者其病原也惟大劑芎歸養血血行則風自滅若立齋以補中湯倍川芎此是治氣虛頭痛為宜至汚血頭痛產後恒有若用黑龍丹下蛭虫于此又病機之不可測者矣

產後心痛屬虛寒血凝不散

產寶百問曰心者血之主產後虛寒血凝不散氣逆上冲于心以溫熱治之寒去則血脈溫而經脈通大岩蜜湯主之四物去川芎加獨活吳茱萸乾姜細辛桂心甘草

產後心痛屬陰勝火冲包絡

大全曰產後心痛為陰血虧損隨火上冲心絡名曰心包絡痛

宜大岩蜜湯治之。若寒傷心經，名曰真心痛，無藥可救。

產後心痛屬寒氣上攻

單養賢曰：產後寒氣上攻，則心痛；下攻，則腹痛。兼血塊者，宜服生化湯加桂，未止，加吳茱萸、姜三片助血。若獨用諸熱藥攻寒，其痛難止，其血未免來多，以虛產母也。

產後心痛屬血虛

薛立齋曰：前證若陽氣虛寒，岩蜜湯溫之。瘀血上冲，失笑散行之。血既散而痛仍作，八珍湯補之。大凡心腹作痛，以手按之，不痛，此血虛也，須用補養之劑。

女科經綸

卷五

心痛

三

慎齋按：已上四條，序產後有心痛之證也。心痛在產後，非血虛火逆，即寒凝傷血。產寶用岩蜜湯治虛寒血凝，則得矣。若大至火冲心包絡，而亦用岩蜜湯治之，豈熱藥從治之意，能無助邪為患？至有產後殺血心痛，亦屬惡露不盡，如陳無擇評大岩蜜湯下云：產後心痛，雖非產時常疾，痛或有九，未必便是血痛。設是岩蜜湯，豈可用熟地泥血，安能去痛？以此湯治血痛，不若失笑散更捷。予謂產後心痛屬血者多，但有寒熱虛實不全，若云未必便是血痛，則非矣。

產後腹痛屬腹有乾血

金匱要略曰：產後腹痛，法當以枳實芍藥散。假令不愈，此為腹中有乾血，着臍下，宜下瘀血湯主之。

產後腹痛屬餘血壅滯

大全曰：產後惡血雖常通行，或因外感五邪，內傷七氣，致令斬然而止，餘血壅滯，所下不盡，故令腹痛。當審因治之。

產後腹痛屬傷食異血

士節齋曰：假如產後朝數內，或飲食如常，忽作腹痛，六脈沉伏，四肢厥冷，此惡露不盡，傷食，聚血而脈不起也。不可誤認為氣血兩虛，用大補劑，須用消導行血之藥。

女科經綸

卷五

腹痛

三

產後腹痛屬氣弱阻寒

金匱要略曰：產後腹中疝痛，當歸生薑羊肉湯主之。

註曰：疝痛者，緩緩痛也。概屬客寒相阻，故以當歸通血分之滯，生薑行氣分之寒。君以羊肉者，所謂形不足補以味。羊肉補氣，疝痛屬氣弱，故宜之。

產後腹痛屬冷氣乘虛入產門

寇宗奭曰：婦人產後，寒氣入產門，臍下脹滿，手不得犯，此寒疝也。醫將治以抵當湯，謂有瘀血也。予教之曰：非其治也。可張仲景羊肉湯，又產後六七日，忽然臍腹痛，皆由呼吸之間使

冷氣乘虛而入宜服當歸建中湯四項理中丸

慎齋按產後有下血過多沖任空虛肝經血少而腹痛脈弦者以熟地山茱為主加白芍藥木瓜藥茶一劑有難產久坐風入胞門而腹痛欲絕脈浮而弦續斷一兩防風五錢服之立愈一虛一實不可不辨

產後腹痛分證用藥法

家居醫錄曰產後腹痛惡露既去而仍痛四神散調補之不應八珍湯若痛而惡心或欲作嘔六君子湯若痛而泄瀉六君子湯送四神丸若胸膈飽悶或惡食吞酸或腹痛手不可按此是

女科經綸

卷五

腹痛

五

飲食所湯用二陳加白朮山查消導之若食既消而仍痛或按之不痛或更加頭痛煩熱作渴惡寒欲嘔等證此是中氣被傷宜補脾胃為主若發熱腹痛按之痛甚不惡食吞酸此是瘀血停滯失笑散消之若止是發熱頭痛或兼腹痛按之却不痛此是血虛用四物加炮姜參朮以補之

產後血塊腹痛戒用峻厲藥

產寶新書曰產後血塊痛用生化湯加肉桂紅花塊散痛止慎不可用蘇木三稜蓬朮等峻利之藥雖山查行氣行血亦不宜服恐虛產母也

慎齋按已上七條序產後有腹痛之證也產後腹痛有虛實之分實者有惡露不盡有乾血瘀滯有食傷致血虛者有氣弱寒阻有血虛空痛自當審因施治在虛者固宜補氣補血而實者亦未可以峻厲剋伐重虛其虛也

產後小腹痛屬惡露凝結

產寶百問曰產後小腹痛由惡露凝結或外寒搏之若久而不散必成血瘕月水不調

產後小腹痛屬血滯名兒枕痛

大全曰兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破敗與兒俱

女科經綸

卷五

小腹痛

五

下則無患若產婦臍脈風冷使血凝滯在小腹不能流通令結聚疼痛名曰兒枕痛胎以食母之血十月滿足餘血結成塊俗呼為兒枕欲產時血塊先動敗血裹其子是以難產

產後小腹痛屬瘀血停滯有骨疽證

薛立齋曰有產婦小腹痛作痛服行氣破血藥不効脈洪數此瘀血內積為膿也大抵此證因藥術不調瘀血停滯宜急治之緩則腐化為膿最難治療若流注關節則患骨疽失治多為敗證脈數而洪已有膿遲緊乃瘀血也下之愈若腹脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜用蟻九太乙膏或瓜子仁湯下

腰而愈

產後臍下痛作惡露不盡論

單養賢曰產後臍下痛在七日內未曾服藥者當作惡露不盡論如按而痛止者屬虛加味生化湯

慎齋按已上四條序產後有小腹痛之證也產後小腹痛非惡露瘀積即風寒乘襲小腹為足厥陰部分藏血之所兒產後一有不慎則風寒乘虛與惡血凝結即有兒枕痛之名若瘀血潰膿亦不早治之故也臨證宜慮及之

產後腰痛屬血滯經絡

女科經綸 卷五

腰痛

七

大全曰產後惡露方行忽然斷止斷絕不來腰中重痛下注兩股痛如錐刺入骨此由血滯經絡不即通之必作癰疽宜桃仁湯五香連喬湯

慎齋按產後惡露不行血滯經絡而作癰疽必是血氣大虛榮衛不調所致必八珍十全可療用桃仁五香則謬矣

產後腰痛屬勞傷腎氣風冷乘虛

大全曰腎主腰脚產後腰痛者腎為胞胎所係產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平復風冷客之冷氣乘腰故令腰痛若寒冷邪氣連滯背脊痛久未已後忽有娠必致損動胞絡屬腎腎主

腰故也

產後腰痛屬真氣虛

薛立齋曰前證真氣虛邪乘之用當歸黃芪湯或十全湯為主佐以寄生湯不應十全湯加附子

慎齋按已上三條序產後有腰痛之證也胞胎繫于腎腰者腎之外候產後勞傷腎氣損動胞絡屬虛者居多雖有風冷帶血亦必兼補真氣為要立齋一條挾其旨矣

產後脇痛屬氣與水相激

女科經綸 卷五

脇痛

八

大全曰產後兩脇脹滿氣痛由膀胱宿有停水因產後惡露下不盡水壅痞與氣相搏積在膀胱故令脇肋脹滿氣與水相激故令痛也

產後脇痛分證用藥之法

薛立齋曰此證若肝經血瘀玄胡索散若肝經氣虛四君子加柴胡青皮若肝經血虛四物加參朮柴胡若腎水不足不能生肝六味丸若肺金勢盛剋制肝木瀉白散仍參前證治之此證苟非用姜桂辛溫助脾肺以行藥不惟無以施功而反助其脹矣

慎齋按已上二條序產後有脇痛之證也脇者肝

藏血。產後惡露不盡。與去血過多。均足以致脇痛。未必屬于水氣相激。必參立齋一條。始做當爾。

產後遍身疼痛屬血氣失其常度

郭稽中曰。產後遍身疼痛者。何曰。因產走動氣血。升降失其常度。留滯關節。筋脈引急。是以遍身疼痛。甚則腰背強硬。不能俯仰。手足拘攣。不能屈伸。或身熱頭暈。不可作他病。但服趁痛散。循流血氣。使筋脈舒暢。疼痛自止。

陳無擇曰。趁痛散。不特治產後氣弱血滯。兼能治太陽經感風頭痛。腰背疼。白汗發熱。若感寒傷食。變恐驚怒。皆致身疼。

女科經綸

卷五

趁痛散

方

發熱頭痛。况有辱勞諸證。尤甚。趁痛散。不能療。不若五積散。入醋煎用。却不妨。

立齋按。五積散。治產後身痛。兼感寒傷食。若氣虛血弱。人似非所宜。如手按而痛。是血滯也。用四物炮姜桃仁紅花澤蘭補散之。按而痛稍緩者。血虛也。四物加參朮炮姜補養之。慎齋按。已上一條。序產後有遍身疼痛證也。產後百節開張。血脈流散。曰遍身。則自筋骨皮肉。手足脇腹腰背。無處不痛。大全以為血滯經絡。似屬有餘。然去血過多。而風寒襲之。亦為疼痛。故趁痛散為的對藥。無擇乃云不能療。不若五積

散殊未確也。

產後血塊築痛屬風冷凝血

楊仁齋曰。此因產後起血未盡所致。世俗收生。多就踏板起血。不思生產時。已坐草近地。產畢。臟腑空虛。又近地起血。冷溼風邪乘虛而入。使敗血凝為血塊。足謂母血冲築硬痛。治法以不換金正氣散。加辣桂蓬朮乾姜川芎白芷熱服。散其冷溼風邪。從二便出。

產後積聚屬氣血為風冷所搏

陳良甫曰。積者陰氣也。五臟所生。聚者陽氣也。六腑所成。然積

女科經綸

卷五

血塊

方

為陰。陰性沉伏。故痛不離其部。聚為陽。陽性浮動。故痛無常處。皆由產後氣血虛弱。風冷所乘。搏于臟腑。與血氣相結。故成積聚。癥塊也。

產後痲痛屬風冷搏血

大全曰。新產後有血與氣相搏而痛者。謂之痲。痲者假也。謂其痛浮假無定處也。此由原有風冷。血氣不調。至產血下少。故致此病。不急治。多成積結。妨害月水。

產後寒氣入腹名寒疝

八良方曰。產後寒氣入腹。硬築臍下刺痛。此名曰寒疝。當用

炒吳茱若誤認爲惡露不盡小腹畜血則診矣

產後有血損筋變之證

薛立齋曰有產煩腹中有一物時痛不止以爲血痕用行血破氣藥兩脇肚腹尤甚支節間各結小核隱于肉裏以爲贅子方用下虫藥夫肝藏血而養諸筋此肝血虛損筋潤而擊結耳肢節胸項皆屬肝胆部分養其脾土補水以滋肝血則筋自舒八珍湯逍遙散歸脾湯加減治之

產後氣血凝結宜固元氣

薛立齋曰凡真氣虧損則邪氣乘之况產得此尤當固元氣爲

女科經綸 卷五 傷食 望

主若求旦夕之効而攻邪則速其危矣如寒邪乘客氣血凝結此因氣病而血病也當補養胃氣調和月經寬緩靜養爲善

慎齋按已上六條序產後有血塊積聚痲筋攣諸證也產

後惡血不盡氣血虛而風寒乘襲則血凝氣滯遂爲血塊痲筋等證若用破血耗氣之劑以攻有形之邪禍不旋踵故以立齋固元氣一條序後示人求本之道也

產後口乾痞悶屬毒聚胃

郭稽中曰問產口乾痞悶者何荅曰產後藥補太虛血氣未定藥過太早胃不能消化麪毒聚于胃上熏胸中是以口乾燥

渴心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅滯以藥下之萬不得已但服見現丸則愈

陳無擇曰產後口乾痞悶未必只因食麪或產母內積憂煩外傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨所因調之可也

產後傷食停滯分證用藥法

薛立齋曰前證若宿食停滯六君子加枳實神曲若因肉食加由查若因魚鱸加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔此脾胃受傷六君子或鹽酸煨腐加炮姜作瀉加升麻不應佐四神丸或間用補中湯

女科經綸 卷五 腹痛 嘔吐 望

慎齋按已上二條序產後有傷食之證也產後氣血已虛胃

中元氣甚弱凡飲食偶有所傷必難運化而成痞悶誠不止麪毒也但北方以麪爲飯南方風俗三朝洗兒有食麪之例產婦恃健傷之者多此稽中舉此爲言也故丹溪教新產婦食白粥并戒食雞子正以虛人易致停滯故耳

產後腹脹嘔吐屬敗血入脾胃

郭稽中曰產後腹脹滿悶嘔吐不定者何曰敗血散于脾胃脾胃受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥病與藥不相于轉傷

動正氣。疾愈難胎。但服抵聖湯則愈。

產後腹脹嘔吐屬飲食傷脾胃

薛立齋曰。前證若敗血傷脾胃。宜用前方。若飲食停脾。宜六君子加厚朴。若飲食傷胃。宜六君子湯。大抵損其脾者。當節飲食為善。

慎齋按。已上二條。序產後有腹脹嘔吐之證也。產後腹脹嘔吐。未有不因脾胃虛弱所致。郭論則主于敗血。薛論則主于傷食。食與血均屬有餘。證攻補合宜。是在臨證之工耳。

產後嘔吐屬腸胃燥澀氣逆

女科經綸

卷五

腹脹嘔吐

聖

大全曰。胃為水穀之海。水穀之精。以為血氣。榮潤臟腑。因產則臟腑傷動。有時而氣獨盛。氣乘腸胃。腸胃燥澀。其氣則逆。故嘔逆不下食。

產後嘔逆屬惡露不下

郭稽中曰。胃受水穀。脾主運化。生血生氣。內濡臟腑。曰產暴虛。惡露不下。敗血乘虛。散于脾胃。脾受之為腹脹。胃受之為嘔吐。亦有惡露過多。氣無所主。聚于脾胃。脾受之亦為腹脹。胃受之亦為吐逆也。

產後嘔吐屬脾胃病分證用藥

薛立齋曰。產後嘔吐。因飲食過多者。六君子加查曲。兼勞役者。

補中湯。因飲食停滯者。八參養胃湯。脾胃氣虛者。六君子。胃氣虛寒者。加炮姜。木香。寒水侮土者。益黃散。肝木侮土者。六君子加升柴。命門火衰不能生土者。八味丸。嘔吐泄瀉手足俱冷。或肚腹作痛。乃陽氣虛寒。急用附子理中。

慎齋按。已上三條。序產後有嘔吐之證也。嘔吐為中焦病。產後氣血大虧。則中氣不運。為飲食所傷。而嘔吐者多。若大全主于燥澀氣逆。稽中主于惡露不下。此在新產三四朝內。庸有之。病機不可不審。

女科經綸

卷五

嘔逆

聖

產後嘔逆屬脾虛聚冷胃中伏寒

大全曰。肺主氣。五臟六腑。俱稟于氣。產後氣血傷。臟腑皆損。風冷搏于氣。則氣逆上。又脾虛聚冷。胃中伏寒。因食熱物。冷熱之氣相為衝擊。使氣厥不順。則為嘔逆。脾主中焦。為三焦之關。五臟之倉廩。貯積水穀。若陰陽氣虛。使榮衛之氣厥逆。致生斯病。經云。呃噫者。胃寒所生。服藥無効。灸期穴三壯。必愈。

產後嘔逆分證用藥法

薛立齋曰。前證屬胃氣虛寒之惡候。如用丁香散未應。急投參附湯。亦有生者。若產後嘔逆。有寒熱虛實之不全。如寒者。丁香

姜桂熱者宜乾柿竹茹虛者宜人參附子實者宜香附橘皮
施則有噬臍之悔

慎齋按已上二條序產後有呃逆之證也經云病深者其聲
嗷嗷即呃逆也諸病見之為惡候况產後犯此有虛無實有
寒無熱矣立齋必兼熱實論殊謬若古方治產後呃逆又兼
敗血瘀停胃逆用丁香豆蔻散煎桃仁吳茱湯下之病機又
不可不知

產後氣喘屬敗血停凝上熏于肺

郭稽中曰產後惡露不快敗血停凝上熏于肺亦令喘急但

女科經綸

卷五

氣喘

聖

奪命丹血去而喘自定又產後敗血冲心胸滿上喘命在須臾
服血竭散或參蘇飲治產後血入于肺面黑發喘欲然人參一
兩蘇木二兩

產後發喘屬汚血感寒

斐全善曰產後喘者多痰有產二月洗浴即氣喘坐不得卧者
九月惡風得暖稍緩用丹皮桃仁桂枝茯苓乾姜枳實厚朴桑
皮紫蘇五味瓜婁煎服即卧其痰如失作汚血感寒治也

產後氣喘屬孤陽絕陰

郭稽中曰產後喉中氣急喘促者何者曰榮者血也衛者氣也

榮行脈中衛行脈外相隨上不謂之榮衛因產所下過多榮
暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘此名孤陽絕陰為難治

產後發喘不可誤藥

單養賢曰產後發喘氣促此第一危證也世每以痰火實證治
之訛以傳訛當以人參生化湯加減人多疑參能助喘不用致
不救者多矣加芎歸在內萬無有失有用參加陳皮監制反致
非散切不可信

慎齋按已上四條序產後有發喘之證也產後發喘有虛實

之分敗血入肺汚血感寒此屬于實也參蘇飲奪命丹血竭

女科經綸

卷五

發喘

聖

散下之而愈若去血過多榮血暴竭衛氣無主孤陽上浮此
血脫而氣不歸元也非大劑人參生脈散與生化湯加桂附
莫療誤以風痰汚血為治是速之斃矣觀立齋治產後喘急
謂脾肺氣弱用六君子中氣虛寒用補中湯加姜桂更有陽
氣虛脫喘促自汗手足俱冷以參附湯大劑服之論誠知本
也

女科經綸卷五

女科經綸卷六

構李蕭 撰廣六纂著

叔

成遠聞

幾仔臨

全校

雲煥鳴仲 廷貴齋公

吳兆麟振為 駱飛塵雲駿

未郡

陳左衣紫佩

錢

發天拔

孫

溎公望

全恭訂

陸 澄露馨

高

彥俊之

趙光宗鹿園

談錫命天臣

葉

崧瞻嵩

產後證下

。產後浮腫屬敗血停積不可作水氣治

女科經綸

卷六

浮腫

十一

燕貽堂

產寶百問曰。產後四肢浮腫。由敗血乘虛停積。循經流入四肢。留淫日深。腐壞如水。故令面黃。四肢浮腫。醫人不識。便作水氣。治之。凡治水多用導水藥。極虛人。產後既虛。又以藥虛之。是謂重虛。多致夭枉。服小調經散。血行腫消。則愈。

產後浮腫屬血與氣搏留滯經絡

陳無擇曰。產後浮腫多端。有自懷妊腫。至產後不退。亦有產後失于將理。外感寒暑風溼。內則喜怒憂驚。血與氣搏。留滯經絡。氣分血分。不可不辨。當隨脈證治之。宜得其情。小調經散。治血分。固効。但力淺難憑。不若吳萊湯。枳木湯。奪魂散。大調經散。皆

要藥也

產後浮腫屬風邪搏氣

陳良甫曰。產後勞傷血氣。腠理虛。為風邪所乘。邪搏于氣。不得宣越。令虛腫輕浮。是邪搏于氣。氣腫也。若皮膚如熱。李狀。則變水腫。氣腫者。發汗即愈。水腫者。利小便即差。

慎齋按。產後虛腫。多屬氣血虛。而脾胃弱。榮衛不運所致。若去發汗。利小便。是重竭津液。而益虛其虛矣。豈產後腫。竟作外邪。有餘證治乎。

產後浮腫屬體虛有溼熱

女科經綸

卷六

浮腫

十二

燕貽堂

朱丹溪曰。產後浮腫。小便少。口渴。惡寒。無力。脈沉。此體虛而有溼熱之積。必上焦滿悶。宜補中導水。行氣可也。方用白朮。陳皮。茯苓。芎朮。通。

。產後浮腫屬虛大補氣血

朱丹溪曰。產後腫。必用大補氣血。為主。少佐蒼朮。茯苓。使水自利。

產後浮腫分證治法

薛立齋曰。前證若寒水侮土。宜養脾。肺若氣虛浮腫。宜益脾胃。若水氣浮腫。宜補中氣。又曰。產後浮腫。或兼喘咳。脈沉細無力。

此命門火衰脾土虛寒八味丸主之

慎齋按已上六條序產後有浮腫之證也。浮腫雖有風寒溼熱外邪之感。若產後則屬氣血虛而脾土不運。肺氣不輸者。多故產寶以下四條。主客邪有餘論。而丹溪立齋。惟以補氣血扶脾土為要也。

○產後外感風寒發熱不可作傷寒治

李氏曰。產後外感。離床太早。或摸衣襲風。冷入下部。令人寒熱似瘧。頭疼不止。而虛者。豈歸湯。加人參柴葛。氣虛者。補中湯。加防風乾姜。切不可以傷寒法治之。

女科經綸

卷六

發熱

三

燕貽堂

○產後頭痛發熱不可作外傷感冒治

大全曰。凡產後頭痛發熱。不可便作外傷感冒治。此等多是血虛。或是敗血作梗。宜以和平之劑。必效。如玉露散。或四物加柴胡。若便以小柴胡竹葉石膏之類。不救者多矣。

○產後諸發熱狀類傷寒不可發汗

吳蒙齋曰。新產後傷寒。不可輕易發汗。產時有傷力。發熱有去血過多。發熱有惡露不去。發熱有三日蒸乳。發熱有起勞動。飲食停滯。發熱狀類傷寒。要在仔細詳辨。切不可便發汗。大抵產後大血空。虛汗之則變筋惕肉瞤。或鬱胃昏迷。或搐搦。或便

秘其害非輕。凡有發熱。宜與四物為君。加柴胡人參炮姜。最效。

蓋乾姜辛熱。能引血藥入血分。氣藥入氣分。且能去惡生新。有陽生陰長之道。以熱治熱。淡合內經之旨。

慎齋按已上三條。序產後有外感發熱之證也。產後發熱。狀類傷寒。雖有外感。禁用發表。惟以養血為主。佐以散風寒之劑。如生化湯。芎歸湯。倍加用芎蔥白。若吳氏論發熱數種。又當分因治之。如惡露未盡。腹痛未除。形壯脈實。五七朝內。不見虛證。人參尚宜。斟酌如有虛證。必以桃仁與人參同用為當。

女科經綸

卷六

發熱

四

燕貽堂

產後傷食發熱宜下

金匱要略曰。產後病解。能食七八日。更發熱。此為胃實。大承氣湯主之。

徐註曰。此條言大虛之後。有實證。即當以實治。故謂病解能食。則經絡臟腑之氣俱平。無產後本病可疑。至七八日。更發熱。不惡寒。又無表證可疑。明是食復之象。故曰胃實。大承氣峻逐之。恐因循致虛也。

產後傷食發熱類傷寒

證治要訣曰。彌月俗名滿肚。多有恣意食物。致傷食發熱。有類

傷寒食復證宜先用紅丸子一二服却進小柴胡湯此論蓋有所本

產後傷食發熱不可作血虛治
王節齋曰產後脾胃大虛多有過服飲食傷滯發熱者誤作血虛則不効故凡遇產後發熱須問服何飲食有無傷積飽悶惡食泄瀉等證只作傷食治之若發熱而飲食調者方用補血正法

產後傷食發熱分證用藥

薛立齋曰前證若胸膈飽悶噯腐惡食或吞酸吐瀉發熱此為

女科經綸 卷六 發熱 五 燕貽堂

飲食停滯宜四君子加厚朴杏曲若胸膈悶滿食少發熱或食難化此為脾氣虛弱宜四君子加炮姜若用峻厲之劑復傷元氣則謬矣

慎齋按已上四條序產後有傷食發熱之證也產後發熱有六證一曰血虛發熱二曰勞力發熱三曰瘀血發熱四曰風寒發熱五曰傷食發熱六曰蒸乳發熱須分有餘不足治法如血虛勞力為不足瘀血傷食風寒蒸乳為不足中之有餘不足者固宜大補氣血而不足中之有餘亦不可以務求而忘本也金匱胃實一證雖下亦當酌量

產後發熱屬肝虛血燥

趙養葵曰如胎前原有陰火證至產後去血過多必大發熱煩躁汗出等證若依前法大補氣血其證必甚當用逍遙散以清肝火養肝血因去血既多肝虛血燥之故不可泥于氣血虛之論也

產後發熱屬陰虛生內熱

朱丹溪曰產後發熱此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳以補陰藥大劑服之必用乾姜者何也曰乾姜能入肺利氣入肝經引血藥生血然不可獨用與補陰藥同用此造化自然之妙

女科經綸 卷六 發熱 六 燕貽堂

婁全善曰產後發熱多屬虛寒惟乾姜加入補陰藥中神効此丹溪之法也

產後發熱屬陰虛陽浮于外

王節齋曰婦人產後陰虛陽無所依浮散于外故發熱用四物湯補血以炙乾姜之苦溫從治收其浮散以歸于陰也

產後發熱屬血脫陽無所附

薛立齋曰新產婦人陰血暴亡陽無所附而外熱四物加炮姜補陰以配陽若誤服寒涼剋伐之劑而外熱此為寒氣隔陽于外四君子加姜桂不應急加附子若肌膚發熱面赤大渴引飲

血脫發燥也當歸補血湯

產後陰虛發熱宜補氣

趙養葵曰產後大失血陰血暴亡必大發熱名陰虛發熱此陰

字正謂氣血之陰若以涼藥正治必斃正所謂證象白虎悞服

白虎必死此特備不用四物有形之物不能速化幾希之氣急

用獨參湯或當歸補血湯使無形生出有形來陽生陰長之妙

不可不知也

產後發熱不可作火治誤用寒涼

薛立齋曰產後虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛故惡寒發熱

若誤作火證投以涼劑禍在反掌

論丹溪治產後發熱用方之法

武叔卿曰丹溪治產後發熱以芎歸四君子加黃芪不用芍地

者以新產後用血脫益氣之法不宜斂降涼血以伐生氣也熱

甚者加乾姜若產後陰血弱發熱四物加茯苓熱甚加炮姜此

方全不用氣藥是血虛氣不虛也加茯苓者使天氣降而陰自

生陰生則熱自退熱甚加炒乾姜者不從陽引陰亦可從陰引

陽微乎微乎

慎齋按已上七條序產後有發熱之證也產後發熱有風寒

有傷食有瘀血有蒸乳而外大抵屬陰血虛而陽浮外故當以辛溫從治戒用寒涼若肝虛血燥則宜補血逍遙散清火亦宜慎用陰血大脫又當益氣母用補血此又用藥之權衡也

產後乍寒乍熱屬敗血不散

郭稽中曰產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散能令

乍寒乍熱也產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍

熱陰陽相乘則或寒或熱產因勞傷臟腑血弱不得宣越故令

敗血不散入于肺則熱入于脾則寒醫人誤作瘧治則謬矣陰

陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別

之曰時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也

產後敗血不散熱為閉陰閉陽

陳無擇曰產後乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若敗血不散豈

止脾肺二臟大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱

只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣

解則休過再會而復作太調經散入醋煎佳

產後敗血閉陰閉陽之辨

武叔卿曰閉陰閉陽之說率難理解敗血閉陰則寒閉陽則熱

女科經緯 卷六 發熱 七 燕貽堂

女科經緯 卷六 發熱 八 燕貽堂

145.007 子部醫家類 0 六一六

汗出所以產後喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰寒乃復

徐忠可曰產後鬱冒虛多邪少故脈微弱中氣虛也內虛一身之陰陽不和故身無汗但頭汗出所以頭汗出者何血虛下厥則下之陰氣盡而陽為孤陽陽孤則上出而頭汗矣然既頭汗仍喜其汗出而解者何蓋陰不亡則血未入虛惟產後血去過多而亡陰則陽為孤陽自陰較之陽為獨盛所以喜其汗損陽就陰則陰陽平故曰乃復

產後頭汗屬虛熱熏蒸

女科經綸 卷六 虛汗 王 燕貽堂

王海藏曰產後頭汗出至頸而還額上偏多蓋額為六陽之會由虛熱熏蒸而出也

慎齋按已上四條序產後有汗出之證也經云奪血者無汗汗與血類產後去血過多則陰不維陽陰虛而陽無所附周身汗出不止此為陰陽兩虛有亡陽之患為危證若身無汗但頭有汗頭為諸陽之會陰血暴亡孤陽上越陰雖虛而陽氣尚為有餘此時陰不勝陽故頭汗額上偏多心火上浮逼陽于外急補其陰而入以斂陽之藥則病自復故產後又喜其頭汗出也

產後中風屬于虛

金匱要略曰產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之徐忠可曰中風發熱頭痛表邪也然面正赤所謂面若朱絳乃真陽上浮加之喘氣高不下也明是產後大虛元陽不能自固又雜以表邪自宜攻補兼施故以桂甘防葛桔梗姜棗清在上之邪竹葉清胆腑之熱而以參附培元氣反其欲脫之陽也

產後中風屬勞損臟腑氣虛邪入

大全曰產後中風由產時傷動血氣勞損臟腑未曾平復起

女科經綸 卷六 頭汗 王 燕貽堂

勞動致氣虛而風邪乘之冷氣客于皮膚經絡但痺痺之不任少氣大凡筋脈挾寒則舉急鳴僻挾溫則縱緩虛弱若入諸臟恍惚驚悸隨其所傷臟腑經絡而生病焉

產後中風屬勞傷所致

郭稽中曰產後中風者何荅曰產後五七日內強力下牀或一月之內傷于房室或懷憂怒擾濕沖和或因食生硬傷動臟腑得病之初眼澁口噤肌肉觸搖漸至腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶爾中風所得也

產後中風屬下血過多虛極生風

大全曰產後下血過多。虛極生風者。何。昔曰。煩人以榮血為主。因產血下太多。氣無所主。唇青肉冷。汗山目眩。神昏命在須臾。此虛極生風也。若以風藥治之。則誤矣。

。產後中風宜大補不可作風治

朱丹溪曰。產後中風。口眼喎斜。必用大補氣血。然後治痰。當以左右手脈分氣血多少。以治。切不可作中風治。用小續命湯發表。治風之藥。

。產後中風當補元氣為主

薛立齋曰。產後中風。果外邪所屬。形氣不足。病氣有餘。當補元

氣為主。稍佐治病之藥。若強力不休。月內入房。形氣俱不足。當

純補元氣。多有復甦者。若誤投風藥。是促其危也。前證若心脾

血氣俱虛。十全湯不應加附子。鈎藤。若肝經血虛。逍遙散加鈎

藤。經云。脾之榮在唇。心之液為汗。若心脾三臟虛極。急用參而

救之。

慎齋按。已上六條。序產後有中風之證也。中風有真中。類中。有火有氣有痰。中。中。中。血脈之不一。若產後中風。總屬血虛而動傷臟腑所致。即有外邪。以大補為主。遵丹溪立齋之法。為不易也。若舍此。而以中風為治。用愈風續命之類。速

之難矣。戒之。

產後血虛中風病症

金匱要略曰。新產婦人有三病。一者病瘕。何謂也。曰新產血虛。多汗。出喜中風。故令病瘕。

產後血虛汗多。遇風變瘕。

郭稽中曰。產後血虛。腠理不密。故多汗。因遇風邪。搏之。則變瘕。瘕者。口噤。開背。強而直。如發痛。狀。搖頭。馬鳴。身反折。氣息絕。汗出如兩。兩手。攢。控者。不可治。

產後瘕。瘕。屬。亡。血。過。多。筋。無。所。養。

薛立齋曰。產後發瘕。因去血過多。元氣虧損。故外邪相搏。致于

關緊。急。四肢。痲。痺。或。腰。背。反。張。肢。體。抽。搐。若有汗。不惡寒。曰。瘕。瘕。無。汗。惡。寒。曰。痲。痺。然。產。後。患。之。由。亡。血。過。多。筋。無。所。養。而。致。

大補氣血。多保無虞。若攻風邪。必無疑矣。

產後病瘕。屬陰虛。內熱生風。

經仲淳曰。產後血虛。角弓反張。病者曰瘕。瘕者。勁也。去血過多。陰氣暴虛。陰虛生內熱。熱極生風。故外現瘕。其症。陰血不足。無以養筋。所致。足厥陰肝經大虛之候。宜益陰補血。清熱則愈。產後成瘕。不可同傷寒例治。

薛立齋曰仲景云傷寒有汗為柔瘥用桂枝湯無汗為剛瘥用麻黃湯產後得此血氣俱虛敗證不可與傷寒例看丹溪云產後當大補氣血為主多服參芪附子中風乃虛極之象固其本元請病自退

產後變證不可輕用發表

慶全善曰小續命大豆紫湯舉卿古拜散俱太陽厥陰藥也如邪寒而脈來浮弦有力者固宜但產後氣血大虛人不宜輕發其表但用防風當歸散治之為妙

用續命湯辨

女科經綸 卷六 瘥 燕貽堂

武叔卿曰寒主收引風寒在太陽經項背強直者太陽筋病也諸方皆主續命從仲景論也郭氏不問產後虛寒邪之有無概宗之似乎一偏至薛氏又以產後亡血過多非十全大補不可又一見也及夷堅志按以大豆紫湯獨活湯而愈又主于風矣是續命亦不為妄也但本方有麻黃附子氣血兩虛人不可輕用而郭氏論又有速灌之說稍緩即汗出如雨反不以麻黃為忌何語工切也二說似不可廢臨證之際詳之
真齋按已上八條序產後有瘥證也產後成瘥大抵血虛所致故金匱以不四條均主于亡血過多當從立齋仲淳治例

但二條辨不可用續命湯致有誤治之失以示戒也

產後口噤屬血氣虛風乘三陽經

大全曰產後中風口噤是血氣虛而風入頷頰口之筋也手三陽之筋結于頷產則勞損臟腑傷于筋脈風乘之則三陽之筋脈偏虛得風冷則急故令口噤

產後角弓反張屬體虛受風

大全曰產後角弓反張是體虛受風風入諸陽之經也人之陰陽經絡周環于身風邪乘虛入諸陽之經則腰背反折聳急如角弓狀

女科經綸 卷六 口票 角弓 燕貽堂

產後角弓反張屬虛氣宜固氣血

薛立齋曰前證因氣血耗損腠理不密汗出過多患此乃虛象也宜固氣血為主此證乃氣血虛極宜大劑參芪歸朮肉桂培養之不應加附子倍人參名參附湯猶未應乃藥力未能及宜多用之

產後瘥瘥屬陰虛火熾筋無所養

薛立齋曰瘥者筋脈拘急也瘥者筋脈弛縱也經云肝主筋藏血肝氣為陽為火肝血為陰為水產後陰血去多陽火熾盛筋脈所養而然治法以八珍湯加丹皮鉤藤以生陰血則陽火退

而諸證愈不應。用四君子芎歸丹皮鈎藤補脾土蓋血在于至陰。至陰者脾土也。此證若肢體惡寒脈微細者此為真狀若脈浮大發熱煩渴此為假象。惟當固本為善若無力抽搐戴眼反折汗出如珠者不治。

產後拘攣屬氣血不足

大全曰產後中風筋脈四肢攣急者氣血不足臟腑俱虛月內未滿起早勞動動傷臟腑虛損未復為風所乘風邪冷氣客于皮膚經絡令人頑痺不仁。羸乏少氣風氣入于筋脈。挾寒則攣急也。

女科經綸 卷六 角弓反張 七

產後拘攣屬肝經風熱血燥

薛立齋曰肝屬木主筋若肝經風熱血燥用加味逍遙散不應。六味丸以補腎水經云風客淫氣精乃亡邪傷肝也。

慎齋按已上五條原產後有口噤角弓與痙攣拘攣諸證也。諸證為中風內見證雖有口噤角弓異名總以產後氣血大虛所致。故一切風藥概不可用。惟遵丹溪立齋之論治為產後中風病之要道也。

產後不語屬敗血入心

郭晉中曰產後不語者何。晉曰人心有七孔三毛心者君主之

官神明出焉外應于舌。舌者聲之機產後虛弱多至則血停。上下于心。心竅閉塞神志不能明了。又心氣通于心。心氣閉則舌強不語。但服七珍散。

產後不語屬胃溼熱痰迷心

武叔卿曰產後不語有臨產服藥與湯過多胃溼使然。又有熱痰迷于心不語。導痰湯。

產後不語屬熱血熱痰迷心竅

方約之曰產後不語有熱血迷塞心竅者有熱痰迷塞心竅者。前方七珍散治熱血孤風散治熱痰。肥人多是熱痰。瘦人多是熱血。

女科經綸 卷六 不語 太 燕貽堂

產後不語分證用藥

薛立齋曰經云大腸之脈散舌下。又云脾之脈是動。病舌本強不能言。又云腎之別脈上入于心繫舌本。虛則不能言。前證若心腎氣虛用七珍散。腎虛風熱地黃飲。大腸風熱加味逍遙散。加防風白芷。脾經風熱秦朮升麻湯。肝經風熱柴胡清肝散。加防風白芷。脾氣鬱結加味歸脾湯。加升麻。肝木太過小柴胡加鈎藤。脾受木侮加白芷升麻鈎藤。肝脾血虛佛手散。脾氣虛四君子湯。氣血俱虛八珍湯。不應。獨參湯。加附子。補其氣而生血。

若竟用血藥則誤矣

慎齋按已上四條序產後有不語之證也。產後不語。稽中主于敗血。迷心。濟陰主于胃溼熱痰。此皆論病之屬有餘也。產後去血過多。陰火上乘。鬱胃心神。為不語。此證之屬虛者。為多而敗血熱痰。亦間有之。至論胃溼使然。則迂矣。若立齋又兼肝脾風熱用藥。多以防升柴為發散。似未切中病機也。

產後驚悸屬心氣虛風邪搏心
大全曰產後臟虛。心神驚悸者。體虛心氣不足。心經為風邪所乘。或恐懼憂迫。令心氣受于風邪。邪搏于心。則驚不自安。驚不

女科經綸 卷六 驚悸 尤 燕貽堂

已則悸動不定。其狀目睛不轉。不能動診。其脈動而弱者。驚悸也。

產後驚悸屬于心血虛
薛立齋曰。人所主者心。心所主者血。心血一虛。神氣不守。驚悸所由來也。當補血氣為主。

產後恍惚屬榮衛不足厥邪所乘
大全曰。產後中風恍惚者。由心主血。血氣通于榮衛。臟腑通循。絡。產則血氣俱傷。五臟俱虛。榮衛不足。即為風邪所乘。令心恍惚不定。

女科經綸 卷六 驚悸 尤 燕貽堂

產後恍惚不可作風治

薛立齋曰。產後恍惚證。當大補血氣為主。佐後方為善。蓋風為虛極之假象。固其本元。諸病自退。若專治其風。則速其危矣。

慎齋按已上四條。序產後有驚悸恍惚之證也。濟陰綱目云。不語至驚悸恍惚諸證。有謂氣虛血虛。有謂敗血入心。有謂風邪所乘。一皆名為心風。然此風從何來。當從何治。前人亦未之悉。但言治痰治風。丹溪立齋則以大補氣血為主。各有所見。在臨證酌用之。愚謂產後不語一證。有敗血有溼有熱。痰有風熱。一主實邪外感為病。而不及于虛。此亦前人立論。

女科經綸 卷六 發狂 丰 燕貽堂

之失若驚悸恍惚。自是血虛。心氣不足所致。大全必言風邪搏心。致有斯證。其言甚戾。立齋以為。但固本源。母專治風。有功。來學不小。

產後發狂屬敗血冲心
大全曰。產後因驚敗血。冲心昏悶發狂。如見鬼祟。宜用方大聖澤蘭散。加辰砂棗仁湯下之。

立齋按此乃血虛神不守舍。非補養元氣不可。
產後發狂屬肝虛火炎

仲淳曰。有產後六朝發狂。持刀殺人。此陰血暴崩。肝虛火炎。

故也。用澤蘭歸地牛膝茯神遠志棗仁加童便。

產後乍見鬼神屬敗血停心

大全曰。心主身之血脈。因產傷耗血脈。心氣虛則敗血停積。上干于心。心不受觸。遂致心中煩躁。臥起不安。昨見鬼神。言語錯亂。醫人不識。呼為風邪。如此治。必不愈。但服調經散。加龍腦。得睡即安。

產後乍見鬼神屬血虛邪淫

郭稽中曰。產後乍見鬼神者。何曰肝藏血。心主血。因產去耗其血。勞動肝心。敗血奔冲。邪淫于心。所以乍見鬼神。言語顛倒。非

文科經綸

卷六

見鬼

三

燕胎堂

風邪也。但服調經散黑龍丹。

產後乍見鬼神屬心脾血少

薛立齋曰。產後乍見鬼神。若敗血停滯。用調經散。若心血虛。用栝子仁散。此證皆心脾血少所致。但調補脾胃之氣。則痰清而神自安。若果係鬼祟所附。即灸鬼穴可愈。其或不起。多因驚痰降火攻伐之過也。

慎齋按。已上五條。產後有發狂見鬼之證也。夫心所主者血也。心生血。肝藏血。產後陰血暴亡。則心失所養。肝火得以。上炎肝藏魂。心藏神。血虛則神魂不守。有發狂見鬼諸證。此

皆虛火上乘之病。立齋但主補虛而未之論。及繆仲淳一條。乃發前人未發。

產後妄言見邪不可作痰火論

單養賢曰。產後失血。心神失守。妄言見邪。宜服生化湯。加茯神。棗仁。遠志。慎不可作痰火論。用消痰降火藥。信師巫以驚產母。產後狂言謔語分五證治。

大全曰。產後語言顛倒。或狂言謔語。如見鬼神。其源不一。辨證

治之一。則因產後心虛。敗血停積。上干于心。而狂言獨語者。當在乍見鬼神條求之。二則產後臟虛。心神驚悸。志意不安。言語

文科經綸

卷六

妄言

三

燕胎堂

語亂不自知覺。神思不安者。當在驚悸條求之。三則有宿風毒。因產心虛。氣弱。腰背強直。或歌哭嗔笑。言語亂道。當作風癲治。在心驚中風條求之。四則產後多因敗血迷亂。心經言語顛狂。或暈悶。當于血暈中求之。五則產後感冒風寒。惡露斯然不行。憎寒發熱。如瘧。晝日明了。暮則譫語。如見鬼狀。當作熱入血室治之。宜琥珀地黃丸。及四物湯。以上諸證。大抵產後首當逐敗生新。然後仔細詳痰。不可妄立名色。自生新意。加減方藥。大宜對證。依古法施治。未有不安者也。

薛立齋按。前證當固胃氣為主。佐以見證之藥。若一子攻痰。

則誤矣

產後虛煩屬餘血奔心

大全曰產後餘血奔心以致虛煩。蓋因分娩後不與重便并擗心下及卧太早兼食不相宜之物所致。

產後虛煩戒服竹葉石膏湯

陳無擇曰尋常治諸虛煩熱以竹葉石膏湯温胆湯不知產後與尋常不全如石膏等藥不宜輕用之必死。

產後渴屬于血虛

集驗方曰產後血渴血渴者血虛而渴也方用人參麥冬生地

女科經綸

卷六

虛煩

三

燕貽堂

甘草瓜婁又產後心煩發渴宜清心蓮子飲

產後心煩血渴分證用藥

薛立齋曰前證若出血過多虛火上炎用童便入四物加白朮麥冬丹皮若胃氣虛有熱竹葉黃芪湯若血虛發熱八物加麥冬五味若血脫煩躁用當歸補血湯胃氣弱補中湯七味白朮散

慎齋按已上四條序產後有虛煩血渴之證也血為周身津

液產後去血過多陰虛火旺則有煩躁有發渴證宜大劑滋陰降火消瘀加童便為主濟陰綱目云產後血虛氣無所附

逆而為火火上逆而瘀血隨之則心煩發躁童便潤陰也味苦寒而鹹性就下降火消瘀所謂濁陰出下竅是也二證並用之為妙若仲景二物黃芩湯有黃芩苦參又有竹茹石膏治產煩中虛煩亂四肢苦煩熱諸證未敢信也當以三因之論為主

產後口鼻黑衄屬胃絕肺敗

郭稽中曰產後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脈之海起于鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左產後氣血虛散榮衛不和散亂入于諸經却還不得故今口鼻黑氣起及

女科經綸

卷六

口鼻

三

燕貽堂

變鼻衄此緣產後虛熱變生此證胃絕肺敗不可治病機云產後見衄者不可治

產後鼻衄為氣脫血歛證

薛立齋曰胃脈挾口繞承漿鼻準屬脾土鼻孔屬肺金此胃虛肺損為氣脫血歛之證急用二味參蘇飲加附子亦有得生者慎齋按已上二條序產後有鼻衄之證也鼻衄本非外證產後犯此或惡露不下虛火載血上行溢出血竅不循經度肺胃已受火熱故黑氣變現于鼻口此熱極反兼水化也故曰肺胃敗絕為不可治立齋參蘇飲加附子似未穩莫若大盞

童便加牛膝丹皮澤蘭生熟地倍人參服之

產後咳嗽屬肺經感邪

大全曰肺主氣因產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風熱或寒溼皆令人咳嗽若產後吃鹽太早咳嗽者難治

產後咳嗽屬食麩壅納

郭稽中曰產後血氣不通咳嗽者何荅曰產後咳嗽多因食熱麩壅納或熱痔或有氣塊發時冲心痛氣急咳嗽四肢寒熱

產後咳嗽屬惡露土攻瘀血入肺

原良甫曰產後傷風咳嗽是惡露上攻流入肺經或面赤發喘

女科經綸

卷六

燕貽堂

欲。急。用。二。味。參。蘇。飲。又。李。氏。曰。產。後。咳。嗽。多。是。瘀。血。入。肺。知

母。飲。治。產。後。惡。露。流。入。肺。經。咳。嗽。

濟。陰。按。知。母。貝。母。涼。藥。也。豈。可。治。惡。露。上。攻。人。參。補。氣。藥。也

豈。可。治。流。入。肺。經。之。嗽。卽。加。桃。仁。杏。仁。以。瀉。肺。導。瘀。亦。不。可

妄。用。

產後咳嗽屬胃氣不足

薛立齋曰產後咳嗽悉胃氣不足胃為五臟之本胃氣一虛五臟失所百病生焉患者多謂膠理不密所致不知肺屬辛金生于巳土亦因土虛不能生金膠理不密外邪所感其陰火上炎

宜壯土。金。生。腎。水。制。火。為。善。若。遲。治。咳。嗽。則。誤。矣。

產後咳嗽分證用藥

薛立齋曰產後咳嗽或因陰血耗損或因肺氣虧傷或陰火上炎或風寒所感治法不一若陰血虛者芎歸熟地參朮肺氣傷者四君子加芎歸桔梗陰火上炎者六味地黃加參朮風寒感者補中湯加桔梗紫蘇

慎齋按已上五條序產後有咳嗽之證也產後咳嗽有外邪

有內傷有瘀血不外三因之感其本則以氣血虛而胃氣不

足所致夫咳嗽為肺金病土虛不能生金致有咳嗽之患雖

女科經綸

卷六

燕貽堂

有外邪傷食惡露諸證必顧母為要此立齋之論為知本也

產後寒熱屬敗血不可作瘡治

郭稽中曰產後乍寒乍熱多是敗血為害或陰陽不和若概作瘡治則誤矣

婁全善曰產後瘡疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四

物湯調之熱多者草果飲子寒多者生熟飲子

產後瘡疾屬陰陽兩虛不可用柴胡湯

產寶新書曰產後類瘡分二證產後半月內外寒熱往來或午

後日晡夜間發熱或一日兩三度其發有期其證類瘡由氣血

後日晡夜間發熱或一日兩三度其發有期其證類瘡由氣血

並場陽虛寒作陰虛發熱也。慎毋以瘧治。雖小柴胡湯不可輕用。惟調補氣血寒熱自除。仲景云傷寒往來寒熱一日二三度發。此陰陽俱虛不可更發汗更吐更下。其意亦全。

產後瘧疾屬氣血虛宜補胃氣為主。

薛立齋曰產後瘧疾總以補胃氣為主。佐草果飲之類。若胃氣利充以草果飲為主。佐以補胃藥。蓋氣虛則寒血虛則熱。胃氣虛則惡寒胃氣下陷則寒熱交作。當大補氣血。其病自退。若誤用清脾截瘧之類多致不起。

慎齋按已上三條序產後有瘧疾之證也。瘧病在夏秋之交。

女科經緯 卷六

瘧

三

燕貽堂

本風寒暑溼四氣之感而產後之瘧雖有外邪當從氣血兩虛為治。陽虛外寒陰虛內熱陰陽兩虛則寒熱交作。故宜大補氣血為主。若郭氏以敗血為害。固當消瘀。亦必兼補氣血。始善。故一切治瘧諸方如小柴清脾截瘧四獸之屬概不可施。兜草果飲有川芎白芷紫蘇柴胡青皮良姜之發表耗氣。立齋以補胃氣立論。誠得治瘧之本。若以草果飲為主。佐則失矣。不能無辨。

產後痢疾屬內外諸傷

大全曰產後痢疾由產勞傷臟腑不足。日月未滿。虛乏未復。或

勞動太早。或誤食生冷。行起太早。外傷風冷。乘虛入于腸胃。候食生冷難化之物。傷于脾胃。皆令泄瀉。甚則變痢。若血滲大腸。則為血痢。難治。世謂之產子痢。產後本虛。又加久痢。愈見羸弱。謂之虛羸下痢。又有產後氣不順。下痢赤白。謂之氣痢。治法熱則涼之。冷則溫之。冷熱相搏。則調之。滑者澀之。虛者補之。若產婦不能寬解。須當順氣。未有不妥者也。

產後下痢屬風冷乘虛

郭稽中曰產後腹痛及瀉痢者何。答曰產後腸胃虛怯。寒邪易侵。若未滿月。飲冷當風。乘虛襲留于盲膜。散于腹脇。故腹痛作。

女科經緯 卷六

痢

三

燕貽堂

陣或如刀刺。流入大腸。水穀不化。洞瀉腸鳴。或下赤白。肚脇腹痛。或痛走不定。急服調中湯立愈。若以為積滯取之。禍不旋踵。謹之。

產後痢疾作渴屬津液內竭

產寶百問曰產後下痢作渴者。水穀之精化為血氣。津液以養臟腑。臟腑虛燥。故痢而渴。若引飲則難止。反溢水氣。脾胃既虛。不能剋水。水自流溢。浸漬皮膚。則令人腫。但止其渴。痢自差。薛立齋曰產後痢作渴。渴而不喜冷飲。屬胃氣虛不能生津液也。七味白朮散如夜間發熱口渴者。腎水弱而不能潤也。

六味丸佐益氣湯以滋化源。

產後痢分證用藥

薛立齋曰產後痢或因飲食傷損脾土脾土虛不能消食當審消之若米食所傷六君子加穀芽麩食傷加麥芽萊菔子肉食傷加山楂神曲兼嘔吐加藿香若久不愈或非飲食所傷乃屬腎氣虧損必用四神六味八味丸補腎若用分利導水之劑是虛其虛也

產後滯下不可用下藥

繆仲淳曰凡產後痢積滯雖多腹痛雖極不可用大黃等藥行

女科經綸

卷六

產勞

无

燕貽堂

之致傷胃氣遂不可救但用人參歸芍紅麩醋炒升麻倍加甘草與益母草滑石足矣若惡露未盡兼用乳香沒藥砂仁阿膠自愈

慎齋按已上五條序產後有痢疾之證也痢本于外感六淫內傷飲食所致若產後當兼氣血虛處治故不可用治痢常法而以調補脾胃為要也又按產後痢屬氣血大虛不可治痢惟補氣血以大劑人參當歸主之

產後羸勞屬風冷搏于氣血

大全曰產後羸勞由生產日淺血氣虛弱飲食未平不滿百日

女科經綸 卷六

將養失所風冷密之搏于氣血不能溫于肌膚使虛乏勞倦乍臥乍起顏容憔悴食飲不消風冷邪氣感于肺肺受微寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受風邪流注臟腑須臾頻發時有盜汗寒熱如瘧背膊煩悶四肢不舉沉重着床此羸勞之候也

產後羸勞屬憂勞思慮所致

陳良甫曰婦人因產理不順疲極筋力憂勞思慮致令虛羸帶乏寒熱如瘧頭痛自汗肢體倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺名曰羸勞

女科經綸

卷六

產勞

三

燕貽堂

產後羸勞屬虧損血氣所致

產寶百問曰產後虛羸漸成羸勞皆由產下虧損血氣所致須慎起居節飲食調養百日庶保無疾若中年及難產者毋論日期必須調養平復方可動作否則氣血復傷虛羸之證作矣

產後羸勞當補脾胃養正氣為主

薛立齋曰羸勞當扶養正氣為主多因脾胃虛弱飲食減少致諸經疲憊當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟有所賴其病自愈

慎齋按已上四條序產後有羸勞之證也羸勞之成因產後

六二七

氣血虛損不慎起居或感風冷外邪或傷七情憂慮以致動
作不時將養失宜遂成瘵勞之候此產寶以調養為訓立齋
以養正為先也

產後血崩屬勞役驚怒所致

郭稽中曰產後血崩者何曰因產後所下過多血氣暴虛未得
平復或因勞役或因驚怒致血暴崩又有榮衛素傷氣衰血弱
亦變崩中若小腹滿痛此肝經已壞為難治俱宜固經丸止之
若小腹脹滿此為內有瘀血未可止之必致淋瀝

產後血崩屬酸鹹不節以傷榮衛

女科經綸

卷六

血崩

註

陳良甫曰產後傷耗經脈未得平復勞役損動致血暴崩或因
酸鹹不節以傷榮衛亦變崩中

產後血崩屬臟氣不平

陳無擇曰血崩不是輕病况產後有此是謂重傷恐不止酸
不節所致多因驚憂恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡
血不消鬱滿作堅亦或崩中固經丸自難貴効不若大料煮芎
藭湯加芍藥隨證治之

產後血崩分證用藥

薛立齋曰前證若血滯小腹脹滿用失笑散肝火血妄行加味

道遙散脾鬱不統血加末歸脾湯脾虛不攝血補中湯厚味
熱傷血清胃散加槐花風熱相搏傷血四君子加防風枳殼
慎齋按已上四條序產後有血崩之證也產後已亡血而又
有崩證似非輕病多屬陰虛氣脫所致稽中主于勞役驚怒
是本內傷七情為病若良山以酸鹹不節無擇以血藥斷早
均非病機之要予謂產後下多亡陰須用仲景法血脫益氣
純用血藥無濟也觀薛氏醫案有婦人血崩如湧以六君子
加黑姜而愈得其旨矣

產後便秘屬亡津液胃燥

女科經綸

卷六

註

金匱要略曰新產婦人有三病三者大便難何謂也而亡津液
胃燥故大便難

產後便秘屬內亡津液

聖濟總錄曰大腸者傳導之官變化出焉產後津液減耗胃中
枯燥潤養不足糟粕壅滯故令大便難或致不通蓋新產之人
喜病者由去血過多內亡津液故也

產後便秘屬血虛火燥

薛立齋曰產後大便不通因去血過多大腸乾澀或血虛火燥
不可計日期飲食數多用藥通潤之必待服滿腹脹自欲去不

能去乃結在直腸。宜膽導之。若服苦寒藥通之。反傷中焦元氣。或逾難通。或通而瀉不止。必成敗證。若血虛火燥。加味逍遙散。氣血俱虛。八珍湯。慎不可用麻仁杏仁枳殼之類。

產後便秘屬津液不足不可服寒藥

郭稽中曰。產後大便秘澁者。何荅曰。產後水血俱下。腸胃虛竭。津液不足。是以大便秘澁不通。若過五六月。悶脹者。此燥屎在。蒸腑乾澁。未能出耳。宜麻仁丸以潤之。若誤以為有熱。投寒藥。則陽消陰長。變證百出矣。

產後秘結屬血少腸燥不可用峻利藥

單養賢曰。產後大便日久不通。因血少腸燥故也。宜多服生化湯。則血旺氣順。傳化如常。自無燥澁之患。切不可用硝黃峻利之劑。以亡陰血。致中氣虛而便秘愈甚。遂成脹滿者。有之。

產後便秘戒輕用大黃

陳無擇曰。產後不得利。利者百無一生。去血過多。臟燥。大便秘澁。固當滑之大黃。似輕難用。惟葱涎調臘茶為丸。復以臘茶下之。

慎齋按。已上六條。序產後有大便秘結之證也。產後水血俱下。則大腸燥澁。便閉不通。全置聖濟均主津液內亡立齋主

文科經綸

卷六

大便

重

燕貽堂

血虛火燥。自是元氣內乏。受病故戒不可以苦寒峻利再傷。氣血漸致不救也。

產後小便不通屬內積冷氣

產乳集曰。產後小便不通。腹脹如鼓。悶亂不醒。蓋緣未產前內積冷氣。遂致產時。尿胞運動。用鹽于臍中填平。用葱白搗一指。厚安鹽上。以艾炷餅灸之。覺熱氣入腹內。即時便通。神驗。

產後淋屬熱客胞中

大全曰。產後諸淋。因產有熱氣客胞中。內虛則頻數。熱則小便澀痛。故謂之淋。

文科經綸

卷六

小便

重

燕貽堂

產後淋屬熱邪搏血滲入胞中

大全曰。有因產損氣虛。挾熱熱邪搏血。流滲胞中。血流小便而出。則為血淋。

產後淋治法宜重虛實

陳無擇曰。治諸產前後淋。其法不同。產前當安胎。產後當去血。如冷熱膏石氣淋等。為治則一。但量虛實用之。聖藥蒲黃。是產後要藥。惟當尋究所因。則不失機要矣。

慎齋按。已上四條。序產後有小便不通淋秘之證也。三因云。產前當安胎。產後當去血。此二語為與緊如產前淋。或由氣

虛不化當用參芪補氣安胎不可過用滲利產後淋或由汚血阻滯當以瞿麥蒲黃為要藥若血虛熱鬱當用六味九道遙散補陰養血滋其化源佐以導血藥可也

產後二便不通屬津液燥竭

大全曰產後大小便不通腸胃本挾熱因產水血俱下津液燥竭腸胃宿滯熱氣結于腸胃故令大小便不通有煩產下泄二便不通飲牛乳而通人乳尤善

產後小便數屬氣虛不制

大全曰產後數者氣虛不能制也

女科經綸

卷六

小便

證

產後小便不禁屬脾腎虛

薛立齋曰產後遺尿腎氣不固也五味子丸主之若脾腎虛弱用還少丹仍以補中湯為主虛寒加肉果補骨或四神丸若脾腎虛寒用八味丸四神丸佐之

產後小便不禁屬產傷膀胱

陳良甫曰婦人產理不順致傷膀胱遺尿無時

產後小便淋瀝屬損破尿脬

朱丹溪曰有收生不謹損破產婦尿脬致病淋瀝用猪羊胞煎湯入藥參芪為君歸地為佐桃仁陳皮茯苓為使于極飢時飲

之令氣血驟長其胞自完稍緩亦難成功也

產後小便淋瀝分證用藥

薛立齋曰穠婆不慎致胞損而小便淋瀝者八珍湯補氣血若因膀胱氣虛小便頻數當補脾肺若膀胱陰虛小便淋瀝須補肺腎方用補中湯加山萊山藥為主佐以桑螵蛸散

慎齋按已上六條序產後小便有數有不禁遺尿有淋瀝之證也經云腎主二便開竅二陰小便不禁淋瀝前陰病也產後氣血大虛有傷臟腑非肺氣虛而不能約制為遺尿為不禁即腎氣竭而多有虛熱移于膀胱為瀝為淋總以補養氣

女科經綸

卷六

小便

證

血加并提同溢之劑為主若用滲利疎導是重虛也戒之

產後小便出血屬熱乘胞內

大全曰產後小便出血因血氣虛而熱乘之血得熱則流散滲于胞內故血隨小便出有產後尿血而黃腸脹少食此肝木乘脾土也用加味逍遙散補中湯兼服而愈

產後大便出血分諸證用藥

薛立齋曰產後便血或飲食起居或六淫七情致元氣虧損腸絡外傷治法若因膏梁積熱加味清胃散因醉酒溼毒為花解醒湯怒動肝火六君子加芍歸芍藥柴胡因驚結傷脾加味歸

脾湯思慮傷心妙香散大腸風熱四物加栝葉荆防枳殼槐花
大腸血熱四物加苓連腸胃虛弱六君子加升柴腸胃虛寒六
君子加肉果木香因元氣下陷補中湯加茯苓半夏胃氣虛弱
六君子加舟麻血虛四物加升麻氣血虛八珍加升柴溫補
慎齋按已上二條序產後有二便下血之證也產後既凶血
而大小二便復有下血之患此非尋常火熱滲于膀胱歸于
大腸可例治也非血虛即氣脫心主血脾統血心氣虛則小
腸不能制而血流脾氣弱則大腸無移蔭而血下故二便出
血當責之心脾二經為病若大全竟以熱論立齋一條分因

女科經綸

卷六

月水

五

燕貽堂

雜出詳證配方未免膠柱似難責効立齋之書補元陰元陽
動以滋化源立論開發後人有功來學不少但每證輒以方
配某病用某方似欲後人按圖索驥刻舟求劍矣善讀立齋
之書者不知予言為河漢否也

產後發癰疽不可用治毒藥

產寶新書曰產後發癰疽宜生化湯加運喬金銀花甘草乳香
菴豆粉和服不可用大黃等藥并敗毒散之類
慎齋按新產婦人或在十朝十五朝之後忽發癰腫于四肢
胸腹間或是敗血不盡或是氣血虛弱榮氣不從逆于肉理

發為癰毒如敗血瘀滯經絡者當補血行血導痰疎氣為主
如氣血虛弱榮衛遲遲成癰腫者當補氣活血為主切不可
從毒治用寒涼清火解毒藥只用大補如十全八珍之屬以
固本元扶胃氣氣壯血流其毒自解若欲攻毒勢必潰爛不
能收功矣

產後月水不調屬風邪冷熱客經絡

大全曰產後月水不調由產傷動血氣虛損未復風邪冷熱之
氣客于經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少
或在月前或在月後名不調也

女科經綸

卷六

月水

五

燕貽堂

產後月水不調屬風冷傷經

大全曰產傷動血氣虛損未復為風冷所傷血得冷則凝結故
風冷傷于經血結胞絡之間令月水不通凡血結月水不通則
成血瘕水血相併復遇脾胃衰弱肌肉虛者為水腫

產後月水不通不必藥

陳良甫曰婦人冲在之脈為經絡之海皆起胞內手太陽小腸
于少陰心此三經上為乳汁下為月水若產後月水不通新產
後勞傷氣血或去血過多乳汁自然不通若乳子半歲或一歲
之內月經不行此常候非病也若半歲而行或四五個月便行

是少甘血盛之人若產後一二年月經不通無疾苦亦不必服藥或勞傷氣血冲任脈虛氣血衰少不行但服健脾胃資氣血之藥自然通行以藥通之為害滋大

慎齋按已上三條序產後有月水不調不通之證也月水不行為煩人要病至產後不行又不可以病言也大全二條均主風冷邪傷專以外感為病亦屬偏論失產後月水不調不通有因于產動勞傷臟氣血虛弱者有因于懷于自乳血脈上為乳汁者有因脾胃氣虛飲食少進者不止風邪冷熱之感也良甫一條甚悉病機至云但服健脾胃資氣血藥不必

女科經綸 卷六 乳病 堯

通經尤見探本之論

產後乳汁不行屬亡津液

大全曰。煩人乳汁氣血所化不行者。由氣血虛弱。經絡不調所致。或謂產後必有乳。乳雖脹而產後發作者。此年少之人。初經產乳有風熱。須服清利之藥。則乳行。若累經產而無乳者。亡津液故也。須服滋益之藥。助之。若有乳不甚多者。須服通經之藥。仍以羹臠引之。蓋煩人之乳。資以冲脈。與胃經通故也。有屢經產而乳汁常多者。亦煩人血氣不衰。使然。若煩人素有疾。在冲任經者。乳汁少而色黃。生子亦怯弱多疾。

產婦乳汁不行有二

陳無擇曰。產婦有兩種乳汁不行。有氣血盛而壅閉不行。有血氣少弱澁而不行。虛當補之。盛當疎之。盛者當用通草漏蘆土瓜根。虛者用煉鍾乳粉豬蹄鯽魚之屬。

產婦乳汁不行宜壯脾胃以滋化源

薛立齋曰。前證若氣血虛弱不能生化者。宜壯脾胃。怒動肝火。乳腫汁出者。宜清肝火。乳汁乃氣血所化。在上為乳。在下為經。若屢產無乳。或大便澁滯者。亡津液也。當滋化源。冲任之脈盛。脾胃之氣壯。則乳汁多而濃。衰則淡而少。所乳之子亦弱而多。

女科經綸 卷六 乳病 早

病

產後乳自出屬胃氣虛

大全曰。產後乳汁自出。胃氣虛也。宜補藥以止之。若未產而乳自出者。謂之乳泣。生子多不育。若產後勞役。乳汁湧下。此陽氣虛而厥也。獨參湯補之。

乳房腫脹用麥芽

薛立齋曰。凡煩人氣血方盛。乳房作脹。或無兒飲。痛脹寒熱。用麥芽二三兩炒熟。水煎服之。立消。其耗散血氣如此。何脾胃虛弱。飲食不消。方中多用之一。云麥芽最消腎。若氣血虛而乳汁

自出者宜十全大補湯

。產後乳癰屬邪熱攻陽明血搏氣滯

聖濟總錄曰產後冲任不足氣血俱虛其熱潛行入足陽明之脈直行者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中冲脈者起于氣冲蓋足陽明之經夾臍上行至胸中而散其經為邪熱攻冲則血為之擊搏氣為之留滯擊搏則痛作留滯則腫生產後多有此疾由乳汁壅積與氣相擊搏故也

慎齋按已上六條序產後有乳汁不行之證也煩人以血用事上為乳汁下為月水而血之所化則本于脾胃飲食之精

微運行而為乳為經產後脾胃之氣旺則血旺而乳多脾胃之氣衰則血減而乳少此立齋治乳汁以壯脾胃滋化源為要也若不顧脾胃以補氣血徒從事于通乳之劑是猶求于金于乞丐而不可得矣

產後陰脫屬產勞太過所致
陳三因曰煩人越產勞力勞熱太過致陰下脫及陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水續續小便淋瀝硫黃烏賊骨五味子為未參之

產後玉門不閉屬氣血不能收攝

陳良甫曰產門不閉由元氣素弱胎前失于調養以致血氣不能收攝故也十全大補湯有初產陰戶腫脹或嫩痛不閉或求逍遙散若腫不閉者補中湯加五味子切忌寒涼之藥

產門不閉腫痛分證用藥

薛立齋曰玉門不閉氣血虛弱也十全大補湯腫脹嫩痛肝經虛熱也加味逍遙散

慎齋按已上三條序產後有陰脫不閉之二證也產後一切證總以氣血大虛為治况陰挺下脫玉門不閉乎故丹溪立齋醫案有產戶下一物如手帕者有下一物如合鉢有二岐

者有出肉線一條者有子宮損落一片者凡此皆氣虛血脫故子戶胞門見證種種共立方處治不過參芪歸地加以升提收澁臨證之工可以神明之矣

女科經綸 卷六 胎前 胎前

女科經論卷七

橋李蕭 撰 廣六纂著

禾部

全纂訂

崩帶門

經論血崩屬悲哀陽氣內動

女科經論

卷七 血崩

燕貽堂

素問曰悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發為心下崩數洩血

經論血崩屬悲哀熱氣在中

素問曰悲哀太過則心系急肺布葉舉而上焦不通熱氣在中故血走而崩也

經論血崩屬陰虛陽搏

素問曰陰虛陽搏謂之崩

經論血溢屬勞力傷腸胃絡脈

靈樞曰猝然飲食則腸滿起居不節用力過度則絡脈傷陰絡

傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢于外

慎齋按已上經論三條序煩人血崩之屬內傷為病也血崩有得之悲哀者此七情傷心之崩也有得之勞力者此內傷勞倦之崩也

經論血崩屬于熱

運氣曰少陰司天熱淫所勝民病血泄少陽在泉火淫所勝民病便血歲金不及炎火乃行民病下血綱目曰是火炎助心血盛而血下也

經論血崩屬于寒

女科經論

卷七 血崩

二

燕貽堂

運氣曰太陰司天寒淫所勝血變于中民病血泄太陽之勝血脈凝泣感為血泄陽明司天之氣民病便血治以諸熱綱目曰是寒攻心血虛而下血也

經論血崩屬于風

運氣曰少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫民病血崩慎齋按已上經論三條序煩人血崩之屬火熱風寒外感為病也血崩固屬內傷不足證而火熱風寒客邪之感亦間有之但血崩為煩人前陰病屬于內因運氣血泄便血是言太陽下血屬于外因綱目列之血崩證內則誤矣序書之訛在

于全善且然而況下此乎姑存以俟正之

金匱論血崩屬三焦絕經

張仲景曰寸口脈微而緩微者衛氣疎疎則其膚空緩者胃弱不實則穀消而水化穀入于胃脈道乃行水入于經其血乃成榮盛則其膚必疎三焦絕經名曰血崩

金匱論崩漏屬虛寒相搏

張仲景曰寸口脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛虛寒相搏此名曰草嬾人則半產漏下

慎齋按已上金匱二條序嬾人崩漏本于三焦絕經而芤減

女科經綸

卷七

血崩

三

之脈為虛寒相搏之病也

○崩漏屬敗血膿積

王海藏曰或因胎產或因酒色前後脫血帶漏不已先由子臟俱入赤腸澤液惡穢前行大過滓糞燥結後滯不通此胎腸俱病治宜推去敗血膿積益血致新也心所不生脾所不聚肝所不藏此三焦絕也宿雖為病亦有淺深新久治亦從輕重之

○血崩有瘀屬惡血未盡

戴原禮曰血大至曰崩或清或濁或純下瘀血勢不可止有崩甚腹痛人多疑惡血未盡又見血色瘀黑愈信惡血之說不放

止截大凡血之為患欲出未出之際停在腹中即成瘀血以瘀為惡又焉知瘀之不為虛冷乎瘀而腹痛血行則痛止崩而腹痛血住則痛止芎歸湯加姜附止其血而痛自止

○血崩屬涎鬱胸膈

朱丹溪曰有涎鬱胸中清氣不升故經脈壅遏而降下非開涎不足以行氣非氣升則血不能歸隊道此論血泄之義甚明蓋以開胸膈間之濁涎則清氣升清氣升則血歸隊道而不崩矣其證或腹滿如孕或臍腹疝痛或血結成片或血出則快止則悶或臍上動治宜開結痰行滯氣消汚血

女科經綸

卷七

血崩

四

慎齋按已上三條序血崩之屬汚血痰涎實邪為病也凡病先明虛實寒熱如崩漏證有虛有實有寒有熱虛者主于血虛氣虛陰虛陽虛實者主于汚瘀惡血痰涎鬱滯虛則為寒為冷實則為火為熱此證之不可不先辨者也

○崩漏屬沖任血虛不能約制

聖濟總錄曰嬾人崩漏病經血淋瀝不斷是也沖任之脈至有時若非時而下猶器之津洩故名曰漏下蓋由血氣衰不能約制又有瘀血在內因冷熱不調使血敗其色或赤如豆汁黃如爛瓜黑如衄青如藍血如膿五色隨五臟虛損而漏應焉

崩下屬冲任氣虛不能制。朱丹溪曰崩下由臟腑傷損衝任二脈血氣俱虛故也。二脈為經脈之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若勞傷過極冲任氣虛不能約制經血故忽然而下謂之崩中暴下治當大補氣血升舉脾胃之氣微加鎮墜心火之藥以治心補陰瀉陽而崩自止。東垣有治法但不言熱其主在寒學者宜細思之。

血崩屬陽虛不足

趙養葵曰血崩之疾當分陰陽而治氣血人身之陰陽也陽主升陰主降陽根陰陰根陽一升一降循經而行無崩漏也若陽

女科經綸

卷七

血崩

五

有餘則升者勝血出上竅陽不足則降者勝血出下竅總之血隨陽氣而升降陽氣者風也風能上升然必須東方之溫風始能升故用助風益氣湯凡氣虛不能捍血而崩者其人必面白尺脈虛大食飲無味久病者有之

慎齋按已上三條序血崩之屬血虛氣虛陽虛不足也血崩本為血病而有陽氣之虛者血脫氣亦脫也陰陽相維互為其概陰血大下陽不能維固當以無形之氣生有形之血也

血崩屬熱為陽脈有餘病

張子和曰婦人天癸盡本不當下血血得熱而流散非寒也女

子血崩多因大悲哭甚則肺葉布心系為之急血不禁而下崩經曰陰虛陽搏謂之崩陰脈不足陽脈有餘數則內崩血下流世有以虛損治之莫有知其非者可服大劑黃連解毒湯

血崩屬陽乘于陰為陽邪有餘病

許學士曰崩中多用止血及補血藥不効以露蘆酒治之此陽乘于陰所謂天旱地熱經水沸溢是也經云陰虛者尺脈虛浮陽搏者寸脈弦急也是為陰血不足陽邪有餘故為失血內崩證用奇効四物加膠艾再入黃芩醫曰心主血血得熱則行得寒則止故漏下屬熱兼虛者四物加黃連凡婦人感熱血脈妄

女科經綸

卷七

血崩

六

行病曰熱崩以抑氣散倍加生地

血崩屬熱不可作寒論

王海藏曰婦人血崩來如潮湧明是熱勢妄行豈可作寒論治宜清補兼升提不可驟止

經血暴崩屬火熱為喜怒驚恐所致

張子和曰婦人經血終于七七之數數外暴下經曰火主暴速亦因暴喜暴怒憂結驚恐所致然也慎不可作冷病治之用峻熱之藥則效可用黃連解毒湯以清于土更用蓮房殼灰棕灰以添于下後用四物加胡索散涼血和經之藥

血崩屬陰虛火逼妄行關心腎二經

馬文臺曰。經云。陰虛陽搏。謂之崩。蓋尺脈既虛。則血已損。寸脈搏擊。虛火愈熾。謂之曰崩。由火逼而妄行也。頰人血崩。是從胞絡宮來。血久下行。已為熱經。則本宮血之十二經之血。皆從此滲漏矣。然胞絡下繫于腎。上通于心。故此證實關心腎二經。宜有陰虛陽搏之脈也。東垣用十二經引經之藥。使血歸十二經。然後用黑藥止之。若徒用黑藥。不先服領血歸經藥。病亦難愈也。

血崩屬真陰虛不能鎮守包絡相火

女科經綸 卷一 血崩

張素古曰。崩者。倏然暴下也。漏者。淋瀝不斷也。將息失宜。勞役過度。喜怒不常。大傷于肝。肝為血府。傷則不藏血。而為崩中。漏下。或悲思憂恐。太甚。陽氣內動。真陰虛不能鎮守。包絡相火。故血走而崩。宜養血安神為主。或因脾胃氣虛。下陷腎與相火相合。濕熱下迫。而致宜調脾養血為主。或大小新產。遺精房事。皆作崩漏。或經水未絕。慾食而傷血海。亦致崩漏。皆宜養血鎮守為上。

崩漏屬脾胃虛火乘心包

李東垣曰。女子漏下惡血。或暴崩不止。多下水煎之物。皆由欲

食不節。或勞傷形體。或心氣不足。致令心火乘脾。脾土受邪。夫脾土滋榮周身者也。心生血。血主脈。二者受邪。病皆在脈。脈之府也。心脈之神也。心不主令。包絡代之。心系者。包絡命門之脈也。主月事。生孕。因脾胃虛。而心包乘之。故漏下血水不止。當除濕去熱。用升陽除濕湯。此藥乃從權衡之法。以風藥勝濕。為胃氣下陷。而迫于下。以救其血之暴崩也。若病愈。經血惡物已盡。主病雖除。後必須以黃芪人參甘草當歸之類。數服以補之。若經血惡物下之不絕。尤宜救根本。當益脾胃。退心火之亢。甚

是治其根蒂也

女科經綸 卷一 血崩

崩漏屬心火亢甚肝實不納血

虞天民曰。頰人崩漏不止。先因心火亢甚。于是血脈泛溢。以致肝實而不納血。出納之道。遂廢。經曰。子能令母實。是肝腎之相火。挾心火之勢。從而相扇。所以月水錯經。妄行無時。而泛溢也。若不早治。漸而崩中。甚則為血枯發熱。勞極證。不可治矣。

慎齋按。已上八條。序崩漏之屬。火熱為病也。血崩漏下。內經運氣的主于火。然火亦有虛實之分。惟子和學士海藏三家。則以陽邪有餘立論。故有不可作寒冷治法之說。至素古東垣。雖言包絡相火。心火乘脾。而曰真陰虛。曰脾胃虛。則又不

可純以火熱為治矣。玄臺天民亦從張李以發明其未盡路。是證者母竟從火治必兼潔古東垣之論為不易也。

血崩屬寒在下焦

陳良甫曰：煩人衝任二脈為經脈之海。外循經絡內榮臟腑。若陰陽和平則經下依時。如勞傷不能約制忽然暴下其則昏悶。若寸脈微遲為寒在上焦則吐血。芤尺脈微遲為寒在下焦則崩血。便血法當調補脾胃為主。

崩漏日久化寒主升舉論

李東垣曰：聖人治病必本四時升降浮沉之理。經漏不止是前

女科經綸

卷一

血崩

九

陰之氣血已下脫水瀉不止。是後陰之氣血又下陷。後陰者主有形之物。前陰者精氣之門戶。前後二陰俱下。是病人周身之氣常行秋冬之令。主肅然收藏。人身中陽氣升浮。穀氣上行。則陽生陰長。春夏是也。既病則周身氣血皆不生。長穀氣不升。前雖屬熱。下焦久脫。已化為寒。久沉久降。寒濕大勝。當急救之。瀉寒以熱。降濕以燥。大升大舉。以助生長。補養氣血。不致偏枯。聖人立治法。云濕氣大勝。以所勝助之。甲風木上升是也。經云。風勝濕。是以所勝平之。當和調胃氣而滋元氣。如不止。用風藥以勝濕。此之謂也。

血崩服寒藥變寒用熱治法

薛立齋曰：有煩人患崩。過服寒藥。脾胃久虛。中病未已。寒病復起。煩渴引飲。粒米不進。昏憤時作。脈洪大。按之微弱。此無根之火。內虛寒而外假熱也。十全大補加附子。崩減。日服八味丸。愈。又有久患崩。服四物涼血劑。或作或止。有主降火。加腹痛。手足俱冷。此脾胃虛寒所致。先用附子理中湯。次用濟生歸脾補中益氣二湯。崩頓愈。若泥痛無補法。則誤矣。

慎齋按：已上三條。序血崩之屬虛寒為病也。血崩屬火熱致病者多。崩中日久。則熱變為寒。亦有服寒涼過甚。中寒內生。

女科經綸

卷一

血崩

十

者。東垣立齋之案治。不可不留意也。崩漏有實有虛。有熱有寒。寒熱虛實之辨明。而治法可以不忒矣。

崩漏有五色之分

王叔和曰：五崩何等類。師曰：白崩者。形如涕。赤崩者。形如絳。青崩者。形如爛瓜。青崩者。形如藍色。黑崩者。形如衄血。

崩有陰陽以五色分五臟屬虛冷所致

齊仲甫曰：受熱而色赤者。謂之陽崩。受冷而色白者。謂之陰崩。五臟皆虛。五色隨崩俱下。一臟虛。隨臟見色而下。其色白如涕。知肺臟之虛冷也。其色青如藍。知肝臟之虛冷也。其色黃如爛。

瓜。知脾臟之虛冷也。其色赤如絲。知心臟之虛冷也。其色黑形加肝血。知腎臟之虛冷也。五臟俱虛。五色相雜。謂之五崩。

崩漏有陰證陽證之分

龔雲林曰。崩漏之證。有陰陽。若婦人年五十後。經止數年。忽然又行。兼腹痛。或身熱。口渴。者。曰崩。此陰證也。若婦人年三十。四十後。經行三十日。湧暴不止者。曰漏。此陽證也。

慎齋按。已上二條。序崩漏有陰陽五色五臟之見證也。

血崩心痛名殺血心痛

陳良甫曰。婦人血崩。心痛。名曰殺血。心痛。由心脾血虛也。若小

產去血過多。而心痛者。亦虛也。用烏賊骨炒末。醋湯下。失笑散。

血崩心痛屬血虛心無所養

薛立齋曰。血崩兼心痛者。心主血。去血過多。心無所養。以致作痛。十全湯。倍參朮。多服。如瘀血不行者。失笑散。陰血耗散者。烏賊丸。收斂之。

慎齋按。已上二條。序血崩有兼心痛之證也。

治崩漏先調其氣

許叔微曰。治下血不止。成五色崩漏。香附是煨人仙藥。醋炒為末。火服為佳。又曰。女人以氣血為主。不知因氣不先理。然後血

脈不順。卽生崩帶。諸證。抑氣散異香。四神散。大有奧理。

慎齋按。香附味辛氣溫。能行十二經。八脈為血中耗氣之藥。煨人虛寒氣鬱不舒。用之固宜。若陰虛血熱。有口乾燥。渴骨蒸。五心煩熱等證。而必謂煨人之仙藥。以用之。未免抱薪救火矣。慎之。

崩漏有分證治法

李太素曰。崩為急證。漏為緩病。崩必是大怒傷肝。沖動血海。或火盛之極。血熱沸騰。而然。漏則房勞過度。傷損沖任二脈。氣虛不能約制經血。或其人平素多火。血不能安。故不時漏泄。崩宜

女科經綸 卷七 血崩

十一

三

理。氣降火升。提漏宜滋陰養氣。養血。或兼制火。

治血崩有初中末之三法

方約之曰。血屬陰。靜則循經。榮內動則錯經妄行。故七情過極。則五志亢甚。經血暴下。久而不止。謂之崩中。治法初用止血。以塞其流。中用清熱涼血。以澄其源。末用補血。以復其舊。若止塞其流。不澄其源。則循天之勢。不能遏。若止澄其源。而不復其舊。則孤陽之浮。無以止。不可不審也。

慎齋按。治崩之法。有消逐汚血。有寒涼降火。有收澁固脫。有大升大舉。有扶脾健胃。有補氣補血。有溫暖下焦。種種不一。

方氏三法分初中末。有倒行逆施之弊。予謂中法當為初法。初法當為末法。末法當為中法。庶無差治也。

治崩漏宜調脾胃為主

薛立齋曰。人以脾胃為本。納五穀。化精微。清者入榮。濁者入衛。陰陽得此。是謂橐籥。人得土以養。百骸失土則枯。四肢東垣以飲食自傷。醫多妄下。清氣下陷。濁氣不降。乃生腹脹。所以胃腕之陽不能升舉。其氣陷入中焦。當用補中湯。使濁氣得降。不治自安。若因飽食後致崩漏。是傷脾氣。下陷于腎。與相火相合。濕熱下迫所致。宜甘溫之劑。調補脾胃。則血自歸經。若誤用寒涼。

女科經綸

卷一

崩漏

三

損傷胃氣。則不能攝歸經。東垣曰。凡下血證。須用四君子湯。收功。厥有旨哉。此皆從脾胃本源病治。不可不知也。

慎齋按。已上四條。序治崩漏之大略也。

婦人血崩服四物湯問

王海藏曰。婦人月事不至。是為胞閉。為血不足。宜服四物湯。婦人崩者是為血有餘。亦服四物湯。何也。曰。婦人月事不至者。內損其原。不能生。故胞閉不通。是血不足。宜服四物湯。是滋原和血之藥也。崩中者是血多也。暴損其原是火逼妄行。瀉竭為根。亦宜四物湯。何潤燥益原之藥也。

崩漏屬虛熱用藥之法

朱丹溪曰。崩漏有虛有熱。虛則下瀉。熱則宜通。氣虛血虛。皆以四物加參芪。因勞力者。參芪加升麻。熱加黃芩。寒加乾姜。又曰。漏下乃熱而虛。四物加黃連。崩過多者。先用五靈一服。紫色成塊者。血熱也。四物加柴胡黃連。後用四物加黑姜。急則治標。用白芷湯下百草霜。

崩漏分諸證用藥之法

薛立齋曰。經云。陰虛陽搏。謂之崩。又云。陽絡傷。血外溢。陰絡傷。血內溢。又云。脾統血。肝藏血。其為患。因脾胃虛損。不能攝血。歸。

女科經綸

卷一

崩漏

四

經。或因肝經有火。血得熱而下。行。或因肝經有風。血得風而妄行。或因怒動肝火。血熱沸騰。或因脾經鬱熱。血不歸經。或因悲哀太過。胞絡傷而下。崩治療之法。脾胃虛弱者。六君子加芎歸。柴胡脾胃虛陷者。補中湯加白芍山梔。肝經血熱者。四物湯加柴胡山梔。蒼木。肝經風熱者。加味逍遙散。或小柴胡加山梔白芍。丹皮。若怒動肝火。亦用前藥。脾經鬱火者。歸脾湯加山梔柴胡。丹皮。悲傷胞絡者。四君子加升麻山梔。故丹溪東垣云。凡下血證。須四君子收功。斯言厥有旨也。若大去血後。母以脈診。急用獨參湯。其發熱潮熱。咳嗽脈數。乃元氣虛弱。假熱之脈也。凡。

當用人參此等證無不由脾胃先損故脈洪大察其中有胃氣受補則可放設用寒涼復傷脾胃生氣反不能攝血歸源是速其危也。

血崩用藥有三治

醫聖元戎曰女子經病血崩久而成枯者宜瀉之益之血閉久而成竭者宜益之破之破血有三治始則四物入紅花調黃芪肉桂次則四物入紅花調鯨鯉甲桃仁桂童便和酒煎服末則四物入紅花調易老沒藥散

慎齋按已上四條序治血崩用藥之大法也

女科經論

卷七

血崩

五

血熱崩漏用荆芥四物湯論

武叔卿曰血藏于肝肝氣不升則熱迫于下故血不能藏而崩也。沉厥陰之經環陰器。廷孔前陰皆屬之。荆芥升肝氣香附理肝氣條芩除內熱四物養血涼血故能收功也。

血熱崩漏用河間生地黃散論

武叔卿曰河間生地黃散治經漏不止脈虛洪經水紫黑夫脈虛洪者氣不足也紫黑者熱之甚也黃芪所以補氣氣盛則生火天冬地骨以清氣中之火熟地所以生血血生而不涼尤慮妄行故以生地黃連涼心芍藥甘草緩肝益脾柴胡升舉柯根

地黃又肝腎全歸者也

熱崩用涼血地黃湯論

武叔卿曰涼血地黃湯治婦人血崩不止腎水陰虛鎮守胞絡相火血走而崩夫陰者從陽而亟起也血屬陰陰不自升故諸經之血必隨諸經之氣而後升若氣有所陷則熱迫血而內崩矣故用黃柏以清下焦胞絡之火心者火之主也故以生地黃連治火之原知母黃芩滋水之母歸尾破瘀紅花生血所謂去故生新也川芎行血海之餘曼荆涼諸經之血升柴防羌其本細辛諸風藥皆所以升諸經之氣也諸經氣行則陰血不得不隨之而起矣故曰從陽亟起也有是證者法之

女科經論

卷七

血崩

六

慎齋按血崩不止則去血過多矣方中風藥大半不敵生地一味獨不慮風藥燥血乎雖云升舉而血之耗者已多用方者酌之

虛寒崩漏用丁香膠艾湯論

武叔卿曰丁香膠艾湯治婦人崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節其脈兩尺俱弦緊而洪按之無方其證自覺臍下如冰求厚衣被以禦寒白帶白滑之物雖多間下如屋漏水下時有鮮血不多右尺脈時微洪屋漏水暴下者是弦急脈為寒多

洪脈時見乃熱少合而言之急弦者北方寒水多也洪脈時出者命門胞絡之火也黑物多赤物少合成屋漏水之狀也以四物湯加丁香阿膠生艾

虛寒崩下用鹿茸丸論

武叔卿曰鹿茸丸治經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸少氣臍腹冷極則汗如雨兩尺脈微小由冲任虛衰為風冷客胞中氣不能固可多開元百壯夫丹溪以紫黑為禁此言瘀黑者乃下焦氣寒血凝而黑各有治法然女子氣海在上血海在下故下焦溫而後氣升血行如鹿茸以血成形由氣而長血隨氣上

女科經絡 卷七 血崩

而成角故入血分以生升又以附子艾葉佐而溫之以赤石脂禹餘糧鎮而固之柏葉清之歸地續斷補之誠下元虛寒之全方也不加人參豈無意焉而炙開元之意可想矣

虛寒崩漏用伏龍肝散論

武叔卿曰伏龍肝散治勞傷冲任脈虛非時崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸夫五色者五臟之色崩久則五臟氣陷血不能化故五色見焉蓋生血于氣而化于中焦氣生于下元而培于脾胃如臍腹疼痛者下元氣衰也以艾

葉溫之黃瘦食減無力者中焦氣寒也以乾姜煖之伏龍肝有火土相生之妙君以川芎有扶肝行濁之能肉桂甘草和榮衛而通調血脈麥冬熟地益金水而治虛煩口乾石脂當歸補血以固脫通之澁之濕之濡之誠治久脫藏寒之良方也

勞傷崩漏用當歸芍藥湯論

武叔卿曰當歸芍藥湯治婦人經脈漏下不止其色鮮紅先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食四肢倦怠大便時澀東垣製此方一服後諸證悉去大抵因勞役下血若拘血熱之說用四物加黃芩則不愈矣蓋血虛須兼補氣

女科經絡 卷七 血崩

譬之血猶水也氣猶隄也隄堅則水不橫決氣固則血不妄行自然之理也黃芪最多白朮次之四物兼生熟地以陳皮甘草柴胡佐之俗醫不達此理常用涼藥不知涼藥傷胃服久則正氣愈弱血安得固故特表而出之

氣陷崩漏用益胃升陽湯論

武叔卿曰東垣云血脫益氣古法也先補胃氣以助生長故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉世皆以為補氣殊不知甘能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之一身內數為寶補中益氣方加神曲黃芩各益胃升陽湯以起始人崩血之漏氣下

陷者。

火鬱崩漏用升陽除濕湯論

武叔卿曰。升陽除濕湯。治女子漏下惡血。或暴崩不止。夫土陷則濕。故怠情嗜臥。木鬱則熱。故氣上冲。緩為濕之徵。弦為木之象。鬱而不伸則熱。此心火乘脾也。脈之洪大者。火在下也。胞絡為相火。寄于命門。為多血之經。病從火。心火以藏德為神。相火聽命于心。三焦主氣。胞絡主血。故血分之火。專主胞絡氣分之火。專主三焦。鬱則火不得遂。炎上之性。迫于血分。故陰絡傷也。方以蒼朮升麻。發太陽陽明之濕。柴胡防風。達厥陰少陽之木。

女科經綸

卷七

血崩

九

羌活。藥本以升舉少陰太陽下部之鬱。所謂下者舉之也。但升散之物。過則耗氣而傷金。故又以黃芪保肺。當歸引血。使各有所歸。甘草和氣。蔓荊涼血。此四種者。又制亢害之法也。

氣虛崩漏用斷下湯論

武叔卿曰。斷下湯。治冲任氣虛。崩中漏下。臍腹痛。漸減飲食。四肢無力。此膠艾四物之變例也。彼有芍藥。此有人參。于姜。艾。大。概血虛而不斂者。宜芍藥。酸寒以收之。氣脫而不溫者。宜參。姜。烏賊之類。溫補而泄之。阿膠者。益金水以成收藏之用也。陽虛則寒。陰虛則熱。故以此主之。而腹痛一證。人皆以為瘀血者多。

此以為漏不止者。服熱附丸。正元禮。所謂崩而腹痛者。崩止而痛除也。

血瘀崩漏用五靈脂

武叔卿曰。五靈脂散。治血崩不止。不拘多少。炒令烟盡。研末。加當歸酒。或童便。調下三錢。一名抽刀散。治產後惡血。心腹痛。不可忍。其効如神。真救急之良方也。人家不可不備。并治蛇蝎蜈蚣咬。塗傷處立愈。

崩漏丸論

濟陰綱目曰。氣血人身之陰陽也。陽主升。陰主降。陽根乎陰。陰

女科經綸

卷七

血崩

十

根乎陽。一動一靜。互為其根。則一升一降。循經而行。無崩漏之患。若陽有餘。則升者勝。血從上竅而出。陽不足。則降者勝。血從下竅而出。是丸也。肉桂。人參。芪。朮。甘草。壯陽益氣之品也。二活。柴。防。高。細。川。芎。升。陽。舉。經。之。品。也。歸。地。白。芍。桃。仁。紅。花。滋。陰。入。血。之。品。也。壯。陽。則。氣。不。虛。舉。經。則。血。不。陷。滋。陰。則。血。不。燥。如。是。因。血。為。氣。之。守。氣。為。血。之。衛。血。榮。于。中。氣。衛。于。外。升。降。上。下。一。循。乎。經。胡。自。而。崩。哉。

崩漏用灰藥主治

醫學綱目曰。氣陷者。用升氣藥。灰。止之。如夏枯草。荆芥之類。血

熱者涼血藥灰止之如槐花黃芩之類氣滯者用行氣藥灰止之如醋炒黑香附之類血汚者炒熱失笑散之類血寒者用熱藥灰如桂心乾姜之類血脫者用滋藥如白礬百草霜棕灰之類

慎齋按已上十三條序治崩漏用藥之方論也濟陰綱目載方立論不止于此數方詳說簡要切用故採錄之

崩漏之脈

脈訣舉要曰崩漏下血脈遲小虛滑者生疾急大實緊數者死尺舉虛者漏血脈浮者死不治

女科經綸 卷二 帶下 帶下證

經論帶下屬任脈為病

素問曰任脈為病男子內結七疝女子帶下瘕聚

王註曰任脈起于胞中上過帶脈貫于臍上起于季脇章門似束帶狀故曰帶下

經論帶下屬小腸寬結

素問曰脾傳之腎名曰疝瘕小腸寬結而痛出白名曰白蠱出白澁又曰少腹寬熱澁出白液

經論帶下歷思想無窮所致

素問曰思想無窮所願不得意淫于外入房太甚發為白淫王註曰白淫者白物淫衍如精狀男子因澁而下女子陰中綿綿下也

慎齋按已上經論三條序帶下為任脈小腸經之病而其因或得之思想入房所致也經文白蠱白液白淫即是男子白濁之屬婦人帶下亦屬白物王太僕以為陰中綿綿下即是白帶之物也若思想無窮入房太甚乃夢遺證也與帶下證有別因前賢論帶下必引經文數條為證故載之

考婦人帶下屬任脈之病

女科經綸 卷二 帶下

三

劉河間曰帶下者任脈之病也經云任脈者起于中極之下以手毛際循腹裏上關元至喉咽上頤循面任脈自胞上過帶脈貫臍上其病所發正在過帶脈之分淋瀝故曰帶慎齋按已上一條序帶病本于任脈之考也

帶下屬于風冷入肝

聖惠方曰婦人帶下者由勞神過度損動經血致令身虛受于風冷風冷入于肝絡傳其血之所成也

帶下屬風邪乘虛入于肝中

巢元方曰任脈為經之海任之為病女子則為帶下手太陽為

小腸經手少陰為心經心為臟主裏小腸為腑主表二經之血在媢人上為乳汁下為月水衝任所統也衝任脈起于脀內陰陽過度則傷脀絡故風邪乘虛入于脀中損衝任之經傷太陽少陽之血致令脀絡之間穢與血相兼帶而下冷則白熱則赤

帶下屬風冷傷于胞絡

嚴用和曰媢人赤白帶下此由勞傷衝任風冷據于胞絡媢人平居血欲常多氣欲常少而疾不生或氣倍于血氣倍生寒血不化赤遂成白帶若氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交併赤白俱下其脈右尺浮浮為陽陽絕者無子若足冷

女科經綸

卷七

帶下

三

帶下輕則漏下甚則崩中皆心不榮血肝不藏血所致

帶下出于風冷停宿

楊仁齋曰帶之為患出于風冷停宿官桂干姜細辛白芷先與散其寒邪然後為封固用二朮人參以補氣

帶下屬下元虛冷

戴復庵曰赤白帶下皆因七情內傷或下元虛冷感非一端犬率下白帶多問有下赤帶者宜順氣散吞鎮靈丹佐艾附丸帶下不止成疝瘰者四物加牡蠣下固腸丸帶下屬虛寒精氣蘊積而成

李氏曰帶下有虛寒帶腥臭者因小水淋瀝不已或崩中暴下或產後去血過多以致陰虧陽竭榮氣不升經脈凝泣衛氣下陷精氣累滯下焦蘊積而成白滑如涕下流腥臭者黃芪建中湯去桂加當歸

慎齋按已上六條序媢人帶下屬風冷寒邪為病也媢人帶下不止風冷邪于自聖惠方以風冷入脀絡立論巢氏以下諸家遂無異議豈知病邪之感不一故以張子和濕熱之論序後當令濕熱諸論參治庶無偏失也

室女帶下有三病所致

女科經綸

卷七

帶下

讀

產寶百問曰未嫁女子有三病何也曰女子一病經水初下陰中必熱或當風臥或乘涼飲冷二病太冲脈盛則內熱以冷水澆洗之三病或見丹下驚怖或因鬱怒悲哀之氣擊搏三者一有所犯後必有帶下之疾

媢人帶下分三證所感俱屬風冷客邪

婁全善曰未嫁之女月經初下止而即浴以冷水或熱而當風此室女病帶下之由也有家之媢陰陽過多即傷胞絡風邪乘虛而入胞絡觸冷遂成穢液與血水相混而下也產後帶下山亡血過多則氣脫傷動胞絡玉門未閉外風襲體虛風冷乘之

冷與熱搏則成液而下

慎齋按已上二條。序室女與婦人帶下之病所感有三證之分。不外風冷客邪之傷也。

帶下屬濕熱寬鬱不可主風冷論

張子和曰。婦人帶下。聖惠方與巢氏二家之說。皆非也。夫治病當先識經絡。人身大經有十二。奇經有八。脈十二。經與八脈通。身往來經絡共二十道。上下流走環周。晝夜不息。然此十二經。上下周流者。止十九道耳。惟帶脈起少腹季脇之端。乃章門穴也。環周一身絡腰而過。如束帶之于身。難經云。帶之為病。溶溶

女科經綸

卷七

帶下

垂

如坐水中。冲任者是經脈之海也。循腹脇。夾膈。傍傳流于氣冲。屬于帶脈。絡于督脈。督脈者起于關元穴。任脈者女子養胎孕之所。督脈乃是督領。婦人經脈之海也。冲任督三脈同起而異行。一源而三岐。皆絡于帶脈。冲任督三脈皆統于箕戶。循陰器。行。廷孔。溺孔。上端。冲任督三脈以帶脈束之。因餘經上下往來。遺熱于帶脈之間。客熱抑鬱。熱者血也。血積多日不流。從金之化而為白。乘少腹寬熱。白物滿溢。隨洩而下。綿綿不絕。是為白帶。多不痛。或有痛者。因壅滯而成也。經曰。少腹寬熱。洩出白液。寬者屈滯也。病非本經。為他經寬鬱而成。此疾皆從濕熱治之。

遺熱于小腸。從金化而為白。與治病全法。赤白痢。乃邪熱傳于大腸。赤白帶。邪熱傳于小腸。故治二證。不可驟用峻熱藥。燥之則內水涸。內水涸則必煩渴。煩渴則小便不利。則足腫。面浮。漸至不起。治法先以導水。禹功瀉之。次以淡劑。降心火。益腎水。下小溲。利水道。則愈矣。

帶下屬任脈濕熱鬱結不可川辛熱治

劉河間曰。帶下由下部任脈濕熱甚。津液溢而為帶下也。如火煉金。熱極反兼水化。如六月熱極。則物反出液。而濕潤。木流津。故肝熱甚則出泣。心熱則出汗。脾熱則出涎。肺熱則出涕。

女科經綸

卷七

帶下

垂

燕貽堂

賢熱則出唾。猶煎湯熱甚。則沸溢。及熱氣熏蒸于物。而生津也。俗醫治白帶。用辛熱藥。病微者。或令鬱結。開通流濕。潤燥重者。反加病。刺莫若以辛。苦寒藥。按法治之。使微甚者。得鬱結開通。濕法燥除而愈也。

帶下屬任脈經虛濕熱寬結

張潔古曰。帶下證。皆任脈經虛也。赤者熱入小腸。白者熱入大腸。原其本。皆濕熱結于任脈。故津液湧溢。為赤白帶下。本不病。結緣任脈虛。結熱滯于帶脈。故臍下痛。陰中綿綿而下。此濕熱寬結不散為病也。先以十棗湯下之。後服苦練丸。大延胡索。

散熱屬而除病自愈矣

帶下屬濁水熱乘太陽經

張戴人曰有病白帶如水芴滯中綿綿不絕穢臭不可近諸醫皆云積冷以陽起石硫黃姜附燥補之污水轉多此帶本濁水熱乘太陽經寒水不禁故也經云少腹寬熱洩出白液帶病溼溶然若在水中故治帶必從濕熱治宜逐水利小便水自高而趨下宜先絕其上源乃湧痰二三升次用寒涼之劑

帶下屬沖然濕熱濁氣滲入膀胱

羅周彥曰帶下者榮衛滯氣所成也皆因喜怒憂思產育房勞

女科經綸

卷七

帶下

三

傷其榮衛或素有濕熱使濁氣滲入膀胱故穢白之物如涕而下流不止面色無光腰腿痠疼精神短少世徒知中焦之虛寒不知中焦之濕熱反用燥熱溫補之劑偏助心火心火既盛陰血漸燥譬如猪膏烹之則融冷則凝中焦濕熱淫氣不清則為白帶所以火升水降則上熱下寒下焦虛冷凝結濁物若熱氣熏蒸則為腥腐之氣安得獨言虛寒乎法當清上實下清濁自分理脾養血濕熱自解也

帶下屬濕熱鬱下焦帶脈

汪石山曰帶證色有赤白之分病有氣血之異與疴相似蓋中

中氣虧敗運動失常致濕熱鬱結于下焦帶脈之分滲流而下故名帶下治先清濕為主必須却厚味以防濕熱之氣故丹溪

論赤白帶下由七情內傷使下元虛憊致濕熱痰積乘虛下流

叔和謂崩中日久為白帶崩中日久者下元虛憊之意治法羅

太無謂十棗湯神佑丸玉燭散皆可用但虛弱者不可峻攻丹

溪用升提法真妙諦也

慎齋按已上六條序帶下之屬濕熱為病也帶下自聖惠元

方以下主于風冷之邪子和非之斷為濕熱寬鬱不可作風

冷治故河間潔古均從濕熱立論但濕熱有主于任脈經虛

者有主于熱乘太陽者有主于中焦濁氣者有主于下焦鬱

滯者無非明濕熱下乘有各經不全總不若子和據經考證

帶脈受病原委為詳悉也

帶下屬瘀血在于少腹

張仲景曰問婦人年五十病下利數十日不止暮即發熱少腹

裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故

曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之

當以溫經主之

帶下屬腸中有膿血敗濁

帶下屬腸中有膿血敗濁

帶下屬腸中有膿血敗濁

帶下屬腸中有膿血敗濁

帶下屬腸中有膿血敗濁

女科經綸

卷七

帶下

三

王叔和曰。婦人帶下。腸中有膿。為榮衛相干。血為敗濁。有可下不可下之異。

準繩按。帶下有敗膿。淋瀝不已。腥穢之甚。遂至臍腹冷痛。此蓋敗膿所致。用白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。白礬各五錢。為末。蠟丸米飲。候膿盡。以補藥佐之。

帶下屬胃中濕痰滲入膀胱

朱丹溪曰。赤屬血。白屬氣。屬痰。俱是胃中痰積。流下滲入膀胱。宜用升舉。無人知此。肥人多屬濕痰。瘦人帶病少。如有屬熱痰。用半夏。南星。蒼朮。海石。炒黃柏。青黛。川芎。椿樹皮之屬。

女科經綸

卷七

帶下

三

濟陰綱目按。立齋云。不可拘肥人多痰。瘦人多火。輕用燥瀉。瀉火之法。夫肥痰瘦火之說。為丹溪認病總訣。何嘗教人泥定一方。雖不可輕治。而火濕終莫能逃。若以穩當之言。猶不可輕治。則潔古之十棗子和之吐下。太無之神佑玉燭。與小胃丹之類。可輕用與。

慎齋按。已上三條。序帶下之屬。瘀血敗膿。濕痰為病也。帶下有風冷。有濕熱。是外感有餘之病。有瘀血。有敗膿。有濕痰。是內傷有餘之病。病機不一。不可不審。
。帶下屬血海枯津液內竭

李東垣曰。有病白帶。常下漏。久服諸藥不止。診得心包尺脈微。下流不止。叔和曰。崩中日久。為白帶。漏下時多。骨水枯。崩中者。始病血崩。久則血少。復亡其陽。故白帶之物。下流不止。是本經血海將枯。津液復亡。枯乾不能滋養。筋骨以本部行經藥為引。使以大辛甘油膩之藥。潤其枯燥。滋養精液。以大辛熱氣味之藥。補其陽道。生其血脈。以苦寒之藥。瀉肺而救上熱。氣傷者。以人參補之。以苦溫之藥為佐。名補經固真湯。

。帶下屬脾虛氣陷

繆仲淳曰。婦人多憂思鬱怒。損傷心脾。肺火時發。血走不歸經。

女科經綸

卷七

帶下

三

此多患赤白帶也。白帶多是脾虛。肝氣鬱則脾受傷。脾傷則濕土之氣下陷。是脾精不守。不能輸為榮血。而下白滑之物。皆由肝木鬱于地中。使然。法當開提肝氣。補助脾元。蓋以白帶多屬氣虛。故健脾補氣要法也。若有帶下。如米泔水。腥穢臭者。濕熱勝也。亦有脾胃氣虛。不能約制其水。而濕痰下墜者。宜二朮茯苓。芩柏車前主之。佐以升提。若帶下如雞子清者。脾腎虛極也。面色必不華。足脛必浮。腰腿必酸。宜五味子。八味丸。間用開脾養心之劑。如歸脾湯之類。陰虛有火。宜六味丸。如兔絲。五味車前。黃柏。叔和云。崩中日久。為白帶。漏下時多。骨水枯。言崩久氣。

血虛耗白滑之物下不止耳。此證雖有氣血寒熱之分。總屬氣虛下陷。

帶下屬于下焦腎氣虛損。

趙養葵曰。女人帶下之疾。帶者奇經八脈之一也。腰臍間回身一週。如束帶焉。八脈俱屬腎經。人身帶脈統攝一身無形之水。下焦腎氣損。虛帶脈漏下。白為氣虛。赤為有火。治法俱以補腎為主。白者多。赤者少。有脾虛者。六君子加升麻。有氣虛者。補中湯。肝虛者。逍遙散。兼六味丸。

赤帶屬心肝二火陰血漸虛。

女科經綸

卷七

帶下

三

繆仲淳曰。赤帶多因心肝二火。時熾不已。久而陰血漸虛。中氣漸損。遂下赤帶。治宜養心為主。兼和肝緩中。涼血清氣。赤帶久不止。則血虛宜膠艾四物湯。加便蝦牡蠣粉。棗仁。麥冬。慎齋按。已上四條。序帶下屬于血枯。脾虛。腎虛。為病也。帶證自外邪風冷濕熱。內傷瘀血。濕痰。皆有餘之病。若東垣以血海將枯。津液復。是原其病在血虛也。仲淳以脾精不守。元氣下陷。是原其病在氣虛也。養葵更推原帶脈為病。下焦腎氣虛損所致。尤為探本之要。此與梅坡以十六味保元湯。六龍固本丸。治婦人帶下。證甚有自來矣。

治帶下同治濕之法

張子和曰。赤白痢者是邪熱傳于大腸。下廣腸。出赤白也。帶下者。傳于小腸。入脬經。下赤白也。據此二證。皆可同治濕之法。治之。

治帶下有先攻後補之法

婁全善曰。潔古治帶下。少腹宛結而痛者。先以十棗湯下之。次服苦練丸。大延胡散。是先攻後補法也。丹溪治結痰白帶。先于半饑時。津下小胃丹十餘粒。至鬱積行。用白朮四物。諸藥補之。亦先攻後補法也。

女科經綸

卷七

帶下

三

治帶下用藥之法

朱丹溪曰。赤白帶。羅先生法。或十棗湯。神佑丸。或玉燭散。皆可用。但虛者不可峻攻。實者可行也。血虛加減四物。氣虛以參朮。陳皮間用之。赤屬血。白屬氣。主治以燥濕為先。甚者固腸丸。若有相火動者。諸藥中加炒黃柏。滑脫加龍骨。赤石脂。婦人帶下。與男子夢遺全治之。

治帶下分寒熱用藥之法

方約之曰。帶脈總束諸脈。使不妄行。如人束帶而前垂也。婦人多鬱怒傷肝。肝屬木。脾屬土。肝邪乘脾。則土受傷。而有濕。濕生。

熱熱則流通。故滑濁之物。滲入膀胱。從小便而出。古人作濕。寒用辛溫藥。則非矣。丹溪作濕熱。用苦溫藥。為是不知用苦寒。正治也。用辛溫。從治也。如濕熱佛鬱于內。腹痛帶下。非辛溫從治。能開散之乎。若小腹不痛。止下赤白帶者。雖有濕熱。而氣不鬱。結用苦寒治之為當也。

。治帶下分諸因有虛寔之法

劉宗厚曰。帶證多本陰虛陽竭。榮氣不升。經脈凝泣。衛氣下陷。精氣累滯。下焦奇經之分。蘊積而成。其病或醉飽房勞。服燥劑所致。亦有濕痰流注。下焦或腎肝陰淫之濕勝。或因驚恐而木

女科經絡 卷七 帶下

帶下

論

乘土位。濁液下流。或思想無窮。而為筋痿。或餘經濕熱。屈帶少。腹而下。是皆氣血虛損。榮衛之精氣累滯而成也。前人立論已。盡病機。治無定法。如戴人以帶下。得兩手俱滑。大有力。上用宣。去痰飲。下以導水丸。泄熱去濕。繼以淡劑。滲之。此瀉寔法也。若。諸脈微細。或沉緊而澁。按之空虛。或洪大而澁。按之無力。正元。氣不足。陰虛中寒。東垣有補陽調經之劑。丹溪治濕痰下注。用。海石。南星。半夏之類。并加升提之法。或發中兼補。補中兼利。燥。中兼升。發潤中益氣。兼收澁。其例不一。正以病機有輕重。淺深。之異耳。

。治帶下屬衛胃俱虛。以固衛厚脾為主。

楊仁齋曰。下崩出血不止。謂之崩中。穢液常流。謂之帶下。崩中。失血多。因冲任虛損。榮衛受傷。得之冷帶。雜下。多因下焦不固。內挾風冷。得之是固然矣。然崩中者。投以芎歸香附。諸黑藥之。屬則血暫止。而終不止。帶下者。投以熟艾。禹糧。桑螵。牡蠣之類。則帶暫歇。而終不歇。何哉。經曰。衛者所以溫分肉。充皮膚。肥腠。理。司開闔。衛氣若虛。則分肉不溫。皮膚不充。腠理不肥。而開闔。失其司矣。况胃為血海。水液會焉。胃者中央之土。又主肌肉。而。約血水。衛氣與胃氣俱虛。則肌弱而膚空。血與水不能約制。是

女科經絡 卷七 帶下

卷七 帶下

帶下

論

以休作無時。不暫停也。然則封之止之。可。不加意于固衛厚脾。之劑乎。此桂枝附子湯。以之固衛。人參白朮茯苓甘草果丁香木。香以之厚脾。二者俱不可缺。使氣血自循。故道不希收澁。以劫。奪之也。

。治帶下不可作濕痰治。以補養固本為主。

吳梅坡曰。婦女下赤白而不甚稠者。曰白淫。與男子白濁。全系。于相火如龍雷之擾。而不澄清也。屬足少陰足太陰。治當清補。為主。如有滑白稠粘者。謂之帶下。屬心包手厥陰少陽。即如男。子自遺之精。甚如砂石之淋。原乎心胞。系乎春。結于帶脈。通于。

任脈下抵湧泉上至泥丸治宜血肉之劑以培之此窮源探本之論時人皆泥于常套作流痰治以牡蠣龍骨地榆膠艾之類。滋之和以四物加以升提殊不知根本損傷以致腐敗而來彼。塞滯不清之物則益加其滯升提不正之氣則逾增其鬱推以。六龍固本九十六味保元湯主之證屬于虛宜當補養其他書。以痰以濕俗謂內臟冷又云白屬氣赤屬血皆泛而不切之言。也明于斯道者必有神悟焉。十六味保元湯治赤白帶下骨。碎補貫仲去毛三錢杜仲小茴香菴酒炒一錢五分人參二錢。黃芪一錢巴戟二錢當歸一錢石斛七分升麻七分山藥一錢。

女科經綸 卷七 帶下

生草六分獨活一錢茯苓七分連翹一錢黃柏八分貝肉三枚。六龍固本丸山藥四兩巴戟肉四兩山茱萸四兩川練子。二兩小茴香一兩補骨二兩青鹽三錢湯拌人參二兩連肉二兩黃芪二兩川芎一兩木瓜一兩。治帶下以肚脾胃升陽氣為主。薛立齋曰徐用誠云帶下白屬氣赤屬血東垣云血崩久則必。陽故白滑之物下流未必全拘于帶脈竊謂前証或因六淫七。情或因醉飽房勞或因膏粱厚味或燥劑所致脾胃虧損陽氣。下陷或濕痰下注蘊積而成故言帶也凡此皆當壯脾胃升陽。

為主佐以各經見證之藥色青屬肝小柴胡加山梔防風濕熱。壅滯小便赤澀龍膽瀉肝湯肝血不足或燥熱風熱六味丸色。赤屬心小柴胡加黃連山梔當歸思慮過傷妙香散色白屬肺。補中湯加山梔色黃屬脾六君子加山梔柴胡不應用歸脾湯。色黑屬腎六味丸氣血俱虛八珍湯陽氣下陷補中湯濕痰下。注補中加茯苓半夏蒼朮黃柏氣虛痰飲下注四七湯送六味。丸不可拘肥人多痰瘦人多火而以燥濕瀉火之藥輕治之也。慎齋按已上七條序治帶下之大法也帶下有寒冷濕熱虛。寔之不同故諸家治法有攻下溫補之不一如子和太無潔。

女科經綸 卷七 帶下

古用攻下之法也丹溪約之宗厚用攻補兼施之法也至楊。仁齋薛立齋以厚脾壯胃立論與東垣仲淳之旨為共貫矣。吳梅坡以補腎固本為治與養葵之旨有先得矣此皆探本。窮源之學與張劉之燥濕清熱丹溪之消痰升澁又有標本。內外之殊讀者當會通之。帶下傷五臟有五色之分。婦人良方曰婦人帶下其名有五因經行產後風邪入胞門傳。于臟腑而致之若傷足厥陰肝經色如青泥傷手少陰心經色。如紅津傷手太陰肺經形如白涕傷足太陰脾經黃如爛瓜傷。

足少陰腎經黑如衄血人有帶脈橫于腰間如束帶之狀病生于此故名爲帶

女科經綸

卷八

帶下

七

女科經綸卷八

傅李蕭 壩廣六集著

全校

禾郡

全參訂

雜證門

熱入血室證

女科經綸

卷八

熱入血室

一

婦人熱入血室如瘧狀

金匱要略曰婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

徐註曰婦人熱入血室有四熱入血室必譫語此則不譫語但如瘧狀謂傷寒男女皆有之而婦人有獨異故首曰婦人中風即傷寒中所主桂枝湯之風證也七八日則表邪已解復有寒熱故曰續來然不長熱故曰有時問其經水則已來而適斷明是餘熱未盡乘虛人之則餘血必結故寒熱有時

然非太陽傳入少陽比因結血之熱致有此病故曰使如瘧狀雖非傳入少陽而藥仍用小柴胡者蓋血室之氣肝主之肝與膽為表裏膽因肝受邪而病如瘧非他藥所宜故主和表裏謂上焦之氣和而驟結之血將自行也若峻攻之如抵當湯證則犯少陽之禁矣

按已上一條是言經行未盡而適斷雖有結血未為全實小柴胡加當歸丹皮生地以涼之

婦人熱入血室治無犯胃氣

金匱要略曰婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如

女科經綸 卷八 熱入血室

二

見鬼狀此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈也

徐註曰此言熱入血室不必血結初即搏邪為患曰傷寒即所謂無汗惡寒也曰發熱病之初也曰經水適來是經水初行時也邪盛則經氣亦盛適相值寒邪必傷營故邪與血搏血屬陰主夜故晝則熱雖發而明了暮則入陰分邪挾陰氣而為譫語如見鬼狀者譫之甚也此為熱入血室者言血室雖在內表邪實未嘗犯胃及上二焦故治法亦惟和表邪略兼清血室之熱足矣悞以為客邪入內攻之則所傷實多故曰無犯胃氣及上二焦心自愈也

按此條是言經行不斷則熱不留結勿謂譫語悞用硝黃犯其胃氣刺動榮血犯其中焦柴胡和解犯其上焦但不妄犯熱隨血散自愈也

婦人熱入血室當刺期門

金匱要略曰婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼胸脇滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之

徐註曰此言經與病值不即為患病解後反搏邪在胃脇作楚謂中風病雖稍異于前之傷寒然發熱惡寒經水適來與

女科經綸 卷八 熱入血室

三

前之邪盛經亦盛無二後七八日熱除脈遲身涼是經在病中行而不礙也却七八日後反胃脇滿如結胸狀譫語是入血室之熱不竄于經而結于肝之府故脈所過處為滿甚則如結胸狀陰火盛則譫語也然滿雖胃脇非少陽表邪雖如結胃非太陽表邪入裏雖譫語非胃實故曰此熱入血室亦見不可悞攻胃及上二焦當刺期門期門肝之分也此肝實病瀉其實而取之

按此條言適來即斷血結在裏為實證故刺期門以瀉之不善刺者小柴胡去人參加桃仁丹皮歸尾山甲以行之

熱入血室諸語頭汗出當刺期門

金匱要略曰陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而瀉之澱然汗出者愈

徐註曰此言陽明病亦有熱入血室但下血頭汗出不同耳陽明病即頭痛鼻乾不眠是也假如轉入陽明之腑必有汗譫語等為可下証何緣下血譫語故知為熱入血室然陽明宜通身有汗此血中有熱而血耗耗則下虛而厥身為燥陰所閉故無汗惟頭則陰不能入而陽仍通故汗此病亦由肝實不當責陽明故亦刺期門而曰隨其實而瀉之澱者通身

女科經緯

卷八

熱入血室

四

微微似汗也汗則肝不強而陰陽平故愈

婦人熱入血室治宜化痰除熱

金匱要略曰婦人中風發熱惡寒經水適來書則明了暮則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者不曉以剛劑與之遂致胃腸不利涎潮土脫昏冒不知當先化其痰後除其熱

慎齋按已上五條序金匱論婦人傷寒有熱入血室之一証也第一條詳熱入血室証候下四條言治法也

慎齋按婦人熱入血室因經水適來寒邪乘虛襲入熱血必結故有譫語見鬼之証仲景第一條用小柴胡湯以寒熱如

瘧狀故用之也以下四條但云刺期門隨實瀉之化痰除熱三法原以血結于中而用瀉法也可笑庸工不解仲景全文一遇熱入血室證即以柴胡湯一方為主劑不大謬耶故凡遇熱入血室當導血下行以清熱不可悞執小柴胡方為戾也

婦人熱入血室解

成無已曰室者屋室也謂可停止處人之血室榮血停止之所為經脈留會之處即衝脈也衝脈者奇經八脈之一起于腎下絡氣街並足陽明夾臍上行至胃中而散太僕曰衝為血海言

女科經緯

卷八

熱入血室

五

諸經之血朝會于此男子運而行之女子上為乳汁下為月水經言任脈通太冲脈盛月事以時下是也傷寒之邪婦人則隨經而入男子由陽明而傳以冲脈與少陰之絡起于腎女子感邪太陽隨經便入冲之經並足陽明男子陽明內熱方得入衝脈得熱血必妄行在男子則下血譫語在婦人則月水適來陽明病下血譫語此為熱入血室蓋言男子不止謂婦人也婦人傷寒經水適來適斷經氣既虛宮室不閉邪得乘虛而入有治而愈有不治而愈如婦人發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼胃腸下如結胃狀譫語此為熱入血室當刺期門

隨其實而瀉之又煩人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故為瘧狀發作有時小柴胡湯主之二者須治而愈煩人傷寒發熱經水適來晝則明了夜則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上中二焦必自愈是不須治而愈夫譫語為病邪之甚何反不須治而愈蓋結胃譫語是邪氣留結胃脇而不去必刺期門隨其實而瀉之寒熱如瘧發作有時是血結不行須小柴胡散之二者既有留邪必散之可愈若發熱經水適來晝日明了暮則譫語此經水適來以裏無留邪但不妄犯熱隨血散必自愈經云血自下下者愈

女科經綸 卷八 熱入血室 六

故無犯胃氣及上二焦必自愈所謂妄犯者謂恐以譫語為陽明內實攻之犯其胃氣也此無胃脇之邪刺期門恐犯中焦也此無血結與小柴胡恐犯上焦也蓋小柴胡解散則動衛氣衛出上焦劫衛氣是犯上焦矣刺期門則動榮氣榮出中焦動榮氣是犯中焦矣脈經曰無犯胃氣及上中二焦豈謂藥而不謂鍼耶

熱入血室成結胃證論
許叔微曰或問熱入血室何為而成結胃曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流通遇經水適來適斷邪氣乘虛入丁血室血

為邪所迫上入肝經肝受邪則譫語見鬼復入臆中則血結于胃矣何以言之煩人平居水養木方未受孕則為月水既孕則膏以養胎已產上壅為乳皆血也今邪逐血併歸于肝經聚于臆中結于乳下故手觸之則痛非藥可及當刺期門也

熱入血室屬肝臟邪客

武叔卿曰小柴胡湯治太陽傳經病蓋臟血適來則血室虛邪氣乘虛入而為越經證然血室與胃腑有氣血之分故譫語有晝夜之別日如見鬼者以肝臟邪客而魂不安本神自病也用小柴胡解表裏之邪用地黃涼血中之熱設有不愈又有刺期

女科經綸 卷八 熱入血室 七

門法其加桃仁紅花與承氣抵當等湯者各因其微甚而瀉之也

產後熱入血室治法

楊仁齋曰凡大小產熱入血室小柴胡湯力所不及者于內加五靈脂乃以黃連赤茯苓佐之蓋心主血黃連茯苓皆清心涼血之劑所以收功也若疎利血毒則活人壽桃仁承氣有餘耳矣

熱入血室男子亦有

張路玉曰冲為血海即是血室冲脈得熱則逼血下行男子亦

有是證不獨煩人也

慎齋按已上五條序煩人傷寒有熱入血室之證也血室即血海冲任之脈所係為藏精受胎之所因煩人血海有餘遇經行之期而犯傷寒之邪則熱邪乘血室之虛襲入而與血相搏夫肝藏魂血室虛則肝無所依肝受熱邪則為譫語為見鬼肝之魂不能安也故治法惟有清熱行血甚則桃仁承氣微則生地丹皮桃仁紅花赤芍五靈脂甘草木通丹參可以胡治之不可拘執小柴胡湯為治傷寒熱入血室之定例也夫小柴胡方為傷寒傳少陽和解表裏之藥必欲用之于

女科經綸

卷八

熱入血室

下

熱入血室

熱入血室之證豈知柴胡發表黃芩退熱半夏行痰為血家所忌人參補氣助邪非血熱所宜今人一遇熱入血室之證便用小柴胡湯定法曰我遵仲景書也豈知仲景第一條云煩人中風寒熱發作有時如瘧狀明屬少陽經證故曰小柴胡湯主之則小柴胡湯原為少陽經設也至後四條但云必自愈云當刺期門又云隨其實而瀉之實者熱血結于胃也瀉之者瀉其實邪也並無小柴胡湯主之一語則知小柴胡湯祇因煩人傷寒有續寒熱如瘧狀之證故以之治少陽如瘧之病而非治熱入血室之證也今人不玩仲景前後原

文漫謂煩人熱入血室動輒用小柴胡主之豈不大可嗤耶故凡煩人病熱入血室有續得寒熱發作有時如瘧狀者小柴胡湯可用也亦必加桃仁丹皮五靈脂以行其血如熱入血室而無有寒熱如瘧之證則小柴胡湯斷不可用也舉世懵懵特表而出之

血分水分證

煩人血分水分證

金匱要略曰問病有血分水分何也師曰經水前斷後病水名曰血分此病為難治先病水後斷經水名曰水分此病易治何

女科經綸

卷八

熱入血室

九

以故去水其經自下也

煩人血分屬寒濕傷其衝任

聖濟總錄曰血分者經水通之際因寒濕傷其衝任氣壅不行播在皮膚邪氣相搏經血分而為水發為胛腫故曰血分脈經曰經水前斷後病水者名曰血分久不治積成水腫即難治

煩人水分屬水氣上溢皮膚

聖濟總錄曰水分者以水氣上溢皮膚散于四肢發為胛腫蓋腎者胃之開關門不利故聚水而從其類也此病與血分相似治藥有先後耳

婦人血分水分屬脾肺虛冷

汪石山曰凡經先斷而後病水少陰脈沉而滑沉則在裏滑則為實沉滑相搏血結胞門為血分難治若先病水而後病經斷少陽脈牢少陰脈細男子小便不利婦人經水不通經通則為血不利則為水各水分易治此因脾肺虛冷不能通調水道下輸膀胱滲泄之令不行生化之氣不運東垣云水飲留積若上在雨中則為泥得和氣暖日水濕去而萬物自生長用加減腎氣丸歸脾湯六君子加木香炮姜肉桂

婦人血分水分所化有別

女科經綸

卷八

血分水分

十

陳良甫曰婦人經水不通則水化為血血不通則復化為水故先因經水斷絕後四肢浮腫小便不通名曰血分是血化為水也宜椒仁丸若先因小便不通後身面浮腫致經水不通名曰水分是水化為血也宜葶藶丸經脈不通而化為水流走四肢悉腫滿亦名血分其證與水證相類實非水也用人參丸張嘯瑋按先浮腫而後經水不通明係土虛不能制水經虛則血不能生故經止若水化為血等語真堪捧腹

婦人血分辨證用藥法

李氏曰經水斷而後腫名曰血分乃瘀血化水開塞胞水比水

女科經綸 卷八

腫難治但當調其經則水自消用小調經散葶藶丸加丹皮牛膝紅花若先浮腫而後經水不通名曰水分乃脾不能制血與水併肌肉為之虛腫紅碧丸腎氣丸加澤瀉防已葶藶木通

血分水分以補元氣為主

薛立齋曰婦人血分水分或因病飲食失節或因六淫七情失宜以致脾胃虧損不能生發氣血乖違失常致形氣不足邪塞隊道必用椒仁葶藶二丸以宣導其邪佐以補元氣之藥庶真氣不復傷也

慎齋按已上七條序婦人有血分水分之證也婦人以血用

女科經綸

卷八

血分

十一

燕胎堂

事而月信其最要也故曰八門看婦人病先問經期經期之先後多寡枯閉即可以斷病之淺深輕重如血分之病在經水先斷而後頭面四肢腫滿此血不運行氣壅不化法當通經調血血行而腫自消若先四肢腫滿後經水斷絕此直是水腫病耳何必名以水分與血分同出條例耶此古入分證立名之多惑也

婦人血分病不可作水治

證治要訣曰有經事不通血入四肢化為水遂成腫滿非獨產後為然名曰血分快作水治其害不小宜調經散

六五七

婦人血分屬氣壅不能化血

武叔卿曰。氣者水之母。血者氣所化。非氣無以生血。非血無以養氣。若經水不通。則血病。氣亦病。豈有水不通而能化血乎。血不通而化水者。乃是氣壅不能化血。而成水也。觀桃仁丸可見矣。

婦人血分用藥從血上求治

婦人良方曰。婦人血分如奪命丹。黑神散。皆為要藥。血分一證。大小產後多有之。惟胎前脚腫不全。產後則皆敗血所致。當于血上求之。

女科經綸 卷八 血分 三 燕胎室

椒仁丸治血分

婦人良方曰。先因經水斷絕。後至四肢浮腫。小便不通。血化為水。名曰血分。椒仁丸藥雖峻利。所用不多。若畏而不服。有養病害身之患。當治虛弱人。亦未有悞也。

濟陰按血既化為水。則以利水為先。而行血溫血。開結破氣。又不可少。然非峻利氣悍之物。不可。故又佐以大毒之藥。慎齋按。已上四條。序治血分用藥之法也。夫血分屬婦人經水不通而致。必是六淫外侵。七情內傷。以致脾胃虛衰。不能運化精微。故血運不流。氣不能化。法當補脾健胃。扶養氣血。

佐以溫經行血之劑。可也。椒仁丸有班毛。砒信。甘遂。芫花。黑丑。乾青。群隊。大毒之藥。以攻之。禍有不可勝言者。大金乃曰。治虛弱人。未見有誤。是何言與。

咽中証

婦人咽中如有炙癆病

金匱要略曰。婦人咽中如有炙癆。半夏厚朴湯主之。

徐忠可曰。此條即所謂寒傷經絡。凝堅在上也。炙癆。譬如乾肉也。千金所謂咽中怏怏。如有炙肉。吐之不出。吞之不下。狀如有炙癆。數語甚明。切此病不因腸胃。故不礙飲食。二便不

女科經綸 卷八 咽中 三

因表邪故無骨痛寒熱。乃氣為積寒所傷。不與血和。血中之氣溢而浮于咽中。得水濕之氣。而凝結難移。婦人血分受寒。多積冷結。氣最易得此病。男子亦間有之。藥用半夏厚朴湯。乃二陳湯去陳皮。甘草加厚朴。紫蘇。生姜也。半夏降逆厚朴。兼散結。故主之。生姜茯苓。宜至高之滯。而下其濕。蘇葉味辛。氣香。色紫。性溫。能入陰和血。兼歸氣于血。夏天暑傷心陰。能下暑鬱。而炙癆者用之。則氣與血和。不復上浮也。論曰。余治王小乙。咽中。每嚥寒嗽不出。以半夏厚朴湯投之。即愈。後每復發。細問之。云。夜中燈下。每見暈如團五色背脊。

內間瘦其人又壯盛知夏初因受寒陰氣不足而肝反鬱熱甚則結寒微動挾腎氣上衝咽喉塞噎也即于此方加大劑枸杞、菊花、丹皮、肉桂、暈乃漸除咽中亦愈故曰男子間有之信不誣也

婦人咽中如梅核證

產寶百問曰喉嚨有咽門二者各有所司喉嚨者空虛也肺之系氣之道絡肺應天故屬天氣所生有九節以通九臟之氣所以謂之隘或陰陽之氣痰結咽喉膈塞噎狀若梅核妨礙飲食久而不愈即成翻胃或胸膈痰結與氣相搏上逆咽喉之間作

女科經綸

卷八

咽中

西

聚狀如炙肉之證也以半夏厚朴湯治婦人喜怒悲思憂恐驚怖之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉咯不出嚥不下此七情所為或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中滯嘔逆惡心

慎齋按已上二條序婦人有咽中炙嚙梅核之證也徐註主寒冷氣滯實主七情痰結一屬外感一屬內傷當兼舉之

癥瘕疝瘕證

婦人癥瘕疝瘕形狀總考

證治準繩曰大全良方分疝瘕諸氣疝瘕腹中瘕血瘕痞食瘕

凡七門疝者在腹內近臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀故名曰疝瘕者僻在兩肋之間有時而痛故名曰癥疝者痛也瘕者假也其結聚浮假而痛推移乃動也八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血瘕脂瘕孤瘕蛇瘕蠶瘕積在腹內或腸胃之間與臟氣結搏堅牢雖推之不移名曰瘕言其病形可徵驗也氣瘕寒為痞言其氣痞塞不宣暢也傷食成塊堅而不移名曰食瘕瘕血成塊堅而不移名曰血瘕若腹中瘕血則積而未堅未至于成塊者也大抵推之不動為瘕推之動為瘕也至疝與瘕瘕則與痛俱痛即現不痛即隱在臍左右

女科經綸

卷八

八瘕

五

疝瘕

為疝在兩肋間為瘕在小腹牽引腰脇為疝恐學者一時難了未免淆亂故總敘條析之

婦人八瘕屬血脈精氣不調所生

巢元方曰八瘕者皆胞胎生產月水往來血脈精氣不調所生也腎為陰主開閉左為胞門右為子戶主月水生子之道胞門子戶主精血神氣出入合于中黃玉門四邊主持關元禁閉子精臍下三寸名曰關元主藏魂魄婦人之胞三焦之府常所從止若婦人經脈愈終合調月水以時來至能生子而無病如經絡榮衛斷絕不通邪氣便得往來八合于臟若生血木盡而合

陰陽即合血脈。急小腹重急。支滿胸脇。四肢痠痛。飲食不調。結牢惡血不除。月水不時。因生積聚。如懷胎狀。陰中腫。內坐風。小便不利。若痛如淋狀。久不復生子。

慎齋按巢氏病源論。婦人八瘕。不外新產。月水之後。感寒濕。風冷凝泣。血脈留滯。經絡閉塞。隊道而成也。乃強分黃瘦。黃瘦。瘦。瘦。血。瘕。脂。瘕。狐。瘕。蛇。瘕。驚。瘕。之名。以惑世。誣名。宜其為張戴人所斥也。夫瘕者。假也。不過假人身之氣血。加以食積。痰飲。膠結成形。內經止有石瘕。生于胞中。一證。何嘗有為黃。為青之名色耶。即有八瘕之證。醫者亦難辨。其是狐。是蛇。是。

婦科經綸 卷八 八瘕

燕貽堂

驚也。因刪之。婦人良方中。但存八瘕之名。而不載條目。最有見。

婦人八瘕屬外邪乘合陰陽所致。

婦人良方曰。婦人臟腑調和。經脈循環。月水以時。故能生子。無病。若乘外邪。而合陰陽。則小腹胸脇腰背相引而痛。月事不調。陰中腫脹。小便淋瀝。而色黃黑。則瘕生矣。八瘕者。黃。青。燥。血。脂。狐。蛇。驚。是也。千金外臺言之詳矣。

薛立齋按經云。氣主煦之。血主濡之。若血不流。則凝而為瘕。瘕者。中雖硬而忽聚忽散。多因六淫七情。飲食起居。動傷臟。

腑而成。當與痰癖諸證治同。慎不可復傷元氣。

婦人瘕痞屬脾胃虧損。邪正相搏。

大全曰。婦人瘕痞。由飲食失節。脾胃虧損。邪正相搏。積于腹中。牢固不動。有可徵驗。故名曰瘕。氣道壅塞。故名曰痞。得冷則發。冷入子臟。則不孕。入胞絡。則月水不通。

薛立齋按此證。若脾胃虛弱。六君子加芎藭。若肝脾虛弱。補中湯及歸脾湯。若肝火鬱滯。佐以蘆薈地黃二丸。外貼阿魏膏。患者須慎七情六淫。飲食起居。治者不時審察病機。而藥之。庶幾有效。

婦科經綸 卷八 瘕痞

燕貽堂

婦人食瘕屬經行不忌。生冷所致。

大全曰。婦人食瘕。由臟腑虛弱。經行不忌。生冷之物。不能消化。與臟氣相持。結聚成塊。日漸生長。牢固不安。謂之食瘕。或勞傷元氣所致。陳無擇云。經不行者。宜先導之。然後固元氣為主。

薛立齋曰。證若形氣虛弱。須先調補脾胃。為主。佐以消導。若形氣克實。當先疏導。為主。佐以補脾胃。若氣壅血滯。而不行者。宜烏藥散。散而行之。若脾氣虛。而血不行者。四君子芎藭。補而行之。若脾氣鬱。而血不行者。歸脾湯。解而行之。若肝脾血燥。而血行者。加味道遙散。清而行之。大抵食積痞塊。證為。

有形邪氣勝則實。真氣奪則虛。當養正。開邪而積。自除。雖云堅者削之。客者除之。胃氣未虛。或可少用。若病久虛乏。不宜輕用。

婦人血癥屬風冷飲食與血氣相結

大全曰。婦人寒熱失節。臟腑氣虛。風冷在內。飲食不消。與血氣相結。漸生塊。不移動。皆因血氣勞傷。月水往來。經絡痞塞。惡血不除。久而不差。心腹兩脇苦痛。碍于飲食。肌膚消瘦。問癥一也。何以知是血癥。曰。血外證。脅悶煩躁。驚狂痰嘔。汗多骨蒸。肢冷其畜在下焦者。必臍下結急。外熱內痛。尺脈洪而數。桃仁靈脂。

女科經綸

卷八

血癥

六

燕貽堂

生地牛膝大黃甘草去之

薛立齋按此證。多兼七情虧損。五臟氣血乘違而致。氣主响之。血主濡之。脾統血。肝藏血。故鬱結傷脾。志怒傷肝者。多患之。腹脇作痛。正肝脾二經證。紫古云。養正積自除。東垣云。人以胃氣為本。治法當主固元氣。佐以攻伐之劑。必需之歲月。若期速效。投以峻劑。反致有誤也。

婦人疝瘕屬風冷入腹與血相結

大全曰。婦人疝瘕。由飲食不節。寒溫不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。風冷入腹。與血相結。而生。婦人之病。有異于丈夫者。或因產後。

血虛受寒。或因經水往來。取冷過度。非獨因飲食失節。多挾血氣所成也。其脈弦急者。生虛弱。小者。死。只脈濇而浮。牢為血實。氣虛。其發腹痛。逆氣上行。此為胞中有惡血。久則結成血瘕。

婦人疝瘕屬血之所為

大全曰。疝瘕二者。皆陰陽不和。經絡痞隔。飲食停滯。不得宣流。邪冷之氣。搏結不散。得冷則發。作疼痛。夫疝瘕瘕瘕。血氣壅。發作則痛。甚則欲死。究而言之。皆血之所為也。

薛立齋按前證。因飲食起居七情失宜。虧損臟腑。氣血乖違。陰絡受傷。循行失度。所致。羅謙甫云。養正邪自除。必先調養。

女科經綸

卷八

疝瘕

九

燕貽堂

榮衛充實。若不消散。方可議下。但除不以漸。必有顛覆之害。若不守禁忌。未有能愈者也。

婦人精聚瘕瘕皆屬血病

王宇泰曰。古方有五積六聚。七瘕八瘕之名。五臟之氣積。名曰積。故曰積有五。六腑之氣聚。名曰聚。故聚有六。若七瘕八瘕。則婦人居多。七者。火數。屬心。血生于心。八者。木數。屬肝。血歸于肝。雖曰強分。理似不混。夫瘕者。堅也。堅則難破。瘕者。假也。假物成形。古人將婦人病。為瘕疾。以蛟龍等為生。瘕然。亦不必如此。執泥。婦人瘕瘕。並屬血。龍蛇魚鱉肉髮。瘕瘕等事。皆出偶然。但飲。

食間誤中之留聚臟腑假血而成自有活性亦猶永徽中僧病
噎者腹中有一物其狀如魚卽生瘕也與夫宿血停疑結爲痞
塊雖內之所感不全治法當以類相從所謂醫者意也如以敗
梳治蝨瘕銅屑治龍瘕麩麩治米瘕石灰治酒瘕如此等類學
者可以理解也

慎齋按方書有五積六聚七瘕八瘕之名五積六聚出自越
人難經有心肝脾肺腎五臟之積而無有六聚以聚爲氣病
積爲血病也故東垣有五積丸治法若巢氏病源論載七瘕
八瘕但有八瘕名證而無七瘕病形其他方書亦不散見豈

女科經綸 卷八 瘕瘕 辛 燕貽堂

以瘕爲氣病瘕爲血病故無可考耶宇太先生云不必執泥
事出偶然可謂善會古人之書者也然事之或有者毋盡信
亦不可不信如慈谿王節齋先生尊信丹溪之書曰嚴補陰
丸無間者數十年內有龜甲製之不善大下小赤色龜數十
而歿此卽八瘕之類有感而生者也寧獨病在嬾人耶

治瘕瘕兼消痰瘕

武叔卿曰痞一瘕二曰血曰食而不及痰飲何也蓋痞氣之中
未嘗無飲而血瘕食瘕之內未嘗無痰則痰食血未有不因氣
病而後形病故消積之中兼行氣消痰消瘕之藥爲是

治瘕瘕不可峻攻以傷元氣
李氏曰善治瘕瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰衰其
大半而止不可猛攻以傷元氣寧扶脾胃正氣待其自化凡攻
擊之藥病重病受之病輕則胃氣受傷矣或云待塊消盡而後
補養則胃氣之存也幾希

治瘕瘕積聚以行氣爲主
武叔卿曰瘕瘕積聚並起于氣故有氣積氣聚之說然謂瘕屬
血病者氣聚而後血凝也其夾食夾痰又各隨所積而變見矣
夫痰與血食皆賴氣以行也故氣行物生氣病物病此百病所

女科經綸 卷八 瘕瘕 壬 燕貽堂

以皆生于氣破血消痰消食之劑必用氣藥者以此也
慎齋按已上三條序治痞瘕瘕瘕之大法也夫痞瘕瘕瘕不
外氣之所聚血之所凝故治法不過破血行氣濟陰又推廣
痰食瘕血兼以行氣爲主也內經有石瘕腸覃二證前已載
之胎前鬼胎證故茲不復贅

乳證

嬾人之乳屬肺肝二經

醫暇卮言曰女人產育哺養以乳乳之體居經絡氣血之闕也
蓋自寅時始于手太陰肺經出于雲門穴穴在乳上陰陽絡

以行週十二經至丑時歸于足厥陰肝經入于期門穴穴在乳下出于上入于下肺領氣肝藏血乳正居于其間也

慎齋按已上一條序原娘人乳汁之所自出屬肺肝二經氣血之化也

乳癰屬陽明經熱為風邪所客

聖濟總錄曰足陽明之脈自缺盆下于乳又冲脈者起于氣冲竝足陽明經夾臍上行三胸中而散娘人以冲任為本若失于將理冲任不和陽明經熱或為風邪所客則氣壅不散結聚乳間或硬或腫疼痛有核皮膚焮腫寒熱往來謂之乳癰風多則

次科經綸

卷八

乳癰

主

燕貽堂

硬腫色白熱多則焮腫色赤不治血不流通氣為壅滯與乳內津液相搏腐化為膿宜速下乳汁導其壅塞散其風熱則病可愈

乳癰屬風熱結薄血脈凝注

張子和曰乳癰發痛者亦生于心也俗呼曰吹乳是也吹者風也風熱結薄于乳房之間血脈凝注久而不散潰腐為膿也

慎齋按已上二條序乳癰屬于風熱外邪為病也

乳癰屬膽胃二經熱毒氣血壅滯

娘人良方曰經云乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足陽明胃經若

乳房忽然腫痛結核色赤數日之外焮痛脹潰稠膿湧出此屬肝胃熱毒血壅滯名曰乳癰為易治

或頭痛煩渴用人參敗毒散神效瓜蒌散加味逍遙散治之白消散若膿成潰發稠膿湧出膿盡自愈若氣血虛弱或誤用敗毒久不收斂膿清脈大則難治

薛立齋又按乳癰治法初起寒熱焮痛即發表散邪疎肝清胃為主或不作膿膿或不潰宜用托裏或肌肉不生膿水清稀宜補脾胃或膿出及痛惡寒發熱宜補氣血或腫焮作痛

次科經綸

卷八

乳癰

主

燕貽堂

晡熱宜補陰血或飲食少反作嘔宜補胃氣切不可用薤白復傷脾胃也

乳癰屬忿怒鬱悶陽明血熱沸騰

朱丹溪曰經云乳房屬足陽明胃經所經乳頭屬足厥陰肝經所屬娘人不知調養忿怒所逆鬱悶所遇厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不得通而汁不出陽明之血沸騰熱甚化膿治法青皮疎厥陰之滯氣右膏肓陽明之血熱生草節行汚濁之血消腫導毒瓜蒌仁沒藥青橘葉角刺金銀當歸酒佐之加艾炙二三十壯于痛處甚効切不可用刀針必致危困

乳癰屬飲食厚味胃火上蒸乳房

李氏曰。嬾人之乳。男子之腎。皆性命之根也。有飲食厚味。鬱怒以致胃火上蒸。乳房則乳汁化為濁膿。肝經氣滯。乳頭竅塞不通。致令結核不散。痛不可忍。初起宜隔蒜灸之。切忌刀針。能飲者一醉膏。加當歸兩服即効。

慎齋按。已上三條。序乳癰屬七情飲食熱毒內傷為病也。

乳癰屬兒口氣吹所致

大全曰。產後吹乳者。因兒喫奶之際。忽自睡着。為兒口氣所吹。令乳汁不通。蓄積在內。遂成腫硬。壅閉乳道。傷結疼痛。亦有不

女科經綸 卷八 乳癰 語

痒不痛。腫硬如石者。總名曰吹乳。若不急治。腫甚成膿。連服皂角散。括婁散。傳以南星散。更以手揉之。則散。

乳癰屬乳子口氣吹熱所吹

朱丹溪曰。嬾人有所乳之子。膈有滯痰。口氣吹熱。舍乳而唾。熱氣吹入乳房。凝滯不散。遂生結核。若初起時。忍痛揉軟。吮乳汁透。即可消散。失此不治。必成癰腫。

慎齋按。已上二條。序乳癰屬兒之口氣所吹。為不內外因病也。嬾人乳癰。不外三端。一者外感風熱。客于陽明。一經二者鬱怒厚味。傷于肝胃。三者兒口吹氣。熱壅不散。皆足致乳

癰之病也

治乳癰不宜用涼藥

薛立齋曰。嬾人乳癰。多因小兒斷乳後。不能回化。又有嬾人乳多。孩提少飲。積滯凝結。又有經候不調。逆行失道。又有邪氣內鬱。結成癰腫。初發時。切不宜用涼藥。蓋乳本血化。不能漏泄。遂結實腫。其性清寒。又加涼藥。則陰爛宜也。惟涼藥用之。既破之後。則佳。如初發時。宜用南星。姜汁敷之。可以內消。更加草烏一味。能破惡血。逐塊。遇冷即消。遇熱即潰。更加乳香。沒藥。以定痛。內用瓜婁仁。十宣散。通順散。間服之。

女科經綸 卷八 乳癰 語

嬾人乳癰有可治不可治

孫真人曰。凡女人多患乳癰。年四十已下。治之多瘥。年五十已上。慎勿治之。多效。不治。自得終天年。

慎齋按。已上二條。序治乳癰。戒用涼藥。并示人以可治不可治之法也。

乳癰屬憂怒抑鬱肝脾氣逆

朱丹溪曰。嬾人有憂怒抑鬱。朝夕積累。脾氣消阻。肝氣橫逆。遂成隱核。如碁子。不痛不痒。數年而發。名曰奶巖。以瘡形似巖穴。也不可治。

乳巖屬肝脾鬱怒氣血虧損所致

薛立齋曰乳巖乃七情所傷肝經血氣枯槁之證不赤下痛內有小核積之歲月漸大內潰淡爛為難治因肝脾鬱怒氣血虧損故也治法嗽痛寒熱初起即發表散邪疎肝清胃為主宜益氣養榮湯加味逍遙散可以內消若用行氣破血則速其亡矣

乳巖屬鬱氣有用藥法

武叔卿曰乳巖之病大都生于鬱氣蓋肝主怒其性條達鬱而不舒則屈其挺然之質乳頭屬厥陰其氣與痰時積累而成結核茲以風藥從其性氣藥行其滯參芪歸芍補氣血枳實烏藥

女科經綸

卷八

乳巖

三

木通疎利壅積柴防蘇葉表散白芷腐膿通柴術枳榔通滯下行宜桂行和血人且曰木得桂而枯為伐肝之要藥

慎齋按已上三條序乳巖之證也病雖均在乳而有癰與巖之分癰輕而巖重癰之來也驟而巖之成也漸故治癰易而治巖難大抵癰屬外感之風熱內傷之厚味見吮俱多巖木于七情鬱怒臟氣不平肝脾虧損故治巖之法與治癰微有不全一宜補少而瀉多一宜瀉少而補多也

乳證治法總論

薛立齋曰大凡乳證若悲怒宜疎肝清熱熱痛寒熱宜發表散

那腫痲痛宜清肝消毒並隔蒜灸不作膿或膿不潰補氣血

為主不收斂或膿稀補脾胃為主膿出反痛或發寒熱補氣血為主或嗜熱內熱補血為主若飲食少思或作嘔吐補胃為主飲食難化或作泄瀉補脾為主勞瘵腫痛補氣血為主怒氣腫痛養肝血為主兒口所吹須吮通揉散若成瘻治以前法若乳巖屬肝脾二臟鬱怒氣血虧損故初起小核結于乳內肉色如故五心發熱肢體倦瘦月經不調加味歸脾湯加味逍遙散神效瓜婁散多服白消若迂延日久漸大巖色赤出水腐潰淡潤用前歸脾湯等藥可延歲月若悞攻伐則危殆矣

女科經綸

卷八

乳巖

三

慎齋按已上一條序治乳癰乳巖之大法也世醫治乳癰乳巖不過寒涼清火破氣消痰豈知病之成也原於肝胃虧損榮衛不能運行所致惟立齋惓惓于扶持脾胃補氣養血為主戒人不可誅伐太過以致殊柱垂訓之意深矣

前陰諸證

婦人陰腫屬風邪乘陰與血相搏
陳良甫曰婦人陰腫是虛損受風邪所為胞絡虛而風邪客之風氣乘于陰與血氣相搏令氣痞寒勝理壅閉不洩越故令腫
婦人陰腫屬房勞傷損

徐春甫曰陰腫有因房勞過度傷損陰戶致腫宜節慾調治有慾勝而熱甚生虫以致腫痒甚者皆宜戒房室速治之有邪氣漸盛致陰戶潰爛不收失于早治也

薛立齋按前證若氣血虛弱補中湯舉而補之肝經濕熱龍膽瀉肝湯添而清之又有肝脾鬱怒元氣下陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加升柴解鬱結補脾氣夕用加味逍遙散清肝火生肝血除濕熱

慎齋按已上二條序嬾人陰戶腫有風邪之外感有房勞之內傷也陰腫病大全主于風邪入客春甫主于勞傷房事立

女科經綸 卷八

陰腫

彙

齋推原于肝經濕熱所致此為病機之要

嬾人陰中痛名小戶嫁痛

千金方曰嬾人小戶嫁痛連日方用甘草生姜白芍桂心酒煮溫服又方療嫁痛一味牛膝或一味大黃酒煮服又烏賊魚骨燒末酒之外用青鹽炒熱布裹熨之

嬾人陰中腫痛屬肝經濕熱

良方論曰嬾人或肝經濕熱下注或鬱怒傷損肝脾外證或兩拘小腹腫痛或玉門焮腫作痛或寒熱往來憎寒壯熱內證或小便滯澀或腹內急痛或小腹痞悶若兩拘小腹腫痛肝經濕

熱壅滯也用龍膽瀉肝湯玉門腫脹肝火血虛也加味道遙散及龍膽瀉肝湯加水香若概投散血攻毒之劑則誤甚矣

李氏按陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸者用四物湯加乳香末搗餅納陰中立効又陰腫痛極便秘欲死四物加柴胡丹皮山梔膽草如時常陰腫者四物加藁本防風若腫痛不閉者逍遙散加丹皮山梔

慎齋按已上二條序嬾人陰中腫痛之證也足厥陰經環陰器嬾人陰戶為肝經之分是經血虛火燥則為腫為痛痛者火也實則瀉其子龍膽瀉肝湯加味道遙散雖為本經的對

女科經綸 卷八

陰腫

彙

之藥不若大劑導赤散加黃連以瀉肝之子而以六味飲滋化源以補其母之勝也

嬾人陰痒屬臟虛虫蝕

陳良甫曰嬾人陰痒是虫蝕所為三虫在腸胃之間因臟虛三虫動作蝕于陰內其虫作熱微則為痒重者乃痛

嬾人陰痒屬慾事不遂積成濕熱

徐春甫曰嬾人陰痒多屬虫蝕所為始因濕熱不已故生三虫在腸胃間其虫蝕陰戶中作痒甚則痒痛不已潰爛腫突在室女寡嬾尼姑多因慾事不遂思想所淫以致氣血凝于陰間積

成濕熱久而不散遂成三虫故有此疾亦有房室過傷以致熱
壅故作腫痒內痛外為便毒莫不出慾事傷損所致

薛立齋按前證屬肝經所化當用龍膽瀉肝湯道途散以主
其內外以桃仁研膏和雄黃末和雞肝研餅納陰中以制其
虫仍用清肝解鬱之藥此證有鬱怒傷肝脾所致肢體倦怠
陰中悶痒小便赤澀者歸脾湯加山梔柴胡丹皮有肝脾氣
虛濕熱下注陰內痛痒不時出水食少體倦者歸脾湯加山
梔白芍甘草丹皮

李氏按陰中生虫屢如小蛆者乃濕熱甚而心氣又鬱氣血

女科經綸

卷八

陰痒

幸

凝滯而生宜薑香養胃湯補心湯硫鯉丸外用艾煎汁調雄
黃未燒薰之又以蛇床子煎湯頻洗同棉樹皮焙末入枯礬
麝香少許敷之立効

慎齋按已上二條序煩人有陰痒生虫之證也厥陰屬風木
之臟木朽則蟲生肝經血少津液枯渴致氣血不能榮運則
壅鬱生濕濕生熱熱生虫理所必然故治法不外參濕清熱
外以殺虫為治然其本元又當滋養肝血補助脾土益陰燥
濕也至春甫論慾事不隨所致亦病情之不可不察者也
煩人陰冷屬風冷客于子臟

陳良甫曰煩人陰中冷因勞傷子臟風冷客之

薛立齋按陰冷有肝經有濕熱外乘風冷所致若小便澀滯
或小腹痞痛龍膽瀉肝湯又有煩人陰中寒冷小便澄清腹
中亦冷飲食少思大便不實下元虛冷治以八味丸愈八味
治血弱不能榮養臟腑津液枯澀風寒客于子臟以致陰冷
有効

慎齋按已上一條序煩人有陰冷之證也陰中冷非外邪風
冷客于子臟即氣衰血虛臟腑虛寒以致肝經失養陰戶為
之寒冷也立齋必欲斷為肝經濕熱外乘風冷所致豈有客

女科經綸

卷八

陰痒

幸

邪之氣加于濕熱之病而變為陰冷耶論屬未當
煩人陰挺下脫有三證所致

大全曰煩人陰挺下脫或因胞絡傷損或因于臟虛冷或因分
挽用力所致

薛立齋按陰挺下脫當升補元氣為主若肝脾鬱結氣虛下
陷補中湯若肝火濕熱小便赤澀龍膽湯

煩人陰挺屬肝火濕熱脾虛下陷

薛立齋曰有煩人陰中突出如菌四圍腫痛小便數頻熱似瘰
似痛小便重墜此肝火濕熱而腫痛脾虛下陷而重墜也先以

補中湯加山梔茯苓車前青皮以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾胃外以生豬油和藜蘆末塗之而收

婦人陰挺屬熱藥房事意淫不遂所致

大全曰婦人陰中生一物挺出五寸許牽引腰腹膨痛至不思飲食皆因多服熱藥及煎焯或犯非理房事兼意淫不遂者陰挺三葉丸一捻金丸主之

慎齋按已上三條序婦人有陰挺之證也陰挺者陰器中挺出一物即立齋所謂舒出如蛇如菌如雞冠狀是也夫婦人陰器為足厥陰經部分而衝任督三脈所系胞門于戶在焉

外科經緯 卷八

陰挺

三

其所挺之物大約子臈腸癩之屬非濕熱脾虛下陷即濕熱樂房事所致此病機之屬于隱曲者在醫者以難以診候施之者立齋之書每多載之真有不可臆度者矣

婦人陰吹屬胃氣下泄

金匱要略曰胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎

李時珍按婦人胃氣下泄陰吹甚喧宜猪膏煎亂髮化服病從小便而出

程雲來曰經曰胃滿則腸虛腸滿則胃虛更虛更實則氣得

上下今胃中穀氣寔則腸胃虛虛則氣不得上下而腎又不能為胃關其氣但走胞門而出于陰戶膏髮煎者導小便藥也使其氣以化小便則不為陰吹之證矣

慎齋按婦人陰吹仲景以為穀氣寔胃氣下泄所致此之証者未之嘗聞千百年之書其闕疑可也予甲寅歲游峽石有友吳禹仲來詢云此鎮有一富翁室女病陰戶中時時有聲如後陰之轉失氣狀遍訪醫者不曉此何病也予曰此

外科經緯 卷八

陰吹

三

陰吹證也仲景之書有之禹仲因嘆予讀書之博

婦人陰蝕瘡屬心煩胃弱氣血凝滯

大全曰婦人陰蝕瘡凡婦人少陰脈數而滑陰中必生瘡名曰蠹瘡或痛或痒如出行狀淋瀝膿汁亦有陰蝕幾盡者此皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血凝滯耳故經云諸痛痒瘡皆屬于心又云陽明主肌肉痛癢皆屬于心治當補心養胃外以熏洗坐導治之

薛立齋曰婦人陰中生瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注其外證有陰中舒出如蛇俗呼陰挺有翻突如餅俗呼陰菌

亦有如雞冠花亦有生諸虫，亦有腫痛濕痒，潰爛出水，脹悶脫墜者，其內證口乾內熱，倦體經候不調，或飲食無味，脯熱胸膈不利，小腹痞脹，赤白帶下，小水淋漓，其治法腫痛者，四物湯加柴胡山梔丹皮，胆草濕痒者，歸脾湯加山梔丹皮柴胡，瀉淋者，龍胆湯加白朮丹皮，潰腐者，加味逍遙散，腫悶脫墜者，補中湯加山梔丹皮，佐以外治之法。

婦人陰中生瘡屬虫動侵蝕

陳良甫曰：陰瘡者，由三虫或九虫動作，侵蝕所為也。諸虫在入腸胃之間，臟腑調和，血氣充寔，不能為害。若勞傷經絡，腸胃虛

女科經綸

卷八

陰瘡

論

損則動作侵蝕于陰經者，或痒或痛，重則生瘡。

婦人疝瘡屬月事行房濁流陰道

千金方曰：婦人疝瘡，因月後便行房，致濕濁伏流陰道，生疝瘡。搔痒先用葱椒湯頻洗，後服赤石脂龍骨黑牽牛，尾絲子黃芪沙苑蒺藜之屬。又治婦人陰瘡，與男子妒精同方。用黃丹枯礬扁蓄藜本硫黃白蛇皮荆芥蛇床，為末葱湯洗後搽之。

慎齋按：已上三條，序婦人有陰瘡之證也。婦人陰中生瘡，屬于濕熱之邪，下流腎肝陰器為肝腎之部。二經虛則濕熱下陷，而生疝瘡諸瘡矣。若月事行房，敗精與濁血凝滯成瘡者。

此又八事之不謹當以清火消濁為治也。

婦人疝瘡屬肝經濕熱下注

婦人良方曰：婦人疝瘡，或肝經濕熱下注，或鬱怒傷損肝脾，其外證或兩物小腹腫痛，或玉門焮腫作痛，或寒熱往來，憎寒壯熱，其內證或小便澀滯，或腹內急痛，或小腹痞悶，上攻兩脇，或脯熱重墜，若兩物小腹腫痛，肝經濕熱壅滯也。龍胆瀉肝湯，五門腫脹，肝火血虛也。加味道遙散及龍胆湯加木香，若概投散血攻毒之劑，則誤矣。

婦人足跟瘡腫屬足三陰虛熱所致

女科經綸

卷八

足瘡

論

婦人良方曰：婦人足跟，足指腫痛，足心發熱，皆因胎產經行失于調攝，虧損足三陰虛熱所致。若腫痛或出膿，用六味丸為主，佐以八珍湯，胃虛懶食，佐以六君子湯，寒熱內熱，佐以逍遙散，脯熱益甚，頭目不清，佐以補中益氣湯，大凡發熱，脯熱內熱，自汗盜汗等證，皆陰虛假熱也。故丹溪謂火起九泉，陰虛之極也。足跟乃腎脈發源之所，腎經所過之地，若不求其屬，泛用寒涼以悞矣。然男子酒色過度者，多患此證。

婦人膿瘡屬肝脾濕熱下注

家醫錄曰：婦人兩腋生瘡，或因胎產飲食失宜，傷損脾胃，或

憂思鬱怒，損肝脾，以致溼熱下注，或外邪所侵，外腫屬足三陽，可治。內腫屬足三陰，難治。若初起發腫赤痛，屬溼毒所乘，人參敗毒散，或檳榔散，取毒散，若漫腫作痛，或不腫不痛，屬脾虛溼熱下注，補中益氣湯，或八珍湯，若膿水淋漓，體倦少食，內熱口乾，屬脾氣虛弱，補中湯，加茯苓、酒芍，若午後發熱，體倦屬血虛，前湯加川芎、熟地，或六味丸，若肢體畏寒，飲食少思，屬脾腎虛寒，八味丸，大抵色赤屬熱，毒易治，色黑屬虛寒，難治。設誤用攻伐，復傷胃氣，則難療矣。

婦人血風瘡屬風熱鬱火血燥

女科經綸 卷八 足瘡

家居醫錄曰：婦人血風瘡，因肝脾二經風熱鬱火血燥所致。其外證身發疙疹，或如丹毒，痒痛不常，搔破成瘡，膿水淋漓，其內證月經無定，小便不調，夜熱內熱，自汗盜汗，惡寒憎熱，肢倦體怠，飲食不甘，若發熱作痛，乃肝經風熱血燥，當歸飲，加柴胡、山梔，若體倦食少，口乾潮熱，乃肝脾鬱火傷血，加逍遙散，若疙疹痛痒，寒熱往來，乃肝經風熱傷血，柴胡、山梔、黃連，若不寐盜汗，內熱肺熱，乃脾經血虛，歸脾湯，兼寒熱，加山梔、熟地，如愈後身起白屑，搔則肌膚如帛，所隔此氣血虛，不能榮于腠理也。十全大補湯，若用風藥復傷陰血，反致他證。

慎齋按：已上序，婦人有疔，疔足瘡，腫瘡，血風諸證也。諸證總歸濕熱，實之肝脾損者居多，故立齋論治一以補養氣血為主。此治病求本之要道也。

婦人足指痛如焚，屬濕毒留滯經絡。

產寶百問曰：婦人脚十指如熱油煎者，此由榮衛氣虛，濕毒之氣留滯經絡，上攻心則心痛，下攻脚則脚痛，其脚指如焚亦脚氣之類。經云：熱厥者是也。

慎齋按：婦人足十指如熱油煎，方書但云脚氣之類，方用換腿丸、萬靈散、活血丹、從脚氣治法，殊未盡善。夫諸陽氣起于

女科經綸 卷八 足指

四肢足之三陽三陰俱起，足指之端其熱如油煎者，榮衛虧損，陰衰火旺之極。足三陰三陽經受傷，故也。豈但云脚氣而已，法當大劑滋水益陰，乃可救其燎原之焚耳。

婦人夢與鬼交通，屬氣血虛衰。

大全曰：人稟五行秀氣而生，承五臟神氣而養陰陽調和，勝腑強盛，邪魅安得干之？若捫理失節，血氣虛衰，則鬼邪干正，隱蔽而不欲見人，時獨言笑，忽時悲泣，是其候也。脈遲伏或如鳥啄，或綿綿而來，不知度數，面色不改，亦其候也。

婦人夜夢鬼交，屬干臟虛

產實百問曰人有五臟有七神藏氣盛則神強外邪鬼魅不能干犯若捫理失節血氣虛衰邪邪侵傷故婦人多與鬼魅交通其狀不欲見人如有對忤是也設令宮中人與寡婦曾夜夢交通邪氣懷惑久作癡癡或成鬼胎

婦人與鬼交屬七情虧損神無所護

薛立齋曰並證多由七情虧損心血神無所護而然用安神定志等藥正氣復而神自安若脈來乍大乍小乍短乍長亦是鬼祟宜灸鬼哭穴以患人兩手拇指相並用線紫緊當合縫處半肉半甲間灸七吐果是邪祟病者即乞求免灸云我自去矣

女科經綸 卷八 夜夢

天

慎齋按已上三條序婦人有夢與鬼交之證也夫人之五臟各有所藏心藏神肝藏魂肺藏魄脾藏意腎藏精與志心之血虛則神無所依肝之血虛則魂無所附肺之氣虛則魄無所歸脾腎二臟虛則意與志恍惚而不能主神明之官一失而魂魄已離其體夜夢鬼邪乘虛而慌恍若有所見者即我之魂魄也豈真有所謂鬼邪祟魅與之交感者哉立齋斷以為七情虧損心血神無所護而然真發病情之秘者矣若準繩綱目所載交接出血陽道遠理傷丈夫諸證事近隱曲變鄙在病者與醫者似難診療概惻之

卷八 終

女科輯要

〔清〕沈又彭撰

據中國中醫研究院圖書館藏
清同治元年刻本影印原書版框高
一八二毫米寬二六二毫米

女科精輯
卷之二

女科精輯



海上大隱廬藏

女科輯要序

題封沈氏所著醫經續傷寒論隨簡明切當允為善本尚存女科輯要一書世罕傳本原稿為余外舅徐紅橋先生補註珍藏先生早歸道山余受室後得見其書頗多涉理深說發前人所未發者今年揚素園明府閱有此稿命為借鈔余謂婦兄友珊曰君子之孝也亦務其大者遠者而已寶守遺編莫若傳諸不朽表珊許焉爰不揣鄙俚稍加參訂而公諸世云

光緒庚申冬棘人王士雄書於滬

女科輯要目次

卷上

經水

崩漏

帶下

求子

受胎

辨胎

妊娠諸病

附妊娠藥禁

附產西諸症

卷下

產

產後諸病

乳證

雜病

諸方

女科輯要卷上

沈竟封先生講

瑪後學徐政杰講輝補注

男 之藩友珊校

經水

素問女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任

脈通太衝脈盛月事以時下

沈按天癸是女精由任脈而來月事是經血由太

衝而來經言二七而天癸至緣任脈通斯時太衝

脈盛月事亦以時下一順言之一逆言之耳故月

事不調不來及崩是血病咎在衝脈衝脈隸陽明

帶下是精病咎在任脈任脈隸少陰蓋身中中央

一條是任脈背後脊裡一條是督脈皆起於前後

兩陰之交會處惟難經明晰靈素傳說帶脈起于

季脇似束帶狀入精藏於腎腎繫於腰背精欲下

泄必由帶脈而前然後從任脈而下故經言任脈

為病女子帶下

相按俞東扶云經言男子二八而腎氣盛天癸至

精氣溢瀉若天癸即月水丈夫有之乎蓋男女皆

有精易謂男女撒精可據然指天癸為精亦不妥

天癸為精不當又云精氣溢瀉矣後賢請受孕之道有陽精陰血先至後衝等說亦謬夫男女交接會見女人有血出形交接出血是病豈能聚精及為精所聚哉大約兩精歡暢百脈齊到大癸與男女之精偕至斯為任脈而成胎耳男胎女胎則由夫婦之天癸有強弱盈虛之不同也吾友徐亞枝云如沈氏說一若天癸即精者如俞氏說一若血與精之外別有他物所謂天癸者竊謂天癸者指腎水本體而言癸者水也腎為水臟天一生水故謂腎水為天癸至請至極也猶言足也女子七七

男子二八腎氣始盛而腎水乃足蓋人身五臟五行惟腎生最先而腎足最遲腎衰最早故孩提能悲能喜能怒能思而絕無慾念其有情實早開者亦在腎氣將盛天癸將至之年可見腎氣未盛癸水未足則不生慾念也迨腎氣衰癸水絕則慾念自除矣詳此段經文者當云女子必二七而腎水之本體充足任脈乃通大衝之脈始盛月事因而時而矣夫前陰二竅溺之出水數者無論矣其由精液清源于天癸者也月水雖從衝脈不謂為天癸之常可也洩精成孕是任脈之施受請為

天癸之能可也帶下乃任脈之失擔任謂為天癸之病其然則帶身水為天癸似亦無不可也前賢解此皆重讀上二字而略下一字惟將至字當作來字看遂至議論紛紜耳

王冰曰男以氣運故陽氣應日而一舉女以血滿故陰血從月而一下

月事不調
素問天地溫和則經水安靜天寒地凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸溢暴風暴起則經水波湧而漚

素問曰女子天癸既至逾十年無男子合則不調未逾十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或積而入骨或變而為腫或雖合而難子合多則枯虛人產乳眾則血枯殺人

惟按此論甚不盡然存其意可也惟產乳眾而血枯卒死者頗多然吾鄉與醴香大令徐夫人年逾五旬精力不衰猶能操家政而撫馭羣下也方約之云婦人不得自專每多忿怒氣結則血亦結惟按此至言也氣為血帥故調經必先理氣然

氣不可徒以香燥也。蓋鬱怒為情志之火，煩服香燥則營陰愈耗矣。

趙養葵云：經水不及期而來者，有火也。五六味丸，水加不及期而來多者，加白芍、柴胡、海螵蛸，如半月或十日而來，且綿延不止者，屬氣虛，宜補中湯。如過期而來者，火衰也。六味加艾葉，如脈遲而色淡者，加桂。此其大略也。其間有不及期而無火者，有過期而有火者，不可拘於一定，當察脈視稟，滋水為主，隨證加減。

維按：婦人之病，雖以調經為先，第人秉不同，亦如其面而有終身月汛不齊，而善於生育者，有經期極準而竟不受孕者，雖於女科閱歷多年，見聞不少，始知古人之論不可盡泥，无妄之藥不可妄試也。

辨色及痛
趙養葵曰：衝任藏精系胞，又恃一點命門之火為之主宰。火旺則紅，火衰則淡，火太旺則紫，火太衰則白。所以滋水更當養火，甚有乾枯不通者，雖曰火盛之極，亦不宜以苦寒之藥降火，祇宜大補其水，從天之一源以養之，使滿。又曰：紫與黑色者，多屬火旺，亦有虛寒而黑色者，不可不察。若淡白則無火明矣。

沈按：王宇素以寒則凝，既行而紫黑，定非寒證。然投熱藥取效，十中嘗見一二。色白無火，亦屬近理。然間有不宜補火者，嘗見元和一婦，經水過期十日方至，色淡，穩婆據此，投肉桂藥數劑，經水過多，遍身發黃，不能飲食，身熱脈數，竟成危候。此是丹溪所謂經水淡白屬氣虛一證，要之臨診時須細察脈象，復參旁證，方識虛實寒熱，儻有疑似證中，有兩說者，先用其輕劑，如色淡一證，先用補氣法，不效再投補火，庶無差誤。錄葉氏辨證于左。

嘗見一二。蓋寒主收引，小腹必常冷痛，經行時或手足厥冷，唇青面白，尺脈遲，或微而虛，或大而無力，熱則尺脈洪數，或實有力。參之脈證為的。

維按：色淡竟有屬熱者，古人從未道及，須以脈證互勘自得，但不可作實熱論而瀉以苦寒也。更有奇者，方氏婦產後經色漸淡，數年後竟無赤色，且亦結塊，平時亦無帶下。人曰：底底余診之，脈更數口苦，而時有寒熱，與青蒿白薇黃芩柴胡當歸歸身甲鱗板芍藥烏梅枸杞地骨皮等藥，出入為方，服百劑而愈。此僅見之證矣。

滑伯仁曰。經前臍腹絞痛。寒熱交作。下如黑豆汁。兩尺脈瀉。餘皆弦急。此寒溼搏於衝任。寒溼生而。下如豆汁。與血交爭。故痛。宜辛散苦溫血藥。

杰按辛散血藥是川芎之類。苦溫血藥是艾葉之類。

李氏曰。經水帶黃混濁者。溼痰也。

丹溪曰。經將行而痛者。氣之滯也。用香附青皮桃仁。

黃連。或用抑氣散。四物加胡索丹皮條芩。又曰。經

將來腹中陣痛。乍作乍止。者血熱氣實也。四物加川

連丹皮。

杰按抑氣散出嚴氏條芩附片陳皮一兩茯苓

炙甘草兩半也。為末。每服一錢。治婦人氣盛於血。

變生諸證。頭暈腦滿。取肉經高者。抑之之。甚則

謂是方和平。可用。若補血以平陽火。亦正治也。

又經後作痛者。氣血俱虛也。宜八珍湯。

又成塊者。氣之凝也。

沈按。經前腹痛。必有所滯。氣滯必沉。寒滯必

緊。溼滯必濡。兼寒兼熱。當參旁證。至若風邪由

下部而入于脈中。亦能作痛。其脈乍大乍小。有

龍起。葉氏用防風荆芥。粘梗甘草。連者加人參。

壹錢。焙黑。取其入血分。研末。酒送神效。

又按。經前後俱痛。病多由肝經。而其中更有不同。

脈弦細者。是木氣之鬱。宜逍遙散。及川棟小茴橘

核之類。脈大者。是肝風內動。體發紅塊者。是肝

外越。俱宜溫潤。戴禮亭室人向患經前後腹痛。

連及右足。體發紅塊。脈大。右關尺尤甚。己卯秋。予

作肝風內動治。用生地四錢。炒枸杞一錢。細石斛

二錢。杜仲二錢。乾淡菴蓉一錢。麥冬一錢。年廉。

錢歸身一錢五分。炒白芍一錢。服之。痛止。後於經

前後數劑。經來甚適。不腹痛。因作丸服。此方屢

川有驗。

經來聲啞。證荀恆大兄長女。嫁斜塘倪姓。早寡。體

氣虛弱。每逢月事。聲音必啞。余用天冬地黃菴蓉

歸身等藥。病益甚。張口指畫。毫無一字可辨。即於

此方加細辛少許。以通少陰之絡。藥後入口。其聲

即出。十餘劑後。桂附人味。丸調理。永不發。

撮要。經後日暗。屬血虛。

汪石山曰。經行泄瀉。屬脾虛多溼。宜參苓白朮散。

雄按。亦有肝木侮土者。

楊氏曰。經行白帶。屬陽虛下陷。用參朮助陽之藥。

雄按亦有鬱火內盛者

月事不來

素問二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息奔者死不治

沈按二陽指陽明經言不指厥腑言二陽之病發

心脾者陽明為多血之經血乃水穀之精氣藉心

火煅煉而成憂愁思慮傷心困及其子不嗜飲食

血無以資生陽明病矣經云前陰總宗筋之所會

會於氣街而陽明為之長故陽明病則陽事衰而

不得隱曲也太衝為血海並陽明之經而行故陽

明病則衝脈衰而女子不月也

雄按經水固以月行為常陰虛者多火經每先

期陰愈虛行愈速甚至旬日半月而一行更有血

已無多而猶每月竭歷一行者其涸也可立而待

也若血雖虛而火不甚熾決必愆期此含蓄有機

雖停止一二年或竟斷絕不行但其脈不甚數者

正合坤主吝齋之道皆可無慮味者不知此理而

但憑月事以分病之輕重聞其不行輒欲通之竭

澤而漁不仁甚矣

金匱云婦人病因虛積冷結氣經水斷絕

張景岳云經閉有血隔血枯不同隔者病發于通之則愈枯者其來也漸補養乃充

沈按金匱三證積冷結氣有血不行也景岳謂之

血隔積冷宜肉桂大辛熱之藥導血下行後用養

榮之藥調之一氣精宜宜如逍遙散或香附烏藥

行氣之品宜之虛者無血可行也景岳謂之無

枯宜補趨養葵補水補火補中氣三法最為扼要

雄按補水勿泥于六味補火勿泥于八味補中氣

勿泥于歸脾

寇宗奭曰童年情實早開精想在心月水先閉蓋憂

愁思慮則傷心心傷則血耗竭故經水閉也火既受

病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發

嗽嗽既作則水氣竭故四肢乾木氣不充故多怒髮

髮焦筋癢五臟以次傳遍故卒不死然終死也此於

諸勞最為難治

沈按此條亦從金匱虛字內分出實有是證但此

證所願不得相火必熾非補水無以制之六味地

黃湯補陰瀉陽固是妙法然脾虛食減倘嫌地黃

泥隔炒枯可也不然以女貞易之顧名思義鮮滋

相火

綱按此證最難治六味礙脾。歸脾助火。惟許一瓢滋營養液膏加小麥大棗遠志庶幾合法一瓢又有心脾雙補丸亦可酌用。

要全善曰。經閉有汚血凝滯胞門一證。羅謙甫血極膏一味大黃為末醋熬成膏服之利一二行經血自下是婦人之仙藥也。

朱丹溪曰。肥人痰塞胞門宜厚朴二陳湯。

沈按全匱論經閉有冷無熱非闕文也。蓋天暑地熱則經水沸溢。豈反有凝泣不來之理。然由東垣降心火瀉三焦之說不可盡信。即骨蒸內熱亦屬陰虛非同實火之可寒而愈也。

綱按王子亨全生指迷方地黃煎以生地汁入兩熬耗一半內大黃末一兩同熬候可丸如梧子大熟水下五粒未效加至十粒治女子氣竭傷肝月事不來病名血枯蓋瘀血不去則新血日枯也。即

丙經烏鰂丸。仲聖大黃廣蟲丸之義耳。後人但知彼血枯為血虛而不知血得熱則瘀反用溫補豈能愈此血枯之病。魏封亦為此論。毋乃欠考。

淋瀝不絕一名經漏。

陳良甫云。或因氣虛不能攝血。或因經行而合陰陽

外邪客於胞內。

綱按亦有因血熱而不循其常度者。

月事異常

經云七七而天癸竭。有年過五旬經行不止者。許叔微主血有餘不可止。宜當歸散。產寶主勞傷過度喜怒不時。李時珍作敗血論。三說不同。當參脈證。

李時珍曰。月事一月一行其常也。或先或後或逆或寒其病也。有行期抵吐血。或眼耳出血。是謂倒經。有三月一行。是謂居經。有一年一行。是謂避年。有一生不行而受胎者。是謂暗經。有受胎後月月行經

而產子者。是謂胎盛。俗名胎垢。有受胎數月血忽大下而胎不墮者。是謂漏胎。此雖以氣血有餘不足言。而亦異常矣。

綱按有未及二七之年而經水已行者。有年逾花甲而月事不絕者。有無病而偶停數月者。有壯年而汛即斷者。有帶下過甚而經不行者。有數年而一行者。有產後自乳而仍按月行經者。有一產而停經一二年者。秉賦不齊。不可以常理概也。

血崩。血大至日崩。此是急病。

素問陰虛癰搏謂之。許叔微云。天暑地熱

經水沸溢。又云陰虛者尺脈虛。陽搏者寸脈弦。急是為陰血不足。陽邪有餘。故為失血內崩。宜奇效四物湯。或四物加黃連。

四物湯

當歸酒洗 川芎 白芍 熟地黃以上為四物

阿膠 艾葉 黃芩炒 各一錢

又云。女人因氣不先理。然後血脈不順。生崩帶諸證。香附是婦人仙藥。醋炒為末。久服為佳。每服二錢。清米飲調下。徐朝奉內人徧藥不效。服此獲安。

杰按。叔微理氣二字。專主怒氣鬱氣傷肝。故用香

附理氣以和肝慎不可用破氣藥

詳立齋云。肝經風熱。或怒動肝火。俱宜加味逍遙散。

加味逍遙散 當歸 白芍 柴胡 甘草 茯苓 白朮 丹皮 黑梔 加薄荷 薑棗煎

李太素曰。崩宜理氣降火升提。

金匱云。寸口脈微而緩。微者衛氣疎。疎則其膚空。緩者胃弱不實。則穀消而水化。穀入于胃。脈道乃行。水入于經。其血乃成。營盛則其膚必疎。三焦絕經。名曰血崩。

趙養葵曰。氣為陽主升。血為陰主降。陽有餘則升者。勝血出上竅。陽不足則降者。勝血出下竅。氣虛者。面色必白。尺脈虛大。

東垣云。下血。須用四君子補氣藥收功。

又云。人傷飲食。胃多妄下。清氣下陷。濁氣下降。乃生崩。所以胃脘之陽不能升舉。其氣陷下致崩。宜補中湯。

丹溪云。有涎鬱胸中。清氣不升。故經脈壅遏而降下。非開涎不足以行氣。非氣升則血不能歸隧道。其證或腹滿如孕。或臍腹疝痛。或血結成片。或血出則快。

止則悶。或膈上動。治宜開結痰。行滯氣。消汚血。沈按。衝為血海。並陽明之經而行。故東垣丹溪皆主胃脘之陽不升。顧其病源各異。李曰。妄下。朱云。痰鬱。有腹滿如孕。血出反快。止反悶。等證。可證妄下則無有也。非問不得。

沈按衝為血海並陽明之經而行故東垣丹溪皆主胃脘之陽不升顧其病源各異李曰妄下朱云痰鬱有腹滿如孕血出反快止反悶等證可證妄下則無有也非問不得

數元禮曰。血大至曰崩。或清或濁。或純下紫血。勢不可止。有崩甚腹痛。人多疑惡血未盡。又見血色紫黑。愈信為惡血。不敢止。截凡血之為患。卻出未出之際。停在腹中。即成紫血。以紫血為不可留。又安知紫血之不為虛寒乎。瘀而腹痛。血行則痛止。崩而腹痛。血

之。不為虛寒乎。瘀而腹痛。血行則痛止。崩而腹痛。血

住則痛止。芎歸湯加薑附止其血而痛自止。

薛立齋云。有婦患崩。過服寒藥。脾胃久虛。中病未已。

寒病復起。煩渴引飲。粒米不進。昏憤時作。脈洪大。按

之微弱。此無根之火。內虛寒而外假熱也。十全大補

加附子。崩減。日服八味丸而愈。又有久患崩。服四

物湯。涼血劑。或作或止。有主降火。加腹痛手足厥冷。

此脾胃虛寒所致。先用附子理中湯。次用濟生歸脾

補中益氣二湯。崩頓止。若泥痛無補法。則誤矣。

沈按。崩證熱多寒少。若血大至色赤者。是熱非寒。

僅色紫黑者。出絡而凝。其中有陽虛一證。經云。陽

氣者。衛外而為固也。營行脈中。衛行脈外。脈外之

陽虛失於護衛。則脈中之營血漏泄。既出絡脈。凝

而不流。漸漸變紫變黑。然必須少腹惡寒。方可按

溫。

崩證極驗方

地榆二錢 生地四錢 白芍三錢 川連五

分 黃芩一錢 甘草八分 蓮類一錢 丹

皮錢半 黑梔一錢 牡蠣二錢 水煎服

一婦日服人參阿膠血不止。投此即效。因伊帶多。

偶以苦參易芩。血復至。用芩即止。去血又至。加

連即止。

一婦患崩月餘。余診時太崩發。最後脫。是方加人

參十錢。服之即定。十劑而安。

一婦患此年逾五旬。投人參阿膠不效。一日用黃

連五分。甚不相安。一醫云。是氣病。用酒炒香附歸

芩丹皮黃芩牡蠣棗仁黑荆芥各二錢。鬱金一錢

五分。檳皮一錢。上沉香磨沖三分。柴胡五分。棕櫚

灰八分。煎服一劑。崩止。除去柴胡。棕櫚。荆芥。數劑

食進。後加白朮為散。服之作脹。減去即安。

一婦證少腹惡寒。用桂附八味丸。收全效。

雄按。經漏崩淋。並由精竅出。惟漏血從溺竅而下。

婦女雖自知。然報于細述。醫者不知。辨別。往往誤

治。更有因病汎愆。而衝脈之血。改從大腸而下者。

人亦但知為便血也。臨證均須細審。

素問。狂脈為病。男子內結。七疝。女子帶下。瘕聚。

又曰。脾傳之腎。名曰疝瘕。小腸宛結。而痛。出白名曰

又曰。少腹宛熱。洩出白液。

又曰。思想無窮。所願不得。意淫于外。入房太甚。陵為

又曰。思想無窮。所願不得。意淫于外。入房太甚。陵為

白帶

沈按帶下有主風冷八于脾絡者巢元方孫思邈
嚴用和楊仁齋婁全善諸人是也有主淫熱者劉
河間張潔古張戴人羅周產諸人是也有主脾虛
氣虛者趙養葵薛立齋諸人是也有主淫痰者朱
丹溪是也有主脾腎虛者張景岳薛新甫是也又
有主木鬱地中者方約之繆仲淳是也其所下之
物嚴主血不化赤而成張主血積日久而成劉主
熱極則津液溢出其治法有用大辛熱者有用大
苦寒者有用大攻伐者有用大填補者雖立論製

方各有意義然其所下之物究竟不知為何物惟
丹溪云婦人帶下與男子夢遺同顯然指着女精
言千古疑竇一言道破但精滑一證所因不同情
其所製之方圍於痰火二字中耳由是言之白帶
即同白濁赤帶即同赤濁此皆滑膩如精者至若
狀如米泔或臭水不黏者此乃脾家之物氣虛下
陷使然高年亦有患此非精氣之病不可混治
又按戴元禮論赤濁云精者血之所化有濁去太
多精化不及赤未變白故成赤濁此虛之甚也何
以知之有人夫癸未至強力好色所泄半精半血

若濁不赤無他熱證縱見赤濁不可以赤為熱祇
宜以治白濁法治之觀此則以赤帶為熱者謬矣
細按帶下女子生而即有津津常潤本非病也故
扁鵲自稱帶下醫即今所謂女科是矣金匱亦以
三十六病隸之帶下但過多則為病溼熱下注者
為實精液不守者為虛苟體強氣旺之人雖多亦
不為害惟乾燥則病甚蓋營津枯涸即是虛勞凡
汛愆而帶盛者內熱逼液而不及化赤也併帶而
枯燥全無者則為乾血勞之候矣彙而觀之精也
液也痰也溼也血也皆可由任脈下行而為帶然

有虛寒有虛熱有實熱三者之分治遺精亦然而
虛寒證較少故天士治帶必以黃檗為佐也
妙香散 治脈小食少或大便不實者
龍骨 一兩 益智仁 兩 人參 一兩 白茯苓
錢 五 遠志 五錢 茯神 五錢 硃砂 二錢
甘草 錢半 為末每服酌用數錢
地黃飲子去桂附 腎陰不足肝陽內風鼓動而滑
精其脈弦大者宜之葉云天地溫和風濤自息又云
坎中陽微下焦失納又云肝為剛臟不宜剛藥祇宜
溫柔養之

水製熟地八錢 川石斛一分 石菖蒲一分 遠

志肉一錢 巴戟肉一錢 乾淡菴蓉一錢 麥冬

五分 茯苓一錢 五味子一錢 黃肉未二味酸

補腎陰清肝陽方 王宇泰云腎為陰主藏精肝為

陽主疏泄故腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不

固按此方以清芬之品清肝不以苦寒之藥傷氣

藕節一兩 青松葉一兩 側柏葉一兩 生地八兩

玉竹八兩 天冬八兩 女貞子四兩 旱蓮草四兩

八味丸 戴元禮云有赤白濁人服元免丹不效服

附子八味丸即愈者不可不知按此即坎中陽微下

焦失納之意屢用有效

雄按陰虛而兼溼火者宜六味丸甚者加黃檗丸

妙

松硫丸 此是方外之方治赤白濁赤白帶日久不

愈無熱證者其效如神

松香 硫黃 鐵銹內溶化 將醋頻頻灑上俟藥

如飴移銚置冷處用冷水濡手丸如豆大必須人

眾方可否則凝硬難丸每服壹錢

雄按此方究宜慎服

固精丸 選註云陽虛則無氣以制其精故察則陽

隨而精道不禁隨煙隨池不必夢而遺也必須提陽

固氣乃克有濟

鹿茸一兩 鹿角霜分兩 韭子一兩 五味子

五錢 淡乾菴蓉一兩 茯苓五錢 熟附子五錢 巴

戟肉五錢 龍骨五錢 赤石脂五錢 酒糊丸

溫柔瀉法 葉氏治白淫

白龍骨 桑螺蛸 湖蓮 芡實 茯苓 金

櫻子 覆盆子 遠志肉 茯神 密丸

赤水元珠端本丸 治脈大體肥大便晨泄不爽淫

熱遺精極驗 葉云溼熱之病面色赤亮可證

苦參二兩 黃檗二兩 牡蠣一兩 蛤粉一兩 葛根

青蒿一兩 白螺蛸殼一兩 神麴和丸

本事方清心丸 戴元禮云有經絡熱而滑精者此

方最妙 大智禪師云腰脊熱而遺者皆熱遺也

黃檗 冰片 鹽湯為丸

杰按然亦有陰虧之極致腿足腰脊肝腎部位作

熱而遺者又宜填陰固瀉以斂虛陽非可妄投瀉

火宜詳辨脈證

導赤散 李瀨湖云一壯年男子夢遺自濁少腹有

無氣腰熱退則前陰氣動手足溫又且多下氣甚多
噫氣時振逾旬必遺脈弦滑而大偶投瀉藥則一夜
二遺遂用此方大劑煎服遺濁皆止

生地 木通 甘草稍

細按任脈虛而帶下不攝者往往滋補雖投而不
能愈余以海螺蛸一味為粉廣魚鱈煮爛杵丸綠
豆大淡菜湯下久服無不收功真妙法也

求子

素問女子二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以
時下故有子七七而任脈虛太衝脈衰少天癸竭地

道不通故形壞而無子

沈按此求子全賴氣血充足虛衰即無子故謂立

齋云至要處在審男女尺脈若右尺脈細或虛大

無力用八味丸左尺洪大按之無力用六味丸兩

尺俱微細或浮大用十補丸此遵內經而察脈用

方可謂善矣然此特言其本體虛而不受胎者也

若本體不虛而不受胎者必有他病繆仲淳主風

冷乘襲子宮朱丹溪主衝任伏熱張子和主胸中

實痰丹溪於肥盛婦人主脂膜塞胞陳良甫于二

三十年全不產育者胞中必有積血主以盪胞湯

諸賢所論不同要皆理之所有宜察脈辨證施治
盪胞湯在千金為婦人求子第一方孫真人鄭重
之

盪胞湯

朴硝 丹皮 當歸 大黃 桃仁 生用各三錢

厚朴 桔梗 人參 赤芍 茯苓 桂心

甘草 牛膝 檳皮 各二錢 附子 六錢 蠶虫

水蛭 各十枚

右十七味吹咀以清酒五升水五升合煮取三
升分四服日三夜一每服相去三時更服如前

女科輯要 卷上

三

覆被取微汗天寒汗不出着火籠之必下膿血

務須斟酌下盡二三服即止如大悶不堪可食

酢飯冷漿一口即止然恐去惡不盡忍之尤妙

雄按子不可以強求也求子之心愈切而得子愈

難天地無心而成化乃不期然而然之事非可以

智力為者惟有病而求其孕育之人始可用藥以

治病凡無病之人切勿妄藥以求子弄巧反拙豈

徒無益而已耶縱使有效而藥性皆偏其子稟之

非天札即頑悖余歷驗不爽

又按盪胞湯雖有深意其藥太峻未可輕用惟保

胎神佑九善舒氣鬱緩消積血不但為保胎之良藥亦是調經易孕之仙丹每日七九頻服甚效余悉用有驗最為穩妙

又按世有愚夫愚婦一無所知而敏于生育者此方靈臯所謂此事但宜有人欲而不可有天理也觀于此則一切求子之法皆不足憑况體氣不齊豈容概論有終身不致孕者有畢世僅一產者有一產之後踰十餘年而再妊者有按年而妊者有媿甫彌月而即妊者有每妊必駢胎者且有一產三胎或四胎者駢胎之胞有合有分其產也有接

女科輯要卷上

三

踵而下者有踰日而下者甚有踰一旬半月而下者諺云十箇孩兒十樣生是以古人有甯醫十男子莫醫一婦人之說因婦人有胎產之千態萬狀不可以常理測也世之習婦科者不可不究心焉又按古人五種不男曰螺紋鼓角脈而人多誤解余謂螺乃螺字之譌螺形之人交骨如環不能開拆如受孕必以產厄亡紋則陰竅屈曲如螺紋之盤旋礙于交合俗謂之實女是也後人不知螺形之異而改爲螺遂以紋之似螺者又混于鼓鼓者陰戶有皮輓如鼓僅有小竅通溺而已設幼時以

鉛作鉅逐日經之久則自開尚可以人力為也則陰中有物與至亦有能舉者名曰二陰人俗云雌雄人是也脈則終身不行經者理難孕育然臨經亦可受胎錢國寶云蘭絲孫茂匠之妻自來無經而生四子一女故五種之中惟三者非人力所能治而紋角二種併不可交也特考定之以正相傳之譌其可男可女之身名人病者亦角類也

受胎總論

李東璧曰易云男女媾精萬物化生乾道成男坤道成女褚澄言血先至裏精則生男精先至裏血則生

女陰陽均至

三

女陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之

東垣言血海始淨一二日成男三四日成女聖濟言因氣而左動陽資之則成男因氣而右動陰資之則成女丹溪乃非褚氏而是東垣主聖濟左右之說立論歸于子宮左右之系可謂悉矣竊謂褚氏未可非東垣亦未盡是也蓋褚氏以氣血之先後言道藏以日數之奇偶言東垣以女血之盈虧言聖濟丹溪以子宮之左右言各執一見會而通之理自得矣蓋獨男獨女可以日數論駢胎品胎亦可以日數論

載一產三子四子。有半男半女。或男多女少。或男少女多。則一二五日為男。二四六日為女之說。豈其然哉。褚氏聖濟丹溪主精血子宮左右之論。為有見而道藏東垣日數之論。為可疑矣。叔和脈經以脈之左右浮沉辨狼生之男女。高陽脈訣以脈之縱橫逆順別斷品之胎形。恐臆度之見。而非確論也。

雄按閱微草堂筆記云。夫胎者兩精相搏。翁合而成者也。媾合之際。其情既洽。其精乃至。陽精至而陰精不至。陰精至而陽精不至。皆不能成。皆至矣。時有先後。則先至者氣散不攝。亦不能成。不先不

後兩精並至。陽先衝而陰包之。則成男。陰先衝而

陽包之。則成女。此化生自然之妙。非人力所能為。

故有一合即成者。有千百合而終不成者。愚夫婦所知能。聖人有所不知能。此之謂矣。端恪後人沈君辛甫云。胎脈辨別處。誠醫者所當知。若受妊之始。曷以得男。何緣得女。生化之機。初無一定。諸家議論雖歧。無關損益。置之可也。

辨胎

素問婦人足少陰脈動甚者。妊子也。

沈按足少陰腎脈也。動者如豆。厥厥動搖也。王太

僕作手少陰。于少陰脈。應在掌後。餘骨之後。應在中直對小指。非太淵脈也。必有所據。全元起作足少陰。候在尺中。經云尺裡以候腹中。胎在腹中。當應在尺。此為近理。

又曰陰搏陽別。謂之有子。

沈按王注云。陰尺中也。搏謂搏觸于尺也。尺脈搏擊與寸脈迥別。則有孕之兆也。

又曰何以知懷子之且生也。曰身有病而無邪脈也。難經曰女子以腎系胞。三部脈浮沉正等。按之不絕者有妊也。

沈按叔和曰。婦人三部脈浮沉正等。以手按之。不絕者。孕子也。妊娠初時。寸微呼吸五至。三月而尺數也。脈滑疾重。以手按之。散者。胎已三月也。脈重。手按之不散。但疾不滑者。五月也。此即陰搏陽別之義。言尺脈滑數。寸脈微小。尺與寸脈別者。孕子也。

辨男女胎

王叔和曰。妊娠四月。其脈左疾為男。右疾為女。俱疾為生二子。又曰左尺偏大為男。右尺偏大為女。左右俱大。產二子。大者如實。此即陰搏之意。尺脈實大。

與寸脈迥別。但分男左女右也。又曰左脈沉實為男。右脈浮大為女。

張全善曰按州漢云男受胎在左子宮。女受胎在右子宮。推之于脈其義亦然。如胎在左則氣血護胎必

盛于左。故脈左疾為男。左大為男也。胎在右則氣血護胎必盛于右。故脈右疾為女。右大為女也。亦猶經

文陰搏陽別謂之有子。言胎必在身半之下。氣血護胎必盛于下。故陰尺鼓搏與陽寸迥別也。

千金云令妊婦面南行。從背後呼之。左迴首者是男。右迴首者是女。又女腹如箕。以女胎背母。足膝抵腹。

下大上小。故如箕。男腹如釜。男胎向母背脊抵腹。其形正圓。故如釜也。

沈按內經妊娠脈數條。惟陰搏陽別尤為妙諦。素問診法。上以候上。下以候下。氣血聚于上。則寸脈盛。

氣血聚于下。則尺脈盛。其勢然也。試之瘡瘍。無不驗者。况胎在腹中。氣血大聚。豈反無徵驗之理。胎

系於腎。在身半以下。故見于尺部。但人脈體不同。有本大者。有本小者。即懷妊時。有見動脈者。有不

見動脈者。然尺中或疾或數。總與寸脈迥然。有別細審自得。即左右男女亦然。受胎時偏左成男。

氣血聚于左。則左重。故呼之則左顛側。脈必形于

左尺。受胎時偏右成女。氣血聚於右。則右重。呼之則右顛側。脈必形于右尺。此一定之理也。至若丹

溪男受胎於左子宮。女受胎于右子宮。此是語病。猶言偏于子宮之左。偏于子宮之右耳。原非有二

子宮也。惟左男右女。指醫人之左右手言。恐未必然。

雄按諸家之說。皆有至理。而皆有驗。有不驗。余自髫年即專究於此。三十年來見聞多矣。有甫受孕而脈即顯呈于指下者。有半月一月後而見于脈

者。有二三月而見於脈者。有始見孕脈而五六月之後反不見孕脈者。有始終不見于脈者。有受孕

後反見絃澀細數之象者。甚有兩脈反沉伏難尋者。古人所論。原是各抒心得。奈死法不可以限生

人。紙上談兵。未嘗閱歷者。何足以語此。惟今春與楊素圃大令談之。極蒙折服。始深嘗此中甘苦也。

憶辛丑秋診周光遠令正之脈。右寸關忽見絃大滑疾。上溢魚際之象。平昔之脈未嘗見此。頗為賦

然。及詢起居。諸無所苦。惟汛愆半月耳。余曰。妊也。詳可必其為男。繼而其父孫際初聞之。診乃女脈。

曰妊則或然恐為女孕。余曰肺象乎天。今右寸脈最絀滑且見上溢之象。豈非本乎天者親上耶。爾曰此雖君之創解。然極有理。究不知瓜紅何似耳。始壬寅夏果舉一男。聊附一端。以為鑿鑿談脈者。

妊婦似風 辨按即子胎證

沈按妊婦病源有三大綱。一曰陰虧。人身精血有限。聚以養胎。必分必虛。二曰氣滯。腹中增一障礙。則升降之氣必滯。三曰痰飲。人身臟腑接壤。腹中遠增一物。機括為之不靈。津液聚為痰飲。

知此三者。庶不為邪說所惑。妊婦卒倒不語。或口眼歪斜。或手足痠癱。皆名中風。或腰背反張。時昏時醒。名為風痺。又名子癇。古來皆作風治。不知卒倒不語。病名為厥。陰虛失納。孤陽逆上之謂。口眼歪斜。手足痠癱。或因痰滯經絡。或因陰虧不吸。肝陽內風暴動。至若腰背反張一證。臨危必見。戴眼其故何歟。蓋足膀胱經太陽之脈。起於目內眥。上額交顛。循肩膊內。夾脊抵腰中。足太陽主津液。虛則經脈時縮。脈縮故腰背反張。經云。瞳子高者太陽不足。謂太陽之津液不足也。脈縮急則瞳子高。

甚則戴眼。治此當用地黃麥冬等藥。滋養津液為主。胎前病陽虛者。絕少。慎勿用小續命湯。

按陰虛氣滯二者。昔人曾已言之。痰飲一端。可謂發前人之未發。因而悟及產後諸妄等證。誠沈氏獨得之秘。反覆申明。有裨後學之功。不亦多乎。

沈按錢鶴雲正室。飲食起居無恙。一夜連厥數十次。發則目上竄。形如尸。次日又厥數十次。至晚一厥不醒。以火炭投醋中。近鼻熏之。不覺。切其脈三部俱應。不數不遲。並無怪象。診畢。伊父倪福增曰。可治否。余曰。可用青鉛一筋化炷。傾盆水內。撈起。

女科輯要

再炷再傾。三次取水煎生地一兩。天冬二錢。細石斛三錢。甘草一錢。石菖蒲一錢。服。倪留余就寢。書室晨起。見倪復治。藥云。昨夜服藥後。至今止厥六次。厥亦甚輕。故照前方再煎。與服。服後。厥遂不發。後生一子。計其時。乃受胎初月也。移治中年非受胎者。亦屢效。

吳門葉氏治一反張。發時如跳。蟲離席。數寸。發過即如平人。用白芍甘草紫石英炒小麥南棗煎服。而愈。捷徑方載一毒藥攻胎。藥毒衝上。外設牙關緊急。口不能言。兩手強直。握拳自汗。身有微熱。與中風相似。

但脈浮而軟十死一生醫多不識若作中風治必死
用白扁豆二兩生去皮爲末新汲水調下即效
痰滯經絡宜二陳加膽星竹瀝薑汁

初娠似勞

沈按錢彬安室人內熱咳喘涎痰夜不能臥脈細
且數呼吸七至邀余診視問及經事答言向來不
準今過期不至余因隣近素知伊稟怯弱不敢用
藥就診吳門葉氏云此百日勞不治歸延本邑浦
書亭療投逍遙散不應更萎蕤湯亦不應日病本
無藥可治但不藥必斃病者可與六味湯柳復爾

爾因取六味丸料二十分之一煎服一劑咳減二
劑熱退四劑霍然惟覺腹中有塊日大一日滿月
生一女母子俱安越二十餘年女嫁母故後以此
法治懷妊效驗涎痰或內熱或不內熱或脈數或
脈不數五月以內者俱效五月以外者有效有不
效
雄按亦有勞損似疑者蓋凡事皆有兩面也

丹溪云因火動胎逆上作喘急者川條苓香附爲末
水調服

引滄洲曰有婦胎死腹中喘喘不得臥醫以風藥治
脈診其脈氣口盛人迎一倍左關弦動而疾兩尺俱
短而離經因曰病蓋得之毒藥動血以致胎死不下
奔迫而上冲非外感也大劑芎歸湯加催生藥服之
下死胎其夫曰病妾有懷室人見嫉故藥去之眾所
不知也

外感作喘仍照男子治故不錄他病倣此
王海藏醫元戎曰胎前病唯當順氣若外感四氣
內傷七情以成他病治法與男子同當於各證類中
求之惟動胎之藥切不可犯

惡阻

金匱曰婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒
熱名妊娠於法六十日當有此證設有醫者治逆卻
一月加吐下者則絕之

沈按聖全善曰惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食
是也絕之者謂絕止醫藥候其自安也予嘗治一
二妊婦嘔吐愈治愈逆因思絕之之旨停藥月餘
自安

朱丹溪曰有妊二月嘔吐眩暈脈之左弦而弱此惡
阻因怒氣所激肝氣傷又挾胎氣上逆以茯苓半夏

湯下抑青丸

千金半夏茯苓湯治妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩體重四肢百節疼痛煩沉羸多臥少起惡寒汗出疲極黃瘦

半夏 生薑各三 乾地黄 茯苓各十 橘

皮 旋覆花 細辛 人參 芍藥 芎藭

桔梗 甘草各十

右十二味以水一斗煮取三升分三服若

病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變者

熱煩渴口生瘡者去橘皮細辛加煎胡知母各

十二銖若變冷下利者去乾地黄入桂心十二

銖若食少胃中虛生熱大便閉塞小便赤少者

宜加大黃十八銖去地黄加黃芩六銖餘依方

服一劑得下後消息看氣力冷熱增損方更服

一劑湯便急使茯苓丸令能食便強健也忌生

冷醋滑油膩

千金茯苓圓 服前湯兩劑後服此即效

茯苓 人參 桂心 乾薑 半夏 橘皮

各一 白朮 葛根 甘草 枳實各二 右十

味蜜丸梧子大飲服二十九漸加至三十九日

三

杰按肘后不用乾姜半夏橘皮白朮葛根只用五

物又云妊娠忌桂故熬

雄按胎前產後非確有虛寒脈證者皆勿妄投熱

劑暑月尤宜慎之

方

青竹茹 橘皮各十 茯苓 生薑各一 半夏

各三

右五味水六升煮取二升分三服

千金橘皮湯治妊娠嘔吐不下益

橘皮 竹茹 人參 白朮各十 生薑一

厚朴十二 右六味水七升煮取二升分三

服

沈按費姓婦懷妊三月嘔吐飲食服橘皮竹茹黃

芩等藥不效松郡車潤津用二陳湯加旋覆花薑

皮水煎沖生地汁一杯一劑吐止四劑全愈一醫

笑曰古方生地半夏同用甚少不知此方即千金

半夏茯苓湯除去細辛桔梗芎藭白芍四味

又按嘔吐不外肝胃兩經病人身臟腑本是接壤

懷妊則腹中增了一物臟腑機所為之不靈水數

六九〇

之精微不能生蒸為氣血。凝聚而為痰飲。壅塞胃
口。所以食入作嘔。此是胃病。又婦人既娠。則精血
養胎。無以攝納肝陽。則肝陽易升。肝之經脈火旺。
肝陽過升。則飲食自不能下胃。此是肝病。千金牛
夏茯苓湯中用二陳化痰以通胃也。用旋覆高者
抑之也。用地黃補陰以吸陽也。用人參生津以養
胃也。其法可謂詳且盡矣。至若細辛亦能散痰。桔
梗亦能理上焦之氣。芍藥亦能宣血中之滯。未免
升提。白芍雖能平肝。然陰仰景法胸滿者去之。故
華氏皆不用。斟酌盡善。西劑獲安有以也。

雄按發明盡致。精義入神。

沈按蔡姓婦惡阻。水藥俱吐。松劑醫用抑青丸立
效。黃連一味為末。粥糊丸麻子大。每服二三十丸。

又按肝陽上升。補陰吸陽。原屬治本正理。至肝陽
亢甚。滴水吐出。即有滋陰湯藥亦無所用。不得不
用黃連之苦寒。先折其太甚。得水飲通。然後以滋
陰藥調之。以收全效。

雄按左金丸亦妙。

沈按沈姓婦惡阻。水漿不咽。即吐。醫藥雜投。不應。
身證骨立。精神困倦。自謂必死。醫亦束手。一老婦

云急停藥。八日自覺。後果如其言。停藥者即金
匱絕之之義也。至八日當愈。一語。豈金匱六十
自當有此證之誤耶。不然。何此言之驗也。

又朱宗承正室甲戌秋。體倦吐食。診之略見動脈。
詢得停經兩月。惡阻證也。述前治法有效。有不效。
如或不效。即當停藥。錄半夏茯苓湯方與之。不效。
連更數醫。越二旬復。邀余診。前之動脈不見。但覺
細軟。嘔惡日夜不止。且吐蛇兩條。余曰。惡阻無礙。
吐就是重候。始安其就。以觀動靜。用烏梅丸。早晚
各二十九。四日就止。惡阻不詐。此治惡阻之變局。

雄按沈之

姓婦煩名子煩

丹溪云。煩因胎元壅滯。熱氣所發。

沈按子煩病因曰痰。曰火。曰陰虧。因痰者胸中必
滿。仲景云。心中滿而煩。宜瓜蒂散。此是吐痰法。妊
婦禁吐。宜二陳湯加黃芩。竹茹。旋覆花。陰虧火甚
者。仲景黃連阿膠最妙。

醫方集解注。初有竹葉湯一方。治妊娠心驚
膽怯。終日煩悶。名子煩。因受胎四五。月相火用藥
或盛夏。君火大行。但能乘肺。以致煩燥。胎動不安。

亦有停痰積飲滯于胸膈以致煩躁者

麥冬錢 茯苓 黃芩錢 人參五 淡竹葉

片 竹葉清煩黃芩 消熱麥冬涼肺心火乘肺故

煩出於肺茯苓安心人參補虛妊娠心煩因多虛

也 如相火盛者單知母九君火盛者單黃連九

神不安者珠砂安神丸切不可作虛煩用梔豉等

藥治之一方茯苓為末無人參有防風一方有防

風知母無人參有茯苓加竹瀝

子懸

嚴氏紫蘇散許叔微云治懷胎近上脹滿疼痛謂之

子懸 陳良甫曰妊婦因五月者相二火養胎熱氣

逆上胎濟心胸腹滿痛名曰子懸用此加黃芩山

梔之類一方無川芎名七寶散許叔微云六七月子

懸者用之數數有驗不十服胎便近下

紫蘇兩 腹皮 人參 川芎 橘皮 白芍

當歸分 甘草分 剉分三服水一盞生薑四

片葱白煎去渣服

杰按去川芎應避升提之故

汪詡菴曰治胎氣不和滾上胸腹脹滿頭疼心腹腰

脇皆痛名子懸因下流氣實相火旺盛舉胎而上

上

通心利也每服止用蘇葉一錢當歸七分腹皮以下

皆五分甘草二分無葱白心腹痛者加水香延胡

陳來種曰芎歸芍藥以和其血蘇橘大腹以順其氣

氣順血和則胎安矣既利其氣復以人參甘草養其

氣者順則順其邪逆之氣養則養其沖和之氣也

杰按延胡動血恐未可用

趙養葵有命門虛寒胎上湧心就煖一說

沈按此是百中僅一非實見虛寒脈證熱藥不可

嘗試

又郁姓婦懷妊九月獨獨動遂覺腹痛胎漸升

至胸中氣塞不通忽然狂叫咬人數人扶持不住

病名子上撞心即子懸之最重者用旋覆代赭湯

去參棗連淮兩劑胎墮得生又一婦證亦如之服

前藥胎墮而死

又陸檢修正室子上撞心如穩婆效磨代赭汁服

遂產兩子一子在上橫於心下一子撞着上子故

經一晝夜不至撞心得不死產下遂安

慈白湯治胎上逼心煩悶又治胎動困篤本草云葱

白通陽安胎聖全善曰此方神效脈浮滑者宜之葱

白二七莖濃煮汁飲之胎未死即安已死即出未效

未效

再服

陳良甫曰。治一婦孕七箇月。遠歸。忽然胎上衝作痛。坐臥不安。兩醫治之無效。遂云胎已死矣。用芫麻子。何爛和麝香。貼臍中以下之。命在呼吸。召陳診視。兩尺脈絕。他脈和平。陳問二醫作何證治之。答云死胎。陳問何以知之。曰兩尺沉絕。以此知之。陳曰。此說出何書。二醫無答。陳曰。此子懸也。若是胎死。卻有辨處。面赤舌青。子死母活。面青舌赤。吐沫母死。子活。唇舌俱青。子母俱死。今面不赤舌不青。其子未死。是胎上衝。心宜以紫蘇飲連進。至計服而胎近下矣。

女科輯要

卷上

李氏曰。子懸證火盛極。一時心氣閉絕而死。紫蘇飲連進可救。若兩尺脈絕者。有誤服動胎藥。子死腹中。則憎寒。手指唇爪俱青。全以舌為證驗。芫歸湯救之。

緬按戊申秋。荆人妊八月。而患欬嗽。礙眠。鼻衄如。赤面浮腫。諸藥不應。諱思其故。素屬陰虛。內火自盛。胎因火動。上凌心胸。肺受其衝。欬逆乃作。是不必治其嗽。仍當以子懸治之。因以七寶散去參。芍生薑為其胸滿而內熱也。加生石膏以清陽明之火。然地黃以攝根蒂之陰。投匕即安。今年冬仲。

亦以八月之候。而悲哀。喉痛之候。胎氣衝逆。眩暈。救療。脫胎。便澀。苦黃口渴。子獨飲六神湯去。臍星。茯苓。加枳實。蘇葉。大腹皮。以理氣。開鬱。黃芩。芫子。竹筴。以清熱。安胎。一劑。知。二劑。已。凡子懸證。因子痰滯者。余每用此法。無不應。如桴鼓。

妊腫脹

沈按。妊婦腹過脹滿。或一身及手足。而面目俱浮。病名子滿。或名子腫。或名子氣。或名胎水。或名琉璃胎。但兩腳腫者。或名被脚。或名肥脚。名色雖多。不外有形之水病。與無形之氣病而已。何則。胎礙臍。

女科輯要

卷上

臍機括不靈。腎者胃之關也。或關門不利。因而聚水。或脾不能散精行肌。或肺不能水精四布。此有形之水病也。又腹中增一物。則大氣升降之道窒塞。此無形之氣病也。病在有形之水。其證必皮薄。色白而亮。病在無形之氣。其證必皮厚。色不變。說見內經。脹論。細玩自明。更有痰滯一證。痰雖水類。然凝聚質厚。不能遍及皮膚。惟壅滯氣道。使氣不宣通。亦能作腫。其皮色亦不變。故用理氣藥不應。加化痰之品。自然獲效。徐按。靈樞水脹論曰。水始起。目窠上微腫。如新臥。

起之狀其頸脈動時或除肢開寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也膚脹者寒氣客于皮膚之間熱然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也愚按於膚脹言皮厚色不變則水脹之皮薄色變可知矣存參

千金鯉魚湯治妊娠腹脹或渾身浮腫小便赤澀沈按此治有形之水也以腹脹滿為主身腫溺澀上加一或字乃或有或無之詞不必悉具

陳良甫曰胎孕至五六箇月腹大異常此由胞中畜水名曰胎水不早治恐胎死或生子手足軟短宜于

金鯉魚湯蓋鯉魚歸腎又是活動之藥臣以苓朮薑橘直達胞中去水又恐水去胎虛佐以歸芍使胎得養真神方也

當歸 白芍 各一 茯苓 五分 白朮 二 橘

紅分 鯉魚一尾去鱗腸作一服白水煮熟去魚用汁一盞半入生薑三片煎一盞空心服胎水即下如腹悶未盡除再合一服

金匱葵子茯苓湯治妊娠有水氣身重小便不利消渴惡寒起即頭眩按此滑利之劑亦治有核之水

葵子 一 茯苓 三 為散飲服方寸匕日三服小便利則愈

天仙藤散治妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫至腿膝行步艱難喘悶妨食狀似水氣甚至足指開出黃水者謂之子氣此元豐中淮南名醫陳景初製也木名香附散後李伯時更名天仙藤散按此理氣方也脚而漸腫至腿膝併足指開黃水出是水與氣同有之證不得即謂之氣病必皮厚色不變方是氣病用此方為對證

天仙藤 青木香 香附 炒 陳皮 甘草

烏藥 木香 等 劉宋每服五錢加生薑三片紫蘇五葉水煎日三服腫消止藥

齊仲甫曰妊娠八九月見脚腫不必治當易產因胎中水血多不至慘胎故也若初妊即腫者是水氣過多兒未成體恐胎傷壞

脚腫主男胎宋少主微行徐文伯從見一妊婦不能行少主脈之曰此女形也文伯診之曰此男胎也在左則胎色黑少主怒欲破之文伯惻然曰臣請針之

補合谷瀉三陰交應手而下男形而色黑鮮立齋案云一妊婦腹脹小便不利吐逆諸醫雜進

溫胃寬氣等藥服之反吐轉加脹滿澀心驗之胎死已久服下死胎藥不能通因得鯉魚湯其論曰妊婦通身腫滿或心胸急脹名曰胎水遂看妊婦崩肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消服去方得分娩死胎此證蓋因懷妊腹大不以爲怪竟至傷胎可不慎哉

妊婦經來

王叔和曰婦人月經下但少師脈之反言有娠其後審然其脈何類曰寸口脈陰陽俱平營衛調和寸口營衛調和也按之則滑浮之則輕則微是有餘之象

浮取之以候陽分則輕是不足陽明少陰各如經法之象竊謂此即陰搏陽別之義陽明少陰各如經法經法精陽明主血任少陰主精各如身反洒淅不欲食頭痛心亂嘔吐而無邪脈妊子也呼之則微吸之不驚陽多氣溢陰滑氣盛滑則多實六經養成所以月見多於外令陽氣入之氣舒徐不驚是陽氣內盛所以月見於外令陽氣入之氣舒徐不驚是陽氣養成所以月見於外令陽氣入之氣舒徐不驚是陽氣損胎然胎中若散脈必散而不滑今脈滑無虛也設復傷盛雙妊二胎今陽不足故令激經也盛必雙胎非雙胎乃激經也

產乳集云妊婦月信不絕而胎不墮問產科能宗古

答云此婦血盛氣衰其人必肥既妊後月信常來而胎不動若便以漏胎治之則胎必墮若不作漏胎治則胎未必墮宗古之言誠爲有見然亦有未必因血盛者榮經有風則經血喜動以風勝故也則所下者非養胎之血皆作漏胎治投以滋補是實實也胎豈有不墮若知是風當以一味風藥投之經信可止即不服藥胎亦無恙然亦有胎本不固因房室不節先漏而後墮胎者須作漏胎治又不可不審也

沈按妊婦經來與漏胎不同經來是按期而至來一亦必少其人血盛氣衰體必肥壯漏胎或因邪風

所迫或因房室不節血來未必按期體亦不必肥壯且漏胎之因不盡風邪房室更有血熱肝火諸證不可不察脈辨證風入脈中其脈乍大乍小時隨起所云一味治風藥是舉劑古拜散即華散劑芥畧炒爲末每服血熱證必五心煩熱治以黃芩阿膠涼血之藥肝火內動脈必弦數併見氣脹腹痛治以加味道遙散見崩房勞證脈必虛宜入參或虛而帶數宜六味湯

廣天民曰或問妊婦有按月行經而胎自長者有三五箇月間其血大下而胎不墮者或及期而分塊或

日盛胎其婦氣血充盈養胎之外其血有餘故也有數月之胎而血大下謂之漏胎因事觸胎動其衝脈故血下而不傷子宮也然孕中失血胎雖不墮氣血亦虧多致踰月不產會見有十二三月十七八月或二十四五箇月生者往往有之俱是氣血不足胚胎難長故耳凡十月之後未產者當大補氣血以培養之庶無分媿之患也

李氏曰胎漏自人門下血尿血自尿門下血

蕭廣云胎漏下血類出無時尿血溺時方下不溺

則不下

沈按尿血小劑飲子妙

雄按懷孕屢漏之後氣血耗傷有遲至三四月而生者若妊娠帶下多主生女亦大不然也吳醒香大令五令媳素患帶婚後帶益盛繼漸汎愆醫皆以為帶所致也久投溫濕無效余診之脈甚滑數以懷麟際清其胎火而愈及期果誕一男

子淋 轉胞

杰按此淋字與俗所云赤淋淋字不同彼指赤帶皆係女精此係指小便言也

妊婦淋日子淋小便不出曰轉胞子淋小便頻數點滴而痛轉胞頻數出少不痛淋屬肝經陰虧火熾轉胞因膀胱被胎壓住膀胱止有一口未溺時其口向上口端橫一管上半管即石下焦下半管即是溺孔未溺時膀胱之底下垂如瓶狀其口在上與下焦直對溺從下焦滲入故曰下焦者別迴腸而滲入膀胱焉欲溺時大氣舉膀胱之底如傾瓶狀其口向下從溺孔注出故曰氣化則能出矣轉胞一證因胎大壓住膀胱或因氣虛不能舉膀胱之底氣虛者補氣胎壓者托胎若浪投通利無益於病反傷正氣

杰按淋瀝者又謂胞轉其痛為轉胞

或數或閉二說小異

子淋方

生地 阿膠 黃芩 黑山梔 木通 甘草 水煎服

丹溪治一妊婦小便不通令一婦用香油塗手自產門入托起其胎溺出如注即用人參黃耆升麻大劑煮服又治一婦轉胞用參歸煎服探吐得愈

沈按初卷載其方名參朮飲蓋當歸熟地黃芩龍芍藥人參白朮留白陳皮半夏炙甘草加薑煎空

子淋 轉胞 6 反更內

心脈... 者性躁急者食味厚者多有之古方用滑藥鮮效
 因思胞不自轉為胎被壓胎若舉起胞必自疏水
 道自通矣近吳宅龍人患此脈似瀉重則弦予曰
 此得之憂患清為血少氣多弦為有飲血少則胎
 弱不能舉氣多有飲中焦不清而溢則胎避而就
 下乃以上藥與飲隨以指探喉中吐出藥汁候氣
 定又與之而安此恐偶中後治數人皆效
 仲景云婦人本肥盛今反羸瘦胞系了戾但利小便
 則愈宜服腎氣丸以中有茯苓故也地黃為君功在
 補胞又法將孕婦倒置胎轉而小便自通矣
 沈按汪昂採本事安榮散治子淋心煩悶亂云子
 淋膀胱小腸虛熱也虛則不能制水熱則不能通
 利故淋心與小腸相表裡故煩悶方用人參甘草
 之甘以補虛木通燈草之滲滑石之滑以通淋
 肺燥則天氣不降而麥冬能清之腎燥則地氣不
 升而細辛能潤之血燥則滑瀉不濡而當歸能滋
 之也亦有因房勞內傷胞門衝任虛者宜八珍湯
 或腎氣丸

或利

本草... 去白留黃入漂鉛丹五錢... 二錢米飲下一服效是男兩服效是女... 效有不效然利即不止而腹痛必緩
 辭立齋云一妊婦久利用消導理氣之劑腹內重墜
 胎氣不安又用阿膠艾葉之類不應用補中益氣湯
 而安繼用六君子全愈
 又云妊娠利下黃水是脾土虧損真氣下陷也宜補
 中湯

雄按此下利乃泄瀉自利之難治者下赤白之痢
 證仍當別治

妊娠腹痛

金匱曰婦人懷妊腹中疝痛當歸芍藥散主之

當歸 芍藥 茯苓 白朮 澤瀉

芎藭 芍藥

右六味為散取方寸匕酒和日三服

又曰妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

芎藭 阿膠 甘草 艾葉 當歸

芍藥 乾地黃

若七味水五升清酒三升合煮取三升去渣內

臍中消盡溫服一升日三

太按嚴氏用治胎動經漏腰痛腹滿搶心短氣加黃耆認菴亦謂妊娠下血腹痛為胞阻主此湯又按又方阿膠一筋蛤粉炒艾葉數莖亦名膠艾湯治胎動不安腰痛疼或胎上搶心去血腹痛又曰懷妊六七凡脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者小腹如臍所以然者子藏開故也當以附子湯溫其藏

附子 人參 白朮 芍藥 茯苓

大全云妊娠四五月後每常胸腹間氣刺痛或腸鳴以致嘔逆減食此由忿怒憂思過度飲食失節所致蔡元度寵人有子夫人怒欲逐之遂成此病醫官王師復處以木香散莪朮木香甘草丁香煎湯下三服而愈

夏墓蕩一婦豐前橋章氏女也己卯夏章氏來請云懷孕七箇月患三瘧利疾及診病者止云小便不通腹痛欲死小腹時有物墮起至若利疾晝夜數十起所下無多仍是糞水瘧亦寒熱甚微予思俱是肝病蓋肝脈環陰器抵小腹肝氣作脹故小腹痛溺不利脹甚則數欲大便肝病似瘧故寒熱

如此即活不必顧胎子用川棟子楸核白通草白芍茯苓甘草煎服一劑腹痛止小便利四劑瘧利盡除胎亦不墮以後竟不服藥彌月而產

自胎間策策動未幾偏行腹中疼不可忍頻年醫治不一其人而持論各異外貼膏藥內服湯丸攻補溫涼備嘗不效病已瀕危謝絕醫藥迨半月後病勢稍減兩月後飲食如常而向之策策動者日覺其長嗣至滿腹又疑其數也復為醫治亦不能愈如是者又三年忽一日腹痛幾死旋產一男

子無恙而腹痞薄許自初病至產蓋已九年餘矣此等異證雖不恒見然為醫者不可不知也

妊娠腰痛

大全曰婦人腎以繫胞腰痛甚則胎墮故最為緊要若因挫氣不行者通氣散腎虛者青娥不老丸總以固胎為主

通氣散方

良方 礞石煅瓦上炒香為末先嚼胡桃一箇爛後以溫酒調服故紙末三錢空心服 治妊娠腰痛不可忍此藥最神

山梅
沈按腰之近脊處屬腎兩旁近季肋者屬肝

妊婦腹內鐘鳴

天全用鼠窟前後注為細末研麝香酒調下立愈

腹內兒哭

產寶云腹中臍帶上疔瘡兒含口中因妊婦登高舉

臂脫出兒口以此作聲令其婦曲腰就地如拾物狀

仍入兒口即止
艾二兩空房中鼠穴土同川黃連

煎汁飲亦效

沈按相傳腹內鐘鳴

兒哭令人治此撒豆一

把在地令妊婦細細拾完即愈此是妙法

猶按此書言也王清任曰初結胎無日時又以何

物吮血養生既不明白何不歸而謀諸婦訪問的

確再下筆庶不貽笑後人此說甚精余嘗謂身中

之事而身外揣測雖聖人亦不免有未必盡然之

慮故拙論雖但以氣血寒熱言之固屬弁陔實

不敢以己所未信者欺人也今春與楊素園大令

言及從來藏府之論殊多可疑楊侯歎曰君可謂

讀書得髓矣後世世人之效者矣因出玉田王清任

醫林改錯易胎換胎之說竟將軒岐以來四千餘

年之案一旦全反毋乃誠闕然此公徵諸目擊非

託空言且楊侯徧驗諸獸無不胎合然則昔之鑿

鑿言藏府之形者豈不皆成笑柄哉然泰西人身

圖說一書流入中國已二百餘年所載藏府與王

說略同而愈理初未見改錯過信古書于癸巳類

稿內沿襲舊說謂中外藏府迥殊且云外洋人器

丸有四枚尤屬杜撰欺人

養胎

杰按金匱云懷身七月太陰當養以此見十月養

胎之說其來久矣

徐之才曰妊娠一月名胎胚足厥陰肝脈養之二月

名始膏足少陽膽脈養之三月名始胞手少陰心主

胞絡脈養之四月始受水精以成血脈手少陽三焦

脈養之五月始受火精以成氣足太陰脾脈養之六

月始受金精之氣以成筋足陽明胃脈養之七月始

受木精之氣以成骨手少陰肺脈養之八月始受土

精之氣以成膚革手陽明大腸脈養之九月始受石

精之氣以成毛髮足少陰腎脈養之十月五臟六腑

皆具矣特而述

然按人鏡經惟手太陽不屬與手少陰心經一經不養者以其上為乳汁下主月水也

維按此亦道其常耳有母妊不足月而產者有必

險期而產者有先後不等者亦不為病也惟產不

足月而形有未備或產雖足月而兒極萎小者皆

母氣不足為病再有身時須預為調補自然充備

余鄰家畜一母雞連下數卵殼皆軟弱以為不祥

欲殺之余謂此下卵過多母氣虛也令以稷米蛇

牀子飼之數日後下卵如常推之于入理無二致

巢元方曰妊娠受胎之日一變胎在三五月者

多在二四六月者久三月心五月屬脾七月屬肺

皆屬臟腑為陰陰氣不足故多墮耳如在三月墮者

後孕至三月仍墮者心脈受傷也先須調心五月七

月墮者亦然惟一月墮者或不知也一月屬肝怒則

多墮洗下體癢開亦墮一次既墮肝脈受傷下次仍

墮今之無子者大半是一月墮者非盡不受胎也故

凡初交後最宜將息勿復交接以擾子宮勿令勞怒

勿舉重勿洗浴又多服藥肝平氣藥則胎固矣

丹溪曰陽施陰化胎孕成血氣虛損不足以榮養其

胎則白墮譬如枝枯則果落藤萎則花墮或勞怒

情內火便動亦能動胎正如風撼其樹人折其枝也

火能消物造化自然源乃謂風冷傷子厥而墮未

得病情者也有孕婦至三四月必墮其脈左手大而

無力重取則滑知血少也止補中氣使血自榮以自

北濃煎下黃芩末數子劑而安因思胎墮于內熱而

虛者為多日熱日虛當分輕重蓋孕至三月上屬相

火所以易墮不然黃芩熱艾阿膠何謂安胎妙藥耶

方約之曰婦人有疾則礙脾運化遲而生惡溼生熱

丹溪用黃芩白朮為安胎聖藥蓋白朮健脾養溼條

芩清熱故也但在婦人胎前產後均宜用之川芎佐

之為尤備耳

張飛鳴曰古人用條芩安胎惟形瘦血熱營行過疾

胎常上逼者相宜若形盛氣衰胎常下墜者非入參

舉之不安形實氣盛胎常不運者非香砂耗之不安

血虛火旺腹常急痛者非歸芍養之不安體肥痰盛

嘔逆眩暈者非二陳豁之不安此皆治母氣之偏勝

也若有外邪仍宜表散伏邪時氣尤宜急下惟忌芒

硝切不可犯

雄按條芩但宜于血熱之體若血虛有火者余以

竹茹桑葉絲瓜絡為君隨證而輔以他藥極有效

黃土物皆養血滋熱而息內風也物之堅強莫

竹皮禮云如竹箭之有筠是也皮肉之繫結亦莫

如竹故竹雖從而皮肉不相離實為諸血證之要

藥觀寒舟不漏可知矣桑葉蠶食之以成絲絲瓜

絡筋膜聯絡質韌子堅具包羅雜繫之形且皆色

青入肝肝虛而胎系不牢者勝于四物阿膠多矣

惜未有發明之者

王海藏云安胎之法有二如母病以致動胎者但療

母則胎自安若胎有動以致母病者安胎則母自

愈

丹溪云有婦經住或取養未其胎必墮察其性急

多怒色黑氣實此相火太盛不能生氣化胎反食氣

傷精故也

又曰有婦經住三月後尺脈或澀或微弱其婦卻無

病知是子宮真氣不全故陽不施陰不化精血雖凝

終不成形或產血塊或產血泡也惟脈洪盛者不墮

胎動不安

血虛火盛其婦必形瘦色黑其胎常上暈者宜條芩

阿膠

然按前張家說謂形瘦血熱宜條芩血虛火旺

宜歸枚此似將上一二條併為一治想須在胎上

與腹急痛上分別未知是否存參

氣虛婦體肥白胎常下墜宜人參

杰按體肥白是氣虛證據宜與張說參看又思體

肥白者未必皆氣虛必肥白而胎下墜方是形盛

氣衰也須辨存參

相按審屬氣虛欲墮者補中益氣法甚妙

形氣盛胎常不運者宜香砂

痰氣阻滯 體肥嘔逆宜二陳

怒氣傷肝 加味逍遙散

毒藥動胎 白扁豆二兩生薑皮為末新汲水下煎

以辨其證

交接動胎 其證多嘔產室 載綱目方飲竹瀝

一升有驗人參九炒

藥礮著胎 惡露已下疼痛不止口噤欲絕用神妙

佛手散探之若不損則痛止子母俱安若損胎立

便逐下即芎藭湯治傷胎多神效

胎動下血不絕欲死本草綱目芎藭湯如鴉子本

煎三五洗投美酒半升服立

性清八陽明故也

雄按懷妊臨月並無傷動驟然血下不止腹無痛
苦者名海底漏亟投大劑參耆十不能救其一二
此由元氣大虛衝脈不攝而營脫于下也

王叔和云胎病不動欲知生死令人摸之如覆盆者
男如肘頸參差起者女也冷者為死溫者為生

聖濟總錄云胞衣不下急於胎之未生子死腹中危
於胎之未下蓋胞衣未下子與母氣通其呼吸若

子死腹中胞藏氣寒胎血凝滯氣不升降古方多
以行血順氣藥及硝石水銀礞砂之類然胎已死

軀形已冷血凝氣聚復以至寒之藥下之不惟無

益而害母命也

理有二端用藥各從其宜如娠婦胎漏血蓋

子死者有惡血滯內傷子死者有久病胎萎子
死者以附子湯進服使胞着溫煖凝血流動蓋

以附子能破寒氣隨胎散也若因傷寒熱證溫瘧
之類胎受熱毒而死留於胞中不下者古人慮其

胎受熱毒勢必脹大難出故用礞砂水銀礞砂之
類不惟使胎不脹且能使胎化爛副以行血順氣

之藥使胎即下也

熱病胎死腹中新汲冰濃煮紅花汁和童便蒸飲

效

好病去胎大麥芽一升煮二升服之即下
齊仲甫曰墮胎後血出不止一則因熱而行一則氣

虛不能統瀉血多者必煩悶而死或因風冷墮胎血
結不出搶上攻心煩悶而死當溫經逐寒其血自行

若血淋漓不止是衝氣虛不能利制故也宜膠艾
湯加伏龍肝散

雄按有無故墮胎而惡露全無者此血虛不能榮
養如果之未熟而落血既斷則不可拘常例而再

妄行其藥也

問何以知胎死曰面赤舌青者胎死而青舌赤子
活母死而舌俱青子母俱死死胎墮腹脹痛亦與常

產不同

雄按吳鞠通曰死胎不下不可拘執成方而悉用
通法催生亦然當求其不下之故參以臨時所現

之脈證若何補偏救弊而胎自下也余謂諸病皆
爾不特下死胎也

又按寓意草有用瀉白散加芩柏以下死胎之藥
可見人無一定之病病非一法可治藥無一藥之

用惟應變貴乎用得其常也

又按許裕卿治御海貞室。娠十月不產。不敢執
意。憑脈問諸情況。果孕非病。但云孕五月以後不
動。心竊訝之。為主丹參一味。令日服七錢。兩旬餘
胎下已死而枯。其胎之死。料在五月不動時。經年
在腹不腐而枯。如果實在。胎敗者必腐。亦有不腐
者。則枯胎之理可推也。余謂此由結胎之後。生氣
不旺。未能長養。萎于胞中。又名僵胎。亦有不足月
而自下者。併有不能破胞而自落者。余見過數人
矣。若胎已長成。豈能死于腹中而不為大患。至年
餘而始下哉。惜許君言之未詳也。丹參。養子行血

專丹能下胎。凡胎前宜慎。用世人謂其功兼
四物以之安胎。因而反。其墮。而人不知之。余見
亦多矣。

又按凡大毒大熱及破血開竅重墜利水之藥皆
為妊娠所忌。便產須知歌曰。坑青即青。水即水。水即水。水即水。
與蟲。烏頭。附子。及天。雄。野葛。水銀。豎巴豆。牛膝。
意。苒。併。蜈蚣。三稜。莖。菝葜。石。芫。花。麝。香。大戟。蛇。蛻。
黃。雌。雄。砒。石。火。芒。硝。大。黃。牡。丹。桂。槐。花。子同此藥
何。以。孕。婦。禁。服。也。蓋。能。牽。牛。自。角。同。牛。夏。去。透。者
蕩。滌。子。宮。精。濁。也。牽。牛。自。角。同。牛。夏。去。透。者
星。麝。製。久。兼。通。導。羅。麥。乾。薑。桂。仁。木。通。細。砂。石。

側子羊。野。葱。葱。厚。朴。及。薇。衛。樞。根。蘭。茹。葵。
花。子。赤。箭。南。草。刺。桐。皮。鬼。箭。紅。花。蘇。方。木。麥。藥。常。
山。美。薺。蟬。錫。粉。硫。砂。紅。娘。子。即葛上。硫。黃。石。蠶。並。
蜘蛛。蜈。蚣。衣。魚。兼。斷。竭。梁。蠶。飛。生。盤。粉。雞。牛。黃。太。
免。驢。馬。肉。隨。解。蝦。蟻。籠。共。龜。余。又。補。之。甘。遂。沒。
藥。破。故。紙。延。胡。瀉。韓。五。靈。脂。薑。黃。葶。藶。穿。山。甲。歸。
尾。靈。仙。樟。蠟。王。不。留。行。龜。鼈。甲。麻。黃。川。椒。神。
效。伏。龍。肝。珍。珠。犀。角。車。前。子。赤。芍。丹。參。益。母。射。干。
澤。瀉。澤。蘭。紫。草。蔓。土。瓜。根。滑。石。自犀角至此難

治尚宜避忌。况內服乎。故婦人善飲火酒者。每無
生育。以酒性熱烈。能消胎也。附及之以為種玉者
先。

附泰西諸說。合信。新論。
女子尻骨盤內。前為膀胱。中為子宮。後為直腸。膀
胱。溺。管。一。寸。其。下。為。陰。道。即。產。門。也。產。門。內。理。橫。
生。可。寬。可。窄。其。底。銜。子。宮。之。口。陰。水。生。焉。

子宮狀若番茄。挂骨盆之內長二寸。底濶一寸。三分內空為三角。房一角在比兩角在底。底角有小孔。底孔有二筋帶懸之。此帶無力。即有子宮下墜之憂。受胎之後。漸大而圓。七月至臍上。九月至胸下。晚後夜縮小。

子宮之底左右各出子管一支。與小孔通。長二寸半。垂于子核之側。不即不能。

子核者在子宮空右。離一寸。向內有帶與子宮相連。向外有筋帶與子管相繫。形如雀卵。內有精珠十五粒。至十八粒。不帶內貯清液。變為陰精。女子八月之年。精珠始至。至月信絕。其珠化為鳥。有男精入子宮。透于管。子管單子核。子核感動。精珠迸裂。陰陽交會。復入子宮。結成胚珠。子管漸大。胚珠漸行。數日之內。行至子宮。生膠粒以塞子宮之口。是謂受胎。此後身不不孕。始即核無精珠。故即子核之內。裂一珠。成一孕。裂雙珠。即孿生。若子宮受病。子管閉塞。子核有恙。核無精珠者。皆不受孕。受孕而胚珠生。十二日生毛。內涵清水。有兩小物。淨其中。一圓一長。長者人也。積日彌大。圓者養胎之物也。積日彌小。胎盤生。此物即無矣。二十日胚

形如大蠟。三十日如牛蠅。長四分。身背可辨。且有眼模。三十五日。臍帶生。四十二日。腦有口。四十五日。初見四肢。六十日。手足全。世始生。上有耳鼻。下有肛門。是為受形之始。長一寸。六十五日。始生藏府。九十日。見全形。男女可辨。長二寸。胎盤成。至四月。內外皆備。長四寸。五月。胎動。六月。長六寸。髮甲生。七月。長八寸。骨節相成。八月。長一尺一寸。舉九由腹落入囊。九月。目始開。長尺二寸。十月。胎足。嬰兒在胎。肺小。肝大。不須呼吸。地氣。故血之運行。與出世不同。妊始二十日。心已成。換初見一管。漸分兩房。漸成四房。上兩房有戶相通。此出胎兒之血。來自胎盤。由臍帶入一半入肝。肝透入心。一半入迴血總管。上達心。右上方。即通左上方。世此出通而落左下房。入血脈總管。先上兩手頭腦之內。由迴管返心。右下方。即自入肺管。透血脈總管之拱。此世後不通。然後落下身兩足。兒必上大下小。以上身先受赤血也。于是復出臍帶。而達胎盤。改換赤血。輪流不息。蓋以胎盤為肺用也。出世後。呱呱以啼。肺即開張。以呼吸。而心左右兩通之戶。即閉塞。若不閉。紫血與赤血併。兒即死。而身青矣。身青。按人

云胎居子宮以臍帶吸取母血

養之有如樹木以根吸取土澤

胎盤俗名胞衣乃胚珠之毛黏子宮內膜而生其

手漸變為血管三月成盤形圓徑五寸厚一寸其

體半為孕婦血管半為胎兒血管孕婦脈管甚大

銜接兒血管滲洩精液以養之

一頭連兒臍中空成管外有兩脈管繞之兒生之

後母子血管截然分張或有胎盤未離血管半斷

則血暴下

乳者赤血所生乳頭之管漸入漸分如樹分枝行

至乳核即與脈管相接乳汁由是化成月水乃

子宮所生之液以備胎孕之需非血也按所云

非灌輸脈絡榮養百骸之宮血故無孕之時可以

按月而行然亦藉氣血以生化故氣血衰則月水

少若月水過多則氣血亦耗也

禽不雄而卵伏而不解蛙蛤之屬常雌出卵雄出

其精以護之身負而行精不入腹蚯蚓雌雄相交

兩皆成孕草木以中心為雌花鬚為雄風吹鬚粉

散落于花心膠液接之乃能含仁結子若去其鬚

即不實雄按鹿苑總而有孕白鶴視而有胎造化

論又云中外之人貌自不同而氣相感而成形也新

考且說理最精並非虛揣空談爰錄如右以資參

考惟產育有不止十八胎者其精味之數極其可泥

卷上終

女科輯要卷下

婿王士雄孟英參

沈鏡封先生 錢塘後學徐政杰鵲輝補注

男 之潘友珊校

產

杰按濟生產經曰胎前之脈貴實產後之脈貴虛

胎前則順氣安胎產後則扶虛消痰此其要也丹

溪云產後脈洪數產前脈細小瀕弱多死懷妊者

脈主洪數已產而洪數不改者多主死

楊子建十產論 一日正產 二日傷產 未滿月而痛如

欲產非果產也 若為試月遠爾用力是謂傷產 三日

催產正產之候悉見而難產用藥催之是謂催產 四

日凍產冬產血凝不生 五日熱產過熱血沸令人昏

暈 六日橫產兒身半轉遠爾用力致先露手令穩婆

徐推兒手使自攀耳 七日倒產兒身全未得轉即為

用功致先露冠令穩婆推足入腹 八日偏產兒未正

而用力所致 九日礙產兒身已順不能生下或因臍

帶絆肩令穩婆撥之十日坐產急于高處繫一手巾

令母攀之輕輕屈足坐身可產 十一日盤腸產臨產

母腸先出然後兒生產後若腸不收用醋半盞新汲

水

水

水七分和勻。噴產母面。每噴一縮。三噴盡收。孕婦止
腹痛。未必產。連腰痛者。將產。胞繫於腎。故也。腹痛。試
握產母手中指中節。或本節跳動。方臨盆。即產。

雄按中指跳動。亦有不即產者。更有腰腹不甚痛
但覺痠墜而即產者。

兒未生時。頭本在上。欲生時。轉身向下。故腹痛難忍。
此時婦當正身。寬帶仰臥。待兒頭到了產戶。方可用
力催下。若用力太早。或束肚倚著兒。不得轉身。即有
橫生逆生手足先出之患。

許叔微曰。有產累日不下。服藥不驗。此必坐草太早。
心懼而氣結不行也。經云。恐則氣下。恐則精怯。怯則
上焦閉。閉則氣逆。逆則下焦脹。氣乃不行。得紫蘇飲
一服。便產。方見子懸門

雄按難產自古有之。莊公寤生。見於左傳。故先生
如達。不圻。不副。詩人以為異徵。但先生難而後生。
易理之常也。晚嫁者尤可必焉。然亦有雖晚嫁而
初產不難者。非晚嫁而初產難。易繼產反難者。或
頻產皆易。開有一次甚難者。有一生所產皆易。
生所產皆難者。此或由稟賦之不齊。或由人事之
所召。未可以一例論也。諺云。十個孩兒十樣生。至

或言乎。若得兒身順下。縱稍時日。不必驚惶。安心
靜俟。可耳。會稽施圃生。茂才誕時。其母產十三日
而始下。母子皆安。世俗不知此理。稍覺不易。先自
慌張。近有凶惡穩婆。故為恫嚇。妄施毒手。妄取重
價。嚮而出之。索謝去後。產母隨以告。煩者有之。奈
賢賢者尚誇其手。設之高。忍心害理。慘莫慘於此
矣。設果胎不能下。自有因證調治諸法。即胎死腹
中。亦有可下之方。自古方書。未聞有嚮割之刑。加
諸投生之嬰兒者。附識於此。冀世人之憬然悟而
勿為凶人牟利之妖言所惑也。但有一種騾形者。
交骨如環。不能開圻。名鎖子骨。能受孕而不能產。
如懷娠。必以晚難死。此乃異稟。萬中不得其一。如
交骨可開者。斷無不能晚者也。方書五種不孕之
所謂。騾者。即騾字之譌也。蓋騾馬交而生。騾純牝
無牡。其交骨如環。無端。不交不孕。稟乎純陰。性極
馴良而善走。勝於驢馬。然亦馬之屬也。易曰。坤為
馬。行地無疆。利牝馬之貞。皆取象於此之謂也。人
賦此形而不能安其貞。則厄於晚矣。

催產神方 治胎漿已此胎不得下。或延至兩三日
者。一服即產。屢用有神效

當歸四錢 人參一錢 牛膝三錢 川芎一錢 龜板三錢 赭石三錢 研肉桂一錢 去皮 益母二錢 水煎服

雄按此方極宜慎服夏月尤忌必審其確係虛寒者始可服之通津玉露湯最妙余用猪肉一味煎清湯服亦甚效

如神散 路上草鞋一雙 名千里馬 取鼻梁上繩洗淨燒灰童便和酒調下三錢神驗 武叔卿濟陰綱目云於理固難通於用實靈驗按千里馬得人最下之氣佐以童便之精下酒性之行血故用之

良驗此藥不寒不熱最是穩劑 雄按催生藥不宜輕用必胎近產門而不能即下始可用之又須量其虛實或補助其氣血或展拓其機關寒者溫行熱者清降逆者鎮墜未可拘守成方而概施也

婦人良方曰加味芎歸湯入龜板治交骨不閉 醋油調滑石塗入產門為滑胎之聖藥 花蘆石散治血入胞衣脹大不能下或惡露上攻 草麻子治治衣不下 佛手散治血虛危證 清魂散治血暈諸證 失笑散治惡露腹痛不省人事 平胃散加撲

神為腐死胎之藥 杰按佛手散亦下死胎胎死先宜服此不傷氣血服此不下次用平胃撲確可也 凍產治驗 劉復真治府判女產死將殮取紅花濃煎扶女於凳上以綿帛蘸湯盪之隨以澆帛上以器盛之又煖又淋久而蘇醒遂產一男蓋過嚴冬血凝不行得溫故便產也 逆產足先出用鹽塗兒足底橫產手先出塗兒手心杰按鹽螫手足縮便縮入俗乃謂之討鹽生也 胞衣不下 急以物牢扎臍帶墜住使不上升然後將臍帶剪斷使血不入胞萎縮易下若水藥先斷胞升凌心必死杰按保生錄覺胎衣不下產婦用自已頭髮塞口中打一惡心即下切須放心不可驚恐不可聽穩婆妄用手取多致傷生又以草紙燒烟薰鼻即下 芒硝三錢童便沖服立效 生自噴 松蘿一老穩婆包醫是證自帶白末藥一包買牛膝二兩同煎去渣沖童便半盃服立下 白末藥定是元明粉也 產後喜笑不休

一老嫗云產時被侍者扶落腰子使然用烏梅肉二個煎湯服立效蘇郡錢

惡露過多不止

伏龍肝二兩煎湯澄清拌入阿膠一兩服如不應加人參

惡露不來

輕則艾葉及奪命散重則無極丸寒凝者肉桂紅花等藥併花蕊石散

雄按產後苟無寒證的據一切辛熱之藥皆忌惡

露不來腹無痛苦者勿亂投藥餌聽之可也如有

產後惡露不盡

疼脹者祇宜丹參丹皮元胡滑石益母草山查澤

蘭桃仁歸尾通草之類為治慎毋妄施峻劑生化

湯最勿擅用

九竅出血

彙補云九竅出血死證恆多惟產後瘀血妄行九竅

出血有川逐瘀之藥而生者不可遽斷其必死此是

閱歷後之言不可忽畧雖無方藥其法已具

黑氣鼻衄

郭稽中云產後口鼻黑氣起及鼻衄者不治蓋陽明為經脈之海口鼻乃陽明所見之部黑氣鼻衄是營

衛散亂營氣先絕故不愈詳立齋云急用一味參

眩暈昏冒

去血過多者宜重用阿膠水化畧加重便服

血去不多者宜奪命散沒藥去油二錢血竭一錢共

研末分兩服糖調酒下二條宜與前惡露

錢姓婦產後發暈兩日不醒產時惡露甚少量時

惡露已斷伊夫向鄰家討琥珀散一服約重二錢

許酒調灌下即醒其藥之色與香俱似沒藥大約

即是血竭沒藥之方

庚辰春呂姓婦分娩次日患血暈畧醒一刻又目

閉頭傾一日數十發其惡露產時不少今亦不斷

脈大左關弦硬用酒化阿膠一兩衝童便服是夜

暈雖少減而頭汗出少腹痛有形寒戰如瘧戰已

發熱更甚投沒藥血竭奪命散二錢酒調服寒熱

腹痛發暈頓除惟嫌通身汗出此是氣血已通而

現虛象用黃耆五錢炒歸身二錢甘草一錢炒棗

仁三錢炒小麥五錢大棗三個煎服汗止而安

雄按惡露雖少而胸腹無苦者不可亂投破瘀之

藥今秋周鶴庭室人新產眩暈自汗懶言目不能

開乃父何新之視脈虛弦浮大因拉余商治詢其
惡露雖無而腕腹無患乃投以牡蠣石英龜板龍
甲琥珀丹參甘草紅朮小麥之劑覆杯即減數日
霍然此由血虛有素既悅則營陰下奪陽越不滯
設泥新產瘀衝之常例而不細參脈證則殺人之
事矣

發狂謔語

惡露不來者是血瘀宜無極丸惡露仍通者是痰迷
宜六神湯半夏麩一錢樹紅一錢膽星一錢石菖蒲
一錢茯神一錢旋覆花一錢水煎連服

一成衣婦產後半月餘發狂打罵不儀其夫鎖之
磨上余付無極丸六錢分兩服酒下服畢即愈越
四五月復發又與六服後不復發

丁姓婦產後神昏謔語如狂惡露仍通亦不過多
醫者議攻議補不一余尚陶前輩後至診畢曰待
我用一平淡方喫下去看用杜剗橘紅石菖蒲等
六味一劑神氣清四劑霍然此方想是屢驗故當
此危證絕不矜持歸語舍弟慶虞答曰此名六神
湯余未考其所自

甲戌孟春錢香樹先生如君產後微熱病隱時時

諸語惡露不斷余用理血藥不應改用六神湯四
劑病去如失

不能識

武叔卿曰熱痰迷心使然 膽星一錢 樹紅一錢
半夏一錢五分 石菖蒲一錢 鬱金一錢 水
煎入竹瀝一調羹生薑汁三小茶匙服 按神昏不
語有虛有實當參旁證及脈

聲啞

按屬腎虛 補腎之中宜兼溫通
元生地四錢 茯苓二錢 山藥一錢五分 歸身
二錢 肉桂五分 遠志肉炒五分 水煎服

呃逆

虛脫惡候人參送黑錫丹十全一二

杰按姜用川采葶 載黑鉛乃水之精入托有

壬癸凡遇陰火衝逆 眞陽暴脫氣喘痰鳴之急難

同桂附回陽等藥用之立見奇功即輕云重劑是

也

又按姜又載何惟丹先生呃逆治驗方云傷寒呃

逆聲聞數家者用刀豆子數粒瓦上煨存性爲末

白湯調下二錢立止又本草綱目云病後呃逆刀

豆連殼燒服姜云此方宜入旋覆代赭湯

沈按有脫閉二證。下血過多者是脫證。喉中氣促。命在須臾。方書雖有參蘇飲一方。恐不及待。露不快者是閉證。投奪命丹可定。如不應。當作痰治。此皆急證。更有一種緩者。妻全善所云產後喘者多死。有產二月洗浴。即氣喘坐不得臥者。五月惡風。得煖稍緩。用丹皮桃仁桂枝茯苓乾薑枳實厚樸桑皮紫蘇五味瓜蒌煎服。即臥其疾如失。作汚血感寒治也。按此亦是痰證。所以能持久。痰滯陽經。所以惡寒。方中著力在瓜蒌厚樸枳實桂枝。茯苓乾薑五味數味。餘皆多贅。

發熱

沈按產後發熱。所因不同。其證參看。感冒者鼻塞。亦不可過汗。經有勞血無汗之禁。只宜芎歸湯。停食者。噎腐飽悶。宜平劑消食。血虛發熱無別證者。服大而孔。宜歸芪。陰虛者。煩渴脈細。宜生地阿膠。更有一種表熱裏寒。下利清穀。煩渴惡熱。脈微細者。此少陰危證。宜四逆湯。雄按暴感發熱。可以鼻塞驗之。荷胎前伏邪。脫後陡發者。何嘗有頭疼身寒之形證乎。雖脈亦有不

即頰露者。惟舌苔頗有河。或厚白而膩。或黃膩黃燥。或有赤點。或微苔舌赤。或口苦。或口渴。或胸膈或洩熱。此皆溫溼暑熱之邪內蘊。世人不察。再飲以糖酒生化湯之類。則輕者重。而重者危。不過明眼人亦但知其產亡。而不知其死於何病。設於何藥也。我見實多。每為太息。其後條之。年累年熱亦當如是。請察。燕所遺以天殃也。

乍寒乍熱

沈按。即日血閉於陽經。榮衛行之不通則寒。寒閉於陰經。榮衛行之不通則熱。必於通而後寒熱自已。

仲景曰。病有漸。漸惡寒者。陽脈不足。陰往乘之。陰脈不足。陽往乘之。

沈按。前條是痰。後條是陰陽相乘。甚則俱有。戰慄者。治痰血宜奪命丹。調補陰陽。輕則歸者。建中重則桂附。八味。

頭汗

王海藏云。頭汗出至頸。而遺。額止。偏多。蓋額為六陽之會。由虛熱蒸蒸而出也。

沈按。汗出不止。屬氣血兩虛。黃耆五錢。白芍三錢。歸身二錢。東仁。炒二錢。甘草。炒一錢。小麥。

三錢南棗肉三錢煎服神效與眩暈內呂註

泄瀉

乙亥初夏傅木作婦產時去血過多隨寒戰汗出便瀉不止余用大劑真武乾薑易生薑兩劑戰少定而汗瀉如故又服兩日寒戰復作余用補中湯無人參加附子兩劑病者云我肚裡大熱口渴喜飲然汗出下利寒戰仍不減正疑神思慮開其母曰彼大孔如洞不能收閉諒無活理余改用黃耆五錢炒北五味四錢搗白芍二錢炒歸身一錢五分炒甘草一錢五分炒茯苓二錢山藥二錢大棗三個一劑病減四劑而愈

雖按觀此案則可見氣虛不能收攝者宜甘溫以補之酸澀以收之不可用辛熱走泄以助火而食氣也

鄒氏婦產後便泄余用參附溫補藥未效新成吳敬一診云虛寒而兼下陷用補中益氣加熟地茯苓杜附應手取效以是知方論內言下虛不可升提不盡然也

陸姓婦產後三日發疹細而成粒不稀不密用荆芥薄荷枯子等藥一劑頭面俱透越一日漸有回

忽大便溏泄數次覺神氣不寧問其所苦曰熱

日渴語言皆如抖出脈虛細數有七至我師金大

文診之曰此陽脫證也屬少陰用生附子三錢水

炒片礞如炮乾薑八分炒甘草一錢炒白芍一錢

五分水煎衝入尿一調羹青魚膽汁四小茶匙夜

中無豬胆故以此代即羊胆亦可服畢即睡覺來熱渴俱除續用

黃耆建中湯加丹參蘇木二劑而安

產後惡露不行餘血滲入天腸洞泄不禁或下青

黑物的奇數極驗荆芥大者四五種於壺內懸火

燒成灰不得犯油火入麝香少許研勻沸湯一兩

呷調下此藥雖微能愈大病慎弗忽視

千金膠蠟湯治產後利黃蠟二錢子大阿膠二

錢當歸二錢牛黃連三錢黃藥一錢陳米半升煎

湯煎藥服

倒秘

金匱云亡津液胃燥故也

沈按當用當歸肉蓯蓉生首烏麻仁杏仁不應用

麻仁九四五十九

頭痛

沈按陰虛於下則陽易升上致頭痛者宜便最效

褚侍中云。重便降火甚速。降血甚神。故為療厥逆頭疼之聖藥。若血虛受風。宜一奇散。即芎歸湯也。薛按。載一產婦頭痛。日用補中益氣已三年。稍勞則惡寒內熱。擬作陽虛治。加附子一錢於前湯中。數劑不發。

胃脘痛腹痛少腹痛

沈按。有血瘀血虛停食感寒肝氣之異。手按痛減者。血虛也。按之痛增者。非停食。即瘀血停食。則右關脈獨實。且有嘔噎氣。瘀血則所下惡露必少。得熱即減者。感寒也。至若厥陰肝脈抵小腹。挾胃又

為藏血之臟。血去肝虛。其氣易動。一關氣微。隨為

皖腹大痛。治法血虛宜歸耆建中。消食惟查肉桂

最妙。兼和血也。消瘀宜奪命散。感寒者。輕則炮薑

艾葉。重則桂附。葉煎肝氣痛。養血藥中加川棟

橘核。苦以泄之。重則烏梅。尤辛散酸收。苦泄並用。

杰按。一婦產後腹痛。令其夫以手按之。小腹痛尤

甚。下惡露而痛仍不減。知其非瘀。乃燥糞也。子藥

一劑。大便潤下而愈。姜用川治驗。炮薑五分。丹

皮二錢。歸身三錢。川芎一錢五分。山查二錢。炒枳

殼一錢五分。炒麻仁二錢。枳殼桃仁泥二錢。生地

二錢。炙甘草四分。加研爛松子仁五粒。蕭虞六云。下血過多。肝經血少。腹痛。其脈弦者。以熟地。黃肉為君。加白芍。木瓜。茯苓。一劑可止。有難產久坐。風入胞門。致腹痛欲絕。其脈浮。風五錢。服之立愈。

腹中虛痛胸項結核

薛按。一產婦腹中有物作痛。投破節胸項各結小核。腫於肉裏。此肝血之凝。而主筋。血虛則筋急而攣。以諸筋皆屬於筋。而胸項又肝之

遙歸脾加減治驗

小腹痛瘀血成膿

薛案。載一產後小腹痛。行氣破瘀。血成膿也。用瓜子仁湯二劑。痛

膿而愈。產後多有此證。雖非癰。用有膿。脈但數。微有膿。脈遲緊。但有

血。即愈。若腹脹大。轉側作水聲。或便出。宜用蠶礬丸。太乙膏。及托裏

緩則化為膿。難治。若流注關節。則

膿骨。失治多為

膿。其脈弦者。以熟地。黃肉為君。加白芍。木瓜。茯苓。一劑可止。有難產久坐。風入胞門。致腹痛欲絕。其脈浮。風五錢。服之立愈。

氣行血藥。尤甚。其血虛也。蓋肝為藏血。見於肢節。胸項者。即分也。用久珍

血。不應脈洪。數。此止。更以太乙膏下之。神效。脈洪數。已瘀血。尚未成膿。下膿。從臍出。或從大便。出。此瘀血宜急治。

膿。其脈弦者。以熟地。黃肉為君。加白芍。木瓜。茯苓。一劑可止。有難產久坐。風入胞門。致腹痛欲絕。其脈浮。風五錢。服之立愈。

婦按古今醫案載一婦產後憊

每發時小腹脹痛從下攻上膈

入胃即吐偏治不效葉香巖用

酒炒當歸二錢自製鹿角霜菟

生查肉三錢川芎八分水煎送

而愈次用烏雞煎丸原方半料

積之方如桃仁煎川大黃蟲

俱用川烏巴霜局方聖散子三

乾黍此皆峻厲之劑用而中病

輕嘗鮮不敗事試閱葉案積聚

如千金硝石丸人參硝黃並用

學者但將丹溪治積聚諸案細

神丸生熟黍並用尤勿輕試每

黍身為癩之言則飛補之說其

腰痛

失全產後惡露方行忽然斷絕腰

痛如錐刺入骨此由血滯經絡不

宜桃仁湯五香連翹湯

沈按前方不穩不若用桃仁紅

常識為安

如神湯治瘀血腰痛延胡當歸肉桂等分水煎服

沈按腰痛不見前證者多屬肝腎虛宜當歸杜仲

補骨脂之類

遍身疼痛

浮腫

沈按產後浮腫先要分水病氣痲水病皮薄色白

而亮如裹水之狀氣病皮厚色不變經云腎者胃

之關也關門不利聚水生痲蓋產後腎氣必損胃

底陽微不能蒸布津液通調水道此聚水之由也

宜腎氣湯丸是證皮薄色白可證人身營衛之氣

通則平滯則脹頑痰瘀血皆能阻滯氣道作腫是

證皮厚色不變以脈弦者為痰脈結或乳者為血

分證分別論治用藥更有一種血虛而致氣滯者

其腫不甚色帶淡黃宜歸身為君佐以白朮陳皮

茯苓之類

咳散

一婦妊七八個月痰嗽不止有時嘔厚痰數碗投

二陳旋覆不應用清肺滋陰愈甚遂不服藥彌月

而遂痰嗽如故日夜不寐三劑後二陳加膽星竹

惡吐出厚皮數塊嗽仍不止更用二陳加旋覆當歸少減利可喫飯因嗽不減痰漸變薄加入生地四錢食頓減嗽轉甚通身汗出脈象微弦川歸身三錢茯苓二錢炒甘草一錢紫石英三錢因汗欲用黃耆因嗽又止推敲半晌仍用炒黃耆三錢一服汗止而嗽亦大減十劑而安

口眼喎斜

丹溪云必須大補氣血然後治痰當以左右手脈分氣血多少治之切不可作中風治用小續命湯治風之藥謂小續命湯等治風之藥不可用也

續命湯

腰背反張

詳云產後腰背反張肢體抽搐因亡血過多筋無所養使然大補氣血多保無虞若發表驅風百不全一武叔卿云寒主收引背項強直寒在太陽經也諸家皆主續命湯此古法也郭氏不問產後虛實邪之有無概用續命似覺一偏至詳氏專主亡血過多非十全大補不可是或一見乃夷堅志按以大豆紫湯獨活湯而愈亦主於風矣是續命固不為妄也但本方有麻黃附子氣血兩虛人不可輕用而郭氏論又囑人速灌取汗而解漏不以麻黃為忌何也二說俱不

可廢臨診時詳之

沈按仲景論腰背反張為瘧無汗者名剛瘧主以葛根湯有汗者名柔瘧主以桂枝加葛根湯桂枝湯乃治風主方故有汗之瘧屬風葛根湯中用麻黃麻黃乃散寒主藥故無汗之瘧屬寒仲景治少陰傷寒未見吐利之裡證者用麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯微發汗蓋寒邪乘少陰之虛而欲入急以附子保坎中之陽而以麻黃散外感之寒真神方也小續命湯雖非仲景之製方中用此二味正見攻守相須之妙而叔卿反云麻附二味

續命湯

充

氣血兩虛者不可輕用假使除卻麻黃何以散寒寒除卻附子何以保真陽特不可用於有汗之柔瘧耳有汗柔瘧更有兩種一則因虛而受外來之風一則血虛則筋急並無外感之風有風者雖汗出必熱惡風主以華元化愈風散祇血虛而無風者必不惡風純宜補血又按人身氣血之外更有真陽真陰藏在坎中亦立命之根基胎系於腎腎司二陰產育之時下焦洞開坎中陰陽有不入損者乎况背後夾脊四行俱未開經脈太陽之根則少陰脊裡一節是督

脈亦隸少陰。此脈急縮與少陰大有關會。此用麻
兼用附之深意也。使置此不講。徒執氣虛血虛以
治產後百病。業醫亦覺太易矣。

小續命湯 治產後中風。身體緩急。或頑痺不仁。或
口眼喎斜。牙關緊急。角弓反張。

防風一錢 麻黃去節 黃芩 白芍 人參

川芎 防己 肉桂各七 附子炮

杏仁各五 甘草四分 加生薑水煎服

華陀愈風散 治產後中風。口噤。牙關緊閉。手足癱
瘓。如角弓狀。亦治產後血暈。不省人事。四肢強直。或

心腹倒築。吐瀉欲死。此藥清神氣。通血脈。其效如神。

荆芥炒為末。每服三錢。黑豆滓酒調服。童便亦

可。口噤。擗開灌之。或吹鼻中。李瀕湖曰。此方

諸書盛稱其妙。姚僧坦集驗方。以酒服。名如聖
散。藥下可立效。陳氏方名舉卿古拜散。勸存敬

方。用古老錢煎湯服。名一捻金。許叔微本事方

云。此藥委有奇效。神聖之功。一產後睡久。及醒
則昏昏如醉。不省人事。醫用此藥。及交加散云

服後當睡。必以左手搥頭。用之果然。皆脫產寶
方云。此病多因怒氣傷肝。或憂氣內鬱。或坐草

受風而成。宜服此藥。陳氏證治要法。名獨行散

賈似道悅生隨抄。呼為再生丹。指迷方加

沈云。丁丑三月。練塘金處旬第四。媳產後變證。伊

郎來請。先述病狀。云。上年十月。生產甚健。至十二

月初旬。面上浮腫。驅風不應。加麻黃三帖。通身脹

腫。小便不利。更用五皮雜治。反加臍凸。更用肉桂

五苓。小便畧通。脹亦稍減。續用桂附八味。其腫漸

消。惟右手足不減。忽一日。口眼歪斜。左手足不舉

舌不能言。因作血虛治。變為俯不得仰。數日後吐

黑血盈盃。吐後俯仰自如。旬餘復不能仰。又吐黑

血而定。投以消痰。忽然口閉。目開如脫狀。伊母一

夜煎人參三錢。灌之。得醒。醒來索飯。喫一小盃。近

日。又厥。灌人參不醒。已三晝夜矣。余遂往診。右手

無脈。因臆極。不以為怪。左脈浮取亦無。重按則如

循刀。亦余曰。此是實證。停參可醫。遂用臍星半夏

石菖蒲。楸皮。夫蟲地龍。紫草。水煎。入竹瀝薑汁。

劑。知四劑。手足能舉。不換方。十二劑。能出外房。診

脈。諸病悉退。惟舌音未清。仍用前方。而愈。余問奇

病之源。余曰。人身臟腑。接壤受胎。後腹中遂增。等

物。臟腑之機。括為之不盡。五液聚為痰飲。故胎前

精痰滯居半。千金半夏茯苓湯所以神也。至臨產時痰涎與惡血齊出。方得無病。若止血下而痰飲不下。諸病叢生。故產後理血不應。六神湯為要藥。此證初起。不過痰飲阻滯氣道。作肺血本無病。用五苓腎氣腫減者。痰滯氣道得熱斬開故也。久投不已。血分過熱。致吐血兩次。至若牛身不遂。口眼歪斜。舌絡不靈。俱是痰滯經絡見證。即厥亦是痰迷所致。並非虛脫。故消痰通絡。病自漸愈。何奇之有。

雜按此等事識皆從閱歷而來。朱生甫令郎仲和

之室。後復患此。醫治不能除根。再產亦然。延已數年。繼復懷妊。病發益頻。余用大劑滌痰藥。服月餘。產後安然。病根竟杳。

震澤一婦產後十餘日。延我師金大文診視。余從。據述新產時證似虛脫。服溫補藥數劑。近日變一怪證。左邊冷。右邊熱。一身四肢盡然。前後中分冷。則如冰。熱則如炭。鼻亦如之。舌色左白右黑。師問。曰。此是何病。用何方治。余曰。書未曾載。目未曾睹。不知應用何方。師曰。奇證當於無方之書求之。經不云乎。左右者陰陽之道路也。陰陽者水火之象。

兆也。敗血阻住陰陽升降道路。不能旋轉。陽盛處自熱。陰盛處自寒。所以偏熱偏寒。用澤蘭查肉劉季奴蘇木桃仁琥珀等藥兩劑。病勢減半。繼服不應。遂更醫雜治。以至不起。由今思之。此證不但血阻。必兼痰滯。我師見及阻住陰陽升降道路。病源已經識出。特跳不出產後消痰圈子耳。倘通痰不應。即兼化痰。或者如前案金婦得起。未可知也。此時尚初學。我師見識過人。特未悟徹痰滯一證。惜哉。

薛案郭茂恂嫂金華君。產七日不食。始言頭痛。頭痛

已。又心痛作。既而目睛痛如刺。更作更止。相去無瞬息間。每頭痛欲取大石壓良久。漸定。心痛作則以十指抓臂。血流滿掌。痛定目復痛。復以兩手自刺。且如是十日不已。眾醫無計。進黑龍丹半粒。疾少間。中夜再服。乃瞑目。寢如平時。至清晨下一行。約三升。許如蝗蟲。子病減半。已刻又行如前。痛盡除。黑龍丹 治產難及胞衣不下。血迷。血暈。不省人事。一切危急惡候。垂死者。但灌藥得下。無不全活。

當歸 五靈脂 川芎 良薑 熟地 各二兩
砂鍋內細煎 百草膏 一兩 硫黃 乳香

錢各一琥珀 花柳毒藥 和末醋糊先如藥

子大每用一二丸炭火煨紅投入生薑自然汁

中浸碎以鹽和合酒調服下

小便不通

產乳集用鹽填臍中令平葱白搗鋪一指厚安鹽止

以艾炷餅上灸之覺熱氣入腹內即通最靈

沈按此法不效必是氣虛不能升舉黃耆補氣之

中已寓上汁之性期經為君五錢麥冬能清土源

用以為臣一錢五分白通草通利達下川以為佐

八分水煎服之

尿血

天全云產婦尿血而黃腸腹少食此肝木乘脾土也

用加味逍遙散補中湯煎服可愈

尿胞被傷小便淋瀝

丹溪云嘗見收生者不謹損破產婦尿脬致痛淋漓

遂成廢疾有一婦年壯難產得此因思肌肉破傷在

外者皆可補完尿脬在裏諒亦可治遂診其脈虛甚

子曰難產之由多是氣虛產後血氣尤虛試與破補

肉以參耆為君黃耆歸身杜仲仁陳皮茯苓為佐煎以

猪羊肝煎湯極飢時飲之但劑小率用一兩至一月

而安蓋令氣血驟長其脬自完恐少緩亦難成功矣

又產時尿胞被傷小便淋瀝用二錢煎燒存性作末

服一月可愈

玉門不閉

薛立齋云氣虛血弱十全大補湯主之

玉門腫脹焮癢

薛云是肝經虛熱加味逍遙散主之

坐草過早產戶傷壞紅腫潰爛痛不可忍用蒸包子

籠內荷葉煎湯洗日三次兩日可愈

陰脫

陳無擇云產後陰脫如脫肛狀及陰下挺出逼迫腫

痛舉動房勞即發清水續續小便淋瀝硫黃烏賊骨

各二兩五味子二錢半為末糝之日三次

子宮下

丹溪云一產子後陰戶下一物如合鉢狀有二歧其

夫來求治予思之此子宮也必氣血弱而下墜遂用

升麻當歸黃耆幾帖與之半日後其夫復來云服二

次後覺响一聲視之已收陰戶訖但因經宿乾著席

上破一片如掌心大在麓某妻在家哭泣恐傷破不

復能生子思此非腸胃乃脂膏也肌肉破尚可復完

若寒直充盛必... 湯加入參與百... 三年後復有子

治子宮下黃者一錢半人參一錢當歸七分升麻三... 分甘草二分作一帖水煎食前服外用五倍子末泡... 湯洗又用末傅之如此數次宜多服藥永不下

產戶下物

丹溪云一婦三十餘歲生女二日後產戶下一物如... 手帕下有帕尖約重一觔予思之此因胎前勞乏傷... 氣或肝痿所致卻喜血不甚虛耳其時歲暮天寒恐... 冷乾壞了急與炙黃耆二錢人參一錢白朮五分當

女科輯要

卷下

歸一錢半升麻五分三帖連服之即收上得汗通身... 方安但下翳沾席處乾者落一片約五六兩重蓋脂... 膜也食進得眠診其脈皆瀉左畧弦視其形卻寬與... 白朮白芍各半錢陳皮一錢生薑一片煎二三帖以... 養之

水道下肉線

一產後水道中下肉線一條長三四尺動之則痛欲... 絕先服笑散數帖次以帶皮薑三觔研爛入清油... 二觔煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲於水道邊以... 煎薑之給刺刺之六日有夜補其缺二六日即愈

入再服笑散青歸湯調理之如肉線斷則不可治

乳汁不通

涌泉散山甲炮研末酒服方寸匕日二服外以油梳... 梳乳即通見經

陳自明婦人良方曰子婦食素產後七日乳汁不行... 赤小豆一升煮粥食之當夜即行一婦乳汁不行... 煎當歸八錢服即通王不留行白通草穿山甲是... 要藥

回乳

無子與乳乳不消令人發熱惡寒用大麥芽二兩炒... 為末每服五錢白湯下丹溪

乳頭碎裂

丹溪老黃茄子燒灰傅之綱目丁香末傅之

吹乳

繆仲淳云如乳內外吹乳乳巖乳癰不外陽明厥陰... 二經之病橘葉最妙又用生半夏一箇研末生蔥... 頭一段研裹左右互塞鼻神驗又於山中掘野芥... 菜根洗淨搗爛無灰酒煎數滾飲一二次即以... 渣湯患處凡乳癰米成或腫或硬或脹痛者無不立

消屢治經驗野芥菜一名天芥菜又名鴨哥草似芥菜而畧矮小其根數出如蘭根用以治乳想其形似乳囊也故用有驗附錄

乳癰疔方發

活小鯽魚一尾剖去腸同生山藥寸許搗爛塗之少頃發痒即愈屢驗無山藥即芋奶亦可

乳癰已成

胡桃膈瓦上焙燥研末每服三錢紅糖調勻溫酒送下三服無不全愈

又方用玫瑰花五七朵乾者醇酒煎服燙酒極熱沖服亦可

即以花殼搗散鋪貼患處三兩次可愈即已成硬塊者亦可消散曾經治驗數人

乳巖

坎瓦洗淨切薄焙燥研末日喫一條酒下約二十條效

效

又狗糞東丹獨囊蒜三味搗勻攤布上勿用膏藥合粘貼吐微痛數日可愈

沈按

乳巖初起堅硬不作膿其成也肌肉疊起形似山巖病起抑鬱不治之證方書云桃花開時死

出鮮血者死余見一婦患此已四年診時出鮮血

盈盂以為必死日服人參錢許竟不死明年春桃

花大放仍無恙直至秋分節候方斃此婦抑鬱不

得志誠是肝病然不死於春而死於秋何哉豈肝

病有二其太過者死於旺時其不及者死於衰時

耶此證本屬肝病移以坎瓦補腎而愈亦理之不

可解者

外有方附後瘍科方選中

雜按芎藭通日當歸芎藭為產後要藥然惟血寒

而滯者為宜若血虛而熱者斷不可用蓋當歸香

實要藥其於麻辛急走善行不能靜守止能運血

衰多益其如通血液虧孤陽上冒等證而欲望其

補血不亦愚哉芎藭有車輪紋其性更急於當歸

蓋物性之偏長於通者必不長於守也世人不取

用芍藥而恣用歸芎何其顛倒哉余謂今人血虛

而熱者為多產後血液大耗孤陽易浮吳氏此言

深中時弊又論達生篇所用方藥未可盡信皆先

得我心之同然者詳見解產難醫者宜究心焉

雜病

熱入血室

仲景傷寒論云婦人傷寒發熱經水適來晝日明了

暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

又婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

又婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

沈按論言勿犯胃氣及上二焦者謂不可攻下并不可吐汗也然有似是實非之證不可不辨

女科雜要卷下

三

陳良甫曰脈遲身涼而胸脇下滿如結胸狀譫語者當刺期門穴下針病人五吸停針良久徐徐出針凡針期門穴必瀉勿補肥人二寸瘦人寸半

許學士治一婦病傷寒發熱遇夜則如見鬼狀經六七日忽然昏寒涎嚮如引鋸牙關緊急瞑目不知人病勢危困許視之曰得病之初曾值月經來否其家云經水方來病作而經遂止後一二日發寒熱盡

雖靜夜則見鬼昨日不省人事許曰此是熱入血室證醫者不曉以剛劑與之故致此當先化痰後治其

熱乃急以呷散投之兩時許涎下得睡即省人事次

投以小柴胡湯加生地二服不汗而熱遂除

又一熱入血室證醫用補血調氣藥治之數日遂成血結胸或勸用前藥許曰小柴胡已遲不可行矣刺期門則可請善針者治之如言而愈或問何為而成

結胸許曰邪氣乘虛入於血室血為邪所迫上入肝經則譫語見鬼復入腹中則血結於胸中矣故觸之則痛非藥可及當用刺法

一婦熱多寒少譫語夜甚經水來三日病發而止本家亦知熱入血室醫用小柴胡數帖病增舌色黃燥上下齒俱是乾血余用生地丹皮麥冬等藥

女科雜要卷下

三

不應藥入則乾嘔脈象弱而不大因思弱脈多火胃液乾燥所以作嘔遂用白虎湯加生地麥冬二劑熱退神清唯二十餘日不大便為苦與麻仁丸三服得便而安

一室女發熱經來醫用表散藥增劇譫語夜甚投小柴胡不應夜起如狂或疑蓄血投涼血消瘀藥亦不應左關脈弦硬搏指詢知病從怒起因用膽

草黃芩山梔丹皮羚羊角蘆薈甘草歸身等藥煎服一劑知四劑愈

張儀表合愛發熱經來昏夜譫語如見鬼狀投小

柴胡增劇詢其病情云醒時下體惡寒即憤時亦嘗牽被斂衣因悟此證平素必患帶下且完姻未久隱曲之事未免過當復值經來過多精血兩虧陰陽並竭其惡寒發熱由陰陽相乘所致非外感熱邪深入也悞投發散清熱證同亡陽傷寒論云亡陽則譫語內經云脫陽者見鬼是也因用腎氣丸早晚各二錢神氣即清隨以從蓉易桂附數劑全愈此即前所云似是實非之證不可不辨者也堯封自記

金匱婦人咽中如有炙肉半夏厚樸湯主之千金

所云咽中粘帖如有炙肉吐之不出吞之不下是也

半夏厚樸湯 半夏一升 厚樸三兩 茯苓四兩 生薑五兩 蘇葉二兩水煎分四服 日夜一

厥燥 婦人厥燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大

棗湯主之 甘草三兩 小麥一升 大棗十枚 棗煎三分

服 陰寒

婦人陰寒温陰中坐藥蛇床子散主之 蛇床子末

以白粉少許和合相得如棗大綿裹納之

陰吹

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也猪膏髮煎導

猪膏半觔 亂髮如鷄子 三枚 和膏中煎之髮消藥成分再服

雜按陰吹亦婦人恆有之事別無所苦者亦不為病况屬隱微之候故醫亦不知耳俗傳產後未彌月而吹者必患此惟吹之太喧而大便難燥乃

稱爲病然仲聖但潤其陽明之燥則府氣自通仍

不必治其吹也

陰癢

善邑西門外三里有婦陰中極癢難忍因寡居無人轉述醫者莫知病情治皆不效至蘇就葉天士診微露其意葉用蛇床子煎湯洗內服龜鹿二仙膠四日而愈

陰蝕有用猪肝煮熟削如挺鑽孔數十納陰中良久取出必有蟲在肝孔內另易一挺納之蟲盡自愈亦良法也

雄按尚有陰挺一證用飛蟻六枚 雄七枚 五味

于雄黃各五錢 銅綠四錢 末之煉蜜丸每重四錢

即以方內雄黃為衣坐入玉門重者二次必愈

王宇泰女科證治準繩序云婦人有專治方舊矣史

稱扁鵲過邯鄲聞貴婦人即為帶下醫語兼長也然

帶下直婦人一病耳調經雜證懷子免身忠苦百出

療治萬方一帶下寧據盡之乎世所傳張長沙雜病

方論三卷婦人居一焉其方用之奇驗奈此廣何孫

貞人著千金方特以婦人為首蓋易其乾坤詩首

睢之義其說曰特須教子女學習此三卷婦人方令

其精曉即於倉卒之秋何憂畏也而精於醫者未之

深許也周大中初白敏中守成都其家有因免乳死

者訪問名醫得皆殷備集驗方三百七十八首以獻

是為產寶宋時濮陽李師聖得產論二十一篇有說

無方醫學教授郭稽中以方附焉而陳無擇於三因

方評其得失詳矣娶醫杜政又附益之是為產育寶

慶集臨川陳自明良甫以為諸書綱領散漫而無統

節目簡畧而未備醫者局於簡易不能深求偏覽有

纔進一方不效輒束手者有無方可據揣摩臆度者

乃采摭諸家之善附以家傳驗方編葺成篇凡八門

門數十餘體總三百六十餘論論後列方綱領節目

燦然可觀是為大全良方良方出而闡閣之調將大

備矣然其論多采巢氏病源什九歸諸風冷藥備獷

熱未有條分縷晰其宜否者近代薛己新甫始取良

方增注其論酌寒熱之中大抵依於養脾胃補氣血

不以去病為事可謂救時之良醫也已第陳氏所著

多上古專科禁方具有源流本末不可沒也而薛氏

一切以己意及除變亂使古方自此湮沒余重惜之

故於是編附存陳氏之舊而刪其偏駁者然亦存十

之六七而已至薛氏之說則盡收之取其以養正為

注直爾而易海難女子學習無難也若易水瀉水師

弟則後長沙而精於醫者一方一論其援是也他

書所無有挾是而過邯鄲庶無道少之患哉其積德

求子與夫安產藏衣吉凶方位皆非醫家事故削不

載云此方全依王宇泰女科證治準繩卷之六附註

細按若帶下直婦人一病耳未必人人病此何以

扁鵲聞貴婦人即為帶下醫緣帶下本女子生而

即有之事原非病也後人以帶脈不主約束一言

遂以女人之遺濁稱為帶下之證然則扁鵲之為

帶下醫猶今之幼科自稱痘醫也痘雖幼科之一

證而亦人人必有之事且世俗無不貴小兒者所

以人多樂為痘醫耳。

集方論中所列各丸有彼此互見者集錄

補養門類及分方集解所錄

六味丸錢仲治肝腎不足真陰虧損精血枯竭

地黃砂仁酒拌九山茱肉酒潤四兩茯苓乳丹

皮澤瀉各三兩蜜丸空心鹽湯下冬酒下

六味地黃湯治同上

前方煎服

八味丸崔氏

前方加肉桂附子各一兩名桂附八味丸治相火

不足尺脈弱者宜之亦治婦人轉胞

前方加黃柏知母各二兩名知柏八味丸治陰虛

火盛尺脈旺者宜之

腎氣丸金匱

桂附八味丸加車前牛膝劑用地黃四兩山藥

以下皆一兩茯苓三兩附子五錢製

杰按金匱要畧用桂枝無車前牛膝治婦人轉胞

此名加味腎氣丸係治水腫

青娥不老丸集解名青娥丸治腎虛腰痛

破故紙十兩酒蒸為末胡桃肉十二兩去皮研爛杜仲一兩去

絲生薑炒蒜各四兩蜜調為丸

又丹溪青娥丸止用故紙四兩仲四兩生薑二兩

胡桃肉三十個蜜丸桐子大每服四五丸鹽酒下

黑錫丹治陰陽不升降上盛下虛頭目眩運

黑鉛二兩硫黃二兩將鉛鎔化漸入硫黃候結成片傾

地上出火毒研至無聲為度

參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉

人參白朮茯苓甘草炙山藥炒扁

豆炒薏仁炒蓮子肉去心陳皮砂仁桔

梗為末每三錢棗湯或米飲調服

八珍湯治心肺虛損氣血兩虛

人參白朮茯苓甘草當歸生地

芍藥芎藭

十全大補湯

八珍再加黃耆以助陽固表加肉桂以發水腫元

金匱曰虛者十補勿瀉之是也

補中益氣湯東垣治一切清陽下陷中氣不足之證

黃耆蜜炙人參甘草炙白朮炒陳

皮白當歸分升麻柴胡葛根三片棗二

枚煎

歸脾湯生清 治心脾受傷不能攝血 血妄行及婦

人帶下

人參

白朮土炒

茯神

棗仁

龍眼肉

黃耆一錢

炙

當歸洗酒

遠志錢一

木香

甘草五分

薑棗煎

四物湯 治一切血虛及婦人經閉

當歸洗酒

生地黃

芍藥各二錢

芎藭一錢

奇效四物湯 治失血內崩

當歸洗酒

熟地黃

芍藥炒

川芎

阿膠

艾

葉

黃芩炒香

芎歸湯一作歸芎湯未知 治產後血虛頭痛胎動下

血服此即安子死腹中服此即下 催生神效亦名當

歸湯若腹疼加桂若腹痛自汗頭暈少氣加羊肉

當歸三五錢

川芎二錢

若為末

石佛手散又名一

奇散又名君臣散

又有神妙散

手散未考

加味芎歸湯 川芎當歸各一兩 日死還板一具

炙生過男女婦人頭髮一握燒 性治分燒

兩水煎服良久自下

當歸芍藥散金匱 治懷妊腹中疝痛

當歸三兩 芍藥一兩 茯苓四兩 白朮四兩 澤瀉二兩

芎藭三兩 右六味為散取方寸七酒和日三服

膠艾湯金匱 治婦人衝任虛損經水淋瀝及血虛下

痢并妊娠腹痛為胞阻

當歸三兩

芍藥四兩

乾地黃六兩

芎藭二兩

艾

葉三兩

阿膠

甘草各二兩

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去渣納

膠令消盡溫服一升日三

仲景黃連阿膠湯 治傷寒少陰病得之二三日以

上心煩不得臥

黃連四兩

黃芩二兩

芍藥二兩

阿膠三兩

雞子黃二

用生

杰按陰氣為陽熱所灼也用此以收攝其欲亡之

微陰故沈謂子煩陰虛火甚者宜服此

祇寒

大建中湯金匱 治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中

寒氣上衝皮起出見有頭足上下痛而不可近者

杰按心為陽寒為陰寒乘於心陰陽相激故痛寒

乘於脾脾冷不消水穀心脾為子母之藏為邪所

乘故痛而嘔復不能飲食也

蜀椒合

乾薑兩

人參二兩

煎去滓入飴糖

升微煎溫服

杰按陽受氣於胸中陽虛則陰邪得以中之陰寒之氣逆而上冲橫格於中焦故見高起痛嘔不可觸近之症 蜀椒辛熱入肺散寒入脾暖胃入腎門補火乾薑辛熱通心助陽逐冷散逆人參甘温大補脾肺之氣飴糖甘能補土緩可和中所以太祛下焦之陰而復上焦之陽也
小建中湯 仲景 治傷寒陽脈濇陰脈弦腹中急痛傷寒二三日心悸而煩 通治虛勞悸衄裏急腹痛夢遺失精

女科輯要 卷下

單

杰按三陰下利而腹痛者裏寒也宜温也四逆湯附子理中湯腸鳴泄瀉而痛者裏虛有寒也宜小建中温中散寒悸者陽氣虛也煩者陰血虛也與此湯先建其裏倍芍藥者酸以斂陰陰收則陽歸附矣 喻嘉言曰虛勞病至於亡血失精精血枯槁難為方矣急宜建其中藏使飲食進而陰血旺故但用稼穡作甘之味生其精血而酸辛鹹苦絕所不用舍是無良法也

桂枝 生薑 甘草 芍藥 大枣 芎藭
藥六 入飴糖一升微火解服 此即建中湯也

薄耳其名桂枝加芍藥而名建中以飴糖為君也今人用建中者不用飴糖失其建中意矣不去薑桂所以散邪吳鶴皋曰桂枝當是桂枝味薄用以解表桂味厚用以建裏
黃耆建中湯 金匱 治虛勞諸不足 準繩曰血不足而氣血之海氣血所從生也即補血湯者五倍於當歸之義

即前方加黃耆兩半 黃耆易當歸名當歸建中湯 治產後虛羸不足腹中痛引腰背小腹痛拘急若崩傷不止加地黃阿膠
理中湯 仲景 治傷寒太陰病自利不渴寒多而嘔腹中痛發漉脈沉無力或厥冷拘急或結胸吐寒虺及感寒霍亂

女科輯要 卷下

單

白朮 陳壁土 人參 乾薑 炮 甘草 一兩 每服四錢本方等分蜜丸名理中丸
附子理中湯 治中寒腹痛身痛四肢拘急即前方三兩加附子一枚
補中湯 治泄瀉瀉不已者加附子
理中湯加陳皮茯苓 改加青皮陳皮名治中湯
治太陰傷寒腹滿病悶兼食積者
四逆湯 仲景 治三陰傷寒身痛腹痛下利清穀惡寒不汗四肢厥冷或反不惡寒面赤煩躁裏寒外熱或乾嘔或咽痛脈沉微細欲絕

附子一枚 乾薑兩 甘草二兩 冷服而赤者格

陽於上也加葱九莖以通陽腹痛者真陰不足也

加芍藥二兩以斂陰咽痛陰氣上結也加桔梗一

兩以利咽止痛脈不出加人參二兩以助陽補氣

血 嘔吐加生薑二兩以散逆氣湯加減之法

真武湯仲景 治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重

疼痛自下利者此為有水氣或咳或嘔或小便利及

太陽病發汗汗出不解仍發熱心悸頭眩筋惕肉瞤

振振欲擗地氣寒惡寒此亦腎中陽虛見症仍屬少

附子一枚 白朮二兩 茯苓兩 芍藥兩 生薑兩 水

寒相搏咳者加五味子細辛乾薑小便利去茯苓

下利去芍藥加乾薑嘔去附子加生薑一倍

附子湯仲景 治少陰病身軀痛手足寒骨節痛脈沉

者及少陰病得之二三日口中和背惡寒者

前方去生薑加人參二兩

烏梅丸仲景 治傷寒厥陰證寒厥吐衄傷寒厥者

微而脈至七八日清冷發燥無暫安時也厥者脈

出入隔則煩須臾復止得食則嘔而又煩厥者食

復出也此為藏寒當亦治胃府發咳而嘔甚則

長蟲出亦主久利

烏梅三百 細辛 桂枝 人參 附子 黃

漿六兩 黃連一兩 乾薑十兩 川椒去 當歸兩

苦酒醱也 浸烏梅一宿去核蒸熟和藥蜜丸

祛風

小續命湯千金 治中風不省人事神氣潰亂半身不

遂筋急拘攣口眼喎斜語言蹇澁風溼腰痛痰火併

多六經中風及剛柔二瘳亦治產後中風論見

麻黃去 杏仁去皮尖 桂枝 白芍酒 甘草

炙 人參 川芎 黃芩 防己每一兩 防風兩

附子半兩炮 每服三錢或四五錢加薑棗煎溫服

取微汗 筋急語遲脈弦者倍人參去芍芍以避

中寒服後稍輕再加當歸 煩躁不大便去桂附

倍芍藥加竹瀝熱去附子入白附子亦可 如不

大便日久胸中不快加大黃枳殼如藏寒下利去

黃芩防己倍附子加朮 嘔逆加半夏 語言蹇

澁手足戰掉加菖蒲竹瀝身痛發搐加羌活

渴加麥冬花粉 煩渴多驚加犀角羚羊角汗多

去麻杏加白朮 舌燥去桂附加石膏參丹

獨活湯丹溪 治風虛癱瘓昏憤不覺或為寒熱

獨活 羌活 防風 和辛 桂心 白微

歸 川芎 半夏 人參 茯苓 遠志 菖蒲

五 甘草二錢 每服一兩加薑棗煎

愈風散 治產後中風口噤角弓反張亦治血暈

不省人事四肢強直 類亦名如聖散

化痰

三陳湯 治一切痰飲為病咳嗽脹滿嘔吐惡心

頭眩心悸

半夏 陳皮 茯苓 甘草 加薑

煎 無燥散之患故名二陳

千金半夏茯苓湯 治妊娠惡阻煩悶吐逆惡食頭

眩體重惡寒汗出等症

半夏 生薑 乾地黄 茯苓 橘皮

旋覆花 細辛 人參 芍藥 芎藭 桔梗

甘草 右十二味 咀以水一斗 煮取三升 分三服 若病

阻積 閉日不得治 及服藥冷熱失候 病變客熱煩

渴口生瘡者 去橘皮 細辛 加前胡 知母 各十二銖

若變冷下利者 去地黄 入桂心 十二銖 若食少胃

中虛生熱 大便閉塞 小便赤少者 宜加大黃十八

銖 去地黄 加黃芩六銖 餘依方服 一劑得下 後消

息看氣力 冷熱增損 方更服 一劑湯便急 使茯苓

九令能食 便強健也 忌生冷醋滑油膩

千金茯苓圓 茯苓 人參 桂心 乾薑 半夏 橘皮

白朮 葛根 甘草 枳實 右十味 蜜丸 梧子大 飲服二十九 漸加三十九日

三 肘後不用 乾薑 半 又方 書名 竹節湯 治孕 婦嘔吐不止 惡心少食 服此 止嘔 清痰

青竹筍 橘皮 茯苓 生薑 半夏

右五味 水六升 煮取三升 半分三服

千金橘皮湯 治妊娠嘔吐不下食

竹茹 橘皮 人參 白朮 生薑 厚

橫 右六味 水七升 煮取二升 半分三服 附金匱單用

橘皮湯 又橘皮 升 如 升 人參 甘草 生薑 枳實

大棗 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

六神湯 治產後痰迷 神昏 諸語 懸露 不斷者 甚或

半身不遂 口眼歪斜 治 後 來 也

女科輯要 卷下

七二七

杜利稱壯 右養精 半夏 亦可 膽星 茯苓

神 旋覆花 各一錢 煎服

理氣

紫蘇飲 嚴氏 治胎氣不和 癆上心胸腹滿痛悶名爲

子懸 胎至四五六月 若相二火 養胎熱氣逆上之故

紫蘇 兩 腹皮 人參 川芎 橘皮 白芍

當歸 三 甘草 分

劉分三分水一盞生薑四片葱白煎去渣服一方

無川芎名七寶散 注初菴醫方集解載此藥

止一錢 當歸七分 甘草二分 餘皆五分

天仙藤散 陳景 木名香 附散治子氣腫脹

天仙藤 即青木香 香附 炒 陳皮 甘草 烏

藥 木香 分 劉末 每服五錢加生薑三片紫蘇

五葉水煎口三服腫消止藥 汪本無木香有木

聖瓜 三

木香散 王師 治妊娠四五六月後每胸腹間氣刺滿痛

或腸鳴嘔逆減食 此由 忿怒憂思 飲食 失節所致

義北 木香 丁香 甘草 薑湯下

抑氣散 丹溪 治婦人經將行而痛氣之滯也

四物加胡索 丹皮 條芩

又抑氣散 嚴氏 治婦人氣盛於血變生諸證頭暈

海

香附 兩 陳皮 兩 茯苓 甘草 爲末每服

二錢

抑青丸 大瀉肝火治左脇作痛婦人怒氣傷肝胎

氣上逆致嘔逆水飲不能入黃連一味吳茱萸湯浸一

宿爲丸

札緒旋覆湯 治傷寒發汗若吐若下解後心下

痞鞭噎氣不除 邪雖解胃弱不和 虛氣上逆故也

又周揚俊曰余每借以治反胃噎食氣逆不降者

神效 活人云有代赭旋覆湯證氣虛者先服四逆

旋覆花 草三兩 代赭 石 兩 人參 兩 甘草 三

半夏 升 生薑 兩 大棗 十二 枚

旋覆花湯 金匱 要畧

旋覆花 葱 新經

逍遙散 局方 治血虛肝燥 骨蒸潮熱口乾便澀月經

不調

柴胡 當歸 白芍 白朮 茯苓 芍藥

甘草 炙 五分 加煨薑 芩 煎本方加丹皮梔子名

加味逍遙散

小柴胡湯 仲景 治傷寒吐風少陽證往來寒熱胸脇

痞滿默默不欲食心煩嘔或腹中痛或脇下痛或

渴或咳或利或悸小便不利口苦耳聾脈弦或汗後

餘熱不解及春時嗽發熱寒熱婦人傷寒熱入血室

小柴胡在經主氣在厥主血故更能入血室

柴胡八兩 半夏半升 人參 甘草 黃芩

生薑三兩 大棗十二枚

理血 小崩飲子 治男婦下焦熱結尿血淋漓痛者為血

為溺血論見 妊婦經來類

小蘗 蒲黃 藕節 滑石 木通 生地

梔子 炒 淡竹葉 常歸 甘草 各五分

導赤散 錢氏 治小腸有火便赤淋痛 論見帶下類

生地黃 木通 甘草 淡竹葉 等分煎

血極膏 羅謙甫 治婦人汚血凝滯胞門致成經閉 見

經閉

大黃一味為末醋熬成膏服之利一二行經血自

下

蠶胞湯 千金 治二三十年不產有胞中必有積血 見

求子

樸硝 丹皮 當歸 大黃 桃仁 生用各三錢 厚

樸 桔梗 人參 赤芍 茯苓 桂心 甘草

牛膝 橘皮 各二錢 附子 六錢 蠱蟲 水蛭 各十枚

右十七味攷咀以清酒五升水五升合煮取三升

分四服日三夜一每服相去三時覆被取微汗天

寒汗不出著火籠之必下膿血務須斟酌下盡二

三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止

然恐去惡不盡忍之尤妙

奪命散 治產後惡露不行眩暈昏冒 論見產後眩暈

不

浸藥 去油 血竭 壹錢 共研末分兩服糖調酒下

奪命丹 良方 治瘀血入胞脹滿難下急服此即消胞

衣自下

杰按似與前論惡閉致喘證未對姑列此以俟再

考

附子 炮牛 乾漆 研之炒 牡丹皮 各一兩

右為細末另用大黃末一兩以好醋一升同熬成

膏和前藥丸桐子大溫酒吞五七丸一方有當歸

花蕊石散 治血入胞衣服大不能下或惡露上攻

或寒凝惡露不行

花蕊石四兩 梳黃壹兩 研細泥封煨赤服二錢童便下

又葛可久花蕊石散 治畧同上

花蕊石 煨存性研如粉以童便一盞男人入酒

少許女人入醋少許煎溫食後調服三錢甚者五

錢能使瘀血化為黃水後用獨參湯補之非寒凝者不宜

無極丸 治惡露不行發狂譫語血瘀之重者

失笑散局方 治惡露不行心包絡痛或死血腹痛不

不省人事

蒲黃 五靈脂淨者等分炒為末煎膏醋調服或用

二三錢酒煎熱服

如神湯 治瘀血腰痛下注兩股如錐刺

延胡 當歸 肉桂 等分水煎服

二味參蘇飲

人參 蘇木

清魂散局方 治產後惡露已盡忽昏暈不知人產後氣虛

風邪也

澤蘭葉 人參各二錢半 荆芥一兩 川芎五錢 甘草

錢二

右為末用溫酒熱湯各半盞調灌一二錢龍下咽即開眼更宜燒漆氣淬醋煨于牀前使聞其氣

伏龍肝散 治大小產血去過多不止

伏龍肝

黑龍丹亦名琥珀 治產難及胞衣不下血迷血暈不

省人事一切危急惡候垂死者但灌藥得下無不全

活亦治產後疑難雜證案見奇

當歸 五靈脂淨者 川芎 良薑 熟地各二兩

砂鍋內紙筋鹽 泥固濟火煨過 百草霜一兩 硫黃 乳香各二錢

琥珀 花蕊石各一錢 為細末醋糊丸如彈子大每

用一二九炭火煨紅投入生薑自然汁中浸碎以

童便合酒調灌下

托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈洪

實數腫甚欲作膿者亦治產後瘀血將成膿見

金銀花 當歸二兩 大黃 樸硝 花粉 連翹

牡蠣 皂角刺三錢 黃芩 赤芍各五錢 牛酒半

水煎

蠟礬丸 治一切瘡癤惡毒先服此丸護膜托裏使

毒不攻心或為毒蟲蛇犬所傷並宜服之

黃蠟二兩 白礬一兩 先將蠟融化候少冷入礬和勻為丸酒下每服十九二十九漸加至百丸則有力瘡愈後服之亦佳

大乙膏 治瘰癧子瘡神効

臘子一錢 輕粉各二錢 麝香三錢 浸藥四錢 黃丹五兩 右用清油一筋先下黃丹熬

用柳枝攪又用慈兒葱七枝先下一枝熬焦再下一枝葱盡為度下火不住手攪凝冷熱得所入臘子等藥攪勻磁器盛之用時旋攤

滴下

麻仁丸 仲景 治便難脾約

大黃四兩 厚樸 枳實即大承氣 麻仁一兩

杏仁二兩 芍藥 蜜丸梧子大每服三五

十九溫水下丹溪書名

丹溪麻仁丸 治同上兼治風秘

郁李仁 麻子仁各六兩 大黃二兩 山

藥 防風 枳殼七錢 檳榔五錢 羌活 木香

錢各五 蜜丸梧子大服七十九白湯下

平胃散 治脾有停滯痰飲痞膈宿食不消滿悶

瀉瀉 加橫痃善腐死

蒼朮五兩 厚樸製 陳皮各三兩 甘草三兩 右為末 每服五錢加薑三片棗一個煎入鹽一捻

安胎方

黃耆炙 杜仲薑汁炒 茯苓各一錢 黃芩一錢

白朮五兩 阿膠珠 甘草三錢 續斷八分 胸

中脹滿 加紫蘇陳皮各八分 下紅加艾葉地榆

各二錢 并多加阿膠引用糯米百粒酒二杯煎服

腹痛用 心火煎

保胎神佑 此方屢驗一有孕即合起每日服之

虎身滑胎 者自無事且易產

白茯苓 於朮一兩 米泔浸一 條芩一兩 酒

香附二兩 延胡一兩 紅花一兩 紙烘乾益

母草淨 真沒藥三錢 焙乾去油 右為末蜜丸

桐子大 每服七丸白滾水下若胎動一日可服三

五次切 不可多服一九至囑

杰按胎 前自是血熱動胎之故方中紅花行血延

胡走而 不守恐非保胎所宜况已有香附行氣氣

行血自 不滯何取動血之品宜去之為穩

雄按每 七丸故有奇效而無小損也毋庸裁減



又按神	百九乘能調經種子大有殊功
養胎磐石	丸
廣山藥	四兩 杜仲 去粗皮淨三兩 川續斷 二兩
炒 共	為末糯米糊為丸如菴豆大每服三錢米
湯送下	乃雖平常屢用屢驗乃吳人所授也凡胎
欲墮者	一服即保住慣小產者宜常服之或每月
服數次	至慣半產之月即服之無不保全
銀芎酒	治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍及胎羈下
血	
芎根	紋銀 酒一碗 如無芎之處用茅
草根	加水煎之
紫酒	妊娠腰痛如折
三熟料豆	二合 自酒一大碗煎至七分空心服
仙傳回急	保生丹 此方得之神效驗異常
大紅鳳	仙守 自鳳仙子 自死龜板
一兩麻	通精懷半 桃仁 川芎
油塗水	鳳仙子研末包好臨產時將餘藥
自歸身	為末配入臨盆時米飲調服二錢遲則
明分兩	交骨不開者即開難產者不過三服
服二錢	內木方去鳳仙子入益母膏二兩每日早
益一月	

米飲調服二錢則臨盆迅速胎元不足者勿服產後瘀血不淨變生病者或見枕痛於本方內加炒紅地三錢酒炒馬料豆二合共為末用童便半杯陳酒半盃調服二三服即愈唯鳳仙子只於臨盆時用仙傳迅津救命玉靈湯 治裂胞生及難產數日血水已乾產戶枯澀者垂危者

龍眼肉去核六兩生牛膝精一兩黃酒將龍眼肉煎濃汁沖入牛膝酒內服之去日即產親教教人無不奇驗

維按龍眼甘溫能補氣益胎產力勝參者宜先期剉取淨肉貯瓷碗內每肉一兩加入白沙糖一錢素體多人者併加西洋參片如糖之數羅以絲棉一層日日放飯鍋內蒸之蒸至百次者良謂之代參膏較生前者功百倍矣晚時開水淪之其汁盡出如遇難產即併牛膝酒共淪更覺簡便凡氣血不足別無痰滯便滑之病者不論男婦皆可蒸服殊勝他藥也