

永樂大典

卷一千三十七

永樂大典卷之一千三十七

二支

兒 小兒證治七十

小兒諸丹

巢元方病原丹候 風熱毒氣客於腠理熱毒搏於血氣蒸發於外其皮上熱而赤如丹之塗故謂之丹也若久不瘥即肌肉爛傷 赤黑丹候 丹病本是毒熱折於血氣蘊蒸色赤而復有冷氣乘之冷熱互交更相續療令色赤黑 屬火丹候 丹發初從體下起皆亦能移走謂之屬火丹也 飛火丹候 丹著兩臂及背腰謂之飛火丹也 遊火丹候 丹發初發尚黑急腫起兩臂及背如火炙者謂之遊火丹也 風火丹候 丹初發尚黑急腫起謂之風火丹也 崩火丹候 崩火丹之狀帶黑紀色謂之崩火丹也 留火丹之狀發一日一夜便成瘡如棗大正赤色謂之留火丹也 石火丹候 丹發從肺走肺之勢火丹也 石火丹候 丹發從肺走肺之勢火丹也

藥效微

小兒諸丹

聚成塊如蠅頭色如藍子繼久不散者謂之蠅頭丹經李開岐伯曰後生子難多被惡疾者毒二品者何分之峻伯曰陽解百半一十已上為毒一十已下為丹毒一也隨其大小分別之治之有毒生寒方萬無一差喻人間男女皆遭丹毒生寒此枉死者復何限哉良由信邪師之誣仍被恐之愚昧之人勿與下手請依方用之今出此圖形狀如後 伊火丹從兩脇起 神竈丹從肚起 采竈丹從踝起 胡吹竈丹從陰囊上起 天火丹從腹背過身起 天雷丹從頭項起 爆火丹從背甲起 胡漏竈丹從腰中起 煙竈丹從曲臂起 神氣丹從頸背上起 土竈丹從陰踝起 木黃丹赤豆色過身上起 黃火丹從耳起 野竈丹從背脊起 魁火丹從面上起土山砂新古許叔微齊濟本草十種丹毒變易萬不失一如經三日不治攻入臟腑則終不可救不可緩也太平聖惠方非輕治之或緩能終不救余不惜走方能逐一仔細辨認依此方法治之夫小兒諸丹者由風熱毒氣在於腠理熱毒搏於血氣發於外其皮上熱而赤如丹塗之狀故謂之丹也若人不敗則肌肉壞爛若毒氣入腹則殺人也今以一方同療之故號一切丹也丹癟熱毒氣客於腠理傳於血氣發於外皮上赤如丹當以白玉散金之聖濟方解論曰風熱發升古方謂

小兒得之最忌以其氣血未定肌膚柔脆無以勝御毒故是以諸丹不
問其發無定處俗又謂之濁流走經絡散發肌表如塗丹之赤有法可據
溴去毒氣不爾則丹毒入腹近心即死但初發於心頭者不可據爾李裡
兒或夜間蓋覆太暖日間燒火或婦母喜食燒炙物飲酒之類皆致兒病
與破出血為上策十全有服食升補湯皆可用也湯氏望嬰孩妙訣大抵
丹毒雖有多種病源一也皆風熱毒氣與血相隨有赤丹遍身辨者或女
年十五六而經脉未通多要發升疹皆由血盛而有風毒乘之張三太尉
女十五歲病此諸醫百藥俱試而不能偶中按變之甚切凡數次虛實候
未穩而不挫第二三日杳忽不已遂以故舊不可得而尋杜見之再三以
丈人參根飲一椀余遞看之乃無根而參空爲諸醫不察其本繼服以生
糾四時寒暑風寒一日而愈此非遺傳之法人知捕捉強毒擇知
其根是不獲此之根也君素不識人不知其根而不知其本故難治以生
糾其根而知其本故能速愈也

小兒丹毒發於頭面四肢之管之管便不可拔此小兒亦如大人之
遍身毒子癰瘍之毒在內急以磁片微刺紫血其病立愈如不愈者後用
冰膈散加大黃芒硝利三五行為妙次用拔毒散掃三五度必愈矣經曰
升煉赤痛火之色也相火主之凡小兒有赤痛暴瘡可先用牛黃通膈
丸瀉之後用陽起石散傅之則腫毒自消如不消可用鉛錠砭刺血出而
愈矣張子和儒門事親書黃氏小兒面赤瘡兩目不閉戴人以鉛錠刺輕
硬之除兩目之外亂刺數十錠出血三次乃愈此法人多不肯從必欲治
病不可謾曹世榮活幼心言經云赤紫丹毒皆心火內鬱而發赤如丹砂
故名丹毒心主血而火性熱血熱相搏陰滯於陽即發升毒心虛寒則瘡
心實熱則痛。自腹生出四肢者易治自四肢生於腹者難治先用百解散
來之次以當歸散加連翹荆芥水煎服度牛蒡湯加炒麻仁研碎同煎此
善燥痒但見出浮於遍體神昏不悅名陰濕毒證先以沖和散加南木香
水薑煎服次用當歸散確黃散然此二證不同赤白若入腹入骨多效為
害不可輕視如常自取因爾柄真子嬰童寶鑑小兒諸般丹毒狀丹火
初成似火燒天火升上浑身亦轉紅伊火升傍邊青黑色屬丹額上起根

永樂大典

卷一〇三七

苗臂并紋道燙丹毒。如帶紫紅者大刀割傷火燒時一日甚改變無時五色不齊。標家大頭連雙腋乳天竈內腫到陰房背并膝赤瘡丹病股內膚陰承竈招風。疹火丹。皮肉熱盛生風。疹俄然發遍身大升並赤斑毒亦驚人。經濟小兒保和方。書赤瘡丹毒燈軟毛敷風邪觸皮膚癰疹浮。膚中加熱毒赤腫轉難消。壯狀膚青出通身黑點。然心胸加壹氣定。死在昏朝。小兒赤瘡丹毒者辨受患之始觀虛實檢方對藥調理。若見膚青凸出壯狀如鼓。通身黑斑心胸加壹為死候也。丹毒小兒氣銷肌膚薄紅毒乘來便發作惡須化毒與消風毒散內消始安樂。驚火在胎時母受驚驚毒邪熱子傷神急微赤片微微起涼解肌膚始。

九章

本中治小兒諸熱丹毒。並以水鉢服生銀少許切膝帶黃火如細絲。清退千金要方治丹毒。大毒腫身紅熱百治不折。

寒藥石

上一錢

水三錢

鹽水

冬月炮角

水

右十五味㕮咀以水五升并竹蔗取三升。二合大毒內杏。指鼻汁。蜜大腹取二升。二合。三歲兒服二合。大者量加二升。

麻黃湯治小兒丹腫及風毒風疹

射干

獨活

射干

甘草

桂枝

甘草

石青

射干

甘草

射干

右八味㕮咀以水三升煮取一升。三歲兒分三服。日再

人方治小兒熱毒丹及風毒風疹

射干

獨活

射干

甘草

麻黃

射干

獨活

射干

甘草

射干

桂枝

射干

獨活

射干

甘草

射干

大黃湯治小兒數十種丹

射干

獨活

射干

甘草

大黃

射干

獨活

射干

甘草

升麻

射干

獨活

射干

甘草

升麻

射干

獨活

射干

甘草

芒硝

射干

獨活

射干

甘草

射干

右十三味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒消以沸溫湯中
適寒溫搗之乾則易之取瘥止

孫思邈千金翼方治小兒赤腫方

右橘梗大車絞取汁全之良。日十遍夜三四

治小兒赤腫方

棗根

升麻

大黃

白欃

甘草

一兩

黃連

地黃汁一升

梔子

黃耆

生地黃汁一升

附子

地黃各半兩

右九味切以水一斗四升煮取七升去滓內地黃汁煎三沸以故帛
雨重內湯中以搗膏上小炷即易之常令溫

澤蘭湯主丹參入腹發兒

澤蘭

芍藥

附子地黃各半兩

桑草

棗根

細辛

甘草各半兩

桑葉

右二味細剉。每得五升以水二斗煮取三五沸去滓和適下黃土金之外臺劉氏方療小兒油丹赤腫

又方 取桑參麪以醋和塗之差

救急療小兒赤丹一名丹瘤方

右取小豆搗末以鷄子白和空之以差爲度先以鍼次丹上然後傅之

古今錄驗療月內兒發丹方

升麻三分聖惠用一分

黃芩二分聖惠用一分

犀角三分聖惠用一分

甘草一分大黃聖惠用半分

紫胡二分聖惠用一分

大黃別度二分聖惠用一分

蘭葉切三分聖惠用一分

梔子仁八分聖惠用一分

右九味切以水一升二合煮取八合下竹瀝四合更煎取一升去滓
分二服甚妙

石膏三分聖惠用一分半

又方 捣藍汁全之

廣濟瘡小兒丹毒方

青藍十五分 竹燈一

右二味相和分為二三服大小量之 合至三合

簡安濟丹治小兒丹毒從臍中起方

伏龍肝 足半斤生薑十斤水研為末

右以厘滿水和如糊傅患處乾即再傅以差為度新漫水調亦得

修人秘首治小兒丹毒方

右用羌麻子五箇去皮研入麯一匙水調全之甚効

陳藏器治小兒丹毒方

右以淬鐵水一合飲之此打鐵器時堅鐵撞中水

治小兒丹毒寒熱腹內熱結方

右以精鹽單橘絞汁服之

治小兒丹毒方 用板花根苗搗絞汁服之

子母祕錄治小兒丹毒方

右用榔索一片水一斗煮取三升去滓搗丸如梧七八度

治癰瘍瘻瘍及小兒丹毒方 木榔搗傅上

治小兒丹毒方 用卿魚肉細切五合小豆搗屑三合和米杵如泥和水傅上

食療治小兒丹毒方 以鯉魚血塗之即差

姚和東治小兒丹毒破作瘡黃水出方

右焦炒令煙絕為細末油調傅之

太平聖惠方藍青散治小兒一切丹毒大赤腫身體壯熱如火已脹諸藥

不損宜服

藍青十四分 冬水石六分 石膏一兩 屏角屑一兩

柴胡一兩知母一兩 杏仁半兩湯浸去皮尖雙核炒微黃

黃芩一兩 桃子仁半兩 甘草半兩大微毒剝

赤芍藥三分 稜半角屑一兩

右件藥搗篩羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入竹燈
蜜生葛等汁共一合更煎三兩沸放湯不計時候量兒大小分減服之

藍葉一兩 黃芩一兩 桃子仁二分 川升麻一分半石膏一分半

柴胡去苗

川升麻一分半石膏一分半

甘草半分大微赤剗

右件藥搗蘆薈爲散。每服一錢以水一小盞煎至五分去滓下竹瀝半合更煎三兩沸放溫不計時候量兒大小分減服之。

升麻散治小兒一切牙癟牙壯熱煩渴

川升麻一分黃芩一分參門冬三分去心葛根三分剗
川大黃一分剗碎微炒川朴消三分

右件藥搗蘆薈爲散。每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之。

大黃散治小兒一切牙癟牙赤痛

川大黃半兩剗碎炒少川朴消三分
川升麻一分黃芩一分防風半兩去蘆頭
麻黃一分去根節

右件藥搗蘆薈爲散。每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之。

甘草散治小兒一切牙癟牙赤熱如火燒

川朴消三分白芍藥川芩消三分去根節
甘草一錢去心葛根三分白芍藥川芩消三分去根節

右件藥搗蘆薈爲散。每服一錢以竹瀝浸一夜明日晨出却入鑄中用臘月豬脂一斤於慢火上熬一食久。取熱以錦瀝去滓候冷成膏以夏令盛放取摩之。敷以膏如棗核大。以竹瀝調服之。

俱大草散治小兒一切牙癟

俱大草半兩紫葛半兩剗
白芍藥一錢

右件藥細研爲散。用冷水調塗之乾即再塗以蓋爲度

消石散治小兒一切牙癟身體熱

消石一兩乳香一分清石半兩

右件藥細研爲散。以雞子白調塗之

人方

太陰女精石一兩白礬一分

右件藥細研爲散。以水調塗之

人方以浮萍草研如泥傅之

以藍靛塗之。然即更塗

永樂大典

卷一〇三七

人方 取生地中土以水調金之
又方 取桑末以水煮農汁末之
又方 取地龍煮以水研如泥金之
治小兒一切丹及諸毒腫方

鼠粘草根去苗

右搗絞取汁每服半合量兒大小分減服
治小兒一切丹熱如火速服即損人宜用此方

馬齒莧

右搗絞取汁金之効

治小兒一切青方

芭蕉根

右搗絞取汁塗之

人方 取葫蘆搣取汁塗之
又方 以水苔搣搣傳之

人方 驱天蓬蟲傳之
人方 驅用藥酒以本傳之

本傳之

嬰孺方凡小兒病是此病發起最卒急者不治凡人養小之家當先察審
病源初起端倪尋方觀圖視病形象隨用別藥余少采之較差者甚衆故
復記之曰治丹毒天下極驗無及水中藥但有患熱毒丹腫百藥不差者
右以水藥不拘多少切爛搗熟傳于上厚三分許乾則易之至差則止

又治小兒丹方

升麻

柴胡

石膏

橘子仁各一分

大黃

生葛各一分

子芩

犀角屑

杏仁

芍藥各四分

甘草一錢

竹蔗一錢

右切以水三升并置一升為一服此是一歲兒服量之

又治小兒青毒搗方

升麻

岸角屑

白飲

黃芩

槐子各二兩

藍葉四片

石膏四合研

生地黃四分

右以五升水竹蔗二升煮二升去滓沾帛搗之乾即易

又方

恭菜四升 政五分
右杵以水和如泥封之

芒硝五分

又方 以緒槽下泥傅之立已

又方 黃龍湯服三合升全之

又方 取生麻油塗之

又治小兒惡毒丹赤及風疹方

又方 右取甘草杵傅之

又方 以小豆屑五合生麻油和如泥塗之

又方 杵蔓菁根傅之

又方 取婦人月水本洗傅毒處不洗中央散廣去

又方 以白鶴血傅之乾即易之已上十一方或加新膏

錢已小兒方白玉散

白土一分 寒水石半兩

右末之用未驗或新水調塗

聖濟總錄藍青湯治小兒丹毒赤腫壯熱百治不虛者

藍青二兩 滚水石片

石青研

山梔子仁各一兩

華胡荽苗

犀角粉

黃芩去黑心

甘草去黑心

柏仁諸綠去皮去雙仁

桑苦葉

羚羊角粉

右一十三味燒篩每一錢已水半盞煎至四分下蜜半錢竹瀝少許再煎至三分去滓空心日晚分溫二服更量大小加減

黃芩湯治小兒丹毒遍身

黃芩去黑心 麻黃去根而根尤去苗上 升麻各一分

大黃剉炒 防風去叉各半兩

右六味燒篩每一錢已水七分煎至四分下朴消木半錢已去滓空心分溫二服再服更量兒大小加減

黃耆湯治小兒丹毒

黃耆剉 菟葵子炒去黃芩去黑心 大黃剉倍

甘草去黑心各半兩

右五味燒篩每一錢已水七分煎至四分下朴消木半錢已去滓食前分溫二服更量兒大小加減

麻黃散治小兒丹若入腹及下部陰卵百藥不差

麻黃去根節升麻各半兩消石研一兩

右三味燒篩為散每服半錢已井華水調下空心日晚各一

甘草散治小兒牙癟方

甘草一錢

水煎

右二味先取油麻去皮研細候取一升調甘草末半錢日服內治小兒丹數十種大黃搗湯方

大黃

甘草一錢

水煎

白芷

獨活一錢

水煎

芒消

沉香一錢

水煎

升麻

木香一錢

水煎

芒硝

木蘭皮一錢

水煎

右一十二味羌搗節杵勻每用一兩以水五升煎至四升去滓以絲二片薑之更互溫搗丹上令即易日五七度即差

吳藍湯搗治小兒發牙癟熱痛

吳藍

大黃一錢

水煎

榆皮

槐白皮一錢

水煎

右五味細剉每用三兩以水五升煎至四升去滓入朴消半兩攪烏

升麻

桑根白皮一錢

水煎

生藥

生藥一錢

水煎

右二味都用水七升煎至四升去滓溫洗丹上令即再煖日三五度即差

即差

鰣魚金治牙癟偏身癆

生鰣魚

麻油一兩

水煎

右二味搗魚全細入油研勻金丹上日三五度即差

鱗增散治丹行皮中久廣者名丹火也入腹侵人

乾鱗增

水煎

右一味研末油調金之以差為度

藍青散治小兒丹毒赤腫壯熱百腫不差者

藍青散

竹蔗各一斤

水煎

蜜一斤

生葛根汁一升

水煎

知母一兩

寒水石研內瓦石膏研

水煎

杏仁一錢

山梔子仁一錢

水煎

甘草一錢

赤芍藥一錢

水煎

右十五味除研藥并汁外咬咀以水五升并竹蔗先煎去滓取三

升次內杏仁葛汁及蜜微大煎成煎每服半合至一合水飲化下日三升麻黃芩湯治小兒月內發丹

升麻

黃芩

去黑心

犀角

大黃

柴胡

山梔子

甘草大剉一錢各半兩

剉炒

藍葉

石膏三分

甘草

大剉一錢

分

切二錢

分

右九味鹿橘研末二錢匕水一盞煎至半盞去滓食後分溫二服更量大小加減

張氏雜本方治丹癰 搗細豆豉水和傅之

又方 桃子去皮爲末水調塗之

又方 生地黃搗爛取汁塗之

又方

大黃木

芒消

等分

右合研令勻水調塗之

劉氏家傳小兒發丹方

當歸

生地黃各一錢

沙苑子

白芷子半錢治小兒丹癰方

莊氏家傳治小兒丹癰方

右半夏三錢老生皮細研醋調以雞硝傅隨手消之

吉氏家傳治小兒丹瘡隨亦方

赤小豆

蛤粉

右等分爲末用圓姜十個煎

右木浮灰打鐵者細羅安調之隨手差

又方銳骨遍身熱眼前聖惠六味升麻散後更宜金比

滑石

乳頭香

右以雞子清調塗之

又方治小兒丹毒癰疹方

右天麻末每服半錢或丈大婦人每服二錢紅酒調下之

鄭端友家傳少獨效散治小兒諸瘡毒赤流腫

右以柏枝研細金立效又調白礬汁頻拭之即消

又方 以芒硝泡湯拭之亦效

永樂大典

卷一〇三七

黃皮散治小兒遍身火瘡并赤道

右以黃皮山楂子等分爲末。水調。即瘡人方。兼宜大黃酒末。荷蜜水調。塗入馬齒莧研全人瘡。又藍靛金之井藍青十粒之人。半錢水少許飲之。并抹身上。又黃芩水調亦效。

薑藥散治小兒火瘡并一切風疹赤斑

生薑五兩切片。

白藥二兩半同上調少時日乾不光大

右爲末。土薑自然汁調鵝毛拂之。又方。牽牛末。薄荷蜜水調下食後。大便利是效。

夏子益術丸十全方。治小兒丹毒腫痛如大

大黃

朴消

右各等分爲細末。醋調塗之。效。

丹腫 方湯。八望嬰孩妙訣。丹毒侵乃熱毒之氣極。與血相搏而風乘之。故赤腫及遊走遍體者。又名赤遊風。入腹腎則殺人也。宜服防已散。

漢防已半兩

朴消一分

犀角一分

黃芩一分

雙耆

川升麻

十黃散追丹毒

金精散

甘草大

桔梗去梗

天花粉

馬粉

桑白皮

黃菊花

丹參

淋洗方

右件等分爲末。每服一錢。薄荷湯入蜜調下。

人浴方

右等分加荆芥煎湯浴患處。

防風

黃芩根四兩

丹參二兩

乾菊花一兩

白玉散治赤斑丹腫

白玉一兩

寒水石二兩

右木末醋調傅上患處。或痛至外有破處。只用水調。

人方 行在潘御幹傳尤妙。於前方只一畫痕消盡。又用花棗石散生薑。生薄荷自然汁。鵝毛刷上患處。

又方生料四物湯治血熱生瘡遍身腫癰及脾胃常煩不禁大黃等分
故宜服之

生乾地黃

赤芍藥

川芎

當歸

本方加

防風各等分

黃芩止汗

大黃等分

火灼瘡一月先毒此候乃血熱肌熱而人傷熱其狀似火先起痘而火醫成瘡宜服前方牛黃散仍用此傳

黃連

苦參等分

右末和輕粉和移患處

洗方

棗葉無葉用根菊花

右二件煎湯用猪膽水入湯和浴次用前藥乾炒之仍服牛黃散無不瘡者

十便良方治小兒諸般丹毒

大樹方

右用赤小豆陳年細末以新汲井水調糊先拂上大妙

消癰散治小兒一切青癰身體熱

消石一兩

乳香一分

右件藥細研為散以雞子白調全之

又方 玄地龍黃以水研如泥全之

又方治小兒一切丹熱如火速換即損人宜用此方

右以馬齒莧擣絞取汁全之效

又方治小兒一切丹以芭蕉根擣絞取汁全之

又方 取蘋蘿擣絞取汁全之

治小兒火丹每肿方杵黃芩末水調傳之

牛膝一兩

甘草半兩上用

右件藥細剉以水一大盞煎至五分去滓調伏龍肝末全之效

又方

大黃一兩土用赤小豆半升小黃豆

甘草半兩上用

右件藥搗羅為末以雞子清潤全之輕則易之

又方

以膏汁全之

又方 用白礬一兩以水煮冷浸得所洗之

張果醫說治小兒熱毒遊脰

右破草鞋人亂放燒灰醋和傅

楊仁齋直指方治熱毒遊脰

北梗

川芎

赤芍藥

獨活

柴胡

天花粉

乾葛

川升麻

右剉散每錢三片井水煎服
演山省翁活幼口談升毒至效散治小兒一切丹毒及龍帶發作尤狠
毒飲次日傅之

黃芩一錢重 朴消一錢重 赤小豆四錢齊者為木半合

右研令勻井水調以雞矢刷立效

陳自明外科精義治小兒丹毒方

右將木鳖子研如泥淡酒調傅之。一日三五次便効。

寶慶方治小兒丹毒膿瘍如大

大黃

朴消

本草綱目卷之三

右等分馬木水調敷脰處

又方 土峰棗為末入麝香少許蜜調塗之水調與嗽尤妙

田氏保嬰集月裏土赤遊脫膚赤如丹塗者先用牛黃散托裏噴後用藍葉散塗外乳母服清涼飲子三大劑

劉止齋保嬰集名方白玉散治小兒丹毒赤腫

白玉五味

寒水石一兩

右為細木木醋或新水調塗搽赤腫處即消如乾上用水雞翎津二

拔毒膏治小兒丹毒赤腫及治頰腫痛

黃檗一兩

寒水石一兩 石膏半兩

甘草一錢半

右為細木醋調成膏貼赤腫處或新水調塗亦可

院本經脈丸治小兒風丹疹寒調赤土殊入酒一二滴服之研搽疼止

治小兒丹毒服裏托散消毒飲外用白芨白蔹研為細末搽無病肉上而

載之令不得過却用紫浮萍爛研傅瘡上萬不失一

小兒丹毒膏瘡項較陰腫等雜方 論曰凡患諸丹毒腫毒必須先服升

麻飲之類導氣藥以散其毒方可用藥調塗不然恐毒氣入腹則致

黃芩半兩

升麻飲治一切升過身壯熱煩渴

人也 升麻

黃芩

大黃各一錢
麥門冬六錢

葛根各一錢
朴消一錢研

右葛根細末和蜜熱水調下半錢
治急紋丹毒有白扁豆末水調金若入腹心者宜以慎大草取汁一盞服

乾即末之水調服

藍青散治一切丹毒赤腫才熱如火已服諸藥不退由風熱毒氣在於腠理熱毒傳於血脈發於外其皮上熱而赤如丹塗之狀故謂之丹若久不治則肌肉壞爛若毒氣入腹則殺人也今以一方同療之

藍青

知母

甘草

升麻

杏仁去皮尖各半兩
寒水石

朱胡

右等分爲末水煎服

人方

人方 治大人小兒經蛇丹初發時使用蚯蚓連皮土槿研爛金即金

人方 大黃爲末搗爛烏龜取汁調金已成丹者亦治

人方 蒸葉燒灰雞子清和敷金之

人方 桃仁湯浸去皮搗搗金之清油調白礬末亦妙

治小兒大人丹毒入腹即殺人繞後使用則可
右水苔生地黃蘚茱萸薤浮萍慎火草大黃梔子但將一味研末

水調傅之皆効取使效之

治丹癰方

右大黃朴硝大土蜂窠三味爲末用瓦罐定真赤處將丹瘡利
金出惡血然後用井水調金

人方

白堦乾葛等分爲末用半兩水三碗煎透日洗
蓬蘽鋪實燒竹筒方治小兒大人熱丹瘡成片可取綠芥草葉將丹瘡利

破即愈

治小兒丹癰

綿羊腦子生用

朴消

永樂大典

卷一〇三七

右二味調勻貼於瘡上。立効。

曹世榮治初心瘡黃芩四物湯理諸瘡丹毒赤瘡燥瘡

黃芩一兩

當歸酒洗

生乾地黃
赤芍藥
川芎四味各半兩
何首烏士蘆皮草烏地黃

玄參三味各二錢半
甘草六錢
右件㕮咀。每服二錢水一盞。煎至七分。無時溫服。

化骨湯解利丹毒遍身燥癬發熱煩渴

川獨活
射干根干

麻黃去根節
石膏木
薄桂去皮皮梢木

甘草一本五錢

黃芩

右件㕮咀。每服二錢水一盞煎七分。無時溫服。
赤葛散治因血熱與風熱相搏。遍身丹毒燥癬日久不消

赤葛二兩
甘草三錢

右件㕮咀。每服二錢。無灰酒一盞煎至七分。無時溫服。不飲酒者止

荆芥穗一盞。入酒一大匙服。

九連丸血妄行及遍身癰瘡
牛蒡子六兩微炒五研碎
荆芥穗二兩
甘草一兩
右為龜木。每服二錢水一盞煎七分。無時溫服。

危亦林侍効方平血飲治風熱精毒聚成瘻於頭面手足熱者如胭脂色
其熱如火。輕者子瘡不可忍。加紫草煎與犀角消毒飲相間服。赤瘡大
疘紫萍痔並治。壯熱煩渴甚加黃芩麥門冬去心朴消各半錢。白芷各半錢
內托散

紅內消
當歸
羌活

黃芩
荆芥穗二兩
甘草一兩
右為木。每服二錢。桔梗前湯調或土地黃亦可。

敗毒散治瘧毒初發如白梅樣遊走遍體燥熱腹脹焦渴

前胡一两
柴胡一两
羌活

桔梗
枳殼
甘草各半两
人參

右㕮咀。每服二錢水一盞。生薑二片。紫草少許。煎溫服。
通治平血飲與敗毒散合和生薑薄荷。連去足矣。防風去蘆細切煎湯。

加天花粉少許

人方角癰遊走不定，愀然赤腫疼痛，用藥角歸丹上為妙。後取碎

寒水石

石膏

黃連

黃柏

右爲末水調制

人方 青黛土末爲末井水調入蜜敷角亦可

又方 黃丹不拘多少磨刀水調制

又方 毒瘤腫瘍如火用大黃朴消爲末調金腫丸治

洗方 用防風酸半草赤豆當心土煎水洗

人方洗角後用小鷺尾壓杵大鷺尾鎮驚散

棋針法取腫用火燒數條以青苔蓋覆或紙亦可，去血即消未消再用

瘡毒滿身偏黑入腹入陰難治

衛生至寶牛黃散治五種大毒

鬱金

甘草

桔梗

天花粉

葛粉

冬瓜子

右爲末，每服一錢，薄荷湯下，入蜜少許。

未當時大方銀耳散治小兒赤腫丹毒，緩不可解。

硝石

大黃

朱立等分

右爲細末，每服用雞子清調傅浮處，如惡物所傷，更有點子，加入腦

麝硝砂少許同貼

黃丹散

白礬

龍骨

黃丹

麝香

右爲細末，以錦紋子拭耳內，令淨後用紙糊于頭，兼入耳內

塗去治諸丹毒，燒僵即殺人，內蟲算，持細紋子傅之。

計法治丹毒燒僵即殺人，內蟲算，持細紋子傅之。

大赤足娛

冰片

白礬

膽礬

麝香

冰片

右爲細末，每用一勺半許，以針撥破唇口，其藥在內，以醋搗糊成

花子貼定日一換，好肉生膜，血惡肉盡上即止，兼

眼丹 方此之某驗方法治小兒眼赤腫，有十數醫者名眼丹，

方遲效之必能損目。

右全患人仰卧以紅繩繩直而刀刃却支在老人眼上以三枚大紗人各拈艾炷一枚在剪上灸之仍一人作云不灸病人只灸耳如此三遍候煙斷將此剪刀棄之毫後或無人作處路上渴宿收之神効五色丹論裏小方病有五色丹發而變改無常或青黃白黑赤此由蟲毒之熱有盛有衰或冷或熱故發為五色丹也

方孫思邈千金要方治小兒五色丹

右摘蘋蕪葉傳之

又方 以猪槽下爛泥傳之乾則易集驗治卒赤黑丹

又方 服黃龍湯二合并傳患上

太平聖惠方治小兒五色丹

川大黃

黃芩

川芎消

梔子仁

右件藥搗細羅為散以水調塗之主効

治小兒五色丹偏才宜用洗浴桑根湯

桑根根四兩

丹參三兩

禹梔一兩半

甘草一兩半

右件藥以水五升煎至三升去滓者令熱避風

洗浴桑根湯

入方

苦根葉一斤細剉

赤小豆一合

右件藥以水五升煎至三升去滓者令熱避風洗浴

治小兒丹發恐毒五色無常宜用此方

青棗迷

青刺者

右摘碎以水煮洗之

又方 用赤小豆末以雞子白和如丸搗

治小兒五色丹偏身熱如火燒速置即指人正用此方

薑臺子一兩細研

右以酒一小盃研取汁塗之

孔夫家傳治小兒五色丹方

右用小柴胡湯如法煎飲清汁灌傳丹上良效

伊火丹論裏小方原伊火丹候丹發於膀胱青黑色謂之伊火丹

方聖濟經錄治小兒伊火丹從兩脅下起青黑色羊脂塗方

蠟鐵下槽中鐵屎搗研烏木半兩

羊脂一兩

猪糞丸 反一兩

右三味研勻如糊塗之以瘡為度
癰頭經伊火丹從兩脇起

右用猪糞燒灰并鐵槽中泥拌調塗之日三載即効
燥火丹 論巢元方高源燥火丹候丹發於臂背較道者謂之燥火丹也
方嬰孺方治燥火丹發從背起或走兩足赤如火
景天草十兩 真珠一分

右和杵爲泥封丹上

又方治丹入腹及下至卵者不治

麻黃炒 升麻各三分

硝石四分

右爲末以井華水服方寸匕日三一 方用大黃半分
茱萸大丹 論巢元方病源丹發初從背起偏身如細綱謂之茱萸大丹也
名聖濟總錄台小兒茱萸丹初從背起偏身如綱一宿成瘡者雞子全

雞子白 赤小豆大

右二味和調如糊塗之以瘡為度一方云治水丹

癰丹 論巢元方病源赤丹係此謂丹之純赤色者則大熱毒搏血氣所

馬也太平聖惠方夫小兒赤丹者由風寒之害故使赤也初發疼起大如
連錢小者如麻豆內生土末外如雞冠故謂之赤丹亦名茱萸丹也
方孫思邈千金要方治小兒赤丹

又方治小兒赤丹斑駁

右唾和胡粉從外向內傅之

又方 咬鐵朱以猪脂傅之

兵部手集治孩子赤丹不止

右以上番黃米粉雞子白和傅之黃米粉黃米粉六

又方 以蕎麥麪醋和傅之差

又方 以胡荽汁傅之瘧譚氏方同

太平聖惠方升麻膏治小兒赤丹毒腫

川升麻

白飲

漏蘆

川芒消各一兩

黃芩

枳殼

連翹

永樂大典

卷一〇三七

梔子仁

蒴藋

右件藥細剗以豬脂一斤半入於鍋中以慢火煎諸藥八赤色去半

放冷以楚合盛旋取盒之

治小兒面身手足赤升或癬或腫起不速療之即殺人宜用此方

羖羊角屑八兩

右以水五升煎至一升絹濾去滓入銚子猪脂五兩和令勿停之

又方 以葛勒蔓輕磨破以醋研阿梨勒塗之妙

嬰孺方治小兒赤升斑駁

右以蓼子鹽湯洗了按蓼金之

人方 半前子爲末粉之

又方 蓼沙以水二升煮汁洗之已上二方載於新書

伏湏腎分炒過升麻膏治赤升初發肉色如木色如雞冠又名茱萸丹

川升麻

白欽

漏蘆

川芒消各一錢

右件藥細剗以猪脂半斤入鍋中用慢火煎諸藥全赤色去滓放冷

然後分次服每服少許塗患處

聖濟總錄治小兒赤升色赤亦爲熱毒搏熱氣血烏蘆莖汁方

烏蘆莖

梔子仁

漏蘆

川芒消各一錢

右一味調搗絞取汁三合空心溫服一合午時再服即差

莊氏家傳水輪散治小兒丹毒如火燒紅赤

已上二方載於新書

右赤脚蜈蚣尾上慢火焙乾爲末入石脂水研成水調

塗即止

李氏的大方蜜傳散治小兒身上發赤五色

右搗碎爲細末蜜調傅之隨手消

白丹 論第七方病源白丹候初是熱毒挾風熱搏於血續蒸發亦

也熱輕而挾風多者則其色微白也太平聖惠方論曰夫小兒白丹者由

挾風冷之氣故使色白也初發痛庠痏虛腫如吹脣起不痛不赤而白色也

方孫思邈十金要方治小兒白丹

右燒豬屎灰雞子白和傅之

大千金丸治小兒白丹

酸母草

五葉草

公私制

右件藥搗絞取汁塗之

人方 携川大黃末以馬齒莧搗絞取汁塗之

人方 香豉一合少食

伏龍肝二兩

右件藥搗爲末以生油調塗之

人方 以蘭香葉搗爛塗之

人方 以蓼葉搗爛塗之

人方 以梁上塵以醋和塗之

人方 取鹿角燒灰細研以豬脂和塗之

人方 取猪糞燒灰細研以雞子白調塗之

叟孺方五香湯治小兒風熱毒腫色白或乃惡核瘰癧附骨癰疽節解下

丹白色遍走遍身白癰疹

方載初編新言

本香

薰陸香

海藻各一分

麝香半兩

木黃八分

竹瀝三分

布紋參四升下瀝取一升二合溫服之

此方未小兒風熱毒腫發於頭面今色黑也初

方太平聖惠方治癩瘍小兒風丹

川升麻一兩

湯蘆一兩

川柴消二兩

黃芩二兩

槐子仁一兩 烘擦半兩

右件藥細剉和勻每用三兩以水五升煎至三升去滓微溫以輕帛

旋蘸搗病上以消為度

人方 凤化石炭二兩

屋四角茅草三兩燒灰

人方 茄蔚子

蛇街草

護大草各二兩

右件藥搗令爛以雞子白調塗之

人方 以銀楮杓子炙令熟熨之

孫洪賢方炒過桂散治丹黑色痒痛腫起

川升麻二兩

漏蘆二兩

川芒消二兩

黃芩二兩

右件搗爲末每用兩匙頭以水三盞煎至兩盞去滓微熱以輕帛

梔子仁

兩

拔癰搘瘡上以消為度

天富丹 方頸頭經天富丹從頭頸起

右用陰乾蕙赤木拌脂塗入用膏下土雞子白調塗之
大火丹 論巢元方病源大火丹候丹發竟身體斑赤如火之燒故謂之
大火丹也太平聖惠方大小兒丹發肉中有赤如丹赤已大者如手割者
偏身赤痒拔瘡天火丹也

方頸頭經天火丹從腹背遍身起

右用樟皮白朮和生油調塗之亦用赤石脂羊脂調塗之此即所言
孫思邈千金要方治小兒天火丹肉中有赤如丹色大者如手甚者遍身
或痛或痒或腫

右用赤小豆二升木之難子白和如薄泥傅之數則易一切丹並用此
玄青便差

人方 用生羊脂塗之

太平聖惠方治小兒天火丹候丹發竟身無瘡已宜服此方

又方 虎脂

黃丹

右件藥研爲膏塗之即差

又方 桑根白皮

二兩丹參一兩

甘菊花一兩十華草

右件藥細剉和勻每用二兩以水三升煎至二升去滓省冷煖避風

浴兒

又方 以鬼臼搗絞取汁赤處塗之

又方 搗茇子汁塗之

又方 取小兒埋肥衣瓶子中水一二合時時與兒服及塗身上有赤處

許叔微濟本草方天火丹從背起赤點用桑白皮末羊脂調塗

大火丹 論巢元方治小兒天火丹候發兩脣及腋下體上謂之殃火丹也

孫思邈千金要方治小兒天火丹毒著兩脣及腋下者

伏龍肝爲末油和傅之乾則易若入腹及陰以換火草收十撮之

太平聖惠方治小兒殃火丹生於脣腋下

川朴消

右細研爲散每服以竹瀝調下半錢量兒大小加減服之

人方 以浮萍草搗絞取汁時時與兒服之

張渙醫方妙選拔毒散治升發生於兩脇及腋下及名喚火丹

川朴消一兩 桔子仁半兩

右件搗羅為細末每用半錢好醋調塗患處次用

山梔子膏

桔子仁四兩

右件用生鰣魚半斤同梔子搗如泥每用少許看升發處以醋化塗患處
神氣丹 方顧顛經神氣丹從頭背土起

右用枯牛骨燒灰羊脂調塗之吳少川新書

聖濟總錄治小兒神氣丹從項起大骨灰塗方

大枯骨

右一味為末以青草脂調如糊塗之日三五次

神火丹 論眾丸方病源神火丹惟丹從兩鬚不過一日便赤黑謂之神
火丹也

方太平聖惠方治小兒神火丹

景天花

右擣絞取汁先微搗丹上後塗之以差為度

人方 以鰣魚半斤搗如泥金丹上唯敷塗為良

又方 以桔子仁搗末用醋和塗之

神龜丹 方聖濟總錄治小兒神龜丹起而頰傍不出一日變為赤黑色

慎大草汁塗方

慎火草

右一味絞汁先以刀子微搗丹上令血出塗乘以差為度

顧頭經神龜丹從肚起

右用土蜂窠杏仁膩粉土油調塗立差吳少川新書

鬼火丹 論眾丸方病源鬼火丹候丹發兩臂亦起如李子及從面上起或生塗傳方

成鹽一分

附子一枚

右二味燒過研細用雄雞血調塗金丹上日五倘以差為度

太平聖惠方治小兒鬼火丹

景天草五兩 蛇術草三兩

永樂大典

卷一〇三七

嬰孩方鬼火子初發兩臂赤如小豆及大豆治之方

右用苦桃皮煮汁浴之

入方 用虎脂隨病塗之 矣幼幼新方

張洪醫方炒鹽或鹽散治發兩臂赤起如李子乃名鬼火丹

戎鹽一兩

附子一枚

雄黃半兩

研水服

野火丹 論巢元方病源野火丹破丹發赤斑斑如梅子竟背腹謂之野火丹也

方林思邈千金要方治小兒野火丹病遍身皆赤者

右用油塗之 矣幼幼新方

聖濟總錄治小兒野火丹發偏身班如梅李狀雄黃塗方

雄黃研

戎鹽研各一兩

右二味以雄黃白調塗方上日三五次以瘥為度

太平聖惠方治小兒野火丹

雄黃半兩

戎鹽半兩

右仲景藥細研爲散以雄黃白調敷散塗之以瘥為度

青竹葉二兩燒灰

又方 右仲景藥細研爲散以雄黃白和塗之

快火草一兩

許叔微普濟本事方野火丹從兩脚赤腫用乳香木半脂調塗

骨大丹 論巢元方病源骨大丹便丹發初在臂起正赤若黑謂之骨火丹也

方林思邈千金要方治小兒骨火丹其瘡見骨

右持大小蒜厚封之看足踝者是

嬰孺方治小兒骨大丹刺腫上入三分

右以大黃木牛膽汁和塗之 矣幼幼新方

家火丹 論巢元方病源家火丹候丹初發者兩腋下兩脅上名之曰家火丹也

方聖濟總錄治小兒家火丹發如大指日長一寸偏者兩脅傍兩頰上拌木灰塗方

梓木白皮

辰龍

右一味燒灰研末以雞子白調如糊塗之以差為度
嬰孺方治小兒大人升攻候入腹大便不利

消石

漱水石各一兩

又方 右研入銅器中熬令乾取研服方寸匕末差加之

又方

烏頭一分

赤石脂三分

火丹 論巢元方高涼火丹候火丹之狀往往如傷赤者身而日斬大者謂之火丹也。丹火候升火之狀發赤如火之燒須臾熛聚起是也。望六火丹者往往如傷赤者身體不從傷火而得名赤如日出時以從其處人名曰丹。宜同用千金漏蘆湯治小兒熱毒癰疽赤白木丹瘡毒不虛一

生兒麻丹

方孫思邈千金要方治小兒火丹赤如朱走皮中

右以醋和豉研傅之

又方

以鯉魚血傅之良

又方 捣薤子傅之良

又方 以猪屎水和鍛取汁服少許良

仙人水

治火丹瘡方

養髮

黃連各一錢

又方 右同研令細塗之即差切不得入油及鹽半分新書

治小兒火丹熱如火繞腰即損人

右杵馬齒莧傅之日二

聖濟總錄治小兒火丹熱如火繞腰須急絞之養臺塗方
養臺茶

又治火丹瘡和汁塗傅之以差為度

右一味爛搗和汁塗傅方

右於兒男左女右大拇指面螺文上鍼挑有筋斷之即差

嬰孺方小兒火丹走皮中赤者

右槐子末以醋和傅之

又治小兒火丹方

右取不犯水羊脂向火上炙傅丹上以白粉粉之大便無忌

方與和脉序

未當時大方小豆散治火丹述腰大人亦可

赤小豆爲細末雞卵清傳之乾即易

螢火丹 論巢元方病源螢火丹候丹發如灼在脣下正亦初從脰起而長上痛是螢火丹也

方顙頭經治螢火丹方

右用快火草搗汁盦之生火以燭其火勿加新者

太平聖急方治小兒螢火丹

赤小豆一合 消石半兩

寒水石一分

右件藥搗細羅爲散每服以冷水調下半錢日三服量兒大小加減

服之

又方 窪中黃土一合生油二合

右件藥研和如泥時用塗之以差爲度若痛上陰不治即殺人

嬰孩方澤蘭湯治螢火丹走癰瘍入腹殺人

澤蘭

芍各三分

附子炮

莽草

幕本

細辛

茵芋各二分

畫

朱田火丹 論巢元方病源朱田火丹傷背先發背起癰者一日一夜而成瘡謂之朱田火丹也

方顙頭經朱田火丹赤豆色搗身上起

右用快火草搗汁和酒調盦之

孫思邈千金要方治小兒朱田火丹病一日一夜即成瘡先從背起漸至

偏身如棗大正赤色者

右濃煮棗根汁洗之已成瘡者赤小豆末傳之凡方中用雞子者皆取壳破者用之未破者無力

太平聖急方治小兒朱田火丹

右以藍凝盦之

又方 以雞子白盦之 胡吹靄丹 方顙頭經胡吹靄丹從陰囊上起

右用水茄窠下泥和姜酒盦之

許叔微普濟本事方胡吹丹從腰上起黃腫用檳榔爲末米醋調盦

聖濟經錄治小兒胡吹靄丹從陰下起泥醋盦方

右用磨刀水棚下泥和醋調青盦之乾即更盦以瘥為度

胡漏高升

方頭經胡漏高升從臍中起

許叔微

普濟本事方胡漏升從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調金

土竈升

方頭經土竈升從陰踝起

聖濟總錄治小兒地竈升從陰下起入踝骨上廢搏塗方

廢搏塗

屋四角茅姑水各二兩

右二味和研勻細以新汲水調如糊金丹乾即易之以廬為度

天竈火丹

論巢元方病源天竈火丹候發兩脣裏死門正赤及陰頭赤

體血出謂之天竈火丹也

方孫思邈千金要方治小兒天竈火丹病健脾開起小兒木滿百日犯行

路竈君若熱下流令陰頭赤體血出

右伏龍肝搗末雞子白和傅之日三良

人方

卿魚肉水五分赤小豆末三合

太平聖惠方治小兒天竈火丹

右二味和搗少水和傅之良

人方

右件藥等分細研爲末以雞子白調查

人方

右件藥相和搗如膏摩之擦再摩之

人方

細辛一兩

桔梗末一合

景天草三兩

人方

右件藥搗如泥金丹上差

人方

伏龍肝 赤小豆末

人方

右件藥等分細研爲末以雞子白調查

人方

以蠶沙一升水煮去滓洗之

人方

以鐵落木屑陽和如膏金之

聖濟總錄治小兒天竈火丹錢尻間正赤流陰頭赤體血出葱薑尾塗方

葱五莖和蜜以研赤小豆末

龜門上灰研各一合

右四味合研勻細以青羊脂三兩調勻塗之以差爲度

豐孺方治天竈升初發者脚胫間

細辛二兩

白生米二合 景天二兩

永樂大典

卷一〇三七

右用杵如泥傅之

又方 茄根切二升以水一升煮一沸去滓分之日三不差更服

又方 取生浮萍杵為泥傅之或狀如童稚多色良方

張氏醫方妙選赤豆散治丹發兩膀裏肩間正赤至陰處乃名天龜大

丹與人子聖丸方

許叔微普濟本事方五天龜丹從兩臂赤腫黃色用柳木燒灰水調塗

廢瘡火丹

論葉氏方有原廢瘡火丹候發從足趺起正赤者謂之廢瘡大

火丹也

方額頭經廢瘡火丹從曲臂起

右用屋四角茅草灰雜子白調查之本山山野新書

孫思邈千金要方治小兒廢瘡火丹初從足趺起正赤色者

右以棗根煮汁沐浴五六度

太平聖惠方治小兒廢瘡火丹

寒水石半两 棕草 半两 消石半两

右件藥杵細羅為散每服以新汲水調下半錢。日三服量兒大小加減服之

又方

赤小豆末一两半角一两研末

又方

右件藥細研為散用雞子白調如泥塗

又方

五加葉根五两研末

嬰孺方

治廢瘡丹初起足趺正赤

右桑根煮汁半盞

外以竹筒盛

尿瘡火丹論葉氏方有原尿瘡火丹候丹發膝上從兩股起及膝間走

入陰頭謂之尿瘡火丹也

方額頭經尿瘡丹從踝起

右用屋四角茅草灰使雞子白調查之本山山野新書

孫思邈千金要方治小兒尿瘡火丹初從兩股起及膝間走入陰頭皆赤色者

右以水二升桑皮切二升煮取汁浴之良。又方右用桑根皮火丹

張氏醫方妙選六根湯治丹發膝上從兩股至膝間走入陰處乃名尿瘡

火丹

桑根白皮四兩 李子根四兩

右件細剗每用三匙頭以水兩碗煎至一椀去滓看冷熱避風處淋

患處

野窩丹 方顧顙經野窩丹從背脊起

右用桑香芽蒴葉赤小豆木金之立差 本細切新書

聖濟總錄治小兒野窩丹從膝起脊葉塗方

乾薺葉木 香薷末 赤小豆木各半兩
生薺葉莖一枝細剗

大孕丹 方長沙腎者鄭愈傳治小兒大孕丹諸般腫毒聖金散

凌霄花 萬州花各一兩 苦根半兩切焙乾用

右一處搗研以酒和蜜同調服少許塗於丹上立消散 本細切新書

爾朱丹 方娶孺方治小兒爾朱丹及一切丹粉散

杜鵑根赤 馬頭蛇 麻黃根各三分吳茱二分

石青一分 麻香半分

右以六味為末以東來粉二升令和馬散火中少炒須冷研袋盛以

病上然後以粉之大驗 本細切新書

私窩丹 方聖濟總錄治小兒私窩丹從背上起窩土金

窟中黃土研

粉粉過身大便大丹治爾珠有瘡汁以粉之無不立愈以麻油金

病上然後以粉之大驗 本細切新書

人方治小兒煙火丹從背上起或走兩臂足赤如火真珠塗

吳茱細研如粉一兩 懷大草研成汁華人服之

飛窩丹 方聖濟總錄治小兒飛窩丹從項起鐵精水洗

右取淬鐵精中水日洗三五度

許叔微普濟本事方飛窩丹從項頭起腫光用葱白研取自然汁塗

言窩丹 方許叔微普濟本事方言窩丹從頭上紅腫痛

用赤小豆末雞子清調金

水丹 方許叔微普濟本事方水丹從兩脇虛腫

用生鐵爲本猪糞調査

驚丹 論曹世榮活初心書嬰兒生後百日之內半歲以上多然眼胞紅，暈微起而帶青黯色，向夜煩啼或臉如胭脂此伏熱在內亦有臉不紅者，始因居胎之時母父重驚驚邪傷胎通相傳襲降生之後復父熱毒或再微紅而不杜出沒休息無定處到頸項赤如朱砂名爲驚丹用四聖散洗其目次百解散加五和湯同前與驚丹毒牛蒡湯當歸散三解散黃芩四物湯皆可爲治如驚丹發至脊乳間微有瘡喘作搐急宜宣熱扶毒丸散內流爲害不淺五和湯加升麻生薑地黃水薑燈心煎服則自消除仍用前數藥調治不生他症或投萬安散

赤流 論太平聖惠方大小兒身上或一片片赤色如胭脂染及熱斬引此名丹毒俗謂之流若因熱而得者色赤或因風而得者色白皆腫而壯熱也可用一小鍼刀散鑿去惡血毒木入腹者可療也張氏醫方少見謹按小兒諸丹毒病由風邪熱毒之氣搏於腠理其皮膚色赤如丹毒之狀遍身壯熱煩渴間亂

方圓經治小兒遊癰丹毒

人方 以老鷄眼睛草葉入醋細研治小兒大瘡丹消赤腫即天茄子也

東山子所言

太平聖惠方升麻散治小兒心熱身上赤流色如胭脂皮膚壯熱

川升麻

川大黃

川升麻

川朴消

各半兩

生升麻

黃芩

桔子仁

木通

各一錢

大參

甘草

各半錢

各半錢

各半錢

一計時候量兒大小分減服之

大黃散治小兒赤流熱如火

川大黃

鬱金

黃藥

膾粉

豬牙皂莢大皮子根以上各半兩

右件藥搗麪羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫不

人方

護火草汁三分赤地利末

膾粉各一錢

右件藥相和量兒大小分減服之良久寫下血片爲散其半傳赤茶

亦佳

治小兒赤流半身，紅斬斬展引不止方

牛膝一兩去苗甘草半兩半升

右件藥細剉以水一大盞煎至五分去滓調伏龍肝末塗之效

又方 川大黃一兩半升

赤小豆半合少川朴消三分

右件藥搗羅為末以雞子清調塗之乾則易之

李子油一升朱砂一分木

右件藥調如膏塗之

以膏汁塗之

人方 以羅摩汁塗隨手便瘥

人方 薑參麯以醋調塗之不過三兩上差

人方 以胡荽半塗之

用白礬一兩以水煮冷後得所洗之

取燒粉家火灰水半之

取紅藍花木以醋調塗之

以黃芩半搗塗之

人方 蘿蔴根搗木以醋調塗之乾即再塗

人方 糯米水研如粥塗之乾即再塗

人方 束粉炒令黑以唾調塗之

人方 蒜末水研如粥塗之乾即再塗

人方 甘泉消石 白龍骨各一兩

右研細淨器內盛若有患赤癟丹及毒瘡者以紙槽水調一錢，帶金

連底水調和頻擦使身輕

放瘡皆方妙足消毒散治諸丹赤流初發甚者

川大黃一兩半升微以

川升麻半兩 黃芩半兩

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫服

永樂大典 卷一〇三七

不計時候量兒大小加減
棗根浴湯治發赤流變改無常

棗木根四兩

升參三兩

菊花二兩

右件藥細刻碎勻每用兩匙頭以水二碗煎三五沸者冷熱避風處

浴兒極佳

木通散治身體赤流片片赤色如胭脂染毒氣漸引

木通一兩

川升麻半兩

川大黃半兩刻碎微炒

川朴消半兩

桔子仁一分

甘草一分大令微赤

右件藥搗羅為末散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫服

不計時候量兒大小加減

又方載毒散治赤流熱如火者

川大黃半兩

鬱金半兩

黃芩藥半兩

膩粉半兩

豬牙皂角半兩生皮子用

右件藥搗羅為散每用少許看赤處以土油調塗患處

田氏保嬰集赤流治法宜服犀角散一法先錄去惡血服上藥一法用牛膝一兩去苗甘草半兩生剉碎水煎一大盞去滓調伏龍肝塗之武山幼

東林總校官付郎高拱
分校官翁端修士良翟景淳
圖點監生王張四祖
直傳道主會陳祖