


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社



一〇一〇・子部・醫家類

- 全幼心鑑四卷〔明〕寇平撰……………一
- 新刊萬氏家傳幼科發揮二卷〔明〕萬全撰……………二九一
- 萬氏秘傳片玉心書五卷〔明〕萬全撰……………三六七
- 萬氏家傳育嬰四卷〔明〕萬全撰……………四四五
- 幼科鐵鏡六卷〔清〕夏鼎撰……………五五五
- 鼎鑿幼幼集成六卷（卷一、卷二）〔清〕陳復正撰……………六一一

全幼心鑑序

上古聖賢嘗百草作素問靈樞經醫藥編除

痾瘵躋斯民于壽域歷代醫師繼志述事

立言立方廣乎功用大抵以活人為心而

又分為十三科俾專於一科用志不分必

獲十全之效小兒科乃其一然小兒號曰

難治何也夫赤子之生乳下弱質神未全

氣未克言語未能飲食不知節寒暑不知

謹不可開切故也專是科者必明乎性命

樞紐榮衛脈絡相因以五臟之色見

於面部察疾病之根源以藥性溫寒為攻

補緩急然古方有效有不效蓋

天地氣運古今不同猶一歲有春夏秋冬

之異不知今日是何時選古方效於今日

者彙成一書前列察病法後具用藥方名

全幼心鑑綉梓印行快其心目開卷易曉

茲又以是流布四方其用心

書于端為醫學勸

全幼堂箴

民之始生 曰在襁褓 口未語言

脈未朕毛 調護失宜 疾病乃作

欲全厥生 莫先於察 醫云克全

非問于口 藥云克全 非切于手

全以聞聲 知病源委 全以觀色

知病表裏 既成同醫 全之勿異

當貧一藥 全之勿二 何為而然

全我明德 全之全乎 茲箴是式

嬰孩小兒一科上古黃帝未有信著

鬼吏區云小兒為疾男是一門故不

載入素問始自西一姑撰願願經篇立

自後智者繼述未末世傳諸家之言

經進詳要旨證虛一收其文以占壽



編集名方醫明標本厥疾延壽自此始有小兒方也宜察詳之

大明成化四年龍象著雍困敦八月中秋日嵩陽寇平衡美集



全幼心錄目錄

卷之一

警醫

醫守十全三德

為醫先去貪嗔

天醫服藥吉日

六甲服藥吉日

求醫凶日

用藥法

灌藥服藥法

不可服熱藥

議金銀薄荷

藥

煉蜜法

五臟標本

醫治說

小兒初受氣論

小兒脉總論

稟賦

小兒受六氣說

相兒命短長法

小兒胎稟說

戒醫士用好心體病家用好藥

戒藥同道

六甲合藥吉日

要安服藥吉日

游禍日

炮製法

服藥法

不可服涼藥

論腦麝銀粉已積不可輕用

薑

蜜

修合和藥法

血氣論

小兒難醫於大人

生小兒說

聯珠論

保育

相兒壽夭歌

小兒眼中神法

小兒初誕歌

護養之法	養子十法	通變	參詳	食忌	攻味知病法	及幼女補	小兒無患歌	聖聞問切	視證	論面部	面部逐位	面部之圖	面部氣色總現	五色下病	面部之圖	定四季色各歸部位	分面部雜病證	五臟通竅相應病證	分定五位所屬圖
調理之法	養子日用	難易	傷憐	審味	撮要	辯證早決安危	小兒常安	察形證	觀形氣	內臺秘論	察病形色歌	面部氣色論	面部五色之圖	五臟病證形色總見面部	分五臟五色面部形候	分五臟面部病證	分面色相兼病證	五臟受病圖	辨五臟受驚積冷熱形證

五臟分部定位	五行相生	五行木生相侵	五臟勝伏相交	五臟畏愛	五臟伏敵喜傷	五臟病證	五臟相生形尅	辨王氏是非	內證	冷熱證	面冷腮紅	雜病不治	面部遠證	肝熱	肺感復有冷風	肺熱怯	心實	目內證	肝病勝肝	肝有熱	貴
五臟五色本位	五行相尅	五臟生本相臨	五臟受敵尅入	五臟子母生成	五臟所主	五臟相勝輕重	形候驗病歌	小兒得病之源	外證	上熱下冷	逆危衰脫	辨小兒病證	肝外生感風	肺熱	肺虛熱	心熱	腎虛	肝病勝肺	肝有風	肝有風甚	貴













全幼心鑑卷之一

按雷建王冊內

六律有曰凡世間之良方頗有效者其嫉妬之甚佳性者而示傳故絕於世者多矣人有疾者莫能拯救若非神人出示以之疾無瘳矣凡有方者而不傳者輕則歿於本身重則無嗣是以此方之中多有世人未見之方用之如神得之者可安而死可活矣正所謂舒一臂於巖崖絕谷之間風濤覆之際而救其顛墜沉溺者不亦仁乎

百工技藝莫如醫 醫者通靈可濟危 實實虛虛看損益

來生償命不須疑

方真藥偽陰陽錯 價廉多秤貴極則 不依方法暗戕生

利送無厭招報惡

戒醫上用好心勸病家用好藥

醫者天地之大德曰生生者人之所同樂也人之一身不幸於有病有疾不得已而請醫者當日存好心彼之病猶己之病藥契天不敢以一毫客氣勿問貧富貴賤則與貧樂舉以救人為念以慕厚生樂道之意造物者曰祐之以福今有一等醫士用心不臧乘人之急緩見一病視之奇貨不用奇藥惟恐效速是禍不極而功不大或以一二藥為秘傳不肯示人或以知前人已用之藥妄加一二味改易其名便為秘方以惑眾聽又有一等平昔初無寸長全恃口強說及至治病莫能措手病家未免他向同道至門便為仇讐枉用小人之心而終不

會見本事此皆貪婪之巨賊又有一等性務奔馳爭趨人門不請自至時獻者直以問病為由自是明能諱談異說出示一人且云是某處收效某處曾用此等無非實說病家無主易於搖惑則便修合勿然病變急自散去病家雖悔何及每見病家鄙吝所費凡有病隱忍不肯急醫待至自愈或自檢方合藥病不能退又不請明了之醫惟恐所費浩大甘心以千金之身付托於剽竊庸俗之手脉既不明藥不能辨妄意應度且帳合藥無他且圖易於扣合爾日久困重方請明醫醫士至門已難用藥者有之又有醫士數日方欲成功而病家親朋或主薦或獻方問有主人自有定見不受謔言者有之間有易於搖撼者則醫士徒費前功者有之有調理病愈主人自謂須是五行不死則

可者有之或謂夜來曾作何善事今早稍愈有之醫士盡心用力而病家諸般破說背負者有之世道滄海間有此等人然而醫士自當始終盡其在我無愧於好生之心則盡善盡美至於病者索藥必要供方方肯服藥殊不知醫士間有奇方病重而藥賤必不肯說一也或有假醫在傍其間果有秘傳亦不肯供方只以尋常所用海行之方用之二也其間又有病者本自虛損反諱人說是虛喜服良藥或有平日耗散或自外邪誤於虛弱喜服補劑醫士一見不敢進言實情符合病者意向隨所喜而供之者三也此世之通患莫之能革余集此書欲使家家洞悉人人自曉勿為末俗小人說詐而愚豈曰小補之哉

醫士十全三德



夫醫者九流之祖百世之宗為醫士者先習講究經書察其病  
體素問經之首難經治病之源叔和脉訣之浮沉表裏吉凶  
醫要十全一嬰識字二曉陰陽三通運氣四辯浮沉五知反惡  
六會鍼灸七嘗藥性八觀虛實九嬰禮貌十要人私此乃十全  
則何為三德一德者深明仁義博覽經書通二教之幽微知性  
命之理趣仁在昆蟲之外智超衆人之前此為一德也二德者  
情性敦厚道藝深沉正直處德心善無私德色紅潤見如不認  
家貧潔淨聽若不聞錦綉羅綺觀如流水滿堂金玉視若浮雲  
貧賤之祿不可費其志萬鍾之貴不可損其心不可為其財而  
損其德不可為其利而損其仁此乃二德也三德者凝龍潛聖  
不可以欺瞞英雄豪傑不可以趨奉富貴之家不可以辱象腦  
子以為圓貧賤之家不可以麻潘麩米以為歡高貴無二藥貧  
富一服醫上不欺乎  
天下不欺乎地中不欺乎人依方修合積德救人若依十全三  
德此乃有醫道之人也

戒致同道  
大抵行醫片言處 深思遠察要安詳 更思厚斯為美  
切戒逢人恃已長

鄭端友曰醫門一業慈愛為先常有救濟之心方集古賢  
之行近世醫士診察疾 病未言而慮其病不量病有  
淺深效有遲速亦有陰 虛陽實為合轉移之疾之論惟務  
妬賢嫉能利己害人醫 難病家者諒厚則不亦愈歟

之心乎

為醫先去貪嗔

為醫先要去貪嗔 用藥但憑真實心 富不過求貧不憊

補明所在儼如臨

人有恒心踐履端謹始可與言醫道矣凡有請召不以晝  
夜寒暑遠近親疎富貴貧賤聞命即起視彼之疾舉切吾  
身藥必用真材無過望 惟誠拯救勿憚其勞冥冥之中自  
有神佑如臨江張彥川為醫求學以錢為較應有求藥期  
於必效一日城中大火周回焚盡煙焰中獨存其居後且  
子孫榮貴以此見大道有救顯助之靈誠可為敬

六甲合藥吉日

戊辰 巳巳 庚午 壬申 乙亥 戊寅 甲申 丙戌

辛卯 乙未 丙午 辛亥 己未 除日 開日 破日

天醫服藥吉日

正二三四五 六七八九十 十一

要安服藥吉日

寅申卯酉辰戌巳亥午未丑

六甲服藥吉日

乙丑 壬申 癸酉 乙亥 丙子 丁丑 壬午 甲申  
丙戌 巳丑 壬寅 癸巳 甲午 丙申 丁酉 戊戌



巳亥 庚子 辛丑 戊申 巳酉 癸丑 辛酉

右按彭祖曆云破日可服藥滿日未日皆主毒氣為害由

求醫凶日 夏得天醫神在日方為吉兆

丁酉 戊午 巳酉 庚戌 辛丑 壬寅 癸巳 甲戌

乙酉

游禍日

正五九月巳日二六十月寅日三七十一月亥日四八十二月

甲日

辛未日扁鵲死日滿日大凶經云男忌除日文忌破日大

凶

炮製法

全幼心鑑

雷公藥性論藥之有方猶藥之有調也藥備衆調始和其音藥

備衆方始和其劑藥調十七方亦如之曰炮曰熅曰炙曰燂曰

煨曰炒曰煨曰煉曰製曰度曰飛曰伏曰鑊曰撒曰曬曰燥曰

醫是也然用則各有宜焉

用藥法

用藥之法不可僻執古方當加減藥末細辨冷熱精辨玄微使

令子母相得切忌妄自施為誤投散頃刻反惡以致不救傷

殘性命痛切傷心得不責如雄黃牙硝石英南廬丹砂之類

不可火煎川烏半夏附子鬱金南星不生服精專至誠依方修

製毒疾則隨手而瘥矣

服藥法

病在胃腸已上者先食而後服藥

病在心腹以下者先服藥而後食

病在四肢血脉者宜空腹而在旦

病在骨髓者宜飽食而在夜

病在表者不以時候

灌藥服藥法

小兒煎藥以銀器約水半盞藥多入加多焉其或不能下則

以匙送下服藥未盡旋旋與之藥性溫熱乳食前服藥性寒涼

乳食後服頃服和之劑隨意無妨

不可服之藥

足脛冷 腹虛脹 糞色青 吐乳食 眼珠青 面青白

全幼心鑑

脈沉微

不可服熱藥

足脛熱 兩腮紅 大便秘 小便赤 渴不止 上氣急

脈緊數

論腦麝銀粉巴硝不可輕用

小兒急驚風古人以其內外熱熾風氣暴烈而無所泄故用腦

麝黃以通其關節銀粉巴硝以下其痰熱蓋不得已而用之

其實為風熱盛者設也世俗無見不權輕重每見發熱發搐

輒用腦麝蟾酥銀粉水銀輕粉巴豆芒硝等劑視之以為常性

其不當用而輕用或當用而過用之是以心驚轉為慢驚吐瀉

胃虛在再時月驚風之所為難療者正在此也萬一發熱發瀉







肝實目赤多怒頭眩痛引兩脇小腹之下

肝虛目昏曾痛筋縮拘拳恐懼如人將捕

肝納感應及青四肢多汗

平脈春旺七十二日春則弦緩而長春弦者端直之壯細弱而

脈浮濡而短金尅木 危脈弦如張弓弦

在天之熱 在地為火 在人為心 在時為夏 肝木為母

脾土為子 射脾金 主血 主藏神 其聲言

其液汗 其味苦 上應舌 外應掌

其色赤赤欲知暴朱不微如緒

心主熱 熱則傷心 病主驚熱 憂愁思慮則傷心

痘主紅痘 寒則逆水 黑則逆水 逆水

心病面赤喜笑心煩言多口乾開目妄語膈上動氣

心實口乾喜笑身熱汗血筋胸膈背痛滿

心虛恍惚多驚憂煩色白咳嗽舌強腰背酸疼

心絕搖頭直視形如烟薰

平脈夏旺七十二日夏洪緩夏洪者浮大而散來疾去遲

賊脈沉濡而微水尅火 危脈鈞如操帶鉤

脾 在天之濕 在地為土 在人為脾 在時為四季

心火為母 肺金為子 射腎水 主肌肉 其智

其液淚 其味辛 上應口 外應齒

其色黃黃欲如羅髮枯黃不欲如土

乳食飢飽則傷脾 痘為主濕濕則傷脾 風氣勝則病

面青為逆木尅土

脾病面黃善思善嗜體重身痛四肢不收心憊

脾實腹脹重着而不舉腹脹便秘而苦肌

脾虛吐逆泄痢乳食不消腫脹腸鳴四肢無力

平脈土之脈溫厚氣行臟腑之間平和不得見其衰則見焉

四季之月各旺十八日

賊脈弦長而緊木尅土 危脈壯如雞雀啄止而復來

肺 在天之燥 在地為金 在人為肺 在時為秋 脾土為母

腎水為子 射肝木 生氣 主藏魄 其聲哭

其液涕 其味辛 上應鼻 外應皮毛

其色白欲如白玉光澤不欲如望 肺主燥 燥則傷肺

其病嗽 形寒體冷則傷肺 痘為膿疱

熱氣勝則病 而赤則逆火邪來金

其病面白悲愁涕淚哭吐衄喘咳寒熱脇有動氣

肺虛呼吸少氣鼻燥乾喘之咳血

肺實喘促咳嗽上氣鼻塞腰股有疼胃滿



肺氣好出惡濁喘而不休毛起

平脉秋旺七十二日秋脉浮利毛者稀軟之壯輕虛以浮

賊脉浮大而平火尅金 兌脉毛如風吹

肺之氣

在天之寒 在地為水 在天為腎 在時為冬 肺金為母

肝木為子 尅心火 主喜

其聲呻 其液唾 其味鹹 上應耳 下應腰腎

其色黑欲如漆重澤不欲如炭

其病疝

濕氣勝則病

其病面黑恐欠足寒逆氣腹痛殄泄後重臍下動氣

腎實腹膨脹體重少氣不言骨疼發泄小便少

腎虛心懸如飢胃痛引脊厥逆瘦多耳鳴

腎絕反目直視狂言遺尿腰折骨枯

平脉冬旺七十二日冬則沉濡冬石者沉濡而滑舉指來疾

賊脉緩而大 土尅木 危脉石如奪索去如彈石

血氣論

人生之初具此陰陽則亦具此血氣所以得全性命者氣與血

也血氣者乃人身之根本乎氣取諸陽血取諸陰血為榮榮行

脉中滋榮之義也氣為衛衛行脉外護衛之意也人受穀氣於

胃胃為木穀之海灌既經絡長養百骸而五臟六腑皆取其氣

故清者為榮濁者為衛榮衛二氣周流不息一日一夜脉行五

十度平旦復會于氣口陰陽相貫血榮氣衛常相流通何病之

有一室碍焉則百病由此而生且氣之為病發為寒熱喜怒憂

積為瘕痞疝癥癰癰上為頭旋中為胃膈下為臍間動氣或喘

促或咳喘噎則中滿逆則足寒凡此諸疾氣使然也血之為病

妄行則吐衄妄瀉則虛勞蓄之在上其人亡蓄之在下其人狂

迷寒則筋不榮而挛急挾熱則毒內凝而發黃在小便為淋痛

在大便為腸風婦人月事遲退漏下崩中病證非一凡此諸疾

皆血使之也夫血者譬則水也氣者譬則風也風行水上有血

氣之象焉蓋氣者血之帥也氣行則血行氣止則血止氣溫則

血滑氣寒則血凝氣有一息之不足則血有一息之不行病出

於血調其氣猶可以導達病原於氣區區調血又何加焉故人

之一身調氣為上調血次之先陽後陰也若夫血有敗凝滯泥

諸經壅遏氣之道路經所謂去其血而後調之不可不通其變

矣然調氣之劑以之調血而兩得調血之劑以之調氣則非

如木香桂枝細辛厚朴烏藥香附之類也我本草之類治氣可也右

血亦可也若以當歸地黃黃芩施之血證則可然其性燥熱有

助之凡治病當識本末如嘔吐痰涎胃虛不食以致發熱若氣

涼劑退熱則胃氣愈虛熱亦不退宜先助胃止吐為本其熱自

退縱熱不退但得胃氣已正旋與解熱又有傷寒大熱果用寒

涼味轉其熱不退但與調和胃氣自然安愈

心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏止知血之

心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏止知血之

心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏止知血之

心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏止知血之

心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏止知血之

心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏止知血之

心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏止知血之



心而不和血之納於肝知氣之出於肺而不知氣之納於  
腎往往用藥者誤而此散矣假如血病以五苓門冬等劑行其  
心以二大黃逐其積其病猶存者血之所感無以養也必佐以  
芍藥則痛自止假如喘嗽以枳殼桔梗紫蘇桂枝薑橘等劑調  
此氣以南星干夏細辛紫菀而終不升降者氣之所感無以  
收也必佐以補骨脂骨蒸則氣歸元矣病有標本治有先後辨舉  
而目前斯集矣意此傳心緊妙之法敢不與衛生君子共之

醫治說

孫真人云能治十男了莫治一婦人能治十婦人莫搏一小兒  
醫有三科最難者無過於小兒也

小兒醫難於大人

大醫之道誠為難矣故治小兒尤為難理寧醫十丈夫莫醫一  
婦人何也夫夫者榮衛氣壯婦人血脉相衝兼產難治千金云  
婦人之病比男子十倍難療寧醫十婦人莫醫一老兒何也婦  
人者氣血尚盛老兒元陽枯竭氣血皆衰以為老兒難治寧醫  
十老兒莫醫一不語小兒何也老兒皆元陽皆竭氣血皆衰疼  
痛即能言不語小兒者疼痛不能言精神猶未備骨氣猶未堅  
形聲猶未正脉息猶未全所以難治者語不能問其得病之由  
脉不能診其必然之理故

黃帝云若吾不能察其幼小也齊鑑云冠壯易明幼童難治  
孫氏云學方三年無病得治治病三年無方可療

小兒初受氣論

聖濟總錄小兒在母腹中受其精氣一月二月三月血脉  
四月形體成五月能動六月筋骨成七月八月九十月臟腑具  
九月氣入胃十月百神備而後生後六十日瞳子成孩兒能  
類笑語識人百日任脉生能反覆一百八十日尻骨成能獨坐  
二百一十日掌骨成能匍匐三百日齒牙生能獨行  
三百六十日為一林膝骨成乃能移步此是常步之法不如此  
者身不平爾

生小兒說

小兒一歲之中變象未定五行未分能以能生能生日混沌  
老子曰抱一能無離乎專氣致柔能嬰兒乎滌除玄覽能無  
疵乎未識父母謂之朴識父母謂之赤者君病也君病者心病

全幼心鑑卷一

也由分彼我疾病生焉按乾鑿度云入形出于乾有太易太初  
太始太素夫太易者未見氣也太初有氣之始也太素者質之  
始也形氣以具而病病者察察者病田是明生焉  
黃帝問此太素質之始也人生從乎太易病從乎太素叔和以  
言小兒病爾

小兒脉總

夫人稟陰陽二氣生疾病於三焦冠壯易明幼童難治  
黃帝云吾不能察其幼小者為別是一家調理爾此不在黃帝  
圖經之論也又云小兒如水上之草頭之露者以表用藥無  
令造次焉惟小兒臟腑嬌嫩血氣虛弱肌體不密精神未備故  
辨不易醫也初生曰嬰兒三歲曰小兒十歲曰童子大小各異



且不可一槩而用藥者必明消息 乃候審定生死察病患之淺深知藥性之寒溫乃一世之良工也

珠論

天地肇分陰陽始成人稟五行而成體合四時以成形父母之精血父之精則白而輕清母之血則黑而重濁陽胎氣輕清九分陰胎氣重濁十分好娠過月者貴不足者賤小兒在母腹中受父感之精血父先樂則精氣血而先兒母先樂則血氣精而先兒兒在母腹中十月各有主二月如珠露三月如絞桃花三月男女分男子先生左臂左眼四月形體全五月筋骨成六月髮生七月遊其魂能動左手八月遊其魂能動右手九月三動十月滿足生小兒緣生下有身破裂者必死陰囊白者必

全初心經

陰不起者必死無齒門者必死忽作鴉聲者必死透鼻缺者必死滿受胎得社公日兒胎氣不就盲聾啞是天聾地啞日受胎實女人懷胎時曾食金石藥不能行母因懷胎時好食藤黃精菜未五歲以前有五不成不可醫一枕骨不成而不能言二掌骨不成而不能匍匐三膝骨不成而不能行坐四尻骨不成而不能行立五膝骨不成而不能移步上件五疾是父母已遇之疾也

稟賦

夫小兒胞胎成形產育具相人有以為十箇月滿足而生究竟生理則是二百七十日實為之論蓋就中虛計一月以應十箇月也經云九九為上八八次之七七又次之凡人之生稟賦

二儀之氣會合三才之道各得其九三九二十七即二百七十日為正血氣充實精神純全為人相貌俱足智性具通八八者三才各得其八三八二十四即二百四十日而生七七者三才各得其七三七二十一即二百一十日而生其有逾十月而產者謂之太過其七八月而產者謂之不及太過者血氣陰之有餘不及者血氣養之不足大抵人得中道乃為純粹陰陽得所剛柔兼濟氣血相和百脉相順心智明通精神全備臟腑充實形體壯健觀其顛顛斯可知矣未周之兒顛顛堅合睛黑神清口方其厚骨應齶滿臍深肚軟莖小外大齒細髮潤聲洪其此迺受氣得中者也如二週三歲之間其顛尚大其顛開則髮未生手脚拳縮膝如鶴節或五歲而不能行或近十餘歲而身體手足瘦瘠此皆受氣不足者也

全初心經

身

保育

千金論曰兒生六十日後瞳子成能笑認人勿令生人抱之及見非常之物百日任脉成能自反覆一百八十日尻骨成乳母令學坐二百四十日掌骨成母當扶教爾三百日臍骨成母當教扶立三百六十日膝骨成母當令扶行此皆之法若或後衣不令出見風日若常捧抱不曾就着地氣致使筋骨緩弱雖倍歲數不能行步誠非保育之法觀田舍小兒未嘗愛護終日暴露拖泥帶土絕無他病者皆見風日着地飛之力也貴賤之理有異哉明乎此則保育之道得矣

小兒受六氣說



小兒受其六氣六氣者筋骨血肉精氣也其筋骨則力名骨實則早行立血實形瘦多髮肉實則小其乳母多抑則其氣血精實則靈利多語笑不怕寒暑氣血少髮而體肥也

相兒壽夭歌

身軟陽痿頭四破 臍小臍高肉不流 髮稀色脆短聲啼  
遍體青筋俱不壽 凡腫臍骨若不成 能珞能行能立死  
臍深色老性尊持 方是人家長命子

相兒命短長法

兒初生叫聲連延相屬者壽聲絕而後揚急者不壽啼聲散不成人  
啼聲深不成人 臍中無血者好

全細心書

臍小者不壽

通身許弱如無骨者不壽

鮮白長大者壽

自關口者不成人

汗不流不成人

汗血者多厄不壽

頭四破不成人

小便凝如脂膏不成人

早坐早行早齒早語皆惡性非佳人

頭毛不周匝者不成人

髮稀少百強不聽人作不聽

額上有旋毛者早貴妨父母

兒生松官不成者能言而死

尻骨不成者能偃而死

掌骨不成者能匍匐而死

踵骨不成者能行而死

膈骨不成者能立而死

身不收者死

魚口者死

腹間無生肉者死

頤下破者死

喉不起者死

陰囊下白者死赤者死

外縫通連黑者壽

論曰小兒三歲已上十歲已下視其性氣而可知其壽夭

太畧兒小時識悟通敏過人者多大大則其壽短同之流是也

小兒音法成就感儀迴轉遲舒稍費人精神此法者壽其預知人意迴旋敏速者亦天即楊修孔融之徒是也由此觀之天壽大畧可知也亦猶梅花早發不觀其寒其萌晚成終於年事是知晚成者壽之兆也

小兒眼中神法

小兒病證雖可畏而六衝有脈神氣未脫雖門未閉者顏色指

全細心書

中未至點黑者猶可着力雖然五臟六腑之精氣皆上注於目望而知之當先以目中神氣為驗

小兒胎稟說

家貴之家居於奧室懷孕婦人飢則羊酸鹹辣無所不食飽則恣意坐臥不勞力不運動所以腹中之子胎受軟弱兒生之後必添稠勻歲於幃帳之內不見風日雖如陰地之中草木少有生實者也

小兒因胎稟怯弱外肥裏虛面皎白色腹中氣響嘔吐乳如或便青糞或頭大顙開若失治者後必為慢驚風生而難愈

小兒初誕歌

小兒初誕月 禁口病非輕 吐氣并吹沫 胎中久受驚



小兒初誕月 胃弱手頻顫 疾病名錄 父母惜因難

小兒初誕月 驚積發腦風 口如魚口樣 天命定須終

小兒初誕月 白日青瞳性 夜後多啼哭 連痰白沫頻

小兒初誕月 壯熱哭聲頻 瀉下如盤散 胎中素受驚

小兒初誕月 腹痛兩肩輕 病號盤腸氣 時時困又惺

小兒初誕月 姪女熱中來 不識將乳哺 元因是吐謀

小兒初誕月 肌體骨崖崖 小指并唇缺 元因鬼疳胎

小兒初誕月 七孔血先流 壯熱時時搗 胎中損莫收

乳子歌

養小須調護 看承其縱橫 乳多終損胃 食塵即傷脾

余厚非為益 衣單正所宜 無風頻見日 寒暑順天時

變蒸

一肝蒸時為尚書童子 二肺蒸魂 相開胃臆咳吃

三心蒸體子為 四肺蒸精志為大夫

帝王血脈 六耳蒸筋脉通流能行

五腎蒸列精生澤絃 七蒸課骨漸行 八蒸呼吸精神定

八蒸歌

深嗟初育小孩兒 緣出胎來識飽飢 在母胎中無觸犯

乳清溫和漸覺肥 第一肝蒸生三魂 雙眼難開瞳子昏

三兩日間微壯熱 定眼看人似欲言 第二肺蒸生七魄

驚風咳嗽開胃痛 見人共笑語喃喃 暗裏時時長筋脉

第三心蒸生百神 方能識母以傍人 血脈初生學反護

肌肉皮膚漸漸均 第四脾蒸生智慧 凡骨初成學坐臥

三焦胃腑初受盛 乳哺止則小間離 第五腎蒸生精志

血脉相通轉流利 掌骨初成寸節匍 反覆投擲隨其意

第六筋骨初成蒸 九竅精液日相應 時時放手立停停

氣力加添日漸勝 第七膝膠骨初成 顏色紅光遍體榮

舉腳踏身學移步 嚙嚙語音日敏聲 第八呼吸定精神

氣血調和暢一身 自喜自樂百自樂 見人見物便欣欣

小兒變蒸歌 俗謂牙生也

第一變蒸熱 唇上白珠生 四肢寒熱渴 吐乳食如常

煎躁還啼哭 須常解腸涼 二旬餘二日 一變自安康

四八為期節 形容頓異殊 溫濕潮熱作 唇上起尖珠

瞳子無光色 精神漸展舒 身骨增智巧 移步擬躊躇

下瀉黃兼瑋 微驚氣帶塵 乳哺如似現 切已誤宣珠

筋骨將成立 肌膚旋長軀 變蒸推此數 八八并當途

變蒸之候若為程 一一從頭別有名 第一看兒毛髮豎

唇口尖上白珠生 二兩日間起蒸熱 忽然睡裏足虛驚

或則遍身流盜汗 或然微刺腹中鳴 或則因悶皮膚急

忽然吐逆氣交橫 七日之中驚寒表 但看變蒸得其候

智者將心信醫藥 下愚不曉逐邪行 雖然變蒸得其候

還須用藥保長生

小兒始生變蒸歌



百二十二日一變生腎臟氣 屬足少陰經

髮中白泡起如珠 蒸變居常有自珠 壯熱來時還有透

兒經初度長肌膚

百二十四日二變一蒸生壬膀胱腑氣 屬足太陽經

二蒸乳或多乳 寒熱來時宛噴頭 毛髮堅時生乳血

過其七日有精神 主耳與聽冷

百二十六日三變生丁心臟氣 屬足少陰經

嬰兒體熱動心神 汗出虛驚又畏人 蒸變有期增骨體

時時及後學翻身

百二十八日四變二蒸生丙小腸腑氣 屬足太陽經

四蒸纔過體安康 乳食甘甘其常 教氣時增添意志

難能學坐未能行 主汗出微細

百六十日五變生乙肝臟氣 屬足厥陰經

經絡通流第五蒸 今時增志日時增 形稜未定多嬌態

掌骨生而前齒能

百九十二日六變三蒸生甲膽腑氣 屬足少陽經

情昏神倦色更移 或自喜或自悲 蓋自陰陽常運合

滋榮氣血止相宜 主眼不開

二百二十四日七變生辛肺臟氣 屬足太陰經

七變憔悴昏兒目 情思惶惶多哭 近則五朝三日散

遠過七日方平復

二百五十六日八變四蒸生庚大腸腑氣 屬足陽明經

八蒸驚哭更甚煎 變易肌膚血氣堅 微利腸鳴更甚煎

精神充悅得人怜 主青熱

二百八十八日九變生巳脾臟氣 屬足太陰經

九蒸筋骨始能全 氣血攻而不肯眠 變過自秋生意若

肌膚潤澤臉如蓮

三百二十日十變五蒸生戊胃腑氣 屬足陽明經

十蒸學語幾般聲 停立亭亭又怕驚 扶步堪怜猶未穩

三焦通利暢心神 主不食腸痛吐乳

心胞絡臟 屬手厥陰經

三焦為腑 屬手少陽經

此一臟一腑俱無形狀故不變而不蒸也

前十變五蒸訖後又有三大蒸

六十四日為一大蒸計二百八十四日

又六十四日為一大蒸計四百四十八日

又六十四日為一大蒸計五百一十二日

至五百七十六日變蒸俱畢兒乃成人也所以變者而變生五臟也蒸者而蒸養六腑也其血脈方始榮骨木長情性有異於前當變蒸之時先看兒子唇口如上唇微腫有如卧蠶或有珠

泡子者是變蒸證也即宜少與乳食喫下可妄投藥餌切不得火蒸着衣若不依此多致殺兒身有此故書以告之

變蒸證候唇口形狀







之十日百段三十二日計三百二十變為一遍亦曰一蒸骨  
之餘氣自腦分入銀中作三十二齒而齒牙不及三十二數者  
由變不足其常也或二十八日即至長二十八齒已下微此但  
不過三十二之數也凡一周變乃發虛熱諸病如是十周則小  
蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全而此也故初三十二日一  
變生腎志六十四日百變生膀胱其發汗與凡今皆與膀胱俱  
上於水水數一故先變生之九十六日二變生心喜一百二十  
八日四變生小腸其發汗出而微驚心為火火數二一百六十  
日五變生肝哭一作呼一百九十二日六變生膽其發汗不閉  
一本作開而赤肝主木木數三二百二十四日七變生肺聲二百  
五十六日八變生大腸其發汗熱而汗或不汗肺者金金數四  
二百八十八日九變生脾智三百二十日十變生胃其發不食  
痛痛而吐乳此後乃齒生能言知喜怒故云始全也不倉云氣  
入則長骨骨於十變後六十四日長其經脈手足手足受血故  
能持物是受血能行立經云變且蒸謂蒸畢而是一歲之日也  
脚曰不汗而熱者發其汗大吐者微止一本作下不可別治是以  
小兒須變蒸脫齒者如花之易苗所謂不及三十二齒由變之  
不及齒常與變日相合也年壯而視齒方明視齒當作明當作周  
小兒變者變其情能蒸者蒸其血脈三十二日一變初變生腎  
水次變生膀胱二變生心六四變生小腸五變生肝木六變生  
膽七變生肺金八變生大腸九變生脾十變生胃每經一變則  
情態異常十變蒸畢又三大蒸共五百七十六日乃周歲家七

月方成人故稱水數一先變也以其體之水數為腎腎父之  
氣腎生肝乃子母相生故當從子之份變為肝也變蒸五臟六腑皆  
脈骨節皆循環一而各有證應極而後熱微汗似驚重則脈亂  
壯熱吐汗煩喘躁渴其後與傷寒相似但身上一白珠可驗宜用  
輕藥不治而自愈  
小兒變者以長血氣也變者上氣蒸者體熱變者有輕重家  
氏云先變五日後蒸五日為十日之中熱乃除古法以紫圓子  
主之亦有不驚不熱或無證候暗變者多矣蓋胎壯實故也  
自生之後三十二日為一變傳肝六十四日二變傳膽九十六  
日三變傳心一百二十八日四變傳小腸一百六十四日五變傳  
脾一百九十二日六變傳胃二百二十四日七變傳肺二百五  
十六日八變傳大腸二百八十八日九變傳腎三百二十日十  
變傳膀胱三百二十日小變蒸畢每變蒸之後骨情性異常  
百九十二日大蒸後更二百二十八日後蒸即五百七十六  
小兒三十二日一變其後三大蒸總五百七十六日變者上氣  
蒸者體熱每經一變情能助異輕則發熱微汗其狀似傷寒則  
壯熱脈亂而數或吐或汗或煩喘躁渴輕者五日解重則七八  
日解其候與傷寒相若亦有微蒸之餘續感寒邪搏之則其熱  
交變腹中作痛而啼叫之聲日夜不絕變者易也蒸於肝則目  
昏微赤蒸於肺則噴嗽毛聳五臟六腑筋脈骨節皆微一而  
各有證候其陰陽水火之變歟治法和平之劑微表熱者宜



利之或不治亦自愈

寶鑑云初變肝為肝乃是餘者非二變肺三變心四變脾五變腎  
二者所論皆五行顛倒如生者却逢相尅相尅者又逢相生  
宜變證大抵陰陽造化五行五臟相生者順相尅者逆其變  
法是長血氣滋榮五臟相生之法此理昭然聖濟經云水火  
土金為序者以其相生有母子之道也水火金木土為序者以  
其相尅有夫婦之義也相生所以相繼相尅所以相治愚原胎  
者得水火既濟陰陽造化受五行相治而成形故始於腎氣之  
初生也錢氏將腎初變非嬰兒變蒸者當血氣攻革陰陽升降  
從五臟相繼而成人寶鑑云三大蒸都計五百七十六日乃成  
人也故始於肝經之初變也寶鑑云肝為初變是也肝者東方

全初心經

三十九

甲乙木為首孫真人新生芽兒芽者萬物始生為芽應東方甲  
乙木為首以此驗之初變明矣小兒變蒸法者合相生而傳矣  
故錢氏寶鑑五說差殊之誤使後之學不至疑惑也素問云  
天地俱生萬物以榮應者肝木為首也

小兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六日三變  
一百二十八日四變變且蒸一百六十五日五變一百九十二日  
六變變且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且蒸  
二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積三百一十一日  
小蒸畢後六十四日大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二  
十八日復大蒸小兒自生三十二日一變再變為一蒸凡十變  
而五小蒸又二天變蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人

小兒所以變蒸者是榮其氣脈改其五臟故一變空氣散其情  
有異於常其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變者右轉重其  
者體熱而微驚耳冷鼻上唇頭白泡起如魚目珠子微汗出  
其重者身熱壯熱而麻亂或汗或不汗不飲食食則吐現目白  
精微赤黑精微白又云目不白者重赤也者微變者目精明  
矣此其證也單變小徵兼蒸小劇凡蒸平者五日而蒸者十  
日而蒸先期五日後期五日為十日之中熱乃除耳兒生三十  
二日一變二十九日先期而熱便治之如法至三十六七日蒸  
乃畢爾恐不解了故重說之且變蒸之時不欲驚動勿令傍多  
人兒變蒸或早或晚不如法者多又初變之時或熱者連日  
數不散審計變蒸之日當其時有熱微驚慎不可治及於到但

全初心經

三十九

若其久熱不可已少與紫園子微下熱散便止若於變  
時加以時行溫病或非變蒸時而得時行者其診者相似  
無白泡爾當先服里散以發其汗汗出溫  
粉之熱當散便止若猶不都除乃與紫園子下之兒變蒸  
時若有寒加之即寒熱交攻于腹腰大紅喘不止者慰之則愈也  
變蒸與溫壯傷寒相似若非變蒸身日熱死亦熱此乃為他病  
可作餘治者是變蒸不得為餘治也

又一法見生三十二日始變變者身熱也至六十四日再變變  
且蒸其壯且端正也至九十六日三變定者候丹孔出而泄至  
一百二十八日四變變且蒸以能咳笑也至一百六十五日五變  
以成機關也至一百九十二日六變變且蒸五機成也至二百



二十四日七變以能開食也至二百五十六日八變變且蒸以

知飲學語也至二百六十八日九變以能坐也小兒生至二

百八十八日九變四變也者其變之曰惟不可妄治之謂其

疾變且蒸是兒送迎月也蒸者其始在內氣出是也若五

日散意者八九日散也常是蒸上不可久蒸之也

小兒變本在熱非謂其精不燥自愈

治嬰孩小兒變蒸壯熱亦治傷寒發熱

治黃或錢半去節 大黃半錢同切炒令黑色為末

杏仁或錢半去皮尖炒黑為末

右入乳鉢內研極細為末每服壹字量大小加絨用熱水不

以時候調服後抱兒溫暖處良久有微汗渾身稍涼癢

百病自日內且服

人參半錢去蘆 白茯苓半錢半去皮 甘草半錢

川升麻或分根

右以暖湯水煎不以時候服稟受弱者加白朮壹錢肥壯

實者不用

治嬰孩小兒退變蒸潮熱

人參半錢去蘆 杏仁半錢去皮尖 川升麻半錢

甘草半錢

右為極細末百日已前每服壹字用暖湯冬去心煎湯冬遠

調服

東坡曰吾平生求醫於平時默驗其工拙至於有疾則必盡

所患而後診視使醫士了然知厥疾所在虛實必熱先定于心

則脈之疑似不能惑也雖謂中醫亦能愈疾吾求疾愈而已豈

以困醫命乎真醫遠濟世之箴規也所謂問證以參脈醫者

意也安可舉一而廢一哉切近世以來多秘所患不診驗醫

之能否醫亦不問五浪一診自執其長其者病家從前誤

藥或飲食起居虛僻疾隱諱問之不以實告使庸醫索病於冥漠

之間別虛實於熱於疑似之際毫厘千里寧不委性命於一擲

與庸醫之試伎乎是以舉前醫格言以解世俗之惑不然經曰

有所謂問其所俗臣味以知其病所起所在又何言焉

調理之法

聖朝十三科小兒亦一科也前賢不曰醫而曰調理蓋小兒臟

腑嬌嫩易虛易實易冷易熱猶難調治是以胡氏曰乳下嬰兒

榮衛未足胃氣未全風邪易入乳食易傷如水之泡草頭之露

一旦受病不得已而用藥蓋藥性不寒則熱不表則下不若令

乳母服鮮釀乳乳兒間以少許與兒中病則止能食童子肉食

無不備嘗血氣兒實治病與大人稍同但小其劑料爾

人之病必先助火請其陰盛而陽微小兒必先瀉火請其陽多

而陰少亦有老而實少而虛者用藥不可執一治病之法當以



氣於胃灌經絡長養百骸胃氣有虧則五臟六腑之氣亦饑矣知胃虛者不食發熱過用涼藥則胃氣虛虛者亦不食發熱一此為本胃氣上分與鮮熱又易傷寒大熱兼用寒涼疎利而熱不退亦當調胃則則有嘔吐不食之證虛則益之胃實則有痞滿內實之候實則損之小兒難任非常之熱亦不堪非常之冷稍有太過不及則病從而生抑之冷藥以水濟水水冷胃氣為吐利腹脹重則成慢驚慢脾助之熱藥以火益火則熱勢大盛寒衛難進重則熱則生風蓋解表不致於冷調養不致於熱治熱當令熱去而不冷治冷當令冷去而不熱湯氏曰不熱過母為冷誤補過為多當救其失乃前賢調理小兒之良法也胡氏以令人不究病證危急一藥用不急之劑如四君湯之類止欲逃其美誤爾而

至切心鑑卷

不思病勢變證蜂起束手待斃此乃醫家之也仁齋曰治病如定其當先救急而畧其緩也如病久熱服通利而吐利大作不食且以定吐進食為先嘔吐定飲食進是元氣既正縱有微熱待假熱爾又曰治病如操舟當風波震盪之時一有轉移則覆舟矣醫者操藥術王持在我不可偏徇病家所欲不可張惶便病家驚恐思有病家難識皮膚反覆難辨萬物自惑庶得對病用藥矣為之醫士當以人身難得因果非輕當推惻隱之心以廣好生之德幼人之幼吾之幼母吝藥以希財能薄施而濟眾全其生命天道福善餘慶如谷應聲豈不偉歟

昔聖人論置藥石療諸疾病者以其五臟本於五行五行有相生勝之理藥術本於陰陽陰陽有逆順之理也故萬物皆宜陰

陽五行而生有五色焉有五味焉有寒熱焉有良毒焉聖人取其色味冷熱良毒之性歸之五行處以為藥以治諸疾順五行之氣者以相勝之物為藥以養之逆五行之氣者以相勝之物為藥以攻之或瀉母以利子或益子以補母用藥之奇法經曰天地萬物之盜人萬物之盜人所以去毒萬物而養之法其未陸之物為飲食者不啻千品其五色五味冷熱補瀉之性亦皆稟於陰陽五行與藥無殊大體用藥之法以冷治熱以熱治冷實則瀉之虛則補之此用藥之大要也人若能知其食性調而用之則倍勝於藥也善治病者不如善慎疾善治藥者不如善治食為醫士者宜留意焉

護養之法

至切心鑑卷

五

某氏曰將養小兒不可太暖熱則汗出而虛風邪易入乳不可太飽飽則胃弱易傷積滯難化千金論曰夏不去熱乳兒今兒嘔逆冬不去冷乳兒今兒咳痢葛氏曰乳者奶也哺者食也乳後不可與食食後不可與乳練小兒脾胃怯弱乳食易傷難以消化初得成積久則成癖成疳自我致怒又何咎焉張炳曰小兒周歲膝骨成能行此乃定法今之富家但令襁褓不令見地氣藏之幃帳不令見風日致令筋力緩弱但歲不行或非愛護之法湯氏曰譬之草不生於山林容易合抱至若園中異菓奇花常加培植秀而不實者有矣

養子日用無病在手醫者

更熱 喫軟 喫少 則不病



寒令 寒多 則生

凡三分寒 寒七分飽 頻揉肚

養子十法

一要背暖

經云背脊三顧下節兩傍是肺俞 一穴也若風寒傷於肺俞 經使人寒毛直皮膚閉而為病其 證或咳或喘或喘或喘或喘或喘 或吐逆及胃滿增寒壯熱皆肺經寒 而得也故背宜暖

三要肚暖

俗曰肚無熱肚肚者是胃也為木公之海若冷則物不腐化腸 鳴腹痛嘔噎泄瀉等疾生焉經云 熱而能消飯必能飲食也 故肚宜暖

三要足暖

經云其足是陽明胃之經所上 俗曰寒從下起此之謂也

四要頭涼

經云頭者六陽之會諸陽所聚 頭腦為髓之海若熱則髓溢 汗泄或頭顱腫起或頭縫開裂 或頭赤自疾俗曰頭無涼頭故 頭宜涼

一五要心胃涼

其心屬丙火若外受寒熱 按心火則內外俱熱也其證輕則 口乾舌燥顯紅面赤重則 時驚掣攣心胃宜涼

六者精神未全

小兒忽見非常之物或 未識之人或鷄鳴犬吠或見牛馬等

獸或喜戲驚嚇或聞大驚 而作搐者緣心氣乘虛而精神 散故也當用補心溫氣藥 之如用鎮心法水銀牛黃朱砂金 銀腦麝等藥則成慢驚風搐 如腹脹足冷者難救也

七者慢驚

經云脾為黃運胃為金運志 至五臟六腑若脾胃全固則津液 通行氣血流轉便表裏沖和 一身康健蓋脾胃屬土而惡濕冷 飲乳小兒多因變蒸上唇腫而 頭熱或上氣身熱父母不曉妄 作傷風傷食治之或以解藥出 或以食藥宜泄或以涼藥鎮 心或以昂蕪湯水擦額唇口致 令冷氣入兒腹內傷兒脾胃搏 於大腸故糞便青色久不已者 即吐而不已者作搐見兒作 搐又言熱即生風轉用涼藥治 之此敗傷真氣而不救者多

八者嘔吐黃青色

矣經云脾土虛弱肝木盛冷故筋 變而作搐宜用補脾溫胃下 氣藥治之其藥性溫則固養元 陽冷則敗傷真氣不可不知此 理也

九者勿服輕末

小兒在胎之時其母取冷過度 冷氣入於胎胞之中兒生之後 因悲啼未定便與乳妳使乳妳 與冷氣蘊蓄於腹內久而不散 傷兒脾胃輕則嘔吐黃青重則 腹中急響逆氣逆潮以致難愈

水銀粉輕粉味甘 性寒 下疔 損神

辰砂朱砂 味甘 性寒 下疔 損神

二味相合雖下痰涎其性又寒 又冷損心損神不可獨用也



小兒胎受壯實服之軟弱  
小兒胎受虛弱服之易燥  
新生襁褓孩下胎毒隱  
多致致胎害苦難救夫一未之  
所悞也

十者因洗浴生赤白丹毒

小兒一周之內皮膚肌肉筋骨髓腦五臟六腑皆氣血皆未  
堅固譬如草木萌芽之壯未經寒暑嬌嫩軟弱今嬰孩稱爲  
兒故也一周之內切不可頻頻洗浴以濕熱之氣鬱蒸不散身  
生赤遊丹毒俗謂之流丹如胎毒金瘡皆腫而壯熱若毒入  
腹者則腹脹硬氣以致殺兒此因洗浴而得也若肌肉寬緩膝  
理開泄包暴失宜復爲風邪所乘而身生白流皆腫而壯熱也  
或增寒壯熱鼻塞腦關或上氣痰喘咳嗽吐逆種種之疾因洗  
浴脫着而得也

責善

信夫執術爲醫荷負至重其  
一輕患有平得失稍失其理如育  
索塗事致疎虞於戲斷不復續  
死不復生哀哀之誠誰爲罹歎  
當知醫家一門上古聖賢測天  
微道詳氣四時逆順陰陽香通  
表裏然後察之五臟六腑三焦  
百脉究竟標本盈虧參審絕生  
變動代謝榮枯流行注脈如此  
知義少契古風然有僥倖侮訛  
狂暴輕欺者衆矣僥倖恃其時  
運以誇勝侮訛者道之亨通而  
慢易狂暴者不能務本與從師  
理欺者肆意妄執以爲是四者  
人事何嘗博古窮經明心盡性  
且邪醫之務業其道有四不可  
遺其一焉行之惻隱施之濟惠  
付之周至受之平等惻憫者每

務仁慈濟惠常加愛護周至者連  
用無虧平等者勿論高下如  
此推誠可稍入醫學之道若也縱  
恣身心嬉遊妄作及其  
臨時檢束以齊矧矩斯乃自敗之  
端殃積于後野老數年之  
抱術活人親見同道各有耽僻終  
不爲良或好籠養或貪博奕  
或網或釣或射或獵或謳或飲或  
歌或舞浪遊花衢在穿柳陌  
或習弓弩或縱聲喧嘩或樂烟粉  
詞或月風情可意此等用心  
不常僻性執異濫稱醫士得毋  
枉究物涉狂佞須知醫家者流  
幸志在前賢聖哲無時不習者  
守之以道分之以安天地間爲  
神明欽焉

通變

初生嬰孩至於童稚血氣未  
定疾病危虛大疾之存不可  
皇醫之欲安堂可滅烈至於  
學得中務令其善良工進藥  
若通則醫不繁機能變則藥  
者爲妙古云心通方學道思  
文墨但究確曾雖則嘔嘍  
者正理廣傳觸受咸知變者  
理今人處因革方欲食坐  
利豈可不知犬吠鷄鳴尤  
吐利驚疴五臟傳久暴  
其堪行即行堪轉即轉其



之施謀換策略智度討人此乃兵家之權術前為用  
診切視聽此乃醫家之權術一切所為皆由通達活人  
周功過於兵法主治存心而後其變此乃良工用心規矩  
其變且智不遺此乃儒夫用心操執常運其通而知其  
證而知其病生死預救危生不故斯乃上下之通達也  
字相連何由而通何因而斷乃下客之通達也  
變我即因其變而變之或輕或重而作我亦隨其  
重而理之通達之謂如是而已

難易

天地陰陽尚有盈虧世人陰陽自致順逆失其則度者正相  
干違其安和者慮災相及小兒一科古人云有難者必有  
全幼心鑑

然長幼受疾自是不同所有難易之言者非謂陰陽勝伏非謂  
傳變差殊非謂氣參差非謂臟腑虛實是以其難者為難  
之難達其候者認謂之易無以難證而妄謂之易無以易證而  
妄謂之難難易之功不出至誠窮理盡性為得之矣原上  
師範性恭古風是必臆記諸家明文旨歸要說更須端  
輕重較量凡觀男幼傳變又不可執於古意亦不可  
常情搜羅盡善究竟周旋無一證一假當運於其間方可  
舉十全之妙道者耶古人云心中了了指下難明小兒方脈指  
下易明心用了了其或不然然關蒙昧縱有生疎前功後  
之掌以重負利害不可自逞才能何堪稱譽家傳三世業未  
彰名蓋由滅裂用醫倉皇太急故有得失於戲既無深慮遠慮

豈有履寬多聞若求僥倖之功必害平生之福迂哉  
無虞性命相投豈可視為容易諸候未明切莫勉  
察之

參詳

調理嬰孩一科天下之難事也亘古從今著載未詳其議世有  
賢能之士未嘗廢業蓋此等方脈之術也然其察胃生理之妙  
無化馬所謂審察究詳按考惟係既已定矣不為難哉夫初  
然取次應急相投必致謬濫噫若者審察表裏終者察定陰陽  
究者究竟臟腑詳者詳悉標本按者按明虛實考者考較輕重  
推者推評前後備者備準端的八法于心十全保命口無泛語  
意無濫思脈無虛究藥無虛發凡看嬰兒先以視之為上聽聲

為次察脈又為次且以嬰兒所受胎氣去克其色白其形其  
氣怯其聲濁焉得顯顯者虛者信乃顯也固宜稍長不任變  
蒸緊于變蒸不備則形體不壯性情不舒疾病無情不有  
初生之兒所受胎氣充足其色其形其聲其氣壯其聲清焉得  
顯顯虛曠稍長漸受變蒸而變蒸滿則顯顯形固情充  
疾病經年不作為醫士者專誠守業毋浪游毋泛飲毋  
耽執用之則專專心不以淨泛遺之則穩今其絕疑無  
行用以明機變焉而致其每以法則不可輕易設意無  
性莫不及切須究竟學八過不及凡過臨危赴急看候一見  
人愴然者勿可向參而斷但如前八法明度而已若也視之  
常察之為妄視聽不專淨泛致亂虛作實作熱表為裏



通如此食皇安得不有疎謬今天摠與富項致謹系詳乃讀成  
全日用護助者即

傷憐

老矣見孫長大方于不惟驕然之甚復加愛憐傷夫不任用也  
既思既濃猶令咀嚼火閣既變猶令飲酌且蓋重衣猶令衣者  
無拍額愛摩衣妻作以手掌衣衣服妻拍背引風疾指物言最  
營因戲謔莫觀顯親心情內變危坐放手我笑渠惡欲令喜笑  
脇肋指礙門非仕宦莫與札脚年不及時莫常梳掠長裏無恙  
莫類服樂戲謔之物不可然樂刀劍兒具勿可與捉莫近埃埃  
傷志也莫拘鴛雀指眼也抱男看書抱女觀作女工作也男方  
學行勿縱綽略兒方學語勿令揮霍會坐莫久腰背却却行莫

全勿心經卷

十一

今早筋骨柔弱惡莫與顯善可與學順時調攝自然安樂雷馬  
繫鼓莫與掩耳眼目過時須令早起飲食飽飽酒當戒止非時  
莫衣常時莫羨羨疏宜淡滋味膿尿夜莫停燈書莫說鬼胎莫  
當風坐莫近水笑極與和哭極與喜智者當知撫育至理

食忌

普天之下產育既同將護之因有所不同者貧富之謂歟然富  
與貴飲食則具有所益於兒母貧賤又何以言之古人有二病  
不服藥謂之中醫正如此說外護寒邪內節飲食審物順時何  
疾之有前云富與貴傷其太過貧與賤用所不及然不及之意  
乃與中醫之言得其所哉且如幼孩之候數至其時溫熱有作  
令兒漸固舒展筋骨生長百脉和順經絡自然之理何必加藥

凡兒漸長必漸飲食東西南北地產其氣田種其物山有木  
野有藪草魚有溪池水有清濁人之所生隨土地之所宜飲食  
亦隨其所有南人不堪食北物以麩為糧以黍為食北人何有  
食南物以魚為菜以麩為飯磨城米近海散之鹹鹹居山食之  
野味北菓多涼南菓多熱東菓多酸西菓多苦宜多食五臟  
六腑強納疾病生焉凡小兒心之有病不宜食鹹國痛之有病  
不宜食佳苦肝之有病不宜食辛脾之有病不宜食酸酸  
之有病不宜食甘甜蓋由助其氣氣於我而通子焉能  
通心氣石榴餘掛大滋腸胃乾柿煮糜猶能益肺蒸藕炒豆於  
肝宜利五味准棗五味子是脾家可意肺病忌食肥膩鴨魚  
蝦油鹽雞醃醃之類脾病忌食生冷甜包氣之物謂饅餡

全勿心經卷

五二

包子餛飩鴨卵肚腹文餅皆包氣之物心病忌食心血隨腎竭  
羊多燻炮炒前燻等肝病忌食燥頭此指在津膩濕麵應小兒  
不問有病無病並不可與食酸子及肚痛心食令走馬疳候  
葱韭薤蒜姜蒜亦不可與食令心氣壅結水竇不通三焦虛  
熱神情不味飛禽雀雀不可與食令兒生瘡癩癩亦煩燥遺悶  
鮭素蝦蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹之類不可與食令兒積食積積積積積  
或痢或通或閉食甜成疳食飽傷氣食冷成積食酸損智食苦  
耗神食鹹閉氣食肥生痰食辣傷肝食味淡薄臟腑清氣乃是  
愛其子惜其兒故與禁忌若也恐與前說重與滋味乃是憐而  
不愛憐之有傷以至丁矣哺露疾作無辜救療無門海之不及  
育子之家當宜知之理宜戒之



小兒不宜食肉大早傷及脾胃致致蟲積

小兒食鷄肉生疔毒未三歲勿食

小兒食忌甜成疳飽傷成積肥生痰魚子辛辣酸熱毒尤不可食

審味

肝酸心苦及脾甘。肺愛於辛腎合鹹。所好即知其臟病。是將色脈與相參。

致味知病法

好食酸則肝病。好食苦則心病。好食甘則脾病。

好食辛則肺病。好食鹹則腎病。好食熱則內寒。

好食冷則內熱。

全幼心鑑

卷一

小兒簡謂已後逐物便與父母喜之或飲食之間必須以口物詞之此非愛惜之法乃成害之一端殊不知小兒脾胃嫩弱胃脆軟不禁雜物未能消化今之患食積疳積肚大面黃肚大腫小好覆冷地者得患皆由此也

撮要

小兒在胞胎必須飲食有常起居自若使神全氣和胎受常安生子必健

懷娠之後最忌食熱毒等物庶免兒孩兒有胎毒癩癧

乳母常須養其血和其氣樂以心愛使乳汗溫平縱兒孩作自

安平過半矣

初生兒必忌外客所觸庶免致客忤熱古人所以忌客一

小兒母容入神廟中恐神情閃爍必生怖畏

小兒患鼻孔黑如煤耳輪廓焦黑目翻指甲黑作鴉聲或吐

數聲及手尋衣求背無可治

小兒受病在腑有自愈者故先賢惟理其臟未言其腑腑陽

陰如肺子一證乃是肺病

小兒生殺道無字多致不救無速驗必假物透以通之

小兒入夏今經囊盛杏仁七箇去皮入鹽炒小兒佩帶之開

應效自然不權

小兒不可令就熱及瓶中飲水語言多訥

拔劍倚門兒不驚

小兒平常無病不必服藥餌恐遇疾不即為效

及幼攻補

察病必須明表裏 更詳虛實在初分 惡攻喜補人皆信

誰識攻中有補存

張子和曰人身不過表裏血氣不通虛實此言其大界

惟庸工之治病純補其虛不敢治其表裏世皆曰平穩

人不見其迹渠亦不自省其過雖終老而不悔且曰吾用

補藥也何罪焉病人亦曰彼以補藥補我彼何罪焉

亦不知覺此庸工誤人最深如絲淫泆水不知五行之

夫補者人所喜攻者人所惡醫者以其逆病人之心而不

見用不若順病人之心而獲利也豈復計病者之死生乎

蓋醫有賢愚人多謬誤以賢為非以愚為是不明標本



投藥餌自取危困徒切感慨所謂攻者萬病先須發散外邪表之義也外邪既去而元氣自復即攻中有補存焉其之義也然察其表裏虛實尤在臨機應變毋執一定之規矣

辨證早決安危

色脉參詳貴造微 早憑疾證決安危 將醫怕觸病家諱 病稍差池便死谷

為醫固難及幼尤難故醫士診視小兒之證僅色脉精明則死生可判若以恐觸病家之諱猶探其說不吐真情稍有差池必招其怨與其受怨於後孰若告之於先縱有危難亦復何怨昔扁鵲見桓侯曰疾在腠理不治將深桓侯

不信復見曰疾在骨髓雖司命無如之何後果弗起學者

於此觸類究心斯有得於扁鵲之妙旨

小兒無患歌

孩兒常體貌 情態竟殊然 鼻內乾無涕 喉中絕痰涎  
頭如青黛染 唇似點珠鮮 臉方花映竹 頰綻水盈蓮  
喜引方纔笑 非待子不宣 縱哭無多哭 雖眠不久眠  
意同波浪靜 性若鏡中天 此患俱安吉 何愁患再纏

小兒常安

四時欲得小兒安 常要一分德與寒 但願人皆依此法 自然諸疾不相干

望聞問切

望 鑒貌辨色 聞 聽聲知語 問 問病究源 切 切脉視絡

表病在六腑 裏病在五臟 汗在表宜汗 下在裏宜下 虛者宜之 實者宜之 冷者溫之 熱者涼之

望而知之謂之神 望而視其面部察其五色盛衰以決死生 聞而知之謂之聖 聞者聽其聲音及喘聲也

四時明潤色平安 醫士審度在胃襟 醫士審度在胃襟 清亮屬陽陰則濁

問而知之謂之工 活人書曰未診先問最為有準當問其母如兒吮乳乳口氣熱大小便秘澀則知兒是熱證如口氣冷大小便自利則知兒是冷證

切而知之謂之巧 切者看虎口三關一指脉

經曰望而知之者謂之神 聞而知之者謂之聖 問而知之者謂之工 切脉而知之者謂之巧 蓋理而知之者其望其五色以知其病也如左臉青色必知肝病肝色青應在左臉聞而知之者

是聞其五音以別其病也如多哭聲硬必知肺病肺主聲應於哭問而知之者是問其所欲五味以知其病也如人好食甘必知脾病土也味應於甘切脉而知之者診其寸口見其虛實以知其病在何臟腑也如寸口得芤脉必知心病心脉見則應寸口要之五臟之象可以類推五臟聲音可以音識五色形證可以目察善觀者能合色脉可謂神聖之巧也 脉訣云脉理精微其體難辯在心易了指下難明蓋小兒脉



尤難如大人也

察形證

湯氏曰有小兒疾病先觀形證神色而以味久之先微別其五臟各有所主次者稟受盈虧胎氣虛實陰陽分熱之證補過為多當救其失兼五臟六腑表裏各有相應配對若能明其標本則神聖工巧自然有之

視證

三因曰經云視精明者五臟精明聚於目精全則目明神定則視當察其面之五色乃氣之精華也赤欲如帛裹朱不欲如赭白欲如白玉光澤不欲如堊青欲如蒼土之澤不欲如藍黃欲如羅縵雄黃不欲如黃土黑欲如漆重澤不欲如炭察五色精敗則生死見立談間矣

觀形氣

觀形氣要精祖 稟受原來自不同 細察盈虧明部分

形者面形

神氣 小兒證候不可取之一端

在表裏相應

消息豈惟相鼓瑟者所能觀其形而知

其證哉信斯言也况小兒虛實有半索手肥瘦而係乎氣

名者何以言之蓋有肥而氣怯瘦而氣壯氣怯則色必嫩

其為虛可知矣氣壯則色必盛其為實可知矣由是論之

五臟之氣者形於面部肝青心赤肺白腎黑脾黃是也五

體肝旺於春心上於夏肺旺於秋腎旺於冬各七十二日

脾寄旺於四季後一十八日是其本位然有時乎不春不

冬而面變青黑者非肝之與腎也不秋不夏而面變赤白

者亦非心之與肺也蓋五臟之氣層見疊出隨證流形初

無一定勿然青黑主乎痛勿然赤者主乎熱勿然白者主

乎冷勿然黃者主乎積此其氣之開闔非係乎時非拘乎

位又如心主額肝主眼并左臉脾主唇之上下肺主右臉

腎主耳前頰音孩外其形或見於位或露於他部所謂不

可取之一端明其義也且脾主唇之上下為吐瀉或患痢

日久然其色黑則腎之乘脾水反克土名為強勝其臟或

敗耳肝主眼并左臉其色青本色也主驚駭風發動於是

為順證若見白色乃肺之克肝即為逆證以此推考變而

通之存乎其人學者留心于此誠用焉

論面部

嬰兒惟察其面部必有五色以知病源人身五體以頭為首首

中有面部中有睛睛中有神神者目中光彩是也隱顯橫逆應

位而見以應五臟五色者青赤黃白黑五臟之色肝青心赤脾

黃肺白腎黑五臟所主病證編其內必形色見於外小兒有病

先觀其本部形色以論其五行生剋吉凶形色若有相應然後

聽聲切脉

內臺秘論

男女十歲以前有不安者皆觀其氣色面上如青紅黃白從從

際至印堂不以疾壯淺深有者六十日必死若無者一月須







善理所謂多知多謀無效方善宜其廣知廣見深決是時會  
專誠良師致力不昧乎方學若行醫須盡其理至誠至孝難以  
述之務學惟精自得中妙

面部氣色總現

五位總作流波泛濺陽應照藍青色者驚穢不散欲發風候其  
神彩觀屬不穩上上下下證變風生

五位總作閃爍發射丹爐映大紅色者痰積壅盛驚悸增進其  
神彩視物不定恍惚惚候變驚速


五位總作混滾泥漿衣傳土培黃色者食積積傷欲作疳候或  
痺痞有之其神看顧散漫昏沉沉其候寒熱潮發飲食不飲  
氣虛短滿困倦喜噁嘔噦有之瀉痢有之

全身心鑑卷一

五位總作濺濺浮虛野露入穀白色者肺氣不利大腸滑洩水  
穀不分欲作吐痢其脾凝濁失其精神膝膝臃腫性情不有光  
滑全無五臟少實百脉多虛或土崩之後有失調補

五位總作漫漫點點反逆覆黑色者傳不順證變即逆候表  
裏有虧臟腑欲絕其血不榮其氣不衛榮衛失序經絡流注凝  
滯於脈為疾危惡其神昏沉沉沈默默者為人不久也

面部五色之圖



面青肝病  
面赤心病  
面黃脾病  
面白肺病  
面黑腎病

左腮為肝右為肺 額為心兮鼻為脾 腎主頰間誠別證  
更參五色識真機

假如肝病面青時 白色當春未易醫 此是肺金乘尅木  
其餘倣此例推之

唇紅面赤是傷寒 臉青唇黑是驚風 唇青面白是瘧疾  
面黃如土有食癥

痢疾頰頭皺 驚風面頰紅 渴來唇帶赤 熱甚眼朦朧  
面黃多積病 青色是驚風 白色多成瀉 傷寒色紫紅

青脉生於左太陽 一度須驚易審量 赤是傷寒微熱燥  
面青聲色乳為傷

面邊青脉不拘多 有則頻驚難奈何 紅赤為風抽掣目



青黑三朝命不過

五色主病

積黃青色是驚風 熱赤傷寒紫淡紅 黑痛白為虛冷嗽

更須隨部用神工

望聞問切醫士先之凡觀面形指紋聽聲察色聖賢圖內

載方冊固有詳矣但寓於小嬰孩多在懷抱手無垢膩則

指白皮嫩其紋顯而易見至三五歲者常會戲耍手弄泥

水則皮膚厚其紋隱而難辨參諸面部是為捷要紫黑

而紋或或吐怒而容變則倉卒難定必須聽聲有中風而

迷悶或久患而昏沉語遲失音口瘡咽痛尤非聞而知之

所能盡問證一節最為的當然幼幼方脈謂之望和雜指

長成語不足信有飽日饑日痛如是類者屢嘗試之每

究心及此初在父母審其得患之由以告醫士參詳則易

於調治多有病家不肯自言其致疾之始末而一聽醫士

之揣摩由是觀之問亦難矣必須診脈以決諸證於南北

稟賦不同施治之法亦當隨地虛實冷熱用藥可也若夫

造妙工夫粉無其他大學所謂如保赤子心誠求之專是

業者儘不盡此心之誠何以察不言之疾

五臟病證形色總見面部

青色者為驚積不散欲發風候

紅赤色者為熱為痰積壅盛驚悸煩燥增進

黃色者亦為熱為食積微傷欲作疳後或作疔癰若神思昏沉

其候初熱氣鬱困倦或嘔或瀉或瀉利

白色為寒為肺氣不利大腸滑泄以作吐瀉

黑色者為痛所傳不煩變證即為逆候榮衛失序為痰為癰

面者諸陽經絡所聚

面者五臟氣血之榮

臟者神之舍也色者

神之旗五臟衰則面

色必枯槁五臟充實


面色必光華色之光

澤者生色之大槁者

卒經以理為先察

其生死盛衰也

面者諸陽經絡所聚 面者五臟氣血之榮 臟者神之舍也色者 神之旗五臟衰則面 色必枯槁五臟充實 面色必光華色之光 澤者生色之大槁者 卒經以理為先察 其生死盛衰也





正口	常紅無病	乾躁肝熱	白虛
人中	黑腹痛蟲動	點點黑生刺	
山根	紫傷乳食驚	青人叫喚	黑危
印堂	青驚	紅驚熱	白無病
額	青驚	紅熱	
兩眉	紅夜啼躁熱		
兩眼	黑睛黃傷寒	白睛黃積	赤心熱
	青肝熱		淡紅心虛熱
太陽	紅血林	青驚	兩紋青第一驚
	紅驚	青惡危	赤傷寒
			右青驚
風池	紅熱多啼	黃吐逆	
金匱	青筋驚		
兩頰	熱赤啼哭		
額	紅熱		
年上	準頭近乘名年上	黃吐刺	赤吐刺
腮	紅紫痰氣	青驚	
承漿	黃吐	青驚	
危證	目無睛光	瞳人不活	眼上膜
			赤脉貫瞳俱死證也
	已上各有歌只載文繁大抵紅赤則熱	青驚	
	黃積或吐刺	黑色非病則危證也	
正口常紅四體和	青黃必定積驚多	乾燥脾家皆有熱	

黑色來時	何奈何		
人中若有	點點黑	只因瀉痢難愈	若還平滿出分明
任是	虛醫救不得		
鼻頭無病	要微黃	黃其長憂入死鄉	黑色必當煩燥死
靈丹	何必救其殃		
山根黑者	死來侵	紫色曾因飲食驚	青色必添人叫喚
醫士子	細察其形		
印堂青色	受人驚	紅白皆綠水火侵	若憂安然無病疾
鎮驚	定搐使安寧		
額上青紋	先受驚	忽然紅白命速逃	何如早早求藥
莫使	根源漸漸深		
兩眉紅色	夜多啼	紫色由遭風熱隨	若見赤紅千萬死
何須	苦拜神醫		
兩眼根元	本屬肝	黑瞳黃色定傷寒	白睛黃色皆因積
黑白分明	子細看		
太陽若有	兩紋青	此是皆緣第二驚	若憂安然無疾病
驚紋入耳	不惺惺		
風池若有	青黃色	其子必然多生逆	青色呼為小小驚
醫士	何用千金力		
金匱望之	青	却緣先受驚	用藥宜生草
兩頰赤色	曾經熱	多哭多啼無休歇	醫士見者不須憂
一張	清涼便喜悅		



年上微黃為正色 若平更陷天難察 忽然痢疾黑危後

霍亂吐時黃色深

鼻準微黃赤白平 土黃燥黑死並并 人中短縮亡因痢

蛔咬心烏黑主蛔死唇反傾

正口常紅號曰平 躁乾脾熱積黃生 白為失血黑如遠

青主驚風盡死形

承漿青色食時驚 黑主驚風所感生 吐逆心黃紅則痢

要須子細與推尋

兩眉青者斯為言 霍亂纒生黃有餘 煩燥夜啼紅色見

若其久病赤遠殂

白睛青色是肝風 片是黃絲有積火 或見黑睛黃色現

傷寒病證此其蹤

風氣二池黃吐逆 若還青色定為風 驚啼煩燥紅為驗

兩頭如蓮客熱攻

太陽青色驚方始 紅主赤林等藥起 欲知死候是如何

青色從眉生入耳

兩眼黃痰實 如紅風熱攻 若還青色現 客忤定相衝

赤色形雙頰 傷寒候已叢 或然黃氣露 有積定非空

風門黑疝氣 青主水驚來 或然紅光現 端知風熱災

兩頰青色吐蟲定 黃黑須知是滯願 金匱一紋青若見

遺驚三次復奚疑

黑色連眉入耳來 其人七日定哀哉 黑如噤口一日死

唇黑仍兼不食埋

分五臟五色面部形候

左頰屬肝 東方之應其位居左脉訣云青形象木位列在東方

右頰屬肺 西方之應其位居右脉訣云兌為八卦地金屬五行牽

額上屬心 南方之應火性炎上脉訣云象尚隨夏旺屬火向南生

鼻上屬脾 中央之應其位居中脉訣云旺時隨四季自與土為根

下頰屬腎 北方之應水性潤下脉訣云旺時隨四季自與土為根

難經曰上臟有五色皆見於面素問云伸之變也其華在面又

云視其五色黃赤為熱白為寒青黑為痛此所謂視而可見者

也錢氏云左頰為肝右頰為肺額上為心鼻上為脾下頰為腎

赤者熱隨證治之

定四季色各歸部位

春色 左頰微青者平深青者病白色者絕

夏色 額上微赤者平深赤者病黑色者絕

秋色 右頰微白者平深白者病赤色者絕

冬色 下頰微黑者平深黑者病青色者絕

季色 鼻上微黃者平深黃者病青色者絕

季色者四季月各十八日土旺脾

分五臟面部病證

額上心證

赤色者心經有風熱主心燥驚悸睡卧不安身黑心中邪

主驚風腹痛善鑑云心乃中邪手攪縱而啼吐青黑甚則心腹



赤色身熱拘急肝風熱也青黑主驚或腹痛淺赤潮熱心煩有  
一尋小兒夜間潮熱日中面臉不安必唇紅乾燥恐驚不宜兼  
診脈緊數

左臉肝證

赤色身熱淺色潮熱或大便堅而氣逆喘嗽青白色主咳嗽惡  
心青色主風入肺時時咳嗽青黑主驚風欲發或腹痛嬰兒驚  
風內癇

右臉肺證

赤色身熱不思飲食深黃色小便不通鼻孔乾燥主衄血  
腎虛云鼻乾喘息鼻氣有聲主衄血鼻孔乾燥下氣逆是肺熱  
夜間多鼻上淡白色主洩瀉食不化王氏云鼻清主吐如鼻中  
乾燥主大小便不利萬全云鼻頭黃色小便不通

鼻上脾證

赤色主膀胱熱膀胱與腎為表裏有熱則水道不利令小便不  
通

下面腎證

分面部雜病證

面目證

青色驚肝風熱赤色心肝熱  
煩燥風熱黃綠色主脾積口臭可  
食目鮮主驚目眦肝風熱主癇  
目灼浮腫主久數惡心如不數

赤色身熱拘急肝風熱也青黑主驚或腹痛淺赤潮熱心煩有  
一尋小兒夜間潮熱日中面臉不安必唇紅乾燥恐驚不宜兼  
診脈緊數

印堂證

青黑色主腹痛夜啼靈秘云印堂青黑夜啼如傷風主頭疼不  
傷寒主久刺靈秘云拘疾眉頭皺王氏云有中心淡白色主瀉  
瀉糞白食物不化

人中證

黃云人中左右兩邊黃主傷食人中下青主乳不化便青  
秘云人中單下俱青亦主乳食不消

唇口證

唇白主吐涎嘔逆亦主吐血便血唇紅赤乾燥而皺者主瀉  
秘云渴來唇帶赤唇紅赤不皺主口臭大便不通夜間心躁不  
睡紅乾而燥主驚王氏云唇乾燥主熱口臭大便多赤夜間煩  
燥顛斗又云口臭唇黃脾受積後必發腫亦至夜起糞白不化  
又云唇口紫吐涎主蟲痛唯仙論云唇口紫不吐涎是積滯  
秘云口四畔黃如橘暉之積熱千金云唇赤主心熱口舌生



槍至聖訣云唇紅赤主嘔  
唇白亦然唇口動主驚熱秘云  
唇口動是驚熱重又云口流  
清水欲生重舌又主口瘡有一等  
小兒脾冷流涎下頰常濕  
滯頰不在此條錢氏云口頻撮氣  
不和益黃散又云血虛怯死  
脾寒或時壯疼乳食減少

舌上證

舌乾舌白舌黑舌燥舌胎舌  
黃舌赤腫主大便不通或通利  
大便必焦黃舌裂舌上芒刺  
舌上出血皆熱極陽毒也舌上生  
瘡心脾熱舌捲主驚有久瀉  
糊舌黑必潤不可認為熱蓋久痢  
上焦虛熱久瀉痢舌黑必潤  
死不治

氣噎證

全加心醫家

目

氣噎不通必主驚候靈秘云  
噎飲須知死歎氣噎氣下氣頻呵  
欠主驚

兩耳卷

上氏云耳前微赤主耳聾  
黃主腎驚睡中咬牙耳輪乾燥  
主肝骨蒸熱

分面色相兼病證

面色淡白

主惡心可食驚瀉面青白主  
生瀉靈秘云主驚風欲發又云面  
青白主軀身哭胎受邪驚  
云面青白軀身哭腹中受邪上氏  
云面青唇白主吐奶不化  
云難經云證面白喜定悲愁不樂  
只欲哭

面青黑色

吐沫者痛不吐沫者食  
積痛亦主驚靈秘云主天釣風面青  
通身熱發燥多變痢疾面  
目有汗口內氣熱必發  
證出靈秘云面黃夜  
泣者寒忤面青黑主天風  
呼已上四證皆靈

面青臉赤

上壯熱驚搐面青白黑往  
來不定主心腹痛發有無時靈秘云  
臉赤面黃白主心疳壯熱  
金云面赤目黃主小便不潔通真  
子云面青筋急或多喧鬧  
驚思不見

面紅赤色

主傷寒發熱心燥不安若  
鮮欲驚發狂靈秘云主身熱傷風  
又云面紅變易主驚搐  
云面紅主身熱傷寒通真子云面  
赤心煩仍喜笑

面黃臉赤

上傷寒潮熱發熱時不安  
如肉內微微赤者主疳食初熱  
氏云心疳面黃臉赤身壯熱  
安神圓主之

面黃白色

主疳積大便不調夜起食不  
消嘔逆寶鑑云面黃白有積靈秘  
云面黃白主脾肺有積通真  
子云面色萎黃為痢無時錢氏云  
面脫白氣欬腹肚疼不思  
乳食

面黃青黃

主脾熱白黃痘發靈秘云黃  
面黃青黃為痘發云此證多於大



病之後不因病及身微黃者胃熱而黃壯大脾乾初生嬰兒黃胎疸

頭面青筋

見者將欲發驚因執必作搐因吐必肚疼若頭面大小青筋如綠繩透起者急治不爾使搐搦則進退難痊

非時弄色

面色不定謂之弄色面色非時變易不定者是治風有餘亦主容悴面色或青或白或黑不定者心虛冷痛

右前形候雖已各部分列疾證後之學者恐難記謹今於各部內將面色之圖形候病源懸成歌曰庶幾易記亦無忘於膏臆云

五臟通於舌

心竅通於舌

心為臟小腸為腑心色赤主夏三月心味苦心液汗心養血心聲言心氣呵有餘笑不足憂千金云心氣實則笑不休虛則悲不已

肝竅通兩目

肝為臟膽為腑肝色青主春三月肝味酸肝液泪肝養筋肝聲泣肝氣嗔有餘怒不足悲千金云怒則目眦則虛

脾竅通唇口

脾為臟胃為腑脾色黃主四季脾味甘脾液涎脾養肌肉脾聲歌脾氣呼有餘腹滿不足少氣

肺竅通鼻

肺為臟大腸為腑肺色白主秋三月肺味辛肺液涕內主氣外養皮毛肺聲哭肺氣哂有餘喘不足嘆息

腎竅通兩耳

腎為臟膀胱為腑腎色黑主冬三月腎味鹹腎液唾腎聲呻腎氣吹有餘腸澼不足則厥逆

右前證候內有二條

萬全方云稱脾有餘腹滿其間有虛實二證腎有餘腸澼亦有虛實二證蓋當時不曾分明注不可一例取之素問云形有餘則腹脹溼澼不利不足則四肢不收

脾之臟也脾氣虛則四肢不收五臟不安實則腹脹溼澼不利小便難也


千金云腹滿按之不痛者實按之痛者虛素問云志有餘則腹脹腹澼不足則厥

腎之臟也腎臟精精合志腎氣虛則厥實則腹脹

五臟受病圖



肝受病圖



驚風髮際白  
受積食倉黃  
面青爲冷候  
眉赤熱爲殃

自髮際下至承相印其色淡白爲肝受驚

自食介至耳前色黃主肝受病


面青目黑爲肝受冷

正眉赤色爲肝受熱

全紅心驚

十一

心受病圖



心驚有鼻赤  
積後起太陽  
熱多面頰赤  
冷即目無光


自眉心微赤心驚生風下至耳前爲惡候

太陽亢虛心受積

面頰赤色爲心受熱

太陽黑目無光爲心受冷

脾受病圖



脾驚髮際倉  
有積口唇黃  
冷即有心白  
熱則太陽堂

髮際色微青爲脾受驚候

口唇黃色爲有積


中嶽白色爲受冷

太陽白色爲受熱

全赤心驚

十二

肺受病圖



髮驚赤爲驚  
髮際赤爲驚  
冷在人中見  
熱頂面頰青

髮驚赤赤爲肺受驚


髮際赤爲肺受積

人見隨四季見色或青或白爲肺傷寒冷

面頰色青白爲肺受熱候



腎受病圖



驚入下所真  
眼沉積所傷  
冷觀額上紫  
熱變食倉元

耳前亢黃為腎受驚

眼胞深沉為腎受積

額上色紫為冷入腎

食倉色赤為腎有熱


分定五位所屬圖

肝臟部位




風池與正眉氣池泡皆額上下形動處太陽及天陰達及山根  
所皆屬肝之部位

心臟部位



額面臉頰心火所屬氣池之下法令之傍食倉之上古骨取之  
一寸八分皆屬心之部位


脾臟部位



承漿之上人中之一法令之內食倉之傍其合即唇其開即口  
合即屬脾開即屬心四方二寸內分據對之皆皆脾之部位




肺臟部位




鼻頭至山根兩孔并中梁皆頭直下年上壽上裏外通息皆屬肺之部位

腎臟部位



耳花及輪廓文臺山林順髮際兼地閣四維如海岸皆屬腎之部位

命門部位



天中與天庭 司空及印堂 額角方廣處 有病定存亡  
青黑驚風惡 體和滑澤光 不可陷兼掄 純黑病難醫  
青則甚憂急 昏黯亦堪傷 此是命門地 醫士觀較宜

變五臟受驚積冷熱形證圖

肝臟受驚候起髮際其色淺白若至承相印變驚風渾身發熱  
夜間多啼宜下驚風藥若退即可調治若其色不退下至東嶽  
即有死候耳前完黑金尅於木若是外候鼻乾燥眼睛吊上肝  
主筋筋縮則睛無光即是腎絕童子不轉即是肝絕爪甲黑也  
肝臟受積候起食倉其色微黃下侵齒候眉即是受積黑睛黃赤  
早晚發熱則多愛睡乃有死候啼哭無泪是也


肝臟受冷候面青淡白眼中淚出齒齲淡白口吐清水大便酸  
氣目中多睡夜間前迫者是也

肝臟受熱候起正眉薄薄赤氣即衝承相心暴於肝兩眼亦赤  
多有眼脂小者吐奶大者吐食有痰生一風早晚發熱多啼少睡



肝屬東方木

肝驚起髮際  
肝積在食倉  
肝冷面青白  
肝熱正眉常



心臟受驚候起印堂其色微黑下至眉心赤則生風若至食積  
即有死候皮無血色更生黑脈水赴於火惡即兩日亥子難過  
兼有外候則多焦渴乳不收舌出口外是也  
心臟受積候起額角太陽穴虛兩眼白赤小便如泄面合地則  
大極即吐熱氣此惡候也

心臟受冷候起太陽黑筋脈子來侵印堂面色淡赤日即無光  
裏轉如食口吐清水日多煩渴也

心臟受熱候起面頰更加赤色多驚少睡髮乾頰渴鼻下赤爛  
口氣衝人牙牀惡臭睡計開口多煩燥外候則吐蟲也


心屬南方火

心驚印堂上  
心積額角亮  
心冷太陽位  
心熱面煩裝



脾屬中央土

脾驚止髮際  
脾積唇應黃  
脾冷有中欬  
脾熱亢太陽



脾臟受驚候起髮際其色微青即轉於肝若有心其色漸赤  
即轉於心若至鼻柱其色必白若分兩耳黑氣連之即生驚風  
如此不退周時必死其候生唇不盡齒口無津液此是脾絕  
四肢垂冷胃主四肢即是胃絕不中理也五日後其死其  
外候則瀉黑血也

脾臟受積候口唇黃色兩眼沉腫早晚面浮太陽穴調外候頭  
痛腹脹大便食不消化頻頻夜起傷冷則瀉白糞若臟熱則赤  
若冷熱不調則赤白痢

脾臟受冷候起眉心中微其色淡白來侵量柱又及玄珠即是  
外候黃白食不消化泄瀉無時下應唇白乃脾逆也面色黃赤此  
脾臟受熱候起太陽亢白薄皮起如竹托口唇乾燥兼有口氣

外候若起大便亦赤夜間煩燥頭叫是也



肺臟受積候起髮際其色微赤傳於司空則生瘧風外候氣喘  
無力多喘者若上玄常即生死候作鷓鴣聲喉中細突無痰鼻乾  
黑燥者是也


肺臟受積候起髮際其色微赤下至眉心肺脈應心若至鼻梁  
更到準頭即是死候若氣喘急不迴者只三日于未時難過  
肺臟受傷寒候起人中下至承漿亦到下頰其色若春即青夏  
即赤秋即白冬即黑外候鼻涕流兩眼赤者南類亦喘熱寒等  
其惡候則面黑咬人鼻黑身熱氣喘不定是也  
肺臟受熱候起面頰其色青白到衝金粟若是外候鼻中出血  
夜間之啼又即煩渴其此為症也

全初心鑑卷

六

肺屬西方金

肺驚髮鬢赤  
肺積髮際成  
肺寒人中見  
肺熱面臉傍



腎入腎臟候起耳前穴其色微黃下侵潮口若起外候  
牙乃候下關則生惡候而

積入腎臟候起兩眼深沉其色微黑眼睛微赤外候傳  
腫頭上頰門生瘡較後耳  
冷入腎臟候起額上色紫  
淚亦多也少精光也  
熱入腎臟候起食食其色  
外候耳重多有耳脂小使  
微赤下到準頭而還日久兩眼  
微赤是也

全初心鑑卷

六

腎屬北方水

腎驚耳前穴  
腎積眼胞睛  
腎冷額色紫  
腎熱赤食食





五臟分部定位

肝部所主

眼睛有光 內藏其神 外究五輪 眶收屬脾 熱則生眵  
 兩皆屬心 執痛如針 白屬肺家 熱赤生砂 黃屬肝脈  
 昏翳障障 中心瞳人 腎熱不明 兒孩眼目 痛即便哭  
 良方對治 更與思壽 或患丹瘡 後裏為殃 經效良藥  
 速療無妨 眼本屬肝 怯熱怯寒 今有治法 極理何難  
 眼忽連取 驚風交雜 忽然窺視 驚風已至 肝絕定睛  
 或翻無神 瞳去中陷 十無一生

心部所主

眼睛直下 高骨之中 名之曰顴 顴下名百 百裏名臉

面部名類

面外名類 顴百臉類 屬心無別 黑即沉困 青即驚悸

赤心發風 白乃疳氣 虛黃為積 浮腫氣逆 相順則安

相斗則吉 相反病非 相對謬矣 醫士喜之 平常不動

良士惡之 其色反弄 應病弄色 九分不得 心絕何因

大耳數聲 過關不叫 必作鴉聲 夫人一身 主事于心

心不可病 神散呻吟 兒心宜 緩熱傷神 神既昏亂

當與調榮 藥劑主心 心為身主 常安佳語 忽然加熱

謔譏駭汝 心要常清 邪工不寧 醫士究竟 藥宜亂陳

脾部所主

唇即口門 語言之尊 舌居其中 飲食之宗 齒牙咀嚼

咽喉相約 牙質既剛 角唇利尚 嬰孩未定 唇口元疾

上即人中 下乃承漿 上下四方 皆屬脾經 口內屬心

心脾有熱 舌瘡唇烈 三焦燥熱 唇紅如血 深紅重渴

輕即流沫 顴口膜口 木舌重舌 脾肺熱乾 口內噴鼻

脾腎氣寒 色如死肝 大驚一熱 口乾唇白 時時積聚

漸新傳心 心氣不足 今兒爛矣 何知脾絕 胎甲皆黑

目無神光 醫士知亡 五種撮口 驚風最惡 可醫識方

無過莫錯

肺部所主

鼻孔名井 竈尖處名 準眼頭尾 名大小背 中央坎陷

名山根若 鼻孔黑如 煤即肺經 焦或作黑 燥如黑者

即肺家絕 其候難治 鼻中赤瘁 疔成爛鼻 或瀉白塗

膈塞困寐 或流清涕 傷風毒喘 肺熱鼻塞 因心火得

有妨吻乳 關緊閉阻 感風寒邪 熱亦如此 鼻下生瘡

潰爛即疔 鼻中常臭 積熱為咎

腎部所主

耳穴之前 名曰耳花 耳弦名輪 輪裏名廓 輪廓焦黑

腎家虛熱 其黑如炭 腎絕死且 耳門生瘡 衛損非常

耳中膿出 腎熱痛極 臭名特耳 膿汁不止 瘡牽如刺

其候虛熱 忽聽不聽 心腎氣壅 常任開閉 氣氣上攻

或作蟲刺 榮虛微熱 耳輪如冰 麻痘相侵 耳輪紅熱

傷寒是則 熱極內痛 腫氣相攻 清心涼腦 關竅通塞

竟發兩腎 當虛無病 若有攻繫 使令無益



五臟五色本位

心主紅 脾主黃 肺主白 肝主青 腎主黑

五行相生

水生木 木生火 火生土 土生金

五行相克

金剋木 木剋土 土剋水 水剋火 火剋金

五行本生相侵

心氣侵黃 脾氣侵白 肺氣侵黑 腎氣侵青 肝氣侵紅

五臟生本相臨

心氣臨青 脾氣臨紅 肺氣臨黃 腎氣臨白 肝氣臨黑

五臟勝伏相交

白色交心 黑色交脾 青色交肺 紅色交腎 黃色交肝

五臟受敵剋入

青色入心 紅色入脾 黃色入肺 白色入腎 黑色入肝

五臟畏愛

肺本辛金 肝本乙木 脾本丙火 心本丁火 腎本癸水

五臟子母生成

肺是母是子 腎是母是子 肝是母是子 心是母是子 脾是母是子

五臟伏敵喜傷

肺所伏者心所敵者肝所喜者辣所傷者信也 肝所伏者脾所敵者心所喜者酸所傷者怒也 脾所伏者肺所敵者脾所喜者甘所傷者憂也 心所伏者肝所敵者肝所喜者苦所傷者喜也 腎所伏者腎所敵者腎所喜者鹹所傷者恐也

和則情性悅樂疾主驚癲恐悸虛燥啼叫譏語狂煩涎流口角

和則消穀氣美飲食疾主嘔噦泄積虛痢痞癖潮熱不思乳食

和則魂神壯意智生疾主風痺搖擗眼目腫赤疼痛

和則情性悅樂疾主驚癲恐悸虛燥啼叫譏語狂煩涎流口角

和則消穀氣美飲食疾主嘔噦泄積虛痢痞癖潮熱不思乳食

和則魂神壯意智生疾主風痺搖擗眼目腫赤疼痛

和則情性悅樂疾主驚癲恐悸虛燥啼叫譏語狂煩涎流口角

和則消穀氣美飲食疾主嘔噦泄積虛痢痞癖潮熱不思乳食

和則魂神壯意智生疾主風痺搖擗眼目腫赤疼痛

和則情性悅樂疾主驚癲恐悸虛燥啼叫譏語狂煩涎流口角

和則消穀氣美飲食疾主嘔噦泄積虛痢痞癖潮熱不思乳食

和則魂神壯意智生疾主風痺搖擗眼目腫赤疼痛

和則情性悅樂疾主驚癲恐悸虛燥啼叫譏語狂煩涎流口角

和則消穀氣美飲食疾主嘔噦泄積虛痢痞癖潮熱不思乳食

和則魂神壯意智生疾主風痺搖擗眼目腫赤疼痛

和則情性悅樂疾主驚癲恐悸虛燥啼叫譏語狂煩涎流口角

和則消穀氣美飲食疾主嘔噦泄積虛痢痞癖潮熱不思乳食

和則魂神壯意智生疾主風痺搖擗眼目腫赤疼痛

和則情性悅樂疾主驚癲恐悸虛燥啼叫譏語狂煩涎流口角

和則消穀氣美飲食疾主嘔噦泄積虛痢痞癖潮熱不思乳食

和則魂神壯意智生疾主風痺搖擗眼目腫赤疼痛

和則情性悅樂疾主驚癲恐悸虛燥啼叫譏語狂煩涎流口角

和則消穀氣美飲食疾主嘔噦泄積虛痢痞癖潮熱不思乳食

和則魂神壯意智生疾主風痺搖擗眼目腫赤疼痛

五臟病證

肝主風實則目直大叫呵欠項急頓悶虛則咬牙氣熱則外主氣濕則內生

脾主困實則困憊身熱飲木虛則吐瀉生風

肺主喘實則悶亂喘促有飲水有不飲水虛則噎氣長出氣

腎主虛無實惟瘡疹嗜實則黑陷

更當別虛實證假如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也若目有大斗哭項急頓悶者難治蓋肺久病則虛冷肝強實而反勝肺也視病之新久虛實虛則補母實則瀉

肝病哭叫 呵欠頓項急



心病多叫突驚悸手足動振發熱飲水

脾病困睡遺瀉不思飲食

肺病則亂噎氣長出氣短喘急

腎病無精光畏明體骨重

五臟相勝輕重

肝臟病見秋木旺肝強勝肺宜補肺為肝輕者肝病重者厚  
白而硬

心臟病見冬火旺心強勝腎當補腎治心輕者病重者下竅  
赤語腎怯虛也

脾臟病見四季土旺皆做此治之順者易治逆者難治脾怯當  
白而赤黃五臟相反隨證治之

肺臟病見春金旺肺勝肝當薄肺輕者肺病重者目淡青色  
發驚更有赤者當插為肝怯當目淡青色也

腎臟病見夏木勝火腎勝心也當治腎輕者病重則悸動當  
插也

五臟相生刑克

肝屬東方木心屬南方火脾屬中宮土肺屬西方金腎屬北方  
水所言肝屬木肺屬金肝却見水沉肺却見水浮者何也肝者  
謂水所生又行其陰道被水土所勝故見水而沉及至黃熟遷  
其本性却又浮也其肺者金所謂心之相近又行其陽道所以  
被火抽見水權虛浮及至黃熟後遷本性而卻沉矣

形候驗病歌

額上青色

額上多青色 驚悸不安 赤時身壯熱 黃燥汗難乾

素問云心熱者顏赤赤氣合火火有於指象明候故候於顏頰也

毛髮黃色

毛髮燥乾黃 驚狂體似湯 熱除須有汗 微渴意恹惶

毛髮燥乾黃 驚狂體似湯 熱除須有汗 微渴意恹惶  
素問云肺熱者毛黃毛黃者肺熱也

左臉赤色

左臉連頰赤 身軀發熱時 肝弦筋脈急 驚哭之攢眉

身熱攢眉主頭痛不熱攢眉主下痢素問云肝熱病者左臉先  
氣合木木氣應春南面正理之則其左臉也

右臉青色

右臉顯青白 時時咳嗽頻 痰涎多嘔噦 不食少精神

素問云金之氣應秋南面正理之則右臉也  
兩臉赤色 感風而赤者多

兩臉微赤因潮熱 夜間發作日中歇 久則令兒氣血虛

骨肉如蒸四肢厥

有等小兒兩臉微赤是血氣壯實自然也非熱所作若臉赤有熱者  
色必燥燥者去之氣虛則發厥謂手足冷也血虛則發熱謂肌肉熱也

兩臉青色

兩臉顯青黑 多啼勿奈何 驚疾是進退 臍腑不安

鼻燥黃色



單燥身羸促 孩兒衄血因 黃時尿不利 赤色熱多噴

單燥白面

單燥兒多哭 皆因肺熱為 白青連口鼻 吐瀉冷傷脾

目鮮青面色

目鮮目眇目青驚 目眇肝熱已成 一臟戰爭風火盛

肝主風主火

看看搐搦動雙睛

較以目亦兼青欬後搐口直面青身尺強直風三壯風熱日連取萬

全方云若目睛青赤左脇下必便多便多吐逆家論謂云目睛青赤王

瘳塊也

眼睛黃赤

有積眼睛黃 春冬骨似湯 夏秋多為痢 飽脹嗽難當

眼睛黃赤

兩目赤浮腫 皆因又效為 睛黃連有積 潮熱有瘡瘡

亦有目如腫不救者因食積積傷久必虛腫有目腫脹者必利色一無

常

眼深黑色

眼深微黑睛微赤 必主三疳腎受積 眼稍如有細紅筋

內釣驚風是跡跡

印堂青色

印堂多青黑 腹痛夜頻啼 每臥時驚悸 無懼日慘凄

眉目雜色

攢眉因下利 疳積面黃浮 吐瀉形容日 厚乾渴不休

傷寒身熱攢眉者主頭眩

人中黃色

黃色人中旺 兒因食物傷 形青便澀沫 脾胃不交康

唇白紅色

唇白兒煩吐 兼成失血形 紅赤亦自唇乾唇皸渴 夜熱不安

寧 久渴瀉尿紅是虛證不可涼藥

唇中黃色

有積唇黃色 看看作腫形 脾虛多夜起 糞白臭酸腥

唇間青色 唇色不故青黑主喘又癆痘瘡出不透喘唇青黑

色不治

唇青脾胃怯 腸冷痛非常 畏食多嫌乳 增寒白面黃

唇焦赤色

唇青赤色唇焦赤者脾之氣熱氣以唇焦 腸中糞不通如

後血氣不復故令唇青

唇間紫色

口白舌燥唇焦赤者脾之氣熱氣以唇焦 腸中糞不通如

遲利必焦黃 氣麤多作熱 睡卧不和同

唇上紫色

紫色唇間見 涎流口畔垂 細蟲及刺痛 久則致疔疔

涎流唇系細蟲積

痛作疼時汗出多 虛若痛來脾胃冷

五消積滯保安和



古上雜色

舌白乾焦燥 烏黃並熱為 小便難且澀 心火漸蒸肝

如小便澀少燥黃舌腫厚急欲乳不能吸者此因熱客入兒膈流入心

脾即古厚唇燥不食心熱入心散導赤散黑魚切片于匙上上百草霜

聖等分利金舌上下赤黃舌上出血舌腫舌上赤利舌黑舌

赤並假地黃甚

耳前赤色

兩耳前微赤 疳攻必耳聾 微黃驚入腎 夏齒齲魂中

頰下微黃赤主之或曰女子無腎素問云胞胎者繫腎

眇白青色

眇白青形而 心燔瀉又驚 軀身而腹痛 臍膈作雷鳴

面青赤色

面色青兼赤 敬求熱已成 色青腸胃冷 腹痛但啼聲

面紅赤色

紅赤傷寒面 心煩熱不安 眼鮮驚必作 風盛變多端

有等小兒面黃赤赤者發熱傷寒壯熱者必唇乾燥或氣微促也

面黃白色

面黃皆見 心燔瀉不調 因傷常夜起 乳食不能消

面黃赤色

面色黃兼赤 驚疳發病因 睡中多啼哭 潮熱俱精神

胃熱黃色

胃熱身金色 脾蒸面眼黃 不宜腸自利 黃疸病難當

面青青色

頭面青筋起 眩煎不肯眠 身軀才發熱 驚天撼地拳

面部雜色

唇紅面赤睡難安 頭黑青筋驚氣蟠 冷氣入腸成內疝

虛風在胃變多端 軀身啼哭非為祟 掛頸啼聲欲作癩

不久自伏驚搖候 陰陽邪正互相干

非時弄色

弄色非時變 胎風客忤驚 紅青須發搐 兼黑痛分明

錢氏云病重面有五色不常不澤者死孫氏云弄色為大色者死

下頰赤色

微微下頰赤 熱聚小腸中 結滯腸內 令兒

熱不通

本問云腎熱病者噴先赤腎水入水水性潤下指象明痰攻候於頰舌書

有一證云面青目赤黃小便澀異常亦主滑

辨王氏是非

魚目定睛夜死

魚目定睛是肝絕肝木也外應睛睛定筋絕不能轉也筋

屬肝目中瞳人屬腎主以云腎主眼中瞳人腎絕瞳人不

動腎水也水生木令母子俱絕近死在申酉時遠死在庚

辛日何以知之肝屬木申酉時與庚辛日俱屬金金能剋

木故知至期而死也

面青唇黑書云



面青唇黑是脾絕脾土也外應唇唇黑是水絕土能克水  
本脾土絕腎水反尅面青木色木尅土奈脾氣又絕近寅  
卯時遠死在甲乙日何以知之寅卯與甲乙日皆屬木木  
能尅土故知至期而死也

啼而不哭是痛

啼者有聲來往啼叫無泪是腹有痛處王氏云盤腸氣痛  
而帝無泪寶鑑云夜啼為腹有痛處而金方云夜啼者由  
臟冷也夜則陰盛陰氣相感痛甚故令夜啼也以此  
證其啼而是痛也

哭而不啼是驚

哭者連聲不絕哭泣多泪是驚悸也錢氏云心土驚實則  
哭叫王氏云自言多哭是驚入心肺風熱也其理乃是驚  
也

嗔前不安是煩

嗔煎者心經有熱精神恍惚內煩不得安千金云心熱煩  
滿扁鵲云煎熬必心煩煩則熱熱則自然生驚

嗔唯不定是燥

嗔唯者心經有風邪精神恍惚內煩不安片錦云小兒嗔  
唯心燥生風孫氏云熱多不安煩久而驚風多不定燥久  
而搖

小兒得病之源

大喜後乳食多變驚癇

喜傷心大喜後乳食則傷其心錢氏云心主驚驚是癇也  
又云大喜乳食多成驚癇素問云暴怒傷陰暴怒傷陽孫  
真人云傷陰則瀉傷陽則驚

大喜後飲水多成喘急

喜後飲水則停於上膈今胃喘急通真子云喜後飲水水  
傷於三焦令氣息喘急聖惠方云汗後飲水必成喘也蓋  
喜傷心汗亦屬心故也

大哭後乳食多成吐瀉

哭屬肺大哭後乳食則傷肺肺氣逆則作吐瀉故肺與大  
腸為表裏錢氏云大哭後乳食多成吐瀉杜氏云哭時乳  
食必熱吐瀉

大哭後飲水多成嗽噎

哭屬肺大哭後飲水則氣逆不利成痰嗽氣喘聖惠方云  
飲水積結不散故成痰也又云肺水氣乘之則多咳嗽也  
倉公曰哭人飲成氣噎嘔吐咳嗽痰水

大飢後乳食多成腹痛

孫真人云飢人急食則成腹痛修真秘訣云飢食過多成  
結積聚又云凡食不用急急則不細不細則傷脾胃氣偏  
鶴云大飢急食久成癖塊面黃

大飢後飲水泄瀉肚疼

飢後飲水則冷濕傷於脾胃氣受濕則令腹痛道書曰飢  
後飲水成泄瀉肚疼素問云濕勝則瀉聖惠方云飲冷過



多結在心下故令心腹

大飽後飲水多成氣逆

素問云飲多則肺布葉一作散氣逆而上奔也故能生痰疾  
道書曰飲水過多成痰逆氣逆養生云飲水莫吐噤久成

氣病

大飽後迎風多成暴厥

大飽則食氣上衝心肺之間未散半被風冷所傷故暴厥  
不醒如中風之狀也仙經曰大飽迎風多成暴厥不醒修

真秘訣云熱食汗出盪氣發瘧頭疼多睡

大驚後乳食嘔吐心痛

大驚後乳食則手少陰經受邪多成心痛抱朴子云夾驚

便食多成心痛心主驚故也大驚飲食氣節不通成吐逆

翻胃

大驚後飲水久成下語

心主驚驚後飲水則傷心心氣通於舌舌本無力故不語  
也百端經曰驚後飲水久成不語亦能成水痢癰實錄云

小兒水痢癰者因飲水被驚而成也

當風乳兒成嗽吐腹脹

魯公曰小兒迎風飲乳風冷入肺則令咳嗽寶鑑云風冷  
傷於乳小兒成吐嘔氣冷腹脹又經曰形寒飲冷則傷肺

肺傷則咳嗽肺主氣氣傷則腹脹

當風飲水成雀口青黃

素問曰風氣通於肝當風飲水則水停於肝肝氣通於巨

故成青盲雀目也寶鑑云小兒飲水久停肝

辯物難 夜裏不明為雀目 青盲晝夜一雙般

夜露下乳兒多成嘔吐

夜露下乳兒證氣入咽冷乳不散多成嘔逆寶鑑云天中

而餵乳 氣逆在胃停 皆成嘔逆是 上者細尋經條

真訣云夜露食不用食其上有邪氣

夜露下飲水多成腹瀉

夜露下飲水則傷於脾胃脾胃受濕則成腹瀉素問云濕

勝在內攻於脾胃脾胃受濕則水穀不分水穀相和故大

腸傳道而泄瀉也

正食便乳成疳黃口臭

王氏云正食便乳小兒口臭牙中血出通真子云乳食並  
冷小兒面黃口臭又能生痰癰集氏云飲乳食哺不能無

痰癰

正汗便乳成心疳壯熱

葛洪云汗者心之液正汗便乳則傷其心心傷則液散液

散則皮膚若燥成心疳壯熱錢氏云心疳面黃臉赤身體

壯熱真訣云大汗脫衣不得偏風半身不遂

食熱乳兒多成龜背

聖惠方云小兒龜背 肺熱脹滿所生又乳性恣食五辛

熱變今兒龜背也孫 凡云恣食五辛令兒龜背徐氏云食



熱痰乳兒久必成癆

食酸鹹炙燥乳兒成渴

聖惠方云乳母恣食五辛多味酸鹹夜食炙燥心胃停滯

即便乳兒致臟腑主熱熱則煩燥致冷渴不止世又云

食醬肉渴飲水則成渴痢

母醉則當風乳兒失音

聖惠方云乳母醉則當風乳兒令失音抱朴子云乳母飲

酒過度當風取涼仰臥乳兒風冷酒毒氣亂之乳入於喉

揜之間故令兒失音不語也

母飽便乳兒身熱喘急

孫氏云乳母大飽胃腸停滯氣息未調便即乳兒逐令身

熱喘急扁鵲云乳母大飽便即乳兒故令身熱喘急也

全云醉飽傷勞便乳兒者多成痘病

飲水便乳積痰盛驚風

寶鑑云飲水并傷乳 為痰結在胃 令兒乳不下

吐瀉與瀉同 實則身多熱 南言入糖中 早瀉醫治

取 久則變驚風 修真訣云瀉飲過多則成痰癆

飲酒食肉乳兒成大癆

聖惠方云乳母食飲無常酒肉過度煩毒氣流入乳中即

便乳兒心肺主熱熱毒氣盛風邪所傷則令心神恍惚即

目反騰壯熱不休四肢抽掣或成大癆

飲後飲乳成驚喘痰噎

嗽者肺也嗽後飲乳痰聚不散氣道不利關脈不通則成

痰喘痰喘即驚喘姚氏云正嗽乳兒成痰嗽驚喘

嗽後飲水成鼻淵多涕

嗽主肺肺氣通於鼻嗽後飲水則傷於肺氣肺氣受寒則

鼻淵多涕家寶云清涕出肺受寒

悲喜未定便乳成涎嗽

孟氏云悲喜未定便乳兒者涎嗽引風高氏云悲喜未定

便乳成涎嗽又云小兒悲喜未定便飲乳者則傷肝心風

火交急則化成痰流滯於肺而成痰嗽

悲喜未定飲水成吐血

悲喜未定氣血不和飲水則逆其氣氣逆則勝血血隨氣

行故今吐血寶鑑云血隨氣上奔心來吐下如屠忽恐

萬全方云瀉則飲水多停心下故令喘嗽其則喘血

兒啼未定便乳生癩氣

聖惠方云兒啼未定以乳乳之令氣不得消散故結聚成

癩氣也孟氏云兒啼未定肺竅開便即乳兒與氣相逆氣

結停積多成癩瘰也

兒啼未定飲水成胃高

孟氏云兒啼未定飲水則痰結痰結則肺脹肺脹則胃高

巢氏云痰者水飲停結胃膈之間故結成痰也又云若為

風冷所加即氣聚於肺肺脹則令胃高氣急

沃浴未乾乳兒生瘡疥



青蓮云小兒驚風於風中浴後拭之未乾和水飲乳水  
夏月汗出而不止者細星星者是也修真秘訣云次湯  
洗面無光彩作紅生瘡

拭浴未乾飲水或頭疼  
拭浴未乾便飲水者則內外傷冷故本身熱頭疼身  
熱飲水則內外寒冷交攻遂發驚風身熱仙經曰次湯  
洗浴則多成痺

已上是小兒得病之源不可不避如稟受虛弱犯之者必熱  
或疾壯實小兒雖未即為患僅更疳之必不能免前者所述  
亦因此之類也

內證

體有紅點 小兒有驚 外驚赤腫 如米熟盛 紅青相間  
定有風症 淨紫體熱 五臟風生 一黑輕可治 紅赤傷寒

赤青腫病 青黑慢驚 紫細紅間 四六急驚 紫赤相間  
定是疳成 紫如米粒 夾食傷寒 紫散風脾 紫青相間

紫深難治 可去風痰 紅赤連出 乳母不常 兩手俱熱  
奮化神王 巨觀五色 長短浮沉 可定生死 證而用之

外證

壯熱脚冷傷積定 脚熱頭熱是感風 吐冷脚熱驚厥作  
瘡毒發來耳後紅

冷熱證

量冷定知是瘡癰 年令應知風熱證 瘦身皆熱是傷寒

上熱下冷傷食病 上熱下冷 下洩瀉頻為滑腸 渴飲唇乾咽若火

虛陽上熱口生瘡 四肢逆冷似冰霜 面冷顯紅 手青甲黯指如丁 朝朝嘔吐時時瀉

面冷顯紅 舌腫風涎牽鋸響 唇焦氣喘水雞聲 齒緊牙牙偏咬妳 頻吹魚口作雅聲

逆危衰脫 面白唇紅逆 睛昏力困危 驚風兼有汗 痢熱怕攢眉

吐瀉防咽噎 痰涎忌氣萎 顛低脾胃脫 頭軟骨筋衰 雜病不治 紅筋貫眼中 牽抽長握手 強直反如弓

白膜遮睛上 雞聲將齒齧 因顛轉疳羸 昏沉多瘦劣 口燥舌舒舌 才哭却無聲 粘痰喉內響 驚氣腹中鳴

要啼全不哭 才哭却無聲 粘痰喉內響 驚氣腹中鳴 搐搦青掌 嘔逆咽喉渴 顛陷或虛浮 頭皮如火熱

痢熱膿多聚 傷寒汗不流 蛔蟲吐可慮 黠血瀉頻憂 久瀉精神耗 大瀉皮膚槁 冷氣喘聲轟 風牽天柱倒

凡小兒有疾病須宜速治失治則變成大患 右已上病化之十難一生

至道術書云小兒不吐則大罪盈小病不除則大患至所謂停

囚長智養病養身可信之矣



辨小兒病證

目直兼者發搐

咬牙甚者發驚

昏睡善噫嘔者將發必驚

吐稠涎咯血者肺熱

瀉青白穀不化傷食宜下

吐沫及痰白綠水者胃虛冷

瀉黃紅赤濕脾胃熱毒

尿深黃色久則尿血

小便不通腹痛謂盤腸痛葱白煎湯煎臍小便利痛止

吐涎痰熱者下

洗浴拭臍不乾崩包濕風入作瘡令兒撮口臍風發搐脾虛

胎實面紅目黑睛多者多喜哭

大喜後食乳多成吐瀉

心痛不吐水者冷心痛

呵欠面赤者風熱

呵欠面黃者脾虛驚

呵欠氣熱者傷風

弄舌者脾微熱飲水者脾胃虛津液少不可作熱治大病後弄

舌凶

暈明怕日是心肝一臟會被驚

痰壅喘氣胃家積熱

牙疳口氣是妳食結毒

而背是肺家有風客熱

遍身虛腫會與取積不盡

傷寒即刺下白膿

至卸乃初生下時繳拭口中惡而不盡即令大熱

播擗血凝為腹中胎毒未知孩兒生再傷風令兒啼聲如渴人

身上黑點

臍風不乾常有青黃木出因初生下六腑傷

天釣者心胃有惡物外傷寒

淋瀝者心氣伏熱不順

面部遠證

髮際一路青筋如小指大

目胞上下青紫亂紋并紫黑色

目尾一條青黑筋直入鬢者

面色或如死鷄肝兼如蘭無血色

口鼻耳舌如土白日睛陷不光者

鼻管中紫黑舌縮短唇焦黑者

目白忽如火赤兼後腦赤腫起如雞卵

唇口連鼻常常如青黑日如蘭色

目胞黑紫耳唇俱青面如白紙

目鼻額向上生青黑筋如羅紋無數

右件等形候若未患已前有之者亦惡治也若中串後便有



此等形證在面上百不治一皆死候乃分定耳  
余未水火上肺肝心腎神相對日子若耳則便腎主病  
主痺舌主心目主肝也若分此五臟中患有此等死候若是則  
肝病則忌庚辛日時也肝病內丁日時也心病忌壬癸日  
時也脾病忌甲乙日時也腎病忌戊己日時也此為五行對  
絕約有應驗

肝外生感風

呵欠頻咽口中氣熱當發散大青膏主之若能食飲水不吐皆  
熱利之餘不可下

肝熱

手尋衣領及亂拾物紅青圓主之壯熱飲水渴瀉白散主之

肺熱

手指眉目鼻青其結湯主之

肺虛復有冷風

胃清短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散  
大青膏主之肺只傷寒則不胃清

肺虛熱

唇深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散

肺臟性

唇白色當補肺阿膠散主之若亂吐瀉而促更氣者難治肺  
虛損故也

肺病又則虛而唇白脾者肺之表也皆虛不能相養故

名曰肺主唇白而澤者吉白而枯者死

心熱

視其睛口中氣溫或合面暗及上唇赤牙皆心熱也瀉赤散主  
之

心實

心氣實則氣上不行游合則氣不得通故喜仰臥則氣得上  
下通也瀉心湯主之

腎虛

小兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其額即解  
面白純白此皆難養難長不過八八之數若恣色慾多不及四

旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎氣不足則下氣急

重惟欲墜下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎地黃  
圓主之

曰內證

赤者心熱瀉赤散主之淡紅者心虛熱生犀散主之青者肝熱  
瀉青圓主之淺淡者補之黃者脾者瀉黃散主之無精元者腎  
虛地黃圓主之

肝病勝肺

肝病秋見作日肺肝強勝肺肺性不能勝肝當補肺治肝益  
脾者身令子實故也補脾益黃散治肝瀉青圓主之

肺病勝肝







實者虛者其氣必弱而不畏熱之虛寒而不畏寒

虛者實氣性弱多寒多熱見天氣寒陰則感寒而腹痛過天氣

稍次則中暑發熱

論曰病出者為虛入者為實陰出乘陽陽入乘陰言者為虛不

言者為實實者為虛虛者為實陰則緩陽則急言者為虛虛

者為實實者為虛痛者為實外痛內快者為實內虛外快內痛

者為虛內實其有心腹皮膚內外俱痛按之而虛者按之而

痛者按之經所謂皮虛則執麻虛則發肉虛則發骨虛則發

則淵虛則填腸虛則世三陽實三陰虛汗不出三陰實三陽

虛汗不止

飲食進退則知人穀氣之虛實

大便清澀則知人臟腑之冷熱

辨虛實

假令肺病又見肝證必身多呵欠者易治難治者不能勝病故也

若目直大叫哭項強頭暈者難治蓋脾氣不和則虛冷肝強實而

反勝肺也視病之新久虛實虛則補實則瀉

凡病先虛或下之當下先實其母然後宜下

假令肺虛痰實可下先當益脾後方可瀉肺

熱證疎利或解化後無虛證勿溫補熱必再生

春夏不瀉下之必任其自然所以兩者臟腑之氣軟弱易虛者

實下即必虛益之上焦生熱熱即增痰痰即成病不可下之也

貴

實者之脈與虛者之脈不同

賤

常布之軀與純綿之軀各異

小兒諸雜病狀

小兒驚風聲沉不響者是病重用藥難痊若聲浮者輕劑即愈

瘡頭皮乾枯筋脈緊急唇外赤而肉白有瘡痕如無津王者難

驚而難痊此是救過極矣赤眼是肝積熱怕明心肝有驚牙疳

如食之毒喫食不消是脾積冷耳聾是腎之積胎疳是肺積風

潮熱是因驚而得喉內如鋸是隔上客風入肺及因驚入大腸

而得或悲或要歌是邪入脾口瘡肚脹疳氣逆吐蟲心與大腸

熱瘧疾是脾之積開口睡是五臟毒盛多哭是驚風入肺愛喫

泥土是脾生蟲夜多盜汗是虛熱肝氣不順五心熱是疳積疳

耳是腎積風脹脹惡心是肺中積愛喫布脚是肺生蟲愛喫天

炭是肝生蟲愛喫鹽腎生蟲愛喫茶末是心生蟲愛喫酸物是

膽生蟲

小兒雜病歌

諸般雜病要須知 不問童兒與女兒 多睡只因肝是本

心留積熱夜驚啼 叫呼冷汗因蟲積 寒熱手中積在脾

臉赤口瘡心肝壅 虛風搐搦四肢垂 冷滑傷脾或瀉痢

或膿或血下無時 積多肚大多秋水 氣喘腮黃不問醫

眼腫吐涎頭擺急 莫教豚鼠慢微微 患者求神兼問地

不求良藥苦求師



續談孩兒諸般病 患壯因由諸端 眼赤紅家因熱毒  
怕明肝與心受驚 脾家積聚成疳 疳積家積聚成  
積熱在脾多愛睡 牙疳妳食毒結成 遍習肺中有客熱  
龜背客風傷心行 停耳原是醫風毒 却因傷積甚分明  
遍身虛腫濕不盡 走馬疳因腎得名 天約肺風傷風取  
喉中痰上客風驚 小便不利何事積 心氣不順難其名  
要識驚癇及痰者 脾風之後與心驚 或喜或悲情難測  
謹君休惜勿作驚

小兒一見生死歌

幼童脉氣辨何形 二十五種甚分明 抱着遍身不溫暖  
四肢重艱哭鴉聲 乾乾黑燥目直視 啼哭無淚為延壽

尋得搖眼爪甲黑 泥壇腫起或為坑 筋絕死地不顧門也

將口咬人魚口急 脚有肚穴有青筋 氣絕動不收

上視似觀於高物 長嘔出氣黑文行 血不擦脉

栗乳不收骨結舌出口 唇不蓋齒眼昏傾 脾絕舌縮眼傾

瀉痢多變黑點血 偏搐似笑沒心情 不論男賤及男女

救十人無一活

小兒總遠近證歌

目慢沉沉碧 相將欲欲發驚 乳時常齟齬 髮際印堂青

唇白脾虛弱 紅桂燥熱生 多啼涎滿囁 呷吐在邊巡

噫噓酸餛臭 痰黃喘促頻 胞黃并臉腫 積向臍中停

兒多憂悴 聲乾不轉睛 四肢寒熱戰 邪毒久停心

背絳如温火 喉咽響似鈴 觸風成搐搦 癩癧或為癩  
氣弱沉沉困 增明不肯看 脾虛泄瀉胃 變慢治應難  
目白紅生糞 朝輕夕重煩 耳尖尻骨冷 疏豆發麻斑  
單寒多清涕 狂煩卧不安 呻吟并煩赤 謔語作傷寒  
蘊熱無時節 癥瘕後脇間 痞痞胃癰脹 澀結應難寬  
久痧因成痢 頻頻色數散 肚温便冷水 蟲毒若為肝  
寒熱朝昏作 毛枯血漸乾 糞中蟲數色 尿白是毒源  
諸患多端證 明醫子細看 分毫差錯誤 枉逝入黃泉

小兒形證歌

初生芽兒一塊血 也無形證也無脉 有極當知是胎驚  
有熱須知是胎熱 三朝綱抱未安和 七日一臘古來說

臍風撮口老娘乖 鎖肚青筋唇口撮 又有因邪客忤兒

若紅難救命演更 嫌兒指甲兼唇黑 女子初生小便血

正是胎中受熱得 男兒兩目閉不開 或患丹痧俱熱極

日閉丹痧消毒良 血出浪用生地黄 又有初生便發涎

或將向火或加綿 神情不穩目邪視 強直反張深可憐

醫士若作驚風錯 但只涼心便安樂 酒宜少許地黃多

更加些靈神仙藥 芽兒未周不驚驚 忌它聲響不安寧

月內半周名襁褓 驚熱浪當應 驚蒸 三十二日為一變

六十四日為一蒸 一十八次變 無足 方有脫自寸口生

變蒸未足在面部 左眼太陽陰 眉處 眉稜上下俱是木



半是中宮鎮皇土 耳間屬腎常主虛 唇日兩畔脾所居

面中顛臉屬心火 惟有人中是肺都 五行相生重細症

右邊相刻着工夫 順候易理逆難尋 智不通者性莫靈

心主驚去肺主氣 肝主風兮脾主味 胃家不得冷兼虛

吐瀉不止驚風至 自古皆言心主驚 五臟六腑有驚者

心驚血散氣不接 流入虛室百病生 肺經噴水汗喘細

乾嘔無時脾因因 腎寒呀玉肝指眼 夜啼腸恐臉紅心

五心熱是脾招悽 面青下白膽生驚 若在二焦終作渴

或入膀胱如痛聲 小兒形證卒難測 滿口頑涎喉中塞

身上皮膚無顏色 汗出如油頭嫩咬 目無光彩鼻中黑

浮黃心凸 牽撮口手足如冰脚面直 搐搦精斜連唇口

將手抱頭難可救 眼匡青色多狂渴 飲水百盃猶未歇

臉腫眼浮脉不来 是物粘身背口呬 啼哭無淚及鷓聲

喉中牽鋸口吹沫 此疾誠難可瘥之 免被時人道醫殺

歌曰

搖頭揉目 肝熱生風 眵淚憎明 三焦積熱 單生清滄

肺受其寒 頰赤面黃 風傷肺熱 霍亂吐逆 胃積氣傷

瀉痢不常 氣攻腸滑 面青呵欠 驚氣傳肝 盜汗頻頻

脹肺虛熱 傷寒驚搐 風盛發狂 胃熱生斑 氣傷冷厥

長吁驚喘 風盛氣生 上氣搖頭 憂高胃結 肺壅氣傷

咳嗽咯血 涎紫紫約 積傷風熱 小便尿赤 熱聚膀胱

疝氣因帶 胎中積結 肺之受熱 愛與泥土 脾臟生疝 疝疔痰涎 蛔蟲吐

脫肛瀉血 冷熱積傷 消渴口瘡 心家受熱 面黃赤

積熱所攻 積脈解斷 因風肺熱 行遲語澀 胎積氣傷

項硬肝風 氣傷木舌 驚經要咬 病源辨別 審而用之

細詳使藥

小兒有疾歌

小兒有疾號天痛 喚在驚風難治源 一回啼哭與一回

吐逆增寒心腹脹 忽吐忽瀉不能安 急者須更眼翻上

更有常眠睡不醒 哭起啼哭無語笑 不問男女審看之

愚人喚作爲天虧

小兒諸雜病論詩

慢驚風眼喜張

慢脾風眼喜閉

面青唇黑盡上

哭而不啼是燥

張口出舌是風

張口似睡不思乳食是虛

搖頭項硬三焦壅

清涕常出肺受寒

腹滿盈盈是氣壅

翻身即是脾疾

面黃目赤者不死

面黃目赤者不死



歷驗不治

顛腫數日忽病不治或風攻頭門頭骨開解或吐而赤如酒色少時即退必發驚不可治

小兒百日內外發搐愈而後作并後頭腫不可治病愈後復作面黑神昏雖不吐瀉大便如常身熱口瘡喉前兒目睛內者是胃中有痰久不發驚不治

小兒雜色不治

青色從眉入目者死 青色通目入耳者死

青色如斜目下者死 青色入口心者死

黑色多透口鼻者死 黑色從眉透耳者死

單上青色腹痛者死 單上白色語出血者死

全幼心要

耳中口鼻起黑或白色者死 汗不出出不止者死

熱病得汗熱不去者死

小兒死候

目白面黑者死 背脊人中返者三日死

面無睛光似土不能食者四日死 面黃目黑者九日死

口不能閉者三日死 面赤目黑者立死

尸臭者兩日死 面黑目白者八日死

頭目俱赤卒時者死 面青唇黑者死

面黑目直視者死 面黑目白者死

手掌無紋者死 掌裏俱腫者死

唇滿送人中滿者死 唇白飲食者四日死

身衣縫者死

汗出不流舌卷者死 熱吐目赤者死

陰結陽絕目無光彩者死 驚啼者四日死

遺泄不復者死 唇黑俱佳者死

齒黑如豆者死 面青目黑者五日死

妄語錯亂不語者死 手足爪甲下肉黑者死

卒腫回蒼色黑者死

小兒形證卒難測 滿口粘涎喉中寒 吐涎無時加咳嗽

發烙皮膚瘡不發 汗出如油目不流 單黑眼中光不絕

留滯手四如撮口 手足直垂冷若鐵 偏搖時邪連唇口

揮手搖頭難可救 眼目青色及身虛 吐瀉唇青皮剝裂

如此形候不勞醫 醫士免被他人說

小兒形候要者詳 背母推頭看一相 單上汗流兼腹脹

手抓鬚前必定亡 五虛五硬并兼軟 下瀉頻多獨不當

指甲內有紅絲見 手心赤脈似生瘡 諸頸腫應中亂

忽然睡裏作強語 不語和身強跳起 關關難通風候是

兩臉如朱無歇時 乳時喫時連吐却 此病還消就鬼

四足驚時目溢黃 瀉如籃鼓熱如湯 莫教傳入心中悲

咬乳搥衣不可當 蛇驚燥燥四肢逆 風候關心須進

或然額上有青紋 驚人酒用懷疑別 久瀉慢驚風一散

珍小醫士不辨真 如此畧說其中候 曉了陰陽定死生



瘦弱若是孩兒身 譬如鴉鵂命難存 眼上或然生赤脉  
眼起者夫不語論 恰似鯉魚被網緊 看看死在途巡  
丹毒只因風熱極 變歸臍腑熱如蒸 若言孩兒驚風候  
只此歌中定死生

小兒雜病死候

吐瀉生風眼上膜 風在掌中抓不覺 急驚過了喘無休  
慢驚過了皮膚薄 盤腸氣過心中孤 嗽吐嘔逆心回惡  
傷寒赤脉青相交 結熱面黑皮毛落 痘子入膜眼不開  
執瀉山蟲口乾惡 鎖口膠低唇鼻青 積滯脾毒唇卷縮  
此病因驚兼有積 豈有神仙醫妙藥

香童二十一惡證

指甲黑或青 啼哭似鴉聲 氣急張口喘 唇舌出不輕  
赤脉腫在額 顛腫鬼來遊 鼻乾并黑燥 齒齒咬人驚  
頭陷不平死 噴藥在丘陵 骨節作聲異 便不覺還醒  
目無睛光色 項筋舒恠真 眼有神最弱 直視不轉睛  
黑斑并惡毒 哂喇聲不停 藥不化便下 腹脹塊不傾  
汗冷唇青逆 脚子手若釘 啼叫無淚死 扁鵲也難明

外證死候

眼上赤脉 下貫瞳人 此為大陽行諸陽起於目上行則明下行則逆  
顛門腫起 兼及作坑 鼻乾黑燥 肚大青筋 目多直視  
視不轉睛 指甲黑色 忽作鴉聲 虛舌出口舌者心也毒也  
神藏克已不藏也大無後也言也

啼下作聲 如蟲既出 必是死形 用藥速忘 十無一主  
通百子曰 太衝無脉 直視看人 魚口自動 忽作鴉聲  
若時後變者死氣急作聲者 危

舌出不動者不死 或縮生赤 五心凸腫 時時惡叫  
伏熱不泄 喉中必響 瀉出黑血 身生黑斑 面黃燥  
吐瀉不止 兩眼半開 驚叫咬人 指甲青黑 走馬瀉  
顛腫或塌 瀉止又瀉 丹毒遍身 啼高聲咽 魚際不勻  
右骨前項形諸皆是 候小兒犯之必入鬼錄

察雜病生死證

內外俱虛身體冷汗出 喘而煩擾手足厥逆體不安靜者死  
形龐不熱振振氣絕 一病候已一病復生五行勝復相乘

也其人必死

驗五臟氣絕證

心絕病證 如珠如油舒舌出口舌腫發熱瀉  
頭暈目眩汗出不流汗 如珠如油舒舌出口舌腫發熱瀉  
熱血暴直如家皮膚熱 世已逆死舌突曰

肝絕病證

病重啼哭無泪病重不 入下淚爪甲青黑腹深如筒舌紫  
發搐目斜延唇口動手 和齒之壯或脚面直素問云其毒在  
瓜其克在筋並死庚辛

脾絕病證

人中清人中黑唇縮 於唇枯燥及唇紫黑及不蓋齒血腫



尿血舌縮或卷鼻孔開張齒牙冷澀如油撮口如蟻食如土色  
四肢逆冷如濕石之吐乳不收瀉養亦黑並死甲乙日

肺絕病證

有執喉湯水并藥食喉中鳴是胃管直水不能降肺此證書  
罕有蓋果曾有驗必死不治目直青鮮日昏氣喘不吐食多  
嗜嗽痰涎壅塞口喉中喘急鼻乾黑燥鼻塞不通肺脹胸膈頭  
汗肢冷並死丙丁日

腎絕病證

面黑神昏眼黑睛腫目無光彩耳輪青黃耳輪焦枯牙齒焦枯  
痔牙齒落髮疎黃燥膚黑皮燥驚風交如驚風化發  
黑色透口並死戊己日

五臟相剋雜證

心病目黑腎剋心壬癸日絕 肝病皮黑肺剋肝庚辛日絕  
脾病唇青肝剋脾甲乙日絕 肺病頰腫目赤心剋肺丙丁日絕  
腎病面腫唇黃脾剋腎戊己日絕

剋絕歌

五臟相形剋 推之數可量 耳焦并鼻黑 戊己丙丁當

目陷唇枯縮 庚辛甲乙方 舌青并紫腫 壬癸入泉鄉

剋絕者病在心 證主舌絕壬癸水病在肝 證主目絕庚辛金

病在脾 證主唇絕甲乙木病在肺 證主鼻絕丙丁火病在腎

證主耳絕戊己土

臟腑病外候

喜寒而欲見人為病 渴而喜飲為病 汗出不止或汗出如油其身如  
洗皆不可救

小兒諸病但見兩眼無睛光黑 睛無運轉目睛無鋒芒如魚眼  
猶眼之狀箇箇不治或神疲其內但外若昏困者無妨其有病  
驚而眼中神氣不脫者猶可以活眼者五臟六腑神氣之所萃  
神氣已脫脉雖存亦未愈

五軟惡候

手軟 脚軟 頸軟 背軟 腰軟

五硬惡候

手硬 脚硬 頸硬 背硬 腰硬

五冷惡候

手冷 脚冷 氣冷 唇冷 面冷

五縮惡候

手縮 脚縮 舌縮 唇縮 陰縮

五反惡候

眼反 唇反 舌反 項反 脚反

五緊惡候

咽喉緊 口唇緊 眼稍緊 手脚緊 陰囊緊

五陷惡候

頭門陷 太陽陷 眼輪陷 胃下陷 肩井陷



手心腫 人中腫 舌腫 陰囊腫 膝腫

五端惡候

瘡毒 喘 嘔 吐瀉 喘 下痢 喘

五言惡候

驚風 驚 皮 肉 骨 又驚 骨

全幼心鑑

虎

虎口又手處也

三關第二指又三節

關 風關第一節 魚位

指 氣關第二節 卵位

掌 命關第三節 辰位

圖



三關指紋要訣

辨虎口手訣

命關死候

氣關病深 風關易治

未關命門 中關風候 初關氣候

嬰兒生下一月至三歲當看虎口內脉兩邊

辨虎口手訣

夫三歲已前若有患須看虎口脉次指表節為命關次氣關次

風關古人所謂初得風關病猶可傳入氣命定難陳是也

湯氏云小兒初生至五歲氣未定呼吸至數太過必辨虎口

色脉方可察其病之的要者正謂此也男以左手觀之女以右

手觀之

虎口三關紋訣

虎口者又手處是也三關者第二指之三節是也除母指第一

指近虎口第一節為初關亦名風關第二節為中關亦名氣關

近指端第三節為末關亦名命關男以左手女以右手側看之

驚風初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色赤而紫

看病又傳過其色紫青病勢深重其色青黑青而紋亂者病深

重若見純黑心驚不眠大抵紅者風熱輕赤者風熱盛紫者驚

風者驚積者亦相于驚積風熱俱有主急驚風者而淡紫伸

縮未去主慢驚風紫者皆然或黑然隱隱相雜少出不主慢



辟風凡千紋在初關者易治過  
關者難治透末關者不治三  
關直透大抵不治脈紋勢勢  
方若勢勢弓反出外駸駸靠於  
如流珠流末三五點相連或形  
陽為男陰為女三關虎口紋男  
手屬陽男以陽為主右手屬陰  
此陰陽左右兩手亦當察驗左  
應肺脾於此消息又得變而通  
指脈紋驗病證

小兒三歲已前虎口第一指上  
男左女右觀之  
其間有指紋不見有病者必於  
病者必於脈息主之更宜  
定指上三關

辰關指頭節 卯關指中節 寅關指下節  
脈紋從寅關起不至卯關者  
如寅關連卯關侵過辰關者  
不妨

指紋色樣  
指紋深青色主驚悸淺青主便  
紋色紅赤主驚熱淺紅主下  
色淡紫主驚哭淺紫主煩渴

指紋色樣  
指紋深青色主驚悸淺青主便  
紋色紅赤主驚熱淺紅主下  
色淡紫主驚哭淺紫主煩渴

指紋色樣  
指紋深青色主驚悸淺青主便  
紋色紅赤主驚熱淺紅主下  
色淡紫主驚哭淺紫主煩渴

脈紋透起指面者必發熱驚臥不安不熱則受病日深不  
變風搐者指紋生紋節者不治或有遲退嗜前多睡精神不爽  
指紋不見者必發驚候不治

小兒食指變三關

男左女右一般看 皆知初氣中風候  
未是命門易亦難 要知虎口脈紋脈 倒指看紋分五色

黃紅安樂五臟和 紅紫依稀自損益 紫青傷食氣虛煩

青黑之時證候逆 忽然純黑在其間 好手醫士心膽寒

若也直上到風關 粒米短長分兩端 如鎗衝射驚風至

分作枝叉有數般 弓反乘順外為逆 順逆交連病已難

又頭長短尤可救 如此醫士子細看 男兒兩歲尚為嬰

三歲四歲幼為名 五六次第年少長 七韶八亂漸論情

九歲為童十稚子 有病關格辯其因 十一痼疾號癩風

症病還同勞病攻 痞癖定為沉積候 退他潮熱不相同

初者掌心中有熱 便知身體熱相從 肚熱脚冷傷積定

脾熱額熱是感風 額冷脚熱驚所得 瘡癩發來耳後紅

小兒有積宜與場 傷寒三種解為宜 食瀉之時須有積

今瀉須用與温脾 水瀉宜與瀉臟腑 先將滯腸散與之

孩兒無事忽大叫 不是驚風是天拗 六叫氣促長聲驚

誤喫熱毒問心竅 急須吐下却和脾 若將驚藥真堪笑

痢疾努氣肩頭皺 不努不皺腸有風 冷熱不調分赤白

脫肛因毒熱相攻 十二種痢何為惡 禁口刮腸皆不同



脈大弦洪肚上熱 胎兒實熱下無妨 面赤睛紅氣壯強  
四肢浮腫夜啼長 通體生瘡肚隱痛 下之必愈是為良

小兒生一月餘 有病如何為分別 男左女右虎口看  
若是紫紋胎驚熱 青色受胎氣不全 亦有驚積多搐掣  
赤色必因數日前 有驚因跌撲頭顛 孩兒一歲至三歲  
虎口紋內看兩邊 若過一關長一米 定是驚風傳候起

半寸病因是驚傳 先須用藥鎮心裏 若過第二第三節  
並同驚積一般說 似出不出隱隱紋 此乃經傳脾藏絕  
若還紫色難醫療 或紅顏色便心寬 用藥之時立便安  
脈過三關連指面 孩兒死候立須覓 不拘顏色赤白紅  
十死一生休怨歎

揚仁齋曰大抵驚風初得紋在虎口或在風關多是紅色傳至  
中關色赤而紫病又傳過其色紫青病又深重其色青黑而紋  
亂若見絕黑危惡不治  
紅者風熱深赤者熱盛紫者驚積熱青者驚積赤青相半風驚  
積風熱具有主急驚風青而淡紫伸縮未去汗出主慢驚紫紋  
青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主慢脾三關紋如流珠流米

三五點或形於面或形於背俱死證  
揚正臣曰脉紋彎入裏者病雖重而順脉紋反出外透甲心  
脉不拘顏色俱死證

五指稍頭冷 驚來不可安 若逢中指熱 必定是傷寒  
中指獨自冷 麻痘證相傳 女右男分左 分明子細看  
第一關驚風積熱 第二關風痰在心

第三關開魚刺湯成慢脾不治  
三關青是鳥獸驚 三關赤是水驚 三關黑是人驚  
有此通度三關脉候是急驚之候必死不過三關者可治  
指紋脉主病

初起寅關淺 紋侵過卯深 生枝終不治 辰位青難禁  
青色胎氣不全 主驚積多搐掣  
指脉深青則不寧 微青腹脹糞多青 青兼黑色經腸瀉  
發搐牽抽不暫停

紅色驚入脾竅  
孩兒指脉深紅色 發熱驚時身強直 微紅下痢腹中疼  
吐瀉脾虛多不食  
紫中紋生紫色深 驚時哭泣又呻吟 微中紫色腸中痛  
吐瀉絞急主惡心  
三關脈



左有紅紋似線形 定知發熱又兼驚 右有紅紋如六種

脾傷驚積一齊生 紋頭若是三叉樣 肺熱風痰夜有聲

青赤應是傷寒候 只見空紅定瀉生

虎口亂紋多 因和氣不和 色青驚積聚 下亂瀉相和

青即慢驚發 入掌內筋多 三關若通過 此病必沉痾

脈候若深青 情知四足驚 亦因水火得 紅色是人驚

面及風熱盛 三紋變食停 但看以手處 方可辨直形

青色大小曲 人驚并四足 赤色大小曲 水火飛禽

紫色大小曲 傷米麵魚肉 黑色大小曲 脾風微作搐

紫色紅傷寒 青驚白色疳 黑紋因中惡 黃色困脾端

觀男左女右二指節紋如過三節上者難治自下而上者甚有可準

凡三歲已前且看形候兼看虎口三歲已後宜看兩手

風關初得患易治

氣關有脉病深急治

命關有脉病深死候

辯三關訣

指上辯青紋 青脉見 認是四足驚 虎口脉青色是猪犬馬驚

黑則遭水撲 黑脉見 認是赤色火驚 人赤脉是人驚 撲手驚

紫色多成瀉 紫主瀉利 黃者是雷驚 黃色者是雷驚

內隱風還盛 由是驚風并有乾熱 醫弓食上赤而外是傷寒

風關驚傳心臟

氣關疳積肺脹

命關通度三關肺風慢驚肺臟

風關慢驚可醫

氣關心疳亦醫

命關不治

形似環來昏受疳 好泥好土作常食 消瘳右遇良醫藥

取動方知體漸安 風關若直醫有積

氣關不治

命關不治

三關都有紋並是蟲

紋亂疳積驚狂心 悲啼曉夜痛難禁 求神拜地渾無效

服藥安和莫誤人

風氣命三關都過有積

命關獨有不治

面上及身上者便是流米死候不治

流米死候不堪醫 便是三關有所推 風氣得之後可治

命紋有此死何疑

水鑑入脉主病

形如魚刺勿驚瘥 形似懸針瀉利多 水以肺驚微見甚

亦知肝積要溫和



形似虫瘕患久 如環腎積細詳看 縫紋亂後知蟲積

流米通身莫望安

脉向裏是疳

脉曲水者是風

雙釣脉者傷寒身執不食

脉三曲如長蟲者硬物

脉兩曲者傷冷

脉如亂蟲常疳亦疳蟲

外 頭面肚上有大脉并青筋乳食毒驚積不治

辨虎口脉紋

氣紋黃盛作紅紅盛作紫紫盛作青青盛變黑純黑則難治深

青主驚悸淺青主便青肚疼青黑主驚搐內瀉紅紫主驚熱淺

紅主下痢腹痛如不利主吐瀉不食深紫主煩渴驚悸主傷乳

不吐即瀉生艾枝不治紋不見必發驚候不治又當於面部間

以互考之

指紋脉訣說

黃色無形者即安樂脉也紅若無形亦安寧脉有前件形者即

病之脉次第而變初作一點子氣漸多紅脉主風關其色方傳

變紫色病已傳過青色已受之極也色其病危急純黑分明不

可療治三歲已上病重危急指甲口鼻多作黑色蓋兒脉絕神

困證候惡逆雖有妙藥良方不保咽喉孩性命

詳解脉紋

流珠只一點子紅色環珠其形差大長珠其形圓長以上指

關子極皆紅脉真氣之如此來蛇即是長珠散一頭大一頭小

去蛇亦如此乃公其上下朝故曰來去角弓反張其裏外向裏

為脈向外為逆鎗形有上魚骨分開水字即三脉並行針行即

過關一二粒米許射甲命脉射外透指命脉曲裏一十三位悉

有輕重元由一氣自微至著從漸至極輕重悉詳前云五色者

黃紅紫青黑由其病盛色脈加變又傳加進即越黃紅之色紅

感作紫又有紅紫之色紫感作青又有紫青之色青感作黑又

有青黑之色至於純黑之色者不可得而療治之也

魚刺為驚積

針樣執傷風

流珠中腸熱

風關青如魚刺易治是初驚候黑色難治

氣關青如魚刺主虛勞身熱易治

命關青如魚刺主虛風邪傳脾難治

風關青黑如懸針青主水驚

氣關赤如懸針主府兼肺熱積熱

命關青黑如懸針主人驚若此凡五色皆是死候三關通

度如懸者主慢驚風難治

風關如水字主驚風入肺咳救面赤

氣關如水字主驚風入肺咳救面赤

命關如水字主驚風入肺咳救面赤



乙 風關如乙字主肝癰驚風易治

命關如乙字主驚風

分關如乙字青黑色主母脾難治

丙 風關如丙字者疰病蟲聚骨節如橫排等子肚皮似吹起

若猪胞

氣關如曲蟲主大腸癰結

命關如曲蟲主心臟傳難治

己 風關如環主肝臟疰有積聚

氣關如環主疰入胃吐逆不治

命關如環難治

庚 此紋着在風氣二關易治

全知心鑑卷

命關通度者難治

此紋在手上或在面上或在左右臉邊皆是死候

脉曲向裏者己是氣疰

脉曲向外者丁是風疰

脉斜向右者己是傷寒身熱不食無汗

脉斜向左者丁是傷風身熱不食有汗

雙勾脉者丁是傷寒

脉三曲如長蟲者是傷硬物

脉兩曲如鈎者是傷冷

面上有此點者丁是耳發之候

脉一頭如環又有細者己是傷寒


頭面肚上 有此脉青黑劫亞是食毒驚積難治  
脉如亂蟲者 是疰亦有蛔蟲食積疰  
治之必瘥凡脉不足細者己亞是風氣但消疰後取

兒

全知心鑑卷

百五十一

沈珠形主夾食膈熱  
三焦不和氣不調順  
飲食飲吐或瀉作熱  
或腸鳴自利煩燥啼  
哭  
環珠形主氣不和脾  
胃虛弱飲食傷滯心  
腹膨滿作熱夾食虛  
煩頭悶






長球形主痰積傷滯  
腹肚疼痛或有寒熱  
脇肋膨脹食不消化  
或蟲動不安

來蛇形主中脘不和  
積氣及則飲食不下  
赤魚狀傳臟腑不寧  
澎滿乾澀





去蛇卷形主脾胃虛食  
積吐瀉煩渴煩燥氣  
盛喘息飲食不化神  
困多睡

弓反裏形主內感受寒  
邪頭目昏重心神驚悸  
沉沉默默倦怠昏困四  
肢稍冷咳痰多痰色色





弓反外形主痰  
熱心神不寧  
卧不穩作熱  
驚夾食風瀉證

鎗形主邪熱痰  
感生風精神恍  
惚睡不安覺發  
搐弱驚風傳受



魚骨形主驚風痰熱  
諸候已變可以救風化  
痰利驚退熱不作証  
惡候忌以傳過之作它  
證



水字形主驚積食積  
極熱煩燥心神迷悶夜  
啼不眠痰涎壅盛  
涎潮口紫漸加搐搦





形如針刺黑青長  
壯熱煩渴肺家傷  
若過風關驚執甚  
鎖心發汗始清涼

脉紋微黑末文青  
定知且夕必生驚  
更加腹脹時時喘  
取涎調氣便和平



脉紋青碧兼驚積  
發熱多啼并有癍  
掌中青色似桃花  
胃氣不和兼咳噫

形如乙字病傳肝  
驚哭多啼睡不安  
此是肺風相傳受  
禮請醫士子細骨



形如乙字病傳肝  
驚哭多啼睡不安  
此是肺風相傳受  
禮請醫士子細骨

脉紋微黑末文青  
定知且夕必生驚  
更加腹脹時時喘  
取涎調氣便和平



脉紋青碧兼驚積  
發熱多啼并有癍  
掌中青色似桃花  
胃氣不和兼咳噫







形如蛇尾紫兼紅  
驚食傷脾又夾風  
頭兼胃腹溫溫熱  
消積團取便和同

脉紋如絲散亂生  
腹中冷瀉至虛驚  
手足似冰尋白色  
調脾止瀉細看形

脉紋微黑赤又青  
定是劫疾渴難任  
冷痢面黃多汗出  
熱瀉眼澁因沉

形如木字肺家風  
虛積相傳向色青  
腦上有涎須調理  
瀉肺消腫使惺惺



形如紫赤渴應深  
見水心驚却似金  
速與涼心瀉  
免教煩悶死來侵

紅紫紋日死  
青黑紋夜死

王環集八段

實赤因驚積在心  
口乾發渴又呻吟  
若逢中赤速瀉解  
不解之時命必沉

實黑須知腎臟傳  
中關黑戶病纏綿  
水驚人驚相夾雜

口反直視有痰涎  
上青肝臟本傳留  
日閉身疼四體柔  
一則冷邪侵胃氣

中青胃逆幾時休  
下青驚是再驚來  
用藥追風可免災  
上下若青唇又白

四肢逆冷葬泉臺  
上赤由兼黑脉沉  
或涼或熱驚多青  
上下一同煩渴熱

更兼尿赤解方醒  
下黑赤脉共同隨  
氣瀉下泄病須知  
漸變慢脾風謹候

心虛體軟早求醫  
赤傳辰位赤相通  
大便秘結熱兼風  
上下若逢因打跌

熱求眼閉漫心驚  
紅淨為安四體寧  
如逢紅黑定須驚  
更兼紅亂則人盛

轉下除驚藥有靈  
赤段輕微是外驚  
若如未劫驚非輕  
紅紫之內驚人盛

驚極料來豈得寧



忽逢相間有其青 看看立便有風生 紅青點狀風疔起

不現風疔氣膈發 急急驚心命危傾 若加淨紫體還熱

亂頭誤藥紫發青 紅紫傷寒痰積停 赤青已受脾風

酒知五疔有風生 紫青多濁即風癩 隱隱紫紋難治瘵

黑無可治死還生 紫赤相間則疔成 紫若一同如米粒

青黑脾風作慢驚 紫細紅因六畜驚 火食傷寒蓋已成

紫散風傳脾臟間 去風痰毒命須還 紅紫連寸赤若輕

必因乳母不相應 有疔高寸俱無現 定知觸犯惡神明

八段錦 內有癥積面如珠 疔積如油臟腑虛 若診看來須任意

精神不定命須更 第二癥成內有裏 浮脾虛大體更虛 娘母奶食食不得

孩兒秋後定沉疔 第三有積眼下降 胎中有病理難痊 史如世醫難往洩

臟內生蟲臟氣虛 第四體熱似油煎 傷毒元來口有涎 亦是累曾塗毒物

致令病患有根源 第五一歲至三秋 未行體軟亦難醫 患者因不遇月

致令命速水中遊 脾家受病在還肝 若也得逢如此候

孩兒秋後命關山 第七脾泄鼻下赤 變紫定是疔生瘡 積毒肝臟連心肺

喉中積執不久亡 第八眼脉赤有浮 渾身汗冷內腫虛 喉中涎上寒風感

乍醒乍退亦難痊 十段錦 乳食不消化 紫則有風生 浮乃是延逆 脉急是驚風

五指節稍冷 驚來不可安 忽逢中指熱 決定是傷寒

中指獨自冷 麻痘出多般 女右逢男左 十段錦中看

人身有陰陽五行 人身大抵同天地 亦有陰陽及五行 視聽脉聲并察色

為醫者得始為精 聖人為治須南面 左屬於陽右屬陰 陽木陰金分左右

五行因此可推尋 辨手足十二經脉法 足太陰脾脉 足少陰腎脉 足厥陰肝脉

足太陽膀胱脉 足少陽膽脉 足陽明胃脉

手太陰肺脉 手少陰心包脉 手厥陰三焦脉

手太陽小腸脉 手少陽命門脉 手陽明大腸脉

凡人兩手足各有三陰三陽脉皆履行故有六陰六陽分



為十二經

辯手足三陰三陽

手三陽

大陽小腸

陽明大腸

少陽三焦

足三陰

大陰脾

少陰腎

厥陰肝

手三陰

陰肺

少陰心

厥陰心主

足三陽

大陽膀胱

陽明胃

少陽膽

辯三陽受病狀

足太陽膀胱經

足太陽膀胱經

頭疼腰痛

項強轉筋難

百病皆起

尿清熱寒

足陽明胃經

潮熱時微汗

謔言目不安

尿紅多

飲水不咽乾

足少陽膽經

來往發寒熱

口苦連唇舌

耳重胸膈

嘔吐喉中噎

辯三陰受病狀

足太陰脾經

面目滿腹脹

疼因冷氣攻

大便常自利

嗜睡

足少陽腎經

心煩但欲寐

或渴或自利

欬吐吐難通

惡寒多悲

足厥陰肝經

飢來不飲食 食則吐衄

瀉瀉心腹

四肢不

辨脈形狀相類歌

弦直緊相似 微與弱無別

滑數則

般 浮洪

遲澁似不殊 沉伏難分別

已上相類脈最為難辨醫士用意

憊以別之

臟腑配合

甲膽手少陽

乙肝手厥陰

東方木也

丙小腸手太陽

丁心手少陰

南方火也

庚大腸手陽明

辛肺手太陰

西方金也

壬膀胱足太陽

癸腎足少陰

北方水也

戊胃足陽明

己脾足太陰

中央土也

凡先言者為剛為陽為亢為

後言者為柔為陰為姤為

臟主於裏也 主於表

十二支

寅卯辰

巳午未

申酉戌

亥子丑

臟腑經絡配合

寅三焦手少陽

卯大腸手陽明

辰小腸手太陽

巳包絡手厥陰

午心手少陰

未肺手太陰

申膽足少陽

酉胃足陽明

戌膀胱足太陽

亥肝足厥陰

子腎足少陰

丑脾足太陰

手足三陰三陽者十二經絡之名也

經絡之名也



手足經絡配天地四時

寅卯辰手三陽天陽春也 巳午未手三陰天陰夏也

申酉戌足三陽地陽秋也 亥子丑足三陰地陰冬也

合土表裏

太陽少陽合 陽明太陰合 少陽厥陰合 足與足合

手與手合 如是太陽膀胱水合是少陽腎水也

陽為腑屬表 陰為臟屬裏

陰陽臟腑

肝與膽厥陰風木也 心與小腸少陰 君火暑熱也

包絡三焦小陽相火也 此為陽之臟腑

脾與胃太陰濕土也 肺與大腸陽明 燥金也

全初心經者

腎與膀胱太陽寒水也 此為陰之臟腑

肝 肺 腎 兼包絡一名命門 為六腑

胃 小腸膽 大腸膀胱兼三焦

四時氣運

陰氣始於立秋 陽氣終於立冬

陰氣終於立夏 陽氣始於立春

人生形體合於天地

老子曰人受天地變化而生一月而膏凝也二月血脈三月而胎四月而胎五月而筋六月而骨七月而成形八月而動九月而躁宮室列布以定精也十月而生形骸已成五臟方形肝主目腎主耳脾主舌肺主鼻膽主口外為表中為裏頭圓法天足方

東地天有四時五行九解三百六十日人有四肢五臟九竅三百六十節大有風雨寒暑人有取與喜怒勝為主肺為氣運為風腎為雨肝為雷人與天地相類而心為之主耳目者日月也血氣者風雨也



全幼心鑑卷之二

脈法

脈者血之府也。或則氣滯短則氣病數則心煩大則病進。凡見水鏡先生曰小兒難受陰陽二氣成其形壯氣尚未固。何言有脈直至變蒸候。蓋陰陽氣力可看脈其髮亂之年方生陰陽二氣。

聖人云男七歲曰鬚生其元陽之氣女八歲曰齒其陰陽方成。故未滿七歲之年呼為純陽若髮齒滿後呼為童兒始可看脈。如身體俱感味旺一息八至為常人之脈一息八至為熱九至為風五至虛四至損三至脫二至死十至必是疳積虛損形容瘦劣若或身肥血色青白一息十一二至謂之虛是感病危是為

脈乳若一息一二至者為脈不來其人當冷必死。連若一息十二至者必死。速不滿三息何者為一息一呼一吸名為一息。呼吸者即是出一氣入一氣謂之一息。其脈若指下求硬隱指意大者是有積者求微細即是冷者虛弱即是熱時後一大即足驚若大小不勻即是惡候也。先生所論浮數為熱伏結為寒沉細為冷大小不勻為惡候也。數者緊也浮者轉也伏者結也。重手方見結者亂者沉者重沒謂之沉細有微也大小不勻則足或大或小而不勻是謂氣不生其人必死也。

疔氣

經云胡於寸口人迎以處百病而決死生也。寸口人迎陰陽之氣通於朝五晝時據本經云至始從中佳注乎大陰此是氣足

位實時陽明時時陽明注是陽明長時大陰也。時大陰注手少陰是入迎之脈。時太陽未時太陽注是太陽。時少陰未時少陰注手少陰。時少陽未時少陽注是少陽。時厥陰未時厥陰注手太陰。又云寸口者脈之大會。手少陰之脈動也。此寸口指右手寸口也。脈於寸口陰脈氣所發脈也。脈會入於寸口。六者二經。聖者都會之所。手少陰脈所動之處。

若朝於寸口人迎是朝於左手手少陰心經之位。非右手氣口手太陰肺經之位。若寸口人迎陰陽之氣通於朝是早朝朝於左手人迎手少陰心經之位。非右手氣口手太陰肺經之位。人迎手少陰心經乃午時朝會也。即不見寅時朝會也。楊氏曰手少陰心經脈手少陽二經脈也。故合於左手上部

足大陰脾脈也。是陽明胃脈也。故合為右手中部。此經作如此。分別若依脈經配三部又與此不同也。夫此法楊氏不能明其理。故言不同也。是師將三部及到配合五行六氣而言之。師謂此寸尺及到入問三部各何所主。說石上部法天主胸以上至頭之有疾。中部法人主膈下至臍之有疾。下部法地主臍以下至足之有疾。故言審而次之者也。

經云脈有三部。七關。八部位。部者有四經。經者三部之內。今為十二經。今云四經者。是謂寸太陽陽明與足少陽少陰。此二經注水火之性各有綱紀而不能通上下。餘八經在手生足在足生手。所以經言部有四經也。手有大陰肺陽明大陰心足有人陽膀胱少陰腎為上。下部肺腎為下。何謂也。張氏云大陰陽明金也。三經屬時



與太陽為金是少陰太陽水也二經是腎 與少陰為金 金生水肺  
 金在上而下生腎水 水流下行而不 肺上故在下部水無有不  
 下水之性流下行不能逆上故在下部 足厥陰少陽水也二經是肝  
 與脾屬木 生手太陽少陰火 二經是心與小腸火前不能生火火  
 上行而不能下故在上部火性炎上不能下生足而手心主少陽  
 火是生右尺相火故在上部 手心主少陽火心為君人為相火二經  
 是心包絡三焦 生足太陽陽明土 二經是脾與胃屬土相火能生  
 土主中宮故在中部此皆五行子母更相生養者也右寸金生  
 左尺水水生左關木木能生左寸君火君火生右尺相火相火生右關  
 土故曰子母相生

脈證

論曰文藻雖雅義理難尋動靜之變有得有失辨別二十字不  
 濫絲毫約則示沉浮數總括綱紀  
 浮為風為虛 沉為濕為實 遲為寒為冷 數為熱為燥  
 脈亂不流 氣不和弦急 傷食沉緩 虛驚促急  
 風浮

三脈五脈直說

凡看小兒初生至半晝之間有病即與看額前眉上髮際之下  
 以名中食二指輕手滿曲按之兒頭在左舉右手在右舉左手  
 食指為上中指為中名指為下若三指俱熱感受風寒邪氣  
 若食中指熱上熱下  
 冷若名中指熱寒驚之候若食指熱胸膈不和氣滿若名指熱

乳食不消

半晝已上方可看虎口周晬已上看虎口兼一指脈若五  
 百七十四日變象滿足六與看一指脈以食指家轉分取  
 三部凡言三部者非寸關尺後小兒三部同看氣色為一  
 部虎口脈紋為二部寸口一指脈為三部凡脈者上按頭  
 前下診大衝并前三部謂之五脈凡見有患不為惡候即  
 不可與診大衝脈其脈定生死之要也其證候危惡故  
 當診之不可看惡汚人情傷於不仕用矣

分三部法

分三部但取掌後高骨為關關前為寸口關後為尺澤如診小  
 兒脈可以一指按其三關進退取之此法至明不須疑惑也

定喘急法

欲看候先須自審已知氣息然後審病人之氣息人一呼一吸  
 名曰一息醫士自息不可與人診候

定舉按法

診脈輕按得之者肺也重按得之者臟也不輕不重得之者胃  
 氣也

論小兒脈

小兒脈三歲以上五歲已下然後可看候與大人有異者為呼  
 吸至八是常也九至病十至困蓋小兒純陽故脈息數促如大  
 人者為不同也小兒周歲以前脈息難憑周歲已後方有脈形  
 齊鑑云五百七十六日乃成人血脈骨肉皆成至年方可診候也



訣脈主病

緩小腸鳴滿 沉微乳不消 數浮驚熱作 弦緊痛來潮

脾脈微細不吐則瀉難治陽數或消主吐乳又主瀉不爾

即熱易治實鑑云臟腑不和見浮於關上也

沉數熱加寒 微浮救不安 澁微多利血 浮實大便難

訣脈逆順

七表八裏脈乃是五臟六腑脈也蓋小兒純陽有病多見七表脈為屬陽脈故也主病有驗八裏脈所以不見者為屬陰脈故也設是小兒有八裏脈者必發陰痲孫氏云陽脈急甚必變陽痲急驚風也陰脈沉遲多變陰痲是慢驚風也是以八裏脈多不經見

傷寒脈大最相宜 腫滿浮洪病可醫 微細心疼終是順 沉遲吐瀉必須危 蟲攻緊滑皆知吉 渴飲沉微勢已衰 驚搐浮洪多易治 喘急澁盛滑為奇

三部脈

浮按之不足者之有餘動餘皮膚 洪按之極大 弦按之如引弦 數子吸之中七八息至

此四者屬陽為實熱病主脈主表 沉細取不得重手乃得 緩一呼一吸二至日緩

弱按之若無壯弱 此四者屬陰為虛冷病主脈主裏

湯氏曰

二歲已下十五以下謂之童 孩宜以脈診之小兒八至

為平九至乃死 舌骨指下診之只多大人一至為平若八九至

乃是數脈必終驚熱醫士詳之

臟腑定位 左心小腸肝膽腎 右肺大腸脾胃命 腎家之府是膀胱

命脈外診三焦病 五臟平脈 浮大而散心之常 肝脈來弦細又長 肺脈短浮脾緩大

沉濡而滑腎家鄉 汗下溫脈 大凡溫藥脈沉遲 浮緊須知汗可施 脈若來長兼散實

此為可下不須疑 脾胃有脈 脾胃于今脈上存 六腑色黃難進食 尺中弱甚似無根 斯人終不到長門 陰陽脈證逆順 諸屬陽陰陰陽 仙丹妙劑少安平 若遲後後關陰證 陽脈回時却入生 小兒脈總歌 嬰兒有疾未能言 筋骨肌膚尚少堅 脈理未全難考據 當觀形色定由緣 面青青色肝之疾 赤色心病因可必 白為肺病黃屬脾 黑屬腎虧斯為得 黑死還轉死可生 紅深時氣有積停 赤壅已受脾風了 青黑應傳入慢驚



發熱必冷是寒瘧 耳冷應知熱瘧 通身皆熱是傷寒

上熱下冷傷食病 更將虎口結氣看 或紅或紫傷風寒

青紫白痢黑中惡 黃因脾端皆可觀 紋直是驚則傷損

沉隱為風因可識 曲外為冷內食傷 紋得短少當安逸

五臟部位怕相承 更看胃氣有虧盈 陰陽表裏不可亂

補過多須辯名 五百七十有六日 大小變蒸數已畢

血榮氣盛脈理全 診後方能無所失 男左女右不相干

須臾一指蓋三關 浮風洪熱驚瀕數 遲冷沉虛實積然

脈浮因知感風候 浮大傷寒宜審究 浮緊驚風不可當

浮數風熱應須有 浮遲之脈有潮熱 乃是胃寒無所守

浮虛盜汗睡中多 浮洪胃口如火炙 瀉瀉浮大不可醫

口噤不食亦堪悲 脈洪腹痛多嘔逆 定知蟲動不容違

脈弦為風或為寒 弦數之脈瘧未痊 弦急因知為客忤

氣或不和邪所干 脈沉帶緊為腹痛 緊數驚驚多痰痰

脈浮而實大便難 牢緊痰聚何能動 脈浮沉遲為虛弱

久亦變經上還作 虛緊伏熱致生風 虛瀉慢驚且可觀

脈沉而實為有積 沉數骨節煩極熱 沉遲虛冷豈宜無

沉緩食傷多嘔逆 脈緩筋細皆為冷 氣反不化胸膈宜

單細疳勞伏氣攻 大小不均惡候者 變蒸寸脈多不拘

既曰變蒸何心驚 脈如雀啄屋癩候 直上直下亦驚石

又 二三歲時看虎口 更加中指按骨節 浮即風生數即驚

緊是癰癩風作熱 沉細脈痛緣沉虛 瀉瀉皆出此脈初

微遲有積兼蟲盛 遲瀉元來胃院迂 四歲脈不在指端

一指高骨按虛實 五六夜轉尋三部 平正關上為準則

七八稍移指少許 九十次第分位取 十一十二也同者

十四十五三指數 小兒有病脈不多 先定浮瀉沉瀉遲冷

數驚瀕數音所 沉遲瀉瀉浮瀉陽 更有何部屬何妨

青色驚風白虛瀉 赤生發熱黑難當 黃是脾家滯有積

醫士審度用良方 小兒五歲一指診 十歲方將兩指看

更量長短旋推端 十六人迎以候外 右手氣口以候內

外候風痰暑濕并 內則乳食痰積害 其餘一一依前法

更不於此重引載 孩兒五歲至七歲 五歲脈中方見指

男左女右專心記 左主脾肺心腎肝 右主熱生驚疳積

女孩反此背看之 更察病源人在智 若脈來時洪大急

此是傷寒須莫執 洪大却慢是傷脾有積 遲細脾虛因取

積脾胃虛弱 脈小急來腎氣虛脈小急者乃是驚風候

積在小腸瀉藥方醫在小腸令小便瀉成泄氣 診脈若來一兩朝

此名心死瘵難瘥 及人面指急如弓 驚死候

脾疾死候君莫怪 脈急脾風死候

二關六脈生死歌

小兒有證須憑脈 一指二關定有息 須知風熱脈浮洪



緊數驚風四肢掣

緊促之時危症

洪緊無汗是傷寒

醫士不辯誠無識

氣口緊盛傷於食

分明妙訣請君知

五至為虛四至病

六至平和曰無病

九至十至病勢極

十一十二死無疑

脈治直訣

小兒有病須憑脈

一指三關定有息

虛冷沉遲實有積

浮洪風盛數多驚

熱盛之脈須與解

風盛之脈須與利

傷冷之脈須與溫

積聚之脈下為最

小兒三歲至五歲

呼吸將八至者

全幼心鑑

短長大小有邪干

九至為遲十至困

小兒脈緊是風癩

沉滑須知乳食難

沉而數者骨中寒

腹痛緊弦實秘

胸膈痞結目直視

口中冷氣吐如癡

掌冷頭低盡驚醫

身形強直手足冷

小兒脈大多風熱

沉細元因乳食結

緊數驚風四肢掣

弦長多是肝膈風

虛濡有氣又蕪驚

脈乳大小便中血

沉細腹中痛切切

滑中露濕冷所傷

小兒乳後多嘔逆

更無脈亂無憂慮

脈緩即是不消乳

緊數細快亦少苦

河下官腸急痛時

浮大之脈歸泉路

小兒脈緊風癩候

沉緩食傷多吐逆

弦緊因知驚悸

緩急疳積神不守

冷則沉細風則浮

生實大便應秘久

腹痛之候緊而弦

此是胃寒宜療救

變蒸之時脈亦變

不治自然無過謬

單細瘡疥洪有蟲

大小不勻受惡候

脈伏而遲有寒熱

此是胃家多作嘔

瀉瀉浮大不可醫

子細對量口審究

此是胃家多作嘔

太衝尺脈

上關無脈已昏沉

脚回猶着尺脈存

此理恰如枝葉悴

尚餘生意在其根

太衝陽脈

太衝在兩足大指本節後

寸陷中動脈是

一六一寸半足

厥陰之所注診此者可決男子之死生

或診太衝即門外穴在

足內踝後跟骨上動脈陷中

七表脈

浮按不足舉有餘

此脈中空兩畔居

滑體如珠中有力

實形偏偏與長俱

弦如始按弓弦壯

等若牽繩轉亦初

洪濤按之皆極大

此為七表不同途

八裏脈

微來如有又如無

沉舉都無按有餘

弦緩息間二度七

濡來散止細仍虛

伏須切骨沉和類

軟弱而沉指下圖

澀脈如石輕刮竹

分明八裏即如途



七表病

浮滿中風乳失血 滑吐實下分明別 弦為拘急緊為瘵

洪脈元中偏七熱

八裏受病

遲寒緩結微為瘵 澁則血滯沉氣滯 伏為物聚滿氣虛

弱則筋萎須審記

聽聲驗病訣

樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變蓋人病蘊於臟內聲音必形於外樂聲亂則五音不和人聲亂則五臟不和所以聽聲音驗人之疾病也

全切心鑑

素問云視喘息聽聲音而知所苦者是故周官云以五氣五色五

聲視以死生

孫真人曰五臟不和五聲不順五色不定必主病也

三因曰觀五臟有餘不足喉之於聲臟音中之守也中盛則氣

盛中衰則氣弱故聲如從空中出者氣之虛也言微終日乃後

言者氣之奪也謔妄不避善惡明之亂也鄭聲音意不相續

陰陽失守也故曰得守者生失守者死

驗五臟正聲

脾屬土應宮音

肺屬金應商音

肝屬木應角音

心屬火應徵音

腎屬水應羽音

亂聲音主病

聲雄而重大

聲雌而實澁

聲悲而微細

聲濁而沉重

聲哭而不啼

聲喘而不哭

聲促而燥急

聲長而細小

聲嘔而不響

聲嘔而欬顫

聲短而微細

聲短而遲緩

聲前促而後緩

聲啞煎不定

聽聲驗病

肝應角其聲悲而和雅

心應徵其聲雄而清明

脾應宮其聲慢而緩大

肺應商其聲促而清冷

腎應羽其聲沉而細長

聲悲是肝病 二聲呼聲雄是心病 三聲笑聲慢是脾病 四聲啞聲促是肺病 五聲哭聲沉是腎病 六聲呻

已上驗臟病

聲清是膽病

聲短是小腸病

聲速是胃病

聲長是大腸病

聲微是膀胱病

已上驗腑病

聲悲慢是肝脾相剋病

聲速微細是胃膀胱相剋病

聲細長是腎聲輕是虛

聲沉重是風

聲細短是氣

聲靡是熱

聲短遲是瀉

聲長細是痢

聲實是秘澁

重實聲

重實聲雄軀熱為 二焦氣壅在心脾 傷風咳嗽咽喉痛



結注腸中糞出邊

悲焦聲

聲悲焦有燥 恐怖欲生風 重濁聲沉靜 疳攻必耳聾

哭啼聲

但哭無啼只是驚 多啼不哭痛分明 驚輕顛噴風瀉病

速緩聲頻吐瀉成

效則聲

驚前煩燥睡難安 躁促聲言為感寒 語短氣微尿主瀉

長澤聲細刺多般

遲緩聲

語短聲遲緩 腸鳴泄瀉頻 噴管多不響 風熱肺家因

小兒聲噴咳喉眼目溢者是欲出痘痘有痘痘盛出或出後痘

毒咽喉聲啞者死候也有初生兒重舌喘聲不出者死

初生將護法

小兒初生出胎便以綿裹指拭口中及舌上青泥惡血若不急

拭啼聲一發即入腹成百病矣

小兒初生落地不作聲者取冷水灌之須臾自啼及以葱白

細鞭之即啼

初生回氣法

小兒初生氣欲絕者必因難產或胃寒冷所致不可便斷脛帶

急烘綿絮包抱懷中以胎煎置火上燒用大紙捻點清油燒於

脛帶上往來燎之使暖氣入腹須臾氣回方止

拭口法

小兒在胎口有穢惡生下啼聲不出多用新軟綿包指拭去口

中惡汁免便嚔下嚔下則為心口痘瘡不可不知若伏之在於

心遇人行時氣久熱不除熱乘於心口生則出痘瘡之在胃

而胃主肌肉發出外則出痘瘡伏之在脾則出痘瘡伏之在肺

則出膿泡感胃風寒其毒當出也之不見其毒能出此者或幼

年不去半至四五歲亦無可免古人仍謂黃連法甘草法諸

乳法米茶法牛黃法蓋前人未當講究點入口中以解毒能用

此法則終身無瘡痘之患

小兒生下不能啼 惡物咽中未去之 軟綿包須指拭口

好將朱蜜煎凝 勿令他日為瘡毒 莫使藥心熱透肌

活法定用須講究 從來此理少人知

甘草法

妊婦臨月預辦甘草細切必許產時濃煎湯泡蓋內至定

收生之際急以新軟綿包裹指蘸甘草汁拭其口搨與喫次用

黃連

黃連法

產婦臨月用黃連細切搥碎綿裹百沸湯同甘草一處泡如煎

法拭口次用朱蜜

朱蜜法

錢氏日用好朱砂二大匙細研水飛煉好白蜜一塊投着稀稠

和成膏每用一小豆大乳汁化服時時滴口中二日內止進



粒又按

葛氏肘後方云先用甘草黃連法口吐其惡汁稍定更取米  
蜜安神穴用朱砂一大豆粒研細以蜜一蜺殼和末炒旋  
沫口中非獨鎮心安神亦能解毒之毒一生免痘瘡之患

牛黃法

錢氏日用真牛黃一小豆大塊用如蜜搜和成膏每服一小豆  
大乳汁化服時時口中形色不寧者宜多服之或身熱  
黃白痘瘡

千金方云牛黃蓋肝膽除熱定精神宜常服之送百病

豬乳法

聖惠方云取豬乳須令豬兒飲母次便捉豬兒後脚起口自流

乳急用玉將之即得乳矣非此法不可取也

張煥論云初生兒或未有奶子產婦之乳未下可用豬乳代之  
可免驚癇痘瘡

錢氏曰初生小兒至滿月內可嘗取豬乳滴口中最佳

初生浴法

小兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍

風癢瘡等證用清油調髮灰傳膚洗兒不可用木打濕臍帶干

金論曰浴兒當調和湯看冷熱若不得所令兒水驚即成痰病

冬寒不可久浴則傷風寒夏不可久浴則傷熱水溫不始浴時

當護兒背須風邪自此而入使之發熱成癩

小兒生下可先浴後斷臍以不可使令臍須預致剪刀於懷中

冷煖以軟絹裹臍然後斷之蓋臍不可令長又不可太短只取

兒足掌長如長則不乾引外風則成臍風之患川椒穢肉痛向

青帝叫不已浴水煮以金銀丹砂虎骨則除驚癇瘡疥瘡以

銅鐵器則辟惡氣煮以桃樹李根黃連指下主瘡不生丹毒

黃以麥門冬子荆芥鉉錫則安心氣覺白薯或生薑以甘草浸

水一宿銀錢熬水成膏入丹砂末合和服之則去惡瘡惡

毒物妙斯法預防諸疾患禍不作自能平安矣

浴兒湯熱添少許清泉水一匙極其宜也

風又引散諸氣夏中盛暑時宜用此湯洗兒不致發熱能

令成膏毒秋成亦白痢浴後可令兒息良久熟後乳之故可患

初生兒浴用豬膽一枚投入湯中煎熟煎前可免驚瘡浴時調

和湯看冷熱若或冷或熱令兒驚而後洗者宜用此湯

湯除惡氣不驚惡毒之患浴後及之不理

小兒莫抱於簾下濕氣常為害及及道舖舖之則臍帶之時各

異石之親諸物並不可與兒切宜忌之

浴兒之法要相當 其遠類藥水藥 冬令恐風吹等症背

夏涼因熱入於物 將豬膽一箇於水 兒生百日亦可去不祥

桃李根湯洗更宜 千金方云 臍汁傾於水中兒生三日後桃李根

煎湯浴可詳不祥不生瘡 免使後來生癩疥

孩兒從此日安康

洗浴吉日

寅卯酉日吉 壬午丁未 甲申丁巳癸巳凶



五種湯

桃根

柳根

梅根

桑根

柳根

右每味一兩洗淨切碎用水煮溫洗浴後用鮮粉撲身上  
只用五般藥亦好枝亦好凡浴護兒者宜以此而  
用益母草剉碎一升煎令十沸溫浴不生瘡毒

喉癰證

小兒喉癰者乃生下浴之遲也作病四肢寒慄多啼若見啼聲  
不生面臉青紫舌上白胎若胸乾喘不下手足時搐皆死候

產後難致病端 浴遲喉癰胃經寒 四肢寒慄時無聲  
胎額青黃證可觀 手足搐拘如具候 唇牙開禁未能安

全幼心鑑

消除胎毒諸邪毒 用保康寧亦不難

髮際穴

小兒初誕收生者多於頭額前髮際中間灸之至血取其可以截  
風路也諸風驚證藥力不及昏迷沉瀉無效於此均每每  
有扶危之功然亦顧其善後之劑何如齒白會一穴在頂心端  
正旋毛間亦濟危困者以是哉

新生兒戒灸

愚嘗戒之有北人居於南方新生兒多與灸然其害非淺古云  
河洛上地多寒兒生三日灸顯以防驚者東南地土多濕新  
生芽兒無病不宜逆灸

濟經云前世之書執小兒氣盛之驗者不知陽中有陰而

應吐利執河北關中地寒之驗者不知南北之異而專於灸  
大抵察地土寒濕燥實

斷臍法

千金論曰凡斷臍切不可刀割斷後纏結所令臍帶令至兒  
足跌上短則中寒令兒肚中不調或成內疝若先斷臍然後浴  
者水入臍中則令腹痛其臍斷訖連臍帶中多有蟲者宜急剔  
撥去不然則入腹成疾大抵嬰兒初生斷臍之後宜用熟艾厚  
裹愛護若乳母不詳或因沐浴水入臍中或遺尿在襁抱之內  
濕氣傷於臍中或因解脫為風冷邪氣所侵皆能令兒臍腫多  
啼不能乳哺即成臍風也

全幼心鑑

錢氏曰初生兒若洗訖斷臍帶須臍單衣交斷將暖氣呵七遍  
斷臍當重六寸長則傷肌短則傷臟中寒或成內疝急剔去臍  
帶中穢氣免令入腹成疾又按汁不盡暖氣少寒氣後則成臍  
風

嬰兒生下合應為 須臍單衣交斷臍 短則入緣傷臟腑  
長因臍是損臍肌 無令水入偏為妙 其候風傷恐致疑

但用新綿縛縛定 免教孩子受危

嬰臍法

千金論曰嬰臍須令白練柔軟方四寸新綿厚半寸與臍等  
長之緩急待中急則令兒吐乳兒生二十日乃解臍視之或燥  
則其後發啼時當解之易衣再裹解臍須閉戶下帳冬間用火  
令暖夏間用

令暖夏間用

全幼心鑑



錢氏曰斷臍後初起時看兒形色若面紅目赤赤脈浮快其食  
用米粉半錢令兒吮之有臍囊下最佳

臍風證

聖惠曰斷臍為水濕之氣流於心包絡

湯氏曰或初起尿濕之所侵或當風解脫之風邪所侵能令臍

突腫爛四肢柔直多啼不乳先撮口而生毒若臍囊青黑撮口

不開是為內搐不治瓜甲黑青即死

三氏曰或熱在胸堂伸引驚風亦令臍腫服龍膽湯

千金論曰小兒始生其氣尚盛若有疾瘕則頭暈之若不特下

則成別證

小兒生下有臍風證者多因斷臍帶後為風濕所傷而成也風

入臍者令臍腫脹臍口撮多啼不能乳食之臍風若入經絡

多變為疳積宜速治之紫圓子熱感四順散

宜風散 治初生兒因斷臍後外傷風濕及青口撮多啼不乳

口出白沫

全蝎二箇頭尾全去毒用無灰酒一許塗于臍末

麝香一小豆別研

右為研極細末用半字金銀煎湯或麥門冬去心煎湯調化

食遠服

防風散 治初生兒臍風

防風去蘆 羌活

黃芩

當歸

川白芷

甘草各半錢

右為極細末少許用燈心煎麥門冬去心煎湯調化不拘時服

撮口證

湯氏曰初生一臘乃免七日也

巢氏曰胎受風熱入臍流毒心脾之經或胎前風胎後風

腸外泄等證皆令氣促舌強撮口如囊不乳

其證面目黃赤撮口不乳治宜速利

千金論曰小兒初出胎骨肉未斂肌肉所是血也血凝止斂方

成肌若其血阻敗不成肌肉致令面目皆黃閉口撮口皆血

脈不斂也

聖惠論曰小兒撮口者皆由在母胎中感於風熱兒生之後氣

血未調洗浴當風而成然若口吐白沫四肢覺冷必難用藥也

小兒患諸風疾傳入惡候至於撮口病致危急凡有臍門撮口

胎風撮口鎖肚撮口癆腸撮口外疝撮口應病悉入成風風入

心脾俱能撮口夫患在撮口者皆由結鬱于中于及腸胃閉不

得通氣不能化腹中滿脹肚下青筋撮口不乳證候甚急若不

速與利下無因救療醫工若將撮口以為常則候傳入豈可授

藥應患用紫圓子利之繩通疾去氣和日利用者敬信而已

龍膽湯 治嬰孩小兒胎驚月內氣盛熱熱臍風撮口壯熱

龍膽草

釣藤

柴胡去蘆

黃芩炒

桔梗去蘆炒

赤芍藥炒

茯苓去皮

甘草炙各五錢

蜣螂二枚去翅足炙



大黃一分紙裹煨

右合研為極細末用棗子核煎或加防風土麻仁麥門冬去心以導心熱食前調服

辰砂礬石散 治初生撮口

辰砂水浸過半錢礬石其的去殼用沙一錢

蛇蛻皮炒一錢 麝香研一錢

右為極細末少許用蜜調傅唇口

急風散 治初生撮口

蛇蛻皮炒一錢 全蝎稍去毒炒一錢

鈞藤七箇 牛黃半錢 麝香一字

石為極細末少許用白竹瀝入乳汁不拘時候調化服

孤孫驚為極細末用乳汁食乳前調化服

臍突

胎乃育孩臍乃根本胎氣固則形體壯臍深則根命長受氣重遺形萎臍突凡兒斷臍利益漸長漸深吻乳調和愈固愈實是血脉之相順致形躰之相資初生之兒有熱在胃室則頻頻伸引呃呃作聲其氣抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可要無識之夫將謂斷臍不利而使之然者非也斷臍不盈亦一臍之內隨其根帶自固實者深之弱者淺之深淺之理以其臍賦得之此乃良由胎中母多驚悸或因食熱毒之物有作宜與藥其熱自散其臍歸本不必以藥傳之恐毒傷入為害醫士當知之矣

照孩生下旬餘日 臍突光澤非大疾 穢水伴中明所因 徐徐用藥令消釋

二豆散 治嬰孩小兒臍突腫

赤小豆不去皮 豆豉 天南星去皮研

白飯各錢

右為極細末半錢用芭蕉自然汁調傅臍四傍一日一次二日二次若得小臍下白即安

臍瘡

巢氏曰因浴兒水入臍中或尿濕襁袍致臍中受濕腫爛成瘡或解脫風邪所襲入於臍則成風癩若瘡腫不乾久則發瘡小兒臍風撮口者因水毒傷臍中則風邪貫臍而作若凡啼叫不止臍青出曾翻頃欬乳不通喉四肢加厥寒瘡疔生為惡候不可治

水毒傷臍 風邪入臍中 面青唇口紫 吐沫似痛風 啼叫臍青出 曾翻乳不通 四肢加厥冷 寒瘡命難空 風邪半受入臍中 七日之間變吉凶 若見臍皮起

惡候口紫是為風

臍濕生瘡 臍濕生瘡 風偏冷氣攻 臍腹作痛 桂毒必生風

封臍散

紅膏灰 乳頭髮灰 白膏灰 南星

紅膏灰 乳頭髮灰 白膏灰 南星

紅膏灰 乳頭髮灰 白膏灰 南星

紅膏灰 乳頭髮灰 白膏灰 南星

紅膏灰 乳頭髮灰 白膏灰 南星

紅膏灰 乳頭髮灰 白膏灰 南星



白欬 當歸頭 赤小豆

五倍子 血竭 龍骨

赤石脂煨 海螵蛸 百草霜

臘脂各半錢

右合研為極細末濕乾傳乾則清油塗忌生水浴

封臍散

紅綿灰 黃牛糞灰 龍骨

乾臘脂各半錢

右為極細末濕乾傳乾清油塗臍

封臍散

治臍肉出水汁不乾

當歸頭一錢 綿綿脂煨灰一錢 或舊綿

右為極細末入麝香一小字同研少許乾傳臍

真功散

治臍中瘡 薄荷葉 蛇床子各三錢

輕粉半錢

右為極細末少許乾傳臍

龍骨散

治臍中瘡 龍骨煨 輕粉各半錢 黃連去鬚一錢半

右為極細末少許乾傳臍

治兒滿月啼叫臍中出血用白石脂炒研極細末乾傳

治兒因剪臍傷於外風致臍瘡

龍骨煨各半錢

礬石

右為極細末乾傳

預治

初生兒預防臍風者臍瘡 最宜早治 藥散 臍散 臍散 臍散

拭口中牙板上有筋兩條 用竹刀輕輕刮斷 則無疳積

黃連去鬚一錢 甘草一錢 其散

臍白一錢

右用黃子小便煎乾 臍中

抱兒向明看臍上有赤脈 宜便赤 臍上赤脈者生

下胎毒

古之方書中言已始生者 服朱砂白蜜黃連散 下胎毒明醫

詳之論曰今之人比古者 人起居攝養大以不同其藥乃傷

脾收陽之藥若亂見服後 生異病或吐或瀉或寒

或咳或喘或急或腹脹或腹中 氣急或驚悸大抵萬物人之類從

根本而生者若根壯實則耐 心寒免使少年之後服脾胃藥

丹田三里丸

凡下胎毒宜用淡豆豉煎 水與三九口其毒自下又能助

養脾胃消化乳食用淡豆豉 無損的

楊氏曰小兒在胎受病非 一 夜裏無驚結難開不通宜取

胎毒

瘰癧

瘰癧曰胎受熱毒流於心脾 下為風邪侵襲自滿寸至百

二十日見此名犯瘰癧不

瘰癧



其證眼閉口噤啼聲漸小舌下裏肉如粟米狀不乳口吐白沫色赤鼻黃是其候也

風緊

聖惠方曰乃在胎久受驚熱至重

其證眼閉不開牙關緊閉口噤不乳舌瘡如粟如初覺喫乳不穩啼聲漸小色赤鼻黃是其候也急宜治之

湯氏曰百日內見此名犯風緊連治口不治

聖惠方如口開見有物如蝸牛或如黃頭白毛薄切猪油擦消看兒上脣有白泡子用指甲輕輕刮破

三因方以熱帛蘸溫水入口拭破

口噤

全幼心鑑

巢氏病源曰小兒在胎之時母喫熱物熱入腸臟兒生之後熱毒結聚口裏舌上有形如粟米大令兒不能開口名曰口噤

聖惠方曰初生兒須防三病一曰口噤二曰撮口三曰臍風皆足急病就治口噤尤甚若過一臘方免此厄但看牙關緊急不能喫奶啼聲漸小口吐涎沫便是此證急看兒上脣有白點子先以指甲刮去次後服藥

青點口噤

初生小嬰孩 着噤口難開 臍內流鮮血 肌膚碧似青

口噤不開

小兒口噤不開牙關者謂藥勿效生天南星去皮臍研為末調末龍腦少許合和用指蘸生薑汁於大牙根上擦之開

全幼心鑑

刺頭

聖惠方曰小兒初刺頭俱不得日皆於滿月日刺之蓋氣血未

前產婦未得山房於滿月即與俱出謂胎髮微惡有細神

驚令小兒不安故於此日必刺頭而出凡刺頭就溫暖避風處仍刺後頭以杏仁三枚去皮失研碎入薄荷三葉再同研却入

生麻油三四滴攪拌和頭上擦以避風邪兒生髮亦助其後小兒亦用治法

刺頭吉日

斗室崔氏曰小兒初刺頭良日宜丑寅日吉丁未日凶

小兒初刺頭胎髮息丙丁日頭生惡為五月七月令兒短命

全幼心鑑

牙疳之疾最不妨 刺令煖處正宜言 若逢丁未須迴避

不信須遠避有瘡

正二臨諸四五難 二九十一子午進 十月十一卯六吉

十八巳上髮根齊 每遇十五丁不刺 刺頭宜早無疑

不尿證

小兒初生不尿者皆因在胎之時母食燥熱物致令胎中氣血不和胎中兒因氣血是以生下肚腹脹滿腹如覺臍四倍

有青黑紫色及口撮即不可救也如未有青黑色不飲乳者服

慈乳湯

右慈乳湯大者以竹葉煎汁半小者同煎片時分作四次服即通不飲者服之即安乳



果木之葉本寒宜也百意速用呼呵及以慧髮令聲發越雖然  
妙理奈緣自無根本產子育兒當知其義理哉

乳汁說

婦人乳汁者血也其血屬陰味甘性冷飲乳小兒因用湯水撮  
繳唇口致令冷氣入腹傷動脾胃遂成大患

初生嬰兒產婦之乳未下可用猪乳代之可治膈風驚瀾

擇乳母

錢氏曰凡乳母者其血氣高乳汁也五情善惡悉是血氣所生

乳兒當謹分怒之氣未解即便乳兒則必成疾也大抵擇乳母

一切禁忌不可用胡瓜在乳夫瘦瘦腋氣喘呻嗽病者及身軀

疥癬頭瘡髮少缺唇耳聾暗啞鼻風癩癩病獨眼癩瘡麻風

毒跛足龜背蛇背鬼形惡貌等疾皆不可乳兒除此外皆可用

也緣染之久識性亦同恰如接木之造化不可不詳

保幼須知云乳母二三日早服沉香降氣湯有奇效

形容醜惡不宜乳 腋氣胸等總莫求

識情方見有來由

乳兒法

湯氏曰夏中盛熱時乳母浴後或兒啼不可定時乳之

毒秋成赤白痢浴後可令定息良久熱躁乳之

再氏曰盛啼不可食乳惡氣逆不順聚而為疳亦能

千金論曰凡乳兒不可過飽飽則溢而成嘔吐若乳來多

出後後再乳切須乳時令先令擗去宿熱乳狀乳之

計寐當以臂枕之令乳與兒頭平母欲睡者待即奪其乳恐其  
不知飽足亦成嘔吐父母交合之間兒臥於側成驚起不可乳  
見蓋氣亂未定必能殺兒也

巢氏云小兒啼未定氣息不調母不可以乳飲蓋惡乳不得下  
停滯膏膈則為嘔吐也為害不輕

顧顯經曰夏中熱盛乳母浴後可令定息少久熱躁乳之方免  
痰病夏不去熱乳令兒嘔吐冬不去寒乳令兒泄瀉後瀉尤不

可不謹

小兒啼未定氣息未調乳母勿遽以乳飲之故不得

隔而成嘔吐此患有之可不為戒

小兒初舉三日用飲三日之後用哺量日以為則勿令

不及哺之道所以助穀氣然後五臟得所養矣

夜間無好乳乳母起身坐地抱兒餵之

每候早欲飲乳皆須程去宿乳

凡為乳母者皆有節度如不禁忌即令兒百病生如是拙調可

致兒無疾長壽是以春夏切不得衝熱哺兒必發熱疳并嘔逆

秋冬切勿以冷乳兒必令腹脹臃腹

乳汁勿投於地為蟻食之令乳無汁可沃東壁下佳

乳兒

產婦血敗者當下禁者化乳血下不盡母致其疾乳有不調兒

惜其病凡兒吻其乳有不調於膏堂氣滯積隘或冷或餒故以

出或問之無恙不口不宜也久兒神困力乏氣怯肌

出或問之無恙不口不宜也久兒神困力乏氣怯肌



脾家者虛遂作瀉疾及成疾脾風定矣初生  
氣未備穀食未入乳快如無恙自然體弱不可  
壯壯神氣清童則失乳如人絕食食為根資養性命豈可  
乳幼本只柔弱血氣輕微臟腑淺薄根基危脆豈可失乳  
若失乖終甚多乳之老慈性命難保其或母用性不順則  
亂則乳汁不和乳汁不和令兒現運且其連與療理若  
必至害生小沉香煎及鹽豉圓兼與服之當飲其驗  
養香正氣散加枳木尤良

悲喜莫乳

悲喜令兒乳 痰涎嗽不消 停留胃膈上 此

巢氏云小兒飲乳因冷 寒不調停積膏膈之間結聚成痰

全幼心鑑

痰多則令飲不下吐痰 不絕痰結微壯熱痰食壯熱不

止則發驚癇

保幼須知云小兒飽食後不食乳恐生走馬疳

哺兒

葛氏曰兒初生三日開腹助 碎米濃作汁飲如乳駱與兒

大豆許含嚙之

湯氏曰初生小兒乳哺須要得法乳者好也哺者食也乳後不  
得便與食哺後不得便與乳小兒脾胃怯弱乳食相併難以化  
化周歲以上必成乳癖食積於中作痰作熱疳病從此起也  
初生小兒始哺十日前如赤核 十日信之五十日如彈子大  
百日如棗若乳母奶少不得從此 當用意哺身却不可過飽

若兒不嗜食勿強與之強與之則不消以成疳也  
外喜雀氏初哺見法以手定成口

丑寅辰巳酉日大吉 男忌戊己日女忌丙丁日哺

彈丸乳食令兒病

不善操舟者罪河之厲也非河之罪也不善操舟者之罪也不  
善乳兒者罪兒之多病非兒之罪也不善乳兒者之罪也後漢  
王潛大論云嬰兒常病傷於乳也乳哺多則生癩疔蓋小兒飽  
病多有傷患

素問云飲食自倍腸胃乃傷 公抵強飽乳食自令兒信快矣

乳令兒病證

喜乳涎喘生驚

全幼心鑑

孫兆云今兒上氣顛狂亦今兒生痰喘急或生驚

怒乳疝氣脹

千金翼云怒乳令兒疝氣扁鵲云女子則腹脹

寒乳疝片不化

史記華佗論云乳氣虛冷故令便止而啼千金翼云令

兒咳喘

熱乳疝黃不食

千金翼云今兒嘔吐 張氏云熱乳傷損氣令兒驚

氣乳吐瀉腹脹

寶鑑云今兒面黃白 乳哺減少夜啼明乳

病乳能生諸疾



今兒黃瘦骨蒸盜汗驚風夜哭孫氏云病乳則致虛羸及

生諸疾

逆乳吐逆生痰

靈秘云逆乳成痰涎涎生驚悸實證云逆乳成痰涎又吐

逆生痰

逆乳腹急臍冷

寶鑑云腹急而瀉胃背皆熱夜啼肌瘦一如疳塊

醉乳恍惚多驚

千金翼云小兒執腹等痛扁鵲云醉乳則乳兒恍惚

多驚

淫乳必發驚癇

小兒心鑑裏

寶鑑云乳母淫佚情亂乳兒令吐瀉身熱啼叫如鴉不治

已上乳急欲乳兒能主諸病不可不忌也凡喜怒驚亂未定

乳兒則成吐瀉腹瀉疳積不食寒熱壅積不散乳目則成痰

癖涎嗽肺脹鼻齋滯淫喘乳多發驚癇聖惠方云醉淫喘乳

能殺小兒聖濟經論乳者夏不欲熱熱則致吐逆冬不欲寒

寒則致瀉瀉母不欲怒怒則令上氣熱狂母不欲醉醉則令

身熱腹滿母方吐下而乳則致虛羸母有積熱而乳則發黃

不能食新居而乳則瘦悴交脛不能行大抵乳食不便則生

疾痲

斷乳法

保嬰須知云小兒年三四歲當斷乳而不肯斷者宜

斷乳膏

山梔三箇煨存性雄黃少

朱砂少

右為極細末入生麻油輕粉各少許調勻候兒睡着濃抹於

兩眉上醒來便不食乳未效再用加黃丹一錢

斷乳吉日

丁虛 丑斗 寅室 卯女 辰箕 巳房 午角 未後

申鬼 酉葡 戌胃 亥壁

非吉日 三月 五月 七月忌斷乳

小沉香前圓 治嬰孩小兒虛中積證本

氣乳積腸胃久虛臍中皖不和痞氣

厥腹肚疼痛見軀羸不堪動轉者乃

藥

沉香

乳香

丁香

木香各二錢

肉豆蔻麩麥火煨去油一箇

百草霜一分

杏仁去皮尖二錢炒

巴豆十四箇去皮心油

右為極細末煮酒封頭蟻和圓如黍米大用淡生薑湯食前

服

鹽鼓圓 治嬰孩小兒嘔乳不止

鹹鼓口內含去皮七粒

膩粉一錢

右為研如黍米大母服二圓或五圓用薑香葉煎湯食前服

乳頭吻亦得



藏衣

兒衣先以清水洗之勿令沙土草垢又以清酒洗之仍內錢一文在衣中盛於新瓶內以青帛裹之其瓶口上仍蓋蓋頭且置便且處待滿三日然後依月吉地向陽高燥之處入地三尺埋之瓶上土厚一尺七寸准須牢築令兒長壽有智慧若藏衣不謹為猪狗所食者令兒癩狂蟲蟻食者令兒病患瘡大鳥食之令兒兵死近社廟傍者令兒見鬼近深水滄令兒溺死近故墓傍令兒驚惕近井傍者令兒病聾盲乘道路街巷者令兒絕嗣無子富門戶者令兒聲不出耳聾若水流下者令兒有官乘於火裏者令兒生爛瘡若木頭者令兒白絞死如此之忌皆須慎之

藏衣天德月德月空

正月天德在丁月空在丙壬 二月天德在坤月空在甲庚  
三月天德在壬月空在丙壬 四月天德在辛月空在甲庚  
五月天德在乾月空在丙壬 六月天德在甲月空在甲庚  
七月天德在癸月空在丙壬 八月天德在辰月空在甲庚  
九月天德在丙月空在丙壬 十月天德在乙月空在甲庚  
十一月天德在丙月空在丙壬 十二月天德在庚月空在甲庚  
凡藏兒衣者依此法天德日空數埋之若有違反之者且以衣內新瓶盛蜜封塞口桂於室外福德之上向陽高燥之處待過月然後依法埋藏大吉 四寅旬中十日不得埋藏兒衣以解盛蜜封安置空處度十日即藏埋之

看衣法

千金論云小兒用衣故衣緊着衣女用母故衣勿使新綿功不可過厚也傷皮膚生癩疥皆自此始  
聖惠論曰小兒一禁之內皆宜用故衣為之不可用新綿若用新綿則令兒壯熱或驚癇及天氣和暖風定之時當令乳母抱內日中嬉戲頻見風日則血氣凝滯肌肉硬窄堪承風寒疾病而少也若常高堂大廈之間則以故衣厚衣如陰幽之草木不見風日不無風寒矣  
小兒未春勿衣新綿綿為蒸熱大暖宜慎於肉衣列履頂蓋足致陽氣不出故多發熱  
保幼要知云小兒不令暖衣但用故衣當要潔淨仍不可露星

藏衣劫

小兒無辜疾者古云天上有一鳥有無辜因驚見及物大吹過夜遇此鳥遺尿之令兒啼叫謹察所主日漸黃瘦者此劫也  
是八邪所得之也其八邪者氣逆痰飲後風驚者請之八邪則令人日漸黃瘦食不長肌肉夜間多哭身上或發微熱或熱多渴與食不知飽飽或生瘡癬是也  
特護法湯氏請謹查  
錢氏曰小兒須看帽頂衣蓋風池取乾菊花在枕邊首今日此  
呂氏云乳母每日二時令孩兒項後風池若壯熱者即與之  
汗出即愈風池在頭項前兩腋之處



張煥論云小兒生後滿月日學成能識人認人勿令生人

抱之仍不可見非常之物恐感分忤也

錢氏曰百晬任脈生能又覆乳母當存節喜怒適其寒溫又云

半晬尻骨已成乳母當教兒學坐

千金方云小兒二百日外掌骨成乳母當教兒地上匍匐至三

百日腦骨已成乳母當教兒獨之周歲膝骨已成乳母當教兒

行步

小兒若能調和飲食并着承襲護如法則別無疾病亦不須令

兒常服湯藥此宜審之

初生兒未滿月內所驅使人亦不得令有犯到於兒前惡氣觸

兒兒得疾難治

初生兒出月必欲入襁褓襁褓之道必須有宜且如春夏之月乃

萬物生長之時宜放令地臥使之不逆生長之氣如秋冬之月

乃宜物收藏之時宜就溫和之處使之不逆收藏之氣然後血

氣氣則則百病無自而入矣

小兒又當有息無令汗出汗出則致虛損便受風寒晝夜驚寐

皆當慎之

小兒所以少病癩者其母懷娠時須時勞役運動骨血則氣強

胎養盛矣若少運動血氣微胎氣弱則兒軟弱易傷故多病癩

小兒春夏間有疾不可亂有動下使下焦虛上焦熱變成大病

矣

初生兒悲根汁灌即吐出惡水今無病

定命散 治初生兒口吐不乳

蟬蛻

白為極細末入輕粉少許和用乳汁乳透調化服

辰砂全蠍散 治初生兒口吐

辰砂

右為極細末用乳母嚼調塗口唇裏及牙齒上或用豬乳少

許調入口內

鎖肚法

初生兒有鎖肚證由在胎中

食諸熱物熱毒感結於肛門

謂而不通兒生之後無復效

所以如此至若第三日不通急

令婦人以溫水洗嗽口了

處凡四五次仍以輕粉半錢

以通為度如更不通即是

快也若腹肚膨脹不能乳

鍾洪聲大潤遠流長形處

不虧耳目兩竅相通大小

作聲聲而為其或短較上

不足何更投藥使成人

氣不相乘焉

此由肺氣



大小便不通

小兒初生腹脹欲絕大小便不通急令婦人漱口及通乳前背心手足心臍下共七處以紅赤色藥末塗之自通

大小便通

氣鬱生風熱大便不疎泄小便澀難通 須臾成驚

小便閉

小腸心之腑也水竇流行隨其氣而利之心氣鬱則小便不通心氣必冷小便多泄音鬱謂酒濁也心氣若寒小便澀心氣若熱小便難泄心氣積熱小便自赤光赤而後言問小便者醫謂下結腹吐脹緊滿不遺其便者此為心氣鬱而閉也而此乃是閉不通利于心疼痛精微於此而人謂之閉也修去泥壅少許研傅如仍燒薑紙灰有性水於壅下壅合同研採細用麥門冬去心燈心同煎湯食前服時見效

小便秘澀

楊氏曰腎主水膀胱為之腑水滿膀胱則小便也然小腸應於心蓋陰不可無陽水不可無火水火既濟則下利交濟而流行水道開闔不失所司矣若心腎不濟陰陽不調故內外閉格而水道澀傳送失道則水道澀則不通冷則不禁其熱者小便閉而絕無其熱微者小便澀而僅有醫與膀胱俱虛者熱乘之水道澀焉自令心氣旺盛小便澀通而赤茯苓麥門冬澄新車前子之類清利行之

草蜜湯

生車前搗取汁入蜜食前調服

五苓散去桂多即赤茯苓用燈新車前草煎湯食前服

掩臍法 治嬰孩小兒大小便不通

取連根葱一莖去泥土生薑一塊淡豆豉二十一粒搗一小匙同研細爛搗作餅烘熱臍中用帛扎定良久無透自通不通再用一餅

水通散

水通 滑石 桑牛炒

葵子各錢

右用燈新葱白車前草同煎食前服

大便秘澀

切勿言曰五味之精者以養臟腑五味之精者皆歸大腸吐出而不納也楊氏曰藥邪入心則胃氣鬱塞二焦伏暑則津液中乾此大腸之夾熱也若心火熾則腸痛胃氣欲積熱氣番灼則內受風熱消燥秘塞無宜疏利黃圓積宜消積圓胃中活法治之

膠蜜湯 治嬰孩小兒虛秘

葱白三莖

右用水煎去葱入阿膠炒及生薑蜜溶化食前服

獨棗湯

棗一枚去核入輕粉半錢

右用棗相合縛定慢火同煮熟食棗用棗煎湯食前服



甘枳湯

甘草

枳殼煨去穢各錢

右劉散水煎食前服

血脉不斂

鄧氏曰初生兒出腹骨肉未斂肌肉未成猶尚是血血凝則堅而成肌肉其有阻斂不成肌肉則必面日口鼻乾燥四肢不能伸縮者是血脉不斂也

首龍湯

乾地黃

山茱萸去核 山藥

澤瀉

白茯苓去皮 甘草炙

右為極細末用白湯調取一二滴入口中

腦冷腦熱

小兒有腦冷腦熱者兩證腦冷則腦漿水溜下從鼻孔中出日久不差氣息甚惡熱則腦枕骨疼閉目不開或太陽穴疼痛者

神仙二黃散 治嬰孩小兒腦冷

硫黃

黃丹炒

川白芷各一錢

右為極細末每用少許吹鼻中十餘次即止

通頂散 治嬰孩小兒腦熱

川芎末

薄荷末

朴硝各錢

右拌和研勻用少許吹鼻中

鼻塞不通

小兒鼻塞者由肺氣通於鼻氣高揚若氣受風寒停滯鼻間則成鼻塞氣寒而津液不收則多鼻涕若冷氣久不散膿涕結聚使鼻不聞香臭則鼻若挾熱則鼻乾皆阻礙乳

小兒稟賦胎氣元實三關九竅五臟六腑內外呼吸上下貫通

流行百脉止順三焦者皆因所協元命自然之氣也凡喘喘兒

三朝五日六歲一臘忽然鼻塞吻乳不能開口呼吸者多是乳

母安睡之時不知情上見子鼻中出息吹着兒額或洗浴用水

溫冷氣不避風邪所以致兒鼻塞

鼻塞不通

邪客皮毛肺中風 致令鼻塞氣難通 寒停額戶流清涕

息肉生成滿鼻中

鼻流清涕

鼻內流清涕 元因腦感寒 寒停傳額戶 鼻涕不曾乾

鼻塞清涕流 毛黃汗悠悠 喘促叫聲啞 傷寒外證未

開關散

香附子炒五毛

川芎去土

荊芥穗

獨活去骨炒

細辛葉

猪牙皂角煨各半錢

右為極細末入生葱白搗成膏用紅帛感夜貼額門

川芎膏 治嬰孩小兒鼻塞

川芎

細辛去土

藥末

川白芷

甘草各三錢 杏仁去皮尖二箇



龍腦香各半錢

右為極細末煉白蜜圓如梧桐子大用燈煎湯研化食後服如新用新油包二圓塞鼻孔中男左女右

細辛散 治嬰孩小兒氣寒多涕

防風去蘆文錦川芎

前胡去蘆 人參去蘆 甘草各二錢

右為極細末用乳香煎湯調化食後服

萬金膏 治嬰孩小兒疔毒

羌活去蘆 川芎 細辛

石菖蒲 木通去節 麻黃去節各一錢

龍腦少 麝香各半錢

全幼心鑑

右為極細末煉白蜜圓如梧桐子大用新綿包一圓塞鼻孔中男左女右

半黃犀角圓 治嬰孩小兒肺癰黃乾

牛黃半錢 犀角末 川芎

升麻 細辛 麻黃去節

甘草各二錢半末砂 龍腦各半錢

麝香一字

右為極細末煉白蜜圓如芙蓉大用荆芥煎湯研化食後服

眼閉證

小兒初生眼閉者由產母食熱物毒物致成斯疾宜速治之  
將少許蒸水洗眼上一日七八次如三日不開用此藥更治

仍洗乳 須要服山茵陳湯以眼開

生地黄湯 治初生兒眼不開

乾地黄 赤芍藥 川芎

當歸去蘆 瓜蒌根 甘草各一錢

右為細末少許用燈煎湯調抹入口中連服

山茵陳湯 釀乳

山茵陳藥 澤瀉各三錢 瓜蒌根

猪苓去皮 甘草生 生地黄各一錢半

右咬咀用水煎食後服初第一服第二服且捏去舊乳第三服後即令兒喫乳不妨若產母自乳亦可服

胎毒散

胎毒散

呂氏曰初生小兒須洗令淨若洗不淨則穢汁浸漬於眼此中使臉赤爛至長不瘥母食熱物穢藥名曰胎赤

真金散

黃連去蘆 黃蘗 當歸去蘆

赤芍藥各一錢 杏仁去皮尖半錢

右剉乳汁浸一宿藥以極細末用生地黄汁調一字煎爛

點眼新綿裹荆芥煎湯浸放湯時洗浴母服

洗心散

甘草生 當歸去蘆 麻黃去節

芍藥 白木 荆芥穗

大黃煨各半錢



右為極細末用生薑薄荷煎湯調化食滾服

血眼

胎氣克足兒將介降胞囊已破先行清水其兒既誕血即送下緣由胎氣頗滋轉側差緩其血壓症睡背遂致濺漆感則灌注其睛不見瞳人輕則外泡腫赤上下眩爛若投涼藥必寒厥宜與服生熟地黃湯流行氣血或用杏仁一枚去皮尖細嚼乳汁三五匙臍粉少許蒸熟以絹斤包蘸頻點重感者加黃連升

疳眼羞明

疳眼最羞明 才開泪又傾 肝心俱積熱 生膜翳遮睛

省目青膏

省目氣薰肝 黃昏見物難 睛雖無翳膜 內障若雲翳

生下經旬目見紅 蓋因胎受熱兼風 涼肝心藥斯為美

雖有痘疹宜別致 搥頭揉目熱攻肝 愛暗增明不欲視 省目母因風熱盛

斑疹疳疔醫睛漫 目腫弦紅赤 增目淚少乾 渣痰生習肉 血翳漸漫漫

肝冷睛浮碧 青光瞻受寒 全無諸障瘳 晝夜不能看

四聖散 治嬰孩小兒胎受熱毒上下兩目不開

燈薪 黃連去鬚 秦皮

木賊 黃各五錢

右咬 用用水煎清渣洗眼目自開不拘時候

辟瘟膏 治嬰孩小兒塵埃入目指成腫熱作痛啼哭

油煙細墨

右以墨新汲井水濃磨入玄明粉半錢和勻為膏用筆多點目內三五次忌酒熱物

關睛

龍木論小兒關睛候皆因失慎染打觸着頭面額角垂倒撲令兒肝受驚風遂使兩目關睛

牛黃膏

牛黃半錢

白附子炮

桂去皮

全蝎去毒炒

川芎

石膏各二錢

白芷

藿香葉

辰砂水飛各二錢

麝香一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

胎驚

小兒在胎中母因驚悸驚入胎兒當受之降生之後其兒精神不爽顏色虛白初則溫溫有熱其後煩赤多驚物動即恐驚響即悸若不細搜安胎取次難為調適既有胎驚將傳胎風之候產母忌食一切熱毒之物若作尋常畢竟難蓋是血脈家弱臟腑虛怯不堪重劑何可攻繫足使智者怯懼有之若也輕受熱以自散則於頂上生瘰其大如拳多白驚氣須當破之而後合之勿傳毒藥恐壞胎也射不惟傷壞深恐有害反為無益也

湯莫大焉



葉氏曰小兒胎毒受於母而得

其證印堂青色壯熱乳膳中多驚手足微掣十指如數  
久則成癩受驚之輕者青龍湯全蝎餅至聖保命丹重者  
奪命丹治之

小兒胎中累受驚則心氣不足矣若有此候當用安神壓驚鎮  
心圓散主之若見印堂浮紫痰涎吐沫搐搦不時者皆為惡候  
吳氏云小兒胎驚者見在母腹中十相具足或妊婦驚悸擗撲  
夫驚而心主血脉應之於胎故生下未滿月而發者是也

錢氏曰小兒壯熱吐乳心神不寧手足抽掣身熱強直眼目反  
張是胎驚風證

小兒胎驚風以胎婦調適乖常飲酒嗜慾怒驚撲母有所觸

全幼心鑑

卷二

胎必感之或外挾風邪有傷於胎故生乘母氣生下即病也其  
候月內溫壯翻眼握拳噤口咬牙身熱強直潮嘔吐搐驚  
啼聲縮頸開或頰赤或面青眼合胎脈脈不可尋作慢慢用溫藥  
其有者噤撮口之類亦此一種之所發也視其有間氣色紅赤  
鮮碧者可治若黯黑者不治虎口指紋曲入裏者可治紋  
反出外者不治治法解散風邪利驚化痰涎調氣

胎驚搐搦口喎斜 筋骨拘攣臉似花 口噤涎沫哭聲短

手足相牽腹受邪 唇青齒齦多緊急 腹臍腫起似垂瓜

腹脹額頭青脈見 逐涎安魄命須除 面腫顴聲蛇眼視

名方說說幾千車

愛聖胎中累受驚 生來緣此病停心 身肌軟弱氣乾枯

戰慄多啼睡不寧 臉鼻淡青燕目碧 印堂浮紫紫黑紫

驚丹次第安心胎 免致孩兒性命傾 月未出母之胎

因母身災子受災 腹直哭時先口微 面青拳縮搐攣腮

此患未出胎一月前因母傷寒風傳邪入臟各生

身筋帶之特傷於外風亦名疎風疎口 一身筋脈如何急

兩眼膠生閉不開 醫士見形先問母 便知此患自初來

三須退避驚風了 墜下風痰病不回 六抵醫家識者稀

一百息氣為一氣 人謂此病大過微 上下面如湯發熱

定知胎熱母身肥 應須懷腹失扶持 脚上生瘡如爛疔

未滿胎前先撮口 兩拳相握項腰直

全幼心鑑

胎毒胎內氣生毒 口眼三歪骨肉離 男者抽搐歸向裏

女子向外可堪醫 逆候不須投藥餌 有候仍存存兩肩

背裏無筋青碧色 應須有命莫憂疑 背裏有筋青碧色

神方妙藥也難醫

書全圖 治嬰孩小色解散胎熱化痰涎驚邪

人參土蘆 天麻炭 伏神去朱

白附子炮 牛膝南星各錢

甘草炙錢半 青黛錢 朱砂水飛錢

麝香一七

右為極細末煉白蜜圓如梧桐子大用釣藤皂莢十煎湯研  
化不拘時候服



胎疳即胎驚之異名

幼幼方曰小兒在胎久受驚動則成疳

其證身熱面青手足搐掣牙關緊急腰身強睛邪目閉

多啼不乳胎受之重者

小兒胎疳者乃孕中累受驚邪或因食毒而感若見諸癩疳後

皆不可治

孕中食毒與酸鹹 物類常驚氣鬱 長下孩兒昏眩困

膽心不足外邪干 面青唇白無時候 口禁睛翻吐沫痰

日久發頻加瘦癯 此般發候號胎疳

驅風散

胡黃連二錢半 全蝎去毒焙 犀角

天竺黃

右為細末用乳汁調化食遠服

全蝎膏

全蝎頭尾全者二十九箇去毒每箇用薄荷皮包了用絲縛定

慢火土炙令薄苛乾除去薄荷

朱砂一字

麝香半錢

右為極細末煉白蜜圓如梧桐子大用鈎藤煎湯研化食遠

服

胎風

小兒生軟身頭面如火撮口不乳眉間青色握指男外女內順

身冷而軟逆擦涌弓反張不治在胎受驚至重

胎風者由在胎之時臟腑未具神氣未定而動靜不常過酒房

勞或受熱感慮時噴聲高或自開大驚悸動心神又因驚發失

宜觸胃寒暑腹脹理前洩風邪疝毒入於胎中胎心之發邪氣在

臟不能宣通或可暴失度為觸胎帶風毒以四肢不調令

兒吐乳時後面青或痰實難積則半壯壯時復面青一者不已

致令均急驚風不安手足動搖身及強首者靜坐動即胎疳也

小兒胎中久積風邪若見偏搐面青唇白者皆為惡候

胎疳變胎風 胎驚變不同 胎疳寒腹痛 胎驚搖如子

胎中蘊積風邪久 長下孩兒作病端 寒熱無時腸閉結

心胃痞滿氣難寬 手足拳擊皮燥逆 筋拘四息若垂癱

目眩浮赤腮癆瘵 鶴膝多因此證傳

胎熱

其證曰小兒在胎母食熱毒之物或熱藥令兒生下身熱面赤

胎熱之證也

小兒生下身熱時叫哭身壯熱若淡茶色目赤大便赤黃

胎熱之證也

胎熱之證也

胎熱之證也

胎熱之證也

胎熱之證也

胎熱之證也

胎熱之證也

胎熱之證也



小兒生下 可赤脈赤 眼閉不開 身壯熱 口熱如燙

此皆因在母胎之時受熱毒所致 若有此證 宜令乳母

漸次解之

釀乳法 母子同煎

猪苓 去黑皮 澤瀉 赤茯苓 去皮

五苓粉 茵陳 甘草生

生地黃 山梔 去殼

右剉散用米煎不拘時候服

甘豆湯 治嬰孩小兒胎熱

甘草一錢 黑豆二錢 淡竹葉一錢

右以咀用水入燈籠七葉煎不拘時候服

本草心經

小兒初生有胎熱者證不可求速效法當先令乳母服藥見服

乳後漸次解熱百無一失節以涼藥攻之必致嘔吐也有大患

者宜細審之

胎黃 巢氏曰小兒在胎受母熱毒一下遍身面目俱黃身熱大便秘

小便黃多啼不乳

千金論曰小兒生下遍身面目皆黃壯如金色身壯熱大便

不通小便如琥珀汁不思乳食啼叫不止此胎黃之極也皆乃母

受熱而傳於胎也有此證乳母服地黃湯

黃相似

小兒身皮日皆黃有黃病也身痛腫背強大小便澀

面目指爪皆黃小便如屋蓋色看物皆黃濁者難治此

二證多病於大病後別有一證生下百日及半周不因

微黃者胃熱也大人一同又有面黃腹大食土渴者脾病也有

自生而身黃者胎疸也古書云諸疴皆熱色深黃者是也若淡

黃兼白者胃怯胃不和也

胃熱身黃

胃熱遍身黃 薑蒸體似湯 瀉煩心腹脹 脈亂定知亡

地黃湯

生地黃 赤芍藥 天花粉

赤茯苓 去皮 川芎 當歸 去蘆

猪苓 去黑皮 澤瀉 甘草

茵陳

右剉散用水煎食前服

地黃飲子 治嬰孩小兒生下滿身面目皆黃壯如金色或而

赤身熱眼閉不開大便不通小便如山梔汁滿身生瘡

生地黃 赤芍藥 各二錢 羌活 去蘆

當歸 去蘆 甘草 各一錢

右為極細末用燈煎湯食前服產婦煎服抹些入兒口內

犀角散 治嬰孩小兒黃疸一身盡黃

犀角 五錢 茵陳 瓜蒌 煨

龍膽 甘草

生地黃 各二錢 寒水石 一分半



右父咀用水煎不拘時候服

胎怯

小兒生下面色無精光肌肉薄大便白水身無血色時時哽氣多噦目無精彩當浴

胎肥

小兒生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸肌瘦目白睛紅紅色五心熱大便難時時生涎當浴

浴體法

天麻末二錢 全蝎土毒 朱砂各半錢

烏蛇肉酒浸 白礬各三錢 麝香一字

青黛三錢

全蝎心

毒

右同研勻用水三碗入藥三錢桃枝一握并葉五七枚同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

鵝口

巢氏病源曰小兒乃胎受熱毒心脾最盛上蒸於口致生白屑滿舌上口中如鵝見之口

作命散

白礬一錢 馬牙硝五錢 朱砂水飛二錢

右為極細末每用一字取白鵝糞以水攪取汁調塗舌上額頰內未用藥時先以手指纏亂頭髮揩拭舌上垢然後用藥

傳

葛氏方 黃丹煨乾擦舌上口中即愈仍服消毒飲

重舌

巢氏病源曰小兒重舌者心脾熱故也心候於舌而主於血脈之脈絡又出舌下心火脾土二臟母子也有熱即與血氣俱盛其壯附舌下近舌根生形如舌而短者故謂之重舌也

小兒初生重舌者心脾俱有熱也心候於舌所主者血脈之絡脈出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根而重生一物形如舌而短小是也若者頰裏及上腭者曰重舌有者齒斷者曰重舌皆當刺去其血也

小兒看舌下若連舌有膜石榴子若啼不出穀不轉運以指爪摘斷之或用葦刀子割之微有血出即活

弄舌

全初心

毒

脾臟微熱令舌絡微緊時時吐舌治之勿用冷藥及下當少與瀉散漸服亦或飲水腎疑為熱必冷藥下非也飲水者脾胃虛津液少也又加舌肌瘦五心煩熱即為疳瘦加胡黃連圓輩大病未已用藥弄舌者凶

積熱心胃多煩渴 舌乾澀腫活無因 南鵬腦疳并疑水更與分筋妙手針

孩兒胎受諸邪熱 熱毒三焦作重舌 或成鵝口證堪憂 用藥更須針刺裂

鵝口重舌一般調 牙板風腫熱上焦 此號腹中傳毒熱 舌不呷妳口內淫 有時睡裏多驚 時時虛汗熱來潮

莫教錯認諸家病 看取巢元子細 探



弄舌舒舌

弄舌微露即收 得於病後最難瘳 出長收緩名舒舌  
統在心脾不用憂

舌腫如刺

嬰兒患重舌 啼叫哭無聲 面色類更變 驚寒命必傾

弄舌生驚

弄舌生驚極 牽睛引皺眉 涎流空歎氣 唇撮口如吹

烏魚散 治嬰孩小兒心脾有熱則血氣俱感其舌下近舌根

生形如舌者謂之重舌

烏魚骨五錢

蟻蝦

薄荷葉各一錢

白礬煨半分

聖心散

右為極細末用雞卵黃調勻塗舌上濕津無妨

青液散 治嬰孩小兒鵝口重舌及口瘡

青黛一錢

龍腦一字

朴硝一錢

右為極細末用蜜調鵝翎少許傳

當歸尾 治嬰孩小兒心脾有熱舌下有形如舌而小者

名曰重舌及唇口兩畔生瘡

當歸尾

蓮翹

川白芷各三錢

大黃煨

甘草各錢

右入咀用水煎食前服

一捻金散

雄黃二錢

鵬砂一錢

腦子半錢

甘草半錢

右為極細末乾搗舌上或用蜜調鵝翎蘸刷

瀉黃散

藜蘆葉三錢半 山柰六錢五錢 石膏二錢半

甘草二錢

防風去蘆二兩

右剉散用水煎不拘時候服

木舌

聖惠方云木舌者脾之脈絡在舌下心主舌若臟腑滯心脾  
積熱氣隨脈上衝於舌初則舌腫漸腫大塞滿口中是為木  
舌若不急療必至害人此小兒重舌切不可用手去按按則舌  
根損長成話不正因此得之

聖心散

川礬散

朴硝五錢

真紫雪一分

鹽半分

右為細末入竹漚三兩點用白湯調傳熱津無妨

垂癰

呂氏云初生兒喉舌上有物如蒼蠅壯者謂之垂癰

錢氏云蓋由胎毒上攻血氣不斂也如有氣脹起急以綿纏長

針留刃處如粟米許以利之如重更血水泄水用鹽湯洗

如聖散

麝香錢

牛黃

大陰玄精石

辰砂水浸冬一分

右為細末入龍漚一分研勻將口內患處



懸癰

千金論曰小兒出胎之後宜血氣收斂成血則口肉舌上肉類  
裏色自清淨也若頰裏舌上有物如瘡瘡者名曰懸癰可以銀  
鏤長針留刃處如粟米許入以刺之令泄去青黃赤血汁先用  
鹽湯洗拭次用蜜調一字散少許塗刺處之一刺且止如未  
消次日再刺不過二次自愈

一字散

朱砂

鵬砂各半錢

龍腦

朴硝

方為極細末用蜜調少許鵬翎刺口內懸下無妨

重懸重癰

全切心

重

初生兒有重眼重睛者由其血氣不收斂成肉故癰重者上有物  
如瘡瘡或水壯腫者名重眼者有齒齩者名重眼治法當以線  
纏長針留刃處如粟米大以刺之令泄去血汁先用淡鹽湯洗  
拭次用一字散即愈又兒口裏舌上有白屑者名齩口齩未須  
服藥當以天南星散貼脚心次用青液散

天南星散

天南星 生土皮

右為極細末用醋調塗脚心男左女右厚皮紙貼如乾時再  
用醋潤

麥門冬散

治嬰孩小兒胃中客熱口氣作臭不思乳食心腹  
煩悶齒齩腫出鮮血

人參去蒸

天南星去心

天南星去心

生地黃

天南星

赤茯苓去皮

白茅根去心各二錢

甘草炙一錢

有吹喉用本煎不拘時服

丹毒

經云赤紫丹癰皆心火肉腐而發赤如丹砂故名丹毒心主血  
而大性熱血熱相搏滯於陽即發丹毒心虛燥則痒心實熱  
則痛自腹生四肢者易治自四肢入腹者難療先用表藥  
治之有身上發時亦如前證不甚深澤但見出浮於通脈神昏  
不悅名陰濕毒證若入腹入腎多致為害不可輕視如常自取  
困爾

全切心

重

熱毒與血相擊而風乘之所以赤腫遊走而編腫也此由乳母  
酒醜氣多過度或夫燥或與兒不潔冷而由多成此疾或後  
於手足或發於頭面皆令兒燥悶腹脹其熱如火痛不可忍  
經云人腹入腎之證便不可救藥用散毒散如紫草茸外用  
青黛土升研極細末用井水入蜜調傳丹之名有種最多究其  
因孰毒與血相搏而風乘之有赤腫而遊走通脈者入腹入腎  
則殺入亦由乳母酒醜氣多過度或與兒不潔冷而由多成此  
丹毒熱毒氣客於腠理傳於血氣發於汗上赤如丹片白如散  
此丹有五色乃血熱毒有或有寒夾冷夾熱故其  
此不同大抵諸毒皆屬於心主血熱而血之媒古人以丹



者謂心應火而色赤也乃心家血熱風以動之是以遊走遍身  
初生自背腹流散四肢易治自四肢流入腹入腎則殺人矣  
阮氏曰治丹毒必先服藥內解熱毒方可塗傳免毒氣無所泄  
而入裏害人

湯氏曰所謂丹有一十五種又有赤遊風及煙瘡木事方以十  
種治

熱風生風疹 我然發遍身 火丹并赤腫 惡毒亦驚入

疔瘻風邪爛 皮膚癢癢招 臟中加熱毒 赤腫轉難消

壯熱作驚啼 壯熱作驚啼 脚膝連腫 岐透死不知

小兒丹毒候 壯熱作驚啼 脚膝連腫 岐透死不知

只在胎時母受驚 驚傳邪熱子傷神 忽然赤片微微起

至初心鑑

涼解肌清熱見寧 熱毒乘虛乘發作 急須化毒與消風

小兒氣弱肌膚薄 疔瘻出瘻 固煩紫浮 疔瘻不乳 皮肉白脹 手足拳攣

疔瘻出瘻 固煩紫浮 疔瘻不乳 皮肉白脹 手足拳攣

大小便絕 胃背血點 古字瘡黑 小兒驚腫

十腫丹

飛龍丹從頭頂腫起搗生葱汁塗

古龍丹從頭上紅腫起赤小豆雞子清塗

鬼火丹從面腫起龍心土雞子清塗

天火丹赤點從背起桑根白皮末羊膏塗

天龍丹從兩背赤腫黃色柳木灰水塗

水丹從兩脇虛腫生錢磨水猪鬃塗

胡火丹從膝下起黃腫檳榔末米醋塗

野火丹從兩足赤腫乳香末羊脂塗

煙火丹自兩足起有赤白點猪槽土土塗

明漏丹自腎上起黃腫屋漏瘡土塗

冰黃散 治嬰孩小兒赤流丹毒用小破刀子破去頭頂赤量

惡血毒汁

土硝五錢 大黃半錢

右為極細末用新井水調勻塗

葛根白朮散 治嬰孩小兒赤白丹毒腫

白朮 錢 茯苓去皮三錢 木香一錢

至初心鑑

甘草二錢半 葛根炒三錢 枳殼炒一錢

右剉散用水煎不拘時候服

犀角消毒飲 治嬰孩小兒風毒赤紫丹毒壯熱狂燥醫計不

受膏膈滿悶咽喉腫痛九道有血妄行身熱丹毒

牛旁子炒兩錢 甘草二錢半

荆芥穗五錢 防風去蘆一錢半 犀角一錢半

右剉散用水煎不拘時候服

散風散 治嬰孩小兒疔毒赤丹毒如瘡口上腫以白丁而上

至處必死利發急以此藥散之







咽喉者為一身之總要與胃氣相接呼吸之所從也其病之  
間蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而為咽喉之病喉內生瘡  
或壯如肉腐為腫痛塞塞不通吐熱不下甚則生出血也  
之尤宜先去風痰以通咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患  
又有熱毒衝上上聘而生瘡謂之懸癰及肺寒亦能令人咽喉  
吞吐不利臨病詳審治之

咽喉之疾亦傷熱毒上攻也四時受熱藏心脾之間一旦所觸  
上攻咽喉所謂腎傷寒也然其證有單肉嫩變肉燥有重舌上  
舌胖腫有懸癰腫脹有重舌皆腫甚者上攻頭面皆腫大法  
洗去口中舌上白胎其次掃去風熱單雙肉燥可針則針  
有不可針者則用重摻藥退後方依次用服藥如是木舌服藥  
之外仍用摻藥則用塗藥輕者但服藥而自退不須用針及  
藥點其瘡當自消也

咽喉腫痛

咽喉中痛 咽乾噤物難 有痰風熱作 延喘不寧安

咽喉閉腫痛家殃 心熱多痰口舌瘡 都緣風感三焦熱

鵬砂龍腦藥為良

化毒湯 治嬰孩小兒解風熱上攻咽喉腫痛乳食不便

桔梗 甘草各二錢半 山豆根一錢半 牙痛 荊芥穗

甘草各二錢半 山豆根一錢半 牙痛 荊芥穗

鵬砂 朱砂水飛各二錢 朴硝 雄黃水飛

朱砂水飛各二錢

右為極細末或溫湯調不拘時候服少與含熱  
竹精湯 治嬰孩小兒感冒風熱入氣重者瘡癰腫上攻  
喉腫痛痰氣不順咳嗽失音

人參 手磨五錢 桔梗 蜜炒一兩 甘草 半生半炙二錢

右煎散用水煎不拘時候服

立效散 治嬰孩小兒咽喉痺痛不能吞嚥

鵬砂 龍腦 雄黃

朴硝各半錢

右為極細末乾摻

吹喉散 治嬰孩小兒咽喉腫痛氣塞不通

甘草生三錢半 朴硝一兩

全幼心鑑

右為極細末乾摻喉中如腫者用小竹管吹入喉內

纏喉風

小兒纏喉風者乃心胃受熱生毒積聚痰而作也若其毒氣塞

喉頭低痰如膠色不可治

心胃痰毒積多時 熱蘊生風最難之 面赤氣急喉腫閉

纏喉重舌急求醫 鼻唇青黑乾焦縮 塞喉頭低痰漸危

延結如膠鳴似鋸 看看朝暮死將期

一頭瘡

王氏曰小兒頭瘡多因胎熱及腎上衝之所為也

小兒頭瘡是六陽受毒熱而攻頭成瘡也若頭上散成片常常

髮落毛髮稀少有類白屑此因積熱上攻名曰禿瘡雖生於



頭世人只知

頭者諸陽所

故生於頭

可矣

藥外傳得愈不逾旬月其瘡又發何為而然

之處洪乾五疔火口炎上熱毒上攻諸病相灼

魚肝陳生音到之積熱導心經之煩躁音了斯

頭面半

五臟不和同

經云五臟不和九竅不通六腑不和血結為癰

血熱生瘡

血結生瘡疥

滿頭及額生如癩

一抹全塗無不快

連床散

治嬰孩小兒滿頭如癩瘡毒及手足身上陰器瘡毒

黃連去殼五錢 蛇床子去土一錢半

五倍子去土一錢二分

右為極細末先以煎芥葱同煎湯洗拭乾後用清油調傳

四黃散

治嬰孩小兒身上熱毒瘡疥燥痒抓破有汗不乾

黃連去殼 黃蘗 黃芩 滑石各錢 五倍子去土一錢

右為極細末用清油調傳

解毒冰黃散

治嬰孩小兒風熱毒瘡

黃蘗末

山虎去皮

糯米各錢

右為極細末水調塗

走馬油

此藥多因氣虛受寒及有宿留而不去積滯成癩瘡多氣

上熱或食甜酸鹹膩之物而脾難甘積滯日久或熱上攻於

致傷脾胃爛肉出血而聚成癩瘡其成癩後宜用此藥

藥及以溫鹽水灌漱或軟雞翎蘸鹽水拂洗其試者經久不

愈者傳於唇之上下乃成崩砂諸或穴發滿腮面赤骨節酸軟

癩心氣促痰喘必致危矣

此藥多因氣虛受寒及有宿留而不去積滯成癩瘡多氣

上熱或食甜酸鹹膩之物而脾難甘積滯日久或熱上攻於

致傷脾胃爛肉出血而聚成癩瘡其成癩後宜用此藥

藥及以溫鹽水灌漱或軟雞翎蘸鹽水拂洗其試者經久不

愈者傳於唇之上下乃成崩砂諸或穴發滿腮面赤骨節酸軟

癩心氣促痰喘必致危矣

此藥多因氣虛受寒及有宿留而不去積滯成癩瘡多氣

上熱或食甜酸鹹膩之物而脾難甘積滯日久或熱上攻於

致傷脾胃爛肉出血而聚成癩瘡其成癩後宜用此藥

藥及以溫鹽水灌漱或軟雞翎蘸鹽水拂洗其試者經久不

愈者傳於唇之上下乃成崩砂諸或穴發滿腮面赤骨節酸軟

癩心氣促痰喘必致危矣







瘰癧結塊

瘰癧木因肝 連珠核數服 項瘰癧結塊 瘰癧結塊

初發原於耳項旁 證輕多謂是無妨 因循作腫成膿後

穿破名爲瘰癧瘻 瘡口深黑 內潰青爛 穿過透喉 乳食不通 口腫舌出

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

瘰癧散 治嬰孩小兒解瘰癧瘻疔腫疼痛

此皮膚病發遍身而四肢難較風瘡亦發遍身其形甚小也  
呼為疥癬瘡疥癬發處不定即滯其血故在瘡處集疥瘡發於脛  
後作其形甚小如蠶子蓋因腹中蟻血而化其瘡即疥  
而疥瘡成疔子如癬相似其有死血瘡若疥瘡較只是歸脫  
中須是取却毒方瘡及與疥瘡藥

瘰癧

瘰癧若發在四肢手足腕時亦難瘡宜服驚藥

瘰癧瘻

瘰癧瘻是肺熱也

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

全銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡



澤瀉散 治嬰孩小兒肺積鼻內生毒及鼻下赤爛

澤瀉 鬱金 甘草炙

山梔仁各錢

右為極細末用甘草煎湯調食後服用青金散

青金散

銅青 白礬石各一錢

右為極細末傳

先鼻粉 用熊膽乳湯以新小筆點鼻

○ 停耳

嬰孩實錄曰耳者三脈之所聚腎氣之所通小兒腎虛感而有

全幼心鑑

耳者謂之停耳紅腫出者謂之膿耳白者謂之耳

耳白膿出者謂之纏耳裏面虛鳴有青膿者謂之裏耳病雖

有至其源則一或由風水入耳而內有積熱上壅而成若不速

治久則成聾

耳者腎之候小兒腎經氣實其熱上衝於耳或停津液雍滯焉

稠膿為清汁者此也亦有沐浴水入耳中水濕停滯傳於血氣

醞釀成熱亦令耳膿久不瘳者變成聾耳

膿耳成聾

腦戶停風熱 重寒作膿 腫疼因熱 氣結亦成聾

龍骨散

白礬煅錢 龍骨煅錢半 黃丹炒錢

臘脂半錢 麝香一字

右為極細末先以綿杖子屢却正市膿不用藥末一字擦在

耳內勿令風入耳加海螵蛸末半錢

蜘蛛一箇 臘脂坯子半錢麝香一字

右為極細末鷄毛管吹藥入耳內

耳瘡

黃連去毒 蛇床子各錢 輕粉一字

右為極細末鷄毛管吹藥入耳內

○ 解頤

小兒年六頭縫開解而不合也腎主腦髓為髓海腎氣有虧腦

全幼心鑑

髓不足所以頭頤開而不能合腦髓久少如水無源不過十日

終成癡人

巢氏云頤大頭縫不合如開解故曰解頤此由腎氣不成故也

皆不能合也為此疾不遲十日必為癡人

湯氏曰設有此證不可束手待斃宜依

錢氏云補其腎萬一有可生之理生下而頤不合腎氣不成也

長必少笑更有目白睛多眵白色瘦者多愁少喜也餘見解頤

又

小兒解頤者乃見頭骨開解者謂解頤因母懷胎五箇月被

風雨雷電驚胎令見生時頭骨開也

小兒顛頭未合乃氣虛所致



解胎毒

小兒解胎者多因胎氣不全血氣虧弱故頭在縫久則骨中昏昏遂作肉乾皮黑傳鶴膝矣

小兒稟氣不足肌肉不克肢體柴瘦骨節此其路如鶴之膝名爲鶴節

顛腫或陷

初生小嬰孩 惟怕顛門開 胎風憂顛腫 顛陷亦多災

顛門低陷

顛陷形容瘦 顛傷乳所爲 瀉黃白水 嘔吐因難醫

顛門腫起

顛腫首有筋 驚前又怕驚 吐涎并嘔乳 風引動雙睛

顛腫頭大

顛腫頭皮急 風攻腦縫開 縫開頭必大 筋緩頸難擡

顛門開大

顛門開大 胎中母氣衰 父精因不足 肌體致尪羸

顛門初見如開解 腎弱元虛大可憂 補腎調元是良藥

長之不應定難瘳

解胎毒胎傷寒 胎腫因驚胃氣攻 胎行遲胎氣促

胎目定視肝臟風

受氣不完頭作縫 胎時溫壯證多端 臉青目碧唇乾白

頻現胎中胃受寒 胎漸漸羸又髮落 手拳脚縮旋枯乾

傳成鶴膝皮焦黑 血凝筋衰治轉難

地黃圓 治嬰孩小兒稟氣不足肌肉不克時麻柴瘦骨節露如鶴之脚名曰鶴節

地黃熟六錢 山藥去核 山藥

當歸去鬚 澤瀉 牡丹皮

白茯苓去皮各三錢

右爲極細末煉白蜜圓如老膏大用熱水化食前服仍用大天南星炮去酥皮研極細末入米醋調傅於縫常烘熱貼

人參地黃圓 治嬰孩小兒顛門開解頭縫不合名曰顛解此乃腎氣不成腎主骨髓而腦爲髓海腎氣不液所以腦髓不足故不能合

人參五錢 地黃熟四錢 鹿茸酒炙

山藥去皮 白茯苓去皮 牡丹皮去心

山藥去皮去核各三錢

右爲極細末煉白蜜圓如老膏大用人參煎湯調化食遠服

調元散 治嬰孩小兒稟氣不足顛門開解肌肉消瘦腹大如腫致語遲行遲手足如筒神色昏慢齒生遲者

山藥去皮五錢 人參去蘆 白茯苓去皮

茯苓去皮末 白朮 白芍藥

地黃熟 當歸去蘆尾 黃耆蜜炙各二錢半

川芎 甘草炙各三錢 石菖蒲二錢

右吹咀生薑三片煮一筒去核同煎不拘時候服

烏附膏理顛門陷



綿川烏 附子

雄黃

右為極細末用生葱根葉

隨處

冷證

脈沉而微證面色青白身

乳食不化隨證用藥治之

中寒

其證手足厥冷寒顛口

史氏方 用食鹽同吳茱萸

胎寒腹痛

全幼心鑑

見胎中受寒面色青白四肢厥冷腹痛盤腸內疝多帝

嬰孩可書小兒胎中受寒於臟傷動胎胎生下不能將護再傷

外風

其證面色青白四肢厥冷手足顛動似大人癩或禁口不

開乃胎寒也或作盤腸內疝因寒而得

面青且鼻如青黑 寒氣無時乳不食 沉瀉昏昏偏受暖

遍身如粟怯衣單 胎中虛冷攻脾胃 乾嘔無時咽又難

氣血漸羸肢膝瘦 温中止氣始痊安

孩兒百日胎寒候 足曲難伸兩手拳 口冷腹膨身戰慄

晝啼不已夜驚照

宿歸散

當歸去蘆 黃耆蜜炙 細辛去毒

橘皮去白 桂枝 白薑生

縮砂去殼 甘草炙

右劉散用生薑一片糯米四十九粒同煎食前服

温中湯 治嬰孩小兒胎寒腹痛

木香 橘皮去白 檳榔去毒

桂去皮 白薑生 甘草炙

右劉散用水煎食前服

消積飲 加丁香生薑去核同煎食前服

鐵寒腹痛

湯氏曰乳母食寒生冷觸冒風寒令乳夾冷氣入兒腹中遇夜

半陰氣又感或夫蓋令兒腹冷作痛多啼大便瀉青白

四君子湯

人參去蘆 白朮 茯苓去皮

甘草炙

右劉散生薑三片棗一箇去核加丁香同煎不拘時候服以

熟艾烘熱用絹帛包頻熨臍腹

盤腸 男名疝腸 女名盤腸

氣和乃升降安樂之由也氣逆則壅結疾病之致也幼幼有患

盤腸非暴所得元由氣鬱積久不散聚壅結五臟六腑無一

針暢其氣乘虛發作不流上下結 小隘于腸胃之間有聲較轉連

連而設如猫吐惡視之不忍何以 所堪嗟乎一身四大無主又



有虧腸一證寒氣凝結內不伸舒雖不引氣鼓動臟腑皆真  
臍上下約促躬曲偃就急疼痛二候既作醫駭驚然俱氣  
所患受發不同盤腸宜服勻氣散加沉香煎調氣順助根本方  
佳勝也

其證偃腰曲乾哭無淚額有汗

盤腸氣痛頭先曲 無淚多啼眼乾哭 口開脚冷上唇焦

頭汗如珠濕漉漉 醫士須用釣藤膏 順氣化痰除痰哭

腹上一塊膠如冰 腰曲如弓面色青 小便頻數腸中結

四稍汗出寒無穀 都緣冷積傷脾胃 不思乳食困沉沉

停積傳流或成痢 腹胃絞腫命難任 痛來難忍面青黑

小兒有積號盤腸 如刀絞脇痛堪傷 痛來難忍面青黑

體硬如弓更復張 此是腸中傷毒氣 醫士何必用名方

但須退氣溫中藥 免致孩兒受苦殃 臍上如蛇隱見形

盤腸瀉痢令兒哭 氣刺攻衝聲漉漉 臍上如蛇隱見形

發渴無時因積毒 十歲上下多有此證

通身冰冷 唇臉青顛 腹滿乾鳴 透心刺痛 手足甲黑

氣冷大汗

釣藤膏

乳香 沒藥 木香

薑黃各錢 木鼈子去殼香

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用釣藤煎化食遠服

調中散 治嬰孩小兒盤腸氣腹內集痛

青木香 川棟子 丁香 沒藥

人參去蘆 茯苓七厘冬半錢 桂去皮半

白牽牛炒半生半十五粒

右到散用葱白半寸鹽一檢同煎食前服

勻氣散 治氣滯不勻胸膈虛痞宿食不消心腹刺痛除脹滿

噎塞嘔吐惡心調脾胃進飲食

丁香 檀香 木香

白豆蔻上殼各四錢 薑黃各錢

甘草炙各錢 縮砂去殼四錢

右為極細末用鹽湯調化不拘時候服

湯氏方 用葱一握水煮湯淋於兒腹以葱頭磨臍良久尿出

痛止

又方 乳香沒藥木香用水煎食前服

阮氏曰研乳香用燈芯同研碎燈草順手研忌逆行

內疳

驚風內疳腹痛多啼唇黑囊腫偃腰反張腹內有紅筋斑血者

口全黑氣壅結驚風而符之又盤腸氣與驚證亦令腹痛多

啼偃腰相苦也盤腸氣痛則腹曲乾喘額上有汗是小腸氣冷

氣所搏狀爾蟲痛則吐清沫痛有去來是疳化為疳疳積出

滯然爾內疳用調氣散風鎮驚之劑盤腸氣用溫和調氣之

要證用去蘆之藥請詳帶之

盤腸內疳脹身尖 氣癆時曲臍腹 每夜多啼見下引



胎中有毒眼間搐 百日內外多有此證

內癩多啼請細看 莫為蟲疳一般般 蟲痛吐涎唇口紫

內癩還同黑一般 但視眼跟紅脈見 須知驚候本根源

溫臟鎮驚施妙手 管交孩子命全安

桃符圓

銀朱半錢 乳香一錢 蒜煨箇

右為極細末同蒜研勻圓如黍米大半周五圓用薄荷煎湯

食遠服

天癩

天癩壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或啼或笑喜怒不常甚者 瓜甲皆青如崇之壯蓋由乳母酒肉過度煩毒之氣入乳逆復

乳見遂使心肺生熱痰鬱氣滯加之外挾風邪致有此爾治法

解利風熱

錢氏云小兒心膈滯邪熱痰涎凝積不得宣通或乳母飲酒 食肉無度煩毒之氣流入乳中令兒宿滯不消邪熱毒氣乘於

心神致使驚悸眼翻騰壯熱不休四肢痠癢名曰天癩

天癩候非天癩人也因驚熱盛而成初得之時頻頻呵人中

忽然而有淚不落壯熱不時手足搐搦脈浮實洪大

尋常天癩病 休道小兒嬌 積熱心留滯 眸翻涎欲潮

後仰多因取 仍兼唇口焦 愚醫无灸培 必死在三朝

地上坐時睡 驚風本在肝 夜啼并面白 肺臟與詳觀

顏色時時變 心形日日看 喘急脾臟乏 咬齒宜家寒

面自腫虛多吹乳 四肢煩熱汗類生 雙眼赤赤時時

惡時元來畫屬驚

天癩元因積熱深 涎潮心緒又多驚 雙眸翻

呵欠頻頻疾便生

釣藤散

釣藤 人參去虛 雙角各錢半

甘草二分半 全蝎去毒焙下錢 天麻一分

右以吹咀用水煎不拘時候服

天竺黃散 治嬰孩小兒天癩目睛釣上四肢癩癢

天竺黃 臘茶 甘草各一錢

全蝎生薄甘炙大七箇 黃豆半生炒碎

荆芥穗 白礬散 雄黃水 半錢

右為極細末用人參煎湯調類赤者生薄荷煎湯調化不拘

時候服

內癩腹痛

病源曰驚風內癩腹痛多啼汗出寒青咬乳眼慢流涎或唇焦 甲囊腫偃偻友驚眼內有紅筋斑血虎口脈紋入掌服青龍湯

加釣藤釣于七箇不蛀皂角子七粒薄荷同煎食遠服

腹脹內癩

初生小嬰孩 腹脹日燈開 內癩難止 驚風痛再來

烟厥腹痛

初幼方曰烟厥多以慢驚但唇口紫



易氏曰每月初五日已前頭頭四上取已後安之

其證愁啼乾痛吐清涎人中一唇中鼻皆高小兒多蛔蟲

名食蟲 苗蟲亦名疳蟲 胃蟲 蛔亦名蟲

化蟲散

雷丸

鶴虱

甘草

大黃生各錢 史君子去殼土質

右為極細末用猪肉煮汁調食則服

蛔蟲咬痛

本為從來藥物 蟲生體內瘦肌膚 愛甘嗜食多生痛

痛便聲高命欲殞 形疾人中之上見 鼻頭唇口一齊烏

沫涎若定蟲方退 取下蛔蟲方得無

史君子散 治嬰孩小兒蛔蟲咬痛口吐涎末

史君子 去殼

右為極細末用米飲調五更早空心服

痘痢冷痛

惡哭疳疔蟲咬心 吐涎積冷痛難禁 恣食生挑并冷硬

蟲生致使患深沉

積柳圓

檳榔 去核

鶴虱

員峇

乾漆炒存性

蕪荑

川棟子 去核

史君子 去殼

雷丸

雄黃水飛

輕粉少許

巴豆去皮心油三箇 水香

黃丹 錫灰炒不見炭

右為極細末酒煮麵糊圓如黍米大五更早用猪肉葱酒煎

將肉細嚼莫吞引蟲頭向上便用肉汁調化蟲散服檳榔圓

至已時取下蟲進飲食

夜啼

小兒夜啼者非是鬼神為祟蓋因胎熱伏心陰則與陽相形熱

則與陽相合腹中燥悶所以驚啼

夜啼者小兒臟冷也陰感於夜則冷動則為陰極發燥寒

感作夜所以夜啼而不歇也

然各有陰陽冷熱之不同惟夜啼乃陰感於夜為臟冷之證陰

極發燥寒感作痛啼而不哭是痛故直聲來往而無淚哭而不

啼是驚故連聲不絕而多淚

演山云啼而不哭為煩哭而不啼是燥陰陽之分人在此

其證腹冷而痛面青白頭低身曲大便瀉青白眼閉肚緊

夜半後發

積熱在心為熱所乘炎上而焦哭約熱面紅舌白腹熱小便赤

啼時有汗在半夜前啼先當清導小腑重則胸突頭反喜燥且

疎利

有客忤中惡兒目有所見而口不能言而驚哭日夜哭上漆前

後甚者其兩手虎口背無脈紋面變青色

有口瘡重舌到乳上即啼身額微熱急以燈照非口瘡也字腫

所致



驚啼

驚啼者有陰陽二證亦有半陰半陽證陰則身軀溫涼大便青綠時復驚啼陽則身軀發熱精神不定睡中驚長由風冷乘之榮衛不調又有身涼大便赤黃而啼者有身熱大便青白啼者是半陰半陽之證也

夜啼

夜啼者有陰陽二證陰者臟冷也夜則陰盛與冷相搏冷與臟氣交繫故作痛而啼陽者臟熱夜則陽衰與熱相搏熱與臟氣交繫故作痛而啼又有冷熱之氣與胎毒攻衝亦食夜啼也

腹痛

腹痛者有陰陽二證陰者由母妊娠之時將養失度取涼飲冷不避風寒冷氣入胞傷兒臟腑兒生之後胎寒腹內與正氣相搏今兒腹痛仰面而啼其面青印堂黑大便青色是也陽者亦每妊娠之時酒食熱物厚火烘焙食服熱氣入胞傷兒臟腑兒生之後胎熱腹內與正氣相搏今兒腹痛腹身而啼其證面赤印堂黃大便黃色是也又有兒出腹口中胎穢拭除不盡嘔下血穢停留臟腑亦是腹痛也

全幼心鑑

全

驚風

驚風者母發時驚內如蛇盤之壯漣漣有聲由乳母妊娠之時憂愁思慮勞役心氣纏結不散觸入胎中致生之後胎氣怯弱被正氣相搏今兒生其有陰陽二證陰則曲身而啼大便青沫陽則驚熱而斗大便青是二者皆驚啼無淚大便氣

驚風

驚風內者皆陰陽二證陰者起於吐瀉之後胃氣虛弱精神昏憤驚風起於吐瀉之後胃氣虛弱精神昏憤驚風起於吐瀉之後胃氣虛弱精神昏憤驚風起於吐瀉之後胃氣虛弱精神昏憤

胎熱

胎熱者由母妊娠之時寒食辛酸多味厚及焙服胎熱伏心啼者由母妊娠之時寒食辛酸多味厚及焙服胎熱伏心啼者由母妊娠之時寒食辛酸多味厚及焙服胎熱伏心啼者由母妊娠之時寒食辛酸多味厚及焙服

胎寒

胎寒者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服胎寒者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服胎寒者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服胎寒者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服

心腹

心腹刺痛者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服心腹刺痛者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服心腹刺痛者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服心腹刺痛者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服

邪心

邪心者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服邪心者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服邪心者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服邪心者由母妊娠之時食辛酸多味厚及焙服



火心也是五臟之主精神之舍心氣實則邪不干正心氣虛則邪傷於心傷於心則神去神去則死矣經曰真心痛且發夕死夕發且死凡諸邪在心者止在心包脈絡是心之別脈也蓋兒稟受虛性厥氣上逆痞而不散故發心痛而啼也

乳食作痛啼

乳食作痛啼者因面飲乳乳壅不散傷動脾胃胃氣弱不能消化滯乳停留與正氣交蒸欲成陣作痛而啼也

夜啼祟啼

面赤頭顛仰 狂啼夜不停 背中如火熱 邪燥蓄心經

日上唇微噤 產前惡寒真 面青腰曲叫 三證細推尋

小兒叫有三一則心搖邪燥面赤頭仰而叫名曰夜啼二則落

前祟嘔啼叫日上視上唇牙微噤三則腰曲額汗而叫名曰驚

小兒生下有三啼 一一從頭為說知 邪熱在心內燥

忽然驚哭則生悲 臟腑冷多陰氣作 或因觸犯惡神祇

啼裏哭聲聲不歇 夜啼之候請君知

夜啼四證驚為一 無淚見燈心熱煩 面楚夾青膝下痛

無時煩哭是神干

才出胎來便愛燈 白日無言任意眠 恰至黃昏生意嗟

通宵啼叫到天明 休使師巫催符法 莫言鬼魅及家先

都緣只是心家熱 用藥涼肝為解驚

邪祟所侵

湯氏曰目有所視而驚哭

其證兩手虎口俱無脈紋百變五生

萬金散 治嬰孩小兒厥冷夜啼

當歸去蘆 丁香 人參去蘆

五味子 乳香各二錢半 白朮

赤芍藥各半分沉香一錢 桂皮半錢

右劑散用酒煎食後服

安神散 治嬰孩小兒一百二十日內夜啼

蠶蛻四九管八月後一歲除去前二截管膠

右為極細末作四服用鈞藤煎湯調化不拘時候服

金鎖鎮心丹 治嬰孩小兒鎮心解熱退驚安神除煩燥止啼

全蝎七箇用薄青包縛慢火炙乾 天麻塊

防風去蘆義 羌活去蘆 土黃

赤茯苓去皮 犀角 甘草炙各二錢

煨砂木飛錢 麝香半錢 金箔二十片

右為極細末煉白蜜圓如皂角子大用薄青煎湯不拘時候

調服

大聖寧心丹 治嬰孩小兒驚啼身熱溫涼大便青色

人參去蘆 山藥 龍齒煨

天麻煨 酸棗仁炒 白朮

茯神去皮炒 甘草炙各二錢 朱砂水飛一錢

麝香半錢



右為極細末用飯團如芙蓉大用麥門冬去心煮去核...

湯研化不拘時候服

聚香圓 治嬰孩小兒夜間腹痛曲膝而啼

乳香半錢 木香去蘆 丁香

沉香各一錢半 茴香炒 香附子去毛炒各二錢

甘草各二錢

右為極細末飯團如芙蓉大用紫蘇葉煎湯研化食後服

沉香散 治嬰孩小兒驚風入腹內瀉壯熱吐瀉并受胎氣怯

弱冷氣傷脾腹脹啼叫壯若鬼蒸腹脹回青

沉香 木香 當歸去蘆

白木 甘草炙 桂去皮

枳殼炒 五味子 赤芍藥去皮各三錢

右吹咀用水酒各和同煎食前服

五味子散 治嬰孩小兒夜啼及腸痛至夜輒劇狀似鬼祟

五味子 當歸去蘆 赤芍藥去皮

白木各五錢 茯神去皮 陳皮去白

桂去皮 甘草炙各二錢半

右剉散用水煎食前服

蟬花散 治嬰孩小兒夜啼不止狀若鬼祟

蟬蛻七箇下半截

右為極細末用薄荷煎湯入酒少許調食後服或者不信將

土半截為末依前法服後啼如初古人之法實知其妙

花火膏

燈花七箇 朱砂一字

右研極細末用白蜜調兒睡抹唇內

楊氏方 蘇合香圓入雄黃末用降真香煎湯研化食後服

又方 用淡豆豉窰中土蚯蚓糞入醋杵搗和圓如雞卵大摩

兒額上及手足心并臍上下各七次擘開有毛髮之

導赤散 小柴胡湯加 地黃 燈薪 麥門冬去心

竹茹

右吹咀用水煎不拘時候服

客忤

論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人是

為客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳母及父母或從外還

衣服經履飛神蟲惡暴風或牛馬之氣皆為忤也執作喘息乳

氣未定者皆為客忤其乳母過醉及房勞喘後乳兒最劇能

兒也不可不慎凡諸乘馬行得汗氣臭未盥洗易反裝便向

兒邊令兒中馬客忤兒卒見馬來及聞馬鳴驚及馬上衣物馬

氣皆令小兒中馬客忤慎護持之中一歲兒也小兒衣布帛綿

中不得可頭髮履中亦爾曰反青帶青反白帶皆令中忤此非

常人及諸物從外來亦能驚小兒致病欲防之法諸有從外來

人及有異物入戶當將兒避之勿令見也若不避者燒尿令常

有煙氣置戶前則善

小兒中客忤為病者無時不有此病也而秋初一切小兒皆病



者豈是一切小兒皆然客邪小兒所以春夏少病秋夏多病秋  
夏小兒陽氣在外血脈嫩弱夏末秋初晨夕時有暴冷小兒  
弱其外則易傷暴冷折其陽陽結則壯熱實冷則下痢是故夏  
末秋初小兒多壯熱而下痢也未必皆是中客及懸也若治少  
小法夏末秋初常宜候天氣溫涼也有暴寒卒冷者其少小則  
多患壯熱而下痢也慎不可先下之皆先殺毒後下之爾

客作物忤中惡而變五色壯若驚瀧但目不上視  
小兒忽見非常之物或見未識之人或雞鳴人吠或見牛馬禽  
獸喜戲驚熱或聞大聲因而作搐緣心氣衰虛精神離散當補  
心溫氣藥治不可妄用大寒之劑妄作驚風峻下忌成慢驚蓋  
精神未痊多待此證

客忤者小兒神氣嫩弱外邪客氣獸畜異物暴觸而忤之其候  
口吐青黃白沫水穀鮮雜面色變易喘息腹痛及側癱癱壯似  
驚瀧但眼不上窺脈來弦急而數初其口中懸癰左右若有小  
小腫核即以竹針刺潰之或以瓜搗之治法辟邪正氣散驚定  
心延久則難為力也

小兒驚悸客忤乃累遭驚撲氣虛而作若見四肢疲憊不止面  
色黑目上視無光涎流不收牙疳氣冷此證不治  
女中記云天下有女鳥名姑獲時後子母秘錄作鳥獲一名天地  
女一名隱飛鳥一名夜行游女又名星鬼喜以陰雨夜過飛  
鳴徘徊人村里喚得來者是也鳥神無雄不產陰氣毒化生  
實落毛羽於人中庭首見夜中便令自作癩病必死即化鳥

見也是以小兒生至十歲衣被不可露七八月尤忌

客忤吐沫吞氣方云入房喘息未定便乳兒者則成客忤小兒

客忤畏生人 或衝鬼共神 吐黃青白沫 驚悸黑紅新

眼白睛垂下 唇青色變頻 甚傷淫帶乳 腹痛命凌逆

累累連驚恐 心虛膽積憂 額青浮碧色 津液出唇流

口上牙微噤 胃穢似有餅 安神無正胃 早治自然瘳

物觸

小兒小兒隨其心性不可觸逆凡有所愛之物不可強奪取之

羔小兒而神必執着若不及所慾心神亂解神逐物散必不食

不言神昏如醉四肢垂懈壯若諸惡恐醫士見之莫知所指如

有此證詢問乳母及左右看者順從所欲然後用藥則安也

沉香順氣散 治嬰孩小兒物觸

沉香 茯神去灰木 紫蘇葉

人參去蘆 甘草炙各一錢

右為極細末用紫蘇梗煎湯調化不拘時候服

白虎

小兒有白虎一病不可不察也據統天曆遊手圖云白虎在大

歲後一辰也假如太歲在巳則白虎在辰太歲在申則白虎在

未餘皆倣此惟其神在方小兒不知禁心出入居處稍有觸

便能為病其狀身微熱有時小兒有時神昏斗屈指如數物手足

不瘳癡者是也

葉香散 治嬰孩小兒白虎病

一第1010 冊 續修四庫全書 第 3 卷 5 頁



降真香

沉香

乳香

檀香

安息香

人參 去蘆

伏神 去灰木

甘草 炙

酸棗仁 去殼

右咬咀用水煎入麝香一字調不拘時候服存藥淨房內燒

尸蛇

小兒尸疰者壯若驚癇而後拋紅赤腫黑矣如大人傳尸之患

或因胎受或相傳而得若見偏搐唇眼俱顫滿頭赤腫不治

或因胎受或相傳 有似驚風項仰翻 後拋忽生唇赤腫

痰潮面腫色如蠶 時時目上加乾澀 旋旋風拘齒禁關

偏搐額青唇眼顫 徒勞用藥保生全

中惡

中惡者卒然心腹刺痛悶絕煩死腹大而滿 其脈緊細而微者生 緊大而浮者死

蘇合香圓 研雄黃麝香用降真香煎湯研化食遠服

阮氏千金湯 治嬰孩小兒暴驚卒死中惡

蜀漆 二錢半 左顧牡蠣 一錢二分

右剉散用漿水煎不拘時候服

卒死

阮氏曰中惡論曰凡人志氣心虛精神失守件犯邪惡令人心

腹暴痛悶亂如死

卒忤者蓋陰陽否隔氣逆厥逆上下不通陽氣散亂故不知人

氣還則生不還則死

三虛之中

三虛者乘年之衰逢月之空失時之和致賊風鬼邪之氣乘虛

而入致令陰氣偏竭於內陽氣阻隔於外二氣壅閉不得升降

而蒸絕也氣逆則復活

乘年逢月失時和 此是三虛被鬼魔 賊氣中心見蒸死

陰陽未絕免沉疴

乘年衰方逢月空 失時和者三虛中 遇賊風方還卒死

急須救治莫匆匆

破棺散 治魔死縊死溺死卒死惡死五絕若心頭暖者可治

魏夫人方傳于世出

孫真人備急仙方世人纔見一轉氣絕便以為死不知有可救

之方 半夏去麩皮研極細生末量大小或一字吹入鼻內

或用水調塞鼻內一方用皂角極細末吹鼻內

華佗真人方 雄黃水飛研極細末用桃樹枝煎湯灌

五硬 仰頭取氣動程難 氣逆疼連胸膈間 撒手心如冰冷硬

頭仰為風命不還

硬氣築心

熱極則生寒 都緣氣少寬 腹中交刺痛 連咳湊心疼

面青仍白 唇焦似死肝 更加頻喘噎 難復命完全

五軟

蘇氏論五軟證名曰胎怯良由父母精不足母血氣衰而得誠哉



是言以遇之有因母血薄之冷用此藥強補而孕者有受胎而胎多疾者或其父好色貪酒氣賦虛弱或年事已邁而後見子有日月不足而生者或服墮胎之劑不去而竟成孕者徒爾耗傷真氣苟或有生墮諸陰地淺土之草雖有發生而暢茂者少又如培植樹木動搖其根而成者鮮矣由是論之嬰孩怯弱不耐寒暑縱使成人亦多有疾爰自降生之後精神不克筋骨痿弱肌肉虛瘦神色昏慢才為六淫所侵便致頭項手足身軟名五軟投藥不效亦為癡人犯此惡證難治

頭因不舉 項軟難收 腎肝之病 發不能休

四肢無力 腳手皆垂 脾風之候 尚可用醫

喫食不長 肉少脾寬 瀉痢交作 醫治却難

五歲後兒 腳弱虛羸 尚可禁氣 進地黃圓

虛舌出口 太過盛陽 宜先治腦 唇青必亡

與賦元虛顯不克 六淫之氣易來攻 頭無手足身羸弱

世證名為五軟同

驚後肢軟

慢驚難差後 神思一如癡 不語因痰滯 須防軟四肢

項頸軟倒

面紅髮豎唇無色 項軟如綿無氣力 肺膈邪毒在肝源

乳食昏昏全不喫 四肢垂頭先倒 膽熱肝衰眼青碧

疎風調氣補肝脾 筋緩項舒要全識

纒傾天柱道難醫 筭得源由心脾 此息却須先吐瀉

更難又病瘦危羸 或傷氣脈偏無汗 妙藥醫之定已遲 至此危然成大患 又無不變四肢肥 難擡項軟頭如石

面赤唇紅臉似緋 此患只緣陽熱 後來肝熱又相隨 肝經風熱傾天柱 請用消涼藥退之 純藥貼時筋項煖

安和功效不須疑

小兒臞肥容壯不為瘦瘠勿然項軟傾側此名下窳皆因肝腎氣虛客邪侵襲風肝傳於筋骨故成斯疾蓋肝主筋骨主手

有筋骨俱弱則項軟垂下無力又名天柱傾與五軟相類不遠

天柱骨倒

天柱骨倒者有三種有吐瀉日久羸弱成者有肝膽伏熱而赤唇紅面黃者有傷寒不及發表成者是皆風邪入肝以致筋

絡舒弛吐瀉者當調胃氣肝熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼

項傷傷寒天柱骨倒者難療調治之法將何擇焉

天柱骨倒為危候 所得元因吐瀉類 肝受賊風難辨仰

脾傷必氣損精神 頭暈顛軟身漸倚 筋緩皮寬項不伸

面黃瘦黃胃腹脹 渴多異食命凌遲

忽狀天柱倒何如 此病皆因肝腎虛 外有風邪容易襲

故傳項軟不相隨

貼項取

附于去後醫護天尚星方書云

右為極細末用生薑汁調攤貼患處服滿青圓

熱



小兒生稟純陽血氣壯實五臟易生熱也夫肝熱則潮服赤瘧  
流淚羞明或生翳障心熱則日內生瘡小便赤腫淋瀝不通肺  
熱則鼻衄不止天腑秘結脾熱則多有涎沫口內長流心脾熱  
則生重舌及木舌胃熱則口氣作臭腎熱則耳聾或出膿水汁  
至於五臟蘊蓄風熱毒氣則令面赤如緋五心煩熱四肢溫壯  
淚涎壅盛目溢多濁若一衝咽喉則與氣血相搏結聚壅塞  
而成喉閉腫肺二證危在頃刻也五臟所主熱各不同其治也  
亦不同是不可一藥論也又小兒心肺有熱因當風解脫風邪  
傷於皮毛入於臟腑則令惡風壯熱腦痛煩悶日遊頭昏或時  
面青胃之風熱又有小兒面赤頭痛唇焦咽痛舌燥目赤頰下  
結破口內生瘡痰實不利涕唾稠粘睡卧不安語語狂妄謂之  
驚風又有小兒在胎之時因母服熱藥過多或食糟酒炙煨滷  
鹹等物是諸熱毒傳入於胎中兒生之後身熱黃赤兩眼不開  
逆逆之凡病熱者作呻吟面赤身熱啼叫不止口熱如湯或  
生瘡疥之胎熱證治之凡病熱者切不可飲酒有大熱毒  
不戒則損新救火難除之藥終於罔功若尚食好須乳母同  
忌

楊氏曰小兒有病惟熱最多明理論曰發熱者怫怫然發於皮  
膚之間焮焮然散而成熱也輕重不同有所謂翕發熱者若  
合羽所發明其熱在外屬表乃風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致  
宜發汗而散之所謂蒸蒸然熱者謂若黃蒸之蒸明其熱在內  
屬裏乃陽氣下陷而入陰中也法當攻下以滌之表證未罷邪

氣傳裏裏未作實是為半裏半表之謂則表裏俱發熱而熱又  
輕於純在表也發熱惡寒及於陽也無熱惡寒發於陰也楊氏  
曰陽明裏實熱感當攻之以寒太陽風寒外傳陰感惡寒雖然  
方宜溫散少湯氣如解脾胃小柴胡湯如微熱未清入營加桂  
明也而後得清也惡寒之常經云脈陰陽俱平熱不止及下利發  
熱者宜下也惡寒者宜下也惡寒者宜下也惡寒者宜下也  
此亦治之證

小兒熱證百不一種然例有驚風熱風熱潮熱傷寒熱泄熱  
驚熱五熱惡寒熱餘毒熱十種熱證病各不同已有編類而作  
別錄者即括括也類近積熱證先腹肚熱熱者足傷寒熱  
與積熱亦相類且復兼有二種皆從表發入裏且惡寒隨五  
臟受傳裏出表故不同微風熱與驚熱亦相近熱與餘毒  
熱亦相近惡寒有五候皆由脾胃陰陽不順若驚熱感風  
熱者丹毒熱有數種皆五臟熱毒所作自上發下曰毒自下發  
上曰丹發名之曰丹毒各隨輕重又有一種龍帶橫腰多過肚  
上或至背前相父者重有如火熾其候亦同丹治病後餘毒熱  
諸證皆有之復適輕重難證而調解不可越前病用藥如傷  
寒後有餘毒熱即於傷寒調理不及而解餘皆做大抵驚熱  
涼之風熱化之疳熱補之潮熱散之傷寒熱解之疳熱分之積  
熱利之丹熱消之瘧熱順表之諸證餘熱皆和之此理雖明  
大藥如是言畢竟用之有理乃為醫士善學誠有不違其斯  
可謂之善見也



有表而熱者謂之表熱 有裏而熱者謂之裏熱 有表裏俱熱者謂之表裏俱熱 有表裏俱寒者謂之表裏俱寒 有表寒裏熱者謂之表寒裏熱 有表熱裏寒者謂之表熱裏寒 有表裏俱虛者謂之表裏俱虛 有表裏俱實者謂之表裏俱實 有表裏俱虛者謂之表裏俱虛 有表裏俱實者謂之表裏俱實 有表裏俱虛者謂之表裏俱虛 有表裏俱實者謂之表裏俱實

榮熱

小兒在胎中母於冬物尤喜飲薑瓜古人有曰修養缺養食薑餘指薑薑性至熱八是轉轉攻及血脈傳入經絡輕則令兒偏軀生蛆瘡延熱毒滑丹瘡之類經年發作或於頭額生核重則發大癰癩潰即爛壞皮膚十死一生何堪忽見初生幼幼毒氣加盛肌肉柔弱痿不托裏拘攣扶肌拘攣者皆養氣節養常與清心平調血脈慎其口又抱令錢醫士順理與扶其危

衛熱

小兒在胎中母和氣飢飽勞役神疲力倦多矣其有不勞役者即有憂愁田入胎臟兒乃思不穩狂啼心正醫平調胎既正熱自故止

辨法

小兒發熱者用度者謂之驚熱世呼為潮熱

小兒發熱形瘦多渴與食不長肌肉者謂之疳熱

小兒發熱煩叫不時面青者謂之風熱

小兒發熱日中可夜間熱其大明復涼謂之傷寒餘熱失解

小兒發熱時覺煩叫無時通身熱渴謂之積熱

小兒諸病惟熱最多先當辨其虛實隨證治之

小兒病熱者左臉先赤肝受熱也右臉先赤肺受熱也額上先赤心受熱也頤間先赤腎受熱也鼻上先赤脾受熱也

主熱不同其治也亦不同是不可一藥而論大抵熱則生風

風生則發矣

潮熱發歇有時驚熱煩叫恍惚夜熱夕發日正餘熱寒邪未盡

食熱壯背先熱疳積熱骨蒸盜汗出一向不止煩熱心燥不安積

熱類赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去不定癩

熱涎嗽飲水寒熱發如瘧壯血熱反已發熱癩熱耳鼻大冷諸

熱得之各有所歸其間二三證交互者宜隨其輕重而治

虛熱

其證面色青白身微熱溫冷口氣冷手足心不足大小便

自利恍惚神慢虛氣軟弱泄瀉多尿虛汗自出

叔和曰虛熱不可太攻熱去則寒起

惺惺散

四君子湯 錢氏白朮散

實熱

其證面赤氣盛口熱煩渴唇腫大便難排揭衣被喜暴暴

其證面赤氣盛口熱煩渴唇腫大便難排揭衣被喜暴暴

其證面赤氣盛口熱煩渴唇腫大便難排揭衣被喜暴暴

其證面赤氣盛口熱煩渴唇腫大便難排揭衣被喜暴暴



在裏宜下

青龍湯

解肌湯加麻黃

四順飲

解肌湯加大黃

孫真人曰得利謹勿中補熱氣得補復作

表裏俱熱舉按脈實而黃頰赤唇燥口乾小便赤澀大便

堅硬口中熱氣

四順飲加川芎黃芩桂枝散加麻黃大黃

青龍湯

解肌湯加大黃黃芩麻黃黃芩

冷熱不調

其論身熱汗下而溫者宜下熱上盛下泄水穀不分

敗毒散加赤芍 解肌湯加桂枝

汗下熱不除

全幼心鑑

李

仁壽門表熱宜微汗退裏熱宜微下汗下而熱入得米乃表

裏熱氣不歸元陽浮於外不可再用涼藥及再汗下當和胃

氣飲歸內其氣自止

參天白朮散 實脾散

汗下若以經汗下六熱去除恐防痧瘧不可妄用涼藥

餘熱不除

二劑用涼藥不可十分盡用蓋熱去則寒起古人戒之或餘

熱不除不足關心

川芎

茯苓 去皮

甘草 炙

白朮

右制散用水煎食遠服和胃氣收斂浮陽

又曰壯熱煩燥已用柴胡黃芩大黃解利之其熱下輕進宜

黃連黃芩湯 川芎 活血

赤茯苓 去皮利小便

地黃湯

右制散用燈心一捻用水煎食遠服心血一調其熱自退

寒熱往來

明理論曰陽盛則熱陰盛則寒乃陰陽相勝也寒為陰熱為陽

裏為陰表為陽邪克於表與陽爭則為寒邪入於裏則陰爭則

為熱邪在半表半裏外與陽爭為寒內與陰爭為熱邪在半表

半裏則實熱亦半矣審其熱多少知其表裏邪之氣淺深小柴

胡湯主之內經曰熱淫於內以苦發之必先散熱以苦寒為主

柴胡為君黃芩為臣以成微熱發表之劑人參味甘平邪氣傳

裏甘以緩之人參甘草為佐以扶正氣半夏味苦辛微溫邪入

初裏辛以散之以三味佐柴胡和表生薑味辛溫大棗味甘溫

經曰辛能發散是以生薑大棗為使和柴胡以和表七味相合

兩解之劑則當矣仁壽曰此藥非獨和解毒裏大能解血熱消

惡血蓋傷寒一二日調治失宜必致傷血此藥內有黃芩柴胡

最能行血但藥性差涼宜以寒熱輕重用藥溫涼加減得法本

方解肌湯內此方藥味俱味俱用詳審用之母為熱過冷誤乃

良心也

邪熱在內

湯氏曰本臟傷火後為熱所乘故炎上而焦尖

其證面紅小便赤口氣熱喘時有汗仰身煩燥畏燈火



小兒胡湯加生地黃... 積熱在內

王氏曰小兒內外... 嘔等疾

楊氏曰內因酒麵... 禁熱出於心熱感山傷血

三黃圓 治嬰孩小兒解三焦積熱

黃連去髮炒 黃芩炒 大黃紙煨各半錢

右為極細末煉白蜜圓如皂子大用白湯研化食前服

四順飲 治嬰孩小兒血脈壅實臟腑熱煩赤多渴五心煩

全細心藥

說

燥睡卧不安四肢驚掣及因乳哺不特寒温失理令兒血氣不和腸胃不調或温壯連滯或壯熱不飲欲發驚瀾并積潮熱瘧瘡發熱并解痘毒及痘毒痘後眼赤翳障身疼癰腫須加川芎增損方法隨方用尋常只用本方又治風熱結核頭面生瘡瘡目亦咽痛壅滯

當歸歸身多熱多驚去蘆 大黃蒸二次小便赤少大便多熱

甘草熱則寒多泄多炙 赤芍藥 驚熱小便赤各錢

文咀用水煎食前服本草云口時行發痘瘡川大黃微炒

加柴胡

傷風熱

如方曰由乳母不能謹護風池早細脫風致風邪入於

廣達於膝理... 衛氣故表虛自汗法當解肌不可用麻黃汗之則發瘧

解肌湯 敗毒散 人參羌活散

夜間遍體熱如湯 繞到天明依在涼 不食鬼神為禍祟 口綠脾臟受風傷 先宜解表退熱散 後用葛圓瀉大腸 此說還須調五臟 安和脾胃自身康

風熱熱

得志風痰熱 晚熱早還涼 喫水無時度 粥飯食如常

日夜多啼叫 喘急驚風昌 患宜煩燥藥 莫待眼翻張

頭熱脚冷氣不和 漸生氣喘驚風多 屢裏自驚手足掣

除熱消痰不作癆

湯氏曰乃發在痰而生風也實者利之

金真圓 白圓子 玉餅子

人參羌活散加 荆芥穗

慳慳散加 防風 荆芥穗 麻黃去節

疹后熱

疹行麻痘熱 中指冷如冰 目澁常如睡 乳食不曾開

耳冷眼中赤 麻痘出將呈 或時寒熱起 困亂是心驚

驚風熱

兒患驚風熱 驚啼汗出多 囊背無兒乳 兩眼慢雲和

咬乳流涎出 掛冷病纏病 若逢眼仰視 早宜投藥



疳熱

此證疳為熱 鼻赤齒頰燥 乳食常無飽 頭發髮焦  
泥炭強如飯 肌膚不<sub>不</sub>膏 五心煩熱盛 有積是疳勞

潮熱

因疾未安和 潮熱早<sub>早</sub>晚<sub>晚</sub> 體虛并氣弱 調理莫<sub>莫</sub>蹉<sub>蹉</sub>  
日久加驚悸 脾邪因<sub>因</sub>初<sub>初</sub>多 百肥唇色<sub>色</sub>絕 厥逆已<sub>已</sub>沉<sub>沉</sub>瀉

發熱

發熱頻<sub>頻</sub>厥<sub>厥</sub>厥<sub>厥</sub>虛 氣<sub>氣</sub>積<sub>積</sub>因<sub>因</sub>何<sub>何</sub>未<sub>未</sub>退<sub>退</sub>除 頰赤口<sub>口</sub>乾<sub>乾</sub>多<sub>多</sub>發<sub>發</sub>哭  
不<sub>不</sub>息<sub>息</sub>熱<sub>熱</sub>高<sub>高</sub>實<sub>實</sub>氣<sub>氣</sub>盛

消風散 治嬰孩小兒因解脫風邪傷於皮毛入於臟腑則令  
惡風壯熱曾<sub>曾</sub>腸<sub>腸</sub>有<sub>有</sub>涎<sub>涎</sub>目<sub>目</sub>流<sub>流</sub>多<sub>多</sub>睡<sub>睡</sub>虛<sub>虛</sub>風<sub>風</sub>神<sub>神</sub>慢<sub>慢</sub>驚<sub>驚</sub>熱

荆芥穗

甘草炙

苦蕒

羌活去<sub>去</sub>蘆

僵蠶去<sub>去</sub>嘴<sub>嘴</sub>

防風去<sub>去</sub>蘆<sub>蘆</sub>又

茯苓去<sub>去</sub>皮

蟬蛻炒<sub>炒</sub>去<sub>去</sub>土

藜香葉

人參去<sub>去</sub>蘆<sub>蘆</sub>冬<sub>冬</sub>兩<sub>兩</sub>厚<sub>厚</sub>朴<sub>朴</sub>去<sub>去</sub>皮<sub>皮</sub>製<sub>製</sub>炒<sub>炒</sub>陳<sub>陳</sub>皮<sub>皮</sub>去<sub>去</sub>白<sub>白</sub>冬<sub>冬</sub>三<sub>三</sub>錢<sub>錢</sub>半

右為極細不用茶清或乳香煎湯調化不拘時候服

瀉黃散 治嬰孩小兒身體蒸熱曾<sub>曾</sub>腸<sub>腸</sub>煩<sub>煩</sub>滿<sub>滿</sub>皮<sub>皮</sub>膚<sub>膚</sub>如<sub>如</sub>疳<sub>疳</sub>積<sub>積</sub>之<sub>之</sub>黃  
白<sub>白</sub>睛<sub>睛</sub>亦<sub>亦</sub>然<sub>然</sub>蒸<sub>蒸</sub>熱<sub>熱</sub>所<sub>所</sub>致<sub>致</sub>也

黃連去<sub>去</sub>蘆

茵陳各<sub>各</sub>五<sub>五</sub>分

黃蘗

黃芩各<sub>各</sub>四<sub>四</sub>分

梔子去<sub>去</sub>殼

茯苓去<sub>去</sub>皮

澤瀉各<sub>各</sub>三<sub>三</sub>分

右以咀用水煎食前服

壯熱

巢氏曰乃熱氣感<sub>感</sub>毒<sub>毒</sub>發<sub>發</sub>於<sub>於</sub>外<sub>外</sub>故<sub>故</sub>令<sub>令</sub>身<sub>身</sub>壯<sub>壯</sub>熱<sub>熱</sub>其<sub>其</sub>發<sub>發</sub>於<sub>於</sub>外<sub>外</sub>壯<sub>壯</sub>  
相似小有異者熱加其<sub>其</sub>毒

六合湯 治嬰孩小兒血熱每日巳午間發熱過<sub>過</sub>則<sub>則</sub>涼

當歸去<sub>去</sub>蘆

大黃<sub>大</sub>八<sub>八</sub>分

川芎

地黃

白芍藥炒

柴胡去<sub>去</sub>蘆<sub>蘆</sub>各<sub>各</sub>五<sub>五</sub>錢

右剉散用水煎食前服 一方加桂二錢

火府散 治嬰孩小兒面赤咬牙發熱<sub>發</sub>展<sub>展</sub>乾<sub>乾</sub>燥<sub>燥</sub>小<sub>小</sub>便<sub>便</sub>赤<sub>赤</sub>澀<sub>澀</sub>邪<sub>邪</sub>熱

地黃

木通去<sub>去</sub>蘆<sub>蘆</sub>各<sub>各</sub>五<sub>五</sub>錢

甘草炙各<sub>各</sub>三<sub>三</sub>錢<sub>錢</sub>半

右以咀用水煎食前服入竹葉五錢

溫壯熱

湯氏曰由臟腑不調內有伏熱則大便黃而臭內夾有冷則大  
便白而酸氣皆冷熱持於胃氣致令不和血氣壅<sub>壅</sub>故<sub>故</sub>編<sub>編</sub>積<sub>積</sub>體

熱服 惺惺散

內有伏熱服

內有宿寒服

柴葛散 治嬰孩小兒溫壯伏熱<sub>伏</sub>去<sub>去</sub>

柴胡去<sub>去</sub>蘆

麥門冬<sub>冬</sub>各<sub>各</sub>三<sub>三</sub>分

人參去<sub>去</sub>蘆

赤茯苓去<sub>去</sub>皮

甘草炙各<sub>各</sub>三<sub>三</sub>錢<sub>錢</sub>半

黃芩五<sub>五</sub>錢

右剉散用水煎入小麥二十粒竹葉二皮

時熱



巢氏曰感冒四時不正之氣頭痛壯熱與傷寒相似但二時所行之證人人相似故曰時氣

太一十神湯

陳皮去白

赤芍藥

麻黃去節

升麻

右咬咀用生薑三斤棗一箇去核同煎不拘時候服未受證者加大黃研碎黃同煎服以解疫毒熱毒之氣

時氣傳變

時氣因邪觸 春秋及夏冬 受邪則肉內 傷各衛榮中

頭暈身熱 心煩兩頰紅 鼻清涎液噴 傳變似傷風

夜熱身涼

夜熱身如火 纏明依舊涼 非干邪氣作 蓋為寒風傷

汗熱身多赤 脾蒸熱帶黃 汗采方始退 肌體漸羸脆

頭熱身涼

頭熱身身涼 陰虧不順陽 陰沈陽不降 病作必為殃

頭熱頭痛

諸陽傷腦戶 熱痛攻頭 陰被陽相觸 榮行衛不流

久熱筋疼

久熱傷筋骨 伸舒痛若風 亦能成軟弱 氣血不能通

久熱頭暈

久熱生頭暈 心虛臥不寧 骨蒸微汗 憔悴減容形

風熱相競

風熱互相競 風擊不自由 疼牽腰脊間 痛引熱攻頭

諸熱通治

身中有熱先除熱 熱裏逢虛先補虛 一粒金丹 治嬰孩小兒五臟燥熱曾 嘔煩閉目溢多渴而赤

頭暈身熱咽痛舌煩生瘡及延毒感五心煩熱四肢溫壯小便黃赤

人參去蘆

犀角

琥珀各錢

寒水石煨

朱砂水飛各二錢 麝香半錢

右為極細末用糯米糊圓如芡實大余酒為丸用麥門冬去

心煎湯或薄荷煎湯研化不拘時候服

清涼飲子 治嬰孩小兒血氣壅盛臟腑生熱類赤多涕五心

煩熱咽閉痛乳 痛不時寒溫失度潮熱往來睡臥不安手足

振掉欲生風候

人參 川芎各二錢

當歸尾 赤芍藥片

防風去蘆 大黃麵裹

甘草各二錢

右咬咀入燈籠 七葉麥門冬去心七粒同煎不拘時候服

使下湯 治嬰孩小兒積熱心驚小便赤腫口内生瘡



木通七厘散 當歸尾散

白芷水錢 防風水錢 甘草水錢

右為極細末用地黃漿調冬冬六心同煎湯調不拘時候服  
有吐瀉後生口瘡乃名曰絕心熱宜用回陽之藥

生犀圓 治嬰孩小兒解熱風劫驚清心肺利咽喉

犀角 犀角 防風水錢

羌活水錢 天竺黃 茯神水錢

大黃錢 甘草水錢 朱砂水錢

右為極細末用白蜜調如次膏天用薄荷煎湯研化入麥門  
冬去心不須時候服又至後立春前宜服

暑

李初

重

聖惠曰用乳母福昌暑熱乳兒及小兒日中遊戲受熱成疾

楊氏曰人心包絡與胃口相應或因胃暑暑毒自口中入凝

於牙頰達於心包絡及者天運中胃熱常於水數口勿熱使吐之去暑毒

蓋暑之入人也伏於二焦腸胃之間至於無節累月而不可測

識或為霍亂吐痢為中滿為癰疔為大渴為腹脹為下血為諸

熱等疾若因暑得之其根未除雖百藥通難收其效蓋傷暑

蓋似傷寒但暑能消氣氣消則脈散虛而無力或六脈沉伏緩

微弱

其證面垢唇燥毛髮悉寒吐痢煩燥渴其壯如傷寒身熱

頭疼或四肢厥冷但身熱無汗

治法宜早驅暑和用藥不可過冷若冷藥過度胃寒

停水潮熱而嘔或身熱微煩則湧浮於外宜小半夏湯若飲水

過多或傷冷藥吐痢不食自痢不消此外熱裏寒宜理中湯若

脈虛而黑冷汗手足微寒發渴口氣熱乃裏熱之證不可誤投

熱藥如抱新救焚不發黃則發旺矣

阮石峯曰暑天忽有老幼昏悶不醒手足搐搦或角弓反張壯

如驚風或吐痢身熱如火乃伏暑無感風邪宜服批杷葉散若

倉卒無藥以批杷葉火燎去手搗西瓜汁瀉去津灌即醒

王氏曰夏秋之間小兒發熱傷風傷寒等證乃先受暑毒而後

風邪乘先解暑天則解表發散若不先去暑毒定傳瘧疾日久

難痊矣

小兒伏暑者蓋緣脾胃虛弱脾胃開疎暑氣乘虛而入故也大

抵夏月間小兒最要調理脾胃和則暑毒不為功也夫

暑者在天為熱在地為火在人為心是以暑毒傷人必於心

而後傷風者其候身熱朝熱晝夜不歇若三四日朝熱退者

是暑入心蒙蔽心竅則合手足搐搦不醒人事此名暑風證也

若身直不醒則成痙證難治自古至今暑風一證醫書之所不

載但診其脈浮而虛者是也蓋浮則為風虛則為暑此證者以

驚風治之必不效若只伏暑無傷風證者其候頭暈五心熱

小便赤而少面淡地吐或有只吐而不瀉或瀉而不吐者

或有吐瀉俱作者又有年長成童在道途間為暑風所中煩悶

而不醒人事者急扶在陰涼處切不可便與冷水并針瀉地若

與冷水即與暑氣相繫危反等當以布帛蘸湯熱熨胸膈



間續以布帛帕頭放臍上用湯飛盛熱湯淋怕令臍脈流通候漸甦醒方可用米飲徐徐灌之然後用藥解其暑毒必平復

伏暑生驚

伏熱生涎燥 多嘔見食悲 向明憎不樂 入暗稍相宜 或即鮮雙目 無時動四肢 渴煩尋冷地 暑毒作驚危

中暑似驚

暑毒傷心壯若驚 頭塔渴熱燥無聲 昏沉喘噦延無汗 手足相牽眼闔睛

吐瀉因暑

吐瀉因傷暑 腸鳴利色黃 扁鵲云傷暑吐瀉腸鳴便黃水久則青厚千金云寒則腸中泄瀉腸滿痛入云腸虛則腸知腐鳴瀉者自石石食

全列心鑑夏

夏

不消化脘腹痛也 渴多煩不食 尿少熱如湯 困頓精神便

嘔煎意思荒 氣瀰類腸痛 而色減精光

去桂五苓散 治嬰孩小兒伏暑作渴

猪苓去皮

白朮

外茯苓去皮各五錢

澤瀉七錢半

右為極細末用車前草燈新同煎湯調不拘時候服

一方加羌活 鎮心加朱砂 吐不止加生薑自然汁

渴盛加人參

異功圓 五苓散加人參為極細末煉白蜜圓如芡實大朱砂

為灰小兒煩渴用燈薪竹葉同煎湯研化食前服

衛生之家修合常服以解暑毒

二類散 治嬰孩小兒渴瀉煩嗽五苓散加杏仁去皮尖

甘草炙

右為極細末用片水調或煎服虛者 白湯調服

六和湯 治嬰孩小兒中暑霍亂吐瀉 煩渴痰嗽

人參去蘆 縮砂去殼 甘草炙

杏仁去尖 半夏湯浸去鹹各五錢

扁豆薑製炒 赤茯苓去皮 藿香葉

木瓜各一兩 香薷葉 厚朴薑製各二兩

右劉散用生薑二片棗一箇去核同煎食前服

小半夏湯 治嬰孩小兒嘔吐風痰水飲

半夏薑製五錢 茯苓去皮二錢

全列心鑑夏

夏

右以咀入薑汁同水煎不拘時候服

清膈飲子 治嬰孩小兒伏暑嘔吐煩渴五心熱小便赤少面

伏地卧

香薷 茯苓去皮各三錢淡竹葉

人參去蘆 半夏麩 檀香各二錢

甘草炙二錢 粳米五錢

方咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎食後沉冷服

二生圓 治嬰孩小兒暑毒入心痰塞心驚昏困迷悶不能言

語捕翔

天南星去皮磨 半夏去脣 白附子

右各生用為極細末猪膽汁糊圓如黍不大曬乾用薄荷煎



不拘時候服後可令小兒側卧吐痰水即醒蓋此乃  
危急之證若非生料藥膜膠之劑不足以代病也幸毋忽  
濕

巢氏病源曰濕者水濕之蒸氣也活人書云風雨襲虛山澤蒸  
氣豈止大人中濕小兒亦有受證者緣小兒入夏以來脾胃虛  
弱腠理開疎或因連日雨作或地上蒸濕小兒坐卧便濕氣或  
乳母抱在陰濕地坐嬉戲下覺稍久亦失濕氣夫受濕者其脈  
沉緩濕流關節身軀煩疼發熱惡寒或汗惡風精神昏悶或  
小便不利大腑滯泄若經久不除則手足垂痺若入臟則疳啞  
木言挾風者為煩熱為流走為拘急為寒者為痛為浮為腫與  
風寒二氣相合則為痺痛此皆先受濕後挾風寒之氣而然也  
大抵治濕之法不可發汗亦不可向猛火處只當疎利小腑其  
濕自去不利小腑病根不除流連歲月是養虛遺患也  
參朮散 治嬰孩小兒初受濕氣身軀煩疼發熱惡風多汗回  
浮作嘔小便不利

人參去蘆 猪苓去皮 乾薑炮  
白朮各一錢 澤瀉 木通去皮節  
赤茯苓去皮各三錢

右咬咀入燈薪七葉重煎下 拾用水同煎食前服  
除濕湯 治嬰孩小兒助脾土 去濕氣傷筋手足軟弱吐瀉  
握舉疼痛

人參去蘆 橘 藿香葉

蒼朮水浸洗淨 大腹皮 茯苓去皮

厚朴去粗皮 生薑洗去青白朮

甘草炙各三錢

右咬咀用水煎不拘時候服

傷風

食睡口中氣熱呵欠頻悶常發熱不解有下證當下大飲水  
不止而善食者可飲下證不可下也

傷風惡寒

脾臟虛冷和脾後發散如解

傷風自利

脾臟虛冷當補脾散散本注調中有下證後服溫驚圓

傷風腹脹

將臟虛當補脾必不喘後發散仍補脾去脹用塌氣圓

傷風無痰

無心驚悸無肺則喘喘惡硬氣長山山氣散善則畏明冬  
隨補母臟虛見故也

傷風下後餘熱

以藥下之大過胃中虛熱飲水無力也當當當當津液多腹白  
天散

傷風吐瀉身溫

有下熱睡多氣喘大便黃白色嘔吐乳食不消時時更  
五臟無見證當煎入臟君臣藥如先曾下或無下證慎不可下



此則脾肺受寒不能入食也

傷風吐瀉身熱

多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃赤此為胃熱瀉吐瀉也  
當生胃中津液以止其渴止後用磁散藥止瀉多服白朮散發  
散藥主之

傷風吐瀉身涼

吐沫瀉青白色瀉亂不渴噎氣長出氣睡露睛此傷在毒輕性  
因成吐瀉當補脾後發散此一證多病於春冬也

風溫潮熱壯熱相似

潮熱者時發熱過時即退來日依時發熱此欲發驚也壯熱  
者一向熱而不已甚則發驚瀉也風熱者身熱而口中氣熱有  
風證溫壯者但溫而不熱也

咳嗽

牙兒及嬰兒咳嗽難治之者蓋為初生血氣微弱五臟未充肌  
體未固應變未周之兒所感寒邪攻及腠理表裏相干邪正  
相勝陰陽未合不可強生攻治妄吐妄下妄汗妄補皆令兒病  
轉盛不惟無益甚有傷害幼幼咳嗽乳母之過圓故狼虎醫士  
之罪豈特芽兒及嬰兒難為調理應小兒有患咳嗽未敢輕許  
一服藥便見安樂雖傷寒傷風證候已歸平復且咳嗽尚作  
大抵究竟小兒咳嗽先看有無熱證痰有熱者表無熱傳過或  
是未傳近則未傳久則傳過痰稠熱盛痰壅即吐宜服補肺散  
服之自然痰化熱散咳嗽漸愈未可使用滋藥白礬天南星石

未破粉之類宜先滋潤脾肺後用王氏金華散少時時  
與服凡兒咳嗽須究表裏未可一向攻散若用金石藥直入胃  
院乃成慢脾風候手足勾曲又何所苦巴豆輕粉砒藥下之腸  
胃不禁須更成風亦何所宜只用溫平與表順助其氣滋潤肺  
經和順三焦其痰漸化其熱自退不必攻散所謂理嗽宜補  
氣化痰蓋肺生胃門氣壯即嗽漸為胃正即痰不生肺滋即嗽  
不有在乳母當忌食稍長久用安存避風回滋忌毒慎冷然小  
兒氣弱其嗽作熱用藥調理實不因藥又有時氣咳嗽謂其天  
時令熱不調幼幼虛怯受患者救其救日夜不輟或吐或喘痰  
熱壅盛至重者利之即愈謂用大黃朴硝枳實陳皮半夏人參  
厚朴柴胡心煩悶胃膈不快方宜與服無熱與痰亦不可下  
伏請謹辨毋致得矣

咳嗽屬肺經所主肺主氣外屬皮毛腠理凡牙兒嬰兒日夜  
切與保持無冷風吹腦髓背脊使肺受寒邪咳嗽不已作驚  
多痰若被風吹即日感受次集傳之五臟虛處即任所入蓋初  
生兒氣微易得傳變最由顛動五臟有傷和氣五臟不和二焦  
不順故有傳變是以我生於二斤亦也肝主風類癩眼日克我  
即二心火也心主驚恐頑延血脈腫脹其嗽傳受或吐逆或  
痰涎或厥冷或惡悸至服日兩匙黑紫如被物傷成重發痼古  
人之久嗽成痼謂藥力不及候已傳過難以療理預當告之  
巢氏病源曰小兒嗽者由風傷於肺也五臟之中肺臟軟弱若  
有疾病必難調治肺主氣候皮毛肺輸穴在背上小兒血氣未



年若解之際不避風寒則風寒傷於皮毛因從肺喻元而入即  
 嗽矣小兒須常令背脊有汗亦須用背之心類若背脊得數日  
 內嬰兒百中救一百日內嗽者十中可一而全也大抵嗽證惟  
 七八月間肺氣大旺病者必實其證面赤身熱痰涎壅盛睡臥  
 不得治法當以下之如久則不可下若嗽而硬氣口內持持出  
 氣喉中有聲此則久病肺虛之證久嗽者肺津液耗惟欬久花  
 五錢子湯人參阿膠散土之亦有嗽而咯膿血者乃肺熱盛也  
 合用人參清肺飲二和湯加白茅根同煎食後服至於嗽逆者  
 由喘氣未定因而飲乳與氣相逆氣則飲乳射於肺故咳而  
 氣逆胃之咳逆吞蘇飲主之有嗽而喘不出由客風傷於肺管  
 吸門也肺主聲音紫苑膏柴杏湯主之又有寒嗽就嗽則於嗽  
 寒嗽者由風冷入肺也其證面青氣逆咳嗽喘急晝夜不息人  
 參寧肺湯主之熱嗽者乃肺經蘊熱其證氣逆喘急則開亂  
 不食飲水不止清肺飲子主之鈎鈎嗽者由膏膈痰多痰與氣  
 相擊隨嗽動息所以鈎鈎有聲也七寶散真珠圓主之治嗽之  
 法熱即下之冷即溫之更隨虛實以意加減却不可泥古反成  
 大害若久嗽不已至傷真氣亦生驚風誠非小疾宜治之  
 咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動  
 而為痰也咳嗽定有痰而有聲蓋因傷於肺氣而咳動於脾濕  
 因咳而為嗽也  
 明理論曰咳者聲咳之咳俗謂之嗽肺主氣形寒飲冷則傷肺  
 使氣上而不下逆而不收衝繫咽而為嗽也喉在如拜習習如

便而咳也甚者連連續續不止坐臥不安引動百骸其謂于外  
 矣皮毛者肺之合也皮毛受寒氣從其合內外邪客而嗽也  
 楊氏曰肺為嬌臟外主一身之皮毛內為九臟之華蓋形寒飲  
 冷最易得寒燥氣鬱鬱最易為熱惟其易為冷熱而成咳痰  
 寒實此氣逆不下衝繫動肺與夫肺實肺虛皆能連咳而發嗽  
 也  
 其證感風者鼻息聲重停寒寒清怯寒挾熱則焦煩受濕  
 為纏滯瘀血則肺間腥悶停水則心怔忡或實或虛痰又  
 之黃白唾之稀稠可知也  
 治嗽之法肺脈浮為風邪所客宜發散之肺脈實為氣滯內熱  
 高清利行之肺脈濡散為肺虛宜補肺以安之其間久嗽曾解  
 利以致肺胃虛寒飲食不進則中溫中助胃加以和平治嗽之  
 劑然諸風諸痰嗽喘之類雖用和緩為佐此藥獨不寬中最能  
 行氣氣下則痰下肺證自平矣  
 小兒一時中風熱喘急身熱脈緩者生脈急者死其作痰喘治  
 法得病之源人之緣病  
 傷風發熱咳嗽者宜先發散其表人參羌活散如蘇合香散  
 草散加桑根白皮性性散寒蘇飲皆足發散之藥然不除肺  
 湯主之  
 假如表散風邪無別證微嗽者服抱龍圓瀉白散平肺之劑痰  
 涎壅盛王餅子金星圓下痰熱瀉白散如人參或辰砂半夏圓  
 抱龍圓尤以下後熱不退作驚風之壯且薄荷散服



感寒發熱咳嗽者服惶惶散加麻黃表散寒邪微嗽否參香人  
參手夏圓痰嗽半夏茯苓湯

久嗽曾經解利肺氣虛寒者補肺服補肺散  
風肺受寒久不已灸肺膈九三壯服百部圓陳皮羅漢散桑椹  
白皮煎湯研化食後服

小兒初生百日內咳嗽肺葉脆弱最難治平常冷熱邪入  
肺中無能待出又不堪吐利必明病源消解風寒化痰順氣益  
肺生胃胃開氣壯嗽即漸感不可強攻

冷嗽則鼻流清涕面白痰薄日輕夜重或微有邪熱  
熱嗽則面微紅鼻乾熱痰稠脈浮數

胃熱不因風寒而得以兒啼便乳壅結心脾不敏即嗽而達以  
玉餅子下

錢氏治嗽之法先資脾胃得實肺則和  
小兒咳嗽者膝理以風邪感喉紅喘喘若見喉縮目  
鼻粘乾黑者不治

風邪感 涎生肺受邪 臉紅微帶喘 咳逆痰稠加  
積聚心中有毒痰 夜嗽驚悸不安

積聚心中有毒痰 夜嗽驚悸不安  
食後胃氣不宣 喘急因知病未痊

食後胃氣不宣 喘急因知病未痊  
順氣消痰絕根源

順氣消痰絕根源  
連聲因肺感風寒 眼淚蒸感痰下等

連聲因肺感風寒 眼淚蒸感痰下等  
咳水冬因汗本乾

小兒咳嗽最難醫 休說名方皆喘山 頭痛面黃  
作發連連不肯休 心膈痛時有膿血 醫士看了也頭愁

此病根源邪在肺 用藥調和得解憂  
傷風咳嗽 兩頰微紅鼻涕多 汗出遍身無咳嗽

惡風發熱頭應痛 兩頰微紅鼻涕多 汗出遍身無咳嗽  
此傷風證易調和 寒氣相搏氣不通 壯熱多帶心臟熱

鼻流清涕肺傷風 寒氣相搏氣不通 壯熱多帶心臟熱  
發驚涎盛轉加膿

咳嗽氣喘大忌誤用重方云老人小兒熱而腹脹者死  
百日嬰兒嗽 涎鳴肺臟虛 喘急心腹脹 哽咽困難居

喘急變驚 喘急時時面臉鮮 外被各風傷肺穴  
粘痰作嗽發連綿 喘急時時面臉鮮 外被各風傷肺穴

內緣冷氣入喉咽 看者初發雙眸直 漸漸翻身兩手牽  
口角流涎心腹脹 鴉聲齜齒心難痊

感風氣喘 鴉聲齜齒心難痊  
邪客皮毛肺感風 忽然喘急氣難通 斜睛汗出唇青逆

邪客皮毛肺感風 忽然喘急氣難通 斜睛汗出唇青逆  
猶忌痰涎滯腹中

痰中有血 風傷氣血不和同 痰中膿血因頻嗽  
咳嗽痰中忽有紅 風傷氣血不和同 痰中膿血因頻嗽

肺拍聲必引風 咳水冬因汗本乾  
咳嗽因風 痰涎喘急難安 時時發熱心煩燥

咳水冬因汗本乾 痰涎喘急難安 時時發熱心煩燥



臉赤唇紅口鼻乾 鼻內流清涕然

咳嗽因風肺受寒 氣生咯血喘多涎 風盛射胎因積起

乳喘無時即不安

肺穴傷風

肺穴傷風 痰涎嗽喘聲 咳則因有熱 恍惚自狀驚

傷暖傷風

傷暖傷風 令兒鼻不通 乳多咽不利 痰聚引驚風

胃冷咳逆

胃冷咳逆 連聲最損人 衝虛祭不順 牽引痛頻頻

咳逆寒生胃 連聲最損人 衝虛祭不順 牽引痛頻頻

喘急喉噴惡候

寒邪傷肺掄 喘哭聲無聲 氣逆停胸膈 痰涎喘自驚

驚喘痰壅

驚喘痰壅 風驚又食傷 是因二種作 發熱體如湯

驚痰雍滯

痰涎滯乳滯胸中 膈節令兒乳不通 咳嗽自然生喘急

精神恍惚變驚風

喉中哽氣

喉中多哽氣 噎飲飲生驚 二證皆癩疾 看看瘡塌成

百日內乳嗽

此些痰嗽是尋常 如斯好與肺清涼 大故日久宜作變

須求智者與商量 前篇論說皆痰候 却問回生不死方

更遇新生百日內 若生此候不相當

肺痿

小兒肺痿則寒熱無時咳逆黃膿虛守若見即欲咳痰為如

肺痿虛而黑者百不治一是有死候

因嗽連綿久 風邪肺受殃 無時寒熱作 咳逆出膿黃

促喘頭低軟 痰鳴氣胃傷 鼻唇無潤黑 性命在膏肓

瘦胸

小兒瘦胸則因肺臟軟弱 面唇帶青 肺虛者見項下沉凹

陷如漆口內腥臭全縮皆為死候不治

胸陷同瘦證 喉咽若錐聲 肺因邪濕感 氣喘面唇青

項下深凹陷 涎如膠漆類 口生腥臭惡 舌縮命將傾

李幼中遺集

咳嗽因風肺受寒 肺停冷血喘生痰 肺言驚無他故

肺熱因而目不安

今兒驚熱驚喘時 下忌酸鹹又乳之 痰自肺經傷水殺

及及結聚早求奇

胸陷亦是肺熱風 一回發時氣上衝 初即宜為好劍柄

後來龜背又龜胸 口閉不開涎上壅 雙目黃時似點燈

此疾終成殘患字 有奇功斷不從容

瀝脊

喘促垂蒸瘴 痰毒臉脈紅 澹膏如錐齒 手足似枯筒

兩臉虛浮癩 心胃痞不通 魚尾痰紫黑 靈藥總無功

喘急

喘急



華佗云盛而為喘成而為枯故活人亦云孫思邈者氣有餘也凡看文字須要會得本意盛而為喘者非肺氣有餘也氣有餘則作氣表有餘當議作不足肺

人參煎湯 治嬰孩小兒傷寒後氣不和順喘急咳嗽胃弱痞塞日夜煩悶神困力乏不思飲食仍治虛痰煩滿頭目眩暈但是傷寒感冷咳嗽不問肺之虛實可汗可溫可下要藥也

枳實四筒上穰米泔浸麩炒 桑根白皮蜜炙  
半夏麩 甘草炙 茯苓上炭  
款冬花去梗炒 五味子 細辛上葉  
阿膠麩炒 麻黃去節 桔梗去蘆炒各五錢  
人參二錢 薑二錢半

右劉散用生薑二片棗一箇去核同煎加烏梅去核少不拘時候服

三和湯 治嬰孩小兒解肺經寒邪止嗽化痰  
甘草炙 麻黃去節 杏仁去皮尖各二錢

右吹咀用水煎食遠服  
潤肺散 治嬰孩小兒寒壅和交肺氣不利咳嗽喘急語聲不出痰涎壅塞胃膈煩滿鼻寒清涕咽喉乾痛

貝母去心 杏仁去皮尖炒各二錢半  
麻黃去節 兩 阿膠炒 桔梗去蘆炒各二錢半  
人參去蘆七錢 甘草炙五錢 陳皮去白二錢

右吹咀用水煎食遠服

寒熱散 治嬰孩小兒寒熱傷寒吐逆壯熱頭痛氣喘痰嗽能利肺經驚吐癰疹遍身赤痒往來潮熱時行麻痘瀉子餘毒未盡止咳化痰

人參去蘆 茯苓去皮 桔梗去蘆炒  
半夏麩 杏仁去皮尖炒各二錢半  
白朮 柴胡去蘆 知母  
貝母去心麩炒 麻黃去節 甘草去節生  
葶藶炒 桑根白皮炒各二錢

秋冬加桂 裏熱加大黃 喘促加馬兜零  
發汗用生薑葱同煎不拘時候服

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用生薑湯研化食後服

清肺飲子 治嬰孩小兒解肺經熱化痰止咳

人參去蘆 羌活去蘆 川芎  
石膏 赤芍藥 黃芩炒  
乾葛 甘草炙 桑根白皮

右劉散用水煎不拘時候服  
款冬花 五味子 麻黃去節  
杏仁去皮尖各三錢 甘草炙一錢

右吹咀用水煎加馬兜零二錢同煎食遠服  
補肺阿膠散 治嬰孩小兒肺胃俱寒氣促咳嗽化痰

人參去蘆 阿膠一錢炒各二錢 馬兜零去皮



杏仁去尖去毒 鼠粘子炒 甘草炙各一錢

糯米五錢

右吹咀用水煎食後服

人參寧肺湯 治嬰孩小兒肺胃俱寒延喘氣急不得安眠

人參去虛

五味子

茯苓去皮

白朮

陳皮去白

甘草炙各一錢

右劉散生薑二片第一箇去核同煎食遠服

人參清肺飲 治嬰孩小兒咳嗽寒熱除風痰

人參去虛

羌活去虛

五味子

款冬花各二錢

麻黃去節

甘草炙各一錢

右吹咀入桑根白皮一寸炙同煎不拘時候服

紫香湯 治嬰孩小兒咳嗽聲音不清

紫苑去一

麥門冬去心

款冬花炒

杏仁去皮尖殼炒 甘草炙各二錢

右為極細末用桑根白皮煎湯入坯子臙脂少許調食遠服

補肺散 治嬰孩小兒咳嗽痰喘氣急

人參去虛

白朮

茯苓去皮

甘草炙

麻黃去節

杏仁去皮尖

阿膠炒

訶子煨去核

地骨皮

桑根白皮炙

桔梗去虛炒

半夏麩

右吹咀用生薑三片煎不拘時候服風熱加防風去虛又天麻煨

紫苑膏 治嬰孩小兒咳嗽聲不出

紫苑去土

杏仁去皮尖

右紫苑末同杏仁研入蜜煎如膏如艾實大用苦味子風湯

研化食遠服

杏蘇飲 治嬰孩小兒痰氣咳嗽不止

杏仁去皮尖炒

紫蘇子炒

陳皮去色

赤茯苓去皮

桑根白皮炒

大腹皮

半夏麩

甘草炙各一錢

右吹咀用生薑一片煎食遠服

七寶散 治嬰孩小兒清肺散熱化痰定喘止咳

大黃麩暴煨

梔子仁

赤茯苓去白

滑石

黃芩炒

赤芍藥炒

甘草炙各一錢

右為極細末用桑根白皮煎湯如喘急滿喘不得磨刀水澄

清溫暖食遠服磨刀水只要常用藥刀去麩石研盆上磨汁

真珠圓 治嬰孩小兒定喘急鎮驚風痰

天竺黃

天麻煨

牛膽天南星炒

白附子炮

青黛

甘草炙各一錢

真珠

朱砂水飛各一錢 輕粉半錢

麝香一字

右為極細末煉白蜜圓如艾實大輕粉為衣用竹白竹瀝煎湯研化食遠服



元膏湯 治嬰孩小兒咳嗽喘急連綿不已及不得睡

薄荷葉

紫蘇

大腹皮

麻黃去節

桂枝

桑根白皮蜜炙

杏仁去皮尖

陳皮去白

甘草炙各一錢

右以咀用生薑三片烏梅半箇同煎食後服

人參半夏圓 治嬰孩小兒感冒受冷咳嗽氣急胃膈痞滿喉

中呀聲口吐涎沫乳食不下

半夏麩

厚朴薑汁炙天

陳皮去白

人參

細辛 各半錢

右為極細末生薑汁煮麩糊圓如芥米大用生薑湯食後服

百部圓 治嬰孩小兒感冒受寒咳嗽痰熱

百部炙

麻黃去節各一錢杏仁 去皮尖

右為極細末煉白蜜圓如芥實大用陳皮去白桑根白皮炙

罌粟殼去蒂蜜酒煎過研化不拘時候服入松子肉

去皮五十粒沙糖圓各七服

金滿草散

治嬰孩小兒傷風感冒涕痰壅熱嗽

金滿草

荆芥穗各三錢 麻黃去節四錢

前胡 去蘆二錢半 半夏麩 一錢半 甘草炙二錢

赤芍藥 炒錢半 桑根白皮 蜜炙一錢

右以咀用生薑三片煎 煎去核同煎不拘時候服

半夏茯苓湯 治嬰孩小兒咳嗽痰

半夏麩

茯苓去皮

陳皮去白

五味子 葶藶炒 人參炙

細辛去毒

桑根白皮蜜炙羌活去皮

桔梗去蘆炒

右以咀用生薑三片煎食後服

華蓋散 治嬰孩小兒感冒風邪鼻塞聲重口不出四肢拘

倦咳嗽多痰胃滿氣短

紫蘇子炒

赤茯苓去皮

陳皮去白

桑根白皮蜜炙杏仁 去皮尖炒

麻黃去節各一錢

甘草炙二錢半

右以咀用水煎不拘時候服以反被蓋覆

甘桔湯 治嬰孩小兒下咳嗽

甘草炙

桔梗去蘆炒各一錢

加入人參去蘆

葶藶炒各半錢 杏仁 去皮尖去白

右為極細末煉白蜜圓如芥實大實妳上令兒服

杏仁膏 治嬰孩小兒久患遠日咳嗽不止

杏仁 去皮尖

貝母去心

茯苓去皮各一錢

槐花炒半錢

皂角去皮酥炙一錢

右為極細末煉白蜜圓如芥實大用麥門冬去心煎湯研化

食後服

白散 治嬰孩小兒風熱咳嗽

桑根白皮蜜炙地骨皮

甘草炙

右以咀加入人參手磨糯米一百粒同煎不拘時候服



痛白散 治嬰孩小兒發熱咳嗽喘促吐降氣不能下降降氣不能上升

五味子 茯苓去皮 青皮去穢

陳皮去白 加人參去蘆

右以咀用生薑三斤煎合透服

瀉白散 治嬰孩小兒風熱痰喘咳嗽

知母 陳皮去白 桔梗去蘆炒

地骨皮各錢半 桑根白皮蜜炒一兩

甘草多 青皮去穢炒 黃芩去蘆炒

右以咀用水煎食遠服

寧師散 治嬰孩小兒咳嗽無問新久

麻黃五錢 罌粟殼去穢蜜炒一兩

甘草炙錢十

右為極細末用烏梅一箇去核煎湯調化臨睡服

薄荷散 治嬰孩小兒驚風痰盛

薄荷葉五錢 羌活去蘆 麻黃去節

全蝎去毒炒 甘草炙各半錢 天竺黃

僵蚕去用絲炒 白附子炮炒 錢加竹瀝少許

右為極細末用薄荷煎湯調化不拘時候服

金星圓 治嬰孩小兒驚風痰盛風熱

鬱金二錢 半夏炒 雄黃水飛各半錢

蝎稍毒炒 天南星 香薷炮各一錢

巴豆去心皮狀油七角

右為極細末用生薑煎如黍米大用生薑薄荷同煎湯食

煎服

上斷子 治嬰孩小兒食不調嘔吐泄瀉痢疾胃腸滿腹

繼咳嗽腹中癰疾

天南星毒炮錢半 夏去毒薑汁浸七次十二箇

白附子炮 滑石各半錢 全蝎去毒尾炒一箇

輕粉一角 巴豆去心殼水浸三日

右為極細末黃糯米糊圓如黍米大用生薑薄荷食前服

玉餅子 治嬰孩小兒風痰驚風咳嗽

天南星去毒炮一錢半 全蝎去毒尾炒一箇

滑石 白附子炮各半錢 輕粉一角

巴豆去心殼油米浸三日

右為極細末黃糯米糊圓如黍米大用生薑薄荷食前服

餅子 治嬰孩小兒驚風痰盛

天南星毒薑汁浸半夏去毒薑汁製煉碎餅各五錢

桔梗去毒炒五錢 甘草炙二錢 白礬一錢

右為極細末薑汁桑根白皮同煎湯調化如黍米大用生薑

煎湯食遠服傷寒痰嗽白麥煎散服

杏參膏 治嬰孩小兒傷風咳嗽

杏仁去皮尖七箇入參去蘆 甘草炙

貝母去心 五味子 阿膠炒



蘇黃去節各一錢

石為極細末煉白蜜圓如芡實大用白湯研化食後服

辰砂半夏圓 治嬰孩小兒肺癰痰食咳嗽喘促胃弱疳積

悶咳嗽不利呀呷有聲

五靈脂水飛去沙石炒

杏仁去尖尖

草薺炒各半錢 半夏麴一錢

右為極細末生薑汁煮麵糊圓如芥米大米砂為衣用生薑

煎湯食遠服

金花散 治嬰孩小兒因解脫風寒傷肺咳嗽

燈金半錢

防風去毒人

半夏去毒各分

皂角一皮

巴豆去皮膜油七筒

全初心藥

右以水一升銀器內入巴豆皂角煮乾餘一味同為極細末

用薄可蜜煎湯調化食前服

人參欬化膏 治嬰孩小兒肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳

嗽痰涎嘔逆惡心腹脹滿瘦脊倦痛虛弱冷嗽遠年近日

人參去虛

欬冬花去梗炒 五味子

紫苑去土

桑根白皮去皮各二錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用生薑煎湯研化不拘時

候服

人參欬化膏 治證同前

人參去虛

欬冬花去梗炒 五味子各八錢

紫苑去土

桑根白皮去皮炒各二兩

加杏仁去尖尖炒入錢

木香

檳榔去脂 紫蘇葉各五錢 桔梗去毒炒

貝母去毒各二錢半

馬兜零二錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用生薑煎湯研化食後服

人參欬花膏 治證同前

人參去虛

欬冬花去梗炒 五味子

紫苑去土

桑根白皮炒各二錢半

知母

貝母去心

白礬煨

麻黃去節

訶子煨去核

陳皮

細辛各錢半

半夏麴半錢

罌粟殼去毒蓋炙二錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用生薑煎湯研化食後服

無價散

治嬰孩小兒風熱喘促悶亂不安俗言謂之馬脾風

辰砂水飛三錢半

輕粉一錢

甘遂麴煮二錢半

右為極細末每服一字用漿水少許上瀉油 小點抄藥在

上沉下去却漿灌之

愈風餅子

治嬰孩小兒咳嗽驚痰風熱

天南星去毒炮白礬煨

半夏麴

猪牙皂柴土子熱各一錢

大黃紙煨炒二錢

右為極細末

和餅用生薑煎湯研化食前服

定喘如神散

治嬰孩小兒咳嗽風痰喘促不安

罌粟殼去毒蓋炙黃二兩

細辛去葉

人參去虛

五味子

欬冬花去梗



紫苑去土 桑根白皮 各一兩

杏仁去皮尖炒一升 知母七錢

右為細末用生薑汁一箇去核同煎湯調化不拘

時飲

全杏膏 治百日咳及百日咳嗽

杏仁一升 桑白皮一升 馬兜零去皮

百部本二升

右為細末用生薑汁一箇去核同煎湯調化在於唇上服

百日內咳嗽

甘草半斤 炙 其草半斤 炙 一錢

右為細末用生薑汁一箇去核同煎湯調化不拘時飲服

傷寒

傷寒之病 始於風寒 傷於皮膚 入於絡脈 傳於經脈 內傳於腑 外傳於經 逆傳則入於心包 傳於心則死

或言吐瀉 傷寒之病 始於風寒 傷於皮膚 入於絡脈 傳於經脈 內傳於腑 外傳於經 逆傳則入於心包 傳於心則死

傷寒之病 始於風寒 傷於皮膚 入於絡脈 傳於經脈 內傳於腑 外傳於經 逆傳則入於心包 傳於心則死

傷寒之病 始於風寒 傷於皮膚 入於絡脈 傳於經脈 內傳於腑 外傳於經 逆傳則入於心包 傳於心則死

傷寒之病 始於風寒 傷於皮膚 入於絡脈 傳於經脈 內傳於腑 外傳於經 逆傳則入於心包 傳於心則死

傷寒之病 始於風寒 傷於皮膚 入於絡脈 傳於經脈 內傳於腑 外傳於經 逆傳則入於心包 傳於心則死

傷寒之病 始於風寒 傷於皮膚 入於絡脈 傳於經脈 內傳於腑 外傳於經 逆傳則入於心包 傳於心則死

傷寒之病 始於風寒 傷於皮膚 入於絡脈 傳於經脈 內傳於腑 外傳於經 逆傳則入於心包 傳於心則死

傷寒之病 始於風寒 傷於皮膚 入於絡脈 傳於經脈 內傳於腑 外傳於經 逆傳則入於心包 傳於心則死

傷寒之病 始於風寒 傷於皮膚 入於絡脈 傳於經脈 內傳於腑 外傳於經 逆傳則入於心包 傳於心則死

辨證

應象大論云春傷於風夏生痲泄夏傷於暑秋為瘧疾秋傷於

濕冬生咳嗽久傷於寒春必病溫

口熱 口中醋氣 妳辨不清 腹中疼痛

小兒嬰孩必辨虎口三關脈紋紅紫而長一指三部左手入迎

緊盛斷之再驗小便赤白可知表熱有無大便秘可知裏熱輕

重裏實四脈欲微下

論小兒傷寒與時氣同

小兒傷寒得之與大人無異所異治者蕪驚而已又多因夾食

而得傷寒論云治法與大人一般但小兒刻藥性溫涼爾仲景

云人受寒溫之氣即發者為傷寒其寒毒藏於肌膚之間至春

而發者為溫者至夏而發者為熱病又以其氣溫春氣寒夏氣

冷秋氣熱為之時氣萬全云熱病傷寒與時氣傳變無異也

凡時氣者四時之間有不正之氣也為春應暖而反寒夏應熱

而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫此其時而有其氣其氣

傷人則頭眩吐氣咳嗽氣逆煩渴此其時而有其氣其氣傷人

無異俗呼謂天行者是也治法亦同傷寒其言云時氣歌云但

作傷寒病治之

論陰陽二厥

凡陰陽二厥者且不同陽厥者微厥部發熱若陰厥則不發熱

四肢逆冷為寒厥微而細大小便清洩又一法陽厥手掌心

溫陰厥其冷



傷寒表證兩見

傷寒表證當汗裏證當下不易之法也發表攻裏本自不同... 散主之假令傷寒不大便六七日頭痛有熱者是裏證當下其... 可下宜與桂枝湯假令病人心中滿口燥不欲食六便堅脈沉... 細是裏證當下頭痛汗出微惡寒手足冷却當汗此兩證俱見... 者仲景所謂半在表半在裏是也小柴胡湯主之假令太陽病... 表裏未除而醫數下之遂協熱而利利不止心下痞硬仲景謂... 之表裏不解桂枝人參湯主之假令太陽病醫反下之因而... 腹痛是有表復有裏仲景用桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大... 黃又云太陽病桂枝證醫反下之利不止脈促者表未解喘而... 汗出者葛根黃連湯主之

已上仲景治傷寒有表復有裏之法學者當意推之

凡治傷寒須辨表裏表裏不分汗下差誤古人曰桂枝下咽陽... 盛則斃承氣入胃陰盛乃亡

孫真人曰汗下相反其害甚速如魚出水若蟻入湯傷寒有表... 證有表證有半在表半在裏有表裏兩證俱見有無表裏證在... 表宜汗在裏宜下半在表宜和解表裏俱見兩證參詳... 無表裏證大柴胡湯下之

傷寒正受

傷寒治法前大人一同但用藥溫涼藥所謂七十二證... 證其證無越越長沙朱奉議格例不過小小分劑中病... 即止惡寒者必假人藏身引衣庇躰發熱者連類亦至... 身寒多涕是為表證宜微汗當微汗之劑解肌湯諸氏... 敗毒散惡熱而內實者必出頭露下揚手熱足微反氣... 燥重是為裏證宜瀉利至若頭額冷手足厥口氣冷而... 淡大便自利或瀉青此則陰病裏虛當用溫經散裏理中湯... 君子湯加木香丁香陳皮生薑棗等開去按前不拘時... 有虛熱參白朮散辨證之法幻見嬰孩必辨虎口二關脈紋... 紅色長而重稚一指三部左手人迎發盛斷之再驗小便赤... 可知表熱之有無大便秘利可知裏熱之輕重所謂熱之虛實

傷寒表裏汗下溫之法鳳髓經云小兒傷寒止有正受夾驚夾... 食三證

其證有陰極發燥陰證似陽學者當以脈別之諸數為熱... 諸證皆無如此最驗也小兒有證陰者即變為慢驚今... 列陰證原要識之

傷寒正受夾驚夾食

正受傷寒所由感受寒邪胃冷腹脹者傷於脾胃理輕則傷風重則... 壯熱頭痛鼻塞流涕斯乃正傷寒 候又有傷風傷者傷於筋濕... 皆能作熱困乏但不咳嗽又有夾驚因驚之時而又傷寒故云... 夾驚傷寒又有因食之時而感寒邪故曰夾食大抵傷寒或... 有七證似積之類切不可妄下若下之六早表裏俱虛難以調



論謂之壞證大人尤尚可藥小兒壞證救濟無門或試凡傷寒有驚候亦不可下驚藥雖是寒驚證亦不可用驚藥勿勿傷寒口可表解雖曰用表不可令兒汗出如王氏薄苛散人參羌活散之類若熱在裏識語鄭聲於證當下者只用散末藥洗心散四順飲之類不可用以圓子或以取積藥下之其熱不去反成無辜夾食者於理用下宜紫圓子下之量其虛實而用須究問先傷寒後夾食或夾食後傷寒夾食乃在於食時之間惟母覺知其先後多是不覺若知其理以後受者而先調理既已不明其先後即可表解以後裏證有者方可與下尤為善也且下與表二理不可併行有乎得失且如家寶云二日前在表三日後在裏斯乃大藥約而言之恐後人傳之不當以為其言凡傷寒在表即解在裏即下不可以日限為拘其或有在表裏之間亦宜和解和解久不愈俟傳裏下為良大者識語小兒煩痛切不可急急取愈且在用心明究表裏若也審察表裏用藥不當吁哉

巢氏病源曰小兒傷寒候傷寒者久時發寒而人月觸之寒氣入腠理搏於血氣則發潮熱頭痛體熱鼻衄流涕謂之傷寒又春時應暖而反寒此非其時而有其氣發初謂之時行傷寒小兒不能冒觸寒氣而病傷寒者多因乳母解脫衣服不避風寒故也夏秋之間天氣盛熱乳母抱持當風取涼致風寒之氣傷之是以亦病傷寒也其善驚者是熱乘心心主血脈小兒心動易動而熱所乘故發驚其大便不通者是寒持於氣而生熱也

流入大腸故燥澀而不通也其咳者邪在於肺肺主氣傷寒邪氣先客皮膚隨氣而入故救重者有膿血也其汗者陽虛受邪陰氣又虛邪氣又乘於陰陰陽虛不能制其津液所以汗出也其潮熱往來者是邪氣與正氣交爭正氣勝則邪氣散故潮熱退若邪氣未盡則潮熱往來不止其甚者胃氣虛熱乘虛入胃胃得熱則氣逆故嘔逆其渴者是熱入臟腑得熱則津液竭燥故渴也其鼻衄者是熱持於血而垂於血血得熱則流散故衄鼻出血大凡小兒傷寒治法用歲以歲數輕者服輕藥重者服重藥已後急須表汗次當發散後調理須在一晝夜得熱退方保無虞今之醫士多不表汗致令五六日熱不除入於經絡搏於血氣傳變多證或至驚風漸至危篤傷生等命不可不慎乎合先投解肌湯一二服汗透而熱漸輕次用人參羌活散熱退汗多服人參湯者湯調理如無汗可隨證用藥無差誤矣

傷寒虛實同異

傷寒男體重面黃女面赤喘急喘急口中氣熱可欠煩悶煩急也痰牽則腹赤燥多渴多汗動昏倦四肢公傷寒當發散治癆行溫平有大執者解毒

論六經所受表裏虛實

表證 屬陽 病在六腑 小腸大腸膀胱胃二焦 陽病外證脈 浮 洪 數 其證汗熱煩渴大小便秘遊頭回有汗昏憤氣虛接于辨



足三陽乃足三陽且頭至足

太陽屬膀胱

其證腰脊強頭項痛發熱惡寒乃陽證之裏

陽明屬胃

其證身痛身熱鼻塞不惡寒反惡熱自汗不寐內實大便

難乃陽證之裏

少陽屬膽

其證胸膈痛口苦咽乾目眩往來寒熱而嘔病在三陽二

陰之間

表證

發熱惡寒頭痛惡風惡寒或身酸及痛小便清

脈

浮洪 浮緊 浮數

表虛脈

浮而緩

其證自汗惡風小便不利

明理論曰汗出而惡風為表虛當解肌

參蘇飲

人參羌活散

香蘇散加葛根

惺惺散

解肌湯

小柴胡湯加防風白朮

表實脈

浮而緊

其證無汗而惡大熱小便赤澀

明理論曰無汗而惡寒為表實當發汗

解肌湯

麻黃桂枝湯加黃芩 蕭氏青龍湯

惺惺散

加麻黃人參敗毒散

論汗下

活人書曰表病裏和汗之則愈下之則死

楊氏曰陽證體輕脈輕而浮於外在腑為表表有邪則知

陽虛而陰虛發表之藥宜溫抑陰助陽也

湯氏曰下以發熱之初急須表汗次當發散然後調理

在一晝夜熱退為佳今之醫士多不用麻黃但用惺惺散

人參羌活散之類此乃常法致令失表三五日熱不除入

於經絡搏於血氣表裏受邪內外蘊熱變證蜂起或作驚

風或成痘證亦有別證傷生之命此皆失表之過也

當汗而不汗

仁齋曰則汗血化為毒血則熱悶眩暈昏迷心忪氣

短發燥喘滿小便多皆血證也

當汗而誤下

明理論曰表未解而醫反下之胃中空虛陽氣內陷則為

懊憹

楊氏曰誤下則內泄其真氣邪氣得深入為痞滿為結

實為懊憹為衄血

張氏曰承氣入胃陰盛乃亡乃陰盛出外而誤投承氣下

之外得寒而助邪內受虛而損正安得不亡述之為妄下

之戒

裏證

屬陰

病在內臟 心肝脾肺腎命門

陰病外證脈

沉而微

其證厥冷自利煩燥無身熱頭痛



六陰屬脾

其證腹滿或痛手足溫自利不渴咽乾腹滿時痛有積

少陰屬腎

其證口燥舌乾而渴惡寒欲寐不寐見光明咽乾口燥胃  
汁乾也

厥陰屬肝

其證唇青煩滿消渴不得食舌卷囊縮身反腎也

裏證

不惡寒反惡熱手足心液下有汗口燥胃乾身熱腹滿  
小便如常大便堅硬

脈滑

裏實脈

實弦緊中間數盛此實證也  
沉而實

明理論曰腹脹滿而短氣者尤在裏法當下之

四順青煎飲

裏虛而傳陰證

脈沉微細

其證自利厥冷身清冷四逆口氣冷煩燥而無身熱腹青

舌黑或白胎或春強頭額冷手冷溫面色黧淡瀉青

明理論曰腹脹滿而短氣者裏邪虛也且溫之

仁齋曰陰病裏虛當用溫熱藥炒裏

理中湯溫裏

甘草乾薑湯 厥冷管脾散  
四君子湯加乾薑黃芩加附子去皮鹽大炮

論汗下

活人書曰裏病表和下之則愈汗之則死

仁齋曰裏病體重脈重而不浮其病在裏

有邪則為陰虛而陽感是以攻裏之藥性宜寒

九

又曰陰病亦謂之裏陰經受邪則成臟病裏者胃府之主

而臟受病又深於裏焉又當助陽以救裏法當溫之是以

溫陰之藥性宜助助陽抑陰也

當下而失下

楊氏曰致血氣不通是以熱燥欲飲者手足冷也陰感

則厥其脈滑數指爪時溫

當下而誤汗

楊氏曰外泄其正氣內邪感虛而出誤汗為亡陽動經下

厥上逆至於陽厥以陰

楊氏曰桂枝下咽陽感則斃正惡陽感而入誤以桂枝發

汗內得熱以助邪外受虛而損正安得不斃述之為誤汗

戒

審驗汗下

千金云陽盛陰虛汗出即死下之當愈陽虛陰感下之即死汗

之即愈身熱增寒汗出陽虛宜汗身熱潮熱汗出陰虛宜下

調經論云陽虛則外寒陰虛則內熱陽感則外熱陰感則內寒

以此別之



不汗強汗 津液枯竭而死

合汗不汗 竅閉悶絕而死

不下強下 洞洩不禁而死

合下不下 脹腫煩亂而死

右件當辨今的當行之

可汗病證

惡寒者不當風而憎寒惡風者當風而憎寒皆屬表

龐氏云大法春宜汗秋宜

發熱惡寒身體痛而脈浮凡傷寒發表須當隨輕重而汗有發

汗者有和解者兼四時發汗亦自不同春不可大發汗以陽氣

尚弱可用小柴胡湯之類冬不可發汗者以陽氣伏藏不問傷

寒中風並數用桂枝麻黃各半湯或得少汗而解或無汗自解

病勢甚者不拘比夏月天氣大熱而脈洪大宜止發汗不可用

麻黃桂枝熱性藥須是桂枝麻黃湯加黃芩石膏知母升麻夏

月有桂枝麻黃證不加黃芩輩服之轉助熱氣便發斑大陰脈

浮少陰發熱亦須發汗

脈雖云汗不出不至足者死熱病得汗大熱不去

者竟

不可汗證

脈虛不轉失氣是腹中動氣也大便堅小便數大便堅小便少

未可攻之恐津液還入胃必先硬後溏也小便如常乃可攻之

當問其小便日幾行若本小便日三四行今且罷行故大便不

又出公為小便數少以津液當還入胃故大便不久必通也

已上證候皆不可下

王氏云傷寒有承氣之戒又問轉藥孰緊答曰大承氣湯最緊

小承氣湯者次之大柴胡湯又次之仲景治注瀉湯條熱積疝

用湯液不可用瀉了

下後忌補 孫真人云服大承氣湯得利差忌不可服補藥藥氣得補後成

便下之是重瀉也 可水不可水 脈沉數細無多寒少脈微虛煩腹間有動氣衄血壞病已發汗

吐下不解為壞病 可下病證 不惡寒反惡熱手掌心并腋下濺濺汗出胃中乾燥與結聚潮

熱大便硬小便如常腹滿而喘或譫語脈浮而滑或心胃連膈

腹大段注悶腹中痛坐臥不安胃悶喘急極者不候他證使下

之凡大便秘妨悶恐尚有表證者亦須少少飲小承氣湯微解

之不可過多令大洩也若失下則氣血不通四肢便厥醫士不

誠反疑是陰厥彼進熱藥禍如反掌不可不察

已上證候皆可下

不可下證

病自汗若發汗小便自利不可下宜發汗法通脈浮惡寒

病自汗若發汗小便自利不可下宜發汗法通脈浮惡寒

病自汗若發汗小便自利不可下宜發汗法通脈浮惡寒



凡病人非大渴不可與冷水若小渴口燥咽乾小小咽滋潤之  
若大渴煩燥能飲一升者可與半升隨力量多少但減一半若  
不與則無由作汗乾燥煩喘而死者多矣但實令足意飲也若  
大汗將來燥渴甚者足意飲之勿疑常見人因渴飲水而傷汗  
見小渴遂強與之致停飲心下滿結喘而死者亦多矣難辨脈  
數尚可作汗而解者出於幸也

可吐不可吐

胃脘痞滿痰涎凝滯或滑泄宜瓜蒂散吐之虛人當吐不  
敢吐宜枳實散散氣毒痰水過則毒入胃乃可微吐

枳實散枳實炒石黃細末每服半錢用米飲調化食遠服

斑毒

全幼心鑑

斑毒

斑毒有二證有溫毒發斑有熱毒發斑溫毒發斑者因冬月觸  
冒寒毒之氣至春始發熱毒發斑者因夏月觸冒暑毒發汗已  
經汗下熱即發大抵斑毒四時感於乖戾之氣或水發汗熱毒  
不散表虛裏實血凝不行故遍身發出斑疹及癰疹如錦紋巢  
氏云發斑不可用表藥

犀角地黃湯 治嬰孩小兒傷寒及痘病應發汗而不解內有  
瘀血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便黑者此方消化瘀血  
兼治瘡癩出得大盛

赤芍藥三分 地黃生二兩 牡丹皮一兩

犀角一兩

右咬咀用水煎食後服

葛根橘皮湯 治嬰孩小兒冬寒未即病至春發  
發至夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑爛  
悶但嘔清汁者

葛根 橘皮 杏仁 去尖炒

知母 黃芩 麻黃

甘草各五錢

右咬咀用水煎不拘時候服

黑膏子 治嬰孩小兒初春病人肌肉發冷癰疹如錦紋咳嗽  
心悶但嘔者此名瘟毒也

地黃生四兩 豉半升

右二味以猪膏一斤合研絞汁用麝香 雄黃少許調化不拘

時候服毒便從皮膚中出則愈惡毒入

大青四物湯 治嬰孩小兒傷寒熱病 白已上發汗吐下後

熱不除身上斑出

大青一兩 阿膠炒二錢 甘草炙五錢

豉一兩

右咬咀用水煎食前服

陽毒傷寒者蓋言陽氣勝而為毒毒入於脈浮大面之數身重頭  
疼面赤有斑斑如錦紋狂言見鬼咽乾口腫痛下痢膿血五日可

治七日不可治

陽毒升麻湯 治嬰孩小兒傷寒一二日便成陽毒或吐下之

後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤 狂言狂走或下痢或見鬼



脈浮大數發熱如錦紋咽疼下膿血

升麻 犀角 射干

黃芩 人參上盧 甘草炙各壹

右咬咀用水煎食遠服溫覆手足汗出則解未愈再服

龍膽散 治嬰孩小兒傷寒陽毒毒氣在臟狂言妄語亂走

草龍膽一兩 鐵粉二兩

右為極細末用磨刀水調化食遠服小兒多有此病

發黃

夫發黃皆由寒溫之氣結在於脾胃蒸發而成也陽明病無汗小便不利心中熱壅必發黃凡發黃其寸口無脈鼻氣冷並不可治果氏云凡發黃而下痢心腹滿者必死診其脈沉細者

全初心經

亦死又有百日生小兒非傷寒瘟病而身微黃者亦是脾胃

熱忌不可炙也炙之則熱甚此是將息過度所為微瀉而反數

與除熱粉散粉之自歌不得妄與湯藥及炙

茵陳湯 治嬰孩小兒陽明病發熱汗出者此為熱越不能發

黃也但頭汗出身無汗刺頸而還小便不利渴欲飲水者此為

瘧熱在裏必發黃傷寒七八日身黃如橘色小便不利腹滿

茵陳 梔子去殼 大黃

右以咀用水煎食前服小便當自利尿如皂莢汁吐色正赤

一宿腹減黃隨小便中出也

梔子蘗皮湯 治嬰孩小兒傷寒身黃發熱

梔子去殼五箇甘草一兩 黃蘗二兩

右以咀用水煎食後服

連翹赤小豆湯 治嬰孩小兒傷寒發黃身

麻黃去毒 連翹 甘草炙

赤小豆 梓皮生各二兩

杏仁去尖大四十箇 棗去核二兩

右以咀用水煎食後服生小兒發熱汗出

粉散

白朮 白芍 川芎

白芷

右為極細末每一兩入水粉二兩粉撲周身止汗若汗

已出晝後服散汗出多亡陽遂風煩燥不得眠也

又方治熱發黃身微黃者亦非脾胃熱也

正受傷寒 感證傷寒熱 寒多非時 目紅身煩赤 毛髮起稀疎

鼻寒并多涕 呵氣見赤醫 若冷身即冷 傷寒更莫疑

傷寒壯熱胃邪攻 煩燥煩煩面紅 本是先傳心與肺

急須解利恐變虛

傷風寒證

明理論曰惡寒者不待風而寒身雖大熱而不去及至於向火

覆被惡風者雖不當風自欲其去

傷寒無汗惡寒者 緊澀浮脈 在裏不 自汗惡風脈浮緩

面光不燥

面光不燥

面光不燥

面光不燥



傷寒之候有多般 一器 詳便心難 百百 傷寒之候

傷寒最害 猶須細審詳 若言煩表汗 十日見至張

但前良藥解 鮮脫必生黃 滿口瘡難救 都緣純是陽

初得渾身熱 多帶無意悅 眼急似驚風 涼胃莫令熱

和無輕清劑 四肢汗自發 鼻蒸腦受寒 咳嗽喘不安

臉赤煩發熱 面青口舌乾 熱感發狂語 微利調氣痊

表裏皆因冷熱虧 渾身壯熱 如緋 便冷良矣 胃作渴

便交畏冷渴類稀 此為二證 細視心時 鼻耳脾

用藥過虛兼與實 若令錯誤 危 傷寒初得渾身熱 惡哭多啼不

却被醫士道急熱 切須涼胃莫令渴 渴時飲水無休歇

只將表藥和解服 四肢便輕汗自發 傷寒病證

單傷寒夾驚傷寒火食傷寒二候發 一 同今有明證妙訣如

單傷寒者渾身壯熱鼻流清涕身七寒毛起咳嗽欲喘

夾驚傷寒證 小兒先受驚後感傷寒先發汗後利驚

其驚驚啼咬乳痰壅脚冷怔忡面紅 熱時發驚傷手足

頭熱脚稍冷 驚風氣不和 漸生涎氣急 夢寐搐來過

愛眠肺受觸 嗽盛有涎多 急宜速散 且治莫遲託

小兒壯熱積驚涎 喘喘身煩不穩眠 煩赤口乾脾胃熱

心風氣盛發狂言 頭燒脚冷氣傷和 氣急仍兼愛睡多

更加喘甚有涎過 若翻便汗方能痊 急解消痰去久痼

汗出定驚全退熱 要須子細急醫他 夾食傷寒證

小兒先停積滯後解傷寒 其證身熱頭痛頭肚腹熱感惡風氣急滑利眼堆膿面

黃寒熱如瘡目胞腫腹痛夜熱晝涼或吐瀉痢肚硬下糞

酸臭夾食傷寒之候 脈氣口緊感 解表 惺惺散加麻黃 後取積漸調胃氣

頭痛并腹疼 嘔逆又噤煎 臟腑腥酸臭 蒸蒸熱不眠

有積通身熱 陰陽氣失節 面上斑紅點 開口時加渴

先表方知藥有功 次取如神真妙訣 用藥微利兩三行

調和脾胃方喜悅 鼻涕頭疼時吐逆 面黃紅白變不一 此因夾食又傷寒

發表有功方下積 有積通身先自熱 那更傷寒來相接 面上紅斑赤似丹



渾身壯熱被風傷 早冷微暖似湯 如此占居二三日

頭疼煩燥汗如漿 鼻中清涕流清涕 咳嗽頻頻口內腐

臟腑夾食宜先下 次須解得汗出良

單受傷寒證 此類多因倦 身熱惡寒度 鼻內流清涕 頭疼咳嗽

八般傷寒證 鼻涕流 非時肌熱無休 喘鳴吐水不吐

傷寒候 鼻塞下泄赤黃 喘急咽內毒微通

傷寒候 鼻中清涕時時出 傷風咳嗽聲由

傷寒候 小便如粉面如粧

傷寒候 咳聲聲相連 胃中陽毒積 延潮夜進

傷寒候 汗閉氣不宣 逆食多酸積 都緣有

傷寒候 疎風斷根源

傷寒候 精聚心中養毒延 夜嗽胃高兼肚大

傷寒候 身乾汗閉氣無宣 更加逆食諸言重 理嗽應宜不解

傷寒候 表汗除風以此治 定教慈母早安眠

傷寒候 大抵傷寒不可重 亦不可重下 併行則成壞證

傷寒候 風可表傷宜宜下 慎思因之咳嗽宜早治

傷寒候 夾風傷寒證

傷寒候 孩兒傷寒又夾風 目多淚淚 三三三 太陽

傷寒候 傷寒候

傷寒候

傷寒候

口水如涎滴滿

傷寒變為麻子候

小兒發于候偏多 嗽喘延潮似久疴 後就驚風無怕物

看熱眼定目光多 喉中似響如刺船 那等相重甘逆和

及至發熱如急搖 唇紅臉赤脈交羅 心煩渴水口頭熱

且肺如冰髮以黑 舌上有瘡如粟米 定知二日就來

此病便如麻子候 莫將良藥與教多 便須用表解為

便與調和藥勿過

傷寒變為痘子候

未前五日臉唇青 一見生入慢便驚 鼻地胃前如赤瘰

漸同根本箇般形 齒牙有血風多臭 指甲無紅似白銀

會得醫時容易好 不能却道熱氣表 脾藥與之凉心臍

痘自消而不動情 未效變之成大患 不須占卜鬼和神

傷寒變為子候

未先五日顛如寒 不覺生驚人怕癩 心下有如棋李樣

眼睛青黑面紅鮮 手心如火髮毛豎 睡裏時開狂亂言

手撥嫌人多悶燥 又兼喘急氣相關 一周此是風瀾候

二三歲為癩子看 切忌不須通臟腑 只將圓散表心間

延開癩子生如血 七日之間便自安

傷寒驚狂

傷寒身熱發狂顛 臉赤唇紅目又鮮 氣促生涎多渴燥

驚睛卒口不曾眠



傷寒鼻衄

傷寒何鼻衄 蓋為熱傳心 合汗應無汗 陽邪氣深

結胃傷寒

大結胃寸小結胃 因熱寒熱不雷同 陽經下早留為毒

用藥無非直達攻

痞似結胃

證同前證應無痛 病在陰經下早虛 邪毒結留心下滿

此右痞氣胸中居

傷寒伏熱候

傷寒伏熱脈慢遲 不用調理速次醫 須汗遍身後煩熱

咽喉痛燥不相宜 急須涼藥投心肺 方用通腸取轉

全幼心鑑

傷寒結胃惡候

傷寒因下早 腫滿結胃間 痞悶時時喘 皮膚作紫斑

傷寒結胃死候

氣短而脈青 心間痛不停 胃弱浮紫腫 背脊冷如水

手足尋衣縫 睛中赤血筋 鼻腫連耳黑 克絕在遠巡

傷寒伏毒傳臟腑不治

傷寒未解脈微浮 裏毒欲出無蹤由 外邪伏入臟腑內

致令下痢血堪愁 片生黑血寸腸斷 醫士一見便須憂

妙藥莫調心肺臟

傷寒惡候

小兒傷寒面色黑 耳內痛聲無吃意 嘔吐泄瀉氣交橫

大腸小腸乾痛泄 眼生紅淚鼻爛漫 性命歸其空虛息

傷寒死候

目白如星火 長吁氣短切 鼻連眉下黑 燥喘似癩狂

唇烈乾焦縮 舌重發紫赤 傷寒有如此 不必紀書方

傷寒或已發未發惡候

項軟聲沉 羊睛血脈 五心黑腫 長吁如湯 鼻竅焦黑

喘促狂燥 指脾紅血 唇焦乾縮 舌生血瘡 手足攣攣

咬人定睛 大小便絕 脈中乾響 外腎紫縮 渴水齒齧

傷寒變作死候

面黑目白如火赤乾漱塞噎 舌生瘡如白梅唇青黑縮

大熱煩燥多渴日睛閉 面如土色口吐白沫通身熱如火

全幼心鑑

面如鮮色髮豎口鼻上下如蘭 煩喘臥不着席外腎紫縮

項強反張胃前青黑色無喘 大氣出如湯渾身熱熱如湯

有欬同白瘰縮四肢冷身上汗如雨

忽瀉下黑血及如魚腸腥臭

大小便不利肚脹如鼓服諸藥不通

忽身上腫起如惡風毒氣延延如膠

手足心主重瘡大熱不退口禁涎流

喘促塞塞身如水時時長山氣

口開不收舌縮手足指甲青甲色

小兒傷寒可醫

真內清水是傷寒 必汗出是傷寒 鼻塞是傷寒



面赤是傷寒 吐白沫是傷寒 兩眼黃赤是傷寒

小便黃赤是傷寒

小兒傷寒不可醫

傷寒面黃者不治

傷寒大小腸痛不治

傷寒急作吐聲不治

傷寒吐聲不出不治

傷寒黃黑不治

傷寒瓜甲黑不治

右件其傷寒皆是邪氣傷於臟腑滯氣其血氣則寒熱血脈亂不能飲食其頭痛面赤者則是陽毒其面青不語多笑身寒是為陰毒凡傷寒三日而汗三日後且轉又云陰毒且迴陽陽毒且解散轉亦此說三日而汗三日後轉此大畧之言爾

全幼心鑑卷之二

全幼心鑑卷之二

全幼心鑑卷之三

人參羌活散 治嬰孩小兒寒熱溫病時疫瘡癩頭痛發熱

人參 去蘆

羌活 去蘆

柴胡 去蘆

川芎

獨活 去蘆

甘草 炙

枳殼 去蘆

枳殼 去蘆 炒

桔梗 去蘆 炒

前胡 去蘆

地骨皮

天麻 各二錢半

驚風加全蝎 去毒炒

殭蠶 去毒炒

白附子 炮各二錢

防風 去蘆 二錢半

痰喘嗽加

半夏 麩 二錢

五味子 一錢

桑根白皮 炙 二錢半

發汗加麻黃 去毒 炒

荆芥 穗 二錢半

右為極細末用生薑薄許同煎湯調化食遠服

羌活散 治嬰孩小兒散風邪止驚搐退熱解肌

羌活

甘草

天麻 生

茯苓

川芎 各二錢

荆芥 穗

白薑 蒸 炒

白朮

白附子 炮 各一錢

枳殼 二錢半

防風 一錢半

全蝎 去毒 炒 半錢

朱砂 半錢

天南星 一字 炮 熟

右為極細末用薄荷煎湯傷風鼻塞流涕急白煎湯咳嗽

氣促桑白皮煎湯調化食遠服

人參敗毒散 治嬰孩小兒傷寒時氣頭痛項強壯熱寒身



蘇蘇飲 治嬰孩小兒感冒發熱頭痛痰欬嗽喉痛並驚風

人參 去蘆

柴胡 去蘆

甘草 炙

枳殼 去穢炒

前胡 去蘆

羌活 去蘆

獨活 去蘆

右吹咀用生薑三片薄荷少許同煎不拘時候寒多則熱服

蘇蘇飲

治嬰孩小兒感冒發熱頭痛痰欬嗽喉痛並驚風

人參 去蘆

紫蘇葉

葛根

半夏 麩

前胡 去蘆

茯苓 去皮

枳殼 去穢炒

桔梗 去蘆炒

甘草 炙

陳皮 去白

右吹咀用生薑三片煎不拘時候服

全幼心鑑

惺惺散

治嬰孩小兒傷寒風熱癰疽疔瘡等時氣重痛壯熱目

瀝多睡咳喘喘鼻衄清涕

人參 去蘆

天竺粉

細辛 去蘆

白木

茯苓 去皮

甘草 炙

桔梗 去蘆

防風 去蘆

加枳殼 去穢炒

右為極細末用生薑薄荷同煎湯調化食後服

惺惺散

治嬰孩小兒傷寒鼻衄發熱驚風頭痛咳嗽時行瘧

痘凡寒熱不問傷風風熱先與此藥數服往往必愈

人參 去蘆

白木

茯苓 去皮

甘草 炙

細辛 去蘆

桔梗 去蘆炒

加川芎

右吹咀用生薑三片薄荷同煎食後服

惺惺散

治諸病

蒼朮 去皮炒

川芎

細辛 去蘆

羌活 去蘆

防風 去蘆

白芷

桔梗 去蘆炒

茯苓 去皮

瓜蒌根

甘草 炙

赤芍藥炒

麻黃 去蘆

荆芥 穗

當歸 去蘆

右吹咀用生薑三片薄荷同煎食後服

時雨散

治嬰孩小兒春冬傷寒發汗春冬及夏初行極效

蒼朮 米泔水浸去皮炒一兩

甘草 炙

全幼心鑑

麻黃 去蘆

猪牙皂 炙一握

右吹咀用水煎不拘時候服蓋被汗出但是時行寒發時氣

腦熱頭疼不止并硝水調塗頂上

解表散

治嬰孩小兒傷風感冷咳嗽痰喘嘔吐瀉痢驚悸有

熱在表者亦能發散

麻黃 去蘆

杏仁 去皮尖

赤茯苓 去皮各五錢

川芎

防風 去蘆

枳殼 去穢炒

甘草 半生半炙三錢

右吹咀用生薑三片葱白一莖薄荷三葉同煎食後服

解肌散

治嬰孩小兒傷寒來驚傷風而赤齒牙身壯熱

人參 去蘆一錢

石膏 煨二錢

麻黃 去蘆



甘草多一錢半 芍藥炒三錢 茯苓法皮半錢  
杏仁去油去尖 鈞藤 桔梗炒  
川芎各一錢半

右為極細末用生薑三片棗一箇土核同煎湯不拘時候服  
化服

解肌湯 治證同

人參去蘆三錢 川芎五錢 芍藥炒三錢  
前胡去蘆五錢 羌活去蘆五錢 甘草炙二錢  
加荆芥穗二錢

右為極細末用生薑薄荷同煎湯調化不拘時候服汗止仍  
服羌活散以退餘熱

解肌湯 治證同

羌活去蘆 柴胡去蘆 防風去蘆又節  
川芎 葛根 人參去蘆  
赤芍藥炒 石膏 黃芩炒  
枳殼去穰麩炒 桔梗去蘆炒 甘草炙  
天花粉 荆芥穗 地骨皮  
半夏麩 蒼朮米泔水浸去皮炒各半錢  
薄荷二錢

右為極細末用生薑葱白同煎湯調化食遠服

和解散 治嬰孩小兒四時感冒風邪壯熱煩燥身寒清涕

汗自汗四肢骨節痠痛瘧症已發未發

羌活去蘆 防風去蘆又節 川芎  
人參去蘆 甘草炙 升麻  
葛根

白汗加白朮  
右咬咀用生薑三片棗一箇土核同煎不拘時候服

脫申散 治嬰孩小兒傷熱頭目昏沉不思乳食夾驚寒食  
寒熱大小便秘或赤白煩燥作渴今汗多不來積傷滯脹  
腹脹黃瘦日晡發熱及驚風等症各符筋骨痠痛  
疳積等熱

柴胡去蘆 當歸去蘆 龍膽草去蘆  
知母各二錢 茯苓去皮二錢半 人參去蘆

川芎各二錢 甘草炙四錢 麻黃去節一錢

右為極細末用葱白連鬚寸煎湯調化不拘時候服  
清神散 治傷寒無汗咳嗽熱無時意身熱瘧症

人參去蘆 枳殼去蘆炒 細辛去葉  
甘草炙 白朮 茯苓去皮  
天花粉

右為極細末用薄荷煎湯和氣加棗同煎食遠服退熱加防  
風土蘆入頭身熱不退者且服黃龍湯加羌活  
香附炒 紫蘇葉一兩 陳皮去白

香附炒 青皮去穰炒 甘草炙 葛根炒五錢



右咳用生薑三片葱白一節同煎不拘時服

香葛湯 治嬰孩小兒時氣濕熱頭痛發熱

葛根 一兩 羌活 一兩 白芷 一兩 薄荷 一兩 甘草 一兩 水煎服

桔梗 一兩 杏仁 一兩 白芍 一兩 甘草 一兩 水煎服

右咳用生薑三片葱白一節同煎不拘時服

五苓散 治嬰孩小兒渴飲水不化小便不利

茯苓 一兩 豬苓 一兩 白朮 一兩 澤瀉 一兩 桂枝 一兩 水煎服

發汗後大汗出胃中乾欲得飲不得飲者與水

胃和則愈若脈浮小便不利微熱消渴及發汗脈浮者與五苓散

熱身發多飲水

蓮瀉 一兩 白朮 一兩 水煎服

木猪苓 一兩 白朮 一兩 水煎服

右為極細末用白湯調化食遠服飲水者新汲水調但多

服汁出立愈伏暑飲水多心腹脹滿吐瀉者服散小兒吐瀉

亦治腫甚效有身熱多渴口乾渴者宜內寒者服

紅蓮散 治嬰孩小兒夾驚傷寒咳嗽氣急身熱驚悸和疳疔

南星 一兩 去毒 一兩 薑汁 一兩 宿者 一兩 乾薑 一兩 水煎服

朱砂 一兩 麝香 一兩 龍腦 一兩 水煎服

天麻 一兩 水煎服

右為極細末用薄荷煎湯調化食遠服

紅龍散 治嬰孩小兒夾驚驚風頭暈目眩及驚風

治熱小兒不眠

滑石 一兩 五錢 丹砂 五錢 水煎服

龍腦 一兩 麝香 一兩 水煎服

右為極細末用燈芯煎湯調化三歲一木拘時服

紅桃散 治嬰孩小兒夾驚傷寒頭眩壯

心煩及治氣癱腦節不通

石膏 一兩 水煎服

龍腦 一兩 麝香 一兩 水煎服

右為極細末用燈芯煎湯調化不拘時服

紅綿散 治嬰孩小兒單傷寒及夾驚傷

天麻 一兩 白附子 一兩 水煎服

大黃 一兩 水煎服

右咳用入綿臙脂些子用水同煎不拘時服

紅綿散 治嬰孩小兒夾驚傷寒頭眩壯

天麻 一兩 白附子 一兩 水煎服

僵蠶 一兩 水煎服

甘草 一兩 水煎服

右剉散入綿少許用水同煎不拘時服

香蘇散 治嬰孩小兒四時傷寒頭痛發熱

香附子 一兩 水煎服

甘草 一兩 水煎服



右咬咀用生薑二斤連薑葱一握同煎不拘時候服或細碎

細末服

桂枝湯 治太陽風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗

自出膏肓惡寒者發熱欲得乾嘔者

桂枝湯 芍藥 兩半 甘草 炙 四兩

右咬咀用生薑二斤連薑葱不拘時候服更飲熱粥

一小盞以助藥力溫覆令一時許通身熱微似出汗者佳

自西至二方居 八四時行之無不應驗江淮間唯冬及春可

行之自春末及 夏已前桂枝證加黃芩一分謂之陽旦湯夏

至已後有桂枝 湯加麻黃各五錢加升麻一分謂之陽旦湯

虛寒者用白 芍不在加減也或曰桂枝最難用雖 藥不

解脈浮而發汗 桂枝湯須臾病人常自汗出小便數手足

足溫知如手足 稍作微冷少頃即溫身雖似煩而大增寒

始可行之若病 愈身熱汗小便數或手足冷不惡寒者忌不

可行桂枝湯也 右有桂枝證者不可再與

麻黃湯 治傷寒 惡寒發熱身痛惡風無汗喘滿又治太陽病

脈浮緊無汗發熱 惡寒八九日不解表證仍在此當發其汗服

藥已微除其人發 汗自暈劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重

故也

麻黃湯 麻黃 兩 桂枝 一兩 甘草 炙 五錢

右咬咀用水煎 不拘時候服取微汗不須喫粥加蔥豉是

至後須加知母 五錢石膏一兩黃芩一分蓋麻黃湯性熱夏

三月服之有發黃汗出血之失凡傷寒熱病藥性須涼不可太

溫唯冬及春病入素虛寒者乃用正方不在加減也

桂枝麻黃各半湯 治太陽病得之八九日如瘧壯熱惡寒

熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者欲

愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更吐下也面色

反有熱者欲未解也以其不能得小汗出身必痒

桂枝 八錢 芍藥 五錢 甘草 炙 五錢 杏仁 去皮尖十二箇

黃 去核二箇 麻黃 去節各 五錢

右剉散用水煎不拘時候服

小青龍湯 治傷寒溫疫表不解惡寒身重下乾嘔

熱咳嗽喘急及主肺脹胸滿鼻寒清涕咳逆上氣喘鳴迫塞

仲景曰治表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或小

便利或噎或噎小腹滿喘者

麻黃 去節微利去麻黃加羌活如彈子大炒赤色者

者去麻黃加杏仁一分

赤芍藥 半夏 去脂炮若渴者去

細辛 去葉 乾薑 炮 甘草 炙

桂枝 各七錢半 五味子 五錢

右咬咀用水煎不拘時候服

大青龍湯 治太陽中風脈浮發熱惡寒身疼痛不汗出而

煩燥者宜用若脈微弱汗出惡風不可服及治傷寒脈浮緩身

痛者宜用若脈微弱汗出惡風不可服及治傷寒脈浮緩身



不終作重少陰證

麻黃 去節三兩 桂枝

甘草炙各一兩

杏仁 去皮尖

棗 去核三箇

薑 生一兩五錢

石膏 如半雞子大

右咬咀用水煎不拘時候服汗出為度

麻黃杏仁湯 治傷寒飲水過度水停心下故喘又水入腎亦喘喘高者死譫語且視而喘者亦死發汗後不可行桂枝湯汗

出而喘無大熱者

麻黃 去節

杏仁 去皮尖

石膏 各一兩

甘草 炙五錢

右咬咀用水煎不拘時候服太陽病下之微喘表未解桂枝

湯加厚朴六錢杏仁去皮

五味子湯 治傷寒喘促眩而厥

人參 去蘆

五味子 五錢

麥門冬 去心

橘皮 去白

杏仁 去皮小各二錢半

右咬咀用生薑三片棗五箇去核同煎不拘時候服

防己湯 治感冒風濕之氣失於解表流注兩足疼痛至兩膝

浮腫不能屈伸傳成癰疽

防己 去皮

麻黃 去節存根

桂枝 各五錢

赤芍藥

蒼朮 米泔水

赤茯苓 去皮各一兩

甘草 炙七錢半

右咬咀用生薑三片葱一莖同煎食前服或入雞白煎服

防己湯 治傷寒喘促及年久喘急

防己 二兩

訶子 炮去核

麻黃

杏仁 去皮尖麩炒各一兩

右咬咀用水煎臨熟入臘茶少許再沸不拘時候服

小承氣湯 治太陽病吐下後發汗而微煩小便數大便堅宜

服陽明病若出汗多而微寒為外未解無潮熱不可與之若腹

滿不大便可小小與之

大黃 微炒一兩

厚朴 薑製炒

枳實 炙各一箇

右咬咀用水煎食前服陽明病潮熱大便微硬可與大承氣

湯不硬者不可與之若不六七日恐有燥屎欲知之法

少與小承氣湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之

若不轉失氣者必頭硬後漉不可攻之攻之必腹滿不能食

也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便硬而少也以下

承氣湯和之不轉失氣者忌不可攻也夫實則噦言虛則噦

噦者重語也直視譫言喘滿者死下利者亦死發汗多若重

發汗者亡陽譫言脈短者死脈和者生傷寒若吐下後不解

不大便五六日已上至十餘日日晡時發潮熱不惡寒獨語

如見鬼壯者劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直

視脈弦者生濡者死微者但發熱譫言者大承氣湯主之陽

明病多汗以津液外出胃中乾燥大便必硬硬則譫語小承

氣湯主之若一服利者止後服

大承氣湯 治陽明病不吐而煩者且服陽明病脈遲雖汗出



不惡寒脈重腹滿而喘有潮熱可攻其裏下濇濇汗出為大便已堅宜服之陽明病其人多汗津液外出胃中乾燥大便必堅堅者必譫語宜服陽明病發時汗不解腹脹宜服陽明少陰合病自利脈浮者順清而散者有但食宜服少陰病口燥舌乾宜服少陰病脈細沉數病在裏不可發汗且服少陰腹滿不大便者宜服之

大黃 炒五錢 厚朴 薑製炙 枳實 炮炙沙大一節

芒硝 五錢

右咬咀用本煎臨熟入芒硝食前服

調胃承氣湯 治傷寒發汗後惡寒虛也不惡寒但熱者實也當下之傷寒十二日過經譫語者當下之若自利者脈滑而微厥

李和少錄

反和者此為內實當下之大陽病經十餘日心下溫溫欲吐而胃中實大便澀腹微滿發熱微煩當下之大陽病三日發汗不解者宜當下之

大黃 炒一兩 芒硝 九錢 甘草 炙五錢

右咬咀用本煎食前服

小柴胡湯 治太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外解設

胃滿腹痛且服傷寒五六日中風往來寒熱胸脇若滿默默不欲食心煩喜嘔或胸膈煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心下悸小便不利或不渴身微熱或咳者宜服血弱氣虛腰膝痠痛邪氣因入與正氣相搏結於脇下邪正分爭往來寒熱休作有臍腹相連其痛必下邪尚痛下故使嘔也宜服傷寒五六

日身熱惡風項強脇下滿手足溫而渴宜服傷寒五六日頭汗出微惡寒心下滿不欲食大便硬脈細者為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出而微微欲絕純陰結不得復有外證也惡在裏也然半在表半在裏也脈雖沉緊不得汗非少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也宜服設不

了得盡而解陽明病發潮熱大便溏小便少胸脇滿宜服陽明病脈下硬滿不大便而嘔舌上白者宜服陽明中風脈弦浮而短氣促腹滿脇下及心下痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜

臥一身及目赤黃小便難有潮熱而嘔身前後腫痲過十日脈

續浮宜服傷寒溫疫身熱壯熱頭痛項強腰脊四肢煩渴脇下

金剛心錄

卒滿乾嘔逆不能飲食及病差後往來寒熱痰實嘔逆肌脈羸瘦倦怠少力活人書云身熱不渴表有熱小柴胡加桂湯以云

小柴胡湯治瘧症甚驗

柴胡 去蘆二兩 黃芩 炒 人參 去蘆

甘草 炙七錢 半夏 去肺泡七次一兩五錢

右咬咀用生薑五片棗十箇去核同煎不拘時候服

孫兆吹名貴龍湯治世此藥盛行患傷寒者問表裏虛實皆令服之甚快矣此藥傷寒數十證其間有一證不可服有五證最不可服之必愈不可服者有 證一者因渴飲而嘔二者身不溫熱當以此二證明矣可服者有 證一者身熱中心逆或嘔逆二者惡寒往來三者潮熱四者心煩下滿或渴或不渴五者傷寒已後更發熱此五證不可服



勿宜便可服之必差餘證候子細詳方證及脈候相宜方可  
 用不可一藥用也世人但知小柴胡湯治傷寒不問何病便  
 服之反有所害緣此藥稍寒也唯此五證按而行之庶無失  
 也不可不察也本方更有加減法雖不在此五證內用之亦  
 效今亦載于此若胸中煩而不嘔去半夏加入參栝梨根各  
 一兩腹中痛去黃芩加芍藥二六極有效常時腹痛亦療  
 下痢梗去棗加牡蠣一兩若心悸小便不利去黃芩加茯苓  
 一兩若不渴外有微熱去人參加桂枝二分溫覆微汗愈若  
 咳去人參棗加五味子七錢乾薑五錢時行無大小皆宜服  
 皆命冷時上應痰實口飯本方食後飲散其效亦白痢无  
 效痢中藥無如此驗蓋痢多因伏暑積滯暑氣傷寒之人

審是暑病不問是何候進數服即解

大柴胡湯 治陽明病外證身熱汗出而不惡寒但惡熱宜服  
 陽明病脈遲發熱惡寒小便秘此欲發痙必小腹痛宜服陽明  
 病動下腹滿大便秘而嘔口燥宜服陽明病中風其脈浮大短  
 氣心痛鼻乾喘不得汗一身盡黃小便難有潮熱而噤宜服  
 傷寒三日少陽受病口乾燥目眩宜服少陽病腦下至滿乾嘔  
 不食往來寒熱若未吐下其脈沉緊宜服少陰若已吐下發自  
 汗譫語者宜服少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩不可  
 吐下吐下則悸而驚宜服少陰病惡寒時時自煩不欲食宜  
 服少陰病利清水色青者心下必痛口乾燥者宜服傷寒六日  
 陽脈泄陰脈弦者服上急宜服傷寒六日下之腦滿煩驚

便不利譫語一身不可轉側且服傷寒發熱汗出不解心下痞  
 硬嘔吐不利傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱及陽明病汗出  
 譫語腹中滿痛并陽明少陰合病下利脈滑而數傷寒六七日  
 日中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱七八日脈浮數  
 病人煩熱汗出解後如瘧社日哺發潮熱脈滑者宜服

柴胡 去蘆二兩 枳殼 去穢 黃芩 炒  
 大黃 紙裹 半兩 芍藥 七錢 赤芍藥 炒各一兩

右以咀用生薑五片棗五圓去核同煎食前服

白虎湯 治傷寒脈滑而微厥裏有熱三陽合病腹滿身重  
 難以轉側口中不乾口乾譫語遺尿發汗則譫語下之則額上  
 生汗手足逆冷自汗出宜服之服後發熱後大汗出煩渴不解

脈洪大傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時  
 時惡寒大渴舌乾燥而煩欲飲水數升傷寒無大熱口乾燥渴  
 心煩背微惡寒渴飲水無表裏證者宜白虎湯加人參湯脈  
 浮發熱無汗不可服諸亡血不可服活人書曰脈微而滑裏有  
 熱白虎湯加人參廣濟云傷寒及溫熱病脈大洪增寒壯熱煩  
 燥欲飲水及夏月傷暑發熱惡寒身熱大渴不止燥煩汗  
 出脈細小手足微冷并時疾未經轉瀉胃熱發斑惡痘煎熱  
 天行後餘熱不解但是一切伏熱宜服董氏云小兒瘧瘧其證  
 未全或未明者與白虎湯如秋冬入春寒未用白虎湯之時但  
 加棗葉煎不必拘常法

知母 兩五錢 甘草 五錢 粳米 八錢



右咬咀用水煎不拘時候服加入參子錢八方加石膏四兩  
竹葉石膏湯 治傷寒解後虛羸少氣嘔逆欲吐及虛煩似傷  
寒身熱煩燥頭不痛身不疼脈不緊數無治中身煩渴吐逆脈  
數

水竹葉 半錢 甘草 炙五錢 石膏 四兩  
半夏 去麩 七兩 麥門冬 去心 二兩 人參 上薑 五錢

右咬咀用水入梗米煎不拘時候服加生薑一兩五錢

知母麻黃湯 治傷寒差後或十數日或半月二十日終不惺  
惺昏沉似失精神言語錯繆又無寒熱醫士或作鬼崇或作風  
疾多治不差朝夕潮熱赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘  
毒在心包絡間所致

知母 一兩五錢 麻黃 去節 甘草 五錢 黃芩 各五錢 桂枝 五錢 芍藥 各五錢  
右咬咀用水煎不拘時候服令微汗若心煩不得眠欲飲水  
當少少與之令胃中和即寤未汗再服一法小柴胡湯生黃  
清心圓尤佳

麻黃 去節 甘草 炙 五錢 黃芩 各五錢 桂枝 五錢 芍藥 各五錢

右咬咀用水煎不拘時候服令微汗若心煩不得眠欲飲水  
當少少與之令胃中和即寤未汗再服一法小柴胡湯生黃  
清心圓尤佳

麻黃 去節 甘草 炙 五錢 黃芩 各五錢 桂枝 五錢 芍藥 各五錢

麻黃 去節 甘草 炙 五錢 黃芩 各五錢 桂枝 五錢 芍藥 各五錢

麻黃 去節 甘草 炙 五錢 黃芩 各五錢 桂枝 五錢 芍藥 各五錢

右為極細末用沸湯調化食遠服或作飲子水煎服

枳實湯 治傷風傷寒胸滿氣促咳嗽不食多痰咳吐

枳實 炮 七錢 赤茯苓 五錢 半夏 七錢 甘草 炙 五錢

右咬咀用生薑三片煎不拘時候服

水解散 治嬰孩小兒天行時氣瘧疾身熱壯熱頭疼煩渴心  
或出尚熱

麻黃 去節 一兩 黃芩 炒 桂心 甘草 炙 白芍藥 炒 大黃 紙裹煨各一錢

右為極細末用熟水調化不拘時候服汗出為差或利亦效  
此調風骨之人三伏中亦宜用若去大黃春夏可用  
蕭氏青龍湯

防風 去塵 羌活 去塵 川芎 荆芥 穗 桔梗 炒 柴胡 炒 牛蒡子 炒 甘草 炙 黃芩 炒

表汗加麻黃 裏熱加大黃 紙裹煨各半錢

右咬咀或為極細末用生薑三片煎白一棗同煎不拘時候  
服汗透熱輕即散服解肌湯

黃龍湯 治嬰孩小兒傷寒身熱不泄

柴胡 去蘆 黃芩 炒 甘草 炙 赤芍藥 右為極細末用沸湯調化食遠服或作飲子水煎服

右為極細末用沸湯調化食遠服或作飲子水煎服

蓮奇散 治嬰孩小兒天行時氣瘧疾身熱壯熱頭疼煩渴心  
或出尚熱



磨豆已發不發

生藥葉

白附子炮

天竺黃

甘草 各二錢

麻黃 去節

殭蠶 去毒炒各五錢

羌活 去蘆

全蝎 去毒炒各一錢

右為極細末用薄荷煎湯調化或茶清不拘時候服

清解散

治嬰孩小兒感冒發熱頭疼鼻寒涕流及溫壯熱

人參 去蘆

防風 去蘆又節

天麻 煨

前胡 去蘆

茯苓 去皮

桔梗 炒

枳殼 炒

甘草 各二錢

細辛 去葉

柴胡 去蘆各一錢

川芎 三錢

石為極細末用薄荷煎湯調化食遠服

八止散

治嬰孩小兒傷寒壯熱及潮熱積熱痘疹入痘心燥

發渴大便不通小便赤澀口舌生瘡

大黃 煨一錢

梔子 去殼

木通 去節

滑石

甘草 去節

瞿麥

車前子 炒各二錢

地龍 苗一兩

右到散用水煎食前服痘痘中加紫草煎服

小歸命散

治嬰孩小兒傷溫變蒸傷寒潮熱驚悸牙疳流

清涕咳嗽渾身溫壯咽喉有涎及驚熱墜涎安神百病不生

人參 去蘆

白朮

茯苓 去皮各九錢

甘草 各二錢

辰砂 水飛研

龍腦 少

麝香 少

右為極細末用金銀薄荷煎湯調化食遠服

天歸命散 治嬰孩小兒溫

瘧傷寒傷風夾驚傷寒驚潮虛熱

面色紅赤鼻流清涕渾身溫

壯手足心熱氣微喘噤咬牙口氣

溫熱似渴不渴夜卧不安

時發吟目白微紅

石膏 煨五錢

白朮

甘草

麻黃 去節

川芎 各五錢

陳皮 去白二錢半

荊芥穗 七錢半

腦 少

薄荷 少

右為極細末用棗一箇土

核煎湯調化食遠服

溫膽湯 治傷寒病後虛

不得睡卧心膈虛怯驚悸

半夏 去蘆

枳實 各一兩

橘紅 去白一兩五錢

右吹咀用生薑三片棗一箇

去核入竹茹一小塊同煎食前

服

洗心散 治嬰孩小兒溫

熱頭昏極痛背脊拘急大熱上衝

口苦唇焦夜卧舌乾咽燥

痛涕唾稠粘痰壅氣逆乳食不進

心神燥熱眼赤睛疼傷寒

瘧四肢沉重語澀不出百骨節痛

大小便不利驚澀痘疹時

瀉夜狂語多渴及治天動驚風

大黃 細末煨

甘草 各一兩

當歸 去蘆

赤芍藥 炒

木通 各二兩

白朮 五錢

麻黃 去節二兩

茯苓 活人書用二兩

右為極細末用生薑薄荷

同煎湯調化食前服或煎服

蜜煎法 治小兒陽明病

汗出若發汗小便自利者此為津



液內滯呆出鞭不可攻之當須自欲大便自發而通之若  
上瓜根及猪膽汁皆可為導

右以突不拘多少銅器中微火煎之稍凝如細絲小續之勿  
分條若欲可固捻作銀如指許長一寸以上膏乾時急以令  
兩頭尖內敷道中以手急抱欲大便時乃去之

驚風證

驚風方論

驚者虛怯怔忡氣怯神散痰涎來去宜瀉必青漸生風而未至  
風也驚邪入心則面色紅臉赤揚揚發熱驚邪入肝則面色青  
俱青眼睛直視驚邪入腎則面色黑驚邪入脾則面色黃  
則面色淡白喘急氣急之驚邪入脾則面色不食不語多睡

淡黃據脈觀之虛則散而濡者在數而訣治法雖繁此痰安神  
定志亦須究其真臟受病之處而調理之然有所謂溫驚者所  
謂利驚者所謂涼驚者溫之實者利之熱者涼之是為活法  
臨中驚喘最沉者易治最沉不響者難治雖小兒有病問之  
則勿不能言望之則易驚身重之則或揚或動自六歲已下  
黃帝不載其說者以其難也又况驚風一科古無全書則尤為  
難固足以知之詳矣

詳驚風證

似是而非若同而異受證非一治法不同此疾之惑人也醫者以  
當自明辨而治之

陳氏曰驚風一證驚自驚急慢慢理也風自風五臟中風也當

分別治之世言熱極生風而不知風寒者濕之氣亦能生風也  
醫士每見小兒發搐不詳是否驚風便用蜈蚣腦麝生貴已謂  
輕粉寒涼毒劑多致天傷或成慢候蓋真氣者元陽也如用藥  
性溫則固發元陽出藥性冷則敗傷真氣且用溫涼之劑則無  
過而不及

錢氏曰假令傷風傷寒傷食麻痘變蒸等候亦能發搐所謂假  
搐者是也熱感生驚受證不同各有現證如傷寒傷風熱感必  
有傷寒傷風之證但牙關不緊

楊氏曰驚風暴烈惟蜈蚣能截能擒貴乎病藥相當詳認的是  
驚風之證方可用之或一字或半字而止或恐傷風等證假搐  
不可妄投中毒非淺或有誤焉急以桑根白皮煎為解速之

於醫士戒之

驚邪入五臟

入肝 面目俱青眼睛直視 入心 面紅腹赤揚揚夜啼

入脾 嘔吐不食虛汗多睡面帶黃色

入肺 面色淡白喘急氣急 入腎 面黑惡叫齒齙咬牙

其脈 虛則散而濡 實則數而駛

治法 溫驚比痰安神定志究竟五臟受證而調理之有所  
謂溫驚利驚涼驚驚者虛則溫之實則利之熱則涼之

驚風熱證

嬰孩小兒驚風急驚方搐不可驚擾但扶持不得擒捉蓋風氣  
方感心流入筋脈或手足拘攣待轉如無虛證不可妄用



種毒熱者有燥指之壯則喘風退熱化痰不可不用投截驚風  
之劑急驚風脈紅者風熱驚風者風熱感寒者驚風者驚積  
青赤相半驚積風熱俱有

驚風等證

驚者總名也嬰孩小兒心氣未足智志率伏恍惚無定神不守  
舍怯人怕物漸作怖畏怖里之盛已作恐根恐根之多乃抱怔  
忡怔忡之父母則自惕惕惴惴既有稟賦已為斯乃心氣不足而  
生之慚但分輕重爾又有心氣虛弱暴觸作驚更不由漸即便  
面青唇白視之定睛目無所視聽之聞聾耳無所聞精神頓去  
心智全失及至良久收斂日五臟六腑虛處所受驚風而作疾  
已述前議然幼多因吻口不意之乳耗其心氣作驚以漸凡  
小兒因水火所加者悸也自跌後所致者恐也人物之所觸者  
愕也惕惕不散驚驚謂於物堂者怔忡也是知積驚難禁因其  
不能自化如恐恐悸者蓋音能知之矣不為積驚也惟畏之誠  
常在其中尤以自責偶因觸心心神其肝主風其脾生痰其肺  
作熱其心發驚四證相隨而驚者先發假如雷聲震至響不為  
咎者何蓋嚴相想情無所加天惟有心記在靜靜或神廟中  
心存怖之時忽被無知小兒戲吐鬼來鬼來且鬼奔走無門驚  
氣入心若不速利其驚氣心則指甲里裏口青所受重害不  
可得療理自古及今調理應孩最為難事若善為藥取愈且驚  
風至難也慢驚又難也慢驚候尤難也今論調理小兒至難

者恐候前後有所不堪療理或古人未備其意或已著下集恐  
後人未明者今與詳悉本末開陳利害指於迷途幸甚可謂  
有益於世者則大務家治產之夫及仕宦子弟其親其親幼  
陰陽相和偏則偏而扶之不至天橫暇日研研可謂德業長土  
一 觀足知野老肺肺意不載機亦無錄飾功為更無其情  
直欲普濟便嬰孩初生自幼至長有患無政受疾不吝惟所披  
腹歌笑嬉嬉父母即無覺有覺額慶喜之致怡然順事不勞再  
三快哉歎哉至誠感獲休焉

驚風等證

小兒受病其最危者莫如驚風人皆知有驚風而不知其之從來  
蓋非一所宜審察蓋小兒之神氣未備氣血未壯其氣未藏  
腑未堅在襁抱者愛護如持脫薄之器不令跌墜可也若被振  
搖搖之首危猛在室之物觸犯小兒則驚風於心矣心者神  
之舍神好靜若有所觸必致心神亡散心神亡散則四肢搖掣  
而成搖驚不起於心而五臟亦有焉名隨虛實所屬感而受之  
也夫肝驚則眼上視筋脈急面青呵欠搖頭碌古字之據心  
驚則大啼叫而神散壯熱面赤睡臥不安舉動多懼抽驚入脾  
則不能食五心煩熱或在嘔吐心懼啼哭眠臥不安驚入肺則  
咳嗽喘急延壅喉中如曳鐵驚入腎則面黑咬牙齒乳齲多露  
睛此五臟之驚也又有小兒在胎之時動靜喘息莫不隨母母  
有所動胎必感之若將理失且飲食不節喜怒不常生肝風  
遇酒房勞或被驚恐必傷胎氣致兒生之後形骸怯弱頭暈  
解額上青筋壯熱痰盛口日之前一月之內手足抽掣身熱



直眼風也此形風也愈而後發者不絕是名胎前風也  
 小兒邪熱手足經痰涎壅胸膈因驚而感風邪則令心神不定  
 身熱壯熱牙關緊閉手足搐搦此急驚風也證屬陽又有小兒  
 身氣虛怯或因吐瀉或瀉後失調脾胃虛弱陽氣不足陰氣蒸  
 或手足抽掣發時身熱冷口鼻氣出亦冷昏睡露睛或出冷汗  
 此慢驚風也證屬陰又有小兒久患驚風證候乍靜乍發在再  
 不安或用取轉之藥稍過致令脾氣虛弱脾氣既衰風疾自生  
 故手足抽掣四肢逆冷睡多露睛醒多喜閉此慢脾風也又有  
 小兒身熱潮熱丘輪鼻尖手足稍冷或發搐者此瀉搐證也又  
 有小兒盛夏之月先伏暑而後傷風致身熱潮熱手足搐搦者  
 此暑風證也此二證切不可作急驚證醫以上諸驚其名雖同  
 其證各異其藥亦異可不謹哉

驗驚搐先證

目鮮目眩	目白目青	目斜目闔	目轉目掙	殼焦殼裂
熱頭殼輕	嘔口弄舌	捲舌露筋	噓氣噎氣	噓氣撮唇
噎乳噎食	忽然定睛	吐涎吐沫	拗頸仰身	搖頭擗面
戲頭曼明	手攣手顛	腦響不伸	忽掙忽亂	恍惚精神
失張失志	眼睡不寧	睡中喜笑	困囁齒齟	心煩燥熱
啼哭咬人	面臉赤色	或紅或青	伸舒用力	微微作殼

有前證候 是欲發驚  
 已上證候不久必發驚預防之驅風膏琥珀散更擇對  
 證藥治之

煩煩乳 十日便毒 吐痰吐食 瀉酸瀉腥 吐曠多目  
 滿指脫形 晝眠默默 夜起頻勤 瘡痂無度 延喘作殼  
 虛臍藏冷 次無汗骨蒸 諸數失血 諸渴亡津 諸病進退  
 必成慢驚

已上證候久則心旺陰瀰預防之安神膏琥珀散更擇對  
 證藥治之

驚氣噎噎

夫因驚氣亂氣亂則上下不通併於中焦氣壅則痰痰痰聚  
 則不飲故氣結噎噎而虛欬此驚之先兆也

驚搐握拳

夫驚搐握拳者有陰陽兩證陰者握指在內陽者握指在外陽  
 拳者順陰拳者逆

驚風搐握拳

男子握拳於外為順於內為逆女子握拳於內為順於外為逆  
 又指者驚候也

急驚握拳

急驚欲發先握拳 蓋為胸中有毒涎 陰錯陽差為逆候  
 男左女右握須痊 目白唇白應少睡 口噤舌卷更驚眼

大忌腹高頭手汗 神昏氣促豈能安

總發驚風有握拳 指分內外細須言 大指在內外

內陰陽外斯為順 女右左男令搖先 大忌悶涎衝入

人心之內不能安 更將形證重重看 用藥開關雙眼開



速與心驚治法 此命端白傷丸泉


推指於外



推指於內



又打



論心驚驚搗

凡身軀壯熱舌白唇紅大便臭或瀉或吐而發驚者不可認為慢驚用溫熱藥則生痰燥亦不可認為急驚用涼藥則增吐逆蓋小兒熱感本欲發為驚又傷乳食因吐發搗此食滿也

驚潮發搗

男發搗目左視無殺右視有殺女發搗目右視無殺左視有殺相勝故也更有發時證

早晨發搗

因朝熱寅卯辰時身軀壯熱上視下視口內生熱涎項頸急此肝旺當補腎治肝也且補腎地黃圓治肝瀉青圓主之

日中發搗

因朝熱午未時發搗心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊口內涎手足動搗此心旺也當補肝治心治心且導赤散涼解瀉補肝地黃圓主之

日晚發搗

因朝熱申酉戌時不甚搐而喘目微斜視身軀似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺當補脾治心肝補脾宜羌活散治肝瀉青圓治心導赤散主之

夜間發搗

因朝熱亥子丑時不甚搐而吐不穩身軀溫壯目睛緊視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不省細津液當補脾治心補脾宜羌活散治心導赤散主之

傷風後發搗

傷寒後得之口中氣出熱呵欠頻閉手足動搗宜散且大青膏主之小兒生本怯者多此病也

傷食後發搗

傷食後發得之身軀溫多睡多睡或吐不思飲食而發搗當先定搗搗退宜玉餅子利之後服安神圓

白日內發搗

真者不過三兩次必死假者發頻不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搗也欲知假者口中氣出熱也治之可發散



驚搐源因

結氣而成

小兒多驚怖而風冷之氣育於喉嚨間傳於心肺傳入肝膽其氣上不能升下不能降使津液凝滯不得流行故痰涎壅閉而作搐也

如腹中氣鬱胸門腫陷則難愈治法先至痰入固元氣元氣盛則津液行血氣流轉自然不搐

風搐源因

土厚則物壯脾土虛弱肝木盛冷

小兒候服京藥鎮心宜導或用煎藥湯水繳擦唇口因此傷動脾胃或泄瀉或腹脹或腹中氣響

小兒面少血色當無喜笑不喜上而視下

小兒頭顛高急頭縫青筋時便青糞

小兒肌癢壯熱如青筋或如凍汁

小兒時時吐乳眼裏如便青白沫有時乾乾

已上證候然極吐者必成陰瀉俗謂之慢驚風搐

醫患之家不究病之源因不分陰陽表裏入不察色脈虛實妄謂熱即生風便餌宜導涼藥因此敗傷真氣搐而不救者多矣

蓋真氣者元陽也其藥性溫則固養元陽冷則敗傷真氣故宜溫中下氣藥治之

蓋新者內蘊食積熱發痰涎其則搐掣變而癩癩治法味導熱氣利驚定心亦有寒熱之別其熱盛得之但服輕劑或不治

亦自愈

陳氏曰小兒驚風一證方書中未嘗分析詳細蓋驚風自驚風自風當分別而治之世俗通言熱極生風殊不知寒暑燥濕之極亦能生風凡見作搐不察形氣虛實使用牛黃朱砂腦麝之劑以致不救者多矣深可憫念不致天枉之意

小兒熱狂筋脈亦發搐者非真搐也如或過劑則變假為真小兒身及張非驚風也投寒涼藥命非驚風所傳

證治源因

凡身熱壯熱且輪鼻尖及手足稍冷然發搐者此非驚是真搐也其驚搐則諸處皆熱有驚定後熱不退者二三日必出瘡疔再出亦同

麻痘發搐

感痘發搐者乃熱乘於心火炎上故目睛赤黃乃痘瘡欲出之壯必中指冷其後有紅縷及四臟之證但無痰潮呵欠

嘔噴睡中急驚耳大冷眼赤

小兒用麻痘發搐不可下驚藥有熱不可用退熱藥有汗不可止汗或吐不可理吐或下亦不可下

時行瘡痘數日前壯似傷風面臉鮮乍熱乍涼頭有汗

虛驚虛悸手多牽唇紅熱時加喘鼻清耳冷口食眠

日滿氣逆頻噴噴定知瘡毒有相傳

瘡毒多驚悸時行候一同增寒偏寒水發熱又驚風

日滿氣逆頻噴 胸浮兩臉紅 嗽涎殷喉噴 呵欠睡驚離



痘疔相傳染 時氣若感風 唇乾唇白綠 目赤目微紅

疔出眉先破 瘡來鼻不通 皮毛寒發立 熱痘隱其中

時氣行瘡痘 形青面臉鮮 嗽前頭有汗 恍惚手多羣

噴噴無微嗽 嗑呵口愛眠 睡中驚起哭 瘡痘欲相傳

驚變痘瘡

孩兒驚搐定 身熱壯如湯 斑疹藏肌肉 身涼出痘瘡

瘡痘發搐

身熱心煩燥 驚來耳似冰 指稍俱帶冷 痘出甚分明

驚前生驚

嗽前無休歇 風生五臟中 面青因腹痛 不爾變驚風

呵欠生驚

呵欠若頻頻 睛斜撮口唇 雖發驚未發 啼哭動心神

搖頭生驚

搖頭頻擦回 拗脛亦因風 目眇青鮮綻 牽身勢若弓

孩子發驚

孩子發驚時 唇紅汗濕肌 瞪睛雙直視 癡睡四肢垂

肢脹頻頻喘 精神漸漸衰 吐涎非易治 爪甲黑難醫

發搐面白

發搐面白唇中黑 身上皮膚青 汗出如油粘 躄滑

頭涎滿口喉中寒

驚風指黑

驚風指黑瓜如煙 手口多垂軟似綿 咬妳多啼無淚下

暫時停息又羣纏

啼哭無淚

啼哭無淚或無聲 下氣時時又發驚 齒肉粘痰魚口動

睡人昏暗驚連睛

痘毒發驚

痘後驚來逆 瘡前搐亦危 吐痰真可畏 哽氣不相宜

再發驚風

再或發驚潮搐 涎流臉目斜 烏青連口鼻 啼哭類如鴉

驚風不語

驚風得病不能言 口被風邪五臟綿 涎滯肺心閉氣道

至今敲語不相連

虛陽生風

虛脫變虛風 虛陽必上攻 下焦陰氣盛 中脘食難通

半陰半陽

身熱脈浮精神恍惚或吐瀉不思乳食發搐即是半陰半陽合

病身涼脈沉精神倦怠不吐不瀉又能乳食發搐者亦是半陰

半陽合病正如傷寒半是表半是裏之義也

退熱疎風

王氏曰驚搐多因感冒風熱及諸熱失表以致熱極生風當先

解表退熱

人參羌活散

加麻黃 荆芥穗

惺惺散

加荆芥 防風



小兒胡湯 加枳殼煨熟 防風 麻黃 表汗

大黃 裏熱

青龍湯 解肌湯 加麻黃 生葱 金銀薄荷同煎

三解散

驚風者則身熱壯熱則驚叫不時 肝風多因吐瀉而得必有風痰急驚風者只是中外邪也慢驚風者是虛積生胎驚風熱之所為也

小兒開聲即掣跳者非驚也乃肺旺不足而神有未安

小兒驚風發搐手足不宜執捉恐風攔進入經絡廢害肢節

驚風候

小兒非時釣上眼睛 肝風驚

小兒身中五疳動驚風在筋

小兒白目非時 驚風在肺

小兒身中非時手足動驚風在脾 肝一臟

小兒面色赤非時 驚風在腎

小兒畏人怕布驚在脾

小兒非時手足握人驚在三焦

小兒非時咬人牙驚風入骨

小兒睡時喉中響驚風在肺 奔胃

小兒身中吐舌驚在心

小兒非時喜身上汗山驚在二

小兒非時向上坐黑心驚

小兒五心熱心經受熱

小兒面色青白非時發 驚風在脾

唇青眼紅兼多烙黃中帶有一人生

小兒驚風熱 夜啼汗多 驚言善嘔乳 兩眼慢相

咬乳流涎出 脚冷病 驚 若逢頭仰視 早治其驚

目白沉沉碧 瞳人散 驚 乳時頻齧齒 髮際印

見物多憂怕 驚啼少 驚 出時常不穩 此候要自驚

照臉如紫色 鴉聲舌 驚 喉中鳴似鋸 連目黑侵

眉額時珠汗 牙關舌 驚 急驚如有證 休要費精神

兩臉無時赤 驚邪各 驚 渾身常壯熱 氣急口唇紅

喉咽痰頻響 腸間結 驚 更無微燥渴 早晚發驚風

小兒驚搐積生涎 目 腎虛遍身斑 頰赤口乾多發熱

涎高風盛發狂言

驚驚之候本因涎 積 肝心兩所傳 眼赤唇青并手搐

下涎風去是精專

面青而欠累遭驚 痰 驚啼睡不寧 驚眼向紅頰壯熱

忽然至後且生驚人

面中卒中渾身熱 唇 牙關氣如絕 目 驚搐搦喉有痰

此是急驚容易決

偏證雖分急慢驚 亦 因氣鬱致昏沉 醫士欲治宜真氣

氣順之時搐自停

身慢驚風足兩股 急 驚風熱慢驚疾 脈來息數最驚



臉赤心煩口舌乾 且睛上視生眵淚 尿赤便堅睡不安

時時手足頻抽搐 號驚風此的端 但看睛上微動牙

七日從前便發驚 喉乾髮緊滿時青 印堂之上右筋青

兼有涎生拍物驚 掌內一似桃花赤 印堂之上右筋青

醫士子細分別看 莫作一般風熱名 面紅赤作毛髮怒然

未發之時先愛睡 睡中吐舌更搔頭 面紅赤作毛髮怒然

手足是渾身亦似鉤 吐乳作腥生氣息 鼻頭手顫汗珠

流 速宜表汗通腸藥 先取常常瀉不休 先看眼中微有淚

多喘急痛更無偏 定 風宜氣不宜 驚天心中有聚延

百士須識病根原 面 紫色非為差 驚天心中有聚延

必有紅筋為痼疾 青 虎口患須傳 驚天心中有聚延

元氣孩兒面色青 次 背脊上冷如冰 陽男左搐無妨事

若搐須知是可驚 女 孩右邊猶可理 若還搐左恐無生

子心大忌如冰汗 如 搐在肚膨為不寧 驚風之候有多般

驚風之候有多般 難 山根源見易難 驚風咬牙驚入骨

在時眼上病歸肝 夜 加至曉數方息 向日兼看候一般

前後心煩四肢熱 面 紅如火向心觀 夜多盜汗日多困

氣喘不言邪在肝 急慢驚風總說

急慢驚風小兒發 肺 小兒風有陰陽 一證因身熱面赤而發

種上似牙關緊硬者 證 也因吐瀉或口此而不瀉日漸危重

急曰吐脾虛冷而發 不 止其病微微目上視手足微動者陰

證也陽證用涼藥陰證用溫藥 不可一藥治之

證欲發時先身熱或吐或瀉 此非驚風也

詳審 急慢驚互變

閻氏云治急慢驚風古人多 藥有性溫性涼不可不用

審別之 錢氏云急驚合涼瀉慢驚合 瀉而不愈變為慢驚有慢驚

者多矣所以古人撰一方一 治急慢驚觀前互變之證其意

有理惜乎當時有失詳注如 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因

急驚變為慢驚之因 急驚變為慢驚之因







大便者加大黃如紅燒痰涎壅盛者利驚圓或生黃奪命散

加砂礬一字用蜜水調服利後神志未平至聖保命丹安

神志未定宜用沙糖煎湯研化食遠服

假令神志未定宜定志化痰利驚丸驚熱出於心肺須從小便

利之用清寧散因薑黃同煎微煎不退濕膽湯用竹茹生薑

黃同煎服痰嗽者抱龍膏皆驅風化痰之藥

假令肝有風熱身必大張性下而小滿心不受熱也當補腎治

肝脈補腎地黃圓治肝風黃圓治心風此則調理脾胃進食藥不

可用寒涼之劑經曰熱則必寒則溫之

假令驚風已退神志未定宜寧心定志安神化痰利驚安靜之

後二三日復發急須調治宜寧心定志安神化痰利驚安靜之

去毒藥便以爲安永幾後得是道術之說

楊氏曰驚風抽搐驚厥六通皆由痰塞中脘留滯口舌所致痰

之壅塞者宜用黃連之治風痰常用生薑開胃全蝎僵蠶等亦當

用蘇合香圓同膏丸白圓子用薄荷煎湯調入生薑汁灌服蓋

便氣下則痰下則驚散自通若搐鼻不嚏者不治

救生散

諸才白芍炮 天南星 去藤生 半夏 去藤生

川烏 炮 草烏 炮 天麻 去藤生

羌活 去藤生 荆芥 穗 防風 去藤生

僵蠶 去藤生 細辛 去藤生 全蝎 去藤生

薄荷少

右爲極細末入麝香一字雄黃同研拌勻搐鼻用竹管吹

吹入鼻中開關用生薑汁調擦牙

聖散子

赤足蜈蚣一條中分作二片 全蝎 頭尾全者十四

二味各記左右爲極細末各分作左右各貼左眼左手搐者

用左藥搐左鼻右眼右手搐者用右藥搐雙搐者俱用

驚風後失音

楊氏曰咽喉爲氣之道路風傷其氣故掩閉聲音道路之門亦

有血滯於心心竅不通不能言也可服

肥兒圓 治嬰孩小兒風後瘖不能言

石爲極細末用猪膽汁糊圓如黍米大用木通上節煎湯食

遠服黃連能去心竅惡血

木通湯 治嬰孩小兒諸風失音

木通 去節 石鼻蒲 防風 去藤生

桑螵蛸 全蝎 去毒炒 僵蠶 去藤生

甘草 炙 一錢半 天南星 炮 五錢

右劑散用生薑二片紫蘇三葉同煎食前服大便不通加枳

殼散 杏仁 去皮 治嬰孩小兒驚風並退只是般症不能言



天南星 去皮膽一箇炮

右為細末每服半字或一字二三次  
前調服藥入喉中使能言語

二聖散 治嬰孩小兒風痰壅閉證  
不出氣促喘急  
詳似痛

訶子 大者半粒 小者半粒 大腹皮 各五錢

右咬咀用水煎不拘時候服

治驚風後瞳人不正

阿膠 炒 人參 去蘆 各一錢

右咬咀用水煎食前服

假令夏間伏暑毒得驚風者有白目  
如慢驚相似不搖眼閉

全幼心經

昏睡不醒身熱頭痛便不可投藥  
宜先於解暑然後定驚  
服五苓散加羌活全蝎寧心加散  
元散異功固暑去風

驚風定抱龍圓方最也

驚風肝絕

身熱頭旋不舉頭 目黃眼澁  
時連食和乳

四肢逆冷痛咽喉 休道傷寒因驚  
鬼神降禍也休求

何如命盡黃泉下 脈亂洪浮  
此鈞

驚邪死證

有似驚邪不羈抽 搐搦時時動  
頭 眼暗上視睛邪轉

唇青口黑吐涎流 冷熱相潮時  
醒 啼無聲汗如油

此是百驚鬼神患 求神服藥  
不效

驚風死證

忽作鴉散 胃瞳散 噎氣不通 長  
舌 舌絕 額汗作珠  
口開唇縮 瞳睛不轉 兩臉如朱  
鼻乾黑 腹中虛鳴  
疾如膠黑 手足丁直

急慢驚風雜病不治證

眼陷無光 白睛灌人 瓜甲青黑  
四肢垂攣 腹肚胸高  
面赤如緋 面青背冷 頭目仰後  
足冷目青 啼哭無淚

手掣胸膈 唇舌鼻黑 魚口氣羸  
顛腫頰陷 滯痰無淚  
冷肝不止 汗出如珠 如油眼青  
瀉裏胸痰 入心肺喉

舌出虛口 齧乳咬人 五硬五軟  
五冷五乾 吐出不定  
泄瀉不止 面精神好 煩渴不止  
止而又渴 吹鼻不噴

病重口乾 不睡時氣 唇上青黑  
點癩深赤 如塗臘脂  
鼻數開張 喘急不定 俱是死證  
病逆不治

瓜甲黑是肝絕 瀉黑血是心絕  
吐止又吐是胃絕 久瀉  
任又瀉是脾絕 兩目不開不食  
急作鴉散是肺絕 口吐白  
沫是腎絕

驚風變作死候

驚風瓜甲黑主肝肝絕亦為血絕  
上無一存

瀉黑血則心絕心乃五臟之主  
主絕口得一日而死

目多盜汗汗主氣氣絕故令汗  
出不止數日而死

忽作鴉散為肺絕其數只有出而  
不迴三日必死



厥人足背絕主齒牙咬妳從裏噴出即遂亡也

眼半開半合其瞳無光無力腎絕四日死

口鼻乾黑脾絕無津液兩日而死寅卯時

病極眼下青筋出及青色起死

鼻頭粟米粒裏出

下藥不得口中有涎粘塞

頭軀向後及腦開或腦腫起

項筋舒展無力手足垂而不知收

汗出如油不流及指甲青黑

口大生瘡頭黑者是風熱毒氣入臟

喉中作嘔聲長短及九心凹

目內赤赤脈上侵瞳人

患此者氣衝心口如魚咬

病似瘧疾發無度發米禁齒作聲名鎖勝疔死

病極瀉痢如鷓鴣血者是脾敗

諸風肚緊手脚硬目直大

諸病口下唇痛漏水者死

病極視脚心不知痛者死

齒齒搖動變拳禁腹高心陷喘逆氣

面青多困目不開手足如冰

目黑入散量唇舌拘黑

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫

驚風不可醫



則無散逆則有散 肝風心火二經受毒故發搐也血亂氣痰  
延難盛百脈凝滯 關氣不通風氣凝成而無所泄暴烈而成急  
驚也

急驚風候

醫云陽相也手足 搐搦延朝下 醫家下之其所用藥往往利  
以輕粉或水銀也 言皆有毒性既已甦醒之後精神由尚昏沉  
未快乳食者或有 餘熱其候欲得安痊和平只可用半德藥調  
胃氣不可直使與 服燥熱藥若與服之其候復作何可怪耶  
因聞大驚或大驚 而發搐發過則如故此無陰也當下利驚間  
主之小兒急驚者 小因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大  
小便黃赤劇則搐 也蓋其則心風屬肝此陽盛陰虛也故  
利驚圍主之以除 其痰熱不可與巴豆及口藥大下之恐搐  
既不清也熱痰客 於心胃因聞散非當則動而驚搐矣若熱  
雖不因聞散及驚 亦自發驚

急驚風證候上驚 反張搐搦口流痰涎壯熱併有之其或有視  
左視右者有僵有 仆也屬陽拳握指有黃有外醫分男女  
左陰陽順逆之理 有左右引搐連及脚至身麻顫動初則搐搦  
俱作久而搐在口 指有黃有緩但口肩動又痰涎聚凝者候之  
輕也搐則盛也搦 又重也反張牙關緊急喉中有涎即是驚風  
候如牙關不緊口 無痰涎口反張搐搦上驚者未可便作驚風  
候宜來驚夾食傷 寒瘧痘或二焦壅熱五臟六腑流入經絡  
在筋脈亦作搐搦 錢氏搐有真假不立病也亦宜急驚風

分數者是約熱之輕重而與利之

急驚若見證候 氣凝延朝其證在後發矣只公候人而急  
促唇口眉跟眼引 連併俗語云急驚風發命如神  
是說治之有法 輕重調治

急驚先當定搐 搐由風也風由熱也搐由驚也作方下  
執若不退驚亦 不敢不移其時搐搦大作所謂過街候乃是  
家不調緣見搐 定便言安樂僕謂急驚風難治有二只有初驚  
時其風猶微作 困酌輕重去風定搐搐大驚之時其驚或常  
人執是妄便下 之既下了諸證皆下者一難治也其正搐  
病人一向執扶 不令棄指且風氣不得入經筋力不  
及則病成癱根 在血脉或汗經絡二難治也又其兒虛候有順

有逆順即易 理逆即難治也  
越去下由而作 他證者三難治也  
急驚風候用藥 非謂難也專治急驚風者其法及不效不傳  
次第下藥無不 愈之理多是病家倉皇不識醫理信于山野庸  
鄙之言病候延 久不無傳續傳即證重矣其法經二三  
醫藥不效兒受 困苦無能安藥去之其家必方與證一日見  
證候危惡急 臨時以何方治之其法極難口勢危急  
藥下關端的一 向攻緊信手其法極難其法極難其法極難  
藥不及則無妨 事可以療理其也太過即時等生  
療嬰孩豈可以 藥有候投之太過或不及由尚不可亦  
乃為枉究兒童 雖分長幼有患臟腑皆令怯弱易冷易熱



易實若攻之相重其不任彼強執言疾不廖反為七害曷不謹  
歟公者無驚風及慢脾風藥即是老夫特准雁備緩急至  
要則效之者不待更較可少之理

驚風痰熱已論在前且驚與風其痰與熱各自有本證候受病  
急風為疾四者併聚有驚有風有痰有熱或因驚而有風生痰  
作熱或有熱而作驚成風生痰或積痰而發熱成風生驚變風  
或又有風候痰涎常有因驚而發熱調理後復發者形證  
一不可有善明脈醫士於其作者亦當知之也驚風風熱化  
痰又盛二者醫風散熱痰涎鎮驚四證相須藥宜併理古人處  
方亦合此意然學醫者不可不究其源遠若見候將作尋常甲  
方輕忽病無少安證傳七候不逆且惡禍不旋踵

嬰孩急驚風候便須先審察四證四證之中而作八候八候者  
一搐二搦三掣四顛五反六引七竄八視一搐者臂肘搐縮二  
搦者十指開合搦之不已即成握拳男者大姆指其指握在外  
為順在裏為逆女反看之三掣者肩頭搐掣或連身跳起四顛  
者或手或脚或頭或身四身顛動五反者身首反張六引者以  
手有如挽弓狀男左手直右曲為順右直左曲為逆女反看之  
七竄者眼上竄高男上竄為順下竄為逆女反看之八視者  
男斜目視左為順視右為逆女反看之既有四證八候次隨  
生若只去得驚風且痰熱不散未可言安痰與熱聚將來必致  
痲疾所治之法其痰與熱須察之可下即下痰熱既下驚風未  
盡消去則病依前又有發作所言四證相須不可留一若理得

驚風已定隨便下了痰熱且驚風不復有作此理至為妙也  
嬰孩有患在痰熱未有驚風者只可退熱化痰不宜妄投驚風  
藥何也驚風之藥其味多寒涼經絡本自無事稍有攻擊透其  
痰熱入於經絡却成風痰之疾搐搦致之

嬰孩五臟經絡虛即生風既虛所受且驚亦然而有作驚風有  
作八候次第而生所謂兒無病不可與服攻擊所治之藥  
嬰孩驚風發作有心人有壯弱有淺深但輕重大者加劑重  
者多與服數乃合其理

嬰孩間響即掣跳者乃肝肺不足魂魄不穩故神有不安即聞  
響掣跳者非謂驚也犀角地黃圓主之又兒心氣虛怯神不安  
定連併掣跳者宜四君子湯加辰砂脾胃氣壯神魂俱清自然  
不恐

嬰孩欲發驚風候先神不定頭左復右觀上及下或已定其睛  
凝其神恍惚忽怕物懼人不若常日嬉戲者急當察之如有  
熱先退熱有驚散驚熱退不生痰驚散不作風良久自然安定  
神情和悅氣脈舒暢若待風變而驚驚感而退熱事由至緩  
不若四證俱全由可治療

嬰孩急驚風發搐手足不可執提及以手用力灸之即傷經絡  
經絡既傷亦無所益則癢肢害甚  
急驚風候有大有小有輕有重有順有逆有偏有正詳審又暴  
次第進藥且病家無不倉惶驚恐醫士須是正定無自昏惑  
急驚即日用醫其驚氣和平方可調理若以急驚之謂調理事



致為慢驚之消息

醫急驚初用在我則我既證候遵法度來傳變審候以治之切不可信病家及左右人說其所欲調順人情有等得去主治在我豈可妄信致之差謬罪累誰耶

急驚初無痰而後痰盛初有搐而後不搐者此證所傳候之至盛人少知之蓋由初發縱然病家不識經三五家用藥或痛吐所見不同有大過不及之害如此則不謹微

醫急驚須量輕重下之得其中意良且驚風類之痰熱已化不作後患所下之藥稍多巴霜膩粉為重即傳慢候無痰急驚欲下之理須在急驚上竄斜視及張所作之時可下若傳過或已搐定少緩之間未可直便緊下有乎得失

急驚用藥先與服截風定搐次與下熱藥去則無風風散則下搐是知以藥之功在我意設不至恣妄為各到此顯功方知難易

急驚有上竄者有搐有引有反有僵有仆有叫者有淚者有痰涎潮盛有溫壯發作各隨四證輕重而受之急驚截風定搐為要風搐既定諸證漸息定搐消用通關非指其之謂通截風乃為調絡

定上竄者左視乃於男女之順候忽反是則逆也大抵逆則難治順易理不以逆證候為不可治古人言難治謂陰陽相逆

候畢主須用審究其證詳審其候必為盡力致之取效而後為之奈何

急慢驚風候者言之失意為慢驚乃陽弱慢驚乃陰虛正心為陽作陰治陰友陽豈一藥以合四證又云治陰虛一證陽虛之說能曉此理可謂通變

急驚候至為要緊急在於片時之間若或差殊互有得失一時所見見其端時用藥無疑在疑情未須投藥候候無疑其意靜善疑在未發藥之前良妙矣

急驚頭額心背元被灸了口大定發痲不可常藥候候謂風痲可灸驚熱不可灸蓋風熱痲痰涎凝成員腦腦昏亂迷悶不能醒知心如所失既灸着儿痰化心開即漸安愈驚之與熱心神常存聞知被灸急痛不肌驚轉感其疾差重所以用艾在先藥必未有益

驚風疾愈未嘗見因灸而活每見老嫗婦無行只及姓兒生二五日之間便以艾燒之不惟失元因痛增怪經絡未全如何愈病智者消詳不可不究

急驚風吼吐二兩敵者難治心受驚痛絕于內乃傷其根本之謂

急驚風木投藥四證俱全已服藥四肢垂痺者難治

急驚噴藥者難治又藥中平者亦難治

急驚搐之後四脈俱伏者難治  
急驚發作之後脚作擺者難治  
急驚抽後目睛翻轉者難治  
驚風搐弱已住神情慢慢手尋娘或或尋自身軀者亦不可治



驚風諸證候盡皆已住但神情或慢氣促者不治

驚風證候已住目紅物不捨情性緩緩於中非謂十全必有再發之理如或再發不可治

烏驚風鼻中出血者易治口中出血者難治鼻中出血者其難

已散易治口中出血者難治

驚風尿尿已遺者難治大小便閉者易治

慢驚慢脾風證

緊口慢驚者陰證也因吐瀉病久脾胃虛損似搐而不似搐

亦名痰涎脈有力用宣風散導之後用益黃散平之天麻防風

圓亦可

小兒慢驚慢脾得大病之後或轉慢取急驚峻下以致脾胃虛

損風邪乘之似搐而不甚恰似睡而精神昏漫四肢與口中氣

皆冷膳則露睛或胃痛而啼哭如鴉般此證危急蓋脾胃虛損

故也受證不等故難治也急驚用涼藥或取下太過轉成吐痢

不止而得或氣虛暴吐瀉而成有臟腑虛洞泄成者風邪入於

腸胃大便不禁而得有久痢虛脫成者有傷寒傳變日久而成

者有久嗽成癆者有下積峻取而成者有發癆不已而得者有

蟲積沖心者有卵腫疝氣腹痛者有晝夜盜汗脾困多睡煩燥

引飲四肢浮腫大小便秘結丹瘤腫毒龍帶纏腰走馬急疳皆

傳慢候吐瀉精利成虛則變急甚速

治病不同受證非一審問病源準較陰陽虧盛淺深何如便不

可用溫藥燥烈大熱之劑可用生胃生津建脾驅風之藥治其

痰疾 痰疾

陰氣易感陽氣易微慢驚本無熱虛熱者是也蓋脾胃虛損發

熱痰盛六脈浮洪虛熱虛痰上攻因候引氣龜大痰響聲如拽

鋸是謂陰盛強陽也亦無汗下之理一時不識謂之驚風陽

氣已復覆燈將滅用藥下痰痰隨氣下氣隨痰降驚風兩用

阮氏白圓子四聖散驚風化痰之藥書州白圓子合金夜丹二

藥等分搗碎羅極細末煮麵糊為圓如黍米大二三十圓用生

薑煎湯或遠服日進二服瀉痢不止微搐者烏蛇四君子湯生

薑煎湯或遠服日進二服瀉痢不止微搐者烏蛇四君子湯生

虛熱不止至蠟觀音散實脾散大醒脾散皆可服寒極無陽氣

者理中湯加附子回陽服四君子湯加乾薑丁香木香生薑煎

同煎食前服調中湯治之無他證調理脾胃藥治之慢驚風之

候或吐或瀉或喘或微喘眼開神緩睡則露睛驚跳搐搦下後乍

靜或身熱或身冷或四肢熱或口鼻冷氣面色淡白淡青唇唇

間或青黯其脈沉遲散緩蓋由急驚過用寒涼或轉大驟傳變

成之又有吐痢不止而成者有氣虛暴吐瀉而成者有夏月脾

胃伏熱大吐瀉當解暑熱不可專曰因陽有臟虛洞泄成者有

久痢氣脫而成者有下積取瀉成者有吐血瀉血而成者有傷

寒傳變陰證成者有得之久嗽作癆者有得之發癆不已者有

得之蟲積衝心者有得之卵腫疝氣腹痛其或汗出太過脾固

煩渴四肢浮腫大小便閉走馬急疳亦傳慢候惟吐瀉積利成

虛致之則證變甚速凡纒吐瀉便是慢驚須用溫中快裏或搐

來緊急乃慢驚初傳尚有陽證不可誤作急驚用藥世口搐慢



醫家  
當細  
辨之

為慢驚非也。若此往往指慢脾為慢驚矣。凡慢驚者，子以瀉  
得之為重。女子以吐得之為重。古人云：病家怕驚，不怕瀉。醫家  
怕瀉，不怕驚。如因洩瀉久患不止，且先治瀉，若更治風，則驚風  
愈甚。如因他證例，當循原施治也。其慢驚候者，從急驚傳來，只  
可散風調胃，均平陰陽，不可全用陽藥，使陽歸陽，復作急驚之  
候。用藥施治無過不及可也。急驚以關格不通，裏施腦解開通  
定其搐搦，尚可慢驚陰重，陽虛諸經已虛，不宜通關，又涼其臟  
易作慢脾。風慢驚危急，如眼睛昏定，而不眨，雖眨不左右顧，  
或窺視四肢厥冷，汗出如流，口面黯黯，指甲黑，四肢垂，重  
慢驚證眼半開，半合似睡不睡是也。其脈或浮或沉，身或熱或  
涼，或吐或瀉，或不吐瀉，或食乳或阻乳，名半陰半陽，合病如傷

寒主表，主裏也。治法大要，審問源流，施治不可一槩。曰慢驚證  
如因吐瀉得之，用醒脾散之類。他證可以類求，推次第子後然  
慢驚已傳屬陰，亦須準較陰陽，虧盛淺深，不可溫燥之劑。太過  
慢脾風之候，面青額汗，舌短頭低，眼合不開，搦中搦頭，口舌類  
嘔，身熱，口咬牙，手足微搐而不收，或身冷身溫，而四肢冷，其  
脈沉微，陰氣極盛，胃氣極虛，十救一。蓋由慢驚之後，吐瀉損  
脾，病傳已極，總歸虛虛，惟脾所受故曰脾風。若逐風則無風可  
逐，若療驚則無驚可療，但脾間痰涎，虛熱往來，其眼合者，脾困  
氣之神志，沉迷痰涎，凝滯然爾。世所謂慢風難療者，慢脾風是  
也。然慢脾一名虛風，或吐或瀉之後，面色虛黃，大勢虛損，若因  
虛而發熱，繼此必得慢脾風，纔見搦頭斜視，以手摸人，昏困喜

睡，額上汗多，身亦粘汗，其數小，而能即是。經風之證，不外皆  
由急慢風傳久而至。又當識之。又慢脾之後，言脾而不言胃，何  
也。蓋胃為脾屬，傷非若脾乃陰臟也。故小兒病傳在脾，多自愈  
在臟不可不治。蓋小兒純陽之氣，在腑為順，在臟為逆。古人皆  
理其臟，未言治腑也。又腎一臟，常主虛，不可攻。公若醫者，有患  
但清心脾，緣心與腎即既齊，而肺與腎及子母也。無與者，藥及  
諸補藥也。慢脾惟吐瀉積，血痢傳入慢候，其病變至，或虛或  
寒也。治法大要，主胃回陽，右眼半開，左手足不冷，證候尚  
在，慢驚則勿用回陽，或已入慢脾，而湯氣不甚，脫者，亦未可即  
用硫黃附子等劑。手足漸暖，仍以醒脾散等調之。慢脾風用藥  
乃非得已也。若如燈無油，漸見成滅。

慢驚風候

楊氏曰：慢驚之證，或因急驚過用涼藥，或取下太過，傳變而成。  
或吐瀉不止，而得或氣虛暴吐，利而成。有臟腑虛弱，世或者風  
邪入於腸胃，故大便不禁，而痢又有久痢，胃氣虛脫，成者有傷  
寒傳陰，陰證而成者有得之。又嗽成疳者，有下積峻取而成者。  
有吐血瀉血而成者，有感風不解，候藥成者，有得之。後癩不已  
者，有得之。鼻損中心者，有卵腫，氣腹痛得之者，有山夜盜汗  
脾困多睡，煩燥引飲，四肢浮腫，大小便秘，丹瘤腫毒，龍帶纏腰  
走馬急疳，皆傳慢候。惟吐瀉積，疳成虛治之，則變證甚速。  
柳叔舉曰：急驚吐痢，服涼藥太過，虛胃虛弱，乳食不化，則難救。



仲景陰不得有汗蓋陰證無汗有汗者亡陽古人說陰證無汗是也似搖不搖其間亦有慢驚如急搐者是死期之速此凡慢驚有汗多死

小兒因病後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時痲瘳昏睡露睛此無陽也急慢驚陰陽異證切宜辨而治之急驚合涼瀉慢驚合溫補世間俗方多不分別誤小兒甚多小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以涼藥治之又不能已謂之本傷風醫亂攻之因脾氣即虛內不能散外不能解至十餘日其證多晦露睛身溫風在脾胃故大便不聚而為瀉當去脾胃風風去則利止宜風散主之後史君子圓補其胃亦有諸吐痢久不差者脾虛生風而成慢驚

古云陰瀉也良由急驚用寒涼之藥太過轉動深重乃傳作慢驚或因風食一瀉不治而變或慢驚或因咳嗽下痰轉虛而成慢驚因由甚繁藥而舉之病家怕驚不怕瀉醫士恐瀉不怕驚其瀉不止則驚風愈盛若隨治驚更用寒涼之藥且瀉轉多加進重矣

慢驚曰陰瀉

失慢驚雖曰陰瀉實因二種而得二種者或只吐或只瀉或吐瀉俱發亦因風驚食所化是也

慢驚之因

慢驚者因父吐而胃氣先虛胃與肺母子也母虛亦令子衰二經虛則生粘痰者胃所出也痰則凝滯在於咽喉如牽鋸之

般時復痰厥是也

慢脾之因

慢脾者因父瀉而脾氣先虛脾氣虛則母子母也母虛亦令子衰二經俱虛則生瀉延瀉延者脾肺所出也瀉則溢流在於咽喉如水雞之般時復痰厥是也

陰瀉之因

陰瀉者吐瀉之久脾胃俱虛則面色裏也二經俱虛則主痰頑涎相纏如膠塞於咽喉故戲鳴而喘時後手足鬆握或如角弓之反張是也

李幼心鑑

所以陰瀉眼半開半閉者是風氣併行脾胃飛仙論云陰瀉眼似睡不睡王氏云驚風眼半開半合

已上三證似同而異並屬陰也各日時皆量背脊強直或作驚發發難差皆十死一生也

小兒或吐或瀉痰鳴微喘眼開神慢睡則露睛驚跳搐搦下發乍靜或身熱或身冷或因收虛熱或口鼻氣向色淡白瀉青眉間唇間或青或紫黑者睡迷問其脈沉遲微緩

小兒慢驚風候若是急驚傳來而尚陽恐其陽即心不必回陽又不特治陽只可截風調胃均至陰陽可冷可熱可急可急是也若直便與服附子補黃之屬使陽歸陽又是急驚學者理宜知之既知陽證傳作陰證則保命丹一二服無不效清心圓其



有四證且八候稍緩疾成陰瀾者服之若以傳過八候不作四  
證尚在口其甚者服定命飲子若厥手冰冷者乃四逆候不可  
回陽次第與合者即傳作慢脾風候其兒驚風痰涎壅盛搐搦  
不止不可下

嬰孩所受此等證候別無他疑者只依下項用藥無不姓醒切  
不可延久其陽易化陰氣漸盛藥力不及使人難治又不可一  
向連併投藥每次一二服了須審察證候緩急自應傳變稍覺  
寬定其藥放慢或勢漸緊宜以次為緊為緩與藥不可就帶一  
藥又不可便換湯餌速併與之所謂察其病與藥宜進止而後  
已今著妙方不勞檢閱脩合如法對證投治效萬一

小兒慢驚若是急驚傳來是知前人不曾截風定搐陽脫而傳  
陰陰重陽劇其風與熱隨流縱入經絡又有曾服大寒涼之藥  
過多又有下積取瀉致作又有臟腑虛寒洩瀉而為其所受多  
端已載別篇

小兒慢驚當知陰瀾之說其證屬陰臟寒氣虛或向泄瀉不止  
且驚正作多因無識之人一向治驚更不理瀉藥用寒涼投之  
今氣愈虛洩瀉不止陰證愈重驚搖愈增止瀉藥用寒涼投之  
候復加四證不退慢驚雖曰難活蓋醫亦不實宜察病作如進  
深為重事

醫慢驚不可爭攻急驚陽瀾稍易理慢驚陰瀾  
愈而尚虛乏未醒三五日之間者有之俗謂過佳  
不可輕易妄劑投之攻擊則前功俱沒

受驚所治之理須究問元由所發若是  
陽瀾所治之理須究問元由所發若是  
而慢驚者男兒為重如因吐逆而作慢驚者女子為重  
腹而陰瀾小兒有長幼之別臟腑有虛實之分有瀉三五次便  
成風候乃由虛之盛也或有二三日泄方成風候或有五七日  
瀉不止而成風候暴瀉成風由可速止蓋回陽調中補氣之為  
易若又瀉漸傳成風候者為虛瀉之難理候

慢驚者候所以用藥不一治瀉不等其發作不同故速在別難  
則四者之議猶為大賤智者得之細敘詳其輕重可否之意而  
施設之

醫理慢驚之候其意在慢治急驚之候其意在急何也且急驚  
過因暴生風作驚發機在驚他物之作也驚發機極即發生  
風搐搦等候皆熱所乘若也則急驚之候自息於世  
所作不常當宜省察用意子細所為故宜消息為之慢也不可  
倉惶恐懼有平得文非失治請速救之為慢也又曰驚無  
爭攻蓋所瘥至為難事無安當也

醫慢驚不可與語無妨疎脫有一無誠不謹亦有之無見不明  
亦有之又不可言難於人事存妙理究竟深得法者投  
藥必愈不曉其理裁度未良者十萬無順人情投藥既無可治  
之說若或所見不到即與善者者調治庶不枉矣若也按急驚  
候必敗其德會者勉強為善耶

慢脾風候即是慢驚風所傳也由吐瀉虛驚而傳入故曰

慢脾風候即是慢驚風所傳也由吐瀉虛驚而傳入故曰







慢驚風變作死候

面色青白多困日睛陷 口噴白沫直視四肢不能收

四肢逆冷渾身腫如瓜 痰中涎如錫唇青縮舌黑

眼目乾嘔魚口面或如粧 外腎黑縮下瀉如牛皮膠

手足甲里西消冷如冰 虛舌出口身上汗如雨

忽作大瀉身軀俱軟不能動 忽作大瀉身軀俱軟不能動

煩燥項強及張胸陷喘促

慢脾風證

慢脾曰脾風若逐風則無風可逐若治驚則無驚可治脾間痰

涎虛熱往來眼合脾困氣之神志昏迷無痰滑謂慢脾風難

治者慢脾風是也一名虛風慢驚本無痰乃虛者是也

其證面青額汗身亦汗粘其數凡小舌短頭低眼合不開

搖頭困睡常吐舌類嘔噎鼻息口噤牙手足微搐而不

收或身冷身溫四肢厥逆脾氣困之神志昏迷虛熱往來

痰涎凝滯眼半開半合手足不冷不熱有慢驚不可回陽

治法治風無風可治驚驚無驚可救蓋肝胃虛可養脾安胃生

津之藥大養脾圖參白朮散大醒脾散烏蝎四君子湯不拘

時候煎服

鼻管中黑 眩睛口開 長呼虛顛 手足脚紫 硬氣噎痰

羊睛視下 涎口浮青 眼圓瞳散 髮際汗珠

論下痰

楊氏曰小兒慢驚慢脾欲絕之時虛痰一攻咽喉引氣龜大痰

來浮數是感強陽或認為陽氣陽氣已沒有喉中痰聲

錮一二日間閉目不開乃虛候之極虛痰抱養其

覆燈將滅又用藥下痰痰隨氣下氣隨痰絕醫殺之

慢脾風若是急驚傳來而尚有陽證其陽即虧不必回陽又不

可治陽只可截風調胃均平陰陽可冷可熱可緩可急是也

久瀉不止青白也 眼閉半開睛轉黑 虎口若見隱隱紋

此證名為慢脾風 先服四聖定其搐 次進觀音散調服

只因脾臟受風寒 請醫子細調中脈

脾風先要睡 吐舌更搖頭 面青毛髮真 脚手曲如鉤

吐涎脾風氣 千顆淚珠流 表汗通腸效 只恐瀉不休

忽然吐瀉頻頻 四肢微寒目倒睛 面唇色白無紅艷

睛內無影尿色青 診之遲緩無微細 手足微揚慢脾驚

慢脾死候

此病屬陰因吐瀉胃氣虛變成慢驚脾風四肢逆冷面色青

沉困氣喘是陰盛後乃陽氣不舒脾胃空虛及肺臟受風氣

膈脹滯此慢驚脾風切勿不得用涼藥取吐先發汗藥迴陽後用

驚藥如加白瘻上眼睛若更氣急瀉下果色嘔逆不治死候

小兒吐瀉痢慢驚慢脾綠脾胃虛弱乳食不可過飽再傷脾胃

鳳麟詩云傷好區前命也休切且戒之

溫驚圓 治嬰孩小兒急驚風熱搐的痰壅

天南星 牛膝 朱砂 小兒驚風 錢 天竺黃 二錢 一分

還子臍脂 三分 龍腦 半字



右為極細末煉白蜜圓如芙蓉大用沙糖煎湯研化食遠服

涼驚圓 治嬰孩小兒驚痰熱搐

龍膽草 防風 去蘆義 青黛 各三錢

鉤藤 二錢 牛黃 一字 麝香 一字

黃連 去蘆義 龍腦 一字

右為極細末煮麵糊圓如黍米大每三五十圓用金銀煎湯

食遠服

涼驚圓 治嬰孩小兒驚熱疳瘦乳癖

大黃 煨 黃連 去蘆義 龍膽草

防風 去蘆義 川芎 薄荷葉 各二錢半

右為極細末煮麵糊圓如黍米大青黛為衣每五七圓至二

全幼心鑑

十圓用滾白湯食前服

瀉青圓 治嬰孩小兒肝受風熱目睛上視驚搐

當歸 去頭蘆 龍膽草 川芎

梔子 去殼 羌活 去蘆 防風 去蘆義 各一錢

大黃 紙裹煨半錢

右為極細末煉白蜜圓如芙蓉大用竹葉沙糖同煎湯研化

食前服

利驚圓 治嬰孩小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利取驚

消積

辰砂 水飛半錢 南星 炮去皮 巴豆 去殼心油半錢

右為研極細末蒸餅圓如黍米大看虛實或天晴散上服用

薄荷生薑同煎湯

利驚圓 治嬰孩小兒急慢驚熱潮搐

犀角 一字 天竺黃 青黛 各一錢

華牛 頭末 五錢

右為極細末煉白蜜圓如芙蓉大用薄荷煎湯研化食前服

琥珀圓 治嬰孩小兒急慢驚風涎潮昏冒目睛搐搦驚悸

痰乃和順滄痘小可驚哭眼目不安天除病根

辰砂 水飛 琥珀 牛黃

僵蠶 去鬚絲炒 天南星 牛膽 全蝎 去毒炒

白附子 炮 代赭石 醋煨 天麻 煨

乳香 各一錢 麝香 半錢

全幼心鑑

龍腦 一字

右為極細末煉白蜜圓如芙蓉大用薄荷煎湯研化或為末

不拘時候調服

安神圓 治嬰孩小兒心虛疴熱面黃瘦赤壯熱驚常神志恍惚不寧

芒硝 茯苓 去皮 山藥 九焙

寒水石 煨 甘草 炙 麥門冬 去心 各五錢

朱砂 水飛 兩 龍腦 一字

右為極細末煉白蜜圓如芙蓉大用沙糖煎湯研化食遠服

安神圓 治嬰孩小兒鎮驚安神除風齒牙腐

人參 去蘆 天麻 煨 防風 去蘆義



山藥

地黃炒

甘草炙

琥珀一錢

全蝎去毒炒

殭蠶去毒炒

朱砂水飛

金箔一片

右為極細末入金箔一錢白米飯心圓如芡實大朱砂為衣用酒心上煎湯研化不拘時候服

定志圓

治嬰孩小兒驚風已退未定

琥珀一錢

茯神去皮水

遠志去心土炒

人參去蘆

白附子炮

天麻根

天門冬去心

醋素仁

甘草炙各一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大辰砂為衣用薄荷燈新同煎湯研化食遠服

定志圓

治嬰孩小兒退驚化痰定志寧眠止疳疔

人參去蘆

琥珀

全蝎去毒

天麻根

防風去蘆

茯神去皮水各一錢

真珠

白附子炮

朱砂水飛各一錢

甘草炙一錢半

殭蠶去毒半錢

右為極細末白米飯心圓如芡實大辰砂為衣用麥門冬去心煎湯研化不拘時候服

定魄圓

治嬰孩小兒退驚安神定魄除痰牙疳

天麻根

人參去蘆

龍齒煨

防風去蘆

茯苓去皮

甘草炙各一錢

琥珀一錢

朱砂水飛半錢

右為極細末白米飯心圓如芡實大用龜心上煎湯研化不拘時候服

辰砂化痰圓

治嬰孩小兒咳嗽化痰安神驅風熱喘

辰砂水飛

白礬煨

白附子炮各五錢

天南星去毒水

半夏夏一兩五錢

右為極細末煮糯米生薑汁糊圓如黍米大每二五十四圓用薄荷煎湯不以時候服

鎮肝圓

治嬰孩小兒急驚風目直上視抽搐昏亂不醒人事是厥熱

天竺黃

地黃生

竹葉

當歸去蘆

草龍膽

川芎

大黃煨

羌活去蘆

防風去蘆各一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用沙糖水煎湯研化不拘時候服

保命圓

治嬰孩小兒安神定魄驚跳止啼叫

人參去蘆

琥珀

犀角

甘草炙各一錢

茯神去皮水

天麻根各二錢

全蝎去毒炒

防風去蘆

殭蠶去毒炒

朱砂水飛各一錢

麝香一字

右為極細末白米飯心圓如芡實大用麥門冬去心煎湯研化食遠服

七星圓

治嬰孩小兒瘡痘將出潮熱痰盛手足搐搦



不披  
子請

人參 去蘆

白附子 炮

天南星 炮

天南星 炮

天南星 炮

甘草 各三錢

朱砂 水飛

礬石 一字

右為極細末，黃麵糊圓如芡實，大朱砂為衣，用酒蒸，黃子

同煎湯研化，不拘時候服。

抱龍圓 抱龍之義，抱者保也。龍者心也。肝應東方青龍，木

生火，謂主我者父母也。肝為母，心為子。母安則子安，況心藏神

肝藏魄，神魂既定，驚從何生。故曰抱龍。理嬰孩小兒諸驚，四

時感冒瘟疫，邪熱致煩燥，不寧，發熱，急欲出，發搐，並宜

可投，其藥性溫平，不燥不寒，常服驅風化痰，鎮心解熱，和脾胃

壯精神。

琥珀

人參

天竺黃

檀香

茯苓 各五錢

甘草 去節，各三兩

枳殼 去穰，炒

枳實 去穰，炒

辰砂 水飛五兩

山藥 去皮，炒

大南星 炮

金箔 一百片

右為極細末，取新汲水和勻，隨午圓如芡實，大陰乾，治法用

葱白煎湯，或薄荷煎湯，煎藥，其生薑煎湯，煎藥，見形有

驚，白湯心悸不安，燈煎湯，入真珠末一兩，和勻，不拘時候

服

抱龍圓

治嬰孩小兒驚風，潮搐，傷寒，瘟疫，身熱，昏睡，氣喘，

天南星 炮

辰砂 水飛

天竺黃

雄黃 水飛，各

蘇合 一錢

右為極細末，濃煎甘草水，黃麵糊圓如芡實，大雪水，黃麵丸

佳用薄荷煎湯研化，不拘時候服。

抱龍圓 治證同前

礬石

茯苓 去皮

甘草 炙

雄黃 水飛，各

人參 去蘆

雄黃 水飛，各五錢

山藥 炮

辰砂 水飛，七

全蠍 去毒，炒，二錢半

蘇合 半錢

龍腦 一字

金箔 十片

右為極細末，煉白蜜圓如芡實，大用薄荷煎湯研化，食前服

清心圓 治嬰孩小兒驚風，潮搐，精神昏，積痰涎，流涎，并虛熱

煩燥，頭痛，惡心，風眩，不語，喘，吐，倦，宜

牛黃 一錢半

龍腦

蘇合 各半錢

雄黃 水飛，一錢

川芎

茯苓 去皮

柴胡 去蘆

枳殼 去穰，炒

犀角 各二錢

白朮 去蘆

黃芩 炒

黑豆 炒

阿膠 炒

麥門冬 去心

杏仁 去皮，炒

人參 去蘆

神效 炒

桂 去皮

乾薑 炮，各一

薄荷 炒

芍藥 炒，各一兩

山藥 炮，各一

甘草 炙，七錢半

羚羊角 錢十片

金箔 一百五十片

右為極細末，煉白蜜圓如芡實，大用薄荷煎湯研化，食前服

化不拘時候服



牛黃清心圓 治嬰孩小兒諸風狂亂驚癇痰涎壅塞精神昏

牛黃一錢二分 羚羊角一錢 均藥炒

防風去蘆 白朮去蘆 麥門冬去心

黃芩各一 當歸去蘆平錢 人參去蘆

薄荷炒 神麴炒各二 犀角磨二錢

山藥去蘆炒 桂去皮一錢 白朮七錢半

甘草炙五錢 雄黃水飛八分 龍腦半錢

乾薑炮七分半 茯苓去皮 川芎

桔梗去梗 杏仁去尖尖殼炒研成膏

柴胡去蘆炒各一錢二分半 麝香一錢

阿膠炒一錢 煑去核皮研 金箔一百一十片

大黑豆黃卷炒一錢七分

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用竹葉煎湯研化不拘時

候服

牛黃清心圓 治嬰孩小兒四證八候天風發熱驚熱

南星 半夏 白附子

川烏各一兩 川鬱金五錢

右五味作塵末用臘月黃牛膽三箇取汁和藥入膽內孔懸

當風處三月乾取出入添馬牙磁米砂雄黃鴨卵各一錢

麝少許如膽藥一兩硝砂四味各一錢稀麵糊圓如芡實大

金銀薄荷煎湯服一歲十圓

天麻防風圓 治嬰孩小兒驚風身熱壯熱多

御精神以慎痰涎不利及風濕邪熱

全蝎去毒炒 僵蠶去毒炒 天麻

防風去蘆 人參去蘆各一錢 辰砂水飛

雄黃水飛 甘草炙 牛黃各一錢

麝香半錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化不拘時

候服

全陷鎮心圓 治嬰孩小兒風驚痰涎壅塞精神昏

佳類亦夜臥不安諸語狂妄急驚抽搐

紫荷車用黑豆黃卷炒 人參去蘆

甘草炙 茯苓去皮各一兩五錢

牙硝各一錢半 辰砂水飛 麝香半錢

龍腦一角 金箔一百一十片

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研

化食後服常服安鎮心神散敗邪熱涼咽膈止驚啼

大鎮心圓 治嬰孩小兒精神不寧驚悸必驚心忪恐悸四肢

戰拉舉動欲倒壯類驚熱或煩燥而多啼退驚風化痰涎壯心

氣壯精神

犀角鎊 鐵粉各一兩 羚羊角鎊

龜甲鎊 天麻鎊 甘肅各五錢

牛黃 茯苓去皮 遠志去心



天竺黃

蛇蛻皮

龍腦

人參去蘆各二錢半

桂去皮二錢

龍腦一分

辰砂水飛一錢

金箔五十片

銀箔五十片

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

心圓 治嬰孩小兒涼心經驚熱飲盛

甜菊

人參去蘆各一兩

甘草

寒水石兩五錢

山藥

茯苓去皮各二兩

朱砂水飛一兩

龍腦

麝香各一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用淡白湯研化食後服如

要紅色入坯子懸脂一錢

鎮心圓 治嬰孩小兒鎮心解熱退驚面赤止啼

全蝎去毒每兩用生薄荷煎一棗包了

天麻

寒水石

防風去蘆義

羌活去蘆

赤茯苓去皮各一兩

甘草各二錢

朱砂水飛一錢

麝香一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

鎮心圓 治嬰孩小兒急驚化痰鎮心

朱砂水飛

龍腦

牛黃各一錢

鐵粉

琥珀

人參去蘆

茯神去皮木

防風去蘆

全蝎去毒炒十箇

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化不拘時

候服如無牛黃可用製牛膽天南星代

丹砂鎮心圓 治嬰孩小兒心神不安有時驚悸目睛偏視

延不利痲癩安鎮心神定驚止搐

辰砂水飛一兩

天麻煨二兩

人參去蘆

甘草多

茯苓去皮各五錢

天竺黃

鉛白霜各二錢

牛黃一錢

龍腦一角

麝香半錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用金銀薄荷同煎湯研化

不拘時候服

消驚圓 治嬰孩小兒驚風鎮心利痰解熱

人參去蘆

天麻煨

茯苓去皮

朱砂水飛

全蝎去毒炒

礬石去毒炒

羚羊角錢

犀角錢各一錢

麝香一字

天南星牛膽製四錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用菖蒲煎湯研化食後服

牛黃圓 治嬰孩小兒膈熱痰涎稠感心神不安睡不安穩煩

燥怔忡四脉作熱驚風痰熱

葛根炒一兩

防風去蘆義

甘草多

黃芩炒各二錢半

麝香一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

鎮驚圓 治嬰孩小兒急慢驚風痰壅手足抽掣口眼喎斜煩

燥生疳精神昏悶常服寧心鎮驚疎風順氣

人參去蘆三錢

甘草半生半炙

茯神去皮木



殭蠶 去毒絲炒 枳殼 各一錢 白附子 炮

天南星 牛膝炒 茯苓 去皮 鱉砂

牙硝 硃砂 水飛各一錢半 全蝎 去尾毒十箇

麝香 一字

右為極細末糯米煮糊圓如芡實大用生薑煎湯後驚薄荷煎湯或麥門冬去心煎湯研化不拘時候服

五雷丹 治嬰孩小兒急慢驚風

蛇含石 醋煨 天南星 炮去毒 白附子 炮

辰砂 水飛 麝香 青礞石

天麻 煨 牛黃 天竺黃

羌活 去蘆 茯苓 去皮 防風 去蘆各一錢半

全蝎 去毒 殭蠶 去毒絲炒 川烏 去大鱗炮

鬱金 雄黃 水飛各一錢 龍腦 七分半

金箔 二十片

右為極細末甘草熬成膏搜和為印錠用薄荷煎湯研化不拘時候服

龍虎壽生丹 治嬰孩小兒急慢驚風

全蝎 去毒絲炒 天麻 煨一錢 殭蠶 去毒絲炒

辰砂 水飛 天南星 炮去毒 白附子 炮

白花蛇肉 去骨酒洗 防風 去蘆又一錢

代赭石 醋煨 鐵孕粉 各半錢 龍腦 一字

麝香 一字

右為極細末糯米煮糊圓如芡實大用生薑煎湯後驚薄荷煎湯或麥門冬去心煎湯研化不拘時候服

化不拘時候服

壽生丹 治嬰孩小兒驚風危篤

人參 去蘆 天麻 煨 防風 去蘆各五錢

殭蠶 去毒絲炒 全蝎 去毒絲炒各一錢 雄黃 水飛

蟬蛻 去頭足 天南星 牛膝製炒各半錢

牛黃 獨角仙 翅足 甘草 各一錢

白花蛇肉 酒煮熟一錢半 辰砂 水飛

麝香 各一錢 代赭石 醋煨七次一錢半

慢驚白附子 炮一錢 半夏 麴炒一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用生薑煎湯研化不拘時候服

化不拘時候服

至寶丹 治嬰孩小兒諸癩急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩燥風寒搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐

犀角 生玳瑁屑 琥珀

朱砂 水飛 雄黃 水飛各一兩 金箔 五十片

銀箔 五十片 龍腦 麝香 各一分

牛黃 五錢 安息香 用無灰酒飛過淨去砂

右為極細末令白將安息香膏以重湯煮凝成和搜為劑如乾即入煉白蜜盛不津器中旋圓如梧桐子大用人參去蘆煎湯研化不拘時候服

鎮心至寶丹 治嬰孩小兒驚風搐搦吐熱涎多魚口鴉散眼

鎮心至寶丹 治嬰孩小兒驚風搐搦吐熱涎多魚口鴉散眼

鎮心至寶丹 治嬰孩小兒驚風搐搦吐熱涎多魚口鴉散眼

鎮心至寶丹 治嬰孩小兒驚風搐搦吐熱涎多魚口鴉散眼

鎮心至寶丹 治嬰孩小兒驚風搐搦吐熱涎多魚口鴉散眼



睛直視

天南星去毒 白附子炮 雄黃水飛

全蝎去毒炒 僵蚕去毒炒 麝香各二錢 辰砂水飛一分

龍腦 膩粉二錢 滑石二兩

右為極細末煉白蜜圓如皂莢子大金銀箔為衣用薄荷煎

湯研化食後常服鎮心神涼咽膈

聚寶丹 治嬰孩小兒心脾不定熱感痰多因驚而感風邪身

脉潮熱牙關緊急手足搐搦

全蝎去毒每箇用生薄荷一皮包了 琥珀去毒 茯苓去毒

防風去毒 玳瑁屑 犀角屑

甘草炙各三錢 牛黃 真珠

朱砂水飛 麝香 龍腦各一錢

金箔 銀箔各十片

右為極細末白米飲心圓如芙蓉大用鈞藤煎湯研化不拘

時候服

鎮心丹

治嬰孩小兒驚後脾胃尚虛心驚俱怯齒齙好睡

人參去毒 龍齒煨 茯神去皮木

防風去毒 甘草炙一錢 琥珀半錢

全蝎去毒 辰砂心內煎熟出用

右為極細末白米飯心圓如芙蓉大用鈞藤寤心土同煎湯

研化不拘時候服

至聖保命丹 治嬰孩小兒胎驚內約腹肚攣目睛上視手

足搐掣角弓反張痰涎壅盛急慢驚風

全蝎去毒炒 僵蚕去毒炒 天南星去毒炮

白附子炮 辰砂水飛 蟬蛻去土各一錢

防風去毒 天麻煨各一錢 麝香半錢

金箔十片

右為極細末燉飯取中心軟者圓如芙蓉大初生兒半圓用

乳汁研化全銀薄荷煎湯不拘時候服常服鎮心安神化痰

除一切驚風證

保命丹 治嬰孩小兒急驚風候傳慢驚

辰砂水飛 茯苓去毒 白附子炮

牛黃 天南星炮 全蝎去毒炒

天麻煨 甘草炙各一錢 鵬砂一錢

龍腦 麝香各半字

右為極細末煮麵糊圓如芙蓉大用全銀薄荷同煎湯研化

不拘時候服

太乙萬金丹 治嬰孩小兒驚風痰熱

代赭石醋煨 全蝎去毒炒 朱砂水飛

琥珀 天南星去毒炮 白附子生

防風去毒 烏蛇肉酒浸炙 天麻煨各一錢

麝香一字



右為極細末粟米煮糊圓如梧桐子太急驚用薄荷煎湯研  
傳慢驚尚有陽證用人參 蘆薈煎湯研化不拘時候服

至聖寧心丹 治嬰孩小兒 女神退驚止疳疔寧眠

人參 去蘆 防風 去蘆 天麻 煨

蝎蛇 去毒 龍腦 煨 茯神 去皮木

甘草 炙 酸棗 仁 去皮 各一錢

朱砂 麝香

右為極細末白米飯心圓如芙蓉大用麥門冬去心煎湯研  
化食遠服

太乙保生丹 治嬰孩小兒慢驚尚有陽證

全蝎 去毒 炒 白附子 炮 殭蠶 去毒 炒

蠅蛭 去土 牛膽 天南星 炒

琥珀 各一錢 防風 去蘆 又 辰砂 水飛 各半錢

麝香 二分半

右為極細末粟米煮糊圓如芙蓉大用薄荷煎湯  
研化食遠服

五福化壽丹 治嬰孩小兒痘毒熱驚惕狂燥煩赤咽乾口

舌生瘡夜臥不安識語煩渴頭面身熱多生瘡疔

桔梗 去蘆 炒 人參 去蘆 各 甘草 炙 七錢半

牙硝 枯 人參 去蘆 各 甘草 炙 七錢半

茯苓 去皮 二 麝香 二分半 金箔

銀箔 各四片

右為極細末煉白蜜圓如芙蓉大用薄荷煎湯研化食後服  
及瘡癩後餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黃自然汁服用  
雞翎掃在口內熱指肌肉黃瘦者日夜不見物陳粟米泔水  
研化服

五福化壽丹 治嬰孩小兒驚悸涼心膈

生地黃 煨 熟地黃 各二兩 天門冬 去心

麥門冬 去心 各 女參 去蘆 各 甘草 炙

甜硝 各一兩 高麗 七錢半

右為極細末煉白蜜圓如芙蓉大用水研化食後服

至聖寧心丹 治嬰孩小兒急慢驚風風潮中惡寒汗物汗口

眼鳴金痰

人參 去蘆 茯苓 去皮 白朮 去蘆

天麻 去毒 天南星 炮 半夏 去毒 各二錢半

羌活 去蘆 扶神 去皮木 川烏 去皮 炮

獨活 去蘆 細辛 去毒 各 蟬蛭 去足 土十四錢

遠志 去心 荆芥 穗 酸棗 仁 去皮

白芷 川芎 白附子 炮

石菖蒲 各一錢 確黃 去毒 各 麝香 各半錢

全蝎 去毒 炒 防風 去蘆 各 金箔

銀箔 各十片

右為極細末生薑汁煮麵糊圓如芙蓉大辰砂為衣用金箔



薄荷煎湯研化不拘時候服搗下止雞冠血小兒息驚服

治驚風至重者

大聖奪命金丹 治急慢驚風癲癇天動各件物許中惡及初

生麻風撮口着禁胎驚胎疳牙關緊等驚風痰執搗搗擊顛反

引驚視昏悶不醒但是一切驚風危惡緊急之證並皆治之其

效如神其他驚藥功力俱不及此其起死回生良劑

天麻 炮 全蝎 去毒炒 僵蠶 去毒炒

天南星 去毒炒 防風 去毒炒 羌活 去毒炒

白附子 炮 茯神 去毒炒 川芎

遠志 去心 杜梗 去毒炒 石菖蒲

生夏半 人參 去毒炒 白朮 去毒炒

茯苓 去毒炒 酸棗仁 去毒炒 荊芥穗

細辛 去毒炒 川烏 去毒炒 甘草 炙

烏蛇尾 酒浸炙 大赤足蜈蚣 炙

沉香 辰砂 水飛 龍齒

珍珠 各三錢 金箔 二十片 銀箔 四十片

琥珀 三錢 雄黃 一錢 麝香 一錢

右為極細末薑汁煮麵糊圓如芡實大辰砂為衣用金銀箔

荷煎湯研化不拘時候服如欲存久且安暖處常加晒焙免

失藥味驚風牙關不開搗鼻心噴以藥入搗鼻開關

犀角地黃膏 治嬰孩小兒開眼即掣跳者肝肺不足魂魄不

穩故神不安非謂驚也

天門冬 去心 麥門冬 去心 茯苓 去心

茯神 去心 地黃 生 前胡 下毒

柴胡 去毒 人參 去毒 玄參 去毒

甘草 炙 川芎 天麻 煨

羌活 去毒 防風 去毒 錢

右為極細末煨金粟一小挺存性煉白蜜圓如芡實大金粟

為衣用薄荷煎湯研化食後服

大青膏 治嬰孩小兒驚熱涎盛眠卧不安或即發搐

大青葉 一錢半 白附子 炮 青黛

天麻 煨各一錢 全蝎尾 半錢 朱砂 水酒一字

麝香 一字 烏梢蛇 半錢 天竺黃 一字

右為極細末生蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

百枝膏 治嬰孩小兒安心寧神

人參 去毒 防風 去毒 天麻 煨

茯神 去毒 白附子 炮 琥珀

酸棗仁 去毒 石菖蒲 各一錢 麝香 少

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用麥門冬去心煎湯研化

不拘時候服

寧心膏 治嬰孩小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭如人將

捕眠睡驚驚常服鎮心除百病

人參 去毒 白朮 茯苓 去毒

茯神 去毒 山藥 羌活 去毒



甘草 各一錢 龍腦

麝香 各一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

寧神膏 治嬰孩小兒鎮心退熱定驚身熱壯熱

人參 去蘆 茯苓 川芎

羌活 去蘆 天麻 防風 去蘆

甘草 各二錢 木砂 水飛半錢 麝香 一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用麥門冬去心煎湯研化

不拘時候服

寧眠膏 治嬰孩小兒驚風發熱心神恍惚眼目昏

甜硝 人參 辰砂 水飛

茯苓 去皮 山藥 兩 甘草 炙

寒水石 煨各二錢 龍腦 一分 麝香 半錢

右為極細末入蚌膠脂一錢煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎

湯研化食後服

驅風膏 治嬰孩小兒去風除熱消痰寬筋脈眼上視

防風 去蘆 琥珀 白附子 炮

甘草 炙 天麻 煨 辰砂 水飛

全蝎 稍去毒 鐵粉 真珠 各一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化不拘時

候服

驅風膏 治嬰孩小兒肝風筋脈急回紅目青眼上視

辰砂 水飛 全蝎尾 去毒 當歸 去蘆

龍睛草 川芎 山梔子 去殼

大黃 紙裹煨 羌活 去蘆 防風 去蘆

甘草 各一錢 麝香 一字

右為極細末煉沙糖圓如芡實大用薄荷竹葉同煎湯研化

食前服

羌活膏 治嬰孩小兒急慢驚風

羌活 去蘆 防風 去蘆 川芎

茯苓 去皮 茯神 去皮木 白朮

白附子 炮 全蝎 去毒炒 僵蠶 去毒炒

加天麻 煨 牛膝 天南星 炒各一錢

右為極細末煉蜜圓如芡實大辰砂為衣用麥門冬去心薄

荷同煎湯研化不拘時候服

牛黃膏 治嬰孩小兒驚風涼膈鎮心除咳嗽止煩熱

甘草 炙 雄黃 水飛 鬱金 各一錢

甜硝 一錢半 寒水石 生 苳豆 五錢

龍腦 一字

右為極細末煉白蜜圓如皂子大用薄荷煎湯研化食後服

牛黃膏 治嬰孩小兒急驚風熱夜啼痰促

雄黃 小者大胡蘆煎汁 甜硝



甘草 炙 二錢 灰砂 小 寒水石

龍腦 一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

全生錠 治嬰孩小兒急慢驚風

辰砂 水飛 人參 上 白朮

茯苓 去皮 茯神 去皮 五靈脂 水飛

山藥 赤石脂 麝香 一錢 一角

乳香 五錢 金箔 二十片

右為極細末白米飯心印錠全指貼錠回用薄荷煎湯研化不拘時候服

尋星錠 治嬰孩小兒胎驚風熱再毒

黃連 去心 炮 炮 子 去殼 黃蘗

黃芩 炒 薄荷葉 川芎

羌活 去蘆 當歸 去蘆 炒 防風 去蘆 又

天南星 牛膽 半夏 炮 炒 天麻 煨 各 五 錢

滑石 水飛 兩 犀角 一兩 麝香 一錢

右為極細末煮糯米糊印錠用生薑薄荷同煎湯研化不拘時候服

尋星錠 治嬰孩小兒急慢驚風

防風 去蘆 又 人參 上 白朮 炮 炒

遠志 酒 茯苓 去皮 茯神 去皮 又

川芎 僵蠶 去嘴 絲 炒 白芷

鹿肉 不去心 甘草 炙 各 一 養心茶 二錢

天麻 煨 白附子 炮 桔梗 去蘆 炒

天南星 去心 羌活 去蘆 琥珀 各 一 錢 半

鈎藤 去心 全蝎 去毒 炒 辰砂 水飛 二 錢

蟬蛻 去毒 麝香 一 角 金箔 二十 片

山藥 炮 炒

右為極細末煉白蜜印錠用薄花煎湯研化不拘時候服

保生錠 治嬰孩小兒急慢驚風盤腸內疝腹痛啼身若反

三眼直上視手足搐搦痰涎潮壅卒中客忤睡卧不安乳食不

蛇含石 七次 代赭石 七次 各 一 兩

黃連 去心 炮 人參 去蘆 二 天竺黃

白附子 炮 犀角 鎊 半夏 炮 炒

全蝎 去毒 炒 僵蠶 去嘴 炒 天麻 煨

羚羊角 鎊 天南星 牛膽 製 一 錢 二 分 半

麝香 半 錢

右為極細末煮糯米糊印錠用薄荷煎湯研化食後服

鎮心餅 治嬰孩小兒急慢驚風

人參 去蘆 赤茯苓 去皮 甘草 炙

山藥 各 五 錢 辰砂 水飛 桔梗 炒 各 二 錢 半

乳香 一 錢 半 麝香 二 分

右為極細末煉白蜜印錠用薄荷煎湯研化不拘時候服



人鴉餅 治嬰孩小兒鎮心去驚 補定志驚之輕者常服

全蠶 去毒煎餅汁 殭蠶 去毒煎餅汁

酸棗仁 去皮炒 茯神 去毒 天花粉

桔梗 去毒 天麻 煨 遠志 去心

羌活 去毒 甘草 炙 各三錢

右為極細末者 麪糊為餅朱砂 夜全蠶薄荷而湯研化不 拘時候服

太乙丹 治嬰孩小兒急慢驚癇風 血潮發搐搦口眼相引項

背強直精神昏困痰涎不利

天南星 去毒煎餅汁 烏蛇 酒浸一宿

附子 炮去毒 麻黃 去毒炒一錢半

白附子 炮去毒 炒四錢

已上為細末以水一升調成二升 食麪一斗拌勻踏作餅

須六月六日楮葉卷七日取出 用紙袋盛掛當風十四

日可用每餅末一兩入下通藥 錢雄黃 水飛三錢

琥珀 一錢 辰砂 水飛 錢雄黃 水飛三錢

甘草 炙一錢半 液水研化不拘時候服

右為極細末煉白蜜圓如芡實大 治嬰孩小兒急慢驚癇痰涎

粉霜 一錢 輕粉 白牽牛 炒各半錢

右為極細末一字用薄荷煎湯調化 食前服吐涎效

極播散 治嬰孩小兒解男右女左 不順者

枳殼 去穢炒 釣藤 去毒 荆芥 穗

羌活 去毒 防風 去毒 甘草 炙各一錢

右咬咀生薑三片煎入薄荷三葉不拘時候服

釋瀝散 治嬰孩小兒急慢驚風不醒人事

猪牙皂角 三錢 細辛 去毒 川芎

白芷 各二錢 躑躅花 一錢半

右為極細末少許用大燈薪三寸長燒氣內得噴嚏為驗 煎藥不可焙焙則不應

宣風散 治嬰孩小兒驚風痰熱

檳榔 去毒二箇 甘草 炙 枳殼 去毒各五錢

牽牛 半生半炒熟末一兩

右為極細末用白蜜煎湯調化食前服

宣風散 治嬰孩小兒急驚風熱喘

白牽牛 生末 黑牽牛 生末 大黃 煨五錢

檳榔 去毒二錢 辰砂 水飛一錢 輕粉 一字

青礞石 煨 膩粉 各一錢

右為極細末用白蜜煎湯調化食前服

導赤散 治嬰孩小兒內虛邪熱煩燥悶亂傳流下經小便赤

淋瀝瀝中滿痛

地黃 生 水通 去毒 甘草 炙各一錢

右為極細末用竹葉煎湯調化食遠服一升不用甘草用黃

芩



牛黃奪命散 治嬰孩小兒急驚風 肺脹喘滿胸高氣急兩脇

扇動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽沫 聲啞不鳴痰涎潮塞俗云

馬脾風若不急治死在朝夕

白牽牛 半生半熟頭末

檳榔 土金屑

黑牽牛 半生半熟頭末

大黃 煨各五錢

右為極細末用白蜜煎滿調化 食前服痰盛加輕粉一字

真珠散 治嬰孩小兒客忤驚風 痰熱心煩恍惚睡驚跳時

或咬牙啼叫不已小便赤澀或吐黃沫

真珠 海螵蛸

滑石 水飛

辰砂 水飛各一錢

人參 土磨 白附子 炮各二錢

全蝎 去毒炒 甘草 炙

麝香 各半錢

龍腦 一角 金箔

銀箔 各五片

右為極細末用燈新麥門冬去心入蜜同煎湯調化不拘時

候服

清寧散 治嬰孩小兒驚執出於心肺須從小便利之

桑根白皮 去皮 葶藶 扁紙炒 赤茯苓 去皮

車前子 梔子 去殼各 甘草 炙半錢

右咬咀生薑三片棗一箇去核同煎食前服

全蝎散 治嬰孩小兒急慢驚風發搐化痰截驚

全蝎 十二箇用新薄荷葉包全蝎竹片

僵蠶 竹片夾定慢火焙乾用新薄荷葉包僵蠶竹片

天南星 五錢去腐湯泡七次再蒸五七沸切片

防風 去蘆又 天麻 煨 甘草 炙

辰砂 水飛 川芎 白附子 炮各二錢半

右為極細末一歲一字二歲半錢用薄荷煎湯調化食遠服

身熱發搐導赤散加防風又 黃芩 炒

慢驚生薑薄荷煎湯調化服

保命散 治嬰孩小兒胎中受驚一百二十日內發搐

防風 去蘆又 天麻 煨 琥珀

甘草 炙各二錢 白附子 炮 天南星 半錢

辰砂 水飛各半錢

右為極細末一字由鈞藤煎湯調化食遠服

天王散 治嬰孩小兒吐瀉或慢服冷藥脾虛生風成慢驚

天南星 一箇重八九錢去腐淨黃土地坑子深三寸

炭火五斤燒通紅赤入好酒半盞後入天南星却用

炭三兩條蓋坑子候天南星微乾取出剉碎再炒

熟為極細末用五錢入麻煨取末一錢麝香一字和

勻三歲半錢用生薑煎防風去蘆又煎湯調化不拘時

候服亦治久嗽惡心

四聖散 治嬰孩小兒慢驚痰滯虛熱若有窺視搐搦證壯以

少許用管吹入鼻中

全蝎 去毒炒 僵蠶 去毒炒 天南星 去腐十錢半

川烏 去腐三錢生

右將天南星碾極細末水 作餅聚全蝎僵蠶川烏外用水



浸濕紙重可受火灰中煨赤色放在地二伏時取出為極

細末一字用金銀煎湯點清茶少許調化不拘時候服

卷活通關散 治嬰孩小兒指證已定關數未通啼聲未發乳

食不進

卷活 上五厘 白附子 炮各 川芎

細辛 去毒 防風 去毒 全蝎稍 去毒

甘草 炙各二錢

右吹咀用燈新六莖麥門冬去心同煎食遠服

醒脾散 治嬰孩小兒吐瀉不止痰作驚風脾困昏沉默默不

食

木香 炮一錢 全蝎 去毒炒 大麻 煨

人參 去毒 茯苓 去毒 白朮

白附子 炮 甘草 炙各二錢

右為極細末用煮玉核煎湯調化不拘時候服

醒脾散 治吐瀉脾困不食痰作驚風

全蝎 去毒炒 白附子 炮 天麻 煨

甘草 炙 人參 去毒 茯苓 去毒

石菖蒲 細切 木香 石蓮肉 去心

白朮 各一錢

右為極細末用生薑煮去核煎湯調化有熱者去木香不拘

時候服

大醒脾散 二方通用驅風醒脾胃虛不消乳食尤須節酌

天南星 茯苓 去皮 橘紅 各二錢半

全蝎 去毒炒 甘草 炙 白附子 炮

蓮肉 去心 人參 去毒 木香 各 錢二分

陳倉米 二百粒

右剉散用生薑三片煮一箇去核同煎食遠服

大醒脾散 治嬰孩小兒慢脾風內虛昏迷不醒

人參 去毒 白附子 炮 天麻 煨

甘草 炙 全蝎 去毒炒 石蓮肉 去心

茯苓 去皮 木香 白朮 去根

石菖蒲 細切 橘紅 去白 山藥 炒

天南星 去膽炮 肉豆蔻 炙 麩炒 去油 各一錢

縮砂 去殼 丁香 錢半

右吹咀用生薑三片煮一箇去核同煎食前服回陽加附子

白薑

吉州醒脾散 治證同前

人參 去毒 橘紅 去白 甘草 炙

白朮 去根 茯苓 去皮 全蝎 去毒炒 各五錢

木香 半長 麩 各二 白附子 炮 四箇

天南星 炮一箇 陳倉米 二百粒

右剉散用生薑三片煮一箇去核同煎不拘時候服

八仙散 治嬰孩小兒慢驚風

天麻 煨 白附子 炮 花柳肉 酒浸



方風 去蘆義 天南星 炮去毒 半真錢

全蝎 去毒炒 冬瓜仁 炒各半錢

右以明用生薑三片棗一箇上核同煎食後服

觀音散 治嬰孩小兒外感風冷內傷脾胃嘔吐瀉下泄

食久則漸漸羸弱大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛則瀉

已以防慢候

人參 去蘆一兩 茯苓 去皮 神麴 炒二錢

石蓮肉 去心炒 黃耆 蜜炙

木香 白扁豆 炒去皮 甘草 炙各一錢

右以明用棗一箇去核薑香二葉同煎食後服

全蝎觀音散 治證同前

全蝎 去毒炒 天麻 煨 防風 去蘆義

白芷 各二錢半 黃耆 蜜炙 甘草 炙

茯苓 去皮 白扁豆 生薑汁浸去皮炒各一錢半

人參 去蘆二錢

右為極細末用棗一箇去核冬瓜仁炒同煎湯調化不拘時

候服

寶脾散 治嬰孩小兒脾胃虛冷吐瀉不止不進飲食慢候

脾癰疔 痢不能收醫

人參 去蘆 白朮 茯苓 去皮

縮砂 去殼 麥蘖 炒 神麴 炒

石蓮肉 去心 橘皮 去白 豆豉 油炒

山藥 去皮炒 青皮 去蘆炒 冬瓜仁 炒各二錢半

肉豆蔻 炮去毒 陳米 一撮炒

白扁豆 炒去皮 丁香

蔥白 炒各一錢 香附子 炒去毒 木香 半錢

右為極細末用棗三片棗一箇去核同煎調化食遠服或米飲亦可

慢候慢脾手足厥冷加附子理中湯同服

以吐瀉加附子訶子煨去核同服

毛桂枝散 治嬰孩小兒急慢驚風發小時

全蝎 去毒炒 薄荷 十四葉 麻黃 七葉

白朮 五錢

右三味溫湯浴潤以兩葉麥蝎一箇用麻黃七葉縛定炒至

焦黑次入白朮生薑白芷汁浸透焙乾右為極細末每服半

錢用林葉煎湯食遠服

調中湯 治嬰孩小兒慢驚和脾胃止吐瀉溫中正氣

人參 去蘆 白朮 去皮 茯苓 去皮

甘草 炙 白芷 石蓮肉 去心

藿香葉 天麻 煨 橘皮 去白

白扁豆 生薑汁浸炒去皮 半夏 麴

木香 各半錢

右到散用生薑三片棗一箇去核同煎不拘時候服

理中湯 治嬰孩小兒吐瀉手足厥冷加附子回陽

人參 去蘆 白朮 去皮 乾薑 炮



甘草湯

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎食前服

烏蝎四君子湯 治嬰孩小兒慢驚慢脾風吐瀉不止

人參 去蘆 白朮 去土 茯苓 去皮

甘草 炙

加川烏 去脂皮 炮 全蝎 去毒炒

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎食前服

溫膽湯 治嬰孩小兒驚悸煩燥

半夏 湯浸去毒 枳實 炒 酸棗仁 去心

陳皮 去白各 錢半 茯苓 去皮五錢 甘草 炙一錢

右咬咀用生薑三片棗一箇竹茹一撮同煎不拘時候服

醒風湯 治嬰孩小兒胎氣虛弱因吐瀉後胃虛生風手足搐搦驚悸

天麻 炒 防風 去蘆又 人參 去蘆

白附子 炮 全蝎 去毒炒 僵蚕 去嘴絲炒

天南星 炮去毒 甘草 炙

右咬咀用生薑三片冬瓜仁三十粒同煎不拘時候服

定命飲子 治嬰孩小兒吐瀉脾胃虛弱發作慢驚風搐搦不

已截風不止取痰不下散熱不退即驚不吐欲傳慢脾風候

半夏 炒 天麻 炒 甘草 炙

茯苓 去皮 白朮 去土 牛黃 炒

右到散用生薑三片棗一箇去核同煎食前服或作細末服

紫葳飲 治嬰孩小兒早發熱至晚大熱面赤目黃時久惡寒

口出熱氣痰涎壅盛手足搐搦

紫葳 蘇木 甘草 炙各二錢

川升麻 煨 芍藥 炒 葛根 各四錢

右咬咀用蠟殼一箇三錢脚葱白一寸同煎不拘時候服

易氏曰吐瀉成慢驚慢脾虛風上斷乳令兒飢甚以醃乳法

乳兒

人參 去蘆 木香 薑汁炒

沉香 橘紅 去白 縮砂 炒

丁香 神麩 炒 麥蘖 炒

虛者其如白薑 痢不止加訶子 嘔吐不止加生薑汁

右咬咀用生薑五片紫蘇十皮棗二箇去核同煎冷乳母捏

去毒乳盡服即仰睡寔時冷藥入乳令兒飲數日不可過

飽令兒吐再瀉脾胃

瀉

易氏曰瀉者小兒之惡病也小兒血脈不榮骨氣不聚為風邪

所傷為驚悸所觸為乳哺失節停滯結癥經終而得之

湯氏曰十歲以上為瀉十歲以下為瀉

湯氏曰瀉曰五瀉病分五瀉調治之法惟以驚風命三瀉治之

又當別以陰陽二證此為要法大槩血滯心致邪氣在心積

成瀉宜通經調平心血順氣豁痰為良法也

楊氏曰發瀉耳後高骨間必有青紋紛紛如線急與拆破令血



此四時大得氣道

凡濯兒衣不可夜露恐為雌鳥所食能成癩

其證神氣拂鬱臉眼直視面目引口噤涎流腹肚

手足搐掣似死似生或聲或嘿以項背反張或腰脊強直

但四體柔軟發而時醒者為癩右一身強硬終日不醒則

為癩瘵矣

心癩面赤目眩吐舌齒齒心下煩燥氣短息數

肝癩面青唇青其眼上翳手足拳攣抽掣反折

脾癩面黃寒黃眼晴直視腹滿目閉四肢不收

肺癩面如枯骨目白及視驚跳抽掣亦吐涎沫

腎癩面黑而晦振目視人其吐清沫不動如尸

此五臟之證然調理之法惟以驚風食三種陰陽一證別而

治之

風癩者汗出解脫風邪乘虛其初起者如計數有熱主痰是也

驚癩者震駭恐怖打墜積驚其初驚叫大啼恍惚神魂是也

食癩者食時得驚停宿結滯其初吐乳不哺大便酸臭或結成

乳癖元寒後熱是也別之以陰陽則始者身體有熱抽掣啼叫

是為

陽癩陽病脈浮面色元澤病在六腑肌膚此猶易愈始者身體

無熱手足清冷不抽掣不啼叫是為

陰癩陰病脈沉面色黑晦病在五臟骨體此最難痊或仰臥屬

陽覆卧屬亦可參驗陽證不可用溫陰證不可用寒

癩癩則先為之散風

驚癩則先為之利驚

食癩則先為之消積續以定癩等劑主之若藏若腑一陰一陽

是固不可無別小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常驚悸

此皆發癩之漸即以紫圓子導之時間量與紫圓子減其盛氣

則無驚風癩癩之患癩證方萌其後高骨間必有青紋紛紛如

線見之急為爪破須令血出啼叫尤得氣通澀濯兒衣不可露

天恐為純雌落羽所汚染觸其間未有不為癩也挾邪恠者而

色變身不常見人羞怕諸癩瘡不能言者蓋咽喉為氣之道路

風傷其氣以掩聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致

爾

論陰陽癩證

關氏云急慢驚古人書無之惟曰陰陽癩所謂急慢驚風者後

世名之大抵治法須判陰陽陽癩急驚陽動而速身熱脈浮口

中氣熱大便實而小便赤或食不食其病在腑而易治也陰癩

慢驚陰靜而緩身涼脈沉口中氣冷大便瀉而小便青或吐或

不吐其病在臟故難治也

分陰陽癩證

吐虛者曰慢驚風 瀉虛者曰慢脾風 吐瀉虛者曰陰癩

吐熱驚搐曰陽癩 慢驚風眼偏喜開 慢脾風眼偏喜閉

陰癩眼半開半閉 陽癩眼半鮮半青 急驚風十生一死

慢驚風十死一生



風癩之因

風癩者因將養失度血氣不和或厚 或汗出腠理開舒風邪入 為之曰風癩其病在肝肝主風驗其 證目青面紅發搐是也

驚癩之因

驚癩者因血氣感實臟腑生熱或驚 怖大嗜精神傷動外邪所 入為之者曰驚癩其病在心主驚 驗其證怒然口聲發搐是 也

食癩之因

食癩者因乳食過多傷動脾胃或食 傷中 或因生痰熱氣逆上 衝為之者曰食癩其病在脾脾主 食驗其證腹脹發搐是 也

在初心癩狀

已上三證大同小異蓋屬陽也各 自精詳科手是朝攝或 作猪聲發過即差皆十生一死也

論陰陽癩差後復作證

陰癩差後復發多死設有安者必須 少神眼目鮮斜語言不正 或口有痰涎流溢頤下或手足 偏癱癱瘓差後復作多延緣驚 風有三種所作忽發癩在耳失 治風涎流滯心包絡間或因驚 而再發或感風而發或傷食而 發過如舊或進退不定潮作有 時也

古書論說諸癩羊癩等類皆因 像立名為飾文其實皆 陰陽一證也

論癩狂癩瘖

癩狂癩瘖始本於心者精神之 昏亂也其證目赤面紅發 搐及為驚癩癩於內熱傳於 外脾胃因虛不能制腎 水上刑於心火陰陽并居遂 致精神失守恍惚多驚癩 之疾所由而生蓋重陰則癩 重陽則狂病則身軟而醒 強而溫癩之來也發則異常 或歌或哭乍喜乍悲狂之 證也妄言不食而歌晝夜而 走癩者發則吐沫或作猪聲 則腰背仰折狀如反弓痰壅 而厥良由風涎流滯心絡故 也 而失治損傷於心心傷則神 去神去則死矣設有安者則 語澁少神或緩弱為癩八

癩狂癩喜

重陰相勝必為癩 癩喜無時面目鮮 陽盛兩爭強自作

或歌或哭或驚

或歌或哭或驚 只為胸中聚毒痰 更被驚士重疊取 驚風不定後復傳 兩眼有如羊不睡 更加目睛定不安

大德有脈猶堪治 如沒大光不請言

驚傳二指後成癩 醫末牙關目上翻 明辯陰陽色脈

不拘輕重總風痰

癩來什地口流涎 醫舌唇青眼鼻奉 頭顛手推痰癩瘖

朝昏退醒復依然

慢驚難治後 涎壅溢難收 發歇成癩疾 精神不自由

胎中驚喜怒 傳作聲多端 而赤咽喉響 唇青吐沫痰

驚睛胸壅起 牙齦氣難覓 狂走無時節 頑涎積癩間

胎中驚喜怒 傳作聲多端 而赤咽喉響 唇青吐沫痰



風飛貫心竅 欲發臉如蠟 瘰癧墜方出 羊癲目白紅  
 昏昏常不醒 泥土亂朝食 日久癩難差 出齒感作癩  
 舌縮胸膈閉 通身汗不乾 口開肢體瘦 頃刻黃泉  
 大汗不止 皮鼓黑色 口開舌出 身體冰冷 胸膈聲絕  
 心下脹起 逆喘不通 羊睛血脈 頃刻噴痰  
 五臟獸癩  
 犬癩反折上竅犬叫肝也 羊癩目瞪舌手叫心也  
 牛癩目直視腹脹牛叫脾也 雞癩驚跳反折手變雞啼肺也  
 猪癩如尸吐沫猪叫腎也  
 五癩重者死病後食者亦死  
 癩者小兒之惡病也或有不及求醫而致凶者也然氣發於內  
 必先有候常宜審察其精神而採其候也  
 手白肉魚際脈黑者是癩候魚際脈赤者熱  
 脈青大者其脈青細者為平也  
 鼻口乾燥大小便不利是癩候  
 眼不明上視喜陽是癩候  
 耳後完骨上有青紋盛臥不靜是癩候青脈刺之令血出也  
 小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癩候  
 鼻口青時小驚是癩候  
 目閉青時小驚是癩候  
 身熱頭常汗出是癩候  
 身熱吐現而喘是癩候

喜大目上視是癩候  
 身熱目視不精是癩候  
 目撞丁卒大黑於常是癩候  
 四肢惕而驚手足動搖是癩候  
 則憂笑手足動搖是癩候  
 意氣下而妄怒是癩候  
 咽乳不利是癩候  
 身熱小便難是癩候  
 吐利不止厥痛時起是癩候  
 弄舌探頭是癩候  
 諸癩危證  
 目直無聲 目睛不轉 眼生白膜 眼慢唇黑 瞳人瞬動  
 眉間色青黑 面青指黑 口中涎沫如白膿 口噤吐脹不  
 乳 喉如錫聲 多睡不乳 身熱下血不食 身體痿軟不  
 醒 腹滿虛鳴 厥逆而痛 吐利不止 汗出壯熱不止  
 臥久不寐 癩瘡身體反張大人脊下容側手小兒脊下容三  
 指並不治 諸癩僵直什搐掣但扶持之謹勿把捉  
 大之散 治嬰孩小兒胎癩正發未分差後  
 天漿子炒 全蝎稍心二十方風去蘆又  
 天麻 辰砂五錢 麝香一字  
 右為極細末用乳汁調化不拘時服



安神散

治驚風心驚

茯苓 去心 各一錢 白鮮皮 二錢

人參 去蘆 各一錢 遠志 去心 各一錢 石膏 二錢

犀角 鎔 各一錢 甘草 炙 各一錢

右判散用麥門冬去心同煎不拘時候服

獨活散

治嬰孩小兒風癩解表通裏內熱

獨活 去即 川芎 各一錢

天麻 煨 防風 去蘆 各一錢 細辛 去葉 各一錢

荆芥 穗 各一錢 甘草 炙 各一錢 大黃 煨 各一錢

右吹咀用生薑三片同煎食前服

化風丹

治嬰孩小兒風癩

天南星 煨 天麻 煨 各一錢 桑活 去蘆 各一錢

獨活 去蘆 各一錢 防風 去蘆 各一錢 人參 去蘆 各一錢

荆芥 穗 川芎 甘草 炙 各一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化或紫蘇煎湯食遠服

風癩湯

治嬰孩小兒風癩痰熱相感而動於心風痰相亂則

頭悶無知口出涎沫或禁不言身反目直

竹藤 地黃 生 防風 去蘆 各一錢

薑 生 麻黃 去蘆 各一錢 防己 各一錢

附子 炮 去蘆 各一錢 桂枝 去皮 各一錢 石膏 二錢

龍腦 各一錢

右判散用本煎不拘時候服

鐵粉圓 治嬰孩小兒風癩無特心悶吐沫

龍齒 煨 輕粉 天麻 煨 各一錢

天南星 煨 麝香 各一錢 沒藥 二錢

牛黃 一錢 麝香 半錢

右臘日或端午日為極細末用水煎如梧桐子大煎服

湯研化食遠服先煎入藥之際取水之時切勿不得語

女小兒雞六指見驚亦可

大寶丹 治嬰孩小兒驚風驚厥癩疳吐言識語如見神鬼大則行走如飛不可止

羚羊角 犀角 玳瑁 各一錢

琥珀 防風 去蘆 各一錢 茯苓 去皮 各一錢

天南星 煨 各一錢 辰砂 水飛 一錢

麝香 龍腦 各半錢 金箔 三十片

右為極細末煎米泔糊圓如芡實大用薄荷煎湯研化或紫蘇煎湯研化不拘時候服

疳膽南星散 治嬰孩小兒癩後疳不能言

天南星 煨 各一錢

右為極細末用雄雞膽汁調化食遠服

牛黃膏 治嬰孩小兒風癩未開抽掣痰潮

天南星 煨 全蝎 去毒 各一錢 蟬蛻 去足 各一錢

僵蠶 去毒 白附子 生法 各一錢 防風 去蘆 各一錢



天麻散

右為極細末萊菔去皮核取肉同和水銀一角研入藥末  
如小豆大用荆芥穗生薑同煎湯研化食遠服

沈浴散 風截劑

薄荷三兩五錢 防風去蘆二兩 荆芥二兩

石膏 梅根各一兩

右為極細末每用三匙水二碗煎五七沸適寒溫浴兒先洗面  
後浴身體避風處佳

麻黃湯字異義同

楊氏曰發痘證候由先傷於風又感寒濕致之此虛極生熱熱  
極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出又自嘔逆醫士不開汗

之必發痘濕家發汗稍多亦發痘痘背強直腰身反掣口不開  
痰嚔口不語發熱腹痛鎮日不醒其壯可畏病在足太陽經剛

症無汗柔症有汗其面紅眼赤牙緊口張痰涎壅盛身清煩渴  
小便赤色先識語而發者此剛症也其大便滑泄不渴不語先

手足冷而發者此柔症也剛柔二症亦如陰胸陽胸陰之類  
剛症為之發汗柔症為之解肌證治有法醫士圖之

治法先與消痰順氣為上同是病熱稍止後後審其熱之輕重  
而解利之熱輕者散毒散熱感者小柴胡湯壯熱胸滿口燥咬

齒而大便秘結者是為內實大承氣湯下之得病以來無汗用  
麻黃按方有汗則麻黃謹勿用也其若痰寒氣感則大南星半

夏茯苓以消其痰松實陳皮蘇以順其氣痰消則風止氣順

神醒則痰無之發好發症為之解肌難痊十救其一

三日不治

溼則身強直 症則 足水冷

濕病強直

強直反如弓 神昏似 風 涎流唇口動 痰涎壅胸

小兒痘症病停汗 氣 心胸閉不通 乳食有時開口懶

情俄顛弱少奇答 睡 驚驚如搐搦 目睛半動似瀉風

自肺胸壅剛柔症 細 陰陽始見功

治剛症有熱服小柴胡

治剛症胸滿內實口緊 瀉服大承氣湯

治剛症無汗服麻黃湯

治柔症有汗服桂枝湯

治柔症厥冷自汗服理中

治柔症自汗肢厥服冷服

防風溫膽湯 治嬰孩小

半夏 薑製一兩

橘紅 去白

右制散用生薑三斤紫

麻黃為根湯 治剛症無

麻黃 去節

去為藥 葛根

右制散用葱白一根同煎不拘時候服



桂枝湯根湯 治寒症有汗

桂枝

赤芍藥

甘草

葛根

右剉散用生薑三片棗一箇去核同煎不拘時候服

至聖散 治嬰孩小兒中風癱病昏悶不醒

全蝎尾去毒二箇 晚蠶蛾

天藥子

白附子炮各五錢 辰砂水飛一分 麝香一分

右為經細末用薄荷煎湯入酒二三滴調化不拘時候服

中風

小兒中風者以其血氣未定寒溫失調內則感熱蘊蓄於外則發理虛開致風邪自背上五臟俞而入乘其外虛而暴中之其

昏不知人壯熱狂燥搐掣氣逆口噤痰潮必有五臟中風之

蓋風寒暑濕亦能中人是也

楊氏曰小兒多因感風寒不能發散致風邪入肺臟之絡遂

肺風口能視人口不能言是其候也

楊氏曰是風也始入於淺膚次達於經絡而搏於筋脈風入額

頰之筋則口喎而牙緊風入頰則喉閉之候也

與氣搏氣以移隔則喉閉如射船之擊搏於筋脈則筋抽

筋牽痛脈必浮緊得熱則緩也人隨脈必浮洪風入寒則

急風夾熱氣即緩弛宜追風毒散散大抵脈浮洪在表脈沉

在裏脈促病在上在表宜發散在裏宜疏導使於上則脈

者宜吐之若虛寒者附子川烏不可缺古人治法以類

天醫消息權度而投焉

宋氏曰治風先理氣不可專服風藥攻之愈急則風勢愈甚且

調理氣活血和平榮衛調陽則風疾不治而愈

楊氏曰中風者人之驟病也一時倉卒若未能精審五臟受證

且先與搐鼻開關豁痰下氣蓋諸中風皆因痰鬱氣滯而作痰

消氣下病勢稍蘇然後辯證

治風先理氣良劑小續命湯為上排風湯次之然一藥主風不

主氣須以人參順氣散烏藥順氣散佐用其氣一流行則風

自疎散矣順氣則蘇合香團南木香等藥則白附子天麻

半夏可用如銀粉磁石等謹勿妄施寒毒入胃則血脈凝滯

氣銷鑠而成癱人俗謂熱則生風者則天雄附子桂川烏不可

缺也

巢氏病源曰小兒中風之證肝中風則踞坐舉頭不得若驚

面黃急治唇黑面白下治心中風則但能仰臥不得若汗

出唇紅急治唇黑面黃治脾中風則腹滿而身黃若吐清

水可治面青足冷不治肺中風則偃臥而胸滿急胃悶不

人事面白血治面赤赤治腎中風則目黑而腰疼兩脇未打

色急治齒黃髮直面如土色不治此五臟所中之證若用藥差

則的成顛癇也

中風惡病細推求 口噤須逢脈數喜 眼合不開并氣昏

面排面黑手難收 口張吐沫氣龜大 髮直搔頭汗不流

軒軀喉鳴善鼻冷 遺尿瀉血並皆休



先以搐鼻... 治者不治

皂角煨去灰

細辛去葉

天南星去毒生

半夏去灰

右為極細末用小蘆管盛藥末吹入鼻中牙關緊者為極細末梅去核同藥末擦牙加麝香一字

吐逐風痰

豬牙皂角二片炮去灰

玄胡索十箇

右為極細末用新汲水灌

掃涎散

治嬰孩小兒中風昏悶

豬牙皂角一條去灰

礬二錢一分

輕粉一字

右為極細末用溫水調灌服不致大吐但微出冷涎二三口

便醒

瓜蒂散

治嬰孩小兒吐乳者可用治風痰壅塞諸藥化不下

者

甜瓜蒂為細末加輕粉半字清水調灌服良久痰自出合沙糖一塊下咽即吐

小續命湯

治嬰孩小兒剛柔及不分之症中風

麻黃去節

人參去蘆

黃芩炒

杏仁去皮尖炒

芍藥炒

甘草炙

桂去皮各五錢

附子炮去毒反

防風去蘆又十錢半

剛柔不分加附子生 大便自利厥冷加附子炮

右到散用生薑

三片同煎食前服

排風湯

治嬰孩小兒中風邪氣入於五臟狂言妄語手足不仁痰涎壅盛

白鮮皮

白朮

當歸酒洗

桂去皮

杏仁炒

甘草炙

蘇黃炒

茯苓去皮

右到散用生薑二片棗一箇去核同煎食遠服

人參順氣散

治小兒感冒風寒頭痛身熱重中風疏通氣

道然後服風藥

川芎

白芷

桔梗炒

白朮

甘草炙

陳皮去白

枳殼去穢炒

白薑炮

烏藥

人參去蘆

右到散用生薑二片棗一箇去核以前不拘時候服有熱去

白薑

獨活湯

治嬰孩小兒驚癇鶴膝及吐風濕日久致腰背手足

疼痛日輕夜重四肢不仁

獨活酒洗

當歸酒洗

白朮

黃耆炙

桂去皮

牛膝酒洗各二錢



甘草 各一錢

右咬咀用生薑二片雞白一棧同煎食前服

驚風散 治嬰孩小兒卒暴中風全不能言口眼喎斜驚癇

聖藥寶煩悶神昏有熱睡臥不穩

防風 去蘆義 兩半 天南星 生去 皮 甘草 生

半夏 去蘆義 炒 黃芩 炒 各

右咬咀用生薑三片同煎不拘時候服

三生飲 治嬰孩小兒卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂痰

厥氣厥

天南星 生去 川烏 生 半夏 生去 騰

木香 各一錢

右剉散用生薑五片同煎調蘇合香圓自然汁擦牙不拘時

候服

疎風散 治嬰孩小兒五臟中風身體不能自收冒悶不知疼

痛口不能言筋脈拘急手足抽掣

防風 去蘆義 犀角 麻黃 去節

當歸 去尾蘆 川芎 羌活 去蘆

人參 去蘆 遠志 去心 茯神 去皮木

甘草 炙半錢

右咬咀用水煎食前服永除根木不成癩疾

百部圓 治嬰孩小兒肺中風

百部 炙五錢 杏仁 去尖炒 麻黃 去節

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用酒送下

白圓子 治嬰孩小兒驚風中風痰厥

白附子 炮 天南星 去腐爛 半夏 生去 騰 各五錢

天麻 煨 全蝎 去毒炒 礬石 去青絲炒

川烏 去皮尖煨 各二錢半

右為極細末生薑汁煮麪糊圓如芡米大用生薑煎湯不拘時候服

白圓子 治嬰孩小兒驚風中風

天南星 去皮 白附子 生 各 半夏 生去 騰 各

川烏 生五錢

右為極細末以生絹袋盛用井花水攪末出者更以手揉令

出如有滓更研再入絹袋攪盡為度故磁盆中日懸夜露至

時棄水別用井花水攪又懸至來日早再換新水攪如此春

五日夏三日秋七日冬十日云水懸乾後如玉片研細糯米

粉煎粥清圓如芡米大用薄荷煎湯不拘時候服

蘇合香圓 治嬰孩小兒心腹刺痛啼叫下止或中邪氣或衝

客忤驚氣入腹夜啼齒痛面色不定辟邪氣瘟疫除癩霍亂中

風九積疔瘡疔瘡氣塊狐狸鬼魅狐魅鬼疰吐瀉痢證

蘇合香 酒熬膏 乳香 朱砂 水飛

安息香 酒熬膏 人參 去蘆 白木

沉香 青木香 檀香



丁香

香附子炒

犀角鎊

異香茄

阿梨勒炮去核麝香二錢半

龍腦一錢

右為極細末除安息香乳香用酒浸透研成膏與蘇合香湯瓶內蒸透同入藥末煉白蜜圓如芡實大用熱湯研化不拘時候服

蘇合香圓 治證同前

蘇合香

乳香

龍腦各一錢

白木

丁香

朱砂水飛

青木香

檀香

沉香

犀角鎊

安息香

香附子炒

阿梨勒炮去核麝香

麝香

異撥各二錢

右為極細末同前藥修合

小兒驚風發搐及慢驚脾風鼻流清涕中風不醒人事

天南星

燒存性川烏去皮尖燒存性三錢玄參去蘆四錢

薄荷葉四錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化不拘時候服有蘇沈良方但天南星川烏各一箇薄荷玄參各五錢

烏犀膏 治嬰孩小兒驚風中風發搐化痰退熱

薄荷葉

烏藥燒存性京墨三錢

鵬砂三錢

麝香

朱砂水飛

玄精石

研牙皂角各一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化入藥汁一煎服

精

古人有言不盡意者非失言也如用前功不可得而書乎經之謂且學者初機未可便得純粹廣見之謂識開通心智曰狀運出狀後可謂之醫在也此科最難學最難教最難要緊今病家將作尋常醫士不識此理之謂也

至博變方覺困重之務以心信平

東漢王氏不言與馮及潤則連連而已所證治法之謂也小兒有自幼及長不患驚風潮疳癩瘡者有之矣未聞無患積

證者謂五臟之所積名曰積六腑之所積名曰積小兒只理五臟受病故不有六聚候者何腑為陽雖有積入而不自愈且

胃屬腑氣主以漸乃脾主食有疾當治之積屬陰治之七難治四季有積欲下之理皆可用藥但與藥其性宜後利之

有積氣不能全消量其積重故古人有按積積積化積化積不積之說足知積之不可不真以獨下其積虛極元氣耗散

胃今其克實次與推下若積證一二三停作之者宜先下而後調胃藥服稍用劑置不免為它咎乃計利害所議積證作也

用與之安和一味宜下斯為良法有積不可安養人則為它病

雖積證先宜定去寒熱寒熱已去方可換下以通其下之



治之尤宜深究無令得失

積聚之因蓋由心怒生冷麵食肥滯物停於臟腑

陰陰氣不行蓄積一處不動故曰積積屬陽氣運轉不定遇

上即聚故曰聚積之候黃虛腫面黃地而吐小便如油腹脹

虛鳴頭髮焦黃下痢赤白兩眼黃赤滿身虛腫昏困多睡者是

也若面白喘急面黑眼直口出熱氣手腳心主澹乾不食瀉

住入瀉腹急如鼓項軟口噤手足俱細則難治

經言病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故陰

沉而伏陽伏而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者

五臟所生也聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其

痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始

發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚故以是別知積

聚也

楊氏曰止以二積論之治積不得峻取

食積者乳食無度多殘過飽飽而便解腹脹

其證吐硬而熱痛瀉吐乳

乳積者啼叫不已便乳兒痰氣結聚停滯不化

其證吐乳瀉乳其氣酸臭

氣積者乳母怒氣過忤兒食氣乳停滯不化

其證腹滿啼叫瀉痢如蠟

湯氏曰論五積乃風積肝積食積疔積驚積

吐乳瀉乳其氣酸臭因啼叫未已乳哺停滯不化得

食積

肚硬帶熱瀉瀉或嘔因飲食過飽飽後腫眼白睛浮

氣積

腹瀉啼叫痢如蠟因瀉忤其氣禁衛不和日久得

虛積

渾身微熱或冷不思乳食昏睡或頭面手足肢壯浮腫乳食不

化

壯熱發硬身熱而渴嗜食善飢

積痛

口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡臭食或大便酸

臭者當摩積藥治之

積證有傷乳傷食而身體熱者惟肚熱為甚且夜間有熱者傷

積之明驗也

驚積

小兒驚積本因痰 壯熱肝心兩臟停 潮熱而青痰中響

速與涼脾利下是

大腑無時泄下青 凡人啾唧似生真 解驚去積宜施劑

互效精神起肝毒

傷積

頭痛身熱腹微脹 足冷神昏只愛眠 因食所傷積氣動



下宜遲緩教為尤

面黃目少精光 多睡嗜前被食傷 嘔逆出酸氣息

時時腹痛陣難常

腹脹時時好覆肌 髮黃眼赤吐并宜以嗽 更無瀉下腸鳴

甚 去積消積立見痊

夏日食瓜菓 肥疳積不將 病因多積熱 秋後利難當

傷寒餓喉臭 煎瀉瀉白肥 積滯物不化 給食又還稀

食瀉重當取 疳虛要補虛 再傷宜再取 何患積難除

食積熱

究源曰小兒脾胃嬌嫩乳食易傷脾胃虛冷不得剋化

其證有面黃腫肚熱腹脹多困多啼乳食減少夜熱蒸涼

下泄酸臭水穀不化便前無禁

嬰孩食積熱 氣急不尋常 寒熱常如瘧 瀉瀉要呼漿

眼滿頭堆腫 吞便更瀉瀉 睡安合地睡 此是積為傷

脈實氣口緊或解其虛實宜辨實宜取

小兒五積候 還因乳哺成 先從腹肚脹 次後回虛形

多睡回什地 小便似油清 髮直兼毛豎 眼黃是積名

白痢更兼赤 吐逆腹虛鳴

虛積熱

若患虛積熱 渾身熱又羸 脚毛着看細 肚急硬如吹

且食還增愛 瀉瀉盡如脂 終日無懼色 唇紅不可醫

積熱

積傷腹痛吐酸帶 喘急延高乳食稀 瀉瀉不常類發熱

傷積熱

新熱多因積在脾 瀉瀉如瀉入脾經 潮來及內汗須記

煩渴傷熱更發時 其脈轉虛其熱甚 凉心此患自然難

有他且時發形傷 青者蒸風亦積積

善治食傷

作瀉不甚寒 或吐又不吐 乍瀉乍瀉 多言多怒

小便瀉難治 大便物不聚 驚悸與食傷 嘔前難乳哺

乳食類傷

乳食若類傷 為痰亦為積 吐而臭酸醒 瀉多惡氣息

腹脹腹脹 腹黃疳瘦痛 或倦或嘔煎 不眠不安動

之

寒熱因積

壯熱寒時又亦寒 皮膚燥熱髮毛乾 非十神鬼為邪祟

取下脾間積始安 素問云寒熱生於脾積生於心也寒即

即寒

食停中脘

食停中脘內 嘔逆氣難通 不瀉特為痛 生痰必引風

食物難消化 脾胃有積停 腸及結聚作瀉 進退不安寧

因乳傷飽



因飢傷太烈 氣脹腹膨時 渴汗汗黃熱 嘔噎不寧行

腹大非飽

腹大非干飽 多食只是飢 胃深常胃熱 肌體致疰羸者

不知飢飽又不飽 肌肉不舒故也 大便必精液由腸胃不守故也

百歲地腫

傷者傷脾金 心煩腹地脹 腹脹致渴燥 止與瀉相連

虛脹皆因食積傷

虛而傳滿瀉相連 動氣實 氣實

積虛虛腫

因食傷傷脾 肌膚壯甚次 腹脹多氣促 瘰癧無疑

積熱虛腫

積在脾中熱不通 至令臉赤又唇紅 胸膈氣急吐無大

真氣必立動肺風 喉裏作聲亦上聲 驚悸腫起熱來衝

只消原部心中病 三日之間見效功

積病可醫

面上虛腫是積 面合地計是積 小便逆滯是積 腹脹是

積 髮黃是積 赤白痢是積 兩眼黃赤睛言是積 遍身

虛腫是積 多瀉白晝是積

積病不可醫

喘急息肺積 面黃是腎積 吐熱氣熱積 手脚心生瘡疔

積 惡心吐乾嘔胃積 瀉久住入瀉積交皮爛

痞

痞者音甫入音 傷氣得之心腹膨脹肚大脇滿痛刺往來注在左

肋向者肌瘦倦怠無力久而不治漸在痞塊又曰氣塊痞者寒

也結者實也熱氣蘊於胸膈之間留飲聚於腹脇之內於是榮

衛不得流行臟腑不得宣通由脹滿而至痞結使然此熱

實之證

痞似結胃

證同前論應無痛 病在陰經下甲虛 邪毒結留心下滿

此名痞氣胸中居

癖氣

癖者音僻積得之其證如腸癖之疾便利無度滑不成糞似痢非

痢似非非蟲腹肚乾痛上築心胸滿悶久而不治頑結不散後

結成塊者類痞狀

楊氏曰小兒乳哺失調二焦闌格以致水漿乳哺停滯腸胃不

能宣行今氣結聚初得成積久則血膜包水時時作痛或為潮

熱或生寒熱及應家多於中脫黃積黃水日久結癖寒熱不已

幼幼方曰由脾胃虛冷乳食積滯不能剋化以致血膜頑痰叢

積而成癖

湯氏曰小兒食積其壯在右脇時後心多驚喘乳癖在心時

或上下疼痛嘔吐發熱疳癖在脇下如水梳子疳癖在右左脇

多啼惟驚積在心頭不動因驚積而得痰涎凝滯不動多驚者

於取積藥中不問是半夏變化痰之劑實者取而後補虛者補



而後取

小兒癖者血膜包水癖則於過傍時時而作痛也惟癖為能發  
潮熱生寒熱致瀉家中脫多蓄黃水日久而後結癖寒熱之不  
已者以此小兒臍腑和平禁衛調暢則津液自然流通縱使多  
飲水漿不能為病惟夫乳哺失調三焦開格以致水漿停滯腸  
胃不能宣行冷搏之於是結聚而成癖

小兒癖積久則癥瘕疔瘻隨之噯臭酸餒寒熱間作心膨肚脹  
拋浮黃癖虛實治之

小兒癖證在脇腹間亦虛中之積先寒後熱飲水不食以致喘  
嗽證

錢氏小兒以癖為潮熱治法詳散寒熱即與下癖痞亦在左右

全幼心鑑  
小兒心鑑  
全幼心鑑

按中有癖

小兒癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水或喘嗽與潮  
熱相逐不早治必成疳以其有癖則令兒不食致脾胃虛而熱  
發故引飲水過多即蕩滌脾胃亡失津液脾胃不能傳化水穀  
其跡沉細蓋不食脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳

虛癖

小兒虛癖積者有實中之虛虛中之實補下  
候當細詳藥有  
諸癖及死候不治

受歲酸餒息 昏昏顛語言 兩補寒熱作 乳食少胃冷

胞臉浮黃色 心膨腹不寬 臍中停積滯 疎利吐輕矣

虛癖豈無因 昏昏似顛形 疳時溫熱作 更夜渴方慳

百類浮青白 酸餒臍腑停 日深加足冷 寒熱轉相親

癥瘕疔瘻積因傷 腹脹筋 且面色黃 發熱有時加更渴

不狀舌上又生瘡 本因積久成頑結 男左女右居臍脇 俗云通務不須聽

化癖調脾白安帖 元因乳食聚脾肝 或即橫膈連腹痛

無時隱見臍間安 虛癖朝熱未退 因傷積滯未消除 口乾唇白多煩渴

發熱頻頻氣若濡 不食痰生胃轉虛 瘳積死證

全幼心鑑  
瘳積死證

瘳心類刺痛 氣短喘加煩 滿肚蓋如鼓 皮焦瘡紫斑

唇臉始藍色 臍連腸硬積 瘳瘳諸積證 死候其醫者

青紫 吐痰黃水 目眦紅血 肚滿如胞 皮焦黑點

舌乾唇縮 心下赤浮 兩脰白爛 腎陷自瀉

面黑瀉黑 久痢不止 吐利交作 臍肚脹滿 氣出鼻大

手心生瘡 瘦弱柔軟

一切癖積候變作死證

面紫黑氣喘涎壅肚脹如鼓服藥不利

腹中刺痛湊心忽瀉下鮮血口唇舌黑縮

肚痞脹上生小瘰瘡自刺面青多



手足心忽腫起發反熱口鼻吐出青黑血  
作寒熱日久體虛忽發搖不住面青口伴涎出

肚腹臍出熱感刺痛面青吐瀉出蟲

紫圓子 治嬰孩小兒乳哺失節宿滯不化腹脹痞滿嘔吐惡  
心便利不調乳食減少又治傷寒溫壯內挾冷實大便酸臭乳  
食不消或以待汗身熱不除及變蒸發熱多日不解因食成疳  
先寒後熱

代赭石 醋煨 赤石脂 煨各 杏仁 去皮尖麩

巴豆 一錢淨洗巴豆取仁二錢重去膜心出

右除杏仁巴霜外研為極細末入杏仁巴霜同藥研勻水浸  
蒸餅圓如黍米大兒生三十日外服一圓用乳汁或米飲亦

得微利即差

千金云無所不治雖下不虛八

消積圓 治嬰孩小兒中脘積食不消吞酸惡心口吐清水心  
腹刺痛腹泄如痢

烏梅 去核七箇 白芷 霜三錢 巴豆 去皮尖心油二箇

杏仁 去皮尖炒半百及七次九箇 縮砂 去殼二十一箇

右為極細末煮麵糊圓如黍米大每服三五七十圓用生薑  
煎湯食前服

下積圓 治嬰孩小兒乳食傷積心腹脹滿嘔吐泄

瀉

丁香

縮砂 去殼

史均平 去殼五箇

右為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲食後服

七聖圓 治嬰孩小兒宿食積滯腹脹吐瀉

三稜 煨 蓬莪朮 煨 縮砂 去殼

右先用醋浸羌花一宿少乾入一棗連皮入同炒赤色入

青皮橘皮川棟子杏仁各一錢極細末煮麵糊圓如黍米大用

白湯食遠服日間所食之食物盡行消化水無積滯

快膈消食圓 治嬰孩小兒宿食積滯腹脹吐瀉

三稜 煨 蓬莪朮 煨 縮砂 去殼

橘皮 去白 神麩 炒 麥藥 炒各五錢

香附子 炒一兩

右為極細末煮麵糊圓如黍米大用生薑煎湯或白湯食遠服

看輕重却用下積藥一方加枳殼麩炒一錢

消積圓 治嬰孩小兒積聚腹脹吐瀉食化滯物

木香 去殼 參 去殼 炒 去殼

水香 去殼 橘皮 去白 青皮 去殼 炒

右為極細末用麵煮糊圓如黍米大用米飲食後服

五積圓 治嬰孩小兒疳積諸積

天南星 炮去毒 風積 鱗金

天南星 炮去毒 風積 鱗金

天南星 炮去毒 風積 鱗金



桂去灰 麥積

麥積子 去灰 碾碎各三錢 麥積

巴豆 去心油 食積

右為極細末蒸餅圓如赤米大用薑蔥煎湯食之

香稜圓 治嬰孩小兒清積聚微塊

木香 各一錢半 用薑蔥炒

枳殼 去穢 炒 青皮 去穢 炒 三稜 煨

蓬莪朮 細切用巴豆七箇天殼同炒 巴豆赤色不用巴豆各一錢

三稜圓 治嬰孩小兒積積清積連食

三稜 煨 蓬莪朮 炮 神曲 炒

麥蘖 炒 青皮 去穢 炒 陳皮 去白

全幼心鑑

右為極細末蒸餅圓如赤米大用赤米飲食連服

香稜圓 治嬰孩小兒積氣發熱肚腹脹脹肢體瘦弱飲食不

滋肌膚

木香 丁香 檳榔 去穢

枳殼 去穢 炒 青皮 去穢 炒 三稜 煨

神曲 炒 麥蘖 炒 各一錢 丁香子 去灰

蓬莪朮 煨 青皮 去穢 炒 陳皮 去白

香附子 炒 各五錢 胡黃連 一錢

右為極細末蒸餅圓如赤米大用赤米飲食連服

香積圓 治嬰孩小兒積滯不化腹脹痛

心便利之調乳食減以消痰泄瀉大便酸臭等症

食退黃長肌

二稜 煨 丁香 各七錢半 乾薑 炮半錢

巴豆 去皮心 油七箇 青皮 去穢 炒 丁香 各二錢半

右為極細末醋煮麵糊圓如赤米大用生薑煎湯食之

藥不用大黃研砂赤粉之類並是性溫之藥

七香圓 治嬰孩小兒溫中 快膈化積和氣嘔逆食噎疳積

甘松 一兩六錢 益和 去穢 一錢 香附子 炒二兩四錢

丁皮 甘草 炙 蓬莪朮 煨

縮砂 去殼各四錢

右為極細末蒸餅圓如赤米大用生薑煎湯食連服

長生圓 治嬰孩小兒寬上實下補脾化痰

木香 二錢半 檳榔 去穢 枳實 去穢 炒各五錢

半夏 去穢 湯 丁香 縮砂 去穢

肉豆蔻 麵裹煨去油各一錢半 全蝎 去毒炒十箇

右為極細末白米飯圓如赤米大用米飲不拘時候服量見

大小以意增添圓數

鶴頂丹 治嬰孩小兒傷乳食發熱咳嗽食積肢脹疼痛癩疾

大便秘結

半夏 去穢 湯 杏仁 湯泡七次 巴豆 去皮心油

右為極細末成片入乾腦脂半錢用烏梅湯水麵糊

米大用生薑煎湯食前服



肥兒團 治嬰孩小兒脾疳積黃疳 疔大口臭好食泥土消

胡黃連 神麩炒 麥蘖炒各五錢

檳榔 去穢一兩 木香一錢 肉豆蔻 麩炒去油

史君子 去穢各一錢半

右為極細末蒸餅團如黍米大用酒飲食後服

福園子 治嬰孩小兒陰陽不和 疔怯弱乳食不消心腹脹

滿食噎乳癖痞結冷痛嘔逆氣急助喘瀉頻併腹中冷痛積

聚腸胃或秘或利頭面浮腫不思乳食五種瀉氣八種痢疾肌

肉消瘦氣羸腹大神色昏惰情意不樂散冷氣調臟腑進飲食

蘿蔔子 炒五錢 陳皮 去白 青皮 去穢炒

三稜 煨 蓬莖木 煨 黑牽牛 炒用頭末

木香 半錢 胡椒 一錢

右為極細末其麵糊團如黍米大用生薑煎湯食後服

三稜散 治嬰孩小兒氣積腹瀉消乳食

三稜 煨 蓬莖木 煨 甘草 炙

益智 去殼 青皮 去穢炒 陳皮 去白

神麩炒 麥蘖 炒各一錢

右為極細末用白湯調化不拘時候服

丁皮散 治嬰孩小兒脾疳積夜痛

丁皮 木 茯苓 去皮

青皮 上穢炒 陳皮 去白 烏蘞

神麩炒 麥蘖炒

甘草炙 桂 去皮各半錢

右為極細末用燒脾湯調化食後服

安胃和脾散 治嬰孩小兒脾胃不和腹滿氣痞嘔吐痰涎

氣吞酸面黃肌瘦腹脹潮熱便閉不調乳不思乳食不化

蒼朮 去皮重製如前色二兩 人參 去殼

白朮 茯苓 去皮 青皮 去穢炒

陳皮 去白 蓬莖木 煨

三稜 煨 蓬莖木 煨 檳榔 去穢

澤瀉 甘草炙 厚朴 木清水浸去皮

東 去殼焙二十四箇

右為極細末用生薑煎湯調化不拘時候服

消積散 治嬰孩小兒脾虛冷不能消化乳食致成積冷氣

和氣虛虛積以類調脾進食

縮砂 炒 陳皮 去白一錢 烏蘞 香附子

丁香 甘草炙各一錢 香附子 炒

高香 炒 麥蘖 生 三稜 煨

蓬莖木 煨 蒼朮 米泔浸 厚朴 去穢炒

青皮 去穢炒 枳殼 炒 神麩 炒

右為極細末用米飲調化食前服或冬瓜子炒黃連煎湯送

下 嬰孩小兒脾疳積夜痛

神麩炒 麥蘖炒 烏蘞 香附子 炒



久不醫漸成癥結又曰食結

癥音加 傷血待之胸膈鬱悶痛引少腹時或攻築上脘心腹  
雖不阻食肌肉不生久而不治漸成癥結之口血結

小兒癥瘕者臟腑之內久積聚令兒腹內有塊癥者是一處不  
動瘕者腹內去來不定也

癥瘕痛乃久積所致亦能成疳此皆禁衛俱虛外則感受風寒  
內則過傷乳食停滯既久不能消化故邪併於陰為癥陰則專  
靜凝而不移邪併於陽為瘕假物象形動而不息蓋此二證若  
久而不治亦成脾疳積或兩脇間有塊如石按之則痛不按則  
輕或面黃肌瘦肚硬而脹及有青筋晝涼夜熱蒸潮無曉乳食  
減少愛喫泥土或大便酸瀉痛則身冷如冰法當調脾養胃磨  
積消滯此積滯之疾非比劑可療也必須次第調理則日久自  
然愈矣

大凡腹痛初非一 不特癥瘕與疳疳 分條析類證多端  
看取論中最詳悉

檳榔圓 治嬰孩小兒消食癥瘕積聚

檳榔 去穢三箇 水香 麩粳 青皮 去穢記二二二

炒半時 陳米 半合 炒去穢 去穢

右為極細末蒸餅圓如黍米大用米飲食前服看虛實大小  
加減

北柴胡散 治嬰孩小兒疳結癥瘕積聚往來腹肚疼痛

北柴胡 去穢 人參 去塵 木香  
枳殼 去穢 二稜 煨 檳榔 去穢 各半  
赤茯苓 去反 甘草 炙 各三錢

腹痛

右咬咀用生薑一片同煎不拘時候服身體瘦瘠加東去核  
一箇如熱甚汗多加黃耆蜜炙三錢

楊氏曰俗謂脾家疼痛出於胃虛不究病源多用和養等劑以  
致掩蔽邪氣蓋腹痛多因邪正交爭與臟氣相擊而作也受證  
非一或熱痛者壯熱面赤或四肢煩手足心熱藥宜四順飲加  
青皮去穢炒枳殼麵炒炒夾食冷痛者面白或青甚者面青唇  
爪爪甲皆青藥宜理中湯冷熱不調邪正交爭宜枳殼湯如青  
皮陳皮去白木香丁香桂當歸去穢炒有積傷脾則面黃腹脹  
夜熱晝涼宜紫圓子去其積風冷入脾則脾胃積冷中滿之痛  
登每歲月不可測識藥宜抽刀散以伐其積脾間如熱則在  
作乍止嘔吐清沫藥宜檳榔圓王之知此通一舉為矣痛止繼  
以養脾之劑療病如濯衣去其垢法方加藥備此為妙

枳殼湯

枳殼 去穢 煨 青皮 去穢 炒 陳皮 去白

木香 丁香 當歸 去穢 炒

右為極細末用燒鹽湯調化食遠龍

奪命抽刀散 治嬰孩小兒脾胃積聚腹肚疼痛



乾薑 巴豆半錢同炒黑去巴豆 良薑 炮十箇同炒

糯米 炒二兩半 石菖蒲 二兩二錢

右為極細末用生薑煎湯調化食前服

安息香圓 治嬰孩小兒腹肚疼痛曲曲而啼

安息香 成膏 沉香 木香

丁香 八角茴香 藿香葉 各三錢

香附子 炒 縮砂 去殼 甘草 炙各五錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用紫蘇煎湯研化食遠服

瘧

楊氏曰風寒暑濕邪自外來飲食居處邪由內作又曰豈特夏傷於暑秋必瘧瘧哉古人以暑受病最多言之爾夫瘧者始而

全如心錄

瘧

呵欠繼而足冷面青黃身熱拘急寒慄鼓顛腰脊俱疼寒去

未幾內外皆熱頭疼而渴但欲飲冷嘔惡防悶而不嗜食或內

伏寒痰涎從背起冷如掌大瘧之寒熱豈非陰陽二氣互相勝

負而作耶邪併於陰則寒邪併於陽則熱陰盛則寒多陽盛則

熱熾其寒也湯火不能溫其熱也冰雪不能寒其氣與邪氣交

爭病以作邪氣與衛氣相離故汗出乃解而病以休衛氣盡行

陽夜行陰得陽而外出故發於日間得陰而內持故發於暮夜

或隔日或二日一發或三日乃衛氣行遲爾若內外失守其邪

不分陰陽迭持寒熱互起則休作無定時矣

湯氏曰是以外因感受邪氣客於皮膚達於經絡內因停積乳

食痰飲漬於臟腑此瘧疾之胚胎也

聖惠曰瘧疾欲解則有汗汗出多則津液減耗又熱乘於藏則

生虛燥故渴而欲飲

張秘教曰若病瘧無汗非也

陽衰瘧則有傷寒證見大小便赤赤食瘧必腹脹腹脹厚壯熱

足冷脈緊手紋紫赤先表解調脾胃而後可下脾胃虛生痰其發必

有痰證脾脈弱四肢或浮先表解中加麻藥脾寒發瘧則面色

青黃四肢冷大小便或自利亦可養胃滋養之尋瘧皆寒而垢

嬰童瘧疾

瘧疾是邪成 陰陽有競爭 早期風府會 吳發奇所傳

至速連動發 來連間日行 小兒遭遇此 何必問神明

李如心錄

水鏡仙人百日内瘧

瘧是邪風寒熱收 直須術治免成危 常山刻作人形狀

丁釘孩兒生氣宮 如金生人金生在 此人本生在亥酉 上錄依此

冷物為瘧

寒熱性來頻 傷脾是病因 連朝勞血氣 問日信精神

瘧瘧無時作 連綿久不除 痿其羸漸瘦 添瘧骨中居

乳食動皆減 傷筋血不舒 漸喘加乾咳 持一表身軀

及傷於暑秋成瘧 問日連朝不少差 解表去邪須次第

再宜養胃固脾家

常山歌 治嬰孩小兒發瘧瘧瘧煩悶

常山

大黃

甘草 炙各一錢



桂心 烏梅 去核各半分

右剉散用水煎未發前服

清脾湯 治嬰孩小兒瘡疾久不瘥者脾胃虛弱形容憔悴

厚朴薑製炒 烏梅去核 半夏麩

良薑東壁土炒 青皮去穢炒 草菓去殼二錢半

甘草炙二錢

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎未發前服忌生冷油膩時菓毒物

驅瘡飲

治嬰孩小兒瘡疾日久脾虛胃弱

紫蘇 白芷 檳榔去脂

陳皮去白 茯苓去皮 甘草炙

前胡去蘆各五錢 草菓去殼 半夏去穢湯洗

右咬咀用生薑三片棗一箇去核入烏梅一箇去核同煎不拘時候服

驅瘡飲子

治嬰孩小兒調脾胃進乳食退寒熱

人參去蘆 藿香葉 厚朴薑製炒

白朮 白芷 半夏麩

陳皮去白 甘草炙

右咬咀用生薑一片棗一箇去核同煎看兒大小食遠服

人參北柴胡湯 治嬰孩小兒周歲以下寒熱

人參去蘆 柴胡去蘆 黃芩炒

半夏麩 甘草炙 地骨皮

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎食遠服

脾胃宿食不消驚惕不食

人以胃氣為本飲食不消命脾為中州土也胃受土之氣滋養萬物食入胃脾為磨化五味以養五臟榮養百骸潤澤四肢其根本也胃氣調則脾氣清消化脾胃虛冷則宿食不消脾熱生痰涎驚惕不食者心火解脾火能生土當以心藥入脾胃母能令子實脾胃有冷小兒涎多留在兩嘴角流出而不收潰於頤下名滯頤之疾俗謂之捏破涎高兒者

小兒滯頤涎流出而清於頤間也涎者脾之涎脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當溫脾

脾冷涎流

脾冷流涎唾 經云是滯頤 不宜類下濕 濕久損傷飢

小兒滯頤口因傷 清涎流出汚衣裳 此見脾虛善胃冷

遇人却道破涎囊 必朝服藥全無效 夜卧不止又流床

好先洗肺調胃脘 溫脾壯健保安康

溫脾丹

丁香 木香 半夏麩各五錢

青皮去穢炒 白朮 乾薑炮各二錢半

右為極細末煉白蜜圓如赤米大用米飲食前服

溫胃散

丁香二錢半 肉豆蔻麩炒 半夏麩

白朮 乾薑炮 甘草炙



人參 去蘆皮二錢二分半

右吹咀用生薑三片棗一箇去核同煎食前服

丁香半夏圓 治嬰孩小兒脾冷多涎

丁香 半夏 去穢生薄荷二兩搗碎炒黃

木香 各三錢 青皮 去穢炒 白朮

乾薑 炮各一錢半

右為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

金朱丹 治嬰孩小兒涎多乳食不下涎流不出口者名脾熱

金箔 十片 朱砂 水飛 半夏 去穢湯洗

天南星 牛膽製 石膏 茯苓 去皮各二錢半

右為極細末生薑汁圓用人參去蘆煎湯食遠服

全効心鑑秋

胃氣不和

同眩白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾

胃冷虛

面皸白色瘦弱腹痛不思乳食當補脾

脾胃不和受驚

小兒昏睡傷風熱傷食瘰疬皆相似未能變認可疎風退熱

便不可服驚藥峻下忌傷元氣人參羌活散性惺散小柴胡湯

加羌活去蘆防風去蘆以枳殼去穢麩炒生薑棗去核同煎

服和解散不致悞也惟傷食大便酸臭食物不化腹痛有吐瀉

之證

驚瀉不止青黃色 緊急收中睛轉黑 但看指紋青脈現

次進觀音散調服 此證紅綿表裏除 解毒清心真妙訣

醫士須用氣和脾 只依仙方勿有別

脾氣虛實

人以胃氣為本惟治病亦欲胃氣有虛有實虛則有嘔吐不食

實則有痞滿內熱之證虛者益之實者損之欲得其平則可矣

又不可關塞在酌量但以服之夫是之為脾胃

心者脾之母進食不止於和脾蓋火能生土當以心藥入於脾

胃藥之中庶幾兩得古人進食方劑多用益智者此也

益智 去殼 石菖蒲 茯苓 去皮

蓮肉 去心 橘紅 去白 縮砂 去殼

半夏 麩 木香 厚朴 薑製炒各二錢

全効心鑑秋

甘草 炙一錢一字

右剉散用生薑三片棗一箇去核同煎不飢飽服

嘔乳糞青

小兒嘔乳糞青色在胎之時母取冷過度冷氣入於胞胎之中

生兒之後悲啼未定承氣便與乳使乳冷氣蘊蓄於腹內久而

不散傷於脾胃輕則嘔吐糞青重則腹中氣響逆氣痰潮以致

難愈可服溫胃藥不可妄作驚治

小兒驚泄瀉則目白如淡墨下糞青黃吸啞微渴若見心喘

狂熱不止甚為死候不可治

氣弱更因驚 睛如淡黑形 乳多隨糞下 瀉出夾糞青

吸啞常微渴 寒溼 晚臨 心脾熱喘燥 轉見病相深



五蟲痛

夫蟲者由兒一歲之後甘肥不節生冷過度或食生粟炙肉魚生皆致生蟲其蟲因臟腑虛弱而動或食甘肥而動或胃冷而動或胃熱而動動則往來上下腹疼攻心疔痛叫哭仰身擗手心神悶亂吐涎沫或吐清水飲食不成肌膚沉沈默默其蟲不瘥傷心害人保生云蛔蟲九蟲之數入腹中皆有之小兒失亂而甫早或食甜過多胃虛蟲動令兒腹動惡心口吐清水腹上青筋是其證也

巢氏云蛔蟲九蟲之內一蟲也長尺亦有長五六寸者或因臟腑虛弱而動或食甘肥而動其動則腹中痛發作種聚行來上下痛有休止亦攻心痛口多吐涎及清水胃傷心者死小兒有

李物心錄

卷三

蟲於月初四初五間五更服至日午煎蠶下以和脾胃藥一二服調理或有蟲痛發作似癩但目不斜手不搖擗惟只心痛也

其候哭啼俯仰坐卧不安自按心腹時時大叫面無正色

或青或黃唇慢而白目無睛光口吐涎沫此為蟲痛

遺蠶圓 治嬰孩小兒蟲動腹痛啼叫口吐涎沫

檳榔去核

蕪荑去皮

雷丸

定粉

鷓鴣 炒各半錢

右為極細末川棟根煎湯煮麪糊圓如黍米大用史君子去

殼煎湯食前服

千金方云蠶攻下部燒艾煙薰

安蟲散 治嬰孩小兒蟲咬心痛來去不定不思乳食

蠶虱炒

檳榔去核

胡椒

川棟子根

檳榔

半生半取

胡

右為極細末用米飲調化食前服如有小蟲化為水大蟲

白下片初開服

霍亂者陰陽二氣相干氣亂於腸胃之間腸腑陰而不降

陽而不升邪正相干中脘節閉結滯於中卒然吐瀉成霍亂先

心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則瀉瀉後脾受則邪水

來勝土也

小兒內因脾胃虛弱乳哺停積外感暑寒暑邪正交爭於熱不

同藥有寒溫各異脾虛則吐胃虛則瀉脾胃俱虛吐瀉并作暴

吐暴瀉津液驟亡失其所養甚則轉筋入腹而死

經曰濕霍亂死者少乾霍亂死者多

治法必先定吐安胃為先次隨證止瀉丁香圓四君子湯加丁

香陳皮半夏生薑棗土核同煎食遠服安胃止吐伏暑熱者五

苓散用生薑煎湯調化食前服感寒者理中湯加丁香乳哺停

滯者史君子微利後服加味四君子湯

乾霍亂

乾霍亂者忽然心腹脹滿絞痛欲吐不吐似瀉不瀉痰壅腹脹

傾刻之間便致悶絕所傷之物因吐瀉盡則生若上不得吐下

不得泄瀉壅閉正氣關隔陰陽燥燥燥燥霍亂氣息少者危

治法先疎利為先服紫圓子鶴頂丹得吐者生不得吐者死



鹽湯吐法

調鹽湯一小鍾盛熱飲之手拈鵝翎於喉中導引其吐令三飲  
三吐方可不可得吐便止比方一死九生

鹽湯法

鹽一兩釜內炒大熱紙包用絛獲覆胸前并肚腹令熱氣入口  
即醒又對背灸中脘丹田灸

人病怕逢乾霍亂 濃心鹽湯乘熱灌 莫言畧通便到休

三吐方知停積散 却加木瓜尤良好 直須吐盡保身兼

急早便服蘇合香 再投消積圓子良 藥教連灌醫無效

然後調脾却不妨

先記青黃色兩般 定知風熱在脾間 怕人髮直眼不合

口是心中有毒逆 熱在脾間多燥渴 有熱無熱必為八

胃逆更宜早搖起 常常唇白口須乾 若還舌上生黃

過熱須知命莫延

全幼心鑑卷之四

嘔吐

有物有數名曰嘔乾嘔則無物有物無數名曰吐嘔者有穀吐  
則無穀嘔吐出物也胃氣不和是陽明經胃脈絡陽明之氣下  
行則順今逆上行作嘔吐者胃寒胃熱痰水宿食氣攻之證有  
傷乳氣乳吐熱吐寒吐冷吐傷食吐傷寒吐各受病非一治法  
不同凡吐不問冷熱久吐不止胃虛生風恐成慢候嘔吐每每  
太便秘上下壅遏氣不流行當利導之藥治之微候候胃氣將  
絕常嘔腥臭不保天年

小兒脾胃虛怯方作吐瀉其證有五有熱吐冷吐虛吐痰吐食  
吐所三熱吐者謂母飲酒喫肥炙燥醃鹹或胃風傷暑致熱兒

吐乳入胃遂成熱吐冷吐者謂兒胃冷加以宿冷之物與兒即

吐虛吐者其兒肌弱神困疳積未消胃堂又虛即吐痰吐者其

兒胃氣本虛復感寒邪生痰作熱留滯胸膈故吐食吐者其兒

脾胃飲食不節強食傷脾作熱神困後即吐瀉家但知其吐

不明其所以吐且吐無瀉其作名曰霍亂其吐候又推輕重有

五初見乳自流出謂之嘔嘔之不已即謂之吐吐之不已則作

嘔嘔之不已即傳嘔逆之不已即作噎噎者自嘔逆噎皆有吐

噎動氣嘔者口開而作噎者心胸上下氣逆鬱結噎者無物可

出即膈虛胃寒引氣噎噎作噎此等噎惡須臾證變即慢即風

熱吐者先去風痰冷吐虛吐與生胃氣痰吐下却其痰痰與正

氣食吐宜與場氣豈可一藥理之吐瀉不止將虛風生張開風



驚眼合慢脾治之不啻更下驚藥死不旋踵豈可得而救  
分長幼病察虛實有吐瀉三五日發風者有一日半日而  
大抵女孩以吐為急男以瀉為速若氣虛暴瀉暴吐纏作便得  
之惟有疳瀉不成風候久則患無辜證終於虛之矣但滯腸止  
瀉為良吐即生胃為正截風之藥加而用之凡驚藥及寒涼之  
藥切不可用亦不可用太熱藥其候乃屬陰證醫士載之勿妄  
為幸

小兒呢吐嘔噦或有五疳者謂呢乳如視簷水射出吐者吐出  
有物嘔者開口而作噦者心膈上下氣逆鬱聚噦者無物可出  
皆緊切之證慢驚皆由此而作又須詳其冷熱虛實合傷所因  
胃寒即似氣吐面青唇白清涎夾炒吐出

熱吐即似驚吐有黃涎夾乳食乳成片頭額溫五心熱小便赤  
少或乾嘔噦無物夏秋間多有此證

虛吐肌弱神困不思乳食用生胃氣藥  
痰吐即風癱吐咳嗽氣急或表熱

傷乳食吐即積滯吐吐作霍氣吐熱  
蟲吐面白毛焦唇紅或紫或昏而不醒人事時吐又當於驚風  
內癩蟲痛及疳積門治之

鄭氏云但吐不瀉為逆吐而有瀉發驚者危治之當斷乳但與  
稀粥食

熱吐者夏間多有小兒日中遊水伏暑熱毒入乳母出外感冒  
暑氣承熱便乳兒多成熱吐額溫五心熱小便赤必夾中

暑之證當解暑退熱止嘔化痰五苓散用生薑煎湯調化不拘  
時候服香薷飲天水散皆消暑之藥

冷吐者冬月多有感冒風寒由乳母感受寒氣承寒便乳兒冷  
氣入兒胃中嘔吐喜熱惡寒四肢清寒吐必夾清涎吐出以  
溫中藥服丁香圓霍香正氣散加丁香四君子湯加丁香陳皮  
去白乾薑炮生薑棗去核同煎前食前服寒極者理中湯加附子  
炮去皮尖臍量虛實治之

傷食吐酸臭夾乳食而出惡食胃痛身發潮熱有下證下之有  
食積宿滯者服消積圓鶴頂丹無宿滯者下之後服消食圓長  
生圓治之

傷乳吐乳食過飽滿而必溢導虛胃氣久吐不止慢驚自此而  
得乳母服沉香降氣湯兒服助胃膏調中湯大醒脾散治之

氣乳吐乳母憂思忿怒之氣食乳乳兒乳隨上不能克化故嘔  
兒吐下并高脹沉香降氣湯

傷寒吐傷寒傳裏裏氣上逆半表半裏之證多嘔有胃氣熱乘  
虛入胃胃得熱則氣逆嘔

### 吐奶說

小兒吐奶有數般或是風疾所致則其吐不可止也吐奶更夾  
痰涎吐却即生風若止却後其風無止處更入外風則則心閉  
胃管後變驚風胃土四肢被痰涎閉却即搐心主神被外邪所  
干即驚神不主故變驚風也故止住吐即驚風發手足搐搦口  
舌紅赤



小兒吐奶胃寒傷風肺夜間煩燥身上發熱

小兒吐奶唇黑多哭是傷脾須夾痰也

小兒吐奶身熱其奶成片子者是胃有熱積久則生風

小兒吐奶不化夾清水是胃冷其人必面青唇白是也

小兒吐奶早晚發熱則足驚吐而不睡是也

小兒翻吐候 搐搦氣脹 此病難醫療 其名號胃虛

氣逆胃家冷 氣細急風生 急取為妙手 調脾是術精

乳吐停胸膈 生痰作吐頻 不宜尿糞澁 尤忌燥紅唇

現乳候嘔吐曰現 顛腦動不停 常聞有吐腥 碧暈眼上膜 汗出脚如冰

其發胃虛多現吐眼碧膜心受驚風氣不順顛腦動及多

汗胃氣虛必致成此病 吐奶胃氣實 胃滿生吐逆 多有風生 驚風因此得

吐罷腦後溫 吐乳無變色 先須定却氣 隨後除風疾

面青唇白胃曾驚 吐現黃痰冷熱并 乳食不通乾嘔逆

調脾利膈立惺惺 小兒吐現嘔逆候脾氣不順胃氣細冷也用調胃補虛若生風

氣壅用藥止吐瀉 現乳從來胃來實 奶滿胸高生吐逆 吐多遍體有風生

驚邪皆為如斯得 吐定須更腦後溫 吐出奶來無變色

先宜定氣又除風 急早求醫尋妙訣

時時顛倒動無停 現乳常聞氣又腥 碧色眼睛如上膜

更看汗出脚如冰 若還氣細胃家冷 氣若虛時是驚

胃冷調和方是妙 是風急取見須明

現乳生涎

現乳非為吉 生涎其可疑 關睛防掣搐 啞口必驚危

時時吐唾服地黃丸

時時頻吐唾 腎氣冷之因 日漸亡津液 萎黃作瘦人

吐乳發搐惡候

吐乳頻頻必發驚 脾虛困弱失精神 精神既失涎潮壅

顛腫青筋不救因 顛亦同 壅乳生吐惡候

孩兒何嘔逆 壅乳為傷脾 解脫因風冷 頻頻吐不宜

素問二食則嘔者物盛滿而上溢東氏云小兒吐現者乳

甫冷熱不調則停胸膈因哺乳前後相觸氣不宣流故令

見吐現也

五苓散 治嬰孩小兒霍亂吐瀉煩渴飲水虛熱加黃耆蜜炙

人參 治虛

猪苓 去黑皮 白朮 赤茯苓 去皮各五錢

澤瀉 七錢半 桂 去皮二錢半

右為極細末用生薑煎湯調化不拘時候服

香薷飲 治嬰孩小兒臟腑冷熱不調飲食不節霍亂氣逆有

心痛而先吐有腹痛而利者有發熱頭疼寒痛而腹吐利虛煩

或嘔無物四肢逆冷脈欲絕須臾昏塞而欲死



白扁豆 炒去皮二兩厚不 薑汁製炒四兩

香薷 八兩 黃連 炒一兩五錢

右劉散用水煎不拘時候服

益元散 一名天水散

滑石 水飛 廿五平 炙各七錢半

右為極細末用滾白湯入蜜少許吐不止者薑汁調化不拘時候服

丁香圓 治嬰孩小兒嘔吐不止

丁香 半夏 去皮麻生各三錢

右用生薑汁次一宿晒乾為極細末生薑汁煮麩糊圓如黍米大用生薑煎湯食遠服

沉香散 治嬰孩小兒補虛調胃氣止吐瀉進乳食

沉香 一分 丁香 甘草炙 各半錢

霍香葉 各一錢 木香 桂 各半錢

茯苓 一分

右為極細末用紫蘇木瓜同煎湯調化食前服

理中湯加丁香 木香

四君子湯加丁香 陳皮 去白 乾薑 炮

右咬咀生薑三片棗一箇去核同煎食遠服

定吐紫金核 治嬰孩小兒嘔吐不止

人參 去蘆 白木 薑香葉

半夏 木香 丁香 各二錢半

右為極細末煮麩糊圓如黍米大入沉香末一錢朱砂水飛

末一錢同為衣陰乾棗一箇核細藥一圓在內濕紙包裹

熟嚼化服後用米飲壓之

朱沉煎 治嬰孩小兒嘔吐不止

朱砂 水飛一錢 霍香葉 水三錢 滑石 水飛 錢

丁香 卜四箇 沉香 一錢

右為極細末用新汲水一小匙之油點成花子炒藥在上

須臾墜下瀉去水却用別水調化食前服

益中膏 治嬰孩小兒嘔吐泄瀉脾虛甚全不食肚脹腹疼困倦

丁香 肉豆 磁石 煅去油各二錢

縮砂 去殼一錢 訶子 炮去核 甘草

青皮 去穢炒各五錢 陳皮 去白一兩

右為極細末煉白蜜圓如黍米大用滾白湯研化食前服不

思乳食大便未穀不化夜起者日進二服

益善散 治嬰孩小兒脾胃虛弱腹瀉泄痢不思乳食嘔吐不

止困乏神懶心腸膨脹顏色青黃微瀝不醒

丁香 二錢 陳皮 去白一兩 甘草炙

青皮 去穢炒各二錢 訶子 炮去核五錢

加肉豆蔻 炙去油 二錢半

右為極細末用生薑棗去核同煎湯調化食前服

沉香降氣湯

香附子 炒一兩五錢 沉香 一錢







飢傷飽胃不能消心腹膨脹所下酸臭夜熱晝涼泄者若脾胃  
合氣以消水穀水穀既分亦有所謂脾恙而泄也

治法究以受病之源宜用四證之藥吐瀉暴作暴為急證蓋脾

虛則吐胃虛則瀉脾胃俱虛吐瀉並作吐瀉不止必傳慢驚慢

脾風也足陽明胃經以養筋筋暴吐暴瀉津液驟之失其所養

則轉筋入腹而死

大要散風邪消積滯開胃進食養脾之藥惟傷食泄瀉者必惡

食發熱心腹脹痛下酸臭先以疎利其食服消積圓鶴頂丹微

疎導不可峻取後消食藥治之

食積泄瀉者積聚停飲痞膈中滿肋脇疼痛夜熱晝涼口吐酸

水嘔逆注瀉冰實者先利而後補服消積圓鶴頂丹下後服消

導藥虛者元補而後下

暴吐瀉者脾胃俱虛參朮散加丁香生薑棗去核同煎服以正

胃氣

傷風泄瀉者脾臟虛怯也當補脾脾實者先解風熱服藿香散

風熱已退微熱者參朮散加圓子脾虛者先實脾後發散服醒

脾散實脾散

假令春月間多有傷風咳嗽泄瀉者表裏俱虛服藿香正氣散

倍加茯苓去皮白朮生薑棗去核同煎痰嗽發熱微瀉者服人

參羌活散加生夏麩同煎後加味四君子湯參朮散止瀉治之

夏月傷暑泄瀉者其證固垢煩燥作渴飲水漿頭熱嘔吐泄瀉

服丁香圓定吐紫金核先定吐後參朮散發熱煩瀉不止者參

木散如天...調任意服其功圓單水瀉不止者  
服玉華丹治之

秋月痰嗽泄瀉者服六和治之

冬月感寒泄瀉者助胃膏益黃散加肉豆蔻生薑棗去核同煎

服寒極者附子理中湯吐瀉脾胃俱虛欲作慢驚服烏蝎四君

子湯生薑棗去核同煎服或脾散全蝎蝎音散治之

中濕泄瀉者著冷腸鳴肚腹補手足寒服理中湯大養脾圓定

香正氣散腹痛加桂乾薑伏者加香薷寒暑同用

錢氏治傷寒泄瀉者泄止而後復瀉乃脾間有風不能發泄泄

也而又泄用宣風散宣去脾間風然後止瀉

夏月伏暑吐瀉者乳母觸暑者熱熱乳乳兒及小兒日中遊戲

受熱成疾便為霍亂吐瀉為中滿瘧疾大渴腹脹下痢諸熱病

疾因暑得之其根未除難收其效傷暑證似傷寒但若能消氣

氣消則脈散虛而無力六脈沉浮微弱

其證固垢昏倦毛聳惡寒吐痢煩燥渴其壯身熱頭痛四

肢厥冷身熱無痛當解毒毒後發散表不解暑定傳瘧疾

日久難痊

治證服五苓散生薑煎湯調服天水散發解暑瀉不止者玉華

丹煩渴不止者參朮散合天水散滾白湯調任食前服

中暑昏沉不醒黃連香薷散加羌活煎服調天水散異功圓地

龍圓治之逆搖吐瀉交作喘而不治

古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚



小兒患吐瀉者身瀉最急證吐瀉不止脾虛風生急治

五月二十五日身至心後吐瀉身壯熱此熱也小兒臟腑十分

中九分熱也或因傷熱乳食吐乳不消瀉深黃色服王露散

六月十五日大暑後吐瀉身溫似熱臟腑六分熱四分冷也吐

嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前少服益黃

散食後多服王露散

七月七日立秋後七日吐瀉身溫涼三分熱七分冷也不能食

乳多似睡悶亂吐氣長出氣睡露睛唇白多痰欲大便不渴食

前多服益黃散食後少服王露散

八月十五日秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾噦瀉青褐

水服益黃散不可下吐乳

吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下

虛瀉脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後脾胃尚

弱不能傳化穀氣有冷者時時下利唇口青白有熱者溫壯身

熱肌肉微黃此冷熱虛瀉也冷者木香圓夏月不可服如有證

則少服

小兒臟寒腑冷大腸不禁摠謂之瀉分別輕重究竟緩速有瀉

有泄有滑有利有洞五者不同豈可一藥而理之唐者糟粕不

聚由其尚濃似瀉非瀉泄者無時而泄或出不知利者直射瀉

瀉氣從中皖滑者穀食直過腸胃不化洞者頓然下之如桶散

瀉餘更不留即知其兒臟寒腑冷瀉之作疾其來緩速輕重可

知凡見瀉糞出青色者皆脾寒所瀉肝屬乙木能克己土

所勝之功故現本質由其臟之虛寒非謂驚也又瀉初黃長久

變青也乃臟寒之徵又瀉藥物自過尤為寒滑凡虛滑三五次

則中乏若不急與溫其臟調其胃平順三焦和正發衛不爾即

慢驚候傳變如此之意欲以止瀉藥次第理之往往不及惟

務溫其臟腑臟既溫寒何能留於腸胃之間或以熱藥頓止

則熱及為它疾須先投婦腸藥然後生胃正氣與服切不可意

急過刺投之熱藥稍或臟腑至虛寒後宜用之兩收厥冷者是

謂逆證用附子白朮乾薑量輕重而用凡於熱瀉止即刺作

無疑理瀉良方已著在後請意度之為得妙矣

瀉之證不同溇泄滑利洞也溇者糟粕不聚似瀉非瀉世者無

時而作或不知出利者直射瀉氣從中皖滑者水穀直過腸

胃不化洞者頓然下如桶散瀉不留者脾胃之不調也熱瀉大

便必黃赤或有沫糞射出遠先用五苓散分其水穀却平胃氣

脾虛受冷面青唇白眼輪黑糞或青或白手足冷不溫瀉其脾

必傳慢驚疳暴瀉糞臭如臭雞子腹膨時或瀉者絞紫身熱

熱黃可下之却調胃傷食瀉肚膨熱是冷瀉寒瀉其瀉補不

止宜下却補脾若脾弱田消積脾藥却暖補驚瀉糞青夜啼或

時驚悸參苓白朮散四君子湯加茯苓神連肉有食積者治法能

令黃瘦子須作化生兒去服五積圓微利其積後服三棱圓

夫大便青者臟冷也或初出微黃長久則青者亦然也靈秘云

瀉下如藍澀胎中受積豎豎心受驚心主驚心驚則膽怯膽者

與肝為表裏也膽怯則肝冷肝傳脾脾受邪故大便初出微黃



脾之本色黃又復青肝之本色也肝熱則外發自赤肝冷則內  
作便青又有不因驚而得此證者蓋胎氣怯弱內受風寒故  
也有便青夾白濃稠粘如涎者亦走腸寒又則今兒面白形青  
腹痛驚悸失治則成陰瀉也

吐瀉  
初生三日內吐瀉壯熱不思乳大便乳食不消或白色是傷  
食膏利之後紅胃用益積散治之

初生三日已上至十日吐瀉身無涼不思乳食大便青白色乳  
食不消此上瀉下虛亦有無見也

肺熱露睛喘氣 心驚悸飲水 脾因倦饒睡 肝呵欠頻聞  
腎不語畏明當瀉 凡見此等臟腑脾熱等證治之此二證多

病於夏秋也  
生下吐初生下拭掠兒口中穢惡不潔咽入喉中故吐木瓜  
王之初生急須拭掠口中令其若有啼數 發則瀉下多生諸病

傷風吐瀉身溫下涼下熱腸多氣逆大便黃白色嘔吐乳食不  
消咳嗽更有五臟兼見證當取入臟君臣藥先大青膏後服益

黃散如先瀉下或無下證慎不可下也此乃脾肺受寒不能入  
食也

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此為胃  
虛熱渴吐瀉當生胃中津液以止其渴止後用益樂止渴多服

白木散發散大青膏

便黃因內熱 紅赤黑同看 綠青皆冷 疳肥食臭酸

久瀉四肢癱 綠青睡不安 熱疳毛作穗 涎定作食

疳瀉脈脈脹 肌膚日漸衰 脾虛難化食 腸滑久經瀉

熱多腥臭 頭垂腫四肢 唇紅因渴熱 進退極難醫

肝冷傳脾臭綠青 焦黃脾土熱之形 肺腸寒色凝結白

赤熱因心腎熱成  
小兒洩瀉精神少 久患虛食不聞 碧綠眼睛生白膜

青黃面臉見紅筋 有時鼻鼻鼻眉額 或即唇唇擦齒齦

渴飲後留脾受濕 至冷水飲不能分 毛乾唇白額頭筋

定是疳多積與驚 肚脹有微雞子樣 瀉如糟粕色黃形

其將熱與飽服 止住腸中便作鳴 忽若渴生身熱熱 候人虛脾又風生

只緣積熱傷脾後 致使終日瀉不休 項軟見人多嘔氣

更兼清水鼻中流 少時一二深黃色 多努腸頭出不休

形候只看胸膈上 胸紅定有汗通流 眼如赤脈久難理

唇赤生瘡命定休 用藥先溫脾胃內 次醫瀉瀉是源由

身熱發厥 久瀉利多虛熱  
氣虛多發厥 血虛須作熱 氣血若俱虛 身熱手足厥

洩而腹脹脈弦者死 腹大而洩脈微細而澀者生緊大而滑  
者死 洩注脈緩微小者生浮不數者死 注下脈細者可治

浮大者劇 洞洩食不化下膿 血脈微小者生緊急者死  
助胃膏 治嬰孩小兒胃氣虛弱飲食不進腹脹滿腸鳴泄  
瀉兒乳便青夜啼冷寒腹痛



白豆蔻去殼 肉豆蔻煨 丁香

人參去蘆 木香各五錢 茯苓去皮

甘草炙 白木 桂去支

藿香葉 縮砂去殼各 陳皮去白

山藥炒各二錢 加沉香二錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用木瓜煎湯或米飲研化

食前服

助胃膏 治嬰孩小兒慢驚風吐瀉不進乳食

人參去蘆 白木 蓮肉去心各二錢

白豆蔻去殼 甘草炙 茴香炒

丁香 檀香 木香各一錢

右為極細末煮粟米糊圓如芡實大用陳米飲研化食前服

脾胃不醒用冬瓜仁炒煎湯服

助胃膏 治嬰孩小兒助養脾止吐

人參去蘆 白木 茯苓去皮

縮砂去殼 山藥 甘草各三錢

沉香 木香各一錢 丁香五粒

肉豆蔻煨 藜蘆去油

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用生薑煎湯研化食前服

掌背膏 治嬰孩小兒脾虛胃弱泄瀉不止

人參去蘆 白木 茯苓去皮

甘草炙 肉豆蔻煨 白豆蔻去殼

草豆蔻去殼 陳皮 枇杷葉去毛

青皮去穢炒 丁香 沉香

木香 藿香葉 縮砂去殼各一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研化食前服

養脾圓 治嬰孩小兒脾虛泄瀉

白木 茯苓去皮 乾薑炮

黃連炒 肉豆蔻煨 木香各一錢

右為極細末煮麵糊圓如芡實大用燈薪糯米同煎湯不拘

時候服

藿香正氣散 治嬰孩小兒傷寒頭痛增寒壯熱痰喘咳嗽心

腹疼痛吐瀉虛腫疳積

藿香葉七錢半 甘草炙六錢 腹皮

白芷 紫蘇 茯苓去皮各三錢

半夏麩 白木 陳皮去白

桔梗去蘆炒 厚朴薑製炒各五錢

右以咀用生薑三片棗一箇去核同煎不拘時候服

不換金正氣散 治嬰孩小兒四時傷寒五臟氣喘咳嗽痰涎

霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白

藿香葉 厚朴薑製炒各一錢半 甘草炙一錢半

蒼朮炒四錢 人參去蘆 茯苓去皮

木香各一錢 半夏麩三錢 陳皮二錢

右以咀用生薑三片棗一箇去核同煎食前服



參朮白朮散 治小兒脾胃虛弱飲食不進嘔吐泄瀉此藥中不和熱久服養脾胃止瀉劑

蓮肉 去心 薏苡仁 縮砂 去殼

桔梗 炒各五錢 茯苓 去皮 甘草 炙

白朮 各一兩 白扁豆 炒生薑汁浸去皮

山藥 一兩一錢

右為極細末用棗去核煎湯調化食前服禁口痢加石膏瀉

五錢 藥末去核煎服

香散 治嬰孩小兒脾胃虛弱乳食不調身熱風熱作驚吐瀉不止

丁香 去殼 人參 去蘆 茯苓 去皮

丁香 去殼 差活 去蘆 防風 去蘆 又

半長麵

右攻用生薑三片棗一箇去核同煎食遠服

凶且寇圓 治嬰孩小兒嘔吐泄瀉

木香 縮砂 去殼 赤石脂 七錢半

礬 煨七錢半 龍骨 訶子 煨去核

肉豆蔻 麩裹煨去油各五錢

右為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲食前服

沉香豆蔻圓 治嬰孩小兒乳哺失宜冷熱不調熱衝上膈冷

歸下焦虛實不等水穀不化遂傷脾胃胃虛則嘔吐脾虛則泄

利夾積變為下痢膿血善店常脾胃取在調適也

利夾積變為下痢膿血善店常脾胃取在調適也

利夾積變為下痢膿血善店常脾胃取在調適也

沉香 芍藥 炒 人參 去蘆

蓬朮 木 煨 縮砂 去殼 各 當歸 去蘆 炒

肉豆蔻 煨 麩裹 煨 木 各 白朮 各二錢半

右為極細末蒸餅圓如黍米大用米飲食前服

固腸散 治嬰孩小兒嘔吐泄瀉不止

人參 去蘆 白朮 茯苓 去皮

甘草 炙 訶子 煨去核 木香 縮砂 去殼 各一錢

肉豆蔻 煨 麩裹 煨 當歸 去蘆 炒

右到散用水煎食前服

桂朮白朮散 治嬰孩小兒瀉驚胃胃暑濕熱轉筋腹痛

桂朮 去皮 茯苓 去皮 白朮 各二錢半

甘草 炙 澤瀉 石膏

寒水石 各五錢 滑石 一兩

右為極細末用生薑煎湯 化食前服

桂朮甘露飲 治嬰孩小兒液咳喉調臟腑寒熱嘔吐流瀉

開燥通身氣逆水腫泄瀉不

桂朮 去皮 人參 去蘆 藿香葉 各二錢半

茯苓 去皮 白朮 甘草 炙

葛根 寒水石

澤瀉 各五錢 木香 一錢 滑石 一錢

右為極細末用生薑煎湯 滾日湯調化食前服

交泰散 治嬰孩小兒霍亂瀉瀉

交泰散 治嬰孩小兒霍亂瀉瀉



肉豆蔻製熟煨陳皮去白 煨熟

半夏麩 青皮去穢炒 木八

甘草炙各五錢 石膏清二錢

右以咀用生薑三片紫蘇二葉同煎不拘時候服

開胃圓 治嬰孩小兒臟腑怯弱內受風冷腹脹滿腸鳴瀉

利書白乳食不化臟冷夜啼胎寒腹痛

木香 蓬莪木煨 當歸去蘆炒

人參去蘆 白木各五錢 芍藥炒

麝香各一分

右為極細末煉白蜜圓如其實大用米飲研化食前服

乳豆圓 治嬰孩小兒泄瀉

乳香二錢半 肉豆蔻切片五錢

右用生薑五片同炒黑色只存乳香肉豆蔻二味研細成膏

旋圓如黍米大用米飲食前服

玉華丹 治嬰孩小兒伏暑泄瀉驚搐

淨淨毛龜合定出火煨過八兩

右為極細末真醋糊圓如黍米大用木瓜煎湯食前服

白龍圓 治嬰孩小兒泄瀉不止

白石脂 龍骨各二錢半

右為極細末滴水圓如黍米大每三圓用紫蘇木瓜煎湯食

前服

白龍圓 治嬰孩小兒中暑泄瀉不止

加止硫黃 煨熟同炒成膏 消石

麝香各五錢

右為極細末用飛羅麵煮糊圓如黍米大用木瓜煎湯或倒

流水食前服

白龍圓 治嬰孩小兒吐瀉不定滑泄注水小便少

附子炮去麻 白石脂煨 龍骨煨各二錢半

右為極細末醋煮麵糊圓如黍米大用米飲食前服一方加

礬煨二錢半

參朮散 治嬰孩小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不止津液枯

燥煩渴多燥但欲飲水乳食不進羸困少力因而失治變成風

瀉不問陰陽虛實

人參去蘆 白木 木香

茯苓去皮 藿香葉搗去 甘草炙各一錢

烏根炒二錢

右剉散用生薑三片棗一箇去核同煎食前服

伏暑煩渴加益元散用白湯調服吐瀉加丁香黃耆各白

扁豆炒去皮各一錢

寒朮散 治嬰孩小兒吐瀉亡津液煩渴心燥進乳食

人參去蘆 白木 茯苓去皮

山藥 白扁豆炒去皮 葛根炒

藿香葉 丁香 訶子炮去核

甘草炙



右為極細末用... 去核煎湯調化食前服

大安圓 治嬰孩小兒吐瀉不止

木香 芍藥 人參 五錢

白木各 茯苓 去片 訶子 炮去核

厚朴 薑汁浸炒 陳皮 去白各半錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研化食前服

調中散 治嬰孩小兒瀉瀉傷食瀉

香附子 炒 甘草 多 茯苓 去皮

天仙藤 藿香葉 搗土 芍藥 炒

葛根 炒

石為極細末用烏梅去核甘草同煎湯調化食前服

六神散 治嬰孩小兒脾虛胃弱吐瀉不進乳食

人參 去蘆 白朮 山藥 炒各五錢

甘草 炙二錢 白扁豆 炒去皮 茯苓 去皮各一兩

石為極細末用生薑煮去核煎湯調化食前服發搐加天麻更不止加木香

妙香圓 治嬰孩小兒水瀉不止上吐下瀉飲食對過瀉出止

熱煩渴頭額有汗不進乳食

木香 黃連 炒 蒼朮

五倍子 各半錢 石榴皮 穿山甲 煨各一錢

右為極細末煮麵糊圓如赤米大用陳米飲或丁香一粒

香二葉同煎湯食前服

赤白冷熱不調日夜頻併愈而又發

赤白冷熱不調日夜頻併愈而又發

肉豆蔻 炮 薑 煨 去油 一箇 胡粉 炒 二錢

龍骨 生 醫 各一錢

右為極細末用米飲調化不拘時候服

木香圓 治嬰孩小兒脾胃冷瘦疳

木香 青黛 檳榔 去腐

白豆蔻 去殼各 麝香 一字 續隨子 二錢

蝦蟆 燒存性 二錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食前服

王露散 治嬰孩小兒傷寒吐瀉黃色

寒水石 五錢 石膏 五錢 甘草 生 二錢半

右為極細末用滾白湯調化食後服

沉香散 治嬰孩小兒補虛調胃氣治吐止瀉進乳食

沉香 茯苓 去皮各 木香

桂 去皮各半錢 藿香葉 甘草 炙

丁香 各一分

右為極細末用紫蘇木瓜同煎湯調化食前服

溫白圓 治嬰孩小兒久瀉脾虛不進飲食訖仍前瀉下米飲

白木 二錢半 半夏 麩 一錢半 丁香 炒 半錢

右為極細末生薑汁煮麵糊圓如赤米大用淡生薑煎湯食



前服  
木水圓 治腹瀉小兒嘔吐

木水末一

賦粉

木香末

木各一字

右為極細末

米大每一圓用甘草水不粘

時候服

痢

凡春傷於風因及暖時脫熱風冷所傷載在肌肉吐復因飲食居處不調又彼風沙塵以入腸胃先輕後重則下痢也其冷盛則頻下痢赤白赤白熱乘於血血滲大腸則赤也若風亦夾熱則所下黃而赤白

全初心錄

五

寒邪併之則所下白而重熱相交故赤白相半重者壯若膿而雜之輕者白而中間或有赤縷內夾風邪故清血流注溫毒入腸胃之間則下如豆

治法大要形風邪行滯氣滯積滯解暑毒開胃進食為先初得痢者便不可用肉豆蔻罌粟

邪氣得補心慾風邪積滯不能發泄腸胃滯腫服日久難愈痢出於積滯積物積也滯者滯也物積欲出而氣滯不與出則下墜裏急後重乍起乍止

當先未用通利之藥疎其腸腑積滯然後不問寒熱寒暑隨證治之

其病感自疾者食淡熱非冷初食飢飽不能開發皆成五泄

大者白五泄者有清澀瀉瀉泄瀉滑泄此五泄青者感肝木之象其色青赤者受心火之氣其色赤白者得西方金肺之

氣其色白黃者脾土之氣其色黃黑者得北方土之氣平與水

隨之其色赤黃併發者痛而不愈諸藥不止者須下服導滯散

小積微利之所除瀉瀉者毒病閉積滯而使氣液宣通內腸

胃虛冷乳食積滯外感暑風寒暑濕所傷遂成瀉痢傷風者自

汗惡風寒感寒者回轉定寒傷暑者煩燥飲水傷濕者肌肉

虛浮停積者夜熱晝涼乍遊乍澹冷痢者內脾虛胃冷食啖食

物停滯下青白成凍赤白赤者熱也白者冷也久痢者腸胃久

虛脾胃滑泄不止休息痢腸胃虛寒腸鳴不禁日夜頻併無度

各受病不同用藥難收其效有積者服消積圓太乙圓或水沉

全初心錄

五

丹駐直圓先疎其積滯瀉瀉瀉服阿膠梅連圓或黃連阿膠

圓感風邪發熱服人參散散加蓮肉去心梗米煎服停寒腹

痛即中湯加茯苓厚朴生薑去核同煎服水煎木香圓中濕

者不換金正氣散加木香人參赤茯苓生薑去核同煎服感

胃者毒五苓散入中前子以天用米飲食前調服黃連阿膠圓

香連圓久痢休息痢者脾胃久虛不禁服大養脾圓真人養臟

湯切胃膏水煎木香圓赤者熱散大腸下赤痢發熱服芍藥

甘草湯白水煎服後服芍藥和皮圓白者腹中苦痛身痛厥逆

表裏俱虛理中湯寒極者附子赤白痢者冷熱不調下痢亦

白相雜服胃風湯小駐果惟傷食下痢夜熱晝涼氣急發泄

日飽腫脹腹瀉下痢亦宜腦酸臭食此痢亦不可使補茶



圓子消積圓子後服補圓子加炒黃連能消食止痢開胃進食  
有積者用巴豆大黃氣用枳殼桔梗青皮蓬莪木佐黃連阿膠  
大腸要藥有熱毒則能疎導無熱毒則安阿膠圓子當歸青皮赤  
茯苓黃連阿膠炒作劑入烏梅蜜同煎服最能將惡積若止則  
止積滯既去痢漸減疎有熱去熱無熱則安用木香茯苓縮砂  
白豆蔻甘草和脾進食

治痢主薑助胃為陽茶助胃為陰平調陰陽蜜治痢生薑作片  
煎茶各一錢半蜜水煎服蟲毒痢阿膠黃蘗各一錢用水同煎  
服

痢疾不能飲食邪氣疫毒不能發泄傳入臟腑腸胃折疊以禁  
口九死一生脾虛胃弱有熱氣關閉胸中禁口服參及白朮散

小兒八痢者皆因八邪而生也或冷熱不勻風邪入臟則為痢  
或濕熱則赤冷痢則白冷熱相和則雜赤白色食痢則酸臭驚  
痢則青膿痢則臭食不消化時行時止有血痢則是瀉瀉不時  
此是八痢也

小兒八痢日冷日熱日瘡日噤日冷熱不調日休息日瀉痢日  
毒毒諸痢無積不能成冷痢白積積熱痢赤積冷熱不調積下  
赤白疳痢黃白疳下無積度疳積積休息痢重黑如魚腸痢  
而後作瀉痢積積而又下肚大飲食不為肌膚氣臭大便燥結  
疼痛啼叫蟲毒痢上紫黑不可不詳察略方藥斟酌用之  
小兒久痢消山思酒時時欲飲者是腸胃精液枯竭也諸書不

百說經有效委問云痢癖使血身熱則死寒者生湯瀉下痢  
白沫脉沉者生浮大者死大奇論云熱在七日死腸癖下痢血  
而熱者是火氣內絕去心歸於外故死火受制故七日死凡痢  
如癰中膿者多死久痢舌黑者死聖惠方云久痢脉沉腹痛者  
死久痢身熱汗出者死

痢者利也痢之為積無積不成及至積化成痢且脾胃亦虛即  
不可更下善痢者生其胃濕其脾虛其腸和其濕無不愈也若  
成痢疾故不可下下之反虛作渴浮腫痞滿脹急不食亦不可  
便補補則傷熱能令脫肛不收先與蘇蘇一切毒食之物類與  
生胃急即與厚腸胃服此痢即與和脾氣溫臟腑或純白者乃  
積冷毒加之即與接去其毒熱與溫其脾胃其利自止痢疾能

飲食可以治之妙藥調理亦不憂愈稍失胃氣不能飲食疾不  
禁口有不食至死又有毒瘵胃口亦不飲食或患痢疾因食  
物毒不見腸頭鮮血頻滴而身大黑可畏腹中痞積甚急  
後重名曰刮腸日夜頻飢食食自過名曰滑腸此二種痢最為  
惡候乃是一十二種中皆傳受而作此候也小兒美飲食  
者飲謂飲乳食謂食飯若病中能飲水漿喜食菓子魚物之類  
者亦助其虛不能令臟腑實須是白粽子爛煮飯可矣若以  
極糲極粘膩不堪脾胃之類極其增困幼者切乳克化漸安五  
臟平和六腑調貼然後陰陽自均氣脉自壯固最湯劑不以抑

之或有餘毒宜以順調緩不可攻擊又有時氣作痢黃者相  
染而成乃出天氣時雨不陰濕之氣冷熱相干腸胃積滯不



瘰癧成其疾腹肚疔痛瘰癧復重化瘰癧治者宜服木香散  
地榆當歸芍藥因豆蔻石菖極細末蒸烏梅肉圓如黍米人用  
乘去核煎湯食前服神功也

瘰癧歌曰濕多成五泄腸去若雷奔下痢微小却為生脈大  
瘰癧無瘰癧身寒則生瘰癧熱則死

瘰癧後有瘰癧唇青兩臉瘰癧 瘰癧來唇帶赤 盛熱眼朦朧  
多因瘰癧乳 瘰癧於黃腸 日久傳成滿 如膠夾白紅

瘰癧疔刺痛 似凍或垂瘰癧 此為諸瘰癧 早治莫從容  
小兒下痢有多般 不可不一例看 冷痢有時青與白

熱多黃赤糞成團 瘰癧侵絡為鮮血 瘰癧毒纏似紫肝  
冷熱相交紅白雜 或成青黑或成丹

白痢 先傷冷積在胃故發渴而吐其出也  
痢尤發渴要湯水 面上珠汗出光 騰騰眼慢常如瞶

腹內緣如刀刃傷 努出腸多發痛 不思飲食回極黃  
髮焦眼碧耳雙冷 瘰癧變色 變色三朝必定亡

赤痢 欲知赤痢服無開 定是官食熱藥來 唇白舌紺瘰癧口  
一時須去十餘回 腹中刺痛兼滴瀝 胃閉難開飲食乖

赤白痢 此是毒脾先一候 要須如藥與詳裁

小兒下痢細尋推 不獨以於積所為 冷熱數般雖各異

瘰癧諸言在醫師

白痢青冷熱赤紅 夾食滯積也 有風 初患滿身壯熱  
不思飲食亦為終 且須開胃調 胸膈 腹痛急與用神功  
重重熱為一兩日 為他脈候不浮洪

風痢 風毒乘脾黃褐色 看來其痢 驚同 但聞不臭斯為好  
獨瀉脾經自有功

五色痢 痢成五色豈堪聞 日久傳及神氣昏 乾痛煩燥為惡候  
更防兒小命難存

五色痢疾無定止 已下方亦有五般 青色只因驚積聚  
黃多熱毒在脾間 胸高唇細齒還露 臉赤青筋出額

三七已前無變色 其令氣細喘相連 先安五臟不為露  
氣次取預後止痢 醫家存心仔細看

下痢是冷 不食痢多類 熱痛渴焦良 手足時時冷 血黯命凌巡  
痢腫腸疼 痢腫腸疼 令兒體腫如吹 雙睛赤脈生雲翳

下痢時多必損脾 令兒體腫如吹 雙睛赤脈生雲翳  
渴喘腸疼病已危

痢遍身腫 痢遍身腫 令兒體腫如吹 雙睛赤脈生雲翳  
冷痢日久失醫持 遍身腫恰如吹 脈洪是氣化為腫

沉實多因有積之 順氣出腫依元治 冷利兩日便如尿

沉實多因有積之 順氣出腫依元治 冷利兩日便如尿



更有二種不可療 食則無通其效

瀉痢脫形

秋深瀉痢脫形神 嘔吐或沉渴燥煩 血氣兩亡肢體冷

涎潮腹痛死之因

瀉痢舌黑

瀉痢舌黑 經時五臟傷 黃因脾氣敗 手足冷須亡

痢噎不食

痢多胸膈滿 噎氣食難通 臟腑魚腸色 虛煩必變風

脾毒積痢

脾間有病本因傷 或被醫士執藥發 致使大腸成結澁 加添滯血入於腸 眼先因之如風候 項熱頭溫脚又涼

全幼心鑑

舌出胸膈為外候 多啼啞 更對量 先須解毒溫胃口

此是醫家用藥良

赤痢下血

鼻根白色唇如土 此患原來化穢毒 口緣臟腑冷熱毒 致使脾虛不消穀 臉白眼胞 山緣青 其作尋常觀不足 但請看也手足心 點點深紅 血沃

疳痢雜色

大便膿血黑青黃 久患成疳 滑腸 下部脫肛情倦怠 上焦煩渴意悽惶 痰來冷熱 干作 因為寒溫理失常 體熱須宜多進食 豈愁憔悴少精光

諸痢先候

諸痢先候

諸痢先候

諸痢先候

諸痢先候

痢類都不食 腹脹喘逆 下痢全如黑 渾身熱渴俱

穀道陷如筒 喉中乳不通 喉中乳不通 渴煩托燥喘

腎痛命將終 壯自箱其仰 唇枯目白紅 痢中若有此

不必問醫功

目陷唇枯縮 睛中散黑筒 痢中還有此 死證命將終

久田疴未產 積痰臍中寒 頻痢如膏白 痰便若水汁

日漸瘦黃瘦 心胸痞滿煩 喉中痰壅塞 不乳命難安

久痢不治

身熱膿青 身熱血黯 潮熱腹痛 增寒汗出 頭熱足冷

形羸顛軟 暗昏赤脈 眼邊白漠 口臭生痰 面腫作喘

舌頭黃黑 口唇焦赤 喉中鳴響 腸滿氣喘 肌不能食

渴飲思酒 痢如血蠶 或如膿穢 神昏項硬

下痢脈微小者生大而浮洪者死 下痢膿血脈懸絕者死得

者生 下痢白沫脈沉者生浮者死

一切瀉痢變作死候

糞門如竹筒黑色

口舌發瘡如白梅焦乾不通乳哺

肚皮陷落四肢逆冷

面青乾噁呀目無淚

唇青目陷肚熱如湯

面青黑啼叫不已煩燥

睡臥煩燥手足身體酸轉不穩

睡臥煩燥手足身體酸轉不穩

睡臥煩燥手足身體酸轉不穩



或瀉下如雞子白腥臭

多渴口黑時伏齧魚口

瀉下如爛魚腸臭及如黑膠色

瀉久不住則忽痞脹暴發大熱氣喘促

通神冷如冰四肢軟不收

忽吐長氣出戲面如緋紙色

瀉後用藥對過瀉出外腎黑縮

口氣臭唇黑縮鼻其面目如蘭青

通身忽作大熱汗出如雨目閉不開

項軟氣喘促口吐白沫青血

口開不收目直視腎大陷煩燥

吐如雷響瀉下如死雞肝黑腥臭

手足甲黑口吐白蟲項強氣喘促

六乙圓 治嬰孩小兒傷乳食肚腹疼痛下痢赤白

乳香 沒藥各一錢 胡椒四十九箇

巴豆 上箇酥油炙去皮心膜

右為極細末煮麵糊圓如黍米大三五七圓紅痢用蜜煎湯

白痢生薑煎湯赤白痢生薑蜜同煎湯食前服

水沉丹 治嬰孩小兒泄瀉赤白痢

礬石 黃丹各一錢 黃臘二錢 溶化

巴豆 十四箇入礬石內煎透後下小片巴豆

古用杵搗千餘下入藥一處和為劑旋圓如黍米大三五圓用

新水食前服

註車圓 治嬰孩小兒赤白痢不止

百草霜二錢 巴豆 櫻桃煎去殼心煎油一錢

右為極細末飛羅麵煮糊圓如黍米大三五圓用甘草煎湯白

痢米飲紅白痢生薑煎湯食前服

斷下圓 治嬰孩小兒肚痛痢疾

礬石 丁香 杏仁 去皮去

右為極細末搜和為劑旋圓如黍米大三五七圓赤痢用生

薑煎湯白痢乾薑煎湯赤白痢白草乾薑同煎湯食前服

斷下圓 治嬰孩小兒下痢日久不禁

茯苓 去皮 白朮 甘草各

草菓連皮 嬰菓殼 糯米各一錢

右為極細末煉白蜜圓如黍米大用生薑煮去核煎湯研

化食前服

香連圓 治嬰孩小兒冷熱不調泄瀉瀉水熱不化腹痛

鳴下痢膿血裏急後重夜起頻併不思乳食肌肉消瘦新變

疳

白石脂 龍骨 乾薑

黃連 礬石 各二錢

右為極細末醋煮麵糊圓如黍米大煩渴用人參煎湯或

飲食前服







右為極細末煉白蜜圓如大實大用水半小鍾煮 箇上核  
同煎三五沸食前服

胃風湯 治嬰孩小兒冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注  
下腹脇虛滿瀉鳴疳痛腸胃濕毒下如豆汁或下餘血日夜無

度

白朮

川芎

人參 去蘆

芍藥 炒

當歸 去蘆炒

桂 去皮

茯苓 去水

右吹咀用水入粟米百粒同煎食前稍熱服

純湯真人養臟湯 治嬰孩小兒腸胃虛弱冷熱不調臟腑等  
寒下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重腹痛瀉瀉日交無

度胸膈痞悶肺肋脹滿全不思食脫肛墜下酒毒便血

人參 去蘆

當歸 去蘆炒

白朮 去蘆

甘草 炙

桂 去皮各八錢

芍藥 炒 各五錢

芍藥 炒

木香 各一兩

訶子 兩二錢

聖藥散

去帶蓋蜜炙各二錢

右剉散用水煎食前服蒸瀉臍滑世忌酒麵生冷魚腥油  
膩之物久痢虛寒加附子炮去皮大棗三四片同煎服

真人養臟散

木香

當歸 去蘆炒

肉豆蔻 炒

茯苓 去水

人參 去蘆

甘草 炙

聖藥散

去帶蓋蜜炙各二錢一分

烏梅 去核六

酸石榴皮

陳皮

赤芍藥 炒

黃連 炒

白芍藥 炒

厚朴 薑汁炙炒

乾薑 炒

同膠粉炒

訶子 炮去核

地榆 各一錢

八分六釐

右剉散用水煎食前服

參香散 治嬰孩小兒臟氣虛怯冷熱不調積在臟腑作成痢  
疾或下鮮血或如豆汁魚腦血或下紫黑血或赤白相雜或  
成五色裏急後重日夜頻併臍腹絞痛甚不可忍及噤口疳

時瀉諸痢無問新舊

人參 去蘆

白扁豆 炒去皮

木香 各四錢

肉豆蔻 炒

茯苓 去水

陳皮 去白

聖藥散

去帶蓋蜜炙各二兩四錢

地榆 散

治嬰孩小兒冷熱痢腹痛下痢赤白頻併

地榆 一分

甘草 二分

芍藥 一兩

聖藥散

去帶蓋蜜炙各二兩四錢

右剉散用水煎食前服

玄黃散 治嬰孩小兒春傷於風因入暖解脫為風冷所傷或  
亡血因三夏因飲食居憂不調又被風冷乘之以入腸胃先後  
重則下痢其冷氣盛則併下

定粉

海飄油

龍骨

黃丹 炒

訶子 炮去核

訶子 炮去核



右為極細末用紫蘇米飲調化食前服

金鎖散 治嬰孩小兒久患赤白痢

性去皮薑汁黃連用茶葉同炒去茶葉

右為極細末用紫蘇木瓜同煎湯調化食前服

片藥甘直湯 治嬰孩小兒血痢發熱

赤芍藥炒 甘草炙 黃芩炒

右咬咀用水煎食前服

道滯散

當歸去蘆頭 大黃紙裹煨

右對散用水煎食前服下血出不禁止或瘀血在內胸腹脹

滿喘氣短加檀榔去麻

全幼心鑑本

地榆散

治嬰孩小兒赤白痢發熱

地榆 訶子各一錢

枳殼去穢炒

赤芍藥炒

右為極細末赤利甘草煎湯或水瀉五倍子

煎湯亦白相參用米飲調化食前服

燒脾散

手足冷

木香一錢半 甘草一錢 五倍子一錢半

白木一錢 沉香 神龜砂各一分

酸石榴皮 一錢 陳皮 一錢 薑水煎各半錢

右為極細末用乾薑米飲煎湯飲調化瀉白痢如雞卵白

用陳艾三葉煎湯食前服

人參養臟湯 治嬰孩小兒驚悸青色

人參去蘆 當歸去蘆炒 白石脂煨

白木 甘草炙各一錢

右為極細末用米飲調化食前服

艾葉當歸湯 治嬰孩小兒白痢腹痛

艾葉炒 當歸去蘆炒 乾薑炮

木香 訶子炮去核各一錢半

右為極細末用粟米煎湯調化或陳米飲食前服

香梅飲子 治嬰孩小兒腸胃受積脾虛下痢赤白腹肚疼痛

香梅 烏梅半生半 當歸去蘆半生半

而治冷熱病可謂功要而穩當也

甘草半生半炙 陳皮去白半生半炒各二錢半

木香一錢 黑豆半生半炒三十粒

右咬咀用水煎食前服

金粟圓 治嬰孩小兒下痢赤白水穀不化

黃連炒 神龜砂各一兩 川芎

枳殼紙炒 蘇子 赤茯苓去皮

赤茯苓去皮

赤茯苓去皮



白芷 木香 各五錢

右熟極細末神麩煮糊圓如米大用米飲不拘時候服

生熟飲子 治嬰孩小兒虛積肚腹疳積下痢裏急後重日

夜無度病有冷熱熱有生熟病有除陽藥有造化有虛實有君

臣按君臣以理虛實分生熟而均冷熱治主本之法

聖藥穀 大者四箇一牛炙去 陳皮 二片半炙

甘草 二寸半炙 烏梅 二箇半 棗 二箇半 煨去核

生薑 二塊 煨 木香 一錢 作兩 訶子 二箇半 煨去核

黑豆 六十粒 黃耆 一兩半炙 白朮 二塊半 煨

當歸 去蘆 二十半 煨

右各半生半熟吹咀用水煎任意服有生黑豆不要打破要

圓全同煎服

神仙救急散 治嬰孩小兒痢疾赤白晝夜百十行不止

檳榔 去殼切片 罌粟殼 去蒂半盞炒黃焦色各五

右二味藥各自收用和勻紅痢番湯白痢沙糖湯赤白痢沙

糖茶同煎湯食前調化服忌食腥醃鹹生冷之物

疳

夫初生嬰兒者托質胞胎成形氣血誕生之後骨肉輕軟腸胃

微細乳哺須要合宜臟腑自然調適若乳母寒溫失理動止乖

違飲食無節甘肥過度喜怒氣亂醉飲傷勞即令兒成疳也百

日已後五臟已前乳食漸多不稔冷熱好食肥膩心食甘酸臟

腑不調並生也

楊氏曰兒童二十歲以下其病為疳二十歲以上其病為勞疳

與勞皆氣血虛憊腸胃受傷致之同出而異名也疳者白小兒

臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆

乳食不調甘肥無節而得也或因嬰孩關乳食肉大早耗傷形

氣則疳自虛生或三兩醉後乳食稍多過飽無度則疳以傷得

或恣食甘肥精膩生冷鹹酸停滯中脘則疳因積成或乳母寒

濕失調飲食乖常喜怒房勞即阻兒乳則疳因母患傳氣而入

此皆病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而得也

有因吐瀉之後妄施吐下津液虛渴得之者有因潮熱大下利

無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏熱冷飲太過渴飲水漿

變而生熱熱氣未散復干外邪得之又有積癥寒熱膈下硬痛

或老不能漸與消磨遽以礪巴峻取津液暴傷得之者此乃醫

誤藥壞病之過也

疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之必積者虛中

之積治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫燥補治積不可用藥

峻取

錢氏曰小兒初病為肥熱疳熱則涼之久病為冷瘦疳冷則溫

之小兒易虛易實服寒則生冷服溫則生熱峻取則再傷脾胃

反所益疾上醫處此消積以和胃滋血補氣隨順藥餌以扶持之

病家調節乳食以脾養之使榮衛調和臟腑充實若或過焉若

子未保其往積者疳之母由積而虛謂之疳極凡有積者無不

壯熱脚冷若積而虛其則先扶胃使胃氣克實方與微利急以



和胃之藥扶虛救裏如白豆蔻薑 蜀子縮砂蓬莖木消積等藥  
劑疎利也腸間癖痛亦虛中之積先寒後熱飲水不食或飲水  
而致喘嗽

錢氏有癖為潮熱之說法當解暑寒熱即與下癖治療不一宜  
權度於此哉

湯氏曰小兒疳病乃庸醫之壞病也或因吐痢之後再施吐下  
致脾胃虛弱津液耗亡如日中潮熱乃心虛也肝為心母宜先  
補肝肝實而後瀉心必得母氣而內平潮熱自退庸醫每見潮  
熱妄謂其實妄以大黃芒硝冷藥宜利既多津液內亡而成疳  
頭反光急 毛髮焦稀 顯縮鼻乾 口乾唇白 兩眼昏爛  
揉鼻擗眉 脊脊駝黃 鬪牙咬甲 焦渴自汗 尿白瀉酸

肚脹腸鳴 癖結潮熱 酷嗜瓜菓 鹹酸炭米 泥土而飲  
水占飯者 皆其候也 疳曰五疳 病關五臟 以臟別之

自然生疳

久吐 久瀉 久痢 久渴 久污 久熱 久瘡 久嗽  
久血 久淋

五疳在臟

目不轉睛乾啼少淚其病在肝  
瘦粹少血舌乾多啼其病在心  
搭口癢睡胸乾渴其病在脾  
殷焦皮燥大便乾結其病在肺  
身熱尿乾手足清冷其病在腎

菓實甘甜和乳食 交他臟腑有多般 因此腹中皮

肚上青筋作一團 朝夜渴瀉身壯熱 口澆眼腫面如蠟  
取轉虛中疳積病 補利調脾治得安

頻頻飲水心臟疳 目青脇硬定連肝 肚尚展白脾中起  
喘甚鳴籠肺裏藏 好喫土泥愛餌酸 腎疳之候細審看

專心若會通神訣 死後分明有數般 每食甜物并桃李  
惡哭疳痢痛咬心 吐涎積冷痛難任

致死蟲生病轉深 喫泥愛土面青黃 本是脾家每被傷 腹痛氣攻蟲上嘔  
發熱虛汗不曾涼

小兒喫土面痿黃 髮立毛焦手腦瘡 蓋為臟中積積熱

難消乳食胃曾傷 揉頭揉目熱攻肝 愛暗增明不欲觀 雀目母因風熱盛  
斑疹肺腑弱時漫

渾身熱似火 手足冷如水 腹大時加渴 皮膚盜汗蒸  
疳眼最羞明 才開泪又傾 肝心俱積熱 生膜翳遮睛

氣血未堅全 因傷積不痊 朝昏寒熱作 頭額汗相連  
日夜頻啼叫 蟲生作毒涎 面青多口水 錫菓不宜餐

溫壯痿黃色 多端不阻食 肚高青脈見 瘡癬滿身斑  
糞白蟲頻出 眉疎手足乾 尿時如米汁 此證是諸疳

虛黃如熟李 疳水定無疑 氣聚膀胱內 陰囊腫似吹

小兒無辜疾 皆因母所為 若能精慎護 何得漸疳羸



驚撲成風急 寒暄即氣痿 那得食兩乳 何間着...

方內上難醫 腮腫肝還感 吞高力已衰 頭皮光...

首髮白稀稀 肝壅侵雙目 皮黃入四肢 肚大非為飽

口謔不是飢 胸中常痞悶 喘息轉般恹 畫鼓何曾打

綉衣無意持 梳頭須速理 硬氣致身危 油未汗不理

養黑不須醫 不專求藥餌 有意叩神祇 父母情懷測

仙方還自就 神功萬藥 得效用烏犀 堪施調理者

方知有妙奇 雖然黃瘦子 變化化生兒

寒熱作連綿 成疳久不痊 髓中蒸揮作 骨血漸羸乾

四軀如枯竹 毛焦皮魚斑 舌瘡黃齒露 難保此生痊

驚疳相傳 相傳心與脾 嚔煎多愛哭 憔悴漸疳羸

驚病無疳病 疳寒灰白脂 睡中眠不穩 遍軀有瘡痍

小兒五疳 因過多食 或因甘甜 驚氣入腹 或緣患後

不長肌肉 致成疳疾 不思乳食 朝好暮惡 或發潮熱

四肢羸瘦 腹急如端 頭髮稀疎 喜食泥土 變成疳勞

肝疳白瘦 肝疳白瘦 怕日羞明淚不乾 交甲挫頭肌軀瘦

肝疳白瘦眼中瞞 肝疳白瘦眼中瞞 肝疳白瘦眼中瞞

肝疳白瘦眼中瞞 肝疳白瘦眼中瞞 肝疳白瘦眼中瞞

肝疳白瘦眼中瞞 肝疳白瘦眼中瞞 肝疳白瘦眼中瞞

肝疳白瘦眼中瞞 肝疳白瘦眼中瞞 肝疳白瘦眼中瞞

肝疳白瘦眼中瞞 肝疳白瘦眼中瞞 肝疳白瘦眼中瞞

心疳紅面少精光 壯熱唇紅面黃 才臥皮膚流盜汗

脾疳腹脹 脾疳腹脹 食物難消又滑腸 揉鼻揉目多愛吐

肺疳咳嗽 肺疳咳嗽 喘急痰涎氣力多 疥癩皮膚生瘡痒

腎疳骨熱 腎疳骨熱 齒黑唇焦瘡疔鼻 增寒壯熱手如冰

肝風疳 肝風疳 白膜眼中縷 楷磨常淚出 兩目不肯乾

心驚疳 心驚疳 渾身瘡癬斑 毛焦并髮緊 此病本從肝

脾疳腹脹 脾疳腹脹 食物難消又滑腸 揉鼻揉目多愛吐

肺疳咳嗽 肺疳咳嗽 喘急痰涎氣力多 疥癩皮膚生瘡痒

腎疳骨熱 腎疳骨熱 齒黑唇焦瘡疔鼻 增寒壯熱手如冰

肝風疳 肝風疳 白膜眼中縷 楷磨常淚出 兩目不肯乾

心驚疳 心驚疳 渾身瘡癬斑 毛焦并髮緊 此病本從肝

脾疳腹脹 脾疳腹脹 食物難消又滑腸 揉鼻揉目多愛吐

肺疳咳嗽 肺疳咳嗽 喘急痰涎氣力多 疥癩皮膚生瘡痒

腎疳骨熱 腎疳骨熱 齒黑唇焦瘡疔鼻 增寒壯熱手如冰

肝風疳 肝風疳 白膜眼中縷 楷磨常淚出 兩目不肯乾

心驚疳 心驚疳 渾身瘡癬斑 毛焦并髮緊 此病本從肝

脾疳腹脹 脾疳腹脹 食物難消又滑腸 揉鼻揉目多愛吐

肺疳咳嗽 肺疳咳嗽 喘急痰涎氣力多 疥癩皮膚生瘡痒

腎疳骨熱 腎疳骨熱 齒黑唇焦瘡疔鼻 增寒壯熱手如冰

肝風疳 肝風疳 白膜眼中縷 楷磨常淚出 兩目不肯乾

心驚疳 心驚疳 渾身瘡癬斑 毛焦并髮緊 此病本從肝

脾疳腹脹 脾疳腹脹 食物難消又滑腸 揉鼻揉目多愛吐

肺疳咳嗽 肺疳咳嗽 喘急痰涎氣力多 疥癩皮膚生瘡痒

腎疳骨熱 腎疳骨熱 齒黑唇焦瘡疔鼻 增寒壯熱手如冰



帶多并救逆 口鼻脛生瘡 昏昏饒愛睡 筋瘦又滑脫

四肢無氣力 容兒不同常 瀉膿并吐血 此病肺家傷

腎急辨

瀉痢時頻并 吐逆轉加深 大腸紅頭脫 壯熱無腹驚

乳食全不進 手足冷如冰 急并難治療 此病腎家因

小兒五臟發疳歌

肝

肝臟目頻痛 雙眸又不開 吐痢頻頻感 疳蟲瀉出來

眼溢專思睡 唇青淚滿腮 必竟毒時發 此病是肝來

心

心腹渾身熱 四肢力不禁 面黃兼頰赤 怯冷愛會食

口鼻常乾燥 根源積漸深 舌上瘡斑點 此病本從心

脾

脾臟精神好 早晚辭疳類 吐出還釘飯 見泥便欲食

莫教傳臟腑 他時即便難 醫士多不識 此病在脾間

肺

肺臟連時發 咽痰不出散 口唇齒根鼠爛 腹脹幾時輕

肚為下部痛 脫肛醫未徵 必後轉加甚 此病致之形

腎

腎臟腰間氣 尋常祇愛驚 六春中米不化 皮膚瘡疥起

血氣陰沉久 手足冷如冰 口內瘡膿山 此病腎中生

五臟五疳五般看 治法詳推重 若見面黃肌肉瘦

齒痛髮脫即為疳

身軀如柴 頭皮紫黑 目黃睛散 喘促心陷 兩脇凌癢

刺滯氣短 皮生紫瘡 牙齦黑爛 舌如白梅 乾噦塞噎

乳食直瀉 唇臉如稿 皆不可治

喘促目睛黃 頭皮紫黑光 龜胸心下陷 錯脊舌喉瘡

手足如乾竹 枯蘗氣血傷 諸疳若有此 死證不相當

諸疳惡證

肝疳左脇結硬 頻數吐涎 目睛青筋 眼角黑氣 不治

心疳飲水不化 食則驚啼 耳邊紋多 舌上黯黑 不治

脾疳喫泥泄痢 水穀不消 唇白腹高 人中平滿 不治

肺疳咳逆氣促 頻瀉白沫 身上粟生 其色斑黑 不治

腎疳飲水好鹹 小便如乳 耳焦眉落 牙黑骨枯 不治

五絕不治

其或清泄不休 脫肛掣逆 抱起昏沉 手足垂軟 觀及脚心全不

知覺 項筋舒展 身軀變冷 是則為五絕 證候甚者 胸陷喘噦 乳

食直瀉 腫滿下 刺腹脇脹 皮發紫瘡 肌肉光紫 與夫疳勞瀉

渴面搞色 天骨露齒 張肚硬不食 者皆危篤 矣抑有聞焉 石溫

玉而山輝 水懷珠而川媚 人受父母之氣 以生精血 不榮胞胎

有損如草木萌芽 之受傷 望其華實 之不獲 漏者難矣 丁亥甫

露腦疳瘡 非胎中已受之病乎 不持此爾 兒方周晬 母復有孕

乳汁成毒 飲毒小兒 神氣亦致 吾之冠 羸是謂之疳 病凡此等

類 盧扁復生 難施其功 余以終篇 所以為之 抽關啓鑰 云



一切疳後變作死候

手足如竹筒口舌上黑白瘡發喘渴熱

身軀如柴無肉色青黑耳聾生瘡

目如碧色身軀乾枯吐出不沫瀉下白蟲

龜胸鋸脊氣喘口舌生瘡喉中涎噎

解頰鶴膝下瀉如米泔外腎里糞門如竹筒

肚大青筋乳食即吐塞噎手足細軟不能行

忽吐下黑血連蛔并小白蟲出無數

手足鼻耳口舌後胎生黑大腫毒瘡不乳

腹中刺痛面青里吐瀉下黑血并蛔等蟲

手足四肢如冰頭項拘軟不收口伴痰流

李勿心錄

五疳保童圖 治嬰孩小兒五疳蓋其骨肉輕軟腸胃微細若

乳哺有節則臟腑相調乳母寒溫失理飲食無節飽喜怒及

百晷以後五歲已前乳食漸多不擇生冷好餐肥膩甘酸之物

即成五疳

一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛頭流汗遍身合面而目

溼痒肉色青黃髮立頭佳筋青腦熱腹中積聚下痢頻多久而

不痊轉甚為癰

二曰心疳其候渾身壯熱吐痢無常類赤面黃胸膈煩燥鼻乾

心燥口舌生瘡利久不痊多下膿血有時盜汗或乃虛驚

三曰脾疳其候腹多筋脉喘促氣麤乳食不多心腹脹滿多嗜

嗜逆面色萎黃骨立毛焦形枯力劣胸膈壅滯水穀不消口臭

常乾好喫泥土情意不悅愛憎不明腸胃不和痢多酸臭

四曰肺疳其候咳嗽氣逆皮焦乾佳饒涕多喘喉不利揉鼻

咬甲壯熱憎寒口鼻生瘡唇邊赤痒腹內氣脹乳食漸稀大腸

不調頻頻洩痢糞中米出皮上粟生

五曰腎疳其候肌肉消瘦齒齩生瘡寒熱作時口鼻乾燥壯熱

如火脚冷如冰逆既增乳食減少瀉痢頻并下部開張肛門

不收疳瘡痒痛是走馬疳已

疳積一錢

應香一錢

白鮮頭一錢

雄黃水飛

夜明砂微炒

青黛各二錢半

右為極細末糯米飯圓如黍米大一歲二圓用米飲不拘時

候日進三服

消疳肥兒圓

蒼朮一錢

青皮去穢炒

生龍膽去毒

鐵砂去粗

木香

香附炒



何皮 炒二錢 人參 錢半 無美

炒實 炒錢 羅子 炒各三錢 一兩

神麩 炒 麥蘖 炒各五錢 柴胡 去蘆三錢

右為極細末蒸餅圓如黍米大用米飲食遠服

治嬰孩小兒食肉大半生蟲積發熱脾泄

蘼荑 檳榔 去臍

黃連 炒各二錢 胡黃連 五錢

青黛 蟬蛻 去足二錢 麝香 一兩

右為極細末猪膽汁圓如黍米大用米飲食後服

香積散 治嬰孩小兒百日內下糞有綠如頭髮

木香 甘草 炙各一錢 檳榔 去臍二錢

史君子 去殼 麝香 一字

右為極細末用米飲調化食前服

消疳圓 治嬰孩小兒諸疳面合地因多稱如醉腹脹回黃

最啼叫心痛口乾糞下有蟲蓋由曾喫不熟肉食

檳榔 去臍三箇 蕪荑 去皮二錢 蘼荑 一錢

夜明砂 一錢 史君子 去殼二錢 黃連 炒三錢

苦練根 地內者去皮五錢

右為極細末煮糊圓如黍米大用米飲食遠服

肝疳即風疳

出乳母不調肝臟受熱所致也若乳母寒喧不調滋味不節

外感風寒內傷喜怒邪氣未撤遽爾乳兒多成風疳者服之

候上隔伏熱痰涎滯滯以致肝風入眼赤睛翳生眵淚爛以瀉

搖頭搥目 白膜遍睛 眼青淚多 頭昏髮立 筋青

甲癢筋癢 燥多汗多 下疳瘡癩 謂之肝疳

天麻圓 治嬰孩小兒肝疳風疳疳眼

青黛 黃連 炒 天麻 一錢

夜明砂 炒 川芎

五靈脂 水飛各一錢 防風 去蘆一錢

右為極細末猪膽汁浸米糕圓如黍米大用清荷煎湯食遠

服

銀圓子 治嬰孩小兒肝疳眼青白眼睛痒淚多面合地

龍齒 煨二錢 茯苓 去皮 一錢

黃芩 炒 茯神 去皮 一錢

右為極細末蒸餅圓如黍米大用米飲食遠服

雞心圓 治嬰孩小兒肝疳面青黃疳疳眼交甲水

檳榔 去臍三箇 赤芍藥 一錢

龍膽草 去蘆 一錢

右為極細末蒸餅圓如黍米大用熱水不拘時候服

皂莢 煨存性三錢 獨活 一錢

川芎 各二錢

全幼心鑑 卷四

一二四一



生熟地黃湯 治嬰孩小兒疳眼閉合不開內有痰

生地黃 熟地黃各五錢 川芎

赤茯苓 去皮 枳殼 去穢 麩炒 杏仁 去皮 尖炒

黃連 炒 半夏 炙 大麻 煨

地骨皮 甘草 炙 各二錢半

右以咀用生薑三片黑豆十五粒同煎臨睡服

心疳即驚疳

由乳母不調心臟受熱所致也蓋其血氣未定乳哺有傷易生

滯滯內有滯熱未得疏通故心驚鬱而作驚疳外證

身體壯熱 臉赤唇紅 口舌生瘡 胸膈煩悶 小便赤澀

五心皆熱 次汗發渴 齒齙虛驚 謂之心疳

茯神圓 治嬰孩小兒心疳驚疳

茯神 去皮 木 琥珀 黃連 炒

赤茯苓 去皮 各 鈞藤 皮 遠志 去心 生薑 炙

蝦蟇 去頭 煨 灰 葛蒲 細節 一錢 麝香 一字

蘆薈 半錢

右為極細末粟米煮糊圓如黍米大用薄餅煎湯食遠服

龍膽圓 治嬰孩小兒心疳頰赤面黃鼻乾心燥口内生瘡

悸煩渴頭髮作穗

龍膽草 十五釐 赤茯苓 去皮 各 黃連 炒

胡黃連 各二錢 朱砂 水飛 半 麝香 一字

右為極細末煮麵糊圓如黍米大用熟水食遠服

脾疳即食疳

由乳母不節脾胃受傷所致也或乳母過食生冷

過傷或飯後與乳致使吐乳多眠久則變為乳癖腹脹結塊亦

名疳疳外證

面黃身黃 肚大脚細 吐逆中滿 乏力嗜啼 水穀不消

泄下酸臭 合齒困睡 減食與泥 謂之脾疳

靈脂圓 治嬰孩小兒脾疳食疳

五靈脂 水飛 縮砂 去殼 白豆蔻 去殼

麥蘖 炒 蓬莪 木煨 青皮 去穢 炒

天茄子 去殼 蝦蟇 炙 橘紅 去白 各一錢

右為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

雞肉前圓 治嬰孩小兒脾疳面足痿黃心腹膨脹滿身瘦痿

乳食不進好喫泥土潮熱往來焦喘出汗

蘆薈 人參 去蘆 北柴胡 去蘆

史君子 去殼 胡黃連 黃連 炒

燕美 去殼 炒 各二錢

右為極細末拌和用黃雌雞一隻重一斤籠者專蘇子飼之

至三日依事治法去毛令淨放於簪後開孔去腸肚淨拭乾

入前藥在雞腹內以線縫取小甌先以黑豆鋪甌底厚二寸

安雞於甌中四傍亦以黑豆圍裹上亦以黑豆厚二寸蓋之

自日出時蒸至晚候放冷取雞骨淨將肉研細酒煮麵糊圓

如黍米大用水飲食遠服



捉疳圓 治嬰孩小兒脾胃虛弱面黃腹脹多睡如醉或嘔生米紙及碎瓦上泥十

丁香 木香 各一半 黃連 炒

蕪荑 去皮炒 蚌粉 神麴 炒

三稜 煨 青皮 去穢炒 各一錢

右為極細末猪膽汁煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

肺疳即氣疳

高乳食不調壅熱傷肺所致也肺主乎氣鼻乃肺氣所通其不和則風濕乘虛客於皮毛入於血脈故鼻下兩傍赤癢流是為鼻疳其瘡不痛汁所流處隨即成疳亦名猪鬃疥證

咳嗽喘逆 壯熱惡寒 皮膚粟生 鼻癢流涕 咽喉不利

願爛唾吐 氣脹毛焦 泄瀉頻併 謂之肺疳

清肺飲 治嬰孩小兒肺熱疳積穿乳汁鼻或生息肉

桑根白皮 炙 紫蘇葉 前胡 去蘆

黃芩 炒 當歸 去蘆炒 天門冬 去心

赤茯苓 去皮 桔梗 去蘆炒 連翹

防風 去蘆炙 生地黃 甘草 各一錢

右咬咀用水煎食後服

化屋圓

蕪荑 去皮 蘆薈 青黛

川芎 白芷 胡黃連

黃連 炒 蝦蟇 煨 各一錢

石為極細末猪膽汁浸米糕圓如黍米大用杏仁去皮尖煎湯臨睡服

龍腦膏 治嬰孩小兒肺疳鼻下赤爛頭髮焦枯搽鼻指眼旁

下血痢 龍腦 一字 朱砂 一錢 鈞藤

赤茯苓 去皮 人參 去蘆 甘草 炙

夜明砂 各一錢半

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研化食後服

鼻疳用熊膽泡湯小筆蘸洗俟服化屋圓進數服後用

青黛 當歸 去蘆 赤小豆

瓜蒂 地榆 黃連 炒

蘆薈 雄黃 少

右為極細末入量欬瘡

疳疔即急疔

由乳食不調臟腑伏熱遂使孩提心下擾悶若上蝕齒斷則口瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢紅爛濕癢生瘡療治不痊

精熱消耗難以有瘡蟲者隱也目為濕隱多因疔傷久痢腸胃受濕得之壯如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬為喻初作口氣名

腎王虛纏受熱疔疔氣直奔上焦故以走馬為喻初作口氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽熱血逆出名曰宜露甚者牙皆脫落名曰腐根其根既腐縱得全活齒不復

生矣外證

全幼心鑑 卷四



腦熱肌削 手足如冰 寒熱時來 滑泄肚痛 口臭乾渴

齒齦生瘡 瓜黑舌黯 身多瘡疥 謂之腎疳

地黃圓 治嬰孩小兒腎疳

熟地黃 四錢半 赤茯苓 去皮 山茱萸 去核

當歸 去蘆 川芎 川棟子 去皮核

牡丹皮 山藥 史君子 去殼各二錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用滾白湯研化食前服

殺疳圓 治嬰孩小兒腎疳面無顏色黃瘦及有齒齦臭爛出血

不思飲食

木香 肉豆蔻 煨 胡黃連

夜明砂 茯苓 去殼各 麝香 一字

右為極細末蒸圓如芥米大用米飲食遠服

雄黃散 治嬰孩小兒腎疳又名急疳又名走馬疳齒齦臭

臭爛出血

雄黃 如粟豆 大七粒 雄雞 去核七箇

右將一粒雄黃入一箇雄雞內將小鐵線纏定留三四寸

長用油燈上燒以藥外黑內乾為度將碗合定再燒第二箇

如前法候燒得二箇成時少時為極細末少許乾擦牙齦臭

爛出血處停少時噴去涎再擦以血止為度

疳蟲

疳出蟲者疳傷之源雖起於乳哺不調然臟腑停積已久其

不化而為蟲其蟲如絲髮或如馬尾多出於頭項脰背之間黃

治青黃者用雞屎也

無菜

雞屎 煨 檳榔 去核

蜈蚣 炙 蘆薈 半錢

右為極細末雄猪膽汁圓如芥米大用陳米飲或史君子去

殼煎湯凡蟲月首則頭向上夜早服

蛔疳

蛔疳者夫乳食不食肉大早或腸胃停滯化為蟲其終

織眉多時 嘔吐清沫 腹中生痾 肚腹青筋 唇口紫黑

腸頭濕瀝 謂之蛔疳

脊疳

脊疳者蟲蝕脊骨身熱羸黃積中生熱煩渴下痢拍背如鼓鳴

脊骨如鋸齒或下指生瘡頻嚙瓜甲是也

下蟲圓

新苦棟根皮 貫衆 木香

桃仁 去皮尖炒 檳榔 去核各一錢

鶴虱 炒 錢半 輕粉 一箇 蟻頭 一箇

史君子 去殼 十五箇

加當歸 去蘆炒 黃連 炒各一錢

右為極細末蒸圓如芥米大用肉汁湯食前服

腦疳

腦疳者腦中素受風熱生下乳哺失常頭面黃瘦



熱如火髮結如穗遍身多汗頭暈頭高是也或或胎產多熱亦然  
易損兒眼

龍腦膏 治嬰孩小兒腦疳熱疔瘡

龍膽草 去毒 川升麻 煨 苦練根皮

防風 去毒 赤茯苓 去皮木 油髮 煨 各一錢

青黛 黃連 炒 各一錢 黃連 炒 各一錢

右為極細末猪膽汁浸末糕圓如黍米大用薄荷煎紫蘇泡  
湯食後服仍以蘆薈研細末吹鼻中

疳瀉

疳瀉者臟腑以有疳氣加之乳母恣食甘肥酒麵炙燥使邪入  
心肺壅熱日則煩渴飲水飲食不進夜則渴止是也服

麥冬白朮散

黃連圓 治嬰孩小兒疳瀉

黃連 雄猪膽汁浸一夜 瓜蒌 煨

烏梅 去毒 杏仁 去皮尖 蓮肉 去心

茯苓 去皮各二錢

右為極細末牛膽汁浸末糕圓如黍米大用烏梅生薑蜜同  
煎湯食遠服

全生方曰凡疳病皆因津液枯竭飲食之中入藥食之

王氏曰仍以前藥加黃連入猪肚內縛口煮爛入臼內杵細末  
圓用米飲食後服生津清心止渴調脾諸疳常服

疳瀉

疳瀉者毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下積相是也勿用熱  
藥止之

歌曰

小兒疳瀉時 連軟腫如癰 此疳名疳注 醫士細意看

香薷圓 治嬰孩小兒疳瀉

黃連 炒 肉豆蔻 生 木香

訶子 煨 去核 縮砂 去殼 茯苓 去皮各一錢

右為極細末白朮飲圓如黍米大用木飲食前服

疳瀉

疳瀉者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水穀不聚煩  
下惡物是也

木香圓 治嬰孩小兒疳瀉

黃連 炒 三錢 木香 厚朴 薑汁製炒

縮砂 去殼 夜明砂 煨 炒 各一錢

訶子 煨 去核 一錢

右為極細末飯圓如黍米大用艾生薑蜜同煎湯食前服

香薷圓

史君子 去殼 訶子 煨 去核 神麩 炒

麥蘖 炒 甘草 炙 厚朴 薑製炒 各一錢

右為極細末凍白蜜圓如黍米大用木飲研化食前服

疳脹瀉



湯氏曰此瀉與積瀉相類但具如抱退難學瀉又不頻又不如水聚作一次口難得止實者宜微取積

人參散

人參 去蘆

白朮

黃芩 各二錢

茯苓 去皮

甘草 各二錢

史君子 去殼五錢

白蘆 五錢

胡黃連

丁香 各二錢

木香 一錢

肉豆蔻

麵裹煨去油一箇

右為極細末用陳米飲調化食前服

六神圓

肉豆蔻 麵裹煨

木香

丁香 各二錢半

訶子 去核一錢

史君子 去殼

廣藿香 半錢

右為極細末粳米飯圓如黍米大用米飲食遠服

疳腫脹

疳腫脹者虛中有積其毒與氣交并故令腹壯脹由是脾胃受濕腎中不能宣導故令頭面手足浮腫是也

積圓子 治嬰孩小兒疳腫脹

蘿蔔子 炒五錢

陳皮 去白

青皮 去穢炒

檳榔 去腐

一星牽牛 炒

五靈脂 水煎

赤茯苓 去皮

三達棧木 煨

木香 各二錢半

右為極細末飛麪煮糊圓如黍米大用紫蘇桑根白皮同煎

湯不拘時候服

異香散 治嬰孩小兒疳積 腫脹調脾胃

三稜炮

蓬朮炮

青皮 去穢炒

陳皮 去白

半夏麩

藿香葉

桔梗 炒

益智 去殼

枳殼 去穢麩炒

香附子 炒

縮砂 去殼各

丁香 一錢

甘草 炙一錢半

右到散用生薑三片棗一箇去核同煎食遠服

疳勞

疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胸前熱而發瘡汗骨蒸嗽喘枯棒是也

渴而復瀉 飲水惡食 肚硬如石 面色如銀 斷不可治

黃耆湯 治嬰孩小兒疳勞

黃耆 炙

當歸 去蘆炒

川芎

芍藥 炒

生地黃

蝦蟇 炙去足

鱉甲 醋炙焦各

人參 去蘆

茯苓 去皮

橘皮 去白

半夏麩

柴胡 去蘆

史君子 煨去殼

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎食前服

紫血煎

人參 去蘆五錢

燕糞

柴胡 去蘆各

史君子 去殼

胡黃連

黃連 炒各二兩

右用紫血一盞吳茱萸一兩和一二黃連淹一宿次早炒乾



透去其米黃并血只用一運之餘藥杵搗極細養粟米粉糊  
圓如黍米大用熟水食前服

猪心圓

水香

黃連炒

生地黄

柴胡去蘆各

驚甲九筋者童子一便浸炙一兩

右為極細末猪肚一箇入藥在內縛定口入瓦籠煮爛取出  
杵搗壯藥圓如黍米大用米飲食前服

無辜疳

無辜疳者腹後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有蟲  
如米粉不速破而去之免毒隨熱氣流散滯蝕臟腑以致生疳  
癰瘡便利膿血壯熱羸瘦頭暈骨高是針刺破管藥貼

丁癸膏

其若手足極細項小骨節凡削腫脹大膝突腕突胸陷或生  
穀蠹是為丁癸之證

丁癸者山乳食過厚脾胃虛弱不能磨消嗜食不化則水穀之  
精凝積無以榮其氣血故肌肉消瘦面黃腹大頸小者是也

哺露膏

虛熱性來頭骨分間 飢食吐蟲煩渴嘔噦此二者皆柴骨枯露  
危矣

哺露者因乳食不化腸胃致脾胃衰弱不能飲食血氣凝  
積不榮肌肉而萎 哺露者因乳食不化腸胃致脾胃衰弱不能飲食血氣凝  
積不榮肌肉而萎 哺露者因乳食不化腸胃致脾胃衰弱不能飲食血氣凝  
積不榮肌肉而萎

丁癸哺露者高肉腫骨不虛不能傳化水穀以榮其氣血故

瘦弱氣不足復為風冷所傷便骨枯露有胎中受毒者  
致之此皆無辜積類之疾因而至此不幾殆哉

丁癸哺露膏

皮膚蒼黑斑

枯焦肚大作

渴熱頭并寒

乳食隨便出

如膿瀉數般

舌喉瘡白滿

父母轉悲酸

久積成疳因失治

肚高頸細變丁癸

更無手足如筒樣

面白血黃汗不時

積得疳後曰丁癸

哺露因而又得之

腹大青筋蟲滿肚

吐瀉瀉數急調脾

十全丹

治嬰孩小兒丁癸哺露

青皮去蘆炒

陳皮去白

二稜炮

蓬莪木炮

川芎

白豆蔻去殼

檳榔去殼

縮砂去殼

史君子去殼

木香各五錢

蘆薈一錢

丁香二錢

蝦蟇煨

香附炒各三錢

右為極細末猪膽汁浸米糕圓如黍米大用米飲食遠服

醒醐散

治嬰孩小兒吐瀉後調和脾胃進乳食及丁癸哺露

虛熱煩渴

陳皮去白

縮砂去殼

厚朴薑製炒

麥藥炒

烏梅各五錢

良薑用東壁七炒

葛根

烏藥各二錢半 草菓炮二錢

甘草炙三錢

右吹咀用生薑三片東一箇去核同煎食前服



冷熱疳

馮多膿血口加瘦弱

通神固 治嬰孩小兒冷熱疳

胡黃連

黃連炒各三錢 木香

蘇莢各二錢 丁香

肉豆蔻生

史君子去殼各 蝦蟇去骨一錢半

右為極細末蝦蟇內圓如赤米大用米飲食前服

冷疳

湯氏曰小兒冷疳多渴好卧冷地乳食不進漸成羸瘦其證難

明有甚無大便滑泄此證錢氏木香圓服病愈可服有效驗其

病在內痢色無常其末青白肢厥軟弱目腫面黃遂致遍身熱

瘡煩渴不已

木香圓在瀉門

豬肚黃連圓

豬肚一具 黃連七兩

右剉水浸濕納豬肚內縛定口入粳米飯上蒸爛安石臼內

入粳飯杵括圓如赤米大用米飲食遠服後用

川芎

生地黃

茯苓去皮

茯苓去皮木

甘草炙

右咬咀用水煎食遠服調而清心用薑蔥圓肥兒圓合服佐

之可也

入方

大腹皮

苦參

白芷去蘆煎湯洗

肥熱疳

小兒初病謂之肥熱疳其候

病多在外 鼻下赤爛 頭瘡濕瘡 五心煩熱 欲食不食

渴飲冷水 煩燥臥地 肚熱足冷 潮熱往來 乃欲傳疳

補脾進食 磨積消疳

肥兒圓

巴豆去油心皮膜石制將巴豆炒

青皮去穢 陳皮去白各 三稜炮

蓬莪木炮 神麩炒 麥蘖炒

川棟子去穢 黃連炒 史君子去殼五錢

蘇莢各一錢 胡黃連二錢半

青黛 殺蟻去足殼一錢半

右剉一處入銚內用煎巴豆微炒去巴豆和前藥為極細末

煮麵糊圓如赤米大用米飲食遠服

凡久積欲復疳候宜在虛中積治之虛則補而後取實則取而

後補切不可用胡黃連磨食治補服實脾散磨積消積藥之

五疳潮熱

小兒肚脹髮焦切不可用大黃黃芩損傷胃氣恐生別證難治

胡黃連五錢 五靈脂木飛一兩

右為極細末豬膽汁圓如赤米大用米飲食遠服

取胎毒者取而後補虛者補而後取當以補脾胃

淡豆豉上粒

巴豆去油膜心三箇



右汗如花圓如黍米大用生薑煎湯食前服取下魚鱗

除痰

取文蛤一切用酒

夜胡沙五錢

右入瓦瓶內取精猪肉三兩薄切入瓶內木煮取肉干前與

兒食澄清肉汁令兒飲汁食肉取下腹中胎毒次用生薑四

兩和皮切炒黃芩用黃連一兩一味為細末煮麵糊圓如

黍米大用米飲食前服

疳疔不消

肥兒用蘇合香入朱砂五靈脂細末煉白蜜圓如黍米

大用石葛蒲煎湯不拘時候服

疳疔不消

小兒所以有疳疔者是婦人懷娠有惡神毒其腹中胎妬嫉他

小兒今病也疳疔者小兒也此疳疔人下老招致人時有此爾

疳疔為疾喜微微下痢其熱或有土氣毫毛皆屬不悅是

其證也

婦人先有小兒未能行而世更有娠使元飲此乳亦作疳也令

兒黃瘦骨立髮落壯熱是也

阮氏曰小兒一二歲面色痿黃乳食不消腹脹如絞或生疳疔

且新羸瘦此由乳母兒未斷乳而又有孕其乳名曰愛奶小兒

氣之致有此疾

論小兒疳疔者婦人懷娠惡神導胎中理誤嫉妬小兒

致令此病其壯微微下而髮熱赤去毛髮髮神色不悅疳疔

云疳疔是小兒鬼也蓋凡有病即腹中子之魂識嫉妬也非母

之鬼子緣不靈孕婦身外嬰兒眼淨豈而致患以愚觀之既言

嬰兒眼淨豈而得之其能嬰兒未能言安能有是語也又所言惡

神導胎鬼神之事吾亦難明一說俱未之信也要之積神成胎

其子必靈孩鬼成胎其子必怪靈子者如石變木是也怪

子者如漢末之時三頭二首是也今之小兒形像於形既非其

靈又非其怪一旦受病證可謂惡神導胎者乎蓋婦人妊娠之

時氣血不榮或頭疼嘔吐或胎動不安或氣滯不注經絡滯滯

乳脈不調將乳飲之令兒面黃腹脹臍不調寒熱赤去毛髮

髮髮精神不悅日漸黃瘦者乃是飲母疳乳也皆非惡神鬼

疳為之其間有兒飲喜乳熱乳寒乳氣乳病乳滯乳醉乳

淫乳亦令兒病斷乳小兒必無疳病如母有病孕小兒飲別乳

亦無此患證類本草云小兒變病因母有娠乳兒兒有病如疳

疔他日亦相繼腹大或痿或發其有受胎或實或虛寒或大飽

而大飢或大醉而大勞至大雨大寒太暑及陰陽不等犯

諸禁忌受胎之氣令兒生下故多在懷抱中且有是病也所謂

惡神傳繼之說蓋因此證而妄云也若夫靈子怪者是必有說

焉

小兒有患疳疔者非五臟傳變亦非六腑所主也緣兒生後方

且用母後有孕血氣所養分之兩端是故胎胎漸傷乳汁成

毒虛邪相攻兒勿致疾歟率其氣鬱傷其神魄令兒疳疔疔



括痺煩燥朝昏嘔噦日夜不可得寐理但速與乳其乳溫平胃氣和順血脈自然而愈其有萎疰致痰乃成無辜證候何足怪訝者耶

龍睛湯 治嬰孩小兒疳病

龍睛草 去蘆 鈞藤 柴胡 去蘆

桔梗 去蘆 芍藥 川芎

茯苓 去皮 甘草 各一錢 人參 二錢 下錢

大黃 濕紙裹煨一錢半

右剉散每服二錢用井水煎食前服仍以紅紗袋夜明砂與兒帶

鬼胎

在初心

婦人產育有鬼胎者廣都謂婦人納鬼之氣而受之者非也鬼胎者乃父精不足母氣衰羸故首添添之不及謀安存之失調方及七八箇月以生又有過及十箇月而生者初產氣血虛羸降誕艱難所言鬼者即胎氣怯弱榮衛不克致子萎弱語猶如菓子結實之時有所墜藉不到灌溉為物偏小其形猥衰無有可愛如此之謂胎氣陰萎常與圓散扶挾乳哺勻調氣血克陰陽胃固壯即保其靜善蓋由受氣不足稟賦不全忽爾橫殤非可惜耶

陰囊痛

人有常言天生地長多與小兒近地然兒有大小壯弱起止中節可也夫腎經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經之風

邪滯氣傷之石為陰腫勢布矣問有嘔吐怒氣閉繫於下結聚不散 以水袋不行亦能發為此疾

揚氏曰腎主納氣乃人之氣海為腎氣為風寒所乘為暑濕所鬱為膏火驚恐所傷而水結又散又為氣搏邪聚於中為疝為奔豚為小腸氣為膀胱等證不特外腎小腹作痛或攻刺腰脇或遊走背脊或邪氣滄心下痛滿或痛流腫傍或脇之左右如五成臍之上下如臂或腹中累累如桃李或胃脘腹大如盤或壯熱惡寒或洒泫寒熱有大小便秘者有裏急而下泄者其於陰間則卵有大小申縮上下不常囊有腫脹急痛而發欲無定夾冷驚怒則塊物上逼囊根或攻腹脇皆謂腎氣

治法大綱風則散之寒則溫之暑則解其熱濕則滲其水驚怒

在初心

六九

則調其心氣水與氣搏則行其小便其間又以治腎氣藥療之其間行疏利為先母曰腎虛不敢踈泄蓋腎氣所干若其間病何由愈倘或姑息畏虛妄投剛補之劑大小踈秘而不通邪氣入腹冲心危殆心空然腎氣雖虛得之當明冷熱及冷熱不調之證冷者脇邊及外腎清冷小便清而多過寒則發熱者內夾暑氣或積酒毒熱則外腎與小腹俱熱小便數而泄瀉熱則其冷熱不調者小便外腎下冷乍熱大小便或澀或利用藥溫涼流行疏導於其下矣若逆氣長吁中脘停酸燥悶嘔吐最惡候乃天一生水腎氣主三焦筋脈於陰語必藉陽明胃土以養今脾土未強腎水既涸脾土又二焦陰陽不升降滯而不流行大小便秘澀腎汁胃中必為酸汁而暴吐者大抵難治



巢元方論曰諸筋會於陰器邪客於厥陰少陰之經與冷氣相搏則陰囊腫痛而引縮經中雖分四證曰腸瀉氣瀝水瀝如瀝然小兒患此若治之不早則成癩疔如腹中腹痛冷汗目出而陰囊二子瀉縮入腹痛止方出名為內瀝有陰囊全縮不見有陰囊足腫不見此因肝腎氣宜以橘字仁煎湯服又曰由腎虛或坐地為風冷浸氣侵襲或為地龍所吹或啼叫怒氣結聚或水道受熱滯滯而成

經曰癩癧疔膚脹者陰亦盛而腹脹不通故曰癩癧疔由是觀之乃陰氣盛而致有此癯縮者筋急也筋遇寒則汗縮遇熱則弛張故三因所用方法以寬小腸氣疎風為治然小兒此證多因坐陰潤之地感風濕而得有外腎無故而膚囊腫大不燥不痛光亮如吹此名氣虛外腎膚囊亦腫通明及女兒陰戶腫脹乃心熱之所得也

**陰囊腫痛**  
厥陰少陰寒激搏 致令腫縮且溫藥 光浮不痛作虛治 亦腫須憑涼劑却

**浮囊腫痛**  
浮轉尿時痛 尿時恰似常 非干淋瀝病 氣壅結膀胱 青木香湯 治嬰孩小兒陰囊無故而腫或痛細初因陽明有風熱濕氣相傳所以如是法當寬此一經其證自愈蓋陽明受病不能養其宗筋故也

青木香 去蘆 枳殼 去穢 炒 甘草 炙 錢半

右吹咀用水煎食前服

**五消散** 治嬰孩小兒膀胱久受熱毒致陰器膚囊亦腫脹痛 赤小豆 赤芍藥 枳殼 去穢生

**杜確** 商陸

右為極細末用栢樹枝煎湯候冷調金重處煎五茶散如車前子慈苳仁用水煎食前服

**天花散** 治嬰孩小兒外腎膚囊 天花粉 一兩 甘草 炙 一錢半

右吹咀用水煎入酒食前服

**桃仁圓** 桃仁 去皮 炒 三錢 桂 去皮 牽牛 炒 頭末 各 一錢 全幼心鑑 卷四

右為極細末煉白蜜圓如黍米大用青皮木香葱白入苧少許同煎湯食前服

**三白散** 治嬰孩小兒解初中腫疾四肢膚囊浮脹大小便不利皆因膀胱蘊熱風濕相乘 桑根白皮 炒 白木 木通 去皮 節 陳皮 去白 白牽牛 半生 甘草 炙 各 五錢 右吹咀用水煎食前服

**母蟻散** 治嬰孩小兒外腎腫大莖通明 母蟻粉

右為極細末先以津唾塗腫處次以母蟻粉傳



知腫

外名膀胱內是腎臟一處承受三經所傳其外腎心熱皆自心氣主之心經有熱熱入小腸或赤或白或淋或澀心經有寒寒流膀胱或秘或瀉或腫或光初生見兩箇石子俱大光淨名曰如腫一邊差大名曰偏墜蓋由驚氣所行傳受於中或母懷孕驚憂之氣不散胞胎之間兒亦受之所以生下便有如腫汁宜傳之內用清心順之

黑散

黃連

黃芩

大黃

黃蘗各二錢

右同燒存性為極細末雄指膽汁蜜同調傳

又方卵照用桃仁去皮尖研極細津唾調傳

遺尿

楊氏曰小便者津液小餘也腎主水膀胱為津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿聽裏自出者謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾於所致也

尿床遺溺

膀胱因受冷 夜自必尿床 久則遺便溺 淋瀝滑小腸

偏墜腫硬

陰核腫如吹 兒啼怒氣為 或因疳積作 或被暑邪欺 傳上膀胱內 侵凌外腎垂 停留堅百天 結聚一邊軟

雞腸散

雞腸一具男用雞雞七用雄雞燒存性

牡蠣

茯苓土皮

桑螵蛸炒五錢

桂去皮

龍骨各二錢半

右為極細末仍以雞肚腔一具雞腸一具燒存性研極細末每用前藥末一錢用溫酒調化食前服

白濁

楊氏曰小兒尿如白米泔壯由乳哺失節有傷於脾致使清濁不分而色白也久則成疳亦心膈伏熱無所得之

小兒夜間尿床有父母不曉以管掃掃愈重其病殊不知此因膀胱冷夜傷陰故小便不禁睡裏自出也至於便濁則有二先

赤後白者心熱也便下純白者疳證也又有年齒稍長而非熱非疳亦白濁也此由習毒辯太過或因驚入小

雖同其治則異隨證用藥

茯苓散 治嬰孩小兒伏熱尿白

三棱

蓬莪木

縮砂

赤茯苓

去皮

青皮

陳皮

滑石水

甘草

各二錢半

右為極細末用麥門冬去心燈籠同煎湯調化食前服

香砂圓

治嬰孩小兒小便白濁

香附子

炒

縮砂

去殼五錢

三稜

蓬莪木

炒

陳皮

麥蘗炒各四錢



產後各五錢半

心為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲湯食前服

方用大甘草頭煎湯食前服

疝

按內經太奇論曰腎脉大急沉肝脉大急沉皆為疝心脉搏滑急為心疝肺脉沉搏為肺疝蓋疝者寒氣結聚之所為故令脉腹絞痛者是也

巢氏方論謂疝者陰氣積於內復為寒氣所傷榮衛不調一氣虛弱風冷入腹而成故脉經云急者緊也緊則為寒為實為痛血為寒流則為瘕氣為寒聚則為疝皆因本臟氣虛外感於寒溫內傷於生冷遂使腸腹絞刺激搏而痛無有定處倉卒之際不堪忍謂之疝也宜五苓散調湯服

疝如者陰核之氣腫大而痛也多因小兒啼怒不止動陰氣故陰氣下繫結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉亦變此候惟是陰氣不得流行加以風冷入焉血水聚焉故水氣上乘於肺先喘急而後疝痛其壯有如李者亦有稀軟者亦有并腎腫大者亦有大硬者疝下痛楚皆不能忍用藥行心氣逐腎邪利其大小二便更無補法

胎積疝

小兒疝氣每因啼胎積勝脫不散之偏者或傷或左右結成年久不堪醫

疝縮頻啼 勝脫冷熱 疝紅腫痛 刺痛氣相隨

腎外皮色黑 囊中紫黑 青浮連小腹 何用更堪醫

諸疝原來各有名 蓋因寒濕熱侵成 治法各異烏梅散

疝氣入經與五苓

此病從來有兩般 夜啼疝氣要詳看 赤絞虎口為疝疝

青脉端知哭夜間 一搐來時宜速理 莫教疝積便難難

勝脫疝氣入腎囊 羞顏疝墜兩分張 此是喜怒嘔逆氣

驚搖孩兒怒毒傷 行有小腸通小氣 莫教虛損不尋藥

更有一般疝裏患 人言獨腎不成雙

勝脫浮青 腎皮焦黑 紫血滿囊 耳中清血 唇黑氣噎

手足心黑

疝氣散 治嬰孩小兒疝氣通利後及冷疝腹痛氣滯不和

桔梗 去白 五錢 縮砂 去殼

茴香 各一錢半 白薑 炮一錢半 甘草 炙二錢

右為極細末用滾白湯冷煎服痛燒湯調服食前服

烏梅散 治嬰孩小兒腹痛初生疝下冷痛疝氣

烏梅 不去核 延胡索 甘草 各半錢半

乳香 沒藥 鈞藤 各一錢半

疝氣疝用本煎食前服

金鈴散 治嬰孩小兒疝氣腹痛愈而復作

金鈴子 同三錢 二錢 蓬莪朮 醋炙

青皮 去穢炒 陳皮 去白 赤茯苓 去皮各

茴香 二錢半 木香 一兩 甘草 炙二錢



檳榔 去脂 炒 投 去穢 炒 鈞藤 各 錢 一 錢 湯 服

右為極細末用酒炒丹灰酒調化食前服不飲酒者煎香炒煎湯服

金菜圓 治嬰孩小兒冷泄氣痛及膚囊浮腫

金鈴子肉 五錢 吳茱萸 二錢 半

右為極細末酒煮麵糊圓如芥米大用鹽湯食前服

川棟圓 治嬰孩小兒疝氣小腹痛引腰脊彎曲身不能直

木香 檳榔 去穢 二錢 蓬莪朮 炮 青皮 去穢 炒 陳皮 去白

川棟子 去皮 炒 芫花 各 錢 五 錢 巴豆 去心 湯 半 錢

桂 去 皮 黑 薑 半 生 各 三 錢

右為極細末煮麵糊圓如芥米大用薑湯食前服

楊氏曰諸淋皆腎虛而膀胱生熱也水火不交心腎氣鬱使

淋

陰陽乖舛清濁相干蓄在下焦故膀胱裏急膏血沙石從水道

出焉故有欲出不出淋瀝不斷之壯其者室塞其間或令人悶

絕大凡小腸有氣則小便脹有血則小便澀有熱則小便痛痛

者為血淋不痛者為尿血敗精結壅為以敗精敗者為膏金石

結者為石揣木尋源各從其類治法並用流行滯氣疎利小便

清解邪熱調平心火蓋心清則小便自利心平則血不妄行切

不可好息用補氣得補而愈脹血得補而愈澀熱得補而愈感

求道不行加之穀道不通格不通道其能生者也又腎

虛弱中受寒水而小便淋瀝者其證先寒戰而後溲使蓋

冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰而成淋熱氣勝則戰解方得便尿也

巢氏病源曰諸淋皆腎虛所致腎虛膀胱為表裏至水下入小

腸通於胞行於陰而為腎氣通於陰下流之道也淋有五名

曰膏曰冷曰熱曰血曰石膏淋見小便有肥脂似膏而淨於小

便之上此腎虛不能制其肥液而下行也冷淋先戰慄而後小

便此腎虛而下焦受冷氣入胞與正氣交爭故小便澀而戰

慄熱淋下焦有熱熱氣傳於腎流入於胞其病黃多而澀間有

鮮血同來者血淋熱之極也心者血之主外行經絡內行臟腑

熱盛則去其常道心與小腸為表裏故下流而入於胞則為血

淋石淋腎主水水結則化為石腎為熱所變過小便則室中痛

不得流則痛引小腹則沙石從小便出甚則室痛令人昏悶通

身有汗而後醒此痛之使然也五淋者雖曰皆虛所致然小腸

為受感之府氣通於膀胱膀胱為津液之府氣通於腎餘化下

流而不通皆曰腎氣不足熱入膀胱水道澀而不利出入起數

臍腹急痛纏作有時或如豆汁管血用五苓散自然愈也

鳳龍歌

五般淋瀝病相傳 一一須分病本源 若是呼啼傷水積

或因食食入脾間 次便因循傳入臟 致令淋病小便乾

但看眼尾紅筋上 有血相和汗又連 肚上青筋垂至腹

定知沙石痛難安 唇上乾燥加皮退 此是風淋定惡泉



外腎不種氣不急 一陰才種氣明運 先與寬腸疎導氣 定知醫藥可安痊

血淋尿血

又熱膀胱內 胞中積聚成 小便時下血 澁少痛干心

熱淋結澁

三焦因有熱 熱聚入膀胱 結澁陰串痛 淋瀝溺色黃

石淋沙石

膀胱并腎熱 小水胞中結 似石或如沙 澁痛溺難洩

氣淋頻澁

寒氣膀胱內 尿難澁又頻 腎虛胞又冷 水道不澁精

寒淋如膏

淋瀝脂膏水 胞寒腎氣虛 溺頻精液耗 白濁又難除

水泉不止

水泉頻不止 胞內不收藏 冷滑澁難禁 亡精耗小腸

淋病雖然分五種 要明各類在詳看 曰膏曰冷同其證

血不均為熱一般

小兒淋瀝膀胱熱 風滯氣澁小腸結 胎中積聚沙石淋

熱結氣攻小便止

小兒淋瀝成難忍 冷熱須分色數般 小腹刺痛常結閉

腰間急脹肯能寬 或如膏色兼膿色 有似重梳若米泔

腎縮黑青心撮痛 便投靈藥亦難安

外黑裏縮 睛下清睛 鼓滿額裂 湊心唇黑 頭軟腰折

口開氣冷

五淋散

赤茯苓 夫皮

赤芍藥 炒

山梔子 去殼

甘草 生

當歸 去尾

黃芩 炒

車前子

淡竹葉

絲新

木通 去皮節

滑石 水飛

葵子

葶藶 炒

右取用葱白一莖煎入車前草杆搗取汁用五苓散調化

食前服或硝石末調化服 血淋白茅根燈心煎湯服

有氣淋小腹脹滿尿後有餘瀝木通煎湯服 熱淋小便

赤而淋瀝腫下痛新水煎服或黃芩煎湯服 石淋苦肉

痛尿澁有沙石令人悶絕砂石膈紙炒焦為細末葵子煎湯

服

葵子散 治嬰孩小兒諸淋

葵子 車前子 木通 去皮節

蓬麥 桑椹白皮 炒 赤茯苓 去殼

山梔子 去殼 甘草 炒

右到散用井水葱白二寸煎食前服

草豆湯 治嬰孩小兒沙石淋

甘草 一升 生 黑豆 一升 二十粒

右取用新水煮藥熟入骨石末煎後煎服

阮氏方 治熱淋



六田螺十五箇新水養候螺中出泥登去上清水以  
底下泥入噉粉調金藤上尿即通將田螺放去流水  
中若殺之病不得愈

尿血方

蒲黃生 地黃生 赤茯苓 去皮

甘草生

右剉散用水煎入人髮灰調化食前服

又方小便出血生地黃汁生薑汁入生蜜同調化食前服

小腸氣痛

小腸氣痛腰先曲 無淚叫啼空眼哭 口乾脚冷二唇乾

額上汗珠濕漉漉

木香飲

治嬰孩小兒小腸氣痛

川棟子 上箇巴豆七粒炒令黃玄胡 各半兩

南木香 二錢 史君子

右為極細末用米飲食前調服

脫肛

脈訣曰大腸其肺為傳送蓋肺與大腸為表裏壯者大腸之時  
肺實熱則閉結不通肺虛寒則腸出蓋有因痢久裏急後重  
努力肛開為外風所吹或伏暑泄瀉腸頭不禁或稟賦怯弱易  
於感冷亦致大腸虛脫小兒所患蓋前皆因暑濕風熱乘脾而  
得蓋風屬木木勝則土土主脾胃虛而受制入濕喜傷脾因  
虛受濕不能分別清濁水穀交雜則為同泄洞泄既久大腸亦

虛大腸乃平陽明燥金而土虛不能生金金氣既虛則傳送之  
道亦虛又為風火所襲故肛門脫而不收法宜補脾滋胃使金  
得受丹之益而氣實平胃散主之次則內投固腸之劑其肛門  
色紅而軟肺脈浮數右手指紋紫見身微有熱時或煩燥難經  
曰出者為虛入者為實

楊氏曰惟實則溫溫則內氣充而有所蓄惟虛則寒寒則內氣  
餒而不能收視人腸之厚薄膏脂之肥瘠內氣之虛實何如爾  
此治脫肛先以溫湯澆軟漸漸納入及小兒啼叫氣急久痢不  
止風邪襲虛亦有此證

肛腸脫出

肛頭頻自下 因利滑難收 秋後經時日 今傷痛不休

脫肛瀉血積因傷 冷熱攻脾作滑腸 清湯日乾焦上熱

氣攻虛腫面青黃 再感風傷事可憂 况自先傳脾胃弱

肛門出露久難收 更詳冷熱易為瘻

本因良藥過於涼 冷氣從而入大腸 只看鼻根青脉見

更無唇白齒根黃

凡腸頭作痒即是有蟲用生艾川棟根煎湯薰洗

龍骨散 治嬰孩小兒大腸虛肛門脫出

龍骨 二錢半 訶子 煨去核 次石子 二錢

赤石脂 嬰粟散 去毛帶橫煎炒各二錢

右為極細末用米飲調化食前服



蟬龍散 治嬰孩小兒陽虛脫肛

地龍蟬 錢樣者上一兩 朴 錢

右為極細末凡門濕潤乾慘思慮乾燥用清油調塗先以見  
薄清劑芥生葱煮湯溫浴洗輕與拭乾然後傳藥

伏龍肝散 治嬰孩小兒陰證脫肛

伏龍肝 一兩 藟頭骨 五錢 百藥煎 一錢半

右為極細末用紫蘇煎濃湯候溫清酒同調傳

赤石脂散 治嬰孩小兒瀉利後肛門不收

赤石脂 伏龍肝 各一錢

右為極細末賜頭上傳

又方 蒲黃五錢猪脂一兩煉猪脂同蒲黃成膏塗賜頭

汗

楊氏曰汗者血之異名陽主氣氣為衛陰主血血為榮人之  
身有陰抱陽平則寧偏則病陰虛陽必去故發熱汗出如水就  
而湧陽虛陰必乘故發厥汗出如水蓋而流汗者素虛而津液  
為之發泄也人以衛氣固其表所以濡肌肉充皮膚肥腠理明  
理論曰津液溱溱之利為腠之理續會之中為理可謂固衛氣  
一虛則肌肉不溫皮膚不充腠理不肥開關守也

明理論曰自汗者謂不因發散或昏或睡自汗而出盜汗者睡  
醒則出醒則復收頭汗者邪搏諸陽津液上溼則汗出頭上汗  
足汗者胃主四肢陽明之證無汗者寒中榮則無汗謂溱溱閉  
也

汗者心之液也脈訣曰液汗遺皮潤聲言受氣清蓋人之氣血  
猶水火也平則寧偏則病陰虛陽必溼則發熱自汗陽虛陰心  
乘則發厥自汗小兒脾虛自汗多出額上沾粘人手速救胃氣  
用全蝎觀音散治之

小兒盜汗由冷食熱水傷脾土為水傷不能制其津液故成汗  
自出汗者心之液或心虛驚恐血不足而汗先當收斂心氣有  
遇夜而睡中汗出者名曰盜汗

小兒盜汗者因食冷物過度或熱水淘飯大能損脾土為水之  
所傷則不能制其津液故成汗自出也

夫盜汗者心之液也小兒血氣嫩弱膚腠未密辛厚衣溫暖薰  
蒸臟腑生熱搏於心心為邪所勝故液不能內藏薰出肌膚

則為盜汗也又或傷於冷傷於熱冷熱交爭陰陽不順津液洩  
越亦令睡中汗自出其間有虛實之證虛者謂諸病後或大汗

後血氣尚弱液溢自汗實者或潮熱成寒熱發過之後身涼自  
汗二者日久令人黃瘦夫治則變為骨蒸疳勞也

巢元方論曰病因睡寐中而才汗流此因陽虛所致久不已  
者令人羸瘠枯瘦心氣不足津液妄出故也

自汗

血不榮則神不備氣不衛則人脈不充理其血用和其氣安其  
神用調其脈陰陽均平氣和相參百脈流順二焦五臟自然以  
充其軀凡初生至周歲之元不可自汗自汗即亡陽亡陽即氣  
怯氣怯即脈虛脈虛則神散神散即驚風有作驚風已作搐搦



病為醫士失之究意血不榮氣不衛作疾不輕為害必大禍生  
於於做人事而不察庸醫反笑之曰自汗豈能成風痼耶愚曰  
亦莫知其所以然者非其友也舉此一端虛以類之智者應有  
謂云觀其瀾而探其海其末須明其本通變之士審乎得失  
是是非非不離乎中裁度踈謹而後已瘵乳幻自汗切勿止之  
方用白朮一分小麥一撮水煮乾去麥為末黃耆煎湯調服  
以愈為良若以止汗及為閉氣作熱煩燥所謂氣血相參則汗  
自止矣

盜汗如珠

才睡汗如珠 夜多日晝無 亡津添骨熱 面色燥皮膚

虛熱盜汗

盜汗類來氣受傷 臟中虛熱小便黃 夜間潮熱無時節  
類亦屢書有口瘡

小兒自汗證多端 切莫將為一例看 要識陰陽虛實候

動動調理自然安

團參湯 治嬰孩小兒虛汗盜汗心血液感亦發為汗收斂心

氣

人參 去蘆

當歸 去蘆炒各二錢

右割散用雄猪心一箇切二片每服二錢猪心一片并水同

煎食遠服一方加黃耆蜜炙二錢

牡蠣散 治嬰孩小兒自汗

牡蠣

黃耆 蜜炙

生地黃

右以咀入浮麥煎黃根同煎食前服

止汗散

人參 去蘆

白朮

茯苓 去皮

黃耆 蜜炙

當歸 去蘆炒

甘草 炙各一錢

右以咀用生薑三片入麥麩同煎食前服

又方

白朮 五錢

小麥 一撮水煮乾去麥白朮杵極細

末用黃耆煎湯食前服

國浮方

牡蠣

麻黃根

赤石脂

糯米粉

具母

右為極細末綿包藥撲汗

腫

全生方曰由小兒臟腑嬌嫩乳母過傷脾胃虛冷不能消化乳  
食停滯腹間脾受積傷衰弱不能制水故流溢清於脾膚腫有  
三證甜水積水驚水也

疳水者心中虛腫

積水者五積在腹結化為水其候或冷或熱四肢頭面俱浮

若面浮作虛中積治止補而後取

驚水者前後重疊驚致令心火熾瀆飲水過多停積於脾

其候四肢腫身上熱脈訣曰水氣浮大得延生沉細應當

是死別尺脈如系或浮洪按之無根乃絕脈



楊氏曰古洛陽以腫於癩疾則知病之危惡非他疾比也夫人  
全性命者水穀而已則腎主之上穀則脾主之惟腎虛不能行  
水脾虛不能制水胃與脾合氣傳為水穀之海因虛而不能傳  
化故腎水泛溢浸漬脾上於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮  
膚注於肌肉而發腫矣其候目胞上下微腫四肢腫着咳喘怔  
忡股間清冷小便澁黃皮黃薄而光手按成窠舉手則滿  
楊氏曰身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下  
則通利小便順氣和脾不可緩也然證雖可下當審其虛實確  
其輕重不可過用芫花甘遂大戟猛烈之劑用之太過吾恐峻  
決者易固閉者難水氣復來何以治之  
凡虛腫先起於腹而散於四肢者可活先自四肢而後歸腹者  
不治蟲脹肚上有筋腹滿而大便滑泄久瘕轉作虛浮及唇  
黑傷肝缺盆平傷心脾突傷脾足平傷腎背平傷肺男為足腫  
而上女從身腫而下或肉硬或手掌平皆不治  
經云諸有水自下必微腫又頭面腫曰風脚腫曰水  
朱氏曰腫因積而得既取積而腫再作小便不利若再用利小  
便藥性寒而小便愈不通到此則束手矣蓋中焦下焦不升降為  
風寒痞膈故水凝而不通服沉附湯則小便自通喘滿自愈大  
小通用久服無礙  
腫脹二證皆由臟腑怯弱榮衛不順三焦壅滯表裏俱虛虛中  
有積久患失治虛虛不能傳化水氣滲泄經絡脾得之氣溢皮  
膚而腫入臟而喘能最要當明其因受濕腫脾胃受濕冷

不尅氣浮四肢面目皆腫此由脾虛止調胃補脾後去腫先  
服理中湯傷寒下之早來虛久腹作腫理中湯加枳實作喘加  
豆豉食毒傷脾胃傷冷積致腫瀉利久脾氣虛致腫先正氣調  
胃氣虛腫亦名氣蠱血虛腫亦名血蠱榮衛俱虛腫亦名血氣  
蠱先服榮衛飲子次分氣飲子已上七證先明所因用榮衛飲  
子至穩若水腫或受濕以利小便切不可動大腑蓋腫脹  
已因脾虛若下之愈見脾弱也  
原腫病之標本之疾腎主元氣天一之水主高肺主沖化地四  
之金高為腎為本而肺為標是至陰以積水其為病也腎者胃  
之關鍵關不利福機不轉水乃不行滲於脈絡皮膚而為浮  
腫當推究內外所因而為施治兒大者憑脈以明虛實古方有  
十種論證知氣不得卧而心水兩脇緊痛為肝水大便鳴澇為  
肺水四肢若重為脾水腰痛足冷為腎水口苦咽乾為膽水乍  
虛乍實為大腸水腹急肢瘦為膀胱水小便秘澁為胃水小腹  
急滿為小腸水然脈浮為風為虛沉澁為水病沉則脈絡虛伏  
則小便難即為正水脾脈虛大多作脾腫因循不治乃成水腫  
蓋脾屬土喜燥而惡濕常感濕氣濕氣傷脾血化為水土敗不  
能制水則停蓄不行留滯皮膚故作浮腫初得病時見眼泡早  
晨浮突至午後稍消以羌活散疎解久醒脾散去之此證夏秋  
秋冬治之頗易惟春不秋蓋四時之水無如春水泛溢兼肝木  
旺而脾土受尅不能勝水所以難療進退不常須慎調即忌益  
腎養肝油麵皆味鹹能溢水者併其他生金毒物亦戒重則半



投則其疾自不再作

劉氏曰治腫非易補養尤難

鄭氏方引千金云從腰以下

內經云關鬼門也

疔腫明亮

虛黃如熟李 泔水定無疑

風腫多痒

腫時時痒 風邪客肺皮

氣腫因嗽

久嗽如浮腫 因勞肺氣為

虛腫煩渴

久痢損傷脾 脾虛腫四肢

遍身浮紫黑 喘促渴煩

臍邊青腫出 外腎脹如八

古今議腫是脾虛 大抵多從濕熱為

詳分補 在臨機

皮肉紫腫 臍出青黑

滿面血 氣逆不通

禁衛飲子 治嬰孩小兒

以致喘急

茯苓 去皮 川芎 白朮

甘草 炙 芍藥 炒 枳殼 去穢麩炒

陳皮 去白 黃耆 炙 桑根 白皮 炙

右為極細末或水煎不拘時候服

分氣飲子 治嬰孩小兒調理腫脹

四肢浮腫飲食吐逆神困喜睡

五味子 枳椇 去穢炒 茯苓 去皮

甘草 炙 陳皮 去白 桑根 白皮 炙

草菓 去殼 大腹皮 白朮

附子 生去皮 切片二錢

右以咀用生薑一片棗一箇去核同煎

沉附湯

右割散用生薑五片入沉香一錢

內消圓 治嬰孩小兒頭面手脚虛浮

橘用青湯浸 巴豆 去皮心膜 木香 炮一錢

防己 一錢半 丁香 十四箇

右青橘巴豆同炒蒼色去巴豆不用

米大男用陳皮煎湯女用艾葉煎湯

塌氣圓 治嬰孩小兒乳食不化

巴豆 十粒 胡椒 十粒 丁香 十箇

當歸 去穢 熟地黃 人參 去蘆







夏月生地黃取汁沙糖用井水調化食遠服

夏秋月車前草洗淨取汁生薑汁入蜜一小匙調化先以洋菜

煎次以井水澆汁服地黃湯若傷寒證小柴胡湯入生地黃煎

服

夏秋方用生蘿蔔汁仰頭滴下且飲汁

吐血

夫吐血證者出於氣逆也榮者血也衛者氣也榮衛相濟不失常道一有所感則致逆行血者水也決之東則東流決之西則西流氣之使血其勢如此

巢氏云吐血者是有熱氣感而血虛熱乘於血注得熱則流散妄行氣逆則血隨氣上故令吐血也或飲食大飽之後脾胃內

冷不能消化忽吐所食之物氣血相衝因傷脾胃亦令吐血又

嗽氣逆而目浮腫而嗽吐血者是肺虛損也

小兒九道出血何為而然蓋人之所有者血與氣也心者血之

主肺者氣之主氣主向之血主滲而之榮養有微瀆源係脈升降

上下榮衛諸和自然順適一或不調疾由生矣或外為六淫所

浸內因七情所迫氣乃流而不行血乃壅而不濡內外抑鬱不

能流注以禁於身必有妄動之患

嗽和以孔脈為失血之義在上者傷陽故也陽明主乎多氣多

血未有不因熱而得蓋氣血傷熱鬱鬱內逼失其常度是以安

行有在強裸意此證者因非其助所傷皆乳母執着不自寬釋

及啖辛辣之味流於乳絡足飲之後停滯不取鬱蒸於內亦能

動血或居重傷後開火氣面赤不令常見風日積溫成熱熱林則湧泄或吐或衄或大小便亦多血來者

吐血氣逆

血虛氣逆不和同 熱毒流 心肝肺風 忽發氣逆榮衛逆

吐血鮮明點紅

九道何為安血行 蓋因初 證熱邪生 隨經施治則愈實

氣順如常血自勻

便血

見生七日之內大小便有血出者由胎氣熱感或母食酒麵炙

博鹹醃流入心胎在胎受之 熱毒亦傳心胎且女之臟其熱即

入心故小便有之男之臟其熱即入肺故大便有之或淡如坭

水或血加鮮又不可謂熱過 服涼劑其血愈只以生地黃根取

汁五七匙酒半匙蜜半匙同 和勻食渣服

夫大便者是太陽熱結損傷 胃為也臟氣既傷風邪自入或痛

熱或積冷或濕毒傳於脾胃 胃食傷於臟腑因致冷熱交擊

疳濕互作致動血氣停滯於 腸中故大便下

血也又有腹痛冷氣在內攻 亦令大便下血又因風冷乘虛

客入脾胃或瘀血腸濕毒下 血汗入府傷於臟亦能使血若

上焦心肺積熱流注大腸亦 令大便下血亡血脾弱必渴又則

血虛其人必肌熱萎黃頭暈 不黑矣

大便下血

風必腸間入熱攻 交相繫 疔瘻須紅 疔傷臟腑令便血

風必腸間入熱攻 交相繫 疔瘻須紅 疔傷臟腑令便血



云肺音瀉血而瘦孫氏  
二州傷心肺傷中下血  
痰涎壅滯在胃中  
古云云  
下如赤白汁

阿膠炒 蛤粉各一錢 辰砂水飛少

右為極細末用藕汁入白蜜調化食遠服

方 藕節晒乾為極細末用人參去蘆白蜜同煎湯調化食

遠服能消瘀血

五疳圓 治嬰孩小兒大便下血腸風臟毒

五疳子

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研化食前服

小便出血

夫小便者蓋心主血與小腸相合血之流行周遍絡脈

腑若熱聚膀胱血滲入胞故小便出血也

蒲黃散 治嬰孩小兒吐血咯血下血

蒲黃 油頭髮 各一錢

右為極細末用生地黃汁或米飲調化食前服

槐花散 治嬰孩小兒熱便血

荆芥穗 槐花 枳殼去穢炒

甘草 生各一錢

右為極細末用白蜜煎湯調化食前服

三效散 治嬰孩小兒糞前後血下腸風下血

糞前血石榴皮末用茄枝煎湯調化食前服

糞後血五倍子末用艾葉煎湯調化食前服

糞血或腸風下血而帶燒赤存性為末用米飲調化食前服

龜胸

胸高脹滿其壯如龜此肺經受邪所致也乳母酒麪無度或夏

月熱煩熱乳與兒得之或乳母多食五辛亦成此疾

保幼須知乳母常担去宿乳真常洗乳令淨担去熱乳恐傷損

肺氣胸膈脹滿令兒如龜胸也

常論此候因風痰停飲聚積心胸再感風熱肺為諸臟華蓋居

於膈上水氣之溢則肺為之浮口久疑而為痰停滯心胸兼以

風熱內發其外證唇紅面赤咳嗽喘促致胸膈高如覆掌及白

龜胸服藥後而復作傳變自睛視痰涎上壅難以發搖難治

無喘唇口忽然紅 心肺因痰飲聚中 風熱乘之加喘急

形如覆掌號龜胸

龜胸散

大黃煨二分 天門冬 去心 百合

杏仁 麩炒 木通 去節 枳殼麩炒

桑根白皮 蜜炙 甜葶藶 紙炒 朴硝 各五錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用溫湯研化食後服

龜背

兒生下不能護首各風吹脊入於骨髓致之或小兒坐早亦致

龜背者蓋初生未滿半周強令坐早春風吹着脊傳入骨髓

通背者蓋初生未滿半周強令坐早春風吹着脊傳入骨髓



故念背高如龜之壯名曰龜背終成痼疾  
和緩防風圓

枳殼去穢麩 防風去蘆 獨活去蘆

大黃煨 前胡去蘆 當歸去蘆炒

麻黃去節各一錢

右為極細末煮麩糊圓如黍米大用米飲以後服

語選

保嬰須知言心散也小兒受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒  
感受母氣心官不守舌本不通四五歲長大而不能言也

育清圓

人參去蘆 石菖蒲 麥門冬去心

遠志去心 川芎 當歸去蘆

乳香 朱砂水飛各一錢

右為極細末煉白蜜圓如黍米大用米飲食後服

又方社壇餘脂酒飲

齒遲

聶氏云稟受腎氣不足者即髓不強善膏之所經而為髓不足  
故不能兄於齒不生也

苦黃散

川芎五錢 山慈 當歸去蘆炒

芍藥炒 甘草炙各一錢半

右為極細末用白湯調化食後服心末溲瀉限

三香檳榔圓 治嬰孩小兒稟受腎氣不足腎主骨髓髓不充  
於齒故齒不生

香附子炒 沉香各二錢 檳榔去穢

人參去蘆各一錢半 麝香少許 蝦蟇燒灰二錢半

右為極細末羊髓煮爛圓如黍米大用米飲食後服

髮遲

本方見稟受血氣不足不能榮於髮故頭髮不生或者呼之  
為疳積疳也

香粉膏

香需一兩 胡粉五錢 猪脂二錢半

右用水一小鍾煎香需取汁三分入胡粉猪脂調勻頭上塗

一日二次

行遲

聶氏云兒生至周歲三百六十日膝骨成乃能行也近世小兒  
多因父母氣血虛弱故胎氣不強骨氣軟弱故不能行也

骨者髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨故軟弱而不能行

抑亦肝腎俱虛得之肝主筋筋弱而不能行也

聶氏補腎地黃圓加鹿茸牛膝五加皮酒炙服髓生而骨強即

能漸漸行也

虎骨圓

虎脛骨酒洗 地黃 茯苓去皮

酸棗仁酒洗 桂去皮 防風去蘆

虎脛骨酒洗 地黃 茯苓去皮



當歸

川芎

牛膝

右為極細末煉日蜜圓如黍米大用木瓜煎湯食前服

五加皮散 治嬰孩小兒三歲不能行

五加皮二錢半 木瓜一錢二分半

方為極細末用粥飲入酒二點調化食前服

調元散 治嬰孩小兒稟受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦

大如腫致語遲行遲手足如箇神色昏慢齒生遲

山藥

人參

茯苓

茯苓

白朮

芍藥

熟地黃

當歸

黃耆

川芎

甘草

石菖蒲

右剉散用生薑三片棗一箇去核同煎不拘時候服如嬰孩

幼乳母同服

雜證

長大不語 心氣不足

長齒不出 受胎父氣不足

長髮不出 受胎母氣不足

長大不行 腎肝不足

手彎不展 肝氣不足

腳彎不展 腎肝氣不足

三不治法

二者內實而表虛腹痛滿大小便不通心下強手足煩熱

赤細數而乾嘔無水出者死候也

二者內虛而表實內熱而吐下清瀉水者虛也脈洪大者必死

候也

三者內外俱虛身熱冷而汗出如珠微吐嘔而虛煩脈厥

身不安靜必死候也

五絕 口定筋斷肝腎傷 口虛乾逆而青黃 心絕不言魚口禁

喘急腸虛肝受殃

警者

證候不明醫之過也回救不良十之繆也去醫裁藥審證察候

猶若權衡以究標本醫藥純全之道調理小兒雜病須究其五

臟所傳及至變作也患殊失源流迷而不及所以作疾故述詳

悉

小兒平常服藥過多頑玩臟腑調和之劑不愈則易之以攻

金幼心鑑

究

固守之劑太過則時乎而疏利主治在我不可不問源流不可

偏徇病家所欲直機變消息輕重而應之是通變之不可無

法也大槩小兒臟腑柔嫩易虛易實易冷易熱兒有大小壯弱

病有輕重淺深所貴乎日視指切意度心推醫權權衡斟酌對

證調治



瘡毒論

小兒瘡毒之由皆始生之時所感一發口中所含血隨吸而下  
下還於右腎內經之向中其發之發下焦相火熾也三等之斑  
皆出於此太陽寒水之經外為大寒內為二火文攻化血肉為  
膿寒為寒寒邪可令內瀉二火又令濕氣上歸本位一二服斑  
疹即愈已後再無一番斑出之患而損其命者矣

小兒斑疹始出之證必先見面頰赤目眦赤則火熱則作涼  
乍熱咳嗽噴足稍冷多睡驚悸並瀉疹之證或生膿或生小  
水痘或生癰瘡此三等不同蓋諸證皆太陽寒水起於右腎之  
下煎熬左腎是太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽  
丙火不得傳導逆于面上是壬癸寒水逆起丙丁熱火故也

痘毒受病之由

小兒在胎之時乃母五臟所養成形也其母不忌禁忌恣意所  
欲加添滋味好啖辛酸或食毒物其氣傳於胎胞之中所以小  
兒在胎胞之時受得此毒名曰二穢液毒今瘡毒者是二穢液  
毒所出也

一者五臟六腑穢液之毒發為水痘瘡

二者皮膚筋肉穢液之毒發為膿血水痘瘡

三者氣血骨髓穢液之毒發為膿血水痘瘡

三者既出發為瘡痘瘡也子母宜慎口即不可食煎炒雜  
酒醋椒薑蒜雞兔雞牛羊及河海魚腥等味世俗未曉將為食  
藥往往不覺其後候傷者多矣

痘毒受病之由

光武年自光武至魏相去一百九十五年則是起於東漢也  
氏無言漢魏能無疑乎蓋小兒痘瘡是托質成形在胎食母血  
穢何以知之兒生下不食乳前古今以黃連汁飲一二日下胎  
毒前以此觀之胎中食穢則矣出腹哺養才落則蒸下血熾坐  
妻急拭口中冷淨兒生由病同胎養而下唯血穢之氣存焉錢

史建武乃

氏云餘氣入兒臟中本因傷寒入兒成痘瘡因傷寒時氣或積  
熱潮熱運動穢氣入於五臟其毒當出譬之荒野草木無根而  
生石蓋受地土之氣也小兒痘瘡因熱而生者蓋受胎穢之氣  
也五臟受穢氣多則出膿少則出稀其穢則相雜出兒宜氣虛  
則出早氣實則出晚如地虛則萌芽早發實則遲也穢氣入肝  
則赤相感則為水泡色澤微青以應肝之象入心與血相感則  
為赤相感則為深紅以應心之象入脾與地相感則為子色赤  
黃相感則為黃為黃也故色赤黃淺也以應脾之象入肺與  
燥相感則為白而兒以應肺之象腎主二穢液之毒

出不一也然痘毒之由皆始生之時所感一發口中所含血隨吸而下  
下還於右腎內經之向中其發之發下焦相火熾也三等之斑  
皆出於此太陽寒水之經外為大寒內為二火文攻化血肉為  
膿寒為寒寒邪可令內瀉二火又令濕氣上歸本位一二服斑  
疹即愈已後再無一番斑出之患而損其命者矣



腎旺多作寒顛寒牙之證其瘡發出五臟先有證候各有時辰  
錢氏云河欠頓悶肝也時發驚悸心也乍熱乍涼脾也頰赤發  
喘肺也寒顛寒牙腎也

道書曰寅卯屬肝巳午屬心申酉屬肺亥子屬腎辰戌丑未屬  
脾五臟之氣皆與時辰相合也

檢五臟所出瘡字

肝 出為水泡其氣旺在寅卯 心 出為赤斑其氣旺在巳午

脾 出為疹子其氣旺在辰戌丑未 肺 出為膿血癩其氣旺在申酉

腎 主瘡黑色其氣旺在亥子

假如小兒寅卯時發潮熱來日依時或三日依時蓋肝旺於寅  
卯因潮熱而運動肝氣故隨臟而出必知水泡也錢氏云自寅

至午皆心肝用事脈經云晝旺日甲乙旺旺時平日日出如已

午時發潮熱來日依時必出疹子也若辰戌丑未時內占一特

發熱來日又占一特復作者必知出疹子也如申酉時復作潮

熱本屬肺臟來日却在寅卯時發熱不依次第必知膿痂水疱

相雜而出餘皆效此推之腎之在下不受穢氣惟內虛多歸於

腎變黑色難治也凡瘡痘欲出先見於頭面難經曰諸陽皆會

於頭錢氏云瘡痘屬陽出則為順素問云春陽上升故知先出

於頭向也瘡痘者是小兒大難不可不為詳審也

四臟有證腎獨無證

小兒在胎含濁穢以養五臟生下則其證當出痘出之時其證

悉見 呵欠頓悶也乍涼乍熱 足冷多睡也時發驚悸也河

赤斑打噴嚏惟腎在腑下不受穢濁無其證腎之平證也  
屍氣耳尻俱屬腎屬水又居於下右瘡足陷而耳尻反熱乃變  
壞歸腎其證也逆

痘瘡熱諸熱不同

小兒痘瘡其初不免乎發熱臨病之際不可不審一藥用藥鮮  
不敗事今列于后以便後學

傷寒熱手足稍微冷熱熱寒而無汗面色青慘而不舒

左額有青紋

傷風熱手足稍微溫發目汗面赤而光

傷食熱目胞腫右額有青紋身熱而頭顛腹肚最甚仍熱

晝夜面黃或吐痢腹疼

驚風熱面色青紅額正下有青紋手心有汗時作驚惕手

脈絡微動而發熱

風熱身熱倍能食唇紅赤大小便秘

潮熱如水之潮依時而止

痘瘡熱心有四臟之證山公中指冷尻冷

朝熱

谷空響應形動影隨舉此而彼也痘瘡發熱者其朝熱之時

可知何臟發出

寅卯辰時潮熱傷肝 出水泡

巳午未時潮熱傷心 出斑瘡

申酉戌時潮熱傷肺 出膿疱

亥子時潮熱傷腎 出膿血



痘子九時潮熱厚脾 常出疹

獨腎無證

辨證

人稟天地之氣要元氣盛壯論語註云肉氣不可勝穀氣穀氣不可勝元氣人身氣血相乘環轉頂是氣旺和血氣和人安血散氣弱則疾生小兒痘瘡將出肌脉至熱得氣壯出長皆齊歛也瘡易入譬如春種十餘日方出夏止五六日即長為何氣盛然也瘡出猶火熾若下涼劑如水投火必傷其和又如痘瘡出長皆齊或小兒喫涼物便減元氣若水滅火力氣弱則弱身反加熱致瘡毒入不曉者再服溫涼藥則臟冷瀉其命傾矣經云氣亡神或出瘡當忌涼藥可也

嬰童痘毒二毒痘是臟腑俱熱發於皮膚為之熱在腑發之即熱熱在臟發之即痘未發同一治未出可下解熱而退既出忌勿下及冷藥過之其病不出在裏害人  
瘡痘之病首尾證平下之者宜首尾有實熱證不下者誤切不可用巴豆圓子下之此藥乃攻食積出活人書首尾有虛寒證不補者誤瘡痘出透色澤紅紅證平者不須服藥如證候平穩強施湯藥殺小兒也大抵治病之法對證用藥有是證服是藥順其證則生逆之則死此而昭然

斷治痘瘡

寶鑑云瘡痘是臟腑積熱發於皮膚為之熱在腑發之即瘡熱在臟發之即痘未發同一治未出可下解熱藥惟此言其詳誠

可信也

論痘痘約日訣

小兒瘡痘者與傷寒相類或安或危或見或隱皆六七日之間歸證明矣凡瘡欲出先發熱輕者三四日次者五日遠者不過七日此約法也一日太陽傳膀胱二日陽明傳胃三日少陽傳膽四日大陰傳脾五日少陰傳腎六日厥陰傳脾七日還經傳遍五臟六腑故七日而止也有小兒因傷寒至七日後或已汗或未汗或吐下後熱不除此毒氣盛而未發熱毒入胃發於皮膚成斑者壯如蚊蚤所啣赤斑十生一死黑斑十死一主及有胃熱發黃者壯如橘色下利者死又有成癍癍或白泡者此皆傷寒熱毒不除多變此疾也巢氏云發斑不可用發汗藥

春夏為順秋冬為逆

經云春夏陽氣在上人氣亦在上秋冬陽氣在下人氣亦在下今痘瘡之發自裏達表當春夏之時則血氣隨陽氣而上運而行疾秋冬則血氣隨陽氣而下陷而行是以前於春夏者順秋冬者逆又當論小兒稟受充實堪耐寒暑則令變更不以爲事雖發於秋冬亦不爲害受氣怯弱者寒暑易節便生疾及雖發於春夏未可言爲順也

順候

春夏為順先發播而後發痘者生先發熱大便如常其瘡紅赤乳食如常

逆候







如表裏俱實者其毒易出易醫也

如表裏俱虛者其毒易出難醫也

正痘疹

董氏曰初出如紅點逐旋起脹形如豌豆而結膿窠方結如疔

而愈

癰毒即疔子

王氏曰有熱則易出一出遍於肌膚上如痛瘡細疔子見而

便消

楊氏曰赤疹遇涼而後消白疹遇溫而後滅

傷寒熱毒後痘疹

胡氏曰乃熱在表而失于熱毒蒸發其色白或赤如丹頭帶

白膿者輕根下紫色在肌肉者重其痘疹也

斑毒紋迹

楊氏曰陽證候發溫藥或失汗下陽毒內熱蒸騰外迫毒氣入

胃令人發斑其證昏憤關前脈洪大先紅後赤多見於胸腹輕

則如癍子重則如錦紋紅者易治黑者難救

紋迹陽脈不洪病人自靜先紅後黃多在手足之間乃紋迹也

丹毒

楊氏曰赤浮肌肉變易五臟遊走遍軀

遍認痘疹

楊氏曰方論所載皆以耳冷尻冷中指冷驗之或中或不當以

耳後有紅脈亦續焉的

董氏曰有以紅紙粘於鼻油而鼻油必有小紅點如粟

謝氏曰忽然發搐但無痰涎不為風性熱腹瀉則腹先出

瀉則腹先出熱輕者亦輕熱重者亦重身熱時不出直候身涼

方山

錢氏曰面紅燥喉唇赤眼瞖黃目胞赤四肢亦赤手足冷其尖

冷尻冷身熱或生涼上熱則腹痛吞酸瀉小便赤少大便

不通不惡寒惟惡熱皆多辨必有四臟之證

先發熱指

夾熱吐瀉者不可投燥藥瀉者不可投寒劑經

云諸瀉皆出於心火痘疹雖出於四臟要之心火為之主毒氣

毒作未形見之間忽發發指乃毒氣自心經而出也苟不外

證辯明之痘證必有中指冷四臟之證不以痘證防備之便用

銀粉巴硝腦解毒等劑更心寒肌冷毒氣內陷往往痘疹之

初發者多因誤服寒藥而死氣絕之際或隱隱斑出已無及

矣蓋心竅一寒則毒氣陷伏表裏不透況心主一身之血心寒

則血凝不行痘疹欲出不可得也且痘疹發時必有外證可驗

又小兒未居女界素無痘毒或爾發指者痘證也用解毒退熱

消毒快氣利小便藥服之不致誤證待其親證得泄心神亦自

安矣或有風寒與內熱相博致疾者宜從其證治之但加引氣

藥為妙

張氏曰痘疹氣勻則出於毒氣勻則毒毒無毒毒毒毒毒毒毒

毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒

毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒

毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒

毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒



治驚准平肝利小便為第一志也

錢氏曰旺田心所生心主熱而生血熱則生風肝風心火二臟  
交爭而發瘡又曰瘡者脾所生脾虛而肝旺乘之木能勝土熱  
動心神而生驚

必令避穢

木得桂而枯柑得脯而壞物之相畏者如此痘瘡之畏穢也  
氣者亦由是也

仲景曰痘瘡欲出宜燂香木仍謹司門戶勿令主人輒入大忌  
狐臭父母房事月婦經水穢觸動而發六畜棲穢穢房中  
床帳多掛胡妥以酒噴之常燒乳香降真香使榮衛得香運行  
甚速酒掃房舍潔淨若不防避如法使欲出者不出已出者斑

爛成片甚者瘡黑陷伏加以臭爛痛如刀割悶亂死者多矣

出遲而朝夕啼哭

五臟平和則精神安靜有病則不然痘瘡乃五臟蘊毒發作之  
時朝夕啼哭當察其毒氣在表在裏若虛在骨隨證調治使氣  
血流通神守清爽昧者或以為心熱為腹疼妄亂出藥以致冷  
熱偏勝變生他證可不審乎

遍身青紫紋

痘瘡之出乃熱邪內外蒸發熱毒方運天氣暴寒折之外寒與  
內熱相拒而不得入內熱為外寒所閉而不能出毒氣纏於肌  
皮其痘如痣點或青或紫俗云魚搭青或年壯肌肉厚密亦有  
此證

百毒為患

上下治未病心主血痘以血為主面赤身熱痘疹乃心之  
證形為順今面反青色乃色病不相應也其證為逆重當察其  
外證預防之熱者必坐風涼者必下刺且消風散毒者下刺宜  
理中湯異功散

膿汁不乾

出得大盛膿水不乾粘或蒸騰疼痛濕爛不能轉動且白龍散  
敗草散

陷伏倒靨黑陷

外感風寒不能出者謂之倒靨

胡氏曰若外感風寒肌肉閉塞血凝不行必有身疼四肢微厥

紅點不長或青紫紋或黑色宜溫肌發散寒邪使毒氣復行其

瘡自出

楊氏曰或因煩燥惡熱披揭衣被為風邪所傷或驚脫取氣為  
風冷所襲或值天寒為冷氣所侵輕則其壯如精色紅而不發  
重則陷如石白色白而冰硬治法當溫血氣散寒邪宜不換金  
正氣散加川芎惡寒加桂紫蘇

穢氣觸忤而成倒靨

胡氏曰痘瘡初出未收被父母房事月婦等穢氣衝觸欲出者  
使之不出已出者毒爛成疔感者瘡黑陷伏加以臭爛痛如刀  
刺悶亂而危急且黃解之常以胡荽酒噴床帳仍掛胡荽以辟  
惡毒宜辟穢丹烈火焚之



瘡黑有逆順

黑瘡陷伏本是逆證亦有順者瘡雖黑陷而忽瀉膿血加死能食者為順此必得服脾藥脾強可以勝腎脾土不致毒入腹而瀉出脾病則五臟危今脾土既盛他證無虞矣所謂運者脾土虛不能制腎水乳食不化脾虛則四臟危矣

不結痂疔

血冠既成常結膿窠痂疔而愈痂疔者瘡疔是也當結而不結乃內外熱極毒氣散漫無陰氣以斂之古方用宣風散導之磨生犀汁解之或用沙糖滾白湯調化服隨手而愈用沙糖不可大早以瘡入目入血冠起脹毒氣弥盛而不結也

痘癰腫硬

痘瘡既平夫為解利餘毒太盛內不能入於臟腑外不能泄於皮膚聚而不散輕則結於瘡癰重則頭項胸背手足肢節亦腫而成癰疽消毒飲

痘瘡入目

痘瘡毒氣攻目成翳治法活血解毒而已活血不致於熱解毒不致於冷用藥平和其證自退或誤用熱藥反所益疾過用冷藥反以傷脾也

有正痘有膚瘡

臟腑蘊熱不同表裏受證各異六腑屬陽有熱則易出一出偏於肌皮之上如癩瘡泡子見而便沒受毒淺也此名膚瘡俗曰麻子五臟屬陰有熱則難出在肌肉之間受毒深也此為痘瘡

內虛不能出者謂之陷伏

胡氏曰若胃虛不能割榮衛必出而復沒瘡點白色或黑其人必不能食大便自利或吐或厥急以救裏溫而出之

楊氏曰痘瘡初出或因臟腑虛怯自然吐痢或未發之前候服涼藥以致泄痢其瘡不發形見小點淡紅而白或白而微黃不能起脹治法先正吐痢後以溫和之藥發之宜理中湯水香散異功散豆豉圓

熱毒入裏重陷

胡氏曰痘瘡不透心煩狂燥氣喘妄言如見鬼神大小便秘瀉而能食毒盛入裏此證甚貴及血冠六七日當結膿窠痂疔而不結乃毒氣瀰盛心火炎燥宜猪尾膏曾用一服則結痂疔神

異奇速癒方 篇中後醫士詳之

黑陷而發寒

痘瘡黑陷其證有四所因不同用藥亦異一者感冒風寒宜溫散之二者毒氣太盛宜解毒利小便二者內虛無陽急宜溫散四者穢毒腐爛宜重解之大抵黑陷發寒者為重不發寒者為輕發寒之證乃脾弱為腎水所勝用百祥圓瀉膀胱執若先溫脾土救胃氣以制腎水決無黑陷發寒之證

變壞歸腎黑陷

胡氏曰由蘊熱至重內外蘊熱不結痂疔大小便秘腹脹瘡黑紫而乾陷錢氏以百祥圓瀉膀胱經毒服之身溫飲水者可治加以寒戰身冷汗出耳尻反熱者死獨立



大抵熱蒸而便閉者必屬癆火熱難出必痘疹

湯氏曰小兒痘疹其證與傷寒相似先當發表使毒氣出腑則成細癩若失表則熱毒在臟則成痘瘡

楊氏曰由風邪夾熱起於湊理皮膚不腫不疼發而瘙癢謂之癩癩此風熱在表之浮淺也亦有寒暑濕之氣行於風熱在表天時炎暄燥氣乘之則為赤形風熱在表天時寒涼氣折之則成白癩赤者遇青涼而後滅白者遇溫熱而後消又有浴後感受汗出解脫得之者隱隱微黃似疥似癩癩肉之間而四軀重者此風熱夾濕當知寒暑濕之所由主不可一藥用而執等藥便痰嗽喘喘雜證交攻阻滯癩而變為痘瘡矣

餘毒作嘔吐

全幼心鑑本

脾胃主納而不主出大小腸主出而不主納痘疹吐餘毒在胃也病有冷熱之不同藥有溫涼之各異醫士明之

熱吐者心煩而渴食乳甚急暴滿胸中後又吐出如射其人必面赤手足心熱居處喜冷且去桂五苓散加橘皮主薑汁服

冷吐者面色青白乳食隨吐不化大小便自利宜理中湯黃散大抵病後餘毒多是熱證其間冷證十有一二

吐瀉不食

吐瀉有冷熱之不同不食有虛實之各異吐而不瀉瀉而手足冷面色青白此冷證也元黃散治之既吐而口渴瀉而手足心熱面赤身熱喜居冷處此熱證也五苓散竹葉石膏湯治之脾胃虛弱精神慢而不食者慈惠湯溫養之理中

小兒痘疹清利小兒痘疹清利小兒痘疹清利小兒痘疹清利

貴賤不同用藥亦異

富貴之人形藥而志若加之奉養遇風雨寒暑邪氣易為侵襲方暑而傷熱多陰則中寒嗅荆芥薄荷而腹痛服薑桂雄附而不知其熱貧賤之人其身雖苦其志則安服薑桂蒼朮則發熱大便秘阻風雨霜雪而習以為常用藥之際不可一藥論也又有形志俱樂形志俱苦之不同醫士宜併知之

痘疹論

夫痘疹始出之證必先見面燥腮赤目胞赤呵欠煩悶乍涼乍熱咳嗽噴嚏足稍冷多睡忽驚并瘡疹之證或生膿疱或生小

全幼心鑑本

重

紅腫或生癰癤此三等不同何故俱顯上證而後乃出蓋已上諸證皆太陽寒水起於右腎之下前熱左腎是太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額連手太陽丙火不能傳導逆於上故顯是證蓋主寒水尅丙丁熱火故也諸般證皆從寒水逆流而作也醫士當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤管一名膀胱亦名命門主男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生死之源非五行也非水亦非火此陰陽之異名也象坤土之生萬物也夫人始感血海始靜一日二日精緣其血則為男子三日四日五日血氣已旺精不勝血則為女子乃二物相搏長先身生謂之神又謂之精道種二門謂之木來向日是也其在腹中十月之間隨母呼吸亦吸者陽氣也而生動作益精神則食



母血清則飲血而腫日長皮肉筋骨血脈形氣俱足十月降生  
口中尚有惡血噓散一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻  
于一隅伏而不發直至因內傷乳食濕熱之氣下溜合於腎中  
三火交攻營氣不從逆於肉裏歸于陽明故三番癩始顯之證  
皆足太陽于膀胱起小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉裏  
熱化爲膿二火熾盛反傷寒水遍身俱出此理皆足太陽傳變  
中來也當外發寒邪便令消散內瀉二火不令交攻其中今滋  
上歸復其本位可一二服之止仍令小兒已後再無一番癩出  
之患此內外經之法詳矣

癩疔勸戒論

多有人不會醫小兒疔瘡今具捷法如信用之者但保十全醫

醫至當先說病源狀後診視庶無差錯言之幾何人哉

疔瘡既分曉即三證一曰好證二曰常證三曰危證

一好證若乳食與大便如常或一日一次或兩日一次通者此

爲好證不須服藥亦自愈如要服藥只平和不冷不熱即安


二常證出疔瘡而大便秘小便赤者此是常證

三危證出疔瘡而腹瀉不已及小便青者此爲危證用生料理

中湯四味加藿香葉數片入米三十粒濃煎服人家出疔瘡爲

父母者切忌色慾不得熬油不得出廁仍須忌食一切毒物

陳氏形圖



疔瘡 日二日始見微微欲出如粟米未入或如粟米大似  
水珠光澤明淨者極佳

四日五日疔瘡大小不一等根窠紅光澤明淨者輕如稠蜜頂  
陷灰白色或瀉酒者重

六日七日疔瘡肥紅光澤者輕如身溫氣促口乾腹脹止指冷  
者重

八日九日疔瘡長足肥滿蒼蠅已者輕如雀戩悶亂腹脹煩渴



牙者至重

十日全十一日消瘡層層瘡加欲結而愈

冷而虛

身冷

精神慢

治法冷則溫之

熱而實

身熱

手足心熱

治法熱則涼之

輕者

根集紅

如常

青著

皆有

白內黑大

自利

自汗

至初心驚

吐瀉

脾胃虛冷

乳食不進

厚

大便秘

小便赤色

脈大

喜居冷處

大小不一等

頭面稀少

眼中無

稠密無縫

五內七孔回目

或如紫莖三五

半輕半重

輕重

飲冷水

服藥

月婦外人

信巫不信醫

担廁糞六

重變輕

避風寒

忌外人

萬物以禁

大抵天地萬物遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生

成者也今瘡疹之病臟腑調和則血氣充實自然易出易歸蓋

因外常和暖內無冷氣之所由也

表裏俱實

小兒瘡疹始出一日至十日渾身壯健能食大便黃稠小便清

利乳食如常其瘡以光澤必起發必肥滿必易屬根集紅是表

裏俱實而不致損傷也

表裏俱虛

小兒瘡疹已出未愈之間其瘡不化澤不起發根集不紅或腹

脹或瀉渴或氣促是表裏俱虛也當干一味異功散七味肉苁

菟圓治之以助元陽六腑表裏之氣

不宜用升麻葛根湯

外黑內赤

疔瘡夾瘡

犯房室

不忌口

日風寒

食生冷

食小蜜

過飽食飢

飲酒多

誤服升麻湯大黃巴豆等涼藥

瘡已出而汗妄下

不食血肉

常和暖

大便稠

不燥渴

不燥渴

不燥渴

不燥渴

不燥渴

不燥渴

不燥渴

不燥渴

不燥渴



小兒如痘癩始出一日至五七日之間雖身熱或腹脹足稍冷者不宜升麻葛根湯或身熱瀉瀉者亦不宜升麻葛根湯或身熱驚悸腹脹者則不宜升麻葛根湯或身熱汗出者不宜升麻葛根湯已上四證宜服十一味木香湯治之

戒用升麻葛根湯

道有經有權兵有正有奇病有常有變常者可以變者不可必古人用升麻之意治痘瘡之常不治痘瘡之變常者未見痘點之先已結痂死之後始發熱者常也若夫癰點既見及正出未收其證不一曾無定論可拘如傷寒傳變不一也安可執一藥以應無窮之變哉且升麻葛根湯藥性大寒不過涼肌解表而已今昧者不能究此既出未收之際向令服餌及喜受虛弱者

緊用之致令肌寒表弱陷伏危殆醫士戒之

楊氏曰古方用升麻葛根湯治痘瘡已發表發皆可服世習以為常不問虛實冷熱正出未收以為常用之劑蓋升麻葛根湯其性寒涼若小兒內虛胃弱則以水濟水虧損胃氣水凝血脈使已出者不能起脹未出者陷伏不起或出而復陷傷生之命可不慎乎

陳氏曰痘瘡首尾皆不可用升麻葛根湯切宜戒之

小兒出痘癩時方宜先用四味升麻葛根湯涼劑又方用五色豆黃爛食之豆性亦涼須看虛實大便不通或大小便赤黃色可用大小便青白色或泄瀉二方切不可服

宜利之過

小兒痘瘡雖出不快皆由毒氣壅盛或謂其熱以藥宜利解散致令臟腑受冷榮衛漸滯則氣血不能衝膚皮膚肌肉其瘡不得起發不得克滿不得結實不能成痂故多瘡癩爛喘渴而死皆因宜利解散之過也縱得其生而必罕矣

瓜菓冷物

小兒痘癩發熱口熱乾燥煩渴不止者切不可冷亦不可與蜜紅柿西瓜等冷物食之又不可妄投清涼飲消毒吹等藥恐冷氣內攻濕損脾胃則腹脹喘悶寒戰咬牙難治咬牙者齒槁也乃血氣不榮也不可妄作熱治之

泄瀉

小兒痘癩若如瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者宜十一味木

香散七味薏苡圓治之瀉止者住服不止者多服

瀉脫

小兒痘癩若瀉頻多津液內耗血氣不榮其瘡雖是起發亦不能磨也如身溫腹脹喘牙喘渴者難治綠水穀去多津液枯竭而欲飲水不止者瀉散真氣故多死矣速與十一味木香散急救之如不愈十二味異功散治之

瀉腸

小兒痘癩如四五日不大便者可用肥嫩猪脹一塊以淡白水浸火煮軟熟取出切如豆大或皂子大與兒食之令臟腑滋潤使瘡死易落百無滯礙切不可妄投宜瀉藥恐內虛瘡毒入於裏傷元真氣



大便燥結

小兒瘡癩六七日身壯熱不大使其脈緊盛宜三味消毒飲服微得利即愈

禁忌

小兒神氣軟弱瘡癩白初出二三日至十二口當思外人恐有卒暴風寒穢惡之氣觸兒瘡癩

寒熱

若帝問曰飲有陰陽何也好飲者水雪不知寒好飲熱者湯湯不知熱岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不知熱治之何如故陽盛則補陰十一味木香散加丁香桂陰虛陽虛十二味異功散加木香當歸每一兩藥共加一錢

小兒瘡癩若身及發熱煩渴者且六味人參麥門冬散治如不愈服七味人參白朮散治

小兒痘瘡欲靨已靨之間忽不能靨腹脹煩渴不可與水蜜若與者轉渴而死且十一味木香散治

小兒痘瘡欲靨已靨之間頭溫足指冷或腹脹瀉渴氣促者不可與水蜜若與者即死急宜十一味異功散治

小兒痘瘡十日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧計則硬氣煩渴嚙牙急服十一味異功散更加木香當歸以救陰

陽表裏若與水蜜西瓜等冷物者殺之六味人中納忠誠告

賢明君子當且詳審

十二日十三日瘡加已落宜瘡癩猶黠或凸肌肉尚嫩不

可燥浴亦不宜食炙博物乃不宜食五辛五味并毒之物恐熱毒薰於肝肺眼目多生翳障若不依此禁食為兒身之患宜三味穀精草散治

若痘瘡靨已真痂欲落不落煩渴不止切不可與水蜜而瓜紅柿冷物等食之若與之轉生熱渴或頭瀉或或或或時瀉或咬牙以致難愈且十一味木香散治

壯熱不除

若身壯熱經日不除則無他證宜三味柴胡麥門冬散治熱退者住服如不愈服七味人參白朮散

浮腫身熱

若涕唾稠粘身熱身熱大便如常小便黃赤宜六味人參清肺散治

風熱咳嗽

若風熱咳嗽咽腫不利宜三味薄荷散治

人參白朮散治

若痰實壯熱中煩渴大便堅宜三味薄荷散治

小渴

若小渴者六味人參白朮散如不愈者服七味人參白朮散

大渴



若身熱大渴者宜七味人參白朮散如不愈者服十一味木香散治

渴

若腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身溫渴者或身熱面皯白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不已者已上九證即非熱乃脾胃肌肉虛津液衰少故也宜十一味木香散如不愈者更加丁香桂多煎服丁香吹裏桂發表其表裏俱實而瘡不致瘳場喘渴而死矣

身生癰腫

小兒痘瘡首尾不宜與水壅壅候與之瘡癘之後其加遲若或身生癰腫若鍼之成疔蝕瘡血水不絕其則宜重唇白以致難愈者何也蓋脾屬土外主一身之肌肉以緣飲水過多滯損脾胃傳於肌肉其脾胃肌肉虛則津液衰少津液衰則榮衛滯滯榮衛滯滯則氣血不能周流凝結不散故瘡癘遲落而身生癰腫也

疔蝕瘡毒

小兒瘡癘已醫未愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未得平復忽被風邪搏於膏腠之間則津液滯滯故成疔蝕瘡也宜雄黃散綿繭散治久不愈者清膏傷筋以致殺人

疔蝕瘡毒

小兒痘瘡毒之病俗言瘡子是肺胃有熱也其肺胃結積熱毒或以時氣所化黃發於皮膚狀如蚊蚤所咬故赤癩遍身也

凡發赤痘者十生一死發黑痘者十死一生

痘毒生熱

痘毒多生熱 攻衝氣血虛 黃肝睛上膜 入肺嗽難除 傳腎瘡猶黑 傳脾結毒有餘 傳心驚恍惚 眠臥不能舒

痘毒攻肝

執毒攻肝 羞明眼 澀昏 赤筋生肉 白翳結癥痕 瘡痘如珠 肥紅正行 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

瘡痘如珠

瘡毒未盡

瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

瘡毒未盡

瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

瘡毒未盡

瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

瘡毒未盡

瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

瘡毒未盡

瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

瘡毒未盡

瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

瘡毒未盡

瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

瘡毒未盡

瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

瘡毒未盡



毒熱交攻 尿難養不通 數日須鼻衄 或瀉又腸風

瘡痘逆候 不治

吐瀉瘧瘧逆 便難移亦危 驚風因走氣 壓痘血之衰

瘡痘變證 不治

喉中槍鏢聲 痰涎有汗 腹脹氣虛鳴

瘡痘青黑 不治

瘡痘欲出先青黑 半在皮膚紫黑色 昏沉默默又增寒

困頓其食都不食 心煩延盛痛腫頭 射熱喘急難離極

渴吐寒牙時發顫 毒嘔咽喉熱氣塞

全生方云一病未已一病復生五行勝復相乘其人必死

痘瘡五不治

瘡塌寒戰咬牙渴不止 吐逆色暗渴不寧

灰白色陷頂腹脹喘渴 吐逆足冷胸亂飲冰

咬牙氣促瀉瀉煩渴俱難治

一切麻豆變作死候

通身忽生起如雞子大腫毒黑 赤發喘

忽自瀉下鮮血并黑豆如死雞 赤色

唇青黑縮咽喉腫閉口舌喉生 赤白色瘡

忽被外風手足搐搦直視口吐 沫沫不惺

肚脹如鼓氣喘煩燥大熱發渴 并出血

瘡子紫黑色毒沖心先陷沒後 赤出

瘡子出後通身氣腫如冬瓜氣 赤急促

面耳口鼻俱黑四肢逆冷項軟 出大汗

手足身軀俱冷如冰腎中黑縮 口吐腥臭

被外風面青黑手足搐搦 破手足足

一向作大熱煩燥喘急服諸藥 熱不退面黑

消毒救苦湯 治嬰孩小兒 證悉且消化便今不出如已出

稀者再不生癰立方隨四時 造化明藥性若能此

麻黃根

細辛 去葉

白朮 去梗

藜蘆

葛根 去皮

當歸 去蘆各

吳茱萸

升麻 煨各五分

右改咀水煎食前服

小兒出痘瘡時用五色豆煮爛 各赤出

赤豆

黑豆

黃豆

論用五色豆煮爛食豆性涼須 着鹿膏大便不通或大小便赤

黃色可用大小便青白色或泄 瀉切不可服



瘡癤腫眼人多用胭脂塗目內邊仍以黃蘗膏塗之

黃蘗膏 治嬰孩小兒瘡癤正出用此藥塗而後用胡荽酒

黃蘗五錢 新葦豆 五錢半 甘草 生二兩

右為極細末用生油調如膏從目前至眼匡唇口並厚塗育  
三五次若早用瘡癤不生頭面用之遲縱出亦稀

胡荽酒防諸般惡氣用胡荽二兩切細入好酒二盞煎令沸天

胡荽便以物合定不令氣出候冷出薄微吸一兩口

噴從項已下噴背脊及兩足心腹令通勿噴向上頭病人

左右常令有胡荽即能辟去汗氣瘡癤出快忘外人穢觸

之物雖不可受風冷然亦不可擁過常令衣服得中并虛

涼處坐臥

楊氏曰胡荽酒噴身瘡便出快也若見虛弱及天氣陰寒則可

用之若春夏晴熱陽氣發越之時及兒壯實加以酒麴助虐以

天益火胃中熱熾毒血甚聚變成黑陷急煎麥湯入猪尾血

和龍腦服

薰解穢惡

阮氏辟穢丹

蒼朮 細辛 甘松

川芎 乳香 降真

右為末用水圓引火焚解穢氣

小兒痘瘡房室中宜時時燒大黃蒜末以辟穢氣不宜燒沉檀

等真麝乳白粉等香煎燭肉油益益切忌之

痘瘡不透乾黑危困用紫葶子右為細末紫葶酒煎調服食前

新生小兒上三日將木身見脫下臍帶燒灰研極細末用親母

乳汁調灌服不拘時候不生痘瘡

芥子膏 治嬰孩小兒瘡癤不入服

白芥子

右為極細末用木調傳足心引毒歸下

仙退散 治嬰孩小兒胎毒入眼成翳

蟬蛻

右為極細末用羊肝煎湯調化食後服

十味木香散 治嬰孩小兒性溫平能和表裏通行津液清

上實下扶陰助陽之藥腹脹瀉渴如神

木香

大腹皮

桂心去心

前胡去蘆

橘紅去白

丁香

訶梨勒煨去核

人參去蘆

半夏麴炒

赤茯苓去皮

甘草炙各三錢

右為散散用水一小鍾生薑三片同煎去滓食前溫服量兒

大小以意加減服藥後忌蜜水

十二味異功散 治嬰孩小兒能除風寒溫痺調和陰陽滋養

氣血使瘡癤易出易愈蓋因不致瘡塌六中代代世醫不敢妄

處藥誤思人身難得因果非輕

木香

當歸去蘆焙

人參去蘆

橘紅去白

厚朴薑汁製炒丁香



肉豆蔻 麩 麩 去油各二錢半 桂 去皮

茯苓 去皮 白朮 各二錢 半夏 麩炒

附子 炮去小皮 以火各一錢半 有執不用

右為劉散用水一小鍾生薑三片 棗五箇 去核 同煎去滓食

前執服三歲兒作三次服五歲兒作二次服一週二歲兒作

五次服病有大小以意加減累經效驗急客水

七味肉苁蓉圓

木香 縮砂 去殼各 白龍骨 煨

訶梨勒 煨去核 肉苁蓉 麩炒去油各五錢

赤石脂 煨 白礬 煨各七錢半

右為極細末 糲糊圓如黍米大 用米飲食前服一週兒服三

十圓或五十圓三歲兒服一日圓瀉不止異功散同服瀉止

任服若不止瀉多服

人參麥門冬散

麥門冬 去心 人參 去蘆 甘草 炙

陳皮 去白 厚朴 薑汁製炒 白朮 各五錢

右以咀用水煎不拘時候服

人參清腦散

人參 去蘆 柴胡 去蘆 羌活 去蘆 獨活 去蘆 羌活 炒

芍藥 炒 知母 桑白皮 各八

白朮 黃耆 炙 紫 各五錢

地骨皮 茯苓 去皮 石

滑石 各七錢半

右劉散用水煎食遠溫服

射干鼠粘子湯

鼠粘子 炒一兩 甘草 炙 升麻 煨

射干 各二錢半

右劉散用水煎不拘時候服

救精草散 治嬰孩小兒痘疹已靨自發膿腫墮人癩滯

淚出久而不退

救精草 五錢 蛤粉 生一兩

右為極細末 糲猪肝一葉 用竹刀批作片子 搗藥在內 用草

繩縛定 以葦筒內貯水 慢火煮熟 令兒食不拘時候

前胡枳殼湯

前胡 去蘆 赤茯苓 去皮 枳殼 去穢 麥麩炒

甘草 炙 各五錢 大黃 煨 紙裹 一錢

右以咀用水煎去滓 食前服 如身溫脈微 并瀉者不可服

四聖散 治嬰孩小兒痘疹出不快 倒靨小便赤色 餘熱不除

紫草 水通 去節 甘草 炙

黃耆 炙 枳殼 去穢 麥麩炒 各一錢

右以咀用水煎去滓 不拘時候服

紫草散 治嬰孩小兒痘疹瘡黑陷

紫草 甘草 黃耆 炙

糯米 各一錢半



右咬咀用水煎去滓不拘時候服

生地黃散 治嬰孩小兒癩疥身熱口乾咳嗽心煩

生地黃 五錢 麥門冬 七錢 欬冬花 五錢

杏仁 七錢 陳皮 各三錢 甘草 炙 一錢

右剉散用水煎去滓不拘時候服

栝樓甘草防風湯

栝樓 去蘆炒 甘草 炙 防風 去蘆炒又

右咬咀用水煎去滓不拘時候服

麥湯散 治嬰孩小兒水瀉

地骨皮 炒半份 麻黃 去節一分 甘草 炙半份

滑石 水煎半份 人參 去蘆 知母

甜葶藶 炒 大黃 紙裹煨 卷活 各一錢

右剉散用水煎入小麥七粒同煎不拘時候服

身痒

氣血不足其痒為虛不進乳食胃主肌肉調脾進食活血自氣

宜澹不致痒塌

蟬蛻 去足洗淨二十一枚 甘草 炙 一錢

右咬咀用水煎去滓食後服

阮氏收草散

屋爛草 乃屋瓦多生燥草如無益者亦可

右其草多經霜雪雨露感大地陰陽之氣善解毒其功不

能盡述一味不以多少晒乾或焙乾為極細末或貼或時時

渾身疥破膿水不絕粘衣裳難以坐卧可用二三升推磨

上令兒坐臥仍用十一味水香散加丁香桂煎服

王充白龍散

黃牛糞 晒乾火煨過成灰取中白者用

右研極細末用綿包撲之

百草膏 治嬰孩小兒痘風瘡

乾羊糞 燒灰清油調傳

減麻散 治嬰孩小兒痘瘡癰毒氣尚未全散瘡如雞落其

癩癩點或凹或凸

韶粉 一兩 輕粉 一字

右研極細末煉豬脂油調傳

百花膏 治嬰孩小兒痘瘡癰毒難愈誤搗成瘡及瘡起於落不

落

蜜用好白蜜

右塗瘡上其疤易落自無紫黑癩痕

綿繭散 治嬰孩小兒身熱及肢節上生疔腫瘡膿水不絕

出蟻綿繭

右不拘多少用生白礬槌碎塞入綿繭內令滿以炭火燒化

白礬汁盡取出為極細末用乾貼瘡口內

猪尾膏 治嬰孩小兒瘡癰用猪尾尖刺血亦好

龍腦 一兩



右細研旋酒猪心血圓如茶葉大用紫蓋煎湯  
潘氏曰此方與靈死方同須臾一身痘出遂安  
橫矣

四聖丹 治嬰孩小兒瘧行

珍珠 七粒或三五粒研

磁石 四十九粒

頭髮 不拘多少燒灰

右為極細末用搽面臍脂調成膏字字為極細末大於開口將  
藥點入疔內即時大小疔皆變為瘡小兒出痘瘡  
有灰頂者十死八九為瘡人小兒皆宜此法故  
也今要於瘡頂黑色中取出有瘡字字為極細末  
疔又有瘡臭氣者為疔依方治之救人多矣

四物湯

治嬰孩小兒時行痘毒瘡癩之出未出者出不快又

消瘡癩餘毒大凡瘡痘不消者為毒也此藥能活血調  
瘡癩無如此藥活人書曰瘡癩一藥能治瘡癩不快以此  
四物湯誠瘡痘之仙藥也一方知言草尤妙

白芍藥 炒

川芎 去土

熟地黃

當歸 去土炒

右取咀用小一小盞煎去滓服不拘時服候此是婦人藥也  
痢入櫻栗殼炒同煎

天花散

治嬰孩小兒瘡痘去毒

天竺粉

桔槔 五厘

茯苓 去皮

訶子 煨去核

犀角 磨

甘草 炙

右為極細末用水調在碗內小竹七葉小荆芥七葉續作  
束點火在碗內煎臨睡服

小兒明堂灸經

夫小兒之患詳悉幽玄然而抱疾且不能言也或即胎中受病  
或是生後傷風動發無時寒溫各異且據諸家方論醫藥多門  
藥既無痊全憑灸法散在諸經文繁至其其說不同既點穴以  
差訛則治病全失統緒按諸家明堂之內精選到小兒應驗七  
十餘穴正是曾經使用累驗神功今錄于後

天醫取師療病吉日

正月卯日 二月寅日 三月丑日 四月子日

五月亥日 六月戌日 七月酉日 八月申日

九月未日 十月午日 十一月巳日 十二月辰日

點灸法

凡點灸時須得身軀平直四肢無令牽縮坐點無令俯仰立點  
無令傾側灸時孔穴不正無益於事徒燒好肉虛忍痛楚之苦  
有病先灸於上後灸於下先灸於少後灸於多皆宜審之

下火法

凡下火點灸欲令艾炷根下赤煙廣二分若不三分孔穴不中  
不合得經絡緣染衛經脈氣血通流各有所主灸元不中即火  
氣不能透達而病未能愈矣

用火法

古家用火灸病忌八般木火切宜避之八木者松木火難避







白細膩者猶曰腹上者更佳

正人形第一圖



小兒驚癇者先驚悸啼叫後乃發也髮頂旋毛中三壯及耳後青絡脉炷如小麥大

小兒風癇者先屈手指如數物乃發也髮鼻柱上髮際死宛中三壯炷如小麥大

小兒緩驚風灸尺澤各一壯在肘下橫文約上動脉中炷如小麥大

小兒二三歲忽發兩眼大小皆俱赤灸手大指次指間後一寸五分陷者中各三壯炷如小麥大

小兒顛門不合灸臑上臑下各五分一穴各三壯灸瘡未發顛門先合炷如小麥大

小兒夜啼者上唇啼雞鳴止有灸中指甲後一分中衝一壯炷

如小麥大

正人形第二圖



小兒喉中鳴嚔乳不利灸璇璣一穴二壯在天突下一寸陷者中炷如小麥大

癇病者小兒惡疾也呼吸之間不及未師致困者不少諸國無良醫枉死者半小兒猪癇病如口穢吐沫灸巨關穴三壯在鳩下一寸陷者中炷如小麥大

小兒睡中驚目不合灸屈肘橫文中上三分各一壯炷如小麥大

小兒口有瘡銜斷鼻穢氣衝灸灸唇口一穴各一壯在手心中以名指屈指頭繫言者處是也炷如小麥大

小兒雞癇善驚及掣目揉灸手少陰二壯在掌後去腕半寸炷如小麥大

如小麥大



小兒瘡久不愈者灸足大指次指外間陷者各一壯炷如小麥大內疔尤也

正人形第三圖



小兒身強角弓反張灸鼻上入髮際三分三壯灸大椎下節間三壯炷如小麥大

小兒龜胸緣肺熱脹滿攻胸膈所生又緣乳母食熱麩五辛轉更胸起高也灸兩乳前各一寸半上兩行三骨節間六處各三壯炷如小麥大春夏從下秋冬從上及下若不依此法灸十處不愈一二也

小兒疳眼灸食各三壯炷如小麥大在手大指次指兩骨間陷者中灸三壯如小麥大

小兒秋深冷痢不止者灸臍下一寸三寸間動脈炷如小麥大

正人形第四圖



小兒驚癇灸鬼祿穴在上唇內中央弦上炷如小麥大綱刀決斷更往

小兒水氣盡腫及腹灸臍上一寸三壯炷如小麥大分水穴小兒熱毒風感腹脹痛灸手中指末節頭三壯名拳火也炷如小麥大

小兒龜背生時被寒風拍着脊骨骨達於髓也所致如是灸肺俞心俞膈俞各三壯炷如小麥大

肺俞在三椎下兩傍各一寸半


心俞在五椎下兩傍各一寸半

膈俞在七椎下兩傍各一寸

小兒臍腫灸腰對臍骨節間炷如小麥大



正人形第五圖



小兒急驚風灸前項一穴壯在百會前一寸若不命項灸兩眉頭及鼻下人中一穴壯如小麥大

小兒但見風瀉諸般醫治不差灸耳上入髮際一寸五分豎而取之蠟灸也

小兒嘔吐好汁灸中庭一穴一壯在臍中穴下一寸陷者中炷如小麥大

小兒目澁怕明狀如青盲灸中渚一穴各一壯在手小指次指大節後陷者中炷如小麥大

小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內廉橫大頭白肉除各一壯炷如小麥大

小兒睡中驚掣灸足大指次指之端去爪甲如韭菜各一壯炷

正人形第六圖



小兒多疳者是腦風被風拍着以肺寒也灸額會一穴二壯炷如小麥大在上星上一寸直鼻

小兒急喉痺灸天突穴一壯在喉結下二寸兩骨間炷如小麥大

小兒食瀉者先寒熱酒乃發也灸鳩尾上五分三壯炷如小麥大

小兒半癩目直視腹脹乃發也灸尾一穴一壯在臍後骨下五分陷者中炷如小麥大

小兒馬癩張口搖頭身及折馬鳴也灸僕參一穴各一壯在足跟骨下白肉際陷者中炷是取之炷如小麥大

小兒陰腫灸內崑崙一穴各三壯在內踝後五分筋骨間陷中

小麥大



壯如小麥大

背人形第一圖




小兒脫肛瀉血每則瀉肝撮痛不可忍者及百會一穴三壯在頭中心陷者是也炷如小麥大

小兒初生三四日七日內噤不吮奶多啼者是受風中於臍脘流至心脾二經遂使舌強唇脛痙攣得斯疾所施方藥不有十全亦大抵以去風無過灸承漿一穴七壯在下唇稜下宛死中是也次灸頰車一穴各七壯在耳下曲頰骨後炷如雀尿大小兒食時頭痛及五心熱者灸噤乳各一壯在第六椎下兩傍各三寸宛死中炷如小麥大

小兒三五歲兩眼昏至春秋心主口齟遮睛一疼痛不可忍者灸九椎上一壯炷如小麥大

背人形第二圖



小兒五六歲不語者心氣不足舌本無力發轉難灸心俞九壯炷如小麥大在五椎下兩傍各一寸半陷者

小兒刺下赤白秋末脫肛每則肛疼不可忍者灸十二椎下節間名接脊穴灸一壯炷如小麥大


黃帝療小兒疳刺脫肛腫渴飲形容瘦悴諸般醫治不差者灸翠尾骨上三寸骨陷間三壯炷如小麥大

岐伯云無三伏時內用桃柳水浴孩子午正時當日灸之後用清吊子拭其背似見蟲子隨汗出也此法神效不可量

岐伯灸法小兒脫肛瀉血秋深不較灸龜尾一壯如小麥大脊端窮骨也



背人形第三圖



小兒癩瘡入眼灸大椎二穴各一壯在項後第一椎下兩傍各一寸半陷者中炷如小麥六

小兒好癩日不明者灸中俞一穴各一壯在肩甲內無土者二寸陷者中炷如小麥六

小兒三癩目腫吐舌驚也灸第九椎下節間三壯炷如小麥六

小兒飲亦不欲面目赤者灸陽剛二穴各一壯在十四椎下兩傍各一寸陷者中炷如小麥六

小兒胎產加偏腫面赤灸囊後縫十字文當上三壯春灸夏較夏灸秋較秋灸冬較冬灸春較炷如小麥六

小兒疳積瘦食飲少壯在十二椎下兩傍各

一寸陷者中炷如小麥六

一曰為醫一日憂

脈通三部須防變

補瀉先明惟此

毫釐差失任生命

上三科分自傳流

藥施千金為弗瘥

陰陽務在論剛柔

撥水焉能再得收

全幼心鑑卷之四



據上海圖書館藏清乾隆六年敷  
文堂刻萬密齋書本影印原書版  
框高一九三毫米寬二五二毫米

# 新刊萬氏家傳幼科發揮

〔明〕萬全撰



萬家濟書

# 初科發揮

敷文堂

新刊萬氏家傳幼科發揮 序

幼科發揮序

上海圖書館藏

造化大慈也有所授之手焉有智於其微而身皆  
 傳之者是帝之力臣而軒岐氏嗣響也慈父母塗  
 所備設憂感顧乃於意實嗜好而積之有形無形  
 之別也無形而消天絲即慈父母之懷猶然災疹  
 之區矧乎寒熱燥濕之微茫而又以的為器乎或  
 者謂彭湯有主方書之奇也鯨龍之代其脆也別  
 參朮芩苓當不與山青並爛其半為造物所竊者  
 天與人並不至也而不見夫蓬蓬者乎塞向有方  
 指而勝之躡而勝之南北海而躡躡猶有及也而

幼科發揮序

敷文堂

不見乎豫章之木乎即林之腴青陽之德然必七  
 年而後可覺方芽而斲削是尋其盡也斯頃奈何  
 養赤子者愛孩一情一躡斧斲而還自賊也其忽  
 緝銖其譬什伯蚤覺者反是操才帙而攻萬產代  
 冥冥力故耳目逾貴於方輿之內所謂朝必軒而  
 參元宰者萬氏於此道至焉哉廣嗣者弓衛皇皇  
 馬而茂時之已痘者珍治皇皇焉而茂得之其危  
 而不可必者屢屢也斯書成人之命所必欲得者  
 無不得之於萬氏則非鯨龍之詭而其脆之可通  
 常也手授其徒命曰家秘不佞奄有赤子之邦不



以廣而傳之是蔽造化之大慈而不能得之枚萬  
氏者無以得之於天矣不佞文不以歸萬氏而歸  
之真真有神授之者也庶幾附於如保之意

汝萬氏幼科源流

粵自先祖杏城翁謙章人以幼科鳴第一世承  
先考菊軒翁孤繼其志而述之成化庚子客於羅  
娶先妣陳氏生不肖乃家焉其術大行遠近聞而  
誦之萬氏小兒科云為成世羅有鉅儒張玉泉胡  
切溪講明律曆史綱之學翁知全可教命從存核  
夫子之門而學焉頗得其傳翁卒矣顧其幼科之  
不則不行也前無作者雖美弗彰後無述者雖盛  
弗傳不肖之責也故予暇日自求家世相傳之緒  
散失者集之缺畧者補之繁蕪者刪之錯誤者訂  
之書成名育嬰家秘以遺子孫為三世惜乎有子  
十人未有能而行之者其書已流傳於荆襄閩洛  
吳越之間莫不曰此萬氏家傳小兒科也余切念  
之治病者法也主治者意也擇法而不精徒法也  
語意而不詳徒意也法愈煩而意無補核世不知  
無書又著幼科發揮以明之者發明育嬰家秘之  
遺意也言不明後世君子必有明之者不與諸子  
恐其不能明不能行也氏之澤未及肆世而斬矣  
與門人者苟能如尹公他得庾公之斯而教之則  
授受得人夫子之道不墜

若陳相繼周孔之道亦終失其傳也







新刊萬氏家傳幼科發揮卷之上

羅田寒齋 全編著  
雲林澹齋胡 畧校定

男清宇胡廷佐編次

胎疾 小兒初生至周歲有疾者皆為胎疾

氣陽也血陰也人之有生受氣於父陽之變也成形於母陰之合也陰陽變合而成其身身之中形臟四頭面一也耳目口鼻二也手足三也皮肉筋骨四也神臟五心藏神肝藏魂脾藏意肺藏魄腎藏志是也凡九臟者皆父母一體而分者也形拘于一徧而不幼科發揮卷之上 胎疾 敷文堂

筋肝氣不足則筋不束骨機閉不利受腎之氣為骨腎氣不足則骨軟此胎稟之病當隨其臟氣求之肝腎心氣不足宜六味地黃丸主之脾肺不足者宜參苓白朮丸主之子之氣弱皆父母精血之弱也所謂父強母弱生女必羸父弱母強生男必弱者是也故見有頭破顛離神慢氣少項軟頭傾手足痿弱齒生不齊髮生不黑行定坐立要人扶掖皆胎稟不足也宜宜六味地黃丸主之

胎毒者精血中之火毒即命門相火之毒命門者男子以藏精女子以繫胎也觀東垣有紅疔之論丹溪

幼科發揮卷之上 胎毒 敷文堂

胎毒之論治法可見矣古方有解毒之方如黃連其草法又有育嬰解毒延齡丹皆良法也予新立一方用丹溪三補丸方參連葉半生用半酒炒甘草半生半炙各等分為末雪水丸麻子大硃砂雄黃為衣名曰生熟解毒丸小兒日與服之佳

有胎毒所生者如蟲疥流丹浸淫溫瘡癰癩結核重舌木舌鵝口口瘡與夫胎熱胎寒胎黃胎驚之類兒之初生有病多屬胎毒如一臘之臍風百疔之痰嗽難醫恰半歲而真搐者兩末一周而流丹者死難救也况初生之兒腸胃薄小血氣未充藥石則難進也



榮衛微弱筋脉未實鍼灸則難調也業幼科者慎勿忽諸

一小兒升發於臉眼中紅腫手不可近三日死

一小兒生下一月後遍身蟲疥浸淫濕爛其皮如脫

日夜啼忽一日其瘡盡隱發搐而死

或問胎稟不足之證得於父母有生之初如何醫得

予曰諸器破損者尚可補之豈謂胎弱者不可補之

乎貴得其安也夫男女之生受氣於父成形於母故

父母強者生子亦強父母弱者生子亦弱所以肥瘦

長短大小妍媸皆肖父母也兒受父母之精血以生

幼科發揮卷之上 三 數文堂

凡五臟不足者古人生地黃丸主之或曰五臟不足

而專補腎何也曰太極初分天一生水精血妙合先

生兩腎腎者五臟之根本也經云植木者必培其根

此之謂也

或問胎毒之說予曰先賢論之詳矣蓋人生而靜天

之性也感物而動胎之欲也欲者火也故思慮之妄

火生於心志怒之發火生於肝悲哀之過火起於肺

酒肉之饜火起於脾淫佚之縱火起於腎五欲之火

隱於母血之中即是毒也男女交構精氣凝結毒亦

附焉此胎毒之原也加謂兒在母腹飢則食母之血

渴則飲母之血及其破胎而出口有餘血拭之不淨

嚙下腹中是各胎毒斯言也一人倡之百人和之未

有辨之者此書之不可盡信也胚胎資始父精所生

身體資生母血所養是水珠露花男女漸分毫髮筋

骨形象斯具誕彌厥月氣足形全乃破胎而生矣初

在母腹之時如鳥之雛伏於卵殼之中何所飲食耶

口之血乃母臨產惡露漬入口中未必是母腹中所

嗜血也既云嚙下腹中則入於大腸界從大便出矣

安得留在命門待時而發耶詳見痘疹心要

一兒頭細其父常問於予可養何如予曰頭者頭之

幼科發揮卷之上 四 數文堂

莖也頭細則不能任元在父母調養之八歲後再議

至五歲死

一兒解顛未一歲認字念書父母甚愛之予曰此兒

胎稟不足腎虛顛解真陽弱矣聰慧早發真陽洩矣

恐遺父母憂未一歲而發搐死

一兒周歲後多笑予曰此兒難養父問其故予曰腎

為水心為火水陰火陽陰常不足陽常有餘笑者火

之聲也水不勝火故知難養父曰諸兒笑者皆不可

養乎予曰待人引之而笑者此有情也見人自笑者

此無情也後以瘡痘死



一此頭縫四破皮光而急兩眼甚小予曰腦者髓之海也腎主骨髓中有伏火故髓熱而頭破額顛大而眼楞小也宜服地黃丸父母不信至十四歲而死一兒一日發搐五日不醒藥石難入予鍼其三里合谷人中而醒父母喜曰吾兒未出痘疹願結拜為父乞調養之予曰養用鍼時鍼下無氣此稟賦不足也如調理數年後出痘疹可保無事若在近年不敢許次年果以痘疹死

一兒四歲出痘時頸軟頭傾不能自舉予謂其父曰此兒胎稟不足瘡疔正發壯火食氣亟補元氣使痘易發易靨幸而保全再補其陰不然恐難出二八數也乃大作調元湯連進之獲安

有三因所生之者衣太厚則熱太薄則冷冷熱之傷此外因也乳多則飽乳少則飢飢飽之傷此內因也容忤中惡墜仆折傷此不內不外因也順乎天時適其寒溫則不傷冷傷熱者慎擇乳母節其飲食則不傷飢飽調護之謹愛惜之深必無縱弛之失矣慎勿使庸醫妄用湯丸誤見性命

胎風 胎在兩腎之間任衝胃三脈之所係也見之

初生新胎護胎不可不慎故斷胎之時隔衣咬斷者上也以火燎而斷之次也以剪斷之以火燎之又其次也護胎之法胎既斷矣用軟布纏裹待乾自落勿使犯去也三朝洗兒當護其胎勿使水漬入也胎落之後當換抱裙勿使及胎中如此調護則無胎風之病所謂上工治未病十得十全也

治初病兒生旬日之內胎風為惡病也凡覺小兒噴嚏多啼此胎風欲發之後急抱兒向明窗處審視口中上脰有泡如珠如米或聚此病根也其色白者初起也黃者久也可用銀空耳輕手刮出煎甘草薄荷湯拭洗之預取桑白皮汁塗之自此日視之有即去之不可因循以貽後禍所謂中工治初病十全六七也

治已病不知保護于未病之先不知調護于初病之日其泡子落八腹中變為三證一曰撮口二曰噤風三曰鎖肚證雖不同皆胎風也撮口證兒多啼口頻撮者此胎腹痛也可用雄黃解毒丸加乳香沒藥各五分丸如黍米大每服五丸竹瀝生薑自然汁送下利去惡涎良外用新艾炒熱杵爛護其胎頓換使溫暖之氣不絕也不乳者不治



噤風證。牙開緊急。不能吮乳。啼聲不出。發搐者不治。頰肚證。臍突青腫。肚腹脹大。青筋浮露。大便澁。不通者不治。

或問臍風三證。古人有方。何謂不治。予曰。一臍之內。謂初生八日。草木方萌。稍有觸犯。即便折傷。經曰。根干中者。命曰神機。神去則機息。故噤風者。乳食不得入。則機廢于上矣。頰肚者。便溺不得出。則機廢于下矣。所謂出入廢則神機。愴滅者是也。神出機息。雖有神丹。不可為也。豈蜈蚣蠶蝎。諸毒藥之可治耶。

一小兒生後三日。啼哭不乳。予視其證。非臍風。乃臍

腹痛也。取蘄艾杆爛。火上烘熱。掩其臍上。以帛勒之。須臾吮乳。而不啼矣。

一小兒生八日。噴嚏多啼。請予視。予曰。此臍風也。視其上。果有泥色。變黃矣。乃取銀挖耳刮去之。其父慘然愛惜之心。見于形色。故去之未盡也。有老嫗聞之。急使婢女告其父。當急去之。其言迫切。父益懼。自取銀挖耳刮之。不惜也。遣人告予。予面書云。旬日後當發臍風。後果病。迎予治之。許厚報之。且泣曰。予三十六歲得此一子也。予曰。無傷。授以至聖保命丹。而愈。

變蒸

變蒸非病也。乃兒生長之次第也。兒生之後。凡三十日。一變。變則發熱。昏睡不乳。似病非病也。恐人不知。誤疑為熱。而汗下之。誅罰無過。各白大惑。或誤以變蒸得於胎病中者。或曰。兒之生也。初無變蒸。既生之後。當以三十二日一變。至于三百八十四日之後。又無變者。何也。曰。初無變蒸者。藏諸用陰之闔也。中有變者。顯諸仁陽之闔也。終無變者。陰陽闔闔之機成也。故不復蒸也。故兒之初生。語其皮肉。則未實也。語其筋骨。則未堅也。語其腸胃。則穀氣未充也。語其神智。則未發開也。只是一塊血肉耳。至于三百八十四日。然後臟腑氣足。經絡脉滿。軟肉菓菜。以漸而食。方成人也。

或曰。變蒸之日。必以三十二日者。何也。曰。易傳云。性之謂易。易者變易也。不變不易。不足以見天地生物之心。人有五臟六腑。以配手足十二經絡。腑屬陽。以配陽卦三十二。臟屬陰。以配陰卦三十二。取其一臟一腑。各以三十二日。一小變。六十四日。一大變。陽卦之爻。一百九十二。陰卦之爻。一百九十二。合歲並閏月。凡三百八十四爻。所以變蒸一期之日。三百八十四。以應六十四卦之數也。或曰。三十二日一小變。



六十四日一大變所生者何物也所生之物亦有說  
 曰形既生矣復何生也所生者五臟之知覺運動  
 也次初生三十二日一變生足少陰發水腎之精也  
 六十四日二變生足太陽膀胱壬水而腎之一臟一  
 腑成矣此天一生水矣水之精為腦子此後始能認  
 人夫九十六日三變生手少陰心丁火一百二十八  
 日四變生手太陽小腸丙火而心與小腸之一臟一  
 腑之氣足矣此地二生火也火之精為神此後能嬉  
 久也一百六十五日五變生足厥陰肝膽乙木一百九  
 十二日六變生足少陽肝膽甲木而肝與膽一臟一

幼科發揮卷之上 凌燕 九 教文堂

脈受氣足而神合矣此天三生木也木之精為筋此  
 後能坐矣二百二十四日七變生手太陰肺辛金二  
 百五十八日八變生手陽明大腸庚金而肺與大腸  
 一臟一腑之氣足矣此地四生金也金之精為聲此  
 後始能言人語矣二百八十八日九變生足太陰脾  
 己土三百二十二日十變生足陽明胃戊土乃脾胃  
 一腑一臟之氣足矣此天五生土也土之精為肉脾  
 胃主四肢此後能前匍矣三百五十二日十一變生  
 手厥陰心包絡三百八十四日十二變生手少陽三  
 焦三焦配腎腎主骨髓自此能坐能立能行矣變蒸

已足形神俱全矣正如蠶之眠不如是不足成令矣  
 凡一變之過則筋骨手足以漸而堅知覺運動以漸  
 而發日異而月不同日變者變易也日蒸者發熱也  
 初訓云變蒸雖是胎疾非胎熱胎毒之可比矣此少  
 陰生長之氣發育萬物者見之強者雖有是病不覺  
 氣弱者始見如變後形體漸長知歲漸增反為無病  
 也故無治也古方黑子散始置之可也其間或有  
 未及期而發熱者或有變過熱留而不除者抑有他  
 故須詳察之如昏睡不乳則不須治待其自退

變證 幼科發揮卷之上 凌燕 十 教文堂

變證之時有外感風寒者宜發散惺惺散主之按摩  
 法亦可用也內傷乳食者宜消導消胃丸主之輕  
 則節之可也有被驚嚇及容忤者安神丸至聖保命  
 丹如變蒸過受病以治病為主慎勿犯其胃氣咳嗽  
 耳聾結梗湯加阿膠吐瀉理中湯加藿香葉驚風琥  
 珀龍九瀉青丸瀉赤散如受病後而變蒸者正補  
 脾為主錢氏異功散加對病之藥  
 惺惺散四君子湯加蘇葉 加防風  
 湖廣按察司憲長有子九月發熱恐是痘疹差人來  
 取全往見之非痘是變蒸也公曰何以辨之全曰以



目計又有當炭蒸之期以證察之亦無痘疹之證公  
問痘何證也全曰痘者五臟之液毒也故五臟各見  
一證呵欠驚悸心也項急頓悶肝也咳嗽噴嚏肺也  
吐瀉昏睡脾也身體皆涼腎也今公子無之知非痘  
乃變蒸將退也次日果安公喜汝術甚精贈以白金  
五兩應付而歸

本縣胡正備有子二月發熱不乳予見之雖似變蒸  
非變蒸也時乳母皆肥健者必因傷乳發熱也令損  
之次日熱退而安矣

幼疾 兒生一歲後至七歲後變蒸已足脈雖難  
診口則能言病多傷食之證八歲已後有  
勿科發揮卷之十一

有因氣動而病生於內者如盤腸內吊蛇蟲瘕塊之  
類有因氣動而病生於外者如重舌木舌鵝口口瘡  
癰疽瘡癤之類有不因氣動而病生於內者如傷食  
食生冷之類  
有不因氣動而病生於外者如感冒四時金刃湯火  
傷之類 右上四因之病治見各證之下  
一小兒周歲因初食雜肉太早自此成積日漸羸瘦  
不思乳食其父以詳告予予取藥治之養脾去積丸  
先服三日後服丁香脾積丸雜肉湯下取下雜肉一

片猶未化也再進養脾丸而愈

家傳養脾消積丸 消宿食去陳積 白朮一兩

陳皮七錢 蒼朮 厚朴 薑汁炒 枳殼 夫此

半夏曲 青皮 神曲 麥芽

山查各五錢 甘草炙三錢 右為細末蒸餅為丸

黍米大每服二三十丸米飲 送下育嬰延齡解

毒丸能解胎毒初生小兒宜服

兒漸臍帶連胞不拘長短剪取新瓦上焙乾每一錢

加生甘草末二錢黃連末一錢朱砂飛半錢共和勻

生白砂糖調和磁罐收貯每服一豆許內兒口中以

幼科發揮卷之十一

五臟主病 肝經主病

肝主風 實則目直視呵欠大叫哭項急頓悶

虛則交牙呵欠氣溫則內生氣熱則外生也氣謂

口中氣也 實則瀉青丸當歸龍薈丸瀉之 虛

則也黃丸補之

瀉青丸 治急驚搐搦主肝熱 羌活

防風 當歸 川芎 山柃仁

龍膽草 大黃 酒浸狗腰各等分 右為末蜜

丸次實大每服半丸至一九煎竹葉湯砂糖化下



當歸龍薈丸 治腎肝陰虛風熱結發驚悸抽搐

當歸兩 龍膽草兩 山梔子兩

黃連三錢 黃藥兩 大黃五錢 蘆薈五錢

青黛五錢 木香一錢 射香五分 黃芩兩

右為細末蜜丸麻子大每服五丸至十五丸竹葉湯下

地黃丸 治小兒胎稟不足腎怯不言解顛兒大不能行又治肝疳白膜遮睛淚血失音身瘦瘡疥

熟地黃八兩焙取末 山茱萸焙 山藥各四

白茯苓三兩澤瀉 牡丹皮各二兩

切科發揮卷之上 主 救文堂

右為末蜜丸芡實大一歲兒服一九二歲以上加

至三九空心溫水下

兼證 諸風抽搐牽引筋竹皆肝之病也宜獨

一小兒七月發搐無時昏睡不醒不哭不乳插之則

之不痛啼之鼻不建灌藥不入予曰此真搐也不可

治夫兼見心證則發熱而搐予曰肝有風則目連灸

小搐得心熱則搐肝有熱則目直視不搐得心熱則

搐瀉肝瀉青丸瀉心瀉赤散 方見肝心下

其見脾證輕則皆睡不嗜飲食常視其大便何如大

便秘者宜蜜法慎勿下之恐下得脾震反為驚痰

大便潤者宜琥珀抱龍丸主之

其見肺證喘急開亂痰涎壅塞源從大小便以利之

如喘息有聲 肩聳脘高喉中痰響首不洽清寧散

三三 清寧散驚散出於心肺源從小便利之

赤茯苓 車前子 甜葶藶炒

山梔仁各等 耳草炙或半 右為末每服半錢姜

煎水煎服汗熱則大小便難加煨大黃下

一小兒痰壅而發搐氣促而喘予用礞石滾痰丸藥

白皮煎湯碾碎調服之喘定痰下搐亦止矣

兼見腎證暴暗失音手足強直此從風治輕者地黃

切科發揮卷之上 古 救文堂

丸生之重則為廢疾而不可治矣

五臟諸證 此因五臟氣動所生之病乃病生於

內者也

肝所生病 諸風痺眩皆屬肝木脈訣云熱則生

風是也

急慢驚風

急驚風者肝風甚而心火從之木生火從前來為實

邪實則瀉之宜用瀉青丸以瀉肝之風瀉赤散以瀉

心之火

慢驚風錢氏云脾虛則吐瀉生風此脾土散而肝木



乘之肝屬木而脾屬土從所不勝來者為賊和故慢驚為難也脾虛生風虛則補之東垣用調元湯加白芷主之此以黃芪人參補脾之虛白芍藥甘草以瀉肝之實誠千古不傳之秘法也予加桂在內乃黃芪建中湯木得桂而枯古方治慢驚者如醒脾散觀音散皆良法也可用之

醒脾散

人參

陳皮

甘草

白朮

白茯苓

全蝎

半夏曲

木香

各三分

白付子

四個

右為末

每服一錢

速二枚姜三片水煎

幼科發揮卷之上

驚風

至

散

觀音散

全蝎

十個

去

三麻根

防風

白芷

黃芪

甘草

白茯苓

錢五

人參一錢

烏豆

錢五分姜汁炒

為末煎湯下

或問曰上工治未病急慢驚風何以預治之曰方其熱甚之時頭紅面赤而目如怒直視不轉者此驚風之似也宜服河間當歸龍薈丸以瀉肝膽之火則不成急驚風也當吐瀉不止之時見其手足冷瞳睛口鼻氣出冷者此慢驚風欲成之似也急用參苓白朮散以補脾琥珀抱龍丸去枳壳枳實加黃芪以平

肝別慢驚風不能生矣此吾得傳秘法

參苓白朮散

人參

白朮

白茯苓

山藥

扁豆去壳姜汁浸炒而半甘草

桔梗

慧苡仁

蓮肉各一兩

為細末煎湯送下

琥珀抱龍丸

治小兒諸驚風四時感冒寒溫風暑直疫和熱煩躁不安痰嗽氣急及瘰疹欲出發搐并宜服之此予家傳常用之方

真琥珀

天竺黃

白檀香

人參

幼科發揮卷之上

驚風

至

散

白茯苓

各兩

粉草

去毒二

枳實

枳壳

各兩

朱砂

五兩

牛膽南星

一兩

山藥

一兩

金泊

百片為衣

右各製取末和均用臘酒溶水如無

取新液或長流水并為丸如芡實大大均重半錢陰乾每服一九煎薄荷湯下

此方內有補益之藥人皆喜而用之但有枳壳枳實能散滯氣無滯氣者損胸中至高之氣如慢驚風及元氣弱者減此二末用當歸川芎各二兩代之至聖保命丹一名紫金錠子 膽星



僅系 一錢 白付子銘一全場十四枚天麻防風  
 號項三分 辰砂飛半水麝香一牛珍珠五分  
 九分為二十錠金泊為衣每一錠薄荷葉煎湯磨  
 服 礞石滾痰丸 降火墜痰之要藥方見大方脉科  
 涼驚丸 諸熱通用此吾家傳之方又名金花丸  
 黃蘗 黃連 山梔仁各  
 分 珠砂水飛成一本有龍膽草五分  
 右為細末臘雪水為丸麻子大薄荷湯送下  
 勿科發揮卷之上 教文堂  
 三黃瀉心丸 一名三黃五色丸麻利諸驚熱  
 黃連 黃芩 大黃各等分為末雪水  
 九麻子大溫水送 均分作五分用衣 一分珠砂衣  
 一分青黛衣 一分雄黃衣 一分輕粉衣  
 一分蘆薈衣  
 不通散 能瀉肝風降心火最利驚熱  
 山梔仁 大黃煨 羌活 木通  
 赤茯苓 牛草 以上各等分右為末每服一  
 字紫蘇葉煎湯送下  
 諸疳汁藥方

定志丸治驚火成癇  
 人參 白茯苓 遠志 石菖蒲炒  
 酸枣仁炒 柏子仁各錢 琥珀  
 膽星 鐵花粉銘一 珠砂飛 射香銘  
 右為末水煮山藥粉為丸黍米大每服十五丸燈  
 心煎湯下更煮猪心與兒食之以助藥力  
 急驚風屬陽病在六腑易治宜用京瀉  
 慢驚風屬陰病在五臟難治宜用溫補  
 或問病有急慢陰陽者何也曰肝主風木也飄驟急  
 疾莫甚於風心主驚火也暴烈飛揚莫甚於火木火  
 幼科發揮卷之上 教文堂  
 陽也故病在于心肝者謂之急而屬陽脾胃者土也  
 沉重遲滯莫甚于土脾土者至陰之屬也故病在于  
 脾者謂之慢而屬陰肝常有餘有餘則瀉而損之脾  
 常不足不足則補而益之至于心主驚肝主風以宜  
 前論然火資風勢風資火威風火相扇而發情故  
 可別論也驚風之病有類證者有類證者不可不辨  
 急驚風有三因  
 有外因者如感冒風寒溫濕之氣而發熱者宜即發  
 散之和解之以除其熱可也苟失而不治熱甚發搐  
 此外因之病也宜瀉赤散瀉青丸主之



有因者。如傷飲食發熱者。即宜消導之下之。如保  
和。三黃枳朮丸之類。以除其熱可也。苟失而不治。  
其甚發搐。此內因之病也。當視大小便何如。如大便  
不通。先去其宿食。宜木香枳朮丸。及膽瀉法。大便潤  
宜辰砂五苓散。琥珀抱龍丸主之。

有不內外因者。如有驚恐。或客忤中惡。得之。蓋心藏  
神。驚有傷神。腎藏志。與精。恐有傷腎。經云。隨神往來  
謂之魂。并精出入謂之魄。故神傷則魂離。精傷則魄  
散。小兒神志怯弱。猝有驚恐。所以精神潰亂。魂魄飛  
揚。氣逆痰聚。乃發搐也。客忤中惡。出其下意。大人且

勿科發揮卷之上

驚况小兒。宜先去其痰。辰砂膏主之。後安其神。琥  
珀抱龍丸主之。有熱者。東垣安神丸。下痰之藥。慎勿  
用。輕粉巴豆之類。恐傷元氣。損脾胃。誤殺小兒。

錢氏抱龍丸 治小兒風痰熱甚昏睡急驚

雄黃飛 天竺黃各四錢 膽星一錢 射香三分

硃砂飛四錢 右為末。煮甘草膏丸。芡實大薄荷

湯化下

辰砂膏以通心氣 朱砂飛一錢 牙硝

雄黃飛各二錢五分 射香二字 金箔

銀箔各十五片 白付子 枳壳三錢

川芎 白茯苓各四錢 人參 黃連  
遠志各二錢 右除前六味。另碾後七味。共為末。  
和均蜜丸。芡實大每服一丸。麥門冬煎湯化下。此  
砂膏加戒

或問熱盛則生痰。痰盛則發搐。錢氏有利驚丸。以下  
其痰。陳氏有芎朮散。以吐其痰。皆可用否。予曰。藥不  
執方。合宜而用。可也。見壯實者。吐之。下之。病則止。見  
怯弱者。不可猛浪。反傷元氣。大抵痰在咽喉之中。壅  
塞沾滯。藥食不得入者。則宜吐而去之。此在上者。越  
而治之法也。宜用蠶蚕牙皂。灸焦芥分碾末。每服少

幼科發揮卷之上

許以土牛膝根。自然汁灌之。即吐。吐後却進下痰藥。  
効五色三黃丸。礞石滾痰丸。辰砂膏。皆可用之。辰砂  
膏下痰甚妙。辰砂飛三錢 礞砂 馬牙硝各

半 玄明粉二錢 全蝎去毒 珍珠

射一字 右為末。和均用好油。單紙包起。自然成

膏。再用一粒許。治諸驚薄。騎下治胎驚。乳汁調寒

湯下

予初習醫。治一兒。二歲發搐而死。請予至。主家痛哭  
乃阻之。告其父曰。此兒面色未脫。手足未冷。乃氣結  
痰壅而悶絕。非真死也。取艾作小炷。灸兩手中衝六



火方及肉而嘔大哭父母皆喜遂用家傳治驚方以  
雄黃解毒丸十五丸利其痰涼驚丸二十五丸去其  
熱合之煎薄荷湯送下瀕吏利下黃涎搗止矣子歸  
父問用何藥如是速效全以具告父父語母曰吾有  
子矣

一兒發搐痰壅有醫用白餅子下之不退凡三下病  
益深合目昏睡不哭不乳喉中氣鳴上氣喘促大便  
時下干曰五臟氣絕病不可治轉下之過也彼醫曰  
白餅子錢氏下痰神方也予曰盡信書不如無書錢  
氏小兒皆出于門人附會之事也蓋人之有痰猶木

幼科發搐卷之上

王 敷文堂

之有津時令大熱草木流津痰自熱生此明驗也痰  
猶水也附氣自行逆頰在山豈水之性哉乃博敏使  
之也今痰隨火上不知降火而反下之損其胃氣胃  
氣既攻五臟俱損故目不開者肝絕也昏睡不乳者  
脾絕也啼聲不出者心絕也喘促痰響者肺絕也便  
溺遺失者腎絕也果不可治而死

邑中有儒醫治病有奇方惟性太執不知變通時有  
小兒發搐予謂急驚 當用涼瀉瀉赤散瀉青丸  
是也彼謂驚風者肝火鬱遏而成也火鬱則發之小  
續命湯是也人不能決而從之子所治者一日而安

彼治者死悔不信吾言無及矣

一兒發搐先取善推法推之止向後發病益危甚予  
曰推法者乃針灸按摩之遺意也經曰無刺大嗔人  
推插之法壯實者可用之如怯弱者其氣不行推則  
有汗反傷元氣也其家不信予言予曰不死必成痼  
疾半月後果死

一兒發搐因有推法暫退一月後如期復發又推之  
或一月一發或一月再發予曰病成痼矣推法者乃  
發表之意痰聚在心不得出也幸初成痼者當可治  
若久則為終身痼疾不可治也因立方用

幼科發搐卷之上

王 敷文堂

黃連 五錢

殊砂 二錢

飛 錢半

白甘遂 三分

膽星 一錢

為末粟米糊丸

九燈草煎湯化下夜服三日服一遂安

癸亥二月英山縣大尹前縣兵公一子發搐彼醫以

二陳湯姜汁竺瀝治之不退公初來任迺羅與全有

識承差人請之全往視其外候三閱青氣兩頰赤色

目常直視指如燃物曰此得之外感未與發散熱入

于裏錢氏曰肝有熱則目直視得心熱則發搐又曰

兩頰赤而目直視必作驚風小兒肝嘗有餘又乘木

旺之時當與瀉肝若二陳湯陳皮半夏生姜之辛皆



助肝之物經曰以辛補之所以無效乃用瀉青丸以瀉肝木之有餘熱赤散以瀉心之火一服而痛即止公喜謂其下曰所見不同用藥即效真良醫也後到時吾心有主今果無憂矣全見其胎稟素怯脾胃且弱恐後作搐便成痼疾又作琥珀丸與之常服而安斷水沙坂徐淑道一子患驚風先求醫張姓者治之數日不效謂予往痰喘正急驚搐頻發予先治其痰次治其搐以次而定唯身熱備熾張姓者欲用解毒湯竺葉湯小柴胡湯予皆不可謂之曰小兒肝嘗有餘脾嘗不足病發於肝風木太旺脾土受傷此乃虛

幼科發揮卷之上

重

敷文堂

熱勿用寒涼致損中氣也乃用四君子湯加炙黃芪炒黑乾姜一服而安

一小兒年五歲夢中驚哭抱其母叫怕此因被驚肺得之予製一方用人參麥門冬白茯苓黃連酸水仁栢子仁炙甘草朱砂各等分一半水煎一半入地黃加炙甘草為末山藥粉糊丸黍米大每服二十五丸燈草煎湯下未盡劑而安

一小兒周歲發熱而搐以瀉青丸投之不効乃問其發搐之狀其母曰搐過後只好睡以乳與之則飲不與乳飲則不思乳醒時則戲作猫兒聲見人則笑不

發搐便是好了予曰醫要識證藥要對證底前藥之不効也以藥赤散服之一劑而安其父問是何故予曰心臟屬火其聲為笑火生于寅屬虎猫首虎之類也猫聲而笑知非肝病乃心病也故以藥赤散瀉其心火而安聞者嘆服

急驚風證

脾風發搐者難治

初生月內非脾風證發搐者此胎驚也宜至聖保命丹金銀磨水送下

或用全蝎一枚薄荷葉包炙為末珠砂末三分和勻猪乳調五粒許服則常發者名胎癩不可治也如

幼科發揮卷之上

重

敷文堂

變蒸發熱甚發搐者只用藥赤散瀉青丸主之効瘡疹未出發搐者此吉兆也宜用藥赤散煎調朱砂服之効或將醫發搐者西兆也此毒氣攻心宜急解

救之用真小黃腦子各一分珠砂末五分和勻猪尾尖血和丸小粟粒大每一丸燈草煎湯化下

丹痛發搐視其先後何如先發丹後發瘡者不治此胎毒自外入裏也先發搐後發丹此名驚丹可治此胎毒自內而外也宜用大連翹飲主之

連翹 瞿麥 滑石 車前子

大力子 赤芍 各錢 木通 去子



常歸 防風各五分 黃芩錢半 柴胡 甘草各二 荆芥穗一錢 蟬蛻 右為細末再加 大黃灯心水煎

蟲疥浸淫入腹發痛難治急用雄黃解毒丸升麻煎湯下瘡再發地痛止者吉咳嗽發痛視其病之新久如初咳嗽時痰甚氣促連聲不止而不能治發痛者宜葶藶九蘇葉煎湯下利去其痰咳止痛亦止矣如久嗽不止者難治宜用小阿膠散服五分至一錢煎去渣灌下如發痛後變嗽者此風邪入肺也宜人參荆芥散再發之

切科發揮卷之上 清畏堂

陳皮去白 荆芥穗 桔梗 半夏

細辛 甘草炙 杏仁去皮尖 木通

桂枝各等分 右煎姜引

泄痢發痛如先吐瀉或痢痰久不止以致脾胃虛弱者此慢驚風也難治如先發痛後發泄痢者比因發痛之時多服利瀉下痰之藥或多服寒涼之藥傷其胃氣泄痢不止宜補瀉之錢氏異攻散加木香砂仁肉荳蔻州柯子肉為末山藥粉糊丸米飲下調之瘧疾發痛瘧作熱時發痛者此宜截去其瘧瘧止痛亦止矣小柴胡湯加常山槲榔烏梅發日服以截其

瘧發過服辰砂五苓散以定其痛神效如發痛後寒瘧者此脾風之證也宜平瘧養脾丸主之


薪水李中庵醫也一兒未周歲因傷食發瘧間一日一發在子丑時瘧發痛亦發也發時咬牙呻喚大便黃綠努黃而出用口吮母口得乳即止瘧後汗出心下跳腹中鳴退後頂上有小熱其父母愛惜之心瘧退痛退則喜而稱愈瘧痛俱發則憂悞不勝其母又不禁口病未十日成疳矣面色眊白顛陷髮疎兒漸羸瘦請予治之予曰此兒先受暑濕暑則為瘧濕則為痰又傷飲食助其暑濕之邪暑則傷心濕則傷脾者生熱濕生痰脾土一衰肝木隨旺瘧曰食瘧疳曰食疳當從虛治且大哭手撒皆肝膽之病子時屬膽咬牙者心肝俱熱也肝木心火子母病也大叫哭者肝病也呻喚者腎病也腎水肝木母以子病也肝者厥陰風木也心肝者少陰君火也水火相搏則內作痛故大便努黃而出用口吮母之口此內熱作渴也兒口不能言得乳自解汗出者初發之時和氣拂鬱及其退而有汗此真氣外泄也故治瘧之法無汗要有汗散邪為主有汗要無汗養正為主此兒汗泄于外便泄于內心下跳腹中鳴皆火盛證也肝膽從

幼利發揮卷之上 清畏堂

瘧發過服辰砂五苓散以定其痛神效如發痛後寒瘧者此脾風之證也宜平瘧養脾丸主之



原缺



之

黃連五錢

白茯苓

石菖蒲

錢

珍珠

鐵華粉

錢

朱砂飛三錢 其遂五分

右為細末

粟米粉煑糊八錢 猪心血三枚 同杵均為丸如彈

子大每一丸取債心一枚 切開兩片入藥在內 錢

紫定水煑熟分三服本湯送下

一兒三歲病驚風後未服豁痰安神之藥自後成癇

每發之時面色青黑兩日連劄口如嚼物涎出干口

昏眩仆地當欲發之狀即以手探其口中以吐其涎

如此調理至七歲不作矣

勿科發揮卷之上



夫

清畏堂

一兒四歲病驚已絕予用錢刺其湧泉一穴而醒自

此驚已不發予謂其父曰此驚雖未發未服豁痰之

藥若下早治恐發癇也父母不信未及半年兒似痰

迷飲食便溺皆不知也時後昏倒果然成癇病其父

來訴曰不信先生之言誠有今日之病願乞醫治不

敢忘報予乃問其子爾病發時能自知乎子曰欲昏

則發乃作錢氏安神丸加膽草服之教其父曰爾子

病將發時急插兩手合谷穴如此調理一月而安

急驚風成癇者肝主風風淫末疾故驚風之後有半

足癱瘓而不能舉者此血虛不能養筋故也宜地黃



凡加膏胎牛膝用獨活肉桂為丸服之

一女子十四歲病驚風後右手大指次指屈而不能伸筋用羌活防風天麻全蝎僵蚕蟬蛻諸風藥治之病益甚予嘆曰彼庸醫也不知手足不隨血虛也伸筋不能屈者筋弛長也屈而不能伸者筋短縮也皆血虛不能養筋之證也手大指者太陰肺經之所主手次指者陽明大腸之所主與大腸皆屬燥金此血燥之象也一切風藥助風生燥故血轉虛而病轉盛口授一方用黃芪八參天麥門冬生熟地黃當歸各等分官桂減半為引經橫行手指之端其為未審練勿科發揮卷之上

天 敷文堂

丸艾實大每一丸食後湯化下

一小兒驚風後右手羸硬五指拳曲不能舉物兼口角流涎語言蹇澁予曰此脾有濕痰脾不足而肝木乘之不可治也

急驚風煩證

天鈞似癩

天鈞者性熱驚悸眼耳翻騰手足指掣或啼或笑喜怒不常甚者反甲皆青如祟之狀故宜和解風熱鈞藥散主之

二錢五分

防風

朱砂飛

蟬蛻

藥散主之

鈞藤

白茯苓

各兩 大黃 酒浸

羌活

獨活

青皮

甘草

右為未萎末煎服 此瀉青丸變化加減也 瘧病似天鈞

瘧病項背強在腰身反張擡頭掣癢噤口不語發熱酸痛鎮日不醒其狀可畏但受病與天鈞不同中風自汗不可再汗汗多則發瘧中濕宜微汗不可大汗大汗過則發瘧有剛柔二瘧無汗曰剛瘧宜麻黃葛根湯有汗曰柔瘧宜桂枝葛根湯二瘧並宜人參敗毒散加防風主之

麻黃根湯

麻黃 去節

赤芍藥

各兩 葛根 二兩

勿科發揮卷之上

三

三

葱白 二莖

豉 半合

上剉散每服二字煎服

桂枝葛根湯

桂枝

白芍藥

甘草 各二錢

分半

葛根 兩半

生薑 一兩

大棗 四枚

上剉散每服三字煎服

內鈞以癩

內鈞腹痛多啼唇黑囊腫偃後反張眼內有紅筋斑血者是也此寒氣壅結只宜溫散木香丸主之

沒藥

木香

沉香

舶上茴香

炒

鈞藤 各等分 乳香

全蝎 底半

右為未取大蒜切爛和丸梧桐子大每服二九鈞



湯下

錢調酒服

錢調酒服 治寒邪入腎經小腹急痛面青手足冷者

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

歸 歸 歸

弓反張之證亦相似也但天鈞有搐掣而症病無搐掣也盤腸痛屬手太陽小腸經內行于小腹與厥陰之脉內行者不同所以小腹忽痛也但內鈞有痲痲而盤腸痛無痲痲可辨也

客忤似痲

客忤者口中吐青黃白沫水穀鮮雜面色變異喘息腹痛反側痲痲狀似驚癇但眼不上竅耳治法宜碎邪正氣散驚安神蘇合丸至聖保命丹主之

客忤者謂容氣忤犯主氣之病也如五氣之和自鼻而入則忤其心肝五味之和自口而入則忤其脾胃

幼科發揮卷之上

有所驚恐則忤其神有所拂逆則忤其意當博求之故曰心誠求之雖不中不遠矣詳見育嬰家秘

一兒半歲忽日憐然不樂昏睡不乳子曰形色無病

將謂外感風寒則無外感之證將謂內傷乳食則無

內傷乳食之證此兒莫有所思思則傷脾乃昏睡不

乳也其父母悟云有一小廝相伴者吾使他往今三

日矣乳母亦云自小廝去後便不欣喜不乳父急

命呼之歸兒見其章嘻笑父曰非翁之妙術不能知

也

一兒一歲啼哭不止予審察之非病也其父母曰無



病何由生與常子乃問其乳母此兒平日戲玩者何物乳母曰馬鞭子即以取至兒見大笑擊人而哭止

一兒九歲吐乳便黃身有微熱予曰此傷熱乳也吐作腥氣今已成積母曰未食熱物予密語其父曰必傷交奶得之父問何故交奶予曰父母交感之後以乳哺兒此淫火之邪忤兒脾胃正氣也不治之必成癖矣何以致曰淫火者肝火也病則發抽搐者脾病也積不消則為疳父問何以治之曰瀉肝補脾乃以瀉火胃苓丸服之

幼科發揮卷之上

三

中惡似癩

中惡小兒之危惡也其病有二如中惡毒之氣者病自外至其證眩僕四肢厥冷兩手握拳不能喘息先用辟瘟散 躑躅花分半 雄黃三分 射少許

右為末用燈心三寸長蘸葉少許插入鼻孔得嚏即醒蘇合丸灌之 或攝生飲

南星煨

半夏洗

木香各分五 生蒼木

生甘草

后葛蒲各一

右剉入生姜用水煎

服盡一劑以平為期如內生中惡毒之物病自內生其證心腹刺痛腹皮青黑悶亂欲死宜急攻之

雄黃解毒丸主之

白虎燈似癩

白虎證乃流年前九位之神兒觸犯之則不精爽而目視不轉手如斂物宜服至聖保命丹取太陽真土伏龍肝碎煎湯送下取龍虎相制之義或同客忤中惡白虎三證何氣使然曰皆客氣也客氣不正之氣也兒之所稟謂之主氣為之忤者謂之客氣經云邪之所奏其氣必虛故兒之主氣強者雖有客氣不能忤也主氣弱者稍有所忤則成病矣客忤者病之總名也中惡則客忤之重者白虎者別客忤之輕者也治法皆以辟邪養正安神和胃為主蘇合香丸治三病之聖藥也

蟲病似癩

蟲痛乃蚊蟲攻其心痛也發則目直視口噤不言或大叫哭口中流沫涎水面色或青或白手足強直宜急攻之雄黃解毒丸苦練根皮煎湯下

馬脾風似癩

馬脾風者肺脹也上氣喘急兩脇扇動鼻張悶亂喘喘聲啞啞涎壅塞其證危惡宜急攻之牛黃散主之 黑白牽牛 兩 大黃二兩 檳榔半兩



木香三錢 輕粉少許 右為末和勻每服用冷  
水或漿水調服為度

或問何以謂之馬脾風午屬馬為少陰君火心主熱  
脾主虛心火乘肺脾之痰升故肺脹而喘謂之馬脾  
風也

一兒四歲忽作喘氣逆痰壅鼻孔開張予曰此馬脾  
風也如胸高有聳汗出髮潤則不可治須急治之以  
葶藶丸去防已加大黃除肺之熱合小陷胸湯除肺  
之痰張為細末並瀝調服而愈

慢驚有三因

幼科發揮卷之上

三

救文堂

因病後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻亦冷手足時  
痲痲昏睡露睛此無陽也宜待其未發而治之調元  
湯合小建中湯主之如見上證雖有神丹不可治也  
或問吐瀉何以生風而不可治者何也曰五行之理  
氣有餘則乘其所勝不足則所勝乘之吐瀉損脾脾  
者土也風者肝木所生也脾土不足則肝木乘之木  
勝土也其病不可治人身之中以穀為本並多則水  
穀不入瀉多則水穀不藏吐則傷氣泄則傷血水穀  
已絕血氣又敗如之何不死也  
或問風從風治何以所立之方不用風藥何也曰內

經云肝者急以甘緩之以酸泄之以辛散之又云脾  
欲緩急食甘以緩之調元湯參芪甘草之甘可以  
緩脾之急為治風之聖藥也而又可以補脾者藥桂  
枝辛熱之從可以建中二方合而用之治慢驚風者  
此東垣老人之秘傳也

因得驚風醫用利驚之藥太多致傷脾胃元氣益虛  
變為慢驚者此外風未退中虛又生風虛相搏正去  
邪存大命隨傾此慢驚風證尤慎於始也

一兒五歲病痢醫用藥治之痢轉甚其脾胃中氣下  
陷也予用參苓白朮散調之十日痢止予辭歸有惑

幼科發揮卷之上

三

救文堂

者謂其父曰無積不成痢富家之子多是肉積吾有  
阿魏嘗用治痢有效父惑而聽之乃以阿魏作丸如  
小豆大連服三九其子昏睡遠予又至以服阿魏丸  
告之予驚曰阿魏雖去肉積大損元氣今即脾胃已  
弱豈可服之父曰病安而喜睡未醒也予謂乳母味  
之則目露睛氣已絕矣  
有兒脾胃素弱一日病瀉以理中丸服之瀉未止口  
內生瘡謂兒前藥性熱助火復以冷藥投之身微熱  
腫則揚睛予見之曰此兒陰慢驚風今即脾胃本虛  
瀉則益虛口中生瘡者脾虛熱也誤服冷藥則中氣



益損昏睡不乳虛損之極也當急作調元湯倍加人參服之調理半月而愈

一女子五個月內發搐子以瀉青丸投之三四服搐不止轉甚予思痰壅氣鬱乃發搐也丸散頗粗與痰粘滯于咽喉之間致氣不通而搐愈甚也用竹葉煎作湯取綿紙濾去其渣滓澄清服之搐止而安其父嘆曰醫之貴于變通也如是夫

一小兒得真搐予曰不治彼家請一推拿法者搐之其兒護痛目瞪口動一家盡喜再觀兒斜視彼曰看娘兒口開張彼曰尋娘乳吃予嘆曰誤矣觀子轉睛

幼科發揮卷之上

三

清異堂

謂之看娘急口張開謂之尋乳皆死證也其夜果死肝主風急驚風搐搦振掉肝之本經氣動所生也當急治之得心熱則發宜瀉青丸用煎赤散煎湯送下初發搐昏睡不醒或搐人中或搐太陵或灸中衝待其醒而藥之

或用白蠶蚕猪牙皂角細辛川芎藜蘆葇分為末吹鼻中嚏者可治不嚏者不可治

如頑涎壅塞者用蠶蚕末吐之或礞石滾痰丸吐之家傳三黃五色丸下之

凡發搐如法治之搐止者吉如時發時止或昏睡

不醒不食者死

凡一歲發搐不止口臭氣出溫者此真搐也不可治搐後身醒口臭出熱者此假搐也可治

錢氏云氣溫則內生謂肝之真臟病見者故曰真氣熱者病自外生者也故曰假

先翁治一兒滿月後發搐以至聖保命丹治之安祖訓治急驚風只用瀉青丸煎赤散

舊縣張月山長子病急驚風十七日不醒待請予到舌色黑矣予嘗見父念玉函經傷寒舌黑洗不紅藥洗明分見古函全問曰用何藥洗之父曰薄荷湯乃

幼科發揮卷之上

三

清異堂

依法急取薄荷湯洗之舌變紅色予曰可治也用瀉青丸二錢煎湯服之一飲而盡口燥渴已止也其夜

搐止熱退而安此子不遇予幾死

汪元津幼子七月間因傷食病瘥七日發搐予見之肝風雖甚脾未至用當瀉其肝後補其脾可也乃以

瀉肝散三服而搐止後用調元湯以補其脾琥珀抱龍丸以平其肝喜睡二目不能開子思喜睡者非脾

困也乃神昏欠惺惺也目屬肝而胞屬脾合日不開者非亡魂也乃神倦也今兒目欲開欲合可知也只

用前方又二日令其家中平日相與嬉戲者取其小



鼓小兒之物在房中水前唱舞以諫之未半日目翳而平復也凡十日而安

胡鳳塵育子痘瘡後傷食疳飢瘦髮穗有醫童一冊見之曰不是疳證乃血虛也其家惑之始効則生一病如癩非癩盡則安靜夜則憂寐扼其乳母叫三我怕我怕如人捕之狀詢其病原此兒性不吃藥一冊來纓藥必將針火以忍赫之而得斯疾也蓋胃為戊土腎為癸水合而化為火腎主恐恐則傷腎此因脾胃虛弱不能生肺腎無化原亦從而虛也腎藏志腎虛則神志不寧而生驚恐也寤則神棲于心寐則神

幼科發揮卷之上

三

教文堂

棲于腎脾志往來出入之門戶也必以補脾為主安神次之補脾肥兒丸安神錢氏安神丸調理半年而安

天鈞內鈞足厥陰肝經之脉起足大指而上環陰器左交右右交左上入小復下會督脉循脊脊過而上至于巔如風傷肝則發天鈞其狀眼上翻頭項向後仰身反折澤如角弓之狀錢氏云肝有風甚則角弓反張者是也天鈞屬木宜發散瀉青丸中去大黃加天麻全蝎蠶蚕鈞藤內鈞者肝受寒則小復痛大叫哭目直視但不搖耳

宜急温其內當歸茱萸湯及木香丸

當歸茱萸湯

當歸

吳茱萸炮焙乾

小茴香炒

甘草

木香

木香丸方見驚風類證

小兒腸痛亦在小腹腰屈空啼無淚此名盤腸痛證似內鈞但不直視也金錢子散見類證主之癩疔此厥陰肝經痛也與腎無干皆寒所致有腫而不痛者名癩疔而不腫者名疔有腫又痛名癩疔茱萸內消丸主之

本縣大尹梁公子病疔右邊舉丸腫大如雞卵長約

幼科發揮卷之上

單

教文堂

五寸上絡臍傍下抵陰囊直直硬痛大小便不通急召全全立方用當歸川芎木香青皮去穢山梔仁山查子小茴香川練子澤瀉二劑而安

卵腫小兒性急多哭者有之  
予曾治小兒立方用香附子川芎木香青皮山梔子麥芽等分作丸服之

又小兒一腸痛予用諸證辨疑內一方五苓散加川練子小茴香入鹽一捻煎神効

肝之竅在目目赤痛者肝熱也宜瀉青丸加黃連作丸服之



目中白翳者肝虛也宜瀉青丸去大黃枝子加乾菊花木賊蟬蛻作丸服

經云肝有熱者則小便先赤煎赤散加梔子條芩膠草并草稍主之

本府三守小姐溺出如青水着肉處潰亂成瘡夫人憂之守問全云莫非女之臟腑壞也答云膀胱受五臟之液以藏之是為溺也各隨本臟之色青者肝之色也着處成瘡肝火盛也火之所灼則潰爛矣全獨治之以前治小便赤方更加黃蘗為丸調理五日而安夫人大喜命小姐出而拜之

幼科發揮卷之上 聖 教文堂

拍陰臭神效 當歸 贈草 山枝子

水通 車前子 津鴻 并草稍

條芩 水煎

肝有病則大使難瀉青丸木通主之

錢氏云肝熱者手循衣領及亂捻物或咬非

一小兒五十日晝夜啼哭不止予用瀉青九五厘竺

葉煎湯入砂糖少許調服立止

咳嗽不止作搐者此肺衰也而肝木侮之也當先補

肺阿膠散後瀉肝瀉青丸搐止者可治不止者不治

木寡乎畏也錢氏所謂三補端而咳嗽不除三瀉肝

而肝搐不止者是也

斷水舉人蔡沙江有子病咳以不止請予治予往見

其連聲不止咳時面青右手嘗自擺動謂沙江曰令

即不可治也沙江問何故曰嗽者肺病也肺屬金面

青者肝之色也肝屬木手擺者肝風欲發之狀也木

來侮金寡乎畏也維今十月金病木生之時四時之

序將來者進成功者退木生而進金病而退發搐不

可治也甲乙日劇果甲乙日搐而死

黃州府其秀才女驚後右手大指屈而不能伸醫用

全蠟蠶蚕治之不効問予求治法肝主筋筋賴血養

故曰掌得血而能屈也血燥則筋枯屈而不能伸也

手大指手太陰之脉以起也金本性燥復用風藥以

治之燥益甚矣劉宗厚云休治風休治燥治得火時

風燥了乃授一方用人參固本丸加黃芩黃蘗知母

作丸服之

百日內兒痛最惡謂之胎驚錢氏論詳

驚風後餘證

搐後成癱瘓者左氏謂風淫末疾是也肝主筋肝熱

則筋弛而長長則軟弱手足伸而不能屈矣肝寒則

筋縮而短短則拘牽手足屈而不能伸矣並豆六味



地黃丸上之藥者加附子肉桂軟弱者加黃蘗知

丹當歸牛膝續命蜜丸服之

驚風後疳不能言宜六味地黃丸加巴戟遠志石菖

蒲

本縣一尹吳子生四個月病驚風搐過則昏迷不醒

發搐則醒服邪視右手搐搦請予予曰此真搐不可

治而辭退

心經主病 心主驚實則叫哭發熱飲食而搐

虛則因卧悸動不安

實則道赤散瀉心湯 虛則二安神丸服之

幼科發揮卷之上 聖 數文堂

瀉赤散 治心熱及小便赤夜啼 生地黃

木通 甘草稍炙各等分 劉加竹葉水煎

食前服加黃芩各火府散

瀉心湯 治驚熱 黃連去心一錢

為細末每服一字至半錢卧温來調服

錢氏安神丸 治邪熱驚啼心痺面黃頰赤壯熱

麥門冬 馬牙硝 曰茯苓 山藥

寒水石煨飛甘草各五錢朱砂一兩飛腦子一字

右為末蜜丸芡實大每半丸砂糖水化下無時

東垣安神丸

經云熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦而

去心煩除熱為君以甘草生地黃瀉火補氣生陰血

為臣以當歸身補其血不足朱砂約浮游之火以安

其神也 甘草五錢牛黃連酒炒六錢

當歸身二錢生地黃錢半朱砂五錢水飛為末

右為末蒸餅丸黍米大朱砂為衣每服十九至

十九温水送下

兼證

諸熱驚悸不安多啼此心臟本病也宜瀉赤散加朱

砂主之甚者涼驚丸三黃瀉心丸

幼科發揮卷之上 聖

兼見肝證則發熱而搐宜木通散主之

兼見脾證則嗜卧夢中咬牙多驚宜錢氏安神丸

兼見肺證則發熱作搐而喘宜青寧散主之

兼見腎證為驚癇發則忽然仆仆咬开搐搦手足逆

冷發過即醒精神恍惚

蓋心藏神驚則傷神腎藏志恐則傷志小兒神志怯

弱有所驚恐則神志失守而成癇矣如書傳所謂請

信寄名僧為摩頂誦呪鬼彼赫而成癇後見穿皂衣

人即發是也亦有驚以成癇者初起即可治定志丸

主之父母怠忽以而不治遂成終身之患



一小兒驚後成癩予制一方天水散一料碾為細末分作三劑二兩三錢八真青黛五錢張勺名清魂散寅卯時煎竹葉湯調服一錢以平肝火一劑二兩三錢入朱砂水飛五錢名安神散巳午時煎燈草湯調服以鎮其神一劑二兩三錢八真輕粉二錢研勺名定魂散申酉時煎淡姜湯服以去其痰旬日而安一小兒十歲久得癩疾予視而自渾白無有晴光語言蹇澁舉動癡迷乃語其父曰不可治矣後請醫治之竟無成功

驚久成癩乃痰迷心竅之病最為難治或分五癩以幼科發揮卷之上

牛馬狗猪羊各之者未見其方不必拘也錢氏五癩丸祖訓未用予亦不敢輕用也見有者當先觀其狀貌而後治之可也如伶俐聰明者可治之若成癡呆言語錯亂不必治之如強治之終無成功間有聰明伶俐治之無効非真癩也此宜琥珀抱龍丸主之或辛香者不如抱龍丸猶穩  
蘇水周維峯有子病癩予見神氣昏滯語言含糊狀類癡呆告其父曰不能治也辭歸  
黃州府萬魯齋有子病癩予見容貌俊偉性格聰明告其父曰可治乃與琥珀抱龍丸方使自製服之

本縣汪前川兒驚病一月之間嘗發二三次予曰不治必成癩也求治于予乃立一方用枳實黃連半夏白茯苓各等分 拆半朱砂飛又拆半同前碾末神曲糊丸艾實大朱砂衣每服一九用獾猪心一個川開入藥在內綫紮定放瓦罐中煮熟取出猪心和藥食之以湯送下後竟不發名曰斷癩丸

心所生病 經曰諸痛痒瘡疾皆屬心火

發揮云心火者君火也君務德而不為毒為痒痛瘡瘍者乃命門相火之所為也小兒諸瘡皆胎毒也命門者右腎也雖云男子以藏精女以繫胞父母命門

幼科發揮卷之上

之中原有伏火胚胎之始兒則受之既生之後其火必發為癰疽丹疹疥癬一切惡瘡名曰胎毒者是也古云立法于兒初生之時有拭口法有黃連并草末密法無非以解毒而設也後人因之合上三法取臍帶合藥名曰育嬰延齡解毒丹方備載在前戶痰條東垣之治紅絲癰丹溪之治小便淋皆有解毒之法見格致餘論請博求  
予立一方以丹溪三補丸半生用半酒炒并草半生半灸各并分為末雪水丸麻子大朱砂雄黃各二分之一水飛為衣淡豆豉湯下初生二臘內服之良天



行痘疹之歲猶宜服之

小兒初生有育嬰廷齡解毒丹服之能解其胎毒其有發瘡瘍者有迦源解毒湯乳母服之

丹痛此胎毒之最酷者即紅絲瘤也名龍纏火帶也

乃小兒之惡疾二歲以上兒可治半周歲者難治百

無一二也發處腫硬一塊其色甚赤手不可近如火

炙流舄往下翹走自頭上起至心即死自足下起至

腎即死古方治法無可取者唯家傳蟻針法破法出

其惡氣以泄其火毒十治六七誠良法也經云血食

者決之是也切不可用寒涼之藥傳之使火毒鬱而

不得泄入腹為脹脹為喘為驚狂為搐搦者

必死宜用通聖散全料剉細入酒中浸濕晒乾炒碾

為極細末蜜水調服外以通聖散加金銀花藤葉煎

湯浴之此水漬法亦火鬱則發之也先發驚後發丹

者可治通聖散主之或用道赤散加連喬玄參防風

荆芥薄荷青丸先發丹後發驚者不治

疥癬乾者可治胡麻丸主之若浸淫潰爛內無完膚

日夜啼哭者不可治切不可用砒硫粉永為藥搽之

使毒氣乘虛入腹發搐發喘者皆死

苦參

耳菊

大力子

石菖蒲

胡麻仁炒

何首烏 藏靈仙 蔓荊子 烏梢蛇

去皮骨取肉焙乾各等分一本有蒺藜炒

黃連炒 無蛇 右為末酒為丸麻子大竹葉

湯下 此祖傳十三方也

治小兒瘡疥宜調乳母迦源解毒湯主之

人參 歸身 赤芍藥 川芎

黃連酒炒 連喬 木通 生地黃

陳皮 甘草 水煎服以少許服兒佳

本有竹瀝

小兒生下遍身虫疥乾痒喜人摩拍予制一方用烏

蛇酒浸焙乾取肉一錢若參酒浸焙乾二錢胡麻仁

炒白蒺藜炒去 各一錢五分共為末用浸蛇與苦

參酒糊為丸甘草湯下愈

一兒五歲每至春時則遍身生膿泡瘡此胎毒子成

用搽藥恐粉砒硫之毒乘虛入腹以胡麻服之而愈

更灸風池血池曲池三里自此再不發矣

兒瘡入腹腹脹大小便不通或喘或作搐者先用雄

黃解毒丸治之

雄冠雄黃飛二錢 真鬱金 莊大黃

錢 巴豆霜一錢一木無大黃



右共碾勻水糊丸小豆大每服一二丸不清下比  
續傳十三方也

黃州李四守生子五個月遍身濕疥一旦盡乾召全  
問之全曰瘡出驚止無憂也連更數醫不能治

小兒生癰毒者不可輕針恐傷筋骨慎之

一子滿月後血盆中發一癰請外科胡長官針之斷  
其骨竟不可救

小兒頭下或耳前後有結核者此熱也切不可作瘰  
癧治之內服蟹螯外施針火及爛藥必殺兒也戒之

予家傳消結神應丸乃新立真神方也 黃芩酒  
幼科發揮卷之上

黃連炒 山梔仁 生貝母 海昆布酒先

海藻洗 桔梗 麥蘗炒各一錢五分

紫背天葵 玄參 連喬 瞿麥各二錢

薄荷葉一錢五分 右共為末酒煮稀糊丸芡實

大每服一九酒下

斲水朱蠟三子結喉上生一核如李問予求治予謂

病原式云結核者熱也又攻本草消結喉之藥立一

方與之遂買藥製成藥未溫湯調服効病此者服之

無不應驗乃名之曰神應丹

國風師碧泉致仕在家唯一公子項下生一結核感

于醫作瘰治用藥破爛轉加腫大此任脉所過之路  
元氣受傷致成疔瘰醫無識其證者及請予往勢不  
可為矣

王思泉一女四歲耳後側有結核問予予曰此瘰瘡  
乃痰核也不必治亦不為害他醫所惑作瘰治之用

蟹螯內消之藥過多脾胃受傷致成疔瘰而死哀哉  
馬刀多生于耳後前腫硬赤痛俗名疔腮用散毒散

救之神効

主方用生菜豆碾為細末醋調如膏敷之再換神  
効 又方治結核用五倍子研為細末醋調服之皆

幼科發揮卷之上 李 敷文堂

効此皆家傳之方也

肥瘡農血推積久不愈用熟皮蜜上煙膠松香共研  
清油調搽如蟲多不絕用水銀鉛製入鍾內指搽唾

調搽上蟲盡斃矣

軟癩不愈只用紫金丹水磨搽之膿盡乾而自効也  
又苦參研末敷之

耳前後或鼻下或眉間生瘡赤爛用蘆甘石海螵蛸

研末八輕粉三之一和均敷之

脚背上生瘡痒痛不常久不愈俗呼牛頭癩用雞子

黃熬油搽之



此心脾二經有熱也用蘇連散搽之  
生黃連 生地黄 白楓柳 研細末

口舌生瘡乳食不得者宜洗心散服之

大黃 麻黃 白朮 當歸  
芍藥 荆芥穗 甘草 薄荷葉

右剉水煎服更用栢連散搽之

滿口生白雲瘡又各鵝口瘡先翁用珠砂白凡礬末  
口舌劫又用穩公一隻以糯米於口中喂食盡取水  
洗之

幼科發揮卷之上 至 敷文堂

一兒患口舌生瘡醫用藥服之搽之者皆岑連知藥  
類無効予曰心熱所為苦八心而反助其熱宜無効  
乃作洗心散與之一服而安

予外甥李中庵子也滿口生瘡咽喉唇舌皆是令人  
取藥予製一方用藥連一錢朱砂白凡五分鳳婦焙  
乾三分共為細散之立効乃奇方也

見有重舌重靨者宜用三稜針刺去血內服東垣赤  
痛散凡口內諸病唯針最捷

舒熱者心熱也涼赤散弄舌者脾熱也瀉黃散主之  
錢氏云心主驚心驚神鬼心氣陰時或聞大聲見異

物異人未言不動其神也謂之客忤

驚後其氣不散鬱而生痰痰生熱熱生風如此而發  
痛者陳氏所謂氣逆而作搐而發驚者是也此驚風  
二字所以不同

凡因驚而發搐者此心火旺而肝木乘之宜先止其  
驚煎赤散作湯吞下河間當歸龍薈此後安其神錢

氏安神丸主之有痰涎壅塞者先降其痰辰砂膏主  
之先止其搐後安其神

辰砂膏下痰甚妙 辰砂 礬砂  
馬牙 硃砂 錢玄明粉 二錢 全蝎 去毒 珠珀 一

幼科發揮卷之上 至 敷文堂

射香一字 右另為末和均用好油車紙包起自  
然成膏每用一粒許治諸驚薄荷湯調下 胎驚

乳汁和寒湯下 先翁治驚風至聖保命丹

方見肝部此但加蟬蛻一錢 便君子一錢五分  
英山縣大尹吳清溪子病驚風諸醫作風治之不効

急差人請予予往見尹曰非風也乃因驚得之風從  
肝治驚從心治不識病原如何有効乃取至聖保命

丹治之搗止矣次日邑中僚屬士夫皆來問之尹用  
名不虛傳果良醫也彼一見自有主意不似他人蕩



力留住數日厚待而歸  
心屬火惡熱心熱則煩多夜啼或日夜啼宜導赤散  
主之

本縣大尹張剛石公子生四月無乳取一民壯婦人  
乳之一夜大啼取醫耳大用治之吾所傳者呼為腹  
痛用理中湯不効又呼為傷食用益黃散又不効夜  
更啼哭急請予視之其語其故意欲我扶同其言也  
心本惡熱藥中又犯乾姜丁香如何不助火而益增  
其病也乃請公子看之尹曰夜啼四日矣全曰夜啼  
有四心煩一也尹曰傷食乎腹痛乎余曰腹痛則面  
幼科發揮卷之上 聖 敷本堂

多青傷食則面多眊白今面多赤心煩證的也大用  
趨出予用導赤散加麥冬燈心進一服次早往問之  
用自內出云昨夜到天明不止予嘆之彼喜其藥不  
中病也不知病退矣余入隙尹曰昨夜哭猶甚也予  
告之曰公子病安矣公子貴體微和四日夜未乳昨  
夜病退思乳乳母在外故知往夜之哭病哭也昨夜  
之哭飢哭也尹喜曰怪哉乳母來後再不復啼矣病  
果退也  
心熱有喜面合卧者有喜仰卧者宜導赤散三黃瀉  
心丸主之

見性執拗凡平日親愛之人玩弄之物不可失也失  
則心思思則傷脾昏睡不食求人不得則怒怒則傷  
肝啼哭不止此忤其心也謂客忤成病也平日未親  
愛之人未見之物不可使之見見則驚驚則傷心凡  
未見之人不可使之近迫近則恐恐則傷腎令兒成  
痲此皆客忤病也今之為父母者則稱所畏者以止  
之如長老止夜啼之故事為醫者因兒不服藥則持  
針以搏灸以迫之令兒生病

楚府典儀胡西序漱三溪翁之伯子也幼多疾托予  
調養至丁酉七月七夕周歲三溪談酒請予作乞巧  
幼科發揮卷之上 聖 敷本堂

會日沒後哭不止予視之無疾復即席初更哭尤甚  
母促再視果無疾曰無疾何以黃昏哭一更不止予  
思外候無證但見兒左右顧盼其當直之人如有所  
失者口不能言但啼哭此物哭也猛詢問其當直曰  
此兒今日所戲者是玉印子也已收拾矣急命取與  
之兒笑而哭止三溪曰如保赤子心誠求之善哉添  
酒惟醉而歸

諸汗  
汗者心之液也唯頭汗不必治小兒純陽之體頭者  
諸陽之會心屬火頭汗者炎上之象也故頭汗者乃



清陽發越之象不必治也

自汗者晝夜出不止此血氣俱熱榮衛虛也宜當歸

六黃湯主之其方以黃芪以補其衛當歸生地黃以

補其榮芩連蘗以瀉其氣血之火用浮小麥為引入

肺以瀉其皮毛之熱此治諸汗之神方也

盜汗者夢中自出醒則乾也其病在腎宜當歸六黃

湯加止汗散主之

錢氏止汗散 敗清翁燒存性碾末入煎藥內假物

象形之理也

本縣江蘭峯以子七歲頭面出汗如流用人參當歸

幼科發揮卷之上



五

敷文堂

二味同猶猪心煮湯服之安

諸熱 小兒病則有熱熱則生風不可不訂理也

肝熱者目中青手尋衣領及亂痰物瀉青丸當歸龍

蒼丸主之

有身熱口中氣熱濕風證者謂之風熱亦肝熱也宜

生犀散脫甲散主之

心熱者目中赤視其睡口中氣溫喜合面睡或仰睡

土寮咬牙宜瀉赤散黃連安神丸主之

有一向熱不已亦心熱也甚則發驚癇宜黃連安神

丸主之

如目中熱心虛也宜錢氏安神丸主之

脾熱者口中黃弄舌瀉黃散茵陳五苓散主之

有但溫而不熱亦謂之溫熱亦脾熱也宜人參白虎

湯主之

肺熱者目中混白手插眉目面鼻其枯渴木通散姓

有時開發熱過後却退次日依時發熱謂之潮熱此

亦肺熱也宜地骨皮散主之

腎熱者目無精光畏明脊骨重日中白精白多其顛

即解地黃丸主之

熱有表裏

幼科發揮卷之上



五

敷文堂

表熱者多因傷風寒之故喜人懷抱畏縮惡風寒不

欲露頭面而有慘色不渴清便自調者此熱在表也

宜發散惺惺散敗毒散升陽散火湯十神湯選用而

裏熱者喜露頂面而卧揚手擗足揭去衣被渴飲冷

水兒小不能言 吃乳不休者是也小便赤大便秘

此熱在裏也宜解利之涼驚丸三黃丸四順清涼飲

涼隔散錢氏抱龍丸牛黃涼膈丸黃芩湯選用而用之

有表裏俱熱者宜通聖散柴芩湯人參白虎湯選用

熱有虛實

虛熱者多在大病之後或溫熱兼潮熱或渴或不渴



大小便如常宜補之竹葉湯調元湯地骨皮散主之  
實熱者面赤腮燥鼻乾焦喜就冷或合面即或仰臥  
露出手足按去衣被大渴飲水大小便秘宜瀉之神  
膏九大金花丸大便秘不通者用膽草法

或同治熱以寒治寒以熱良工不能廢其繩墨也今  
治虛熱乃用溫藥者亦有說乎予曰說見內經實熱  
者邪火也可以水制可以實拆故以寒治熱者逆治  
法也虛熱者真火也水不能制寒水能拆唯甘溫之  
劑可以勝之故以溫治虛熱者從治法也逆之從之  
不離乎正

勿科發揮卷之上 五 敷文堂

按錢氏書中有潮熱發搐似驚者附會之說也蓋熱  
則生風諸熱不退皆能發搐不時潮熱也其以十二  
月分五歲者固是愚竊有疑焉人身之氣晝則行陽  
二十五度故晝則發搐夜則明了者此熱在氣分宜  
小柴胡湯合白虎湯主之夜則行陰二十五度故夜  
則發熱晝則明了者此熱在血分宜四物合桂枝湯  
主之如晝夜發熱者此氣血俱虛也宜如前去分表  
裏實治之如日晡潮熱乃胃中有宿食也宜下之  
小承氣湯三黃枳朮丸主之  
如傷風發熱傷飲食發熱憂蒸瘡疹發熱胎熱疥熱

各隨其類治之

生犀散 治風熱 地骨皮 赤芍藥

比柴胡 乾姜各一兩 甘草半兩 生犀角 錢

右為細末每服一二錢水一盞煎七分溫服

脫用散 治夾驚傷寒煩燥渴 柴胡

龍膽草 甘草炙 知母各三

白茯苓二錢五分 人參 川芎二錢

麻黃連根節二錢 熱甚加升麻葛根

右為細末每服一錢入連鬚葱白煎服

黃連安神丸 治心熱

勿科發揮卷之上 五 敷文堂

朱砂飛四錢黃連五錢 甘草五分

右為末餅丸黍米大每服一二十九燈草湯下

木通散 治心肺熱 生地黃 木通

別芥 地骨皮 桑白皮炒 甘草炙

桔梗各等分 右剉細入生薑水煎服

地骨皮散 治夜熱及潮熱虛熱病後餘熱

知母 柴胡 甘草炙 人參

地骨皮初拆 牛夏 赤茯苓各等分

右為末量人大小加減入生薑水煎

升陽散火湯 治諸熱在表者宜發散之乃火鬱則



發之也

升麻

荷根

獨活

羌活

人參

白赤芍

各五分防風五分

黃芩八分

甘草二分 甘草生二分 水煎

牛黃解毒丸

治上焦壅熱口乾咽痛燥煩延潮

馬牙硝

寒水石

石交各二兩 甘草一分

膽星三錢

柴石英

牛黃

腦子

射香 右為末煉蜜丸每一兩分二十四丸每一

丸薄荷湯化下

神芩丸

治一切諸熱實者服之虛者禁用

大黃

黃芩各二兩 牽牛頭末

滑石

幼科發揮卷之上

羌

散末

黃連

薄荷葉

川芎各半兩

右為末水丸隨大小加減溫水下

黃芩湯

治心肺蘊熱口瘡痛淋濁不利

澤瀉

枝子仁

黃芩

麥門冬

木通

生地黃

甘草各等分煎

右剉入生姜一片水煎

竹葉湯

治虛熱

竹葉

石膏

半夏

麥門冬

人參

甘草

粳米 右剉除梗米外先煎藥成去渣入米

煎米熟去米服

柴芩湯

小柴胡合五苓散

通聖散

大金花丸

敗毒散

涼膈散

河間涼膈散用硝黃東垣涼膈

散去硝黃加桔梗 四順清涼飲十神湯

茵陳五苓散五苓散加茵陳

一兒生下便有目赤口瘡之症自是頭常熱山根青

筋橫戔勿疾甚多予曰此胎熱也其治在肝小兒者

純陽之體頭者諸陽之會肝為乙木旺于春乃少陽

發生之氣經云春氣者病在頭故頭常熱也肝之色

青故青筋浮露也肝常有餘不治恐發驚風乃用瀉

青丸去大黃加黃芩為末煉蜜為丸服之自此頭涼

幼科發揮卷之上

辛

散末

青筋根沒亦少病矣

一兒發熱至日晡尤甚其醫作瘧治不効又作潮熱

治亦不効予曰此胃虛有宿食也謂瘧疾則寒熱有

發有止謂潮熱則發有時如水之潮過即退次日依

時復發此兒身嘗溫熱至申酉時則甚故知是宿食

發熱也彼曰有所據乎曰出仲景傷寒正理論陽明

病證云潮熱者實也宜下之以三化丸下之愈

一兒驚風時熱不退羣醫有議用小柴胡湯者有欲

用竹葉湯者有欲用涼驚丸者予曰大驚之後脾胃

已虛宜溫補之三藥寒涼不可服也乃作理中湯用



妙乾姜一劑熱除

已未冬十月本府三守張公子於初三日發熱初五日熱亦甚目上直視口多妄言衆醫作風治無効時代巡汪府所屬州縣官各舉其醫皆莫治吾縣大尹汪憲水公以全薦張公亟召之全往此二十七日也診其外證稟曰公子病勢將退但肺熱未除耳公曰何如全曰三閉黃潤兩自精明此病當愈惟正而戴陽喘氣上息此肺虛熱也公喜曰予正憂其氣喘汝謂無効當用何藥全曰小阿膠散衆醫厥而阻之公不曉竟服一劑其夕喘止熱退始求微食二十八日幼科發揮卷之上

空 敷文堂

早公謂衆醫曰汝等作風治誤矣昨聽汝等之言則無此効早請汝來此兒不受苦也衆慙而退二十九日賜金馳驛而歸

脾經主病

脾主困實則日晡身熱飲水 虛則吐瀉生風

實則瀉黃散三黃九瀉之 虛則益黃散異功散

小建中湯調元湯肥兒丸補之

瀉黃散 治脾熱弄舌 藿香葉七錢山枝仁兩

石膏半兩 防風四兩 右剉蜜酒炒微香煨為

末水煎服

益黃散 治脾胃虛冷 陳皮一兩 青皮

訶子 甘草炙 丁香二錢

右為末水煎服量兒大小加減

治脾胃寒濕太甚神品之藥也以補脾胃之虛誤矣病非嘔吐瀉痢清白不可服也東垣云丁香辛熱助火火旺土愈虛矣青橘皮瀉肝丁香大瀉肺與大腸脾胃實常瀉子今脾胃虛更瀉子而助火重虛其土殺人無疑故以異功散代之

錢氏異功散 溫中抑氣 治吐瀉不思食及脾胃

虛冷痛 人參 白茯苓 白朮

幼科發揮卷之上 空 敷文堂

甘草炙 陳皮各等分 右為末每服錢半至

一錢水煎服即四君子加陳皮

調元湯 補脾胃扶元氣之聖方益脾土瀉火和補

元氣之要藥

黃芪 蜜炙 人參 各半分 炙甘草 水煎服無時

小建中湯 治脾胃中氣虛損 加黃芪名 中湯

白芍藥酒炒炙甘草各等分 肉桂 成半

右剉末水煎成劑去渣滓入白湯一匙再煎一沸

溫服

肥兒丸 小兒脾胃素弱食少而瘦或氣強壯偶因



傷食或因人病後瘦此家傳秘方 人參

白朮 白茯苓 山藥蒸 蓮肉

當歸身酒洗各五錢 陳皮二錢 青皮

木香 砂仁 史君子 神曲各三

炙甘草 桔梗 麥藥各二錢右為末荷

葉浸水煮粳米粉糊丸麻子大每服十五丸二十

五丸三十五丸四十五丸至五十九丸米飲送下

煎送

諸因睡不嗜食吐瀉皆脾臟之本病也昏腫身熱宜

胃苓丸琥珀抱龍丸主之吐瀉有冷有熱冷者不渴

幼科發揮卷之五

理中丸主之熱者渴飲冷水五苓散調天水散主之

煎見肝證初傷風吐瀉惡風發熱煩急煩悶此宜發

散惺惺散主之如先吐瀉後發慢驚風者不治

五苓散 能分陰陽止吐瀉利小便定驚悸

猪苓 澤瀉 白朮 赤茯苓

桂枝半 右剉或為末水煎加珠砂五苓散 加

茵陳名茵陳五苓散

天水散一名六一散一名益元散除熱止渴化痰癆

利小便 滑石 甘草各一兩

右末碾均水調服

惺惺散 治傷寒時氣風熱痰涎咳嗽 四君子加

桔梗 細辛 瓜蒌根 防風各半

右為末小者每服一錢大 者二錢入薄荷葉五片

水煎至七分溫服到亦可

煎見心證發熱昏睡妄中驚悸宜東垣安神丸王之

渴飲水辰砂五苓散

煎見肺證發熱昏睡氣促而喘者宜葶藶丸主之

葶藶丸 治傷食衝脾傷風喘嗽痰涎喘促者

甜葶藶 去皮葶藶 黑牽牛 炒取頭末

防已 杏仁去皮尖 研為青膏分石研和均

幼科發揮卷之五

取膠枣肉去皮炸爛入棗丹梓丸麻子大每服五

丸至七丸淡姜湯食後臨卧送下量兒強弱加減

予今家傳去黑牽牛加蘿蔔子真蘇子炒入七炒

煎見腎證羸瘦腹弱背卧不能起者宜脾腎煎補

腎宜地黃丸補脾宜養脾丸如瀉以便膿血者死

補脾丸 此家傳補脾之聖方小兒脾常不 足者宜

人參 白朮 茯苓 粉草

白芍 酒炒 黃芪 炙 陳皮 當歸身

山藥 蓮肉 各一兩 神曲 王錢 肉桂 五分

右為末荷葉水煮粳米粉糊丸麻子大每服五



一 女者卧發熱頂軟頭傾倒不能舉諸醫作風治而持疑不決予至見之謂諸醫曰此陽虛病也蓋頭者諸陽之首胃者諸陽之會此女必乳食虧胃胃氣不足故清陽不升而項軟不能任元也可服調元湯一劑而安人皆嘆服

脾所生病 經云諸濕腫滿皆屬脾土

新刊萬氏秘傳幼科發揮卷之下

羅田密齋萬 全編著

腫

腫有二經云面腫曰風足腫曰水凡腫自土起者皆因於風治在肺宜發散之所謂開鬼門者是也鬼門汗孔也參蘇飲合五皮湯主之

腫自下起者因於腎虛宜滲利之所謂潔淨府是利其小便也故仲景云治濕不利小便非其治也宜五

幼科發揮卷之下

散東堂

苓散加防已栝榔主之 有一身盡腫者宜胃苓五皮湯主之經鬱則折之謂上下分消以去其濕發汗利小便此方是小兒者胃

苓丸煎五皮湯送下 胃苓丸 此予家傳十三方也

蒼朮 厚朴 陳皮 猪苓

澤瀉 白朮 茯苓 各一兩 苧草

官桂 草菓仁各三錢 為末水麪丸麻子大米

飲下此小兒常用之藥隨病換引

先翁治小兒腫只用胃苓丸正方順叔長流水入燈



心煎湯送下每日午時用五加皮煎湯抱兒於房內無風去浴之浴罷上床睡令一覺以薄被蓋之得微汗佳如是腫消而止未有不効者

五皮湯  
桑白皮 陳皮 生姜皮 茯苓皮

大腹皮 水煎

經紀萬邦瑞女二十七歲病腫甚異寅後午前上半身腫午後丑前下半身腫上下盡消惟此戶腫小便難諸醫不能治請予治之予曰經云身半以上天之陽也宜發其汗使清陽出上竅也身半以下地之陰

切科發揮卷之下 二 救女堂

也宜利小便使濁陰出下竅也正上下分消以去其濕之法唯半夜陰戶腫不得小便此又當從肝經求之恭厥陰肝經之脈丑時起於足上環陰器又肝病者則大小便難用胃苓五皮湯發汗利小便也內有茯苓所以伐腎肝之邪木得柱而枯又以辛散其肝經之水以溫腎之真寒濕也連服十一劑而腫盡消去矣

予奉先翁之教凡腫微者只用胃苓丸本方治之如面腫甚者胃苓丸本方內加紫蘇葉二錢苦葶藶一錢隔紙炒以去肺經之風足腫甚者本方內加漢防

已二錢牽牛炒取頭末一錢共為丸燈心煎湯下清有一二人不守先訓專用葶藶牽牛為治腫之藥隨消隨腫殺兒甚多累吾之德雖禁之不能阻也

湖廣右布政使孫 隆慶丁卯入場監試為書經禮記總裁有小姐病留余司中調理小姐誤食菱角傷脾面腫而喘夫人憂之命余進藥余立一方用錢氏異攻散加藿香葉以去脾經之濕紫蘇葉以去肺經之風一劑而安場罷後公出見其方謂全曰此方甚好取筆札令舍人孫環書記之

小兒病嗽病瘡病瘡後腫者皆虛腫也

切科發揮卷之下 三 救女堂

如受風雨水濕之氣而腫者實腫也通用胃苓丸主之此家傳之法也

小兒諸腫不問虛實並用胃苓丸五皮湯主之此家傳也

如因喘嗽面月浮腫者宜消腫葶藶丸主之

如癰後遍身浮腫者此因癰發之後外中風邪內傷冷水得之宜胃苓丸用長流水順取入燈心煎湯送

下更如日午浴之法如前

如無他病浮腫者視其腫起之處治之如自面起上半身先腫者此風腫也宜五皮湯加紫蘇葉防風主



之如從足起下半身先腫者此濕腫也宜五苓散防已木通主之

如腫久不消氣實能食者宜利其水商陸胃苓丸主之

腎者水之根濕則傷腎小兒久坐濕地者多此疾

如氣弱食少者只以補脾為主脾屬土土能勝水脾

強則水去而腫消矣宜參苓平胃散加藿香葉紫蘇

葉木香砂仁為丸服之

有腎虛者安腎丸服之

有面目俱黃遍身俱黃且腫者此黃腫也宜胃苓丸

幼科發源卷之下

加茵陳服之

如黃而不腫者此痘證也觀其色之明黯如黃而色

鮮明小便色黃且澀者此熱也宜三黃金花丸主之

如黃色昏黯小便不利者此濕也宜茵陳五苓散主

之

安腎丸 大腫不消腎虛不納也

川烏炮去皮 桂心 各一兩 白茯苓 白朮

石斛酒炒 白茯苓剉去 已戟天 茯苓酒洗

故紙炒 桃仁去皮尖 葶藶各三兩

右為末煉蜜為丸每服一丸鹽湯下

胃苓五皮湯 治腫要藥 平胃 五苓方見

右到取長流水燈心煎服

商陸胃苓丸 病腫氣壯能食者宜此治之謂商陸

葶藶淨府也

石共為末水煮麩丸麻子大每服五十九至三十

丸止大便後快又服衰其半而止

一兒瘡後腫用胃苓丸長流水煎燈心湯下又用浴

法調理二十日而安

一兒病腫有庸醫假專門之名不守家傳之法嘗稱

得異人之術用牽牛葶藶為治腫方之神藥作散服

幼科發源卷之下

之元氣下陷肚大坐不得臥陰囊腫大莖長而卷于

見之嘆曰脾土已敗肝木獨旺乃賊邪也不可治矣

果死

一兒病腫腹大彼自庸醫妄談五日消一分乃取繩

子圍其腹量之按以牽牛葶藶服之利下數行腫減

十分之三父母甚喜約至五日再消三分未三日又

大腫較大如前庸醫聞之走去病勢益甚而死

一義子十五歲病痘面目俱黃予問之對曰傷食起

腹中大熱又痛乃立一方用黃蘗枝子等大黃減半

以退其熱烙苓澤瀉茯苓蒼朮等分以去其濕枳實



厚朴神麩以去其食積茵陳蒿倍用以去其黃共為  
細末酒糊丸車前子煎湯下三日後吐去黃水一碗  
許胃中不熱又二日泄三行腹中不痛十日以後小  
便漸清黃亦減矣 此一良方在重刊

脹病

脹病有二屬虛者多實者少東垣錢氏等從虛治內  
經云太陽從濕謂寒濕也作熱治者誤矣當以脈證  
辨之實脹者或因食積或因癖塊先有物在胃腸中  
而後脹形於外也按之則堅宜消導以去之不可攻  
之攻之愈虛不可治矣宜胃苓九主之

幼科發揮卷之下

脹病

六

救女堂

虛脹者或因吐瀉瘧痢之後脾胃以傷而病此虛氣  
在於膜育之外其外雖脹其中無物按之則濡扣之  
春聲不可外攻攻之即死宜用溫補錢氏加減異攻  
散作丸服之

人參 白朮 甘草 各一 陳皮  
青皮 枳實 厚朴 半夏曲  
黃連 薑汁 木香 丁香 藿香葉  
右共為末神曲糊丸麻子大炒陳米湯下因於熱  
者必口乾飲水神識不清無時謔安宜三黃丸河  
間涼膈散仍作膽導法

河間涼膈散

連喬 一分 黃芩 二分 薄荷葉 二分 核子 仁 三分  
牛草 大黃 朴硝 各五分  
右用水一鐘竹葉五片煎臨熟入蜜一匙去渣溫  
服

因於宿食者必惡食吞酸腹中時痛宜三黃枳朮丸  
方見後木香檳榔丸主之  
因於積者腹中陣痛丁香脾積丸主之  
小兒腹脹與大人不同多曰傷食得之宜胃苓丸合  
冊溪保和丸主之

幼科發揮卷之下

脹病

七

救女堂

如果傷食腹脹或痛吞酸惡食大便不利者宜木香  
承氣丸主之  
枳實 厚朴 薑汁 檳榔 等分 木香 減半  
大黃 酒浸分兩同上三味  
右為末酒糊丸麻子大白湯下  
木香檳榔丸 治傷一切熱積兼治痢疾腹痛  
木香 檳榔 青皮 去白 陳皮 去白  
莖朮 煨 黃連 黃蘗 香附子  
枳壳 煨 各 將軍 黑丑 加二倍 婦人加當  
歸 兩 半 一方有黃芩三枚 分兩不同



右為末水杵為丸麻子大姜湯下  
加減弱氣湯 治腹脹

車發

砂仁

青皮

陳皮

丁香

全蝎

萊服子 炒各等分

右為末神曲糊丸麻子大厚朴湯送下

予外甥女有食積脾虛病出痘後又傷食腹脹不喜  
食予用胃苓丸方加枳實炒神麩麥蘗青皮作丸服  
之

予孫邦子也先病瘡傷食成疳又傷食甚瘦腹脹大  
而堅見人則哭予立一方用人參白朮白茯苓甘草

幼科發揮卷之下

服病

數表

半夏曲 枳實炒厚朴 黃連 木香 莪朮 砂仁 使君子 神

曲 麥芽 蘗甲 夜明砂 當歸 川芎 等藥

一小兒瀉後腹脹予用加減塌氣丸服之愈

一小兒瘕久不退腹大而堅予用化癖丸服之愈

一小兒五歲腹大善食予見之謂其父母曰乳多必  
損胃食壅即傷脾今即腹大如是又不知節縱其口

腹吾恐腸胃乃傷不成腸癖必成疳也後果成疳肚

大青疳予治以集聖丸調理而愈

一兒善食腹大予用保和丸胃苓丸二方服之調理

而愈

一兒因傷食腹痛脹醫用萊下之愈又傷食腹脹醫  
再下之予聞之曰非其治也誤殺此兒果半年而死  
或問何料神也曰有食飽傷胃而脹法宜消導之不  
可攻下也有脾虛不能消食食飽則脹者此宜補脾  
以助其傳化之可也豈可下乎此兒初脹食飽傷脾  
也不行消導乃下之誤矣後又腹脹則脾虛之病也  
再三下之不大誤乎屢下屢脹故令即腹大無紋臍  
突皆平而死雖醫之誤不聽吾言父母之過也  
腹中有癖瘕後多有之兒有癖者常作寒熱似瘧不  
可作瘧治也癖去則寒熱自止家傳消癖丸甚効

幼科發揮卷之下

服病

九

數表

人參

陳皮

三稜

莪朮

木香

黃連

砂仁

蘗甲

枳實

夜明砂

使君子

乾蟾

半夏曲

麥芽

海昆布

右為末酒糊丸麻子大米飲下

先翁治癖只用香礬丸 此家傳十三方也

木香

人參

黃芪

當歸

桔梗

三稜

莪朮

蘗甲

綠礬

枳實

使君子

練根皮

訶子

乾蟾

黃連

一兩



右為末丸如綠豆大每服三四十丸水飲下

腹痛 有蟲 有積

蟲痛發作無時隨痛隨止發則面色眊白口吐涎沫

腹中痛作疔吞脉洪大目直視似癩宜下之用木香

檳榔丸苦練根白皮煎湯送下 先翁用雄黃解毒

丸下之小兒體弱者不可下也用安蟲丸以斬去之

莪術 醋煨 木香 黃連 青皮

使君子 白蕪荑仁 白雷丸

苦練根皮 紅者可用赤者有券各等分

右為末醋麩丸麻子大白湯下

家訓云九欲取蟲須於每月上弦前取之虫頭向上

若望後頭向下不可取也

王小亭子善食嘗苦虫痛予用安神丸服之三日後

取下一蟲甚異約長一尺身赤色大如鱗令人手持

其兩頭牽之長二三尺形如小綫放下依舊短縮此

虫母也

胡泮西弟蚤卒遺子乃泮西夫人養之嘗苦腹中蟲

痛請先翁治之再三不効復請予治之予問先翁曾

用何藥翁曰雄黃解毒丸予問翁再有別方否翁曰

以此一方用之屢効予告翁云此蟲有靈當設法取

之擇定除破日在每月初旬取之勿令兒知也臨夜

煎下苦練根湯次日五更與其伯母議用清油煎鷄

子餅一個先食之後服藥故不與食兒聞其香味急

欲食之腹中如有物湧土心口取藥與服之少頃心

口之物墜下以蛋食之不食也已時腹中大鳴而瀉

下一蟲甚異約小指長有頭有手足狀如嬰兒予見

之驚曰此云傳癆虫也泮西云彼父癆死母亦癆死

今此兒正三傳也幸去之矣令一婢用鐵鉗夾之河

中以火焚之有烟撲入婢口中其婢亦病癆死此男

無恙至今誦之翁曰汝用何藥如此効余曰雄黃餅

毒丸恐人知之故秘之也

木縣戶房吏閻姓者麻城人也子有蟲痛黃瘦腹中

時痛口饑如有肉食則痛不發一日無肉則痛發也

請先翁治之翁命予往見其子甚弱不敢下乃思一

計只用苦練根皮放肉汁中煮食之單服三日下蟲

如喇斗者一盆色黃黑後以養脾丸調理而安閻厚

謝先翁謂先所曰吾有子矣往吾教他讀書醫出於

儒先母聞之喜

一兒七歲善食肉嘗病腹痛其父問曰積痛虫痛何

如予曰積痛發有當處手不可按惡食而口乾虫痛



無嘗處喜手按摩口飲而吐清水此兒乃蟲痛也以  
藥取之下蟲大者十餘條而痛止未一月又痛予曰  
不可再取矣如不去其蟲則痛不除積不除則蟲不  
生苟再取之恐傷胃氣不可也乃立一方用黃連木  
香檳榔去積為主陳皮青皮三稜莪朮枳實山查專  
去其積使君子白蕪荑川練子苦練根皮專去其虫  
等分為末神曲糊丸麻子大米飲下常服之時下小  
虫及下大便如指大約長一尺乃虫母也自後痛漸  
減

或問人腹中皆有蛇虫何兒之虫獨多也予曰小兒  
幼科發揮卷之下 主 敷衣堂

食傷成積積化為虫嘗觀草腐而化螢木腐而生蠹  
人脾虛而虫葉其理一也或又問虫之狀有不同者  
何也曰各從其臟變化也如心屬火化為羽虫肝屬  
木化為毛虫肺屬金化為介虫腎屬水化為鱗虫脾  
屬土化為保虫故蛇虫保虫出於脾為土化也

積痛

小兒腹痛為食積者多食積之痛屬寒者多蓋天地  
之化熱則發散而流通寒則翕聚而壅窒飲食下咽  
之後腸胃之陽不能行其變化轉輸之令使穀肉菓  
米之物留滯腸胃之中故隨其所在之處而作痛也

如在胃中猶是完物在當心而痛宜吐之所謂高者  
越之也瓜蒂散主之

其在小腸中雖變化猶是糟粕其痛在心之下臍之  
上宜辛溫之藥利下之宜丁香脾積丸主之

一兒周歲食肉太早自此成積日漸羸瘦不思乳食  
其父沙溪告予請醫治之予取養脾去積丸先服三  
日後用脾積丸鷄肉湯下取下鷄肉一片猶未化也  
再服養脾丸調理而愈

其在大腸者水穀已分傳送廣腸為疾也其痛在臍  
之下宜苦寒之藥下之木香檳榔丸主之

幼科發揮卷之下 主 敷衣堂  
如可吐者不如吐湯探吐之法猶妙如飲食之後梗  
有胃口痛者此宜吐之如因舊日之積作痛者不可  
吐之恐傷胃氣宜小陷胸丸主之

枳實大炒二錢 半夏 黃連姜汁炒 草薢冠炒  
分

右為未神曲糊丸麻子大米湯下

王小亭一日胃腕當心而痛請予治之七日不止予  
以手摸其胸腹問在何處惟心之下手不可近予曰  
吾差矣何怪其藥之不効也凡腹手可按者虛痛也  
手不可按者實痛也實痛非疾則痰故手不可按也



乃立一方以枳實導滯九控涎丹二方內揮取枳實黃連半夏冬二錢木香黑牽牛頭末白芥子炒甘草等分搗羅為末用生姜自然汁和神曲作丸麻十大以沈香木香煑柳磨水下或姜湯亦可初服二十一丸少頃痛移下中腕又服七丸至臍下又服五丸利下清水而止乃知是腕痛也復作枳朮丸加青皮陳皮木香砂仁神曲麥芽山查調理而安治痛者其可忽諸

凡腹中積痛者只在腸胃之中蓋腸胃為市物之聚也脾主腐化而無所受故也非客所犯必不為痛如

幼科發揮卷之下

有脾痛者宜祖傳三聖散主之

蒼朮 鹽炒 香附子 鹽炒 良姜 清油炒

吐瀉

石為細末熟酒調下  
吐瀉 吐出上焦瀉出下焦乃腸胃之病也脾在中焦管攝乎上下之間吐瀉互作者乃脾之病也夫人身之中足陽明脾脈之氣自上而下足太陰脾採之氣自下而上上下循環陰陽交接謂之順而無病也故胃氣逆而為上則為嘔吐脾氣逆而為下則為泄瀉吐瀉之病脾胃為之總司也

發揮云胃在上焦主內而不出嘔吐則不納矣腸在下焦主出而不入有經泄瀉出則無經矣觀朱無謔傷寒括云胃家有熱難留食胃冷無緣納水漿則吐瀉之出於上焦也明矣又張長沙傷寒論云下利服理中不止理中者理中氣也治泄不利小便非其治也五苓散主之不止者在下焦赤石脂禹餘糧湯主之則泄瀉出於下焦也明矣

赤石脂一斤 禹餘糧一斤 水陸升煮取貳升去渣分三服

又按治泄利者有四法焉有用理中湯以治其理氣

幼科發揮卷之下

五

歲

者有用五苓散以利其小便者有用真武湯以溫其腎者有用赤石脂禹餘糧以固澁其大腸者不可不知其要也蓋腎開竅於二陰主蟄藏者也如門戶然泄瀉不止門戶不要也故以姜附以溫之閉其門戶也腸胃者容受水穀之氣猶倉廩然脾司出納乃倉廩之官也吐瀉之不止乃倉廩之不藏官之失其職也故用參朮以補之封其倉廩也下焦者水穀注下之路如溝瀆然小便不利者溝瀆之不能別也故用諸苓澤瀉以利之疏通其水瀆也大便不禁溝瀆之不能瀉也故用赤石脂龍骨以澁之塞其決也



扶杖 芍藥 主姜 各一兩 附子 一枚 白朮 二兩

右用水八升煮取三升溫服七合三日

祖訓治吐瀉者只用胃苓丸吐以煖生薑湯 世以

一粒丹和之炒米湯下

一粒丹 亦名白王丹 此家傳十三方也

寒水石 兩 白凡 枯 一兩 為末水糊丸小豆大每

丸米湯下

錢氏曰脾主困謂疲憊也非嗜臥也吐瀉久則生風 飲食傷則成疴易至疲憊也此與腎主虛同

幼科發揮卷之下 未 教文堂

論腎者元氣之主腎虛則為稟賦不足之病脾者氣

穀之主脾虛則為津液不足之病故小兒五臟之病

脾腎最多肝心次之肺又次之

小兒吐瀉多因傷乳食得之

如吐瀉時不啼哭不喜飲食此傷乳食也初得之不

可遽止宿食未盡去也宜換乳食勿令重傷吐瀉益

甚非醫之咎也益黃散主之

有熱者胃苓丸用東向陳壁土和乾姜少許炒焦入

水煎湯澄清吞下瀉不止以胃苓丸一粒丹合而服

之前湯下効

如吐瀉時不惡風寒喜人懷抱此傷風吐瀉也宜發 散惺惺散

如吐瀉時啼哭其身倦仰不安者必腹中有痛此霍

亂也內傷乳食外感風寒得之先治其裏宜理中湯

加藿香後治其表桂枝湯表裏通治一霍香正氣散

一兒周歲吐瀉並作時天太寒醫用理中胃苓丸服

之不効予曰此表裏有寒邪未得發散也取益黃散

與之其夜得大汗而止

一女歲半與前兒同症吐瀉此傷食也前有外感風

邪故用益黃散溫其表裏之寒此只是傷食用胃苓

丸一粒丹陳壁土湯下調其脾胃消其食積而吐瀉

俱止

一兒暴吐瀉上下所出皆乳不化用理中丸服之効

一兒暴吐瀉上下所吐皆黃水中有乳片用二陳湯

加黃連姜汁炒煎服効

或問二病同而治之異者何也曰所出之乳不化者

胃有寒也故以理中丸急溫之所出乳片不化者胃

有熱邪熱不殺熱宜半夏黃連以解之此同病異治

法也

嘔吐

幼科發揮卷之下 未 教文堂



一兒嘔吐多因乳食之傷得之非若大人有寒有熱也然因於寒者亦有之

嘔乳者初生小兒胃小而脆容乳不多為乳母者量

而與之勿令其太飽可也子之胃小而脆毋之乳多而急子縱飲之則胃不能容大嘔而出嘔有聲而

乳多出如瓶注水滿而溢也

懷抱扶持之也乳后太飽兒身不正必溢出二三口也如餅注水傾而出也

幼科發揮卷之下

太

教文堂

嘔乳者小兒無時乳常流出口角唇邊常見如餅之漏而水滲出也即吐露

嘔乳者節之可也。溢乳者正抱其身可也。皆不必治。嘔乳者胃病虛也。宜補之。理中湯丸加藿香木瓜主

之。

先翁治小兒嘔吐只用胃苓丸研碎以生姜煨熱煎湯調下即止

理中湯治嘔吐或有不吐者嘔家不喜甘故也必去甘草加藿香之辛木瓜之酸用之効

傷冷乳者所出清冷面皸白者是也宜益黃散煨生

姜煎湯調服

傷熱乳者物出熱而赤唇燥者是也宜六一散煨生

湯煎碎調服

傷乳食物出作酸酸氣者是也宜胃苓丸煨生

本縣儒學教官陶有一子生八月病吐諸醫治之不

止湯丸入口即吐請醫云食入即吐是有火也欲作

火治用瀉火藥又不効眾醫不能治其吐益劇即請

予至議治予曰理中湯師曰服此方不得入也予曰

用法不同時有生員蒸一山素與吾不曉在傍哄云

不必多言且看汝法何如也予曰汝亦不必多言明

早來問始見吾之能也此非試宏詞博學科何相忌

即作理中湯劑用積諸膽汁童便各半拌之炒焦以



問陰氣漸泄陽氣乃發此熱藥須冷服以主治格拒之寒必止嘔噦者是也

宋理宗嘔吐不止名醫楊吉老治之問用何方曰辛

熱藥如帝曰服之不效吉老奏曰熱藥冷服藥成放

井中良久澄冷進服一啜而吐止即此法也師聞而

喜之後以六君子湯作丸調之

王少宰次子三個月病吐請醫治之藥乳不納予見

其兒在乳母中以身伸弩上窠呢呢作聲有發驚之

意乃取理中湯丸末子一分用猪膽汁童便各半匙

調分三服初一次少停畧以乳喂一二口即止又進

幼科發揮卷之下 敷林堂

一次又乳之其兒睡一覺醒則嘔止不伸弩不呢呢

作聲夫予以是法教諸子止渴活人甚多乃良法也

英山鄭孔韶一女辛丑三月患嘔吐請予往視其證

乃傷食吐乳也家人云無乃用理中湯去耳草加丁

香薷香不效又作膽汁童便法亦不效四日後吐出

飯半碗予謂家人曰此女數日不食何有此完飯也

吾言傷食汝曰無勞吾心力不得見効遂取脾積

丸投之取下惡糞如靛詢之果五日前外翁王宅歸

比壞鴉子黃色愛也所吐出之飯即所食之飯也滯

塞腸胃格拒飲食所以作吐下之即愈

予思小兒嘔噦不止多是肝膽二經之病故仲景猪

膽人瀉白通方在厥陰病中

新製一方止嘔吐不止之病

吳茱萸 黃連 各等分

石用向東壁土一塊杵碎用藥放在銚中炒焦入

水煎一二沸澄清服之

凡治小兒嘔吐止後不可便與乳其吐復作非醫之

咎也吐後多渴禁與湯水須使忍一時渴自止也若

與湯水轉渴轉吐不可止也大人同

有吐坑者胃寒甚也宜理中丸用烏梅與椒煎湯調

幼科發揮卷之下 敷林堂

服神效

寒水石煨半夏煨五分 白枯礬五

右為末水糊為丸麻子大姜湯下此家傳十三方

也

因於寒者食久則吐其乳不化宜理中湯加藿香砂

仁至之 因於熱者食入則吐其乳成疝宜理中湯

加黃連竹茹至之 因於食積者吐出酸氣味惡

食宜養脾消積丸甚者丁香脾積丸至之吐止後胃

於丸至之 因於承者吐多清水腹痛多啼宜理中

湯如木香枳榔丸至之嘔吐藥食不得入者此胃中



有寒陰盛格陽也。宜理中湯入童便猪膽汁主之。  
 一兒初生即吐醫欲用錢氏木瓜丸予阻之曰不可  
 小兒初生胃氣甚微初飲乳或有乳多過飽而吐者  
 當令乳母緩緩與之或因浴時客寒犯胃而吐者當  
 取其乳汁一杯用姜葱同煎少與服之或因惡露涉  
 水停在腹中而吐者宜以炙甘草煎湯而吐去之如  
 何敢用木瓜丸以鐵粉兵即之劑重犯其胃中初生  
 中和之氣耶故常語人曰錢氏小兒方非先生親筆  
 乃門人附會說也。  
 一兒自滿月後常吐乳父母憂之諸醫不能止一日  
 幼科發揮卷之下  
 問予予曰嘔吐者非常有之病也今常吐乳非病也  
 然孩兒賴乳以生頻吐乳者非所宜也恐傷氣不可  
 不求其故有母氣壯乳多者唯恐兒飢縱兒飽足飽  
 則傷胃所食之乳湧而出此名溢乳如瓶之注水滿  
 而溢也宜損節之更服肥兒丸兒之初生筋骨軟弱  
 為乳母者當懷抱護持可也。不然則左右傾側其乳  
 流出此名碗乳如餅之側其水流出也。能緊護持則  
 不吐也。有胃弱者不能受乳而變化之無時吐出所  
 吐不多此名哺露如餅之湯不能容受也。當補其脾  
 胃助其變化可也。亦以肥兒丸主治。

新刊萬氏家傳幼科發揮 卷下

泄瀉 泄瀉有三寒熱積也  
 寒瀉者不渴宜理中丸主之  
 熱瀉者有渴宜五苓散調六一散主之  
 積瀉者面黃所下酸臭食也宜丁香脾積丸下之積  
 不去瀉不止也  
 三稜 煨 莪朮 煨 良姜 醋 青皮 去白 醋煮  
 各五分 丁香 去蒂三分 木香  
 石草霜 錢三 巴豆霜 五分 錢  
 右為末醋麵糊左麻子大隨人加減迴源湯送原  
 物亦可  
 幼科發揮卷之下  
 胡三溪子病瀉不止三溪自與耳大用同醫皆吾所  
 傳也不効其兄元溪云今有璞玉於此雖萬鏹必使  
 玉人雕琢之今子病何不請密齋爾與耳子能治之  
 乎時吾在英山此子原結拜我吾聞之即歸問其所  
 用之方皆不對觀其外候面色黃所下酸臭此積  
 瀉宜下之積去瀉斯止矣乃取丁香脾積丸一服而  
 如其父問云吾聞滋多成五瀉未聞明為積瀉也予  
 曰難經有云所為大瀉瀉者是也溫成五瀉者有內  
 因者有外因者有不內外因者如因於風者水谷不  
 分謂之飧泄因於熱者水谷果泄謂之洞泄因於寒



者水谷不化謂之滯瀉因於濕者水谷稠糲謂之瀉  
 瀉此四瀉者外因之病濕自外生者也因於積者膿  
 血交雜腸鳴腹痛所下腥臭謂之瘕瀉瘕者宿食積  
 滯之名乃食癥也此內因之病濕自内生者也有不  
 內外因者乃誤下之病有挾熱挾寒之分所謂腸垢  
 驚瀉者是也又問脾積丸乃取下之劑何以能止瀉  
 也曰胃者水穀之海腸者水穀流行之道路也瀉瀉  
 者腸胃之病也腸胃無邪則水穀變化便溺流行是  
 為無病兒矣今有宿食不化陳腐之物苑積於腸胃  
 之中變為泄痢如源泉之水停積於中流出於外苟  
 幼科發揮卷之下 下泄瀉 蘇文堂  
 不遇其源而出之則泄痢終不止也故以脾積丸去  
 其陳腐此按本塞源之法按本草云巴豆末泄能令  
 人泄已泄能令人止脾積丸之治積泄祖訓當遵守  
 也余教諸子治泄瀉始終三法 初用理中丸一服  
 不止次用五苓散一二服分秒 不止三用白朮散  
 服之良 又不止用參苓白朮散調理未有不效  
 再不止用參苓白朮散二分荳蔻一分  
 發揮云難經五瀉之論甚詳予論大腸瀉小腸瀉大  
 瘕瀉則易明予論脾瀉腎瀉則難分曉也且腑者府  
 也謂水穀所藏之府有所受則有所出臟者藏也乃

魂魄神志意所藏之舍無有所受豈有所出哉其脾  
 瀉者即胃瀉也謂脾不能約束其胃胃不能藏而瀉  
 也故瀉有屬脾者有屬腎者但自胃來者水穀注下  
 而多自脾來者則成黃糜瀉無度而少也觀仲景傷  
 寒論中大便不通者用脾約丸其易明矣腎亦臟也  
 謂之腎瀉者腎開竅於二陰為閉藏之至腎虛則不  
 能主閉藏而水穀自下且下焦如瀆有所受則有所  
 出也但瀉不同難經云其瀉下重者即腎瀉也觀東  
 垣先生脾胃論補中益氣湯方凡大便胷貢者加當  
 歸身紅花芩貢者即下重當歸紅花以潤血蓋腎惡  
 燥故用二物以潤之腎瀉亦與大瘕瀉同瀉者痢也  
 乃積滯之物故痢曰滯下况痢則腹痛有腸鳴有裏  
 急有赤白若腎瀉則便時畧准却無裏急后重之證  
 故云痢則下重也古人立方治腎瀉者有用破故紙  
 者補其腎也有用吳茱萸者補其肝也皆苦以堅之  
 辛以潤之之法今吾立方治脾瀉者只用參苓白朮  
 丸治腎瀉者只用六味地黃丸加破故紙甚効  
 胃瀉大腸泄小腸泄三者不同蓋自胃來者水穀注  
 下而不分所下者皆完谷也此從寒治理中丸主之  
 白小腸來者亦水穀注下而不分則成糟粕而非完

一第1010 冊 續修四庫全書 子部 醫家類 2 頁 4



穀且小腸為受氣之府水穀到此已變化而未盡變  
 化也治宜分別水穀以五苓散主之使水穀分利則  
 瀉止矣自大腸來者則變化盡而成屎但不結聚而  
 所下皆酸臭也宜用傷寒論中禹餘糧湯陳文中痘  
 疹方中肉苳菴丸主之此流可以去滑之法也  
 以初云濕多五瀉此本內經濕勝則濡瀉之論所謂  
 五瀉則與難經之論不同素問以臟腑分五瀉叔和  
 以風寒濕熱食分五瀉如泄時有發熱惡寒水穀不  
 分有此風濕證也謂穀泄經云春傷于風夏生飧泄  
 者是也宜小建中湯加防風主之若兼膿血者胃風  
 勿科發揮卷之下  
 湯主之如瀉時有腹痛或吐或不吐所瀉者多完穀  
 未化此寒濕證也宜理中湯主之如瀉時有腹痛或  
 痛或不痛所下亦有完穀而未盡化者此邪熱不殺  
 穀也有成糟粕者皆屬執濕以傷寒論中猪苓湯主  
 之寒濕熱濕宜詳辨之屬寒者不渴屬熱者渴也如  
 瀉時水穀混下小便少而大便多者此濕瀉也有漉  
 瀉無度者此久濕也並宜五苓散主之如瀉時有腹  
 痛腹鳴之證惡食所下酸臭之物此因宿食停滯於  
 中而成濕此食化為濕也宜下之積去泄自止也丁  
 香脾積丸主之

泄瀉二字亦當辨之泄者謂水穀之物泄出也瀉者  
 謂腸胃之氣下陷也  
 猪苓湯 猪苓 澤瀉 阿膠  
 滑石 茯苓 水煎  
 春月得之名傷風其證發熱而渴小便短少宜先清  
 熱後補脾清熱藜蘆湯補脾白朮散  
 夏至後得之瀉者有寒有熱渴欲飲水者熱瀉也先  
 服五苓散以清暑止渴後服白朮散以補脾  
 如不渴者寒瀉也先服理中丸以溫中補脾後服五  
 苓散以清暑此祖傳之妙也  
 勿科發揮卷之下  
 夏月水瀉其詳有在因五和之氣所生病條內有案  
 秋月得之傷濕瀉也其證體重所下溏糞謂之濡瀉  
 宜參濕補脾利小便胃苓湯主之或升麻除濕湯  
 冬月得之傷寒瀉也其證腹痛所下清水宜溫理中  
 丸或理中湯加熟附子少許主之不止宜薑菴丸  
 四時之中有積瀉者面黃善腫腹中時痛所下酸臭  
 者是也宜先去積后調脾胃去積丁香脾積丸調理  
 脾胃苓丸  
 治瀉大法不問寒熱先服理中丸理中者理中氣也  
 治濕不利小便非其治也五苓散主之更不止胃氣



下陷也。補中益氣湯清氣上升，則不瀉矣。又不止者，此滑瀉也。宜澁之。荳蔻丸主之。此祖傳之秘法也。兒泄瀉，依法治之不効者，脾胃已衰，不能轉運藥性，以施變化，只以補脾為主。脾胃既健，藥自効也。白朮散主之，常與無間。此予先父之秘受也。久瀉不止，津液消耗，脾胃倒敗，下之殺亡，必成慢驚。所謂脾虛則吐瀉，主風者是也。故應補脾胃於將衰之先，宜用白朮散補之。補之不効，宜用調元湯加建中湯急救。否則慢風已成，雖使仲陽復生，不可為也。詳見慢驚內。小兒泄瀉，大瀉不止者，勿與湯水飲之。

幼科發揮卷之下

水人則愈。加渴而病益甚，宜生脾胃之津液。白朮散主之。久瀉不止，發熱者，此津液不足，乃虛熱也。勿投以涼藥，反耗津液。宜白朮散主之。如熱更甚，黃連丸主之。白朮散治小兒泄瀉，煩渴者，四君子加朮香。藿香 各等分 芍藥 加一倍 名七味白朮散

右作大劑水煎常服，以代湯水。

黃連丸 治久瀉發熱，此虛熱也。

黃連 乾蟾 各二 木香 使君子 一

蘆薈 夜明砂 各七分

右為末，山藥研粉，水糊丸，麻子大，米水下。

升麻除濕湯 治風濕，依瀉自下而上者，引而竭之。加脾胃甚弱，不思飲食，腸鳴腹痛，泄瀉無度，小便赤澀，四肢困倦。升麻 柴胡 防風

神曲 澤瀉 猪苓 各五分 蒼朮 一

陳皮 甘草 炙 麥蘖 各三分

為末，水煎熱服。

玉露散 治傷熱瀉，黃蘗見與五苓散，令和勻，名桂苓甘露飲。治熱瀉，此予心得之妙。

一兒有病，一日夜三五行，或瀉或止，連年不愈。此脾瀉也。胃苓丸加人參主之。

幼科發揮卷之下

一兒無病時，值盛夏，醫以天水散與之，謂其能解暑毒也。服後暴瀉，醫悔用作理中湯，連進三劑，瀉變痢。疾日夜無度，膿血相雜，見益困頓，皮燥無汗，髮聚成穗。請予治之，予曰：挾熱而痢者，其腸必垢，瀉久不止，則成痺瀉。此兒初瀉本時行之病，非于天水散也。醫當用天水散調五苓散服之，可也。反以理中湯熱劑投之，遂成挾熱腸垢之病。皮燥髮穗者，表有熱甚也。下痢窘迫者，裏有熱甚也。表裏俱熱，津液亦衰，事急矣。因製一方用。

黃連 乾蟾 各一 木香 青皮



白茯苓

當歸身

訶子肉

各一分

共為末粟米粉作糊為丸每服三十九炒陳米湯下十日後滿頭出小瘡身上發癩如粟熟平痂止而愈噫此子非吾無生矣

一兒病瀉大渴不止醫以五苓散玉露散皆不効病益困腮疔唇紅予見之曰不可治也泄瀉大渴者水去較少津液不足故也法常用白朮散補其津液可也乃服五苓散玉露散滲利之劑靈亡津液脾胃轉虛訣云大渴不止止而不渴者死泄瀉不止精神好者死父母不信三日後發搐而死

幼科發揮卷之下

三

三

敷文堂

壬子經魁萬賓蘭石泉翁之伯子也翁得子晚始生賓蘭發如珠玉周歲得水瀉一日夜十餘行翁善醫自作理中湯訶子肉蓋慈與之不効乃急請予至叙其用藥不効予曰正理論云理中者理中氣也治泄不利小便非其治也遂用五苓散去桂加甘草一服瀉止三日後遍身發出赤斑石泉懼予曰無妨活人書云傷寒病下之太早熱氣乘虛入胃發斑今夏月熱盛之時瀉久裏虛熱氣乘虛而入且多服理中辛甘之劑熱晉胃中今發赤斑熱自裏而出於表也宜作化斑湯必易愈翁曰百膏性寒非瀉所宜曰有是

病則較是藥在夏月白虎猶宜用也一服而斑液熱退

本醫大尹朱雲閣公于病泄十日不止安醫或用理中五苓益元白朮散等皆不効瀉渴益甚公函召余至。視其外候。答曰瀉太甚。當先止瀉。公曰當先止瀉。余曰病本濕熱。水穀不分。更飲水。多則濕傷脾胃。水積腸胃。所瀉之水。乃所飲之水也。故當先止其瀉。渴止瀉亦止矣。公曰當用何方。曰白朮散。尹曰已服過。余曰用之不同也。尹曰用之不同別法乎。余曰本方在常與服之。此常字便是法也。蓋白朮散乃治瀉

幼科發揮卷之下

三

三

敷文堂

作瀉之神方。此方有二。法人參白朮茯苓甘草藿香六味各一錢。葛根倍二錢。者泄瀉久不止。胃中津液下隔也。故葛根倍用之。以升胃中之津液。此一法也。今人不知倍用之法。與六味等分同。故効少也。兒病瀉者。湯水不離。今人不知常服之法。其以藥常代湯飲之也。故所用之方。雖是所用之法。不同。藥劑少而湯水稍多。藥少湯多。猶以一杯之水。救一車薪之火。水不勝火。如何有効。當作大劑煎湯。以代湯水飲之。渴只飲本方。一切湯水禁之。勿與。則胃氣土升。津液自生。瀉渴止矣。尹聞而是之。果一劑治矣。不問泄瀉



病疾並宜服此多多益善不唯泄瀉可止亦不至脾

虛生風也真神妙方也謹詳述之

公子脾胃素弱常傷食一醫以米丸保和丸其意常

用枳朮丸補脾至傷食則服保和丸不効公以問余

余曰此法固好但專用枳朮丸則無消導之藥初不

能制其飲食之傷專服保和丸則脾胃之虛不能勝

其消導而反損中和之氣當立一方七分補養三分

消導則脾胃自強不能再傷矣公曰甚善汝作一方

來看余乃製用人參白朮青皮陳皮片草朮香宿砂

仁山藥蓮肉使君子神曲麥芽為末荷葉煨飯搗爛

為丸米飲送下之曰養脾消食肥兒丸服後精采頓

異飲食無傷公益喜錄其方常用之親書儒醫二

字作扁賜之

幼科發揮卷之下

三

三

敷文堂

子肉昔菴黃連木香乾蟾為末神曲糊丸煎四君子

湯下服未二日膚潤有微汗再一日頭上見出紅瘡

小便漸多五日而瀉止后更以參苓白朮散作丸服

之調理而安

汪望峯長子城南生一子寄姊夫南河胡家養南河

嘗語人曰萬老先生好小兒科今子全作聰明兒有

病可請張祖兄醫之乃先生親傳予亦與人會藥不

執方合宜而用吾之活人多矣試舉其一二驗者實

之城南一子病瀉十餘日不止一向是張用藥以胃

苓丸一粒丹豈治此重哉乃取菴菴丸五十胃苓丸

五十陳倉米煎湯下南河云只此一劑而止不再下

也南河初不聽泄止大悟曰良工不示以朴信乎

幼科發揮卷之下

三

三

敷文堂



日可安公曰病久矣一月而安幸也乃進白朮散作  
大劑以代湯頃與飲盡予見其渴甚再加製過天花  
粉二劑其夜渴止瀉亦微止次日又進一劑渴瀉俱  
止三日熱亦漸退四日公又問余曰小姐病未安奈  
何余告曰初來時曾許三日止渴五日止瀉十日退  
熱今日來五日渴瀉俱止熱亦漸退耕當問數織當  
問女小如貴體余以身任之唯足下寬量數日可也  
公稱謝可用白朮散減乾葛加陳皮調治半月而安  
公大喜給劉付冠帶儒醫扁白金一十兩此萬曆元  
年九月初四日也本縣大尹唐百峯行之

幼科發揮卷之下

泄瀉

三四

歌文堂

痢疾

痢不問赤白皆從積治濕熱者食積之所主也痢初  
得之其法宜下積不去痢不止也如吐泄後痢者其  
積已下不可再下復傷胃氣可下者木香導滯丸至  
之不可下宜去積保和丸主之

陳皮五錢

枳殼炒三錢

黃連姜汁炒五錢

神曲

山查肉

麥菜各三錢

萊服子炒三錢

枳榔三錢

右為末水糊丸麻子大白湯下

木香導滯丸

枳實炒

厚朴姜汁炒

枳榔各五錢

黃連

黃芩

黃蘗

大黃各七錢半

木香二分 黑牽牛半生半炒取頭末二分半  
右為末酒糊丸小豆大白湯下

祖傳只用黃連丸

黃連

一兩半用吳茱萸

不用

木香五錢

石蓮肉

一錢

右為末酒糊丸麻子大陳倉米煎湯下此家傳十  
三方也

予教諸子治痢只用保和丸香連丸同服萬無一失  
即陽撫治都御史孫小姐自五月病痢至七月未愈  
先荆裴感差取鄧陽醫官治之不効遺承差王加宜  
取予予往病亟矣至用人參白茯苓甘草當歸白芍

幼科發揮卷之下

痢疾

三五

歌文堂

黃芩車前子陳皮各等分炒乾姜少許煎服畧差五  
日大安公晚飲問問余云諸醫皆用木香黃連今汝  
不用所用皆非治痢之藥而効者何也余曰此乃可  
謂黃連芍藥湯方也所謂調其氣則後重除養其血  
而痢止之法也台云小女前年在湖廣病泄今年在  
比病痢皆五六月間幸遇汝之良方安然小女之遇  
汝爾之遇我非偶然余叩首謝

本縣祝道士長子七歲病痢半年不愈求予治之予  
與一方用人參白朮茯苓甘草陳皮山藥黃芪桔梗  
木香黃連枳子肉荳蔻車前子乾姜炒澤瀉神曲當



歸家等白芍為末水煎米飲下一月安名和中丸  
一友十歲患痢久不止脈洪數或曰下痢脈宜小今  
脈洪數恐難治予曰無妨玉亟經曰欲識童男并童  
女或在寸關并尺裡自然緊數甚分明都緣未散精  
華氣此童女脈宜如是胃氣當強不久自愈果數日  
痢漸止

本縣張大丑有公子半歲病赤白痢甚苦用黃連一  
錢木香五分石蓮肉五分陳皮七分乾姜炒二分為  
末神曲丸黍米大陳米飲下

痢疾渴者七味白朮散去乾葛加炒乾姜黃連阿膠  
幼科發揮卷之下

烏梅主之

痢苦噤口者宜參苓白朮散加蒼朮蒲為末陳米湯  
下

痢疾脫肛者只止其痢痢止肛自不下矣

瀉後變痢後重者胃氣之下陷也赤白者腸垢之下  
瀉也水穀盡而腸胃敗故死

痢後變瀉後重止者濕熱之氣去也赤白止者陳腐  
之物盡也腸胃通而水穀行故生也

凡下痢鮮血者黑如屋漏水者氣促者大吼如竹筒  
者嘔噦不食者足跖腫者身熱麻大者渴欲飲水者

只大渴者面嬌面青者皆死詔也

初病痢者腹中急痛大便窘迫小便赤澀身熱飲水  
宜急下之輕者三黃枳朮丸重者木香枳榔丸去其

陳垢其痢自止此時邪氣未動正氣未傷故宜下之  
若喜補惡攻使邪氣日強正氣日弱不下之則積熱

不除下之則脾胃俱弱釀成大病醫之過也

初病泄瀉變漸痢者此時宿垢已去不可再下如有  
腹痛裏急後重之證乃未盡之餘邪也宜去積止痢

去積保和去滯丸止痢香連丸

痢久不止者名休息痢家傳和中丸

幼科發揮卷之下

痢疾

卷七

散文堂

或問赤痢為熱白痢為寒何如曰原病式論之詳矣

痢下赤白皆濕熱也赤者自小腸來小腸者心之腑  
心屬火故其色赤白者自大腸來大腸者肺之腑也

肺屬金故其色白赤者屬熱白者屬濕濕亦熱也經  
云濕盛而熱也若初痢下鮮血者非赤也此風熱之

毒宜剪紅丸主之如痢下瘀血或如豆汁者此濕氣  
下血也宜胃風湯主之

或問河間云行氣則後重除養血則痢止此千古不  
易之法也今幼科治痢之方不用其法何也曰痢者

素云腸澼難云大瘕泄古云滯下腸澼者因於飽食



也大便泄者食積也滯下者積滯之物下出也故云無積不成痢治法以攻積為先務也積不去則氣不行去積所以行其氣而不裏急者重也熱則傷血痢久則傷血去熱止泄所以養其血也法雖不同意則合也

或問丹溪云先瀉後痢者脾傳腎也難治先痢後瀉者腎傳脾也易治何以言之曰脾主濕濕勝則瀉瀉瀉者脾之病也瀉久不止又變成痢痢下後重腎病也如痢并真痢也改後重者胃氣之下陷也膿血者陽若之下溜也真氣敗而穀氣絕是謂難治

惡濕小兒以坐濕地則傷腎裏急後重便膿血者腎之病也痢以不止忍變成瀉濕去而脾病在也故裏不急痛者濕熱之毒除也便無膿血者陳莖之穢盡也腸胃通而水穀行故易治

或問痢疾身涼脈靜者生身熱脈燥者死其然乎曰初病時邪氣方盛身熱脈躁者多不可呼為死證也邪氣盛則實可急下之邪去脈自衰身自涼也痢以而身熱脈燥則不可治也脈靜身涼久痢之後真氣已虛之脈也身宜溫不可太涼脈宜靜不可太弱經云瀉痢五虛者死脈細一也皮寒二也心氣三也泄

痢不止四也飲食不入五也此脈靜身涼之言不可執著也痢久不能食或有食入即吐者各禁口痢即經所謂五虛者死古方雖多無甚効者大抵瀉痢日久津液已竭脾胃虛弱不能食也宜以補脾為主白朮散去乾葛加炒乾姜主之能食者生矣不能食者死痢久脫肛者氣血虛也素云下陷者虛也難云出者為虛古方多用澁劑如罌皮木賊之類此治其標也當用河間行氣養血之法痢止后重除肛腸自不脫出矣加減八珍丸主之

有痢下赤白青黑者各野鷄痢用阿膠梅連丸主之有痢兩膝腫大者名曰鶴膝風加味地黃丸主之保和去滯丸治痢疾有積胃弱不可重下

陳皮錢五 半夏錢五 白茯苓錢五 枳實錢五  
厚朴錢五 姜汁炒 檳榔各五錢 萊服子錢五 木香錢五  
右為末神曲糊丸麻子大陳米湯下  
三黃枳朴丸 治濕熱成痢并有食積者  
黃連 黃芩 黃蘗皆酒炒 大黃酒煨  
枳實炒 厚朴姜汁炒 檳榔各二錢  
右為末酒糊丸麻子大姜湯下



胃風湯 八物湯去地黃甘草加桂等分入粟米同煎本方去桂加連等分吳茱萸減半同炒為末酒糊丸可治遠近血痢

阿膠梅連丸 治痢無分久新赤白青黑疼痛證  
阿膠成珠炒 赤茯苓 烏梅去核炒 赤芍

黃蘗炒 黃連炒 乾姜炒 當歸各等分  
右為末入阿膠和勻水丸麻子大陳水飲下

家傳和中丸 專治休息痢  
人參 甘草 當歸身 川芎

車釐子炒 猪苓 澤瀉 神曲  
幼科發揮卷之下

黃連各三錢 麥蘗麩 柯子 石連子  
乾姜炮 肉苳菴燂 木香各三錢 白茯苓

白朮 白芍 陳皮三錢  
右為末酒糊丸麻子大陳米飲下

加味地黃丸 治痢後鶴膝風 地黃丸加牛膝虎脛骨酥炙白茯苓共為末蜜丸服

加減八珍丸 治久痢脫肛 八物湯去川芎白朮加黃連炒 阿膠土炒各三分 木香三分 二減半

右共為末水丸麻子大炒米湯下多服佳  
剪紅丸 治痢血神効 當歸身 黃連炒

柳角子炒 側柏葉炒 荆芥穗 枳壳炒各  
右為末酒煮麩糊丸麻子大陳米湯下

瘧疾不問新舊並宜服平瘧養脾丸此家傳秘方

治有三方 初截 中和 未補  
初治法 初起有外因者不問風寒暑濕之邪並宜香蘇散加紫蘇香附陳皮甘草外加常山枳榔烏梅

於發日五更時服得吐為善蓋吐中即有發散之義不復作矣有內因飲食不化積而成痰痰變為瘧宜

平胃散蒼朮陳皮厚朴甘草加常山烏梅枳榔臨發幼科發揮卷之下

日五更服或吐或下痰積悉除不復作矣有不內不外因者客忤中惡夢寐顛倒成瘧者此邪瘧也宜四

聖丸加家傳斬鬼丹主之人身榮衛之氣晝則行陽二十五度夜則行陰二十五度故瘧之晝發者邪在

陽分易治宜用前法截之夜發者不可截也宜桂枝湯桂枝芍藥甘草加當歸生地黃桃仁發出血中之

邪自已不已者必須提至陽分然後截也升提宜柴胡四物湯加升麻葛根截宜柴胡湯加常山枳榔烏

梅主之  
中治法 邪氣漸強正氣漸衰宜以養正去邪和解



為主柴苓湯主之此和解之聖方也服三劑後加葛  
山烏梅以去其邪二補一攻常與調理以瘡為度  
如有熱多寒少宜用柴胡白虎湯寒多熱少者柴胡  
桂枝湯主之二劑之後間截藥一劑熱多者用常山  
知母草菓栝柳各一錢寒多者用常山錢半丁香五  
分烏梅一個為劑各用酒一盞浸一夕發日五更服  
如神

未治法 瘡久不退謂之疹瘡也 邪氣未盡正氣  
已衰專以養正為主使正氣復邪氣自盡也十全大  
補湯加陳皮半夏柴胡主之食少者去地黃加神曲  
幼科發揮卷之下

有瘡毋者本方加青皮神曲九助驚甲醋服  
小兒瘡久不退腹中或左或右有塊者此名瘡毋即  
瘡也瘡後有此經年不愈常為潮熱其狀似瘡面黃  
腹大乃其候也宜消去之祖方用月朮九今予之消  
瘡丸 小兒久瘡成瘡勞者集聖丸主之  
瘡後浮腫者胃苓丸主之 瘡後與泄痢並作者宜  
柴苓加栝柳烏梅主之蓋小柴胡湯治瘡五苓散治  
瀉痢栝柳烏梅痢瘡必用之藥也  
平瘡養脾丸此吾家傳治瘡之神方也  
人參 白朮 白茯苓 甘草

當歸 川芎 陳皮 半夏曲  
蒼朮 厚朴 姜汁 柴胡 黃芩  
猪苓 澤瀉 草菓 常山  
青皮 辣桂 九助驚甲 酥炙各  
右一十九味共研末於五月五日及三元八節天  
月德要安晉護福生除開破日脩合酒煮曲糊九  
麻子大陳米湯下

消癖丸 專治瘡毋食痰痰癖五飲成癖並治  
三稜 魚形 莪朮 各醋炙 陳皮 枳殼 炒  
厚朴 姜汁 炒 山茱萸 使君子 夜明砂  
幼科發揮卷之下

黃連 炒 木香 乾姜 炒 各二 海藻 炒 各  
神曲 麥朮 半夏曲 錢 乾蟾 灸  
九助驚甲 醋炒 各三錢  
右為末酒煮麵糊丸麻子大米飲下  
家傳斬鬼丹 截瘡神効 黃丹研 獨頭大蒜  
研爛如 右於五月五日午時至誠修合用蒜泥和  
丹同杵絮手為丸隨人大小發日五更取長流面  
東下  
四聖丸 治瘡有効 穿山甲 去筋膜 兩  
鷄骨常山 烏梅 去核 栝柳 各一兩



右為未糯米糊丸隨人大小黃丹為衣每服一十五丸至三十九臨發日五更面東溫酒送下

柴胡桂枝湯 治瘧疾寒多熱少者 小柴胡湯

柴胡二錢五分黃芩半夏一錢人參錢半甘草五分合桂枝湯桂枝芍藥耳草加括萎根牡蠣乾姜炮姜束同煎

柴胡白虎湯 治熱多寒少者 小柴胡湯合白虎湯

石膏五知母一甘草一

大粳米生薑煎

一兒歲半病瘧二日一發久不愈其兒黃瘦面浮腹脹予用平瘧養脾丸治之愈

幼科發揮卷之下 聖

一兒病瘧醫以柴苓湯投之調理二三日不効予用平瘧養脾丸治之効

一兒病瘧醫用截藥內有砒丹三截之速成瘧瘧其父悵恨前藥之悞也予用平瘧養脾丸治瘧集聖丸治瘧調理一月而愈

一兒先驚後瘧瘧久成瘧予用集聖丸調理一月而安

一兒先瘧後驚予用調元湯琥珀龍九治之安

一兒病瘧一日一發予用家傳斬血丹截之止三日

後又發再截之三日三截俱三四日又發其父怪問之時六七月寒熱予疑其必發生瘧故止而復發也問之果然乃禁之先用胃苓丸調理三日更以斬鬼丹截之遂愈

汪南汀季子七歲病瘧三年諸醫治之無効乃請予治之予視其外候而色黃白山根帶青腹大而堅曰此久瘧成癖癖在胸膈常與補脾消癖瘧熱自除恨無丸筋驚耳南汀求得之因製一方用人參白朮陳皮青皮三稜莪朮木香砂仁當歸川芎黃連柴胡薑甲為末神曲糊丸此米煎水日三服調理五十餘日安

幼科發揮卷之下 聖

陸沉巷李宅一女七歲戊戌秋先患外感後發瘧因用截藥屢作痢至冬痢雖止瘧益甚請予往視其外候大骨高起大肉陷下髮稀目陷面黃鼻燥不思飲食唯啖蓮肉乃肉傷脾虛瘧瘵證也時有江西醫人萬陽在彼謂不可治予曰無慮吾能治之至春必愈用集聖丸一料次年二月果安

一兒病瘧問曰一發予依祖訓當用胃苓丸補之發日以斬鬼丹截之調理半月以漸平復適有麻城丁醫至見兒未大好謂其父曰我秘方只一劑而愈其



父惑之不知其所用者何方也將進一劑磨即大便  
 矣更甚於前予笑其醫云只用秘方令吾前功盡廢  
 又勞調理也其父悔且怨醫辭去予調理一月愈  
 一兒久瘡成癩因癩生熱或三五日一發熱則十餘  
 日不止常在甲酉時但不寒顛又微惡寒即發熱熱  
 亦不甚發過不渴不頭痛予用消癩丸平瘡養脾丸  
 相間服之半年而愈

瘵

瘵證此小兒科之極病也雖有五臟之不同其實皆  
 脾胃之病也幼科書論諸瘵頭緒太多法無經驗無  
 可取者唯錢氏分肥瘦冷熱四者庶為近理而以物  
 病者為肥熱瘵久病者為瘦冷瘵似有虛實之分不  
 知瘵為虛證曾有實者予至於治瘦冷瘵方上有瘵  
 隨子未免虛實之失故予嘗曰錢氏方論非先生之  
 親筆乃門人附會之說也今乃推先生之意以補之  
 曰兒太飽則傷胃太飢則傷脾肥熱瘵其食多太飽  
 之病乎瘦冷瘵其食少太飢之病乎如審其食少者  
 肥兒丸食多者集聖丸主之

小兒乳少者父母嘗以他物飼之兒之性只求一飽

或食太多或食太少所以脾胃受傷生此疳病也  
 漸水陸沉巷李廣之妻程希南之女也新嘉止有一  
 女幼病瘡又病痢瘦發熱少食日啖蓮肉五六枚請  
 予往治之予與集聖丸時有江西一醫萬昂在彼自  
 難治常問予運氣之說予詳教之彼本不知唯唯耳  
 予謂昂曰明年二三月來看此女之長大也次年三  
 月手其母在程氏宅請予謝之命其女拜云小女服  
 後一日改容一日非昔日比也

瘵生王開一子周歲因食猪肉受傷肢體瘦削使人  
 水葉予問其詳乃食積瘵似有餘取脾積丸五粒與  
 之數以猪肉湯吞下果下一塊如小指頭大涎沫夾  
 裹其子頰宏

幼科發揮卷之下

集聖丸 治瘵通用 丹溪心法黃連乾塘三錢  
 蘇味皆二錢 黃連 乾塘  
 青皮 陳皮 莪朮 使君子  
 砂仁 各一錢 蘆薈 夜明砂 五靈脂  
 歸身 奔瀉 川芎 各三錢 木香 八分  
 集聖丸 三錢 歸身 奔瀉 川芎 各三錢 木香 八分  
 王三季長子患瘵瘵請予治之見之曰此乳少病也



父曰乳極多乎即辭退歸謂其友胡三溪云王子病  
 疳乃乳少也彼云乳多不聽吾言今成疳矣特胡會  
 川在座聞言而退後三溪云病者會川之婿聞兄之  
 言不說而歸予曰非也必往邀三峯兄同來也少頃  
 果同至三峯自訴云我南監坐監時一子病疳死全  
 此子病我心甚慮今特來登問此兒計個乳母養有  
 乳無乳實不知也今夜歸家看子細明日來報果無  
 乳也日則嚼飯喂夜則一盞冷米湯灌之奈何予曰  
 不易乳母治之無功易之則兒慮其乳母之愛母依  
 其兒衣食之計請權擇乳母佐之晝則抱之夜則乳  
 之自然日久情熱事兩全矣乃作肥兒丸一料服之  
 兩月而安

幼科發揮卷之下

疳

四

肥兒丸

人參

白木

白茯苓

炙甘草

陳皮

青皮

山藥

蓮肉

當歸

川芎

使君子

為末神曲糊丸米飲下

胡鳳祥子病疳但多食則腹痛請予治之予曰人以  
 穀為本穀入作痛豈新穀作痛乎必有舊穀為積未  
 能消去故新穀相持也豈有絕穀食之理乃作養理  
 消積丸服之安

胃丸

錢氏與攻散

加木杏

青皮

砂仁

使君子

枳實

黃連

右共為末神曲糊丸米飲下

痘

痘有二證

有因天地溫熱之氣而發之者 有因

水穀之溫熱而發之者 小兒之病多因溫熱食積

極大人不同宜茵陳胃苓丸主之

胃苓丸 茵陳 未五六

煨白神曲糊丸燈心煎湯下

幼科發揮卷之下

四

小兒十四歲病痘面目

黃連

黃蘗

枝子仁

茵陳

猪苓

澤瀉

枳實

厚朴 各一水 大黃 一錢

右為末神曲糊丸陳米湯下初服二日吐宿冷黃

水二三碗又二日利三行五日退

調理脾胃

人以脾胃為本所當調理小兒脾常不足尤不可不  
 調理也調理之法不專在醫唯調乳母節飲食慎醫  
 藥使脾胃無傷則根本常固矣  
 脾喜溫而惡寒胃喜清而惡熱故用藥者偏寒則傷



脾偏熱則傷胃也製方之法宜五味相濟四氣俱備可也故積溫則成熱積涼則成寒偏熱偏寒食也食多則飽飽傷胃食少則飢飢傷脾故調脾胃宜節飲食適寒溫也今之調脾胃者不知中和之道偏之為害喜補而惡攻害於友者大害於補者益小小哉見有少食而易飽者此胃之不受脾之不能消也宜益胃之陽養脾之陰宜錢氏異攻散合小建中湯主之

炙甘草 陳皮 白芍 茯苓  
桂皮 各等分 木香 砂仁 各減半 當歸

幼科發揮卷之下

右為未神曲糊丸麻子大米飲下

兒有多食而易飢此脾胃之邪熱甚也宜瀉脾胃之  
大三黃枳實丸主之  
枳實 白朮

黃連 黃芩 大黃 各等

右共為未神曲糊丸麻子大白湯下

平縣大丑朱雲閣公子常有脾胃病向是韓醫生調治平時服養脾丸傷食服保和丸未有寧日一旦問余云聞汝小兒甚精小官人脾胃久虛汝可治之余曰當攻補兼用不可偏補偏攻韓醫云空齋非所長也如專補脾胃則飲食難化如專瀉導則中氣易耗

小聽曰汝進一方來以進養脾肥兒丸用  
人參 白朮 甘草  
枳實 木香 茯苓  
山藥 蓮肉 麥芽  
山查 青皮 神曲

共為未荷葉浸水煮梗米飯丸麻子大米飲下脩合服之大効再無脾胃之病尹猶相信賜扁

乳母者兒之所依為命者也如母壯則乳多而子肥母弱則乳少而子瘠母安則子安母病則子病其干係匪輕蓋乳者血所化也血者水穀之精氣所生也  
幼科發揮卷之下

飲食入胃氣通於乳母食熱則乳亦熱母食冷則乳亦冷故見傷熱乳者則為黃色黃芩芍藥湯加黃連主之傷冷乳則為青色理中丸主之乳多者則絕之不爾令兒吐乳也乳少者宜調其乳母使乳常足不可令兒飢以他物餵之為害甚大調乳母宜加減四物湯猪蹄湯主之乳母忌酒熱生冷及一切辛熱之物常作猪蹄湯與之甚良乳母經閉經漏請醫治之恐乳少也  
一小兒食肉早得脾胃病或泄痢腹大而堅肌肉消瘦也已成疳矣其母曰愛兒病深予見爾之乃製



二方人參黃芪蜜炙白茯苓白朮粉草當歸川芎以  
清脾胃養氣血陳皮青皮半夏曲木香砂仁枳實厚  
汁神曲麥蘆麩以清積二稜莪朮煨九助監甲醋煮  
以消癖黃乾膽燒灰存性使君子夜明砂以除癖熱  
共二十三味碾末粟米糊丸麻子大每服二十五丸  
炒米湯下調理而安

乳食兒之賴以養命者也養子欲云乳多終損胃食  
壅即傷脾甚矣乳食之不可不節也難經云補其脾  
者節其飲食適其寒溫減調理脾胃之大法也蓋飽  
則傷胃飢則傷脾熱則傷胃寒則傷脾今之養子者

幼科發揮卷之下

調理脾胃

五

穀肉菜菓順其自欲唯恐兒之飢也兒不知節必至  
飽方足富貴之兒脾胃之病多傷飲食也貧賤之子  
無所嗜而脾胃中和之氣不損也傷之輕者損穀自  
愈傷之重者則消導之宜胃苓保和丸養脾消積丸  
主之傷之甚者則推去之審其所傷之物如傷熱食  
者宜三化丸三黃枳朮丸木香檳榔丸傷冷物宜三  
稜消積丸丁香脾積丸主之如脾胃素弱食少但過  
食則傷者補脾進食肥兒丸要藥也  
一富家生子甚弱結義予左家公予重其義朝夕戒  
其乳毋乳食不可太飽或世以爛粥而哺之其一

切勿藥餅肥甘肥生之物皆禁之或有小疾專以  
補脾胃為主其子自幼至長亦無大疾今氣實力壯  
飲食多尚不傷寒暑不能侵南北奔走不為勞嘗語  
人曰生我者父母也養我者萬家公也

一兒生二月忽昏睡不乳予以日計之非變蒸也視  
有二乳母皆年少氣壯者其乳必多更代與之必傷  
乳也戒以今日損之令幾一日自愈後宜絕之只用  
一乳母可也次日果安父母如其教亦無傷食之病  
醫藥者兒之所以保命者也無病之時不可服藥一  
旦有病如請專門之良老成忠厚者中選之粗工勿  
幼科發揮卷之下

調理脾胃

五

信也如有外感風寒則發散之不可過汗亡其陽也  
內傷飲食則消導之不可過下亡其陰也小兒易虛  
易實虛則補之實則瀉之藥必對證中病勿過劑也  
病有可攻者急攻之不可喜補惡攻以天兒命雖有  
可攻者猶不可犯其胃氣也小兒用藥費用和平偏  
熱偏寒之劑不可多服如輕粉之法痰稠沙之消積  
礞黃之四陽有毒之藥皆宜速之故發散者宜惺惺  
散消導者宜保和丸虛實瀉按錢氏五臟補瀉之  
方加減用之誤服熱藥者宜大豆卷散主之誤服寒  
藥皆宜益胃散主之汗下太過者宜黃芪中湯主



之

小兒久病只以補脾胃為主補其正氣則病自愈宜  
養脾丸加所病之藥一二味在內服之

或問脾胃補瀉之味予曰天食人以五氣地食人以  
五味五氣者寒熱溫涼平也五味者酸苦辛甘鹹也  
氣為陽陽不足者補之以氣味為陰陰不足者補之  
以味故肝屬木味以辛補酸瀉氣以溫補涼瀉心屬  
火味以鹹補苦瀉氣以熱補寒瀉肺屬金味以酸補  
辛瀉氣以涼補溫瀉腎屬水味以苦補鹹瀉氣以寒  
補熱瀉是四臟者各屬一季味則逆之氣則從之以

幼科發揮卷之下

脾胃解胃 辛酉

補以瀉也至於脾胃屬土寄於四季無定位無從逆  
也故於五味相濟四季均平以中和為主補瀉亦無  
偏勝也况脾胃溫而惡寒胃喜清而惡熱偏寒偏熱  
之氣固不可以專用而積溫成熱積涼成寒雖溫平  
涼平之藥亦不可以群聚久服也經云治熱以寒溫  
而行之治寒以熱涼而行之斯為善矣  
一人自知醫生一男謂小兒脾不足作補丸主之至  
於有疾不肯請醫亦自治之予曰小兒無病不可服  
藥古人所謂無病服藥如壁中安柱此言何謂也五  
行之理偏勝則害病必請醫如耕當問農織當問女

之意也醫不三世不服其藥自非專門之術而病之  
虛實藥之良毒吾恐必誤也

一兒八歲形氣甚弱其父責令讀書予見之謂其父  
曰令郎形氣如常懷保之不可一於嚴也乃晉養脾  
丸肥兒丸與之調理半年後病成拜矣先請一老醫  
不知幼科謂之傷食用一粒金丹服之病乃劇請予  
予曰前與養脾丸肥兒丸服盡乎曰未服也又問曰  
令服者何方也曰一粒金丹予辭曰不可治矣一粒  
金丹內有草烏巴豆大毒之藥豈可常服者乎此兒  
脾胃素弱怯食少而瘦故以肥兒丸調理應服而不

幼科發揮卷之下

脾胃解胃 辛酉

服一粒金丹大傷犯胃氣此不應服而服傷之重傷  
謂之虛死死在且久後果死  
一庸醫狂悖藉父祖專門之名自稱得異人之傳妄  
立方法變亂繩墨嘗語人曰吾能知人之臟腑有病  
而云之知其所傷之物而取下之知其疾之順逆而  
預解之言大而誕人皆信之時有富家楊姓者生二  
子聞其名而交結之禮意懇至蓋為其子之未出痘  
也後一子出痘因熱以湯蒸汗而死小子因服附子  
毒發癰亦死於醫之手惜哉  
盧生胡篤庵咳久不止汗之不可下之不可因於表



裏之邪俱甚也自製一方用蘇葉薄荷葉桑白皮末  
杏霜括萎番桔梗末甘草末各等分虛者加阿膠蜜  
丸白湯下或口中含五日而安後以此方治人屢效  
黃芩芍藥湯 治傷熱乳而瀉黃

條芩 白芍藥各等 甘草半 加黃連分等

水煎

加減四物湯 治婦人乳少

常歸身 川芎 生地 麥門冬

桔梗 人參 生甘草各等

右到水煎服更用漬猪蹄新汲水煮熟爛和汁食之

勿科發揮卷之下

三化丸 去胸中宿食莖莖之熱

枳實 厚朴 姜汁炒 大黃各等分

神曲糊丸麻子大每服量大小虛實溫水下

家傳保和丸 補脾胃進飲食治一切食積

白朮 陳皮 半夏曲 白茯苓

神曲各三錢 枳實 厚朴 姜汁炒 香附子

山查 麥葉麴各二錢半 黃連 姜汁炒 連翹

萊服子各二

右為末荷葉浸水煮梗米糊丸麻子大姜湯下

三黃枳木丸 治傷內食惡餅並辛辣肥厚一切物

黃芩 黃連 酒炒 大黃 酒炒 神曲

陳皮 白朮各一兩 枳實 錢五

右為末荷葉浸梗米丸麻子大白湯下

三稜消積丸 治傷生冷一切硬物冷積

三稜炮 莪朮炮 神曲各一錢 青皮

陳皮 小茴香 巴豆 和米炒焦黑

益智仁 丁香各三錢

右醋炙丸麻子大量人加減生姜湯下

疏胃散 治誤服寒藥過多傷其脾胃者

陳皮 黃芪 白豆蔻

勿科發揮卷之下

澤瀉 乾姜 炒各三錢 砂仁 甘草

霍香葉 厚朴 炮 人參各三錢

一方有姜黃 三錢

右為細末每服五分至一錢姜枣煎湯

大黃豆卷散 治誤服熱藥此解之

買衆 板藍根 耳草 大豆卷

根水浸生卷是也

右為細末每服五分井泉水煎飲

肺臟主病

肺上喘 實則悶亂喘促好飲水有不飲水者



虛則更氣長出氣

實則瀉白散葶藶丸瀉之

虛則阿膠散生脉散合其桔湯補之

瀉白散 治咳嗽而微喘面腫身熱

桑白皮 蜜炒 地骨皮 各等分 甘草 減半入 粳米水煎服

阿膠散 治久嗽肺無津液

阿膠 兩半 粉 大力子 二錢 馬兜苳 半兩 甘草 錢

杏仁 七個 去 皮 粳米

右為末每服量加減煎服

生脉散合其桔湯 久嗽肺虛

勿科發揮卷之下

人參 錢一 麥門冬 錢二 五味子 十粒 苦梗 錢一

右對分五劑每劑入阿膠五分水煎

兼證

諸氣喘促上氣咳嗽面腫皆肺臟之本病也加味瀉白散主之桔梗防風二錢甘草一錢地骨皮一錢分煎見肝證由中風得之鼻流清涕惡風喘嗽宜發散加減參蘇飲主之 如久咳變風疾不論如錢氏所謂三瀉肝而肝病不遲三補肺而肺證尤虛是也 一小兒二歲久病嗽時十月初請予治之予曰不可治矣父問其故予曰嗽者肺病也四時之病將來者

進成功者退十日建亥金氣已衰未氣始生吾觀令

而色恍白肺之衰也頭搖手擺肝之風也肺衰風

生作喘而死果不治無見心證發熱飲水喘嗽悶亂

此心大勝也宜涼膈散加知母石善主之

久嗽不止黃連阿膠九黃連赤茯苓能抑心火肝得

其精焦見脾證咳則吐此傷乳食而喘嗽不安宜葶

藶丸小陷胃加大黃主之

一兒泄瀉後病咳而喘上氣急予用芎藭散効

一女子脾胃素弱一日炎土瘰病腹脹而喘其丹憂

甚恐夫知食以生冷也予曰勿憂乃依錢氏異攻散

勿科發揮卷之下

加霍香葉以主脾經之濕紫蘇葉以去肺經之風一

大劑而脹消喘止

一女子素有喘病發則多痰予用補腎地黃丸服之

或怪而問曰喘者肺病也今補腎何也予曰肺主氣

腎則納而藏之痰涎者腎之津液所生也哮喘吐涎

乃氣不歸元津液無所受也果服此丸而安

加味瀉白散 古瀉白散加蘇葉桔梗是也

參蘇飲 治傷風咳嗽 古參蘇飲紫蘇葉陳皮前胡

枳殼桔梗半夏茯苓乾葛甘草人參木香枳實皆

等分甘草減半是也



東垣涼膈散 治心肺熱 甘草 枝子

薄荷 桔梗 連翹

河間涼膈散 去硝黃加桔梗是也

黃連阿膠丸 治肺熱或咯唾血

黃連 三錢 赤茯苓 二錢 阿膠 炒一錢

右以蓮肉為末水調膠和衆手九麻子大米飲下

小陷胸加大黃湯 治痰壅喘促以代葶藶丸

黃連 半夏 枳實 括蕒 用和皮

甜葶藶 大黃 各等分

右剉先以水煮括蕒一沸入藥煎七分食後服

勿科齊揮卷之下 辛 芳竭散 治脾虛上氣喘息急嘔吐痰涎足脛冷者

川芎 葶藶 各一錢 搗梢 去毒三 半夏 一兩

水洗七 細辛 各二分

右為極細末熱湯調稍熱服

肺所生病 諸氣上逆喘逆皆屬於肺

咳嗽有二 風寒外感者 痰飲者

如因感冒得之者必洒洒惡寒鼻流清涕或鼻塞宜

發散加減五拗湯主之

麻黃 連根節 杏仁 若皮水 紫蘇葉 苦梗

各等分

右剉水煎姜引服得微汗止

如發散不退渴飲飲水者宜瀉白散主之

如不熱不渴并桔湯主之 桔梗 甘草 各等分

紫葉 烏梅肉

右用水煎去渣入阿膠化丸

因於痰者或因乳多湧出兒小吞嚥不及嗆出而成

痰嗽者或因兒啼聲未息氣未平強以乳哺氣逆而

嗽者此乳夾痰而嗽也宜玉液丸主之

有痰甚氣弱不可下宜潤下丸主之

陳皮 炮去白塩淡水浸 枳壳 炒 桔梗

勿科齊揮卷之下 辛 大半夏 姜湯泡七次 甘草 蘇子 炒

萊服子 炒 白茯苓 各一錢

右為末神曲糊丸黍米大白湯下

發揮云經曰秋傷冷濕冬發咳嗽乃太陰濕土之病

也凡咳嗽有痰有氣痰出於脾氣出於肝皆飲食之

所化脾總司之也飲食入胃脾為傳化水穀之精氣

為榮悍氣為衛周流一身晝夜不息虛則不能運化

精悍之氣以成榮衛其精悍之清者為飲濁者為痰

留於胸中滯於咽嗑其氣相傳浮淫作痒介介作聲

而發為咳嗽也故治痰咳先化其痰欲化其痰者先



理其氣味皮枳殼以理肺中之氣半夏茯苓以理脾中之痰此治咳之大畧也若夫虛則補之阿膠散實則瀉之葶藶丸但傳玉液丸無多丸予

小阿膠散 阿膠粉炒 蘇葉錢一 烏梅錢一 每四字煎服

監生胡篤庵滋元溪翁之子也辛丑方四歲二月間患咳嗽因與吾不合請醫張鵬素所用者以葶藶治

之隨止隨作四月間咳甚又請醫耳大用治以五拗湯暫止復作更迭用藥咳不得止秋亦甚咳百十聲

痰血並來至九月加重事急矣不得已欲請予治乃籤之得寒之漸其辭曰大寒明來遂請予往予以活

幼科發揮卷之下

人為心不記宿怨視其外候兩頰微赤山根青準頭紅視其內證果咳聲連至百十氣促面赤痰先出而血隨之痰血既來其咳方定問其所起之時曰自二月有之問其所服之藥曰某用葶藶丸某用五拗湯予細思之此病起於春初春多上升之氣木旺金衰法當抑肝補脾以資肺之化源以葶藶瀉肺此一逆也夏多火熱火旺金攻法當清心養肺治以寒涼反用五拗湯并熱之藥犯用熱遠熱之戒此再逆也今秋氣宜降矣而上氣急者春休之令未退也氣宜歛矣而痰血並出者夏火之氣未退也必與清金降火

潤肺涼血非三五劑不効也乃告之曰金即之疾

肺有虛火幸過秋深金旺可治吾能愈之假以一月成功元溪曰何大遲也曰病經八月者無効公不曰

遲而以一月為遲何哉又思予雖用心彼終不安乃語元溪云請置一簿自初服藥日起某日服某藥某

日加減其藥彼聞之喜終有疑心因製一方天冬門冬知貝母桔梗生甘草陳皮去白枳殼阿膠片參蘇

葉水煎一本無枳殼蘇葉 劑後痰減十分之七口鼻之血止矣元溪終不釋疑

又請醫萬紹治之或謂予曰他不要你你可去矣予

幼科發揮卷之下

曰彼只一子非吾不能治也吾去彼再不復請也誤了此兒非吾殺之亦吾過也雖然且看萬紹用何方用之有理吾去之如又誤必力阻之阻之不得去未遲也乃語元溪云今即之病吾今治之將好一半矣如何又請他人彼云有病眾人醫恐一人之見有限也予曰然紹立一方以防風百部杏仁桑白皮之類予謂紹曰王好古湯液本草風升生例防風居先此兒肺井不降肺散不收防風百部豈可並用耶紹云防風百部治咳救之神藥也元溪從傍和之云他是秘方予曰吾為此子憂非相妬也故撫其子之頭曰



且少吃些可憐疾之復作奈何。獨舉不辭而退。元溪  
畧不介意。是日服紹葉。總一小杯。步復作。氣復促。血  
復來。如劫。其子泣曰。吾乞萬先生藥好。此命請這人  
來。要毒殺我。其妻且怒且罵。元溪始悔。親至大用之  
家。予被酒困。坐待夜半方醒。元溪拜謝。祈請之心甚  
切。予嘆曰。早聽吾言。不存此。卿要我謝。必去。嫌疑  
之心。事付托之。任功一月。為期至家。鄧夫人取白金  
五兩。權作利市。小兒好時。再補五兩。不敢少。望先生  
用心。予笑曰。只要專信我。用我。使我治好了。不在謝  
之多少。已至此。專心聽信。依舊昭日。立方血止。後去

幼科舉揮卷之下

燕証

李四

本館加冬花五味咳止。後以參苓白朮散調之。凡十  
七日而安。如舊謝歸。因各其方。曰潤肺降火。蘇根湯。  
今吾子等用之。皆効。

黃州府省祭許成仁有子病咳。血醫用吾前根湯治  
之不効。吾見之。與其醫云。病不同也。彼乃肺中有火  
氣逆而散。此則肺虛嗽血矣。乃立方與之用。河膠珠  
天門冬。麥門冬。桑白皮。蜜炒。桔梗。甘草。蘇葉。烏梅。柿  
霜。煎服五日効。

麻城曾芸塘一子。喻長州之妹婿也。病咳。半夜甚。其  
子年九歲。乃胎稟之不足。腎虛嗽也。用人參固本丸。

加河膠。桑白皮。蜜丸。服盡劑而安。  
本縣汪元津一子。病腎虛嗽。與上證同。請予治。用人  
參固本丸。加白茯苓。不知母貝。毋山藥。各等分。為末。蜜  
丸。服之。安。凡小兒百日內。嗽不止者。各百。野。散。推  
治。宜。其。枯。湯。加。阿。膠。主。之。

小兒素有哮喘。遇天雨。則發者。蘇陳九寶湯。主之。如  
吐痰者。多六味地黃丸。主之。

發揮云。腎者水臟也。受五臟六腑之津液。而藏之。入  
心為汗。入肝為淚。入肺為涕。入脾為涎。入腎為精。凡  
咳嗽之多。吐痰之首。乃腎之精液不歸元也。宜補腎地

幼科舉揮卷之下

燕証

李五

敷文堂

黃丸。主之。加巴戟。杜仲。鹽水炒。肉桂。酒洗。去甲。小  
茴香。炒。破。故。紙。炒。研。末。蜜。丸。煎。麥。門。冬。湯。下。

本縣胡三溪。長女。素有喘痰。發則多吐痰。涎用上。肺  
腎地黃丸。人初不知有笑之者。後喘止。痰止。乃信之。

凡小兒久嗽不止。面目浮腫者。此肺氣逆也。宜五皮  
湯。加蘇葉。最妙。

一富室小兒。瀉泄後。病喘急。予思此脾虛也。寒濕之  
氣上升也。用陳氏野蠹散。一服而止。

一兒三歲。病嗽。血醫用前根湯。主治手阻之。彼有後  
言。予笑曰。此吾家方也。不信。以夫子之。道。反。議。夫。子。



牙因製一方用阿膠珠桑白皮蜜炒杏仁炒桔梗其  
草紫蘇葉各等分為末蜜丸茨實大每一丸陳皮湯  
下五日而安

喘嗽 肺主喘嗽喘有順逆嗽有新舊須辨明之  
喘順者或因風寒而發不然則無是病也此傷外感  
宜發散五虎湯主之

或有喘病遇寒冷而發發則連綿不已發過如常有  
時復發此為宿疾不可除也初發之時且勿治之待  
其少衰宜蘇陳九寶湯主之慎勿用此霜輕粉諸毒  
藥攻之與其巧而無益不若拙而行其所無事也

幼科發揮卷之下 李 敷文堂

逆者大病與諸危篤病但氣喘急痰涎有音皆惡候  
也不治惟腫脹之病常有喘者宜蘇子降氣湯主之  
嗽 新者因風寒中於皮毛皮毛者肺之合也肺受  
風寒之邪則發為咳嗽其證或鼻流清涕或鼻塞者  
是也宜發散華蓋散作丸服之即三拗湯加減法也  
或因乳得之凡兒啼哭未定不可以乳強入口乳氣  
相搏而逆心豁出也胃氣既逆肺氣不和發為痰嗽  
咳則吐乳是也宜順氣和胃加減大安丸主之  
初傷乳者未得順氣化痰以致脾胃俱虛乃成虛喘  
宜健脾胃消乳化痰三奇湯主之

久嗽者初得病時因於風者未得發散以漸而入於  
裏肺氣益虛遂成虛嗽宜蘇肺滋陰散人參潤肺散  
主之

久嗽不已服上諸藥不効者宜神應散主之氣弱者  
必用之劑也如氣實者不可服宜家傳華蓋生主之  
久嗽不已嗽而有血者此肺損也宜蘇花湯主之  
久嗽不已胸高起如龜殼此名龜胸難治宜家傳華  
蓋丸主之咳止者吉不止者發搖必死

久嗽不已日漸羸弱又發搖者此慢驚風不治如不  
發搖但羸瘦者此名痺瘦宜人參款花羔合阿膠丸  
幼科發揮卷之下 李 敷文堂

主之久嗽不已而浮腫者宜五皮湯加紫蘇葉主之  
久嗽咯唾膿血者此肺癰也宜桔梗湯主之發不  
止發搖者死

小兒初生至百日內嗽者謂之百日內嗽度多者宜  
玉液丸肺虛者阿膠散主之此名胎毒最為難治如  
喘嗽氣促連聲不止以致發搖必死

華蓋散 治肺 感風寒痰壅咳嗽  
麻黃 杏仁 去尖 蘇子 炒  
桑白皮 蜜炒 茯苓 各等分 甘草 炙  
右為末蜜丸彈子大每一丸姜棗煎水服



人參 治久咳肺虛

百合 桑白皮 五味子 人參

右為末蜜丸艾實大每一丸紫蘇葉煎湯下

加減三奇湯 治傷乳嗽痰湧吐乳 桔梗

陳皮 白茯苓 青皮 蘇子

人參 桑白皮 半夏 枳實

甘草 杏仁 右為末姜汁煮神曲糊丸用米大滾白水下

九寶湯 九寶陳麻薄一錢桂枝蘇杏腹皮黃桑耳二

字烏梅一二片生薑用水煎一本有桔梗入壹便

幼科發揮卷之十 散文室

五虎湯 治肺喘 麻黃 杏仁

甘草 細辛 石膏

右作一服水煎本方去茶石羔加紫桑桑皮等分

各家傳五物湯

家傳五物丸 葶藶丸去防已牽牛加蘇子炒陳皮

去白等分東肉丸是也

加減六安丸 治傷乳喘嗽此保和丸加減法也

陳皮 半夏 白茯苓 白朮

口實 桔梗 蘇子 車前子

桑眼子

右為末姜汁煮神曲糊丸麻子大炭姜湯下

桔梗湯 治肺癰 桔梗 生貝母

黃芩 括萎仁 枳殼 薏苡仁

桑白皮 防已 黃芪 甘草

杏仁 去皮尖 百合 杏仁

右對生薑水煎 神應散 治一切虛散 粟殼 杏仁

白膠香 人參 阿膠 麻黃

烏梅 桑白皮 款冬花 甘草

右為末蜜丸人加減姜末煎服

幼科發揮卷之十 散文室

一女子四歲嗽久不止胸高起狀如龜壳嗽則其骨

扇動母之父知醫治之不効問予何如予曰此肺熱

而脹成龜胸也當聞諸父教云龜胸龜背方善皆有

之無治法也後嗽不止發搐而死

腎臟主病

腎主虛無實地黃丸主之

唯瘡疹腎實則黑陷此非錢氏之語乃記者之誤焉

而不詳者也以起後人之疑有馮賢之方如百祥在

之類有補脾瀉腎之論今兒天材盡信書則不如無

書也蓋人之一身肺主皮毛心主血脾主肌肉肝



主筋腎主骨筋五臟之有腎猶四時之有冬也瘡之毒乃自骨髓出現於肌肉血脈皮膚之外如品物之翕聚於冬者發散而為春之生夏之長秋之藏也變黑歸腎則不能發散於外而反陷於內此腎中真氣之虛邪氣之實所以立有祥丸牛李膏以為腎中之邪氣其瀉腎之真氣也况腎中之水潤澤光壯申津液之充滿也瘡疹黑陷者正腎主虛水不勝火津液乾枯故變為黑倒陷入裏所謂瀉之者瀉火救水之良法詳見痘疹心要

燕證 諸虛不足胎稟怯弱者皆腎之本臟病也

幼科發揮卷之下 牛李膏 燕夜堂

五臟病後成腎虛者各用地黃丸加戒隨證惟瘡疹

歸腎有補有瀉變黑例陷者宜石祥丸牛李膏瀉之

泄瀉反白瘡塌者宜陳氏異功散補之

燕見肝證驚風及手足癱者宜地黃丸加牛膝當歸

續斷各二兩肉桂一兩為末蜜丸服

燕見心證驚風及失音不語者宜地黃丸加石菖蒲

栝子仁遠志各二兩為末蜜丸服

燕見脾證吐瀉及變痲疾者宜地黃丸加黃連黃蘗

各酒炒二兩乾姜炒車前子均等炭炒煨各一兩為

末蜜丸服

燕見肺證咳嗽痰中有血宜地黃丸加天門冬麥門冬焙知母黃蘗蜜水炒阿膠炒各二兩蜜丸服

陳氏異功散 木香 人參 當歸

凍皮 肉桂 茯苓 丁香 厚朴各錢

附子炮各一 白朮各二錢 半夏

右劉姜二片東二枚煎服

腎外生病 錢氏曰腎主虛即胎稟不足之病也

按經云腎主骨骨會大杼大杼以上脊骨也項者頭

之莖莖弱則頭顛顛矣大杼以下脊骨也脊者身之柱

幼科發揮卷之下 牛李膏 燕夜堂

脊弱則身曲矣脊之下尻骨也尻骨不成則兒坐遲

矣尻骨之下則胯骨也胯骨弱則不能立矣胯之下

膝骨也膝骨弱則不能行矣齒者骨之餘骨氣不足

則齒生遲矣髮者血之餘腎之主血血不足則髮不

生去皆胎稟不足之病也謂之五軟此兒難養宜

六味丸加當歸杜仲牛膝川續斷主之

腎肝在下母子也腎主骨肝主筋骨屬于筋筋束乎

骨二者相為依附也肝虛筋弱者亦宜地黃丸主之

乃虛則補其母也

腎主骨髓脊者髓之路腦者髓之海也肝之脈與腎

相連

相連



脉內行於脊骨之中上會於腦故頭破解頭脊痺之病又肝腎之風熱子停於肝之病也

解頭者有二或生下之後頭縫四破頭皮光急日漸長大眼愕紫小此髓熱也

又有生下五六月後頭門已合而後開者此等小兒大數難養腎肝風熱之病宜加味瀉青丸主之所

謂實則瀉其子也瀉腎瀉青丸加黃蘗黃芩黃連等分經末蜜丸服辟者小兒生後生瘡成痂狀如覆

盤此風熱也宜加味瀉青丸加蔓荊子白茯苓炒

紫葳者小兒疳積者如銀齒助骨高起拍之有聲宜

幼科藥種卷之下 藥聖九加龍胎草施子仁黃蘗同為丸服

正齒根黑爛臭息出血者各走馬疳樣斗散主之

藥聖子亮下向多少入塩填滿二斗相合放火中

燒過研末搽牙

下有一孫無父周旋生走馬疳子用尿掃底白塗劑下新瓦上火焙乾五分五倍子內虫灰三分鼠婦焙乾三分枯白凡一錢共研末先用臘茶葉浸米泔水

洗淨以藥付之神效各曰不二散

見有大病暴瘡夫瘡者此腎性也宜地黃丸加石菖蒲

宜後小兒有平時大便常結者後重者此腎虛血不足病也難經云利如下重是也不可聽信下醫妄用

下劑宜地黃丸加當歸二兩火麻仁二兩主之

按五臟虛實補瀉之法引經解之經云和氣盛則實

真氣奪則虛所謂實則瀉之者瀉其邪氣也虛則補

之者補其真氣也如真氣實則瀉之者瀉其邪氣也虛則補

之者子云肝常有餘脾常不足者此却是本臟之氣

也蓋肝乃少陽之氣兒之物生如木方角乃少陽生

長之氣以漸而壯故有餘也腸胃脆薄氣未充此

脾所以不足也

幼科藥種卷之下 小兒五色脣明聲音清響此心肺之氣足也乳食能

進大小便調此腸胃之氣足也手足和暖筋骨剛健

此皆腎肝之氣足也是謂無病易養不宜妄投藥餌

誅罰無過也 如面色皓白聲音微小此心肺不足也乳食減少吐

瀉不止 止氣急 肝發熱 大便燥 小便黃



小兒冷證有七 面晄白 查青色 腹虛脹

眼珠青 嘔奶乳 脉微沉 足脛冷 已上不直

此熱證者即氣實也宜用寒涼瀉之如服熱藥謂之

實實寒證者真氣虛也宜用溫熱補之如服寒藥謂

之虛虛經云母實實母虛虛母天入長命此之謂也

因五邪之氣所生病

經云春傷於風夏生飧泄 飧泄者謂飧食不化也

發揮云唯經有五瀉之辨脉訣云濕多成五瀉又有

胃風湯證雖大小不同間亦有之不可不知也

如傷風吐瀉者風傷木脾胃屬土土虛故木乘之水

幼科發揮卷之下 醫所生病 辛四 敷文堂

穀不化謂之完穀也此從胃中來故不化若自小腸

來則半腐化出來成糟粕矣自大腸來水穀已別穀

多水少矣故傷風飧瀉有惡風表證者宜發散之桂

枝湯加羌活防風黃芩或瀉青丸去大黃加炙甘草

或加減敗毒散 無表證者神木散 風癘柴苓湯

加減敗毒散 古方去獨活枳壳加當歸 各等分

神木散 治春傷於風夏生飧泄

蒼米 滋 藜木 川芎 各六錢 羌活 分

升草 各六分 細辛 分二

石為末分二服姜水一盃

如下鮮血者此風熱也胃風湯主之

傷風咳嗽此風入肺也宜發散人參荊芥散主之

傷風內 夏月傷暑作吐瀉者宜加味五苓散主之

猪苓 澤泄 白朮 白茯苓

桂 藜香葉 砂仁 各等分

為末白湯化下

夏月泄瀉小兒極多治有三法清暑者一也利小便

二也溫中三也以涼藥止之治壞病也

發揮云初瀉有發熱口渴者此宜以清暑氣為先不

可便用理中湯丸內有熱恐乾姜犯時禁加減香薷

幼科發揮卷之下 醫所生病 辛五 敷文堂

飲主之 香薷 黃連 炙甘草 各分

煎湯熱服

或理中湯丸冷服之或六一散生薑湯調服

如初水瀉無熱無渴者不可服玉露散太多恐犯胃

氣也宜理中湯加藿香煎成湯澄冷服或理中丸用

冷水化開服之

玉露散 寒水石 煨 滑石 各三兩 甘草 水一

共研勻冷水調服

如上法不止者宜利小便有熱有渴者六一散同服

無熱無渴者入理中丸化開服之此吾家傳治夏月



瀉泄之良方也從吾法者有發有降遠吾教者得少  
失多詳見前

予年安切生男未週歲六月病瀉安兄林大用吾所  
傳者治之不效反加大熱大瀉予歸問曰所服者理  
中丸吾蓋料其不知用熱遠熱之戒犯時禁也乃製  
玉露散以解時令之熱冷水調服一劑而安玉露散  
自此收入小兒方也又本縣一屠家徐姓者有兒十  
二歲六月病瀉請大用用因前失以玉露散之不知  
中病即止恐犯胃氣之戒又失之此兒初服藥後瀉  
渴俱止再服之瀉亦甚又服之大熱大瀉面赤如大  
幼科卷下

去

數文堂

張口喘呼用見事急自邀我同看予問所服者何藥  
也云前所製玉露散也又問服幾次其父母應云初  
服一次効後連服三日越服越不好望相公救之予  
教用理中湯加熟附子一疋服之又教云服藥後若  
安靜即止藥若煩燥再與一劑用受教往治果加煩  
燥連進二服而安用獲厚謝特至吾家拜曰以報日  
前之教因問予二子病證相同治法各別何也予曰  
夏至後瀉者七分熱三分寒治此瀉者當七分寒藥  
三分熱藥前證因汝多服理中湯犯用熱遠熱之戒  
故用玉露散以解大令之熱後証因汝過服玉露散

傷其中心氣故用理中湯加附子以救裏也用曰何以  
安靜者不治煩燥者反可治也曰夏至後垢卦用事

伏陰在內六月建未其位在坤坤為腹而生土土爻  
暖而惡寒玉露性寒傷其脾土陰甚於內陽脫於外  
故用理中附子之辛熱所以收斂欲脫之陽勝其方  
長之陰吸藥安靜者脾以收斂投藥不知故不可治  
加煩燥者寒熱相搏脾有生意故再投藥使勝其寒  
也思曰如此神妙予初何以知之下火治此熱瀉當  
如之何予曰看其病證何如瀉多熱瀉少者急以溫  
中為主先進理中湯後以玉露散微解之不瀉者不  
必用也先大熱大瀉瀉少者此裏熱甚也急解其暑  
毒以玉露散解之熱瀉畧止後用理中湯補其中氣  
泄止不可再服也如瀉不止只用白朮散治之理中  
玉露皆不可服切記吾言再勿悞也白朮散治瀉渴  
不止要藥也如服白朮散瀉渴不止者此上壅以犯  
者腎得水而反燥故轉瀉瀉宜白朮散去乾葛加炒  
乾姜等分服之幸以潤燥致津液用自此後醫術漸  
通家道頗昌 暑瘧者柴胡白朮湯即小柴胡合白  
朮湯 暑咳者甘桔湯合黃連阿膠丸

去

數文堂

經云夏傷於暑秋發為瘧早謂瘧之為病不惟中土



有之凡風寒暑濕飲食勞倦皆能為病也大抵民病  
瘧痢者多蓋四時之氣太陰濕土之令乎太陰肺經  
受風寒暑濕之氣病瘧多足太陰脾經受飲食水穀  
之邪則病痢多二經俱受邪則瘧又病痢也病瘧者  
平瘧養脾丸主之病痢者和中丸主之此家傳不易  
之秘法也實之重之勿輕示人也難云形寒飲冷則  
傷肺肺主皮毛秋冬病宜攻者多因傷寒得之鼻塞  
聲重宜發散麻黃湯主之

麻黃

連根水

杏仁

去皮尖

生甘草

各等分

右用水煎服熱甚者加生石膏末嚼茶葉各五虎

勿科來年卷之下

湯神効

濕傷腎利而重秋月病痢者皆腎病也宜地黃丸  
夫丹皮加黃蘗酒炒破故紙炒小茴香炒各二兩乾  
姜炒黑五錢研末丸服

經云冬傷於寒春必病溫溫者溫熱之病也况冬月  
脂熱令行則陽氣暴洩不能閉藏為寒所折至春則  
發為熱病也小兒得之則發瘡疹病者亦溫熱之類  
也如有此氣宜預服代天宣化解毒丸甚有良驗




據上海圖書館藏清順治十一年  
泰安李氏刻本影印原書版框  
高二一二毫米寬二六六毫米

# 萬氏秘傳片玉心書

〔明〕萬全撰



原缺



萬氏秘傳片玉心書 叙

荒錢失懷青囊者未嘗不歎  
恨也幸五世孫萬通之獲秘  
藏於千百泥磚蓋象壁之極  
直不欲從此道柱後撫焉者  
色人士齒方悅李師朱益  
暇僉請討粹名而慮工浩

難

難成余與通謀曰通之有小  
兒片玉痘疹乃家所和  
而全書未經載者曷先刊  
全書之藉通之欣然乃出屬  
友致訂授梓踰年載而始就  
嗣后全書漸次刊行然足



小兒一書圖象方症探妙鉤  
尤洵盧扁之精微肯堂之未  
及闡悉者如許奇珍寧不  
寶貴父母斯人小兒之幸矣  
雖然仁壽

七

一出將民  
矯之于俱遊於堯天舜日  
中矣誰謂醫之書非采庸  
教鐸之功德哉誰謂萬民  
之書不成於仁人孝子之聞

揚執企傳金鑰以誌不朽云  
昔  
順治之甲午歲季夏穀  
旦邑人呂慕劉一吳書



萬氏秘傳片玉心書目錄

卷之一

活幼指南賦

慈幼做心賦

卷之二

小兒總治法

卷之三

水

今

額印

鼻準論歌

承漿兩眉論歌

風池氣池兩順論歌

兩臉論歌

現形色總論

命門部位圖附歌

小兒脈法

歌

則論歌

兩太陽論歌

兩頤金匱風門論歌

五位所屬

現形色西江月

小兒治法

卷之四

胎毒門

痰熱門

驚風門

嘔吐門

瀉泄門

吐瀉門

痢疾門

卷之五

瘡疾門

發熱門

哮喘門

咳嗽門

心腹痛門

浮腫門

片玉心書

黃疸門

痢

夜啼門

驚悸門

大小便門

疳積門

目病門

疳

鼻病門

口瘡門

舌病門

牙齒門

咽喉門

形聲門

諸瘡門

丹毒門

斑疹癰疹門

秘傳十三方

目錄終



萬氏秘傳片玉心書卷之一

山東泰安州李雨齋方心

維四萬 全密齋 著

活幼指南賦

小兒方術號曰啞科口不能言脉無可把惟察色以  
為憑竭心思而施治故善養子者似養龍以調權  
不善養子者如抵憤而一借愛之愈動害之愈急  
乍頭温而足冷忽多涕而不心 之毫釐失之千  
里此小兒方術專門以補化之不及

心書一卷

腸胃脆薄子飲食易傷筋骨孱弱子風寒易襲父  
母何知看承太弛重綿厚襖及以陽以耗陰流飲  
放飯持飲脾而慎胃門異聲見異物朱于隄防深  
其居簡其出過于用察然期而行立子喜其長成  
無事而嘻笑子謂之聰慧一旦病生變親心戚不  
信醫而信巫罔求藥而求咒乃人事之弗修謂天  
命之如此  
欲觀氣色先分卸位左頰子青龍屬肝右頰子白  
虎屬肺天庭高而離陽心火地低而坎陰腎水鼻

左頰即  
右頰即  
左頰骨  
右頰骨

雙頰即  
頰之兩

中惡即  
為之極

朱雀即  
心經心  
屬火  
龍仁屬  
水即  
水即  
火即  
青龍即  
肝經屬  
木

在面中脾通氣現乎色之所現知乎病之所起不  
况脾應乎唇肺通乎鼻舌乃心苗目為肝液胃流  
注于雙頰腎開竅于兩耳瓜則筋餘而脾為之運  
變則血而腎為之主脾司手足腎連牙齒本  
臟之或衰即所屬之先憊能辨形色子似挺撞鐘  
若昧朕兆子如石投水  
凡現乎外可知其內色現  
青青色露而驚  
悸如煤之黑子中惡之因似橋之黃子脾虛之謂  
白乃麻癆紫為熱急青連口角扁鵲難醫黑掩太

陽虛醫莫治年壽赤光子多生膿血山根青色子  
頻見灾危能察色以知由也 按圖而索驥  
朱雀貫於雙瞳子火子水子龍統于四白子肝  
乘肺位泄痢而帶陽者須防咳嗽而掩藍者可畏  
腹痛方放常而青而唇探驚風欲發先頰赤而目  
睛火光談子外感風寒金氣浮又子中藏癆積  
乍黃乍白子麻熱連綿又青又赤子風和紫急察  
之既精治之得理鴉聲魚口枉費心機肉折皮乾  
空勞氣力



氣色改移形容變易氣乏則顛門成坑血衰則頭  
毛作穗眼生眵淚子肝風眩目口流涎沫子脾冷  
滯頤面目虛浮定膨脹而氣喘眉毛顰蹙則肚痛  
以多啼蛇回子脾胃漸敗匿瘡子肝臟先虧為瞑  
眩而弗瘳繼神仙亦何益  
手如數物子驚風將 如塗硃子心火已熾坐  
臥愛冷子顛 煖子風寒之畏肚大  
脚小脾款困而成痺耶妙 張勢已危而必斃弄  
舌脾熱解顛賢德重舌衣去蓋熱積于心脾硬氣

喘氣實火浮于肝肺齟齬 露必是牙疳噴露丁  
奚多緣食積齟齬作渴 自利夜啼分為四証  
變蒸周于一歲心熱欲言 能脾虛無時而好  
睡病後失聲者腎怯 失聲者肺痿肚痛而青  
水流出者虫腹痛而大便酸臭者積口頻撮而脾  
虛舌長伸而火熾危胸是肺火脹于胸膈龜背乃  
腎風入于骨髓鼻乾黑燥子火盛金衰肚大筋青  
子木強上潰  
丹瘤瘡疥皆胎毒之流連吐泄瘡疔乃積食之沾

滯不能吮乳者熱在心脾當設俯臥者火蒸腸胃  
喜視灯火煩熱在心愛吃泥土疳熱在脾腹痛寒  
侵口瘡熱積疳風忌于一臘火丹畏子周歲驚自  
熱來癩因痰致吐泄而精神耗者則危瘡疔而飲  
食減者必瘵  
驚本心生風由肝致 今左右子証有順逆藥分  
補泄子病有虛實急驚由于積熱之深涼泄便宜  
慢驚得于大病之後溫補為貴頭搖目窳而氣喘  
子工莫醫口禁鼻張而足冷子神丹何濟閉目

者無魂枉叫者多祟不知吞吐必見閻羅互加閱  
乱者終歸蒿裡既明症候次知調理  
胎毒用甘草黃連食積用白木枳實急驚搗擊以  
導赤泄清慢驚痰涎以 氣集聖去疳備急  
治積抱龍丸化痰鎮驚胃苓丸補脾開胃夜啼瀉  
退熱清心疳熱必養血升提理中止泄香連止痢  
積熱不除涼驚丸大有神効沉寒難療養脾丸最  
為靈秘痰火攻子三黃丸水谷不化子金丹一粒  
柴苓治瘡月蟬消痞潮熱金花咳嗽玉液瘡疥若



胡麻丹瘡者涼膈吐泄而渴者白木可投煩熱而渴者益元為最斑疹者消毒腹痛者脾積衄血咳血者茅花重舌木舌者針刺口瘡不愈者洗心腹脹不食者平胃五拗治喘四苓利水退黃消腫胃老加減以堪行破積安重集聖從容而可治大抵嬰兒易為虛實調理最取其平補泄無過其劑尤忌巴牛勿多今石辛熱走氣以耗陰苦寒敗陽而損胃如逢食積解之不可或遲若遇虛羸補之尤為至急總少俄延便成勞瘵

醫家類

卷一

慈幼傲心賦

醫門治例幼科最難腸胃脆而多傷乳食筋骨嫩而易感風寒易虛易實子變如反掌或補或泄子貴若轉丸鹹多泄腎酸甚扶肝苦入心而寒涼損胃奔走肺而燥熱傷元欲求中正無過平耳或病瀕于瞑眩子勿犯其毒且淺治于權宜子但取其能中病即已收本為先苟慢投于湯藥即便致于損殘此上工誓於活人而良醫驗于抆肱

嘗聞法無一定但占症候回不三世勿服湯丸病者

詳于擇術醫者務于救瘥視疾若已見利勿貪先察運氣子陽陰妙契次觀形色子順逆了然春夏陽而苦寒可用在夫人之勇健秋冬陰而辛溫可參相其人之勞瘁既溫反補已寒再宣七神離散五臟虧崩雖番心于方脈子何補于世及致人傷劫子獲罪于天是故胎疾子急于解毒食積子利在消痺治子二法効可十全襁褓未寧但調其母闔劑不快當回其元悲夫腸胃中和豈堪築石微乎氣血推積以漸發生治非得已病有卒然如護



風燭心常凜。若惜掌珠意惟拳。醫可補手司命應無忝于家傳。

且如病則熱起熱則驚生或治熱以熱或攻熱以寒熱在表而柴葛解肌可飲熱在裏而芩連消毒急煎積熱無如集聖虛熱妙以調元要在識夫脉色不可妄按湯丸貽終身之痼疾促嬰兒之寿年輕以變重功不補患徒委命于氣數不詳審手簡編前車既覆後轍猶然現魄遊于郊野哭聲達于淵泉賊此之故是誰之愆嗟夫渡蟻駕橋放雀解

其况伊萬物之灵匪值一虫之賤不知謹密遽爾輕泛排惻阨之良心如見八井考聖賢之遺訓如弗及泉居易慮險因蹶知便証隨百出治無一偏變調造化保赤真元善攻不如善守宜急不若宜緩種杏成林睡當年之董奉植橘名井見今日之蘇耽奈何泄久變痼積久成痲瘡久生瘡驚久成痼未至番連弓攻之宜速已見沉疴弓治之宜緩腸胃秘塞急泄而已氣血虛羸弓急補而安外毒急攻世令人腹表和急解世令人再傳餘則緩而調

理嘗恐急而生變若藥下咽猶防其過治或中病勿張其能知者常慮一失死者不可復矣與其悔于已悞孰若謹于未然欲求魚兔當守筌蹄苟尋方而治病宜三復于斯言



小兒總治法

面赤發熱服涼驚黃白發熱用胃苓身熱便秘三黃  
下瘦弱發熱集聖靈安蒸發熱用擊法驚風專赤  
吞泄青泄瀉胃苓用一粒熱泄玉露散同行寒泄  
理中丸可服泄瀉白朮散生津痢疾保和開香連  
瘡疾養脾疔自平咳嗽玉液降痰氣喘腫胃苓引  
灯心瘡疥胡麻丸最好養脾最是保孩嬰細叮呼  
白用集聖臨時用藥細叮呼

小兒初生胎風

初生三五日大便血紫未黑色為胎毒鮮紅實可哀  
初生便嘔吐胞漿畜胃中物尽吐自止不止便為  
小兒初生十日內少乳多啼常噴嚏急者喉中有珠  
泡手法括去免憂慮

不看操胎風撮胎糞少通急用解毒散便下淨涎容  
便閉肚彭脹口緊咬唇青時七手足掣胎風枉用心  
腹脹不便名鎖肚口緊不乳是噤風目直叫哭盤腸  
吊天吊身仰似角弓初生某兒有此病父母歡喜  
一場空

小兒交蒸

小兒初生多交蒸三十五日細推論如蚕之眠添智  
慧遍身發熱不惺  
安蒸休用藥三日自然安舒減惺散傷食保和丸  
惺散內用人參其桔川等白茯苓紅棗少許天花  
粉防風白朮九味行

小兒胎疾

胎熱其草黃連湯胎寒去連如桂方胎黃其草加茵  
陳胎驚衣砂一味良胎瘦胎肥浴躰法胎怯五軟

用地黃此是家傳真口訣兒孫記誦莫遺忘

肝色多青心赤紅脾黃肺白腎黑同黃白瘰虛黑中  
惡赤紅是熱青驚風

小兒五臟部位

五臟有外候不離正而開耳乃腎之竅兩眼原屬肝  
鼻吼肺為主脾唇心舌尖左頰屬木肝生風右頰  
屬金肺位同頰為心火類為腎準頭鼻上位居中  
五臟外症

肝主風子目直視闕亂叫哭不安寧心主熱子不得



眠驚悸飲水口舌乾脾主困子多幻睡吐瀉瘦弱  
病成痺肺主氣子多咳嗽尖乾髮枯喘綿七腎主  
虛子胎氣弱小兒腎弱米應難

看小兒虎口紋

今人專看虎口紋風閉氣閉命閉今風閉病輕氣閉  
重命閉若過死時臨青筋紅熱黑勢惡直斜曲  
重看云

脉法

小兒一指分三位息數須將六至看七至八至數為

熱三至四至遲虛寒堅實平和無病新細小沉遲  
有病看

按全嬰等書云小兒三歲已前虎口第一指上寅卯  
開有脉絃見者可驗病伏男左女右視之脉絃從  
寅開起不至卯開者病易治若連于卯開者病難  
治如寅連卯上過辰開者十難救一若脉絃小或  
短者病可治宜參視之

小兒夜啼

啼哭直視熱在肝泄青一服即時安啼哭面赤熱在

心導赤麥冬効如神面赤四逆腹中痛益黃散用  
姜湯送夜上見灯多拗哭父母嬌愛多不足

驚風

急症驚風面赤青目多直視不回睛手足搐掣牙關  
緊只怕昏口再不醒

驚來插人中虎口拿捻筋泄青麥導赤調理治涼驚  
口眼若喎斜看他左右偏太陽頰了穴一焯自然  
安

面色黃白神氣弱昏睡眼閉口不合口身氣冷手足

冷慢驚搐掣時上作

慢驚不可醫調元急補脾漸醒能食吉常昏不乳危

吐瀉

吐泄之病面黃有寒有熱有食傷面紅熱渴難調  
理手足寒時急補陽

吐泄常治法胃苓一粒丹脾積去食積理中補虛寒

吐泄多傷食益黃散最宜看他病畧退胃苓再補脾

泄瀉常如是消積功十全

泄瀉作渴白朮散人參白朮茯苓甘草香干葛霍香



葉常與服之真格言

瀉甚烏梅加入熱甚知世門冬虛煩甘草灸用隨症

用藥不同

痢症

痢疾赤白皆是熱肩頭掌腋中疼身熱脈大難得

退脈小身涼容易安

痢症多因積先下木香丸保和消滯積止痢用香連

痢疾若不食噤口痢必殘急用香連散能食保平

安

行玉心書卷之二

五

小兒瘡疾

瘡疾之色多黃黑痛至作寒又作熱早瘡日未容易

退晚瘡間宜急

初瘡要吐痰斬鬼及崇山久瘡不可裁養脾功十全

咳嗽

行寒飲冷即傷肺咳嗽病來多痰氣面青氣促怕生

驚面白胸高還不吉

初咳要發表五拗并九寶氣實葶藶宜肺虛阿膠好

嘗服玉液丸桔梗同甘草

五拗用麻黃杏仁甘草強石羔臘茶葉發汗是奇方

九寶蘇葉配麻黃薄荷陳皮杏桂良大腹桑白同煎

若烏梅加入細茶詳

痺癆

面色黃白是痺癆肚大頸細頭髮焦折乳傷食大病

後只怕時上熱來潮

痺症無多法集聖初如神面色轉紅活相間服胃苓

潮熱如不退只防作慢驚

傷食

傷食發熱面赤紅惡心腹脹痛時攻露身怕熱不思

食症與傷寒大不同

傷食宜調解香散最宜保和同與服病退再養脾

若是成驚搖惟下有為奇

傷食發熱用霍香蘇葉香付朴陳蒼半夏黃連甘草

曲茯苓引子用生姜

傷寒

傷風發熱面色赤煩悶不困不思食喜人眼抱畏風

寒作渴便秘裏必實



惡寒病在表敗毒拿法好裏實三黃九驚未泄青計  
敗毒發表用姜防升麻紫葛鮮肌涼前胡枳壳耳草  
桔蘇葉人參用成湯

### 浮腫

小兒浮腫因風濕久瘡脾虛六有之上身主風下主  
濕養脾一法少人知  
遍身若浮腫胃苓丸裡求避風行浴法切莫用牽牛  
肚大有青筋灯火又處焯內用集聖丸胃苓宜相  
兼

### 口瘡

小兒驚口瘡白屑珠凡良赤瘡姜連散洗心是奇方  
洗心散內用麻黃荆芥薄荷赤芍當白朮將軍同  
國老臨時煎服入生姜  
牙根爛成瘡走馬疳可防出血又作臭蚊蛤散宜良  
小兒口流涎滯脾虛寒益黃加蒼朮不治必成瘡  
疥瘡

遍身疥瘡是何因血熱由來胎毒成痛痒不安多夜  
哭切莫入腹每歸雲

瘡疥不宜搽胡麻丸最佳入腹宜鮮毒驚未莫治他

### 雜症

小兒吃泥土脾熱用泄黃集聖相間服瘡成不可當  
小兒合面睡原來熱在心只用導赤散泄心與涼驚  
小兒多白尿落地如米淋胃苓湯送數服鮮憂煎  
小兒大便清和熱在肝經只用泄青丸此法効如神  
小兒薰焦黃和熱在脾脾雖知泄黃散端的是奇方  
五臟外症

吐泄瘡疾病在脾驚風心肝兩經為咳嗽哮喘病在

### 肺髮稀骨軟腎元虧

五軟病症  
如小兒五軟有胎稟不足軟者有大病後軟者有慢  
服涼藥軟者胎稟軟者地黃丸主之六病後軟者  
參苓白朮丸主之服涼藥軟者加味八味地黃丸  
主之已上三症若不急治有傷真元久則成瘡以  
致不可治者多矣

萬氏秘傳片玉心書卷之一終



萬氏家傳片玉心書卷之二

羅田齋萬全著

公孫通之萬達列

水鏡訣

夫阴阳運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑部位各分順逆難明若憑寸口之浮沉必乃橫亡于孩子頃明虎口辨別三關恭詳用藥必无差悞未至三歲止看虎口男左女右從第二指第一節名風關若脉見初交病第二節為氣關脉見則

惟治第三節為命關脉見則死又當辨其色若三關青四足驚三關赤水驚三關黑人驚紫色泄痢黃色雷驚三關脉通度是急驚之症必死餘病可治或青或紅有紋如線一直者是乳食傷脾及發熱驚左右一樣者是驚此積齊發有三條或散是肺生風痰或似駒鈴聲有青是傷寒及嗽如紅火是瀉有黑相真主下痢紅多白痢黑多是赤痢有紫相真加渴不虛虎口脉紋亂乃氣不和也蓋脉紋見有色皆曰黃紅紫青黑由其病甚色能加變

如黃紅之色紅盛作紫紅紫之色紫盛作青紫青之色青盛作黑青黑之色至于純無之色者不可治矣又當辨長珠形主夾積傷滯肚腹疼痛寒熱飲食不化來蛇形主中腕不和積氣攻刺臍膈不寧乾嘔去蛇形肝虛冷積泄瀉神困多睡于反裡形主感寒熱邪氣頭目昏重心神驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色弓反外形主痰熱心神恍惚作熱夾驚夾食風癇症候鎗形主邪熱痰盛生風發搐驚風魚骨形主驚癇熱水字形主驚積熱煩燥心

指掌形圖



神迷悶夜啼痰壅口噤搐搦針形主心肺受熱極生風驚悸煩悶神困不食痰壅搐搦透關射指主驚風痰熱四症皆聚在胸膈不散透關射指主驚風惡候受驚傳八經絡風熱發生十死一生唯治此十三位形脉悉有輕重察其病根則詳其症男以左手側看之

女以右手側看之



虎口者入手處是也

三關者二指三節是也

風關第一節寅位是也

氣關第二節卯位是也

命關第三節辰位是也

風關指頭上節

如關指中節

寅關指下節

命關死候

氣關病候

風關易治

未關命門

中關氣候

初關風候

凡嬰兒生下一月至三歲以前頭看虎口脉次指辰

節為命關火氣關次風關所謂初得風關病危可

傳入氣命定難陳湯氏云小兒初生至五歲血氣

未定呼吸至數太過必辨虎口脉色方可察病之

於矣男驗左手女驗右手蓋取左手屬陽男以陽

為主右手屬陰女以陰為主然男女一身均具此

明陽左右兩手亦當參驗左手之紋病應心肝右

手之大病應肺脾知此消息又得變通之意驚風

初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色

赤而紫者病又傳過其色紫青病勢深重其色青

界而故此者病深重若見純黑在惡不治大抵紅

者風熱輕赤者一風熱甚紫者驚熱青者驚積青赤

相半驚積風熱俱有主急驚風青而淡紫伸縮來

去主慢驚風或紫系青系黑系既相雜似出不

出主慢脾風脉紋從寅關起不至卯關者病易治若

連卯關者有病難治如寅關連卯便過辰關者十

指救一若脉紋小或短者看病不妨如紋勢彎曲

入裡者病雖重而症順枕可用力故勢方反出外

駁：靠于指甲者斷不可回其有三關紋如沉珠

沉米三五點相連或形于面或形于身危惡尤甚

八門候歌三首

三指稍頭冷驚來不可安若逢中橫必定是傷寒

三指獨自冷麻痘症相傳女右男左分明仔細看

初起寅關淺紋侵過卯關生枝終不治辰位實難禁

辨虎口指脉紋訣

氣紋黃盛作紅，盛作紫，盛作青，盛作黑純黑

則難治矣

黃色无形者即安樂脉也紅若无形亦安寧脉也有















小兒病形各樣慢憑眼力消詳懷子畏縮怕風涼合

面腫時熱瘰夜啼熱煩腹痛目赤驚搐須防長吁

短氣熱中藏痰喘上冲火旺

妄辨小兒死症顛門陷下成坑喉中拽鋸氣和痰

閉无神拘管口唇牙齦粉白手足恰似冰寒

口紫眼常離不乳遺尿悶亂

小兒脈法

小兒一歲以上可以看脈以六至為平和七至八至

為實熱三至四至為遲為虛弱

西江月

小兒尋常脈候一息六至平和七至八至轉生多三

四虛寒病作九十連來雀啄一二動指成痲微虛

紫數不差訛補泄分用藥

身熱脈浮可汗身寒脈細休攻喘咳紫數藥无功腫

脈細微堪痛泄痢沉是易愈痘出洪數宜從若還

吐切自浮洪腹疼沉微拈弄

小兒治法

知是驚風兩脈紅煩渴不止頭面紅露揚手擲足大

便閉小便黃赤身壯熱不退此宜涼解不可服熱瀉

之藥如足壯冷面皓白吐泄不止肚腹作痛身常畏人眼

珠青口中冷氣潮熱往來不定此宜溫補不可服

涼利之藥

西江月

小兒不宜熱藥兩腮俱帶鮮紅手足壯熱火烘六

脈浮洪亂動小便赤黃又溢大便秘結難通微衣

飲不喜當風煩渴鼻流血湧

小兒木宜涼藥面皮皓白无精四肢厥冷似寒水六

脈浮微沉吃乳不消嘔吐糞如鴨屎頻上神虛

腹疼眼珠青病久成痺諸症

小兒純陽之體陰陽不可偏傷常帶三分觀其涼此

個孩兒易養大抵脾胃常不足有餘肝氣須防不寒

不熱藥為良切忌妄行猛煎

小兒何為難治古今號曰疳科脈无可觀如之何口

不能言病作父母時驚怕匠人試驗缺多從醫

對症用方藥有甚難為捉味



萬氏秘傳片玉心書卷之四

上海圖書館藏

羅田醫齋萬全著  
公孫通之萬全達刻

胎毒門

凡小兒在月內有病皆胎毒也併治其母  
小兒月內腸胃甚脆氣血未充若有微疾不可妄施  
補瀉恐臟腑一傷將胎患終身或致致命矣可不  
成哉如不得已而用湯丸毋伐天和病即止又  
不可過劑也乳母服藥必別擇乳母而右其補可

泄也若養母自乳又不可亂投湯藥蓋產后之婦  
氣血甚虛有補無泄苟兒有熱病而用涼藥則犯  
產后之禁必害其母如有溫補則反加小兒之熱  
又害其子醫者人之司命而可妄為乎必須斟酌  
謹慎勿損陰德 生兒之母謂之曰尊  
凡小兒生即死者急看兒口中懸癰脰上必有泡  
塞住即以手指搗破其泡連以軟綿拭血令淨若  
血入咽即死

凡小兒初生氣絕不能啼者必因吐產或因胃寒所

致急以綿絮重裹其兒抱于懷中不可便斷脐帶  
却把胞衣置鍋中向炭火上煮之又作油炷點着  
于脐帶上性寒燥之瀆史熱氣由脐入腹便能啼  
方可洗浴斷帶若不知此急救之而先斷帶者多  
死不活

凡小兒初生下被寒風所吹鼻塞服藥不得者用天  
南星為末生薑自然汁調成膏貼額門上自愈  
凡小兒生后或月內或百日氣急喘滿目閉眼赤睡  
多神困呵吹遍身壯熱小便赤澀大便不通時僅

驚煩此胎毒也因母平日嗜食辛辣油膩物食服燥  
藥而致用涼驚丸黃連解毒湯治之

黃連解毒湯

黃連 甘草 木通 生地 連翹 薄荷 少許  
川芎 陳皮 灯心 三棱 水煎服

小兒生後竟口冷腹脹腸滑泄瀉者多眠或在多  
啼此胎毒也因母喜哺生冷或外感多服涼藥致  
傷胎氣理中丸芍氣散治之

芍氣散



桔梗 陳皮 砂仁 茴香 生薑 地...  
粉草 四分 加木香 二分 共為細末 每服一字 粟...  
湯調下

凡小兒生下浮腫 遍身紅色 滿月以後漸瘦 疳...  
心煩熱 此名胎肥 又有生下面毛 晶光 身无血...  
目无精彩 肌肉消削 此名胎怯 並內服八物湯 外...  
用沐浴法

八物湯  
當歸 川芎 生地 白芍 人參 白朮

甘草 白朮 姜棗引水煎服

沐浴法  
天麻 蝎稍 硃砂 白丸 青黛 射香  
烏梢蛇肉 酒浸燒為末 各三錢 共研為細末 每用三錢水  
三碗 桃枝連葉一握 同煎十沸 待溫 熱沐之 慎勿  
沐背

凡小兒生下遍身而目皆黃 狀如金色 身上壯熱 大...  
便不通 小便如枝子汁 乳食不思 皆胎黃也 因乳...  
母受熱而傳于胎用

地黃湯

生地 赤芍 大花粉 赤茯苓 川芎 當歸  
猪苓 澤泄 木通 甘草 茵陳 水煎溫服

凡小兒生後壯熱 驚風 搐搦 牙身 痰強 直涎 潮嘔...  
吐 搐掣 驚啼 腮縮 顛開 或煩赤 面青 眼合 更胎風...  
眼合 不可候作慢脾風 妄用湯藥 要視其眉間氣...  
色 若紅赤 鮮碧者可治 若黧黑青黑者不治 虎口...  
指紋 曲入裏者可治 出外者不治 此因妊婦調食...  
平常飲酒嗜肉 忿怒 驚撲 母有所触 胎必感之 或

外挾風邪 有傷于胎 故子乘母氣 生下即病 以至...  
聖保命丹 金銀灯心湯下

聖保命丹 治小兒驚內 癆腹肚 堅硬 睡不安夜...  
多啼哭 急慢驚風 眼目上視 手足搐掣 不省人...  
事者服之即効

全蝎 十四個 防风 二身 白附子 一兩 星...  
蟬退 去毒 僵蚕 炒去 天麻 條二 辰砂 一分 射香 分...  
右為末 搽糯米飯 丸如黃豆 大金丹 為衣 每一丸...  
鈞藤灯心湯 磨下有熱 加牛黃 腦子 明砂 又方加



老活二子此藥常服鎮心化痰

袖珍方云胎驚治法宜解散風邪利驚化痰調氣貼

頭甚則以朱銀九利之而青拳指者且服保命丹

釣藤散全蝎散初生嬰兒難以用藥凡有此候急

取猪乳細研取砂半黃射香各少許調抹入口中

即愈矣

全蝎散 治胎驚癇諸驚

全蝎一琥珀各少夜砂各少 交冬湯調下一字

獨活湯 治胎驚發散風邪

獨活各二

羌活各二 兵即 天麻 麻黃去 耳草各一

右劉散每服一茶白才煎內加天南末密調貼額

門上

凡小兒生下大便三五日不通者此名鎖胎胎中受

熱毒壅盛結于肛門閉而不通死後滋潤急令

婦人以溫水漱口吸咽兒前後心併臍下手足共

七處凡四五次再用輕粉五分密少許溫水化開

時少許服之以通為度如更不通即是肛門內

合或以金替通之通之須判八二寸以香油和密

納入孔中糞出為快也若胎服不乳呻吟聲至于

七日難可望生矣

凡小兒生即不吐乳此由拭口不淨穢物入腹致全

腹滿氣短不能吐乳或有嘔吐乳不得下或胎中

受寒令兒腹痛不乳此則多啼以

木香散治之

木香 甘草 茯苓 干姜 木瓜 丁香

陳皮 各等分共為細末每用一字水煎綿蘸酒

與食之

胎毒

胎毒者由斷胎之後枝木濕風冷之氣所乘流入心

脾令腹脹臍腫四肢強直日夜多啼不能吐乳甚

則發為風搐者胎毒者喉嚨口不開者是為內搐

不活本甲藥者死

撮口者由胎氣挾熱毒風邪入肝滲入心脾二經故

令舌強唇青口撮喘急啼聲不出不乳若口出白

沫四肢冷者不治最為急候一臘之內尤甚

紫風者眼閉口撮啼聲漸少吐乳不待口吐白沫大

小便不通亦由胎中受熱毒流入心脾故形



于喉舌間也

以上三症其名雖異受病則一初生七日之內得此症者多死若不急救坐以待斃良可憫焉

但見小兒噴嚏多啼身熱不乳急看兒上脘有小泡

子如粟米大或以指甲或以它耳輕刮去以綿

綿纏指蘸溫水拭淨其血勿令下咽即便安妥不

必服藥誠良方也

凡小兒牙關緊急已成撮口驚搐者先用撮風散以

開其關次用控痰散以吐其痰然後用益脾散和

胃保命丹祛驚即愈若手足李拳口噤不開者不

治

撮風散

金脚蜈蚣去毒 全蝎五個 炒直僵蚕炒去嘴

射香許少 共為末每用一字以猪乳和之滴入口

中即開

控痰散

蝎尾 銅青各五 硃砂一分 膩粉一分 射香許少

共為末每服一字陳茶清化下吐出風痰

益脾散

白茯苓 草果煨 木香 甘草 陳皮 厚朴炙

蘇子 各等分為細末每服五分姜枣煎湯細

服之

亦有懸在胸堂伸縮无時呢々作聲弩脹其氣以致

臍突浮腫此非斷臍使之然也但散其血愈加成

龍胆湯主之

胆草 前胡 黃芩 防風 桑葉 桔梗

赤芍 枳殼 甘草 大黃煨 水煎服得下便止

亦有肚腹青筋吊腸外疝內氣引痛而撮口者皆腸

胃鬱結不通致之治法貴乎疎利紫霜丸量而與

之一粒金丹尤妙

紫霜丸

代赭石七 醋炒赤石脂各一 杏仁五十粒 巴豆三十粒

先將杏仁巴豆研如泥布入二石和勻慢蒸餅丸

如粟米大百日者三丸用麩者五丸看兒肥怯加

減微利為度

凡臍中出汗不乾者用龍骨五 黃柏一分 九二分 為



未敷之

西江月

小兒初生病症許多名狀皆同胎驚撮口與疳風寒  
熱疔瘦黃腫嘔吐昏不乳臍間血水滲未育  
滿月病多凶好以風中燭弄

最是脐風可畏三朝八日為殃初然噴涕似風傷啼  
哭時口噴沫急看口中上脘刮除白泡中央展開  
惡血細端詳莫使下咽為上

若是不知此法致令泡落兒吞忽然腹脹滿膨臍

腫青筋雜亂撮口昏不乳目眩又紫牙關啼声

不出命喘天勸取衣棺平斷

胎黃狀如金色身熱大便不通小便黃赤色膝腕少  
乳時舌弄此症傳來无膏脾胃濕熱相攻凉驚  
涼血解重保養胎元蒸用

外有胎肥胎瘦此為稟賦虛盈父精母血必多虧兒  
子不充元氣此個甚難調理愚夫不曉支持一朝  
有病致傾危却把命來救可

上時吐奶不思乳食昏沉此由穢物下咽門拭

洗未能潔淨會喉中間阻隔太倉上口而凝結痰

順氣藥通神炮製生薑作引

生下忽然腹脹脐中血水淋漓斷脐將息失調宜  
水邪風侵入外用灰丸粘貼連令乾較為奇若遲  
誤口哭声稀縱有灵丹莫治

小兒生下數日睡中啼哭多驚此因母氣失和平常  
因七情為病以致胎胞氣逆痰涎流入脾心治須  
順氣更清神鎮墜痰涎始定

胎熱過身如火發斑丹毒風瘡神昏目痛又驚章大

小便難哭噪此是母食煎炒温經煖藥幸方急須

解毒令清凉耳草黃連為上

胎寒生來吐泄大便滑瀉多清腹中疼痛哭声頻而  
色青黃不定平日母喜生冷寒邪傳入胞娃治宜  
丸散用并温可保嬰兒性命

要識小兒治法方為得業專門半週一歲病何因胎  
毒單見症自後飲食漸瘦肥甘之變源明此時  
脾胃病多尋消食養脾法定

胎病要行凉解无如耳草黃連若加脾病相參參



木陳皮有驗巴豆牽牛丁桂硫磺白汞青鉛俱傷  
正氣損真元悞了孩兒命短

變蒸門

變蒸者此小兒正病也蓋變者異也每變罪性情即  
異于前何者長生臟腑之意也蒸者蒸工然蒸也  
諸物生于春而長于夏者以陽主生長時于人亦  
然故變蒸足始及成人氣血充實骨肉堅牢也小  
兒此症譬如蚕之有眠龍之脫骨虎之轉爪而變  
化同也故每三十二日有變蒸至五百七十六日

變蒸

重

大小變蒸足矣鞋則發熱微汗其狀似驚重則壯  
熱脈亂而數或汗或煩啼哭燥渴輕者五日解其  
候與傷寒相似亦有變蒸之餘感寒邪者但變蒸  
則耳冷上唇發泡如濁珠若寒邪傳之則寒熱交  
爭而腹痛啼哭之聲且夜不絕治此之法輕者不  
須服藥重者以平和飲子微表之甚甚便結以紫  
霜丸微利之若吐泄不乳多啼者調氣散治之  
平和飲子

人參五分 白朮一分 去皮并厚五分 升麻一分 煨五分 粟受弱 者加

白朮紅肥實者不用 水煎服

調氣散

木香 香附 厚朴 炙人參 陳皮 藿香  
炙草 姜棗水煎

凡小兒初生有用黃連甘草以下胎藥者若見吐  
者稟胎足固无所損者稟胎怯弱者受此寒涼之  
劑不生異症者鮮矣

如有稟症結壅閉不通者飲下胎毒只用淡豆豉  
濃煎湯與之五七口其毒自下又能助脾胃真

奇方也

凡小兒當變蒸之時不熱不驚別生他症是為暗變  
一此受胎氣壯實故也

凡小兒初生多有灸百會者取其可以截風也殊不知地  
南北人有勇怯北人用灸固宜南人用之无  
益而有害也

凡小兒初生下有身破裂者必死閉囊白者必死閉  
不起者必死无囊門者必死既開死而者必死哭  
如鴨者必死周歲之間願骨間解齒未生手足李



縮膝如雀節身體瘦弱長大不能行立者此皆胎氣不足者也多夭若筋實則多力骨實則行早血實則形瘦多髮肉實則少病精實則伶俐多語笑不怕寒暑氣實則少髮而體肥此皆受稟胎氣之自餘也多壽

西江月

小兒交蒸何以三十二日為期精神改變異常時發熱蒸之昏睡或遇風寒外感或蒸乳食傷脾胃過苦楚莫差池好把湯丸調治

大抵六十四月初生腎與膀胱并生心火與小腸肝胆第三長養肺與大腸若四脾胃五次消詳三焦胞絡不同鄉只為有名者狀

小兒交生智慧自然發熱如蒸昏之不乳欠醒之怕似蚕眠相應醫者不須妄治父母何必憂驚三日之后自和平只怕別生形症

若遇風寒外感怪之散子堪行內傷乳食不安驚保和養脾蒸進咳痰參蘇飲下吐泄理中景靈驚來臨掣用瀉青導亦亦宜選進

驚風門

驚自是驚風自定以要分別明白不可混治

凡小兒因聞非常之聲見異類之物或為爭鬪推跌或大小禽獸之類致驚其神氣結于心而痰生焉痰壅氣逆遂成搐搦口服至卯口吐涎沫一時即醒如常无事或一日一發或間日再發或三五日一發或半年一發一年一發若不急治變成癩疾而為終身之痼疾也治法當先利痰順氣后用清心安神

凡若或因外感風寒或內傷飲食以致熱生痰之壅

發搐口服至卯手足牽動氣喘涎潮口吐涎沫發過畧醒潮熱不退洵更復發治法當先泄火開痰後用安神清熱

驚風有二有急有慢急驚風為突為熱當涼驚泄火慢驚風為虛為寒當用溫補不可一例混治以致殺人

急驚風小兒无氣素安或因恐怖或因風或因飲食而發要審明白詳察症候而施治法

口青因恐怖而成驚者其症發過即如常无他症先



以利痰九順氣開痰後用安神九調之

如曾因風寒而成者其症發過畧醒更復發者

只用導赤散吞下瀉青九以清心肝之火後以抱

龍九治痰保命丹除風緩調之

如曾因傷飲食而成者其症發過畧醒多啼哭酒

史復發不思乳食先用陳皮麥芽湯吞下五色九

推去食積則痰自降後用辰砂五苓散治之

凡治急驚風除飲食一症外不可墮用下藥必先問

其大小便何如若小便清大便通利其邪在表只

用導赤散加防風或泄青九去

用導赤散加防風或泄青九去大黃加金蠅作湯

服之去表中之寒邪其風自退後以辰砂五苓散

調之不可犯射香恐引邪入裏若小便赤澀大便

秘結此邪在裏可用五色九下之後用抱龍九保

命丹調之

凡急驚發時牙關緊閉不醒者急用艾炷灸兩手大

指頭少商穴合而灸之在甲旁即醒而後施治法

凡急驚風痰氣喘急者用定喘湯加竹瀝治之

痰涎湧塞不聞者可用水法

凡病退後潮熱不退者此脾虛熱也四君子湯加炒

乾姜以治之若小便赤大便硬兩腮紅足脛熱者

此餘邪未盡不可作虛看用涼驚丸薄荷灯心煎

湯吞下調之

凡病退後睡眠不醒者此心脾二經之邪熱未去

也安神九治之

凡小兒但有潮熱現其兩頰若赤日上現者必作驚

風也當先以導赤散加灯心薄荷以去其熱次用

抱龍九以安其神則風自不作矣

利痰九

南星牛胆者 枳壳麸炒 陳皮去白 大黃二

牽牛頭末二 共為末皂角煎水為丸灯心湯吞

下

安神九

黃連去老 石膏清 遠志去心 歸身二 麥冬去

茯苓二 山枝子二 共為末煉蜜為丸

導赤散

生地 木通 甘草 加竹葉七皮水煎服



五色丸

黃芩紅 大黃紅 黃連紅 共為末分作五分煎水  
為丸一分青黛為衣名青九子一分硃砂為衣名  
紅九子一分輕粉為衣名白九子一分皂角燒灰  
存性研末為衣名黑九子一分雄黃為衣名黃九  
子

瀉青丸

崑身 川芎 大黃煨 羌活 防風 枝子仁  
胆草 各等分為末煉蜜為丸如梧桐子大竹葉

湯下 此瀉肝火之藥也如發熱去 大黃 加

全蠍 姜蚕炒 竹葉引水煎服

辰砂五苓散

朱苓 澤泄 赤茯苓 白朮 官桂 灯心引水

煎調辰砂末服之

定喘湯

陳皮去 南星 製枝子仁 枳石燕 杏仁泥  
薄荷葉 赤茯苓 右對水煎入竹瀝服之

吐法 用土牛膝根取自然汁灌入口中其涎自吐

灸法 先以兩手六指相合于甲側縫中燻燒三壯

又以兩手中指相合于甲側縫中心燒一二

壯即醒者可治不痛者不治

和傳治驚風先以雄黃解毒丸利去痰熱後用涼驚

丸退火再用保命丹安神丸調之

發急驚風之時手撮目閉口張頭仰口氣促急吐沫

噴藥昏睡不語不啼口禁絕不飲食遺尿失屎面

赤如硃此皆不治之症

凡慢驚風小兒胎稟素弱又多痰病或大吐大瀉或

凡癰痢慢服吐下之藥皆致精神虛耗漸成搐搦

十无一全如元神虛弱又逢恐怖而成慢驚者其

症發過即如常但多啼哭睡中不寧不可妄用利

痰之藥先以青州白九子加青礞石以去其痰次

服安神丸以四君子湯送下如因吐瀉大病之後

手足逆冷昏睡目睛微露而无搐掣者此欲成慢

驚症也急溫補之四君子湯加熟附子一片愈后

以集聖丸調之

凡吐泄大病之後已成慢驚風者其症口目牽引手



足膝掣以醒脾散驅風醒脾風退以參苓白朮散  
為丸服之

凡慢驚風痰氣壅塞者不可妄用通利之藥只以青  
州白丸子加青礬石治之

凡慢驚風不醒不退者灸百會三里男左女右乳下  
凡慢驚風已退或有餘熱不喜飲食先服四君子湯

一二劑后以集聖丸調之  
青州白丸子

半夏炮川烏去皮炙南星去白附子五共為末

以絹袋盛之用水攤平為度放磁器內日晒夜露  
一日一換其水換水必撓數轉候如玉片丹研細

不用青礬石一另研細以煅礬石同石末入  
銅鍋內煨通紅稍不為度令冷入上藥和勻以糯

米粉打糊為丸以薄荷湯入蜜調送下其痰自墜  
調元湯

黃芪參甘草二白芍五水煎服內經  
云熱澤于內以耳泄之以酸收之此之謂也

醒脾散

人參 全蝎 白附子 天麻 升麻 白茯苓  
木香 白朮 石菖蒲 蓮肉 水一中姜枣煎  
煎服有熱去木香

凡治驚風不可妄用辛香寒涼之藥蓋辛香能竅元  
氣寒涼反傷脾胃也

凡小兒夜啼哭目睛上視日間畧定者此內鈞也蓋  
因受寒氣腹中作痛以至痛極日定以打心燒灰  
調滾水化下理中丸痛止痛退

如小兒日夜啼哭目覩物不轉身後仰者此外鈞也

五食積腹痛其身強直而目亦定以灶心土泡滾  
水送下丁香脾積丸病退痛止

如小兒忽然氣急涎响口眼如常手足不搖身无熱  
者此乍感風寒肺經受邪也用芎藭散一服即退

如小兒腹脹喘滿胸膈氣急兩肋翳動臨下作坑兩  
鼻竅張闔吐咳嗽作渴声啞涎痰壅塞大小便閉

此馬脾風也若不急救或不識症死在旦夕宜先  
用牛黃奪命散下之後用白虎湯平之

如小兒兩手輪指目畧直視此白虎症也但身不熱



手足不掣宜向年白虎方取土泡湯吞蘇合香丸  
 如小兒口吐黃白沫面色變易喘急腹痛反側掣搐  
 其狀似驚但眼不上竄此由精神虛弱外感寒氣  
 卒暴觸忤名各忤耳先視其口中上脘左右有小  
 腫胞急摘破之更以蘇合香丸姜湯化下外以降  
 香皂角二味燒薰以用淡豆豉三合水浸溫搗爛  
 為丸如雞子大摩兒顛上及兩足心各五六遍次  
 摩臍心良久拍開有毛即擲之  
 如小兒久咳腹脹作喘胸高氣逆目睛上視手足牽

引此名龜胸熱症也但身无熱以葶藶丸治之見方  
 嗽以上之症俱與驚相似不可一例施治候若恐  
 傷其命

考蝎散

川芎 葶藶 各一 蝎梢 二 細辛 半 蔓 酒浸 七 次  
 一 焙 乾 共為末 煎湯 調服 或薄荷 湯化 下 亦可  
 午黃奪命散

白牽牛 黑丑 各半 生 半 烏 大黃 枳壳 各一  
 共為末 漿水 調下 涎多 者加 薑少 許

如小兒痘疹驚搐者只用導赤散調服砂末一服不  
 可妄用涼驚抱龍保命等藥  
 西江月  
 小兒驚風症候須分急慢根由急因寒熱泄中求慢  
 是虛寒溫補急為風寒食積慢是久病調膠如斯  
 辨認不差謬藥益神功妙手  
 急驚卒然大熱因而熱則生風痰涎哽塞角張舌口  
 眼歪邪沉重先使嚏驚妙散後用導赤疏通合灸  
 少商與中冲瀉青涼驚選用

君過風寒外感先瀉津汗為宜瀉丹九子作湯臣加  
 上蝎蚕二味果是內傷飲食又當解利相隨三黃  
 五色任施為積去熱除驚止

慢驚先因久病精神漸減脾虛慳 沉困氣長吁口  
 眼張開不乳搐搦時 奔奔四肢逆冷何如理中  
 附子急驅除不瘥艾灸左乳 即刺門穴也小兒乳

要認驚風軍症而如紅粉塗搽口涎涎出緊閉牙目  
 直氣粗声啞喉內响似拽鋸毛喘汗如珠了目睛  
 眼小不須誇大叫闕亂尤怕



搐掣乍作乍止痰涎无了无休昏，新睡喚難醒乳  
 食不知吞吐屎尿遺時少氣四肢僵直難收喘聲  
 不出汗如油喘鼻鼻丹難收  
 小兒驚風咳嗽入，當僕風哮喘大黃白果二牽牛人  
 參分兩勺用四味俱研為末蜜水調和稀稠灌將  
 一字下咽喉免得胡針亂灸  
 兩指伸縮名為搐 十指開合搐之形  
 掣則連身常跳起 顛而四體動搖鈴  
 身即向後為五症 手如挽弓引狀成

凡五心書卷之四  
 驚風

怒目靨高是搐樣 睛露赤活最斯真  
 嘔吐門  
 聲物俱有曰嘔无聲有物曰吐有聲无物曰乾嘔其  
 症有三有寒有熱有食積  
 寒吐者吐時少而出物多此胃虛寒也以理中丸治  
 之或用胃苓丸以暖胃湯送下寒吐食不化惡食  
 熱吐者吐時多而出物少此胃有熱也以二陳湯加  
 黃連煨薑治之熱吐食化不惡食  
 食積吐者要分三集明白俱惡食如食即吐若此積

在上集胃口也宜用滋益湯吞一小中後以鴉翎  
 毛掃喉中令有吐尽則積后以二陳湯加乾薑煨  
 神曲炒麥芽炒砂仁治之如食入之時而吐者此  
 積在中焦下口過小腸上口也燒以丁香脾積  
 丸通去則積后以二陳湯加消導藥治之如早食  
 晚吐晚食早吐者此積在下焦小腸下口過大腸  
 上口也先以丁香脾積丸下之后以二陳湯加  
 消導藥治之消導藥 神曲麥芽炒砂仁香附子  
 之類

凡五心書卷之四  
 嘔吐

如嘔吐久而諸藥不納者此胃口壯火關格之病用  
 二理中湯以薑使備煎汁同炒煎服即愈  
 如嘔吐或至者以理中丸加烏梅一個附子一小片  
 黃柏川椒一服即愈  
 凡嘔吐后瘦弱者只以集毒丸調之  
 理中湯 此藥性熱所以治寒  
 人參 甘草 炒乾薑 白朮 水一中煎服  
 若為丸煉蜜隔時為丸滾水送下  
 如嘔吐不納藥者此明盛拒阻也必加重便備胆汁



者取重便味酸鹹性寒胆汁味苦性寒以和理中湯服則脾胃漸消陽性乃發故內經曰伏其所主先其所因之謂也

二陳湯 此藥性平寒熱通用

陳皮 半夏 白茯苓 甘草 水一中生

姜三片引嘔 吐加白木 煨乾姜此二味嘔吐

必用之藥也 按熱而吐者加 煨乾姜炒黃連

凡傷食加 神曲炒麥芽砂仁青附子山查 此

五味消導必用之藥

本草綱目卷之四

吐

祖傳治嘔吐只用胃苓丸煨乾姜湯亦治之不問寒

熱凡吐不止服藥無效加蠟燭者不治吐不止日

上竄頭后仰者不治

西江月

嘔吐病原不一治者要辨由嘔則物一時有

物無聲曰吐更有聲無物此名噦而乾嘔又當

辨症藥分法有甚難焉措手

冷吐乳食不化腹脹喘急先時面白眼慢氣多干吐

有夾食清水此因風寒入胃或食生冷傷脾抑傷

有乳胃中虛不納乳食吐也

吐唇紅面赤乳食入而難消吐物黃色遍身既大

熱渴多煩燥此因暑氣在胃或食熱物蒸熱胃氣

因熱不和調氣運運吐了

積吐如何分曉眼胞浮而微黃足冷肚熱異尋常登

鞋夜重寤瘳宿冷滯在脾胃故吐黃酸水嘔或吐

酸酸氣味有此傷宿食形吐

小兒傷乳吐者形症更難辨乳緣哺后吐浪瀉或

少停而吐止此因乳食无度脾胃弱不能當運轉

本草綱目卷之四

吐

空乳令兒嘗乳節吐止為上

吐症既分明白治法能貴精微冷吐理中湯最宜熱

吐五苓散桂枝湯吐九轉靈應下后枳朮調之傷乳

而吐藥方青三稜散子為最

嘔吐乳食不納任是湯藥難帶此謂閉塞格於胸時

醫都无主張參朮煨姜熱附島梅查便尤良指胆

同入慢消詳此法應如影响

吐嘔藥不納我有絕勝奇方雖吐乳于妙非常半

夏官桂二棗生姜枳朮多煎并兼少用為良法方



製造水煎嘗仍用生姜為上

一苛細虫吐此為蛔多厥陰烏梅九子効如神一

服細安吐定又有咳而吐者化痰順氣須明如營

嘔吐及胃苓湯用生薑作引

嘔吐不止之症分明說與匠人如服正藥俱无灵更

加煩燥亂悶嘔吐只是不止目睛上窺頭危頭往

上仰魄如飛正好安排后事

再附惡心一症有痰有熱有虛三症生薑通用之藥

宜隨症區處若是胃中有熱二陳加上苓連姜汁

萬氏秘傳片玉心書

卷四

炒過共同煎各用一錢最驗

泄瀉門

泄瀉皆屬于濕其症有五治法分利并提為主

如泄瀉青白或不思食不化腹痛四肢冷而魄白作

渴者此寒濕也其症多得于冬以五苓散作引

吞化理中丸即止如寒甚不止者理中湯加附子

一片即効

如泄瀉注成黃水者或渴或不渴此風濕也其症多

得于春五苓散加防風羌活蒼朮治之

如泄瀉清水厥中无痛者此純濕也以胃苓湯治之

如泄瀉腸滑不止者此濕傷元氣下陷也宜升提之

四君子湯加升麻防風烏梅治之或用四君子湯

吞下七味肉豆蔻丸

如泄瀉酸臭腹痛面黃帶熱不喜飲食者此食積也

先以丁香脾積丸推去其積后以集聖丸調之

如泄瀉日久目无神氣口唇張四肢冷好睡者以四

君子湯調之多服有効甚者加熟附子一片煨姜

服之

萬氏秘傳片玉心書

卷四

如泄瀉日久身熱不退只以調元湯治之此虛熱也

不可妄用寒涼之藥甚者加乾薑即効

凡久泄後人事黃弱者以集聖丸調之

五苓散 入膀胱腎經

朱苓 皮澤泄 白朮 赤茯苓 官桂 此分利

理中丸 陰陽之藥也水一中煎服

理中丸

人參 白朮 甘草 乾姜 加砂仁 藿香

烏梅 附子 朱苓 澤泄



玉露散 此藥性寒所以治熱

寒水石 滑石 各一升 甘草 五錢 共為末每服一錢  
冷水調下或用此藥煎湯吞理中丸

胃苓湯

蒼朮 厚朴 猪苓 澤瀉 白朮 白茯苓

甘草 陳皮 官桂

四君子湯 此藥性溫可以補元氣之不足

人參 白朮 白茯苓 甘草 水一中 姜三片 枣  
二枚 溫服

黃

肉豆蔻丸 此藥性溫而澀所以止瀉也

肉豆蔻 五錢 赤石脂 七錢 廣木香 二錢 砂仁 二錢 枳殼 七錢

白朮散 此治瀉之至藥也

人參 白朮 白茯苓 木香 藿香葉 甘草

乾薑 二錢 共為粗末每用一二錢姜三片引水煎

服 袖珍方非乾薑乃乾薑也

調元湯 此治虛熱之至藥也

黃芪 人參 甘草 如是不退加乾姜即效如

身熱手足寒者加熟附一錢煎服

組傳治泄瀉不問寒熱凡用胃苓丸其一粒 丹以

車前草同炒米煎湯服之

凡久泄不止精神黃好面赤唇紅者不治

凡久泄不止作渴不休者不治

凡久泄不止脈沉細遍身皮冷不思飲食泄滑不止

者不治

凡久泄不止又感驚悸者不治

凡久泄不止或成赤白痢疾者不治

黃

凡久泄不止大肉消瘦者不治

凡久泄不止大孔如竹筒不收閉者不治

凡泄瀉不問輕重只要飲食如常不半他症者不難

于治而為愈

西江月

泄瀉秘傳治法非開不證時人如今得授與子孫勝

似良田萬頃初決且行淡滲溫中以次施行三升

四塞收斂嬰此方古今亦定

泄瀉保何勞作只以水吞無分所以淡滲法先行小



便長而泄定滑石車前赤茯苓白朮芩并草  
澤泄與砂仁姜車煎來作引

淡滲行而又泄須防谷氣中虛濕中丸散不須拘  
受一時泄住白朮入參砂薑炙姜草依書烏梅

熱附澤泄猪引用生薑作主  
溫中若还不効中氣下陷須擬人參白朮黃芪并

草乾姜炙取澤泄猪苓并煎熱附烏梅柴胡  
白芍與當歸引用姜車休養

以此升提未止只因腸滑難收塞用通用更何憂  
其情婦可救參朮炙姜草烏梅粟壳相扶并麻

柯子為婦求姜車同煎溫服  
注：泄不止其間吉少凶多假饒父母不奈何要

你醫時休錯參朮附陳等車砂仁豆蔻粟柯乾蟬  
聲茶木香和赤石醋丸服可

泄瀉時常作渴白朮散子如仙人參白朮木香蒸乾  
當歸香葉片并草車麥七味烏梅加上同煎時

再用代龍肝此法千金不換  
泄瀉如常治法不須別用心机只將黑藥胃苓臣三

服自然停息如此不能取効依前四法支持吾將  
心法教人知脾顯明臣三世

五六月間泄瀉其中舉少熱多理中九子救沉疴玉  
露散子真可不勒四苓作引同吞理中調和自然

泄止莫嗟訖活得人多念我  
夏月人多泄瀉腹疼煩熱相攻猪苓澤泄夜苓同并

草乾姜炙用白朮黃連滑石人參砂薑溫中并麻  
提氣妙无旁更把烏梅煎送

泄瀉症雖各别大要摠因濕成風寒水濕中人身乳  
食過傷為病此由中氣不足脾胃積滯惟深以致

氣脉不調勿故成泄瀉之症  
人皆知有泄瀉當分泄瀉原根冷則滑泄故无声熱

則腸結為痢故致重急後重如車注下有声此名  
瀉症熱緣因下筋條成痼疾

細詳冷泄病在腸中却似雷鳴注下清白水之形而  
白肚疼等症甚者四肢厥逆此由兇瀉寒侵寒氣

在腹刺攻人故令兇患此症  
熱泄色多黃赤小便不利心煩口燥作渴定咽乾食



乳必粗可驗此由腸胃挾熱冷風乘入其間括瓦相傳不安然所以見有此患

冷熱不均泄瀉、色赤白不常或水或谷病為殃小兒如何抵當此由先冷后熱先熱後冷傷腸胃

宿虛內中藏冷熱交攻勾當

更有傷食而泄腹痛乳食不思面黃寒熱異常時糞多酸臭氣味此由乳食過度以致脾胃傷虧遂成

泄瀉病孩提小兒多有此疾

又有一般暑泄多于暑熱之時亦宜寒熱症中推庶

心身事錄

十一

好射酌用劑若或瀉濇赤白腹大青筋髮稀或吐

泥土出蛇時此為疳泄之疾

久見泄多青色亦或赤此有時睡臥不安忽驚悸乃

是驚泄之勢此是脾受肝剋速宜及早醫之若變

疳風痲瘋時就是神仙費力

泄瀉津成黃水或濁不濁殊途此在風濕症中求多

病春天時候如或瀉下青水腹中不作痛楚此是

純濕病之由症傳明兩表后

泄瀉腸滑不止濕傷元氣陷虛藥宜非齊救地驅繞

得理妙處如或泄瀉日久身熱仍不除此為日久氣多虛調元湯劑且服

治泄之法瀉水腹死新存此藥因受濕分明四

苓一木當增飲食不胃不吐宿食不化純在此則

氣虛痛之根參苓朮芍也

腹內痛甚瀉瀉、后痛甚此此在食積在中尋神

曲大黃排湯一劑一泄此障泄火更見腸鳴大便

分明用四苓和上步通走勝

大端泄瀉瀉瀉法條貫分明匠人兼要細詳論尤

心身事錄

十一

黃休方對瀉瀉只依前法瀉藥切勿驚先行若然

胡亂敗章釋反更病腫重症

泄瀉不知症候許久不止堪憂精神衰好瀉无休而

赤唇紅消瘦脾理若見沉細瀉泄不乳額熱痰瀉

赤白或驚搐大孔如筒不救

辨瘵歌

便黃因內熱紅赤兼同青綠而青皆冷丹肥食臭嗜

久泄四肢麻痺驚悸不安瘵疔毛作穗涎嗽定陽寒

肝冷傳脾臭綠青

其黃脾土熱之形



肺腸寒色腥粘白 赤熱因心腎熱成

身熱發厥歌 久泄多虛熱

氣虛多發厥血虛須作熱氣血若俱虛身熱手足厥

吐瀉門

吐瀉名曰霍亂其症有三有寒有熱有食積

凡上吐下瀉兩腿紅赤遍身熱口作渴吐瀉時多而

出物少者此屬于熱用五苓散燥乾薑治之或用

燥薑湯透冷調服無效神效

凡上吐下瀉而腕白足冷腹痛多啼哭不作渴吐瀉

時少初出物多者此屬于寒用理中湯治之甚者

加附子烏梅効此上二症皆不阻乳食

凡吐瀉出物酸臭面黃不喜飲食腹常作痛者此食

積也以丁香神精先推去其積后以集聖丸調之

凡吐瀉久身瘦作熱者只用集聖丸治之

祖傳治吐瀉不問寒熱虛實只用胃導丸燥薑湯透

下即安

益元散 又名六一散又名天水散

滑石兩六 甘草兩一 為細末或煎服或冷水調服

凡吐瀉不止作瀉不休者不治加驚搐者不治口舌

生瘡手足冷身熱此陰勝陽升脾氣中絕不治

西江月

大凡男女吐瀉明陽順逆當明男走瀉甚下走陰女

子吐多不應出物多而數少此為寒盛相侵如逆

物少數頻、火盛細加依認

吐泄若是同見此名霍亂用理中只用一劑理中湯上

吐下瀉了當服此若还不効再加熱附燥薑烏梅

作引是良方其與俗人誇獎

吐瀉時三作瀉諸般湯藥無效飲水飲湯腹膨、東

手坐現死症急用伏龍飲子時 吳吃調停頭更

吐止火即寧緣此理中對症

吐瀉分為三症食積寒熱當知面黃真與惡乳食此

症方為食積若身熱作瀉宜為熱症法除面白

身寒腹痛時正是虛寒之疾

食積宜行轉取足應去積為宜如途熱症又何如

元五苓為主寒症理中可用甚加附子烏梅寒熱

總用胃導奇吞用乾薑煎水



痢疾門

痢疾不問赤白皆屬濕熱或以赤為熱白為寒者非也亦有食積而成者其治法有痢有泄赤白濕熱皆有但熱症腹痛濕熱症腹不痛

凡痢有赤此濕熱傷脾分推小腸中來也以四物湯加黃連香薷木瀉之

凡痢有白者此濕熱在氣分從大腸中來也以四君子湯加黃連香薷木瀉之

凡赤白相雜者此血氣俱傷以八物湯加黃連黃芩

黃柏香木滑瀉清之

凡治痢疾不問赤白但初起之時急後重腹中腹痛者先用三黃丸大承氣瀉下之後用香薷丸

凡痢赤白日久人羸虛弱經下精盡下之則人事虛而不可損其不足者不可則積不去而難愈只用佛和老連散數次快散止痛為度後以香蓮丸調之

凡治痢不可妄用也車草牛只用三黃丸穩當

凡痢有鮮血者用清血丸以車前草陳米煎湯送下

凡痢有白涎久不止者用固腸丸以陳米飲送下

凡暑月痢純血者以益元散炒過滑石加紅曲為丸陳米飲送下

凡赤白痢脫肛者此氣下陷也宜升提之和中丸以升麻湯吞之

凡赤白痢嘔吐不食者此名禁口痢用木香則失之溫用山藥則失之閉只以參苓白朮散加石菖蒲末陳米飲調下胸次一開自然思食

凡痢止后身熱不退或人事疲弱者只用集玉丸

芍藥湯

行血則便膿自愈和氣則后重自除

白芍二兩 歸尾 黃連 黃芩 各一 大黃 七 甘草

煨即 木香 桂心 各五 右細切作一服水碗

半煎一碗空心服如痛初起重急迫者倍加大黃加芒硝一各若痛滿氣不宣通者加枳實一各

四物湯

當歸 川芎 白芍 熟地 加 黃連 黃芩

黃柏 水煎溫服

四君子湯 見門加 黃連 黃芩 蒼朮 水煎服



八物湯 見胎加 黃連 黃芩 黃柏 蒼朮

滑石 枳壳 枳即 水煎空心温服

三黃丸

黃連 黃芩 大黃 各等分為末神曲糊丸木

香枳即湯送下

大承氣湯 此通腸去積之藥

枳壳 厚朴 大黃 芒硝 甘草 加枳即水

煎服

保和丸 凡食積脾胃虛者用此藥

山查肉 神曲 半夏 白朮 陳皮 萊菔子

連翹 各五 麥芽 炒一 甘草 共為末蒸餅和丸

如粟米大米飲送下

清血丸

槐子 炒 荆芥穗 枳壳 炒 側柏葉 炒 各等分為

末醋糊丸陳米湯送下

同腸丸 即二根丸

紅椿木根白皮 白椿木根白皮 各等分為末

米糊丸陳米飲送下

清六丸 即益元散加紅朮是也血痢者此方主之

滑石 炒一 升草 半二 紅朮 炒 為末米糊丸陳

米湯送下

和中丸

黃連 炒 陳皮 各五 澤瀉 車前子 白朮 山藥

白朮 木香 石蓮肉 肉豆蔻 炒 乾姜 炒

人參 各二 共為末醋糊丸陳米飲送下如脫肛者

升麻湯送下

參苓白朮散 此藥性平補助脾胃之藥也

人參 白朮 白朮 山藥 白扁豆 甘草

桔梗 薏仁 石蓮肉 各一 加石高海 炒

共為末陳米湯化服

血痢治痢不問赤白只用保和丸香連丸調之

凡痢久大熱大渴不退者不治

凡痢日久六脉洪數面赤身熱者不治

凡痢日久作渴不止者不治

凡痢日久嘔吐不食服藥無效者不治

凡痢日久不止下紫血成塊者不治



凡痢日久下膿水如屋漏塵水者不治

凡痢日久大肉瘦削折者不治

凡痢久脫肛出寸餘者不治

凡痢久轉作驚搐者不治

凡痢變作泄瀉飲食如常者易治

西江月

痢疾古名滯下食積濕熱相蒸腸鳴腹痛不能安裏

急后重无過赤乃小腸火盛白自大腸邪傳惡匿

以白作寒者辛熱行元散

治痢无過二法河間秘訣

取十全无變丸行復重自止血和下痢自瘳寒涼

淡滲禁辛并不可怕年深日遠

凡痢先行通藥黃連枳殼多加酒蒸肉大黃或用

三黃推湯若是虛人忌此且從消導推詳保和丸

子是仙方只要認痛停當

下后痛除乘急丹將赤白消詳赤痢无過剪紅方白

痢同腸穩當赤白相兼不愈有連九子高強壯精

御郡把名揚奪取錦纏頭上

若過時行痢疾排門一樣无差頭疼身痛慢吁勞

一病行須怕先用人參敗毒次將承氣推車然後

察脈看藏加虛突分明調他

痢久前法不止氣隔腸滑者作急將赤藥與黃升因

流涎行甚穩參朮并麻歸芍烏梅粟壳連苓乾姜

柯子赤茯苓陳皮作引

記得痢症藥品解毒子參連大黃芒硝可推陳本

香青皮痛定梅加枳壳后重非麻紫胡排非回腸

粟壳柯梅夏澤泄來參水順

痢疾不治數症勝若洪大濼防滯口不食吐水兼大

熱煩渴腹脹大孔不收勉力集和壓鼻爪穰面紅

唇赤陷眉暈乳急悶亂死樣

小兒肛頭脫出此由泄痢濕沉氣虛下陷不能并冷

並不和相併毒急后重唯使用力太過傷神以致

肛出冷寒乘不得收運而健

長識脫肛症治養血和氣為宜川芎白芷與當歸白

芍人參赤石棗子山藥蓮肉龍骨五倍相隨細研

五倍九子兒仍用米湯吞吃



內服湯丸取効外用醋藥扶持保上側掛壁壘灰生  
頭燒灰研細鼠糞共末艾摺入桶用火燃之人坐  
其上令煙直頂刺鼻頭收入

前法若还不効由採取搗為泥朴附大黃共和之煎  
膏敷上即愈不効再用搽藥熊胆水片堪題題胆  
調搽病即除此法逐人牢記

導乳琴連共木香 大黃婦芍亮按即  
痢下膿血時无度 昏取一服即安康

治脫肛浴法 用陳艾煎水以陳壁土研細入艾水

澄過渣以艾水溫浴之俟收入為度外用

煎法 用麥麩以好米醋和成薄餅敷在脐上將艾  
薄鋪于餅上燃之



萬氏秘傳片玉心書卷之五



瘡疾門

瘡疾治法有二新瘡先截後補久瘡先補後截

疔瘡要分早晚治之如上半日發者此邪在陽分氣

位也先用平胃散加常山草果截之後用平瘡芥

脾丸調理而安 如下半日發者此邪在陰分血

位也輕者以四物湯加桂枝桃仁紅花發出血

寒邪甚者以小柴胡湯加升麻當歸提到兩分

瘡以小柴胡湯加常山草果截之畧愈以平瘡芥

脾丸調之而安

如瘡來寒多熱少者以平胃散加常山桂枝草果仁

截之熱多寒少者以白虎湯加常山草果青皮截

之寒熱相半者用小柴胡湯加常山草果截之後

以平瘡芥脾丸調之如大人以補中流氣湯調之

以上數症皆先截后補也

如久瘡連綿不逞者或二三日一次其邪已深不可



妄用截藥只以平瘡赤脾丸調之在汗要无汗无汗要有汗其瘡易退再要避風寒禁雞魚冷水死不安者如犯禁戒維九轉靈丹亦難治也

凡瘡後轉作痢症者此症多得于夏末秋初因內有伏閉多傷生冷故也當從虛治不可妄用通利之藥如平常下痢者以香連九米湯送下

如瘡痢併作者以平瘡赤脾丸橘皮和中丸相間之如瘡后遍身浮腫者此因汗后受風故也以胃苓丸加五加皮大腹皮灯心長流水煎湯治之大兒加

戒胃苓湯治之外用浴法于日當午時向避風處以溫水拂拭遍身畧睡一時以被蓋之微汗為度每日依此行之為妙甚効

如瘡后腹脹或喘或不喘者此因內傷生冷脾肺俱病故也蓋脾主脹喘屬肺以痛氣丸消脹以葶藶丸定喘治之后以集聖丸調之

如瘡后腹中有痞者此瘡母也因多食冷水所至亦有熱而痞者治以月塘丸主之凡瘡后形體瘦者只以集聖丸調之

平月散 此治濕養脾之藥也

香朮 米泔浸炒 厚朴 姜汁炒 陳皮 各二錢 甘草 一錢 加

常山 紅草 薑來引

四物湯 此藥性平治血不足之聖藥也

桂枝湯 此發散風邪之藥也

桂枝 赤芍 甘草 姜來引

小柴胡湯 此半表半裏之藥也

柴胡 二錢 黃芩 一錢 半夏 七錢 人參 七錢 甘草 五錢 加山枝

丹皮 各加味小柴胡湯 姜來引 心中飽悶加

枳殼 桔梗 痞滿加黃連枳實 渴加知母石膏

內熱甚錯語心煩不得眠者合解毒湯

白虎湯 此藥性寒所以治熱也

石膏 五錢 知母 二錢 粳米 一升 甘草 七錢 水煎服

以上諸方截瘡必用常山草果者蓋此二味乃治

瘡必用之藥也

補中益氣湯 此補中氣不足之聖藥也

黃芪 人參 甘草 柴胡 升麻 白朮

當歸 陳皮 水煎姜來引 有汗用白朮無汗



用養本治瘡加青皮

加養胃養湯 此參利之至藥也

米苓 澤泄 赤茯苓 白朮 官桂 五加皮

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 木通 大腹皮

防風 生薑皮 灯心 姜引取 順流 水煎服

平瘰養脾丸

婦身 人參 陳皮 去燥 各 黃苓 二 草果仁 一 各

南尾 炮 一 白朮 五 一 白茯苓 一 紫胡 五 一 甘草 五

共為末米糊丸如黍米大竹葉炒米湯下一方加

常山 黃芪 鱉甲 醋炙 黃色

月瘡丸

木香 人參 黃芪 當歸 桔梗 史君子肉

黃連 山稜 枳實 義木 椶櫚甲 灰 苦練根皮

乾蟾 燒 存 柯子肉 夜明砂 綠丸 各 共 為 末

醋糊丸陳米湯下

祖傳治瘡之法以斷絕丹截之胃苓丸調之常用平

胃散加常山草果為末每服一字于臨發日五更

用桃柳枝七根煎湯調服

治大人瘰癧方

人參 五 常山 三 炒 枳殼 三 草果仁 四 藜豆粉 炒

甘草 灰 貝母 三 青皮 五 水煎服

又方

常山 枳殼 一 當歸 蒼朮 甘草 陳皮

先一服用酒搗細滾酒泡服如不效將桃枝七根

灯心七根水煎二三滾露一宿發日五更溫服禁

生冷鷓鴣魚藥物

西江月

瘰癧來時潮熱內傷外感生瘰初時截法似神仙不

可兼虎遺毒外感小柴飲子內傷平胃為先內加

草果與常山東西桃柳枝煎

截后線調脾胃只消清瘰養脾法和補正作良臣不

讓仲陽錢氏瘰癧丸著成瘰癧面黃腹滿消肌月瘰

集聖是根基此個方兒審記

如是小兒久瘰或于半后來潮又如間日又三朝截

法不宜急暴只用養脾清瘰相集集聖和調神丹

蘇氏真神曉曉日五更分曉



瘧痢如逢此作其調吉而須知二端飲食要加時胃  
氣完全可治若是不思乳食強持脾胃扶持胃奉  
九子其差池間以香地止痢

久瘧多成壞症脾焦肚大青筋頭乾脚細或元神欲  
食全然不飽面目羸浮怯弱四肢無力准行不瀆  
醫治枉勞心尤死一王危病

平瘧養脾用人參 白朮陳皮當歸身  
茯苓厚朴姜汁炒 蒼朮五錢米水浸  
粉草半夏浸七次 青皮柴胡共黃芩

常山草果二錢半 鱉甲五錢勸細切

發熱門

小兒凡病有熱症既不同治亦多異酒分虛寒不可  
妄用汗下也

傷風發熱其症汗出身熱呵欠目赤泄多腫惡風喘  
急此因解脫受風所致宜疎風解肌退熱先服紫  
荷解肌湯發去風邪結道七時再服涼驚丸以防  
內熱

傷寒發熱其症无汗身熱呵欠煩悶煩急而未喘急

惡寒口中氣熱此因解脫受寒所致宜發散寒邪  
退熱鎮驚先服醒心散發去寒邪後以涼驚丸以  
防內熱 以上二症如小兒驚賦原寒者可用涼  
驚丸若虛怯者不如只用胃苓丸甚効

如傷風發熱又吐泄者不可發散此脾虛怯也只  
以五苓散吞理中丸甚効

傷熱發熱多得于夏其症身熱自汗作渴昏睡手足  
俱逆此因天乳已熱包漿太厚重受其熱也先以  
白虎湯調益元散以解其熱次服調元生脈散以

補正氣

傷暑發熱亦多得于夏其症身熱自汗作渴昏睡手  
足冷此由阴寒中食涼太過所致服調元生脈散  
補其元氣次服四君子湯以防吐泄之病

如夏月汗出當風以致身熱渾身自汗不寧者此名  
暑風四君子湯加麻黃根黃芪以去風次以益元  
散以去熱

傷食發熱其症手心脾腹在熱噎乳吐乳大便酸臭  
或腹疼多啼飽脹喘急不思乳食此因飲食過度



所傷宜先用利藥去其積用丁香脾積丸復以集  
至九調之  
如傷食已久日漸黃瘦无時作熱者不可下之野者  
保和丸重者集至九百无一失  
痘疹發熱其症面燥腮赤目胞赤呵欠煩悶乍熱  
乍涼咳嗽噴嚏手足指冷驚怖多睡此由時行痘  
疹各相傳染宜清熱解毒惟痘疹宜參蘇飲加水  
香麻痘宜用荆防敗毒散不可妄施汗下恐生變  
症若變蒸發熱此小兒常症不須服藥見本門

片玉心書卷五

一

潮熱者當分二症有時間發過時即退來日依時  
復發其狀如癰此肺熱也荷早晚發者每日兩度  
如潮水之應期者此胃熱也蓋因感觸邪氣以致  
血脈凝滯不得流通若不治之變為驚悸者多矣  
肺熱地骨散主之胃熱三黃丸下之如虛熱者用  
集至九調之  
驚熱者通身發熱而青自汗心悸不寧脈數煩燥煩  
叫恍惚此心熱也以涼驚丸退熱安神丸定心  
以熱者但夜發晝退此血虛症也以人參當歸散治

之更無抱龍丸以防作搐  
熱者傷寒汗后而熱又來乃表裏俱虛氣不歸元  
陽浮于外不可再用寒涼之藥古人戒之當和胃  
氣使陽氣收斂共進人參養榮主之甚者四  
君子湯加炒乾姜即効  
瘧熱者形色黃瘦食不長肉骨蒸盜汗泄瀉无常壯  
大脚小此多得于大病之后失于轉息又或傷飽  
失飢用集至九調理  
壯熱者一向熱而不已由乳血蘊聚五臟生熱鬱蒸

片玉心書卷五

一

于內則睡卧不安精神恍惚兼發于外則表裏俱  
熱燥急喘粗甚則喘急癰先以導赤散泄青丸以  
治其熱后以抱龍丸鎮其驚如突然大小便秘者  
三黃丸下之  
煩熱者心燥不寧五心煩熱四肢溫壯小便赤色宜  
導赤散加麥冬山棧仁治之再以涼驚丸撤其除  
邪  
積熱者煩赤口瘡大小便赤澀此表裏俱實或內傷  
酒麵煎燒熱瀉峻補外因厚綿炒火所侵皆能生



此內外蘊積之熱也非食積先以三黃丸下之  
后以涼驚丸調之

汗下太過津液虛耗或因大病之后元  
氣受傷皆能生熱其症困倦少力面色青白虛汗

自汗浸淫氣軟弱手足厥冷此氣血俱虛氣虛則  
發熱血虛則發熱也四君子湯加炒乾姜甚著加

熟附子一片待熱少退以涼驚丸調之

發熱者陽邪下于心也心若受邪則熱形于額故先  
起于頭面而身熱恍惚多驚聞聲則恐此由正氣

虛而邪氣勝故其之交爭發渴死時進退不定如  
客之往來先以導赤散去其邪后以涼驚丸調之

解熱者由乳食不消伏結于中致成癖塊以生內熱  
蓋灼于外集聖丸主之

瘧熱者寒熱往來有頭痛汗出者有嘔吐不食憎寒  
壯熱作渴者有遍身疼痛者或吐泄者症既百出

病非一端頭痛汗出及遍身疼者小柴胡湯加蒼  
朮羌活治之腹痛者脾積丸下之作渴者白朮散

治之吐泄者理中湯治之后用平癘養脾丸調之

血熱者每日巳午時發熱遇夜則涼此心熱也輕者

導赤散重者四順散治之

柴葛解肌湯

柴胡 乾葛 黃芩 桂枝 赤芍 人參

甘草 竹葉七皮姜棗引

怪散

人參 白朮 白朮 甘草 桔梗 天竺粉

細辛 防風 川芎 加麻黃 薄荷葉 姜引

調元生肌散

黃芩 人參 麥冬 甘草 五味子 水煎

參蘇飲

人參 半夏 茯苓 甘草 桔梗 枳殼

乾葛 前胡 木香 蘇葉 陳皮 姜棗引

防風敗毒散

生地 防風 連翹 升麻 剝芥穗 牛蒡子

玄參 酒糟 人參 桔梗 甘草 水煎服

地骨皮散

知母 紫胡 升麻 地骨皮 赤茯苓 半夏



姜三片引水煎服

人參當歸散

人參 歸身 生地黄 地骨皮 柴胡 甘草

生薑引

四順散 鮮小兒疳熱

當歸 大黃酒 赤芍 升草 水煎服

祖傳治發熱不閉其症脾胃虛弱者以胃苓丸竹葉

炒米湯吞元氣虛者以涼驚丸竹葉薄荷灯心湯

送下隨症用引

西江月

西江月

小兒病則生熱須知得病根苗風寒外感熱來潮飲

食內傷煩燥吐泄瘧痢疹疥變蒸痘疹如燒骨蒸

體熱漸成勞調治難分曉

若是風寒外感面紅又惡風寒怪散子妙難言有

咳參蘇効驗飲食內傷可下三黃脾積加參再加

集至保平安莫使脾胃虛難轉

泄胃苓最妙赤白痢用香連瘧家平瘧解和干瘧

疥胡麻丸散更煎小兒常病不須安用藥丸如逢

瘧疾汗下作錯誤汗誤下傷人應汗而下瘧疾後

下而汗驚走只為不明表裏致令兇命早傾果能

從摸且因循藥用胃苓集至

哮喘門

哮喘之症有二不離痰火

有卒感風寒而得者有自傷鹽水而得者有傷醋湯

而得者至天明則發連綿不已輕則用五虎湯一

帖重則洋鹿丸治之此皆一時急解之法若要斷

根常服五至丹外用灸法

五至丹

天南星煨 半夏泡 陳皮去白 甘草

杏仁四十九粒 先以南星半夏二味研末姜汁皂

角汁拌勻和作餅又將甘草陳皮研末取竹瀝一

碗以藥和成餅子焙乾又浸濕又焙乾竹瀝不為

度再研杏仁泥蒸密和為丸臨時噙化一九以薄

荷湯送下

取心心 尾三單心 各三粒仍蒸酸醃平

取心心 尾三單心 各三粒仍蒸酸醃平



熱之物

西江月

哮喘症雖有二皆由痰火中藏或被風寒襲外方門  
披盪水醋哈亦有乳哈而得致令攻脈為殃用藥

調理法雖良斷根灸法為上

哮喘多成宿疾天阴飲而連綿治時登表及行痰九  
室時常靈驗表邪未除五虎裏突毒蘆為先不須

訛石作成九候了孩兒命短

咳嗽門

咳嗽門

書

咳嗽治法有三有發汗有下泄有清補

如初起挾風寒外感者轉則蘇沉九室湯重則五虎

湯一帖即効

如咳久身熱喘急此肺中伏火也以葶藶丸利之

如咳久肺虛連綿不已即當補肺阿膠散主之

如咳久連声不已口鼻出血者茅根湯主之

如夏月得咳嗽者以加味白虎湯治之不可汗下見方

門

咳痰甚精以利痰九主之方見醫門

如咳久成龜胸者以葶藶丸主之

如咳嗽吐血者二陳湯加姜汁主之

如咳嗽咽痛声啞者以井栝湯主之

蘇沉九室湯 此發散之藥也

桑白皮去赤 甘草 大腹皮 官桂 陳皮 蘇葉

麻黃節不去 烏梅一个 薄荷葉 杏仁皮尖不去 各等分姜

引水煎微汗為度

五虎湯 此發散之上藥也

麻黃比杏仁大一 甘草四 細茶炒七 白石蓮半 水

五虎湯

書

滋陰清肺風

葶藶丸 泄肺喘通水道

葶藶炒 黑牽牛炒 杏仁去皮尖 漢防已 各等分

共為末然後入杏仁泥和之棗肉同搗為丸淡姜

湯送下

阿膠散 定喘消痰止咳此補肺之藥也

牛蒡子 井草 杏仁 烏兜參 阿膠粉炒成

糯米 水煎服

引限湯



陳皮白半夏炒茯苓 甘草 天冬去心杏仁泥  
片參 枝子 貝母 知母 石燕 瓜蒌霜  
生地 桔梗 水煎取茅根自然汁和服  
凡咳嗽日久而青而光其氣喘促哽氣時多出声唇  
白如練此肝氣旺而肺氣絕者不治一  
凡咳嗽日久喉舌生瘡其聲啞者不治  
凡咳嗽日久胸高而喘肩與胸脇俱動加驚搐者不治  
凡咳嗽日久潮熱喘急一咳之時面青黑目上流血  
從口鼻長出者此本火旺盛而肺已絕不治

唐李中書奇效

姜

凡咳嗽日久面白唇青目閉悶亂頭暈手擺者此肺  
氣將絕不治

西江月

小兒或病咳嗽醫家症要分明咳為有傷于肺經嗽  
則脾家瘕瘕有聲平痰是咳無聲有痰嗽真時乎  
咳嗽病同臨有聲有痰一定

小兒傷風咳嗽其症身熱憎寒自汗燥煩不安然日  
夜嗽聲先通時常鼻流清涕咽喉不利痰涎肺浮  
頭痛症多端治則宜乎發汗

咳嗽或傷寒症此因飲冷形寒冬日坐卧濕地開  
後冷風吹犯其喉脈紫无汗煩燥不渴惡寒治宜  
發散汗為先藥用參蘇飲驗  
此是咳嗽傷熱其症而赤燥煩飲水不止隔咽乾咳  
唾稠粘症現甚則急喘而喘痰涎必生喉咽潮熱  
手足或冰寒小兒多有此患  
咳嗽若患火症決然咯唾血濃甚者七竅血流通此  
是肺熱火動若吐青綠白水胃冷停飲相攻嗽吐  
痰涎乳食中宿滯不消取用

唐李中書奇效

姜

要知治嗽大法依時認症扶持春天外感症無疑夏  
是炎上火氣秋則肺傷燥熱冬為風冷相隨相時  
而動作良醫對症依方用劑

大抵實者當下虛則補藥為宜寒者溫散藥中推推  
症清涼為貴凡則佐當發散停痰消逐為施初然  
止泄莫投之德要化痰順氣

肺乃五臟最嬌皮毛為感風寒初醫發汗最為先杏  
仁麻黃桑葉薄荷百葉甘草黃芩桔梗人參而胡  
枳壳喘茶煎一服消風散散



久咳不宣發汗化痰順氣為宜潤下至液有神不  
幼百行湯劑貝母陳皮枳殼茯苓甘草桂枝前胡  
薄荷杏仁泥有熱石羔堪取

久咳痰壅發熱看他二便何如若還清利是中虛只  
用抱龍區慶如果秘結實熱葶藶五色驅除要分  
虛實不須拘此見小兒命主

久咳連声出血清金降火為佳參連并桔款冬花知  
貝二冬多下去白陳皮枳殼前胡地骨霜木茯苓  
玄參茅根如此個方兒死價

大九咳救治法

大

大九咳救治法必須清化痰涎化痰順氣最為先氣

順痰行咳減順氣陳皮枳殼化痰半夏夏天南黃苓

按子火邪干桔梗茯苓開漆

虛咳時加作熱西黃氣短无神當歸陳皮白朮苓枝

子黃苓枳殼知貝前胡天麥甘草枳殼人參更加

黃栢炒如神煎用生姜作引

久咳連声不已西青目窺常吁胸高有息汗如珠臉

白唇青背脊骨瘦如柴潮熱鼻乾髮燥神虛嘔噎

驚搐不須拘縱有靈丹无驗

蠟蒸瘴論症治歌

咳嗽小鷄鳴痰多吐血淋非麻湯一劑管叫得安寧

心腹痛門

心腹痛有六有寒有熱有食有積有五有霍亂

小兒外感風寒內傷冷物胃氣當心而痛啼哭悶

絕手足冷或吐或不吐以熱手按摩則止若用草

豆蔻丸主之

凡小兒受寒遠腹疼痛叫哭不寧手足冷汗出或泄

或不泄得熱稍定以中湯主之

凡小兒腹痛

凡

凡小兒腹痛无時舉者此積痛也不可數下則

氣傷而難愈以集毒丸調之

凡小兒飲食之后卒然腹痛此傷食也須問其平日

日有此疾否若原無此疾作傷食者以丁香脾積

丸利去所傷之食用原傷之物煎湯送下后以集

毒丸調之若原有此疾當作積論

凡小兒心腹疼痛嘔雜口吐清水面黃肌瘦得食即

止肚飢又作嘔雜痛此虫痛也先用雄黃解毒丸

苦練根白皮煎湯吞下進去其虫后用集毒丸調



之如元氣弱者不可下只用集聖丸主之

凡小兒昼則死夜則啼哭此腹痛也蓋暖屬閉痛  
主寒遇夜則發閉寒甚也以理中丸灯心燒灰煎  
湯下

厚豆蔻丸

草豆蔻 麵包煨去陳皮 大澤泄 半夏 各一各  
桃仁 七粒 去 麥芽 炒二 神曲 炒 柴胡 姜黃 各四  
共為末湯浸蒸餅為丸白湯下

丁香脾積丸

丁香 良姜 醋炙各 木香 巴豆霜 三枚 煨  
莪朮 各三 青皮 醋炙去 皂角 煨存性 百草霜 四各  
共為末醋糊丸有積茴香湯下 傷食原物湯下  
水泄若并草湯下

祖傳治腹痛甚若解毒丸下之輕者脾積丸下之

凡小兒心腹痛急面青手足冷指甲青目上瀉闊亂

煩燥狂言和諸噴鼻喘急者皆不治

西江月

凡過小兒腹痛必須察認原由西黃腹痛食中求驗

白肝虫作楚指冷而青寒痛三家啼哭无休或温  
或下藥先按不可認時差謬

積痛先行脾積散脾以次調和虫家別用取虫科集  
聖助之服可寒痛理中藥妙藥黃湯引宜多至時  
腹痛又如何集聖妙如利藥

積痛有時發作面黃腹脹唯症丁香脾積下當先后  
用養脾調緩蒼白青陳曲麥苗香莪朮山稜砂仁  
靈脂木香其枳實黃連川練

靈脂時作楚面白青水長流極即芦香與糖越君

子薑黃陳肉白朮木香靈脂黃連枳實砂莪朮青陳  
乾蟬與麥曲引去痛除是福

疝氣門

疝氣初得屬寒久則屬火

凡小腹疼痛外疝腫硬者此名疝氣蓋由小兒久寒

濕地以致寒氣內侵于疝而得所以小腹刺痛外

疝腫硬但左為偏墜右為膀胱輕者內服五苓散

加苗香川練子橘核按即少加水通屢試屢效甚

者加附子一片即効后服茱萸內消丸調之外用



敷藥及薰洗法

凡小兒性急多啼有傷于脾胃以致羸九腫大下  
者小腹不痛但外囊溼大泪之有聲此宜二陳湯  
去耳草加海藻昆布荔枝核小茴香川練子為末  
順流水調服更以瀉青丸去大黃加青皮相間服  
敷藥 用蚯蚓糞不拘多少為細末以葱汁調敷腫  
處一日一換以消為度  
薰法 用葱搥研細煎百沸湯入鹽少許以瓶盛之  
令小兒正坐其上蓋其腫處待水溫洗之後加敷藥

灸法

灸法

灸法 牽小兒兩臂向膝側比之尺處是穴左則取  
左右則取右併灸三兩交穴各三壯  
祖傳治小兒疝氣偏墜用茱萸肉消丸外用敷藥  
西江月  
疝氣如何而得下焦結膀胱腎囊腫大似茄樣左  
右墜難抵當內服茱萸丸子外用龍土葱湯待他  
痛止腎消囊再灸兩邊膝上  
我有得傳妙法楠核木有沉香茴香大小用相當食  
鹽故紙為上巴豆少炒川練去巴取練如常研為

浮腫門

浮腫法開也門者發汗也潔淨府者利小便也  
凡小兒面目遍身浮腫者或因胎稟虛弱卒胃風濕  
或因瘧疾汗后不曾禁風皆成此症輕者用胃苓  
丸治之重者用加減胃苓湯治之  
凡小兒浮腫又加喘急者此脾傳肺也當專治脾而  
兼治肺日服加減胃苓湯夜服葶藶丸如先喘急  
而后面目浮腫者此肺傳脾也當專治肺而兼治

脾日服葶藶丸

葶藶丸

脾日服葶藶丸夜服胃苓湯加麻黃杏仁  
如先浮腫而后腹脹者此表邪傳裏也只以加減胃  
苓湯主之  
凡浮腫不可妄用汗下藥不單用大戟并逐牽牛之  
類以傷元氣  
加減胃苓湯  
陳皮 蒼朮 厚朴 枳實 茯苓 赤茯苓  
澤泄 木通 白朮 官桂 滑石 防己  
五加皮 生薑皮



因... 麻黃杏仁桑白皮

腹脹者加 大腹皮木香枳即蘇梗去甘草

氣虛者加 人參 灯心引煩取長流水煎溫服

浴法 于平時適蒸百沸湯畦風處浴之蓋要零取

微汗日 依此行之効

祖傳治浮腫只用胃苓丸用長流水五加皮灯心煎

湯吞外用浴法

凡浮腫氣促面黑脉微細不飲食者不治

西江月

...

...

小兒病患浮腫或因胎氣蘊虛幸得風濕外和款以

一數渾身腫起又或諸病汗下脾虛又被風吹遂府

浮腫甚憂症別輕重用劑

輕用胃苓丸子重則加成堪行再用浴法保安寧此

法古今未定亦可大梳汗下木補亦不單行能依

方法救孩嬰方可稱為司命

大抵浮腫治法也門淨府須知木通防已五加皮蘇

葉車前滑石滑澤面茶飲子補脾平胃通宜灯心

長流水煎之每日清晨早吃

要識浮腫死症氣候面黑頭憂脉微細小不堪謀飲

食不殮難救臍韻糞如羊屎太山倒了難扶忽生

大喘肺經虛縱有丹何救

脹滿門

脹滿專屬于肺有虛脹積脹熱脹寒脹

虛脹者或因吐泄或悞服下藥致成脹滿者此宜補

中調氣利小便以四君子湯去甘草加厚朴陳皮

蒼朮木香木通治之蓋中滿忌甘草所以去之若

厚朴乃脹滿必用之藥

積脹者腹中原有食積結糞小便黃腹時作痛微喘

脉實時 飲水又不能食者可下用下春脾積丸

下后以集聖丸調之

如脾胃素弱不能消導運化傷食作脹者先補脾四

君子湯去甘草加厚朴陳皮砂仁后以脾積丸下

之后天補脾集聖丸主之輕者只以保和丸調之

熱脹者渾身壯熱而赤煩燥大便秘此因胎稟素厚

悞服藥而致者急以三黃丸下之不通者用胆導

法下后以胃苓丸調之



寒脹者因寒積鬱結而脹手足厥冷而青氣急先以塌氣丸治之

凡脹滿喘急除寒脹一症其餘俱以葶藶丸治之

亦有通身瘡疥因淋洗盆擦過毒婦內而腹脹者輕

則敗毒散治之重則解毒丸下之瘡出腹消而愈

如而青黑氣上急手足冷目直視或目閉嘔乳者皆不可治

塌氣丸

胡椒一錫稍云毒共為末糊丸陳米飲下一方

敗毒散

加蘇首子名楊九子

敗毒散

荆芥 防風 連翹 枳殼 葶藶 薄荷葉

羌活 獨活 桔梗 乾薑 木通 金銀花

黃芩 川芎 甘草 山枝子 土硫加葱三煎

下腫加灯心一握 葵三片引水煎服

凡腫脹大小便不通嘔吐者不治膀胱與背平者不治

凡腹脹喘急氣長出目閉不食者不治

凡腹脹喘促驚搐亂者不治

杜傳治腹滿以解毒丸下之胃苓丸調之

西江月

腹脹名為惡症寒熱虛分明忽然飽悶勢律傷

食熱家休認吐泄腹而來形大便秘而實因四肢

浮腫濕寒尋痞瘕久減羸瘠

傷食脹而急下，后还用燥和者是寒脹理中可塌

氣神方不錯秘結三黃葶藶木香順氣宜多胃苓

又是溫家科痞瘕月蟬堪妥

實症悶亂喘滿治宜白餅及丹其喘作虛者溫藥

補養方驗

二木參苓厚朴陳皮木香當參更加木

通利小便此藥虛症可也

凡治小兒虛脹先服塌氣神方不愈食積腹中藏糞

結小便黃燥但竟時間微喘飲水能食如常脉浮

而實下為良下后丹正補藥

大抵腹脹急症皆平肝與多凶二便秘結卡難通及

吐水漿堪痛氣喘脈象常病只愁目閉痰癰面赤

脚細黑筋叢集至九子妙用

小兒腹脹多因食 山查曲麥米青陳



甘草 仁同入内 寒加柴 薑 葱 加 葱

小兒患腹脹紫 難寫 陳 其 食 少 加 白 朮 煎 服 自 然 安

黃疸門

黃疸不必分五 樣 總 是 濕 熱

凡小兒身皮目 皆 黃 者 黃 病 身 痛 背 強 大 小 便 澀 一

身 而 目 指 爪 俱 皆 黃 小 便 如 壅 滿 壅 水 色 著 物 皆

黃 濁 者 難 治 此 黃 疸 也 其 症 多 得 下 大 病 之 后 以

茯苓 滲 濕 湯 主 之

如小兒生下 百 日 及 半 年 不 因 病 后 身 微 黃 者 胃 熱

黃

也 加 戒 瀉 黃 散 主 之

如面黃腫大 吐 食 而 渴 者 脾 痺 也 集 聖 丸 主 之

又有自生 而 身 黃 者 胎 疸 也 地 黃 湯 主 之 若 淡 黃 甚

白 者 胃 怯 白 朮 散 主 之

如夏月身 休 甚 熱 胸 膈 煩 滿 皮 膚 似 蠟 白 睛 亦 黃 筋

骨 痠 弱 不 能 行 立 者 脾 胃 鬱 熱 也 加 戒 瀉 黃 散 主 之

通治黃疸 茵 陳 五 苓 散 尤 穩

如此泄 黃 疸 三 稜 湯 主 之

茯苓 滲 濕 湯

澤泄 茵陳 倍苓 黃芩 黃連

枳子 防已 白朮 蒼朮 陳皮 枳壳

水煎徐 溫 服

加戒瀉黃散

黃連 茵陳 各 五 黃精 黃芩 茯苓 枳子 各

澤泄 各 二 水煎

三稜湯

三稜 莪朮 青皮 陳皮 神曲 茯苓

甘草 黃連 白朮 茯苓 傷食吐泄加山 查

黃

神氣吐泄 加 滑石 寒熱加 薄荷 水煎

祖傳治黃疸 以 胃 苓 丸 一 劑 加 茵 陳 末 五 分 同 為 丸

用 竹 葉 灯 心 車 前 子 煎 湯 吞 服

凡發黃大 渴 不 止 而 黑 鼻 氣 冷 寸 口 无 脉 者 不 可 治

請汗門

汗者心之 所 藏 在 內 為 血 在 外 為 汗

小兒氣血 雖 弱 膚 膜 未 密 若 穿 衣 太 暖 蒸 熱 脾 肺 必

肺 生 熱 汗 持 于 心 故 液 不 能 自 藏 而 額 汗 斷 也 額

屬 心 本 傳 宜 收 斂 心 氣 團 參 湯 主 之 此 虛 汗 也



如大熱后氣血尚弱液雖自汗或潮熱或寒熱發後  
之后身涼自汗日久令人黃瘦失治則變為骨蒸  
疢癆黃芪固真湯主之

如睡中汗出不醒則死汗乃腫瀆也醒則止而不  
後出汗亦是心虛此盜汗也宜欬心丸圓參湯  
如睡中遍身汗出醒竟時久不乾此積疢盜汗脾冷  
所致益黃散主之

如病困睡中身體汗流此因陽虛所致黃芪固真湯  
主之

如脾虛泄瀉自汗后而通身冷而汗出有時過泄則

无末世則有此為大虛症急當補脾宜理中湯加  
熟附子待泄止又以黃芪固真湯主之

凡自汗上至胸下至臍此胃氣虛也當補胃四君子  
湯加黃芪治之

如肺虛自汗其症有臉色多恍白脉按之无力蓋因  
又咳嗽連声不已以致肺氣上壅故令汗出以四  
君子湯加麥冬此補母收子之義也

如慢驚自汗通身俱有其冷如水此危症也大補湯

如熱附子一片治之

如傷風作熱自汗者宜收表解肌以柴葛解肌湯  
如死時冷汗出發根如頭珠面頰上滅三然此為驚  
風宜抱龍丸四君子湯加麻黃根治之

凡小兒自汗上至頭下至項謂之六陽虛汗不須治  
之自愈

凡小兒傷寒汗出至頸而止者此欲發黃茵陳湯  
凡諸汗症服前藥不止者俱加牡蠣粉或止汗散

調之如有實熱在內煩燥汗出不止三黃丸下之

固參湯

人參 當歸 各三 桂枝心 一个切 每藥二分 猪心

一片 非水中半煎一中食前溫服

黃芪固真湯

黃芪 人參 白朮 甘草 各當歸 麥冬 水煎

益黃散

陳皮 所青皮 柯子肉 枳實 各五分 丁香 二分 為末

每服二分 未週歲者只服五分 水煎 如感寒吐

泄加姜枣



大補湯

當歸 人參 黃芪 白芍 生地 枳殼  
白朮 白茯苓 川芎 加附子去苓芍 浮麥一  
撮為引水煎

止汗散

以敗蒲扇燒灰灯心湯調下或酒調亦可

夜啼門

夜啼之症有四驚啼熱煩啼腹痛啼神不安啼

驚啼者邪熱乘于心也當安心以導赤散加灯心照

心熱以安神丸定心効

熱煩啼者其哭无淚見灯則喜而止以導赤散加麥

冬枝子仁治之

腹痛啼者脾胃冷而痛也面青而呆以温中藥調理

中氣益黃散治之

神不安啼者睡中忽驚自哭以安神丸灯心燒灰調

湯吞服

又有拂其性而拘哭者要審明白不可妄投藥丸

祖傳治夜啼以至至聖保命丹灯心灰調湯下甚効

西江月

小兒夜啼四症忤驚肚疼心煩如逢拘哭忤家言睡  
中忽啼驚見肚痛手足厥冷腰曲口气水寒心熱  
煩燥不安眠其症面赤腹暖

既辨夜啼症候其間治法須明分明傳授與人問只  
得心誠求過忤驚安神九子理中專治脾疼涼驚  
錠子治心煩搥用灯花妙散

灯花散 用灯花七枚辰砂一分研末灯草湯吞

痺症門

丁亥者手足挂細項小骨高死則休瘦腹大睛哭號

哭胸隔骨痠漸熱是也哺露者虛熱往來頭骨分

開翻食吐更煩渴嘔喘是也丁亥哺露皆因脾胃  
久虛不能化水谷以致精神減損無以榮其氣故

肌肉消削腎氣不足復為冷風所傷骨枯露也

小兒十五以上為癖十五以下其症為癆此皆氣血

虛憊腸胃受傷致之同出而異名也蓋小兒易虛

易寒凡病久則成癖用藥乖力飲食過度將息失

宜俱成癖症俱用集聖九加減治之



小兒肚痛嬌嫩飽則易傷飲食失常不為疳積  
或小便失乳粥飯太早耗傷神氣則疳之根生故  
乳食稍多過飽无度則疳因傷得恣食肥甘粘膩  
生冷醜酸以滯中脫則疳因積生

乳母睡臥寒暖失其調理飲食乖常喜怒房勞即  
與兒乳則疳因母患傳氣而入以致脾胃一傷諸  
疳皆弱但見目澁或生白膜唇赤身黃喜臥冷地  
愛吃泥土泄痢无常肚腹脹滿耳鼻生瘡頭髮作  
穗脚弱項小極瘦飲水潮熱進退皆其症也以集

疳積

聖

至九本方調之無服參苓白朮丸百无一失

有因大病妄投吐利之藥以致胃虛而亡津液內發  
虛熱外消肌肉者以集聖丸去莖朮青皮加人參  
白朮治之

有因熱病不退以致津液粘燥者集聖丸去砂仁莖  
朮加龍胆草治之

有因吐泄下痢而成疳者集聖丸去青皮莖朮加白  
朮白豆蔻柯子治之亦無服參苓白朮丸治之

有因久癰不退而成疳者集聖丸加鱉甲治之

有因食積而成疳者集聖丸去歸考加川練子  
子肉小茴香三稜治之

有因虫痛而成疳者本方去歸考加白薑黃川練子  
肉治之

有因脾胃久虛不能運轉以積其氣或胸中受毒腫  
疳血少以致手足杳細項小骨高見削体瘦者前  
丁薑補露之症者以集聖丸參朮白朮丸治之

有因乳母恣食五辛酒麵炙煖致令小兒日則煩渴  
飲水乳食下泄夜則渴止此名疳渴以集聖丸去

疳積

聖

莖朮砂仁加人參白朮治之無服人參麥冬散治

凡疳症甚者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可用  
涼治冷不可用溫也不可用雲龍汗下以致殺人

凡小兒羸見黃瘦作瘰癧疔癰痛不思乳食者即服  
五疳消積丸或集聖丸治

凡治疳疔不必細分五疳但虛則補之熱則清之冷  
則溫之吐則治吐痢則治痢積則治積虫則治虫

不出集聖丸加減用之屢試有驗  
凡有疳疔者膿疔項邊有核如彈子按之則動軟



而不動又則肢體離棄便溺膿血吐泄癰疽頭露  
骨是也凡見此症速破其核有虫如米粉膏藥貼  
之內服集至丸調治

集至丸

芦荟焙乾 五灵脂炒 夜明砂淘去 煨砂仁炒 木香  
陳皮去 義木使君肉 黃連 川芎酒洗 炒  
乾薑炙 當歸酒洗 青皮炙 因于虛者加人參  
白朮炙 去義木青皮五灵脂 因于熱者加龍胆  
草炙 去砂仁義木 因于瘡者加鱉甲炙 焦三

片玉心書卷五

五

因于吐泄下痢者加白朮炙 肉豆蔻煨 柯子肉炙  
去青皮義木 因于積痛者加三棱煨 川練子肉  
小茴香炒 去當歸川芎 因于虫者加蘇莢炒  
川練肉炙 去婦考 因于渴者加人參白朮炙  
去義木砂仁 右為末用雄猪胆二個取汁和麵  
糊為丸米飲送下

參苓白朮丸

人參 白朮 白茯苓 甘草 山藥 白扁豆  
附便 薏米 蓮肉各一 加歸身各一 川芎各一 共為

米神曲調丸米飲送下

人參麥冬散

人參 白朮 麥冬 黃連 甘草 乾葛

柴胡 竹葉引

五疳消積丸

使君子肉炒 五來芽炒 陳皮 神曲 山查肉

白燕莢 黃連 胆草 各等分為末陳米飯為

丸米飲送下

西江月

片玉心書卷五

五

小兒疳癆又險惡夫不識根苗面死血色變德焦肚  
大頭乾脚小吐泄時舉發似瘡非瘡來潮吃泥  
弄舌滯頤交不治休嗟命歎  
小兒食傷脾胃疳癆煩熱虛羸黃連芦荟解蒸危義  
木香青去積當歸川芎赤血 夜砂君子攻炒乾蟬  
木香五灵脂粟米糊丸為最

大小便門

凡小兒有病或甚勝痛或驚大小便不通者此亦怪  
危者處實急通利之



如小兒形實甚內服三黃丸外用貼臍法即通  
如小兒形怯不可下者用熨臍法即通  
如用上法不通又加腹脹氣喘多哭悶亂目上視手足冷者不可治也

凡小便不通者有陰陽二症閉者冷溫乘虛入裡因而不通五苓散加兩木香為末空心煎湯調服外用炒鹽熨臍即通閉者因暴熱所逼澀而不通輕者五苓散加車前子灯心治之重者以木通散外用熨臍法即通

素

小便淋澀者蓋小腸為受盛之府氣通于膀胱膀胱者為津液之府氣通于腎小腸受氣容于膀胱銷導腎水之道澀而不利故小便澀痛也先以八正散泄去其熱次以香芎九調之不論五淋治法同小便出血者熱之極也蓋心生血于小腸相合熱甚則失其常道故不流滲入于胞故小便血出也以導赤散加蒲黃末空心時灯心湯送下小便出白者初出微赤良久澄白如米泔狀此由乳哺失節有傷于脾致令清濁不分而色白也又則

或痔以分清飲主之  
如傳治小便白色如米泔者以胃苓丸溫藥湯下小便不禁此腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能制其尿出而不禁謂之遺尿睡裡自出者謂之尿床俱以雞腸散治更以地黃丸調之  
凡大小便不通者有虛有熱虛者津液不足大腸乾澀而秘結內服通幽湯甚者用導法  
若若膀胱積熱內有燥糞其腹必痛或作渴內服三黃丸外用導法

素

大便下血者是大腸中有積熱也因恣食酒麵炙煨熱物流入心肺血熱妄行滲入腸中故大便下血久則疔毒无時下血黃連丸主之  
凡小兒初生七日之內大小便有血者此胎毒也不可用他藥只以生地黃取自然汁入蜜少許和勻溫服之自愈  
凡小兒非月內大小便有血者此積熱在心肺二經煎積于心故小便出血熱積于肺故大腸出血三黃解毒湯主之



上海圖書館藏

小兒出痘疹之時大小便血者此熱毒內伏

凡小兒常時其後出血不止者此名野雞痢地榆丸

主之

木通散

木通 扁蓄 大黃 瞿麥 滑石 赤茯苓

枝仁 佛手 車前子 升麻 灯心引

八正散

滑石 瞿麥 大黃 木通 扁蓄 車前子

聖

山枝仁 升麻 加黃精 灯心引

香芍丸

香附 川芍 赤茯苓 海金沙 滑石 各一

枳壳 澤泄 石膏 煨即 共為末糯米粥

糊丸麥冬湯送下

如小便澀痛者取長流急處順水用火微溫入鹽少

許調勻空心服

分清飲

烏藥 加茯苓

各等分為末灯心引水煎服

雞腸散

雞腸 男用雄壯仍燻白茯苓 桑礬 微炒

骨 各二 共為粗末姜枣湯服

黃丸

酒浸焙 山茱萸肉 山藥 各四 澤泄 丹皮

白茯苓 各五 共為末煉蜜為丸溫水空心服

通幽湯

生地 升麻 桃仁泥 婦身 升麻 紅花

聖

麻仁 炒 加大黃 水煎調換即末服

黃連丸

黃連 五 梔子 煨 枳壳 剉芥穗 各三

地榆 三 脫肛者加蠟皮條 三 為末糯米粥

飲送下

三黃解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 紅花 木通 大黃

生地 婦身 升麻 水煎服

地榆丸



防風 烏枳 枳壳 阿膠 升麻 升麻 升麻 升麻  
黃連 生地 當歸身 槐花 白朮 伏龍肝  
不和丸陳米飲下 加地榆

用田螺大者拖爛貼臍下能開結核  
熨臍法

用連翹葱一根不洗去泥上生姜一片淡豆豉二  
十一粒鹽二匙同研拖作餅燒銚子烘熱餅掩臍  
中以厚綿絮繫定良久氣通自利不然再換

胆導法  
用猪胆大者一個將毛筒截去兩頭一頭挿入  
胆中用線扎定不令移動着口吹氣入胆內又以  
線作活套子扎定其氣將毛筒向內納入谷道  
中取出活套捏胆汁入腹中須臾氣通自利  
西江月

大便不通症候有虛有實不同虛為津液少流通腸  
澀不能傳送內服通瀉湯劑外貼導疏通者是  
也症腹中存屎燥三苦可用

若傷食症候腹中必作痛疼面黃便秘禁藥用  
北棗靈應大便若足下血大腸積熱之因連槐花  
栝榆柳剝脫肛蠟皮加增

糞后時常出血地榆九子高強防風枳壳與生黃地  
榆當歸為上烏梅甘草柯子黃連荆芥同行伏龍  
槐花白朮當米醋為丸吞服

小便不通症治閉閉閉須知閉為風冷入乘虛五  
苓木香加入又加靈砂為末空心鹽湯吞之外用  
鹽炒熨其臍氣流通曰滯

陽閉暴熱所通其症唇赤面紅便如敗滴血鮮流五  
苓車前加用或用剪紅散子車前八正木通外用  
熨臍法即通活切之功可頌

又有濕痰下墜其兒体胖身肥喉中有痰面微紅小  
便落地時注其形澤如米泔此症不可胡為二陳  
湯內增蒼朮木通非麻加入  
初出有微紅色良大澀白如泔此由乳食積脾元清  
滯不分症現治用分清飲子或用胃苓湯先補脾  
的滯法為先脾實方為此患



凡治小便不通涼藥不可多施若用田螺貼其脬區  
寒入腹難出宜用人參白朮茯苓甘草相隨再加  
車前與滑石并麻茶通併入  
大小二便俱閉此症果是凶危先通大便最為宜小  
便自然通利藥用九轉靈應車前煎水調之此般  
治法實為奇醫者銘心牢記  
大小二便下血心肺積熱相攻三黃解毒有神功黃  
連黃芩相共黃柏紅花生地大黃并草木通當歸  
只可用其身白水煎湯相送

萬氏秘傳片玉心書

卷五

頭項門

小兒之頭四時要涼但見頭熱即有病生可預服抱  
龍丸  
小兒頭顛腫大青筋顯露者此肝熱也瀉青丸主之  
頭顛腫起者此因熱在內其氣上冲故而腫起宜  
退熱疏風瀉青丸抱龍丸主之  
小兒死病項軟者此肝熱有風也瀉青丸主之  
顛門下陷者此因久病肺虛弱氣不上行故下陷  
如坑參參白朮丸主之已成疔者集聖丸主之

正內服地黃丸外用封顛法  
久病之后其頸軟者此天柱骨倒乃危症也當大補  
氣血八物湯主之以養養末調服  
小兒生下便頸軟者此胎氣不足地黃丸主之  
封顛法  
用大南星微炮為末米醋調塗項上烘熱貼之  
以合為度  
目病門

萬氏秘傳片玉心書

卷五

黑珠屬肝白珠屬肺腫仁偏腎兩角屬心兩胞屬脾  
目內赤者心經積熱上攻導赤散加黃連防風  
粗得治小兒目赤者以涼驚丸菊乾煎湯下  
目內黃者脾熱也瀉黃散主之目胞腫者同治  
目連刺者肝有風也凡痛或新或久皆引肝風目屬  
肝風入目上下左右如風吹兒不能任故連刺也  
用瀉青丸主之 方見驚門  
目直視者肝有熱也熱入于目聾其筋脉目之兩角  
俱緊不能轉視故目直也俱用瀉青丸主之



小兒初生其目閉者此胎熱也內連服生地黄湯  
 外用胆草煎水洗目上一日七次恐緩則損目  
 小兒生下眼胞赤爛者此因生時洗拭不淨以致  
 汚漬兩角中故兩胞赤爛至長不瘳其金散主之  
 小兒久嗽其目兩眶紫黑如物傷損白珠紅赤如血  
 謂之血眼內服至液丸外用貼法  
 小兒生下日久之後目不見物者謂之雀目此肝虛  
 也用地黃丸治之以猪羊肝吞壓  
 小兒痘疹之後目內有膜者以谷精散主之

小兒熱病其目羞明喜暗者此風熱也

宜鮮風熱以

清陽散火湯主之

小兒吐泄后目有白膜閉不能開及无精光者難治

瀉黃散

藜蘆 山枝仁 石菖蒲 甘草 防風 二分

石剉細用蜜拌炒但微炒為末水煎溫服

真金散

黃連 黃柏 當歸 赤芍 杏仁 去皮

右剉細用乳汁浸一宿晒乾為末生地黄汁調一

字頻 點眼以新帛蘸荆芥湯洗之

生地黄湯

生地黄 赤芍 川芎 當歸 甘草 天花粉

此皆分湯末每少許灯燭湯調服

貼法

生地黄黃無豆溫研成膏貼目上其血自散如血

出腫黑自消甚妙

谷精草散

谷精草 兩 蝉退 三 起 密蒙花 五 白蔞 三 炒 去 刺

共為末每用一

小兒內以草束定水煎肝熱令兒食肝飲湯

清陽散火湯

黃芩 荆芥穗 川芎 防風 薄荷葉 甘草

連翹 山枝仁 當歸 石菖蒲 羌活 水煎 溫服

小兒驚風目斜視而不轉睛者灸風池穴目左斜灸

右穴右斜灸左穴

西江月

小兒眼目多病皆因自食酸其能生邪熱焚其肝沖



發于目為患或為赤腫痒痛或多眵淚遮慢甚則  
翳膜掩瞳間更有睛盲者眼

眼目即分常識五臟各屬一位黑珠屬肝白珠肺腫  
人又為腎水大小兩角雖與心火是則屬之上下

兩胞屬何如脾土中央定位  
目內赤色心經積熱上冲導赤加連併防風更

宜洗心堪用又或現出黃色此為脾熱蒸攻瀉黃  
散子有神功此方又逐浮腫

小兒目患赤痛難用照藥匠攻只將湯藥內既通外  
用敷藥止痛湯藥洗心肝散敷藥四螺連同二味

共研要通融紙攤貼之休動  
如或要用點藥莫將藥雜禁只把黃連細研勻將

大四螺水浸藥末納入螺內須臾黃水流行藥水  
點入眼中存熱退涼生痛定

目痛肝家風熱瀉肝散是仙方外用乳洗目清涼  
使點藥輕安久病目生白膜肝虛之症消詳盡則

補母用地黃養血養精為上  
耳病門

耳病為腎耳珠前屬少阳耳病有五皆由于腎經

實其氣上冲于耳遂使津液壅而為膿為清汁也  
亦有因沐浴水入耳中為聾耳內服蔓刺子散

外用龍骨散搽之  
耳珠前后生瘡浸淫不愈昔黃藥散主之

耳傍赤腫若此熱毒也若不急治必成大癰外用敷  
毒散內服消毒飲

凡聾聵者此氣閉也通竅丸主之  
耳入耳者以清油灌之其虫即出又用兩刀于耳

危磨其虫開磨刀声即出  
膿耳方 用蛇退結昆存性研末吹入耳中幼

蔓刺子散  
蔓刺子 耳草 乾葛花 升麻 赤芍 前胡

桑白皮 炒木通 麥冬 生地黃 赤茯苓  
姜枣引

龍骨散  
龍骨 白枯丸 射青 黃丹 胭脂

為細末以綿辰乾膿用筒吹入耳



黃藥散

黃栢 白栢 九 海標硝 滑石 龍骨 各等分

為末 溫用乾搽 乾用猪油調敷

救毒散

用桑豆粉不拘多少 或且研細末 以淡醋調敷

處乾則易之

清毒飲

羌活 防風 黃芩 連翹 桔梗 甘草

人參 川芎 當歸 柴胡 水煎服

通竅丸

用磁石一未射香 五同研成丸 如末核大 綿裹之

納耳中 又以錐針一塊 熱酒泡過 含口中 瀝史氣

即通矣

西江月

尋常耳中水出日久 就結難通 雖然停耳 不為凶只

悉定 膿堪痛治在少 附風熱 腎經濕熱 同攻 紅綿

精血可消 膿方子 分明選用

鼻病門

鼻為肺之竅 鼻塞者 蓋肺氣不通于竅 然肺主鼻

風寒外感 則肺氣壅閉 而鼻塞 川芎膏主之

鼻涕者 肺為風寒所襲 而津液不收 則為鼻涕 細辛

散主之

鼽鼻者 肺受風寒 久而不散 濃涕結聚 不開使不開

香臭 則鼽矣 萬金膏主之 以上三症 皆宜通利 供

鼻乾者 心脾有熱 上蒸于肺 故津液枯竭 而結當清

熱生津 導赤散 吞抱龍丸 治之

如痛已極 鼻乾而黑 數張長出 冷乳者 此肺絕也 必

死之症

鼻淵者 流下渣滓 極其腥臭 此胆移熱于腦 又名腦

崩 葶藶散主之

凡小兒初生 三朝五日 一臘 忽然鼻塞 不能吮乳 不

得呼吸者 同乳母安卧之時 而不知迴避 鼻中出

氣 吹着兒額門 或因洗浴 用水溫冷 又不避風 邪

所以致兒鼻塞 通關散治之

鼻衄者 是五臟積熱 所為也 蓋血隨氣行 今得熱 則

熱氣動 而妄行 溢出于鼻也 宜涼血為主 內服加



威地黃湯外川吹鼻散

川考膏

川考 細辛 藜本 白芷 牛草 龍腦

射香 杏仁 去皮尖 共為末煉蜜為丸 灯心湯

如体弱者綿裹一丸塞鼻孔中男左女右

細辛散

細辛 前胡 防風 川考 人參 甘草

各寺分為末乳香湯調服

萬金膏

畫

羌活 川考 細辛 藜本 麻黃 石膏

加味麗澤通氣散

羌活 獨活 香木 蘇合 升麻 荆芥穗

葛根 甘草 細辛 麻黃 白芷 川考

不通 姜三片末二枚葱白三寸水煎食后服

辛夷散

辛夷仁 五蒼耳子 白芷 薄荷葉 黃連

共晒乾為末葱湯調服

香子 川考 荆芥穗 僵蚕 細辛 牙皂

共為末以葱白搗成膏推銷細上烘乾臨卧時貼

顯門

加威地黃湯

生地 黃芩 枳子仁 赤芍 鬱金 茅花引

水煎入車前草自然汁細服之

吹鼻散

山枝仁 亂頭髮燒灰 共為末吹入鼻中

畫

祖傳治衄血用神考九茅花煎湯可

西江月

小兒若是鼻塞風寒各有根由傷風清涕必長流乾

燥傷寒挑擣清涕劑防發散乾燥火挑中水奉連

按柯可同侍引用葱姜平復

忽然鼻中衄血五臟積熱所為血隨氣上溢于鼻治

用涼血為主川考當歸赤芍生地 黃芩生枝黃連

甘草牡丹皮栝葉茅根煎吃

口瘡門



脾之竅存內應乎脾

小兒口者口內白屑痛舌上如鵝之口者此為胎

熱而心脾最甚重發于口也當內服涼驚丸外用

鵝口中涎以絹包手指洗淨以保命散吹之此亦

名口瘡

口瘡者滿口赤瘡此因胎稟本厚者有過溫心脾積

熱薰蒸于上以成口瘡內服涼驚丸外用地雞搗

水適塗瘡上又以一連散敷之地雞搗下多有之

以上二症如服涼驚丸不效洗心散一服如神

口糜者滿口生潰爛乃膀胱移熱于小腸腸腸不便

上為口糜以導赤散去小腸熱五苓散去膀胱熱

當以導赤散調五苓散主之

口瘡服涼藥不効乃肝脾氣不足虛火泛上而無制

用理中湯治之外用官桂末吹之

正泄后口生瘡者亦是虛火理中湯主之

小兒上脘有脹起如懸癰者此名重膈由脾胃積熱

血氣不能收斂而成此者用針刺去惡血內服涼

而散外用碧雪散吹之惟若服涼驚丸

小兒兩頰流涎浸潰胸前者此滯順蓋涎者脾之

口為脾之竅由脾胃虛冷不能收斂津液故涎從

口出而潰于頰者宜溫脾丹主之

小兒口頻撮者氣不和也蓋唇應乎脾氣乃肺之所

生脾虛不能養子故口頻撮宜補其母則氣自和

以異攻散主之

小兒口撮面青多哭者此脐下痛也理中湯主之

初生因脐風口撮脐腹腫者不治

小兒急欲乳吃而口不吮乳者此心脾有熱瀉黃散

治之

保命散 一名殊凡散

硃砂 白枯凡五牙硝五 共為細末搽舌上

一連散 即泄心湯

黃連為末蜜水調

洗心散

白朮 甘草 當歸 荆芥 加生地 大黃 煨

麻黃 赤芍 薄荷葉 生姜引

碧雪散

碧雪散

1010 子部 醫家類 8



蒲黃 青黛 硃砂 火硝 生甘草 苛分為

末次之

溫脾丹

木香 半夏 各五 生姜 白朮 各一 青皮 各一 陳皮 各一 共研末 糝糊為丸 米飲下

異攻散

人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 姜棗引食

前溫服

小兒鵝口 口瘡 重勝 不能吃乳 咽喉 腫塞 者用

庚子心書卷之五

柔

青黛散

青黛 二 黃連 黃柏 各五 牙研 各一 硃砂 各一 雄黃

硼砂 牛黃 各五 腦子 各一 共為細末 先以薄荷

汁拭口 后擦藥入口 每用二分半

西江月

小兒心脾積熱 唇口舌上生瘡 白為鵝口 屑浮 潮赤 者石橋子 搽上下口 唇破裂 令兒乳食 非 彈洗心

亦隔是奇方 搽洗各宜 停當

舌病門

舌尖屬心 舌根屬脾

重舌者 心脾有熱也 蓋心候乎舌 而主血 脾之脾

出于舌下 若心脾有熱 則氣俱盛 附舌根 而重生

一物形如舌 而短小 內服涼膈散 外用針刺 去惡

血以蒲黃和黃柏敷之

木舌者 心脾積熱之氣 上冲 故令舌腫 漸長 大塞

滿口中 若不救 急必致害人 內服涼膈散 以針刺

去惡血 用碧雪散和竹瀝敷之

弄舌者 脾旺微熱 令舌絳 緊時 用薄荷 冷藥 及下

庚子心書卷之五

柔

之少以瀉黃散服之 亦或飲水 面無紅白 色者 此

脾胃少津液 故耳不可燥 認為熱 以白朮散主之

面黃肌瘦 五心煩 熱弄舌者 此痺症也 集聖丸主之

大病后 用藥而舌弄者 凶舌上生白胎者 此丹由積

熱也 內服涼膈散 外用碧雪散治之

舌上生黑胎者 其熱已劇 急以薄荷煎水 洗之 如紅

者可治 以涼膈散下之 洗不紅者 必死

舌上生胎 又加大熱者 不可治 十有九死 此泄后 舌上生白胎者 此虛熱也 理中湯主之



涼膈散

連喬 山枝仁 大黃 薄荷葉 黃芩 甘草  
苦硝 姜汁少許引

西江月

兒重舌木舌心脾蘊熱攻中舌下生舌兩重不  
舌大硬腫痛急用針刺去血何妨鮮血凝紅枯  
搽上有神功解熱消風可用  
牙齒門

上片牙屬胃下片牙屬大腸齒屬腎

凡齒生遲者腎氣不足也蓋腎主骨齒者骨之餘

不足則髓虧髓虧則不能充乎齒所以齒生遲也

以地黃丸治之  
上下齒床腫者此即明寒熱也涼膈散以酒蒸大黃

為君加知母石膏并麻為佐頗含齒牙齦謂之  
重齦者腎腫積熱附齦腫痛謂之重齦以針刺去其

血用鹽湯洗淨黃柏末敷之  
小兒多食肉牙齒與息不可近者此即明有熱也內

服神效丸外用姜汁別源含能

牙疳者狀如狐惑初作與乳次則牙齒黑甚則齦肉

爛而出血名曰宣露此由腎熱其乳并上焦故以  
走馬為喻當速治之若上下唇破鼻穿牙齒落者

此名崩砂氣喘痰潮飲食減少則不可治當內服  
黃柏丸外用如聖散敷之

咬牙者風熱也由明明大腸二經積熱則生風故  
令相擊而作聲必于夢中者蓋動則風散于表靜

則風歸于裏也宜風散主之

上唇生瘡虫食其肉曰疔下唇生瘡虫食其肉曰疔

出傷寒指掌之言狐惑者取其進退猶豫之義

咬牙惟痘疹中有此者為危餘无大害亦有因病戰

栗鼓頰而閉牙者治其病則自止矣  
牙齒落而不再生者由于舌絃之故其肉頑厚用針

刺出血以鼠骨散搽之即生

大蛤散 治牙疳

雄黃 枯 九 各 五 五 倍 子 二 蚕 退 紙 一 外 燒 共 為

末先以米泔水洗净以藥搽上一月三四次為愈

蚕退紙散 治牙疳



赤遊紙五分 灰人中白五分 燒過紅楊片五分 白礬一分  
神效丸 取川 共為末搽之

神效丸

蘭香葉 當歸 藿香葉 木香 各一 升麻 二

生地 酒洗 甘草 各二 黃黃 炒酒 砂仁 各五 共為末

湯浸蒸餅為丸白湯送下

黃栢丸

黃栢 半生 為末煉蜜丸白湯送下

如全散

用婦人尿 桶中白垢刮取燉尽烟氣銅索二分

射香 半分 共為末先以臘葉浸米泔水洗淨血后

搽此藥

風散

風散

栳即 二陳皮 甘草 各及 牽牛 半生 共為末蜜水

調食前服

鼠膏散

用椎鼠 一個爛尽肉取骨研末加射香少許粉

擦姜湯漱口

西江月

上下牙齦黑爛眼宣息露堪嗟敗唇穿鼻落齒牙迅  
速呼為走馬內壞咽喉可畏啼聲漸變啞啞又名

喉疔 喉疔 喉疔 喉疔 喉疔 喉疔 喉疔 喉疔 喉疔 喉疔

咽喉門

咽者胃腕主納小管喉者肺腕主氣出入第一身之

樞要若胸膈間結積熱毒致生風痰壅滯而不散

矣而為咽喉病名雖數種皆受熱毒宜速解熱毒

緩則有難救之患輕則并指湯重則化毒湯主之

化毒湯

如出痘瘡而咽喉痛者此毒氣上攻也如戒并指湯

主之喉中生瘡不能吮乳者化毒湯主之

小兒為諸骨所哽骨大難噤者以鴨羽掃喉吐也骨

小者用海上方及福由科治之不治恐傷人

誤吞麥芒者取梅口中涎嚥之即効

并指湯

桔梗 甘草 人參 水煎細吞之

化毒湯

桔梗 五 清荷葉 別 養穉 各 五 甘草 二 半 小 指 各 一



山豆根牙疳 硃砂分二種 黃辰砂 辰砂一名  
為細末吹之或以水調服

海上方

用金盞花根碎米醋煎用有甯既盛之時口却  
粘嘴仰面嚙之其骨即出吞時勿令汙牙

用玉簪花根亦可 或威灵仙根亦可俱如前法

祝由科

用淨水半碗一紙書龍師火帝七遍吞水即効

西江月

小兒咽喉

壘

小兒咽喉却位一身難命所關極積熱毒胸膈間致

生風痰不散病難數種各別治宜去痰為先後解

風熱病斯痊是有難收之患

咽喉若然有疾治宜認其重輕輕者非粘散先行重

則化毒當進如或喉腫口禁開散子宜薰喉風

急收散通神吐痰消腫退病

知患單以鵝喉治者不可胡行可針之症要用針下

當針時要禁只用薰漆等藥退後依次施行擦酥

錠子點瘡疔瘡毒自消可幸

形声門

髮乃血之餘腎之苗也小兒髮久不生維生不異而

稀此由腎氣衰則血氣不足之故也地黃丸主之

齒乃骨之餘骨者腎所主也齒久不生維生而不齊

者此腎虛故也地黃丸主之

行遲者何也蓋骨乃髓之所養血氣不充則髓不滿

骨故軟弱不能行此由腎與肝俱虛得之蓋肝主

筋筋弱而不能早行腎主骨骨弱而不堅加味地

黃丸主之

小兒筋骨

壘

脚細者稟受不足氣血不充故肌肉瘦薄骨節俱露

如鶴之膝此亦由腎虛名鶴膝節加味地黃丸主之

小兒大病后手足痿弱及驚風后手足痿緩併宜加

減地黃丸主之

語遲者由見在胎之時母受驚印之氣兼心兒感母

氣心神不定不能發舌故而語遲當用地黃丸主之

凡心泄及大病后雖有聲而不能言又能進藥此外

失音乃腎快不能上接于咽也地黃丸主之

有卒暴寒冷而声不出者此脾風邪也加味瀉白散



主之

龜胸者其胸高腫狀如龜背此肺熱也加戒葶蘆丸

此症多成痼疾間有灸肺俞二第三次推骨節下兩

傍各寸半隔俞穴第二骨下兩傍各寸半如此而

收功者然未見效也以枳壳丸主之

地黃丸

熟地黃酒蒸八分 山茱萸去核 山藥各 四 澤泄 白茯苓

三 腎弱失音者加 巴戟去心 石菖蒲各 三

煉蜜為丸麥冬湯下

加味地黃丸

虎脛骨酒炙 生地黃 酸棗仁炒 辣桂 白茯苓

防風 當歸 如驚者得前症者加 羌活

煉蜜為丸白湯下

為膏丸

人參 石菖蒲 麥冬去心 遠志肉桂 汁川芎

當歸各 三 滴乳香 硃砂各 一 因于驚得者加

牛胆南星各 三 煉蜜為丸米飲下

加戒葶蘆丸

大黃煨 天心 杏仁去皮 百合 桑白皮炒

木通 甜葶蘆炒 蜜丸滾白米送下

顛顛詩 七言

乳食不帶飢飽起來熱積脾氣上冲致成此症隨輕

重風熱相交未易攻治宜退熱疏風症泄青丸于

顯神功

顛隔詩 七言

瀉泄久而氣血虛不能上冲元氣虧損脊脊黃為

末雞蛋白糊服即愈藥用參苓白朮散服之此症

頃能除

滯頓詩 七言

脾胃虛寒涎自流不能收斂瀆頓寐半米萎陳青皮

末一歲一丸米飲投

語遲詩 七言

受胎母即有驚邪二氣乘心者未加昔術後神參遠

志來冬當歸乳香砂蜜丸粟大吞二十薄荷湯下



可見症

行遲詩七言

肝腎二經俱不足肝主筋腎主骨若嬰二經氣血

充加味地黃能助補

龜胸詩五言

小兒龜胸症肺熱脹于胸加減葶藶丸服之有神功

龜背詩五言

龜背為惡症風入骨髓內服枳壳丸灸法宜相繼

髮齒生遲詩七言

髮久不生

不黑齒久不生不齊賢虛血弱成斯

症地黃丸子俱能治

解頤四言句

解頤八物有熱加速以綿繫束香附白欬

鶴膝四言句

小兒鶴膝此屬腎虛地黃加味服却无虞

諸瘡門

小兒初生遍身生虫瘡及流涎水瘡風瘡皆胎毒也切

勿株藥恐逼毒入腹宜服胡麻丸

凡有誤用漆藥逼毒入腹以致腹脹者解毒之藥  
凡有頸面遍身生瘡非干漆藥忽然自平加痰喘者  
切不可解利當以連喬湯治之以上數症俱是胎  
毒不可用灸法

其有一歲以上生流水瘡者此血風瘡也胡麻丸  
痘瘡后生膿泡瘡者此痘風瘡以胡麻丸治之  
以上二症俱是風熱宜灸風池穴曲池穴血海穴  
足三里穴各灸三壯

連喬湯

鹿角 人參 川芎 黃連 生甘草 陳皮

白芍 木通 水煎入竹瀝服

小兒生癩毒腫癢者皆因氣血凝而熱乘之內服解  
毒湯外用貼藥如已潰者內服木桶湯外用紫金  
錠塗之

解毒湯

玄參 連喬 升麻 黃芩 赤芍 附子

羌活 防風 生地 甘草 刺芥穗 秘結者

加大黃 木通



補湯

人參 黃芪 川芎 蓮荷 白芷 白茯苓  
當歸 生地 白朮 耳草 赤芍 姜棗引

紫金錠

山慈姑<sup>三</sup> 五倍子<sup>三</sup> 大戟<sup>兩</sup> 續隨子<sup>兩</sup> 射香<sup>各</sup>  
雄黃<sup>各</sup> 硃砂<sup>各</sup> 為末糯米糊作錠子 磨水搽

貼藥

黃芩 黃連 黃柏<sup>各</sup> 大黃 蒲黃<sup>各</sup> 血結  
乳香<sup>各</sup> 沒藥<sup>各</sup> 射香<sup>少</sup> 共為末取生薑自然

汁和雞蛋清打勻調藥貼之

頭上生軟癩膿水不乾者用紫金錠搽之 自愈用車

方搽亦効

單方

用上好磁器不拘多少研為極細末雞子清調搽

又方

大枳壳一個去穢令空磨令口平以麪糊塗抹枳  
壳四圍安貼于癩上自破膿血流不先于一邊以  
灯草一根通之癩瘡便无痕迹

又方

用石灰篩過以雞子清和灰為丸入炭火燒煉通  
紅如此搥和三次依法煨煉取研細香油調敷  
頭上生核腫脹發熱者內服連喬丸外用五倍子為  
末淡米醋調敷一日二次易之効

連喬丸

連喬 桑白皮 白頭翁 牡丹皮 防風  
黃柏 肉桂 豆豉 独活 秦花<sup>各</sup> 五  
海標硝<sup>半</sup> 為末煉蜜丸灯心湯下

西江月

毒丸

小兒遍身瘡疥虫窠膿血浸淫此由胎毒內藏深故  
有許多形症凉血殺虫解毒胡麻丸子通神切防  
搽洗毒婦心腹痛神昏命危

若是要用搽藥瘡痒无過此來實虫作楚用雄黃痛

腫喉水為當不痒酒加狗脊喜益湯火 硫黃<sup>珠</sup> 猫

同研熟由良手擦鼻聞搽上

丹毒門

小兒赤遊丹毒雖有十種皆由心火內盛熱與血搏



或起于手足或發于頭而胸背遊移上下其起如  
火痛不可言亦如刀切故名丹毒自腹出四肢者  
易治自四肢入腹者難治此症者其法必先用  
表藥以解熱毒方可搽敷若遽用藥搽使氣无所  
泄而入于裏傷人者多矣  
小兒丹毒一歲以下者易治未週歲者難治  
百回驚后而發丹者此毒氣由內出外易治有先發  
丹而后驚者此毒氣由外入內者多死不治  
一從頭項起者名飛灶丹

二從頭上起者名走灶丹  
三從面上起者名鬼火丹  
四從背上起者名天火丹  
五從兩手起者名天灶丹  
六從兩脇起者名水丹  
七從兩腋起者名胡芦丹  
八從兩脚起者名野火丹  
九從兩脚背起者名烟火丹  
十從兩脚上起者名胡漏丹

飛灶丹 先用葱白自然汁搽  
走灶丹 紅腫痛 用赤小豆末雞子清調搽  
鬼火丹 用伏龍肝雞子清調搽  
天火丹 用桑白皮末羊脂調搽  
天灶丹 用柳木燒灰水調搽  
水丹 用生鐵秀末猪脂調搽  
胡芦丹 用煨即末米醋調搽  
野火丹 用乳香末半脂調搽  
烟火丹 用猪槽下土清油調搽

胡漏丹 用屋漏處的五羊脂調搽  
以上十種丹毒俱先服防風升麻湯以解其毒次  
用熨針法以去其毒血如無熨針用針法然後  
用救急法  
防風升麻湯  
防風 升麻 山棧仁 甘草 桑木 去刺芥穗  
木通 葛根 滑石 芍藥 連翹 牛黃  
便秘者加 大黃 水煎服  
熨針法



用水蜈蚣條放于江腫處令吃出血血立愈

用磁瓦片打成尖鋒以快子夾死此住連刺令出血  
惡血  
急救法

取灶心對鍋底焦土研末以新汲水調搽乾則易  
小兒丹毒腹脹氣喘悶亂不乳及驚搐者皆不可治  
小兒生后百日之內半歲以上忽兩眼胞紅暈微起  
面青黯色夜則煩哭或除如胭脂此因伏熱在內

丹毒

量

發之于外初則滿面狀如水痘脚微紅而不壯出  
注休息无定次至頸項赤如丹砂名為驚丹以三  
解散治之

三解散

人參 防風 天麻 薄荷 扶神 白附子  
大黃 黃芩 羌活 金蠟 枳壳 菖荷葉  
粉草 赤芍 灯心引

小兒驚風后風從氣行血逆氣使毒氣蓄于皮膚流  
為腫毒多在腮頰耳根間成癰成疔謂之毒風宜

內服當歸百解散外用拂毒散敷之

當歸百解散  
當歸 赤芍 大黃 川芎 芥麻 菖荷葉  
乾葛 麻黃 黃芩 甘草 枳壳 皂角刺  
葱姜引

拂毒散

半夏 貝母 大黃 朴硝 五倍子 各二  
共為末淡醋調敷患處乾則易之

小兒或因跌撲刀斧破傷皮膚風邪侵襲傷處發此

丹毒

量

謂之破傷風宜內服風活血散外以紫金丹塗

風活血散

當歸 生地 川芎 赤芍 荆芥 防風  
甘草 紅花 蘇木 水煎服入酒少許  
西江月

小兒赤遊丹毒雖有十種原根皆由心火熱多痰上  
下遊移不定其色渾如丹石故稱丹毒之名治法  
方冊甚分明全在醫家體認



小兒流丹藥毒十種發出不同自上而下... 下至腎可憫半週之內休見滿週病此宜攻... 的之有神功內解外敷燕用... 內解婦稍赤芍羌活荆芥防風非麻非草地黃通竹... 藥玄參煎用外用益元付貼更加寒水相同三朝... 五日急相攻驚搐靈丹如夢... 治丹用功次第從頭一鋪陳解表下毒藥先行次... 用蟬針吃進若是蜈針不便須更急用砭針然後... 塗藥救孩身此法前人已免

捷法先須解毒或將利藥疏通

初起塗敷莫胡攻毒

入于裏過壅解毒無價散子防風非麻湯同利藥... 靈應有神功只在匠人善用... 經驗治乃妙法而今說與后入先將靈應淋病身下... 店練施塗潤田螺搗餅敷貼或用水調灶心艾... 南星大黃停芒硝研勺水浸... 烘挂衣與兒... 老硝寒水石... 赤噫因何起... 火丹遂成之... 青黛石羔奇... 胎中受熱多

不必請臣和

斑疹癩疹門 小兒斑疹其狀腫于外者屬少陽相火也謂之斑紅... 點在皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹... 其症有明暗輕重之別明斑用托裏消熱化斑涼血... 此急治其標也明疹用調中溫胃其疹自消此緩... 則治其本也大抵安裏之藥多發表之藥少首尾... 不可妄下四毒者或發于面部或發于背脊或發... 于四肢極其稠密狀如錦紋紅赤者胃熱也紫黑

有胃爛也一則下之早其熱乘虛而入胃一則下

之晚其胃熱不得發越當服消斑青黛飲明疹者

或出胸背手足稀而小者此由失守之火聚于胸... 中上薰于肺傳于皮膚而成斑點如蚊蚋蚤虱所... 咬而非錦紋也宜服理中湯治之其火自降其斑... 自退矣... 疹者自吐泄者慎勿亂治因其毒氣上下皆出宜... 調中氣若吐泄之後過身強斑如錦紋者此熱即... 乘虛入胃其症多得于夏天化斑湯主之



消斑青黛飲

黃連 井草 石膏 知母 柴胡 山枝仁  
玄參 井麻 生地 黃芩 人參 青黛  
姜三片 豆豉二十粒引

調中湯

蒼朮 陳皮 砂仁 白芍 炒 井草 姜 薑青葉  
枳殼 半夏 白芷 羌活 枳殼 川芎  
姜三片引

化斑湯

犀角 石膏 知母 甘草 水蘩 粳米引

犀角

人參 石膏 知母 甘草 水蘩 粳米引  
知斑紅者易治 治異者難治

小兒癰疔多屬于脾以共隱工在皮膚之間發而多  
疔或不紅者併風與毒而成也 加味羌活散治之  
或加減攻毒散亦効

加味羌活散

羌活 前胡 人參 枳殼 井草 薄荷葉  
枳殼 川芎 天麻 茯苓 鮮薑 姜三片引

加減攻毒散

羌活 枳殼 前胡 柴胡 當歸 川芎

枳殼 枳殼 茯苓 人參 井草 薄荷葉

防風 荆芥 蒼朮 芍藥 生地 姜三片引

續諸瘡驗方

小兒眉叢中生瘡流淚不乾者名曰鍊銀瘡用川山  
甲煎時上甲炙焦為末入紅粉少許清油調敷  
凍耳成瘡者內服防風通聖散外用鉛粉以水搽細  
將艾條爛焚成烏色研末敷之

防風通聖散

防風 川芎 當歸 薄荷葉 大黃 山枝仁

赤芍 麻黃 連翹 石膏 黃芩 枳殼

滑石 荆芥 白朮 井草 加乾葛 生薑引

身上生瘡如粟米大成塊成路極痛者此名龍纏瘡  
用珍珠鳳尾草搗汁搽之又以渣調清油敷之効

文驗方

取糯米不拘多少浸漲搗漿淀粉搽之

治夫地瘡方

以韭菜地蚯蚓糞炒乾研極細蜜調搽

下缺



據湖北省圖書館藏清乾隆六年  
敷文堂刻萬密齋書本影印原書  
版框高一八五毫米寬二五二毫米

# 萬氏家傳育嬰

〔明〕萬全撰



第七種

萬密齋書

# 育嬰秘訣

敷文堂

新刻萬氏育嬰家秘目錄

羅田密齋萬全

幼科發微賦

卷之一

五臟証治總論

心臟

肺臟

預養以培其元

臨養以防其變

辨小兒壽夭

肝臟

脾臟

腎臟 十三科

胎養以保其真

鞠養以慎其疾

辨小兒形色

目錄

敷文堂

卷之二

辨小兒脉息

胎疾

寢蒸

驚風總論

痢症

辨小兒色脉

臍風

急慢驚風

搐后餘症

驚風諸証

卷之三

諸熱症治

感冒四氣

咳嗽喘各症治

調理脾胃

中濕

喘



疳疾	痢疾	積聚	嘔吐	泄瀉	霍亂
瘧疾	腹脹	腹痛	腹痛	傷食	傷食
疔瘡	疔瘡	疔瘡	疔瘡	夜啼	夜啼
疔瘡	疔瘡	疔瘡	疔瘡	疔瘡	疔瘡

萬氏家傳育嬰卷之一

田家齊萬 全

林澹齋胡 畧

男靖宇胡廷佐編次

分例分明証治多

豈因難治廢診哉

古來醫有十三科  
何事勿科門例少  
十三科

大方脈科 小方脈科 婦人科 傷寒科 風科  
眼科 口齒咽喉科 瘡癩科 針灸科 正骨科  
金匱科 祝由科 養生科

右上一十三科分門分例詳悉俱備惟小方脈一科  
錢陳二先生外不多見也蓋小兒初生只是一塊血  
肉耳雖有神臟形臟有其具而未能用也百日後  
知覺運動以漸而生至於有痰口不能言脈無可診  
名曰啞科一二三歲口雖能言而胃氣未實經脈未  
滿其脈難辨也故曰子產三年然後危於父母之懷  
其有疾也而欲治之則腸胃脆薄不勝湯丸藥劑小耳  
弱難施針灸四歲以後諸病與大人同但藥劑小耳  
驚疔痘疹四歲當別論之經曰不能察其幼小者謂  
冠世易明童稚難治也



育嬰四法集成篇

人欲求嗣能讀此

博採諸書盡格言

嗟夫世之求嗣者。惟知問命卜禱鬼神。而不知當務之為急也。余嘗傳廣嗣紀要。列例十條。一脩德。二寡慾。三擇配。四調元。五感孕。六保胎。七護產。八育嬰。九風水。十祈禱。求嗣之道盡矣。今集育嬰家秘。又分四目。一曰預養以培其元。二曰胎養以保其真。三曰產養以防其變。四曰鞠養以慎其疾。預養者。即調元之意也。胎養者。即保胎之道也。產養者。即護產之法也。鞠養者。即育嬰之教也。二書之論。並行而不悖也。有

志求嗣者。合而觀之。篤信而守之。則桂子森森。履後

其昌矣。於預養以培其元。

孕元立本章云。易曰。大哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。有生之物。雖陽予之正育。而充必陰之主。因形移易。日改月化。無非神道之代終也。天之德。地之氣。陰陽之至和。相與流通於一體。能順時聽謹。人事勿動而傷。則生育之道得矣。昧者曾不知此。乃拂自惑之理。謬為求息之術。方且推生死於五行。析補養於藥石。以偽勝真。以人助天。雖或有子。孕而不育。育而不壽者多矣。昔人論年老者有子。者男不過盡八

八女不過盡七七。則知氣血在人。固有自量。豈外陰陽之定數哉。少大全良也。

疑形殊稟。章云。易曰。男女媾精。萬物化生。天地陰陽之形氣寓焉。其稟賦也。體有剛柔。脈有強弱。氣有多寡。血有盛衰。皆一定而不易也。以至分地。真域則所產有多寡之宜。吉事有祥。則所慶各應其類。是故荆揚薄壤。多女。雍冀厚壤。多男。熊羆為男子之祥。虺蛇為女子之祥。是皆理之可推也。同上。

娠子論云。昔有人以婦人無子。問西京常器之者。乃曰。女人自少多病。服燥藥無節。使天癸耗動。且早妖

終身無子。又有問袁伯宋。大亨者亦然。同上。

按道藏經云。有床子法云。婦人月信初止後。一日三日五日。值男女旺相。陽日陽時。交合有子。多男。若男女稟受皆壯。則多子。一有怯弱。則少子。同上。

精氏遺書曰。男女交合。二情交暢。陰血先至。陽精後。衝血開。裹精。精入為骨。而男形成矣。陽精先入。陰血後。精開。裹血。血入居本。而女形成矣。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。父少母老。產女必贏。毋壯父衰。生男必弱。古之良子。有察乎此。補

虛。先養血。壯脾。補弱。男則滋腎。節色。氣之偏。痺與



之補也

東垣云李和叔問中年以來得一子至一歲以後身  
生紅瘡不救后生四子一二歲皆病瘡而死何緣至  
此翌日見之謂曰汝乃腎中伏火精氣中多有紅絲  
以氣相傳生子故有此疾俗名胎瘡是也試觀之果  
如其言遂以滋腎丸數服以瀉腎中火邪補真陰不  
足忌酒辛熱之物其妻與六味地黃丸以養陰血受  
胎五月之後以黃芩白朮二味作散啖五七服後生  
子前証不復作矣按東垣先生此論誠求子之要百  
世不可易也

冊溪云無子之因多起於父氣之不足豈可獨歸於  
母血之虛寒况母之血豈止於虛與寒而已哉無子  
多因血少不能攝精俗醫率從子宮虛冷投以熱劑  
如秦桂丸之類煎熬臟腑氣血沸騰禍不旋踵按冊  
溪先生此論誠可為婦人服熱藥之戒余按易曰  
天地絪縕萬物化醇設使陰陽偏勝則不能成變化  
而生萬物矣男女亦然故男之無子者責精之不足  
也女之無子者責血之不足也精氣之不足腎實主  
之六味地黃丸其要藥也

補腎地黃丸 熟地 山藥 澤泄

山茱萸肉西牡丹皮 肉蓯蓉酒洗去  
共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每五十九空心  
食前服淡塩湯下

今人不知此理男女喜服壯陽之藥以快其欲如附  
子陽起石鹿茸硫黃沉香母丁香之類女子喜飲燥  
宮之藥亟欲生子如桂枝真茶萸沉香附子之類以  
致自詭終身無生反成熱中乃則津液消耗為消渴  
秘結之類外則經脈壅滯為癰疽之發也生子之道  
不在於藥石也設使情欲之感不節變合之神不凝  
雖湯丸竭進無益也必於平日男子清心寡慾以養  
其精女子忍性戒怒以養其血至於交合之時男悅  
其女女悅其男兩情欣洽自然精血混合而生子也  
胎養以保其真二

娠子論云夫至精絪化一氣方始受胎胎漸成形  
胞子在腹中隨母聽聞自妊娠之後則須行坐端履  
性情和悅常處靜室多聽美言令人講讀詩書陳說  
禮樂耳不聞非言目不視惡事如此則生男女福壽  
敦厚忠孝賢明不然則生男女多鄙賤不壽而愚頑  
此所謂因外象而內感也昔太妊懷文王耳不聽惡  
聲目不視惡色口不出惡言世傳胎教之道此之謂



也。妊娠三月各胎始。當此之時血不流行形象始化未  
有定儀見物而變。須知端正嚴莊。當令母見貴人不  
可見狀貌醜惡人也。欲生男宜操弓矢。乘牡馬。欲生  
女宜著珥璫。施環珞。欲子美好宜玩白璧。視孔雀。欲  
子賢能宜看詩書。務和雅。吾見鄙俗婦人懷胎時看  
撒鬼。偏裝神像。壽候。或看後來生子貌多肖之。  
胎養之法有所謂轉女成男者。亦皆理之自然也。如  
食雄鷄。取陽精之全。於天產者。帶雄黃。取陽氣之全  
於地產者。操弓矢。藉麥。卒。取陽物之見於人事者。氣

可以勝用。變女為男。理固然也。  
氣質生成。章云。具天地之勝。集萬物之靈。陰陽平均  
氣質完備。成具自爾。然而奇耦異帶。有行有耗。剛柔  
異用。有強有贏。血榮氣衛。不能逃於消息。盈虛之理。  
則稟賦之功。詎可一槩而論。是以附贅。疔疔。駢母。枝  
指。侏儒。跛躄。形氣所賦。有如此者。瘡瘍。癰腫。膿聲。音  
亞。瘦瘠。疥癩。形氣之疾。有如此者。然則胚胎造化之  
始。精通氣變之後。保衛輔翼。固有道矣。按此條稟賦  
之症。除瘡瘍。癰。疔。疔。毒。皆稟賦之偏。不可治矣。

天有五氣。各有所養。地有五味。各有所入。所養有節  
適。所入有度量。凡所畏忌。悉當戒懼。慎物以為養者。  
理固然也。以致調喜怒。節嗜慾。作勞不妄。而氣血從  
之。皆所以保攝妊娠。使諸邪不得干焉。苟為不然。方  
稟受之時。一失調養。則內不足。以為守中。外不足。以  
為強身。氣形弗充。而疾病因之。如食兔。吞蝕。食大無  
聲。食雜魚。而亦癘之屬。皆以食物不戒之故也。心氣  
火驚。而顛疾。腎氣不足。而解頭。脾胃不和。而羸瘦。心  
氣虛乏。而神不足之類。皆以氣血不調之故也。  
按全皆由此推廣之。兒在母腹中。藉母五臟之氣。以  
為養也。苟一臟受傷。則一臟之氣失養。而不足矣。如  
風則傷肝。熱則傷心。與肺。濕則傷脾。寒則傷腎。此天  
之四氣所傷也。酸多則傷肝。苦多則傷心。甘多則傷  
脾。辛多則傷肺。鹹多則傷腎。此地之五味所傷也。怒  
則傷肝。喜則傷心。思則傷脾。憂則傷肺。恐則傷腎。此  
人之七情所傷也。是以風寒暑濕。則避之。五味之食。  
則節之。七情之感。則絕之。皆胎養之道也。若夫勿登  
高。勿臨險。勿獨處。暗室。勿入廟社。勿恣肥甘之味。勿  
啖瓜果之物。勿犯禁之方。所以調護輔翼者。各有道  
也。



如不利嗣息或驕倨太甚者動必成咎雖鄰家有所  
興修亦犯其胎氣令兒破形頽命如刀犯者形必傷  
泥犯者竅必塞打驚者色青黯繫縛首相拘孳如此  
諸劇驗於形影可不慎哉

妊婦有疾不可妄投藥餌必在醫者審度病勢之輕  
重藥性之上下處以中庸不必多品視其病勢已衰  
藥宜便止則病去於母而子亦無損矣

全嘗集女科凡孕婦無疾不可服藥設有疾只以和  
胎為主其疾以未治之中病即止勿過用劑也故孕  
婦之病宜柴胡和胎飲主之

柴胡和胎飲

柴胡	黃芩 <small>君沉</small>	白朮 <small>無由</small>	二味安神
當歸身 <small>洗</small>	白芍 <small>巨</small>	陳皮	之聖藥
紫蘇 <small>法生</small>	枳殼 <small>傷風者加</small>	葛根	甘草
扶傷食者加	枳殼	神曲	枳殼
知母	石膏	胸滿者加	枳殼
桔梗	腹滿者加	大腹皮	胎中痛加
枳壳	砂仁	漏下血者加	阿膠
陳艾葉	如方加減不可輕忽	水煎食前服	

婦人有孕至八九月宜服丹溪連生散庶免難產

大腹皮 <small>酒洗</small>	人參	陳皮 <small>各五</small>	白芍
白朮	當歸 <small>各一</small>	甘草 <small>各二</small>	

右細切作一服入姜七片葱五莖水煎服

春加防丰川芎夏加芩蘆五味秋澤瀉冬砂仁

臨產之時胞漿已破急進秘傳催生如聖散以飽難  
產即五苓散加車前子順取長流水煎服

羶養以防其變三

回氣提法兒纒生下即氣絕不啼哭俗名關臍生則  
寤生也必是難產或胃寒所致必以綿絮包裹抱懷  
中不可斷臍帶且將包衣烘火上鍋銚滾水中煮之

仍以熱水於臍蒂抹之使煖氣由臍入腹須臾氣四  
啼哭如常方可浴洗新去臍帶今鄉俗見寤生者即  
連呼其父之乳名縱有醒者如兒寐中呼喚驚醒也  
拭口時法兒初生穩婆急以綿絮指拭兒口中惡物  
令爭若不急拭啼哭一聲驟下則生有痛矣然有不  
及如法者古有甘草黃連珠砂三法用之作其法臨  
月預備甘草一錢切煎以綿絮指蘸甘草汁拭其口  
次用連五分槌碎綿裹放甘草沸湯中同浸泡湯如  
上法拭口拭鼻更珠砂研極細入蜜螺殼和之拭兒  
口中然後以乳乳之非獨能解惡穢之毒亦可安神



免疹疹驚風之疾。

又秘方取虎臍帶寸許焙末狂黃蓮味仁硃砂分

察和生三日抹兒口中名曰育嬰解毒延齡膏

浴兒法。陳產取猪脛水七升。煮四升。澄清浴兒。長

大無疹。如兒生下浴水未到。以綿絮暖抱懷中。浴

湯須調和得宜。若兒驚。則致五臟疾矣。浴後須暖。遇

夏不可去其綿。以下出母腹。不可令胃寒氣也。兒生

三日。浴用五枝湯。桃柳棘梅槐各取嫩枝。如苦參白

芷。煎湯去渣。澄清八指。膽汁浴之。不生疹。疥。

斷臍法

兒生下。浴後方可斷臍。口咬最好。或以火燎而斷

之。或以剪放火燒。熱剪之。斷後艾炷。從斷處燒三

炷。令暖氣入腹。可免臍風之疾。斷臍後。用新艾并

爛和綿絮包護其臍。勿令犯風。使寒濕之氣入之

則成臍風。內疔之疾。斷臍後。或臍已落未乾時。或

傷於風濕。或尿在抱裙之內。必成臍風。內疔。臍漏

兒命矣。慎之慎之。

哺兒法

兒生下後。產母乳汁未行。必擇乳母。年壯體厚。乳

汁濃白者。以乳之可也。產母乳汁既行。必須擇而

捏去之。此乳不可哺也。積滯之氣。恐損兒也。

凡兒吮乳。初則乳汁漸行。其來尚緩而少。久則如泉

湧出。急而且多。急取出之。恐兒氣弱。吞嚥不及。錯啜

噴吐。傷胃氣也。

兒生七日。助谷神以導運腸胃。用栗杵爛煮粥。飲與

乳母。日與一二匙。或用粳米研爛亦佳。

刮泡法

兒生後。十日之內。常抱向明處。視其口中懸雍上

脰。有小胞子如珠堆積者。急用銀篋耳刮去。或

以手指甲刮去。任以軟綿拭去惡血。煎甘草湯

洗之。不然。則泡落成疾。不可救矣。

通便法

兒初生後。大小便不通。腹脹欲絕。昔急令婦人以

溫水漱。口。亟吸。啞兒前後心。并臍兩手足心。共七

處。每一處凡三五次。漱口吸啞。取紅赤為度。須臾

自通。不爾。無生意。又古用皂角燒存性。研為細末。

煉蜜作丸。如棗核樣。內穀道中即通。

貼額法

兒生後。鼻塞氣促。吮乳不得。用天南星一錢。北

細辛五分。共為細末。生薑油。生葱油。共調成膏。塗



貼額上自愈

牛黃法

兒生三日去驚邪除惡氣用真牛黃大豆許細研以石蜜加酸棗許共研勻以綿蘸之與吃一日令盡

鞠養以慎其疾四

養子須調護看戒莫縱弛乳多終損胃食難即傷脾衾厚非為益衣單正所宜無風頭見日乘暑順天時丹溪曰人生十六歲以前氣血俱盛如日方升如月將圓惟陰常不足故童子裳不裘袴前管格言裝下體之服帛溫軟甚於布也裘皮如溫軟甚於帛也若下體主陰得寒則陰易長得溫煖則陰曠滯是以下體不與絹帛夾厚溫煖之服恐防陰氣是為確論小兒始生肌膚未實不可煖衣煖甚則令肌膚緩弱宜頻見風日若不見風日則肌膚脆軟易得損傷當以父母著過破絮舊衣勿加新綿天氣和煖之時宜抱向日中嬉戲數見風日則血凝易凝肌膚堅實可耐風寒不致疾病若藏於帳幃之內重衣厚煖譬如陰地草木不見風日軟脆不任風寒當以薄衣但令皆煖薄衣之法當初秋習之不可卒減其衣否則令

中風寒所以從秋初習之者以漸稍寒如此則必別寒冬月但著兩薄襦一復裳耳若不忍見其寒冷當舉加耳若愛而煖之所以害之也又當消息勿令汗出如汗出則表虛風邪易入也晝夜寤寐當常慎之丹溪曰小兒氣血但盛食物易消故食無時然腸胃尚脆而寒若稠粘乾硬酸醃辛辣一切魚肉水果溫煖燒炙煨炒但是發熱難化之物皆宜禁絕只如生栗乾柿熟菜白粥非惟不能縱其口且可養其德蓋生栗味鹹柿乾性涼可以養陰之助然栗大補柿大澀俱為難化亦宜少與婦人無知惟務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以當貴醫養有子多疾

按陳氏曰小兒宜喫七分飽者謂節之也小兒無知見物則愛豈能節之節之者父母也父母不知縱其所欲如餅膩和餅瓜菜生冷之類無不與之任其無度以致生疾雖曰愛之其實害之丹溪曰乳子之毋尤宜謹節飲食下咽乳汁便通情欲動中乳脉便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病亡至不吐則泄不瘥則熱或為口糜或為驚搐或為夜啼或為腹脹病之初來其溺必小便頻詢問



証謂治毋安于亦安可消患於未形也

小兒啼哭正甚其母強以乳哺之啼哭未息逆氣未定被乳所阻乳又被氣滯積於胸中便成疾也吐瀉瘡痢腹痛痞滿疳癆之疾從此起矣

小兒在腹中賴血以養之及共生也賴乳以養之乳積血所化也未及一歲之後不可便以肉果炎之胃薄脾脆不能消化也乳者飲食之津液其母亦當淡滋味一切酒麪肥甘之熱物瓜果生冷之寒物皆當禁之苟不知禁氣通於乳猶兒食之以成寒熱之病乳母之過也

凡乳母大醉後勿乳大勞後勿乳大怒後勿乳房事後勿乳有熱病勿乳其子啼哭未止勿乳睡未醒勿乳飽後勿乳夜間毋必起坐床上抱起兒乳之勿側臥乳後也其子使其身直恐軟弱傾側致乳溢出也不爾皆令兒病

陳氏養子十法云一要背暖二要肚暖三要足暖四要頭涼五要心胸涼六勿令忽見一非常之人七脾胃要溫八兒哭未定勿使飲乳九勿服輕疎十宜少洗浴大凡小兒冬不可久洗浴則傷冷夏不可久洗浴則傷熱頭風則肯冷而致驚皆過熱時以軟絹蘸

湯拭之可也

小兒臍帶未落時不可頓浴浴則水入臍中臍風燥口皆從此起

小兒神氣衰弱忽見非常之物或見未識之人或聞鷄鳴犬吠或見牛馬禽獸嬉戲驚嚇或聞人之叫呼雷霆號爆之聲未有不驚動者皆成客忤驚癇之病蓋心藏神驚則傷神腎藏志恐則志失大人皆然小兒為甚也凡小兒嬉戲不可妄指他物作出作蛇小兒啼哭不可令人裝扮欺詐以止其啼使神志昏亂心小胆怯成客忤也不可不慎

小兒玩弄嬉戲當在目前之物不可去之但勿使之弄刀劍叩銅鐵近水火見鬼神耳小兒能言必教之以正言如鄙俚之言勿語也能食則教以恭敬如褻慢之習勿作也能坐能行則扶持之勿使傾跌也宗族鄉黨之人則教以親疎尊卑長幼之分勿使謀媢言語問答教以誠實勿使欺妄也賓客往來教以拜揖進退勿使退避也衣服器用五穀六畜之類遇物則教之使其知之也或教以數目或教以方隅或教以歲月時日之類如此則不但無病而知識亦早矣



凡小兒專愛一人懷抱見他人則避之此神怯弱也抱之則喜放之行坐則哭者此氣虛弱也喜食其味腹有虫也

小兒週歲有病者勿妄用藥調其乳母可也不得已而必用中病之藥病衰則已勿過其則也

幼科有挈指法者乃按摩之變也小兒未週歲者難以藥餌治誠宜之則可以治外邪而不能治內病也

能治小疾及氣實者如大病氣虛者用之必誤兒也為父母者喜罕而惡藥致令夭折者是誰之過歟

父母常將幼子憐 幾因愛恤取愁煩

育嬰家秘無多術 要受三分饑與寒 人之無子者蓋姬妾覓方術閉命卜禱鬼神其心勞矣及其生子愛恤之深保養之失過於熱也熱則生風迺於他飽則成積醫不擇良藥或犯毒不可救也

柳子種水傳云雖曰愛之其實害之所以取譬也 諺云若要小兒安常受三分饑與寒饑謂節其飲食也寒謂適其寒溫也勿令太飽太煖之意非不食不衣之謬說也

頭要清涼背要溫 露其下體養其陰 天時勿犯如春候 寒熱乖違客氣侵

此言適其寒溫之法也頭者六陽之會常要涼不可纏裹腹為陰背為陽皆臟腑之俞募也常要和煖不可便露小兒純陽之氣嫌於無陰故下體要露使近地氣以養其陰也天時者即寒熱也春者溫和之氣萬物皆賴以生長也謂襁褓之中寒不犯寒熱不犯熱常如春氣溫和時以長養兒之身體皆有乖違寒熱之客氣來侵矣

乳為血化美如飴 肉穀雖甘更亂真 到得後來能食日 莫教縱恣損脾陰

此言節其飲食之法也兒在母腹之時賴血以養既生之後飲食之乳亦血之所化也雖有穀肉不可與之以亂其腸胃中和之氣至於能食猶當節之不可縱其所好以快其心因而致病者多矣內經曰飲食自倍腸胃乃傷不可不慎也

耳目之神寄在心 異聞異見易生驚 痰生氣逆因成癇 恨慈終身作廢人 初生小兒未與物接卒有見聞必驚其神為父母者必慎之可也若失防閑致成驚癇為終身之痼疾有

醫不執泥曰上工 能知富貴與貧窮



生來氣體分清濁 居來看承又不同  
人有恒言富貴之子多病者其氣清其體薄而過於  
飽煖也貧賤之子少病者其氣濁其體厚而常受饑  
寒也上智之醫識得此意觀父母而知其氣稟之厚  
薄觀形色而知其腑臟之虛實猛峻之藥不可妄如  
和平之方亦不可執用也

人之受病者有富貴貧賤之殊自天地視之皆其所  
生者也無一人不養焉則無一人不愛矣醫者仁術  
也博愛之心也當以天地之心為心視人之子猶已  
之子勿以勢利之心易之也如使救人之疾而有所

得此一時之利也苟能活人之多則一世之功也一  
時之利小一世之功大與其積利不若積功故曰古  
來醫道通仙道半積陰功半養身

小兒初誕多胎疾 能食過多為食積  
於斯二者作提綱 仲陽復起從吾議

小兒之疾如痘疹丹痛臍風癩蒸斑黃虫疥解顧五  
軟之類皆胎疾也如吐瀉瘡痢腫脹痞積疳積之類  
皆傷食之疾也惟發熱咳嗽或有外感風寒者故曰  
小兒之疾屬胎毒者十之四屬食傷者十之五外感  
者十之一二

驚癇原來肝有餘 脾常不足致疳虛  
形體不全知腎弱 上醫會得謹其初  
大抵小兒脾常不足肝常有餘腎主虛亦不足也故  
小兒之病驚風傷肝疳積屬脾胎氣不足屬腎上醫  
治病必先所屬而預防之故曰不治已病治未病  
家傳三法

家傳三法救孩童 驚癇預防用抱龍  
胎稟怯時宜補腎 肥兒疳疾有奇功

治癇用琥珀抱龍丸 治疳用肥兒丸 治胎稟不足用  
補腎地黃丸 此三方者祖訓相傳子孫敬守

抱龍丸解 抱者養也龍者純陽之物蓋震為龍東  
方乙木也為少陽之氣時至乎春乃萬物發生之始  
氣也乙者肝木也肝為風木初生小兒純陽無陰龍  
之象也肝為有餘少陽之氣壯也肝主風小兒病則  
有熱熱則生風上醫慮之製此方以平肝木防驚風  
此抱龍之名義  
錢氏抱龍丸非實兒宜用之然內有雄珠金石之藥  
不可服如麝香之耗真氣能引風邪入裏如油之入  
麵不得出也故人皆禁之不可用也  
琥珀抱龍丸內用補益之藥人皆喜而用之然有起



壳枳實二味能散滯氣與滯氣者能損胸中至高之氣如急慢驚及元氣弱者去此二味可用當歸川芎各二兩代之然琥珀天竺黃二味須擇真者

錢氏抱龍丸 治傷風瘟疫身熱昏瞶氣粗

痰實擁嗽又治驚風潮搐及蟲毒者盛暑沐浴後

並可服壯實小兒宜時與服之

雄黃二錢半 辰砂五錢另 天竺黃一兩 胆星四

射香分五

共末煮甘草水為丸皂角子大溫水化下有日見

每丸分作三服

寶珠抱龍丸 理小兒諸驚四時感冒風寒濕痰邪

熱至煩燥不安痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜可服

真琥珀

天竺黃

檀香細

人參去

白茯苓各一兩

粉草去節三

枳殼一兩

枳實一兩

硃砂五

犀星二兩

山藥一斤去

金箔百

取見成藥末一兩同在乳餅內研極細杵仍和前末用右為末和勻取新汲井水為丸如此〇樣大

粒陰乾每服用薄荷湯化下

肥兒丸 小兒脾胃素弱食少而瘦或素強健偶因

傷食成積而瘦或因火病之後而瘦者宜服之

人參 白朮各二錢 白茯苓去皮 陳皮焙上

甘草 木香 砂仁 青皮

神曲 麥芽炒 使君子肉各一錢

山藥 蓮肉去心各 桔槔錢

共為細末荷葉浸水煮梗米粉為丸米飲下

此參苓白朮散以治疳病將成之聖藥也

腹中有癖者加 三稜 莪朮各煨

九助驚甲醋炙各 有熱者加 北柴胡二

黃芩 黃連 乾蟾煨存性 蘆薈各半

瘦太甚者加 當歸 川芎

泄瀉者加 肉豆蔻煨 訶子肉各一錢

疳瘦食少者去 麥芽 神曲

乳母須求不病人 擗其體厚性和平

不貪口腹無滯欲 鞠養何求子不成

養子之道當擇乳母必取無病婦人肌肉豐肥性情和平者為之則其乳汁濃厚其美瑩白溫和於子有益如病寒者乳寒病瘡者乳毒食口腹者則味不純

喜淫慾者則氣不清何益於子故宜遠之

幼科精熟是專門 壽天平時認得明



色脉合觀知五臟

補虛瀉實藥通神

古語云三折肱為良醫。謂歷練熟也。故勿科精專者。凡小兒之壽夭。先瞭然於目中矣。病不可治。必不可治也。至於臨病之時。觀形察色。便知五臟之証。治所以補之瀉之意。之所生有通神之妙也。

辨小兒壽夭

小兒壽夭最難明

只在良工眼力精

形氣有餘為壽相

如其不足豈遐齡

小兒壽夭。須觀形氣。如形實氣實者。此稟氣有餘。為壽相。無病易養。如形虛氣虛者。此稟氣不足。為夭相。

多病難養。蓋兒之生也。受氣於父。成形於母。父母俱強。則形氣有餘。父母俱弱者。則形氣不足。父強母弱。則氣有餘。父弱母強。則氣不足。而形有餘也。大抵壽夭。竅通聰明。愚痴皆以預定。豈能逃乎。小兒所稟全賴父母之餘氣。以長形質。故肥不可生。瘦瘦不可生。肥大。小與父母不等。則難養也。雖物生多患。若形體相稱。則壽也。小兒而舒轉者。遲滯稍貴。人形。球者。壽之兆也。若小兒預知人意。身輕力弱者。難養也。古

人有言。譬如梅花。早發不暗。歲寒。其菊。晚榮。終於年。故知晚成者。壽之兆也。若小兒陰小而黑。與身相

等者可養之子。若陰大而白。并難養也。若小兒形體

弱。頭面多青。脈精神昏。瘁者。難養。若小兒剛悍。眼目

後。明神氣爽。髮絳而澤者。壽之相也。若小兒精神

實。則少病。故易長成也。若形瘁而多病者。難養也。若

小兒黑珠少。白珠多。面色。此白者。非壽之相也。縱長

不及天年。若青珠大。而白睛少。面色。黑形不淡者。亦

要觀其眼中。黑白分明。表裏相稱。曰壽。曰康。若黑珠

動搖。光明閃爛。縱長亦應。目疾。壽亦不及。四句也。

頭圓背厚。腹如垂。目秀眉清。鼻准齊。

耳角分明。口方正。腎堅肉實。體豐肥。

頭者髓之海也。腎主骨髓。頭圓則腎足矣。背者五臟

之所附也。背厚則五臟安矣。腹者水穀之海也。腹大

則水穀盈矣。目者肝之竅。耳者腎之竅。鼻者肺之竅。

口者脾之竅。七竅。各關則形全矣。脾主肉。肉實者脾

氣足也。肝主筋。筋強者肝氣足也。腎主骨。骨氣足則

腎堅矣。

腮妍髮絳。形表端。二便調和。裏氣安。

脚健項肥。囊紫小。肌膚溫潤。更紅鮮。

腮研如桃。髮黑如漆。此表實也。小便長大。便潤。此裏

實也。脚者身之柱也。柱壯而強。則身不撓。項者頭之



莖也項長而肥則頭不嫩養者宗筋之會也髮黑而小如荔枝者壽肌肉者榮衛之所舍也溫潤紅鮮則榮衛宣暢而氣血足矣

情靜神安狀若愚 自然清氣與人殊

樂於後笑不多哭 若到眠時不久醒

英華不露神氣內藏此非凡兒相也心主笑不妄笑者心氣足也肺主哭不多哭者肺氣足也又哭氣不絕連綿者肺氣實也脾主睡睡不久者脾氣實也此上三條皆壽相也其兒無病而易養也

頭破露縫眼露睛 鼻乾唇縮口流津

髮稀項軟腭小 滿面紛紛青紫筋

諸陽皆會於頭頭破則陽上衰矣諸陰皆起於足腭喘者吳壯肉也小則陰下衰矣鼻為肺竅鼻乾則肺氣衰矣唇口為脾竅唇縮流津脾氣衰矣髮為血餘髮稀則血衰矣項為天柱項軟則柱折矣青紫之筋皆風熱之候散見於面必多驚癇之病

形枯色夭欠火晶 肚大筋浮瀉利煩

虫疥浸滌多叫哭 見人語笑弄精神

形枯色夭者此表虛也瀉利無時者此裏虛也亦瘡啼哭多笑語者皆陽火妄動之候此上三條皆天相

也其兒多病而難養

辨小兒形色

小兒有病觀形色

黃為傷食自主痺

青主驚風紅主熱

肝主風其色青心主熱其色紅脾主穀其色黃白者氣血不榮於面也故主痺黑者凶色也故主中惡

氣色須看何部中 心主正額火光紅

左頰木肝右金肺

此以五行分部位也

肝屬木東方故於左頰候之

肺屬金西方故於右頰候之心屬火南方故於額

上天庭候之腎屬水北方故於額下地閣候之脾

屬土中央故於鼻準候也

肝病須觀眼目中

肺有病時常在鼻

此以五竅分五臟也

肝之病見於目心之病見於額脾之病見於唇肺之病見於鼻腎之病見於耳

各隨寒熱虛實決之目揚面赤熱生風眉縞呻吟

腹痛攻面腫色黃知瘵疾髮稀面白有疳虫

肝主風目揚者肝病也揚者直視也心主熱面赤者

心病也風熱相傳必生驚搐人有痛則眉縞而呻吟



决云痢疾肩頭纏腸中病脾主濕濕勝脾腫而腫色黃故知脾病宿食成積積久成疔疔者津液不足之病也髮稀自血之虛也疔病多再

下痢應熾面貌新 驚風面赤亦甚憐

咳嗽面白為真色 青遠唇傍青紫筋

訣曰瀉不定精神好者死風病面如塗味者死咳久不止面光白者肺之真臟色見也

小兒疾厄命宮尋 虎口三開食指放

欲知生死無錯誤 不離五色認分明

命宮謂山根也小兒山根斷絕青紅紫黑筋橫欄者

多病難養相法云山根青色出胎後見災危是也男

左女右手指橫紋初而曰凡開中節曰氣關三節曰

命關謂之虎口紋青主驚赤主熱黑主水其紋曲向

內者病在內曲向外者病在外其紋初節止者病輕

上至次者病重過三關者死下大上小者吉下小上

大者凶

要知虎口氣紋脈 到指看紋分五色

黃紅安樂五臟和 紅紫依稀有損益

紫青傷食氣虛煩 青黑之時証候逆

忽然熱黑在其間 好叫醫人心腹寒

若也直上到風關 粒米短長分兩端

如鈴衝射驚風至 分作技又有數端

弓反裏順外為逆 順逆交連命似難

又頭長知猶可救 如此醫師仔細看

辨小兒脈息

小兒未損天真氣 指下脈來宜有力

大滑數實最為良 細瀉遲虛終不吉

脈大者氣實也脈滑者血虛也六至為數脈來有力

皆賦稟有餘之脈也脈細者氣虛也脈滑者血虛也

三至為遲虛則無力皆則稟賦不足之脈也小兒壽

夭以此辨之

一息六至號平和 八至之說不可憑

四至以下虛冷憊 八九十至熱生驚

小兒之脈一呼三至一吸三至謂之一息六至乃和

平無病之脈也訣云八至為平和脈者勿從一息四

至曰離經三至以下謂之損脈為虛冷疔癆之病一

息八至曰離經九至以上謂之至脈為實熱驚風之

病

辨小兒脈証治

上醫色脈盡須明

虛實証治如法行



有一事境即不中。為兒作禍犯天刑。內經曰能合色脉可以萬全。蓋上醫之治小兒也。以色合脉以脉合色實則瀉之虛則補之不違則制萬全之道也。且如兩腮紅者色實也脉急數者脉實也。大便秘小便黃濁不止上氣急足胫熱者實証也。有此三實者宜以寒涼之藥瀉之所謂不可服熱藥者有七也。如面觥白者色虛也脉微沉者脉虛也。黃色青腹虛脹嘔乳見眼珠青足胫冷虛証也。有此三虛者宜以溫熱之藥補之所謂不可服寒藥者有七也。今之粗工色脉証治憤然無知妄作易九夭兒性命。天必譴之。

青嬰卷之

天

敷

藥必對証無差錯。待其來復真氣生。

中病即已無太過。食養盡之無補佐。

謂此治病之要術也。色脉証治了然在心故以寒治熱以熱治寒實則瀉之虛則補之皆對病之方藥也。服藥之後中病即已勿過其制者即內經大毒治病十去其三小毒治病十去其五無毒治病十去其七之法也。內經曰及其衰也待其來復謂病衰其半即止其藥以待其真氣之發生又以乳食之養助其發生之氣諺云藥補不如食補者是也。粗工不知此理。

攻寒令熱寒未退而內熱已生制熱令寒熱未除而中寒又起欲求其過安可得乎。天札之曰必始於此。此條治法亦吾與緊為人處。

小兒用藥擇其良。毒藥毫厘不可嘗。邪氣未除真氣損。可憐嫩草不耐霜。

良謂氣味平和無毒之藥也。毒謂猛峻蝕利損眩之藥也。故小兒之方實則瀉之如瀉青導赤瀉白瀉黃之類。虛則補之如安神異攻阿膠地黃之類。如涼驚治熱理中治寒抱龍治癇肥兒治疳之類皆和平無毒之劑。此吾家秘傳之良方也。如巴豆牽牛雖未嘗不用亦不敢專用也。予見今之行幼科者以礪砂治積輕粉治痰以砒治瘰以硫治寒皆是大毒之藥小兒之腸胃嬌脆安能當此毒也。

小兒汗下勿輕嘗。實實虛虛必損傷。

寒熱誤殺如太過。溫中解毒有奇方。

按仲景治傷寒法云不應汗而汗之者為斑疹驚湯汗不止之証所謂桂枝下咽陽盛則斃也不應下而下之者為痞滿腹瀉吐瀉腸滑不止之証所謂承氣入胃陰盛乃亡也。

小兒有病不可下。不蒸自汗無自瀉。



神困顛隔四肢冷  
 吐蟲面白髮焦穗  
 鼻寒咳嗽及虛痰  
 若將有積與疎通  
 孩兒實熱下無妨  
 脉上弦洪肚上熱  
 屎硬腹脹筋肋滿  
 遍身生瘡肚隱痛  
 如誤服寒涼藥過多者以致脾胃虛弱胃脘痛宜溫  
 胃散主之

陳皮 黃芪 沙仁 甘草  
 厚朴 姜汁炒 益智仁 白豆蔻仁 澤瀉  
 乾姜炮 姜黃 各各錢 八參各二錢  
 兵細末每服五分至一錢水煎去滓食前溫服  
 如誤服熱藥太過者以致煩燥悶亂或作吐或狂或  
 渴宜先解毒菜豆粉飲主之  
 菜豆粉 黃連 乾葛 半草  
 三味共末同菜豆粉拌勻每服五分至一錢淡豆  
 豉湯溫調服  
 如小兒病驚多用藥性太溫及熱藥治之有驚未退

而別生熱証有病愈而致熱証者有反為急驚者者  
 多當病者數日因何得之曾以何藥調之可用解毒  
 之藥無不效也。以豆卷散主之  
 貫衆 板藍根 甘草 大豆黃卷  
 以水浸豆生 卷是也  
 每各一兩為末服五分至一錢水煎去渣服  
 芽兒嫩小不耐傷 針灸湯尤莫妄嘗  
 破肉損筋成瘦疾 壞湯敗胃作餘殃  
 初生小兒內外脆薄藥石針灸必不能耐也良工當  
 以愛其已子之心而愛人之子憐惜之撫摩之未可

輕治為兒作禍也書曰如保赤子其愛養之謂歟為  
 父母者不可不知  
 病未發熱不惺惺 不信醫師信鬼神  
 龍木祝由真人訣 未聞生殺解病驚  
 經曰惑於鬼神者不足與言至德故有信巫不信醫  
 之成。祝由科龍木所傳乃移精變氣之術如禱鬼神  
 之事徒殺牲耳何益哉  
 病不可治對人言 病可醫時用意專  
 三法始經常記憶 勿傷脾胃反成症  
 古語云病不可治即宜早告不可隱忍遭人耻笑誠



哉是言也其病可治視人之子如己子調護保養  
所不致可也然有三法初用猛法以攻病之藥去之  
不可惡攻而愛補反助其邪為鬼之害中用寬猛相  
濟病久不除乳食必少脾胃大卷於補脾藥中加攻  
病藥看兒強弱加減末則用寬法兒病既久久則成  
疳只以補脾胃為主正氣完則邪氣自盡矣

五臟証治總論

五臟之理與五臟之方真萬  
氏獨步

是病皆從五臟生  
細將色脉相參合

不知臟腑亦徒然  
對証裁方治不難

五臟平和則病不生或寒暑之適和或飲食之失節

則風傷肝暑傷心寒傷肺濕傷腎飲食傷脾而病生  
矣語其色則肝青心赤脾黃肺白腎黑也語其脉則  
肝弦心洪脾緩肺毛腎沉也語其証則肝主風心主  
驚脾主困肺主喘腎主虛也語其治則心肺脾三臟  
有補有瀉肝則有瀉無補腎則有補無瀉也色脉証  
治本請五臟心中了謂之上工

五臟之中肝有餘

脾常不足腎常虛

心熱為火同肝論

嬌肺遺傷不易愈

人皆曰肝常有餘脾常不足予亦曰心常有餘肺常  
不足有餘為實不足為虛內經曰和氣盛則實真氣

奪則虛此所謂有餘不足者非經云虛實之謂也  
肝之有餘者肝屬木旺於春春乃少陽之氣萬物  
所資以發生者也兒之初生曰芽兒者謂如草木之  
芽受氣物生其氣方盛亦少陽之氣方長而未已故  
曰肝有餘有餘者乃陽自然有餘也脾常不足者脾  
司火氣兒之物生所飲食皆乳耳水穀未入脾未用  
事其氣尚弱故曰不足不足者乃穀氣之自然不足  
也心亦曰有餘者心屬火旺於夏所謂壯火之氣也  
腎主虛者此父母有生之後稟氣不足之謂也肺亦  
不足者肺為嬌臟難調而易傷也脾肺皆屬太陰天

地之寒熱傷人也感則肺先受之水穀之寒熱傷人  
也感則脾先受之故曰脾肺皆不足

肝臟証治

肝為風木主生風

形証脈然在目中

雖於瀉之無用補

少陽生氣與春同

肝者足厥陰風木也木生風故主風錢氏云肝主風  
實則目直視大叫呵欠項間項急虛則咬牙多欠氣  
熱則外生氣滯則內生此肝病之証也肝之竅在目  
故有病常以目候之如肝有風則目連劄肝有熱則  
目直視肝有燥則白膜濼睛之類是也又肝主筋肝病



則筋急為項強為搐搦牽引肝主怒病則性急大叫  
哭甚則為卵臄俗呼氣卵是也肝在下焦熱則大小  
便難肝臟魂肝熱手尋衣領吸亂捻物甚則提空摸  
床此喪魂之病也

肝病錢氏有瀉青丸一方而無補者謂其氣有餘也  
然肝乃少陽之氣所以養生者也肝無病固不可瀉  
以伐生氣亦不可補以助長也

肝胆原來從火治 木中有火無人識  
水不能勝號龍雷 惟有耳溫差可制

肝胆之病從火治者木中原有大燧人氏傳云知空

有火麗木則明此其驗也肝胆之火水不能滅寒不  
能勝又謂龍雷之火惟耳溫之劑如人參耳聾之類  
可以制之也故曰耳能瀉火也內經曰辛以散之如  
川芎防辛之類又曰辛甘發散為陽以辛甘之藥合  
而用之所謂火權則發之此治肝病之太畧也  
肝熱以瀉青丸當歸蘆薈丸瀉之肝實同法肝虛以  
六味地黃丸補之肝乃腎之子虛則補其母也肝寒  
以溫胆湯及吳茱萸生薑之類  
兒病目視物不轉睛者或斜視不轉者或目合不開  
或自開不合或哭無淚或不哭淚自出者皆肝病

瀉青丸 治肝熱急驚搐搦錢氏云氣溫則內生氣  
熱則外生謂口中之氣也此方冷氣熱則外生急  
搐之症

羌活 大黃炮 川芎 山枝子仁

胆草 當歸 防非 各等分

煉蜜為丸鷓鴣頭子大每服半丸至一丸竹葉湯同  
砂糖溫水化下

當歸龍首丸 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋  
惕搐搦神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉潤癢  
胸膈因虛不利腸胃燥澀躁擾狂越置馬驚駭火

熱等症錢氏云氣溫則內生驚搐者此方主之  
當歸 龍胆草 大梔子 黃連  
黃柏 黃芩 各壹兩 大黃 蘆薈  
溫青黛略 辛木香 射 分五  
蜜丸如小豆大姜湯下每二三十丸

六味地黃丸 見後腎臟  
溫胆湯 治心胆虛怯觸事多驚亦冷水氣怔忡  
赤夏制 枳殼制 白茯苓 各壹兩 橘紅 壹兩  
牛草 五錢 炙

對和勻每服三錢半姜七片葱三枚剉竹青一塊



如錢大煎服或加熟遠志尤妙不睡者胆寒也加酸枣仁炒若喜睡者胆熱也酸枣仁生用

心臟証治

心為神舍易生驚

色脉相通惡熱侵

實則澀嫌性瀉腑

如虛散挫嬰安神

內經曰心者君主之官神明出焉鬼之初生知覺未開見聞易動故神怯而易生驚也錢氏云心主驚實則叫哭發熱飲水而痛虛則困卧悸動不安此心病之証也心主血脉血色者血之萃脉者心之合也如色見紅潤脉未大數者此心氣有餘之象其兒易養如色見昏黯脉來沉細者此為不足其兒多病難養此觀其形色脉以知其心中之虛實也心惡熱與風相搏則發搐故肝生風得心熱則搐也心屬火火盛則津液乾而病渴心臟神熱則神亂而卧不安喜合面睡卧者心氣熱則胸中亦熱欲言不能而有就冷之意故合而卧心氣實則氣上下行澀合而刺氣不通故喜仰卧有努其身而直伸者謂之上竄亦心熱也舌者心之苗熱則舌破成瘡又為重舌木舌舌長出不收之病內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬於心火兒病瘡疔斑疹諸纏疔帶疔疥瘰瘡皆心火之病也

錢氏治心熱病以導赤散夫導赤乃瀉小腸之藥也心為君主不可犯之瀉其腑者以避嫌也心虛則主不安故以安神丸補其臟也

心為君主豈容邪

客熱來侵事可差

瀉實補虛有成法

何須方外覓靈砂

心為火臟常苦緩散而不收孫真人立生脉散夏月服之以五味子之酸能收耗散之氣也治兒心病者擴而充之可也故心熱病生於內者宜導赤散瀉心湯東垣安神丸之類生於外者如口舌生瘡洗心散主之心氣虛者錢氏安神丸虛易驚者琥珀抱龍丸內經曰苦瀉之黃連是也以酸補之津瀉車前子是也神氣浮越發驚悸者宜珠砂赤石脂龍骨以鎮之如心病入肝出髮潤或舌出不收或暴啞不語或神昏憤亂或斑疹變黑此皆心絕之候不治導赤散治心熱及小便赤夜啼生地木通甘草各等分共粗末每二錢水一盞入淡竹葉七友同煎至五分食後温服錢氏安神丸治邪熱驚啼心疳而黃煩赤壯熱寒冬性馬牙疳白痰寒水



甘草 各五錢 碎炒  
家為丸 鴉頭子大 每服半丸 砂糖水化下 不拘時

東垣安神丸

內經曰 熱淫所勝 治以平寒 以苦瀉之 以黃連之  
苦寒去心煩 除濕熱 為君 以生地 甘草之甘寒瀉  
火補氣 滋生陰血 為臣 以當歸 補血之不足 砂  
幼浮瀆之火 而安神明也

并草 五錢 五黃連 淨酒洗 當歸 去蘆 二分 生地 一錢  
右四味 為細末 湯浸蒸餅 為丸 如黍米 以珠砂 五

養心湯

錢另研水飛 為衣 每服十五丸 或二十津唾嚥下  
食後或溫水或涼水少許送下 亦得此近而奇偶  
制之緩也

瀉心湯 實熱宜服

黃連 淨一兩  
為末 每服一字至五分 乙錢臨卧 溫水調下

洗心散 治壯熱煩燥 風熱壅塞 大小便閉 澀口舌

生瘡 大黃 煨 甘草 各 當歸

芍藥 麻黃 不去節 荆芥 穗 各三 白朮 七錢

共為末 每服二錢五分 生姜薄荷少許 同煎食後

兜龍丸 見家傳立法內

幻科方中 脾病多 只因乳食致沉疴  
失餓失飽 皆成疾 寒熱交侵 氣不和

內經曰 脾胃者 倉稟之官 謂為水穀之所聚也 兄之

為生 脾薄而弱 乳食身傷 故曰脾常不足也 錢氏云

脾主困 實則困 睡身熱 飲水虛則吐 瀉生風 此脾病

之証也 脾屬土 其體濇 故脾病喜困 土主濕 濕傷則

為腫 為脹 為黃 為吐瀉 不止則成慢驚 風內經曰 土

氣之下 木氣承之上 為坤土 坤為腹 故脾病則腹中

痛 脾痺則肚大筋青也 脾之竅在口唇 脾有風則口

喎 唇動 熱則口臭 唇瘡 寒則口角流涎 謂之帶風 氣

不和 則口頻撮 脾主舌 本熱則吐舌 弄舌 脾主肉 脾

虛則瘦 大肉折 脾主味 脾虛則不喜食 脾熱則食不

化 肌膚傷于食 則成積 積久則成癖 脾主津液 脾熱

則口乾 飲水虛則津液不生 而成疝也

脾與胃異 同論 蓋胃受穀 脾消穀也 調其脾胃者 當

遵其寒濕 節其飲食也 故飽則傷胃 饑則傷脾 熱則

傷胃 寒則傷脾

胃受清涼 脾受溫 難將脾胃一按論

陰陽相濟 和為貴 偏熱偏寒 不可



脾喜溫而惡寒。胃喜清涼而惡熱。喜惡不同故難攝於一法也。蓋脾胃為土居中。以應四傍。其立法也。必四氣俱備。五味調和。而後可。四氣者。謂寒熱溫涼也。五味者。謂酸苦甘辛鹹也。辛甘溫熱為陽。酸苦鹹寒為陰。氣本合而服之。謂之陰陽相濟。得其中和之法也。如偏熱則傷胃。偏寒則傷脾。非中道也。錢氏立方以益黃散。十補脾。東垣老人謂其偏熱。而以異攻散代之。其慮深矣。祖訓錢氏諸方法。當遵守。惟脾胃一條。吾於脾熱者。湯黃散。胃熱者。人參白虎湯。脾胃寒者。理中湯。九脾。胃虛者。異攻散。謂元湯。人參白朮散。育嬰卷之一下

養脾丸。傷食者。積消丸。保和丸。宿食成積者。枳朮大黃丸。濕勝者。胃苓丸。欲成疝者。肥兒丸。已成疝者。集聖丸。此吾家秘之法也。不可輕泄。

如脾病。火大肉消。肚大青筋。或口禁不開。或唇口開張。或遍身虛腫。或脚背腫。眼下胞腫。或吐瀉不止。飲食不入。或睡則露睛。口開不合。或多食而瘦。口能喜啖。辨物或虫出於口。或唇齶而縫。此皆脾絕之証也。不可治。

益黃散 陳橘皮 一 青橘皮 柯子肉

其草 各五 丁香 二

為粗末。每二錢水一盞煎。五分食前溫服。

按益黃散治脾。胃寒溫太甚。仲品之藥也。以補脾胃之虛。則誤矣。東垣云。丁香辛熱助火。火旺土愈虛矣。青橘皮瀉肺。丁香大瀉肺。與大腸脾實常瀉。子令脾虛。反更瀉子。而助大重虛。其土殺人無疑。故以異攻散代之。病非嘔吐腹痛瀉利。青白不可服。

錢氏異攻散 溫中和氣治吐瀉不思飲食。凡治小兒。見虛冷病。先與教服。以正其氣。

人參 茯苓 白朮 并草 各一

陳橘皮 各等分

育嬰卷之一下

為未。每錢水一盞。姜五束。二引。煎食前溫服。

謂元湯 此平肝木。益脾土。瀉邪火。補元氣之要藥也。

黃芪 各二 人參 各一 并草 各五

到細末。水煎。食遠服。

養脾丸 徒脾消食 陳皮 七錢 五 半夏曲 枳實 各五 白朮 一 厚朴 各一 神曲 各五 青皮 厚朴 各一

為極細末。薄荷葉浸水。煮粳米粉。作糊。為丸。米飲送下。此枳實丸。變化法也。

胃冷丸 補脾胃。消積退熱。解渴祛瘧疾。止吐瀉去。



腫脹乃幼科之要藥也

蒼木製

陳皮

澤泄

白木

白茯苓一兩 猪苓

甘草各七錢 厚朴半

共末水煎麩糊為丸補脾胃常服米飲下 祛瘡

退熱竹葉炒陳米煎湯下 腫用五加皮燈心長

流水順取煎湯下小便黃白塩湯下

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進或嘔吐泄利

大病後補助脾胃此藥極妙

人參 白朮

山藥

白扁豆

一兩 五錢 各 甘草

桔梗

薏苡仁

育嬰卷之一

聖

數

蓮肉各兩半 東湯調服

瀉黃散 治脾熱弄舌

藿香葉七錢 山枝仁

石膏 甘草

共剉用酒蜜微炒香為末末煎溫服

人參白朮湯 瀉胃火此治大熱大渴之重藥也

石膏

知母

甘草

粳米

吹咀水煎待米熟去渣溫服

聖中湯丸 治一切飲食所傷胸腹飽悶不安或腹

中有食積痞塊多服日漸消散脾胃虛者勿服

山查肉

神曲

半夏

茯苓

陳皮

華芎子

麥蘖

連翹

為細末別用生神曲五兩八生薑汁一小盞水調

打糊為丸每服白湯或清米飲送下

此方脾胃虛者服之虛虛之漏疾如反掌蓋山查

一味大能消化食物若胃中無食脾虛不運不思

食者服之則尅伐之氣勝故云然也

家傳保和丸 治氣虛傷食者傷食之病有二小兒

素強者偶被飲食所傷此食傷脾胃也宜用上冊

溪保和丸治之如脾胃素弱者飲食畧多便成內

傷此脾不能傳任宜服此方以助傳化之職也

育嬰卷之一

聖

數

山查肉

白朮

白茯苓

甘草

麥芽

神曲

神曲

神曲

為細末另用神曲水煎作糊為丸

加減保和丸

消痰利氣扶脾胃進飲食治痲疾

山查

神曲

半夏

茯苓

陳皮

連翹

薤白

薤白

蒼朮

枳實

香附

厚朴

黃芩

黃連

神曲

神曲

共為末姜汁煮麵糊為丸每食後服水湯下

保和丸

治小兒五疳及痢吐瀉肚大青筋面



黃肌瘦疳積等証神效

白木并沒土 神曲炒 木香 枳柳

茯苓 三稜各一兩 莪朮兩 使君子

厚朴姜 青皮 甘草炙 一蒼朮二兩

陳皮去白 枳實炒 痰癆 人參 砂仁

黃連酒製 麥芽炒 益智炒 藿香

肉豆蔻製去 白豆蔻各五

共末煉蜜為丸。龍眼大每服一九用清水平化送

下。嘔吐姜湯下。印積加山查一兩。喘加蘿蔔子二

兩。瀉加猪苓澤泄各一兩。如無他症只服本方神

效。

保和丸有四。丹溪保和丸乃二陳湯加消導藥氣實

者宜用之。家傳保和丸乃異攻散加消導藥氣實者

宜用之。加減保和丸乃丹溪保和丸加平胃散枳朮

丸也。惟火積有熱者宜用之。秘傳保和丸又上加減

保和丸家傳保和丸相合變化也。以積成疳者宜用

之。臨病之工擇而用之可也。

枳實大黃丸 見後積症

肥兒丸 見家傳三法

集聖丸 見後疳症

肺臟証治

肺為嬌臟原主氣 寒熱蒸侵其氣逆

熱壅胸高喘不寧 虛羸氣短難報息

肺最居上為臟腑之華蓋。口鼻相通息之出入氣之

升降必由之。故主氣。錢氏云肺主喘實則悶亂喘

促。有飲水者有不飲水者。虛則喘氣長出氣此肺病

之症也。難經曰形寒則傷肺兒之衣太薄則傷寒內

經曰熱傷肺兒之衣太厚則傷熱寒熱傷肺則氣逆

為喘。為咳。鼻者肺之竅。肺受風則噴嚏鼻流涕。受

寒則鼻塞呼吸不利。受熱則鼻乾。或為衄血肺痺則

鼻下赤爛。肺主皮毛。肺虛則皮乾毛焦。病喘咳者喘

不止。則面腫咳不止。則胸骨高。謂之龜胸。交驚者死

也。肺屬金。其體燥。病則渴不止。好飲水。謂之兩渴。

真兩肺氣與天通。藥用消陽以類從。

肺實麻黃強瀉白。阿膠虛補有奇功。

內經曰天氣通於肺。輕清為天。清陽出上竅。本乎天

者親上也。故治肺病者宜用辛苦升浮之藥。如苦酸

必用酒炒。使上升也。錢氏立方肺實者以瀉白散。葶

蘆丸。虛者以阿膠散。祖訓云其法太簡。肺主喘咳。因

於寒者。麻黃湯為主。因於熱者。以瀉白散。肺熱在胸



者以東垣涼隔散渴飲水者人參白沙湯... 肺乃脾之子虛則補其母也或單以生脉散其法始

如肺久病咳嗽連綿喘息不休或肩息或危胸或嗽... 絕之候不治

馮白散 治咳嗽而後喘而腫身熱... 桑白皮 地骨皮 甘草

右吹咀入粳米同煎食後服... 芫花 治乳食衝脾傷風咳嗽面赤身熱痰甚

促者 糾葶藶 去土 禹紙 黑牽牛... 杏仁 去皮夫炒黃巧 漢防已 各等分

為末入杏泥取蒸陳束肉和搗為劑丸如麻子大... 每服五九至七九淡生姜湯乳食後或臨卧服

兒加減 此方因乳食衝脾痰甚者及壯實小兒... 去牽牛加真蘇子炒各等分為丸

阿膠 一兩 黍粘子 二錢 馬莖 二兩... 炙甘草 一錢 杏仁 七個 去 糯米 兩

小阿膠散 治風熱涎潮喘促搐掣驚視... 透明阿膠 半 紫蘇 一

為末每服一錢入烏梅肉少許同煎灌下神效... 出於肺熱則生渴阿膠清肺行小便故也肺風用

麻黃湯 玉液丸 二方見後咳嗽 調元湯 見前脾症... 東垣涼隔散 見後痰熱 人參白虎湯 見前脾症

其桔湯 治痰熱咽喉不利... 甘草 二兩 桔梗 兩半 乾用 加牛房子 錢五

為末每服八阿膠泡故煎食後溫服... 生脉散 此孫真人所立方使人夏月常服

人參 麥冬 五味子 三味... 見大人科中暑閉

腎臟証治... 天一真精聚命門 入無天脉木無根

內行骨節宜堅固 一水難勝二火焚... 腎屬水乃天一真精之所生也人之有由木之有



俱其脈在及腎之虛實以尺脈候之命門在腎之髓  
為元氣聚會之處兒之強弱壽夭尤係於斯全主實  
身虛也腎氣不足則下窠蓋骨重惟欲下墜而縮身  
腎水陰也腎虛則目畏明兒本虛怯由胎氣不成則  
神不足目中白睛多其願即解色此白此皆難養或  
有因病而致非腎虛也此屬病之証也腎主帶腎虛  
者骨髓不滿也兒必畏寒多為五軟之病尻骨不成  
則不能坐課骨不成則不能行齒乃骨之餘骨不餘  
則齒生遲腎之液為血髮乃血之餘腎虛則髮希不  
黑腎之竅在耳腎虛則耳薄熱則耳中出膿腎主齒

腎熱則生疳即走馬疳也

腎開竅於二陰腎熱則大小便不通腎冷則小便下  
如米泔二火者乃君相火也經曰一水不勝二火正  
此謂也

陰常不足腎常虛

錢氏立方惟有補

筋骨難成親必瘡  
經云瘡疹馮其餘

水為陰火為陽一水不勝二火此陽常有餘陰常不  
足腎之本虛也明矣故錢氏只用補腎地黃丸一方  
不敢瀉者因無實証也或謂痘疹腎不可寬當瀉之  
此言甚謬蓋腎主液痘中之血化為水水化為液皆

腎初傷癆瘵如疔若無腎水則唇枯黑而死矣豈可  
瀉之痘疹曰歸腎者蓋瘡疹之毒內發於骨髓外發  
於皮毛者為順變黑復陷入於骨髓之中故為害此  
非順之為害也乃火旺水衰之病錢氏以有祥丸牛  
李膏治黑陷者以瀉腎中之邪非腎中之真陰也詳  
見痘疹心要腎熱大便不通者宜以豬肚汁導之借  
者水畜也小便不利者宜五苓散瀉其膀胱腑也東  
垣滋陰丸以瀉腎火如腎病入身下窠月中如見鬼  
疔或骨委弱卧不能起或二便遺失皆腎敗之候不  
治

錢氏地黃丸

治肝疳白膜連睛瀉血失音身瘦瘡  
疹又治腎怯不言解頤小兒長大不能行赤專服  
即效

熟地黃 酒洗焙乾研 山茱萸

乾山藥 兩各四 澤泄 牡丹皮 白茯苓

蜜丸如梧桐大 三歲以下二丸至三丸空心溫水  
化下

活幼補腎地黃丸 治稟賦不足腎氣虛弱骨體枯  
竭頭太頭縫不合體瘦語遲行步多艱齒生緩者

乾山藥 去黑 山茱萸 酒浸熟地 酒洗焙乾

牛膝 酒洗各 牡丹皮 去心 白茯苓 澤瀉

鹿茸 酒洗

澤瀉 兩各一



一方不用鹿茸有用續斷酒洗四兩蜜丸如上法  
五苓散 治傷寒中渴煩燥小便不利而 或霍亂

吐瀉不止 澤瀉一兩五 白朮 赤茯苓

猪苓各一兩 兩桂半

為末每服或白湯或清米飲任服

東垣曰五苓散乃太陽裏之下乘也夫太陽高則汗  
而發之下則引而竭之渴者邪入太陽本也當下之  
使邪從膀胱出也其腎燥膀胱熱小便不利此藥主  
之小便利者不宜用此太陽病熱而渴小便澀利亦  
宜此藥下之當服不服則殺消水去邪亡必就陽明

青囊卷之一 聖 數

燥丸伐胃發黃此太陽入本失下也

東垣滋腎丸 治腎熱小便不利

黃柏三 知母二 桂枝

熟水為丸每服食前沸湯下

本臟自病論精神 補瀉分明有定方

若是相傳作兼病 更宜通變五提綱

按難經有五邪之論論本臟自病者為正邪自前來  
者為實邪自後來者為虛邪自所勝來者為微邪自  
所不勝來者為賊邪此以五行生剋之理論之也錢  
氏所論肝主風心主驚脾主困肺主喘腎主重此皆

本臟自病者謂之正邪故立五補六瀉之方以主之

紫古先生乃取難經之言以明五臟傳變之証捕錢

氏之所未及者其法始倫故風傷肝熱傷心濕傷肺

寒傷腎飲食勞倦則傷脾此五臟自受之邪為本病

也如肝主風其中風者本病也謂之正邪由傷熱得

之乃心乘肝自前來者為實邪由傷濕得之乃肺承

肝自所不勝來者為賊邪由傷寒得之乃腎乘肝自

後來者為虛邪由飲食勞倦得之乃脾乘肝自所勝

來者為微邪餘臟倣此語見四十九難紫古論其治

五勝之法如肝臟自病者只治其肝宜瀉青丸若心

乘肝者宜以導赤瀉心實則瀉其子也腎傷肝者宜

以姜附四逆湯補腎虛則補其母也肺傳肝者宜以

瀉白散瀉肺地黃丸補肝先補而後瀉也脾乘肝者

宜調元湯以益脾制肝餘倣此推之其餘方漢不必

拘定會而通之可也是皆治其初得之病也

又有一臟之病而傳別臟者謂之兼証當視標本之

緩急而治之先病謂之本後見病謂之標急如大小

便不通或吐瀉不止或咽喉腫痛飲食不化或心腹

急痛之類雖後得之當先治之故曰急則治其標也

如無急証只從先得之病治之以後病之藥隨其証



而治加之所謂緩則治其本也

大抵嬰兒脾病多

以因乳食久調和

知他脏病須調胃

若到成疳受折磨

胃主納穀脾主消穀則傷胃飽則傷脾小兒之病

多過於飽也或母有氣實形壯者其乳必多求兒不

哭縱乳飲之定乃傷於乳也母之氣所形瘦者其乳

必少恐子之哭必取穀啣把菓之類嚼而哺之不飽

不止定乃傷於食也故小兒之病胃最多也五臟以

氣為本類其滋養也胃者中和之氣也非若五性

之偏也如五脏有病或瀉或補慎勿犯其胃氣胃氣

有嬰兒之一終

若傷則不食而瘦或善食而瘦



重錄萬氏家藏育嬰家秘卷之二

羅田容齋



胎疾

孩兒初生襁褓中

四因內外能分辨

如苗秀實漸成童 治不乖方大有功

幼科立方古有定制見初生後病者惟以膏丸化而

服之蓋以實蒸未定腸胃脆弱恐不勝藥則立調治

乳母之法一歲之後則有湯藥與大人同但劑小耳

有因氣動而病生于內者如驚病重癖之屬驚用安

神丸內疳用木香丸虫用虫丸癖用消癖丸

有不因氣動而病生于內者如傷乳食之屬初傷以

胃苓丸和之和不夫以保和丸消之消之不去以

脾積丸取之量兒虛寒勿損胃氣

有因氣動而病生于外者如結核虫疥丹瘤之屬結

核用家秘內消丸再疥用苦參丸丹瘤用法

有不因氣動而病生于外者如傷風傷寒傷暑傷濕

之屬風用瀉青丸防風惺惺散寒用理中丸藿香正

氣散暑用涼驚丸黃連香薷飲混用胃苓天水五苓



散

胎疾初生治較難 幼科証治若生談

丹溪妙論如繩墨 家秘書中次第看

小兒胎病有不必治。有不可治者。常觀內經。顛疾之  
之東垣紅絲癰之論。則見疾之生于父母者。似乎不  
必治矣。一臘之臍風不治。百晷之痰咳難醫。未三月  
而驚搖者。凶恰一月而丹癰者。死。又不可治者矣。  
今幼科有胎熱胎寒胎肥胎瘦胎驚胎黃之論。証治  
雖詳。豈小兒常服之藥也。况寒熱者。胎胚之餘毒也。  
肥怯者。父母之賦予也。非惟不可治。亦且不必治矣。

惟丹溪論治胎毒者。只調治乳母。其法誠幼科之綱  
墨典。

胎寒者。毋娠時多熱病。乃服寒涼之藥。令兒受之。生  
後昏昏多睡。間或吮乳。瀉白。此其候也。或百日之內。  
忽病。戰慄口冷。手卷曲不伸。手亦握拳。腹痛晝夜啼  
哭不止。此生后受寒得之。亦名毒胎。宜服溫補之劑。  
當歸散主之。乳母宜服釀乳當歸散。  
當歸散 治小兒胎中受寒。生下再感外風。面色青  
白。四肢厥冷。大便青黑。及腹痛。盤腸內疝。  
歸尾酒 黃芪 人參 細辛

龍骨 桂心 赤芍 甘草

為細末。每服一字。以乳調下。

釀乳當歸散 乳母服之

當歸 川芎 赤芍 生地

香附 炙甘草 桂心 煨姜

吹咀水煎。食后服。少頃。捫去宿乳。與兒吮之。

胎熱者。毋娠時喜食辛熱煎炒之物。或患熱病。失於  
清解。使兒受之。生后目閉面赤。眼胞浮腫。常以身努  
呢呢。你發。或時啼叫。或時驚煩。遍身壯熱。小便黃澀。  
此胎熱也。若不早治。則丹瘤瘡癰。由此生矣。宜用辛

黃連炙甘草各等分。為末。入珠砂半和勻。生蜜調成  
劑。每取豆許。大納兒口中。令其嚥下。乳母宜服釀乳  
赤芍散。

生地酒 黃芪 川芎 當歸

木通酒 炙甘草 赤芍 天花粉

連香各等 吹咀加淡竹葉水煎。食后服。令乳母捫  
去宿乳。亦須少與兒吮之。

胎驚者。毋娠時曾因驚悸。氣傳于子。子受之。生後顛  
頓發驚。此胎癰也。不可治。治之無功。如因有熱發搐  
者。必先啼哭。亦名胎驚。用燈心湯下東垣安神丸效。



插不止者此真插也勿治

又方 治小兒胎中受驚生未滿月而驚啼用

黃連珠砂 射少許研細取宿乳調稀納入口中又

用全蝎一枚以生薄荷葉裹之線札定火上炙焦為

末分四服入珠砂射少許麥冬湯調下

胎黃者兒生下而目身盡黃者亦胎熱也治同法

胎肥者兒生下遍身肌肥肉如血色紅滿月以后漸

漸羸瘦

胎怯者兒生下目無晶光面無華彩身無血色此二

二者乃胎稟不足之病宜服地黃丸方見前

青嬰卷七

又用沐體法

天麻二錢 蝎稍五分 珠砂五分 白凡

膏三錢 射香一字 烏梢蛇肉三錢 酒洗焙乾同研

末每用三錢水三碗桃枝一握並葉五六片同煮十

沸去渣溫熱浴之勿沐替

一 小兒初生遍身無皮俱是赤肉用白菓粉遍身搽

上候生皮乃止

一 小兒初生如魚泡又如水晶破則水流用蜜陀僧

研極細擦之

小兒胎疾有胎稟不足並宜地黃丸有胎毒者如胎

熱法所謂胎稟不足者各隨五臟論之如語遲心氣

不足也心主言行過折肝氣不足也肝主筋齒髮不

生者腎氣不足也髮者血之餘腎主血齒者骨之餘

腎主骨吐瀉頻併者脾胃之氣不足也脾胃為水谷

之府帝穀短者肺氣不足也肺主殺

臍風証治

臍在身中號命關

衛任在此發靈根

最宜調護無傷損

總少差也成壽元

臍在兩腎之間謂之命門乃人之根本也衛任胃三

脈皆起于臍之下任脈自中而上至于人中與腎脈

合衝脈二道夾任脈而上散于舌下與脾脈合胃脈

二道又夾衝脈任脈而上入于眼

中上下往來如環

無端故男子十六歲而精行女子十四歲而血動任

脈行衝脈滿胃脈寔也小兒初生三脈方具而臍之

子係尤重也所以斷臍之時不可不慎或剪臍帶太

短或結縛不緊致外風侵于臍中或用鉄器斷臍為

冷所侵浴兒時或牽動臍帶水入生瘡客風乘虛而

入內傷于腎腎傳肝肝傳心心傳脾脾傳肺肺蘊著

其毒發為臍風之病其症而赤啼哭者心病也手足

微搐者肝病也唇青口撮痰涎壅塞者脾病也牙關

緊者腎病也啼聲不出者肺病也五臟之中畧見一



二臟之証者病猶可治悉見不能矣

臍風幼子幾遭傷 一臟之中最不詳

識得病在何處起 無求無患早提防

小兒初生一臟之內惟臍風為惡候也如臍腫腹痛  
啼哭不止唇青口撮者曰臍風牙關緊急吮乳不得  
啼聲不出者曰禁風肚腹脹腸若雷鳴大小便不  
通者曰鎖肚此三者同一病也但症不同耳俗名焉  
死風者是也三症多死臍腫唇撮者脾胃之氣絕于  
中也禁風乳食不入者心肺之氣絕于上也鎖肚大  
小便不通者肝腎之氣絕于下也任脈止衝脈閉胃

脈散如之何不死欲免此症須要提防

預防法 小兒初生十日之內但覺嘔噎多啼不乳  
者此將發之候也急抱兒向明處視其喉中懸癰上  
脘有小泡如珠之樣相聚者即用銀窠耳或平指甲  
刮去之以軟綿蘸甘草汁拭去其血去之早而泡白  
者無慮也其色黃或有泡痕在而落入腹中者急用  
硃砂牛黃射香各少許研細取豬乳汁調稀抹入口  
中或取豬乳汁一二匙與兒吞之佳蓋豬乳汁主小  
兒口禁不閉最良

又法五苓散加 當歸 川芎 木通

木香除此不與乳母服如上法

若失預防之法其病將來而口漸撮啼多乳少者此  
腹中痛也內癰同宜五苓散加 當歸 茵陳 炒  
木香 乳香 沒藥 鈎藤 二為極細末乳拌如  
芫寔大納兒口中服之無時乳母仍服上五苓散又  
取附子桂等分為末生薑自然湯調作餅約一分厚  
與臍相等放在兒臍上以帛托住上用熨斗火熨之  
如諸症悉見不可治也

按古方治臍風者初用控涎膏吐風痰次用益胃散  
和胃又用辰砂膏利驚此良法也又用僵蚕全蝎蜈

蚣諸毒藥以怯禁風者此皆治其標也不治其  
本而治其標故鮮克有濟者矣然父母愛子之心必  
欲救之醫有活人之心不可不救也病輕各如上以  
五苓散為主蓋五苓散是太陽膀胱之裏藥也澤瀉  
茯苓以養心安神官桂其荂黃當歸以伐肝臟寒和  
之氣白朮茯苓以去脾臟寒濕之氣木香乳香沒藥  
以止腹中之痛官桂荂苓澤瀉猪苓又去腎中之濕  
以鈎藤官桂去風之瘡以人乳和之或乳母血之所  
化其氣用也若有痰者本方加胆星末口禁者加白  
僵蚕末更加人參末服之加大便不通者宜三黃餅



毒丸下此急則治其標也去其惡毒之后如此法治之臍風之病有胎毒者十無一生吾見人家難于子息者所生之子多以臍風死如東垣所論紅絲瘡之事是以知之

臍瘡者其帶因有所犯而落故根未欽潰腫而成瘡也宜白龍宜枯凡黃栢三味為末敷之甚妙要宜常看勿使抱裙之內有尿濕也

臍突者小兒多啼所致也臍下為氣海啼哭不止則觸動氣氣動于中臍突于外理之常也其狀突出者光浮如吹起者捏按則微有聲此症鄉俗但遇婦人

挑水來者即抱兒以突臍當擔頭上觸之不痛日數

以臍入為度每試輒效亦良法也吾見小兒臍突者多難養由于多哭也

不乳似臍風小兒生下三日之內忽有不乳者當審問之勿以不乳似臍風治也臍有多蒂撮唇之症若此無之但不乳也

有吐乳乳之又吐者或因拭口不淨惡物入腹也用黃連甘草木香瓜各少許為末每用少許納兒口中乳汁下如有啼哭不乳者此腹痛也乃胎寒症宜上方去黃連甘草加乳香沒藥以當歸湯少許煎調如上喂之加無上症無故不乳者

問其母之乳汁多少有乳多者傷乳也宜少蓄之久自思乳矣乳少者必有他症心誠求之

變蒸証治

草木逢春變化新 太和元氣日薰蒸

細推物理皆如是 莫把芽兒作病名

天地之造化陽主生長陰主收斂故草木之生長于春夏者陽之舒也收藏于秋冬者陰之慘也幼科書中變者變生五臟也蒸者蒸養六腑也以變蒸二字分臟腑論又有變蒸之後有三大蒸之說后人因之莫有覺其非者故予直解之曰變者變易也謂兒之

知覺運動以漸而發也蒸者蒸然發熱也形神變易

之時真陽發舒之象也人之生也一歲而變蒸是男子八歲而真牙更十六歲而精動六十餘歲而精竭

女子七歲而真牙更十四歲而經行四十九歲而經止此天地陰陽之氣其分數固已定矣其一歲之外復有三大蒸之論者誠未達其旨也若一歲之內變

蒸之日似亦不可執也形有強弱氣有清濁變有遲速故形壯氣清者其變常速形弱氣濁其變常遲謂三十二日一變者乃舉其大概如是也至于形之強弱氣之清濁則又稟于父母出于造化陰陽之殊也



幼科中治夏蒸者發熱方用黑散子麻黃杏仁發表藥也大黃攻裏藥也表裏無邪不知此法如何而立夏蒸之熱生于其中發于其外自有微汗而解按仲景論有傷寒不宜汗下之戒如是方者慎見多矣兒當夏蒸之時或有傷風或有傷食者法當治之先後補瀉不可不辨如先有所傷兒後夏蒸者邪氣盛而正氣受傷當先瀉後補也先夏蒸而後有所傷者正氣虛而邪氣乃湊也當先補後瀉家秘之法扶外感首宜單理之法以發散塊內傷者宜枳朮丸研細與之更節其乳有客忤者宜至聖保命丹薄荷湯研

南醫卷二

及事

十

救文堂

服或吐瀉者錢氏異攻散加藿香葉共作細末蜜為丸如芡寔大每服一丸米湯化下

小兒夏蒸過如蒸不除者調其乳毋用加減小柴胡

湯 人參 柴胡 甘草 麥冬

生地 木通 陳皮 等分

淡竹葉水煎食後服如前法

有夏蒸咳嗽痰壅鼻塞嚴重惺惺散要方也方見傷

寒

又浴法 用白正或苦參煎湯抱兒向避風處浴之

有夏蒸發搐者此甚生風亦胎驚也宜尋驚風法

治之瀉肝瀉青丸瀉心導赤散如先發驚搐方治正後夏蒸又發者此胎驚將成癩也勿用正法此有痰伏心中宜安神去痰錢氏安神丸主之方見心臍

急慢驚風

兒在母腹中只是一塊血肉耳及其生也啼聲一發以後九竅開張四肢蠕動如慶初覺之象肌骨嬌嫩又如草木萌芽之象故曰芽兒以漸壯健全賴父母之養一旦有病醫藥之助不可無之然病有三因須明辨之有因于胎毒者如丹疹瘡癍之類宜解其毒如幼嬰解毒延齡丸迎源解毒湯之類是也有因胎

南醫卷二

胎風

上

救文堂

稟不足者如解願五軟之類是也宜地黃丸主之有因外感風寒暑濕之氣得者謂之外因有因飲食寒熱之傷得者謂之內因有客忤傾跌湯火得之者謂之不內外因如外因者發散之內因者消導之不內外因者各從其症治之臨機應變不失其宜可也幼嬰延齡解毒丹 解胎毒氣初生下便宜服之用胞衣餘帶近衣者不拘長短剪下炭火上焙乾為末每一錢加甘草一錢淨黃連五分硃砂飛三分為細末用生蜜和勻分作七服每日取豆大許納兒口中以乳送下七日去其腹中之穢毒自 辟風之疾



通源解毒湯 兒有胎疾乳母服之此四物湯也

當歸 川芎 生地 人參

連翹 黃連 皮 甘草

木通 水煎濃入竹瀝服之

丹溪曰乳母致病事起于跌人多玩忽醫所不知故乳母稟受之厚薄性情之緩急骨肉之堅脆德行之善惡令兒相肖為大關係不可不格也

驚風總論

小兒大病是驚風 急慢陰陽便不同

育嬰卷二 驚風 救文堂

採集前賢諸秘訣 指揮後學救孩童

錢氏云急慢或聞大聲或大驚而發搐發過則如故此無陰也當下之此症本因熱生于心身熱面赤嗜飲口中氣熱大小便黃赤則熱也蓋熱甚則生風風屬肝此陽盛陰虛也故下之以除其痰也不可與巴豆大溫藥下之恐觸虛熱不消也小兒熱痰客于心間因聞非常之聲則動而驚搐矣若熱極不聞聲及驚亦自發搐也按錢氏治之用利驚丸亦以硃砂膏代之  
慢驚因疾後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻出氣亦

冷手足時瘳痲昏睡露睛此無陽也按錢氏  
湯不知其義今用調元合建中湯

急慢驚陰陽異証切宜辨而治之急驚合涼瀉慢合  
溫補如不分別則誤甚矣

薄氏曰小兒平常無事忽發肚熱手足搐搦眼目戴  
上涎潮壅塞牙關緊急身熱面赤此急驚風屬陽病  
在腑當治以涼如面白身無熱口中氣冷多啼不寐  
目睛上視項背強直牙關緊急涎潮或自汗此慢驚  
風屬陰病在臟當治以溫

肝驚眼赤面青糞下青白心驚面皮紅赤夜啼至晚  
育嬰卷二 驚風 救文堂

肺驚氣喘飲食中痰鳴腎驚夢中咬牙睡中驚哭  
驚驚五心煩熱乾嘔腹脹不食

按陳氏治慢驚風初去痰用芎蝎散次溫中用油珠  
膏后補元氣用補脾益中湯多辛燥之藥今改用沉  
香礞石丸以降其痰調元建中湯加附子以溫其中

十全大補湯以復其元氣或參苓白朮散

緊古云急驚陽証也俱腑受病耳小兒客痰熱于心  
膈是少陽相火旺經云熱生風因時火盛而作蓋東  
方震木得火氣而發搐木火不動得風而動而用利  
驚丸蘆赤散瀉青丸地黃丸主之搐止服安神丸乃



東垣安神丸也

慢驚陰証也。但臟受病耳。小兒吐瀉病久。脾胃虛損。若不早治。則成慢驚。名曰痰厥。以搐而非真搐也。因脾胃虛損。故大便不聚。當去脾胃間風。則其利自止。既以失治。則脾胃俱虛。致按木所乘。是為慢驚也。當用溫補。按潔古用宣風散。以導脾胃間之風。不知其義。蓋脾胃虛損。豈可用牽牛大瀉元氣。此不可服也。用益黃散。羌活膏。皆犯辛熱。大耗真氣之藥。不如東垣之論。其義最精。見后。

東垣曰。外物驚宜鎮心。以黃連安神丸。若氣動所驚。

宜錢氏寒水石安神丸。大忌防丰丸。治風以辛溫之藥。必殺人。何也。辛散溫浮熱火也。

因驚而瀉青色。先治肝以硃砂之類。勿犯寒涼之氣。大禁涼驚丸。風木旺必尅脾胃。當先定其土。后瀉其木。聞茅忠集錢方。以益黃散補土。誤矣。其藥有丁香。辛熱以助其火。土旺土愈虛矣。青橘皮瀉肺。丁香熱大瀉肺。與大腸。脾寒當瀉。子。今脾胃虛反更瀉。子而助火重虛。其土殺人無疑矣。其風木既旺。有關脈洪大。掌中熱。腹皮熱。豈可以助火瀉金。今立一方。火補金。大補其土之為神治之法。宜黃芪湯主之。乃

治驚慢之神藥也。即調元湯加芍藥是也。

丹溪曰。驚風有二。慢驚。傷脾胃虛。所主多死。宜溫補。一云。溫補宜參朮煎湯。下安神丸。急驚。屬痰熱。宜涼驚。一云。用養血藥。作湯。下降火。清痰。九子錢氏涼驚丸。世以一緊通治二証。甚謬。

急慢發熱。口瘡。心。肺。伏熱。痰熱。痰嗽。痰喘。並用湧法。重則瓜蒂散。輕則用苦參末。小豆末。以淡蒸汁調服。吐之。吐後搐定。更宜防風通聖散。為末。蜜丸服之。

全嬰方云。驚証因風。則目青面紅發搐。其病在肝。因食則嘔吐。驚舌瘡面赤。忽然作聲發搐。其病在心。因食則嘔吐。

氣而發搐。其病在脾。皆陽病也。脾胃經虛。則生粘痰。痰涎者。脾胃所出也。痰則凝滯。在于咽喉。如牽鋸之

聲。時復痙瘓。或因吐瀉所致。脾胃虛。則肺亦虛。痰涎流溢。其証亦然。此陰病也。

身熱。脈浮。精神恍惚。或吐瀉。不思乳食。發搐。即半陰半陽合病。身熱。脈沉。精神倦怠。或吐不瀉。又能乳食。

發搐。亦半陰半陽合病者也。亦有急驚。瀉涼而不愈。或與吐下藥太過者。變為慢驚。又有慢驚。溫補而不愈。變為急驚者。急慢驚風。症有陰陽。有順逆。搐有真假。治有次第。



不可不知其候可預防者如目鮮目眩目白目青目斜月閉目轉目瞪聲寔聲啞聲輕啞口弄舌蹇舌露筋噓風撮口噎乳噎食忽然定睛吐涎沫扭項搖頭仰身擦面藏頭畏明手拳手戰脚拳不伸忽擦忽亂失張失志精神恍惚睡卧不寧睡中喜笑困噁噁眼心煩噪哭咬人面臉色變或紅或青身舒用力呢上作聲者已上症候乃急驚之先兆也宜預防之

驅風膏錢氏抱龍丸凡見搖頭斜視以手抹人昏睡喜卧額上多汗亦粘汗其脈沉細即是慢驚之候宜急溫之調元湯

中湯定心丸主之

病有陰陽急驚風屬實熱病在肝心二脏謂之陽癇慢驚風屬虛寒病在脾肺二脏謂之陰癇此以寒熱分陰陽也五臟為陰六腑為陽急驚發於六腑為易治慢驚發於五臟為難治此以臟腑分陰陽也証分順逆者男發搐目左視握拳拇指在外者為順反此者逆女發搐目右視握拳拇指在內者為順反此者逆蓋天地之道陽左陰右陽外陰內也錢氏云男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也蓋震東兌西男女之症

位也震屬乙木兌屬辛金肝肺之分位也男子主於寅而左行女子主於申而右行左右者陰陽之道路也今男搐左視無聲寅乃甲之旺位乙之從甲妹之從兄也故為順而無聲右則從庚乙與庚合金木相擊而有聲也女搐右視無聲申乃庚金旺位辛之從庚妹之從兄也故為順而無聲左則從丙辛與丙合火金相灼而有聲也活幼心書順搐散可取用之如此視之急驚風為順而易治慢驚風為逆而難治搐有真假此錢氏論百日內發搐之証也真者不過三兩次必死假者發頻不為重真者內生驚癇假者

外生風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治之可發散

按錢氏肝主病云氣溫則內生氣熱則外生外生者病在表故可治發散宜瀉青丸去大黃加天麻全蝎主之內生者病在裏乃氣動之病也周歲以後小兒宜瀉其本脏當歸龍薈丸主之治有次第初發搐時卒然昏絕牙關緊急俗用搐法次法以醒其驚者蓋不知昏絕口禁皆痰涎壅塞之所為也輕者可搐可灸即醒重則先用嚏驚散吹鼻中嚏出可治不出則用辟瘟散必醒如不嚏不醒不



可治也。次用開閉散擦牙涎出自開然後進藥。急慢同法。

如痰涎壅塞或吐之。或利之。皆非其治也。蓋痰之上壅者火載而上也。辟如釜中之水益沸故云揚湯止沸。不如釜底去薪。今不瀉火而但吐之。利之前痰雖去後痰壅塞復至矣。急驚風用珠砂膏搗風湯。甚則用蒙石滾痰丸。慢驚風用星香散。甚則以礞石丸降之。痰去則搐自止矣。搐不止者依後法治之。搐止驚退可以安也。急用錢氏涼驚丸。慢用溫驚定心丸。此用急慢驚風始終之要藥也。

急慢驚風氣喘氣鳴手足冷皆不可治。風在肝經食在脾。

驚恐傷心神志亂。現其發搐在何時。

錢氏曰傷風得之口中氣出熱呵欠頻悶手足搖動當發散。小兒木怯者多此病也。

錢氏曰因食得之。身體溫多睡多墜或吐不思食而搐當先定搐後安神。

兒因嬉戲指一蟻以阻之者或因啼哭扮稱異類以止之者皆能作搐。蓋心藏神。心主驚。則傷神。腎藏志。腎主恐。則傷志。神志既傷則心腎俱虛。而胆亦

怯矣。如此搐者若作驚搐治之誤矣。宜補心腎之神志定志丸主之。

錢氏曰病潮熱寅卯辰時身作壯熱目上視手足搐動口内生熱涎煩悶頭急此肝旺也。繫古云潮熱于寅卯辰時木旺之位是肝旺也。當先補腎水以制心火。地黃丸後瀉肝以止其搐。瀉青丸。

因潮熱巳午未時發搐心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊急口內涎潮此心旺也。繫古云巳午未時火旺之位而熱搐者心熱也。導赤散涼驚丸。錢氏方或木通散以瀉心肝之火。

因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微邪視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃是肺旺也。繫古云申酉戌時金旺之位而肝木強法當補脾。恐被木之賊所尅害。當瀉心肝以挫其勢。而後補肺。按瀉心肝宜木通散。補脾宜錢氏異攻散。治肺又小阿膠散。

因潮熱亥子丑時不甚搐而卧不穩身體溫壯目睛緊針視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不醒。繫古云皆因大病之後脾胃虛損多有此病。故宜補脾涼心。按補脾宜異攻散涼心宜涼驚丸。皆錢氏方。按錢氏案古論日夜發搐之証治亦有陰陽之分宜



卯辰巳午未陽之位也申酉戌亥子丑陰之位也  
肝心之搐多用涼瀉肺脾之搐多用溫補也

也病傳來發搐多或因搐後變他症  
能將脈証分虛實 從本從標治不訛

瘳風發搐此胎毒也兒生一臘之內多啼不乳或握

唇或牙關緊或肚大或睛尖發搐者此胎驚也爾之

宜搐生于內者氣喘痰鳴手足冷者不治詳見麻風

變蒸發搐此胎病也因受蒸之後或傷風或傷乳或

突驚或發搐百日之內搐有真假說見前皆曰胎驚

真搐者頻發必死假搐者少宜散風化痰安神至聖

保命丹主之百日以後發搐口中氣熱此肝旺病也

宜瀉青丸竹葉湯入沙糖少許化服後以至聖保命

丹安神如逢變蒸之期必發搐者此胎痛也自內生

者若不急治後成終身之病宜安魂鎮心定魄類

細與服之以不發為度秘傳三聖散主之

白滑石飛兩 甘草二錢 和勻作三分一用青黛一

錢和勻名安魂散早以淡竹葉湯下 一用硃砂

飛一錢和勻名鎮心散午用灯心湯下 一用苦

煨細末和勻名定魄散晚用蘇葉湯下

外感傷風發搐其病在肝即前傷風發搐也治同法

如肝有風甚則角弓反張似天病似痲症此有搐也  
宜瀉肝散風蓋足厥陰經之脈隨腎脈循脊裏上至  
巔頂脊傍兩行則足太陽膀胱脈也故風甚同見証  
也宜加減穿合湯主之如脊下脊三指者不治

人參 柴胡 黃芩 杏仁 去尖

麻黃 羌活 川芎 葛根

升麻 羌活 當歸 防丰

石膏 此瀉青柴胡麻黃梟根四方加減也共為

細末鈞藤湯調服

傷食發搐其病在脾讀之食積即前傷發搐病也搐

甚者如前治法太甚者宜用輕劑下之去其食熱三

黃枳木丸主之 黃連 酒洗 大黃 酒洗 神麩 炒

陳皮 白朮 枳實 五分

為末湯浸蒸餅丸百沸湯下

中暑發搐一名暑風宜清暑涼心下痰安神却暑丹

主之 五苓散 乙兩 黃連 末 甘草 二錢

硃砂 飛錢 和勻蜜丸如芡實大每服一丸麥門冬

煎湯下此辰砂五苓散也

霍亂發搐其病在胃此乾霍亂也神氣變亂心腹絞



不吐不瀉所以邪氣上下不得出陳氏所謂氣逆而作搐痰聚發驚是也不急治之必死先用瀉吐法宜瓜蒂散吐出積食痰散氣順後和其胃氣以藿香正氣散主之

藿香

紫蘇

白芷

厚朴

白朮

陳皮

桔梗

半夏

井草

加枳實

為細末姜汁調下

吐瀉發搐者病在肝先病吐瀉後發搐者此因吐瀉

每少許以淡豆豉湯服即吐

不止脾虛生風乃慢驚風也治法同後但吐瀉未止

又加發搐者宜參苓白朮散或散或蜜丸如龍眼大每

如先發搐后吐瀉者此因病時多服利驚之藥脾胃

受傷所致宜參苓白朮散或散或蜜丸如龍眼大每

用一丸米飲下如搐甚下泄者乃遺尿也不治

痢疾發搐者其病在肝先病未止又發搐者此因誤

服丁香木香豆蔻等辛熱止痢之劑太多以致內有

積熱則生風也蓋肝為厥陰風木在裏則便膿血在

外則為瘧脹肝乃屬火反服辛熱助火之藥安得不

發搐也宜用瀉青丸如黃芩黃連蜜丸井草湯下此

瀉青三黃丸二方合也如痢止後發搐者作脾虛治

同慢驚風法東垣調元湯加白芍湯主之

搐後變痢此表邪入裏也蓋風傷脾入裏則便膿血

先用小柴胡湯加大黃下之後以加減龍薈丸主之

當歸

川芎

陳皮

青皮

黃連

黃芩

木香

人參

炙甘草

為末別用阿膠三錢溶化作丸陳米湯下

瘧疾發搐者其病在肝脾此有三症或併病者瘧至

發熱則搐瘧止搐止日日如之病如是者不必治搐

但治其瘧上退搐亦退也初起宜用劫藥風瘧小柴

胡湯暑瘧用白朮湯食瘧用平胃散痰瘧用栝柳吐

出其痰即愈火瘧補脾平肝宜加戒平瘧養脾丸主

黃芪

白朮

常山

柴胡

內桂

神曲

神曲糊丸陳米湯下

人參

白朮

當歸

半夏

黃芩

陳皮

鱉甲

使君子

神曲

草果

厚朴

神曲

青皮

炙草

神曲

神曲

神曲

神曲

神曲



一先搐後瘳者此肝傳脾也宜養脾平瘳丸主之  
一先瘳後搐者脾虛損肝木乘之也為慢驚風治同  
慢驚

一咳嗽發搐者病在肝肺肝木肺金金木相搏故成  
此病得此者多不治但現新久衰旺何如如初得咳  
嗽數十声不止而發搐此痰盛氣逆也所謂氣逆而  
作搐痰聚而發驚是也宜丹溪薄荷湯主之如久咳  
發搐者面目唇白咳而喘促此肺虛而肝木乘之也  
病不可治無上証者身熱而渴宜小阿膠散或搐甚  
者宜先補肺後瀉肝補肺以阿膠散瀉肝以瀉青丸  
主之

如搐後咳嗽者驚痰未去也宜丹溪鎮驚丸主之已  
上方並見前

一丹毒發搐者病在少陽少陽者胆之相火也先搐  
後發丹毒者此毒火自內出外也可治先發丹後發  
搐者毒自外入內也必死自內出者火之餘直發散  
解毒及後法防丰通聖散主之或用加減升麻葛根  
湯  
桔梗 乾葛 升麻 川芎 赤芍  
歸尾 羌活 柴胡 甘草 升水煎服此  
驚丹之要藥也

一瘳瘳發搐此胎毒也小兒身生虫疥浸淫瘳瘳不  
知用藥內服解毒之劑外用此硫毒藥搽之瘳忽自  
平或不擦自平者其候腹脹便秘膚無血色目閉不  
開而發搐者乃惡候也急進解毒之劑瘳出方生瘳  
不出加喘者死雄黃解毒丸主之

雄黃 另研 壽金 各一 巴豆 八錢 乳香  
沒藥 各二錢 各製為末醋糊丸珠砂衣此方治諸  
惡病甚妙

凡小兒未周歲者不問瘳毒瘳疥丹瘳但發搐者皆  
難治脾胃嫩脆各氣未實難以藥攻也

一瘳疹發搐者其病在心初發熱時作搐此瘳毒欲  
出也宜清心安神道赤散入珠砂末調服神効瘳出  
搐止者吉瘳出搐不止者凶瘳正發時作搐者宜錢  
氏涼驚丸加珠砂主之搐不止者不治瘳結層作搐  
者此非正醫乃倒醫也瘳毒噴于內乃凶惡之候急  
用雄黃解毒丸茶草井水煎湯下瘳復起者吉搐不  
止者凶

瘳後餘症  
病有搐久不止其舌黑者熱劇也內服涼驚丸外用  
生薄荷葉煎湯洗之舌轉紅者可治玉瀝散曰傷寒



舌黑洗不紅者凶藥洗明見吉凶即此意也

一病有搐久未止大小便秘者宜八正散主之如大便四五日不通者不可利之恐損其胃氣宜猪胆汁通法通之神效

一病有唇内生瘡者此熱在心脾二經也內服洗心散外以藥連散加珠砂搽之神效

一病有日久其搐似止不止神昏有痰者不早治之必成痼症此病在心宜利驚丸主之

胆草 防風 真青黛 蘆會

胆星 鈎藤 鐵華粉 牙硝

珠砂 腦射 蜜丸艾實大每服一丸金銀煎湯下

一病有搐時失音者宜木通湯主之

木通 石菖蒲 防風 苦梗

真桑螵蛸 全蝎 炙草 僵蚕

胆星 共末每服二字紫蘇三片煎湯調服

一病有搐後失音者此痰入心肺竅中故也如不早治必瘖成癡人矣宜加減錢氏安神丸主之

黃芪 人參 歸身 川芎 麥冬 去心 石菖蒲 木通 炙草

遠志 去心 姜汁 浸寒水石 蜜丸艾實大每服

一丸蘇葉三片煎湯下每日取債猶心連肺管屬

剖一半煎湯飲之以助藥力久服神效

一病有搐時鼻衄不止者此肺熱症肝乘肺也又有心火上炎者以心火乘肺也宜瀉心肝之火珠砂涼肺丸主之

黃芩 黃連 山枝 連喬 桔梗 甘草 人參 薄荷

珠砂 為衣 蜜丸艾實大每服一丸

一病有搐後目不明者此肝虛也地黃丸主之

一病後有餘熱不退者當察其虛寔治之如身壯熱面赤唇燥大小便不利此熱為寔因服補脾之藥太早宜小柴胡加大黃主之如面皸白大小便自調唇潤者此虛熱也宜清心丸主之

人參 麥冬 茯苓 柴胡 防風 炙草 珠砂 蜜丸艾實大

金箔十片為衣每服一丸淡竹葉湯下

一病後發熱喘咳者當察其虛寔治之如身熱飲水鼻乾唇燥脈疾有力者此熱在心肺為寔宜從小便利之寧肺散



桑白皮炒 葶藶 赤茯苓 車前  
炙子等分 天草法半 姜東引煎服如面皯白不  
熱不渴此虛也阿膠散主之

一病後肌膏消瘦精神昏憤者此驚癇也宜安神丸  
主之

茯神去心 蘆薈 琥珀 黃連  
赤茯苓各三 胆星 遠志 甘草湯煮  
蝦蟇一錢 石菖蒲 使君子四錢

山藥煮糊丸灯心湯下

一病後食少形瘦者宜補脾和中丸主之

系氏異攻散一兩 加青皮 砂仁 使君子

一另取神曲作糊為丸陳水湯下

一凡病搖止後宜補胃參苓白朮散或蜜為丸甚効  
凡病搖後以券心安神定志丸主之方俱見前

癇

驚自心生風自肝 凡因病后見癇癱  
急求妙手施方法 父母因循作癱殘

癇者其病卒然忽倒四肢強直目閉或翻上不轉口  
塞或有咬其舌者口中涎出或有無涎者面色或青  
或白或作六畜聲其狀不一乃小兒之惡候也一時

即解如常也 矣也或以旬日計或以月計或以年  
計古人有三癇五癇之名証治太多又與急慢驚同  
論似無一定之說故後學不知其所從也雖有論者  
不過依樣西葫蘆耳愚不自揣強為之辨所謂三癇  
者原其得病之因也所謂五癇者叙其病發之狀也  
驚久成癇者慢驚風之變症也不然何以小兒之  
發搐者皆有治法而發癇者至終身更無治法耶管  
見如是惟高明者擇之

一癇之所起因父母之循醫之無遠慮也且知初發  
時或有不治自愈者或有因指法而愈者父母喜

之見其易退兒無他苦恬不知意或有頻發之時不  
返請醫捕之請巫侍之而已不知求上智之醫以斷  
之乃為終身不治之症此父母之過也其為醫者當  
視病之時如風癇則發之食癇則下之驚癇則安  
之幸其病退以為能也及其再發不逆仍用前法而  
不思有結痰在心以致痼病為終身之病此醫之過  
也  
治癇之法切科所載其方甚多而無可取者也惟系  
氏五色丸室鎰琥珀壽星丸及牛迷借胆湯加蘇丸  
三者誠治癇之要藥也今予以此三法辨立一方屢



試屢驗如神乃名為斷病丸

黃連

礞石

石菖蒲

研砂

珍珠

鐵花粉

胆星

并遂

沉香

茯苓

共末熬膏為末別用人參

一錢白朮三錢煮糊為丸次寔大每用一丸取借

諸心一個劈開入藥在內將線札長流水煮熟取

出九子研細灯心湯調下以借心及汗與兒食之

三日服一丸又宜常服參沙膏以通心氣

珠砂

牙硝

雄黃

金銀箔

枳壳

射香

白茯苓

人參

黃連

遠志

前五味另研勻後七味共末和勻蜜丸

每服一丸麥冬煎湯下此珠砂膏加減也

一癩之為病乃痰迷心竅之所致也初病之時使宜

服通竅化痰鎮心之劑醫者慮不及此執用平日治

驚之法父母不肯早治淹延年久其狀如痴如健忘

者終不可治也常見在火水而卒強者後致厥傷亦

多矣

一胎癩由見在腹中受驚氣得之生未便有是病不

可治也

按大無云一小兒周歲因長老摩頂受記僧人念咒

恐俱發搐痰涎有聲目多白睛強項背一時許方醒

後安見皂衣人即發多服犀珠腦射鐵墜之藥已四

年餘此症尚在又添行步動作神思如痴診其脈沉

弦而急絨經云心脈洪大痛癢筋柔病久氣弱多服

鎮墜寒涼之劑復損其氣故添動作如痴先灸兩睛

各二壯然後服藥后肝脈小急蓋小兒神氣尚弱因

而被驚神思無依一動于肝肝主筋故癢癢筋事立

大名沉香天麻湯怪曰恐則氣下精怯而上焦所以

羌活獨活之苦溫引氣上行又入太陽為引故用以

為君天麻防風辛溫以散火甘草當歸辛溫以補氣

血之不足故養脾胃是以為臣附子川烏益智大辛

溫行陽退陰又主助胃腎主五液入脾為涎以生養

半夏燥溫化痰沉香辛溫體重氣清去怯安神故以

為使

承氏云一小兒吐瀉諸醫藥下之至虛變慢驚手足

痙瘓而身冷醫復與八正散口不能食而胃中虛故

利大小便即死久則脾胃俱虛常身冷而目閉必用

益黃散四君子九補脾遂能飲食又不愈以地黃丸

補腎一日而安引此一事以為治癩者之法



一灸法按鍼經云癱痲痲痲不知所苦而矯男陽女陰絮古云晝發灸陽橋中脉穴夜發灸陰橋照海穴各二十七壯

一癱者手足或掣曲強直或軟緩無力不能舉動或左或右其人目視不正口中流涎語言蹇澁因受風寒之氣得之未得發散初病搗時日久不醒以致風濕之氣深入筋骨后雖搗止手足之病未平如五軟五硬之狀父母因循不知早治遂成癱疾

一治癱之法當視其在左在右在左者為血虛其治在肝肝筋肝血虛則筋無所養故筋急拘牽強直宜

補腎地黃丸主之乃虛則補其母也  
小藥 山茱萸酒洗 熟地焙 獨活  
川斷續酒洗 白茯苓 丹皮 澤泄焙

手不利加桂 足不利加牛膝 手足俱不利並加各二黍蜜丸空心溫酒下此地黃丸加減法也在右者為痰其治在脾脾主四肢手足為液痰流經絡故手足緩而不能舉也宜補脾行痰大補丸主之

灸法 人參 白朮 白茯苓 炙甘草  
當歸酒 川芎 白芍酒洗 半夏酒 陳皮  
絡 川烏炮 三酒湖丸姜湯下此十全大

補湯加減也更多曲池三里捷骨肩頤各二十七壯若口眼違向一邊者灸頰車穴左灸右山灸左

驚風諸症

兒多異病狀如癩 莫作真搐一例看 家秘勿科皆有法 非人勿示泄心傳

一天癇以癩天癇者壯熱驚悸眼目翻騰手足攣掣或哭或笑喜怒不常甚者爪甲皆青紫之狀此肝病也但小睡即耳宜解利風和則愈鈞藤散主之

鈞藤 白茯苓各五 大黃炮 防風

珠砂 蟬退 羌活 獨活

青皮 甘草各三 為末姜蜜調服此瀉青丸加減也

又方用鈞藤 人參 犀角屑各五 炙甘草

天麻 全蝎各二 為末薄荷湯調服

一內鈞似瘋內鈞者腹痛多啼唇黑囊腫偃僕反張眼向有紅筋斑黑首也此肝病也但不昏困耳乃受寒氣所致先是內腔抽掣極病狂叫泄瀉縮脚腸痛而啼內鈞一過外証油掣又來內外交攻極難調理須分內外用藥治之內鈞甚者宜乳香膏主之



乳香五分 沉香一分 為極細末蜜丸梧桐子大

每服二丸用石菖蒲 鈎藤 煎湯下

又方木香丸 沒藥 茴香 木香各分

鈎藤同上

全蝎 乳香各半 先研乳香另放後研上諸

藥為末取蒜少許研和肉為丸梧桐子大每服二

丸酒下按此二方治內鈎之要藥也內鈎甚者宜

鈎藤丸主之

鈎藤 白茯苓各五分 天麻 防半

珠砂各 蟬退 羌活 獨活

青皮 炙草各二分 除珠砂另研餘為末水煎

調珠砂末服

按天鈎內鈎二症百日内小兒多有之此二者皆肝

之病也蓋厥陰肝經內行于小腸外行于背故小感

傷風熱則為天鈎內傷寒冷則為內鈎故曰天鈎者

陽也內鈎者陰也

病有盤腸腹痛似內鈎者乃小腸氣痛也亦食腹痛

作啼偃倭腰曲乾痛多啼額上有汗此小腸為冷氣

所搏終耳宜用和乎溫氣之劑川練子散主之

內無紅筋黑疔囊不腫者 木香 小荷去毒

各一川練子 二分用巴豆二粒炒去豆 共末酒調

一客忤似癇小兒神氣怯弱外邪客氣賦焉異物暴

觸而忤之其候口吐青黃白沫水谷鮮也面色變異

喘急腹痛反側痰涎狀似驚癇脈來弦急而數視其

口中懸癭在左右若有小腫核即以竹針刺潰或以

指甲摘破治之當辟邪正氣散驚安神久延則難為

力也古方作客忤及中惡者急作醋炭服蘇合丸此

方治客忤中惡之要藥也

全按客忤者謂客和之氣忤其兒之正氣也論其所

忤不但外邪之氣與人物之氣自鼻而入乃外因之

客忤也聞見之驚自心而生乃內因之客忤也然邪

之所乘其氣必虛小兒神氣既虛故易動耳和有微

甚治有輕重勿科混同論之所謂辨之未辨者矣夫

癇則病發而因忤則病發而醒此似癇而非癇也若

發而因亦真癇矣予特表而出之按手指三關紋經

曰脈候若深青情知四足驚赤因水火符紅

色是人驚此治客忤者以此辨

養小兒之法詳見前卷育嬰四要中凡小兒客忤中

惡諸病皆父母及抱養者之過也或因生人遠來忤

者或因六畜忤者或因感冷水忤者皆外生者也



物之氣自鼻而入上衝顛項經曰五氣入鼻藏于心  
肺主皮毛心主血脉項顛之上諸陽之所會也邪  
中之即病矣宜用冰體法塗額法治其外吹鼻法插  
之內服對証之藥以扶正氣為主正氣勝則邪氣自  
退也 並用酸乳湯

病時睡不醒而喜睡者忤之微也宜發散醒之散

人參 白朮 白朮 炙草

桔梗 天花粉各等 細辛減半

一方加防手 川芎各等 水煎薄荷葉引微汗妙

浴休法 治客忤中惡白利諸証有邪者當宜浴之

青翠卷三

川芎 蒼朮 白芷 藁木

零陵香各等 長流水 煎去渣向無風處浴之浴

後睡片時

塗額法 治客忤白虎証伏龍肝散

灶心黄土紅雄黃 射少許 束肉和丸捏作

餅子如不樣四圍出顛一分顛門上安餅取艾作

小灶灸三壯

搐鼻法 一名救苦散治傷風寒頭目不清並客忤

川芎 藿香 藜蘆各三 玄胡索

牡月皮 硃砂各 絡為極細末少許吹鼻得嚏

則邪氣出矣

如病時客忤症悉具者此忤之甚也宜表裏發散  
生飲安神驚氣丸主之

再生飲 治一切卒中大小科同

南星包煨 木香 半夏炮各 北細辛

生花木 石菖蒲 甘草各一

為末每用生姜同水煎調驚氣丸服

驚氣丸 治驚憂積氣又受風邪發則牙關緊急涎

潮昏塞醒則精神若痴又可治痲

木香 白僵蚕 白花蛇肉酒洗 橘紅白

青翠卷三

天麻 麻黃各 鐵華粉各半 全蝎二

蘇子一兩 胆星半兩 硃砂二分 腦射少許

此許學士方也蜜丸艾寔大旬用一丸痛用薄荷

金銀湯下 已上治外中客忤之法

知抱兒騎馬或父母騎馬遠行未及換衣薰衣即抱

其兒或戲抱兒在馬鞍上坐得病者此名馬客忤或

聞馬嘶著驚者取馬尾燒烟薰兒面頻薰以醒為度

如見生人異扮人或六畜跳躍異者或見神惡狀者

或迅雷擊鼓一切大聲使兒成客忤者此內生之病

也宜安神去痰不用病根日深但見聞原忤之例即



發兒成痲矣抱龍丸主之

水銀二兩 鉛一兩五錢浴八水長制研以柳枝

燒成珠又入珠沙末乳香末各一兩在內乘熱用柳木槌搗勻為丸天寔大每一丸空心片花水下服后令睡不可驚動或作小丸服亦如此平氏五色丸賦賦也

如見平常憤熱之人喜炎之果玩戲之物有所不得則忤其意但見神昏不食即其病也宜順意更與之及服安神之劑沉香丸主之

人參五分 白朮 陳皮 枳殼

青礞石 青色礞石 金色礞石 炙草

沉香 沉香 珠砂 珠砂 黃連 神曲 粉為丸

黍米 大麥 冬 湯下

小兒客忤者吾以為父母之過有所喜者乃戲而奪之則怒而哭矣有所畏者乃戲而嚇之則恐而驚矣夫失所喜者思則傷脾遇所畏者驚則傷心因循而成痲誰之過哉

一中惡似痲此客忤之甚者乃小兒危急症也其候因物中惡毒心腹刺痛腹皮青黑不能喘息悶亂欲死立方治此先用皂角末治鼻急服蘇合香丸全按

中惡與尸厥同但腹不鳴心腹俱暖也此有二症幼

科未辨有中惡毒之氣自鼻而入心肺受之故忽倒地四肢厥冷而手握拳不能喘息也有中惡毒之物自口而入腸胃受之故心腹刺痛腹皮青黑悶亂欲死者先用霹靂散搐鼻令醒進藥仍以救鬼丸房內燒之以薰百鬼惡氣

霹靂散 治卒惡死者

牙皂 三分 細辛 川芎 白芷 各五分

羊躑躅花 粉雄黃 二分 射少許 共末每用少許

打心 三寸長蘸點鼻內噴嚏為驗

救鬼丸 雄雌黃 各二 枯羊骨 虎頭 各一

龍骨 驚甲 蛟解甲 蜩皮 各三

樗鷄 十五枚 无即以此 川芎 白蒺藜

鬼白 禹餘糧 東白上雄鷄頭一枚用蠟

二十兩為丸梧子大門口房內燒之男左女右臂

上帶一丸可辟百鬼

如中惡毒之氣即死者宜返魂湯主之即仲景麻黃湯也

麻黃 三錢 杏仁 七枚 炙草 一兩 水一盞煎半

盞分開細服



如中惡毒之劫卒死者宜雄黃解毒丸主之方見前

又方通治中毒用降真香

白膠香 沉香 虎頭骨 兔肉

龍胆草 人參 白茯苓 雄黃各五分

射一各 煉蜜丸 艾寔大乳香湯下或令兒佩帶一

丸即燒卧房妙

一兒忽大叫一聲而絕者亦中惡例不治。

一白虎似病白虎者流年白虎神太歲后五位是所

占之方不可犯也小兒變蒸未滿者乳母無知抱兒

向其方頑戲更觸犯之使兒不精爽兩眼楊物不轉

手如數物此客忤之怪者也宜用浴體法更以藥

丸房內燒之使兒聞其烟又取伏龍肝搗醋和丸

久摩兒頭及五心效如婦人以鷄子一枚遍身摩

之送奠地埋之亦穰法也

一邪祟似病醉淫鬼衣不可夜露恐為雜鳥落羽所

汚染觸兒身未有不為病者其後面色變不常見人

痘怕宜常用煎浴體法房中殺鬼丸又以囊盛一丸

掛兒背上男左女右宜辟邪丸主之

人參 白茯苓 艾草 使君子肉

夜明粉 乾塘辰砂 沉香 雄黃

珠砂各五分 黃連各半 射少許 猪胆汁和粟米糊

為丸黍米大每服二十一丸至三十五米飲下

一馬脾風似癩小兒肺脹喘滿胸高氣逆而脇痛動

鼻脹胸亂嗽喝聲啞痰涎稠塞俗謂之馬脾風者宜

雄黃奪命散主之

黑白丑各半 取頭末半兩 大黃 檳榔各半

木香 為末三歲者服二升溫水調服涎多者加

輕粉少許方見丹溪附余

一蠱痛似癩小兒本怯致胃虛冷則虫痛而心痛口

中味及涎水出發痛有忤但目不斜手不搐也宜木

香化虫丸主之

檳榔一升 木香 鶴虱 貫仲

錫灰 乾勝各五分 使君子肉各五分

輕粉二升 巴豆肉 雷丸各半 飛羅麵糊為

丸五更米飲下

一瘧症似癩其症頂背強直腰身反張搖頭掣手瘳

瘳口不語發熱腹痛鎮目不醒病在足太陽經其

候有二如面紅眼赤牙紫手張痰涎壅甚昏曠煩渴

小便赤澀先語語而發者此剛症也宜小柴胡加大

黃湯方見前



如大便滑泄不渴不語手足先冷而發者此柔症也  
宜理中加桂枝湯主之。

理中湯加桂枝 白芍 水煎服

萬氏家藏育嬰家秘卷之三

羅回密齋萬全編著

治諸熱証

陽在身中主發生

嬰孩本是純陽體

奈何掃蕩熱焚煎

熱証推求有數般

人身之中溫養臟腑流通榮衛者陽氣也有風寒傷  
之於外則榮衛之氣不行水穀傷之於內則臟腑之  
氣不行不行則陽氣拂鬱而熱生焉故隨其所發以  
育嬰卷之三

為熱病之名也夫傷有輕重則熱有微盛病有新久

則熱有虛實此其當辨者也錢氏有論詳見下文

按錢氏云心熱者視其睛口中氣溫或合面而臥及

土麻插頭咬牙瀉心湯主之肝熱者手尋衣領及亂

驗物瀉青丸主之脾熱者其熱在肌肉遇夜更深急

指背即身熱飲水四肢不收瀉黃散主之肺熱者手

搯肩目口面熱甚喘數壯熱飲水瀉白散主之一云

涼隔散腎熱者兩足不喜衣履蓋臍之下皆腎之所

主緣心下行于腎部也宜地黃丸主之一云東垣濕







四順清涼飲 治小兒臍膈積實熱

當歸 大黃 甘草 赤芍

吹咀小煎服

惺惺散 治小兒虛熱解表

人參 桔梗 白茯苓 白朮

天花粉 細辛 炙甘草 防風

川芎 南星 錢半 各二

每服加生姜片半薄荷葉共藥末慢火煎此方煎

七味本方也

加減惺惺散 治傷風風熱及傷寒鼻塞發熱

育嬰卷之三

前方去人參白朮芩南星四味加 蒼朮

羌活 白芷 赤芍 麻黃

荊芥 當歸

上方治表虛熱此方治表實熱

參苓白朮散 治胃氣收飲浮陽退餘熱方見脾胃

一小兒有病惟熱居多夫熱有虛有實實則面赤濃

黃氣粗口熱燥渴唇腫大小便難撮揭露身煩帝暴

斗虛則面色青白恍惚神緩口中清冷噓氣軟弱瀉

泄多瀉夜出虛汗其或不瀉不溫憐憐悸惕上盛下

瀉水瀉不分此冷熱不調之症虛熱者惺惺散實熱

者四順湯冷飲加柴胡冷熱不調則敗毒散加木香

當歸 按全嬰論云小兒氣稟純陽臍膈主熱陰陽氣變

薰於外致身熱也則兩眼赤痛流淚羞明或生翳障

心熱則口内生瘡小便赤腫淋瀝不通肺熱則鼻衄

不止大腸必結脾熱則多涎沫口內常流心脾熱則

生重舌水舌胃熱則口臭腎熱則耳聾或出濃汁

症所論五臟熱証與前錢氏不同大抵熱証俱多不

概盡也今以上中下立法治之頭面之熱神芎上清

丸主之中焦之熱赤陽散主之下焦之熱入正散主

育嬰卷之三

之手足熱者赤陽散火陽主之表裏俱熱者通聖散

解散主之

神芎上清丸 治一切熱証清頭面利咽隔

大黃 黃芩 各二兩 滑石 薄荷葉

川芎 各半兩 桔梗 黃連 甘草 各二錢半

蜜丸芩實大每服一九或二九滾白湯化下

東垣涼隔散 治上焦積熱煩燥多渴面赤咽噴痛

口瘡 黃芩 枝子仁 連翹

甘草 各傳分 薄荷 各傳分

為極細末每用淡竹葉湯入蜜少許調服或煉膏



九竹葉湯下

河間涼隔散 治中焦煩燥狂妄啼哭睡卧不安仰  
溺赤澁即前方無枯梗有大黃朴硝是也本方力黃  
連各清心湯

正散 治下焦熱二便秘結多渴咽乾口熱淋血

大黃 瞿麥 木通 滑石 未

扁豆 車前子 山枝仁 甘草稍

各等分 吹咀入燈心煎服

升陽散火湯 治手足發熱此胃虛也

升麻 葛根 羌活 羌活

育嬰春之主 白芍各五分 防手一錢 柴胡八分

人參 甘草 生各三

吹咀水作四劑煎服

通聖雙解散 治表裏俱熱又治瘡疹

防手 川芎 桔梗 芍藥

黃芩 薄荷 當歸 荆芥

滑石 石膏 白朮 連翹

枝子 麻黃 大黃 朴硝 各等

甘草 減半

吹咀入生姜水煎調益元散服或末蜜加姜湯化

下有表無裏去硝黃有裏無表去麻黃

胎熱者兒初生十日之內便有諸熱症者宜育嬰解  
毒延齡丸目赤腫不開者用黃連磨乳汁洗之口瘡  
者黃連黃柏二味為末蜜水調搽兒生滿月後有傷  
發熱者惡寒病在表宜用推拿搗法除之惡熱病在  
裏用豬膽汁導之勿輕汗下之三歲以後方與大人  
同論前法主之

夜熱者至夜則發熱啼哭不止日則無事此血熱也

心主熱東垣安神丸主之乳母宜服小柴胡加參黃

湯

育嬰春之主 餘熱者三歲以後如傷寒後裏已解又發熱者此虛  
熱也宜擬神散主之收斂胃氣清涼肌表

人參 白朮 白茯苓 山藥 各一

桔梗 白扁豆炒 知母 生地

炙草各五分 竹葉 地骨皮 麥冬各五

三歲兒分作四劑姜末引水煎頻服之

食熱者傷食得之手心壯熱暖氣吐乳大便酸臭輕

者胃苓丸重者保和丸其者枳殼大黃丸不可猛浪

傷胃氣也

煩熱者心煩不安多啼此心熱也錢氏安神丸主之

煩熱者心煩不安多啼此心熱也錢氏安神丸主之

煩熱者心煩不安多啼此心熱也錢氏安神丸主之



恐發驚搐虛熱者有二皆大病之後也如形氣未甚弱者此胃虛也宜參苓白朮散若形瘦頭髮成穗肚大足小者此疳積也宜集聖丸主之方見疳病疳熱者如瘧而不寒如潮熱而止無時面黃消瘵丸主之方見疳病

慎服熱藥而發熱者宜大豆卷散主之用黑豆水浸生芽取出晒乾  
買衆 板藍根  
炙草各等分

梁水煎服漿水者乃粟米泔水也  
凡人喜仰臥或合面臥者皆心熱也宜導赤散

育嬰卷之三  
諸熱  
八  
數

調理脾胃

萬物五行皆藉土 人身脾胃是根基

四時調理和為貴 胃氣常存怕損虧

內經曰胃者五臟五腑之海也水谷皆入於胃五臟六腑皆稟氣於胃胃者五臟六腑之源也萬物藉出而生故古人以調理脾胃為醫中王道厥有旨哉胃主納穀脾主消穀皆穀氣之本也穀多則傷胃穀少則傷脾全穀則胃絕穀則七故人身之中穀為寶焉然脾喜溫而惡寒胃喜清而惡熱所以調理脾胃者節其飲食透其寒溫為中和之道也苟能飲食有節

寒溫適宜則脾胃強實外邪不能浸內邪無由起何病之有哉若飲食無節寒暑不適則脾胃虛弱有病生矣兒小兒脾常不足非大人可比幼小無知口腹是貪父母溺愛縱其所欲是以脾胃之病視大人猶多也蓋調理脾胃必資於藥五氣屬天五味屬地味氣之中惟甘平者土之性也古人立法必曰氣渾令五味相濟所以合於四時五臟陰陽揆度以為常也今幼科方中多用丁香豆蔻益智仁砂仁之例一切辛燥者集群成劑溫養脾胃耗散陽氣熬煎陰血甚非所宜也蓋調理脾胃之法固難而變通之法尤難

熱則消於肌肉寒則凝於飲食吾在家秘養脾丸以和中進飲食之傷肥兒丸以補脾胃之弱不加黃芪調元湯錢氏異攻散參苓白朮散皆調理脾胃之要藥也茲於其間又取古方可用者以補其未盡之法於左

- 加減異攻散 調理脾胃傷食不消
- 神曲炒 麥芽 山查肉 藿香 乾姜炒
- 傷食嘔吐加半夏
- 如吞酸水再加 黃連 將兵葉煎 枳實
- 傷食胸膈痞悶加 半夏



黃連 薑汁炒 去白米

傷食腹痛加木香

常覺氣逆去人參

枳壳 桔梗

傷食泄瀉酸臭者加

澤泄 細末 姜束湯調服

加味理中丸

服寒藥太過用白朮

神曲 各一錢

炙草 半錢

育嬰堂

加味平胃散

加人參一錢

東肉和丸姜湯下

健脾丸

先方內加

砂仁 八分

神曲 炒各二錢

人參 白朮

蓮肉 一兩

山查 七錢

砂仁

白朮

香附

木香

黃連

加半夏

人參

白朮

乾姜 煨

麥芽 炒各二錢

煉蜜丸姜湯嚼下

治脾胃不和不思飲食用平胃散

白朮 煨

蓮肉 各二錢

木香

麥芽 炒各一錢

白朮 煨

東肉和丸米飲下

治脾胃虛弱肌膚瘦快欲成疳症者

茯苓

山藥

麥芽炒

澤泄 各五錢

未煉蜜丸龍眼大每服一九朱飲化下

○感冒四氣

感冒天時四氣中

必先歲氣無輕犯

寒熱溫涼有逆從

天地之氣行乎四時者有四氣焉

四氣者風寒暑濕

之氣也人在氣中體之虛也

感則病矣故春傷風夏

傷暑秋傷濕冬傷寒此四時之正氣病也

小兒失其調理尤易感之

故治法與大人同但劑小耳

文小兒病則發熱則發搐此與大人異也

四時調理之法不同

春宜食酸下可犯溫夏宜食寒不可犯熱

秋宜食溫不可犯涼冬宜食熱不可犯寒

然發表者必宜用辛甘溫之劑

如有可汗之症必犯其禁而用

之經云發表不遠熱者是也

但於汗藥中少加涼藥以制之

勿使熱甚而發搐也

小兒四時感冒病幼科

未備今時表而出之

小兒傷風寒者口不能言



誤也。如惡風寒者，必煖其身於毋煖內引衣窠隱，是為表症，可微汗之。人參敗毒散主之。如惡熱出頭，露而揚，手擲足渴，煩燥，披衣氣粗，是為裏症，畧與疎通之。小柴胡加大黃湯主之。方見驚風中病即止。如頭額冷，手足涼，口中冷氣，面色間淡，大便泄青，此為陰病裏虛，當以溫藥救其裏。以理中湯加附子主之。方見脾臟，如不惡風，大熱大渴，此表裏俱熱，半表半裏也。宜和解，柴胡白虎湯主之。又有夾食夾驚者，不可與上症同治也。夾驚傷寒者，或因驚之時又感寒邪，以發散為主，宜脫甲散主之。或因傷寒發熱，以

驚風散之主

驚風散之主

驚風散之主

致驚風者，宜退驚為主，以薄荷散主之。夾食傷寒者，如先傷寒後傷食者，此食傷証也。只實大黃丸主之。如先傷食後傷寒，無吐下者，先解其表，香葛散後去其宿食，只實大黃丸主之。如有吐瀉者，以藿香正氣散主之。

入參敗毒散 治四時感冒及時行瘟疫並痘疹初發熱宜服 羌活 獨活 前胡

柴胡 川芎 只實 桔梗  
茯苓 人參 甘草 等分

以咀水煎服，斑疹加防丰荆芥名為荆防敗毒散

痢疾時行加陳倉米名食廩湯  
柴胡白虎湯 治傷寒半表半裏大熱大渴自汗不

柴胡 人參 黃芩 知母  
甘草 石膏

以咀淡竹葉水煎服

脫甲散 治夾驚傷寒煩渴

柴胡 當歸 胆草 炙草  
知母 各三錢 白朮 人參 川芎 各二錢

麻黃 去根節

用連根葱白水煎服，熱甚加升麻乾葛

驚風散之主

驚風散之主

驚風散之主

薄荷散 治傷寒發熱痰涎壅甚

薄荷葉 半兩 羌活 全蝎 去毒 犀黃  
甘草 僵蚕 天竺黃 白附子

薄荷湯調下一匙畧煎數沸入竹瀝少許服

只朴大黃丸 治傷食腹滿煩熱及傷寒後食服

只實 厚朴 大黃  
等分煉蜜丸，共實大每服一九用大枝子一個所

破淡豆豉三粒水煎濃汁化下  
香葛散 治夾食傷寒不吐利者

香附子 紫蘇葉 等分 葛根 陳皮



青皮 各減半 炙草 不減半

此香附散加減也。吹咀生薑葱白引要溫服以汗微出為度。傷食輕者木方去葛根姜葱加小只實一枝重者一分。

三黃只木丸 治傷食乃下劑之輕者有熱者可服

黃芩 炒 黃連 炒 大黃 炒 只實 炒

白朮 等分

神曲糊丸黍米大每服二三十丸白湯下

霍香正氣散 治夾食傷寒有吐利者

藿香 白朮如發汗用 蒼朮

厚朴 陳皮 半夏 白茯苓

白芷 枳椇 天麻 蘇葉

甘草

吹咀入生薑片煎徐徐服之

凡小兒風寒外感用推摩捏插法亦效

中暑夏月有之。其症面垢遍身大熱。自汗煩燥不安

而渴。兒不能言但吐乳不止是渴也。治有二法

富貴家小兒居高厚深涼之處。其有病也乃靜而得

之。謂之中暑也。惡寒發熱者以人參白朮湯加減主

之。不惡寒而發熱者人參白朮湯皆可服。熱退服調

元生脈散如有吐泄者加味五苓散主之。乳母服清暑湯

一尋常家小兒常在烈日之中坐於熱地之上浴於寒澗之內其有病者乃動而得之。為中熱也。或有病熱者或吐瀉者並以藿香飲加減主之。

如上暑熱二症有發驚搐者。如先病熱後作搐者辰砂五苓散和益元散主之。或先驚搐文中暑者以藿香湯加減主之。

人參白朮湯方見肺臟。有中暑不惡寒者只惡熱而渴加麥冬淡竹葉水煎調天水散。用滑石水飛六錢

甘草一錢和勻。無汗惡寒者加麻黃不去根節。本不去皮尖。有汗惡寒者加桂枝白芍藥。調元湯見脾經。加麥冬五味子。乃生脈散二方合也。清暑湯 小兒一歲內中暑以此方調其乳母

人參 白朮 茯苓 炙草 生地 麥冬 黃連 黃芩 等分

吹咀煎食後服

五苓散 此治暑之要藥也 方見腎經 加味五苓散 吐瀉加藿香木瓜砂仁煉蜜丸只實大陳皮湯也 有寒熱加 香薷 厚朴 姜汁炒 白烏豆炒



母草 名驚苓湯

有吐瀉再加藿香 木瓜

有驚搐者用五苓散未一加辰砂三錢 黃芩未

甘草未各五錢

和勻煉蜜丸芡實大苓冬湯下名却暑丹如先

後中暑者合香薷飲加人參黃連麥冬

中濕

凡小兒喜弄冷水者坐濕地者名此病其症頭重體

重寒熱往來並宜五苓散平胃散為主二方合者乃

治暑之要藥也蓋五苓散治中濕惡熱如瘧小柴胡

湯合服名五苓湯中濕吐瀉與平胃散相合名胃苓

湯更以砂仁藿香木瓜

平胃散 治中濕體章芥補脾胃

蒼朮未厚朴未姜汁未陳皮各三分炙甘草半

每姜湯服本方與五苓散 澤泄

蒼朮八兩同茯苓 白朮 厚朴

陳皮兩桂枝 甘草等

名胃苓丸小兒要藥也本方末半斤加川椒末二

兩和勻別用紅棗蒸取肉四兩蒜去皮入獾猪肚

內煎熱去肚不用取蒜與肉共搗爛和藥令勻

為丸酒與米飲任不名椒米養脾丸男女並宜服

之臍寒者最宜忌生冷滷藏等物本方以咀一料

加小紅棗二百枚蒸法核生薑二兩和皮切共

五才慢火煮乾搗作餅子膠乾淡塩湯調服大人

小兒濕養脾元平胃氣最良

中濕浮腫者胃苓湯加五皮湯主之生姜皮大腹皮

茯苓皮桑白皮五加皮即五皮湯 中暑黃者五苓

加茵陳蒿各茵陳五苓散

如時行瘟疫小兒得染者用平胃散去厚朴加蘇葉

香附為末雪水煮菘豆粉為丸芡實大雄黃硃砂為

衣每服一丸姜末湯化下面東服之可免不正之氣

所中也常用雄黃磨水抹兒鼻孔并丸宜服之

咳嗽喘各色症治

風寒乘外從虛入 肺主皮毛先受邪

氣逆上衝成咳嗽 綿延轉變八他家

按錢氏論咳症云八九月間肺氣大旺其病乃寬以

葶藶丸下之十一月間咳者乃傷風寒咳嗽也或

以麻黃或以牛桔湯五七月間身熱痰甚吐乳者以

福銀丸下之有吐青綠水者以百祥丸下之虛者阿

膠散補之後人信之得治法大法不過如此愚竊有



疑焉仲陽先生著論立方仲景之下一人而已仲景之治傷寒在表則汗之在裏則下之在半表裏之間則和解之小兒咳嗽皆自風寒得之豈無在表裏之間可發散者乎八九月間咳嗽者豈專可下之乎觀其下藥非牽牛巴豆則磁石輕粉也如此峻利之劑幼小嬌弱者豈能勝之乎欲治其肺先損其胃豈有不誤人者乎是書也皆出於關孝忠之筆恐非先生法也或曰有之吾亦不敢用夫今採諸賢之論分三法於左初得之未有不因感冒而傷於肺內經曰皮毛者肺之合皮毛先受邪氣邪氣得從其合使氣上而不下降而不下充塞咽道故令咳也乍覺肺衣風邪從背肺愈穴而入而赤唇紅氣粗發熱咳求痰鳴或因汗出未乾遽戰冷水者服胞後浮額汗痰鳴如此數者當以鼻中辨之因乎風者則鼻流清涕有汗宜參蘇飲主之因於寒者則氣塞氣促聲濁無汗以麻黃湯主之

參蘇飲 治四時胃感風寒頭痛發熱咳嗽痰壅

人參 茯苓 只壳 半夏

前胡 桔梗 蘇葉 葛根

陳皮 牛蒡子

以阻姜葱引溫服取微汗

加味麻黃湯 治肺感風寒痰涎咳嗽

麻黃 蘇葉 桑白皮 杏仁 甘草

加茯苓 陳皮

名華益散其功同改坦以煎服得汗咳止身熱而渴者加知母石膏

百部丸小兒未一歲不能服湯藥者以此代之以水畧煮又各取末和勺蜜丸皂角子大溫水化二三丸此已上初治之法

凡咳嗽發熱後不止或有未發散者其蒸症以法治之

咳嗽氣上逆喘嗽有痰者此肺咳也宜清肺飲主之喘甚者葶藶丸下之方見肺脾虛

清肺飲 治肺氣上逆咳嗽

前胡 柴胡 荆芥 桑白皮

炙草 只壳 杏仁 知母 貝母

薄荷 茯苓 桔梗 紫蘇

阿膠 杏仁 去皮尖 天冬 各五分

散用烏梅同煎去渣服



一咳喉中介介有聲而赤發熱心煩或咽喉痛聲啞者此肺病兼見心症也以清寧散咽喉痛宜清心湯加桔梗方見諸熱心悶驚悸者以錢氏安神龍主之方見心煎

清寧散 治咳嗽心肺有熱者宜小便利出

桑白皮 炒 葶藶 炒 赤茯苓 車前子

枝子仁 等分 耳炒 咸半

細末每服半錢姜末煎服

咳嗽面黃痰涎壅塞或吐痰或止食者食少喜卧此肺病見脾症也大抵咳嗽屬肺者多肺主氣脾

主痰也

橘皮湯 治咳嗽痰甚嘔吐者

半夏 洗 五錢 茯苓 陳皮 各四錢 細辛

人參 旋復花 各一錢 青蘘 桔梗

枳殼 炙草 各二錢

為散入生姜水煎服

玉液丸 化痰涎止咳數此家傳治小兒咳嗽者

寒水石 煉研取末二兩 半夏 炮七次 研

桔凡三錢

為極細末生姜自然汁煮飛羅麵糊凡黍米入淡

姜湯下

咳嗽痰涎壅塞喘咳不轉腦目紅視此肺病兼肝症也不治則發搐宜豁痰丸主之轉者琥珀抱龍丸主之方見家傳三法

豁痰丸 咳痰涎壅塞通用

兩星 錢三 半夏 錢二

二味切片用濃皂角水浸一宿取出焙乾為末

白附子 五靈脂 白僵蚕 炒 細辛

枳白凡各一錢 全蝎 三錢 半

為末皂角湯汁煮麵糊丸黍米六姜湯下

咳嗽久不止吐痰涎水此肺病兼腎症也宜大阿膠丸主之

阿膠 炒 熟地 白朮 五味一

山藥 各一兩 貝母 百部 栝子仁

破故紙 桂心 杜仲 姜汁炒 麥冬 焙乾

兩各 人參 沉香 各三錢

為丸每服大每服九紫蘇湯

凡咳嗽有熱者宜東垣涼膈散加瀉白散土之大小

便不利者加大黃風化硝咳氣盛者宜加戒糖于

降氣湯



真蘇子

半夏

炙草

前胡

陳皮

厚朴姜汁炒桂枝

犬腹皮

桑白皮分

煎服兼治面浮腫

咳痰甚者輕者王液丸壅塞者沉香丸化痰

青礞石研白凡

猪牙皂炒南星泡

半夏洗白茯苓

陳皮各三錢煨壳炒

黃芩各沉香分

共細末姜汁煮神由俚為丸黍米大薄荷湯下

咳聲不止口鼻出血者此氣逆血亦逆也只宜止

咳為主加入參款花羔主之

人參

五味子

天冬

麥冬

款冬花

貝母

桑白皮炒

阿膠炒

黃芩

黃連

炙草

枳殼

當歸各燒半

煉蜜丸圓服大每服二丸陳皮湯化下已上中在

之法也

調理之後其咳不止此肺虛也。只以補肺為主。錢氏  
阿膠散方見肺旺然補肺不補脾非其治也。虛則補  
其脾。脾者肺之助也。死病久者胃氣亦虛。在自腹以

胃氣也用仁參王味子主之

人參

五味

桔梗

白六

白朮

炙草

熟地

當歸各

地骨皮

前胡

桑皮

枳殼炒

黃芪炒

陳皮去

柴胡各三錢

蜜丸艾實大每服一丸或三丸姜末湯化下

久咳不已經驗方各提金散此劫劑也用

鬼粟壳水獨去其筋

烏梅擇肥者水洗去刺

葶草

陳皮去白朮

蘇州薄荷葉二

蜜丸圓服大則時令命化一丸妙已上為未定之

法也

久咳酒防百醉中

痰涎作搗類多肉

胸高其狀如龜壳

咳血無憂只怕濃

小兒百日內有痰嗽者謂之百醉嗽或因出胎之時

暴受風寒或因浴兒之時為風所襲或因解換襪裳

或出漿乳皆風邪之自致入者也。因乳脈湧出不

無不及。乃昔。啼哭未定以乳哺之氣逆冷

出者此病之從內出。能為咳如前汗下調理

之劑難其服之。蓋胃氣方生恐藥傷也。故曰小兒百

咳難治。



如上百咳者一歲及三歲者加一痰涎壅塞逆氣  
 冲併以致發驚搐者多不可治蓋小兒無知痰在咽  
 中不會吐吞往來自任故也將作搐者急進殊砂羔  
 以除去之。搗止者志頻搐者凶故頭搖者目帶上視  
 者閉目呻吟者手足攣舞者有息胸突者喉中痰鳴  
 者口禁不乳者喘不傳者手足冷者咬牙者皆死  
 以咳不止胸高骨起其狀如龜者謂之扁胸此肺  
 天冬去心炒 杏仁去皮尖 百合洗 木通  
 桑皮炒 壁虎隔鹽炒 存羔各等分  
 蜜丸焚實大服一九紫蘇湯下較者吉如龜胸已  
 成乃終身之病疾也  
 久咳不止咯唾血者如前治之。噎滯血解臭者此肺  
 瘵也多死欲治此者無如桔梗湯  
 桔梗 當歸 貝母 瓜蒌  
 漢防己 甘草 杏仁 石合  
 枳殼炒 薏苡仁 黃芪 桑皮  
 加玄參等分  
 入生姜煎瀕服有熱口乾燥加薑木大便秘加水  
 黃小便赤少加木通

氣喘綿綿自肺生 有寒有熱自痰起  
 尋常哮喘無他惡 病篤應喘急添  
 內經曰諸氣噴鬱皆為平肺喘者肺氣之噴鬱逆而  
 上行也。有因感寒而得之者必惡寒發熱面赤唇紅  
 鼻息不利清便自調邪在表也宜發散之用五虎湯  
 主之內有寒痰者苦竭散  
 麻黃分 杏仁去皮尖 甘草分 細茶分  
 石膏分 煎服  
 有因熱而得之者必口燥咽乾大小便不利宜葶藶  
 丸下之。有因宿痰而得者必痰涎壅上喘息有聲以  
 育嬰卷之三  
 千尋湯主之 半夏七個湯 甘草炒 一打 生姜指  
 卓角十  
 咳吐作一服煎已上皆素無而暴有者也  
 素有哮喘之疾遇天寒宣不常化則連綿不已發過  
 自愈不須上方。但人有苦於此必欲治之可預為之  
 防也。有一發而吐痰涎者宜服補腎地黃丸加五味  
 子破故布炒 方見腎 肺有發而不吐痰者宜用反治  
 痰喘方  
 瓜蒌 南星 半夏 人參  
 蘆荷子 香附 陳皮炒 卓角灰



為未姜汁煮神曲糊九黍米大每服二十九姜湯

下切不可輕聽時醫妄用此信有毒之物

臨時宜用九寶湯此常治經年喘嗽屢驗

麻黃去節 陳皮去白 薄荷各五分 辣桂

紫蘇三分 桑皮炒 大腹皮 杏仁去皮

劉烏梅生薑童便少許煎服

有小兒胸膈積熱大喘者此肺服也各馬脾風用牛

黃奪命散主之方見驚風

又方用 并逐雄黃

青嬰卷之三 每服五分新汲水五七匙清油三匙調下吐痰後

喘定 大抵喘者惡候也。有因利下而愈者。亦有因利下而

短者。有數年痲痘而自瘳者。亦有因他痰火而不救

者。如汗出髮潤喘者為肺絕。自汗如油喘者為命絕。

直視譫語喘滿者不治。諸有篤疾正氣欲絕絕時邪

氣盛行多壅逆而為喘也。

諸疳 疳疔皆從水穀生 衰水減便成疳症

只因飢飽失調理 肥瘦空將口訣記

兒童十六歲以下其病為疳十六歲以上其病為疔

疳者血氣虛也。疔者脾胃受病之所致。同出而異名也。

蓋骨者水穀之海也。水穀之精氣為榮榮者血也。悍

氣為衛衛者氣也。氣以內之。充皮毛肥腠理者氣也。

以濡之。潤皮膚。膚美顏色者血也。故水穀實者無病。水

穀少減者病。水去穀亡則死矣。凡病疳而形不壯者。

氣衰也。色不華者血弱也。氣衰血弱而脾胃傷則水

穀少矣。疳之生於脾胃也。明矣。蓋小兒臟腑嬌嫩。飽

則易傷乳食。一者失常不成疳。鮮矣。疳者飲食不

調。肥甘無節。而然。或嬰兒缺乳粥飯太早。或二三歲

後。肉穀菜菓恣其欲。則肝已傷。得因而太飽。停滯中

焦。食久成積。積成疳。或因取積轉下太過。耗散胃氣

或轉下之後。又傷食。一傷一取。重亡津液。疳之病起

於積者也。或因大病之後。吐瀉瘵痢。乳食減少。脾胃

夫養氣血。蓋虛此疳之生於大病之後者也。其候頭

皮光急。毛髮焦稀。臍縮。鼻乾。口燥。唇白。兩眼昏爛。揉

腹。揉背。脊骨。體黃。閉牙。交甲。焦渴。自汗。尿白。泄酸。肚

脹。腸鳴。痔結。潮熱。酷食。瓜菜。鹹炭。水。泥。者。皆其候也。

按錢氏云。大抵疳病多辨冷熱。肥瘦。其初病者名肥

熱。疳病久者名瘦。冷疳者木香丸。熱者黃連主之。



斯言也亦其門人附會之誤也故湯氏云痲之為痲皆虛使然其熱有虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄瀉過涼治冷不可妄補過溫積溫成熱積涼成冷當識此宜今木香丸內核細續隨子乃下重轉下之劑豈以病者可服乎吾為詳之曰凡病得於傷食之後者其病雖虛宿食猶存此受有餘之病曰肥熱痲得於大病之後者正氣已傷此為不足之病謂之曰瘦冷痲 熱者宜加戒集聖丸冷者宜加戒肥兒丸

加戒集聖丸 治肥熱痲

黃連 乾蟾 砂仁 木香 夜明砂 五靈脂 神曲 用粟米糊為丸黍米大量兒大小加減米飲下如未至疳者只服祖傳保和丸方見脾臟

乾蟾 燒青性 義木 煨 青皮 使君子

敷文堂

炙菴 人參 白朮 伏苓 炙草 陳皮 青皮 當歸 川芎 白芍 薑甲 使君子肉 黃連 乾蟾 存性 木香

另取山藥煮糊丸黍米大量兒加戒米湯下如未成痲者只服肥兒丸方見家傳三法

凡有痲熱者不可妄用推拿搗法吾見殺兒多矣不問諸痲總屬脾胃無津液致羸瘦只將集聖丸為主隨症從權加戒

大抵痲之為病皆由乳食過飽或因無乳而以他物飼之或因病後被食所傷於脾胃一家有積不治傳之他脏亦有兒飢食少或病後食少脾胃亦虛五臟六腑皆無所稟乃成五痲之症治此者只以脾胃為主集聖丸主之其有五脏雜症或因他病變成痲者

各視其症從權加戒不必多求方法也

集聖丸 不問冷熱諸痲病皆治之此治痲之神方 蘆薈 五靈脂 夜明砂 陶砂仁 陳皮 青皮 義木 煨 使君子 木香 當歸 川芎 各三錢 黃連

乾蟾 炙性各 三錢 用猪胆一个取汁和藥粟米糊丸黍米大服三十丸米飲下 病有咬牙舒舌舌上生瘡愛食冷水唇紅面赤喜倦地而睡此心痲也又名驚痲前方大莖縮青陳芳木



香六味加 生地 白茯苓 胆星各二錢  
 甘草 硃砂一錢 目生眵淚髮際左腦各  
 青或目生白膜瀉痢夾水或如青色此肝痺又名  
 瀉肝前方去莪縮陳木香四味加  
 胆草 山支仁 防朶 天麻  
 蟬退各二錢 青黛半錢  
 病愛吃泥土冷物飲食無度身面俱黃髮稀作瘧頭  
 大項小腹脹脚弱間或瀉瀉肌瘦晝夜熱不思乳  
 食此脾痺也。又名食積痺宜前方主之  
 病鼻下赤爛手足枯細口出腥氣或作喘咳嗽右腮  
 疔各肺痺宜前方去莪米縮砂青芍木香五味加  
 桑皮 桔梗 炙草 紫蘇  
 阿膠 各二錢 為丸外用 蘭香葉 一錢 銅青 半  
 輕粉 二錢 半  
 細末貼鼻下赤爛處  
 一方用鹽胆泡湯筆蘸法鼻中  
 病兩耳內外生瘡脚如鶴膝頭縫不合。或未能行或  
 齒生暈或齒縫臭爛傳變作走馬疳之例各曰腎疳  
 前方去莪縮青陳木香五靈脂六味加  
 澤瀉 茯苓 桑葉 山

山藥 各二錢 地黃 各三錢  
 為丸外用治兩耳前後赤爛用黃丹 硃砂 各  
 莖豆粉 各一錢  
 研末搽之或以香調亦可  
 又方治牙疳 取尿桶內白堊刮起新瓦上火煨過  
 五分鼠婦七枚。蚊蛤內重二分。枯丸半分末。煎  
 病積成疳又復傷食其症形瘦腹紫時發潮熱蓋  
 與人見見之則哭。依前方去蘆薈五靈脂二味加  
 人參 黃芪 白朮  
 炙草 半夏 只實 厚朴  
 神曲 炒 麥芽 炒 煎甲 各三錢 二錢  
 為丸  
 痢有瀉久不止胃虛成痺者此疳瀉也。宜前方去蘆  
 薈莖木五靈脂三味加 人參 白朮  
 茯苓 白豆蔻 各一錢 阿子肉 各二錢  
 梗米糊丸如先病疳又病瀉者宜先止瀉用  
 錢氏異攻散加白芍 阿子肉 豆蔻  
 乾姜 炙草 各半錢  
 山藥作糊丸服待泄止又服治疳洲本方  
 病痢久不止胃虛成疳此痢疳也。以前方去蘆薈莖



木青皮五靈脂四味加 訶子

梗米糊丸如先有疥病復病利者以治疥為主宜

和中丸方見後痢門痢止再服治疥瘡

病瘡未已胃虛成疥者此必有疥謂之疥瘡宜前方

去蘆薈五靈脂二味加 黃芪多 人參

鯨甲炙 柴胡 半夏 神曲

山稜各一錢

瘦米糊丸如先病疥又病瘡者用平瘡養脾丸與

前方相間服之

病驚後成疥者即心疥肝疥也宜前方但疥病變驚

風者謂之慢脾風難治如腫脹者此疥之外候即

疥也咳久成疥者肺疥也瘡瘻成疥者此腎疥也各

有本方

病腦疥者皮毛光急滿頭餅疹腦熱如火髮結如繆

遍身多汗腮腫頰高令兒眼痛其病在肝宜前方去

莖縮青陳木香五朱加 胆草 川芎

升麻 羌活 防丰

循胆汁浸糕糊丸薄荷湯泡下外用鱈魚胆滴鼻

中連三五日甚效產婦月中多念令兒有此

兩脊疥者食食背脊發熱麻黃積中生熱煩渴下痢

指背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡頰齒爪甲宜

前方去莖縮青陳歸芎六味加苦練根皮白者綠色

質象蕪荑揆仰各二錢為末各安虫丸蓋五疔成有

停食成積積久成虫或如絲髮或如馬尾多出於頭

頸腹背之間黃白或赤者可治青黑則難治也按岐

伯云三伏內用桃柳枝煎水浴兒於午時當日中灸

兒尾翠骨上三寸腦中三壯後用青帛拭之有見疥

虫隨汗出也此法甚效

病如疥者綿眉多啼嘔吐清沫腹中食痛中則成堅

肚腹青筋唇口紫黑腸頭齒痒者是也細雖食虫虫

不可動從口鼻出者難治用下虫丸方見虫病輕者

前安虫丸主之

病手足極細項小骨高尻削體瘦腹大膈突號哭胸

陷是為丁奚虛熱往來頭骨分開飢食吐虫煩渴嘔

涎是為哺露是為痒病之狀也宜集聖丸主之

病無疥者腦後頂邊有核如彈按之隨動軟而不

痛其間有虫如米粉不速攻之則虫隨熱氣流散臟

腑淫蝕精血以致遍身瘡痞便利膿血壯熱虛度頭

露骨高幼科書中稱是妖鳥之毒此或有之亦客許

中惡之類耳天地間游魂為變之氣甚多不但妖鳥



也宜刺其核用紫金丹塗之內服前方去我滿五靈  
脂三味加 人參 黃菁參 薑甲

栝柳二 共末取青蒿白朮汁煮飛羅麵為丸米飲下

病痒熱者脾胃虛弱陽浮於外氣不歸元只以補脾  
胃為主使陽氣收斂熱自退也參苓白朮散主之多  
服佳見脾脏

病痒渴者此胃氣下陷津液不生故渴也宜補其胃  
氣使清氣上升津液漸生渴自止矣七味白朮散主  
之見泄瀉多服佳

育嬰卷之三

驚風

病走馬疳者重也一名驚謂匿於腦筋之間不見也  
以走馬名者齒屬腎腎主虛絳受邪熱直奔上焦故  
以走馬為喻狀如狐惑傷寒唇瘡之症初作口氣各  
曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛各潰槽熱血  
迸出名曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其根既腐  
縱得全活齒不復生外証腦熱肌削手足如冰寒熱  
時來滑瀉肚痛口臭乾渴齒根生瘡爪黑面黃身多  
瘡疥瘡疹之後多有此病不可救者毒歸於腎故也  
宜服加味清胃湯

升天

注地

黃連

黃丹皮 白芷稍時

細辛半

為末燕之外用燒鹽散用橡斗子不拘多少埋而

不入蓋滿殼蓋作一合或十數个安在火內扣搥  
燒透取放地上退火毒以碗蓋定存性候冷入射

香少許乳鉢內搗極細先用湯洗磨上後以數  
文方 治走馬疳蝕透損骨用天南星一个當心剉

坑安雄黃一塊在內以麵裹煨候雄黃作汁以碗  
蓋定出火毒去麩射少許為細末搽瘡甚驗或發  
滿腮鼻穿牙落飲食不進氣促痰鳴乃不生之症  
也

育嬰卷之三

驚風

驚風

驚風

兒方周歲母腹有孕乳汁成毒發時小兒神氣亦致  
骨主危羸足為驚病宜龍膽湯主之

脂草此 鈞藤皮 柴胡 桔梗

赤芍 川芎 茯苓 甘草

大黃溫 人參或

井水煎服仍以夜明砂不拘多少紅紗作袋盛之  
常佩

霍亂

霍亂無嘔吐瀉煩

霍亂無嘔吐瀉煩 乾膈乾痛腹中厚

治其吐瀉多寒熱 乾痛須防喘與驚



霍亂之病起於倉卒多因夾食傷寒陰陽乖隔上吐下瀉而燥煩悶亂也。人有三焦上主納水穀入而不入中主腐化水穀流行臟腑下焦主分別水穀出而不入上焦者上胃脘也邪在上焦則吐下焦者下胃脘也邪在下焦則瀉中焦者中胃脘也邪在中焦則上吐下瀉霍亂者得吐瀉則邪氣上下得出無苦也。陳莖出盡吐瀉自止不吐瀉者乾霍亂又名絞腸痧其病因胃邪氣無從出也若加喘滿驚搐者十不救一其吐瀉者須分寒熱主治大要所其乳食恐增痰也故霍亂飲米湯必死霍亂吐瀉宜用藿香正氣散主之方見感冒四氣其先瀉後吐者乃脾胃虛冷故先瀉白水吐亦不多口氣緩而神色慢頰前有汗六脉沉滯此為冷也宜補溫之錢氏益壽散方見脾胃及理中湯加藿香木瓜主之

理中湯 治霍亂吐瀉水穀不化手足厥冷

人參 白朮 甘草 乾姜  
 加藿香 木瓜  
 以咀水煎為末密丸共黃大木飲化下霍亂姜湯下  
 其先吐後瀉者乃脾胃有熱故促唇紅吐來面赤湯

飲水救脉洪而此為熱也宜和辨之五靈散加藿香主之

五靈散 治小兒霍亂吐瀉燥渴飲水

猪苓 澤瀉 白朮 茯苓

加藿香 右末水煎其乾霍亂不得吐瀉者有鹽湯吐法最佳但小兒必待探吐之或以針刺十指甲縫令血出或於委中刺血皆良法也

或發驚搐或腹脹氣喘者皆死候也急用枳實一枚剉半夏一枚劈破黃連三分切細用水煎湯入甘遂

末五厘沉香磨小一匙和勻服之得吐後進合

病素有積者發則吐瀉不化非霍亂也宜下之脾積丸主之方見積

小兒嘔吐有三因熱因寒因食停藥食難嘗成格拒吐多清水是虫名

勿科云小兒嘔吐大槩難舉有寒有熱有食積然寒吐熱吐夫有不因於食積者故吐之病多屬於胃也又有溢乳有嘔乳有嘔吐相似不可以吐瀉



治之又有格拒者。有出者當放法外求之。太極小兒  
嘔吐莫如節乳。節者減少之謂。非斷其乳食也。嘔吐  
多渴勿急飲之。水入後吐終不得止。必磁器一二時  
而後以薄粥與之。吐自止矣。

按劉河間論吐者分三焦。此言甚善。如食入即吐者  
有積在上焦胃脘也。上胃脘在咽喉之下。太倉之上  
也。名曰賁門。食方下咽。積者塞不得入胃。故吐也  
也。宜瓜蒂散吐之。此王上者。司功越之止。是用吐法  
使積去。乳食得入也。如食入少頃吐出者。有積在中  
焦胃脘也。中胃脘在太倉下口之上。小腸上口之上。名

賁門。飲食入胃不得入於小腸。故轉而上出。則吐  
也。吐出皆完穀未腐熟者是也。如食半月後復吐者  
此積在下焦胃脘也。下胃脘在小腸下口之下。大腸  
上名曰關門。有積壅塞。傳化不去。復轉向上出。為吐  
也。多糟粕之物是也。此二吐並宜下之。去陳莖莖物  
使腸胃之氣得通。水穀之物得行。吐自止矣。丁香脾  
積丸主之。以見前傷寒。

瓜蒂散 瓜蒂 炒黃君 赤小豆  
共末每少許。淡豉煎濃湯調服。量兒加減。  
寒吐者乳片不消。多吐而少出。面白眼慢。氣緩神昏。

額上有汗出。脉息沉微。宜溫中消食。輕者胃苓丸。煖  
藥湯研碎服之。不止用理中丸。加藿香。如諸藥不止  
以參香散治之。

參香散 治小兒胃虛作吐。諸藥不止者。  
人參 沉香 丁香 藿香葉  
木香 細末。木瓜湯調下。

如服已上藥。并乳食不得入。則吐者。此陰盛格陽  
謂之格拒也。宜理中切戒。用積豬膽汁。童便各少  
許。拌藥炒焦。煎服即止。內經曰。熱因寒用之法。蓋陰  
寒氣太甚。陽熱之藥難入。故理中湯溫熱。用胆汁童  
便之寒涼與之服。其始則同。其終則異。入咽之後。陰  
體漸消。陽氣乃發。伏其所主。先其所因此。仲景之秘  
論也。

熱吐者。面赤唇紅。吐次少。而多出乳片。消而色黃。遍  
身熱甚。而煩燥。夏月多此証。宜胃苓丸。用向東陳壁  
土一槐杵細炒。熟入水煎數沸。澄清將丸研服。不止  
用黃連 厚朴 藿香 香薷  
水煎服。吐久不止。用理中湯煎熱。調天水散冷服  
即止。

食積吐者。腹脹。浮腫。面微黃。足冷。熱日輕。夜重。或吐



乳音行小兒

酸酸之氣或吐黃水或吐青痰脈弦實而消此有積食也宜下去其積乃止脾積丸主之

傷乳吐者緣哺乳即吐或少停而吐此因乳食無脾脾胃嫩弱不能運化倚如小瓶注水滿則溢出也宜節其乳自止 兒乳者時時吐乳而不多似吐非吐

非吐是吐此胃虛吐也參香散主之 溢乳者謂乳多而溢出非真吐乳也苟不知禁即成

真吐矣百日内小兒多有之蓋身小身軟不能自立必待毋擁抱之苟有傾側乳即溢出碎以瓶注水瓶

側而水出矣不煩治之 嗽吐者必待兒嗽定而後乳也或嗽未定以乳哺之

其氣必逆乳不得消化而為痰痰氣壅塞嗽不得轉故嗽而吐乳也宜玉液丸姜湯下

小兒初生三日內吐者錢氏方用白餅子下之誤也初生小兒出離毋腹惟乳可食安可當此毒藥也此

由拭口不盡使惡穢之物損其胃氣只用丁香一小粒去苞陳皮一分木瓜一分共研細末每半小

納兒口中令自嚥用煎皆是 嘔穢者有聲無物也不問大小但病久危因嘔穢者

不治經云木陳者葉必落弦絕者聲必嘶是也

蟲者腹有虫時作酸痛痛則吐清水涎沫宜下

下虫丸 白苦練根 酒浸焙 綠色貫衆

木香 桃仁 去皮尖 尖棋柳 蘇黃 二錢

鶴虱 乾蟾 一錢 使君子肉 五十枚

輕粉 五分 右末麵糊丸麻子大每服一二十九俟天明以

白汁味臭鼻內使香聞鼻中即仍由汁下丸 傷食証治 傷食無如損節奇 規其輕重法何為 欲求陳莖推將去 消導不行政取之

內經曰飲食自倍脾胃乃傷東垣先生解云飲者無形之氣也食者有形之血也山此推之乳為血所化

飲之類也乳食之類宜有辨矣勿科消乳丸有山稜莪朮誤也

小兒之病傷食最多故乳食停滯中焦不化而成病者必發熱惡食或噯氣作酸或惡聞食臭或欲吐不

吐或吐出酸氣或氣短痞悶或腹痛啼哭此皆傷食之候也方見傷食之証不必悉具便宜損之損之者

謂姑止之勿與食也使其自消所謂傷之輕者損之自愈也損之不減則用胃苓丸以調之調之者謂







前胡 人參 川芎 當歸

枳壳 茯苓 羌活 桔梗

耳草 加蟬退等

未薄荷同煎服

傷食或吐或瀉則其所傷之物去矣只以肥兒丸調之和其胃氣或錢氏之異攻散蜜湯調服

積聚証治

宿食停傷脾胃中

是名食積法宜攻

必詢原物分寒熱

莫犯虛虛可立功

按東垣云食者有形之物傷之則宜損其穀其次莫

治消之不止則攻之此治初傷乳食之法也只因不早治之或治之晚以致陳莖聚乃成積也小兒病積者多其候面黃色白腹大或緊食少或腹作痛無所發作發則數日不止治其積者若不問平日所傷之物是寒是熱觀兒之形或虛或實一槩用偏寒偏熱峻下之劑而犯虛虛之戒其害大矣如曾傷乳熱食熱者則為熱積如傷冷乳冷食者則為冷積傷五穀者則為食積傷五畜之內者則為肉積熱積傷五果之類者則為菓子積生冷積傷五菜之類者則為菜積有冷有積宜丁香脾積丸下之以原食生

冷之物作湯熱積宜丁香枳柳丸下之以原傷穀肉之物作湯謂之迴源湯  
凡用攻下取之藥必先補其胃氣如異攻散之類而後下之所謂補而瀉之勿犯胃氣也  
家傳丁香脾積丸 治冷積腹痛之治傷食積瀉效  
丁香 木香 皂角 虎存性 枳柳 各二錢 良姜 清油炒 青皮 各一錢 芥末 煨香 各三錢 巴豆 四十九粒 去壳 另研如泥 右前入味細末入巴豆泥研令勻用醋煮麵糊丸 麻子大每五丸原物湯下如取虫苦練根皮湯下

青嬰卷之三 散寒丸

木香枳柳丸 治熱疾腹痛天治痢疾

木香 枳壳 煨 芥末 煨 黃連 青皮 陳皮

香附 大黃 各三兩 黑牽牛 取頭末 三兩

右細末滴水為丸麻子大每服十九丸原物湯下

原物湯取原日所傷之物用韭菜搗爛捏成餅子燒存性研細煎湯送下名取積丸

如素弱者不可輕下當以補藥去之用錢氏益黃散

加莪朮木香黃連炒共細末水煎神曲糊丸黍米

大服二三十丸米湯下



泄瀉証治

泄瀉先須辨五因

治分三類見於經

養其脾胃皆為本

莫使五臟成慢驚

泄有五者謂風寒暑濕食積也皆屬濕論故風濕寒濕濕熱中濕此皆濕之主於外者也食積則濕之主於內者也叔和云濕多分五瀉者是也治有三法者按仲景傷寒論云下利宜理中丸不止理中者理中氣也治瀉不利小便非其治也五苓散主之不止者利在下焦也宜赤茯苓芍藥湯上之故初則濕中理其胃氣也次則分利使陰陽和湯水散分別也末則止澀澀可去脫恐腸胃滑而穀氣不收也此三者治瀉之大法也故予家傳心法初用五苓散中用五苓散末用七味豆蔻丸或一粒白玉膏即是仲景之法

七味豆蔻丸 治瀉泄不止澀可去腸之法也又治  
 白龍骨 訶子肉 赤石脂 枯丸  
 共細末麵糊丸麻子大諒兒加減亦者十五丸服  
 止五十九米飲下  
 白玉母又名一粒除 治滑瀉不止神效大人通用

寒水石 陳研水飛二兩

枯丸 兩

共細末麵糊丸小者冷子大大者皂子大中者乾豆大每服一九米飲下久者宜用初則勿用

傷風瀉泄其症口乾氣熱呵欠頻阿不寐不熱睡多氣粗大便黃白色嘔吐乳食不消令時咳噎宜發散加減惺惺散主之

加減惺惺散 治小兒風泄補脾胃散風利為主

人參 白朮

白茯苓 炙甘草

防丰 川芎

藿香 半夏 細辛

按小兒科論夏至後泄者熱多秋分後瀉者寒多中間按節氣分寒熱多少之說以太強細不若原病式明白蓋麻泄熱泄四時有之但暑月多熱冬月多寒熱瀉者原病式云穀雖不化而色變淡白瀉瀉小更赤澀凡穀消化魚肉色及他症便為熱也寒瀉而穀消化者未之有也然熱瀉亦有不化穀者和熱不殺穀也穀雖不化乃糟粕耳非若邪氣之完穀出也此宜辨之如夏月得之大瀉者宜五苓散作湯調玉露散若身熱與瀉暑減者只服五苓散不可更加玉露散恐生中寒之症瀉仍不止用胃苓丸和一粒丹止之神效非夏有此熱瀉者瀉飲水白朮散乃聖藥



寒瀉者原病或云完穀不化而色不變吐利腥穢溢  
清冷小便清白不礙身涼不瀉此為寒也冬月得之  
宜理中湯丸不止以五苓散加姜枣煎再不止者七  
味肉豆蔻丸主之春秋月同惟夏月得之先服理中  
湯丸後以五苓散和玉露散

玉露散 一名吐露飲 治傷熱瀉黃色

石膏 寒水石 研水飛二兩 甘草 生七分

右極細末每服一字或半錢溫水調下

如寒泄火不止一日三四次糖而不多腹中鳴宜

黃芪補胃湯 炙芪 歸身 川芎

香嬰卷之三 柴胡 五智仁 陳皮 炙草 歸身 川芎

升麻 共末水煎服 濕瀉者身重泄水風濕者水穀混雜宜升除濕湯濕

熱者宜五苓散加玉露散濕不瀉宜胃苓湯此病夏

秋間多有之益黃散尤如 升麻除濕湯 治風濕作瀉自下而上者引而瀉之

升麻 柴胡 神曲 防丰

澤泄 猪苓 各五分 蒼朮 一錢 陳皮

炙草 麥藁 炒各五分

如胃寒膈鳴加 益智仁 半夏 等

人姜枣煎瀉瀉鳴不得用也右吹咀分作五服水煎

胃苓湯 治夏秋間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止

五苓散 平胃散二方相合八姜枣同煎服今治泄

瀉者不問大人小兒通用此方

如寒濕瀉不止宜益黃散此治寒濕之要藥也

食積泄者因飲食過多遂傷脾胃以致泄瀉其候大

便不聚臭如敗卵或作酸臭之氣或色黃白腹中或

有痛者宜先補胃氣而後下之補用錢氏異攻散加

神曲下用丁香脾積丸小下積之方惟此能去痛止

瀉也有巴豆按藥性巴豆能令未瀉者瀉能令已瀉

者止故也 凡大瀉引飲者其病不論新久皆服白朮散痲病亦

同蓋脾惡濕腎惡燥飲水太多火腎益燥津液不升

瀉亦不止水止於脾濕傷脾胃瀉亦不止故白朮散

治瀉瀉之聖藥也常宜服之以折湯水不可再飲湯

水煎之不效矣 白朮散 治泄瀉胃熱煩渴閉陰陽並宜服之

白朮 茯苓 木香

人參 藿香 各一錢 葛根 一

甘草 半夏 等



共細末水煎服本方治小兒陽明經木虛陰陽不和  
和以瀉止津液煩熱口乾以參朮甘草并溫補胃  
和裏木香藿香辛溫以助脾茯苓并平分陰陽利  
水濕葛根耳平倍於衆藥其氣輕浮鼓舞胃氣上  
行津液又解肌熱治脾胃虛弱泄瀉之聖藥也一  
問泄痢但久不止者並服之

錢氏云瀉黃者傷熱乳也瀉青者傷冷乳也子家通  
用胃苓丸主之熱者用車前草湯下寒者用煨姜湯  
下

久瀉不止非青氣之下陷則腸滑不禁及肺虛不行  
青嬰養之  
故也宜家傳和陽回脫湯主之

人參 白朮 白茯苓 坤草  
當歸 白芍 地黃 朱麻  
猪苓 澤泄 葛根 陳皮  
烏梅 訶子肉  
共十四味等分量兒大小咬咀水煎服魚時即大  
人亦可服之  
久瀉不止多屬虛寒魚有熱也故經曰暴瀉無寒久  
瀉無熱宜由豆蔻丸和胃苓丸各半相合陳米炒熟  
煎湯送下即止如再不止宜用人參白朮散加切豆

慈麵罌煨柯子肉為丸服庶不成虛瘦慢驚風也  
有先瀉未止而成疳者易治宜參苓白朮散加肉豆  
蔻訶子肉丸服之則泄自止津液漸生不致成疳也  
有先疳而後瀉者謂之疳瀉難治宜用集聖丸去蘆  
薈莖朮五靈脂三味加 肉豆蔻 訶子肉等

大山藥糊丸黍米大每二十五丸四君子湯下  
經曰五虛者一昧細二皮寒三少氣四泄瀉不止五  
飲食不入五虛悉具者生能食者生又瀉不定精神  
好者脾敗也吐瀉唇深紅者內熱故也 不退必死面  
黑氣喘者不治大瀉不定止之 又瀉腎敗也遺為不  
覺者死

青嬰養之  
痢疾証治

赤白無分寒熱議 多因食積宜通利  
育嬰家寶只三分 傳自河間負秘密  
按內經曰飲食不節起居不時陰受之則入五臟湯  
受之則入六腑填滿閉塞不為殮瀉久為腸癰殮瀉  
者為米穀不化也腸癰者下利是也 又按五七難曰  
胃瀉者飲食不化色黃脾泄者腹脹滿泄注食即嘔  
吐逆大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛小腸  
泄者澀而便濃血小腹痛大瀉泄者裏急後重數至



圓而不能便。莖痛大瘕。世者痢也。由素難之。文觀之。則痢起於食積也。况小兒之病。傷食者多。惟有宿食為積。故因四時之感。而成痢也。赤白皆屬熱。說見原病式中。或謂赤者屬熱。白者屬寒。未敢聽之。但謂痢久不止。則為虛寒。或服冷藥過多。熱變為寒者。則有之矣。此當以脈証別之。身熱而渴。脈數。大有力。而能食者。為熱。身涼不渴。脈沉無力。而不食者。為寒。明矣。治痢之法。勿起腹中。苦痛裏急。後重者。其痛為實。宜急下之。三黃承氣丸。不可用。巴豆。牽牛之劑。巴豆損血。牽牛損氣也。如有外症。不可遽下。宜發散之。舍廩

育嬰卷之三

敷文堂

湯主之物。治不止。各隨其証。施治也。  
 三黃承氣丸 治痢疾初起。兩眉皺。而啼哭者。腹痛也。裏急後重。煩燥不安者。以此下之。

- 大黃 酒蒸一枳實炒 厚朴 炒 枳殼 炒
- 黃連 酒蒸 黃芩 酒炒 黃柏 酒炒 當歸 各三錢

木香 炒 共細末。神曲糊丸。黍米大。兒小者十五丸。兒大者三十丸。滾白水下。  
 會康湯 治傷風痢疾。及時行疫痢。大小相似者。宜先服此方。即人參敗毒散。方見前。加陳倉米煎服。一

方加陳皮。因傷風得之者。則純下清血。宜胃風湯主之。如下純血。宜黃連四物湯。家秘剪紅丸。不止者。何膠梅連丸。大效。

月風湯。治風冷。客於腸胃。泄下鮮血。及腸胃滯。下如豆汁。或下瘀血。

川芎 白芍 白朮 白芍等  
 辣桂 右以且量兒。加減八粟米。按古法同煎。食前熱服。黃連四物湯 治下痢純血

育嬰卷之三

聖

黃連 官歸 川芎 白芍  
 生地 槐花 荊芥穗 等分 加犀角  
 右以咀量兒。大小水煎服。

家傳剪紅丸 治痢下純血。及大人瀉風。下血神效。

枳殼炒 槐子炒 側柏葉炒 荊芥穗等  
 共細末。酒糊丸。黍子大。量兒加減。米飲下。  
 何膠梅連丸 治下痢無問新舊。赤白黑。咳嗽痛。諸症。  
 真阿膠 剉碎 用神  
 烏梅 洗淨 去核 黃連 赤芍  
 骨歸 酒洗 乾 黃連 乾姜



共細末水丸黍米大米飲下。滋鷄魚油膩諸物已上皆初治之法也。

赤白痢者。心主血。因傷熱得之。則心移熱於小腸。是為赤痢。故赤者從小腸而來也。肺主氣。因傷熱得之。則肺遺熱於大腸。是為白痢。故白者從大腸而來也。劉河間據內經云。渡而便澀。血知氣行而血止也。以考藥治主之行血。則便自愈。調氣則後重除。此治痢之要法也。吾之先祖以此立法。用黃連阿膠丸加當歸木香治血痢。於血中行氣。胃苓丸加當歸芍藥治白痢。於氣中養血。赤白相兼者。香連丸。有積者。家秘

治利保和丸相兼服之無不效者。

河間芍藥湯 行血則便自愈。調氣則後重除。

芍藥 當歸 黃連 黃芩

桂枝 分二 大黃 分三 枳實 分二 木香 分二

吹咀兒小分三劑。大則一劑。水煎食前溫服。

黃連阿膠丸 治赤痢 黃連 阿膠

白朮 當歸 木香 各一錢

細末水丸米飲下

胃苓丸 治白痢 加當歸 白朮

白朮 同研末水丸黍米大米飲下

香連丸 治赤白痢此吾家傳秘方也

黃連 大如鴉片者 吳茱萸 木香

石蓮子 去衣橫切 三

共末酒糊丸黍米大量見加減限米炒煎湯下

家傳治痢保和丸 其積有未盡有久痢原未得下

脾虛不可下者俱宜服下之

陳皮 半夏 枳殼

厚朴 炒 黃連 炒 山查肉 蘿蔔子 炒

神曲 麥芽 炒 五 木香 枳實

右細末別取神曲糲丸米飲下此已土中法之治也

炙草 各錢半

痢久不止各休息痢不可驟用肉豆蔻訶子罌粟壳

止之恐有滯積未盡反成重病也必腹中不痛雖

有虛痛切不可止之吾有家秘和中丸不犯此禁如

有可止者幼科中秘傳香連丸萬金散搽而用之

家傳和中丸 專治休息痢及痔痢屢驗

人參 當歸 川芎

車前子 枳實 神曲

神曲



麥芽糖 訶子肉 石蓮肉 白朮

白茯苓 陳皮 白芍 黃連

木香 乾姜 白豆蔻 各一錢

共細末酒煮麪糊丸黍米大米飲下

秘傳香連丸 治男女小兒諸般痢疾作痛並久痢

虛脫濃血不止者服之神效如初痢一二日間不可

服恐攔住積滯熱毒變生他症又反為害也

黃連 酒制炒 木香 肉豆蔻 各一錢

沒藥 各一錢 內豆蔻 三錢 乳香

右末麪糊丸 每食大服一丸 赤痢甘草湯白痢姜

育嬰卷之三 痢疾 藥

湯下

萬金散 治水瀉下痢久不瘥者

粟壳 去殼 生用 兩 荆芥 炒 甘草 各一錢

陳皮 二兩 去 烏梅 和 棗 一

判細合成劑量兒大小熱渴暑熱二沸和渣傾出

碗內蓋定澄清四渣空心溫服已上未治之法也

瀉痢從來更變多 久而休息轉沉痾

脫肛不禁甚惆悵 膝腫其如鴉膝何

有泄瀉變痢疾有痢疾變泄瀉者生正有言曰先瀉

後痢者此脾傳腎也為賊邪難治先瀉後瀉者此胃

傳脾也為微邪易治斯言也謂瀉痢久而傳變者愚

亦有說焉瀉久不止復變痢者其後重者胃氣之下

陷也其膿血者腸垢之下濁也水穀竭而胃敗如之

何不死痢久不止而變瀉者其後重除者乃濕熱之

毒蓋矣其膿血止者乃陳莖之物去也腸胃通而水

穀行故可治也若初瀉便變痢者此氣病傳入血中

宜養血為主加調氣之藥不可復下傷胃氣也初痢

即變瀉者此血病傳入氣中以調氣為主加養血之

藥不可遺泄使毒留而不去後成痢也瀉變痢者宜

四物湯加 黃連 木香 白茯苓

育嬰卷之三 痢疾 藥

痢變瀉者宜四君子湯加當歸白芍主之

痢久不止無津液飲成痔病者宜參苓白朮散大補

胃氣可也 有素病痢又新病痢者此重傷食感冒四

氣之所致也宜錢氏異攻散加 當歸

白芍 木香 訶子肉 神曲炒

各等分為九服不可作痢治之

痢久不止謂之休息痢脾胃受傷其氣之下陷也則

為脫肛其上逆也則為食入即吐不思乳食謂之藥

口腎開竅於二陰痢久則腎敗矣而膝紅腫謂之鴉

膝更有不治之症俱宜辨之



脫肛者胃氣下陷也。後重不除，勞責太過，故腸頭脫肛出也。肛門名魄門，肺是主之。腸頭脫出，又肺氣不出，收令也。宜用養血調氣升提之劑，使病止則肛自不出矣。升麻湯主之外，用洗法托法灸法。

升麻湯 升麻 人參 白朮

白茯苓 陳皮 當歸 白芍

麻子仁 多 五 甘草 防風 多 五分 荆芥穗 二

烏梅 錢 去 錢

右咀分二劑食前服

洗法獨浣散 治脫肛不收

育嬰卷之三 朴硝

五倍子 半兩 研末 并花水 三碗 朴硝

荆芥穗 錢 各一 乘熟薰洗 仍以五倍子末付之

一方用綠桑螺燒存性研末以猪膏和塗腸頭上

托法 用木賊存性為末，搽以軟帛按入

又方 用赤石脂伏龍肝等分為末敷之

又方 用龍骨末木賊燒存性等分末敷之

灸法 脫肛不收，灸尾翠骨穴，神效。又能治痢

禁口者，乃胃虛逆氣上衝而吐也。有不思食者，皆虛

損也。宜用參苓白朮散米飲調服。大抵此病難治，凡

渴痢者能食則吉，不能食則凶。

鶴膝者，兩膝紅腫如鶴之膝也。小兒痢後多此疾，乃腎虛之症也。宜補腎地黃丸，加虎胥骨牛膝主之。有五色痢者，此五臟之真色見也。

痢疾腹脹者，屬中氣不足也。宜胃苓丸調之。慎勿下之，下之則死。亦有餘毒之未盡，誤服瀉藥，大早腹脹者，此為實也。腹中必痛，宜下之。三黃枳朮丸主之。

痢病不治，症外鬼下痢如塵，腐色者死。如屋漏水者，下痢日久，大如竹筒者死。如魚腥者死。凡赤白同下，久而不禁，小便赤澀，腹痛發熱，唇紅舌胎氣促，心煩坐卧不安，大渴飲水，穀道傾陷，而容似

禁口不食，服胞腫足背腫者，皆不可治。內經云：腸癰身熱，脈躁疾者死。身涼脈遲者生。又脈大而有力，皆死。脈微而無力者生。







瘧疾

瘧論經中五六般

時師總號是脾寒

治分三法須求瘧

不及家傳平瘧丸

瘧疾之候始而呵欠繼而足冷面色青黃身體拘急  
慄鼓顛腰脊俱痛寒去未几乃外皆熱頭痛而渴但  
欲飲水嘔惡煩滿而不嗜食者皆其候也按內經有

育嬰卷之四

一

瘧疾

五臟瘧有六經瘧之病名世人總論之曰脾寒蓋脾  
胃者五臟六腑之本也經云邪之所湊其氣必虛  
小兒脾胃素弱故邪乘虛入隨其所入而為五臟六  
腑諸瘧之名也故吾之先人分為七瘧風寒暑濕食  
鬼勞也治瘧之法初則截之謂邪氣初中正氣未傷  
故先驅之使去不可養以為患也中則和之謂邪氣  
漸入正氣漸傷或於補氣血藥中加截藥或於截藥  
中加補氣血藥務適其中以平為期末用補法謂邪  
久不去正氣已衰當以補其脾胃為主使正氣復強  
邪氣自退矣余各因七瘧條陳三法於后以為後學

之繩墨也

風瘧者因感風得之惡風自汗煩渴頭疼風陽氣也  
故先熱後寒初得之宜發散麻黃白朮湯主之不退  
者小柴胡湯加常山枳椇烏梅截之久瘧不已宜補  
汗益氣湯主之

麻黃白朮湯

治感風發熱瘧

麻黃

桂枝

青皮

陳皮

川芎

白芷

半夏曲

紫蘇

白茯苓

白朮

桔梗

甘草

加細辛

枳椇

烏梅 各分 為散量兒加減姜棗引煎

育嬰卷之四

一

瘧疾

未發前二時服

寒瘧者因感寒得之無汗惡寒舉疼面慘陰氣也故  
先寒後熱宜與發散寒邪養胃湯加桂主之如不止  
以平胃散加枳椇草葉截之瘧久不止白朮散去乾  
葛加乾姜主之

養胃湯 治感寒發瘧

草菓

藿香 各五

陳皮 七分半

甘草

桂 各二錢

為末入生姜烏梅煎服量兒大小

暑瘧者因傷暑得之陰氣獨微陽氣獨發但熱不寒  
食不泄煩渴且嘔肌肉消燥宜解暑毒柴胡白虎湯



主之不止者去石膏加貝母常山檳榔截之又止者補中益氣湯主之

柴胡白虎湯 治傷暑發瘧 即小柴胡合白虎湯也

濕瘧者因胃襲而濕汗出燥浴坐卧濕地得之身體重痛肢節煩疼嘔逆脹滿宜胃苓湯主之不退以平

胃散加茯苓檳榔常山截之以不退宜參苓白朮散主之

胃苓湯 治傷濕發瘧 即平胃五苓二方相合也

食瘧者一各痰瘧飲食不節飢飽有傷致然也凡食

嚼生冷燒藏魚肉肥膩中脘生痰皆為食瘧其候若

飢而不食食則中滿嘔逆腹痛宜去其食積四飲飲

主之不止以二陳湯送下紅丸子截之以不已宜六君子湯加青皮主之

四飲飲 治食積和胃消痰

半夏

人參

茯苓

白朮

橘皮

生姜

烏梅

大棗

甘草

右以咀用塩少許水浸濕紙厚裹慢火煨宜量兒

大小水煎服

紅丸子 治食瘧食積氣滯腹脹

三棱

木根

青皮

陳皮

胡椒

乾姜

米醋煮梗米粉糊九粟米大紅丹為衣十九至十

五九二陳湯不

鬼瘧者如瘧癘傳染之病山溪瘴癘之毒容忤無辜寤寐驚怖之變皆是也氣之所中化為毒涎乃生寒

熱是也各鬼瘧俗用符水退之此龍木王所咒雷由利及針間有使穴而愈者有針鞋帶五毒而愈者至

一草一虫皆可祛之信乎治病尚無正方也宜先用

截藥逐出惡涎後用發散之藥解其毒氣不退用柴胡湯調之

鬼哭飲 治瘧久不愈者

常山

檳榔

白茯苓

酥炙等分

右以咀用桃柳枝七寸同煎臨發日五更服量吐惡涎

四聖丸 治諸瘧不分遠近

穿山

烏梅

鷓鴒骨

常山

檳榔

水煎糯米糊丸隨大小丸紅丹衣十五丸至三十



臨發五更濕酒送下

神應丸 祛瘡有驗

當歸酒蒸自柴胡各一兩 穿山甲切 知母

酒糊丸臨發前夜用清茶朝北服一次至發日五

更文朝北服一次

五神丸 治瘡疾萬應 東方巴豆五

射二分半 南方官桂五 朱砂

白丸各二錢 北方青代五 黑附子二

中央硫黃五 雄黃一 定於五月五日各條為未按方包放至午時取五

家粹尖為丸梧桐大每服一丸綿裹於未發前一

日晚男左女右塞鼻孔中立效

大和湯 發散毒氣 人參 葶果

知母 貝母 烏梅 白芷

梅柳 柴胡等分 常山加

咬咀大棗調水各半未發前一日煎露一宿臨發

五更服或香蘇散加川芎白芷蒼朮當歸烏梅

柴胡湯 治瘡久不愈

柴胡半夏與黃芩 耳草常山白茯苓

蒼朮烏梅姜草果 檉柳蘇葉及青桂

水煎服

如前數症經久不瘥真氣已耗邪氣猶存則有所謂

勞瘡者為治法不同

勞瘡者表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞復發謂

之勞瘡久瘥成勞者是也當調養氣血加減十全大

補湯主之

十全大補湯即入物湯加黃芪官桂是也再加陳皮

半夏姜朮煎服

瘡疔者彌年越歲經汗吐下榮衛虧損和氣伏藏

開結癥瘕謂之瘡疔此症不可急攻當補其胃氣以

漸而攻經云衰其半而止也鱉甲飲子主之

鱉甲飲 治瘡久不愈腸中結為癥瘕名曰瘡疔

鱉甲 君 歸 參 倍用 黃芪等 人參

當歸 白木 茯苓 川芎

白芍 耳草 陳皮 青皮

半夏曲 三菱 蘇梅 厚朴

柴胡等分

右咬咀加生薑 烏梅 煎

家傳秘法瘡不問遠年近日不瘥不截通用平瘡

脾丸主之試甚驗誠治瘡之神也



人參 白朮 白朮 炙草

陳皮 青皮 半夏曲 蒼朮散

厚朴 草果仁 柴胡 黃芪

豬苓 澤泄 桂枝 常山末

驚甲 當歸 川芎 等分

十九味各取末和勻酒糊丸黍米大米飲下有癖

塊加山陵莪朮各煨研入內

有食瘕成癖又復傷食腹中有癖按之堅硬漸熱魚

時多哭者前方去蒼朮草果常山黃芩豬苓澤泄加

炙芪黃連木香砂仁夜明砂乾蟾炙使君子神曲

麥芽等分為末神曲糊丸米飲下

有疔瘕又發搐者此亦食瘕積瘕也熱甚生風痰壅

作搐只止瘕驚搐亦止矣宜小柴胡湯加大黃常山

板榔主之如不止驚瘕俱發以致肝旺脾衰變為疔

症顛陷唇白頭髮成穗宜兩治之用加減當歸龍蒼

丸以平肝內帶治疔之藥又用加減參苓白朮散為

丸以補其脾內帶退驚之藥試之甚驗

加減當歸龍蒼丸 治疔熱發搐又治驚疔

當歸 川芎 胆草 龍蒼

黃芪 黃連 半夏曲 青皮

柴胡 人參 白朮 木香

甘草 枝子等分

神曲糊丸竹葉湯下

加減參苓白朮丸 治瘕久成疔謂之疔瘕又名勞

瘕兼治脾虛生風發搐者用之神效

人參 白朮 白朮 甘草

黃芪 白芍 官桂 陳皮

山藥 連肉 使君子 驚甲

神曲 夜明砂 龍胆 南星

荷葉浸水煮熟糊丸黍米大米飲下此與上方因

有驚后變瘕者此脾虛也宜平瘕養脾丸琥珀抱龍

丸相間服之

有瘕後變驚者此脾胃虛也亦如前二方相間服之

有瘕後變驚者此脾胃虛極也乃慢驚風症難治宜

加減參苓白朮丸琥珀抱龍丸主之

有瘕疔並作者初用小柴胡加當歸白芍常山板榔

大黃至之不已者只用參苓丸和之

瘕後變疔者此胃氣下陷也宜補中益氣湯加

黃芪 木香

當歸 神曲 木香



有瘡泄並作者均用柴苓湯主之  
 瘡後變泄者宜胃苓丸和肉桂冠丸服之  
 有瘡後變咳嗽者此因瘡退後復傷風也宜微發散  
 參蘇飲主之  
 有瘡後浮腫者此病極多宜胃苓丸五皮湯下或用  
 胃苓湯合五皮湯同服  
 有瘡後腹脹者看有癖無癖有痞者從痞治宜前平  
 瘡服脾丸加治癖腹脹法治之無癖者治腹脹胃苓  
 丸宜多服  
 有瘡後食少黃瘦不長肌肉者此癖也消之癖虛之  
 肥兒丸和平瘡丸主之  
 瘡疾灸法如人不止灸大椎一穴內庭二穴在足大  
 指次指外間隙中各一壯  
 九瘡之盡發者宜用酒法有夜發者此和在血分也  
 宜麻黃桂枝湯加地黃紅花主之不止者以小柴胡  
 湯合四物湯加升麻治之提至陽分然後用當歸扶  
 苓主之常山檳榔烏梅截之  
 瘡有一日一發者易已有間日一發二日一發者難  
 已惟平瘡養脾丸服久則以漸移近至一日二發者  
 得汗而解俗人見其服藥之後反至日發有疑而

不肯服者不可與言藥者也  
 腫病在治  
 面目浮腫先受風 濕從足起變形容  
 補中上下分清去 下水通腸是下工  
 醫科論小兒腫病與大人同法率用行水之藥誤  
 人甚多惟錢氏之論可宗錢氏云腎熱傳於膀胱勝  
 熱甚逆於脾胃脾胃虛而不制水腎水反尅脾隨  
 水而行脾主四肢而身面皆腫也若大喘者重也何  
 以然腎水勝而尅退脾土土勝心火火勝肺金肺為  
 心尅故喘或問心形肺本見虛金何喘實曰此有二  
 一者肺大喘此五臟逆一者腎水氣上行傍侵於肺  
 故令大喘此皆為難治也腫病之後日胞上下微起  
 肢體重著喘咳怔忡股間清冷小便澀黃皮薄而光  
 按印成疔舉手即滿是也  
 治腫之方諸家只知治濕多利小便之說執此一端  
 遂用泄水之藥則一泄而水消乃曰得泄之力殊不知  
 知脾愈泄而愈虛不逾旬日腫復如初此世人只知  
 泄水為最而不知十補勿一攻之論往往多死者矣  
 吾之家傳大兒用胃苓湯小兒用胃苓丸以五皮湯  
 送下甚驗



胃苓湯治腫之要藥也。方見脾胃印五苓散以治

五皮湯 桑白皮 大腹皮 茯苓皮

生姜皮 五加皮

常甚者加真蘇子。右上一二方有加減法。上半身腫

多者加蘇葉。阿子葛根。下半身腫多者加木通木

瓜。腹脹者加木香。藿香。枳殼。大便秘者加枳實。大

黃微利之。或枳朴。大黃。九亦效。方見傷食

飲食之忌。惟塩醬醢。鮮濕面皆味鹹。能助水者。並他

生冷毒物亦宜戒之。恐傷脾胃。重則半載。輕者三月

須待脾胃平復。血氣充實。然後於飲食中旋以少炒

塩徐徐投之。不至驟吃鹹物。則腫自不再作。故劉云

治腫非難。補養尤難

丹溪治腫大法云。宜補中行濕。利小便。腰以上腫宜

發汗。若遍身腫。煩渴小便赤澀。大便秘結。此屬陽

水。先用五皮散。次用四磨飲。加生枳殼。重則疎鑿飲

子。若遍身腫。不煩渴。大便澀。小便清。少此屬陰水。宜

實脾飲。或木香。訖氣飲。主之

氣若陷下。用二陳湯。加非提之藥。能使大便潤而小

便長。如腹脹少。加厚朴。佐氣不運。加木香。木通。以調

之。按丹溪治腫之法。大人小兒同用。方見名書。可尋用

之。今予做其法。以治小兒之腫。如在表。有熱。可汗者

用五皮湯。加麻黃。葛根。紫蘇。杏仁。以發之。如身熱

水氣在裡者。用五苓散。加醋炒芫花。果實。以下之。陽

水之大便秘。小便澀。煩渴者。用五苓散。作湯。送下。枳

朴。大黃。九。陰水之不潔。清便。自調者。用平胃散。加生

姜。白茯苓。果木。香。藿。香。主之

病有瘰後腫者。有泄痢後腫者。有因咳嗽腫者。有因

疥癩腫。洗後腫者。腫雖不同。治法則一也。經云。去

菴莖者。謂腹有積聚。宜去之也。開鬼門。謂發其汗也

潔淨府者。謂利其小便也。溫衣者。謂常宜和緩。使水

氣得行也。大抵瘰癧後腫者。難治。脾胃虛也。咳嗽而

腫者。宜五皮湯。去五加皮。加地骨皮。陳皮。去白紫蘇

三之。氣上逆者。更加杏仁。葶藶。毒痛。青通。聖散

大凡腫。先起於腹。而散於四肢者。可治。先起於四肢

而歸於腹者。不可治。若鼓脹而肚上有青筋。脹滿大

便。滑泄。久瘰。而轉作虛浮。與夫肉黑。傷肝。缺盆。下傷

心。臍實。傷脾。足平。傷腎。皆平傷。凡此皆為不治之

症。又男從脚。下腫。而上。女從身。上腫。而下。或內。或



掌平或如腫脛長或面黧黑首皆不可治也依原本

脾肺經今屬大陰 喘呼腫脹每相尋

視其標本分先後 秘訣家傳記在心

病脾者未必不喘病喘者未必不腫皆濕土之病也

蓋脾肺者手足太陰皆屬濕土故腫乃濕土敦阜之

家端乃濕土薰蒸之氣治者須以標本先後立法也

如先腫後喘者此脾病肺也脾為本肺為標宜胃

苓九五皮湯如上法合而用之如先喘後腫者此肺

傳脾也脾為本脾為標宜蘇子降氣湯主之

腹脹

育嬰卷之四

腹中脹滿定虛寒 秘結須從實熱

熱多寒少休妄議 虛虛實實天人學

大抵小兒多因飲食飢餓生冷結聚結不散或因

久患疳積及瘵后癖塊不消皆能為脹按之如鼓膨

者者是也故有疳脹虫脹積脹食脹虛脹冷脹種種

不同一言以約之寒脹是也故疳虛者皆屬寒宿食

積癖皆屬熱各隨虛實主治庶不差誤

錢氏云小兒腹脹由脾胃虛寒故作也實者悶亂喘

滿也可下之不喘喘者虛也不可下若誤下致脾虛

氣上附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類

脾主四肢母衰甚必主目胞腮腫也黃色者屬脾治

用芩氣丸漸消之使上下分消其氣則愈也

小兒易為虛實脾虛不受寒濕服寒則生冷服熱則

生熱當識此意勿誤也

凡治小兒虛腹脹先服芩氣丸不愈腹中有食積結

糞小便黃時時微喘脉伏而實時時飲水能食者可

下疳木香檳榔丸主之脾初虛而後有積者不可便

下以肥兒丸調之不愈以三菱丸主之

芩氣丸 治小兒虛腹脹大者加蘿蔔子各搗丸于

胡椒兩 蝎尾去毒五 蘿蔔子 加陳皮

育嬰卷之四

青皮 木香各三錢

為末麵糊丸粟米大服五七丸陳米飲下

三菱丸 治先脾虛後傷食不可下者反疳疾腹脹

三菱醋炒煨 莪米製 青皮 陳皮

枳實 厚刺 麥炒 半夏姜汁炒 黃連炒

香附醋炒 川芎 使君子 夜明砂

神曲 麥牙 乾蟾煨存性 檳榔

木香 砂仁各三錢 當歸一錢

另取神曲煮糊丸黍米大服二十九至五十九米

飲下大便黃涎臭穢為度此積滯去也



治小兒腹脹法

紫蘇根 干葛 用蘿蔔子 陳皮 芍分 耳草 煎

煎服食少加白朮

一法 用蝦蟇一箇入猪肚內煮熱去蝦蟇將肚食

盡改

如有因食積而腹脹者有熱用木香枳實丸有寒用

下香脾積丸有因食多由多腹脹者用三黃枳

料內加香附半夏蒸餅丸服

實者宜下之消之次補之虛者溫之升之補為要也

寸經曰夫脹者皆在臟腑之外排非臟腑而即胃腸

脹滿皮膚故曰脹大抵寒脹多而熱脹少治宜詳辨

之如腹脹時減者為虛腹滿不減者為實按之濡者

為虛按之堅者為實如大病瘥痢之後脹者為虛外

感風邪寒邪入裡者及傷飲食者其脹為實虛者補

之內加行氣之藥勿太犯溫及成熱中也實者下之

內加補脾之藥或先補脾而後下之勿太下之恐傷

胃氣常用秘胃苓丸以紫蘇湯下多服

病脹氣喘者宜分氣飲主之

分氣飲 治腫脹 桔梗 赤茯苓

陳皮 枳殼 桑白皮 大腹皮

半夏 藿香 紫蘇 芍分 耳草

每服一錢水一小盞姜三束二煎服

病脹者腹堅而大腹皮無文臍突背平胸高而喘或

滑泄皆不可治

內經曰五實者死腹緊脹一也氣上喘二也身壯熱

三也脈洪數四也大小便秘五也如此五實者宜急

下之得利者生神效丸主之方用

大戟 芫花 耳草 澤泄

葶藶 連翹 桑白皮 木香

赤小豆 黑牽牛

取頭末等分大棗蒸去核搗泥丸麻子大量兒極

柳湯下以利為度此乃救急之方非可常用得利

后用參苓白朮散去耳草補之

黃疸

濕熱食傷總發黃 是名疸病屬純陽

熱宜寒治濕宜利 從消導良

錢氏曰凡小兒身皮面目皆黃者黃病也身痛轉背

強大小便澀一身面目指爪皆黃小便如屋塵色著

物皆黃渴者難治此黃疸也二症多得於大病之後

又有生下百日及半年不因病過身微黃胃熱也大



人亦同。又自面黃腹大口渴者脾虛也。又有自汗身黃者胎黃也。經云：諸疸皆屬於熱，色深黃者是也。若淡黃兼白色，胃怯不和也。

按論小兒黃疸病，錢氏甚詳。如因熱者其色黃而明，因濕者其色黃而黯。因食積者其色黃而淡。以此辨

冊溪云：不必分五疸，總是濕熱。如金曲相似，此理甚明。

按經中只言瘰，俗稱為疸。瘰者單也，謂單陽而無陰也。因於熱者用涼驚丸，因於濕者用胃苓丸，內加茵

陳作九服之。因於食積同疳黃者，集聖丸、脾胃虛怯

而黃者肥兒丸。此家秘之法也。方見前。大抵治黃胆

者茵陳五苓散尤為穩當。錢氏泄黃散治脾熱發黃

大槩治小兒季夏之時，身體蒸熱，胸膈煩悶，如爛捕

之黃，服中白睛赤黃，筋骨痿弱，不能行立，用加減泄

黃湯主之。

黃連 茵陳 各五錢 黃蘗 茯苓 山枝仁 各二錢 澤泄 二錢

吐咀作一服水煎，稍熱服。此方治虛熱發黃甚效。丹溪治小兒吐泄黃胆方：三菱 茯苓 青皮 陳皮 神曲 麥芽

凡此等症，方口舌不舒，連及我神丹，以傷食傷氣，宜早治。

黃連 甘草 白朮 茯苓

未濕水調服，傷乳食吐泄，加山查時氣吐泄，加滑石發熱加薄荷。此方治傷食及食積發黃甚效。

凡小兒有食積者，面色多帶黃白，宜肥兒丸調之。健脾胃，出積消食，脾胃既和，飲食消進，運化積微，滯

既臟腑流行榮衛，自然五色脩明，其黃去矣。腹中有瘕者，宜化瘕丸。方見前。有積者三菱丸。方見

各依其法治之。無有不驗者。惟幼生小兒胎黃用生地湯與母服之。兒食乳其黃自退。

生地黃湯 生地 赤芍 川芎

消歸 天花粉 水煎服

腹痛 小兒腹痛與聲連 天者能言何處疼

冷熱積疳分四症 盤腸內弟察根源

仁齋云：腹痛之病，因邪正交攻，與臟氣相擊而依也。挾冷痛者於面色或青或白見之。冷甚者則面色黑

黑唇爪甲皆青矣。輕者當歸散，重者燒肝散。主之有吐痛者保童丸。

當歸散 治腹痛有寒無熱 木香 辣桂 人參



耳草等分  
生薑大束引溫服

燒脾散 治傷生冷菓菜停積中焦心脾冷痛

乾姜 厚朴 草菓仁 炒仁

神曲 甘草 麥牙 陳皮

良姜炒等分

末熱鹽湯點服。或煉蜜丸如圓眼大姜湯化一丸

保童丸 治因寒傷風冷食積肚疼吐泄嘔惡

人參 白朮 甘草 蒼朮

厚朴姜 陳皮 茯苓 猪苓

澤泄 藿香 丁香 半夏曲

干姜 辣桂 白豆蔻 青皮

肉豆蔻 滑石 全蝎

木香 訶子肉

神曲糊丸龍眼大一丸米飲下 或用理中丸

苓丸合研細煨姜湯調服已見效

挾熱痛者於面赤壯熱四肢煩痛手足心熱見之宜

四順清涼飲加青皮只亮大便秘者枳朴大黃丸主

之方見類聚大便調者芍藥耳草湯

四順清涼飲 白芍 當歸 升草

大黃等分

芍藥耳草湯 白芍 甘草

己上二方並用水煎服

錢氏云小兒積痛口中氣溫面黃白目無精光或白

睛多及多睡畏食及大便或酸臭者當磨積宜三姜

消積丸主之甚者脾積丸下之。后和胃 胃苓丸香

脾丸肥兒丸參苓白朮散擇而用之

三姜消積丸 治積痛胃脘痛心腹痛小便痛痞痛

腹痛

三姜 菝葜米 半夏 枳實

黃連 真菝葜水炒 陳皮 青皮

木香 檳榔 厚朴姜 川練子肉

小黃等分末

另取神曲糊丸黍米大服二三十丸米飲下

玉痛面皸白心腹痛口中涎沫及清水出發痛時烏

梅丸主之小兒本性者多此病

積痛食積虛痛大同小異惟玉痛口涎而沫出甚者

化重丸萬應丸看病輕重用

烏梅丸 治胃冷蛇攻心痛嘔吐四肢冷



烏桕三十个 黃藥炒 細辛 白桂  
附子炮各六錢 黃連一錢 蜀椒炒各錢 當歸各錢  
姜炮一錢

未取烏梅肉酒浸杵爛和蜜丸麻子大服十九日  
二次忌生冷

化虫丸 治虫交心痛去來不定不思乳食

鶴虱 煨榔 錫灰 白枯丸 三錢半生半

苦練根白皮各一錢 麵糊丸黍米大服二三十丸熱水入香油三滴吞

下食前服如有小虫皆化大玉自利下初服甚效

凡病腹痛喜手按及熱熨者為虛為寒宜用溫補法  
如手不可按者為實宜下之盤腸內疝痛見前驚風  
及後疝痛

癖病

癖居脇下狀如魚 寒熱潮時似瘧臨  
虛實從容衰半止 若逢乳癖不須醫

仁齋云癖者血膜包小側癖脇傍時時作痛惟癖能  
發潮熱生寒熱故瘡家中腕多畜黃水日久而成癖  
寒熱往來不已者成此疾也蓋小兒臟腑和平榮衛  
和也則津液自然流通縱使多飲水將不能為病惟

乳哺失調三焦閉隔水飲停滯腸胃不能宣暢冷氣  
搏之結聚而成癖也錢氏云腹中有癖不食但欲乳  
不早治必成癖

幼科治癖 輕則木香丸重者取癖丸似太峻今予  
立法輕則消癖丸主之如氣壯實者代赭石扶癖丸  
下之

按大槩云一小兒病癖積在左脇下硬如覆孟肚大  
青筋發熱肌瘦咳嗽自汗日晡尤甚牙疳口臭宜露  
出血四肢困倦飲食減少病甚篤太醫劉中安先與  
沉香海金沙丸一服下穢物兩三行次日服癆氣丸

十日後隨以沉香海金沙丸下之入服癆氣丸如此  
五換服至月餘其癖減百而愈遇近年有此疾獲愈  
者多故予家秘訣先服消癖丸五日乃服扶癖丸以  
微下之又服消癖丸十日又以扶癖丸下之

內經曰大積大聚廼可攻也衰其半而止如上法治  
之待其衰去大半不可再下只以消癖丸服之

消癖丸 治癖在脇下者面黃肌瘦午後發熱似瘧  
者  
白茨 青皮 厚朴 枳實 炒  
半夏 砂仁 神曲 麥曲 各二



代赭石 煅 治腹中痞塊或生寒熱或作痛者

木香 一錢 辣桂 乾姜 各一 黃連 錢

同姜炒丸如黍米大服二十九至五十九米飲下

代赭石 煅 治腹中痞塊或生寒熱或作痛者

木香 下見火 三錢 煨 辣桂 川大黃 錢

除巴霜外研末入巴霜再研勻醋煮麵糊丸椰子

大服五九姜湯下

小兒病瘡腹中有痞發熱者連年不已欲成疔癆者

宜用蠶甲猪肚丸主之

枳實 木香 醋炙一兩 大蝦蟇 乾者一個 青皮 各半兩 九筋蠶甲 錢

用猪猪肚一個重斤半者去脂將前藥末在內切

木甌蒸熟同搗和丸麻子大服二三十丸人參湯

不食後服

凡小兒疳癖不必攻治待至長大脾胃漸強自不見

矣

虫痛 個個孩兒腹有虫 胃虛蛇動痛相攻

眼眇吐沫如驚癇 寸白為疳法不同

古方論臟腑九虫 一曰伏虫 二曰白虫 三曰肉虫 四

曰肺虫 五曰胃虫 六曰弱虫 七曰赤虫 八曰蟪虫 九

曰蛇虫 蛇虫俗呼食虫者是也 或長一尺或五六寸

蓋因臟腑虛弱而動或因食甘肥而動其動則腹中

痛發則腫聚痛有去來乍作乍止嘔惡吐涎口出清

沫胃傷心者死自鼻出者死先察其脉或腹中痛者

脉常沉伏弦細今反脉大則是蛇痛也蓋因小兒食

物太早或傷生冷油膩之物蓄而成積積化為虫也

凡有虫者口饑好甜或喜食泥土茶脚火灰之類宜

用取虫之藥如烏梅丸化虫丸方見前木香枳榔丸

蝦蟇丸萬應丸秘傳養寶丹皆可擇而用之

木香枳榔丸 殺諸虫 鷄心枳榔 木香

鷄虱 貫衆 錫灰 乾漆 錢

使君子 各半兩 輕粉 錢

巴豆 各半兩 錢

未飛白麵糊丸麻子大服一二九五更芳練根

白皮煎湯下

蝦蟇殺疳虫丸 大蝦蟇 一個 木香 錢

鷄心枳榔 貫衆 桃仁 尖水 另研



苦練根白皮

酸石榴皮各三錢

燕夷

鶴虱各二錢

巴豆肉二錢另

糯米糊丸麻子大五更石葛蒲下十五丸

高應丸

下諸虫

換柳末五錢 大黃末八錢

黑牽牛頭卡皂角

苦練白皮斤

將前三味末和勻用皂角搥碎與苦練根皮二味

水一大碗熬成膏入藥末搗丸小豆大用沉香白

雷丸木香三味各研細末為衣先用沉香衣次用

雷丸衣後用木香衣每三九五更沙糖水下

秘傳養寶丹 追虫取精神效

青嬰卷之四

注

救文堂

黑丑

末十個頭

錫灰

醋炒一

檳榔末二兩

陳皮

青皮

各二兩

雷丸

白者末

三錢醋

我末醋

鶴虱

皂角

各二兩

使君子

二兩

將各末和勻却以各藥粗渣煎湯去渣搗丸麻子

大每服五分至壹錢四更時用冷茶清吞下復睡

至天明不可洗手洗面吃湯物待取下或虫或積

惡毒滯氣并原藥下盡方用冷水洗面其藥未下

寧半時見藥下終用食哺之

凡欲取虫宜在上半月虫頭向上若下半月虫頭向

下不受其藥徒傷胃氣也取虫之時預將清油煎肉

或煎卵餅令兒與之勿與食也引虫得聞香味皆聚

而求食也急接下虫藥乃中病也

取寸白諸虫買袋酒方 隔夜取買袋煮酒收起至

次日五更將袋肉一塊與兒啣口中勿令吞下虫聞

肉香其頭向上却取去肉以使君子肉三个煨令香

熟與兒嚼爛同輕粉數厘吞下少頃以買袋酒下雄

黃解毒丸三五七粒則泄下皆虫也

小兒病虫多出於脾胃怯弱者如上攻取之藥豈可

常服乃當作腹痛之時然後用之也

有於未服之時常宜服肥兒丸安虫丸所謂防患於

未然使之不發也

安虫丸 治此虫寸白虫匿虫一切諸虫

木香 檳榔 使君子肉 白蕪荑仁

綠色貫衆 苦練根白皮 蝦蟇燒存

夜明砂

末梗米丸黍米大二三十九蜜水下

癩疔

疔腫須分內外因

病因肝氣原非腎

病者寒氣結聚之所為故令內則臍腹絞痛外則卵

內因氣動外寒浸

本腫呼為氣卵名



九腫大是也專屬肝經與腎無干蓋肝善怒大則哭  
 小兒性急多哭得之者此氣動於內謂之氣疝宜行  
 氣開鬱加減二陳湯木香內消丸主之如因以寒寒  
 濕之地得之者此冷氣入腹謂之寒疝宜溫中散寒  
 加減當歸散茱萸內消丸主之有腫而不痛者此濕  
 也宜行消腫加減守效丸主之並外敷方  
 加減二陳湯 治性急多哭卵腫痛連小腹謂之氣  
 疝 木香 半夏 白茯苓  
 附子 川芎 陳皮 小茴  
 耳草 姜三片水煎

木香內消丸 治疝氣 木香 三棱  
 猪苓 澤泄 川練子肉 陳皮  
 香附 酒浸七 小茴 炒等分 海藻 洗 二錢 青皮  
 酒糊丸黍米大空心塩湯下二三十丸  
 加減當歸散 治受寒濕之氣小腹絞痛外腎紅腫  
 並內釣腹痛啼哭多  
 當歸 洗 酒 萸菜萸 炒 官桂 皮 土 川芎  
 干姜 炮 木香 小茴 炒等分 車草  
 未服五分至一錢塩湯調  
 家傳茱萸內消丸 治寒濕所襲番伏作痛癰疝偏

莫菜萸 酒醋浸一 陸心  
 山茱萸 蒸去 馬蘭花 醋 川練子 蒸去 玄胡索 酒  
 舶上茴香 炒 橘紅 青皮 白 海藻 洗 各  
 一 桃仁 炒 去皮 白蒺藜 炒 刺 木香 各 半  
 酒糊丸麻子大服二十丸至五十丸濕酒塩湯下  
 加減守效丸 治卵腫不痛者此濕也又名木腎  
 蒼朮 炒 浸塩 南星 炮 白芷 各 一 兩 山查肉 一  
 川芎 橘核 炒 半夏 炒 神曲 炒 各  
 海藻 洗 莫萸 炒 二錢

酒糊丸麻子大服二十至五十丸茴香湯下

一方治疝物起者田五苓散料內加小茴川練肉服  
 時入塩少許效  
 又方治偏墜痛甚者用川練肉茴香 炒等分 沒藥全  
 蝎減半末空心用熱酒調服或以五苓散煎調更佳  
 傳法 外腎腫大光明者先用神煎水乘熱洗過后  
 用牡蠣灰乾地龍糞焙乾等分末唾津調敷腫上痛  
 者鷄子清調敷  
 又方 用乾龍末不拘多少先以葱椒湯洗次以津  
 調敷  
 小兒素有疝氣或一年或半年發者發則有形外連



單凡內貫小腹腫硬一條如小杵約五六寸長大小  
便不通者宜用

山枝仁

山查子

木香

青皮不去

木通

小茴炒

川練子肉

澤泄

猪苓

作大劑

水煎

小兒木腎腫大連年不消者不早治之便為終身疾  
癩也宜用前家傳菜莢內消丸內加黑五半生半炒  
取頭末二兩為丸服更灸臍傍二穴即章門穴大效  
又取穴法以木兒手掌小指後側橫紋按臍中心中  
指頭盡處是穴

小腸氣

一各

名

盤腸氣痛發則腰不得伸乾哭無淚額

上汗出詳見前內帶病中有方如痛連外腎者宜加  
或川練子散主之

舶上茴香炒

破故紙炒

二葉菜根醋酒浸

木香錢

未溫酒調服

小兒氣仰謂之偏墜得之於父手已老或年多病陰  
痿精少強力入房因有此者謂之胎疝難治

小兒濕地上坐或為丘蚓呵其卵腫長大而垂首臨  
湯洗之蓋盪能殺蛆毒也或用浸蒼木并煎熱少  
以盪在內洗之

小兒疝痛及盤腸痛者以盪一合炒熟放兒臍中慰  
之待冷更以艾在臍上灸之溫氣既入和氣隨散其  
痛立止

小兒陰囊生瘡潰爛者謂之脫囊用紫蘇葉研末敷  
之以荷葉包之或用生荷葉火烘令軟包之雖囊丸  
露亦可治之神效

又治外腎燥痒潰爛用

龍骨炒

石膏

多年爛蚌壳錢

爐耳石煨

五倍子

白芨

黃連各五分

末先以苦參大腹皮紫蘇露蜂房煎湯先洗拭乾

敷藥神效

小兒外腎臊臭特復濕痒宜用

柴胡

澤泄各一錢

車前子

木通各五分

生地

當歸尾

胆草各三分

咀作一服水三大盞煎一碗去渣待宿食消盡空  
心服更以美膳壓之

小兒腎疼甚不可止者用胡椒煎湯洗之立效

啼哭

孩兒多哭事堪憐  
飢渴痒疴如不中

何事漣渙晝夜間  
拂其心意自煩寬



小兒初生百日一週之內神安意靜不妄笑多哭者易養如日夜啼哭不止者難養啼哭與哭不同啼者無時有聲而流淚也哭者時作時止大號跳而有淚也小兒啼哭非餓則渴非痒則痛為父母者心誠求之渴則飲之飢則哺之痛則摩之痒則搔之其哭止者中其心也如哭不止當以意度蓋兒初生性多執拗凡有親狎之人玩弄之物一時不在其心不悅而哭矣謂之拗哭急與之勿使怒傷肝氣生病也假如又

不止請醫視之如大斗哭晝夜不止者肝熱也宜瀉青丸主之淡竹葉湯入沙糖一豆許化下如日夜啼哭身熱煩燥者心熱也宜導赤散加黃連燈心湯服或用東垣珠砂安神丸燈心湯下神效方俱見心用

夜啼

夜啼四症驚為一 無淚見燈心熱煩

面瑩頰青下臍痛 睡中頻笑是邪干

夜啼者脏冷也陰虛於夜則冷動冷動則為陰極發燥寒甚作痛所以夜啼而不歇也鈞藤散益黃散主之

鈞藤散 腹痛夜啼晝則安靜者又治內鈞

鈞藤 茯苓 茯神 川芎

當歸 木香 各一分 草大 錢 薑 末 五 分 至 一 錢 姜 末 零 煎 服

又方治夜啼不止腹中疼痛 甘草 黃芪 當歸 赤芍

木香 末每少許塗乳頭上吃之

又方 木香磨水半盞調乳香沒藥末少許數沸服之立効

其心熱煩啼者必有臉紅舌白赤澁之病宜導赤散加麥冬燈心或東垣安神丸甚効

又方 黃連 汁 甘草 人參

末竹葉水煎服 燈花膏 燈花 二枚 或 珊瑚

又方 珠砂 末以燈心湯調搽兒口中以乳汁嚥下一日三服

小兒夜啼見燈即止者此由點燈習慣乃拗哭也驚啼者常在夢中哭而作宜錢氏安神丸主之

又方胎中受驚生未滿月而驚啼者用 珠砂 牛黃 射各少許

末取猪乳汁調搽兒口中



又方 蟬退十四枚全入珠砂許 蜜調服

有因客忤觸犯禁忌而夜啼者宜四聖保命丹用燈草燒灰和藥杵細乳汁調塗乳上令兒吃之更以術法驗之

一法於兒臍下用硃筆書田字一個即瘥

又法用大柴頭一個長四五寸削平一面硃砂水寫云撥火杖撥火杖差來作神將捉著夜啼鬼打殺不要放急如律令勒

又方 用仙人杖安睡處身伴此杖即笋欲成竹者立死

育嬰卷之四 敷文堂

又方 用抱雞婆草一束置兒篋下勿令人知

諸汗

額頭有汗不瀕疑 漿漿渾身早問醫

若待陽虛成脫病 縱逢國手也虛題

內經曰陽者衛外而為固也陰者內之守也氣為陽

血為陰心主血汗者心之液也肺主氣皮毛腠理肺

之合也小兒心火太盛上薰於肺則皮毛不斂腠理

不密失其衛外之職矣故汗出焉或為自汗或為盜

汗血亦失其守矣汗出不止心亦虛也氣弱血虛大

病生焉縱遇良王不可為也

自汗者或昏或醒浸浸而出不止也盜汗者睡則出醒而復收也並宜黃芪六黃湯止汗散主之當歸六黃湯此治自汗之聖也

當歸 二地 黃槓 黃連分

黃芪加倍

先用浮麥熬成湯去麥入藥煎成劑去渣調止汗散服

止汗散 用故蒲扇燒灰

又方 用杜槩米泔浸洗 麻黃根 黃芪各末

取浮麥一百粒煎湯調煎一沸服効

育嬰卷之四 敷文堂

錢氏云上至頭下至項謂之六陽虛汗不瀕治之

小兒睡而自汗者肌肉虛也止汗散主之適身汗出

者香瓜丸主之上至胸下至臍胃虛也當補脾益黃

散主之勿科執此殊不知自汗者心火旺而肺金虛

也反用丁香以助火青皮以瀉肺其失甚矣東垣有

論見肺本方當歸調元湯加芍藥黃芪建中湯穩

當

黃芪建中湯 治脾胃自汗

黃芪蜜 白芍等 甘草炙 杜桂枝

姜三束引



又方 黃芩六錢 白芍各三錢

加白朮 末姜枣引治胃脾虛汗甚功

凡兒生週歲不可自汗勿用他藥宜用白朮一錢

小麥百粒水煮令乾去麥為末以黃芪湯調服愈

為度

有傷風寒熱症自汗宜小柴胡湯加胆草治之

有夏月中暑濕發熱汗多者宜人參白虎湯加蒼朮

治之効

有傷食積者胸腹多熱有汗宜先去積三黃枳朮丸

下之後以肥兒丸調理自愈

有因瘧後自汗者宜小柴胡湯加黃芪桂枝主之

有因瀉痢後自汗者宜黃芪建中湯加當歸白朮主

之

有急驚風自汗者通身如水之冷此危症也難治

凡大病後有自汗盜汗者宜調元湯加白芍白朮主

之如汗出太多不止者宜養心血團參湯聖藥也

團參湯 治虛汗或心血液盛亦發汗此藥收斂心

氣 新羅人參 川當歸 各三分

咀作三服實情心一个切三片每片入藥二錢并

水碗半煎一碗食後服

又治睡中汗方 酸枣仁 人參 煨冬

蜜丸共實大麥冬湯一丸下

汗出不治症 汗出不流而髮潤一不治也汗出如

注者二不治也汗凝如珠者三不治也君子見機而

作不可不早

大小便病

腎竅便開前後陰 便溺有病屬肝經

血虛大便多硬結 氣熱常為小便淋

內經曰腎開竅於二陰二陰者前陰竅出小便後陰

竅出大便也

又曰肝病者則大小難故中風者多便溺之阻隔也

又云前陰主氣後陰主血者語其用也蓋膀胱之津

液血所化也由氣而後能出太陰之傳送氣之運也

由血而後能潤此便溺之流通然後見氣血之依附

也夫人之所以有生者以有出入也如清陽出上竅

謂呼吸也濁陰出下竅謂大小便也一息不運則機

織窮而死矣故二通加以腹脹氣喘嘔噦燥

者不可治也宜服 小用掩睛法密導法則前

後俱通矣

後俱通矣



八正散 治熱聚下焦二便不通

木香

滑石

山枝仁

車前

崔麥

車前

大黃

芒硝

水一碗先煎上六味二沸入黃煎至半碗去渣入

前煎一沸頃熱服

龍濟法 治驚風積熱大小便閉塞用連翹葱七根

不洗帶土生姜一鬼淡豆豉二十一粒鹽二匙同

研爛作餅餅子烘熱掩臍中以綿扎良以氣通

自利不然再換一餅

又方 用大田螺三五枚和殼杵爛掩臍下即通每

筒加鹽半匙更良

密導法 治二便不通以此通其大便則下焦氣行

而小便自通矣用蜜煉成珠滴水不散入皂角末

和丸如小指頭大似葱管送入穀道中氣通則便

可矣

治小便

膀胱不利號為癃

不約遺尿夢寐中

如此兩端分冷熱

還來水火既真從

經曰膀胱不利為癃不約為遺尿癃者小便不通也

又曰脈有熱則小便先赤凡小便赤澀為熱小便自

遺為寒熱者火有餘水不足治宜瀉心火滋腎水如

味導赤散主之寒者火不足水有餘也治宜溫腎水

益心火益腎仁散主之

加味導赤散 治心熱肝熱小便赤澀者

木通

生地

車前稍

條芩

枝子仁

澤泄

車前子

柴胡稍

末每一二錢淡竹葉七片燈心二寸水煎食

前服

益智仁散 治遺尿

益智仁

破故紙

白朮

青嬰卷中四 敷文堂

細末鹽湯調服

小便不通乃內臟氣虛受熱壅滯宜化不行非塞非

痛似閉不通腹脹緊滿宜五苓散加車前子燈心主

之

有大病後氣虛津液少者不可利之利則氣益虛津

液日枯宜

人參

麥冬

甘草稍

黃柏搗碎

茯苓

末煉蜜丸姜湯下

小兒諸淋不問五者皆屬於熱並用

香附子

川芎

赤茯苓

海金沙

滑石

枳殼

澤泄

石常



栝樹多二錢

糯米粉煮糊九麻子大服二三十九順取長流水入鹽少許煎湯下

如小兒氣病常病淋者不可服上藥宜補腎地黃丸甚効小便自出而不禁者謂之遺溺睡裡自出者謂之尿床此皆腎與膀胱虛寒所致也宜鷄腸散主之

用鷄腸一具牡蠣煨灰白茯苓各半兩真桑螵蛸各半兩

末服一錢姜枣引或與益智散令末煉蜜丸鹽湯下尤妙

小便出血者謂之尿血用 生地 木通 赤茯苓 山枝仁 生蒲黃

青髮卷之四 散文堂

滑石分等末每一錢淡竹葉七片水煎去渣入車前草自然汁同服

又方 用升麻甘草煎湯調一元散服

小兒初出便黃赤落地良久凝如白膏者謂之尿白

切科云火則成疳是也宜用胃苓丸鹽湯下效

如小便出而色白渾濁謂之白濁宜清心蓮子飲主之 石蓮肉 白茯苓 一錢 益智仁

遠志心去 麥冬心去 人參各五分 石菖蒲

車前子 白朮 澤泄各二分 甘草一分

末每一錢燈心同煎

又方分清飲 益智仁去 川華蘇 石菖蒲

天台 烏藥等

末或和白茯苓尤妙燈心湯服

治大便

大便鞭結須宜下 亦有諸緩不可攻

食少氣虛脉濡弱 不如胆導有奇功

夫飲食之物有入必有出也苟大便不通宜急下之

青髮卷之四 散文堂

使舊穀去而新穀得入也然有實秘者有虛秘者臨

病之時最宜詳審如形實氣實脉實又能食者約有

可下之症則下之如河澗涼膈散承氣湯八正散二

黃枳木丸木香栝樹丸丁香脾積丸擇而用之中病

即止不可過也如形虛氣虛脉虛又食少者雖有可

下之症緩則救其本用保和丸只朮丸大黃丸微利

之如常便難者血不足也宜潤腸丸主之急則治其

腸使其通利猪胆汁導法神效此家秘之法也

潤腸丸 治老人虛人小兒產夫大便秘結者良驗

麻子仁去 杏仁去皮尖 桃仁去皮尖 歸身



阿膠 柴蘇 三

胆導法 猪胆仁 以小竹管放口內用線扎緊勿

勿使移動吹氣一口另用一線從管下近氣處繫定

勿使洩了氣揀入穀道中解去繫氣線一手拿住

胆筒一手捏胆汁入腹直待氣通隨捏隨起便即

通矣如不通又有別法口言不盡

凡小兒病有可下不可下者說見第一卷歌中

凡小兒大便下血者宜四物湯加枳壳荆芥穗玄柏

葉主之

育嬰卷之四

小兒目病

存乎人者惟眸子 五臟真氣並見此

一點塵埃不可浸 風熱肝虛為疾耳

日主五臟腫人屬腎黑珠屬肝白珠屬肺兩角屬心

上下胞屬脾目內五臟症錢氏云赤者心熱導赤散

主之淡紅者心虛熱生犀散主之青者肝熱瀉青丸

主之淺淡者地黃丸補之黃者脾熱瀉黃散主之無

精光者腎虛地黃丸主之白而澁者肺熱瀉白散主

之 生犀散 地骨皮 赤芍 柴胡

葛根各一兩 甘草 生犀 二錢

每一錢水煎服 眼目視物不明不腫不痛不赤無翳膜或目睛小無

精光者是肝腎俱虛不可便服涼藥宜地黃丸主之

目者腎之竅瞳人者通竅於腎腎屬水肝屬木母子

相依者也故肝腎之氣實則精彩光明氣衰則昏朦

茸眩烏輪赤暈痛淚漿流此肝熱也眼生清淚粘臉

遮睛此肝虛也瞳人散大淡白偏斜此腎虛也瞳人

焦小或帶微黃此腎熱也 虛一實以此驗之然

者神之舍也又為腎之主也心主血目得血而能

育嬰卷之四

心主熱目因熱而昏昧故四物湯與地黃丸要藥也

補腎水制心火養肝血莫有加於是方者矣

一月痛赤腫有二症或因天行時氣症候暴赤腫痛

晝夜若啼哭不止或因臟腑積熱兩目赤腫並宜

瀉青丸方加 蟬退 白蒺藜 蔓荊子

荆芥穗 柴胡 黃連 車前子

甘草 各等分 每末一錢生蜜水調細服之外用金沙散點洗之

方見下 一目內睛膜有二症或肝腎俱虛服生睛膜及肝疼



白膜遮睛者宜用地黃丸加

五味 人參 當歸 川芎

黃連 蘆薈 蜜丸服

或因痘疹之後毒氣入目生翳膜者用

白菊花 菘豆 各精草等

咀每二錢乾柿餅一枚粟米泔汁二碗慢火煎乾

去渣於食後臨卧只吃柿肉一日三枚如兒不能

服者將煮過柿餅毋嚼爛喂之此二症不可用點

有物生下眼閉不開者其症有二或因產母食熱毒

物以致斯疾治當以胆草少許煎洗眼上一日七次

或用黃連磨乳點之乳毋服

生地黄湯 生地 赤芍 川芎

當歸洗酒 瓜蘆根 加黃連 燈心引

水煎或以本方為細末燈心湯調少許擦兒口中

或因初生洗眼不淨穢汁浸漬於眼目中不能開者

宜真金散万 淨黃連 黃蘗 當歸

赤芍 杏仁去各五分

切乳汗浸一宿晒為極細末以生地汁調一字點

眼中自開

凡物生小兒頭洗令淨使臉赤爛至長不瘡名曰胎

赤見下爛弦

痺服者肝風入眼赤腫目生眵淚爛弦痛痒擦

暗雀育甚至目合不開宜

天麻丸 真青黛 黃連 天麻

五靈脂 夜明砂 川芎 蘆薈各二

胆草 防丰 蟬退去足錢 全蝎二枚

乾瞻炙焦三射

續猪胆汁浸糕糊丸麻子大每十九薄荷湯下

又方 治小兒疳眼赤爛用

苦參 蔓荆子 防丰 胆草

玄參分等

猪胆糊丸麻子大數量大小茶清下

疳眼生瘡者用 瓜蘆根 升草

赤芍 决明分等 每五分蜜湯調下

爛弦者脾有濕熱也或初生洗不淨所致者用

淨黃連炒 蒼朮童便浸 防丰分等

未每服一字蜜水調外用菘豆 耳石重

便淨七 海螵蛸錢一 胆丸 輕粉

次半兩 雄黃各五分

用黃連乳汗浸清汗調藥以鷄乳蘸藥搽上一日



三五次以瘡為度

有因塵埃入目，揩摩成腫，帶哭不已，作痛者用油烟金墨，新汲水磨濃，入玄明粉，如無以馬牙硝代之，和勻為膏，取新筆蘸點目中，以瘡為度，忌熱物。

凡眼暴赤腫，初起勿服寒涼之藥，不能愈，疾又損脾胃氣，使兒不能飲食也。蓋藥之味辛甘散為陽，酸苦瀉為陰，故清陽出上竅，辛甘溫平是也，酸苦寒涼之藥不能上升耳。宜先服九仙散發散之，此火鬱則發之也。不已者以瀉青丸合小柴胡湯加酒黃連作丸服，有大奇功。外當用金沙散洗之，黃連膏點之，以愈此治風熱眼病之要法也。

九仙散 時行自病暴赤腫痛以此發之

柴胡

蒼朮 童便浸 赤芍

荆芥穗

耳草

麻黃 水浸 根節洗

川芎

薄荷

旋覆花 去毛梗

未每

一錢水 一小碗 姜一片 葱一莖 魚時類服

金沙散

時行赤眼腫痛或腎熱多淚

淨黃連

鵬砂 寒水石

大黃 各二錢

海螺

銅青 各一錢

全蝎 去毒

射

爛弦加

輕粉

末每服一字至五分凉水化澄清去渣無時類洗 效忌酒暈

黃連膏

用淨黃連 斤半 苦參 兩四

秦皮 兩二

杏仁 兩十九

冬月製取雪水四碗煎二碗放淨磁器內又以水煎取一碗放前汁內又以水一碗煎取半碗用淨取汁與前汁和一處取爭銅銚子入汁在內慢火焚以桑條不佳手攪勿令沉底勿動灰塵入汁中務宜仔細待熬至一碗再入馬牙硝半兩同煎至半碗取起以紙蓋定再製過蘆耳石末二兩

鵬砂 末半兩

乳香 一錢

沒藥 末一錢

胆 凡末三錢

海標 二錢

和勻入膏中取起攤冷待乾以乳汁磨點之效

目直視者肝有熱也 目逆刺者謂之目開肝有風也 並宜服瀉青丸

目下胞腫青水氣也 必待作腫宜五苓散加車前子

以利其水

目中黃者痘也 宜服茵陳胃苓丸

兒有大病未愈觀其目或在視或斜視不轉睛者或

閉目不開者或開目不合者或哭無淚或不哭淚自



出者有目胞腫者有目陷汁有目中見物而畏怕者皆候

治鼻

鼻中相通呼吸門

唇依牙齒齒依唇

耳同採聽當嫌表

舌主聲音以鋒銳

氣之主通竅於鼻。鼻清氣出入之道路也。小兒受胎氣充實者三關九竅五臟六腑內外呼吸內則清濁不分。泥丸相亂。諸症疊起矣。鼻衄者血與氣相隨而行。若臟腑積熱乘於氣血則

熱氣逼血而妄行。自鼻孔出謂之衄血宜

東垣涼膈散加生薑 阿膠 黃連

茅花主之不止者宜服鷄蘇丸效

鷄蘇丸 治鼻熱胸中鬱熱衄血不止

鷄蘇葉八分即薄荷葉 蒲黃炒一兩 麥冬二錢

阿膠炒一錢 耳草七分半 人參 黃芪各五分

木香 柴胡 生黃各一錢

煉蜜九丸每一丸食後茅花湯下

又方 山枝和殼燒存性油髮灰研勻吹入鼻  
又方 槐花半生半熟未吹鼻

又方 人中白成塊燒去穢氣為末入曲髮灰射之

又方 生蘿蔔搗汁或生藕汁仰頭滴入鼻中或血妄行取汁飲之效

又方 用大蒜煨香研爛塗脚底鼻中有蒜氣即去之

用土方法不止以白紙一張作入摺冷水濕紙放頭頂中以熨斗熨至一重或二重紙乾立止此數方救急之要法也

鼻流清涕者熱則津液流鼻塞不通者冷則收閉也

鼻流清涕其症有二或外因傷風得之噴嚏流清涕

風傷陽其病為熱宜東垣涼膈散加防芩穗主之內因肺熱鼻流濁涕不止名曰鼻淵久而不已心白

血涼膈散加羌活川芎白芷主之

又方 荖耳散 荖耳仁兩 荖耳子錢半 白芷一兩

薄荷葉分五 未茶清調服有因胃中食積熱痰流住者當消食積用 南星炮 半夏洗 葉本 白芷 神曲炒 酒芩 荖夷

荖芥等分末姜湯調服



二症有並用辛夷膏貼之

辛夷膏 治流涕不止

辛夷葉 洗焙 細辛 二兩

木通

白芷

木香 各半兩 杏仁 一兩六分

右末入杏仁泥羊腦髓猪脂各一兩和勻於瓦器

中慢火熬成膏赤黃色為度放地上冷入腦射各

一錢拌勻塗額門土更用少許塗鼻中

鼻寒其症有二或因傷食得之者寒則傷肺肺氣下

利則塞也宜禦寒湯主之若冷氣久不散濃涕結聚

使鼻不聞香臭則為鱗鼻宜萬全膏主之凡新產芽

兒或十日一月之內勿然并塞因乳不能呼吸者

多是乳母睡時不知所忌抱兒身側鼻口中氣出吹

着兒冷氣自頤而入成鼻塞宜貼額法及塞鼻法

萬全膏 治鱗鼻

羌活

川芎

細辛

石菖蒲

木通

麻黃 各一錢

腦射 各一字

煉蜜丸艾實大服一九燈心湯化一或一用一洗

綿包塞鼻中

禦寒湯 治寒邪傷於皮毛令兒鼻塞土喘

黃蘗 二錢

黃芪 一錢

人參 五分

炙草

款冬花 各三分

羌活

黃連 各二錢

白芷

防辛 各三分 陳皮

升麻 各五分 佛柑 三錢

蒼朮 七

末葱湯調服

額法 一名通散

香附 炒

川芎

羌活

僵蚕 炒

細辛

荷葉

牙皂

用末生葱白搗膏以帛盛之夜貼額土

塞鼻法 治鱗鼻

瓜蒂

明瓦

細辛 各一分 雄黃 五分

射 少許

末以雄犬胆汁和丸綿包塞鼻中

鼻痒者肺痒也鼻下兩傍赤痒瘡濕其瘡不痛汁所

流涎隨即生瘡一名疔疔宜清肺飲化蠶丸主之

清肺飲 治肺疔疔蝕鼻穿吼汁臭或生息肉

桑白皮 炒半兩 紫蘇

前胡

黃芩

當歸

天冬

蓮翹

赤茯苓

桔梗

防丰

末水煎服次服

生黃 各二錢 甘草 二錢

化蠶丸

蘆薈

真青黛

川芎

白芷 炒

胡黃連

等分末猪胆汁浸糕糊丸麻子大二十九丸食後臨

卧杏仁湯下



其鼻昂用雄胆泡湯小筆蘸洗使藥各進數服宜

用 青黛 當歸 赤小豆

瓜蒂 地榆 黃連 蘆菖

雄黃 細末入鼻內吹瘡

鼻瘡用 黃連 黃柏 枳柳

研末以猪骨髓和敷或用青黛 槐花

杏仁 丹敷 鼻赤用 雄黃 黃丹

熱根小調敷又用 蒼耳葉 酒蒸乾

寒調服最解食毒

鼻乾者肺熱也用涼膈散加桑白皮 蜜水 木通

鼻赤者用 散又

鼻病乾黑燥者火克金也鼻昂氣喘者肺絕也

小兒山板青者多病 年上赤者有血光病

小兒腦痺鼻痒頭髮作穗面黃肌瘦用鯽魚膽滴鼻

中連三五日效 傷風寒頭痛加川芎 白芷 藜木

蔓荆子 細辛 眼痛加 酒連

羌活 防丰 柴胡 胆草

鼻病加 升麻 白芷 細辛

蘇葉 耳病加 柴胡 木香

蔓荆子 全蝎 口舌病加 石燕

防丰 咽喉痛加 玄參 牛旁子

山豆根 消風化滯除熱清痰通利七竅精神

龍腦川芎丸 氣爽

桔梗 二錢半 片腦 分六 砂仁 分二 白豆蔻 分六

五分 薄荷 分一錢三 川芎 防丰

炙草 酒炒 連翹 各一錢

味密丸每兩作二十九服則一二九茶清化下

頭病 小兒頭病亦多般 散出方書不多言

感謝岐師多指教 法晉後學作端笈

解頰者生下惟頰不合氣衰不盛也多憂多咲更白

日白睛多光白色放者多愁多喜以年久頭縫開

而不合腎主髓腦為髓海腎氣有虧故髓不滿所以

頭顱開而不合也名曰解頰丸得此疾不及于日之

內間有救歲者偶因他疾攻擊遂成廢人不可復藥

也氣色清明能飲食者多服補腎壯黃丸及調元湯

可日內須見效者火第調理或有可治若投藥石如

故亦難矣 錢氏云兒本虛性由胎氣不成則神氣不足目中白

錢氏云兒本虛性由胎氣不成則神氣不足目中白

錢氏云兒本虛性由胎氣不成則神氣不足目中白

錢氏云兒本虛性由胎氣不成則神氣不足目中白



睛多其顛而解而色既白此皆難養縱長不過二八之數若縱色欲多不過四旬而亡因病而成致腎虛者此也

家秘云解顛有二初生後頭骨漸開此胎氣怯弱腎不足也有開而後開者自顛至印堂有破痕可開一分又有頭四破成縫者此皆解顛由病後腎虛水不勝火火氣上薰其髓則熱髓熱則解而頭骨復分開

夫腎虛者宜服地黃丸以補腎之不足調元湯十全大補湯丹子共服之以補脾胃使氣血漸實其顛自合矣其髓熱者宜通聖散為丸服去硝不用外用封

顛法或用新綿紫束之有作巾遮護之久而自合亦良法也

封顛法  
防丰  
南星  
白蘇

白芨分等

末猪大骨髓搗和封顛上一日三易之

又方 鹽頭骨不拘多少燒灰存研末以清油調敷

頭縫

腦疔者頭皮光急髮結如蕪滿頭餅瘡胸熱如火肯

是也用

川芎酒 白芍  
白木酒 當歸酒 一天麻

蒼朮 蒼朮子 酒栢 酒粉 葶藶

防丰 末水煎日服四五次服後睡片時乳母宜服

迦源解毒湯 酒茶 蒼朮酒 蔓荊子 何首烏 酒 胡麻

白莢藜 升麻 末酒糊麻子大服三五十九防丰湯下 外用

敷藥 松樹厚皮 煨灰二兩 白膠香 黃丹 枯白凡 黃芩 黃連

大黃 蛇床 寒水石 各三 無名異 木香 輕粉

末熬熱調敷磨上先用椒塩湯洗去瘡痂敷之佳

又治白禿

又有兒生後其頭漸大頭皮赤光眼小此亦腦疔也

乃受父母熱毒之氣藏於腎中上薰於腦故頭大漸

紅也此難養不出二八之數其未周歲滿頭生瘡結

餅作痒依痛兒不能忍日夜啼哭者亦難養也宜服

前苦參丸及松皮散敷之

癩頭者一名白禿或父母之傳或兄弟姊妹之相受

乃遺毒之氣也初起可治待皮毛光不必治也宜服



清風通聖散除大黃另研酒蒸炒末再酒拌晒乾每  
一錢水煎熱服外用炭燒紅以長流水淬之乘熱  
按捺頭皮以前松皮散敷之

又方 胡荽子 伏龍肝 龍尾

黃連 桔白丸

未發熱清油調敷初頭土散生成庖時當帶瘡痒  
毛髮稀少有類白癩此禿瘡之根也用臘猪油搽  
之自不成白禿矣

頭填顛頤訣曰熱甚則腫虛熱則陷 顛填者顛門  
腫起骨高突也經云熱甚則腫由火邪炎土使清明

之氣土升而不降其症有二以手摸之腫堅實者此

有寒邪在表腠理閉寒熱不得出所謂氣土冲則堅  
勁者是也宜升陽散火湯此鬱則發之也如摸之其  
腫虛浮者此積熱在裏薰蒸於土所謂氣土冲則柔  
軟者是也宜酒製神芎丸此高則抑之也一發一下  
中病即止

升陽散火湯 治風寒外感或胃虛過食生冷抑遏  
陽氣脾土火鬱則發之

升麻 葛根 獨活 羌活

人參 白芍各五分 防辛二分半 柴胡八分

其草各三分  
水煎熱服令膈有微汗

酒製神芎丸 治一切積熱

大黃 黃芩 黑丑 半生半熟取

滑石 各四錢 黃連 薄荷 川芎

用無灰酒九黍米大服五九十五九溫水下

顛陷者謂顛門陷下或坑也其症有二經云陷者下  
氣虛也大病之後津液不足真氣下陷成坑窟者宜  
大補元氣調元湯加升麻主之有脾胃虛弱飲食減  
少脾主肌肉由去皮薄顛門露見非陷也宜服肥兒

九參苓白朮散補脾胃能飲食肌肉自平顛不露

矣 不有枕後陷者活切心書謂其症尤重於顛陷者此  
太虛極百無一活殊不知此非病也乃父母之過也

物生兒頭骨未合常用菜豆作枕枕之常與移動勿  
使只在一邊則頭骨不正矣此後枕骨陷下者乃兒  
卧日久之所致也若難養則頭骨四破高下成窪者  
皆非壽子也

頭仰者頭軟也頭者頭之莖也一名天柱骨頭軟者  
乃天柱骨不能任元而前後左右傾倒也此惡病也



其症有二。小兒初生便頭軟者。皆胎稟不足。腎氣虛弱也。腎主骨。脾主筋。筋不束骨。其骨則折。折則能令子虛也。此兒難養。縱長不及四旬。腎氣虛矣。宜服地黃丸。加當歸續命丸。有因大病之後。頭骨不能起者。此血氣虛弱也。宜十全大補湯。參茸九服。經云。頭者清明之府也。頭仰邪欲。神將去矣。凡大病人有是症。雖治。有病驚風者。或病瘵者。勿作頭軟論。

傷風寒痛者用細根子

黃芩半生半熟

炙草半錢

羌活

藜蘆各一錢

柴胡七錢

川芎五錢

育嬰卷之四

西

書

教

或五分一錢以茶湯調成膏抹兒口中少用白湯

下

頭搖者。頭戰者。腎風熱也。宜瀉青湯。丸加全蝎。主之。頭生胞瘡者。初因皮破成瘡。膿水不乾。頭髮粘結。內生虱。痒則抓之。年久不愈。有成癩頭。當先去其虱。用石菖蒲煎湯洗之。其虱盡死。待乾。用水銀膩粉一味。放碗中。以指研勻。入津調濕。指蘸藥。搽瘡上。四畔及髮內。風盡去。方用秋牛皮。塗口上。烟膠不拘多少。松香研末。入輕粉少許。雄黃少許。熬熱。青油調塗患處。頭生軟節者。年久不愈。用紫金丹塗之。效。方見心虛

頭之有髮。猶山之有草木也。髮者血之餘。髮之多。茂申於血之盛衰也。坎為而封血者。腎之液。髮者腎之苗也。故其色黑也。兒髮久不生。生不黑者。皆腎虛也。宜地黃丸主之。大病後其髮成穗。或稀少者。乃津液不足。疔癩之外候也。宜集聖散主之。

面疔

五臟英華面部開

知其有病望中看

色宜明潤昏枯暗

瘡癬斑痕貌不乖

詩曰。五氣人身藏於心肺。上使五色脩明。聲言能彰。

育嬰卷之四

面

書

教

則面者心肺之所主也。五臟部位。說見一卷。秋中五色者。五臟之英華。發見於面者也。肝色青如翠羽者。吉。枯草者凶。其餘照脈候。做此推之。大抵明潤者吉。暗黯者凶。五色主病。赤主熱。青主風。黃白主疔。虛食積。青黑主痛。五色所忌。肝病白者不治。謂金尅木也。病後面色白者。謂之脫色。皆死。肺病面赤者。不治。謂火尅金也。凡痢疾失色。面赤者死。心病面黑者。不治。水尅火也。脾病面赤青者。不治。木尅土也。腎病面黃浮者。不治。謂土尅水也。面浮腫者。風也。宜五皮湯。加防風蘇葉主之。



頭面紅腫者風熱也用通聖散除大黃另用酒蒸大藥同末酒拌濕晒乾如此三拌三晒或半字一字淡竹瀝調細細那之連進三五次立止以忍冬藤煎湯洗之

而皮黃中有白瘰者此傷食也宜三稜散

人參七錢半 三稜 香附一兩半 青皮 棧

並智仁 陳皮 枳殼 神曲

麥芽 半夏 菝葜 醋煮帶 山查肉

蘇葉各五分 白茯苓 粉草各半生半炙

未服一錢小者五分陳倉米百粒姜引或加大黃

青嬰春之南 東河 郭 敷

半生半煨五錢粳米糊九陳米飲下

面上生瘡如火燒用黃蠟米粉密水調敷或鴉子清和敷

兒疔瘡不愈多生於面部兩耳乳母爵白米成膏治之不過三五日愈並屏禁鴉魚

附錄醫按

小兒始病天庖瘡後發瘡發驚癩翁因育嬰書問

容症治開陳於後育書云此子先受暑濕之氣暑則

為瘡濕則為瘡又傷飲食助其暑濕之邪暑則傷心

濕則傷脾暑生熱濕生痰脾土亦虧脾木隨旺此所

為瘡

濕則傷脾暑生熱濕生痰脾土亦虧脾木隨旺此所

以為瘡為癩也瘡曰食癩火則成瘡觀其色眇白毛髮必疎痒之候也當從虛治凡瘡開日發難止謂受病深也夜發者難已謂邪在陰分必調至晝發一日一發然後可以稱退此理醫者當知今將其病細解於後

問瘡發於子午時又咬齒呻喚又努噴出大便其色

黃綠又大哭手足一撒何也答曰此肝胆病也子屬

胆咬齒者心肝俱熱肝木心火子以毋病也大叫哭

者肝病也呻喚者腎病也腎水肝木毋以子病也肝

百厥陰風木心腎者少陰君火也木火相搏則作

瘡故大便努青而出

瘡發於巳午時多而他時少其理何哉答曰巳為厥

陰風木午為少陽君火且巳為陽極午為陰生此水

火相搏而陰陽分爭之時也况瘡疾之作因暑以傷

心心木屬火火之性又旺於巳傷水乘旺陰水觸動

陽動於陰陰爭陽陰陽交戰寒暑交爭此瘡來一時

增寒一時發熱者此也謂之巳午者不亦宜乎

瘡發時頭痛惡寒顛脊強者其理何哉答曰此邪併

於太陽經也蓋膀胱所化此則陰實陽虛陽虛生外

寒陰實生內寒中外皆寒故見其鼓頰而戰慄惡寒

瘡



莫任也况太陽之脉連頭頂連風府在頭腦後行於腰脊故見頭疼腰脊強痛之症也故名寒瘧麻黃湯活太陽經之汗藥也故以為君防風乃諸藥之卒徒也故以為佐耳草能和諸藥而兼解散故以為使者方乃攻濕之劑臨病用藥不可執泥而昧於通變也瘧發時大熱大渴自汗不得眠者其理何哉答曰此邪併於陽明經也蓋胃腑陽實而陰虛陰虛生內熱陽實生外熱中外皆熱故見其煩渴而身熱惡熱莫任況陽明者胃土也蒸蒸發熱而汗出者胃之汗也通身皆出者胃主肌肉也土得熱則主燥燥則主煩

育嬰卷之四

而心腎不安故不得眠也當用白芷以解陽明之經石羔以清陽明之府知母以養陽明之陰虛也若便實者此藥不足與也宜下之後以木方調之

瘧發時寒熱往來口苦喜嘔者其理何哉答曰此邪併於少陽經也邪在表則惡寒邪在裏則發熱邪在半表半裏則惡寒且熱故令寒熱交集矣其經屬於胆胆汁上溢故白口苦胆者肝之府邪初入府裡氣逆而煩嘔此所以寒熱往來而口苦喜嘔之症見矣當用柴胡黃芩能和解少陽經之邪半夏生薑能散經之嘔人參甘草能補中氣之虛所以防邪之入裡

也

瘧有一日一發有二日一發三月一發者其理何哉答曰氣舍於皮膚與衛氣所居若衛氣者日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄是以而作此受之淺也其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內蓄陰與陽爭不得出故間日作此受之深也邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相爭故數日依此受之最深也

問發瘧之時兒常用口吃母之乳得乳即止者何也答曰此內熱作渴也兒不能言故欲得乳以解耳

瘧後汗出初發無汗退而有汗何也答曰初發時邪氣鬱寒多熱少故無汗及其退也寒去而熱盛此真氣外泄故有汗也凡治無汗者要有汗以散邪為主有汗者要無汗以養正為主此汗泄於外便瀉於內心下跳腹中鳴皆火症也肝胆從火治此其法也

瘧退時後覺頭頂上常有小汗何也答曰傾瀝者乃足厥陰肝經之脉所會處已上所開條論其大畧也若大治法當專以治瘧為主蓋小兒易虛易實病不已虛則成瘕當分二方治之一方治以平肝為主內帶補脾藥一方治瘧以補脾為主內帶平肝



之藥可收全效幸遇秋金正旺木因水衰治不難矣此疾勿庸速效幸遇五家世醫治病有法若遇粗工欲求速效則攻補妄行欲速之害可勝言哉其毋當忌鷄魚生冷諸物有衄血亦內熱也宜亟調之

加減當歸龍薈丸 治癩平肝

當歸 酒洗晒乾一錢 人參

川芎

雀腦 各一錢

胆草 酒浸

山枝仁 各五分 青皮

蘆薈 各七分

甘草

軟柳

柴胡 各一錢

半夏 大者三個泡七次切

生薑自然汁浸一時又以白凡水洗之用水煮神

有藥卷之四

卷

敷文堂

曲糊丸 粟米大二十五丸 寅郊時淡竹葉湯下

加味參苓白朮散丸 治瘡補脾

人參

炙芪

白朮

歸身 酒洗一錢

炙草

青皮 各八分

陳皮 分

柴胡

夜明沙

木香

厚桂皮

澤泄 各五分

鱉甲 九助醋炙去爪二錢

使君子肉 一錢

白芍 酒洗一錢

山藥一兩 煮糊丸 粟米大 已戌時每三十五各一

服炒米湯下

加味四物湯

乳母服

當歸

川芎

赤芍

生地 酒洗

柴胡


升麻

麥冬 木通 去皮 黃芩 酒洗 桔梗 各五分  
薄荷 分  
燈心十食後服

有藥卷之四

卷

敷文堂





同治甲子春鐫

貴池夏禹鑄先生著

# 幼科鏡

揚州文富堂藏板

## 幼科鏡序

自太極判而陰陽分天地之間有正氣即有邪氣正氣長則邪氣消正氣衰則邪氣旺消長衰旺之間天地不能自主而至人調燮之功出焉人身一小天地也方嬰兒在胎時元氣渾淪耳關節臟腑自然而成耳一離母腹即納外氣寒暑燥濕感而疾生或生於陰或王於陽陽受則入六腑陰受則入五臟而嬰

序

兒地氣漸損焉若非保傳之力藥石之功幾何而不致漸滅耶故古之至人即以調燮天地者通其理於人身自神農氏而後學者大小不一要不離乎扶正祛邪者近是然則醫之為道豈渺小哉夏子禹鑄為秋浦儒家世族早登賢書予於簿書之暇每諮而訪焉冲夷粹穆有仁者風間出其所著幼科鏡鏡子披閱一過乃掩卷歎曰信哉仁人之言其利



溥哉是集也其學閎邃其理湛深而於人身之中靡不洞燭勿使有所壅閉湫底正者扶之邪者祛之瞭然不差毫髮雖古和緩諸人何以加茲况以吾儒而兼術若是揆之和緩古今人同不同未可知也昔范文正公為布衣時就相士卜曰不得為相願為醫始為是欤夫立德立言立功古人稱三不朽夏子之道德文章固足標幟而是集得於家學淵源以公於世功焉有量三不朽蓋兼之矣

序

昔

康熙乙亥端月遊陽梁國標正夫氏題於貴

池官署

幼科鐵鏡目錄

第一卷

九賦

十三不可學

十傳

治病不可關門殺賊說

治病不可關門揖盜說

湯方內更換藥味說

面各穴圖

掌面水底撈月引水上天河至洪池圖

掌面運八卦大指正面脾上位次并腕及退下六腑圖

手背正面推上三關揉五指節圖

目錄

側手虎口合骨穴圖

脚各穴圖

全身正面用燈火圖

全身背面肺俞各穴圖

比死症辨

草溪真傳口訣

推拿代藥賦

第二卷

闡明五臟生尅以知補母瀉子

望面色審苗竅從外知內

五臟各有所司從外治內

辯臍風 以下各症未所附效案俱屬疑難不常見之症如無疑難者俱不附



辨胎寒	辨胎熱
胎毒發丹	辨胎驚胎風
胎黃	辨蒸變
辨脾實熱虛熱	辨脾濕
辨肺熱肺寒肺虛	辨心熱實熱虛熱
辨心熱極似寒	辨心熱昏迷似驚
辨燒熱	
第三卷	
聞諸驚名之謬	闡明發驚之由兼詳治驚之法
目錄	
驚癇死症辨	驚癇活症辨
辨驚有痰盛風盛熱	辨執瘧似驚風
辨癇症	辨陽瘧似寒
辨瘧病	慢症
第四卷	
麻症	辨傷風寒
辨夾食傷寒	辨腹痛
辨吐	辨瀉
辨吐瀉	辨痢疾

辨瘧疾門辨陰虛似瘧	
第五卷	
辨咳嗽	痘後
辨中暑中熱	辨失血
辨疔疾	辨夜啼
淋症	赤遊丹火
大便不通	便濁
出汗	小便不通
腫脹	黃疸
膀胱氣痛	辨三消
不寐多困	呆笑
龜背	龜胸
乾瘦似疳	解頰填頰陷
五硬	天柱骨倒
口重膠重眼	齒病口疳瘡
重舌木舌	耳癰
痛瘋	鶴膝瘋
迅雷所驚	冷水瘋
	天庖瘡
目錄	
三	



癩瘡

黃水瘡

惡核癰癧

偏墜

莖腫痛

腎囊腫

灸霍亂

灸瘡母

灸脫肛

灸肚大青筋

灸犬傷

灸蛇傷

疔瘡惡瘡癰毒百方膏

貼骨疔口掛角各疔瘡發背腦癱乳癱大人小兒同治丹

第六卷

目錄

四

藥性小引

藥性幼科摘要

諸湯方

幼科鐵鏡凡例

凡治嬰兒病不望顏色不容苗竅故病不應藥是醫惟以望

顏色審苗竅六字為大主腦

凡症俱有顏色可望苗竅可審獨驚癰癧三症顏色苗竅俱

非本來無處拿提是書洞決死生俱屬先君從百千嬰兒

中偵探出來的辨明形狀俱屬先君從百千嬰兒中體認

出來的治法藥味俱屬先君從百千嬰兒中嘗試出來的

故是書於此三症則冠以初明有曰

凡前輩圖繪各穴俱任意裁插鮮不差謬是書圖穴由兩代

凡例

考索毫不舛錯

凡症所載推拿者俱屬必效不准者如老漢扳繪猿猴摘果

之類盡行刪汰

凡症推三關必須少推腑上以應之推六腑必須少推三關

以應之防補瀉太過

凡症屬載明燈火灸俱起死回生秘法

凡症下無湯散名只有藥味者俱草溪自立方歷驗始載

凡有夏禹鑄日其中多出已見發明至理亦從治效適立說

凡症立說引喻俱屬疑團不譬不明



凡症後間附效案係症有疑難傳以較核

凡症初起不用凡散因各臟病有輕重臨症用劑必有加減

如丸散藥味分兩已定倘內有一二味與症不宜者抽不

出來模糊投入反生別病子於暫症必不肯用若用丸散

殊是症屈一家

凡口訣有古人舊訣有卓溪新訣新訣上註卓溪二字

凡字句用夾圈者是大主腦用尖圈者是認法用單圈者是

緊要

一執滯認法乃卓溪生平第一着得意處自分亦能上繩父

凡例

二

武出以傳世更當研究

一凡症大小方脉書獨不齒及多因症屬至輕邇來痲症為

患最重余每臨症只從脾肺兩臟看虛實肺臟大腸採根

苗於中創出治法一劑必效用以傳世此乃發造物未發

之秘補先輩不足之書

凡推拿古人之代藥後人竟以推拿為兒戲並不知推應

何經拿應何臟所代何藥以致輕症加重七症速死子特

賦出某推當某藥某拿抵某味使人曉得用推拿便是用

藥味藥味既不可悞投推拿又何可亂用

幼科鏡鏡卷之一

貴池卓溪叟夏鼎禹鑄氏手著

受業弟邑庠鐸禹戲

男邑庠之日孟然

全泰

九恨

一恨挑筋割肉五臟之病豈盡在筋挑斷不知當那一味藥六

淫之賊豈盡在血血出又不知退那一經邪這一種挑筋的

死後定在阿羅地獄如對子說出理來子便不憾

一恨病兒見而寒熱虛實茫然不知輒曰死作活醫藥之不效

死不任過一藥偶中活即居功死症能生對子說出理來子

卷之一

一

便不恨

一恨見兒燒熱並不知燒從何感熱自何生亂推亂拿致兒大

啼大叫汗出熱解偶爾撞著便自稱神既自稱神緣何有效

不效對余說出理來余便不恨

一恨不知症候藥與病反不曰自己用藥不當且日見母有失

護持對子說出理來子便不恨

一恨活症屢藥不效明醫一藥成功不曰自己不知且日他有

時運對子說出理來子便不恨

一恨以丸散為欺人之具其實不值一文且曰此丸此散真是



無價不論中病與否解包投服不愈則多方以藥本為解丸散既屬無價投服病胡不瘳對子說出理來子便不恨

一恨動用牛黃竹瀝貝母為除痰要藥痰有寒熱七痰見此真似滾湯潑雪寒痰見此竟是雪上加霜不論寒熱槩投兒服對子說出理來子便不恨

一恨必用柴胡退燒七熱有表裏之殊柴胡帶屬解表之味脾虛腎虛氣血兩虛諸燒熱亦用柴胡對子說出理來子便不恨

一恨用湯頭有內減外加之說加減原在湯頭內看臟腑之有

卷之一

二

虛有實酌藥味之宜多宜寡間或清病之來路塞病之去路外加一二味此是變通妙手如曰內可減外可加則四君子加兩味便成六君子十全大補減兩味便是八珍對子說出埋來子便不恨

夏禹鑄曰余生平來凡嫉我欺我負我侮我以及無故加我者輒過而忘獨於幼科庸醫而恨之但恨之有九何也常見艱於嗣息者於穹蒼於宗祖於名山禱無不至一旦舉子慶也如何及病付醫輕者重之生者死之其飲恨也又何如余抱公憤人也遂引人恨為己恨然恨之正所以覺之也覺之則

捷漢驚來轉脚傾步百尺竿頭悟到醫家三昧方見卓溪叟以九恨作醒人摩頭之一棒也

十三不可學

- 一殘忍之人必不惻怛不可學
- 一馳騫之人必無靜氣不可學
- 一愚下之人必無慧思不可學
- 一鹵莽之人必不思索不可學
- 一猶豫之人必無定見不可學
- 一固執之人必不融通不可學

卷之一

三

- 一輕浮之人必多忽畧不可學
  - 一急遽之人必期速效不可學
  - 一怠緩之人必多逡巡不可學
  - 一宿怨之人借此報復不可學
  - 一自是之人必以非為是不可學
  - 一慳吝之人必以此居奇不可學
  - 一貪婪之人必以此網利不可學
- 子以此十三種人為不可學非外之以為必不可學也苟抱此病先能自醫又何不可學之有



七傳

一兒啼哭無聲前輩俱作死症以為肺絕故也獨子先君子拿之無聲者審出肺氣未絕一藥即生而子亦經驗過歷七不爽生死關頭何可秘而不傳

驚風一傷寒一熱瘧三種相似前輩俱未能辨悞醫悞死不知凡幾獨子先君辨出驚風的模樣傷寒的光景熱瘧的認法透徹無遺一經醫治無有不生而子亦經驗過歷七不爽生死關頭何可秘而不傳

一兒左手之三關六腑大指之脾位五指之上下兩脚之左右

卷之一

四

前輩無不悞傳獨余先君悟出至理爾盡各處差謬闡出部位根源推無不效補無不應瀉無不神而子亦經驗過歷七不爽毫厘千里何可秘而不傳

一兒疥風前輩只知風入腠內以致喉口噤口卒不知風入深淺死生有异子獨悟出逆尅至理見外知內治無不退經驗過歷七不爽生死關頭何可秘而不傳

一見慢症前輩多作慢驚亂推亂拿亂搦亂火以致汗愈亡陽痛愈傷脾獨子體貼慢字不作驚治惟補脾虛經驗過歷七不爽生死關頭何可秘而不傳

一見胃有實痰藥解不散惟有取法前人取之多有壅塞喉內

不吐出又不同去因不敢取子偶見修養家作神仙大睡法眼翻氣築時於氣海穴以手指曲節抵之一放即活子因悟及取痰不出又不下者以是法行之果即下復取便出經驗

過歷七不爽此因詩悟禮觸類旁通萬病俱可因端起悟何可秘而不傳

一見有驚風痰熱虛實表裏前人俱用推拿且曰小兒肚腸脆嫩不可服藥獨子先君云急驚風痰非推拿不效臟腑虛寒非藥味莫廖此子兩代因病用推拿經驗過歷七不爽好

卷之一

五

竿鼓瑟必不相宜何可秘而不傳

一見有病前人以四季之五行按五臟之五行以藥味之四性合天時之四季其理固是然不知棄輕從重之妙如當夏宜

用黃連等味以瀉心不宜用棗仁等味以補心理也設使心經虛極或怔忡不眠或汗出如雨補耶瀉耶當夏宜用五味等味以救肺不宜用桑皮等味以瀉肺理也設使肺經熱極

或大便閉塞或熱血妄流瀉耶救耶此種學問余從不因執惟相其緩急權其標本棄輕從重不拘時令只照病醫却無不好經驗過歷七不爽深恐膠柱鼓瑟者流不敢輕用藥味



何可秘而不傳

一望見顏色不錯証之苗竅相符藥之又與病合若服一二三劑病猶照常不除又不加甚切不可因人言藥不合症半路更方蓋在我望色既真辨竅既稔效不見速無非病深藥淺藥力未到譬之舟人駕舟兩岸遼闊一時難到我既認定風色亦只把定舵牙活握蓬索一任浪湧兼天塵一塵自然到岸如把持不定在半江中或辭蓬轉舵則斷無不覆之舟子兩代經驗過歷七不爽似此成敗關頭何可秘而不傳

一兒病患舉世幼科皆於見第二指面筋紋細摹細看以形色

卷之一

六

論症候以透關决死生子兩代以醫術濟人共約七十餘年治活嬰兒不下百千萬數皆以望面色審苗竅爲主治無不神間亦摹看筋紋了無証驗似此迷津道岸何可秘而不傳夏禹鑄曰摹看手指筋紋乃醫家異教蓋指面筋紋生來已定豈因咳嗽而變爲反弓驚積而化爲魚刺腸熱而結爲流珠肝氣粗而來蛇狀之理卽曰能變能化亦不過反弓知咳嗽魚刺知驚積流珠知腸熱蛇來知氣粗而已外有何知况二指一面僅大小二腸所屬非五臟諸經並見之地卽曰並見一指長不過寸許闊不過分餘設也腸熱而兼氣粗氣粗而

兼咳嗽則流珠與反弓蛇來並相斷混請從何辨又訣曰初關午入官支退筋透三關命必亡常見筋透三關竟無病者亦有病時透三關而必不亡者此種道理殊不知解余兩代經過不驗不忍隱而不言見之者幸勿執迷不悟

禹鑄曰治病不可開門殺賊賊賊之病必有賊邪或自外至或自內成祛賊不尋去路以致內伏是謂開門殺賊如傷寒賊由外入法宜表散心火賊自內成清利爲先譬之祿山乃李唐外至之邪三思武則天內成之賊俱不開門逐出幾移唐祚賊之爲害豈淺鮮哉是知降心火而不利小便除肺熱而

卷之一

七

不引大腸治風熱而不發表藥夾食而不導消痢初起而不通利瘡始發而遽用截方凡此皆閉門之弊不第不能殺賊而五臟六腑無地不受其蹂躪則閉門之害可勝道哉有心幼科者又不可不知也

禹鑄曰治病不可開門揖盜若賊賊有虛外雖傷感悞爲表散分利惹來別症是謂開門揖盜試以脾虛作瀉論之脾虛惟恐補之不及一用分利則正氣日下而脾愈傷便來脾慢之症譬之六國之病在弱離橫合縱乃季子補救之策解約散縱自開吞并之門是亂臣亡國與分利崩靡無異理也至於



肺虛悞為發散心虛利水肝虛抑肝諸類當從脾虛分利而類推之可也

尚鑄曰在湯頭中更換藥味有宜不宜猶文字上更換字眼有妥不妥一般更換字眼有慧思鄙見之殊更換藥味亦有鄙見慧思之別如范希文作子陵祠堂記有歌曰先生之德貴李太伯在座以風字易德字洵是慧思李太白詩人烟寒橘柚而黃魯直以家園字易烟寒字便是鄙見至于醫家用四物湯以補血內有熟地若心有火而血熱以生地易熟地却是慧思若心無火血不熱而亦以生地易熟地便是鄙見此

卷之一

八

等學問只可與知者道難與不知者言也業醫道者當留心焉

萬鑄曰凡小兒病有百端逃不去五臟六腑氣血症雖多怪七不去虛實寒熱風痰病縱難知瞞不過顏色苗竅症即難辨莫忽畧青白紅黃面上之顏色苗竅乃臟腑氣血發出來的顏色之紅黃青白乃寒熱虛實獻出來的業醫者能于此處做工夫便得吾家之秘訣

面圖

太陽 男重揉些發汗 女揉些汗

太陰 男揉些汗 女重揉些發汗

推法用菘姜煎汁浸染面人大指先從眉心向額上推至二十四次從眉心分推至太陽太陰九數再自天庭至承漿各穴搯一下以代針法

再于太陽太陰或發汗或止汗再將兩耳下垂尖捻而揉之又將兩手捧頭面搖之以順其氣

再看寒熱向手推三關六腑及運八卦

隨分推胃口及揉膝推委中畢再揉井肩至于別穴看症再加揉法

卷之一

九

手正面圖

此點正對推上清小便

此處作左肱骨之極矣

以此處作三關六候

威震對掌與推至不空星齊看揉加愈矣

寒熱發推後長矣

推則從從坎入艮


精氣對掌降發痰喘

推三關退六腑運八卦男女俱在左手人以男右手為女之左手獨不思右掌无八卦若亦有八卦則震居西兌居東艮



居乾而坤居巽豈後天八卦之定理而為女子之推拿遂變其位置耶况男女心肝腎脈俱在左手若女以右手為左則心肝諸脈可在右手不

手正掌面形




兒眼翻上者將大指甲在小天心向掌心下指即平  
兒眼翻下者將大指甲在小天心向總筋上指即平

卷之一

十

夏禹鑄曰大指面屬脾西家画手掌不把大指画正面乃西家之正法前人只得以脾土字寫在側邊後人誤認以訛傳訛遂以大指之側邊為脾余故將前掌圖大指移作正面此因脾土画圖之權宜又因口訣有曰脾土曲補直為推見有曲字便把兒指一曲着則側面居正故愈以側面為脾那曉得曲補之說曲者旋也于指正面旋推為補直推至指甲為瀉此前人一字之訛遂成流弊莫救今人推之不效皆由穴之不真前人傳之已悞後人幸勿再悞

手背正面圖



此指即重按捻以逆轉也  
且此指非推往是清腎利小便

卷之一

士

夏禹鑄曰五指稍尖俱屬下前人作上悞矣譬諸草木根是本梢為末上下也不辨可知前人又每以左足為右足獨不想到人在堂居中朝上坐却是西邊為左邊如此明白顯易的道理胡為乎還錯了若女則右足為左足地道尚右也男左手直骨背面為三關屬氣分推上氣行陽動故熱為補男左手直骨正面為六腑乃血分退下則血行陰動故為瀉為涼其兩邊側裏屬陽氣陰血交界之地以此處作三關六腑推之氣血無所適從補瀉何可合用  
三關陽也何女以推上為寒為涼所謂陽極陰生是也女陰道



故從陰生處推之

六腑陰也何女以退下為執為補所謂陰極生陽是也故女從


陽生處推之

訣曰腎水一紋與後溪推上為清下補之小便閉赤清之妙腎  
虛便少補為宜禹鑄曰四臟俱推上為補下為瀉何腎與四  
臟相反蓋四臟居一身之上而腎居下腎虛則非四臟之氣  
往下以滋腎故曰下補腎水混濁則小便閉赤若再往下推  
則閉愈甚一往上提疏通水道而小便自清故曰推上為清  
此上下清補有異若不發明上下之理恐人疑推腎之上下


卷之一

七

兩字有訛則遺害不淺故識之



合骨虎口二穴圖



卷之一

七

夏禹鑄曰前人因合骨穴故画側手圖只能画一面不能畫三  
面故以三閉六腑寫在兩邊按圖雖在兩邊而推画圖之情  
兩邊原是正面後人不體其情以側手圖之側邊遂執為兒  
手正面之側邊作三閉六腑不大可怪哉古人画圖繪穴想  
無不真多因彼讀書明理家為醫道不足習上之者皆俗子  
庸夫不能揣情度理一錯看過以訛傳訛相習不察余力闢  
前謬非故示異也由幾番折肱體認得來的後之君子當毋  
以長誕日我







死症辨

前輩有死症訣然於中治之却有不死者醫家不可棄而不治  
大冲即大敦無脈是弱症屬不足直視搖頭是風症屬有餘二  
者相兼覺無此理倘有相兼不治症也如止有一斷非死症魚  
口自動忽作鴉聲此脾有痰而肝有風若祛風豁痰覺非死症  
蛔虫盡出不加燒熱補脾即安亦非死症面黃四肢腫若黃有  
寶色補脾行氣自消却非死症至于鼻門黑燥兼以肚大青筋  
手抱頭上兼以汗似油淋顛門腫起忽陷成坑只犯一宗猶非  
死症若果並見必死無疑

卷之一

六

卓溪家傳秘訣 前輩相傳不效者刪之兩代經驗過者補  
之亦有訣傳不明者出已見以闡發之

嬰兒十指冷如冰便是驚風體不安十指梢頭熱似火定是夾  
食又傷寒 握之恐不真再以兒手  
指點吾面試之不夾

以吾三指按兒額感受風邪三指熱三指按今三指冷內傷飲  
食風邪感 以上探病法

一年之氣二十四開額天門亦此義自古陰陽數有九額上分  
推義無異天庭透指至承漿 卓溪  
以指代針行血氣 此乃開  
自推法

傷寒推法上三關熱專推六腑間 卓溪  
六腑推三關應一三  
關推十腑推三推多應少為調燮血氣之中始不偏 如只推不  
應恐發熱

則動火過  
涼又有滿

啼哭聲從肺裏來無聲肺絕實哀哉 卓溪  
若因痰蔽聲難出此  
在醫家用妙裁

卓溪 病在背脊不可攻我知肺俞穴能通不愁痰築無聲息艾  
灸通神勝化工

卓溪 百會由來在頂心此中一穴管通身撲前仰後歪斜癩艾  
灸三九抵萬金腹痛難禁還瀉血亦將灸法此中尋

張口搖頭并反折速將艾灸鬼眼穴更把臍中壯一艾却是神  
仙最妙訣

卷之二

七

卓溪 井肩穴是大開津指此開通血氣行各處推完將此指不  
愁氣血不周身

病在脾家食不進重揉良官妙似聖再加大指面旋推脾若初  
傷推印應 旋字不可忽畧

頭疼肚痛外勞官揉外勞官即見功疼痛醫家何處識 卓溪  
頭壓七哭聲雄 古人只曰頭疼肚痛  
非此辨法何以知之

心經熱盛作痴迷天河引水上洪池掌中水底撈明月六腑生  
涼那怕痴

嬰兒臍腑有寒風試問醫人何處攻揉動外勞將指屈此日黃



遷入洞中

揀指五指爪節時有風驚嚇必須知若還人事難甦醒精威二

穴對拿之

胆經有病口作苦只將妙法推脾土 卓溪 口苦醫人何處知合

日頰七左右扭 古人只曰口苦非此辨法何以知其口苦耶

大腸側推到虎口止瀉止痢斷根源 卓溪 不從指面斜推入任

教骨碎與皮穿揉臍兼要揉龜尾更用推揉到湧泉 則字不可忽

腎水小指與後溪推上為清下補之小便閉赤清之妙腎虛便

少補為宜 小指正面為腎水

卷之十

六

卓溪 小兒初誕月中啼氣滯盤腸不用疑臍輪胸口宜燈火木

香用下勿遲 身不燒熱啼聲雄壯

白睛青色有肝風鼻破生瘡肺熱攻 卓溪 祛風却用祛風散指

頭瀉肺效相同

鼻準微黃紫庶幾 卓溪 奇紅帶燥熱居脾大指面將脾土瀉灶

上煎湯却亦宜 灶土即灶心焦土名伏龍肝

太陽發汗來如雨身弱兼揉太陰止太陰發汗女兒家太陽止

汗卑屬女

眼翻即指小小心望上須將下指平若是雙眸低看地天心吐

拍即迴睛

卓溪 口眼相邀扯右邊肝風動極起風牽若還口眼頻牽左定

是脾家動却痰腎水居唇之上下風來焉不作波瀾雙眸原屬

肝家木枝動因風理必然右扯將見左耳墜左去搭回右耳邊

將耳垂下扯

卓溪 三朝七日眼邊黃便是臍風肝受傷急將燈火十三點此

是醫仙第一方

卓溪 效見推拿是病輕重時莫道藥無靈療驚定要元背火非

火何能定得驚若用推拿須下午推拿切莫在侵晨任君能火

卷之一

九

還能藥燒熱常多退五更叮嚀寄語無他意恐笑先生訣不真

推拿代藥賦

前人忽畧推拿卓溪今來一賦寒熱溫平藥之四性推拿揉指

性與藥同用推即是藥不明何可亂推七上三關代却麻黃

肉桂退下六腑替來滑石羚羊水底撈月便是黃連犀角天河

引水還同芩柏連翹大指脾面旋推味似人參白朮瀉之則為

灶土石膏大腸側推虎口何殊訶子炮姜反之則為大黃枳實

湧泉右轉不揉朴硝何異一推一揉右轉參朮無差食指瀉肝

功並桑皮桔梗旋推止嗽效爭五味冬花精威拿紫豈羨牛黃



貝母肺俞重揉漫誇半夏南星黃蜂入洞超出防風羌活搽耳  
搖頭遠過生地木香五指節上輪揉乃祛風之膏非足拿大敦  
鞋帶實定掣之勾藤后溪推上不減猪苓澤瀉小指補腎焉差  
杜仲地黃湧泉左揉類夫砂仁藿葉重揉手背同乎白芍川芎  
臍風燈火十三恩符再定驚元宵十五不啻仙丹病知表裏  
虛實推合重症能生不諳推拿揉指亂用便添一死代藥五十  
八言自古無人道及雖無格致之功却亦透宗之賦

卷之一終

幼科鏡卷之二

貴池卓溪夏鼎禹鑄氏手著

受業弟邑庠鐸禹懸

男

邑庠之日孟然

郡庠之雲飛霖全泰

卓溪夏禹鑄曰萬物以土為母而人身亦然陳非宋問曰物賴  
土生有形可見人身亦以土為母何以知之曰脾屬土也而  
鼻屬於脾彼孕婦成胎先從鼻始故人稱始祖曰鼻祖以是  
知脾土為一身之母也有脾土而後生肺金肺金生腎水腎

卷之二

水生肝木肝木生心火心火生脾土此五臟相生之序也有  
生亦必有尅不尅則太旺無制故肝木尅脾土脾土尅腎水  
腎水尅心火心火尅肺金肺金尅肝木此五臟相尅之序也  
業醫者不明五臟生尅之定理則治病兼補兼瀉之法從何  
而施如脾家虛極法雖用補補之不足必兼補心苟不明相  
生之理焉知補心以補脾如脾家熱極法雖瀉脾然瀉之不  
克必兼瀉肺不明相生之理又焉知瀉肺以瀉脾生我者謂  
之母尅我者謂之賊邪如肝家虛極則肺邪乘肝補肝必兼  
祛賊賊去而肝自安不明相尅之理又焉知瀉肺以補肝舉



此兩臟餘臟皆可類推

一望形色審苗竅知表裏之寒熱虛實

禹鑄曰望聞問切固醫家之不可少一者也在大方脉則然而小兒科則惟以望為主問繼之聞則次而切則無矣經云切而知之之謂巧夫小兒六脉未全切無可切而巧亦無所用其巧問而知之之謂工小兒于未言時問之無可問即于能言者問之多不以真對是問之不必問而工亦無所用其工聞而知之之謂聖小兒初病之時聲音或不失其常至病久而氣衰氣喪而聲失聞之無可聞而聖又何所見其聖况書

卷之二

二

有曰哭聲不響赴陰君而亦有不去陰君者何無非泥其聲而不得其肺之絕與不絕故也吾故曰以望為主曰五臟之體隱而理微望從何處曰體固隱矣然發見于苗竅顏色之間者用無不周理固微矣乃昭著于四大五官之外者無一不顯中庸所謂費而隱顯之微者不可引之相發明哉故小兒病于內必形于外外者內之著也望形審竅自知其病按病推拿藥石見效之速未有不如響之應聲者內有熾曰心曰脾曰肺曰腎曰肝五臟不可望惟望五臟之苗與竅舌乃心之苗紅紫心熱也唇黑心火極也淡白虛也鼻準與牙床

乃脾之竅鼻紅燥脾熱也漆青脾敗也牙床紅腫熱也破爛脾胃火也唇乃脾胃之竅紅紫熱也淡白虛也如漆黑者脾胃將絕也口右扯肝風也左扯脾之痰也鼻孔肺之竅乾燥也流清涕寒也耳與齒乃腎之竅耳鳴氣不和也齒如黃豆腎氣絕也目乃肝之竅勇視而睛轉者風也直視而不轉睛者肝氣將絕也以目分言之又屬五臟之竅黑珠屬肺純是黃色凶症也白珠屬肺色青肝風侮肺也淡黃色脾有積滯也老黃色乃肺受濕熱疽症也瞳仁屬腎無光彩又兼髮黃腎氣虛也大角屬大腸破爛肺有風也小角屬小腸破爛

卷之二

三

心有熱也上皮膚腫脾腫傷也下皮膚胃青色胃有寒也上下皮睡合不緊露一線縫者脾胃虛極也面有五位五臟各有所屬額屬心離火也左腮屬肝震木也右腮屬肺兌金也唇之上下屬腎坎水也五臟裏也六腑表也小腸心之表小便短黃澀痛心熱也清長而利虛也胃乃脾之表唇紅而吐胃熱也唇慘白而吐胃虛也唇色平常而吐作傷胃論大腸肺之表閉結肺有火也肺無熱而便閉必血枯不可通下脫肛肺虛也胆乃肝之表口苦肝旺也悶聲著赫肝虛也膀胱腎之表居臍下氣海之右有名無形筋腫筋痛腎水之寒氣



入膀胱也面有五色一日紅七病在心面紅者熱一日青七病在肝面青者痛一日黃七病在脾面黃者脾傷一日白七病在肺面白者寒一日黑七病在腎面黑而無潤澤腎氣敗也望其色若異于平日而苗髮之色與面色相符則臟腑虛實無有不驗者矣

五臟各有所司

心乃一身之主通身皆心司之 尚主血 尚司神 如驚悸不

無因而汗身瘦不動而蒸陽物也腫 汗者心虛也 以上有病俱從心

治

卷之二

四

脾 尚司元氣 氣弱者 氣又分司汗 肌肉 消瘦者 痰 實痰動者

痰動者 思慮 過則 以上有病俱從脾治

肺 尚司聲音 物者肺虛也 有聲不出者 痰也 聲出在皮

破癢者肺燥 咳者肺氣不斂也 無聲者肺絕也 素肺

毛 尚司血 血弱者 血又分司汗 筋 抽掣者 以上有病俱從肝

治

腎 尚司骨 齒 耳 以上有病俱從腎治

脾肺內有傷皆從外入如父母慈情過愛則飲食傷脾護持疎失則六淫傷肺至于心腎肝無有傷處到成人後生情慾

多房事傷腎守錢虜去財殺傷心四長堂時忍惱傷肝乃如

之症遠近便多卓溪雖有良方惜乎鞭長莫及

霍六淫 風寒暑濕燥火

一辨臍風

夏西鑄日三朝之內便是臍風如七朝之外定然不是前人只

日風由臍入腹以致撮口噤口並不會說出一種理來余思

嬰兒出世剪落臍帶七口有水風因乘水由臍入腹然腹與

唇舌相去甚遠而唇撮舌強何故把賊邪逆犯之理一悟乃

知風入于腹始附于肝七木也風則附木而鳴目肝之竅而

卷之二

五

眼角故有黃色風入于肝必逆犯乎脾鼻準脾之屬致準頭

又有黃色入于脾必逆犯乎腎兩唇屬腎故色黃口撮入于

腎必逆犯乎心舌乃心之苗故舌必強直到此風水交感亡

之必矣予悟臍風顛末至此自問亦不自知語曰思之思之

鬼神運之殆此謂欲臍風初發吸乳必較前稍鬆兩眼角挨

眉心處忽有黃色宜急治之治之最易黃色到鼻治之仍易

到人中承漿治之稍難口不撮而微有吹噓猶可治也至唇

口收束鎖鑿舌頭強直不必治矣一見眼角鼻及入中有黃

色而唇不撮緊者由見小指抹外勞即川燈火于額門有心



人中承漿兩手大指少商各穴一燄臍輪六燄未落帶于帶口火燃既落于落處一燄共十三燄風便止而黃即退矣此火攻之法何異呂祖虛中藥虛公可生方哉願普天下為兒父母的依予看治即十百于黃億中斷無有一孩之死于臍風者

余常見大方脈書垂效案無一姓氏似屬虛誕卓溪東附錄必書姓氏斷不敢謬如有借名是書一出將何以對效案中諸君子乎兩代效集充符不能盡載聊取疑難之症約畧附之各症之未非矜已也用以資事斯道者之相較驗云

卷之二

六

長山岸友儲二有一日抵掌下偶道及從前舉子俱不育于臍風予為約日後弄璋三朝內招余過望此患可除後果如約將兒抱出兩眼畔黃色方與用燈火十三燄即退此望臍風不爽之一驗也

余邑中嶧桐居士劉伯宗先生乃郎信三指大舉燄臍風延至七日口不吹噓亦不撮緊兩眼角黃色深集溶上鼻準并溝畔黃色淡上身上微燒見之甚訝從未有臍風能延至七日者以眼角鼻上黃色濃淡揣之知其脾土稟賦甚旺風難遷入以故爾七余重揉外勞用燈火十三燄攻拔肝風于鼻

上并左右溝裏加火三燄以截去路用防風一錢煎服立愈此臍風異症之一驗也

一辨胎寒

胎寒下地後或半日一日内通面皆青如靛染口不吮乳先有啼聲後復不啼而昏迷者是也觀兒兩眼鼻準無黃色口又不吹喘定是胎寒先于精靈威靈二穴對拿緊并將崑崙穴拿緊其聲稍出即用十五元宵火斷之或聲不出亦用此火則聲必出乳必吸青色必漸退矣然此症須防作吐治寒者臍臍皆寒胃先納乳胃寒不能納故必吐治用人參一分枯梗一錢白朮

卷之二

七

三分霍香五分服之自愈亦有發之遲者胎有寒而外無感冒則遲之二三日之間胎有寒而下地復感其寒故即發于半日一日之內面必青色唇白瀉白或昏睡或腹痛或口不吮乳四肢必冷曲手握拳或啼哭不已皆胎寒也治之切勿認為臍風當以辨臍風之法辨之治宜用理中湯五加附子遲久或變為盤腸內疝治宜用勻藤膏六此症由娠母好食生冷坐臥貪涼所致

一辨胎熱

胎熱者通面大紅七雖赤子本色恐人不能辨蓋本色紅而淡



淡而正熱色深紅而燥七而色雜如滿口熱氣莽七或舌腫而紅紫口氣蒸手或大便閉結小便短赤日內紅赤此皆胎熱也如牙齦腫硬不能吸乳用銀簪于牙上下合骨處刺破出血而乳自能吸隨用連翹一錢伏龍肝二錢車前一錢煎服或用大連翹飲四此症由娠母喜睡火炕好食煎炒所致

一胎毒發丹

此症由娠婦常浴熱湯或久臥火炕或過食煎炒辛辣其候丹發頭面四肢赤色遊走不定先用天保采薇湯二表散次用大連翹飲或傷乳發丹大便閉結宜用四順清涼飲二十八通之

卷之二

八

自愈

一辨胎驚胎風

驚與風名異而症同如面青搐搦口噤身熱背強者是也若目直窺視最為難治宜先拿精威二穴并崑崙穴少頃即曲見小指重揉外勞宮隨用元宵火定之即服指乳膏六十七此症由娠母性強撒顛撲損傷心血應之于胎外復感扶風邪相觸而發

一辨胎黃

胎黃由娠母感受濕熱傳于胞胎故兒生下面目通身皆如黃

金色壯熱便秘溺赤者是也治用地黃茵陳湯七

余同學庠友方孟居舉子剛出世少頃通面青如靛染味爽呼門振袂往視知為胎寒之極拿精威二穴無聲曲小指揉外勞隨用元宵火加肺愈二燠少商各一燠即乳余知必吐頂用藿香煎之果吐與服之早食候天庭青退至亭午通面皆紅矣此執色驗症之一徵也

方姓有子通其人者生子七日內不吮乳適子在郡請別醫誤作臍風子歸要路再治見其唇燥極面色紅中帶焮燒熱亦甚揣不吮乳之故必是牙關腫硬用針于骨合處各一針

卷之二

九

血出放手即乳用連翹一錢灶心土二錢木通五分煎服即愈此望色審察之一驗也

余舅之雲同年泮友胡增奇生男四日內地距四十里許不便邀看來與余說面上黃色身有微燒子指臍風黃色必不通面因問眼內何如渠說亦有黃色勢樣予曰定是胎黃以地黃茵陳湯方授之愈此問色知症之一驗也

一辨蒸變

小兒生下三十二日一變六十四日一蒸變者變生五臟蒸者蒸養六腑長血氣而生精神益智慧也積五百七十六日乃除



蒸變必燒熱其狀似驚耳尻俱冷口內上唇有白泡如魚目粟  
米大者是也蒸變之候口唇舌色俱照尋常無異燒熱雖有重  
輕精神却不喪失口氣必不暴戾輕則三四日解重則六七日  
除不可妄投藥餌听其自愈

一辨脾之實熱虛熱

脾實熱鼻必紅燥唇必紅燥而裂牙之裏傍必掀腫而紅紫大  
便色必深黃或身熱不食或精神疲倦或熱吐熱瀉治用伏龍  
肝五錢熟石膏一錢服之自愈脾虛本無熱所以熱者虛使然  
耳初出脾虛而復傷飲食其候身微熱鼻微紅而微汗口雖渴

卷之二

寸

而唇必慘白口氣必微弱以手按之而不蒸手或食而不化或  
見食而不喜食或瀉或吐此皆虛熱之症也治宜補脾為主用  
六君子湯九加藿香有脾虛腹腫或因傷食而起以指彈之如  
鼓聲以手捺之如綿軟切不可用通藥宜用六君子湯加厚朴  
或脚腫加大腹皮如腹腫彈之不響捺之鉄硬上有青筋作肚  
大青筋論四肢俱腫作腫脹論如脾虛腹腫一用通藥十有十  
死連用六君子湯十劑自消

一辨脾濕

脾濕由脾弱不能制水水反侮土其候面闇而不澤唇腫而不  
紅或痰易動而不化或食稍傷而即瀉瀉下澄清如水或身上

發熱此脾濕症也治用蒼朮白朮陳皮白伏半夏甘草如脾土  
傷食而生痰者治用消導二陳湯加炮薑十九

一辨肺熱肺寒肺虛

肺熱右腮紅至申酉時其紅更盛或大便閉結或身熱或喘急  
而咳嗽或嗽不出而面壅赤無痰或口渴氣莽或鼻門乾燥且  
燥破生瘡皆肺熱也治宜用瀉白散三十九肺虛面色慘白外  
無感冒治宜用五味子白朮白茯苓陳皮欬冬花甘草肺寒治用  
參蘇飲三十六其肺寒及寒極似熱治法在後傷寒類

一辨心實熱虛熱

卷之二

寸

心熱額色紅燥或舌紅紫或舌紅而腫或小便赤七而澀上而  
痛或燒熱皆心熱也推法運掌從坎入艮退下六腑水底傍明  
月引水上天河治用犀角解毒湯二虛熱症面白唇舌慘淡小  
便清利口亦作渴治用人參白茯苓神遠志白木甘草服三四劑  
自愈

一辨心經熱極似寒

額不紅舌不紅腫小便不赤澀乃熱蘊于心不形于外不傳于  
色口氣如焚睡中齒如錯錯口必狂言啼哭泪多此熱極似寒  
也推法同心熱藥用犀角磨水飲之或大連翹飲四



心熱昏迷似驚

其候燒熱平常似有驚而不抽昏迷無知治用半夏陳皮枳梗

各二錢煎服後用甘草三錢連翹木通各一錢服之自愈

九思軒指大方遊萃舉子纒兩目症屬脾濕動痰傳入肺厥

乃盡呼挑筋婦挑之症加甚且日挑進了不可愈余往視之

今却無聲審音知痰入肺竅先用推拿兼使燈火隨用半夏

二錢桔梗只壳白朮各一錢服之稍愈遊萃聞予言半夏合

症重用之微動燥氣子即用赤芍等味解之全愈此脾濕動

痰挑筋無濟用藥輒效之一驗也

卷之二

七

余長女甫四歲身上微熱口說詭話且無所不說面色紫黃

唇色畧紅舌尖獨燥口氣如火精神不弱口不作渴據面色

卻是中暑但病值三月暑非其時以舌尖口氣并精神揣之

定是熱極似寒用犀角磨水一杯服之少頃一吐即愈此熱

極似寒審察探情之一驗也

辨燒熱

夏禹錫曰燒熱之因不一不可槩作風寒今照症發明人當探

肺部燒熱有五

一感冒面色寒滯兩頰或似水紅桃花鼻流清涕惡風痰壅治宜芍蘇飲以表之六十一

一受暑面色慘淡唇口舌皆淡白色四肢困倦神氣委靡白汗

煩渴或說詭話治宜用清升益氣湯六八

一本臟發熱鄰家有流行麻痘者不可悞除

一本臟有虛面色白口氣微唇舌淡色或發嗽熱必輕微治宜

用五味子麥冬冬花白朮白茯苓陳皮等味服之自愈

一本臟有熱而發燒熱者面色紅燥口中作渴鼻門乾燥或大

便秘結治宜瀉白散三九

卷之二

七

心經燒熱有二

面紅狂燥唇舌色紅紫口氣莽七小便赤治用黃連生地木通

甘草竹葉 舌白口氣微小便清驚悸燒熱微七此虛燒也治用夜神遠志甘草

脾家燒熱有三

一實熱舌唇牙床皆紅燥或破烈或碎爛或大便秘結或瀉黃

或口渴氣莽治用石膏一錢灶心土三錢黃芩甘草

一虛寒脾本無寒虛則生寒面色慘淡唇口淡白微渴口氣微

一實痰燒熱脾木有利因濕而動或兼食傷面色黯晦唇有瘰



色喉內痰勢响滑治且六君子湯加藿香九

肝經燒熱有一

一肝經燒熱面色青目眵視或驚或轉筋或兩手拳衣捻物或

多怒治用瀉肝湯六一或天保采薇湯二

時毒燒熱有一

時毒燒熱或腫頰或腫腮或身有瘡毒或頭瘡抹絲瘡愈毒

一氣歸內氣喘治用天保采薇湯二托解瘡復出仍用天保采

薇湯一二劑自愈

血虛燒熱有一

卷之二

古

一血虛燒熱面無血氣下午至夜燒熱加重唇口白淡大便常

滯而不出七則瀉瀉治用四物湯四十

子會試 都門有粵東臬司張玉川乃媛年十三歲身極瘦

弱每食只能一茶鐘許終日微七燒熱下午加甚都中醫俱

作童癆治不效延子一望知為血虛血虛必腸胃無滋以致

窄狹故不能多食用四物湯加厚朴橘紅服十劑兼用熟大

麥米為飯食半月愈此望色審竅而知血虛燒熱之一驗也

幼科鏡卷之三

許池卓溪叟夏鼎禹錫氏手著

受業弟邑庠鍾禹憲

邑庠之日孟然

男 郡庠之雲飛霖全泰

一聞諸驚之名之謬

治之當從本病辨風寒暑濕虛實痰熱

夏禹鑄曰小兒發驚而村婦庸夫多以鍼針於兒手挑筋破肉

噫異矣此孩心之村婦覓食之庸醫不知驚之為驚而誤認

為筋骨之筋也蓋驚者驚嚇也由見先有內傷復來外感肺

卷之三

一

驚寐迷心無所主一着驚而即發也若不豁痰以療驚祛風

以止學只把手筋挑斷以免筋抽不猶之止見之啼而惟塞

其口耶况驚屬心筋屬肝若挑筋以治驚便與明紀上有云

女婿牙疼灸岳母的脚後跟又何有異推前人所稱蛇絲馬

蹄鯽魚烏鴉等驚名之意無非為後之痴人立其名色告以

病表使易識耳因兒舌吐出如蛇舌遂以蛇絲驚名兒手足

撐踢如馬蹄遂以馬蹄驚名兒口動如魚吮水遂以鯽魚驚

名兒身黑如烏鴉遂以烏鴉驚名如執此以治驚則當用雄

黃以治蛇絲絆馬繩以治馬蹄香餌以治鯽魚穿楊箭以治



烏鴉方為中病之藥然筋亦有時而抽者何蓋筋屬於肝血  
行於筋氣以行血肝有賊邪則氣血與賊邪交戰而不行以  
致筋受風邪而抽掣耳故豁痰以療驚祛風以止掣乃莫破  
之理予妙法備傳較之玉官菜府之仙方枯木回春之造化  
不相軒輊凡我同人萬不可以蛇絲諸詭名執為正論垂之  
以殺有冤莫恕之嬰兒也

一 闡明發驚之由兼詳治驚之法

夏禹鑄曰驚生于心痰生于脾風生于肝熱出于肺此一定之  
理也熱盛生風七盛生痰七盛生驚此賊邪逆寇必至之勢

卷之三

二

療驚必先豁痰豁痰必先祛風祛風必先解熱而解熱又以  
何者為先乎肺主皮毛皮毛為賊邪入內之門戶彼風寒暑  
濕燥火六邪之來皮毛受之即入犯乎肺七本出熱地也燥  
火暑邪一入則熱與熱依而熱盛風寒濕邪一入肺竅為之  
閉塞則熱無所洩而熱亦盛若解熱必先祛邪前書上只云  
解熱並未說到祛邪今以祛邪之法詳之一用拿一用推一  
用燈火一用灸一用藥

驚瀉死症辨

先君初明有曰如兒體不近肥痰不甚盛不省人事張目視人

者在精咸二穴對拿緊了不知痛竟無掙聲模樣惟咬齒搗  
頭此肺經已絕肺金也如鐘磬之類空則聲亮碎則聲無治  
之無益夏禹鑄曰驚之為症七屬有餘語云寧腎有餘不腎  
不足既曰有餘胡亦有死我知之矣此乃肺氣先弱肺主皮  
毛淫邪一犯肺實變之是已弱又加弱也由肺犯肝由肝犯  
脾理應犯腎奈腎居虛位却無實地亦且水鄉風則可動而  
熱與燥火俱不得入其勢又難中阻只得又順傳入肺嗟七  
肺氣幾何而能堪此重困耶到此地位須得聚窟中返魂樹  
西域內更生香庶乎可活

卷之三

三

驚瀉活症辨

初明曰如驚痰築甚盛昏七不省人事于不抽掣時把精咸二  
穴對拿緊不咬齒不搗頭不直視人亦無掙聲的模樣將兒  
面向我以我兩手騎兒肩大指握前以第二兩指並狠七揉  
肺愈兩穴聲雖不出一掙一掙拾似那螺贏在窠中喚化螟  
蛉却不是開口叫類我類我有聲有音的樣子却是個緊閉  
着口掙不出疊七如貫珠有聲無音的樣子此乃肺被痰築  
如鐘磬中以物塞之即重扣亦不響定是活症急灸肺俞穴  
各三壯只用天保采薇湯二不必川推若發驚拿醒便知人



事即用後推法并燈火及藥

推法開天門二十四下從眉心推上髮際分陰陽九下川兩指從眉

太陰此不論寒如感寒在太陽上重揉發汗體弱感寒亦揉太

陽發汗並揉太陰以留汗使發汗在皮裏膜外之間庶免汗失

亡陽更加虛弱之弊女則揉太陰發汗揉太陽止汗隨向天庭眉心山根準頭

人中承漿各指一下以代針法男在左手三關推上三十退六

腑五六下以應之又將我兩手握兒在手掌向上手總筋八分

推六七下又在左手掌上運八卦從艮宮推往坎宮二三十迴

曲兒左手小指重揉外勞宮名曰黃蜂入洞三十下即于五指

卷之三 四

節逐一捻揉兩次在左腳委中穴往下捋三十下以上男

推左手左腳即用元宵火定之隨服天保采薇湯邪即解驚即

退而燒熱即除矣此祛邪之法也如症重燒極再加一劑從未

有不效者燒熱退定在五更鼓以上法不論肺熱肺寒肝旺肝

熱脾濕並用

辨驚有痰盛風盛熱盛

初明日痰盛發驚一驚即死不省人事抽掣輕而燒熱盛此脾

痰入肺亦用天保采薇湯內半夏倍加三四錢前胡倍加二

錢蒼朮倍加一錢夏月加香茹

初明日風盛發驚雖驚死而精感二穴一拿即甦若手足抽掣

不已一日一夜竟發數十次此肝風入筋亦用天保采薇湯

內羌活柴胡各倍加一錢半夏倍加三錢如在夏月外加香

茹一錢五分

初明日熱盛發驚其狀無異風痰只口多作渴此外邪入肺亦

用天保采薇湯內乾葛桔梗倍加二錢除以上三症外有心

經發驚之症舌必吐出其色紅燥此本臟有熱而發推法開

天門分陰陽男在左手退下六腑女推上三關男女俱在左

掌心運八卦推坎入艮掌中水底撈月引水上天河再用連

卷之三 五

薤二錢黃連五分木通防風各一錢水煎服如在夏月加香

茹

初明日驚症或驚死一二日或三四五六七日不甦即甦亦不

省人事或抽掣或不抽掣宜急于肺俞穴用艾灸三焦若一

拿即甦不必用灸只須元宵火天保采薇湯連服三四劑重

加半夏四五錢從未有不活者如在夏月外加香茹一錢五

初明日間亦有肺無痰塞拿之無聲者不搖頭張目亦是活症

此由病久亂醫亂推亂拿無所不至哭喪肺氣以致無聲如

此便知失聲之由切不可再推再拿用火用灸惟用天保藥



菽湯等分服之一劑便愈如在夏月外加香茹二錢

初明日又間有發驚昏七沉七條七直七而睡者雖不省人事

亦能自己翻身手脚曲直自如竟至十日內外不醒却又不

死此症却與柔痲相似不必推惟用拿七精威大敦中賺并

肩諸穴并揉五指節及肺俞穴以上諸穴各用燈火一燂用

彌佗僧一字係二厘半研細醋製用半杯水酒灌下再服天

保采菽湯倍加桔梗半夏即甦如在夏月外加香茹二錢

夏禹鑄曰以上驚症先君只說形狀不言色竅蓋因驚死之際

面目唇舌俱非本色如云望色必清濁難分求其治法必亂

卷之三

六

絲無緒北適南較在所不免只得把形狀辨別方無有悞

辨熱瘧似驚風傷寒

夏禹鑄曰熱瘧之燒熱與傷寒無異最難辨別看時若無真傳

慧眼以熱瘧作傷寒驚風治者十有其十即問之普天下醫

家能辨此者吾知其治無半個也予考先君效案中醫愈不

下數千人看法載用仁悉治法亦覺平常然治之必效古所

謂藥用當而通神者此也余遵先君辨法一見便知自信不

啻雙鏡照胆一藥便愈無不咳曰奇症奇醫然而無奇也人

惟辨之不真以故藥之不效今發辨瘧之秘傳我同人俾嬰

一見不苦于熱瘧厥可告無罪汗瘧醫

傷寒燒熱每日到晚不減一分不增一分始終毫不間斷只是

平七而燒不扣不驚此乃傷寒之燒熱也驚風燒熱似乎傷

寒而多一抽掣蓋由筋屬于肝七風動故抽筋肝風入脾七

助痰故驚此乃驚風燒熱之辨也

熱瘧燒熱雖同而症實有別或食淡茶滾湯或大哭大叫頭面

上必有汗一有汗燒熱即退二三分少頃又照原便是熱瘧

此一辨也

自早至晚必有一時更甚或眼泛去或手足掣一掣出汗燒熱

卷之三

七

即退獨腹上不退少頃又燒每日皆然定是熱瘧此一辨也

喉內必有痰一哭必嘔七即痰出定是熱瘧若驚風之痰盤踞

于肺必不到胃何得吐出此一辨也

醫家具有靈心慧眼者不須辨此只須一眼一望而知面色非

黃似黃非白似白精采似倦不倦而皮條七而無潤澤毛孔

爽七而不直樹兩眼睛人却像個無病的光景熱瘧昭然此

症多發于五六月七八九月之間用清脾飲四七無有不效發

一二日者定要服五六劑發至五六日者只須三四劑亦有

與作驚風傷寒治者或至十日二十日甚至一月不愈只須



一二劑切不可一劑不愈遂作別症見方而誤殺人性命  
也不知者難怪指鹿為馬在予父子兩代治之屢七不啻黑  
白分明今把金針遠度何難巧繡鴛鴦

又有熱瘧一日一發七有定期其候不冷一來只發熱或自下  
午起至半夜汗出便解手心肚腹熱不盡解或不自下午發  
不可拘亦用清脾飲四七以上熱瘧如小兒瘦怯者熱退或  
弱死去必要用六君子湯九以補脾

後例雜症余半出書傳惟于疑惑處辨之經驗者著之不效者  
則之于書所未傳見症想出治法不過十之四五獨驚類以

卷之三 八

及熱瘧臍風新法前所未傳推拿傳法亦誤予父子兩代于  
七十餘年中因症生悟由悟入神一見便知一藥便愈倘所  
謂前無古而後無今者非耶今出蘭亭真本慎勿視為風落

吳江

凡症用藥不過一二三味甚至八九味為度獨驚痢症用至十  
九味何也只因尋邪逞勢各臟為殃深入內地無不受害上  
而顛頂下而厥陰手足腹心到處波及是以攻堅削亂之兵  
不可缺一故王剪伐荆預知非六十萬眾不克正此之謂凡  
我幼科慎不可以天保采薇湯作八寸三分帽蓋人可戴也

痢症

痢雖有七種歷治惟從陰陽二痢治之為驗一痢即死咬牙抽  
掣痰壅喉內不省人事在日發者為陽痢面色光澤病在六  
腑肌表如拿不難必灸肺俞各穴三壯即用天保采薇湯等  
分各一錢連服二三劑自愈

一痢初發身無燒熱手足青冷口紫驚喘吐舌搖頭是為陰痢  
面色黯晦或從寒發病在五臟皆隨此最難治宜用固真湯

十加南星

一陽瘧兼痢

卷之三

夏高齡曰其症先有發熱一痢而死拿之即汗出稍定汗止  
又發此乃陽瘧兼腸痢也瘧是本病痢是標症急則治標先  
用天保采薇湯表散倍加半夏三錢連服二三劑再服清脾  
飲四七一二劑標本俱清即愈

辨瘧症

瘧病皆因風濕而成漏乃本而風則標若面目赤色無汗惡寒  
牙關緊急一身強硬痰涎壅盛小便赤澀一發終日不甦先  
有諸語名曰剛瘧乃風性剛急症屬于風是也治宜小續命  
湯五九去附子若四肢厥冷有汗不惡寒大便滑瀉不渴不



語名曰柔痲是濕性溫和症屬于濕也亦用小續命湯五九

去麻黃

一症如痰壅氣盛加南星半夏白茯苓以清痰枳殼陳皮紫蘇以

順氣內熱便秘用承氣湯三五以下之柔痲用附子理中湯

五以溫之六君子湯九以補之如纏綿不已則難治也如病

久而復手足抽掣如角弓反張此乃血枯不能養筋治用四

物湯四十加附子防風羌活切不可作驚癇治恐悞則殞命

矣

余外孫與內姪孫兼患熱瘧見之甚真老妻見服清脾飲

卷之三

十

劑不愈曰世上百此瘧疾致是老眼昏花錯認了予曰能辨

至四劑自愈果驗內姪孫亦以清脾飲方授持歸不服作別

症醫病益甚又來強子往視予怒極老妻慰之行一到仍檢

清脾飲二劑命服之予老友方桓綏訝曰有此奇症就有此

奇醫俱隨命服六君子湯三劑以叻去路此熱瘧認症既真

不聽阻撓之一驗也

烏沙夾臣庠程灼公子九歲時得病請予往治羣醫在座抱

兒出兩手排波肌肉膿血淋漓瘳不忍見每日夜抽掣數十

尋回壯熱不退予問曰如此一症諸位填門治胡不愈願

問各用之藥有以竹瀝墜痰言者有以牛黃鎮驚丸言者有

以天麻勾藤定驚言者有歸咎于排筋用火之為害者予不

禁掩口胡虛此症君輩不知也交口請以症示曰此陽瘧兼

陽癇也如此治法症有萬千吾不知從何處說起中一人問

曰先生認法得自何書予曰唐許胤宗有曰醫者意也思精

則得之自我作祖何書之有衆皆默然用天保采薇湯各一

錢五分半夏倍之共三兩許一服抽定燒熱減半隨用清脾

飲一劑全愈與諸醫解座此挑筋無濟望色通神之一驗也

鄰邑石埭沈若錫年五十餘僅妾出一子方二歲患病請救

卷之三

十一

於子即拿精威二穴了不出聲通身燒熱面白雖慘寶色內

存皮不輕浮光溜擦面色不應無聲據無聲卻犯死症因問

前可醫過否沈曰初起時家鄰嫗挑筋兩次又別請拿推數

次昨有人將桃柳柔枝遍身推括晚便無聲矣予揣病久肺

氣已虛屢致慘哭氣喪七氣以致無聲惟照色用劑以天保

采薇湯外加冬花一錢薄暮煎服夜半熱退此熱瘧兼癇望

色番聲之一驗也

徐聖積子患驚癇不省人事約五六日緣乃伯指大伯子曾

與子同硯席邀治精威二穴拿之無聲即向肺愈重揉聲難



不出却存鼻上貫珠掙不出來模樣灸肺喻各三壯用天保  
采薇湯倍加半夏單向大方脈素與余友善徐仲石處檢藥  
對聖緒云在禹鑄人信砒霜俱用得然好也是這一服不好  
也是這一服予臨別云服此一劑雞鳴便退燒熱果如期熱  
退二服全愈此陽癩已死採肺俞採肺竅之一驗也

庠友張孔邇增邑庠王紹宗年可二十餘歲一時癩死不省  
人事約半月餘他醫純用連芩之劑毫不見瘳遂予看治予  
以症屬大方脈固辭孔邇力迫之行一見顏色便知痰患拿  
精成二穴不應于老龍穴一指直視予予有哄也若獲裏首

卷之三

三

用半夏四錢桔梗二錢枳殼防風甘草各一錢一劑稍甦五  
劑全愈足見肺雖無聲非金碎何不可藥此中痰望形審竅  
大小皆同之一驗也

竹塘陳諱春者一子十一歲患病十餘日不知人事初人見  
其不醒以為驚死于鞋帶穴人中指咬破爛不堪請予往治  
見其唇口晦色如醬不抽不掣不渴肢冷如水治用燈火十  
五元背隨服小續命湯去麻黃一劑即甦此望色審竅而知  
為柔症之一驗也

慢症悟宗

八動曰慢者字獨曰慢症蓋此症多成于大病之後或庸醫之  
見病命遂不防守去路或初慢汗悞下吐瀉久而脾胃虛極  
故成慢症慢字緩字雖對急字而言然所以成此症者皆由  
父母急慢之故或有汗山不止者聽之吐瀉不止者聽之以  
致汗久亡陽此久亡胃瀉久絕脾成難起之疾故曰慢症慢  
症何驚之有以慢症而云驚皆庸醫見兒眼翻手掣握拳形  
狀似驚故以驚名之一作驚或推或拿或火是猶見已下  
井而後落以石也慢症者脾虛也眼皮屬脾七敗故眼皮不  
能緊合而睡則露睛虛極則脾失元氣故兩目無神而多漂

卷之三

三

泥脾敗則枯涎無統故凝滯咽喉而有牽踰之聲手足脾胃  
所司脾胃敗故四肢厥冷虛慢必生寒七則大便瀉青而小  
便清利便知為慢脾之症若療驚則無驚可療祛風則無風  
可祛除痰則無痰可除解熱則無熱可解惟脾間枯痰虛熱  
往來耳治宜固真湯<sup>田</sup>加天麻勾藤或六君子湯<sup>九</sup>加炮姜  
或理中湯五加附子

凡見一到慢症十僅能醫六七蓋症至此肺心脾三臟俱虛胃  
氣大腸兩腑俱敗若虛而不絕雖久能生如胃氣將盡萬不  
可活即強藥之亦活一二日究非真活也然非假活不足



以見藥力之妙予見之甚衆如慨然領手者其症必生脚腫  
固謝者藥亦死此無他惟于面上看腎色胃肺探消息生  
死便燎然在目矣

余幼女于壬寅冬值先君辭世之會麻症有失經理冷瀉成  
慢幼甥同症熱瀉成慢妹婿聞遠波僧精于此道呼治之日  
索藥價九如菜豆大每丸銀三錢屢服症加重予女眼閉不  
開約十餘日問乳母幸吮乳不輟面上黃色猶存予用固真  
湯加附子五分服三劑眼一開頃又閉揣之藥力未及連服  
十劑愈甥漫雖同寒熱迥別知不可治殊堪嘆予有親疎之

卷之三

古

別藥吝參附與予味反目遠波僧見子甥光景強健如故滿  
口許其必生子作色辨曰爾以健壯爲生耶獨不思熱則氣  
壯况熱瀉明知肺熱用參反傷乎肺不用則慢無治法將謂  
清肺再用參一清則脾氣即絕清不得補不得何生之有遠  
波熱然趨去越三日死此慢症雖同寒熱迥異不可不察之  
驗也熱慢不多見亦學者之所宜知

幼科鏡卷之四

貴池卓溪夏鼎禹錡氏手著

受業弟邑庠鐸禹懸

男 邑庠之日孟然

郡庠之雲飛霖全泰

麻症

夏禹錡曰痘出於臟麻出於腑麻乃大腸主之毒氣蒸肺故發  
咳嗽先輩書未嘗齒及麻症蓋以其輕而忽之也卻不知表  
症雖輕毒侵肺腑亦多與鬼爲鄰子經歷甚衆費手居多因

卷之四

不惜筆力詳著于篇以杜嬰兒麻症之患流行麻症其候燒  
熱必發咳嗽聲必稍啞面皮微有腫樣兩腮顏色微紅此吉  
兆也如<sup>田</sup>發不快及不透發或紅點見面偶挾風邪而隱或  
醫人不知誤除燒熱隱而不見腹內作痛治之神莫神於天  
保保薇湯望莫聖於天保保薇湯只須一服即發出或有不  
盡發者再加一服從未有不效者如肺臟先虛又加大腸毒  
氣攻肺面皮像澆薄的式子慘白浮上光上潤上便是肺氣  
已絕在精威二穴對拿其聲不出必是死症藥之無濟  
有麻方見點隨即收入或瀉青水審非風寒爲害唇色慘白



氣微上此乃內虛不能送毒不可分利止瀉惟用八珍湯六九以托之外用葱半斤許白酒煎過身擦之如再不透發六額上稍見些微惟用六君子湯九循上調治自愈

有麻初發熱時心火盛極刑肺金致麻不出必先用童連本通等分服之再用防風荆芥葛根升麻南星枳殼赤芍桑皮柴胡桔梗甘草煎服之即發

有痢疾兼麻症若麻見點急用香茹桔梗只壳黃連厚朴木通升麻赤芍車前煎服麻透發而治痢疾此乘輕從重之說不可不知

卷之四

二

木邑陶一公泮玉之子麻症發熱方兩日醫人悞為除熱麻伏不出形狀似驚差役請子治面色花雜喘急不嗽必有內毒于太陽穴以口涎擦之皮內隱有紅點知是麻毒內攻無燒不出用天保采薇湯倍加升麻乾葛一服額上見點色不紅起面色唇口淡無澤知為內虛即用固真湯一服通身發熱臨公驚怖子曰麻非帶熱不出仍服天保采薇湯一劑通體透發愈此見面色花雜便知內毒之一驗也

培經樓同學序友方恒綬一子麻症隱而不山形症甚凶邀子治見其面色慘白口氣微冷唇舌淡白大便泄瀉即用八

珍湯一服額稍見點恒綬因姪前麻症殞于泄瀉力迫止瀉子曰分利更虛不允見口吻間覺以瀉閉性命勉強用五苓散果止而額上紅點即隱又用十全大補湯內托外用菖酒蒸引卒不透發于值事往郡歸後札示皮上每發一泡破即成黑窟附他醫攻毒方單子札復曰肌肉脾腐破即成窟乃脾虛之極何可攻毒惟用六君子湯顧脾為主果效此望色審數萬無一失分利虛脾即此可見之一驗也

卷之四

三

思誠堂同學友措大方薪衍第五郎患麻症初醫者不知麻候用六一散以除燒熱邀子過治見其舌純紫兩唇燥裂大小二便皆秘聲嘶不已即用黃連八分木通黃柏各一錢服下大便刮白如冷痢然在座者口吻覺為涼劑所致子亦期附滿志豈臟腑苗竅此症獨不相符毫不首鼠問前醫退熱所用何劑薪衍曰六一散子便恍覺下元為六一寒冷所滯致火不降灼無疑矣隨以炒鹽久熨臍下仍用前味黃連倍加服之方下大便燥結與濕熱無異可見苗竅辨真治定不爽之一驗也

一辨傷寒

附寒極似熱

小兒之十指俱冷以三指按額俱熱身壯熱面赤而淡不動不



掣此傷寒之症也表散法開天門分陰陽推三開體厚則大發其汗揉太陽并外勞官運八卦推良入坎症一之目愈重則用元宵火定之體弱隨發汗隨止女反是治用芎蘇飲

〔六十一服之〕有寒極似熱者面色紅如水紅桃花口渴而唇不乾燥舌不紅紫大便青色小便清長此寒極也似熱者因面有紅色口有渴形故也治之與前法同

如口作渴大便秘小便赤是內有熱而外傷寒也宜先表外而後清裏為主表用芎蘇飲六十裏用白茯苓夏陳皮連翹木

卷之四 四

通枳壳甘草煎服

本郡田三公祖之公孫方二歲抱風寒燒熱症郡醫見燒有驚悸便作驚症治數日不愈予以三指按額俱熱兒十指俱

冷用芎蘇飲一劑留飲席未解內小童報曰小相公熱退矣此燒有表裏不可不辨之一驗也

子於癸丑科會試盛京有鑾儀衛正堂許公乃係方歲半患傷寒症初延太醫院幼科失表後于朝房內予同里員外

郎陳是菴道及于予即日來貴池館親邀往治但見身冷如水振毛差七面色慘晦不知人事知寒邪內伏用大保赤散

湯一劑囑曰夜發熱則明日來治不則莫可如何矣夜果發

熱仍用前湯一劑熱又解許曰發熱退熱藥同效異真出有也予曰尋常症在表感一劑便解如令公孫邪被藥伏內

昨一劑攻邪七到肌表化兒邪自是作熱仍以原方加進一劑表解熱除無甚奇也許曰前是菴倫道年翁乃幼科自肩

合若此洵名下無虛矣以百金壽子辭曰晚兩代治救嬰兒從不受謝一文再四面壁更欲

延請入太醫院又辭曰老母在堂晚在都門白雲願望承盛意心領之可矣許乃止此開門殺賊之一徵也

卷之四 五

方伯亦存儒初生有公郎抱驚風患初郡中醫往來食用消導劑症加甚後子用半夏四錢生薑一錢防風二錢一服即

愈遂拜子為假父此藥用當而通神之一驗也子邑張中尊媛患病邑中醫曾治十餘日不愈會余到邑中

尊得聞接余治婢方抱出離座五六步外望見面上光七浮七毫無寶色余曰不須抱近請回中尊問症若何余曰肺氣

已絕不可治矣明日果死此望色而知為死症之驗也一辨夾食傷寒

小兒十指俱熱我按見額三指俱冷其候身熱或吐或瀉或不



吐瀉口必惡食腹必浮脹拍如鼓聲或作痛是也推法開天  
門分陰陽男女同男重揉太陽發汗體弱揉太陰止之女反  
是推上三關三十退腑六七下運八卦重揉長官子大指面  
旋推補脾曲兒小指重揉外勞子第二指大腸位側推到虎  
口以止瀉不瀉不推重按中指一節以止吐不吐不搯子  
左脚湧泉穴左轉揉之止瀉不瀉不揉少頃右轉揉之止吐  
不吐不揉女則右轉右揉止瀉左轉左揉止吐推畢即用燈  
火臍輪四焦胸口一焦用水酒麩一枚火煨黃色研末白湯  
送下即愈重則用消導二陳湯干九加柴胡紫蘇等味煎服

卷之四

六

疳山孝廉方韻皇乃孫發吐燒熱微掣吐輕熱重余子壻方  
平培初業斯道投天保采薇湯一劑不效邀予一見知為內  
傷飲食外挾風邪用藿香正氣散一服即愈余以湯名曰天  
保采薇取其治外治內之意用之不當雖多奚為在子壻以  
為症屬內傷外感湯屬內外並治渠見不為非是然不知症  
似社鼠城狐重鎮何可輕發此學者之所宜知而宜慎也

一辨腹痛

腹痛臍以上屬火臍以下屬寒其因不一有寒痛熱痛傷食痛  
積滯痛氣不和而痛脾虛而痛肝木乘脾而痛蛔動而痛數

種寒痛則面白口氣冷大便青色小便清利痛之來也遷緩  
而不速疾痛則赤口氣熱口渴唇紅大便秘小便赤時痛時止痛來  
是也推法曲兒小指重揉外勞宮推上三關揉臍五十藥用  
干姜肉桂等分煎無如木香磨水入服之自愈

熱痛則面赤口氣熱口渴唇紅大便秘小便赤時痛時止痛來  
迅厲腹形如常不腫不飽彈之不响以熱手按之其痛愈甚  
肚皮滾熱此真熱也推用下六腑水底撈月蓋熱痛主心脾  
兩熱用燈心車前伏龍肝加木香磨水稍許入服

傷食痛者必惡食眼胞必浮腫或瀉下酸臭腹必飽脹彈如鼓

卷之四

七

聲或身作熱是也如氣不旺者不宜取瀉只用消導二陳湯

十九

積滯痛者今日傷明日傷逐日傷之而滯于脾胃間不以飲食  
得其傷不痛既有滯而傷以乳食傷碍故痛也面色黃噯氣  
酸大便酸臭便後痛減足冷嗜臥不思飲食是也治宜枳壳  
兵榔木香下之之後即以小異攻散下六補之

氣不和而痛者見下地後或地多濕兒臍受風以裹肚束臍過  
緊不知兒體漸長束帶未鬆則上氣不通下氣以故內氣不  
和故作痛也審其非寒非熱問其母而臍果有束縛之態



氣不和之痛必矣治以木香磨水服之隨用燈火臍輪

疝下氣海一熇心口窩一熇其痛即止大兒之氣不和者其

候眼胞不腫面色不黃飲食如故腹臍擊如鼓聲搖其頭而

噯氣是也宜川木香陳皮枳殼甘草服之

脾虛痛者其候面無血氣微黃帶微白大便少而色白治以補

脾開胃為主用六君子湯九加橘皮

肝木乘脾痛者肝木尅脾土虛不勝其尅則肝氣無所洩故乘

脾之衰而作痛也其候唇白口中色淡面多青色痛則腹連

兩脇重按其腹則痛止起手又痛是也治用四君子湯三十

卷之四

八

加柴胡白芍

蛔痛者腰曲撲身口流青涎痛久不歇少頃又痛或一時或二

時而止或歇半日又痛而黃唇白此蛔痛也治用史君子去

殼火煨吃十餘粒少頃又吃即止以上嬰兒腹痛口不能言

何以知之蓋兒痛必哭無故而哭者痛也哭聲雄慘而雙眉

蹙皺是也如使君子食之不止不妙於苦練子樹根皮約一

二兩許水煎一茶鐘吃下虫即盡出但體弱者不可輕用

又有一種奇痛一痛只大叫幾聲痛七七即抱胸暈死子家

一婢犯此症先君在日子見將婢面撲地用冷水一盆以婢

擦着水上于委中穴澆水狠拍粗筋腫起用銀針傍筋打入

二針七出血流斗一聲痛即避隨用冷水滾水各半連吃一

二碗立愈記先君曰此急沙也與轉筋火差似如平常腹痛

從未有一痛而即死者急沙之辨緊記在此

夏禹鑄曰嘗觀內經有曰胃虛則吐胃熱則嘔此說殊屬大

謬何也余屢見吐七固有虛常亦有熱嘔固是熱卻亦有

寒此子匪非議前人蓋見之多而治之效也二症各有虛熱

不可拘執惟望面色唇舌之間紅則熱而淡則虛斷無有悞

至于泄瀉出少而緩曰泄出多而勢急曰瀉泄則症輕瀉則

卷之四

九

重凡以所瀉之色驗之治無不效

一吐

胃虛發吐其候面白神疲不熱不渴口氣溫和而帶微冷額前

微汗治宜助胃膏二十二

胃熱發吐而赤唇紅煩渴溺赤口氣蒸手宜用熟石膏七分八

分研細末神茶送下

胃氣不和發吐其候惡食此由積滯在胃復為傷食搗見之頭

便噯氣治用火酒曲一枚火煨黃色研細白湯調下用枳殼

木香陳皮半夏香附服之



有盛夏外感暑氣吐者宜六和湯二土

有霍亂而吐者吐不出者手足厥冷臍腹之上絞痛名曰轉筋

火治用滾水一碗冷水一碗相和飲下即愈

有內傷飲食外感風邪而吐者身熱眼燒疲倦治用藿香正氣

散七土

有傷風嗽吐者治用清金飲五八

一瀉

夏時鑄曰吐從面色辨之不爽瀉更宜辨所瀉之色暴傾下延

屬火水液澄清屬寒老黃色屬心肺脾胃熱宜清淡黃色屬

卷之四

十

虛熱宜補青色屬寒宜溫淡白色屬脾虛宜補醬色屬濕氣

宜着木燥濕酸臭屬傷食宜消二陳湯十九

脾虛作瀉七下白色或穀食不化或水液澄清其候面神疲唇

口慘淡舌白口氣溫冷治宜理中湯五加附子或六君子湯

九

脾熱作瀉七時暴注下迫便黃瀉赤口氣蒸手煩渴少食治宜

五苓散十八加山梔仁

有氣虛下陷瀉者宜補中益氣湯其候與脾虛差同

有傷食兼滯瀉者其候噎噎氣吞酸服滿一痛則瀉一瀉痛減

治宜用大腹皮神曲麥芽山楂白朮木香檳榔如食已消痛

已止而瀉不止者乃脾失清升之氣宜補中益氣湯三七若

食消而腹猶痛乃脾痛也宜小異攻散十六

有肝瀉者瀉青稠粘乃肝木乘脾治宜麥冬桔梗白朮白茯苓

參木香酸棗仁甘草

先瀉數日已止又瀉隨瀉此症多不可治蓋瀉而又瀉脾敗

之極加之外邪由脾起肝上有動風危脾已敗將死不受肝

尅故肝風烈極毫無泄處如祛風解熱元氣將盡將謂療驚

不能救脾將謂救脾驚不能止無法可治

卷之四

十一

一吐瀉

夏時鑄曰內經有曰胃虛則吐脾虛作瀉脾胃俱虛吐瀉兼作

此言極謬若先泄後吐面白神疲不熱不渴額有微汗乃脾

一胃虛寒也宜理中湯五或小異攻散十六或六君子湯九若

一先吐後瀉面赤唇燥煩渴渴赤乃脾胃有熱也治宜五苓散

一十八加竹茹煎服又有積滯在脾不能運化水谷而吐瀉者

宜用消導二陳湯十九

有長夏夾暑吐瀉者宜用六和湯二土

余影年硯席友陳公載嫂患吐瀉逾余抱風寒因延大方脈



用溫胃痢吐益甚帶疾往視其唇紅灑氣出蒸手舌色紅紫  
用熟石膏一錢研碎神茶一碗送下稍止隨加一服立愈在  
大人苗數尚驗况嬰兒乎後又患吐色竅俱同仍用石膏卻  
不甚應揣之下元或有寒氣用炒鹽熨腹仍服石膏即愈可  
見苗竅顏色從不一悞

余于歲癸丑北上到會館湊陳是菴幼郎脾瀉將慢付予治  
問曰曾服參否是菴曰如服一分便爬了上壁予心以為南  
北或亦有異轉思初到

都門恐孟浪來謂以六君子湯去人參連服二劑了無一效餅

卷之四

三

接別醫良久一醫擁輿至館去後予請所發劑視之劑屬消  
導因問彼何人斯是菴曰此名震

京都之鄭小兒科也予曰久瀉將慢尚可再用消導之藥用之  
命不可知矣乃止予便不以是菴之言為正硬用六君子湯  
倍加人參且外加附子五分兩服即愈是菴歎曰素聞妙手  
今果然矣此辨色審竅勿以人言為信之一驗也

一辨痢疾

夏禹鑄曰丹溪云痢無止法以通利為主此言亦不盡然何也  
痢疾有寒有熱白者虛寒也紅者實熱也治宜調脾為主若

梁一二日間身壯熱膿血稠粘裏急後重腹痛者宜用承氣  
湯三五以下之或用木香兵榔九二六若虛怯者不可下痢  
久身涼自汗宜用補中益氣湯二七挾熱而痢純血宜用四  
順清涼飲二八或黃連芍藥湯十七挾冷而痢純白或乳食  
不消者宜用理中湯五有濕熱之毒熏蒸清道上致胃口閉  
塞而為噤口者宜用人參黃連石蓮子有痢久胃氣虛則不  
能乳食而為噤口者宜用理中湯五或六君子湯九有積毒  
之氣上冲而嘔惡者宜用人參敗毒湯二九有胃氣虛寒而  
嘔惡者宜用附子理中湯五有痢後脾虛不能制水而偏身

卷之四

三

浮腫者宜用六君子湯九外加蒼朮厚朴猪苓澤瀉黃連芍  
藥有痢久脫肛者經曰肺氣虛寒由脾虛而金無所養故大  
腸虛脫而下陷也宜補脾溫胃用固腸飲六五有積毒而痢  
久不愈乃脾氣下陷宜用補中益氣湯二七或四君子湯二  
十若初起宜用姜茶散三一有寒暑熱而痢下赤白相兼者  
用清暑益氣湯六八加香茹飲五五

子長男之日五歲時與幼甥同患痢疾男素脾弱痢起腹血  
不痛痢下純膿白色中帶藍色口氣微冷不用通利即以六  
君子湯服之甥痢純紅偏身有風疹用四順清涼飲加防風



柴胡兩藥各器同爐煎烟家悞以男藥與甥服之風疹即隱  
氣喘促喘射予急以大保采薇湯與服疹復出喘止仍用前  
湯數劑愈此可見脾虛之極不必清利硬用補劑熱痢宜清  
不可用補之一驗也

一辨瘧疾

瘧疾皆由冒感風寒暑濕而發丹溪有曰若無汗要有汗以散  
邪為主若有汗要止汗以扶正氣為先此千古不磨之至論  
也發時有一寒一熱身重骨節疼痛自汗多嘔者濕瘧也由  
汗出脫衣衝冒風寒或渴極過飲冷水或冷水浴身所致有

卷之四

齒

食瘧者食所傷由飲食過度傷寒所致俱用柴胡前胡青皮  
陳皮蒼朮白朮白茯苓甘草猪苓澤瀉知母貝母厚朴半夏黃  
柏等分姜棗引服一劑以清之于發瘧日之五鼓空心以前  
方加恒山栝榔草菓仁等分煎服以截之即愈如久瘧不止  
致中氣弱極名曰脾瘧用四獸飲三二加棗姜服五六劑自  
愈

夏禹鑄曰有陰虛似瘧竟作瘧治者這般人卻沒有一毫心思  
一錢想頭夫謂之曰似則兩症相去原是星淵即口似瘧亦  
祇似其瘧之脾寒試問普天下人可有瘧一起而就成脾寒

者是必始于清之無法繼又截之無方或從不服藥相延日  
久纔到脾寒之證明七有這一條來路若一見每日不午身  
有潮熱冷狀颯七便作瘧治獨不想到瘧有來路况脾瘧由  
重戒輕陰虛由輕加重兩症判然竟不知別此二種心竅試  
取黑漆皮燈籠與之相况當耶不

陰虛似瘧如潮熱稍重于作寒治用四物湯四十加入參如心  
肺肝有熱雖湯內已有熟地再外加生地如作寒稍重于用  
熱四物湯外加黃芪人參甘草等分參減半如潮熱作寒俱  
輕只用四物湯不須外加如女忠此加紅花二三分

卷之四

七



幼科鐵鏡卷之五

貴池卓溪夏鼎禹鑄氏手著

受業弟邑庠鐸禹懸

邑庠之日孟然

男 郡庠之雲飛霖全泰

一辨咳嗽

以馬鑄曰前書只說風寒暑濕燥火六淫之邪氣侵肺皆令人

嗽又曰五臟六腑皆有嗽非獨在肺此僅言咳嗽之大綱卒

未透發六淫侵肺之顏色與臟腑俱嗽之分別予憶其故必

卷之五

從大方脈書上採來惟照脈論症故不說到六淫侵肺的顏

色亦未分疏臟腑致嗽的根由即言一二形症俱屬模糊子

把六淫侵肺臟腑皆嗽這八個字上一一體出形色歷藥不

爽若風寒濕三邪侵肺其候面白而畏風燒熱而無汗或頭

疼或鼻流清涕唇色晦闇痰涎白色或滑而易出小便清長

便知為風寒與濕氣所侵宜用疏風順氣湯七一或清肺飲

七二去白朮加防風便愈

火侵肺嗽與火炎無制相同方以後若燥侵肺嗽其候頭面汗

出寒熱往來皮膚乾燥皮疥搔癢大便閉結痰涎膠粘治宜

潤肺清金之劑用麥冬貝母冬花黃芩防風麻仁甘州赤芍

一揀皮骨氣侵肺而嗽其候口渴唇淡治宜香茹厚朴扁豆加

冬花麥冬至於六肺皆嗽之說殊屬大概子着實窮究六淫

之外嗽又有五一瀕傳一逆尅一反侮一隔經傳染一水火

不相交濟

順傳之嗽在脾上不能生子金無土養故嗽漢武帝金鐘自鳴

東方朔曰土其母也母喪則子鳴山必有崩者久之蜀郡有

奏山崩以此悟之脾虛肺嗽乃一定之理其候唇口慘白氣

喘神疲小便清短大便或溏瀉淡白色便知脾嗽治用六

卷之五

君子湯自愈九

逆尅之嗽在心心火盛則金被火傷而嗽試觀冶人煉金火烈

而金躍息火則金安嘗閱徐無猜地理闡宗書有曰如金星

結穴火星作朝此外火尅內不為吉穴須兩旁有水星山現

則制火以救金始為吉因此悟火尅金沸亦一定之理其候

舌紅唇燥小便赤澀口氣蒸手便知心火尅金法惟瀉心用

貝母陳皮甘州黃連木通杏仁麥冬五味等分燈心引煎服

三四劑自愈

瀕尅之嗽在肝上有制伏肝始不旺如肺弱木強侮金則肺乃



一被侮而嗽星士家書云我尅者為妻財乃知肝猶肺之妻也  
一彼河東獅吼必因夫主柔弱便恃強侮夫肝侮肺嗽又一定  
之理其候目勇口苦宜用白芍柴胡冬花五味枳椇半夏甘  
州等分煎服五劑自愈

水火不相交濟之嗽由腎水不能上升則火炎無制乃上刑肺  
金而嗽猶之易之未濟離火居上坎水居下水不得火而無  
一功火不得水而功亦無所施水火不相交故不各得其用若  
既濟則為有用矣况五行惟火最烈故昔有慾火無制口中  
吐出祇廟俱焚者由此觀之豈止嗽耶其症涕唾帶血甚至

卷之五

三

血溢治用滋陰降火湯四五二三劑自愈屢治屢效案難悉

載

一隔經傳染之嗽在胃上有熱因染乎肺而嗽肺胃各經順傳  
不到逆尅不及又不相侮胡為亦嗽乃由胃肺逼隣胃司食  
入肺司氣出入雖不同途卻共呼吸門戶胃熱熏蒸波及  
肺竅所謂失火殃魚亡猿災木者是也其候唇紅口紅作渴  
氣出大熱治用石膏冬花麻仁五味甘艸  
以上諸嗽如喘加麥冬天冬如咳有聲無痰加杏仁防風有  
聲有痰加半夏枳椇

一余于本經咳嗽外復將此五種旁引由愈無非為嗽雖出自  
肺家而卻有隔經之嗽理實難明故不惜多方以譬明耳幸  
毋以厄言罪我

江平世業醫道地距四十餘里一孫咳嗽自藥不應以形色  
一札白之子併來藥單乃瀉肺之味據曰面舌唇口皆紅小便  
一赤色子札復示以瀉心之劑後開三劑愈此心火刑金瀉心  
救肺之一驗也

一痘後痘有專科痘中症候不載惟于痘後至緊要症附傳數方

一泄瀉唇口淡白瘡靨平白小便清宜用六君子湯九

卷之五

四

一痘瘡靨平白宜用保元湯十一

一痘靨不落七過者亦平白宜用八珍湯六九

一痘中眼内生翳子宜用芫荽焙之為末每服三四錢白水送  
下服至升餘即散

一痘後瘡靨或紅腫紫腫黑腫急宜解毒用生地連翹歸尾甘  
艸赤芍等服三四劑毒自解

郡城孝廉危東原兩痘痘後一愆期不收一收後痘靨平白  
俱有微熱遊子過治見唇口慘白氣出微微并用十全大補  
湯服二劑熱除靨脫俱轉紅潤隨以保元湯十一調服之愈



此望色審察知血氣兩虛之一驗也

一辨諸血

肺朝百脉之氣肝統諸經之血蓋榮血者水穀之精氣也脾胃有傷榮衛虛弱故血失常道而妄行若氣虛氣弱神瘦唇有

血色者治法宜用四君子湯三十

血虛者精神照原唇舌無色治用四物湯四十加參朮藥前見

血為近血用黃連解毒湯十七藥後見血為遠血用清胃湯

四二久不止者用補中益氣湯二七加胡黃連

吐血者胃中積熱宜麥門冬飲四一或清胃湯四二

卷之五

五

衄血者脾熱傳肺而肺不能統血從鼻出宜六君子湯九加枳

梗當歸梔仁黃芩

咯血者腎虛也咯如牝雞喚乳雞聲嬰兒無此症一

有咳嗽而吐血者庸醫多以童子癆治之悞矣此乃腎水心火

不相升降火炎無制治宜滋陰降火湯四五

夏禹鑄曰諸般失血有面色可審俱屬尋常惟血脫嗽血二

種症不多見附錄效案以憑較證子友陳公載姪女七歲血

吐數升身冷如水通身筋現青色平常撲跌處青更甚唇口

慘白口氣微冷此乃氣虛血脫初大方脈作肺熱迫血妄行

用梔仁黃芩等味吐愈甚此固照理用劑卻不知看色之妙

後子用人參黃芪肉桂麥冬甘艸白朮三劑而愈此氣虛脫

血望形審察之一驗也咳嗽帶血方見咳嗽類用滋陰降火

湯四五屢用屢效症無疑二故不附案

一辨中暑中熱

夏禹鑄曰前輩云動而得之為中熱靜而得之為中暑此言甚

是然中暑與中熱病形無異中暑作渴中熱亦作渴中熱說

詭話中暑亦說詭話若不細審形色雖得動靜二字究何益

也如採中暑說詭話乃低聲平正而說中熱發狂雄壯而說

卷之五

六

此猶恐不得其真只于口中一看舌色慘白唇無血色口氣

微弱而冷便是中暑宜用清暑益氣湯六八立愈若唇舌皆

紅氣出如焚小便赤澁定是心經中熱宜用木通薄荷煎熟

再以犀角磨水一杯羚羊角磨水半杯入煎藥和服即解

已亥歲子從伯一孫方四歲患病初伯與先君交惡已久伯

母呼子往治舉至阻撓且畏之曰彼孫一死禍來匪輕子曰

具有兩眼不煩過慮視之口氣微微面色慘極唇舌白淡口

道誕話知為中暑用清暑益氣湯一服愈

穿山郡庠方紹文僅一子乃子培十七歲抱疾以子只知幼



科延兩方脈共治彼見口說詭話便作熱治用盡犀角翹連  
本膏涼劑疾益加甚急問于予予往見直臥如尸口氣冰冷  
唇舌皆白乃中暑之症悞作中熱大可怪也用清暑益氣湯  
一服立愈此大方脈切脈不如小兒科望色辨疑為妙之一  
證也

一辨夜啼

夜啼有六一面深紅多淚無燈則啼稍息見燈則啼愈甚此心  
熱也遇火兩陽相搏故見燈而啼甚也其候手腹必熱小便  
赤推用水底撈月引水上天河退下六腑及運八卦推坎入

卷之五

七

良藥用導赤散三加梔仁薄荷天珠

一哭多睡少天明則已面色青白便亦清白治宜溫下焦用備

急方七四

一為異物所侵目有所視口不能言但雁中驚悸抱母大哭面  
色紫黑治宜陳皮生姜扶神遠志甘州服此仍啼當審其果  
不犯諸夜啼等症可將雜色紙作一異物狀令見一視即對  
見以火焚之兒疑頓釋自不啼矣

一有脾胃兩虛吐瀉少食而啼者治宜用六君子湯九加炮姜

木香

一有心血不足而啼者其候腫濃忽悸舌色淡白而色不重宜  
用安神湯四八

一有臟寒腸痛而啼者以手按其腹即不啼起手又啼此候而  
必青手必冷口不吮乳治用當歸白芍人參甘草桔梗橘皮  
等分服之外此而啼者必非病也或夜醒時為戲燈所慣無  
燈而啼者有之或乳母缺乳而啼者有之

一辨疳疾

疳者乾而瘦也此由寒熱失理飲食不節或因吐久瀉久痢久  
瘧久熱久汗久咳久瘧久以致脾胃虧損亡久津液而成也

卷之五

八

心疳者面黃頰赤小便赤滿口舌生瘡煩渴治宜寧心九五

肝疳者肌肉消瘦目胞赤腫翳生泪多白膜遮睛傷多青色治

用肝疳九五一

脾疳黃瘦腹大或吐土吃米吃茶宜調脾湯十三

肺疳潮熱喘嗽鼻爛流涕宜先用清肺湯七二次用化愚九五

疳腫者乃由疳久脾衰不能制水故頭面四肢發腫脹甚者禡

子九五三大疳者不治

丁笑腹大項細喘露翻食吐蛔宜蘆薈膏九十五

一赤遊丹火



此候田內有積熱重蒸外被風熱所感搏於血氣皮膚赤腫色如火灼或注頭上或發肢體卻非輕症入腹入腎亦能殺人宜速治之用升麻黃芩連翹各一錢大黃朴硝各二錢全煎服四五劑自愈

余同袍胡道生乃孫頭患丹火接余治用前方服二劑不退又以价來請余以札復曰此症非輕非一二服可愈宜重用各味五六劑定然見效後如數服愈前歲余宗人有一女患此症余囑曰此重症也、可息緩不聽果死

淋症

卷之五

九

有沙淋者腎水為熱所結化為沙石內塞水道沙出痛止治用

五淋散四六氣淋者小腹脹滿小便更澀滯而痛用瀉白散

血淋者心熱血散治用五淋散四六加小蘗滑石車前子寒

淋者膀胱冷氣與正氣交爭寒戰而後溺治用六味地黃丸

十四加附子肉桂有心熱者用清心蓮子飯五六腎熱者用

六味地黃丸十四肝熱者用柴胡梔子飲六四脾熱者用蓮

黃散三八脾虛者用小異攻散十六肺熱者用瀉白散

肺虛熱者治用小異攻散十六加炒山梔

以上心熱等七種淋症辨法在辨脾心肺肝腎之坎內求之

便溺

尿白如米泔水久則成疳用人參甘艸當歸木通猪苓赤芍赤茯苓青皮川草辨治之

大便不通

肺與大腸有熱七則津液少而便閉治用四順清涼飲二八血虛燥滯不通者治用四物湯四十加栝子仁松子仁胡桃仁等分服之

同邑紳徐梅宜公即痘後四十日大便閉有七日他醫以承氣湯單授之子昇氏時在徐宅力薦請予往視之日血虛之

卷之五

十

極幸未通利通則不可藥矣梅宜且幸且疑硬用四物湯一服便出乃溏糞帶白色梅宜拍案叫絕曰一望即知神何至此前庸手幾敗乃事此望色審察知非肺熱之一驗也

小便不通

小便不通由肺燥不能生水當清肺中之熱而滋腎火之源治

宜用黃芩黃連天花粉知母麥冬茯苓木通甘艸等分服之

若脾濕氣不土升當健脾生金先用瀉黃散三八隨用六君子

湯九若膀胱有熱澀滯其流治用五苓散十八

出汗



汗者寢中通身如浴覺來方知屬陰虛榮血之所主也治宜  
四物湯四十加黃芪浮小麥黃連煎服有自汗者不時而出  
動則乃息屬陽虛衛氣之所司也治宜補中益氣湯三七加  
麻黃根浮小麥七門冬煎服有脾虛泄瀉自汗而汗出有時  
者此症大虛治宜六君子湯九或附子理中湯五姜棗引煎  
服

黃疸

黃疸其候色黃屬脾蓋小兒由飲食所傷兼之濕熱之氣蘊積  
脾胃故成此症面目指爪小便遍身皆黃疸症無疑治用地

卷之五

十一

黃茵陳湯七

辨腫脹

腫脹之症有二一曰氣腫先腫而後喘由脾胃虛弱脾主肌肉  
肺主皮膚土弱不能生金虛氣上攻乎肺行于面目遍身浮  
腫也治宜調脾行氣為主用五子五皮湯三七等分煎服輕  
則六劑重則十劑無有不愈

一曰水腫先喘而後腫因上焦煩渴喜飲茶水脾虛不能制水  
水反侮上上衝乎肺流走皮膚而光腫也治宜實脾利水為  
主用胃苓湯二二又瀉後痢後瘡諸病後脾虛發腫者宜調

脾胃為主用六君子湯九或補中益氣湯二七切不可用通  
藥如通萬不能活如因癰疽諸病後突然而腫脹者方從  
水氣二腫治之此方即大方脉家用之亦無一不效如通身  
不腫只有腹腫彈之如鼓聲按之卻綿軟此脾虛也宜用六  
君子湯九加厚朴若腹腫彈之不響按之如石此單腹脹也  
不治之症

三消

三消之症實熱者少虛熱者多不足之症也若作有餘治之悞  
矣始而心肺消渴或脾胃消中或腎水消渴傳染日久則腸

卷之五

十一

胃合消五臟乾燥精神倦怠以致消瘦四肢

消渴心火動而消上上消乎心移熱于肺渴飲茶水飲之又渴  
名曰上消治宜蓮花飲七五為主次以生津四物湯川芎八  
分歸身一錢生地一錢酒洗知母一錢白芍一錢用水  
一錢去心川連八分烏梅肉五分天花粉七分薄荷石蓮肉用  
黃柏蜜炒甘艸炙各五分

消肌脾火動而消中上消于脾移熱于胃喜多食食無足時小  
便色黃名曰中消宜用石膏知母甘艸人參倍加石膏外加  
粳米次宜生津養液



消渴火動消腎移熱于膀胱小便渾濁色如膏脂名曰下消宜  
川蓮子知母芡實麥冬入四物湯服之

凡消症務要養脾生肺降火滋陰病自除矣

總治三消以生血為主用黃連天花粉二味為末藕汁生地汁  
生姜汁人乳并蜜共和二末為丸每次一指而大白湯送下

膀胱氣痛

嬰兒小腸與膀胱氣痛在臍下氣海兩邊筋腫到腎囊邊痛不  
可抵治用川練子橋核小茴香荔枝核俱焙炒為末白酒熱  
調三四錢一服不數服即愈

卷之五

五

呆笑

兒無甚病忽然見人呵叱而笑即不見人亦然每日如是治用  
積梗三錢半夏五錢木通一錢甘艸五錢煎服隨于頂心百  
合穴灸灸二壯即愈

不寐多困

嬰兒不睡有二一心虛一胆虛睡中不聞人聲忽醒而不寐者  
此心血不足宜用人參安神丸四八有睡中稍聞人聲响動  
即驚而不寐者此胆虛之極宜用參竹湯七五

多睡者脾氣虛弱健運之令不行而嗜臥也治宜溫補脾胃以

四君子湯三士加木香半夏倍加白朮

龜胸

由感風熱凝注為痰停心滯胸咳嗽喘促肺氣脹滿攻于胸膈  
漸成龜胸或乳母過食辛辣夏哺熱乳亦成此症治宜寬氣  
化痰九六三

龜背

田客風吹背傳入于髓故背突如龜或咳嗽久以致肺虛腎無  
所生腎主骨風寒乘虛而入于筋骨致精血不能流通故骨  
弓而駝治宜松蘿丹六三外以龜尿點脊背中七縫即愈木

卷之五

五

論解顛顛填顛陷

小兒生下頭縫不合腎主骨而腦為髓海腎有虧故不合也各  
日解顛治宜六味地黃丸十四顛門之起各日顛填宜大連翹飲  
四或瀉青湯五七顛陷如坑者由病久血氣虛弱不能上充  
治宜固真湯十又以狗骨炙為末雞子清調敷之

乾瘦似疳

見父母平常節兒飲食從不傷脾飲食不飲久又非病後但見  
逐日消瘦其症必由有所思想而難言或二三歲四五歲昔  
母又有所生乳哺懷中多有寒食之毒而見從傍窺伺見其



愛有所奪不能入懷吮乳惟朝思暮想久則傷脾治之非藥所及此症前所未傳今不概見余先君在日余妹歸寧見投甥乾瘦瘠無他症頃見妹哺次甥長甥倚膝覺神不在舍因問子妹獲始于何日妹曰自得次甥後經今月餘矣先君念妹哺兒之時勿令瘦弱得見哺後賜抱入懷以空乳喂之且慰之曰我只疼你如此一月果下藥而肥追思先君妙何如也神何如也

天柱骨倒

天柱骨倒乃項軟也由真氣虛弱容邪入胸傳于筋骨項則軟

卷之五

五

垂下而無力治宜祛風散四四或吐久瀉久病久而軟者治宜六君子湯九加肉桂手軟者宜用薏苡仁當歸秦艽棗仁防風羌活荆芥等分服之足軟者治宜六味地黃十四加牛膝五加皮鹿茸等分服之

子從弟鐸禹懸孫方十個月天柱骨倒弟曰弱極即要用參于日客邪入內何可選用弟意不果予作色拒之用祛風散作煎劑一服項稍直即命用六君子湯外加防風五劑愈

五硬

頭頸手足強直如冰乃肝受風邪治宜小續命湯五九

齒病口疳瘡

此病由胎中受熱而成口瘡或牙疳疔生赤馬治宜導赤散三并清胃湯四二如久病之後瘦弱之極難治之症

重唇重齦

口中上膠皮腫起如囊盛水名曰重唇牙疔腫起名曰重齦俱以大針刺破去血用蒲黃敷之

耳癰

耳內腫及耳外腫耳外出膿或間一日膿一出或間二日膿一出治宜用黃蠟以刀斬斷滴血入耳數次或用天保采薇湯

卷之五

六

重舌木舌

重舌者舌下根復生如小舌也木舌者其舌腫硬填口也皆由心脾熱極治用黃連灶心上木通連翹等分煎犀角磨水和藥服之用朴硝紫雪白鹽每五分用竹瀝調敷即愈

于子丙午科同從弟鐸再從姪謨鄉試白下姪念慮重舌弟伴向外科用刀刺破流出如雞蛋清歸窩又腫如此兩回不愈予執舌乃心苗立方用黃連黃芩木通枳殼甘草二劑舌消一半喉痰忽墜予揣必是誤用黃芩之弊蓋心火刑肺七已不安悞將肺瀉焉不痰墜于是去黃芩加五味二錢一劑



並愈此因前治癩瘰疔方見藥不可誤用之一驗也

### 鶴膝瘋

此候由腎氣不足兩腿細小膝骨腫大如鶴膝之狀治宜屈膝散六六或用六味地黃丸十四加牛膝鹿茸又有瀉痢久而成此症者紅腫作痛成膿治用補中益氣湯二七如腫硬不痛而色白者治不愈也

### 痛瘋

四肢上或身上一處腫痛或移動他處色紅不圓塊參差腫起按之滾熱便是痛瘋治用羌活獨活五加皮威靈仙秦艽防

## 卷之五

七

風桂枝前胡如下身加牛膝各一錢煎服數劑自愈

邑庠方玉相幼子左手左足各曲貼肉痛屈不伸用前方煎服五劑愈如大人須用酒煮每夜儘量飲每味一兩五錢煮酒約五六斤飲畢即愈此予創方屢效不爽

### 冷水瘋

脚背上與指上及解溪鞋帶諸所埋痛不可言一痛幾死用青磚一塊火內燒紅以木桶盛之將老醋澆入磚上以大人手伴兒脚懸于磚上蒸之氣蒸則將脚稍遠氣溫則就磚桶口以綿絮之類圍塞不令氣洩一蒸即驗如神

### 迅雷所驚

其候抽搐形狀與前驚無異只手掌內橫直紋痕皆是深黃顏色此因驚胆其色故黃拿避用鼓對兒輕上敲起漸上加重重擊二三聲持去鼓以解疑即服參竹湯七五以寧胆穿山林宅諱祥者一子四歲膈月被爆竹驚死拿魁如父母喚聲畧重又驚死與飲食時先以食示之再做聲便不驚其父亦業幼科投以棗仁遠志等味不效至予告其顛未余曰此胆家受病作心家醫候矣余授以參竹湯二劑愈

### 天炮瘡

## 卷之五

八

此由風邪毒氣客于皮膚搏于血氣而生始生如湯盪作泡一破漿出成瘡治用生地升麻藍葉山梔大黃各一兩剉碎用猪油八兩文武火煎色變瀉去渣磁器盛之塗患處

### 癩瘡

其狀如粟粒色赤而瘡夏月多生頭面或遍身用天保米菴湯三等分煎服

### 黃水瘡

由濕熱與血氣相搏其瘡初生碎小後有膿汁浸滿成瘡用雄黃雌黃川烏各一兩松香三錢為末亂髮一團燒灰存性猪



油六兩熬化再入三味煎至髮消盡以綿濾去渣入二黃攪勻盛器塗瘡上

惡核瘰癧

此患由風熱毒邪與血氣相搏鬱結成核如貫珠于耳項之間腫硬白色搖奪不動而有根者便是瘰癧或潰爛成惡毒如用藥多有不效不妙于用燈火至易而至效子亦曾患此用燈燻兩次即愈今故以燈火燻法垂于身之背而圍如瘰癧在左則燻左邊瘰癧在右則燻右邊前自頸上耳脚下起離六分地一點一點直下乳次過脇上至肺愈穴到頸上耳後止在

卷之五

九

瘰癧上周圍亦燻第二次照原路空處補之便愈若只有核而搖得動者便不是瘰癧初起紅腫便是癰疽不可作瘰癧治

偏墜

腎囊子或一個腫大一個小用香茹厚朴只壳姜汁炒木通扁豆生姜甘艸申前葉煎服或用萬年青根約五寸去黑皮搗碎白酒煎服不吃渣亦愈

莖腫痛并腎囊腫

莖即腸物如腫用黃連木通各一錢煎服即愈

腎囊腫如琉璃燈樣用塘內水上無根浮萍以篩盛之下用木

一盞置篩于盆上烈日晒乾為末每服二錢即消腫痛如用鍋焙萬七不乾

灸霍亂

霍亂灸崑崙穴七壯起死神效

灸胎母

胎母灸肺愈穴各三壯背對臍穴三壯神效

灸脫肛

脫肛灸龜尾穴症暫用補中益氣湯十服此乃肺氣下陷

灸肚大青筋

卷之五

十

肚大青筋堅如鉄石于臍之上下左右離五分地各灸二壯即消

灸犬傷

犬傷用青磚上青苔和牛糞搗爛如被瘋犬傷于患處灸三壯即愈

灸蛇傷

蛇傷于患處灸三壯

以上灸法俱用獨蒜截片遮患處盛艾于上灸之

疔瘡惡瘡癰疽膏異方



水粉 黃蠟 各五錢 寒水石 一兩研細 乳香 二錢 蘇油 三兩 先入  
鍋滾過入蠟化開再入粉石再入粉石熬成入乳香攪勻成膏  
貼之即愈

貼骨疔口卍角各疔瘡發背腦癰大人小兒同治丹

疔瘡發背腦癰瘰癧乳癰一切無名腫毒用飛龍奪命丹服之  
便有頭先不痛不癢者服之便痛便癢未成者內消已成者即  
潰其毒化為黑水從小便中出此乃惡瘡毒中之仙丹用蟬酥  
乾者酒 化三錢 胆礬 一錢 海羊虫 二十個 雄黃 三錢 輕粉 五分 蜈蚣 一條  
足 去首 射香片腦 各五分 共為細末酒為丸如棗豆大每服三九用

卷之五

三

葱白三根長三寸白嚼爛吐在男左女右掌心以前丸裹于葱  
內熱水酒三四鍾送下厚被蓋之取汗約頓飯之時再用熱酒  
催助汗出其毒即消如汗不出其毒乃重再服三九汗出即效  
只是發背疔瘡方可取汗此方子于

都門許宅香火院住持小西天喇媽曾處專來不論大小老幼  
如有前患用之無有不效

卷之五終

幼科鐵鏡卷之六

貴池卓溪夏夏鼎禹鑄氏手著

受業弟邑庠鐸禹懸

邑庠之日孟然

郡庠之雲飛霖全泰

藥性小引

醫家治病如經生制菽然病有表裏重輕猶題有大小搭截病  
有來路去路用藥有清源塞流之法猶題有上文下文作文有  
承上合下之規藥味猶貴詮題面之字眼藥性猶字眼義意之

卷之六

一

淺深體認不明便成差謬不觀之下子夏乎於素以為納詩只  
因一句滑讀週便不解為字之義則醫家下學於百藥之性可  
昧昧焉而不一為之究耶余前按症列單因病用藥固矣然茫  
不知性倘症變裁方何所措手爰約畧幼科常用百味之性列  
於篇左以便詳究以供採擇焉

藥性賦幼科摘要

寒性 犀角解乎心熱羚羊清乎肺肝澤瀉利水通淋而補陰  
不足葶苈能理肺氣面風濕堪除直前子明目止瀉能清小便  
瓜蒞子潤肺止嗽下氣寬中黃栢瀉膀胱而補腎薄荷消諸腫



以清風寬中下氣枳椇緩而枳實速療肌解表柴胡次而乾葛  
先柴胡瀉肝止兩腸之痛枳實削積除久滯之痰百部治肺熱  
於咳嗽可止梔子涼心腎而鼻衄最宜升麻力消風熱發散瘡  
痂足陰引氣升陽導藥遊經有四麥冬清心解渴專除肺熱清  
肺隱伏之火生肺不足之金金箔乃鎮心而安魂魄茵陳除濕  
熱而治胎黃石膏墜頭痛兼清脾胃天冬定肺喘又潤心肝大  
黃能通閉結朴硝降火通閉前胡除內外之實痰滑石利六腑  
之澁結熱地黃滋腎水補益真陰生地黃涼心火肺脾解熱赤  
芍藥行血而療腹痛煩熱亦解白芍藥補虛兼瀉肝火新血能

卷之六

二

生香附子理氣有消浮退腫之功知母滋陰乃瀉腎除蒸之用  
貝母清熱痰而利心脾寒痰愈滯桔梗通肺竅而傳諸藥肺部  
引經黃芩瀉大腸之火肺寒勿用常山攻痰結之味勦瘧尤神  
葶藶子止肺喘以通水氣水蘊節消瘀血而止衄紅大黃朴硝  
乃脾虛送死之鳩毒黃連貝母乃寒痰伐命之斧斤  
夏禹鑄曰大黃猶之一員猛將朴硝卻是偏裨如賊勢猖獗  
負踞要衝用之塞旗折敵一出成功若民遭困苦之餘平定  
安集尚恐不及亦輕為廟遺不惟無地樹功而且賊梳兵篋  
輕用之害慘不可言果肺火滔天大腸毒結一用則瞬息通

關至於臟腑俱虛或氣虛腫脹損用則掃盡元氣不刃而殺  
人矣嗟七夜臺黑暗地獄之設舍殺人者其誰此種堅牢特  
能解脫一能筋斗翻來斬新日月縱有前番罪孽是即向世  
尊誠悔便作光明會上一位大菩薩

熱性 生薑發散除平胃嘔胃熱切不可用五味止嗽且滋腎  
水初嗽不可遽加川芎能祛風濕清頭補血紫蘇力能表散亦  
可助脾麻黃散寒邪以發表根止盜汗而因虛白朮治濕痰而  
溫胃利水道以強脾丁香快脾胃以止吐逆附子療虛寒大壯  
元陽當歸補虛以養血獨活祛風以治痲厚朴溫胃且消嘔脹

卷之六

三

除痰亦驗肉桂而療冷瀉止汗如神橘紅皮開胃去痰導壅滯  
之逆氣山菜肉治頭昏暈上下部之遺精  
夏禹鑄曰附子之性有富貴的力量用之貴小心謹慎譬之  
富貴家凶年發賑在細民之既飢且寒者受之則雙眉喜溢  
如枯木逢春在廉介之士雖橫窺無壁壯氣不衰慎為過問  
必髮直衝冠以是知脾氣兩虛元陽亡失虛極生寒體如水  
雪口中寒氣逼人一用如石投水不特莫之逆也且同流濕  
就燥如只虛而不寒即寒不到陰極地位形勢猶能自立一  
用加水投石不特莫之受也而且水火參商是知宜用不怕



朝夕不宜卻怕分厘語云恩不在大貴期當厄怨不在大只怕傷心可爲輕用附子者作一箴規

濕性 木香理乎滯氣半夏主於風痰蒼朮燥脾去濕山藥脾濕能醫藪香葉止吐溫胃能消喉嚨之寒痰款冬花潤肺去痰又定久嗽之壅喘葶藶仁溫脾胃以止瘧威靈仙宜瘋氣以除疼尚香却膀胱疝氣之痛蔡芫去肢節腫痛之瘋積擲墜痰逐水治痢疾之後重如神訶子生津潤肺療滑瀉之沉疴似聖防風祛風杜仲益腎橋核止腰疼疝氣之急痛麻仁潤肺及六腑之燥堅黃耆實腠理益元氣外固表虛之汗肉豆蔻溫中止瀉

卷之六

四

亂更助脾臟之虛生薑皮作消浮腫鈞藤專定驚風

夏禹鑄曰黃耆之性溫內分實腠理益元氣外固表虛之盜汗內托陰證之瘡瘍乃脾家氣分之第一種固虛藥也故仲景有曰黃耆甘艸以益元氣之內人參肉桂調和榮衛之中人動曰提氣只知道一個氣字那知道人身上氣有兩種主乎脾者氣之元也主乎肺者氣之發也脾之元氣猶每歲之爲生爲長爲收爲藏內運之氣是也肺發之氣猶山嶽之晴嵐邨落之烟霧溪壑之陰雲碧海之樓市外發之氣也不能分別兩種各有所司狼曰提氣嗟七黃芪何曾走着脾家又

何會理着肺氣把扶正氣的一味聖藥看壞了致令脾氣弱症卒不敢用不亦深可悼哉子推其故多因肺部有邪氣喘氣促那醫家不去清肺之邪而遽爲扶脾之氣適奏其會氣愈喘愈促便誣賴到黃芪身上不然黃芪與肺何涉而亦能道提氣耶若以予言爲謬試到明醫處把黃耆溫內分實腠理益元氣固盜汗這幾個字幾種性細問一番庶可脫離無間欲步入明鏡臺矣

卷之六

五

平生 青皮利脾胃快膈削積天麻定驚癇燥濕祛風甘艸調變陰陽解藥百毒生用乃瀉心經之火人參寧心潤肺助胃開脾生津扶氣肺熱反來傷肺之憂南星去驚風痰吐之苦棗仁有補心去怔之功大腹皮消浮下氣亦能和胃遠志肉遺精能止而寧心水通猪苓並爲利水之神蓮肉醒脾更有清心之妙白茯苓補虛勞心脾俱到白茯神寧心臟驚悸能安麥蘗有人脾化食之力脾虛莫用小麥有止汗養心之功浮者爲佳神麩消食恐傷脾氣百合止嗽兼斂肺虛連翹瀉六經之火排卻瘡膿大棗有健脾之力中滿勿嘗烏梅治便血瘡痢兼用竹瀝治痰壅寒滯宜防

夏禹鑄曰人參是凡問一種仙丹不肯救度惡人至肯救度



善類若脾虛作嘔吐心虛驚悸肺虛作嗽津亡作渴  
氣虛失血病久成慢諸類用之如入芝蘭之室蓋善與善相  
親也肺熱氣旺風邪熱邪燥邪火邪諸類用之如入鮑魚之  
肆蓋邪正不肯並立也凡今之人因前庸手快用傷人相治  
視爲鳩毒不深可恨哉職有謂邪不可遽用邪去正衰不可  
不用遽用者傷人不用者亦殺人也後之君子一能問經大  
悟作上乘禪師發囊普濟虛寒不須淨土修日卽井橋枝頭  
古林葉底便結個花宮裏天中天之大波羅蜜也

卷之六

六

幼科錢氏湯方

一 天保來蘇湯

羌活 前胡 半夏 陳皮 柴胡 赤芍 白茯苓 川芎  
枳殼 厚朴 桔梗 蒼朮 升麻 葛根 杏仁 獨活  
甘艸

三 犀角解毒湯 治胎熱丹毒

犀角 赤芍 生地黃 白芷 甘艸 連翹 荆芥 防風  
牡丹皮 木通

三 導赤散 治夜啼

卷之六

七

木通 生地 甘草 竹葉 黃芩

四 大連翹飲 治胎熱等症

連翹 赤芍 歸尾 木通 甘艸 防風 荆芥

五 理中湯 治胎寒等症

乾薑 白朮 甘草 人參 若加附子名附子理中湯

六 釣藤膏 治內吊肚痛

乳香 沒藥 木香 姜香 其爲丸釣藤湯下

七 地黃茵陳湯 治胎毒

生地 歸尾 猪苓 天花粉 赤芍 赤茯苓 茵陳 澤



渴 甘艸

八芍藥湯 治夜啼泄瀉

白芍 澤瀉 甘艸 大茴 薄荷 木香 萊菔 生薑

五六君子湯 治脾胃虛寒等症

陳皮 半夏 人參 白朮 甘艸 白茯苓 生薑 大棗引

干固真湯 治畏驚因散冷不省人事

附子 甘艸 人參 山藥 黃耆 肉桂 白朮 白茯苓

美棗引

于一保元湯 治汗多變慢驚

卷之六

黃芪 人參 甘艸 生薑 三片 大棗 一枚 水煎服

十二姜半散 治吐不止將成慢驚

半夏 生薑 肉桂

十三調脾湯 治脾疳

陳皮 白朮 丁香 人參 柯子 青皮 甘艸

十四六味地黃丸 治腎疳

牡丹皮 熟地黃 白茯苓 山萸肉 酒蒸 去核 白澤瀉 淮山藥

右為細末煉蜜丸如桐子大空心滾水送下

十五瀉毒丸 治了笑哺露

瀉毒丸 人參 白朮 白茯苓 山藥 木香 陳皮 青皮 麥芽 神麴 當歸 名三 棋榔 兩個 麝香 少許

右為細末猪胆打麴糊為丸如麻子大清水湯送下

十六小異攻散 治先瀉後吐 脾胃虛冷

人參 白朮 橘皮 白茯苓 美棗為引煎服

一七黃連芍藥湯 治先吐後瀉

黃連 芍藥 猪苓 澤瀉 白茯苓 白朮 甘艸

一八玉苓散 治吐瀉

猪苓 白朮 白茯苓 澤瀉 肉桂

卷之六

一十九消導二陳湯 導痰消食健脾

陳皮 半夏 白茯苓 白朮 蒼朮 神麴 香附 砂仁

甘艸

二十六和湯 治暑瀉

陳皮 半夏 白茯苓 甘艸 黃連 厚朴 台香 香茹

加扁豆 木瓜

廿一胃苓湯 治長夏暑瀉

澤瀉 陳皮 白茯苓 猪苓 厚朴 白朮 甘艸 蒼朮

廿二助胃膏 治胃氣虛寒嘔吐



人參 白朮 白朮 甘草 山藥 木香 丁香 合香 砂仁

〔廿三〕柯附丸 治癆泄

柯子肉 灶心土 黑附子 為末米糊丸如粟米大米湯下

〔廿四〕十六味兒丸 治脾胃虛弱

人參 白朮 白朮 山藥 薏米 芡實 蓮肉 甘草

陳皮 山查 麥芽 砂仁 黃連 澤瀉 芍藥 蓮翹

右為末蜜丸如彈子大米湯下

〔廿五〕承氣湯 治裏急後重腹痛痢疾

卷之六

朴硝 大黃 枳實 厚朴

〔廿六〕木香檳榔丸 治食積

黑丑 檳榔 木香 神曲 大黃

右為末生姜汁糊丸如粟米大米湯下

〔廿七〕補中益氣湯

黃芪 人參 甘草 陳皮 白朮 升麻 柴胡 當歸

〔廿八〕四順清涼飲 治中焦熱

白芍 當歸 生地 甘草 柴胡

〔廿九〕人參敗毒散 治積毒嘔惡

柴胡 前胡 川芎 羌活 獨活 白朮 羌活 桔梗

甘草 人參 生薑引

〔三十四〕君子湯 治脾胃不調等症

人參 白朮 白朮 甘草 生薑引

〔三十二〕姜茶飲 治赤白痢

陳茶 生薑 黃蠟 鹽 車前葉

〔三十四〕飲 治虛癩

白朮 人參 白朮 苡果 半夏 甘草 陳皮 烏梅

要引

卷之六

〔三十三〕人參養胃湯 治虛寒多熱少

陳皮 半夏 茯苓 人參 蒼朮 厚朴 苡果 台香

要引

〔三四〕清瘧飲

柴胡 枳殼 青皮 半夏 白朮 黃芩 厚朴 薄荷

白朮 澤瀉 陳皮 甘草 貝母 知母 全胡

〔三五〕隨用裁方 加恒山草果檳榔姜引 係加在前草煎服

〔三十六〕蘇飲

人參 蘇梗 桔梗 前胡 半夏 乾葛 陳皮 枳殼



杏仁 木香 甘艸 茯苓 姜引

三七五子五皮飲 治脚腫

蘇子 山查子 蘿藦子 葶藶子 香附子 桑皮 橘皮

大腹皮 茯苓皮 杜蘆皮

三八瀉黃散 治濕熱腫脹

赤茯苓 黃連 黃柏 黃芩 山梔 澤瀉 茵陳

三九瀉白散 治肺熱

甘艸 桔梗 陳皮 桑皮 地骨皮

四十四物湯 調益榮衛

卷之六

十一

川芎 當歸 熟地 白芍

四一麥門冬飲 治吐血久不止

麥冬 黃芪 當歸 人參 生地 五味子

四二清胃湯 治毒後見血

山梔子 生地 牡丹皮 黃連 當歸

四三茵陳湯 治黃疸

茵陳 梔子 黃柏

四四祛風散 治天柱骨倒

防風 甘艸 羌活 細辛 黃芩 白芷 薄荷 當歸

川芎

四五滋陰降火湯 治陰虛火結

當歸 地黃 白芍 黃連 白茯苓 知母 天花粉 蓮子

黑玄參 甘艸 麥冬 燈心引

四六五淋散 治血淋

赤茯苓 赤芍 山梔仁 條黃芩 當歸 甘艸 灯心 一團引

四七清脾飲 治熱癩或熱多寒少

青皮 半夏 黃芩 甘艸 白朮 白茯苓 柴胡 陳皮

枳實 厚朴 姜黃引

卷之六

十二

四八人參安神湯 治心血不足 驚悸不眠

麥冬 人參 當歸 黃連 棗仁 生地 茯神

四九安神湯 治心血不足驚悸

人參 半夏 棗仁 茯神 當歸 橘紅 赤芍 五味子

甘艸 姜引

五十寧心丸

麥冬 五錢 去心寒水石 一兩 白茯苓 甘艸 牙硝 山藥 各五錢

硃砂 一兩 龍腦 一字

右為末煉蜜為丸如茶實大每服半丸砂糖水磨下如慢症



用人參白朮煎濃汁化下

〔五二〕肝疳丸

五靈脂 夜明砂 龍胆草 天麻 訖蟾頭 全蝎 一酒

蟬退 川芎 蘆薈 黃連 青黛 防風

右為末猪胆汁浸為丸麻子大每服十丸薄荷湯下

〔五三〕化蠶丸 治肺疳

蕪荑 青黛 蘆薈 川芎 白芷 胡連 川連

蝦蟇灰各等分為末猪胆汁浸糊為丸麻子大每服二十枚

臨臥杏仁湯下

卷之六

〔五三〕疳子丸 治疳積

羅白子 一兩 青皮 陳皮 檳榔 赤茯苓 黑牽牛 莪朮 一

五靈脂 各五錢 木香 減半

右為末糊為丸棗豆大每服十五丸桑皮柴蘇煎湯或蘿白

湯下

〔五四〕五味二陳湯 治水暑傷寒吐瀉

陳皮 半夏 白茯苓 甘艸 厚朴 香茹 黃連 山查

麥芽 神曲 木通 澤瀉

〔五五〕香茹飲 治暑熱

香茹 厚朴 扁豆 黃連

〔五六〕清心蓮子飲 治瀉血

麥冬 地骨皮 黃芩 甘艸 白朮 黃芪 柴胡 車前

石蓮肉 人參

〔五七〕瀉青湯 治煩填

羌活 川芎 梔仁 龍胆艸 當歸 防風 各等分 大黃 或寒

竹葉引

〔五八〕清金飲 治瀉風嗽吐

前胡 杏仁 桔梗 桑皮 半夏 甘艸 旋覆花 薄荷

卷之六

陳皮 大煎

〔五九〕小續命湯 治剛柔痙病

麻黃 人參 黃芩 川芎 芍藥 甘艸 杏仁 防風

防己 肉桂 附子

〔六十〕香蘇飲

川芎 蘇葉 陳皮 半夏 柴胡 桔梗 枳殼 乾薑

白茯苓 甘艸

〔六一〕瀉肝湯

車前 木通 生黃 歸尾 山梔 黃芩 龍胆艸 甘艸



各五分

〔六二〕松蘆丹 治諸青

松花 枳椇 防風 獨活 杏仁 麻黃 前胡 大黃 桂心

各五分 爲末蜜丸黍米大每服二十九丸飲下

〔六三〕寬氣化痰丸 治喘胸

大黃 三分 杏仁 百合 木通 桑皮 甜葶力 天冬

石膏 各五分 爲末煉蜜丸黍米大食後臨臥白熱水化下

〔六四〕柴胡梔子飲

柴胡 山梔 白朮 川芎 白芍 當歸 丹皮 牛蒡

卷之六

六

甘艸等分水煎子母並服

〔六五〕固腸飲 治久痢不止

木香 黃連 當歸 白芍 人參 白朮 白朮 甘艸

訶子肉 水煎

〔六六〕屈膝散 治轉膝

防風 意苡仁 牛膝 苦參 女便 何首烏 各一錢 姜蚕

天花粉 荆芥蘇 各五分 肥皂核肉 一兩 鹿茸 五錢

共爲粗末每用三錢同冷飯煎四兩猪油六錢粘米菜豆

各一儞水四碗煎至二碗分作二次服

〔六七〕猪乳膏 治胎風胎驚

牛黃 硃砂 各少 取猪乳調抹兒口中

〔六八〕清暑益氣湯 治傷暑煩熱

黃芪 升麻 人參 白朮 陳皮 神曲 澤瀉 黃柏

當歸 青皮 乾葛 五味 甘艸 木煎服

〔六九〕八珍湯

人參 白朮 茯苓 甘艸 川芎 當歸 熟地 白芍

姜棗引

〔七十〕藿香正氣散 治傷脾胃外感寒邪

卷之六

十七

合香 紫蘇 大腹皮 陳皮 桔梗 甘艸 茯苓 半夏

神曲 厚朴 白芷 薑棗引

〔七一〕疏風順氣湯 治風寒發喘

紫蘇 乾葛 桑皮 前胡 麻黃 杏仁 甘艸 水煎服

〔七二〕清肺湯

白朮 茯苓 陳皮 薄荷 南星 桑皮 細辛 甘艸

桔梗

〔七三〕備急方 治夜啼內疝

煎葱湯淋洗其腹又用艾絨烘熱包熨臍腹十數次其痛漸愈



七四蓮花飲

甘艸 知母 蓮花鬚 川蓮仁 瓜蒌仁 五味子 人參

乾葛 白茯苓 生地 竹葉

七五參竹湯

麥冬 人參 竹葉 甘艸 半夏 小麥 粳米 陳皮

生姜

一六終

卷之六

七



裘叔度梁荆來二先生鑿定

羅浮陳飛霞道人輯訂

# 幼幼集成

集成者幼幼全書也其中闢驚風之悖謬晰指紋之精微與乎秘傳神火之功驗莫不有本有標有表有裏陰陽有寒熱虛實條分縷晰界限井然俾後之業醫者無誤治之虞保赤者荷生全之德先生之仁心仁術可以不朽矣豈尋常淺陋之士所能旁贊一辭哉夫先生之學上溯軒岐下逮秦漢以來唐宋元明大家之書靡搜博覽皆有以副其真偽別其醇疵而攝其精華故能聚千腋以成裘綴萬毫而成錦命曰集成不亦宜乎

周虛中識

廬陵劉宗孟先生校正

翰墨園藏板

序

余讀太史公書而歎越人之善乎方也邯鄲貴婦人則治婦人周貴老人則治老人秦人愛小兒亦即治小兒其施屢變然其所奏

序一

亦並效何哉蓋古者卜筮醫藥皆有專官世授其業不遷而為良苟能專其傳精其意通知其理而無所惑則婦人孺子老幼之各得其治吾以為雖不必越



人可也。後世專業既失，凡其治方術者，又不能精而多通，由此婦人丈夫之與小兒，始各為科分，而小兒之中，又有所為疹者、疳者、驚風者、疔瘍者，與夫他疾，庫三多端之分部。莊子所云，道為天下裂者，非耶？然世之為小兒醫者，雖習其書用其方，往往無所效，豈其傳於古者，法猶有未備，而道或猶有所未至也乎？嶺南

陳君飛霞自少知醫，以治小兒者多所乖誤，而弊實中於驚風家言，不憚大聲疾呼，以瀾其謬，乃取前代之說，存其精要，辨其是非，訂為一書，名之曰《幼幼集》，庫三成其間以「搐」字易「驚」字，標出誤搐類，搐非搐三條，既可使天下習驚風之教者，廢然自返，而又俾涉書中所載病因證治，循塗守轍，以庶幾於動無不當，投無



不宜、君之心勤而語懇如  
 此、此蒼欲舉天下之幼者、  
 扶持而安全之、令一無天  
 扎而後快也、君學仙好道、  
 瓢笠洒然、吾聞道家者流、  
 以老氏為宗、老氏言三寶、  
 其一曰慈、夫慈之為道大  
 矣、固不獨幼幼、然幼幼則  
 所以為慈、君本此意行之、  
 而將託是書以為嬰兒孺  
 之福、豈非仁人長者所樂  
 與哉、乃因其請而為之序

序四

云、

賜進士出身通奉大夫

日講起居注官內閣學士兼禮

部侍郎加二級西昌袁曰

修撰



序五



幼幼集成序

鑿之爲言意也、神存心手之間、心可得解、口不可得言、然則方劑之著無益乎、而非也、觀乎靈樞素問肇自軒皇、嗣是而鑿家者流

梁序一

著書立說不一、其人家相祖述、代有師承、於呂稽舊聞、諦診視、救其偏敗、而濟乎殒死、厥功偉焉、則不事方書、乃神於醫者之深造自得、而非可以槩天下也、

故醫者濟人之術、而方書之作、則以得諸心者、傳諸世、以濟人於無窮也、獨是專憑臆見、既虞師心之滯於偏墨、守成規、又嫌膠柱而不知變、蓋觀一言之誤、

梁序二

貽害匪輕、而歎方書之難言也、雖然爲方書難、爲方書而及幼科則尤難、何則、呱呱襁褓、啼笑無端、疾痛疴癢不能自白、其藏府未克、則藥物不能多受、其筋



骨尚脆、則針砭尤非易施、誤用刀圭、便傷生理、此鍊師陳君飛霞三折肱於斯道、有匆匆集成之作也、君少慕冲舉、學道羅浮、龍虎功純、洞然有得於性命之

梁序三

際、乃瓢笠雲遊、借醫藥以濟世、謂世之醫小兒者、因前人以傷寒病瘕、稱爲驚風、訛謬相沿、無論外感內傷、遇發熱者、率以驚風爲名、而妄用其法、致扎傷者

多、心甚憫焉、乃取在昔幼科諸書、叅互考訂、按之臨證之所心得、判其合離、析其同異、以搐字易驚字、槩曰搐、將急驚慢驚、慢脾三則、易爲誤搐類、搐非搐、分

梁序四

門別類、詳其審切之訣、附以經驗之方、自胎孕乳哺、及痘麻疹瘡瘍諸證、胥辨晰而條貫焉、將授梓、徵敘於余、余循覽之下、歎其宅心之良厚、而殫精之不辭其



瘁也。君已疾多奇效，有他醫治之，垂絕。君至曰：可生。服其藥，無不活。遇窶人，療之不受謝。有急需補劑者，或更以參朮相資，意所不合，雖貴富人招之不可致。

梁序五

蓋天真踈放，不隨俗俯仰，故游情方外，而有急病讓奪之思也。是編也，本長生之妙道，作保赤之金丹，其斯為明六度而除四魔，以自利利他乎？其斯為父天

聖天子恤幼之仁，均有合焉。爰

地而毋神明憫幼穉之顛連，而弘煦嫗於吾胞乎？後之業幼科者，習於斯而有得，將千載榛蕪一朝盡闢，以治嬰孩，自足以辨析毫芒，隨氣用巧，而利賴靡涯矣。余既重君之行高而意厚，又信此書之足以傳世而行遠，而揆諸我夫子懷少之志，暨

梁序六

浣筆以叙其端。



禮部進士文林郎候選縣

尹龍泉梁玉撰



梁序七

凡例

一幼科之書幾於汗牛其驚風之傳誠多謬誤喻嘉  
言陳遠公程鳳雛業已闢之指出病癩惜未申明  
病癩之由與治癩之法仍無著落不足服人予茲  
徹底揭破以傷寒病癩雜病致搐併竭絕脫證分  
為三則以搐字槩之曰誤搐曰類搐曰非搐條分  
縷晰證治判然名目既正度治療不惑

周虛中日開此三大法門可濟無窮天札

一幼科論證悉以陽有餘陰不足立說乖誤相承流

幼幼集成

凡例

禍千古後人誤以嬰兒為一團陽火肆用寒涼傷  
脾胃胃古初稟受敦龐貽害猶淺今非背此怯弱  
者眾古方今病每多齟齬是故聊為刪訂非敢輕  
前人而執已見蓋亦因時制宜之用也

一胎嬰柔嫩之姿乍離母腹如水上海風前燭防護  
稍疎立見馮妖而幼科所用毒劣之方令其暗損  
真元陰傷榮衛即能倖得生而精神已耗一生虛  
怯莫可補救况復不生者多茲於切奪之方毒劣  
之味概行刪去而易以反正逆從之治無辜赤子



或可免含冤於九地

一顧願肇於東漢衛旣而成於宋人錢仲陽其能用

仲景地黃湯治賦稟不足以七味白朮散治濕利

作渴豈不卓然有見迨門人某隱其名存厚也假托其名

輒用霸方劫奪致人夭枉遂致貽譏後世茲為用

其所長去其所短非敢好為節畧實所以成仲陽

之初志

一幼科惟從驚風暴擬而傷寒門類全然遺棄故學

者但知有驚風不知有傷寒毫芒千里豈勝言

幼幼集腋

凡例

七

獨程鳳雛能見及此茲併纂入以備酌用

一痘疹為幼科切要諸家多不經意或另立一門學

人以為源流各別不復留心討論今併纂入使知

痘實幼科本有不敢不經心體察

一痘科之書如馮氏陳氏聶氏翟氏萬氏雖皆不為

無見而實繁簡不侔又惟萬氏明顯可以濟急惜

原板燬於明末康熙二年復梓者則亥豕盈篇魯

魚過半詩歌黏韻全亡證論先後重複識者鄙之

予甚惜焉因為詳悉刪潤纂入以成全璧

一火功為幼科第一要務濟急無提於此奈從前所

傳悉犯關門逐盜之戒不惟無濟而反有害今以

異授神火繪圖作歌公諸同志急迫之濟可以回

春頃刻

一治療自有正方其未盡者復以經驗簡方併外治

之法附於方後內有起死回生之訣若能留心記

覽隨宜酌用其利無窮

一書不但為知醫者設即不知醫者亦能用之蓋

理路通暢用方簡切並無幽渺難明之說家置一

幼幼集腋

凡例

三

冊可以對證調治自利利人不無小補

一書雖云編輯而幼科家言又未敢盡信以為確

其理明義曠有裨實用者取之浮汎不切者去之

間有未妥之處即參以鄙見併素所經驗者成全

之故難分某段為何人之言非敢掩人之功為已

有也蓋幼科非方脈之比以其病因疾苦莫能告

人一七下咽死生立判故不敢不為詳慎是書附

酌去取頗為得宜

一書文義荒疎由予幼時未嘗學問祇以無辜天



扎不恣坐視所以忘其固陋不禁率意言之語雖不倫理或非誣

明府幸毋以是見薄弟原其忠愛之心而賜之規正  
是亦勞莠之幸也

復正再識

凡例終

幼幼集成

凡例

四

鼎鏗幼幼集成總目

第一卷目錄

序

幼幼集成序

集成小引

凡例

總目

賦稟

護胎

幼幼集成

目錄

指紋晰義 圖附

三關部位歌

浮沉分表裏歌

紅紫辨寒熱歌

淡滯定虛實歌

紋形主病歌

小兒脈法

四脈主病

總括脈要歌



脈證宜忌歌
保產論
難產七因
產要
附血暈氣脫案
小產論
集成三合保胎丸 <small>附論</small>
保產方 <small>附簡方</small>
熟料五積散 <small>附論</small>
幼幼集成 <small>目錄</small>
初誕救護
調燮
臍風證論
用火日訣
集成神火圖
集成神火歌
用火宜忌
附夏氏臍風火圖
回生艾火

臍風諸方
初生護持
勿輕服藥 <small>附馮楚瞻論</small>
藥何之誤
看病訣
壽夭辨
面部圖
面部形色賦 <small>分註附</small>
審形色苗瘡
幼幼集成 <small>目錄</small>
簡切辨證
五臟所屬之證
變蒸辨 <small>附景岳說</small>
第二卷目錄
胎病論
集成沆瀣丹 <small>附論</small>
六味地黃湯 <small>附論</small>
驚風闕妄 <small>喻嘉言論四段 集成論三段</small>
錄諸家驚風論 <small>辨註附</small>



辨明致妄之由 易去嬌字

新立誤搗類搗非搗分門別證

誤搗二條 論併方附周虛中先生  
太陽血虛筋急治案二

類搗十條 論併方附

非搗二條 論併方附

附小兒時疫證治

痢疾證治

集成定痢九 附論

幼科宜修製應用九藥七方

幼幼集成 目錄

四

乳子傷寒證治

小兒傷寒類治

傷風證治

傷暑證治

傷濕證治

霍亂證治

第三卷目錄

咳嗽證治

百疳嗽論 附案

哮喘證治

諸疳類治 附方

嘔吐證治

泄瀉證治

傷食類治 方附

食積證治

發熱證治

神奇外治法 九條

治病至要口訣 二段

幼幼集成 目錄

五

痢疾證治

集成至聖丹論

瘧疾證治

消渴證治

諸血證治

第四卷目錄

腫滿證治

脹滿證治

黃痺證治



腹痛證治
癖積證治
蟲痛證治
諸汗證治
疝氣證治
啼哭證治
夜啼證治
二便證治
小便證治
幼幼集成 目錄 六
大便證治
頭顱證治
眼目證治
耳病證治
鼻病證治
口病證治
舌病證治
齒病證治
咽喉證治

龜胸龜背
鶴膝證治
五癩五癩
丹毒證治
水痘露丹
破傷風證
癩疹癩疹
諸瘡證治
瘰癧證治
幼幼集成 目錄 七
梅瘡證治 附案
疥癬諸方
湯火諸方
第五卷目錄
痘疹天元賦 二十三段
痘疹西江月 四十九首
痘疹順險逆五善七惡
痘疹總畧歌 十五首
發熱證治歌 二十五首



見形證治歌 十八首

起發證治歌 二十六首  
共五十五方

第六卷目錄

成實證治歌 十六首

收勝證治歌 十六首

落癩證治歌 五首

餘毒證治歌 三十一首

婦女痘疹證治歌 十二首

麻疹骨髓賦 四段

幼幼集成

麻證西江月 十首

麻疹證治歌 十五首

後跋 十九方

集成小引

稽自三墳啟秘神聖迭興本草內經昭垂星日  
蓋聖人繼天立極位育為功念天壤之間陰陽  
代謝運氣推遷至之先後已無成規應之早遲  
靡有定律其間六淫勝復釀為災眚哀此蒼黎  
能無因是而天扎者此岐演十世之傳帝啟九  
章之間而有醫氏之學也伏讀黃帝之謂岐伯  
曰至哉聖人之道天地大化非夫子孰能通之  
請藏之靈蘭之室非齋戒不敢示夫聖如軒皇  
而於醫事崇尚若此豈非痼疾一體胞與為懷  
欲登萬世斯人於仁壽者歟素問而下如伊尹  
湯液皇甫論甲乙秦越人問難張仲景金匱王  
叔和脉經陶景肘後此數公者雖曰祖述靈素  
其實以作為述自茲而往醫事寥寥雖著作者  
代不乏人求其無偏無岐實難多覩惟明末李  
時珍張景岳喻嘉言遁出闡明金匱發洩內經  
掃蕪穢而返清純有功於醫事者不小然數人  
雖產明代而其書始盛行於康熙初年大為世

曉明按  
恐青字

幼幼集成 卷之一 小引



用、蓋由

聖天子臨御、德孚中外、仁協萬方、近纂醫宗金鑑、遍

周海宇、將見民無疵癘、物遂生成、故預產明良

以勸位育之功、非偶然矣、惟幼科一門、不無遺

憾、雖嘉言微啟、其端而其言未竟、予每讀驚風

之書、未嘗不三歎而流涕也、予幼稟虧多病、於

醫家色脈之要、頗嘗究心、長際仙師、授金匙火

符性命之秘、嗣是遨遊海嶽、冀遇同儕、竹杖芒

屨、行蹤幾半宇內、凡紳衿士庶名公鉅卿、以及

幼幼集成

卷之一 小引

二

至賤至微者、蓋嘗隨緣而方便之、其臨證救治

之多、有非筆楮所能罄、第念驚風之說、在在訛

傳、莫獲辭而正之、坐使無辜嬰稗、枉受貽殃、前

後相仍、迄無底止、茲將驚風之說、概為刪訂、而

附以一得之愚、自稟予胎元火功、爍艾以及雜

證、痘湯火瘡、瀉、無不周備、彙為六卷、計數十萬

言、書成付梓、顏曰幼幼集成、其中診治權衡、一

遵經旨、罔或偏枯、務期有當於理、無害於人、而

後已、非敢妄議前人、遂其一隅之見、第念保赤

誠求不中不違、此書不無萬一之助、勿恐終默而息、不辭狂瞽、呈政

大方、豈日井海、燕天、立言啟後、亦聊體

古聖仁民愛物之心、欲自效其負墮之愆云爾

昔維

大清乾隆十五年歲次庚午孟春月羅浮陳復正飛

霞氏書於滎陽之種杏草堂



幼幼集成

卷之一 小引

三



鼎鑿幼幼集成卷之一

羅浮陳從正飛霞氏 輯訂

廬陵劉 勣家孟氏 校正

潞陽周宗願虛中氏 參定

○賦稟

夫人之生也秉兩大以成形藉陰陽而賦命是故頭圓象天足方象地五行運於內二曜明於外乃至精神魂魄知覺靈明何者非陰陽之造就與氣化相盛衰然天地之氣化有古今斯賦稟由之分厚

幼幼集成

卷之一

薄上古元氣渾龐太和洋溢八風正而寒暑調六氣勻而雨暘若人情敦茂物類昌明當是之時有情無情悉歸於厚非物之原由氣厚也及開闢既人人物繁植發洩過傷攘竊天元雕殘太樸世風漸下人性澆漓故水旱有不時之擾流災有比戶之侵生物不蕃民用日促值此之際有知無知咸歸於薄非物之薄由氣薄也然則今之受氣於父母者其不能不薄也可知矣况有膏粱異養貴賤殊形醫術稱仁顧可視為不經之務夫膏粱者形

樂氣散心蕩神浮口脈甘肥身安華屋願養過厚體質嬌柔而且珠翠盈前婉妍列侍縱熊羆之叶夢難桂栢以參天復有癡由貪起利令志昏者有雪案螢牕剝心噴血者有粟陳貫朽握筭持籌不覺形衰氣瘵者有志高命蹇妄念鎖營以致心倦神疲者凡此耗本傷元胚胎之植安保其深根固蒂也乃若藜藿之家形勢志一願足心安守益稟瓶倉對荆釵裙布乃其神志無傷反得胎嬰自固以此較彼得失判然矣若夫怒傷元氣勞役形骸

幼幼集成

卷之一

迅雷烈風嚴寒酷暑日月薄蝕病體初安醉飽傷神落紅未淨胎孕之由斯愈薄實又成於人所不覺者故今之稟受十有九虛究其所因多半率由於是業斯道者當知氣化厚薄人事澆醇因以察其胎元之受於父母者之盛衰堅脆庶幾近焉若但以上古成方而治今時薄弱膠柱鼓瑟究歸無當泥而不通未可以言達於理也

○護胎

易曰天地氤縕萬物化醇男女媾精萬物化生蓋天



地生生之道終古為然矣。願願經曰：成胎之後一月為胞胎，精氣凝也。二月為胎形，始成胚也。三月陽神為三魂，四月陰靈為七魄，五月應五行，分五臟也。六月應六律，定六腑也。七月精開竅，通光明也。八月元神具降，真靈也。九月宮室羅布，以禦外侮。十月受氣足，萬象成也。此胎元長養造化自然，非人力也。第妊母臟氣護胎，仍若四時之有序，足厥陰肝足少陽膽屬木，壬春養胎在一月二月，手心主包絡手少陽三焦屬火，旺夏養胎在三月四月。

幼幼集成

卷之一

三

凡足太陰脾足陽明胃屬土，旺長夏養胎在五月六月。手太陰肺手陽明大腸屬金，旺秋養胎在七月八月。足少陰腎屬水，旺冬養胎在九月。至十月兒氣已足，待時而生。惟手少陰心，君主之官，神明之臟，雖不主月，而無月不在其胎元長養。臟氣護持，可謂至矣。而人事恣縱，敗壞能保其衝任有恒。平菴德錄曰：世人無不惑於生子要知生子之道，精氣交媾，餘液成胎。故少慾之人恒多子，且易育。氣固而精凝也。多慾之人常艱子，且易夭。氣洩而

精薄也。譬之釀酒，然斗米下斗水則醲，釀且耐久。其質全也。斗米倍下水則淡，三倍四倍則酒非酒。水非水矣。其真元少也。今人夜夜淫縱，精氣妄洩，邪火上升，其陽愈慙，安能成胎。即僥倖生子，又安能必其有成。所以年少生子者，或多羸弱。慾勤而精薄也。老年生子者，反見強盛。慾少而精全也。且凡嗜於飲者，酒亂其性，精半非真。非濕熱勤於慾者，孕後不節，盜洩母陰，耗其胎氣，所謂恣縱敗壞者，殆以是歟。然父天母地，古人嘗言之矣。父主

幼幼集成

卷之一

四

陽施猶天雨露，母主陰受若地資生。胎成之後，陽精之凝，尤仗陰氣護養。故胎要在腹，與母同呼吸，共安危。而母之饑飽勞逸，喜怒憂驚，飲食寒溫，起居慎肆，莫不相為休戚。古人胎教，今實難言。但願妊娠之母，能節飲食，適寒暑，戒嗔恚，寡嗜慾，則善矣。此尤切於胞胎之急務。幸母視為汎常而忽之。○指紋晰義  
幼科指紋總無正論，且游移不定，莫可稽攷。有謂不必用者，有用而至於怪誕不經，誣民惑世者，是皆



曉明按下  
從恐後字

未明紋中之理所以有用不用之殊議請以一得  
之愚聊發其要蓋此指紋與寸關尺同一脈也按  
內經十二經絡始於手太陰即肺脈也其支者從腕從  
出次指之端而交於手陽明支者即旁支也從手  
交通榮衛於手即此指紋是也明如景岳猶謂此  
陽明大腸之經脈後出食指之端而  
紋為手陽明浮絡不知手太陰經起於中府而終  
於大府之少商手陽明經起於食指之商陽兩不  
相值若無此旁支交通榮衛不幾令太陰陽明表  
裏斷絕乎况此脈可診人所不知其遲數代促與

幼幼集成

卷之一

五

太淵一毫無異但脈體差小由旁支也指紋之法  
起於宋人錢仲陽以食指分為三關寅日風關卯  
日氣關辰日命關其訣謂風輕氣重命危雖未必  
其言悉驗而其義可取蓋位則自下而上邪則自  
淺而深證則自輕而重人皆可信祇恨復出詭異  
之說謬撰驚風門類致後賢多岐亡羊反成疑案  
予意仲陽宋之明人以孝見稱豈肯為此誤世大  
抵後之俗子假托其名而為之者惟有識者知其  
語言鄙俚論證荒唐便能棄置不用如張景岳夏

禹鑄輩皆謂可不必用蓋非不用實惡其妄誕不  
經而無可用耳近世醫家不知真偽不辨是非習  
而行之乃致惑世誣民禍害嬰幼夫醫事動關生  
命乃聽無稽之言流傳貽殃是豈其可予雖不敏  
竊知經脈每見幼科指紋之說不勝髮豎欲為規  
正恨非其人知而不言此心未慊今幸餘閒請言  
其要蓋此指紋即太淵脈之旁支也則紋之變易  
亦即太淵之變易不必另立異說眩人心目但當  
以浮沉分表裏紅紫辨寒熱淡滯定虛實則用之

幼幼集成

卷之一

六

不盡矣倘舍此不圖妄執偽說以為是臨證不察  
病源謬指為人驚音驚誑惑愚昧予恐盲人鬻馬  
終墮重淵莫之能出矣  
周虛中曰指紋晰義之精自仲陽以來七百餘年無  
人道及今讀至此如夢初覺如醉初醒足以快人  
神智真千古特識也  
世人乍聞此言未能深信姑就其外謬之傳擬其  
大要以正之其畧曰指上辨青紋認是四足驚虎  
口脈青色是猪犬馬獾黑色因水撲赤色火人驚



紫色多成瀉黃印是雷驚又曰青驚白是疳黃印  
困脾端青色大小曲人驚併四足云云凡此等之  
言斷非錢氏所出實齊東野語正人君子所不屑  
於齒頰者然不明指其非人或以予言不實今駁  
其最無理者以博一笑其曰指上辨青紋認是四  
足驚虎口脈青色是猪犬馬驚黑色因水撲赤色  
火人驚紫色多成瀉黃印是雷驚是指紋之青黃  
赤黑一皆驚之所致然則小兒之賦稟厚薄胎元  
寒熱以及內傷外感雜證麻痘數百之證悉當以

幼幼集

卷之十一

七

驚風稱之以驚風治之矣不然除去青黃赤黑之  
紋又將何者辨其非驚風乎謬誤之傳莫此為最  
既云黃印困脾端矣是謂指紋黃色脾土受傷不  
足之證又曰黃印是雷驚似謂聞雷致驚有餘之  
候假令小兒指紋見黃不知此時應斷為脾困乎  
抑應斷為雷驚乎治之者不知應治脾乎應治其  
雷乎或將合一為治乎抑亦分晰其方乎且脾困  
為虛雷驚為實治虛遺實治實礙虛兼治不能分  
治不可不亦莫知何所適從乎至謂青色大小曲

人驚並四足夫人與四足靈蠢天淵清濁水炭氣  
化純雜不侔斷無並列之理今既曰人驚並四足  
矣則是臨證時凡指紋青者謂之人驚可也即謂  
之四足驚亦可也是人與四足竟可以通稱而四  
足與人不幾同類耶即以紋曲之大小別之原其  
意必謂大曲為人驚小曲四足驚又安知人驚不  
為小曲者驚不為大曲乎何所據而確知其人驚  
之曲必應大者驚之曲必應小設使大曲之中仍  
有小曲小曲之旁兼見大曲得無曰此人驚中之

幼幼集

卷之十一

八

音驚音驚中之人驚耶無稽之談不堪寓且再究  
其治療更無是處若謂人驚音驚總為一驚不必  
論證不須異治則今之分大分小指人指音者得  
非謬妄乎若謂人驚音驚各為一驚未可同論正  
不知人驚為何病音驚為何證宜以何物治人驚  
何物治四足驚既有已上之驚各應立已上之證  
治何以並無一法而徒設此無稽虛言以誑俗在  
庸妄固不足責而立言諸公不之規正反為編次  
於書遺悞後世吾恐有目者未必不為之皆裂也



再曰青驚白是疳青驚即已前諸說不必瑣贅至於白是疳誠為妄誕夫疳證即方脈之虛勞在幼穉謂之疳積本脾腎兩傷之候久之五臟俱損中氣敗極則面目肌膚俱見晃白形如枯骨之象故曰白是疳此以形色言也今以指紋當之謬之甚矣蓋氣血兩傷精神人虧之證其紋必淡凡虛證皆然不特疳證已也然止可言其色淡不可謂之色白蓋指上從無白紋予臨證四十餘載未嘗一遇後人勿謂古人之言一定不易必俟其指紋自色

幼幼集成

卷之一


九

始可稱之為疳若然則疳證之兒無幸矣故知按圖索驥終非解人神而明之始稱匠手指紋辨證詳列於左

○指紋切要

小兒自彌月而至於三歲猶未可以診切非無脈可診蓋診之難而虛實不易定也小兒每怯生人初見不無啼叫呼吸先亂神志倉惶而遲數大小已失本來之象矣診之何益不若以指紋之可見者與面色病候相印證此亦醫中望切聞問之意也

指紋三關圖



幼幼集成

卷之一

十

令人抱兒對立於向光之處以左手握兒食指以我右手拇指推兒三關察其形色細心體認亦惟辨其表裏寒熱虛實足之矣世人好異不從實地用功以此為淺近之談不屑留意不知臨證能辨此六者便為至高之手蓋表裏清則知病之在經在府而汗下無懼寒熱明則知用寒遠熱用熱遠寒或寒因寒用熱因熱用因事制宜用無不當虛實辨則知太虛有盛候大實有瀉狀不為假證眩惑凡真虛真實易知假虛假實難辨真假既明則無



虛虛實實之患於此切要關頭不知體會但以不經之言欺世誑俗謂何者為人驚何者為音驚不特欺人而且自欺不特無益治療而且誤人生命是誰之咎哉

○三關部位歌 部位未可以定輕重安危由

初起風關證未央氣關紋現急須防乍臨命位誠危

恐射甲通關病勢彰 紋見風關為病邪初入之象

易。紋現氣關邪氣正盛病已沉重治之宜速。倘三關通度紋出命關則邪氣瀰漫充塞經絡為至重之候設透關射甲則邪氣無所容高而不能降為尤能有悔之象治之者切宜留心慎毋輕視

幼幼集

卷之十一

○浮沉分表裏歌

指紋何故乍然浮邪在皮膚未足愁腠理不通名表

證惡行疎解汗之投 此紋與太淵脈相通凡有外邪太淵脈浮此紋亦浮蓋邪

在皮毛腠理之間故指紋亦顯露於外謂之表證速宜疎散散其皮毛開其腠理使邪隨微汗而解

一七成功何嫌而不投哉

忽爾關紋漸漸沉已知入裏病方深莫將風藥輕相

試須問陽明裏證尋 指紋見沉知邪入裏但有淺深之別若往來寒熱指紋半

沉尚在陽明胃經治宜解肌若外證壯熱不已指紋極沉已入陽明府速宜攻下庸妄見其身熱

猶以風藥治之蓋病在內治其外非其治也不特病邪不服適足以燥其陰血愈增其困耳

○紅紫辨寒熱歌

身安定見紅黃色紅艷多從寒裏得淡紅隱隱本虛

寒莫待深紅化為熱 平景象蓋黃為中和之氣紅乃文明之色紅黃隱隱景物熙熙焉有不和之理

○其邪初入皮毛經絡乍滯所以紋見紅鮮由血滯也無論內寒外寒初病人病一見此紋總皆寒

證。凡人中氣怯弱榮衛不充紋必淡瑩淡而兼紅虛寒之應。至謂深紅化熱其理安在紅木寒

因豈能化熱由其寒閉皮毛腠理不通蓋人身內臟之氣暗與皮毛之氣相通貫無一息之暫停今

寒閉汗孔內出之氣無所洩鬱於皮毛之間漸積漸厚而化為熱矣此內出之氣

為熱非外受之寒能變熱也

關紋見紫熱之徵青色為風古所稱傷食紫青痰氣

幼幼集

卷之十一

逆三關青黑禍難勝 榮行脈中衛行脈外熱壅經絡阻其陰榮之道所以紋紫

紫為熱熾千古定評也。少陽甲木其色青肝

受邪熱熾見青色此傷風候也而可以風熱稱之不可稱驚風以假世大青者木之色內經有在天

為風在地為木之言所以風木同氣肝受風邪紋必見青此理最明最顯而幼科偏不言青為風偏

言青為驚厥幼科所論驚出於心然青非心之色何以青為驚乎此等牽強之說最為謬誤予有驚

風關妄詳列二卷。紫而兼青食傷之候蓋食飲有形之物阻抑中焦壅遏脾氣不能宣布故風木

乘其困而侮之所以痰氣上逆也疏泄壅滯合其流利可也。倘抑鬱既入脾氣愈不運榮衛愈見

瀉則風痰食熱固結中焦所以青而兼黑此抑鬱之至也急宜攻下庶有生機誤認驚風百無一救

○淡滯定虛實歌



指紋淡淡亦堪驚總為先天賦稟輕脾胃本虛中氣

弱切防攻伐損胎嬰小兒稟受陽虛肌膚見口唇舌淡者指紋四時皆淡

有病亦止淡紅淡青淡紫而已蓋淡紅虛寒淡青

虛風淡紫虛熱此等之兒根本不堅中氣怯弱無

論新病久病總歸於虛一毫攻伐不敢

輕用倘慢投剋制覆水難收悔之遲矣

關紋清滯甚因山邪遏陰榮衛氣留食鬱中焦風熱

熾不行推蕩更何求病邪阻滯榮衛運行遲滯升降

全無活潑流利之象由食飲風熱相搏是為實證

急宜推蕩去其莖莖其愈亦易若三關純黑推之

不動死證也

○紋形主病歌

幼幼集成 卷之一 十三

腹疼紋入掌中心尋內風寒次第侵紋向外尋痰食

熱水形肥胖兩傷陰掌心色絡所主紋入掌中邪

痛。紋若彎弓內外有別其紋之兩頭尋向中指

為內為順證為外感風寒流之稱易其紋尋向大

指為外為逆證為內傷飲食治之稱難。形如木

字脾肺不足食寒太陰中氣怯弱脾不運化故也

或問指紋惟止一線安能有本字之形曰不觀太

淵之脈亦止一線何以陽維陰維陽蹻陰蹻皆左

右彈石豈非水字之形乎脈有左右安知紋無左

右但能觸類旁通無往非理豈特指紋為然哉

凡看指紋以我之太拇指側而推兒食指三關切不可

可覆指而推蓋螺紋有火尅制肺金紋必變色又

只可從命關推上風關切不可從風關推出命關

此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推而出

之犬損肺氣慎之戒之

以上表裏寒熱虛實鑿鑿有據但能於臨證時認得

此六字分明胸中自有主宰雖不中不遠矣若但

以驚證塞責何難應對第晨鐘自問未免懷漸凡

我同人互為砥礪幸矣

○小兒脈法

小兒三五歲可以診視第手腕短促三部莫分惟以

一指候之誠非易易內經診視小兒以大小緩急

四脈為準予不避僭越體其意竟易為浮沉遲數

而以有力無力定其虛實似比大小緩急更為明

悉後賢其體認之

○內經脈要

黃帝曰乳子而病熱脈懸小者何如夫乳子病熱脈

見陰脈本為大忌但小而緩者邪之微其

愈易小而急者邪之甚為可慮故以為問岐伯曰

手足溫則生寒則死夫小兒以脾胃之體而加病

足溫者以四肢為諸陽之本陽猶在也若四

肢寒冷者則邪勝其正元陽去矣故曰死也

帝曰乳子中風熱喘鳴肩息者脈何如岐伯曰喘鳴



有息者脈實大也緩則生急則死此言小兒之外陽分而喘鳴有息者脈當實大但大而緩則胃氣在邪漸退故生實而急則真臟見病日進故死也

此內經之言聖人立言簡切而總括無餘世人不

悟視為汎常能於此等處着眼則診視之要思過

半矣予之臨證診視每論吉凶而多中者亦不外

此第意之所至口莫能宣竊詳經所謂大小緩急

者亦發而不露之意蓋大即浮洪類也小即沉細

類也急即數也緩即遲也何若竟易以浮沉遲數

之為得乎再以節庵之有力無力辨其表裏虛實

幼幼集戊

卷之一

十五

誠診視小兒天然不易之妙訣夫節庵亦一常人

而能以有力無力辨其陰陽表裏寒熱虛實雖至

顯淺至平易却至確當孰謂古今不相及耶

○四脈主病

浮脈主表 病在外

沉脈主裏 病在內

遲脈主臟 病為寒

數脈主腑 病為熱

五至四至為遲為寒為不足浮遲外寒沉遲內寒有力實寒無力虛寒

七至八至為數為熱為太過浮數表熱沉數裏熱有力實熱無力虛熱

○主證

浮而有力風熱 無力陰虛

沉而有力痰食 無力氣滯

遲而有力為痛 無力虛寒

數而有力實熱 無力瘡瘍

○總括脈要歌

太淵一指定安危六至中和五至虧七八熱多三四

余浮沉遲數貴詳推有力為陽為實熱虛寒無力

幼幼集戊

卷之一

十六

裏何疑若能留意於中取何致亡洋洋遺岐

浮而有力熱兼風風熱皆陽表之實也無力陰虛汗雨濛陰

之虛也安洩表有力而沉痰食害結於裏也沉沉無力氣

凝胸氣滯於中遲而有力多為痛浮遲外痛無力不運化也

虛寒氣血窮氣弱血衰至虛之候數脈熱多終有力數而有九實熱

何瘡瘵無力熱虛攻陰血受傷虛熱所致

○脈證宜忌歌

脈浮身熱汗之鬆陽邪居表應從汗解沉細身涼莫強攻無論表裏

不堪咳嗽正嫌浮帶數浮緩為宜浮數大忌細沉腫脹定知



凶、脾胃虛寒、沉遲下痢方為吉。氣血俱傷、洪大偏愈不運化、最嫌洪數。

宜痘疹逢陰陽充足、毒不能留、腹痛不堪浮有力。三陰受病、浮則反常。

浮洪吐衄總無功。陽火太盛、陰血愈傷。

陶節庵曰、診脈之要、無論浮沉遲數、但於有力無力中、分有力者為陽、為實、為熱、無力者為陰、為虛、為寒、至哉斯言也、後賢無忽。

○保產論

生產一道、天地自然之理、不待勉強而無難者也、然今之世、往往以難產聞者、得無以人事之失而損

幼幼集成

卷之一

十七

其天耶、保產之術、可不詳乎、世風不古、胎教人廢、為母者、既不能保於平時、而徒臨產措置、猶覺其遲、謹將難產之由、詳列於左、庶知預為調攝也。

○難產七因

一因安逸、蓋婦人懷胎、血以養之、氣以護之、宜常時微勞、令氣血周流、胞胎活動、如久坐臥、以致氣不運行、血不流、脈胎亦沉滯、不活動、故令難產、常見田野勞苦之婦、忽然途中腹痛、立便生產、可知二因奉養、蓋胎之肥瘦、氣通於母、母之所嗜、胎之所

養如恣食厚味、不知減節、故致胎肥而難產、常見藜藿之家、容易生產、可知。

三因淫慾、古者婦人懷孕、即居側室、與夫異寢、以淫慾、是所當禁、蓋胎在胞中、全賴氣血、育養、靜則神藏、若情慾一動、火擾於中、血氣沸騰、三月已前犯之、則易動胎小產、三月已後犯之、一則胞衣太厚、而難產、一則胎元漏洩、子多肥白而不壽、且不觀諸物乎、人與物均稟血氣以生、然人之生子、不能胎胎順、個個存、而牛馬犬豕、胎胎俱、易個個無損。

幼幼集成

卷之一

十八

何也、蓋牛馬犬豕、一受胎後、則牝牡絕不相交、而人受孕、不能禁絕、矧有縱而無度者乎。

四因憂疑、今人求子之心、雖切、保胎之計、甚疎、或問卜、禱神、或問適有產變者、常懷憂懼、心懸意怯、因之產亦艱難。

五因軟怯、如少婦初產、神氣怯弱、子戶未舒、更腰曲不伸、展轉傾側、兒不得出、又中年婦人、生育既多、氣虛血少、產亦艱難。

六因倉皇、有等愚蠢、穩婆不審、正產弄產、但見腹痛。



遽令努力產婦無主只得聽從以致橫生倒生子母不保

七因虛乏孕婦當產時兒未欲生用力太早及兒欲出母力已乏合兒停住因而產戶乾澀產亦艱難惟大補氣血助之可也

○產要

產婦臨盆必須聽其自然勿宜催逼安其神志勿使驚慌直待瓜熟蒂圓自當落矣所以凡用穩婆必擇老成忠厚者預先囑之及至臨盆務令從容鎮

幼幼集成

卷之十

十九

靜不得用法催逼管見有穩婆性急者恐傾此失彼強勉試湯分之插之逼之使下多致頭身未順而手足先出或橫或倒為害不小故未有緊陣不可令其動手切記要緊又管見奸詭之婦故為哼訝之聲或輕事報重以顯已能以圖酬謝因致產婦驚疑害尤非細極當慎也

一孕婦將產不可占卜問神如巫覡之徒哄嚇誅利妄言吉凶產婦聞之倍生疑懼因令氣血結滯多致難產所宜戒也

懷孕六七個月或八九個月偶略曲身胎忽亂動三二日間或痛或止或有水下惟腰不甚痛胎未離經名曰弄產又有臨產一月前忽然腰痛却又不產此是轉胞名曰試月胎水有無俱不妨但宜直身坐臥行立自然無事又有伸手高處取物忽然于鳴腹中但令鞠躬片時即安

臨產陣痛有三三日有五七日者原非正產驚動太早子未出胞非難產也但聽其坐臥任意不得扶坐努力而合其憂疑氣餒惟勸其飲食以藥餌滋

幼幼集成

卷之十

二十

補之

臨產有七候臍腹急痛腰間重墜眼中出火糞門逆急產戶腫滿手指筋脉跳動胞水或血俱下方是子出胞時始可用力如數證未備即一二日切不可使其努掙又有胞水已下兒頭已至產門三四日仍不下者因母氣先餒此時惟人參為專功力不能者大劑八珍湯補其元氣調其飲食時至自生

臨產時飲食減少最為可慮即宜以獨參湯常服不



可使其精力衰之若交骨不開出血氣衰不能運  
達宜十全大補助之自開加味芎歸湯亦可

臨產時驚動太早血先下而胎元乾涸殭死腹中不  
必驚惶惟令產母上牀穩臥切勿用力努掙徒傷

神氣第宜勉進飲食勿令氣之予治極多十可全

十惟以脫花煎加芒硝三五錢水煎熱服其胎化

水而下矣古方以平胃散加芒硝下死胎下胞衣

功雖最捷而暗中有損予見數人用此者胞胎雖

下而產婦過一二年皆痰無一免者大都平胃散

劫伐胃氣而芒硝鹹寒傷血所以臟腑暗中受損

今易用脫花煎藥味甘溫而歸芎生血活血肉桂

暖血更加附子一二錢雖芒硝之寒不能為害矣

此等之事非臨證人者莫知其弊也予嘗治一少

婦年二十四原係初產總由慌忙急促產不如法

乃至人不能下延予至而胎已死矣問產婦腹內

動否曰不動小腹陰冷知其胎死無疑欲用前藥

慮其初產門戶未得因與主家商酌肯聽予言則

萬無一失今死胎殭硬以藥下之恐交骨未開必

損其母莫若以十全大補倍參桂一以扶產母精

力二可以煖其下元使胎自爛始能保全無恙主

家以予言為是依此行之以十全大補倍參桂服

一劑後腹中溫煖不痛不急予自得之矣所慮者

腹痛作墜今不痛不墜可以耐之更幸產婦年力

本強脾胃素健每食乾飯三盃肥鷄半隻予見更

喜以其中氣不衰自堪承任仍每日如是調理至

五日而死胎自下糜爛臭穢不堪產母精神如舊

毫無傷損可見死胎不忙不亂尙能保全况生胎

乎第人不肯安靜必欲強為奈之何哉

產時子有出戶之勢轉身差緩母力一逼或手或足

或橫或倒又有生路未順兒頭偏挂左右腿味名

曰偏產又有兒頭偏挂穀道名曰根後此等數證

穩婆精巧者則不須服藥若穩婆無用者恐扶產

母上牀正身仰臥厚被覆之令老成穩婆徐徐往

上推之內服補中益氣湯升提之須臾提上重新

轉身兒頭已對產門急扶卽下

產時門戶俱正兒已露頂而不下此轉身時臍帶絆

幼幼集成 卷之一 二十一

幼幼集成 卷之一 二十一



其肩也扶母正身仰臥輕輕推兒向上以手指輕按兒肩去其臍帶然後用力送下

胎衣來遲氣虛弱也急服脫花煎若血流入衣中脹悶疼痛脫花煎加芒硝下之或有能事穩婆以手循臍帶而上以中指頂其衣輕覆衣中之血從容俟之亦下此良法也

產時用力太早水衣先破被風所吹產尸腫脹乾澀狹小者以紫蘇煎湯熏洗以香油和蜜潤之從容俟之無不下者

幼幼集成

卷之一

二十三

產時腸先出用淨盆盛溫水少入香油養潤待兒與胞衣下時母略仰臥自己吸氣上升穩婆以香油塗手徐徐送入或濃煎黃芪湯浸之內服補中益氣湯即上又有兒併胞衣下後膀胱墜出產尸者用前法送入仍服補中益氣湯若穩婆不謹膀胱扯破者八珍湯加猪脬為引服之可復

產畢產門不閉血氣大虛十全大補湯若因胎大而擦傷產門者斷艾益母草煎湯洗之

昏不知人古人多云惡露乘虛上攻故致血暈不知此證有二一日血暈一日氣脫若以氣脫作血暈而用辛香逐血化痰之劑則立刻斃矣不可不慎

一氣脫證產時血既大下則血去氣亦去故昏暈不省微虛者少刻即甦大虛者竭脫即死但察其面目如眼閉口開手撒手冷六脉微細之甚或浮而散亂此即氣脫證也速用人參多則五七錢少則三二錢加入炒米煨薑紅棗煎湯徐徐灌之但得

幼幼集成

卷之一

二十四

下咽即可救活若少遲延則無及矣無力備參者以大劑當歸補血湯加炒米煨薑紅棗煎湯灌下亦能救之

○附氣脫案

州左澧陽雲軒高君夫人梁氏膏梁之稟其質最怯產育亦多戊午分娩未見過艱產下精神猶健雲翁不以為意與予閑話中庭殊因一時下血過多忽報倒仆於地急視之則口張手撒面唇俱黑呼吸已寂然矣幸人參有便煎之不及即以一枝碎



噤納產婦口中以滾湯灌之方得下咽一吐傾囊  
而出蓋胃氣已不納受矣又嚼又灌連嚼五枝雖  
吐而未盡出良久嚼氣一聲而呼吸漸回仍大進  
參朮而愈自後分娩不復爲難客歲復姬偶患微  
痔予曰孕中患痔難於用藥姑緩圖之雲翁深以  
爲是而夫人必欲速愈予知其不可不敢承任勸  
其更醫連易數手分毫無效復延外科妄用毒劣  
胎雖未墮而瘡愈隆而不收以致晝夜呼號窘迫  
萬狀精神形質困憊已極及至臨月見其回唇見

幼幼集成

卷之一

二十五

白聲息至微六脉空浮而無根當夜用參三錢服  
十全大補一劑次早胞水以下煎參七錢以鷄湯  
冲服登時即產一男產婦精神勝舊不意三朝偶  
沾外感頭疼身痛惡寒發熱投以熟料五積散而  
愈未數日忽因惱怒陡然上氣喘急咳嗽連聲胸  
前脹痛喉內痰鳴水米不入略啜茶湯則上下阻  
截氣不相續數人扶坐莫能伏枕不時昏絕舉室  
惶惶因診其脉則細收無倫將近十至予知爲無  
根脫氣上衝乃以入味地黃湯黃納其氣二劑毫

不爲動予曰此等之證非大補真元莫能挽也乃  
以六味回陽飲參附桂薑歸地各三錢加鹿茸五  
錢一劑下咽而氣平能臥四劑全安曩之大臈乾  
枯業已滋潤而痔瘡痛苦亦不復言矣此等脉證  
在常俗之輩必疑臨產服參過多非用寬胸下氣  
不可消降一投下咽即斃仍歸罪於從前之參必  
群起而吹之矣不知臨產之日非猛進參朮則已  
脫於當產之際何能至今今之氣喘實由參力已  
過虛證復現予午不交竭絕立至非大力之方安

幼幼集成

卷之一

二十六

可挽回此證得生實由雲翁學識超邁胸中有主  
惟予言是聽所以效捷桴鼓稍循俗見者萬無生  
理矣  
凡閉脫二證不特產後宜辨卽中風中痰氣厥暑風  
及卒然倒仆昏暈不省咸宜辨之如牙關緊閉兩  
手握拳謂之閉證有餘之候卽疎風化痰亦可用  
之如口張手撒眼閉遺尿鼾聲謂之脫證蓋口張  
心絕手撒脾絕眼閉肝絕遺尿腎絕鼾聲肺絕皆  
元氣竭絕之候惟大進參附或可十中救一



予見產後脫證不敢服參而斃者不知其幾嘗聞人  
曰某產後無病忽爾眼暗一暈而絕者又某產後  
忽一呵欠即口張氣絕者即此脫證是也復有妄  
人不知脫證為何事不識人參為何物而從中阻  
撓不令服參而斃者亦不知凡幾死者有知能無  
抱九原之慟乎

一血暈證本由氣虛一時昏暈然血壅痰盛者亦或  
有之如果形氣脈氣俱有餘胸腹脹痛氣粗外證  
兩手握拳牙關緊閉此血逆證也黑神散無脹無

幼幼集成

卷之一

二十七

痛者悉屬氣虛大劑芍歸湯加肉桂

卒然暈倒藥有未及者燒紅秤錘用瓦盆盛至床前  
以醋沃之令酸氣入鼻收神即醒

產後百脈空虛洗拭太早令中風口噤手足搐搦角  
弓反張或因怒氣發熱迷悶用荆芥穗酒炒至黑  
大當歸各三錢用水半杯酒半杯童便半杯煎至  
一杯灌之牙關緊以簪抉開灌之仍捻其鼻以手  
摩其喉使得下喉即活矣 此即產後病瘳而幼  
科稱為驚風者是也

孕時觸損臟氣胞繫裂斷忽然胎墜名曰小產虧敗  
子宮較大產為尤甚然治此亦不同大產惟以滋  
補為上計

馮楚瞻曰小產不可輕視將養宜十倍於正產大產  
如栗熟自脫小產如生採之破其皮殼斷其根蒂  
也忽略成病者不少因而致死者恒多然此證始  
因歛血以成胎繼因精血以長養終因精血不足  
而萎墮故瘀血甚少倘有腹痛成塊有形多屬血  
虛氣逆惟大用溫補則新者生而瘀者去若行消

幼幼集成

卷之一

二十八

導破滯則逆氣愈攻而愈升多致不救更有血虛  
腹痛復有陰虧不能納氣以致痕疝為患者當以  
八味地黃丸加牛膝五味早晚服之自愈

張景岳曰凡小產有遠近其在二三月者謂之近五  
月六月謂之遠新受而產者其勢輕懷人而產者  
其勢重此皆人之所知也至若尤有近者則隨孕  
隨產矣凡今艱嗣之家犯此者十居五六其為故  
也總由縱慾而然第自來人所不知亦所不信茲  
謹以筆代燈用指迷者倘濟後人實深願也請詳



言之蓋胎元始肇一月如露珠二月如桃花三月四月而後血脈形體具五月六月而後筋骨毛髮生方其初受不過一滴之玄津耳此其橐籥正無依根莖尚無地盤之則固決之則流故凡受胎之後極宜節慾以防泛溢而少年縱情罔知忌憚雖胎因慾輕者保全亦多其有兼人之勇者或恃強而不敗或既敗而復戰當此時也主方欲靜客不肯休狂徒敲門撞戶顧彼水性熱腸有不啟扉而從隨流而逝者乎斯時也落花與粉蝶齊飛火棗

幼幼集

卷之一

二十九

其交梨並逸合汚同流已莫知其昨日孕而今日產矣朔日孕而望日產矣隨孕隨產本無形迹在明產者胎已成形小產必覺暗產者胎仍似水直溜何知故凡今之術術家多無大產以小產之多也娶娼妓者多少子息以其子宮滑而慣於小產也又嘗見艱嗣之人而求方者問其陽事則曰能戰問其功夫則曰儘通問其意况則怨嘆曰人皆有子我獨無亦豈知人之明產而爾之暗產耶此外如受胎三月五月而每有墮者雖衰薄之婦常

有之然必由縱慾不節致傷母氣而墮者為尤多也故凡恃強過勇者多無子以強弱之自相殘也縱肆不節者多不育以盜損胎元之氣也豈悉由婦人之罪哉

此景岳見道之言古人每日寡慾多男此即其註脚也世人每恨不孕孰知既受而暗損之屢受而屢損之終身無子不亦宜乎第有婦人由於衰弱或陰陽偏勝障胎至於數次而醫者竟無一策以保固之亦可哀矣予有至神至聖保孕之方屢經效

幼幼集

卷之一

三十

驗但信而行之斷不相悞

○集成三合保胎丸

此為素慣墮胎者設也蓋胎孕之屢墮雖由於衝任虧脾胃弱若德性幽閑內臟無火者決不墮也能清心節慾起居有恒者決不墮也凡屢墮者皆偏破之性暴怒之人以致於肝氣有餘肝血不足血虛生熱火燥子宮又或恣縱不節其胎必漏而墮矣而世之安胎者無非執泥古法以香砂芎艾為保孕良圖不知熱藥安胎猶抱薪救火不惟無濟



而反速之予甚不嫌因以古之內補丸杜仲丸白  
朮散三方合奏名三合保胎丸以條芩清肝火而  
涼血白朮扶中氣以健脾當歸養血寧心熟地滋  
陰補腎續斷填損傷而堅胞繫杜仲益腰膝而暖  
子宮至怯者加以人參力不能者不用亦可藥雖  
平易功勝神丹誠所謂鍼芥相投捷如影響凡屢  
墮者服之無不保全實亦婦科保胎安胎之聖藥  
也再有叮嚀凡屢墮者受娠一月即製此丸服之  
蓋墮胎必在三月五月七月之間此三月內切忌

幼幼集成

卷之十

三十一

房勞惱怒犯之必墮七月已過萬無一失

○方

大懷地 一十二兩用砂仁三兩老薑三兩同地黃入  
入好酒煮之線以地黃糜爛為度將酒煮乾

取起原去砂仁燕片不用將地黃搗碎候  
大當歸 兩以好酒洗過晒乾聽用

漂白朮 取淨乾片一十二兩以黃土研碎拌炒極

實條芩 枯炒者不用取小質者切片六兩酒炒

杜仲 切片一十二兩鹽水

川續斷 切片一十

二兩酒炒

右將後五味和為一處火焙乾燥石磨磨為細末  
篩過以前地黃膏和勻少加煉蜜入石臼內搗干  
餘柞為丸棗豆大每早鹽湯送三錢晚臨臥酒送  
三錢每日如此不可間斷孕婦素怯者須兩料方  
可自一月服起過七個月方保無虞此方至神至  
聖幸勿輕視

凡臨產時亟齋有六字真言一日睡二日忍痛三日  
慢臨益予復有三字寶曰未離經較六字真言更  
為親切蓋六字真言出於常人之口產婦未能深

幼幼集成

卷之十一

三十二

信三字實為醫者之言不容不信誠保產金丹回  
生上藥予以此法救人莫可勝紀凡臨產家診視  
無論脈之滑濇痛之緊緩但曰未離經仍囑產婦  
曰脈未離經尚非正產且脈氣舒徐定然安吉惟  
宜加食穩臥俟其時至可也此何意蓋產育全賴  
母氣為主產婦問其脈未離經知時未到不敢望  
其速下惟安心耐之而已產婦一安舉室皆安庶  
無倉皇擾攘之患天下原無難產之事凡難產而  
致死者總出時候未至倉皇逼迫害之也始則家



長驚張不能鎮定總則產婦嬌怯不肯忍痛或弄  
 產或轉胞稍有腹痛隨即聲揚無知穩婆便稱是  
 產而試水坐草一任胡為豈知七候未臨胎氣未  
 足子在胞中安然不動欲令其產焉可得乎因其  
 人而不下產婦則驚懼憂疑飲食不納漸至氣怯  
 神昏常有未產而斃者矣予臨是證但曰未離經  
 惟以大劑甘溫之藥與之如八珍十全之類助其  
 產母之元氣若為正產則腹痛陣緊一陣痛急自  
 下倘非正產則腹痛漸減漸緩胎元得暖而安矣

幼幼集成 卷之一 三十三

予之所經穩婆謂頭已平門予診得脈未離經用  
 固胎暖藥而安之有遲至一月半月十日而產者  
 已經十數人矣豈有頭已平門而能倒懸一月半  
 月之理即此可知穩婆之不足信不觀巫齋有日  
 凡邪滯之婦私胎血無難產總因胎起於私怕人  
 知覺只得極力忍痛痛到極熱之時則脫然而出  
 此豈有穩婆分插妙藥催生乎凡產育能耐心忍  
 痛聽其自然則萬舉萬全若謂藥能催生予則未  
 敢許也至催生之法謂產時胞漿已下一二時辰

不生方可用之蓋漿乃養兒之物漿乾不產必胎  
 元無力愈遲則愈乾力必愈之不得不以大補氣  
 血之藥助其母力又惟人參為至聖其次則脫花  
 煎芎歸湯皆可然亦須子已出胞交骨既開門戶  
 已正方為有益若止鬼產婦腹痛之言穩婆頭至  
 之說妄用催生方藥不惟無濟反速其斃慎之戒

○人方

十全大補湯

幼幼集成 卷之一 三十四

揀人參 炒白朮 白茯苓 懷熟地 當歸身  
 正川芎 杭白芍 炙黃耆 上肉桂 炙甘草  
 生薑紅棗為引

八珍湯

揀人參 炒白朮 白茯苓 大當歸 正川芎  
 白芍藥 懷熟地 生薑大棗為引

加味芎歸湯 治新產交骨不開

全當歸 正川芎 油髮灰 敗龜板 炙

水煎熱服



周虛中曰、陽開而陰主闔自然之理也、今交骨不開、陰極矣、必加肉桂以宜佈陽和、庶為有濟、若龜板、髮灰之純陰、僅可為通任脉之嚮導耳、

脫花煎 凡生產臨盆、此方最佳、并治產難、經日不下、并死胎胞衣不下俱妙、

全當歸錢一 正川芎錢三 上青桂錢二 淮牛膝錢二

淨車前錢五 水煎加酒對服、若胎死不下及胞衣

不來、併加芒硝五錢、氣虛困劇者、加入參二三錢、

更加附子二錢、無不下者、此方比平胃散加芒硝

功効集戾 卷之一 三十五

功勝百倍、以其藥味甘溫、不傷元氣、故也、

補中益氣湯

揀人參 炒白朮 炙黃耆 黑升麻 北柴胡

全當歸 廣陳皮 炙甘草 生薑大棗引

當歸補血湯 治產時去血過多、心內怔忡、頭暈眼

黑昏沉不醒、

炙黃耆兩一 當歸身錢五 加炒米一兩 生薑五片

大棗五枚水煎服

黑神散 治產後血暈、胸腹脹痛、氣粗、牙關緊閉、兩

手握拳、血逆之證、

上青桂 全當歸 杭白芍 黑炮薑 懷熟地

大黑豆錢炒五 水煎酒對服、

生化湯 此方去舊生新、凡產後無論有病無病、能

服數劑、使惡露盡去、新血速生、誠產後之要藥也、

世俗每以紅糖下瘀、反致損胃、戒之、

大歸身錢五 正川芎錢二 光桃仁二十粒

黑炮薑錢一 炙甘草錢一 每日一劑、水煎熱服、四

五劑為度、

功効集戾 卷之一 三十六

清魂散 治產後瘀血攻心、數日神昏不醒、痰化為

膿、流出臭穢、而不知者、神效、

白當歸錢三 正川芎錢二 鮮澤蘭錢三 川芥穗錢一

鮮益母錢二 揀人參錢一 炙甘草五分

生薑大棗水煎服

加味芎歸湯 催生及產後、此為穩當、功亦鉅、

當歸身兩一 大川芎錢五 上青桂錢二 催生但用

此三味、水煎酒對服、立下、預防血暈、以本方

酒炒荆芥二錢、先將此藥煎好、俟胞衣已下、



服之永無血暈之患效經千百斷不悞人

八味地黃湯 產後氣浮喘促不甚虛者以此納氣

歸元至虛者不能

懷熟地五錢 正懷山四錢 淨棗皮三錢 白茯苓三錢

宜澤瀉錢 粉丹皮錢 川附片二錢 上青桂二錢

水煎極濃空心服

六味回陽飲 凡真元已敗氣血既亡陰陽將脫非

此莫能挽回誠回天贊化第一之功此景岳新方

知者尚少

幼幼集戊

卷之二

三十七

大熟地五錢 大當歸三錢 熟炮薑二錢 熟附子二錢

青化桂二錢 上揀參錢 加鹿茸錢 功更捷生

薑大棗為引水煎溫服此方不剛不猛能回散失

之元陽能斂亂離之陰血濟急扶傾無出其右者

催生簡便方

人能鎮定耐痛待時必無難產之患或因倉皇急

迫不幸遇此而催生之法不可不知又或窮鄉僻

壤醫藥不便誠為困苦故附單方於此以備急需

一治橫生逆產胞衣不下併落死胎 用蓖麻子四

十九粒去殼研爛於產婦頭頂心剃去少髮以蓖

麻膏塗之須臾覺腹中提上即宜除下却懸於足

心塗之自然順生生下即速去藥遲則恐防腸出

如胞衣不下貼足心即下

一鄉村僻壤無藥之處不幸過此即取花椒葉香圓

葉柚子葉菜葉生薑生葱紫蘇濃煎湯一盆俟

可下手即令產婦以小櫬坐盆上澆湯淋洗其臍

腹陰戶久久淋洗氣溫血行登時即產已上諸藥

少一二味亦不妨

幼幼集戊

卷之二

三十八

一治死胎不下及胞衣來遲 用黑豆一升炒香熟

入醋一大碗煎至六七分去豆取湯分三次服之

以熱手順摩小腹其胞胎俱下

又方 用冬蜜一大杯以百沸湯調服之立下如胞

衣來遲再服一碗即下

一治產難及橫生逆產或血海乾枯以致胎死不下

惶惶無措死在須臾 急用皮硝五錢熟附子一

錢五分好酒半杯童便半杯同煎三沸溫服立下

百發百中



一方治產婦元氣弱極胞衣來遲者用真青化桂三錢當歸川芎各錢半酒煎熱服立下

一下死胎 用麥芽半觔搗碎水二大碗煎至一碗服之即下

又方 天花粉四錢 上肉桂 淮牛膝 淡豆豉  
各三錢 用水二碗煎至一碗熱服即下

熟料五積散

此方專治婦人產後外感內傷瘀血不行痰凝氣滯頭疼身痛惡寒發熱心腹疼痛寒熱往來似瘧

幼幼集成

卷之一

三十九

非瘧小腹痛滿傷風咳嗽嘔吐痰水不思飲食胸緊氣急手足搐搦狀類中風四肢酸疼渾身麻癩凡產後一切無名怪證並皆治之

夫產後百節俱開氣血兩敗外則腠理不密易感風寒內則臟腑空虛易傷飲食稍有不慎諸證叢生古書有產後以大補氣血為主雜病以未治之之戒後世莫不遵之惟事滋補不知風寒未去食飲未消滋補一投反成大害昧者猶以為藥力未到愈補愈深死而後已天下之通弊莫此為甚予昔

於潭州遇師指授此方按法治之往輒裕如不敢自秘逢人口授併會刊板印送於茲四十餘載活人莫可勝紀但慮世人不悟以為淺近之方安能神應若是故古人謂千金易得一訣難求予今訣破度狐疑頓釋方名五積者謂此方能去寒積血積氣積痰積食積也今產後之病怯正犯此五積以五積之證投五積之方豈非藥病相值乎猶慮藥味辛散而以醋水拌炒名熟料五積散俾藥性和緩表而不發消而不攻方內所用肉桂解表逐

幼幼集成

卷之一

四十

寒白芍和榮諸衛蒼朮厚樸走陽明兩散滿陳皮半夏疎逆氣以除痰芎歸薑芷入血分而祛寒濕枳殼桔梗寬胸膈而利咽喉茯苓去飲寧心甘草和中補土大虛大怯者加入參微虛者可不用共為溫中散寒之妙劑川於產後無往非宜 五積散本方原有人參因世人不取輕用故方中未載香白芷一錢 上青桂一錢 此二味不必炒 川厚樸 正川芎 芽桔梗 陳枳殼 白雲苓 炒蒼朮 杭白芍 法半夏 黑炮薑 炙甘草 廣陳皮



已上各一錢 全當歸<sub>工錢</sub> 虛加人參<sub>錢</sub>

右藥味皆宜秤過除白芷肉桂在外不炒餘藥合為一劑用好醋小半杯淨水一杯與醋和勻將藥潤濕入鍋內炒至黃色為度取起攤地上去火毒候冷入白芷肉桂在內生薑三片紅棗三枚淨水二碗煎至一碗熱服此方至平穩見效之後依而服之不拘劑數以愈為度惟產後大汗泄瀉或虛脫之證忌之蓋此方但能去病不能補虛虛證有方在前並宜參攷

幼幼集成 卷之一 四十一

產後簡便方

產時母腸先出然後兒生產後其腸不收甚為危迫用醋半杯新汲水半杯調勻喂產婦每喫一縮三吸收盡其良法也

又方 以蓖麻子四十九粒去殼研爛塗產婦頭頂心腸即收入急去藥以溫水洗淨倘其腸乾燥難收用磨刀水溫潤其腸再以雄磁石煎湯服之其腸自收  
一產婦及平居偶因用力大過傷致子腸不收用

艾九菘豆夫灸頭頂心百會穴三五壯即收

又方 先以鹽湯洗淨後用五靈脂燒煙於桶內合患者坐桶上熏之自上

又方 用清油五觔煉熟以盆盛之候溫涼合產婦坐油盆內約一頓飯久仍以皂角為細末微以一盞吹入鼻中合作嚏立上

產後玉門腫痛 用蛇床子三兩煎湯頻洗即愈又以葱白和乳香搗成膏貼腫上效

產後乳汁不通 用天花粉炒黃為細末每用二錢

幼幼集成 卷之一 四十二

以紅飯豆煎濃湯調服每日服二次其乳流溢

產婦氣血大虛無乳者用 全當歸<sub>三錢</sub> 正川芎<sub>二錢</sub> 穿山甲<sub>炙</sub> 王不留<sub>各錢</sub> 川木通<sub>五分</sub> 猪蹄<sub>一</sub>

隻煮藥以猪蹄爛為度去藥服湯並蹄立通

產後陽氣虛寒玉門不閉用 石硫黃 海螵蛸

北五味 等分共為末摻患處日三易

產後玉門不閉陰戶突出 石硫黃<sub>三錢</sub> 兔絲子

吳茱萸<sub>各二錢</sub> 蛇床子<sub>一錢</sub> 水一大碗煎至半碗

類洗自收



產後擦破膀胱不能小便而淋瀝 黃絲絹剪碎

牡丹皮 鮮白芩各一錢 將丹皮白芩研為末同

黃絹用水一碗煮至絹爛空心服之服時不可作聲作聲則不效

○初誕救護

小兒初生或不能發聲謂之夢生多不知救深為可

憫切勿斷臍帶速用明火將胞衣炙煖使煖氣入

兒腹更以熱湯盪洗臍帶却取貓一隻以布袋裹

其頭足使佻佻婦人拿住貓頭向兒耳邊以口嚙

幼幼集成

卷之一

四十三

猶耳貓必大叫一聲兒即醒而開聲方可燒斷臍

帶

又有因難產或日風寒舉之遲兒氣欲絕不能啼者

亦以前法溫暖之令暖氣入腹氣回即甦更令父

母之真氣呵而接之

凡斷臍帶世俗皆以刀剪斷之最為不妥但以大紙

燃蘸香油燃火於臍帶上燒之令斷蓋所以補接

其陽氣不但為回生起死之良法且後日無傷寒

泄瀉之患

此明按字 與此字 本判細目 處他僧附 方攪作撮

初生腎緒乃受寒氣所致用硫黃與茱萸各三錢研

極細末指取葱汁調藥塗臍腹另以蛇床子燒燼

熏之即伸

悶臍生者兒糞門有一膜悶住兒氣故不能出擊拍

之則膜破而叫矣 又有用輕巧婦人以銀簪輕

輕挑破為甚便或不能挑急以暖衣緊包勿令散

放以熱水浸其胞衣寒天則以火炙之人則熱氣

入腹而氣內鼓其膜自破聲自出

又有生下無穀道者乃肺熱閉於肛門急以金銀或

幼幼集成

卷之一

四十四

玉簪看其端的刺穿之或以火針刺穿但不可深

以油紙燃套住免其再合

兒初生下遍身如魚脰或如水晶破則流水以蜜它

參研細末攪之

初生遍身無皮俱是紅肉急以早米粉乾撲之候其

皮生則止

初生大小便不通腹脹危急者急令婦人口含熱水

吮兒之前後心并臍下手足心共七處每一處吮

吸七口以肉色紅赤為止須臾即通 又方以蜜



時明按此  
切與烏八

汁人乳各半調勻抹兒口中須臾即通

初生不尿以葱一根切碎人乳半杯同煎去葱取乳分作四次服即尿 不吮乳者服此即吮乳

○調燮

小兒初生飲食未開胃氣未動廓然清虛之府宜乘此時加意調燮於兒未啼之時令精巧婦女輕指探兒口挖去汚血隨以甘草湯用軟帛裹指蘸音湯拭去口中涎沫然後看兒面色若身面俱紅唇舌紫赤知其必有胎毒每日用鹽茶但不可太鹹

幼幼集成

卷之一

四十五

以帛蘸洗其口去其粘涎日須五六次此法至神至異世所不知蓋兒之胎毒藏於脾胃口中多有粘涎其馬牙鵝口重舌木舌皆從此起每日洗拭則毒隨涎去病從何來而且至簡至易何忽視而不為倘胎毒重直須洗過週歲方得此有毒者之調燮也倘兒面唇淡紫此為胎寒不可用茶惟以淡薑湯洗拭每日一二次足矣蓋薑能開胃而且和中最切於時用者至於古方之用黃連大黃朱砂輕粉開口之法此時斷不可用今時稟受十有

四字典戶  
取切

九虛苦寒剋劑最不相宜况嬰兒初誕如蟄蟲出穴草木萌芽卒遇暴雪嚴霜未有不為其殪折者以苦寒而入初誕之口亦若是也每見三朝七日必有吐痰現乳泄瀉夜啼之證是皆苦寒傷胃之害其孰能知之

或曰子言苦寒不可用於初誕之口何以後之沈瀝丹及瀉青丸有三黃大黃得無矛盾乎曰彼胎毒已現外證可憑有病病當何大黃之足畏今初誕開口未辨毒之有無即使有毒尚然未發深藏

幼幼集成

卷之一

四十六

潛伏聲臭俱泯程鳳雛有言正如問閻無事時未可執平人而誅之曰爾將為寇也以苦寒而開口是誅平人也毒發而畏苦寒是有寇不誅鄉原之仁焉乎可也

○臍風論證

臍為百風總竅五臟寒門道家謂之下丹田為人身之命蒂兒在胎時口鼻未通呼吸惟臍間真息隨母之呼吸為呼吸及其下地凹底一聲氣通口鼻而胎元之一息不復為用矣遂寄於臍內一寸三



余中虛一穴左青右白上赤下黑中央黃色八脈  
 九竅經絡聯絡為真息往來之路坎離交會之鄉  
 凡脩鍊仙胎皆從此處立基所以謂之命帶故小  
 兒初生惟臍之一係最重斷臍之時不可不慎或  
 剪臍帶太短或結束不緊致外風侵入臍中或浴  
 兒時牽動臍帶水入生瘡客風乘虛而入內傷於  
 腎腎傳肝肝傳心心傳脾脾傳肺蘊蓄其毒發為  
 臍風其證面赤啼叫者心病手足微搐者肝病唇  
 青口搥痰涎壅塞者脾病牙關緊急者腎病啼哭  
 不止者肺病五臟之證略見一二者猶可治悉見  
 者不治

幼幼集成

卷之一

四十七

小兒初生惟臍風為惡候其證有三曰臍風曰噤口  
 曰鎖肚雖皆臍證而寒熱自別治者宜詳  
 一曰臍風由斷臍後為水濕風寒所乘入於臍而流  
 於心脾合肚腹脹滿吮乳口鬆多啼不乳此初起  
 之時速用火攻散之若至氣息喘急啼聲不出或  
 肚上青筋吊疝作痛此胎毒夾風邪入臟外用火  
 功內服指迷七氣湯方見二卷胎毒門若肚臍青腫撮口

不開牙關緊閉口吐白沫瓜甲青黑者皆不治  
 一曰噤口其證眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟  
 米狀吮乳不得口吐白沫大小便不通遇此先看  
 其上脘有黑子即以指甲輕輕刮破以木香白朮  
 仁各五分煎湯化下沈滄丹利動臟腑氣順自愈  
 一曰鎖肚由胎中熱毒壅盛結於肛門大便不通急  
 令婦女溫水漱口吮兒之前後心併臍下及手足  
 共七處凡四五次外以輕粉五分研末蜂蜜少許  
 溫水調服以通為度如更不通以葱白三四寸長  
 用油抹潤輕透穀道納入二寸許以通為快若至  
 七日不通者死

幼幼集成

卷之一

四十八

古人之論臍風皆謂由於水濕風冷所致予則以為  
 古論猶未盡也蓋臍風有內外二因有可治不可  
 治之別外因者風濕所傷內因者稟父之真陽不  
 足也予嘗見一士產育十數胎皆男盡殤於七日  
 內之臍風無一存者若謂外邪所傷何以獨傷此  
 家之兒又豈無一兒能避之者此內因之顯而易  
 見也凡男子之命門真陽不足者右尺脈必細



無神生子必有臍風此予察之詳見之確非耳聞者比也其外因者病發於二三四五日之間病生於六腑故可治內因者必發於六七日之間病生於五臟故不可治曩者夏禹錡有預防臍風之訣謂三朝一七看兒兩眼角黃必有臍風不知稟受厚者生下卽滿面紅黃乃爲吉色誤認臍風其害不小此法不確惟令乳母每日摸兒兩乳乳內有一小核是其候也然乳內有核發臍風者固多而復有不發臍風者此法十有七八亦有二三不分

幼幼集成 卷之一 四十九

確但看小兒不時噴嚏更多啼哭吮乳口鬆是真候也急宜治之若臍風之治無一成法可遵雖有疎風攻下之法莫能濟急獨予異授燈火無論臍風痙搐以及凶危險證用藥不能挽回者此火可以生之人經效驗未肯輕傳因見幼科不知火穴往往錯誤用之反致引動風邪蔽固火毒致兒身熱不退火毒內攻每多不救故不忍隱秘盡行吐露以公諸世世之幼科治病輒曰剪風曰截風夫剪者邀遏之謂也截者堵塞之謂也以火功用於

中官任脈所行之地豈非堵遏其邪而犯關門逐盜之戒乎不知風邪之在人身善行數變無形無聲欲除其害無如疎散條達而去之不使久羈於榮衛經絡則善矣如仲景之治傷寒而立汗吐下三法邪之在表者汗而散之邪之在上者吐而越之邪之深入者下而奪之總欲其邪盡而後已未聞有邀遏之爲也今幼科不但不爲逐邪而反閉關絕險阻其去路使邪氣進不可退不能猖狂躑躅欲其不倒刃相攻斬關逆犯者不可得也此皆

幼幼集成 卷之一 五十

爲治者釀成之禍於邪何尤凡邪之傷人未有不從三陽而入驅除之法亦必使其從三陽而出故此火穴亦惟三陽有之蓋欲引其出表斷不使之入裏也故爲圖說

請政

大方

○用火口訣

夫嬰兒全身燈火誠幼科第一捷法實有起死回生之功火共六十四燠陰符易數能疎風散表行氣




利痰解鬱開胸醒昏定搐一切凶危之候火到病除用火之時倘值寒冬必於房中燃燒明火使兒不致受寒燈草大小適中以麻油染用令老練婦人抱兒解衣去帽從左耳角孫起總依後之歌訣用之凡用火不可姑息勿謂火數太多憫其難受蓋小兒受病由其經絡凝滯臟氣不舒以火散之正欲使其大叫大哭方得臟氣流通渾身得汗榮衛宣暢立時見功此火暗合周天不可減少少則不效若救腦風非此不可火穴圖歌並列於後

幼幼集成

卷之一


五十二

集成神火圖



銅人正面

銅人背面



幼幼集成

卷之一

五十二

集成神火歌

仙傳神火天然理始自角孫惡脈起聽宮曲髮木神旁次及天容仍右取 願會承漿左肩井曲池合谷諸邪屏氣關已過至神門右亦如之昏可醒左乳根中七燦始右亦如之何待齒崩下陰交續命關平平三點凶危止 脊中身柱至長強肺俞陽陵承山當崑崙解谿邱墟穴湧泉右亦效之良

指明火穴



仙傳神火天然理始自角孫聽脈起凡用燈火無論男嬰女嬰皆從

左邊用起角孫在耳尖上聽脈在耳後根聽宮曲髮本神功次及天容

仍右取聽宮在耳門前曲髮在髮脚旁本神在額角天容在耳輪根下左邊已完右亦如此

願會承漿左肩井曲池合谷諸邪屏願會印願門承漿在下唇

宛宛中肩井在肩上天宛中從左起故口左肩井

曲池在肘灣上廉屈縫處合谷在虎口近又骨處

氣關已過至神門右亦如之昏可醒氣關在食指第二節神門

在掌後下廉銳骨之端左宛右亦如之左乳根中七焦始右亦如之

何待齒自左乳根下起從上至下七焦止右乳根亦如之臍下陰交續命

關平平三點凶危止陰交在肚臍下脊中身柱至半寸用火三焦

長強肺俞陽陵承山常身柱在項骨三節下從上至下九焦至長強穴止肺

俞在兩假魁骨縫中陽陵泉在膝外邊下三寸承山在脚肚盡處崑崙解谿邱墟

湧泉右亦效之良崑崙在脚後解谿在繫鞋帶處邱墟在脚後骨前湧泉在

脚底中心左脚焯完右亦如之

○宜用火者

一平素產子有臍風則胎胎不爽於產下第二日勿

待其發先以此火散之百不失一

一胎嬰生下多啼不乳噴嚏呵欠吮乳口鬆是即臍風作矣急以此火散之

一凡兒病面青面黑扭項推頭仰身擦面或眼青怒

視或左右斜視或上下窺視或兩目連刺或頭項

牽強蹇舌露筋噓風撮口啼哭咬人或手如數物

或兩手牽引或兩足跳掣忽擾忽亂失張失志但

覺神情與常有異者由從前表裏不清將欲作瘧

此火至妙

一傷寒已瘳角弓反張眼目斜視左右搐搦并中惡

客忤癩證與食填太陰及一切風閉火閉痰閉氣

閉乍然卒死者此火最神

一食傷脾胃肚大青筋於端午日午時用全身燈火

復於青筋開又處以火截之二又一點其肚自消

風寒痰氣閉塞之證此火實有神功凡用燈火既

完俟兒啼哭已定即用金粟丹半丸薑湯化服服

後以衣裹之蒙其頭面合之安卧片時以復其神

志其病如夫

切忌火者

一小兒四時傷風感冒身熱自汗大小便調唇舌如

常口不作渴此表病輕證也疎解之則愈愚人妄



凡足謂輕病重治反為不祥

一 小兒邪已入裏身熱而赤口渴大小便秘唇焦舌

紫眼紅或手足心熱夜熱焦煩舌上黃胎揚手擲

足厥衣揭覆此裏證內熱也清利之自愈不可用

火強用之不特不能使熱邪從裏以達表適足以

助熱而耗陰致身熱不退在夏秋燥令尤為大忌

一 小兒大病久病身體怯弱面色青黃唇舌白瑩播

頭斜視昏睡露眼形骸消瘦聲息輕微自汗盜汗

或一切嘔吐瀉利痘麻瘡癰久瘧久嗽失血之後

幼幼集成

卷之一

五十五

精神疲倦乳食減少指紋沉細六脈無神此皆虛

極之證切忌火攻慮其升散故也

一切久熱消渴疳證形骸黑瘦毛髮焦枯山陰虧血


弱虛熱所為誤用燈火愈增其燥慎之

一 燈火為兒科切要今醫家不特不明火穴而併不

辨寒熱虛實不當用而用之反為大害惟依以前

辨法則用之無不當矣

附夏禹鑄臍風火圖



幼幼集成

卷之一

五十六

夏禹鑄曰臍風初發吮乳必口鬆兩眼角挨眉心處

忽有黃色宜急治之治之品易黃色到鼻治之仍

易到人中承漿治之稍難口不撮微有吹噓猶可

治也至唇口收束鎖緊舌頭強直不必治矣一見

眉心鼻準有黃色即用燈火於額門一燦人中承

漿兩手大拇指端少商各一燦臍輪遠臍六燦臍

帶未落於帶口一燦既落於落處一燦共一十三

燦風便止而黃即退矣

予按古今燈火惟上全身火有經有府有理有法



無有出其右者，第火炷多恐倉卒之際，在嫻熟者不難，倘素未經練者，一時不能用，故附夏氏臍風火於此，庶忙迫之時，可以濟急。此火亦曾經驗，第不及全身燈火耳。

○回生艾火

以前全身燈火，皆為實邪升散之用，併一切怪證，莫可名狀者，無不奏功。倘涉久病體虛，忽然精神潰亂，人事昏沉，前火則為不宜，須用回生艾火挽之。蓋此火能回散失之元陽，收歸氣海，固其根蒂，免

幼幼集成

卷之一

五十七

致離散。其法以生薑切為紙厚薄片，大如指甲，貼尾間穴。脊骨盡處命門穴。在腰脊間前正對臍以艾絨接緊如菘豆大，炷片上用火灸之，每穴以三炷為度，灸完另以薑片貼臍下陰交穴，如前灸之。此火不待小兒可用，凡男婦一切中風中痰氣厥陰證虛寒竭脫，百危之候，咸宜用之，有起死回生之功。幸母輕視。


凡小兒中惡客忤，以及痰閉火閉風閉，乍然卒死，即以全身燈火醒之，倘一時未有其人，即以大拇指

其人中穴病輕者，一搦即啼哭而醒，倘不應，搦合谷，又不應，搦中衝。若再不應，其病至重，則以艾炷如蘿蔔子大，於中衝穴灸之，火到即活。蓋中衝一穴為厥陰心包絡之脈所出，其經與少陰心臟相通。此火一燃，則心中惕然而覺，倘此火全然不知，則百中不能救一矣。

幼幼集成

卷之一

五十八



○入方

辰砂殭蠶散 治撮口臍風鎖肚

鏡辰砂水飛五錢 立殭蠶炒一錢 天竺黃分五

蚌珠珍分三 真麝香分一



為末每用少許蜜調抹兒口中、  
龍膽湯 治身熱臍風撮口、

龍膽草 鈞藤鈞 北柴胡 虎黃草炒 京赤芍

炙甘草 茅桔梗 白茯苓各五分 川大黃紙包煨

大棗一枚木煎溫服、

治撮口 用牛黃一分研末、竹瀝調滴入口中、又

方取蝎虎一箇印壁虎也裝瓶內、用朱砂細末亦入瓶

內、封其口、月餘令食砂、取出其身赤色陰乾為末

每一二分酒調下

幼幼集成

卷之一

五十九

又方治撮口 用穿山甲用尾上甲三片 羊油炙極黃色 蝎稍七

共為細末、入乳汁調塗乳上、令兒吮之、用厚衣包

裹須臾汗出即愈、

保生湯 治胎風鎖肚口噤、

北防風七分 陳枳殼五分 小橘紅四分 白茯苓三分

荆芥蕙三分 遠志肉四分 制南星五分 茅桔梗三分

炙甘草二分 燈心引

二豆散 治臍腫突、

紅飯豆 淡豆豉 天南星 鮮白蕪各一錢

為末、用芭蕉自然汁少加香油、調藥收臍、四傍得  
小便目下即愈、

龍骨散 治臍瘡

石龍骨煨一錢 真輕粉五分 川黃連一錢 枯白礬煨一錢

為末乾摻 一方用大紅羊絨燒灰為末敷

之效

○臍證簡便方

小兒初生、犯撮口臍風、荷包風、鵝口風等項、并齒根

邊生白點、名馬牙、啼哭不吮乳、即看口內堅硬之

幼幼集成

卷之一

六十

處、或牙根邊白點、將針挑破、出血、濃煎薄荷湯磨

京墨調勻、以指攪過、再以產母乳髮蘸墨、滿口搽

之、仍用新青布蘸溫水展口、即愈

小兒臍風撮口、用完全生葱二根、搗爛取汁、又以直

礪蠶三個、炒去絲、研極細末、以葱汁調勻、塗母乳

頭上、令兒吮之、或灌兒口內亦可、

小兒臍風撮口、以艾葉燒灰、填臍上、以帛縛之、若臍

帶已落、用蒜切薄片、貼臍上、以艾火灸之、候口中

有艾氣、立愈



小兒噤風初生日噤不乳蟬蛻十四枚全蠲去尾毒  
洗去鹽泥十四枚炒乾爲細末入輕粉三分每用  
一匙乳汁調灌

小兒撮口但看舌上有瘡如粟米者是也以蜈蚣炙  
焦研末敷瘡上

撮口噤風面黃色氣喘聲不出由胎氣挾熱流毒心  
脾故合舌強唇青粟口發噤用直僵蠶二枚去嘴  
畧炒爲末蜜調納兒口中

小兒十日內日噤不乳取大蜘蛛一枚去足炙焦研

幼幼集成

卷之一

六十一

細末入豬乳一小杯和勻分作三次徐徐灌之神  
效無比

小兒臍疔出血及膿用海蝶蛸胭脂共爲末以油潤  
漆乃擦藥

○初生護持

嬰兒初生肌膚未實宜用舊絮護其背亦不可太煖  
更宜數見風日則血氣剛強肌肉緻密若藏於重  
幃密室或厚衣過暖則筋骨軟脆不任風寒多易  
致病衣衫當隨寒熱加減但令背暖爲佳亦勿令

其汗出恐致表虛風邪易入乳哺亦不宜過飽所  
謂慈三分饑喫七分飽頗操肚少洗澡皆至言也  
又須令乳母預慎六淫七情蓋兒初生藉乳爲命  
善爲乳母者夏不欲熱熱則致兒吐逆冬不欲寒  
寒則致兒欬嗽怒乳則上氣顛狂醉乳則身熱腹  
痛新房而乳則瘦瘠交脛不能行新浴而乳則發  
吐傷神冷熱不調停積胸膈結爲痰飲遂成壯熱  
壯熱不已乃成風痲兒啼未定劇以乳哺氣逆不  
消因成乳癖有孕而乳致兒黃瘦肚大脚小各日

幼幼集成

卷之一

六十二

魁音病總之乳母能慎寒暑恚怒厚味炙燥庶乳  
汁清和兒不致疾否則陰陽偏勝氣血沸騰乳汁  
敗壞必生諸病若屢服藥餌則臟腑陰損多變敗  
證均不可不知

初誕之時有於頭額之前髮際之間灸之又有以燈  
火遍身燒之彼以爲能截風路不知道足以大開  
風門蓋火功由兒有病不得已而用之無故而用  
伐及無辜諸病自茲始矣戒之戒之

凡浴時須調和湯水試看冷熱若不得所令兒怖畏



况冬久浴則傷寒夏久浴則傷熱其浴兒當護兒  
亦恐風寒從背而入

凡洗兒衣不可露於星月之下易惹邪祟如偶失收  
當用醋炭熏過方可衣之 有鳥各天地女又名

隱飛鳥其喜陰雨夜過飛鳴徘徊其鳥純雌無雄  
善落羽毛於兒衣中令兒作癩不可不謹

凡當春夏月間宜令其地臥使不逆生長之氣如遇  
秋冬宜就溫和使不逆收藏之令

凡在春天勿與護頂裝足以致陽氣不舒因多發熱

幼幼集成

卷之一

六十三

即至年長下體勿令過暖蓋十六歲前血氣方盛

如日方升惟真陰未足下體主陰得清涼則陰易

長過溫暖則陰易消故曲禮云童子不衣裘裳

夫人以脾胃為主故乳哺須節節則調養脾胃過則

損傷脾胃夏天忌熱乳冬月忌寒乳皆宜捏去之

而後與之凡食後不可與乳乳後不可與食小兒

脾胃怯弱乳食並進難於消化初得成積久則成

癖成疝皆乳母不慎之過

凡寒則加衣熱則減衣過寒則氣滯而血凝過熱

則汗洩而腠理疎以致風寒易入疾病乃生更忌  
解脫當風易於感冒然風和日暖又當抱出遊戲  
如陰地草木不見風日未有能堅持者又不可日  
置地間令肚着地以致脾胃受寒腹痛泄瀉慎之  
慎之

○勿輕服藥

初誕之兒未可輕藥蓋無情草木氣味不純原非嬌  
嫩者所宜且問切無因惟憑望色粗疎之輩寒熱  
二字且不能辨而欲其識證無差未易得也凡有

幼幼集成

卷之一

六十四

微疾不用倉忙但合乳母戒油膩葷酒能得乳

汁清和一二日間不藥自愈所謂不藥為中醫至

哉言也每見愚人兒稍不快即忙覓醫練達者或

不致悞疎略者惟以通套驚風藥治之此無事之

中生出有事伐及無辜病反致重父母見其無效

是必更醫卒無善手相與任意揣度日風日痰日

驚日熱前藥未行後藥繼至甚至日易數醫各為

臆說湯丸疊進刻不容緩嗟乎藥性不同見識各

異嬌嫩腸胃豈堪此無情惡味擾攘於中不必病



能傷人而藥卽可以死之矣予每見不聽勸戒雜藥妄投者百無一救哀哉

馮楚勝曰凡爲幼科猶宜參看方脈諸書蓋幼穉名曰啞科疾病痛苦勿能告人全賴治者細心詳察况幼科諸書理淺言略難明病源惟以小兒不節飲食爲執見最重消磨更以純陽之子爲定論恣投寒苦孰知易停滯者脾氣必虛若圖見小效於目前則便遺大害於日後况芽兒易虛易實言虛者正氣易於虛也言實者邪氣易於實也然邪

幼幼集成

卷之一

六十五

之實必乘正氣之虛若不顧正氣之虛惟逐邪氣之實其有不敗者幾希如寒傷榮也但溫養榮陰風傷衛也惟辛調衛氣但使榮衛和平而宣行則客邪不攻而自散使正氣自行逐賊則邪退而正氣安然如浮雲一過天日昭明也若尙投與氣血無情之猛劑客邪雖散正氣亦傷乘虛之邪將接踵而至矣豈知正氣不至空虛邪必不能乘而爲實至於云純陽者以無陰而謂乃穉陽耳其陽幾何陰氣未全而復敗其陽將何以望其生長耶况

天地之氣化日薄男女之情性日漓幼穉之稟受日弱有稟父之陽氣不足者多犯氣虛中滿有稟母之陰血不足者多犯陰虛發熱患痘則多犯腎虛內潰之證此皆先天不足所致近來比比皆然若徒效上古剋制寒涼如肥兒丸蘆薈丸之類則千中千死其能挽也至云小兒陽火有餘不知火之有餘實由水之不足壯水以制陽光先賢至論服寒涼百不一生古哲格言以不生之藥投欲生之兒心何忍哉凡小兒脾胃自能消穀今偶有停

幼幼集成

卷之一

六十六

滯則脾胃受傷只健其脾胃而穀自化矣故方有助脾消化推揚穀氣者有稟命門火衰生火補土者有一消一補者有以補爲消者誠恐寬一分卽耗一分元氣也夫人有生惟此一氣易虧難復何可輕耗况幼穉之稟尤爲易虧惟必根究先天之薄弱而從方脈諸書求源探本以爲治斯能補救當代赤子元氣於後天便亦培植後代赤子元氣於先天而壽世於無疆矣若徒宗上古幼科淺略方論則猶灌溉樹木者不顧根本而惟洒潤枝葉



欲望其生長未之有也而况復加剗劑者乎

○藥創之誤 張景岳

小兒氣血未充一生盛衰之基金在幼時此飲食之宜調而藥餌尤當慎也今舉世幼科既不知此大本又無的確明見而惟苟完目前故凡遇一病則無論虛實寒熱但用海底塊法而悉以散風消食清痰降火行滯利水之劑總不出二十餘味一套混用謬稱穩當何其誕也夫有是病而用是藥則病受之無是病而用是藥則元氣受之小兒元氣

幼幼集成

卷之一

六十七

幾何能無陰受其損而變生不測此當今幼科之大病而醫之不可輕任者正以此也又見有愛子者因其清瘦每以為慮而詢之庸流則不云痰火必云食積動以肥兒九保和丸之類使之常服不知肥兒九以苦寒之品最敗元陽保和丸以消導之物極損胃氣謂其肥兒也適足以瘦兒謂其保和也適足以造和耳即如抱龍丸之類亦不可輕易屢用予嘗見一富翁之子每多痰氣或時驚叫凡遇疾作輒用此丸一投而愈彼時以為神丹如

此者不啻十餘次及其長也則一無所知凝然一瘦物而已豈非貽損元神所致耶凡此剗伐之劑最當慎用故必有真正火證疳熱乃宜肥兒丸及寒涼等劑真正食積脹滿乃宜保和丸及消導等劑真正痰火喘急乃宜抱龍丸及化痰等劑即用此者亦不過中病則止非可過也倘不知此而徒以肥兒保和等名乃欲藉為保障不知小兒之元氣無多病已傷之而醫復伐之其有不萎敗者鮮矣

幼幼集成

卷之一

六十八

○看病訣

小兒初生欲知其有病無病以手捻其頭摸其頤頤不作聲者為無病以手指探其口雖發聲而從容啞指者有病亦輕若即發聲不啞指者面色青紅帶紫或牙關緊急不納乳汁此落地受寒之甚風邪入足太陽及足陽明而然也須急治之庶可平復

一初生之兒肥胖色嫩日覺好看者此其根本不堅甚非佳兆且且易感冒風寒邪入腑者近在第二



三日見之其證吐乳夜啼腹鳴此皆胎風之類然  
證猶淺而易治宜用全身燈火十不失一  
若邪之入臟遠在六七日見之此即胎風燥風擗口  
風之候若口噤舌大痰壅者皆不治蓋病傳入臟  
係心脾肺三經也此風氣甚盛無所發洩便形見  
於喉口牙關聲音也

凡生下時身破裂者死陰囊白者死陰不起者死無  
糞門者死股間無生肉者死開口如鴉聲者死粉  
白花色者死皮肉不光者死泣不出聲者死舌如

幼幼集成

卷之一

六十九

豬肝色者死面無彩色者天臍帶短大紫色者天  
生下渾身銀白色者天生下有齒者大齒主傷父  
母不然必傷自身生下未褻即撒尿者殺父母蕩  
家產在世終身勞苦

○壽夭辨

頭者諸陽之會髓之海也凡兒頭角豐隆髓海足也  
背者五臟六腑俞穴皆附於背脊背平滿臍腑實  
也腹者水穀之海腹皮寬厚水穀盈也目為肝竅  
耳為腎竅鼻為肺竅口為脾竅七竅無闕形象全

矣故知肉實者脾足筋強者肝足骨堅者腎足不  
妄言笑者心足不多啼哭者肺足哭聲連續者肺  
實不人眠睡者脾實兼之脚健而壯項長而肥囊  
小而黑根株固也肌肉溫潤營衛和也而更腮妍  
如桃髮黑似漆表氣實也小便清長大便滋潤裏  
氣實也已上皆為壽相其兒無病易養

諸陽皆起於頭顱破項軟者陽衰於上諸陰皆起於  
足臍小脚踏者陰衰於下鼻孔乾燥肺枯唇縮流  
津脾冷髮稀者血衰項軟者柱折青紫之筋散見

幼幼集成

卷之一


七十

於面者多病風熱兼之形枯色夭者表虛瀉利無  
時者裏虛瘡疥啼哭及多笑語者皆陽火妄動之  
候已上皆為天相其兒多病者難養

凡聲音清亮者壽有回音者壽哭聲澁者病散面無  
聲者夭



○面色部位圖



五臟所屬

○面部形色賦

幼幼集成

卷之一

七十二

察兒形色先分部位左頰青龍屬肝右頰白虎屬肺  
 天庭高而離陽心火地角低而坎陰腎水鼻在兩  
 中脾應唇際紅色見而熱痰壅盛青色露而肝風  
 怔忡如煤之黑為痛中惡逆傳以橘之黃食傷脾  
 虛吐利白乃滯癆紫為熱熾青透日角難醫黑掩  
 太陽不治年壽赤光多生膿血山根青黑頰逢火  
 異朱雀貫於雙瞳火入水鄉青龍透於四白肝乘  
 肺位洩痢而帶陽須防咳嗽而拖藍可忌痰痛方  
 殷面青而唇口撮肝風欲發面赤而目窺視火光

曉明按摺  
下文帶恐  
載之訛

曉明按摺  
下文以恐  
似之訛

焮焮外感風寒金氣浮浮中藏積滯乍黃乍白疔

積連綿又赤又青風邪癱瘓氣乏頰門成坑血衰

頭毛作穗肝氣眼生眵淚脾冷流涎滯頰面目虛

浮定腹脹而上喘肩毛頻蹙必腹痛而多啼左右

兩頰似青黛知為客忤風氣二池如黃土無乃傷

脾風門黑主疝青為風方廣光滑吉昏暗危手如

數物兮肝風將發面若塗硃兮心火燃眉坐卧愛

煖風寒之入伸縮就冷煩熱何疑肚大脚小脾欲

困而成疔日瞪日張勢似危而必驚噫五體以頭

幼幼集成

卷之一

七十二

為尊一而惟神可恃况聲之輕重不同啼之乾濕  
 頓異呵欠連綿知病之欲作乍然驚叫識火之將  
 熾此察證之規繩拳拳拳而不諱

此賦不出幼科之手蓋六朝時高陽生所作臨診辨

證頗為得理予驗既久所以知其不誣今於字句

未洽處特為之更定並加以小註非敢妄添蛇足

實為初學之一助云

○辨色分註

察兒形色先分部位欲辨形之強弱堅脆色之天澤  
枯榮必先分上下左右之部定



左明按  
右恐當作

幼幼集成

卷之一

七十三

五行四象之位然後按  
部察色以定證之安危  
左頰青龍屬肝右頰白虎  
屬肺經曰左右者陰陽之道路也蓋五行之位木  
右降故以左頰配肝右頰配肺非謂左頰即是肝  
右頰即是肺無過以生殺之理配木金龍虎之位  
以候其臟氣  
之強弱耳  
天庭高而離陽心火地角低而坎陰  
腎水  
周易以東震而兌南離北坎定子午卯酉之  
四正蓋後天之用有形者無不由之故以心  
配離南之午火於天庭腎配坎北之子水於地角  
亦陽上陰下之義第據其理而言之非謂額上即  
心唇下即腎竅笑幼科未識淵源  
刻舟求劍未可向癡人說夢也  
鼻在面中脾應  
唇際內經以鼻為面王以其位居至中內通呼吸  
唇際生死賴之所以謂之中也脾為中土經口中  
央黃色入通於脾開竅於口又曰脾胃者倉廩之  
本其華在唇四白故曰脾應唇際亦中州受納之

幼幼集成

卷之一

七十四

此概言通面之色通面為足陽明胃經所主胃經  
鬱熱而必淡紅熱搏津液定化為痰而壅滯風邪  
衝供而必見青心神  
不安則為怔忡驚悸  
如煤之黑為痛中惡逆傳似  
橘之黃食傷脾虛吐利  
面見鰐黑至凶之候幸而  
偶因惡毒之氣從鼻而入肺先受之阻遏正氣墜  
道不通所以腹痛邪盛不能自出反致子乘母位  
而逆傳如肺傳脾脾傳心者是也橘黃言其深黃  
也脾司運化乳食不停何黃之有由其運化失職  
所以食填太陰脾氣凝滯故  
深黃上面必致有吐瀉之虞白乃疳癆紫為熱熾  
白屬肺氣虛于傷累母所以脾必因而為疳  
紫為風熱燥經絡受邪定化為壯熱而不已青遮  
紫為風熱燥經絡受邪定化為壯熱而不已青遮  
日角難醫黑掩太陽不治  
此下逐部分言之諸書  
無口角之位不但無此位證亦全不符蓋小兒中  
氣強者唇不變色中氣虛寒者十有九青此為常  
候非難醫之證今正之曰角左額也猶日之東升  
而為青色遮蔽為木蔽陽光病則必有疑難之慮  
太陽左右兩額也太陽為泉陽之宗屬火旺夏氣  
色宜紅今黑色掩映將有水來尅火之象定見傷  
發故曰  
年壽赤光多生膿血山根青黑每多災異  
不流形則血必凝滯將有膿血之災山根足陽明  
胃脈所起大凡小兒脾胃無傷則山根之脈不現  
倘乳食過度胃氣抑鬱則青黑之紋橫截於山根  
之位必有延綿  
嗽噴故曰吹異朱雀貫於雙瞳火入水鄉青龍達  
於四白肝乘肺位  
朱雀赤脈也雙瞳腎水也赤脈  
青龍肝木也四白肺金也白珠  
瀉瀉而戴陽須防  
見青肝風侵肺治宜保肺平肝  
瀉瀉而戴陽須防  
咳嗽而拖盞可忌  
既傷先後二天並弱面宜慎



今反面見紅赤知為虛陽上泛故曰須防咳嗽喘  
病也青者肝色也由其肺氣已虛肝無所畏木乘  
金位恐其生火以 疼痛方殷面青而唇口噤肝風  
尅金故曰可忌 疼痛方殷面青而唇口噤肝風

欲發面赤而目竄視 疼痛腹痛也寒氣侵脾內臟  
無火一派陰冷阻抑陽利故

面青而唇噤也竄視日直視也幼科指為肝病其  
實太陽經本澄蓋太陽之脈繫目上綱血虛受寒

則上綱緊急故目直視今指為肝風必用風  
藥耗其津液反成不救能知養血其病自瘳 火光

焮焮外感風寒金氣浮浮中藏積滯通面火光風  
寒傷胃陽明

拂鬱表未解也黃色滿面食 乍黃乍白疳積連綿  
傷脾也運化無功人成積也

又赤又青風邪癢癢 傷無氣以運乳食難消脾肺俱  
傷為積久則為疳赤為火色青為風色風火相

乘榮血枯燥筋脈牽強甚則搐搦而為瘳矣 氣乏  
七十五

幼幼集成

卷之一

頤門成坑血衰頭毛作穗 小兒稟受精微不足者  
平日腦髓未充頤氣以

充之今大病之後中氣下陷安保其頤不成坑耶  
髮乃血之餘血榮則髮黑今頭毛如朔之頤知其

榮血枯 肝氣眼生眵淚脾冷流涎滯頤 氣乏則肝  
焦也

乾硬肝氣虛則膠粘寒傷脾則淚谷熱傷肝則  
淚熱脾主涎脾氣虛冷不能收攝故津液妄泄而

滯於頤間謂為 面口虛浮定腹脹而上喘肩毛頻  
脾熱禍不旋踵

感必腹痛而多啼 脾肺兩虛中宮寒肅以致氣不  
歸源反逆血之上則上氣喘急

面目虛浮因知其內必腹脹小兒知識未開於七  
情六欲毫不相識何類是之亦因臟寒腹痛所

以不時啼喘面 左右兩頰似青黛知為忤客風氣  
頻蹙不樂也

二池如黃土無乃傷脾 左右兩頰俱青忤客之證  
由小兒神氣怯弱陽和未

恐上文按據

充外邪客氣得以乘之從鼻而入忤其正氣則口  
吐青黃白沫面色變異不常腹痛喘急者是也風  
池氣池眉上眼下也風池屬肝氣池屬胃

如黃土之色由木勝土復所以真臟色見 風門黑  
主赤青為風方廣光滑吉昏暗危 風門耳前也少

為寒為痲青則為燥為風方廣肩稍 手如數物兮  
也亦少陽所主光亮則吉昏暗則危

肝風將發面若塗朱兮心火燃眉 邪熱傷神手如  
伸不定如數物之狀速宜疎解熱邪斷無肝風之

發淡紅為陽明胃經表熱深紅為少陰 心經裏熱  
面若塗朱知為心熱心不可瀉

惟瀉小腸丙火一清丁火自息 坐臥愛煖風寒之  
入伸縮就冷煩躁何疑 此小兒假入母懷藏頭密

也由風寒初入未能化熱所以坐臥愛煖 邪已入  
裏則掀衣揭覆揚手露面僵俯仰臥口渴燥煩由

其內外皆熱所 肚大脚小脾欲因而成疳目瞪口  
以欲就清涼

幼幼集成

卷之一

張勢似危而必斃 脾不運化而肚大肌肉消削而  
脚小蓋脾主肌肉由其乳食失

節所以脾困而成疳勝脫絕而目瞪 脾噫五體以  
氣絕而口張其勢已危必無可生之理

頭為尊一面惟神可恃况聲之輕重不同啼之乾  
濕頓異呵欠連綿知病之欲作忽然驚叫識火之

將熾此察證之規繩拳拳而不諱 頭為元首故  
以爲尊面分

五位惟神是賴神存則生神亡則死 蓋指眼光而  
言也况聲有輕重啼有乾濕安得無辨此聲微者

知其氣不足聲則前知其氣有餘 哭而無淚者實  
哭而多淚者虛呵欠連綿為陰陽交外升降不前

知其病之將至忽然大叫則知火熱擾神必有  
熱之證倘能依此辨證亦猶工之有規矩樂之有

知其病之將至忽然大叫則知火熱擾神必有  
熱之證倘能依此辨證亦猶工之有規矩樂之有

知其病之將至忽然大叫則知火熱擾神必有  
熱之證倘能依此辨證亦猶工之有規矩樂之有



六律是則是效是究是圖  
自不致有望洋之歎矣

○一審顏色苗竅知表裏之寒熱虛實

夏禹鑄曰望聞問切固醫家之不可少一者也在大  
方脈則然而小兒科惟以望為主問繼之聞則次  
而切則無矣經云切而知之之謂巧夫小兒以脈  
未全切之無可切而巧亦無所用其巧問而知之  
之謂工小兒於未言時問之無可問即於能言者  
問之多不以實對是問不必問而工亦無所用其  
工聞而知之之謂聖小兒初病時聲音或不失其

幼幼集成

卷之一

七十七

曉明按字  
典釋與釋  
同

常至病人而氣喪氣喪而聲失聞之無可聞而聖  
又何所見其聖况書曰哭聲不得赴陰君而亦有  
不赴陰君者何無非疑其聲而不得肺之絕與不  
絕故也吾故曰以望為主曰五臟之屬體隱而理  
微望從何處曰體固隱矣而發見於苗竅顏色之  
間者用無不周理固微矣而昭著於四大五官之  
外者無一不顯中庸所謂費而隱微之顯者不可  
引之相發明哉故小兒病於內必形於外外者內  
之著也望形審竅自知其病按病用藥見效之速

未有不加嚮之應聲者內有臟曰心曰脾曰肺曰  
腎曰肝五臟不可望惟望五臟之苗與竅舌乃心  
之苗紅紫心熱也腫黑心火極也淡白虛也鼻準  
與牙床乃脾之竅鼻紅燥脾熱也慘黃脾敗也牙  
床紅腫熱也破爛胃火也唇乃脾之竅紅紫熱也  
淡白虛也黑者脾將絕也口右批肝風也左批脾  
之痰也鼻孔肺之竅乾燥熱也流清涕寒也耳與  
齒乃腎之竅耳鳴氣不和也耳流膿腎熱也齒如  
黃豆腎氣絕也目乃肝之竅勇視而睛轉者風也

幼幼集成

卷之一

七十八

直視而睛不轉者肝氣將絕也以目分言之又屬  
五臟之竅黑珠屬肝純見黃色百證也白珠屬肺  
色青肝風侮肺也淡黃色脾有積滯也老黃色乃  
肺受濕熱證也瞳人屬腎無光彩又兼髮黃腎氣  
虛也大角屬大腸破爛肺有風也小角屬小腸破  
爛心有熱也上胞屬脾腫則脾傷也下胞屬胃青  
色胃有風也睡而露睛者脾胃虛極也面有五位  
五臟各有所屬額屬心離火也左腮屬肝震木也  
右腮屬肺兌金也口下屬腎坎水也鼻準屬脾坤



土也五臟裏也六腑表也小腸心之表小便短黃  
 澀痛心熱也清長而利心虛也胃乃脾之表唇紅  
 而吐胃熱也唇慘白而吐胃虛也唇色平常而吐  
 作傷胃論大腸肺之表閉結肺有火也肺無熱而  
 便秘血枯也不可攻下脫肛肺虛也膽乃肝之表  
 口苦胆火也聞聲作驚肝虛也膀胱腎之表筋腫  
 筋痛腎之寒氣入膀胱也面有五色一日紅紅病  
 在心面紅者熱一日青青病在肝面青者痛一日  
 黃黃病在脾面黃者脾傷一日白白病在肺面白

幼幼集成

卷之一

七十九

者中寒一日黑黑病在腎面黑而無潤色腎氣敗  
 也望其色若異於平日而首發之色與面色不相  
 則臟腑虛實無有不驗者矣

○簡切辨證

小兒熱證有七

面腮紅 大便秘 小便黃 渴不止 上氣急

足心熱 眼紅赤 此皆實熱證忌用溫補

小兒寒證有七

面脫白 糞青白 肚虛脹 眼珠青 吐瀉無

足脛冷 睡露睛 此皆虛寒忌用寒涼

○五臟所屬之證

肝者足厥陰木也實則目赤大眦呵欠頓悶虛則呵  
 欠咬牙有風則目連劄有熱則目直視成疔則白  
 膜遮睛主怒則性急大眦哭甚則卵腫熱則大小  
 便難手尋衣領手亂捻物甚則掘空摸床此喪魂  
 病也兒病時目睛視物不轉或目合不開或目開  
 不合或哭而無淚或不哭淚出皆肝絕也

幼幼集成

卷之一

八十

心者手少陰火也實則叫哭發熱飲水虛則困卧悸  
 動不安心血足則面色紅潤易養心血虧則面色  
 昏黯難養熱甚則津液乾而病渴神亂而卧不安  
 喜伏卧舌破成瘡又為重舌木舌舌出不收之病  
 凡病丹痧斑疹龍纏虎帶蟲疥燥瘡皆心之證也  
 如心病久汗出髮潤或舌出不收禁瘡不語或神  
 昏潰亂或斑疹變黑此皆心絕也

脾者足太陰土也為水穀之海實則困睡身熱飲水  
 虛則吐瀉生風傷濕則為腫為脹為黃為吐瀉故  
 脾痛則腹痛脾疔則肚大青筋脾熱則口臭唇瘡



飲食不為肌膚吐舌弄舌口乾飲水寒則口角流涎謂之滯頤氣不和則口頻撮虛則肉削而瘦不喜飲食傷食則成積積久則成疝成癰如脾火病大肉消削肚大青筋或遍身虛腫或吐瀉不止飲食不入或多食而瘦或蟲出於口或唇蹇而縮皆脾絕也

肺者手太陰金也實則悶亂喘促虛則哽氣長出經曰寒傷肺由兒之衣薄受寒也經曰熱傷肺由兒之衣厚鬱熱也寒熱傷肺則氣逆而為喘為咳肺

幼幼集成

卷之一

八十一

受風則噴嚏而流清涕受寒則鼻塞呼吸不利受熱則鼻乾或為衄血成疔則鼻下赤爛喘不止則面腫咳不止則胸骨高謂之龜胸燥則渴不止好飲水謂之膈消如肺火病咳嗽連綿喘息不休或有息或龜胸或欬血不止或鼻孔黑燥或鼻孔開張而喘或瀉利不休大孔如筒或面目虛浮上喘氣逆皆肺絕也

腎者足少陰水也虛則目畏明目中白睛多其顛即解色眈白骨髓不滿兒必畏寒多為五軟之證尻

骨不成則坐遲髀骨不成則行遲真陽不足則齒遲血脈不榮則髮稀心氣不足則語遲熱則耳中出膿生疔如腎病久身下窳目中如見鬼狀或骨痿弱不能起或二便遺失此腎敗也

○變蒸辨

幼科謂嬰兒生下三十二日為一變六十四日為一蒸變者變生五臟蒸者蒸養六腑長氣血而生精神益智慧也積五百七十六日而畢凡遇變蒸必身有熱或有驚惕而口面唇舌俱不變色身熱或

幼幼集成

卷之一

八十二

重輕而精神與常無異口中氣出溫和三四日間自愈或有熱不退乳母宜服小柴胡則安此猶為幼科中傑出者之言也乃攷其變蒸方中有用福銀丸之巴豆水銀黑鉛京墨麝香之類而峻下之者夫既曰長氣血生精神益智惟宜助其升生可也顧且用毒劣滅其化元不幾於非徒無益而又害之耶據其說以周天三百六十五度應人身三百六十五骨節內除手足四十五餘骨外止三百二十數以生下一日主十段十日百段三十二



且則三百二十段為一變而以天一生水地二生火為次序則一變腎二變膀胱三變心四變小腸五變肝六變膽七變肺八變大腸九變脾十變胃雖無實據而理有可取即合以此為準亦見確然不易之法乃又有以木火相生為言者則似為一肝二膽三心四小腸五脾六胃七肺八大腸九腎十膀胱矣復有以木金相剋為言者則又為一肝二膽三肺四大腸五心六小腸七脾八胃九腎十膀胱矣夫小兒臟腑骨度生來已定毫不可移

幼幼集成

卷之一

八十三

易者則變蒸應有定理今則各逞已見各為臆說然則臟腑竟可以倒置骨度亦可以更張是非真偽從何究詰謂天一生水者為是則木火相生木金相剋者非矣謂木火相生木金相剋者為是則天一生水者非矣徒滋葛藤迄無定論將使來學何所適從所幸變蒸非病可任其顛倒錯亂假使變蒸為病率宜依經用藥者豈不以脾病而治腎膀胱病而治胃乎總之此等固執之言不可為訓蓋天地陰陽之理數可限而不可限如五運六氣

為一定不易之規而有應至不至不應至而至往來勝復主客加臨有應不應之殊天地尚且如斯而况嬰兒之生風土不侔賦稟各異時合有差膏藜非一而以此等定局以限其某時應變某時應蒸于臨證四十餘載從未見一兒依期作熱而變者有自生至長未嘗一熱者有生下十朝半凡而常多作熱者豈變蒸之謂乎凡小兒作熱總無一定不必拘泥後賢母執以為實而以正病作變蒸遷延時日誤事不小但依證治療自可生全

幼幼集成

卷之一

八十四

張景岳曰小兒變蒸之說古所無也至西晉王叔和始一言之自隋唐巢氏以來則日相傳演其說益繁然以予觀之則似有未必然者何也蓋兒胎月足離懷氣質雖未成實而臟腑已皆完備及既生之後凡長養之機則如月如苗一息不容有間百骸齊到日當時異而日不同豈復有此先彼後如一變腎二變膀胱及每變必三十二日之理乎又如小兒之病與不病余所見者治者蓋亦不少凡屬違和則不因外感必以內傷初未聞有無因而



病者豈真變蒸之謂耶又見保護得宜而自生至長毫無疾病者不少抑又何也雖有暗變之說終亦不能信然余恐臨證者有執迷之誤故道其愚昧若此明達者以為然否

幼幼集成卷之一終

鼎鏗幼幼集成卷之二

羅浮陳復正飛俊氏 輯

廬陵劉 勳宋孟氏 校正

遂陽周宗願虛中氏 參定

○胎病論

兒之初生有疢亦惟胎弱胎毒二者而已矣胎弱者稟受於氣之不足也子於父母一體而分而稟受不可不察如稟肺氣為皮毛肺氣不足則皮薄怯寒毛髮不生稟心氣為血脈心氣不足則血不華

幼幼集成卷之二

色面無光彩受脾氣為肉脾氣不足則肌肉不生手足如削受肝氣為筋肝氣不足則筋不束骨機關不利受腎氣為骨腎氣不足則骨節軟弱人不能行此皆胎稟之病隨其臟氣而求之所謂父強母弱生女必羸父弱母強生兒必弱故小兒有頭破顱解神慢氣怯項軟頭傾手足痿軟齒生不齊髮生不黑行住坐立須人扶掖者此皆胎稟不足之故也

胎毒者即父母命門相火之毒也命門者男子以藏



精女子以繫胞道家謂之下丹田也夫二五之精  
 妙合而凝純粹之精鎔液而成胎淫佚之火蓄之  
 則為胎毒矣蓋人生而靜天之性也感物而動人  
 之欲也成胎之後其母之關係尤緊凡思慮火起  
 於心恚怒火生於肝悲哀火鬱於肺甘肥火積於  
 脾淫縱火發於腎五欲之火隱於母胞遂結為胎  
 毒凡胎毒之發如蟲疥流丹濕瘡癰癩結核重舌  
 木舌鵝口口瘡與夫胎熱胎寒胎搐胎黃之類是  
 也更如一七之臍風百日之咳嗽半歲之真搐一

幼幼集成 卷之二

週之流丹此又毒之至酷至烈而不可解者也  
 胎寒者母娠時患熱病多服寒涼之藥又或過食生  
 冷令兒受之生後昏昏多睡間或嘔乳瀉白此內  
 因也或百日之內忽病戰慄口冷手足踈曲不伸  
 腹痛啼叫不止此生後受寒得之治宜溫散指迷  
 七氣湯助胃膏為佳  
 胎熱者母娠時喜食辛熱炙搏之物或患熱病失於  
 清解使兒受之生後目閉面赤眼胞浮腫弩身呢  
 呢作聲或啼叫驚煩遍身壯熱小便黃澁此胎熱

也若不早治則丹瘤瘡癩由此而至宜集成沉龍  
 丹徐服解之以平為度

胎搐者母娠時曾因驚恐氣傳於子生後頻頻作搐  
 其後身熱面青手足搐掣牙關緊閉腰直身僵睛  
 邪目閉多啼不乳此乃胎癩不治之證如因身有  
 熱而作者必先啼叫雖曰胎病由外因也宜天麻  
 九後以六味地黃湯滋其化源久服自愈

幼幼集成 卷之二

盤腸氣者幼科稱內吊者是也皆因胎氣鬱積壅結  
 榮衛五臟六腑無一舒暢其氣不能升降築隘腸  
 胃之間抵心而痛其聲漶漶如猫吐惡乾啼口開  
 手足皆冷宜疎散通氣調中散及木香丸  
 臍突者小兒多啼所致也臍之下為氣海啼哭不止  
 則觸動氣海氣動於中則臍突於外其狀突出光  
 浮如吹起者捏之則微有聲用亂髮燒灰枯礬等  
 分為細末敷臍上以膏藥貼之自肖  
 不乳者小兒生下三二日間忽然不乳當詢問之勿  
 以不乳作臍風治蓋臍風有多啼撮口之證此則  
 無之但不乳耳有吐乳乳之又吐者或因拭口不



淨惡穢入腹也宜用檳榔木香甘草煎湯與服如  
啼哭不乳者腹痛也亦胎寒之證宜木香丁香乳  
香當歸甘草煎湯與服如無已上諸證無故不乳  
宜問其母之乳汁多少乳多者傷乳也宜少節之  
不久自思乳矣乳少者必有他證細心察之  
胎黃者兒生下面目渾身皆黃如金色或目閉身上  
壯熱大便不通小便如梔子汁皮膚生瘡不思乳  
食啼哭不止此胎中受濕熱也宜茵陳地黃湯母  
子同服以黃退為度

幼幼集成

卷之二

四

胎肥者兒生下遍身肌厚肉色通紅面色亦紅而黑  
睛多時時生痰自滿月以後漸漸肌瘦五心熱而  
大便難白睛粉紅色此各胎肥是亦在胎時母食  
甘肥濕熱太過流入胞中以致形質虛肥血分壅  
熱也加減大連翹飲外以浴體法浴之

胎怯者生下而無精光肌肉瘦薄大便白而身無血  
色目無精彩時時哽氣多噉者此即胎怯也非育  
於父母之暮年即生於產多之孕婦成胎之際元  
精既已澆漓受胎之後氣血復難長養以致生來

怯弱若後天調理得宜者十可保全一二調元散  
助之

○入方

指迷七氣湯

一切腹痛寒熱多啼不乳等證皆由陰陽不升降  
氣道壅塞而然並宜此方凡人身內之氣呼吸出  
入無刻不與天道陰陽之氣通故六淫外襲則感  
而致病翁受之理也內氣閉塞則天道不通升者  
不升降者不降寒熱由此而生也是方疎利臟腑

幼幼集成

卷之二

五

神化無方最宜領會

廣陳皮 杭青皮 藿香葉 芽桔梗 蓬莪朮

香附米 法半夏 上肉桂 公丁香 益智仁

老生薑 大紅棗 炙甘草

右咬咀水二碗煎至一碗母子同服

助胃膏

治胎寒內釣胃氣虛弱胸膈脹滿嘔乳便青

白豆蔻 肉豆蔻 麩包煨 官揀參 廣木香 各

錢 公丁香 藿香葉 雲茯苓 漂白朮 炒



真青桂 西砂仁 炙甘草 各一兩  
廣陳皮 二錢  
洋沉香 二錢 懷山藥 五兩

爲末蜜丸芡實大每一丸炒米湯化服

集成沈瀝丹 昔九械北斗夜半所降之甘露也

治小兒一切胎毒胎熱胎黃面赤目閉鵝口口瘡

重舌木舌喉閉乳蛾渾身壯熱小便黃赤大便閉

結麻疹斑癩遊風疥癬流丹癰疹痰食風熱疔腮

面腫十種火丹諸般風搐並皆神效

此方古書未載得之異授微似古之神芎九近有

幼幼集成

卷之二

六

能者妙出化裁而增損之遂爲幼科有一無二之神方作三焦之主治蓋凡賊氣流通者必不鬱滯或受毒於胎前或感邪於誕後遂爾中氣抑鬱則見以前諸證方內所用黃芩清上焦之熱黃柏清下焦之熱大黃清中焦之熱又藉其有推陳致新之功活血除煩之力能導三焦鬱火從魄門而出猶慮苦寒凝滯復加檳榔枳殼之辛散爲行氣利痰之佐使川芎薄荷引頭面風熱從高而下趨迎翹解毒除煩赤芍調榮活血牽牛利水走氣分而

舒鬱消石清潤抑陽火而扶陰又能引邪熱從小便而出用治以前有餘諸證應如桴鼓予生平最慎攻伐惟此方用之最久功效莫能殫述真濟世之良方也

杭川芎 九錢 錦莊黃 九錢 實黃芩 九錢

厚川柏 九錢 黑牽牛 炒取頭末六錢 薄荷葉 四錢

粉滑石 六錢 尖檳榔 七錢五分 陳枳殼 四錢五分

淨連翹 除去心隔取淨六錢 京赤芍 六錢

右十一味依方炮製和勻焙燥研極細末煉蜜爲丸

幼幼集成

卷之二

七

九如芡實大月內之兒每服一九稍大者二九俱用茶湯化服乳母切忌油膩但覺微有泄瀉則藥力行病即減矣如不泄再服之重病每日三服以愈爲度此方斷不峻厲幸毋疑畏惟胎寒胎怯面青白者忌之

天麻丸 治胎搐先以此丸通其經絡次服地黃丸

明天麻 薑 法半夏 北防手 川羌活

牛膽星 直殭蠶 北全蝎 各五錢

爲末蜜丸芡實大每一丸釣藤湯下



六味地黃丸

卽仲景所製金匱地黃丸原治腎水虧損小便淋瀝頭目眩暈腰腿酸軟陰虛發熱自汗盜汗憔悴瘦弱精神疲困壯水之主以制陽光此方是也錢仲陽以之治小兒胎怯稟受先天不足併肝脾白膜遮睛瀉血失音身瘦瘡疥腎怯語遲解顛行遲等證

薛立齋又以治小兒肝經血虛燥熱腎經虛熱作渴小便淋秘痰氣上壅或風淫客氣癩癰結核或

幼幼集成 卷之二

八

四肢搐搦眼目瞶動或欬血吐血頭目眩暈或咽喉燥痛口舌生瘡或稟腎不足解顛失音五遲五軟腎脾肝疳凡腎肝不足之證皆宜用此以滋化源其功不能盡述

予按錢薛二翁能用此方治小兒先天不足誠卓然有識者予所敬佩奈今之小兒體質元氣更不及前古以地黃丸為補劑今則實為涼劑矣此藥用於陰虛枯燥者誠為得宜倘兒肌肥面白脾弱多痰者服此必致膩膈變生他證其害不小非方

之不良由今稟受愈薄也予故為之斟酌其炮製必使地黃陰凝之質稍近陽和不致沉寒返冷始能免膩膈損脾之患矣

大懷地 四兩以西砂仁一兩不必搥碎生薑二兩切片縫一小袋布袋盛此二味同地黃入

砂鍋以水煮兩晝夜方入好酒煮一晝夜以地黃糜爛為度取起其袋不用以地黃搗膏聽候

白雲芥 二兩乳 懷山藥 三兩乳 淨棗皮 二兩

粉丹皮 一兩 宜澤瀉 一兩 酒炒 水炒

右依炮製和勻一處焙燥研為細末和前地黃膏少加煉蜜石臼內杵勻重一錢一顆半週一歲者

幼幼集成 卷之二

九

每月一九三五歲者二九俱空腹鹽湯化下倘九一時未備即以前藥十分之一但宜炮製不可生用水煎服之名六味地黃湯功效更捷

調中散 治嬰孩盤腸氣腹內築痛

青木香 川練子 暗沒藥 白雲芥 上青桂

杭青皮 萊菔子 陳枳殼 尖檳榔 炙甘草

等分入葱白二寸鹽一錢水煎空心服

茵陳地黃湯

治初誕小兒面目渾身其黃如金胎中受濕熱也



懷生地 京赤芍 正川芎 大當歸 天花粉

赤茯苓 結猪苓 茵陳葉 宜澤瀉

諸藥隨時定分兩水煎母子同服

大連翹飲 治胎肥解熱毒

淨連翹 瞿麥蕙 白滑石 牛芎子 車前子

川木通 北防風 炒梔仁 片黃芩 京芥穗

大當歸 北柴胡 京赤芍 淨蟬蛻 炙甘草

竹葉十片燈心十莖水煎熱服

浴體法 治胎肥

幼幼集成

卷之三

十

明天麻二錢 淨全蝎去毒 箭硃砂各五分 烏蛇肉酒浸

枯白礬 洋青黛各三錢 真麝香一分

共研勻每用三錢水三碗桃枝一握同煎十沸溫

熱浴之但勿浴拭

調元散 治胎怯

揀人參 漂白朮 白茯苓 化橘紅 大當歸

甘枸杞 炙甘草各二錢 陳粳米三合

為末每服二三錢龍眼煎湯調下

八味地黃丸 治稟受先天不足

即前六味地黃丸加青化桂一兩熟川附一兩治稟賦命門火衰凡齒遲語遲行遲顛門開大辟疇等證或火衰不能生土以致脾土虛寒不思乳食臍腹疼痛夜多漩瀲皆稟先天不足自晬周時即有虛弱腎病能從幼填補亦多可復此方用水煎各八味地黃湯經曰益火之源以消陰翳此之謂也凡乳母肥白者母子同服

○驚風關妄

喻嘉言曰驚風一門古人鑿空妄談後世之小兒受

幼幼集成

卷之三

十一

其害者不知千百億兆蓋小兒初生陰氣未足性稟純陽身內易致生熱熱盛則生風生痰亦所恒有乃以驚風命名隨有八候之目夫小兒腠理不密更易感冒寒邪寒邪中人必先入太陽經太陽之脈起於目內眥上額交巔還出別下項夾脊抵腰中是以病則筋脈牽強遂有抽掣搐搦種種不通名目妄用金石腦麝開關鎮墜之藥引邪深入臟腑千中千死徒據小兒八歲以前無傷寒之說而立驚風一門殊不知小兒不耐傷寒故初傳太



陽一經早已身強多汗筋脈牽強人事昏沈病勢已極湯藥妄投危亡接踵何由得至傳經解散哉故言小兒無傷寒也不知小兒易於外感惟傷寒為獨多而世之妄稱驚風者即此也是以小兒傷寒要在三日內即愈者為貴若至傳經則無力耐之矣且傷寒門中剛痙無汗柔痙有汗小兒剛痙少柔痙多世俗見其汗出不止神昏不醒便以慢驚為名妄用參耆木附閉塞腠理熱邪不得外越亦為大害但比金石差減耳所以凡治小兒之熱切須審其本元虛實察其外邪重輕或陰或陽或表或裏但當徹其外邪出表不當因邪入裏也仲景原有桂枝湯舍而不用徒事驚風毫釐千里害豈勝言哉

幼幼集成

卷之五

十一

不治外淫之邪反投金石腦麝之藥于中于死而不悟也又曰凡治小兒痙病妄稱驚風各色輕用鎮墜之藥者立殺其兒此通國所當共禁者也蓋小兒不耐傷寒壯熱易致昏沉即於其前放銃吶喊有所不知妄捏驚風輕施鎮墜勾引外邪深入內藏于中于死從未有一救者通國不為厲禁寧有底止哉又曰婦人產後血舍空虛外風易入仲景謂新產亡血虛多汗出喜中風故令病痙後賢各從血舍驅風成法可遵非甚不肖者不妄用鎮驚之藥不似小兒驚風之名貽害千古在賢智且不免焉茲約通國共為厲禁革除驚風二字不許出口入耳凡兒病發熱昏沉務擇傷寒名家循經救治百不失一於以打破小兒人鬼關天人共快也痙擊上聲風強病也前為喻先生闢除驚風指明病痙之說誠善矣第驚風之名誤傳既久沉迷者衆倘不為之剖晰詳明指出證候治療俾臨證者有所依歸則後人何能深信予不辭狂瞽請為詳晰申明之蓋病痙非止

幼幼集成

卷之五

十三



一端男婦皆有不特小兒為然也如太陽過汗變  
瘧風病誤下變瘧瘡家誤汗變瘧產後汗多過風  
變瘧跌撲破傷冒風變瘧表虛不任風寒變瘧一  
切去血過多變瘧然男婦病此醫者皆從太陽厥  
陰循經救治未聞以驚風之治治瘧者無如小兒  
病瘧獨以驚風名而治者由宋人之訛傳也一人  
倡之遂羣起而和之然亦無師之智各為臆說愈  
趨愈下遂致於離經叛道乃有黃帝不知幼小之  
妄談殊不知內經通評虛實論有孔子病熱孔子

幼幼集成

卷之二

十四

病風熱脈證之辨刺逆論有嬰兒肉脆血少氣弱  
毫鍼之傳經雖三章而脈證治瘵井然可據蓋以  
今日之丈夫即昔年之孔子他時之方脈即此際  
之幼科人此人也理此理也安可岐之為二故不  
另立科分孰料後人不特岐之而併皇皇經旨全  
然抹煞蒙蔽後人耳目得肆其無稽之妄談詩經  
毀聖罪無可道所以嘉言痛闕其謬者有由來矣  
予亦非妄言附利實有成見蓋臨證四十餘載所  
治嬰幼以萬計從不以驚風掛齒類亦未嘗遇一

兒之驚風間有傷寒病瘧昏迷不省者予以火功  
甦之仍為循經治瘵無不生全從未假一抱龍菴  
合為之鎮墜開關可見喻氏之言確乎其不爽矣  
或曰經以風寒濕合邪而病瘧今孔子未離襁褓  
安得有風寒濕而病瘧乎曰子謂風寒濕嬰兒絕  
少殊不知風寒濕惟孔子為獨多如藜藿之兒房  
廊卑隘戶牖蕭疎衣祿單寒坐臥非處風寒之來  
孰能悉為捍禦膏粱之子過於慎重於其甫生輒  
閉戶塞牖不親風日不窺外門重衣疊綿溫暖過

幼幼集成

卷之二

十五

度微汗時出膜理甚疎偶然脫換風寒則乘虛而  
入矣至於濕氣尤為難避凡衣祿不乾非濕乎衾  
褥遺洩非濕乎澡浴糞穢非濕乎愚夫愚婦遇兒  
有疾重衣複被包裹嚴密以致雨汗淋漓失於更  
換非濕乎嬰兒患是三者於隱微之中而醫者莫  
之能測也况幼科諸君臨證不察病源惟以驚風  
二字橫於胸臆及至診視但見發熱昏沉即以驚  
風名之輒以開關鎮墜截風定搐之死法以治變  
幻莫測之傷寒抑遏其表邪邀攔其出路乃致茶



毒以死而死者不知其然父母不知其然醫者亦不知其所以然而死之也此非後人之咎作俑者不得辭其責矣

妄名之害其禍最酷不特舉世兒科滿口驚風而舉世病家亦滿口驚風甚至愚至惑者又惟婦女為尤甚習俗相沿竟成一驚風世界最可駭者遇兒有疾亦不察其為傷寒為雜證為內傷外感且先曰病由於嚇致醫者聞之正中下懷不辨是嚇非嚇先與之鎮驚及其引邪入裏壯熱不退醫者復

幼幼集成

卷之七

十六

不究其熱之在表在裏為虛為實且先日熱則生風矣病家聞之適合其意不察有風無風先需截風定掃之藥醫必投其所好而與之病家坦然無疑而受之南轅北轍刻奪誤投病日沈危而病家不以為怪設有明者辨證既確不事驚風而病家不喜是必更醫必致覆水難收死而後已如此死者亦不可盡歸咎於醫蓋病家有以致之也吁妄名之為害如此乎  
驚風之名其來已久今忽謂小兒之病非驚風必

致投珠按劍詭為不祥予亦不必深辨但以諸家驚風之說逐細節錄亦不忍直指其姓氏書曰凡有一家惟書有曰二字於首其中偏陂固執支離牽強者不辭狂驚小註其下而辨定之則是非當有公論矣

錄諸家驚風論

愚有小註以辨其惑

有日急驚身熱目赤口鼻氣粗痰凝潮壅忽然而發發過容色如舊未有不因外感內傷而無故身熱來亦草擬有因驚駭者亦有不因驚駭者大都是

幼幼集成

卷之七

十七

火燥本急由寒傷筋急者居多未可盡指為火燥也故身先有熱未  
有身涼而發者二語如但應體究熱從何來始有實據若但曰身先有熱不知此熱在表在裏證皆屬陽宜用涼劑豈有不經疎散而輒用涼劑不慮其引邪入裏乎除熱化痰則驚自息昔人謂痰生熱熱生風風生驚其實皆本氣自病何所據而知為本氣自病世不解風自內生焉知其不由外至而為本氣自病徒執天麻膽星瓜  
婁貝母殭蠶全蝎雜亂風痰之藥治之不應由於投受以致禍世殃民千古恨矣更以廣東蠟丸牛黃紫雪治之及至元氣損傷虛痰上逼胸膈膨脹則謂證變結胸



有是理哉此開門揖盜引邪入

有曰驚者嚇也嚇致山兒先有內傷復來外感肺竅

痰迷心無所主一着驚而即發也既知先有內傷

於肺竅痰迷心無所主此實由於病非由於驚也

今日一着驚即發則所重在驚治之者不治病而

有曰驚生於心痰生於脾風生於肝熱出於肺此一

定之理也半真半妄熱盛則生風風盛生痰痰盛

生驚此賊邪必至之勢上云驚生於心痰生於脾

痰熱皆本臟自生何以又驚驚必先豁痰豁痰必

幼幼集成 卷之三 十八

先祛風祛風必先解熱而解熱又以何者為先乎

肺主皮毛皮毛為熱邪出入之門戶此又明指外

肺肺自彼風寒暑濕燥火六淫之來前云風自內

六淫外至不皮毛受之即入犯乎肺肺本出熱地

也肺主清肅之令何以見肺為出熱之地經曰形

邪獨不可燥火暑邪一入則熱與熱依而熱盛風

寒濕邪一入肺竅為之閉塞六淫初來無過皮毛

為之疎散豈能便入則熱無所洩而熱亦盛若解

熱必先祛邪上云療驚必先豁痰豁痰必先祛邪

在先竟不祛邪以致邪不能解而發熱生風生痰

有曰急驚者肝經血虛火動生風此另換題目益風

生則陰血愈散陰火愈熾陰虛則陽火熾此陰火

火動肺金愈虛肝邪愈熾宜滋肝血養脾氣若屢

服祛風化痰瀉火之劑而不效若果火盛生風則

宜認作脾虛血損便宜認作妙毫無急補脾土急

幼幼集成 卷之三 十九

有曰急驚屬木火上實木實

則搐而有九目上視動劄頻土實則身熱面赤而

不吐瀉偃臥合睛治宜涼瀉亦有因驚而發者因

而發神虛可知此以致牙關緊急壯熱等證此內

有實熱外挾風邪此所挾之風不知指內當截風

定搐截風定搐四字比干將鎮邪龍泉太阿

有曰急驚者壯熱痰壅實視反張搐搦掣動牙關緊

急口中氣熱頰赤唇紅脈浮洪數此肝邪風熱陽



盛陰虛證也。脈浮洪數飲冷便結明是傷寒之證未經疎解以致熱邪入裏表裏皆急方顯以上諸證非疎裏不足以解表猶敢以急驚稱之耶

有曰小兒驚風肝病也亦脾腎心肺病也。諸書皆以

未足腎不主麻惟心肝脾肺主之今忽言及於腎誠所謂破天荒矣蓋小兒之真陰

未足柔不濟剛故肝邪易動。人身榮衛脈度每日

然後五十度周於身至五時終於足厥陰肝寅時復交於肺為陰陽大會之臟寅下起元之所而幼

科日為肝邪則人身無不邪之臟矣則木能生火火能生風風熱相

搏則血虛血虛筋急。寒傷陰榮筋急則眩掉反張

強直之類皆肝木之本病也。此拾內經太陽筋所生病而為驚風之色

幼幼集成

卷之二

相可至其相移木邪侮土則脾病木盛金衰則肺

病木火上炎則心病木火傷陰則腎病。肝為乙木

芽蘖之姿發生之本天地無此風木則春生夏長

秋實冬成者以何物為刑德五運無此丁玉則蒼

齡赤素玄運行於五天之中者以何物為從合六

氣無此已亥則司天在泉循環於左右兩間者以

何物為對化人身無此肝則受胎一月珠露方

凝之際以何物為鄰鄂肇基化元莫大乎此而幼

科一倡百和目為萬惡兇濤之害氣諸臟逢之無

不焦頭爛額乃至於動風生火凌土侮金傷陰害

水諸惡畢備即攻伐並至不足以盡其辜除非殺

此嬰兒使肝木無置身之地始可杜其兇殘也

心背理其何以堪或曰大都腎水未足肝氣有餘

所以害及諸臟亦或有之今必謂其無恐難盡信

日嘻此言愈相矛盾矣既知腎水未足肝氣有餘

則此無根之木偏勝之氣推搡不定欲住無因正

宜速救根本滋水以生之養血以配之汲汲培補

猶恨其遲而敢認為賊邪剋之削之凌之虐之生

令其凋零摧折挽枝無由不亦大可悲哉此五臟驚風之大概也此處

五臟驚風則驚風之屬五臟也明矣治之之法有要存焉一曰風二

曰火三曰痰四曰陽虛五曰陰虛忽添陽虛

有曰急慢驚風古入所謂陰陽痢也。痢為痼疾非暴

入急驚屬陽慢驚屬陰驚邪入心則面紅頰赤惕

惕夜啼入肝則面目俱青眼睛窺視入腎則面黑

惡叫嚙齒咬人入肺則面色淡白喘息氣急入脾

則嘔吐不食面色淡黃。前云驚者嚇也惟心臟受

驚邪為何物而嘔嘵然論之也然風非火不動

火非風不發風火相搏而成驚風故心肝二臟主

之。前云驚邪于五臟則肝風無與焉於此又必批

入肝風以證其木火生風之妄語令人欲嘔

然火盛則金傷木失其母而火無所畏且木無所

制而脾土又受傷矣。獨不可曰水盛則火傷土失

制而肝木又受傷矣率枝帶葉何患無離不過欲

實一肝風名目而累及於五臟即失火殃魚凶猿

禍木未若是之勢也

有曰急驚者陽證也小兒陽常有餘陰常不足經曰

者若天與日失其所則折壽而不彰又曰陽精下

降其人天易以陽為君子陰陰小人非貴陽賤陰

幼幼集成

卷之二

心入肝入腎入肺入脾又不知指

驚邪為何物而嘔嘵然論之也然風非火不動

火非風不發風火相搏而成驚風故心肝二臟主

之。前云驚邪于五臟則肝風無與焉於此又必批

入肝風以證其木火生風之妄語令人欲嘔

然火盛則金傷木失其母而火無所畏且木無所

制而脾土又受傷矣。獨不可曰水盛則火傷土失

制而肝木又受傷矣率枝帶葉何患無離不過欲

實一肝風名目而累及於五臟即失火殃魚凶猿

禍木未若是之勢也

有曰急驚者陽證也小兒陽常有餘陰常不足經曰

者若天與日失其所則折壽而不彰又曰陽精下

降其人天易以陽為君子陰陰小人非貴陽賤陰



蓋以陽主升生陰主肅殺故也幼科之人必欲相反聖人則扶陽抑陰幼科則護陰賊陽每每以陽有餘陰不足為言然雖諄諄言之究竟不知其所謂若謂血為陰氣為陽經曰嬰兒肉脆血少氣弱未嘗曰血少氣多蓋謂真氣未生惟此呼吸一絛而已今認為有餘必使此一絛之氣出入全無方可謂陽不足乎若謂寒為陰熱為陽寒主收斂熱主發生人身所賴者惟此陽和而已有此陽和則百骸五官方能運動今認為有餘必使此溫煖之氣寂滅無餘至於四肢僵木通體寒冰方可謂陽不足乎若謂水為陰火為陽天一非陰地二非陽坎戊非陰離已非陽更為不切若謂肺為陰肝為陽金不制木肝氣有餘不知肝屬厥陰職司藏血血乃陰榮乙癸同治誤認為陽蓋見外謬若謂肝為陰膽為陽膽無出入竅雖屬少陽專司半表半裏有病惟宜和解表裏嚴禁汗吐下三法今誤認少陽膽經之熱為陽火有餘輕用涼瀉攻下之治不幾故違經訓甘蹈誤世之譏乎若謂真陽有餘

幼幼集成

卷之二

二十二

小兒天癸未足真陽尚未肇基一發無謂若謂五臟為陰六腑為陽即應端瀉六腑之陽不應以心火肝風為賊邪乃以黃連甘遂大寒大毒之物以瀉其不足之陰不知果何所指而哓哓其詞豈小兒別有所謂陽有餘陰不足乎予易於生熱熱盛之識見短淺不足以窺其幽深且食飲難節忽則生風生痰生驚巴人下里之語且食飲難節忽於喜怒不常忽委罪於性情暴怒傷陰暴喜傷陽傷陰則瀉傷陽則驚上云陽常有餘既有餘則傷不為害今日傷陽致驚則陽之不可傷者又在言外矣辭小兒暴喜傷乳上云暴喜傷陽此言暴喜傷乳乳為血液本非屬陽夫乳甘緩戀膈又歸咎於乳何以暴喜傷之乎夫乳甘緩戀膈又歸咎於乳廢食之又兼外感寒邪則痰凝壅塞鬱滯熏蒸乳議矣

總脈寒復外侵以致於痰凝壅塞鬱滯熏蒸治痰之劑惟有絕其乳食為上者不然病根何時得斷哉  
 內有食熱外感風邪上云乳滯挾寒邪此云食熱挾風邪一片迷離夢境  
 心家熱盛則生驚前云驚由驚致肝家風盛則發  
 搐肝風心火交爭前云風非火不動火非風不發  
 是風火交相為用者此言風火交爭不知所  
 因乃痰生於脾風生於肝驚出於心  
 熱出於肺驚風痰熱四證若具八候生焉此篇從  
 虛生熱生風說起乃至食飲喜怒乳哺食熱寒邪內傷外感多般辨熱仍舊說到驚風痰熱四字止費如許心思不過欲為驚風二字作陪襯不知無本之學謬誤之談任極口鋪張說來總不順理無非東扯西曳以誑俗人耳目  
 明眼者必不為其所欺也

幼幼集成

卷之二

二十三

有曰急慢驚風或聞大聲或大驚而發搐發過如故此無陰也當下之內經言大驚卒恐氣血分離此  
 虞其不及何以見無陰而此證本因熱生於心既  
 當下不慮其下多亡陰乎此證本因熱生於心既  
 驚卒恐心身熱面赤嗜飲口中氣熱大小便黃赤劇則熱也蓋熱盛則生風風屬肝陽盛陰虛也故下之以除其痰也上云發過如故下云身熱面赤種種  
 此由於病非由於驚也若謂發搐之後而見此證則前之所謂發過如故者不幾囁語乎小兒痰熱客於心間無怪乎驟用巴豆甘遂以逐心間  
 過阻於脾之大絡塞其氣道耳何嘗能入心間而以大毒之物伐及無辜傷其神明之臟欲不成癩



其可因聞非常之聲動而發搐矣若熱極不聞聲  
及驚亦自發搐也以精生氣氣生神神之倚氣如  
魚依水凡小兒稟受薄者先天既不足於前矣  
水復未成於現在故元精未足元氣無根所以元  
神最怯每多聞聲則惕此實神虛怯不足之證  
而幼科不但不憐其元神不足而偏指為心火有  
餘不但指心火有餘而併肝風脾痰肺熱一總扯  
入以誑其驚風痰熱四證入候之妄言復有開非  
常之聲見異類之物乍然驚悸動惕此正神鬼無  
主榮衛俱亂搖搖沉沉欲定不能之際而不為之  
防護保救猶曰熱生於心必欲下之以除其痰入  
井下石雪上加霜此等人不知是何肺腑海堪詫  
異

有日小兒平常無事忽發肚熱手足搐搦眼目戴上

幼幼集成

卷之三

二十四

涎潮壅塞牙關緊急身熱目赤

既曰平常無事則無病可知乍見以

上種種惡候必如俗人所言鬼病也不然何以平  
常無事而忽凶危若是耶豈知小兒易感風寒易  
傷乳食在先半日邪已入內兒不能言父母未覺  
邪鬱不伸所以乍然而搐觀其忽發肚熱之言可  
知矣非風寒入裏為壯熱即食飲停滯為壯熱此  
實因病而致豈平常無事之謂哉治此無難但應  
察其受病之源外因則達之發之內因則導之奪  
之病邪既去神性自寧若必曰無因而致在俗人  
必疑為鬼祟求之巫覡庸工必曰無因而致在俗人  
驚風妄為治療兩相悖候奈之何哉此急驚屬陽  
病在脈每云驚風為心肝所主此處忽云屬腑不  
知心肝屬腑乎屬臟乎要問幼科之開天  
祖師方能辨自予則  
眼花撩亂莫能識也

有日急驚者陽證也俱腑受病耳小兒客痰熱于心

脈是少陽相火旺每言心火此經云熱生風因將  
火盛而作不知此火蓋東方之震木得火氣而發  
搐此處不言肝風心火作搐硬派為少陽相火作  
搐但聞雷得火而豐未聞震得火而搐杜撰

有日身熱脈浮精神恍惚或吐瀉不思乳食發搐即  
半陰半陽合病身熱脈浮外感風寒也吐瀉兼作  
何必曰半陰半陽原其意不過以身熱脈浮屬太  
陽吐瀉屬陽明太陰凡幼科所言者無非心肝脾  
之臟病若自外感內傷則驚風痰熱身熱脈沉精  
神倦怠或吐不瀉又能乳食發搐亦半陰半陽合  
病身熱脈沉屬太陰但吐不瀉屬陽明是陽明  
傷食太陰受寒顯然夾食傷寒偏不明言悲哉

幼幼集成

卷之三

二十五

有日亦有急驚涼瀉而不愈或與吐下藥太過變為

慢驚者此等之言益見背謬諸書以急驚為陽為  
蓋因誤以傷寒表證為急驚所以不愈也既涼瀉  
不愈則誤認不確自應愧悔何味焉不察而更用  
吐下之藥乎涼瀉一誤吐下再誤而不變為  
壞證者未之有也非病之能變由醫變之也又有  
慢驚補溫而不愈變為急驚者幼科疎忽於此數  
脾虛陰寒為慢驚則用溫補適為恰當今不特不  
愈反加變證蓋誤以傷風自汗為慢驚不知此證  
本有風邪在表正宜解肌今誤用溫補而致變偏  
死亦日病變於死與醫何  
涉可謂善為說辭者矣

有日病有陰陽急驚風屬實熱病在心肝二臟謂之



陽癘慢驚風屬虛寒病在脾肺二臟謂之陰癘此以寒熱分陰陽也

五臟屬陰六腑屬陽急驚發於六腑為易治慢驚發於五臟為難治此以臟腑分陰陽也

病在心肝二臟慢驚病虛寒病在脾肺二臟此以急慢二驚皆屬五臟也

云急驚發於六腑慢驚發於五臟是以以臟腑均有驚風也夫六腑者膀胱胃膽小腸大腸三焦六

經是也其六經證治輕重不等理應指明急驚發於何腑五臟者心肝脾肺腎五經是也其五經證

治實賤不同理應指明慢驚發於何臟後人始有實據今竟不指明弟汎言急驚發於六腑慢驚發於五臟

慢驚之至五臟均傷應用五經之藥治之乎必無

幼幼集成

卷之十

二十六

是理若以上節心肝脾肺之言為是則與下節六腑五臟不相作矣若以下節六腑五臟之言為是

則與上節心肝脾肺陰陽相矛盾矣蓋腑屬陽表裏豈容混稱如腑為表臟為裏表府不可

治裏裏病不可治表不易之規以其陰陽不同內外自別不可誤治者也

今詳前說既驚風之屬臟屬腑者已無定論而臨證之治表治裏者安有成規吾恐其李代桃僵有所不免如前諸家之論非

但臟腑混淆表裏不辨而反多增名色眩人心目日風日咳日驚日嘔日火日熱日血虛日木急日

相火日陰火日外感日內傷日喜怒日乳哺日陽盛日陰虛日屬腑日屬臟究於驚風二字毫無着落其論證如此支離治療何能不誤不為規正其害豈勝言哉

諸家之說已見於前種種不經殊難盡述夫古哲立言自有定理如仲景傷寒六經表裏汗下和溫并

然不亂孰敢妄贊一辭獨此驚風之說紛紜洶湧莫可究詰醫事動關生命豈容混亂經常不特求學無歸練達者難言不惑予因不辭狂悖易去驚風字樣庶知病各有名治無致悞在醫者俾不致入海求蟾病者亦可以鑑車易轍矣

○辨明致妄之由 易去驚風字

驚風二字千古疑城嘉言欲打破人鬼關其實未易能也蓋從前有此名目後人莫敢翻其成案惟從驚風摹擬究竟愈募愈失愈論愈晦要實由於仲

幼幼集成

卷之十一

二十七

陽立名之不慎也在伊當日或適因嬰兒傷寒病瘕下有反張搐搦之態故偶立驚風之名亦猶方

脈中之驚悸驚惕驚慌等類初亦未嘗即欲以此兩字示法來茲而門人繼述不善遂以驚字為驚

嚇之驚風字即驚字之變支觀幼科書中凡青為風者皆曰青為驚可知矣謬謂小兒之病悉由驚

而生風誤以傷寒無汗之表證為急驚以傷風自汗之解肌證為慢驚以脾敗胃傷竭絕之證為慢

脾妄立諸驚名色眩惑後人何嘗有一毫實際裨

汗之解肌證為慢驚以脾敗胃傷竭絕之證為慢



於治療而諸家旋祖其術極力敷演亦不過隨波逐浪猜度摹擬初無理要可以服人是仲陽偶以一字之乖訛而後世受禍如此其烈也至於見證立名更爲舛謬如小兒傷寒病瘵外證有頭項強背反張目上視此金匱所謂能仰不能俯者屬太陽則稱天弔驚眼目下竄即金匱之頸項几几音海藏之低頭下視屬二陽合病則稱看地驚兩脚掣跳海藏所謂肘膝相搆屬陽明則稱馬蹄驚兩手牽引海藏所謂左右搖擗屬少陽則稱彎弓驚

幼幼集成

卷之二

二十八

傷寒病瘵誤用驚藥耗其津液而筋脈受傷遂致兩手拘攣已爲不治之證乃猶稱鷹爪驚虛證肆行攻伐乃致脾敗胃絕四肢羸曳奄奄待盡猶復稱撒手驚至於陰寒腹痛面青口撮口吐白沫曰鯽魚驚脾虛生熱舌絡緊急不時舔舌曰蛇絲驚蛔蟲貫膈大叫一聲即昏悶不省曰烏鴉驚兒病作熱本爲常候曰潮熱驚食飲停滯胸腹飽悶曰膨脹驚更有諸多不通名項莫能枚舉夫已上諸證皆表裏寒熱分明證候顯然可據而若輩不究

病源妄立各色悉以驚字目之設也八病陽明內實踰垣上屋則將名飛天驚陰極發燥欲臥泥水中則將名擗地驚少陰昏沉嗜寐則將名瞌睡驚中消多食無厭則又名饗餐驚平荒唐鄙野雖奚童癡婢有所不言而醫者公然筆之於書後人見其證皆驚證紋悉驚紋相與依樣葫蘆一倡百和以爲一遵古法誰曰不然不知論證可任其牽強而治療不容於假借如傷寒病瘵由風寒濕三氣合邪病在太陽陽明少陽與心驚肝風脾痰肺熱

幼幼集成

卷之二

二十九

風中牛馬若以爲驚風治之則無辜之心肝脾肺枉受剝膚而風寒濕外至之邪儵然磐石此豈有一可乎予欲爲之更改之以爲非易去驚風二字仍恐流禍無已將欲以瘵字瘵字易之又慮其不入俗因思幼科以搐掣各驚今即以搐字易驚字屏去禍害之驚祛除籠統之風總名之曰搐庶不駭聽而又不失病瘵之本來復以急驚慢驚慢脾之八石堆易之爲誤搐類搐非搐之三寶後提携墊溺穩步康衢將於是乎在焉何爲誤搐益傷寒



小兒最多由醫者治不如法抑遏其表邪莫能外解故壯熱不退遂爾變而為瘧則有搐搦反張之候要知此證由風寒濕所致雖有身熱俱皆表邪非火熱之比且與內經諸瘧項強諸風掉眩諸寒收引之例恰正相符因剔出風寒二瘧歸於誤搐條下俾臨證者知為傷寒病瘧不致有開闕鎮治之害何為類搐蓋傷暑瘧痲咳嗽丹毒瘡痘霍亂客忤中惡其證顯然可見辨認既明一藥可愈何至作搐由醫者遷延時日或抑遏邪氣無所發洩

幼幼集成

卷之二

三十一

間有變為搐者搐非固有所以謂之類搐要知此證由火熱居多實非風寒惟咳嗽瘧疾微兼表邪治者宜審今遵內經諸熱瘧瘧皆屬於火之例共一十條總歸於類搐條下逐證註明各從本門為治以免截風定搐之患何為非搐蓋小兒大吐大瀉久病病後脾敗胃絕昏睡露睛虛痰來往此竭絕之證而幼科以為慢脾風更以大驚卒恐神魂離散之證為急驚風不知已上二證死生呼吸猶敢以驚風稱之耶因體東垣非風之意竟以非搐

名之使後人知此等證候全非風搐而治風治搐之法遠屏三舍庶可以保全竭絕而不致於天扎無辜也以上三門逐證分晰其所用藥方一遵經旨罔敢立異要使幼科之證毫無遺漏而驚風二字不屏自却人鬼關豈徒打破行將化為瓊樓玉宇矣

周虛中曰雄辭闕辨駁得諸家之言論者無可置喙快極快極

○新立誤搐類搐非搐分門別證

幼幼集成

卷之二

三十一

二曰誤搐即傷寒病瘧也蓋頭項強背反張目上視屬太陽低頭下視口噤不語手足牽引肘膝相搆屬陽明眼目或左或右而斜視手足或左或右而搐搦屬少陽此實三陽表證豈得混稱為驚風瘧由誤致今故易名誤搐然瘧有剛柔治非一類以柔瘧列之於首剛瘧次之更詳其致瘧之由與治瘧之方總歸於誤搐條下證治井然有據明府當不以予為妄也

柔瘧 傷風有汗為柔風性軟弱也



經曰太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔痙。○其證初起發熱自汗口中氣熱呵欠頓悶手足動搖甚則反張由風邪傷衛榮衛不和小兒體弱者最多此證亦因腠理不密自汗無時所以風邪易入幼科見其多汗昏沉輒以慢驚稱之。按此條風邪傷衛本屬輕證若能早為解肌調和榮衛藥到病起誤作慢驚妄投補劑其禍不可勝言矣。此即家所云慢驚溫補而不愈變為急驚者即此例也。剛痙傷寒無汗為剛寒性剛勁也。

幼幼集成

卷之二

三十二

經曰太陽中風重感寒濕而變痙。○蓋傷風原有汗惡人不知重衣厚被令其大汗汗多衣襟必濕濕久寒生滲注關節故謂重感寒濕寒濕內閉反合無汗是名剛痙其證初惡風寒發熱頭痛假藏於母懷者是也小兒口不能言父母一時不覺但見其發熱不知其惡寒但見其昏沉不知其頭痛醫者見其發熱滿口稱為驚風置傷寒表裏於不問惟事鎮墜涼瀉抑遏其表邪不能外出必致延及於三陽。太陽傳陽明陽明傳少陽所以有身熱足冷頸項強

急頭身俱熱面目紅赤獨推頭卒口噤背反張手足搐搦眼目斜視此則三陽經之全瘧幼科所稱四證八候者即此也斯時正宜循經用藥解去三陽之邪其病霍然而起倘舍此不圖邪必自三陽而入於三陰發熱腹瀉四肢偃伸能俯不能仰已成陰瘧凶危之候猶以慢驚風稱之風藥亂投死將旋踵哀哉。此即前諸家所云急驚涼瀉而不愈或與吐下藥太過變為慢驚者即此也。

按傷寒之來豈初日便能變瘧由醫者誤治致之

幼幼集成

卷之二

三十三

耳蓋邪自太陽而入太陽之脈上起於頭中行於背下至於足因其經脈受邪榮衛滯滯則頭項背足皆有痛楚牽強之象幼科見此便詫為驚風妄行鎮墜以致邪無所伸而後乃變為瘧此際尚不知為誤治所致而反謂小兒固有之證此其所以為誤中之誤也嘗觀夏初明治小兒作搐而死以至三五日不醒者悉用天保采微湯投之而愈其子禹鑄廣傳其方惜無一字發明之致後人莫維其義于不辭僂舌耶為剖露夫天保采微湯乃敗



毒散不換金正氣散升麻葛根湯三方合湊者也  
其中作用以羌獨走太陽而祛寒發表以蒼前升  
葛陳樸甘苓走陽明而除濕解肌以芍柴入少陽  
而和解表裏以桔半枳藿芍藥入太陰而和榮逐  
飲或問既為三陽表藥何以輒及於太陰曰小兒  
全藉脾肺為行藥之主此實扶中氣以托邪豈引  
邪入裏之謂耶然其中一十七味並非五金八石  
三黃四神而能於死中求活者豈疎解之藥可以  
起死回生乎由從前誤以傷寒作礮治未經發散

幼幼集成

卷之二

三十四

以致邪閉而死今投疎解以生者亦不過為從前  
補其闕失耳豈有奇特深義哉第此等之治猶為  
未著若早循經治療又何至如是凶危始效獵人  
之羅網四張希庶幾乎一遇苟如鄙刻所集一見  
小兒發熱昏沉即為之分別有汗無汗有汗者解  
散肌邪無汗者開通榮衛領邪外出神志自清又  
何有閉塞昏迷之變耶

附血虛寒韻太陽病瘥案

周虛中曰張景岳有云太陽血少者多有戴眼反張

之證俗醫稱為驚風誤矣蓋太陽經脈起於目內  
眥上額由後頸下背脊至足小指凡有血虛不能  
榮養經絡者一著寒邪則收引而急縮理固然也  
時俗不察往往以豁痰截風之劑耗其血液豈不  
悖哉此景岳之特見也予憶往者張 乃媛年  
五六歲體極瘦削一日羣坐忽然顛倒作反弓狀  
自言樓上有鬼眼目翻騰見白而不見黑幼科羣  
集作驚風治不效已經三日矣觀其人之骨露筋  
浮明係太陽少血况樓為枯木鬼屬陰邪亦係寒

幼幼集成

卷之二

三十五

氣傷榮所致乃遵景岳之言與  
道翁先生相商確用厥陰門中當歸四逆湯為主甫  
投一劑黑暗稍現反弓之狀亦減於是連進三服  
而安又姻翁高 乃妾冬月擁爐向火忽然背  
筋抽引作痛頭足彎後四肢厥逆眼皮吊起不能  
下亦用前湯倍加當歸大劑煎服一劑而痊可見  
先生之力闢驚風確乎不謬而太陽之瘥又有血虛  
體弱之不同也

瘥有剛柔剛瘥無汗柔瘥有汗小兒剛瘥少柔瘥



多而且肌膚薄腠理疎不勝發表惟宜解肌治瘧當以金匱爲主李金匱之方未敢輒用而世人亦不能用今之所選獨海藏五方金匱一方雜選一方附血虛寒襲一方以爲嬰兒病瘧之準則其隨機應變又在後賢神而明之予又何敢限量

○入方

海藏桂枝葛根湯

治傷風項背強身熱自汗柔瘧此蓋邪在太陽微兼陽明用此方通其榮衛則外受之邪有出無入

幼幼集賦

卷之三

三十六

其所全甚大

嫩桂枝錢一 白芍藥錢五 粉乾葛錢五 老生薑錢一

大紅棗錢三 炙甘草錢一

水煎熱服仍欲微似有汗瘧風邪自出而汗孔自閉但不可令其大汗致傷榮氣

海藏桂枝加川芎防風湯

治發熱自汗柔瘧比前方藥性微輕

嫩桂枝錢五 白芍藥錢二 北防風錢一 正川芎錢一

老生薑錢一 大紅棗錢三 炙甘草錢一

水煎熱服

予按此方不特治瘧凡小兒外感初起發熱不論有汗無汗皆宜用之效捷桴鼓人所未識

海藏柴胡加防風湯

治汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來寒熱此證太陽陽明已罷邪尙未解傳入少陽半表半裏故以小柴胡湯加防風和解之不使之入裏也

官揀參分七 北柴胡錢一 片黃芩錢一 製半夏錢一

北防風錢一 炙甘草分五 老生薑錢三 大紅棗錢一

幼幼集成

卷之三

三十七

水煎熱服

海藏防風當歸湯

治發汗過多發熱頭暈卒口噤背反張者太陽兼陽明也宜去風養血速救陰榮以靜勝燥也

北防風錢五 當歸身錢二 正川芎錢一 大生地錢五

淨水煎熱服

金匱瓜蒌根桂枝湯

治太陽頭痛身熱身體頸項俱強無汗爲剛瘧此卽先因傷風自汗汗多衣濕濕久寒生反而入內



故謂重感寒濕寒濕內閉反令無汗故見以前諸證此榮衛閉塞也設不用此通其榮衛則未瘥者成瘥已瘥者難愈矣

瓜蒌根錢五 嫩桂枝錢一 白芍藥錢五 老生薑錢一

大紅棗三枚 炙甘草錢一

水煎熱服榮衛既和微汗而解

予按小兒發熱身體頸項俱強在幼科必以為驚風矣孰肯認為太陽陽明之病瘥而用此閉通榮衛之方若早知為傷寒能用此方則未瘥者不瘥

幼幼集

卷之一

三十八

已瘥者可瘥其如偏執驚風舍太陽陽明之邪而不治反攻其無過之心火肝風致令外邪愈強內氣愈弱不至於死地不止也

凡小兒傷寒無汗者不論已瘥未瘥皆當以此方為主出入加減斷無不效之理予非親履實踐心不敢妄言以誤世也

羚羊角散

治剛瘥身熱無汗頭項強直四肢疼痛煩燥心忪睡臥不寧

羚羊角骨 真犀角骨 北防風 白茯神

陳枳殼 大麥冬心 官揀參 粉乾葛

北柴胡 熟石膏 炙甘草上各七錢五分

真龍齒煨二錢五分

右研粗末每用三錢水一盞煎至半盞去渣溫服不拘時

予按此證先由風寒濕閉其腠理不能開通內出之氣壅而為熱則風寒濕不能自強皆化而為熱矣尙在肌肉之間猶未入裏故以辛涼解散之實

幼幼集

卷之三

三十九

治熱也非治風寒濕也 嘉言謂此方治傷寒陽瘥深得清解之法

海藏附子散

治陰瘥手足厥冷筋脈拘急汗出不止頭項強直頭搖口噤此由多汗亡陽也

青化桂七分 川附片七分 漂白朮錢五 正川芎錢一

川獨活八分 大紅棗五枚

水煎溫冷服

當歸四逆湯



治小兒血虛體弱寒邪傷榮以致眼目翻上身體反張蓋太陽主筋病故也

當歸身 嫩桂枝 杭白芍 以上各三錢 川木通

炙甘草 以上各二錢 北細辛 一錢 大紅棗 五枚

水煎熱服

已上所選之方原為誤搗病瘵而設其下類搗十條證候不同各隨本門用方不得與誤搗混同論治

一曰類搗即幼科所云驚風餘證者是也原非小兒

幼幼集成 卷之七

四十一

固有由遷延而致予故名為類搗何以言之蓋暑證瘵痢咳嗽丹毒瘡痘霍亂客忤中惡其證顯然可見但能識證詳確則一藥可愈醫者審視不的藥罔對證遷延時日其熱愈甚小兒陰血未充不耐壯熱熱盛則神志昏悶陽亢必津液受傷血不榮筋則手足搗掣此正與內經之諸熱者悉音悉翅音翅手足抽掣也皆屬於火之例相符概將以下十證皆列類搗條下仍逐證註明各依本門用方庶與誤搗非搗之寒熱虛實治不相淆矣

者證

經曰太陽中熱暈是也○其證初起面垢身熱自汗煩躁不安唇舌皆赤氣出如火小便赤濇口中大渴此證常見夏秋

按此條在藜藿之兒多有之以其坐臥烈日之中澡浴寒澗之內以致暑氣入裏內熱外寒故見已前諸證醫者見其身熱自汗口渴煩燥疑為驚風妄用風藥反燥其血以致心中噎悶昏不知人甚則反張搗掣皆由血不榮筋煩熱過甚之故也若

幼幼集成 卷之七

四十二

膏梁之兒不涉長途不經酷日暑證尙少何有暑風若謂高堂廣廈口食生冷身納風涼而得之者即傷寒之類又何暑之可稱  
古人謂暑傷心其實心不可傷傷之必死蓋心為君主之官虛靈湛寂神性居之邪不易犯止因六氣之中以暑配君火故曰暑傷心然所犯者心包絡耳包絡為心之官闕捍蔽外邪不容輕侮惟由暑熱推撼外邪故神志為之昏惑但瀉其太陽內火則少陰君火神志自寧矣宜却暑丹



○入方

却暑丹

治小兒傷暑誤用風藥致心神昏悶煩燥不安甚則搖擗

漂白木錢五

白茯苓錢五

紫猪苓錢五

宜澤瀉錢五

青化桂錢二

片黃芩錢五

正川蓮錢三

鏡辰砂錢二

炙甘草錢五

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服二三丸量兒大小加減麥冬湯化服或十中取一煎服亦可

幼幼集

卷之三

四十三

瘧疾

經曰夏傷於暑秋必瘧。○其證初起呵欠頻悶發熱口渴面帶黃白頭額有汗一哭汗出其熱漸退二三分不久復熱如故喉內痰鳴一哭即嘔嘔則痰出每日如此者即瘧證也

按內經謂十二經皆有瘧究其所因而大要不一乎少陽膽經夫瘧之不離乎少陽猶咳嗽之不離乎肺也蓋凡寒熱往來總為少陽所主早能和解表裏分理陰陽則瘧邪霍然而散出其悞認驚風

輕施鎮墜以致正邪激搏榮衛遲留陽欲入裏陰內阻之陰欲出表陽外遏之少陽欲升不得升太陰欲降不能降乃致神情憤亂臨瘧而搐宜消脾飲解之其搐自止

○入方

清脾飲

治小兒熱瘧作搐不必治搐惟治其瘧

杭青皮錢一

製半夏錢一

枯黃芩錢一

艸萊仁錢五

白雲苓錢一

北柴胡錢一

真陳皮錢一

漂白木錢一

幼幼集

卷之三

四十三

川厚樸錢一

炙甘草錢五

生薑三片大棗三枚水煎熱服

痢疾

經曰飲食不節起居不時陰受之則入五臟下為殞泄久為腸澼○其證初起兩脅皺而多啼由腹痛也煩燥不安由裏急後重也數至圍而不能便或赤白相兼或單紅單白是其候也

按此證雖曰內傷飲食莫不由於外感而發也有至妙之治人所不知但以人參敗毒散升散之其



曉明按一  
當作二下

病即減設有食飲停滯輕則消導之重則疎通之

去其積垢無不愈者味者不察反投柯慈止瀉之

乃致積毒內鬱腹痛裏急欲固不能此通因通用

之證而反通因塞用遂爾神昏擾攘者有之矣急

用沉瀄丹三仙丹二藥同服疎通之後其病自去

○入方

集成沉瀄丹

方見一卷胎疾門

集成三仙丹

幼幼集成

卷之二

四十四

治小兒縱口飲啖食物過多有形之物填塞腸胃

之間不能轉運傳送脾氣抑鬱所以發熱不退眼

閉難開人事昏沉四肢攤軟儼然虛極之象古人

謂大實有羸狀即此證也味者以為虛證而峻補

之或疑為驚風而鎮墜之百無一救速以此九同

沉瀄丹同服待其下後人事即清于救治既多剖

心相告 痢疾誤用瀉藥閉其濕熱比食物有形

之塞殆有甚焉速宜下之不下即死

五靈脂

兩

南木香

五錢

巴豆仁

四十粒

右將靈脂木香研為細末聽用以巴豆剝去殼取

淨肉四十粒去其肉上嫩皮紙包水濕人慢火中

煨極熟取起另以綿紙包之緩緩搥去其油紙濕

則另換以成白粉為度謂之巴霜與前二味和勻

醋打麩糊為丸菜豆大以硃砂為衣曬乾收貯每

服五丸或七丸九丸量兒大小加減合沉瀄丹二

三丸同研爛茶清調下待其下後其病立愈此起

死回生之藥勿以常方視之

咳嗽

幼幼集成

卷之二

四十五

經曰咳嗽上氣厥在胸中過在手陽明太陰○其

證初起面赤唇紅氣粗發熱咳來痰鳴或服胞微

浮額上汗出此外感風寒急宜疎解

按咳嗽致搖其證嘗少蓋外感以咳嗽為輕內傷

以咳嗽為重大凡春溫夏熱秋燥冬寒四時正病

與平時行疫癘即至重至危之候但有咳嗽便是

生機蓋外感一傳手六經斷不致死故謂外感以

咳嗽為輕至於酒色在且之輩平素嗜慾不節耗

費過傷但逢咳嗽即為可慮倘治不如法則虛勞



肺痿跂足而待故謂內傷以咳嗽為重嬰兒知識未開內傷何有所有咳嗽無非寒熱二者而已矣寒固傷肺熱亦傷肺醫者能的辨其寒熱對證用方效無不捷其如不識陰陽罔分寒熱應辛散者而反涼濕應滋潤者反用升浮乃致寒者愈寒燥者愈燥欲不聲音不轉眼翻手搐其可得乎治宜

集成金粟丹

○入方

集成金粟丹

幼幼集成

卷之二十一

四十七

此丸專能疎風化痰消火降氣併治咳嗽上氣喘急不定嗽聲不轉眼翻手搐凡諸家截風定搐之方皆不及此方之聖倘前醫用藥不當誤而致搐昏沉不醒即以全身燈火醒之用此丸一服即痊九製牛膽南星二兩 明天麻一兩薑一兩 淨全蝎揀去尾足以滾湯泡淨 明乳香去油 淨一代赭石七次研細末以水飛晒乾一兩 赤金箔五十張 真麝香三分 梅花片三分

明按裝王福衷也

其為細末煉蜜為丸梟角于大貼以金箔每用一丸薑湯化服此方比抱龍金液保命至寶定命等方功倍十百惟虛寒之痰無根之氣絕脫之證不可用之以其降令重也

製南星法

用生南星半觔研極細末盛於碗內

取牛膽一枚傾出膽汁於碗內將南星末和勻仍復裝入膽皮之內懸有風無日之處俟其陰乾有

膽之時將前膽剖破取出南星研末仍以膽汁和

勻裝入懸之能裝過九膽誠為至寶任彼真正牛

幼幼集成

卷之二十一

四十七

黃莫能及此且今之牛黃切無真者若市肆膽星一膽而已不可用

丹毒

千金曰丹毒一名天火皆風熱惡毒所為入腹則殺人○其證由心火熾盛熱與血搏或起於手足或發於頭面胸背遊移上下其熱如火赤如丹砂形如錦紋其痛非常凡自胸腹而散於四肢者易治自四肢而入腹者難治

按丹毒雖曰風熱而由胎毒之發者十之八九小



兒屍多方脉無此世有丹毒傷生而不知者蓋此毒每發於隱密之處倘父母不覺遂致傷兒大凡小兒頭面四肢胸背脇腋忽有紅暈一點漸次散開色如錦紋外帶黃色即是火丹速宜砭去惡血內服沈瀼丹庶不致內攻作搐倘醫者不知針砭妄用搽敷逼毒入內必致作搐而死每見丹毒之禍兒者比比矣

○入方

集成沈瀼丹

幼幼集成

卷之二

四十九

方見一卷胎毒門

磁針砭法

法見四卷丹毒門

瘡癰

經曰諸痛癢瘡皆屬心火○按瘡癰疥癬小兒獨多由胎毒滯火使然也治之者宜清熱解毒使之外出可也倘醫者視為汎常不先內托解毒誤用砭硫毒藥搽之逼毒內入以致瘡忽自平其證腹脹便閉身無血色目閉不開手足動搖此毒氣

內攻也

此條與方脉之發背癰疽偶傷風濕而手足搐搦角弓反張者大不相侔蓋彼因誤傷風濕而病癰此因誤用搽敷而致搐病因不同治宜各別速服雄黃解毒丸微下之瘡出則吉瘡不出加喘者死

○入方

雄黃解毒丸

治瘡癰毒氣內攻腹脹便閉身無血色目閉不開併能解一切瘡疥之毒更可下痰追蟲打積

幼幼集成

卷之二

四十九

明雄黃一錢 川礬金二錢 巴豆霜一錢

右為細末醋打米糊為丸菴豆大每服三五丸白湯送下以利為度

痘瘡

痘稟先天胎元之毒遇時行而即發其證初起兩眼含淚珠如水鼻氣出粗睡中驚惕兩耳紋現惡熱不惡寒痘證也

按初起發熱三四日間應與疎通腠理微解表邪使毒氣易出若不行疎散以致腠理固閉熱盛神



昏而搐矣此常候也先宜人參敗毒散升散

川導赤散加硃砂以制其猖獗痘出則吉屢

凶收醫後作搐此痘毒倒陷雄黃解毒丸紫艸

湯下痘復出者吉搐不止者凶五卷痘疹門論證

訖詳宜攷

○入方

人參敗毒散

治四時感冒併痘疹升散之川

川羌活七分 川獨活五分 北柴胡五分 信前胡四分

功効集成 卷之二十一 五十一

正川芎五分 白雲苓五分 真枳殼五分 牙桔梗五分

上棟參三分 炙甘艸四分

薑一片棗一枚水煎熱服

導赤散

此清心經之熱從小便而出

大生地三錢 川木通二錢 生甘草一錢

右作一劑竹葉七片為引水煎臨服加硃砂末一

分調服

雄黃解毒丸

方見先條瘡瘍門

○附案

滋陽文庠立天張君有子三歲於今春布種神痘一

夕作搐十數次痘師某者坐守其家莫能得定次

早微明張君來寓叩門因訴其作搐之由予念故

人之子往視之見其昏迷不醒手足搐掣各處艾

火疤無數問所服藥一派涼瀉予知其誤治乃以

全身燈火醒之即能開聲因用人參敗毒散令其

母子同服一劑而搐止痘出可見理之未明毫釐

幼効集成 卷之二十一 五十一

千里蓋痘麻初起全賴陽和升生之氣故發熱本

為正候由其不與疎通腠理毒鬱不伸乃致作搐

此時正宜升散助其生機顧乃反用艾火堵截之

用涼藥鎮墜之欲其搐止其可得乎是幼科礪風

之說皆此輩釀成之禍於患者何有焉

霍亂

經曰足太陰厥氣上逆則霍亂○其證先傷於食

後感風寒邪正相爭心腹絞痛有上吐下瀉者有

上下得吐下不得瀉者所以煩燥悶亂其證最急



速宜鹽湯探吐之俟其吐瀉之後乃用藿香正氣散分理其陰陽可也但見喘而搐者不治

按此乃乾霍亂也俗名絞腸痧由其上不得吐下不得瀉所以神情昏亂若上既能吐下既能瀉則宿食痰飲俱去安有昏亂之理若曰大吐大瀉之後而見昏憤此即脫證之例豈作搐之謂耶看書若止隨文解義則執一不化皓首無成然此猶為中人言之也至有全不知書道聽途說訛訛相指以致於誣民惑世者此類醫中儘多昔人謂巫者

幼幼集成

卷之二

五十二

對本宜科教風掃地予謂巫者猶能對本宜科而醫中之不肖者即欲宜科更苦於無本可對然則醫風之掃地不殆有甚乎

○入方

鹽湯探吐法

法見二卷霍亂門

藿香正氣散

治內傷脾胃外感風寒吐瀉霍亂等證

藿香梗 家藜葉 大腹皮 真廣皮 牙桔梗

白雲芥 法半夏 六神麩 香白芷已上各二錢

客忤

川厚樸 炙甘草各五分

右作一劑生薑三片大棗三枚水煎溫服  
小兒客忤由兒真元不足神氣未充故外邪客氣得以乘之經曰邪之所湊其正必虛不治其虛安問其餘忤者謂外來人畜之氣忤觸其兒之正氣也或因生人遠來或因六畜暴至或抱兒戲騎牛馬或父母騎馬遠歸未及熏衣即抱其兒則馬汗

幼幼集成

卷之二

五十三

不正之氣從鼻而入經曰五氣入鼻藏於心肺則正氣受忤此外因之客忤也其證口吐青黃白沫面色變異喘急腹痛反側不安手足噤瘳第此證神不昏亂為異耳治宜塗額法搐鼻法內服攝生飲

復有內因客忤或兒平日所喜者乃戲而奪之平日所畏者乃戲而恐之凡親愛之人喜食之菓玩弄之物心之所繫口不能言一時不得遂逆其心志其候昏昏喜睡寤不惺惺不思乳食即其證也



宜先順其心意內服沉香安神丸併惺惺散

○入方

塗頤法

前治客忤等證

竈心土一錢

明雄黃五分

真麝香半分

共為細末棗肉和勻捏作一餅子照頤門寬窄為

樣以餅貼頤止取艾絨作豆大一粒灸三炷即止

摘鼻法

治傷風傷寒頭目不清併治客忤

幼幼集成

卷之二十三

五十四

正川芎

藿香葉

鮮藜蘆各二錢

玄胡索

粉丹皮

鏡辰砂飛各二錢

共為極細末以少許吹鼻中得嚏則邪氣出矣

攝生飲

治一切卒中大小科同

制南星

南木香

法半夏各錢半

北細辛

漂蒼朮

石菖蒲

炙甘草各一錢

右作一劑生薑三片水煎熱服

沉香安神丸

治內因客忤

官揀參一錢

漂白朮

真廣皮

陳枳殼

牙桔梗

青礞石煨各五錢

炙甘草

上沉香各一錢

鏡辰砂飛一錢

真川連五錢

共為細末蜜丸艾實大每一二九麥冬湯下

惺惺散

方見二卷孔子傷寒門

中惡

此證比之客忤為更甚蓋客忤無非外來人畜不

幼幼集成

卷之二十三

五十五

正之氣中惡則中惡毒之氣如老柩腐屍淫祠古

樹冷廟枯井敗屋陰溝皆有惡毒之氣存焉小兒

觸之從鼻而入肺先受之閉其清道填塞胸中忽

然而倒四肢厥逆兩手握拳上氣喘急者是也

復有中惡毒之物者亦謂之中惡如菌蕈河豚蠱

牛疫馬自死六畜併水雞蝦蚌之類自口而入則

腸胃受之故心腹刺痛腹皮青黑悶亂欲死前後

二證俱宜霹靂散搐其鼻令其噴嚏之後毒氣已

出然後用藥前證中毒氣死者用返魂湯此中毒



物死者用雄黃解毒丸下去之、

○入方

霹靂散

治中惡卒死併一切卒暴之證、

猪牙皂三分 比細辛五分 大川芎五分 香白芷五分

躑躅花分半 明雄黃分二 真麝香分半

右為極細末、每用少許、以燈心三寸長蘸藥點鼻孔內、以得噴嚏為驗、

返魂湯

幼幼集成

卷之二

五十六

治中惡卒死宜此主之、即仲景之麻黃湯也、因其毒氣閉塞肺竅、以此開通之、

淨麻黃去節二錢 光杏仁去皮七個 炙甘草一錢

葱白三寸水一盞煎半盞分數次服、

雄黃解毒丸

方見二卷類摘瘡瘍門

一日非搐

即幼科之慢驚風慢脾風者是也

按幼科有言曰、急驚傳慢驚、慢驚成慢脾、慢脾者

純陰之證也、然慢驚亦有虛熱、嘗多便秘、痰壅氣

塞、便誤認為實熱、妄用巴黃以下痰、行便或妄投

腦麝以通竅、涼臟、致使陰氣愈張、陽氣愈弱、幸不

死而成此證、又有一名虛風、因吐瀉日久、風邪入

腸、乃大便不禁、面色虛黃、脾氣已脫、真元已虧、繼

此發熱、即是慢脾、此不必皆由急驚傳至、男子以

瀉得之、為重、女子以吐得之、為重、其候面青舌短、

頭低眼合、吐舌咬采、聲音沉小、睡中搖頭、四肢微

搐、冷而不收、身則有冷、有熱、痰涎凝滯、神志昏迷、

幼幼集成

卷之二

五十七

沉沉喜睡、逐風則無、風可逐、瘳驚則無、驚可瘳、乃

至重之候、十難救一二也、治法大要、生胃養脾、回

陽益志、鎮心定魄、化痰順氣、若眼半開、半合、手足

不冷、二便瀦瀦、此尚有陽證、須溫和化痰理氣、不

可即用回陽、然亦不可因陽證而用清涼之藥、此

僅虛火往來、會成如陽證耳、在幼科所論者如此、

見此等辨論、娓娓其辭、自相矛盾、乖誤多端、惟有

拊膝長嘘而已、孰料幼科謬劣、一至此哉、既知慢

脾為純陰之證、又誤以慢驚之虛熱作實熱、誤下



痰誤通竅，為致變為慢脾，又有因吐瀉日久，風入腸胃，大便不禁，面色虛黃，脾氣已脫，真元已虧，繼此發熱，即是慢脾，如此之候，即應急救，真元維持，竭絕，何得以眼之半開半合，手足不冷，二便瀦滯，為尚有陽證，不可即用回陽，此淺近之理，猶且未明，而尚欲立言，傳世，平蓋眼之半開半合，名為昏睡露睛，此脾胃兩傷，敗極之證，安得目為有餘，手足為諸陽之本，四時皆宜溫和，今手足不冷，猶幸有一綫微陽，牽引接續，尚未至於厥逆，豈可謂

幼幼集

卷之二

五十八

之陽證，二便瀦滯，由其氣血傷敗，大腸枯焦，無以滋榮傳送，又豈真實便秘之比哉，此等之證，治之得法，尚可挽回，而乃稱為陽證，為之順氣化痰，豈眼之半開半合，手足不冷，二便瀦滯，果為陽熱有餘耶，抑由痰凝氣滯耶，不然化痰順氣，將焉用之，嗚呼，幼科淺陋，莫可挽救，凡小兒有熱，不辨表熱裏熱，虛熱實熱，陽浮作熱，陰極發躁，一槩稱為陽火，今慢脾之熱，無非純陰之證，真陽被逼，不能存貯，浮越肌表，散漫無歸，亡在頃刻，即急為收攝，飲

曉明按余  
字與俗  
字居切

納猶慮不及，而反謂之陽證，必欲其口鼻無氣，兩眼不開，四肢冰凍，二便長流，始可謂之陰證乎，立言者見地如斯，繼述者自可知矣，予故於此等之證，以非播名之，使知一意挽救，不用猜度，且亦不須細辨，請以幼科夏禹鑄之言，以明斯證之誤，亦可見予言之不虛也。

夏禹鑄曰：世人動曰慢驚，予獨曰慢證，蓋此證多成於大病之後，庸工一見病愈，遂不防守，去路或初誤汗，誤下，吐瀉久而脾胃虛極，故成慢證，慢字緩

幼幼集

卷之二

五十九

字，雖對急字而言，然所以成此證者，亦由於父母怠慢之故，或有汗多不止者，聽之吐瀉不止者，聽之，以致汗多亡陽，吐久亡胃，瀉久絕脾，成難起之證，故曰慢證，慢證何驚之有，以慢證而云驚，皆屬庸醫見兒眼翻，手搐握拳，形狀似驚，故以驚名之，一作驚治，或推或拿，或火，是猶兒已下井而復落之以石也，慢證者脾虛也，眼皮屬脾，脾敗故眼皮不能緊合，而睡則露睛，虛則脾失元氣，故兩目無神而漂沈，脾敗則枯澀無統，故凝滯咽喉而有牽



鋸之聲手足爲脾胃所司脾胃敗故四肢厥冷虛必生寒寒則大便瀉青而小便清利便知爲慢脾之候若療驚則無驚可療祛風則無風可祛除痰則無痰可除解熱則無熱可解惟脾胃間枯痰虛熱往來耳治此或以六君子湯加炮薑或理中湯加附子

此夏氏之見超乎流俗申明慢驚慢脾一皆竭絕之證而療驚祛風除痰解熱之治毫不可用先得我心之所同然者今以夏氏所云吐瀉脾敗之證

幼幼集成

卷之二

六十

列之於前復以景岳所云大驚卒恐次之歸於非搐條下以見此等之證總非風搐庶不乞靈願願枉害無辜也以上治法悉依夏氏張氏原方予母容復養

吐瀉

經曰少陽所至爲涌嘔又曰春傷於風夏生瀉泄○其證先傷乳食後感風邪乃致脾胃受傷吐瀉不止漸至遍身四肢口鼻俱冷手足微掣昏睡露睛蓋小兒全賴乳食以爲命吐多則乳食不入

瀉多則乳食不藏吐則傷氣瀉則傷血乳食既絕氣血復傷速救真元以免竭脫

○入方

六君子湯

治小兒吐瀉之後脾胃大傷或大病之後不思乳食一切久病中氣虛寒並皆治之

官棟參

漂白朮

白雲苓

法半夏

真廣皮

炙甘草

四肢厥冷加炮薑甚者

加附子

手足搐掣加青化桂七分鈎藤一錢

幼幼集成

卷之二

六十一

右作一劑煨薑三片紅棗三枚早米一撮水煎溫服

理中湯

方見二卷孔子傷寒門

○大驚卒恐

幼科以此爲急驚故詳辨明之

張景岳曰小兒忽被大驚最傷心膽之氣內經口問篇曰大驚卒恐則氣血分離陰陽破散經絡厥絕脈道不通陰陽相逆經脈空虛血氣不次乃失其常此內經槩言受驚之病有如此矧小兒氣血尤



非大人之比若受大驚卒恐則其神氣失散憤亂不堪尙何實邪之有斯時也收復正氣猶恐不暇顧可復爲清散耶卽如硃砂琥珀之類不過取其鎮墜之意亦非救本之法今幼科諸書皆以大驚之證例作急驚誤亦甚矣不知急驚由於風熱慢驚由於脾腎之虛皆不必由驚而得余之千言萬語闡除驚風只消景岳二十三字便以道盡後賢若肯於此數語體認更不必予之瑣瑣於斯也而此以大驚致困者本乎心膽受傷神氣陡離之病當以收復神氣爲主宜秘旨安神丸團參散獨參湯之類加金銀等物煎服之

幼幼集成

卷之二

六十二

○入方

秘旨安神丸

原治心血虛而睡中驚惕并治大驚卒恐

官棟參 淨棗仁 白茯神 法半夏已上各一錢

大當歸 杭白芍 小檳榔各七分 北五味七分

炙甘草五分

右爲細末煉蜜爲丸如芡實大每服一九生薑湯

化下

團參散

治心虛血熱目汗盜汗并治大驚卒恐

官棟參 白當歸等分

右爲細末用臘猪心一個切作三片每以藥末一

錢用猪心一片煎湯調服

獨參湯

治氣虛氣脫神散魂離以此亟救元陽草還丹之名誠不愧也

官棟參不拘多少同炒米煨薑紅棗濃煎湯徐徐

幼幼集成

卷之二

六十三

服之實有起死回生之力

或曰傷寒病與非搐二條不可用驚風之治已聞命矣而類搐十條既爲火熱何以不用驚風門中截風定搐涼瀉鎮墜之法治之此何意也曰暑瘧嗽痢痘霍亂丹痧病雖不一而搐由病致者尋其源治其病而搐自止若不去病而用截風定搐涼瀉鎮墜之治仍抑遏其病邪非但搐不能止必致變生他證醫者復不察其本病未去疑爲驚風證重藥不去病而用毒劣劫奪之者每見治驚風愈



治愈危乃致不收者皆此弊也。曰由談驚風而得

治病求源之要誠至論也。請筆之以為來學式。

已上誤搗類搗非搗證其一十四條。即幼科之急驚

慢驚慢脾者。盡止於此。業已條分縷晰。逐款逐條

註明矣。臨治者當知各證之病源有別。而治療之

攻補自殊。不得復以急驚慢驚慢脾混同立論。而

以截風定搐之死法統治之。從前未經剖露。猶謂

陷於不知。今已證治判然。惟祈後賢留心討論。神

而明之。醫稱仁。於是乎不相遠矣。

幼幼集成

卷之二

六十四

附小兒時疫證治

吳又可曰。凡小兒感冒風寒。瘧痢等證。人所易知。一

染時疫。人所難窺。所以舛誤者。良多。蓋幼科詳於

痘疹。吐瀉。驚疳。併諸雜證。在傷寒時疫。甚略之一

也。古人稱幼穉為啞科。蓋不能盡罄所苦。以告師

師。又安能悉夫問切之義。所以但知其身熱。不知

其頭疼身痛。但知其不思乳食。心胸膨脹。疑其內

傷乳食。安知其疫邪傳胃也。但見嘔吐惡心。口渴

下利。以小兒吐瀉為常事。又安知其協熱下利也。

又何暇致思為時疫。二也。小兒賦質嬌怯。筋骨柔

脆。一染時疫。延捱失治。即便兩目上吊。不時驚搐。

肢體發痙。十指勾曲。甚則角弓反張。必延幼科。正

合渠平日學習見聞之證。因多誤認為慢驚風。遂

投抱龍丸安神丸。竭盡驚風之劑。轉治轉劇。因見

不啼不語。又將神門眉心亂灸。艾火雖微。內攻甚

急。兩陽相搏。如火添油。死者不可勝計。深為痛憫。

今凡遇地方疫毒流行。大人可染。小兒獨不可染。

耶。但所受之邪。雖一。因其氣血未足。筋骨柔脆。故

幼幼集成

卷之二

六十五

所現之證。為異耳。務宜求邪以治。故用藥與大人

彷彿。凡五六歲以上者。藥當減半。一三三四歲者

四分之一可也。又腸胃柔脆。少有差誤。為禍更速。

臨證尤宜加慎。

太極丸

凡疫癘流行之時。小兒作熱。即是時疫。不有眼目

上竄。角弓反張。手足搐掣。不可誤認驚風。但以時

疫治之。自愈。

天竺黃錢五

膽南星錢五

酒大黃錢二

直僵蠶錢三



真麝香二分 梅花片二分  
此為細末端午日午時修合煉蜜為丸如艾實大  
硃砂為衣凡遇疫證薑湯化服一丸神效

○癘證

錢仲陽曰小兒發癘因氣血未充神氣未實或為風  
邪所傷或為驚怪所觸亦有因妊娠時七情驚怖  
所致若眼直目窵口噤流涎肚膨發搐項背反張  
腰脊強勁形如死狀終日不醒則為癘矣按仲陽  
之說亦明知有癘病而謂終日不醒者為癘不知

幼幼集成

卷之二

六十六

癘病為三陽表證據幼科所稱癘為心肝脾肺  
之裏證今反以表病腑病為重裏病臟病為輕經  
脈行於皮膚肌肉者為重經脈行于內臟貫膈者為  
輕邪傷傳導之府為重邪傷神明之臟為輕顛倒  
背謬令人不解仲陽尚為此言又安保後人之不  
訛傳也

萬密齋曰癘者卒然而倒四肢強直目閉或眼珠翻  
上不轉口噤或有咬其舌者口中涎出或無涎者  
面色或青或白面色或青或白後賢仔細看眼或作六畜聲其狀

不一乃小兒之惡證也昏暈一時即醒如常矣其  
發也或以旬日計或以月計或以歲計古人有三  
癘五癘之名證治太多似無一定之說故後學不  
知其所從也凡治癘之法幼科所載其方甚多而  
無可取者惟子家秘新方名斷癘丸誠治癘之神  
方也

子按密齋之說不為無見乃私心竊喜賴有斯人  
為之砥柱及攷其斷癘之方則皆寒涼攻伐鎮墜  
毒劣之藥予又以為不盡然焉夫癘者癘疾也非

幼幼集成

卷之二

六十七

暴病之謂亦由於初病時誤作驚治輕施鎮墜以  
致被固其邪不能外散所以留連於膈膜之間一  
遇風寒冷飲引動其痰倏然而起堵塞脾之大絡  
絕其升降之隧致陰陽不相順接故卒然而倒病  
至於此其真元之敗氣血之傷瞭然在望挽之不  
能猶認作此中之邪無異鐵石非攻堅破壘不足  
勝其真頑嗚呼以嬌嫩虧軟之體而猶入井石豈  
豈司命慈幼之心哉因錄原方以正其惑

斷癘丸此方重墜寒涼毒劣用之增困



川黃連 青礞石 石菖蒲 辰砂砂 蚌珍珠  
鐵華粉 膽南星 白甘遂 上沉香 白茯苓  
別以人參一錢白朮三錢煎湯煮糊為丸猪心湯  
下

通心丸 本非心病何用通心  
伐及無辜未可為訓

辰砂砂 馬牙硝 明雄黃 真麝香 白附子  
陳枳殼 正川芎 白茯苓 揀人參 川黃連  
金銀箔 蜜丸麥冬湯下

此卽所謂斷癇丸也予謂此等之兒似未離乎幼科  
幼幼集成 卷之二 六十八

習氣夫病至於癇非稟於先天不足卽由於攻伐  
過傷每見癇兒無不肌肥面白神慢氣怯卽萬氏  
亦謂面色或青或白豈有青白之兒能任攻伐者  
乎只因中氣素弱脾不運化則乳食精微不化榮  
衛而化為痰偶值寒凝卽倏然而發豈必心竅有  
痰而後發哉若果心竅有痰則已懵然一物何以  
發過清明如故可知非痰迷心竅之證誤作痰迷  
心竅之治愈攻愈敗愈發愈動不至於廢棄不止  
也有識者補救尙虞不暇猶敢以礞石砂砂珍珠

鐵粉之重墜傷其心氣以甘遂大毒之物損其心  
血更加黃連之苦寒敗胃雖有一錢之參如紅爐  
點雪後方砂砂牙硝雄黃金箔之類亦猶是也原  
其意不過謂重墜可以鎮心苦寒可以瀉火毒豈  
可以攻痰此等治癇無異赧王伐秦救趙而周趙  
卒為秦併雖理或有說而勢所不能也故予之治  
癇從不用治癇之方而十全其十此等之證非用  
從治之法莫能成功其如幼科諸君枋榆自足高  
遠厭聞雅知見證治證不知古哲有見痰休治痰

幼幼集成 卷之二

見血休治血有汗勿止汗逢熱莫退熱喘生母降  
氣精遺勿澁洩之訓此蓋從治之法而幼科視爲  
汎言寄司命之責者固如是乎有見者毫不治痰  
而痰自不生毫不治癇而癇自不作此其所以爲  
神也

○入方

消風丸

凡治小兒諸般癇證先服此丸七服此非治癇之  
藥用以疎散外感開通經絡後藥得以流通故



耳

南薄荷 川羌活 川獨活 北防風 明天麻

荆芥穗 正川芎 北細辛已上俱一錢 膽南星二錢

右為細末煉蜜為九重一錢一顆每日一丸薄荷

煎葉煎湯化服服完七九方服後藥

集成定痢丸

治小兒痢證從前攻伐太過致中氣虛衰脾不運  
化津液為痰偶然有觸則昏暈卒倒良久方甦此  
不可見證治證蓋病源深固但可徐圖惟以健脾

幼幼集成

卷之二

七

補中為主久服痰自不生痢自不作矣倘係年深

日久者與河車八味丸間服無不愈者

官揀參一兩切 漂白木一兩五錢 白雲苓一兩

切片薑汁一兩 真廣皮一兩 法半夏一兩 石菖蒲一兩

五錢取九節者切片 白當歸一兩酒洗 青化桂五錢去皮

杭白芍一兩酒炒 白蓮仁一兩酒炒 漂蒼朮一兩用黑

南木香五錢忌火 真龍齒一兩火煨醋淬研末

赤金箔三十張 鏡面砂三錢研末水飛晒乾聽用

右藥各依分兩製過合為一處焙乾研細末篩過

煉蜜為丸龍眼核大以硃砂為衣貼以金箔晒乾

以磁瓶收貯每日早午晚各服一丸薑湯化服痢

證未久者服此倘年深日久者早服河車八味丸

午晚服此無力借參者不用亦可

河車八味丸

治小兒痢證年深日遠肝腎已虧脾虛不足心血

耗散證候不時舉發此證總歸於虛不可以為有

餘而攻逐之致成不救但以此丸早服以救肝腎

前定痢丸午晚服以寧心健脾生脈則萬舉萬全

幼幼集成

卷之二

七

真神治也

紫河車一具頭生男者用白醬煎湯 大地黃三兩

藍汁砂仁一兩 淨棗皮一兩 粉丹皮五錢

同酒煮爛 宜澤瀉五錢鹽水炒乾 嫩鹿茸二兩切 白雲苓一兩

乳汁一兩 懷山藥一兩五錢酒炒 川熟附七錢五分

蒸晒 青化桂七錢五分 北五味一兩去梗炒乾 大麥冬一兩

去心糯米拌炒

右藥依法炮製和為一處焙極乾研為細末煉蜜  
為丸龍眼核大每早一丸用淡淡鹽湯化服以飲



食壓之、午及臨臥各用前定痢丸一服、

○幼科預宜修製應用九藥七方

消風丸 凡疎通腠理、清解表邪、啟發皮毛、流利經

絡、病之初起者用之

方見二卷痢證門

集成金粟丹 凡開關通竅、下氣利痰、醒昏定瘧、一

切危急者用之、

方見二卷咳嗽門

集成沉瀝丹音尤 凡導滯清熱、降火利膈、解胎毒、去

幼幼集成

卷之二

七十三

積熱、通利二便用之、

方見二卷胎疾門

瀉青丸 凡退熱平肝、清表裏、定瘧、搐、解煩、退熱、表

裏兩急者用之

方見四卷啼哭門

理中丸 凡脾虛中寒、面青腹痛、寒嘔寒瀉、四肢厥

冷、一切虛寒者用之、

方見二卷乳子傷寒之理中湯、加增分兩炒研蜜

丸、即理中丸

三仙丹 凡飲食過多、有形之物填塞中焦、及痢疾

大便不通、一切宜攻下者用之、

方見二卷痢疾門

太極丸 凡遇年歲疫癘流行、小兒發熱昏沉、甚則

作搐者、時疫也、宜用此

方見二卷小兒時疫門

已上七方皆宜預為修製、以備急需、凡古方截風

定搐之藥、無所用之、不必留意

○乳子傷寒證治

幼幼集成

卷之二

七十四

幼科謂小兒八歲以前無傷寒、不知此語出於何

經、夫寒、風、暑、濕、燥、火為六氣、政令乃陰陽代謝之

機、豈傷人之物、只因人之臟氣不足者、各從其類

而翕受之、因其偏受而致病、所以謂六淫之邪、其

來自天、決無擇人而入之理、今謂小兒八歲以前

無傷寒、不知寒邪不傷八歲以前之兒乎、抑八歲

以前之兒、不受寒邪之傷乎、若謂八歲以前天癸

未足、則八歲以後天癸仍未足、則應云十六歲以

前無傷寒、又何獨以八歲為言哉、夫癸腎內藏真



陽與壬勝為表裏今發水真陽未足則壬水清寒故寒邪之來各從其類竟趨太陽寒水之經以寒召寒誠莫能禦所以小兒傷寒為最多命謂其無傷寒不幾令小兒之病傷寒者束手待斃皆死非命乎非小兒無傷寒因其榮血未充易於生熱治之不當即變而為瘧幼科指為驚風者即此是也然小兒傷寒貴於急治但不宜發表由其肌膚薄腠理疎泄致汗多亡陽若能於初起之時即為解肌融其表邪從外而出則必無變虛之虞矣

幼幼集成

卷之二

七十四

或曰傷寒同一病耳而乳子與小兒治各有異何也曰乳子筋骨柔脆不耐傷寒初入太陽即人事昏沉渾身壯熱筋脈牽強醫不詳辨誤認驚風其禍立至所以乳子傷寒貴於急治故辨證不繁用方宜簡若遷延時日則無能耐之矣是以與小兒之傳經論治者緩急不同

其證初起男體重而黃而帶慘色女面赤而帶慘色喘急惡寒口中氣熱呵欠頓悶項急者是也如惡風寒必偃其身於母懷者是藏頭伏面此

表證可與解肌桂枝防風湯

如惡熱出頭露面揚手擲足煩渴便秘掀衣氣亂是為裏證暑疎通之小柴胡湯加大黃中病即止

如頭額冷手足冷口中氣冷面色闊淡大便瀉青此為陰證裏虛當救其裏理中湯

如大熱大渴自汗此表裏實熱宜和解柴胡白虎湯清之

又有先傷風寒後傷飲食或先停飲食後感風寒名夾食傷寒其證壯熱頭痛噯氣腹脹大便酸臭

幼幼集成

卷之五

七十五

連不解大柴胡湯下之體素怯者惺惺散

○入方

桂枝防風湯

治半週一歲以至三五歲幼兒傷寒初起惡寒發熱體重面黃或面白喘急口中氣熱呵欠頓悶速以此方解散肌肉之邪此方有汗能止無汗能發不致過汗亡陽為幼科解表之第一方

嫩桂枝錢半

杭白芍錢二

北防風錢半

老生薑錢一

大紅棗五枚

炙甘草錢一



右作一劑水煎熱服

有痰加北芥子錢一 有嘔吐加陳皮半夏各一錢

熱多加柴胡錢一 胸緊氣急加枳殼桔梗各一錢

小柴胡湯加大黃

治小兒裏熱惡熱出頭露面揚手擲足煩渴燥糞

掀衣氣麓微利之

官揀參分七 北柴胡錢半 片黃芩錢一 法半夏錢一

炙甘草分五 錦莊黃錢一

生薑三片紅棗三枚為引水煎熱服

幼幼集成

卷之二

七十五

理中湯

治陰證裏虛頭額冷手足冷口中氣冷面色闇淡

大便泄青

官揀參錢一 漂白朮錢二 炮薑灰錢五 炙甘草錢一

大棗三枚為引水煎濃涼冷服

柴胡白虎湯

治表裏皆熱大熱大渴自汗

官揀參錢一 熟石膏錢二 淨知母錢一 北柴胡錢一

炙甘艸錢一

合一劑用早粳米一撮為引水煎熱服

大柴胡湯

治夾食傷寒其證壯熱頭痛噯氣腹脹大便酸臭

延綿不解

北柴胡錢五 錦莊黃錢一 法半夏錢一 赤芍藥錢一

小枳實錢二分

生薑三片大棗一枚為引水煎熱服

惺惺散

治小兒真元不足氣血怯弱內傷外感熱不能受

幼幼集成

卷之二

七十六

官揀參錢一

漂白朮錢五 白雲苓錢一 白芍藥錢一

牙桔梗錢一 天花粉錢一 北細辛分五 正川芎錢一

生薑三片紅棗三枚為引水煎熱服

○小兒傷寒類治出程鳳雛 慈幼後

帝曰人傷於寒而傳為熱何也岐伯曰夫寒盛則生

熱也帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也○小兒

八歲以後氣血充足經脈完固傷寒與大人同治

仍自表達裏先皮毛次肌肉次筋骨腸胃絲毫不



爽其始也先從太陽寒水一經有惡風惡寒頭痛脊強等證寒鬱皮毛是為在表脉浮緊無汗為傷寒麻黃湯發之得汗而解 脉浮緩有汗為傷風以桂枝湯散之汗止而解

疏太陽經在最外一層故邪入皮毛即先傷之皮毛不能傳變由太陽之絡脈傳入本經而後內入諸經也邪客皮毛即玄府閉汗孔人身臟腑之氣無刻不與外氣通通故和暢玄府閉則內氣不能發洩而生熱非風寒能變熱也此時但發其皮毛

功効集

卷之三

七十八

玄府開而邪隨汗散矣麻黃桂枝汗皮毛之方非解中之藥也若表不解熱積而日甚從本經反而之內及各經之井榮俞合交會之處則熱傳於他經而各經並見矣經脉所出為井所溜為榮所注為俞所入為合十二經脉莫不皆然

太陽既罷無頭痛惡寒脉又不浮為表證罷而在中乃陽明少陽之間脉不浮不沉而在乎肌肉之間皮毛之下然有二焉若微洪而長陽明脉也外證與乾不眠用葛根解肌脉弦而數少陽脈也外證胸膈耳聾口苦寒熱往來以小柴胡湯和之蓋陽

明少陽不從標本從乎中治若有一毫惡寒邪尚在表雖入中還當兼散邪

疏肌肉不能傳變肌肉之中皆經絡也經絡謂之中裏則臟腑表則皮毛臟腑之氣血惟經絡傳達外邪之壅熱亦惟經絡傳變故陽明少陽皆從中治中者經病也非胃與膽病也陽明屬胃少陽屬膽非內之胃與膽病也經病用和解和解亦必由汗散然非開發皮毛之法矣蓋邪初客表經中陰津受傷但啟其毛竅而汗自通及熱傳中經血液燔灼竅雖

功効集

卷之三

七十九

啟而汗為熱隔不能外達庸工不知尚用風熱之藥以發其表益助熱而耗陰汗源乾涸究竟不得汗而斃者多矣仲景和解只清解熱邪而津液自存陰汗既充湧出肌表而外邪自然煥散此養汗以開玄府與開玄府而出汗者迥乎不同也邪在陽明則解肌邪在少陽則和解然病猶未退既為傳裏實熱脉不浮而沉按之筋骨之間所謂陽明胃府病也與經病不同陽明經病已罷至此傳入於胸中之胃府矣若脉沉實有力外證不惡風寒而反惡熱證語大



渴六七日不大便皆腸胃燥實致之輕則大柴胡湯重則三承氣大便通而熱愈矣

〔疏〕熱邪入裏驅出為難故就大便通洩從其近也得汗而經邪從汗解非汗為害而欲驅之也便矢而府邪從矢出非矢為難而欲攻之也矢與尿同醫不察此但知消尅瀉下之法始終禁絕飲食求一便矢為能事殊可笑矣

寒邪直入三陰之經名曰直中乃三陽主氣衰無熱拒寒也故初起即手足厥冷或戰慄臥不渴或

幼幼集成

卷之二

三十八

腹痛嘔吐泄瀉或口吐涎沫面如刀刮不發熱而脈沉遲無力此不從陽經傳入同治之例更當看外證何如輕則理中湯重則薑附湯四逆湯治之〔疏〕傷寒者由皮毛經絡而後入臟腑初雖惡寒發熱而終為熱證其人必素有火者直中臟腑始終惡寒而並無發熱等證其人必素無火者一則發表攻裏一則溫中散寒兩途判然明白

證有反常者如發熱面赤煩躁揭去衣被飲冷脈大非陽證乎然投涼藥而死者何也內有伏陰也切

其脈不論浮沉大小必指下無力按之筋骨之間皆然甚者服一切茶湯及藥皆吐此陰盛格陽乃自通湯加人尿猪膽汁證仲景將傳經直中并論正謂有陰證似陽陽證似陰耳如太陽證頭疼發熱當脈浮而反沉又似少陰矣故用麻黃附子細辛湯少陰證脈沉應無熱而反發熱又似太陽矣須用甘草乾薑附子湯陰證四肢厥逆而陽證亦有厥逆此四逆湯與四逆散不同也陰證下利陽證亦有漏底此理中湯與黃龍湯不同也

幼幼集成

卷之二

八

○傷寒總括五法

一曰發表其證脈浮發熱身痛惡寒脊項強氣喘咳嗽頭痛四肢拘急目舌和脈不沉口不渴大小便如常方主麻黃桂枝青龍之屬

一曰解肌脈尺寸俱長目痛鼻乾漱水不欲嚥方

主葛根湯升麻葛根之屬

一曰和解脈不浮不沉在來寒熱嘔吐脇痛胸前脹滿耳聾頭汗盜汗目眩口苦方主小柴胡大柴胡之屬



一曰攻裏脈至沉而有方潮熱惡熱腹痛下利轉失  
 氣手足心腋下汗出咽乾齒燥目不明譫語發  
 狂小腹滿下利清黃水不得眠小便多自汗外證  
 頭痛發熱俱罷 方主白虎小承氣六一順氣之  
 屬  
 一曰救裏脈沉無力下利清穀小便清長四肢厥冷  
 嘔吐清水涎沫背惡寒踈臥多眠囊縮爪甲青吐  
 虵乾嘔舌卷手足拘急身體痛如被杖 方主理  
 中四逆真武白通之類

○入方

麻黃湯 治太陽經寒傷榮發熱無汗惡寒  
 淨麻黃 嫩桂枝 光杏仁 炙甘草 等分  
 水煎熱服得汗而解  
 桂枝湯 治太陽經風傷衛發熱自汗惡風  
 嫩桂枝 杭白芍 老生薑 大紅棗  
 炙甘草 錢一

水煎熱服仍得微汗不可大汗

大青龍湯

治太陽證見風脈

淨麻黃 熟石膏 嫩桂枝 光杏仁  
 炙甘草 老生薑 大紅棗

水煎溫服惟恐汗多

太陽證而見風脈是有頭痛身熱無汗惡寒但脈  
 不緊而緩為傷寒兼中風之候故合麻黃桂枝用  
 之風寒外盛則人身之陽鬱為內熱石膏所以加

幼幼集成

八十三

也曰大青龍言其行雲致雨之速然苟不善用則  
 亡陽之禍變為筋惕肉瞤矣可不慎哉

小青龍湯

治表不解心下有水氣乾嘔或咳或噎或喘

淨麻黃 嫩桂枝 白芍藥 製半夏  
 炙甘草 白乾薑 北細辛 北五味

水煎溫涼得所徐服

表不解者頭痛身熱尚在也渴時飲水過多故心  
 下有水氣咳噎喘者水寒射肺也有聲無物曰乾



嘔此方麻桂草發表夏辛薑散水氣芍藥和陰血  
五味收肺氣所謂青龍者東方木神主發育萬物  
之義

惺惺散

方見前孔子傷寒門

葛根湯

治陽明胃經目痛鼻乾不眠

粉乾葛

一錢五分

赤芍藥

嫩桂枝

炙甘草

各六分

淨麻黃

去節一錢

鮮葱白

三莖

老生薑

片一

大棗

一枚

淨水煎服

淨水煎服

如惡寒加麻黃 惡風加桂枝

如正陽明腑病

不惡寒有汗而渴當用白虎湯

升麻葛根湯

治邪在陽明經無汗惡寒發熱

絲升麻

粉乾葛

赤芍藥

炙甘草

淨水煎服

此方疏表去寒和血調氣故為痘家之用

小柴胡湯

治少陽膽經耳聾脇痛寒熱往來口苦

北柴胡

三錢

官棟參

片黃芩

法半夏

炙甘草

各一錢

薑一片棗一枚為引水煎服

按此經無出入路不可汗下止此湯和解之如兼

陽明證本方加葛根芍藥如尙有惡寒等證用大

柴胡湯

太陽經表之表也行身之背陽明經表之裏也行

身之前少陽經半表半裏也行乎兩脇之傍過此

則少陰太陰厥陰俱入臟而為裏

大柴胡湯

治表證未除裏證又急汗下兼行

北柴胡

五錢

片黃芩

一錢

白芍藥

一錢

法半夏

八分

錦莊黃

七分

小枳實

四分

老生薑

三片

大紅棗

一枚

水煎空心熱服

白虎湯

治身熱大渴而有汗脈洪大者無渴者不宜

煑石膏

三錢

淨知母

二錢

炙甘草

一錢

晚粳米

一匙



淨水煎濃滾熱服

邪入於裏內有實熱故惡熱越故有汗裏燥故有渴邪盛故脉大邪在陽明故脉長白虎者西方金神也名此者欲秋金之令行而夏火之炎息耳此暑月熱病發熱正方石膏寒中之藥淡而辛能汗能利必其人大汗而渴齒燥脉洪長可用若無汗脈虛而不洪長或重按全無雖壯熱口渴象白虎證此脾胃氣虛元陽不足悞服必死

調胃承氣湯

功效集成

卷之二

八十六

治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結而嘔日晡潮熱

錦莊黃錢二 白芒硝錢二 炙甘草錢一

生薑五片水煎熱服

大承氣湯

治陽明太陰諸語五六日不大便腹痛煩渴并少

陰舌乾口燥日晡發熱脉沉實者

錦莊黃錢五 川厚樸錢二 小枳實錢一 白芒硝錢三

老生薑五片用水煎滾熱服

小承氣湯

治六七日不大便腹脹滿悶病在太陰無表證汗後不惡寒潮熱狂言而喘者

錦莊黃錢三 川厚樸錢二 小枳實錢一

淨水煎濃滾熱服

桃仁承氣湯

治外證已解小便急大便黑小便利為瘀血證

錦莊黃錢二 白芒硝錢一 嫩桂枝錢一

光桃仁十粒 炙甘草錢一

功效集成

卷之二

八十七

水煎滾熱空心服

凡用三承氣者須以手按病人自胸至小腹果有硬處手不可近又看其舌之燥滑何如然後分別當急下者宜大承氣湯可少與者宜小承氣湯宜微和胃氣者調胃承氣湯此以仲景聖法用之也

小建中湯

治傷寒腹中急痛陰陽相乖

嫩桂枝錢一 白芍藥錢二 炙甘草錢一 新傷糖五

老生薑五片 大紅棗三枚



淨水濃煎半飢服

陰證腹痛不大便秘枝芍藥湯腹痛甚桂枝大黃

湯腹痛自利小便清白宜四逆理中

黃耆建中湯

治傷寒汗後身痛脉遲弱者

炙黃耆錢五 炒白芍錢二 青化桂錢一 炙甘草錢一

老生薑片五 大紅棗枚五

煎好入飴糖三匙再煎一沸服若微溇泄者或嘔

者皆不用

幼幼集

卷之二

八十一

汗多耗損陰氣不能榮養筋骨故痛陽虛故脉遲

汗後故脉弱此乃建立中氣使生長榮衛通行津

液則表不虛而身痛自愈

理中湯

治太陰即病自利不渴寒多腹痛

人參片二 漂白朮錢三 炮乾薑錢一 炙甘草錢一

淨水濃煎溫涼徐服

真武湯

治汗發過多心下悸頭眩身瞶振振欲擗地者

熟附片 白芍藥 白雲苓各二錢 漂白朮錢五

老生薑錢二

淨水濃煎溫涼得中服

心亡津液腎氣欲上而凌心故悸汗多亡陽虛邪

內動故眩暈欲擗地真武者北方之神能司水火

不使蛟龍起陸者也

白通湯

治少陰下利無脉

熟附子錢三 白乾薑半錢 鮮葱白三莖

幼幼集

卷之二

八十二

淨水濃煎冷服

少陰主禁固二便寒邪居之則失其權矣故下利

葱白所以通陽氣也薑附所以散陰寒也能散能

通差足盡少陰之職

服此湯利不止復厥逆無脉乾嘔而煩即加薑便

半杯猪膽汁五匙服之脈微續者生脉暴出者死

麻黃附子細辛湯

治少陰病始得發熱脉沉

淨麻黃錢三 熟附片錢三 北細辛錢一



淨水煎濃溫冷服

病發於陰當無熱有熱者乃太陽經表裏相傳之證也少陰虛則太陽之邪由絡直入其不盡入者留為表熱故用麻黃以發汗辛附以溫中中外互攻而賊邪警服矣

四逆湯

治陽氣亢極血脈不通四肢厥逆在臂脛之下若陰證則上過乎肘下過乎膝矣

北柴胡 白芍藥 小枳實 炙甘草 等分

淨水濃煎滾熱服

陽邪傳入於陰裏有結熱陽氣不能伸於四末故四逆而不溫用枳實所以破結氣而除裏熱用柴胡所以升發真陽而回四逆甘草和不調之氣芍藥收失位之陰犬傷寒以陽為主四逆則有陰進之象若用苦寒下之必致陽益虧矣故用此方  
甘草瀉心湯

治呢逆脉洪大心火上奔肺不得納

炙甘草 正川連 法半夏 片黃芩

暖明按湯 醫作散

官揀參 白乾薑 老生薑 大紅棗

淨水濃煎對人參湯服

胃寒呢逆脈微細乾薑半夏丁香柿蒂治之若因失下大便實者小承氣湯治之

玄參升麻湯

治發痲咽痛

黑玄參 綠升麻 炙甘草

淨水濃煎熱服

陽毒升麻湯

治赤痲狂言吐膿血

綠升麻 真犀角 鮮射干 片黃芩

官揀參 炙甘草

淨水濃煎對人參湯熱服

陽證誤溫當汗失汗當下失下或下早邪熱入胃或下遲熱留胃中皆致發痲赤者二方可治紫黑必死

世有內傷發痲者胃氣虛極一身之火浮遊於外宜補以降之此證人多不識



桃仁湯

治狐惑聲啞

光桃仁十二錢 槐花子二錢 陳艾葉一錢 大紅棗三枚

淨水久煎極濃空心熱服

狐惑者失汗所致食少胃空蟲咬其臟則上唇生

瘡為惑蟲食其肛則下唇生瘡為狐其候齒燥聲

啞惡食面目乍赤乍白乍黑舌上白胎唇黑四肢

沉重喜眠服此須更以黃連犀角清之

黃連犀角湯

幼幼集成

卷之二

九十三

服桃仁湯後服此

真犀角三錢 正川連二錢 肥烏梅四個 南木香二分

淨水濃煎磨木香沖服

雄黃銳散

治蟲食肛狐惑證

明雄黃 光桃仁 乾苦參 正川連 青箱子

右等分為末艾汁和勻如小指尖大綿裹納人穀

道中日易之

牛蒡根湯

治發汗不透餘毒在心包絡令瘡後昏沉甚至手

足指搦或寒或熱

牛蒡根 淨麻黃 川牛膝 製南星各六錢

右為末每服五分好酒調下日三服

牡蠣澤瀉湯

治前證腰以下浮腫者

左牡蠣煨 宣澤瀉 甜葶藶 天花粉等分

右為細末每服一錢米飲調下

黃龍湯

幼幼集成

卷之二

九十三

治發熱不退或寒熱往來

北柴胡三錢 炒黃芩 赤芍藥 炙甘草各二錢

生薑三片紅棗三枚為引水煎熱服

傷風證治

經曰風為百病之長清淨則肉腠閉拒雖有大風苛

毒勿之能害否則天有八風乘虛感襲又曰賊風

虛邪避之有時○賊風者如立春日起肝木王七

十二日西風為賊邪金尅木也立夏日起心火王

七十二日北風為賊邪水尅火也立秋日起肺金



王七十二日南風為賊邪火尅金也立冬日起腎水王七十二日西南風為賊邪土尅木也三六九十二月脾土每季王一十八日東風為賊邪木尅土也此對衝之風最能傷人然中氣足膠理密者始能無害其所以受邪致病者皆怯弱之體故風邪得以乘之或有不慎而感受者頓然頭痛鼻塞呵欠喘急身熱脉浮者是也蓋肺主皮毛風入皮毛多為咳嗽其指紋紅紫而長外感候也復有傷風自利腹脹而手足冷者脾怯也當與和脾而兼

幼幼集

卷之二

九十四

發散有潮熱多睡氣急嘔吐乳食不消大便黃白而嗽者脾肺受寒不能受納而吐也若傷風多淚脇痛目腫而咳者兼肝證也舌苦面赤汗流而嗽者兼心證也面黃唇腫少食惡心兼脾證也面白眩腫上氣喘急為肺本病也嗽而腰疼者兼腎證也

○入方

人參敗毒散人參無力指辨者不用亦可

治小兒四時感冒以及傷風咳嗽凡咳嗽痰不應

者每日二服不拘劑數以痰豁為度

官揀參分五 白桔梗 陳枳殼 正川芎 甘艸

白雲芥 川羌活 川獨活 信前胡 北柴胡

北防風 荆芥穗各一錢

生薑一小片為引水煎熱服忌油

脾怯者倍雲芥加懷山扁豆

脾肺寒者倍雲芥加白朮懷山薑梗

兼肝證倍柴胡加白芍微加青皮

兼心證倍獨活加連翹木通

兼脾證加六翹山查麥芽

兼肺證倍枳殼加北芥子

兼腎證倍獨活

○傷暑證治

經曰因於暑汗煩則喘滿靜則多言體若燔炭汗出

而散又曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷

暑○嬰兒之患夏秋為甚蓋火土旺於長夏正當

金水受傷穉陽陰微已失天和加之暑熱陽氣浮

於外生冷戕於中夏失長養則不能生金而病於

幼幼集成

卷之二

九十五



暑然有中暑而病者有因暑而致病者雖病有本  
同而總由於暑故其為病有陰陽二證曰陰暑曰  
陽暑治由水炭不可不辨也

一陰暑者因暑而受寒也凡膏粱之兒畏暑貪涼不  
避寒氣又或居深堂廣廈或午熱乍寒之時不離  
衣被以致寒邪襲於肌表其證頭痛無汗惡寒身  
體拘急四肢酸疼此以暑月受寒雖名陰暑即傷  
寒也治宜溫散五積散清暑益氣湯不惡寒而發  
熱者人參白虎湯熱退後用調元生脈散補之

幼幼集成

卷之二

九

又有不慎口腹過食生冷瓜果涼茶冷水以致寒涼  
傷臟而為嘔吐瀉利腹痛等證此亦因暑受寒寒  
邪在內治以溫中為主加味五苓散不應理中湯  
陽暑者藜藿之兒有之常在烈日之中坐於熱地  
之上澡浴寒澗之內其證發熱頭痛煩燥大渴大  
泄脈洪滑大便乾結小便赤痛者白虎湯脈虛煩  
渴而少氣者人參白虎湯若暈者生脈散兼吐  
瀉者藜藿湯

凡治暑證最當辨其陰陽虛實若外中熱邪內亦煩

燥而熱者此表裏俱熱方是陽證治宜清補如前  
若脈虛無力或為惡寒背寒或為嘔惡或為腹痛泄  
瀉或四肢鼻尖微冷或不喜涼茶冷水或息促氣  
短無力以動之類皆陽中之陰證也凡見此類但  
當專顧元氣四君子為主治或理中湯加芍藥若  
虛寒甚者則會時令而從證附桂在所必用切勿  
可因暑熱之名而執用寒涼解暑則禍不可勝言  
矣

○入方

五積散

治陰暑受寒頭痛無汗惡寒身體拘急四肢酸疼  
以此溫散之

九

香白芷 真廣皮 川厚樸 牙桔梗 陳枳殼  
正川芎 杭白芍 白雲苓 漂蒼朮 大當歸  
製半夏 嫩桂枝 黑炮薑 炙甘草  
生薑三片紅棗三枚水煎服  
清暑益氣湯  
治傷暑煩熱自汗口渴惡寒發熱者



官揀參六分 炙黃耆錢一 漂白朮錢一 六神麩錢一

宜澤瀉五分 川黃蘗五分 杭青皮五分 粉乾葛錢一

北五味三分 炙甘草五分

生薑一片大棗三枚為引水煎熱服

人參白虎湯

治中暑不惡寒而發熱者

大官揀錢一 鞣石膏錢一 淨知母錢一 炙甘草錢一

晚粳米錢五

水煎熱服口渴甚加麥冬一錢北五味五分

幼幼集

卷之三

九

調元生脈散

平肝木益脾土瀉邪火補元氣小兒要藥

官揀參錢一 炙黃耆錢二 大杭冬錢一 北五味三分

炙甘草錢一

生薑三片大棗三枚水煎溫服

加味五苓散

治暑證之要藥也

漂白朮錢二 白雲苓錢二 結猪苓錢二 宜澤瀉錢二

青化桂錢一 藿香梗錢一 宜木瓜錢一 西砂仁錢一

生薑一片大棗一枚燈心十莖引水煎熱服

理中湯

治陰暑嘔吐瀉利腹痛

官揀參錢三 漂白朮錢三 黑炮薑錢五 炙甘草錢二

大棗三枚引水煎溫服

白虎湯

治陽暑發熱頭痛煩燥大渴大汗脈洪實大便秘

結小便赤痛

鞣石膏錢三 淨知母錢二 炙甘草錢一 晚粳米錢一

幼幼集

卷之三

九

水一碗先煮米熟納後三味同煎滾熱服

生脈散

固中氣清火熱保肺金

官揀參錢一 大杭冬錢三 北五味七分

水煎極濃溫服

藿香湯

治陽暑脈虛兼吐瀉

漂白朮錢二 陳香薷錢半 白雲苓錢二 結猪苓錢二

宜澤瀉錢二 青化桂錢一 白扁豆錢五 川厚樸錢一



炙甘草五分

生薑一片大棗一枚燈心十莖引水煎服

四君子湯

方見三卷瘧疾門

理中湯加芍藥

治傷暑腹痛泄瀉即本方加炒白芍藥一錢五分

○傷濕證治

經曰諸濕腫滿皆屬於脾又曰風雨則傷上清濕則傷下○是濕之為病有出於天氣者雨露是也有

幼幼集成

卷之三

一百

出地氣者泥水是也有出飲食者酒漿生冷是也有出人事者汗衣臥濕如小兒澡浴糞穢衣襟不乾皆是也然所因雖異悉由乎脾氣之虛而辨治之法其要惟二一曰濕熱一曰寒濕盡之矣病而發熱者謂之濕熱病而多寒者謂之寒濕濕熱之治宜清宜利熱去濕亦去也寒濕之治宜燥宜溫非溫不能燥也

一濕熱證其證發熱身痛多煩渴小便赤澀大便秘結脈見洪滑方是熱證宜利宜清柴苓湯茵陳飲

如果濕熱之甚或元氣壯而兼秘結不通者方可推蕩之集或沉瀝丹

一寒濕證惟腹滿泄瀉嘔吐皆寒濕之病也凡小兒喜弄冷水坐臥濕地其證頭暈身重寒熱往來宜胃苓湯如兼嘔吐加藿香砂仁如因中濕浮腫者胃苓湯合五皮散如不效必用溫補俟陽氣漸復則陰邪始退如理中湯八味丸宜擇用之

凡脾虛多病濕內因酒麪停滯嗜瓜果喜生冷燒炙甘肥以致濕熱壅滯而為病者此內因也復有坐

幼幼集成

卷之三

一百

臥濕地露露陰雨所客澡浴為風所閉涉水為濕所鬱鬱於肌腠則發黃此濕由外生可見內外所感皆由脾氣虛弱而濕邪乘而襲之中濕發黃者茵陳五苓散不效六君子湯燥脾而黃自退

○入方

柴苓湯

治中濕惡熱如瘧

官棟參錢 北柴胡錢 枯黃芩錢 法半夏錢  
浮白朮錢 結猪苓錢 宜澤瀉錢 上青桂錢



白雲苓錢一 炙甘草分五

生薑三片大棗三枚水煎熱服

茵陳飲

治中濕發黃作熱大小便瀉

茵陳蒿錢二 黑梔仁錢五 赤茯苓錢一 甜葶藶錢一

小枳實分五 生甘草分五

燈心十莖水煎食前服

沈瀝丹

方見二卷胎疝門

幼幼集成

卷之三

二百三

胃苓湯

治中濕頭重體重往來寒熱和水土調脾胃

漂蒼朮錢二 炒厚樸錢一 廣陳皮錢一 炒白朮錢一

白雲苓錢一 結猪苓錢一 宜澤瀉錢一 炙甘草分五

上青桂分五

生薑三片水煎食前服

五皮散

此方合胃苓湯專治浮腫神效

生薑皮 大腹皮 茯苓皮 桑白皮 五加皮

已上各二錢

燈心十莖大棗三枚為引水煎空心服

理中湯

方見二卷傷暑門

八味地黃湯

方見一卷保產門

茵陳五苓散

治中濕發黃

茵陳蒿錢二 漂白朮錢一 白雲苓錢一 結猪苓錢一

幼幼集成

卷之三

二百三

宜澤瀉錢一 青化桂分五 炙甘草分五

生薑三片大棗三枚為引水煎服

六君子湯

方見二卷非搐門

○霍亂證治

經曰足太陰厥氣上逆則霍亂又曰不遠熱則熱至

熱至則身熱吐下霍亂○夫霍亂之病起於含卒

其證揮霍擾亂無有寧止故名霍亂多因夾食傷

寒陰陽隔上吐下瀉而煩燥悶亂者是也菴人有



三焦受納水穀，主人而不主出，中焦腐化水穀，流行於五臟六腑，下焦分別水穀，主出而不主納。故邪在上焦則吐，邪在下焦則瀉，邪在中焦則上吐下瀉。凡霍亂得吐瀉，則邪氣上下得出，斯無苦也。陳莖出盡而吐瀉自止，乃有上不得吐，下不得瀉，為乾霍亂。又名絞腸痧，其病因脾胃之邪無從而出，若加喘滿作搐者，十不收一。其有上吐下瀉者，當分寒熱而治之，亦宜止其乳食，恐其增痰也。故霍亂飲米湯必死，以其助胃邪故也。宜藿香正氣散。

功効集戊 卷之二 一百四

有先瀉後吐者，乃脾胃虛寒，故先瀉白水而吐亦不多，口氣緩而神色慢，額上有汗，六脈沉細，此為虛冷，宜溫之。六君子湯，不愈則理中湯，加藿香木瓜各一錢。有先吐後瀉者，乃脾胃有熱，故喘促唇紅，吐來面赤，渴飲水漿，脈洪而數，此為熱也，宜和解之。五苓散加藿香。其乾霍亂，上不得吐，下不得瀉，最為危迫，速用鹽湯。

探吐之，必待其吐出宿食積痰，然後用藥，或以針刺十指甲邊令血出，或刺膝灣名委中穴，出血即解。後用藿香正氣散。

○入方

藿香正氣散

治風邪傷胃，陰陽不和，上吐下瀉。

紫蘇葉一錢 大腹皮一錢 芽荳梗一錢 白雲苓一錢

製半夏五錢 川厚樸一錢 香白芷一錢 真廣皮一錢

炙甘草一錢

功効集戊 卷之二 一百五

生薑三片，大棗三枚，水煎熱服。

六君子湯

方見二卷非搐門

理中湯

方見二卷乳子傷寒門，此加藿香木瓜。

五苓散

方見二卷中暑門，此加藿香。

鹽湯吐法

其法以溫水調食鹽畧鹹，一大碗令兒服之，良久。



以指探其喉間則吐一吐即鬆

○霍亂簡便方

凡霍亂吐瀉腹痛者切忌熱湯及米湯犯之必死必待其吐瀉後一二時久服藥過後俟其胃氣稍回渴止知饑方可以稀粥與之

凡霍亂嘔吐不能受納藥食危甚者速以新汲水和百沸湯各一盞和勻各陰陽湯飲數日即定

凡痰壅及宿食惡毒之物阻塞中焦而令腹脹欲飲

霍亂者即與鹽湯令其頓服吐盡痰食即安

幼幼集成

卷之二

一百六

霍亂吐瀉諸藥不效菘豆胡椒各二十一粒研細水煎服如口渴甚者將二物研細以新汲井水調服則安

一方以六一散一二錢薑湯調服夏月更妙蓋六一散涼薑湯熱亦寒因熱用之意也

乾霍亂即絞腸痧其證忽然心腹絞痛不可忍上不得吐下不得瀉痰壅腹脹手足厥冷六脉沉細或伏或在須臾真惡候也急用食鹽一兩生薑五錢搗碎同鹽炒黑色水一大碗煎數沸溫服良久以

指探喉中探吐之或不吐即瀉

絞腸痧亦有陰陽陰痧腹痛手足冷者其身上有紅

點以燈火於紅點上燂之○陽痧腹痛手足煖以

針刺其十指背近爪甲處一韭葉許出血即安仍

先自兩臂挾下其惡血令聚指頭然後刺之

凡發痧手足厥冷腹痛用溫水一碗令病人伏臥枕

上以手蘸水拍其兩膝灣各委中穴看其有紫黑

點現以針刺出惡血即愈脾脉肝脉腎脉三陰之脈皆從此委中穴過

又法以香油拍兩手出池穴即肘內灣處以苧麻蘸

幼幼集成

卷之二

一百七

油搨之刮起紫痧立刻即愈肺脉心脉心包絡脉皆從此曲池而過已

上所為亦疎散之意也

幼幼集成卷之二終