


《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇〇〇〇・子部・醫家類

雞峯普濟方三十卷（存卷一、卷四、卷五、卷七、卷九至卷三十）〔宋〕張銳撰……………一

洪氏集驗方五卷〔宋〕洪遵輯……………四一九

魏氏家藏方十卷（存卷一、卷二、卷四至卷十）〔宋〕魏峴撰……………四六五

宋本雞峯普濟方

濟方 藝芸書舍藏板

道光戊子仲夏重刊

重刻雞峯普濟方序

閩原觀察多藏秘笈其雞峯普濟方一書又世所罕傳於是重加刊刻既成屬予爲序予不知醫其將何以序是哉雖然嘗病夫今之醫者之爲方也舉凡方書罔克究心雖顯著如千金外臺之屬精深博大者家有其書已鮮矣而況讀乎而況用乎惟坊肆陋本抄撮湯頭編爲歌訣人挾一冊口剽目竊以漸速化迨病之來皆皮附應之冀望其倖中此固必不得之數也太史公傳倉公言意自少喜醫藥醫藥方試之多不驗者得見師臨菑元里公乘陽慶謂意曰盡去而方書非是也欲盡以我禁方書悉教公然則觀國工之所以得悟俗工

之所以失盡去其不驗非是之故方更受
古先遺傳之禁方豈非此日之急務哉陽
慶之子不可違特當於昔人方書中求之
耳張氏審擇會萃以普濟之心成書汪君
不專己有刊普濟之書行世厥以是乎厥
以是乎予既辭不獲命輒書此序之以待
夫後之讀而用者時

二

道光八年歲在戊子夏五月顧千里撰

鹿茸煎散	七香元	經効鹿角元
人參元	栝子仁煎	無比山藥元
黃耆腎瀝湯	松脂元	橘皮元
門冬元	三千元	金釵石斛元
沉香元	薏苡仁散	腎瀝湯
犀角元	韭子元	從蓉元
煉陰丹	小腎氣元	增損腎瀝湯
肉苳蓉元	鹿茸元	鹿茸煎元
平補湯	草寒石散	胡蘆巴元
椒紅元	水芝丹	補骨脂元
	仙茅煎	水芝煎
內炙丹	山藥地黃元	附子黃耆湯
地黃煎	九仙丹	內補湯
養氣續斷煎	固氣元	平補從蓉煎
鍾乳煎	平補煎	三台元
大建中湯	九仙丹	茱萸湯
二陽丹	紫河車元	平補丹
鹽精丹	禿雞散	神効八味劉散
栝子仁元	敲枕散	峻補元
附子鹿角元	肥中元	肉苳蓉煎
禹餘糧元	香茸元	榆皮通滑煎
玉霜丹	鍾乳煎元	肉苳蓉散

桂木元	內固丹	陳皮元
五味子元	炙肝散	白木元
黃耆建中湯	二陽丹	白木散
廬山譚先生酒	太陽丹	麋角霜元
杜仲散	當歸元	扇灰散
破故紙元	厚腸元	禁精湯
班龍元	香茸元	丹砂鹿茸元
人參栝子仁元	加附子鹿茸元	
第七卷		
補虛		
走馬苗香元	乳粉散	薯預元
巨勝煎	五補鹿茸煎	苗香煎
熟乾地黃元	地黃煎元	人參薯預元
無名丹	固真丹	玉關元
毗沙門元	木香劉散	五香驚甲散
補真元	敗龜散	遠志散
小黃耆元	磁石元	天雄散
酸棗仁散	茯神散	苾萸煎
人參散	草豆蔻散	石斛元
迅補元	覆盆子元	麋角元
鍾乳散	五柔元	麝香鹿茸元
附子鹿茸煎	白豆蔻散	木香煎

阿魏元	肉蓯蓉散	鹿茸續斷散
附子元	肉蓯蓉牛膝元	杜仲元
酸棗仁散	茯神散	伏火雄黃元
二氣丹	正元散	填骨髓煎
玉飲方	茜根散	伏龍肝散
補肺散	鹿髓煎	白朮散
訶梨勒散	人參散	酸棗仁元
黃耆散	石斛散	建中散
鹿茸元	鍾乳天雄元	川椒元
黃肝散	人參黃散	遠志元
葶撥散	八石散	訶梨勒元
麋角元	八味元	鶴頂丹
烏頭蓯蓉元	養血百補元	檳榔元
地黃煎元	山藥附子元	
第八卷		
勞疰		
獺肝煎	鱉甲犀角元	萬安元
大黃耆煎	乞力茄散	人參黃耆湯
陷冰丹	反童丹	腎氣元
補腎元	牛膝煎元	黃耆人參散
杏仁煎	腎氣元	增損禹餘糧元
石斛散	玉筵散	紫河車煎

犀角元	花蓯蓉元	沉香散
鍾乳元	薯蕷元	生地黄元
生犀角元	鹿角湯	大附著散
萬病元散	溫脾散	內補鹿茸元
草豆蔻元	厚朴元	樂令黃耆湯
大王筵元	黃耆元	芫青散
散	大黃蜜蟲元	肉蓯蓉散
三黃元	肉豆蔻元	大建中湯
附著丹	麝香煎	烏頭湯
真珠散	十香元	阿魏煎
沉香煎	巖蜜湯	木香散
川烏頭散	丹砂元	熟乾地黄元
補益鹿茸元	桃仁煎	麥煎散
白茯苓散	麥門冬散	丹砂元
炙甘草湯	神補方	符呪
氣方	熟乾地黄散	赤芍藥元
沙牛角煎	天雄散	大鹿角膠煎
髮灰煎	腎著湯	奪命丹
青漆元	麝香元	香砂元
蒲黃散	鹿茸元	犀角元
青蒿煎	柴胡芍藥湯	椒薑元
鹿角膠散	殺鬼元	青蒿元

黑虎骨丹 天門冬煎 雄黃石法

第九卷 勞症

出毛元 百勞煎 安息香湯

阿魏藥法 皂莢元 桃仁粥方

青蒿煎 治尸疰 白柘湯

地黄湯 茯神散 大麥煎散

麝香散 團參補氣元 大羌活元

生乾地黄元 橘皮桃仁元 白朮散

蕪荑煎元 黃耆散 天門冬元

麥門冬元 小羊腎湯 大羊腎湯

目

十四

防風散 巴戟散 樟木散

薄荷煎元 獾猪肝元 柴胡煎元

三神煎 三稜煎元 炙肝散

桃仁散 丁香散 石斛散

黃耆散 石斛元 熟乾地黄散

羚羊角元 鹿角膠散 麻仁散

陳橘皮元 鹿角膠元 川椒元

鍾乳粉元 木香元 麋角元

葶子鹿茸元 覆盆子元 棘刺元

小肉蓯蓉散 天雄元 金鎖子元

海藻元 治虛勞陰腫方 青蒿元

栢子仁元 秦苳散 黃芩散

積聚

萬病元 如聖元 礞石元

大白朮元 桃仁元 如意元

京三稜元 丹砂沉香煎 烏頭煎

三稜元 如意紫沉煎 木香三稜元

乳香元 硃砂煎元 大温白丹

半夏湯 靈砂丹 三稜煎元

酒癆元 石鷲子元 桂元

半夏元 木香五積元 桂參元

目

十五

煮金元 化癖丹 酒癆元

金箔元 玉壺元 妙應元

小化癖元 烏金硃砂餅子 返魂丹

硃砂元 茯苓元 猫糞散

妙香元 丹砂元 萬靈元

乳石烏頭元 小丁香煎 酒癆元

黃疸

知母散 茵陳元 茵陳湯

杏仁茯苓元 小茵陳元 甘露飲子

恒山湯 茵陳梔子元 朱砂元

赤小豆散 水解散 赤小豆散

茵陳五苓散 茵陳蒿湯 山茵陳散

丁香散 苦酒湯 茵陳蒿湯

苾芾散 小建中湯 礬石散

小半夏湯 黑虎元 大黃元

第十卷

血

活潑煎 木香元 白頭翁湯

血竭散 人參黃耆散 傷中湯

伏龍肝散 附子地黃散 竹茹湯

栝葉膏 竹薑湯 香膏方

內補散湯 阿膠散 芍藥散

黃土湯 小刺薊煎 刺薊散

小伏龍肝散 黑玉丹 人參栝葉湯

麝香綿灰煎 生地黃湯 蒲黃散

阿膠散 鹿角膠煎 柔脾湯

槐花元 阿伽陀元 百草霜散

大犀角散 白朮煎元 小栝葉湯

棕攔散 黃龍散 地黃湯

人參元 犀角地榆湯 艾葉元

藥葉湯 人參湯 黃耆散

立愈元 藥皮湯 地黃煎

藍根人參散 紫苑元 淡黃元

治鼻衄方 隔竹煮粥法 川芎散

蒲黃散 治小便鮮血方 涼血散

牛膝元 栝葉膏 治金瘡等血方五

治男子婦人小兒鼻衄 修善散

治吐血等方 大聖散 救暴散三方

治衄血等方 五傷湯 開胃阿膠散

紫金元 治鼻衄

小便 榆白皮散 七寶散

石韋飲子 葵子湯方 固脬元

阿膠湯 大固脬元 菴蓉元

阿膠湯 大固脬元 菴蓉元

葱白湯 琥珀散 鬼絲子元

蓬莪散 厚朴散 莢葉散

石韋湯 茯苓湯 地榆飲子

治大小便不通等方 小豆散

鹿角元

第十一卷 因格大小便不通

心肺

養心丹 鎮心丹 門冬山藥湯

安心湯 黃耆湯 朱砂膏

鎮心散 遠志煎 犀角元

雄黃麝香元 茯苓元 丹砂元

雷元散	菜萸煎	蜀椒湯
地黃元	遠志元	當歸湯
遠志元	桂心湯	附子煎
檳榔鶴虱散	紫桂煎	補心湯
集効元	蛇黃元	犀角散
麝香元	如智元	益智散
六氣散	藥珠丹	補心丹
茯神湯	守靈散	補心湯
桂心湯	茯苓湯	九痛元
高良薑湯	溫中元	拈痛元
細辛煎	紫石英湯	大聖散
桂枝烏頭湯	杏仁紫苑元	大溫中湯
孔子大聖枕中方	失笑元	養心丹
定志元	生薑枳實湯	五味子煎
班猫元	良薑湯	椒菜元
驚甲散	雄黃元	撞氣元
肺		
勝金元	神効四時加減養肺湯	
瀉肺散	大阿膠煎	五參散
平肺湯	麥門冬五膈下氣元	
百花煎元	鍾乳白石英元	定嗽散
溫肺元	紫苑元	欵肺散

白石英散	溫中當歸湯	通氣元
補肺湯	貝母散	阿膠元
相傳湯	木香散	戎鹽湯
養肺煎	鍾乳人參元	胡椒理中元
欵冬花散	乾薑散	酥蜜膏
虛成散	四滿元	香朴元
杏仁紫苑元	潤肺元	水煮元
通聲膏	潤肺散	麥門冬煎
續斷散	潤肺散	蜜陸僧元
椒紅元	膠飴湯	平肺湯
平肺散	華蓋散	百部元
鍾乳元	紫苑湯	杏仁煎
聖力元	阿膠散	白前湯
杏子湯	鍾乳元	天門冬湯
附子細辛湯	射干湯	麻黃厚朴湯
茯苓元	圍參黃耆散	五味實散
五味杏仁湯	白石英湯	人參半夏元
牡礪散	溫肺湯	防己元
五味細辛湯	廣濟紫苑湯	黃耆補肺湯
辰砂半夏元	粳米湯	地骨皮散
已嗽元	金露散	杏仁煎
益肺散	紫苑元	四順散
		蟻煎元

潤肺散	苳薑煎元	橘皮元
國老湯	百部元	欵肺散
通聲元	參角元	梔子湯
熨法	雄黃元	貝母元
桃仁酒	三焦脹厚朴生薑半夏湯	
育痺三物小陷育湯	肺中有痰葶藶大棗湯	
久嗽	肺虛客熱	肺傷湯
蜀椒元	小胡椒煎	天門冬煎
五嗽丹	防風湯	茜根散
鍾乳丹	平肺散	生薑汁煎
白蜜膏	五味子散	厚朴散
金露元	杏仁煎	
第十二卷		
脾胃		
大驚甲湯	重湯元	智意湯
沉香養脾散	三稜散	鍾乳建脾元
葶澄茄散	建脾散	如意紫沉煎元
養脾元	人參霍香散	厚朴湯
丁香元	肉豆蔻元	橘皮煮散
補脾散	歸真散	安胃元
神翅元	小建脾散	平補湯
厚朴建中湯	進食丹	訶梨勒散

白木散	大温脾元	桂香散
磨脾湯	葶澄茄元	製木散
暢中散	厚朴元	阿膠散
人參散	葶撥元	虛脾元
助脾煎	生氣湯	丁香建脾散
温中煎	小建脾元	進食散
厚朴元	調中元	大聖人參散
接真丹	雞舌香湯	固陽丹
小品養脾元	調中白木元	菟停湯
燒胃元	白木胡椒元	温胃建脾元
沉香神翅煎	神翅湯	建脾人參元
十香煎	豆蔻散	小葶澄茄煎
開胃元	厚朴湯	白木元
人參散	神翅白木元	如意丹
白木厚朴湯	乾薑建脾散	加減理中元
葶薑元	助脾元	安胃元
煨薑元	附子理中元	龍骨厚朴湯
大半夏湯	豆蔻散	附子白木元
建脾湯	丁香神翅散	啓中元
草豆蔻散	大聖膏	温胃元
无礙元	千金進食元	翅孽元
椒朴元	厚朴煎	平胃元

生薑湯	乾薑元	橘皮元
烏頭建脾散	四倍元	老薑元
四倍散	大橘皮元	薑麵元 <small>二方</small>
正氣元	理中煎	三味建脾湯
消穀斷下元	中金丹	玉蕊元
麻豆湯	蘿附煎	麥蘗散
定胃散	棗附元	水沃雪丹
髮灰酒	大効厚朴煎元	交加散
延年白朮元	牛膝地黄散	大葦撥元
白豆蔻元	大肉豆蔻元	附子神麴元
胃脹元	人參厚朴散	酒煎附子煎
方目		
厚朴散	訶子皮散	温中良薑元
參芩白朮散	平胃散	助脾散
乾木瓜元	四君子湯	五百羅漢元
肝腎		
沉香猪肚元	沉香豆蔻散	大石斛元
石斛薤蓉散	沉香元	煉陰丹
補肝元	茯神元	人參遠志湯
山藥地黄元	益陽散	大通元
十一聖元		黃耆牛膝散
葫蘆巴散	蘭花散	香積散
川椒元	金鈴散	三茱煎

大戟元	側子石斛煎	鍾乳薯蓣預湯
含明散	七聖元	沉香元
楮實煎	香茸元	育嬰散
白芍藥散	木香薑澄茄元	木通茴香元
煨腎元	羌活散	四味湯
草還丹	椒仁元	沉香散
七里香湯	橘皮元	補腎腰子法
生薑丹	腎喘湯	論足膝病方
固元散	棗肉元	養氣湯
補肝丹		
第十三卷		
熱		
方目		
丹毒千金論	升麻膏	七疝散
平肺元	地黄元	楸煎
芍藥黃耆湯	參橘元	大建中湯
論及方四	柴胡苦消湯	橘皮甘草湯
白虎桂枝湯	澤瀉湯	兔絲子煎
空心平補元子	又方非時飲子	
大便秘		
枇杷葉散	宣壅元	四順飲子
麻仁元	神功元	小當歸元
紫蘇元	葳靈仙元	備急元

朱砂餅子

大橘皮元

赤小豆散

蒲黃散

薰法

妙應元

橘皮杏仁元

通腸元

論

小黃耆元

冷

葱白散

木香散

三建元

葫蘆巴元

山茱萸湯

正氣元

大阿魏元

葫蘆芭散

正陽丹

大四神煎

已寒元

養正金丹

厚朴煎

大硃砂元

八神湯

二陽丹

火疰丹

正金丹

方目

共四

紫桂丹

救陽丹

赤元

大効蘿蔔元

助陽丹

溫脾湯

丁香神翹散

訶梨勒散

伏火四神丹

正氣丹

劉快活燒死砂子法

火輪散

鍾乳元

紫金丹

斷下湯

溫勝散

救陽湯

二氣丹

豆蔻四神丹

燒中丹法

伏火中丹方

煨中丹法

安爐法

治冷令熱方

含光丹

治心腹脹短氣

治陰冷

治腹脹滿二方論

調中湯

寬中元

雞矢醴三稜元

附子枳實元

商陸元

硫朱丹

桃仁元

木香橘皮元

赤小豆元

橘皮煎元

迅補丹

洞陽丹

第十四卷

瀉痢

鍾乳元

霍香飲子

厚朴葶撥元

勝金黃連元

香連元

葶撥散

龍脂元

正元丹

赤石脂元

纏金丹

大桃花湯

縮砂蜜元

烏梅肉元

艾葉散

大丁沉元

補脾元

具葉莢元

當歸白朮元

方目

共五

厚朴散

通聖元

訶子散

小枇杷葉散

正氣活命散

龍骨元

黃連散

水煮木香元

露珠元

烏樗散

小訶子散

乾薑白朮散

保安丹

硃砂元

沉香水煮散

厚朴七棗湯

香藤散

阿膠神翹煎

肉豆蔻散

訶梨勒元

木香白朮元

胃風湯

綿薑湯

御米湯

草豆蔻散

厚朴散

附子葶撥元

烏賊魚元

胡粉元

木香散

甘草茱萸元

附子湯

狗頭骨元

五苓散	半夏正氣丹	豆蔻元
椒艾元	沒食子元	理中附子湯
烏梅元	紫蘇子元	四味阿膠元
炙肝散	禹餘糧元	四順湯
厚朴湯	槐花散	烏頭散
軟紅元	針頭元	玉粉散
木苳湯	建脾散	四等散
附子元	吳茱萸湯	地榆散
乳香散	三物散	石榴湯
丁香元	延年駐車元	豆蔻白朮元
薑附湯	太白元	三味黃連元
▲方目 共		
朱粉丹	香薷散	四逆湯
良薑湯	丁香散	厚朴散
母丁香膏	樗根湯	神麴散
乳香散	烏梅三物散	真阿膠元
吳茱萸元	小阿膠元	隱居溫中湯
玉粉丹	杏仁元	黑霜元
朴附元	香薑散	丁香散
椽實散	橘皮茯苓湯	桃花元
霍香散	艾餛飩	金液丹
冰壺散	勝金元	豆蔻散
訶梨勒煎	紫粉元	酒磨元

治瀉痢不羗	軟疰丹	玉鎖丹
辛木散	神聖散	水解散
感應膏	米囊皮散	白丹法
鍾乳粥	訶子煮散	茱萸斷下元
藿香飲子	龍脂元	阿膠散
茜根散	黃連散	香藤散
當歸散	赤石脂元	固腸散
地榆散	黑神散	當歸散
母丁香元	玉龍散	玉蕊散
朝真丹	瘡痢附	
▲方目 共		
瘡母煎	香甲散	丹砂烏梅元
大五補湯	烏梅元	十味元
甘草烏梅元	剋効餅子	紅英丹
恒山驚甲散	朱砂元	大黃元
神應湯	薑桂湯	雄黃丹
藿香散	荆芥散	栝婁湯
綿袞元	小柴胡湯	桃花元
祛邪元	草豆蔻散	辟邪丹
常山湯	乾漆元	七棗湯
太一神丹	靈霜元	桃仁恒山元
霜黃元	淡豉烏梅元	鈔丹元

三蒲元	丹砂元	光明元
烏莖散	拒虎膏	真丹
靈砂散	神聖散	治瘡疾久不羸
論	至聖經金丹	香和元
草菓飲子	潑雪元	瘡丹
滲濕湯	草豆蔻散	
第十五卷		
婦人	崩漏	
熟乾地黃煎	大五石澤蘭元	澤蘭散
栝子仁元	紫苑煎	大聖散
琥珀元	順經元	石脂澤蘭散
補益鍾乳元	玉筵散	昆布煎
白聖煎	小活血丹	安息香元
澤蘭元	萬安散	人參禹餘糧元
壯丹元	土苴根元	補益阿膠元
紫石英元	馬蹄元	勝金元散
桑耳散	槐耳元	古今錄驗澤蘭元
荆芥柴胡散	人參散	內補黃耆湯
人參荆芥散	保生丹	鍾乳澤蘭煎
羌活散	補陰丹	牡丹散
大勝金元	白豆蔻元	獨活散
人參散	續斷元	桂心白朮元

琥珀散	比聖散	烏頭當歸湯
川芎牡丹散	桃仁湯	防風散
虎骨散	龜甲散	大補益當歸元
小犀角元	紅花勝金散	羌活牡丹散
沒藥散	阿膠元	五味子散
草薢散	神麴元	麝香沒藥散
大補中當歸湯		半夏茯苓湯
當歸湯	龍鱗散	莽草膏
當歸散	藁本細辛散	椒紅元
溫經湯	麥煎湯	海桐皮散
金花散	養陰膏	阿膠散
二冊		
地榆當歸散	人參元	茯苓煎
阿膠白朮散	寄生散	黃耆散
赤芍藥元	艾葉元	桑黃散
馬蘭湯	牛角腮散	交加元
馬子得道人傳魏夫人延壽丹		牡丹皮散
吳茱萸湯	黑神散	白芷元
崩漏		
崩漏白聖元	續斷地榆煎	栝菜散
小薊湯	補真丹	當歸湯
白茅根散	小龜甲散	烏龍散
桑耳散	香灰散	立効散

第十六卷

婦人

半夏元

前胡細辛散

膠艾湯

油煎散

丹砂元

牡蠣湯

郁李仁散

熟乾地黄元

乾漆散

麥胥花元

紅藍花散

內補元

沒藥元

代赭元

膠艾湯

人參元

滑石散

七補元

大黃元

蘇木飲子

地黃煎元

平安丹

內補芩翦湯

麻子仁元

承澤元

榆白皮散

陽起石元

二十九

目

三十

猪腎湯

白朮散

阿膠散

阿膠元

葵子散

小豆茯苓元

烏魚骨散

滑胎散

當歸散

阿膠芩翦散

木香白朮散

桃仁散

丁香當歸元

栝蒌鹿茸元

竹瀝湯

貝齒膏

四物湯

羊肉湯

當歸建中湯

大川芎湯

論

當歸散

芩子湯

烏金散

順元散

乾薑人參元

內補當歸湯

四神散

大黃散

芩椒白朮散

半夏厚朴湯

附子當歸元

團參阿膠煎

紫葳散

烏藥元

透泉散

木鱉子湯

牡蠣散

艾煎元

秦元散

榆白皮散

大黃沒藥煎

茯苓湯

地黄散

錫粉元

滋陰養血元

芩翦湯

大豆紫湯

薑黃元

乾薑元

湧泉散

備急散

二聖散

真前子散

豆淋酒

堅中丹

白朮茯苓散

神驗膏

葱白阿膠散

治吹妳法

皂角散

芩藁散

天南星散

大聖散

大豆煎

荆芥湯

目

三十一

獨活湯

蒲黃散

兔血散

產後腹痛方

樗根白皮散

獨聖散

常器之大龍丹

治婦人有娠大便秘等三方

治胎不安等方

奪命散奪命散桑根煎

四聖印法

治婦人數日難產法

又灸法等七

又述藥公治產法

又述產前後治療法等二十五

第十七卷

婦人

芍藥元

白朮元

羊肉當歸湯

白朮散

熟乾地黄丹

桑寄生散

艾葉散	百合散	內補芎藭湯
赤芍藥散	白芍藥元	紫石英栝子仁元
紫石英天門冬元	牡蒙元	
雲母芎藭散	大填火草散	四石湯
大遠志元	牡丹煎元	白薇元
伏龍肝散	孰乾地黄散	紫石英元
小白薇元	石斛麥門冬散	鬼箭元
小琥珀散	牡丹散	歲靈仙散
桃仁散	犀角元	分膈元
麒麟元	大澤蘭元	水府丹
瞿麥元	太蚤虫元	牡丹皮湯
當歸芎藭湯	紫胡散	沒藥硃砂煎
槐耳白斂元	蠶甲元	澤蘭散
伏龍肝散	續斷元	小麥散
二生散	酸棗仁散	茯神散
疾梨散	菴草散	沒藥散
漏蘆散	雄黃散	芎藭散
虎骨散	溫經湯	桂枝桃仁湯
小薊根湯	鹿茸煎元	栝子仁元
澤蘭湯	地黄通經元	地黄煎
葶藶元	半夏飲子	當歸湯
栝素散	鹿茸元	伏龍肝散

大附子元	沒藥散	內補湯
三物湯 _{三方}	川芎散	
喘		
團參元	玉液散	橘皮元
五愈元	乾薑散	九寶散
白朮元	欵肺元	郁李仁元
白朮元	芫花餅子	薑酥膏
神秘湯	貝母散	神秘湯
紫金煎	杏仁膏	平肺湯
茯苓飲子	竹葉湯	無心散
犀角散 _{太息}		
五痔		
烏蛇黃耆元	槐子元	內補黃耆散
茄根散	沒藥元	七聖散
七寶丹	烏金散	蜜陀僧元
必効元	商殼元	鷹鶚元
小黃耆元	保命散	坐散
槐花散	如聖元	麴木元
牛膽元	雞酒膏	枳殼湯
朴消散	狐牙散	如聖元
皂角蠟散	治五痔漏法 _{三方}	小黃耆元
苦練元	槐角煎	沒藥元

假蘇元	地錦湯	烏金散
小豆元	貫眾散	蠟皮湯
黃耆元	黃連元	神翅元
黃耆散	膽礬元	
第十八卷		
淋		
榆白皮散	滑石散	當歸湯
陳皮滑石散	瞿麥散	榆白湯
石韋飲子	熟地黃散	沉香散
瞿麥散	甘草滑石散	七寶散
引使方	巨用散	陳皮石韋散
白茅根湯	木通子芩湯	榆皮通滑泄熱煎
茅根飲子	山梔子湯	子芩伏龍肝散
滑石湯	石韋瞿麥散	螭元子
石韋散	石韋子煎	長將散二
白芍藥煎	石韋散	茯苓散
固脬丹	滑石石韋散	菩薩散
通秘散	生茶散	木通散
抵聖散	車前草湯	髮灰散
香格散	燈心湯	定磁散
緩中湯	枳殼湯	地黃鹿茸元
絳宮元	五淋絳宮湯	鹿茸地黃煎

石韋湯	痰飲	
芫花散	五飲元	赤伏苓散
寬中沉參散	延年白木元	小五飲元
細辛橘皮湯	十味大半夏湯	半夏者散
旋覆花湯	金箔鈔粉丹	前胡半夏湯
薑汁湯	白雪元	開胃正氣散
水煮元	酒穢元	乾薑芎藭元
半夏藿香元	欬肺元	大半夏湯
半夏茯苓飲子		烏頭元
青龍元	丁香餅子	延年茯苓飲子
小温中元	海藻元	鍾乳元
桂心元	三薑元	消痰飲元
桔梗杏仁元	桂杏元	枳殼橘皮湯
辰砂元	黑神元	人參半夏元
半夏白木元	羌活散	深師消飲元
化痰王虛元	白木茯苓湯	半夏湯
龍膽元	皂角元	良薑元
粉霜半夏元	半夏元	半夏厚朴湯
甘松香元	黃耆散	丁香半夏元
玉液化痰元	倍木元	白木茯苓湯
對薑元	三倍元	丁香元

玉液散	桂苓元	小半夏湯
大半夏元	半夏茯苓湯	神應散
厚朴天南星元	鐵刺散	天門冬元
大半夏湯	大薤香散	乾葛湯
半硫元	青金散	金針元
青金木香元	紫蘇半夏湯	甜葶藶元
頭面	頭痛附	
旋覆花元	流氣飲子	草烏頭湯
降真丹	香芎散	桃紅散
白附子散	清神散	聖餅子
黃耆膏	細辛元	石膏元
香茶散	朱砂丹	神聖散
茯苓椒目元	芍藥黃耆湯	通頂散
硝石元	硫黃元	黑散子
麝香散	治膿耳	治頭痛
藁本散	雞郊膏	蚯蚓散
延年去風洗面方		千金療面黥
羌活湯	治中風面腫	如神散
治偏頭痛	輕金散	川芎湯
清神散	降真丹	大愈風丹
檀根煎	開胃散	
第十九卷	消渴	

熟乾地黄元	黃耆元	茯苓元
山茱萸元	腎瀝湯	花茯苓元
黃連黃耆元	雞內金散	薯預元
茱萸黃耆元	人參腎瀝湯	增損腎瀝湯
熟地黄散	白茯苓元	千金古瓦湯
黃耆散	鐵粉湯	金箔鈔丹元
腎氣元	鈔丹散	兔絲子散
人參鹿茸元	黃耆湯	菝葜湯
斷渴湯	加減六物元	阿膠湯
茯苓黃連元	葛根飲子	乾葛散
枸杞湯	消餘元	嬰粟湯
兔絲子元	黃連元	治渴不止
神効黑神元	黃連煎	熟乾地黄元
濡咽煎	生地黄元	茱萸元
水氣		
附子木香元	治水氣法	辯水證
紫金丹	地黃紫金丹	千斧元
三部茯苓煎	椒仁元	水腫茯苓煎
十水丹	七百五十元	白元子
椒目煎	滑石元	千金翼澤漆湯
解帶散	論說	川朴消煎
補元散	玉龍元	服藥法

勝金煎	萬病散	海藻元
桂黃元	太一神精丹	女翹散
葶藶煎	海蛤丹	白元子
胡蘆散	天雄元	集驗葱豆湯
朱砂水銀煎	石韋散	猪蹄洗湯
木香元	論	正陽丹
防已湯	碧霞丹	初和用治水腫痔
神助散	黃龍散	茯苓湯
白朮散	澤瀉湯	小黃耆散
小白朮散	補益散	青龍丹
越婢加木湯	葶藶子元	樟柳散
黃耆五兩湯	黃耆桂枝苦酒湯	
庚戌八月十二夜夢得治水氣方	神掌膏	
蛇黃餅子	大棗杏仁元	陷水散
逐水散	大豆散	香薷元
桑皮豆法	萬金散	石英酒
商陸逐水散	大豆煎	治水氣連四肢腫
治石水方	治風水法	消飲白朮煎
三稜元	水銀丹	白朮湯
膩粉滑石元	漢防已散	京三稜元
五皮散		

正氣三和散	嘉禾散	橘皮煎元
丹砂沉香煎	舶上茴香元	降氣湯
大丁沉煎	分氣元	十膈散
乳香元	熨炷丹	萬安元
備急紅元子	茯苓湯	石膈散
小茴香元	厚朴建中湯	寬中理氣元
引氣丹	鑽胃元	丹參膏
丁香氣鍼元	葶澄茄元	橐籥元
堅腸湯	三和散	胡盧巴散
防已葶藶元	還魂湯	丁沉煎元
訶子元	和中煎	欬氣元
參桂元	檳榔元	葶澄茄散
金鈴散	中和元	香積散
白豆蔻散	沉香煎元	麝香勻氣元
茯苓半夏元	和胃橘紅元	雞舌香煎
氣下元	七氣湯	訶梨勒散
理氣元	木香散	小降氣湯
小理中煎	開胃正氣散	勻氣團參散
大腹湯	溫中湯	快活元
藥珠丹	鹽精元	八等散
三陽丹	三稜湯	沉香烏藥煎

人參半夏散	麝香元	沉香元
賁豚湯	安胃白朮散	生氣湯
炙炗丹	順氣元	白氣散
杏仁順氣元	黑神元	七氣湯
奔風湯	赴痛散	木香理氣元
木瓜分氣元	調中白朮煎	沉香卷氣元
木香餅子	養氣元	葶澄茄元
半夏散	正氣散	九痛元
集福元	桃仁煎	乳香元
木香散	中和湯	奔氣湯
分氣煎元	紫蘇子煎	青木香元
太一白元	妙應元	丁香飲子
草豆蔻散	肥中元	茯神湯
牛黃元	半夏厚朴湯	四味湯
烏梅元	正中元	神保元
伏梁元	三稜煎	大棗元
桂枝加桂湯	調氣元	中金元
良薑散	塌氣元	聖妙散
陳橘皮煎	堅氣散	三倍丹
小神翹元	川練散	倉卒散
斷絃散	昆布煎	失笑散
玄胡索散	枳木湯	桃仁煎

附子湯	附子開胃散	訶梨勒元
皂角元	賁豚湯	賁豚茯苓湯
大七氣湯	小正中元	吳茱萸元
石脂元	大露宿元	賺氣散
五積元	順氣散	胃氣元
壅藥	茱萸元	五靈脂散
第二十一卷		
眼目		
還睛元	蓋子澄眼藥方	决明元
如聖膏	煇甘石點眼藥	通神膏
羌活元	逼毒七寶散	金慈膏
枸杞元	神翹元	猪膽膏
當歸散	治眼赤痛	黃連膏
治眼爛眩方	空青散	雞心膏
石决明元	羊肝夾子方	點眼藥
覆盆子元	紫金膏	洗輪散
地黃元		
口齒		
齊天銀	牢牙散	烏金散
玉池散	頂禮散	如聖散
陳希夷先生指齒烏髮方		升麻地黃散
當歸散	失笑散	菖蒲散

皂角細辛散	麝香散	沉香散
槐枝膏	香椒散	川升麻散
細辛散	白芷散	黑錫散
松霜散	烏頭散	如聖散
五倍子散	生皂角散	神妙散
一字散	香白芷散	葶撥散
消毒散	葶撥散	烏金散
治牙疼	香乳散	附子膏
青散子	治風熱 <small>女齒斷</small>	落神牙法
蘭香散	牛齒散	治風神痛方
金華丹	茵草散	梧桐律散
沉香散	地黄散	大梧桐律散
治牙疼	咽喉	
無憂散	犀角散	佛手散
生地黄散	薔薇根散	神聖吹喉散
吹喉散	鵬砂散	小鵬砂散
消毒散	雄黃散	治纏喉風等方
露蜂房散	鈔霜散	鵬砂元
治咽喉腫塞	又治咽喉不通	金箔散
川升消散		

瘡腫	玉連鑲	半夏散	松脂膏
	土蜂窠散	五傷丹	神聖膏
	七聖膏	烏金膏	補肌散
	獨活膏 <small>方</small>	乳香散	一井金
	赤小豆膏	柞葉湯	皂角煎
	真珠散	立應元	大聖散
	乳香散	吳茱萸散	五香散
	碧金散	白芷散	白膏藥
	多黑散	黃蘗散	蛇床子散
	檳榔膏	柳枝膏	沉水膏
	鵝茶煎	貝母煎	檳榔散
	山茄子散	紫金散 <small>方</small>	白欵散
	金仙散	白膠香膏	栢根散
	小真珠散	乳香餅子	塗摩膏
	胡麻散	神授散	萬安散
	雄黃元 <small>方</small>	失笑散	治蛇咬
	治惡瘡	黃蜀葵散	返魂散
	治乾濕癬久不差		桃花散
	治久漏不差	治諸惡瘡久不差	
	治白癩	八神膏	治破傷毒蛇等方
	接骨丹	治傷折等法	如神膏

丁腫論辨	小朱散	大府丹
烏頭餅子	小腸茶煎	治金瘡血不止
治乳癰漸成瘡 <small>三方</small>	地骨散	豆豉膏
治指疽痛不可忍 <small>三方</small>	木香膏	治乾濕癬圈 <small>癬膏</small>
治惡瘡并出箭頭等法 <small>五</small>	治一切惡瘡等方 <small>二十七</small>	鯽魚元
奪命散	治湯火瘡	治癩瘡甲 <small>癩等瘡 痛四方</small>
療灸瘡	蕪荑散	紫金膏
千金奪命齧牙膏	接骨丹	柴胡湯
得應膏	杏仁膏	葶藶散
白芷膏	抵聖膏	蓮翹煎
小犀角元	木鱉子湯	硫黃膏
五香蓮翹湯	龍骨散	蓮翹散
大黃散	續骨元	犀角膏
紫金膏	黃耆膏	石膏油散
大黃湯	大白及散	雄黃散
漏蘆蓮翹湯	小白及散	黃耆湯
蜀葵散	紫參元	猪脂膏
硃砂散	黃耆散	太一膏
黃蘗膏	烏犀神靈膏	神妙麝香膏
栝子仁元	大黃湯	白芥子散
如聖膏		

理氣湯	小還丹	托裏散
枯萸散	茯苓元	萬金散
白麥飯膏	真粉散	山竹膏
山甲散	金星散	又治瘡 <small>十二方</small>
破棺散	皂角散	論發背瘡
辨發背證法	截發背方 <small>三</small>	烏龍丹
黃金保命膏	何首烏散	天麻散
五香湯	葱白膏	水犀角元
第二十三卷		
治小兒諸病方論	陰癩證候	陰癩治療
小兒陰癩	陽癩證候	陽癩治療
諸疳	瘡疹	
羗活元	保童元	玉龍膏
大玉柱杖元	麝香膏	史君子元
羗活膏	羗活散	玉柱杖元
雞頭元	連翹煎	安中元
抱龍元	小兒白木散	剪刀股元
鈞藤飲子	黃錠子	全蝎散
大天南星元	麝香元	紅散子
羊角元	益兒元	救生散

定吐救生丹	吳婆散	如聖散
大惺惺元	和中散	紫蘇子散
潤肺散	進食散	麝蟾元
大胡黃連元	大青膏	安神元
延壽元	小進食元	黃錠子
開胃元	至聖麝香餅子	香蟾煎
小史君子湯	小羌活膏	木香元
進食煎	黃耆湯	瀉青元
猪膽元		
第二十四卷		
小兒		
无憂散	桃紅散	神砂元
六神元	大鷲元	當歸元
丹砂元	麝香散	小兒胃風元
蘆薈元	天竺黃散	龍骨散
地黃元	人參半夏元	辰砂半夏元
溫白元	地龍膏	罷搐散
香連煎	化虫元	梧桐律散
漏銀元	四聖湯	益黃散
五靈脂元	佛茹花散	五味元
二神散	雄黃麝香散	小柴胡湯
四物元	升麻湯	荆芥湯

竹葉湯	犀角飲子	豆蔻散
寸金散	白木散	海浮石元
鵬砂散子	化癖丹	惺惺散
麝香膏	秋霜散	蟬花散
昇麻葛根湯	利鷲元	宣風散
蜜陀僧散	金芪元	葶澄茄元
苕根散	沒石子元	白木湯
蘇墨散	小青元	小紅元
小黃元	豆蔻香連元	小香連元
溫白元	蕪荑散	蚕灰散
上鼠膏	白麵元	安虫元
消毒散	皂角子散	瀉白散
導赤散	胡黃連元	蘭香散
奪命丹	甲季散	如聖散
蜘蛛元	赤石脂散	牡礪散
牡丹散	黃丹元	奪命丹
捏頭散	五靈脂散	半夏散
括萎湯	大棗膏	甘麥散
神龍散	經効苦練元	人白膏
治小兒牙疳散	瀉心湯	硫黃散
芎湯	竹葉散	鱖魚酒
牙疳膏	百祥元	熟鐮膏

留齒散	藍炭膏	燈花膏
柳枝湯	木炭散	單方雜治
小兒脉法	去茨根湯	論并方
没石子元	生黃膏	天麻防風元
第二十五卷		
雜治		
大効紫苑元	接骨丹	大黃散
无憂解毒元	活絡丹	生木菴湯
犀角散	保靈丹	荆瀝湯
橘紅湯	和中湯	靈黍湯
食積聖餅子	杏仁元	鼓子花散
止汗散	神仙煎	除邪丹
近侍湯	洞庭湯	香棖湯
道合湯	磁石元	化鐵丹
龍砂湯	真一湯	苳蒂散
治耳龍耳方	六一湯	廣濟療蛔男
遠志膏	乳香散	解藥毒方
治骨梗方	治湯火燒法	治蛇傷法
治下脫不收等雜方七		潤膚膏
雲母膏	花藥石散	雄黃散
蘇乳湯	金粟散	燒肝散
苦參散	天門冬元	妙効膏

團參散	蜜陀僧散	醉仙散
地骨皮散	棗湯	赴筵散
朱砂丹		
第二十六卷		
奇疾		
項上生瘡如櫻桃有五色	人發寒不止	
大腸頭出寸餘乾自落	口鼻中腥臭水流	
鼻中毛出長五尺	面上遍身 <small>生瘡似</small>	
脇破腸出	口鼻氣出盤旋不散	
婦人月信退出皆為禽獸之狀		
遍身忽肉出如錐		
眉毛搖動目不能視交睫	毛竅非時出血	
手十指節斷惟有筋連	遍身忽皮底如波浪聲	
眼白人渾黑	因着炙火痴便退落	
每至臨卧渾身虱出	眼赤鼻張大 <small>喘渾身</small>	
有虫如蠅走於皮下	手足甲忽然長 <small>刺生如</small>	
咽喉間生肉層層相疊五色漸腫		
腹脹如鐵石臍中水出	眼前常見諸般 <small>禽虫</small>	
大腸虫出長百十尺	眼睛垂出至鼻	
腹中有物作聲	兩足心凸如腫生 <small>黑色</small>	
凡腹脹經久忽泄瀉數升	四肢節脫但有皮連	
玉莖硬不痿	遍身生瘡如橘子大	

有飲油五升以來方快意
久卧於床四肢不能動
忽氣上喘全不能語口中汁似脂
口内生肉越臭惡
渾身生瘰胞大如甘棠梨
頭面上發熱有光色
人自覺身形作兩人
牙齒逐日微長

第二十七卷

雜記

烏髮鬚復容方

烏髮藥四方

嵌甲藥四方

治癭方

治諸丹流

治節腕脫

治蛇入七竅挽不出者

治耳痛通耳

治中惡欲死

保命丹

神效救命丹三方

治傳尸骨蒸勞二方

方目

五十

治中毒蛇傷等六方

第二十八卷

丹訣

七返丹妙訣

第一轉至第七轉訣

歌九首

固濟泥

合燒硃砂法

水火既濟鼎式

伏火金液丹

丹砂法

六甲神丹

洞陽金丹法

伏火朱砂法

正一丹法七

固中下蜜煮硃砂煎元

大四神丹

歎口煨煉太一神丹秘方

治產難滑胎丹

雄黃丹

通靈玉粉丹

朱砂丹

玉芝丹

紫粉靈寶丹

白金丹

青金丹

伏火水銀黃、硫、紫粉丹

紫靈丹

四壁櫃朱砂法

太陽紫粉丹

青花丹

太陽流珠丹

四靈丹二方

伏火玄石櫃靈砂丹

紫霞丹

金液含化靈丹

含化朱砂丹

保神丹

陰伏紫靈丹

擬金丹

護命丹

安魂定魄丹

返魂丹

柳花丹

伏火四神玉粉丹

小三生丹

碧珠丹

碧玉丹

神朱丹

第二十九卷

方

五十一

丹訣

伏火朱砂丹二方

五福靈丹

張子華伏火丹法

擊爐樣

硫黃丹法

五福延壽丹方序

小伏火丹砂

至聖蜜陀僧法

玉粉丹

小金丹

保長壽命椒丹胃州青神王蒙累世服暖水臟明目

露珠丹

靈砂丹三

神仙四神丹

玉倪丹

含金丹

九陽丹

玉倪丹

蜜煮朱砂煎元

伏火丹砂二方

四神丹煉法

紫金丹

伏火朱砂歎口法

神丹法

軟朱砂延壽水仙丹

洞陽金丹

神仙六甲飛伏雄黃丹

第三十卷

備急單方全

雞峯普濟方卷目錄終

方目

五十一

雞峯普濟方卷第一

馮翊賈兼重校定

諸論

諸風

劉子儀曰經有急風候又有卒中風候又有風瘧候夫急風與卒中理固無二指風而言則謂之急風指病而言則謂之卒中其風瘧蓋出於急風之候也何者經云奄然忽不知人咽中塞窒然舌強不能言如此則是中急風而生其候也發汗身軟者生汗不出身直者死若痰涎壅盛者當吐之視其鼻人中左右上白者可治一黑一赤吐沫者死

風痲

方

風痲者身無痛也病在臟四肢不收智不亂一旦臂不隨者風痲也能言微有知則可治不能言者不可治足如履霜時如入湯脛股淫鏗眩悶頭痛時嘔短氣汗出久則悲喜不常不出三年死凡欲治此病依先後次第不得妄投湯藥以失機宜非但殺人因茲遂為痼疾當先服竹瀝飲子

風痲

經有風痲候又有風角弓反張候痲者身體強直口噤如發痲狀角弓反張者腰背反折不能俛仰二者皆曰風邪傷於陽之經而然也治法一同

腰腿

經稱腰腿風者為四肢不收身體疼痛肌肉虛滿是也。以風邪侵於肌肉之間流於血脉之內也。既云肌肉虛滿即風邪入腎之經絡而然也。水氣論曰諸腫俱屬於腎是也。治法當兼理腎為得一云不治變為水氣。

癩疾

癩者精神不守言語錯亂其則登高罵詈或至狂走癩者發則仆地嚼舌吐沫手足搐搦或作六畜之聲頃刻即蘇癩者邪入於陰經一日陽併則狂癩者邪干於心其處方用藥亦皆相類。

風眩

夫風眩之病起於心氣不足胃中蓄積實故有高風面熱

方一

二

之所為也痰熱相感而動風風心相亂則悶瞽故謂之風眩。瞽者大人曰癩小兒則為癩。一說頭風目眩者由血氣虛風邪入腦而牽引目系故也。五臟六腑之精氣皆上注於目血氣與脉并上為目系屬於腦後出於項中血脉若虛則為風邪所傷入腦則轉而目系急故成眩也。其脉洪大而長者風眩也。凡人病發宜急與續命湯因急時但度灸穴便宜針之無不差者。初得針了便灸最良灸法次列於後。

風痺

夫痺者為風寒濕三氣共合而成痺也。其狀肌肉頑厚或則疼痛此由人體虛腠理開則受於風邪也。其邪先中經

絡後入於五臟其以春遇痺者為筋痺筋痺不已又遇邪者則移入於肝也。肝痺之狀夜則則驚飲食多小便數夏遇痺者為脉痺血脉不流令人萎黃脉痺不已又遇邪者則移入於心心痺之狀心下鼓氣卒然逆喘不通咽乾喜噫仲夏遇痺為肌痺肌痺不已後遇邪者則入於脾胃痺之狀四肢懈惰發欬嘔吐秋遇痺者為皮痺則皮膚都無所覺皮痺不已則入於肺肺痺之狀氣奔喘痛冬遇痺者為骨痺骨重不可舉不遂而痛骨痺不已又遇邪者則移入於腎腎痺之狀喜脹訖其脉大澁者為痺脉來急者為痺脉澁而緊者為痺。

癱瘓

方一

三

世傳左為癱右為瘓此說尤非何者經既有偏中半身不遂之候即癱瘓之候當以左右俱中者名之又說以春夏得之難治秋冬得之易療春夏者陽氣上騰火力方盛風火相得而王故難治也。秋冬者陽氣降下漸微即易療也。此說亦未可必惟其中之淺深為難易爾。治法兼理肝腎為得蓋肝主筋腎主骨風中肝腎則筋骨癱瘓也。

偏枯

經有偏風候又有半身不遂候又有風偏枯候此三者大要同而古人別為之篇目蓋指風則謂之偏風指疾則謂之半身不遂其肌肉偏小者呼為偏枯皆由脾胃虛弱所致也。脾胃為水穀之海水穀之精化為血氣潤養身體

今脾胃虛弱則水穀之精養有所不周血氣偏虛為邪所中故半身不遂或至肌肉枯小爾治法兼治脾胃

傷寒表證

傷寒脈浮緊表證病不解心下有水氣嘔而發熱或嗽或渴或痢小便數或噦或微喘者小青龍湯主之

又

太陽證脈浮緊病在表慎不可下下之若微喘者是表未解再宜表之外證未解慎不可下下之則逆喘重者變結胃未解者且宜桂枝麻黃青龍湯細辯前證而服之

又

太陽候先曾發汗不解下之不愈其脈浮為在外故今不愈見今表證在者且宜解邪用桂枝庸醫為先曾下之不敢再表大為悞矣蓋浮為在表表之必愈

又

脈浮緊無汗而發熱者疼痛八九日當發汗微除其心煩目瞑增劇者必衄血乃解所以然者陽氣重故也或當發汗麻黃湯主之太陽病脈浮發熱身無汗自衄血而愈也

又

夫傷寒頭不甚痛脈不緊實慎不可下下之必甚或作結胃則難愈矣

傷寒表裏

夫醫方之用不可不精當在審其脈氣息數辯其體候虛實莫不以寒療熱以熱攻寒聖賢治病此為繩墨更在細詳淺深若夫面赤氣盛則上熱滿實面青唇冷則寒痞心胃腹泄肢涼乃寒濕中下焦之間捧臍痛悶是熱蓄痺於丹田又如仰則心胃注滿按之即痛是結胃之候指按不痛意懷膨滿便評虛斬之由內熱則好冷內寒則好熱更詳其在陰在陽在上則名外胃中也在下則名裏臍腹也瀉實補虛下氣取滯更須用意精思不可自出小見誤用湯元枉傷人命當遵古聖之旨自獲無窮之福其有悖理好勝窺財寡義苟目前之榮華忘身後之殃禍余素所深患遂書于此

喘疾

九喘證世為危惡之疾有病喘數十年每發至危篤而復愈者有忽因佗疾纔發喘而便致不救者有利下而愈者有因瀉而死者有服金石藥接助真氣而愈者以諸家所說亦不同使學者莫知適從或纔見發喘便以為不可治者九喘而不得卧者若咳嗽而喘息有音不得卧者是陽明經氣逆也若肺脹膨脹而喘者皆當於春秋之交發作宜以溫中下氣等藥治之若但坐而不得卧而氣上衝者是水氣之客肺經也當身腫小便不利夫水者循津液而流行水氣上乘於肺故喘而不得卧支飲亦上喘不得眠身體腫者此欲變為水證也內經曰諸痿喘嘔皆屬於

上脈浮緊者與小青龙湯大桂枝湯脈沈弦者與瀉肺湯方安元若四肢厥冷脈息沉細或寸大尺小六脉促疾或心下脹滿或結硬或冷汗自出或大便頻數氣急喘促或咽喉不利者此是本氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜用返陰丹來甦丹及理中湯四逆湯之類內經曰陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起則薰肺使人喘鳴及着灸諸穴若灸之手足不温氣息轉高者此名五臟氣逆腎水乘克於心爲大逆不可治內經曰連經則生連臟則死者正謂此也其餘如陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜下之若脉浮無汗而喘者乃太陽證尚在宜麻黃湯若表邪未解誤服下利藥不止脉促喘而汗出者宜葛根黃連

方一

方二

黃芩湯若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻黃杏子甘草石膏湯若表邪未解心有停水喘而發熱或嘔者小青龍湯肺痺者亦煩滿喘而嘔心下痺者亦上氣而喘脚氣喘滿之類此皆因他疾而發喘當只從本病治之則喘證自已不必專用治喘之藥

瀉痢

諸方論瀉痢止言是脾胃病不過謂風冷濕毒之所侵入及飲食傷滯遇腸虛則泄痢而不知肝腎氣虛亦能爲瀉痢古書所載甚明不可不辯經曰洩痢前後不止腎虛也又曰諸厥固洩皆屬於下下謂下焦肝腎之氣也門戶東要肝之氣也守司於下腎之氣也肝氣厥而上行故下焦

不能禁固而泄痢腎爲胃關門戶不要故倉廩不藏也苟病泄痢其源或出於此而專以脾胃藥治之則謬固千里矣故古人有曰下痢不止心下痞斬服瀉心湯後以它藥下之痢不止醫以理中與之痢益甚蓋理中治中焦此痢在下焦赤石脂禹餘糧湯主之服不止當利其小便以余見如此洩痢乃肝腎氣虛之所致者矣

處方

近世醫者用藥治病多出新意不用古方不知古人方意有今人所不到者甚多如諸寒食散五石澤蘭元三石澤蘭元登仙酒之類其治療有意外不測之効觀其所用藥則皆尋常所用之物也但以相反相惡者並用之激之使

方一

方二

爲功效詳其妙意蓋出於今人之表經曰草生五色五色之變不可勝視草生五味五味之美不可勝極蓋言錯雜和合則其間必有爭効其能者故不可勝視勝極也孫真人亦云神物効靈不拘常制至理關感智莫能知其猶龍吟雲起虎嘯風生戎鹽累卵懶膽分盃撫掌成聲沃火生沸不知所以然也又如五味顏色和合其變化不可得而名焉出乎繩墨規矩之外然後能致顏色氣味之妙此非神智則孰能至此學者不可忽也

瘧疾

瘧之病候經論載之詳矣先寒後熱名爲寒瘧先熱後寒名爲溫瘧但熱無寒名爲瘧瘧但寒無熱名爲牝瘧是皆

發作有時若邪氣中於風府則間日而作邪氣客於頭項則頻日而作氣有虛實邪中異所故又有早晚之異然經止論寒溫瘧瘧所受之因而不及牝瘧又論溫瘧瘧瘧所舍之藏而不及寒瘧意有五見發明處學者究陰陽之盛衰深思以得之大抵風者陽氣也寒者陰氣也先傷於風後傷於寒即先熱後寒先傷於寒後傷於風即先寒後熱陰氣先絕陽氣獨發則但熱無寒陽氣先絕陰氣獨發則但寒無熱以溫瘧得之於冬邪氣藏於骨髓則知寒瘧乃得之於夏邪氣客於皮膚腠理之間矣以瘧瘧之氣實而不泄且不及於陰則知牝瘧乃氣虛而泄且不及於陽矣是皆不出於陰陽上下交爭虛實更作也又有挾諸溪毒

方一

八

嵐瘴鬼邪之氣亦寒熱羸瘦延引歲月休作有時久不已變成勞瘵或結為癥瘕者名曰瘵母至於五臟三陽三陰瘵者皆因臟氣偏虛故邪氣乘而舍之其治法各隨其經絡灸刺及所用藥各不同後學宜細詳之

勞瘵

勞動作也郭逢原曰凡人暫尔疲倦通謂之勞而今人以勞為惡疾而惡聞之親戚朋友共為隱諱見其狀莫敢呼之殊不知勞之為病初起於動作不能節慎至於疲倦且傷不已漸成大疾凡言虛勞者五勞是也六極七傷為類蓋蒙莊所謂精太用則竭神太勞則弊者治法不過補養五臟滋益氣血使之強盛則其疾自去又有傳尸勞者

則非此類蓋汨尸瘵及挾邪精鬼氣而成者也經曰人有三虛逢年之衰遇月之空失時之和乍感生死之氣忽犯鬼物之精大槩寒熱淋露沉沉默默不的知其所苦而無處不惡積月累年漸就委頓既死之後又復傳瘵他人者是也茲又須用通神明去惡氣諸藥以治之經曰草木咸得其性鬼神無所遁情剗麝刺犀驅洩邪惡飛丹煉石引納清和疑其為此疾而設也

反治法

治病之法莫不以寒療熱以熱療寒通則塞之塞則通之益所不勝損其所勝氣平邪服病乃良已然疾勢有大小藥力有重輕聖賢制為方論必求其所因以伏其所主譬

方一

九

猶火也人間之火遇草而執得木而燔可以濕伏可以水滅疾之小者似之而疾之大者則若神龍之火得濕則焰遇水則燔寒與熱相拒熱與寒相違不可以常法治之故經有熱因寒用寒因熱用通因通用塞因塞用之法可使氣調可使必已治熱者以豆豉浸酒此因熱用寒者也治寒者以蜜煎烏頭此因寒用熱者也久痢通滑必當先去其積中蒲實寒必當峻補其下經云寒積內凝久痢溲澇愈而復發連歷歲時以熱下之結散痢止此因通治之法也下虛中滿之病補虛則滿甚於中宣導則轉虛其下故當踈啓其中峻補其下此因塞治之法也

婦人

孫真人云婦人之病比之男子十倍難治以嗜欲多於丈夫故感病倍於男子蓋以慈戀愛憎嫉妬憂恚染着堅牢情不自逆因此成疾寔非感冒外邪飲食起居失節所致也誠以情想內結自無而生有是以釋氏稱談說酢梅口中水出想踏懸崖足心酸澁憶前人或憐或恨眼中淚盈貪求財寶心發愛涎舉體光潤大率是此若非寬緩情意則雖服金丹大藥則亦不能已法當令病者先存想以攝心抑情意以養性葛仙翁云凡婦人諸病兼治憂恚令寬其思慮則疾無不愈人之病疾無不自虛實冷熱而作各有形證可以對治其用藥不過補瀉寒溫而已然亦不有由虛實冷熱而致者如前說是也又有諸虫入耳喉

方一

十

中諸梗蠖蝮溺人影而生瘡目中有眯之類皆非虛實冷熱之病法當以意治之如灌牛乳炙猪肉掩耳上以治諸虫默念鸚鵡及戴魚網以治魚鯁以象牙末狐狸骨以治骨鯁地上畫蠖蝮形取腹中土以治溺影瘡以膽汁雞肝血及視水中豆以治目中眯之類竹蠹牙以治竹刺此皆以意治之法也

傷滯

人之腑臟皆因觸冒以成疾病而脾胃最易受觸蓋日用飲食稍或過多則停積難化冷熱不調則吐嘔泄痢膏梁者為尤甚蓋口腹縱恣不能慎節近用消化藥或論飲食既傷於前難以毒藥反攻其後不復使巴豆礪砂等藥止

用麴孽之類殊不知古人立方用意各有主對麴孽止能消化米穀如肉食有傷則非礪砂阿魏等藥不能治也至於魚鮮過傷則須用橘皮紫蘇生薑菓菜有傷則須用丁香桂心水飲傷則須用牽牛芫花固不可以一槩論也必審其所傷之因對用其藥則無不愈其間輕重則隨患人氣血以增之而已又有一等虛人沉積不可直取當以蠟置其藥蓋蠟能粘逐其病而又久留腸胃間又不傷氣能消磨至盡也又有脾氣偏虛飲食遲化者止宜助養脾胃則自能消磨不須用尅化藥耳病久成積聚癥瘕者則又須用三稜鱉甲之類寒冷成積者輕則附子厚朴重則礬石硫黃瘀血結塊者則用桃仁大黃之類醫者宜審詳之

方一

十一

外感內生諸疾

四時之中有寒暑燥濕風氣相搏喜變諸疾須預察之稍失防閑則並能中人又有時行疫癘瘴癘等疾遞相傳染者而人之五臟有大小高下堅脆端正偏傾六腑亦有長短薄厚緩急稟賦不同各如其面目有疾恙至少者終身長抱一疾者其飲食五味禽魚菓實之屬性有偏嗜者金石草木血肉苦辛之藥素有服餌者又有貴者後賤富者乍貧有常貴常富者有暴富暴貴者有暴苦暴樂者有始樂終苦者有離絕蘊結憂恐善怒者故常富者惡勞驕惰者情消多事則神勞多語則氣爭多笑則腑傷多恐則志懾多樂則意逸多喜則錯忘多怒則百脉不定多惡

則憔悴無歡多好則昏迷不定此又非外邪所中而得之於內者也良工必精審察其由先知病者臟腑經絡受病之所由又別外感內生之所致則可舉萬全矣

咳嗽

經曰人感於寒則受病微則為咳甚為泄為痛凡咳嗽五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故咳為肺病五臟則各以治時受邪六腑則又為五臟所移古人言肺病難愈而喜卒死者肺為驕臟怕寒而惡熱故邪氣易傷而難治以其湯散運過針灸不及故也十種咳嗽者肺咳心咳脾咳腎咳肝咳風咳寒咳支飲咳膽咳厥陰咳華佗所謂五嗽者冷嗽氣嗽鯁嗽飲

方一

十二

嗽邪嗽孫真人亦有方治寒毒症嗽者歷代方論著之甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經見意其華佗所謂邪嗽真入所謂症嗽者是已此病蓋酒色過度勞傷肺損動經絡其重者咯唾膿血輕者時發時差又有因虛感邪惡之氣且傳症得之或先嘔血而後嗽或先咳嗽漸就沉羸此則非特內損肺經又挾邪惡傳症之氣所以特甚病之毒害無過此也真人治症嗽通氣元方用蜈蚣四節又云夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣外臺方四蒲元治五嗽亦用蜈蚣近世名公能推原其指意率用蛤蚧天靈蓋桃柳枝麝香丹砂雄黃安息香之類以通神明之藥療之高出古人之意矣又肺中有虫如蚕令人喉痒而咳湯散運過

針灸不及以藥舍化虫死即嗽止方列於治嗽門中

難產

凡治難產之法有四一腎為慳藏其氣以慳秘為事故催生之方多用滑利迅疾之藥如兔腦筆頭灰有血水先下子道乾澀令兒不能下者如猪脂蜜酒葱白葵子有稽停勞動之久風冷乘虛安於胞胎使氣血凝澀而不下如桂酒葱之類五積散加有觸犯禁忌者如符法及臘月兔順元散煎服尤効 有胎肥方用甘草枳殼氣血實盛人可服虛人不可服此藥是母氣盛實乃可服之

運悶

凡產後運悶有四種有血下太多虛極運悶宜服羊內湯有血下少血上逆於心亦令運悶湯加桂黑神散芎藭湯

方一

十三

有體中素多風痰因產損傷氣血乘虛而運悶四物湯加熱多者與觸活柴胡湯并治風痰藥有心虛將溫過度邪蠲積元之類不宜用大段有性之藥熱上乘於心亦令言語錯亂運悶者宜服鎮心丹補心湯

產後用藥次叙

凡纔產訖與黑神散以童子小便調二錢服三日內別無證候只須服此一日之間只可一服或腹中有塊痛或運悶煩躁則兼四物湯日喫三兩服不妨直候三日後與四順理中元兼羊肉湯日各二服如大段羸劣氣欲脫者與羊肉湯下丹藥一二粒丹不必多也蓋以今人氣候不及古人所以難用常法切不可不知也如不甚羸劣除丹外

二藥日各一服可也亦不須候三日便可服之七日後與澤蘭元若全極消瘦者與五石澤蘭元亦不候七日也服及滿月為佳如產後三五日內竟頭痛身熱或汗自出脈浮大者此只是血虛證候初不可作傷風攻治但只與四物湯加入參與羊肉湯相兼服自愈大山羊元人參元鹿角膠散皆可服之

又

凡產後血上衝心煩躁悶亂狂言妄語血不下者宜服此散

虛勞用藥

凡虛勞之疾皆緣情慾過度榮衛勞傷致百脉空虚五臟衰損邪氣乘襲致生百疾聖人必假藥石以資血氣密腠理以禦諸邪肌肉之虛猶物體之輕虛如馬勃通草蒲梢燈心之屬是也非滋潤粘膩之物以養之不能實也故前

方一

十四

古方中鹿角膠阿膠牛乳鹿髓羊肉飴糖酥酪杏仁煎酒蜜人參當歸地黃門冬之類者蓋出此意本草經云補可去弱羊肉人參之屬是也所謂虛勞者因勞役過甚而致虛損故謂之虛勞今人纔見虛弱疾證悉用燥熱之藥如伏火金石附子薑桂之類致五臟焦枯血氣乾涸而致危困皆因此也如虛而兼冷者止可於諸虛勞方中加諸溫熱藥為助可也如此即不失古人之意

取像

古之論疾多取像取類使人易曉以臟腑稀散為鴨塘或為鷺塘野鴨謂謂其生於水中屎常稀散故也以遇夜目昏不見物為雀目謂雀遇昏晚目不見物故也以腎氣奔

衝為奔豚以豚為能奔逸而不能遠故也以時氣聲嗷咽乾欲睡復不安眠為狐惑以狐多疑惑故也以大便艱難為野雞痔謂欲便而復止故也狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺盆之上連延耳根腫大謂其疾來暴猛如狼故也其源緣憂恚氣上不得下蟻螬漏始發於頸下無頭尾如棗核塊累移在皮中謂其無頭尾狀若蟻螬故也

霍亂

夫霍亂之起皆由居處之失宜飲食之不節露卧濕地或當風取快溫涼不調清濁相犯風冷之氣歸於三焦傳於脾胃其邪相干水穀不化便致吐利皆名霍亂言其揮霍之間便致撩亂訖其脉來代者霍亂又脉代而絕者是證也霍亂脉大者可治微細者不可治脉微而遲氣息少不欲言者不可治養生方云七月食蜜令人暴下

方一

十五

積聚

經論五臟積氣皆因五臟旺時不受所傳邪氣而成如肺病傳肝肝復傳脾脾以長夏旺旺不受邪肝復欲還肺不肯受因留為積故肝之積名肥氣以仲夏戊巳日得之餘臟亦如此例言之肝之積在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人病瘕瘕心之積名伏梁以秋庚辛日得之其積起於臍上大如臂上至於心橫於心下如屋梁也逼心為難治脾之積名痞氣於冬壬癸日得之其積在胃管覆大如杯久不愈令人四肢不用發黃疸食不為肌肉肺之積名

息賁以春甲乙日得之在右脇下覆大如杯久不愈令人
寒熱喘嗽發肺癰腎之積名奔狝以夏丙丁日得之其積
發於小腹上至心下如狝之奔走上下無時久不愈令人
喘逆發骨痿少氣常究此說亦未可必夫肺病傳肝肝傳
脾之類自是傳其所勝夫傳所勝者死若如所言則五臟
之積皆死候也其實不然也

疰瘕

夫疰瘕之病大同而小異疰者近臍左右成條大者如臂
次者如弦之狀瘕在兩肋之間有時而痛此皆由陰陽不
和經絡否隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結而成也

癥瘕

癥瘕之狀雖同而不動者名癥其治有法而可推移者名
瘕瘕病輕於癥瘕不動者必死之候其發語聲嘶搥言語
而不出此人食結在腹其病寒口中常有水出四支洒洒
如瘧飲食不能鬱鬱而痛此食瘕也

心痛

心藏神心者身之主也其正經為風邪所乘名真心痛旦
發夕死夕發旦死心有包絡脉是心之別脉為風冷所乘
亦令心痛然乍輕乍甚不至於死又手少陰心之經其氣
逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也其心下急痛
名脾心痛腹脹而心痛名胃心痛下重而苦泄寒中為腎
心痛又有九種心痛一虫二疰三風四悸五食六飲七冷

八熱九從來此皆邪氣乘於手少陰之絡邪氣搏於正氣
邪正相擊故令心痛訖其心脉急者為痛引背食不下寸
口脉沉緊苦心下寒時痛關上脉緊心下苦痛左手寸脉
沉則為陰陽絕者無心脉也苦心下毒痛

腰痛

古之論腰痛有五種而大抵俱本於腎蓋腎主腰脚而三
陰三陽十二經奇經八脉皆貫於腎絡於腰脊或少陰氣
衰而自病千金方云十月万物陽氣皆衰是以腎痛或風濕搏於腎經或因勞
役而傷腎或內有積水腎氣不宣通皆令腰痛治法補腎
而隨其風水而處之為得

六淫之疾

孫尚藥曰夫六淫之氣天之常行者也蓋人無搏節傷其
氣候暴中邪毒有踈治療轉著肢躄或寒溫不避暑濕時
傷憂思喜怒疾恚便起治療有差攻傳五臟遂至積疔轉
深醫者苟求目前之捷効不審元散之悞投刻意世財動
邀富貴企踵權豪希圖媒進病者又即吝惜資財不知其
身可貴委憑庸妄一死無生可不哀哉凡六淫疾者切在
細明治療有中必得十全之効陽淫熱疾則拒熱不前看
虛實以涼之陰淫寒疾則怯寒而身拒須憑溫藥以治之
風淫末疾必身強直眩也此乃動性不調須和冷熱以平
之在陰則寒在陽則熱故寒則筋變骨痛熱則痿緩不收兩淫腹疾
濡泄濕氣要憑滲燥之方更看冷熱之候晦邪所淫精神

熒惑當平正氣而可痊明淫心疾狂邪重感識妄多言憂
愁轉甚此二氣同一皆引心胃之虛邪治療正氣須用至
寶之藥平生經驗甚多故集口訣方書以傳于家孫尚藥
曰夫風者天地之號令物性之動氣人雖萬物之貴不能
搏節觸冒四時乘精氣虛邪而入於腠裏積之微末累傷
重併滿而大作或不慎味欲所傷又深虛邪實邪以干正
氣搏陽經則痿厥而肢躄不收襲陰經則筋攣絡急中風
之名因茲而起初得小中之號漸作癱瘓之疾故風趣百
竅獨聚一肢言舌蹇澁形若癡人鑿者妄令吐瀉用藥躁
煩十無一痊致使人手足不任精神昏亂殊不知內不能
通外不能泄致昏悶形死又不知通泄之藥亦不在大吐

方一

十八

大下似此治療往往五死五生雖其人稟氣充實亦為所
苦彌甚不幸遂至枉死切觀自古聖賢治療有法十有九
驗夫療病之法必先准四時虛實以詳中病之由依繩墨
拯濟乃是解死脫厄之路四時之病春中時風自東而來
名曰溫風蓋時令不和而傷人也浮而輕淺可汗而解敗
毒散菴活細辛之類更看發起在陰在陽隨而得效若其
人自虛羸從後而來名曰虛風中人煩悶肢躄攣痺不任
便可服續命湯八風湯成劑頓服更加灸法三五日間勢
必減退漸漸調和以求生路如從前來名曰實風亦主人
脊悶脉緊浮大宜以伏神湯西州續命湯求效不用火劫
自使勢慢須緩緩治之故千金曰風者百病之長又曰治

風不以續命湯治之則不為治風所以見聖人之心矣更
有後方經驗頗多並依四時虛實治療錄之如左切在對
病詳證用之

脉形氣逆順

孫尚藥曰凡詠脉先視人之長短肥瘦形氣相得者不病
形氣不相得者病形氣損者危形氣反者死形氣既反脉
又加之懸絕者形氣俱病見者立死故人長脉亦長人短
脉亦短人肥脉亦厚人瘦脉亦急此形氣之相得也然人
賴五行以生而常為八邪所攻若非次有誤中他邪得病
亦易為治療謂形氣相得也形氣不相得而反者謂人長
脉短之類若得病必難拯治此是人之氣候无病者不

方一

十九

當病病必危矣危者近於死也切須畏忌搏節和氣養神
勿更恣意不慎轉耗天真深思深思
凡脉順四時者謂春弦夏鉤秋毛冬石中有和氣軟滑而
長乃是不病之人得病亦易為治療蓋從和氣而生也用
法萬全如氣反脉逆形氣相失名曰不可治是形盛氣虛
形虛氣盛故不可治也凡人形氣俱虛安穀者過期而死
不安穀者不過期而死安穀謂飲食且進期是八節之氣
候也
詠脉治病必先度人之肥瘦以調氣之虛實虛則補之實
則泄之故人形盛脉細少氣不足者危危者近於死也猶
有可治之理以氣不足而形盛故也若形瘦脉大胃中多

氣者必死是形氣俱不足而脈反有餘故死也其形氣相得者生是人形氣肥瘦長短氣候相得故生也參五不調者病謂脈氣交亂而不調故病也上下寸關尺三部脈如參樁者病甚也三部脈左右手十至不可數者死是一呼一吸脈來往十至已上無生氣也故死矣

形氣相得相反

大凡診脈先定四時之脈便取太過不及虛實冷熱寒溫至數損益陰陽衰盛五行生剋臟腑所屬看之以為大法然後取其人形神長短肥瘦氣候虛實盛衰性氣高下布衣血食老幼強弱但順形神四時五氣氣候無過者生之反本其形氣與五行者危病若過盛而形氣反逆脈有懸

方一

二十

絕者死不治矣

五實五虛

五實者死五虛者死五實謂脈盛皮熱腹脹前後不通悶瞀此五實也五虛者脈細皮寒氣少泄痢前後不止飲食不入此五虛也皆死矣亦有生者何漿粥入胃泄瀉止則虛者活身得汗出後大小便利則實者活此有生者也不可見虛實病重不急救治枉致其死有生者救之必活矣治病先度其病人形之肥瘦以調氣之虛實實則瀉之虛則補之急瀉緩瀉急補緩補緊慢皆度病之緊慢用法治之萬全矣又經言先去血然後調之去血者人緣血脈為宗主血既有瘀滯氣便不能流行必先去瘀滯惡血然

後調行衛氣瘀血在經脈之中必絡脈有腫毒獨異於常經也便先砭針去血然後調逆滯之氣更無問大小新舊之病以此為准治之萬全矣若血在經絡分肉砭射去之如血在臟腑瀕於大小便瀉泄被解去之但血在上則多忘者病人詐言多忘也血在下則狂者病人狂言多速急也便瀕急去血調之虛則鄭聲實則誠語鄭聲言鄭重聲散不知高下也實則誠語言語有誠信多狂言尔言心誠之事也已上皆病之虛實若發狂言而有熱去血則用大黃地黃之類若病證有寒破去滯滯之血則用當歸水蛭之類治療効速矣凡人病作未有不因六氣七情所中內外邪攻致生百疾風寒暑濕炎涼證候各異於常脈邪

方一

廿

氣未入於血脈臟腑皆可汗可瀉可汗可治可吐可泄可和可瀉可決可祛若邪氣深攻膝理傳入大經又加之誤用湯元失其繩墨治療無准便成大疾又如傳生者則病傳剋者則死生謂傳於木火土金水剋謂傳於金木土水火仍別將證候脈息看詳諒切從深淺急緩標本輕重治之若見急病邪盛但從害命重處先治之亦便不問陰陽標本也但躰中有寒則筋攣骨痛治之以溫躰中有熱則痿緩不收癱瘓少力治之以涼更在子細詳之

四時感病用藥次叙

凡人初中病便不如常者則診視脈證形躰惡風者傷風怯寒者病寒脈澁而浮緊皆中風寒在表也則可汗之宜

用溫藥桂枝之類小寒之邪乃可溫之大寒之邪可以熱之理中元散主之有小逆者可以之和之但身惡熱者有熱脈洪數浮大則皆中熱也熱則從中風治更看輕重大小續命湯主之熱在於表則可汗之宜用溫涼藥柴胡湯之類小熱之邪乃可涼之大熱之邪可以冷之則用白虎湯之類虛熱虛煩竹葉湯補解之類或有逆者可以橘皮人參湯涼溫藥和之止之如病證有寒熱者傷於中寒熱也先寒者為先中寒於陽經此乃陰邪在陽經之裏也寒氣勝故先寒動也先熱者熱中於陽熱邪在表故熱先發也但從熱從寒辨證診脈表裏先後治之若病人脈浮緊盛澁惡寒身軀頭面煩痺項強四肢痠痛腰脚皆疼是太陽

方一

世三

中邪並可汗之但脈緊實沉澁澁滯而頭甚痛軀不惡寒皆可治裏仍看虛實宣泄調順不必五日當從急重而治之也宜慎詳之表和裏病下之溫之便愈裏和表病散之汗之立痊但四軀溫和祇是頭痛氣滿心腹疰滿脈又沉實或伏經者此是表和裏病不可須守待第五日方瀉緣其病在裏須且祛逐邪氣慮有變動若瀉出邪氣病必即時而愈如脈浮或壯熱四肢煩疼惡寒項強腰膝疼此是表未和裏却無滯不可下下之必危須且解表發汗更依日數次第看證候吐瀉調治必愈故脈微不可吐虛細不可下陰虛脈沉微而氣弱者不可發汗如不依證候而汗下乃醫人大禁也和之平之自然即効今中病者初得可

吐可汗可攻可瀉可平便愈其有邪勝未効或治療無准漸傳痼疾則別立證候理之乃全今再引五臟病證候調治之法必無損誤矣

用藥不同

夫傷寒中風溫濕熱病瘧時疫雖同陰陽之法須別作治療若與傷寒同治必致危損經言脈有陰陽之法何也凡脈浮大洪數動滑此名陽脈也沉細澁弱弦微此名陰脈也陰病見陽脈者生陽病見陰者死審而察之

病生於和氣不須深治

凡人三部脈大小沉浮遲疾同等不越至數勻和者雖病有寒熱不解此為陰陽和平之脈縱病必愈此乃感小邪

方一

世三

之氣故不可深治大攻吐瀉發汗若藥勢過多反致危損切切禁之脈如應四時氣候平勻者雖有小邪寒熱此乃無妄之疾勿藥有喜不可拘以日數次第強為攻發必別致大患深思深思見方士誤醫致夭枉者甚多故立此篇宜在細意而辨之

本病中別生滯礙

夫治病之要切在精詳虛實冷熱寒溫陰陽計踵脈息時候並在前文細述然慮有於本病中別生滯礙即時變動兼本病同起須備急難先從危急證候去其邪由然後調治本病即得萬全若也七情妄起五臟暴傷不慎寒熱誤中邪由百疾斯攻伎方有失便生他病如其以寒療熱以

熱攻寒則為順治設或藥病偏勝毒邪轉深更在醫攻別作更新之意亦不廢於繩墨則治療必獲十全今述應用經驗奇偶方并治風勞氣冷備難救急調治疾邪淺深具列如左

五膈

古方論膈氣乃有五種謂憂膈寒膈熱膈也夫胃中氣結煩悶飲食不下羸瘦無力此名憂膈心下實滿食不消化噫輒醋心大小便不利此名寒膈胃腸逆滿咽喉閉塞噫聞食臭此名氣膈心腹滿脹欬逆腸鳴食不生肌此名寒膈五心中熱口舌生瘡骨煩體重唇乾口燥背痛胃痺此名熱膈

方一

廿四

五噎

夫噎病亦有五種謂氣噎憂噎食噎勞噎思噎噎者乃噎塞不通心胃不利飲食不下也治法各隨其證候而治之

痰飲

古之論痰飲有五種有痰飲有懸飲有溢飲有支飲有留飲又有痰痺有痰冷有痰熱有痰厥有痰實候夫痰飲之候其人素盛今瘦胃腸脹滿水穀不消結在腹脇水入腸胃漉漉有聲身重多唾短氣好眠甚則上氣嘔逆其形如腫以其飲水留滯而成痰也下後水留在脇下咳唾引痛謂之懸飲飲水過多溢行四肢當汗出而不汗出謂之溢飲其人咳逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲留飲

者其人背寒手足冷噫氣酸息腹滿吞酸是也痰癖之候飲食停聚在於脇肋痠痺而痛時有水聲痰冷之候痰水結聚停在胃膈令人吞酸氣逆色變青不能飲食痰熱之候身體虛熱逆害飲食蓋由陰陽否膈飲食不散熱氣與痰水相搏而成也痰厥之候由痰水結聚陰氣逆衝於頭目令人頭痛胃滿短氣嘔吐白沫痰實之候心腹痞滿氣息不利頭痛目眩常欲嘔逆或發寒熱大抵諸候皆由氣脈閉塞津液不通所致也

惡阻

凡婦人虛羸血氣不足腎氣弱或當風取涼太過心下有痰水者欲有胎喜病阻何謂欲有胎其人月水尚來顏色

方一

廿五

肌膚如常而沉重憤悶不用食飲不知患所在脈理順時平和則是欲有娠如此經二月日後覺不通則結胎也阻病謂心中憤憤頭重眼眩四肢沉重嗜不欲動作惡聞食氣欲噉鹹酸果實多卧少起世謂惡食其至三四月已上皆大劇吐逆不能自據舉如前候者便宜服厚朴茯苓湯散數劑後服茯苓元痰水消除便欲食也既得食力躡強氣盛力足養胎母便健也

難產

夫難產者由先因漏胞去血臟燥或子臟宿挾疾疢或觸犯禁忌或胎腹覺痛產時來到便即驚動穢露早下致子道乾澁產婦力疲皆令難也或觸犯禁忌其證候更看母

舌青兒死母活唇口青兩邊沫出者子母俱死面青舌赤沫出者母死子活也故將產時坐卧安定背平着席體不偃曲則兒不失其道若坐卧未安身體斜曲兒正轉動忽然強偃氣暴衝擊則令兒曲後孔或橫逆皆由產時忽遽或觸犯禁忌坐卧不安審所為故產婦坐卧須平安正順四時方面避五行禁忌所有觸犯多至患害也

產後

凡母子纔獲分解不得問是男是女須速與產母童子小便一盞不得與酒緣酒引血迸入四肢兼臟腑方虛若熱酒入腹必致昏悶可與醋墨服之不得過多醋雖破血而又傷肺因成咳嗽此其由也若分解之後頻燒磚石投醋

方一

廿六

中使常聞猛醋煙氣以防運也纔生產畢不得便卧須坐久乃可高枝床頭仰卧立膝厚鋪褥密遮四壁使無賊風時時令人從心上擗至臍下如此一日可止食白粥時飲童子小便一盞七日後方可少進醇酒并少鹽味半月後漸食軟羊肉出月後方可食麵仍不得思慮憂恚恐有所傷待敗血盡臟氣自然安和切須調養一百日不得自言平復取次違犯脫有所觸便難整理

婦人月水不通及不斷

宜入血脈風藥
請令熱用之

婦人衝任之脉起胞中為候之海手太陽小腸之經也手少陰心之經也二經為表裏主下月水月水來如期謂之月信其不來者緣風冷傷本經故血結在內不通也或曾

經唾血及吐血致血枯或醉以入室勞傷肝氣肝臟血竭於內俱令月水不通又胃氣虛不能消化水穀使津液不生血氣亦令月水不通其候腸中鳴是也但益津液則經血自下久不通者血結為塊若脾胃虛弱則變為水腫土不勝水故也其月水來而斷者由勞傷經脉衝任氣虛不能制經血也

漏下帶下崩中

婦人衝任二脉為十二經之海二經氣虛復為勞傷則不能制其血故非時即下淋瀝不斷謂之漏下其血与穢液相兼帶而下謂之帶下忽然暴下謂之崩中其色白為冷赤為熱赤白相兼有冷熱也

方一

廿七

尸蟲

椰子厚罵尸蟲文云人皆有三尺蟲處人腹中伺隱微失誤輒籍記日庚申幸其人之昏睡出讒于帝以求饗以是人多謫過疾厲夭死而醫經亦云能与鬼靈相通常接引外邪為患害其發作之狀或沉沉默默不的知其所苦而無處不惡或腹痛脹急或礫塊踊起或攣引腰脊或精神雜錯變證多端其病大同而小異

尸厥

夫尸厥者是陰陽氣逆也此為陽脉卒下墜陰脉卒上昇陰陽離居榮衛不通真氣厥亂客邪乘之其狀如死猶微有息而不常脉尚動而形无知也聽其耳內脩脩有如嘯

聲而股間暖者是也耳內雖無嘯聲而脉動者故當以尸厥治之其寸口脉沉大而滑沉即為實滑則為氣實氣相搏身温而汗此為入腑雖卒厥不知人氣復則自愈若唇面青身冷此為入臟亦卒厥不知人即死候其左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰手少陰俱虛也病若恍惚尸厥不知人妄有所見也

總論五勞

夫人作勞傷於五臟五臟之氣因傷成病故謂之五勞肺勞之狀短氣而面腫不聞香臭肝勞之狀面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨卧目視不明心勞之狀忽忽善忘大便難或時溇時痢口内生瘡脾勞之狀舌根苦直不得

方一 方八

嚙唾腎勞之狀背難俛仰小便不利赤黃而有餘瀝囊濕生瘡小腹裏急治法肝勞補心氣心勞補脾氣肺勞補腎氣腎勞補肝氣此療子以益母也經曰聖人春夏養陽秋冬養陰以順其根本肝心為陽肺脾腎為陰夫五臟實亦成勞虛則補之實則瀉之

七傷

夫七傷者一曰大怒逆氣傷肝二曰憂愁思慮傷心三曰飲食大飽傷脾四曰形寒飲冷傷肺五曰久坐濕地傷腎六曰風雨寒濕傷形七曰大恐怖懼傷志故肝傷則少血目暗心傷則苦驚喜志脾傷則面黃善卧肺傷則短氣咳嗽腎傷則短氣腰痛厥逆下冷形傷則皮膚枯槁志傷則

恍惚不樂治法與五勞六極同

六極

六極者筋極主肝脉極主心骨極主腎精極主臟腑筋極之狀令人數轉筋十指手甲皆痛苦倦不能久立脉極之狀令人忽忽善忘少顏色眉髮墮落肉極之狀飲食無味不生肌肉皮膚枯槁氣極之狀正氣少邪氣多氣不足多喘少言骨極之狀腰脊酸削齒痛手足煩痛不欲行動精極之狀肉虛少氣喜忘鬚髮落然謂之極者病重於勞也治法與治勞同

骨蒸

古經惟有骨蒸病候而巢氏論說乃曰骨蒸病有五種一

方一 方九

曰骨蒸其根在腎旦起則體涼日晚則熱躁四肢不安飲食無味小便赤黃忽忽煩亂喘促無力腰脊背多痛兩足逆冷手心常熱蒸盛過傷則內變為疳蝕入五臟二曰疰蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水多唾白沫睡即浪言驚恐不安其脉浮數蒸盛之時或變為疳疴下脹痛或痢不止三曰皮蒸其根在肺大喘短氣鼻口乾舌上色白蒸盛之時骨滿注熱兩脇下脹咳嗽胃疼痛眠卧不安蒸毒傷肺即唾血也四曰肉蒸其根在脾體如火煩躁無時心腹脹食即欲嘔小便如血大便秘澁盛之時或身腫目赤眠卧不安五曰內蒸亦名血蒸所名內蒸者必外寒而內熱以手拊而內熱者其根在五臟六腑此說殊未

當蒸既異候即血蒸之候必在於肝肝主血故也然又謂三十三蒸者此蓋觸類長之遂至紛紛之論其實五臟勞而生熱故也然獨以骨蒸名之者此病熱深古人舉其重者言之方雖列骨蒸方內其五臟熱候在第一卷五臟勞候在前

虛勞諸疾

男子平人脉大為勞極虛亦為勞男子勞之為病其脉浮大手足煩春夏極秋冬差陰寒精自出瘦削不能行寸口脉浮遲浮即為虛遲則為勞虛即衛氣不足浮即榮氣竭脉直者遲逆虛也脉澁無陽是腎少寸關澁無血氣逆冷是大虛脉浮微緩而大者也勞也脉濡微相搏為五勞微

方一

卅

弱相搏虛損為七傷此古諸雜候因虛損即生病其候不一覽者觀方意而用之也

冷勞

夫冷勞之人氣血枯竭表裏俱虛陰陽不和精氣散失則內生寒冷也皆由臟腑久虛積冷之氣遂令宿食不消心腹積聚臍腹疼痛面色痿黃口舌生瘡大腸泄痢手足無力骨節酸疼久而不痊轉加羸瘦故曰冷勞也

五噎諸氣

婦人多有此疾

此病不在外不在內不屬冷不屬熱不是實不是虛所以藥難取効此病緣憂思悲怒動氣傷神氣積於內氣動則諸證悉見氣靜疾候稍平捫之而不得疾之所在目視之

而不知色之所因耳聽之不知音之所發故針灸服藥皆不獲効此乃神意間病也頃京師一士人家有此疾證勸令靜觀內外將一切用心力事委之他人服藥方得見効若不如此恐卒不能安但依此戒兼之灼艾膏盲與四花穴及服此三藥可以必差孫真人云婦人嗜欲多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎疾妬憂恚染着堅牢情不自抑所以為病根深療之為難差

手足沉重狀若風者

此證其源起於脾胃虛榮衛不足胃為水穀之海脾氣磨而消之水穀之精化為榮衛以養四肢若起居失節飲食不時則致脾胃之氣不足既榮衛之氣潤養不周風邪

方一

卅

虛而干之蓋脾胃主四肢其脉連舌本而絡於唇口故四肢與唇口俱痺語言蹇澁也治法宜多用脾胃藥少服去風藥則可取安矣若久久不治則變為痿疾經所謂治痿獨取陽明是也陽明者胃之經也

臂細無力不任重

此乃肝腎氣風邪客滯於榮衛之間使氣血不能周養四肢故有此證候肝主項背與臂膊腎主腰膝與脚腓其二臟若偏虛則隨其所主而生病焉今此證乃肝氣偏虛宜專補肝兼補腎宜內補丹并服黃耆元

凍死

人路逢凄風苦雨繁霜大雪衣服濡濡冷氣入臟致令陰

氣閉於內陽氣絕於外榮衛結澁不復通故致噤絕而死
若早得救療血溫氣通則生又云凍死一日猶可治過此
則不可也

溺死

人為水所沒水從孔竅入灌注腑臟其氣壅閉故死若早
拯救得出即泄瀉其水令氣血得通便得活也又云半日
及一日猶可活氣若已絕心上脘亦可活

自縊死

人有不得意志者多生忿恨往往自縊若覺早雖已死徐
徐捧下其陰陽經絡雖暴壅閉而臟腑真氣未盡所以猶
可救若遽斷其繩則氣不能還不得生又云自旦至暮雖

方一

世二

冷猶可活自暮至旦則難活此謂晝則陽盛其氣易通夜
則陰盛其氣難通又去夏熱易活又去氣雖斷而心微溫
者一日已上猶可活

魘不寤

人眠則魂魄外遊為鬼邪所魘屈其精神弱者魘則久不
得寤乃至氣絕所以須傍人助喚并以方術治之低聲遠
喚即活

病名不同

凡古今病名率多不同緩急尋檢常致疑阻若不判別何
以示眾且如世人呼陰毒傷寒最為劇病實陰易之候命
一疾而涉三病以此為治豈不甚遠而殊不知陰毒少陰

陰易自是三候為治全別古有方證其說甚明今而混淆
害人最急又如腸風臟毒咳逆慢驚遍稽方論無此名稱
深窮其狀腸風乃腸痔下血臟毒乃痢之蟲毒咳逆者歲
逆之名慢驚者陰瀉之病若不知古知今何以為人司命
加以古人經方言多雅奧以痢為滯下以魘為脚氣以淋
為瘡以實為秘以天行為傷寒以白虎為歷節以隔氣為
膏肓以喘嗽為咳逆以強直為瘓以不語為瘖以緩縱為
瘵以怔忡為悸以痰為飲以黃為瘰諸如此類可不討論
而况病有數候相類二病同名者哉宜其視傷寒中風熱
病溫疫通曰傷寒膚脹鼓脹腸覃石瘕率為水氣瘵中風
專用乎痰藥指帶下或以為勞疾伏梁不辯乎風根中風
不分乎時疾此今天下醫者之公患也是以別白而言之

七氣

病源曰七氣者寒氣熱氣怒氣悲氣喜氣憂氣愁氣凡七
種之氣積聚堅大如椀若繫在心下腹中疼痛欲死飲食
不能時來時去每發欲死如有禍崇此皆七氣所生寒氣
則嘔逆惡心熱氣則說物不竟言而迫怒氣則上氣不可
忍熱氣則痛上搶心短氣欲死不得氣息悲氣則積聚在
心下心滿不得飲喜氣則不可疾行不能久立憂氣則不可
劇作暮卧不安席愁氣則喜忘不識人語置物四方還取不
得去處若聞急則四肢手足筋攣不能舉狀如得病此是七
氣所生男子卒得飲食不時所致婦人則產中風餘疾

炮製法

玉石藥

鍾乳粉

硫黃研

寒水石細

石膏煨

丹砂研

玉屑研和

曾青煨

石膽

雲母

白礬研

滑石

石脂

紫石英

白石英

金牙石研

理石煨

礬石書夜

陽起石書夜

玄石煨酒

代赭煨

青鹽

牛黃

自然銅紅

鉛霜

禹餘糧研

硃砂飛

鵬砂飛

石鷲燒

花藥石煨

已上並研如粉

草木肉藥

烏頭

附子 側子

漏藍子 烏喙

方一

卅四

天雄

已上炮去皮臍

半夏

已上湯洗七遍去滑

半夏麴

已上每半夏一兩用生薑二兩同搗捏作片子焙乾

人參

沙參

玄參

紫參

丹參

甘草

柴胡

羌活

獨活

防風

茜根

當歸

秦艽

黃芩

葶本

苦參

前胡

紫苑

桔梗

萎蕤

白薇

石斛根

防葵

紫草

已上並去苗

兔絲子

研了

牛膝

茯苓

烏蛇去骨

白花蛇去骨

去皮

已上酒浸一宿焙乾

茯苓

杜仲剉

黃蘗

厚朴薑制

桂

已上並去鹿皮

天門冬

湯

麥門冬

湯

遠志

已上去心焙乾

澤蘭

石楠

同草

藿香

已上用葉

鹿茸

虎骨

蛤蚧

天靈蓋

已上酥炙黃

方一

卅五

紫河車

兒孩兒者九佳用醃醋浸伏時

龍角

羚羊角

鼈甲醋炙

犀角

瀝乾火上炙焦搗羅為細末

已上錯成鹿末

杏仁

桃仁

已上湯去皮尖炒

大棗

呵子

白豆蔻

麻子

縮紗

薏苡

麝香

沒藥

蘆薈

阿魏

伏龍肝

已上去皮

大青	青黛	蛇黃	琥珀	松脂
楓香脂	天竺黃	龍腦	乳香	白膠香
細辛	已上細研	葛蒲		
已上用根				
巴豆	已上去皮去油			
阿膠	葛蒲	水蛭	白蠶蚕	地龍 <small>去土</small>
蕪荑	赤小豆	小麦	麴	茴香
吳茱萸	破故紙	胡蘆芭		
已上並炒				
班猫	既蜻	蠶蚕		
已上炒變色				
艾葉				
已上先用清麵絲遍灑焙乾後方擣可免作熟艾				
難羅也				
芭芭葉	石葦	芮草	金毛狗脊	
已上並去毛				
菊花	款冬花	旋覆花	覆盆子	薄荷
紫蘇	吳茱萸	丁香		
已上去枝杖				
車前子	葶藶	葛根 <small>剉</small>	地龍	

甘草	已上去土			
蜈蚣	已上炙			
乾薑	天南星	白附子		
已上炮烈				
亂髮 <small>燒灰</small>	牡蠣	石決明	蚕退	墨
已上並燒				
高良薑 <small>剉細</small>	牛角鯁			
已上並剉				
麻黃	已上去節			
烏鴉	兔頭	牛膽	猪肪	野狸肝
已上臘水收				
商陸	已上切焙			
古人戒用飛走殺命藥合藥救人只當以自死者代之為				
上若能以金石或草藥代之尤佳				
晚蚕蛾	虻虫	水蛭	丘蚓	鳩
班猫	烏鴉	桑螵蛸	魚	蝸牛
元青	龜	蜘蛛	雀	蛇
蠅	蝎	蟹	獺	兔
雞峯普濟方卷第一終				

雞峯普濟方卷第四

馮翊賈兼重校定

脚氣曹防禦方論著之首篇

昔孫思邈著書叙百病必先中風叙中風必先脚氣豈無意哉蓋以謂風者百病之長而卑濕蒸鬱之氣中人尤重雖方既舉綱目而治療之法頗為踈况自古以來斯疾甚於卑濕之處時感此患人多不辨識貫之自少為此所苦五六年遂博覽素問靈樞甲乙巢源千金外臺聖惠小品金匱玉函諸家本草及蘇恭方論古今脉書凡有是說無不窮治而臟腑之論針艾之法脉證之辨食飲之宜四時之要道引之術以至淋漆蒸熨備急要方或經驗者悉錄而集之名曰脚氣治法總要分為一十九門通為一卷非

方四

敢自謂有補於將來亦欲傳於好事者庶幾臨病有所考焉

天門冬元治風毒四肢頑痺手足浮腫脚弱醫所不治此悉主之

天門冬 切取汁

生地黄 如上

枸杞子 切取汁

石伍斗 煮取壹斗 以水或 煎其碎之 以水

酥煉 升

白蜜 參升 煉

已上六味並大斗銅器中微火先煎地黃門冬汁減半仍合煎取二大斗下後藥煎取一斗內銅器重釜煎令隱掌可元梧桐子大二十元日二服加至五十元慎生冷醋滑雞猪魚蒜油麵等擇四時

王相日合之散如左

白茯苓 栝子仁 白木 萎蕤 菖蒲

遠志 澤瀉 薯蕷 人參 石斛

牛膝 杜仲 細辛 獨活 枳實

芎藭 黃耆 茯苓 續斷 狗脊

萆薢 白芷 巴戟 五加皮 覆盆子

陳橘皮 胡麻仁 大豆黃卷 茯神

石南 桂 各叁分 甘草 陸兩 蜀椒 薏苡仁 壹升

阿膠 拾 大棗 壹百 鹿角膠 伍兩 蔓荊子 兩

右三十八味內煎中添牛髓鹿髓各三升大佳小便澁去栝子仁加秦艽二兩乾地黄六兩陰萎失精去萎蕤

方四

加五味子二兩頭風去栝子仁加菊花防風各二兩小便利陰氣弱去細辛防風加茱萸二兩小便冷去防風各二兩加乾薑二兩無他疾依方合之女人先患熱者得服患冷者不得服

金牙酒治瘴癘毒氣中人風冷濕痺口喎面戾半身不遂

手足拘攣歷節腫痛甚者不仁名曰脚氣無所不治

金牙石 壹斤 側子 附子 天雄 當歸

人參 茯苓 白茯苓 黃耆 防風

薯蕷 細辛 桂心 萆薢 萎蕤

白芷 桔梗 遠志 牡荊子 川芎

地骨皮 五加皮 杜仲 厚朴 枳實

白木

黃耆各參

磁石

薏苡仁

麥門冬各拾

石斛兩

蒟蒻兩

生地黄升

右剉碎以酒八斗漬七日温服一合日四五夜一石藥細研別絹袋盛去藥同漬藥力和善主治極多凡是風虛四體小覺有風者皆須時服一依方合之不得輒住

大醫甲湯

治脚弱風毒癰痺氣上及傷寒惡風温毒山水瘡氣熱毒四肢痺弱

幣帛兩

防風

麻黃

白木

石膏

知母

升麻

茯苓

黃橘皮芎

杏仁

人參

半夏

當歸

赤芍藥

甘草

麥門冬各壹

羚羊角壹分

大黃壹兩

犀角

方四

雄黃

木香各半

棗拾个

貝母條

烏頭條

生薑兩

薤白拾肆

麝香錢

小豆合

吳茱萸伍

萎蕤分

右為麋末每服三錢水一大盞入生薑五片棗半個薤白三寸同煎至七分去滓温服相去十里得下止一方用大黃半兩得下可用六銖一方用羚羊角半兩毒盛可用三分

犀角飲子

治脚氣大効

羚羊角

羌活

桂心

白茯苓

牛膝

杏仁

郁李仁

半夏

附子

大腹皮

麻黃

大黃

白附子

檳榔各半

葶藶子

木香

白木

陳橘皮

防風

枳殼

甘草壹兩

犀角壹兩

右各淨洗細剉日煦乾分為八分若年高或臟腑虛冷即分作十六服每服用水兩碗薑錢十片煎至兩中蓋濃磨犀角水一合投入藥內更略煎過濾去滓分作二服不以時候温服重用水一中盞煎至半盞作一服更看病狀每料臨時添藥如後

脚膝痛添肉桂牛膝羌活附子各一兩

大便澀秘添大黃滑石各一錢若臟腑實更添一

錢無妨

筋脉拘急添蘇牛膝各一分

方四

脚轉筋添木瓜牛膝各半兩

攻作浮熱添天麻石膏各半兩

氣攻心痛添檳榔半兩木香一錢

已上藥依法服食方不失一切忌濕麵炙煖動

風毒物

烏地元治風毒濕脚氣攻注疼痛或即痒痺生瘡瘡中黃水不止服之大効諸藥不及方

烏地兩

虎骨淨洗了

黃松節酒浸

天麻

牛膝

石斛拾取

草薢

杜仲各壹

兔絲子

巴戟

獨活

防風

桂心

肉苁蓉

金毛狗脊

續斷

葶藶子

當歸 附子各壹兩 木香研半兩 乳香研半兩

右為細末研勻用木炭隔子皮蒸令爛研如糊以法酒化開銀石器中熬過和劑前藥為元如梧桐子大温服空心下三十元日二月必愈

側子酒治虛風冷濕頑痺不仁脚弱不能行

側子 牛膝 丹參 山茱萸 蒟蒻根

杜仲 石斛各壹兩 防風 乾薑 蜀椒

細辛 羌活 秦艽 川芎 當歸

白朮 茵芋 桂各壹兩 五加皮兩伍 薏苡仁兩陸

右為細末絹袋盛清酒四斗漬六宿初服三合稍加以知為度

方四 五

深師增損腎瀉湯治風虛勞損挾毒脚氣痿弱或痺不隨

下焦虛冷胷中微有客熱心虛驚悸不得眠食少乏氣日夜數渴心頭迫不得卧小便不利又時復下

黃耆 甘草 白芍藥 麥門冬 人參

從蓉 熟地黄 赤石脂 地骨皮 白茯苓

當歸 遠志 磁石 枳實 防風

龍骨各壹兩 川芎 桂各壹兩 五味子兩叁 半夏兩伍

右為鹿末每服三錢水二盞半先煮羊腎一具去筋膜煎取汁一盞半入藥并生薑五片棗一箇同煎至七分去滓空心温服不利下者除龍骨赤石脂小便赤色以赤茯苓代伏神加白朮三兩多熱加黃芩一兩遺溺加

桑螵蛸二十箇

預防法九治脚氣風毒發不與期攻心即死若居僻遠無藥物處致斃為橫死其要藥常有備隨身妙

半夏 青木香 吳茱萸 木瓜子 犀角

大黃 生薑研乾切 黃橘皮 檳榔 茯苓

昆布 葶撥 紫蘇 杏仁 前胡

細辛 桂心 旋覆花 當歸 防風

並須備急救命若新患無藥處隨病所在三五味濃煮服之後依方合藥服之

巴戟元治虛勞羸瘦下元冷憊脚膝無力風氣相攻

巴戟 兔絲子 石斛 牛膝 松子

方四 六

人參 桂心 羌活 附子 白茯苓各壹兩

鍾乳粉 雲母粉 肉從蓉 熟乾地黄各壹兩

甘菊花 五味子 防風各壹兩

右為細末同研了藥研令勻煉蜜和杵五七百杵元如梧桐子大每服三十元空心及晚食前以温酒下

補泄元治脚氣方熙寧年間三川知寨魏琦得此方三服而愈

木香 檳榔 大黃各壹兩 麻子仁拾貳分

薑屑兩壹 桂心兩貳 訶子兩壹 枳殼兩貳 牛膝兩貳

山茱萸兩壹 附子兩貳 芎藭兩壹 薑解兩貳

羚羊角兩壹 獨活 前胡 防風各壹兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大每服二十元空心温

酒下

風引湯治兩脚痠痺脉微而弱腫或不仁拘急屈不得行

麻黃 石膏 羌活 白茯苓 白朮各貳兩

附子 吳茱萸 秦艽 細辛 人參

川芎 防風 防已 乾薑 甘草

桂各壹兩 杏仁兩

右為細末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前

竹瀝湯治兩脚痺弱脉浮大而緊或轉筋皮肉不仁腹脹

起如腫按之不陷拍必中惡或患冷

升麻 防風各壹兩 附子 白朮各壹兩 甘草

秦艽 葛根 黃芩 麻黃 防已

方四 七

細辛 乾薑 桂各壹兩 茯苓兩 杏仁兩

右為鹿末每服三大錢匕竹瀝一合水一盞同煎至八

分去滓服空心

獨活湯主脚氣風疼痺不仁脚中沉重行止不隨氣上方

獨活 桂心 半夏各肆兩 麻黃

芎藭 人參 茯苓各叁兩 附子壹個捌

大棗拾貳個 防風 芍藥 當歸 黃耆

乾薑 甘草各貳兩

右十五味以水一斗五升酒二升煮取三升半分

為五服

獨活寄生湯治腰背痛夫腰背痛者皆由腎氣虛弱卧冷

濕地當風所得也不時速治善流入脚腠為偏枯冷痺緩弱或重或腰痛攣脚重痺宜急用此方

獨活 續斷 杜仲 牛膝 細辛

秦艽 茯苓 桂心 防風 川芎

人參 甘草 當歸 白芍藥 熟地黃各貳兩

右為細末每服四錢水一盞半煎至六分去滓食前溫

如身勿冷也若虛下痢當除乾地黃服湯取萹蓄葉火

療厚安席上及熱睡其上冷復療之冬月取根春取莖

熬熟臥之佳其餘薄熨不及蒲葦蒸也諸處風濕亦用

此法如新產了便患腹痛不得轉動及腰脚攣痛不得

屈伸痺弱者宜服此湯除風消血也又後有附子一枚大者無寄生人參當歸

方四 八

續斷煎治濕痺腎關不利腰脚等病

續斷 牡丹 山藥 澤瀉 山茱萸

石斛 五味子 白茯苓 麥門冬 桂各叁兩

人參 阿膠 防風 白朮各貳兩 熟地黃拾

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元不以時

米飲下一方加附子一兩減地黃五兩或麥門冬

薏苡湯治風濕毒氣攻兩腿疼重或連足浮腫或皮膚焦

悴肉色紫破筋骨抽痛心悶氣脹頭旋多睡眼暗並治

薏苡仁捌兩 白茯苓 防風 羌活 玄參

石膏 麻黃各伍兩 牛膝 五加皮 桂心各陸

羚羊角 枳殼各肆兩 升麻陸兩 防風陸兩

右為細末每服三錢水一盞半先浸一宿平旦煎至八分去滓溫服不以時

硫黃散 主大補脚弱面熱風虛方

硫黃 鍾乳粉 防風各伍兩 乾薑兩 白朮
人參 蜀椒 細辛 附子 天雄
茯苓 石斛 桂心 山茱萸各參分
右一十四味為細末旦以熱酒服方寸匕日三加至三

赴痛元 治婦人男女風毒走疰腰脚疼痛

苦葶藶 木鱉子仁 白膠香 地龍
五苓脂 赤小豆 當歸 骨碎補 海桐皮

威靈仙各半兩 草烏頭壹兩半 烏藥
甜瓜子各半兩 生白者

右為細末酒者麵糊為元如葶藶大每服三五元空心加至七八元嚼木瓜熱酒下服藥後忌熱物少時

楊皮湯 淋漆脚氣攣疼緩弱消腫毒

白楊皮 茵草 羌活 獨活 杜仲
防風 葶藶 夏枯草 荊芥穗 地椒
威靈仙 白礬各壹兩

右為鹿末每服用半兩水五升煮至四升乘熱淋漆兩足

陳亮膏 治脚氣筋骨疼痛拘攣去一切風濕肉疼而痺皮

肉紫破乾脚氣論曰夫乾脚氣者由腎虛每事不節當風取涼卧不覆足或夏月冷水漬脚膝理開疎風冷濕氣外入而脚脛枯細或痛攣或冷或熱煩渴吐逆喘燥而無瘡破者是其候也今隨證存藥

當歸 細辛各參兩 桂壹兩 天雄伍 生地黄貳
白芷壹兩 川芎壹兩 丹砂貳 乾薑兩 烏頭壹兩
松脂捌兩 猪脂拾斤

右十二味吹咀而生地黄取汁漬藥一宿煎猪脂去滓內藥煎十五沸去滓內丹砂末孰攪勻塗藥炙手摩病上日千遍羌胡洽有人參防風各三兩附子三十枚雄黃二兩大酖三升

牛膝煎 治臟腑氣血俱虛風冷攻注四肢疼痛腰脚無力

虛脚氣論曰人有血氣虛及與居不節或謂脚氣不可滋補冬日略不小補但服踈瀉藥過度臟虛而兩脚酸削身躄酷冷少力膝冷轉筋攣緊而重者是其候也宜風引湯八味元木瓜元石南元金牙酒及炙絕骨於冬時服之即免毒氣入腹及不作也

牛膝 羌活 五加皮 杜仲 安息香
乾薑 當歸 桂各壹兩 補骨脂 石斛
巴戟各壹兩 附子貳
右為細末蜜黃麵糊為元如梧桐子大每服三十元空心鹽湯下

牛蒡子酒 陶隱居江左之時世患脚膝寒痺皮膚不仁骨中疼痛行履不得

牛蒡子 茵芋各拾 白茯苓 杜若

乾薑各肆 枸杞子 石斛 牛膝

側子各柒 川椒兩伍 大豆貳 麻子壹

右為鹿末以夾絹袋盛安瓷餅子中以好酒二十升浸二七日空心飲之量人氣薰二飲了於夾幕及不見風處坐

附子末液煎元 治丈夫婦人風濕客中經絡疼痛傳入臟腑衝痛昏塞咽搐直視面色青黑脉道閉伏不省人事平時心神不樂語澁舌緊腰腿沉重行履艱難補元氣壯筋骨

骨養脾腎大療乾濕脚氣辟寒邪除風涎行滯氣活血進食

附子貳錢 木瓜大者肆个去子

牛膝貳 白朮壹 薏苡仁壹兩 羌活半兩

杜仲兩半 續斷 萆薢 防風 五加皮

熟乾地黄各半

右為細末木瓜元如梧桐子大每日服空心日午温酒任下四十元

菜萹散 治風冷脚氣偏中兩足枯瘦不隨疼痛呻吟醫所不能治

吳茱萸 乾薑 白斂 牡荊 附子

天雄 金毛狗脊 乾漆 薯蕷

秦艽 防風各半

右為細末每服方寸匕飲調日三藥入肌浮浮然三日知一月差

神仙紫雪 治脚氣毒攻內外煩熱狂易叫走解一切執毒

黃金壹伯 寒水石 石膏各壹斤 犀角屑

羚羊角屑各拾 玄參壹斤 沉香 木香

丁香各伍 甘草兩捌 升麻兩陸

右以水八斗煮至三斗去金入諸藥再煎至一斗去滓投朴硝二斤微火煎以柳木篋子撓勻停手候欲凝入盆中便下研朱砂麝香各三兩急令撓勻候冷凝成雪

神仙紅雪 治脚氣氣毒身內外煩熱瘡腫狂叫及諸般石毒癩癘時行一切風熱方實脚氣論曰人有久畜積熱因感寒毒成之後或一向補益不經汗即使風毒感實因致和結壯熱喘滿脚腫赤痛大小便秘喜妄語者是其候也宜紅雪防風湯神功元犀角飲如小便澁即服終宮元白皮小豆散治之

升麻兩叁 大青兩叁 桑白皮兩貳 犀角屑壹兩

羚羊角兩壹 呵子叁拾 檳榔叁拾 蘇禾兩陸 淡竹肆兩

山梔子叁拾 槐木花兩壹

右並剉細以水二斗浸經宿煎取一斗去滓下好朴硝十斤又煎以柳木篋子撓新瓦盆中時時傾去餘煎不

散並在本門

冷水即成紅雪

聖南風元

治腎氣虛弱風濕脚氣筋脉拘急攣痺緩弱下氣除筋骨間邪氣陰不仁寒厥痿痺腰脊痛脚膝冷轉筋腿緊不能久立及如履物隱痛

石南葉 附子 防風 桂各陸兩 牛膝

白茯苓各捌分 熟地黄 兔絲子 薏苡仁各拾分

五加皮陸分 木苾陸兩

右為細末用大木苾一个去皮穰蒸熟研成膏和前藥末為劑如乾更入少熟蜜和丸如梧桐子大空心薏苡湯下三十元日二服

獨活湯

治脚氣腿膝疼痛下腫下瘦緩弱不能行喘滿上

方四

十三

氣

獨活 丹參 細辛 五加皮 牛膝

川芎 白殭蚕各半兩 桑白皮壹兩

麻黃壹兩 杏仁 甘草各叁分

右為麤末每服三錢水一盞煎至八分去滓温服不以時候

食前元

調補尋常服之不令脚氣發動疎散榮衛氣血風氣通行陰脚氣論曰陽氣衰於下則為寒厥其人足脛寒筋攣急脛酸膝冷痛或頑痺不仁惡明好淨此其候也宜以食前元金牙酒側子酒八味元海桐皮散木香飲子松節散及灸風市穴即愈金牙酒側子酒在前八味元海桐皮散木香飲子松節散及灸風市穴法在後

木香 白茯苓 羚羊角 薏苡仁 檳榔各貳兩

熟地黄 楮實各叁兩 旋覆花 桂各壹兩 大黃壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子空心温酒下三十元

立應散

治乾濕脚氣衝注四肢

大腹子 木香 訶子皮 漢防已 紫蘇莖

羌活 赤芍藥 乾木苾 松木節 沉香

右各半兩剉細分十貼每貼水八合煎取二合已上去滓温服空心夜卧各一服兩服滓併煎作一服

黃耆煎

治脚膝痠疼

黃耆拾兩 烏藥拾伍兩 地龍肆拾兩 赤小豆拾斤 杜蒺藜伍斤

防風拾斤 川烏頭肆拾兩 川練子拾斤 陳橘皮斤拾

方四

古

苗香拾斤

右為細末酒煮麵糊元如梧桐大每服三十元空心木苾湯下重校定此方分兩多可改斤作兩貴易合也

食後元

治尋常脚氣欲發先大便秘澁腹中氣滿脇肋妨悶不思飲食小便赤黃肉多蠕動痰涎不利煩熱緩弱

前胡 防風 黃芩 犀角 蔓荊子

梔子 人參 車前子 麥門冬各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食後温漿水服

獨活膏

治腰背痛夫腰背者皆由腎氣虛弱卧冷湿地當風所得不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼

重或響脅痛脚氣偏重宜急服此湯脚氣毒濕多風少論曰素無風或久履濕冷或足汗脫履或洗足當風為濕毒內攻足經兩腿緩縱變痛若或皮肉紫破有瘡其候也宜以獨活寄生湯意改湯本元天麻元及蒸慰摩膏也

獨活 寄生 細辛 杜仲 牛膝

防風 芎 桂 熟地黃 等分

右為細末每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服日二服訖溫身勿令冷也若虛下利者去地黃服之取蒟藿菜火燎厚安置床上及熱卧上冷復燎之冬月取根春取莖熬熟卧之其餘薄尉不及蒟藿蒸也諸處風濕亦用此法婦人新產竟便患腹痛不得轉動及腰脚痛

方四 十五

攣不得屈伸痺弱者尤宜服之除風消血也

海桐皮散 治風濕脚氣氣勝於形兩腿腫滿疼重及一切

風濕凝滯氣除百節筋攣痛等

海桐皮 羌活 防風 赤茯苓 檳榔

熟地黃 桂 羚羊角 薏苡仁 各貳

右為細末每服三錢水一盞入生薑五片同煎至七分去滓溫服食前

傳信散 療風毒腰脚無力腫痛腹脹心煩悶氣上衝咽喉

頭面浮腫嘔逆之候當日服之

旋覆花 白茯苓 黃橘皮 桑白皮 各叁

犀角屑 紫蘇莖 豆豉 生薑 棗 各貳

右除薑棗外細剉都以水八升煎至三升絞取汁去滓分三服每服如人行十里不以時

海桐皮酒 治毒氣流於脚膝行立不得

海桐皮 五加皮 獨活 防風 枳殼

杜仲 牛膝 薏苡仁 生熟地黃 兩

右咬咀以綿裹用無灰酒二升春浸七日秋二七日空心溫服一盞常令酒氣相接勿令大醉重者不過二劑即差忌生冷蒜等如或時恐壞且浸半料江南多有此疾号为軟脚博陵崔公信居吳興得此疾几半歲服百藥無効朱邑為處此方服之立効公信去其疾退之狀如蛇數百條奔走出自是獲安後傳之無不効者

方四 十六

犀角飲子 治陽脚氣毒在腑發熱悶眊唇口乾焦意欲噴

叫喜明好語兩脚腫煩極疰弱如帶方

犀角屑 黃芩 木香 升麻 麥門冬

石膏 甘草 竹茹 兩

右為散每服三錢水一大盞入生薑五片同煎至七分去滓入紫雪一錢攪勻溫服食後

石南元 治風濕氣脚重少力脚膝緩弱或腫不腫痺麻脛

冷脚下隱痛行履艱難筋脉攣急不得屈伸項背腰脊腫痛及虛風上攻頭面浮腫生瘡痒痛膿汁浸漬手脚少力牙斷宜爛齒搖髮落耳內嘯鳴

石南 續斷 黃耆 狗脊 木苾

烏藥各半 地龍 烏頭各肆

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子大每服三十元空心木苾湯下

天麻地龍元 治濕毒脚氣攻注兩腿腫破重疼皮肉頑紫或上攻頭面皮肉炸熱方

天麻 地龍 羌活 附子生 桂心

沒藥 荆芥穗各壹 麝香壹

右為細末研勻以生蜜元如彈子大坩器盛每服荆芥蠟茶嚼下一元如是破至甚者不過二十日上攻者食後服下注者食前服

斛交散 治榮衛凝滯風冷乘襲腰膝脚脛疼痛

方四 十七

當歸 杜仲各壹 延胡索 吳茱萸 赤芍藥

牡丹 斛交 桂各叁

右為細末空心温酒調下二錢

降氣湯 治下虛上壅氣不升降滯痰實咳嗽喘滿頭目昏眩肩背拘急及治脚氣上攻脚弱腰痛心胃不快可思飲食

紫蘇子 半夏各伍 桂肆 橘皮叁 前胡

紫厚朴 甘草 當歸各貳

右為鹿末每服二錢水一盞入生姜紫蘇葉各三片同煎至七分去滓熱服不以時

石斛元 治脚脛屈伸不得

石斛 牛膝各拾 天雄 側子各肆 狗脊

右為細末蜜元如梧桐子大食前温酒下三十元

海桐煎 治久患脚脛濕痺行履不得

海桐皮拾 牛膝貳 楮實貳 枳實陸 木香

白芍藥各肆 桂捌

右為細末蜜和元如梧桐子大食前空心服四十元

木香飲子 治陰脚氣冷積於臟腑脹悶衝心嘔逆氣促胃寒不通飲食不下腹脇滿痛肢躄頑痺脚脛冷癢方

木香捌 吳茱萸 桔梗各陸 大復子伍个

太黃肆 厚朴捌分 薑壹

方四 十八

右為細末每服三錢水一大盞入生薑三片同煎至七分去滓温服如人行十里再服良久氣通乃老

沙節湯 治風毒脚氣下注兩脚疼腫淋漆方

沙木節 木通 羌活 川椒各半 烏頭壹分

橘皮半兩 橘壹

右以水三斗葱一握煎減半通手淋漆再煖可兩日淋漆

白飲散 治腎臟風毒流注脚脛生瘡痛痒有時

白斂 白及 黃芩 當歸 芍藥

吳茱萸各半

右為細末看瘡多少用生蜜調膏攤紙上帖瘡日一換

之先用鹽湯熱洗了拭乾

麻仁元 解風秘不通脹滿氣悶兩脚痛風氣不順

麻仁升壹 白芍藥兩肆 枳實兩肆 大黃片 厚朴半兩

杏仁兩貳

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元熟水下

不以時

唐侍中散 自療脚氣攻心此方甚散腫下氣効極驗

檳榔個 生薑兩 橘皮 吳茱萸 紫蘇葉菜

木苳各壹兩

右剉細以水三升煮取一升分再服不以時

松節散 治脚氣

方四

松節 檳榔 紫蘇 桑白皮 芎各壹兩

甘草分壹

右末之每服三錢水七分童子小便三分同煎取六分

去滓服不以時

活血丹 若一邊足腫無力漸漸瘦細肌肉不澤上牽脇肋

下連筋急不能行步此由大病之後數三津液血少不榮

氣弱不能運行肝氣虧損肝虛無血以養筋筋不榮則乾

急而痛亦不能舉

乾地黄兩 當歸兩 白芍藥兩 續斷兩 白木兩

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子大溫酒下三十元

漸加至五十元

木通元 治脚氣服補藥太過小便不通淋閉臍下脹

當歸 梔子仁 芍藥 甘草 赤茯苓各壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓通口服不

以時

平補草薢元 治脚腫冷氣衝腰行履不前

草薢壹兩 杜仲 乾木苳 續斷 牛膝各壹兩

右為細末煉蜜元如彈子大每服一元空心鹽酒鹽湯

任下日三服

吳茱萸湯 淋漆暖筋壯筋力調暢榮衛

青嫩蒟藿壹兩 附子兩 青橘皮兩 吳茱萸兩

椒兩

方四

右藥鹿末之作兩次使每次水五升煮三十餘沸去滓

先淋右肩至手指無風處淋之三五日一次再煖湯方

淋右膝胛至脚指為佳

白皮小豆散 治脚氣小便澀兩脚腫氣脹

赤小豆升 桑白皮兩 紫蘇兩 生薑兩

右以水三升煎至豆熟取之食餘飲之

木瓜元 治風濕脚氣兩足緩弱轉筋疼痛久服如飛

木瓜大者壹兩破為 乳香兩 青鹽兩 菊花為末

右將木瓜去穢入二味後以線繫定入飯甑內蒸熟研

為膏和菊花元如梧桐子大每服三十元空心酒下

越婢湯 亦名麻黃白木湯治素風盛疼痺脚弱

麻黃陸兩 白朮肆兩 甘草貳兩 附子壹兩

右為細末每服四錢水一盞半生薑七片棗三箇同煎至一盞去滓溫服取汗出為佳食前服

越痛元 治脚氣毒攻兩脚痛不可忍

白甘遂 白芥子 大戟 白麵各貳兩

右為細末滴水和元作餅子炙黃色為末醋煮麵糊和元如菜豆大每服十元冷酒下利則止不服

大黃湯 如脚氣大便秘服諸藥不通風毒攻心氣悶心欲狂熱悶口乾喉中如火生秘澀不通

紅雪 大黃各貳兩 黑豆 木香各壹兩

右剉碎先以水一升煎取八合將藥汁浸一宿時時飲

之

四斤元 補腎治風強脚膝

菴蓉 天麻 牛膝各壹斤 木瓜壹斤

右件焙乾搗羅為細末煉前浸藥酒如膏用和元如梧桐子大空心湯酒任下三十元如浸藥酒少和不盡更添酒煉

沉香 治氣厥上重下輕久成脚氣

黃橘皮肆兩 沉香 紫蘇葉 人參各壹兩

右為細末薑汁糊和元如梧桐子大每服二十元生薑湯下

狗胆湯 淋洗脚氣 如有瘡服橘皮元

枸杞 煨麻根 枸椒根 蒟蒻根

右等分為鹿末煎湯淋洗

四柱元 虛人服又曰長生丹此藥添精補髓長筋力縮小便大壯筋骨久患腰脚者能去根本頭白再黑齒落再生

何首烏 石菖蒲 牛膝各肆兩

右剉為鹿末以酒三升入菟鍋內慢火煮令乾更用川烏頭四兩炮細剉同上件藥末之酒煮麵糊為元如梧桐子大每服三十元空心鹽酒任下

松節散 治脚氣冷傳於筋轉筋攣痛方

松節取伏神中根心子用壹兩削如末 乳香錢壹

右用銀石器中炒令焦只留一二分性出火毒研細每

服一錢至二錢執末瓜酒調下應是筋病治之

茱萸湯 治毒氣攻心手足脈絕此亦難濟不得已作此湯得下十愈七八專主脚氣入腹因悶欲死腹脹方脚氣入腹毒攻五臟論曰風濕毒氣中於足經遂為脚氣若妄治之一向踈下乘臟腑氣虛弱毒內攻入腹悶亂煩喘氣不得息若不速以湊毒之藥必致惡氣內薰五臟使三焦榮衛不通則治療為難譬由浸溪瘡從四肢者易治此瘡毒不由經絡外皮膚者尚尔又况風毒因經絡受邪而內連五臟者歟如此極內攻腹者無出木瓜元茱萸湯最救困急服餌之後雖使惡毒邪濕盛來無由入矣

吳茱萸陸升 木瓜貳枚

右二味水一斗三升煮取三升分為三服或以吐汗便愈蘇恭云服得下治此甚易但久服則見効耳此方為是起死乃高麗老師方與徐王方相似故云神驗如無木瓜取吳茱萸一色煮服又方加青木香三兩犀角屑二兩亦去此方起急病

黃蘗散治腎臟風毒流注脚脛生瘡紫黑久不羸

黃蘗兩

葱根拾莖

右二味同搗為泥再焙擣為細末每用看瘡多少以蜜調攤帛上帖之先以湯浸二三錢淋漆瘡拭乾後用黃蘗散帖之亦佳

檳榔元若服藥之後麻痺漸退而但微痛拘急大便秘澀

方四

廿三

此由先氣澁而後生風邪服藥風去而氣澁亦

檳榔

芎

右等分為細末煉蜜和元如梧桐子大薑湯下三十元不以時

橘皮元治脚氣有風人氣不順致生熱而大便秘此藥通

用不損人進飲食散脹滿調中下氣偏宜脚氣

黃橘皮兩

乾生薑兩

右為細末以蜜半斤同熬成膏元如梧桐子大每服三十元生薑湯下食前

淋漆湯治脚氣兩足寒熱腫痛脹滿寧緩

韶腦不以多少

右每用半兩以水一斗煎兩沸濯足膝

止嘔湯治脚氣嘔逆及吐利後轉筋

木瓜

右取五錢水一盞煎至半盞去滓溫服不以時

木瓜漿防熱疾興下氣利腰脚治緩弱不得行

右取木瓜削去皮片切以湯浸之加少薑汁沉之井中冷以進如新木瓜澁入少鈔白霜如味酸入少蜜

草麻散治脚氣初發從足起至膝骨腫疼者

右取草麻子菜切擣蒸薄裹之日二三易即腫消若冬月無草麻菜取胡蘿蔔擣碎和酒糟三分相合一分令蒸熟及熱封裹腫上如前法日二易腫即消亦治頑痺

方四

廿四

蜀椒湯治脚氣腫攣消赤腫

右蜀椒四升以水四斗煎至三斗半甕盛下着火煖之懸板為橋去湯上二寸許以脚踏板柱脚坐以綿絮密塞勿令泄氣若覺冷即出入被以粉摩之一食久更令甕下火不絕勿使湯冷如此消息不過七日得伸展并腫消

腫消

礬石湯治脚氣衝心

右以礬石三兩研水一斗五升煎數沸浸脚

神應丹治脚氣

右以附子大者十箇用赤小豆一斗半水三斗慢火同附子煮令水盡揀出附子去皮臍十字切作塊子再同

赤小豆五升水一斗煮附子至水盡取附子切片焙乾為細末入青鹽一分酒煮麩糊為元如梧桐子大空心鹽酒任下三十元

脚氣道引法論曰夫中央者其地平以濕法土德之用而生物也衆故中國之人食雜而不勞是以多痿厥因遇有疾當行道引按躄不可專以湯藥故素問云中央之人道引藥不能獨治也又况脚氣有風之人尤要氣血流通四時之中獨禁於冬須在春夏故歧伯所謂冬不按躄者良以不欲擾動陽氣故也

治脚氣腫痛及四肢風

右當存息正坐直伸兩足立指在上伸兩手齊足指漸

方四

共五

漸及足心若肥盛人手不能及足者以綿繩兩條作兩捲子蹬兩足心以手攀之如此五七遍大輕腰脚逐四肢風

若始覺脚氣連炙風市三里各二十一壯以瀉風濕毒氣若覺悶熱者慎毋炙之以本有熱炙之則大助風生食物大忌酒麩海藻仍忌房勞不尔服藥無益

取穴法

風市穴使病人平身正立垂兩手貼兩腿中脂尖頭是穴三里穴取病人膝蓋下三寸簾外按之少陷者是穴

又法以指深按之則足跌陽脉不見者為准

脚氣燥熱紫雪等

郭都官久患脚氣發即寒熱脹滿氣上服熱藥即甚北与外臺延年茯苓飲以下其氣再用六物麻子元以洩其熱後來見之但尚苦燥熱遂令服紫雪大効

脚氣檳榔湯

少府監韓正彦得疾手足不能牽諸醫皆以為中風針刺臂腿不知非曰此脚氣也令服此湯乃愈

檳榔不以多少

右為細末每用三錢生薑三片紫蘇七葉陳橘皮去白者三枚水一盞半煎至八分去滓稍熱服不以時

脚氣後心腹不快青木香

方四

共

部署郝質患脚氣腫滿生瘡有人治之如水氣以藥下之日三九五十餘行脚腫即消後或有時心腹不快非令服青木香元甚覺快暢而有効校定青木香元見局方

虎骨元治肝腎臟風流注腰脚疼痛冷痺及筋骨拘急行履不得

虎脛骨壹兩沉香兩半白花蛇貳兩乾蝎兩半天麻

防風 羌活各參分天南星兩半海桐皮兩桂心參分

芎藭 白附子兩半麻黃壹兩赤芍藥兩半

羚羊角兩分硫黃兩川烏頭兩半牛膝兩

白殭蚕兩半

右為細末煉蜜和搗三二百杵元如梧桐子大每服二

十元食前以温酒下

八風散治風虛面青黑色不見日月光脚氣痺弱準經面青黑主腎不見日月光主肝補腎治肝

甘菊花頭子兩

石斛

天雄各壹兩半

人參

附子

甘草各壹兩陸錄

薯預

鍾乳令研

交夜水飛之研令无声

續斷

黃耆

澤瀉

麥門冬 遠志

細辛

龍膽

秦艽

石葦

兔絲子

牛膝

菖蒲

杜仲

白茯苓

熟地黄

栝子人

蛇床子

防風

白朮

乾薑

葶藶

山茱萸各壹兩

五味子

烏頭兩

茯苓兩

方四

廿七

右為細末酒服方寸匕日三不知加至二七不以時

地黄粥以補虛

右取肥好地黄四兩取汁去滓作粥候粥半熟即下之以綿裹椒一百粒生薑一片投粥中候熟出之下羊腎一具去脂膜細切如韭菜大同煮熟加少鹽食之

防風粥以去四肢風

右取防風一分去芦頭煮取汁去滓如食法作粥食之

紫蘇粥以去壅氣

右取紫蘇子炒令黃香以研瀝汁去滓作粥食之

桑枝煎本方云桑枝平不冷不熱可以常服療遍身風痺

乾燥脚氣四肢拘攣上氣眼暈氣喘咳嗽消食利小便久

服輕身利耳目令人先澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑枝煎不服出抱朴子孫真人方

右取桑枝如箭幹者細剉三斗炒令微黃以水六斗煎取三斗去滓以重湯煎取二升下白蜜一合黃明膠一兩炙搗末煎成入以不津器封貯之每服一匙湯化服之

大牛膝元治風毒脚氣流注腰腿兩脚疼重攣痛及腎虛目見黑花

牛膝

川芎

續斷

葶藶

丹參

黑狗脊

杜仲

獨活

白朮

枳殼

當歸

白芍藥

防風

乾木瓜

方四

廿八

熟乾地黄兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元空心木

瓜湯下

練花粉粉身汗以固陽氣禦風寒霧濕止癩子風疹瘙癢

川芎

藁本

練花各壹兩

丁香兩

英粉半

右同杵勻細粉身以止汗

枝定英粉不知何物疑糯米粉也

道引法主消食暖元氣去壅滯方

行住坐臥處

手磨脇與肚

背通快時

兩手胛下鋸

鋸之膀胱通

背拳摩腎部

背通滯消

兩腮紅色聚

才資力稍倦

却使家人助

行之但須頻

晝夜無拘數

歲久積功成

漸入神仙路

行氣大法夜半後日午前於密室中令鋪厚軟仰卧枕下
共身平舒手展足手握大拍節去身四五寸兩脚相去亦
可四五寸引氣從鼻中入足即停有力便取久住氣悶從
口細細吐出盡更作若患寒熱及偏風脚氣霍亂等並療
之每旦天晴即時常以鼻引清氣口吐濁氣皆除百病每
作東向微微吐之大凡氣宜清煉液宜數咽手宜在面齒
宜數叩形宜數見此五宜為大率意者氣之使意有所到
則氣到每躰不安處則微閉氣以意引氣到疾所而攻之

方四

六九

必差

大豆蒸法

崔氏療暴風四肢攣縮枯細不能行動用此方

右取大豆三大升淨揀擇淘之漉出蒸之待氣溜下甑
投二大升醇醋甑中和攪令遍密室內地上謾鋪席又
鋪一帛帕傾豆於帕上仍以五六重綿衣覆豆令病人
於上卧以被覆若豆冷漸漸取却綿衣令一人於被下
引挽攣急處却綿衣尺豆冷收取更着甑中依前法蒸
熟復着醋半升和豆一准前用每收豆作二升每三日
一作之

茴香丸

治風毒濕氣攻注成瘡皮紫破膿壞行步无力皮

肉所熱

舶上茴香

地龍

赤小豆

川苦練

川烏頭 烏藥

黑牽牛 各壹兩

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子大每服空心鹽湯
下十五元日二

三脫散

治三焦氣逆解大便秘澀胃膈滿脹備氣除風氣

或已服諸藥大便不通者依法煎服就腹中藥便通大効

極不虛人脚氣心腹脹悶大便不通宜服

大腹皮

酒浸壹遍更以大豆汁洗叁遍焙乾用

木瓜

紫蘇并梗

獨活

沉香 各壹兩

木香

甘草

檳榔

陳橘皮

各叁分

白木

分壹

川芎

兩半

右為細末每秤一分水二盞同煎至一盞去滓温服取

方四

三十

便通為効不以時

脚氣針灸法

九針灸孔穴主對者穴名在上病狀在下其

脚氣一病最宜針灸若針而不灸灸而不針非也針灸而
不藥尤非也脚氣初得便速針灸若專以藥不針灸則可
半老矣然取寸之法人有長短膚有肥瘦皆須精思准折
之不得一槩致有差失尺寸之準以銅人隨中指中文為
是若坐點穴者坐灸之卧點穴者卧灸之立點穴者立灸
之不依此者徒破肉耳昔蘇恭有去脚氣始發隨痛處灸
不必依穴者亦如素問繆刺之法亦可依用

初灸風市

主脚腕牽痛引脇拘急痺或青或枯削黑如腐大緩縱痿痺

次灸伏兔

主中寒按甲二經云是湯明經刺可伍分不可過也

次灸犢鼻主腫中病痛不仁難跪此

次灸腓兩眼主腫冷足

次灸三里穴主腰痛不能久立膝疼脹

次灸上廉穴主小便難廣

次灸絕骨穴主風勞身重髀樞痛膝骨檢痺不仁筋

次灸下廉穴主小便難黃赤

右八穴第一風市點穴之法令病人起正身平垂兩臂直下舒十指掩着兩髀便點當手中指頭痺大筋止是也灸百壯多亦任人輕者不減百壯重者乃至一處五六百壯勿令頓灸須三報之乃佳候盤色赤白平如舊則風毒盡矣若色青黑風毒未盡當再報之第二伏兔

四九字

方四

壯一

穴令病人平身端坐以灸人手掩橫膝上手下傍与曲膝頭齊上傍側手際當中央是灸百壯亦可五十壯第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外骨邊平處以手按之得節則是一去在膝頭下近外三骨箕踵動脚以手按之窟解是灸三五十壯第四腓眼穴在腓頭骨兩傍陷者宛中是灸五十壯第五三里穴在腓頭骨下三寸附脛骨外是一去在腓骨節下三寸人長短大小當以病人手度取灸之百壯第六上廉穴在三里下一寸亦附脛骨外是灸之百壯第七絕骨穴在脚外踝上一寸第八下廉二穴在輔骨下去上廉一寸輔充肉其分外斜治頭風臂肘痛溺黃可灸三七壯凡此諸穴不必一頓灸

盡壯數可日月報灸之三日灸令足壯數為佳凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚九脚弱皆多兩脚又一方去如覺脚惡便灸三里穴及絕骨各處兩脚惡者灸四處灸之多少隨病輕重大約雖輕不可減百壯不差速以灸之多益佳

五枝湯 淋漆風濕一切筋骨疼痛

桑枝 槐枝 楮枝 桃枝 柳枝各壹兩

右各細剉更以麻菜一把水三斗煎取二斗去滓淋洗洗畢宜就便寢不可見風

元和十二年二月得乾脚氣夜半痞絕左脇有塊如大豆且因大寒不知人三日家人皆號哭有鄭絢美傳杉木節

方四

壯二

方服之半食間下氣通立愈

杉木節 橘葉各剉壹大升 大腹子柒枚

童子小便參大升

右四味同煮取一大升分作兩服得快利即止乾脚氣者頭痛腰脚酸疼心間躁悶乾渴食飯粥飲藥立吐却遍出汗出氣喘者是

療脚氣攻心

右取生猪肉去脂以漿水洗淨兩板壓去汁細切鱸蒜蓋啖之日二頓下氣除風神驗此外國法

桃花散 療脚氣及腰腎膀胱宿水及痰飲

右取桃花陰乾量取一盞但虛滿不須按捺杵為散紗

紗羅下温酒調一服令盡通利為度空肚服之須臾當轉可六七行但宿食不消化等物摠瀉下若中間竟飢虛少進軟粥飯安穩不似轉藥虛人不廢朝謁但竟腰脚輕快使人勇躍食味倍加脚氣先腫者一宿頓消三日內腹虛大都消悉慎生冷酢滑五辛酒麪及粘食肥膩四五月外諸食復常

延年茯苓飲子 主脚氣腫痛喘急上攻心腹執胃悶嘔逆飲食不下

白茯苓 紫蘇葉 杏仁 橘皮 升麻

柴胡 犀角各貳兩 檳榔拾貳枚 生薑肆兩

右為鹿末以水八升煮取二升五合去滓温分三服如

人行八里忌醋物

桃花氣元 治温濕風毒客伏經絡氣壅血澁支躄悶痛懊煩壯熱氣奔逆衝心腹痞滿腰脊重痛脚膝難卒痛不能動肩背拘強眩冒神昏或將温過度客熱內感隨氣升降遊注疼痛及腫滿水氣

桃花錢柒 漆烟脂錢伍

白附子 甘遂

天南星各貳錢 大麥麩錢拾

葦靈仙錢伍 大戟錢叁

右件為末秤生用滴水和元如梧桐子大每服二十元先用水一大盞煎桑白皮三寸煎五七沸去皮不用內

藥再煮五七沸漉出並放温將元煮藥湯下食後臨卧常服不耗氣血疎風氣

鶴頂丹 強脚膝補氣能令氣下行安五臟填骨髓補虛羸去百病

辰砂 椒紅 青塩各伍兩

已上三味入銀瓶中木塞口油紙封角重湯煮七

晝夜入地坑出火毒一宿入後藥

鹿茸伍兩壹分酒 參伍兩 茅朮伍兩

右同前三味拌勻同杵三五百下元如梧桐子大服四

十粒空心食前米飲下

椒仁元 治足膝虛腫

椒仁 商陸 橘皮 桑白皮

右各等分為細末白麩糊元如梧桐子大飲下二十元以小便通為度不以時

虎骨煎 治風濕筋脉緩縱不隨言語蹇澁及治中風脚氣等去麻痺止風通利血脉

虎骨 當歸 海桐皮 參 木香

附子 白花地 桂心 敗龜 天南星各柒兩半

乾薑 沒藥 麝香 地龍 蔓荊子

菊花 殭蚕 乾蝎 防風 芎藭各壹兩

羌活貳兩 天麻壹兩

右為細末入麝香沒藥研勻煉蜜和元如梧桐子大每

服三十元至五十元食前温酒下

思仙丸 治肝腎風虛弱腿膝酸疼不可履地風濕毒流注脚氣行李不得小便餘瀝裏急後重久服補五臟內傷不足調中益氣涼血堅筋骨輕身

思仙木兩 乾蝎兩 五加皮 防風 草薢

天麻 薏苡仁 續斷 白木 羌活

牛膝 生乾地黄各壹兩半老人加附子壹兩

右為細末宣州木瓜去穰皮了秤半斤先蒸過切作片子以好酒二升化青鹽三兩同鹽酒煮爛為膏和藥元如梧桐子大每服四五元空心食前温酒鹽湯任下如膏少添酒煮麪糊為元日三服

方四 卅五

防風湯 治肢躄虛風微腫發熱肢節不隨恍惚狂言來去

无時不自覺語南方支法師所用多得力温和不甚損人為勝風引續命越婢等湯風引湯在前續命湯在後

陰脚氣論曰陰氣於下則為執厥則令人足熱赤腫緩縱脛軟若帶抽痛喜嘔叫好明處者陽脚氣之候也宜以防風湯食後元三黃元竹瀝湯紫雪犀角飲及針石之類方重校定防風湯等並於本門前已重出

雞金普濟方第四

雞金普濟方卷第五

馮翊賈兼重校定

傷寒 中暑附

聖澤湯 治傷寒時行疫癘風濕温不同陰陽兩感表裏未辨或內熱外寒頭項腰脊拘急疼痛發熱惡寒肢節疼痛嘔逆喘咳鼻塞声重及食飲生冷傷在胃脘骨滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利亦名聖散子

草豆蔻拾 猪苓 葛蒲 良薑 羌活
附子 麻黃 厚朴 藁本 白芍藥
枳殼 柴胡 澤瀉 細辛 防風
白木 藿香 半夏各半 甘草壹兩

方五

右為鹿末每服四錢水一盞半煎至一盞去滓熱服不以時一方加木吳茱萸

五積散 一名異功散治一切風疾解傷寒及五勞七傷頭痛目赤咽喉痛澁痰涎不利勞疾咳嗽及產前產後諸疾

蒼朮陸拾 桔梗陸拾 桂枝兩 白芍藥兩 白芷兩
枳殼兩 厚朴陸 茯苓 人參各壹 當歸兩
川芎肆兩 半夏兩 甘草 麻黃各玖 乾薑兩
陳皮兩 烏頭兩 附子 天南星各壹
木香半兩 名順

右為鹿末每服二錢生薑白水同煎不以時一服以水一盞煎七分

木香元治瘴氣

檳榔 陳皮各參 木香 附子 人參

厚朴 羌活 獨活 芎 甘草

荆三稜 大黃 赤芍藥 乾薑 桂各半

黑牽牛肆兩 肉豆蔻兩

右為細末瓷器密盛之臨服用牽牛末二兩藥末一兩

研勻煉蜜和元如梧桐子大心腹脹一切風疾勞冷氣

臍下刺痛口吐清水白沫醋心疰癖氣塊男子腎臟風

毒攻刺四躰及陽毒脚氣目昏頭痛心間嘔逆及兩脇

堅滿服時橘皮湯下三十元以利為度自後每夜二十

元女人血痢下血刺痛積年血塊胃口逆手足心煩熱

方五

不思飲食薑湯下三十元取利每服每夜更二十元小

兒五疳氣腹脹氣口空心溫湯下五七元小者減之凡

胃腸飽悶不消脾泄不止臨臥溫酒下取利食毒癰疽

發背嵐瘴氣纒竟頭痛背膊拘急便宜服之決利為度

常服可以不染瘴氣凡瘴昏因脾胃實熱所致常以涼

藥解兩上壅熱并以此藥通利弥善此元本治嵐瘴及

溫瘴大効服訖灸氣海百壯中脘三十壯尤善

順氣散

治脾元虛弱肌体羸瘠食飲難消胃弱痞悶痰多

嘔逆氣刺脹滿及外感寒邪頭昏躰倦項強惡寒並宜服

當歸 厚朴 乾薑各陸 人參 茯苓

半夏 芎各肆 枳殼陸 陳橘皮陸

桔梗兩 甘草 白芷 桂各錢 白朮

白芍藥錢

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片葱白二寸煎至

六分去滓食前溫服

神健散解利傷寒

人參 白朮 牡丹 桑白皮 當歸

柴胡 枳殼 桔梗 甘草 杏仁

旋覆花 澤瀉 茯苓 半夏 芎等分

右為細末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫熱服食

後空時

林檎散治傷寒及時行疫癘頭痛項強壯熱惡寒腰背拘

方五

急四肢煩疼面赤嘔乾嘔逆煩渴

川烏頭 乾葛 木通 大黃 石膏

桔梗 山柘 藿香 覆麥 白朮

甘草 桂各壹 麻黃兩

右為鹿末每服二錢水一盞入林檎片十數片新者亦

得煎至七分去滓稍熱不以時服相次再服衣被覆出

汗

犀角散治熱病黃疸熱渴及熱惡酒勞胃滿氣促皮膚漸黃

如金色

犀角屑 通草 人參 柴胡各壹 葛根

秦艽 知母 藍葉 桔梗 桑根白皮

赤茯苓 各壹兩

右為細末每服四錢水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合攪令勻非時溫服

人參前胡散 治風溫癘氣頭痛項強壯熱惡風身躄煩倦及寒咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔逆寒熱加陳皮杏仁名百解散亦名敗毒散

柴胡 前胡 羌活 獨活 桔梗

枳殼 人參 茯苓 甘草 芎 各壹兩

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服加薄荷三葉煎為佳

百順散 解利傷寒

方五

芎 壹兩 羌活 防風 木通 荆芥

甘草 大力子 各壹兩 菊花 白芷

麻黃 各半兩

右為細末每服一錢白湯點服如解傷寒加生薑薄荷煎

刺薊散 治熱病吐血并鼻衄不止頭面俱熱

刺薊 川升麻 雞蘇莖葉 川朴硝 各兩

子芩 赤芍藥 各壹兩 大青 犀角屑

甘草 各壹分 生乾地黄 兩式

右為細末每服四錢水一中盞煎至六分去滓非時溫服

附子散 治天行病七日已上熱勢弥固大便秘澁心腹痞滿飲食不下精神昏乱恍惚狂言異語其脉沉細眾疾之中無一可救計訣

附子 白鮮皮 茵陳 各半兩 白朮 吳茱萸

時 右為鹿末每服三錢水二盞煎至一盞去滓溫服不以

大半夏湯 与驚冒湯治病相近

半夏 大黃 各伍兩 吳茱萸 朴硝 桂 各壹兩

牡丹 柴胡 乾薑 細辛 白朮 各壹兩

右如前法煎服

方五

中和散 治熱病毒氣在心脾燥口乾煩悶

犀角屑 瓜蒌根 川升麻 寒水石 葛根

胡黃連 生乾地黄 各壹兩 麥門冬 兩式 甘草 半兩

右為細末每服一錢以新汲水調下非時

麻黃元 治傷寒解正頭疼兼治破傷風及一切諸風

麻黃 兩式 烏頭 水浸三日換水 石膏 泥裹火燒通赤

天南星 半夏 石龍腦 研已上各肆兩 麝香 壹分

白芷 兩 甘草 兩 龍腦 兩 麝香 壹分

右水煮天南星為元如小彈子大每服一元葱茶或酒嚼下薄荷茶亦得此乃白龍元加麻黃去寒水石膏小傷風服之甚妙

前胡散 治熱病壯熱咳嗽頭痛心悶

前胡 川升麻 地骨皮 杏仁 湯去皮尖麩

紫苑 各壹兩 石膏 貳兩 麥門冬 貳兩 甘草 半兩

右為細末每服五錢水一大盞竹葉五七片煎至五分去滓非時溫服

生地黄飲子 治熱病毒氣攻肺咳嗽中生瘡

生地黄 兩 川升麻 玄參 川大黃 生 貝母

麥門冬 百合 甘草 各壹兩 柴胡 貳兩

右細剉和勻每服半兩水一大盞煎至五分去滓入蜜一小匙更煎一沸放溫非時服

百合散 治熱病心肺熱感小便黃赤上氣咳嗽

百合 壹兩 杏仁 木通 黃芩 各壹兩 麥門冬

甘草 甜葶藶 各叁分 麻黃 紫苑 各半兩

右為鹿末每服五錢水一大盞煎至五分去滓非時溫服

川升麻散 治熱病口瘡壯熱頭痛心神煩躁

升麻 玄參 黃連 大青 知母

黃芩 各壹兩 柴胡 壹兩 甘草 叁分 地骨皮 兩

右為鹿末每服三錢水一盞入淡竹葉五七片煎至六分去滓非時溫服

馬蘭根散 治熱病咽喉閉塞連舌腫疼

馬蘭根 川升麻 玄參 各貳兩 川大黃 生 射干 各叁分

犀角屑 木通 棘針 甘草 各半兩

右為細末每服五錢水一大盞煎至五分不時去滓溫服

白藥子散 治熱病咽喉腫塞連舌根疼痛及乾嘔頭疼不下食

川升麻 白藥 前胡 石膏 各壹兩 羚羊角屑

甘草 貳兩 玄參 叁分 麥門冬 壹兩 川朴 貳兩

右為鹿末每服五錢水一盞竹茹一分煎至五分去滓非時溫服

和解湯 治血氣虛弱外感寒邪身軀疲倦壯熱惡寒腹中疼痛鼻塞頭昏痰多咳嗽大便不調

白芍藥 桂 各叁分 厚朴 甘草 乾薑

白朮 各壹兩 人參 茯苓 各壹兩

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六分去滓溫服不以時

麥門冬散 治熱病頭痛咳嗽

麥門冬 壹兩 葛根 貝母 各叁分 柴胡 壹兩

百合 川升麻 各半兩 梔子仁 甘草 各壹分

右為鹿末每服四錢水一中盞入豉半合葱白二莖煎至六分去滓非時溫服

麻黃散 治熱病咳嗽不止心骨煩悶上氣喘促

麻黃 前胡 紫蘇子 各叁分 大麻仁

桑白皮 杏仁各壹兩 麥門冬壹兩半 甘草半兩
右為鹿末每服五錢以水一盞煎至五分非時溫服

解風散 解利風寒頭昏拘急躄倦
荊芥 麻黃 石膏 細辛 羌活
人參 芎各壹兩 甘草半兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分溫服不以時

調中湯 治暑氣

陳粟米叁兩 縮砂 香薷 苳陵香
藿香 香附子 甘草 白扁豆各壹兩

右為鹿末每服二錢生薑煎服不以時

八神湯 辟除霧露山嵐之氣消飲食補脾胃

方五
神翅炒 麥孽炒 青鹽炒各兩 甘草炒各兩 胡椒式錢
生薑陸兩去皮生研 草豆蔻式個大者黃熟去麩并皮

丁香

右除丁香胡椒外將六味合杵成鹿滓帶潤淹一宿焙乾同八味搗為細末沸湯點服不以時

水胡盧元 治胃暑伏熱欲渴引飲口乾無味

百藥煎兩 甘草壹兩 烏梅肉 白梅肉各半兩
人參 乾葛 麥門冬各壹兩 紫蘇葉兩

右為細末煉蜜和元如櫻桃大含化一元不以時如无百藥煎以餘甘子代尤妙

温白丹 治傷寒及冷腹痛

黑附子炮 白附子 川烏頭 半夏 乾薑半兩
天南星各壹兩肆味漿水浸軟切焙 石膏
寒水石各壹兩
右為細末水煮麵糊為元如豌豆大每服十元五元生薑艾菜湯下

蘇無湯 治形表虛疎風邪乘襲頭昏煩強壯熱惡風鼻塞
聲重肢節煩疼及時行疫癘冬溫瘡疹悉解

人參 白朮 白茯苓 羌活 防風
芎各壹兩 甘草半兩

右為鹿末每服二錢水一盞薑三片棗一枚同煎至六分去滓溫服不以時

順氣人參散 溫和表裏祛逐風寒治壯熱頭痛項強腰疼
心胃氣痞咳嗽痰多發熱惡寒响葛不利

人參 桔梗 乾葛 白芷 白朮各壹兩
乾薑 甘草各半兩

右為鹿末每服二錢水一盞薑三片葱白二寸煎至六分去滓溫服

金沸草散 治傷寒暑熱風氣壅盛頭目心胃不利婦人血

風潮發丈夫風氣上攻其壯如醉人中腕有痰令人壯熱頭痛項筋緊急時發寒熱皆類傷風則汗出如風盛則解利

荊芥肆分 麻黃 旋覆 前胡各叁分 甘草

半夏 芍藥各壹分

右為細末每服三錢水一盞荆芥三穗煎至八分去滓熱服不以時

屠蘇酒方辟疫氣令人不染溫病及傷寒時疾

大黃拾貳 白木拾捌 桔梗 蜀椒各拾 桂拾捌
烏頭陸 芩莢拾貳

一方無大黃加防風一兩大棗二分

右七味吹咀紅袋盛以十二月晦日中懸沉井令至溼正月朔日平明出藥置酒中煎數沸於向東戶飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得三朝還淨至井中能仍歲飲可無

病當家內外有井皆悉著藥辟溫氣也

地黃煎治熱病熱毒氣攻咽喉腫痛連舌根生瘡

生地黄汁半升 牛蒡根汁參合 蜜參合
黃丹壹兩 杏仁貳兩 鈔霜壹分 太陰玄精半兩

右合研勻入銀器內重湯煮用槐枝子撓不得住看色紫即傾入瓷合中盛每服不以時取如小彈子大含嚥津

龍膽煎治熱病口瘡發渴疼痛不可忍

龍膽 黃連 川升麻 槐白皮 大青各壹兩
竹葉 薔薇根各式

右細剉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜三合慢

火煎成膏塗於瘡上有涎吐了

小香薷元治暑氣

香薷壹兩 白扁豆 木香各壹兩 藿香 茯苓各半
益智壹分 丁皮貳兩

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服三十元食前紫蘇湯下

和解散治溫疫散寒邪解利傷寒

川芎 羌活 獨活 厚朴 蒼朮
細辛等分 甘草減半

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服不以時

香朴補虛湯治傷寒傷食及夏秋瘧疾不過三兩服見効

大益脾胃老幼皆可服
厚朴 蒼朮各拾分 茴香 附子 乾薑各伍分
陳皮肆分 甘草參分

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一箇同煎至八分溫服空心生薑鹽煎不以時服亦可

六神散調適陰陽和養榮衛治脾胃虛弱不思飲食肌躰瘦瘠咽乾口燥時氣已經汗下血氣已虛邪猶未解變生諸疾

人參 白朮 黃耆 甘草 百合
茯苓各壹兩

右為細末每服二錢水一盞生薑二片棗一箇煎至六分去滓服不以時

含化射干元 治熱病脾肺壅熱咽喉腫塞連舌根痛

射干 川升麻各壹兩 鵬砂 甘草各半兩

杏仁 豉心各貳兩

右為細末研藥令勻煉蜜和杵三二百杵元如小彈子

大每服含化一元嚥津

生地黄煎 治熱病心胃煩熱口乾皮肉黃

生地黄汁 生苡蕒根汁各伍兩

蜜壹兩 生麥門冬汁伍兩 酥壹兩 生藕汁壹兩

右一處相和於鍋中熬令稠每服不以時抄服半匙

方五 十二

犀角煎 治熱病咽喉赤腫口内生瘡不能下食

犀角屑 川升麻 川大黃 黃藥各壹兩 馬牙硝

黃蘗各半兩

右為末以水四大盞煎至一大盞去滓入蜜三合相和

更煎一兩沸放溫徐徐含嚥

紅藍花散 治熱病吐血心胃不利

紅藍花 川大黃各壹兩 訶梨勒皮 羚羊角屑

黃芩 刺薊各參分

右為鹿末每服五錢水一大盞煎至五分去滓下赤馬

通汁半合更煎一兩沸非時溫服

疏黃元 治中暑吐逆不止

硫黃 焰硝 滑石 白礬各貳兩

半夏兩 白麵兩 和時入

右為細末薑汁和元如梧桐子大每服二三十元熟水下小兒三五元

大戟散 治結胃傷寒下不透者服此立得出汗

大戟 甘遂各壹兩 膩粉 半兩 硫黃壹分

水銀半兩 同研勻以新

右合研勻每服一二錢溫漿水調下

柴胡芍藥湯 治傷寒溫疫身壯熱頭痛項強腰背四肢

煩疼脇下牢滿乾嘔噦逆不能飲食及婦人經水方來適

斷熱入血室寒熱如瘧讞言妄語

方五 十三

柴胡兩 赤芍藥 人參 甘草各貳分 半夏陸錢

右為鹿末每服三錢水一盞半生薑五片棗三個煎至

八分溫服不以時

竹葉石膏湯 治虛煩頭痛痰逆惡心潮熱煩燥口乾好飲

四肢倦怠嘔吐心忪及瘵時行氣病後虛羸吸吸少氣惡

心欲吐全不入食

人參 甘草 石膏兩 麥門冬兩 半夏參分

重校定此方內人參甘草五分兩此方南陽活人書亦載之內人參甘草各半兩

右為鹿末每服四錢水二盞竹葉二十片粳米一合生

薑三片煎至七分食後服

小柴胡湯 治傷寒溫病表證未解壯熱惡風頭痛項強骨

節煩痰寒熱往來裏病尚在胃滿脇硬嘔逆煩渴噤嚙可食又瘵婦人中風續得寒執發作有時經水適斷熱入血室其狀如瘵

柴胡 人參 黃芩 甘草各各半夏壹分
右為鹿末每服三錢水一盞半生薑四片棗二箇煎至六分去滓溫服

五苓散 治水飲停積留滯不散胃膈膨悶腹脹喘逆口乾引飲嘔噦惡心中暑煩渴脾濕生黃殮泄注下水穀不分及瘵傷寒惡亂頭痛發渴口燥消渴水入吐逆心下痞悶小便不利

澤瀉壹兩白朮 猪苓 茯苓各各桂兩

右為細末每服一錢熟水調下不以時

交泰元 治陰陽痞隔榮衛差錯水火不交冷熱乖適邪熱炎上煩躁悶亂昏塞不省人事冷氣上衝胃膈痞塞霍亂吐瀉手足逆冷唇青氣喘及瘵傷寒下早冷熱結痞心下脹滿嘔噦咳逆陰陽不辨並宜服之

硝石 硫黃研細於銚子內炒 五靈脂
青皮 陳皮各壹兩

右為細末水煮麪糊和元如梧桐子大每服二十元米飲下不以時

竹茹散 治熱病吐血兼草衄不止

青竹茹壹兩 子芩 蒲黃 伏龍肝錢各

生藕汁貳合

右先以水一大盞半煎竹茹子芩至一盞去滓下蒲黃等三味煮勻非時分為三服

萬參散 解風溫時疫瘡疹

姜蕤 乾葛 人參 甘草 芎

右等分為細末水煎二錢水一盞煎至七分去滓熱服食後

牛黃元 治伏暑氣不問新久曾經取轉針灸不效臥床危困及傷寒餘毒并四時山嵐之氣皆治

大黃好者 白不灰木好者各壹兩 黑牽牛壹兩半用壹
粉霜光明者壹分有黃石者不用 朴消壹兩壹分去月白成塊子佳黃色不用

右除粉霜別研外餘為末入粉霜同拌勻煉蜜和元如梧桐子大隨證服之每服三五元食後以生薑湯下熱多者可服

紫蘇丁香元 消暑益胃調陰陽止煩渴寬中進飲食消痰定逆

真紫蘇葉 好人參 桂 陳皮不去
丁香各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十五元至二十元溫熟水嚼下不以時

人參四順湯 治表裏俱虛傷冒寒冷腹脇脹滿嘔逆痰涎及治邪中陰經手足厥冷既吐且利小便頻數裏寒身躄

疼痛脉細微下利清穀頭痛惡寒亡陽自汗

人參兩壹 附子壹个 乾薑兩壹 甘草兩貳

右為鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓食前温服

甘草附子湯 治風濕相搏骨節疼痛腰痛不得屈伸近之

則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者

甘草 白朮各壹兩 附子壹个 桂枝壹分

右為鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓温服不以

時身腫者加防已二兩悸氣小便不利者加茯苓

升麻散 治風温疫癘頭疼身痛壯熱惡風口鼻乾燥眠卧

不穩目眩項強及小兒風温瘡疹已發未發

升麻 葛根 白芍藥 甘草

方五 十六

右等分為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓温服

不以時

大順散 治伏熱傷冷脾胃受濕水穀不分霍乱吐瀉心胃

煩悶燥渴引飲腸脇疼脹不思飲食

乾薑兩壹 杏仁 桂枝各半兩 甘草兩壹 炒黃色

右為細末每服一錢沸湯點温冷任意不以時

梅實散 調中止渴去痰滯消宿酒治霍乱煩熱心腹不安

服之令多睡又治諸瘧少力氣弱吐逆不利肢躄倦痛好

睡口乾或傷寒躁渴虛勞骨蒸產婦氣刺

白梅兩拾 白檀兩拾 鹽拾伍 甘草拾壹

右為細末每服一錢沸湯點服或乾摻舌上嚥津亦得

不以時

防己黃耆湯 治榮衛虛弱風湿相乘關節煩疼一身沉重

惡風自汗洒淅不欲去衣及治風水客搏腰脚浮腫上輕

下重不能屈伸大便不利

黃耆兩伍 防已兩肆 白朮兩壹 甘草兩貳

右為鹿末每服三錢水一盞生薑三片棗二个煎至一

盞去滓稍熱服取微汗

承氣元 治傷寒十餘日不大便者

大黃 杏仁各壹兩 枳殼兩壹 芒消壹兩

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元用白湯六分

化破温服不以時

方五 十七

石膏元 治傷寒偏正頭疼惡心痰逆

石膏兩肆 元精石兩貳 硝石 烏頭各壹兩

右為細末薑汁糊和元如梧桐子大荆芥湯下十元至十

五元

白朮附子湯 治風湿相搏身躄疼煩不能轉側惡風多汗

食不知味不嘔不渴躄若黃黃風虛眩冒

白朮兩肆 附子壹个 甘草兩貳

右為鹿末每服三錢水一盞生薑三片棗二个煎至六

分去滓温服不以時

香薷散 治冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起

居不節或露卧湿地或當風取凉冷氣乘於三焦傳於脾

胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間致吐利心腹疼痛霍亂吐逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛眩疼而腹吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而逆脈絕或煩悶昏塞而欲死者一方加黃連

香薷去梗厚朴 白扁豆 各壹兩

右為鹿末每服二錢水一杯酒一分煎至七分水中沉

冷連喫二服 一方無白扁豆只用黃連

消毒黃龍元 治中腸煩躁汗出身熱頭疼痰逆惡心口燥多渴胃滿不利飲食減少昏困嗜卧又治暑毒熱氣內伏

方五 十八

久久不已變成瘡癩黃疸困倦減食日漸羸瘦

半夏各 白茯苓 甘草 生各

右為細末薑糊元如粟豆大每服二十元生薑湯下煩

躁用新汲水下不以時

貝母散 治熱病鼻衄不止

貝母 刺薊 蒲黃 各壹兩

右為細末每服一錢新汲水調下非時

三順散 治暑氣

乾姜 陳橘皮 甘草 各半

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

復陽湯 治脾胃虛弱陽氣衰微手足逆冷煩躁吐逆咽中乾燥自汗惡寒及肺痿吐唾涎沫上虛不能制下小便頻數遺溺虛強

乾薑壹錢 甘草貳錢

右為鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

薑附湯 治於逆中寒心腹冷痛痰飲痞滿飲食不下腹內拘急脇肋牽疼及治攻下太多發汗過甚陽氣虛弱陰邪獨在手足厥冷脈候沉微不嘔不渴身無熱證盡日煩躁不能眠夜則安靜或欲寐諸虛寒濕悉宜服之

乾薑 壹兩 附子 壹個

方五 十九

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

枳殼湯 治傷寒痞氣胃滿欲死者

枳殼 各壹兩

右剉如豆大用水一盞半煎減半去滓分二服

通毒散 治瘴氣截傷寒

蒼朮 兩 甘草 貳

右為細末每服三大錢生薑葱白煎水一盞半煎至一盞去滓熱服不以時

暑暈湯 治暑暈巡悶絕不救者

道上熟土 大蒜

右各等分爛研冷水和去滓飲之又治暑伏肌膚瘡癩爛

或因搔成疹者取乾壁土搗細末傅之隨手即卷

酒煮黃連元 治暑毒伏深累取不差無藥可治伏暑發渴者宜服

黃連 肆兩以无灰酒浸藥上約一寸重湯熬之

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大熟水下二三十元胃滿不熱不渴為驗

神仙辟温湯方

每年臘辰前一日看合家幾口用黃明乳香一小塊子合聚於乳鉢內順日在研極細即於臘日五更初起旋汲井花水先取數滴在乳鉢內香末如泥然後添水調勻五更面東每人呷一茶脚許老小任意加減此方得

方五

廿

於孔宗翰待制家眷百口服之數十年无疫癘之疾

冷壺散 治伏暑傷冷暴瀉不止

右鹿剉良姜末水煎三錢沉冷服

黑龍散 治傷寒陰盛隔陽身冷煩躁脉細沉緊

附子壹箇半兩者燒存性取出以冷灰培殺

右細研入真腦茶一大錢同分作二服每服用水一盞蜜半匙同煎至六分放冷飲之須臾躁止得睡汗出為効

治傷寒下部生膿瘡

烏梅肉 參兩炒燥

右為細末煉蜜和元如梧桐子大煎石榴皮湯下十元

治傷寒蝕狐 或出蝕下部肛外如馬痛痒不止

雄黃半兩

右先取小口瓶子一箇內盛灰如粧香法燒薰

治熱病下部有膿生瘡

右以鹽炒熟以綿裹熨之

循衣摸床 大承氣

有人苦風痰頭痛顛掉吐逆食飲減少醫以為傷冷物遂以藥温之不愈又以元藥下之遂厥復与金液丹後謔語吐逆不省人事狂若風鬼循衣摸床手足厥冷脉伏此胃中有結熱故昏瞶不省人事以陽氣不能布於外陰氣不能持於內即顛掉而厥遂与大承氣湯至一劑乃愈

方五

廿一

後服金箔元 方見刪繁

不卧散 截傷寒

蒼朮 川芎 甘草 藁本 各壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞葱白三寸同煎至八分去滓温服熱服不以時

滓温服熱服不以時

百解散 治風温疫氣頭昏壯熱肢節煩疼

前胡 柴胡 人參 白朮 茯苓

羌活 桔梗 川芎 各壹兩 甘草 陳皮 各壹分

右為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至六分去滓食後温服

滓食後温服

三山元 治傷寒食疫氣温黃疾病勞瘧嵐瘴

山茵陳 川大黃各壹兩 常山 山梔子 杏仁

芒消各壹兩 豉心伍兩 巴豆壹兩 驚甲貳兩

重校定三山元山茵陳五分兩此方千金方內亦載之名曰山茵陳元山茵陳合用叁兩

右為末煉蜜和元如梧桐子大每服十元葱湯下老幼

臨時加減喫藥或吐或利或汗或瀉其疫氣當解如風

熱盛未行再服三五元投之婦人血氣刺痛醋湯下十

元如患傷寒不定日數早晚並可服若不是兼食傷寒

不可於三日已前服之如是傷寒五七日已後胃膈痞

悶喘急嘔逆亦可服若无此證候不可與服

羌活散治傷寒頭疼身倦發寒熱

羌活 菊花 麻黃 川芎 防風

方五 廿一

石膏 前胡 茯苓 蔓荊子 甘草

白殭蚕 細辛各壹兩 枳殼 黃芩各半兩

右為鹿末每服二錢水一盞生薑四片薄荷三葉同煎

至六分去滓温服不以時

雜治法凡傷寒之病本是風寒暑濕疫癘之氣其證各別初

查病在表寒熱頭疼四肢拘急六脉浮緊此乃邪氣膚淺真

氣尚盛宜發汗而取安也又有初病時六脉沉澁宜用理中

元散去冷温脾胃候日高再審其脉必浮洪當令解也

又有兼飲食作孽因好用消化之藥雖不利動要為妄攻

雖復發汗不能解也

凡調治傷寒切須慎初經云傷寒之病作於陽者為病必

熱雖甚而不死惟陰厥多危細詳其由多緣寒藥及妄轉

瀉之所致也

此陰厥證皆緣始感寒服辛甘藥發散既不愈却不保其

真而調其穀氣故邪不退而成此疾若保真氣調穀氣邪

必自退也

若傷真壞穀邪氣熾盛變異多端仲景去春夏宜汗是不

可下也下汗須隨其所宜今病發於陽而反攻下必致搖

熱入骨氣結伏心胃也通滯解結藥不可不用又結胃脉

浮大下之必死可不慎哉若自得此疾全不服藥者亦得

中存真調穀七日之外十差八九今轉為藥所誤十死一

生猶去疎取不尽若胃氣不敗不問強弱老幼病重病輕

方五 廿三

无緣死得今勸病者之家應于病疾切在安養胃氣不得

妄亂攻取必无夭枉之人今將傷寒時氣論下汗吐補之

法隨順陰陽證候不損脾胃保護真源的不誤人之訣尽

述于此愚每念傷寒有倉卒之變害人最急經云傷寒吐

下發汗之相反其害至速信哉愚欲使人人尽達其理凡

衛生者幸少留心而詳考之

治療有下汗吐補交錯致於死候

夫病有宜湯宜元宜散者宜下宜吐宜汗宜灸宜針宜補

者宜按摩宜導引者宜蒸熨者宜溲洗者宜悅愉者宜和

緩者宜水宜火者種種之法豈能一也非良善專博難以

得愈於庸下識淺亂投湯元下汗吐補動使交錯輕者令

重者令死卒世皆然

且湯可以蕩滌臟腑開通經絡調品陰陽祛分邪惡潤澤

枯朽悅皮膚益氣力助困竭莫離於湯也

元可以逐風冷破堅癥消積聚進飲食舒榮衛宣開竅緩

筋脉無出於元也

散者能散風寒暑濕之氣摠寒溫濁穢毒發揚四肢雍滯

剪除五臟之結伏開腸利胃行脉通經莫離於散也

下則舒豁閉塞

補則益助虛乏

灸則起陽救陰

針則行榮引衛

道引則可逐客邪流利關節

按摩則可以祛浮腫於肌肉

當汗而不汗則使人毛孔閉塞悶絕而死

當下而不下則使人腹脹通手浮腫而死

當吐而不吐則使人胃結上喘水食不入而死

當灸而不灸使人冷氣重凝陰毒乃聚厥氣上衝分決不

散以致消滅

當針而不針則使人榮衛不行經絡不利邪漸據真睛昧

而休

宜導引而不導引則使人邪浸關節固徑難通

宜按摩而不按摩則使人淫隨肌肉久留半消

宜蒸熨而不蒸熨則使人冷氣潛伏漸成痺厥

宜澡洗而不澡洗則使人陽氣不行陰邪相害

不當下而下則令人開腸蕩胃洞泄不禁

不當汗而汗則令人肌肉消絕津液枯耗

不當吐而吐則令人心神煩亂臟腑奔衝

不當灸而灸則令人傷經害絡內畜炎毒及害中和致於不救

不當針而針則使人氣血散失機關細陷

不當導引而導引則使人真氣勞散邪氣妄行

不當按摩而按摩則使人肌肉內衝腹腫筋骨舒張

不當蒸熨而蒸熨則使人勞氣頓行陰氣內聚

不當澡洗而澡洗則使人濕起皮膚熱生肌躄

不當悅愉而悅愉則使人神失氣消精神失次

不當和緩而和緩則使人氣停意折健忘傷失

大凡治療要合其宜脉候病狀少陳於後病不發汗則勿

發其汗脉不疾數則勿踈其下心胃不閉尺脉

微弱不可吐也

關節不急榮衛不壅不可用針

陰氣不盛陽氣不表不可灼艾內無客邪勿導引外無淫

氣勿按摩皮膚不痺勿蒸熨

肌肉不塞勿澡洗

神不凝迷勿悅愉

氣不奔走勿和緩順之者生逆之者死爾謹叙下汗吐補

交錯證下於前病類對藥備說於後九衛生者
宜加意而詳審焉

經曰治傷寒有法非雜病之比然昔人重氣強實可以依
次用法治療今人氣血怯弱其治法之要宜以
溫藥扶持過七日之後邪氣自衰如遇有他證
則隨證用藥无不愈也

九似元 治中暑伏渴變生諸疾時發寒熱似瘧疾頭痛壯
熱似傷寒翻胃吐食似雨氣飲水不止似消渴小便不利
似淋瀝大便有血似臟毒困倦无力似虛勞通身黃腫似
食黃眼精黃赤似酒疸

船上硫黃 玄精石 滑石

方五

寒水石煨過江水 甘草 白礬

盆硝各半 寒食麵壹

右為末滴水元和彈子大每服一元同芝麻生薑各小
許同細嚼唾津嚥下食後臨臥非時服亦可

香蘇散 治瘟疫及煙嵐瘴氣

紫蘇葉兩 陳橘皮貳兩不

香附子肆兩慢火炒 甘草壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服不拘
時候服

柴胡地黃湯 治產後惡露方下忽尔斷絕晝日明了暮則
謔語寒熱往來如見鬼狀此為熱入血室不即治之諸變

不測

柴胡兩 人參 黃芩 甘草 地黃各壹

半夏貳

右為鹿末每服五錢水二盞生薑三片棗一个煎至一
盞去滓溫服

葉散 治頭目昏重鼻塞涕

防風 白芷 何首烏 麻黃 甘草

白芍藥 旋覆花各壹

右件為細末每服二錢茶清調下食後服

如聖散 治風毒上攻頭目偏痛

煇消續 青黛壹 鬱金 薄荷茶 川芎各貳

方五

鴨砂壹

右為末鼻內搗之

芎辛散 治風客陽經頭痛暈眩項背拘急肢麻痺痛倦鼻
塞聲重發熱惡寒及諸語澀麻痺而筋掣

川芎肆 蒼朮捌錢 甘草錢 細辛壹

右為末每服一錢茶清調下不以時

大聖人參散 治頭昏眩倦胃弱不利狀若感寒

白朮 人參 白芷 葛根 青皮

桔梗各壹 甘草 乾姜各貳

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六
分去滓食前溫服

五卷末

雞峯普濟方卷第七 馮翊賈兼重校定

補虛

走馬茴香元治腎虛挾寒小腸氣痛

附子 桂 葫蘆巴 馬蘭花 青橘皮

川練子 乾薑 茴香 破故布 巴戟各壹兩

右為細末酒煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元空心溫酒下

乳粉散補虛扶衰

鍾乳粉壹兩 金釵石斛 人參各壹分 乾薑半兩

右為細末合和勻每服一錢以酒一分米飲擦生薑汁少許同調服再用米飲送下空心服

方七

薯蕷元治健忘安魂魄

薯蕷 遠志 熟地黄 天門冬 茯苓

龍齒 地骨皮 防風 茯苓 麥門冬

人參 桂各陸分 五味子 車前子各伍分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大酒服二十元食後臨臥

巨勝煎補虛損變白為黑髮

巨勝半大 地黄拾斤取 杏仁伍大 桂末壹兩

黑豆黃子壹大升 乳蘇伍兩

右先下地黄汁煎至三升次下杏仁巨勝乳蘇等候凝下豆桂末和元如梧桐子大每服四五十元溫酒下不

以時

五補鹿茸煎治腎氣虛損五勞七傷腰脚酸疼肢節苦痛

目暗眩暈心中喜怒恍惚不定夜卧多夢覺則口乾食不知味心神不樂多有悲怒心腹脹滿尿有餘瀝

鹿茸拾伍分 天門冬柒分 熟乾地黄 菴蓉各拾分

巴戟 五加皮 五味子 天雄 人參

防風 牛膝 遠志 石斛 狗脊

薯蕷各肆分 萆薢 石南葉 蛇床子 白朮各叁分

兔絲子伍分 覆盆子 石龍芮各捌分 杜仲陸分

茯苓伍分

方七

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心米飲下有風加當歸黃耆茯苓神菴活栢子仁芎藭增石南

五加皮天雄白朮有氣加厚朴枳殼橘皮有冷加乾薑

桂吳茱萸附子細辛川椒泄精加茈萆子白龍骨牡蠣鹿

茸泄痢加赤石脂龍骨黃連烏梅各三分

茴香煎治丈夫元臟久虛冷氣攻衝臍腹絞痛腰背拘急

面色痿黃飲食減少及膀胱小腸氣痛并腎臟風毒頭面

虛浮目暗耳鳴脚膝少力腫痛生瘡婦人血臟虛冷飲食

減少肢膝疼痛久服補虛損除風冷壯筋骨明耳目

茴香 赤小豆各壹分 川練子 川烏頭 萆薢

防風 威靈仙 青橘皮 烏藥伍分 川椒貳分

地龍壹分

右為細末酒煮麵糊和元如梧桐子大酒下二十元小腸氣痛炒生薑茴香酒下脚轉筋木瓜湯下腹痛清利艾湯下

熟乾地黃元 治虛勞損小便出血時復澀痛

車前子 熟乾地黃 葵子 鹿茸

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元食前米

飲下 重按定此方無分兩與指迷方內從蓉元一同並各用壹兩

地黃煎元 治腎臟風勞損添精補髓益氣養神駐顏調血

脉令人輕健

生地黄 伍斤取汁 無灰酒 壹斗貳味於銀器以火熬成膏

肉苁蓉 貳兩 巴戟 壹兩 鹿茸 貳兩 桑螵蛸 貳兩

方七

五味子 蛇床子 石斛 枳殼 黃耆

牛膝 兔然子 陳皮 石龍芮 沉香

鹿角膠 各壹兩 補骨脂 附子 各貳兩

右為細末用先膏和元如梧桐子大温酒下三十元空心

心

人參薯預元 治腎臟虛弱客風流入四肢腰背拘急不能

俛仰躄熱身重毒風上攻心胃悶滿攻注頸項志意不樂肌膚消瘦嗜卧無力喜怒好忌若服煖藥又加轉甚常服聰明耳目保定骨髓開心強記去驚怖除邪熱四支煩滿沉重虛勞等疾

生地黄 人參 防風 薯預 五味子

茯苓 各壹兩 麥門冬 貳兩 貝母 遠志 各半兩 熟地黃 百部 栝子仁 丹參 杜仲 茯神

右為細末煉蜜和元如櫻桃大或梧桐子大每服十元

熟水下食後

無名丹 補氣守神澁精固陽道男子服之有奇功非筆舌

可盡量其作用非至神不能處之無名可稱其効因此為名

茅山蒼朮 壹斤 川烏頭 壹兩 龍骨 破故紙 各貳兩

川練子 茴香 各叁兩

右為細末酒煮麵糊和元如梧桐子大以朱砂為衣多

方七

可百元少止三十元空心食前温酒或米飲鹽湯下欲

得藥力冷酒下五十元婦人無子至百日妊娠

固真丹 固真壯陽氣專治遺精遺泄及虛損真耗等疾

天雄 長者壹對 雞頭殼 伍拾個 覆盆子 半斤

龍骨 肆兩 家茱子 半斤 蓮花葉 採月採日採者肆兩 密膏乾

右以水七升煮陝西白蒺梨二升耗至五升去蒺梨子

將所煎汁再入銀鍋內熬如餛飩狀又入白沙蜜四兩同

熬數沸將此膏子同和前件藥末看稀稠得所元如梧

桐子大每服三四十元空心温酒下服至百日精氣固

密神彩倍常忌菜車前子等

玉關元 亦名越邪丹治男子婦人關鍵不牢精源失禁神

志恐怯夢見婦人宜進此藥服藥數日後雖與陰人交交而不泄又服數日後雖與陰人戲戲而不交又服數日後遂見陰人回避而走程君容楊廷珪桓虞臣皆曾病此與說先有夢應之驗悉皆不信至服藥次漸見如余所說神妙有如此者

山茱萸 補骨脂 龍骨 牡蠣
白茯苓 青蘘

右等分為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十粒空心煎車前子菜湯下乃太醫博士巢氏治隋煬帝方
毗沙門元 治諸虛熱頭昏眩運耳鳴作聲口乾微嗽手足煩熱怔忡不安

熟乾地黄方七 阿膠壹分 黃耆 五味子
天門冬 山藥各貳分 栢子仁 伏神 百部
丹參 遠志 人參 麥門冬各壹分
防風貳分

右為細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元水八分煎至五分和滓熱服臨臥

木香散 治虛勞氣弱寒熱往來不思飲食口舌生瘡四肢勞倦五心煩躁肌膚不澤

木香壹分 鼈甲 銀州柴胡各壹兩 秦艽壹分
黃耆兩 知母 茯苓各壹分 人參壹兩 桔梗兩
白木兩 甘草兩 防風分 肉豆蔻壹分 白芍藥分

半夏 枳殼各半兩

右件藥並洗澤淨須是州土者依分兩細剉如粟豆大每服半兩生薑一分棗三個水一升煎十分以生絹濾過溫分二服辰暮各進一服盡將兩服滓依前煎作一服

五香散 治五臟虛氣攻注四肢無力手足疼痛背甲氣刺日漸瘦弱心下氣滿不思飲食

鼈甲貳兩 荆三稜 茯苓各壹兩 人參貳兩
大黃分 黑附子 枳殼 牛膝各壹兩
官桂兩 羌活 檳榔各壹兩 熟乾地黄壹兩
厚朴 五味子 木香 丁香
當歸 白木 芍藥 肉豆蔻仁
沉香各壹兩

右為細末每服三錢水一大盞棗三枚生薑五片同煎至七分去滓服再將兩服滓用水一盞半煎取七分作一服

補真元 治脾元臟虛冷四肢無力喫食不得心腹滿脹或時下痢虛驚盜汗冷勞瘵癖

厚朴 蒼朮淨刮去黑皮貳味各肆兩用大棗壹斤薑貳斤細切同入鍋以漿水煮壹日耗更添之慢火熟盡水焙乾用 陳橘皮貳兩 鼈甲壹兩 石斛兩 丁香 肉蓯蓉
塗炙了焙乾 木香 巴戟 當歸 草豆蔻 訶子皮

肉桂 五味子 檳榔 山茱萸 杜仲
破故紙 人參 附子 柴胡 茯苓
沉香各壹兩 黃耆各壹兩

右件藥為細末將一半用棗肉為元如梧桐子大空心米飲下二十元一半作散米飲調下一錢或者羊肝每具用藥十錢鹽花葱白漿水煮熟空心服之又用羊肝切如柳葉更入吳茱萸半兩水煮半日五七度換水煮了焙乾與上件藥同杵羅為末依法修製服用之

敗龜散 治丈夫婦人一切風虛勞氣喘發熱並宜服之

敗龜 虎骨各半兩 官桂 木香各壹兩 海桐皮
防風 當歸 赤芍藥 木通各半兩 酸棗仁

黃耆 大腹子 麻黃 牛膝各壹兩

右為細末每服三錢水一盞入青蒿烏梅各少許同煎至七分去滓溫服又法加柴胡熟地黃各半兩

遠志散 治心虛勞損羸瘦四肢無力心神昏悶常服除寒熱利腰脚充肌膚益氣方

遠志 白朮 人參 杜仲 川椒
牛膝 白茯苓 薯蕷 山茱萸 栝子仁
生乾地黃 石斛 黃耆各壹兩 甘草半兩

肉桂 鱉甲 天門冬各壹兩
右為細末每服一錢以溫酒調下空心及晚食前服忌鯉魚葷菜

小黃耆元 治脾胃虛勞羸瘦脚膝疼痛服之充肌調中助

黃耆 覆盆子 牛膝 鱉甲 石斛
白朮 肉蓯蓉 附子 五味子 人參

沉香各壹兩 肉桂 熟乾地黃各壹兩

右為細末煉蜜和搗三二百杵元如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下三十元

磁石元 治腎氣虛損卧多盜汗小便餘瀝陰濕萎弱名曰勞極宜服此

磁石貳兩 五味子 鹿茸 兔絲子 蛇床子
車前子 白茯苓 桂心 黃耆 肉蓯蓉

防風 陽起石 附子 山茱萸 熟乾地黃各壹兩

右為細末煉蜜和元搗三五百下如梧桐子大每日空心以溫酒下三十元漸加至四十元晚食前再服

天雄散 治虛勞客邪所攻偏枯不遂肢節疼痛晝夜呻吟不能治宜服此

天雄 當歸 牛膝 白朮 桂心
側子 乾漆 狗脊各壹兩 防風 吳茱萸
枳殼 丹參各半兩

右為細末每服二錢空心及晚食前溫酒調下

酸棗仁散 治虛勞口舌乾燥心忪煩渴少得睡卧

酸棗仁 人參 黃耆 烏梅肉 麥門冬

白茯苓各壹兩 覆盆子 苾蓐 甘草各半兩
右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後臨臥服

茯神散治虛勞多渴四肢羸乏

茯神 石斛 苾蓐根 肉蓯蓉 知母
人參 白茯苓各壹兩 五味子半兩 黃連分壹

丹參 當歸 葳蕤 甘草各半兩 麥蘖分壹
右為鹿末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

苾蓐煎治虛勞躁渴四脉虛乏羸瘦

苾蓐兩 茯神 石斛 人參 肉蓯蓉各壹兩

甘草 黃連 當歸 五味子 丹參各半兩

知母 胡麻各壹兩 地骨皮 葳蕤各貳兩 蜜伍合

生地黄汁壹升 牛髓壹合 淡竹葉伍拾片

生麥門冬汁伍合 生薑汁壹合

右件藥以水三升煮地骨皮葳蕤胡麻淡竹葉四味去滓取汁一升和地黄汁麥門冬牛髓蜜薑汁等入煎藥末攪令勻又煎成膏入於銅器中每服不計時候以粥飲調下半匙

人參散治虛勞脾胃虛冷食不消化腹脇氣痛

人參壹兩 當歸 草豆蔻 桂心 白朮各壹兩
陳橘皮兩 厚朴 大麥蘖各貳兩 吳茱萸

甘草各半兩
右為鹿末每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

草豆蔻散治虛勞脾胃虛冷食不消化

草豆蔻 人參 白朮 陳橘皮 厚朴各壹兩
桂心 半夏各半兩 甘草壹分

右為鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

石斛元治久虛冷腰脚疼痛

栝子仁壹兩半 石斛 漢椒 硫黃
楮實各貳兩 杜仲 續斷 鹿茸 巴戟

附子各壹兩 補骨脂貳兩 桂心叁分

右為細末研令勻煉蜜和搗三五百杵元如梧桐子大每服食前以煖酒下三十元

迎補元治脾胃久虛積寒在內氣羸食少食飲遲化腹脹

倦怠服藥不能取効者服之即愈累經大効
舶上硫黃 陽起石 鍾乳粉

礬石各壹兩 法在炮製門中 川烏頭肆兩

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大朱砂為衣每服十元十五元空心及晚食前溫米飲下

覆盆子元治元臟虛弱臍腹疼痛脛胫乏力百節酸疼昏

倦多睡小便頻濁頭旋痰唾背脊拘急飲食無味常服溫

順臟氣補益丹田

覆盆子 肉苁蓉 黃耆各壹兩 芎藭 當歸

赤芍藥各壹分 五味子壹兩 補骨脂 烏藥

石斛 澤瀉 葶澄茄 沉香 巴戟各貳兩

山茱萸分 熟乾地黄 兔絲子各貳兩

右為細末蜜元梧桐子大空心鹽湯下二十元

麋角元 治真元虧耗榮衛勞傷精液不固大便不調食少

乏力久服填骨髓補虛勞駐顏色去方病

生麋角拾兩 附子壹兩

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子大每服三十元至

四十元空心米飲下

方七 十一

鍾乳散 治六極虛寒晝差暮甚氣短息寒主百病令人力

強能飲食去風冷

鍾乳 乾薑 桔梗 茯苓 細辛

桂心 附子 人參各貳兩 白朮肆兩 防風

牡蠣 瓜蒌各拾兩

右為細末以酒服方寸匕日三漸加二匕五十已上可

數服得方寸匕

五桑元 治亡津液虛秘大便不通結燥後重飲食不生肌

肉補虛損調三焦

大黃貳兩 前胡 半夏 苳蓉 苦苧塵

赤芍藥 白茯苓 細辛 當歸各壹兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大溫水下二十元以通

為度漸加之重校定此方大黃一味无分兩字此方千金方內亦載之大黃合用貳兩

麝香鹿茸元 益真氣補虛憊治下焦傷竭臍腹絞痛兩脇

脹滿飲食減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步艱難

目視茫然夜夢鬼交遺泄失精神 不爽陽事不舉小便

滑數氣虛腸鳴大便白痢虛煩盜汗津液內燥並宜服之

鹿茸兩 附子肆百枚 苳蓉斤 熟乾地黄斤拾

乾山藥肆斤 五味子斤 牛膝肆兩 杜仲半斤

右為細末煉蜜為元如梧桐子大用麝香為衣每服二

十元溫酒下鹽湯亦可食前

附子鹿茸煎 治肝腎氣虛肢躄疼痛

方七 十二

鹿茸 破故紙 山藥各式 桂壹兩 附子

牛膝 澤瀉 熟地黄 山茱萸 茯神

巴戟 赤石脂各壹兩 苳蓉肆兩 五味子半兩

兔絲子 杜仲各壹兩 鹿射香錢

右為細末蜜和為元如梧桐子大每服三十元空心溫

酒下

白豆蔻散 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛兩脇脹滿不思飲

食

白豆蔻 茴香子 檳榔子 木香 青橘皮各半兩

乾薑 吳茱萸各壹分 硫黃兩

右為細末每服一錢以熱酒調下不以時

木香煎治腎臟積冷氣攻心腹疼痛發歇不定

木香 桃仁 附子 青橘皮

桂各壹兩 阿魏 乾蝎各半兩

右為細末用童子小便二大盞煎藥成膏收埋器中每服不計時候生薑酒調下一茶匙

阿魏元治腎臟積冷氣攻心腹疼痛不可忍

阿魏 自然銅 硃砂各壹分 木香

白礬 乾蝎 桃仁各半兩

右為細末醋煮麵糊為元如菜豆大每服二三十元以熱生薑酒下不以時

肉苳蓉散治腎臟虛損精氣衰竭陽道萎弱

肉苳蓉 麋茸 牛膝 石斛

遠志 兔絲子各壹兩 石龍芮各壹分 雄蚕蛾半兩

五味子 蛇床子 天雄 巴戟各壹兩

右為細末每服二錢溫酒調下食前服

鹿茸續斷散治腎氣虛寒陽道不振

肉苳蓉 鍾乳粉 鹿茸各壹兩 遠志 續斷

天雄 石龍芮 蛇床子各壹兩 兔絲子壹兩半

右為細末每服二錢食前溫酒調下

附子元治腎臟衰弱手足多冷

附子 蛇床子 鍾乳粉 鹿茸

兔絲子 肉苳蓉各壹兩

右為細末醋煮麵糊為元如梧桐子大每服空心酒下

三十元鹽湯亦得

肉苳蓉牛膝元治下元補傷憊駐顏悅色

黃狗脊骨壹條兩頭去節截段留少許取硃砂壹兩

在汁中浸三日炭火炙乾以汁旋刷汁盡令黃

肉苳蓉 肉桂 附子 乾薑各壹兩 蛇床子

牛膝 五味子 胡椒 陽起石各半兩

鹿茸壹隻

右為細末用棗肉五兩酥一兩相和入臼杵一二千下看硬軟得所為元如菜豆大噉乾每日鹽湯下十元服之一月其精如火兩月精結實三月精秘不泄益顏容

壯筋力百病不生

杜仲元補下元烏髮鬚壯脚膝進飲食悅顏色治腰痛

杜仲 補骨脂 胡桃仁各壹兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大每服三十元空心溫酒下

酸棗仁散治膽虛冷精神不守頭目昏眩常多恐懼

酸棗仁 羌活 黃耆各壹兩 栢子仁 茯神

甘菊花 防風 熟乾地黄 人參各壹兩

白芍藥 當歸 甘草各半兩

右為細末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候忌生冷猪魚溫服

茯神散治膽虛不得睡神思不安

茯神 酸棗仁 黃耆 人參各壹兩 栢子仁

遠志 五味子 熟乾地黄各半兩

右為細末每服一錢不計時候以温酒調下

伏火雄黃元治心腹固冷百疾

雄黃 錦文大黃 不艸皂角分等

右以甘鍋子一箇指今乾淨入雄黃末實捺約五分已來然後入大黃皂角末蓋頭亦捺令實於文武火中安放甘鍋子上用瓦子一片蓋微歇口一分已來候煙色漸青雄黃成汁急取出傾入厚埧器中放冷研為細末以生薑汁煮麵糊和元如梧桐子大每服一元空心米

飲服下

二氣丹治痼冷

硫黃 桂各壹分 乾薑錢 附子兩

右為細末水煮麵糊為元如梧桐子大以朱砂為衣每服五七元煎艾蘘湯下

正元散治一切冷氣

烏頭兩肆 益智兩叁 乾薑 青橘皮各壹兩

茴香兩壹

右為鹿末每服二錢水一盞入蘘同煎至六分食前服

填骨髓煎治虛勞乾渴羸瘦少力

白茯苓兩貳 山茱萸 當歸 巴戟 五味子

人參 遠志 桂心 附子 兔絲子

天門冬 大豆黃卷各壹兩 肉蓯蓉兩貳 石斛

石韋各半兩

右為細末取生地黃汁二升生苲蓐根汁一升白蜜三合牛髓二合入銀鍋中煎藥攪令勻以慢火熬成膏收入埧合中每服食前以粥飲調下半匙

玉飲方治虛勞煩渴鎮心神宜服此

真玉可重拾兩 粟穀壹升

右以水一斗煮粟穀取汁五升去粟穀澄瀝却以此汁煮玉至三升旋旋分呷服之神驗

畫根散治虛勞少力吐血心悶頭旋目運

畫根 栢菜 刺薊 羚羊角屑

阿膠 白芍藥 白朮 黃耆

當歸 黃芩各壹兩 甘草 生乾地黄

伏龍肝各貳兩 亂髮灰半兩

右為鹿末每服四錢水一中盞入竹茹一分煎至六分去滓不計時候温服

伏龍肝散治虛勞吐血心煩頭悶

伏龍肝 生乾地黄 鹿角膠各壹兩

芎藭 當歸 桂心 白芍藥

白芷 麥門冬 細辛 甘草各壹兩

右為鹿末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候温服

補肺散 治虛勞咳嗽氣喘乏力喫食全少坐卧不安

人參 桂心 鍾乳粉 白石英 麦門冬

五味子 白茯苓 熟乾地黄 乾薑

黃耆 鹿角膠 甘草

右為細末每服二錢不計時候煮薑粥飲調下

鹿髓煎 治虛勞傷中脉絕筋急脚萎咳嗽

鹿髓 蜜 酥 生地黃汁

杏仁 桃仁

右以桃仁杏仁地黄等汁於銀鍋內煎令減半次下鹿髓酥蜜等同煎如錫每於食後含燕一茶匕

白朮散 治虛勞裏急四肢不和身軀疼痛不欲喫食

白朮 仁參 當歸 附子 黃耆

白芍藥 甘草 半夏 桂心

右為鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前温服

訶梨勒散 治虛勞裏急兩脇疼痛四肢無力不欲喫食

訶梨勒 木香 陳橘皮 當歸 白朮

桂心 黃耆 白茯苓 人參 白芍藥

甘草

右為鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前温服

人參散 治虛勞少氣四肢疼痛心神煩躁不得睡卧喫食全少

人參 黃耆 麦門冬 甘草

當歸 熟乾地黄 酸棗仁

白芍藥 白朮

右為鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

酸棗仁元 治虛勞煩熱不得睡卧

酸棗仁 榆菜 麦門冬

右為細末煉蜜和杵百下元如梧桐子大每服不計時候以糯米粥飲下三十元

黃耆散 治虛勞不足小便數四肢少力不能自持

石斛 黃耆 補骨脂 人參 熟乾地黄

澤瀉 遠志 當歸 桂心 牛膝

白茯苓 龍骨 五味子 鹿茸

右為鹿末每服用羊腎一對切去脂膜以水一盞半煮取汁一盞去羊腎入藥五錢煎至五分去滓食前温服晚食前服滓再煎之

石斛散 治虛勞不足乏力食少服此大補益

石斛 肉蓯蓉 枸杞子 熟乾地黄

遠志 兔絲子 續斷 天雄

右為鹿末每服二錢食前以温酒調下

建中散 治虛勞益氣補不足

黃耆 桂心 白芍藥 白朮 當歸

附子各壹兩 甘草兩半 木香 熟乾地黄各壹兩

右為鹿末每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓下錫糖如棗大更煎一兩沸食前溫服

鹿茸元 治虛勞不足腎臟傷憊

鹿茸壹兩 麋茸 熟乾地黄各貳兩 牛膝

人參 白茯苓 桂心 五味子 巴戟

兔絲子 附子 肉苁蓉 山茱萸 薯蓣

車前子 遠志 地床子各壹兩 漢椒半兩

右為細末取白羊腎十隻去筋膜細切爛研用好酒五

升方七 十九

升慢火熬成膏入前藥末和搗三五百杵元如梧桐子

大每服空心及晚食前溫酒下三十元

鍾乳天雄元 治虛勞水臃久憊腰膝疼冷筋骨無力夢寐

不安陽道劣弱面色萎黃飲食不得日漸羸瘦

鍾乳粉 天雄 巴戟各壹兩 肉苁蓉 兔絲子

懷香子 補骨脂 木香 天門冬 續斷

沉香 石斛 丁香 山茱萸 肉桂

當歸 麝香 白朮 人參 仙靈脾

薯蓣 牛膝 厚朴 磁石 附子各貳兩

熟乾地黄 石龍芮各壹兩

右為細末煉蜜和搗五七百下元如梧桐子大每日空

心溫酒下三十元臨晚再服如不飲酒鹽湯亦服得

川椒元 治虛勞羸瘦食飲无味百節酸疼神思昏沉四肢

無力常服補益強元氣令肥健

川椒壹兩 黃耆 乾薑 白茯苓 栝子仁

芎藭 人參 桂心 當歸 山茱萸

附子 枸杞子 薯蓣各壹兩 枳實兩半 牛膝

厚朴 肉苁蓉 石斛 熟乾地黄

兔絲子各壹兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵元如梧桐子大每服空

心溫酒下三十元晚食前再服

養肝散 治虛勞不思飲食

木香 人參 白朮 白芍藥 陳橘皮各壹兩

桂心 補骨脂 高良薑 乾薑 厚朴

縮紗各半兩 胡椒壹分

右為細末每服用獾猪肝一具細切以藥末五錢拌和

令勻入於鑊內以漿水四大盞入葱白五寸煮令爛熟

任意食之

人參養散 治虛勞驚悸心神不安

人參 黃耆 茯神 白龍骨 牡蠣

遠志 澤瀉各壹兩 白芍藥 桂心各壹兩 甘草兩半

酸棗仁貳兩

右為鹿末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

遠志元治虛勞驚悸神氣不寧

遠志兩 伏神 石菖蒲 薑耆 熟乾地黄

人參各壹兩

右為細末水煮麵糊為元如梧桐子大米飲下一十元不以時

華撥散治虛勞大腸久冷洩痢不止

華撥 肉豆蔻各壹分 赤石脂 訶梨勒各壹兩

丁香 白茯苓 阿膠 當歸 桂心

陳橘皮各壹分 白龍骨 縮砂 人參

厚朴各壹分 甘草壹分

方七 廿一

右為細末每服文粥飲調下二錢空心及晚食前服

八石散治虛勞泄瀉痢至甚者神効

白礬 陽起石 太陰玄精石 禹餘糧各壹兩

鍾乳粉 寒水石 金牙石 黃丹各壹兩

右件藥搗研如粉以塩泥固濟餅子內諸藥末密封泥候乾漸以火逼之相次加火至二十斤煨之火盡為度候冷取出同研令極細每服三錢病重者四錢以猪

肝一具切作片子入藥末在肝內并入塩一錢葱白一握擘碎炉鐵燂令熟了便以胡椒華撥末生薑醋醬喫

後飲煖酒一二盞渴即粥飲解之甚者不過三度

訶梨勒元治虛勞脾胃氣不和大腸泄痢水穀不化少思

訶梨勒壹兩 當歸各壹兩 地榆 乳香 白龍骨

飲食

訶梨勒 當歸各壹兩 地榆 乳香 白龍骨

阿膠 附子各壹兩 木香 乾薑各半兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵元如梧桐子大每服空心及晚食前以米飲湯下三十元

麋角元治一切風氣壯筋骨實下元秘精安魂定魄却老

延年補壯腰膝永除諸疾

麋角霜壹斤 白龍骨半斤 天雄長大者拾兩 紅椒半斤 兔絲時蒸

壯礪伍兩 磁石兩壹 巴戟兩 陽起石兩

金釵石斛 肉桂 韭子 肉苁蓉各壹兩

木賊兩 朱砂壹兩 澤瀉 熟地黄 山茱萸 薯蕷各肆兩 澤瀉 牡丹皮

方七 廿一

右為細末酒煮麵糊為元杵千下如梧桐子大每服三十元酒或塩湯下經旬自覺強健

八味元治虛損不足大渴飲水腰脊痛小腸拘急小便不利及脚氣上入小腹不仁

熟地黄 山茱萸 薯蕷各肆兩 澤瀉 牡丹皮

白茯苓 桂心 附子各壹兩

右為細末煉蜜和元如桐子大每服二十元空心木炭

右為細末煉蜜和元如桐子大每服二十元空心木炭

右為細末煉蜜和元如桐子大每服二十元空心木炭

右為細末煉蜜和元如桐子大每服二十元空心木炭

右為細末煉蜜和元如桐子大每服二十元空心木炭

湯下加至三十元

鶴頂丹 強脚膝補氣能令氣下行安五臟填骨髓補諸虛去万病

辰砂打碎千百遍入水不住手研至日可
青鹽兩伍

右為細末水煮麵糊元如梧桐子大每服二三十元米飲下空心

烏頭從容元 治腎臟風下注脚膝疼痛行履艱難

川烏頭壹兩對入鹽炒去鹽用烏頭 肉從容 海桐皮

牛膝 骨碎補 當歸 天台烏藥

杜蒺藜 羌活 木鱉子 地龍各半兩

沒藥 乳香

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子每服二三十元空心食前米飲下

養血百補元 治真元衰弱榮衛虛微風勞氣冷諸疾荏苒不愈久病羸瘦咳嗽痰涎唾如膠粘或如紅物手足心熱

雖思飲食而喫不多眠睡不安或夢見先亡之人或夢與鬼邪交通肩背拘急百節煩疼足脛痿弱行步無力腹中

如空氣短喘促喜見人過旦起惺惺午後昏沉精神煩擾鬱悒悲啼此藥補臟腑虛消化為害諸虫

人參 牡丹 檳榔 吳茱萸 肉豆蔻

白芍藥 澤瀉 木香 遠志 縮砂

枳殼 柴胡 麻黃 麝香 鹽各半兩

烏梅兩貳 知母 升麻 甘草 鱉甲

從容 白斂 葳蕤 虎骨 桃仁

羌活 防風 茯苓 附子 青蒿

秦艽 厚朴 牛膝 半夏 桂各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元加至五十元空心溫酒下

檳榔元 治男子五勞七傷虛乏羸瘦

茯神 山藥 人參 五味子 附子

石斛 牛膝 從容各捌分 遠志 鹿茸

澤瀉 山茱萸 地床子 黃耆 訶子

桂各陸分 熟地黃拾分 麻仁 鍾乳各拾貳分 檳榔拾分

右為細末煉蜜和元梧桐子大空心酒下二十元

地黃煎元 治腎臟風勞損添精補髓益氣養神駐顏調血脉令人輕健

生地黃伍斤取汁 无灰酒壹斗二味於銀器以火熬成膏

肉從容貳兩 巴戟壹兩 鹿茸貳兩 桑螵蛸

五味子 蛇床子 石斛 枳殼 黃耆

牛膝 兔絲子 陳皮 石龍芮 沉香各壹兩

補骨脂 附子各貳兩 鹿角膠壹兩

右為細末用先膏和元如桐子大溫酒下三十元空心

山藥附子元 治男子五勞七傷虛乏羸瘦大便秘滯小腹

滿悶

茯神 山藥 人參 五味子 附子
 石斛 牛膝 菴蓉各別 遠志 鹿茸
 澤瀉 山茱萸 地床子 黃耆 訶子
 桂各陸 熟地黃 麻仁 鍾乳粉各拾
 檳榔貳兩

右為細末煉蜜和元如桐子大空心酒下二十元

雞峯普濟方卷七

方七

廿五

雞峯普濟方卷第九

馮翊賈兼重校定

勞症

出毛元 治肺疼久嗽夢見先亡或夢中飲食亡精失血多

怒少睡飲食不入漸漸羸瘦及骨蒸虛勞傳涼鬼氣服之

雄黃 大蒜 杏仁各壹兩

右除雄黃外先搗如泥入乳鉢內與雄黃同研勻日內

嗽候可元即元如梧桐子大每服二十一元凌晨空心

清米飲下服畢不得洗手頻看十指甲中有毛出逐旋

拭了至辰時候方得洗手

百勞煎 治勞嗽旦輕夕重增寒壯熱少喜多噴勿心進忽退

面色不潤積漸少食必入肺脉緊浮者宜服

方九

杏仁半斤 新地餅壹斤

右取杏仁於地餅內以童子小便二升浸七日瀉出去

小便以煖水淘過於沙盆內研如泥別用地餅以小

三升煎之如膏量其輕重食上熟水調一匙至半匙室

女婦人服之妙以炒麵和膏為元尤佳白湯下食後

安息香湯 治惡症入心欲死宜服此方

安息香半兩

右為末分為二服以熱酒和服之不以時

阿魏藥法 主一切尸症惡氣療人有親近死屍惡氣入腹

終身不痊遂至死亡醫所不療亦主一切症神効方

阿魏參兩 研如

右一味以餛飩麵裹半兩熟煑吞之日三服滿三七日
求差忌五辛油麵生冷酢滑以酒服之即差

皂莢元 治骨蒸傳屍鬼氣

右取皂莢并樹白皮及棘刺各五片燒為灰水淋取汁
更於灰上再淋如此三五遍即煎成霜取二兩入麝香
三錢同細研用軟餅和元如小豆大每服空心以酒下
七元瀉下勞虫即愈如未利即加元服之以利為度

桃仁粥方 治傳尸骨蒸鬼氣咳嗽氣急不能下食及疔癰
氣日漸黃瘦

桃仁兩

右以水二盞半和桃仁研取汁煮米二合煮粥空腹食

方九

青蒿煎 治一切勞瘦

青蒿細剉嫩者壹升

右以水三升童子小便五升同煎成膏元如桐子大每
服十元温酒下不以時

治尸症 鬼疰遁尸腹脹氣急衝心或成塊起或牽腰脊痛

右以炒鹽熱以青布裹熨之

白栝湯 治人素有勞根苦作便發發則身躄百節皮膚疼
痛或熱極筋急

右以白栝東南根一尺去皮取中皮炙熟細切為末每
服三錢温酒調下

地黄湯 治勞瘦

生地黃 麵各壹斤

右杵爛炒焙乾為末每服二錢米飲或酒調下非時

茯神散 治積執勞瘦婦人產後血虛潮熱羸勞五心有熱
皆療累有驗

茯神 牡丹皮 地骨皮 官桂 山茵陳

人參 白芍藥 甘草 丹參 玄參

胡黃連 石解 柴胡各壹兩 麥門冬分叁 犀角末

羚羊角末各半兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至五七沸
温温和滓服之食後

大麥煎散 治勞氣四肢煩疼拘急勞倦兼治虛風

方九

九肋散魚甲壹兩 銀州柴胡

秦艽各壹兩 木香 川烏頭各半兩 乾漆

乾葛 石菖蒲 宣連各壹兩 官桂

黑附子各半兩 石斛 沉香各壹兩

右件藥細剉如豆每服一兩用小麦湯一升同煎至五
合去滓温分二服

麝香散 治氣勞及一切瘡氣胃膈膈疼痛不利

沉香 白木各半兩 人參分壹 肉豆蔻伍分 檳榔分壹

木香兩半 官桂 陳橘皮 枳殼 荆三稜

草豆蔻各叁分 厚朴 丁香 訶子

茯苓 益智 青橘皮 蓬莪茂各半兩

甘草壹兩 乾薑壹分 郁李仁湯浸去皮放乾研如膏入白麵壹大匙連水和餅子薄塗黃香熟用
右件藥除郁李仁外為細末後以郁李仁餅子與藥同搗羅令細更研入真麝香半分令勻每服一錢生薑湯調下入鹽點亦得神妙

團參補氣元 治積勞損或因大病後不復常苦四肢沉滯

骨肉酸疼吸吸少氣行步喘憊心中虛悸口燥咽乾漸致瘦削痰唾稠粘飲食減少夢寐失精神思不樂

大豆黃卷 熟地黃 神麴 當歸

桂各伍分 防風 芍藥 白朮 杏仁

麥門冬 芎藭各壹分 薯蕷拾伍分 甘草 阿膠

人參各壹兩 桔梗 茯苓 芫胡各壹兩 乾薑壹兩

白斂壹分 方九 四

右為細末蒸棗肉二百枚為膏和元如梧桐子大每服二十元米飲或溫酒下空心服

大羌活元 治肝臟風勞筋脉拘急頭目不利腰脚冷疼四肢羸瘦

羌活壹兩 茯苓 五加皮 鹿茸 防風

牛膝 桂心 五味子 熟地黃

生乾地黃 兔絲子 栝子仁 酸棗仁

山茱萸 巴戟各壹兩

右為細末煉蜜和搗三二百杵元如梧桐子大每日空心溫酒下四十元晚食前再服

生乾地黃元 治肝臟風勞頭眩多忘憂恚不足面色青黃

生乾地黃 防風 薯蕷 伏神

山茱萸 桂心 天雄 遠志 栝子仁

川椒 細辛 枳實 甘菊花各壹兩

甘草壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大杵三五百下每服食前以溫酒下二十元

橘皮桃仁元 治勞執傷心有長蟲長一尺貫周心為病令

人心痛 雷元 狼牙刺 陳橘皮 貫眾 桃仁

蕪荑 青蘘子 蜀漆 桃白皮 吳茱萸各壹兩

白殭蚕壹分 方九 五 亂髮壹分

右為細末煉蜜和元杵三二百下元如梧桐子大每服空心以粥飲下三十元以蠱下為度

白朮散 治脾勞胃中虛冷飲食不消腹脇脹滿憂恚不樂

白朮壹兩 白茯苓 厚朴 人參各壹兩 桂心

陳翹 吳茱萸各壹分 草豆蔻 大麥孽

木香 陳橘皮 檳榔各壹兩

右為細末每服二錢食前溫酒調下

蕪荑煎 治脾勞飲食不節口苦舌澁多吐清水四肢黃瘦雖食不成肌膚大腸時時泄滑

蕪荑仁貳兩 為末以米醋 人參壹分 木香半兩

陳橘皮兩壹丁香 乳香 肉豆蔻各半兩

附子 縮砂 香附子 枳實

白木 厚朴 肉桂 薑芩

辛夷各叁分

右為細末入蕪荑煎和令勻更入蜜和搗三五百杵元如梧桐子大每服空心及晚食前以粥飲下二十元漸加至三十元

黃耆散治肺勞少氣津液不通皮毛枯燥常服思食補虛

黃耆 赤芍藥 五味子 天門冬 白茯苓

人參 杏仁 生乾地黄各壹兩 桂心

甘草 半夏各叁分

方九 六

右件藥搗羅為散每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服忌鯉魚飴糖

天門冬元治肺勞痰嗽氣促下焦虛損上焦煩熱四肢羸瘦

瘦

天門冬 麥門冬 酸棗 熟乾地黄各壹兩

牛膝 人參 黃耆 杏仁 白茯苓

薯蕷 五味子 石斛 枸杞子 沉香

訶梨勒皮 肉蓯蓉各壹兩 紫苑叁分

右為細末煉蜜和搗三五百杵元如梧桐子大每服食前以棗湯下三十元忌鯉魚菓菜

麥門冬元治肺勞經久即生蟲在肺令人欬逆氣喘或為

憂恙氣隔寒熱

附子 人參 細辛 桂心 遠志

百部 黃耆 杏仁各壹兩 麥門冬貳兩 川椒

乾薑各半兩

右為細末煉蜜和搗三百杵元如彈子大每服綿裹一元含化嚥津

小羊腎湯治腎勞虛損面黑耳聾腰脚疼痛小便滑數

磁石 肉蓯蓉各壹兩 白茯苓 桂心

石菖蒲 附子 五味子 當歸 芎藭

石斛 桑螵蛸 杜仲各半兩 熟乾地黄壹兩

右件藥搗篩為散每服用羊腎一對切去脂膜以水一

方九 七

盞半煎至一盞去腎下藥末半兩入生薑半分煎至五分去滓空心溫服晚食前再服

天羊腎湯治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利夢悟驚悸上氣小腹裏急痛引腰脊四肢苦寒小便

白濁

人參 白芍藥各壹兩 麥門冬壹兩 熟乾地黄

杜仲 當歸 芎藭 遠志

白茯苓 石斛 五味子 桂心

續斷各壹兩 黃耆兩 磁石兩

右為鹿末每服用羊腎一對切去脂膜以水一盞半煎至一盞去腎下藥末五錢入生薑半分棗三枚煎至五

分去滓空心及晚食前温服

防風散 治風勞躄虛食少羸劣筋脉不利手足疼痛

防風 天麻 海桐皮 附子 沉香各壹兩

桂心 芎藭 白朮 白茯苓 山茱萸

熟乾地黄各壹分 枳殼半兩

右為鹿末每服二錢水一盞入生薑三片煎至六分去滓食前温服

滓食前温服

巴戟散 治風勞氣血不足臟腑虛傷肢節煩疼腰膝無力

形體羸瘦面色痿黃小便數多卧即盜汗

巴戟 栢子仁 石龍芮 天麻 牛膝

牡蠣 兔絲子 天雄各壹兩 葶藶 防風

羌活 當歸 桑螵蛸各壹分 肉苁蓉各壹兩

右為細末每服二錢空心及晚食前以温酒調下

樟木散 治風勞羸瘦面色青黃肢節煩重神思不安臟腑

虛傷有虫作梗令人心躁食飲無味

樟木瘤節 皂莢木瘤節

槐木瘤節各壹兩 天靈蓋壹兩

牛黃分參 麝香半兩

右為細末入牛黃麝香研令勻每服空心及晚食前以

温酒調下二錢

薄荷煎 治急勞骨蒸

薄荷汁 生地黄汁 青蒿汁各壹升

童子小便貳升

朱砂壹兩

秦艽兩參

桃仁兩參

麝香錢

右件藥用薄荷等汁取小便同煎然後下桃仁膏及朱砂等以慢火熬候可元即元如梧桐子大每日空腹以清粥飲下三十元晚食前再服

猪猪肝元 治急勞瘦病

猪猪肝兩肆 柴胡 黃連各貳兩

訶梨勒皮貳兩 甘草壹兩 敝留貳兩

右件藥先將肝用童子小便五升煮以小便盡為度取出薄切焙乾與諸藥同搗羅為末用猪膽汁和杵三二百下元如梧桐子大每日空心及晚食前以粥飲下三十元

柴胡煎元 治虛勞骨熱肢節煩疼心膈躁悶

柴胡壹兩 犀角屑 知母 胡黃連 桔梗

川升麻 地骨皮 黃芩 訶梨勒皮各壹兩

蘇婁壹兩 敝留貳兩 甘草 人參 赤茯苓各壹兩

右為細末用猪膽五枚取汁及蜜半斤攪和令勻慢火煎成膏和藥末搗三五杵元如梧桐子大每服食後煎烏梅小便下二十元忌葷菜

三神煎 治虛勞癥瘕結塊不消者

桃仁壹斤貳 京三稜 敝留各壹兩

右件藥除桃仁外搗羅為細末於鐺中先煎桃仁汁耗

一升下二味以木篋不住手攪煎良久又下好酒三味煎如稀飴收蕪器中盛每日空心及晚食前以熱酒一中盞調下一茶匙忌葷菜生冷濕麵

三稜煎元

治虛勞癥瘕心腹疼痛胃南不利

京三稜

陳橘皮各兩

黑三稜

桃仁各兩 研如膏

已上四味除桃仁外為末用好酒五升於鑊中以慢火煎次下桃仁膏熬如稀飴入後藥末

檳榔

訶梨勒

木香

欒甲各兩

枳殼肆兩

硃砂

硫黃各壹兩

附子貳兩

乾薑叁兩

右為細末入研了硃砂硫黃等重研令勻入前藥內和元如梧桐子大每服空心及晚食前以生薑湯或溫酒

方九

十一

下三十元忌葷菜

炙肝散

治冷勞欬嗽四肢無力大腸不調喫食減少復脇氣脹

蒼朮

桔梗

陳橘皮各半兩

柴胡壹兩半

赤芍藥

紫苑

縮砂各叁分

訶梨勒

高良薑

各壹兩

右為細末每服用猪肝一具切去脂膜如肉片入散一兩拌和令勻竹筋子串慢火炙令熟食前任意喫以粥飲下

桃仁散

治氣勞羸瘦腹脇痞堅臍下冷疼不欲飲食

桃仁叁分

吳茱萸

木香

芎藭

桂心

青橘皮 當歸 檳榔 赤芍藥 甘草各半兩

京三稜 白木 訶梨勒 高良薑各叁分

柴胡壹兩

右為鹿末每服三錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

丁香散

治氣勞脾胃久弱嘔逆不納飲食四肢羸瘦漸加乏力

丁香

白木

前胡

桂心

人參

白茯苓

陳橘皮各叁分

半夏

甘草

批把菜各半兩

厚朴叁分

訶梨勒

柴胡各壹兩

右為鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

方九

十一

丁香散

治虛勞脾胃氣嘔逆不欲飲食四肢少力

丁香

人參

白木各叁分

甘草

高良薑

白豆蔻

陳橘皮

半夏各半兩

茯神壹兩

右為鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

石斛散

治虛勞手足煩疼羸瘦無力不能飲食小便頻數等疾

石斛壹兩半

黃耆

桑螵蛸

雞胚脰

人參

牛膝

熟乾地黄

當歸各壹兩

赤芍藥壹兩

白龍骨

麥門冬各叁分

右為鹿末每服四錢以水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

黃耆散 治虛勞手足煩疼羸瘦困乏兩脇裏急不欲飲食

黃耆兩壹 牛膝 白朮 陳橘皮 人參

桂心 白茯苓 白芍藥 當歸各壹分 麥門冬壹兩

五味子 甘草各半兩

右為鹿末每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

石斛元 治虛勞痿痺四肢攣急肌躄枯瘦

石斛 牛膝 肉苁蓉 附子各壹兩 熟乾地黄

秦艽 桂心 白茯苓各壹兩 麥門冬壹兩半

方九 十三

五味子 澤瀉 防風 芎藭 獨活

人參 甘草 細辛 黃耆 石龍芮

白芍藥各半兩

右為細末煉蜜和元搗三五百杵元如梧桐子大每服於食前以溫酒下三十元忌生冷猪雞牛馬肉

熟乾地黄散 治虛勞氣弱四肢少力筋脉拘攣骨節疼痛不欲飲食

熟乾地黄 黃耆 牛膝 人參

薏苡人 附子 白茯苓各壹兩 酸棗仁

當歸 桂心 五加皮 白芍藥 防風各壹分

甘草兩半

右為鹿末每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓食前溫服

羚羊角元 治虛勞筋脉拘攣牽引頭面眼目瞤動胃中氣逆不多思食

羚羊角屑 酸棗仁 防風 晚蚕沙

附子 藁本 黃耆 葳靈仙 白芍藥

羌活 白茯苓各壹兩 熟乾地黄貳兩

右為細末煉蜜和搗三二百下元如梧桐子大每服以溫酒下三十元日三服

鹿角膠散 治虛勞少氣羸損

鹿角膠 肉苁蓉各貳兩 熟乾地黄兩壹

黃耆 當歸各壹兩半 麥門冬貳兩半 石斛壹兩

方九 十三

五味子兩貳 黃耆 當歸各壹兩半 麥門冬貳兩半 石斛壹兩

右為細末每服二錢食前以生薑棗湯調下溫酒亦得

麻仁散 治虛勞四肢浮腫

大麻仁 商陸 防風 附子 陳橘皮

漢防已各壹兩

右為鹿末每服五錢水一大盞入赤小豆一百粒煎至五分去滓食前溫服

陳橘皮元 治虛勞心胃壅悶喘促大小便不利四肢浮腫

陳橘皮貳兩 紫蘇子分壹 郁李仁 桑根白皮

甜葶藶 赤茯苓 木通各壹兩 甘遂 漢防已各半兩

右為細末煉蜜和搗三三百杵元如梧桐子大每服空心及晚食前以生薑棗湯下二十元

鹿角膠元 治虛勞腰脚疼痛不可行步

鹿角膠壹兩 附子 桂心 杜仲

山茱萸 兔絲子 肉蓯蓉 熟乾地黄

五味子 巴戟 牛膝各壹兩 乾薑兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服食前以温酒下三十元

川椒元 治虛勞膝冷陰萎四肢羸弱

川椒 續斷 肉蓯蓉 附子 山茱萸

地床子各壹兩 兔絲子貳兩 桂心分 牛膝壹兩

鹿茸貳兩 遠志 防風各壹分

右為細末煉蜜和搗三二百杵元如梧桐子大每服食前以温酒下三十元

鍾乳粉元 治虛勞衰弱絕陽陰萎膝冷

鍾乳粉 兔絲子各貳兩 地床子分 石斛

桂心 肉蓯蓉各壹兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵元如梧桐子大每服食前以温酒下三十元

木香元 治虛勞四肢逆冷心腹氣脹唇青吐逆

木香 藜蘆 桂心 硫黃各壹分 附子

陳橘皮各壹兩 訶梨勒皮各壹兩 乾薑

吳茱萸各半兩

右為細末煉蜜和搗三三百杵元如梧桐子大每服不以時候以薑棗湯下十元

麋角元 治虛勞腎氣弱陰下濕痒小便遺失夜夢鬼交精泄不禁

麋角半斤 鑄細以牛乳少許拌和得所於小甌子內以大麥壓蒸壹伏時 黃耆

補骨脂 當歸 龍骨各貳兩 韭子兩 地床子

石龍芮 覆盆子 附子 遠志 續斷

石斛 栝子人各壹兩 人參

右為細末煉蜜和搗三五百杵元如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十元

韭子鹿茸元 治虛勞夢與鬼交精泄不止四肢羸瘦少力心神虛煩

鹿茸分 韭子 栝子人 兔絲子 黃耆

巴戟 附子各壹兩 澤瀉 伏神 石斛

石龍芮 麝香各半兩 天門冬壹兩 龍骨

露蜂窠各壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十元

覆盆子元 治虛勞夢與鬼交失精腰膝疼痛

覆盆子肆兩 兔絲子 肉蓯蓉 熟乾地黄各貳兩

龍骨壹兩 附子半兩 巴戟壹兩 人參壹兩

地床子 栢子人 鹿茸各壹兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵元如梧桐子大每服空心及晚食前温酒下三十元

棘刺元治虛勞腎氣不足夢泄

棘刺 威蕤 石斛 豚 厚朴

龍齒 遠志各壹兩 乾薑分參 烏頭 甘草

防風 細辛各半兩 兔絲子貳兩 薯蕷 石龍芮

枸杞子 巴戟 桂心各參分 草薢 天門冬各壹兩半

右為細末煉蜜和搗三五百杵元如梧桐子大食前以温酒下三十元

小肉從參散治虛勞羸損陰萎精氣之弱

方九 十六

肉從參 枸杞子 天雄各壹兩 石斛分參 遠志半兩

續斷 蝨蚕蛾各參分 兔絲子

孰乾地黄壹兩半

重校定此方內兔絲子五分兩其本方內天雄元治療藥味与此方相類今從此天雄元方兔絲子用參兩

右為細末每服二錢食前以温酒調下

天雄元治虛勞羸瘦陽氣不足陰萎小便數

天雄 鹿茸 兔絲子 肉從參 羌活

山茱萸各貳兩 覆盆子 巴戟 五味子

桂心 石龍芮 石南葉各壹兩 牛膝

防風各壹兩半 孰乾地黄貳兩

右為細末煉蜜和搗五百杵元如梧桐子大每服食

前以温酒下三十元

金鎖子元治虛勞小便出精

補骨脂 韭子各貳兩 牛膝 巴戟 肉從參

龍骨 兔絲子 山茱萸 桑螵蛸各壹兩

右為細末煉蜜和搗三二百杵元如桐子大每服食前以温酒下三十元

海藻元治虛勞損腎陰腫痰痛

海藻壹兩 肉從參 茴香子 沉香 天雄各參分

牡礪粉 木香 牛膝 硫黃各半兩

右為細末酒煮麩糊和元如梧桐子大每服二十元空心以温酒下

方九 十七

治虛勞陰痿痛方

右取桃仁去皮尖炒黃為末以熱酒服彈元許日三四服即差

青蒿元治少年十五歲至二十歲已上骨蒸熱成勞不思飲食食即無味身熱苦痛陽熱轉盛面色赤多無心作用起身多慵

青蒿肆兩 甘草 桃仁 杏仁各壹兩去皮尖

并均執內焙灰火燒壹宿取出別研 天靈蓋 生前子 知母

赤芍藥 紫苑 黃連 葳蕤 枳殼

檳榔 熟地黄 荆三稜 秦艸 柴胡

續斷 當歸各壹分 射香錢 犀角 獺肝各半兩

續斷 當歸各壹分 射香錢 犀角 獺肝各半兩

續斷 當歸各壹分 射香錢 犀角 獺肝各半兩

續斷 當歸各壹分 射香錢 犀角 獺肝各半兩

續斷 當歸各壹分 射香錢 犀角 獺肝各半兩

續斷 當歸各壹分 射香錢 犀角 獺肝各半兩

續斷 當歸各壹分 射香錢 犀角 獺肝各半兩

右為細末以前小便和搗元如梧桐子大每服米飲下三十粒不以時咳嗽加貝母二分婦人月水不調加牡丹皮延胡索各一分五心煩燥加地骨皮茯苓夜夢不祥加茯神羚羊角初患為傳諸臟酒下四服即愈腹中有塊及瘕癖無度惡寒頭痛面黃毛髮焦枯服必便愈

栢子仁元 治虛勞多汗

栢子仁肆分 人參 半夏 茯苓 牡蠣
五味子 白朮 淨麩各參分 木香壹分

秦元散 治虛勞羸瘦身熱發黃食少忪悸頭昏眩運上焦

虛熱口乾煩鬱 方九 十八

秦元 金釵石斛 伏神 山藥
人參 五味子 當歸 遠志
白芍藥 牡丹皮 黃耆各壹兩 茯苓

熟乾地黄各貳兩 葳蕤叁分
右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服五十元空心米飲下

黃參散 治勞人不堪虛有熱胃中煩手足熱心忪悸口苦咽乾痰嗽潮躁

黃耆 白朮 前胡 枳殼各伍兩 柴胡
杏仁 人參 白茯苓 甘草 當歸

半夏 黃耆 白芍藥 麥門冬
熟乾地黄各參兩

右為細末每服二天錢水一盞煎至七分去滓食後臨卧温服

紫帶元 治風勞肌瘦面黃

人參 牡丹皮 檳榔 吳茱萸 鹽
肉豆蔻 赤芍藥 澤瀉 木香 遠志
縮砂仁 枳殼 柴胡 麻黃 射香各半兩
烏梅貳兩 知母 升麻 甘草 鱉甲
茯苓 白斂 葳蕤 虎骨 桃仁
羌活 防風 茯苓 附子 青蒿

積聚

萬病元 治結聚癥癖氣塊血脉不通

秦元 厚朴 牛膝 半夏 桂各壹兩
雄黃 狼毒 附子 烏頭 巴豆
甘遂 芫花 大戟 桃仁 桂
當歸 川芎 蜀椒 吳茱萸 厚朴
乾薑 鱉甲 大黃 柴胡 枳殼
乾漆 犀角 檳榔 朱砂
右等分為細末煉蜜和元如梧桐子大每服一二元米

飲下空心

如聖元 治腹內諸積聚歲入癖塊不消黃瘦宿水朝暮咳嗽及治積年冷氣臍下絞結衝心膀胱兩脇徹背連腰痛無休息連臍似虫咬不可忍及十種水病五般痔疾九種心痛反胃吐逆飲食減少又治宿食不消婦人月水不通五邪八瘕沉重欲死恐懼歌笑不定心神狂亂形體羸瘦又治一切風遍身頑痺不知痒痛或似虫行手足煩熱夜卧不安又治小兒驚疳等但是諸疾莫辨其狀曾服諸藥未差者

草烏頭

黃連各參分

官桂

乾薑

桔梗

茯苓

川椒

萊菔

柴胡

厚朴

方九

乾地黄

菖蒲

紫苑

防風

人參

驚雷

大芎

枳殼

貝母

甘草

甘遂

各壹兩 取白霜半

重校定此方內賦味無分兩以本方紫苑元治瘵藥味一同內草烏頭黃連各用參分

右為細末麵糊和元如梧桐子大每服五元食前米飲下每日只一服先因馬墜臨老痛楚不能飲食命在頃更日服五元經旬日取下血如雞肝一二千片與膿清水二分許其病遂差又三原主薄妻病十五年羸瘦至甚日服五元旬日取下青虫六十四箇膿血三四升其病遂差又柳功曹臥病經年服此藥取下肉蟻娘近百箇清黃水一升許便愈又有一人患大風病眉毛落盡

遍身生瘡服藥百日取下五色膿并清水各數升遂得平復又有人食即吐逆羸病十年服藥半月取下蝦蟇七箇清水一升許便愈又有人患癖塊積年服藥二十日取肉地二條各長尺餘又有人久患帶下服藥二十日後汗出及取下雞肝色惡物病差其功不可具述

礞石元 治諸虛中積

礞石壹兩 升化

巴豆霜參兩半 先同煮

青礞石兩

三稜壹兩 醋浸壹宿 煨已上

大黃壹兩半 參分 生煨又次入

木香

檳榔

肉豆蔻

乾薑

猪牙皂角

芫

芫花醋浸壹宿 微炒有煙

丁香

桂各壹兩

白豆蔻

墨

青皮

胡椒

粉霜各壹分

麵式兩 升化

方九

右礞砂合巴豆煎兩食久投礞石三稜又投酒麵又投大黃相去皆半食久乃入眾藥熬元如菜豆大每服三五元酒飲調下凡癥積飲食所傷等治之

大白末元 去積聚癖氣不能食心肋下滿四肢骨節酸疼盜汗不絕

白朮

黃耆

人參

茯苓

烏頭

乾薑

當歸

甘草

檳榔各陸分

牡蠣

白芍藥

細辛

麥門冬

前胡

鱉魚甲各肆分

桂伍分

防葵

紫苑

桔梗各參分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服空心酒下二十

元日再加至三十元忌葷菜桃李雀肉猪肉生葱海藻
松菜等

桃仁元 主疔癰氣心胃脹滿不能下食發即便連乳脹滿
頭面閉悶咳嗽氣急

桃仁分捌 鱉甲 枳實 白木各陸 桔梗

吳茱萸 檳榔仁 防葵 乾薑各伍 烏頭分柒

赤芍藥 紫苑 細辛 人參各肆 皂莢分叁

黃橘皮 甘草各肆

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元日再加至
二十元酒下忌海藻菘菜猪肉冷水生菜桃李雀肉葷
菜等

方九 廿二

如意元 治五積疔氣及消酒食

硃砂壹兩 木香 棟丁香 華澄茄 牽牛子各壹

附子 桂 乾薑 大黃 巴豆

陳皮 香墨 青橘皮 蓬莪茂 京三稜

筒子漆各貳

右為細末用醋熬硃砂大黃巴豆成膏和前件藥末為
元菘豆大每服五元溫水好茶任下

京三稜元 治食癥癖氣食勞宿食不消痰逆

京三稜 乳香 木香 丁香 肉豆蔻

當歸 青橘皮 五靈脂各半 紫苑

乾薑 附子 硃砂 猪牙皂角各壹

朱砂分半 巴豆壹兩 鱉甲貳兩

右件乳香巴豆同搗如泥餘藥為細末以醋醋一升化

硃砂去石滓熬令稠入麵煑為糊和諸藥末令軟硬得

所搗三五百下元如菘豆大每服以溫酒下三元至五

元

丹砂沉香煎 治久積虛冷伏滯及呼吸寒氣膨脹心腹暴
痛兩脇刺疼并婦人血氣疼痛皆主之

沉香壹兩 烏頭壹兩 阿魏壹兩 細銀器內熬盡

沒藥壹兩 升麻壹兩 巴豆壹兩 細研

硃砂壹兩 硃砂壹兩 丹砂壹兩 細研

硫黃壹兩 檳榔 木香 人參

胡椒各壹 丁香兩半 乾薑分叁 青橘皮 良薑水壹伍

桂各壹 右為細末入丹砂硫黃再研令勻以前膏和元如梧桐

子大每服二三元溫橘皮湯下如心痛嚼破溫酒下不

以時婦人血氣當歸酒下

烏頭煎 治男子女人寒冷腹內積聚邪氣往來厥逆搶心

心痛痞悶吐下不止婦人產後羸瘦

烏頭拾伍 吳茱萸 蜀椒 乾薑 桂心各貳

前胡 細辛 人參 芎藭 白木各壹

皂莢 紫苑 白微 芳藥各拾 乾地黃壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元酒下日三

稍加之以知為度

治脾胃氣結聚

三稜 各壹兩 欒甲 各貳兩 草豆蔻 檳榔 枳殼

白木 各壹兩 桂 兩半 神麴 郁李仁 五味子

當歸 木香 附子 各壹兩

右為細末煉蜜醋膠和元如梧桐子大每服三十元空心生薑湯下

如意紫沉煎 治氣虛中寒脾胃不和宿穀遲化飲食多傷

胃隔痞悶心腹疼痛噎醋吞酸嘔逆惡心脇肋脹痛泄痢裏急久新積聚疝瘕癖結等疾

沉香 木香 朱砂 硃砂 史君子

方九

華澄茄 荆三稜 芫 各壹分 肉豆蔻 檳榔 各壹兩

母丁香 伍分 巴豆 貳分 黑牽牛粉 兩半

右為細末水煮麵糊和元如麻子大每服三三元温酒下空心

木香三稜元 治男子婦人右脇下痛

芫花 赤黃分醋炒 京三稜 青皮 陳皮

茴香 乾漆 蓬莪朮 各半兩 硃砂

乾薑 桂 各壹分 檳榔 壹兩 巴豆 肆拾粒醋

右為細末醋浸饑餅和元如梧桐子大每服七元橘皮湯下空心

乳香元 消化積滯

乳香 木香 沉香 枳殼 檳榔

芫 各貳兩 乾漆 各半兩 阿魏 壹分 青皮

硃砂 各壹分 川練肉 壹分

右為細末將川練醋熬膏和元如豌豆大每服十元至十五元温酒下

硃砂煎元 治一切滯積化氣消食補益真氣及婦人產後

逐敗血補虛損

當歸 荏蓉 巴戟 檳榔

茴香 木香 沉香 黑附子 天雄

阿魏 醋磨半兩 川練子 貳兩酒浸去皮

重校定此方內硃砂已下元分兩此方難沈良方內亦載之內硃砂當歸荏蓉巴戟檳榔茴香木香沉香黑附子天雄各壹兩

方九

右為細末酒煮麵糊和元如梧桐子大每服三十元空心酒下葶中利與它利不同常利可用苦澁藥主之葶

中利生於血不足投澁藥則血愈不行痢當更甚惟此藥最能治產後利先以桂元小下之次投硃砂元日九

十元痢頃減半次日必愈硃砂元產後無疾亦宜服能養血去積聚

天温白丹 療男子婦人心腹積聚久癥癖塊大如桮椀黃

疸宿食朝起嘔吐支滿上氣心腹脹滿心下堅結氣攻胃脇連背痛無常熱心痛狀如虫咬療十種水氣八種痞塞

返胃吐嘔飲食噎塞五淋九種心疼七十二種風三十六道尸注或顛癩五邪失心愁憂思慮情意不樂恐懼悲啼

婦人月水不通直似懷妊連年累月四肢沉重羸瘦困弊

紫苑 吳茱萸 葛蒲 枇杷葉 桔梗

茯苓 皂角 厚朴 薑 連翹

椒 巴豆各等分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三元食後米飲

下一方元批杷菜有柴胡人參桂川烏頭

半夏湯 主酒癖心胃脹滿肌肉沉重逆害飲食小便赤黃

此根本虛勞風冷飲食衝心此由脾胃客痰所致

半夏升壹 生薑兩拾 黃芩 前胡 茯苓各壹

當歸 茵陳各壹 枳實 大戟 白朮

甘草各壹

方九 廿六

右十一味以水一斗煮取三升分三服

靈砂丹 治臟腑怯弱內有積滯臍腹撮痛下痢膿血日夜

無度裏急後重腸鳴腹脹米穀不化少氣困倦不思飲食

或發寒熱漸向羸瘦

信州砒霜半兩 硝石半兩與砒一匙研入磁罐內用石

枯礬 黃丹各壹 朱砂飛壹 粉霜

膩粉各半 桂府滑石 乳香各壹

右研羅為細末用饑餅三兩浸開和元如梧桐子大每

服五元溫粟米飲下未愈加元數再服小兒一二元隨

兒大小臨時增減

三稜煎元 消積化滯

桂枝 乾薑 三稜 當歸 半夏

丁香皮 烏梅各肆 硃砂壹 巴豆兩半

右為細末煮麵糊和元如麻子大每服三五元橘皮湯

下

酒澱元 治酒癖引飲唾涎頭痛背倦小便赤數

白茯苓 木猪苓 蒲黃各半 神翹 白丁香

大麥蘖 乾葛 葛花各壹兩

右八味以神翹末二兩半滴水調成糊伴和煎末元如

梧桐子大放一宿用陳粟米同炒藥元每元子有竅出

香熟為度每服五七元不以時酒下

石鷲子元 治脇下有硬癖寒熱不盡

方九 廿七

石鷲子 青礞石 寒水石 海金沙 白丁香

鵬砂 硃砂 輕粉各陸

右為細末煉蜜和至第六七日元如梧桐子大茴香湯

下五元

桂元 治年久冷積諸藥不効者

桂 硃砂 甘遂 丁香 木香

芫花 巴豆如法製

右等分為細末水煮麵糊和元如粟豆大每服二三十

元溫水下量虛實加減

半夏丸 治癖結堅痼經久不差令人少食

半夏 杏仁 桂 川椒 細辛各

狼毒兩 附子錢

右為細末煉蜜和搗五百下元如梧桐子大每服五七元生薑湯下或生薑粥飲下

木香五積元 消化陳積和脾胃進飲食

三稜 蓬莪莖各錢 木香 丁香

陳皮 神麴各半 芫花壹兩并三稜木香參味並

稜并蓬莪莖木香切片子焙乾將餘醋投芫花並黃焦色

右為細末醋煮麵糊和元如菉豆大每服二十元生薑湯下

桂參元 崔氏療瘕癖積冷發如錐刀所刺鬼疰往來者

烏頭錢 人參 桂 附子 乾薑

赤石脂各捌分 朱砂壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大以煖酒服七元加至十元忌生冷醋滑猪魚雞蒜小豆油膩牛馬肉生血葱物等

養命元 取積

雄黃 硃砂各貳錢 續隨子兩半 輕粉壹錢

青礞石錢 芫花末壹錢 白麵兩半

右為細末滴水為元如豌豆大大人九元小兒如黃米大五元薑汁黃浮起取出乾用皂角子湯下積下藥出

化癖丹 治癥瘕癖等積

黃膺條 膩粉 朱砂各壹錢 巴豆霜半錢

前服食後亦得

妙應元 治氣虛有積

大附子 破故紙 葶澄茄 木香各半兩

右為細末和大麥麩藥同燒候麵黃焦去麵將藥為細末用麵糊和元如菘豆大每服三五元米飲下食後臨臥服

小化癖元 消癖氣治脹滿

青皮末錢 蝎梢錢 胡椒拾肆 麝香少許

右合杵如泥油單裹旋元如菘豆大食後臨臥煎葱白

湯下二元一方無青皮

烏金明砂餅子 治男子婦人左脇下痛

乾漆取壹兩 硃砂 沒藥 乳香各壹分

右為細末和作餅子以梧桐子大為劑子每服一餅子熱湯下

返真餅 治腸內一切卒暴百病

大黃 乾薑等分 巴豆減半熬令黃去皮心杵作泥又研入令碎

右大黃乾薑搗篩成末和巴豆膏熟研須急至勻煉白蜜為元更杵三千下若中惡客忤心腹脹滿刺痛氣急口噤停尸卒死者以暖水或酒服如大豆許三箇捧起頭令得下便愈若已口噤研一元成汁仍傾口中令從

齒間入至腹良驗忌薑蒜猪肉冷水

硃砂元 消痼冷沉積腸下作塊

肉豆蔻仁 木香 硃砂各壹分

右用白麵三錢與木香和為餅子將硃砂餅子拌勻以木香餅子包裹作毬子用銅錢二十文作一垛上安藥毬子四兩以炭火逼候勻遍黃色為度碾為細末滴水和元如梧桐子大每服三五元空心米飲下

茯苓元 治飲濕

茯苓壹兩 吳茱萸壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元不以時米飲下

貓糞散 治人腹中塊攻疰發痛諸藥不効

人家倉內貓糞生白衣者

右用泥毬子裹燒紅取出放冷研細入麝香少許溫酒一盞調下一錢立愈

妙香元 治傷寒結胃及療五日六日七日已上面赤大躁喘鼾鼻中黑或有血用龍腦漿水下丸斯須壓下躁喘

不出一伏時已裏下惡物并藥元據元法却收再用硃砂麝香末養之一丸可治三人不收亦得

牛黃 膩粉 麝香 龍腦各壹分

辰砂水飛 巴豆參伯壹拾伍 金箔玳瑁兩和勻

右件各研極細煉黃蠟為元每兩作三十元如小兒服

丸作菘豆大丈夫婦人并孕婦患經十日病證惡極醫
所難辨者但與一元服必獲大効驚癩年深不過五服
永不發如小兒驚執驚風可旋元三粒如菘豆大准前
湯使下小兒驚涎積執類赤口乾患經五七日已上小
方脉不能療者十歲兒服如菘豆大七元亦用湯使下
如婦人產後傷生硬物服之神妙大人小兒虛中有積
吐瀉諸痢不止臟腑疼痛甚者並宜服之臨時以歲數
虛實加減

丹砂元治積冷作痛不止

當歸兩壹 檳榔壹 白木兩壹 木香 雄黃
乳香各壹 麝香 犀角各半 沉香 安息香

朱砂各壹 桃仁叁拾 重校定此方內雄黃一味无分兩此方太
平聖惠方亦載之內雄黃合用壹分

右末之水麵糊和元如梧桐子大每服十元生薑湯下
白湯亦得

萬靈元治腹中積塊疼痛

硃砂 沒藥 乳香各壹 丁香伍
巴豆伍 肉豆蔻壹

右為細末每用晉棗一箇取核內盛硃砂沒藥用麩裹
燒熟不用麩取出棗將其餘藥末同棗合和每量虛實
旋元傷寒恣茶下傷食食湯下心痛艾醋湯下婦人產
後紅花酒下婦人赤白帶下當歸酒下疝疾桃柳湯下
赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下五色痢荆芥木瓜湯下

並一元至二三元

乳石烏頭元治男子百病虛弱勞冷宿寒久癖及癥
瘕積聚或嘔逆不下食并風濕諸病无不治之者

鍾乳煉 紫石英 硫黃 赤石脂 礬石
枳實 甘草 白朮 紫花 茺蔚
防風 白薇 桔梗 天雄 皂莢
細辛 菴蓉 人參 附子 藜蘆各壹兩
乾薑 吳茱萸 蜀椒 桂 麥門冬各壹兩
烏頭兩壹 厚朴 遠志 茯苓各壹兩 當歸貳兩
棗膏伍 乾地黄壹兩拾

右末之蜜和搗五千杵酒服如梧桐子十元日三稍加

小丁香煎治積滯止心腹疼痛 新附

丁香兩壹 木香兩壹 硃砂 粉霜各壹兩 五苓脂拾伍
肉豆蔻 巴豆各壹

右為細末水煮麵糊和元如粟米大每服五七元食後
米飲下

酒澄元治酒積開胃取痰 新附

巴豆壹拾 粉霜各壹 神麩兩壹 乳香錢壹
半夏 粉霜各壹 輕粉壹錢
麵壹斤 硃砂壹兩

右將麥蘖末半兩用水半椀熬麥蘖末至八分一盞去滓

再入黃連三二錢熬成水黃和硬軟得所少水只熬黃連水添和元如小豆大熬乾用陳粟米半升炒藥元子如銀褐色為度每服一元食前開胃口食後止痰涎嗽生薑酒下至二元消食濃煎蘿蔔湯下中酒嚼丁香生薑酒下二元如要動取積嚼破一元相臟腑加減大有神効

黃疸

知母散治中熱黃疸寒熱往還脈數煩倦四肢解息

柴胡兩半

知母

恒山各壹分

鱉魚甲半兩青厚者削去脊骨裙襴醋炙焦

人參

白茯苓

山茵陳葉

黃連

生犀角

羚羊角各壹分

甘草

草龍膽各半兩

方九

卅四

右為細末朱砂三分細研令勻以薤合每服二錢人參湯調下食前日三服

茵陳元主黑疸身熱間黑小便澀躄重方

茵陳兩壹

甘遂壹分

當歸

蜀椒各半兩

杏仁

大黃

半夏各壹分

葶藶

茯苓

乾薑各壹兩

枳實

白朮各伍分

右為細末煉蜜和元如梧桐大空心米飲下三元日三服

茵陳湯主時行黃疸結熱面目四肢通黃乾嘔大便不通小便赤黃腹痛心煩方

茵陳

半夏各貳兩

生薑肆兩

大黃貳兩

芍藥

白朮各壹兩半 枳實 厚朴 前胡各貳兩

右件吹咀以水四斗煮取九升七分十分服

杏仁茯苓元主患黃心下縱橫結堅小便赤色此是酒疸

茯苓

茵陳

乾薑各壹兩

半夏

杏仁各壹分

商陸兩半

甘遂壹分

枳實伍分

蜀椒貳分

白朮伍分

右為細末煉蜜和元如蟬豆大每服三元以薤湯下之

夫患黃疸常須服此若渴欲飲水即服五苓散若妨滿

宛轉元治之

小茵陳元治黑疸身熱間黑小便赤色

茵陳

枳殼

白朮

赤茯苓 甜葶藶各壹分

半夏

當歸

川椒

大黃各壹分 甘遂壹分

右為細末煉蜜和元如蟬豆大每服三元食前白湯下

甘露飲子治胃熱齒齲宣露口臭心中多煩飢不欲食喜

睡目臉重及治小兒瘡疥已發者并治血虛黃疸尤効

生乾地黄

熟地黄

天門冬

枇杷葉

黃芩

石斛

枳實

山茵陳

甘草

右等分為細末每服二錢至三錢水一大盞煎至七分

去滓食後溫服若齒齲宣露煎藥稍熱嗽之冷即吐却

極効

恒山湯治急黃酒黃心黃勞黃氣喘欲發

柴胡兩 恒山 芒消 大黃各拾兩 黃芩

龍膽 茵陳 秦艽各壹兩 梔子拾肆

右為細末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

茵陳梔子元 治時行病急黃并瘴癘疫氣及疔瘡

茵陳 梔子 芒硝 杏仁各貳兩 巴豆壹兩

恒山 礬石各貳兩 大黃兩 豉伍合

右為細末煉飴為元如梧桐子大每服三元米飲下以吐利為佳不知加

朱砂元 治瘵食氣通宜黃腫多年老羸及一切塊積

朱砂 硃砂 麝香各壹分 雄黃 黃丹各半兩

方九 膩粉參筒 巴豆參拾个去皮出油後爛研

右為細末入巴豆膏內用麩塵和滴水元如菘豆大每

服五七元用水半盞煮一沸取出臨卧溫酒下至晚但微瀉二三行是効並不搜攪入臟腑

赤小豆散 治急黃身如金色

赤小豆 丁香 黍米 薰陸香各壹分

方九 荜蒂半 青布伍十燒灰麝香分壹

右為細末與研藥和勻每服一錢米飲調下不以時若用少許鼻中當有黃水即効

水解散 治溫黃天行時氣預防

麻黃兩 桂 芒硝 甘草各壹兩

大黃貳兩 乾葛半兩

右為細末空心冷水服一錢如欲汗即以葱豉粥熱投之

赤小豆散 治陰黃吐

赤小豆 丁香 荜蒂各貳錢 麝香壹錢 青布灰錢

右為細末每服一錢溫水調下日四五服若取少許吹鼻中即出黃水為効

茵陳五苓散 治因病未除忽然一身面目悉黃如橘色由瘀血在裏或因大熱以冷水洗之濕熱相搏薰蒸肌肉謂之黃疸宜此藥并摩皮湯方在後

猪苓 茯苓 澤瀉 白朮各壹兩 桂半兩

右為細末以茵陳蒿一分水一盞煎至七分去滓調二錢匕服不以時

荜蒂吹鼻散 治黃疸面目爪甲皆黃心膈躁悶

荜蒂 赤小豆 秫米 丁香各壹分

右為細末取如豆大內鼻中痛搗之須臾當出黃汗或涎口中出升餘則愈若病重者加一豆不羸即復內鼻中即効

山茵陳散 經驗解黃

山茵陳 梔子各壹兩 枳殼壹个

右細剉為一劑水二升煎至一升作三服去滓溫冷任意服如臍氣實秘結加大黃一兩未愈再作一劑小便

不利加茯苓一兩

丁香散治急黃

丁香

荜蒂

赤小豆

各半

右為細末以雞子清一箇相和用新汲水調頓服當吐利即効未應再服

苦酒湯治病人一身面目悉黃身躄四肢微腫胃滿不得

卧汗出如黃栢汁此由大汗出卒入水中所致謂之黃汗

黃耆

兩

芍藥

桂

各半

兩

右為鹿末每服五錢水一盞半苦酒半盞煎至一盞去滓温服

茵陳蒿湯治食畢頭痛心忪拂鬱由失飢大食胃氣不轉

方九

廿九

與熱相搏謂之穀疸

茵陳蒿

兩

大黃

兩

梔子

壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服非時

赤帝散治心下懊痛足脛腫滿小便黃色面發赤斑由大

醉當風入水冷熱相搏蒸於脾氣所致謂之酒疸治如飲

法脉浮腹滿欲嘔吐者先吐之脉沉腹滿大便秘者先下

之吐之宜此藥

荜蒂

赤豆

秫米

各半

右為細末米飲調下二錢不以時

小建中湯治疸面目黃氣力乏少脛脛痿弱由榮衛虛弱

裏急虛熱與濕氣相搏所致治屬虛勞

芍藥

兩

桂

參兩

甘草

貳兩

右為鹿末每服五錢水二盞薑三片棗一箇錫如棗大煎至一盞去滓温服

礬石散治身皆黃發熱惡寒小腹急小便難大便黑由大勞已交接竟入水所謂女勞疸

礬石

硝石

右件等分為細末麥粥飲調下二錢

小半夏湯治身面黃小便色如故欲自利腹滿而喘不可

除熱除必噦此腹中有飲謂之濕疸

半夏

兩

生薑

兩

右以水七升煮一升半分温三服去滓

方九

廿九

黑虎元治食氣遍身黃腫氣喘噎食不得心胃滿悶

右用不蚰皂角一挺去皮心以醋炙令焦為末每用皂

角末一分入巴豆七箇去皮出油和勻以淡醋磨好墨

和元如麻子大每服三元食後橘皮湯下日三服至隔

日又增一元每隔日增一元以利動為度常服大消酒

食

大黃元治心下懊痛足脛腫滿小便黃色面發赤斑由大

醉當風入水冷熱相搏蒸於脾氣所致為之酒疸治如飲

法脉浮腹滿欲嘔吐者先吐之脉沉腹滿大便秘者先下

之宜服此

大黃

苦葶藶等分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大蜜湯下十元十五元以利為度

雞峯普濟方卷第九

方九

早

雞峯普濟方卷第十

馮翊賈兼重校定

血 小便

千金要論曰稟上云吐血有三種有內衄有肺疽有傷胃內衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間津液出還流入胃中或如薑羹汁或如切蠟血凝停胃中因即滿悶便出或出數斗至于一石者是也

得之於勞倦飲食過常所為也肺疽者或飲酒之後毒滿悶吐之時血從吐後出或一合半升是也傷胃者因飲食大飽之後胃中冷物不能消化便煩悶強嘔吐之所食之物與氣共上衝臍因傷裂胃口吐血色鮮赤腸絞痛自汗出其脉緊而數者為難治也

方十

問曰病胃腸支滿妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清瘦目眩時時前後失血病名為何何以治之對曰病名血枯此得之年少時有所大奪血醉以入房中氣竭而肝傷女子則月事衰少不來也

治驚 治先因吐血止而後嗽中血出如線引脇下時痛日漸羸瘦此由悲憂傷肺肺主氣而血隨氣傷則血無所主故始則暴去後隨病而上下脉緩小可治細數加急者不治宜此藥并黃老散

活驚 酒各五升烏梅五箇碎桃柳枝各對壹合共用新綿包于慢火同煮令驚死候減耗壹半取出綿包子將驚去甲腸肚細切研爛再熬約得至半碗將蓋盛將甲骨炙令焦黃色入後藥

人參 琥珀 木香 柴胡 枳實
 杏仁 黃耆 恒山 安息香 附子
 當歸 桂 羌活 知母 茯苓
 烏梅肉

右件等分為細末將散膏加杵千下元如桐子大温酒下三十元食前臨臥服更有使胡黃連三稜亦等分

木香元 治無氣及一切積聚敗血為病

人參 木香 茯苓 去皮水煮 沒藥
 青橘皮 菴間子 各壹 檳榔
 白豆蔻仁 各伍 水銀 肆兩水煮壹伏時
 當歸 捌兩 金牙石 麒麟竭 各半 薄荷

方十

荆介穗 各半 大膽 拾肆 不坤皂角 壹挺
 右為細末分一半別入燈上燎者巴豆杏仁各二十一箇同用麵糊為元如梧桐子大治乾血氣積血氣有巴豆杏仁者名大藥無巴豆杏仁者名小藥治產後及血氣荏弱不下食血暈大効一半藥末只煉蜜為劑迴面向東杵一千下喫時旋元小豆大每服五七元看病大小用之湯使臨時

白頭翁湯 治下血連月不羸

厚朴 貳分 阿膠 黃連 秦皮 附子
 黃蘗 各壹 龍骨 貳 茯苓 白頭翁 芍藥 各貳
 乾薑 當歸 赤石脂 甘草 各壹

右為細末每服二錢入棗一枚擘破以硬米飲煎至七分和滓温服不以時
血竭散 治婦人血氣產後渴燥一切血邪乱語眼如血袋及血上衝口鼻血出

硃砂 各壹 海馬 壹對 乾漆 壹 蜜虫 貳拾 龍腦 壹錢
 水蛭 拾肆 當歸 鵬砂 阿魏 各壹
 右研為細末每服一錢冷水調下如產後血上衝口鼻血出用童子小便調服三服必効

人參黃耆散 治勞嗽嘔咯血出

黃耆 貳 紫苑 款冬花 知母 芍藥

方十

人參 阿膠 各壹 食茱萸 桂 各半 糯米 半
 伏龍肝 壹雞 欒甲 壹
 右為細末水一盞煎三錢食後臨臥熱服盜汗入竹三葉同煎咽痛入乾薑皂大困乏入葱二寸薑七片棗二箇嗽甚入杏仁七箇鷲悖入茯神半錢煩渴入烏梅二箇礎碎氣逆入橘皮二錢頭目痛入生甘草二寸咯血紅花少許同煎

傷風湯 主傷中肺氣不足脇下疼痛上氣咳嗽唾有膿血不欲食惡風目視眩眩足脛腫痛

小麦 壹 熟地黄 柔白皮 紫苑 各壹 麻仁 壹兩
 阿膠 兩 人參 桂 甘草 各壹 芎藭 肆兩

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片錫一棗大煎至六分去滓溫服

伏龍肝散 治衄血

伏龍肝或如雞子大

生地黃兩

芍藥兩

乾薑

吳茱萸

甘草

白芷

桂各參兩

芎壹兩

細辛銖

右為細末每服二錢水三分酒七分煎至七分去滓溫服不以時

附子地黄散 治虛勞吐血下血衄血崩血漏血

附子

乾薑

桂

黃耆

龍骨

烏魚骨

白朮

牡蠣

生乾地黄各貳兩

白芍藥兩壹

右為細末每服二錢空心米飲調下

竹茹湯 治婦人汗血衄血尿血下血

竹茹貳升

乾地黄兩肆

人參

芍藥

桔梗

當歸

甘草

芎

桂各壹兩

右為細末每服一錢水一盞煎至七分食後去滓溫服

栝菜膏 治咳嗽唾血久不較

人參

黃耆自土皮畧各壹兩

桑寄生

當歸

沉香

荆芥穗各錢

麥門冬兩

黃連

起為度壹分半

槐實片切炒色

右為細末每服二錢匕用新汲水八分化破栝菜膏少

虛氣弱或投高墜下勞傷所至其脉虛弱當補陰平陽宜
阿加陀元 方在後

人參 白木 桔梗 黃耆 白茯苓
山藥 甘草 阿膠
右件等分為細末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫
服不以時

芍藥散 治吐血衄血溺血皆藏氣虛腸氣傷或起驚悸

生竹皮各壹 芍藥 黃芩各壹 當歸 甘草
芎 桂各壹

右為鹿末每服二錢水一盞煎至七分食後去滓溫服

黃土湯 治吐血衄血下血

方十
黃土各壹 甘草 黃芩 附子 白木

阿膠 熟地黃
右件等分為鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓食
後溫服

小刺薊煎 治吐血

刺薊 白薄荷各貳 荆芥 生地黃
栢葉 赤芍藥 甘草各壹

右為細末煉蜜和元如彈子大食後茶清嚙下一元

刺薊散 治鼻衄晝夜不止

刺薊 生地黃 黃連 栢子仁 大黃
栢葉 苦參各壹

右為鹿末每服五錢水二盞入青竹茹半雞子大煎
至一盞去滓溫服

小伏龍肝散 治五臟經熱鼻衄心胃煩悶

伏龍肝 赤芍藥 當歸 黃耆
犀角屑 刺薊各壹 生地黃各壹
右為鹿末每服五錢水二盞竹茹一雞子大煎至一盞
去滓溫服

黑玉丹 治吐血先聞腥臊臭出清液胃腸支滿妨於食目

眩時時前後失血此由素經大失血若醉入房中氣竭傷
肝女子則月事衰少不來病名血枯宜烏賊魚骨元

槐花各肆 枳殼 地榆 黃耆

方十
芎各貳 五靈脂 五倍子各壹

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服三十元空
心米飲下

人參栢葉湯 治宮臟虛弱下血不止

人參 栢葉仁 芍藥 熟地黃
當歸 阿膠各半

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服裏急
虛寒脉凝欲絕者宜加乾薑附子桂等分

麝香綿灰煎 治咯血

麝香錢半 綿灰 乳香各壹 防已各壹
阿膠 甘草各半

生地黄湯 治鼻衄面無顏色
右為細末煉蜜和元如雞頭大每服一元含化嚥津

生地黄黃兩半 赤芍藥 赤茯苓各三分
栝菜壹兩 阿膠 當歸各半

右為細末煎黃耆湯調下二錢及搐向鼻內先含水一口閉目搐入然後吐出水即止神妙

蒲黃散 治大便出血及口鼻皆出血上胃心氣急此是勞執所致

生地黄兩 蒲黃升壹 地骨皮兩伍
黃芩 芍藥 生竹茹各叁

右為細末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後溫服

阿膠散 治鼻衄不止此是陽毒傷肺

阿膠 伏龍肝 黃芩 地骨皮
葱白連鬚 豉壹合

重校定此方內四味死分兩其衛生秘方內有黃土湯與此方治療藥味相類阿膠等各用貳錢半

右剉令勻以水一大盞半煎至一盞去滓入生地黄汁二合攪勻分溫三服非時

鹿角膠煎 治血少氣多躄熱羸瘦

鹿角膠壹兩 乳汁壹升 酥 蜜
薑汁兩

右先下乳煎即下鹿角膠銷即下酥等緩火煎至七八沸均器中凝以竹刀割服之熱水下半匙食後臨臥

柔脾湯 主脾氣不足下焦虛冷胃膈滿塞汗出脇下支滿吐血下血

熟地黄兩叁 黃耆 桂 芍藥 甘草各壹兩
右為鹿末每服二錢水酒少許煎至六分去滓溫服

槐花元 治腸風下血

槐花兩壹 蒲黃 地榆 卷栝各半 乾薑分壹
右為細末每服一錢水一盞煎數沸不以時候服

阿伽陀元 治久新百疾諸病失血寒熱往來不知痛處或驚悸恍惚昏昏似醉膚麻斑駁失心顛狂面腫心悶尸注復連夢想顛倒身軀瘦損乍起乍卧咽中噎塞疔墮下利下部腫痛中惡疰疔疰下堅疼心腹脹滿氣急奔衝上下

紫檀青木香 苗根 欝金 黃蘗 胡椒各壹兩
右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服一元米飲下不以時

百草霜散 治金瘡止血

石灰斤壹 刺薊兩陸 馬齒兩貳 莖兩肆 百草霜斤壹
右先將草藥四味同搗爛漸漸入石灰再搗勻捏作餅子陰乾為末乾摻之

大犀角散 治熱病毒氣未解心肺積熱吐血不止心中壅悶

犀角屑 梔子仁 地骨皮 子芩 川大黃各半
麥門冬分叁 甘草 茯神 川升麻 茅根
蘆根兩半 生熟地黄壹兩

右先下乳煎即下鹿角膠銷即下酥等緩火煎至七八沸均器中凝以竹刀割服之熱水下半匙食後臨臥

右為細末每服四錢水一盞煎至六分去滓非時溫服
白朮元 治吐血腹中絞痛汗出胃中悶此由飲食過傷
胃中冷不能尅消便覺煩悶嘔吐所食之物與氣共上衝
感因傷胃列表

白朮兩 當歸兩 神翅 乾薑 人參各半

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服米飲下十元食
後服

小相素湯 治吐血不止

栢菜 艾菜 乾薑 阿膠等分

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服

棕櫚散 治久鼻衄不止

棕櫚 刺薊 樺皮 龍骨

右件等分為細末每服二錢米飲調下

黃龍散 治脾毒臍毒下血

鯽魚壹頭大者不去鱗只去腸肚 葦撥 木香各壹分

黃連半兩

右三味為細末內魚腹中以數重濕紙裹入糖灰火內
燒熟取去皮骨後焙乾細研為末每服一大錢空心米
飲下腸風下血並治

地黃湯 治衄血

生乾地黃壹兩 芍藥 牡丹皮各肆分

玄參壹分

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後臨卧
溫服伏熱者以犀角代玄參

人參元 治鼻血

人參 生蒲黃各半 甘草生壹分

麥門冬兩

右為細末煉蜜和元如酸棗大每服一元溫水化下含
化亦佳忌熱麵炙燂等物

犀角地榆湯 治雜血兼治蠱及着藥等下血而有熱者

乾藍 犀角 地榆各捌分 蜜貳分

右四味以水五升煮取一升半去滓下蜜煎取五
合分三服此藥治熱毒蠱妙

艾素元 治血

艾菜 赤小豆 當歸 阿膠各肆分

右為細末水煮麵糊元如梧桐子大每服三十元空心
米飲下

藥湯 治吐血至一斗脉細小氣奔急此由陽暴逆其血
橫流無所居不循經絡而行故其出亦暴譬如泥水之來
宜此藥若脉洪太喜渴心中煩宜地黃煎在後方

藥菜 乾薑 阿膠

右件等分為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

人參湯 吐血服湯轉加悶亂煩躁紛紛欲嘔顛倒不安者

此由逆氣停留血在胃上其脉沉伏急須吐之

瓜蒂分 杜衡 人參各壹兩

右為細末溫漿水調方寸匕須臾更吐清黃汁或血一二升無害

黃耆散 治吐血不止

黃耆 阿膠

右件等分為細末米飲調二錢不以時

文愈元 治鼻衄不止

朱砂 鴈砂 牙消各壹錢

右為細末醋煮麵糊和元如麻粒大遇衄時先用新汲水洗兩脚心淨次用蒜二片研如泥貼在脚心上次一藥元貼在蒜上却以紙裹定立地擡頭三次立止

方十

十二

藥皮湯 論諸氣皆屬於陽諸血皆屬於陰陰盛則陽虧陽盛則陰虧經所謂陽勝則陰病陰勝則陽病諸血衄血由陽氣侵陰陰氣被傷血失常道或從口出或從鼻出若暴出而色鮮心煩躁悶時欲引出至一二斗此陽邪暴入於陰分血得執則流散蓋人之經血譬如天地之經水天暑地熱則經水沸溢而湧起故有衄血肺疽其證大同而小異其脈洪數者為逆微少者為順衄至一二斗悶絕者宜此并剪金湯後方在

葉皮 梔子各壹兩 甘草半兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

地黃煎 治脾虛失血

生地黄汁升 大黃末壹兩

右將地黃汁熬去一半內大黃末一匙再熬和元如梧桐子大每服五元米飲下不以時

藍根人參散 治一切血

盧藍根壹兩 人參半兩

右細剉每服二錢水一大盞煎至六分去滓溫服食後

紫苑元 治吐血咯血嗽血

真紫苑 茜根

右等分為細末煉蜜和元如櫻桃子大含化一元不以時

淡黃元 治虛冷下血不止

方十

十三

石灰炒赤 硫黃

右等分為細末水煮麵糊和元如梧子大每服三十元空心米飲下一方使白麵不使硫黃

治鼻衄 不可欲絕者

大刺薊壹兩 相思子半兩

右為細末每服十分水一盞煎至七分去滓不以時服溫服

隔竹養粥 治服乳石人咳嗽有血

糯米 白蠟彈子大

右以青竹筒一箇入水一升下米與蠟密封了口重湯煮熟稍熱任意食之

川芎散 治男子婦人小兒鼻血

川芎壹兩

甘草壹分

右為細末每服半錢水煎乘熱服不以時

蒲黃散 治鼻血

蒲黃

龍骨等分

右為細末乾噀鼻中

治小便鮮血

大麥孽

竹葉等分

右為細末或鹿末或不搗同煎溫服不以時

涼血散 治上熱吐血

蛤粉肆兩

朱砂壹兩

右為細末每服一錢新汲水調下

方十

牛膝元 治血癥臍腹堅脹下痢羸瘦

牛膝肆兩

宿焙為末

乾漆半兩 碎兩 碎兩

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子大每服五元空心

米飲下日二三服

栢葉膏 治吐血下血

右用新栢葉

去木取葉不要墳墓上墓上採寺中最佳

三斤清水淘控乾木

石臼中搗旋洒些鷹水只取一兩盞許俟搗得爛新綿

裂取自然汁生絹重瀝退銀盂內重湯慢火熬成膏旋

煉旋添白沙蜜三兩俟如稠餈用新坭瓶收之少許含化

治金瘡流血不止

饒州白坭器

黃栢末等分

右為細末以唾津調塗

剪金湯 治吐血

剪金

花并莖葉陰乾不以多少

右濃煮服之立定

治吐血下血後渴不止及產後渴不止

蓮子心不以多少

右生取為末每服二錢米飲調下不以時

治時氣鼻衄血 五七日不住

人中白不以多少列在

新瓦內火逼乾

右研過入麝香少許溫酒調下

方十

治中蠱下血 欲死

右以藍汁一服半盞頻與服

治男子婦人小兒鼻衄

右以頭上掠髮子男左女右繫中指根於風府穴以手

按之數下

修善散 治腸風大便血

當歸多炒

右為細末食前空心一大錢濃煎赤小豆汁取一盞與

當歸同煎五七沸通口頓三服立効

治吐血等方

仙經治鼻衄血 用白膠香研為細末每服一錢新汲水調下無時候

又方 治食吐用胡椒新汲水下十粒無時立効

大聖散 治吐血咯血

黃蜀葵 去毒 焙乾

右為細末用一錢雞子清或溫水調下食後

救暴散 治鼻血 一方用壁上蜘蛛 燒灰於出血草中 真明淨乳香一塊皂子

大用倒流水於硯瓦中以墨同研約半盞碎盡香為度頓服止

又方 急以椽塵 一名 歌塵 捻於出血鼻竅前氣吸一吸一開指

候盡再捻一面出一面吸塵得少頃方定更吸以止為度
罷用新水輕着洗四面并面上不得動着至三兩時辰
慢慢取去乾血塵

方十 十六

治衄血等方

治牙衄 出血不止用蟾酥塗立止取蟾酥法將蝦蟇擠兩眉

正白汁放在青竹片上不可對面恐汁射人損目即使放之勿殺

治淋 潮煩臥不安隨咯唾有清血

天南星 揀不堅硬絕白 大者不洗生用

右不以多少搗為細末每服秤半兩用水兩大盞生蘿
蔔大指大十塊同煮水用盡溫湯洗淨蘿蔔用溫熱飲
嚼下不以時

治卒中蠱毒 下血如肝晝夜不絕臟腑不壞

桔梗

右取生者搗汁服七合

又方

蝟皮 燒灰存性

右水服二錢溫酒送下

治男子婦人下血

五靈脂 伍兩

右用水二升煮去滓熬成膏別入神麴一兩炒枳殼一
兩炒去穰為末同和元如梧桐子大每服十元十五元
米湯下不以時

治腸痔下血 如泥水久不羸者

右用河水每遇洗衣罷便泔浸之久浚為佳無河水井
水亦得

方十 十七

小品治下血連歲不愈 下清血痿黃者

黃連 去須為末以雞子白和 為餅子猛火炙令黃焦

右為細末每服一錢米飲調下次服

蒼朮 米泔浸參 日去皮 甘草 燈心

米囊子

右等分細剉每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服極
有神効

五傷湯 治勞傷榮衛吐血下血諸虛不足

當歸 白芍藥 各參 人參

川芎 各貳分 甘草 桂 各壹兩 阿膠 壹分

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至

六分去滓食前温服

開胃阿膠散 治吐血

阿膠片參拾

木香錢參

糯米合參

右為細末每服二錢白湯調下食後臨卧

紫金元 治嗽血衄血

紫金粉拾分露蜂窠

貝母肆分

蘆薈壹分

右為細末煉蜜和元如拍頭大一元以水七分煎至五分温服衄血以酒半盞化一元服之

治鼻衄

右以羊糞乾者一枚扎在血出鼻中

小便

方十

十八

右草飲子 治氣淋小遺澀痛

石韋湯浸刷

藎麥

木通各壹兩

陳橘皮

茯苓

芍藥

桑白皮

人參

黃芩各參分

右為細末每服二錢水一大盞生薑一分煎至七分温服

榆白皮散 治久挾風冷入脬中小便肥濁如膏或如稠泔

成塊者

榆白皮

葦子

滑石各壹兩

沉香

黃耆

黃橘皮

黃芩

甘草各壹分

藎麥兩貳

右為細末每服二錢米飲調下

石淋 若沙石自小便出出輒欲死此由故執伏留腸間與水液相搏結而成石訖其脉散澀而無常度謂之石淋宜琥珀散後方在

琥珀

沒藥

乳香

蒲黃

百部末

桃膠

郁李仁湯浸去皮研入麴少許研勻令乾入温水和作餅子焙為末

右各等分研勻温酒調下一錢腹空服仍先用引藥

好胡桃一箇燒存性

右細研酒一盞調服移時服七寶散

阿膠湯 若血隨小便出每便輒痛由心氣留熱搏於小腸蓋心主血遇熱即流散滲於脬中訖其心脉大散而數疾謂之血淋宜此阿膠湯其不痛不澀者非熱非淋由驚氣

方十

十九

乘心心氣散溢血無所歸訖其脉濡弱宜地榆飲子後方在

猪苓

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠各肆分

車前子貳

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服不以

時

葵子湯 治小便凝澀不通

葵子

車前子

茯苓

白朮

木通

赤芍藥

右各等分為細末每服二錢酒調下

又方 若便輒微痛漸艱難數往而欲出痛不可忍亦由心與小腸受熱腸中熱則傳道澀或由服五石及其氣搏

津液枯涸跡其尺脉微小而疾謂之熱淋

赤茯苓兩 葵子 石韋 澤瀉 白朮各半

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服食後

固脬元 治脬寒小便頻數又一方覆盆子煎兩

益智人兩 石菖蒲壹兩 白龍骨分

川烏頭壹兩生去皮臍剉用牡蠣粉壹兩炒

右為細末酒煮麵糊和元如梧桐子大每服空心煎益

智湯下四十元

阿膠湯 治虛熱小便利而多或因當風取冷脚氣發動兼

消渴消腎脉細而弱服此湯立減

阿膠兩 乾薑兩 麻子 遠志各壹兩半

方十

附子壹個

右為鹿末每服三錢水二盞煎至一盞服之說去小便

多利日夜數十行至不計數者頻服

大固脬元 若小便滑數日夜十數行此由脬門不閉水液

不藏或因思慮過多心氣散溢小腸又弱不能禁制者至

夜夢恍惚詠其脉微散宜大建中湯方見發熱門 又或作勞過

度腎與膀胱俱虛不能禁固至於脛酸無力其脉微弱

苗香兩 附子兩 兔絲子揀淨水淘酒浸壹宿承潤搗鹿末焙貳兩

桑螵蛸兩 戎鹽壹分

右為細末酒煮麵糊和元梧桐子大米飲下三十元空

心服一方加磁石半兩雞臍壹兩

菴蓉元 若小便純血血下凝結假假氣短日就羸瘦不食

此由陽氣不固陰無所守五液注下詠其脉散遊欲絕而

身冷者死治屬虛損

兔絲子揀淨水淘酒浸壹宿承潤搗鹿末再焙 乾地黄

鹿茸各壹兩

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子大米飲下三

菴白湯 若卒暴不通小腸膨急氣上衝心悶欲絕死此由

暴氣乘併膀胱或從驚憂氣無所伸鬱而不流氣衝脬系

不止詠其脉右手澁左手急大宜服

青橘皮兩 葵子壹兩 菴白壹兩

右為細末每服二錢水一盞至七分去滓溫服不以時

方十

琥珀散 小便澁痛

淋石分 琥珀兩 當歸

重校定此方內當歸一味無分兩此方指述方向亦載之當歸用半兩

右為細末米飲調下二錢匕不羸服後方

兔絲子元 若胎肥隨便而下策策而痛由腎氣虛衰精液

不收氣不禁固詠其脉散濇而微謂之膏淋宜此

兔絲子揀淨水淘酒浸壹宿承潤先搗為鹿末焙

桑螵蛸兩 澤瀉壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大米飲下三十元空心

蓬莪散 治小便暴不通方

蓬莪茂 苗香 生茶等分

右為細末每服二錢水一大盞益二錢葱白二寸同煎至七分和滓空心溫服

厚朴散 治白便濁夫婦小兒並用專治白濁不治淋

厚朴 牡蠣 白木 各半兩

右為細末空心米飲調下二錢日進二三服

藟葉散 論曰小腸為受盛之府傳導水液若始覺小便其

色赤黃漸漸不通臍腹膨亨此心經蘊熱傳於小腸小腸受濕滲於脾胃屈擗而系轉其心脉大而牢治之

果茶藟葉 兩 滑石

右同研為細末沸湯點二錢溫服

石葶湯 治小便淋瀝疼痛

方十 廿三

石葶 車前子 等分

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

茯苓湯 小便白濁不利時有作痛

茯苓 沉香 各壹兩 一方用琥珀代沉香

右為細末每服二錢白湯點食後臨臥服之

地榆飲子 治小便凝澀

新香附子 新地榆

右咬咀各濃煎湯一盞先呷附子湯次呷地榆湯以盡為度末知再服

治大小便不通等方

治大便不通

右以皂角燒灰為細末每服二三錢粥飲調下不以時

治小便不通

琥珀 末

右一味空心濃煎管草根汁調下二錢乃通

治小便數

純糯米稈一把去穗去根取稈淨器中燒作灰

右臨臥每用一合湯浸良久澄去滓乘溫頓服之其味如灰汁

治小便不通 或利不得服滑瀉藥急悶欲絕方

鹽二升

右以鐺炒用布綿帛裹臍下按之小便當漸通之用

方十 廿三

後方

又方

右取鹽填滿臍中大作艾炷灸令熱為度

治小便數

右取純糯米糠一手大臨臥時灸令軟熟啗之仍以溫酒送下

小豆散 治腫滿小便不利

赤小豆 燒熟

右細末酒調二錢食前葱白酒尤佳

鹿角丸 治小便數日夜一斛

鹿角 淨開炙焦黃為細末

右為細末酒煮麴糊為元如梧桐子大每服五十元空
心米飲下日三服

開格大小便不通 大承氣

奉職趙令儀妻忽吐逆大小便不通煩亂四肢漸冷無脈
九一日半與大承氣湯一劑至夜半漸得大便通脈漸生
翌日乃安此開格之病極為難治北所見者惟此一人

雞峯普濟方卷第十

方十

廿四

雞峯普濟方卷第十一

馮翊賈兼重校定

心痛附

養心丹

補益心氣常服安神去百邪調順榮衛補養腎氣

首蒲 紫石英 茯神 菖蓉 遠志

交門冬 豆卷 栝子仁 當歸 細辛

卷栢 乾薑 人參 石膏 澤瀉

薯預 秦朮 丹參 熟地黄 桔梗

白斂 前胡 防風 白朮 半夏

桂 各壹兩 牛黃 鐵粉精 麝香 朱砂 各壹分

金箔 各壹片 銀箔 各壹片 一方多山藥甘草芍藥各壹兩

右為細末用棗肉為元如菜豆大以牛黃等為衣人參

方十一

湯下三十元鐵粉精乃炉内鐵煙如紫粉

鎮心丹

治憂愁思慮過傷心氣不足神色損變志意沉伏

怔忡恍惚眩冒恐怯驚怖及治骨熱諸勞失精亂夢飛尸

鬼注肌瘦色黃食少倦怠夜寢盜汗胃府氣痞以至大怒

小恐所傷吐血失血丈夫勞損婦人血虛產前產後虛損

種種心疾

熟地黄 遠志 茯苓 栝子仁 白朮 各壹兩半

人參 菖蒲 交門冬 酸棗人 木通

百部 貝母 茯神 甘草 朱砂

天門冬 赤石脂心 防風 桂 各壹兩

棗肉 兩肆

右為細末煉蜜和元如梧子大每服三十元人參湯下
如大段血氣虛弱食少不眠煎酸棗人湯下

明冬山藥湯 補心虛驚悸治虛風顛掉風中有熱眩冒風
氣百疾

麥門冬 山藥各貳兩 人參 甘草 生地黄

神麴各參分 桔梗 紫苑 犀角 白茯苓

柴胡 黃芩 大豆卷 芍藥白者 白朮

防風 阿膠 伏神 芎 當歸各半兩

朱砂分壹 乾薑分壹

右為細末每服二錢煎棗湯調下食後

安湯 補心虛驚悸

方十一

麥門冬 山藥各捌分 芎 茯苓 犀角

桔梗 柴胡 紫苑 黃芩 白朮

白芍藥 防風 阿膠 當歸 伏神

大豆卷各貳分 神麴 生地黄各參分

人參 甘草各陸分 乾薑壹分 朱砂貳錢

右除研藥外為細末與研藥和勻每服半錢食後臨臥

棗湯調下

續耆湯 治稟氣怯弱將溫過度積溫成熱薰蒸五臟或外
觸微寒薄於咽而寒熱相壅攻衝肺經或咳嗽曲折或胃
滿短氣或壅邪漸退氣血猶弱或胃口虛煩飢而不欲飲
食或餘邪尚留經絡小勞輒劇又不可服諸補藥者宜服

黃耆 人參 秦艽 甘草 紫苑

桑白皮 五味子 前胡 陳橘皮 白茯苓

貝母 桔梗 山藥 白芍藥 當歸

天門冬 乾地黄各壹分 半夏 木香各半

右為細末每服二錢水一盞入生薑五片棗一個同煎
至六分去滓溫服不以時

朱砂膏 鎮心安神解熱及肺損嗽血等疾

朱砂 真珠 生犀 玳瑁 人參

甘草各壹兩 蘇合油貳分 牛黃 麝香 生腦

鵬砂 琥珀 羚羊角 安息香 遠志

茯苓各半兩 金箔 鐵液粉各壹兩

方十一

三

右都為細末合研勻煉蜜破蘇合香油劑諸藥為錠子
更以金箔裹之每服一皂子大食後合化丸嗽血與阿膠
相雜服之妙

鎮心散 治風氣驚弱恍惚失常忽嗔恚悲愁志意不樂

紫石英 白石英 龍齒 朱砂 細辛

人參 白朮 防風 茯苓 乾薑

桂 遠志 天雄 附子 生地黄

右件等分為細末每服一錢溫酒調下

遠志煎 治健忘安魂魄

薯蕷 遠志 熟地黄 天門冬 茯苓

龍齒 地骨皮 防風 茯苓 麥門冬

人參 桂各壹 五味子 車前子各伍
右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元酒下
犀角元 古今經驗療心患心痛積年不定不過一時間還發發甚則數日不能食又便出乾血

犀角 麝香 桔梗 莽草 鬼臼

附子 桂 芫花各叁 朱砂肆分 貝齒伍个

甘草陸分 巴豆貳拾个 赤足蜈蚣貳个

右十三味為細末煉蜜和元如梧桐子大每服一元米飲下漸加三元以利為度忌生葱猪肉野猪肉蘆葦生血等

雄黃麝香元 治九種心痛及惡血結塊

烏頭捌兩 雄黃伍兩 麝香壹兩 朱砂陸兩

蜀椒 巴豆各肆兩 檳榔拾兩 當歸 木香

桂各陸兩 犀角叁兩 乾薑肆兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心米飲下七元

茯苓元 安定心神亦治虛損方

遠志 甘草 茯苓 麥門冬 人參

當歸 白朮 澤瀉 獨活 芎藭各壹兩

薯蕷 阿膠各壹兩 乾薑肆兩 乾地黄伍兩 桂叁兩

右為細末煉蜜和元如大豆大未食溫酒服二十元日三不知稍增至五十元若大虛身躄冷少津液加鍾乳三兩為善

丹砂元 治風虛心神驚悸或時煩悶志意不安

丹砂壹兩 龍齒 鐵精 人參 生乾地黄各叁兩

金箔壹拾片 牛黃 麝香各壹分 栢子仁 芎藭

遠志 琥珀 伏神各半兩

右為細末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵元如梧桐子大每服二十元不以時金箔湯下

雷元散 治蛔虫咬心痛悶絕坐卧不安

雷元 鶴虱 葶藶 蕪荑各肆兩 乾薑

乾漆 石脂各叁兩 龍膽 檳榔各陸兩 當歸伍兩

右為細末每服三錢煎石榴根湯調下

茱萸煎 治心痛

吳茱萸 乾薑各半兩 桂壹兩 白朮貳兩 人參

陳皮 川椒 甘草 當歸 桔梗各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元至十五元米飲下一方有黃芩一兩

蜀椒湯 療產後心痛大寒冷所致

蜀椒合壹兩 芍藥兩 半夏 當歸 桂

人參 甘草各貳兩 生薑汁伍合 蜜壹升

右以水九升煮椒令沸下諸藥煮取三升半去滓下薑汁蜜等更煎取三升一服五合老忌如常

地黄元 治心經熱

芎藭肆兩 蜜兩 生地黄汁壹中

右研為膏子蒲黃為元如彈子大新水化下一元食後
遠志元 治心氣不定恍惚健忘語言錯亂或即寒濕驚悸
心忪神思不定常服鎮心安神爽識強記

朱砂 遠志 人參 茯苓 伏神
甘草 白石英 紫石英 乾山藥 龍齒各壹兩
右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元煎人參
湯下寅午戌時服

當歸湯 廣濟療心痛癥塊硬築心氣欲絕

當歸 桔梗 白芍藥各捌分 厚朴拾分
黃橘皮捌分 人參陸分 良薑拾分 桃仁伍拾分
生薑捌分

方十一 六

右九味以水八升煮取三升五合去滓分溫三服訖如
人行六七里進一服不利忌猪肉生冷油膩雞魚粘食
小豆大蒜

遠志元 治心中恍惚不寧

遠志 菖蒲 龍齒 茯苓 黃耆
人參 赤石脂各壹兩 乾地黄貳兩 交門冬半兩
右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二三十元米飲
下

桂心湯 若心痛不得臥如從心間動作亦甚急面色不變
此肺氣逆行遂乘於心蓋肺在膈上病則不可以偃故動
則痛甚而其脉濇謂之肺心痛宜此桂心湯

紫蘇葉貳兩 桂壹兩 黃橘皮 桔梗各壹錢 甘草
細辛 附子各半兩 半夏 人參
右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

附子煎 治冷氣及瘀血心痛兼癥塊
附子 烏頭各陸兩 乾薑 當歸各伍兩
檳榔拾兩 赤石脂捌兩 桂伍兩 蜀椒肆兩
右為細末煉蜜為元如梧桐子大每服十元空心米飲
下

檳榔鶴虱散 廣濟療諸蟲心痛無問冷熱蛔虫心痛

當歸 桔梗 芍藥 黃橘皮
鶴虱各捌分 人參 桂各陸分 檳榔兩半

方十一 七

右為細末空腹煮薑棗湯服方寸匕漸加至二匕乃利
忌猪肉生葱油膩小豆粘食等

紫桂煎 延年療冷氣又刺心痛不能飲食

當歸 桂 桔梗 吳茱萸
人參 白朮 良薑各陸分 黃橘皮壹分
右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元酒下日二
服加至十五二十元為度忌生葱桃李猪肉雀肉等

補心湯 治心氣不足驚悸汗出心中煩悶短氣悲憂獨語
自夢悉不自知及諸失血舌本強直
人參 白朮 茯苓 伏神 菖蒲各半兩
遠志錢肆 甘草 桂各壹錢

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎至七分食後溫服

集効元 治久心痛不可忍發歇經年不止治虫疰心痛并痔疾下部有虫痛痒不止

木香 鶴虱 檳榔 訶梨勒

蕪荑 附子 乾薑各貳兩 大黃肆兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元食前橘皮湯下婦人醋湯下

地黃元 通心氣治驚悸狀若心風譏語狂顛化痰涎

地黃 朱砂 鐵粉 不灰木

人參 茯苓各半兩 甘草生 雄黃各壹分

方十一

右為細末用糯飯為元如梧桐子大每服十元金銀薄荷湯下久服令人心開聰惠

犀角散 治心經行榮衛涼血療瘡

白茯苓 人參 甘草 乾地黃

芍藥 麥門冬 黃耆 黃芩各半兩

右為細末每服一錢水一盞紫蘇木苳少許同煎至六分食後溫服

麝香元 治心痛

桂壹兩 當歸 芍藥 人參 細辛

川烏頭各壹分 麝香壹錢 巴豆兩半

右為細末白麪糊為元如菉豆大米飲下三元不以時

若痛而衝聚往來上下行痛者休止腹中熱燥煩吐清水其脈當弦而無常此由胃弱而濕則生虫謂之虫痛宜此如智元九痛元方在

如智元

木香末 硫黃各半兩 蜜陀僧壹兩

附子半兩炮去皮為末醋煮成膏

右為細末將三味為末研勻以附子膏元如菉豆大每服三十元茶下

益智散 若痛如針刺其心而痛甚者此脾受邪氣以其脈上膈注心中邪氣隨經直干於心診其脈緩甚謂之脾心痛宜此方

痛宜此方

方十一

烏頭肆兩 益智兩 乾薑兩

青皮兩

右為鹿末每服三錢水一盞益一字煎至七分去滓溫服

六氣散 治脾胃傷冷心腹疼痛又治霍亂吐瀉婦人血氣

血刺

白木米泔浸壹宿焙乾麵炒微黃取出 良薑

桂 陳皮 茴香

甘草

右等分為末每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去滓稍熱服空心食前入鹽沸湯點亦得

藥珠丹 鎮心空膈去八邪氣及婦人血攻寒熱驚憂成病

朱砂分五 阿魏 木香分各貳 附子壹分

生薑或用 安息香各壹分 桃仁肆拾

右蜜和元如梧桐子大每服十元桃心湯下腹中有塊

如拳尤宜校定此方生薑注云或用雄疑此當用雄黃

補心丹 治心虛諸疾

乾山藥 人參 茯苓 菖蒲各肆

熟地黃 黃耆 紫石英各貳

右為細末煉蜜和元如彈子大辰砂一兩為衣臨卧白

湯化下一元

茯神湯 治或驚恐失財或忿怒惆悵若驚憂逼逐致志氣

方士

錯越心行違僻不得安定

龍骨 遠志 茯神 防風

牡蠣各貳 甘草貳兩 大棗壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞棗一枚同煎至六分去滓

温服

又方

熟地黃 茯苓各肆 人參 桂各叁

甘草貳分 麥門冬伍分 半夏

右為鹿末每服二錢水一盞生薑一片煎至六分温服

不以時

守靈散 補心臟勞極

茯苓貳 丁香 呵子各半 桔梗

芍藥貳 羌活 甘草壹分

右為細末每服二錢水一盞用銀耳環一隻葱白一寸

煎至八分通口服不拘時

補心湯 治心氣虛弱少樂多憂

麥門冬壹錢 人參貳兩 紫苑壹兩 桂 紫石英各貳

甘草半錢 赤小豆肆拾

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚擘破同

煎至七分食後温服

若心咳脉浮惡風宜桂心湯惡寒時不能言口噤脉緊大

宜附子細辛湯方在後 惡熱脉疾小便赤澀宜茯苓湯

方士

桂心湯

人參貳兩 桂 白茯苓各壹兩 麻黃

貝母各半兩 甘草 遠志各壹分

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

茯苓湯

茯苓 麥門冬 黃芩各壹兩 秦艽

柴胡各半兩 五味子壹兩 杏仁壹分

右為鹿末每服五錢水二盞煎至七分去滓温服不以

時

九痛元 治心痛

附子兩叁 乾薑 巴豆去油 人參 吳茱萸

狼牙草 各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三元食前溫酒下

高良薑湯 治心痛

高良薑 伍兩 厚朴 貳兩 當歸 桂 各壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

溫中元 治心腹痛

乾薑 半夏 各壹兩 白朮 貳兩 細辛 胡椒 各半兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大每服三十元米飲下食前服

括痛元 治九種心痛

五靈脂 木香 當歸 良薑 蓬莪朮

右等分為細末煉蜜為元如梧桐子大每服五七元至十元空心木香湯下

細辛煎 治心腹俱痛

附子 細辛 人參 各貳分 乾薑 肆分 吳茱萸 壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元空心米飲下

紫石英湯 主心虛驚悸寒熱百病令人肥健

紫石英 白石英 各拾兩 赤石脂

白石脂 乾薑 各壹兩

右五味咬咀皆畢用二石英各一兩石脂等三味各三

兩以水三升用微火煎一宿且勿食稍定則分為四

服日三夜一服後午時乃食日日依前秤取昨日藥仍

置新藥中同煮至藥盡不妨其水數一唯新藥纔盡便

添水去滓服之至四日止忌酒肉藥水須用大升取

汁亦用大升服湯訖即便行動勿得住坐及卧令藥力

遍百脉中行若大冷者春秋各四十九日服令疾退服

時直須澄清藥汁乃佳

大聖散 治心腹疼痛不已

川烏頭 肆錢 益智 壹錢 青橘皮 乾薑 各壹錢 茴香 壹錢

右為細末每服三錢水一盞入鹽少許同煎至六分去滓食前溫服

桂枝烏頭湯 若痛引小腹此寒氣客於厥陰之脉或脇肋

相引肝腎脉弦大而緊久成寒疝宜此

桂枝 白芍藥 各壹兩 烏頭 貳兩 甘草 貳兩

右為鹿末每服五錢水二盞生薑三片棗三枚煎至一

盞去滓溫服不以時

杏仁紫苑元 治心下停水

葶藶子 貳拾分 杏仁 拾貳分 茯苓 陸分

牽牛子 捌分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服八元日再夜一

服漸加至二十元煮棗汁送下忌醋物

乾薑 良薑 厚朴 官桂 等分

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不以時

孔子大聖枕中方 補心虛健忘助神

龜甲 龍骨 遠志 苝蒲 各壹兩

右為細末每服一錢食前溫酒調下

失笑元 治九種心痛

茴香 當歸 金毛狗脊 蕪荑 各壹兩

右為細末醋煮麵糊為元如梧桐子大每服十元先用油滾過熱醋下男子冷水下

養心丹 服之能寬神消慮全志通神明不老不忘

光明珠砂 明淨乳香 各壹分

酸棗仁 雪白茯苓 各半兩

右為細末以棗和元如梧桐子大空心清淨水吞下元**定志元** 治心氣不定五臟不足恍惚振悸憂愁傷嗟夜多夢寐驚魔恐怖不寧喜怒非時朝老暮劇暮老朝劇或發狂眩可服

人參 茯神 遠志 苝蒲 各半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食後臨卧米飲下

生薑枳實湯 若痛而但腹脹心痛甚者此由胃邪干心其脉微緩謂之胃心痛宜此

桂 生薑 各壹兩 枳實 半兩

右為細末以水三升煎至一升去滓分溫三服不以時

五味子煎 治心痛

五味子 兩 桂 川烏頭 各壹兩

右三味為鹿末水五升煎取一半絞去滓入好蜜二兩再熬成膏溫酒化下一彈子大不以時

班猫元 治心痛

班猫 柒个 胡椒 肆拾个 乳香 壹象

右三味為細末水蜜煮麵糊為元如梧桐子大每服三粒婦人醋湯下男子苝蒲酒下不以時

良薑湯 治心痛腹痛久瘡瘦弱

乾薑 真良薑 油焙紫色水洗去油

右等分細末每服二三錢白湯點不以時溫酒亦得

椒菜元 治心腹疼痛

椒 兩 吳茱萸 肆兩

右為細末醋煮麵糊為元如梧桐子大每服三四十元米飲或酒下空心服

蠶甲散 治痞氣心腹堅脹飲食不消

蠶甲 壹兩 訶梨勒皮 壹兩

右為細末每服二錢食前煎生薑橘皮湯調下

雄黃元 治久患心痛時發不定多吐清水不下飲食

雄黃 貳兩 好醋 貳升 燉火

右乾饊餅和元如梧桐子大每服七元生薑湯下空心
撞氣元 治一切痰積心痛不可忍著

良薑 生用 乾薑 兩各壹 半夏 兩各壹 青皮 兩各壹
陳皮 各壹兩 巴豆 貳柒个去皮同陳橘皮青橘

右為細末生薑麵糊為元如桐子大每服二十元至三十元煎生薑湯下食前服

肺嗽附

勝金元 治肺虛勞咳嗽不出聲者

肥皂角 寸伍 馬屎勃 分壹 乾枇杷葉 片叁 厚朴 分半

半夏 分壹 葶藶子 分半 甘草 分壹 百部 分壹 人參 分半

吳木 分壹 紫苑 分壹 青皮 片肆 馬蜂窠 分壹 白茆 分半

方士 十六

茯苓 石菖蒲 木通 貝母 百合

杏仁 熟地黃 甘松 麥門冬 各壹分

右為細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元含化不以時

神効四時加減養肺湯 治肺氣不足病苦氣逆胃腹滿咳

逆上氣搶喉喉中閉塞咳嗽短氣氣從背脊有時而痛然
自驚或笑或歌或怒無常或乾嘔言語過多觸風邪而使
發咳嗽四時往來不愈

紫苑 五味子 乾薑 款冬花 半夏

人參 糯米 杜仲 白木 桂 各壹兩

柴胡 茯苓 甘草 陳皮 丁香

細辛 射干 山藥 獨活 防風

鍾乳 各半兩

右為鹿末每服二錢水一大盞入生薑三片棗一箇同煎至五分去滓稍熱服不以時夏秋柴胡獨活射干細辛桂減半久嗽虛寒人加蜀椒一分

瀉肺散 治酒後勞倦或出當風喜怒氣合於肺面目黃腫

起即頭眩咳逆上氣時忽忽欲絕心下弦急不能飲食或

吐膿血胃痛引背支飲欲嘔

五味子 百部 各壹兩 茯苓 附子 菴蓉

當歸 石斛 遠志 續斷 各壹兩 細辛

甘草 各柒分 防風 蜀椒 紫苑 款冬花

乾薑 桂 各壹兩 桃仁 杏仁 各玖拾个

方士 十七

右為細末每服一錢空心溫酒調下

大阿膠煎 補肺去風

阿膠 熟地黃 茯苓 山藥 五味子

麥門冬 貝母 百部 栢子仁 茯神

丹參 杜仲 各半兩 遠志 人參 防風 各壹分

右為細末煉蜜和元每兩作二十四元每服一元細嚼米飲下食後

五麥散 治肺臟風毒皮膚生瘡欲似大風者

人參 沙參 各壹兩 玄參 兩半 苦參 丹參

赤箭 各壹兩 烏蛇 兩 甘草 兩半 白蔘 壹兩

已上九味為細末

桑白皮 白楊皮 地骨皮 槐白皮

重校定此方內白皮等四味元分兩其太
平聖惠方內亦載之內四般皮藥各壹兩

右白皮等四味並細剉用生薑汁煮三二十沸取出焙

乾搗羅為細末與前藥末和勻每服一錢溫酒調下不

計時

平肺湯 治肺氣以虛喘急多倦

款冬花 五味子 白茯苓 阿膠 白朮

芎 人參 熟地黃 黃耆 紫苑

甘草 杏仁 桂

右等分為鹿末每服三錢水一盞同煎至六分去滓溫服食後

方七

六

麥門冬五膈下氣元 療肺勞熱肺損生虫形如蚕在肺為

病令人咳逆氣喘或為憂膈氣膈寒膈熱膈皆此勞

氣所生名曰膏育鍼灸不着

麥門冬 遠志 附子 細辛 甘草各拾分

人參 乾薑 黃耆 百部 白朮

桂各伍分 川椒肆分 杏仁肆拾個

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元含化

百花煎元 治肺虛客熱咳嗽氣急胸中煩悸支脈倦痰响

乾口燥多唾痰沫或有惡物肌瘦發熱減食嗜卧

人參 紫苑 阿膠 百部 款冬花

山藥 天門冬 麥門冬 貝母各壹兩 甘草肆兩

杏仁半斤 蠟貳拾兩

右為細末鎔蠟元如彈子大每服一粒水一盞煎至七

分和滓熱服之食後

鍾乳白石英元 治肺虛咳嗽背寒食少泄瀉

鍾乳粉 白石英粉 鹿角膠 五味子

山藥 麥門冬 黃耆 乾薑

熟地黃 人參 桂各壹兩 甘草半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心米飲或酒下

定嗽散 治十五種嗽上氣不順咽喉痒諸藥無効服之甚良

方七

十九

漢防已半兩 雪白茯苓 紫苑 款冬花

桔梗 桑白皮 紫蘇葉 杏仁

貝母各壹兩 甜葶藶 甘草各壹兩 人參半兩

右剉碎焙乾為末每服一錢津液合化徐徐嚥之

溫肺元 治肺挾寒上氣咳嗽胸滿短氣嘔吐痰涎喘鳴肩

息全不嗜食及寒毒疰嗽咯唾膿血

紫苑 陳皮 附子 款冬花 半夏

杏仁各壹兩 乾薑 甘草 細辛 桂各壹兩

人參分參

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前生薑湯下

紫苑元 治嗽

人參 紫苑 附子 款冬花

橘皮 半夏 杏仁各叁分 細辛

甘草 乾薑 桂各半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前薑

棗湯下

欬肺散 治肺虛氣喘咳嗽喘滿胃膈不利痰涎嘔逆可思

飲食

五味子 紫苑 赤茯苓各壹兩 檳榔

枳殼各半兩 桔梗 大腹皮 白木各叁分

貝母 人參各壹兩 甘草半兩

方十一

右為鹿末每服三錢水一大盞入生薑少許同煎至七

分去滓溫服不以時

白石英散 治肺氣虛惡寒咳嗽鼻有清涕息氣微四肢少

力宜服補肺 重校定此方內人參五分兩其大平聖惠方內亦載之人參用壹兩

白石英 五味子各壹兩 交門冬叁分 乾薑半兩

白茯苓 附子各壹兩 甘草半兩 桂

阿膠 人參 陳皮各壹兩

右為鹿末每服三錢以水一中盞入棗三个煎至六分

去滓不以時忌生冷油膩等

温中當歸湯 若痛而不休此重於寒寒留不去與正氣相

搏脉緊弦者謂之虛寒沉緊而實者謂之積寒虛寒者温

而調之宜此温中當歸湯積寒者散而瀉之宜麝香元方在後

當歸 人參 乾薑 白木

厚朴 桂各貳兩 桔梗 白芍藥各壹兩

附子 甘草 木香各半兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

通氣元 治寒嗽

天門冬貳兩 蜀椒貳兩 烏頭壹兩

乾薑 人參各貳兩 桂壹兩 蜈蚣伍節

附子 杏仁各伍分 錫糖壹斤

右為細末煉錫為元如雞頭大每服一元含化食後臨

方十二

卧晝夜十元以胃中温為度

補肺湯 治肺氣不足咳逆上氣心胃氣逆喉中悶塞欬嗽

短氣寒從背起有時而痛乾嘔心煩耳聞風雨聲面目白

色口中如含霜雪語聲不出

交門冬肆兩 五味子叁兩 紫苑 乾薑

欬冬各貳兩 白石英壹兩 桑白皮

鍾乳粉 人參各壹兩 桂陸兩

右為鹿末每服四錢水二盞入竹二十葉棗五个同煎

至七分去滓食前温服

貝母散 治遠年日近嗽

貝母 知母 百部 阿膠 甘草

麻黃 杏仁 人參 茯苓

半夏麴餅子

右等分爲細末每服二錢水一盞大黃臈一皂大同煎至八分通口服

阿膠 平肺氣

阿膠 人參 茯苓 百合 貝母

桔梗 五味子 山藥各壹兩 甘草兩半 半夏壹分

右爲細末煉蜜和元如彈子大每服一元水一盞入生薑三片煎至七分和滓溫服食前

相傳湯 治肺氣不足寒邪外乘咳嗽多痰肢麻倦惡寒發熱嘔逆惡心鼻壅涕咽乾喘滿

方十一
五味子 芍藥各壹兩 半夏 細辛 紫苑

杏仁 桂各壹分 甘草壹分 人參兩半

右爲鹿末每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服不以時

木香散 治寒嗽

木香 白朮 五味子 細辛 甘草各壹錢

乾薑 欵冬花 桂各半兩 附子

右爲鹿末每服二錢水一盞棗一枚擘破同煎至七分去滓溫服食後

戒鹽湯 若痛與腰背相引善瘦癯如物從後觸其心身偏僂者此由腎受邪寒逆氣上下於心其脉沉緊謂之腎心

痛宜此戒鹽湯服之

戎鹽兩半 良薑 芍藥 澤瀉各壹兩

桂式兩 吳茱萸 烏喙 黃耆

茯苓 甘草各壹分

右爲鹿末每服五錢水二盞煮羊肉湯一盞煎至七分去滓溫服

養肺煎 治肺虛

阿膠 人參 五味子 貝母

百合 桔梗 芍藥各壹兩 甘草

半夏麴餅各減半

右爲細末水煮麵糊爲元如梧桐子大每服四十元生薑湯下食後

方十一

鍾乳人參元 療嗽逆上氣燥嗽冷嗽晝夜甚喉中水雞聲

鍾乳 人參 桂 乾薑各壹分 附子

欵冬花 細辛各陸兩 紫苑拾分 杏仁肆兩

右九味爲細末煉蜜酒和元如小豆大每服三十元日三不知稍稍加之忌猪肉冷水生葱生菜等空生薑湯下

湯下

胡椒理中元 治肺胃俱寒欵嗽上氣咽膈痞噎嘔吐痰沫

腹脇膨滿或時下利肩背疼倦飲食減少

胡椒 葶藶 乾薑 良薑 細辛

欵冬花 甘草 黃橘皮各壹兩 白朮壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元米飲下不以時服

欵冬花散 治肺感寒邪咳嗽不已痰實涎盛頭昏鼻塞呀呷喘悶介介作聲胃膈痞滿不欲飲食

貝母兩肆 知母兩式 半夏 杏仁各肆

麻黃斤半 乾桑葉兩式 甘草兩肆 欵冬兩式

阿膠兩肆

右為鹿末每服三錢水一盞入生薑三片同煎至七分去滓食後溫服臨臥更服

乾薑散 治氣嗽呼吸短氣心胃不利可思飲食

乾薑 桂 欵冬花各半 細辛

方士

白朮 甘草 五味子 木香各參分

附子兩壹

右為細末每服三錢水一盞棗二个煎至六分去滓溫服非時

酥蜜膏 治肺臟虛熱咳嗽乾痛唾膿血宜服此方

生地黄汁合捌 黑錫 白蜜

白糖各參 生薑汁壹 酥 川麻

鹿角膠 杏仁各參 校定川麻不知何物疑是升麻以治虛熱也

右都於銀鍋中以慢火煎攪勿住手候稀稠得所以不津器盛之非時含一茶匙嚥津

虛成散 補治肺臟勞極

枳實 秦艽 白茯苓 芍藥 延胡索

當歸 麻黃 茴香各半 甘草壹

右九味為細末每服二錢水一盞入銀耳環一隻蜜三五滴同煎八分通口食後服此補五臟虛勞極方出在真君詠訣方內藥性與本草不同而服餌神效須潔靜心齋服若有所覺

四滿元 治冷嗽氣嗽飲嗽燥嗽邪嗽胃膈支滿多唾上氣咽中腥臭咳不得卧面目浮腫氣喘寒熱

蜈蚣各壹 芫花分伍 乾薑 芎 躑躅花

桂各壹 人參 細辛各半

右為細末煉蜜和元如麻粒大每服二三元食後臨臥

方士

溫米湯下

香朴元 治肺胃虛寒久冷不除四時往來動作咳嗽中脘氣痞氣道不利飲食進退肌肉不澤多倦乏力惡怕風寒鼻中清涕喘出清痰穀飲不消臟腑不調

厚朴 生薑各壹 大棗伯 半夏斤半 陳皮兩式

已上五味用水二斗煮盡水如棗先軟即去皮核餘直至水盡漉出焙乾入

人參 白朮 白茯苓各式

右為細末以棗肉和杵熟元如梧桐子大每服三五元米飲下

杏仁紫苑元 崔氏療肺虛而嗽上氣喘急不得坐卧身面

腫不下食銷腫下氣止咳立驗方

葶藶子分拾

貝母分陸

杏仁分拾

紫苑

茯苓

五味子分各陸

人參伍分

桑白皮捌

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元日二服甚者夜一漸加至二十三元煮棗汁送下若腫氣盛者宜服此藥若小便不利者服後方方在後

潤肺元 治風壅咳嗽化痰涎止喘痞利胃膈肺氣

半夏

阿膠

紫苑

桔梗

貝母

款冬花

漢防已各壹兩

蛤蚧壹對

右為細末煉蜜為元如梧桐子大每服十五元至二十方七

元食後生薑湯下白湯亦得

水煮元 治久病不入飲食胃膈痰滿痰多咳嗽惡心增煩頭目昏痛

半夏

藿香葉

白朮

人參

山藥

茯苓各壹兩

粟米柒兩

白麵壹兩

右為細末旋以冷水和元如梧桐子大每服三十元先用生薑五片水一盞煮至七分去薑然後入藥并棗一皂子大再煎至四分緩緩以匙抄喫用煮藥湯下

通聲膏 治肺虛寒屬風所傷語聲嘶塞氣息喘滿咳嗽二氣嗽

酥

崖蜜

飴糖

薑汁

百部汁

棗肉

杏仁各貳升

甘皮伍兩

右合和微火煎常攪三上三下與一炊久取薑汁等各減半溫酒一升服方寸七細細咽之日二夜一

潤肺散 治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘急語聲不出痰涎壅塞胃膈煩悶鼻塞涕咽喉乾痛

麻黃

人參各貳兩

杏仁貳兩

阿膠半兩

貝母貳兩

甘草壹兩

陳皮壹分

桔梗半兩

右為細末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後溫服

交門冬煎 治暴熱咳嗽心胃煩悶口舌乾燥上焦壅滯

生麥門冬汁肆合

生地黄汁升壹

酥壹合

生薑汁貳合

五味子貳兩

赤茯苓兩壹

射干壹兩

杏仁搗膏

貝母各貳兩

右先搗羅貝母等四味為細末入麥門冬汁杏仁膏等於銀鍋內攪令勻以慢火煎成膏收於不津器中非時取一茶匙含嚥津

續斷散 治盜汗不止

續斷

黃耆

人參

牡蠣

五味子各壹兩

陳皮

甘草各半兩

桂壹兩

右為細末入去心交門冬二十粒生薑三片棗一枚水一盞每服一錢同煎至七分去滓溫服

潤肺散 治肺感寒氣咳嗽氣喘痰涎不利胃滿背痛

人參壹兩

陳皮

五味子

紫苑

乾薑 杏仁各壹分 桂 甘草各壹分
右為細末每服二錢水一盞入生薑三片棗一枚同煎至七分去滓食後溫服

蜜陀僧元 治積年肺氣咳嗽

蜜陀僧壹分 金箔拾肆片 銀箔拾肆片 菘豆粉壹錢
胡粉壹分 膩粉半錢 葛粉壹分 黃丹壹分

右研勻棗和元如小棗大每服一元綿裹含化

椒紅元 治寒嗽

川椒兩 款冬花 紫菀 乾薑各壹兩
礬石 附子 細辛 皂角各半兩

右為細末每服二十元食前米飲下煉蜜為元如梧桐子大

方土

廿

膠飴湯 若腹痛而面色蒼蒼如死灰終日不得太息者此由肝氣受邪客乘於心蓋肝臟血寒客於血溢而變氣不得速行詎其心脉急甚謂之肝心痛宜此

地黃壹兩 芍藥貳兩 當歸壹兩 乾薑貳兩
黃橘皮 川椒各壹兩 甘草兩

右為鹿末每服五錢水二盞棗一枚膠飴如彈子大煎至一盞去滓溫服

平肺湯 平肺氣治寒嗽

人參 五味子 黃耆 桂
杏仁 白茯苓各壹兩 麻黃錢貳

右並剉碎每服二錢水一盞煎至七分食後臨臥細細熱呷纔溫再暖熱呷之尤佳

平肺散 治肺胃受寒咳嗽上氣涎痰不利咯唾涎沫胃滿氣逆喘鳴肩息咽乾噎氣語聲嘶破身軀疼煩時發寒熱

桑斜 枸杞 水蓼 覆盆子各貳兩
皂兒 茴香 荆三稜各壹兩

右為細末每服二錢生薑一塊胡桃肉半枚與藥同嚼細嚙津食後臨臥

華蓋散 治肺感寒邪有痰咳嗽不治不差

紫蘇子 麻黃 杏仁 陳皮
桑白皮 赤茯苓各壹兩 甘草兩

方土

廿九

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後溫服

百部元 治久新咳嗽唾稠粘氣息不通嗽有膿血咽中腥臭喘息有音

百部兩 五味子 乾薑 紫菀
甘草 桂各壹兩 升麻兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二元至三元食後臨臥熱水下

鍾乳元 治肺虛寒嗽不已

鍾乳粉兩 人參 白朮 乾薑
甘草各壹兩 紫菀 款冬各壹兩

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元含化

紫苑湯 平肺氣如多嗽加防已半兩甘草一分

紫苑 欵冬花 麻黃 甘草各壹兩

乾地黄兩貳 卷栢兩半 麥門冬兩壹

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

杏仁煎 治氣嗽心胃不利喘息短氣

杏仁兩伍 五味子兩貳 白蜜伍分 酥

生薑汁各壹合 貝母兩貳 紫蘇子各兩以水伍合研濾取汁

右先研杏仁如膏都與眾藥合煎令稠不以時服一茶匙含化嚥津

聖方元 治肺間有水喘嗽小便不利面目浮腫

葶蘆拾貳分炒 郁李仁伍分 杏仁叁分

漢防已 陳橘皮各肆兩 茯苓伍分 紫蘇伍分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十五元煎生薑橘皮湯下食後服日二道藏千金方孫兆嘗進

阿膠散 治肺痿損傷氣喘咳嗽有血

阿膠 側栢葉各壹兩 熟地黄 人參

麥門冬各叁分 茯苓兩半 蛤蚧壹隻全者

右為細末每服二錢米湯調下食後

若腎效惡風脉浮宜白煎湯惡寒唾冷沫小便數脉緊宜

椒紅元方在煎 惡熱骨間煩疼宜地骨皮散方在後

白煎湯

白煎 細辛 川芎 五味子各壹兩

麻黃 芍藥 桂各半兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服食後

咳嗽論曰咳嗽之說古書咳而無嗽後人則兼言之大抵

皆從肺出其聲響亮不因痰涎而發者謂之咳言其聲音

聞於人痰涎上下隨聲而發者謂之嗽如水之嗽蕩謂能

嗽其氣往來也經稱五臟六腑皆令人咳原其至理必由

皮毛先受邪氣以合於肺也又或感寒飲食入胃從肺脉

而上至於肺肺寒則內外合邪因而客之故咳屬於肺然

五臟各以其時感寒受邪於病謂秋得之在肺春得之在

肝夏得之在心冬得之在腎四季得之在脾故肺咳之狀

咳而喘息有音甚則唾血心咳之狀咳則心痛喉中介介

如梗甚則咽腫喉閉肝咳之狀咳則兩脇下痛甚則不可

轉側轉側則心脇下滿脾咳之狀咳則右脇下痛陰引

背甚則不可以動動則咳劇腎咳之狀咳之則腰背相引

而痛甚則咳涎

右諸咳之原其來雖各不同要之其氣必至於肺而後發

若非其時感邪而發咳者因其臟氣衰而為病或五行之

氣虛衰而為病或五行之氣內相克制而為病病方作時

尋即治之無使傳注不即治之傳注他臟遂致不起然有

因寒者有風者有熱者風寒從外至熱則從內起風寒則

諸經自受其邪熱則諸經府藏或薰乘而為病風則散之

寒則溫之熱則調之因風者惡風出風中則咳甚因寒者

得寒則劇因熱者得熱而發

若肺咳惡風脉浮宜小青龍湯方見傷風門惡寒脉緊宜杏子

湯微小弱者宜鍾乳元惡熱咽燥脉數甚則咯血宜天門冬湯

杏子湯

杏仁 乾薑 細辛 甘草各半兩

五味子 桂各參錢 去皮

右為鹿末每服五錢水二盞棗一箇煎至一盞去滓温服痰多濁涕者加半夏半兩

鍾乳元

鍾乳壹兩 銀石器內 煮壹伏時 研壹伏時 甘水

方十一

款冬花 黃耆各半兩 桑白皮壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元米飲下食前

天門冬湯

天門冬兩半 知母 紫苑各壹兩 桑白皮

五味子 桔梗各半兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服有血者加阿膠半兩大便澁而喘者加葶藶半兩

附子細辛湯

附子 細辛各半兩 菖蒲壹兩

人參兩壹 甘草貳分

五味子兩貳

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

射干湯若肝咳惡風脉浮宜此射干湯惡寒脉弦緊宜五

味子煎惡熱目赤脉頭眩宜百部元五味子煎百部元方並在後

射干 麻黃各半兩 五味子 半夏各壹兩

右為細末每服五錢水二盞生薑三片煎至一盞去滓温服

温服

麻黃厚朴湯若脾欬惡風脉浮緩宜麻黃厚朴湯口中如

含霜雪中腕陰陰冷惡寒脉緊弱宜温中元大便堅從腹上至頭頸發熱宜茯苓元温中元方在後

麻黃厚朴湯

方十二

麻黃 厚朴 黃橘皮各兩 杏仁半兩

甘草兩半 半夏兩半 右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服不以

時

茯苓元

茯苓 黃芩 黃橘皮各壹兩 五味子

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元米飲下食後服

圓象黃耆散

治肺虛熱咳嗽氣急胃中煩悸支躄倦瘵口燥咽乾情思不樂多唾涎沫或有惡物肌瘦發熱減食嗜

卧

人參

黃耆等分

甘草減半

右為細末每服二錢水一盞煎至六分生薑三片棗二枚同煎去滓溫服不以時

五味實散

治形寒飲冷風傷肺藏咳嗽喘急涕唾痰涎鼻

寒欬水頭目眩聲重語音不出嘔逆咽喉噎悶惡寒少力短氣心忪肩背拘急胃腹膨落散風寒止咳嗽

細辛

五味子

白芍藥

甘草

半夏

桂

右件等分為鹿末每服三錢水一盞入生薑七片煎至六分去滓溫服不以時一方有乾薑杏仁

五味杏仁湯

治肺經寒壅不調痰實咳嗽頭昏鼻寒項強惡氣身軀拘倦痰唾稠粘語聲不出

陳皮

麻黃

甘草

杏仁

五味子

白茯苓各壹兩

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後臨卧溫服

白石英湯

主肺虛少氣補虛羸益肺止咳進飲食

白石英

壹分并細者綿裹

五味子

白茯苓

附子

人參各半

甘草壹兩

右以咀用水五大盞銀石器中煮石英至三盞投藥再煎至一盞半去滓分兩服空心晚食前或雞鳴拂旦服

人參半夏元治肺胃受冷咳嗽氣息胃膈痞滿喉中呀

嘔逆涎沫飲食不下

人參

細辛

陳皮各貳兩

丁香

半夏

厚朴各肆兩

右為細末用生薑汁煮麵糊為元如麻子大每服二十元食後服生薑湯下

牡蠣散

治熱汗不止

牡蠣粉

寒水石各壹兩

鈎霜

朱砂

甘草各半兩生

故扇灰分半

右件同研令細每服半錢以新汲水調下非時

溫肺湯

治寒壅相交痰實咳嗽咽腫疼痛鼻塞頭昏肢軀煩疾胃膈痞悶

麻黃伍兩不

杏仁叁兩

甘草壹兩兩

五味子壹兩

桂半兩

右為細末每服二錢白湯調下不以時

防已元

治咳嗽不計新久者

防已

杏仁

貝母

甘草各貳兩

甜葶藶肆兩

右為細末水煮麵糊元如梧桐子大每服二十元食後生薑湯下

五味細辛湯

治肺經感寒咳嗽不已

白茯苓肆兩

甘草叁兩

乾薑叁兩

細辛叁兩

五味子貳兩
右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不以時

廣濟紫苑湯治肺虛喘之痰多咳嗽胃膈逆滿食少羸瘦及治肺痿咯唾膿血

紫苑各壹兩 茯苓各壹兩 五味子 百合各壹分 甘草半兩

右為鹿末每服二錢水一盞生薑五片煎至七分去滓食後溫服

黃耆補肺湯治肺虛有熱

黃耆壹兩 芍藥壹兩 半夏壹兩 人參

甘草各半兩 方十一 卅六

右為鹿末每服四錢水二盞生薑五片棗二箇錫一杏核大同煎至一盞去滓溫服食後

辰砂半夏元治肺癆痰實咳嗽喘急胃膈痞悶心忪煩躁痰涎不利呀呷有聲

半夏兩 朱砂 五靈脂各壹兩 杏仁半兩 麩炒

右為細末入研藥勻以生薑汁煮麵糊為元如梧桐子大每服二十元食後生薑湯下

若痛而嘔者此寒氣客於腸胃得寒則津液流而聚沫聚沫則痛痛則氣逆氣逆則津液反而嘔出其脈緊細而滑

宜梗米湯及炙中脘

梗米湯

附子兩 半夏貳兩 甘草壹兩 梗米貳兩

右為鹿末每服五錢水二盞棗一枚煎至一盞去滓溫服空心食前服

中脘穴在心歧上骨下至臍上取中心是穴可灸五十壯

地骨皮散治肺癆痰嗽

地骨皮 百部各貳兩 芍藥 赤茯苓各壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞竹葉一把煎一盞去滓食後溫服

已嗽元治嗽久不已者 方十一 卅七

款冬花 百部 紫苑 皂角 右件等分為細末煉蜜和元梧桐子大每服十元臨臥煎薑湯下

金露散平補氣

人參 白朮各壹分 五味子叁分 甘草壹分

右為細末每服二錢不以時白湯點服 **小杏仁煎**治枯瘦發咳逆上氣喉中有病心下煩不得咽者宜此

杏仁貳兩 紫苑 款冬花 茯苓各半兩

右研杏仁為膏將諸藥末研勻煉蜜和元如梧桐子大每

服五七元食後米飲下

四順散治嗽

麻黃

杏仁

乾薑各半

甘草式錢

右為細末入盞煎去滓服不以時藥末一大錢水一盞煎至六分稍熱服

益肺散調益肺胃收斂榮衛

糯米

炒黃阿膠

黃耆各壹

右為細末每服二錢煎鹿膠湯調下不以時

紫苑元治肺胃勞傷痰涎咳嗽

紫苑

兩壹

半夏麴

阿膠各半

右為細末煮麴糊為元如梧桐子大每服二十元臨臥

米飲下

蠟煎元治壅嗽一名蠟煎散更不須元

防風

桑白皮

甘草各等分米

右為細末以蠟一塊子同煎二錢水一盞煎至七分去

滓溫服食後

潤肺散治肺虛咳嗽

阿膠

杏仁

糯米

右為細末每服一錢白湯調下不以時

艾葉煎元治肺經攻注面生風瘡上喘氣促咳嗽等疾

艾葉

杏仁

半夏

右件藥並依法脩事先將艾葉攪用銀石器內熬成膏

次入杏仁再熬候冷入半夏艾葉皮末為元如梧桐子大每服三十元煎入參湯下臨臥服食前亦得

橘皮元治氣咳不問遠近

陳皮

桂

杏仁等分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食後白

湯下

國老湯治肺經積熱外感寒邪口乾喘滿咽燥腫痛挾寒咳嗽唾有膿血

桔梗

甘草

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓臨臥溫服

百部元治肺虛

百部

生地黄

右將地黃膏和百部末為元如梧桐子大每服三十元食後米飲下

欬肺散治嗽

大半夏

杏仁

右甘鍋子內燒煙出存性每服末半錢至一錢溫米飲調下不以時

通聲元治肺傷風冷氣不通流欬失聲語音不出溫肺

順氣通暢音聲

桂末

杏仁

右為細末煉蜜為元如櫻桃大每服一元新綿裹含化

稍稍嚥津不以時

參茸元 治肺風皮膚瘙癢生癭疹或疥癬等

苦參

肥皂角

各取斤去皮并子槌碎以水壹斗浸揉取濃汁瀝去滓熬成膏

右將苦參并為細末以皂角膏和元如梧桐子大每服

二十元荆芥湯下

梔子湯 治胃痺切痛

梔子

附子 各壹兩

右剉每服三錢水一大盞薤白三寸同煎至五分去滓

溫服不以時

論曰或氣乘客或藏氣相干其卒然痛而即止者此寒氣客於脉外得寒則縮繆絀急外引小絡得熱則止宜先用

熨法後以高良薑湯治之 高良薑湯方在前

熨法

鹽半斤 炒

右以故帛裹就熱熨痛處

雄黃元 治肺勞咳嗽

雄黃 壹兩

右入瓦合內不固濟坐合子地上用土培之周匝令實可厚三寸以炭一斤簇定頂火煨之三分去一退火待冷出之細研如粉用蟾酥和如粟米大每服三十元空心杏仁湯下

貝母 治久嗽咽嗌妨悶嚥痛咯血

貝母 多不以少

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元食後含化日

可三服

桃仁酒 治咳嗽

右以桃仁三錢去皮尖搗爛著罍中密封頭蒸一炊曝

乾以絹袋盛內二斗酒中六七日可飲四五合稍增之

三焦厚朴生薑半夏湯

殿中丞郭中妹十歲病腹色不變按之而大不陷心腹下痞滿得之因取轉數多病已月餘兆按甲乙經云三焦脹者氣滿於皮膚中殼然不堅遂與仲景厚朴生薑半夏甘草人參湯小其服九經二十日脹消而已今具方

方土

厚朴 半斤去麤皮炙

生薑 半斤細切

半夏 貳兩半洗

甘草 貳兩炙

人參 壹兩

右五味切水一斗煮取三升去滓服一升日三服令人服即減之

曾痺三物小陷胃湯

主薄李述之母患曾中痞急不得喘息按之則痛脉數且澁兆曰曾痺也因與仲景三物小陷胃湯一劑知二劑愈

肺中有痰 葶藶大棗湯瀉肺

著作雷道矩病吐痰坐頃間已及升餘效不甚面色黯鬱精神不快兆告曰肺中有痰胃膈不利令服仲景葶藶大棗湯一服訖已竟曾中快利略無痰唾矣

久嗽

吸款冬花煙燕之

有人病久嗽肺虛生寒熱以款冬花艾三兩纔俟煙出以筆管吸其煙滿口則燕之至倦則已凡數日之間五七作乃差

肺虛客熱

廣濟紫苑湯為元

國博王珣患咽喉噎塞胃膈不利時發寒熱夜多盜汗忽心胃壅悶咳血三兩口即止晚後脈數口乾涎唾稠粘效嗽一兩聲不透肩背微痛於開元氣海中腕三里等穴着灸兆詳病證肺虛其中客熱證皆因誤灸服暖藥所致遂與外臺第十廣濟紫苑湯為元令服之乃効

肺傷湯 治咳嗽唾膿血脇下有痛處不能卧

方十一

四十二

人參

桂 各壹兩

紫苑茸

阿膠 各壹兩

桑白皮 壹斤

熟乾地黄 肆兩

右為細末每服三錢水一盞半煎至一盞取六分清汁入膠飴一匙再溫動調勻服日二三食後服

蜀椒元 治上氣咳嗽心下堅痛咽中腥臭胃脇支滿氣息不通面目浮腫喉中呀呻嗽逆短氣呼吸氣塞語聲不出久新諸嗽並可服之

蜀椒

吳茱萸 各壹兩

紫苑 各壹分

桂

杏仁

款冬花

乾薑

紫苑 各壹分

桂

杏仁

皂莢

礬石

菖蒲

烏頭 各壹分

細辛 貳分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服五元米飲下不以時

小胡椒煎 治肺胃虛寒咳嗽食少

胡椒 伍分

乾薑 陸分

款冬花 分壹

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三元食前白湯下

天門冬煎 治骨蒸勞咳嗽宜此潤心養肺

天門冬 貳兩

白茯苓

貝母

右為細末煉蜜和元如彈子大食後含化一粒

五嗽丹 燥嗽氣嗽冷嗽熱嗽勞嗽並治之

方十一

四十三

皂角

乾薑

桂 各等分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三五元空心溫酒下忌葱

防風散 治風熱咳嗽

防風

桑白皮

甘草

右藥各等分米泔浸一宿暴乾為散每服二錢水一盞黃蠟皂兒大一塊子通煎至七分溫服食後

茜根散 治久咳嗽不羸氣喘欲絕肺傷唾膿

茜根 分壹

百合

桑根白皮

雞蘇葉

阿膠

麥門冬

黃芩 各壹兩

款冬花 分壹

貝母

川升麻

甘草 各半兩

熟乾地黄 兩壹

杏仁分 右為鹿末每服四錢水一中盞入竹茹一握煎至六分去滓不以時溫服

鍾乳丹 治肺虛咳嗽咯唾膿血

鍾乳粉 白石英粉 五味子 人參
桂各壹兩 山藥 乾薑 麥門冬
陳皮 白茯苓各參分 桑白皮兩半

右為細末棗肉和元如梧子大每服二十元米飲下不以時候

平肺散 治肺傷唾血

人參 黃耆 五味子 桑白皮
方士 欵冬花 甘草 杏仁各半兩

右為鹿末每服二錢水一盞煎至七分食後去滓溫服

生薑汁煎 治上氣咳嗽喘息喉中有物唾血

生薑汁 糖 蜜 杏仁
猪脂各壹兩貳味煎令黃去脂研杏仁

右合煎為膏每服杏核大含化不以時

白蜜膏 治久新咳嗽上氣心胃煩熱唾膿血方

紫蘇子各壹兩 生薑汁壹盞 白蜜壹盞中 鹿角膠
杏仁各壹兩 生地黄汁壹盞

右件三味都搗熟入生薑地黄蜜相和以慢火熬成膏於不津器中蜜收之每服以溫粥飲調下半匙日三服

五味子散 治肺虛咳嗽上氣喘滿語聲不出心胃痞悶頭昏痰涎小便赤色

五味子 人參 桑白皮 麥門冬
防風 麻黃 細辛 甘草
白前各半兩 杏仁兩半 甜葶藶壹分 枳殼兩半

右為鹿末每服二錢水一盞入生薑三片同煎至七分去滓食後臨卧溫服

厚朴散 治咳嗽嘔吐寒熱不下飲食

厚朴兩 杏仁 人參 半夏
陳皮 紫苑 白朮 貝母各參分
甘草兩半

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不以時

金匱元 治痰多咳嗽

人參 知母 貝母 甘草各參分
烏梅肉壹分 桃仁 杏仁各半

右為細末煉蜜和元如雞頭大每服一元含化嚥津不以時

杏仁煎 療氣嗽

杏仁伍合 生薑汁貳合 酥壹合 蜜肆合
右四味以水三升研杏仁取汁內銅鑪中煎攪可減半內薑汁煎如稀糖內酥蜜煎如稠錫一服一匙日三服

稍加至兩匙忌猪肉

雞峯普濟方第十一

方十一

四十六

雞峯普濟方卷第十二

馮翊賈兼重校

脾胃 肝腎

大救甲湯治腹實痛

驚甲貳兩 去筋

防風

麻黃

白朮

石膏

知母

升麻

茯苓

黃橘皮

川芎

杏仁

人參

半夏

當歸

赤芍藥

萎蕤

甘草

交門冬各壹兩

羚羊角壹分

大黃壹兩半

犀角

木香

雄黃各半兩

貝齒拾個

川烏頭壹兩

赤小豆壹兩半

吳茱萸壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞生薑五片棗二箇薤白一

方十一

握煎至一盞去滓溫服

重湯元治脾胃虛弱臟腑不調

藿香葉

胡椒

白朮

當歸

桂

青皮

良薑

茯苓

肉豆蔻

神麴

大麥孽

縮砂仁

訶子各壹兩

木香

半夏麴

丁香各叁分

厚朴半斤

甘草叁兩

乾薑貳兩半

草豆蔻肆個

附子壹兩

葶撥

紅豆各貳分

右二十三味為細末煉蜜元如彈子大每服一元一盞水化開重湯煮沸空心服之

智意湯治脾胃虛弱中滿氣痞四肢怠惰九竅不通腰背

疼痛食下悶乱昏倦嗜卧愁憂傷意胃中痞悶飲食无味
不為肌膚面色痿黃大便秘澁不調面目四肢時腫身重
喜飢吞酸嘔逆痰水不能消穀神効

肉豆蔻 白木 益智 半夏

附子 桂 乾薑各壹兩 藿香

甘草 茴香 人參 木香

丁香 大麥孽 破故紙 當歸

麴各半兩 青皮 陳皮 畢澄茄

細辛 良薑半兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片棗一箇擘破同煎七分去滓空心温服

方十一

二

沉香養脾散 治脾胃久虛大腑寒滑全不思食益氣補虛
損宜服

製厚朴貳兩 舶上茴香壹兩 肉豆蔻仁 桂各半兩

白木壹兩 丁香 畢澄茄各半兩 赤石脂

五味子 黃耆各壹兩 木香 沉香

白檀各壹分 良薑半兩 陳皮壹分 胡椒

草豆蔻仁 人參 甘草 訶子皮各半兩

右為細末每服二錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至七分空心温服

三稜散 治脾元虛冷心胃滿悶腹脇脹滿

三稜 芫各壹兩 白木 人參

茯苓 大麥孽 豆蔻仁 青皮各壹兩

木香壹分 桃人 沉香 神麴

訶子皮 檳榔各半兩 甘草壹分 乾薑壹分

右為細末每服一錢入鹽點服不以時

鍾乳建脾元 治脾胃久虛肌躰羸瘦腹中虛冷泄痢腸鳴

膿血相雜裏急後重飲食減退難化易傷

鍾乳粉壹兩 赤石脂 神麴 當歸

黃連 人參 細辛 龍骨

大麥孽 乾薑 茯苓 石斛

桂 附子各壹兩 蜀椒陸兩

右為細末煉蜜和元如梧子大每服二十元空心食前

方十二

三

華澄茄散 治脾胃氣虛不思飲食胃中氣滿四肢不和食
即嘔吐

華澄茄 白豆蔻 丁香 人參

厚朴 訶梨勒各壹分 沉香 木香

良薑 乾薑 桂 半夏各半兩

白木 陳皮各壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞生薑半分棗三箇煎至六分去滓非時温服若以水煮麴糊為元亦佳

建脾散 治脾胃俱虛久積冷氣心腹脹悶裏急刺痛痰逆

惡心吞酸可食倦怠少力腸鳴滑泄肢躰羸瘦及大病之

後諸虛不足

厚朴

同濕司
炒黃乾

大棗

甘草
各肆

生薑

斤各壹
半夏
湯洗以
上肆味

肉豆蔻

壹兩

神翅

良薑
各貳

人參

丁香
壹兩

藿香葉

右為末每服三錢水一盞半入生薑三片同煎至七分

去滓食前執服

如意紫沉煎元

治氣虛中寒脾胃不和宿穀遲化飲食多傷胃膈痞悶心腹絞痛噫醋吞酸嘔逆惡心脇肋疼脹泄痢裏急久新積聚疝瘕癖結等疾悉皆主之

沉香

史君子

肉豆蔻

黑牽牛

壹兩
沙熟透
汗取半兩

湯下食後

右為細末水煮麵糊和元如麻子大每服五七元生薑

養脾元

養建脾胃進食和中散風冷宿寒治腹心肋脇痞塞刺痛嘔逆惡心吞酸食氣止腹鳴洞洩瀉下痢頻滑後重裏急及療久新病後肌羸氣劣及困急無力全不入食

黃橘皮

葶撥

神翅

訶子

胡椒

厚朴

茯苓

紅豆

附子

白朮

大麥蘖

乾薑

桂

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元空心白湯化

下

人參藿香散治一切氣補真氣及治脾胃嘔逆心胃痞滿

瀉疾等

人參

肉豆蔻

厚朴

半夏

藿香

木香

陳皮

丁香

官桂

枇杷葉

沉香

乾薑

甘草

右為細末每服一錢水一盞入生薑三片棗一箇同煎至七分和滓溫服不以時

厚朴湯治脾氣虛腹脹滿噎食難消面色萎黃四肢

厚朴

附子

訶梨勒

乾薑

丁香

白朮

白茯苓

桂

木香

當歸

桂

陳皮

甘草

人參

陳皮

右鹿末每服三錢水一盞生薑半錢棗三個同煎至六

分去滓食前稍熱服忌生冷油膩濕麵粘滑等

丁香元治脾胃氣虛弱食即嘔吐四肢不利心腹妨悶方

丁香

草豆蔻

良薑

藿香

陳皮

葶撥

訶梨勒

人參

白茯苓

附子

白朮

桂

甘草 壹分

右為細末煉蜜和元搗三二百杵元如梧子大非時薑棗湯下二十元一方加半夏一兩

肉豆蔻元 治脾胃俱虛寒濕氣勝心腹絞痛脇肋牽痛手足厥身冷胃噎嘔吐不思飲食无力怠惰嗜卧滑泄頻數米穀完出久痢滑腸或變膿血腹痛腸鳴裏急後重逐寒

滲濕補虛斷痢等疾

肉豆蔻 赤石脂 鍾乳粉 石斛

乾薑 附子 椒 當歸

茯苓 龍骨 人參 各壹兩 訶子皮

桂 各貳兩

方十二

六

右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服二十元食前米飲下

橘皮散 治脾胃虛弱心腹滿飲食進退大腑不調

黃橘皮 白木 各貳兩 訶子 乾薑

枳殼 桂 木香 人參

甘草 各壹兩 草豆蔻 柒個 檳榔 伍個 半夏 叁分

厚朴 壹兩半

右為細末每服三錢水一盞煎至七分去滓空心溫服

補脾散 治脾胃虛冷不思飲食心胃滿悶多倦乏力肌膚

羸瘦

肉豆蔻 肉桂 白朮 訶子

人參 附子 白茯苓 厚朴 各壹兩

乾薑 丁香 沉香 甘草

藿香葉 各半兩

右為細末每服三錢水一盞入生薑五片棗二個同煎至七分去滓食前溫服

歸真散 治脾元氣滯攻疰腹脇時復刺痛下注偏墜發作不定腎氣奔豚膀胱疝氣服眾藥不効者

木香 附子 青皮 草豆蔻

牡蠣 甘草 烏藥 沉香

白朮 藿香 厚朴 桂 各半兩

方十二

七

七分去滓空心服

安胃元 治脾胃虛弱飲食減少嘔逆惡心腹脇膨脹

人參 白朮 茯苓 木香 各壹兩

檳榔 壹個 枇杷葉 藿香 半夏 各壹兩

黃橘皮 各壹兩 甘草 丁香 各分 肉豆蔻 貳個

右為細末水煮麵糊和元如梧子大空心生薑湯下二十元

神翹元 治脾腎虛冷腹脇氣脹不思飲食四肢無力睡常不足

神翹 陳皮 厚朴 訶梨勒 各貳兩

胡椒 桂 乾薑 白朮

附子

白豆蔻 各壹兩

甘草 兩半

當歸 分壹

右為細末煉蜜和元擣三二百杵元如梧子大不以時粥飲下三十元忌生冷油膩麵物等

小建脾散

調適陰陽建中補氣辟風寒濕冷四時非節氣

厚朴

生薑

大棗 各壹斤

半夏 肆兩

已上四味同搗爛熉火焙乾入後藥

甘草 肆兩

人參 壹兩

陳皮 貳兩

良薑

白豆蔻

白朮

神麴 炒

藿香葉 各壹兩

右同為鹿末每服三錢水一大盞入生薑三片煎至七分去滓食前溫服

飛補湯

調胃氣進飲食

方十二

八

黃耆

白茯苓

白朮

人參 各壹兩

五味子

神麴

烏藥

沉香

石斛

薏苡仁 各參分

橘皮

甘草 各半兩

右為細末每服二錢水一盞生薑同煎至六分去滓服

厚朴建中湯

治脾胃虛弱忽中濕冷心腹暴痛脇肋脹滿水穀化遲腸鳴瀉痢後重裏急臍腹冷痛胃滿氣逆嘔吐惡心手足不和躄重節痛噦噫吞酸不思飲食怠惰嗜卧四肢少力此藥大能調適陰陽建中補氣辟風寒濕冷非節之氣山嵐瘴癘等疾氣

厚朴

生薑

大棗 各壹斤

半夏 合杵

甘草 各肆兩

人參 壹兩

陳皮 貳兩

良薑

草豆蔻人

白朮

神麴

藿香 各壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓食後服

進食丹

開胃建脾消積滯止惡心嘔酸

木香

丁香

肉豆蔻 各壹兩

黃橘皮

人參

藿香

白朮

神麴

麥蘖

芫 各參分

檳榔 壹斤

半夏 伍分

右薑糊和元如梧子大薑湯下三十元食後

訶梨勒散

治脾氣不足四肢不和腹脇脹滿或時下痢飲食難消

食難消

訶梨勒 分參

人參 壹兩

當歸

白朮 各參分

乾薑 半兩

桂

草豆蔻 各參分

甘草 半兩

方十二

九

厚朴 壹兩

吳茱萸 半兩

陳皮 分參

右為細末每服三錢棗三枚煎至六分去滓食前熱服

白朮散

治脾藏虛冷食少大腸洩痢腹痛四肢少力

白朮 壹兩

乾薑

桂心

人參 各半兩

厚朴 貳兩

陳皮

附子

縮砂

草豆蔻

當歸

訶子 各壹兩或梨勒亦得

右為細末每服三錢水一盞棗三枚煎至六分去滓食前熱服

大溫脾元

治脾胃虛寒腹脇脹嘔吐痞噎全不能食病羸困經年泄利米穀不消肌躄黃羸氣虛固冷

羸困經年泄利米穀不消肌躄黃羸氣虛固冷

法麴 兩陸

甘草

桔梗

人參

乾薑 吳茱萸各壹兩 大麥蘖 桂

附子 細辛各壹兩 枳實枚

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服三十元空心米飲

下

桂香散治脾胃虛弱及婦人脾血久冷

良薑 草豆蔻 縮砂仁 厚朴

甘草 白木各壹兩 青皮 訶子肉各半兩

桂壹兩 生薑 棗肉各壹兩 用各壹兩 水壹碗 煮乾 焙乾

右為細末每服二錢入鹽少許空心沸湯點服丸腹痛

疾發即悶連日不老者治之尤佳

磨脾湯治脾胃不和食少倦怠

方十二

附子半兩 白豆蔻 甘草 訶子

人參 茯苓 草豆蔻各壹兩 肉豆蔻

木香 麥孽各壹兩 麴貳兩

右為細末每服二錢不以時入鹽白湯點服

葶澄茄元助養脾胃快氣消食治脾胃不和飲食遲化胃

膈噎痞噫氣難通嘔逆惡心臍腹脹痛大便不調或泄或

秘並宜服之

葶澄茄 白豆蔻 縮砂仁 青橘皮

陳橘皮各壹兩 萊菔子 肉豆蔻 茴香

桂各壹兩 丁香 木香各半兩

右為細末水煮麵糊為元如梧子大每服三十元橘皮

湯下不以時

製米散治大人小兒脾胃氣虛飲食化遲腸鳴腹痛臟腑

白木貳兩 用生薑壹兩 將生薑分參 次搗 作末 用生薑壹兩 焙如 此參 次

訶子 人參 藿香 神麴

麥孽 丁香 甘草各壹兩 肉豆蔻

丁香皮各半兩

右為末每服二大錢空心以水一盞半薑棗煎溫服

暢中散調榮衛建脾胃快胃膈進飲食壯筋力升降陰陽

安和五臟

人參壹兩 五味子佳者 白茯苓 白木各壹兩

藿香葉 黃耆各半兩 陳皮陸銖 肉豆蔻肆个

生薑切 陸銖和 甘草兩

右為細末拍罐盛勿透氣每服一錢水八分塩少許煎

至六分熱服之日二

厚朴元治脾胃氣寒經年不老者瘦弱下痢頻并

厚朴拾兩 白龍骨 訶子皮 附子

乾薑 黃連 當歸 石榴皮

艾葉各伍兩 青橘皮壹兩

右為細末用饑餅和元如梧子大空心菜羹湯下三十

元

阿膠散治脾藏虛冷大腸滑泄腹痛食不消化

阿膠	艾葉 <small>各壹兩</small>	乾薑	赤石脂 <small>各壹分</small>
當歸	附子 <small>各壹兩</small>	厚朴 <small>各壹兩</small>	桂
芎藭 <small>各半兩</small>			
右為細末食前熱粥飲調下二錢忌生冷油膩濕麵			
人參散 治脾胃氣弱食飲不下肌躰羸瘦四肢无力宜服			
思食補益	人參	白朮	陳皮
	黃耆	附子 <small>各壹兩</small>	木香
	甘草 <small>壹分</small>		桂心 <small>各半兩</small>
右為鹿末每服三錢水一中盞生薑半分棗三箇煎至六分去滓不以時溫服			
方十二			
葶撥元 治脾胃冷氣大便滑洩及便白痢腹中疼痛	葶撥	良薑	豆蔻人
	縮砂	附子	白朮
			胡椒
	訶梨勒 <small>各壹兩</small>		
右為細末煉蜜和元如梧子大每服空心米飲下三十元			
虛脾元 溫脾胃進飲食止洩利資血氣	乾薑	附子	桂
	丁香 <small>各貳兩半</small>	白茯苓	肉豆蔻
	白朮 <small>貳兩半</small>		訶子皮 <small>貳兩</small>
右為細末棗肉元如梧子大每服五十元空心米飲下			
助脾煎 治脾胃虛寒腹痛泄瀉飲食无味			

人參	葶撥	胡椒	葶澄茄
桂 <small>各壹兩</small>	白朮	乾薑	良薑
附子 <small>各壹兩</small>			
右為細末水煮麵糊為元如梧子大米飲下二十元食前服			
生氣湯 補氣散寒和養脾胃	檀香	丁香	白芷
	人參	胡椒 <small>各壹兩</small>	甘草
	白薑 <small>半兩</small>		溫薑 <small>壹兩</small>
右為細末每服二錢空心白湯點服			
丁香建脾散 治脾胃元氣弱食少腹脹泄瀉腸鳴	草菓 <small>壹個</small>	肉豆蔻 <small>壹個</small>	丁香 <small>壹分</small>
	舶上茴香	白乾薑	桂
	郁李人 <small>壹分</small>		甘草 <small>各半兩</small>
右為細末白湯點之早晨或腹冷痛服之尤効如渴不得飲水			
溫中煎 治脾胃不足伏留寒氣飲食減少肌肉消瘦腹痛不利滑腸脹滿胃膈痞痞中寒氣逆乾嘔惡心困倦少力四肢沉重溫養脾胃思進飲食久虛羸瘦寒多熱少	附子	川烏頭	薑
	葶撥	葶澄	胡椒
	桂心 <small>各壹兩</small>		紅豆
			良薑 <small>貳兩</small>

右水煮麵糊和元梧桐子大每服二十元空心米飲下
小建脾元 治脾胃宿寒胃腹痞悶噫氣吞酸惡心嘔逆臍
腹疼痛便利不調食飲化遲

木香兩半 草豆蔻 厚朴 茴香

乾薑 荆三稜各貳兩 神翅 大麥蘖

陳皮各叁兩

右為細末水煮麵糊和元如豌豆大每服二十元生薑
湯下不以時或薑澄茄代茴香一方有草豆蔻薑澄茄
青陳皮良薑薑黃各一兩

進食散 建脾助胃

青皮 陳皮 甘草各壹分 草豆蔻仁叁分

方十二

良薑 桂各壹分 訶子皮伍分 烏頭壹分

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一箇同煎至
七分去滓空心溫服治脾胃虛冷不思食久病人脾虛
全不食者服之能食

厚朴元 治脾胃氣虛冷水穀不化食即腹脹胃膈不利

厚朴兩叁 陳皮 縮砂 訶梨勒各貳兩

草豆蔻 白朮 桂 乾薑各壹兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵元如梧子大食前以米
飲下三十元

調中元 治榮衛不和脾虛多病肌躰清瘦或發寒熱面色
痿黃化癖進食長肌

人參 白朮 鱉甲 柴胡
茯苓 三稜 當歸 陳皮各半兩

飲下
大聖人參散 和氣快膈養胃生津液

人參 白芷 葛根 青桂皮

桔梗 白朮各叁分 甘草兩壹 乾薑貳分

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片棗一箇擘同
煎至七分去滓溫服不以時

接真丹 治脾胃虛損益氣補血強力進食退昏倦四肢持

黑附子 乾薑 鹿茸各貳兩去毛酒

方十三

硫黃研別 補骨脂 官桂 茴香

金鈴子各壹兩

右件除研者同為細末水煮麵糊為元如梧子大硃砂
為衣每服三十元加至五十元生薑湯下早晚食前各
一服

雞香湯 治脾胃虛弱久積寒痰嘔逆涎沫噦逆惡心宿
食不消胃膈痞悶咳逆喘息目眩頭旋不欲飲食肢躰倦
怠

人參 黃橘皮貳分 鷄舌香 半夏錢壹

甘草 神翅肆錢 生薑錢 草豆蔻壹兩

右為細末每服二錢沸湯點服

固陽丹 治脾胃虛弱藏腑不調或冷熱相雜下痢赤白

肉豆蔻 縮砂 訶梨勒 當歸

厚朴 白木各半 乾薑壹分

右為細末水煮麵糊和元如梧子大空心米飲三十元

小品養脾元 治脾胃久虛中焦宿冷心腹絞痛脇助脹滿

嘔逆惡心吞酸噫醋腸鳴滑洩米穀完出肢躄倦怠全不

思食

縮砂 乾薑各貳兩 人參 茯苓

大麥蘖 甘草各壹兩 白木半兩

右為細末煉蜜和元每兩作八圓每服一元米飲化下

不以時

方十三 十六

調中白木元 和脾胃進飲食

橘皮斤半 丁香 人參 白木

甘草各肆兩 神翅 麥蘖各壹兩

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元空心白湯下嚼

魂停湯 補脾臟勞極

白芍藥 桔梗 人參 茯苓

訶子 丁香 甘草各壹兩

右七味為末每服二大錢水一盞入蜜一匙頭同煎八

分通口服不拘時候每晚食前空心臨卧服即一夜中

腕温温有冲和之氣每服時須念救苦真人一十遍

燒胃元 治脾胃虛困有積冷及痰積冷熱不和滑洩吐逆

盜汗臍腹疼痛肢滿膨脹刺痛倦怠全不思食並宜服之

天雄貳分 硫黃 附子 硃砂壹兩別研

官桂 木香各貳兩 乾薑壹兩

右為細末醋煮麵糊和元如梧子大每服五元至七元

米飲下有痰生薑湯下食前

又方

半夏捌分 厚朴 人參 白木

生薑 棗各陸分 橘皮肆分

右七味切以水二大升煎取一升去滓分温四服空腹

服二服忌羊肉錫桃李雀肉等

白木胡椒元 治痰助胃

白木 胡椒 高良薑 半夏

乾薑各壹兩 茯苓 陳皮各半兩

右為細末水浸饅餅元如梧子大每服五十元食空時

生薑橘皮湯下

温胃建脾元 治脾胃虛弱寒食少多倦

附子叁兩 厚朴貳兩 大棗伍拾個 生薑陸兩取汁

已上三件生薑汁煮附子等透為度然後焙乾

入後藥

丁香 胡椒 肉豆蔻各半兩

右同為細末水煮麵糊和元如梧子大每服三十元至

五十元空心或食前米飲下

沉香神翅煎 治脾虛食少遲化胃膈痞滿腹脹噫氣吞酸嘔逆惡心四肢倦怠心腹疼痛飲食減少大便泄瀉此藥大能補養脾胃助氣消穀若重受怯弱飲食易傷者最宜服之

沉香貳分 神翅拾陸分 乾薑 桂心陸分

吳茱萸 椒肆分 白朮拾分

右為細末酒者麵糊為元如梧子大每服三十粒米飲下空心

神翅湯 溫胃破痰進飲食消宿穀

神翅香炒 麥蘖 半夏翅

五味子各壹兩同為末 焙肆兩

以熱水和作餅子焙乾

木香壹分 甘草壹分

右為細末每服二錢水一盞薑棗煎至七分去滓溫服不以時

健脾人參元 治脾胃久虛飲食全減

鍾乳粉貳分 人參 石斛各叁分 大麥蘖

乾生薑 陳橘皮各半兩

右為細末水煮麵糊和元如桐子大每服二十元空心米飲下一名乳香元

十香煎 治胃虛虫動心中煩憤口舌生瘡

朱砂 雄黃各壹兩 麝香 檳榔各半兩
白蕪荑 阿魏各叁分

右為細末煮葷肉和元如梧子大每服三十元米飲下空心

葷散 和養脾胃消進飲食

草葷去醋和麵裹煨熟 肉豆蔻仁

陳皮各壹兩 陳粟米以生薑汁浸壹宿焙乾取末叁兩

甘草 乾薑各半兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服非時

小葷澄茄煎 治脾氣虛心腹脹

青橘皮 陳橘皮各貳兩 縮砂 葷澄茄各壹兩

神翅 太麥蘖各貳兩

右為細末水煮麵糊為元如麻子大米飲下二三十元不以時

開胃元 治胃氣不和食飲化遲

木香 白朮 蓬莪茂 人參

當歸各半兩 白芍藥壹分

右為細末湯浸饑餅和元黍米大每服十元米飲下不以時

厚朴湯 治脾胃虛冷

厚朴拾斤 棗去豆泔洗兩生 舶上丁香皮捌兩

甘草拾斤 鹽伍斤 丁香枝杖拾貳兩

右為細末每服二錢白湯點服

白朮元 溫中進食

白朮拾壹兩 厚朴 橘皮 藿香

甘草 白茯苓 等分

右為細末水煮麵糊和元如粟米大每服三二十元温米飲下不以時

人參散 治脾胃氣虛弱不能飲食背脊心常冷四肢不和

人參 白朮 高良薑 川烏頭

桂 兩各壹 厚朴 壹兩半

右為細末每服三錢水一盞棗三箇煎至六分去滓不以時稍熱服

神翅白朮元 治脾胃氣虛弱不能飲食肌膚瘦瘠面色痿黃宜服

白朮 神翅 陳皮 人參

方十二

乾薑 分參 薑黃 兩壹

右為細末煮棗肉和元如梧子大每服三十元粥飲下

如意丹 治脾濕腫滿小便不利

硫黃 赤茯苓 陳皮 豬苓

白朮 澤瀉 兩各壹

右為細末湯浸饑餅為元如梧子大空心米飲下三十元一方有桂一兩

白朮厚朴湯 療不能食腹內冷氣

厚朴 橘皮 人參 茯苓

生薑 兩伍

右五味切以水四升煮取一升二合分三服忌桃李雀

肉酥物等

乾薑建脾散 和脾胃進飲食

厚朴 陳皮 半夏 乾薑

棗 壹斤 甘草 兩伍

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食前空心

加減理中元 治脾胃不和三焦壅滯胃膈痞悶脇肋脹痛

嘔吐惡心口淡无味呼吸寒冷心腹暴痛飲酒過傷全不思食常服生養諸氣大益脾胃

白朮 人參 甘草 乾薑

青皮 陳皮 兩各半

方十三

右為細末每服一錢沸湯點服不以時

薑黃元 消食和胃

縮砂 草薹薹 薑黃 橘皮

青皮 薑黃 兩各壹

右為細末水煮熟麵糊和元如豌豆大每服二十元生薑湯下不以時

助脾元 治脾胃人虛飲食難化腹脇脹滿臍腹疼痛噫聞食臭肌躄羸瘦

川椒 香豉 乾薑 神翅

大麥孽 分各參

右為細末酒煮麵糊和元如梧子大每服三十元生薑

湯下以知為度

安胃元 治腸胃虛弱內挾寒濕邪正相攻腹中疼痛大便

水穀不消或冷熱客搏便下赤白後重頻滑無復節度虛

困無力肌幹羸瘦下利既久脾胃增虛嘔噦腸鳴全減飲食

神翅 當歸 人參 白木 乾薑各壹兩

右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服四十元空心

粟米飲下

煨薑元 治胃冷

硃砂壹兩 附子兩半 荳蔻人 胡椒 乾漆各壹分

右為細末棗和元如雞頭大每服一元生薑剉作合子

入藥濕紙裹煨之細嚼飲下

附子理中元 治脾胃冷弱心腹絞痛嘔吐泄痢霍亂轉筋

不進一切沉寒痼冷

人參 白木 乾薑 甘草 附子等分

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元水一盞化破

煎至七分食前熱服

龍骨厚朴湯 主諸腸胃陰陽二氣不和水穀氣冷口乾肚

痛或則泄瀉

厚朴 當歸 龍骨 白木各半兩 熟艾壹分

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不以

時候

大半夏湯 治返胃不受食食已即吐

半夏叁升重拾伍兩 人參貳兩 白蜜壹升重拾兩 泉水二斗

生薑叁兩

右為細末和水蜜揚之二三百下煮取一升半分四服

不以時

豆蔻散 治脾胃久積虛冷氣大腸滑泄腹內作聲肌幹羸

瘦困至甚者

肉豆蔻 厚朴 陳橘皮 良薑

乾薑各半兩 同炒黃令諸藥研

右為細末每服一錢半入稀薑粥調下空心

附子白木元 養胃氣

白木 人參兩半 附子兩半 甘草

乾薑各半兩

右為細末煉蜜和元如梧子大每服三四元空心米

飲服之

建脾湯 調中養氣消化宿穀

生薑壹斤切片青鹽叁兩 草豆蔻 大麥孽

陳橘皮各貳兩 甘草壹兩

右為細末每服一錢白湯調下空心

丁香神翅散 治脾胃氣虛寒感腑瀉食不化大便兼膿遇

冷而劇食已多嘔宜服

丁香兩半 神翅壹兩 肉豆蔻人兩

乾薑兩壹

良薑壹分

右為細末每服三錢白湯調下

啓中元 温中脘除胃寒消痰飲治腹脹進飲食

厚朴

乾薑

白茯苓

陳橘皮

各貳兩

甘草捌分

右為細末煉蜜元如彈子大每服一元細嚼熟米飲送

下食前

草豆蔻散 治大腸虛冷腹痛不思飲食

草豆蔻

壹兩半

白木

高良薑

各壹分

陳橘皮

厚朴各壹兩

右為細末每服二錢水中盪煎至七分空心食前和

滓温服

大聖膏 治脾胃虛弱中脘寒嘔吐痰涎不止

厚朴

大腹皮

枇杷葉

半夏

人參

右等分為鹿末再入生薑二錢去皮切作片子一處搗

爛和作餅子當三錢大焙乾每服一餅子煎至七分去

滓不以時熱服

温胃元 治吐逆

丁香

木香

各貳分

半夏

硫黃

壹分

右為細末粟米飯和元如豌豆大薑湯下五七元

無礙元 治脾胃病溏泄

大腹皮

荆三稜

芫

各壹兩

木香

檳榔各半兩

右炒麥孽搗粉為糊元梧桐子大每服二十元生薑湯

下仍服寒藥

千金進食元 治脾胃不和水穀遲消中寒氣弱心腹脹滿

痰唾嘔逆口苦無味嗜卧少力面黃肌瘦胃膈痞悶滑腸

下利病後氣虛連年累月飲食不能增進美飲食保養中

焦充肥肌肉

神翹

大麥孽

各拾貳兩

烏梅

乾薑

各肆兩

右為細末水煮熟元梧桐子大每服二十元温米飲

下食前加至四五十元

魏壁元 治脾胃虛弱久不能食心腹脹痛食少多傷嘔逆

惡心噎塞痞悶口淡无味舌乾咽燥津液減耗煩渴喜飲

食已則吐腸鳴飧泄常服温脾暖胃消穀進食

小麥孽

神翹

烏梅

乾薑

各壹兩

右為細末蜜和元如彈子大每服一元細嚼米飲下不

以時

椒朴元 治久虛不能食或發腫或日漸羸瘦四肢表倦吐

利无節應脾胃虛候

漢椒

厚朴

茴香

青鹽

各貳兩

右以水二升煮令乾焙燥杵為細末煮麵糊為元如梧

子大空心米飲下三四十元

厚朴煎 治脾胃虛積冷腹脇刺痛飲食進退大便秘泄

厚朴兩肆 陳橘皮兩壹 乾薑兩貳 附子兩壹

右為細末棗肉和元如梧子大每服三十元空心米飲下

平胃元和脾胃進飲食王叔和

白木肆兩 厚朴兩壹 人參兩壹 陳橘皮兩壹

右為細末饑棗和元如櫻桃大每服三元白湯米飲嚼下不以時

生薑湯定嘔逆翻胃隔氣不下食

生薑肆兩和皮切作頭子入石灰壹兩同炒

丁香末分壹 白礬壹分 硫黃分壹

右為細末每服一錢生薑米飲調下噦用乾柿蒂湯

方十二

廿六

乾薑元治脾胃冷氣大腸滑洩不禁腹中常冷飲食不能化者

乾薑兩壹 川烏頭 胡椒 赤石脂各半

右為細末水煮麵糊為元如梧子大空心米飲下二十元

橘皮元治腹脹

厚朴 橘皮黃者 神麴 大麥蘗各壹

右為細末醋煮麵糊為元如梧子大每服三十元空心白湯下

烏頭建脾散治脾胃虛弱洩瀉老人臍洩等

烏頭 厚朴 甘草 乾薑各壹

右為細末每服二錢水三合生薑二片煎至二合熱服

四倍元下痰飲和脾胃

白木肆兩 橘皮兩壹 半夏兩貳 木香兩壹

右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服二三十元食後臨臥服

老薑元補養脾胃

潑殺心頭火去膈上 燃起臍下燈逐臍下

兩條脛腭快 一對眼睛明

生薑十兩淨洗連皮薄切作薑錢同揀淨茴香十兩拌

勻共淹一宿次日炒乾以生薑乾脆為度青薑十兩槌

碎以銀石鈔炒盡硫黃氣攤冷同前藥共三味一處搗

方十三

廿七

羅為末好酒煮麵糊為元如梧子大每服三十元空心

溫酒或米飲下日二服三兩日內便覺心頭快進美飲

食大有效驗

四倍散大補脾胃

訶子 人參各壹 白茯苓兩肆 白木片半

右為末每服二錢水一盞生薑五片煎至六分空心溫

服去滓亦得

大橘皮元調中順氣開胃進食傷冷胃膈噎塞吞酸悉治

陳皮兩肆 肥生薑兩壹 丁香兩半 人參兩貳

右為細末蜜和元如彈子大每服一元薑湯嚼下不時

薑麵元治腹虛冷不飲食食輒不消羸瘦

好麵 斤壹

乾薑 斤拾

吳茱萸 斤伍

青鹽 斤壹

右為細末蜜和元如梧子大每服三十元空心米飲下

蒼朮

好麵 斤壹

當歸

乾薑 斤壹

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服三十元空心米飲下

正氣元治寒冷

茴香 兩貳

良薑 兩貳

甘草 兩壹

鹽 兩貳

右為細末水浸饊餅和元如梧子大每服五十元食空時生薑橘皮湯下

理中煎治脾胃久虛食少羸瘦及暴中寒濕腹痛下利霍

方十二

廿八

乱吐瀉手足逆冷

人參

白朮

乾薑

甘草 各壹兩

右為細末煉蜜和元如彈子大或一錢一粒白湯嚼下或煎服

三味建脾湯行滯氣進飲食

草豆蔻仁 斤壹

甘草 斤壹

麝香 字壹

右為細末每服二錢白湯調下

消穀斷下元治脾胃氣虛中焦不和胃腸痞滿飲食遲消

嘔逆惡心脇肋膨脹心腹時痛大便溏泄四肢倦怠全不思食若氣躄不足內挾風寒久病腸滑常服溫腸胃消散寒冷收斂臟氣大進飲食

吳茱萸 兩貳

大麥孽

神麴 各壹兩

右為末蜜和元如梧子大食前米飲下十五元

中金丹主胃氣久虛宿食不消心下急滿腹脇脹痛洩瀉

吐利惡聞食氣又療風寒濕痺風水腫滿風眩頭痛目中冷泪自汗亡陽或五勞七傷筋骨軟弱腰膝疼痛或溫瘧寒熱山嵐瘴氣經久未愈常服益津煖胃去痰消穀嗜食

人參 分叁

白朮 兩叁

棗肉 兩肆

右為細末棗肉和元如梧子大每服三十元米飲下不以時

玉蕊元治胃虛因吐生風

白元子

金液丹 拾各伍元

方十二

廿九

右為細末煮麵糊元如梧子大每服三十元空心米飲下

麻豆湯治脾胃氣弱水穀不得下食受大小便不利

麻子 叁斤

大豆 叁斤

右為細末每服二錢沸湯下不以時

蘿附煎治腹脹有冷裏急或秘

好附子 為細末

蘿葡 壹斤

右先將蘿葡剉作瓮子次將附子末填在內却用元切蓋子蓋之用竹籤子籤定濕紙裹灰火中煨熟取附子末出用刮下蘿葡內有附末稀軟蘿葡和為元每服三十元米飲下立効

麥芽散治脾胃不進飲食

大麥孽肆兩 甘草半兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服非時

定胃散 博濟治反胃吐逆

附子壹个生去皮臍切作肆塊子

右用生薑半斤水一椀同煮附子汁盡為度取附焙乾

為末每服一錢冷米飲下

棗附元 治諸虛不足臟腑不調常服資血氣進飲食

大附子叁个

右用晉棗五十箇煮附子至五分軟去皮臍別用晉棗

五十箇再煮附子軟片切焙乾搗為細末以棗肉為元

梧桐子大每服二三十元空心米飲下

方十二

三十

水浚雪丹 治脾胃虛腹脹減食甚者水氣作水治則即愈

附子肆兩去皮臍切片子小豆肆升水壹斗煮令水盡揀出附子末之

右以生薑自然汁煮糊和元如梧子大每服三五十元

陳皮湯下

髮及酒 治胃氣小腹切痛服熱藥无効者取婦人油頭髮

燒灰溫酒調下二錢即止

大効厚朴煎元 治脾胃虛弱不入飲食孫兆云補腎不如

補脾胃胃既壯則能飲食既進能旺榮衛榮衛既旺滋養

骨骸保益精血是以素問云精不足補之以味形不足補

之以氣宜服此藥大補脾胃虛損溫中降氣化痰進食

厚朴壹斤去皮用生薑半斤和皮切片子水柴升同朴煮水盡為度不用生薑朴焙乾

乾薑肆兩到作散子大用甘草貳兩半十截水柴升同煮水盡不用甘草乾薑焙乾

茴香肆兩船上者佳微炒 川附子貳兩炮去皮臍

右為末棗肉和元如梧子大每服三十元至五十元空心食前米飲下

心食前米飲下

交加散 治脾胃虛弱飲食減少

肉豆蔻兩個壹个麵裹炮熟壹箇生用

厚朴方圓肆寸壹半生用壹半薑製

右為細末每服二錢水一盞半入生薑棗同煎至一盞

去滓溫服其滓再煎

延年白朮元 主宿冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸下冷

上熱不能食飲并頭風旋運米飲下空心食前服

方十三

卅一

白朮陸分

芎藭

乾薑

茯苓

右為細末煉蜜和元如梧子大每服十五元加至二十

元忌桃李雀肉海藻菘菜醋物生葱

牛膝地黃散 治癥癖疰氣不能食兼虛羸瘦

牛膝兩 生地黃兩

白朮

五味子伍兩

茯苓陸兩

當歸 遠志

人參 桂心 茯苓

麴末 大麥孽

橘皮 吳茱萸

薯蓣 桂心 大麥孽

防風 人參 防風

甘草 白芷

右為細末空心溫酒服方寸匕日二服漸加至一匕半
夏中煮生薑及檳榔飲下加麥門冬六兩不利此方甚
宜久服令人輕健忌桃李雀肉生葱蕪蕪醋物牛犬肉

大華撥元 治脾虛心腹脹滿食少无力服此補脾

華撥 神麴 附子 白豆蔻仁

人參 白木各壹兩 丁香 華澄茄

沉香各半兩 訶梨勒 陳橘皮各叁分 厚朴貳兩

右為細末酒煮棗肉和杵三百下為元如梧子大每服二十元食前生薑湯下

白豆蔻元 溫養脾胃消進飲食

人參 茯苓 訶子 白豆蔻

桂 厚朴廿二 陳橘皮廿二 丁香

華撥 檳榔 附子 當歸

縮砂仁 乾薑各半兩 肉豆蔻仁伍分

右為細末煉蜜和元如梧子大每服三十元空心米飲下

肉豆蔻元 治脾氣虛心腹脹滿胃膈不利食即欲嘔水

肉豆蔻 附子 石斛各壹兩 白木

華撥 椒紅 縮砂仁 良薑各叁分

肉桂 厚朴各壹兩 丁香 當歸

木香各半兩 訶梨勒貳兩 人參叁分

右為細末以生薑汁煮棗肉和元如梧子大每服空心溫酒下三十元

附子神麴元 治脾虛心煩腹脹食少無力服此補脾

神麴 附子 訶梨勒 白豆蔻仁

華撥 白木 白茯苓 人參各壹兩

厚朴貳兩 丁香 華澄茄 沉香各半兩

陳皮叁分

右為細末酒煮棗肉和元如梧子大每服食前生薑湯下二十元

胃脹元 主胃氣不足心氣上奔胃中憤悶寒冷腹中絞痛吐痢宿汁

人參壹兩 茯苓 橘皮 乾薑

甘草各貳兩

右為細末煉蜜和元如梧子大每服二十元不以時白湯下

人參厚朴散 調脾胃進飲食順三焦調榮衛

厚朴 橘皮各壹兩 人參 茯苓

半夏 甘草 桔梗 白木

檳榔 黃耆 五味子 桂

當歸各壹兩 柴胡壹兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片棗一枚煎至六分去滓食前溫服

酒煎附子煎 治心腹積聚風寒邪氣冷癖在脇咳逆上氣喘嗽寒痰痲痺痼冷痛弱筋骨无力百節酸疼虛勞損敗陰汗泄精暑腎久冷心腹疼痛下痢腸滑呼吸少氣瘦悴異形全不思食又主身軀大虛五臟百病

大楮石斤壹 葶撥 胡椒 附子各貳兩

右為細末酒煮麵糊和元如皂兒大空心米飲下二粒

厚朴散 治胃虛嘔吐腹脹堅硬飲食減少因生虛風者

厚朴兩半 天南星分叁 白朮 人參

乾蝎各半

右為細末每服一錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至半盞溫服食前

方十二 卅四

訶子皮散 治脾胃虛弱臟腑滑利腹脇脹滿臍腹疼痛水穀不消腹內虛鳴胃滿氣逆嘔吐惡心後重裏急心胃脹痛困倦少力不羨飲食日久不羨漸向羸瘦

訶子皮兩肆拾 官桂斤伍 青皮兩肆拾 附子兩拾

肉豆蔻仁兩肆拾

右為細末每服三錢水一盞入生薑三片同煎至七分去滓空心食前溫服

溫中良薑元 溫脾胃順三焦治寒痰聚結痞壅不通食即聚吐咽膈噎悶兩脇肋疴刺嘔吐噦逆噫惡心滿短氣噫聞食臭及療留飲腸鳴溫泄冷瀉注下不止常服建脾胃美飲食辟寒邪養正氣

良薑肆斤 甘草壹斤 乾薑肆兩 白朮肆兩

右為細末煉蜜和元每兩為二十元每服一元細嚼生薑橘皮湯下米飲亦得空心食前

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞悶心忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳噫此藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

人參 白茯苓 白朮 甘草 山藥各貳斤 白扁豆 縮砂仁 桔梗 蓮子肉 薏苡仁各壹斤

右為細末每服二錢煎薑湯下小兒量歲數與之

平胃散 和脾胃進飲食作元服尤佳

厚朴 陳橘皮各伍兩 蒼朮捌兩 甘草兩叁

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至六分去滓食前溫服

助脾散 治脾胃虛弱飲食減少

乾薑 草豆蔻 神麴 太麥孽 陳橘皮各貳兩 甘草壹兩

右為細末每服一錢空心食前白湯調下

乾木瓜元 治脾胃生津液止煩渴

乾木瓜壹兩 乾紫蘇 白朮 甘草 乾生薑各壹錢 烏梅肉 神麴 太麥孽各壹錢

丁香錢半 百藥煎字參 人參 茯苓各壹分
 右為細末煉蜜和元如雞頭大每服一元含化無時服
四君子湯 和胃進食

人參 白朮 茯苓 甘草各壹兩
 右為細末每服二錢水一盞入生薑三片棗一枚同煎
 至六分去滓溫服不以時

五百羅漢元 消食化氣

烏梅 胡椒 丁香 巴豆去盡油

縮砂已上各伍伯个

右為末饑餅和元如棗豆大每服五七元食後煎橘皮湯下小兒一二元量大小加減此藥消食化氣寬膈肥腸

進食甚妙 **方十二** 三六

肝腎

沉香猪肚元 治脾腎虛損不思食

石斛 萹撥 訶子 沉香

丁香 木香 人參 白朮

肉桂 白豆蔻 肉豆蔻 萹澄茄

茴香 胡蘆巴 破故紙 烏藥

當歸 川芎 附子 乾薑

胡椒 縮砂仁 川椒 牛膝

巴戟 硫黃 青鹽 厚朴

猪肚壹隻 檳榔已上各壹兩

已上除肚外各一兩又一方治冷積滿悶添枳實桔梗麒麟竭沒藥橘皮三稜蓬莪檳榔等八味又方添硃砂一兩

右為細末猪肚用水煮熟切作基子再入酒內煮軟研和前藥元如梧子大每服三十元空心溫酒或鹽湯下
沉香豆蔻散 治肝元風虛上攻頭目昏眩肩背拘急兼治脾元氣不和

沉香分參 肉桂壹兩 白豆蔻兩半 石斛

巴戟兩各壹 黑附子兩半 赤茯苓壹兩 木香

川芎兩各壹 五味子分參 吳白朮 青橘皮各壹兩

厚朴 黃耆兩各半 藿香 畢澄茄

肉豆蔻 人參各壹分 **方十三** 卅七

右為細末每服三錢水一盞生薑三片棗一箇煎至七分食前溫服

大石斛元 補肝腎益精髓養榮衛去風毒強筋骨明目強

陰輕身壯氣治肝腎風虛頭目諸疾

石斛壹兩半 萹撥兩壹 栝子仁 石龍芮

澤瀉分各壹 附子 杜仲兩各壹 牛膝壹兩半

赤芍藥分各壹 雲母粉 松栢兩各壹 防風

山茱萸分各壹 兔絲子兩壹 細辛 杜仲各壹分

鹿茸 巴戟兩各壹

右為細末酒煮麵糊為元如梧子大每服五十元空心

温酒下忌生冷油膩牛肉

石斛茯苓散 補腎氣

肉苁蓉 壹兩 半

丹參

人參

石南

磁石 各貳兩

石斛

牛膝

杜仲

枳實

五味子

附子

沉香

熟地黄 各半兩

黃耆

當歸

茯苓

桂

右為鹿末每服三錢羊腰子汁一盞半煎至八分去滓温服

沉香元 治腎臟虛冷氣攻心神悶乱四肢逆冷腹脇脹滿痰痛喘促

方十二

廿八

沉香

木香

檳榔

桂

桃仁

藜香子

當歸

肉豆蔻仁

蓬莪朮

阿魏 麩畏煨 熟為度

苦練子 各半兩

丁香

乾姜

乾蝎

青橘皮 各半兩

硫黃 壹兩 半

吳茱萸 半兩 湯洗 次焙乾用

右為細末煉蜜和搗三五万杵元如梧子大每服三十元不以時熱酒下

煉陰丹 治足少陰凝滯氣下墜腫脹如石遊走疼痛不定

玄胡索

海藻

昆布

青橘皮

胡蘆芭

茴香

川練肉

馬蘭花 各壹兩 醋炒

木香 兩半 大戟 醋炙 阿魏 醋升 硃砂

右先將阿魏已下入酒醋內熬成膏放冷入麝香一錢

再攪勻和前藥為元如菉豆大空心燒綿灰酒下五七元十元

元十元

補肝元 治肝虛目暗 一名兔肝煎

兔肝 壹具

車前子

兔絲 各貳兩

栝子仁

熟地黄

茯苓

細辛

枸杞子

麩人 各壹兩 壹分

防風

山藥

芎 各壹兩

五味子 參分

甘草 兩半

右為細末蜜和元如梧子大每服二十元温酒下加至四十元

方十二

廿九

茯神元 千金療夢泄失精尿後餘瀝尿精方

人參

交門冬

赤石脂

遠志

續斷

鹿茸 各陸兩

茯苓

龍齒

磁石

菴蓉 各捌分

乾地黄 拾貳分

韭子

栝子仁 各伍分

右為細末煉蜜和元如梧子大每服二十元温酒下日再稍加至三十元忌熱蕪荑

人參遠志湯 治腎氣不足消渴小便數腰痛无力消瘦

遠志

人參

澤瀉

熟地黄

桂

當歸

白茯苓

黃芩

甘草 芎 白龍骨各壹 五味子貳

右為細末羊腎湯煎服日三竟減則後方每服三錢

山藥地黃元 治心腎氣不足驚悸健忘夢寐不安遺精面

少色脛酸疼

山藥 遠志 熟地黃 天門冬

龍齒各陸分 五味子 白茯苓 麥門冬

車前子 茯神 地骨皮 桂各伍分

右為細末煉蜜和元如梧子大每服二十元食前米飲

下亦各水芝丹

益陽散 治濕冷乘襲下部腫痛

丁香枝杖 藿香 藜蘆香 吳茱萸

方十二 四十

甘松 紫梢花 兔絲子 桂

蛇床子 箋香 木香 杜拘脊各肆分

右為鹿末每服二錢水一盞半煎三五沸乘熱薰洗須

在密室中勿令見風仍溫暖蓋覆

大通元 治丈夫腎臟風上攻下疰頭面脚膝疼痛生瘡及

小腸膀胱宿冷滯氣攻刺腹脇并婦人血風攻疰脚腰拘

攣兼能進食益氣

金釵石斛用半兩 牛膝各壹兩 大附子貳个共

乾薑分 豆蔻去殼麩 檳榔各肆 木香壹分

菊花貳兩 舶上硫黃壹分不 白花地

枸杞子玖蒸玖曝炒

右為細末酒煮麵糊和元如梧子大每服三十元空心

温酒下如喫了轉覺脛骨內疼甚者乃藥効力如疼發

過後只管喫即求差如怕痛住藥疼亦止病未愈婦人

當歸酒下如作散子酒飲調下如常服大効

十一聖元 治丈夫元藏虛冷進食壯筋骨久服經効

大附子 川烏頭各壹兩 肉豆蔻仁 檳榔各肆

肉桂不見火 胡椒 青皮 半夏

硫黃 硃砂 舶上茴香各壹兩

右件除硫黃硃砂外餘為末硫黃硃砂細研米醋半盞

湯餅上熬過次用米醋半碗將研過硃砂入麵一大匙

同煮稀糊和前藥成劑元如梧子大每服三十元鹽湯

方十二 聖

鹽酒空心夜卧服極有効

黃耆牛膝散 治腎藏風虛腰腿脚膝痛

黃耆 白芍藥 牛膝 當歸各叁

防風 磁石各貳拾肆銖 五味子 茯苓

熟地黃 芎藭 桂心各肆

右件為細末每服三錢水一盞入生薑三片棗一枚同

煎至七分去滓温服不以時

葫蘆散 治腎經膀胱虛攻刺疼痛

葫蘆芭 茴香 破故紙 川練子

巴戟各壹兩 青橘皮 桂各叁分 良薑

乾薑各半兩 班猫壹分

右為細末每服二錢入鹽煎不以時

蘭花散治元陽氣弱腎經不能制水循運失時

馬蘭花 川練子 海柑子核樹皮肉不用食只核可用

荔枝核 附子炮切片生腎壹對細切同焙不用腎

沉香兩各半 木香 薰陸香 甘草各壹分

麝香壹分

右為鹿末每服二錢水一盞入炒生薑鹽茴香同煎至七分去滓空心溫服

香積散治小腸氣發作疼痛不可忍及膀胱偏墜結硬散

荆三稜 土茴香 川練子 巴戟天

當歸兩各壹 黑附子 益智仁 南木香兩各半

枳實分

右為細末每服一錢半空心溫酒調下既効即次服舶上茴香元

川椒元

治七疝忽心腹氣逆不得息痛引背脊或臍下堅痛遇冷即極若小腹虛滿引膀胱裏急

川椒壹兩去目并合口者炒 桔梗 細辛各半兩

厚朴壹兩 赤芍藥 乾薑 附子

川烏頭各半兩 檳榔壹兩

右為細末煉蜜和搗三二百下元如梧子大每服二十元食前以生薑橘皮湯下

金鈴散治一切冷氣小腸元臟膀胱氣痛脾元積冷及婦

人血刺冷氣攻疰心腹疼痛嘔逆脹滿臍腹絞痛煩悶急

金鈴子肆拾粒去皮核用巴豆式拾个去皮入麩炒金鈴子肉如桑根色去巴豆及麩只用鈴肉

茴香 荆三稜 茂巴上濕布裹煨熟 枳殼

陳皮 川練子 百部各壹兩

右為細末每服一大錢炒生薑鹽酒調下不以時亦可作元

三菜煎治小腸膀胱腎餘氣

山菜萸 吳茱萸 食茱萸 青橘皮

陳橘皮 茴香 川練子 桂各壹兩

右為細末醋煮麵糊為元如梧子大空心米飲下三十粒

大戟元治膀胱氣陰腫或小腸氣痛

大戟好者對之炒令黃秤半兩 葫芦巴肆兩 木香

茴香 附子 阿梨勒 檳榔各壹兩

麝香兩半

右為細末用川練子五兩好酒一二升蒸白七枚長三寸以來一處煮練子肉軟去皮核只取肉和上件藥末元如梧子大每服五七元至十元每日空心溫酒下生薑鹽湯亦得如潮發疼痛用生薑熟酒下十五元一服立効喫藥後消盡氣且却減藥

側子石斛煎治脚膝屈伸不得

石斛 牛膝各拾兩 茯苓伍兩 天雄

側子各肆

狗脊

桂心

生薑各叁

右為細末煉蜜和元如梧子大每服三十元酒下

鍾乳膏預湯治陰痿精薄而冷方

茯苓

鍾乳

蛇床子

遠志

續斷

薯預

鹿茸各叁

右為細末酒服方寸匕日一服倍蛇床子遠志鹿茸鍾乳尤効

乳尤効

含明散補肝臟勞極

人參

知母

茯苓

秦艽

丁香

甘草

石膏細研各壹兩

右件七味為細末每服二錢用水一盞入葱白一寸煎

方十二

四四

至八分通口服不以早晚

七聖元治下注生瘡

川羌活

綿黃耆

白附子

沙苑

蒺藜

漢防已

五靈脂別研

地龍分

右為細末水煮麵糊為元如梧子大每服十五二十元

腰子羹湯下後用腰子壓之

沉香元治脾腎久虛水飲停積上乘肺經咳嗽短氣腹脇

脹小便不利

沉香壹

烏藥各叁

茯苓

陳皮

澤瀉

香附子各半

麝香半

右為細末煉蜜和元如梧子大每服二三十元孰水

不以時

楮實煎治久患脚膝濕痺行步不得

海桐拾

牛膝玖

楮實柒

枳殼陸

木香伍

芍藥肆

桂心捌

右件為細末煉蜜和元如梧子大每服四十元酒下

香茸元治腎臟虛寒腰膝沉重補益

麝香壹

破故紙肆

牛膝

鹿茸各貳

附子

茯苓各肆

右為細末酒煮稀麵糊和元如梧子大每服五十元食

前益湯或溫酒下

育嬰散補腎臟勞極

方十二

四十五

香附子壹

黑附子壹

白蒺藜

木香各壹

茯苓半兩

甘草壹分

右六味為細末每服二錢水二盞入生薑五片葱白一

小莖同煎至七分空心服

白芍藥散治癰疾久不羸

白芍藥

白茯苓

當歸

白朮

陳皮

香附子各半

右為鹿末每服二錢水一盞同煎至八分去滓食前下

木香菓澄茄元治疝氣及下部濕冷臍腹疼痛

菓澄茄

川練子

木香

舶上茴香

桃仁各壹

蝎壹分

右為細末酒煮麵糊和元如豌豆大每服二三十元空心溫酒或鹽湯下

木通茴香元治小腸氣膀胱氣疼痛不可忍者

川練子各壹兩 青橘皮 茴香各壹兩 木通壹握 巴豆拾

右件同炒黃不用巴豆入海金沙一錢滑石一錢半同研勻每服一大錢熱酒調下立効

煨腎元治陽氣衰弱腰痛膝冷精滑陰痿臍腹疔刺減食力劣皆可服之

附子 葫蘆芭 破故紙 茴香已上並壹兩炒香熟 右為細末爛研羊腰子和元如梧子大每服三五十元

空心溫酒下食前亦得

羌活散治肝藏壅實目赤昏澁熱泪不止筋脉拘急背膊勞倦及頭昏項頸緊急疼痛

羌活 甘菊花 蔓荊子 芎藭各壹分 右為細末每服二錢水一中盞入酸棗仁黍粘子五十粒研碎同煎至七分去滓不以時

四味湯小品治疝氣腹中虛痛及諸腸痛裏急

當歸 生薑 芍藥各壹兩 羊肉脛 右剉以水一斗二升先煮肉爛熟出肉內藥取三升每服七合日三

草遠丹明目補腎

刮皮木壹斤米泔汁浸 菊花捌兩 青鹽

椒各肆兩

右用好頭醋一斗於砂石銀器中煮米數沸入椒菊鹽煮去一半醋取出焙乾為末與餘醋為糊元如梧子大空心臨卧下三四十元

椒人元通利小便

商陸 橘皮 桑白皮

右件等分為細末水煮麵糊為元如梧子大米飲下三十元以小便通為度

沉香散治寒疝小腹堅滿攻作不定時發疼痛腎虛受邪腫脹及藏寒氣弱臍常痛

沉香 附子各壹兩 川練子壹兩半

右為細末每服一錢半水一盞半生薑三片棗一箇鹽少許煎至七分空心服

七里香湯草藥治腿膝腫生瘡

右一味煉汁淋洗一次便無

橘皮元治秘

橘皮不以多少

右為細末煉蜜為元如梧子大以生薑湯下三十元

補腎腰子法治老人腎藏虛寒即其腎以寒虛自結實硬雖服補藥並不入用羊腰子一對水半碗用杜仲闊一寸長二寸許一片同煮腰子軟空心切食令人內腎柔軟然

後服平補藥

生薑丹 治腎受邪陽氣衰弱意情不快多倦男子既腎不受邪即病不生用茴香二兩生薑四兩不去皮 搽拌茴香入坩器內淹一伏時不透氣取出用慢火炒不得過次入青鹽一兩同為細末煮好麵糊為元如梧子大每服三五十元空心酒或鹽湯下並無忌此藥止是用茴香生薑引生薑入腎經散發邪氣也

腎喘湯 治外腎喘

右以左顧牡蠣文片色白者二兩先杵為鹿末以甘鍋子盛火燒通赤放冷為細末每服一錢濃煎鯽魚湯調下不以時鯽魚重四兩者一箇事持了濃煎煎時不得動

論足膝病方

論曰足膝者腎之所主若緩縱無力脛腿頑痺或覺轉筋或時疼痛皮膚腫按之不陷或指節拘攣謂之脚氣甚者至於骨中痞悶寒熱吐逆小腹不仁心中煩躁小便秘澀乃邪氣自外傳內此由脾腎氣鬱滯而濕毒之氣傷於經絡與風毒相傳毒氣從而入者為病病從脚起故謂之脚氣此病有虛有實有冷有熱治法實者瀉之虛者調之冷者溫之熱者寒之唯忌補之蓋本由外邪着於經絡經絡之氣已不通流補之則又實其經絡邪氣無所從出故也若脛脛痿弱痺而不仁步履無力宜小續命湯去風門 若骨中痞悶時欲嘔者增以橘皮元小便利則兼以椒人元骨間冷疼者於小續命湯中去黃芩增桂成一兩半

附子成一兩半加細辛半兩獨活半兩及以烏頭劉散淋沃差後竟無力專宜續斷元骨悶煩疼不可覆以衣者當作麝香防風獨活湯若協前證者則以前主對之藥治之服藥之後常竟熱汗出為佳若大實腫痛大便不通者宜大驚甲湯下之下後未除而復前證者亦依前藥對證而用之

手足筋攣 小續命湯加減方

有人年五十四素羸多中寒近服兔絲子有效小年常服生硫黃數斤脉在上二部右下二部弦緊有力五七年來病手足筋急拘攣言語稍遲遂與仲景小續命湯加薏苡人一兩以主筋急減黃芩芍藥人參各半以避中寒杏仁

方十一

四九

只用百枚後去尚竟太冷因令盡去人參黃芩芍藥三物却加當歸一兩半服之遂安

固元散 治脾胃積寒飲食无味

丁香壹 木香半 芎壹兩 桂貳分

陳皮壹兩 削木半兩 藿香 甘草各半兩

茴香 烏藥各壹兩

右為細末每服二錢隨證改湯事調下

棗肉元 治脾胃不和飲食減

蒼朮米泔浸壹晝夜切碎 生薑切碎 棗去核切碎

川芎酒浸壹晝夜切碎 桂酒浸壹晝夜切碎 已上各肆兩

右五味相間一重重鋪饒軟熟同搗爛用坩合子盛每

服旋元二十元如梧子大空心白湯下

養氣湯

香附子

國寶者去盡黑皮微炒研末

甘草

壹兩

薑黃

湯洗盡為度宿用水淘去及

右三味同搗羅成細末每服一大錢入鹽點空心服皇祐至和間劉君錫以事竄嶺南至桂州遇劉仲遠先生口授此方仲遠是時已百餘歲君錫服此湯間關嶺表數年竟免嵐瘴之患後還襄陽壽至九旬嘗云聞之仲遠曰凌晨盥櫛訖未得議飲食且先服此湯可保一日无事旦旦如此即終身无疾病矣

補肝丹

治肝經風氣上攻頭腦昏重目暗眩項背拘急

方十一

五十

脚膝少力四肢多倦久服養精血明目注顏

栝子仁

熟乾地黄

沉香

壹方用半兩

乾山藥

金釵石斛

石麻

覆盆子

牛膝

黃耆

蔓荊子

右為細末煉蜜和元如梧子大每服二十元米飲下空心服每日止進一服一方加菴蓉一兩酒浸一宿片切焙杜蒺藜一兩木白杵去刺慢火炒黃後秤兔絲子一兩淘去泥土酒浸一宿漉出焙乾

雞峯普濟方卷第十二

雞峯普濟方卷第十三

馮翊賈兼重校定

治熱

丹毒千金論

曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之色大者如手掌甚者徧身有癢有腫無定色有白丹者肉中腫起癢而復痛微虛腫如吹狀隱疼起也有雞冠丹者赤色而起大者如連錢小者如麻豆狀肉上粟起如雞冠肌理也一名菜萸丹有水丹者由徧躰熱起遇水濕搏結丹晃晃黃赤色如有水在皮中喜著股及陰處此雖小疾不治令人至死治之皆用此升麻膏

升麻膏兼治風熱上攻頭面及項背腫赤等

升麻

白斂

漏蘆

連翹

方十一

芒消

黃芩

蛇銜

枳實

蒴藿

梔子

右微搗之水三升浸半日以猪膏五升煎令水氣盡去

滓膏成膏傳諸丹日三及熱瘡腫上

七疝散

治疝氣

茴香

川練子

解鹽

桃仁

麩

班猫

右同炒桃仁熟取出放冷去班猫并麩為末每服一錢

空心溫酒調下

平肺元

治上焦有熱微寒外乘客滯肺經寒熱相交上搶

咽隔成咳嗽不已或邪氣留連日久積動經絡或有惡物

或胃滿氣促或飲食進退或寒熱不常及治咳嗽氣喘
嗽喉中呀齶不得睡卧宜服

真桑白皮去赤皮剉半寸清水米泔浸拾伍日漉出焙令乾貳兩

貝母防已 甘草

杏仁去皮尖雙仁者麩炒赤別研各壹兩

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服三十元食後臨卧生薑湯或橘皮湯下

地黄元治心熱太過三焦不順夜卧不寐退熱安神

生地黄兩 人參 白芍藥 當歸各半兩

甘草壹分

右為細末煉蜜和元如彈子大臨卧濃煎淡竹葉湯嚼

下一元常服養榮衛用人參湯下

棗煎除風熱之疾

棗汁升 白蜜貳合 生薑汁壹合

右重湯煮棗汁三升入鹽酥再煎三沸下薑汁蜜等再熬合得所下不津器中貯之每服一合和酒調服大理百種風疾

芍藥黃耆湯療陰不足則陽偏陽偏則發熱若熱從背起或從手足漸遍身口舌乾燥思欲引水時躁悶此由陰氣虧少少水不能滅盛火蓋諸陽起四末循行於背陰不能斂陽所以發熱或晝發而夜寧或夜發而至旦即清其脉虛疾而小宜服此

白芍藥兩 黃耆 甘草 青蒿各壹兩
右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服不以時

參橘元療熱從腹起上循背腋繞頸額初似温漸至大熱發作無時遇飢愈劇中脘不利善食而瘦面色蒼肌肉不澤口唇乾燥此由脾氣素弱曾於他病後後誤投熱藥入於脾熱則消穀引食善消肌肉其脉濡弱而疾治之

黃橘皮兩 麥門冬 人參各壹兩

右為細末煉蜜為元如桐子大米飲下三十元

大建中湯療熱自腹中或從背脊漸蒸熱日晡則劇至夜漸退或寐而汗出小便或赤或白而濁甚則頻數尿精神不収及陰無所使治屬虛勞

方十三

白芍藥兩 黃耆 遠志 當歸

澤瀉 龍骨 人參 甘草各貳兩

右為鹿末每服五錢水二盞生薑五片棗一个擘膠少許煎至一盞去滓温服食前

論及方

若自腰已上發熱極則汗出出已涼移時如故復加昏冒腹中膨滿其氣上攻時時欬嗽引脇下牽痛睡中驚悸其脉弦急帶疾此由外寒搏客內冷相合寒則氣収而水液聚而不行內化成飲醫以熱藥攻寒寒未已而復增客

熱陰寒內閉拒陽於外而不得入逼陽上行發而為熱散而為汗汗多亡陽心氣內虛故令驚悸治屬飲家溫而利之宜礬石元若熱起骨間煩疼手足時微冷旦起躄涼日晚即發背脊牽急或骨節凸起足膝酸弱此由邪熱加陰畜留骨髓髓得熱則稀髓稀則骨中空虛陽入於陰虛則水少脂液乾枯熱蒸骨軟而凸其脉沉細治屬骨蒸宜蘆根湯補髓元

蘆根湯

蘆根

麥門冬

赤茯苓

芍藥

地骨皮

右為鹿末每服五升水二盞煎至一盞去滓溫服食後

方十三

四

補髓元

生乾地黄

乾漆

右為細末煉蜜和元如菘菜豆大米飲下三十元空心臨

卧服

若自骨已上至頭發熱口鼻氣塞時如煙薰目澁咽燥口乾唾如凝脂時效毛竦大便不利小便赤黃此由肺氣不調邪熱乘客上焦不降其脉疾大先與桔梗湯熱不退與五味子湯

桔梗湯

桔梗

人參

麥門冬

甘草

小麦

右吹咀水三升煎至一升去滓分三服

五味湯

柴胡

半夏

黃芩

赤茯苓

五味子

右為鹿末每服五錢水二盞生薑三片棗一枚煎至一盞去滓溫服食後

柴胡芒硝湯

治旦熱不休日晡尤甚口中勃氣出耳无所聞或時昏睡即浪言意欲喜冷小便赤色大便不通此由三陽氣盛外蘊經絡內畜腑臟或因他病候服熱藥而致其脉洪數病久者短疾

柴胡

黃芩

甘草

赤茯苓

芒硝

右為鹿末每服五錢水二盞生薑三片棗一箇煎至一盞去滓入芒硝一錢攪勻溫服以利為度

橘皮

生薑

甘草

方十三

五

半夏

渴不能飲頭目昏痛惡見日光遇涼稍清起居如故此由飲食失宜胃中空虛熱留胃口其脉虛大而數謂之中暑

橘皮甘草湯

療着身大熱背微惡寒心中煩悶時欲嘔

右吹咀水三升煎至一半去滓分三服不以時

白虎桂枝湯

治間日發熱昏昏多睡熱過則清快至其發時還復如故每發必數次頭痛身熱拘倦此由肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣寔而不外泄其氣內藏於心外

舍於分肉之間令人消燥肌肉其脉弦大而數謂之痘瘡

石膏片

知母兩

甘草

桂各

右為鹿末每服五錢水二盞粳米三十粒煎一盞去滓

温服非時

澤瀉湯治身熱汗出煩滿不為汗解此由太陽之經先受

風邪與熱相搏腎氣上行風與熱搏則為汗腎氣厥則煩

滿謂之風厥

澤瀉兩

白朮

防風各

石膏

赤茯苓兩

各壹

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

兔絲子煎治四肢發熱逢風如炙如火此由陰虛陽盛諸

方十三

六

陽起於四末少水不能滅盛火而陽獨治於外宜服此

兔絲子

五味子各

兩

生乾地黄各

兩

右為細末米飲調下二錢食前

空心平補元子治發熱不解五心煩熱不得睡發渴喫湯

飲初先頭痛壯熱

生乾地黄

黃耆

白茯苓

楮實子

枸杞

山藥

槐實

沉香

澤瀉

白蒺藜等

右為細末每服二錢水一盞煎至七分和滓温服非時

又方非時飲子

人參

黃耆

赤茯苓

白朮

麥門冬

白扁豆

蒸藜

甘草各

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓温服非時

大便秘

枇杷菜散適適陰陽和養脾胃兼治食飲易傷腹脇痞滿

口乾多渴常欲飲冷四肢倦怠大便不利

人參

枇杷菜去毛以藥汁

灸令黃

白朮

陳皮

前胡

藿香葉

白茯苓各

桔梗

甘草各

白豆蔻

半夏各

右為細末每服二錢水一盞入生姜三片棗一枚同煎

至六分去滓食前温服

宣壅元治大便秘滯有三一者三焦五臟不和熱氣小偏

方十三

七

入腸胃二者風客三焦氣弱傳道不利三者腎虛水少脘

腸乾澀皆令大便秘滯並宜服

麻子仁

郁李仁去皮各

並研為膏

陳橘皮

羌活

川芎

木香各

檳榔各

右同為細末与麻子仁郁李仁膏同研煉蜜和元如梧

子大每服二三十元熱水下不以時

四順飲子治大便不通面目身熱口舌生瘡上焦胃悶時

欲得冷此三陽氣壅執併大腸其脉洪大

大黃

赤芍藥

甘草

當歸等

右為鹿末每服五錢水一盞半煎至一盞温服利為度

麻仁元治氣虛秘滯

麻仁去皮研 枳實炒 杏仁方藥 大黃各肆 製厚朴貳

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元熟水吞下不以時

神功元 疎解秘滯及風氣下流腰膝疼痛

麻仁伍 大黃伍 訶子貳 人參半

右為細末煉蜜和元如梧子大每服三十元熟水下不以時不知加之以疎為度

小當歸元 治虛人秘澀潤養腸胃

當歸分 桂分 葳靈仙壹

右為細末水煮麵糊為元如梧子大每服二三十元空心生薑湯下不以時

紫蘇元 治有虛熱秘滯

紫蘇子 黃橘皮各貳 知母壹兩

葳靈仙元 若年高之人津液枯燥無以潤養腸間乾澀氣

血俱衰艱於運化其脉燥大宜此葳靈仙元紫蘇麻人粥

黃耆壹兩 葳靈仙半兩 枳實壹兩

右為細末煉蜜和元如梧子大生薑湯下二十元又將

紫蘇子麻仁研水取汁煮粥甚佳

備急元 治大便秘

大黃 乾薑 巴豆分

右為細末蜜和元如豌豆大米飲下一元羸人服一元

菘豆大以大便利為度

朱砂餅子 治大便秘結

朱砂長州 巴豆條 水銀壹皂

右同用水熬一宿去巴豆水銀將砂細研蜜和成膏置

心上立効

大橘皮元 治大便秘

厚朴 橘皮各壹 杏仁伍

右為細末煉蜜和元如梧子大每服五七十元不以時

米飲下

赤小豆散 治大便秘

赤小豆浸令牙出 當歸壹兩

右為細末温漿水調服二錢不以時

蒲黃散 若純下清血者多因憂思之氣不散而乘於血或

怒氣傷肝逆氣上行血溢流散或飲酒過多熱入於陰而

傷於血其脉或散或瀉者下血久不止也先與蒲黃散不

差與王瓜散方在後

木賊壹兩 蒲黃貳兩

右研勻每服二錢米飲調下不以時

薰法

野狐骨 艾葉多

右燒煙薰穀道以痛為度

妙應元 治氣虛有冷大便不通

金液丹 半硫圓等分

右二味皆妙每服五七十元空心米飲下

橘皮杏仁元 治諸大便秘兼脚氣人秘尤佳

橘皮兩肆 杏仁壹兩貳錢

右為細末煉蜜和元棗豆大每服五七十元白湯下不以時

通腸元 治大腸乾結不通

厚朴去皮生薑汁和 猪狹等分

右用猪狹同和成膏元如梧子大每服三十元生薑水下湯亦得

論曰大腸為傳道之官變化出焉獨受諸陽之濁或秘而

方十三

十

不利或秘而不通若其人腹脹痛悶氣絕胃中痞塞欲嘔此宿食留滯脾氣不轉其脉沉疾而實宜備急元方見頭若但秘澁餘無所苦此由風搏肺經傳於大腸腸中受風津液燥少其脉浮澁謂之風秘宜脾約麻人元亦有氣下降而穀食不流行者其人多噫其脉短澁宜紫蘇元新產婦人亡血而津液少大便秘宜服之

小黃香元 治洞腸風熱大便秘滯及五痔結核

防風壹兩 黃耆兩貳 芎藭兩半 皂子人黃

枳殼各壹分

右為細末煉蜜和元如梧子大每服三十元不以時米飲下

治冷

葱白散 治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛大治婦人產前產後腹痛胎不安或血刺痛者兼治血臟宿冷百骨節倦疼肌瘦怯弱傷寒帶癖服久尽除但婦人一切疾病最宜服之

川芎 當歸 枳殼 厚朴

桂 青橘皮 乾薑 茴香

苦練子 芍藥 木香 神麴

大麥蘖 荊三稜 蓬莪茂醋浸壹宿 人參

茯苓各壹兩 乾地黃兩壹 訶子 大黃各半兩

右藥同為細末每有患者三平錢常服只二錢用葱白

方十三

十一

二寸拍破用水一盞同煎至七分入鹽半錢和滓熱服內訶子大黃二味或有不用者蓋相度狀可入此二味多不全用者須入大黃即服時不須入鹽也

木香散 治臟腑冷極及久冷傷敗口瘡下泄穀米不化飲食无味肌肉瘦悴心多嗔恚婦人產後虛冷一泄及一切水瀉冷痢疾等

破故紙 木香各壹兩 良薑 縮紗人

厚朴各叁分 赤芍藥 桂 陳橘皮

白朮 吳茱萸 胡椒各半兩 肉豆蔻伍个

檳榔壹

右為細末每服三錢用不經水猪肝四兩出筋膜批開

重重揆藥放鼎中入漿水一椀醋二茶脚許蓋覆煮
孰心益一錢葱白三莖薑一彈許同煮水欲盡空心為
一服冷食之或以漿水煮肝為元亦得如梧子大每服
五十元空心米飲下

三建元 治氣極虛寒癖飲留滯胃中痰滿心腹疼痛氣急
不下飲食腹脹虛滿寒冷積聚

硫黃 礬石 烏頭 乾薑

吳茱萸 人參 當歸 蜀椒

細辛 皂角 桂 附子各壹

右為細末煉蜜為元如梧子大每服十元米飲下一方
加天雄赤石脂

葫蘆元 治元臟氣虛下焦冷攻臍腹脹滿疾痛皮胃腸
連陰牽痛不可忍

葫蘆 茴香各壹 木香 桂去鹿皮不
得見火

當歸兩 附子兩 阿魏兩 硫黃壹兩

青橘皮 沉香 白豆蔻各半 桃仁貳兩去皮
尖麩炒研

右除研藥外同杵為細末將研藥拌勻好酒一升半熬
桃仁令稠和諸藥不成劑入曰杵三二百杵元如梧子
大每服二三十元空心溫酒下日三服

山茱萸湯 東莎劉先生既固足經益陽火玉抱肚法

山茱萸生 吳茱萸生各肆

胡椒貳兩 大川烏頭兩 蛇床子生貳 高良薑生壹

已上七味為鹿末以好酒拌勻不可太濕裏一伏
時慢火炒令乾不得有煙取出冷

牡礪肆兩炭火燒令赤
取出放冷地上 乾薑 荖荖香

香白芷 浮萍草貳兩

右十二味為鹿末每用水二斗以來秤藥半兩煎五七
沸去滓盛盆內以氣薰足候通手淋洗如冷再煖亦得
凡沐浴了着鞵卧為佳若小浴尤佳若欲坐湯中須用
水五斗藥末一兩半煎十餘沸通手乃可坐之如冷再
煖之以手淋腎脬一帶愈妙淋了便須就寢勿得見風
五七日日一淋効不欲具述若卧覺腰膝微汗出尤奇
須飽食可浴

正氣元 治氣弱中暴傷風冷胃膈痞悶嘔吐清痰脇肋膨
脹氣逆不通噎噫吞酸不思飲食霍亂吐利心腹疼痛

吳茱萸兩 桂肆 附子 乾薑

厚朴 藜蘆 藜蘆各貳 細辛

川椒 當歸各壹

右為細末煉蜜為元如梧子大每服三十元食前熱米
飲下

大阿魏元 治男子女人一切冷氣霍亂吐瀉元氣將脫四
肢厥冷本臟氣上攻築心悶絕不知人事及治傷冷傷寒
氣虛挾陰氣傷寒並宜先服此固真氣

阿魏壹兩半以醋化入白麩參
匙同和為餅子炒令黃 硫黃壹兩

青木香 <small>兩壹</small>	附子 <small>壹兩半浸</small>	石菖蒲 <small>壹兩半</small>
檳榔 <small>兩各壹</small>	白木 <small>肆兩</small>	乾薑
肉豆蔻	青皮	白豆蔻 <small>各半</small>
右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元生薑湯嚼下		
食前		
葫蘆散 治脾元積冷臍腹弦急引痛腰背面色萎黃手足厥冷脇肋脹痛小便頻數及治育腸小腸一切氣痛		
葫蘆	破故紙	沉香
巴戟	葶澄茄	川練子
附子	桃人	川烏頭 <small>各半</small>
右為細末每服二錢水一盞入鹽少許煎八分去滓空		
心溫服		
正陽丹 治下部虛冷		
硫黃	陽起石	附子
桂	葫蘆	乾薑
茴香 <small>兩各壹</small>	木香 <small>兩半</small>	破故紙
右為細末饑餅和元如梧子大朱砂為衣每服三十元		
鹽湯下婦人醋湯下		
大四神煎 治痼冷		
肉豆蔻	丁香	厚朴
半夏	陳皮	白木
乾薑	桂 <small>各壹</small>	附子

右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服三十元空心米飲下		
已寒元 治素虛有寒冷		
附子	川烏頭	乾薑
胡椒	葶澄茄	良薑
桂 <small>等分</small>		紅豆
右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服三五十元空心白湯下		
養正金丹 治中下寒冷進飲食暖脾胃 <small>張會伯</small>		
硫黃 <small>別去砂</small>	大附子 <small>炮</small>	乾薑
桂	厚朴	半夏
		丁香
		肉豆蔻 <small>各壹</small>
右為細末酒煮麵糊為元如梧子大朱砂為衣每服三十元加至七八十元空心米飲下老人服之尤佳		
厚朴煎 治脾胃久積冷氣不思飲食三焦不調中臟虛乏		
開胃進食		
厚朴 <small>貳</small>	陳皮	訶子
桂 <small>各壹</small>	附子 <small>貳兩</small>	乾薑
	茯苓	甘草 <small>各壹</small>
右為細末煉蜜和元如梧子大每服三十元如大段鬲氣進食不得以水酒共一盞煎藥末二錢和滓下三十元棗肉和元尤佳		
大硝砂元 治冷積		
硝砂	芫花	三稜
		乾薑

皂角

巴豆各半兩

五靈脂

川烏頭各壹兩

右醋熬為膏可元即元如桐子大每二元薑橘湯下

八神湯辟除霧露山嵐之氣消飲食補脾胃

神翅

麥蘖

青鹽

甘草各壹兩

生薑陸兩

胡椒貳分

草豆蔻貳分大者麩

數燒黃熟

丁香貳分

右除丁香胡椒外將六味令杵成麁滓帶潤淹一宿焙乾入物同為細末湯點服不以時

二陽丹補虛逐冷

附子

羊肉肆兩炮附子蒸無息研為膏

桂

硫黃

陽起石

鹿茸

白朮各壹兩

方十三

十六

右以附子膏和元如梧子大朱砂為衣空心鹽酒服三

五十元

火疰丹治脾元虛冷小腸氣發動疼痛及瘕癖冷氣腹痛

茴香

木香各壹兩

硃砂

硫黃

乾蝎

白礬各壹分

附子半兩炮去皮

右為細末酒煮麵糊和元如雞頭大每服二元略嚼破

一元燒綿灰二錢酒調下

正金丹治一切瘡冷補虛養氣

附子

炮去皮火酒浸參日切如要速用浸軟切焙

大烏頭如上製

茴香

硫黃各壹兩

巴戟壹兩

乾薑肆兩

肉桂壹拾貳兩

取皮至味

右為細末淡麵和元如梧子大每服三十元米飲下空心食前

紫桂丹治脾虛有冷飲食不入臍腹疼痛

蒼朮

神翅各肆兩

良薑油煎

乾薑

桂

大麥蘖各貳兩

甘草壹兩半

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元細嚼空心米飲下

飲下

救陽丹補虛療冷

附子壹兩

烏頭貳兩

乾薑壹兩貳錢

防風

桂

牡礪

人參各半兩

右為細末每服三錢水二錢煎至八分空心併三服効

方十三

十七

赤元主寒氣厥逆

茯苓

桂各肆兩

烏頭

附子各貳兩

細辛壹兩

射罔如大棗壹分

右為細末煉蜜和元如麻子大朱砂為衣空心酒服一元日再不知加至二元

元日再不知加至二元

大効蘿蔔元治諸冷積腹脹氣痛

蘿蔔子各壹兩

沉香壹分

草豆蔻半兩

白朮

青橘皮各半兩

右件除蘿蔔子為末別研麵糊為元如梧子大每服十

元老少皆可服

助陽丹治久虛羸瘠或因大病真氣虛耗陽微陰勝虛勞

百疾形寒脉結夜常異夢尸注傳涼多臥乏力或傷寒變
證脉弱燥神明錯亂及療動傷脾胃痼冷堅積惡利膿血
臍腹撮痛虛滑無數厥逆自汗

硫黃 附子 乾薑 桂 朱砂
兩 各壹 兩 半兩

右為末煮糊為元梧子大每服二十元食前米飲下

温脾湯 治久積冷熱赤白痢

大黃 桂 附子 乾薑 人參
兩 各壹 兩 各貳

右為鹿末服三錢水一盞煎七分去滓温服不以時

丁香神麴散 治大腸宿食久下白膿臟腑刺痛大便稀滑
或青或黑遇冷便劇飲食進退肌骸瘦弱

神麴 肉豆蔻 丁香 良薑 乾薑
兩 各肆 兩 陸兩

方十三 十八

右為細末米飲調服二錢一方草豆蔻丁香各四兩良

薑五兩麴七兩半加乾薑六兩

訶梨勒散 治脾胃虛弱臟腑滑利腹脇脹滿臍腹疼痛水

穀不消腹內虛鳴胃滿氣逆嘔吐惡心後重裏急心胃脹
痛困倦少力不美飲食日久不差漸向羸瘦

訶子皮 官桂 附子
兩 拾 兩 拾 兩 拾

肉豆蔻 麴 黍 黍 黍 黍
兩 拾 兩 拾 兩 拾

右為末服三錢水一盞薑三片煎七分去滓空心食前

温服

伏火四神丹 治陽虛陰盛一切痼冷臟腑滑瀉

辰砂 雄黃 雌黃 硫黃
兩 各貳

右四物搥碎用楮皮大帟一張有脊骨者兩面濃研好

松煙墨塗三兩遍令黑光色曝乾號曰崑崙紙用裹前

藥於淨室中搗地坑子一枚深四寸許闊狹上下四面

皆比藥角寬二寸以來用新瓦細末新瓦不經雨者置

坑子中約二寸許安藥角在內又蓋瓦末二寸許比地

面微高如龜背狀用炭七八斤在炉面上煨之徐添

炭約用百斤不令滅火候藥聲作漸次減炭直候藥聲

斷先芒歸躰方始住火取去餘炭用新黄土一大擔覆

兩伏時取出藥角剥去紙用櫻刷子盆中淨水洗刷令

淨霜霧三夜早晚不令見日杵研為極細末糯米糊元

如小雞頭大風乾每服一二粒或三粒温酒或酒下忌

方十三 十九

羊肉葵菜并茶一曰坑子動八寸下用瓦末二十四

正氣丹 治陰寒內盛元藏不足陽氣暴脫下焦傷竭手足

厥逆戰栗背寒腰膝冷重臍腹疼痛大便滑泄小便頻數

行步息短色澤枯悴嘔逆喘急逆自汗霍亂轉筋寒疝
及傷寒陰盛脉微欲絕温固精氣大益脾胃

硫黃 附子 乾薑 桂
兩 各肆

右為細末水煮熟糊為元如梧桐子大每服三十元食

前熱米飲下

劉快活燒死砂子法

重校定死砂子法用玄零皮據藥
无此名稱當是懸鈴也小椒是

百花鋪地面

火從坤上起

玄零作蓋頭是林紅

珠砂死便休

右將砂子細研二兩玄零皮二兩百花合子內依歌子
使用三秤火燒盡為度先用糯米赤石脂固濟口縫次
用塩泥厚一指候火罷出之以棗肉和如桐子大每服
一二粒

火輪散 正陽固氣峻補下經治臟寒滑洩狀如傾注下痢
赤白膿晝夜無度臍腹痛嘔逆腸鳴虛滑夜起全不入
食手足厥冷面色青白漸致氣劣虛汗不絕

附子貳 肉豆蔻壹 乾薑貳
右為細末每服一錢食前米飲調下

鍾乳元 治虛冷
鍾乳粉肆 硫黃末壹 乾山藥壹

右為細末用棗肉和元如梧子大每服七八元至十元
空心米飲或酒下

紫金丹 治冷
石燕子 赤石脂 大赭石 朱砂

硫黃 鍾乳粉 陽起石各壹兩火煨壹伏時
已上各一兩研如粉入沙合子內以蛤粉糊口塩
泥固濟候乾用炭十斤燒煨炭盡為度

良薑 萹撥 桂心 乾薑
草豆蔻 肉豆蔻

已上各一兩為細末
右用大附子二兩炮去皮臍用好酒一升半煎成膏子

和前件藥如雞頭大每服二三元空心米湯下婦人醋
湯下

斷下湯 治滑泄久不羸者
赤石脂伍 龍骨陸 當歸貳

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓温服
温勝散 治大腸虛冷滑泄如痢

肉豆蔻貳 出大毒 縮砂仁壹 參柒
右為細末每服二錢粟米飲調下棗湯下亦得

救陽湯 治陽微陰勝風寒侵襲真氣暴衰形寒脉結神識
不明心胃痰滿嘔逆清涎頭目昏眩不覺倦卧自汗不止
飲食不入下利頻併臍腹疼痛支躄困倦並主之

川烏頭 乾薑各肆兩搗碎同炒轉色
右為鹿末每服三錢水三盞煎一盞去滓食前温服寒
多加良薑二兩汗多加牡礪一兩痰多加附子二兩風
加防風一兩支節蔞加桂一兩

二氣丹 治虛冷
硫黃 水銀

右等分慢火結砂子糊和菜豆大丁香湯下五七元

豆蔻四神丹 治虛冷
龍骨 豆蔻 硫黃 附子

乾薑 桂各壹兩

右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服三十元空心

米飲下

燒中丹法

先煨砒煉錫花

每錫不以多少以新鐵銚子鎔過錫屎三數遍凡錫一

兩用水銀五錢以濕筋紙馳馬紙亦佳十來重下用濕布帕

子揉取細錫花又三四遍候錫可擗如粉研碎為度

煨砒

每砒五兩用黃丹四兩者佳錫花三兩同研極細用內有

坩者罐子外用鹽紙泥固濟別泥爐子留門竅子容上

下着火先放罐子在火內候罐子紅以長竹筒削如馬

耳盛砒寫入罐子內恐手熱也用新瓦作蓋子着火候得所

方十三

廿三

取出候冷打破罐子取砒

燒丹

每辰錦砂一兩用煨砒一兩同擣碎研細用甘鍋子一

箇外以鹽紙泥固濟先煨鍋子乾下砂砒在內九十兩

用炭一秤平放鍋子却以鹽泥作蓋子以醋紙數重先

蓋了次用鹽泥蓋了發火候火尽經夕取出再研極細

每煨過砂一兩用赤石脂二錢同研細以井花水元訖

煨乾並入鍋子燒通紅為度其燒錫花爐子三面作門

子及用瓦條子作喙眼

伏火中丹方

錫花法

黑生錫半斤以新鐵銚子溶成汁用新瓦一片底下着
火瀉在瓦上再溶再瀉後只取精英五兩每兩水銀半
兩同鎔急瀉在濕紙上如粉色佳自然研得如粉

琥珀砒法

砒霜五兩精白如黃丹肆兩色錫花兩

已上三味同研細以鹽泥固濟卽州罐子一个只用銷

金銀鉗鍋子最佳厚三分許乾用風爐子底火四斤上

面四下簇炭三斤中間坐空罐子內候火盡出盡砒鎔

清如水照人面有火光出取出放冷取如琥珀色過火

色黑火小無光淨

中丹方

方十三

廿三

辰砂無石純琥珀砒各伍兩同

固濟一鉗鍋子亦用鹽醋紙泥固濟鍋子內先用醋薄

泥三重如紙厚候乾入藥末以好紙五重醋濕過蓋上

用薄泥一重四下立炭十斤煨火盡為度候經宿取等

子秤每兩赤石脂二錢同研細滴井花水元如桐子大

焙乾再入鉗鍋通用炭火燒治男子婦人一切痼冷五

勞七傷形寒脉結中風手脚不舉腸風五痔泄瀉痞疾

婦人赤白帶下血崩並宜服之每服一粒大憊不足者

五粒一服常服一粒空心溫水下有病者煎茅香湯下

此藥不燥上有冷自去進飲食壯筋骨婦人產後血虛

不止不思飲食瘦弱三粒一服忌羊血

煨中丹法

造錫花

黑錫不以多少用薄鐵銚子鎔成汁地上取去滓三兩次候滓子淨再鎔開先安排紙十餘張用水微噴過瀉錫在上急揉自成錫花未碎者再鎔

煨砒

錫花兩

砒霜兩

黃丹兩

右同研入鉗鍋子坐在火上用新瓦蓋口以三四斤炭煨候鎔成汁急瀉在淨地上自如琥珀色

煨丹

朱砂

砒各戴兩合
研勻細

方十三

廿五

右以醋紙筋和白茶土固濟小口小埧罐子一箇約厚一指候乾入藥在內以篋子按實上用甘草茶末赤土和末子蓋面子次以瓦子作蓋子一箇與餅口相當留一缺子出氣却用前泥泥合口子只留筋頭大窠子一箇坐在灰上以火一斤來養半日令乾透泥合所留窠子不可令漏氣再養火半日用醋拌灰五升放餅子在內按如餅餅樣令實以火三十斤煨煨火盡取出青色乃佳研細每一兩入燒過赤石脂末二錢同研入粟米飲少許滴水元候乾再燒赤紅放於青埧碗中以帕子裹手出光服時再燒如常法

四神丹

羊蹄草
錫子草

丁公藤
水境草

並等分為鹿末撲之

朱砂

雄黃

雌黃各壹兩

硫黃壹兩半

右並各研細秤合之以醋紙和赤土泥固濟一內有埧者砂合子一箇放乾入藥在內以新瓦片子蓋炭火三四斤簇煨令鎔用指頭大新柳攪候火焰起以藥四件末少許撲之再攪旋旋如此候攪着如水柳枝上粘者色紫黑乃熟取下坐在灰上令穩以濕紙三兩張蓋之候冷打開取細研以棗肉菜豆粉糊元如雞頭大服如常法

安炉法

每用灰不以多少用醋拌過乾濕得所以篩子篩過將藥炉子先用厚瓦觀炉子以醋灰為老君塚炉子四邊并上拍厚一指許用手按實以十斤火煨先從頂煨之經宿取出揀出硃砂細研為末棗肉丸櫻桃大一日空心一元熟水下

方十三

廿五

治冷熱方

右內盛菜萸於牛膽中令滿陰乾百日每服二七枚綿裹之齒嚼令碎內陰中良久熱如火

合光丹

治真陽虧少臟腑疼痛

辰砂五兩打如菜豆大勻用乳香半兩天南星末一兩先將朱砂用密浴過上用金箔五片度過用天南星為底乳香為鹿末在上面安一張好紙上裹定用麵糊粘合又上面用苦苣半乾又用一張紙角定糊粘實使土

作一方合上下用解鹽雜賣土合用鹽泥固濟下火五
秤燒如火盡於地下出火毒一日研細用生薑自然汁
煮糊為元用銀石出光每服一元至三元空心米飲下

治心腹脹滿短氣

草豆蔻 壹兩

右為細末每服半錢煎木瓜生薑湯調下

治陰冷漸漸冷氣入腹囊腫滿痛不得眠

生椒 不以多少
揀淨

右以綿裹着囊令厚半寸須更熱氣大通日二次

治腹脹滿等二方 膨曰腹脹之狀上下膨亨或鼓之有聲

喘息不便由上者不降下者不升氣痞於中无所歸息三

方十三

廿六

焦渾亂若卒然脹滿餘无所苦此由脾胃不調冷氣暴折
客乘於中寒則氣收聚聚則壅遏不通是以脹滿其脉弦
遲先宜調中湯後宜寬中元

調中湯

厚朴 肆兩

枳實 叁兩

桂 壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

寬中元

黃橘皮 肆兩

白朮 貳兩

右為細末酒糊和元如桐子大煎木香湯下三十元煎

雞矢醴三稜元 若心腹滿且食暮不能食此由脾元虛弱

不能克制於水水氣上行浸漬於土土濕則不能運化水

穀氣不宣流上下痞塞故令人中滿且則陽氣方長穀氣
易消故能食暮則陰氣方進穀不得化故不能食其脉沉
實而滑病名穀脹宜雞矢醴三稜元

雞矢醴

雞矢白 半升

右以好酒一斗漬七日温服一盞温酒調漱盡淨為佳

三稜元

京三稜

蓬莪朮

青橘皮

陳橘皮 各等分

右為細末白麵糊和元梧桐子大薑湯下二十元未知
加三十元

附子枳實元 若腹脹時發時止發則腸間漉漉有聲痛引

脇下或時目眩頭痛大便秘澁心胃痞悶欲嘔者喜渴此

方十三

廿七

由脾元虛弱引飲過多水漬中脘伏留腸間其脉沉細而
弦謂之留飲先宜玉壺元 方見別卷 後宜此

附子 兩半

枳實 壹兩

右為細末煉蜜和搗三百下元梧桐子大飲下三十元

食前

若腹脹如鼓腹脉起甚蒼黃以拍彈之殼殼然堅按之不
陷此由脾腎久虛氣結不散氣道閉塞水氣橫溢土不勝
水其脉沉大而滑者易治細小者難治脐凸者難治大便
利者為逆亦有身腫大者本起於水四肢瘦削者本起於
氣大便利宜朱砂丹大小便澁宜商陸元

商陸元

商陸 木香 丁香 橘皮

附子 檳榔各半

右為細末白麵糊和元如桐子大椒人湯下三十元大
小便澁煩躁者去附子加瞿麥木通各半兩

硫朱丹

煉熟硫黃兩壹

銀朱壹

右以水浸蒸餅和元如桐子大飲下三十元食前服

桃李元 瘰癧病人覺腹內脹外視如常大便黑小便赤此由
風冷客搏於血血畜而不行其脉沉瀯多生於女人宜此

桃仁貳拾

蜜虫

水蛭各伍

當歸兩壹

右為細末煉蜜和元如豌豆大飲下二十元以知為度

方十三

廿八

木香橘皮元

治一切心腹滿疼蕙蟲氣

乾蝎兩壹

胡椒

木香

青橘皮各貳

蘿蔔子兩壹

右為細末飯米和元如菜豆大每服五七元至十元用
薑橘湯任下温酒亦得不以時

赤小豆元

治腹脹

赤小豆

好硫黃壹

附子半兩

右為細末水糊和元如梧子大每服二十元空心醋湯
橘皮煎元 治脾胃不和腹脹食少

陳橘皮

桂

乾薑

當歸

附子皮臍

京三稜

草薺

神麴各陸

烏頭 木香 川椒各壹 大麥蘖

厚朴各肆

右用無灰酒四升先煎上四味如人行十里更下次三
味又如人行十里次入下六味又添酒兩椀煎成如膏
以留出藥末相和杵一千下為劑元如梧桐子大每服
二十元空心米飲下此藥若用銀鍋煎妙无即取熟使
錫淨洗無油膩先於錫內塗好酥次下藥燉火煎不住
手攪候如膏取出於淨盤中勻攤候硬軟得所然後元

逐補丹

一名太一赤元治陳寒痲冷

鍾乳粉

礬石煨壹

硫黃煨

陽起石煨壹

各壹兩

大川烏頭炮去皮臍重

研如粉

方十三

廿九

右五味合研勻水煮麵糊和元如桐子大朱砂為衣每
服十元至二十粒空心温米飲下

洞陽丹

補真氣去風冷通血脉

附子

天雄

烏頭各壹

右三味同為末入鍾乳粉一兩同研勻酒糊和元如桐
子大朱砂為衣每服一兩元空心温酒下

雞峯並濟方卷第十三

一第1000 冊 賣多日車全書第 2 頁三月

雞峯普濟方卷第十四

馮翊賈兼重校定

瀉痢嘔吐附

瘧

鍾乳元治虛勞泄痢腸胃虛冷飲食不消腹內雷鳴疔刺

疼痛

鐘乳粉

赤石脂

石斛

肉豆蔻

乾薑

附子

當歸

人參

白茯苓

龍骨

川椒各壹兩

桂

訶子皮各貳兩

神麴末半兩

右為細末酒煮麴末和元如梧子大每服三五十元空心米飲下

藿香飲子治膿血痢

方十四

藿香

白芍藥

米囊皮

黃耆

甘草

當歸

白茯苓

澤蘭

白頭翁

附子

乾薑

川芎

蒿豉餅子

右等分為細末每服一錢水一盞入生薑艾七葉同煎至七分放溫去滓服

厚朴薑撥元治久痢不止食不消化

薑撥

陳橘皮

胡椒

白石脂

龍骨各壹兩

乾薑

訶子皮

縮砂仁

白朮各叁分

當歸

桂各半兩

厚朴壹兩半

右為細末煉蜜和元如梧子大每服三十元米飲下不

以時

勝金黃連元治臟寒下痢臍腹撮痛腸鳴脹滿後重裏急不思飲食久而不愈日漸羸瘦

黃連伍兩

龍骨肆兩

草豆蔻

赤芍藥

當歸

乾薑

地榆

橡實各貳兩

乾桑葉

木香各貳兩

赤石脂

代赭石各肆兩

右為細末醋煮麴糊為元如梧子大每服三十元至二十五元空心食前煎艾醋湯下米飲亦得

香連元治藏氣虛止便泄下痢日夜無數怠惰力少米穀不化膿血相雜臍腹疔痛氣虛痞滿腸鳴裏急

黃連

地榆

赤石脂各貳兩

龍骨

方十四

阿膠

木香

艾葉

黃芩各壹兩

肉豆蔻壹兩半

史君子叁分

赤芍藥壹兩

右為細末醋煮麴糊為元如梧子大每服三十元烏梅米飲下不以時

薑撥散治冷痢腹痛不食四肢羸瘦

薑撥

訶黎勒皮

乾薑各叁分

赤石脂

甘草

吳茱萸

當歸各半兩

草豆蔻

附子

陳橘皮

厚朴各壹兩

右為細末每服二錢米飲調下不以時

龍脂元治男子婦人脾胃虛弱或傷冷結聚變成膿血臍腹疼痛腸滑不止飲食不進皆可服之

訶子 肉豆蔻 各壹兩 草豆蔻 各壹兩

龍骨 當歸 赤石脂 縮砂仁

木香 各壹兩 白礬 半兩 黃連 壹兩 乾薑 半兩

右為細末粟米飯和元如梧子大每服二十元至三十元空心米飲下忌油膩雞魚猪肉芋物

正元丹 治脾胃虛冷寒濕久滯心腹脹滿脇肋牽疼吞酸

氣逆嘔吐清涎風寒入腹拘攣不得俯仰癥瘕積聚上下奔衝瀉滑腸裏急後重手足厥冷口中氣寒腹內虛鳴腹脹泄注及膈間停水脇下飲癖眩暈惡心飲食不下一方添赤石脂訶子川椒各一兩去桂

附子 乾薑 良薑 烏頭 各肆兩

方十四

胡椒 薑澄茄 人參 紅豆蔻

白朮 桂 各壹兩

右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服三十元食前米飲下

赤石脂元 治水瀉心腹疴痛四肢逆冷不納飲食一方有當歸無吳茱萸

赤石脂 龍骨 各貳兩 艾葉 肉豆蔻

良薑 附子 縮砂 乾薑

厚朴 各壹兩 吳茱萸 半兩

右為細末醋煮麵糊為元如梧子大每服三十元米飲下不以時

纏金丹 治久積瀉痢

硝石 膩粉 硃砂 粉霜

砒 各壹分 硫黃 貳分 巴豆霜 龍腦 各壹分

辰砂 蠟 各半兩

右九味同研勻細鎔蠟和元如梧子大每服三元臨卧米飲下

大桃花湯 主冷白帶痢腹痛 如膿加厚朴參兩 嘔加橘皮貳兩

赤石脂 分捌 乾薑 當歸 龍骨

牡蠣 各參兩 附子 參兩 甘草 壹兩 木一升 約參兩

人參 貳兩 芍藥 壹兩

右為細末以水一斛二升煮米取九升內諸藥煮取三升分作三服 重校定此方分兩甚多而去其分參服恐不可用於今宜加減以五十大分為壹服

縮砂蜜元 治久痢顏色相雜腹中常冷水穀不化腸鳴裏急後重疼痛或下如赤豆汁或如魚腦者

厚朴 附子 乾薑 艾葉 各參兩 肆味為

龜末生薑肆兩 兩拌勻焙乾 肉豆蔻 訶子皮 各壹兩 吳茱萸

縮砂仁 草豆蔻 陳皮 各壹兩

右為細末水煮麵糊為元如梧子大每服三十元空心米飲下

烏梅肉元 治久痢不差

神翅 升壹 附子 貳兩 大麥蘖 壹升 當歸

桂 各參兩 吳茱萸 烏梅肉 乾薑

黃連兩 川椒壹兩

右為細末煉蜜和元如梧子大每服十元空心米飲服

艾葉散治久痢痼冷食不消化四肢不和心腹多痛少思飲食

附子 艾葉 白石榴 當歸

吳茱萸 龍骨各壹兩 乾薑 阿膠

白木各參 厚朴壹兩

右為細末每服二錢米飲調下不以時

大丁沉元治嘔吐不止

丁香 白茯苓 人參 不灰木

半夏為末生薑汁和作餅子 陽起石

方十四

礞石各半 阿魏半分醋化麩

杏仁燈燎去皮研 巴豆五個去皮心膜

右為細末白蒸餅浸漉出控乾和元雞頭大每服二元

生薑三片水七分煎至四分溫服小兒減服不以時

補脾元若久痢不止體重羸瘦腹中脹急飲食不化遇寒

則極脉弦而遲此脾胃素弱為風冷則穀不化而水勝久

久不止成虛勞宜服此

厚朴去皮壹兩生薑壹兩 白木 石脂

肉豆蔻兩 麥藥兩 葦撥 訶子

附子 神翅各半 乾薑壹兩

右為細末醋煮麵糊為元如梧子大飲下三十元未知

加至五十元

吳茱萸元治久痢不止腹痛不能消食

吳茱萸 乾薑 附子 厚朴各壹兩

甘草 桂心 黃連 木香

青橘皮各半

右為細末煉蜜和元如梧子大每服三十元米飲下不

以時

當歸白木元治痢後四肢羸困不能飲食

附子 白木各貳 人參 神翅

肉豆蔻仁 乾薑 當歸 木香

桂心各半

方十四

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元米飲下

不以時

厚朴散治白痢四肢及腹內疴痛

赤石脂 禹餘糧 厚朴各貳 當歸

乾薑 黃連 地榆各壹兩 赤芍藥

吳茱萸各半

右為細末每服二錢米飲調下不以時

通聖元治脾胃虛寒白痢不止臍腹疼痛

肉豆蔻 仁桂 茱萸 大附子

縮砂仁 訶子皮各壹分 乾薑 硫黃

白礬各貳分

右除研外同為細末却將研藥拌勻水煮麵糊和元如
梧子大每服十五元食前煎醋艾湯送下

訶子散治痢瀉等

赤石脂兩肆 龍骨 乾薑 當歸
厚朴 甘草 白木 陳橘皮各貳兩
訶子皮兩半

右為細末每服二大錢空心米飲調下

小枇杷菜散

治胃暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化
胃膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢躄困倦全不
思食或陰陽不和致成霍亂吐痢轉筋煩燥引飲

枇杷菜 丁香 陳橘皮各半兩 香薷分叁
方十四 七

麥門冬 乾木瓜 白茅根 甘草各壹兩

右為細末每服二錢水一盞生薑二片煎至七分去滓
溫服如煩燥新汲水調不以時小兒三歲已上可服半
錢更量大小加減

正氣活命散

治下虛中弱真氣上逆霍亂吐瀉不下飲食
大附子 藿香葉 半夏 丁香
枇杷菜 人參 厚朴各壹兩 桂半兩

右為鹿末每服一錢水一盞入生薑一分煎至六分去
滓稍熱服不以時

龍骨元

治久痢赤白不止腹痛不食
龍骨 沒石子 當歸 赤石脂

厚朴 艾葉各叁分 川芎 椽實各半兩

右為細末煉蜜和元如梧子大每服二十元空心米飲

黃連散

治熱毒下痢膿血臟腑疔痛日夜無度氣息欲絕
黃連 地榆 赤芍藥 當歸
黃芩各壹兩 阿膠 龍骨各貳兩 梔子人半兩

右為鹿末每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服前

水煮木香元

治瀉變赤白痢及脾虛冷熱不調風邪濕冷
之氣進襲腸胃之間使穀不化
米囊半斤去莖蜜炙 當歸 陳皮各叁兩 甘草
厚朴 訶子皮各貳兩 地榆 木香各壹兩半

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元水一盞生薑

三片棗一箇劈煎至六分去滓食前溫服

露珠元

治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇
虛滯腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜无度宜服此

白木 肉豆蔻 吳茱萸 赤石脂
乾薑 附子 硫黃各壹兩 人參壹兩半

鐘乳 胡粉各叁分

右醋糊和元如梧子大每服二十元

烏梅散

治赤白痢久不止腹中疔痛結瘕及脫肛下血
烏梅肉 樗根皮 赤石脂 當歸
地榆各半兩 黃連 乾薑各叁分 甘草壹分

右為細末每服二錢溫米飲調下食前

小訶子散 治風虛腸滑便痢不禁神効

訶子分參 乾薑 桂各壹 龍骨壹

附子 肉豆蔻各肆 當歸 定粉各壹

右為細末每服一錢空心米飲調下

乾薑白朮散 治久赤白痢不止腸中疼痛

白朮 乾薑 附子 地榆

黃連各壹 阿膠 龍骨各貳 赤石脂參

右為鹿末每服二錢水一盞前至六分去滓食前溫服

保安丹 治脾元虛弱固冷陳寒臍腹堅痰洩利無度或氣

腹膨痞飲食減少肌躰羸瘠漸就困篤

附子 當歸 陳皮 麵黃各壹

厚朴 吳茱萸各半 硫黃壹

右為細末醋煮麵糊為元如梧子大每服二十元空心

米飲下

硃砂元 治大人小兒一切瀉痢無問冷熱赤白連綿不差

愈而復發腹中疼痛者宜服

硃霜壹兩陸分 硃砂壹兩 木鼈壹兩 黃蠟壹兩

杏仁 巴豆拾分 木鼈拾分 黃蠟壹兩

黃丹貳兩 硃砂半兩 乳香陸分

右合研勻鎔蠟和元如黃米大每分作一百二十元每

服一元小兒半元水瀉新汲水赤痢甘草湯下白痢乾

薑湯赤白痢甘草乾薑湯並放冷臨卧服忌熱物一二時

沉香水煮散 治下痢五色後重裏急

米斗子皮壹分 當歸 訶子皮各壹

陳皮陸兩 青皮 木香 芍藥

地榆各參 右冷人加厚朴乾薑各三錢下血去薑加羌活黃耆各

半兩為細末每服一錢水一盞生薑五片棗二个同煎

至六分食前溫服

厚朴七葉湯 治脾胃虛弱內變寒氣泄瀉注下水穀不分

腹脹滿臍腹疼痛腹中虛鳴嘔吐惡心胃膈痞悶困倦

少力不思飲食

厚朴壹斤 川烏頭 茴香 益智

縮砂各半 乾薑肆兩 甘草陸

右為細末每服二錢水二盞棗七个煎取一盞去滓稍

熱服空心食前

香藤散 治下痢赤白膿血不止

香藤 甘草 陳皮 羌活

厚朴 當歸各半 木鼈肆兩

右為細末每服四錢水二盞取清溫服不以時

阿膠神翅煎 治冷痢

神翅 乾薑各陸 當歸 白朮各參

人參 阿膠各貳 甘草壹

右為細末薄糊元如小豆大以白麵為衣每服五十元

水一盞煎令沸入藥者熟以匙抄舍之日二三服

肉豆蔻散 治久痢腹脹滿食不消化

肉豆蔻仁 訶子皮 陳橘皮各壹兩 乾薑

葶藶 木香各半兩 白朮叁分

右為細末每服二錢食前米飲調下

訶梨勒元 治腸癖下痢日夜不止腹內疼痛

訶子皮 黃連 乾薑 當歸

枳殼 肉豆蔻仁 地榆各壹分

右為細末煉蜜和元如梧子大每服三十元空心烏梅湯下

木香白朮元 治氣痢調中

方十四 十一

白朮伍分 豆蔻仁 縮砂仁 訶子皮各貳分

藿香貳分 丁香 木香各壹分

右為細末水煮麵糊和元如豌豆大米飲服二十元

胃風湯 治大人小兒冷氣乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉

注下腸脇虛滿腸鳴疔痛又腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並服之

人參 白茯苓 芎藭 桂皮

當歸 白芍藥 白朮

右等分為鹿末每服二錢水一大盞入粟米百餘粒同煎至七分去滓稍執服空心食前小兒量力減之

綿薑湯 治久瀉

米斗子壹兩 赤石脂研別 乾薑 訶子皮

吳茱萸 桂 附子各壹兩

右為細末每服二錢粟米飲調下空心食前服

御米湯 治年深日近赤白痢暴瀉不已臟腑不調

御米子連皮半兩 當歸半兩 青橘皮 陳皮

羌活 獨活 丁公藤各壹兩

右為鹿末每服二大匙頭水一大盞半前留半盞溫服去滓不以時

草豆蔻散 治霍亂吐瀉不止脈細而緊此為內寒

香薷莖 木瓜各伍分 乾薑貳分 草豆蔻

藿香各肆分 陳橘皮

方十四 十二

右為細末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服非時

厚朴散 治瀉痢

厚朴壹兩半 木香半兩 阿膠

當歸各叁分 肉豆蔻仁 龍骨各壹兩

右為細末每服三錢水一盞入生薑半分棗三個同煎至六分去滓熱服不以時

附子薑撥元 治瀉痢

黑附子炮去 乾薑炮 良薑剉

丁香 吳茱萸湯洗焙 肉桂去

山茱萸炒去核 草豆蔻各半兩

右九件治淨擣羅為細末蒸棗肉去皮核元如梧子大

每服三五十元空心食前米飲下

烏賊魚元治久赤白痢日夜無數腹痛不可忍

烏賊魚骨兩 樗根皮 白石脂 龍骨

雀兒糞 乾髮灰兩

右為細末醋煮麵糊為元如梧子大每服二十元米飲

下不以時一方加代赭石一兩

胡粉元治積痢藥虛中有積尤佳

胡粉 阿膠 烏魚骨兩 枯礬

龍骨兩 蜜陀僧壹分

右為細末粟米飯為元如梧子大每服二十元米飲下

木香散治久白痢不止臍腹疝痛及赤痢

木香分 附子壹兩 黃連壹兩 當歸兩

吳茱萸兩 厚朴貳分

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

甘草茱萸元治臟腑虛寒脾胃怯弱米穀不化腸滑瀉痢

心腹疝痛腹脹腸鳴飲食減少

吳茱萸兩 甘草壹兩

梔子壹兩 乾薑壹兩 縮砂仁壹分

肉豆蔻伍分

右為細末酒煮麵糊和元如梧子大每服十元至十五

元燒生薑湯下

附子湯治瀉不已

白木 蒼朮兩 芍藥兩 茯苓兩

甘草 附子兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

狗頭骨元若下利雜色晝夜不息其人久虛所下腸間垢

膩其脈微弱謂之惡利宜此

狗頭骨 豆蔻兩 青石脂 附子

敗龜 乾薑兩

右為細末醋煮麵糊為元如梧子大米飲下三十元有血

去附子

五苓散治溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲

水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止者宜

服又治霍亂吐瀉躁渴引飲

澤瀉伍兩 橘苓伍兩 桂 茯苓各拾兩

白木兩

右為細末每服二錢熟湯調服不以時服了多飲熟湯

汗出即愈又治痰熱在裏身發黃腫前齒黃湯下

半夏正氣丹治下虛陰陽錯逆霍亂吐逆粥食不下

硫黃 半夏 藿香葉兩 大附子兩

水銀砂子壹分 詳相核內盛慢火上結砂子用

右為細末酒煮麵糊和元如梧子大以朱砂為衣每服

二十元至三十元煎前方正氣活命散下不以時候

豆蔻元止霍亂吐瀉不定渴躁煩熱

肉豆蔻 丁香 良薑 藿香葉
右為細末用棗肉和元如梧子大每服二十元至三十元温生薑米飲下

椒艾元 治真氣虛弱脾胃衰微身軀沉重肌肉消瘦心胃逆滿臍腹疼痛嘔噦惡心逆害飲食脹悶水穀不消寒中滑泄不斷下焦積冷裏急後重腸胃氣虛腹內雷鳴滯下膿血赤汁或變雜痢臭穢散風寒逐濕冷健脾胃進食

蜀椒 參伯 艾葉 壹斤 烏梅 貳伯 乾薑 兩
赤石脂 兩

右為細末水煮麵糊為元如梧子大每服三十元空心米飲下 本方用蜜和更加黃連艾壹斤

沒食子元 治赤痢腹內疼痛遍數不定

沒食子 地榆 各半 黃連 壹兩 黃蘗 貳兩
酸石榴皮 壹兩

右為末醋煮糊元梧子大每服十五元米飲下不以時若下痢嘔逆胃中悶亂心腹併痛手足躁擾卧不安席此由冷熱不調傷於脾胃中焦不和陰陽錯雜清濁相干三焦滯亂脉洪大其人煩擾者生脉微遲短氣不語手足厥者死服藥但增躁熱利不禁脉小四肢為難 治先宜理中附子湯并大曰元方在後

理中附子湯

乾薑 甘草 附子 各壹兩
右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

烏梅元 若痢下純血臍腹絞脉急大而散此由腸胃乘虛為熱毒所滲或先經下痢不應服熱藥而候投之蘊毒不散積於腸門滲而成血宜烏梅元脉浮小手足冷此風冷在腸胃亦令下血宜附子當歸元或大或小浮焮而疾按无常定下血如狍肝五內切痛此或因服五石湯元逼損氣毒攻腸胃或如蟲毒為難治

烏梅肉 兩 黃連 兩 吳茱萸 當歸 各壹兩
酸石榴皮 兩

右為末蜜元如梧子大每服三十元食前米飲下

紫蘇子元 治一切氣逆胃膈噎悶心腹刺痛脇肋脹滿飲食不消嘔逆欲吐及治肺胃傷冷咳嗽痞滿或上氣奔急不得安卧

紫蘇子 陳橘皮 各貳兩 高良薑 桂 人參 各壹兩

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元細嚼温酒或米飲下不以時若食瓜膾生冷覺有所傷噫氣生熱欲成霍乱者含化一元細嚼汁服盡應時立愈常有此藥永不患霍乱甚神妙一方加大腹皮去人參

四味阿膠元 治瀉後成痢

黃連 兩 茯苓 兩 白芍藥 兩 阿膠 壹兩
右將前三味為細末以好醋熬阿膠成稀膏和元如梧子大米飲下三十元食前

若下痢鴨溇滑數不止肌肉消瘦飲食不入脉細皮寒氣少不能言口舌生瘡有時潮熱此由脾虛胃耗胃耗則氣奪氣奪則穀不入穀不入則胃無主胃無主則氣消索五臟之液不收謂之五虛為難治宜炙肝散如漿粥入胃泄注止則可活又下焦利宜禹餘糧元理中元亦可服

炙肝散

紫苑

去苗及枯者洗焙

蒼朮

桔梗

白芍藥

右等分為細末用猪肝三指許批開摻藥在上濕紙裹慢火炙熟細嚼米飲下食前

禹餘糧元

禹餘糧

石脂

乾薑

附子

方十四

十七

右等分為細末水煮麵糊為元如梧桐子大米飲下三十元不以時

四順湯治吐下空腹痛乾嘔手足冷不止

乾薑

甘草

人參

附子

各壹兩

右以水六升煮取三升半分為三服若不止加龍骨二兩腹痛加當歸二兩

厚朴湯治煩嘔腹脹

厚朴

肆兩

桂壹兩

枳實伍

生薑

兩

右以水六升煮取二升分為三服空心食前

槐花散治熱吐

皂角

白礬

飛過

槐花

甘草

右等分為細末每服二錢白湯調下不以時

烏頭散治吐逆

烏頭

兩

川練肉

壹兩

檳榔

木香

各壹兩

右為細末每服二錢水一盞薑二片煎至七分空心服去滓

軟紅元止吐

辰砂

各半

信砒

錢

烟脂

錢

巴豆

拾

右鎔蠟少許入油三兩滴和為劑煎槐花甘草湯下菜豆大一元小兒芥子大忌熟食一時久

針頭元治水瀉

胡椒末

硫黃

各壹分

巴豆

去皮膜不

出油貳貳研

方十四

十六

黃蠟

肆分

右同研勻鎔蠟和元米粒大人三兩元米飲下不以時服

王粉散治冷極泄瀉久滑不禁不思飲食

大附子

紅豆

乾薑

白上硫黃

各壹兩

右四味用半稀粟米粥調末一錢空心温冷喫一服便効再服平愈只可緩緩半錢作一服不過十服好安為元亦得

木苳湯治瀉不止

米

對子

木苳

乾薑

甘草

各

右為細末每服二錢米飲調不以時

建脾散 治脾胃虛洩瀉老人臍泄

烏頭分 厚朴 甘草 乾薑各壹分

右為鹿末每服一錢水三合薑三片煎二合熱服併二服老

四等散 治水瀉或赤白痢或後重腸痛或腹中痛皆主之

乾薑 當歸 黃連 黃蘗各分

右以烏梅三个前湯調下二大錢赤痢加黃蘗白痢加乾薑後重腸痛加黃連腹中痛加當歸並空心服

附子元 治水積痢久不羸腸垢已出者

赤石脂 附子 乾薑 桂各等分

右為細末煉蜜和元如梧子大每服十五元至二十元

空心米飲下 方十四 十九

吳茱萸湯 治積冷赤白痢下不斷變成赤黑汁爛魚腹腸

疼痛不能飲食

黃連兩 吳茱萸 當歸各壹分 石榴皮壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前

地榆散 治新食竟取風為胃風其狀惡風頭多汗膈下塞

不通飲食不下脹滿形瘦腹大失衣則噎食寒則瀉泄痢白

地榆壹兩 當歸 樗根白皮各壹兩

白木壹分

右為鹿末每服三錢水一中盞煎至五分去滓溫服心空

乳香散 治瀉痢和一切寒氣止臍毒瀉血腹內疔痛

乳香少許 訶子皮壹分 當歸 木香各半兩

右剉細末用微火炒候當歸乾為度為細末每服二錢用陳米第一度泔一盞煎至六分空心午前服此藥最妙患及百餘日者服之皆愈

三物散 治血痢

黃連分 當歸 石榴皮 吳茱萸各壹分

右為細末每服二錢水一盞煎至六分溫服去滓

石榴湯 治水痢及赤白痢篤困欲死者

黃連兩 石榴壹个乾者 阿膠 乾薑兩

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服

丁香元 治水瀉及瀉血不止疼痛甚者

烏頭 丁香肆个 巴豆壹个 朱砂壹分

右為細末泡饅餅為元如梧子大每服十元空心米飲下

延年駐車元 治腸胃虛弱冷熱不調下痢赤白或作膿血

臍腹疼痛心胃痞悶後重裏急煩滿嘔逆脇肋脹悶腹內

虛鳴四肢倦怠不美飲食日漸羸瘦

黃連兩 當歸壹兩 乾薑壹分

阿膠壹兩 為末醋煎膏

右膠膏熬元如梧子大每服二十元空心米飲下

豆蔻白朮元 論曰腸胃為倉廩之所開闔有時下痢者蓋

腸胃失守門戶不要由水穀相併運化失宜湊於三焦氣

不禁固又或春傷於風邪氣留連久而不去風勝害脾脾

屬土而惡木脾與胃以膜相連為風邪所害則微弱而不能運化水穀併注腸間腸虛又不能禁制故令不利若形瘦腹大腹脹食畢而下謂之洞泄宜此白朮元附子湯

白朮兩 附子兩 內豆蔻各壹兩

右為細末蒸棗肉和元梧桐子大每服三十元米飲下

食前

薑附湯若暴下如水或青或白臍腹撮痛手足逆冷脉細欲絕漸漸短氣此由寒冷之氣暴傷於陽氣湊下為陰所辟氣不禁固陽復則生不復死宜此薑附湯金液丹方在後又不止者多氣海百壯

乾薑兩 甘草兩 附子各壹兩

方十四 廿

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服食前

太白元治吐

半夏兩 玄精石各壹兩 硫黃半兩

右為細末水煮麵糊為元如梧子大米飲下五十元不以時候

三味黃連元若下痢赤黃日夜數十行手足不厥胃中痞悶時覺微寒服溫藥而增極其脉沉實而大此由濕熱之邪蘊於腸胃復因飲食積而不化聚而不運水穀併注而下先宜此三味黃連元不差者与杏子元方在後

黃連 吳茱萸 白芍藥

右件等分為細末醋煮麵糊為元如梧子大米飲下三元

朱粉丹若下痢純膿或赤或白臍腹撮痛即痢下已即痛其脉緊大而疾此由飲食失宜留而不去與冷氣相搏則白與熱氣則赤水穀与腸間津液腐化成膿新穀送傳而不得行新故相搏滯氣作痛利下則氣行而痛少息謂之積痢宜服此

巴豆壹錢 粉霜 硃砂各半錢

右件研勻黃騰二錢鎔成汁下藥攪勻如菘豆大米飲下一元未知再進

香薷散治藏飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有

方十四 廿二

心痛而先吐者有腹痛先痢者有吐痢俱發者有發熱頭痛身疼而復吐利虛煩者但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而无物或四肢逆冷而脉欲絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能主之

香薷壹斤 厚朴 白扁豆各半斤

右為細末每服三錢水一盞酒一分煎至七分去滓水中沉冷連二服立有神効一方用黃連不用白扁豆

四逆湯治傷寒自痢不渴嘔噦不止吐利俱發小便反利或汗出過多脉微欲絕腹痛脹滿手足逆冷又一切虛寒厥冷並宜服凡病傷寒有此證候皆由陽氣虛裏有寒雖

更覺頭痛眩發熱惡寒四肢拘急表證具者未可攻表
先宜此藥助陽救裏

甘草兩 乾薑壹兩 附子兩

右以甘草乾薑為麤末入附子每服三錢水一盞半煎
至一中盞去滓溫服不以時

良薑湯治脾胃傷冷心腹大痛霍亂吐瀉

厚朴 良薑 桂

右等分為細末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服
不以時

丁香散治霍亂

丁香 藿香各壹兩 人參兩

右為細末每服一錢水半盞煎五沸更入妳汁少許去
滓稍熱細呷頻服量兒大小加減

厚朴散治霍亂吐瀉

厚朴兩 肉豆蔻壹個 草豆蔻肆個

右為細末每服二錢水一盞鹽一捻煎至八分去滓熱
呷如不差再服婦人不用鹽入生薑二片同煎

母丁香散治吐逆不止

五靈脂兩 丁香拾肆個 母丁香柒個

右為細末以犬膽和元如豌豆大捏褊陰乾每服一餅
子到流水下

樗根散治水瀉裏急後重日夜无度

樗根皮兩 枳殼兩 甘草壹分

右食前米飲調下二錢乃愈

神翅散治中寒下痢膿血及婦人漏下

附子壹個 神翅 乾薑各叁分

右為細末每服二錢空心米飲下溫酒尤佳

乳香散治白痢裏急後重日夜无度

好大甘草肆指握文武火 米斗子皮叁個

乳香壹皂

右不犯鐵器搗為細末每服水一椀均罐中煎至半椀
溫服不以時分二服

烏梅三物散治赤痢

胡黃連 烏梅肉 竈下土

右等分為細末空心膈茶調下或血痢取鹽梅一個合
膈茶加醋湯沃服

真阿膠元治赤白痢

真阿膠片 肉棗壹 胡椒柒粒

右三味以甘鍋子燒存性蠟元麻粒大每服二三元白
痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢甘草乾薑湯下泄

瀉以溫水食後臨卧服

吳茱萸元治脾胃受濕氣泄痢不止米穀不化腸鳴腹痛

或下痢膿血如髓腦或如爛肉汁腹滿嘔噦肢體怠倦

吳茱萸 黃連 白芍藥並剉如豆同炒紫色

右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服三十元空心米飲下

小阿膠元 治冷熱不調下痢膿血腹中疝痛口乾欲飲小便不利調中安和藏氣

黃連

阿膠各壹兩

茯苓貳兩

右為細末水煮麵糊和元如桐子大每服二十元食前米飲下

隱居溫中湯 治腹痛止痢

白芍藥

桂各半兩

吳茱萸壹個伍拾个

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去滓空心溫服

方十四

廿五

玉粉丹 若下痢清水其色赤黃但欲飲冷時時嘔逆小便不利得熱則極心胃煩躁脈虛大而數此由乘虛熱入於胃滲下三焦津液不分併於大腸謂之挾熱利先宜五苓散利小便次以此玉粉丹四味阿膠元方在前

蛤粉

硫黃

右件等分為細末水煮麵糊為元如梧子大米飲下五十元不以時

杏仁元 治瀉兼治吐

杏仁

巴豆去油等分

右合和勻麵糊為元如麻子大米飲下一元不以時

黑霜元 治吐瀉霍亂

巴豆壹个去油

百草霜壹錢

右同研令勻湯浸饑餅為元芥子大水瀉冷水一元霍亂吐瀉不定者同蟬殼一个為末冷水調下一元忌熱物只一服便差

朴附元 治脾胃氣弱及下冷不思食泄瀉

厚朴貳兩

附子壹兩各對如皂子

右以生薑六兩取汁於銀石器內貯之重湯熬盡薑汁取出焙乾為細末用神麴法酒煮麵糊和元如梧子大每服三五十元空心熱米飲下

香薑散 治久患脾瀉

生薑肆兩

黃連壹兩各對如豆大

右同炒薑乾脆深赤去薑取黃連為末每服二錢臘茶調下空心

方十四

廿六

丁香散 治痢

附子壹兩炮去皮脂切如麻子大

丁香半兩

生薑貳兩去皮切如麻子大

右二味慢火煎乾微黃色入丁香半兩三味同為細末每服一錢空心米飲調下

橡實散 治赤白痢日夜不止

橡實

乾薑各半兩

右為細末每服二錢米飲調下不以時

橘皮茯苓湯 治下痢煩嘔

陳皮

白茯苓各半兩

右為細末每服二錢食後白湯點服

桃核元 治痢下冷膈下絞痛

赤石脂

乾薑 各壹兩

右二味為細末煉蜜和元如豌豆大每服十元日三加至二十元食前米飲下

霍香散 治瘧

高良薑

藿香 各半兩

右為末均分為四服每服以水一椀煎至一盞溫服未定再服

艾餛飩 治脾虛有寒

乾薑末

熟艾

方十四

廿七

右等分以白麵作餛飩如酸棗大每服四五十個煮熟空心服腹脹者炒厚朴煮汁熟即煮餛飩食之

金液丹 治吐瀉

好硫黃 壹斤

右用一斗三升磁瓶子內盛以瓦子蓋口先用赤石脂固縫通用鹽泥紙筋固濟陰乾磚砌一大炉子可高三尺餘中心掘一坑子先安一水甌令其口大小與硫黃甌子底相當將硫黃罐子坐在水罐子上四下用土培了口縫先下熟灰在炉內令埋罐子一半用熟火三斤簇了罐子再用熟火蓋罐子上約令三四寸深每一伏時再添三斤一如上法蓋覆七日佳火取出打破開如

生金色其滓石尽澄在下不用柳木槌研細水浸饑餅

和元如梧子大每服五十元米飲下食前

冰靈散 治霍亂吐瀉不止

高良薑 生壹兩

右為細末每服二錢水一中盞煎至一半去滓於水內沉極冷頻服立定

勝金元 治吐不止

胡椒十粒

右一味以新水吞下

豆蔻散 治脾濕腸泄暴瀉不止

肉豆蔻 壹斤

方十四

廿八

右以生薑汁和麵裹豆蔻火炮候麵熟去麵將豆蔻為末分作兩服米湯調下

訶梨勒煎 治水痢心腹脹滿嘔逆及上氣咳嗽胃膈氣痞

訶梨勒 以麵裹煨黃去麵

右末之粟米飲和元如梧子大每服三十元空心米飲下

紫粉元 治吐

右以針沙醋浸一宿辟去醋便帶醋炒候黃色无煙乃止細研水煮麵糊為元如梧子大米飲下四十元便啜粥一盞許小兒減之

酒磨元 治吐逆粥藥不下者

右以五靈脂用狗膽汁和元如雞頭大煎熟生薑酒磨化再湯令熱粥一升頓服乘藥熱送下

治瀉痢久不老

右以細石灰一錢攢猪膽一个先用灰炒乾出氣入猪膽同炒黃色用淨紙鋪在地上攤出火毒日曬一日每服半錢如白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾薑甘草湯下

軟疔丹 療疔癰攻衝心腹及小腸氣膀胱氣痛不可忍內

如刀刺九種心痛并婦人血疔血癰血冷血山崩赤白帶下應丈夫婦人一切氣痛不可禁者下咽立効

白上硫黃

白礬

硃砂精白者各別研細

方十四

廿九

乾蝎

茴香

桂

木香

川練子去皮

葫蘆芭

胡椒

破故紙各半兩

黑附子壹兩

右十二味為細末煉蜜和元如彈子大以朱砂為衣每服一粒燒綿灰酒化下温服入口愈空心服如急者不計時候新產婦人不得服

玉鑲丹

治男子腎臟小腸等疾及飲酒過多大便滑瀉青沫遍數頻併宜服之

破故紙

葫蘆芭

吳茱萸

右各四兩並炒香熟搗羅為細末分一半用羊白腸盛藥末酒者香熟去白腸取藥末一處同分下藥末同拌

和勻用煮藥酒煮白麵糊為元每服五十粒加至一百粒空心温酒或益湯下

辛木散 治風濕寒濕身疼自汗

蒼朮兩伍

陳橘皮

細辛

厚朴

縮砂仁

附子

桂

肉豆蔻

乾薑各貳兩

丁香

甘草各壹兩

右為鹿末每服二錢水一盞入生薑三片棗一枚同煎至六分去滓食前温服

神聖散 治瀉痢

黃橘皮各壹兩

白礬壹兩

甘草貳分

川芎兩半

黃丹

朱砂各半

木香壹分

米囊子貳拾個

方十四

三十

右為細末每服一大錢用熟水一盞倒流七次臨卧調服服了次用蒜一塊子生薑三片川芎一皂子大用濕紙裹燒焦去紙爛嚼用熟水下

水解散 治水穀并菓子所傷下瀉不止并變痢疾

米斗皮肆兩

陳皮貳兩

甘草貳兩

丁香皮

桂

縮砂仁

白豆蔻仁

白茯苓各半兩

白芍藥壹兩

右為細末每服二錢如路上行即冷水調下赤痢加烏梅一箇地榆煎服白痢加乾薑赤白痢加乾薑烏梅肉煎下

感應膏

治飲食不消肢體倦怠

木香 丁香 肉豆蔻 乾薑各壹分

杏仁 巴豆拾壹分 百草霜壹分 硃砂細研

右合和勻用黃臘一兩入麻油少許煉熟下蠟鎔了放
溫入前藥一處攪和成劑元如黍米大每服三五元至
七元白湯下不以時

米囊皮散 治瀉痢後胃氣不和兼治赤白痢

米囊皮舊年者去穢 蜜塗炙熟 辟臭蔓赤名 香蔓 厚朴去皮薑汁製

甘草 陳橘皮 羌活

右件六味各一兩細剉焙乾搗為鹿末每劑一大匙頭
以水一盞煉取七分服餘滓重煎服如白痢加阿膠

白丹法 治瀉痢不止

方十四 卅一

上等陽起石十兩火煨通赤一宿成白色如粉次用鍾
乳粉三兩內秤半兩別取白礬末半兩研細用坩堝子
銷成汁下半兩鍾乳粉攪候成丹頭與前陽起石同研
勻細滴水如元如雞頭大每服二三粒空心米飲下大
治臟腑不和注瀉不止

鍾乳粉 治久瀉諸藥不効者

鍾乳粉

右一味以粥調半兩乘熱服之日二其効如神

訶子散 治下瀉下痢腹痛日夜不止已致困篤者並治

米皮肆兩炒 黃色 縮砂仁壹兩 五靈脂兩半 訶子去核
赤石脂兩半 甘草錢叁

右為細末每服一大錢空心米飲調下日三服小兒半
錢忌如常法

萊蕪斷下元 治脾胃氣虛弱臟腑不調下瀉不止日夜无
度全不飲食內積久虛腹中疼痛羸瘦氣弱並治之

吳萊蕪煎兩半 湯洗炒 訶子壹分 去核 赤石脂壹分

縮砂仁 肉豆蔻 乾薑炮 龍骨

人參各壹分

右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服三五十元空
心米飲下日進三服

藿香飲子 治赤白痢久不較變成休息痢裏急後重心腹
疼痛形困氣乏主臟氣虛弱

方十四 卅二

藿香 白芍藥 乾薑 澤蘭葉

當歸 芎 白頭翁 蒿豉餅

附子 黃耆 茯苓 甘草各壹兩

米囊皮貳兩

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓不以時服
龍脂元 治脾胃虛弱或停冷結聚變成膿血痢

訶子 肉豆蔻 黃連 龍骨

當歸 赤石脂 縮砂 木香各壹兩

草豆蔻 白礬 乾薑各半兩

右為細末粟米飯和元如梧子大每服三十元空心米
飲下忌油膩雜肉猪肉等

阿膠散 治熱毒血痢成片臍下疔痛

阿膠 熟乾地黄 地榆 黃連

梔子仁 當歸 刺薊各壹兩 川升麻

犀角屑各半兩

右為鹿末每服四錢水一中盞入葱白七寸豉百粒同煎至六分去滓溫服不以時

茜根散 治蠱毒下血如雞肝腹中攪痛

茜根 升麻 犀角各壹兩 桔梗

黃栢 黃芩各錢 地榆 白蘘荷各肆錢

右為鹿末每服三錢水一盞半煎至八分去滓稍熱服
黃連散 治熱毒下黑血五內絞切痛日夜百行氣絕欲死者

黃連壹兩 龍骨 白木各貳兩 阿膠

乾薑 當歸 赤石脂各壹兩 附子壹兩

右八味以水一斗煮取五升分五服孫真人云余以正觀三年七月十二日忽得此熱毒痢至十五日命將欲絕處方入口即定

香藤散 治下痢赤白不止

香藤 甘草 陳皮 羌活

厚朴 當歸各半兩 米芩皮肆兩

右為細末每服四錢水一盞半煎至一盞取清汁溫服不以時

當歸散 治久血痢不止腸中疔痛面黃羸瘦

當歸 樗樹白皮 艾葉 黃連

地榆各壹兩 酸石榴燒灰 阿膠各參分

右為細末每服二錢米飲調下不以時

赤石脂元 治氣虛冷熱不調臍腹疼痛下痢膿血日夜頻滑四肢少力裏急後重不進飲食

赤石脂 白龍骨 白礬灰各貳兩 胡粉壹兩

蜜陀僧半兩 阿膠 烏賊魚骨各壹兩

右除研藥外同為細末却將研藥拌勻粟米飯和元如梧子大每服二十元溫米飲下忌油膩

固腸散 治血痢腹痛及如魚腦漿或如豆汁

木香壹錢 黃連各半兩 御米殼壹兩半

象鼻壹分 訶子壹分

柿蒂壹分 石榴皮壹分

右為細末每服一錢空心米飲調下一使乳香湯破米飲調下一名御米散

地榆散 治血痢不定日夜頻滑

地榆半兩 酸石榴皮參分 木苓半兩

枳殼參分 赤石脂半兩 甘草壹兩

右為細末每服二錢米飲調下食前服

黑神散 治冷熱痢膿血不止

烏梅 乾薑 木棗碎

右三味同燒存性每服一錢溫米飲調下空心服

當歸散 治血痢

御米皮 乾薑 當歸分

右為細末食前每服二錢米飲調下

母丁香元 治嘔吐不已

母丁香條 丁香 吳茱萸各 硫黃分

石膽壹錢 麝香壹

右為細末生薑自然汁糊為元如梧桐子大每服五七元生薑湯下嘔逆鹽醋少許化一元於筋頭上服之

玉龍散 治吐逆不止

硫黃 滑石等分

右為細末每服一錢糯米飲調下

玉蕊散 止吐逆

滑石兩 硫黃壹 丁香 肉豆蔻各半

右為細末每服一錢食前米飲調下

朝真丹 治吐瀉不止

硫黃兩 枯白礬參兩

右為細末饑餅和元如梧子大朱砂為衣每服三十元温米飲下食前

治瘡痢附

瘡母煎 治久瘡不愈結為癥瘕寒熱

鱉魚甲拾分 烏梢性炮存 乾薑 葶藶

石草 紫葳 厚朴 瞿麥

廣蟲 蟻娘 桃仁各 白芍藥伍分

黃芩 大黃 桂各壹 柴胡分

鼠婦分 人參壹 牡丹皮伍 阿膠

蜂窠分 赤硝拾分 半夏壹分

右為細末鍛竈下灰一斗清酒一斗五升浸灰候酒盡一半着蠶甲於中者令爛如膠綿絞取汁內諸藥煎為元梧桐子大空心服七元日三服一方無鼠婦赤硝加海藻三分大戟一分

香甲散 治一切勞瘧四肢無力渾身疼痛脾胃不和

蠶甲 恒山 柴胡各參 麥蘗

神翅各壹 枳實 京三稜各半 人參

藿香葉各壹 甘松分 黃橘皮不去 厚朴各壹兩

甘草參分 檳榔壹 茯苓參 半夏

桔梗各壹 大腹皮 木香各半 烏梅壹

右為鹿末水煎患勞氣者以童子小便酒桃李枝同煎三錢去滓熱服

丹砂烏梅元 治五瘧不差

烏梅 恒山各拾 知母 犀角各陸

丹砂分 龍膽 甘草 人參

菴蓉 桂各陸 鱉魚甲捌 香豉壹大

桃仁肆拾 虎骨 升麻各捌

右為細末煉蜜和元如梧子大每服二十元空心酒下

大五補湯 治時行後變成瘡方

桂心錄拾 遠志 桔梗 芎藭各貳兩

茯苓 芍藥 人參 白朮

乾地黄 當歸 黃耆 甘草各參兩

半夏 麥門冬 生枸杞根各壹兩

右為鹿末每服二錢水一大盞入生薑三片棗一枚竹葉二片同煎至六分去滓溫服不以時

烏梅元 治寒熱瘧久不羸形躄羸瘦痰結胃呆食飲減少或因行遠久經勞役患之積年不羸服之神効

烏梅肉 豆豉各壹合 升麻 柴胡

鱉甲 恒山 地骨皮 前胡壹兩

百合 蜀漆 玄參 肉蓯蓉

桂心 知母各半兩 桃仁捌拾個

右十五味為細末煉蜜和元空心茶下三十元日二服老少孩童量力通用無所忌

十味元 治久瘧不已已經吐下其原尚在更欲吐利又慮羸宜服此藥

細辛 黃橘皮 桂 地骨皮各肆兩

鬼箭科掛着如金色老 蜀漆各貳兩 白朮伍兩

甘草 當歸 丁香各參兩

右為細末煉蜜和元如梧子大者烏梅飲下之初服十五元再稍加至三十元服經三五日後若竟熱上每服

藥後良久任喫三兩口粥飲壓之

甘草烏梅元 治一切瘧

甘草 烏梅肉熬 人參 桂

肉蓯蓉 牡丹各貳兩 恒山 升麻

桃仁 烏豆皮兩

右搗篩為細末以煉蜜和元蘇屠白搗一萬杵元如梧桐子大發日五更酒下三十元平旦四十元欲發四十元不發日空腹四十元晚三十元無不差一方有知母二兩

剋効餅子 治一切瘧病發作有時先覺伸欠作寒慄鼓振顛領中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已內外皆熱如發渴欲

飲冷或痰聚胃中煩滿欲嘔或先熱後寒或先寒後熱或寒多熱少或熱多寒少或寒熱相半或但熱不寒或但寒不熱或一日一發或隔日一發或一日後六七日再發並能主之

龍腦 麝香兩半 朱砂壹分 荷葉伍兩

萊菔末伍兩 甘草壹兩 信砒貳兩半 定粉半兩

金箔拾伍片

右為細末煉蜜和元每兩作二十元捏扁以金箔為衣每服一餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間日者不發夜服隔數日者發前一日夜服連日者凌晨服

系英丹 治勞瘧極効

雄黃 朱砂 硫黃 天雄

丁香 虎頭骨 黃丹 赤小豆

麝香

右為細末入研了藥令勻取甲子日合用粟米飯和元如菘豆大男左女右以緋絹袋裹繫一元於中指上

恒山驚甲散 治痰鬼瘡瘡

恒山 驚甲 烏梅 甘草

犀角 桃仁 知母 石膏

右為鹿末每服二錢水一盞竹葉二片同煎至六分去滓服之

朱砂元治瘡

朱砂 粉霜 膩粉 硃砂

白丁香 巴豆霜 乾漆末 青橘皮末

右同研勻細棗肉和元如梧子大小兒麻子大更用朱砂末裹過每先服了金箔元更後用麵湯下一兩元投之看虛實加減服

大黃元 治心瘡發歇不定

川大黃 恒山 砒霜 散魚甲

麝香 朱砂 香鼓

右為細末研勻以醋煮麵糊元如梧子大每服二元食前用桃仁冷醋湯下忌熱物

神應湯 治瘡

草豆蔻 棗 烏梅 半夏

橘皮 青橘皮 生薑

右以此一料用泉水三升於銀器內煎至一升半並將藥剉為鹿末同煎不以時去滓任意如發熱可冷服如發寒可熱服

曹桂湯 論曰寒熱之病蓋陰陽相乘陰氣上入陽中則發

寒陽氣下陷陰中則發熱若寒熱戰慄頭痛如破身拘急數欠渴欲冷飲或先寒而後熱先熱而後寒或有發時或

間而作至其時而發發已即如常此謂之瘧瘧脈自弦弦數多執弦遲多寒此皆得之冬中於風寒氣臟於骨髓之中至春陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑而後與邪氣

相合而發多寒者溫之多熱者發之寒熱等者以經調之寒多宜此曹桂湯熱多宜恒山湯枯薑湯寒熱等者宜驚

甲湯

柴胡 桂 黃芩 枯薑根

牡蠣 乾薑 甘草

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

雄黃丹 治丐兒瘡

白駒蹄 大黃 菘豆 砒霜

雄黃 朱砂

右為細末以蜜和元如梧子大發日平旦冷水服二元七日内忌油膩

若其發時胃中痞嘔吐此乃痰瘧脇腹痛胃中悞悞然欲嘔不得出此積瘧並宜玉壺元治見頭

藿香散 凡瘧吐下之後當溫調之宜服
厚朴 藿香葉 生薑 陳橘皮
半夏 甘草各壹兩

右六味同杵令爛焙乾為末每服三錢水一盞生薑三片棗一箇煎至七分去滓食前服

荆芥散 若其人翕翕如熱漸漸如寒無有時度支節如解手足疼痛頭目昏運此由榮衛素弱外為風邪相乘搏於陽則似熱搏於陰則似寒久不治之成勞宜此

荆芥穗壹兩 柴胡貳兩 人參 白朮
當歸 白芍藥 桂 甘草各半兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服非時

栝實湯 治熱瘧
柴胡兩 黃芩 人參 甘草各參兩
栝實根兩肆

右為鹿末每服五錢水二盞生薑三片棗一箇煎至一盞去滓溫服不以時

綿袞元 治瘧
硫黃 官桂 芭豆 白礬
殿花

右件等分為末五月五日用粽子相再入白搗千下元

如梧子大陰乾不拘老幼有孕婦人不拘月日瘧疾用綿一片裹藥一元男左女右納耳內於五更初放在耳內四日復取

小柴胡湯 治傷寒溫熱病身熱惡風腦項強急胃滿脇痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘硬或過經未解潮熱不除及老勞復發熱頭痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及產後傷風頭痛煩熱並可服

柴胡半斤 黃芩 人參各參兩 半夏貳兩
甘草參兩

右為鹿末每服三錢水一盞半生薑五片棗一箇煎至七分去滓熱服不以時候小兒分作二服更量大小加減若胃中煩而不嘔者去半夏人參加栝實實一個若渴去半夏加人參合煎成四兩半栝實根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脇下痞斬去大棗加牡蠣六兩若心卒悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱去人參加桂三兩覆微汗愈若咳者去參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩治瘧瘵瘧癘久即面黃肌瘦不唯新舊月日淺深悉皆主之心胃痞悶不思飲食加橘皮渴加栝實根喘加杏仁大便秘滯加大黃脇下痞斬而痛加牡蠣小可一兩劑大段三五劑克保痊安久經大効記之去半夏加人參更加栝實根名

黃龍湯

桃花元治一切瘡及赤痢白痢

信砒

粉霜各壹

定粉兩半

黃丹貳分

巴豆

赤箇米醋內煎
黑色去皮用

右都研令勻以糯米粥為元如黍米大赤白痢新汲水下兩元治瘡桃心七箇煎湯未發前冷下立差此法常用有效

祛邪元治瘧疾脉浮大寒熱往來用此吐之衛州書六瘧寒多熱少者痰瘧熱少而脉浮則痰無疑矣可吐之也若脉遲微者惡寒瘧耳宜柴胡桂薑湯

麻黃

肆兩去節湯炮
參沸焙乾秤

恒山

甘草

方十四

四十三

大黃

知母各貳兩

右為細末煉蜜和元如梧子大每服十五元面東清淨水吞下

草豆蔻散治老瘡久而不差及山嵐瘴氣遠年不愈兼大

治脾寒

草豆蔻

肉豆蔻

各貳箇並用
裹煨壹生壹熟

梓州厚朴

方圓貳寸壹半
薑製壹半生

甘草

中指大壹半
生壹半炙

生薑

素大貳塊壹塊用
濕蒂裹煨壹塊生

右咬咀分為二大劑於發前臨曉用水一升煎取八合放至來早再溫服留滓再煎二次

辟邪丹治嵐瘴瘴及痞疾等

菴豆

肆拾

黑豆

叁拾

好砒霜

半分

朱砂

兩粒如
黑豆大

黃丹

炒壹分

右件五味同入乳鉢內滴冷水元作十元每服一元以東南桃心七箇取井花水研向日吞服之醋水亦可其驗不具言經三五月患者只一元大段者只微寒若小可便絕去也

常山湯治瘧

常山

知母

甘草各叁分

麻黃壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞溫服以麩粥一盞取汗為度去滓

乾漆元若皮寒至骨湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄

方十四

四十四

此由腎氣素盛恣慾太過水竭指枯髓不滿骨津華不充於外所以不凍慄者非陽虛而為陰乘也名曰骨痺瘡久久不治令孿縮宜此

鹿茸

肆兩

生乾地黃

各肆兩

乾漆

兩半

附子

壹兩

右為細末酒煮麵糊和元如梧子大酒下三十元空服

七寶湯治瘧

大烏頭

壹個移七處
炮熱對碎

生薑

大棗

柒個

葱白

柒寸

右以水一小椀煎至一滿盞未發前一時辰去滓熱服訖喫棗

六一神丹 治久瘡不差

上好砒霜兩半 寒水石兩壹 龍腦 麝香各少許

右先研砒霜在鐵鉢內用寒水石末團之以坩堝合定濕帛封於椀上燒候煙出重紙黃色即止取出以紙襯於地上出火毒須更細研為末以蒸餅水泡為元如梧子大以朱砂作衣每服一元於發時早晨香上度過面北下用井花水吞下一元服後忌熟食魚麵五菓子數日永差此藥合時須是端午日早合忌婦人雞犬孝子見如女人患男兒拈入口中令服立効此藥並不吐瀉患者可只一服必差龍麝候砒霜經火後合研勻然後與饊餅和元

方十四 四十五

靈靈補元 治癩瘡時發大渴寒熱不定

砒霜 菜豆各半兩 川大黃壹兩

麝香壹分

右為細末入研藥令勻煉蜜和元如梧子大夜露一宿發日平旦以冷水下一元臨發前再服一元忌熱物

桃仁恒山元 治癩瘡發作不定但熱不寒宜服此方

恒山 桃仁 黃耆各壹兩 香豉壹合

右為細末水煉蜜和元如梧子大每至發日空心煎桃仁湯下十元於發時再一服

霜黃元 治久瘡不差

砒霜 硫黃 雄黃 雌黃各半兩

右研細於新鉢子內先布鹽末於中即下諸藥於鹽上以坩堝蓋用六一泥封勿令泄氣以一二斤火養半日候冷以甘草湯煮半日出火毒細研以飯和元如菜豆大如大人患以醋湯下三元以青帶繫三元於臂上男左女右立差小兒服一元繫一元

淡豉烏梅元 療瘡不問年月深遠

恒山貳兩 烏梅貳拾 淡豉壹拾

桃仁肆拾 烏梅貳拾 淡豉壹拾

右四味各搗訖都入臼中搗一千下即出之為元如乾即煉蜜相和令得所又搗一千下即成矣修合時不得令孝子懷妊婦人雞犬見大約藥效驗則如此若患者

方十四 四十六

但取發日平明飲下三十元如梧子大食時又二十五元至動時又十四元或下不吐重者服一服便差亦不忌口

鈿丹元 療瘡神効

鈿丹貳兩 人參壹分 天雄拾分

右三味為細末煉蜜和元如梧子大粥飲下二元食前服萬不失一

三滿元 療瘡百發百中神効方

恒山末 白蜜 生雞子白

右三味各一雞子殼於鐺中相和燉看元得即止旦四元晚四十元粥飲下大約雞子白兩個方得一殼

丹砂元 療寒熱相半兼治間日瘧子

丹砂 各壹 附子 壹人半

右為細末煉蜜為元如梧子大煎竹葉湯下二三十元發前三服中病則吐或身習習麻木未中病加至四十元間日發前如法服中病即止

光明元 治久瘧神効方

光明砂 兩半 恒山 壹 杏仁 伍

右為細末研入朱砂令勻煉蜜和元如梧子大未發前以粥飲下十五元欲發再服

烏曹散 治瘧

乾薑 各壹兩並對 良薑 同炒紫色

右為細末每服二錢未發前熱酒調服

扼虎膏 治諸瘧

臙脂 阿魏各壹大豆許同研

右二味以大蒜肉和為膏用大桃核一个擘開去仁取一片以藥膏子填桃核內患者臨發時用藥桃核覆在手虎口上令藥着內以緋白繫定男左女右經宿乃去之疾更不發

真丹 寒熱諸瘧發作无常心下煩熱

常山 末 真丹 壹兩即長號州真黃丹以兩隔鈿子帶觀妙色變用

右同研勻以蜜為元如梧子大每服三元未發時三元已發時三元臨卧三元米飲下

靈砂散 治瘧疾久不差

附子 壹兩約 靈砂 壹分

右將附子用麵裹炮以麵焦為度去麵并皮臍為細末與靈砂拌勻每於未發前冷酒調下一錢

神聖散 治瘧

地皮 高麗得者貳寸

右以燈焰上燒為灰入麝香少許同研細發前以葱白酒調下

治瘧疾久不差 氣脉羸弱

右大烏頭一箇端正者燬灰火中炮七遍不得焦了去皮臍碎切如米粒大以大棗七箇水一大椀生薑七片

葱白七寸慢火同煎至半椀未發前先喫煮藥棗七個然後温服

論曰夫瘧有日作者有間日而作者有先寒後熱先熱後寒者有寒多熱少者但熱不寒者然日作者瘧也間日而作者瘧也先寒後熱者寒瘧也先熱後寒者温瘧也寒多而熱少者壯瘧也但熱而不寒者癰瘧也瘧脉自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者可温之數緊者可發汗針灸也浮大者吐之羌莖數者風疾也以飲食消息去之凡治瘧於發前食頃以治之過則失時也心瘧不治他皆可治多熱者白虎加桂湯及常山甘草前胡大黃作飲子服之

多寒者柴胡桂薑湯

小緊者可下用和胃元三粒妙

可吐者常山汁飲之

若瘧連年不解者由人軀虛邪傷榮衛耗弱正氣不能自

持故久而不去謂之勞瘧宜神精丹方在中此疾雖田舍

之人皆知之但有冷熱虛實之異今略論其一二擇其必

驗者以備倉卒若寒從背起冷大如手不甚戰慄以發熱

而汗出或即頭痛嘔逆時作其脉遲小此由脾胃素弱因

氣寒而水穀不能剋化聚而成痰陰上乘陽陽為陰乘所

以作寒寒逼陽虛散而為汗宜旋覆花元方見頭

若寒熱如瘧不時發腹滿膨亨起則頭眩大便不通或時

腹痛胃膈痞悶此由宿穀停留不化結於腸間氣道不舒

陰陰壅滯宜備急元方見頭

至靈纏金丹治赤白痢

朱砂

黃蠟拾棗

硃砂已上各壹兩

右先鎔蠟作汁煮巴豆焦色去巴豆不用然後入前藥

二味在蠟內溲和成劑有患旋元大人莖豆許一元小

兒莖豆許一元驟泄新汲水下赤白痢黃連艾湯下白

痢艾湯下赤痢黃連湯下如合劑後止用金箔裹之老

人肌瘦亦可服甚者不過再服立愈神妙並空心服服

訖忌熱物少時

香和元治積無等

豆豉搗為末

大蒜去皮研

右二件無分兩合和成劑為度元梧桐子大每服二十

至三十元溫熱水下先進纏金丹次方服此元子

草菓飲子治脾寒瘧疾

草菓

高良薑

甘草

川芎

白芷

青橘皮

紫蘇葉

右等分為末每服二大錢水一盞煎至七分去滓熱服

留滓二服併一服當發日連進三服立見効

發雪元治五勞七傷陰汗盜汗夜多小便沉寒故冷脾胃

虛損久不思飲食消渴腹脹翻胃吐逆腹中絞結疼痛肺

寒咳嗽寒痰不利口吐酸水五瘧脾寒泄瀉一切冷疾並

宜服之

葶撥

人參

茯苓

乾薑

桂心

訶子

胡椒

良薑

瘧丹

小實黑豆

砒霜

雄黃

右用端午日搗羅研為細末滴水元和元梧桐子大每服一

粒於瘧未發前一夜食後臨臥服忌生冷油膩熱物一

伏時欲服藥時先喫溫冷淡飯一頓於稍空時臨臥服

藥尤妙合時忌雞犬婦人見懷胎婦人不得服如急用

不必端午日合

淡瀉湯 一名辛木湯

蒼朮 去皮 伍兩

陳橘皮

細辛 去葉

厚朴 去皮 薑製

縮砂仁

附子 去皮 臍去

桂 去皮

肉豆蔻

乾薑 去各 兩

丁香

甘草 去各 兩

右為鹿末每服二錢水一盞入生薑三片棗一枚同煎至六分去滓食前溫服

草豆蔻散

一名常山飲子治瘧疾因外邪客於風府生冷之物內傷肺胃或先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日發或間日一發寒則肢麻顫掉熱則舉身如燒頭疼惡心煩渴引飲氣息喘急口苦咽乾脊脊酸疼腸鳴腹痛

方十四

五十一

諸藥不効漸成勞瘵者此藥治之

知母 斤 貳

常山 川者 斤 貳

烏藥 搗碎 斤 貳

草菓 斤 貳

甘草 斤 貳

高良薑 斤 貳

右為鹿末每服三錢水一盞生薑五片棗五箇煎至七分去滓溫服

雞峯普濟方卷第十四

雞峯普濟方卷第十五

馮翊賈兼重校定

婦人 崩漏

熟地黃煎 治婦人虛損或頭風入脛及寒痺筋脈緩急血閉無子遊風往來或漏下赤白或月水不通無所不治

白芷

石斛

菴蓉

細辛

防風

卷栢

厚朴

白茯苓

白朮

甘草

桂

乾薑

山藥

禹餘糧

石膏

赤石脂

澤蘭葉

蕪荑 各壹兩

川椒

人參 各柒兩半

杜仲

地床子

續斷

艾葉 各叁兩

五味子 各柒兩半

當歸

熟地黃

牛膝

五倍子

川芎 各柒兩半

黃芩 各柒兩

紫石英 拾伍兩

栢子仁 柒兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服空心米飲下三十元

十元

大五石澤蘭元

治婦人風虛腹內雷鳴緩急風頭痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心腹痞堅逆食手足冷多夢紛紜身躄痺痛榮衛不和虛弱不能動搖及產後虛損並宜服此 千金翼有陽起石壹兩

鍾乳粉

禹餘糧 各壹兩半

石膏

白石英 各壹兩

紫石英 貳兩

澤蘭葉 壹分

蜀椒

乾薑 貳兩

當歸

桂

芎藭

厚朴

栢子仁

熟地黃

細辛

茯苓

五味子

龍骨

甘草

黃耆 各貳兩半

石斛 遠志 人參 續斷 白朮

防風 烏頭壹分 山茱萸 紫苑各壹兩

白芷 藁本 蕪荑各參

重校此方內蜀椒無分兩其本方內又有相子仁元與此方治瘵相類內蜀椒用壹兩半

右為末蜜元如梧桐子大空心温酒服二三十元

澤蘭散 治婦人產乳百疾安胎調氣產後血暈亡血血積

虛勞無子有子墮胎難產子死腹中胎衣不下婦人血注遍身生瘡經候不調赤白帶下乳生惡核咳嗽寒熱氣攻四肢厥女任脉不調常服調血有子

澤蘭分 石膏分 當歸 赤芍藥 白蕪荑

甘草 芎各拾分 桂伍分 生乾地黄陸分

方十五

桔梗 厚朴 吳茱萸 白茯苓 防風

卷柏 細辛 栝子仁各肆兩 人參

白芷 藁本 椒紅 乾薑 烏頭

五味子 黃耆 白朮各參分 白薇 丹參

阿膠各參分

右為細末每服二錢空心熱酒調下凡不美飲食四肢困倦者尤宜服之

栝子仁元 治婦人五勞七傷羸瘦削面無顏色飲食減少貌失光澤及產後斷緒無子久服令人肥白補虛

栝子仁 黃耆 乾薑 鍾乳 白石英

紫石英各貳兩 蜀椒壹兩 杜仲 當歸

甘草 芎各肆拾分 厚朴 桂

白朮 細辛 獨活 人參 石斛

白芷 芍藥 五味子 桔梗 菴蓉

赤石脂各壹兩 澤蘭各肆兩 藁本 蕪荑各拾分

烏頭牛膝 乾地黄陸分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元酒下千金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽各半兩為三十二味并治產後半身枯痺

紫苑散 治婦人久患血勞血氣腹內積聚惡物瘕癖氣塊

腹內去來或上衝心兩肋虛脹腰膝冷疼臍下攪刺脾胃不和喫食無味口吐清水渾身麻痺手脚拘急口溢唇乾

方十五

身軀虛弱睡卧不安心神煩躁面上生瘡四肢沉重月水不調經年累月無時似有孕漸加羸瘦及治一切諸風久不美者悉宜服之

紫苑 人參各捌分 熟地黄陸分 麥門冬 柴胡

蜀椒 烏頭 羌活 甘草各伍分 厚朴

大黃 茯苓 黃連各陸分 巴豆 檳榔

車前子 菴蓉 防葵 吳茱萸 菴蒲

當歸 伏神 乾薑 皂角 桔梗各肆分

防已 白朮各伍分 肉豆蔻貳分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三五元空心米飲下當宣轉三五行如不定以白粥止之

大聖散治婦人產前後一切疾患大能安胎和氣或子死腹中攻刺疼痛產後血暈血癖血帶血崩血勞血入四肢應是血臟患者并胎衣不下及傷寒嘔逆遍身生瘡經候不調赤白帶下乳生惡氣咳嗽寒熱氣撮四肢室女紅脉不調並宜服之如或子臟虛冷頻墜胎及孕後後乖違將攝因成疾並可服之若常服即和顏色血海安寧飲食進美舉止康強丈夫服之亦療五勞七傷

澤蘭分 白木 人參 白芷 藁本

乾薑 黃耆 五味子 丹參各 川椒

厚朴 桔梗 防風 白茯苓 栝子仁

細辛各 生乾地黄壹 吳茱萸 卷柏各

方十五 四

當歸 芍藥 川芎 甘草 白蕪荑各

石膏貳 肉桂伍 白薇貳 阿膠兩

右件藥並揀擇令淨分兩足焙乾為細末每日空心熱酒調下一錢婦人一切疾病但請服之

琥珀元治婦人血風勞

琥珀 木香 檳榔 芎 防風

桂 乾薑 附子 京三稜各

青皮 吳茱萸 白芷 草豆蔻 紅芍藥

天麻 栝菜 吳白木各 當歸壹

桃仁 鼈甲各 敗龜各 人參 柴胡各

乾蝎壹 重校定此方內三味无分兩此方王氏博濟方亦載之內人未詳胡各式分乾蝎壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十五二十元荆芥湯下不以時

順經元補虛損調順經血治衝任氣虛小腹挾寒月水不調臍腹疼痛腰腿沉重四肢倦怠百節酸疼心忪恍惚憂惡不樂面少光澤飲食无味除下臟風冷治帶下三十六疾崩中漏下五色子臟久冷無子及數墮胎兼療產後惡露不下餘血不盡臍腹疼痛憎寒發熱血逆上衝狂言目瞑或乘虛中風口噤不語身軀不遂頭旋身戰臨月服之壯氣養胎正順生理潤胎產後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實腑臟治虛風除痼冷

當歸 石膏 蜀椒 甘草 蟬退

方十五 五

馬鳴退各 栝子仁 白薇 藁本

乾薑 白木 白蕪荑 蒼耳 人參

白芍藥 芎 附子各 食茱萸 厚朴

防風 白芷各 桔梗各 澤蘭各 生犀兩

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元温酒或米飲化下空心服

石脂澤蘭散治產後風虛

澤蘭分 禹餘糧分 石膏 白芷 乾地黄

赤石脂 肉苁蓉 鹿茸 芎 藁本

蜀椒 白木 栝子仁各 桂

甘草 當歸 乾薑各 蕪荑 細辛

厚朴 人參分壹 防風分拾

右二十二味為細末酒服方寸匕日三以意增之

補益鍾乳元 治婦人血海虛上攻於肺或時喘促心煩喫食少味四肢乏力

鍾乳粉兩壹 五味子 肉蓯蓉 澤蘭 芎藭

白芍藥 黃耆 桔梗 栝子仁 當歸

紫石英 紫苑 厚朴各壹兩 天門冬壹兩 蒲黃

甘草 細辛各半兩 遠志 天雄 熟乾地黄各兩

燕美仁各壹兩 熟乾地黄各兩

右為細末煉蜜和杵五七百下元如梧桐子大每服三十元空心及晚食前温酒下

方十五 六

玉蓮散 各依法製治氣虛有熱狀如勞瘵者

山藥各兩 當歸 桂 神翅 熟地黄

大豆卷各兩 甘草 人參各壹兩

芎 白芍藥 白朮 麥門冬 杏仁

柴胡 白茯苓各壹兩 阿膠各壹兩 乾薑各壹兩

白欽各壹兩 防風各壹兩 棗壹兩 桔梗壹兩

右為細末每服三錢食前温米飲調下

昆布煎 治婦人胃中伏氣

昆布 海藻 芍藥 人參 款冬花

白石英 桑白皮 桂各貳兩 栝子仁 茯苓

鍾乳粉各貳兩 紫苑 甘草各壹兩 吳茱萸

五味子 細辛各壹兩 杏仁壹兩 生薑片切

橘皮黃者 紫蘇子各伍分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元生薑湯下不以時

下不以時

白聖煎 治婦人月經一月再來或隔月不來或多或少淋瀝不斷或來而腹痛噓吸短氣不能飲食心腹刺痛所下或青或黃黑色或如水牽絆沉重

白聖 白石脂 牡蠣 禹餘糧 烏魚

龍骨 細辛 當歸 白芍藥 黃連

茯苓 薑 人參 瞿麥 石草

白芷 白欽 附子 甘草 桂各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心温酒下三十元

方十五 七

小活血丹 治血臟虛冷面黃肌瘦骨膈痞悶心腹撮痛嘔逆惡心面生黑黯鬚髮脫落頭旋目黑經候不勻腰腿酸疼脇肋脹痛不欲飲食手足煩熱肢節拘倦一切血氣虛衰皆治之

安息香 當歸 延胡索 木香 桃人

栝子仁各貳兩 澤蘭葉 牡丹皮 乾薑

黃耆 桂心 艾葉各肆兩 大附子 虎杖

山茱萸 吳茱萸 杜仲各貳兩 肉蓯蓉 厚朴各兩

右為細末以前安息香杵碎好酒同研去滓銀器內慢

重校定此方內從容元分兩其太平聖惠方內白薇元治瘵菜味相類內從容合用肆兩

火熬成膏入白麵少許同煮作麵糊為元如梧桐子大每服二十元溫酒下淡醋湯亦可空心食前服

安息香元 治血臟虛冷面黃肌瘦胃膈痞悶心腹絞痛嘔逆惡心面色黑黧鬚髮脫落頭旋眼黑經候不勻腰腿疼痛脇肋脹滿不欲飲食手足煩熱肢節酸疼或寒或熱發歇無時

安息香 桃仁 虎杖 附子 杜仲

山茱萸 吳茱萸 栝子仁 木香 當歸

延胡索 澤蘭 艾葉 乾薑

牡丹皮 黃耆 桂 茯苓 厚朴

右為細末醋煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元空

方十五

心溫酒下

澤蘭元 治風虛中寒腹內雷鳴頭痛寒熱月經不調繞臍惻惻榮衛不和不能動搖產後虛損

澤蘭 石膏 當歸 甘草

栝子仁 防風 茯苓 芎 白芷

蜀椒 藁本 細辛 食茱萸 蕪荑

人參 厚朴 白朮 桂

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前溫酒下

萬安散 治下經不足冷氣攻衝脇肋脹疼小腹堅滿氣不施化小便不利及婦人衝任宿寒臍腹刺痛經候不勻肢

臍疼倦

仁參 茯苓 木香 芍藥 川練子

芎 厚朴 神麴 麥蘖 乾薑

熟地黃 芩 當歸 枳殼 茴香

青皮 荆三稜 桂

右為鹿末每服二錢水一盞葱白二寸煎至七分去滓食前溫服

人參禹餘糧元 若經候乍多乍少或前或後臍腹時痛面色不澤久不治之漸至虛損令人斷產變生他病此由衝任虛弱後至榮衛不調或陰乘陽胞寒氣冷血不運行故令乍少當調其陰陽順其血氣論曰經者有常候謂候一

方十五

九

身之陰陽愆伏知安危血過於陽則前期而來過於陰則後期而至其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱為邪

禹餘糧 龍骨 人參 桂 紫石英

川烏頭 桑寄生 杜仲 五味子 遠志

澤瀉 當歸 石斛 茯苓 乾薑

川椒 牡蠣 甘草

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服米飲下二十元漸加至三十元日三服空心食前

若經道不通繞臍寒痛上下脈沉緊此由寒客血室血凝不行結積不散積血為氣所傳新血與故血相搏所

以發痛譬言如天寒地凍水凝成冰宜溫經湯桂枝桃仁湯產後大便秘澀由內無津液腹胃乾燥宜紫蘇元

紫蘇元方見大腸門桂枝湯見第十七卷

牡丹元大暖婦人血海冷敗傷損壯顏色氣力

牡丹皮 白薇 肉豆蔻 當歸 熟地黃

禹餘糧 菴蓉 木香各壹兩 吳茱萸 細辛

獨活 茯苓 石膏 芎各壹兩 黃耆

五味子 桂各參分 椒兩半

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心溫醋湯下

土苺根元療月經不通六七年或腫滿氣逆腹脹痠痛之疾

方十五

十

蜻螬升壹 熟地黃 牡丹 乾漆 赤芍藥

牛膝 土苺根 桂各肆兩 桃仁 黃芩

牡蒙各參兩 海藻 茯苓各伍兩 蜜蟲肆伯 水蛭叁伯

芒消貳兩 人參分陸 茱萸貳兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心溫酒下七元

補益阿膠元治婦人風虛勞損經血過多臟腑虛乏面色萎黃四肢羸瘦腹內時痛不欲飲食

阿膠 白龍骨 鹿茸 人參 白茯苓

當歸 白朮 厚朴 石斛 黃耆

熟乾地黃各壹兩 白芍藥 乾薑 卷柏

桂 芎各參分 蒲黃各半兩 艾葉分叁

右為細末煉蜜和杵三二百下元如梧桐子大每服四十元空心晚食前以粥飲下

紫石英元治婦人風虛勞冷經候不調四肢不能卒飲食不入

紫石英 熟乾地黃 白石英各叁兩

續斷 木香 桂 當歸 白朮

白芍藥 乾薑 白薇各半兩 牛膝 芎各壹兩

五味子 人參各參分 黃耆 附子 椒紅各壹兩

右為細末煉蜜和杵五七百下元如梧桐子大每服三十元食前溫酒下

方十五

十一

馬蹄元治婦人崩中帶白重校定馬蹄元小蘇根疑是

白馬蹄伍兩 白馬鬚毛 蒲黃 鹿茸

禹餘糧 白芷 續斷 小蘇根各肆兩

人參 乾地黃 栢子仁 黃耆 茯苓

當歸 烏賊骨各壹兩 伏龍肝 菴蓉

艾葉各參兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心米飲下二十元日再加之四十元

勝金元散治婦人諸疾相須並濟凡漏下過期不產近年

此病甚多亦不須深慮有服藥後漏止胎便長進而產者亦只任迤邐却便平復此緣未受胎時衝任有風邪停滯

於內或從產後或從經候來時便利於懸廁之上風從下入得之但只服此勝金元散自然作効經驗多矣

白薇兩 人參 藁本 蒲黃 川烏頭

丹參各參分 吳茱萸 栝子仁 防風 厚朴

細辛各貳分 桂心 乾薑各壹兩壹分 當歸

芎藭各壹兩壹分 生乾地黄捌兩 澤蘭貳兩壹分

右除桂心外同杵以馬尾羅子篩為麤末重炒褐色勿焦候冷再杵為細末入桂心末拌和勻後分為兩處候合成後藥取一半入在此藥中却將此藥一半入在後藥中

元子如後

方十五

十二

延胡索 五味子 白芷 白朮 石菖蒲各壹分

茯苓 桔梗 卷柏 川椒各壹兩 黃耆壹兩

白無憂 甘草 白芍藥各壹兩 石膏壹兩

右件除石膏外同杵以馬尾羅子篩為麤末重炒令褐色候冷依前再杵為細末入石膏拌勻亦分作兩處將一半換前藥相和勻煉蜜和元如梧桐子大如有病證每服用溫酒調前散三錢下此元三十元常服二錢下此元二十元此元散効不可述應婦人室女病至垂死服之無不見効若只服元子不可無散子服散子不可無元子政以相須並濟名之為勝金元散修合時宜精潔在意為妙凡風勞氣冷傷寒咳嗽嘔逆寒熱不定四

肢遍身瘡痒血海不調血臟虛備赤白帶下血運血崩除血流入四肢頭痛惡心血癥積滯產前預服則安胎易生產後諸般疾患但下得藥即便安愈常服此疾不生悅澤顏色素無子者服之有驗兼治丈夫腎臟虛風等疾

桑耳散治婦人帶下赤白無問遠近皆治

桑耳 熟乾地黄 丹參 阿膠

牛角腮 牡蠣 鹿茸 鱉甲 赤石脂

薤葉各壹兩 芎藭 熟艾 小薊根 當歸

地榆 續斷 栝葉各參分

右為細末每服於食前以溫酒調下二錢

方十五

十三

槐耳元治女人白崩及痔病連血臟服諸藥不老者

槐耳 白斂 艾葉 蒲黃 白芷各壹兩

黃耆 人參 續斷 禹餘糧 當歸

橘皮 茯苓 蝟皮 乾地黄各參兩

牛角腮 馬白蹄各肆兩 猪後懸蹄貳拾壹個

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子每日空心酒下二十元日二服

古今錄驗澤蘭元療產後虛風羸瘦百病必効方

澤蘭貳兩 白芷 川椒 蕪荑 藁本

細辛各肆分 栝子仁 白朮 人參 桂

防風 厚朴 丹參各伍分 芎藭 甘草

當歸各柒分 乾地黄拾分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二三十元空心醋湯下

荆芥柴胡散 治處女氣虛血海不調時發寒熱目澁舌乾

身軀困倦心忪氣短不思飲食小便赤澁大便或秘或瀉瘦弱面色萎黃變為勞疾宜服

柴胡 荆芥穗 人參 白朮

綿黃耆 延胡索各壹兩 赤芍藥 當歸

熟乾地黄 木香 青橘皮 黃橘皮

桑白皮 地骨皮 甘草各半兩

右為細末每服一錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

方十五

十四

温服日午臨臥各一服此疾不可疎利與熱藥針灸服之甚有效

人參散 治婦人產前產後虛風上攻頭旋目暈四肢少力

手足顫掉肌肉瘦瘠骨膈痞滿臟腑不調狀若虛勞春秋發歇寒熱作時口苦舌乾心忪短氣咳嗽上喘多驚驚愛

睡昏沉困倦嘔逆痰涎不思飲食腹脹滿皆可治之不限

老少盡可服食常服生肌肉活血脉除百病進飲食

人參 麥門冬各叁分 沉香 桔梗

酸芎 當歸 白朮 生乾地黄

芎藭各半兩 赤茯苓 阿膠 甘草各壹分 青木香

陳橘皮 黃耆 菊花各壹兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食前温服

內補黃耆湯 治婦人五勞七傷身軀疼痛小腹急滿面目

黃黑不能飲食并諸虛之不足氣少心悸不安

黃耆 當歸 芍藥 乾地黄 半夏各叁兩

茯苓 人參 桂 遠志 麥門冬

白朮 澤瀉各貳兩 乾薑伍兩 棗叁拾個 五味子

甘草各壹兩

右咬咀水一斗半煮取三升去滓一服五合日三夜一

人參荆芥散 治婦人血風勞氣骨膈不利經脉滯澁四肢

拘急煩疼心多忪悸不能飲食漸加羸瘦

人參 荆芥 白朮 柴胡 生地黄

酸棗仁 羚羊角 鱉甲 枳殼 桂各壹兩

當歸 防風 甘草 牡丹皮 赤芍藥

芎各壹兩

右為鹿末每服二大錢水一盞薑三片煎至六分去滓

食後服之

保生丹 補宮臟氣虛肢軀瘦倦

石斛 秦朮 熟地黄 貝母 糯米

防風 乾薑 甘草 細辛 桂各半兩

當歸 川椒 黃芩 大麻仁各壹兩

大豆卷 石膏各七兩

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元白湯下酒亦

得細嚼食前

鍾乳澤蘭煎 補虛損

鍾乳粉兩 澤蘭葉錢半 防風壹兩 人參

栝子仁 麥門冬 熟乾地黄 石膏

石斛 芎 甘草 牛膝 山茱萸

乾山藥 當歸 白芷各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元食前温

酒下

羌活散 治婦人血風虛勞冷四肢羸瘦不能飲食面色萎

黃腹內時痛

羌活 桃仁 薺甲 熟乾地黄

牛膝兩 白木 白茯苓 續斷 川芎

附子 木香 當歸各壹分 防風 人參

白芍藥 桂心各半兩

右為鹿末每服四錢水一盞生薑半分煎至六分温服

去滓不以時

補陰丹 治婦人血臟諸疾及諸淋病及經脈不行或產後

餘血不盡變成血瘕皆治之

好朱砂 硃砂 延胡索 半夏麴 芫花

木香 班貓各半兩 海蛤 荆三稜 黑附子

蓬莪朮 川練子 青皮各壹兩 肉豆蔻壹兩 大檳榔壹兩

茴香壹兩

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子大每服五七元空

心温醋湯下

牡丹散 治婦人血臟虛風攻頭目不利可思飲食手足煩

熱肢節拘急疼痛胃膈不利大腸不調陰陽相干心驚忪

悸或時旋運身軀勞倦宜服

牡丹皮 川芎 枳殼各兩 桂 延胡索

京三稜 乾薑 羌活 半夏各半兩 陳皮

木香 白木 赤芍藥 訶子肉各壹分

當歸壹兩 甘草半兩

右為細末每服二錢水半盞煎五七沸食前温服此方

婦人常服益血海退血風勞攻注消寒疾空脾胃理血

氣攻刺及氣虛惡寒潮熱等病至妙

大勝金丹 治妊娠風冷氣血勞傷頭眩眩暈怔忡悸寒

熱往來心腹脇痛肢節煩倦赤白帶下胎氣不寧保養衝

妊順政子道預服易產不痛善除產後一切病温中益氣

進美飲食

牡丹 藜蘆 人參 白木 白芷

白薇 白茯苓 當歸 赤石脂 白芍藥

甘草 芎 沒藥 延胡索各壹兩

桂壹兩

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元空心温酒下

白豆蔻元 治氣和胃

白豆蔻 丁香 木香 沉香 肉豆蔻

檳榔 甘草 青皮各半 白朮伍兩 茯苓

訶子皮 人參各壹兩 桂 乾薑各壹分 麝香壹分

重校定此方內麝香無分兩其六平聖惠方內利濕散與此方治療藥味相類止是元散不同內麝香合用壹分

右為細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元生薑湯嚼下不以時

獨活散 治婦人風痺手足不隨身軀疼痛言語蹇澀筋脉孿急

獨活 桑寄生 牛膝 赤茯苓 桂

秦艽 防風 附子 生乾地黄 當歸各壹兩

方十五 十八

杜仲 細辛 芎藭 赤芍藥各壹分

甘草兩半

右為細末每服四錢水一中盞煎至六分去滓不以時温服

人參散 治婦人血風氣心煩驚悸恐畏恍惚神思不定少欲飲食四肢疼痛

人參 龍齒 茯神 熟乾地黄各壹兩

遠志 附子 細辛 桂 乾薑

防風 菖蒲 黃耆各半 當歸 白朮各壹分

甘草壹分

右為細末每服四錢水一盞生薑半分棗三不煎至六

分去滓不以時温服

續斷元 治婦人月水不斷口乾心煩四肢躄瘦喫食少味

漸加之弱 烏賊魚骨 續斷 當歸 牛角腮

五味子 熟乾地黄 黃耆 赤石脂

甘草 龍骨各壹兩 附子 艾葉 乾薑

芎藭各壹分 白朮兩半

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前温酒下

桂枝白朮元 治婦人脾胃氣虛弱腹中疼痛時復吐逆不能下食四肢少力

方十五 十九

白朮 附子各壹兩 木香 當歸 蓬莪朮

訶梨勒皮 芎藭 人參 乾薑

吳茱萸 桂心各半 甘草壹分 青橘皮 厚朴各壹分

右為細末酒煮麵糊為元搗三五百下如梧桐大每服二十元薑棗湯下不以時

琥珀散 治婦人血風勞

琥珀 沒藥 木香 當歸 芍藥

芎 白芷 羌活 乾地黄 延胡索各壹分

土瓜根 牡丹皮 白朮 桂各壹分

右為細末每服二盞水一盞煎至七分益酒三分復煎少時并滓熱服

此聖散 治婦人血氣產後渴燥一切血邪亂語眼如血袋
敗血上衝口鼻血出

硃砂 血竭 沒藥各壹兩 海馬壹兩 桂
木香 朱砂各壹兩 乾漆壹兩 蜚蠊壹兩
龍腦壹錢 水蛭拾肆個 當歸壹兩 鵬砂壹錢
阿魏壹分

右為細末一處和勻每服一錢冷水調下如產後血上衝口鼻血出用童子小便調服三服必効

烏頭當歸湯 主虛勞損胃腹滿痛急短氣面黃失色頭眩心煩夢寐失精寒氣肢節疼又兩腋不得喘息喘息輒牽痛逆害飲食悉皆主之

烏頭 獨活 白芍藥 蜀椒 白木
人參各壹兩 厚朴肆兩 桂伍兩 麥門冬 細辛各壹兩
吳茱萸壹升 生薑 當歸 甘草各壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓日三空心
川芎牡丹散 治血臟氣不調腹脇脹滿煩躁吐逆頭昏身軀疼痛可思飲食

牡丹 陳橘皮 芎 訶子各壹兩 木香
當歸 白木 延胡索 荆三稜 半夏各壹分
甘草 乾薑 羌活各壹兩 桂壹兩
右為細末每服三錢水二盞薑棗煎至七分去滓溫服不以時

桃仁湯 治產後及墮身月水不調或淋瀝不斷斷即復來狀如瀉水四肢噁吸不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉身沉重惟欲眠睡多思酸物

桃仁伍拾個 澤蘭 甘草 芎藭 人參各壹兩
牛膝 桂 當歸 牡丹皮各壹兩
芍藥 生薑 半夏各肆兩 地黃兩 蒲黃壹兩

右以咀以水二斗煮取六升半分六服古之一升即今之一盞

防風散 治婦人風邪癲狂或啼泣不止或歌笑無度或心神恐懼或言語失常

防風 茯神 獨活 遠志 人參
龍齒 菖蒲 石膏 牡蠣各壹兩 秦朮
禹餘糧 桂各半兩 蛇退 甘草各壹分

右為細末每服三錢水一盞煎至六分去滓不以時溫服
重校定此方內分兩皆錯太平聖惠方亦載之內防風茯神獨活遠志人參龍齒菖蒲石膏牡蠣各壹兩秦朮禹餘糧桂各半兩蛇退壹分甘草壹分

虎骨散 治婦人血風走疰痛無常處

虎骨頭 乾地黃各壹兩 敗龜 乾蝎
琥珀各半兩 當歸 葳靈仙 牛膝 羌活
肉桂各壹兩 天麻 川芎 沒藥各壹分

右為細末無時以溫酒調下二錢
龜甲散 治婦人赤白帶下腰膝疼痛

龜甲 禹餘糧 當歸 栢葉 厚朴各壹兩

人參 桑耳各壹分 白石脂兩 狗脊 白芍藥

桑寄生 桂心 吳茱萸各半兩

右為細末每於食前以粥飲調下二錢

大補益當歸元 治虛羸不足胃中少氣腹內拘急腰疼引

背崩漏帶下失血過多面目脫色唇口乾燥月水不調臍

腹冷痛手足煩熱吸吸短氣憂恚不足精神減退散風冷

補虛損美顏色養經血

當歸 續斷 乾薑 阿膠 甘草

芍各肆兩 白朮 吳茱萸 附子 白芷

白芍藥 桂各壹兩 熟地黄兩

方十五 廿三

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元食

前溫酒下

小犀角散 消除瘡腫

犀角屑兩 升麻 黃芩 防風 人參

當歸 黃耆 蓼藍 黃連 甘草

梔子各壹兩 大黃壹兩 巴豆貳拾分

右為細末入巴豆研勻煉蜜和元如梧桐子大每服三

五十元食後米飲下

紅花勝金散 治血虛寒熱頭目昏眩手足疼心腹痛

紅花 菊花 枳殼 茯苓 川芎

羌活 羚羊角 當歸 款冬花 芪

紅芍藥 烏地 桂

重校定此方內無分兩其太平聖惠方內紅藍花散與此方藥味同內紅花壹兩菊花枳殼茯苓

川芎羌活各羊角當歸款冬花款冬紅芍藥烏地桂各半兩

右為細末每服二錢炒小麥酒調下不以時

羌活牡丹散 治血臟虛風攻頭目不利可思飲食手足煩

熱肢節拘急疼痛胃膈不利大腸不調陰陽相干心驚忪

悸或時旋暈斃倦宜服

牡丹皮 川芎 枳殼各壹兩 桂 延胡索

甘草 羌活 半夏各半兩 陳皮 木香

白朮 訶子各壹分 當歸壹兩

右為細末每服二錢水一中盞煎五七沸食前溫服此

藥婦人常服益血海退血風勞攻注消寒疾益脾胃理

血氣攻刺及氣虛惡寒潮熱等

沒藥散 治血風氣攻刺疼痛

沒藥 延胡索 檳榔 青皮 桃仁

芫 當歸 荆三稜 木香 芍

桂各壹兩 白芷 紅花各半兩

右為細末每服三錢水一盞煎至七分不以時

阿膠元 治氣多血少衛實榮虛月信過期大能生血順氣

出顏色長肌膚益筋力

阿膠 熟地黄 牛膝各貳錢 桂錢 白芍藥兩

五味子 黃耆 白茯苓 當歸 人參

牡丹皮 芍各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心膏湯下三十元
日二一方有白朮一兩

五味子散治婦人心胃痰壅時有喘促咳嗽不欲飲食

五味子 橘皮 訶梨勒 白茯苓 前胡各叁分

半夏 紫苑 枇杷葉 桔梗 杏仁

枳殼 甘草各半兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓
溫服不以時

草薢煎治婦人血風腰脚骨節酸疼筋脉挛急行履艱難
兩脇抽痛

方十五 廿

草薢 牛膝 當歸 石斛 虎骨

附子各壹兩 酸棗仁 丹參 防風 杜仲

桂叁分 赤芍藥半兩

重校定此方內四味無分兩太平聖惠方內有草薢元與此方藥味一同內酸棗仁丹參杜仲三味各壹兩防風叁分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心酒下三十元

神翅元療婦人腹內冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能
食面無顏色狀如傳尸病

神翅 大麥孽 生地黄 牛膝 桑耳壹斤

白朮 薑黃各捌兩 當歸拾肆兩 桃仁 杏仁各拾兩

生薑壹斤 近用加橘皮兩

右切碎於臼中以木杵之如泥內餅中以物蓋之封勿
令泄氣蒸於飯米中飯孰出之停屋下三日開出暴乾

為末酒飲服方寸匕日二服漸加至一匕半初服十日
內忌生冷難消之物以助藥勢過十日外即百無所忌

任意安口食之惟忌桃李若不能散服元之每服三十
元令病人能食及駐顏色忌桃李雀肉燕羹

麝香沒藥散治血風毒氣攻注遊走肢躄疼痛

麝香壹分 沒藥 血竭 自然銅 枳實各半兩

當歸 牡丹皮 赤芍藥 骨碎補 瓜子各壹兩

虎骨 敗龜各貳兩

右為細末每服二錢豆淋酒調下日二服不以時

方十五 廿五

大補中當歸湯治產後虛損不足腹中拘急或瀉血小腹

苦痛或從高墜下犯肉及金瘡血多內傷男子亦宜服

當歸 續斷 桂 芍藥 乾薑

麥門冬各貳兩 白芍藥 吳茱萸各肆兩

熟乾地黄陸兩 甘草 白芷 黃耆各貳兩

右為麤末每服四錢水一盞酒半盞棗二箇同煎至八
分去滓食前溫服

半夏茯苓湯治妊娠阻病心中憤悶虛煩吐逆惡聞食氣

頭重目眩四肢百節疼痛沉重多臥少起惡寒汗出疲極

黃瘦壹方元

半夏 生薑各拾兩 茯苓 乾地黄拾兩

黃橘皮 細辛 人參 白芍藥 旋覆花

芎藭 桔梗 甘草各拾

右十二味以水一斗煮取三升分三服若病阻積及服藥冷熱失候病變下痢者去乾地黄入桂心十二銖若食少胃中虛大便閉塞小便赤者加大黃十八銖去地黄加黃芩六銖餘依方服一劑得下後消息看氣候冷熱增損調定更服一劑湯便急服茯苓元令能食便強健也忌生冷醋滑油膩菘菜海藻

當歸湯 大補中下虛弱

當歸 續斷 乾薑 交門冬 芎
桂各參 白芍藥 吳茱萸各肆 黃耆

方十五

共六

甘草 香白芷各式 熟地黄陸

右為鹿末水酒各半參前藥二錢至七分去滓 服不以時

龍麟散 治產後血暈煩悶不知人事或狂言亂語氣喘欲絕者

鯉魚皮 血餘各捌 黃蟲 水蛭 川山甲各肆

墨貳分 猪牙皂角貳分已上入餅子內泥固

蒲黃肆 麒麟竭 沒藥各貳 麝香壹分 琥珀貳分

右為細末以童子小便服一錢不以時產後纔竟惡心頭旋多涕唾身如在舡車中者速服之

蒜草膏 治婦人風癢遍身生癩疹痒搔之隨手腫起

莽草壹 當歸 芎藭 大戟 細辛

芫花 川椒 附子 蠆蠹花 景天

葫蘆根各壹 苦參半

右件細剉煉猪膏二斤入藥煎候附子黃色膏成去滓傾入甕合中盛塗於病處日三用之

當歸散 治婦人血分腹脇膨脹四肢浮腫肩背雍悶

當歸 京三稜 蟹甲 檳榔各壹 赤茯苓

赤芍藥 桑白皮各貳 川大黃貳 郁李仁壹兩 牽牛子壹兩 桂心 枳殼各半

右為鹿末每服四錢水一中盞生薑十片煎至六分去滓食前溫服

方十五

共七

葶本細辛散 治婦人因產血不足風邪客於皮膚以手搔之隨生癩疥方

葶本 細辛 芎 牡丹皮 人參

白朮 當歸 白芷 白茯苓 甘草

白芍藥

右等分為末溫酒調一錢服米飲亦得

椒紅元 治婦人血風氣臟腑虛冷全不思飲食臍腹多痛體瘦無力者

椒紅 沉香 附子 蓬莪茂 當歸

訶梨勒皮 白朮各壹 良薑 丁香

肉豆蔻各半 麝香壹分

右為細末水煮麵糊和元梧桐子大每服二十元食前
温酒下

温經湯治衝任經虛血氣不足小腹久冷崩中不止漏下

赤白或曾半產瘀血在腹內遶臍撮痛相引腰背咳唾涎
唇口乾燥五心煩熱奄忽眩冒寒熱倦怠月水過多及過
期不至不成妊一方无芍

吳茱萸兩 當歸兩 白芍藥兩 芎兩 人參兩

桂兩 牡丹皮兩 阿膠兩 甘草兩 麥門冬兩

半夏兩

右為鹿末每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去
滓食前温服

方十五

廿八

麥煎湯治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胃煩壅

當歸兩 大黃兩 常山兩 柴胡兩 赤茯苓兩

當歸兩 乾漆兩 白木兩 生地黄兩 石膏兩

甘草兩

右為細末以水二盞小麦五十粒同煎食後臨卧服有
虛汗加麻黄根一兩

海桐皮散治婦人血風走疰疼痛不定

海桐皮兩 牛膝兩 天南星兩 當歸兩 白附子兩

乾蝎兩 白殭蚕兩 川芎兩 沒藥兩 地龍兩

膩粉兩

右為細末糯米飯和元菘豆大温酒下元不以時

金花散治婦人產後血暈一切腹脇痛痰末以老少並皆
治之

薑黃兩 熟地黄兩 桂兩 牛膝兩

劉寄奴兩 虎杖兩 川芎兩 赤芍藥兩 蒲黃兩

乾葛兩

右為細末每服二錢如小可患酒水各半盞生薑煎至
七分和滓温服病急量量且淋酒調下

養陰膏治室女氣血相傳經脈不行躄黃面腫多脹減食

生地黄兩 當歸兩 赤芍藥兩 牛膝兩

烏藥兩 牡丹皮兩 茯苓兩 紅花兩 水蛭兩

重校定此方內茯苓紅花无分兩其太平聖惠方內
牡丹散与此方治療藥味相類紅花茯苓各用半兩

方十五

二九

右為細末煉蜜和元如彈子大每日空心好酒化下一
元忌醋及酸物等

阿膠散治妊娠胎動時有所下腹脇疼痛一方加白朮白茯苓

當歸兩 阿膠兩 芎兩 艾葉兩 赤石脂兩

龍骨兩 熟乾地黄兩 黃耆兩 甘草兩

乾薑兩

右為細末每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三個
煎至六分去滓非時稍熱服

地榆當歸散治妊娠因損動下血腹痛不止

當歸兩 阿膠兩 地榆兩 白芍藥兩 白龍骨兩

熟艾兩 乾薑兩 蒲黃兩 熟乾地黄兩

牛角腮 壹兩

重校定此方內熟地黃无分兩太平至惠方富婦散与此方治療一同藥味相類內熟地黃壹兩

右為細末每服二錢非時以粥飲調下

人參元 治產後大虛心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜不得眠虛煩少氣

人參 甘草 茯苓 各壹兩 麥門冬 苧蒲

澤瀉 薯蕷 乾薑 各壹兩 桂 壹兩 大棗 伍拾枚

右為細末以蜜漿膏和元如梧桐子大未食酒服二十元日三夜一不效稍增更加速志二兩為善若風氣當婦獨活三兩亦治男子虛損心悸

茯苓煎 治妊娠阻病心中煩悶頭眩重憎聞食氣嘔逆吐

方十五 悶顛倒四肢垂弱不自勝持

茯苓 人參 桂 乾薑 半夏

橘皮 各壹兩 葛根 白木 枳殼 甘草 各半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元米飲下不以時候

阿膠白木散 滋養胎氣調順榮衛

白木 壹兩 白茯苓 白芍藥 當歸 熟地黃

人參 白芷 阿膠 芎 各壹兩 甘草 分叁

右為細末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不以時

寄生散 治妊娠胎動不安腹內疼痛下血不止

桑寄生 續斷 芎 各壹兩 龍骨 分叁 當歸

伏龍肝 阿膠 各壹兩 乾薑 甘草 各壹兩

右為細末每服三錢水一盞入生薑三片棗一枚煎至六分去滓空心食前溫服

黃耆散 療婦人懷胎數落而不結實或寒冷熱百病之原

黃耆 吳茱萸 乾薑 人參 甘草

芎 白木 當歸 熟地黃 各貳兩

右為細末清酒服一匕半日再服加至兩匕為劑忌海藻菘菜燕蕪桃李雀肉等

赤芍藥 治血虛腹脇疔痛

赤芍藥 艾葉 附子 乾薑 各半兩 陳皮

當歸 各壹兩 芎 分叁 甘草 吳茱萸 各叁分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元溫酒或醋湯下

艾葉元 治血虛腹脇疔痛

艾葉 赤芍藥 乾薑 附子 各半兩 陳皮

當歸 各壹兩 芎 分叁 吳茱萸 甘草 各壹分

右為細末煉蜜為元如梧桐子大每服三十元酒或醋湯下

桑葉散 治婦人風冷傷於衝任之脈經絡虛損致成白帶下

桑葉 烏賊魚骨 白石脂 鮑魚甲

白芍藥 各壹兩 乾薑 吳茱萸 當歸 各叁分

禹餘糧 各兩 燒醋

右為細末每於食前以粥飲調下二錢

馬蘭湯治婦人風瘙癢疹身痒不止宜用此淋蘸

馬蘭 蒺藜根 芫蔚子 白礬 白蔞梨

茵芋 羊桃根 寶花各二兩 蓖麻葉壹兩

右為細末以水二斗煮一斗去滓於避風處洗之

生魚膠散治帶下四貴方一曰熱病下血二曰寒熱下血

三曰經脈未斷舉重停住下血四曰產後臟開經利不
斷四貴之病外實內虛治之

牛角腮伍鹿茸 當歸 禹餘糧 阿膠

乾薑 續斷各壹兩 烏賊魚骨半兩 赤小豆壹

右為細末用酒調一二錢不以時

方十五 卅二

交加元治婦人諸血妄行滋益榮衛補益衝姓

生地黄壹斤研爛取汁 生薑壹斤同

已上將生地黄汁炒生薑滓生薑汁炒地黄滓令

乾入藥如後

白芍藥 人參 當歸 麥門冬 琥珀

阿膠 蒲黃各壹兩

右並為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元空心

米飲下每服藥後以故舊紗帛一片包龍腦薄荷二兩

以鼻聞其氣一方用白木石斛各一兩無蒲黃用麥門

冬治虛勞百疾

馬子得道人傳南岳魏夫人延壽內固丹用冬月大蘿蔔

作合子一箇令厚一指以上又深酌度盛藥或食之無大
者只用朱砂三分之一

辰砂半兩 黑附子生 白木各壹兩 沒藥半兩

木香壹兩 胡蘆巴壹兩 硃砂半兩

人參壹兩

右硃砂沒藥朱砂細研餘藥別搗細為末同羅研勻入

蘿蔔合內先用赤石脂水調固合子縫外用六一泥六

分膠泥一分紙筋固濟令厚一指已上泥坐在磚上日

氣中令五分乾用炭三斤煨合子上仍留一小竅子以

竹片子試答候蘿蔔熟為度候合子中氣出及泥乾

蘿蔔熟抽火半炊飯許時再添一二斤火專守火候不

方十五 卅三

得令蘿蔔焦即恐藥敗以泥稍黃孰是候放令藥氣透

敲開泥切開蘿蔔取出丹自軟結而香急元如豌豆大

用鹽湯溫酒下三元或二元若以酒化下尤佳漸加至

五元止治百病返老還童治男子脾腎氣衰有積及腰

背冷面黃癱瘓中風婦人虛冷帶下蘿蔔須要有脉帶

五分濕下火此藥甚奇

牡丹皮散治血風攻症頭目疼痛遍身煩疼口苦舌乾多

困少力或發寒熱狀似傷寒

牡丹 赤芍藥 甘菊 防風各 芎

半夏 羌活壹兩 甘草壹兩

重校定此方每伴無分兩此方王氏博濟方亦載
之內牡丹赤芍藥甘菊各壹兩芎半夏各壹錢半

右為細末每服二錢入生薑二片薄荷三葉水一盞同煎至六分去滓臨臥執服

吳茱萸湯治婦人先有寒冷胃滿或心腹刺痛或嘔吐食少或腫或寒或下痢氣息懸憊欲產後益劇此主之

吳茱萸兩 防風 桔梗 乾薑 甘草

細辛 當歸各拾 乾地黄拾

右為鹿末每服二錢水一盞煎至七分去滓放稍熱服空心食前

黑神散治產後諸疾

黑豆兩 白芍藥 熟地黄 當歸 甘草

乾薑 蒲黃 桂兩

右為細末每服二錢食前溫酒調下童子小便尤佳

白芷元治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目脫色腹中疼痛

白芷兩 乾地黄兩 續斷 乾薑 當歸

阿膠各 附子 蒲黃各

右為細末煉蜜和元如梧桐子大酒下二十元日四五服食前

崩漏

崩漏白芷元治婦人三十六疾胞中病漏下不絕

邯鄲白堊兩 牡蠣 烏賊魚骨各拾

禹餘糧 白芷 白石脂 乾薑

龍骨 桂心 瞿麥 大黃 石葦

白斂 細辛 白芍藥 甘草 黃連

附子 當歸 茯苓 鐘乳 蜀椒

黃芩各半

右二十三味為細末煉蜜為元如梧桐子大空心酒服五元日再服不知加至十元

續斷地榆煎治崩漏

續斷 甘草 地榆 鹿茸 丹參

小薊根各拾 乾地黄壹兩 龜甲兩

芎藭 阿膠 石脂 當歸各壹 柏子人兩

秦牛角兩

右十四味為細末煉蜜和元如桐子大空心溫酒下十元日再稍加至三十元

栢菜散治婦人崩中漏下不問年月遠近

栢菜 生地黃 續斷 驚甲 當歸

芎藭各 牡蠣 赤石脂 阿膠 艾葉

鹿茸 地榆各壹 禹餘糧兩

右搗羅為細末每於食前以粥飲調下二錢

小薊湯療婦人崩中無問遠近悉主之

伏龍肝壹斤 地榆 艾葉各壹 阿膠 當歸

續斷 厚朴各貳 生薑伍 小薊根兩

赤石脂

右十味以伏龍肝水煮取三升絞去滓分三服

補真丹 治血臟虛冷崩中漏下或月事頻多面色萎黃四肢少力脘腹痞刺腰膝痠痛

禹餘糧

牡礪

芎各壹兩

烏金石各肆兩

艾各壹兩

吳茱萸

乾薑各半兩

赤石脂

防風

右為細末醋煮麵糊為元如梧子大空心酒或醋服二三十元

當歸湯 治婦人忽暴崩中出血不斷或如鵝鴨肝者

小薊根陸兩

當歸

阿膠

續斷

青竹茹

芎各壹兩

生地黄別兩用熟者

地榆

釜下焦土各肆兩

馬通壹升以水調取汁

右為鹿末每服四錢水八分馬通汁三分同煎至五分瀝去滓空心溫服用大盞頻服三四劑未愈止服前續斷地榆煎

白茅根散 治婦人崩中不止遠脘撮痛或時煩渴

伏龍肝

禹餘糧

白芍藥

熟地黄

地榆

白茅根各肆兩

龍骨

當歸各陸兩

甘草

麒麟竭

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分不以時服

小龜甲散 治婦人久虛赤白帶下腰腿疼痛面色萎黃四肢少力

龜甲壹兩半

桑耳

桑寄生

烏賊魚骨

當歸

栢葉各壹兩

白芍藥各壹兩

禹餘糧壹兩

吳茱萸半兩

芎各壹兩

右搗羅為細末每於食前以溫酒調下二錢

烏龍散 治婦人崩漏帶下赤白久不止或經脈不斷或暴下血不止

烏賊骨

椴皮

牛角腮

菩薩退

綿各肆兩

礬各兩

乾薑壹兩

右並入瓶中泥固濟候乾入火煨赤放冷研細入麝香一錢同研細每服二錢空心服

桑耳散 治婦人崩中下血不止漸加虛困黃瘦

麝香壹兩

晚蚕沙壹兩

椴皮各兩

桑耳半兩

右件同研為散非時以熱酒調二錢

蚕紙灰 治婦人崩中漏下

茶籠內茗葉燒灰各兩

右件細研每於食前溫酒下二錢

立効散 治崩漏下血不止

右取風化石灰一升以醎醋三升慢火煮令醋尽更炒今乾細研每服一錢以椴皮末一錢用溫酒一盞同調勻空心服之藥後復更進酒一盞以助藥力

雞峯普濟方卷第十五

雞峯普濟方卷第十六 馮翊賈兼重校定

婦人

半夏元 治婦人阻病心中憤悶惡聞食臭食則嘔逆急墮少力頭眩嗜臥

藿香葉 白薇 白朮 人參各壹兩 半夏壹兩

乾薑 甘草各壹分 丁香壹錢

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元以沸湯煮三五沸用人參湯下不以時

前胡細辛散 治妊娠阻病心中憤悶嘔煩吐逆惡聞食氣

前胡 細辛 茯苓 厚朴

方十六

芎 人參 半夏 甘草各貳兩

右為鹿末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分食後服去滓

膠艾湯 治妊娠下血腹中痛名為漏胞

阿膠 芎藭 甘草各貳兩 艾葉

當歸 芍藥 生乾地黄 乾薑各參兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服不以時地一黃

油煎散 治血風

牡丹 五加皮 當歸 海桐皮

白芍藥各壹兩 川烏頭各參兩 芎 桂各壹分

右為鹿末每服一錢水一盞入油錢一文煎至七分去滓溫服不以時

丹砂元 治婦人月水不通肢節煩疼寒熱往來腹脇結塊攻刺疼痛日漸羸瘦欲變成勞

丹砂兩肆 水銀 硫黃各壹錢貳味 雄黃

硃砂兩肆 膩粉各壹字 巴豆叁个 班猫壹拾个

右件一處再同研令細以狗膽汁和作四十九元每服二元空心臨臥黃丹少許以酒半盞調勻燒秤錘烙黃丹酒微焦黑色放溫下或產後血露不快兒枕不安腹內疼痛皆可服

牡蠣湯 治婦人漏下五色不止淋瀝連年黃瘦羸瘵

方十六

烏賊魚骨 牡蠣 桂心各壹兩 乾薑

黃耆 白芷各叁分 五色龍骨 熟乾地黄各壹兩半

右為細末每服二錢食前溫酒調下

郁李仁散 治血分氣血壅滯腹脇脹悶四肢浮腫坐臥氣促

郁李仁 牽牛子各壹兩 檳榔 乾地黄各叁分

桂 木香 青橘皮 延胡索各半兩

右為細末食前溫酒調下二錢

熟乾地黄元 醫經云手少陰心之經手太陽小腸之經主

上為乳汁下為月水凡諸吐血下血者通謂之脫血此由將溫過度或起居失節喜怒不常血乃妄行血既不足故

月候為之縮日

熟地黃壹兩半

白芍藥

人參

當歸

芎藭各壹兩

阿膠兩

犀角屑壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元食前米

飲下

乾漆散治血氣滯澁逆酸水心腹痛不可忍著

乾漆壹兩

五靈脂各兩

沒藥

桂心

當歸各半兩

胡椒壹分

麝香壹錢

右為細末每服一錢以熱酒調下醋湯亦可空心食前

凌霄花元治婦人室女經脈不通五心煩熱四肢疼痛宜服之

方十六

凌霄花

芫青去翅足微炒

蚩虫同上

水蛭微炒各壹分

桃仁

大黃

沒藥各半兩

右為細末以狗膽三个法酒一盞先將沒藥末同熬成

膏和前藥元如菉豆大每服七元前後方紅藍花散下

不以時

紅藍花散治經脈不通小便赤色

紅藍花

牡丹皮各壹兩

當歸兩

木通壹兩

苳根兩

甘草壹分

右為鹿末每服三錢水一盞入葱白一寸同煎至六分

空心食前去滓放温下前方凌霄花元日進二服

內補元治婦人衝姓氣虛經候不調赤白帶下

五加皮

白朮

牛膝各兩

葶藶兩

川烏頭

丹參

枳殼各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心米

飲下

沒藥元治產後惡露行而或斷絕驟作寒熱臍腹百脉皆

痛及兒枕痛兼嘔逆狀如錐刺非常此由冷熱不調或思

慮動作氣所擁遏畜血經絡一方加芍藥半兩桃仁壹分

當歸兩

沒藥

延胡索各壹分

五靈脂兩

薑黃

桂

蓬莪莖各半兩

右為細末醋煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元至

三十元温醋湯下食前服

方十六

代赭元廣濟療婦人產後血露不絕崩血不可禁止腹中

絞痛氣息急療摩病三十六疾馬蹄當用白馬蹄甲牛角

亂髮灰

阿膠各兩

代赭

乾薑各壹兩

馬蹄各壹個

乾地黃兩

牛角各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧子大每服空心服二十元日

二至四十元用醋湯下

膠艾湯治勞傷血氣衝姓虛損月水過多淋瀝漏下連日

不斷臍腹疼痛及妊娠將攝失宜胎動不安腹痛下墜或

勞傷經絡胞阻漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶心奔衝

短氣及因產乳衝姓氣虛不能約制經血淋瀝不斷延引

日月漸成羸瘦

阿膠 甘草 芍藥 艾葉

當歸 芍藥 熟地黄

右為鹿末每服三錢水一盞二分酒三分煎至八分去

滓空心溫服重校定膠艾湯重出此一方然用熟地黄比前方微不同故兩存之

人參元 養陰生血補虛

鹿角膠 熟地黄 白芍藥 當歸

白朮 人參 芍藥

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心米

飲下

滑石散 治難產多時不下垂困

瞿麥 滑石 黑豆黃 牛乳

方十六 酥各貳兩 冬葵子壹合 蜜壹合

右為末與酥乳等前成膏熱酒調一匙不以時

七補元 治婦人血氣虛弱衝姓不和腹中堅結狀若懷妊

月候尚來未分喜脉宜服此

白芍藥 川芎 白芷 白朮

熟地黄 阿膠 當歸

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心米

飲下

大黃元 主帶下百病除无子服藥十四日下血二十四日

下長蟲及青黃汁出三十日病除五十日肥白

大黃 柴胡 朴硝 芎藭

乾姜 蜀椒 茯苓

右為細末煉蜜和元如梧桐子大先食服七元米飲下

加至十元以効為度五日微下

蘇木飲子 治產後血運迷悶面色青黑或惡物衝心痛不

可忍時發寒熱嘔逆不思飲食

蘇木 當歸 赤芍藥 桂

陳皮 香附子 甘草

右為鹿末每服二錢水小便各半盞煎至六分去滓溫

服不以時

地黃散元 治婦人產前後眼見黑花或即發狂如見鬼狀

胎衣不下失音不語心腹脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱

往來口内生瘡咽中腫痛心忪悸夜不得睡產後中風角

弓返張面赤牙開緊急崩中下血如豚肝狀身熱煩躁恍

惚昏迷四肢腫滿及胎不安唇口指甲青下血臍腹滿痛

生地黄 生薑

以生薑汁炒地黄滓以地黄汁炒生薑滓至乾

蒲黃 當歸 延胡索

南番琥珀

右為細末煉蜜和元如彈子大當歸湯下一元食前日

二服

平安丹 催產

金箔 銀箔 朱砂 乳香

麝香壹錢 臘月兔腦

右為細末研勻兔腦和元如豌豆大仍先擇吉日望月合之每遇難產之人以乳香下一粒則無諸般苦痛便得分免若男左握藥而出女則右手持丹而下夫神妙

內補養氣湯治產後虛羸及崩傷過多虛竭腹中絞痛並宜服之

芎藭 乾地黄各肆兩 白芍藥伍兩

桂 甘草 乾薑各壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞棗一個煎至六分去滓溫服不以時日三若有寒若微下加附子三兩及治婦人虛羸少氣傷絕腹中拘急疼痛崩傷虛竭面目無色及

方十六 七

唾血甚良

麻子仁元治產後大便秘

麻子壹兩 杏仁貳分 枳實 厚朴各半兩

大黃貳兩 白芍藥半兩

右為細末煉蜜和杵千下元如梧桐子大每服二十元溫水下未効加至五十元

承澤元治婦人三十六疾不孕絕產

梅核仁 辛荑仁各壹升 葛上亭長壹升 澤蘭子伍分 搜疏 葦葉本各壹兩

右為細末煉蜜和元如黑豆大先食服二元日三不効稍增若腹中無堅積聚者去亭長加通草一兩味甘者

和藥先以苦酒溲散乃內蜜也酒服

榆白皮散治婦人產時驚動太早使胞絡乾燥臨時艱難

榆白皮 瞿麥 葵子根壹斤 牛膝

大麻仁各壹分 木通半兩

重校定此方內二味七分一其太平聖惠方內葵子散治療藥味與上件方相類內榆白皮葵麥各用壹兩

右為鹿末每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服不以時

陽起石元治婦人血海久積虛冷不能成妊及婦人虛冷等疾

陽起石貳兩 乾薑 白朮

牛膝各壹分 熟乾地黄 吳茱萸各壹兩

方十六

右為細末煉蜜和杵二百下元如梧桐子大每服三十元溫酒下空心及晚食前服之

豬腎湯廣濟瘡產後虛羸喘之或乍熱狀如瘡名為勞損者

豬腎壹具 香豉 白粳米各壹兩

葱白切壹升 人參 當歸各壹兩

右六味切以水一斗煮取三升去滓分服七合以意消息忌大肉濕麵蒜等

白朮散和養胎氣

白朮 人參 旋覆花 熟地黄

當歸 阿膠各壹兩

右為鹿末每服二錢水二盞酒三分同於銀器中熬至一盞去滓七分空心溫服一日一服至六個月覺胎氣榮安即罷服若覺腰中痛即是藥養胎氣未勝邪氣每服加吳茱萸四七粒同煎

何膠散 治妊娠勞役過度喜怒不常服飲失時冒觸風冷遂至胎動不安腰腹俱痛胞漏下血疲極眩暈

阿膠 人參 白茯苓 桑寄生

白木各壹兩 右為鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓不以時服

阿膠元催產

真阿膠肆片 地脫皮壹條 熟艾兩半 敗筆壹管

右一處研為末以軟粳米飯為元雞頭大元時粘手以少許麵為元雞產三日至五日服此立下如產時衣先下兒未見足踏衣生用通靈散子一字醋湯調下

葵子散 治難產胎不轉動者宜速服

冬葵子壹兩 甘草兩 榆白肆兩 桂陸兩 滑石兩

小品茯苓元 治妊娠惡濕嘔吐顛倒垂死不自勝持

白茯苓 人參各壹兩 桂 甘草 枳實各壹兩 右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元米飲下

不以時

烏魚骨散 治漏下不止

烏魚骨 鹿茸 阿膠各壹兩 當歸兩 蒲黃兩

滑胎散 治痛極難產

榆白皮兩 瞿麥 木通各壹分 牛膝

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不以時

當歸散 溫補

附子 桂 當歸各半兩 白木壹兩 甘草壹分

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓空心服

阿膠芫莢散 治妊娠傷動腹痛下血

阿膠 熟乾地黃 當歸 芫莢各半兩

木香白朮散 安和氣滋養衝任進飲食去百病

白木兩 茯苓兩 人參兩 木香壹分 甘草貳分

桃仁散 治血氣不調臍腹撮痛及產後小腹痛

桃仁 當歸 乾薑 白芷 芎各壹兩 右為細末每服二錢水七分酒三分煎至六分去滓溫

服无時

丁香當歸元 治婦人血氣十生九死腹中作塊不問新久皆治

當歸 母丁香 牡丹皮 紅花生並 肉桂
右件等分爲細末水煮麵糊和元如梧桐子每服二十元空心温酒下不過十服立効

栢葉鹿茸元 治衝任氣虛臍腹痛漏下赤白

栢葉兩 當歸 乾薑各叁分 阿膠半兩 鹿茸壹兩
右爲細末酒煮麵糊和元如梧桐子大每服三十元空心米飲下

竹瀝湯 治妊娠煩悶謂之子煩

方十六 防風 麥門冬各叁兩 茯苓肆兩 黃芩叁兩
右爲鹿末每服五錢水二盞入竹瀝一合煎一盞去滓温服不以時

貝齒膏 治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如豆汁或如膠飴每發欲死食不生肌面目痿黃師所不能治方

貝齒肆个燒 葵子壹升 石膏伍兩 滑石叁兩
右先以水七升煮二物取二升去滓內二石末及猪脂一合更煎分三服服之

四物湯 治妊娠至產前腹痛不可堪忍及治月事或多或少或前或後疼痛等疾

當歸 芍 熟乾地黄 雪白芍藥各等分

右爲鹿末每服四錢水一盞半煎至八九分極清汁帶熱服日三夜二以効爲度若姓孕下血即入艾五七葉阿膠末一錢匕同煎服如上法以効爲度疾勢甚大散藥不効又四味各半兩細坐以水四盞煎至二盞半去滓分四服熱服食前服一日之中令盡以効爲度

羊肉湯 治虛人及產婦腹中痛虛眩不支持兩脅當臍急痛氣上衝前後相引痛治之如神

羊肉肆兩 當歸 芍 生薑各半兩
右以水十盞煎至三盞掠上沫去滓分四服熱服空心服一日盡來日再將前藥滓合爲一日煎之當一劑服入酒煎尤佳

方十六 **當歸建中湯** 治產後虛羸不足腹中疴痛不止吸吸少氣拘急痛引腰背不能飲食產後一月日得服四五劑爲差令人氣壯

當歸 桂各肆兩 白芍藥陸兩 甘草貳兩
右爲鹿末每服四錢水一盞半入生薑五片棗一箇擘破同煎取一半瀝去滓入錫少許再煎錫溶微熱服空心或食前服

大川芎湯 治產後塊不散或亡血過多或惡露不下服之如神重校定大川芎湯即疑重出

熟乾地黄 大芍 白芍藥 當歸等分

右為鹿末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓取六分
清汁溫服空腹日午晚食前病去為度產前腹痛下血
入艾五七葉炒阿膠末一錢依前煎帶熱服崩中下血
亦如此服此神藥也居家不可闕

論曰婦人新產去血過多津液燥少陰陽俱虛大凡有疾
如中風傷寒時氣之類雖當發汗之麻黃慎無用之取汗
無令過多以意酌量又產後諸疾忌脉大若產後昏迷由
本來氣弱因去血過多氣無所主精神不足陰陽雜亂謂
之血運急以炭火投醋中薰鼻及以半夏末少許吹鼻中
即省

當歸散產後氣血俱虛慎無大補恐增客熱別致他病常

今惠露快利為佳

當歸 白芍藥 黃芩各壹兩 白朮兩 川芎壹兩

右為細末溫童子小便或酒調二錢不以時

芥子湯治產後腸頭如以針刺連穀道又如痔痛小便如

淋狀或時寒熱此產時用力併腸間亦由陰虛陽邪客乘
蓋母氣攻衝謂之腸癰校定芥子湯用芥子當用冬瓜仁去殼用

黃荻仁兩 桃仁 牡丹皮各壹兩 瓜子壹兩

右為細末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服非時

烏金散治產後一切病

雄黑豆半斤 生薑和皮肆兩 黃連壹兩 椶櫚皮陸兩

右先將黑豆於鐺內炒熟次便入生薑黃連同炒煙出

却將椶櫚點火入鐺燒之焰欲絕和鐺復地土用盆合

之出火毒一宿來日取出為末更入當歸蓬莪末各

一兩白麵一兩同研勻均器內密封產後諸疾熱酒調

下如是兩日以前用煎過童子小便調下病甚者頻服

產後但非常寒瘧痢外傷之疾悉能療之如血上衝心

不可療之以藥五錢并產人穢血一茶脚許小便一盞

熱調灌之立可以救此方有論行於世者一十道而人

少得往往撰別方代之凡產後雖有敗血其人極虛羸

不能醫者多用金石藥如花石之類至不可者

順元散入五積散一半催生甚奇

烏頭兩 附子壹兩 木香兩 天南星壹兩

右為細末生薑冷水酒共一盞煎三錢至七分溫服不

以時

乾薑人參元治產後諸疾

甘草兩 當歸 乾薑 人參各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心溫

酒下日三服

內補當歸湯治久虛不足腹中疝痛小腹拘急吸短氣

腰背引痛脅助牽疼皮膚枯槁肌肉消瘦婦人去血過多

崩傷內竭面目脫色唇口乾燥產後服之令人丁壯散風

冷寒邪養衛氣和血止痛溫中補虛絕續

當歸兩 甘草兩 白芍藥兩 桂兩

右為鹿末每服五錢水二盞薑十片棗二枚擘破飴糖一匙煎一盞空心服

四神散 治血氣心腹痛

當歸 白芍藥 芎 乾薑

右為細末每服三錢煖湯調下不以時

大黃散 治婦人血瘀產後血暈及諸傷衄內損等

羊脛炭 巴豆肉 大黃 半兩錢

右和研勻每服半錢當歸一分小便前濃稍溫調服產後血暈百疾且當逐血者至甚乃服口噤閉者斡開灌

下 方十六 十五

芎椒白朮散 安養胎氣

白朮 芎 椒 牡蠣

右為細末空心酒調下二錢

半夏厚朴湯 治婦人胃滿心下堅硬咽中貼貼如有炙肉嚮吐之不出咽之不下

半夏 茯苓 厚朴 紫蘇葉

右為細末每服二錢水一盞薑棗煎至七分去滓溫服不以時

附子當歸元 治血臟虛冷

當歸 芍藥 附子 白朮

右為細末每服二錢水一盞薑棗煎至七分去滓溫服不以時

團參阿膠煎 治妊娠肺氣不足寒壅相交痰唾稠粘咳嗽不已

人參 阿膠 五味子 紫苑

右為細末煉蜜和元如櫻桃大食後含一元嚙津服

紫葳散 治婦人室女月候不通臍腹疼痛一切血疾

紫葳 當歸 芩

右為細末空心冷酒調下二錢如行十里許更用熱酒調一服

烏藥元 治妊娠傷寒內熱煩燥胎動不安致喘躁不能臥及有所下

烏藥 白朮 乳香

右同研勻每服二錢糖水調下不以時候

透泉散 下妳

豬懸蹄甲 穿山甲 漏蘆

右將豬懸蹄甲穿山甲炒焦色同漏蘆一處為末食後以溫酒調下二錢神妙

木鱉字湯 下妳

青橘皮 瓜蒌根 木鱉

右為細末每服二錢水一盞煎至六分去滓臨臥溫服

牡蠣散 治小便白濁丈夫婦人小兒並用

牡蠣

厚朴去皮 薑製

牡蠣

白木各半 兩

右為細末空心米飲調二錢日進二三服

艾煎元治衝妊久虛血海冷憊臍腹疼痛月候不勻四肢

息墮百節酸疼飲食進退下臟虛鳴及妊娠不牢赤白帶

下面色萎黃口淡無味胃膈滿悶常服此補血臟解勞倦

止疼痛消脹滿厚肌肉

艾青伍 兩

乾薑貳 兩

附子壹 兩

右為細末醋煮麵糊和元如梧桐子大每服空心醋湯

下二十元

秦朮散治婦人臟腑不調

秦朮

阿膠

艾葉

方十六

十七

右等分為鹿末每服五錢水二盞糯米百粒煎至一盞

去滓溫服空心

榆白皮散治妊娠忽暴下血及胎燥不動搖

榆白皮兩

當歸兩

熟地黃兩

右為鹿末每服五錢水一盞生薑三片煎至六分去滓

溫服不以時

大黃沒藥煎治婦人產後惡物不化時發寒熱躁煩悶亂

狂語發渴面赤

沒藥研 兩

大黃各壹 兩

當歸貳 兩

右為細末用米醋二升入煎藥末調勻於銀器中慢火

熬成稠錫相似攤冷刮入瓷合盛不得濕器打着每服

一彈子許童子小便一盞化開同煎至七分入醋半杓

子重煎至七沸溫服未止半日後再進

茯苓湯治妊娠小便不通時發寒熱

赤茯苓

葵子

右件等分為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫

服不以時

地黃散治婦人血少氣寒面色青白

地黃

乾薑各壹 兩

右為細末每服二錢溫酒調下不以時

錫粉元治妊娠胎死腹中候其母面色赤舌青者是

錫粉

水銀各壹 錢

方十六

十八

右同研不見水銀為度棗兩和元如豌豆大每服五十

元瞿麥湯下

滋陰養血元治勞虛血弱肌肉枯燥手足多煩肢節酸疼

鬚髮脫落面少顏色腹中拘急痛引腰背去血過多崩傷

內竭胃中短氣晝夜不得眠情思不樂怔忡多汗

熟地黃

當歸各壹 兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元米飲下

不以時

芎藭湯調益榮衛滋養血氣治諸疾失血虛羸短氣腹中

疼痛面赤少色心忪驚悸虛煩汗出時發寒熱倦怠無力

妊娠溫和胞絡助氣產後順行餘穢滋生新血

芎

當歸 等分

右為鹿末每服三錢水一盞半入酒少許煎至七分去滓食前溫服

大豆黃湯 治產後百病及中風痲痺或背強口禁或但煩熱苦渴或頭痛背重或身痒者嘔逆直視此皆因虛風冷濕及勞傷所為

大豆 升

清酒 壹

右二味以鐵鑊猛火熬豆令極熱焦煙出以酒沃之去滓服一升日夜數過服之盡更合小汗則愈一以去風一則消血結妊娠傷折胎死在腹中三日服此酒即差一方用獨活一斤酒一斗三升先漬獨活兩宿依前熬

方十六

十九

大豆以獨活酒沃之服如前

薑黃丸 崔氏療妊娠漏胞

乾薑黃 肆兩

乾薑 貳

右為末酒服方寸匕日再服空心食前

乾薑丸 治崩中漏下青黃赤白

乾薑

細墨

右等分為細末醋糊和元如梧桐子大每服三十元溫酒空心下

湧泉散 下妳

防風 兩

葱白 貳拾

右用無灰酒一升同煎至八分時時服一日盡之

備急散 治婦人衝姓血氣不實虛弱心忪頭眩臍腹疼痛血海虛冷漏下赤白及月水不定等疾

百草霜 貳

荆芥穗 錢

右為細末每服二錢溫酒調下須臾更一服立効食前

當歸

五苓脂

右等分為細末每服一二錢以酒童子小便各半盞調服不以時

車前子散 治妊娠患淋瀝水道熱不通

車前子

葵根

右等分為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

不以時

方十六

廿

豆淋酒 治產後諸風

羌活 兩

黑豆 半升

右以酒一升先煮羌活五六沸去羌活乘熱沃在所炒

豆上煎三五沸傾入磁器中以紙蓋却去豆溫飲半盞

風勢大者隨證下諸風藥尤佳如口噤驛曳服阿膠元此小風則服龍砂丹

堅中丹 治室女白沃

半夏

猪苓 各壹兩去皮別為末

右同炒半夏黃色却將猪苓末蓋半夏地上以盞合定經宿去苓只取半夏末之以水糊為元如梧桐子大米

飲下十元不以時

白木茯苓散 治妊娠大小腿腫及有黃水小便或澀

白木

白茯苓 各壹兩

右為細末每服一二錢煎陳皮湯調下不以時

神驗膏 治難產

臘月猪脂 半斤

葱白 貳柒莖 剉碎

右相和煎成膏不以時熱酒調一匙

葱白阿膠散 治婦人裏急不已

阿膠

葱白 同對 等分

右以水煎溫服立効不以時

治吹妳法 產後吹妳最宜急治妳下結膿透至死者連与

方十六

廿

皂角散 治妳下結膿 以天南星散急以手揉之則散

皂角 燒 灰

蛤粉

右等分研細熱酒調一字或半錢急以手揉之

苳蓐散 治產後骨節肌膚熱痛亦可服

苳蓐末 壹兩

乳香 壹錢

右研勻溫酒調二錢不以時服

天南星散 治產後頭痛面腫亦可用

天南星末

右用溫酒調以翎塗之

大聖散 治崩中不止諸藥不能治者

烏賊魚骨

右為細末每服二錢如下所物黑色用胡薑酒下紅色

煎木賊湯調下

大豆煎 男女新久腫及惡暴風入腹婦人新產上瀉清風

入臍腹中如馬鞭者噓吸短氣咳嗽

大豆 壹升 揀 令淨

右以水五斗煮之得一斗三升澄清去下濁者內釜中

以一斗半美酒內汁中煎取九升宿勿食且服三升溫

覆取汗兩食頃再下去風氣腫減真冷十日平復如故

產後牙關緊急手足瘳癡項強目直視此由血虛風邪入

中謂風痙脈緊大者不治宜荆芥獨活湯

方十六

廿二

荆芥湯

荆芥 濃煎絞 汁半升

右頃服將荆芥濃煎湯置盆內坐病人在上薰之及淋

獨活湯

鬼眼紫獨活 乃是極大者 卷活有如鬼眼將尋 常白色者乃是宿前胡慎不可用

右不以多少為末先以黑豆炒焦似欲燃出之以酒一

盞沃之更用水一盞煎藥五分至一盞去滓溫服

蒲黃散 治產後腹中有塊上下時動痛發不可忍此由妊

娠聚血產後氣羸惡露未盡新血與故血相搏而痛俗謂

之枕乃血痂也

真蒲黃 不以 多少

右研米飲服二錢渴燥者新水調下

免血散治難產逆生論稱犯一切神殺固有是理然亦有自然難產兒自逆生者及有產時腸胃俱下者產已則復如故此非疾病所致氣血所生天下之理蓋有不可窮詰者亦宜知之

臍月兔血 用鈺餅切片子蘸紙袋盛當風陰乾

右為細末每服二錢煎乳香湯下

治產後腹痛不可忍

右者黍粘根為飲一服即愈

樗根白皮散治婦人久痢及疴痢諸方不老者此方必效

棟樗根白皮 不以多少當取時不得見日及風

方十六 二十三

右細切搗如泥取細捻作餛飩如小棗勿令破熟煮吞七箇重者不過七八服此藥空心服之忌油膩熱麵

獨聖散治婦人血崩不止累經神效

防風 去蘆不以多少火上炙焦黃色

右為細末酒煮麵糊清調下空心食前日二服

常器之大龍丹治產後血刺血暈血迷敗血上衝不省人事兒枕痛小腹硬痛一切疼痛不可忍

百草霜 不以多少羅過更研極細

右為細末用頭醋作麵糊為元如彈子大朱砂為衣每服一粒火燒焰出入醋內蘸過再燒再蘸用半盞候醋盡細研以酒半盞童子小便半盞調下初一服減腹內疼

痛二服敗血自下神舒和暢三服永破諸疾

治婦人有娠大便秘等方

治婦人有娠大小便不通

右細研入麝香少許酒調一錢不以時

治母欲死子不生者宜服

水銀一彈子大

右以一味幹開口灌之扶起令下

又方

取桃仁分書一片作可字一片作出字依前却合作

一匙令母吞之即下

右法天真神驗不可述

方十六

厚朴湯治婦人汗血下焦勞冷膀胱腎氣損弱自汗小便俱出

右以厚朴如手大長四寸以酒五升煮兩沸去滓取桂一尺末之內酒中調和一宿且頓服之

治胎不安等方

治胎動不安腰痛胎動轉搶心下血不止 芎藭根汁

右一服半升許如下血不止取芎藭三兩酒五升煎至

二升去滓分三服

治妊娠日月未足而欲產者或子母已至於死者

芎藭根汁

右取汁半升灌喉中

治產後中風語澁四肢拘急

羌活 去蘆

右為細末每服三錢水酒各半蒸煎至六分去滓溫服不以時

治婦人血氣奔刺心痛不可忍積年冷氣瘕癖癥塊脹痛

氣壅上衝煩悶霍亂吐瀉心腹疔痛

高良薑不以多少油炒勿焦

右為末每服一錢溫酒調

治產後血脹悶

右以益母草取汁每服一二合不以時

治婦人勒乳痛

方十六

廿五

右以益母草為末水調塗乳上

治吹妳結核

校定治吹妳結疑是黃括樓不聞有玄樓

右以玄樓一枚用穰去子皮綿裹酒煎數沸服之便散

治難產

右以光明生朱砂細研滴水為元如豆大每服二粒立下

奪命散治產後血迷血暈胎衣不下惡血停凝兒塊枕痛

臍腹疔痛及赤白崩帶月候不定等疾

芫花 不以多少用好酒浸壹宿慢火炒令黑色

右為細末每服二錢熱酒調下食前

桑根煎治婦人傷中崩中絕陰使人怠墮不能動作腎脇

心腹四肢滿而身寒熱甚溺血校定此方藥米本粟米每服叁元當作壹元宜酒煎服

右以桑根白皮細切一斗麻子仁三升淳清酒三斗煮

得一斗絞去滓大棗百个去皮核飴五升阿膠五兩白

蜜三升復煎得九升下乾薑末厚朴闊二寸來蜀椒末

三味各一升桂長一尺二寸甘草八兩葉米末一升乾

地黃四兩芍藥六兩玄參五兩元如彈子大每服三元

四聖印法禁吹妳

髑面東迎日着脚丁字不成八字不正閉氣存想心畫

此印吹在物食之上徐徐氣出盡為度與患妳人食之

未成膿者便消勿使患人知

治婦人數日難產困頓無力將欲不救者

方十六

廿六

右用牛耳塞一皂大冷水化下不移時產下無驚恐

又灸法等七

血海二穴在膝臏上內廉白肉際一寸中治

合陽二穴

在膝約中央下二寸治腰脊強引腹痛陰股熱

可灸五壯

油骨一穴

在橫骨之上毛際陷中動應手任脉足厥陰之

會治小腹脹滿小便淋瀝不通癩疔小腹痛婦人赤白

帶下可灸七壯至七七壯鍼入二寸

校定油骨當作曲

帶下赤白裏急瘕癥可灸五壯鍼入六分

又迷藥公治產法

產前產後

凡婦人妊娠切忌房事犯之多令兒作驚癇或有百疾凡
妊娠半年之後即依官方中修合保生元一料計百四十四元
每日空心一服一粒食後臨臥各服枳殼湯一服去房
事即喜怒不唯臨產易生母既不病兒自壯實

又迷產前產後治療法等二十五

余因披閱樂公調氣方見樂公記北平楊道慶者一妹二
女皆產死有兒婦臨月情深憂慮入山尋余覓諸滑胎藥
方余報言少年多游山林未經療理此事然為思量或應
可解慶傳一宿余輒憶想畜生之類緣何不聞有產死者
貧女獨產賤妾偷生亦未聞有產死者此當緣無人逼佐

方十六

二十七

得盡其分理耳其產死者多是富貴家聚居女婦輩當由
兒始轉時覺痛便相告報傍人擾擾令其驚怖驚氣畜結
生理不和血氣一乱痛切惟甚傍人見其痛甚便謂至時
或有約騫者或有力腹者或有冷水澀面者又努力強推
兒便暴出畜聚之氣一時奔下不止便致連絕更非他緣
至此且以此語慶領受所問然猶見邀乃更與隨至其家
十餘日晡時報去兒婦腹痛以是產候余便教屏除牀案
遍一方地面布草置三四處懸繩繫木作桁高下令得所
當腹得憑當桁下鋪慢氈恐兒落草傷之如此布置訖
產者入位語之坐臥任意為其說方法各有分理順之則
生逆之則死安心氣勿怖強此產婦亦解人語語訖閉戶

戶外安牀余共慶坐不令人得入時時隔戶問之何以若
言小痛可忍至一更令爛煮自死牡雞取汁作粳米粥粥
熟急手撓使渾渾適寒溫飲食三升升今之至五更將未
便自產聞兒啼聲始聽人入產者自若安穩或覺小小痛
時便放躄長吐氣一口痛即止蓋任分和氣之効也慶問
何須故食雞汁粥答曰牡雞性滑濡欲使氣滑故耳問何
不與肉答曰氣將下恐肉卒不消為妨而悶又問何故與
粥答曰若飢則氣上氣下則速產理不欲令氣上故耳慶
以此為產術之妙所傳之處無不安也故知樂公隱思妙
符神理但以婦人性弱臨產驚惶遽若不道以諸法多恐
生氣不安所以捨諸家方法題如左

方十六

二十六

產前 覺腹痛臨產時服順元散一兩服

產後治療法

第一日無證候只服黑神散

第二第三日服羊肉湯至第五日服之不論有無

證候

如腹中痛虛眩不支持當睡急痛氣上衝前後引痛服羊

肉湯

如虛羸少氣不欲飲食服四順理中元

如臍腹痛寒熱嘔逆惡露不止或所下過多眩運迷悶

服黑神散

或因而有風證者服辰砂元天麻元甚者服至寶丹有痰

飲證者服丁香半夏元 嘔吐者服玉壺元母丁香元正
 氣散水者人參元 咳嗽者服五味實散 有冷者服胡
 椒理中元 大便大段秘謂五六日秘也服橘皮杏仁元
 脾約元 大便稀滑者服理中元 有冷多者服養
 真丹或紫霞丹赤元等痢疾者服鍾乳建脾元
 如有積滯多者熱則妙香元寒則宜服感應元
 頭痛者服辰砂天麻元甚者服腎厥元
 傷風寒者為惡風寒者也服大聖人參散百解散正氣散
 不惡風寒者服羊肉湯
 發熱七日內只服羊肉湯玉筵散
 常服熟乾地黃元 胃膈不快者服白豆蔻元

產後食物次叙

方十六

二十九

七日後進少醇酒
 半月之後漸食猪肉極爛軟
 一月之後方食少麵

或患乳癰者灸藥法

灸乳根二穴在乳下一寸六分三壯或五壯服小犀角
 元已成瘡者貼雲母膏

治虛人常有之疾


大便秘喫烏地黃者元脾胃下過喫厚朴元霍香散
 氣寒才過喫三建元氣秘喫薑澄茄元腰膝無力行履
 不得無如喫牛膝元兼亦治風烏地黃者元須大便不

秘服之尤佳
 婦人妊娠一月兩月血脈行澁勿食腥辛之物居必靜處
 三月四月形像漸成勿食薑兔等物五月六月勿食諸新
 物等七月八月勿食瓜菓酸物等九月十月勿食生冷一
 切動風疾物等

逐月安產方位

正月丙地安產 壬地藏衣
 二月庚地安產 甲地藏衣
 三月壬地安產 丙地藏衣
 四月甲地安產 庚地藏衣
 五月壬地安產 丙地藏衣
 六月甲地安產 庚地藏衣
 七月壬地安產 丙地藏衣
 八月庚地安產 甲地藏衣
 九月丙地安產 壬地藏衣
 十月甲地安產 庚地藏衣
 十一月壬地安產 丙地藏衣
 十二月庚地安產 甲地藏衣

產圖



澤蘭湯 治產後餘疾寒下凍膿裏急胃脇滿痛咳嗽嘔血寒熱小便赤黃大便不利

澤蘭肆拾 石膏壹兩 當歸拾 遠志壹拾 甘草

厚朴捌拾 葶藶伍拾 乾薑 人參

桔梗 乾地黄貳拾 白朮 蜀椒

白芷 栝子仁 防風 山茱萸 細辛各玖

桑白皮 麻子仁各半

右二十一味咬咀以水一斛五升先內桑白皮煮取七升半去之內諸藥煮取三升五合去滓分三服

保生元 治婦人產前產後一切風冷血氣產後血風頭旋身顫

方十六 世

金釵石斛 秦艽 桂 熟乾地黄

貝母 防風 糯米 乾薑 甘草

細辛錢各貳 當歸 川椒 黃芩 大麻仁各壹兩半

大豆卷 石膏各壹兩

右為細末煉蜜和作一百四十四元每服一元月信不通當歸酒下產前產後赤白帶下溫酒下催生當歸酒下難產及胎不下死胎橫正不順產後不語但心頭熱用棗湯研藥灌之藥入喉立効產後惡血不盡臍腹疼痛寒執煩躁悶亂月後皮膚虛腫面色痿黃漸成勞疾產血不止虛勞中風口噤不語半身不遂大便秘澀煩渴悶暈酒下妊娠臨月頻服此藥每日空心溫酒下臨

產五臟不疼易生也產後中風血暈生地黄汁與溫酒同煎十餘沸研藥灌之立効產後四五日一元細嚼空心熱酒下一切風邪自不能入忌生冷油膩魚肉豉等

慶遠散 主丈夫陽氣不足不能施化無成方

覆盆子 五味子各壹 天雄壹兩 石斛

白朮各壹 桑寄生肆 天門冬貳 兔絲子貳 紫石英貳

右為細末酒服方寸匕先食日三服不耐冷者去寄生加細辛四兩陽氣少而無子者去石斛加檳榔十五枚

方十六 三十二

雞峯普濟方卷第十六

婦人

參藥丸 治腸脇脹滿臍下塊硬如石疼痛不止

白芍藥 當歸 白朮 鱉甲各一兩 訶子
乾薑 人參各一分 雄雀屎一分 肉豆蔻一分

郁李仁一分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二三十元食前米飲下

白朮元 治產後虛損傷於風冷乘虛入於臟腑虛則洩故令痢瀉腹痛

乾薑 白朮 厚朴 赤芍藥 艾葉

當歸 黃連 肉豆蔻

右八味等分為細末棗肉和丸梧桐子大不以時粥飲下三十九日三服

羊肉當歸湯 治產後腹中下切痛不能食

當歸 黃耆 芍 防風 人參各半錢

白芍藥字生薑錢

右剉豆大以羊肉清汁兩盞半煮取一盞半去滓分為兩服

白朮散 治妊娠胎頻動微腹痛

人參 白朮 吳茱萸 阿膠 熟艾
桑寄生 茯苓 當歸各等分

右為鹿末每服五錢水一盞棗三枚煎至八分去滓稍熱服空心食前日進二服

熟乾地黃丹 治婦人血臟虛冷妊娠時復漏下宜服溫暖血臟安養胎氣

熟乾地黃 白芍藥 川芎 當歸 艾葉 阿膠 乾薑 白朮各壹兩 甘草半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大爆乾每服三十元米飲空心服

桑寄生散 治妊娠胎氣衝上攻肩項拘急頭目不清快間或呵欠服此安胎清上氣

真桑寄生 白茯苓 大芎 乾地黃各半兩

吳白朮拾兩 黃耆 甘草各陸銖

右為細末非時棗湯調下一錢匕服

艾葉散 治胎動不安腹內疝痛

艾葉肆錢 阿膠 當歸各半兩 芍

乾薑 桑寄生各肆錢 甘草壹分

右為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓微溫服

百合散 治婦人肺胃不順氣逆嘔血不止咽嗝不利兼治嗽疾

百合 人參 貝母 白茯苓 杏仁
甘草 乾山芋各壹兩 鹿角膠兩

右為細末入杏仁研勻每服二錢水一中盞黃蠟二皂
大煎至六分去滓食前溫服

內補芎藭湯治婦人血氣羸弱或崩傷過多氣傷絕腹
中拘急四肢煩熱面目無色及唾血吐血

芎藭 熟乾地黄各肆兩 白芍藥兩伍 桂心貳兩
甘草 乾薑各壹兩 大棗肆拾

右劉勻每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服不以時
有寒加附子三兩

赤芍藥散治枕痛

赤芍藥兩 當歸 芎
黃橘皮兩各壹 乾薑半兩

右為細末每服二錢溫酒調下或不飲酒以水一盞同
煎至七分溫服不以時

白芍藥丸

治婦人衝任久虛內挾風冷或懷孕不牢或妊
娠久不能產飲食進退肢躄倦怠頭眩項強皆由氣血虛
弱風冷客滯於內

白芍藥 川芎 白朮 阿膠
當歸各壹兩 乾薑 人參各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心米
飲下

紫石英稻子仁丸治女子遇冬夫時行溫風至春夏病熱
熱毒風虛百脉沉重下痢赤白不思飲食而頭眩心悸酸

斯恍惚不能起居

紫石英 栝子人各壹兩 烏頭 桂心
當歸 山茱萸 澤瀉 芎藭 石斛

遠志 桑寄生 菴蓉 乾薑 甘草各壹兩
蜀椒 杜衡 辛荑各壹兩 細辛壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大酒服二十元漸加至
三十元日三服一方用牡礪一兩

紫石英天門冬丸主風冷在子宮有子常墮落或始為婦
便患心腹仍成此疾月水都未曾來服之肥充令人有子

紫石英 天門冬各壹兩 燕蕒 烏頭
菴蓉 桂心 甘草 五味子 栝子人

石解 人參 澤瀉 遠志 禹餘糧
杜仲各壹兩 蜀椒 卷栢 桑寄生 石南葉

雲母粉 當歸 烏賊骨各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大酒服二十元日二服
加至四十元

牡蠣丸亦名紫蓋元治婦人產後十二癥病帶下無子皆
是冷風寒氣或產後未滿百日胞胎惡血未盡便利於懸

圍上及久坐濕寒入胞裏結住小腹牽痛為之積聚小如
雞子大者如拳按之跳手隱隱然或如蟲嚙或針刺氣時

搶心兩脇支滿不能食飲食不消化上下通流或守胃管
痛連玉門背膊疼痛嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中刺刺

引陰痛小便自出子門不正令人无子腰膝疼痛四肢沉重搖躍一身盡腫下來乍去大便不利小便淋瀝或月經不通或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不祥

牡蒙

拾捌

大黃

三兩

附子

壹兩

當歸

半兩

厚朴

消石

前胡

乾薑

麝蟲

牡丹皮

蜀椒

黃芩

桔梗

茯苓

細辛

葶藶

人參

芎藭

桂心

吳茱萸

各拾

右為細末煉蜜和搗萬下元如梧桐子大空心酒服三元日三不知加之至五元下赤白青黃物如魚子者病根出矣

方十七

五

聖母芎藭散

衛公治五崩身瘦欬逆煩滿少氣心下痛面生瘡腰痛不可俛仰陰中腫如有瘡狀如毛中養時痛與子臟相通小便不利常拘急頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急心煩不得臥腹中急痛食不下吞醋噫苦上下腸鳴漏下赤白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀皆是內傷所致中寒即下白熱即下赤多飲即下黑多食即下黃多藥即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒

雲母

芎藭

代赭

東門邊木

各半

白殭蚕

白堊

烏賊骨

各陸

鱖魚甲

桂心

生鯉魚頭

伏龍肝

各拾

切鉄

蝟皮

陸

右十二味為細末酒服方寸匕日三夜一又方有龍骨

乾薑

重校定

鯉魚頭

各陸

大慎火草散

治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏色皮骨相連月經失度往來失常小腹弦急或苦絞痛上至於心兩脅腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰背痛連脇不能久立嗜昏卧

填火草

白石脂

鱖魚甲

乾薑

細辛

當歸

芎藭

石斛

白芍藥

禹餘糧

牡礪

各貳

黃連

乾地黄

薔薇根皮

各肆

熟艾

桂心

各壹

右十六味為細末空心酒服方寸匕日三稍加至二匕

方十七

六

若寒多者加附子椒熱多者加知母黃芩各一兩白多者加乾薑白石脂赤多加桂心代赭各二兩

四石湯

治產後卒中風發疾口噤瘕瘕悶滿不知人并緩急諸風毒痺身軀痙強及挾胎中風婦人百病

紫石英

白石英

石膏

赤石脂

各壹

獨活

生薑

葛根

桂心

芎藭

甘草

白芍藥

黃芩

各貳

右為細末每服二錢水一大盞煎至七分去滓温服不以時

大遠志元

治產後心虛不足心下虛悸志意不安恍惚惚腹中拘急疼痛夜卧不安宵中吸吸少氣常服補傷損

益安定心神

遠志 甘草 茯苓 麥門冬 人參

當歸 白朮 澤瀉 獨活 菖蒲

桂心各參兩 薯蕷 阿膠各貳兩 乾薑肆兩 乾地黄伍兩

右為細末煉蜜和元如大豆大未食温酒服二十元日

三不効稍增至五十元若大虛身躄冷少津液加鍾乳

三兩為善

牡丹煎丸治婦人血刺血弦上搶血塊走疰心背疼痛血

海虛冷臍下膨脹小腹滿悶腿膝無力腰腫腰疼血多血

少背膊悶倦血風皴烈手足麻木身躄振掉腰脊偃僂月

經不調或清或濁赤白帶下血山崩漏面色萎黃身生癩

赤腸內虛鳴面生黑點手足熱疼或生麻痺并筋攣骨疼

兩肋攀急起坐托壁腰背皆牽舒展不得者

牡丹皮 黑附子 藁本 牛膝 五味子

人參 白茯苓 白朮 官桂 當歸

續斷 赤芍藥 木香 白芷 乾山藥

澤瀉各壹兩 熟乾地黄 檳榔 羌活

龍骨各壹兩 乾薑 山茱萸 延胡索 縮砂人各半兩

石斛各兩 蕪荊壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元至二十元

温酒下醋湯亦得空心臨卧各一服不嚼並無所忌

白薇丸補益胎氣治久而無子祛風逐冷或妊娠數慎

白薇 牡蒙 藁本各伍兩 芎藭 人參

栝子人 石斛 桂心 附子 五味子

防風 吳茱萸 甘草 桑寄生 牛膝各壹兩

當歸 乾地黄 薯蕷各伍兩 禹餘糧捌分 秦椒壹分

右為細末煉蜜和搗五七百下杵元如梧桐子大空心

温酒下二三十元日再服忌生葱生菜熱麵蕎麥猪肉

葵菜蕪荊菘菜海藻粘食陳穢物

伏龍肝散治婦人崩中五色或赤白不定或如豉汁久不

止令人黃瘦口乾虛煩不食

伏龍肝 赤石脂各壹兩 甘草 桂心各半兩 芎藭

當歸 乾薑各壹兩 熟乾地黄 艾葉各壹兩

麥門冬壹兩

右為鹿末每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去

滓不計時候服

熟乾地黄散治婦人風虛勞冷頭目昏重四肢煩疼喫食

減少漸加羸瘦

熟乾地黄 人參 白朮 桂心

白茯苓各壹兩 芎藭 防風 當歸 丹參

細辛 藁本各半兩 附子 黃耆

續斷各壹兩

右為鹿末每服四錢水一中盞生薑四片棗三枚煎至

六分去滓食前温服

紫石英元 治婦人氣血虛損風邪客滯經絡肌躰羸瘦遍身疼痛筋脉拘挛及瘵腹中風冷胃腸膨脹嘔噦酸痰腰腹刺痛不欲飲食嗜卧少力便滑泄瀉又治血海久虛經脉不調帶漏時下久絕子嗣常服則補氣益血潤澤肌膚去面黥除頭風

紫石英兩 天門冬 紫葳 甘草 桂心

牡蒙 川烏頭 熟乾地黄 辛夷人

石斛 卷栢 當歸 芎藭 烏賊魚骨

牛膝 栢子人各壹兩 禹餘糧兩 乾山藥

桑寄生 牡丹皮 乾薑 續斷 食茱萸

細辛兩 人參分 厚朴分

方十七 九

右為細末煉蜜和搗五百杵元如梧桐子大每服二十元温酒下米飲亦得空心晚食前

小白薇元 治婦人無子或諸上熱下冷百病皆主之

白薇 川椒 白龍骨各壹兩 車前子

芎藭 當歸 蛇床子 細辛 乾薑各半兩

藁本 卷栢 白芷 桂心 覆盆子

桃人 菖蒲 人參 白茯苓 遠志各叁分

麥門冬兩 熟乾地黄壹兩

右為細末煉蜜和搗五百杵元如梧桐子大每服三十元温酒下空心及晚食前服之

石斛麥門冬散 治婦人虛勞平益宮臟退積除臍腹痛

止白帶進飲食

金釵石斛 麥門冬 黃耆 白芷

官桂 白木 人參 當歸 甘草

熟乾地黄各半兩

右為細末每服二錢空心鹽湯調下

鬼箭元 治婦人血脈不通欲變成勞寒熱不調可思飲食肌膚消瘦心腹刺痛手足沉重

鬼箭羽 赤芍藥 烏梅肉 牛膝 白薇

白木各壹分 當歸 桂心 甘草各貳分 牡丹皮

乾地黄 人參各壹分 川大黃壹分 黃蟲 蒲黃各壹分

朴硝伍分

方十七 十

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大初服十元加至二十元酒下先小腹中取下青泥相似大便微行血通是應

小琥珀散 治血熱虛煩不思飲食潮躁消瘦心腹臍脇疔

痛宜服此

琥珀 沒藥 肉豆蔻仁 血竭

木香各半兩 官桂 人參 赤茯苓 當歸

牡丹皮 赤芍藥各壹兩 延胡索兩

右為細末沸湯點半錢日服三服如有血勞氣與前鬼

箭元次第服大効

牡丹散 治虛脹如鼓不嗜飲食破血行經止痛

牡丹皮 川當歸 芎 吳白芷 凌霄花

延胡索 紅花 官桂 赤芍藥 劉寄奴
右等分為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至六分
後入酒三分重煎三兩沸去生薑服之空心服後更喫
酒投之

威靈仙散 治一切畜熱骨蒸室女經脈不通勞瘦

威靈仙兩 乾漆兩 雄黃分 真麝香錢

右為細末入雄黃麝香拌勻每服一大錢水八分煎至
六分空心和平溫服至午後取下臭穢惡物並是病根
服五七日後惡物少即與好理勞藥及和氣湯散療之
或用湯浸饑餅為元如梧桐子大每日空心午後用溫
米飲下二十元如傳尸伏連患取後別服桃仁散

桃仁散 大桃仁 赤茯苓 赤芍藥 人參

陳橘皮各 檳榔各 麝香錢

右為細末每服三錢生薑半分水一盞煎至六分去滓
早晚食前服

犀角元 治療在方後

馬鳴退 甘草 石膏 當歸 川椒
蟬退各 人參 乾薑 附子 芎
藁本 白蕪荑 栝子人 白薇 白朮
蒼耳 白芍藥 桔梗 白芷
澤蘭分 食茱萸 厚朴 防風分 生犀
孫氏方亦有之犀角用半兩

右為細末煉蜜和元如彈子大匾捏每日空心溫酒下
一元療八風十二痺寒氣乳風血瘀万疾無不立差如
子死在腹兼胎不安一元便安如衣不下一元可下如
有妊娠臨月日服一元至產不知痛消去寒熱及腹中
疝痛遶臍撮痛嘔逆氣衝心中煩悶一元便止又療產
後惡露不盡如中風兼傷寒汗不出以麻黃三分去節
杵為末酒煎下一元汗出差如汗不止只用酒下一元
便止腸痛積聚朝暮進一元若金瘡敗血惡瘡生頭不
合陰中痛月經來往不止下多下少或在月前或在月
後不過三五元即差又絕產無子朝暮服之輒因有子
泄痢嘔逆不能食及赤白痢但是婦人病悉皆治之

分膈元 治血氣及一切積聚敗血為病兼療產後注蕪心
腹痰涎腹秘不通

人參兩 檳榔 肉豆蔻人各 木香
茯苓兩 水銀兩 當歸兩 沒藥
青橘兩 當歸兩 不中 皂角錢 麒麟竭兩

右為細末分一半別入燈上燎者巴豆杏仁各二十一
箇同用麵糊為元如梧桐子大治乾血氣積聚血氣有
巴豆杏仁者名大藥無巴豆杏仁者名小藥治產後及
血氣心腹氣疰悶不下食暈大効一半藥末只煉蜜
為劑迴面向東杵一千下喫時旋元小豆大並每服五
七元看大小用之湯使臨時

麒麟元 治婦人血風勞氣脉熱面黃血刺血塊四肢少力
身軀困倦不思飲食兼通經脉

麒麟竭分參 穿山甲片參 乾漆半生

硃砂

沒藥 京三稜 當歸各壹 巴豆俗

右件除巴豆硃砂三稜末外都一處搗羅為末後入前三味同研令勻細醋煮麵糊為元如菘豆大調京三稜末湯下初服一日喫四元二日五元三日六元第四日七元第五日八元第六日九元盡是空心服之見効大病半月安

大澤蘭元 療婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛或頭風入腦寒痺筋攣緩急血悶無子面上游風去來目淚多出忽忽如醉或胃中冷嘔逆不止洩利淋瀝或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣欬逆或漏下赤白陰中腫痛胃脇肢滿或身軀皮膚中澁如麻豆苦痒痲痺結氣或四肢拘攣風行周身骨節痠痛目眩無所見或上氣惡寒洒淅如瘧或喉中鼻離風癩癩疾或月水不通鬼魄不定飲食無味無所不治服之令人有子補益下元

方十七

十三

澤蘭葉 赤石脂 蕪荑 禹餘糧 石膏各拾

芎藭 當歸 五味子 熟乾地黄

牛膝各半 白芷 石斛 肉苁蓉 細辛

卷栢 防風 厚朴 山藥 白茯苓

白朮 甘草 桂心 乾薑各伍 川椒

人參 杜仲 蛇床子 續斷 艾葉各壹

藁本 栢子人各柒 紫石英拾伍

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服空心及晚食前温酒下二十元至三十元亦得

水府丹 治婦人積虛久冷經候不行癥瘕塊癖腹中卒暴疼痛等

經煨花乳石壹兩 硃砂半 桂 木香

乾薑各壹 縮砂人兩 紅豆半 班猫壹個

芫青升參百頭一味以酒米壹 臍月狗膽壹

生地黄汁 童子小便各壹

右九物為細末三汁熬為膏和上末元如雞頭大朱砂為衣每服一元温酒嚼破食前服米飲亦可孕婦忌服

瞿麥元 治婦人經脉不利即為水水流走四肢悉腫病名曰血分其候與水相類醫作水治之非也宜此

人參 當歸 大黃濕紙裏壹斗米下

瞿麥穗 赤芍藥 桂 白茯苓各半

葶藶分參

右為細末煉蜜和元如梧桐子大米飲下十五元空心服漸加至二十元止於三十元

大重蟲元 治月經不通六七年或腫滿氣逆腹脹痲痛可服

重蟲肆拾 蟻螬壹 乾地黄 牡丹皮 乾漆

芍藥各肆錢 葶藶各肆錢 牛膝 土瓜根 桂心各伍錢
 桃人 黃芩 牡蒙各參錢 茯苓 海藻各半兩
 水蛭各拾枚 芒硝壹錢 人參壹錢 吳茱萸參錢
 右為細末煉蜜和元如梧桐子大每日空心酒下七元不効加之日三服

牡丹皮湯治崩中血甚

牡丹皮 熟乾地黄各參兩 艾葉 禹餘糧
 龍骨 栝菜 厚朴 白芷 伏龍肝
 青竹茹 芎藭 地榆各貳兩 阿膠壹兩 斛菜兩
 白芍藥兩肆

右為鹿末每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服不以時

以時

當歸芎藭湯治妊娠胎動不安或有所下

當歸 芎藭 續斷各陸分 側柏伍分 阿膠拾分
 寄生 艾葉 竹茹各陸分

右為鹿末每服三錢先以金銀各二錢水三盞煎取一盞半去金銀下藥并生薑五片棗一箇擘破同煎至六分去滓空心溫服

柴胡散治妊娠嘔逆

柴胡 半夏 人參 茯苓各陸分
 白朮 枳殼各伍分 黃橘皮肆分
 右為鹿末每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六

分去滓溫服

沒藥研砂煎治婦人瘦勞血氣久冷兩脅有癥塊攻心氣滿不思飲食

沒藥 硃砂 木香 當歸各壹兩
 五靈脂兩伍

右為細末酒醋各半盞同熬膏埴器收熱酒服一彈大不以時

槐耳白欬元治崩漏

槐耳 白欬 艾葉 蒲黃 白芷各貳兩
 黃耆 人參 續斷 禹餘糧兩 當歸
 黃橘皮 茯苓 蝟皮燒存性 熟乾地黄各參兩

右為細末酒煮麵糊和元如梧桐子大每服空心酒下二十元日二加之

驚甲元治女人小腹中積聚大如七八寸盤面上下周旋痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火炙玉門冷如風吹經水不通或在月前或在月後服之三十日便若有孕此是河內魏太守夫人方

驚甲 桂各壹兩 蜂房兩半 玄參 蜀椒
 細辛 人參 苦參 丹參 沙參
 吳茱萸各拾枚 麝香 乾薑 牡丹
 附子 水蛭 皂角 當歸 赤芍藥

甘草 防葵各壹兩 蟾蜍貳拾 大黃 蠱蟲各壹兩
 右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服七元温酒下日
 三服加之以効為度

澤蘭散 治崩中下血羸瘦少氣常服補虛止血調中
 澤蘭貳兩 藁本 厚朴 栝子人各拾
 熟乾地黄 牡礪各壹兩 代赭石 桂心

細辛 乾薑各壹兩 蜀椒貳兩 甘草 當歸
 芎藭各壹兩 山茱萸拾捌 防風壹兩
 燕莢兩半

右十七味為細末空心温酒服方寸匕日三服甚良一
 方加白芷龍骨各十八銖人參一兩十八銖

伏龍肝散 治女人漏下或差或劇常漏不止身躄羸瘦飲
 食減少或赤或白使人無子者
 伏龍肝 赤石脂 白龍骨 牡礪 烏賊骨
 禹餘糧 桂各壹

右為細末空心酒服方寸匕日二白多者加牡礪龍骨
 烏賊骨赤多者加赤石脂禹餘糧黃多者加伏龍肝桂
 心隨病加之張文仲同亦療崩中肘後無白龍骨以粥
 飲食中調服

續斷元 治下經虛冷真氣不足經脉不行氣血凝滯腰腿
 疼痛轉側不得校定此方以麴酒膏為元方中不言以當用神麴壹兩木茱壹兩酒熬為膏元
 杜仲 牛膝 葶藶 白朮 羌活

續斷 木苻各壹兩 狗脊 青鹽 熟地黄
 芎 薏苡人各半 附子貳兩
 右為細末將木苻末入麴煮酒為膏和元梧桐子大每服
 四十元空心酒下

小麥散 療男子婦人虛腫下痢不止小便不利
 小麥各壹兩 乾薑貳兩 細辛 附子 椒目
 官桂各壹兩

右為細末每服一二錢温酒調下食前服
二生散 治婦人血暈至急
 生地黄 生薑各叁兩

右二味相拌和勻同炒乾研為末每服二錢研木香酒
 一盞同煎三兩沸通口服之壓下血立愈木香不須多
 用

酸棗仁散 治婦人血風心神驚悸氣痛眠卧不安四肢煩
 疼不思飲食
 酸棗人 黃耆 赤芍藥 當歸 龍齒
 子芩 秦門冬各叁分 犀角屑 枳殼

防風 細辛 獨活 甘草各半 伏神
 桑根白皮 人參各壹兩 石膏貳兩
 羚羊角屑貳分

右為鹿末每服四錢水一中盞生薑二分棗二枚煎至
 六分去滓不計時候服

茯神散治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神 人參 龍骨 酸棗人 獨活各壹兩
防風 遠志 桂心 細辛 白朮各參分
甘草 乾薑各半兩

右為鹿末每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

萎藜散治婦人風瘙皮膚中如蟲行及生癭疹搔之作瘡面腫心煩

白蒺藜 羚羊角屑各參分 黃芩 細辛
人參 苦參 地床子 秦艽 防風
麻黃 當歸 甘草 枳殼各半兩 莽草參分

右為鹿末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

莽草散治婦人風瘙癢疥身軀搔痒狀若虫行或發或歇

莽草壹兩 麻黃 沙參 白蒺藜各貳分
獨活 黃耆 防風 芎藭 犀角屑
凌霄花 甘草各半兩 天門冬壹分

右為鹿末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

沒藥散治婦人血風走注肢節疼痛發渴來往不定

沒藥 乳香 芎藭 當歸 桂心
漏蘆 木香各半兩 琥珀 地龍 白芷各參分

安息香各壹分 麝香各壹分

右為細末入研了藥令勻每服一錢溫酒調下不以時

漏蘆散治婦人血風走注疼痛無有常處

地龍 防風 羌活 白芷 沒藥
甜瓜子 桂心各半兩 敗龜 虎脛骨各壹兩
牛膝參分

右為細末每服一錢七酒調下不以時

雄黃散治婦人血風走注疼痛

雄黃 地龍 蜘蛛 麒麟竭 赤箭
側子 桂心 沒藥 白芥子 木香各壹兩
烏蛇貳兩 麝香壹分

右為細末入研了藥更研令勻每服一錢熱酒調下不以時

芎藭散治婦人血氣身軀骨節疼痛心胃雍滯少思飲食

芎藭壹兩 赤茯苓 赤芍藥 酸棗人 桂心
當歸 牛膝 木香各參分 羌活 細辛
枳殼 甘草各半兩

右為細末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

虎脛骨散治婦人血風攻注身軀疼痛

虎脛骨壹兩 桂心 芎藭 海桐皮
當歸 牛膝 天麻 骨碎補 附子各壹兩

羌活兩半

右為細末每服一錢空心温酒調下

温經湯

當歸

川芎

白芍藥

桂

牡丹皮

蓬莪朮各半兩

人參

甘草

牛膝各壹兩

重校定此方无搗羅服餌法度此方指迷方内亦載之今開具在右

右搗羅為細末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

桂枝桃人湯

桂枝

赤芍藥各參兩

熟乾地黄貳兩

桃人

甘草各壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞生姜三斤棗一箇煎至一

盞去滓食前温服

小薊根湯

治經候過多遂至崩漏血色鮮明如水下得温則煩甚者至於昏悶其脉數疾微小為順大者甚逆此由陰虛為熱所乘故傷衝任血得熱則流散譬如天暑地熱則經水沸溢傷於陰令人血下當補其陰宜此湯并阿膠陀元方在衄血門中

小薊根湯

小薊根

右三味水一盞煎至一半去滓温服不以時

鹿茸前元

治經候過多其色瘀黑甚者崩下吸少氣脐腹冷極則汗出如雨脉微小由衝任虛衰為風冷客乘胞中氣不能固可灸開元百壯宛見別門宜服此

右三味水一盞煎至一半去滓温服不以時

鹿茸前元

治經候過多其色瘀黑甚者崩下吸少氣脐腹冷極則汗出如雨脉微小由衝任虛衰為風冷客乘胞中氣不能固可灸開元百壯宛見別門宜服此

中氣不能固可灸開元百壯宛見別門宜服此

鹿茸

禹餘糧

赤石脂

當歸各壹兩

艾葉

栢葉

附子各半兩

續斷

熟乾地黄

重校定此方内二味无分兩此方指迷方内亦載之續斷熟乾地黄各用貳兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大温酒下三十元空心服

服

若始因經候微少漸漸不通手足骨肉煩痛日就羸瘦漸生潮熱其脉微數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火火逼水涸津液焦枯當養血益陰慎无以毒藥通之宜服栢子人元澤蘭湯

宜服栢子人元澤蘭湯

宜服栢子人元澤蘭湯

栢子人元

熟地黄

栢子人

牛膝各半兩

續斷

澤蘭葉各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大米飲下三十元空心服

卷栢兩半

右為細末煉蜜和元如梧桐子大米飲下三十元空心服

服

澤蘭湯

澤蘭葉各壹兩

當歸

白芍藥各壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服不以時

以時

若經候煩然不行疴痛上攻心膈欲死或因不行積結漸漸成塊脐腹下如覆杯久成肉癥不可治此由驚恐憂思意所不快氣鬱抑而不舒則乘於血血隨氣行氣滯則血結以氣主先之血主後之宜桂枝桃人湯方見上不差宜地

若經候煩然不行疴痛上攻心膈欲死或因不行積結漸漸成塊脐腹下如覆杯久成肉癥不可治此由驚恐憂思意所不快氣鬱抑而不舒則乘於血血隨氣行氣滯則血結以氣主先之血主後之宜桂枝桃人湯方見上不差宜地

若經候煩然不行疴痛上攻心膈欲死或因不行積結漸漸成塊脐腹下如覆杯久成肉癥不可治此由驚恐憂思意所不快氣鬱抑而不舒則乘於血血隨氣行氣滯則血結以氣主先之血主後之宜桂枝桃人湯方見上不差宜地

若經候煩然不行疴痛上攻心膈欲死或因不行積結漸漸成塊脐腹下如覆杯久成肉癥不可治此由驚恐憂思意所不快氣鬱抑而不舒則乘於血血隨氣行氣滯則血結以氣主先之血主後之宜桂枝桃人湯方見上不差宜地

黃通經元成塊地黃煎

地黃通經元

生地黄兩

蜜

水蛭

桃人拾个

右為細末煉蜜和元如梧桐子大酒下五元未効加至

七元

地黃煎

生地黄取汁

乾漆兩

牛膝兩

右為細末將地黃汁於銀器內慢火熬成膏和元如梧

桐子大酒下三十元食前服

葶藶元

治先因小便不利後身面浮腫致經水不通名曰水分其餘逆順並同水氣

方十七

廿三

葶藶

續隨子各半

乾葶兩

右為細末棗肉和元如梧桐子大煎褊竹湯下七元如

大便利者減葶藶續隨子各一分加白朮半兩

半夏飲子

療脾胃虛弱飲食吐逆水穀不化此為胃友

半夏分

厚朴

人參

白朮各陸分

右為鹿末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚同煎至

六分去滓溫服忌羊肉錫桃李雀肉等

當歸湯治心痛癥塊硬築心氣欲死

當歸

桔梗

白芍藥

黃橘皮各捌分

厚朴

良姜各捌分

人參陸分

桃人伍拾个

右為鹿末每服二錢水一盞生姜三片同煎至六分去

滓溫服日三忌猪肉生冷油膩雞魚粘食大蒜等膩

栢菜散治婦人赤白帶下腹內疝痛四肢煩疼不欲飲食

日漸羸瘦

栢菜分

阿膠

當歸

熟地黄

赤芍藥

牡礪各半

右為細末每服二錢米飲調下不以時

鹿茸元

治帶下五色久不羸漸加黃瘦

阿膠兩

鹿茸

桑蠶

艾葉

京芎

黃連

當歸

禹餘糧各壹兩

方十七

廿

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元食前溫

酒下

伏龍肝散治婦人崩中下血不止遶臍撮痛或時心煩

伏龍肝

地榆

龍骨

當歸

白芍藥

熟乾地黄

驢驘竭各壹兩

禹餘糧

櫻櫚灰各壹兩

右為細末每服三錢溫酒調下不以時

大附子元

治血崩日夜不絕將欲困篤

大附子

禹餘糧

白馬蹄

鹿茸各貳兩

烏賊魚骨

龍骨各壹兩

當歸壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心溫

酒下

沒藥散治血風氣攻注遍身疼痛

沒藥 川芎 木香 川烏頭

天麻 香白芷 官桂 伏神

牡丹皮 赤芍藥 當歸各等分

右為細末每服一錢用陳茶調下日進三四服

內補湯治血虛氣逆風邪稽留榮衛不周手臂麻重五痺

攣急一方去枳殼用當歸

熟地黃 杜仲各捌分 黃耆壹陸分 枳殼 茯苓

陳橘皮 人參各肆分 防風 川芎 白芍藥各叁分

薯蕷 甘草 山茱萸各貳分

右為鹿末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚煎至六

方十七

分去滓食前溫服

三物湯治妊娠心痛及心中痞諸逆懸痛

桂 白朮各貳分 枳實半分

右為鹿末每服二錢水一盞生姜三片同煎至六分去

滓溫服不以時

又方

右以良姜一兩搗為末每服二三錢水一盞煎至六分

去滓食前溫服

川芎散治婦人頭眩痛久不差

川芎 羌活 防風 細辛 旋覆花

蔓荊子各伍兩 石膏 甘草各半兩

右為鹿末每服二錢水一盞生姜三片同煎至六分去滓食後執服

喘

論曰喘急之病皆由榮衛之氣循行失度氣經於臟而臟不能受諸氣上併於肺肺管溢而氣爭故令喘息其始得之或因墜墮恐懼恐則精却却則上焦閉而氣不行氣不行則留於肝肝氣乘肺此喘出於肝或因驚恐則心无所倚神无所歸氣亂於中心乘於肺此喘出於心或因渡水跌仆腎氣暴傷而不通行氣留於腎腎氣上乘於肺此喘出於腎或因飽食過傷動作用力穀氣不流行脾氣逆而乘肺此喘出於脾凡諸臟相乘而喘者宜此團參元

方十七

團參元

團參壹兩 人參壹兩

大腹皮 橘皮黃者各壹兩 麥門冬貳兩

吳茱萸兩半 半夏兩壹 檳榔

芫花 附子 澤瀉

桂 杏仁 枳實

白朮 訶子各半兩 桑白皮貳兩

右為細末姜糊和元如梧桐子大米飲下十元未知加至三十元

若效逆倚息喘急鼻張其人不得仰卧咽喉如水雞聲時發時止此由驚憂之氣畜而不散肺氣鬱伏或因過飽勞動其氣上行而不能出於肺又遇寒邪肺寒則諸氣收聚

氣稍緩則息有所觸則發經久不能治謂之肺脹宜此玉液散

玉液散

川芎 茯苓 知母 貝母 杏仁 葶藶 半夏麴

柴胡 麻黃 甘草 羌活 馬兜苓 石膏 訶子

黃橘皮 白木 桂 人參 右為細末每服三錢水一盞生姜三片棗一箇煎至七分去滓溫服不以時

橘皮元 治風虛支滿膀胱虛冷氣上衝肺氣息奔冷咽喉氣悶往來下氣

方十七

海藻 白前 黃橘皮 杏仁 茯苓 芍藥 桂 人參 白朮 吳茱萸 葶藶 昆布 棗肉 桑白皮 蘇子

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十五二十元白湯下不以時

五愈元 療五臟效積年劇則上氣不得臥喉中如有物醫所不療

細辛 乾姜 白苑 甘草 桂 蜀椒 代赭石 通草 欵冬花 芫花 紫苑 牡礪

伏龍肝 半兩

右為細末錫糖元如棗核大含之以啣中熱為候晝夜二十餘元忌海藻菘菜生葱生菜

乾薑散 治氣嗽呼吸短氣心胃不利可思飲食上喘不得

乾薑 欵冬花 桂 細辛 白朮 五味子 甘草 附子 木香

右為細末每服二錢水一盞棗一枚擘破同煎至七分去滓食前溫服

九寶散 治喘嗽

大腹皮 肉桂 甘草 乾紫蘇 杏仁 桑白皮 麻黃 黃橘皮 乾薄荷

右為鹿末每服一錢匕用水一盞童子小便半盞烏梅二箇生薑五片同煎至一中盞去滓食後臨臥溫服兩浙張大夫病喘二十年每至秋冬輒劇不可坐臥百方不差後得臨平僧法本方服之遂差法本丸病喘三十年服藥半年乃絕根本永不復發凡服此藥須久服

凡喘效時血出四肢懈墮脉浮大而緊此腎氣上併於胃脉道壅塞血无所行而散溢脾精不化上不勝下脾之絡脉外絕去胃外而歸陽明所致宜服此白朮元

白朮元 麥門冬 人參 白朮 澤瀉 茯苓 生乾地黄 大豆卷 桑白皮

右為細末煉蜜和元如梧桐子大米飲下三十元

欬肺元 治肢飲上乘上氣喘急疾涎不利咳嗽不得卧

牽牛兩 木香 檳榔 青皮

半夏兩 五靈脂兩 蘇子分

右為細末冷水和元如豌豆大每服二十元食後生薑

湯下

郁李仁元 治喘嗽痰實身軀頭面微腫小便不利

葶藶子 杏仁各壹分 防已兩 郁李仁

紫蘇子各壹分 陳橘皮兩 赤茯苓壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元至三十元食後生薑湯下以効為度紫蘇湯下亦得

方十七

廿九

白朮元 治肢飲上氣不得卧身軀腫滿小便不利

陳皮兩 澤瀉兩 甘草 防已

葶藶 木香各壹分

右為細末水煮麵糊為元如梧桐子大每服三十元生

姜湯下不以時一方有白朮茯苓半兩

芫花餅子 治喘嗽氣

芫花 桑白皮 陳橘皮 吳茱萸各壹兩

馬兜苓兩 白牽牛兩

右為末以寒食麵三兩以水一處和勻櫻桃大捻作餅

子每服一餅子焙灰火中炮熟細嚼煎馬兜苓湯下

薑蘇膏 治咳嗽喘急喉中似有物唾膿血不止

酥兩 杏仁 阿膠 紫蘇子各貳兩

生薑汁壹合 白蜜伍合

右件相和於銀鍋內以慢火熬成膏每服以溫粥飲調

下一茶匙日四五服

神祕湯 治上氣不得卧

人參 紫蘇子 五味子 陳皮 半夏各壹分

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片同煎至六分去

滓溫服

貝母散 治咳嗽上氣喘急失聲

貝母壹兩 紫苑錢 麥門冬壹兩 杏仁壹分

右為細末每服三錢以水一盞煎至六分去滓溫服日

方十七

三十

三進

若不得卧卧則喘者此由水氣逆行上乘於肺肺得水則

浮不開使氣不得通流其脉沉大宜此神祕湯

神祕湯

黃橘皮 桑白皮 人參 紫蘇 生薑各半兩

右吹咀水三升煮至一升去滓溫三服千金方用五味子不用桑白皮

紫雲膏 治小便不通咳嗽上氣

甜葶藶 苦葶藶各半兩 夏枯草 木香各壹分

右為細末棗肉和元如小豆大煎桑白皮湯下三十元

杏仁膏 治枯瘦咳逆上氣喉中百病心下煩不得咽者

杏仁貳兩 紫苑 款冬花 茯苓各半兩

右研杏仁為膏將餘為末後合研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服五七丸食後米飲下

若喘而發熱脛脈皆動日漸瘦削此由客熱乘肺或始無熱會食飲失宜胃氣不轉逆乘於肺故令氣急醫為虛寒始以燥熱之藥火邪薰肺重加喘息煩赤咽燥其脈細數治屬骨蒸宜小建中湯平肺湯建中湯方見發熱門

平肺湯

天門冬兩 馬兜苓兩 百部兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後臨卧温服

茯苓飲子 古今錄瘵氣忽發滿胃急者

茯苓兩 杏仁兩 黃橘皮兩

右三味切以水六升煮取二升分作三服日三隨小便下愈盡更作忌酢物

竹葉湯 治奔馬及奔越喘之便飲冷水上氣發熱

竹葉兩 黃橘皮兩

右以水二盞煎至一盞去滓温服不以時

無心散 治喘神効

遠志無心者

右為細末每服一錢用綿裹同水一小盞煎至一茶脚許呷之立効

若喘而咽中作水雞聲不得低頭動輒氣奔促時效此由

寒搏肺經痰停胃脘痰與氣共行肺道壅滯謂之上氣治屬飲家宜旋覆花元方見頭眩門

太息

太息 鄜州時節推因飲食次忽人報其祖有事驚憂悲泣食即吐出自後常多不快時時太息不自知過憂思即益甚謹按黃帝三部針灸經云人之太息者何曰憂思即心系急心系急則氣道約而不利故太息伸出之補手少陰陰者心脈也心主者包絡也足少陽者膽脈也用針之法以久留為補究氣之元本以憂思不已使心膽氣虛所致兆素不精用針謹處犀角散治之

生犀錯末 羚羊角錯末 朱砂研 人參各半

牛黃壹分 龍腦壹分 麝香壹分

右為末研勻以磁器密收之勿令洩氣每服半錢熱水調服食後

五痔

烏地黃者元歌

熱風沉於脾胃中擁結令人大腸急二日三日一遍通硬如彈子而又澁或如羊屎及猪糞脚脛腰痛不能立此病名為腸風發久而不治即肛脫忽然時見鮮血流漸漸變作野雞疾

黃耆壹兩 大黃 大麻仁各貳 獨活 枳殼 人參 地骨皮各壹 訶子皮壹分

檳榔壹錢半 烏蛇兩五 羚羊角兩參 郁李仁半參分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心溫酒下二十元
以住為度多即減少即至三十元餘病皆治如酒後胃
膈壅滯悶急酒下五十元疎一行乃止且喫粥一二頓
如大冷大熱大腸澀滯及四肢痛悶皮膚瘡者並看臟
腑虛實服之

槐子元 治腸風下血五痔成瘡發即熾痛不可忍大便下
血肛脫不入腸頭生肉如鼠乳或如櫻桃時下膿血腫處
痒痛肛邊生核久成瘦瘡皆治之

槐角兩 陳橘皮 乾地黄 續斷各壹兩
黃耆 白礬 當歸 乾薑

黃連 附子各半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元至三十
元食前熟米飲下

內補黃耆散 治腸風下血不止面色痿黃氣力全少

黃耆 龍骨 槐子 白芍藥各貳兩
當歸 芎藭 甘草 附子各壹兩

右為細末每服四錢水一中盞入錫一分同煎至六分
去滓食前溫服

茄根散 治淋瀝痔瘡并風毒疼痛

茄子根 菴闍子 連翹 槐枝 柳枝
桃枝 荊芥枝梗 枸杞根

右件等分剉碎用藥一兩以水三兩椀煎十餘沸去滓
淋瀝

沒藥元 治腸風痔疾結核腫痛下膿血飲酒食動風物即
發

沒藥錢參 桂 鯉魚鱗 枳殼
雞冠花各半兩 蝟皮壹兩 槐角錢參

右為細末酒煮麵糊和元如梧桐子大每服三五元
若痛多倍沒藥膿血多倍槐角結核多倍枳殼每喫動
風物先進一服永不發動已作併喫三服乃効食前服

七聖散 治腸風痔瘻

茜根 園荻子 黃芩 紫草
雞冠花各壹兩 苧子 白礬各壹兩

右為細末每服二錢冷薑汁調下食前服忌毒物

七寶丹 治五痔

蝟皮壹兩 皂角刺 猪牙皂角 附子各壹兩
槿藤子壹兩 硫黃 白礬各壹兩

右為細末煮麵糊為元如梧桐子大每服二十元空心
溫酒下如有瘡者用朱砂一小豆大同研三元水調塗
瘡上

烏金散 治五痔漏

穿山甲 刺蝟皮 黃牛角心 猪牙皂角
皂角刺各壹兩 當歸壹兩 莢菜半兩

右先炒甲次蝟次角心各炒黃色乾方將諸藥一處入在五升坩錫子內以鹽泥固濟仍於錫底上鑽一小竅令出煙覆安於炭火上煨通赤煙纔盡便出放令存性以土罨之尤佳搗末以胡桃酒調下一錢空心

蜜陀僧元 治婦人痔疾面色痿黃

白礬灰 蜜陀僧 雞冠花 槐子仁
百草霜各壹兩 皂角灰壹分

右為細末以水煮麵糊為元如梧桐子大每服二十元煎栢木湯下

必効元 治一切痔瘻不問淺深

枳殼壹兩 黃耆 葶藶 兔絲子各貳兩

杜蒺藜 烏蛇各參兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十元空心晚食前米飲下

商殼元 治痔瘻

商殼 槐角 枳實各貳兩 人參
阿膠各壹兩 黃耆各貳兩

右除人參阿膠同搗為末後將四味末鍋內合炒黃黑色入麝香二錢并參膠二味同研粟米飯為元如梧桐子大每服三十元空心橘皮湯下日二三服

鷹鷲元 治痔瘻

鷹鷲角壹副 楨藤子壹 赤龍鱗錢

穿山甲壹錢 搗烏角將軍壹木

右件五味將搗烏木燒外四味一處入瓷罐內燒黑煙出帶黃煙存性冷取出為末細研搗角頭足入在藥中然後用酒煮麵糊為元如梧桐子大每服七元酒調散子下元子

小黃耆元 治脘腸風熱大便秘滯及五痔結核

防風壹兩 黃耆貳兩 芎藭半兩 皂角子仁黃貳分
枳殼壹分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元不以時米飲下

保命散 治遠年不差痔瘻下血不止神効

蝟皮 楮白皮各壹兩 槐子
黃牛角胎各半兩 黑蒺藜子拾个

右件同入甘錫子內用勃膺蓋面圓瓦子蓋口鹽泥固濟用炭火三秤煨白煙出為度用土蓋之候冷取出為細末每藥末一兩用黑附子炮裂去皮膺半兩乳香少許每服二錢煎皂兒湯破酒調下空心食前

劉散 治痔

防風 枳殼 黃耆 竹葉 甘草

右等分為鹿末每服三錢水一大盞生薑二片同煎至八分下藥如已安樂或痔多年有結核以狐牙散治之

槐花散 治五痔膿血

槐花

荆芥各壹分

千針草半兩

伏火硃砂叁錢

錢

右同為細末每服三錢麝香一錢同研如粉用好酒一

聖藥

治年深痔疾惡瘡腫痒

猪鬃蹄

穿山甲

蝟皮

紅棗兒

各叁兩

右藥坐用藏餅一箇入藥在內鹽泥固濟留眼子一箇

用炭火燒令通赤煙盡為度為細末入沒藥一兩乳香

聖藥

治新久一切痔漏之疾

神翅

大麥孽各肆兩

厚朴捌兩

洪木貳兩或白木

方十七

卅七

右為細末以醋煮麵糊為元如梧桐子大食後以温水

下三五十元常服甚妙大治下血痔漏飲食不消有穀

生膳元治痔漏

健牛兒膳

蝟膽各壹個

膩粉伍拾文

真麝香貳拾文

右將蝟膽汁等三味和勻入牛膳內繫頭四十九日熟

旋取為元如大麥粒用帛撚送瘡內候追出惡物是効

瘡口漸合紙面蓋瘡留一邊出惡物

雞酒膏

治腸風痔瘻

沒藥壹錢

麝香半錢

乳香半分

右同研細同雞子一箇尖頭開破傾出黃并清打勻調

聖藥

治腸風痔疾

皂角黃仁

枳殼

青皮各壹兩

右為細末每服一錢米飲調下

朴消散

治淋瀝痔瘡

朴消等分

右為細末每服三兩水三椀同煎至三四沸用之

狐牙散

治痔

大塘娘壹个

白礬壹塊

方十七

卅八

右研同細以生麻油調塗之

聖藥

治痔瘻不問久新有虫無虫可服

校定此方杏仁以肆兩比附為用

杏仁去皮尖并囊仁者砂盆研漚候滓盡

右以銀石器慢火熬更用大棗二十九枚同煎棗熟剝

去皮核再熬候稠入草薺末二兩更熬候可元即元如

梧桐子大每服三四十元空心食前坐散下日二服

皂角鵝散治痔疾

右以皂角鵝不以多少焙乾為末每服一大錢酒一盞

調下氣下泄為度

治五痔漏法三方

右以舊椽皮十葉當歸一兩一處燒取燼研細分作十

服每旦以無灰酒調下一服盡即安瀉者二十服効

又方

右以五倍子不拘多少為細末每服三錢於小盆器中用百沸湯浸洗淋洗日三五次

又方

右以大棗七枚去核入膩粉與硃砂少許填滿濕麵裹之候乾陰陽火煨令黑去麵取棗碾細末每服半錢粥飲調下

小黃香元治手陽明之支脈絡於齒縫而下屬大腸若風客其經則齒牙疼痛及大便秘滯或時便血久久不已則成痔疾宜服此藥

方十七

卅九

熟乾地黄

川芎

枳殼

綿黃耆

防風各半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心煎皂子人湯下

苦練元治腸風下血不以新久

防風

乾漆生

人參

苦練根皮各壹錢

荆芥穗

海金沙各半錢

何首烏壹錢

右為細末醋煮麵糊和元如麻子大每服七元空心煎樗白皮湯下

槐角煎治男子婦人下血

鳳眼草用半斤此乃樗坂殼

槐角

地榆

枳殼各壹兩 荆芥穗 蜜陔僧煨火 槐花各半兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服十五元不以時婦人淡醋湯下

沒藥元主腸風下血疼痛不已

蝟皮

鯉魚鱗氣味燒研

桂去鹿皮有熱者去桂

用黃連或黃蘗黃芩

雞冠花

沒藥各壹兩

枳殼兩

右除研藥外為細末後入研藥令勻煉蜜和或酒煮麵糊元梧桐子大每服二十元空心溫酒下

假蘇元治痔疾成漏膿血脫肛疼痛及腸風下鮮血

假蘇荊芥也

黃耆

防風

皂子仁

槐角

枳殼等分

方十七

四十

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服三四元食前熟水下

地錦湯治腸風下血

苜蓿菜

千針草

酸草子

地錦草等分陰乾

右為細末每服二錢白湯調下食後溫服

烏金散治腸風瀉血神奇方

木鼈壹兩半去皮及青膜

沒藥

枳殼各壹兩

胡桃叁個

右四味以清油燈焰內燒存性細研空心米飲調下二錢覺痛即愈血立止忌生冷油膩

小豆元治腸風毒

赤小豆 好硫黃各壹兩 附子半錢 生用

右為細末水煮麵糊和元梧桐子大每服二十元空心醋湯下

晉象散治腸風下血

貫衆壹兩 煨存性 五倍子半兩 煨存性 白礬貳錢 煨

右同研為細末每服三錢米飲下

蛭皮湯治下血及諸痔成膿血皆愈

穿山甲壹兩 煨存性 肉豆蔻末貳兩 蛭皮壹兩 煨

右為細末每服半錢婦人醋湯調下

黃耆治腸風瀉血

黃耆 黃連

方十七 四十一

右等分為細末麵糊和元如赤小豆大每服二三十元米飲下

黃連治腸風

黃連半兩 入巴豆半兩 同炒赤色去巴豆 草龍膽壹分

右為細末饑餅和元梧桐子大每服三十元食前荆芥湯下日二服

神翹治腸風下血

五靈脂五兩 水飛去滓 熬成膏 神翹壹兩 炒

右為細末將五靈脂熬成膏入神翹末元梧桐子大每服十元男子酒下食後婦人淡醋湯下

黃耆散若血隨大便而下或先或後此飲食不節飢飽不

時傷腸胃榮衛不調或強忍大便氣无從出復陷於陰氣併於陰則血失常經或醉飽房勞酒入於肺絡脉滿經脉虛勞動則氣血相併不勝者為病故先便而後血者其血遠先血而後便者其血近所下不常有所觸動則作遠血耳黃耆散近血宜赤小豆散方在後

枳實貳拾个 煨 青州棗壹拾个 去核 貳味用杵爛

甘草各半 黃耆貳兩

右為細末米飲調二錢下不以時

膽礬若大便腸頭如破膿血時從穀道中久久不已為瘻亦謂之腸痔宜此膽礬元及黃耆方在後

膽礬壹斤 黃泥裹燒通赤 皂子壹升 煨去皮焙乾

白雞冠花壹斤 京三稜肆兩

右為細末醋煮麵糊為元梧桐子大米飲下二三十元

雞峯普濟方卷十七

方十七 四十二

雞峯普濟方卷第十八 馮炳賈兼重校定

淋 痰飲 頭面

榆白皮散治五淋結痛

通草陸分 榆白皮 鷄蘇 茯苓赤者各

當歸 葵子陸分 瞿麥肆分 大黃陸分 芍藥赤者陸分

滑石冬分 芒消指式 麥門冬指式

車枝通此方內當歸無分兩其大平聖惠方內木通散與此方治療一同內當歸用壹兩

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

滑石散治石淋血淋

王不留行 滑石各伍分 甘遂冬分 石韋肆分

葵子陸分 通草拾分 車前子 芍藥赤者 蒲黃

桂 當歸各陸分

右為細末每服二錢空心茶湯下

當歸湯治勞淋小便淋瀝疼痛不可忍者

陳皮 當歸 熟地黄 白芍藥各壹兩

阿膠 桃膠 赤茯苓各叁分 人參

芒消 香附子各半兩 甘草壹分

右為細末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

陳皮滑石散治氣淋腹脹滿臍下氣結小腸疼痛

陳皮 滑石 川芒消 葵子各壹兩 赤茯苓

赤芍藥 子芩 瞿麥 石韋 蒲黃各半兩

右為細末每服二錢食前米飲調下

瞿麥散治熱淋澀痛熱極不解

瞿麥 桑白皮 滑石 木通 赤芍藥

甘草 榆白皮 川芒消 子芩各壹兩

右為鹿末每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前服

榆白湯治勞淋熱淋

榆白皮 黃芩 瞿麥 茯苓赤者 通草

郁李仁 梔子 鷄蘇葉等分

右為鹿末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

石韋飲子治淋小遺澀痛

石韋 瞿麥 木通各壹兩 陳皮黃者 茯苓赤者

芍藥赤者 桑白皮 人參各叁分

右為細末每服二錢生薑一分水一大盞煎至七分溫服早食後臨臥各一服忌冷物

孰地黃散治虛勞內傷小便出血陰道中痛時加寒熱

孰地黃 栢葉 黃芩 當歸

阿膠 黃耆 車前葉各壹兩 甘草半兩

右為鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

沉香散建安林回甫祕校熙寧中與子同客龍門李氏家

林一日下血李兄弟煎八正散與服既服不勝其苦小腹

前陰痛益甚余教林服兔絲山藥丸林病去氣血亦小充

實蓋不可專以熱藥得熱則盈溢為說也沉香散治冷

淋臍下痛小腹妨悶方

沉香 石韋 滑石 當歸

王不留行各半 葵子 白芍藥各參分

甘草壹分

右為細末每服一錢煎大麥飲調下食前日二三服

瞿麥散 利小便治膀胱伏熱小便赤澀淋瀝疼痛

瞿麥壹兩 葵子 木通 大黃 車前

桑皮 滑石各半

右為細末每服二錢白湯調下氣盛有熱者可服

甘草滑石散 行下焦滯熱陰中疼痛小便難

甘草 大黃 黃耆各半 滑石壹兩

山梔子半兩

乳香壹錢 地椒半兩

右為細末每服一錢食前乳香酒調下未愈再服

七寶散 治久新砂石熱結淋疾

南蕃琥珀 沒藥 乳香 蒲黃

桃膠 百部 郁李仁湯浸去皮研如油入麵

溫水參兩滴和作餅子焙乾炙令黃用之已上藥各等分停用之一味味別研

右件藥一味味別研極細如麵再同拌勻再研千餘度

極細勻為末每服一錢溫酒調服腹空時服初服一服

未知夜加一服先服藥引使

引使方

右用實好胡桃一箇燒令存性細研溫酒一銀盞調服

一服後服七寶散三日中効後只每日服七寶散一服

永安

巨用散 治淋尋常小便澀則服之

當歸貳兩 桔梗 瞿麥穗 桂府滑石

海蛤各壹兩 燈心拾束 甘草半兩

右為細末每服二錢水一盞同燈心煎至七分食後冷

服澀甚者加車前子一兩

陳皮石韋散 治下焦有熱淋閉不通小腹妨悶

石韋壹兩 赤芍藥參分 瞿麥穗 木通各壹兩 陳皮

茯苓 桑白皮各參分

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

日二三服以利為度

白茅根湯 治血淋痛不可忍

白茅根 滑石 葵子各壹兩 白芍藥 木通

車前子 乱髮各分

重校定此方內三味无分兩此方太平聖惠方內亦載之名白茅根散內芍藥木通車前子三味各參分乱髮灰用壹分

右為細末每服二錢水一大盞煎至七分去滓食前溫服日二三服

木通子苓湯 治尿血水道中痛不可忍

白茅根參兩 赤芍藥兩 滑石 木通各壹兩 子苓

乱髮灰兩半 葵子半兩

右為鹿末每服四錢水一盞同煎至六分去滓食前候

溫服之
榆皮通滑泄熱煎治腎熱應胞囊澀熱小便黃赤苦痛不通方

榆白皮 葵子各壹升 車前子伍升 赤蜜壹升 滑石

右六味咬咀以水三斗煮取七升去滓下蜜更煎取三分分三服婦人亦同此方

茅根飲子治小便赤澀痛

白茅根 木通 生乾地黄各貳兩 赤茯苓 人參 葵子各壹兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓食前溫服

山梔子湯治五淋及血淋

當歸 芍藥赤者 茯苓赤者 甘草 山梔子 右等分為細末每服二錢水一盞煎至八分溫服

子芩伏龍肝散解血淋

甘草 芎 伏龍肝各壹兩 子芩

赤芍藥
重校定此方內二味死分兩其太平聖惠方內有
瞿麥散一方與此方治療一洞內子芩赤芍藥二
味各用壹兩

右為鹿末用水一升藥半兩煎至七分去滓分作三服

溫服

滑石湯治膀胱急熱小便黃色

滑石捌兩 子芩參兩 榆白皮肆兩 車前子 冬葵子各壹升 右五味咬咀以水七升煮取三分分作三服不以時

石韋瞿麥散治五淋

瞿麥 石韋 車前子 滑石 葵菜子各半兩 右為細末每服二錢水一盞同煎至七分食前空服

蠟元子治淋經効

黃燭貳兩 燈心貳束 木香 肉豆蔻各壹分 硃砂半兩

右件藥并燈心並入蠟油銚子內鐵筋攪候煙盡放冷取出元如梧桐子大每服三元以溫酒調舶上茴香末一錢下先炒燈心欲煙盡後入三味藥更炒移時稍元服之

石韋散通利小便

石韋 木通 瞿麥各半兩 桂府滑石壹兩 揀甘草半兩

右五味都為末每服四錢水半升燈心一束同煎至一半去滓徐徐呷之立効如水透快一晝夜可下數斗便竟身躰輕快行步如常但極清瘦皮骨相連蓋膜間病氣去盡故也然牙齦微動紅腫牙齒間腥臭涎粘出三兩日出得有次第以綿塞子裹治牙齦塞之即已更用

青黛覆穰固濟其佳蓋水本腎病須當撓腎方得病退
早覺無妨恐不知有此應驗故先叙述

石鸞子煎 治沙石淋每發不可忍者

石鸞子兩 滑石 石韋 瞿麥穗等分

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大煎瞿麥燈心湯
下十元食前日進二三即以後湯下元子

石韋 瞿麥 木通各肆 陳皮 白茯苓各叁

石為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓下前元子
長將散 治五淋小便常不利陰中痛日十數起皆勞損虛
熱所致宜服

石韋 滑石各伍 瞿麥 葵子各 車前子各

重校定此方內瞿麥葵子无分兩其太平聖惠
方內亦載之名石韋散內瞿麥葵子各用式兩

右為細末每服二錢熟水調下不以時

又方

葵子 白木 茯苓 當歸各壹

右為鹿末每服三錢水一盞煎至六分去滓食前温服

白芍藥煎 治勞淋小腹疼痛小便不利

當歸 芍藥白者 鹿茸 熟地黄各壹

右為細末煉蜜和元如梧桐子大阿膠湯下三十元

石韋散 治血淋

石韋 白芍藥 當歸各壹 蒲黃壹兩

右為細末每服二錢温酒調下不以時

茯苓散 治血淋

五味子 阿膠 茯苓各壹兩 黄耆壹兩

重校定此方無每服數目其本方內又有瞿
麥散一方治療一同每服六錢以米飲調下

右為細末米飲調下不以時

固脾丹 治脾寒小便頻數

益智仁貳兩 石菖蒲壹兩 白龍骨叁分 川烏頭壹兩

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子大空心服四十元
煎益智鹽湯下一方加覆盆子二兩

滑石石韋散 治熱淋小便澀痛

石韋 榆白皮各壹 滑石貳兩

右為細末每服二錢水一盞入葱白生薑同煎至六分
去滓食前温服

菩薩散 治血淋

菩薩退 犀角末各半 獨掃壹拾

右為細末每服一錢米飲調下空心服

通秘散 治氣淋

陳皮 香附子 赤茯苓各等

右為鹿末每服二錢水一盞同煎至六分去滓食前服

生茶散 治暴患小便不通

蓬莪茂 茴香 生茶等分

分和滓空心服

木通散治熱淋小腸不利莖中急痛

木通

甜葶藶 赤茯苓 各壹兩

右為細末每服二錢食前以溫葱白湯調下

抵聖散治五淋

赤芍藥 壹兩

檳榔 壹个

右為細末每服一錢水一盞煎至七分空心溫服立差

車前草湯治熱淋及小便不通

車前草葉

右取汁服半盞不以時

髮灰散治卒得淋及血淋

方十八

九

右燒髮灰為末酒調服一錢匕空心食前

香椿散治五種淋疾勞淋血淋氣淋熱淋石淋及小便不通至甚者宜服

消石 壹兩

右一味生研為細末每服二錢諸淋各依湯使如後

勞淋勞倦虛損則發小便不出小腹急痛葵子末煎

濃湯調下通後便須服補虛元散忌慎將息

血淋小便不出時時下血疼痛滿急

熱淋小便赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下

氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通湯放溫調下

石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下沙

石令人悶絕將藥末先入銚子內用紙隔炒至紙焦為度再研令極細溫水調下小便不通小麥煎湯調下

卒患諸淋並只用冷水調下並空心先調使藥消散如水後即服之更以湯使送下諸藥不効者服此

立効

淋有五種一者莖中痛溺不得卒出者心淋也二者溺有白汁肥如脂膏淋也一名肉淋三者溺難澀常有餘瀝者氣淋也四者溺留莖中數起不止引小腹疼痛勞淋也五者如豆汁或有血有結不通者一名血淋一名穉淋也

葛氏療淋下血方麻根十箇以水五升煮取二升一服血

方十八

十

止神驗

淋閉之病不可一向作熱治亦有胞囊有寒而便溺不通者亦有胞系了戾而不小便者宜審別之

燈心湯治熱淋疼痛

燈心 乾柿

右等分剉碎水煎服不以時

定磁散治沙石淋

真定磁 赤芍藥 各等分

右為細末每服二錢濃煎燈心湯調下不以時

緩中湯治內淋勞淋

熟地黄 當歸 人參 白朮 阿膠

芍藥 芍藥 甘草 桂

右為鹿末每服二錢肉汁二盞生薑干片煎至十分去滓食前服

枳殼湯 治小便不通小腹脹滿

厚朴 桂 枳殼 滑石 膩粉

右為細末每服二錢冷米飲調下食前服

地黄鹿茸元 治虛淋入桃膠煎亦得

熟地黄 赤芍藥 當歸 赤茯苓 桃膠

右為細末白麵糊和元如梧桐子大每服二十元空心食前溫酒或燈草湯下

絳宮元 治心經熱小便淋澀不通及諸淋

生地黄 木通 黃芩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服三十元溫水下不以時

五淋絳宮湯 治三焦氣滯腹脇注痛因服熱藥引入下焦膀胱受熱小便淋澀下脹痛

露蜂房 血餘 白茅根

右為細末入麝香少許每服一錢空心食前溫酒下淋止不須服甚者不過三五服立効

鹿茸地黄煎 治血淋

鹿茸 熟地黄 當歸 蒲黃 龍骨

髮灰

右為末煉蜜和元如彈子大每服一元水一盞入青鹽一捏食後服

石草湯 治產後卒淋血淋石淋

石草 黃芩 通草 甘草 榆皮

右九味咀咀以水八升煮取二升半分三服集驗元甘草生薑又有不用薑者

痰飲

芫花散 治一切風冷痰飲癱瘓无所不治

芫花 桔梗 紫苑 大戟 烏頭

附子 天雄 白木 莖花 狼毒

五加皮 茵草 括蕁根 荆三稜 躑躅

麻黃 白芷 荆芥 茵芋 石斛

車前子 人參 石長生 石南 草薺

牛膝 地床子 兔絲子 狗脊 菴蓉

秦朮 藜蘆 山藥 細辛 當歸

薏苡人 芎藭 杜仲 厚朴 熟乾地黄

黃耆 乾薑 芍藥 山茱萸 桂

吳茱萸 黃芩 防己 五味子 栢子仁

遠志 川椒 獨活 牡丹 陳橘皮

木通 柴胡 藜蘆 菖蒲 茯苓

續斷 巴戟 石茱萸各一分 王不留行一分

右為細末每服一錢溫酒或米飲白湯調下亦可元服

煉蜜和元如梧桐子大每服五七元白湯米飲溫酒下

續斷治五飲留滯停痰癥飲結在兩脇心腹脹滿羸瘦

不能飲食食不消化喜唾乾嘔大小便或秘或利腹中動

搖作水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脅下

痛

遠志 苦參 藜蘆 白木 甘遂

五味子 大黃 石膏 桔梗 半夏

紫苑 烏賊骨 前胡 芫消 芫花

當歸 人參 括蕁根 大戟 貝母

茯苓 芍藥 黃芩 葶藶 桂各壹

恒山 薯蓣 厚朴 細辛 附子各壹

巴豆各拾 菴蓉壹 甘草叁分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服一二元臨臥時

以熟水下

赤茯苓散治風虛痰飲頭痛惡心

赤茯苓 細辛 半夏 藜蘆各壹 蔓荊子

旋覆花 防風 芎 枳殼 甘草各壹

人參 前胡 羌活各壹 天麻貳兩 菊花半兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至六分去

滓溫服不以時

寬中消食散消飲止渴養肺

半夏伍分 五味子 鹿角膠 茯苓各壹 白木

沉香 款冬花 芎 紫苑 石斛

山藥各貳人參肆分

右為細末每服二錢食前生薑湯調下內有一方減人

參一味

延年白木元主除風痰消積聚胃中冷氣逢秋發動令嘔

吐食後吐清水食飲減少不作肌膚

白木伍分 白芷叁分 乾薑 石斛各陸

五味子 細辛 橘皮 厚朴

桂 防風 茯苓 甘草各肆

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元米飲下日

二服加至二十元忌桃李雀肉生葱海藻菘菜生菜酢

物等

小五飲元治五種痰飲

半夏 甘遂 大戟 牽牛皂 芫花

紫苑 附子 澤瀉各壹 木香 沉香各壹

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服五七元微嚼破

橘皮湯下

細辛橘皮湯治胃膈心腹中痰水冷氣汪洋嘈煩或水鳴

多唾口中清水自出脇肋急脹膨疼不思飲食

半夏伍兩 茯苓肆兩 芎參兩 細辛 陳皮

桔梗 旋覆花 甘草 人參 桂各壹兩
右為鹿末每服三錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓食前溫服

十味大半夏湯

半夏 大黃各伍兩 吳茱萸 朴硝 桂各貳兩
牡丹皮 柴胡 乾薑 細辛 白木各參兩
右為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓食前溫服

半夏煮散 治胃冷有痰嘔逆不食飲食及中酒後大宜服

半夏 木通各拾陸分 前胡 白木 茯苓
陳皮 檳榔各陸分 桂伍分 枳殼伍分 旋覆花伍分

方十八

十五

右為細末每服三錢水一盞入生薑三片同煎至八分去滓空心服餘滓再可煎日午服

旋覆花湯 治榮衛虛弱或胃風寒胃氣衰微停留宿飲

頭眩躄倦痰唾如膠嘔逆惡心不思飲食

旋覆花 細辛 前胡 甘草 茯苓各貳兩
半夏伍兩 桂肆兩 烏頭肆个 生薑捌兩

右為鹿末每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服不以時

金箔鈔粉丹 治風痰鬲腕上盛心神煩執蕪悸心忪眠睡

不寧口苦舌澁頭旋惡心精神昏倦

鈔白霜 鐵引粉各壹兩 金箔伍拾片留參拾斤為衣

乳香 白礬 神錦朱砂 半夏

酸棗仁各壹兩 人參半兩 銀箔伍拾片

右為細末研藥同拌勻入生薑自然汁煮麵糊更入蜜少許元如小豆大以前金箔三十片為衣每服二十元煎入參薄荷湯任下食後臨臥服米飲亦得

前胡半夏湯 治痰氣客於上焦嘔逆不思飲食頭目昏眩

前胡 人參各壹分 陳橘皮 半夏麴 枳殼 甘草 木香各半兩 紫蘇葉 茯苓各壹分

右為細末每服三錢水一盞半生薑七片煎至一盞去滓取七分熱服日二三服

薑汁湯 治胃中痰飲積聚不消咳嗽逆吐飲食不下脾胃

方十八

十六

久虛肌躄羸瘦或自下者

半夏半兩 桔梗 橘皮黃者 茯苓各貳兩
附子 甘草 桂各壹兩 椒壹兩半

右為鹿末每服三錢水一盞半煎至八分去滓入薑汁半醋杓再煎食前服

白雪元 治痰壅膈膈逆及頭目昏眩困倦

天南星 烏頭 白附子 半夏各壹兩 滑石 石膏 龍腦 麝香各壹分

右為細末極稀糊為元如菜葉大每服三十元薑蠟茶或薄荷茶下食後服

開胃正氣散 治痰和胃

厚朴 各壹兩 半夏 各壹兩 生薑 肆兩 陳橘皮 藿香葉
甘草 人參 白朮 各叁分

右為鹿末每服二錢水一盞入生薑五片棗一枚同煎至六分去滓食前溫服

水者完 治久病不思飲食胃膈痰滿痰多咳嗽

半夏 藿香葉 白朮 人參 山藥

茯苓 各壹兩 粟米末 兩 白麵 壹兩

右同研勻每服旋以冷水和為劑元如梧桐子大每服三十元先以生薑五片水一盞煮薑至七分然後入藥并蜜一皂大煮藥令熟以匙緩緩抄喫用煮藥湯下

酒癥元 治酒積開胃取痰

方十八 十七

巴豆 壹百陸拾个內壹百伍拾个去皮膜

半夏 粉霜 各壹錢半 神翅 半兩 乳香 壹錢

麵壹斤 硃砂 壹分 輕粉 壹分半

右將麥孽末半兩用水半碗熬麥孽末至八分一盞瀝去滓再入黃連三錢熬成水黃和硬軟得所少水只熬黃連水添和元如小豆大熟乾用陳粟米半升炒藥元子如銀褐色為度每服一元食前開胃只食後止痰涎嗽生薑酒下至二元消食濃煎蘿蔔湯下中酒嚼丁香生薑酒下二元如要動取積嚼破二元相臧臍加減大有神効

乾薑芎藭元 治冷嗽

蜈蚣 貳个 芫花根 伍分 躑躅花 肆分 乾薑 芎藭
桂 各肆兩 人參 細辛 各貳兩

右為細末煉蜜和元如大豆大每服五元米飲下日三稍加至十元忌生葱菜等

半夏藿香元 治脾胃久虛寒痰雍滯嘔吐苦水噦逆清涎

背背氣刺脇肋牽疼頭痛目眩效嗽上喘腹中水響寤悶惡心飲食不下宿食難消又名丁香半夏元

半夏 各壹兩 陳皮 半兩 丁香 木香 藿香
人參 各壹分 肉豆蔻 壹分

右為細末薑糊和元梧桐子大每服二十元薑湯下不以時一方半夏 兩 天南陳皮 兩 甘松 兩 一方無豆蔻

方十八 十八

有檳榔茯苓壹分藿香 兩

款肺元 治肢飲上乘上氣喘急痰涎不利咳嗽不得卧宜服此

黑牽牛 兩 檳榔 半夏麴 青皮 各壹兩
五靈脂 兩 紫蘇子 分 木香 壹兩

右為細末冷水和元如豌豆大每服一十元食後薑湯下

大半夏湯 治痰冷癖飲胃膈不利

半夏 伍斤 白朮 茯苓 人參
甘草 附子 桂 各貳兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

半夏夜冬飲子 治痰飲嘔吐

半夏兩 附子 赤茯苓 白朮 人參

黃橘皮 丁香各壹分

右為細末空心薑煎五錢心躁者去丁香飲甚者加細辛葶藶一分枳殼實四個

烏頭元 治停飲

草烏頭斤 青鹽兩 青橘皮 陳皮 良薑 乾薑 茴香各壹分

右為細末醋煮麵糊和元梧桐子大空心溫酒或鹽湯下三元以漸加至三十元忌熱物羊血蘿蔔生葱

青龍元 治痰涎壅盛咽喉作聲胃膈不利頭痛惡心

消石兩 滑石 白礬各壹兩 赤粉脚 青黛兩 鈔白霜各壹兩

右六味合和勻用湯浸蒸餅和元梧桐子大生薑湯下十元

丁香餅子 治痰涎嘔逆吐瀉不止飲食不進

沉香 丁香 人參 藿香葉

柿蒂各壹兩 甘草壹分

右為細末晉棗二十枚蒸熟取肉和搜得所用蒸餅劑三二箇包裹蒸熟去麵入白搗三五百下元如彈子大捏作餅子如不進食用生薑二大片夾藥在內以麻縷纏定麵裹煨熟放冷去麵細嚼空心米飲下如咳逆用

水一盞藥二餅子生薑三片同煎至七分空心服立効

延年夜冬飲子 主心胃中有停痰宿水吐水出後心胃間

虛氣滿不能食消痰氣令人飲食

茯苓兩 人參兩 白朮兩 生薑肆兩

枳實兩 黃橘皮壹兩

右六味切以水六升煮取一升八合去滓分溫三服如人行八九里進之忌酢物桃李雀肉等仲景傷寒論同出第十七卷中

小溫中元 暖胃膈消寒痰利咽膈止嘔逆進飲食定咳嗽

乾薑兩 半夏 天南星各壹兩 茯苓壹兩

丁香兩 陳橘皮兩

右為細末水煮麵糊和元梧桐子大每服三十元至五十元食後稍空煎生薑湯下

海藻元 治酒癖因酒後飲水停留於胃膈之間及兩脇下

痛短氣而渴

海藻 漢防己 吳茱萸 川椒 芫花

甜葶藶各壹兩 甘遂兩

右為細末煉蜜和杵三二百下元梧桐子大每服以溫酒下七元日三服

鍾乳元 治脾胃受寒中焦停飲咳嗽喘滿衝氣奔急背冷

面浮嘔吐白沫呀呻有聲乘秋風冷多作喘急而咳

團參 細辛 乾薑 當歸 附子各半兩

鍾乳粉兩壹 吳茱萸分壹

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元空心溫酒下

桂心元 治咳嗽咽喉乾燥語無聲音

杏仁兩壹 桂兩壹 交門冬兩壹 乾薑

甘草分壹

右為細末煉蜜和元如羊棗大綿裹含化一元不以時

薑元 溫胃破痰

良薑 乾薑 青皮 陳皮

半夏兩壹

右為細末薑汁糊和九梧桐子大每服三十元薑湯下

不以時

方十八

廿一

消痰飲元 治酒癖飲酒停痰水食不消化嘔逆不欲聞食

氣腹中水聲

乾薑兩壹 赤茯苓兩壹 白朮兩肆

枳殼兩壹 半夏兩壹

右為細末煉蜜和搗三二百下元梧桐子大每服三四

十元以粥飲下日三服

桔梗杏仁元 治腹中冷癖水穀癥結心下停痰兩脇痞滿

按之鳴轉逆害飲食

桔梗兩肆 桂兩肆 杏仁分伍 芫花分拾貳

巴豆分捌

右除別研者外為末後與巴豆杏仁同研勻水煮麵糊和元如棗豆大每服二三元臨卧米飲下

桂元 治肺胃氣不調上膈痰滯喘滿氣促語聲不出

欵冬花兩半 馬兜鈴分壹 杏仁兩壹 苦葶藶兩半

桂心壹錢

右為細末蒸棗肉和元梧桐子大每服二十元以溫水下臨卧服

下臨卧服

枳殼橘皮湯 治痰氣停積胃中痞滿嘔吐不思飲食

茯苓 白朮兩壹 人參 枳殼兩壹

陳橘皮分叁

右為細末每服三錢水一盞半入生薑七片同煎至七

方十八

廿一

分去滓溫服日三服

辰砂元 墜風痰進飲食

辰砂 白礬兩壹 半夏兩壹 人參

天南星兩壹

右為細末生薑自然汁煮麵糊和元如棗豆大每服十

五元食前臨卧生薑湯下

黑神元 治氣消食化痰

皂角兩壹 杏仁 半夏次入 知母次入

貝母兩壹

右一一炒令黑色便入蘇一兩攪令勻後更入巴豆半

兩摻藥在上更不得攪動便急着器蓋令不得出煙

四面以濕紙固濟其縫候冷便出於地上以紙襯攤勻蓋覆出火毒一宿為末醋煮麵糊為元如菜豆大每服三元至五元生薑醋湯茶酒任下無時候服

人參半夏元 墜痰化涎

半夏 北礬 人參 赤茯苓各壹兩

右為末以水浸蒸餅了却用紙裹煨熟和藥元如菜豆大每服食後夜卧用淡生薑湯下十五元開胃口薑棗湯下風痰皂角一寸薑三片蘿蔔三片同煎湯下

半夏白朮元 治酒癖留滯脇肋堅痛胃腹滿悶飲食進退及嘔逆惡心

白朮貳兩 半夏 乾薑 枳實

右為細末水煮麵糊為元梧桐子大每服二十元生薑湯下不計時候

羌活散 治咳逆

羌活 附子 茴香各半兩 木香 乾薑各叁分

右為細末每服一錢水一盞入薑煎至七分去滓溫服不以時候

深師消飲元 治脾土衰弱水飲不消停積胃膈伏留脇下喘滿氣逆嘔吐惡心吞酸噦苦飲食遲化短氣心忪酒癖

腸鳴腹中漉漉有聲目視眩暈大便鴨溇小便不利

白朮斤半 枳殼兩半 乾薑 茯苓各叁兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元食前熟米飲下

化痰玉靈元 治丈夫婦人積年久嗽一切風痰頭目昏眩

胃膈不利喘滿嘔噦喉中介介及吐逆不能下食四肢倦悶肌躄煩執不思飲食悉能治之

天南星 半夏各壹兩 天麻半兩 白麵肆分

右滴水元和元梧桐子大每服十五元水一盞先煎冷沸入藥煮熟漉出別以生薑湯下

白朮茯苓湯 治脾胃氣弱痰飲不消嘔吐酸水噫醋惡心

胃膈膨悶腹脇脹滿轉側水聲虛氣痞寒不能飲食脇下急痛咳唾尤甚臍下堅滿心忪悸動頭眩喘咳及療時行發汗或下之後仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者

白朮 茯苓 甘草 白芍藥

右件等分停為鹿末每服三大錢水一盞半煎至八分去滓稍熱服不以時入生薑五片棗二箇煎服

半夏湯 治急下涎痰

半夏壹兩 皂角壹寸 甘草壹兩 生薑兩枚

右水一椀煮去半頓服亦名十緡湯一方減甘草一味

龍膽元 解暴熱化痰涎涼心膈清頭目

草龍膽 白礬各肆 天南星片切各 半夏片切各

右為細末用極稀麵糊和元梧桐子大每服三十元臍茶清下咽喉腫痛口舌生瘡並宜服

皂角 消食破氣治嗽化痰

皂角肆 乾薑壹 巴豆 杏仁各拾

右除皂角外將三味以沙炒黑色存性同為末醋煮麵糊為元如菘豆大每服二元臨臥熟水下

良薑 治中寒痰唾

高良薑 乾薑各壹 桂 黃橘皮各半

右為細末水煮麵糊和元梧桐子大每服三十元至百元空心生薑湯下

粉霜 半夏元 化痰涎利胃膈

半夏肆 白礬叁 黑牽牛子貳 粉霜壹

右為細末合和勻以生薑自然汁煮糊為元梧桐子大朱砂為衣每服十元食後白湯下

半夏元 治積痰不散上衝心臟變為風癇不問長幼服之

半夏伍 白礬 朱砂 魏州黃丹各叁

右為細末研勻以粟米飯和元梧桐子大每服二十元人參湯下不以時氣虛者游黃丹白礬各以木柴煨過方在博濟

半夏厚朴湯 下痰涎養脾胃

半夏伍 茯苓肆 厚朴叁 紫蘇子貳

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分去

滓溫服不以時

甘松 香元 治痰眩

半夏肆 天南星各貳 甘松壹

右為細末水煮麵糊為元梧桐子大每服二十元生薑湯下食後

黃耆散 通流榮衛調適陰陽治久嗽痰多虛煩食少

黃耆壹 黃芩兩 薏苡仁半兩 人參壹 甘草錢

右為細末每服一錢水一盞煎至七分去滓溫服食後丁香半夏元 溫益肺胃思進飲食治咳嗽嘔吐胃膈痞滿消痰飲癖止心嘈煩

方十八 廿六

半夏貳 白木壹 丁香壹

右為細末薑糊和元梧桐子大每服二十元薑湯下不以時

玉液化痰元 治風壅化痰涎清頭目止久嗽利咽噤定煩

寒水石兩 半夏 白礬各壹兩半

右為細末用湯浸蒸餅和元如豌豆大每服十元生薑湯下或人參竹葉湯下

倍末元 治五飲酒癖宿冷停寒嘔逆痰水忪悸頭眩逆

支滿喜唾清涎膈中痞悶腹內寒清汗腸鳴濕勝瀉瀉兩脇脹痛心腹時痛身肘腫色黃短氣心下盤結如桮動按

瀝瀝有聲常服建脾胃進飲食散寒滲濕逐飲温中

白木兩 乾薑兩 桂各肆兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前米飲下

白木茯苓湯

治飲積宿痞痰停膈上頭痛目眩噫醋吞酸嘈煩忪悸喘咳嘔逆躄重脇痛腹痛腸鳴倚息短氣身形如腫觸逐支飲通利小便及療時行若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩振振身搖

白木兩 茯苓兩 甘草各貳兩

右為鹿末每服三錢水一盞半煎至八分去滓稍執服不以時

對薑元

方十八 廿七

半夏兩 天南星各半斤 乾薑斤

右為細末薑汁糊和元梧桐子大米飲下三五元不以時

三倍元

治痰飲不熱不冷者嘔吐不已

木香兩 陳皮兩 半夏兩 右為細末生薑汁糊和元梧桐子大每服三四元食後白湯下

丁香元

治胃冷有痰

半夏兩 白礬兩 丁香壹分 右為細末薑汁煮麵糊和元如小豆大每服五元食

後益湯下膈上有痰涎只服三服墜下立見効

五夜散

治胃虛有痰

半夏兩 生薑兩 陳粟米壹合約 右為細末每服一大錢水一盞煎至六分去滓温服時

桂苓元 治水飲不消停留胃腹短氣上喘頭眩心忪面目壅痲心胃注悶不思粥食兩脇脹滿小便利腰腿沉重足脛浮腫遍身黃色時復自汗

桂兩 茯苓各一分減

右為細末熬稠糊和元梧桐子大每服三十元陳皮湯下熟水亦可

小半夏湯

治心腹虛冷避痰氣上胃脇脹滿不欲飲食嘔

逆惡心頭疼眩暈臂背寒嘈煩多睡

半夏兩 陳皮兩

右攪勻每服一分水一盞生薑十片煎至六分去滓温服不以時

大半夏元

墜痰涎

半夏兩 生薑各半斤同研如泥焙乾為細末 右用生薑汁煮糊和元梧桐子大每服三十元食後生薑湯下

半夏茯苓湯

治痰悸

半夏兩 茯苓兩 右剉每服二錢水二盞薑半兩同煎至七分去滓温服

不以時

神應散治痰涎

膽礬

半兩內壹分上
枯壹分生為末

鈔丹 壹分

右為細末每服半錢以淡烏梅湯下

厚朴天南星元治脾虛停飲兼治瘧疾

厚朴

天南星 等分

右為細末薑汁黃糊和元如梧桐子大每服三十元生

薑湯下不以時

鐵刷散治痰神効

白木皮

味不
肥鐵器

右件藥去麁皮搗羅為末用白麵不用赤滓也每服一

方十八

大錢七米飲調下並不拘時候空心服至三服取下痰

氣虛者食後服之化痰為妙

天門冬元治勞嗽發熱涕唾稠粘

天門冬

湯浸去心
竹刀切焙

右末之煉蜜和元梧桐子大臨卧熟水三五元

大半夏湯治心中温温欲嘔惡聞飲食有時吞酸此由宿

寒在胃胃寒則不能運化水穀胃屬土而惡湿故常欲嘔

其脉關上小弦而短宜服此

半夏

白木 各伍

人參 半兩

右為鹿末每服五錢水三盞煎至一盞去滓入白蜜夏

子大停少時温服

大藿香散治心下虛滿不入飲食時時欲嘔無所出噎

噎短氣此由他病後寒邪傷氣氣不復常漿粥不入胃

胃無以養其脉微弱宜此

藿香葉

人參

茯苓

桔梗

桂

木香

白木

半夏 各半

枇杷葉 拾片

右為鹿末每服五錢水三盞先炒薑絲一分為藥同煎

至一盞去滓温服食前

乾葛湯治心下微煩惡聞熱物得熱即嘔時時喜渴此由

邪熱畜於胃中胃中得熱則氣不清氣不清則陰陽渾其

脉虛數或細而疾宜此

方十八

乾葛

甘草

半夏 各叁

右為鹿末每服五錢水二盞生薑三片竹茹棗許大煎

至一盞去滓温服

若心下悶乱嘔吐不止夜卧不安手足躁擾水漿不下此

由冷熱失和邪正相干清濁不分陰陽錯乱喜冷者因熱

惡冷者因寒名曰霍乱寒者其脉弦大宜理中湯 別門

半硫元熱者其脉疾數宜小藿香散不止者宜服青金散

半硫元下痰

半夏

硫黃 兩

右為細末生薑麵糊和元梧桐子大每服三十元飲下

不以時

青金散墜痰

硫黃

水銀等分

右二味同研不見水銀為度生薑汁調一錢不以時

金針元治卒然嘔吐胃中痞悶氣不下行此由飲食失宜過傷胃氣胃氣滯而不行水穀不化氣逆則吐其脉沉疾而短滑宜此

巴豆

朱砂等分

右用白麵糊和元如麻子大遂旋用針穿一竅子每服一元以針刺定於燈上燒少時熟冰下

青金末香元治嘔吐日漸羸瘦氣上促急此由陰陽痞隔不下降內無陽以溫之水穀津液反出其脉浮之即有按

之全無上部有而下部無宜此

硫黃

水銀各半兩二味同研不見水銀為度

木香

吳茱萸各壹分

右同研勻生薑汁煮糊和元梧桐子大每服十元生薑湯下

此蘇半夏湯治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇

半夏

紫苑茸

五味子

陳橘皮各半兩

杏仁壹兩

桑白皮壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞半薑七片煎至一盞去滓熱服日三

甘藷湯順氣寬中破堅祛積逐痰水行結氣消除腹脹

通利痞塞肺氣壅滯喘悶不快胃中停飲腹脹鼓痛或嘔逆涎痰呼吸短氣或脇氣牢滿骨間刺痛又治欬逆腫滿背脊拘急大便祕滯小水赤澀

甜葶藶

杏仁

半夏

神翹壹兩

黑牽牛肆兩半

皂莢伍錢

右為細末後入葶藶杏仁再研勻調浸皂莢酒為麵糊和元梧桐子大每服二十元或三十元溫生薑湯下

頭面頭痛

旋覆花元治頭眩欲嘔心下溫溫胃中不利但覺旋轉此由痰飲飲聚上乘於腦三陽之經不得下行盤鬱於上其脉兩手開上沉弦而急或細謂之痰眩宜此旋覆花元

桂

枳實

人參

乾薑

赤芍藥

白朮各伍分

茯苓

狼毒各壹分

烏頭

礬石各壹分

細辛

大黃

黃芩

厚朴

葶藶

吳茱萸

芫花

黃橘皮各肆分

甘遂錢

旋覆花伍分

右為細末煉蜜和元梧桐子大米飲下三元加至七元食後

但運而不眩發則伏地昏昏食頃乃蘇此由榮衛錯行氣血溷亂陽氣逆行上下相隔氣復通則蘇脉虛大而澀謂之氣運宜流氣飲子草烏頭湯

流氣散子

紫蘇葉 青橘皮 當歸 赤芍藥

烏藥 茯苓 桔梗 半夏

川芎 藁香 枳實 防風各半兩

甘草 橘皮各參分 木香壹分 連皮大腹壹兩

右為鹿末每服三錢水一盞薑三片棗一箇煎至七分

去滓溫服

草烏頭湯

草烏頭 細辛 茶牙各等分

右為鹿末每服三大錢水二盞煎至一盞去滓細服

不以時

方十八 卅三

降真丹 治風痰偏正頭痛項背拘急或傷風不可忍者

石膏壹兩 烏頭半兩 白附子 白殭蚕

天南星 藿香壹兩 辰砂壹兩 研

芎 甘草各壹分 白芷半兩 細辛壹分

麝香半兩 別研

右為細末滴水元和如雞頭大於風陰處浪乾一服一

元細嚼臍茶下食後

論曰頭眩者謂身如旋轉不能仰仰則欲倒頭重不能舉至有視物不正或身如車舡上由此肝虛血弱而風邪乃生蓋風氣通於肝諸風掉眩皆屬於肝其脉左右關上虛弦謂之風弦宜香芎散桃紅散

香芎散

芎芎 獨活 旋覆花 藁本

細辛 蔓荊子各壹兩 石膏

甘草 荆芥穗各半兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分溫服

不以時

桃紅散

辛羅白附子 黃丹等分二味同炒黃色

右將白附子為末茶酒調一錢匕不以時

白附子散 治頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒留於骨髓二者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛宜服此

麻黃節 烏頭 天南星各半兩 乾薑壹分

方十八 卅四

蝎伍箇 白附子壹兩 朱砂壹分 麝香壹分

右為細末每服一字酒調服訖去枕卧少時又多曲鬚

一穴在耳上將耳掩前正當尖上可灸七壯左痛灸左

右痛灸右

清神散 乾洗頭藥

川芎 川烏頭 蒼朮 滑石

苳蓂根 白芷各半兩 菘豆壹合

右為細末每用二錢擦於頭上候少時洗之

聖餅子 治偏正頭痛

川烏頭 天南星 乾薑各壹兩 甘草並上

川芎名貳

防風壹分

天麻半兩

右為細末湯浸蒸餅和元如芡子大陰一夕來自暴乾每服三兩餅子先嚼荆芥三兩穗方嚼藥茶清送下不以時

黃耆膏治頭面生瘡

綿黃耆

吳白芷

槐角

防風

當歸各半

杏仁貳

右用麻油四兩木炭火慢慢熬候藥焦瀝出不用入黃蠟二兩熬成稀膏入坩器中收密封旋取如面油用之

細辛元治頭痛久不羸

烏頭

荳蔻

川芎

細辛各半

甘草壹分

右為細末用石膏半斤研細入甘鍋子內大火煨過飛去石末滴石膏水和丸如彈子大茶酒任下一元不拘時候

石膏元治傷寒偏正頭疼惡心痰逆

石膏肆

玄精石貳

消石壹兩

烏頭壹

右為細末薑汁煮麵糊為元梧桐子大每服十五元荆芥湯下重者不過三服

香茶散治痰癖頭痛

細辛

草烏頭各壹分

陳茶牙貳

麝香少許

麝香熟入

右為細末每服三錢水二盞煎至八分麝香臨熟入少許不過三服愈

朱砂丹治一切頭痛

辰砂水飛

石膏燒赤地內出

白附子各壹兩炮

生腦子半錢

右為細末粟米飲為元梧桐子大薄荷湯細嚼下五元日中嗽朱砂內養一方無石膏

神聖散治頭痛不可忍者

乾蝎半生半熟

藿香葉

細辛

麻黃去根節

右等分為細末每服一錢薄荷酒或荆芥茶調下非時

茯苓椒目元治身面浮腫凡此病或是虛氣或是風冷氣或是水飲氣或腫入腹苦滿急害飲食

葶藶子柒

椒目

茯苓各叁兩

吳茱萸貳

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服十元米飲下日三

勞藥黃老湯頭但能仰視目不能開而眩暈出若涕惡風而振寒此由腎氣不足動作勞損風搏於肺腎氣不足則

膀胱不榮於外故使強上頭視因其勞動而受風在肺故

唾出若涕而惡風謂之勞風宜此

白芍藥貳

黃耆貳

川芎貳

烏頭半

右為鹿末每服五錢水二盞生薑三片棗二箇煎至一盞去滓溫服

通頂散 治頭痛不可忍不問偏正頭痛諸藥無效者及治赤眼牙痛神效方

乾薑 香白芷各半 蒿角子 壹分

右為細末每日用半錢許作三次細細搗之入鼻內揉動兩大陽穴其痛立止

硝石元 治腎厥頭痛

硫黃 研別 石膏 水飛過候乾畧入 天南星 甘錫子火煨赤

右等分為細末水煮麵糊為元梧桐子大每服三十元空心食前溫酒下如未効加作五十元

硫黃元 治頭痛

硫黃 兩 消石 壹兩

右為細末水和九梧桐子大空心騰茶嚼下十五元凡頭痛如破及暑暈皆治之

黑散子 治頭風痛不可忍

天南星 壹分 不艸皂夾 壹分

右二味同入瓶子燒令通赤放冷再入川芎荆芥穗與燒藥等分用內川芎減半同杵為細末騰茶清調下蜜水亦可

麝香散 治通耳疼不止

尿鹹 麝香各少許

右研細乾摻耳中其痛即減膿亦可

治膿耳

白礬 桂 號丹 右等分入麝香少許研為細末每服用少乾貼

治頭痛

附子 石膏煨赤

右等分為細末入龍麝少許茶酒調下

藁朮散 治鼻上赤

右藁朮一味細末先以皂角水擦動赤處拭乾以冷水或蜜水調塗乾再用

又方

右用硫黃末水調塗亦佳

鷄卵膏 治耳聾

方十八 卅八

右用鷄子一箇於頭邊打一眼子內入小蝦蟇一箇以麻纏脚巴豆二箇去皮蠟紙封合炮鷄子候熟研細點入耳中

蚯蚓散 治耳聾

蚯蚓 去 川芎

右二味等分為細末每服二錢食後臨卧茶清調下

延年去風令光潤桃人洗面方

右取桃人五合去尖用糯米飴漿水研之令細以漿水搗取汁令桃人盡即休微溫用洗面時長用極妙

千金療面黥三方

右以李子和雞子白塗上則落夜塗面曉以漿水洗

便塗胡粉不過五六日有效慎出入

又方

右以美酒浸雞子三箇密封面七日成塗面淨無比

羌活湯治風痰頭痛

昔年有進士李龔病三年每發頭痛即心煩或嘔少痰涎即頭痛少減居常驚恐意不樂不奈勞役大便秘結或噴怒即覺左手少力以羌活湯治之

羌活兩

芎藭

防風苗

麻黃節

赤芍藥

大黃

人參

甘菊各

茯苓

紫菀

遠志去心

桂心

檳榔

蟬殼

甘草各

壹兩

方十八

廿九

右為鹿末每日秤一分水三盞入生薑三片煎至一盞半去滓温分二服食後久服乃効

治中風面腫

有男子年六十一脚腫生瘡勿食猪肉不安醫以藥利之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡耳上有浮泡小瘡黃汁出乃与小續命湯加羌活一倍服遂愈

如神散治夾腦風及一切頭痛不可忍

獨頭乾薑

草烏頭

右等分入香白芷少許同為細末先令病人噤水一口鼻內搗藥一字不移刻便止

治偏頭痛

右取仙人骨細搗為末煎湯沃之澄清以水左痛右點

鼻中右痛左點鼻中立差仙人骨是放花枯蘿蔔也

輕金散治太陽厥逆偏正頭痛夾腦風

甘菊花各

川芎

白芷

旋覆花

川烏頭

藿香

天南星並生用

各式錢

右為細末每服一字臘茶清調下不拘時候不可多服只一兩服病差便止如患偏頭疼不問年深但只聞合此藥氣味其病已自半愈服之神驗

川芎湯治頭目昏重肢膝之倦

川芎兩

防風兩

龍腦兩

薄荷葉兩

桔梗兩

細辛兩

甘草兩

半兩

方十八

四十

右為細末煉蜜和元每兩二十五元每服一元食後細嚼茶清下

清神散治頭目不清精神昏憤

川芎

荆芥穗

香附子各

防風

澤瀉

甘草

石膏

荻藜各

右為細末每服一錢茶清調下不以時

降真丹治風虛痰盛上攻偏正頭疼腦痛項背拘急或傷

風頭痛不可忍者

石膏

川烏頭

白附子

白僵蚕

天南星

藿香葉

辰砂壹

川芎

甘草

白芷

細辛各

麝香壹

右為末薑汁麵糊和元桐子大每服二元臈茶嚼下不
羌加元數

大愈風丹治上焦風熱頭疼腦痛無時

薄荷葉 牛膽 天南星 防風各壹

甘草生用 乾生薑各壹

右為細末煉蜜和元每一兩作十五元食後茶清嚼下

檀根煎治肺經風熱上衝面往瘰癧及赤瘰瘡刺

檀香 蟬殼 柴胡各壹 天麻各壹

皂角搗 牛黃 腦子各壹

右為細末煉蜜和元梧桐子大一服三十元食後荆芥

湯下

方十八 四十一

開胃散治婦人洗頭風及牙關緊急

天南星壹个重半兩者酒同生薑汁浸

半夏 川烏頭 白附子 芎 防風

雄黃 朱砂各半 牛黃 麝香各壹

右為細末酒服半錢小兒急慢驚風薄荷湯調下一字

雞峯普濟方卷第十八

雞峯普濟方卷第十九 馮翊賈兼重校定

消渴 水

熟乾地黃元治疝腎煩渴小便數多脚弱陰萎唇乾眼澁

身躄乏力

熟乾地黃兩 五味子 澤瀉 遠志

牛膝 玄參 車前子 桑螵蛸 山茱萸

桂心 人參 附子各半 黃耆 枸杞子

肉蓯蓉 薯蕷 牡丹 白茯苓 甘草各壹

麥門冬壹兩 兔絲子 白石英各壹

右為細末入石英研令勻煉蜜和杵三五百下元梧桐

子大每於食前以溫酒下三十元

方十九

黃耆元治大渴後上焦煩熱不退下元虛乏羸瘦無力小

便白濁飲食微少

黃耆 肉蓯蓉 鹿茸各壹 人參各壹 枸杞子各壹

熟乾地黃兩 白茯苓各壹 甘草各半 地骨皮兩

澤瀉 附子 巴戟 禹餘糧 桂

牡丹皮 五味子 龍骨各壹 磁石壹 赤石脂分

麥門冬兩半 牡蠣壹

右為細末入研了藥令勻煉蜜和杵五百下元梧桐

子大每服食前米飲下三十元

從容元治疝腎小便滑數四肢羸瘦脚膝乏力

肉蓯蓉兩 熟乾地黃壹兩 麥門冬兩 澤瀉

五味子 各半 磁石 黃耆 人參 各壹

桂 半兩 巴戟 兩半 地骨皮 分叁 當歸 半兩 鷄臍脰 兩壹

赤石脂 兩半 韭子 兩半 白龍骨 兩半 甘草 半兩 禹餘糧 分叁

牡丹皮 兩半 桑螵蛸 壹兩 右為細末入研了藥令勻煉蜜和杵三五百下元梧桐

子大每服食前清粥飲下三十元

山茱萸元 治三消飲食倍多肌躰羸瘦小便頻數口乾喜

飲 山茱萸 鹿茸 附子 炮 五味子 菴蓉

巴戟 澤瀉 禹餘糧 牡丹皮 各壹

磁石 麥門冬 赤石脂 白龍骨 各壹

方十九 二 枯樓 熟乾地黄 韭子 各壹 桂心 壹兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元空心酒下

日再服

腎瀝湯 治疝腎氣虛損發渴小便數腰膝痛

鷄臍脰 遠志 人參 黃耆 澤瀉

桑螵蛸 熟乾地黄 桂 當歸

龍骨 各壹 甘草 半兩 麥門冬 貳 五味子 兩半 磁石 叁兩

白茯苓 兩壹 芎藭 貳兩 玄參 半兩 右為末每服用羊腎一對切去脂膜先以水一大盞半

煮腎至一盞去水上浮膜及腎次入藥三錢生薑半分

煎至五分去滓空心溫服晚食前再服

雞內金散 治消渴

朱砂 黃連 鐵粉 括蕒 各壹 赤石脂

蘆薈 龍骨 各壹 鉉丹 胡粉 各壹 甘草

右為細末煉蜜和杵五七百下元梧桐子大每服三十元食前米飲下

花菴蓉元 古今錄驗論消渴病有三一渴而飲水多小便

數其脂似麩片甜者此是消渴病二喫食多不甚渴小便

少似有油而數者此是消中病也三渴水不多但腿腫脚

先瘦小陰萎弱數小便者此是腎消病也特忌房勞若消

渴者倍黃連消中者倍菴蓉腎消者加芒消六分服前件

鉉丹元得小便鹹苦如常後恐虛憊者並宜服此

花菴蓉 分捌 澤瀉 五味子 紫巴戟天

地骨白皮 括蕒 各肆 磁石

人參 赤石脂 各陸 乾薑 拾

禹餘糧 分叁 桑螵蛸 壹拾 右為細末煉蜜和元梧桐子大以牛乳空腹下二十元

日再服忌海藻菘菜胡荽無苳等

黃連黃耆元 治疝腎小便白濁四肢羸瘦漸至困乏

黃耆 黃連 熟乾地黄 牡蠣

鹿茸 各壹 白茯苓 土苳根 玄參 地骨皮

龍骨 人參 桑螵蛸 五味子 各叁

麥門冬 貳 菴蓂 兩半 右為細末煉蜜和杵五七百下元梧桐子大每服三十元食前米飲下

雞內金散 治消渴

朱砂 黃連 鐵粉 括蕒 各壹 赤石脂

蘆薈 龍骨 各壹 鉉丹 胡粉 各壹 甘草

右為細末煉蜜和杵五七百下元梧桐子大每服三十元食前米飲下

雞內金散 治消渴

朱砂 黃連 鐵粉 括蕒 各壹 赤石脂

蘆薈 龍骨 各壹 鉉丹 胡粉 各壹 甘草

澤瀉各壹兩半 牡蠣分壹 蝶蛸拾壹分 雞胚脰壹分

右為細末空心大麥湯調下三錢匕小便減渴止食服後

薯蕷元 治消腎小便滑數四肢少力羸瘦困乏全不思食

薯蕷 雞胚脰 熟地黄 牡丹皮

黃耆 苳蓐根 白龍骨 白茯苓

山茱萸 桂 澤瀉 附子

枸杞子各半兩 麥門冬貳兩

右為末煉蜜和杵三五百下元梧桐子大每服食前以清

粥飲下三十元

茱萸黃耆元 治消腎心神虛煩小便無度四肢羸瘦不思

飲食唇舌乾燥脚膝乏力

方十九 四

黃耆 山茱萸 人參 五味子各壹分

熟乾地黄 雞胚脰 肉苳蓉

牛膝 補骨脂 鹿茸各壹兩 麥門冬貳兩

地骨皮 白茯苓 玄參各半兩

右為細末煉蜜和杵三五百下元梧桐子大每於食前

以粥飲下三十元

人參腎瀝湯 治大虛不足小便數噓吸焦渴引飲膀胱滿

人參 石斛 麥門冬 澤瀉 熟地黄

括蕐根 地骨皮各兩 遠志 甘草 當歸

五味子 桑白皮 桂心 茯苓各半兩

右為鹿末以水一盞半煮羊腎一箇至一盞入藥二錢

仍先去腎前室六分去滓溫服不以時

增損腎瀝湯 治腎氣不足消渴小便數腰痛乏力消瘦

遠志 人參 澤瀉 熟地黄

當歸各壹分 桂 茯苓 黃芩

甘草 芎藭 龍骨各壹分 五味子貳分

麥門冬貳分

右為鹿末以水一盞半煮羊腎一箇至一盞去腎入藥

二錢煎至六分去滓溫服日三兼服後方

熟地黄散 治消腎小便滑數口乾心煩皮膚乾燥腿膝消

細漸至無力

熟乾地黄 雞胚脰 黃耆 白茯苓

方十九 五

牡蠣粉 人參 牛膝各壹兩 麥門冬 桑螵蛸

枸杞子各壹分 龍骨壹兩半

右為細末每服三錢以水一中盞煎至六分去滓非時

溫服

白茯苓元 治消腎因消中之後胃熱入腎消燠腎脂令腎

枯燥遂致此病即兩腿漸細腰脚無力

白茯苓 覆盆子 黃連 人參 苳蓐根

熟乾地黄 萹藶 玄參各壹兩

雞胚脰壹分 石斛 地床子各壹分

右為細末煉蜜和杵三五百下元梧桐子大每於食前

煎磁石湯下三十元

千金百瓦湯 治消渴虛乏食少無力小便頻數

白木各壹 熟乾地黄各壹 陳皮 人參

甘草 黃芩 遠志各壹 當歸 桂

白芍藥各壹

右為鹿末每服四錢先以水三大椀煮屋上瓦二兩拾

年以上者打碎如皂子大者至一椀半去瓦塊入藥末并生薑干片

棗一箇再煎至二大盞去滓放溫服渴時飲之多喫妨下

苗耆散 治消腎心神煩悶小便白濁

黃耆 麥門冬 茯苓 龍骨 苳蕒根

熟乾地黄 桑螵蛸 白石脂 澤瀉各壹

甘草參分

方十九 六

右為細末每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三箇

煎至六分去滓空心溫服

鐵粉湯 治消渴不止心神煩亂宜服此湯

鐵粉壹 麥門冬兩 牡蠣 知母各壹 黃連

苦參 苳蕒根各壹 金薄片壹百 銀薄片百

右為細末鐵粉同研令勻不以時候清粥飲調下一錢

金消鈔丹元 治消渴不止

金薄片百 銀薄片百 鈔丹 麥門冬 牡蠣

知母各壹 黃連 括蕒根 苦參各壹

右為末用括蕒汁和准夏季即用煉蜜和元梧桐子大

每服四十元食後以米飲下日進二服當日必見効可

服及十日每三五元後每日只進一服服藥次勿覺腹痛以厚朴六錢陳皮一分生薑六錢都剉碎用水二升煎至半升溫服訖良以用水飯壓之腹不冷痛不用此法

腎氣元 治腎不足羸瘦百劇吸吸少氣躄重耳聾小便頻

濁渴欲飲水腰脚无力行履艱難

熟地黄兩 山藥 山茱萸各肆 牡丹

澤瀉 茯苓各壹 附子 桂心各貳

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服三十元空心酒下

鈔丹散 止消渴主小便數兼治消中

鈔丹 胡粉各壹 括蕒根 甘草各捌

方十九 七

澤瀉 石膏 白石脂 赤石脂各壹

右八味治下篩水服方寸匕日三服一年病者一日愈

二年病者二日愈渴甚者夜二服腹痛者或作元服亦

佳一服十元傷多令人腹痛

兔絲子散 治消腎小便白濁或不禁

兔絲子 黃連 肉蓯蓉 五味子各壹

蒲黃 雞胚脰中黃皮各壹 磁石半兩

右為細末入研藥令勻每服二錢食前粥飲調下

人參鹿茸元 治消腎小便滑數白濁將欲沉困

鹿茸 肉蓯蓉各壹 黃芩 人參

土苳根各壹 雞胚脰拾 兔絲子各壹

右為細末煉蜜和杵三五百下元和子大每服三十元食前米飲下

薯蕷湯 止渴退熱男子消渴小便極多水飲一斗小便一斗腎氣丹主之既服前腎氣丹補其虛損食後宜此藥

黃耆 茯苓 苳蕷根 人參

甘草各壹兩 麥門冬各壹兩 熟地黄各壹兩

右水煎服之此病切忌慎者三一飲酒二行房三鹹食及麵食

麥門冬湯 治腎虛小便數而渴并歌清瘦形容又躄虛相逢

惟是舌乾枯上焦客熱下元冷涼藥如何解去除請公採取菝葜服溫脾補腎藥中殊一一志心依此服上下和平

渴自無

菝葜壹兩對 如豆大

右用水二盞半煎至八分去滓溫服旦中暮各一服竟減則日二服後以藥調補此方在腎瀝湯方前

斷渴湯 治消渴不止

烏梅肉兩 麥門冬 人參 甘草

茯苓 乾葛兩

右為細末每服三錢以水一盞半煎至六分去滓溫服

加減六物元 治熱中消渴

括蕷根兩 麥門冬壹兩

人參 苦參粉 土瓜根各壹兩

右為細末以牛膽汁和元梧桐子大每服二十元日三服大麥粥汁下未知漸加至三十元咽乾者加麥門冬舌乾加知母脇下滿加人參小便難加苦參小便數加土瓜根

阿膠湯 治虛熱小便利而多服石散人小腸虛熱當風取冷患脚氣喜發動兼渴消腎脉細弱微宜此湯

阿膠兩 乾薑拾 麻子仁 遠志各壹兩

附子壹

右為鹿末每服二錢以水一盞煎至六分去滓溫服不以時

菝葜黃連元 渴人引飲既久夏秋之交濕氣過多脾胃又

弱時或洩瀉

黃連末兩 茯苓陸 木香貳分 訶子皮壹

右為細末水煎麵糊為元梧桐子大每服三十元空心瀉止勿服

葛根飲子 止渴

葛根 麥門冬 竹茹 菝葜各半

右為鹿末水煎或熬粥食之亦佳

乾葛散 治消渴

仙人骨去花結子了 仙人養衣出了蓮子

乾葛 銀湯餅內鱗

右四味等分為細末每服二錢紫蘇熟水下

枸杞湯 治虛勞口中苦渴骨節煩熱或寒

枸杞根升伍 麥門冬升叁 小麥升貳

右三味以水二斗者麥熟藥成去滓每服一升日再服

消餘元 治消渴小便不禁

退鉗鍋壹 牡礪不以多

右以牡礪實內在鉗鍋內大火煨通赤放冷各搗研為

細末每秤一兩更入乾葛一兩研勻以雞子清和元梧

桐子大每服二十元猪肉湯下

嬰粟湯 治消渴引飲不止

嬰粟不以多

右研煮稀粥日飲一盞

兔絲子元 治渴

兔絲子揀擇水淘浸三日控令乾乘潤杆篩鹿末再焙

右為細末煉蜜合麵糊為元梧桐子大每服米飲下三

十元

黃連元 治渴

黃連不以多

右內猪肚中飯上蒸爛同杆元梧桐子大每服米飲下

三十元

治渴不止方

右冷水浸桑椹食之甚奇

神効黑神元 治三焦渴疾

好籐丹壹兩用綿裹扎定甑中以蓋薑之蒸升炊了取出於地下用碗覆蓋少時及熟毒氣為度

右用好京墨研濃如稀糊搜和為元如梧桐子大如少

壯人每服五七元年老三兩元漸加元數服之不渴更

不得再服然後服補藥大忌房色及炙煨之物

黃連煎 治酒毒水毒渴不止

黃連末以新括薑根汁和作餅子焙乾

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服三四十元熟水下

不以時

熟乾地黃元 療五勞七傷六極八風十二痺消渴心下積

聚常服身壯潤澤補養精血

熟乾地黃拾貳分 天門冬拾分 乾薑陸分 兔絲子拾分

石斛捌分 當歸壹分 白朮壹分 白芍藥壹分 牛膝壹分

紫苑壹分 防風壹分 地骨皮各陸分 甘草捌分

肉苁蓉壹分 麥門冬壹分 玄參各柒分 人參壹分 茯苓壹分

杏仁壹分 麻子人各捌分 椒目壹分

右為細末煉蜜和元梧桐子大空心酒下二十元再服

漸加至三十元忌鯉魚海藻菘菜桃李雀肉魚鮓蕪荑

濡咽煎 治渴口舌燥澁

甘草兩 酥壹兩 蜜各壹兩

右內蜜中煎如薄膏含嚥之

生地黃元 治消渴面黃咽燥短氣除虛熱補養

地黃汁各叁升半 桔薑汁各叁升半 牛脂叁升 白蜜半

黃連末禮

右同煎可元即元梧桐子大每服五元不以時米飲下

萊菔元 若其人素渴引飲一旦不渴小便日夜數十行氣之內消謂之消中

茯苓 五味子 山茱萸 乾山藥

右等分為細末酒煮麵糊為元梧桐子大米飲下三十

元空心

治水

附子木香元 治水氣下後補藥消積進食凡水氣已經利下疾證往來不定

附子 木香 石斛 桂

方十九

黃耆 磁石 椒目 茂

當歸 鹿茸 人參 茯苓

枳殼 訶子 黃橘皮 桃人

白朮 桑白皮 桔梗 牛膝

乾薑 厚朴 吳茱萸各半

右為細末以猪腎三對生研入酒三合饑餅少許同杵和元梧桐子大每服二十元空心食前溫米飲下

治水氣法

此病緣脾氣衰弱土不能制水致水妄行始則脛腫漸次腹腫流溢皮膚遍身浮腫百藥不効可服此玉龍元先叙證候次具始末一宗元散若別遇明醫治之減退

更不須此藥或疾勢未瘳不可輕聽庸醫妄進藥餌恐傷臟腑及損動血氣愈難將息

辨水證

項脛脈動睡起眼浮下如蚕卧足脛腫股間冷身重倦行行即喘急面有時而白及光潤準頭黑腸門瀝瀝如水鳴鼻尖常冷小便赤澀雖頻數絕微細大便燥結即即哽氣或喉中如水雞聲腹脇滿悶咳嗽不止凡此皆水證也不可盡紀此病不宜動大腸峻瀉醫者多用羌花大戟甘遂葶藶猪苓澤瀉之類故消取雖易補閉即難往往致水復來而无以治之也今茲紀方各有次序有補有瀉全不損氣能除病根若疾勢未甚不可遽服

方十九

須是證候十分臨證可數服之見効愈捷

紫金丹

治水

丁香半 木香壹錢 檳榔 肉豆蔻各壹

白丁香半 朱砂壹分 雄黃壹分 輕粉壹錢

粉霜半 桂府滑石壹分 水銀壹分

赤土壹分 班猫拾分 巴豆壹分 乳香壹分

桃仁壹分 廣礮壹分 牛黃壹分

麝香壹分 鵬砂壹分

右二十味為細末水煮麵糊為元如菘豆大每服十元至十五元量虛實加減蓋欲行水須先去滯積未服玉龍元當先進此藥如不動再加元數服之候取動可服

王龍元方在後

地黃紫金丹 治水氣汨支飲上氣欲變成水心下堅硬者

地黃研令无声 禹餘糧炒醋淬 木香

肉豆蔻 乾薑 茯苓 當歸 羌活

牛膝 青橘皮 芎 荆三稜

陳橘皮 蒺藜子 桂 附子 蓬莪朮

茴香 針沙五兩先水淘極淨以鐵銚子炒乾入米醋貳升煮醋令乾就銚中煨通赤用之或參兩

右為細末饑餅和元梧桐子大每服三十粒空心食前米飲下

干苓元 治水氣補藥兼治男子婦人五勞七傷病勢甚者

柳絮研斤壹 雷元壹 柴胡兩 樟柳根壹

木瓜片切乾漆各半 白礬兩 膽礬

芫花 檳榔 茴香 石斛

定粉 不艸皂角 桂各半

青皮貳

右為細末用青州棗煮熟去皮核將藥末用醋五升熬成膏後入棗同勻用大斧槌一千下逐旋元如菘豆大每服十元食後生薑湯下日三服

三部茯苓煎 治三焦上中下焦合為三部三焦道閉塞不能便去雖得小去隨復如故其病面目黧黑手足逆冷身

躄枯燥肌膚甲錯身無潤澤漸羸瘦或時嘔吐或大便燥或後重下痢起止甚難久或絞痛雷鳴時時下痢

茯苓分 大黃或煨 白木各壹 桔梗

芎 熟地黃 神麴 前胡各貳

乾薑 桂各壹 黃芩或半 人參

白芍藥 葛蒲各壹

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服十元米飲下非時

椒人元 若腹脹如鼓按之堅硬腹中時痛始起於目下微腫時喘小便不利四肢瘦削其脉自沉大便利則逆謂之石水繞臍堅硬腹不痛者謂之鼓氣石水宜椒人元鼓氣宜木香元方在後

椒人 五靈脂 吳茱萸 甘遂

玄胡索 續遂子 郁李仁 黑牽牛子

附子 木香各半 芫花 石膏各壹

信砒壹

右為細末水煮麵糊和元如菘豆大橘皮湯下一元空心臨卧未知加一元復未知日午再服一服

水腫茯苓煎 治肢飲上氣黃疸及脚氣消渴後成石水腹脇堅脹足脛浮腫上氣不得卧口乾頸脉動腹脹間冷大小便不利

茯苓 白木 椒目各肆 防已

葶藶 澤瀉各伍 赤小豆 前胡

芫花

桂各壹分

芒消分

甘遂分

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服五粒日一服漸加之以小便利為度

十水丹 治水

青水先從面目腫大戟主之

赤水先從心腫葶藶主之

黃水先從腹腫甘遂主之

白水先從脚腫上氣而咳葶藶本主之

玄水先從面腫至足腫芫花主之

黑水先從跌腫連翹主之

風水先從四肢起滿大身盡腫澤瀉主之

方十九

十六

石水先從四肢小腹腫滿大桑白皮主之

累水先從小腸滿巴豆主之

氣水乍盛乍虛乍來乍去赤小豆主之

右十味藥皆等分與病狀同者則倍之白蜜和元先食

服一粒如小豆大日三服欲下病者服三粒乃量虛實

增減之

七百五十元 方行水補虛

葫蘆巴

破故紙

丁香

葶澄茄

大椒

芭豆

烏梅

木香

右一處為細末水煮麵糊為元如黍米大每服五元食

後茶湯下量虛實加減服此藥大和氣進飲食消滯積

白元子 治水氣

龍腦

粉霜各壹分

輕粉壹分

海蛤壹分

海中燒黃

海蛤

寒水石

滑石

再研如粉

海金沙

陽起石

右研勻細糯米飯爛研元如豌豆大每服十元生薑湯

下不以時日三服五日後牙縫中血出及臭涎即住服

如涎血未出加十元又五日未下更加十元直以涎出

出即住藥未即每五日更加元數腫消則尤要將息慎

椒目煎 治大腹水腫氣息不通睡臥不得上喘氣急

椒目

黃牽牛

桂

昆布

海藻

甜葶藶

牛黃

人參

方十九

十七

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服十元米飲下不以

時日二服加至二十元以小便利為度

滑石元 利小便治水氣

木通

滑石

瞿麥

海金沙

甘遂

通草

水蛭

地膽

右為細末糯米粥和元梧桐子大臨臥煎燈草滑石湯

下七元

千金翼澤瀉湯 主水通身洪腫四肢無堪或從消渴或從

黃疸支飲內虛不足榮衛不通血氣不行喘息不安腹中

響脹滿眼不得視方

澤漆根

赤小豆

甘草

鯉魚

麥門冬 茯苓 人參各二兩 生薑兩

右八味切以水一斗七升先煮鯉魚小豆減七升去之內藥者取四升半去滓一服三合日三弱人二合再服氣下喘止可至四合時小便利腫氣減或小溲下若便大利還從一合始大便止若無鯉魚同音亦可用水甚不得卧卧不得轉側加澤漆一片渴加葶藶三兩效加紫苑二兩細辛一兩欬冬花一兩桂三兩增魚汁忌海藻菘菜鮓物等

解帶散治水腫腹脹如鼓上氣喘急前後心刺痞小便不利

海帶 海藻 昆布 益智
木香 雷元 蘿蔔子 皂皂黃

方十九 十八

右等分為細末每服二錢酒一盞煎之服後須分泄百以次

論說

病源曰腎者主水脾胃主土土性尅水脾与胃合相為表裏胃為水穀之海今胃虛不能傳化水氣使水滲液經絡浸漬臟腑脾得水濕之氣則病脾土不能制水故水氣獨歸於腎三焦不瀉經脉閉塞故水氣溢於皮膚而令腫也其狀目裹上微腫如卧起之狀頸脉動時咳股間冷以手按腫處隨手而起如物裹水之狀口苦舌麁不得正偃偃則效清水不得卧卧則驚效甚小便黃色是也水病有五不可療第一唇黑傷肝第二缺盆平傷心第三臍凸傷脾第四足下平滿傷腎第五背平傷肺凡此五傷必不可療

脉沉者水也脉洪大者可治微細者不療也養生方云十一月勿食自死肉脯動於腎喜成水病黃帝問曰水與皮膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯對曰水始起也目裹上微腫如蚕卧起之狀頸脉動時效陰股間寒足胫腫腹乃大其水已成發手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也膚脹者寒氣客於皮膚之間殼殼然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹陷而不起腹色不変此其候也鼓脹者腹脹身腫大与膚脹等其色蒼黃腹脉起此其候也腸覃者寒氣客於腸外与胃氣相搏正氣不得營因有所繫瘕而內著惡氣乃起息肉乃生其始也大如雞卵稍以益大至其成也若懷子之狀久者離歲月按之則堅推之則移月

事不以時下此其候也石瘕者生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之曰膚脹鼓脹可刺耶對曰先瀉其腹之血絡後調其經亦刺去其血脉師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脉亦浮外證附腫按之没指不惡風其腹如鼓不滿不渴當發其汗正水其脉沉遲外證自喘石水其脉自沉外證腹滿不喘黃汗其脉沉遲身熱發熱曾滿四肢面腫久未愈必致癰

方十九 十九

膿腸覃石瘕病惟婦人有之宜服萬安元方在勞莊門中千金論曰大凡水病難療差後特須慎於口味又病水之

人多嗜食不廉所以此病難愈世有醫者隨逐時情意在財物不本性命病人食肉於貴勝之處勸令食羊頭蹄肉如此者未見一愈者耳又此病百脉之中氣水俱實療之皆令瀉之使虛羊頭蹄極補那得療愈所以治水藥多用葶藶等諸藥本草云葶藶久服令人虛故水病非久虛不得絕其根本又有蠱脹但腹滿不脹而四肢面目但腫醫者不善診候療蠱以水藥療水以蠱藥或但見脹滿皆以水藥如此者仲景所謂醫殺之今錄慎忌如左療蠱方在後

喪孝產乳音樂房室諷戲一切魚肉生冷酢滑指無粘米豆油膩並不得食之亦不得用心以上禁者別具本方之下惟房室等猶三年慎之不復再發不慎差而更

方十九

廿

發重發不可更療

諸從腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗即愈論曰此病多從久患氣急不差或從消渴或從黃疸或從支飲或從虛損大病差後失於時治或因產後或因脚氣腫滿或因久患癰疽久經利下或因飲水不即消三焦決漏小便不利變成此疾

川朴消息

凡欲治療當治感疾之由隨證施方以治之十種水氣川朴消前治十種水氣此方出神仙密經人間无本鄭練師向天台金壇上石壁所記有數本錄得傳療諸疾自行此方二十餘年得効者甚多凡水氣有十種此方俱療之一差以後永不再發但能斷得鹹物无不効者此是先聖所

傳石壁金壇所記有此靈驗有人先患脚氣十餘年發盛便成水病四時之中偏身腫滿腹硬如石水飲難下靡覺飢渴但喘鹿不得卧頭不着枕二百餘日無問晝夜即呻吟飲常須倚物而坐羸弱異常因服此藥當日氣散十日後肚硬消盡二十餘日後氣力如舊既獲神驗傳於世

川朴消

杏仁各壹兩

川芎硝

烏頭

甜葶藶紙隔炒赤

葶藶子水浸芽出炒黃色

馬牙消半兩

椒目各壹兩

右葶藶葶藶子杏仁等相和先杵一千杵取大棗十枚者取肉與前件藥都研令勻然後入煉了蜜和搗一千杵元梧桐子大每服桑白皮湯下二十元空心

方十九

廿一

補元散水腫消後補益血氣

人參

白朮

黃耆蜜炙

苦葶藶

山藥各壹兩

木香半兩

附子壹個

右為細末薑棗煎二錢以水一盞煎至六分去滓不以時溫服

龍元治胃熱伏水胃腹膨脹

陽起石

白滑石

硃砂

南鵬砂各半

輕粉

粉霜各壹

右七味都一處先用紙裹了次用麵餅子可半寸厚者裹上更用數重濕布裹之文武火燒經兩時辰取出上麵紙盡灰悉去之麵如未焦色再燒半時辰已焦熟

即止地上掘一坑子可五六寸深取藥種焙之一宿出火毒來日取出剥去焦麵將藥再研如粉飯尖和元如菘豆大飯尖亦須爛研少與藥末用力和揉令勻若飯尖多即藥力少如元以青黛為衣

服藥法

第一日三元三服

二日四元四服

三日五元五服

四日六元六服

此日夜更用前紫雪丹微動一二行即第五日七元服七服六日八元八服七日十元三服如小便透下住此藥者病大小有只服三四日小便透者至七八日透但小便透為度不拘遠近日數也如未甚透快更服此

勾水石韋散方十九

勝金龍治大腹水氣背刺喘急息不能通

牛黃

昆布

海藻各壹兩

牽牛兩

桂壹兩

甜葶藶兩

椒目兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服二十粒食前米飲下日三漸加至四五十粒日三四以水利為効尋常些小發動覺氣促疾盛夜卧不安數服見効

萬病散十種水病

牽牛子

桑白皮

白朮

黃耆

丁香

陳橘皮

破故紙各等分

右為細末先煎生薑湯一盞半先喫半盞用半盞調藥

一大錢七服藥後更喫半盞

海藻元治諸水病者不可填取令便下其水盡其後再發必便困敗三分利之一分立便斷蓋諸酸膩滑淡食經旬日後患者氣稍調則更利之如是三度服藥將養以校為度緣先以脾熱克腎號土水相尅也脾土既病下尅於腎水氣不收故成其疾也范汪曰脾胃為表裏胃為水穀府胃虛不化水穀氣海溢而經絡閉故患者大便小便不通寒之氣扇於脾而脹矣主水病坐卧喘急

海藻

昆布

黃牽牛子各拾兩

葶藶拾貳兩

椒目

桂各肆兩

牛黃貳兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二三十元橘皮湯下

湯下

桂黃元治水氣腫滿小便不利

硫黃肆兩

桂

白朮

赤茯苓

澤瀉

豬苓

黃橘皮各壹兩

右為細末水煮麵糊和元梧桐子大每服五十元空心橘皮湯下一方無桂以饑餅和元

天神精丹消水腫治癥瘕氣塊及諸風疾等

丹砂

曾青

雌黃

雄黃油煎

磁石各壹兩

金牙石陸字

右將丹砂雌黃二味酸醋浸三日曾青用好酒器中浸紙封日中暴之百日急用七日亦得無以火煖訖各研

如粉以好醋拌勻用好砂量藥多少用合子量大小盛之先以赤石脂固縫外黃土蓋紙中和泥固濟候乾用一鐵三脚子可高五寸其不置火約置合子底以三日火不絕為度候冷水浸乾泥令透可取打開合子其蓋子上有五色者佳雪白者最上三色者下研令細乾棗肉和元如粟米大每服一元二元如口噤者以鹽梅水洗口牙關自開灌藥下即省曾青如蚯蚓泥如黃連者佳世少此者好崑崙碌亦得以王相日天晴明齋戒沐浴合之若躰無痛處四肢不收神智不乱一臂不隨時能言者可治不能言者不可治謂之風痲宜天麻散西州續命湯如服續命湯而多汗則以金牙酒代之

艾麴散治痢後虛腫水腫者服此藥小便利止腫消散

艾麴壹升

乾薑

細辛

椒目

附子

桂各壹兩

右為細末每服二三錢温酒調下產後虛腫者大良忌

猪肉生葱生菜

葶藶散治食水腹堅漸大四肢腫滿

甜葶藶兩

川芒硝兩

椒目兩

水銀壹兩以藥內少許研尽

防已

海蛤各壹兩

右為細末蜜元梧桐子大每服三十元米飲下

不以時候

海蛤丹治水氣

海蛤 膩粉 青滑石 寒水石

玄精石 白丁香各壹分

右滴水和為一塊子以濕帛三重裹用白麵包作一毬子用溲灰火燒半日球響為度滴水和元梧桐子大第一日三元第二日三服六元至七日七元方不加元數黑鉛龍腦水下忌鹽魚濕麵等物

白元子 治十種水氣

輕粉

粉霜各壹分

玄精石壹分

滑石半兩

硃砂半兩

白直丁香貳拾分

右先次將粉霜玄精硃砂勻研滴水為元用白麵裹草火內燒麴熟為度不用裹藥麴復同餘藥元如菜豆大

方十九

廿五

再用滑石為衣第一日服三元三服二日五元第三日八元日八服不動臟腑其水隨小便出其効如神熟水

葫蘆散治遍身水腫

木通

葫蘆子各壹兩

澤瀉壹分

防已貳分

猪苓

海蛤各壹兩

右為細末每服五錢水七分酒七分入葱白五寸煎至八分去滓食前温進當下小便數升腫消

天雄元若皮膚骨殼然堅腹大身盡腫皮厚按之沒指陷而不起腹色不変大小便如故此熱客於皮膚之間寒則氣收聚而不行因而經絡壅遏結於皮膚之間謂之膚脹

治之當瀉氣而散寒

天雄兩半 甘遂壹分 黑牽牛酒浸壹宿今熱先去酒炒乾搗麵壹分
 枳實去穢炒 黃橘皮各半 連皮大腹壹兩酒浸壹宿炒
 右為細末酒煮麵糊和元梧桐子大薑湯下食後每服三五元

集驗赤豆湯 療虛熱及服石熱當風露臥冷濕傷飢熱阻

在裏變成熱風水病心腹腫滿氣急不得下小便不利大便難四肢腫如皮囊感水晃々如老蚕色陰卵堅腫如升脛腫生瘡臭如死鼠此皆虛損腎中有熱強取風冷溫痺故也內宜依方服諸利水藥外宜以此湯洗四肢訖以葱豆膏傅之別以猪蹄湯洗瘡爛處及卵腫也

赤小豆 葱 葵藜子 菘菜子

葫蘆根伍升 巴豆壹百個

右六味以水一石二斗煮取四斗以淋洗身腫處古今錄驗同

朱砂水銀煎 治水氣

朱砂 水銀 巴豆 粉霜各壹分

大赭石兩半 蔓荊子兩半

右為細末饑餅和元如彈子大每患者安臍中以軟紙一張摺蓋之後用裹肚繫定令病人臥只一兩食飯間其疾自小便出水約二三斗便住取出藥恐過度却用生薑汁調黃連末半兩作一枚安臍中依前用紙蓋裹肚繫定煎桑白皮湯煮大麥麵餽飢喫之羌後三日用藥

補之如後

海蛤 破故紙 白甘遂 木香

右等分為細末每服半升米飲調下空心忌醃藏生冷鹽等物及醋

石草散 利小便

石草半兩去却上黃毛 木通 瞿麥各半

桂府滑石兩壹 甘草兩半

右五味為細末每服四錢水半升燈心一束同煎至一半去滓徐々呷之立効如水透快一晝夜可下數斗便覺身軀輕快行步如常但極清瘦皮骨相着蓋膜間病氣去盡故也然牙齒微動紅腫牙齒間腥臭涎粘出三

兩自雖多莫訝便是此藥搜撓中腠間病根一時俱出也候三兩日出得有次第以綿塞子裹治牙藥塞之則已更用青黛糞穰固濟其佳蓋水本腎病須當治腎方得病退畢竟無妨恐不知有此應驗故先序述水退後須服此續命丹閉水門方在前

猪蹄洗湯 療丈夫服石有虛熱因勞損熱盛當風臥傷於

風濕身變成熱風水腫病滿氣急四肢欲腫小便不利陰卵堅腫莖腫生瘡赤爛臭如死鼠各水疸以湯洗之

猪蹄壹隻 黃蘗伍兩 葫蘆根伍升 葶藶子伍合

葵藜子壹升

右五味以水三斗煮取二斗令洗之日三次

木香元 消滯積行水

木香 檳榔 陳橘皮 商陸
木通

右為細末水煮麵糊和元梧桐子大每服米飲下二十元不以時

論曰病腫者皮膚緊急腫滿無文沒指若目下微腫如臥蚕之狀及足脛皆腫小便不利其人喘急脉沉大而疾此由脾腎虛弱腎虛水不能象氣揚溢脾胃虛則不能制水水氣流散於經絡經絡水病故能腫滿謂之正水宜正陽丹疏朱丹方見腹脹門脉沉細而弱大便滑皆治大便秘者亦治

正陽丹

方十九

廿八

宣州木瓜 壹斤去皮核子切碎以童子小便好酒各壹升煮令爛攪取汁
大豆 壹斤 附子 半兩 人參 壹兩
銀朱 壹錢

右將三味為細末與銀朱一處研勻將木瓜汁和元梧桐子大煎椒人木香湯下三十元

防已湯

治腹滿按之沒指隨手而起餘與正水皆同但四肢聳動其脉亦浮此由肺氣久虛為風邪所客氣不得運百脉閉塞水氣上行謂之皮水亦宜發汗次以大豆湯

防已 黃耆 桂 各參兩 茯苓 兩

甘草 壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服非時

寒水石 滑石 膩粉 各半兩 粉霜
硃砂 各參兩

右同研勻滴水為膏用濕帛一張裹在內麵一斤和作毬盛藥於牛糞熟火內燒麵勻翻焦熟為度取藥出用青黛羊兩同研滴水和元如豌豆大第一日服三粒日三次服嚼龍腦或生薑燈心木通湯下

初和甫治水腫等方

方十九

廿九

經云平治權衡謂察脉浮沉也去遠陳壅謂滌腸胃中腐敗也開鬼門謂發汗也潔淨府利小便也脉浮如秤衡之在上即發汗鬼門汗空也脉沉如秤槌之在下即利小便淨府小腸也又腰以上腫宜發汗腰以下腫利小便千金外臺並有正方不過麻黃防已白朮猪苓五苓脂之類世醫不知此悉用棗粉水銀之類攻之百無一生齒脫口糜氣耗而死余元豐中親見貴人被害忍復言邪

神助散 仁宗賜名治十水之病四肢面目俱腫喘急不得卧小便澀腹中氣滿

葶藶 兩 黑牽牛 貳兩 木猪苓 水浸軟切去黑皮焙
澤瀉 各壹兩 椒目 壹兩

右為細末先以葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒半

蓋調藥三錢絕早面東服如人行十里以漿水葱白煮
稀粥至葱爛入酒五合熱啜量入啜一升來不得喫鹽
并麵自平旦服至日午當利小便三四升或大便喘定
腫減七八隔日再服既平之後必須大將息及斷房室
等三年孫兆父子常進

黃龍散 如服青龍丹後至第五日水道澀滯不快即服之
如通快不須服

木通 瞿麥各壹兩 大黃兩半 陳橘皮壹分
檳榔肆個

右為細末每服二錢或三錢隨澀甚不甚加減用湯使
三盞用煎至八分和滓熱服今具湯使如後通草燈心

方十九

卅

各一分小麥一合水三升煎取汁一半去滓用煎藥自
初每日喫三服每服下青龍丹三元喫至七日每日加
一元都共一百二十六元

茯苓湯 治皮水其脉亦浮外證肘腫按之沒指亦不惡風
其腹如鼓不渴當發其汗渴而不惡寒者此為皮水身腫
而疼狀如風痺皮水為病四肢腫水在皮膚中聶聶動防
已茯苓湯主之

防已 黃耆 桂各叁兩 茯苓陸兩
甘草貳兩

右為細末水一盞煎藥三錢至六分去滓溫熱服非時
白朮散 若其人久下利之後卒然身躄足脛面目浮腫小

便反快切其脉大而虛此由脾肺虛弱肺虛則不能潮諸
氣脾虛則肌肉空踈氣無所歸

黃橘皮 大腹皮 茯苓皮 生薑各半兩
白朮壹兩

右為細末米飲調下三錢不以時

若不因他病面目卒然如水身無痛形不瘦不能食切其
脉大緊此由風寒之氣客於腎經其脉從腎上貫膈入肺
中故上乘肺而氣不下流風與氣搏故面目浮腫久不治
之腎傳於心令人善驚暴痿而死

澤瀉湯

澤瀉 天雄 白茯苓兩半 防風壹兩

方十九

三十一

枳實兩半 右為細末每服五錢水二盞薑三片煎至一盞去滓溫
服食前

小黃耆散

黃耆 赤小豆各壹兩 去疾藜 枳實各半兩

防風壹兩

右為細末米飲調下二錢或溫酒亦可

白朮散

白朮 甘草各壹兩 白茯苓兩半 桑白皮分叁

右為細末每覺渴時點一錢服之無時服數水消後尋
常可服此補益散方在後

補益散

陳橘皮 大腹皮 茴香各壹兩 桂兩

右為細末每服一錢溫米飲調下日進三服

已上八方須依次第服食病除後忌生冷鹹酸酒麵油膩雞猪葷發風物只喫淡粥飯或石子鶴子候積漸得食力可食者軟羊肉宿饑餅不妨其他一切不可食蓋水候自是亂思飲食往往緣此發動大可為戒房事尤不可道養本法三年戒忌縱不能亦須一年戒忌又此病大忌灸針飲酒毒物

青龍丹

治水氣蔣提倉惠水氣其勢甚危他藥無効因張

苦叟傳此取水數斗遂尔如舊有餘藥以贈一杜道人亦

方十九

三十三

患水氣亦一服而効

青黛 鵬砂各壹兩 白丁香 輕粉各貳分

右同研勻滴水作塊子用蒸餅劑裹一重桑柴皮內煨候熟再裹一重又煨熟放冷剥去麵用水煮麵糊和元

桐子大茴香湯下前件藥先契勘七日内合喫的確元

數依樣大小服之自第一日至七日水未盡中間不可

斷續服也第四日第五日其畜水隨小便出約一二斗

候肚皮塌是効如有餘證即服向後準備藥第一日三

粒二日四粒三日五粒四日七粒五日六粒九粒並茴香湯下日三服

越婢加木湯治腰上浮腫骨節疼痛其人惡風面目悉腫

小便不利此由風濕客搏脾經脾受濕則腫風又剋脾脾氣不流行氣聚為水以風行於上故但腰已上腫其脈浮太當發汗風水其脈自浮外證骨節疼痛其人惡風身軀不疼但重而酸其人不渴汗出即愈此為風水惡寒也此為極虛發汗得之夫風水脈浮為表其人或頭汗出表無他病病者但下重故知從腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸防已黃耆湯主之腹痛者加芍藥風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出而無大熱者

麻黃兩伍 石膏斤半 甘草兩貳 白木肆兩

右為鹿末每服五錢水二盞生薑三片棗一箇煎至一盞去滓溫服惡風加炮附子半兩

方十九

三十三

水病之初先自上腫起如老蚕色狀頭脈動股裏冷脛中滿按之沒指腹內轉側即有聲此其候也不即治須臾身軀稍腫肚盡脹按之隨手起則病已成猶可為治此是從虛損大病或下痢後或從支飲或從消渴或從崩漏或從氣或從黃疸或從瘡癰婦人產後飲之水不即消三焦決病小便不利乃相結漸漸生聚遂流諸經絡故也

葶藶子元治身面浮腫及治腫入腹苦滿急害飲食方

葶藶子兩 椒目 茯苓各叁兩 吳茱萸兩貳

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服米飲下十元日三服此滿或是虛氣或是風冷或是水飲氣此方皆治之

樟柳散消諸般水腫

白樟柳片壹 陳皮兩貳 木香兩壹 赤小豆肆兩

右為細末入水杵為元如菘豆大每服二十元橘皮湯下或為散作鯉魚羹如料入用

黃者五兩湯

治黃汗其脉沉遲身熱發熱曾滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿中室塞不能下食結聚疼痛暴躁不眠此為黃汗黃汗之病兩胫自冷假令發熱此屬歷節食已汗出身常暴躁盜汗出者此勞氣也若汗出已晚反發執者久其身必腫發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒身輕者久必身潤潤即胃中痛及從腰上汗出下無汗腰臑弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此為黃汗

方十九

三十九

黃者伍

白芍藥

桂各叁

甘草叁

右為細末每服三錢水一盞生薑七片棗一枚同煎至七分去滓食後溫服

黃者桂枝酒湯

黃汗之為病身熱腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如蘗汁脉自沉此得之出入水中浴水從汗孔子入為黃汗

黃者伍

白芍藥

桂各叁

右為細末每服三錢水九分醋一分相和煎之去滓溫服當心煩也至六七日乃解若煩不止者以苦酒阻故也一方以清美醞代苦酒

庚戌八月十二日夜夢為費無慮縣封治水氣藥方

每牽牛三粒對胡椒一粒每胡椒十粒對木香皂子大蠅稍一箇

右為細末水煮熟糊和元如麻子大每服十元臨卧橘皮湯下令與赤小豆煮附子藥同服乃効於次年八月中費無慮縣封果患水疾令服此方遂愈

神掌膏

治十種水氣

巴豆各半 膩粉兩 硫黃壹龍眼大壹塊子
右研勻滴水成膏作餅子用綿裹數重貼患處臍中以帶子勒之初更用藥至中夜覺身似火熱水從小便下候四更腫消去藥然後喫調氣藥補元散方在前

地黃餅子

謹藥王治水方

方十九

卅五

白丁香左列

地黃

南鵬砂各等分用炒合子盛

右紙泥固濟用桑木火燒合子通赤取出放冷研細入少白麵滴水作餅子空心嚼細熟水下日三服第二日兩餅三日三餅第四日四餅第五日五餅第六日六餅第七日七餅第八日八餅如水行即止如不及八日但水行住服如牙縫內有血雖水出亦死日進三服其餅子只如雞頭大可矣

大棗杏仁

崔氏療大腹水病身熱腫上氣小便澀赤臍深頸上有兩大脉動唾稠不得眠睡每腫先從脚腫亦有在前頭面腫大便澀者服此藥大佳若先患大便利臍凸腹大脹手掌平滿即不可服此藥

大棗肆拾个肥大不姓者先以煖水浸

葶藶伍兩取苦者 杏仁叁兩不取合歡者以湯去皮煖令黃去尖

右三味先搗葶藶子二万下寫出之乃搗杏仁三百下訖搗和合棗膏搗一万下藥成平旦空腹服之八元日晚食消更服五元以飯汁下之三日後每旦服五元晚服三元如棗核大如大便利未得服此藥若正服藥次忽患痢即先食二三口飯然後喫藥若利過多停藥即可爛煮小豆勿以鹽食之忌鹹脂膩及大冷物等惟得食秬粟米飯及淡醋不得喫稀粥唯只得喫飯佳如食粥即稠煮粥不便遣大便利出

陷水散 治十種水氣極甚腫從脚起入腹證候難忍宜服

方十九

三十六

此方

大戟兩半

當歸

陳皮各壹兩

右為細末每服五錢水一大盞煎至五分去滓臨臥腹空時溫服

逐水散 消腫滿

生薑陸

赤豆各叁兩

鯽魚叁个

右三味實魚腹中以麻線縛之水三升煮赤豆爛去魚只取二物空腹中食之以魚汁送下不汗利即差甚者過二日再作之不過三劑貴戚家乳姥病水飲之一劑即愈

大豆散 消滯氣去濕

大豆肆升燒 白木兩

右為細末米飲調下二錢不以時

桑皮豆法 治水腫小便不利疾輕者

乾香薷陸

白木兩

右二味搗木為末濃煮香薷取汁和木為劑元梧桐子大每服十元日夜四五服利小便極良夏取花葉合用亦佳忌桃李雀肉青魚鯽等

桑皮豆法 治水腫小便不利疾輕者

赤小豆陸

桑白皮兩

右以水同煮至軟爛去白皮只如常服喫赤小豆末已再服无妨和汁飲之尤妙

方十九

廿七

萬金散 治丈夫婦人十種水氣

川獨活不以多少汶上名醫董及之去老活壹本而大者是也

右為細末每服二錢精肉四兩批大片洗過入藥在內麻線繫定銀石器內河水煮令熟令患人喫盡小腸取下泔糊之狀老人五七日再服少壯三兩日病愈止

石英酒 治石水

白石英兩

右碎如大豆盛坩餅中用好酒一斗三升浸如泥封口以馬糞糠批火燒之從卯至午後長令酒小沸火盡即便添燒畢於平處安置日三度飲之如不飲酒亦據器量少飲之餘石英以酒更一度燒煮依前服

商陸逐水散治水氣

白商陸根去麁皮薄切陰乾或焙乾為末

右用黃頰魚三個大蒜三瓣菘豆一合水一升同煮以豆爛為度先食豆飲汁送下又以汁下藥二錢水化為氣內消首即王申病水氣四時悉病不能坐臥晝夜倚壁而立服此一劑頓愈新熱食竟入水自潰及腹為水病

大豆煎治女人久新腫得惡暴風入腹婦人新產上瀉清風入臍腹中如鞭者嘔吸短氣咳嗽

大豆一升

右以水五斗煮之得一斗三升澄清去下濁者內釜中以二斗半美酒內汁中煎取九升宿勿食且服三升溫

方十九

廿八

覆取汗兩食頃廼下去風氣腫慎風冷十日平復如故

治水氣連四肢腫者謂之水氣若止腹腫是蠱毒非水氣

用蓬菁草出秦隴及西蕃如小樹狀本土人識之煎乾取鹿皮去枝幹搗細末空心溫米飲調下半錢匕水即

大泄大小便皆出獲安然後服溫和脾胃藥如理中圓

節喜怒生冷鹹硬濕麵米粥之類忌鹽物不可向口禁

絕慾大効此方本得於西天蕃僧本草不載中國无方

治石水方

十水葶藶散

代州錢防禦命孫兆諤脉得沉緊數六至已上外證目下腫鼻進赤腫唇色紫自心已下腹大腫脹外陰器腫脹如升按之如石堅舉動即喘欬逆痰涎口苦乾渴去得病已

及兩月醫者皆去下虛風氣近曾臍下着灸三里亦灸之

兆告曰病名石水治不主對故不愈仲景曰腰下及腹腫

者皆利其小便又曰腹滿口苦乾燥此腹中有水也方以

防已葶藶椒目大黃元主之遂与服三元日三少覺胃腹

快遂与聖惠方治十水葶藶散初服三錢以葱漿水酒下

食頃以葱漿稀粥投之隔日一服每服葶藶散之日至日

中暮更服防已椒目葶藶大煎元三服次日但進元子三

服九十日覺大便快利腫脹喘咳已減三之一二十日病

去三之二自此消息加減三十日而全愈

治風水法

有兒十五歲病身腫浮數大便自利米穀不化此成風

方十九

卅九

水病以越婢加木湯主之五苓散亦可兼服然正治風水

不及此

消飲白朮煎治支飲上氣不得卧身腫滿小便不利

陳橘皮兩壹

澤瀉

白朮

茯苓各半兩

甘草

防已

葶藶

木香各壹分

右為細末水煮麵糊和元梧桐子大薑湯下三十元不

以時

三稜元治膀胱氣兩脇疼痛遍身虛腫狀如水氣常服治

大小腸氣女人血氣

荆三稜

茴香

白附子

破故紙

甘遂

芫花

檳榔

黃橘皮

當歸 川練子 桂 木香

川椒各半兩

右為細末酒煮麵糊和元梧桐子大每服七元至十元食後白米湯下

水銀丹 治水氣

水銀 牙硝 椒目 苦葶藶各壹兩

右為細末煉蜜和杵五七百下元梧桐子空心服二十元或臨臥其病當從大小便俱利可喫法煮赤小豆以東引桑枝灰淋汁煮豆令熟每日空心喫一盞如渴即飲

白木湯

方十九

白木 甘草各肆分 桑白皮分 茯苓分

右如茶點切不可飲冷

膩粉滑石元 治水氣

膩粉 滑石 海蛤 大麥蘗各貳分

粉霜 硃砂各壹錢 斑猫肆拾枚 和團麵裹燒熟再入

白丁香 白鷹調 鶴鵲糞 鷺子糞各貳分

右研勻與前藥再用石腦油和元梧桐子大瞿麥湯下一元

漢防已散 治虛勞四肢浮腫喘息促急小便不利坐臥不安

漢防已 猪苓各叁分 白木 陳橘皮各壹兩

木香 白木各半兩 桑根白皮 赤茯苓各叁分

檳榔 紫蘇莖葉 木通各壹兩

右為鹿末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

京三稜元 治丈夫婦人頭面手足腫

青皮黃皮各一兩湯浸一宿次日淘赤小豆一合袞煮

二橘皮候豆六七分熟去青皮研黃皮赤小豆如泥若

乾旋添煮豆汁再研極細用後藥

赤茯苓壹兩 猪苓 吳白木

蓬莪朮各半兩 半夏叁分 京三稜捌錢

防已 枳實叁分

方十九

右為細末煉蜜和同小豆泥入臼杵成膏元梧桐子大

每服三十元熱水下不以時

五皮散 治頭目四肢悉腫

大腹皮 桑白皮 茯苓皮 生薑皮

陳橘皮 右等分為細末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓取

七分熱服日二三

雞家普濟方卷第十九

雞峯普濟方卷第二十

馮翔買兼重校定

氣 膈噎附

正氣三和散

治血氣不和上感下虛陰陽不升降心胃痞悶兩肋膨脹情思不樂飲食無味口苦舌鹿四肢倦困脚手酸疼服煖藥則上攻心胃壅滯氣逆服涼藥則臟寒虛冷此藥調順三焦溫養四躰和順胃氣

乾紫蘇葉 壹兩

乾木瓜 壹分

木香

丁香 各半兩

白豆蔻

草果

川芎 川薑

白木

赤茯苓

青橘皮 木通

檳榔

陳橘皮

藿香葉 各半兩

人參 貳兩

紅豆 壹分

甘草 貳兩

大腹子 縮砂

香附子

天台烏藥

肉桂 各壹兩

沉香 半兩勿用火一方用貳兩

右件二十五味為細末每服二錢水一盞生薑三片肥

棗二箇同煎至八分不以時溫服如氣急妨悶入紫蘇三四葉同煎熱服如不及煎每服一錢盞一捻沸湯點

嘉禾散 若咽中如核噎之不下吐之不出久不治之漸妨

於食或由思慮不常氣結不散陰陽阻隔或因飲食之間

氣道卒阻因而留結因氣者謂之氣噎其脈緩澁因食者

謂之食噎其脈短澁並宜此藥并調氣元食噎宜神麴元

後方在

枇杷菜 壹兩 沉香 石斛 各叁兩 薏苡人 兩

杜仲 壹兩皮碎薑汁浸

縮砂仁 兩

藿香葉

木香

訶子 各叁兩

丁香 半兩

半夏 壹兩

青橘皮 兩半

大腹皮 叁兩

檳榔 半兩

白木 貳兩

五味子 兩半

茯苓 壹兩

神麴 壹兩

甘草 壹兩

穀蘖 壹兩

白豆蔻 壹兩

人參 壹兩

桑白皮 半兩

橘皮 叁兩

右為細末每服三錢水一盞乾柿半個煎至七分去滓

溫服食前

橘皮煎丸 治年多冷氣癱瘓積聚四肢无力上氣咳嗽腰

脚疼痛小便頻數下利五漏九瘡婦人血風勞瘦氣劣赤

白帶下少子髮瘁 校定此方用酒參升入陳皮末熬成膏子更入好麴同元梧桐子大服之

陳皮 拾伍兩

石斛

牛膝

杜仲 吳茱萸

陽起石

菴蓉

茄茸 厚朴

附子

兔絲子

京三稜 當歸

萹蘚

乾薑

甘草 桂 各壹兩

右為細末橘皮熬膏元如梧桐子大每服二十元空心

溫酒下

丹砂沉香煎丸 治久積虛冷伏滯及呼吸冷氣膨脹心腹

暴痛兩脇刺疼并婦人血氣疼痛皆主之

沉香 壹兩為末以蜜

阿魏 壹分以酒半升研

沒藥 壹兩為末酒半

巴豆 壹分去皮細研用

硃砂 壹兩以酒半升研令盡以五味同合煨火熬成膏 丹砂 半兩

硫黃 研壹日 檳榔 木香

人參 胡椒 各壹兩 丁香 半兩 乾薑 叁分

橘皮 良薑 煮伍茶 桂 各壹兩

右為細末入硫黃丹砂再研令勻以前膏元梧桐子大每服二三元橘皮湯下心痛嚼破溫酒下不以時婦人血氣當歸酒下

船香元 治膀胱小腸因風寒濕所傷邪氣食於小腹上下牽引發歇疼痛

舶上茴香 土茴香 川練子

胡蘆巴 巴戟 各壹兩 生薑 貳兩 桂 半兩

方二十

車前子 赤茯苓 桃仁 各壹兩 陳皮

附子 木香 各半兩 枳實 壹分 麝香 壹分

右為細末酒煮麵糊為元梧桐子大每服三四元空心溫酒下鹽湯亦得

降氣湯 治胃膈痞悶肢體倦怠

紫蘇子 前胡 厚朴 甘草

橘皮 橫 當歸 半夏 桂 各壹兩

附子 乾薑 桔梗 人參

羌活 各半兩 五加皮 黃耆 各壹兩

右為鹿末每服二錢水一大盞入生薑紫蘇蘇煎至七分去滓溫服食前

大行返煎局方子 沉元是也治心腹疼痛飲食不化

丁香 木香 沉香 檳榔

青皮 白豆蔻 甘草 各伍兩 白木 貳兩

乾薑 桂 各壹兩 訶子皮 麝香 各叁兩

肉豆蔻 貳兩 茯苓 貳兩

右為細末煉蜜和元如雞頭大每服一元細嚼米飲下不以時

分氣元 治男子婦人脾胃虛弱中脘痞塞寒氣不升降四肢倦怠無力多困食飲不消婦人榮衛俱虛經候不調兩肋刺痛膈腹脹滿肢節疼痛時發寒熱面色萎黃日漸瘦弱全不思食

方二十

附子 吳茱萸 當歸 芎

陳皮 蓬莪朮 乾薑 延胡索

桂 五味子 白芷 白及

益智仁 白木 各壹兩

右為細末醋煮麵糊為元梧桐子大每服二三元食前生薑湯下

十膈散 治冷熱憂悲喜怒愁恚食氣疾十膈皆是一種病也並因憂鬱冷熱不調又乖將攝更加喜怒無則貪嗜飲食因而化滯積在胃中上喘痰嗽歲月漸深胃膈噎塞漸至疲羸若久不除必成惡疾

人參 茯苓 厚朴 黃橘皮

荆三稜

枳實

神麴

甘草

白木

訶子

乾薑

桂

檳榔

木香

木香

木香

右為細末每服一錢入鹽點之如脾虛腹脹心胃滿悶

以水一盞薑三片棗二個鹽少許煎至七分和滓執服

一法添麥蘖二兩芡一分檳榔木香各加一分

乳香元

治心腹疼痛氣道凝滯一方加茱萸更延胡索

蓬莪朮

木香

當歸

桂

荆三稜

沒藥

牡丹皮

沉香

桃仁

枳殼

芍藥

厚朴

茴香

乳香

方十

五

右為細末酒煮麵糊和元梧桐子大每服二十元空心

溫酒下

熨疔丹

治小腸元氣發不可忍者脚膝疼无力臍腹冷疼

脾元冷氣

硫黃

茴香

朱砂

木香

薑澄茄

附子

川練子

天麻

胡蘆巴

白礬

沉香

天南星

烏頭

延胡索

右為細末水煮麵糊和元更用朱砂為衣每服作綿灰

三錢執酒調下嚼破一元立効忌房色四十九日如雞

頭大可加至二元

萬安元

治腹中成形作塊按之不移推之不動行輒微喘

令人寒熱腹中時痛漸漸羸瘦久不治之或成水腫虛勞

其始得之亦由思憂驚怒或寒熱結聚陰陽痞滯榮衛結

澁而成其形脉當結澁謂之積氣宜服此藥

大戟

甘遂

黃牽牛

五靈脂

吳茱萸

玄胡索

芫花

石膏

砒

膽礬

細墨末

斑猫

芫菁

巴豆

右為細末水煮麵糊和元如菘豆大生薑橘皮湯下一

元日二服

備急紅元子

治小腸氣及一切冷氣痛消酒食積氣

方十

六

沉香

硃砂

史君子

薑澄茄

蓬莪朮

荆三稜

朱砂

木香

檳榔

肉豆蔻

母丁香

巴豆

黑牽牛子

右為細末麵糊和元如菘豆大朱砂為衣每服三元薑

香酒下加至五七元微利一行痰痛立止丈夫婦人服

之無不立効常服消積化酒

茯苓湯治氣鼓脹上下腫心腹堅強喘息氣急連陰腫坐

不得仍下赤黑血汁日夜不停者

茯苓

防己

黃橘皮

玄參

澤瀉

白木

猪苓

杏仁 桑白皮 郁李仁各拾 大豆

澤漆切各壹升

右為細末水一盞每服二錢煎至七分去滓食後溫服咳嗽加五味子二兩

石膈散 治膈脘痞悶吐沫食少

乾薑 厚朴 甘草 木香

青皮 肉豆蔻各半 枳實 檳榔

益智 三稜 陳皮 蓬莪朮

桂各壹兩

右為細末入鹽少許生薑三片棗一個水一盞藥二錢同煎至七分去滓食後溫服

小茴香元 治膀胱小腸留滯寒邪熱邪脇肋牽引發渴腫滿痛

舶上茴香 土茴香各貳兩 乾生薑肆兩

附子壹個 桃仁壹兩半 黃橘皮 川練子核不去

胡蘆巴 巴戟末 赤茯苓 木通各壹兩

丁香 木香各半兩

右為細末酒煮麴糊和元如豌豆大每服二三十元空心溫酒或鹽湯下

厚朴建中湯 治脾胃虛弱忽中濕冷心腹暴痛脇肋脹滿

水穀化遲腸鳴泄痢後重裏急臍腹冷疼背滿氣逆嘔吐惡心手足不和躄重節痛噦噎吞酸不思飲食怠惰嗜臥

四肢少力此藥大能調適陰陽建中補氣辟風寒濕冷四時非節之氣

厚朴 生薑 大棗各壹斤 半夏

甘草各肆兩 人參壹兩半 陳皮貳兩 良薑

草豆蔻 白朮 神麴 藿香各壹兩

右為鹿末每服三錢水一大盞煎至七分去滓食後服

寬中理氣元 順理諸氣寬利胃膈調和脾胃消化痞滯治

心腹脹滿腹肋刺痛嘔噦痰水噎聞食臭全不思食常服

順氣寬膈消飲去痰道引諸氣升降陰陽進美飲食脚氣等疾並宜服之

木香兩半 青皮 陳皮各壹兩 檳榔

白豆蔻仁 薤白 藜蘆 乾薑

胡蘆巴 丁香皮 厚朴各半兩 黑牽牛壹兩

右為細末水煮麴糊和元如棗豆大每服二十元生薑湯下食後

引氣丹 治一切滯氣

安息香 朱砂 麝香各壹分 白芥子叁百陸拾個

大戟末 牽牛末 五靈脂 乳香

沒藥各壹分 牛黃半分 斑貓貳拾個 巴豆拾肆

右都研勻米飲為元麻子大每服一二元臨卧米飲下

鑽胃元 和暖脾胃治一切膈氣消進飲食兼治一切氣疾

大黑附子壹枚去心以刀子剗開成窠子入硃砂半

小煇消半外以饑餅劑生果附子燉火煨

麵焦熟剝去麵不用只留附子用之

橘皮壹兩 須是好紅色者湯浸去皮白穰每以壹片巴豆不用只半夏 同米半升入鍋內慢火炒令熟留橘皮用之

天南星壹兩 胡椒壹百粒 藿香兩 薑撥壹兩

右為細末用棗肉和元彈子大每服一元生薑一大塊內藥一元在生薑內濕紙裹煨熟和生薑嚼喫空心米飲下

丹參膏 治身中忽有痛如打撲之狀名曰氣痛不可忍者

遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒皆由冬時受溫氣至春暴寒風來折之不成溫病乃作氣痛宜先服五香

連翹湯丹參膏又以白酒煎楊柳皮及煖尉之有赤氣點者即刺出血也其五香連翹湯及小竹瀝湯可服數劑勿以一劑便住以謂無效即禍至矣

丹參 菴藿 荊草 蜀椒

躑躅 秦艸 獨活 白及

牛蒡 菊花 烏梅 防已各壹兩

右十二味咬咀以醋一升浸一宿夏半日如急要便煎之猪脂四升煎令醋氣歇慢火煎之去滓用傳患上日五六度並在瘡腫門中小竹瀝湯在脚氣門中

丁香氣鐵元 下遠年陳積胃中橫氣心腹膨氣脇肋滿氣一切氣病宜服之

甘草 丁香 木香 陳橘皮

青橘皮 縮砂仁 蓬莖茂 京三稜

右件除巴豆霜外並為細末入巴豆霜杏仁伴和勻醋煮麵糊為元如黍米大每服以生薑湯下二十元或三十元用意加減

菓澄茄元 助養脾胃快氣消食脾胃不和飲食遲化育膈

菓澄茄 白豆蔻 縮砂仁 青橘皮

陳皮各壹兩 菜菔子 肉豆蔻 茴香

右為細末水煮麵糊和元梧桐子大每服三十元不以時橘皮湯下

婁鑰元 治氣滯疼痛

大黃兩 當歸 檳榔 藿香

人參 木香 丁香 硫黃

右為細末別取沉香一兩剉碎以水二升煎至半升去滓入蜜熬成膏和元彈子大朱砂為衣生薑米飲化下一元

堅腸湯 溫中快氣進飲食

陳秬米壹兩 神翹 麥蘖各壹兩 生薑壹斤

陳皮兩伍

荆三稜兩貳

青皮壹兩半

茴香

桂

芫

白芷各壹兩

右為細末每服一二錢濃煎生薑湯調服若脾受泄久瀉壯人可用溫酒調下虛人米飲服

三和散和順三焦通調五臟治人心腹痞悶脇肋膨脹風

氣壅滯支節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀大便多秘雖年高氣弱並可服之又治背痛有妨飲食及脚氣上攻胃腹滿悶大便不通

大腹皮

紫蘇葉

羌活

沉香

黃橘皮

白木

甘草

檳榔各半兩

木瓜外捌

木香外陸

木通肆

方廿一

右為細末每服二錢水一盞煎至七分食後去滓溫服

葫蘆散治脾元積冷脘腹強急痛引腰背面色萎黃手

足厥冷脇肋脹疼小便頻數及治育腸小腸一切氣痛

葫蘆色

破故紙

巴戟

萹澄茄

川練子

沉香

茴香

桂心各壹兩

附子肆兩

桃仁叁兩

烏頭半兩

右為細末每服三錢水一盞入鹽一捏煎至七分空心服之

防己葶藶元治腹中濕熱并手足微腫胃滿氣急

葶藶

黑牽牛

白木各半兩

防己分叁

郁李仁

桑白皮

茯苓

羌活

黃橘皮

澤瀉各叁分

右為細末練蜜和元梧桐子大熟水下二十元稍空腹時服五日未効加五元止於三十元

還竟湯治氣不順吐逆不定不思飲食面黑眼黃日漸瘦惡傳為瘵疾十不治九者急用此

葶藶

麥蘖

黃橘皮

人參

桔梗

柴胡

草豆蔻

木香

良薑

半夏餅子

右件等分為細末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

丁沉煎元行滯氣下痰飲

方廿二

丁香

白茯苓

人參

半夏各壹兩

石灰末

陽起石

礞石各半兩

阿魏半分

杏仁

巴豆各伍個

右為細末饑餅和元雞頭大每服二元白湯下

訶子元消食化氣

訶子皮

木香

白豆蔻

檳榔

乾薑

茯苓

人參

桂各壹兩

黑牽牛子

甘草各壹兩

右為細末酒煮麵糊和元梧桐子大每服十五元至二十元如有氣疾發動喫食過多藥心滿悶細嚼茶酒下

九飽食脹滿及氣膈胃膈只一服如人手撥下

和中煎 宣氣寬中宣通滯滯調順三焦快利胃膈溫養脾胃消化宿穀治脾胃怯弱飲食易傷噎噎痞脹滿心腹刺痛噫醋吞酸嘔逆惡心及妊娠中虛痰逆食飲化遲

檳榔 木香 橘皮 青皮
神麴 麥蘖 茯苓 半夏
人參 白朮

右為細末薑黃麵糊為元梧桐子大每服二十元生薑湯下

款氣元 治中焦虛痞食少痰多胃膈滿悶嘔逆惡心肋脇堅脹便利不調九種心痛五般膈氣及婦人妊娠挾寒臍腹疔痛

生薑 阿魏 青皮 甘草
大縮砂 乾薑 木香 桂
當歸 芫荽

右為細末煉蜜和元如雞頭大每服一元至兩元食前爛嚼白湯下或水者麵糊元梧桐子大二十元米飲下

參桂元 葛仙公云凡婦人諸疾多緣憂慮須兼以治憂悲噎疾無不止者古今錄驗五噎元治胃中久寒嘔逆氣膈飲食不下結氣不消氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心忤上下不通噎噎不徹胃膈苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下忤動逆冷勞噎者苦氣膈膈下支滿胃中填塞令手足逆冷不能自溫食噎者無食多少唯胃中苦寒常痛不得

喘息思噎者心忤動喜忘目視眩昏皆憂思嗔怒寒氣上入胃膈所致

乾薑 蜀椒 食茱萸 人參
桂 細辛 白朮 茯苓
附子 橘皮

右為細末煉蜜和元梧桐子大酒服三元日再不知漸加忌桃李雀肉大酢猪肉冷水生葱菜醋物等

檳榔元 療憂膈食膈冷膈氣膈執膈或宿酒不消或為霍亂或心痛醋心腹脇氣脹不食或飲食傷飽

桂心 乾薑 茯苓 檳榔
甘草 人參 細辛 訶子皮
白芍藥 枳殼

右件等分為細末煉蜜和元梧桐子大空心溫酒下十五元嚼破服亦可

華澄茄散 治小脹氣虛小脹疼痛不可忍

華澄茄 檳榔 木香 苦練子
懷香子 砂砂 阿魏 乾蠋
吳茱萸 桃人

右為細末每服二錢生薑酒調下不以時

金錢散 治一切冷氣小脹元臟膀胱氣痛脾元積冷及婦人血刺氣攻症心腹疼痛嘔逆脹滿臍腹絞痛煩悶喘急皆治之

金鈴肆拾

茴香

京三稜

芫

枳殼

橘皮

百部壹分

木香半

右為細末炒薑鹽湯酒調一大錢亦可作元

中和元 治脾胃不和寒氣積聚飲食減少肢躄倦怠

良薑肆兩

烏梅肉壹兩

茴香壹兩

乾薑

神麴

小麥蘖各半

白茯苓

甘草

蒼木各壹兩

右為細末煉蜜和元如彈子大每服非時以米湯嚼下一粒

香積散 治小腸氣作疼痛不可忍及膀胱偏墜結硬不散

京三稜

土茴香

川練子

巴戟天

當歸各壹兩

黑附子

益智仁十五

南木香各半

枳實貳分

右為細末每服一錢半空心溫酒調下既効即次服舶

上茴香元

白豆蔻散 治暑寒熱動氣傷神陰陽不和臟腑生病留

於胃膈之間使氣不通飲食不下羸瘦乏力心下苦滿噫

氣吞酸便溺不利胃膈脹痛咽塞噫聞食臭腸內虛鳴

白豆蔻肆

丁香

木香

縮砂各壹分

甘草壹分

黃橘皮

青皮各貳分

厚朴

香附子各肆

右為細末每服三錢水一盞生薑三片鹽一捏煎至七

分去滓溫服不以時

沉香煎元 治一切冷氣心胃痞滯腹脇疼痛傷冷心痛久

服消化積冷

馬蘭花

芫花

青橘皮

陳皮

蓬萊菜

乾薑

吳茱萸

川烏頭各壹兩

巴豆貳拾

右為細末用好沉香一兩半為末米醋二升慢火熬成

膏入少許麵糊和元梧桐子大每服五元至十元溫酒

下大効

麝香白氣元 治氣道凝滯身躄疼倦

麝香壹分

朱砂

木香

肉豆蔻仁

厚朴各半

乳香壹分

檳榔

桂各壹兩

半夏餅子壹兩

右為細末湯浸饑餅和元如櫻桃大食後臨卧沉香湯

下一元

茯苓半夏元 搜風行氣

牽牛子肆

青橘皮

紫蘇子

半夏

五苓脂各壹兩

木香

檳榔各半

川芎

右為細末水煮麵糊和元梧桐子大每服三十元橘皮

湯下不以時

和胃橘紅元 治脾胃不和傷冷積滯胃膈噎痞心腸痞痛

酒飲停滯嘔逆吞酸消寒痰宿冷瘧症瘵氣痛一方先

陳皮半

沉香

白豆蔻

縮砂仁各半

甘草

神麴各壹

肉豆蔻

大檳榔各壹

乾薑半分或擦

右為細末橘泥和元如彈子大每服一元温酒嚼下不

以時

鷄舌香煎治憂恚氣逆衝上逆等氣胃脘窒塞咽膈噎悶

臟腑積聚欲作癥癖酒食痰毒嘔逆洩利

雞舌香

黑各半

牛膝

犀角各壹

棗伍个

京三稜壹分

鐵錘粉

梅肉各壹

巴豆伍个

方廿

十七

右為細末者麵糊為元如黃米大每服五粒食後米飲

氣下元治胃膈痞滿食飲減少

交門冬

甘草各伍

人參

細辛

遠志

乾薑

川椒

桂各貳

附子壹兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服七元至十元食後

白湯下二七日取安

七氣湯論曰百病皆生於氣大抵不過於喜怒悲恐驚勞

寒執蓋喜則氣緩怒則氣逆悲則氣消恐則氣下驚則氣

亂勞則氣耗寒則氣收執則氣泄由此變生若其氣起於

一或左或右循行上下或在肌肉之間如錐刀所刺其氣

不得息令人腹中滿此由驚恐喜怒或胃寒執留聚而不

散為鬱伏之氣流行隨經上下相傳而痛久令人痞悶大

便結遊其脉短濇謂之聚氣宜此藥并越痛散

京三稜

蓬莪朮

青橘皮

陳橘皮

藿香葉

桔梗

益智各壹

香附子壹兩

甘草分叁

右為鹿末每服五錢水二盞生薑三片棗一个煎至一

盞去滓服

刺刺散治脾虛冷氣不和

當歸

丁香

木香

甘草

肉豆蔻各貳

赤石脂

附子各壹

藿香肆兩

訶子皮壹兩

方廿

十八

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚擘破同

煎至七分去滓食前温服

理氣元治虛人有冷氣道凝澀

香附子壹兩

縮砂仁

木香

白豆蔻仁

甘草

甘松

丁香各壹

薑黃半兩

右為細末湯浸饑餅和元梧桐子大每服二十元生薑

湯下空心

木香散治膈氣心腹疝痛飲食无味口苦舌澀嘔逆不定

噫氣吞酸一切氣疾並皆治之

益智子壹兩

陳皮

茴香

薑黃

香附子 京三稜 神麴各貳兩 鹽肆兩

右為細末白湯點服二錢不以時

小降氣湯 俞山人方治下虛上壅氣不升降膈滯痰實咳嗽喘滿頭目昏眩肩背拘急及治脚氣上攻脚弱腰痛心胃不快可思飲食

紫蘇子 前胡 厚朴 甘草

橘皮 當歸 半夏 桂各半兩

右為鹿末每服二錢水一盞入生薑紫蘇葉煎至七分去滓溫服食前

小理中煎 治三焦氣弱中脘積冷飲食遲化不能消磨胃膈痞悶脇肋膨脹噦逆惡心嘔吐噫酸心腹疼痛臟腑不

方廿

十五

調肢躄倦急可思飲食及治翻胃嘔吐膈氣噎塞若脾胃久虛全不入食縱食易傷者

萹澄茄 草豆蔻 薑黃 良薑

縮砂 青皮各貳兩 阿魏壹兩 陳皮半兩

右為細末醋者麵糊為元如菘豆大每服三十元生薑湯下

開胃正氣散 治真元虧耗榮衛勞傷邪氣乘襲陰陽交錯胃膈噎悶不思飲食或氣痞痞多痰或嘔逆瀉痢或氣結腫滿或出風瘴氣久不能除寒熱作時羸瘦劣弱又治中暑煩燥痰逆頭眩及瘵傷寒陰陽不正亦多證多端

丁香 沉香 藿香 黃橘皮

半夏 厚朴 甘草 人參各壹兩

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓食前溫服

白氣團參散 調順三焦和養脾胃益榮衛進飲食治陰陽痞隔邪氣未分氣逆嘔噦腹脇脹痛或斬固不通或大便滑泄或手足時冷或煩燥口乾及膀胱腎間宿冷腰腹疼

人參 白朮各壹兩 白芷 茯苓

烏藥 藿香 橘皮 甘草各半兩

右為細末每服二錢薑湯調下不以時

大腹湯 治中滿下虛氣不升降胃痞悶食飲難消嘔吐多痰助脇膨脹肢躄羸瘦便利不調及妊娠惡阻憎聞食

方廿

十

臭痰逆頭眩 大腹子 橘皮各捌兩 厚朴 白芷各肆兩

人參 神麴 桂心 桔梗各叁兩

右為細末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服非時

溫中湯 治脾胃虛寒腹中冷痛飲食遲化痰飲併多寒氣上奔心胃刺痛及傷寒陰盛脈細沉微手足逆寒霍亂吐瀉

白朮 棗各半兩 厚朴伍兩 陳皮肆兩

甘草兩 乾薑貳兩 藿香 茯苓各壹兩

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分食前去滓溫服一方厚朴良薑桂等分

快活元 去寒濕壯脾胃寬膈快氣

山茱萸 石茱萸 吳茱萸 金鈴子
 杜苗香 官桂 青橘皮 陳橘皮用並生
 右等分爲細末醋煮麵糊爲元如豇豆大每服三五十
 元食後臨臥生薑湯下熱水亦可

珠珀丹 鎮心空膈去八邪氣及婦人血攻寒熱等疾驚憂
 成病

辰砂壹分 桃仁肆拾分 附子壹分 安息香
 牛黃各壹分 阿魏 木香各半 麝香各壹分
 右爲細末煉蜜少許和元梧桐子大每服五七元至十

鹽精元 治膀胱小腸氣痛
 元空 心鹽湯下 婦人醋湯下 凡腹中有塊如拳尤主之

補骨脂兩 金鈴兩 山茱萸 木香各壹兩
 附子 茴香各壹兩 海蛤壹分 青鹽叁兩
 右爲細末酒煮麵糊和元梧桐子大每服三五十元空

心酒下
八等散 主消穀化氣
 厚朴 吳茱萸 人參 白朮
 茯苓 芎 陳麴 麥蘖

右等分爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服
 不以時

三陽丹 助陽正氣去風除寒濕
 附子兩 羊肉兩 桂 乾薑

硫黃 陽起石 鹿茸 白朮各壹兩
 右爲細末與研藥合勻以前附子和膏元梧桐子大每
 服三十元空心米飲下以朱砂爲衣

三稜湯 治乘氣飲食積滯遲化
 三稜兩 茂半兩 益智 烏藥
 沉香 厚朴 黃橘皮 甘草各壹分

右爲細末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食後
沉香烏藥煎 治胃脇氣疼臟腑疼痛
 沉香 烏藥 澤瀉 陳皮
 赤茯苓 白朮 香附子各半 麝香壹分

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元食後煎橘
 皮湯下

人參半夏散 廣濟貫純氣在心吸吸短氣不欲聞人聲心
 下煩亂不安發作有時四肢煩疼手足逆冷
 桑根白皮兩 半夏兩 乾薑兩 茯苓兩
 人參 甘草各壹兩 附子壹兩 桂肆兩

右切碎以水一斗煮取三升濾去滓分作三服忌生冷
 羊肉錫海藻菘菜油膩等食後服

麝香元 治右脇下如覆杯有頭足久不已令人發瘧寒熱
 痞悶也始得之因肺病傳肝肝得傳脾乘主而不受邪
 其氣留於肝故結而爲積謂之積氣其脉弦澁時結

桂壹兩 當歸 人參各半 細辛

川烏頭

巴豆各分

麝香壹字

蓬莪朮兩半

右為細末水煮麵糊和元如菘豆大米飲下三元

沉香元

治胃中氣痞煩悶飲食不下或心下苦滿噫氣吞酸時聞食臭大小便秘澁此由憂思驚恐寒熱動傷其氣結於胃膈之間經稱陽脉結謂之膈此名膈氣

丁香 木香 吳茱萸 茴香

沉香各壹分

青橘皮

肉豆蔻

檳榔各貳兩黑牽牛貳兩醋浸令軟連一味同炒令牽牛熟去出

右為細末煉蜜和元梧桐子大生薑湯下十元

黃芩湯

治從小腹上衝心胃咽喉發痛如狫之狀發作欲死其始得之由脾病傳腎腎當傳心心乘主而不受邪氣

留於腎其脉沉結謂之黃豚宜此藥及桂枝加桂湯方在後

方廿

廿三

甘草

川芎

半夏

黃芩各貳兩

葛根伍兩

芍藥叁兩

甘李根皮伍兩

右為鹿末每服五錢水二盞生薑五片煎至一盞去滓

温服不以時

安胃白朮散

治脾胃氣虛胃膈膨悶心腹脹滿嘔逆惡心噫氣吞酸口淡無味四肢倦怠全不思食

白朮貳兩

茯苓

藿香

厚朴

半夏

甘草

黃橘皮各壹兩

右為細末每服二錢水一盞煎至六分去滓温服非時

生氣湯

治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫

醋吞酸痰逆嘔吐胃膈痞悶飲食不美又治五膈五噎一切氣疾常服除邪冷生胃氣

丁香

檀香各壹兩

鹽叁兩

乾薑

甘草各貳兩

丁皮壹兩

胡椒壹分

右為細末每服半錢或一錢沸湯點不以時一方有人

參白芷

更疔丹

治脾元虛冷小腸氣發動痠痛及疔瘕冷氣腹痛

茴香

木香各壹兩

硃砂

硫黃

乾蝎

白礬各壹分

附子兩半

右為細末酒煮麵糊和元如雞頭大每服三元略嚼破

一元燒綿灰二錢酒調下

方廿

廿四

順氣元

寬胃膈行滯氣消痰飲爽神氣

黃牽牛拾兩炒別搗

木香

青橘皮

檳榔

半夏各壹兩

紫蘇子兩半

五苓脂壹兩

右為細末滴水元和元梧桐子大每服二十元臨卧生薑湯下

湯下

白氣散

治氣滯不勻胃膈虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿噎塞止嘔吐惡心常服調順脾胃進飲食

丁香貳拾兩

藿香

甘草各伍斤

白豆蔻

白檀

木香各貳拾兩

縮砂仁貳斤

右為細末每服一錢入鹽一字用沸湯點服不以時

杏仁順氣元

寬中順氣破堅去積逐痰水行結氣消除腹

脹通利痞瘵肺氣壅滯喘悶不快胃中停飲腹脹鼓痛或嘔逆痰涎呼吸短氣或肋下牢滿骨間刺痛又治欬逆腫滿背脊拘急大便秘滯便水赤澀等

甜葶藶

杏仁

神麴

半夏

檳榔

牽牛

皂莢

右除葶藶杏仁外同為細末後入上件藥二味再研勻

調浸皂莢酒為麵糊和元梧桐子大每服二三十元溫生薑湯下

黑神元治療在後

乾漆

重湯煮半日令香

神麴

茴香

木香

椒紅

丁香

檳榔

肆个除椒外伍物皆壹半生壹半炒

右為末研和元如彈子大取茴香末十二兩鋪蓋陰地

瘞乾候外乾并茴香取器中極乾乃去茴香腎餘育腸膀胱癰七疝下墜五膈血崩產後諸血滿下赤白並一元分四服死胎一元皆綿灰酒下難產炒葵子四十九

箇搗碎酒煎下一元諸疾不過三服風疾十服膈氣癰

瘞五服血瘞三元當差九婦人腹中有大塊如杯名曰血瘞服此即消

七氣湯主虛冷上氣七氣等

半夏

人參

甘草

生薑

五味子

桂

紫蘇子

右吹咀以水二盞煎至七分去滓臨卧溫服

奔風湯

乾葛

半夏

甘李白皮

當歸

甘草

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

赴痛散治臟腑積寒脇腹脹滿

蓬莪朮

桂

檳榔

羌花

附子

細辛

右為細末每服三錢水一盞煎至七分溫服食前

木香理氣元治脇下滿氣逆不妨於食連年不除此由風

寒之氣伏留而不散聚於脇下正氣不得行謂之積聚

青橘皮

桔梗

桂

檳榔

木香

杏仁

右為細末煉蜜和元梧桐子大薑湯下二十元未知漸

加至三十元

木瓜分氣元治胃腹脹滿

乾木瓜

薑黃

陳橘皮

黑牽牛

蓬莪朮

蘿蔔子

右為細末水煮麵糊為元梧桐子大每服二十元漸加

至三五十元陳橘皮湯下食後臨卧服

調中白朮煎升降陰陽宣通壅滯調中順氣款利三焦治

胃膈窒塞噫氣不通噎噎喘滿食飲遲化痰飲留滯腹脇脹滿傳道不勻或秘或泄脾胃易傷心腹疼痛霍亂嘔吐食飲不下悲怒氣逆憂急結氣或作奔衝胃脇刺痛短氣好眠全不思飲食

人參 白朮 乾薑 甘草

青橘皮 橘皮各半

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元細嚼溫酒下

沉香卷氣元治脾胃不和膈脘痞悶噫醋吞酸口苦無味食入遲化心腹脹痛中酒嘔吐停滯不消常服和氣調中
美進飲食

沉香兩 木香兩 香附子兩 薑黃兩

方廿七

甘草壹兩 甘松壹分

右為細末饑餅和元梧桐子大每服五七元空心米

木香餅子治男子婦人脾胃不和胃膈滿痞心腹刺痛兩脇脹滿食不消化寒痰嘔吐噫醋吞酸霍亂吐瀉五膈氣病咽喉噎塞酒毒痰吐不進飲食妊婦老幼皆可服

木香兩 甘草壹兩 薑黃兩 香附子兩

縮砂仁 甘松各壹分

右為細末湯浸饑餅和元梧桐子大捏作餅子每服十餅子細嚼溫水下不以時

卷氣元治鼓脹

丁香 胡椒 藜蘆 木香

乾蝎各半 蘿蔔子壹兩
右為細末棗肉和元梧桐子大米飲食前下三十元

薑澄茄元治疝氣及下部濕冷臍腹疼痛

薑澄茄 川練子 茴香 木香

右為細末酒煮麵糊和元如豌豆大每服二三十元空心溫酒或鹽湯下

半夏散治五膈噎氣心胃不利涕唾稠粘飲食進退

半夏 厚朴 枇杷葉各壹兩 肉豆蔻壹分

母丁香貳拾 青木香壹塊如

右為細末每服一錢水八分一盞煎至六分去滓熱服

方廿八

葛仙公去凡婦人諸疾多緣憂悲治煩兼憂悲藥

正氣散調順陰陽祛寒正氣治躄虛客寒陽氣內弱中焦不和寒熱相搏頭痛昏倦肢節煩疼痰逆惡心嘔吐冷沫及癆八般瘧疾山嵐瘴氣久不能除時作寒熱或暴冷內傷霍亂吐利或氣脈壅滯手足虛腫又治婦人但病頭痛惡心五種膈氣食飲不下

厚朴 人參 甘草 半夏

陳皮 藿香各壹兩

右為麤末每服二錢水一盞薑五片煎至六分去滓食前服

九痛元治九種心痛虫心痛疰心痛風心痛悸心痛食心

痛飲心痛冷心痛熱心痛生氣心痛

附子

乾薑各壹兩

人參

巴豆

生狼毒

吳茱萸各壹兩

右蜜為元梧桐子大空心米飲下一元

集福元消食化氣止泄瀉腹中諸冷

烏頭

桂

香附子

乾薑

陳橘皮

巴豆肉

麻油內慢火煎自旦至午後巴豆如皂子色即止拭乾冷水浸兩日換水浸研瓦上去油

右母巴豆霜一兩用諸藥各以陳米一升半為末水調成膏直候微酸臭即煮為硬糊元如菘菜大每服五七元酒飲任下一方朱砂為衣

桃人煎治脇肋臍腹氣結痰痛如錐刺及氣奔上不下

桃人

茴香各壹兩

木香兩半

硃砂

阿魏各壹分

蠟梢各拾分

右為末以桃人膏和勻以葱白酒化下一棗大空心若氣大段不快加檳榔三個專主冷結膀胱

乳香元消積冷寬胃膈進飲食不宜多服

乳香

巴豆各壹兩

丁香

木香

桂各壹分

青橘皮各壹兩

右為細末水煮麵糊和元如菘菜大每服五七元以木瓜湯下食後次加至十元十五元

木香散治三焦不和脾胃氣虛閉膈不通

木香

人參

陳皮

甘草各半兩

白朮

山藥各壹兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

中和湯調適陰陽通流榮衛養脾進胃使飲食治脇肋脹滿止嘔逆惡心

白朮

黃橘皮

厚朴

人參

甘草

茯苓各貳兩半

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分去滓食前溫服

奔氣湯治陽氣不足陰寒上乘奔搶膈中迫寒胃痞短氣喘急膨痞悶凝氣不宣行厥逆便竟欲盡腹內冷濕腸鳴

有聲助陽退陰散寒下氣一方不用生薑

甘草

人參

桂各貳兩

吳茱萸陸兩

生薑壹斤

半夏陸兩

右為細末每服二錢生薑平兩水二盞煎至一盞去滓溫服食前

分氣煎元快胃膈進飲食

香附子兩肆

陳橘皮兩貳

木香生

丁香各半兩生

右為細末醋煮神麴糊元如菘菜大不以時生薑湯下

三十元

紫蘇子煎治脾胃氣虛飲食生冷過多腹內脹滿噫聞食

氣霍亂吐瀉及上氣咳嗽

紫蘇子 黃橘皮 良薑 桂心

人參各壹兩

右為細末煉蜜和元如彈子大食前酒服一元

青木香元 寬中利膈行滯氣消飲食治胃膈噎塞腹脇脹痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食

牽牛粉黑者拾兩 補骨脂赤兩 葦澄茄肆兩 木香各壹兩

右為細末水和元如菉豆大每服二十元生薑湯下食後臨卧小兒加減服姓婦勿服

太一白元 治八痞兩脇積聚有羞盤孟胃痛徹背奄奄惻惻裏急氣滿項強痛極者耳聾消渴洩痢手足煩熱或有

方廿 世

流腫小便苦數淋瀝不盡不能飲食少氣流飲時覺妨悶小腹寒大腸熱恍惚喜忘意有不定五緩六急食不生肌

面目顴黑

狼毒 桂各半兩 附子 烏頭

白芍藥各壹兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元空心温酒下

妙應元 治氣虛有積

大附子 破故紙 葦澄茄 木香各半兩

硃砂各半兩

右為細末和大麥麩裹藥同燒候麵黃焦去麵將藥為

細末者麵糊元如菉豆大每服三五元米飲下食後臨卧

丁香飲子 和氣

丁香各壹拾個 肉豆蔻壹壹個 白茯苓 甘草各壹兩

藿香壹壹字

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後臨卧温服

草豆蔻散

草豆蔻仁 生薑 甘草 木香

人參

右等分為鹿末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後温服

方廿 世

肥中元 和胃進食快氣

藿香 人參 白朮各壹兩 半夏半兩

陳粟米貳兩

右為細末每服二錢滴水元梧桐子大用蜜一匙薑三片煮浮温服

茯神湯 主五邪氣入人躰中見鬼妄語有所見聞心悸動搖恍惚不定

人參 茯神各貳兩 茯苓兩 赤小豆肆拾個

芎藭兩

右五味以水一斗者五升半分為五服忌酢羊肉錫師深

千金翼同

牛黃元 治伏暑氣不問新久曾經取轉針灸不效即床危困及傷寒餘毒并四時山嵐之氣皆治之

牛黃

白不灰木

各壹兩

黑牽牛

壹兩半用壹兩半炒壹兩半生

粉霜

光明者壹分有黃石者不用

朴消

壹兩壹分青白成塊子焦黃色不用

右除粉霜別研外餘為末入粉霜同伴勻煉蜜和元梧桐子大隨證服之

半夏厚朴湯 治咽中如炙肉鬱熱之不下吐之不出此胃寒乘肺肺寒則津液聚而成痰肺管不利與痰相搏其脉

澀大宜此藥

半夏

伍兩

厚朴

叁兩

茯苓

紫蘇子

各貳兩

右為細末每服五錢水二盞生薑五片煎至一盞去滓

温服

方廿

廿三

四味湯 治小品寒疝氣腹中虛痛及諸脇痛裏急病

當歸

生薑

芍藥

各叁兩 羊肉

右剉以水一斗二升先煮肉爛熟出肉內藥取三升每服七合日三

烏梅元 快氣下痰消食

烏梅

巴豆

丁香

半夏

法製

右為細末清水和元梧桐子大朱砂為衣一服三元橘皮湯下

正中元 治心氣痛

五苓脂

川烏頭

沒藥

胡椒

各壹分

右為細末醋煮麵糊和元如菘豆大每服五七元醋湯

木香

胡椒

巴豆

乾蝎

右為細末湯浸饅餅和元如麻子大朱砂為衣每服三元心膈痛柳帶燈心湯下腹痛柳帶煨薑湯下血痛炒

薑醋小便下不通燈心湯下血痢臟毒楮葉湯下肺氣甚者白礬蚌粉各三分黃丹一分同研為末煎桑白皮

糯米飲調三錢下小喘用桑皮糯米飲下腎氣脇下痛

茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末一錢下氣噎木香

湯下宿食不消茶酒漿飲下偏治膀胱氣

伏梁元 治若起臍上如臂上至心下又或身軀股脛皆痛

方廿

廿四

腫環臍而痛始得之由腎病傳心心當傳肺肺乘王而不受邪氣留於心結而為積其脉大散而澀時時結聚謂之

伏梁其病累臍血於腸胃之外按之至痛此積下則迫陰必

下膿血上則迫胃脘出膈膈胃脘成癰居臍上為逆居臍

下為從始覺可治久則難治或變水氣宜此藥

青橘皮

參拾个白馬屎浸

巴豆

去皮拾个与青橘皮同炒乾巴豆不用

右為細末水者麵糊和元如菘豆大米飲下五元漸至

十元

三稜元 治若心下如盤久不已令人四肢不收養成黃疸飲食不成肌膚其始得之肝病傳脾脾當傳腎腎乘主而

不受邪氣留於脾胃成痞氣其脈緩澀而時結宜此藥

荆三稜 各津 蓬莪荑 各津 芫花 壹

右用米醋三分同煮醋尽獨留芫花炒乾餘二味片切焙同為細末水煮麵糊為元碗豆大橘皮湯下三元以

知為度

大棗元 治脇下大如杯久不已令人洒淅寒熱喘嗽發肺

癰其始得之由心病傳肺肺當傳肝肝乘旺而不受邪氣留於肺結而為積其脈結澀謂之息貫宜此藥

葶藶 黃橘皮 桔梗 各壹

右為細末棗肉和元梧桐子大米飲下五元以知為度

桂枝加桂湯 治氣虛有寒氣道凝澀

方廿 三十五

桂 伍 芍藥 兩 甘草 貳

右為鹿末每服五錢水二盞姜三片棗一个煎至一盞去滓溫服不以時

調氣元 快氣和中進食

青橘皮 貳 陳橘皮 叁 木香 半

右剉碎用牽牛麵四兩同藥炒黃色其牽牛末更不用將前三味為細末煉蜜和元如雞頭大每服一元含化

燕津

中金元 主胃氣久虛宿食不消心下急滿腹脹脇痛泄利

吐逆惡聞食氣又瘧風寒濕痺風水腫滿風眩頭痛目中冷泪自汗三陽或五勞七傷筋骨輕弱腰膝痠重或溫瘧

寒濕山嵐瘴氣經久未愈常服添津液脾胃去痰消穀嗜

食 白木 兩 人參 分 大棗 半斤取

右為細末棗肉和元梧桐子大每服三十元不以時米飲下

飲下

良姜散 治小腸氣 續隨子

良姜 乾姜 各分

右為細末每服一大錢續隨子霜一字同熱酒一盞入猪膽汁十數點同調一服差

塌氣元 治虛腫脹滿 木香 壹分

胡椒 壹 蝎尾 去毒

右為細末水煮麵糊為元梧桐子大每服五七元加至二十元陳米飲下

聖妙散 治鼓氣利大小腸并治胃膈氣滯之疾

甘遂 分 白牽牛 壹分

白檳榔 壹个 半個生 半個熟

右為細末每服一字至半錢陳粟米湯調下如服補氣藥不得服犯甘草有鹽氣藥每日只得喫淡粥及溫熱之物一月後食得益

陳橘皮煎 治膈氣

陳橘皮 兩 木香 壹 雄丁香 拾

右為細末研獨頭蒜和元如櫻桃大以姜分十片嚼下

一元不以時

堅氣散 升降陰陽通利滯氣

金鈴子

芫 各壹兩

鵬砂 壹分

右為細末空心鹽湯調下二錢欲元水者煮麵糊為元梧桐子大三十元

三倍丹 逐陰氣快胃膈散痰飲開胃進食

木香 壹兩

青皮 兩式

半夏 兩肆

右為細末薑煮麵糊和元梧桐子大每服三十元食後白湯下

小神翹元 消食化氣

神翹 兩壹

陳橘皮 兩式

右為細末煉蜜和元如雞頭大每服三兩粒含化嚥津食後

川練散 治小腸氣下元閉塞不通

川練子 兩壹

巴豆 壹兩半

右和勻炒紫色去巴豆取川練子淨刷為末每服一錢先炒茴香秤一錢以酒一盞煎三五沸去滓服得下洩則差及速年裏外賺瘡

倉卒散 治小腸氣

山梔子 肆拾枚

附子 壹枚

右為細末每服二錢酒調服或酒一盞同煎至七分入鹽一捏溫服及治脾胃李急痛難屈伸腹中沉重如石

痛不可忍自汗如水手足冷久不差者宜服

斷經散 一名失笑散治小腸氣及治婦人血痛尤佳

五苓脂

蒲黃 肆分

右為細末以藥二錢醋醋一合熬藥成膏以水一小盞煎至七分熱呷之

昆布煎 治胃膈滯氣食藥不下

椿杵頭細糠 壹合

昆布 壹兩半末

右二味用老牛涎一合生薑汁一合二味以慢火煎入少蜜攪成膏搜煎二藥元如雞實大不計時候含化一元細細嚥津

失笑散 亦名夾袋散治男子小腸氣

乾漆 炒煙出為度

胡椒 肆分

右為細末每服半小錢煎葱酒調下乘熱服入口疾愈

玄胡索散 治婦人血氣攻心不可忍并走注

蓬莪莖 半兩油煎乘熱切片子

玄胡索 壹分

右為細末每服半錢淡醋湯調下食前

枳木湯 若心下如盤邊如旋此由水飲停留與氣相搏不散宜服此藥

白木 兩肆

枳實 兩式

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

桃人煎 治疔瘰氣心腹疼痛肌膚瘦弱面無顏色及男子元氣婦人血氣並宜服之

桃人拾枚

右細研如膏以酒二斗淘濾取汁鑊中以慢火煎成膏每於食前溫酒調下一茶匙

附子湯治翻胃吐逆

附子壹个重半兩

右坐於燂上四面着火燂令熟生姜汁中蘸過再燂焦如此候燂得泣尺姜汁半碗許即末之每服一錢粟米飲調下空心

附子開胃散治元臟傷冷及開胃口

附子炮去皮臍不以多少

右為細末每服二小水二盞入生薑三片葱白二寸棗

方十

三十九

一枚同煎至八分去滓溫服不以時

阿梨勒元治水利心腹脹滿嘔逆及上氣咳嗽胃膈氣痞

阿梨勒以麵煨黃色去麩

右為細末粟米飯和元梧桐子大每服三十元空心米飲下

皂角元治壓食氣遍身黃腫氣喘飲食不下心胃滿悶宜

此藥

皂角去皮塗醋炙黃為末每壹炙入巴豆柒个去皮

右同研勻醋磨石好墨和元如麻子大食後橘皮湯下三元以利為度

質純湯瘡五勞五臟氣之遊氣上下走時若群豚相逐撞

惛時氣來往自如薤夢精先竭陰萎上引小腹急痛面乍熱赤色喜怒无常耳聾目視无精光方

葛根兩

生李根壹斤

人參兩

半夏壹斤

芍藥兩

當歸

甘草兩

桂心兩

生薑斤

右為鹿末每服三錢水一盞生薑同煎至六分去滓

質純茯苓湯瘡虛氣五臟不足寒氣厥逆腹脇脹滿氣貫

走衝胃膈發作氣欲絕不識人之方羸瘦小腹起騰踊如狽子走上走下奔馳往來執抑引陰氣手足逆冷或煩熱

茯苓兩

生葛兩

甘草兩

李根白皮

半夏升

人參

當歸

芎藭兩

方十

四十

右為鹿末每服三錢水一盞生薑五片煎至六分去滓

溫服不以時

大七氣湯瘡憂勞寒熱愁思及飲食膈塞虛勞內傷五臟

絕傷奔氣不能還下心中悸動不安

桔梗兩

人參兩

芍藥

乾地黄兩

乾薑兩

甘草兩

橘皮

半夏兩

茱萸兩

黃芩兩

桂心兩

枳實兩

右為鹿末每服三錢生薑三片水一盞同煎至六分去

滓溫服不以時

小正中元治心痛

五靈脂

川烏頭兩

沒藥

胡椒分

右為細末醋煮麵糊和元如菽豆大每服五七元醋湯

吳茱萸元 治氣自腹中起上築於咽喉逆氣連屬而不能

出或至十數次或上下不得喘息此由寒傷胃腕腎氣先虛

逆氣上乘於胃與胃氣相併不止者難治謂之噦宜此

吳茱萸 黃橘皮各二 附子半兩

右為細末水煮麵糊為元如梧桐子大米飲下二十元

食前

石脂元 治心痛徹背背痛徹心胃中痞悶脇下逆氣上搶

心腹短氣不得卧寸口脉沉遲關上小緊謂之食痺

附子壹分 烏頭壹兩 赤石脂 乾薑

川椒各壹兩

方廿 四十一

右為細末煉蜜和元梧桐子大酒下三十元食前

大露宿元 治氣極虛寒皮痺不已內舍於肺寒氣入客於

六腑腹脹虛滿寒冷百病

礬石 乾薑 桂心 皂莢

桔梗 附子

右各等分為細末煉蜜和元梧桐子大酒服十元日三

漸加之慎熱及近火

賺氣散 快氣進食

京三稜 蓬莪朮各壹兩 白朮壹兩 木香半兩

枳殼壹兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至六分去

滓溫服不以時

五積元 治宿食不消吞酸噎氣

麵伍兩 大棗柒个 巴豆壹拾

右將白麵米湯調硬軟得所裹棗巴豆候乾用炭火燒

存性取出放冷為細末水糊和元黃米大每服三五元

食後白湯下

順氣散 治氣逆

甘草 茯苓各肆兩 白朮 厚朴各壹兩

乾薑貳兩 陳橘皮貳兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

胃氣元 消進飲食

方廿 四十二

丁香 厚朴 硫黃 附子

乾薑 桂 豆蔻仁 半夏翹等分

右為細末水煮麵糊和元如黍米大每服十五二十元

米飲下不以時

雍藥 專治一切雍熱不可服涼藥者惟臟腑秘口乾嘔逆

即加枳實一二豆大黃連一豆大枳實米泔浸三宿用黃

連蜜炒焦黑用此是凡煎藥每服之所加者數

人參半兩 白茯苓去刺 赤茯苓 白朮各壹兩

菖蒲子貳分 白扁豆壹分若無以白豆代之此別有理 獨活貳分

甘草叁分 天南星貳分 半夏壹分半製

右為細末不羅不計時候水一盞磨水沉香少許荆芥一

二穗同煎三錢匕取八分去滓再煉一日三服

菜菔元 治年深膈氣翻胃吐逆飲食物至晚皆吐出悉皆生存不化膈上常有痰涎時膈嘔血胃中多酸水吐清水無時夜吐輒至曉日漸羸瘦腹中痛楚時復冷滑或即閉結並主之

吳茱萸瓦上焙出油參分 胡椒 當歸

礬石燒存性各半兩 甘草半兩壹半生薑半紙裹伍沸重醋浸透火內煨熟又浸柒次

半夏壹兩水洗壹次爛研為膏

右為細末煉蜜為元梧桐子大每服七元煎桑枝柳湯下日三服銀器內煎

五靈脂散 行滯氣止骨痛

方廿 四十一

五靈脂 茯苓各杏核大 丁香參拾 人參

木香各壹 硃砂半

右為細末每服二錢姜汁米飲調下

雞峯普濟方第二十

雞峯普濟方卷第二十一

馮翊賈兼重校定

眼目

還睛元 治虛勞目暗有黑花

兔絲子 石斛 白茯苓 熟乾地黄

牛膝各壹兩 真珠 覆盆子各叁分 遠志

防風 蔓荊子 車前子 玄參

人參 木香 决明子 地膚子

麩仁 芎藭 羌活 羚羊角屑

枸杞子 薯蕷 甘菊花 黃耆

地骨皮各半兩 兔肝貳兩

右為細末煉蜜和杵三五百下元梧桐子大每服三十

方二十一

元温酒下粥飲亦得忌熱麵葷辛生冷等

蓋子澄眼藥方

第一用多年鷺子窩搗羅為細末用井花水調如胡桃

大白紗帕子包於眼上尉之如有泥却用井花水洗

二用不种皂角三十錠 孰地黄 當歸各壹兩

仙靈脾壹兩 硃砂貳兩 生地黄貳兩 細辛壹兩

白芷半斤 木鱉子十八 川練子兩壹 青鹽貳兩

歲靈仙 香白芷 藿香葉 酸榴皮各壹兩

川百藥煎壹兩 黑牽牛 川芎各壹兩

核桃仁拾捌个乃 酒醋三升醋煉

右件藥拌勻先將青鹽硃砂用乳鉢研碎與醋浸三晝

夜每日番一次將上面藥轉在下面用石拍壓實醋候日滿取出諸藥不用只將皂角用桑柴熟火焙乾皂角再逐錠於所浸下醋內蘸淹醋於火上焙乾又蘸醋再焙至醋盡為度其角焙及六分乾焦熟便碾為細末每日三次或兩次擦牙一月只可用約一兩已上下先擦時少用逐旋加藥如有津液嚙之為妙擦畢漱津數口愈加用藥旬內去頭風自目明身健應驗如神每兩藥末用麝香一百文足多愈妙

三龍眼膏 藥如後

朴消兩半 草龍膽分 白蒺藜壹分 旋覆花壹分半
仙靈脾錢

方二十一

已上藥用黃土半斤將五味藥一處拌勻於五更取井花水一椀和黃土并藥為泥稀稠得所安在坩椀內以匙攤平面鋪白色開通錢五文皆以開字向南字合於地下於錢背上寫五行字（火木）却以硃砂菴豆大二十塊子便別於安排上每文上安四塊子却以別椀合定置淨土上用新黃土周回并上面培遍仍透風氣得三四晝夜開看其硃砂錢上生半寸長如翡翠色便取下次坩器中收之又用

班猫不去翅足 乳香壹塊如棗大
秦皮 胡黃連各壹錢 肥乾棗壹錢 燈心壹握長

古老錢文錄

右七味入無油石器中取新井花水一大盞煎至半盞以綿濾入石器中其滓再入水一盞煎至半盞濾去滓合汁以文武火熬成膏子約得一匙頭半入新坩器中盛頓將已刮下空青更以鵬砂末龍腦各少許却同研勻以銀筋攪勻用角合子收之三五年不壞每日用銀筋點一黃米大次日依舊再點翳膜自隨淚下點藥亦不竟痛如眼微昏三兩日並愈神驗甚速馮敏道傳或黃十一月初一日

决明元 治脾虛膈熱眼目昏翳翳障障隱遊翳

决明子 青箱子 蒼朮 木賊
川芎 羌活 防風 甘草

方二十一

楮實 菊花 蟬殼 石膏各壹錢
地皮壹錢 仙靈脾 穀精草各半兩
右為細末煉蜜和元如櫻桃大每服三元細嚼米飲下食後

如聖膏 治一切眼疾諸藥療不老神驗方

黃連 赤石脂各壹兩 羊肪脂式各錢
硃砂 白礬研 熊膽 龍腦
牙消 麝香 乳香研各
炉甘石肆兩火煨壹伏時搗 白沙蜜肆兩以兩重
右同諸藥入盆研細極勻後入羊肪脂次入蜜和諸藥入白坩椀盛之於盆內用冷水浸一宿去火毒每次點

粟粒大如眼中有翳膜日點三次早午晚極有神效點
柱不得用鐵

炉甘石點眼藥 治大小皆破痒痛等

炉甘石過水飛 黃連末試 鵬砂體

青鹽 乳香各半 黃丹各半 輕粉

硃砂少 麝香少許並

右為細末柱子點之

通神膏 治眼生翳膜赤脉胬翳及痒有淚壹字半

白沙蜜兩 青鹽 麝香壹 乳香

硃砂各半 當歸半 黃連冬 白礬半字

右八味乳鉢內輕研於青竹筒內者半日用綿去滓培

方二十一

瓶內收貯每點了瞑目少時以温湯洗腎膜等並退下

羌活元 治男子婦人小兒遠年日近風毒氣上攻眼目昏

暗赤澁痰肉生瘡腎膜遮障不明及久新偏正頭痛眼目

漸小細及有夾腦風痛多見黑花但有此證服必見効

羌活 川芎 天麻 旋覆花

青皮 天南星 藁本各壹

黑牽牛子陸兩并取式兩

右七味一処為末後入藁本牽牛末和勻取生薑自然

汁者麵糊和元梧桐子大每服二十元食後温酒湯下

通毒七寶散 治眼熱赤痛

黃連 當歸 赤芍藥 蔓荊子

五倍子分 乳香陸分 輕粉叁
右為細末每服二錢水二盞煎數沸瀝清者熱洗眼不
以時候

金絲膏點眼熱痒

腦子 牛黃 硃砂各壹 青鹽

麝香各半字並

右為細末用孩兒乳汁并乳香少許沙糖少許三味先

研勻細次入餘藥調和當以金銀竹柱點

枸杞元 治眼目昏暗

菘蓉 枸杞 川椒取紅 甘菊各等

巴戟減半

方二十二

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元空心酒下

久服明目活血

神翹元 主明目百歲可讀注書千金一名

神翹兩 磁石兩 光明朱砂壹

右三味末之煉蜜和元梧桐子大米飲服三粒日三不

禁常服益目力眾方不及孝者宜知此方神驗

猪膽膏點眼藥

猪膽壹隻 硃砂細研

右以硃砂穰在猪膽中成膏繫定懸當風處候白衣如

霜出掃下收蘆合子內旋旋用柱子點入此目中竟痒乃

罷便无翳膜未盡再點之

當歸散 治風毒攻注眼目疼痛或赤眼疼不可忍者

龍膽 當歸各等分

右二味為細末冷酒調下一大錢

治眼赤痛五方

京棗 壹分 黃連 壹分

右以水一盞同煎至三分時時點之又二味更添竹葉

等分煎汁淋截赤眼尤佳

麻風赤眼藥方

荆芥 防風等分

右二味水煎數十沸入青鹽少許令水鹹溫熱淋洗

治內外障眼

方二十一

蒼朮 肆兩米泔浸柒日換米泔水去黑皮細切入青鹽肆兩炒令黃去鹽

木賊 壹童子小便浸壹宿水淘焙

右為細末不以時每日隨飲調下一錢甚佳

治倒睫眼

草烏頭 白芷各半兩

右為細末每用少許先含水一大口鼻內啗

截赤眼痛

黃柏 貳寸蜜炙黃茶等碎

右以水一盞煎至六分用冷水浸蓋至冷以銅或銀柱

點之口中苦即止

黃連膏 治眼

好黃連 壹

右細末以坩堝調兒孩乳汁成膏膏內攤以古老錢一

文置一坩堝內後用炙錢上一壯便以黃蓮蓋亞之煙

盡搗起將艾灰古老錢放盞內以百沸湯調及半錢露

一宿以古老錢點之口中苦即止不計次數

治眼爛眩

五倍子

右用湯急浴過曬乾為末摻上用生精猪肉二片蓋之

候極痒時換肉藥候不痒再用藥點湯洗之

空青散 治徇蒙招尤

有兒自生下之後至四五歲合眼連點頭不言按素問曰

方二十一

徇蒙招尤目瞑耳聾上虛下實過在足少陽厥陰蓋徇蒙

合眼也招尤點頭也謹處空青散治之

空青 研 牛黃 研 細辛 去葉各等分

右為末研勻薄荷湯調下半錢使內養肝氣而去虛風

雞心膏 治小兒斑瘡浮腫入目大人赤目後醫如丁者

天竺黃 朱砂 雄黃 蔚金 各壹分

大黃 貳兩

右為細末每服半錢用雞子清調藥巴豆三枚去皮同

盛在雞子殼內濕布裹慢火煨熟揀去巴豆不用細嚼

米泔下小兒研爛米泔調下

石決明元 治肝經風毒上攻眼生醫膜隱遮羞明頭目昏

石決明

穀精草

白朮

川芎

羌活

防風

甘草

楮子

蟬殼

草決明

麩人各半

木賊

青橘皮各壹分

地皮壹分

細辛壹分

右為細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元食後臨臥茶

清嚼下日進三服

羊肝灰子 治眼退運并醫膜遮障小兒疳眼雀目並治之

蟬殼

黃連各半

甘草

菊花各壹分

地脫皮壹條

右為末每用羊肝一具竹刀子批搯藥拌勻用白麵裹作夾子每日食後吞一服

方五

八

點眼藥方

烏地頭尾壹副頭參寸尾參寸

丁頭大赭石

草烏頭

乾薑各肆兩

右為鹿末用夾縮袋子盛藥末於銀石器內用新汲水一斗將藥袋子煮以慢火熬及八升傾出以別器物盛

更用黃丹一斤却於銀石器內炒如黃色傾在地下出火毒用薄帛襯更用好蜜二斤與煎藥袋子并水丹

再熬水及七升取出藥袋子當風處懸乾如再要熬點

覆盆子元 治肝氣不足兩目昏暗熱氣衝上淚出疼痛兩

脇虛脹筋脉不利

覆盆子

細辛

當歸

決明子

芎藭

五味子

人參

白茯苓

羌活

桂心

栝子仁

防風

甘菊花

枸杞子

車前子

甘草各半

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服三十元不計時候粥飲下忌酒醋麵炙煨等物

紫金膏 治赤眼

白沙蜜壹兩

黃丹叁分

右同熬成膏紫色為度先用新水試滴下成元子可將藥盡傾在新水乘熱元如彈子大白隔縮袋子盛用水

三兩椀煎三兩沸熱淋至冷再煖再淋日三次甚妙

洗輪散

方六

九

秦皮

桂府滑石

黃連各壹兩

右為細末每服半錢沸湯調候澄清汁乘熱時頻洗

地黃元 治眼昏澁

熟地黃

牛膝各肆兩

乾山藥

覆盆子

枸杞子各壹兩半

右為末煉蜜為元梧桐子大早朝空心酒下三五十元

口齒

齊天銀 治牙齒一切疼痛不可忍

寒水石壹兩

丁香

雄黃別研

白芷

芍藥

升麻

牛膝

仙靈脾根

當歸

黃芩

甘松各陸銖

細辛半分

麝香

壹分 別研

右十三味為細末每日早晚用之先以熱水漱口取一錢指牙齒候少時方漱去能除風疔牙疼極佳日月蝕時飲食則人患齒病必矣齒忌油棗着齒不牢密時每用鹽一捏以熱溫湯含指齒及叩齒百遍為之不絕五日外齒即牢密

牢牙散

升麻

細辛

川芎

防風

槐角

生地黃

白芷

木律

青蘗研

皂角灰各壹分

茯苓研

寒水石燒赤去石研粉

右為細末先用溫水漱口每用少許指牙有涎吐了誤

方廿

十

嚙無妨

烏金散

治骨膈風執牙斷腫痒及風冷疼痛齒痛有血

何首烏

葳靈仙

猪牙皂角

川椒各壹分

醋石榴

槐白皮

乾地黃

細辛各拾兩

麝香壹分 別研

青蘗壹分

右為細末每早指捏少許於牙上擦齒斷上出涎良久

漱口

玉池散

治風疔牙疼腫痒搖動宣露出血口臭者宜服之

防風

細辛

川芎

槐花

當歸

地骨皮

白芷

升麻

蒼朮

甘草

右各等分為細末以指牙甚効大段痛搖動每服二錢以生薑三片黑豆半合水一盞半同煎至一盞和滓服漱口殊効

頂禮散

烏鬚鬚牢牙齒

生乾地黃兩壹

紫苑

苦參

青黛

青蘗

黑錫

桑白皮灰兩各半

龍腦許少

右九味先將上五味為細末次將黑錫於鐵銚子中慢火鎔開用桑白皮灰同錫就銚中研細不見錫星為度後將上件藥末更入龍腦少許合和了用新瓦合盛每用食後臨卧先淨漱口用拍頭捏藥指牙後即漱口臨卧

方廿

十

時更不須漱口必一日兩次初時百日之內不食三白

物二年之後藥力已通苦志用神終老不白如疑有白

者先拔去之疑黃尤好用藥百日効

如聖散

治大人小兒急慢牙疳及牙斷蝕漏膿出不止并

骨膈風及定牙齦腫痛悶者

香白芷

零香香葉

甘草各式

寒水石各兩並為末

草烏頭壹個 重壹錢 已上 破用如粉 香白者

石龍膽

砒霜

鈔白霜各壹分 並研

右為末研勻蜜收每用時先淨漱口了用半字輕指擦有涎吐了神効

陳希夷先生指齒烏鬚藥方

西國升麻熟地黄 猪牙皂角與生薑

木律旱蓮槐角子 細辛荷葉要相當

青蘆等分同燒燉 和合將來使最良

揩牙自然髮鬚黑 豈知世上有仙方

右件九味藥細研如粉用之

升麻地黄散 治風氣上攻牙齒疼痛齦腫連腮頰緊急

升麻 地黄 地骨皮 青蘆

芎 皂角壹錢 細辛減半 槐角子半兩

右為細末每用少許揩擦斷上有涎吐了候嚙無妨

當歸散 鳴鬚鬚牢牙齒

當歸壹兩 香附子貳兩 生乾地黄 白芷各壹兩

方主

已上四味剉碎不犯鐵器黑色存性為末

青蘆半兩燒乾入在 皂角伍斤刮皮

草烏頭貳兩 生薑伍斤穿地坑燒紅埋在

右先將草烏頭生薑皆切作片子及將皂角刮去黑皮

分作兩片內鋪烏頭生薑用麻片縛夾定炭火上

鏟多令通紅於地上用新瓦盆蓋如赭炭狀研細與前

藥一處合和每日兩次擦齒如常法鬚髮白者一月變

黑遇旦望日用河水洗鬚

失笑散 治牙疼

川烏頭 芎 甘草 地骨皮

細辛 白芷 高良薑

右等分為細末每用少許於痛處擦三兩次涎出以溫水漱

芎藭散 治齒疾揩牙下走仙方

五倍子兩肆 石菖蒲兩貳 青蘆兩壹 生乾地黄

苦參各貳兩 草烏頭兩半 生薑兩壹

右將五倍子烏頭苦參先搗為鹿末續入生薑再搗成

膏團作五塊子盛在瓦合或小沙罐子內以圓瓦子蓋

合口微留一小眼子出黑煙鹽泥固濟一指厚以火燉

之見黑煙將盡去火以生土蓋之來日出與前藥同研

令細用之

皂角細辛散 治風腫牙疼

皂角半斤去皮 升麻 細辛各壹兩

鹽貳兩青蘆尤佳三味同淹 槐枝兩各半

右為細末如常法治之一切牙疼兼烏鬚

麝香散 治牙齦腫痛

麝香空皮 木律兩貳 牛膝半斤 郁李人兩壹

黃芩壹斤

已上為末入罐子內上用瓦子一片蓋口留一小

眼子用鹽泥固濟燒令通赤候煙白色即住火以

新土掩一伏時取出次入

升麻半斤 細辛兩半

右為細末如常法措牙

沉香散 治牙風腫痛

香附子壹兩 細辛半兩

川芎

白芷

白殭蚕直者去鬚 地龍各壹分

右為細末措疼處永不作

槐枝膏 又名三枝膏治風熱上攻牙齒腫疼

槐枝

柳枝

桑枝各半斤半寸對

已上三物以水一斗煎至三升瀝去滓慢火熬膏

入後藥末

青鹽壹兩

芎末

細辛末各半兩

右同攪勻以合子盛每用少許茶牙立効

香椒散 治牙齒疼冷

川椒

細辛

荻蓍子

白芷

海桐子

右等分為末用藥三錢白礬槐枝拍破各少許以水一大盞煎至七分熱漱冷吐痛時用之

川升麻散 治口氣牙瘡

細辛

防風

川芎

白芷

升麻各壹兩

右為細末先用溫水漱口每用少許措牙涎吐了誤燕无妨

細辛散 治牙疼

原缺

白殭蚕

升麻末各壹兩

白礬末半兩

右為細末令勻每用半錢指牙患處合口多時吐涎次用沉香散

葦發散治牙疼

良薑對炒

草烏頭生用各壹兩

右為細末指牙上有涎吐了

烏金散牢牙烏髭

晚蚕砂煉淨

麻籽取中者伍兩作末

青塩燒兩半別搗作末

右三味拌和了一罐子盛用益泥固濟仍於罐上留一小竅子晒乾以灰火半秤以來燒煨出煙微微青蚩似絕為度去火將罐子於無風處放冷取藥再搗羅為末

每日早辰午時指齒臨卧時亦用更不漱口此能去風

牢牙烏髭元法六十日漸漸有黑光長髭髮其神効但一月已自効也

治牙疼

香附子

荊芥穗等分

右為細末咬在牙上即止

香乳散治牙疼

乳香許少

荊芥穗參穗

右二味咬在病牙上

附子膏治牙疼腮亦腫痛

生附子壹枚

生烏頭壹个

右細末以醋調成膏只作一劑塗

青散服青龍丹動口齒

青黛 黃連

右等分為末指漱牙齒

治風熱上攻牙齒腫痛不止

皂角燒灰 青塩

右等分研勻漱口訖擦之有涎吐了

落脚牙法

巴豆炒

右去皮爛研自早研至午時以塩豉七粒研勻後分元為十四粒安在竅內一茶間覺熱以冷水漱自落

蘭香散治大人小兒疳齒宣露

蘭香焙乾燒灰為細末

右末入麝香少許同研勻貼宣露處有涎吐了誤嚥

牛齒散擦牙方

右以牛齒不以多少燒灰細研每用少許指牙或煎湯

漱之亦佳冷吐之

治風腫牙痛

右用黑木耳焙乾搗羅為末煎湯執漱

金華丹治一切口瘡久不差

右以真黃丹半兩銚內炒紫色入好蜜二兩攪勻慢火熬直候紫黑色為度成膏收入坩器中以紙密封每用

皂皂大含化燕津一日二次用不妨

茵草散治風腫牙疼

細辛

茵草各半

右為細末入麝香少許每用一錢半水一盞煎至八分

熱含冷吐

梧桐律散治口齒浮動宣露血不止

梧桐律兩半

細辛

地骨皮

防風各壹

白芷兩半

茵草

芎各壹

右為細末每用半錢指牙食久漱冷即吐之

沉香散治老人久患冷牙疼不可忍者

沉香

川升麻

細辛

白芷

地骨皮各壹

黑附子生用

右為細末每用一錢白湯煨溫溫冷即吐了

地黃散治牙浮動飲冷熱痛

乾地黃

升麻

青鹽

蘆薈

防風等分

右細坐和勻每用藥一兩以水一大盞酒一盞同煎至

一盞去滓熱含於齒動處良久倦即吐之以含盡藥

為度日二盡此一劑求差

大梧桐律散治一切風疔牙齒動搖疼痛牢牙

梧桐律

川芎

白芷各半

生乾地黃

檳榔

細辛各六分

丁香

雄黃各壹分

右為細末入雄黃再研令勻每食後并夜卧先用溫水

漱口次用藥少許擦痛處非時亦可使

治牙疼

巴豆壹个燒焦

胡椒柒个為細

右擦痛處即止或用蠟和熬成錠子插牙中即不痛

咽喉

無憂散治熱毒上衝咽喉百疾

垂樓金線草

甜消

板藍根

茯苓

蒲黃

紫河車

百藥煎

貫眾

連子心

白殭蚕

小豆子

山豆根

土馬駝

馬氣勃

螺兒青各壹分

甘草肆分

龍腦許少

右為細末每服一二錢食後蜜水調下亦可以蜜元化

犀角散治咽喉毒氣結塞疼痛不止及湯水不下

犀角屑

沉香

馬牙硝

雞舌香各壹

木香

薰陸香

甘草

黃芩各半

川升麻

射干各參

麝香壹分

右為麈末每服三錢水一盞入竹葉二七蒸煎至六分

去滓非時溫服

佛手散治咽喉腫痛諸疾一名無憂散

龍腦薄荷

百藥煎

鵬砂

牙硝各壹

甘草

青黛各肆

馬氣勃

朴消各半

桔梗壹兩 白殭蚕半兩 直瓦焙

右為細末每用乾摻之兼治赤口瘡一日三五次用之

又用終石陰乾為末水煎漱口治咽喉腫痛甚佳

生地黄散 治咽喉內生瘡唾血不止

生地黄 麥門冬各壹兩 半兩 雞蘇苗 赤茯苓

玄參各壹兩 甘草半兩

右為鹿末每服三錢水一盞入竹茹一分煎至六分去滓非時溫呷

薔薇根散 治熱氣壅滯口舌生瘡

薔薇根皮壹兩 川昇麻分參 生乾地黄 黃蘗各半兩

鈔白霜壹錢

方廿一 廿一

右為細末入鈔白霜研勻每服二錢水一大盞入蜜半匙煎至七分通口熱漱冷即吐之不佳更有藥末摻瘡上極効

神聖吹喉散 治走馬喉閉及喉閉腫疼立効

螺兒青 白殭蚕 焰消 甘草各壹兩

右為細末用臘月內牛膽一箇取出汁同藥拌勻却盛在膽內於透風處陰一百日外取出研細每以一字或半錢用筒子吹在喉內

吹喉散 治咽喉閉塞

銅碌 膽礬 白殭蚕 朴消

右等分用乳鉢細研為末吹在喉中神効

鵬砂散 治喉閉不通者

鵬砂 枯礬 地皮 皂角刺火燒各半兩

右為細末每用少許吹入喉中血出是効

小鵬砂散 治咽喉腫痛及喉閉氣不通垂困者

鵬砂 馬牙消各壹兩 白礬錢 龍腦許

右用研勻使臘月鯽魚膽汁和之却填入皮內陰乾取出為細末吹一字入喉中然鯽魚亦不必須臘月但非暑月皆可合

消暑皆可合

消毒散 治大人小兒咽喉腫痛生瘡及小兒瘡疱欲出未快透肌消毒

牛蒡子兩 甘草兩 荆芥穗壹兩

方廿一 廿一

右為細末每服一錢水一小盞煎至七分溫服不以時雄黃散治纏喉諸風

蜈蚣壹個 去足并去頭為末 雄黃壹分 研

右同研為細末每用一字或半錢冷水調雞翅掃在喉中凡咽喉病及滿口牙齒血爛者皆以主之

治纏喉風

白殭蚕末

右以薑汁調成膏子以溫酒調

治喉閉出氣不得

右以生巴豆和皮磨尖見肉以木針突透以齒咬閉合口唇止於巴豆針眼內出氣不移時內自便消漸出入

氣如常也

露蜂房散 治熱病喉中熱毒閉塞腫痛

露蜂房

甘草

射干

川升麻

川朴消

玄參各半

右為鹿末每服三錢水一盞煎去五分去滓非時溫服

鈔霜散 治熱病咽喉腫痛不利

鈔霜

鵬砂

馬牙消各壹分

川升麻

黃藥

地龍

寒水石

蛇退皮

牛黃

太陰玄精石

甘草各半

右為細末每服一錢不以時新汲水調下

鵬砂元 治咽喉腫痛不利口舌生瘡

方廿

二十三

寒水石

鵬砂伍拾兩

鵬砂兩

腦子貳分

麝香壹兩

牙硝貳兩

梅花腦子壹分

甘草拾斤

右為細末用甘草膏子和元每兩作四百元每服一元含化嚥津常服化痰利膈生津止渴

治咽喉腫塞

芭豆一箇去皮內葱莖中火煨熟取出豆去葱切豆

作兩邊

右邊塞扎右邊左邊塞扎左邊

又治咽喉不通

白礬末

膽礬末

右等分同更研細以筆筒子吹之或用水調令稠抹在

舌根上玄破膿血出

金箔散 治喉閉纏喉風諸哽物

第一爐

蜜陀僧

黃丹各壹兩

水銀參銖

金箔兩

右件藥先以鹽泥固濟爐子着金箔一葉於爐下細研

上件藥令極細着在爐中以金箔一葉蓋上以大火一

煨通赤為度鈐出良久放冷煨用炭三斤以來

第二爐

代赭兩

白礬

硃砂各壹銖

硝石壹兩半

地龍參銖

在爐底

右件藥依前法以大火一煨通赤為度鈐出良久放冷

方廿

廿四

第三用法例

右兩爐煨者藥於乳鉢內裏研令勻以筆筒盛少許

一吹在咽喉處時餉再吹瀝涎哽物自出一切喉痛

皆治立効

川甜消散 治咽喉不測之疾

川甜消

垂樓金線草

板藍根

白茯苓

蒲黃

紫河車

栢藥煎

貫眾各半

蓮子心

白殭蚕

檀子

土馬棕

馬屎勃

螺青各壹分

甘草兩

龍腦少許

右為細末如壅腫纏喉風乾搽嚥津不以時

又方

貫衆 茯苓 桔梗 馬屎氣勃

甘草 阿膠 百藥煎各等分

右蜜和如膏含化一皂子大無時服

雞峯普濟方卷二十一

方廿

廿五

雞峯普濟方卷第二十二

馮翊賈兼重校定

瘡腫 癰疽附

玉連環治一切瘡腫

白及 白欵 蜜陀僧研 代赭石研

糯米粉 菘豆粉

右為細末以水調得所看瘡大小剪紙環子將攤在上

貼瘡一日一換

半夏散治諸瘡腫結實不散或有膿出

半夏 天南星各半 朱砂

乳香 滑石各壹分 五靈脂貳錢

右六味為細末先將溫漿水洗淨瘡令軟看有欲破處

方二十二

以白丁香蝕之成用熟針子探作孔子用紙撚子任藥在內得膿出之

松脂膏治諸般腫疼瘡癩用此膏不宜

慰金 黃蘗 黃蓮各半 巴豆拾伍

瀝青兩 清油壹

右四味為鹿末後煉油香熟細細入瀝青散盡細細入前件藥末熬以楊柳枝攪不住手候滴在水中成珠子

方成膏用攪片濾藥

土蜂窠散治漏瘡及治三十六般蜘蛛瘡

土蜂窠 露蜂窠 白礬 硃砂

雄黃各半 麝香壹錢

右為細末用醋塗病處日二又方咸露蜂窠一味治諸
五傷丹治馬墜并打破閃着疼痛不可忍

乳香分壹 沒藥 川椒 赤芍藥
川芎 當歸各壹

右為細末自然銅粉一兩研勻用黃蠟二兩半銚子內
鎔成汁次入藥末不住手攪令勻放冷搓如彈子大每
服一元好酒一盞同煎藥散通口呷訖就痛處臥少時
些小只可一服止大者三五服永痊自然於肉内生紅
絲接連舊

神聖膏治風毒惡瘡重校定此膏當

蛇退皮壹 烏地 五倍子各半 巴豆貳拾

雄黃 牙硝各壹

右用生油四兩先煎開油香入前四味候巴豆焦黑色
漉出諸藥不用入雄黃牙硝二味攪勻別入黃蠟一兩
同熬以蠟鎔為度

七聖膏治疥癬

黃蘗兩半 苦參 藁本 硫黃各壹

蛇床子 膩粉各半 猪脂陸兩

右為細末煎猪脂油去滓與前藥同拌和稀稠得所以
拍器盛凡有患偏身者即遍塗之不可小有遺漏仍先
以指甲抓破凡用此膏夜間最佳凌晨以濃煎藁本湯
浴之如碎小瘡只一上便較甚者不過三上永絕根本

神良

烏金膏治背瘡

白芷 桂 當歸 川芎 麝
白及 白斂各壹 血竭 沒藥 乳香各貳錢

右件並剉細和令勻以白綿裹用清油三斤將包子入
油內以文武火煎候紫黑色去藥包煎五七沸入黃丹
二十四兩以文武火煎藥油如光漆將少許滴水內成
珠子以津塗手將藥攤無油污手即成入丹後更依次
第下下藥末各二錢匕先入血竭次沒藥次麝香次乳
香收貯坩器內如常使用

補肌散治一切惡瘡

五葉草 木鱉子 雄黃 黃丹各半

狗頭灰壹 蜘蛛大者

右件藥搗羅為末用蕎麵一兩裹藥末燒煙盡為度細
研為末諸般瘡膿水不止疼痛不可忍者摻在瘡口大
効

獨活膏治疥癬

羌活 獨活 丹參 苾白各半

豆蔻壹 是肉豆蔻

右藥入菜油內覺油香更入黃蠟候蠟鎔成膏了即是
如用時先洗瘡拭乾傳藥

甘草 麻黃 大黃 桂
右等分並生為細末每服二錢酒水各一椀煎合一椀去滓溫熱服

乳香散 治諸般惡瘡及打撲着

花浮石 又云花藥石 肆兩燒令赤 試劍草 乳香 各貳分
新瓦末 少許

右並為細末再入乳鉢內研細均器盛之密封但是打損刀傷斧斫出血搽藥患處用帛子繫之勿令着水三日內肌肉便生如有腫膿水瘡并陰毒走馬疔瘡之類用蘘汁淨洗用麻油潤過後用藥搽之

吳茱萸散 治風寒濕注下成瘡

檳榔 壹兩 硫黃 半兩 吳茱萸 錢壹 川烏頭 壹个

右四味為細末搽瘡上乾者油調傳之

五香散 治一切瘡腫欲作癰毒發背亦能消散

木香 丁香 藿香 沉香

右等分為鹿末每服一大錢水一盞煎三兩沸稍執服先嚼好麝香少許以前藥送下曾膈食稍空服之

碧金散 治丁瘡及發背腦疽脚氣下注一切惡瘡此方療諸般瘡疾

蜈蚣 壹對全者壹雌壹雄 其雌者小雄者大 麝香 錢
銅錄 貳錢 綠礬 壹錢

右為末先將銅錄蜈蚣同研七分細續入麝香綠礬膏

原缺

研極細每用時先以大針撥去瘡口內死肉至有血出

急燃一紙條抄藥少許在上覺藥微行急點少油在瘡

上指勻次以沉水膏花子貼蓋瘡口量瘡勢大小用之

白芷散治金鐵所傷及破傷風

黃連 檳榔 木香 白芷

右等分為細末搽所傷處血便止如婦人血運以童子

小便調一錢如藏毒諸血以水煎服

白膏藥治發背諸癰腫惡瘡

乳香兩壹 瀝青 寒水石各貳兩並研為末

輕粉抄肆五錢同前 右同入坩石器內慢火鎔不住用篦子攪勻如泥先手

上塗油圓得成膏子以熟水浸三日有患者先用溫鹽

蘘汁洗瘡拭乾攤作紙花子貼之五日一換忌食辛酸

執毒物不得犯銅器鐵器以磁合子收之熬時時入油

少許如浸三日尚硬再入少油更熬亦勿令過當得所

可也

多魚散逐一切敗血刀箭藥

似錦將軍 豫吞細炭壹握 倚松子巴豆 半兩銅錢用酒

右為細末隨傷大小貼之血出疼痛便止更無痕痕及

出箭頭止血大効及逐婦人一切敗血者可服一字溫

酒調服

黃蘗散治上膈壅毒咽喉腫塞口舌生瘡痰涎不利

五倍子半兩 密陀僧

銅青 黃蘗各壹分

右為細末每用少許搽患處嚙津小兒瘡疥毒氣攻口

齒亦宜服之

蛇床子散治疥

蛇床子 臭硫黃 胡椒等 輕粉少

右為細末每用先淨洗疥用菜油調藥末搽之

檳榔膏治遠年裏外疔瘡不羸者

檳榔 乾猪糞各半 龍骨壹 水銀粉少許

右四味為末入水銀粉研勻先以鹽湯洗瘡熱縮裏乾

以生油調為膏貼瘡三日一易五易定差

柳枝膏貼灸瘡

麻油半 黃丹壹 乳香壹 柳枝壹

右如常法熬成然後入乳香攪勻貯器中

沉水膏治腫起

白及 白斂各壹 乳香錢

右為末及白斂研入乳香看瘡大小以水一碗抄藥在

水中以鐵篦子打散令藥自澄作白膏藥看瘡勢以紙

花子攤貼之

膈茶煎治陰瘡痒痛出水久不差

膈茶 五倍子等 賦粉少許

右先以漿水葱椒煎湯洗淨後傳之末差再傳之

貝母煎 治漏瘡積年不老者

貝母 知母 芥子仁

右等分為末醋煮麵糊和元如梧桐子大每服十五元至二十元空心食前艾湯下

檳榔散 治諸般惡瘡久不生肌

木香 黃連 檳榔各半兩

右為細末如瘡乾用唾調成膏塗之如瘡濕乾傳之

山茄子散 生肌藥

山茄子分兩 撮山合壹錢 石決明半錢

右件同拌勻以唾津溫水調藥花子候瘡肉惡肉淨盡

方廿二

先於瘡口內乾搽少許後用花子貼之

紫金散 治丁子油瘡黑甜者

五靈脂 床粉各半兩 熟桃仁壹兩

右同研令勻雞子清調先刮破然後塗藥

又方

天南星 白殭蚕 蒲翁草根統漏根也又名地低

右等分為末雞子清調塗

白欵散 欵瘡藥

白及 白欵 絡石各半兩取乾者

右為細末乾搽瘡上

金仙散 欵肌藥

金星草貳兩陰乾伍月採連根 白及 白欵各壹兩

右為細末搽瘡上後以膏藥蓋之

白膠香膏 治折傷

乳香 白膠香 瀝青各等分研

右以脂麻油和如麵劑重湯煮成膏不犯銅鐵以杖子別起如絲即成膏

栢根散 治無名惡瘡

烏蛇壹寸浸去皮於瓦上煨乾 黃栢根皮肆寸焙去皮

杏仁壹兩燒存性

右為末含鹽漿水洗了入膩粉津調塗上帛子貼之甚時再上

方廿三

小真珠散 生肌

定粉貳兩 黃丹半兩 白欵末壹兩

右為末乾搽瘡上後用膏藥如瘡口大即用散子

乳香餅子 治瘡止痛生肌肉

乳香 麒麟竭 沒藥各半兩

右研勻以狗膽汁合成膏捏作餅子如榆莢大每使時看瘡大小以餅子安瘡上外用膏藥貼定

塗摩膏

護火草大葉者亦名景天 生薑不洗和研 鹽如上

右塗摩痒處如遍身癢疹塗發甚需餘自消

胡麻散 治癩

苦胡麻半斤

天麻兩

乳香分

右為細末荆芥臙茶下三錢忌酒房事動風物一百二十日服半月後兩腰眼炙十四壯

神授散治傷折內外損

當歸

鈔粉各半

鵬砂錢

右同研勻每服二錢濃煎蘇枋汁調下若損在腰以上先喫淡麵半枕然後服藥腰已下即先服藥後喫麵仍不住呷藕木汁更以糯米為粥入藥三錢拌和攤在紙上或絹上封裹損處如骨碎更須用木夾定外以紙或衣包之

萬安散治一切惡瘡

五倍子

蜜陀僧研

白丁香各等

右先以甘草二兩搥碎以酢蒸汁一升煎五七沸去滓口含洗瘡上令淨拭乾將末旋入麝香少許以唾調作花子貼之

雄黃元治瘰癧瘡

砒霜分

雄黃錢

雄黑豈肆拾柒个揀小者是去皮研之

右三味同再研勻滴水成劑圓如黃米大看口大小用藥入在瘡口內或未破以針剔見血貼藥元在上以膏覆之念大悲呪亦能愈此

又方用桑寄生燒灰以盆蓋候成黑取出研為細末入麝香少許摻瘡上如瘡未破用油調藥塗之兼服散子如後

牡蠣兩

甘草兩

臙茶

右為細末如湯點不數日較又方治瘰癧

龍腦薄荷葉

不艸皂角各壹兩去皮酥炙焦黑去子

右為細末用鹽豉一合醋浸軟同搗得所如硬添醋元如菘豆大每服十元冷水下不計時候亦進三四服忌鹹甜動風物等

失笑散治疔癰

大腹子半

硫黃肆

右為細末每用以清油塗手心內攤嗅之不過三兩上効此藥最驗

治地咬草藥生搽為末皆可

連錢草

菜如小杏菜又如小喬菜幹枝着地盤生而淡紅色无香

地紅草

狀似荆芥而其穗尤似菘活細有花色淡紫无香

右二味生同搗搽傷處立効

治患瘡曾中痰熱惡心

升麻

葛根

右等分為細末每服二錢白湯點服食後

黃蜀葵散治諸般惡瘡疼痛不可忍者

黃蜀葵花

赤小豆

右二味等分杵作末冷水調用雞翅看瘡口大小掃在上頻頻用止痛甚妙

返魂散但是傷損至死先以童子小便調下一錢立効便活

花藥石壹斤搗碎

硫黃陸兩搗碎

鴨舌草生用

右件藥用新坩合子一箇花藥石一重次入硫黃一重一重鋪盡上用鴨草蓋之以赤石脂和塗合子合又用鹽泥固濟使新埽一口上書金木火土字中心土字上放合子用兩秤火煨火盡取出於地坑內埋一宿取出細碾為末但是刀傷打損至死者於傷處搽藥其人便活且去疼痛如婦人產後血運至死但見心頭暖即以童子小便調藥一錢喫了似猪肝片取下已不患血風血暈氣若心下有血耗黃物吐出或隨小便出立効

方廿一

十三

若牛抵人腸出如腸不損者急與內入以桑皮縫了搽藥在上立活亦不用封裹神効不可言如有損臟傷熱煎童子小便調下一錢

治乾濕癬久不差方

豉分炒

斑猫拾壹个去翅足微炒

右二味為細末以沙糖水調傅之以差為度

桃花散治刀斧所傷挾風腫起方

天南星生

黃丹生

右二味各等分研勻乾搽

治久漏不羗

葶藶子

豆豉

右件等分筒搗作餅子七箇如當二錢大小安瘡上用艾炷灸之每三炷一換

治諸惡瘡久不差及疥癬方

水銀兩

臘月猪脂兩伍

右以鐵器中壘電用馬通火七日七夜勿住火出之停冷取膏去水銀以膏貼一切瘡无不應手立効者其水銀不妨別用

治白癩方

礬石

硫黃

右件二味等分研為末醋和傅之

八神膏治一切惡瘡

方廿二

十四

黃丹

南粉各壹兩

乳香許少

右件二味同入乳鉢內細研令勻停分作八分用油四兩於鈹子內煎令熟將鈹子於地上放少時入一分丹粉於油內用青活柳枝如拍鹿者右轉攪令極勻却將鈹子於火上燒煎依前放鈹子於地上再入一分丹粉如此八次都入盡丹粉後更用乳香末一分入油內同煎將藥滴水若散即且煎若不散是藥就用也其柳枝若煎得焦頭即旋去黑者

治破傷地毒等四方

治破傷風

漏藍不去皮

藿香葉各貳分

右為細末每服二錢生油半兩調服良久以大蒜三瓣

口中嚼爛用執酒一盞投之汗出為効患人覺風退不
須服如未効依前再服

治毒蛇并蜈蚣諸毒虫所傷

川椒

鹽鼓各拾

右二味細嚼在手中用天南星末二錢一處調塗患處
黃水出立不痛

治諸般惡瘡生肌肉藥

龍骨

蜜陀僧各壹

右為細末先用温水洗瘡口令淨軟帛子搵令乾後用
此藥乾貼不過三五上必効

治諸惡瘡

方廿二

十五

山竹葉

虎掌草葉

右二味焙乾為細末用煎湯調貼之

接骨丹治傷折

左顧牡蠣燒過

料薑石生用

右為細末以糯米粥攤在紙上然後摻藥末每次用半
兩裹傷處用竹片子周圍夾定稍進通氣纏之候藥自
落依前換

治傷折等法

治傷折

藥疽草

秦艽

並生等分
約重肆兩

右同杵爛以博末半升用童子小便調為膏攤檀子上
卷傷處

治金瘡

滑石壹兩
別研

黃丹半兩

右二味並生用研勻乾摻瘡上

治禿瘡

芋子生者不
以多少

土硫黃研細
等分

右同搗勻捏作餅子貼在瘡上乾即換之數次便較

如神骨濕癰疥癩風瘡久不老者

班猫叁拾

巴豆叁拾

右二味脂麻或菜油半均盞許和盞坐慢火上入甘草
一寸同熬黑色漉去三色藥入黃蠟一塊輕粉半兩凝
冷成膏塗瘡上大効

方廿二

十六

丁腫論并方論曰四時之中忽有大風大霧大寒大熱若不能避
之人有將息失宜感此氣入於躰中頓折皮膚流注經脉
遂使腠理擁隔滯滯結滯陰陰之氣不得宣瀉變成癰疽
丁毒惡瘡諸腫至於丁腫若不預識死不旋踵其瘡初起
必先痒痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重頭痛心驚眼
花若大重者則嘔嘔者難治

忍冬酒治癰疽

忍冬嫩苗

一握蒸尖九蔓生莖葉皆有毛生田野籬
落開面有之兩葉對生春夏秋葉稍
尖而色嫩綠柔薄冬即堅厚色深而丸得霜則葉
卷而色紫經冬不凋四月花開極芳香聞數步初
開時色白數日則變黃每枝黃白相間故一名金
銀花

能扶危可移根庭檻間以備急兼花可愛

甘草 生半兩

右忍冬爛研同甘草入酒一升半沙瓶中塞口煮兩食頃溫服或乾茶三錢甘草方寸酒煮服之

小朱散 治癰疼久不羸每發或先心腹痛痰噎麻痺筋脉不仁

成塊赤土 石者 當歸

右等分為細末冷酒調下二錢日三服兼用塗藥

太府丹 治下疳脚瘡

甘遂 肥寔連珠者壹兩薄切疎布囊盛之

芎藭 壹分

右以紙籠大香炉令至密頂留一竅懸甘遂囊於竅間下燒芎一塊令煙薰甘遂欲過更燃一塊芎盡取甘遂

方廿二

十七

為末三十歲已上氣盛者滿三錢虛者平三錢半羯羊腎一對批開勻分藥在內淨麻纏定炭火炙熟炆令焦臨卧爛嚼溫酒下隨量飲酒能飲一斗者可飲五升以高物襯起雙脚一服即差

烏頭餅子 瘡疥甚者

烏頭 陸兩每個肆片切之

大豆 陸分

右同入沙瓶煮極爛每服一片豆少許空心酒下

小臈茶煎 治陰瘡痒痛出水久不差

銅錢 壹百

烏頭 陸分

右水一椀半煎至一椀熱洗二方相須用之无不即驗

治金瘡流血不止

饒州白垩 研

黃柏末

右以唾津調塗

治乳癰漸成瘡疼不可忍者

乳香

菘豆 各等分研細末

右二味用冷水調切恐冷水寒者溫煎水亦得食後併喫二服每服抄二錢

又方

雞子 壹枚打破

右用熱酒調下五六服即愈

地骨散 治惡瘡久不羸止痛生肌 用此不痛不用此即痛根濃煎

方廿三

十八

地骨皮 先刮取浮皮別收之次取浮皮下賦白粉為細散其白粉下赤皮細剉與浮皮一處為鹿未細散各貯之

右每用鹿皮一合許前濃汁乘熱洗瘡直候藥湯冷以軟帛子裏乾乃用細散傳之 昔人有骨下瘡膿三年痛膜者有手心透者用之須久即差皆用此藥差

治疔疽腫痛不可忍

紫幹菜子 黑色者壹盞子

右一味搗煉爛以水一大椀煮十沸以來將病疔熱蘸七次或乘熱淋涼畢用冷水救一次疔乾以膏藥貼了封裹勿令見風冷

又方

煮猪蹄湯不以多少

右一味如前方

豆豉膏治灸瘡火覺及臭氣所傷腫痛者

豆豉不以多少

右一味細末油調塗瘡上

治惡瘡并出箭頭等五方

治諸惡瘡

黃蜀葵花乘露採

右一味以坩合子盛之放在馬糞底十餘日候成膏取

出塗治諸瘡

消內毒方

葛根

升麻

方廿二

十九

右等分為細末白湯點之

治蜈蚣咬

右以醞醋濃磨附子尖塗之立差

出箭頭

仁宗神應大進方神妙

壁鼠壹个尾長者

右熬乾為末先令患人飲酒一兩盞次調藥喫三四錢

更飲酒令微醺醉覺痒不得搔箭頭自出如針入肉亦

用此藥

治連腰丹瘡

蛇退皮首尾全者

右一味燒灰菜油調塗一二次即差世傳數方皆有

理故編錄之

木香膏治撲傷打傷

木香不以多少

右為細末每用熱酒調成膏以少許塗手上摩痛處

日三四

治一切惡瘡等方

治一切惡瘡及補漏發背等瘡

黃丹

右以象蚪子盛黃丹兩箇相合外以紙裹五重置於炭

火中一煨煙盡取出放於磚石上以椀子蓋之冷即去

灰土將丹研每用摻貼之如神

治火燒瘡痛不可忍

方廿二

十

右以乾黃牛糞燒為灰油調塗之少時痛止生肌

治瘡不羸老而復發骨從孔中出名為骨疽

右以猪膽和楸葉搗封之

附骨疽者其膿在骨間亦曰深疽亦曰疔疽久而膿化為

骨從瘡口中出此疽之大甚者也

右以芙蓉皮作末服之覺膿與骨從肉下踴出

又方 搗白揚末傳之

又方 蕪青子搗傳之帛裹一日一易

又方 檲皮燒末飲服寸匕

又方 應惡瘡灸瘡上痛灸至不痛不痛灸至痛艾炷如

麥粒大

治瘡中水腫方

右以炭白灰胡粉二味等分脂和塗瘡口上水出即時痛止

治瘡因風致腫方

右以櫟木根一斤濃煮內鹽一把漬之

治因瘡腫痛劇者數日死或中風或中水或中狐尿刺方

右燒黍穰或牛馬屎或生桑條取得葉多者燒薰汁出即愈

治瘡因風致腫

右以溫桑灰汁漬冷復溫之常令熱神秘

治惡瘡十年不羸亦名馬疥

方廿二 廿一

右燒蛇退皮一條為細末以猪脂和傅之醋和亦得

治人脚無冬夏常坼裂名曰尸脚方

右以雞屎一升水二升煮數沸停水冷漬半月羸亦可
用馬屎

又方

右燒膠為末唾津調塗上使乾帛貼之

治白癩方

右以平旦綽取韭頭露塗之極効

治男女陰瘡方

右以石硫黃末研細傅瘡上

治瘡腫疼痛

右用赤小豆為末以雞子清調塗

又方

右用菘豆末乳香末等分以新水調塗

治癩癧瘡

右用鯉魚一箇要重半斤已上者使巴豆不計多少和皮以杖子填巴豆入魚口腹內候滿紙糊口使新磚一箇放魚在上以新瓦蓋使木炭燒魚成灰去灰取藥搗羅為末煮麵糊為元如菘豆大每服十五元晚食後煎烏梅湯下若取及兩月皮肉如故孕婦不可服

治破傷風

右以全乾蝎一箇薄荷葉裹火上炙微黃研細熱酒調

方廿二 廿一

下

療腫毒癰疽未潰令消已潰令速愈

右取草烏頭屑水調雞翅掃腫上有瘡者先以膏藥貼定無令藥着瘡人有病瘡腫甚者塗之坐中便見皮皴稍稍而消初塗病人覺如冷水瘡乃不痛

治外腎平赤腫偏大疼痛

右以大黃為末以酸醋和塗之

治一切瘡肉肉出

右以烏梅燒灰乾摻瘡上

又方

右用硫黃末乾摻乾即以唾調之

治熱油湯火傷

右以石膏細研搽瘡上

治舌根強不能咽物於舌根等處兩經絡深紫處以針

刺之出紫血為度

醫癬膏

治乾濕癬
夏枯草根 俗呼吃塔菜者

右一味搗爛以醋浸塗癬瘡上佳

奪命散

治久患漏瘡鼻骨
人糞不以多少

右用泥毬子裹定柴火內燒紅取出不用泥只將糞研細入麝香少許乾搽上七日生肌

方廿二

廿三

治湯火瘡

右用玄精石燒作粉水調塗瘡立効

鯽魚完

治癩癧

右取鯽魚長三寸者去腸以和皮巴豆填滿腹麻皮纏以一束稈草燒煙盡研粳米粥元菜豆大米飲下二元未利盡劑乃安其者破者尤効速忌動風物

療灸瘡

右用猪筒骨中髓以膩粉和為劑復內骨泥裹火煨熟鹽水浴後傳之

蕪美散

治瘡

雄黃兩半
白蕪美分壹

吳茱萸

白礬

重校定此方內吳茱萸元分兩此方太平聖惠方亦有之內吳茱萸用貳錢

右以白礬水調前件藥末塗在瘡上

治癬瘡甲疽等疼痛方

治癬

右用決明子末同少水銀粉為末先擦破癬上以末傅之

治甲疽

筋肉畏甲膿出血疼痛不羸
膽礬 燒灰

右先剔去肉中甲傳藥瘡上縱有筋肉一傳即乾而落丁瘡有三十六種皆因人腠中感風邪寒濕凝結氣血以成若不預識而早治之殺人甚速孫真人云若不預識令人死不逮辰又云已看訖而求方其人已入木矣可不預識而備之哉其狀瘡頭黑硬如釘子四面赤如火燎將發時但於口中頰邊舌上看之赤黑如珠子疼痛應心每日夜增長流諸脉甚則眼中見火光心神昏口乾心煩即死矣有此證者皆宜速治

方廿二

廿四

治一切丁腫神奇方

右以蒼耳根莖苗子但取一色燒為灰醋泔淀和如泥塗之乾則易之不十度其根拔出神良
孫真人云諸方皆不及此

又方

右以艾蒿一擔燒作灰於竹筒中淋取以一二合和石灰如麵漿水以針刺瘡中至痛即點三遍其根自出

千金奪命驚牙膏治遠年惡瘡疔瘡漏瘡無名惡毒瘡諸藥貼不較神効

香白芷 紅皮 白木 青皮

細辛 紅芍藥 白附子 敗龜

通草 虎骨 骨碎補 蒼木

海蛤 當歸 密陀僧 乾姜各各

驚牙 沒藥各一 桂貳錢 木鱉子伍个

腦脂枝腦模枝也 補腦脂根也各 貳錢

黑附子貳个 血竭壹錢半

右件藥同為細末每料使藥末半兩先用清油三兩銚子內煎沸入黃丹一兩不住以柳枝攪候黑色取離火

方世 廿

厚朴 藿香葉 陳橘皮 神麴 訶子皮 煨
 川芎 丁香 木香 白木 甘草各壹
 人參叁分

右為細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元至二元生薑湯下食前服小兒一元分二服米飲化下

雞頭元 治小兒諸病後不能語

雄雞頭壹个 鳴蟬叁个 大黃 甘草各壹
 當歸 黃耆 川芎 遠志
 麥門冬各壹 木通 人參各半

右為細末煉蜜和元如小豆大平旦米飲下五元空心日三四服兒大者加之服取效雞蟬二物宜求死者

用之不可旋殺孫真人云所謂殺生求生去生更遠不可不知也

連翹煎 治小兒无寒熱強健如故身躄結核瘰癧及心脇腹背裏有堅核不消名為結風氣腫

連翹 白及 白頭翁 牡丹 防風
 黃蘗 羌活 桂 秦艽 豉各壹

海藻貳兩

右為細末煉蜜和元如大豆大三歲兒米飲服五粒至十粒五歲以意加之

安中元 治脾胃不和乳食減少

人參 白木各半 木香 藿香 甘草

枇杷葉 半夏 陳皮 丁香各壹 檳榔壹个
 肉豆蔻貳个

右為細末水煮麵糊為元如麻子大每服十元食後米飲下

抱龍元 治風壅痰實頭目昏眩背膈煩悶心神不寧恍惚

驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂躁
 天南星壹斤 藿香葉貳兩 牛黃半兩
 朱砂 白石英各壹 雄黃肆兩 阿膠叁兩
 生犀角 麝香各壹 金箔 銀箔拾片

右件十一味為細末入研者藥令勻温湯搜和為元如雞頭大服一元用新汲水化下入鹽少許服食後

小兒白朮散 治食少多傷壯熱倦怠

人參 茯苓 白朮 前胡 黃橘皮
 藿香 枇杷葉半兩 半夏壹分 桔梗半兩
 甘草壹分 草豆蔻壹个

重校此方內六味无分兩其指迷方內有藿香散一方与此治療一同藥味相類內人參茯苓白朮前胡陳皮藿香等六味各半兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片棗一个煎七分温服不以時

剪髮散 治小兒一切驚風久經宣痢虛而生驚者

朱砂壹分 牛黃 龍腦各壹 麝香半分
 天竺黃壹分 地黄貳分 白僵蚕

蠋 乾蟾 蟬殼 五靈脂
右藥末共二兩四錢東流水煮白麵糊為元如梧桐子大每服一元剪刀鏤頭研食後薄荷湯化下如治慢驚即去龍腦

釣藤飲子 治脾胃虛風吐痢慢驚

釣藤各分 蟬殼 防風 人參 麻黃
白殭蚕 天麻 蝎尾各半 甘草 川芎各壹分
麝香壹分

右為細末每服二錢水一盞 五分溫服量多少與之寒多者加附子末少許不以時

黃鐵子 治小兒慢驚

方廿三 十四

天麻 防風 人參各壹兩 乾蝎全者 白殭蚕兩
甘草 朱砂 雄黃 麝香各壹分 牛黃壹分
一方加白附子半兩火炮

右為細末煉蜜和元作錠子量兒大小加減不以時薄荷湯下未過百日孩兒只与小豆大一元作一服人參湯化下元梧桐子大每服一二元亦佳一名麝香牛黃元

全蝎散 治小兒驚風中風口眼喎斜語言不正手足偏廢不牽

全蝎 白殭蚕 川芎 黃芩 大天南星
甘草 桂枝 赤芍藥 麻黃各壹分 天麻陸分
右為鹿末每服三錢水一盞半生姜七片煎至七分溫

服无時量兒大小與之日三四服忌羊血

大天南星元 治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視口眼

相引牙關緊急背脊強直精神昏塞連日不省
滴乳香 龍腦 牛黃各半 朱砂
天南星各壹錢 麝香半錢 天麻 人參
防風各壹錢 乾蝎壹分

右各研杵令勻煉蜜和元如雞頭大每服一元荆芥薄荷湯下量兒大小加減不以時

麝香元 治胃燥肌躄黃瘦腹脇脹大

沒石子 史君子 川練子 白燕莫仁
肉豆蔻仁一方用 縮砂仁 白木各壹分 母丁香
方廿三 十五

右為細末水煮麵糊為元如麻子大每服十元米飲下不以時

紅散子 治風疾驚搐

蝎壹分 防風 桔梗 茯苓 甘草各壹分
白芷半兩 天南星 麝香壹錢 龍腦少許 朱砂壹分
重校定此方內天南星无分兩其公方內有全蝎散一方以此方治驚一詞兼味相類內天南星前大

右為細末每服半錢薄荷湯下食後服

羊角元 治小兒腎虛或病後筋骨弱五六歲不能行宜補益肝腎

羚羊角 虎腦骨 生乾地黄 白茯苓

酸棗仁各半 當歸 桂心 防風
黃耆各壹分

右為細末煉蜜和成劑每服一皂皂大兒大者加之食前溫水化下日三四服久服取効

益兒元 亦名調中元治榮衛不和肌胕清瘦或發寒熱齒色萎黃化癖進食長肌

人參 白木 柴胡 茯苓 當歸
陳皮 白芍藥各半 鱉甲 三稜
乾薑各壹分

右為細末水煮麵糊為元如麻子大每服三五十元空心米飲下

方廿三

十六

救生散 陽翟縣來既朝奉方治小兒吐瀉後壯熱多睡困倦眼目上視時發驚悸手足瘈瘲乃是慢脾風鑿工以水銀膩粉藥下之頃時乍清復作如故十中无一二活者宜服此藥

厚朴去龜皮用甘草伍寸拍破水二碗慢火煮令水減半去甘草不用只取厚朴乾取壹分
白木片切蜜炙黃 人參壹兩 陳皮 五味子
紫苑 乾薑 杏仁各叁分 桂心 甘草各半兩

右為末每服二錢水一盞入生薑三片棗一個煎至七分去滓食後溫服

定吐救生丹 治小兒伏熱生涎心胃煩躁壯熱藿亂食不下嘔噦惡心或發吐逆

山大戟漿水煮切焙 膩粉伍兩 龍腦貳兩 粉霜柒兩
乳香別研 丁香各伍兩 水銀 鈆與水銀結沙

右合研勻每鎔蠟一兩蜜二錢半和元如黃米大一歲服一元如煩躁研生脂麻馬齒菜水吐逆煎丁香馬齒菜湯更量虛實加減食後臨臥服此藥除熱化涎下兩止吐逆若胃虛傷冷嘔吐不止不可服凡小兒吐逆宜速療久不止遂為慢驚常宜收此備急

吳波散 治疳痢

宣連 白茯苓 阿膠 人參 柏
丁香各壹分 沒石壹分 訶子貳分 桃白皮叁分

方廿三

十七

右為細末每服一二字白米泔湯調下不以時

如聖散 治大人小兒急慢牙疳及牙斷蝕漏膿出不止并骨曹風及定牙齒腫疼悶者

香白芷 芩香素 甘草各壹兩 寒水石兩
草烏頭末叁分 石膽 砒霜
鈆白霜各壹分 鵬砂半兩

右件藥研勻細蜜收每用時先淨漱口了用半字輕指有涎吐了神妙

大醒醒元 治驚疳百病及諸壞病不可具述

辰砂 青礞石 金牙石各壹分 雄黃壹分
蟾灰貳錢 牛黃 龍腦各壹分 麝香別研

地黃生乾

右研勻細水煮餅和元如菘豆大朱砂為衣百日每服一元一歲兒二元食後薄荷湯化下

和中散 習氣止吐瀉定煩渴治腹痛不思食

人參 白茯苓 白朮 甘草 乾蠟

黃耆 白扁豆 藿香葉

右件等為細末每服三錢水一盞棗二不去核生姜五片煎至八分食前溫服

紫蘇子散 治小兒欬逆上氣因乳哺失度內挾風冷傷於肺氣或小兒啼氣未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下

紫蘇子 蘿蔔子 杏仁 木香 人參

方廿三

訶子參兩 青橘皮 甘草各壹兩

重校定此方內五味無分兩此方大醫局方亦載之內紫蘇子蘿蔔子杏仁木香人參五味各壹兩

右為細末每服一錢水一小盞生薑三片煎至五分去滓不以時溫服量大小加減

潤肺散 治小兒寒壅相交肺氣不利咳嗽喘急語聲不出痰涎壅塞胃膈煩滿鼻塞涕咽喉乾痛

麻黃 人參各壹兩 杏仁 貝母各壹兩 甘草各兩

陳皮壹分 桔梗 阿膠各半兩

右為細末每服一錢水八分煎至六分去滓食後服

進食散 治脾胃虛冷腹脹食少

橘皮 青橘皮 甘草 良薑 桂各壹兩

草豆蔻貳箇 川烏頭 訶子皮壹兩

重校定此方內川烏頭一味無分兩此方蘇沈良方亦載之內川烏頭用參箇

右為鹿末每服二錢水一盞同煎取六分去滓溫服不以時

麝蟾元 治驚風涎熱潮搐

大乾蟾灰貳錢 鐵粉 朱砂末 雄黃末

蛇含燒淨 青礞石末各壹錢 龍腦壹字

麝香壹錢 各別研

右拌勻水浸餅心元如梧桐子大朱砂為衣薄荷水化下半元至一元不以時

大胡黃連元 治一切驚疳腹脹虫動好喫泥土生牙不思飲食多睡吸嘔臟腑或秘或瀉肌膚黃瘦毛焦髮黃飲水

方廿三

五心煩能煞虫消進飲食治瘡癬常服不瀉痢

胡黃連 黃連 苦練子 白蕪荑仁去扇半兩

乾蟾頭洗別末 麝香壹錢 青黛半兩 蘆薈壹分

重校定此方內大胡黃連等三味無分兩此方錢氏方亦載之內胡黃連黃連苦練子各用壹兩

右將先四味為末以猪膽汁和為齋每一胡桃大入巴豆人一箇置其中用油單一重裹之蒸熟去巴豆用米

一升許蒸熟為度入後四味水煮麵糊元如麻子大每服十元至十五元清米飲下食後臨臥日進三兩服

大青膏 治驚風熱

天麻壹分 白附子錢半 蝎尾半錢 朱砂壹字

生壹錢

錢半

壹字

青黛 壹錢
鹿麝香 壹字
烏梢蛇肉 半錢

天竺黃 壹字

右同再研細入生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子
大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五
歲已上同甘露散服之

安神元 治上焦多熱驚悸不已

麥門冬 馬牙硝 白茯苓 乾山藥
寒水石 各半 朱砂 壹兩 甘草 半兩 龍腦 壹字

右為細末煉蜜為元如鷄頭大每服半元沙糖水化下
無時

延壽元 治小兒疳氣羸瘦腹大頭小頭髮稀疎臟腑不調

或瀉或秘

乾蝸牛 乾蚯蚓 各半
乾蝦頭 參箇 使君子 沒石子 各伍个
地退皮 麝香 各壹分

右將蝸牛蚯蚓蛇皮蝦頭四味入罐子內封閉口炭火
燒通赤取出同餘三味並為細末用粟米飯為元如菜
豆大每服五元米飲日下二服

小進食元 治乳食不消心腹脹滿壯熱喘急嘔吐痰逆腸

鳴泄瀉米穀完出或下痢赤白腹痛後重及食穢乳癖疔
氣痞結並宜服

代赭 當歸 朱砂 枳殼 木香 各半
麝香 壹分 巴豆霜 半分

右為細末入研藥令勻煮麵糊元如麻子大一歲食後
一元溫米飲下量虛實加減

黃錠子 治小兒風壅急熱

乾蝸牛 黃 麝香 各半 甘草 壹分 天麻 壹分
防風 人參 各壹兩 白殭蚕 壹字

右除研者藥外為細末後合研勻煉蜜和作錠子每服
一歲已下兒服一豌豆大煎人參竹葉湯化下食後臨
卧時

開胃元 治小兒臟腑怯弱內受風冷腹內脹滿腹鳴泄痢
或青或白乳食不化又治臟冷夜啼胎寒腹痛

木香 蓬莪朮 白朮 人參 當歸
麝香 白芍藥 各壹分

右為細末都研勻湯浸饅餅元如黍米大每服十五元
米飲下新生兒腹痛夜啼可服五元並乳食前後

至聖麝香餅子 治三種發癩潮搐瘰癧口眼相引目睛上

視頭項偃仰口吐涎沫及吐痢之後腸胃俱空氣血變亂
卧不得寐反拗多啼令兒發驚手足攣縮腰背強直精神
闇鈍涎潮汗出漸加昏塞每服二餅子煎人參湯下不以
時候

天麻 玄參 地榆 各半 附子 壹兩
白花蛇頭 壹箇 朱砂 麝香 各半
右於銀器內入湯更坐重湯熬成膏元如梧桐子大金

箔為衣提作餅子此亦治老人虛風但去地頭骨及治男子婦人虛風後風客心暗瘖不能言

香蟾煎治小兒疳瘦

乾蟾貳个壹个燒存性一个以酒壹升煮候爛瀝去骨慢火熬成膏

胡黃連 白芫荇各壹兩 青黛 麝香

蘆薈各壹分

右以蟾膏和元如麻粒大看見大小加減服之

小史君子湯治齒疳

史君子壹兩 蒼朮叁分 芍藥半兩 人參

茯苓半兩 黃橘皮壹分 白芫荇

右七味為末空心以米飲調下二錢

方廿三

廿三

小羌活膏治風熱有痰多生齶悸

羌活 防風 天麻各半兩 白附子 藿香葉

天南星各壹分 麝香貳分

右為細末煉蜜和元如皂子大荆芥湯或熟水化下食後服

木香元治小兒疳

木香 青黛 檳榔 豆蔻仁各壹分

麝香半兩 蝦蟇叁个 續斷子壹兩

右為細末煉蜜和元如麻粒大空心服五七元薄荷湯送下

進食煎治傷食腹痛

木香 枳殼 當歸 朱砂各肆兩

麝香 巴豆各壹兩 右為細末煮麵糊為元黃米大每服三五元食後以米飲下

薑薑湯治大熱有瘡宜服此湯

川芎 地黃生乾 黃耆 芍藥赤者 防風各半兩

羌活 甘草各壹分

右為細末每服二錢葱湯調下荆芥湯亦可

瀉青元又名瀉肝元治肝實多驚哭

當歸 龍膽 川芎 山梔子仁

川大黃濕紙 羌活 防風

方廿三

廿三

右等分為細末煉蜜和元如鷄頭大每服半元至一元煎

竹葉湯同沙糖温水化下

豬膽元治疳熱

黃蘗 黃連 甘草生 青橘皮半兩

蘆薈 青黛各壹分 麝香壹錢

重校定此方內四味无分兩此方本宅家藏方內亦有之內黃蘗黃連甘草各用半兩麝香少許

右將上四味用豬膽汁和却蹙入膽中以線繫定漿水內煮十來沸瀉出放冷入乳鉢內研如泥後將蘆薈以下同研勻水煮薄荷糊元如麻子大每一歲兒五元食後臨卧白湯下

雞峯普濟方卷第二十三

小兒

無名散治小兒誤吞錢瓦石竹木鈎鏢等吐不出嚥不下又治上膈壅實咽喉閉塞口舌瘡纏喉風氣急難通湯水不下

方用玄參荆芥穗

茯苓黃連縮砂仁

管眾甘草山豆根

滑石鵬沙寒水石

右九味各半兩鵬沙三錢寒水石燒赤用河水蘸並為末每服一錢新汲水調下不以時

桃紅散治小兒驚熱隊涎傷風喘嗽潮熱若班瘡未出可服之

天南星

方廿四
參用白參半兩甘草生薑各壹兩片切河水洗升同煮水去薑甘草不用將天南星片切焙令乾用

甘草

紫河車

白附子

白殭蚕

各壹分

蟬殼

右旋入腦麝少許一歲兒一字荆芥薄荷湯調下食後

臨卧時

神砂元治小兒伏驚積在內壅併痰涎及妳癖取虛中積轉驚者

辰砂

膩粉

定粉

白丁香

半字

麝香

重校定此方內麝香五分兩此方王氏薄濟方亦有之內麝香用少許辰砂膩粉各用壹錢餘如方

內分兩
使用

右件六味同研為末粟米飯和元如菜豆大捏作餅子慢火內微炮令紫色同粟米飲化下一元微痢為度食後

六神元治小兒疳瘦羸弱臟腑虛怯滑泄不止飲食減少引飲無度

丁香

木香

肉豆蔻

研令同

蘆薈

史君子

訶子肉

右六味同為細末以棗肉和元如菜豆大每服三五元米飲下食前

大驚元治驚風諸癇壯熱昏憤神志恍惚痰涎壅塞或發

搐搦目睛直視並皆治之

雄黃

青礞石

鐵粉

朱砂

地黃

蝦蟇灰

重校定此方內青礞石无分兩此方太醫局方亦載之內青礞石用煎錢半

右研勻以水浸餅和元如梧桐子大每服一元煎薄荷水磨剪刃股化下食後臨卧日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒臟腑口齒腸胃柔弱凡用銀粉藥須慎之則无他苦

當歸元凡小兒夜啼者藏寒而腹痛也面青手冷不嗜乳是也宜此方

當歸 白芍藥 人參各壹分 甘草 桔梗

陳皮各壹錢

右為細末水煎半錢時時少與服又有熱病亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃元人參湯下

丹砂元 治癩氣

海藻 海藻 辰砂 茴香 木香

菜菔各等分 乾者

右為細末水煮麵糊為元如梧桐子大每服二十元空心溫酒下

麝香散 治疔漏齒發腫疼痛臭氣及走馬疳侵蝕

麝香 蘆薈 沒石子 胡黃連 地榆

方廿四

龍齒

右件等分和勻用一字先淨漱口了貼之

小兒胃風元 治下血不入乳食

人參 茯苓 白朮 天麻 防風各貳分

乾蝎壹箇

右為細末水煮麵糊元如粟米大每服三二十元食後米飲下

蘆薈元 治疔熱

青黛 蘆薈 麝香 朱砂各壹錢

乾蝦蟇 大皂角已上二味等分同燒灰存性 為末每壹兩末入下項藥

右合研勻湯浸饑餅和元如麻子大每服十元食後米

飲下

天生黃散 治積熱重校定此方分兩極多可甘草貳兩 子壹分 芫花壹兩 雄黃壹錢 雄黃伍字

甘草貳拾 大梔子貳斤 苡薈子拾斤

鬱金貳拾 雄黃伍兩

右為末每服二錢水一盞煎至六分食後和滓溫服

龍骨散 治一切口瘡走馬疳

砒霜壹字火 煨令熟 粉霜半錢 龍骨壹錢

定粉壹錢 龍腦半字 蟾酥壹字

右先研粉砒霜極細次入龍骨再研又入定粉每用少許傳之

地黃元 治小兒胃氣不和食少黃瘦

乾地黃捌錢 山茱萸 乾山藥各肆分

澤瀉 牡丹皮 白茯苓各叁分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大三歲已下一二元至三元溫水空心化下

人參半夏元 治肺胃受冷咳嗽氣急胃弱痞悶喉中呀呷

人參 細辛各貳兩 丁香 半夏 厚朴肆兩

右為細末生薑汁煮麵糊和元如麻子大三歲兒每服十元生薑湯下食後量兒大小加減

辰砂散 治小兒肺癰痰實咳嗽喘急胃膈痞滿心煩悶痰涎不利呀呷有聲

辰砂壹錢 雄黃壹錢 朱砂壹錢 麝香壹錢

右合研勻湯浸饑餅和元如麻子大每服十元食後米

飲下

飲下

飲下

飲下

半夏

杏仁

葶藶

淘洗別杵成膏各半兩

朱砂

五靈脂

各壹兩

右為細末入研藥勻以生薑汁煮麵糊和元如小麻子大每服五元淡生薑湯下食後

溫白元

治小兒脾胃氣虛困泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉或久病後成慢驚身冷瘵癆

天麻

生貳分

白殭蚕

白附子

乾蝎

天南星

右為細末湯浸寒食麵和元如菜豆大元子於寒食麵內養七日取出未及養七日合成便服亦得每服七元

至二三十元空心煎生薑粟米湯下漸加元數服

地龍膏

治小兒胎風并大人疥癬

地龍

黃連

各壹分

巴豆

黃騰

小油

貳兩

右件三味小油內煎藥焦黑色為度瀝去藥用槐柳枝撓熬成膏入黃騰再撓勻塗貼如常法

罷搖散

治風搖

蜈蚣

壹個全用

蝎

柒個頭尾全者

朱砂

麝香

雄黃

右為細末每服一字油酒調下

香連煎

治瀉痢頻併

白石脂

龍骨

黃連

乾薑

白礬

各等分

右為細末粟米粥和元如黍米大每服十元十五元食後米飲下

化虫元

治諸虫

鶴虱

胡粉

苦練子

白礬

壹兩貳錢半

右為細末麵糊和元如麻子大一歲三元溫漿水入生油三五點撓勻下之

梧桐律散

專治小兒走馬疳

梧桐律

定粉

砒霜

粉霜

麝香

各壹分

右研為末每用先以鹽漿水洗淨後以藥一字搽瘡上自生肌肉兩臉上或口中先生小瘡子漸漸臭氣或連年者並治之

補銀元

治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘鹿

巴豆

水銀

各半兩

好墨

捌錢

墨鈔

銀錢

半兩同水

麝香

半錢

六

方廿四

五

右將巴豆末并墨再研和入砂子麝香陳米粥和元如菜豆大捏扁一歲一元二三歲三元五歲已上五六元前薄荷湯送下不得化破更量虛實增減並食後服

四聖湯

治瘡疹出不快及到揪

紫草茸

木通

枳殼

甘草

黃耆

右等分為鹿末每服一錢水一中盞煎至八分溫服不以時

益黃散

又名補脾散補養脾胃消進飲食

陳橘皮

壹兩

青橘皮

半兩

訶子肉

半兩

甘草

丁香

貳錢

右為細末每服二錢水一盞煎至六分食前服

五靈脂元 治小兒急慢驚風四肢搐搦

五靈脂 白附子 生天南星 生乾蝎 生各蟬殼 生半

右為末醋醋二大盞藥末一兩同熬成膏入餘末和元如菜豆大滿月兒妳汁化破一元二歲已下漸大以意加減並用金銀薄荷湯化下鼻上有汗是効乃愈

佛茹花散 治小兒慢驚神効方

金頭蜈蚣 蝎梢 佛茹花 蔓花

白附子 各等 龍腦 少許

右研極細三歲兒半字三歲已上一字薄荷水調手按

方廿四 七

左鼻搐右按右搐左立止少頃汗如雨困睡勿驚起永不發

五味元 治小兒一切病大有神効

硫黃 硝石 五靈脂

陳皮 青皮 各貳

右為細末水煮麵糊為元如菜豆大每服十元大人亦可服米飲下

重校定此方本來復丹以小兒去服 玄精石惟陰陽不分痞滿厥逆乃可

二神散 治小兒急慢驚風

天將子 貳个 朱砂 輕粉 各壹 蝎梢 伍个

巴豆 貳个

右為細末研妳汁為元如麻子大一歲一元薄荷水下

雄黃麝香散 治小兒走馬疳

麝香 少許 蘆薈 青黛 黃柏 雄黃 各壹

右同為末每服乾摻貼日三上

小柴胡湯 治煩熱

柴胡 兩 人參 黃芩 甘草 各參 半夏 貳兩

右為鹿末每服五錢水二盞生薑五片棗一个煎至一盞去滓溫服嗽者加五味子二兩

四物元 治癩

荔枝核 橘子核 茴香 各壹 牽牛子 半兩

右為細末水煮麵糊為元如梧桐子大每服十五元空心米飲下

方廿四 八

若頭痛發熱肢疼咽煩痛者宜四味升麻湯癩瘡成癩疹者宜荊芥湯時嘔者宜小柴胡湯不惡寒但煩燥小便赤色多渴成赤斑點者則以竹葉湯犀角飲子大便不通者宜四順飲子 腸門 昏睡譫語大便不通或如狂者宜大柴氣湯 瘰癧 若大便自利黑黃色此毒氣亦有所出亦不必廣與湯劑恐重增他病其大便已利不得湯藥助之其瘡赤稀少自快利但以升麻荊芥湯最佳小柴胡湯方在前

升麻湯

升麻 芍藥 葛根 甘草 等分

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時

荆芥湯

薄荷葉

荆芥穗

牛蒡子

甘草各壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

竹葉湯

治虛熱虛煩

石膏肆兩

知母貳兩

麥門冬

甘草各壹兩

重校定此方內二味无分兩此方指迷方亦載之內交門冬甘草各用壹兩

右為鹿末每服五錢水二盞竹葉一握煎至一盞去滓溫服

溫服

犀角飲子

治潮熱播搦

防風貳兩

犀角

甘草

黃芩各壹兩

方廿四

九

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時

豆蔻散

治吐瀉煩渴腹脹小便少

舶上硫黃壹分

桂府白滑石叁分

丁香

肉豆蔻各半兩

右為細末每服一字至半錢米飲調下不以時

寸金散

治小兒未滿百日驚癇胎風搐搦

蟬殼

紫河車

白朮

芎

右等分為細末每服半錢米飲調下

白朮散

和養脾胃

吳白朮壹兩

厚朴貳兩

橘皮貳兩

甘草壹兩半

右為細末每服二錢水一盞煎至六分和滓溫服

海浮石元

治走馬疳

海浮石

人中白各半錢

麝香許少

雄黃壹錢

右四味為細末以糯米粥和成膏擦劑子扎在病處齒縫內瀝涎淨便効凡用此藥先須用槐杖子煎湯或荆芥湯葱白湯漱口然後用之乃妙用藥了以紙條子封閉貼藥齒縫涎自然出只三四日愈

閉貼藥齒縫涎自然出只三四日愈

閉貼藥齒縫涎自然出只三四日愈

閉貼藥齒縫涎自然出只三四日愈

鵬砂散子

治嚔喉不通

鵬砂

枯礬

地皮

皂角刺並燒

右同研為細末每用少許吹入喉中血出是効

化癍丹

消積聚

雄黃

朱砂

蝦蟇頭壹个泥

方廿四

十

烏鷄子壹个酥頭皮破入去皮巴豆貳个裹慢火燒熟用黃并巴豆重校定此方內二味无分兩其太平聖惠方內有乾蟾元一方与此方治療一同藥味相類內雄黃朱砂各用壹分

右同研勻入麝香少許如硬入少糊可元如麻粒大置小兒虛實服之

惺惺散

治感寒

桔梗

細辛

芫荽根

人參

右為細末每服二錢水一盞薄荷兩葉煎至七分不以時溫服

麝香膏

治小兒走馬疳牙斷腐爛惡血口臭牙齒脫落者

麝香

白朮

甘草各壹兩

右為細末每服二錢水一盞煎至六分和滓溫服

右為細末每服二錢水一盞煎至六分和滓溫服

右為細末每服二錢水一盞煎至六分和滓溫服

右為細末每服二錢水一盞煎至六分和滓溫服

黃連半錢 銅綠 麝香各壹錢 水銀壹錢 麝肉壹錢
右淨漱口傳瘡上生蘭香葉覆之肉蝕為坎者傳即生肉

秋霜散 治口齒疔瘡

膽礬 白礬各貳兩 麝香 膩粉各少許
右同研先以鹽水漱口次以少藥乾摻溼涎少時每一日一次慎肥膩滋味等物

蟬花散

治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉壅痛
蟬花和殼 白殭蚕 甘草各壹分 延胡索半分

右為細末一歲一字四五歲半錢蟬殼湯調下食後
鼻麻葛根湯 治傷寒瘟疫風熱頭痛肢躄痛瘡疥已發未發並宜服

利鷯元 治驚

乾薑 升麻 芍藥 甘草 葛根各等分
右為鹿末每服四錢水一盞半煎至一盞溫服無時候

輕粉壹錢 天竺黃貳錢 青黛壹錢

黑牽牛末半兩

右同研勻煉蜜為元如豌豆大一歲一元溫薄荷水化下
宣風散 消散風氣

檳榔貳個 橘皮黃者 甘草各半兩 牽牛肆兩 生熟各壹半
右為細末二三歲蜜湯調下半錢已上食前

蜜陀僧散 治疔

白蠅殼在土日 蜜陀僧各壹兩 火毒
無名異如圓黍粒 麝香半錢

右為細末如有積年疔瘡以溫鹽漿水淨洗摻藥以膏藥蓋候瘡生肌及七分即住藥不然即瘡癩高火

金朮元 清心肺

黃連 黃蘗 甘草 青皮等分

右為細末研入麝香少許和勻以豬膽汁和就却入膽袋盛以線繫定於石器內用漿水煮五十沸取出風中釣一宿取出元如菜豆大每服五七元加至十元米飲下食後服

葶澄茄元 治疝氣及下部溫冷臍腹痛

葶澄茄 川練子 舶上茴香 木香 桃仁壹兩 蝎壹分

右為末酒煮麵糊和元如豌豆大每服二三十元空心溫酒或鹽湯調下

菖根散 治小兒一切疔疾

菖根 葶根各壹分 蒜一瓣 黃丹壹兩 麝香壹錢

右先將二根并蒜爛研次入黃丹麝香再研極爛均合盛之勿令透氣每於端五日絕早合之每有害疔孩兒用線圍脚男左女右自後根至大母指尖為定却把線雙續定自第一推至線盡處用紙花攤藥貼之如藥乾旋入新蒜研藥用之敷定更須調寒食麵作紙花子覆

定藥免走動也聞兒口中作香取皂帛包頭上有疳虫
万千出細如碎髮出見帛上乃是驗也食生米者則瀉
出虫兒也

沒石子元治洩瀉白濁及疳痢滑痛者

木香 黃連各壹分 沒石子壹分

肉豆蔻仁貳分 訶子肉叁分

右為末飯和元如麻子大每服十五元至二十元米飲
下食前量兒大小加減

白木湯治脾虛氣上食少發渴

白木 甘草各壹分 白茯苓半兩 桑白皮叁分

右為末每食渴時點一錢服之不以時

方廿四

三

蕪蕪散治小兒臍風汗出不止

黃蘗末 釜下黑煤 乱髮燒灰各壹分

右研令細少少傳之

小青元治熱

青黛壹分 牽牛末叁分 膩粉壹錢

已上並勻研麵糊為元如黍米大

小紅元治風熱

天南星壹兩 朱砂兩 巴豆壹錢

已上並研勻薑汁煮麵糊和元如黍米大

小黃元治熱秘

生半夏末壹分 巴豆霜壹字 黃栢末半

已上並研勻薑汁煮麵糊和元如黍米大

右百日者各一元一醉者各二元隨乳下

豆蔻香連元治洩痢不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴

切痛

黃連叁分 肉豆蔻 南木香

重校定此方內二味五分兩此方錢氏小兒方亦載之肉豆蔻南木香各用壹分

右為細末粟米飯和元如黍米大每服米飲下十元至
二三十元日夜各四五服食前

小香連元治冷熱腹痛水穀不化腸滑

木香 訶子肉各壹分 黃連半兩

右為細末飯和元如菜豆大米飲下十元至三五十元

方廿四

十四

食前服

溫白元治小兒胃寒瀉白腸痛腸鳴吐酸水不思飲食及

霍亂吐瀉

人參 甘草 白木並為末各壹兩

右為細末薑汁煮麵糊元如菜豆大米飲下二十元

無時服

蕪蕪散療寸白虫

錫沙丹代銅泥者無即以黃丹代油和桐子大 蕪蕪 檳榔等分

右煎石榴根汁半升調藥末三錢下藥元三粒中夜服
且日下虫化為水永斷根本

蚕灰散治溫疳齒

蚕子灰 貳錢

人中白 壹錢

麝香 少許

右為細末貼齒斷上日三遍為妙涎出吐了

上鼠膏 治小兒疳齒血若不急治遂不可脫

五倍子 數个燒存 性作末用

上鼠數箇 校定上鼠不知為何物疑傳寫誤

麝香 少許

右就手心同三味研成膏塗在齒斷上或搽所蛀處孔

中仍先以麥芒淘淨用藥宜常以澄涎鼻孔下其上用

五倍子末傳之奇妙

白麵元 治大人小兒疳虫蝕牙齒血出及走馬疳

砒霜 方寸匕於殼 斗內炒出毒

黃丹 方寸 白麵 壹匕

右三味用麝香一字同研入麵糊和元搗作挺每有患

方廿四

十五

者少蘸生油填在痛處仍挑洗去牙縫內爛肉然後用藥方効

安虫元 治上中二焦虛或胃寒虫動乃痛又名川練元

乾漆 叁分

雄黃

巴豆霜 壹分

重校定此方內雄黃无分兩此方錢氏小兒方亦載之內雄黃合用壹分

右為細末水煮麵糊為元如黍米大看見大小与服取

東引石榴根煎湯下痛者煎苦練根湯下或蕪荑湯下

五七元至二三十元發時服

消毒散 如瘡未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼毒

去痰并治咽痛

牛蒡子 貳兩

甘草 半兩

荆芥穗 壹分

右為鹿末每服三錢水一盞半前至一盞温服不以時

皂角子散 治瘡疥入眼

馬氣勃 半兩

皂角子 拾肆

地骨皮 兩

右入小罐子內塩泥固濟燒存性研細温酒調下一二

錢食後

瀉白散 又名瀉肺散治肺氣壅盛喘急面赤

桑白皮

地骨皮 各壹兩

甘草 半兩

右為末每服一二錢水一中盞入粳米百粒同煎至六

分食後温服

導赤散 通心氣

生乾地黄

木通

甘草

方廿四

十六

右等分為末每服三錢水一盞入竹葉同煎至五分食後温服一方不用甘草用黃芩

胡黃連元 治心經積熱

胡黃連

黃連 各半兩

朱砂 壹分 別研

右二味為末後入朱砂末都填入猪膽內用淡漿水煮

以杖子於銚子上用線釣之勿著候一炊久取出研入

蘆薈麝香各三分飯和元如麻子大每服五七元至二

三十元食後米飲下

蘭香散 治走馬疳

蘭香葉 燒灰

銅青 半匕

輕粉 貳字

右為細末研勻看瘡大小乾貼之

奪命丹 治小兒五疳

乾蝦蟇壹个燒

蟬殼

地退皮

各壹分

右三味為末麝香少許研勻但是一切疳至午後以熱米飲調下半錢一錢二歲即服一字後煎桃柳湯放溫浴兒了使用青衣蓋之當有虫出即効

甲季散

治久患翻胃吐及小兒驚吐

硫黃半兩

水銀壹分與硫黃再研无星

生薑肆兩取汁

右以酒一盞藥三錢先酒與薑汁煎過調藥空心服覆令汗出自足指間迺遷徧身小兒一歲一錢加減服之

如聖散

治大人小兒走馬疳

五倍子

壹个不破者於頂上開壹竅子去其穢別用蓋蒼為細末填滿更用生蠟酥伍柒點滴在

方廿四

內用好帛糊封其口文武火燒存性放冷後入

麝香

雄黃各少許

右件一處研為細末每用少許乾搽患處嚙津无妨大痛不過三上

蚬蛭元

治急慢驚風

全蝎壹兩

地龍半兩

右為細末酒煮麵糊和元如豌豆大荆芥湯下五六元隨兒大小加減及治大人小兒諸癩發搐天吊尋常朱砂為衣

赤石脂散

治小兒因痢後軀氣下推出肛門不入

真赤石脂

伏龍肝

右件等分為細末每服半錢傳腸頭上頻用

牡蠣散 治水瀕偏大上下不定疼痛不可忍

牡蠣

乾薑各貳兩

右為細末水調稀塗之立小便利如皂角汁為効

壯丹散

治癩疔外偏大氣

氣脹一作不能動

防風各壹兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下日二三服

黃丹元

治風癩發作漸頻嘔吐涎沫不問長幼宜服之

黃丹伍兩

皂角伍錢

右為細末糯米粥和元如梧桐子大每服十元食後橘皮湯下

奪命丹 主癩

白礬枯

方廿四

黃丹炒赤

十八

右等分研勻以猪心血和元如梧桐子大熱水下三十元不以時

捏頭散

治小便不通

延胡索

川苦練

右等分為末每服半錢或一錢捏頭湯調下量多少與之如无捏頭即湯中滴油數點食前

五靈脂散

治小兒虫咬心痛欲絕

五靈脂末貳錢

白礬半錢

右同研為細末每服一二錢水一盞煎至五分溫服當吐出虫

半夏散 治小兒脾胃虛寒吐瀉等病及治冷痰

齊州半夏壹兩 陳粟米各分陳梗

右以咀每服三錢水一大盞半生薑十片同煎至八分食前溫服

栝蒌湯 消蘊熱

栝蒌根末貳錢 白甘遂末壹錢

右同於慢火上炒焦黃研勻每服一字煎麝香薄荷湯調下不以時候

大棗膏 治急慢驚風

大棗壹斤蒸熟用 巴豆叁个去皮燒存性用

右二味研成膏如麻粒大一歲一元濃煎荊芥湯下食方廿四 十九

後吐利之後其疾便愈

甘麥散 治脾胃不和

大麥蘖肆兩 甘草兩半

右為細末每服二錢水一盞煎至八分溫服不以時候

神龍散 治走馬牙疳

梧桐律 雄黃各叁兩

右用鉗鍋子內文武火燒煙盡為度取出火以小瓦子蓋口掘地坑子放在內將新土培留口出煙經宿研細入真麝香少許先以溫漿水漱口用一窠耳子多摻貼元患處立効

經効苦練元 治小兒疳黃瘦

苦練子肆兩 川芎貳兩

右為末熟煮猪膽爛研為元如黍米大每服十五二十元食前米飲下

人白膏 治小兒牙斷宣露涎血臭氣

人中白焙乾研細入麝香少許同研勻

右乾貼病處有涎即吐誤嚥無妨人中白尿減也

治小兒牙疳散

大糞燒成灰入麝香少許研勻用

右乾貼病處誤嚥无妨

瀉心湯 涼心經

黃連壹兩

右為末每服一字至半錢一錢臨卧溫酒調下方廿四 廿

硫黃散 治小兒聾耳

硫黃研如粉

右頻頻摻在耳中

又方

烏魚膏

右末之摻在耳內仍先以綿拭去膿又摻之

芎湯 治風脾骨節疼痛

老芎壹塊

右磨汁煎取一小盞或一二大盞食後

竹葉散 治小兒倒嵌不發

苦竹筍葉不以多少

右燒灰細研入蜜少許調服食後

鯁魚酒 治骨鯁或竹木簽刺喉中不下

右臘月取鯁魚膽懸於簷下令乾有鯁取一皂子許酒一合煎化溫啜若得逆便吐骨即隨出若未吐更飲以吐為度雖鯁在腹中日以久疼痛黃瘦甚者服之皆出
蠶魚鯁魚鯽魚皆可用

牙疳膏 治小兒走馬疳大人牙齒疳

右用麝香半兩研細無灰酒半升於銀石器中熬以槐柳枝三五莖不住攪成膏火須緊慢得所患者先以漿水漱口塗之

百祥元 一名南陽元 治吐痢

右以紅芽大戟不以多少陰乾漿水煮熟去骨日中暴乾復內汁中煮汁及焙乾為末水和元如粟米大每服一二十元研赤脂麻湯下不以時吐利皆同

熟鐮膏 治小兒魚口白點危篤者

右用使熟鐮一箇就光處用清油燈燻以乳汁調成膏以竹杖纏母或父頭髮一塊子如皂子大浸藥在上楷口中使睡着須臾白點自無

留齒散 治小兒眼有刺

右竹留齒為末摻在內以用乾鏢以水醮一處火炙之令粘即點刺頭猛取之甚佳

藍淀膏 治急疳蝕唇鼻口欲死

右取藍淀傳之日十度夜四度

燈花膏 治小兒夜啼

右以燈花塗妳上令飲立効

柳枝湯 治水瀕偏大上下不定疼痛不可忍

右楊柳枝指大長三尺二十枝水煮令極熱以故帛及羶掩腫處取熱柳枝更互捍之如此取差故名柳枝湯

又方

右橘子仁末煎空心熱服

木炭散 治諸哽

右取木炭為末研令細米飲調下二錢堅炭亦可用

單方雜治

蛇咬塗猪血又塗駝乳汁

油燻入耳羊乳灌或刺鷄冠血一漚杓漚入耳少頃水出安人中白塗心瘡

真虎舌醋磨塗瘰癧

嚼粟洗車脂栢脂

嚼杏仁洗白黑

骨灰洗羊脂

膠水洗字

雪水洗蚕糞

蜜洗油

鹽湯洗酥

茯苓軟魚骨又胡椒十粒爛嚼嚙之如無楮實代

鷄子清并水調伏龍肝治火焰丹

吃噫湯煎枇杷葉服

取內贅蜜陀僧桑白皮末新水調塗

壁鏡咬醋磨大黃塗

小兒脈法

脈乱 不治

氣不和 強急

傷食 沉緩

虛驚 促急

風浮

冷 沉細

此大既末

土苳根湯

殿中丞郎中言第五歲患疝氣腹中弦起右陰偏大夜微熱發熱脈細而數遂与土苳根湯外用青

方廿四

廿三

土苳根

牡丹皮

當歸 各等分

右為末每服一錢水七分同煎至半盞去滓食前温

服又以青礬散塗之又以大麻子人嚼和塗腫上

論并方

夫治小兒之患詎察幽玄默而抱疾自不能言也或即胎

中受病或是生後傷風動發无時寒温各異且據諸家方

論醫藥多門藥既無痊全憑灸法况小兒灸法散在諸經

文煩至甚牙說不同既穴點差訛治病全然糾繆按諸家

明堂之內選到小兒應驗十餘穴並是曾經使用累驗神

功今具錄于後

小兒驚癇者先驚怖啼叫後乃發也灸項上旋毛三壯及

耳後青落脉炷如小麥大

小兒風癇者先屈手指如數物乃發也灸鼻直上髮際宛

中三壯炷如小麥大

癇病者小兒惡疾也呼吸之間不及求師致困者不少諺

云國无良醫枉死者半小兒猪癇病如尸厥吐沫多巨關

關元三壯鳩尾下一寸陷中者炷如小麥大

小兒雞癇善驚反折手掣目搖灸手少陰三壯在掌後

去腕半寸陷者中炷如小麥大

小兒羊癇目瞪吐舌羊鳴也灸第九椎下節間三壯炷如

小麥大

小兒睡中驚掣手足大指次指之端去爪甲如韭菜各一

方廿四

廿四

壯炷如小麥大

小兒但是風病諸般醫治不差灸耳上入髮際一寸五分

嚼而取之谿谷穴也

小兒食癇者先寒熱洒浙乃發也灸鳩尾上五分三壯炷

如小麥大

小兒牛癇目直視腹脹乃發也灸鳩尾一穴三壯在背蔽

骨下五分陷者中炷如小麥大

小兒馬癇張口搖頭身反折馬鳴也灸僕參二穴合三壯

在足跟骨下白肉際陷者中拱足取之炷如小麥大

小兒驚癇灸兒祿穴一壯在上唇肉中央絃上炷如小麥

大用刀決斷更佳

没石子先治小兒冷疳肌躄黃瘦臟腑不調腹脹羸弱

没石子 史君子 川練子 白蕪荑 肉豆蔻

縮砂仁各壹錢 母丁香 蘆薈各半錢

麝香壹錢 白木壹錢

右為細末水煮麵糊和元如黍米大每服十五元食前米飲下

牛黃骨治風熱

雄黃壹兩 朱砂壹兩 蛤粉壹兩 人參

茯苓各伍兩 甘草壹兩 龍腦半兩

右為細末每一兩作三十元一歲兒半元臨卧米飲化下

天麻防風元治小兒一切驚風壯熱多睡驚悸手足抽掣痰涎風邪等

天麻 防風 人參各壹兩 乾蝎

白殭蚕各半兩 朱砂 雄黃 鹿射香

甘草壹分 牛黃壹錢

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服一元至二元不拘時候薄荷湯下

雞峯普濟方卷第二十四

雞峯普濟方卷第二十五 馮翊賈蕪重校定

雜治

大効紫菀元

唐明皇帝勅錄下臣寮奏過療小腸難治之疾臟腑積聚之冷疾癖氣塊大如拳掌亦如桎梏及黃疸病朝起嘔吐上攻心膈兩肋分痛脹微連甲脊痛无休息常時逆膈九種心痛五淋五痔及胃口閉塞吐逆飲食積年不消及婦人斷續多年又療一切諸風身躄頑麻不知痒痛半面浮疼眼目冷淚遍身如錐刀所刺眉毛墜落面上生瘡遊如虫行莫知所有或手足煩熱或夜卧不安療小兒七十二種風及二十五種驚癇男女夜夢鬼交四肢无力沉重飲食无味昏昏似醉只欲求死真如鬼魅終日憂煩不樂悲啼歌哭並不依常月候不調或多或少時似有孕連年羸瘦在床漸困而致命終但服此藥无不痊愈

紫菀 人參各壹兩 巴豆醋煮去心膜研 肉苻蓉

吳茱萸 苜蓿 乾薑 白檳榔

當歸 防風 茯苓 桔梗

車前子 川椒 烏頭炮去皮

豬牙皂角去皮了塗酥 白木 漢防已

柴胡 羌活 麥門冬 甘草各壹兩壹分

黃連 厚朴 乾地黄 茯苓

大黃各壹兩半 肉豆蔻壹分

右二十八味各依法修製為末煉蜜為元如梧桐子大每服空心五元茶酒或熟水下當宣三五行不定以溫粥止之小兒臨時加減此藥臣兄因隊馬天陰即痛羸瘦在床不能飲食命在頃臯日服五元至月宣下一片如菜菜大白膿水一升許已安臣又見主簿陳勝妻又患心痛羸瘦在床氣急心懸飲食不下日服五元十日取下青虫六十四个大如筋頭又出膿水三升已來自後漸安臣妻先患癖氣塊服此藥十日每日五元出白虫一條有頭尾下膿三升已來又出青黃水三升其病自愈臣又見功曹長孫患腰脚着床經年每日五元至二十日出蟻娘五个又出青黃水二升已來其病自愈

方廿五

臣有師張意困在床枕食即便吐命在逡巡每日五元至半月出似蝦蟇虫五个又出清水二升已來其病自差臣妻又常患宿冷病發便欲死日服五元出肉蛇三條長三尺各有頭目遂使人用刀破腸腹乃是頭髮三條其病自後平愈管見多有風疾眉毛墜落已及三年身上生瘡痂如刀割日服五元至半月出五色癩虫三升已來當時平復部內有縣令妻又患帶下絕嗣多年服至半月出酸水一升又似鷄肝黑血五升已來自後有孕及生子数人台州王推官可道患大風疾二周年眼見得効又剡縣監酒王奉議妻又患諸藥不効是時冬月取青黃水三升第十四服取下非一團尚自青

色如新至十五日取下白虫狀如指甲面闊長一尺三條自後平愈

接骨丹治男子女人骨節疼痛起止不得腎臟風毒下注

瘡癬痒痛不可忍者口面不正脚膝无力只可五七服立見功效校定接骨丹用川烏頭草烏頭當今炮過微裂不可過熟用

海桐皮 狼毒 沙苑蒺藜 川附子

新羅白附子 天南星 何首烏

仙靈脾 川芎 羌活 川烏頭各壹兩

虎頭骨肆兩 地龍 牛膝 天麻

草烏頭 乳香 防風各壹兩 青鹽

赤小豆各肆兩

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子大每服十五元茶酒任下空心臨卧各一服此藥能治水藏及冷及婦人血風瘦弱常服助筋骨輕利氣血衝壯手足冬月不冷

大黃散治百種毒

大黃 瞿麥 白乾葛 牛蒡子

地骨皮 蒼朮各壹兩 升麻 大青

芍藥赤者 枸杞子 當歸 芎藭

黃芩 黃連 連翹 羌活

青皮 鬱金 芎 桑白皮

甘草 牽牛黃者 荆芥穗各式

右為細末每服一二錢生薑自然汁調下食後臨卧服
无夏解諸毒 校定鳳髓不知為何物疑是草名
重校定鳳髓乃鳳眼草

藍根 藍花 藍菜 茯苓

茯神 土馬踪 小茵陳 藍子

伏龍肝 鳳髓 大黃 甘草

薄荷 乾葛 貫眾 大豆

蛇黃 寒水石 龍腦 麝香

右為細末搗糯米者粥為元如彈子大青黛為衣繳乾
每服一元含化曠津大段熱者蜜水化下

活絡丹 去風活血止骨節疼痛

穿山甲 白芷 細辛 藁本

白殭蚕 石膏 藿香 木鱉子

骨碎補 荆芥 天麻 天南星

乾蝎 大赭石 羊蠟 麻黃

草烏頭 斤拾式兩冬壹 斤秋夏各半斤

右為細末煉蜜和元如彈子大每服嚼三元荆芥湯下
不以時

生木衣湯 消食和氣

生木衣 益智子仁 白芷 丁香

生薑 鹽 甘草

肉豆蔻 益智子仁 檀香

桂 縮砂 檀香

右為細末与生薑木瓜菹同研勻令得所以乾淨拍罐
子盛之旋旋以白湯點服每用匙輒不得犯生水可收
三二年

犀角散 治咽喉毒氣結塞疼痛不卡湯水宜服

犀角屑 沉香 馬牙硝 鷄舌香

木香 薰陸香 甘草 黃芩

川升麻 射干 射香

右為鹿末每服三錢水一盞入竹葉二七片煎至六分
去滓温服不以時

保靈丹 治蠱毒及一切藥毒

珠砂 麝香 雄黃 黃丹

巴豆 蜈蚣 山大豆根 苦菜子 續隨子

右十味修制等入乳鉢研勻五月五日午時或九月
九日合之忌鷄犬婦人見用糯米稀粥為元如七斤魚
目大有中毒者先竟脇肋脹滿攻心腹疼更令人嚼黑
豆聞香即是毒將發此藥一元入門病人先聞香氣來
逼亦其驗也令以无粉茶下一元不得嚼斯須患人必
言頭如拽皮片斷声相次毒物便下或自口鼻或自大
便中出毒嫩即是血毒老則成驚鬼蜮蛇等諸雜蠱毒
帶命之物及疑血必畏其藥下却以水洗淨收之一元

可治男子五人婦女三人无問何毒服之便解如卒中諸毒若蛇蝎并馬汗一切水中之毒但以好醋磨塗在傷处立解病人既差如知用毒之人不可論訴恐更害人愈深忌酒肉毒食一月惟喫薤菜淡軟飯佳

荆瀝湯 治諸風疾有熱者及風痙疾

牛黃伍分 人參 麥門冬各二兩 升麻

鐵精各壹兩 龍齒 天門冬 茯苓

梔子仁各二兩

右除牛黃鐵精外為麤末每服五錢水一盞半入竹瀝一合煎至一盞去滓入牛黃鐵精各炒一字調勻温服若忽尔搖頭口噤背強直如發痙之狀此由風邪乘虛

方廿五

六

客於足太陽之經詎其脉緩散而遲者蓋其人本虛風邪日久而發謂之風痙其脉三部俱洪數者由濕熱搏於諸陽之經甚則日夜數十發正所謂熱則生風亦名曰痙如斷齒大便不通者名剛痙風痙宜荆芥豆淋酒食前當歸湯風痙宜龍膽湯剛痙宜大承氣湯

橘紅湯 快氣消食

鹽二兩 黃橘肆兩 生姜半斤 甘草三兩

神麴 大麥蘖壹兩 草豆蔻壹兩

右七味拌勻同罨一宿焙乾搗羅為細末白湯點熱啣之食後

和中湯 調適陰陽通流榮衛養脾胃進飲食治脇肋脹

滿止嘔逆惡心

白朮肆兩 橘皮黃者 厚朴貳兩 人參

茯苓 甘草壹兩

右為細末每服三錢水一盞煎至七分温服用生薑煎空心下

靈漿湯 和養脾胃

大小麥各半升 甘草貳兩 鹽肆兩

乾生薑陸兩 肉豆蔻 草豆蔻各兩

右為細末每服二錢白湯點服不以時

食栢聖餅子 消草毒和脾胃

大豆 大棗各壹升 白茯苓 芡實

方廿五

七

右除棗肉外為末後以棗肉和勻如乾入少煮棗水和之捻作餅子如錢大每一餅子分作四口十餘日外分作六口餘分作八口止百日或經歲則不必藥自可以食餘但一切草葉皆可服食如在路人家遠有飲食未及只服藥一兩餅子飢亦止及臨卧服一兩餅能縮小便服藥後不可飲煎湯只飲冷水

杏仁元 取寸白虫

杏仁貳斤 皂礬半斤 硃砂壹斤 砒霜壹斤

南粉半斤 朱砂壹斤

右件五味為末研勻以湯浸饑餅和元如粟米大每服

一元水一盞同菠蓜或葛苣同煎以水濃為度臨臥温服翌日取下虫切忌熱物如覺心頭悶乱即以宿饑餅壓之

鼓子花散 神仙變白為黑方

深色鼓子花 壹斤

白芷

秦椒 各半斤

肉桂 壹兩

熟乾地黄 貳兩

右同為細末每目空心粥飲調下五錢以食壓之服月餘日則白變為黑若人信但以白羊將此藥拌草喫不過三二十日乃變黑羊也

止汗散 治諸虛不足汗出不止

牡礪 叁分

白朮 壹分

甘草 壹分

方廿五

八

防風 半兩

右為細末每服二錢煎水調下不以時

神仙煎 烏髭治虛三元節日合之尤佳

茯苓

枸杞子

菊花

生地黄

杏仁 各肆兩

右為細末酒蜜麵糊和元如梧桐子大每服三十元空心温酒米飲皆可下

除邪丹 博濟第六 治諸疾

漏蘆 壹兩

附子 各壹兩

巴豆 叁兩

乾薑 壹兩

右件除巴豆霜外搗為細末同巴豆霜研勻每一料用

靈砂一字同研勻又名創丹以水煮麵糊為元量入虛實大小元之用橘皮湯下不入靈砂謂之臍邪丹如新合成只服一元藥舊則加數元產後婦人亦可少服治百病

近侍湯 和脾胃

縮砂仁 貳兩

丁香 壹分

甘草 叁分

鹽 壹兩

右為細末每服二錢白湯點服

洞庭湯 和氣

橘皮 壹斤

甘草

生薑

鹽 各肆兩

右四味一處搗爛作餅子火上焙乾為末每服二錢白湯點服

方廿五

九

香棖湯 行滯氣

綿棖 拾个

生甘草 同棖淹

鹽 各叁兩

白檀 壹分

右用木白搗為細末每服二錢白湯點之不得犯鐵器

道合湯 健脾胃進飲食

削朮 壹斤

甘草

白鹽 各陸兩

椒子 壹百貳拾粒

右件合搗時須要念道合道合四十九聲一搗一念數足即不須念每服二錢薑棗煎至七分點服亦得

磁石元 脫肛方不問新舊

磁石 肆兩

桂 貳兩

猬皮 壹枚

右為細末湯泡饊餅和充如梧桐子大每服五十元空心食前米飲下日二服候服藥了喫食罷腹中稍空即用後法洗日再

新生鐵

右以水一斗煮取汁五升微熱淋洗至夜臨卧時再淋洗一次了用後按之

蟹頭一枚自死者燒成灰

右為細末摻凸出肛門上多舊履底以按尉之令入水不出

化鐵丹 誤吞物在喉中不下者

管眾

赤茯苓各半兩

道人頭壹分

方十五

十

右搗為細末每服一錢新水調下如是已吞下更用鷄子清調藥即隨大便下

龍砂湯 和氣

縮砂仁貳兩壹分

甘草

鹽各壹兩半

右將甘草同鹽炒候甘草黃熟取出寫在縮砂上即以盞掩蓋之候冷同為細末湯點二錢

真一湯 和胃

大麥

小麥各壹升

右二味淘洗淨炒黃取麵各四兩用生薑半斤取汁和成餅子焙乾入炒甘草二兩肉豆蔻二箇麵裹煨熟同為細末入鹽點服

瓜蒂散 治胃膈停滯

瓜蒂 赤小豆末各等分

右二味研勻熱米飲調一錢羸人服甚錢得吐即止

治耳聾方

菖蒲壹寸 巴豆壹粒去皮心

一方巴豆與菖蒲同等分

右二味合杵分作七箇綿裹塞耳中日一次易

六一湯 和胃氣

白朮陸兩 甘草壹兩

右二味為細末每服二錢沸湯點之

廣濟療蛔方

酸石榴皮棘刺入土五寸者切式升用

檳榔柒个

方廿五

十一

右二味以水七升煮取二升半絞去滓着少米煮稀粥空心食之少間虫必死快利効无忌

遠志膏 解烏頭天麻附子毒

遠志 乾防風各半兩

右為細末用飴糖半斤同熬成膏濾去滓每服彈子大一粒含化食後臨卧服之

乳香散 治肉刺久不差

松脂 乳香各錢貳

右同研細先用針刺破以藥傅之密封即差

解藥毒方

右以蚕退燒灰細研每服二錢冷水調下雖面青脉絕

腹脹嘔血服之即活頻服即差

治骨梗方

右先面北取氣一口飲氣於水椀內默寫龍字令人細呷之

治湯火燒法

右用寒水石不以多少研細新水調塗

治蛇傷法

右以雄黃研細傳瘡上

治下脫不收等雜方

右以紙捲子任鼻內一嚏即止

治脫肛

方廿五
管眾 朴消 橘皮黃者

右等分同為鹿末每用五錢煎湯淋洗

治鼻血不止

右以小便盆內刮人中白為末乾研入麝香少許男左女右着鼻內

又方

右綿裹驢糞塞耳內

治虫入耳

右用桃菜塞之出

治蜈蚣入耳

右用多猪肉掩之出

治油蛇入耳

右炒麻子以葛布盛側耳枕之出或用牛乳清油灌之

潤膚膏 治皮膚風熱生瘡麻痺赤色

槐花末 松脂 黃蠟各貳 黃栢末壹斤

白礬半斤 乳香少許 膩粉壹匳

右以清油三兩先煎令沸次入松脂候消即入黃蠟候鎔消即入槐花黃栢白礬乳香膩粉攪勻收入坩器內塗瘡上

雲母膏 治諸般瘡腫

雲母粉 硝石 甘草各肆 槐枝 栢菜

柳枝 桑白皮各叁 桔梗 防風

桂 蒼耳 菖蒲 良薑 黃芩

柴胡 厚朴 松脂 吳椒 芍藥

龍膽草 白芷 白欵 白芨 黃耆

芎藭 茯苓 夜合 附子 鹽花

人參 當歸 木香 麒麟竭 沒藥

麝香 乳香各半 陳皮壹兩 黃丹拾肆 清油肆拾

水銀貳兩

右件藥除研者藥外並剉如豆大用上件油於坩器中浸所剉藥七日以物封閉後用文火煎不佳手攪三上三下每上候匝匝沸乃下火候沸定再上如此三次候

白芷附子之類黃色為度勿令焦黑以綿或新布絞去滓却入鐺中再上火熬後入黃丹與藥八味以柳篦不住手攪直至膏凝良久色變再上火熬仍滴少許水中凝結不粘手為度先炙一坩器熱即傾藥在內候疑如人躰溫熱彈水銀在上每用膏藥先刮去水銀

花蕊石散 治折傷內損等疾

花蕊石 壹斤 硫黃 肆兩

右二味相拌勻先用紙筋和膠泥固濟瓦罐子一箇內可容藥候泥乾入藥內密封泥口了焙籠內焙令透熱便安在方磚上磚上書分封字五行用炭火一秤籠壘周圍自午時從下生火漸上徹有墜下火旋夾火上直至經宿火冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研羅極細相合內盛依法使用

雄黃散 治新久癬瘡

雄黃 貳兩 白礬 貳兩 歷青 貳兩 輕粉 壹兩 血餘 許少

右為細末菜油調塗之先用蒸蒜汁洗了揩乾用藥

蘇乳湯 解渴生津液

紫蘇葉 壹兩 乳糖 肆兩 甘草 叁兩 鹽 貳兩 烏梅 貳兩 生薑 壹兩

右將烏梅甘草紫蘇為末先以薑絲拌次入糖用坩器收點之水亦可

金粟散 治肺熱

白朮 芍藥 赤者 川芎 當歸 各壹兩 右為鹿末每服二錢水一盞入粟米百粒棗一枚同煎至六分去滓食前溫服

燒肝散 治筋脉疼痛四肢倦怠

附子 肆兩 炮去皮臍切片子以生薑汁半斤慢火煮汁盡焙乾用 縮砂 壹兩 肉豆蔻 川椒 各半 茴香 壹分

右為細末每服二錢先以羊肝四兩切作片子去筋膜然後入藥并葱白鹽醋各少許同拌勻以荷葉濕紙裹於塘灰中燒令香熟喫之了後用溫酒厭之

苦參散 洗瘡藥

苦參 漏蘆根 蒺藜 楮莖葉 各壹兩 枳實 錢叁 方廿五 十五

右為鹿末以漿水二盞煎至一盞以綿沾日八九訖以粉拭

天門冬元 治鼻塞

天門冬 壹兩 防風 茯苓 各叁兩 白芷 人參 各半兩 川芎

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食後臨卧熱水下

妙効膏 治疥癬

槐花 半兩 歷青 黃蠟 各壹兩 輕粉 錢壹 清油 貳兩 白礬 乳香 蛇脫 壹兩

右為細末將油蠟膏三味銷鎔後入餘藥攪勻用擦之

團參散 補氣生津
白朮 人參 五味子各半 甘草壹分

右為鹿末每服二錢水一盞入生薑二片同煎至六分去滓溫服不以時

蜜陀僧散 治新久瘡疥

蜜陀僧壹兩 膩粉 乳香各壹兩 麝香壹字

右為細末先以甘草湯浴瘡楷乾然後用少許貼之

醉仙散 治大風疾遍身生瘡

胡麻子 牛蒡子 枸杞子 蔓荊子已上炒
白蒺藜 苦參 瓜蒞根 防風各半

方廿五

十六

右為細末每藥末一兩半入輕粉二錢拌勻每大人用一錢淡茶調下空心日午臨卧各一服喫藥後五七日間先於牙齒縫中出鼻涎水渾身覺疼痛利下穢惡臭氣為度量小兒大小加減與之

地骨皮散 治骨槽風牙齒宣露腫痒浮動疼痛作時或斷爛生瘡

地骨皮 麥蘗各壹兩 皂角半兩 青鹽壹分

右為細末每服看患人大小用之仍以鹽漿水先漱口了搽擦

棗湯 和脾胃

棗壹斤 甘草叁兩 生薑伍兩

右三味一匙搗爛一宿焙乾末之

赴庭散 治口瘡

五倍子捌 黃栢貳 蜜陀僧肆 銅青肆

右為細末乾搽之

朱砂丹 解蠱毒

朱砂壹兩 麝香貳兩 山豆根壹錢 巴豆叁分
雄黃 黃丹 斑猫壹半生壹半

苦藥子炒壹半 續隨子 沒藥各壹分 蜈蚣貳個炒

右以糯米元如鷄頭大每服一元用無粉茶下凡中毒者便下藥少時覺心頭拽斷皮條聲即是毒下或從口中出或從下部出嫩即成血老即成蟻娘斃命帶命之物因凝血裏出即知當初下者毒物其藥瀉出便以洗過香湯再度仍以朱砂收之每一元可治男子五人婦女三人服藥後轉瀉不止白粥止之黃連湯可瀆端午日或臍日合忌一切穢惡內中毒即服之外中毒則醋磨塗之如纔覺中毒先喫黑豆覺其味香甜者是中毒也

方廿五

十七

雞參普濟方卷第二十五

鷄荃普濟方卷第二十六 馮翊賈兼重校定

奇疾

項上生瘡如櫻桃大有五色如瘡破即項皮遂斷上連髮卷去下至足脫之乃為肉人矣初見此瘡治但逐日飲牛乳自消矣

人發寒不止經數日後四肢堅如石以物輕擊之似鐘磬之聲日漸瘦惡治以茱萸木香等分煎湯飲五日可解愈

大腸頭出寸餘痛苦直候乾自退落又出名為截腸病若腸盡乃不治矣但初覺截寸餘治用油壹盞以臀坐之飲大麻子汁數升愈

口鼻中腥臭水流以椀盛之有鐵色蝦魚粳米大走躍不住以手捉之即化為水此肉壞矣治用任饌食鷄月餘可補完獲安矣

方廿六

鼻中毛出一晝夜可長五尺漸漸鹿圓如細繩痛不可忍雖忍痛摘去一莖即復更生此由食猪羊血過多乃生治用乳石硃砂各一兩為末以飯元如梧桐子大空心臨卧各一服水下十粒自然退落

面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲身減少久則透腔名曰寒光疾治多喫魚鷄葱韭自愈矣

脇破腸出臭穢多急以油摸腸却送入煎人參枸杞湯淋之皮自合矣喫羊腎粥十日愈

口鼻氣出盤旋不散疑如蓋黑色過十日則漸漸垂下至

肩背與肉相連堅勝金鐵無由飲食此多因瘡後得也治煎澤瀉湯日飲三盞連服五日自除耳

婦人月信退出皆為禽獸之狀似來傷人治先將綿塞陰戶只頓服沒藥一兩餘作元散皆可服即時愈

遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血住若不速治必潰而膿出治以赤皮葱燒灰淋洗喫鼓湯三五盞自安矣

眉毛搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不較者治用蒜三兩取汁酒調下立愈

毛竅非時一齊血出不止皮脹膨膨如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名脉溢治飲生薑水二三盞自安

方廿六

手十指節斷惟有筋連無節肉出虫如燈心鹿長數尺遍身綠毛脊多名曰血餘治以茯苓胡黃連煎湯飲兩盞愈

遍身忽皮底混混如波浪之聲痒不可忍抓之肉血出亦不能解謂之氣奔治以人參苦杖青蘆白木細辛各一兩都為末作一服水二椀煎十數沸去滓飲盡便安

眼白人渾黑見物依舊毛髮直如鐵條雖能飲食不語如大醉名曰血潰治用五靈脂二錢為末酒調下立愈

因着灸訖火痴便退落瘡內鮮肉片子飛出如蝶狀騰空去了手足隨壞痛不可忍是名肉血俱熱治用大黃朴消各半兩為末水調下微利即愈

每至臨卧渾身虱出約及五升隨手血肉俱壞每宿漸多

痒痛不可名狀惟喫水卧坐床上晝夜號哭舌尖血出不止牙齒俱黑唇動鼻開治但飲鹽醋湯十數盞即愈眼赤鼻張大帶渾身生班毛髮起如銅鐵蓋目中熱毒氣結於下焦治用白礬滑石各一兩為末都作一服水三椀煎至半放冷不住飲盡乃安

有虫如蠟走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化治用雷元雄黃各一兩為末摻在一片猪肉上炙令香熟喫盡自然安

手足甲忽然長倒生刺肉如錐痛不可忍治只任喫菜菜自愈

咽喉間生肉層層相疊五色漸漸腫起不痛多日乃有竅

方廿六

三

子臭氣自出遂退飲食治用石楠葉煎湯喫五盞愈腹脹如鐵石臍中水出變作步闕虫之狀緣身啞啞痒痛難忍撥掃不盡治用濃煎蒼朮湯浴之別用麝香以水調服立痊

眼前常見諸般禽虫飛走以手捉之則無有乃肝膽經為疾治用酸棗仁羌活玄明粉青箱子花各一兩為末每服二錢水一盞滿煎至七分和滓飲逐日喫三服愈

大腸虫出長百十尺不絕斷之復生行坐不得治服鶴虱末水調下五錢愈

眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血出名曰肝脹治用煎羌活汁服數盞自愈

腹中有物作聲隨人言語不能自言治用板藍汁一盞分

作五服一日間喫盡便安

又見小說名曰應聲虫當服雷丸虫自愈

兩足心以凸如腫上面生黑色豆瘡便似丁子釘着履地不得脛骨生碎眼子髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝腎冷熱相攻治用炮川烏頭末傳之前服韭子湯一盞愈九腹脹經久忽泄瀉數升晝夜不止服藥不驗迺為氣脫治用益智子煎湯服之立愈

四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解治以酒浸黃蘆三兩取出焙乾為末每服二錢酒調下每日喫候服盡則安玉莖硬不痿精流無歇時時如針狀者捏之則脆碎此為腎滿漏疾治用韭子破故紙各一兩為末每服三錢水一

方廿六

四

盞煎至六分每日三次飲之愈即住服

遍身生瘡如橘子大有眉口鼻眼因喫諸般肉菓子乃為白人面疾治濃煎貝母湯一椀服只一服愈

有飲油五升以來方始快意長得喫則安不尔則病此是髮胃被氣血裹了化為虫也治用雄黃半兩為末水調服虫自出愈如虫出活得者置於油中逡巡間油自耗矣久臥於床四肢全不能動只進得飲食惟好大言說喫物謂之失說物妄說病治如說食猪肉時便云你喫猪肉一頓病者聞之即喜遂急致肉令病人見却不與喫比乃失他物望也當自睡口中涎出便愈

忽氣上喘全不能語口中汁似脂如流吐逆齒皆搖動氣

出轉大則悶絕蘇後復如是名曰傷寒併熱霍亂治用大黃人參末各半兩水參薑煎至薑盡執去滓一服飲盡口内生肉毛臭惡自已惡見有根線長五寸餘如釵股吐絨出以飲食了却吞其線以手輕捏痛徹於心力困不可言治用喫水調麝香壹錢參宿見効

渾身生燎胞大如甘棠梨每一箇破出水內有石一片如指甲面大胞復生抽盡肌肉則不可治急用京三稜蓬莪莖各五兩為末分作三服酒調下服藥盡乃愈頭面上發熱有光色他人不敢以手近之如火燒人治用蒜汁半兩酒調下吐出如蛇狀遂安

方廿六

五

離魂治用辰砂人參茯苓濃煎湯服之真者氣爽假者化矣遂如舊

牙齒逐日微長漸漸脹開口難為飲食蓋髓溢所致治只喫白朮漸漸自除耳

雞峯普濟方卷第二十六

雞峯普濟方卷第二十七 馮翊賈兼重校定

雜記

烏鬚續復容方

凡人生以血氣為主四十而後血氣漸弱髮鬚斑白九修合烏鬚藥往使石灰石榴皮鹿毒諸藥之類使時隔夜用荷葉包裹次日黃黑不定根白如銀乘其毒藥脆其髮鬚如此非良法也今收得此藥九要烏鬚鬚每用半粳米大可令左右祇候捻在兩指上燃於鬚鬚間立得烏色澤滋潤不唯此得烏黑百日外白者換黑也

- 乾蒲 宿江竹 象子 藿香 牡礪
- 好墨 防風各壹兩

方廿七

右先用胡桃五箇去皮搗成膏子然後入杏仁面油稀稠得所入前項藥七味在內搗成膏子入下項藥

- 麝香 生龍腦 荖陵香末
- 已上各一錢再搗干餘下作餅子用油紙貼收之

烏鬚藥

- 新皂角 嫩芭蕉菜 嫩槐枝 生薑
- 嫩酸石榴皮並陰乾用

右藥等分同剉碎入坩罐子內益泥固濟了不蓋口燒煙尽存性於火內取出罐子別掘地坑子埋罐子一半候一宿出火毒將藥研為末每藥末一兩用鷄骨升麻半兩末同末拌勻每日早晨日午臨卧三度揩牙少時

漱吐之或用細辛亦得其芭蕉葉採時取近心嫩者截了便倒携急繫定截處恐出了津倒懸陰乾

又方 烏鼠鬚

南粉 黃丹各半 朴硝壹分 風化石灰半錢

右為細末以造胡餅藥汁調如糊於坩盞中以慢火溫之候稍熱以竹枝子蘸藥於手指甲上試以黑為度塗於白髮上不宜侵肉如一茶間便用溫水洗去所塗以胡桃油擦髮光潤自然如烏羽黑半月之後自鬚根再生依前用藥

又方 烏鼠

風化石灰半斤 黑錫 黃丹 南粉各貳兩

方廿七

右用鐵鍋先將石灰熬炒用象子木一枝長一赤五寸徑一寸者攪燒反四寸次節次用黑錫黃丹南粉同炒攪及象子木又四寸通燒八寸為度將藥攤冷搗為細末用藥汁調塗荷葉裹護

又方 烏鼠

硃砂壹兩 鐵粉肆兩 青胡桃皮半斤 酸石榴大者壹个

右先將石榴胡桃皮同搗成膏如泥并前藥共盛坩罐子內油單封口馬糞內埋四十九日取出用頭髮刷子蘸藥須稍刷之次用木梳梳之藥力倒行名四倒梳油

嵌甲方

膽礬 乳香各壹分 人剪下指甲燒存 乱髮燒存

烏魚骨 乾燕脂各壹

蜜陀僧各貳

右將前四味燒存性次入後藥研極細用蒿苣菜煮湯淋脚淨令眼明人剔去脚指甲刺以藥貼上一日夜一易之

又方

右以訶子麵裹炮去核用皮搗羅為細末乾擦瘡上用紙裹定不痛自安

又方

鷄屎礬甘錫子先燒了 乳香式 麝香半分 右三味和勻合子盛貯每用先以唾潤嵌甲腫痛處後以藥搽其上成乾即剥去如此三次其病已安

方廿七

又方 治嵌甲亦洗得油污衣上

陳橘皮不去白

右爛嚼貼甲上乾即換之數次病甲自退

治癭

白礬 乾蝎等分

右用甘鍋子內炭火煨存性為末每服一字猪或羊膾一枚揀藥在上於脂麻油燈上燎熟臨卧含定嚙津後徐徐細嚼嚙下枕少時神効

治諸丹流

右以燕子窠故舊者為末以水調塗即安

治節腕脫

右用床米粉木鬻字仁同研為細末以酒熬蘇木汁和成膏塗病處即愈

治因熱取涼睡有蛇入七竅挽之不出者

右取椒七粒破蛇尾裹之在內須臾即出

治耳痛通耳

右用曲善一條於帛子上放之次摻縮砂末曲善成水就便裂汁滴耳中痛即止

治中惡欲死者

右嚼大糞甚妙

保命丹

仁宗皇帝賜狄相公征蠻解毒二十四味

方廿七

滑石 縮砂 青黛 山梔子 白茯苓

草龍膽 寒水石 甘草 管仲 黃芩

乾葛 大豆已上拾貳味各生用壹兩 益智 地黃生乾者

大黃 山豆根 桔梗 紫河車 馬氣勃

薄荷 黃蘗子 粉花 百藥煎

藍根已上拾貳味各生用半兩

右件各揀擇令潔淨搗羅為末用生蜜和元如鷄頭大青黛為衣每服一元細嚼新水送下大治一切諸毒并瘴疫久年暑積咽喉不測之患常服解化諸毒大効

神效救命丹

方四解中諸毒蛇毒蠱毒一切藥毒通療

朱砂壹兩 麝香半兩 雄黃 黃丹各貳分 巴豆貳分去油

班猫式外半去頭尾壹半生壹半必用

已上七味各細研

苦藥子式外半

山豆根壹兩

已上三味同搗末

右同再入鉢內勻煞用糯米煮糊為元如十斤魚眼大每粒可救男五婦三大忌酒肉毒物一月惟食菲羹淡飯九初中毒便令人嚼生黑豆取驗急將藥用真臘茶清下一元須臾患人自覓心頭如斷皮條之聲其毒從目口鼻出或大便下中毒未久即血久即成虫更將藥淨洗收之再用有一切蛇蝎蜈蚣馬汗毒傷以藥點好醋磨汁塗之立解常於端午日修合不及於九月九日

亦得但於靜室中不令人見為妙

方廿七

豆豉叁百 巴豆拾肆粒去皮 百草霜叁合釜底黑墨

右豆豉巴豆二件研細入百草霜再細研勻用水滴為元如彈子大一元新汲水磨下若毒在膈即吐在腹即瀉

又方

巴豆去皮心 馬牙硝各肆分

右同煞研極細生蜜為元如彈子大用冷水送下甚捷

常山肆兩 白鹽肆分

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

右用水一斗漬一宿次日五更令煮取二升分作兩服少時即吐以銅罌盛取若青色以杖杵五尺不斷者即毒未盡更二日再依次煮服直候毒尽且慎勿食熱毒之物

又方取多年廁下博於水中洗過就炎日中暴晒刮取白霜收之用冷水調一錢匕大効人無中毒莫輕与服此藥大寒能解中毒神良

又方取藜蘆生搗汁服數盞大解又用藜蘆煮汁一二升飲之亦解又用藜蘆搗末作散調服亦能單解諸藥毒甚効

又方取甘草剉微火炙熟細嚼嚥汁若食中毒藥即吐急方廿七 六 別求方製藥療之古帝常囊盛甘草十寸自防

又方取雄雞一隻刀刺冠血用好酒調服如无以雌雞亦得及用生鴨一隻斷頭瀝血口中咽下即解若口不開取竹筒灌下甚驗

又方取甘草藜蘆等分濃煮汁不厭多飲即解

又方都淋藤拾兩嶺山背有土人悉知 右用水一斗和酒二升煮取三升分三服飲訖毒藥並逐小便出須是一月慎食毒物不差更依前服之即愈

又方黃藤拾兩亦在嶺南皆有土人悉知得採處

右件依前都淋藤製法

又方取藍根大豆搗汁和猪血飲之即解未則更服

又方取乾藍菜搗末調服大解諸毒又用根亦得

解中毒在腹生蠱通療

殺羊皮方寸 藜蘆 苦參 黃連

當歸各壹兩

又方右用水七升煮取二升分作三服訖即吐未差更服

殺羊皮方寸 藜蘆 苦參

黃連 當歸 犀角 升麻各壹兩

右件細剉以水九升煮取三升分作三服曾与人服即時吐出蜂蠱數升便愈名曰百解散方廿七 七

又方雄黃 朱砂 梨蘆各肆分

雄黃 朱砂 梨蘆各肆分

又方右件搗末空腹以井花水調服刀圭當下毒蠱吐出

班猫壹分去足翅別研 桃皮 木戟各壹分

又方右為細末水和如棗核大以米飲吞下即吐未差候十日更作一服必差

苗根 藜蘆根各式兩

右細剉以水四升煮取二升去滓放溫頓服即好

又方取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬死尽服其汁欲死者皆可治

又方取桑木心細剉一斛入釜淹之令上有三寸水煮取二斗澄清再微火煎取五升空腹服五合又用桑白皮咬咀煎汁須臾吐盡出自愈

又方取鐵精搗末細研用烏雞肝和之為元如梧桐子大每服三元甚者不過十日輕者即差

又方取鹽一升和淳苦酒作一服即吐立愈又用苦酒煮化鹽服之亦良

又方取猪肝一具和蜜一升共煎之令熱分作二十服為元亦得

方廿七

八

又方取桔梗苗搗汁一二升飲之甚解

又方取苦瓠或苦葫一枚以水四升煮取一升頓服立愈即吐又用苦酒一升煮化服之亦驗

又方取皂夾三銚炙去皮子用酒五升漬一宿去滓分作三服甚効

又方取好雄黃一二錢冷水細磨服之大效腹內百虫毒藥極良

解中毒諸飲食菜野芋等物通療

取雞屎燒灰水調服方匕不解更服極良

又方取蒿根不以多少煮汁一二升飲之即解

又方取甘草煮汁飲之能解又用葶苈煮汁亦同

又方

生薑 律兩

甘草 參兩

右以水六升煎取二升去滓空心作三服併服輕則已重則別療

又方取人尿攪汁一升与飲應解諸藥中毒无有及此者大抵人意嫌穢不獲已須是用此為最良

解中毒諸魚鱉肉通療

取黃者橘皮濃汁飲之未解更服大効

又方取冬瓜不以多少濃煮汁服之多最良

又方取蘆根剉碎煮取汁飲一二升極妙

解中毒諸禽獸肉通療

方廿七

九

取頭垢一錢匕水調服之未差更服

又方取豆豉甘草煎汁數升飲之即解

又方取菲搗汁一二升和水服尽即差

又方取黃蘗搗末水調下未差再服

治傳屍骨蒸勞

取黑錫炒末細研用精肉二兩燒熟空腹蘸藥末二錢早服則晚虫下晚服則明日虫下未下再服

又方取吞水蛭入腹用以牛羊熱血一升飲之次煮猪脂一升飲之立下

治中毒蛇傷等 方

神効秘傳 藤散 治中毒蛇傷并蜈蚣蝎蜂蠆 蛇射工沙 蟲毒通療

川椒

豆豉拾

右二味入口爛嚼吐在手心中次零將天南星末調勻得所塗所傷處手擦微熱自有黃水出尽未差更作此藥救毒神良慎勿輕忽

又方取生薄荷搗汁調白礬末喫餘滓塗去傷處立効如用野薄荷更妙

解中毒蒙昧昏悶不省通療

取甘草不以多少寸剉安乾人糞底以土薄覆却用元糞蓋二經雨後晴取出陰乾為末水調服一二分即省未省更服大妙

又方取乾人糞燒末水調服一二分立解諸毒

方廿七

又方於地下掘坑深一尺取新井水一斗傾入就撓百轉候稍澄下連併飲之候吐即解名曰地漿能解衆毒

又方半夏末用一字許吹患人鼻中立効用皂角末亦良

雞峯普濟方卷第二十七

雞峯普濟方卷第二十八

馮翊賈兼重校定

丹訣

七返丹妙訣

第一轉化朱砂為汞

朱砂 黃礬出瓜州者各伍兩朱砂先研細為粉入黃礬和朱砂細

研將入爐以六一泥塗瓶外固更以一餅子為蓋共二瓶

相合用鹽泥固濟勿令泄氣候安在三台釘上以文武火

燒盡三伏時日開看其朱盡飛向上餅子中化為朱汞如

粟米相似掃取用綿綳瀝於瓶名曰赤帝硫汞是第一轉也飛

不盡准前法飛之以飛盡化水銀為度

第二轉化朱汞為砂

方廿八

取前飛者朱汞約三兩以上入水銀一兩硫黃一兩先將

硫黃細研為粉枕盛之於火上鎔成汁名曰黃婆便投前

朱汞入黃婆內急攪之二精和合成親變作青帝兒將

入爐中先以六一泥固瓶外更入好鹽半兩和青兒訖盛

入瓶中用鹽泥固濟餅口候乾安在三台釘上以文武火燒三伏時

開看其藥盡在瓶蓋上赤色收取細研光明於朱砂也名

曰真靈砂也是第二轉

第三轉却化朱砂為水銀

取前靈砂三兩入生朱砂三兩對停都研準前妙黃礬五

兩和二物細研入爐以六一泥塗瓶外乾了還用一瓶子

相合以鹽泥固濟令密候絕乾却取瓶子安在三台釘上

以文武火燒之三伏時日開看却化蛇女以綿漉之於器中轉白光明名曰蛇女右飛不遠者佳第一

第四轉 變蛇女却成朱兒

取前飛者蛇女秤之若有五兩入生汞壹兩硫黃兩準前二遍入椀中細研火上鎔成汁便投二女入黃婆舍中急打合變作青帝子將入爐中六一泥固瓶外如法固濟以文武火燒之三伏時却化為赤帝男晶紫色名曰硫珠丹砂也

第五轉 用藥漿陰伏法

取前燒者硫珠丹砂五兩曾青半兩 雄黃半兩 硫黃壹兩 黃礬壹兩已上藥並須細研如粉用三味藥漿煮其法桑柴灰三斗取二月採

方廿八

二

最上者以火燒灰淋汁三斗米醋五斗得華亭草取上鹽膽汁五升并米醋藥灰等調作漿凡用前藥三日三夜候藥漿乾便點桑灰汁以文武火煮之經七日灰汁若乾即續添之七日夜為滿便取砂用水淘之五七遍於日中曝乾將入爐中以六一泥塗瓶外燒之一日成真五行真鈔也

第六轉 造六一泥塗瓶外法

便取第五遍陰伏砂入六一泥瓶內如法固濟燒之一餉待冷開看之其藥作一團名曰五行真鈔也

第七轉 成紫金砂

取前五行真鈔研為細粉入生汞一兩半和真鈔同研三十餘杵成砂子用白紙裹之內六一泥餅中其餅內伏火

鹽半斤為覆籍如前固濟待乾了以文武火煮之七日夜相次漸漸加火煨之一餉間候冷開看其砂即如金色如不似金色即是火未調勻又須却固濟更煮一日夜便加大火煨之一餉間其砂即如金色也取砂輕研用竹筒子盛之其筒口用蠟如法固濟令密將於寒泉下浸二七日出火毒盡然後出砂子於坩器中以玉石搥研之三千餘轉令極細以粟肉為元如粟米大服法如後

凡初服丹之時先須結壇清齋三七日不得離壇其藥忌雜穢孝子婦人等見用平旦空腹以液吞之三粒向東念保命天尊一如此服十朝後惣不着也但每日如此服之三年可換骨髓骨毛血肉筋脉方可名真人訣不得妄傳

方廿八

三

非代代口受心傳為藥方躰之甚易古來握紙傳畢便燒其本不得留之非人恐泄仙機誠伏火鹽用作前丹砂櫃

歌曰

不須勞力別求仙碧落空梯在眼前曾効鼎壺延日月却嗟東海變桑田三清未降蒼梧印五帝唯留火候篇深駕瑤臺珠珮客還丹莫妄尋閑傳

後續寶先生撰進唐明皇歌訣

第一丹砂化為水銀

當叟丞恩籠燒丹在禁幃釜中諸藥化爐內水銀飛壁合秋霜色光騰夜日輝惣由明主感能使道精微

第二却變朱汞為丹砂

却取抽成汞重燒還作砂上方仙秘密中林不藥精華紫氣
含真色朱光雜曉霞欲將同一躰須變猛三花

第三却抽靈砂為姤女

轉轉窮微妙重重入杳冥猶將藥妙躰却變水銀形氣合
秋霜淨朱分夜落星自然成姤女何處不通靈

第四水銀令凝結却化赤帝男晶

玉液雖初化黃花製色疑光如天下雪影若結冰形砂土
乾如炒羅灰濕拌蒸若須看氣色更待園蓋澄

第五令結硬

文武長調火陰陽鎮在爐釜中看氣色鍋裏定錙銖狗走
重寮養防風六藥泥已堅如合壁何處覓硫珠

方廿八

四

第七伏汞成金

罷火開丹竈金成去藥泥瑞光連日月真氣雜虹霓形勝
添金鼎精華向馬蹄猶須九轉畢看取一刀圭

第八化金為粉

化粉初研煉臨爐定真藏似塵鷲坐紫如麴誣金黃瑞作
三莖穗靈含五色光待抽金毒盡將獻玉堦傍

第九轉成金丹

玉律春初至金丹帝感成南山同聖壽東海此時清至福
玄元降功由至道深小臣雖有術仙事行茹楹
神仙王真君製煉七返丹砂服餌長生訣畢

固濟泥

蚯蚓糞 牡礪 代赭石 黃丹 鹽

赤石脂


右件等分土培之或入羊兔之毛亂絲紙筋杵三十餘
下

合燒朱砂法

先炒硫汞研為細末入合用紙一兩層襯底上却用紙蓋
一兩重便以滑石末蓋之令滿填實固濟灰抱定作塚子
揀好硬炭周圍旋定生熟火一斤從頂燒之令燼候冷
取之研看如紫紅色即止如青黑色研為末依前法再燒

水火既

濟鼎式



方廿八

五

右件鼎鑄了却於爐上再燒通紅

伏火金液丹

硫四兩艾灰一斤同研如粉入合實填培泥固濟一指候
乾以醋灰塚蒙蓋厚三寸一秤或十斤七斤發頂火煨通
赤鷄子香去火以土卷一宿殺研時微用醋云不尔火發
研勻入馬尾羅子內作水池實之前湯旋旋滴淋汁先用
一盛油來者瓶固身以三脚上放了旋旋淋汁緩緩煎欲
乾時以生薑塞口漸漸進火令乾煨餅通赤良久退火冷
打取出煨之或亦火燒通赤去油氣煨

丹砂法

丹以朱砂壹兩為率須用成塊
有墻壁不夾石光淨者良

天南星 草烏頭 細辛 肉桂 川椒

知母 荷葉 五倍子各錢

右用晉棗十枚水浸不以日限且透軟為妙和前件藥入臼搗如

泥或硬更入少水不妨候得所分作兩塊先用一泥捻

枕兒包裹朱砂成合再用一半重裹周密抹水令無縫

於慢火上款款炙令十分透乾候於熱火約三斤炭用

硬炭中心放藥燒之候藥元透赤煙盡為度急取入盆

泉水中微分陰陽水銀皆在藥元之上就水中破藥元取砂如生鐵已

帶紫為上易水淘十次漉出控乾研極細熟棗肉元梧

桐子大大小或參等以歲數用之空心溫酒或新汲水下一元燒藥時下

用一大沙盆子襯使

方廿八

六甲神丹婦人產前產後尤宜服

雄黃九兩水磨為上或研亦可須選光瑩者右入在一砂

合子內平實為度入蜜六兩浸蓋雄黃於其上用防風六

截子長短滿合子面用蓋子合定膠土六斤青塩四兩水

化和溼入紙筋看多少少入候溼熟軟搓作索子交加纏固上用

泥梳子裹合廕七日通風處用篩子盛候十分透乾於地

上作爐深一尺五寸闊一尺二寸內坐丹合子上用細桑

柴灰或无用松柴灰一斗蓋之令平上用硬炭二十斤作五遍燒

勤養一伏時須旋添炭使火氣勻為佳炭少更添不妨太過取出破合如青

色為上紫色紅色為次用油單裹於井中離水一赤懸一

伏時取出極研細酒糊元如梧桐子大早晨面東溫酒下

一粒更元嬰小小者藉小兒服

洞陽金丹法

好朱砂四兩木炭三十斤如炭軟更加五斤黃土六斤入

鹽三兩故紙數幅以淨水和作熟泥大挺甘鍋一箇將朱

砂盛在鍋中楮子在上蓋頭用七箇拍碎光以紙二三重

蓋鍋口然後用泥塗作罈子蓋搭下厚二寸已上其紙與

罈頭是厮着無令空虛盡將泥隨鍋勢以淨灰二升用醋

和得所自頭塗裏在半腰鍋頭及縫口約灰泥一寸厚餘

皆薄傅之用前件木炭着實階排自上發火燒火盡用淨

土罈蓋一宿取之研細熟棗肉和元內有開說不盡看前

面方述

方廿八

伏火朱砂法

光明朱砂四兩成塊者用椽頭合一箇先入桶菜鋪一重

抄蜜一匙在上次入朱砂在內又將桶菜安在上更抄蜜

一匙蓋遍用鹽泥固濟候乾用細灰五升為灰塚子用灰

一秤或二十斤火煨盡為度任意元楊安時傳

正一丹法

又曰來復丹升降陰陽補助正氣之緊藥攻不可攻者之

痞氣破不可破者之陰氣回不能回者陽氣生不能生者

胃氣此藥復陽止汗破痞退陰生脉健胃大治水火不交

陰陽隔絕難解之煩熱欲脫之真氣大虛中滿暑濕

伏留服涼藥則利服溫藥則壅寒熱往來煩渴嘔吐四肢

浮腫小便如淋大便糖泄胃高喘急咳不得眠殮泄清穀
 真氣暴虛臍腹疝痛上攻心腹腸腸久痢裏急後重滑泄
 不常寒疝入腹引陰而痛五損虛勞咳逆唾血喘鳴肩息
 食黃肌瘦停飲癆瘵腸鳴帶下衄血蠱注失血亡陽崩漏
 脫血產乳血渴狂躁喜水嘔逆食飲不下羸中百病並治
 之中腸發熱引飲過度霍亂轉筋宿冷殘疾淹延或躰熱
 狀若尸注並皆主治陰證傷寒手足厥逆自汗自利嘔逆
 面青一身盡痛痛引小腹或經下因作痞氣咽痛息高噫
 逆氣不宣和或陽中伏陰或陰隔於陽渴不飲水證候不
 一脈息交錯陰陽不分者服之即安又主頭心厥痛立効
 小兒吐瀉胃弱生風或因轉瀉變成陰癩驚搐證候危

方廿八

八

惡者研細蠅稍湯調服必愈有起死活人之功無僭上躁
 下之性善能升降陰陽驅逐賊邪安順中州溫養脾元至
 靈至妙服之者須至心清淨無損藥力其驗如神每服五
 十元甚者百元艾湯下溫酒亦得中暑新汲水下早晨申
 時又一服急病不計時候日夜進五七服量意加減如後
 春分二月中陰降中陽升中陽進陰退也宜用此法

硫黃 二兩半

消石 壹兩貳錢

玄精石 壹兩半 研極細 味極合 研

五靈脂 伍兩 搗細 陳皮 壹兩半 青皮 壹兩 去

立夏四月節陰退盡陽獨治可依春分法增消石三分之
 一以依真陰夏至陽升極陰降極一陰始生宜用此法

硫黃 參兩 消石 壹兩半 玄精石 壹兩半

五靈脂 伍兩 青皮 各壹兩 陳皮 各壹兩

立秋七月節陽始降陰始升陽氣未盛可依夏至法損硫
 黃三分之一以全其陰

秋分八月中陽降中陰升中陰進陽退也宜用此法

硫黃 貳兩 消石 壹兩 玄精石 壹兩半 參味依前

五靈脂 伍兩 陳皮 各壹兩 青皮 各壹兩

立冬十月節陽退盡陰獨治可依秋分法損消石三分之
 一以依真陽

冬至陽降極陰升極一陽始動宜用此法

硫黃 貳兩 消石 壹兩半 玄精石 壹兩半 參味依前法研不熟

五靈脂 肆兩 陳皮 貳兩 青皮 壹兩

立春正月節陽始升陰始降陽氣未盛可依此冬至法損
 消石三分之一以全其陽

右件藥將後三味為細末與三件衣研勻水浸饑餅蒸
 元如梧桐子大水運太過火不及加煉過朱砂一兩助
 心火太過金不及增白石英一兩助肺土太過水不及
 增飛過磁石附子各一兩助堅木太過土不及增
 附子各一兩助脾依前方

固中下益脾胃大効蜜煮朱砂煎元

光明成顆粒朱砂 每壹兩管蜜參兩先將朱砂用紗
 朱砂於密內以重湯煮三晝夜取出用新汲水淨
 洗又用溫熱水再洗蜜火微焙乾研令極細

右用蒸熟軟爛棗肉去核研爛綿帛裹棗烈取肉同稍硬清水煮麵糊同和如梧桐子大每服五七粒米湯下忌羊血空心食前日進三服

大四神丹

二氣配類陰陽均平非獨有陰陽之功可緩可急可固可通中脘虛弱飲食多傷氣不通快悉皆主之

硫黃明淨者消石各壹兩研碎將硫黃消石置於沙壙中慢火上鎔銷不住手攪勻頓淨地上搗碎別研

右件藥合和勻水煮麵糊和元梧桐子大每服十五粒煎生薑湯下食後

歇口煨煉太一神丹秘方

右以丹參不以多少用此藥鋪甘鍋底次入朱砂四兩或

方廿八

十

二兩多亦不妨於甘鍋內上蓋頭比底稍厚鋪訖次瓦子蓋之入木炭火煨通紅候有霞光焰出為度揭瓦子看砂藥四壁離甘鍋即乃成就用鈴取出火放定仍念此呪出火毒云輪山急急如律令如此默念一遍吹在甘鍋內却用瓦子蓋少頃放冷傾於乳鉢內研細末用煮棗肉和搜為元如梧桐子大治病下項每服一粒早晨空心臨喫食前服之以乾食壓之

丈夫婦人元臟虛冷每服一元鹽湯下如大段虛

備冷損以艾湯下婦人血勞不思飲食鹽湯下傷

寒結腎艾湯下陰證陰毒傷寒四肢厥冷艾鹽湯

下虛冷瀉痢艾湯下

治產難滑胎丹

朱砂壹兩成顆者

右從端午日晡至一百日不可著雨如滿一百日取研

如粉用臘月兔腦髓和元如菘豆大欲覺動靜以粥飲

下一元良久便生其藥男左女右手中把出

雄黃丹補益筋髓延年駐顏色壯志氣久服可以無疾身

輕骨健耳目聰明其功難以備載

雄黃 磁石 朱砂 硫黃各貳兩

牛黃壹兩麝香半兩

右件藥前四味各於乳鉢內細研水飛過於淨埧器中貯之欲修合時須五月五日收採青艾嫩者約一擔已

方廿八

十一

來擇取用水淨洗木臼中爛搗於淨布中絞取汁可五分已來先塗一爐致銀鍋以慢火煎令成膏斟酌稀稠得所即先下磁石攪令勻次下朱砂又攪令勻次下雄黃又攪令勻良久去鍋下火即下硫黃又攪令勻次下牛黃又攪令勻次下麝香須細意攪要藥末勻候可元即元如菘豆大每日空心以溫酒下五元忌羊血

通靈玉粉丹治腰膝暖水臟益顏色其功不可具載

右以桑柴灰五斗淋取汁煮三伏時時以鐵匙抄於火上試之候伏火即止候乾以火煨之如未伏更煮以伏火為度伏了即細研為末穿地作坑深一尺二寸投水

於中待水清取和硫黃末水不得絕多於坩鍋內煎之
候欲乾即取鐵鏟子一所仰着內細砂上布紙鏟下
着微火令鏟熱即於坩鍋內抄硫黃於紙上滴之自然
如玉色光彩射入此號通靈玉粉細研以飯和元如麻
子大每日空心以鹽湯下十元

朱砂丹 治百病利五臟安魂定魄養心益氣悅澤顏色久
服輕身不老延年長肌肉補丹田聰明耳目功力甚多

辰錦砂壹拾兩

右用白沙蜜一十斤煉令去盡白沫用長項坩鍋子一
枚貯上件蜜其朱砂用夾生絹袋子盛以線繫懸於蜜
瓮子內去底二寸以來用三五重油單子封繫瓮子口

方廿八

十三

後於靜室內泥竈上安一深大釜又用新埽一口安於
釜內以襯瓮子底更用新埽一口壓瓮子口須用東流
河水以文武火晝夜不住煮七復時傍邊別泥一口小
鍋子別煎水亦不住常令水熱候藥釜內水耗則旋旋
添此熱水長令瓮子水及七八分已來煎之煮七復時
訖候竈自冷將此朱砂淨洗令乾研三復時用糯米飯
和元如黃米大每日空心以溫酒下五元或三元不論
老少並宜服之煮煉此藥時忌婦人雞犬見之此藥神
功神効不可量也忌羊血鹽水

玉芝丹

治一切風疾及婦人血氣

黑鈔

水銀兩壹

硫黃壹大

陽起石

代赭石各壹大

消石半分

右先銷鈔成汁次下水銀急手攪令勻後下諸藥咬鈔
已下四味同細研了旋旋取點入鈔中熟攪之旋攪鈔
成灰於一畔候咬鈔盡然後瀉水銀於坩中但秤水
銀有一兩在即止入於後用櫃一兩半細研如麵入
餅子中梳子合之漸漸火逼候鬼焰出即住放冷細研
為櫃又將櫃入一小鑊子中布置以物按中心作坑子
即將鈔中水銀一兩更入硫黃一分同研結為砂子入
於內櫃中以一茶碗合定固之令乾鑊子下常以二兩
火養仍以草灰沒鑊子蓋之勿令火絕如此七日漸以
火燒令通赤即藥成矣放令取紙襯攤於濕地盆合一
復時出火毒細研如麵以棗瓢和元如粟米大每日空
心溫酒下五元如大豆大執茶下二元治天行時疾服
了以厚衣蓋身取汗即差其櫃長生用之

方廿八

十三

紫粉靈寶丹 治筋骨風氣添精益髓神氣清爽好顏色紅

悅火服輕健補暖水臟

黑鈔肆兩

水銀貳兩

不別修製即與上玉芝丹同法每水銀參兩即入硫黃半兩結成砂子細研粉

右取伏火消石於鑊中心作一堆子尖裝之堆四面
流下些些子令蓋鑊底即取砂子末細細摻於堆子上
勿令四面散訖更研入少許硫黃末蓋之又以梳子蓋
鑊口四面以濕紙固濟縫了上又以泥如法固濟候乾
鑊下漸漸以火三五兩候看得所加至一斤已來可燒

半日久又加三五兩如此疊疊加至四五斤火煨之當上下通赤即漸去火待冷輕手搗取藥成一團以甘草二兩水五升煎至二升去滓煮藥渣乾出火毒乾了細研水飛過以煮棗肉和元如梧桐子大每日空心以津送下一元

白金丹 治一切風偏風口不收斂及半身不遂

朱砂研為末

雄黃壹兩

硫黃壹兩

右二黃同研為粉先於鐺中銷成汁次下朱砂末攪令勻即以桑灰汁煮三日三夜旋旋以暖灰添之日滿即刮入鼎子中以文武火協乾出陰氣盡重固濟以十斤火煨候火銷至三三斤即住其藥沉在鼎子底作一片

方廿六

十四

鑿取成白金狀以甘草餘甘子入瓮器中水煮一日出火毒了研為細末以粟米飯和元如棗豆大每日空心以冷椒湯下三元漸加至五元服之半月大効忌羊血

水銀

硫黃

朱砂

黃丹

鉛粉各壹兩

右件藥於銚子內先下硫黃銷成汁即下朱砂水銀結為砂子候冷下黃丹鉛粉同研細入一瓷胡蘆中密固濟以小火養從旦至午加火四斤一斷候火三分減二放冷取出其藥已青紫色細研以紙襯攤於潤地一復時出火毒後用赤箭脂汁調麵作糊元豌豆大每服空心以酸棗仁煎酒下十元初服須要出汗即加薄荷汁

生薑汁白蜜各半匙同服厚蓋以取汗

伏火水銀硫黃紫粉丹 治一切冷氣及胃吐食冷熱血氣

冷勞腸風一切冷病神効重按定此方火元斤數當用伍斤火方可

硫黃陸兩

水銀貳兩

針砂壹兩

太陰玄精研入各

右件藥先細研硫黃次下水銀點少熱水研如泥候水

銀星斷即入鼎中并玄精針砂以水煮七日七夜常如魚目沸水耗即以暖水添之時時以鐵匙攪七日滿即泣乾仍以微火煨陰氣盡即入合子中固之泥法用沙盆末白堊土鹽花搗為泥固濟乾了入灰池內埋合子兩邊以五兩火養六十日夜長令不絕日滿以大火斤斷一日任火自銷冷了以甘草湯浸一日出火毒已

方廿八

十五

鮮紫色候乾細研為末以粳米飯和元如黍米大每日空心以溫酒下七元漸加至十元服經旬日見効

紫雲丹 治一切冷氣消食破女子宿血冷病神効

硫黃捌兩

白鹽花參斤壹斤半白用壹斤半以米醋參升伴入曝乾之

右件藥用一鼎子先築白鹽令實中心砌作坑子入硫

黃末了即以米醋拌了蓋蓋之亦實築又以白鹽蓋之密密固了以文火養之從旦至午後漸加火燒至有鬼焰出即以小簾子蘸醋酒之焰住即止放冷取出用水研飛去鹽藥在盆底乾了又細研以粟米飯和元如棗豆大每日空心以溫酒下五元其鹽水煎花喫甚好

四壁櫃朱砂法 能除風冷溫暖骨髓悅澤顏色久服無病

延年益壽

針砂貳斤 硫黃肆兩 米砂貳兩 白礬肆兩 鹽壹兩

右先以濃醋一斗五升煮針砂硫黃二味令乾以火斷之待鬼焰出盡後放冷再研別入硫黃二兩又用醋一斗五升更煮候乾依前煨之鬼焰盡即止放冷以水淘出取紫汁去其針砂澄紫汁極清去其清水盡陰乾即入白礬蓋同研內坩瓶中四面下火斷之候餅內沸定即止待冷出之細研以醋拌爰櫃先用藥一半入鈔桶中築實即以金箔兩重朱砂入櫃上又以餘櫃蓋之築實以四兩火養三七日即換入桐桶中密固濟用六兩火養三七日足即用十斤火斷之任火自銷寒爐出藥

方十八

十六

朱砂已伏於濕地薄攤盆合一復時出火毒了細研以棗肉和元如麻子大每日空心以溫水下五粒以鈔作桶可重二斤以銅作桶可重三斤忌羊血

太陽紫粉丹治男子久冷婦人血氣冷勞五膈氣反胃疰癖一切冷病無不差者

硫黃 馬牙硝 水銀各叁兩

右件藥以無灰酒旋點於乳鉢中同研候水銀星盡即止日中乾之布於鐵內坩瓶合之以鹽泥如法固濟候乾鎔下漸漸以三四兩火養半日漸加至七八兩火經一復時待冷取藥細研以白蜜拌令泣泣於竹筒中盛糯米飯上蒸一炊久出之更細研以棗肉和元如梧桐

子大空心以鹽湯或酒下三元久冷人加至五元

清花丹治霍亂肚脹冷氣心痛腸風血氣虛冷病小兒疳

疳神效重校定此方桃花一味甚无理疑

空青 定粉 白石脂 朱砂 桃花各壹兩

鹽花肆兩

右件藥同研如麵入坩餅中以鹽蓋之固濟候乾了以二斤火於餅子四面逼之候熟四面著一秤火漸漸煨一食久任火自銷候冷開取搗碎水飛去鹽味曬乾更入麝香一分同細研以爛飯和元如麻子大每日空心以溫酒下五元忌羊血

太陽流珠丹治一切風冷風氣癱瘓結塊女人血氣赤白

方十八

十七

帶下腸風下血多年氣利疰癖常吐清水及反胃吐逆神効

硫黃壹斤 馬牙硝 鹽花炒令轉色各肆兩 硃砂貳兩伏火者

右件藥同研如麵入坩餅內按實上更以炒鹽蓋之出陰氣如法固濟將入一鼎下先鎔鈔半斤礮藥餅子以鐵索粘定又銷鈔注入鼎令沒餅固濟了入灰爐中以火養鈔常似熱為候如此一百日滿出鼎別以小火養三日大火斷令似赤即止放冷取出如琥珀以寒泉出火毒細研為末以棗瓤和元如棗豆大每日空心茶下三元

四靈丹駐顏補益

黃丹 水銀 鋼鐵 硃砂各貳兩

右件藥細研入坩合中固濟令乾安於灰爐中合上灰厚三寸常以一斤火養一百日日足以十斤火煨任火自消放冷取出細研以濃甘草湯拌於飯上蒸一炊火出火毒細研為末以水浸蒸餅和元梧桐子大每服空心以溫酒下三元百日見効

四靈丹 治筋骨風角弓風腎藏風熱毒風皮膚風大風感厥風並皆治之其効如神

硃砂壹兩 硫黃叁兩 水銀壹兩 朱砂壹兩

右件藥將硃砂硫黃同研如麵於坩合中盛之如法固濟令乾入灰爐中其上灰厚三寸以火三兩養一七日

方廿八

十八

開取藥入水銀朱砂各一分同研以水銀星盡為度依前入合養一七日如此四度計二十八日開取細研以水飛過入竹筒中密封頭於飯上蒸兩炊久及熱取出於地上以紙襯盆合一周時出火毒了用粟米餅和元如菜豆大每日空心以溫酒下三元十日後加至五元忌羊血

伏火玄石櫃靈砂丹 補益筋骨駐容色治女人風冷暖子宮久服不老延年

朱砂叁兩 硃砂壹兩

磁壹斤 研去赤汁

右以石腦油十二兩拌磁石令泣泣相入先固濟一坩瓶子令乾入磁石一半於餅子內築令實中心剝作一

坑可容得朱砂裹子入櫃了上以餘藥蓋之築令實餅口以瓦子蓋勿固之以小火逼陰氣盡候瓶子通熱即聚火一秤已來斷之令上下通赤任火自銷待冷開取砂已伏矣去紙灰取砂細研如麵以生薑汁稀調之安於茶碗中飲上蒸三炊久曬乾研如粉以棗肉和元如小豆大每日空心以溫酒下三元忌羊血

金液含化靈丹 補益延年却老功不可具載

山澤銀末捌兩 朱砂貳兩

右先鋪銀末一兩於坩合中即排朱砂塊子勿令相着上以銀末蓋之令勻又布朱砂塊子又以銀末蓋之候朱砂盡即以鹽花蓋上令滿合子口實按如法固濟入

方廿八

十九

灰池中合子上灰厚四寸常以二兩火養七日七夜勿令火猛但令合子熱可通人手為度日滿取出重翻排過一依前法重固濟以火四兩養三十日後加火至三二斤燒可一炊久放冷極冷取出細研入龍腦半分同研如粉以楮汁和元如粟米大每日空心含三元津液嚥之如要作油每一兩以桂心末一錢大羊腎脂煉成者彈子大入龍腦一錢和研兩日久入銀合子中埋於糠甌中蒸三伏時當自化為油每日含如紅豆大去痰補益延駐却老神仙之基也忌羊血

含化朱砂丹 祛熱毒風鎮心神治萬病返老駐顏功力甚大不可具述

朱砂

馬牙消各參兩

消石貳兩

右件藥同研如粉入坩餅中以重抄油紙三重密固瓶口重湯煮之常如魚眼沸水耗即以熱水添之不歇火三七日夜滿開餅子其消並在餅四面收之細研任服其朱砂即在餅中心取出細研以小坩合子中盛固濟微火養一日加火一斤煨令通赤放冷開取細研以棗肉和每一兩砂可元得三百六十元每日早晨含化一元如要多合但依分兩酌度修煉為元婦人服之亦佳大忌羊血

紫霞丹 補暖藏腑添益精髓延年駐顏祛風逐冷治痔漏瘰癧筋骨疼痛婦人服之益子宮神妙方

方廿八

二十

磁石

水銀

雄黃

朱砂

硫黃

各壹兩與水銀結作砂子

金箔壹百片

右件藥同研令勻取一坩瓶子蓋泥固濟待入藥於瓶子內其瓶蓋鑽一竅如半錢孔大蓋瓶口訖仍內燬灰中煨之不得便令火大恐藥飛走專候竅中陰氣盡以鹽泥閉塞其竅以火半斤養三日滿即用火一斤燒一七日後冷取出於土坑中出火毒三日後細研以棗肉和元如麻子大每服空心以溫酒下三元神效忌羊血

硫黃

肆兩

雄黃

朱砂

陰伏紫靈丹 治男子婦人久積冷氣腸風痢疾臍腹疼痛顏色萎黃不思飲食方

右先布鹽花半斤於平底鐺中次鋪硫黃末又以餘鹽蓋之蓋紙固縫長令如魚目沸七日七夜勿令絕火水耗即添湯時開看撓之勿令粘着鐺底日滿法乾入固濟了坩餅子內煨令通赤候冷以湯淋去鹽味取硫黃曬乾細研以棗肉和元梧桐子大每日空心以茶酒任下五元

擬金丹 治風邪癩癩鬼疰心痛解毒瘡癩瘡丹石發動消渴陰黃安心神止驚悸除頭面風止赤白帶下神效

丹砂

水銀

各參兩 黃丹壹斤

右件藥同研令水銀星盡入坩餅中蓋口如法固濟初以文火養候熱微即加火十斤已來煨令通赤半日久

方廿八

二十

藥成候冷開取面上白色內如紫金色光明甚好便細研如麵以紙鋪地攤在上以盆蓋之出火毒一日候以粟米餅和元如棗豆大空心以溫水下三元忌羊血

保神丹 鎮心神治鬼魅驚邪心狂妄語夜多驚夢精神恍惚小兒驚啼心藏雍熱服之必效

金箔貳百片

膩粉半兩

右以新小鐺子中先布金箔二重摻膩粉又鋪金箔膩粉如此重重鋪了用牛乳可鐺子多少浸之以慢火煎至乳盡金箔如泥即成便以火上逼乾研之更入朱砂半兩麝香一分同研令細以水浸蒸餅和元如棗豆大每日空心以新汲水下三元

安魂定魄丹 治驚邪癩癩天行熱病心神狂亂無不差

硫黃研細 水銀各壹兩 黑鉛兩

右先銷鉛成水次下水銀攪令勻良久即下硫黃末當為碧色與攪即去火放冷細研如粉以軟餅和元如菘豆大每服以新汲水研七元服之

返魂丹 治卒中風不語及中惡迷悶安神去風熱

生玳瑁 朱砂 雄黃 白芥子各壹兩

右件藥搗羅為末同研如麵以安息香二兩細剉以酒一升熬成膏和元菘豆大每服以溫酒下三元其藥端午日合之神驗忌羊血

護命丹 治男子冷氣婦人血氣腸風下血及赤白痢並宜服之

方二十八 二十二

黃丹 白礬 寒水石各叁兩

右件藥同細研入固濟了坩瓶中以醋滿餅浸以文武火泣乾便加火煨令通赤候冷取入硫黃一兩同研入餅更煨令赤於潤地上盆合三日夜出火毒了研為末以水浸蒸餅和元如菘豆大每日空心以溫酒下十元

柳花丹 治男子三焦壅熱煩渴不止鎮心神治脚氣乳石發動狂躁不徹

柳絮礬 鈔霜各壹兩

右件同研令細以棗肉和元如梧桐子大每服以冷金銀湯下五元若路行走馬執渴不徹即含化七元或常

含化一元終不患渴極効

伏火四神玉粉丹 治一切冷疾偏補益丈夫下元

兼治諸瘧利功力難述亦名白金丹

握雪者石 寒水石 陽起石各壹兩 砥霜壹兩

右各研為末先取一通油餅子以六一泥固濟可厚三分已來待乾乃先下者石充底次下砥霜次下陽起石上以寒水石蓋之其餅子口磨一罇子蓋之以六一泥固縫於灰池內坐一罇子安藥餅子初以文火後漸斷令通赤住火候冷取出研令極細於潤地鋪藥絹上攤藥可厚半寸以盆合定周遭用濕土攤盆不令透氣一

方廿八 二十三

伏時取出却少時陰氣了細研以麵糊和元如菘豆大每日空心以鹽湯下五元如患瘧利以新汲水下神驗

小三生丹 煖下元益精氣黑髮駐顏色

朱砂 水銀 硫黃各兩

生鐵拾伍斤 礬洗了 以大火燒赤投伍斗 漿水中淬拾遍

右取平底鍋一口以前三味用淬鐵漿水煮之三七日常令如魚目沸水耗即煖漿水添之日滿挑取少許於火上試之如有鬼焰又煎之以無焰為度泣乾却入瓶子中按實以燒鹽蓋覆如法固濟用火半斤養七日滿以火五斤斷令通

赤待冷破瓶取之投湯盆中淘去鹽味澄取
曬乾細研出火毒葛粉元如麻子大酒下七元

碧珠丹 治臟腑積冷腸風痔疾一切瀉利
青鹽半斤 硫黃參兩

右件以醋一斗二升於鍋中煮乾取出入坩餅中固
濟候乾以火五斤斷一伏時細研元如麻子大空心
以栢子仁湯下十元麵糊元之

碧玉丹 止一切疼痛一名應病丹

硫黃兩 水銀壹兩 消石肆兩 雄黃壹兩 古字錢肆兩
右一處細研令水銀星尺用一固濟了坩餅子入錢
一重藥一重徧布令食以瓦塞餅子口以鹽泥固

濟候乾以文火逼去陰氣常用火半斤燒一伏時
後常用火三斤燒半日放冷取之其藥如碧玉
色研為末以熟夾絹裹於土坑中培一伏
時於黃土中出火毒一日一夜取出細研
如粉以粟米餅元如麻子大但有疼痛
處以溫酒下五元不過三服効

神朱丹 煖水藏止疼痛

雄黃壹兩半 古字錢肆兩
右燒古錢杵為末於坩子中布錢末一半次布
雄黃上之除錢末蓋之固濟了以文火養三七日
滿即肯日 取肉和元梧桐子大每服以

溫酒下五元

銅粉丹 壯腰固精髓益顏色耐寒暑方

熟銅屑肆兩 朱砂兩 消石壹兩 硫黃貳兩
右朱砂消石硫黃三味同研為末取一銅桶子內布銅
屑一重安藥一重如此重重布盡即用六一泥固濟待
乾入灰池內以火四兩養一伏時候以大火燒令通赤
候冷取出於濕地上一伏時去火毒研為末以粟米餅
和元如菘豆大每服空腹溫酒下七元忌羊血

白雪丹 治女人風冷及血氣止速剷除骨髓風男子冷病
腸風瀉血等

白礬伍兩已上好者
右於銀鍋中以真牛乳汁五升和白礬煎令泣泣如雪
以寒食蒸餅末旋下於鍋中攪令勻可元梧桐子大每
於空心以粥飲下十五元功效不可備述

雞峰普濟方卷第二十八

雞峯普濟方卷第二十九 馮翊賈兼重校定

丹訣

伏火朱砂丹

草龍膽 五倍子 黃蓮 草烏頭各壹兩

辰砂肆兩成

右為鹿末以米醋調得所入合子以赤石脂固口縫鹽泥固濟厚一大指許略曬不候乾先以灰酒水拌一大椀許就地拍成覆盆狀上置合子更以乾灰攤合子固圍并合子上各厚四指許以木炭一秤自頂發火火盡候經宿取出於圓內撥取朱砂以湯製七遍半夏碾為末可水調糊元如菉豆大空心米飲下三元黃土蓋圓

方廿九

一宿然後出圓取藥

伏火朱砂丹

朱砂不以多少先用少蜜拌過令勻用崑崙紙裹之用於甘鍋子內鋪石中黃或禹餘糧末厚一指許令實安在上件藥裹在內又捺令實上用石中黃末四指許令極實上用鹽實擦磨瓦子蓋用赤石脂固口縫鹽泥於瓦蓋子上及口縫各固半指厚入灰池中項上灰用四指厚一秤火煨上以馬糞蓋早晚換糞須見火方下糞也冷取出須淘洗去惡汁並沙入坑子內絹布裹埋三二日出毒了水飛半夏末作糊元每服三粒棗湯下治一切虛冷之疾

五福靈丹治一切虛冷等每服一粒空心溫酒或水面東

吞之以物食厭乏

朱砂不夾石者辰砂為上

陽起石鈎牙白者

雄黃

雌黃葉子

硫黃各壹兩

右拌和一處用沙合子一箇內先鋪草決明一百粒杏人一七箇嚼破海金沙二錢後將五藥末入在合子內上面更用草決明杏人海金沙如前又用紫石英小棗大放在諸藥之上蓋合子了用赤石脂一兩為極細末醋調如膏固口縫上以重物厭乏一宿候乾用蚯蚓糞鹽一兩好紙數張同作泥固厚兩指許陰乾掘地坑子深五六寸闊尺餘內用新牛頭磚上放合子於坑子中心先將捍草一束逐旋放合子上燒草盡去草灰一半

留一半攤合子然後用木炭五斤為祖火候炭燒及二斤許添生炭斤半亦不要火大亦不火慢只以五斤火為則候燒炭及一秤更看火候加減如火足便以新黃土覆一日取出研為極細末棗肉和元梧桐子大固濟須是如法忌鷄犬婦人

方廿九

張子華伏火丹法

辰砂伍兩元石者敲作皂子大塊者每兩用置藥壹兩用置藥如後

白附子兩

川椒兩

天南星

地骨皮各伍兩

右將置藥四味為細末先將朱砂用蜜和作塊以白紙裹次用置藥再紙裹入合內下地坑內上用火初一火用炭三十斤第二火用炭二十五斤第三火用炭二

十斤第四火用炭一十五斤第五火用炭一十斤每火各用置藥候爐冷取出去置藥將砂子細研半夏糊為元如鷄頭大每服一二粒空心米飲下

擊爐厚闊長尺寸樣

取淨好黃土用馬尾羅子羅過水和作泥造擊陰乾厚三寸闊七寸長一尺兩扇磨平中間各開坑子看深淺作置恰好別於淨地上開爐下敷字與地面平周回用細土填了上用火煨其火初三十斤不可便堆上只用五斤已來旋消添盡三十斤方為一火

硫黃丹法

硫黃不以多少研為細末以菠菱汁調令極稀置在沙合

方廿九

子中却以菜滓固濟合子并蓋不須糊縫安三五斤火上候硫黃有少碧焰子即再澆菜汁以伏為度

五福延壽丹方序

霍先生傳

夫飛丹煉石自有奇功補陰接陽亦須神藥是以古人常以陽病易治而瀉之陰病難調而補之草木不能愈其病而必須金石金石亦非容易而鍊之貴得良法朱砂者八石最靈者也其色赤有南方火之象藏黑有北方水之象陰陽自全坐服之而自可愈疾若得煨煉良法不損精魂不折分兩不移形體不蓄諸毒則可為丹矣夫煨煉法世固多矣或有養之於松柏抱之於鷄卵呵之以鳥鷄雖无毒但生氣所在不能去其錫氣服之無益或有制之以金

石或有置之以毒藥或有擒之以惡類見多火而善性去惡氣存服之亦無益矣或有去其精魂折其分兩形在而躰不固色變而竟不全服之亦無益所貴不損精魂不折分兩不櫃毒藥光明精彩服之無不愈其疾余衰老得遇至人秘傳五福延壽丹與諸煨煉八石迥然不同果有神驗至於衰虛諸藥不差者服之立效治男子婦人一切虛損衰憊陽氣不足精脫漏下左癱右換五勞七傷百歲老兒心氣不足一歲兒胎氣不全並宜服之無病常服身輕躰壯百病不侵久服延年益壽固齒烏髮潤肌膚注顏活血功驗如神

丹價法

方廿九

先用崑崙紙裹定丹藥合子底鋪五倍子次下瞿麥仙靈皮次新羅白附子入藥上再入仙靈皮瞿麥草艾明礬金黃皮各等分為末若人早牢固不用瞿麥仙靈皮無妨赤石脂為末油調固濟口縫六一泥如法固濟十斤火一煨用

元丹法

半夏以丹藥用五分之上去滑湯洗七遍焙乾為細末以生薑自然汁和作餅子用好醋煮每餅夏壹兩用醋壹升煮醋盡為度以半夏餅子和丹別用生朱砂為衣焙乾以絹袋子度去塵光淨為度

五福延壽丹

校定此丹每服二三粒棗湯下病重加至十粒不妨五味須要勻煨

用辰砂上等雄黃雌黃舶上硫黃陽起石等分

小伏火丹砂

辰砂四兩如豆大者

右以甘鍋子一枚盛之上用好新瓦子作蓋子以蜜調蛤粉固濟口縫候乾用皂角大者十錠以水揉取濃汁和柴灰作灰泥毬五塊於淨地上先以四塊簇甘鍋子後以一塊蓋定就上以手拍為一圓堆子不令透氣上以炭十斤發頂火燒炭令盡次日又以炭十斤燒之若欲火多燒三日尤妙取出細研以棗肉或赤石脂半夏糊可為元如棗豆大每服二元空心米飲下

又伏火丹砂

辰砂肆兩如豆大者
一方用參兩

方廿九

五

右以熬一具仰放淨地上指淨煤以龍腦少許塗之先將辰砂以兒孩兒乳汁浸過後用薑黃末衣遍堆在熬上以碎乳香周匝圍簇辰砂又以乳香七粒於辰砂上依月建排北斗形用新坩堝一隻合定上以醋拌濕灰擁壺亭上約厚一寸以炭十斤發頂火燒壺炭取出物研以赤石脂湯化為泥和元如棗豆大每服二三元空心米飲下

至聖靈驗僧法

每一炉黃丹入輕粉十箇白礬二兩黃丹一斤

號丹細研如粉紅好米醋伴乾濕得所有日色即熬令乾無日色以文武火養然後入通油餅子以文武火燒瓦片

蓋頭時時揭看不濕即加火候乾餅子似火色一般火筋攪之如水去火安放冷處取濕土焙瓶子乾取之為團面色於中如紫金色光明可愛治一切疾若服硫黃二兩即服一元可也此是四黃之君見此便伏但有藥毒即能製之其各有十

金異 金液 白環 壞五金 更生

金倉 黃牙 蜜陀僧 玄珠 金花

治四十件病功効至神湯使如後

心痛不可忍醋湯下 熱疾冷水下

上氣攻心煩悶暖酒下 毒藥冷水下

勞瘦傳尸鬼空心新汲水調下

方廿九

六

頭風眼暗薑湯調下 鷓鴣脚汗醋湯胡粉調

鼻中血不止冷水調下 淋瀝痔疾煮大豆汁調

焮渴骨蒸勞漿水調下 面色痿黃頭痛新水調

口瘡齒斷痛乾塗之 隊馬煖酒下

箭頭入骨猪脂塗調貼之

驚癇發無度米甘湯下 胞衣不下葵菜湯下

食不消橘皮湯下 產後血氣走痛當歸湯

女人帶下不止空心温酒下

瘧疾湯酒下 噎氣芍藥湯下

霍亂木瓜湯下 女人腹冷煖酒下

冷風生黃連湯下 猪狗咬以末塗之差

一切風以雞糞醋和塗痛處

瘰癧多年成漏歷連橘子湯下

脚氣衝心薑橘皮湯下 頭風瀉血不克絲子湯

女人月經不通煖酒下 丈夫腰膝痛地黃湯下

遠年冷氣溫酒下 孩子頭痛以末塗之

遠年灸瘡及頑瘡不瘥甘草水洗以藥末塗之

湯火傷蜜調塗之 赤白痢黃連湯下

陰汗盜汗塗之

玉粉丹 治久痢及積滯仍取虛中積

粉霜壹分 膩粉壹分 定粉壹分 石鷲子壹分 玄胡索兩半

右為末以鷄清和元梧桐子大每服兩元食後熱水下

方廿九

小金丹 治五臟虛乏腰膝無力養心氣明目解賊風蠱毒殺

精物惡鬼嗽逆寒熱洩瀉下痢驚氣入腹癰疽瘡痔悉皆治之

久服補精髓好顏色益智不飢輕身長年久療婦人百病

崩帶下赤白產難胞衣不出血閉血利大進飲食

禹餘糧末 肆兩 赤石脂 伍兩

代赭石 壹斤 石中黃 貳兩

右件藥四味搗羅令極細滴水為元如梧桐子大令乾

燒沙鍋通赤次入藥在內用木炭火煨令通赤為度每

服二粒空心食前望太陽香水吞下

保長壽命椒丹

眉州青神縣王家累世服食方暖水臟降氣明目補骨髓

辰砂一兩細研如塵椒揀大粒者色紅者去枝梗并

合口者不用日秤一兩半以生絹袋盛用無灰醇濃

酒浸椒袋令酒在上三二分以來一宿取出空少時

入朱砂鉢內棍之令勻餘者滴浸椒酒少許又棍之

令朱砂盡為度日暴乾每服五十元加至百元空心

酒下不得用火焙不可犯生水此藥用生砂不僭可

久服

靈砂丹

每硫黃四兩先打作小塊子旋旋入生鐵鉢子內以鐵匙

攪鎔作汁遂傾水銀一斤入硫黃內用鐵匙急撻成沙子

如有焰起即以醋噴殺更炒令如博色傾在博上或厚瓦

方三九

盆內候冷傾入有油餅子內餅子量大小只可藥占餅腹

四分然後上安一枚一般大小瓶子以赤石脂封口縫訖

通身固濟先將藥餅以鹽并紙筋并黃土鎚作泥先固濟

了令乾并先釘三釘入地三寸上露四寸了亦用泥固濟

釘子了不固即燒鎔故也然後安藥瓶子穩了方下水餅

子了然後逐旋添溫水令七分內用鐵錢一百五十文足

同煮莫不令乾乾即藥作煙去先於瓶子下添火一斤又一

時更添二斤更一時更添四斤更一時添作六斤更一時

添作九斤約火與藥齊繞周以埽簇火即火氣大俟火過

三分去二即止隔宿打破取之取出打作小塊如半寸已

下即用菌萋乾者搗為末用蜜和得所逐塊裹半指厚都

入在固濟餅子內有油者填實不得擦破如未滿用鹽填
 滿瓦子蓋口用赤石脂固口下在灰池中頂上四指厚灰
 先下馬糞乾者一碗便下熟火四兩養一宿明日更下四
 兩至夜添七斤用馬糞二秤養火盡方取能治丈夫婦人
 腸胃積冷疰癘氣塊霍亂吐瀉飲食不消血凝氣悶膈下
 冷熱口中生瘡胃氣虛冷心狂客熱嘔血能攻擊骨髓
 間餘疾或臟腑不足或腰膝無力或手足逆冷或陽道不
 足或陰下濕痒或冷熱在腹腹中不和遂至下泄或熱在
 胃胃氣不和遂至嘔逆或成痢或醋心或腹脹或尿後餘
 瀝或淋疾不通或腎氣衰成渴病或冷氣成水病或鬼疾
 或氣疾或傳屍或耳目病或臧腑病或四肢病或鬼交或
 遺洩或溺血應五勞七傷九種心痛十般水病五邪八冷
 江南十般虫毒女人產後三十六種病不堪說但請服此
 丹藥無不立差每服三粒温米飲下空心如研時逐旋用
 水飛過楮汁元或用蒸棗肉亦佳元如梧桐子大

又方

卷栢為末先以蜜拌朱砂次用黑紙裹定其卷栢多
 用鹽次第以石脂固濟安頓磚上火候緩急元粒服
 法並如前

又方

乾柿棗並去核同搗熟爛裹朱砂為團以火煨
 允燒此藥若出火須以絹帛裹入淨黃土培一兩日夜出

火毒了方淨水洗淘去沙土雜惡之物然後以水飛研貴
 於極膩以楮汁元為上半夏糊為次然半夏要得下痰為
 効陰乾以生布袋內窰令光須以酥襯手

神仙四神丹

朱砂 水銀 硫黃補上 雄黃

雌黃不夾石者已

右件同研為細末用仙靈脾搗末二兩已來放在崑崙
 紙上了先用絹一片撮四神末微用蜜和令成塊去絹
 片輕拈藥塊安在前面有仙靈脾藥紙中心包裹了一
 周匝外用皂麻線纏之於地坑內以新瓦末填末亦得
 三升已來鋪蓋與地平上面瓦末厚四指許四伴上簇
 火十二斤好炭煨之不得扇火盡取出去紙藥裹如新
 鐵色者佳細研水浸鍊餅為元如梧桐子大每服一元
 空心冷水吞下此須是曾經煨煉方可修合愧無踈失
 湯使如後

痔疾灸艾葉煎湯下一元

血崩以艾煎湯入藥少許下

大風大麻仁湯下 陰毒傷寒煎麻黃湯下

肺勞咳嗽地骨皮湯下 水瀉陳倉米湯下

白痢生薑湯下 脾胃氣京棗湯下

婦人眾疾鹽湯下 冷勞疾新汲水下

虛弱温酒下 腰腿冷痛薑解湯下

氣痢青橘皮湯下

霍乱木瓜湯下

赤痢甘草湯下

赤白痢乾薑甘草湯下

一切風痛醋湯下

丈夫眾疾茅香湯下

右如前疾痛每服不過一元至兩元久服之延年輕身耐老烏髮鬚潤顏色強筋骨進飲食所忌葵菜乳餅其餘並無所忌

露珠丹 養鎮心神

辰砂壹兩

右以琉璃器內盛露露四十九夜遇陰雨不霽令研極細入牛黃一錢研勻煉蜜和元如豌豆大空心新水下元

含金丹 治虛冷

方二十九

十一

右用辰砂五兩打如菽豆大用乳香半兩天南星末一兩先將朱砂用蜜浴過上用金箔五片度過用天南星為底乳香為鹿末在上面安一張好紙上裹定用麵糊合又上面用苦苣菜蓋又用一張紙角定麵糊實使土作合子上下用塩泥固濟下火五秤燒如火盡於地上出火毒一日研細用生薑自然汁煮麵糊為元用銀合出光每服一粒至三粒空心米飲下

九陽丹 治虛冷極佳

辰砂

雄黃

雌黃

陽起石

硫黃

石燕子

禹餘糧

牡礪

紫石英

並鍾乳粉

鹿茸

各壹兩

天雄

木香

船上茴香

蛤蚧 壹對

桑螵蛸 半兩

麝香 壹分

右將禹餘糧末一半鋪合子底次用辰砂次用雄黃次用硫黃次用雌黃又將禹餘糧末一半在上次用陽起石上鋪紙一張用櫃頭藥槐花黃芥馬鞭草草决明為末次用赤石脂末固縫又用紙塩和泥固濟管乾醋拌灰塚合子用紙火一斤燒欲耗再添熟炭火一斤欲耗再添炭火三斤燒燬候冷聞鷄子香取出去火毒一宿開收藥研一日以細為妙次入上件藥筒為細末和研勻用醋煮半夏麵糊為元如皂角子大朱砂為衣每服一元空心温酒下塩湯亦得此藥大補益其功不可細述虛備者每服三元空心温酒或塩湯下氣壯人用冷水下面向東吞之後以軟羊肉壓之又喫酒亦加

方二十九

十二

九陽丹過度

除前六味燒外石燕子紫石英牡礪研為細末并鍾乳粉共四味與鹿茸等藥不入火後與燒者藥筒研以醋拌灰羅過細攤焙合子了亦如塚子先用火三斤遙燴漸簇近又添火籠蓋燬之通可用火十斤許方得所又須別備下醋拌灰二升防被火罷風激縫開即攤之令不走

玉倪丹

無所不主尤補心益精血愈癯疾壯筋骨久服不死大効

辰砂

各拾兩

檳榔仁

遠志

訶梨勒皮

甘草 各一兩

桂 大兩壹斤留蒸氣

右用甘草等四味判以水二斗大釜用細布囊盛丹砂懸於釜中着水和藥炭火煮之第一日兼夜用陰火水緩動第二日兼夜用陽火魚眼沸第三日兼夜用木火花沫沸第四日兼夜用火火泊泊沸第五日用土火微沸第六日兼夜用金火沸下緩下急第七日兼夜用水火緩調令沸先期泥二釜一釜常煖水用添煮藥釜水涸即添煖水常令不減二斗七日滿即去丹砂於銀合中蒸其合中先布桂肉一兩指厚即勻布丹砂又以餘桂一兩覆之即下合置甑中先布糯米厚三寸乃置合又以糯米擁覆上亦令厚三寸許桑薪火蒸之每五日換米換桂其甑蔽可用光竹子為之不尔蒸多甑墜下釜中也甑下側開一小孔子常煖水用小竹筒子注添釜中勿令水減第五日用春火如常炊餅兼夜第二五日兼夜用夏火猛於炊飯第三五日兼夜用秋火似炊餅下緩下急第四五日兼夜用冬火緩於炊餅依五行相生用文武火助之藥成即出丹砂以玉搗力士鉢中研之當不摻如麵即可服之以穀子煎完椰子大每日食上服一元每日三食服三元非時服三元煉或丹砂二年為一劑一年服盡每十年即煉服三兩仍取正月一日起服至盡既須每十年三兩不可旋合當宜頻鍊取一劑貯之

蜜者硃砂煎元固中下益脾胃大効

光明成顆粒朱砂 每壹兩管蜜參兩先將朱砂用紗淨砂於密內以重湯煮定將蜜置銀器或坩器中下淨又用溫熱水再洗蜜盡火微焙乾研令極細

右用蒸熟軟爛棗去核研爛絹帛裹棗列取棗肉同稍硬清水煮麵糊同和如梧桐子大每服五七粒米湯下忌羊血空心食前日三服

伏火丹砂

好辰砂五兩用蜜拌了以表裏黑紙裹了又用砂合子一箇先入藥實築奇一指厚安丹砂在中更入藥四邊并上實築去合口可半指來更鋪川椒末二重更用墨紙蓋定生油調蛤粉泥縫合定外面用膠泥紙筋打

方二十九

十四

相着三分泥一分沙土相和固濟合子可一指來安在地上周迴用醋灰抱定合子周迴倚炭可一秤來上用熟火一斤燒至灰翌日取之更燒如此三遍砂研令極細搗半夏末打麵糊和元梧桐子大每服五元加至十元十五二十元如心氣不足用棗肉和元用藥如後

白附子 橘葉 川椒 各兩 枸杞子

地骨皮 天茄子 如元只用白 細辛 石膏 各壹兩

右將此八味都用蜜和就固濟丹砂在中上面用膠泥糊蓋後用油蛤粉固口縫此法極妙

又法

每用丹砂不以多少一依前法埋一雙罐子與地平入

水七八分頓合子在上用醋灰攤乾用木炭一秤簇火燒至灰盡再用合子翻過丹砂再燒如此五遍研極細半夏麵糊和依前服

四神丹煉法

朱砂

硫黃

水銀

雄黃

各壹兩

右為細末用淨紙一幅書弄字書八卦於八方然後用雞清磨好黑瓦塗紙面四邊量紙兩指闊以號記八卦方法塗墨以勻為佳曝乾裹藥火灸亦同曝藥仍須置井字上以仙靈脾厚裹藥紙約用大葉及七十葉極要周密用細麻繩十字繫定先於淨室作坑一箇周圍深廣並徑一赤二寸計以水置藥坑底上用新瓦末三大椀

方廿九

十五

覆之秤無煙炭一秤槌作小鋌子密置於炭內取一斤作熟火於其上謂之頂茅香少許化白紙錢一貼於其傍茅以解穢紙以遣土地神法當然也閉室至一伏時視之火盡以坩椀旋取出灰至蒸乃止然後用椀取藥置於地上勁之少時緩取去元累藥之物已上並忌雞犬婦人孝子見及不可近殯殮用淨紙裹置露地上以坩椀覆之上用淨土蓋以出火毒亦候一伏時取出研極細如粉補虛及一切危急病用酒煮麵糊為元治脾胃虛弱棗肉為元中風及小兒急慢驚風並製半夏為細末取出生薑自然汁煮麵糊為元量病大小服二三粒至五粒若陰證傷寒氣脫口禁槌破二十

粒孰水灌下良久汗出乃愈

紫金丹

治一切虛損之疾主不老駐顏每用好硃砂一斤土鹽六兩馬牙消六兩如朱砂不甚好者將土鹽馬牙硝各用四兩亦得先將土鹽馬牙硝用甘鍋子一處燒過鹽通紅如馬牙硝不好者只燒土鹽馬牙硝生用亦得先將此二味安向鼎不拘大小用水八分後將朱砂生用絹袋子六重懸煮七日取出淘去沙淨用坩合先將鹽鋪合子底四兩後入朱砂更用蓋頭鹽四兩後用牡礪四兩亦蓋頭了後用鹽泥固濟坩合子厚半寸次用醋二升拌細灰便將醋灰蓋泥者坩合子更用十斤炭火燒通亦用茆灰蓋火燒一伏時後火滅令冷時便取

方廿九

十六

朱砂用水淘淨却安向鼎中用解鹽搗細使六兩上水底火先將紙灰鋪在坩裏後用炭火五兩如鼎高火臨時加減其水不得煎養七日取出又淘去鹽淨焙乾入乳鉢內研如粉用棗湯煮糯米粽子為元臨時看大小元每服一粒空心冷酒下面向東喫

伏火朱砂歌口法

每朱砂二兩且如坩子須用邛州者以羊膽汁塗於坩內四面微火炙乾用赤芍藥末二兩將芍藥末半兩鋪坩子底次安置硃砂次用白生密澆灌封蓋不見硃砂次又用芍藥末蓋之次用崑崙紙須松塗墨者乃佳次用生椒去目填至坩口平為準次用圓瓦子蓋口

神丹法

治肌肉如柴瘦皮如樹皮痰多不食者

狼毒五錢 巴豆 草麻 芫花各二錢 蜜肆兩

右辰砂不以多少先將好紙淹爛和泥入鹽成將砂子

以紙裹用線繫定以蜜先裹了次裹狼毒末次將蜜和

麻巴芫三末固濟砂子入泥再固濟周圍兩指厚日中

照乾以醋和灰貳叁斗自炒底固濟次和泥趨包之厚

參拾斤再煨依前 用指次發火用硬炭貳拾伍斤如死上用 乾炭

法用炭叁拾斤 用好砂五兩為一料用前草藥分兩

固濟候煨了研極細以半夏麵糊為元如梧桐子大每

服量病淺深虛實尋常以三三粒空心米飲下煨了陰

乾不照化砂一煨如鐵色再煨方鎔錢機宜博只

軟朱砂延壽水仙丹 廣南西路轉運使李睦臣睦蒙

聖恩授臣金部郎中廣南西路轉運使臣退省庸材曷勝

任使猥承

聖念保全本職已及二年臣常患瘴疾百日在假有廣州

上靈觀道士盧守明令臣服軟朱砂四十餘日方得病愈

一如舊安臣有二男奉先奉繼亦患瘴疾服食此藥亦得

安康臣專詣守明觀詢問此藥能治百疾臣故不敢隱昧

愚衷特具名狀獻進此方冒犯

天威無任兢惶戰越之至謹具方如後

清油貳兩 白芨 木通草各壹兩並對

右入鈹器內煎熬二物候黑澀去不用更煎油良久以

筋點油向水面上不散成小壓厚迺成如散不住即未

成也且更煎之成即傾新淨器中煎此先取好光明不

夾石成塊朱砂不以多少鉢中研之一復時後以煎成

油旋滴油和朱砂令如麵劑硬軟得所再四搜和勻軟

續以皂夾搥砂水內揉按濃汁一升餘瀝去滓將和成

朱砂水內揉淨直候油淨仍置新水中浸漬水瀕一日

一易如欲服即旋元如梧桐子大空心并花水吞下七

粒百无忌禁善治男子女人下元虛損壯筋骨久服延

年輕身加進飲食兼治酒色傷敗腎氣虛風上攻頭面

下疝腰脚顏色萎黃多睡少安精神恍惚腎膈涎多四

肢倦怠小便頻數而又白濁或又淋瀝骨冷成勞健忘

心驚心忪心悸諸虛不足舉无樂意若服此藥令人面

生光潤氣宇充實又若婦人血氣血風攻奔走注四肢

煩疼虛躁煩熱產前產後冷極虛損不思飲食不瑩肌

膚頭目昏眩又治小兒急慢驚風胃弱多涎薄荷水下

兩元小兒不可常服小兒夜啼臨卧服一元丈夫婦人

每服五七元并花水下宰臣丁謂奏切見廣南西路轉

運使李睦進軟朱砂延壽水仙丹方者臣乞先下翰林

醫官院詳驗朱砂久服有元損益據醫官王道等集眾

定狀驗得本草製法不經大火能暖水臟治下元一歲

已上百歲已下皆可服之臣聞

君有藥臣先嘗之又劄子臣以殘年欲至衰老臣先將

此朱砂依李睦所進方狀遣臣亦服一月果得一身輕

一第 1000 丹 賣參 日事 全書 第 16 文 三 句

健倍加飲食肌膚潤澤神彩怡悅奉

聖旨依所進方修合賜諸大臣

洞陽金丹 治真陽不足五藏氣虛常服養神安魂魄通血

脉止渴久服輕身延年令人不懼寒暑除去萬病

朱砂伍兩 一方用枸杞葉貳拾片初採得兩日掌之
目觀其日呢七遍呢曰我要服你与我攝
念一遍呢取日氣一口噴
在藥上如此七遍可用

右用砂合子一箇於底內鋪枸杞根皮末一錢又注蜜

半兩蜜上鋪金箔方入朱砂上又蓋金五箔上又注蜜

半兩蜜上蓋枸杞根皮末三錢許多亦不妨按令實蜜

和赤石脂末固合子縫務要密次用塩紙泥固濟合

子一指厚放乾置平地上用醋拌細灰擁合拍作塚子

方廿九

十九

用木炭一秤簇起發頂火煨之俟火盡經宿取出合子

去泥開合其朱砂如鐵色生黃土內埋一宿出火毒了

研令極細用棗肉或糯米煮粥糊和元每兩作四十粒

陰乾每服一二粒至三粒空心熟水下

神仙六甲飛伏雄黃丹 治真陽不足五藏氣虛并腸風惡

痢百節之內大風積聚婦人產後一切危證常服殺諸虫

毒去精邪久服無飛走入腹中令人長壽其功不可盡述

本草見之也

上等雄黃玖兩

右將雄黃搗羅極細入在砂合子內填實上却作一坑

子入生蜜四兩於蜜上如蓮子放六塊防風蓋子合定

用塩泥七斤入紙同和熟軟固濟合子陰乾却於平地
上作一地炉深三尺二寸闊三尺內坐藥合子再用細
灰一斗蓋之硬炭二十斤分四次燒之須及一伏時火
盡為度候冷打開合其蜜或作數重或重上須有雄黃
故曰飛伏也其丹深紫為上青亦妙為極細末其香如
鷄黃元雄黃之氣也酒煮麵糊為元如梧桐子大空心
每服十元温酒下此丹可常服

方廿九

二十

雞峯普濟方卷第二十九

雞峯普濟方卷第三十 馮翊賈兼重校定

備急單方

治中風涎盛少氣不語附子湯

附子壹枚重半兩生去皮臍

右剉如麻子大每服秤一錢水一盞半入生薑秤二錢

和皮片切同煎至六分去滓溫服不以時

治中風口噤身軀強直羌活紫神湯

羌活壹兩去蘆剉

右以酒三升浸一宿取黑豆一升淘淨炒出煙乘執就

鍋內以浸藥酒沃之放溫去滓每服半盞日二三服不

以時候

方三十

治中風偏枯積年不差手足瘦細口面喎僻精神不爽松
菜酒

青松菜壹斤擇淨細剉

右搗令汁出清酒二斗漬二宿近火一宿去滓日飲二

三服每服半盞或一盞不以時候以頭面汗為効

治偏躄風痺乾慘脚氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣咳嗽消

食利小便久服輕身桑枝煎

桑枝如箭筈者細剉參升

右入鍋內炒令黃以水六升煎取三升去滓以重湯再

煎至二升下白蜜一匙頭黃明膠末一錢同煎成膏每

服一匙湯化服之食後臨卧

治諸虛風有熱癩癩惡疾耳聾目昏天門冬散

天門冬不以多少去心焙乾

右為細末每服二錢溫酒調下不以時

治風冷凝滯筋骨痠痛肢躄拘攣語言寒澁龍丹

川烏頭炮去皮臍 五靈脂不夾不者

右各等分為細末清冷水和如鷄頭大每服一粒生薑

汁化破溫酒調下日二服

治風痺手足不隨筋脉攣急及風客頭面目不正痰多

語澀腸風瀉血烏荊元

川烏頭炮去皮臍壹兩 荊芥穗貳兩

右為末醋煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元白湯

方三十

下不以時日二服

治吐逆不定欲生風者宜天南星粥

天南星大者壹枚

右生搗羅為細末每服一錢研粟米汁三盞慢火煮成

稀粥放溫緩緩服之

治纏喉風

天南星生 白殭蚕生去絲紫

右各等分為細末每服半錢白薑自然汁調下不以時

治忽遍身風疥癢痒

白礬不以多少

右研細以冷水調塗之乾即再塗

又方

樺皮燒灰

右研細以蜜水調服二錢日數服

治破傷風

鏢不以多少燒存性

右研細每服一錢熱酒調下

治骨髓疼痛風毒流灌藏腑及至骨肉者宜虎骨酒

虎骨炙令黃色刮削令淨

右搥碎如米粒大每骨一升以酒三升漬五宿每服一

盞空心溫服

治血風久虛風邪停滯手足痿緩肢麻痺及皮膚瘙癢

方三十

三

五痔下血

何首烏壹斤赤白各壹半

芍藥貳兩赤白各壹半

右為細末煮麵糊和元梧桐子大每服三四十元空心

米飲下

治風毒上攻頭昏眼暈菊花散

菊花

芎藭

右各等分為細末每服一二錢食後臨卧茶清調下

治五勞乾瘦咳嗽夢寐不寧

阿魏壹兩真者

右搥碎以乳汁一盞浸軟去沙石研為膏重湯煮如錫

用炒熟白麵和元梧桐子大每服十粒食前煮羊肉湯

下忌食菜

治五勞肌躰羸瘦食少多汗夢寐紛紜

兒孩兒胎衣一具醋浸百竹弗火上炙乾

右為細末入麝香少許同研勻醋煮麵糊和元梧桐子

大每服三十粒空心米飲下日二三服

治虛勞有熱咳嗽膿血口苦咽乾胃滿短氣黃耆散

黃耆肆兩去蘆 甘草壹兩炙

右為細末每服二錢白湯點服不以時

治勞嗽且輕夕重憎寒壯熱少喜多嗔忽進忽退面色不

潤積漸少食百勞煎

杏仁半兩湯去皮尖兩人者

方三十

四

右以童子小便二升用小口埴餅一隻浸杏仁七日寫

出去小便以溫水淘過研如泥別取一埴瓶以小便三

升煎之如膏以炒細麵糊和如梧桐子大每服十五元

食後臨卧熱水下

治諸虛不足腹脇疼痛失血少氣不欲飲食噯噯發熱及

婦人經病月事不調萬病元

熟乾地黃切焙 當歸去苗切焙

右各等分為細末後煉蜜和如梧桐子大每服二三十

粒食前白湯下

治虛極羸瘦面色痿黃咳嗽短氣咯唾有血尿即精出

黃明膠搗碎燉火熬炒成珠子

右為細末每服二錢温酒調下米飲亦可

治虛勞腰脚無力久服令人強健

麋角鎊為屑入酥少許慢火炒黃色秤五兩

附子炮去皮臍半兩

右為細末酒煮麵糊和元梧桐子大每服五十粒空心

温酒下

治虛勞失精羸瘦酸削少氣惡聞人聲

韭子不以多少炒香

右搗為細末每服二錢空心温酒調下

治氣脹不下食除惡氣

木香

訶梨勒去核

方三十

五

右各等分為細末以沙糖水煮麵糊和元梧桐子大每服三五十粒温酒下不以時

治五膈五噎飲食不下肌膚羸瘦橘皮元

橘皮不以多少只揀陳久者不去白

右為細末研大蒜和為膏如櫻桃大每服一二粒白湯

嚼下不以時

治大氣上奔氣急不得卧呼吸氣寒

桂去皮取有味處

右剉碎每服秤一錢以水一盞煎至六分去滓温服不以時候

治脊痺背脊引痛

半夏湯洗七遍片切焙乾 桂去皮碎剉

右各等分拌勻每服二錢水一盞入生薑五片同煎至

六分去滓温服不以時

治膀胱小腸氣痛桃仁膏

桃仁湯去皮尖兩人者麩炒赤色研細

苗香炒香為末

右各等分同研勻每服二錢先以葱白三寸煨熟去袴

研為膏同以熱酒調下空心

治三焦氣壅大便秘滯

陳橘皮不去白為末參兩

杏仁湯去皮尖兩人者麩炒研壹兩壹分

方三十

六

右合研勻煉蜜和元梧桐子大每服五七十粒熟水下不以時候

治老人虛人津液減少大便秘澁

麻子仁半兩

右以水研取濃汁煎熟下粳米煮為粥任意食之以大

便流利為度

治陰陽痞滿吐逆粥藥不下二氣元

硫黃

水銀

右各等分研勻於無油銚子內慢火炒令變色再研如粉水煮麵糊和菜豆大每服十粒十五粒丁香湯下小

兒量大小與之

治脾胃虛弱飲食減少易傷難化無力肌瘦膠飴煎

乾薑炮裂為細末

右以白錫剉如櫻桃大以新水過入鐵銚子灰火中煨
冷溶和薑末元桐子大每服三十粒空心米飲下

調適陰陽和養榮衛治心腎氣痞飲食不進凡傷寒陰陽
不分服之氣正二和散

藿香葉

香附子去皮

右各等分為鹿末每服一錢水二盞同煎至六分去滓
溫服不以時

消穀進食治脾胃虛冷腹脇脹滿藏府不調消穀元

吳茱萸 大麥蘗 神麴炒

方三十

七

右各等分為細末煉蜜和元梧桐子大每服三十元空
心米飲下

治傷寒冷熱不和心腹痞滿時發疼痛順陰陽消痞悶

桔梗去蘆

枳殼麩炒去瓢

右各等分為鹿末每服二錢水一盞同煎至六分去滓
溫服不以時

治一切寒冷心腹疼痛疝瘕瘰癧攻刺發歇

川烏頭炮去皮臍剉碎

右每服秤一錢水一大盞入蜜半匙頭慢火煎至六分去
滓溫服空心

治瘡冷陳寒傷寒陰盛手足厥逆自利自汗脉短氣急嘔

逆煩躁

生硫黃研如粉

右以湯浸饑餅和元如梧桐子大每服三五十元煎艾
茶湯下不以時

治傷寒陰盛陽身冷煩躁脉細沉緊

附子壹枚重半兩者

右慢火烧存三分性放冷為末研入臈茶一大錢共分
二服每服以水二盞蜜半匙頭同煎至六分去滓溫服
不以時須更躁止得睡汗出而解

治大瀉不止及霍乱吐瀉脉微不渴

附子壹枚重半兩者炮去皮臍

方三十

八

右為細末每服三錢水一盞半入鹽半錢同煎至六分
去滓溫服不以時

治水瀉及霍乱心腹疼痛不可忍者

良薑不以多少剉如麻子大

右每服二錢水一盞同煎至六分去滓溫服不以時

治菓菜所傷腹脹氣急心腹刮痛

桂去皮取有味處剉碎

右每服二錢水一盞同煎至六分去滓溫服不以時

治卒暴心痛不可忍者
五苓脂不夾石者
右為細末每服二錢熱酒調下婦人醋湯下

治脾胃濕冷下利膿血腹中疼痛

大艾葉肆兩 乾薑壹兩炮

右為細末醋煮麵糊和元如梧桐子大每服三五十元空心米飲下兼治婦人經血不止

治寒瘧久不差食少羸瘦及臧腑滑泄

乾薑炮 良薑

右各等分為細末酒煮麵糊和如梧桐子大每服三十元空心米飲下

治吐血衄血溺血

亂頭髮燒灰

右研細每服一二錢米飲調下衄者吹入鼻中

方三十 九

治吐血

右以伏龍肝末每服二錢水一盞同煎至六分去滓溫服不以時候

治衄血

右以石榴花末每用一字許搐鼻內

又方

右以龍骨末少許吹鼻中

治吐血衄血

右以白茅花每服秤一錢水一盞同煎至六分去滓溫服不以時候

又方

右以生刺薊碎切每服秤三錢水一大盞煎至六分去滓溫服不以時候

又方

右用新綿燒灰研細每服一錢加入小麝香溫酒調下米飲亦可

治時氣衄血不止

右用好細煙墨研為細末鷄子清和元如梧桐子大每服十粒白湯下不以時候

又方

右以生蘿蔔搗取汁每服半盞入鹽少許攪勻頓服之不拘時候

方卅 十

治舌腫

右以百草霜研細醋調成膏舌上下傅之以針決出血汁傅之弥佳

治喉咽腫痛閉塞

白殭蚕生去絲角貳錢 馬牙硝貳錢

右同研為末每服半錢生薑汁調下不以時候

桔梗去蘆 甘草炙

右各等分為鹿末每服一錢水一盞同煎至六分去滓食後臨臥溫熱服兼治肺壅咯唾膿汁如粳米粥者

治口舌生瘡久不差

右以野薔薇根剉碎每用一匙頭以水二盞同煎至六分去滓熱含冷即吐了

治齒間血出

右用苦竹葉不以多少水濃煎取汁入鹽少許寒溫得所含之冷即吐了

又方

右以童子小便每用半升分為三兩次含之冷即吐了

治牙齒動搖

生乾地黄

羌活去蘆

右各等分為鹿末每服二錢水一盞酒少許煎十數沸去滓溫漱冷吐

治風虫牙疼

方卅

十一

皂角數寸去黑皮并子

右為細末漱口訖以刷牙子蘸藥貼病處刷之有涎吐出不得嚥下

治牙齒腫痛牽引頤頰

白芷不以多少切焙乾

右為細末煉蜜元如櫻桃大別研朱砂為衣每服一粒濃煎荊芥湯嚼下

治牙齒風虫頭痛

荈若子不以多少

右以銅錢七文燒赤取小口餅子一枚令可只含得者

將錢入在餅子中急入荈若子令在錢上炮作声仍入少水洒令氣出以口含餅口勿令泄氣候冷再作之以荈為度如無荈若子以葱子或韭子皆可

又方

闍蜂窠

舍松

右各等分為鹿末每用三錢以水一盞醋一盞同煎十數沸溫漱冷吐

治虫涎入耳

右以荈葱水研汁灌耳中側耳少時即出

又方

右以清油滴數點在耳中

方三十

十二

又方

右以牛乳少許灌耳中側卧少時令虫自出腹者飲之

治地虺傷

右用獨頭蒜片切於瘡上炙七壯

治蜘蛛咬

右以薤白嚼爛傅之

治蝎蜇

右以猪脂少許擦之

又方

冷水

右如是手足被蜇以水浸之如是他處以濕布漬之熱

即換易

治狗咬

右以杏仁嚼爛傅之或以人屎傅之尤良

治魚骨鯁

右取飴糖如鷄子黃大含化

又方

右以象牙研為細末每服一錢蜜水調下

治湯火燒

右以風化石灰清油調塗之

又方

右以蕎麥麵炒焦冷水調塗之或入油少許尤妙

方三十

十三

治金瘡

右以桑葉新者切碎搗爛封裹傷處冬月以桑根白皮

封裹之

又方

風化石灰壹斤 生刺薊壹斤

右合搗成團於透風處懸令乾研細隨傷所大小傅貼

治漆瘡

右以蓬莪茂研為細末每二兩以水五盞煎至二盞去

滓洗之

又方

右以白花蠟搗研為細末水煎洗之

又方

右以桂去皮研為末油調塗之

治乾濕癬久不差者

新楮葉

右將有芒刺處於瘡上貼以手拍之候黃水出盡乾即

差愈

治丹瘤熱毒腫痛

右以新粟煮取濃汁洗之

又方

右以曲蟻糞水調如泥以翎掃塗之

又方

方三十

十四

右以護火草新者搗取汁塗之

又方

右以新浮萍草搗取汁塗之

又方

右以豆豉搗細水和傅之

又方

右以梔子去皮研為末水調塗之

又方

右以生地黄搗爛取汁塗之

又方

大黃末

芒消

右合研勻水調塗之

治惡毒腫或著陰外或偏著一邊疼痛癢急牽引小腹不可忍

茴香或菜或根或苗

右擣取汁空心服一合許其滓以貼腫處

治惡刺腫痛日夜癢澁不識眠睡

僕翁英莖葉根俗名吃漏花

右急折斷取白汁以塗之令厚一分許乃佳

又方

右以桑柴灰淋汁漬之冷即易

治水氣腫滿小便不利身面皆浮

方三十一

十五

生章柳肆兩去皮切碎 赤小豆壹升淘揀淨

右以水三升慢火同煮之候豆熟去章柳只取豆任意食之時飲豆汁

治肺癰喘嗽不得卧欲變成水胷脇脹滿一身面目浮腫鼻中塞清涕不聞香臭

苦葶藶壹兩炒令紫色

右搗研如脂蒸棗肉元如彈子大每服一粒水一盞煎至七分去滓食後臨卧温服

治咳嗽積年不差背膈痛不利

欵冬花

右為末煉蜜和如彈子大燒令煙出以口吸煙嚥之

治咳嗽上氣時時唾濁但坐不得卧

皂夾長太者壹銚去皮塗酥炙黃色去子

右為細末煉蜜元如梧子大每服十粒食後白湯下

治赤白痢

酸石榴皮燒灰

右研細每服二錢空心米飲調下日二三服

治久疔及疔痢

樗根白皮

右為細末水煮麵糊和如梧桐子大每服三十元空心

米飲下

治血痢裏急後重

方三十二

十六

黃連去鬚

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服二三十元空心米飲下

治下血

黃蘗蜜炙令杏黃色

右為細末每服一二錢空心温漿水調下日二服

主五痔結核

黃耆去蘆

枳殼麩炒去瓢

右各等分為細末煉蜜和如梧桐子大每服三五十粒空心米飲下

又方

五倍子搗碎去虫末

右為細末煉蜜和如梧桐子大每服三十粒空心米飲下日二三服有瘡者乾末貼之

主五痔痒痛肛邊結核或有血者

皂夾一錠不蛀虫者去黑皮琴絃燒存性

右研細入麝香少許同研勻每服一錢空心温酒調下

又方

槐白皮剉碎

右每二兩以水四升煎至二升半去滓乘熱薰洗桃白皮亦可

治腸風下血

方三十

十七

五靈脂不夾石者

右為細末水煮薄麵糊和如梧桐子大每服三十粒空心米飲下日二三服

治脫肛

木賊不以多少火燒存性

右為末摻在上以手按之

治婦人惡露下赤白臭穢

益母草

右花開時採取陰乾末之每服二錢空心温酒調下

又方

白芍藥壹兩

乾薑壹分炮

右為細末每服二錢空心米飲調日二三服

治產後惡露不下腹中疼痛及下血太多眩暈不能枝梧及妊娠胎動不安腹痛下血

芎藭

當歸去蘆切焙

右為鹿末每服三錢水一大盞入酒少許同煎至六分

去滓温服不以時

治產後上喘發熱或寒執運悶

人參去蘆

右為細末每服一錢濃煎蘇木湯調下未愈再服

治產後風痙口噤不開項強血風頭痛壯熱運悶

荆芥穗

方三十

十八

右為細末每服一錢食後臨卧温酒調下

治赤白帶下或因經候不斷者

狗頭骨燒灰

右為細末每服二錢空心温酒調下日二三服

又方

龍骨燒過

右為細末空心煎艾葉湯調兩錢日二三服

治小兒斑瘡出不快者

開花蘿蔔

右煎汁時時與飲之

又方

右以紫草去苗用水煎汁冷飲之

又方

右以白芍藥研為細末每服一錢或半錢溫酒調下如只欲止痛以熟水調下

治瘡子倒壓

右以生龍腦少許滴小豬兒尾尖血一二兩點以新汲水研下

治瘡疹黃發不快咽喉不利

牛蒡子貳兩

甘草炙半兩

荆芥穗壹分

右為鹿末每服一錢水一小盞煎至半盞去滓時時令服下痢者不可與服

方三十

十九

治頤開不合鼻塞不通

天南星大者壹枚微炮

右為末以淡醋調塗緋帛上以貼頤上多執手頻熨之

治小兒驚風涎盛

天南星貳兩為末

右取臈月黃牛膽一枚以汁和之却入膽中陰乾為細末研入朱砂一錢麝香少許煎甘草湯水和鷄頭大每服一歲小兒服半粒熟水下不以時日二服

治胞冷夜多小便

益智子貳拾壹粒搥碎

右以水一盞入益智少許煎至六分去滓空心溫服

治小便不通

右用大蒜不以多少研爛攤在紙上臍下貼之

又方

右以鹽填滿臍中大作艾炷灸之以小便利為度

治大便秘結不通

右以麻子用水研汁飲之

治一切瘡疾

砒霜貳兩研細 寒水石叁兩搗為末

右以一生鐵銚子先鋪石末一半後堆砒末在上又以餘石一半蓋之然後取一厚盞蓋合定盞周回以濕紙條子糊之約十重以炭火一斤安銚子在上候紙條子

方三十一

二十

黑色取下置冷地上候冷取開盞子淨刮砒石末一處入乳鉢內細研以軟粟米飯和如梧桐子別作一等小者以備小兒服皆以朱砂為衣每服一粒於發日早以冷茶清下一日內不得食熱物合時服時並忌婦人僧尼猫犬鷄鼠等見如婦人病男子喂藥

治瘡疾久不差者灸法

右以繩量病人脚繞足跟及五指一匝訖男左女右截斷取所量得繩置頂心反繩向後至背脊當繩頭盡處脊骨灸三十壯再作再灸之老人小兒量減之

治奔豚氣灸法

右灸臍下三寸或四寸五十壯

治水氣脹滿灸法

右灸臍上一寸日可二十壯以小便利為度

治小腹堅硬如石脹滿結氣如水腫狀者灸法

右灸臍下四寸百壯

治消渴飲水無度日漸瘦弱

右取菝葜半兩剉碎水一大碗煎至六分去滓溫服日四五次服以不渴為度

又方

右以新紫桑椹淘揀去浮者任意食之

治冬月手足赤裂血出疼痛者

右以猪胰用好酒浸數日頻洗之

方三十

主

治發背瘡灸法

右切蒜布瘡上以艾炷灸之以痛即止艾炷貫虛而大

治卒死灸法

右灸臍中百壯鼻中吹皂角末或研薤汁灌耳中

治溺水死者灸法

右急解本人衣服臍中多百壯或倒懸病人挑去臍中垢或吹兩耳中或綿裹皂角末內下部

治伏暑煩躁頭痛惡心四肢倦怠

陳橘皮不去白 甘草灸

右各等分為鹿末每服三錢水一大盞入生薑七片同煎至六分去滓溫服不以時氣虛寒冷人以乾薑代生

薑

又方

半夏肆兩好醋半升慢火煮盡醋為度

赤茯苓去皮 生甘草各壹兩

右為細末以生薑自然汁煮麵糊和元如梧桐子大每服二三十粒生薑湯下不以時

治鼻衄

右用濕紙於項上至肩塌之

人參湯礬石發則令人心急口噤骨節疼強或者即躄熱生瘡以冷水洗浴然後却用生熟湯淋之數通畢宜以少時飲一中盞稍熱酒行百餘步服

方三十

廿三

人參

甘草

麻黃各半

豉貳合

葱白

麥門冬

右為鹿末以水二盞煮取一盞半去滓分溫三服覆衣汗出即差

治硫黃破徧身熱

右以太麻油二合煎熟放溫以匙抄少許喫之日三五服

治硫黃破氣悶

右以羊血半合服之効

烏梅湯治硫黃發時令人背膊冷疼悶眠神暗漠

烏梅肉 沙糖

右以漿水一盞煎至七分時溫服

治丹石發動令人身熱煩疼心躁口乾

甘草

露蜂房

葦蕪各壹兩

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓服不以時

治丹石發動諸藥不能治宜服酒豉方

美酒壹升

好豉貳合

右以酒者鼓五七沸去滓稍熱飲之使盡不愈即再服

治諸石熱氣結滯經年數發宜服此方

胡荽

五月五日採陰乾

右取一兩以水一大盞煎至七分去滓分溫二服未差更服

治乳石發動壅熱羸困上服此下石方

方廿

廿三

露蜂房貳兩

右以水二大盞煮取一盞分為二服空心溫服其石當

從小便下如細細砂盡即住服

下石散主藥發甚方

黍米壹升蒸作糜

鍊成猪脂伍兩

右件調和令勻宿不食明日空心食之令飽當石下

又方

肥猪肉貳斤

葱白

韭白各肆兩

右件以水煮令爛孰空心食之令盡不盡明日更服

治乳石發動上攻頭面口乾舌燥

麥門冬

石膏各貳兩

葛根

威蕪各壹兩

甘草半兩

右為散每服四錢水一中盞入地黃生者一分葱白七

寸豉一百粒煎至六分去滓不以時溫服

治平生服金石熱發所不制金石凌法服之立愈

川朴消

川芒消半斤

石膏

凝水石各肆兩

右以熱水五升清和消芒消一宿澄清安銅器中鹿搗

凝水石石膏內其中仍內金五兩微微煎之數以筋頭

挑看筋成凌雪去滓頭置銅器中又安於水盆中冷一

宿皆成凌也停三日已上候乾研作末差熱病及石發

皆密水調下二錢日三四服

方廿

廿四

治乳石毒發壅熱煩悶上苦

川芒消壹兩

豉壹兩半

猪脂貳兩

葱白伍莖

右件以水三盞煎至一盞半去滓分溫三服頻服

又白鴨通

壹合以湯壹大盞清之澄清候冷存性飲之以差為度

又生棗

壹合童子小便磨檳榔服之入蜜和服如不通轉妨悶

汁服之偏

解疏黃毒

又石南葉搗末以新汲水調一錢服之効

滑石湯治乳石發動躁熱煩渴不止

右滑石半兩研如粉水一中盞攪如白飲頓服之未差

再服

又常令寒水石其子大噉津良
又方

黃連

川升麻

黃藥各壹兩

龍膽參兩

右細劉水四盞煮取二盞去滓溫含漱吐五七口止日

五七度用之

白朮散治乳石發動服涼藥過多致脾胃虛冷腹痛不思
飲食

陳皮

白水

當歸各壹兩

人參分叁

木香兩半

右為散每服四錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六分

去滓溫服不以時

丸服乳石若少覺不下食宜服生薑酒汁

生薑汁合半

白蜜壹匙

清酒伍合

右相和勻微溫頓服之半日乃効

丸服乳石者覺食不下兼躄弱乏氣力即食鮮鱠

鮮鯽魚

右剥去鱗破去腸血勿洗之但用新布二三條淨拭令
血脉斷依常切鱠法作羹不使蕪復用椒薑蔥等尤佳
益人下食亦療氣利及冷利神効

丸服乳石後有不可食者有通食而益人者有益人利乳
石者藥菜等物

油脂其性滑腸而令人不能食縱喫而勿令多

蕪荑能生瘡發石藥

藜蘆能發石亦去損石

芥子及芥菜能發熱藥

蔓菁果能行石氣

葵菜滑而且壅亦不可食

酥其物潤腹而能行石氣

冬瓜龍葵此一物甚壓石宜多食之

丸服乳石者並是欲求延齡補骨填髓矣五臟既暖骨
髓煩蒸則生其疾或因不節滋味或因色欲過多無倦
或馳騁冒暑衝寒或食冷不節邪從外入髓益虛竭復
起無端欲益反損丸服餌之人足可戒之

雞峯普濟方三十

姑蘇閶門外桐涇橋
西吳青霞齋刻字店



洪氏集驗方目錄

一卷 治痢萊連丸

祛瘡散

混元胎丹

瓊玉膏

神妙六逸丸

降氣湯

二卷 化毒排膿內補散

治諸般瘡毒

治癰疽發背方

又發背灸法

內消發背

治癰疽經驗方

又勝冰散

又聖柳散

三卷 菴蓉茸附圓

五解散

硫附鹽礬圓

肉豆蔻散

大交感丹

還少丹

一粒金丹

鐵甕交感丹

牙藥

癰疽靈方

靈寶膏

治背疽搽藥

治甲疽努肉

治癰疽奪命膏

又應補內托圓

治癰疽立効方

鹿茸世寶圓

治痢育腸圓

治腸風下血

比金散

阿魏良薑圓

人參大温中圓

神應乳香圓

虛風圓

妙應圓

神仙透空圓

灸結胃傷寒

烏金散

治腸風痔疾

麋茸圓

水陸二仙丹

神妙驅風散

四斤圓

丁香草菓散

沉香華澄茄湯

治風烏荊圓

良薑湯

治氣塊刺痛

治胎衣不下

治傷折神授散

治喉口熱毒

四卷 治舌衄

治湯火傷

治乾癬

治沙石淋

治冷積降氣

常服散子

安腎圓

普救散

肉豆蔻湯

治舌腫

菴蓉圓

治淋

治毒地傷

秘精圓

治傷折骨碎	治疝氣偏墜
治痔為金散	治腸風倍苓圓
治風毒氣眼	治腰痛
治虛勞秋石丹	治諸癩
治豆瘡倒搽	治喉閉 <small>二方</small>
治腰痛	治腸風
瘡藥方	治癰
接骨方	治漏瘡
治外風入瘡口	癰藥
治喉閉	治盜汗
治傷風	治脚腫
治脚腫甘豆湯	灸勞法
治頭風頭痛	茶牙湯 <small>治偏正頭疼</small>
治腰痛附牛圓	治爛綠風眼
治膝瘡	治癰疥
治脚氣灸法	治蛇毒
治鼻衄	治諸鯁
治盜汗	治暑龍麟散

治風牙疼	治蛀牙疼
治風牙蛀牙疼	治五種牙疼
治風蛀牙破者	治牙槿牙宣
治暴嗽不止	治惡瘡久不較
治冷漏	治喉閉
治咽喉腫痛	治凍死
治喝死	治溺死
治火燒湯潑	治湯火瘡
治嵌甲	治小腸氣
<small>五卷</small> 治產後百病	催生如聖散
萬靈圓	烏金散
救生散	治姙娠下血腰痛
治產後顛狂	催生藥
治滑胎易產	產後羊肉湯
產後防暈方	產後大便不通
順經散	九寶飲
治小兒泄瀉	金液丹
青州白丸子	肥兒圓

神麩豆蔻圓

木香分氣圓

助胃膏

治麻豆瘡膿水

辰砂安驚圓

羗活膏

大天南星圓

治臍風撮口法

沒石子圓

誤吞珠銅鐵方

誤吞錢方

誤吞釘箭等物

封頰

治吐

誤食穀芒

治口瘡消風散

治腫雄朱散

治瘡瘍金華散

治頭瘡如聖散

治喉閉急風散

墜涎圓

辰砂圓

四君子圓

肥兒圓

觀音散

洪氏集驗方目錄

洪氏集驗方卷第一

治痢

先忠宣獲此方屢有神驗 茱萸丸

黃連吳茱萸各二兩如常法揀洗焙乾

黃連劉令寸斷同一處炒俟香熟分為

二各用醋糊為丸如桐子大若小兒則

赤痢則服黃連白痢則服茱萸赤白則

并服之赤先白後則先黃連而後茱萸

赤多白少則二分黃連一分茱萸及是

赤知之每服五七十粒至百粒服之必

愈為度陳米飲下

大辨茱萸治白黃連治赤也黃連用鷹爪者

肉豆蔻散治赤白痢無藥可治者其効如

神上吐下痢者亦治

已下三方韓子溫少卿傳

肉豆蔻

切片子炒黃色

櫻粟殼

搗碎用蜜拌勻炒黑黃

甘草

切碎炒黃黑色

乾生薑

切細炒黃黑

右等分搗羅為末每服六錢如赤痢多

加甘草一寸炙黃同煎若白痢多加炒

生薑一塊同煎用水二大盞煎至一盞

半通口服不計時候却將兩服滓再煎

服無不愈者

祛瘧散熱多寒少者一服無不驗以濟人

服即外聖秘傳出此方專治瘧疾不瘥用水煎以

治時行寒熱諸藥不効者今有夢中神

傳藥方如有此疾者依方服之即愈如

所感深重一服未愈者定毒發一次更

不再來

好高良薑剉碎 好川白薑炮製

二味各碾為極細末

右各秤等分勿令偏些再入乳鉢內一

處研勻細羅過二味病大者共抄三大

錢病小者共三小錢於當發日日未出

時以穢猪膽二枚勿用白色者割開取

汁與藥調勻再用熱酒少許打勻通口

猛作口嚙更以酒少許送下急嗽口以

甜物壓之一日不得喫別藥忌大寒物

其膽須是穢猪膽其翁母猪膽不中江南謂之鐵猪

大交泰丹傷寒未分陰陽不可服

治陰陽二毒傷寒或因下早三陽或致

結伏胃膈四肢厥冷脉息俱無心燥如

火或因冷物傷脾夾臍症痛坐硬入胃

中滿痞塞潮發寒熱并治翻胃噦逆霍

亂吐痢小腸痲痺脇肋氣痛但是陰陽

不順惡候傷寒壞證並皆治之每服一

粒炭火內煨通赤良久取出放冷細研

如粉米飲一盞煎七分溫服不拘時候

隔半時辰再進一服其効如神兼治小

兒瘡疹倒厭依法服半粒立愈

金星石 大陰玄精石

銀星石 雲母石白色片子

代赭石 桂府滑石

禹餘石已上各一兩 寒水石吉州者一兩半

不灰木一兩 色青黑性軟者

右件丸味入磁瓶子炭半秤煨候火耗

一半取出放冷研為細末糯米粥為圓

如彈字天候乾用一條醫壞證傷寒一服可活一人

混元胎丹乃陰陽始生之物氣精血初生之英華蓋命元宮真氣所化修真之士服餌補漏壯氣固神益髓通神明延壽命增益道涯超羣圍外內丹之基具服餌方如後

久無嗣息者服此有驗

以首兒衣

二八月者不用收時連帶中元血收

用長流水淨洗控乾入甕瓶中下無灰

法酒三大勝腦子麝香隨力下之多止一錢或半字以紙

封瓶口下用文武火煨候酒將盡取出

再入酒三勝依前煨却用竹篋或金銀

篋不住攪以覺爛糜似粥模樣待冷取

入砂盆內細研如粉別入外料

人參 二兩 茯苓 二兩 乳香 半兩

朱砂 半兩水飛過浪乾取淨 山藥 四兩

已上並為細末人參等須擇佳者

右用上件藥末入於所煮藥內如乾時

更用元煨酒旋旋添拌勻一處攪搜為

元梧桐子大慢火焙乾每日空心五十

粒加至一百粒用溫酒鹽湯下良久用

甜淡飲食飽壓逐日葷味中減少五味

謂甜淡鹹等物服至五七日微覺小腹連腰沉

重不須疑慮乃是藥力攻元氣相補助

如此

西川羅赤脚仙還少丹大補心腎脾胃一

切虛損神志俱耗筋力頓衰腰脚沉重肢

體倦怠血氣羸乏小便昏濁陳晦叔敷文傳

乾山藥 酒浸一宿焙乾各一兩半

山茱萸 去皮

五味子 酒浸一宿焙乾

石菖蒲 去心 巴戟 去心

遠志 去心 杜仲 去麋皮用生薑汁并酒合和塗炙令熟

楮實 船上茴香 已上各一兩

苟杞子 熟乾地黄 各半兩

右搗羅為末煉蜜入棗肉為圓如梧桐

子大每服三十圓溫酒鹽湯下日進三

服皆食空時如早食併服之無妨至五日覺有力十

日精神爽健半月氣力稍盛二十日目
明一月夜思飲食冬月手足常暖久服
無毒令人身體輕健筋骨壯盛怡悅難
老更看體候加減如身熱加山梔子一
兩心氣不寧加麥門冬一兩少精神加
五味子一兩陽弱加續斷一兩常服齒
牢永無瘵瘡婦人服之姿容光悅去一
切病治子宮久冷

鐵瓮先生神仙秘法瓊玉膏 陳晦叔服此藥有驗

新羅人參 二十四兩春一千下為末 生地黃 一斤十月採搗

雪白茯苓 四十九兩木一千下為末 白沙蜜 十斤

右件人參茯苓為細末蜜用生絹濾過
地黃取自然汁搗時不得用鐵器取汁
盡去滓用藥一處拌和勻入銀石器或
好甕器內封用如器物小分兩處物盛
用淨紙二三十重封閉入湯內以桑木
柴火煮六日如連夜火即三日夜取出
用臘紙數重包瓶口入井內去火毒一

伏時取出再入舊湯內煮一日出水氣
取出開封取三匙作三盞祭天地百神
焚香設拜至誠端心每晨朝以二匙溫
酒化服不飲者白湯化之此膏填精補
髓腸化為筋萬神具足五臟盈溢髓實
血滿髮白變黑返老還童行如奔馬日
進數食或終日不食亦不飢關通強記
日誦萬言神識高邁夜無夢想人年二
十七歲以前服此一料可壽三百六十
歲四十五歲以前服者可壽三百四十
歲六十三歲以前服者可壽百地歲六
十四歲以上服之可壽至百歲服之十
劑絕嗜慾修陰功成地仙矣一料分五
處可救五人癱疾分十處可救十人勞
瘵修合之時沐浴志誠勿輕示人

一粒金丹治中風癱瘓口眼喎斜涎潮語
澁渾身疼痛應一切風疾悉皆治愈 張真甫會

人傳得之劉信叔

大川烏頭

炮去皮臍

大黑附子

炮裂去皮臍

新羅附子

炮裂已上各二兩

五苓脂

一兩

白殭蚕

一兩去絲炒

白蒺藜

一兩炒去刺

沒藥

半兩研

朱砂

半兩研

白礬

一兩枯研

麝香淨肉

半兩研

細香墨

半兩

金箔

二首并

右件前六味同為末後四味研勻同合

和令勻用井花水一大盞研墨盡為度

將汁搜和用杵臼內搗五百下和圓如

彈子大金箔為衣審乾每服一粒用生

薑一兩去皮擦取自然汁將藥圓於汁

內磨化盡用無灰熱酒一大盞同浸化

溫服更量性多少喫溫酒一二升投之

以助藥力用衣被蓋覆汗出為効痛勢

重者日進二服不拘時候

張天師留傳老瘦少壯輕身強記駐顏悅

色髮白變黑開心中迷云聰明耳目神妙

六逸圓

賀州王承務方李少卿若撰傳

石菖蒲

九節者能開心孔聰明耳目益智不忘出音聲治耳聾高志不老

兔絲子

補不足益氣力堅筋骨主口苦燥渴久服輕身延年

地骨皮

主五臟邪氣燥熱消渴裨益真氣久服輕身堅筋骨不老耐寒暑

遠志

補不足除邪氣益精神注智聰明耳目去皮膚中熱久服輕身不老好顏色益心

生乾地黄

填骨髓長肌肉去胃中宿食補五臟通血脈益氣力利耳目

牛膝

能助入筋骨備治腰疼益真氣變白髮久服輕身不老耐寒暑

右件藥各用二兩先搥剉碎用酒浸之

春夏五日秋冬七日慢火焙乾搗羅為

末煉蜜為圓如梧桐子大每服空心溫

酒下三十圓至五十圓百病俱退服至

一百日老却少容服至一年髮如漆過

二年顏如童子三年骨髓堅實四年鬼

神自散精神爽清合藥并服時忌鷄犬

見所傳不得過十三家

湖州杜助教所傳葛仙翁六神圓用藥六

味與此方同

鐵甕申先生交感丹

俞居易侍郎傳

世人中年精耗神衰常言百事心灰蓋緣

心血少而火不能下降於腎氣憊而水不

能上升至心中焦隔絕榮衛不和所苦者
上則心多驚悸中則寒痞飲食減少下則
虛冷遺泄甚至於陰痿不興臟氣滑洩愚
醫徒知峻補下田非獨不能生水滋心而
建偽失真立見衰悴夭折之由當自此始
悲夫所處此方廣濟迷流然不可忽此藥
品志心服之半年漸屏去一切暖藥又不
可恃此而馳嗜慾然後力習秘固并流之
術其神効不可殫述質之天地切勿妄傳
居易之祖通奉遺訓云予年五十一歲遇
鐵甕申先生授此秘術酷志行持服食一
年大補平日所服暖藥一切屏盡而飲食
嗜好不減壯歲此藥力之功大矣今年八
十五享天然之壽眼目無憾獨此藥傳之
理當普示群生同登道果藥後有湯與牙
藥可同用之

伏神 四兩

香附子

一斤去毛用新水
浸一夕炒令黃色

右為末煉蜜圓

如彈子大每服侵晨一

圓以後湯嚼下

降氣湯

伏神 二兩

香附子 半斤炒
浸如前

甘草 一兩半
炙黃

右為末每服二錢沸湯點下

牙藥

香附子 五兩

右以生薑三兩研和滓汁浸香附子三
夕炒焦黑存性為末以青鹽二錢拌勻

揩牙

洪氏集驗方卷第一

洪氏集驗方卷第二 癰疽

化毒排膿內補散 丞相兄刊是方於徽
州予屢以施人皆効

治一切癰疽瘡癤未成者速散已成者
速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不
犯勿伏服藥後疼痛頓減此其嘗試之
効也歛丞胡權初得方於都下異人時
有苦背瘍者七十餘頭諸藥遍試不効
因出是方示之衆醫環立相目而笑曰
是豈癰疽所劑藥耶固謂之曰古又處
方自有意義觀其所用藥性平和縱未
能已疾必不至壞病服之何害迺治藥
與服以熱酒半升許下藥五六錢少頃
痛減七分數服之後瘡大潰膿血流迸
若有物自內托之服之經月瘡口遂合
若未嘗有所苦者又有苦腹疾者其痛
異常醫者莫曉時意此藥頗能止痛試
以餌之當日下膿二三碗許痛亦隨止
乃腸癰也又一老人忽宵間發腫根脚

甚大毒氣上攻如一瓠然斜插項右不
能轉動服藥明日毒腫既散餘一小瘤
如粟許大又明日帖然如故又一人發
腦疑此方不服既殞於庸醫之手明年
其子復苦此與父之狀不異因懲父之
失縱酒飲藥遂至大醉竟日哀卧地上
酒醒病已去矣又一婦人發乳焮腫疼
痛不可堪忍自謂無復生理又二婦人
股間發腫大如杯碗服此皆脫然如失
蒙濟者不可悉數姑叙大略以示未知
此方者大抵癰疽之作皆氣血凝滯風
毒壅結所致治之不早則外壞肌肉內
攻藏府去生遠矣詳味此方其所用者
皆發散風毒流行氣血排膿止痛生肌
長肉等藥五毒不試而坐收瘍醫十全
之功其可尚已今按本草於逐味下聊
疏藥性溫涼與所治療雖處方妙插不
可遽曉庶倉猝之際可以見其用藥大

意而服之不疑

人參 微溫無毒主補五藏除邪氣通血脉
破堅積療心腹鼓病青筋逆滿今以

新羅者為上擇團結重實滋
潤者洗淨去蘆薄切焙乾

當歸 大溫無毒主溫中止痛除客血內寒
客氣虛冷補五藏生肌肉治一切風

一切勞破惡血養新血又外臺金櫃等方皆
謂大補不足決取立効之藥凡氣血昏亂者

服之即定謂能使氣血歸所當歸制名之義
宜出於此今取川中來者擇大如馬尾狀

滋潤甜辣芬香者
溫水洗薄切焙乾

黃耆 微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛
逐五藏間惡血補丈夫虛損五勞羸

瘦煩悶熱毒活血以綿上來者為勝狀如箭
鋒長二三尺頭不叉者洗淨寸截槌破

以鹽湯潤透用蓋盛湯餅上一
焙久焙燥隨眾藥入碾即成細末

芎藭 溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋牽
拘急除腦中冷痛面上游風治一切

風一切氣一切血一切勞損諸寒心腹堅痛中
惡卒急腫痛腰脚軟弱半身不遂壯筋骨調衆

脈破癥結治癰疽發背排膿消痰養血長肉以
川中來者為上今多用撫芎大塊者淨洗切培

防風 溫無毒治心腹痛四肢拘急經脈虛羸
主骨節風男子一切勞劣補中益神通

刺五藏開脈五勞七傷羸損盜汗心煩體重
能安神定志勻氣脈擇新香者淨洗切培

厚朴 大溫無毒主中風寒熱血痺死肌溫中
下氣去留熱止煩滿厚腸胃去結水破

宿血消化水殺止五藏一切氣痛宜用梓州來
者肉厚而色紫指之油出去麤皮切薑汁普一
宿熾熟培燥
切勿用杜朴

桔梗

微溫有小毒主青胸痛如刀刺腹滿
鳴利五藏補血氣除寒熱破血消積止

心腹脹痛補五勞養氣除邪又養血排膿補內
滿療青中寒肺脈數咽燥不渴時時出濁唾腥

臭吐膿如粳米粥是肺癰治之用桔梗甘草各
二兩水三升煮取一升分再服朝暮吐膿血即

差今所在有之以有心味苦者為真無心味甘
者薺芫也主解藥毒恐於衆藥不利切勿誤用

洗淨去頭尾
薄切焙燥

白芷 溫無毒破宿血長新血治乳癰
瘰癧腸風痔瘻排膿止痛生肌

桂 大熱有小毒一曰溫無毒為諸藥先聘至溫
中利肝肺氣去心腹寒熱補五勞七傷通九

竅利關節破痰癖癥瘕消痰血績筋骨生肌肉筒
厚者宜入治癥及下部藥輕薄者宜入治頭目發

散藥今宜用卷薄者古法帶皮桂每兩止取二錢
半合用一兩者當買四兩候衆藥罷別碾方

甘草 平無毒主藏府寒熱邪氣堅筋骨
長肌肉解毒溫中下氣倍力生用

右十味選藥貴精皆取淨曬焙極燥方
秤人參當歸黃耆各二兩餘各一兩除

桂外一處為細末入桂令勻每服自三
錢加至五六錢熱酒調下日夜各數服

以多為妙服至瘡口合更服為佳所以
補箭損杜後患也不飲酒人濃煎木香

湯下然不若酒力之勝也或飲酒不多
能勉強間用酒調并以木香湯解酒功

能勉強間用酒調并以木香湯解酒功

効當不減於酒也

神授癰疽靈方

唐呂西華遇胡僧授此方沈存中良方備載其事

白麥飯石

顏色黃白類麥飯者曾作磨者尤佳炭火燒赤醋中浸之十遍止為末

白斂末

與石等分

鹿角

三寸截之不用自脫者凡帶腦骨者即非自脫炭火燒之煙盡為度搗為末倍前二味

右並搗篩令細取多年米醋於鑊中煎

盡令魚眼沸即下前件末調如稀餈以

篋子塗傅腫上只當瘡頭留一指面地

勿令合以出熱氣如未膿當內消若已

作頭當撮小若日久瘡甚肌肉損爛筋

骨出露即於布上塗藥貼之瘡上乾即

再換但以膏中不穴無不差瘡切忌手

觸宜戒之劉夢得傳信方亦載

治乳癰發背諸般瘡毒

丹陽僧傳

金銀花

一名忍寒草

右採葉研為滓傅瘡口

花五出而白微香蒂帶紅色野生延蔓葉

如薜荔而青子見沈存中良方所載忍冬嫩苗治癰疽云江西醫僧鑿清善治背疽得其方用老

翁驥後在金陵開醫王琪善治癰其方用水楊藤觀之乃老翁驥也又友人王子淵自言得神方活

數人方川大薜荔又杜醫治癰常以二萬錢活一人方用千金藤又寧國尉王子駿傳一方用金銀

花海州士人劉純臣傳一方用金釵股皆自神其方求其草視之蓋一物也存中云倉卒求不獲只

川乾葉為散并甘草酒煮服然不及生者

靈寶膏治一切癰疽腦疽發背等疾

楊池州傳云是

方得之異人和王施此藥前後活數百人甚有神驗

大芫荽十枚

隔二三年陳者盡去其皮留穢子約有半升許用砂盆研細如粉

新胡桃十枚

不油者湯去膜研細如粉

滴乳香十塊

如大指頭大乳鉢內研細如粉

右用白沙蜜十兩同煎藥於銀石器內

極慢火熬三時辰其稠如餈糖多合少

合准此每服二匙無灰酒半盞調下不

拘時候甚者不過兩三服其効如神

治癰疽發背初覺毒氣攻擊赤腫焮痛方

行在金翰林傳

犀角

鎊一兩

玄參

一兩

川升麻

一兩

黃耆

一兩

赤芍藥

一兩

麥門冬

一兩去心

甘草

一兩

當歸

一兩

大黃 二兩 微炒

右為鹿末每服三錢水一盞煎八分去滓不計時

發背灸法 郭廷圭 知縣傳

先用蠟線度左手中指頭至手掌下橫紋止其橫紋有三兩條當以長而分明者為正却將所度蠟線自尾閭骨取中逆量至脊槌骨如度之長以墨記之次以蠟線取中指中節量一寸中指中節

兩頭橫紋多當側取橫紋中長而分明者為正却將所量蠟線橫於墨點處每邊各量一寸朱點記之此正灸穴處前以墨處乃用取中非灸穴也視背疽發於左則灸右發右則灸左甚則左右皆灸至三十壯而止婦人則用右手中指取度其灸法與男子同婦人妳癰九發背發肋發腦發腿之類不論男女皆可參郭云自得此法救人不可勝計有親

戚姓陳者得此疾其妻兒告急而陳苦不之信迫不得已灸之才十壯其紅腫處漸消於是欣然聽命再灸二十壯覺熱毒之氣從腫處下如以手拓從尾閭骨發散陳至今無恙又云莊婦忽背間痒痛偃背以行問知其狀使以法灸隨手即愈如是非一不能盡記

發背灸法 葉子昂 丞相傳

男左女右以手中指自上至手盡處第一路為度却用此去自尾閭骨盡處量在腰間點定穴却用中指中間一節為度自穴分左右背左處發則灸左穴右亦然止三十艾甚則左右穴皆灸婦人乳癰亦用此法治之

治背疽藥 童縣尉傳

龍遊有患背疽已潰如碗面大視五臟僅隔薄膜耳自謂必死有用大鯽魚一枚剝去腸臟以羯羊糞實其中烘焙焦

黑極乾燥研為細末乾糝之瘡口遂收
至今無恙

內消發背

杏仁 三七粒

巴豆 三七粒去油令盡

硃砂 半錢

乳香 半錢

右將上件藥一處研細次用淮棗三七箇去皮核研碎又用丁香三七粒班茅三七箇烏梅三七箇去核三味同為末通前藥拌勻用餅藥麵十文生麵十文

以冷水搜裹藥在內慢火煨一日莫令燒過候藥熟取出地上將盆蓋覆出火氣然後去麵只取藥細研入少許蒸餅末滴水為圓如菉豆大老者七粒壯者十粒旋入甘草少許用馬蘭酒吞下春用馬蘭苗四兩生者秋後用馬蘭根白芽四兩研細同酒半升研去滓吞下如不飲酒蜜水亦可只可三服

治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不差 出靈苑

膽礬 洗

右先剔去甲中肉傳藥瘡上縱有努肉才傳即乾落

治腫毒發背一切癰疽經驗方 鄱陽都路分因請大仙得

此方徐補錄板印施便腫膿皆治

橫紋甘草 一兩炙乾碾為細末

右分為三服無灰熱酒調一服如人行

一里再一服三服併喫鄱陽徐綱忽患

右患赤腫五日不能履地醫治無効才

服此藥須臾之間即能移步再服全愈

治腫毒發背一切癰疽奪命膏 趙教撰之全州醫

屢有神驗已下三方次第用之

麻油 四兩熬一二沸 石蟹 一枚燒米醋淬才黑又燒碎為末

防風 一兩切焙 蛤蚧 一對煨存性

燈心灰 一分 蜈蚣 一條燒存性

全蝎 七箇燒存性 血竭 一分別研

黃連 半兩去蘆切焙 當歸 半兩切焙

右併為末用文武火熬麻油滴水中不

散次入衆藥一處急用柳枝不住手攪
候滴入水中成珠為度候極冷貼瘡如
常法

又勝冰散

茵陳 半兩 焙

防風 半兩 焙

滑石 一兩 別 細研

當歸 半兩 焙

地龍 半兩 碾

乳香 半兩 別研

螺青 一兩 研

馬牙硝 半兩 研 各取末

右八味一處和勻用新汲水調塗腫處

不可令稀時時塗之勿使至乾

又應痛內托圓

赤芍藥 一兩 焙

當歸 一兩 焙

血竭 一分 研

麝香 一分 研

瓜蒌根 二兩 火 煨 存性

人參 半兩 焙

沉香 半兩 剉

茵陳 半兩 焙

全蠋 七枚 煨 存性

大黃 一分 焙

右件十味和勻為末煉蜜圓如彈子大
每服一粒乳香湯化被服之或嚼喫亦

得不拘時

又聖柳散

蒼朮 四兩 米泔水浸 十宿 焙

連翹 一兩 焙

甘草 一兩 炙

大黃 半兩 切

人參 半兩 切

赤茯苓 半兩 切

黃芩 二錢 半 煨 存性

桔梗 半兩

白朮 一分

枳殼 一兩 麩 炒 去 白

南木香 一兩 切

益智 一兩 去 皮 切

白芷 半兩 焙

苦參 一兩 切

右件為細末如渴時加牙硝半兩別研
入每服二大錢水一盞柳枝七寸同煎
至八分去滓溫服不拘時

初發即用奪命膏貼如胃膈滿悶大腸

秘結即用應痛內托圓主之如四邊赤

腫日增即用勝冰散主之如煩渴不已

疾勢轉增即用勝柳散此疾淺深治法

次第也忌鷄肉濕麵疾愈半年方可食

治癰疽立効方

小兒暑月頭額生癰亦可

生水蛭

一名馬蟻蟻取數枚真梳水中用乾紙之冬月蟄於積水邊或田塍水道邊掘土取之

右用薄帛一片剪圓如瘡大仍看瘡膿頭有幾箇其帛對膿頭作小眼搭在瘡上將水蛭着在帛眼處每一膿頭用一水蛭要得先啣去膿其痛立止如無膿頭即以手指按之覺最熱處是也或用茶末以水調塗瘡上看先乾處即點記如不能辨即着在中間如膿頭只一箇而赤暈稍大即近中處加水蛭如膿血啣盡痛定腫退可用膏藥貼之

紹興中汀州黃守

武疽發肩背之間

醫藥不瘥用水蛭立効因就寢蓋被

稍煖睡覺衣被皆濕以燭視之乃瘡

口自出血也

水蛭啣盡惡血不曾貼膏藥身煖好血隨路而出

急

令取池中藕將藕節處泥抹瘡口其

血立止按本草云水蛭攻癰腫毒腫

取十餘枚啣病處取皮皺肉白無不

差冬月中無蛭虫地中掘取暖水中

養之令動先洗去人皮鹹以竹筒盛

蛭綴之須更便咬血滿自脫更用飢

者

張仲欽運使傳云紹興壬申歲沿檄至汀親自其事

洪氏集驗方卷第二

洪氏集驗方卷第三

茯苓附圓平補真元益養脾腎固精壯

氣暖胃思食

督府王翰林方 丞相兄舊苦脚氣百服此藥十餘年不作

鹿茸

一兩先用草燒去毛切作片子用酥炙令香熟為度

茯苓

四兩酒浸一宿切作片子焙乾

兔絲子

四兩酒浸兩宿炒令半乾搗作餅子焙

生膠

二兩酒浸一宿切焙

真為藥

一兩

附子

一兩炮去皮臍

天麻

一兩

葫蘆巴

一兩炒

乾淡木瓜

一兩

木香

一錢麵煨

丁香

二錢不見火

右件搗羅為細末酒糊為圓如梧桐子

大每服三五十圓空心臨臥米飲溫酒

鹽湯下

鹿茸世寶圓諸虛不足心脾氣弱腹脇脹急腸鳴泄瀉腹疼手足厥逆頑痺中滿惡

心頭疼怯寒肢體酸痛飲食少思氣短乏

均敬焉博自汗並能服之用藥如下 督府王翰林方

鹿茸

酥塗炙

白朮

炒

椒紅

沙出汗

茯苓

酒浸炙

肉芫荽

麵裹煨

牛膝

去蘆酒浸一宿

沉香

去心

右件十三味依法修製並為細末次入

鍾乳粉拌勻煉蜜為圓如梧桐子大每

服四十粒鹽飯飲或鹽湯送下食前一

日三服

五解散治傷風感寒或內傷生冷頭目昏

痛身體壯熱胃腸不快乾嘔惡心怯風怕

寒體虛自汗

藿香葉

一兩去土

白朮

一兩

人參

一兩

半夏

一兩湯洗七遍

甘草一兩 炒

白茯苓一兩

陳橘皮一兩 湯盪 洗一次

厚朴二兩 去麩皮用生薑自然汁塗炙紫色為度

右件同搗為麩末每服五大錢水一盞

半生薑七片棗子二枚煎至七分去滓

溫服不拘時候

育腸圓治遠近一切赤白痢實腸胃進飲食

當歸一兩

肉豆蔻仁半兩 粟米炒 以黃為度

訶子皮兩 炮半

黃連一分 去鬚

烏梅肉一分

櫻栗半兩 炒 黃黑色

右為細末蜜煉熟圓大如菉豆許每服

十五圓溫陳米飲食前

平江辛太丞傳 有加芎者尤妙

硫附鹽礬圓治經年久病腸風下血不止

虛弱之甚者一服見効

已下二方上官 彥成駐泊傳

附子一兩 炮去皮臍 別杵為細末

綠礬

四兩 川瓶子盛蓋之火煨食頃候冷取出入鹽一合硫黃一兩同礬研過依前入瓶子內燒如

食頃候冷取出再 研令勻為極細末

右件二味藥末同合一處令勻以粟米

粥為圓如桐子大每日空心用生地黃

汁吞下溫酒米飲亦得每服三十圓

治五種腸風下血上廁糞前有血各外痔

糞後有血各內痔大腸不收各脫肛穀道

四面有努肉如妳各妳舉痔頭上有孔腸

出各漏並皆治之

黃牛角鯁一枝 搥碎

地脫皮一條 白者

猪牙皂角七莖

穿山甲一處七 十鱗

刺蝟一兩 剉

右件五味入瓷瓶子內以黃泥封固候

乾先以小火燒令煙出後用大火煨令

通赤為度取出攤開候冷搗羅為細末

患者先用胡桃一箇分作四分一分臨

臥時細研如糊溫酒下便睡先引出蟲

至五更時以溫酒調下藥末三錢至辰

時更進一服久年不過三服立効

比金散治腸風下血方及治痔漏又名立

効散

饒州周道 太丞傳

蝟皮一箇

皂角刺二兩

膾藤子 一箇去穢刺 碎別碾為末 猪牙皂角 一兩

白礬 半兩

除膾藤子外右四味入瓷瓶內鹽泥封固候乾先以小火燒令煙出方用大火煨令煙盡為度取出攤冷杵羅細末入膾藤子末和勻每服一大錢溫酒調下空心食前服

治五種腸風痔疾 饒州王康 孺翰林傳

凡下血皆謂腸風糞後有血名內痔糞前名外痔大腸頭出謂之脫肛穀道四邊有努肉謂之鼠妳痔頭上出血謂之漏此方通治之

黃牛角腮 一箇 猪牙皂角 二兩

地皮 一條 穿山甲 二兩

大附子 一箇炮 去皮臍 當歸 半兩 炒

蒟葉 四兩 麝香 一錢

蛻皮 一箇

右件一處砂瓶內用炭火煨令通赤取

出於地上用盆合定四畔用土覆之去火毒然後搗羅為細末患者先用胡桃肉半箇研爛同酒半盞調藥末二錢服之便効

阿魏良薑圓治三腕氣弱中焦積寒脾不磨飲食遲化喫物頻傷膏膈滿悶脇肋疼刺嘔吐噦逆噫醋惡心腹脹傷鳴心腹疼痛噎塞膈氣翻胃吐食飲食減少悉能治之 巴下二方上 官駐泊傳

青皮 三兩 陳皮 二兩

良薑 二兩 紅豆 二兩

桂 去麤皮 一兩 縮砂 去皮 二兩

蓬茂 炮二兩 草菓子 去皮 二兩

乾薑 炮二兩 萊菔子 炒 二兩

木香 二兩 硃砂 半錢

阿魏 一分并研砂用 醋化去砂石研

右和麵煮糊為圓如菘豆大每服五十粒淡薑湯吞下不拘時候日進二服久

服大補益脾胃空膈令人能食去寒濕
強中溫暖如素來有沉寒積冷腹中時
作疼痛宜服之或無此證去硃砂常服
溫養中焦有益脾胃

麋茸圓治婦人風虛勞冷一切諸疾或風
寒邪氣留滯經絡氣血冷澁不能溫潤肌
膚或風寒客於腹內則脾胃冷弱不能化
消水穀或腸虛受冷大便時泄或子藏挾
寒月水不調乍多乍少或月前或月後或
淋瀝不斷或閉不通百節酸疼頭頂作痛
相應臍腹腰腿痛痺不仁悉能主治大補
益元臟絕忌羊血解藥力

麋茸

火燒去毛薄切
酥塗灸四兩

當歸

去蘆酒浸一
宿焙乾二兩

麋茸

火燒去毛薄切
酥塗灸二兩

鹿角膠

麋炒
二兩

大黑附子

炮去皮
臍二兩

沉香

二兩不見
火好者

肉蓯蓉

酒洗薄切
焙乾三兩

牛膝

去蘆酒浸一
宿焙乾二兩

熟乾地黄

酒洗焙乾
秤三兩

赤石脂

一兩
煨者

破故紙

酒浸一宿炒二兩
一方有麝香二兩

陽起石

一兩半夜間用礞子盛以酒二
升煮一宿水洗焙乾乳鉢研如粉

右十二味同為細末用酒蜜各等分熬
成稠膏子搜和成劑入木臼內杵三千
餘杵圓如梧桐子大每服三十粒漸加
四十粒至五十粒溫酒鹽湯吞下空心
日午服之 法酒二十兩蜜二十兩
慢火同熬成膏子圓
人參大溫中圓治三焦不順脾胃積冷心
腹大痛嘔逆惡心兩脇刺痛膏膈滿悶腹
脹腸鳴泄瀉頻併溫脾暖胃 婺州李麾
翰林傳

人參

去蘆頭
一兩

白朮

一兩
剉

陳橘皮

去白
一兩

紫蘇子

揀淨
一兩

高良薑

剉
一兩

官桂

去麩皮
一兩

川乾薑

五錢
炮

右件七味為細末煉蜜為圓每一兩作
十圓每服一圓煎生薑湯嚼下不拘時
水陸二仙丹
取鷄頭去外皮取實連殼雜搗令碎曬
乾為末復取糖櫻子去外刺并其中子

洗淨搗碎入甑中蒸令熟却用所蒸湯
淋三兩過取所淋糖櫻汁入銀銚慢火
熬成稀膏用以和鷄頭末圓如梧桐子
大每服鹽湯下五十圓久服固真元悅
澤顏色括蒼吳寅仲久服有奇功此藥精
開當以

車前子
未解之
治諸般惡痢腹中攪刺日夕頻併危惡不
瘥神應乳香圓

安息 一分酒浸三
日水研為末 呵耳 一錢

乳香 一分酒少許
開燉三日
再用火焙
鎔令乾研為末

沒藥 一分研為末
用安息香膏子和勻用土杏仁
不以多少燒令煙出上磨膏子一日乾為度

右件四味研為細末滴水為圓如菜豆
大每服五圓七圓乳香湯下空心食前
日三服加至三五十圓不忌毒物其効
如神

治風毒上攻眼目流痒疼不可忍者或上
下臉赤爛浮翳癢肉侵睛神妙驅風散

出王氏
傳濟方

五倍子 一兩槌破
去塵土 蔓京子 一兩半
洗令淨

右二味同杵為末每服二錢水二盞銅

石器內煎及一盞澄滓熱淋洗留滓二

服再依前法煎淋洗大能明目去澁痒

治大人小兒一切風虛昏眩神志不爽心

氣不寧手足搐跳睡臥不穩虛風圓

麝 一錢 五靈脂 為末銀器內炒煙
盡為度秤一兩

白附子 真大者炮
烈半兩 天南星 大者炮去
皮臍一兩

烏蛇 只用頂後肉去皮酒
浸一宿乾秤一兩

蟾頭 一箇大者炭火燒煙
將盡取出不令成灰

赤脚蜈蚣 三條全者酒
浸一宿培乾

右除麝外同為細末絕細再入麝同研
勻以醇酒作糊為圓桐子大每服一圓
不拘時候或二圓以人參湯麝香湯嚼
下或溫酒亦得治小兒慢驚極妙

壯筋骨治脚膝疼痛四斤圓

宣木瓜 去穢
培乾 牛膝 去蘆頭寸
剉培乾秤

菘蓉 洗塊切
培乾秤 天麻 細剉
已上各半斤

右件用無灰酒五升浸春浸五日夏浸

三日秋浸五日冬浸十日日足取藥焙

乾加附子二兩虎骨一兩虎骨細鎊附子炮去皮尖同

為細末用浸藥酒煮麵糊為圓如梧桐

子大每服五十圓溫酒或鹽湯下空心

食前服虎骨須用酥炙令蘇

妙應圓治婦人血經不調月事湛濁加之

驚憂遂發痰瘧後汗出過多損耗氣血

常服滋煖子宮調血養氣池州徐學諭傳

當歸去蘆頭二兩

延胡索去土一兩

澤蘭取葉一兩半

白芍藥雪白者一兩

肉桂去籠皮一兩不見火

牡丹皮去骨一兩

川芎一兩

木香半兩不見火

石斛去苗一兩

川薑一兩炮

熟乾地黄淨洗薄切焙乾秤二兩

右件修製了焙乾搗羅為細末醋煮麵

糊和圓如梧桐子大每服二十粒用溫

酒或米飲吞下空心及晚飢服之

丁香草菓散治大人小兒脾虛發熱濕潮

熱他藥不能治者服之如神余真州傳

丁香一錢半辣新辣者草菓三箇麵裹煨麵烈為度

麥門冬半兩去心湯洗人參二錢

茯苓二錢半半夏二錢薑製

甘草二錢炙淡竹葉數葉

右為麈末分作六服用水一盞半薑三

片棗一箇煎七分去滓不拘時服小兒

加陳皮二錢去穰

神仙透空圓治男子婦人偏正頭疼惡心

產後體虛傷風憎寒頭痛洗頭沐浴傷風

壯熱頭痛痰厥頭痛腎厥頭痛虛眩頸筋

緊急應一切頭痛江州陳太丞傳

天麻一兩洗香白芷一兩

半夏一兩生用天南星一兩

乾薑四錢生用川芎二兩洗

地龍半兩鎚洗去土淨川烏一兩生用去皮尖

草烏一兩生用去皮尖細辛半兩

甘草

二兩 生用

白附子

半兩

右為細末以藥末一兩入白麵一兩用

新汲水搜和為圓每一兩分作十圓於

新板上排定日內曬之如合須是伏中

合

沉香葦澄茄湯治腰腿間寒濕作痛

饒州雜醫傳

沉香

半兩

南木香

四錢

丁香

四錢

檀香

四錢

葦澄茄

半兩

片子白薑黃

半兩

陳橘紅

三錢

青皮

去白 三錢

粉大胃草

七錢

藿香

去淨土 四錢

白葶藶仁

半兩

天台烏藥

半兩

人參

半兩

縮砂仁

三錢

右為細末每服一二錢入鹽點服

痰結胃傷寒不問陰陽二毒只微有氣者

皆可灸下火立効神功散

黃連

七寸 為末

芭豆

七粒去皮新瓦上出油

二味拌勻令患人仰面臥先用三韓耳

和艾一炷如中指大更用三韓耳子先

着在患人臍中後安艾炷其上只一炷

覺臍腹間有聲即便汗出而愈

治風烏荊圓

川烏頭

一兩炮 去皮

荊芥穗

二兩

右醋麵糊為圓如梧桐子大每服二十

圓酒或熟水下有疾食空時日三四服

無疾早晨一服少府郭監丞少癩風舉

搗頤頤寬鞞不收手承頤然後能食服

此六七服即差遂長服之已五十餘年

年七十餘強健鬚髮無白者此藥療腸

風下血尤妙累省人得効下血又服此

而差者一歲之內數人

烏金散治胃暑悶亂不省人事欲死及發

燥引飲無度咽中痰涎不下

不蛀皂角

一斤刮去皮猛火炙令成炭仍須存性不可使成白灰也秤三兩

甘草

一兩

右同為細末以新汲水或溫熟漿調三

大錢服立差此藥神妙不可具述

良薑湯治陰寒積冷心腹大痛嘔逆惡心
手足厥冷心胃不快腰背疼痛蘇州李庵
翰林傳

高良薑

一兩半
碎炒

官桂

一兩
去皮

當歸

去薑頭用
一兩半炒

乾薑

一兩
炮

人參

一兩去
薑頭

吳茱萸

七錢
半炒

白茯苓

一兩

附子

半兩
炮

右為細末每服二大錢水一盞半入生

薑五片煎至七分去滓膈空服

治氣塊刺痛暮夜即作至不可忍多因氣

中傷冷所致久而不治婦人尤宜服之已下
二方

信守孟郎
中充傳

鱉甲

去裙并膜
醋炙半兩

當歸

去尾
一兩

木香

半兩

青橘皮

去白
一分

枳實

半兩

人參

半兩

荆三稜

半兩

沒藥

一分
研

血竭

一分
研

檳榔

一分

半夏

二錢
生用

右為細末醋煮稀糊圓如菘豆大不計

時白湯下十五粒遇大府通利且止若
氣發便失府不通即加至五十粒以通

為度此病須是服此藥令氣塊消然不

可驟然多服須待積久消磨每日且只

一二服覺得氣消不痛却只一日一服

或三日二日一服仍旋服後面散子以

補氣

常服散子

人參

半兩

黃耆

半兩

當歸

半兩

白朮

一分

木香

一分

陳橘皮

去白
一分

甘草

二分
炙

青橘皮

去白
一分

沉香

一分

右為細末每服三四錢七水一盞薑二

片同煎散七八分不計時服遇氣痛時

每服添枳實末一二豆許

右陳侍御宜人嘗因不喜悅中食柑

自後遂苦心腹痛久之腹中結塊遇痛作時往往悶絕移時方蘇而常在夜間是時得御作辟廱博士京師醫者皆不能治有齋生蜀人史堪載之者醫聞一時乃處此二方服一兩月間遂去根本後二十餘年復因憂悒此疾似欲再作而已微痛即再合服之數日而愈

治婦產後胎衣不下 鄉人萬應之秘技傳

凡產有產後胎衣不合諸血奔入久而血上衝心遂致不救者有產前失血過多胎衣乾澀不下者庸醫不曉例以破血藥治之不知血盡轉澀遂終不救舊有產婦胎衣不下呻吟痛楚聲不可聞忽有人教之用淨麻浸水兩大碗服之即時嘔吐胎衣復下遂得更生

安腎圓治本氣怯弱筋骨無力或時疼痛 信州李諒駐泊傳

熟乾地黃 洗淨焙乾一兩 牡丹皮 半兩

附子 炮去皮失半兩 金釵石斛 半兩

破故紙 炒半兩 山藥 半兩

肉桂 半兩去皮 白蒺藜 炒去刺半兩

巴戟天 去心秤一兩 肉蓯蓉 酒浸一宿一兩切焙

白茯苓 皮秤半兩去 澤瀉 微炒半兩

草薺 半兩 白朮 半兩

右件為細末用煉蜜和為圓如梧桐子大每服三十圓至四十圓用溫酒或鹽

湯送下食前空心服

治傷折內外損神授散 予屢用之甚驗

川當歸 半兩洗淨切搗 鈎粉 半兩洛粉最上

鵬砂 二錢

右同研細每服二錢濃煎蘇枋汁調下若損在腰以酒先喫淡麵半碗然後服藥在腰以酒先服藥後喫麵仍不住呷蘇枋汁更以糯米為粥入藥二錢餅和攤在上或絹上封裹損處如骨碎則更

用竹木夾定外以紙或衣物護之沈存
 中云長安石使君一日在闌閨中忽有
 呼其姓第回顧不見明日過市復聞呼
 聲曰我無求於人以爾有難特來救爾
 石謝之欲下馬與語其人止之褰衣領
 中出一書曰有難即用稠人中遂引去
 石歸視乃此方也石到京師趨朝立馬
 右掖門外為他馬所趨折足墮地又為
 馬踏手臂折昇至家屢氣絕急合此藥
 服且累半夜痛止後手足皆平復

普救散治四時傷寒渾身發熱四肢疼痛
 頭重眼疼不問陰陽二證並皆治之
永平鹿知
 監施此藥

蒼朮 一斤米泔水浸
 三日切焙乾 乾葛 半斤
 切焙

甘草 四兩炙赤
 色切細

右為鹿末每服二大錢水一中盞煎至
 七分去滓熱服如要出汗加連根葱白
 二寸同煎併兩服滓再煎一服不拘時
 候仍用沙鉢不得犯銅鐵器
初發傷寒宜下
 此藥汗後勿服

豆豉散

治喉口熱毒至甚咽喉膈內連心肺疼
 痛飲水不下氣不能出死在須臾名曰馬

閉 饒州上乙卯年春連甲寅冬老幼皆患此病三四日便死
 官醫傳吳江七都持多餘合將毒推搗死治之

巴豆七粒 去殼膜
 研如泥

右以坏子一錢同研成膏子每用一字
 許醋煎皂角汁調令稀稠得所將鵝毛
 蘸藥掃於喉間良久咳唾出膿血或涎
 數升然後用第二法其法白礬飛過白
 僵蚕微切各半兩為細末每服半錢新
 汲水調下

肉豆蔻湯治胃膈痞塞不快脾胃有傷
傳

肉豆蔻 炮 草果子 去皮


石菖蒲 乾木瓜

良薑 乾薑

厚朴 薑多 甘草 炙

右等分為細末每服一錢鹽湯點服

洪氏集驗方卷第三



洪氏集驗方卷第四

治舌衄 二方出方氏泊宅編

槐花

右炒為末摻之昔有士人無故出血仍有小穴醫者不曉何疾偶曰此名舌衄用此而愈

治舌腫

蒲黃

右為末摻之須真者佳一士人汧汭東歸夜泊村步其妻熟寐撼之問何事不答又撼之妻驚起視之舌腫滿口不能出聲急訪醫得一叟負囊而至用藥摻比曉復舊問之乃蒲黃也

治湯火瘡

大黃

右搗碎調以美醋傳瘡上夷堅志云金山修供神怒庖人不謹漬其手鑊中痛楚徹骨號呼欲死神授此方遂愈

菴蓉圓暖水臍明目

菴蓉 二兩酒浸一宿焙乾

枸杞子

川練子

右為末煉蜜為圓如桐子大每服三十粒温酒或鹽湯下空心食前臨卧

治乾癬 巴下八方景盧傳

樟腦 一錢

雄黃 半錢

白礬 半錢生用

並細研以生薑自然汁釀醋各少許磨羊蹄菜根如手指大二寸許調藥擦傳止有食頃痛極不過三次見効

治淋

皂角刺 燒存性 破故紙 等分

為細末紅酒或無灰酒調下

治沙石淋

定磁末羅細以生地黃槌碎同煎如熟水時時飲之

治毒蛇傷 屢試如方

香白芷為末麥門冬水調飲倉卒時新

汲水亦可

治冷積降氣寬膈逐痰

橘皮去穢取紅一斤甘草鹽各四兩水

五椀慢火煮乾焙搗為末點服

補益治漏秘精圓

大附子 炮裂去皮臍去

龍骨 煨通赤

牛膝 酒浸一宿焙

肉苁蓉 酒浸一宿焙

巴戟 去心

兔絲子 酒浸三宿

右等分為末煉蜜圓梧桐子大空心温

酒或鹽湯下三五十粒甚者日午再服

小便如米泔者不過十服

治傷折骨碎 此方用之甚驗

大鯢膠一味碎剉用無灰酒煮爛如粥

逐旋抄喫極苦硬須強進之以多為度

每二兩或四兩為一服傷甚者不過半斤

治疝氣偏墜

牡礪 火煨

良薑

右二味為末用津唾調塗之卒消

烏金散專治痔疾神驗 已下五方韓州王康孺翰林傳

黃牛角腮

烏金子

五倍子

紫河車

威靈仙

枳殼

右等分入甕瓶內用白雄鷄糞和黃泥

固濟上留一竅子炭火煨煙盡為度取

出地上出火氣為細末每服三錢空心

酒調下

倍苓圓治腸風下血

槐花 六兩

五倍子 三兩

五靈脂 三兩

右件為細末麵糊為圓如梧桐子大每

服三十圓米飲下

治風毒氣眼連眦赤爛洗眼神妙

白沙蜜 二兩

乳香 通明者一皂子大温水浴過

好黃丹 抄半錢

右一處於砂石器內或銀器內用慢火

熬令焦黑色滴在水中不化為度每用

兩黑豆大沸湯浸洗眼藥成露一宿方好

治腰痛

五加皮

右不拘多少為細末如梧桐子大酒煮

麵糊為圓每服三十圓空心溫酒下

秋石丹治男子婦人虛勞瘦

秋石 一兩

乾山藥 一兩

右為末別以酒調山藥為糊如梧桐子

大又以乾山藥為衣每服二十圓

治諸癩

道人黃大成傳 屢用之如方

鴨舌膽礬 煨存性

右為細末每發時用一字以筆管吹入

鼻內涎出即愈

治豆瘡倒撮入肉

景盧傳

人齒一箇不以久近燒成灰用豬尾血調

和了入酒小盞同服之實永仲教授年

六歲時生瘡為鄰近焚化所觸盡撮入

肉諸醫束手母已發聲哭親戚劉知縣

說此方才飲酒了元瘡隨手如故

方亦載此用人齒三五枚炙黃為末乳香湯調下溫酒亦得

治喉閉

陳子範教授傳

皂角 半銖

右搗為末用醋一椀就鍋內煎數沸以

帛濾滓令病人服之

又方

高達辰制幹傳

麻油

少許生油

右以筋絞油生沫即以油沫飲之

治腰痛

已下二方孫仲益尚書傳

芸臺子

右用米醋研塗傳疼處

治腸風

橡斗子

右以乾大棗置橡斗子中以麵裹火炮

碎為末用陳米飲作一服

膽丸散

瘡藥方 饒州十七里李家傳甚妙

叢竹殼

野油麻葉

陳屋茅

百合花 乾者

猫兒骨

已燒灰入輕粉和麻油調塗

治癬

羊蹄根 切作片

右至五更初先以布揩癬上即取羊蹄根爛嚼止用汁塗後以其片揩之將冷

水嗽口及洗手初用藥時忌不得語欲氣勿洩也

接骨方

牡蠣 少許

右為末用糯米粥調之塗其上却以沙木板夾之即愈

治漏瘡 高達辰制幹傳

麝香

臈茶

右等分為末乾傳

治外風入瘡口腫毒方

全蝎 一箇

白殭蚕 三箇去絲

蟬蛻 三箇

右為細末裂葱汁調塗即愈

癬藥

白礬 飛過兩

黃丹 半錢

白藥子 半兩

右為細末旋掘羊蹄根獨脚者一根者是取自然汁調藥苑用布擦癬微破用藥

傳之

治喉閉 郭廷圭知縣傳

白礬 一斤好者 好酒 一斗無灰

右同熬以酒盡為度入合子臨時用之

治盜汗

防風 細切

右為細末浮麥煎湯服之婺州汪伯敏將仕云嘗見周仲恭尚書言舊有盜汗之疾每至大屋則肢體凜然須以幃幕

遮護後得此方遂愈

治傷風

五積散敗毒散

右以五藥合煎服之蓋五積性溫敗毒稍涼服之無不効者

治脚腫

四物湯小續命湯

右以二藥同煎章謚靜之節推云嘗有人卒患脚腫服此遂愈

甘豆湯治脚腫

黑豆

甘草

右同煎湯服之郭鎮廷圭知縣云昔年太學生人圍閉中多患脚腫至腹則死前後如此者非一人後有施此方服之皆愈蓋神方也

灸勞法

以肚臍相對取背脊骨灸之甚妙

治頭風頭痛

人中白

焰消 各一兩

右用水一椀無灰皮紙濾下研細重湯煮過再研入少腦子每用少許以斡耳子搐入鼻中即愈襄陽府胡急脚專貨此藥積錢至數萬緡祕惜不傳上官醫以計得之

茶牙湯治偏正頭疼惡心嘔吐不止者

細茶牙 一兩

生草烏 半兩 皮尖

細辛 半兩

右為麤末每五錢水二盞慢火煎至六分去滓溫服一服取効

治丈夫婦人腰痛重腿步武艱辛痛不可忍附牛園

附子

半兩炮 去皮臍

黑牽牛

瓦上炒

右為細末酒煮麵為圓如梧桐子大每三十圓空溫酒下如半邊腰疼只用黑牽牛瓦上焙乾一邊附子炮一邊餘一邊生用不去皮搗羅為末如前法服

治爛綠風眼

覆盆子

右取葉按碎以汁滴眼中即有虫出上官醫云頃歲寓居潭州瀏陽縣石霜寺有皇叔太尉者乳媪患爛綠風眼近二十年一日有藥媪過之曰老婆能治此眼眼中有虫赤而長其細如絲遂入山取藥其家遣人尾其後但見泂山路採取樹葉以手按碎入口咀嚼留其汁以

皂紗蒙患人眼握筆畫雙眼於紗上然後用藥汁滴於眼之下緣須臾虫自紗中出其數十七其家甚喜媪去數日復至則眼下緣肉乾如常人再用前法治眼上緣得虫又以十數媪謂上官曰公為醫官不可不傳此方須以錢二萬償我上官諾之遍召傍近村婦患此眼者治之無不差媪又曰是方出本草葉部中覆盆子注云葉按絞取汁滴目中去

膚赤有虫出如絲線上官屢用之皆効

治謙瘡 上官醫傳

鱈魚

右以鱈魚數條打死先用油塗其腹實患人腿上盤令周遍以帕子繫定食頃患人覺痛不可忍然後取鱈魚腹上有針眼大竅子皆虫也虫既去盡却用死人脛骨燒灰塗瘡口即愈 海存中良方亦載活鱈治漏瘡

治癬疥

宣連

去驢酒浸一宿

右焙乾為末蜜圓如梧桐子大空心日午臨臥酒吞二十粒東坡云惠州軍校姚歡年八十餘鬚髮不白自言年六十歲患癬疥周匝頂踵或教服黃連遂愈久服故髮不白

治腳氣灸法

右灸風市兩穴以多為貴蔡元長為關封少尹一日據案忽覺虫自足心行至

腰間落筆筆倒久之方甦掾曹曰此疾

非俞山人不可療使呼之俞曰真脚氣

也灸風市五艾而去明日又覺虫自足

至風市便止又明日疾如初召俞俞曰

是疾非千艾不可一艾力盡故疾復作

蔡如其言灸數百自此遂愈

沈公雅檢正說子紹興辛巳歲在吳門虛郡宅以備巡幸徙治吳縣縣甲溼始得足痺之疾以風市為至煎湯隔曲池三里灸之即愈

治毒蛇咬毒氣已入腹青黯腫脹痛不能

忍太平州湯三益翰林傳

生白礬末須看所咬瘡口大小然後抄

礬末於刀頭上鎔令沸乘沸滴在瘡口

上隨手痛止若腹中毒氣未退依前點

腫即取草决明葉兩握研取自然汁以

熱酒侵下却將滓貼瘡口上較帛輕手

繫之

治鼻衄不可止欲絕者

右茅花無即以根代每服一大把剉水

兩椀煎濃汁一椀分二服沈存中云林

次中御史在楚州嘗訪一故人久之不

出或問之云子婦衄血垂盡方救視未

及延客坐中一客云適有藥急令掇茅

花一大把煎濃汁一椀帶囊中取小紅

圓二粒令茅花湯吞下一服即差而不

言其方後有人聞之曰此止是茅花之

功耳試復問之其人大笑曰誠如此紅

圓乃含香硃砂圓恐不信茅花之功以

此為記耳存中在廊延時一將官卒病

衄甚困以此療之即差又徐德占教衄

者急灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯

立寢蓋血自此入腦注鼻中常人以線

勒頸後尚可止衄此灸决効無疑

治諸衄

以木炭皮為細末研令極細如無炭皮

堅炭亦可粥飲調下二錢日四五服以

鯁下為度此法人家皆有沈存中云在

漢東乃目覩其神有劉晦士人隣家一

兒誤吞一錢以此飲之下一物如大烏梅剖之乃炭裏一錢也池州徐使君極寶此方數數用之未有不効者近歲累有人言得此方之効不復悉載

治盜汗

當歸 半兩去蘆細切

人參 半兩

猪心 一箇作者細切

右以猪心分四片用一煨水三盞煎一

盞半作二服

一方當歸人參各一兩雄猪心半箇細切五盞水煎三盞去滓兩服

龍鬚散治中暑迷悶不省人事暑月代一切暑藥 子暑月常合此藥以飲從者

甘草 一兩炙

烏梅 一兩去仁瓦上焙乾

白礬 半兩生研

五倍子 一兩揀

右為細末入白麵四兩同和勻每服一大錢新水調下如泄瀉霍亂作渴一服即愈雖平日不敢飲冷者以冷水服藥

不妨 世傳仁廟所賜近臣方

治風牙疼

華陰細辛

多年石灰

右二味等分為末每用少許指牙瀝去涎溫水灌漱立止

治蛀牙疼

巴豆不以多少去殼麩裏煨熟去麩粟米餅同巴豆研為圓如蘿蔔子大每用一二粒綿裹安於蛀孔內仍睡少時覺不疼去之

治風牙蛀牙一切疼痛

每用藥止用一米大仍以連帶貼之

巴豆 一大箇去大皮

豆豉 七箇

大蒜頭 一箇去頭并去薄皮

右作一處研極爛圓作一團用油紙裹每遇牙疼至臥時先以溫水漱口次以針微剔所痛之處以藥實之明日復以水漱灌即愈

治五種牙疼不蛀破處者

細辛

乾薑

川烏

草烏

華撥

吳茱萸 各半兩

茵草

木律 一分

右為細末先用鹽湯蘸濕手點藥指牙

候良久藥力敗用溫水灌漱齒痛即止

治風蛀牙如虫蛀破者

乳香 一錢

巴豆 三粒紙裹
歷去油

右火上鎔乳香成汁用巴豆不住攪和

候冷取出圓成膏子酌量牙齒竅穴大

小將燈上炙旋圓納於穴中痛即止

治牙搖牙宣

湯致遠
知院傳

藁草根

一名香
附草

右去皮細切用生薑汁浸一夕次日曝

乾照為末用之

治暴嗽不止或失聲者

饒州上
官醫傳

款冬花

去枝杖細剉
培乾為細末

右用生蜜搜和作餅子貯火香爐中如

裝香然安藥在火上令病人開口喻煙

米飲吞下臨臥時

子頃年感紹興趙判宗云先
以款冬花燒煙却

用小竹單單之止露一數承
之以口凡三兩次嗽即止

治惡瘡久不較諸藥無効

白鱈魚頭 乾者

右燒為細末用輕粉調塗

治冷漏 行在鄭春
大夫傳

蟻娘虫 化蟬者

右用三兩枚於瓦上炒成灰乾搽瘡口

治喉閉

南鳩砂 一錢

青黛 一錢

甘草 半錢

白僵蚕 二錢

右為細末用腦子少許研和乾搽喉間

即愈

治咽喉腫痛

白礬 飛過

甘草 各半兩

右為細末乾搽喉中徐徐吞下

治凍死 北方九過傷風感寒之人亦用此法家令汗出乃愈

舊薦

右用薦束凍死者其中滾轉不絕手自

然和氣相續即愈

治暈死

泥漿

右於行路中旋以刀器掘開一穴入水其中擣之却取爛漿以飲死者即愈

治溺死

予在鄱陽嘗有溺水者身僵氣絕用此法治之即甦

乾壁泥

右先打壁泥一堵置之地土却以死者仰臥其上更以壁土覆之止露口眼自

然水氣翕入泥中其人遂甦

治火燒湯潑

醋

右以酸者用手擦地上泥塗之

治湯火瘡

釜鑊下黑塵

右以水爛研入蜜及油調傅立愈

治嵌甲

青蠅

四十九枚

麝香

百文

右取蠅折去兩翼不用以其餘熬乾入

麝為末或急用則取蠅置懷中候乾搽

之或瘡乾即入油調傅

又一方用蠅半一枚攪攪一枚燒存性同為

末入膩粉黃丹油調傳然不若此方為妙

治小腸氣

舶上茴香 一斤

右用生薑四兩研碎併滓汁拌和茴香過一宿熬焙乾為細末次用青鹽二兩

別碾入藥酒糊為圓如梧桐子大每服

三五十圓鹽湯或溫酒下空心食前郭

廷圭知縣云舊苦此疾歲不下五七發

服藥一料病根遂除今已十五六年不作

洪氏集驗卷第四

洪氏集驗方卷第五 婦人小兒

治婦人產後百病烏金散 饒州彭氏傳有歌卷十八篇文多不載

烏	金	散
子其頭	去底入藥	燒時以婦人
却用瓦子	好紙筋鹽泥	之用一籃依此
赤取藏瓶	放冷打開	藥

血餘 半兩依前法燒之 鯉魚皮 一兩依前法燒之

沒藥 半兩 紅花 一分生用

伏龍肝 一分竈下取燒赤者土是 凌霄花 半兩色鮮者焙使

好香墨 半兩生用 乾栢木 一分細研入香好者可使

當歸 半兩去梢土微炒令香用之

右件九味並細為末產後母子熱疾後胎死在腹難產生衣不下血暈起坐不得如見異花口乾心悶乍寒乍熱四肢浮腫言語顛狂見神見鬼不語瀉痢腰膝疼痛小腸尿血澁痛崩中嘔逆不安咳嗽涕唾喉中如猫作聲面色遍身黑赤點生眼澁腰腫身發筋急應是一切產後諸疾皆治以酒一盞煎取八分

調藥兩錢空心頻服之用無灰酒大妙催生如聖散

黃蜀葵花

右一味焙乾為細末每服二錢熟湯放溫調下神妙或有漏血胎臍乾澁難產痛劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下如無花只用黃蜀葵子爛研小半盞以酒調濾去滓溫飲尤佳 予家常驗人甚

萬靈圓治婦人月水湛濁不通久無嗣息血癖氣痛四肢浮腫嘔逆心疼虛煩勞悶面色痿黃崩漏帶下寒熱蒸勞頭疼齒痛血下無度淋瀝諸疾產前安胎臨產催生產後胎結痛傷寒煩渴瀉痢血勞血運筋攣痰盛頭疼敗血上衝血刺泄瀉咳嗽喘急嗽血血塊起伏氣痞氣膈血作腰痛小便不禁子死腹中失蓋汗不出血風脚手痺頑凡產後諸疾皆治

牡丹皮 洗 川藁本 洗

川當歸 切開裏面赤 黑色者佳洗 白茯苓 去皮

赤石脂 別研 香白芷

官桂 去皮不見火 白薇 洗

京芎 洗 懸胡索 去皮

白芍藥 白朮 米泔浸一宿 已上各一兩

甘草 沉香 不見火

沒藥 別研 已上各半兩

右件藥材皆用溫水洗淨杵羅為末煉

蜜圓彈子大每服一粒或半粒空心溫

酒化下凡妊娠臨月服此五六粒產時

無痛如久無子服二十粒當月有子并

治積年血風半身不遂種種血疾不問

年深皆可療神効不可具述

烏金散治血崩漏下最治產後血崩并小

產血崩漏下

櫻攔皮 烏梅

乾薑 燒灰存性 三味各等分

右研細每服二大錢煎烏梅湯調溫服

不以時

救生散治急喉閉產前產後有此疾皆可服之

白殭蚕 半兩去絲 劉略炒 甘草 生一錢重

右二味各取末秤和勻每服一錢匕以

生薑汁調藥令稠灌下便急以溫茶清

衝下

治妊娠忽然下血腰痛不可忍

鹿角 一兩 劉 當歸 一兩 劉

右二味作一服以水二盞煎至一盞去

滓溫服食前

治婦人產後因驚或怒傷肝或憂氣逆中

皖或坐草風入子藏遂成顛狂或成中風

不語角弓痠張狂走歌唱不常

荆芥穗 原上 焙乾

右為細末每服二大錢熱米飲調下酒

亦得用之如神

催生藥

香白芷

百草霜

右等分為末用童子小便却入酒醋少

許沸湯調下甚有神驗

滑胎易產神効八味散

一名如意散已下四方
太平州郭師顯駐油傳

甘草

二兩

黃芩

大豆黃卷

乾薑

吳茱萸

麻子仁

太麥蘖

炒

上各四兩

桂心

三分

右為末酒服方寸匕湯飲亦得空心食

前須入月方得服過三十日動作宜謹

勿上廁恐不覺墮地如此之易也

治產後虛眩不能支持兩脇當臍急痛氣

上衝前後相引痛治之如神羊肉湯

精羊肉

切四兩

當歸

切半兩

川芎

剉半兩

生薑

切一兩

右以水十盞煎至三盞掠上沫去滓分

四服空心熱服一日服盡來日再合兩

日滓併一日煎之當一劑服

產後防暈方

舊漆器

右不以多少烈火燒煙薰鼻中即醒

治產後大便不通

緣亡血過多腸間乾燥甚至旬日已上

腹脹急痛悶冒氣喘神昏力弱欲攻之

則必致危殆不攻則無緣得利郭醫云

嘗用古方蜜導法即時得下且無所損

真活人之法其方雖見仲景傷寒論而

產家不載最為緊要

順經散治小兒十餘歲因驚之後心氣不

行小府淋瀝日及三十餘次漸覺黃瘦宜

服此劑主之

高逢辰制幹傳

韭子

湯浸退取白仁乾秤一兩

益智子

取仁鹽炒過半兩

琥珀

半兩令研

石葦

去毛土一錢

白茯苓

三分

狗脊

燼去毛淨半兩

石鷲子

火煨醋炒出火毒令研極細半兩

右七味為末和勻每服一錢用韭菜白煎湯調下空心食前各一服日午一服尤妙予叢姪十餘歲時嘗遊慧山歸已昏暮遇一巨人醉卧寺門驚悸得疾自是之後一日便溺五六十度醫治數月不能効遂以病證扣高逢辰即援筆授此方服藥未幾日減一日初則三二十度最後十數度凡服兩料而愈九寶飲治小兒困傷寒邪不曾解利致成

遠年嗽兼海上喘氣嗽不得睡常州頓助教傳

紫蘇葉 一兩 婆苛葉 一兩

麻黃 一兩去節 大復皮 一兩

肉桂 半兩 甘草 半兩

杏仁 半兩麩炒 桑白皮 半兩

陳橘皮 半兩穰者去

右件為鹿末令將杏仁研極細將諸藥同和勻每服半錢水半盞烏梅半枚生薑一片同煎三分半食後去滓溫服臨

睡亦得忌酒腥之物

治小兒泄瀉

金液丹青州白圓子

右以二藥等分細研用麩糊圓如黍米大每服五十圓米飲下臨安節推章謚靜之云渠有小兒自五月患臟腑至七月不止遂作慢驚候以此藥投一服徐用少粥壓之即愈再服六七服遂無事

錢氏小兒方亦載此

肥兒圓外舅朱臨江傳

川黃連 蕪荑仁

神麩炒 大麥孽炒

右四味等分為細末用獺猪膽為圓如

小菘豆大每服三十圓加至五十圓食

後熟水吞下此方乃李文定丞相家訪海鹽祝奉為常寧時女子失姪極黃瘦丞相孫維翰

來訪為傳此方自云其家得此藥小方脈未盡登門女子自服此藥十日間取下疳虫僅萬餘自此日益頑壯須小兒可服藥即與之孟正云秦相家盡服此藥但加蘿蔔子一味

神麩豆菘圓治小兒疳氣羸弱臟腑虛怯

及滑泄不止飲食減少腹脹寒熱面黃肌瘦引飲無度 劉大用家傳神効

神麴 半兩 炒 肉豆蔻 三枚 麩

麥蘖 半兩 炒 宣連 半兩 去麩

史君子 十四枚 去殼 無萸仁 一分

蘆薈 一分 合研

右為細末用猪膽汁浸麴作糊為圓如

黍米大每服二十圓飯飲吞下空心服

木香分氣圓治小兒脾胃虛弱飲食過傷

積滯內停或多吐逆胃膈不快面黃腹急

下利無度

香附子 水浸一宿搗去黑皮令淨飯上蒸過一次焙乾秤二兩

南木香 一錢 麩 縮砂 一分 去殼

甘草 半兩 炙 京三稜 半兩 濕紙裹煨熟切焙

薑黃 半兩 米泔水浸一宿切焙

右為末用白麴糊為圓如黍米大每服

二十圓飯飲吞下溫熱水亦得食後服

助胃膏助小兒胃氣思食止渴常服甚妙

饒州張果助教傳

人參 白朮

甘草 茴香 各半

乾山藥 一兩 檀香 一兩

烏梅肉 半兩 白豆蔻仁 半兩

縮砂仁 半兩 乾木瓜 一兩

右為細末煉蜜為膏空心如皂子大每

服一圓嚼服或溫水吞下

治小兒麻豆瘡子已出太盛發潰膿水黏

衣者席不能轉動疼痛濕爛傳之便乾更

不成癩痕方

右用牛糞不以多少曬乾火煨成灰取

心中白者研令極細如用蛤粉相似用

綿撲撲有瘡處不以時候一方用烏牛

糞一方用黃牛糞 出幼幼新書一名白龍散此方用之有驗

辰砂安驚圓理風熱涎盛身體拘急睡中

不穩鎮心 已下三方張采助教傳

天麻 一分 川芎 二錢

防風 半兩洗去蘆頭

甘草 一兩炙

白附子 一分

人參 半兩洗

茯苓 半兩

朱砂 二錢一分八藥一半為衣

右細末煉蜜為圓如鷄頭大每一圓至

兩圓用薄荷荊芥煎湯化下

羌活膏散風熱化痰安驚

羌活 半兩

荊芥穗 半兩

白朮 二錢

甘草 半兩

白附子 二錢

桔梗 去蘆頭洗半兩

白茯苓 二錢

川芎 二錢

防風 二錢去蘆頭

朱砂 二錢一分八藥一半為衣

右細末煉蜜為圓如皂皂子大每服一

圓至兩圓用薄荷湯化下如涎盛加臈

茶湯下

大天南星圓治小兒急慢驚風涎潮發搐

目睛上視口眼相引牙關緊急背脊強直

精神昏塞連日不省

滴乳香 研

龍腦 研

牛黃 研各半錢

朱砂 研三錢

麝香 研一錢半

天麻

人參

防風 各一分去蘆頭

天南星 黃牛膽汁製半兩

乾蝎 十四箇湯浸洗去腹內土微炒

右細末煉蜜為圓如大鷄頭大每服一

圓荊芥薄荷湯化下

治喉中小兒臍風撮口法

右視小兒上下斷斷當口中心處若有

白色如紅豆大此病發之候也急以指

爪正當中掐之自外達內掐令血微血

出亦不妨又於白處兩盡頭亦依此掐

令內外斷 只掐令氣脈斷不必破肉指爪勿令大銛恐傷兒甚 沈存中云

為河北察訪使日到趙郡有老人來獻

此法云篤老惜此法將不傳願以濟人

詢之趙人云此翁生平手救千餘兒矣

環數邑之人皆就此翁治兒應手而愈

沒石子圓治小兒吐瀉臟腑不禁 上官醫傳

黃連 鷹爪者炒

訶子 炮去核

肉豆蔻

炮 麩裹

木香

炮

沒石子

炮

右各料一錢為細末粟米飯為圓如菜

豆大米飲三十圓

誤吞珠銅鐵而哽者方

燒弩銅牙令赤內酒中飲之立愈

誤吞錢方

擣火炭末服方寸匕則出

誤吞釘及箭金針鐵等物方

多食肥羊肉脂及諸肥肉自裹出

封額

天南星

一箇極大者

右以慢火炮裂去皮臍入華陰細辛三

錢同杵為末入麝香少許用米醋調塗

緋帛貼在額上以乾為度

治小兒

吐 宗人子與 寺丞傳

赤麩

半兩

藿香葉

半兩

丁香

一分不見火如熱 吐即減丁香之半

肉豆蔻

一箇麩 裹炮

右為細末每服一錢大段小者半錢煎

香楠木湯調下楠木定驚止吐神妙不

可

治小兒誤食穀芒

鵝

右將鵝倒瀝涎盛半蛤蚧令小兒飲之

穀芒即下

消風散治小兒一切口瘡并重舌鵝口

已下五方倍州 蔡敏齋勸教傳

鵬砂

一錢

朱砂

一字

雄黃

一錢

甘草末

一字

腦子

一字

右研細和勻少許傳之吞嚥不妨

雄朱散治小兒顛額裏外腫核

石膏

二錢

雄黃

二錢

牙消

一錢

天竺黃

二錢

甘草末

一錢

腦子

半字

右研細和勻傳之裏核喫不妨外核用

蔞苛汁調塗繳口新水調亦得

金華散治小兒一切瘡瘍

黃皮 去蘆皮半兩多焦

黃連 半兩

海漂消 三錢

五倍子 三錢

輕粉 一分研入

右為細末和勻瘡乾用油調傳濕時乾

傳

如聖散治小兒一切頭瘡

松脂 半兩研

輕粉 半兩

右件和勻油調傳之

急風散治小兒喉閉咽痛

青膽礬 成片好者

每用少許研細新水調少許嚥之吐痰

為妙大人亦治

墜涎圓治咳嗽化痰 已下二方張果助教傳皆補神驗

天南星 去皮臍生用半兩

白附子 瀝去皮半兩

川烏尖 去皮臍生用一分

白殭蚕 洗淨直者一分

白礬 枯一分

半夏 洗淨生用一兩

右為細末用薑汁糊為圓如小菜豆大

每服二十圓用生薑蔞苛泡湯吞下

辰砂圓治咳嗽安驚化痰

辰砂 研一半為藥 白礬 枯半兩

天南星 去皮臍切片子并兩用薑水煮熟乾一兩

大半夏 湯浸七次用生薑自然汁作餅子炙一兩半

白附子 去皮炮半兩

右為細末用糯米粉煮糊為圓如小菜

豆大每服二十圓用膳茶蔞苛湯吞下

西君子圓治脾虛受食不化停積中脘

吐逆惡心臟腑泄瀉常服消化食滯進美

飲食厚腸胃充肌體悅顏色退黃 養州藥助

已下三藥子家常合甚効

縮砂仁 烏梅肉 焙乾

陳橘皮 去穰取仁 呵子 紙裹煨去核取皮用

右各一兩為末煮好大棗取肉為圓如

麻子大每服三十圓至五十圓棗湯熟

水任下無時

肥兒圓

已下上方藥比前方肥兒丸多苦葶一味比次方神采助教傳 麵豆冠丸少內苦葶使君子二味大抵皆好

黃連炒

燕薹仁炒

神麴炒

麥蘗炒

蘆薈各等分 細研已上

右為細末積猪膽汁調麵糊為圓小葉

豆大每服十五圓至二十圓飢飲吞下

觀音散理脾胃不和氣弱昏倦多困不思

食

白朮一分

人參一分

甘草一分

乾葛一分

藿香葉一分

白扁豆三錢

茯苓三錢

櫻粟子三錢

綿黃耆一分

木香一分

右為細末每服二錢用生薑棗子紫蘇


煎湯調下不計時日進三服

洪氏集驗方卷第五

右集驗方五卷皆予平生用之有著驗
或雖未及用而傳聞之審者刻之姑孰
與衆共之乾道庚寅十二月十日番陽
洪連書

賢人留意濟斯民
未捨勤猶訪醫治
因官貴陸心身延知後
遠想見當年德業新
貧仍懶墮不能望見
洪公當宋盛時為待
宰相其官貴為何也
志救民之病

原缺



余素不諳醫而喜蓄醫書非真好醫書也好醫書之為宋元舊刻者今茲六月中有揚州書友來告余云有宋板太醫集業四冊欲售余屬其携來久而未至聞已售于他姓亦不甚惜之因向來各家書目未載即舊藏書家亦俱不知或疑是書未必真宋板後閱陸其清佳趣堂書目載是書云文淵閣藏本有楊南峯鄒臣虎二跋方悔前此不之買而已弗可追矣適余友陶琅軒從都中寄此宋板洪氏集驗方二本至乃欣然以為聊厭我欲蓋此宋板醫書亦罕罕有見有季氏圖書隨檢送今宋板上言目知即係是書卷後八行墨跡季氏云鮮于樞詩跋諒必有本而云然百世行之已下定有脫文想滄葦收藏時必未遺失故知之詳也至于板刻年月載之甚詳宋刻固無疑義而余舊藏傷寒要旨与此同出一手黃憲毛用刻工姓名可致而證刊刻之地固是始孰刊刻之時固是乾道唯辛卯差後庚寅一年尔二書之分不知幾時二書之合又在一地豈非奇之又奇即餘言詳彼書跋語中茲得特誌得書之由并誌余所以考證是書者如此 甲子十一月 堯翁黃丕烈識



頃在揚州郡齋借到太醫集業尋覽之餘見板口有三因字遂取三因板一病證方論互勘知即刻於其殘本為之耳太醫集業者第一卷一條並無別有此書也佳趣堂書目亦云誤歸明堯翁出示是跋等以證之為記於後他年倘仍收歸必相告一笑 嘉慶己丑八月 桐城張慶芳書

魏氏家藏方序

弘前醫學堂
江氏藏書記



人受天地沖融之氣以生莫不予之以上馬者之壽然鳧鶴之不能皆齊者非天之降年爾殊也七情盡於內六淫寇其外於是乎疾生焉夫一疾有一證一證有一方善醫者雖復察脈審色洞知其因方苟未良何所施巧此簡冊之在天下最不厭其博且多者莫方書若也峴自問仕呂來垂四十稔媿無秋豪之善足以活民又以素弱多病百藥備嘗因撫先大父文節公先人刑部所錄及峴躬試而教者得方九千五十有一釐爲四十

一門一十卷集成一書目曰魏氏家藏不敢自竒用鈔諸梓以廣其傳雖復所藏非富未足以盡療世人之疾或者採而用之有所全活則庶幾區區之心不得於彼而得於此耳雖然康節先生之詩曰與其病後能求藥不若病前能自防又曰用藥似交兵兵交豈有寧善養生者常致意於金石草木之先使性不爲情所流主不爲客所感各全其上馬者之壽則是編也譬諸武事蓄而弗試斯善矣是又書外之意尤卷又於世之人云寶慶丁亥中和節碧溪魏峴序

魏氏家藏方目錄

卷第一

中風

- 大藥紫金丹
- 靈龍丹
- 大祛風丹
- 七星圓
- 消鬱圓
- 神感圓
- 黃圓子
- 黑神圓
- 油炒烏頭圓
- 追風圓
- 醒風湯
- 木香附子湯
- 七聖散
- 驅風散
- 治風痺方訣
- 治中風
- 治暗風
- 神保丹
- 七生丹
- 二烏圓
- 川烏靈脂圓
- 何首烏圓 二方
- 祛風大圓
- 加味白圓子
- 虎骨養筋圓
- 通痺圓
- 省風湯 二方
- 延齡湯
- 一呷散
- 舒筋保安散
- 酸棗仁散
- 追風餅
- 治卒中風
- 治風搐口喎

第二卷

一切氣

- 五獸飲子
- 生熟飲
- 治久瘧
- 薑橘飲
- 勝瘧飲 二方
- 神僊感應丹
- 沈魏丹
- 勝七香圓
- 分氣圓 二方
- 撞氣圓
- 朱附圓
- 五膈要圓
- 大溫白圓
- 經進丁香調氣湯
- 經進清中湯
- 正真湯
- 清氣散
- 葶澄茄散
- 拈痛散
- 心氣
- 神僊備急丹
- 沈香煎圓
- 小塌氣圓
- 拈痛圓
- 十香圓
- 橘杏圓
- 橘皮茯苓圓
- 阿魏圓
- 經進過院湯
- 六乙湯
- 四柱散
- 塌氣散
- 沈香散
- 大紫蘇飲

中風服藥次第法

頭風頭痛

南嶽草靈丹

金花一聖散

天雄散

石膏散

治一切頭風

傷寒

十勸

來蘇散

普救散

伏暑

酒蒸黃連圓

香薷湯

冰雪飲子

癘疾

雙聖丹 二方

三倍湯

加料平胃散

立效散

附子細辛湯

茶調散

香芍散

聖餅子 四方

防風散

至聖散

普濟散

黃龍圓

快脾飲

冲和湯

人參散

驅瘧散

二香飲子

辰砂秘真丹

養心丹

九僊丹

朱砂琥珀圓

朱附圓

補心圓

補心湯 二方

金鎖散

治腎氣

立神丹

木香定痛圓

受拜茴香圓

全蠍圓 二方

香礪圓

追痛圓

神應散

沈香散

立効散

百兩金

淋洗法

益心丹

補心丹

生血丹

八物定志圓

遠志圓

茯神酸棗仁湯

辰砂寧心散

金鈴子圓 三方

五香圓

萊菔內消圓

蠍稍圓 二方

胡椒圓

消腎脫鉗圓

火墜散

全蠍散

真珠散

黃仙餅子

治腎氣飛法

疝氣傳藥
痰飲

- | | |
|-------|-------|
| 上清丹 | 南華丹 |
| 羽澤圓 | 青金圓 |
| 平胃圓 | 四倍圓 |
| 消飲圓 | 滌痰圓 |
| 刷痰圓 | 導痰圓 |
| 化痰消飲圓 | 溫白圓 |
| 透扇圓 | 決壅破飲圓 |
| 倍薑半夏圓 | 萊枳圓 |
| 萊萸半夏圓 | 橘皮茯苓圓 |
| 桔梗圓 | 半夏圓 |
| 天南星圓 | 生薑橘皮圓 |
| 白礬圓 | 半夏圓 |
| 香橘圓 | 痰嗽圓 |
| 橘苓圓 | 丁香半夏湯 |
| 萊萸半夏湯 | 豁痰湯 |
| 鍾乳生附湯 | 附子細辛湯 |
| 附子陞降湯 | 橘皮枳實湯 |
| 平肺湯 | 除飲湯 |

第三卷

補益

- | | |
|--------|--------|
| 殊勝湯 | 清涎湯 |
| 鐵刷湯 | 五聖湯 |
| 星附定暈湯 | 刷痰湯 |
| 獨薑湯 | 欬氣散 |
| 參朮散 | 八寶飲 |
| 參訶飲 | 丁香導痰飲 |
| 僊方小延齡丹 | 伏火靈砂丹 |
| 煉陰丹 | 紫丹 |
| 伏火白丹 | 白丹 |
| 三陽丹 | 神仙養氣丹 |
| 養氣丹 | 養氣丹 |
| 聚仙丹 | 潤補小聚仙丹 |
| 鹿茸補髓丹 | 麋酥丹 |
| 神仙聖寶丹 | 入藥神丹 |
| 谷神丹 | 妙仙丹 |
| 草靈丹 | 茸臍靈砂丹 |
| 龍虎肉丹 | 勝灸丹 一方 |
| 沈香益真丹 | 茸朱丹 |

羊腎丹	仙方伏火硫黃丹
三建伏陽丹	肉丹
既濟丹	玄兔丹
神仙修真丹	鹿茸圓 <small>五方</small>
梅茸圓	麋茸圓 <small>二方</small>
鹿角霜圓	斑龍圓
三雄圓	四補圓
增益八味圓	神仙戴寧右九龍圓
十補圓	長生久視圓
韭子圓	固氣圓
煮附圓	茸附圓
世寶圓	沈香十補圓
秋石圓 <small>二方</small>	膻臍圓
仙茅圓 <small>三方</small>	白仙茅圓
黑白圓	大聖補中圓
補骨脂圓	地黃圓
羊肉圓	腎髓圓
安腎圓	金銀圓
雙芝圓	耆絲圓
青鹽圓	百花圓

大馬劉家胡盧巴圓
第四卷

補益

沈附湯	鹿茸湯 <small>二方</small>
茸附湯 <small>二方</small>	羊肉湯
小補髓湯	龍虎湯
加減十全湯	補氣湯
附子降氣湯	黃耆散
大附散	沈香歸附散
龍虎飲	附子鹿角煎
鹿茸地黃煎	補益延壽膏
沈附膏	椒黃酒
煮鹿角膠法	服秋石法
製附子調服法	羊腎羹
羊腎粥	附子麪
虛勞	
山藥圓	栢子仁圓
十八味黃耆建中湯	
二十四味大建中湯	
木香黃耆湯	當歸黃耆湯

大補黃耆湯

參耆鱉甲散

猪骨散

無名散

菴蓉散

如意散

天仙藤散

白芍藥散

人參散

大正氣散

自汗

附子大建中湯

耆附湯

延年斷汗湯

斷汗湯

茯苓散

治虛汗盜汗

治盜汗

治盜汗

撲汗

白濁

玉鎖丹

金鎖丹

固真丹

勝金圓

秘精圓

三白圓

縮泉圓

固睥圓

雙白圓

非子圓

茯苓圓

固精圓

茴香圓

龍骨圓

鎮心圓

奪命圓

第五卷

脾胃

金鎖正元丹

消穀丹

衛經丹

不老圓

加減理中圓

加味火輪圓

棗肉豆蔻圓

椒朴圓 三方

煮朴圓

椒附香朴圓

朴附圓

養脾圓

建脾圓

萊菔健脾圓

快脾圓

補脾圓

補胃圓

固胃圓

生氣養胃圓

丁香開胃圓

益胃圓

溫胃圓

人參大溫中圓

麴蘖二薑圓

消穀圓

加減千金思食圓

木香神麴圓

訶梨勒圓

葶澄茄圓

蘇橘大圓

小建中圓

小薑香圓

三稜圓

料物圓

替飯圓

快膈圓

太倉圓	亦附圓
訶附圓	沈香圓
丁沈圓	己寒圓
棗肉圓	快兒圓
穀神圓	消食圓
丁豆圓	青鹽圓
木香分氣圓	沈香養脾湯
草菓養脾湯	丁香快脾湯
附子燥脾湯	清脾湯
醒脾湯	藿香養胃湯
加減四君子湯	大固腸湯
胃愛湯	三和湯
十正湯	飭虎湯
豆蔻湯	壯脾湯
雄附湯	鱗豸湯
鍾乳建脾散	增損平胃散
生氣散	厚朴豆蔻散
人參藿香散	沈香金粟散
四和丁香散	人參丁香煮散
正氣煮散	草豆蔻散

第六卷

木香煮散	雙棗散
沈香散	五香散
薑附散	橘紅散
清膈散	清脾飲子
三豆蔻飲子	快中飲子
翻胃	順胃散
附子散	
如聖餅子	
心脾疼	
靈脂圓	大效妙應圓
止痛圓	檳菜圓
礞附圓	沈香圓
大溫白圓	失笑散
通中散	二珍散
香附子散	
心腎	
既濟補真丹	神仙既濟丹
煮砂丹	坎離丹
救生丹	小補心丹

三方

至效十精丹

還少丹

中虛丹

固真丹

靈砂寧神圓

赤石脂圓

破故紙圓

脛肭臍圓

琥珀圓

既濟圓

五子圓

仙茅圓

返精圓

坎離圓

養肝圓

沈香附子湯

黃耆栢子仁散

虎骨酒

脾腎

加減大橘皮煎圓

法製厚朴圓

補骨脂圓

胡蘆巴圓

朴附圓

薑香圓

三妙圓

椒蠟圓

愈痛圓

正氣散

卷第七

瀉痢

太素神丹

保壽丹

煮附丹

火毒丹

大臍丹

養臍丹

內灸丹

固陽圓

暖下圓

暖臍圓

厚腸圓

二方

固腸圓

二方

補真斷下圓

煮朴圓

朴附圓

二方

酒煮黃連圓

香蓮圓

二方

薑連圓

蒜連圓

連朴圓

木香圓

艾麥圓

厚胃圓

赤圓子

峻補圓

烏紫金圓

養真圓

補中圓

香茸圓

杏霜圓

如聖圓

三建圓

神應乳香圓

肉附圓

椒附圓

韭附圓

肥腸圓

猪肚煎圓

水煮青鹽圓

育腸湯

萬安湯

調中湯

四味茯苓湯

櫻榆湯

櫻栗湯

六物湯

圓通大聖散

如神湯

神應散

木香散

人參散

豆蔻散

栝子散

二宜散

香櫻散

白石脂散

赤石脂散

三磨散

抵聖散

丁香散

固腸飲

炙肝散

生氣散

薑香散

如聖飲

御米飲

痔漏

先君刑部所藏五痔方

水澄膏

枯藥

荆芥湯

潤腸圓

龍石散

雙金散

國老湯

固榮丹

烏玉圓

朴藥圓

木鼈散

木槿散

必應散

落痔膏

治痔疾

痔藥

洗痔方

治大便下血

烏金圓

二方

黃連圓

梅茸圓

二方

蒲藕圓

獨連圓

二薑圓

艾附湯

歸附湯

沈香湯

神授散

越桃散

栝芷散

木香呵子散

二灰散

妙應散

山梔散

練根散

治大便下血

腸風臟毒

金烏圓

倍槐圓

硫附鹽礬圓

神應圓

梅茸圓

黃連圓

小豆圓

巨勝七寶圓

地黃圓

枳殼圓

枳巴圓

妙應圓

槐花湯

膠薑理中湯

薑香散

梅薑散

茶調香附散

燒梅散

治腸風下血 二方

治腸風

治臟毒下血 二方

治便血

大小便不通

乳珠圓

嬰麥圓

參訶散

霹靂煎

大便秘澀 二方

卷第八

脚氣

活絡丹

神仙輕脚圓

思仙續斷圓

木瓜圓

椒龍圓

葶藶圓

香犀圓

異方黃耆圓

補洩防勞圓

奇應輕脚圓

乳香木瓜圓

薏苡仁圓

萊菔木瓜圓

常服木瓜圓

換腿圓

除濕圓

牛膝木瓜圓 二方

牛膝木瓜圓

乳香沒藥圓

栢子仁圓

鹿茸四斤圓

舒筋圓

神功異寶圓

四蒸圓

五香蠲痛圓

七宣圓

輕脚圓

除濕巡經圓

煨腎圓

承氣輕精圓

趁痛圓

蠲節圓

補瀉圓

神方脚氣圓

神效木瓜湯

五倍湯

左經湯

蠲痺湯

六半湯

沙節湯

雙和湯

萊菔湯

小風引湯

半夏湯

逐毒湯

御府松節湯

五痺湯

蠲痛湯

順氣散

虎骨散

烏藥散

芎桂散

七聖散

續斷散

檳榔散

舒筋散

治脚氣淋溼藥

附子除濕酒

虎骨酒

治大腿骨內痛熨酒

沈香飲子

木香飲子

三建登仙酒

腰痛

磨腰丹

定痛圓

補髓青娥圓

神效定痛圓

倍力圓

神仙青娥圓

川韭圓

左經圓

宣經圓

勝金圓

憎愛圓

巴戟散

追痛散

神金散

卷第九

痲渴

水葫蘆圓

清中圓

清心圓

滋渴湯

加料樂令黃芪湯

竹龍散

解渴飲子

吐血

蒲黃散

靈脂散 七方

治咯血

六乙散

血妄行

應聖圓

黑聖散

順氣散

固經散 二方

止血散 二方

治血妄行吐血

鼻衄

神功散 四方

水腫

通氣圓

餘糧白朮圓

橘薑圓

內消圓

狼毒圓

椒巴圓

沉香散

羌活散

快氣消塊散

治水氣

淋瀝

筋灰散

瞿麥散 二方

木通散

治冷淋

小便閉澀

八味圓

積滯

軟紅圓

皂角圓

丁香內化圓

眼目

清明丹

八味圓

兔絲子圓

夜光圓

升麻細辛湯

竹葉湯

還睛圓

生地黄煎

大牢牙散

堅牙散

菊花散

治目疾

失笑散

立應散

治兩目清盲

七奇湯

玉地散

青鹽散

三神湯

治眼赤疼

全蠍散

香芥散

聖效散

治暴赤眼

灸皂散

養源散

治赤眼 二方

治爛眦風眼

烏石散

薑黃散

羗活膏

金線膏

香椒散

內補散

點眼方 二方

五龍膏

五倍子散

黃蘗散

一輪雪

治障眼

殊聖散

臙脂散

治爛弦風眼

治乍赤眼

芫花散

赤荆散

治眼白赤

燒茄散

治牙疼

耳疾

治風虫牙疼

治風牙腫痛 二方

穿珠圓

紅綿散

發背癰疽

治耳聾

治耳聾多年不聽者

猪蹄湯

加減香連湯

治耳鳴 二方

治聾

立效木香散

破膿炬神散

牙齒

大托裏散

黃芩散 二方

異香丹 二方

紅娘圓

清涼膏

揭毒膏

香烏圓

拈痛圓

生肌藥

收瘡口藥

鶴膝湯

蒼耳湯

三羊散

治軟癬

抵聖散
梨蘆粉
六物散
積熱喉閉舌腫口瘡
白欵散
鹿香散

甘草圓
清扇圓
王礬湯
吹喉散
回生散
追涎散

青礬散
開咽喉捷法
酒煮礬
玉筋硝

白蠟蠶散 二方
立應散
碧雲散
馬啣湯

硝石散
寬咽酒
玉筋硝

第十卷

婦人

拱辰丹
全生丹

真人積德圓
艾茸圓

地黃鹿茸圓
鹿茸圓

紫石英圓
兔絲子圓

黃耆除熱圓
紫靈圓

當歸圓
艾煎圓
靈脂圓
十補圓
安經圓
琥珀圓
龍骨圓
千味養榮湯
浴絡湯
中嶽湯
佛手散
安宮散
參訶散
推陳散
鹿角散
卷栢散
化榮散
三龍散
草麻膏
治婦人經候淋瀝不斷

勝金圓 二方
澤蘭圓
三香圓
滋養圓
內灸圓
追氣圓
陽起石圓
十三味當歸補虛湯
羊肉湯
琥珀衛生散
救脫散
半夏散
地黃散
麝香散
獨芎散
欵經散
赤豆散
消毒膏
靈脂酒

紫靈圓

催生

小兒諸疾

斬邪丹

扁金丹

太一丹

溫胃丹

安神圓

牛黃圓

青龍圓 二方

龍腦青金圓

鎮驚圓

肥兒圓

鼈血煎圓

連胡圓

木香圓

木香分氣圓

萊菔圓

四君子圓

消乳痰圓

白朮半夏圓

碧玉丹

豬肚丹

鎮心安神丹

真珠圓

五癩圓

龍腦圓

朱砂圓 三方

辰砂安驚圓

天麻圓

補氣溫疔圓

金連圓

苦練圓

神麩豆蔻圓

消食圓

實脾圓

安心圓

半夏圓

神白圓

溫疔圓

小麋茸圓

大朱砂圓

豬肚圓

梅連圓

四君子湯

沈香磨脾湯

蘇香湯

化毒湯

銀白散

麴香散

蠟附散

烏蛇散

朱砂散

人參黃耆散

香硃散

上汗散

紅綿散

化毒散

紅紛散

小定志圓

內消圓

八物參朮圓

大黃圓

截風生胃湯

飯虎湯

山藥湯

和解湯

活脾圓

治走馬疳

星香散

安全散

天竺黃散

蠟附散

牡蠣散

龍骨散

歡喜散

龍腦散

烏梅散

六神散

麥門冬散

龍膽散

止吐散

丁香草菓散

王柱杖散

醒脾散

犀角飲

木香煎

把搐膏

羗活膏

烏金膏

助胃膏

朱砂餅子

諸雜方

千鍾酒

神仙救人圓

治誤吞錢二方

治魚骨鯁二方

治一切蛇毒所傷方二

治中砒霜巴豆毒

茯苓散

加味觀音散

草豆蔻散

木香散

竭附散

桔梗散

越桃飲子

辰砂膏

烏犀膏

住唇膏

人參膏

牛黃膏

治腋筆四方

治湯火傷清涼膏二方

治諸骨絞二方

治寸白蟲三方

誤食毒藥咽喉急閉

解毒方

解百藥毒方

染髭髮方

尋痛圓

治筋斷須續者

洗面藥治粉刺

諸湯

香橘湯

慶仙湯

清芬湯

清韻湯

解一切毒

烏髭方二方

治打撲傷損二方

治癩撲閃胛疼痛方二

醍醐湯

鳳池湯

紫薑湯

玉塵湯

魏氏家藏方目錄卷終

魏氏家藏方卷第一

中風

大藥紫金丹

川烏頭炮去皮臍 五靈脂各貳兩 沒藥各壹兩 木鼈子去殼 自然銅荔枝皮者火煨醋淬 麝香肉參錢別研 天麻各半兩 白膠香各壹兩別研 地龍土去 乳香別研

右為細末於辰年辰月辰日辰時辰方上取長流水為圓如不及辰年只用辰月辰日辰時面向辰方焚香滴長流水和於臼中向辰方杵壹仟貳佰下作壹佰陸拾圓陰乾霹靂酒磨下用秤鎚猛火內燒通紅左癱右瘓日夕就床不能坐立及傷寒汗不流腰脚搐搦及婦人產後軟癱脚膝細弱兼治打撲傷損筋骨損敗服之立效尋常傷風及頭風等疾筋骨攣急不能轉側服之即愈如風證病重者一更二更三更各壹服如病輕者用酒化下不拘時服即愈前後親用奇效危困立安跛蹙復常者佰拾人近有人只用端午日午時合用之亦效兼試以治腸風

亦效有婦人手臂不能屈伸只磨藥傅臂上亦愈合時忌婦人雞犬猫畜見合時於辰日前壹日先修製下藥

神保丹治左癱右瘓或一手頑痺一足不仁或半身不遂口喎喉腫

川芎 天南星湯泡 甘松 香白芷 藿香葉洗去土 香附子去毛炒 牛膝去蘆酒浸 桔梗炒 防風去蘆 茴香淘去沙炒 羌活 藜蘆 麻黃去節 當歸去蘆酒浸 草烏頭 大川烏各壹兩半並生去皮尖 甘草肆兩 荊芥穗貳兩 石膏半斤

右為細末糯米糊為圓每以參錢半重作壹圓每圓分作肆服頭風薄苛酒嚼下喉閉生薑薄苛酒下婦人血風久癱豆淋酒下用黑豆炒熟以酒投之去 耳內虛鳴煨猪腎酒下眼腫菊花酒化下小兒

每圓分作捌服、癱風先服順氣散方在脚氣門後服此藥癱風參伍日者服之其效尤捷

靈龍丹治一切風疾、卒中潮搐、口噤不語、舌強、脚弱、鶴膝、癱瘓、半身不隨、偏風、口眼喎斜丁知縣傳

五靈脂

去沙米兩別研

草烏頭

生去皮尖半兩

木鼈子

新者去殼兩別研

白膠香

別研

地龍

上去

乳香

各半兩別研

麝香

壹錢別研

右為細末入諸別研藥拌和以辰年辰月辰日

辰時取辰方上野水搜做小阿膠片風乾每有

患者以壹片分作參服用酒磨下卒中急風以

白礬壹小塊研末用童子小便同酒磨下或口

噤灌少許入鼻中待口開壹時灌盡小兒驚風

分作陸服薄苛湯入酒化下手足疼痛薄苛酒

下或薑汁磨塗患處如治牙疼以少許塞之

七生丹治風邪乘虛入臟留蓄胞膜因氣所動衝

築往來若塊妨進飲食或游走經絡時發寒熱上

攻頭面時作昏痛下至足脛不仁久為伏梁宜服

此方

白附子

天南星

全蠍

半夏

蠶絲

乾薑

川烏頭

右等分竝生為細末生薑汁煮麪糊為圓如梧

桐子大每服參拾圓生薑薄苛湯下臨卧服

大祛風丹

王醫師傳

犀角

鎊屑

羚羊角

鎊屑

牛黃

真者別研

鹿速腦

別研

瑤瑁

鎊屑各

真珠

錢鹽湯洗別研

全蠍

新者只用稍尾去頭

白花蛇

真州者酒浸取淨肉

防風

各半兩去蘆

石膏

方壹切開用

天南星

用新大地切片慢火煮令薑不辣焙乾或兩

右為細末入水飛過朱砂貳兩同再研和煉緊

蜜為圓每兩分作拾貳圓每服壹圓用生薑自

然汁化開熱湯浸服不拘時候

二烏圓治風氣走注疼痛

川烏頭

生去皮臍

海桐皮

草烏頭

生去皮尖

五靈脂

各壹兩別研

右為細末先取不蚰皂角貳鎰鎰碎酒浸揉取

脂濾去滓打麵糊為圓如梧桐子大每服貳拾

脂

圓茶酒任下

七星圓治中風痰涎壅盛

附子生去皮

白附子各貳錢

半夏湯泡

香附子去毛

天南星湯泡

石膏壹兩

地龍參錢

右為細末，韭汁為圓，如梧桐子大，每服茶粒茶湯或溫酒任下，食後臨臥服。

川烏靈脂圓治左癱右瘓，口眼喎斜，寒濕脚氣，一切風疾，悉皆治之。

川烏頭參隻去皮

天南星參箇共伍兩者焙

五靈脂炒別研

右等分為細末，以生薑自然汁為圓，如梧桐子大，每服壹拾圓至拾伍圓，用薄荷自然汁入酒吞服，空心食前日參服。

消礬圓治暗風癩病年深者

消石兩半

赤石脂貳兩煨

白礬壹兩

右為細末，糯米粥為圓，如菜豆大，每服拾伍圓，食後溫水下，日進參服壹日壹次，發者服之半。

月永除根本

何首烏圓能壯筋骨，烏髮鬢，益血脈，助陽氣，又治一切風攻手足沈重，皮膚不仁，遍身麻痺，及風勞氣疾，腸風下血，久服輕身延年，耳目聰明。

牛膝去蘆酒浸

大棗各肆兩

何首烏

用壹斤，須是雌雄，雌壹分，雄壹分，以快竹刀削去皮，切片，日中曬乾。

黑豆

半斤，同棗肉拌和，作壹重鋪在甑底，然後以何首烏末，盡覆上，密閉，蒸俟藥變黑，和氣透，上下棗豆乾，香與藥香相和，同取棗豆乾。

右為細末，酒糊為圓，如梧桐子大，每服參拾圓。

空心食前溫酒或熟下

又方治風活血大補益

何首烏

壹斤，赤白色者各半，米泔浸參宿，取出，用竹刀刮去皮，薄切焙乾。

赤芍藥

右為細末，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服參伍拾圓，食後溫酒或飮任下，日進貳服，切忌鐵器。

須精細修合，知懷州李括與一武臣同官，怪其年七十餘，輕健面如渥丹，能飲食，叩其術，乃得此方，先是李括盛暑中半體無汗，暮年竊自憂之，服此藥一年許，汗遂淡，體初不知其能治此。

也蓋其活血之驗已試之効可無疑矣然何首
烏不宜久服頗作愆念更宜謹之庶不為藥之
所使

神感圓治腰疼脚氣及左癱右瘓卒中風疾外腎
冷疼

破故紙貳兩新瓦
上炒香

地龍去
土

乾木瓜

川烏頭各壹兩
生用

荆芥穗兩半

右為細末用好醋煮麪糊為圓如梧桐子大每
服貳參拾圓鹽酒鹽湯任下如腰脚之疾食前

服如鬲上風痰食後服不得食熱物

祛風大圓治一切風疾手足麻痺語言蹇澀痰涎
壅盛頭目眩暈耳鳴忪悸舉動艱難口眼喎斜半
身不遂牙關緊急不省人事此乃風證也但日服
此藥諸證悉愈久服無毒性平不熱服之神妙切
忌食酒麪雞魚一切海鮮若忌口服之無効

芎藭

赤芍藥

防風去
蘆

白蠟直者炒
去絲

天麻

麻黃去
節

朱砂研水
飛

石膏各壹
兩

龍齒火煨
別研

白花蛇好酒浸
取肉

甘草各半
兩

川大黃鐵
錢

蠍梢炙

麝香各參錢
別研

右為細末煉緊蜜為圓每兩作伍圓每服壹圓
用生薑自然汁化開却用溫湯浸食後服日進

貳服

黃圓子治丈夫婦人一切諸風口眼喎斜半身不
遂手脚麻痺肌肉攣動頭目旋暈痰涎不利遍身
痒悶風虛卒中服之神驗如能常服此藥永無諸
般風疾

甘草炙

華陰細辛

川烏頭各參
兩生

白朮炒

川芎

縮砂去
殼

羌活各貳
兩

白芷肆
兩

雄黃壹兩透明者
別研水飛

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓細嚼

白湯任下不拘時候

加味白圓子去風化痰清頭目

川烏頭生去皮臍切
湯浸柒次

白蠟直者炒去
絲各壹兩

半夏伍兩湯
泡柒次

天南星參兩
生

伸屈行履艱難骨節疼痛膝脛枯細血弱不能榮養經絡服之甚有神驗

虎脛骨連髓者尤佳

淫羊藿去莖酒浸壹宿

牛膝去蘆酒浸

赤箭

天麻

獨活

川當歸酒去蘆酒浸

熟乾地黄洗去土

肉苁蓉酒浸去皮土

鹿茸去毛酥炙

沒藥研別

乳香研別

血蠟研別

麝香各壹兩研別

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服陸拾圓

溫酒鹽湯任下

油炒烏頭圓去風氣建脾暖水臟

草烏頭貳兩水浸軟去黑皮每箇剉作肆兩塊乾揀去黑心者不用

蒼朮肆兩剉作塊

右用銀鈔入麻油壹兩鹽半兩先入烏頭慢火炒微轉色次下蒼朮同炒候烏頭褐色乘熱入碾以細絹羅用白麪糊圓如梧桐子大每服貳拾圓空心溫酒鹽湯下

通痺圓治三十六種風左癱右瘓口眼喎斜半身不遂手足頑麻語言蹇澀一切風疾功效如神

通痺圓治三十六種風左癱右瘓口眼喎斜半身不遂手足頑麻語言蹇澀一切風疾功效如神

川烏頭生去皮臍

五靈脂炒別研

川當歸去蘆酒浸焙各參兩

草烏頭去皮尖

沒藥研別

木鼈子炒取肉

地龍洗去土各貳兩

白膠香壹兩內銀器過

全蠍炒

朱砂各半兩研

乳香壹兩半研

麝香貳錢研

右為細末滴水為圓如雞頭大風乾每服壹圓

生薑汁磨化溫酒侵服婦人血風當歸酒磨下

小兒驚風每圓分作參服金銀薄荷湯磨下大人急中仆倒磨壹圓灌之即甦

追風圓治諸風筋骨疼痛四肢不隨

草烏頭肆兩水浸去皮尖

麻黃去節

白芷各半兩

防風去蘆

川芎各壹兩錢半

地龍壹兩去土

右為細末水煎麪糊為圓如梧桐子大每服柒粒薄荷茶送下空心臨臥日進參服只作散子

每服壹字冷茶調服忌熱湯熱物壹時辰

省風湯治中風

天南星壹箇米錢重者炮去浮皮切片

全蠍梢貳兩

右為麤末，平分兩服。水兩盞，生薑貳拾片，慢火煎至捌分，別用麝香壹錢，細研入前藥內調拌。再重湯煖令熱，細細呷服。若不省者，灌之。又方：人有患頭目眩，或遊風，或口眼開動，非痰乃風之漸也。

天南星壹枚半兩

右切片子，用水參大盞，入生薑參大片，同煎至壹大盞，去滓稍熱服，不拘時候。

醒風湯又提刑方

人參去蘆

附子生

白朮炒

白芷

天麻

蟬蛻各壹兩

白茯苓皮去

白附子炮

天南星湯泡

防風去蘆

半夏湯泡

全蠍半兩

右細切，如小麥大，拌和，每服壹錢半，或貳錢量，病加減，用水壹盞半，生薑參大片，大棗壹枚，煎至陸分，溫服。延齡湯治諸風。

甘草壹兩

荆芥穗兩

白朮貳兩

右為細末，茶清點服，不拘時候，每服貳錢。木香附子湯治急中風不語，口眼喎斜，半身不遂，肢體癱瘓。

附子壹枚半錢重

南木香壹兩

右切片量，病勢重則分作貳服，輕則分作肆服，每服水壹盞半，生薑貳拾片，煎至半盞，去滓，空心食前熱服，間服小續命湯壹服，如急中，附子不炮。

一呷散治卒中昏不知人，痰氣上壅，咽喉作聲，喉痺纏喉，一切風痰壅塞，命在須臾者，一服立見神效。

天南星大者

白蠶蠶半兩

全蠍半兩

右生為細末，每服抄壹錢，用生薑自然汁半燈盞許，調藥灌之，消豁痰涎，如湯沃雪，即時甦省，却隨證別用藥調理。七聖散治血風勞氣，筋骨拘攣，或風痛走注，琅山顯長

白芷

川當歸去蘆

川芎

全蠍

地龍去土

麻黃去節各壹兩

川烏頭貳兩去皮尖半生半醋炙黃色

右為細末每服半錢加至壹錢豆淋酒調溫服

覺麻只半錢

舒筋保安散治左癱右換筋脉拘攣身體不隨脚腿沈重少力行步艱難兼治乾濕脚氣經絡凝滯

乾木瓜伍兩

萆薢

五靈脂

白蠟蠶

綿黃芪

歲靈仙

白芍藥

牛膝

川當歸

松節

烏藥

乳香

天麻

防風

續斷

虎骨

已上拾陸味各半兩

右用木瓜拾陸味藥用無灰酒壹斗浸藥貳米日緊封札不令透氣候日數足留下所浸藥酒將諸藥如法燉焙令乾搗羅為末每服參錢用

所浸藥酒壹大茶脚許別以好酒壹盞侵服

驅風散治諸風

防風去蘆

羌活

人參去蘆

附子生去皮臍

甘草各貳錢半炙

荊芥穗

白芷

細辛

枳殼各壹錢半去穰炙炒

右吹咀每服參錢水壹盞生薑參片煎至柒分去滓溫服

酸棗仁散治脚白虎風痛徹骨髓晝定夜發竝宜服之蔣德傳

服之蔣德傳

沒藥研別

酸棗仁研別

乳香各半兩別研

敗龜炙酥

牛膝去蘆酒浸

桂心懷乾不見火炒

附子生去皮臍

補骨脂炒

枳殼去穰炙炒

赤芍藥

羌活各參分

虎脛骨酥或酒浸炙

地龍去土

當歸酒去蘆浸

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時候夫白虎風者是感寒暑濕之毒因虛將攝失理經脉

凝滯氣血不行，受此風邪，蓄於骨節之間，或在四肢，肉色不變，其疾疼痛，如虎之噬，故名白虎風也。

治風痺方訣

太凡風痺，真氣昏亂，致有偏緩軟弱，喎斜涎流，不隨之候，切不可便服風藥吐瀉，因此有損，非徒無益，而又害之。蓋緣常人多忽事機，先有目，睨腰痺，脚疼，舌澀，面赤，貪食等候，竝謂等閑，無慮。一旦疾作，昏沈，舉族驚惶，止務速安，頃刻之間，藥餌並進，不知性命之存亡在須臾也。其次庸醫不明此理，偶遇人家倉卒招請，計無所出，便據方書用藥，或吐或利，或便用鍼灸，拙術既施，遂致不救。最下者，求速效，急近利，不顧害之在後也。凡如此者，未有能已人之疾苦也。惟明哲之士，審觀要理，萬一失於衛生，遂至此疾，切不可當驚憂之際，任人妄攻，以自取斃。止用正氣藥，便是救性命之要策也。莫若用附子、木香、附子炮裂，去皮臍，貳兩，木香炮過，貳錢半，為細末，每服肆錢，薑拾片，水貳碗，攪令溫服。有熱則候藥冷服之。比壞正氣者，蓋有間矣。氣正則精

神漸定，數日之後，服風藥未晚也。小續命湯之類，併前藥動服，自可取差。風藥如碧霞金虎靈寶之類，最不可服。初虞世論之甚詳。蘇沈方所用藥，尤合人情。今錄此方，以為後來之戒。

追風餅治三十六種風，左癱右瘓，手足不隨，面口喎斜，偏正頭風，竝皆治之。丁知縣傳

防風去蘆

羌活

海桐皮

葳靈仙

石膏用生

撫芎各壹兩

細辛

蒼朮各壹兩半

草烏頭切同蒼朮用鹽壹撮炒令黑

蔓本

天花粉各參兩

蔓本

蔓荊子

草薺

藿香葉去土

白芷各半兩

官桂參錢去麩皮不見火

右為細末，蒸餅糊和為餅子，如小彈子大，每服壹餅，溫酒或茶清嚼下。偏正頭風，薄荷茶嚼下，半饑時服，頭風食後服。

治中風

卒中風口噤不開，先用白梅擦牙，後用生川烏

尖茶枚碾末用麝香水調服候壹時久再用朱附湯用生附子壹枚去皮臍砂鉢內細磨壹半用新汲水壹盞煎至大沸用朱砂飛過入末壹錢同前附子再煎溫服次日再用桂附湯生附子半隻去皮臍砂鉢內細磨用新汲水壹盞煎至大沸用桂肆錢取心好者細磨同前附子再煎微沸服日進貳服次日再用星附湯生附子半隻去皮臍砂鉢內細磨用新汲水壹盞煎至大沸用大天南星壹箇炮去皮臍折裂細磨同前附子煎至大沸通口服日進貳服神效不可具述

治卒中風

青州白圓子入麝香同研碎為末生薑自然汁調灌之如牙緊可自鼻中灌入

治暗風但頭欲倒服之當時便安

猪牙皂角燒過 附子生去皮臍各壹錢 甘草半錢生用

右為細末每服半錢米飲調服頓醒治風搐口喎

蘇麻貳粒去殼細研入生麪少許用水調拌稀

稠得所右喎塗左手心左喎塗右手心用淨水壹盞照口如口正便急洗去手心藥中風服藥次第法

凡覺中風用大附子壹隻生去皮臍細切水貳升生薑貳拾片入麝香壹字慢火煎至壹升溫服壹枚大附子分作兩服風稍定次服南附湯其方如後

大附子

壹隻生去皮臍

大天南星

壹枚生

右各細切以水參升生薑參拾片慢火煎至壹升去滓分作兩服如或語言蹇澀甚者加猪膽壹枚取汁同煎服

頭風頭痛

南嶽草靈丹治頭風等疾朱縣丞謙之傳

草烏頭

貳兩去皮尖炒

全蠍

去毒

地龍

去土

白蠟

直者炒去絲

穿山甲

炒

木鼈子

去殼

乳香

別研

沒藥

別研

天僊子

別研

五靈脂

別研

斑猫

去頭足炒

赤脚蜈蚣

已上各半兩

右為細末米醋糊為圓如梧桐子大朱砂麝香

為衣、每服伍圓空心食前溫酒下、婦人用淡醋湯下、

附子細辛湯、治頭痛連腦戶、或額間與目相連、欲得熱物熨者、

細辛

附子 半兩生去皮臍

川芎 各壹兩

麻黃 貳錢半去節

右為麤末、每服伍錢、薑參片水壹盞半煎至柒分、去滓服、

金花一聖散、治頭風、

川烏頭 去皮臍

川芎

白芷

右等分為細末、每服壹字、先用葱青參肆寸、薄芎參肆葉、安於盞內、同藥食後點服、

茶調散、清神、

川芎 壹兩貳錢

甘草 炙

香白芷

香附子 去毛

防風 去蘆

細辛

縮砂仁 各壹兩

薄芎葉 貳兩

右為細末、每服壹貳錢、食後茶調下、

天雄散、治諸般偏正頭風、

天雄 壹隻、去皮臍、生薑自然汁、半盞、煎炙、汁乾、為度、半兩

鍾乳粉 兩半

石膏 參錢、火煨

雄黃 研別

右為細末、每服壹小錢、臍茶少許、壹處同研、用貓兒薄芎煎湯、食後臨卧點服、不過貳服、即便痛止、

香芎散、治頭風、王醫師方

香白芷

菖蒲 各參分、並炒

川芎

甘草 炙、各壹分

川烏頭 炮去皮臍

香附子 各貳分、去毛

右為細末、每服貳錢、水壹盞、薑參片煎至陸分、食微下溫服、

石膏散、治偏正頭風、

石膏

赤芍藥 各壹兩

川芎 參錢

右件生用為細末、每服壹錢、茶清調下、併喫參服、食後臨卧、

聖餅子、治頭風、

天南星 湯泡、柒次

半夏 湯泡、柒次

防風 去蘆

乾薑 洗

甘草 炙

白附子 生

太陰石 別研

白僵蠶 直者炒 去絲

川烏頭 生去 皮臍

右為細末、生薑自然汁拌和、打成餅子、如錢大、每服壹餅、食後細嚼茶下、

又方

天南星 炮

川烏頭 炮去 皮臍

白芷

石膏 各半 兩

白僵蠶 各壹分 直者 去絲微炒

右為細末、每服壹錢、水壹盞半、生薑伍片、薄荷參葉、白梅壹箇、同煎陸分、食前溫服、

又方

雄黃

硫黃

右等分為細末、糕糊為圓、如梧桐子大、每服拾圓、白梅茶湯下、

又方

天南星 壹兩 炮 切片

蠟梢 壹拾 肆箇

右將南星片子、入建盞內、後用生薑汁浸貳指、高慢火熬乾、入蠟梢、同為細末、每服半錢、食後

臨卧、沸湯調下、

治一切頭風、大病後亦可服、

王克明傳

川芎

甘草 炙

天南星 湯泡 米次

石膏 煨

乾薑 炮洗 各 貳兩

天麻 兩 半

防風 壹分 去蘆各

右為細末、生薑自然汁打糊為圓、作餅子、每服拾餅、食後荆芥茶湯嚼下、

傷寒

十勸

一、頭疼又身熱、便是陽證、不可服熱藥、

傷寒傳三陰、三陽、共六經內、太陰病、頭不疼、

身不熱、少陰病、有反發熱、而無頭疼、其陰病、

有頭疼、而無發熱、故知頭疼、又身熱、即是陽、

證、若醫者、妄投熱藥、決然致死、

二、攻毒氣、不可補益、

邪氣在經絡中、若隨證早攻之、只三四日痊、

安醫者妄謂先須正氣以致邪氣流熾多致殺人

三不思飲食不可服脾胃藥

傷寒不思飲食自是常事終無餓死之理如理中圓之類亦不可輕服若陽病服之致熱氣增重或至不救

四腹痛亦有熱證不可輕服溫暖藥

難經云痛為實故仲景論腹滿時痛之證有曰痛甚者加大黃夫痛甚而反加大黃意可以見也唯身冷厥逆腹痛者方是陰證須消息之醫者見其腹痛便投熱藥以致殺人

五自利當看陰陽證不可例服補暖及止瀉藥自利唯身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆者屬少陰厥陰外其餘身熱下利皆是陽證當隨證依仲景法治之每見醫者多緣下利便投暖藥及止瀉藥以致殺人

六胃脘痛及腹脹滿不可妄用艾灸

常見村落間有此證無藥便用艾灸多致毒氣隨火而盛膨脹發喘致死不知胃脘痛自屬少陽腹脹滿自屬太陰也此外惟陰證者

可灸

七手足厥冷當分陰陽不可例作陰證治

有陽厥有陰厥醫者少能分辨陽厥而投熱藥殺人速於用刃蓋陽病不至於極熱不能發厥仲景所謂熱深則厥深是也熱深而更與熱藥豈復有活之理但看初得病而身熱至三四日後熱氣已深大便秘小便赤或語言昏憤及別有熱證而反發厥者必是陽厥也宜急用承氣湯下之若初得病身不熱大便不秘自引衣蓋身或下利或小便數不見熱證而厥逆者即是陰厥也方可用四逆湯之類二厥所以使人疑者緣為脈皆沈然陽厥脈沈而滑陰厥脈沈而弱又陽厥時復指爪溫陰厥常冷此為可別也

八病已在裏即不可用藥發汗

傷寒證須看表裏如發熱惡寒則是在表正宜發汗如不惡寒反惡熱即是裏證若醫者一例發汗則所出之汗不是邪氣皆是真氣邪氣未除而真氣先涸死者多矣又別有半在表半在裏之證及無表裏之證不唯終不

可下，仍亦不可汗，但隨證治之。
九飲水為欲愈，不可令病人恣飲過度。

病人大渴，當與之水，以消熱氣。故仲景以飲水為欲愈，人見此說，遂令病者縱飲，因為嘔為逆，為喘咳，為下利，為腫，為悸，為水結，為小便不利者，多矣。且如病人欲飲壹椀，可與半椀之類，常令不足為善。

十病初差，不可過飽，及勞動。食羊肉，行房事，與食諸骨汁，并酒麪，脾胃尚弱，飲食過飽，則不能消化，恐病再來，謂之食復。病方愈，氣尚虛，勞動太早，病若再來，謂之勞復。傷寒，不忌食羊肉，行房事者，致死無疑。

防風散，療傷寒時氣，頭痛壯熱，惡風，百節酸疼，肩背拘急，面赤虛煩，聲重咳嗽，寒熱不除，欲解利者，春夏多用之。

厚朴	去皮薑汁製	陳皮	去白
甘草	炙	藁本	各兩
獨活		防風	去蘆
桔梗	各參兩		
蒼朮	微炒		

於木白內打淨，秤貳兩。

右為細末，每服參錢，薑參片，棗子貳箇，水壹大盞煎，茶分溫服，沸湯點亦得。
來蘇散，治傷風及陰陽二毒傷寒。

蒼朮	捌錢	米泔浸	香附子	肆錢
甘草	壹錢	去皮炒	陳皮	去毛
紫蘇葉	各貳錢			

右為細末，每服貳錢，水壹盞半，生薑參片，煎至壹盞，不拘時候，如微覺傷風感冷及頭暈等，用臘茶湯調下。

至聖散，專治一切時行傷寒，不問陰陽，不拘輕重，孕婦皆可服之。

香白芷	壹斤	甘草	半斤
-----	----	----	----

右貳味，焙乾為細末，每服伍錢，水壹盞半，棗子壹枚，生薑伍片，連鬚葱白參寸，煎至捌分，熱服用，衣被蓋覆，約行五六里，更進壹服，汗出即愈。此藥迺異人傳授，救人無數，可卜病凶吉，如煎得黑色，或誤打翻，其病難愈，如煎得黃色，其病即愈。煎時須要至誠，無不應效。

普救散，治四時傷寒，渾身發熱，四肢疼痛，頭重眼疼，不問陰陽二證，竝皆治之。

蒼朮壹斤米泔浸

甘草肆兩

乾葛半斤切焙

右為麤末每服貳大錢水壹中盞煎柒分去滓熱服如要出汗加連根葱白貳寸同煎併兩服滓再煎壹服不拘時候但用砂鈹煎煮不得犯銅鐵器

普濟散治傷寒感冒表裏未分不拘老幼皆可服之且宜導經絡不致傳遍臨川呂醫家傳方

川芎

香附子去毛炒

青皮去穢

乾葛

甘草炙

白芷

陳皮洗淨去白

升麻

芍藥

紫蘇葉

右等分碾為麤末每服參錢水壹盞半生薑伍片煎至柒分不拘時候如發熱頭疼加連鬚葱白貳寸如胃滿氣痞加枳殼少許

伏暑

酒蒸黃連圓治暑毒伏深無藥可治者宜服之如伏暑發渴神效尤妙酒積脾疼酒毒便血並主之

黃連肆兩去鬚以無灰酒浸黃連面上約高壹寸許入銀石器中重湯煮乾爛

碾為細末不見火尤妙

右搗羅為末白麪糊為圓如梧桐子大每服參拾圓熱水下胃膈涼不渴為驗酒積脾疼溫酒下酒毒下血米飲下不拘時候

黃龍圓治久中積暑每遇夏月發熱不思飲食臟腑不調

半夏壹兩洗淨切片

甘草炙

白茯苓各壹兩去皮

右為細末淡米醋糊為圓如梧桐子大每服參伍拾圓熱水吞下不拘時候

香薷湯

香薷葉洗淨

乾薑壹兩半洗

赤茯苓去皮

縮砂各壹兩

右為細末沸湯入鹽煎服有人不肯服五苓散惡其滑精也迺以此代之若作渴宜服後藥

五倍子去肉

烏梅去仁瓦上焙乾

甘草炙

橘紅兩

檀香不見火

川厚朴參兩去皮薑汁製

右為細末每服貳錢新汲水調服即愈
快脾飲治伏暑傷脾寒熱往來

香茸

草菓去皮

青皮去穢

甘草炙

麥蘗炒

紫蘇

厚朴去麤皮

陳皮去穢

半夏湯炮

烏梅核

右等分為麤末每服貳錢水壹盞半生薑炙片
棗子貳枚煎至米分去滓溫服秋間去香茸加
乾薑半兩同煎

冰雪飲子解暴暑

立冬日以糯米不計多少淨淘水浸置北墻陰
下至立春日取以為粉每服貳錢新汲水調下

瘧疾

雙聖丹

朱砂壹分

黃丹壹兩

右貳味用大蒜煨熟和少蜜圓如雞頭大每服
貳粒酒磨湯頓溫當發日五更服合時須端午
日午時勿令雞犬婦人見

又方

滑石

硫黃

右等分為細末酒糊為圓如小雞頭大每服壹
圓當發日五更用井花水下端午日合尤佳
沖和湯治暑瘧寒熱多痰

甘草貳錢

柴胡去穢

半夏湯炮

黃芩壹錢

人參去蘆

右咬咀每服參錢水壹盞半生薑伍片棗子貳
枚煎至米分去滓溫服寒多加桂熱多增人參
渴加乾葛

三倍湯治時行濕多風少寒甚熱微全不進食

乾薑壹兩

白朮參兩

草菓貳兩

右件咬咀每服伍錢水壹盞生薑參片棗子壹
箇煎柒分去滓通口服併貳服滓再煎日進參
服大效

人參散治五般瘧疾服之不吐不瀉

人參壹錢

烏梅

甘草寸伍

陳皮全者

棗子各拾

生薑伍塊

草菓枝

右為麤末、分作伍服、每服以濕紙裹入鹽少許、煨令香熟、去紙入水壹大碗於斃器內同煎至壹大盞去滓當發日空心食前溫服不發住服加料平胃散治一切瘧疾或日久難治者

平胃散壹貼分為兩服每壹服用水壹盞半入紅圓子貳拾粒連翹圓貳拾粒五苓散貳錢生薑伍大片棗子柒枚煎至柒分隔日煎下露星月壹宿當發日五更服

驅瘧散

附子炮去皮 麟參錢

半夏湯泡 柒次

丁香各壹錢

右以咀生薑柒片棗子壹枚水貳盞煎至壹盞去滓當發日五更服

立効散治一切瘧

白附子炮

橘紅各貳兩

右為細末每服壹錢米飲下未發以前參兩時辰連進壹貳服

二香飲子

每用附子壹隻重壹兩平分兩片半生半炮熟

磨木香水壹盞沈香水壹盞生薑拾片煎至壹盞去滓未發前連進貳服

五獸飲子治寒熱

人參分半

半夏壹兩湯泡 柒次

甘草各半兩

草菓拾枚

橘皮去穢

右為麤末每服伍錢水壹盞半生薑柒片烏梅貳箇煎至柒分去滓溫服

薑橘飲

陳皮肆兩 去白

生薑貳兩 去皮

右為麤末用水參碗煎壹碗去滓分作貳服當發日五更服

生熟飲

厚朴貳寸壹寸 生壹寸壹寸 炙壹寸壹寸

甘草貳寸壹寸 生壹寸壹寸 炙壹寸壹寸

草菓壹枚壹枚 炮熟壹枚壹枚

生薑貳兩壹兩 生壹兩壹兩 煨壹兩壹兩

右以咀作壹服水壹大碗好棗柒枚擘破煎至壹盞去滓食前服

勝瘧飲

平胃散壹兩

棗子拾貳兩

藿香葉肆拾片

檳榔壹枚

右咬咀水壹碗半煎至壹碗臨發前連併服
又方

青皮去穰

陳皮全者去白

棗子

草菓各柴

甘草

肆寸分作兩片拋在地上將覆者壹片炙餘壹片生用

右咬咀水壹碗煎柒分去滓服將滓再煎服

治久瘧諸藥不効者壹服立愈

五積散壹貼用水壹甕於發日隔宿將水露至五更大棗柒枚去核丁香柒粒同煎至陸分入無灰酒貳分再煎數沸於未發前壹時辰先食棗乘熱服之寒熱相等者加桃柳同煎

魏氏家藏方卷第一終



之改... 及合勿誤之

魏氏家藏方卷第二
一切氣

弘前醫... 江氏家藏方

搜和成劑每兩作肆拾劑旋圓薑湯下
神僊備急丹治脾腎氣時作雷鳴腹脹滿不美
飲食胃膈隘滯秘利不時及暴下嘔逆慶元府慈
應大師方

- 沈香炒略
- 檳榔
- 石菖蒲酒浸壹宿
- 牡蠣粉火煨酸醋
- 磁石煨
- 硫黃各半
- 縮砂仁研
- 朱砂研
- 白薑洗
- 木香濕紙
- 桃仁去皮
- 阿魏化酒
- 茴香淘
- 紅豆炒

一第1000册續修四庫全書第2頁三目

禹餘糧石 焯米醋

神麩 炒

右為細末 研桃仁為膏 和入酒煮 阿魏糊圓如

梧桐子大 每服參拾圓 或肆拾圓 空心煎薑湯

下內磁石 禹餘糧石 各別研水飛 令極細入藥

沈魏丹 治腹中積塊 氣塊等疾

三稜 炮

青皮 去穢

肉桂 去蟲皮

茴香 淘去火

桃仁 炒

附子 皮去

檳榔 湯泡

茱萸 炒

沈香 不見

阿魏 醋

石 飛過

右將磁石同阿魏打麵 糊為圓 如梧桐子大 每

服參肆拾圓 生薑鹽湯下 不拘時候

沈香煎圓 治下元冷 陽氣衰弱 筋骨無力 或成

下墜 小腸氣痛 腎臟風毒 攻注腰脚 沉重久服 明

耳目壯氣海

天雄 生去

草烏 頭生去皮

黑豆 緊小

天麻 生

己上各貳兩 以無灰酒壹斛 同於銀鍋內 慢火

煮分令大沸 酒盡焙乾

沈香

木香 見火

乾薑 炮洗

肉蓯蓉 酒浸

紫巴 乾

丁香

羌活

肉桂 去蟲皮

陳皮 去

香附子 炒

右竝為細末 煉蜜為圓 如梧桐子大 每服貳參

拾圓 空心溫酒下

勝七香圓 消飲化滯

各貳兩 為細末 陳米半升 巴豆半兩 去皮殼 同

小塌氣圓治一切氣

牽牛炒參兩

陳皮各半白兩炒

右為細末薑糊為圓如梧桐子大每服壹貳拾

圓薑湯下不拘時候

分氣圓

木香濕紙

丁香不見

白豆蔻仁

縮砂仁壹兩

茴香淘去沙炒

檀香各壹分

薑黃

香附子去毛各半兩

甘草壹兩半灸

右為細末神麴糊為圓如雞頭大細嚼嚥下

又方

香附子貳兩去毛

縮砂仁

蓬莪朮炮各壹兩

陳皮白去壹兩

薑黃壹兩錢半

甘松

甘草壹兩半灸

木香各半兩不見火

右為細末糊為圓如梧桐子大每服參拾圓食

前薑湯下

括痛圓

附子炮去皮臍

川烏頭炮去皮臍

胡椒炒

高良薑炒

菓橙

吳茱萸湯泡次再炒

右等分為細末酒糊為圓如梧桐子大每服伍

拾圓薑鹽湯下不拘時候

撞氣圓治一切氣

木香不見

青皮去穢

肉桂去穢不見火

甘草灸

乾薑炮半兩洗

阿魏錢壹

右為細末用水浸蒸餅為圓如彈子大朱砂為

衣每服壹圓鹽湯嚥下

十香圓治一切氣注刺心腹脹痛痰涎壅逆不美

飲食臙膈多泄竝宜服之

茴香淘去沙炒

沉香微炒

木香濕紙裏煨

乾薑洗炮

肉桂去穢不見火

當歸去蘆

三稜炮

胡椒

茴香淘去沙炒

木瓜各壹兩

檳榔壹兩枚

乳香研別炮

蓬莪朮各壹兩

枳殼各壹兩去穢

肉豆蔻貳兩

擯榔兩

吳茱萸貳分用米醋半盞浸壹

丁香參分不取出炒乾只用壹分

右為細末用阿魏壹錢研開入麪為糊圓如梧
桐子大每服參拾圓生薑湯下不拘時候亦可
作食藥服之

朱附圓治十膈五噎

附子壹箇茶錢重者去臍下刻一竅入朱砂參
錢在內再將取出附子屑填滿外用餅麪裹厚
兩小錢許可用巴豆茶粒去殼分作拾肆片貼

在麪上再用白麪裹仍用濕紙裹參伍重以文

武火煨令麪香取出放冷去麪巴豆將附子去

皮臍切片焙乾為末朱砂別研貳味和調滴水

為圓如梧桐子大每服貳拾圓空心食前濃煎

桂花湯下日進壹服病重再服

橘杏圓治氣滯大腸結秘不通亦治脚氣大便秘

澀竝皆治之

陳皮浸洗去白

杏仁壹兩去皮

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服肆拾圓

米飲下不拘時候此藥滋大便潤臟腑非疎導

之藥也

五膈專圓備五膈之患膏背鍼灸不及者

甘草炙

麥門冬壹兩去心各

川椒去目炒

遠志去心

附子炮去皮臍

乾薑炮

人參去蘆

桂心去麩皮

細辛各陸分

右為細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓合化日

進參服令氣勢薰蒸的有奇功

橘皮茯苓圓降氣消痰寬膈和胃進美飲食去濕

利小便

橘皮半斤去白焙肆兩為末

枳實半兩白茯苓貳兩

右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服伍陸拾

圓食後溫熱水下

大溫白圓治恚怒忿鬱三焦氣滯咽嗝噎塞脇肋

膨脹心腹疼痛上氣奔喘翻胃吐嘔不思飲食及

飲酒過度噫酸惡心氣脈閉澀痰飲不散胃痺短

氣痛徹背脊霍亂吐痢手足逆冷

生薑貳拾兩去皮

橘皮捌兩去白

右將薑壹處碾爛乾入白朮壹兩白茯苓錢甘草半兩炙黃芩為細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓空心沸湯嚙下

阿魏圓治丈夫婦人一切氣五聚積氣及奔豚腎氣上衝心下雷鳴注于兩脇久成癥癖腹脹

- 阿魏 壹兩 半
- 官桂 去麤皮 不見火
- 附子 炮去臍
- 川芎 剉醋
- 朱砂 研別炒
- 白及 不見火
- 木香 各參分
- 蓬莪朮 壹兩
- 白朮 壹兩
- 延胡索 炒醋
- 乾薑 洗炮
- 白芷 兩各半
- 肉豆蔻 炒
- 吳茱萸 炒醋
- 陳皮 去白炒
- 當歸 切炒

右為細末米醋半升浸阿魏壹宿用生絹濾去滓取汁煮糊為圓如梧桐子大朱砂為衣每服伍拾圓溫酒或陳皮湯下婦人醋湯下

- 白豆蔻 捌錢
- 縮砂仁 不見火
- 木香 不見火
- 丁香 洗錢不見火
- 乾薑 洗炮
- 白朮 兩各半

粉草壹兩 炒鹽壹兩 右為細末每服貳錢熱湯點服

經進過院湯 草豆蔻壹兩用生薑伍兩切片同拌以水煎 白豆蔻仁 蓬莪朮炮 益智仁兩各半 粉草壹兩 炒鹽壹兩 右為極細末每服貳錢熱湯點服

- 白茯苓 皮去
- 人參 蘆去
- 白朮 炒
- 新菖蒲 去皮淨碎貳兩以米泔浸參伏時
- 白鹽 壹兩

右同為極細末每服貳錢熱湯點服 六乙湯并降氣

香附子 伍兩炒 藿香葉 壹兩 右為細末每沸湯點服不拘時候 正真湯治陰陽不知氣不升降下元虛損上焦痰滯

附子 炮去臍
人參 去蘆

烏藥

白朮 各半
兩炒

右為細末每服貳錢水壹盞生薑伍片煎至茶
分不拘時候服

四粒散治伏氣築塞小腸氣腎氣膀胱腫大疝氣
等疾並皆治之

天台烏藥 好酒浸
兩

青皮 去穢
炒

右等分為末每服貳錢炒生薑童子小便調下
或炒生薑酒亦得婦人血氣甚者煎當歸酒下

不拘時候

清氣散治脾胃虛弱臟腑狹寒中氣不和停痰積
冷腹內膨脹清濁不分腸鳴飧洩手足厥冷臍腹
多疼嘔吐惡心胃膈不快多困少力肢節怠墜常
服知脾胃快氣利膈化宿滯消飲食清神養氣

丁香 不見
火

白豆蔻 仁
乾懷

訶黎勒 炮取肉
壹分

白茯苓 皮去
沉香 不見
白豆蔻

高良薑 炒

舶上茴香 炒

縮砂仁

白茯苓 皮去

人參 蘆去

京三稜 洗濕紙
裹煨

良薑 炒
各兩

丁香 不見
壹分
火

乾薑 炮
洗

甘草 貳兩

右為細末每服貳錢入鹽少許煎棗湯調下或
入鹽沸湯煎服亦得不拘時候

塌氣散治虛氣攻衝心胃滿悶元氣冷疼及一切
氣不調

舶上茴香 炒

高良薑 炒
各

人參 壹兩
米泔浸

蒼朮 壹兩
炒

青皮 去穢
炒

丁香 壹分
不見
火

右為細末每服壹錢水壹盞半生薑參片棗子
壹枚同煎至茶分食前入鹽熱服或沸湯煎服

單澄茄散治腎痺五聚積氣上衝滿悶氣噎不通

單澄茄

白茯苓 皮去

人參 壹兩

胡椒

檀香 壹分
不見
火

木香 壹分
不見
火

檳榔 各壹
兩

青皮 湯泡
壹分
去

和殼 去穢
炒

茯苓 皮去
炒

乾薑 炮
洗

甘草 貳兩
各

陳皮 貳兩
各

延胡索 炒

人參 壹兩

白茯苓 皮去

訶黎勒 炮取肉
壹分

白豆蔻 仁
乾懷

丁香 不見
火

縮砂仁

白茯苓 皮去

人參 壹兩

訶黎勒 炮取肉
壹分

蓬莪朮 炮半兩
木香 壹分 濕

附子 壹隻 米錢者
炮去皮臍

右為細末每服參錢水壹盞生薑參片棗子壹
枚煎至伍分去滓溫服不拘時候
沉香散治冷氣攻注心腹脹滿疼痛吞酸膈痞氣
促壅逆不納飲食

沉香 不見

神麴 炒

舶上茴香 炒

陳皮 去白各壹兩

甘草 炙

白朮 各半兩 炒

乾薑 壹分 洗

草菓 切 壹箇

右為細末每服貳錢水壹盞生薑參片紫蘇葉
葉同煎至柒分去滓入鹽少許空心食前服中
酒嘔吐入鹽煎或酒調下亦得
止痛散治丈夫婦人心腹痛疼不可忍者服之立
有神効

五靈脂 研別

高良薑 炒

右等分為細末每服參錢水壹盞同煎至肆分
却入米醋壹盞再煎至陸分乘痛時熱服
大紫蘇飲治氣通利胃膈

大腹子

訶子 炮去核

右為麤末每服肆錢水壹盞半生薑參片鹽壹
字煎至捌分去滓溫服不拘時候

心氣

辰砂 真丹

辰砂 半兩 研細 水飛過

代赭石 火煨 醋研

新羅參 去鹽
赤石脂 研別
右為細末用糯米熬為圓如梧桐子大每服貳
拾圓煎人參湯下空心常服
益心丹治心氣不足夢中遺泄

黃耆 蜜炙

茯神 去木 各壹兩

人參 去蘆

遠志 水煎

熟乾地黃 各壹兩 洗

北五味子 各貳兩

龍齒 研別

栝子仁 各半兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓

白湯下不拘時候

養心丹寧心定志升降真火調養榮衛

酸棗仁略炒去皮

茯神去木

人參去蘆

綿黃耆去蜜

柏子仁別研各

當歸去蘆

熟乾地黄洗

遠志去心

五味子各半

朱砂壹分研

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓

人參湯下食後臨卧服

補心丹治心氣不足及婦人心血損耗驚悸不寧

一切虛損月事愆期發熱發寒難曉證候及癩邪之狀皆主治之

真辰砂貳錢

雄黃貳錢半

白附子壹錢

右打和用獐猪心內血為圓如菜豆大每服參

粒臨卧人參湯下

九僊丹安心志固精氣

兔絲子水淘淨

石蓮子去心

益智子水淘淨

香附子去心

北五味子酒浸

參味壹處用水壹碗半慢火同煮候猪心爛

韭子洗淨

金鈴子洗淨

車前子洗淨

覆盆子洗淨

右等分為細末酒糊為圓如梧桐子大每服佰

圓空心食前温酒下

生益丹治血少氣弱肌肉不榮脚膝無力眼目多昏等疾

鹿角膠

乾山藥各壹兩

白茯苓去皮

杜丹皮

柏子仁別研

狗忌子

兔絲子洗淨

人參去蘆

五味子

遠志去心

牛膝去蘆

肉蓯蓉壹兩

當歸去蘆

熟乾地黄壹兩

生乾地黄壹兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服肆伍拾

圓空心食前温酒鹽湯下

朱砂琥珀圓

獐猪心壹枚

當歸去蘆

麥門冬壹兩

參味壹處用水壹碗半慢火同煮候猪心爛

去貳藥只取猪心慢火熬乾爛研入後藥

朱砂研別

琥珀研半兩

熟乾地黃洗

酸棗仁炒

右為細末和均煉蜜為圓如梧桐子大每服伍

拾圓空心溫酒下

八物定志圓

人參去蘆

茯神去木

朱砂研別

石菖蒲壹宿

右為細末煮棗肉為圓如梧桐子大每服參拾

圓棗湯或溫酒下不拘時候

朱附圓治心虛睡而汗出

附子炮去

朱砂研別

右為細末棗肉為圓如梧桐子大每服參拾圓

溫酒鹽湯下食前服兩壹方加鍾乳粉壹

遠志圓治心氣不寧安魂定魄去風涎鎮驚氣

酸棗仁炒別

白附子炮

石菖蒲

天南星炮

麥門冬心去

半夏炒

辰砂研別

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大朱砂為衣每

服參拾圓溫酒或人參湯下不計時候

補心圓治男子婦人童男室女憂愁思慮食飽志

怒耗傷心氣精神不守酒後房事百脉離經榮衛

既失調和臟腑遂生疾病陰陽不足則寒熱往來

氣血虛耗皮毛枯槁心不足則怔忡冒亂夢寐驚

惶腎不足則乏力失精小便淋瀝肝不足則目昏

疲倦四肢煩疼肺不足則利不常痰嗽喘急脾

胃不足則面黃腹急飲食無味五臟既有虧損各

有證候難以一槩陳之故立此方生養氣血補不

足瀉有餘滋潤精血養固真元使邪氣無侵令榮

衛堅守氣治鼻衄沙石淋及婦人產後勞勞平日

惡露肌疲骨蒸久無子息或姙月未足多致損墮

遠志心去

人參去蘆

白茯苓皮去

龍骨煨

天麻

鐵粉各壹兩

諸虛不足日久淹延之疾並皆治之

酸棗仁炒去殼

薏苡仁炒

栝子仁炒

車前子炒

五味子炒

覆盆子炒

穿心巴乾心去

兔絲子淘淨酒浸

肉蓯蓉酒去浸

沉香不見

乳香研別

鹿茸炙

當歸酒去浸

人參去蘆

防風去蘆

狗忌子

白茯苓去皮

熟乾地黃洗

右等分爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服伍拾

圓蓮心湯下日進貳服鹽湯飯飲亦得

茯神酸棗仁湯補心氣不足治小便澀濁

酸棗仁炒

人參去蘆

黃香炙

朱砂研別

遠志半去心各

茯神去木

白朮炒

山藥各壹

木香不見

右爲細末每服貳錢白湯點服不拘時候

補心湯寧心定志升降榮衛

人參去蘆

龍齒

桔梗去蘆

遠志湯泡

茯神去木

半夏炒

枳實去穢

當歸酒去浸

甘草炙

白茯苓去皮

黃芪壹兩

桂心壹兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半生薑參片棗子貳枚煎至捌分去滓食前服

又方

酸棗仁貳兩泡去殼

乾山藥

右爲細末却入酸棗仁壹處和之每服貳錢食

前空心煎棗湯調下

蓮肉去心

茯神去木

辰砂寧心散治男子婦人心血久虛陰陽不和憂

愁思慮睡卧不安精神恍惚五心煩熱骨節酸痛

面如火熾頭目昏眩耳內蟬鳴虛氣獨行中滿氣

隘口無津液狀若飲酒此藥專治一切心疾服之

甚有神驗

人參去蘆

木香不見

白茯苓去皮

白朮炒

藿香葉 洗去土

酸棗仁 研別

白附子 炮

甘草 炙

辰砂 研別

右為細末每服貳錢水壹盞生薑參片棗子壹

枚煎柒分空心食前臨卧溫服

金鎖散治遺精白濁益血養氣

鹿角霜 壹兩

白茯苓 皮去

兔絲子 淘淨酒浸研成餅

牡蠣粉 兩半

右為末每服參錢用舶上茴香參拾粒炒赤色

香熟入酒壹盞煎肆伍沸放溫調藥服不拘時

候服

治腎氣

立神丹治下部膀胱疝氣小腸氣等疾

茴香 貳兩用斑貓貳拾壹箇去頭足翅同

香附子 肆兩去毛入

右同前斑貓柒箇共參味壹處為細末用醋糊

肉豆蔻 麩裏

龍齒 研別

遠志 心去

牡蠣粉 兩各壹

肉桂 去麤皮不見

右為細末每服貳錢水壹盞生薑參片棗子壹

枚煎柒分空心食前臨卧溫服

金鎖散治遺精白濁益血養氣

白龍骨 參分米醋浸

益智仁 各壹

車前子 洗淨壹分

右為末每服參錢用舶上茴香參拾粒炒赤色

香熟入酒壹盞煎肆伍沸放溫調藥服不拘時

候服

候服

候服

候服

候服

候服

候服

為圓如梧桐子大每服參拾圓鹽湯或溫酒任

下不拘時候

金鈴子圓

金鈴子 貳拾壹枚

茴香 壹兩

補骨脂 壹兩

胡蘆巴 壹兩

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服拾伍圓

加至貳拾圓或參拾圓止用溫酒任下空心食

前服

又方消腎氣溫暖下元

金鈴子 兩取肉秤參

蒼朮 壹兩

台椒 壹兩

五味子 壹兩

良薑 壹兩

川烏頭 壹兩

杜仲 壹兩

熟乾地黃 壹兩

破故紙 壹兩

右為細末酒煮麪糊為圓如梧桐子大每服伍
陸拾圓食前鹽酒鹽湯任下
又方治小腸氣壹服立愈

牽牛子炒

青皮去穢

良薑各壹

川練子炮去

舶上茴香各兩

延胡索壹兩

右為細末生薑自然汁煮糊圓如梧桐子大朱
砂為衣每服參拾圓燒綿灰浸酒下不計時候
木香定痛圓治小腸氣

川練子壹兩去核用巴豆參拾粒去穢

木香生用

茱萸米醋煮熟

當歸參錢

右為末米醋糊為圓如菜豆大每服參拾圓茴
香酒下病發時服之

五香圓治膜外氣攻築疼痛并痰嗽及丈夫小腸
氣疾

舶上茴香壹兩

丁香乾懷

乳香研別

木香各半

麝香壹分

蛤蚧壹兩

血蠟肆錢

沙苑壹兩

黑牽牛炒參錢
右為細末酒糊為圓如菜豆大每服拾粒食前
麝香湯送下

受拜茴香圓治一切疝氣

舶上茴香壹兩

破故布法如前

杜仲薑製

川椒去目

南木香壹兩

胡蘆巴炒參兩

川椒去目

吳茱萸湯泡

南木香壹兩

延胡索壹兩

川椒去目

川烏頭炮去皮臍

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服參拾圓
至肆拾圓空心溫酒送下鹽湯亦得此藥補腎
消疝止痛不動氣比之內消圓尤為奇特可受
古今疝氣藥之拜

茱萸內消圓治膀胱小腸疝氣木腎偏墜等疾

川練子

川烏頭炮去皮臍

川椒去目

川椒去目

川椒去目

川椒去目

川椒去目

川椒去目

胡椒圓治偏墜，
百單捌圓自有神驗。

胡椒 伍拾粒

川練子 拾粒

茴香 兩

右陸味却將斑貓同炒訖去斑貓為末米醋圓

如菜豆大每服拾伍圓熱酒送下

追痛圓治小腸氣痛不可忍

川苦練 肆拾筒

茴香 壹兩

右為細末酒煮麪糊圓如梧桐子大每服貳拾

圓食前溫酒或鹽湯下

消腎脫鉗圓治一切下部疾痛不可忍者

澤瀉 水猪苓

白朮 木通

青皮 青木香

陳皮 以上各陸兩為末

川練子 核炮去

胡蘆巴 炒

斑貓 貳拾壹筒

淡豆 壹佰

香附子 壹兩

片巴豆 肆拾

赤色只用苦練

水猪苓 皮去黑

木通 皮去

青木香

以上各陸兩為末

胡蘆巴 炒

茴香 壹兩

以上各拾貳兩各用斑貓參兩各炒

香熟泣去斑貓不用

黑牽牛 壹斤

右件泣為細末酒糊圓如梧桐子大每服肆拾

圓或伍拾圓先用桃仁菜粒茴香壹撮葱頭參

莖同炒香熟細嚼溫鹽酒送下

應神散療小腸氣痛不可忍

延胡索 炒

胡椒

右等分為細末每服貳大錢酒水各半蓋煎茶

分食前服

火墜散治疝妙甚

益智 連皮炒

南木香 用生

右等分為細末每服貳錢溫酒調下遇病發時

服以熱到疼處為驗

沈香散治膀胱腎氣小腸疼痛不可忍者

沈香 不見

甘草 兩

京三稜 炮

破故紙 炒

斑貓 參兩

黑牽牛 壹斤

右件泣為細末酒糊圓如梧桐子大每服肆拾

圓或伍拾圓先用桃仁菜粒茴香壹撮葱頭參

莖同炒香熟細嚼溫鹽酒送下

應神散療小腸氣痛不可忍

延胡索 炒

胡椒

右等分為細末每服貳大錢酒水各半蓋煎茶

分食前服

火墜散治疝妙甚

益智 連皮炒

南木香 用生

右等分為細末每服貳錢溫酒調下遇病發時

服以熱到疼處為驗

沈香散治膀胱腎氣小腸疼痛不可忍者

沈香 不見

甘草 兩

京三稜 炮

船上茴香炒 桃仁去皮尖炒別

右捌味到碎慢火炒令黃色秤為細末每服貳錢食前炒葱酒調下

全蠍散治小腸氣痛極不食下泄

全蠍貳拾肆 川練子炮去

茴香淘去 桃仁各半兩

青橘皮分去

右為細末每服貳錢水捌分盞入鹽少許葱白

立効散治小腸氣或疼不可忍疾作時服甚驗

大川練子伍箇炮 青皮去穢

船上茴香壹兩 木通壹把長

巴豆伍拾粒 右件同炒令黃色淨揀去巴豆不用將餘藥同

為細末再入海金砂壹錢滑石末壹錢半同研

每服壹錢熱酒調下立効

真珠散治膀胱蘊熱風濕相乘外腎腫脹小便不利塞痛

白牽牛貳兩 白朮炒
陳皮去穢 木通去

桑白皮各半

右為細末每服貳錢生薑湯調下食前日午臨卧服初服且進壹服未覺驗再服此藥不損氣只是導利留滯

百兩金治腎氣疼痛

破故紙炒 茴香淘去

吳茱萸湯泡 川練子肉生用各

木香不見 乳香研別

右為末每服貳錢食前沸湯調下

黃仙餅子治外腎腫痛偏墜膀胱婦人育腸痛症

死者兼治水氣

川練子參兩 雄黃壹兩

黑附子壹兩 木香壹兩

雄黃壹兩 船上茴香壹兩

右為細末酒糊為餅子每服伍茶餅空心酒嚙

破故紙壹兩 桂有羊兩者不見火

右為細末酒糊為餅子每服伍茶餅空心酒嚙

下日進參服不半月即除根本久年者亦治之
如作圓子如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓
如神效

淋洗法治外腎偏硬如石停留不散及下部諸疾

貫衆

藟木

藿香

吳茱萸

枳殼

杜仲

蛇床子

官桂各等分

右為麤末水參伍碗藥末貳兩許用絹裹煎拾
餘沸乘熱適手淋洗以藥包洗小腹畢以衣被

裏片時不得見風甚妙

治腎氣兜法

牡蠣用淨洗舊草鞋兩隻密包裹用黃泥固濟
大火煨壹日取出如粉碾細貳兩入熟艾半斤
生硫黃半兩細碾打和每服伍錢用絹裹兜上

疝氣傳藥

以火煨牡蠣粉乾薑末水浸取清汁調傳腫疼
處若只用乾薑末須臾如火燔不可忍

痰飲

上清丹治風痰頭痛不可忍

南華丹

天南星大者去皮 舶上茴香炒
右等分為細末入鹽少許在麪內用淡醋打糊
為圓如梧桐子大每服參伍拾圓食後薑湯下

天南星肆兩

白茯苓去及

吳茱萸湯泡

木香半兩

白朮炒

枳實去穢

橘紅各貳兩

右為細末以半夏陸兩湯浸柒次為末再用薑
汁熟煮半夏作糊圓如梧桐子大每服參伍拾
圓食後生薑湯下

羽澤圓治風痰及酒後痰飲

天南星

半夏

右各等分生切碎南星用皂角水半夏用礬水
各浸柒日取出焙乾別用白殭蠶肆兩剉炒同
為細末生薑自然汁和圓如梧桐子大每服參
伍拾圓食後薑湯下

青金圓治痰涎潮盛咳嗽及小兒急驚風

南鵬砂黃色者

天南星炮

川甜消並別

真鬱金各壹分

片腦別研

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服壹圓含化以人參湯漱下

平胃圓治痰章運使

平胃散兩肆

半夏薑製為末肆兩

右和調用好棗壹佰枚燈草壹小把水壹大碗同煮候棗爛去燈心棗子去皮核取肉為圓如

梧桐子大每服伍拾圓空心薑湯下熟水亦得四倍圓化痰

木香壹兩不見火

橘紅兩貳

白朮肆兩

半夏半斤湯泡柒次

右為細末生薑自然汁打麪糊為圓如梧桐子大每服肆伍拾圓薑湯下食後臨臥服消飲圓去腹間虛熱

白朮炒

半夏兩各壹

白茯苓去皮

吳茱萸湯泡柒次炒

人參去蘆

枳實去穢炒

神麪炒

麥蘖炒各半兩

右為細末將神麪麥蘖生薑汁煮糊為圓如梧桐子大每服貳參拾圓食後薑湯下

滌痰圓

白附子壹兩炮

天南星湯泡柒次

白蠶蠶直者炒去絲

滑石兩參

右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服參肆拾圓薑湯送下不拘時候

刷痰圓

天南星

半夏

白附子

川烏頭生去反

已上各貳兩為細末用水浸壹宿次日去水曝乾先用皮紙於灰上閣令

稍乾然後曝再研細入後藥

全蠍兩半

天麻壹兩

右為細末入前藥和以麪糊為圓如梧桐子大每服貳拾圓生薑湯下不拘時候

導痰圓

天南星

半夏各肆兩

皂角斤半

生薑壹斤

右不得犯銅鐵器用水浸高參指許煮參通逐旋煮水乾再添候參通畢去生薑皂角不用只用半夏天南星為末生薑自然汁為圓如梧桐

子大每服參拾圓或伍拾圓熟水下

化痰消飲圓

陸仲安方

橘紅

壹斤用生薑壹斤又同搗候乾用

人參

去蘆

半夏

湯泡

白茯苓

去皮

縮砂仁

炒各

右為細末薑汁煮薄麵糊為圓如梧桐子大每

服參伍拾圓至陸柒拾圓生薑湯下或熟水送

下不拘時候

溫白圓

天南星 湯泡

白茯苓 去皮

陳皮 去

乾薑 洗炮

右等分為細末薑汁打麪糊為圓如梧桐子大

每服參拾圓生薑湯下不拘時候

透高圓消五飲

高良薑 炒

縮砂仁

揀丁香 不見

天南星 湯泡

陳皮 去

青木香

青皮 去

半夏 湯泡

丁香 不見

肉桂 去麤皮

右等分為細末生薑自然汁煮糊圓如梧桐子

大每服參拾圓至柒拾圓食前生薑湯下

決壅破飲圓治脾胃冷膈隘生痰飲食遲化涎沫

壅塞咽喉不利酒後尤盛此藥大能趕逐痰飲快

氣利膈

半夏 湯泡

枳實 去穢

青皮 去

桔梗 炒

天南星 湯泡

麥蘗 炒

右等分為細末薑汁煮糊為圓如梧桐子大焙

乾每服參肆拾圓食後溫米飲下或生薑紫蘇

湯任下

倍薑半夏圓

乾薑 洗兩

半夏 湯泡

橘紅 各壹

白礬 枯

天南星 湯泡

右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服參拾圓

薑湯下不拘時候

某扣圓治中焦停飲癖胃膈不快惡心嘔逆痰氣

隘盛頭目旋運不美飲食此藥能降氣消飲服之

使小便流利則痰氣降也

茯苓兩粉紅者肆 枳實去穢炒

吳茱萸湯泡皮

右為細末薑汁煮神麩糊為圓如梧桐子大每

服參伍拾圓生薑湯下食後稍空服

茱萸半夏圓

天南星炮

白茯苓皮去

五味子枝去

木香壹分不

白朮炒

吳茱萸湯泡皮

訶子肉壹兩

右為細末用半夏末以生薑自然汁打糊為圓

如梧桐子大每服伍拾圓生薑湯下不拘時候

橘皮茯苓圓降氣消痰寬膈和胃美進飲食去濕

利水

橘皮去白淨 枳實半兩

白茯苓去皮 枳實半兩

右為細末薑汁煮糊為圓如梧桐子大每服伍

陸拾圓溫熱水下

桔梗圓除痰下氣治胃腸脹滿寒熱嘔噦心下堅

痞短氣煩悶飲食不下

桔梗微炒

枳實去穢炒

右為細末滴水圓如梧桐子大每服伍拾圓薑

湯下

半夏圓治嗽化痰

半夏壹兩

丁香壹錢

白礬壹錢

右為細末用生薑汁煮糊為圓如梧桐子大每

服壹拾伍圓至貳拾圓食後臨卧薑湯送下

天南星圓專治酒後痰飲

天南星伍兩去臍湯浸貳參時焙乾為細末壹

半用生薑汁打糊搜壹半為圓如梧桐子大每

服肆伍拾圓薑湯下

生薑橘皮圓升降津氣消飲去痰溫中散寒快膈

美食

陳皮壹斤

藿香葉各貳

人參壹兩

半夏湯泡

白茯苓皮去

右件為細末用薑汁煮糊為圓如梧桐子大每

服參拾圓薑湯下食後服壹方只用陳皮壹斤

白礬圓治遠年日近風壅痰甚一切喘咳

知母

款冬花

礬貳兩

貝母
半夏湯泡 各半兩

右為細末以生薑自然汁為圓如梧桐子大每服伍拾圓蘿蔔子煎湯入薑汁少許送下臨嗽時服

半夏圓治痰

天南星

半夏

右各肆兩為細末生薑半斤研細拌作大圓子以榜葉裹縛於草中菴如罨麪之狀候乾入搗皮香附子肆兩竝為末薑汁煮神麪糊為圓如梧桐子大每服參肆拾圓食後薑湯下香檮圓降氣消痰寬中快膈

香附子去毛

檮皮去白

生薑

右等分為細末神麪糊為圓如梧桐子大每服肆伍拾圓白湯送下不拘時候痰嗽圓治痰嗽狀如勞疾

半夏肆兩為末以生薑汁調成餅子炙

蒼朮去皮參兩切片用米泔水浸壹宿曬乾用醋炒參次

陳皮新去白薑汁製

右為細末薑汁為圓如梧桐子大每服肆伍拾圓米飲下日進參服

圓米飲下日進參服

檮皮去白秤

白朮炒

縮砂仁各壹兩

藿香葉各半兩

丁香不見

右為細末神麪糊為圓如梧桐子大每服伍柒拾圓薑湯下

丁香不見

丁香半夏湯治冷氣上攻惡心嘔逆不思飲食寒痰不止

痰不止

乾薑各半兩

丁香不見

右為對末每服參錢水壹盞半生薑拾片煎至

柒分去滓不拘時候

柒煎半夏湯

吳茱萸湯泡

附子皮生去

白茯苓皮去

半夏湯泡

天麻

半夏湯泡

香附子壹兩

生薑拾片煎至

半夏湯泡

檮皮各參

木香 參錢不
甘草 壹分
五味子 兩

右咬咀為末每服肆錢水壹盞半生薑柒片煎至茶分去滓不拘時候熱服

豁痰湯治痰厥

陳皮 洗去
半夏 壹錢
天南星 貳錢
赤茯苓 各參
大附子 壹隻去皮
臍生用

右薄切片子分作參服水參大盞生薑貳兩慢火煎至陸分去滓溫服不拘時候

鍾乳生附湯治肺虛寒咳嗽痰壅

鍾乳粉
天南星 壹兩
附子 生去皮臍 各半兩

右為細末每服貳錢生薑壹兩作拾片煎至茶分去滓不拘時候服小兒加減服之

附子細辛湯治寒痰咳嗽

附子 炮去
甘草 半兩
細辛

右為麤末每服伍錢水貳盞煎至壹盞去滓食

前溫服煎時入薑伍片

附子陸降湯陸仲

附子 生去
橘紅
肉桂 不見
白朮 炒
半夏 湯泡
木香 壹錢不
天南星 湯泡
甘草 灸
吳茱萸 各壹兩半湯
白芍藥
白茯苓 各參兩
去皮

右咬咀每服肆錢水壹盞半生薑伍片煎至茶分去滓不拘時候服

橘皮枳實湯

橘皮 去白
人參 錢
吳茱萸 貳兩湯泡
枳實 去穢炒
半夏 壹兩湯泡

右咬咀每服參大錢水壹盞半生薑拾大斤棗子貳箇煎茶分不拘時候去滓溫服

平肺湯治肺經感寒邪痰嗽盛者

桔梗 炒
陳皮 壹兩
天南星 炮
桑白皮 炒
半夏 湯泡
川薑 貳兩洗各

人參 壹兩半

右為麤末每服伍錢水貳盞生薑伍片煎至茶分去滓食後服

除飲湯

附子 壹兩

天南星 炮

白茯苓 各半兩

白附子 錢貳
白朮 炒

右為麤末每服半兩水貳盞生薑貳拾片同煎

至捌分去滓空心通口服

殊勝湯去痰涎進飲食

半夏 壹兩

甘草 壹寸

右用水壹盞半生薑柒片同煎至壹盞空心稍

熱服

清涎湯

半夏 壹斤以白礬肆兩逐旋泡浸冬月

縮砂 肆兩以生薑自然汁煮度

白豆 壹兩

白豆 壹兩

右為細末每服貳錢沸湯調下

鐵刷湯

附子 壹兩

半夏 壹兩

右咬咀每服參錢水貳盞生薑拾大斤煎至茶分去滓食後服

五聖湯治肺虛咳嗽上氣痰涎壅盛

櫻栗殼 壹兩

甘草 生

良薑 壹分

良薑 壹分

右咬咀每服肆錢水壹盞煎至肆分臨卧服

星附定暈湯治肺經虛衰脾臟怯弱風邪痰飲伏

留於三陽之經氣體羸弱每遇將息失宜或有感

冒飲食不調則痰作嘔吐頭暈心胃痞悶氣血不

和此藥消痰生胃和正氣血寬中定暈升降三焦

止嘔快膈進食應是痰厥痰實氣痰冷痰停痰宿

飲甚至旋暈嘔逆如屋旋倒者但服此藥必効

大天南星 壹兩

附子 壹兩

天雄 壹兩

川芎 壹兩

川芎 壹兩

橘紅 半兩

天南星 炮

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

木香 貳錢

半夏團大者參拾壹枚壹半薑汁同研
白附子拾肆枚半
甘草拾寸半
蠅梢貳拾枚半

右咬咀每服參大錢生薑拾片棗子壹枚水壹

盞半煎至茶分去滓不拘時候服

刷痰湯治留飲停痰

半夏湯泡
紫蘇葉
赤茯苓去皮
陳橘皮去白各壹兩

右咬咀每服壹兩水貳盞薑壹分拍碎同煎至

捌分食前頓服

獨薑湯治痰厥不省語音不出

生薑自然汁約壹小盞溫過服之即時吐出痰

涎便自無事

欬氣散除痰下氣止嗽進食

白朮炒
糯米各貳兩
人參去蘆
甘草炒各半兩

右為細末每服貳錢水壹大盞生薑參片棗子壹枚煎至陸分不拘時候服

參朮散治上膈痰壅咳嗽聲微或表中風邪裏則不消

人參去蘆
白朮炒
白茯苓去皮
甘草炙各壹兩
桑白皮炒各半兩
訶子去核
桔梗炒
大腹子貳枚

右為細末每服貳錢水壹盞生薑參片棗子壹枚煎至茶分食後服

八寶飲治嗽

櫻粟殼去穢帶頂蜜炒
橘紅

欬冬花
桑白皮
百合
桔梗炒
阿膠剉碎炒成珠

右等分為蠶末每服參大錢水壹盞半生薑伍大斤烏梅壹枚北棗貳箇擘開同煎至捌分去滓臨卧溫服

參訶飲治虛寒痰嗽

訶子去核
黃芪蜜炙
人參去蘆
白朮炒
白茯苓去皮
半夏炒各貳錢

肉桂壹分去蟲及不見火

右為咬咀每服肆錢水壹盞半生薑參片煎至
茶分去滓食前服又方加五味子

茸附湯治脾腎俱虛臟腑滑瀉

鹿茸壹兩酒炙

肉豆蔻壹兩煨

白朮各壹分炒

附子貳隻炮

當歸去蘆酒浸

右為麤末每服參錢水壹盞半薑參片煎壹枚
煎至玖分去滓食前溫服

又方補肝腎心血

鹿茸去毛切作片酒浸炙

人參去蘆

當歸去蘆酒浸

熟乾地黃各壹分洗

附子炮半去皮臍

肉蓯蓉酒洗去殼皮

遠志去心炒黃

白芍藥

肉桂去蟲皮不見火

右焙燥為麤末每服伍錢水壹盞半生薑伍片
煎至捌分取清汁食前空心服

羊肉湯治血虛不進飲食

精羊肉

右薄批作小片子用水參大椀煎至壹大椀羊

汁入當歸芍藥各伍錢再煎茶分去滓食前服

小補髓湯孫路分

柴茸極老者不妨刮去毛鋸作甘蕪段再臂作薄片子

大宿砂仁去膜碎

右每服秤柴茸參錢宿砂仁壹錢水壹大椀同
煮至壹盞半去滓取清汁壹盞於溫空心飲之
日進貳服如服此藥須臾去壹切湯劑

龍虎湯調榮衛治虛勞寒熱

鹿茸壹兩酒洗去毛

附子貳兩炮

黃香鹽水浸炙

肉蓯蓉酒洗去殼皮

白朮各壹兩

右為麤末每服參錢水壹盞半煎至茶分食前
去滓服

加減十全湯調榮衛壯力退熱收虛汗美飲食悅
顏色諸虛百損皆可服之

川芎

白芍藥

半夏湯泡七

人參去蘆

金釵石斛酒浸

川當歸去蘆酒浸

熟乾地黃酒洗

秦朮去蘆

白朮炒

甘艸炙

鹿角膠剉熟炒
黃芪壹兩
銀州柴胡去蘆各
白茯苓去皮
肉桂不見火

右咬咀每服參大錢水壹盞半生薑伍片棗子壹枚入錫壹塊煎茶分去滓熱服不拘時候
補氣湯補榮衛治虛勞咳嗽寒熱往來四肢乏力

鹿茸去毛剉作
白朮剉兩
北五味子去梗
人參去蘆
當歸去蘆
附子去皮
黃芪鹽水
金釵石斛

右為細末每服貳錢水壹盞半生薑參片棗子壹枚煎至茶分食前服
附子降氣湯

附子炮去
白茯苓去皮
木香各半兩
人參去蘆各
白朮炒

右為細末生薑參片棗子壹枚水壹盞半煎茶分去滓食前服
黃香散補男子婦人諸虛不足應病後羸之微發

寒熱精竭力弱血氣勞傷痰多嘔逆不思飲食骨節酸痛咳嗽氣急面色浮黃者竝皆補之

人參去蘆
半夏湯泡
當歸去蘆
白朮剉兩
甘艸炙
神曲炒
肉桂不見火
白芍藥兩
麥芽炒
白茯苓去皮
黃香洗

右咬咀每服參錢生薑伍片棗子參箇水壹盞半煎捌分去滓食前溫服此藥有神妙之功大

勝黃芪建中湯
大附散治真陽不足臟氣虛弱榮衛損耗

附子炮去
茯苓去皮
金釵石斛洗淨細剉
黃香鹽水
川芎各壹
甘艸各
山藥去蘆尾
當歸酒浸
木香不見火
人參去蘆
白朮炒

右為細末每服貳錢水壹盞半生薑參片棗子壹箇煎至茶分空心食前服虛弱人傷風加葱

白參子盜汗加小麥參伍拾粒同煎
沈香歸附散治氣不升降順三焦快脾氣

沈香火不見

白豆蔻各半

人參去蘆

甘州參錢

附子炮去皮臍

當歸去蘆洗淨

當歸各壹兩

右為細末每服貳錢水壹盞生薑參片棗子壹

枚煎茶分食前溫服

龍虎飲治虛勞脚弱壯筋益血

鹿茸酒浸

附子炮去皮臍

人參去蘆

草薢

金釵石斛酒浸

杜仲去皮剉薑

肉蓯蓉酒浸

木瓜

當歸酒浸

黃芪蜜水炙

右咬咀每服參錢水壹盞半生薑參片棗子壹

枚煎茶分去滓食前服

附子鹿角煎填精髓補不足

將鹿角寸截肆破之用河水浸柒日淨洗每斤

用杜仲半斤細剉同入瓷瓶內貯水以文武火

煮參日水耗則添候角軟去杜仲將角焙乾為

細末每角肆兩入附子壹兩炮去皮臍同為末
以所煮角膠圓如梧桐子大每服參伍拾圓空
心溫酒鹽湯下

鹿茸地黃煎益精養血長肌肉生津液壯腰脚

鹿茸去毛

肉蓯蓉洗去沙

熟乾地黃洗

羊脊髓各壹兩

右以鹿茸地黃貳味為細末以蓯蓉羊脊髓入

醇酒壹大盞石器內慢火煮候酒乾研成膏和

前藥末每服壹匙溫酒化下

補益延壽膏當服百病皆愈活血通氣養神安志

服之半月面悅澤而體潤滑不生瘡瘍等

生乾地黃

熟乾地黃各肆兩

川當歸酒浸

防風去蘆各

右為細末用大藕參條去皮節切片研取汁壹

椀同前藥於銀器內熬成膏子令厚入蜜肆兩

同熬成膏却頓砂器內每用壹匙空心或日午

臨卧以酒調服半月見效面色紅潤如不飲酒

人入沸湯調之亦無礙大能去山嵐瘴氣

沈附膏治男子真氣傷備形羸氣劣漸成勞瘵將

不救者服之有效

附子貳隻重裝錢者慢火炮去皮臍以快刀薄切如紙平分作參服每服別用沉香烏藥各壹錢重各用水壹分於麤磁器中磨膏子別頓取前附子壹分以水捌分浸附子在銀器內用物畫記水痕更入水壹大盞慢火煎至所記痕處去附子席却入烏沈膏子和調再煎略沸傾出夏用則用冰雪浸極冷服之冬則露壹宿來日早服此藥徑歸丹田滋助真氣不停留胃膈磨燥至虛弱危甚者不過此壹劑可保無虞將附子滓用熱蒸餅和喫或留滓焙乾為末酒糊圓

如梧桐子大服之亦得

椒黃酒補暖下元

去日并合口

熟乾地黃洗

右大約各壹掬剉碎用生絹袋盛酒浸壹宿只飲酒藥味淡則去舊藥換新藥貳味煎乾亦可

別用

煮鹿角膠法

須用兩鍋壹鍋常

每溫湯半用慢添

鹿角

不用許截斷去麤皮

右鹿角用河水浸柒日其水每日壹易候日足洗淨鍋內煮每鹿角伍斤用桑白皮半斤楮實

壹斤舶上硫黃貳兩朱砂貳兩同煮加水畫旋添湯及壹伏時自然軟或火不相繼未甚軟再煮壹時軟則放冷取出於當風掛起便是白霜可入藥用其汁瀉去藥滓再熬却成膠矣滴冷處堅硬為度

服秋石法

人參壹兩

白茯苓壹兩

秋石研別

右將秋石研極細參味搗為末拌和棗肉為圓如梧桐子大每服參拾圓空心鹽湯或鹽酒下

陽氣虛極入從容半兩酒煮加膠為圓每料復入遠志半兩去心用通心氣左佳

製附子調服法

凡服附子當先製其毒其法用新瓦壹片置附子於上以硬炭火肆面寬圍之先用雪白鹽泡湯斷其側有頂藥裂去皮臍投鹽湯內必潤復取實瓦上既乾又投湯內如是參肆次又破作兩片又如前法參肆次又破作肆片又如前法參肆次又破作捌片又如前法參肆次其藥斂裂既多鹽味透徹藥毒去盡候冷末之白湯煎

服每服貳錢加薑汁少許空心白湯煎下亦得蓋今人多以附子作薑附湯服每切片子煎之熱則去滓其藥入經絡而無補於脾胃人以脾腎為主今所服藥既為末子不入經絡其末復留脾臟則可以壯脾胃進飲食
羊腎羹治羸瘦虛損陽氣衰弱腰脚無力服之令人肥健

右已上竝於豉汁中煮入伍味作羹空腹食之

羊腎粥

羊腎 壹對 去脂膜切
葱白 參莖 去
肉蓯蓉 壹兩 酒浸壹宿去殼皮
韭白 葵莖 去
粳米 壹合

右先將羊腎及蓯蓉入少酒炒後入水貳大盞半并米煮之欲熟次下葱白韭白煮作粥入伍味調和空腹食之

附子麪

附子壹隻炮令熟去皮尖為細末和麪肆兩壹處篩過然後用薑汁入溫湯攪和打成茶子麪

分作貳服煮熟以雞羊之類為汁唯不可用猪肉汁麵隨多少食

虛勞

山藥圓治虛勞腎臟衰弱小便白濁腿膝無力

山藥 炮去
附子 皮去
肉桂 不見火
牛膝 蘆去
金釵石斛 酒浸各壹兩
熟乾地黃 洗貳兩
山藥 洗
兔絲子 洗研成餅壹
韭菜子 炒
五味子 枝去
白茯苓 皮去
肉蓯蓉 參兩 酒浸
白龍骨 壹兩 研半
牡丹皮

右為細末煉蜜和搗參貳佰下圓如梧桐子大每服參拾圓食前溫酒下
栝子仁圓截陽氣止盜汗進飲食退經絡熱

栝子仁 去
人參 蘆去
麻黃根
五味子 各壹兩
麥麪 半兩
半夏 麪 各貳兩
牡蠣 醋火 碎
白朮 炒
右為細末用棗肉圓如梧桐子大每服參肆拾

圓米飲下日進貳服得效減壹服
 十八味黃香建中湯治男子婦人不問老幼榮衛
 不調五心煩熱狀如勞瘵其疾如勞口苦舌乾不
 思飲食壹切虛損並皆治之

黃香去蜜 肉桂去麤皮 人參去蘆 鼈甲去醋 南木香不見 柴胡去苗 熟乾地黄 甘草炙 當歸去酒 白茯苓去蘆 地骨皮去骨 秦朮洗

附子炮去 川芎湯泡 半夏湯泡 右咬咀每服貳大錢水壹盞半生薑伍片棗貳
 枚同煎至茶分去滓空心服
 二十四味大建中湯治男子婦人體虛寒熱往來
 日久未愈不思飲食肌肉消瘦虛勞寒熱口燥咽
 乾神効不可其述

人參去蘆 桔梗炒 白茯苓去皮 柴胡去苗

甘草炙 當歸去蘆 川芎湯泡 半夏湯泡 草菓子 白芍藥 鼈甲去醋 烏梅肉 檳榔半 木香壹錢 陳橘皮去 秦朮洗 阿膠炒 栝子仁 烏藥各壹 黃香去蜜 地黃熟 五味子各 地骨皮去骨 肉桂壹錢

右咬咀每服肆錢水壹盞半生薑參片棗子貳
 枚煎至捌分去滓不計時候服
 木香黃芪湯治虛勞榮衛不和時或潮熱夜有盜
 汗口乾引飲四肢無力肌體黃瘦

黃香去蜜 人參去蘆 白芍藥 白茯苓去皮 白朮壹兩 右咬咀每服貳錢半水壹盞煎至半盞去滓溫

服不拘時候

當歸黃芪湯補諸虛不足調榮衛退虛熱進飲食

黃香去蜜

熟乾地黃洗

人參去蘆

白茯苓去皮

甘草炙

右咬咀每服肆錢水壹盞半生薑參片棗子壹枚煎至米分去滓食前溫服

大補黃香湯調養氣血

黃香去蜜

川芎

當歸去蘆酒浸

肉桂去蘆皮

人參去蘆

白茯苓去皮

肉蓯蓉酒浸

右咬咀每服伍錢水壹盞中益半生薑伍片棗子壹枚同煎至捌分去滓空心食前溫服

參香鼈甲散治勞倦補虛壯力調榮衛進飲食

防風去蘆

山茱萸肉核去

白朮炙

甘州炙

五味子各壹兩

熟乾地黃洗

人參去蘆

鼈甲去殼淨酒

當歸去蘆酒浸

甘州炙

附子炮去皮

金釵石斛

肉桂去皮

右為細末每服貳錢水壹大盞生薑參片棗子烏梅各壹枚煎至米分去滓空心食前溫酒調下亦得

下亦得

猪骨散治諸勞氣蒸熱倦怠腰脚酸疼四肢困重

不美飲食肌膚瘦悴

秦朮洗

前胡各壹兩

藜蘆各壹兩

鼈甲洗

黃香去蜜

白朮炒

白茯苓去皮

白芍藥去蘆

附子炮去皮

乾薑洗

肉桂去皮

柴胡去苗

川烏頭炮去皮

燕萸去皮

甘草各半兩

右用雄猪脊骨壹全副去頭尾各壹節去肉將骨細判入水貳大碗磁器中煮令水盡除燕萸甘草貳味外餘竝入猪骨中好酒壹斗同煮令酒盡却入燕萸甘草同焙乾為末每服貳錢溫

酒調下空心夜卧服百無所忌
無名散大解勞倦

天僊藤

香白芷

甘草半兩

右為細末每服貳錢水壹盞生薑參片烏梅壹

枚煎茶分食前稍熱服

從容散治虛勞傷德四肢羸瘦腰膝無力及不進飲食

肉從容酒浸壹宿

熟乾地黄洗

附子炮去

金釵石斛洗

黃耆炙

白茯苓洗

牛膝去鹽

人參去

防風去鹽

白朮炒

五味子去

肉桂各半兩去蟲

右件咬咀每服肆錢水壹中盞生薑半分棗子

參枚煎至陸分去滓食前服
如意散治憂思過度心血不足倦乏瘦悴或夜發寒熱

百合

黃耆炙

烏藥

香附子各壹兩

沉香見火

當歸去

人參去

甘草炙

白茯苓去

右等分為細末每服參錢水壹盞生薑參片烏

梅壹枚煎至米分不拘時候服

天僊藤散治蒸熱勞氣百骨酸痛脾胃拘急小便赤黃脚手沉重胸中不快

天僊藤

桔梗炒

香附子

川白芷

右為末每服貳錢水壹盞生薑參片烏梅壹箇煎

至米分時通口服

白芍藥散治虛勞盜汗便濁走失血少筋痿

白芍藥

牡蠣粉

麒麟竭

栝子仁

茯神去

五味子

栝子仁

甘草炙

天台烏藥

陳皮去白

青皮去穢

附子炮去

肉桂去

黃耆炙

龍骨煨

熟乾地黄

右等分爲細末每服貳錢食前溫酒調下

人參散治虛勞少氣四肢疼痛心神煩熱睡卧不得飲食減少

人參去蘆

甘草兩各半

熟乾地黄兩各壹

黃香兩

白朮分各參

當歸去蘆

酸棗仁

麥門冬壹兩半

白芍藥

右爲麤末每服參錢水壹中盞生薑半錢棗子

參救前至陸分去滓不計時候溫服

大正氣散治真陽不足臟氣虛弱榮衛損耗頭目昏暗耳鳴重聽四肢瘦倦胃膈痞滿面色痞黃畏風怯冷腹時時痛噫氣吞酸惡心嘔逆不進飲食心忪盜汗陰伏下焦足脛如冰血氣虛竭陰陽失守冷熱相搏四肢煩疼或發寒熱此藥大能補二脾元平順胃氣調和臟氣若空腹常服令人飲食進美血氣充盈或陰證傷寒氣虛感冷泣宜服之

白茯苓

陳橘皮去白

黃香兩

白朮肆兩

川芎炒

附子炮去臍

烏藥去心

山藥炮各

紅豆壹兩

甘草炙

乾葛生

肉桂去麤皮

白薑炮

右爲細末每服貳錢水壹盞生薑參片棗子壹枚煎至柒分食前服自汗加小麥百餘粒同煎

自汗

附子大建中湯

附子壹兩炮

白朮炒

當歸去蘆

木香不見

白芍藥各貳

黃香炙

甘艸炙

熟乾地黄洗

肉桂去麤皮

右爲麤末每服伍錢水壹盞生薑伍片棗子壹枚煎至柒分去滓食前溫服

香附湯治盜汗

香附湯治盜汗

附子貳錢炮

右爲麤末每服參錢水壹盞生薑參片棗子壹枚煎至柒分去滓食前服

黃香壹錢鹽水

延年斷汗湯

黃耆蜜炙

白茯苓及去

肉桂去麤皮及

牡蠣粉

右等分爲麤末每服參錢水壹盞半生薑參片

棗子壹枚烏梅壹枚煎至米分去滓食前溫服

斷汗湯

黃耆壹兩

龍骨煨

白朮炒

右爲麤末每服參錢水壹盞半生薑參片棗子

壹枚煎至米分去滓空心服

疾神散治虛勞起動自汗煩熱驚悸睡卧不得

疾神去

熟乾地黄洗

麥門冬去心

酸棗仁炒

五味子

甘州各半

人參去蘆

芍藥

甘州炙

防風去蘆

麻黃節用根

牡蠣粉各半

人參去蘆

牡蠣粉

黃耆蜜炙

龍骨煨

蒼朮宿米去蘆皮

右爲麤末每服肆錢水壹盞中益生薑半分棗子

參枚煎至米分去滓不拘時候溫服

治虛汗盜汗

雪白茯苓爲細末煎烏梅陳艾湯調下貳錢服

之神効

治盜汗

人參半兩

當歸去蘆各壹兩

右爲細末每服肆錢水壹盞入淡豉參拾粒葱

頭貳寸煎至米分不拘時候服

牡蠣粉

麻黃根

右等分爲麤末每服肆錢水壹盞煎陸分不拘

時候溫服

撲汗

牡蠣粉入好蛤粉參分之壹用紗帛包了撲汗

處遇乾又撲以頗撲爲佳

白濁

玉鎖丹治白濁

絳凡壹錢

苗香壹分淘去沙

黑牽牛壹分炒參分

牡蠣壹兩童子小便浸參日壹

兔絲子壹分酒醋煎再通紅別研

右為細末蒜煨取汁圓如梧桐子大每服伍圓
空心麝香酒送下

金鎖丹治下弱胞寒小便白濁或如米泔或若凝
脂夢漏精滑關鎖不固腰痛氣短泣昏主之

鹿茸去毛炙

白茯苓皮去

石菖蒲九節者炒

鍾乳粉煨

陽起石煨

右為細末棗肉為圓如梧桐子大每服肆拾圓

棗湯下日午臨卧服

固真丹治腎與膀胱虛冷真氣不固小便滑數

韭子肆兩

補骨脂炒

鹿角霜

龍骨壹錢煨

遠志半兩

益智子

船上茴香炒

白龍骨研參兩如粉

益智仁

船上茴香揀淨

五色龍骨煨別研

青鹽各別研

右為細末以青鹽鹿角膠各壹兩同煮酒糊為
圓如梧桐子大每服伍拾圓空心溫酒送下鹽
湯亦得

勝金圓治男子婦人諸虛不足小便白濁婦人子
宮久冷

鹿茸去毛切片

桑螵蛸酒浸壹宿

川當歸酒去蘆

附子壹錢

右為細末以肉蓯蓉參兩洗淨切作片子用酒

壹升煮乾研作膏為圓如梧桐子大每服參拾

圓溫酒鹽湯任下婦人醋湯下食後服

秘精圓治漏精補益

大附子炮去

牛膝去蘆酒

已乾心去

右等分為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳

參拾圓空心溫酒鹽湯下甚者日午再服小便

如米泔者不過拾服
三白圓又名素丹治小便遺精白濁滑數及盜汗

白茯苓皮去

龍骨煨別研

熟乾地黃洗各壹兩

龍骨煨通紅

肉蓯蓉別煨酒浸壹宿

龍骨研別

牡蠣粉各壹兩

鹿角霜貳兩

右為細末滴水為圓如梧桐子大以滑石為衣每服拾圓加至拾伍圓鹽湯吞下空心服

縮泉圓治丈夫小便頻史越王方

烏藥

川椒去目并合

吳茱萸九蒸九曝

益智炒

右等分為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服伍陸拾圓臨臥鹽湯下

固精圓治小便不禁或虛寒頻併

茴香壹兩淘

大附子半兩炮

兔絲子貳兩洗淨酒

式鹽壹分

桑螵蛸半兩炙

右為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服參拾圓空心米飲下

雙白圓秘精清小便朱叔通傳

雪白茯苓貳兩

鹿角霜

右等分為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服參伍拾圓空心鹽湯下

又方

苦楮

白茯苓貳兩

右等分為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服參拾圓天門冬煎湯下不拘時候

韭子圓

家韭子炒

巴戟心去

益智子炒

白茯苓貳兩

右等分為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服伍拾圓食前溫酒或米飲下

茯苓圓治小便白濁

白茯苓貳兩用木猪苓肆兩剉水貳升同煮乾

去猪苓只用茯苓為末以黃蠟貳兩鎔化為圓

如彈子大空心細嚼壹圓鹽湯送下忌米醋

固精圓治小便精自出多因驚而得咸呼作膏淋服補藥過多無益但服此藥立愈

牡蠣煨令熟壹味只作壹

右以猪猪臟近腹頭處貳參尺洗淨翻過恐脂

油太多略去了些小如不甚多則不須去亦洗

令淨却翻脂在內旋旋入牡蠣末候滿札定兩

頭慢火水煮令臟爛以指甲得軟為度款款

取出莫教取破候令批開臟取出藥末將臟切

細於砂盆內研成膏，和藥末為圓，如梧桐子大，每服肆伍拾圓，至佰圓，米飲下，日進參肆服，初服茶糊，日或什餘日，小便所出狀如凝脂，或如敗血，或如細膿條，若曲蟻糞不斷，每小便時必出參伍次，或拾數次，切莫疑惑，此是敗精之出，服至半月，病勢已減，茶糊分至月餘，病已瘳矣，更服至佰日，永久不復發動。

苗香圓治遺精夢漏關鎖不固
船上苗香炒
破故紙炒
胡蘆巴
白龍骨壹兩

胡桃參茶苗研成膏
羊石子參對切開鹽半兩
右為細末，將膏子和酒浸蒸餅，搜成劑，并熟圓，如梧桐子大，每服參伍拾圓，空心溫酒送下。

龍骨圓治白濁
糯米飯肆兩
龍骨研別
右為細末，醋煮麵糊圓，焙乾，每服伍拾圓，空心鹽湯送下，食前服。
鎮心圓治白濁

赤石脂肆兩
白茯苓貳兩

益智仁貳兩
牡蠣粉
龍齒壹兩
右為細末，酒煮麵糊圓，如梧桐子大，每服參拾圓，空心鹽湯下，婦人艾醋湯下。

奪命圓治白濁
半夏大者肆粒，小者拾粒，各口破之用，石薺
蓮子肉半兩
白茯苓貳兩
龍骨研別
遠志心去

白凡枯各半兩
右為細末，以車前草取自然汁，煮麵糊為圓，如梧桐子大，每服肆伍拾圓，空心鹽湯下。

龍骨壹兩
茯神壹兩

魏氏家藏方卷第肆

文政甲申春後三日移善

魏氏家藏方卷第五

脾胃

金鎖正元丹煖養脾胃

大附子炮去皮

川練子炒

茴香淘去沙

肉桂去麤皮不見火各壹兩

牡蠣粉

阿魏餅投作子

右為細末將阿魏餅作糊為圓如梧桐子大每

服參拾圓食前溫酒鹽湯下

消穀丹去脾臟風濕進飲食消浮腫

肉豆蔻煨麩裏

皂角黃

白茯苓去皮

訶子肉

人參去蘆

橘紅

厚朴薑製壹宿炒

葶撥淨洗

白芷炒

乾薑洗炮

青皮穰去

硫黃

石菖蒲各貳兩

木香炮兩

丁香不見火

肉桂去麤皮不見火

木香不見火

白朮炒

白薑洗炮

神麩炒

麥蘗炒

良薑炒

右等分為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓薑湯嚼下有虛寒加附子半兩炮去皮臍

衛經丹治脾胃怯弱久受虛寒腰腹疼痛洩瀉無時面無顏色精神不爽腰膝酸重胃膈痞塞嘔吐

惡心痰唾稠粘常服大壯脾胃美進飲食

縮砂仁

葶撥各壹兩

白豆蔻

肉豆蔻煨麩裏

半夏炒

華澄茄

乾薑洗炮

鹿茸壹兩去毛酥炙

陳皮去穰

白朮炒各半兩

麝香壹錢別研

右為細末煉蜜和作劑杵什餘下圓如梧桐子

大每服伍陸拾圓或采拾圓米飲鹽湯任下不拘時候

不老圓治臟腑虛滑久瀉建脾胃消痰飲進美飲食史越王方授先文節公

川厚朴去皮薑製炒

肉豆蔻煨麩裏

川白薑濕紙煨

白朮炒各壹兩半

附子 去皮臍切小塊
薑汁罨壹宿炒
肉桂 去麤皮
丁香 各壹兩
葷撥 半錢

右為細末神麩生薑汁煮糊為圓如梧桐子大每服伍拾圓米飲下不拘時候

加減理中圓快膈壯脾胃消痰飲

半夏 湯泡
乾生薑
白朮 炒
梓朴 剉薑製炒
人參 去蘆各壹兩
附子 去皮臍薑煮
葷撥

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參肆拾圓食前米飲下

加味火輪圓大煖臍氣固養元陽進美飲食

肉豆蔻 麩裏煨
乾薑 洗炮
天雄 炮去臍
葷撥 各半兩
附子 炮去臍
良薑 薄切滴少油炒
訶子 緊小者濕紙裏煨去核

右為細末陳米粉煮糊為圓如梧桐子大每服柒拾圓空心飲下

棗肉豆蔻圓補脾虛止泄瀉
鍾乳粉 肆錢旋入
丁香 不見火

人參 去蘆
白茯苓 去皮各貳兩
肉豆蔻 麩裏煨

右為細末煮棗肉為圓如梧桐子大每服參拾圓沸湯送下不拘時候

椒朴圓壯脾煖胃

益智子 去殼炒
川厚朴 去麤皮薑製炒
白薑 洗炮
台椒 炒出汗
陳皮 去白
茴香 淘去沙炒

右等分用青鹽等分於銀石器內以水浸乎藥用慢火煮乾焙燥為細末酒糊為圓如梧桐子大每服參拾圓加至肆拾圓鹽湯溫酒下空心食前服

又方治脾胃虛乏積伏冷氣飲食不消多困羸瘦面黃口淡不思飲食

梓州厚朴 壹拾兩去皮薑製炙
鹽花 各壹兩
黑附子 貳兩炮去臍
漢椒 炒出汗

右以水拾碗於銀石器內慢火煮候水盡焙乾同為末煉蜜同糯米粉打糊為圓如梧桐子大每服貳參拾圓空心溫酒下如大便滑泄生薑米飲下

又方治脾胃虛冷不思飲食四肢倦怠泄瀉無時應脾虛證宜服之

船上茴香炒

青鹽兩各肆

厚朴去各壹斤

川椒去日合口者淨

右用水壹斗貳升同入銀石器內煮大沸後用

慢火煮令水盡取出焙乾為細末酒糊圓如梧

桐子大每服肆伍拾圓空心米飲下

煮朴圓陸從老方

厚朴肆兩去皮判作寸段用生薑肆兩切水貳碗同煮水盡去生薑不用將

附子貳兩炮乾切厚朴再

川白薑肆兩甘草貳兩到半寸長水

船上茴香炒貳兩

半夏壹兩

右為細末煮棗肉和圓如梧桐子大每服參拾

圓溫湯米飲下

又

吳茱萸湯泡

台椒炒出兩

茴香淘去

白父炒參兩

附子伍兩生

良薑炒

胡椒

肉豆蔻煨麩裏

將前拾貳味藥用酒醋薑汁各貳大碗煮候

乾取出焙燥入後藥

船上茴香炒

川白薑肆兩用甘草貳兩到半寸許水貳

厚朴肆兩去皮判作寸段用生薑肆兩切水貳碗同煮水盡去生薑不用將

半夏壹兩

右為細末煮棗肉和圓如梧桐子大每服參

伍拾圓溫湯米飲下

椒附香朴圓

椒紅炒出

蒼朮湯山者米

厚朴去麩皮判

吳茱萸湯泡

益智

厚朴肆兩去麩

神麩炒

丁香不見

麥蘖炒各壹

附子炮去皮臍判再

川白薑肆兩用甘草貳兩到半寸許水貳

厚朴肆兩去皮判作寸段用生薑肆兩切水貳碗同煮水盡去生薑不用將

半夏壹兩

右為細末神麩糊為圓如梧桐子大每服伍拾

圓空心米飲下

附子炮去

乾薑炮

良薑各貳

茴香兩炒

朴附圓治脾胃久虛穀腸滑泄、臍腹絞痛、腸鳴泄瀉、肢體無力、李學論傳

川厚朴去麤皮剉 附子去皮臍切散
大肉棗伍拾枚 生薑伍兩
己上肆味、用水壹大碗、煮乾、揀出棗子、將參味藥焙乾、

肉豆蔻麤裏 訶子煨取
川白薑炮洗各壹兩 人參半兩
右為細末、將前棗肉為圓、如梧桐子大、每服伍拾圓、加至佰圓、米飲下。

養脾圓

鍾乳粉 白茯苓皮去 人參去蘆
吳茱萸湯泡炒 附子炮去臍
南木香不見 細辛 枳實炒
肉豆蔻麤裏 青皮去穢
金釵石斛 白朮炒
乾薑洗地 麥蘖炒
神麴炒 丁香不見
川椒去目并合口者炒出汗 陳皮白去

益智仁 縮砂仁 檳榔 厚朴去麤皮剉
訶子肉 肉桂去皮不見火
右等分為細末、煉蜜搜和、杵參伍佰下、圓如豌豆大、每服參伍拾圓、空心米飲下。
又方、治脾胃虛弱、胃膈痞悶、心腹疴痛、四肢少力、腹脹腸鳴、飲食不化、

縮砂連殼 乾薑炮洗各半斤
麥蘖炒 白朮炒
藿香葉土去 人參去蘆

白扁豆 厚朴去麤皮剉
橘紅 白茯苓皮去
神麴炒 丁香各伍兩
甘草米兩

右為細末、煉蜜為圓、每兩分作捌圓、每服壹圓、細嚼、生薑湯下、空心服。

建脾圓治丈夫婦人脾胃虛冷、嘔逆惡心、臍腹撮痛、令痞翻胃、惡聞食氣、停寒積飲、飲食不化、臍寒泄瀉等疾、

厚朴去麤皮剉 半夏薑製

白朮炒各壹兩

橘紅

薑黃皮去

白茯苓皮去

葶澄茄

益智仁金液丹代之

硫黃代之

附子壹隻以錢重者炮去皮臍

肉豆蔻參錢藥

肉桂去皮不見火

胡椒

神麩炒

丁香

木香各半兩

人參去蘆各參分

溫薑煨各柴錢半

丁香貳錢不見火

右為細末薑汁打糊為圓如梧桐子大每服伍

陸拾圓空心薑湯下

又方滋養胃氣辟霧露寒濕進美飲食中酒壹圓即醒

肉豆蔻麩裏

草豆蔻

縮砂仁

白附子炮

沈香各壹兩不見火

白茯苓皮去

橘紅

白豆蔻取仁

紅豆

益智子

南木香不見火

人參去蘆

肉桂去蘆皮不見火

乾薑洗炮

甘草炙

右為細末煉蜜為圓如彈子大朱砂為衣每服壹圓食前薑湯嚼下

葶健脾圓治脾氣不和臟腑或泄或秘飲食入胃頻欲便利

吳茱萸湯泡柴次炒

川厚朴去麩皮剉薑汁製炒各貳兩

神麩炒

乾薑半兩洗

附子炮去皮臍各壹兩

麥蘖炒

肉豆蔻麩裏煨

白朮各壹兩半炒

白朮各壹兩半炒

白朮各壹兩半炒

白朮各壹兩半炒

白朮各壹兩半炒

白朮各壹兩半炒

白朮各壹兩半炒

白朮各壹兩半炒

白朮各壹兩半炒

白朮各壹兩半炒

右為細末麵糊為圓如梧桐子大每服柒捌拾

圓食前米飲下

快脾圓趙通判仲宜傳

生薑陸兩洗淨切片以飛羅麩肆兩拌和就日中煎乾

橘皮壹兩去穢

丁香各貳兩不見火

甘草炙

縮砂仁參

縮砂仁參

赤石脂煨

乾薑洗泡

補脾圓補實脾臟兼治大便冷滑

薑湯熟水嚼下

肉豆蔻 麩裹

白朮 兩各壹炒

麥蘖 炒

葶撥 兩各半炒

厚朴 去麩皮剉

訶子 溫紙煨

神麩 炒

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服參拾圓食前熟水下

補胃圓補脾胃進飲食去宿寒

肉豆蔻 麩裹

縮砂仁 焙

乳香 研別

丁香 不見

附子 炮去

乾薑 洗

胡椒 兩各壹

人參 去

梓朴 去皮薑

白朮 炒

右為細末以北棗捌兩用生薑自然汁煮去皮核和藥杵貳參佰下圓如梧桐子大每服伍拾圓米飲下不拘時候

固胃圓

梓朴 去皮剉

棗子 半斤去

已上參味用水貳斗煮棗爛水乾為度

白朮 半斤

高良薑

生薑 各壹斤剉

草豆蔻 兩各參

葶澄胎

白豆蔻仁

甘草 炙

肉桂 皮去

橘皮 去穢各

右為細末麵糊為圓如梧桐子大每服柒拾圓至佰圓清米飲下或熟水亦得不拘時候生氣養胃圓治脾虛冷涎翻胃藥食不納者極効

大附子 壹隻炮去皮臍切

厚朴 壹兩去

陳皮 壹兩去

甘草 半兩

蒼朮 壹兩米泔水浸

白茯苓 壹兩去皮

右為細末用大北棗伍拾枚煮熟去皮核取肉用大蒜伍枚煨熟去皮膜研爛和棗肉搜藥末圓如小梧桐子大每服伍拾圓漸加至佰圓米飲吞下

丁香開胃圓

白豆蔻

半夏 兩各半

肥生薑 參斤薄切焙

右為細末煉蜜為圓壹兩作拾圓每服壹圓白湯嚼下食前

甘草 炙

丁香 壹兩半

人參 去蘆

益胃圓治脾氣胃氣俱虛中脘停痰嘔噦不止

縮砂仁 川薑炮洗

陳皮去白 厚朴去皮剉薑製炒

丁香各二兩不見火 白朮肆兩炒

肉豆蔻壹兩半麩裏煨 半夏貳兩半湯泡柒次

右為細末好麵糊為圓如梧桐子大每服伍陸

拾圓至佰圓空心薑湯或橘皮湯下

溫胃圓暖胃消痰進食

神麩炒 麥蘖炒

白朮各壹兩炒 半夏參兩湯泡柒次

丁香半兩不見火 人參壹分

右為細末生薑自然汁為圓如梧桐子大每服

參肆拾圓薑湯下不拘時候

人參大溫中圓治三焦不順脾胃冷心腹疔痛嘔

逆惡心兩脇刺痛胃膈滿悶腹脹腸鳴泄瀉頻併

竝宜服餌

高良薑炒 肉桂去麩皮不見火

紫蘇子 人參去蘆

陳皮去白 白朮各壹兩炒

川乾薑伍錢炮洗

右為細末煉蜜為圓每兩作捌圓每服壹貳圓食前生薑湯嚼下

麩蘖二薑圓治脾胃不和胃膈痞悶泄瀉下痢水穀不消

高良薑炒 乾薑炮洗各貳兩

神麩炒 麥蘖炒各兩

枳殼去穢炒 肉豆蔻各壹兩麩裏煨

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服參肆拾

圓溫熱水下不拘時候

消穀圓進飲食除宿滯破痰實常服不損氣益脾

胃散宿醒

烏梅肉 川薑炮洗

神麩炒 麥蘖炒各壹兩

香附子去毛 官桂去麩皮不見火

縮砂仁各參兩 益智仁各貳兩

紫蘇葉 茯苓去皮

甘草壹兩半炙

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服參伍拾圓

食前熟水下

加減千金思食圓

烏梅肉

乾生薑 各壹兩

小麥蘗

神麩 各貳兩

縮砂仁

甘草 炙

橘紅 各半斤

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹貳圓米

飲嚼下不拘時候

木香神麩圓治胃寒一切冷氣寬利胃膈消穀快氣進美飲食

華澄茄

木香 各壹兩

草豆蔻仁

乾薑 炮

高良薑 炒

神麩 炒

麥蘗

肉桂 去麤皮

陳皮 去白各肆兩

右件剉碎再炒香熟同為細末用神麩糊為圓如菜豆大每服肆伍拾圓食後薑湯下

訶梨勒圓

吳茱萸 去枝湯泡次

艾葉

厚朴 去麤皮薑製炙

乾薑 洗炮

良薑 去鬚

白朮 各壹兩炒

大附子 貳兩炮去皮切作散子塊

右件入好肉棗參拾枚酒米醋生薑自然汁各壹盞煮前藥乾為末入肉豆蔻伍兩訶子炮熟取皮貳兩丁香半兩胡椒半兩為末酒糊為圓如梧桐子大每服伍拾圓空心米飲下

華澄茄圓治脾氣虛滯飲食難化痰涎壅盛

五味子 去枝

木香 不見火

官桂 去麤皮不見火

丁香 不見火

阿魏 研別

全蠍 炒

茴香 淘去沙炒

青皮 穰去

良薑 各參分炒

草菓子 取肉炒

胡蘆巴 炒

白朮 各壹兩炒

華澄茄 貳兩半

神麩 貳兩炒

甘草 壹分

沈香 半兩不見火

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服肆拾圓坐薑酒下不拘時候

蘇橘大圓治夏月多食生冷濕氣在內

紫蘇葉

陳皮 穰去

乾生薑

人參 壹兩半

白茯苓 去皮

縮砂仁 各壹兩

甘草 半兩炒

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓溫湯嚼下早晨服一方加白豆仁半兩

小建中圓治虛中有積滯不可服疎導之藥

胡椒

白芷炒

縮砂仁兩各壹

甘草兩各壹

益智仁兩貳

乾薑洗炮

茴香壹兩半淘

阿魏參錢別研麩裏煨酒化開入藥

右為細末麵糊圓如梧桐子大每服參拾圓生薑湯下不拘時候

小薑香圓治百物所傷胃膈不快不思飲食

香附子去毛炒

丁香皮

縮砂仁

蓬莪朮炮

陳皮去白炒

麥蘖炒

神麩兩各半

甘草錢各貳

右為細末水浸蒸餅和圓如小赤豆大每服貳

參拾圓生薑湯下不拘時候

三稜圓去積滯快脾氣

京三稜炮

蓬莪朮炮

益智仁

青皮去穢

陳皮去白

右等分為末同炒令黃色麵糊為圓如梧桐子大每服參拾圓薑湯送下

料物圓治脾元怯弱不進飲食

華撥

台椒去目并合口

良薑微炒

茴香海去沙炒

乾薑洗炮

紅豆去殼

白薑洗炮

胡椒

附子炮去皮臍切

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服參伍拾圓空心米飲下

替坂圓

陳倉米參合用丁香肉豆蔻各半兩同炒令香

熟去丁香豆蔻將米碾為細末別用炒了神麩

麥蘖為末打糊為圓如梧桐子大每服伍陸拾

圓米飲下

快膈圓治脾胃虛弱不美飲食痰涎上壅胃膈不

快及酒食所傷

橘皮炮去穢

生薑洗淨切片同搗

半夏炒

皮洗淨切片同搗碎曬乾再以

搗微炒入後藥

炒

藿香去土

丁香皮各肆兩

厚朴去麤皮薑製參兩

右為細末生薑自然汁煮糊為圓如梧桐子大每服參拾圓生薑紫蘇湯下

太倉圓治氣膈脾胃全不進食

白豆蔻仁

縮砂各貳兩

陳米壹升淘洗略蒸過銚內炒

丁香半兩不見火

右為細末棗肉為圓如小赤豆大每服伍柒拾圓至佰圓米飲下

求附圓溫脾煖胃進飲食消痰飲實臟腑

厚朴去麤皮薑製參

茯苓白者去皮

乾薑炮洗

白朮各肆兩炒

半夏貳兩湯泡米次

己上竝剉散子塊入大青州好棗陸兩砂鉢

內水浸沒壹指許煮水盡取棗去皮核用麤布絞取肉入後藥

附子炮去皮臍

甘草各壹兩半炙

右柒味壹處焙乾為末棗肉圓如梧桐子大每服貳拾圓空心食前白湯下

訶附圓治脾胃不和臟腑滑泄不止諸藥不効者

訶子炮去核

附子炮去皮臍

肉豆蔻煨製

右等分為末麵糊圓如梧桐子大每服伍拾圓食前米飲下

赤石脂煨別

沈香圓調順脾胃補益真氣進飲食壯筋骨治虛乏輕脚膝

南木香不見火

舶上茴香炒

沈香不見火

南番胡蘆巴炒

丁香不見火

補骨脂炒

金釵石斛去根

牛膝酒浸去蘆

巴戟去心

川芎各壹兩

青皮去穢

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服參拾圓空心溫酒飯飲任下久服甚妙

附子半兩炮去皮臍

丁沈圓治氣逆脾胃不和症悶胃膈噎塞不利或氣時上攻衝飲食減少

肉豆蔻煨製

白豆蔻仁

丁香不見火

木香不見火

縮砂仁

麥蘖炒

麵薑

人參去蘆

右等分爲細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓食

前鹽湯嚼下

已寒圓治胃有宿寒臟腑虛弱泄瀉頻數

吳茱萸湯泡炒

附子炮皮去

良薑炒

赤石脂煨

縮砂仁炮

右爲細末醋糊圓如梧桐子大每服參拾圓溫

酒米飲下空心食前服

棗肉圓治脾胃受寒或腸鳴泄瀉腹脅虛脹或胃

膈不快飲食不美兼治腎泄腎泄者五更

破故紙肆兩

肉豆蔻貳兩

右爲細末燈心煮淮棗去皮核和圓如梧桐子

大每服參伍拾圓煎人參生薑湯下食半空服

檳榔

訶子皮

青皮去穰

胡椒

肉桂去麤皮

川烏頭炮皮去

厚朴去麤皮

丁香不見

肉豆蔻麵裹煨

肉桂不見火

川烏頭皮去

厚朴去麤皮

丁香不見

肉豆蔻麵裹煨

肉桂不見火

川烏頭皮去

厚朴去麤皮

丁香不見

肉豆蔻麵裹煨

肉桂不見火

川烏頭皮去

或干食前鹽酒鹽湯下亦得
快圓兒治酒後嘔吐

半夏炒

甘草炙

生薑壹拾兩

右爲細末酒糊和圓如雞頭大候乾入甕器中

收每服壹圓嚼下

穀神圓專理脾胃快氣進食消飲磨積

烏梅肉

訶子煨去核

南木香濕紙煨香

麥蘖炒

神麴炒

右爲細末白麵糊爲圓如梧桐子大每服肆伍

拾圓空心生薑湯下

消食圓

半夏炒

白茯苓皮去

吳茱萸湯泡炒

麥蘖炒別

右爲細末將神麴麥蘖以生薑汁煮糊爲圓如

三稜濕紙煨

丁香參分

青皮去穰

陳皮去穰

神麴炒

乾薑炮洗

白朮各壹

枳實炒

神麴炒

白朮各壹

枳實炒

神麴炒

白朮各壹

枳實炒

神麴炒

白朮各壹

枳實炒

神麴炒

白朮各壹

梧桐子大每服參拾圓薑湯下
丁豆圓溫中固臟氣

肉豆蔻 麵裹煨

丁香 不見火

右等分為細末生薑汁煮棗肉和圓如小赤豆
大每服參肆拾圓食前米飲下

青鹽圓專治脾胃 明傳

破故紙 炒

茴香 淘去沙炒

石菖蒲

肉桂 去麩皮

川椒 去目出汗

牡蠣 煨

木香 不見火

陳皮 穰去

縮砂仁

當歸 酒浸

川練子 去核炒

厚朴 去麩皮

鹿角霜

吳茱萸 炒

桃仁 去皮炒

蒼朮 炒

草烏頭 鹽煮

青鹽 炒乾

右為細末酒煮麪糊圓如梧桐子每服陸拾圓
食前鹽湯下 婦人醋湯下

木香分氣圓

白附子 炮

白豆蔻

片子薑黃 洗炮

縮砂仁 各壹兩

木香 半兩 麵裹煨

丁香 壹兩 不見火

右為細末水浸蒸餅為圓如雞頭大每服壹拾圓白湯嚼下

沈香養脾湯治脾胃久虛肌體羸弱心腹脹悶飲食遲化口苦咽乾喜飲湯水黃瘦自汗潮熱多驚

肉豆蔻 麵裹煨

厚朴 去麩皮

甘草 炙

沈香 各壹兩 不見火

人參 去蘆

黃芪 蜜炙

訶子 穰去

橘皮 穰去

木香 炮各

白朮 參兩

白茯苓 壹兩半 去皮

右對咬咀每服貳錢半水壹盞生薑貳片棗子壹枚煎至半盞食前溫服

草菓養脾湯建脾化痰開胃進食久服無瘧痢疾

草菓仁

茯苓 白者

縮砂仁 各半兩

桔梗 壹分

甘草 壹兩

生薑 陸兩 用白麵肆兩同拌和卷壹宿炒黃

右為細末每服壹錢沸湯點下

丁香快脾湯、和脾胃、散寒痰、除積滯、進飲食、及瘧酒後嘔吐、

縮砂仁

神麩炒

麥蘖炒

生薑斤

草菓仁

甘草炙

陳皮去穢

丁香壹分不

右為細末、每服貳錢、水壹盞、棗子壹枚、煎至柒分、去滓、熱服、或沸湯點服、亦得不拘時候、附子燥脾湯、溫脾胃、散冷氣、利膈、進飲食、止嘔化痰、

川厚朴去麩皮

草菓仁去皮

陳皮去穢

甘草各半兩

半夏湯泡

附子炮去皮臍

白薑炮洗

右咬咀、每服肆錢、水壹盞、半坐薑柒片、棗子貳枚、煎至柒分、去滓、食前服、清脾湯、服之、永無瘧痢之疾、

草菓仁炒

川薑洗

陳皮去穢

厚朴去麩皮

甘草壹兩

木香煨兩

麥蘖炒

舶上茴香炒參分

右為細末、食後入鹽沸湯點服、

醒脾湯

天南星炮

附子生皮臍

右等分、咬咀、每服參錢、水壹盞、半坐薑拾片、棗子壹枚、煎至柒分、去滓、不拘時候、

藿香養胃湯

白茯苓皮

華澄茄

薏苡仁炒

藿香葉土

天台烏藥對炒

甘草參兩

人參去

右咬咀、每服貳大錢、水壹大盞、生薑伍片、棗子貳枚、煎至柒分、去滓、溫服、不拘時候、

加減四君子湯、寬胃膈、消食、

白朮炒

人參去

茯苓白者去皮

枳殼半兩去穢

神麩炒各

麥貳兩

藿香葉去

冬瓜子

縮砂仁

半夏湯泡

人參去

白朮各兩

神麩炒

白朮炒

白朮炒

白朮炒

白朮炒

白朮炒

白朮炒

白朮炒

白朮炒

白朮炒

白朮炒

白朮炒

白朮炒

右為細末每服貳錢水壹盞生薑參片棗子壹枚煎至米分去滓溫服不拘時候

大固腸湯補脾元溫腸胃養臟氣進飲食

肉豆蔻煨 麩裏

縮砂仁

藿香葉去土

草菓仁兩各半

荆南茴香兩各壹

訶黎勒

右除肉桂丁香外拾味壹處炒令香熟入貳藥

同為細末每服貳錢入鹽少許食前沸湯調服

胃愛湯

白豆蔻

白匾豆炒

藿香葉去土

麥蘗炒

白朮炒

丁香不見

木香不見

神麩炒

人參去蘆

茯苓白者 去皮

右等分為細末每服貳錢水壹盞中蓋生薑參片棗子壹枚煎至米分去滓食前溫服

三和湯

肉豆蔻煨 麩裏

草豆蔻仁

白豆蔻仁兩各陸

青州棗肉斤參

蒼朮貳斤 去皮 宿

右為細末空心入鹽沸湯調下貳錢

十正湯養脾胃進飲食治氣短四肢怠倦

白豆蔻仁

陳橘皮去穢

白茯苓去皮

人參去蘆

肉豆蔻煨 麩裏

右等分吹咀每服伍錢水貳盞生薑伍片棗子貳枚煎至壹盞去滓溫服不拘時候

飢虎湯治脾虛不思飲食

飢虎湯治脾虛不思飲食

人參去蘆

白茯苓去皮

甘草貳拾

陳皮貳斤 去白

厚朴參斤 參兩 去皮 薑汁製

附子炮 去皮 臍

丁香不見

乾薑炮 洗

白朮炒

藿香葉去土

人參去蘆

白豆蔻仁微炒 各壹兩

乾薑炮 各半兩

高良薑炮

陳皮炒 米錢

甘草炙

草菓仁

右為細末入鹽沸湯調下食前服貳錢

陳皮炒 米錢

高良薑炮

甘草炙

草菓仁

白豆蔻仁微炒 各壹兩

乾薑炮 各半兩

豆蔻湯治脾胃虛弱、不思飲食、吐逆滿悶、胃膈不利、心腹刺痛。

草豆蔻仁 兩

生薑 壹斤連皮切片

甘草 肆兩

右和入銀器內，用水浸過參指許，慢火熬乾，取出焙乾為末，每服壹錢，沸湯點服。夏月煎作冷湯服亦妙。

壯脾湯治脾胃虛弱、臟腑泄瀉、胃膈停寒、不喜飲食。

附子 壹兩炮去皮

白朮 半兩炒

人參 貳錢半

乾薑 兩半

縮砂仁 貳錢

肉豆蔻 貳錢麵裹煨

丁香 貳錢

厚朴 生薑汁製壹兩宿炒半兩

右以咀，每服參錢水壹盞半，生薑伍片，棗子壹枚，煎至柒分，去滓，食前服。

雄附湯健脾溫中、治臟腑虛寒泄瀉。

天雄 貳隻炮去皮臍

附子 肆隻捌錢重者炮去皮臍

綿黃耆 壹兩炙

新羅參 壹兩

白朮 炒

白茯苓 皮去

白芍藥 各貳兩

肉豆蔻 麵裹煨

木香 炮

丁香 不見火各壹兩

川白薑 肆兩泡洗

甘草 炙

沉香 不見火

訶子 去核各半兩

右以咀，每服參錢水壹盞半，入鹿角霜、乳香各少許，生薑伍片，棗子貳枚，同煎至壹小盞，空心服之，併滓再煎，常服不須入乳香、鹿角霜，如臟腑堅固，不必用訶子亦得。

解勞湯

良薑 黃土煮

白朮 各貳兩炒

甘草 炙

縮砂仁

紅豆 各壹兩

胡椒 兩

右為細末，每服壹錢，入鹽沸湯點服，食前。

鍾乳建脾散去壹切冷氣，治脾胃久虛，胃脘痞塞，中脘氣滯，腹脹虛鳴，上氣喘急，心腹繞痛，宿食不化，留飲停積，痰逆嘔吐，噎氣不通，不進飲食，面黃肌瘦，四肢怠墮，及治鬲氣噎塞，霍亂吐瀉。

成煉鍾乳粉

人參 去蘆各貳兩

肉豆蔻 麵裹煨

訶子 去核

高良薑 炒

厚朴 去麩皮薑製炒

白茯苓 皮去

陳皮白去 神麪炒
 草菓仁壹兩半 麥蘖炒各壹兩
 乾薑炮洗

右為細末每服貳錢水壹盞生薑參片棗一枚鹽壹捻同煎至米分通口服不拘時候

增損平胃散

蒼朮米泔浸壹宿刮去麩皮淨判日乾或焙
 厚朴去麩皮判日乾或焙
 陳皮各壹兩 乾薑洗判
 黃耆水軟者判鹽 甘草劈作貳片炙黃
 白茯苓判或日乾亦可 白朮炒
 右為細末每服貳錢食前沸湯點服加人參半兩或貳錢半去蘆同茯苓製尤佳

生氣散

白豆蔻仁 神麪炒
 肉豆蔻煨麩裏 麥蘖炒
 草豆蔻仁 白朮炒
 縮砂仁 丁香不見火
 南木香濕紙裏煨 人參去蘆
 訶子炮核去 白茯苓皮去

甘草炒
 右等分為細末每服貳錢入鹽少許沸湯點服不拘時候

厚朴豆蔻散治脾胃不足飲食生冷傷動所致當補脾養胃

厚朴去麩皮判 乾薑炮洗
 草菓仁 肉豆蔻煨麩裏
 良薑各柒錢 人參去蘆
 縮砂仁各半 白朮炒
 丁香不見火 霍香葉去土
 木香濕紙煨

右為細末每服參錢水壹盞肥棗貳枚煎至米分溫服不拘時候

人參藿香散和氣利膈進食化痰

半夏麪 白朮各壹兩
 白茯苓皮去 藿香各參分
 橘紅 甘草炙
 人參去蘆各半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半生薑棗片棗子壹枚煎至米分去滓溫服不拘時候

沈香金粟散 溫中和氣調養心脾進食止痢

沈香乾煨

人參去蘆

肉桂去麩皮

木香濕紙煨

檳榔

烏藥

當歸去蘆

白芷炒

桔梗炒

遠志去心

縮砂仁

白茯苓去皮

藿香葉去土

嬰粟子炒

肉豆蔻麩裏煨

乾木瓜

訶子炮去核

半夏紅麩炒

丁香不見火

川芎

陳皮去白

白薑炮洗

甘草炙

良薑炒

白扁豆炒

龍骨炮壹兩

附子炮去臍

蓮子肉去心

川厚朴去麩皮

右為細末每服參錢水壹盞貳分生薑伍片棗子貳枚同煎至捌分和滓空心溫服
四和丁香散治年高脾胃不和飲食不化頻頻洞泄四肢無力行步艱辛常服壯氣固腸胃生津液

止瀉

肉豆蔻

甘草參

乾薑炮

右為細末每服貳錢食前米飲調下或地榆訶子煎湯調下亦得

人參丁香煮散治脾胃久虛翻胃吐逆

高良薑炒

人參去蘆

官桂去麩皮

乾薑炮洗

附子炮去臍

甘草壹兩

右為麩末每服半兩水參盞生薑伍片肥棗伍枚煎至捌分去滓食前熱服

正氣煮散調氣不和五臟停滯不美飲食傷寒嵐毒諸般瀉痢常服令人氣爽飲食易消積滯皆化凡有病先投此藥病後投此調氣尤佳

厚朴去麩皮

青皮去穰

胡椒各貳兩

厚朴去麩皮

厚朴去麩皮

厚朴去麩皮

厚朴去麩皮

甘草 各壹斤

陳皮 去白

乾薑 各陸兩

右將厚朴生薑同搗盛菟器中將乾薑為麤末
糝厚朴上罨壹宿次日先將罨厚朴同陳皮入
鍋內水煮乾次將棗子甘草入鍋內將煮藥抄
在上再入水煮乾燥再焙為細末每服貳錢
水壹盞煎至柒分溫服入鹽沸湯調下亦得空
心食前常服

草豆蔻散治脾胃氣不和霍亂不止酒食所傷兼
療脾洩能和壹切冷氣

厚朴 去麤皮用生薑參兩取

陳皮 去白炒 草豆蔻 不去皮

乾薑 洗炮 白朮 炒

訶子 炮去核 甘草 參兩

五味子 參

右為細末每服貳錢水壹盞煎服霍亂冷飲下
若傷酒以酒調下脾痛不可忍者炒生薑酒下
參錢

木香煮散治脾元不和不思飲食心胃痞悶口淡
無味調順中焦兼解傷寒

白茯苓 去皮 人參 去蘆

厚朴 去麤皮入生薑壹

木香 不見火 半夏 炒

白朮 分炒 枳實 炒

官桂 去麤皮 乾薑 炮

甘草 半兩 陳皮 壹兩

檳榔 壹箇 草豆蔻 貳箇

訶子 伍箇 煨

右以咀每服壹大錢水壹盞煎至柒分去滓熱
服不拘時候

雙棗散治脾虛退脾經邪熱及瘧疾

甘草 炙 麥蘖 炒

白薑 肆兩 錫槽 兩

橘皮 陸兩 香附子 壹斤

右為細末每服貳錢水壹盞生薑參片烏梅棗
子各貳枚煎至柒分和滓不拘時候服

沈香散通關膈氣小便不利

郁李仁 湯泡去

沈香 不見火 人參 去蘆

青皮 穰 木香 不見火

陳皮 壹兩

草豆蔻

檳榔

甘草各半兩

乾薑炮洗

肉桂去麤皮不見火

右 每服壹大錢水壹盞煎至柒分温服不拘時候

五香散治男子婦人壹切氣痛

烏藥壹兩

香附子去毛壹兩

青橘皮半兩

甘草參錢

益智仁兩半

蒼朮米泔浸壹宿半兩

陳橘皮半兩

右先用前五味同炒香熟次入陳皮甘草炒赤

色竝為細末每服貳錢水壹盞生薑參片白艾

參葉煎至柒分食前服

薑附散專治脾虛胃寒

每用生附子柒錢生薑壹斤肥者取自然汁同附子入砂器內慢火煮候附子化為糊須不住用匙攪動恐焦直至薑汁煮耗盡約柒分取出挑入銀器內四面攤開頓重湯上時復攪轉重攤過候藥玖分乾可以捻不粘綴手盡取出捻成小餅子頓在篩子內或熬或焙乾碾為細末

再入胡椒丁香末各半兩空心米飲調下丁香火須候附子為末了方可入
橘紅散調中養氣温胃進食

陳橘皮去白

茴香沙淘去

高良薑炒

白芷各壹兩

甘草肆兩

白朮各貳兩

薑黃

右為細末每服貳錢入鹽少許食前沸湯調下

清膈散治脾家疸熱令人口甘

麥門冬去心

沙參

人參去蘆

草龍膽

陳皮去白

木通各半兩

金釵石斛各壹兩

柴胡去根

黃連去鬚

右為末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓食前温服日進貳服

清脾飲子治脾氣久虛中脘氣膈三焦不和飲食不進津液內燥遂致脾氣不清頭目重痛手足心熱羸瘦肌黃胃氣既虧中脘生痰不美飲食竝宜服之

紫蘇葉 壹兩

草菓 炮

厚朴 去麤皮 薑製灸

人參 蘆

桑白皮 各參

香附子 去毛 炒

大腹皮 酒洗炒 各壹分

甘草 炙

訶子皮 炒各 半兩

右咬咀每服參大錢水壹盞半生薑肆片棗子壹枚煎至柒分取清汁食前服

三豆蔻飲子治脾胃受冷過多胃膈痞悶氣不舒暢飲食之後胃間噎塞吸吸氣短全不思食面無顏色日漸氣弱遂成瘦怯庸醫不識此疾往往作

扁氣治之投藥愈多疾愈不效殊不知只是因脾胃間受冷過甚遂致飲食減少日漸氣弱形瘦若服此藥不過參肆服即便見效至數服自然美進飲食氣自調暢則前日所苦痞悶氣短形瘦乏力應是脾胃之疾竝皆愈矣如無脾疾每過天寒陰晦最宜服之

肉豆蔻 壹兩 剉

白豆蔻 壹兩 剉

草豆蔻 貳兩 剉 只

甘草 壹兩 半剉

生薑 兩 柒

右先以生薑貳兩研爛入前藥拌和盒壹時許

打開再以薑貳兩研爛如前以前藥拌和盒壹時再打開再用生薑參兩研爛入前藥拌和趁濕捻成團如雞子大焙乾每服壹圓旋打散用水壹大盞半煎至壹盞入鹽壹捻更前壹貳沸約至捌玖分熱服併貳服滓再煎服不拘時候快中飲子

草菓仁 煨

白朮 炒

烏梅肉

附子 炮去 皮臍

甘草 炙

人參 去 蘆

半夏 麩 炒

縮砂仁

右等分咬咀每服肆錢水壹盞半生薑伍片棗子貳枚煎至柒分食前去滓服

附子散

附子壹隻極大者坐於甑上四面著火漸漸逼熱焯入坐薑自然汁中再用火逼再焯約耗薑汁半椀焙乾為末每服貳錢水壹盞粟米少許同煎至柒分不過參服

順胃散治翻胃

用火附子壹枚生薑半斤肥嫩者以新布揩去

土切片爛研取自然汁半盞竝不得犯生水却以半斤礮炭熟火用新瓦壹片將火四圍簇定為井子將附子蘸薑汁置井子中才乾又蘸以薑汁盡為度附子去皮臍切片為細末每服半錢許安手心內逐旋以舌舐盡藥末空心服不得犯水故不吐耳此法甚佳

如聖餅子治男子婦人鬲氣翻胃

沈香貳錢

木香各壹錢半

藿香葉去土

半夏湯泡

安息香

丁香不見

乳香各參錢

桂心去麤皮

右用天南星壹兩半炮紫邑為末半兩用生薑自然汁煮糊別用硫黃參錢研細水銀貳錢同前藥用南星糊為劑分作肆拾玖餅每服半餅用生薑汁化開空心白湯送下

心脾疼

靈脂圓治脾血氣心疼

五靈脂去砂

蓬莪朮炮

良薑貳錢

當歸去蘆

木香各半兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓加至伍拾圓米飲下

大效妙應圓治久積沈滯結聚癖氣塊時發疔痛心脾疼痛下痢無度不思飲食寬中快膈

附子壹隻陸錢重

丁香不見

葶澄茄

硃砂貳分

木香不見

葶撥

胡椒各參

右為細末與硃砂和調湯浸炊餅心搗去水成糊為圓如梧桐子大每服柒圓用生薑壹塊如

大母指大劈開中心去少薑肉入藥在內連紙包裹數重浸濕煨令香熟取出去紙和藥細嚼

佰沸湯少許送下不計時候

止痛圓治心脾疼及心腹脹滿痛不可忍

高良薑壹兩新元

沒藥肆錢

右拌和每服貳錢熱酒調下如怕辣用濃米飲為圓每服參拾圓白湯送下

檳菜圓治心脾痛

檳榔壹箇剉去心

菜黃炒

宮桂去麤皮

右碾細末打和共分貳服煎葱酒參肆沸調下
礪附圓治虛中有積心腹助脇脹痛

附子半兩

丁香壹錢

乾薑壹錢

礪砂壹錢

右為細末旋入礪砂研和用稀麵糊為圓如梧
桐子大每服拾粒加至貳拾粒生薑湯下不拘
時候

沈香圓治壹切心氣痛不可忍

沈香半兩

沒藥壹錢

辰砂壹錢

血竭壹錢

麝香壹錢

木香半兩

右為細末用銀甕器內熬生甘草膏子為圓如
皂角子大薑鹽湯磨下氣痛不可忍者醋方磨
下

大溫白圓治恚怒忿鬱三焦氣滯咽噎噎塞脇肋
膨脹心腹疼痛上氣奔喘翻胃吐嘔不思飲食

生薑貳拾兩

橘皮捌兩

白朮壹兩

白茯苓壹錢

甘草半兩

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓空心

沸湯嚼下

失笑散治心痛不問所因入口即定神方

檳榔

高良薑剉滴

右等分為細末每服貳錢熱酒調下食前服

通中散治食糯米飲食過度心脾大痛

神麩為末白湯調下參貳錢其糯米見神麩即
化也

二珍散治丈夫婦人九種心痛

芫花兩

高良薑兩

右貳味米醋壹升入砂石器中熬乾為度焙乾

為末每服半錢食空溫酒調下忌油膩之物

香附子散治心脾痛不可忍

高良薑炒

香附子去毛

右等分為細末每服鹽米飲調下吳內

翰得此方即修合次日登舟舟人妻病心痛欲

死吳內翰以半碗與之飲其痛即愈

魏氏家藏方卷第陸

心腎

既濟補真丹 三茅山同元先生方

內經云一陰一陽之謂道偏

生天地中稟陰陽混成之氣

歲而動作不衰今則不然蓋

將息喜怒勞逸憂愁思慮

水火不足陰陽有所偏勝

心火炎上而不息腎水

上下不得升降乃至胞

灌注瞳人眼昏力弱膚腠不密外邪臟腑

不實真陽虛憊血弱氣耗故處此方廣濟世人

以補諸虛不足而滋養之升腎水以制心火降

心火以煖腎水交感陰陽既濟關元生真精和

中焦使上下升降百骸安和溫煖脾胃健壯脚

膝明目聰耳益壽延年添精補髓此丹服百日

臍下溫煖體力勝常脚足有汗飲食美進神清

喜悅是其驗矣若至心服至半月諸疾皆愈漸

屏去一切暖藥專服至三年乃有地僊之效

大附子 貳隻生去皮臍每隻作肆片

陽起石 酒煮參日研 伏火靈砂 壹分粉研

天雄 壹對每隻肆分 以水參升同煮令水盡

磁石 研連吸乾用切 粉針者火煨紅醋半兩別研

鹿茸 酥炙去毛 麋茸 酥炙去毛

船上茴香 酒浸壹宿去蘆 補骨脂 炒

川當歸 酒浸壹宿去蘆 牛膝 酒浸壹宿去蘆各壹兩

鍾乳粉 草澄茄 肉豆蔻 煨 杜仲 去皮 鹽

夜明砂 肉豆蔻 煨 杜仲 去皮 鹽

枸杞子 丁香 各半兩 兔絲子 貳兩淘淨酒

己上製度如法壹處為細末入後膏子為圓

服納臍 酒浸 神麩 炒各半兩 麝香 別研

安息香 化壹分 羊髓 貳兩 羊石 壹對去筋

肉苁蓉 研壹兩極爛 已上捌味用水貳升同於銀石器內重湯熬

不住手攪成膏

右件前藥未并膏子壹處和得所搗件佰杵圓

如梧桐子大每服佰圓鹽湯溫酒任下空心食

前久服神效只忌羊肉

神僊既濟丹夫人以腎為本日以事物交戰損心勞神神動氣散兼飲食過度嗜慾無節虧損精神氣動神疲陰陽交錯水火不濟精神恍惚肢體煩疼夜夢陰交遺精白濁是致氣衰血弱百病所生之由也古聖神僊多方濟人遂出此方服之使人心腎之氣互相交養氣血榮盛精固神全乃得火不上炎而神自清水不下滲而精自固久服精神健壯輕身延年

人參 蘆去

石菖蒲 米泔浸 壹宿

鹿茸 燼去毛 酥炙

栢子仁 淘淨酒浸

遠志 心去

兔絲子 研成餅

巴戟 心去

鹿角膠 酒化 旋入

牛膝 酒浸壹宿去蘆

白茯苓 皮去

當歸 酒浸壹宿去蘆

五味子 枝去

訶子 炮去核

金櫻子

生乾地黄 洗淨各壹兩

鹿角霜 肆兩

右件搗羅為細末酒糊為圓如梧桐子大朱砂麝香為衣每服參拾圓空心食前溫酒下又方治心氣不足上焦有熱小便赤濁

人參 蘆去

澤瀉

木猪苓 皮去黑

黃連 兩各半

白茯苓 皮去

半夏 湯泡兩

右為細末燈心煮棗肉為圓如梧桐子大每服肆拾圓米飲送下日午臨卧服

又方 李亮 卿方

麋茸

鹿茸 酒浸壹宿去毛皮

兔絲子 淘淨酒浸參伍日研成餅

肉蓯蓉 酒浸壹宿去皮

人參 蘆去

茯神 木去

山茱萸 湯泡取肉

附子 炮去皮臍各壹兩

沈香 不見火

遠志 去心各半

牛膝 酒浸去蘆

巴戟 酒浸去心

五味子 枝去

黃芪 蜜炙

當歸 酒浸去蘆

熟乾地黄 洗各壹兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大朱砂為衣每服伍陸拾圓食前鹽湯下

煮砂丹專養心腎 王提點 炳傳

辰砂 有墻壁者大塊者

遠志 湯泡去心

山茱萸 湯泡取肉

補骨脂 炒

石菖蒲 米泔浸壹宿

石蓮肉 皮去

白茯苓皮去 柏子仁研別

熟乾地黄肥實者水洗淨酒浸壹宿

穿心巴戟心去 酸棗仁湯煮壹貳沸

北五味子枝去 人參去蘆

附子炮去皮臍 乾山藥兩參

沈香壹兩不

右別用豬猪心參箇燈心壹兩半又將未砂用燈心裏放猪心內外再以燈心纏之麻線繫之於銀石器內水煮壹日壹夜取出餘物不用將朱砂研極細諸藥為細末別用法酒壹升熬沈香山藥末為膏子搜和衆藥得所入臼中杵參伍佰下圓如梧桐子大每服伍拾圓食前棗湯任下

坎离丹既濟水火

伏火靈砂研細 陽起石酒煮

磁石火煨醋研 鍾乳粉各壹兩半

龍齒壹兩黑豆蒸壹日去豆

右為細末糝角為圓如菜豆大每服拾粒加至貳拾粒空心棗湯下
救生丹治丈夫婦人心腎不交脾氣虛寒榮衛不

行大內俱陷真氣不守津液枯少

膈肭臍壹對壹兩已朱砂研半兩

附子肆錢重者去皮臍酒煮拾沸

人參去蘆 白朮炒

遠志心去 當歸去蘆酒浸

天門冬去心各 神麴炒

鹿茸去毛 肉苁蓉酒浸去皮

沈香壹兩不

右為細末用精羊肉貳斤細切去皮膜秤酒煮過入砂盆肉研爛別用好酒伍升入膈肭臍當歸肉苁蓉天門冬末同熬成膏入餘藥末同搜圓如梧桐子大每服參拾圓加至伍拾圓温酒下空心食前服

小補心丹煖養心腎朱季封傳

鹿茸壹兩酒浸去 伏火朱砂研別

伏火靈砂研別 當歸去蘆各

陽起石酒煮 附子炮去臍

鍾乳粉各半

右為細末酒煮肉苁蓉爛研成膏搜和為圓如梧桐子大每服參肆拾圓棗湯任下空心服

至効十精丹安神定志補養精血治夢寐不安睡
多盜汗體發潮熱小便白濁

人參去蘆 沈香不見

鹿茸去毛 朱砂研別

琥珀研別 附子炮去

酸棗仁去殼 當歸酒去

免絲子淘淨酒浸壹 栝子仁同酸棗

右等分爲細末棗肉爲圓如梧栝子大每服參

拾圓空心棗湯或温酒下日午臨卧服

還少丹大補心腎虛損脾胃怯弱精神昏耗氣血

衰憊骨髓枯竭形容瘦瘁腰背拘急膝脛酸疼語

言錯忘飲食減少耳重聲乾頭疼腦痛五心煩熱

四肢懈怠肺氣風毒瘴瘧嘔吐

乾山藥 牛膝無灰酒浸壹

白茯苓皮去 杜仲宿各壹兩半

五味子枝去 猪實酒製炒令焦

山茱萸核生去 巴戟心去

肉蓯蓉無灰酒 遠志心去

船上茴香浸令透 栝忌子生

熟乾地黄洗壹兩 石菖蒲兩各半

右搗羅爲細末煉蜜入棗肉和圓如梧栝子大
每服參伍拾圓温酒或鹽湯下日進參服若只
早晨壹服則倍加圓數至伍日覺有力拾日精
神爽健半月氣力頗壯貳拾日日明壹月夜思
飲食冬月手足常暖此藥互有製度無毒不僭
不燥正是平補心腎常服永無脾寒嘔逆瘧痢
之疾更看體候加減身熱加山梔子壹兩精滑
加補骨脂壹兩少精加續斷壹兩心病加麥門
冬壹兩如婦人子宮久冷白帶下面無光彩艾
醋湯下服之女容瑩潤氣血調和其功效不可

具述

中虛丹治心血耗散心志不寧

朱砂陸錢懸胎酒煮壹伏時如酒

附子乾施添熱酒煮之温水浴

猪猪心子定刺下附子未刺不用

酸棗仁炒去皮 滴乳香各半兩

右將附子去皮臍爲末辰砂別研細肆味拌研

令和度藥末多少用乾山藥末打糊圓如梧栝

子定刺下附子未刺不用

子定刺下附子未刺不用

子天每服貳拾圓至參拾圓臨卧煎人參湯下
固真丹治腎經虛寒小腹滑數及白濁等疾

天台烏藥剉細 益智子大者去皮炒

右等分爲末別用山藥炒黃爲末打糊圓如梧
桐子大曝乾每服伍拾圓嚼茴香數拾粒鹽湯
或鹽酒下趙郡王加白茯苓等分用羊腰子壹
對切片伍味料初煨熟食之同煎圓
子以溫酒
空心送下

靈砂寧神圓治男子婦人大病之後傷損榮衛或
發汗吐瀉大過或失血過多精氣虧損心神恍惚
不得眠睡飲食全減肌體瘦弱怠墮倦乏嗜卧無
力四肢酸痛常服補虛益氣滋養榮衛壯脾爽神
諸疾不生

辰砂貳兩不夾石者絹袋盛懸於銀石器
內取井花水入椒紅參兩盛於器內
可採捌分夏用鍋子坐盛朱砂器在
內重湯煮令魚眼沸參晝夜爲度取
出辰砂
研水飛

人參去蘆 白朮炒

鹿茸燉去酥炙 茯苓去木 石菖蒲貳兩米泔
浸壹宿

黃耆蜜炙各參兩

右爲細末次入辰砂用棗肉和杵壹貳仟下令
熟圓如梧桐子大每服貳拾圓至參拾圓溫酒

或米飲空心食前服
赤石脂圓

川當歸貳兩半去蘆酒浸 赤石脂壹邑不雜者壹兩半

白茯苓皮去 熟乾地黄自蒸者鋪
中者再蒸
鹿角膠剉碎炒 吳茱萸湯泡米泔
炒壹兩
宣州大木瓜壹箇重半斤已上者開壹蓋
子去穰用艾葉填滿將蓋子
蓋定用艾葉填滿將蓋子
蒸熟取艾同前藥焙乾木瓜
成膏子

右爲細末木瓜膏子爲圓如梧桐子大每服伍
拾圓空心米飲下

破故紙圓治腎氣虛冷小便無度

破故紙大者鹽炒 茴香鹽炒

右等分爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服伍
拾圓或佰圓空心鹽酒鹽湯下

脛肭臍圓補心腎壯陽益陰固下元

鹿茸燉去毛 當歸去蘆酒浸
破故紙炒 杜仲薑製炒
五味子枝去 附子炮去
舶上茴香炒各壹兩 沈香皮去
脛肭臍浸酒 龍骨煨

鍾乳粉各半 熟乾地黄貳兩
右為細末、蜜和酒打糊為圓、如梧桐子大、每服參拾圓、空心鹽酒下、

琥珀圓補心腎、治憂愁思慮、內耗元氣、醉飽房勞、下傷元臟、致令精血不固、神氣大傷、心忡煩悸、夢寐不安、精神恍惚、足脛酸疼、小便白濁、情思不樂、多生恐怖、頭目昏暈、陰痿陽弱、腰膝疼重、一切虛羸、悉皆主之、

- 人參去蘆
- 麥門冬去心
- 白茯苓去皮
- 車前子
- 地骨皮
- 石菖蒲去鬚
- 熟乾地黄洗
- 琥珀研別
- 五味子各半兩
- 遠志去心
- 茯神去木
- 龍齒飛
- 乳香研別
- 山藥
- 朱砂別研
- 黃芪各壹兩
- 栢子仁研別

右為細末、煉蜜圓、如梧桐子大、每服伍拾圓、空心食前、臨臥、棗湯下、
既濟圓、治心腎氣虛、容熱上燥、神水下泄、陰陽不

和清濁相干、下元虛憊、腰脚疼重、心神不寧、水臌滑泄、飲食不進、

- 鹿茸燼去毛
- 白朮炒
- 山藥
- 遠志
- 續斷
- 牛膝酒浸
- 舶上茴香炒
- 白龍骨黑豆蒸去豆
- 巴戟去心
- 兔絲子淘洗酒浸
- 肉蓯蓉酒浸去土
- 蓮子肉炒
- 山茱萸去核
- 右為細末、糯米飯為圓、如梧桐子大、每服伍拾圓、食前溫酒鹽湯下、
- 磁石火煨
- 鹿茸燼去毛
- 破故紙炒
- 當歸酒浸
- 沈香不見
- 五味子枝
- 補骨脂炒
- 白茯苓去皮
- 車前子酒浸
- 覆盆子
- 熟乾地黄洗
- 鹿角膠成珠
- 大附子炮
- 僊靈脾去刺
- 杜仲炒去皮
- 桑螵蛸酒浸
- 麝香別研

又方

- 磁石火煨
- 鹿茸燼去毛
- 破故紙炒
- 當歸酒浸

附子炮去

沈香見火

乳香研別

木香濕紙

朱砂研別

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服肆拾圓温

酒鹽湯米飲下空心食前服

五子圓固心腎大補益泉州傳

覆盆子

兔絲子淘淨酒浸

枸杞子

五味子枝去

肉蓯蓉

山茱萸核去

乾山藥

熟乾地黄洗

破故紙炒各

栝子仁別研各

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服參伍拾圓

空心温酒鹽湯下

蓮子肉去心各

續斷酒壹兩半

酸棗仁去殼炒

石菖蒲酒去毛

栝子仁別研各

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服肆拾圓温

酒鹽湯米飲下空心食前服

五子圓固心腎大補益泉州傳

杜仲去皮薑製

巴戟心去

遠志心去

茯神木去

當歸酒浸

牛膝酒浸

草薢

黃精

青鹽研別

石菖蒲壹兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服參伍拾圓

空心温酒鹽湯下

僊茅圓大補心腎有神功

僊茅製了

菖蒲九節者

右等分不犯鐵器焙乾為細末北棗肉為圓如

梧桐子大每服參肆拾圓空心温酒鹽湯下忌

乳及酥恐減藥力

返精圓此方迺趙待制遇異人得之云是鍾離先

生方異人手書云茯苓定心沒藥養血破故紙補

腎生者既壯疾何自而生待制公與其子服之高

年嗜慾不衰髮鬚如漆更能加功修養可以致長

生也

破故紙貳兩隔紙

白茯苓壹兩

右貳味為細末用沒藥半兩搥破以無灰煮酒

浸高沒藥壹指許候如稠餈狀搜前貳味圓如

梧桐子大每服參伍拾圓隨食湯下如沒藥性

燥難圓再以少酒糊同搜圓食前服

坎離圓平補五臟升降心腎治小便白濁腰腿無

力心神不寧下焦虛寒陰冷遺瀝並皆治之

酸棗仁炒別

栝子仁研別

兔絲子淘淨酒浸

五味子枝去

薏苡仁

人參去蘆

鹿茸去毛剉成

肉蓯蓉酒浸

杜仲薑製炒

地黃洗

沈香不見

龍骨燉谷

麝香壹錢

覆盆子

狗忌子

牛膝去蘆

當歸酒浸

遠志去心

茯神去木

附子炮去

朱砂別研

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服伍拾圓空

心溫酒或人參湯下

養肝圓鎮心腎潤益五臟調順三焦久服應驗

沈香壹兩

鹿茸壹兩

兔絲子壹兩

熟乾地黃壹兩

右為細末入麝香肉壹錢半煉蜜圓如梧桐子大每服肆拾圓溫酒鹽湯空心任下

沈香附子湯

用水壹盞以沈香壹塊於砂盆內旋以水少許

磨沈香參佰匝以餘水洗下將玖錢重附子壹隻炮去皮臍切片子分作參服以沈香水煎每服生薑伍片煎至柒分去滓食前服以吞既濟丹尤佳

黃耆栢子仁散治丈夫腰腎損敗

栢子仁肆兩

遠志去心

人參去蘆

山藥

黃耆壹兩

肉蓯蓉酒浸去

車前子壹兩

茯苓白者

草薢

右為細末酒服方寸匙日參服此藥大治怔忡

安心氣空心食前服

虎骨酒寧神志去虛風補五臟悅神彩強筋骨進飲食久服活血養氣足膝輕健其效如神

虎骨壹兩

天雄壹兩

附子壹兩

肉蓯蓉壹兩

川草薢

酸棗仁炒

當歸去蘆

生薑貳兩

牛膝去蘆

肉桂去蘆

茯神去木

綿黃芪去蜜
金釵石斛

遠志去心

右為麤末用酒壹斗浸柒日每服壹合空心服

脾腎

加減大橘皮煎圓固壯脾經補益下元健美飲食
安神定志兼能升降心腎既濟水火久服無病行
履如飛不僭不燥

鹿茸去毛

兔絲子淘淨酒浸

山茱萸去枝

巴戟去心

人參去蘆

陽起石別研

川厚朴皮壹兩半去

肉苁蓉酒浸去

肉豆蔻煨去

川杜仲剉薑汁浸

補骨脂兩各壹

右為細末酒煮麪糊圓如梧桐子每服伍拾圓
食前鹽酒鹽湯或米飲下飲食減少用丁香附

茯苓去木

大附子炮去皮臍

沈香不見火

丁香不見火

當歸去蘆

橘紅兩

乾薑炮

肉桂去粗皮

牛膝酒浸

茴香炒

子煎湯下曾膈不快丁香茯苓乾薑白朮甘草
煎湯下大便作瀉豆蔻附子煎湯下心氣不足
睡臥不寐茯苓附子煎湯下受寒邪薑附煎湯
下小便多茴香鹽附煎湯下虛冷腹疼茱萸附
子煎湯下大便瀉血縮砂附子煎湯下口吐涎
沫津液稠枯痰飲惡心川烏附子南星煎湯下
法製厚朴圓壯脾腎

台椒去目炒

川厚朴去皮薑

橘紅

茴香淘去

青鹽

益智子炒

白薑炒

右等分以水浸乎藥慢火煮乾焙燥為細末酒
煮麪糊為圓如梧桐子大每服參拾圓加至肆
拾圓鹽湯或溫酒下空心服

補骨脂圓治脾濕流注腎經漸成下部之疾

大草烏頭

肆兩水浸壹片擦洗烏頭皮
鹽肆兩淹春乾每壹片烏頭用
鹽肆兩入盡臘乾慢火旋旋炒
候鹽味入盡臘乾慢火旋旋炒
直候如巴不焦獨取參兩
片嚼如米洗去渣切子焙燥研
蒼朮肆兩取皮以水洗去渣切子焙燥研
貳味用葱白大者拾莖濕紙裹煨切碎爛研

拌上件藥同淹壹宿焙乾草烏不煩

川練子炮去核 台椒去目者蒸壹宿

補骨脂炒 巴戟去心

桃仁沸泡去皮火炒入

舶上茴香炒 白茯苓去皮各

右為細末酒煮麪糊圓如梧桐子每服參拾圓
溫酒鹽湯任下食前服

胡蘆巴圓治脾腎虛冷腰膝疼痛小腸膀胱等病
攻衝大能補益美進飲食

胡蘆巴 破故紙炒各

葶撥 木香不見

葶澄茄 丁香不見

川練子炒 檳榔

穿心巴戟去心 肉桂去麤皮

舶上茴香炒 青皮去

枳殼水浸壹宿去 附子生去皮臍

右為細末酒煮麪糊圓如梧桐子大每服拾伍
圓食前鹽湯下或作散子每服貳錢水酒各半
蓋同煎參肆沸溫服

朴附圓益腎氣固臟腑實脾元進飲食者月陰氣

在內又多飲冷用此燥脾陸駐泊

厚朴去皮薑 附子泡去

茴香淘去

右等分用生薑自然汁浸過煮乾為細末神麪
打糊為圓如梧桐子大每服參伍拾圓食前鹽
采飲或湯酒送下

薑香圓治脾腎百病服之一月飲食倍進

生薑拾兩和皮細擦 茴香伍兩淘

右焙乾為細末酒煮麪糊圓如梧桐子每服肆
拾圓鹽湯鹽酒任下早晚食前服訖如人行參

伍里後方可喫食如患腎氣人加青鹽壹兩同

圓此方廉宣仲博士親題云紹興王從道提舉
服此藥年八十四能飲冷水食生菓無病

三妙圓

鹿茸燼去毛 鍾乳粉

肉豆蔻燼去毛

右等分為細末棗肉為圓如梧桐子大每服參
伍拾圓棗湯下食前服

椒蠟圓治腎冷諸病

川椒去目枝并合口者酒浸壹宿焙

桃仁去皮尖 鉄炒紫色

杏仁去尖

茯苓白者 去皮

右各等分爲細末用黃蠟參兩鎔過調前藥爲圓如梧桐子大每服壹貳拾圓空心食前鹽湯任下

愈痛圓治男子婦人驚憂氣滯脾腎積寒內狹冷氣人成痿癱癥瘕透隱皮膚或兩脇牽痛不已及小腸奔豚氣痛皆主治之

川草薺

鼈甲

川當歸去蘆 酒洗

三稜炮

破故紙炒

神麴炒

蓬莪朮炮

麥蘖炒

熟乾地黄洗各壹兩

乾漆炒令煙盡

延胡索炒

茴香淘去沙炒

沈香不見火

肉桂去麤皮不見火

沒藥各半兩 別研

麝香半錢 別研

右爲細末醋煮麪糊圓如梧桐子每服貳拾圓至參拾圓溫酒或鹽湯任下不拘時候日貳服正氣散治脾腎虛弱氣不歸元腹急脹滿雷鳴有時泄瀉不思飲食

蒼朮伍兩米泔浸壹宿去麤皮

陳皮肆兩去白炒

香附子炒去毛

益智炒

茴香淘去沙炒

甘草炒各壹兩

麥蘖炒

茯苓白者 去皮

厚朴去皮薑製沙

草薺子

訶子炮

烏藥

丁香皮

白薑炮

蓬莪朮炮

三稜炮

青皮去穰

良薑炒

人參去蘆各壹兩

右爲細末每服貳錢水壹盞生薑參片棗子壹枚鹽少許煎柒分食前服

魏氏家藏方卷第陸



魏氏家藏方卷第七

瀉痢

太素神丹治久患痢冷臟腑虛滑痢下膿血婦人血海虛冷赤白帶下經候不時久無子息男子下部積冷腰膝無力寒疝膀胱一切冷病劉德傳

牡蠣雪白壹斤 硫黃壹兩

膩粉兩半

右件先用炭參斤燒牡蠣令通紅放冷碾成粉分爲兩處各半斤用大甘鍋子壹箇鹽泥固濟只留口以牡蠣肆兩實在鍋子底次將硫黃膩粉同碾細用無底小竹筒置牡蠣之上鍋子中心四邊再以牡蠣實之却取竹筒要得不近鍋子四邊也然後再以肆兩餘牡蠣實捺硫黃之上去鍋子口留參貳寸周匝用熟火參斤簇鍋子中焰出以匙抄餘牡蠣糝之焰出又糝以焰絕爲度放冷取出再碾如粉然後取大新甄壹片擊成壹池子深約壹半甄已上將未經煨餘牡蠣平分壹半實鋪在池子底次將已煨過硫黃牡蠣在上更將餘壹半牡蠣覆之實捺平後用新白瓦壹口蓋定以木炭壹秤周匝燒之候

火盡爲度却取出於土內埋半日令出火毒研細滴水爲圓如梧桐子大每服參伍拾圓温米飲送下食前服

保壽丹治臟腑虛寒瀉痢不止陸駐治仲安傳

附子炮去臍 肉豆蔻各壹兩 赤石脂煨 白薑炮洗

革澄茄兩各半

右爲細末麪糊爲圓如梧桐子大每服參拾圓米飲送下

煮附丹治脾虛臟寒冷熱積滯氣結腸間虛脹痞後重滑洩

附子壹隻柴錢重者生去皮臍分切肆片 厚朴去麤皮秤 生薑陸兩薄切

益智淨洗兩到 半夏湯浸七次

川椒去目并汗 青鹽兩壹

右用水伍勝銀石器內慢火煮乾焙乾爲末法酒麪糊圓如梧桐子大每服參拾圓加至伍拾圓温酒或米飲送下空心食前日午日進參服火毒丹暖脾臟止惡心吐瀉

小棗伍拾枚 胡椒參百粒

右同研成膏子、用飛羅麩、不問多少、鉢內炒令色微黃、用生薑自然汁搜成膏、分作小劑、却將前棗椒貳味、如水糲糖心入在逐箇麩劑內、却搓成圓子、用濕紙裹、煨微香為度、去紙嚼喫、不拘多少、

大臟丹、治脾元虛弱、久瀉不止、腸胃不固、致成五洩、服之神驗、

大蒜濕紙煨 厚朴研去皮壹兩
硫黃半兩別研

己上參味、用猪大腸柒寸、去膜入藥在內、兩頭縛定、以好酒參勝煮爛、同研成膏、

茴香淘去沙炒去 肉豆蔻麩裹煨
訶子煨去枝 白茯苓皮去煨
神麩炒 草菓仁煨
白礬枯 白艾葉

麥蘖炒各半兩

右為細末、入前膏子、和圓如梧桐子大、每服伍柒拾圓、米飲送下、

養臟丹、治證前、

猪大臟斤半

大附子貳隻炮去皮臍

厚朴薑製炒為末肆兩 硫黃貳兩研細用厚朴入猪臟內以細繩繫定兩頭用水伍勝煮乾取出
龍骨生用 肉豆蔻麩裹煨
木香不見 白茯苓皮去煨
牡蠣煨 大訶子炮去核
茴香淘去沙炒 破故紙炒兩
右為細末、入麝香壹錢、薄荷糊為圓、如梧桐子大、每服宿圓、空心食前、鹽湯或飯飲下、

內灸丹、治臟腑滑洩、裏急腸鳴等病、

胡椒

乾薑炮洗不見 良薑炒
丁香火不見 附子炮去臍皮
吳茱萸湯泡柒次 肉桂不去皮
山茱萸炒去核 肉豆蔻麩裹煨
草豆蔻去殼各半兩

右為細末、棗肉為圓、如梧桐子大、每服伍拾圓、空心食前、陳米飲任下、日進參服、

固陽圓、治臟腑滑洩、去寒氣、固真陽、

陽起石研別 乾薑炮洗
右各等分、為細末、糯米飯圓、如梧桐子大、每服

暖下圓治臟寒洩瀉
伍柒拾圓米飲下覺虛寒氣短尤宜服之

大附子貳隻生去皮臍以生薑壹斤研細取自然汁煮附子候軟切作片子再慢慢煮候附子玖分熟漉出焙乾好丁香肆柒粒同研為末却將煮附子薑汁熬成膏和圓如小梧桐子大每服參拾圓至伍拾圓食前煎沈香湯送下

吳茱萸湯泡柒次炒

黃連去毛剉炒今赤色

右等分為細末用大蒜頭煨熟研爛為圓如梧

桐子大每服參拾圓空心食前米飲下

厚腸圓治腸胃虛寒不能尅消水穀大腑殮洩

人參去蘆

白朮炒

厚朴去麤皮薑製炒

丁香不見火

葶撥

紅豆

訶子肉煨

附子炮去皮臍

肉豆蔻麪裏煨

神麪炒

縮砂仁

麥蘖炒

白豆蔻

良薑各貳兩炒

檳榔

胡椒

華澄茄

陳皮洗去白

乾薑炮肆兩各

白茯苓皮去

右為細末稀飭搜和秤貳兩分作拾粒每服壹

粒或貳粒嚼細白湯送下不拘時候

又方治臟腑滑泄不禁不以大人小兒皆可服之

肉豆蔻麪裏煨

白朮炒

南沒石子

右為細末白麪糊為圓如梧桐子大每服伍拾

圓空心食前米飲任下小兒別圓服之

又方治肺受寒邪入於腸胃遂致大便虛滑臟腑

不實脾衰氣弱

川薑炮洗

良薑炒壹兩各

麥蘖炒

山茱萸取肉

鍾乳粉各壹分

川椒去目炒出汗

白芍藥

甘草炙

肉桂伍兩去麤皮不見火

當歸各壹兩去蘆

訶子皮煨

白茯苓各壹兩去皮

赤石脂各半兩別研

肉豆蔻麪裏煨

神麪炒

熟硫黃別研

肉桂去麤皮不見火

附子壹隻生去皮剉

白石脂別研各半兩

附子壹隻生去皮剉

肉桂去麤皮不見火

神麪炒

熟硫黃別研

附子壹隻生去皮剉

白石脂別研各半兩

附子壹隻生去皮剉

右為細末、入鍾乳粉和、用粟米粉打糊、為圓如梧桐子大、朱砂為衣、每服伍柒拾圓、至佰圓、薑艾鹽湯送下、不拘時候、或用固腸飲子下、亦妙、
固腸圓

大附子 壹隻炮 去皮臍

肉豆蔻 煨 麩裏

大訶子 核去

右為細末、糯米粉糊圓、如梧桐子大、每服佰圓、鹽飯飲下、空心食前服、

又方、治臟腑滑洩、

真龍骨 煨

右等分、為細末、蒸餅糊為圓、如菘豆大、每服伍拾圓、乾林瓜紫蘇湯下、食前服、

補真斷下圓、治虛寒泄瀉、注下不禁、

陽起石 煨

赤石脂 煨

肉豆蔻 煨 麩裏

乾薑 炮 洗

硫黃 參兩 別研

右為細末、稀醋煮麩糊圓、如梧桐子、每服伍拾

白薑 炮 洗

橘紅 各壹兩 去目

椒紅 各壹兩 去目 炒出汗

赤石脂 煨

細辛 去葉

川椒 去目 合口 炒出汗

白礬 枯

附子 炮 去皮 臍半兩

圓空心米飲送下、壹方加鍾乳粉

厚朴 貳兩 去皮 剉 生薑肆兩 切片 水貳碗 煮乾 為度 去薑不用

附子 壹兩 炮 去皮 臍 訶子 紙裏 蘸濕 煨

肉豆蔻 壹兩 煨 麩裏 乾薑 半兩 炮 洗

右為細末、薑汁煮麩糊圓、如梧桐子大、每服參伍拾圓、食前米飲下、

朴附圓

白艾葉

吳茱萸 湯泡 炒 次

右用生薑汁半盞、同好酒半盞、煮炒令乾燥、別用肉豆蔻半兩、赤石脂半兩、同為細末、酒煮麩糊圓、如梧桐子、每服參伍拾圓、空心食前、米飲送下、

又方

厚朴 去皮 秤貳拾兩 剉 用生薑貳斤 切片 水壹斗 於砂石器內 煮自曉至暮

乾薑 肆兩 炮 洗 甘草 貳兩 炙

己上參味同煮、如前法、取出焙乾、

補骨脂 炒 舶上茴香 炒

附子 炮去皮臍 各伍兩

肉豆蔻 肆兩 裹煨

右已上柴味竝為細末煮棗肉為圓如梧桐子大每服伍拾圓米飲送下或溫酒亦得空心食前服

酒煮黃連圓厚腸胃止泄瀉

黃連 去鬚 伍兩

厚朴 去麤皮 參兩

肉豆蔻 壹兩 裹煨

右竝剉用無灰酒米醋各壹勝慢火熬盡烈日曬乾為末再用酒醋打麪糊為圓如梧桐子大每服伍柒拾圓米飲送下

香連圓治陰陽相搏冷熱不調或瀉或痢

木香 貳寸分作兩段壹段用糯

黃連 半兩壹半用菜黃炒

右各自為細末皆用粳米粉糊圓如梧桐子每服貳拾伍圓白痢用乾薑湯送下

赤痢甘草湯下黃連拾伍圓

痛不忍者醋湯下木香拾圓

人參湯下黃連貳竝食前服

又方治血痢

木香 不見火

黃連 去鬚

乾薑 各壹兩 炮洗

乳香 半兩 別研

右為細末粳米飯為圓如梧桐子大每服參拾圓食前米飲下

薑連圓治痢下赤白

宜黃連 去鬚

生薑 連皮同黃連 炒各肆兩

肉豆蔻 麵裹 煨

當歸 去蘆各 貳兩

櫻栗殼 參兩去頂 帶穰蜜炒

乾薑 炮洗

阿膠 珠剉各壹兩 炒成

右為細末以棗子肆拾玖枚生薑肆兩切片銀石銚內同棗子水浸煮候乾取棗去皮核搗成膏為圓如梧桐子大每服伍拾圓空心米飲下

蒜連圓治臟腑虛滑

黃連 壹兩去鬚剉用菜黃 壹兩同炒去菜黃

右為細末獨頭大蒜濕紙裹煨熟研爛搜黃連為圓如梧桐子大每服參拾圓食前米飲送下

連朴圓厚腸胃

黃連 好者 伍兩

厚朴 拾兩去 麤皮

右咬咀生薑壹拾兩取自然汁浸煮乾為細末清麵糊為圓如梧桐子大每服伍柒拾圓空心米飲送下

木香圓治臟腑冷濕之氣留於脾經注下不已經年未効米穀不化飲食無味肌肉瘦瘠心多嗔恚

木香不見火

高良薑炒

厚朴去麤皮薑製

陳皮白去

白朮兩各半

吳茱萸湯泡

肉豆蔻肆兩

右為細末用獐猪肝肆兩陳米泔水煮入鹽壹

錢葱白參莖生薑貳拾片同煮肝熟研成膏子

搜前藥為圓如梧桐子大每服伍拾圓至佰圓

飢送下不拘時候日進參服

艾麥圓治虛羸久不進食臟腑不固小便常多

艾葉糯米糊

右等分為細末米醋打糯米粉糊圓如梧桐子

大每服參伍拾圓空心醋湯温酒或米飲下

厚胃圓治脾胃不和泄瀉不止諸藥不効者

訶子皮紙裏

肉豆蔻煨

龍骨煨

附子炮去

赤石脂煨

川白薑洗

右等分為細末水煮熟粉糊圓如梧桐子每服肆伍拾圓米飲送下食前服

赤圓子治脾濕虛寒

天雄壹對

川烏頭製同

乾薑肆兩切

右為細末入鍾乳粉壹兩神麩打糊為圓如梧

桐子大用生朱砂為衣陰乾却曬每服伍拾圓

温酒空心食前服

峻補圓專治虛弱常欲滑泄

天雄

川烏頭各貳兩

良薑

吳茱萸湯泡

硫黃研

附子

乾薑洗

胡椒

厚朴去麤皮

右為細末酒煮麩糊圓如梧桐子每服參拾圓

空心食前温酒米飲送下如無天雄只用大川

烏附子亦得

木香不見火

烏紫金圓一切瀉痢不問新舊冷熱及腸風下血並皆治之

肉豆蔻 壹兩 刷去灰土揀最大者每隻鑽竅入丁香米粒在內用醋紙裏煨

櫻粟殼

去頂蒂極淨切片用好酸醋浸壹宿炒乾秤半兩

滴乳香

別研

右為細末湯泡烏梅肉研爛和圓如梧桐子大

每服伍拾圓至柒拾圓瀉痢用米飲下痢用薑湯

下腸風臟毒下血荆芥地榆煎湯下並食前服之

養真圓治臟腑不固補諸虛弱

羊肚 壹枚 常去膏膜

羊腎 壹對 去膜

白朮 貳兩 炒

神麩 壹兩 炒

丁香 不見火

葷撥 各半 炒

沈香 不見火

熟乾地黃 洗

大附子 炮去皮

乾薑 炮

葷澄茄

白茯苓 壹兩 去皮各

當歸 去蘆酒浸

厚朴 去蘆製炙

白豆蔻 仁

人參 去蘆

半夏 麩

鍾乳粉 各半

天門冬

益智

右咬咀同羊腎切細入在羊肚子中以線縫肚

子口於淨甑蒸極熟為度趁熱於木臼中搗碎

曝乾或焙乾再碾為細末用熟棗肉為圓如梧

桐子大每服伍柒拾圓空心食前米飲下

補中圓治赤白痢

白芷 貳兩

櫻粟殼 去蒂穰壹兩

當歸 壹兩 焙去蘆

枳殼 貳兩 炒去穰

陳皮 半兩 炒

檉斗 大者拾枚 小者拾枚

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓水壹

盞白痢入石榴皮壹片赤痢入烏梅半箇煎至

柒分食前服如赤白痢入烏梅石榴皮同煎

香茸圓治日久冷痢

乳香 別研

鹿茸 半兩 酒浸

肉豆蔻 壹兩 淨洗每箇作兩片安乳香在內外用麵裹煨去麵

右為細末陳米餅和圓如梧桐子大每服伍拾

圓食前米飲送下日進參肆服

杏霜圓

杏仁 參箇去皮

百草霜

巴豆 陸粒參稜者去皮取油盡為度

右同研細、用粳米飯爲圓、如芥子大、每服貳圓、赤痢甘草湯下、白痢煎艾湯下、忌生冷油膩濕麵菜熱物、水瀉新汲井花水下、如聖圓治赤白痢、

川百藥煎好者不拘多

右白湯調陳米糕爲圓、如梧桐子大、略用百草霜爲衣、如白冷痢、以櫻栗殼壹枚炙黃色煎湯送下、赤痢甘草湯下、不拘時候、

三建圓止下泄、寬膈進食、補助真元、

天雄附子各壹兩

川烏頭貳隻已上並 陽起石別研

鍾乳粉各半兩

右爲細末、神麩打糊爲圓、如梧桐子大、朱砂爲衣、每服拾圓、薑湯送下、食前服、

神應乳香圓治諸般惡痢、

乳香沒藥各壹分

訶子肉錢壹

安息香壹分酒少許蒸壹時久

右爲細末、用安息香膏搜成餅子、攤蓋中、別以杏仁燒煙薰令乾、翻轉再熏、圓如菜豆大、如硬

入白湯少許潤之、每服參拾圓、空心食前、乳香湯下、

肉附圓治泄瀉不止、

附子壹隻米錢重 肉豆蔻壹兩貳錢

右爲細末、麵糊爲圓、如梧桐子大、每服伍陸拾圓、米飲下、不拘時候、

椒附圓治驟腹痛注下、或滑腸頻併多有冷沫、

川椒炒出汗 附子生去皮臍

右等分爲細末、麵糊爲圓、如梧桐子大、每服參

拾圓、米飲下、食前服、

韭附圓、老人尤宜服之、

大附子壹隻、炮去皮臍、再炒冷微黃色爲末、以

韭菜根研爛、絞取汁、圓如梧桐子大、每服參拾

圓、米飲空心下、須是曬乾服

肥腸圓治脾泄下痢、

硫黃貳兩 吳茱萸肆兩湯泡

已上貳味、用獾猪大腸肆尺、去脂膜、洗淨、入貳味藥在內、用麻線縛兩頭、好米醋壹碗、砂石器內、慢火煮乾、爛研成膏、

厚朴 拾兩、去皮、薑汁浸
附子 貳兩、炮、去皮、臍、南木香 貳兩、濕紙
右為細末、用前膏子搜和、杵什餘下、圓如梧桐
子大、每服伍拾圓、食前米飲送下
猪肚煎圓、治因病後或泄瀉、久服熱藥過度、脾土
燥而不能制水、服積藥則多耗氣精液、不能傳送
或痢甚則頻併、或下白膿、腹肋時痛、此藥潤腸和
臟氣進飲食

船上茴香 貳兩
川椒 貳兩、揀開口、無梗者、用白芨肆兩
枳殼 貳兩、去穢、將炒、椒、芩、同
右為細末、用猪肚壹箇、洗淨者、脂入、硫黃末、右
內用線密縫、以無灰酒肆勝、慢火煮爛、別研令
極細、和藥為圓、如梧桐子大、每服參拾圓、空心
米飲溫酒送下
水煮青鹽圓、治脾積瀉、經年不効者、

附子 臍生去皮
京三稜 炮
木香 濕紙
縮砂仁
人參 去蘆
肉桂 去麤皮
鹿茸 燉去毛
蓬莪朮 生

益智仁 益
陽起石 酒壹盞、煮乾
陳皮 參兩、白
右竝剉入青鹽肆兩、水浸藥平壹指許、煮乾為
度焙乾、為細末、酒煮麪糊圓、如梧桐子、每服參
拾圓、食前溫酒鹽湯下
育腸湯、治脾胃虛弱、內受風冷、倉廩不固、下痢不
實、食不充肌、力減氣弱、下部酸倦

人參 去蘆
高良薑 炒
當歸 酒浸
訶子 濕紙
肉豆蔻 煨、麪裹
右等分為細末、每服肆錢、水壹盞半、粳米佰粒
同煎至米分、食前溫服
萬安湯、治脾泄冷痢、腹痛裏急、寒中色白、米穀不
化、大進飲食、臨安馮
人參 去蘆
大川烏 炮、去皮、臍、剉
甘草 炙、各
草菓子 煨、裹

乾薑 炮、洗、各
厚朴 肆兩、去皮、薑汁
川椒 貳兩、去目、合
赤茯苓 去皮
厚朴 去麤皮、薑製炒
甘草 炙

右為麤末每服參錢水壹盞半生薑貳片棗子壹枚去核同煎至捌分去滓空心食前熱服調中湯治赤白痢由腸胃虛弱冷熱之氣乘虛相搏血滲入腸則瀉為痢重者血與膿相雜狀如濃涕輕者濃血上赤脉狀如魚腦日夜不絕臍腹痛不思飲食竝宜服之

木香 壹錢不見火

黃耆 壹錢蜜炙

人參 壹錢去蘆

當歸 壹錢去蘆酒浸

櫻栗殼 去頂蒂攪半兩剪碎蜜拌炒令黃

右為麤末每服參大錢水壹盞生薑參片棗子壹枚煎至柒分去滓食前通口服如血痢加竹茹壹塊同煎

四味茯苓湯治伏暑瀉痢不進飲食赤痢腹痢者服之神效

宜黃連 兩伍 粉炒

阿膠 壹兩

右為飲子每服肆錢水壹盞半煎柒分去滓早晚食前溫服

藿香葉 兩貳 去皮

白茯苓 壹兩半

櫻榆湯治痢

櫻栗殼 半斤去頂蒂攪蜜炒

陳皮 壹兩

地榆 兩肆

右為麤末每服參錢水壹盞生薑參片棗子壹枚煎至柒分去滓食前溫服

櫻栗湯治痢

大櫻栗殼 拾枚赤痢生用

甘草 半寸

右用陳米半合水兩椀同煎至壹椀分作參服

嚙下駐車圓

六物湯治赤白痢秋後不効最宜服之

櫻栗殼 去頂蒂攪蜜炒

香薷 壹握

甘草 伍寸

右為麤末作參服用水壹中椀煎至柒分去滓空心溫服

圓通大聖散治丈夫婦人小兒赤白痢不痊者竝宜服之

此方迺觀音夢中傳授

木香 方圓貳寸不見火

黃連 半兩去鬚

右貳味以水半勝同煮乾去黃連只取木香切焙為細末分作參服第壹服用陳米湯調下第貳服陳米飲調下第參服甘草湯下小兒隨意加減

如神湯不問新久瀉痢或赤或白或水瀉竝治之

櫻栗殼大者去頂蒂穢淨

當歸去蘆 丁香不見

白朮各壹兩 乳香半兩

右咬咀病輕者每服參錢水壹盞煎柒分去滓通口服甚者每服半兩水壹盞半煎至捌分去滓只壹貳服見效

神應散治瀉痢

櫻栗殼去頂蒂穢

川乾薑壹分半 甘草半兩

人參去蘆 當歸去蘆各壹分

右為細末每服參錢米前米飲調下

木香散治隔年痢不止

木香用黃連半兩同炒

甘草炒

櫻栗殼去頂蒂穢

右等分為細末入麝香少許陳米飲調下貳錢

血痢尤宜服之

人參散任提舉文薦傳

人參去蘆

阿膠蛤粉炒

右等分咬咀每壹兩分作肆服每服水壹盞煎至柒分去滓通口服

豆蔻散治赤白痢

肉豆蔻貳兩

木香壹錢

人參去蘆

甘草炙

右咬咀每服參錢水壹盞半棗子參枚生薑伍片烏梅貳枚煎至陸分去滓不拘時候服

又方治久年新近泄瀉赤白下痢

肉豆蔻壹兩

橘紅壹兩

甘草貳兩

香附子肆兩

川薑壹兩

右為細末每服參伍錢用陳米飲調下不拘時候服

又方治瀉痢腹痛裏急後重糞赤

肉豆蔻 剉裹

石榴皮

櫻栗殼 去頂蒂 穰蜜炙

右等分爲細末每服參錢食前米飲調下

栝子散治赤痢
側栝子貳拾伍枚研爛冷熱水淘紗帛濾去渣入蜜再調連進貳服忌肉及魚腥之物

二宜散治赤白痢

甘草 慢火油煎

乾薑 炮洗

右等分爲末每服壹錢水搦分煎至肆分經宿露空心服如赤多即甘草陸分乾薑肆分白多

甘草肆分乾薑陸分忌生冷油膩物

香櫻散治積痢

木香

半兩用黃連半兩同炒

甘草 壹兩

櫻栗殼

去頂蒂穰半兩用生薑半兩同炒

右爲細末入麝香少許食前陳米飲調下

白石脂散治泄瀉或便血或痢不以老人小兒竝宜服之

白石脂真者用炭煨通紅研細每服參錢空心米飲調下

赤石脂散

赤石脂 煨

縮砂 壹兩

肉豆蔻 剉裹 各肆兩

右爲細末每服貳錢空心米飲調下

三磨散治臟腑虛滑泄瀉不止

川厚朴

長參寸闊壹寸去皮鑽數拾孔薑汁半盞塗炙薑汁盡爲度

附子 壹隻炮

去皮臍 肉豆蔻 剉裹 壹枚

右用第壹米泔水壹大盞分參處參味各磨濃

和入生薑伍片煎至柒分食前溫服

抵聖散治遠年脾泄不瘥者 汪去偽傳

人參 去蘆

陳皮 去白

木香 不見火

肉桂 去麩皮不見火各壹兩

附子 柒錢炮

甘草 參錢

白朮 炒

白茯苓 去皮各半兩

訶子

拾陸枚濕紙裹數重煨香去核

肉豆蔻 剉裹 貳枚

右爲細末每服參錢無灰酒調空心面東服之

如人行伍里路再投酒壹呷忌麩豉汁豆豉汁如年深者貳服即瘥

丁香散治一切冷氣瀉及脾泄腹內刺痛

丁香 壹分不見火

肉豆蔻 剉裹 貳枚

附子

壹兩炮去皮臍到如豆塊生薑肆兩淨洗和皮切碎同附子入鈹內慢火

右為細末每服貳錢溫粥飲調下空心食前日進參服

固腸飲治心脾冷痛不可忍老幼霍亂吐瀉甚效

訶子去核取肉炒 甘草炙

厚朴薑製 乾薑炮

草菓仁用 陳皮炒

良薑炒 白茯苓

神麴炒 麥蘖炒

右等分為末每服貳錢水壹盞煎至柒分入鹽

少許食前服急用沸湯入鹽調服小兒半錢

又固腸飲治腸胃虛弱內狹風冷臍腹撮痛下痢及虛滑或變膿血

肉豆蔻炮 人參去蘆

白朮炒 赤石脂

肉桂皮去 當歸洗切

良薑 附子炮去臍

厚朴薑汁製炒 甘草炙減

右件拾味各等分碾為麤末每服伍錢水壹盞半入粳米壹小撮煎至柒分去滓空心食前溫

服

灸肝散治脾氣虛弱肝脉有餘邪來傷正洩瀉不實倉廩不藏飲食減少力乏氣短飲食不化肌膚倦怠面無顏色

當歸去蘆 破故紙炒

高良薑炒 縮砂仁各參

羌活洗 肉桂去麤皮

陳皮去 白朮炒

赤茯苓皮去 吳茱萸湯泡

肉豆蔻去殼 厚朴製

右為細末每服參錢以獾豬肝參兩切片摻藥於上以漿水壹椀醋少許鹽壹錢同煮水煮盡空心連肝嚼下

生氣散治脾臟氣虛泄瀉不止百藥不效者

鍾乳粉 赤石脂煨

陽起石火煨候紅好酒內浸壹遍研細各半兩

右為細末用附子壹隻炮去皮臍只用半隻入乾薑拾片水貳盞煎至柒分調生氣散貳錢空心服半日再服

薑香散治久患脾洩瀉

宣黃連壹兩 去鬚

生薑肆兩

右判如豆大炒令薑乾脆深赤色去薑取黃連為末每服貳錢空心膈茶清下甚者不過貳服即瘥

如聖飲治痢

櫻粟殼去頂蒂穢 密炙肆兩

橘皮去白

白艾

當歸去蘆

甘草各貳兩 炙

烏梅壹兩

右為麤末每服參錢水壹盞半生薑參片棗子壹枚如赤痢入地榆白痢入乾薑壹小塊煎至

柒分去滓空心温服

御米飲

櫻粟殼去穢米 醋炒

甘草炙各半兩

川厚朴去麤皮 薑製炒

人參去蘆

白茯苓皮去

白薑洗炒各壹兩

大烏梅伍枚 連核

右為麤末每服伍錢水壹盞半煎至壹盞

温服入棗壹枚薑參片同煎亦得如赤痢更加黑豆貳柒粒

痔漏

先君刑部所藏五痔方

予少之時忽患便血至三十歲後漸苦翻花內痔之疾日夕為惱及從宦以來聞有良醫則必訪問方藥其說皆以為有血則必有痔有痔則必有血往往謂先當醫痔則血自不作後因隨侍先人守官中都繼而先人進登通顯士夫間有以方見贈者有告以某郡某邑有善醫者即以書屈致或不憚裹糧往見大抵各自立說強此弱彼究其極至則無非用毒藥或生砒雜以膽礬硃砂或用油煎斑猫巴豆之屬或用桑柴灰自熬餅藥或用灸法或以毒藥薰洗或用刀及藥線去之其說率不過此而已若論其疾生於不便之處每遇登廁疼痛如割飲食坐卧不得自如苟不速以瞑眩之藥攻之何緣有瘳根若不除久則成漏此固然矣又恐患者恨不能即愈一旦遽聽庸醫投以狼虎之藥不特其疾轉增痛楚萬一至於穿腸漏血其害寧小小哉所以不敢輕信醫者之言必待親見有此疾者所用何藥及身曾試之有效方敢用也先人在中都予正苦翻花之疾伏枕呻吟閱

日甚久，雖用朴消、大黃等煎洗及服，應于痔藥如水投石。忽家間幹辦官沈武經薦請河坊李防禦名用和者，以醫遭際。

德壽官蒙恩補官，且賜銀絹鞍馬，乃是丞相為中書舍人日行詞給。誥至今出入德壽官，乞折簡招之，試令一看。遂稟先人許之。李防禦既至，一見所患云：限十日醫，可便堪乘馬出入。予初未深信，姑令用藥，雖未免疼痛，三兩日而其疼止，是覺急重耳。十日之內，痔果焦枯，但李防禦自謂名醫，不無索價。緣此人多不敢輕易見之。渠昔在宣城時有二子，長曰李大官人，却專令供奴僕之職，只以姓名呼之，仍不時箠撻李官人者，輒赴愬於天府，又哀鳴於鄰人馬興嗣，謂我欲將李防禦真方開板散貼臨安府四門馬，曰何損於彼，不若借汝囊費，仍歸宣城貨藥，却以此方見惠。李從其說，馬既得此真方，即攜李防禦親筆藥方一冊來見沈幹辦。沈遂與之俱來，面授予稟。先人既與月給，又補進義副尉，充號簿官。予既得此方，且親見李防禦手法，自後凡數次疾作，命門僧大師妙

莊修製，每用之即得輕減。鄉曲潘宰舊有此疾，其大如拳，亦用是藥半月而愈。此方用藥雖簡，收功甚速，且不驚人，又不甚疼。予慶元四年戊午赴郴陽守，至郡五六月，其痔再作，且復便血。舉室驚憂，郴陽與五嶺接境，絕無醫藥。予謂家人不須憂慮，自有方書。當先服止血藥，然後用李醫之方，擇日治之。遂令郴州職醫李炳依方辨藥，仍教以手法及論。以其間修製曲折，李頗曉解。是日早上，至午間及酉後，凡三次傳藥。半夜忽痔上黃膏，水流衣被，露濕當夜更不上藥。且教黃水流，出至次早，其痔已消縮一半。理愛上藥一二日，緣年高氣衰，非少日比。頃歲全不覺痛。今次用藥，却覺氣脈相連，應外腎作疼。予忽省記李防禦嘗說：若是老人用藥，應得外腎疼。時令人將手於火上烘熟，熨外腎及穀道間，遂用此說，其痛即止。痔既消縮，遂不曾再傳藥。若欲醫治他人，須是傳藥三兩日，直候黃水流，出漸少，方是痔根惡水出盡。如此則痔頭自然焦黑，若膏水正出，便不傳藥。其痔無緣斷根，須令外科早晚看視。若是虛怯之人，三兩日一次

用藥自然藥性緩慢，直候痔頭焦枯方止。予親試之，已三十餘年，是以備諸。今六十有三矣，氣血衰弱，與二十年前事體不同，但得痔疾不致苦楚足矣，所以不敢深治之也。予謂世間大小方脈皆有方書，獨痔疾苦無好方，恐後失記。李醫方藥病中因詳細直書之，以備異日遺忘。今載李氏方于後。慶元五年正月望日，定齋居士書。水澄膏，此是護肉藥方。

鬱金

白及

右等分，同為細末，候內痔登廁翻出在外，用溫湯洗淨，不須坐入，即側臥床沿上，用新水和蜜於盞內調，令稀稠得所，用篋子挑藥，輕手塗在穀道肆邊好肉上，只留痔頭在外，却用薄紙團轉蓋在藥上，仍用羊毛筆蘸溫水塗在連紙上，要紙護定，水澄膏不令肆散耳，才覺藥乾，又用溫水濕之，後却用枯藥。

枯藥

好白礬

肆兩

生砒

貳錢半

朱砂

壹錢生研
令拾分細

右各研為細末，生將砒安在建盞中，次用白礬

末蓋之，用火煨令煙絕，其砒盡隨煙去，止是借砒氣於白礬中，將枯礬取出，研為細末，須是研令拾分細可也。先看痔頭大小，將所煨白礬末抄在手掌心上，入生朱末少許，貳味作壹處，以口津唾就掌心調，令稀稠得所，用篋子塗在痔上，週遭令遍。日參上，須子細看痔頭顏色，只要色轉焦黑，乃是取落之漸。至夜自有黃膏水流，出以布帛襯之，水儘多為妙，乃是惡毒之水，切勿它疑。至中夜更上藥壹遍，至來日依舊上藥。參次縱有些小疼痛不妨，如換藥時用麤碗壹隻盛新水，或溫湯，在痔側以羊毛筆壹管，輕手刷洗痔上，去了舊藥，却上新藥，庶免擡身，仍用護藥。此藥只是借用砒氣，又有朱砂在內，少解砒毒，所以不甚疼痛者，蓋非專用毒藥也。次用荊芥湯洗之，參兩日之後，黃膏水流，出將盡，仍看痔頭焦黑為度，以篋子敲打痔頭，見得漸漸堅硬黑色，却於枯藥中增添生朱，減退白礬，自然藥力慢慢緩矣，須用藥參兩日以後，方可增減。且以日子漸漸取之，庶不驚人，全在用藥人看痔頭轉色，增減厚薄，傳藥方是活法。

荆芥湯

荆芥不拘多少生剉
右為麤末用水參兩椀入瓶內常常煎下如用
了依舊入瓶內用火煨之可用參伍次

潤腸圓

大黃濕紙裹煨剉細

枳殼去穰鉄炒

當歸去蘆

右參味等分細末蜜圓每服貳參拾圓白湯送
下夏量臟腑虛實多寡服之緣為己用枯藥之
後痔將欲焦枯糞門急迫恐大便堅實難出所
以預先服此潤腸圓予以平生稟受虛弱臟腑
素來不實不曾服此却自合松子仁大麻仁藥
準備只要臟腑稀滑耳

龍石散

龍骨煨過去火毒

香白芷

好黃丹

軟石膏煨過去火毒

右等分為極細末乾糝瘡口上又須候痔頭焦
枯落盡以藥收斂瘡口更預先準備些好血竭
末或要止血或要收斂瘡口要用

雙金散

黃連

鬱金

右等分為細末用蜜水調傳痔頭上虛弱之人
己用枯藥痔上忽有些小疼痛用此傳之其痛
即定壹方只用腦子末傳亦可定疼

國老湯

甘草生剉不拘多少

右用水壹兩椀入瓶中常常煎下薰洗痔瘡蓋
緣甘草自是痔藥又解砒毒若瘡口將斂其痒
異常尤要此藥澆洗溫熱隨意內侍霍承宜諧
夫責居郴州亦緣久苦內外痔疾不敢飲酒食
麪坐臥痛楚因見予用此方傳貼有效來求此
方用之有效且云果是妙方全無疼痛用藥之
時坐臥飲食並不相妨今日專來相謝今霍承
宜量移信州可詢之庶知此方之妙李氏方止此

固榮丹治或痔大作下血不止宜服此藥

代赭石火煨通紅醋鉢內研極細焙淨搗

五倍子鉄炒

鹿角膠剉鉄炒

訶子去核剉

當歸剉洗淨

木賊去節剉炒

川芎剉洗淨

右為細末入代赭石末和水煮糯米粉厚糊為

圓如梧桐子大、陰乾、每服百圓米湯下、以止爲度、未効再進、代赭石大治腸風下血、痔疾、建脾、縮小便、亦治鼻衄、吐血、尿血、訶子治腸風下血、五倍子治五痔下血不止、當歸川芎治腸風下血、血既多、以此滋血、不致枯竭也、鹿角膠固血、道補血虛、或下血未已、急進此藥、不輟則自然收斂、不滲失也、腸本無血、血自痔竅中出、乃借路耳、吐血、鼻衄、尿血、橫流、不攝、當用前諸方、隨證服之、

烏玉圓治腸風痔漏

櫻櫚 亂頭髮皂角水洗
 苦練根貳兩 蝟皮兩
 牛角腮參兩 乳香
 麝香各半兩 豬蹄甲後蹄肆拾
 別研兩 雷丸壹兩
 芝麻 壹兩

右除乳麝外用藏瓶、或砂合蓋、以鹽泥固濟、周回用火煨煙盡、存性、不可太過、便去火、入乳麝、再研細、用酒打麪糊爲圓、如梧桐子大、空心食、前胡桃酒下貳參拾圓、楊氏方、名櫻櫚圓、添不、蚌皂角壹兩半餘用、浙東提舉司局方、加槐角

肆兩燒灰存性、楹藤子壹兩貳錢半炒、苦練根減壹半、用牛角腮肆兩、豬蹄甲只用貳拾伍箇、麝香貳錢、芝麻乳香麝香雷丸苦練根楹藤子不燒外餘藥各燒灰存性、不用藏瓶、每服伍拾粒、荆芥茶或溫酒米飲任下、

朴藥圓治腸風下血痔疾

厚朴壹斤去 白朮斤半
 麥蘖陸兩
 右爲細末、生薑自然汁煮神麪末陸兩爲糊、圓如梧桐子大、每服參拾圓、茶酒白湯任下、不拘時候、

木鼈散治痔不以內外洗藥

木鼈去殼切作片爛搗 地骨皮
 紫金皮 當歸去
 枳殼各半 黑豆合參
 右先以豆煮軟、水伍勝、煎至肆勝、去滓、乘熱薰、通手淋洗、可用肆次、易之、如身體生瘡、紫黑、添樟木皮或葉同煎洗、

木槿散乾痔封瘡口

木槿花八月九日採取陰乾

右為末，傅瘡口，其瘡自合，至妙。此貳藥，乃醫家秘方。壹方用葉爛研，痔上極妙。必應散治五種腸風下血，糞前有血，名外痔。糞後有血，名內痔。大腸出名脫肛，穀道四邊有努肉，如乳頭，名鼠爛。痔有穴，腸出血，名漏。竝皆治之。

黃牛角鯁壹枚

白蛇蛻壹條

猪牙皂角壹枚

穿山甲壹片

蝟皮兩

右竝剉碎，入砂瓶內，以鹽泥封固，候乾，先少著火燒，令煙出，後用大火煨，令通赤，為度。取出攤冷，為末。先以胡桃肉壹枚，分肆分，壹分臨臥時細研如糊，酒調下，便睡。先引出蟲，至五更時，壹服。次日辰時，壹服。竝參錢藥末，久患，不過參服，即効。

落痔膏治男子婦人壹拾參般痔，萬不失一。

灰莧灰壹斗

純白炭灰壹斗

右各淋取灰汁伍勝，共壹斗，以薄紙數重，簪箕內盛了，淋伍柒度，取醱清灰汁，入鐺內，煎至壹貳合，却用風化石灰，入細絹羅子內，羅過參伍度。臨時旋將汁少許，調風化石灰少許，以篋子

挑藥點痔頭，少時拭去，又點如此數度，如墨色。其痔自焦落。更看落後裏面，似石榴子內，平，便用鹽湯洗，不得出風，却用前封瘡木槿散。

治痔疾

乳香

烏藥

檳榔

蜜陀僧分兩

右件肆味，以新水磨傅。

痔藥

黃連貳兩

朴硝壹兩

楊樹自然蛙骨兩

右件同為細末，煎湯半，薰半洗。

洗痔方

茵陳

荆芥

黃芩

枳殼

五倍子

朴硝

赤小豆

木蓮

右等分，剉碎，每貳兩，用水參，椀煎熟，濾滓，熏洗。

又方

野苧根壹斤

椽斗子殼壹勝

右共搗碎，用水壹斗，煮及柒分，乘熱，以盆盛洗。

熏患處候湯温通手洗之冷則止藥湯可留煖
用參伍次甚妙

治大便下血

烏金圓

枳實穢去

生乾地黃洗各

橘紅

右為末淡麪糊圓如梧桐子大每服伍拾粒臨
睡熱湯下

又方郭士
仲傳

當歸去

地榆

百草霜陸兩羅

白梅拾貳

枳殼去穢
槐花炒命黃色
白礬陸兩

右為細末用白梅浸出酸水去核只用淨肉搗
令極爛壹處和前藥圓如梧桐子大如難圓用
少陳米飲麪糊為圓每服伍拾圓空心食前用
米飲送下加至壹佰圓已上無害

續斷圓治下血不止

續斷參兩水浸

枳殼去穢

黃耆貳兩蜜
白蠟直者炒去

右細末湯化雪糕和為圓如梧桐子大朱砂麝
香為衣每服參伍拾圓米飲下大便前有血食
前服大便後有血食後服
黃連圓治大便下血

黃連貳兩

右貳味同炒香熟去生薑只用黃連醋煮麪糊

生薑肆兩並剉

圓如梧桐子大每服參拾圓食前烏梅湯下
梅茸圓補陰陽不足及一切下血不止男子婦人
皆可服

麋茸真好

鹿茸有血

右等分用酥炙研為細末用煮熟烏梅取肉研
令爛入熟麪糊少許和為圓如梧桐子大每服
壹佰粒米飲湯下日貳參服大凡男子便血皆
是酒色損耗氣血之過若用他藥而不治其源
必未能速效要當先養其氣氣固則血自不下
須久服此或要加附子亦不妨但不可服黃連
等恐損動脾胃愈無益矣

又方

鹿茸貳兩好嫩者

右為細末用烏梅肉煮軟研碎和前鹿茸末成

圓即圓之不拘烏梅多少米飲下陸柒拾圓食前服

蒲藕圓治大便下血無時久不差者高宮幹 珂傳

熟乾地黃兩壹

當歸去 兩

黃連去 兩

石菖蒲各半 兩

右為細末用生藕節取汁同蜜為圓如梧桐子大每服肆伍拾圓米飲熟水任下食前服

獨連圓

好實黃連參兩淨洗日乾分為參服壹分剉作半寸入陳米壹兩微炒紫黃色壹分亦剉炒熟為度壹分生用焙為細末研粟米粥和杵數佰下圓如梧桐子大每服伍拾圓空心陳米飲吞下壹服立効如急速不及製只用生黃連為末依法用之貳服抵壹服功此方治血痢水瀉佰發佰中

二薑圓治臟寒大便血作

良薑薄切 片炒

乾薑炮洗刮去 皮各壹兩

烏梅肉兩半

右為細末水煮熟陳米搜圓如菜豆大候乾每服壹佰粒食前溫米飲下

艾附湯

大附子貳兩炮去 皮臍切片 熟白艾壹兩

川薑米錢 炮洗

右咬咀每服參錢水壹盞半煎柒分去滓食前溫服

歸附湯

當歸半兩 去蘆

附子壹兩炮 去皮臍

右咬咀每服參錢水壹盞半生薑伍片煎柒分去滓食前溫服

沈香湯失血之後脾虛人尤宜服

香附子去毛 參兩

白茯苓去皮 壹兩各

縮砂仁

甘草炙剉各 壹兩半

沈香貳錢不 見火

右為細末入鹽湯點服如煎服則用薑棗神授散治大便下血不止

白雞冠花

生薑去皮

右等分同於沙盆內爛研捻作餅子焙乾為細末白湯調下不拘時服此方乃趙八節使傳壽皇御前見一樂人黃瘦壹日忽肥壯呼來問之乃云久患失血因得此方遂獲安痊

壽皇面賜此方與 嗣秀王傳於 大父

越桃散治下血及血痢

越桃 也 施子

槐花

青州棗

乾薑

右等分燒存性為末每服貳錢食前用陳米飲調下

栢芷散治大便下血

側栢 貳兩酒浸砂器炒焙乾

香白芷

右為細末每服貳錢米飲調下不拘時候

木香呵子散

木香 半兩不見火

呵子皮

當歸 壹兩去蘆各

右為細末每服參肆錢用第貳米泔壹盞煎至柒分溫服之不拘時候

二灰散治下血

乾側栢 略焙為末伍錢

桐子炭 再燒為灰却為末貳錢

燒了櫻欄灰 存性為末不可燒作白灰參錢

右參味打和作貳服糯米飲調下立止不拘時候服

妙應散

橄欖不拘多少風前浪乾連核於炭火內煨成灰逐箇鉗出碾為細末每服貳錢空心食前用臈茶調下

山梔散治鮮血箭出如紅線者壹服立效

棟新老山梔不拘多少去皮焙乾研細若油出成團即擘開猛火焙乾手擦細羅取末瓷器盛發時用新汲水調下貳錢忌酒麵等毒物參伍日

練根散治便血 王解元良臣傳

木蓮 名木饅頭收陰乾

枳實 去穢缺炒

右等分為細末每服參錢米飲調服不拘時候

治大便下血

槐花 炒

白礬 枯

右等分為細末白麵糊為圓如梧桐子大每服

參拾圓米飲吞下食前服

腸風臟毒

烏金圓治腸風臟毒下血不止

乾櫻欄

乾薑

大象斗子

烏梅

右肆味燒灰存性為細末入枯了白礬末伍味

各等分、麵糊為圓、如梧桐子大、若糞前有血、即空心服、糞後有血、即食後服、每服肆伍拾圓、米飲下、

倍槐圓治腸風下血、

五倍子分壹

槐花分貳

五靈脂分壹

右為細末、麵糊為圓、如梧桐子大、每服參拾圓、食前米飲下、

硫附鹽礬圓治經年久病腸風下血、虛弱甚者、壹服見效、

附子壹兩炮去皮臍

綠礬肆兩用瓶盛之、火煨食頃、候命取出、入鹽壹合、硫黃壹兩、同礬研過、

右合和壹處、以粟米粥為圓、如梧桐子大、每服拾圓、空心生地黃汁吞下、溫酒米飲亦得、

神應圓

新栢葉蒸熟焙乾

槐花瓦上炒

雞冠花瓦上焙

右等分、酒煮麵糊為圓、如梧桐子大、每服參拾圓、米飲下、不拘時候、

梅茸圓治腸風臟毒、經年下血不止者、服之其效累驗、

烏梅肉用新瓦

鹿茸火燼去毛酥

鷹爪黃連去鬚用米醋壹盞炙乾

右等分、為細末、酒煮麵糊為圓、如梧桐子大、每服參拾圓、鹽酒或米飲湯下、空心食前服、傳元元拾餘年、便血服此藥、遂愈、不用黃連亦得、

黃連圓治腸風瀉血、

黃耆炙

黃連去鬚各等分

右為細末、麵糊為圓、如梧桐子大、每服貳參拾圓、食前米飲下、

小豆圓治腸風臟毒、

赤小豆

好硫黃各壹兩

附子生用去皮

右為細末、煮糊為圓、如梧桐子大、每服貳拾圓、空心食前醋湯下、

巨勝七寶圓治一切年深日近、腸風下血、痔漏及有頭成瘡者、

蝟皮壹枚燒

附子壹隻炮

白礬壹分

硫黃壹分

楸藤子 參枚打破 取白穰 猪牙皂角 皮去

皂角刺 燒灰存性 各壹兩

右為細末、研胡桃肉入少酒、麵糊為圓、如梧桐子大、每服伍柒圓、至拾圓、空心酒下、如有頭成瘡、用朱砂壹皂子大、與拾數圓同研、水調傳瘡、上經旬日自好、

地黃圓治臟毒

熟乾地黃 貳兩 洗 黃連 壹兩半 去鬚尾上炒

右為細末、煉蜜圓、如梧桐子大、每服伍拾圓、空心米飲下、

枳殼圓治臟毒

枳殼 用酸米醋浸參日 鈔內炒焦存性

右為細末、麪糊圓、如梧桐子大、每服參拾圓、食前米飲下、

枳巴圓治酒食所傷、遂成痔疾、發則便血、

枳殼 去穰每兩片入巴豆去殼者壹粒、合在內以線扎定、用米醋煮軟爛、黑色、

右為細末、醋煮麵糊為圓、如梧桐子大、每服參拾圓、臘茶湯下、不拘時候、如疾作服之、不宜多

服

妙應圓治腸風臟毒

五倍子 不拘多少

右為細末、酒煮麵糊為圓、如梧桐子大、每服肆拾圓、米飲下、食前服、百無所忌、旋搜旋圓、累驗、自斷根本、

槐花湯治酒毒便血、經年不效者、

椽斗子 壹分 槐花 壹兩貳味 同炒黃色

右為細末、每服貳錢、溫酒調下、不拘時候、

膠薑理中湯治腹虛便血

右用理中湯加黃耆、阿膠、艾當歸煎、食前服、薑香散、止血有奇功、若腸風臟毒、血不止者、可服、若是腸藏虛弱、則不可服也、專以涼藥攻之、必至脾虛、血必大下、宜謹之、

乾薑 香附子

烏梅 各燒灰 存性 烏藥

右等分、細末、煎烏梅湯調下、不拘時候、梅薑散治臟毒瀉血不止、婦人血崩漏下、

櫻櫚 烏梅

乾薑各等分 燒存性

右為細末，每服貳錢，米飲調下，不拘時候。
茶調香附散，治腸風臟毒。

香附子不以多少，於木石相內搗去皮毛，用清
水或米泔浸壹宿，取出控乾，入無油鍋內炒香
熟，紫黑色為度，取出去火毒，碾為細末，每服參
錢，濃膈茶調下，空心服。
燒梅散，治臟毒。

大白梅

枳殼

右同燒存性為末，米飲調下，不拘時候。

治腸風下血

蓮子肉

杜仲薑製炒 去絲

榧子肉

茆花

右等分為細末，麵糊為圓，如梧桐子大，每服參
拾圓，烏梅湯送下，空心服。因傷酒得此疾，用酒
送下，心氣不足，用米飲送下，如又不止，却用茆
根煎湯送下，食前服。

又方

檉榔茅根各少許，燒灰存性，米飲調下，貳錢，與
前藥相間服。

治腸風

貳參桑葉燒灰存性，每服貳錢，米飲調下，食前
服。量虛實，如虛羸人不宜服。
治臟毒下血，久遠不瘥者。

烏梅肉

生乾地黄

右等分為細末，煉蜜圓，如梧桐子大，每服伍柒
拾圓，米飲吞下，不拘時候。

又方

右用茶節葉燒成黑灰，研細入麝香少許，空
心米飲調下。

治便血

鹿角膠切成片，用蚌粉炒成珠，研為細末，每服
參錢，食前米飲調下。

大小便不通

乳朱圓，治小便不通。

鍾乳粉

滑石各半 兩

朱砂貳錢半 別研

右為細末，棗肉為圓，如梧桐子大，每服參拾圓。
燈心湯下，食空服。
瞿麥湯，治小便不通。

苦杖

瞿麥

右等分爲細末每服半兩水貳盞加燈心參拾莖煎壹盞不拘時候服

參訶散治體弱大便不通者

生訶子皮

人參去蘆

右等分爲細末第貳粳米泔水調下不拘時候服
霹靂煎治大便久閉不通不治能閉殺人

用上好棗壹枚去核實以輕粉用麻皮扎定水貳盞煎至壹盞取棗食之以所煎湯送下才服畢即便仍前再作壹服立待通利如黑彈子大
大便秘澀

皂角剉細焙乾爲細末生葱白細切研熟將葱和皂角末圓如毬子大捏在臍心中以手或片帛繫定壹針久未通再換如臟腑大秘經日不通者不過參次

又方

枳殼參錢麩炒橘皮末參錢甘草貳錢微微炙竝爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服參肆拾圓熟水任下不拘時候

魏氏家藏方卷第七終



魏氏家藏方 卷八

魏氏家藏方卷第捌

脚氣

活絡丹治風濕相搏遂致筋脉拘攣足脛疼痛渾身倦怠

真木瓜心去

牛膝去蘆

肉蓯蓉

天麻

黃芪炙

大當歸去蘆各

己上陸味用上好酒浸參日取出焙乾

川附子炮去

虎骨炙

川草薢

沒藥別研

乳香別研

右爲細末用法酒打麪糊圓如梧桐子大每服伍拾圓煎木瓜湯或鹽酒下空心食前服或用小續命湯下尤妙

神僊輕脚圓治脚弱不能久行久立壯筋骨延年益氣

遠志心去

楮實子炒

巴戟心去

白茯苓皮去

五味子枝去

杜仲剉蘆製

舶止茴香炒 兔絲子淘去泥酒浸

覆盆子北地堅實 芡實乾者

山茱萸去核各 乾山藥

肉苁蓉酒洗去皺皮切片

宣木瓜片去穢切 草薺已上各淨

牛膝酒浸焙乾再酒浸

右為細末用北棗肥好不破者貳佰箇蛇床子

肆兩水煮令熟去蛇床子用棗子去皮核取肉

搜藥末杵圓如梧桐子大每服參拾圓或伍拾

圓溫酒空心任下

思僊續斷圓去寒濕壯筋骨

杜仲貳兩去皮薑 全蠍去毒

木瓜 五加皮 當歸酒去薑

防風 天麻酒浸

草薺 續斷

薏苡仁 羌活

白朮炒 生乾地黃洗

牛膝酒去薑

右等分為細末以好酒參升化青鹽參兩木瓜

子大每服參拾圓至伍拾圓食前溫酒鹽湯下

如膏子少添酒煮麪糊

木火圓除風濕暖筋脈壯脚力

吳茱萸壹兩湯泡 羌活

青鹽 木瓜各淨

右前參味為末將木瓜開頂去穢入藥在內以

瓦器盛既上蒸令爛入乳鉢內細研圓如梧桐

子大每服參拾圓空心鹽湯或鹽酒下

椒龍圓治壹切乾濕脚氣

川椒去目及開口 地龍去土

草烏頭去皮尖 全蠍去毒

防風 防己

赤小豆

右等分為末新汲水為圓如梧桐子大每服拾

圓至貳拾圓冷酒壹盞任下鍾動時服再睡至

天明喫荊芥湯茶壹盞如初連年者只壹服效

如患壹貳年者貳服取效患參年者伍服可

取其效 草薺圓壯筋骨活血脈治乾濕脚氣

川草薺 牛膝酒去薑

第一... 丹... 8

石菖蒲兩各肆

天台烏藥

宜服之

薏苡仁兩各貳

黃耆壹

右為細末、雄木瓜壹箇、當中橫切、每服拾字、切

川烏頭皮生去

舶上茴香

肆破去皮、穰以無灰酒、銀石器中用物合定、煮

烏藥

沙苑白蒺藜

糜爛、研成膏、和圓如圓不成、以木瓜酒打麪為

赤小豆比餘藥如

防風上

圓如梧桐子大、每服貳參拾圓、空心食前、木瓜

川椒炒去目合口

地龍上

酒下、或木瓜湯亦得、邢郎中云、一道人貨脚氣

川狼毒

海桐皮

藥大治脚心隱痛、只用烏藥、薏苡仁為末、雪糕

歲靈仙

陳皮白

為圓如梧桐子大、服如前、

石等分、為細末、酒煮麪糊圓如梧桐子、每服伍

香犀圓、專瀉腿膝脚氣及風毒在經絡、小使閉澀、

茶拾圓、茶酒任下、早晚食前各壹服、

犀角屑

羚羊角屑

玳瑁屑

琥珀末

地骨皮

大黃兩各半

歲靈仙骨去

黃芩兩各壹

牽牛子伍兩

芍藥兩各貳

右為細末、淡麪糊圓如梧桐子大、曝乾、每服參

拾圓、加至伍拾圓、熟水下、不拘時候、

異方黃耆圓、治腎臟風、上攻頭目、面虛腫、兩耳常

鳴、或如風雨流注、脚膝疼痛、注破生瘡、脚心隱痛、

行履艱難、腿膝腰胯冷疼、四肢無力、小使滑數、竝

補洩防勞圓、治乾濕脚氣、浮腫、筋脈疼痛、行步不
得氣、衝心腹、不思飲食、能開胃、膈調脾胃、除風毒、
應氣弱、不敢服瀉藥者、用此、

木香不見

檳榔

大黃生

大麻仁各拾

枳殼炒

桂心去麤皮

草薢各壹

牛膝酒拾分

訶子核去

山茱萸核去

芎藭

獨活

前胡

羚羊角屑各肆

附子

右為細末、煉蜜為圓、如梧桐子大、每服貳拾圓、空心溫酒下、壹日壹服、微洩為度、

奇應輕脚圓、治緩風濕痺、脚膝頑弱、腰腿疼痛、足脛腫滿、或麻木不仁、或生瘡不已、應脚氣之證、不可專服補藥、宜用此方、

宣木瓜 壹箇、用竹刀切開、頂作蓋、剉去穢、入熟艾、實之、甑上蒸熟、薄切、焙乾、

肉苁蓉 酒浸壹宿、去土、防風 頭去蘆、

牛膝 壹酒宿、金毛狗脊 去毛、

川草薺 青鹽 研別、

海桐皮 各壹兩、川烏頭 肆兩、生用、去皮、臍為大、

右為細末、將烏頭末、酒煮麩糊圓、如梧桐子大、每服拾圓、至拾伍圓、空心溫酒、或鹽湯下、

乳香木瓜圓、治壹切脚氣疼痛、脚膝緩弱、行步艱難、不能屈伸、服之貳料神效、

宣木瓜 壹箇、開、乳香 研別、

熟艾 尚香 淘去沙炒、

青鹽 錢參、

右肆味為細末、入在木瓜內、蓋定、便竹釘釘合、用炊餅劑裹定、就蒸令熟、取出去麩、不用於砂、

鉢內搗極細、看乾濕得所、用好酒煮麩糊圓、如梧桐子、每服伍拾圓、空心米飲下、日進貳服、

薏苡仁圓、治腰脚走注疼痛、此是脚氣、

白芍藥 茵芋 牛膝 去蘆、

川芎 丹參 去蘆、

防風 去蘆、獨活 各半、

熟乾 地黃 方參、側子 壹枚、

桂心 去蘆皮、不見火、橘紅 各壹兩、

右為細末、煉蜜為圓、如梧桐子大、每服參肆拾圓、酒下、食前參服、木瓜湯亦尚、

菜菔木瓜圓、治脚氣腿膝疼痛、或腫或不腫、及脚氣上衝、步履艱辛者、服之神效、

大宣木瓜壹箇、去穢、留頂蓋、入吳茱萸、填滿、用竹籤剉定、頂蓋入、甑內、上甑、蒸候、木瓜熟爛、將菜菔、研為細末、却將爛木瓜、搜和為圓、如菜菔大、焙乾、每服肆伍拾圓、木瓜湯下、不拘時候、

常服木瓜圓、

木瓜 肆兩、

木香 肆兩、

烏藥 肆兩、

木瓜 肆兩、

右為細末、酒煮麩糊圓如梧桐子、每服參拾圓
至肆伍拾圓、溫酒下、食前臨臥服
換腿圓、治壹切脚氣、

當歸 酒浸去蘆

黃芪 炙

石楠葉

薏苡仁

羌活

川草薢 各貳兩

木瓜 去穢皮

右為細末、酒煮麩糊圓如梧桐子、每服參拾

圓至伍拾圓、空心溫酒鹽湯下、

除濕圓、輕健腰脚、治筋骨諸疾及治諸風、

當歸 酒浸去蘆

川芎

歲靈仙

杜仲 剉蘆製去絲

蒙朮

白朮 炒各半兩

乳香 剉研

天南星 炮

防風 去蘆

續斷

天麻

金錢石 解酒

檳榔

牛膝 酒浸去蘆

右將附子末、安在木瓜內、再以熟艾實之、將頂

蓋之用竹簽簽定、復以麻線縛之、用米醋不拘

多少、於甕器內煮爛、石器中爛研為膏、却用貳

參隻、枕以匙攤於枕內、自看厚薄得所、連枕覆

於焙籠上、慢火焙、時時以手摸、如不沾手、以匙

抄轉、依前攤開、勿令面上焦乾、恐成塊子、如此

數次、看乾濕得所、方可為圓、空心用溫酒送下

神麩 炒

附子 剉皮臍

浸藥 別研

右為細末、酒煮麩糊圓如梧桐子、每服貳拾
圓、空心溫酒或淡醋湯下、
木瓜圓、治脚疼痛、

木瓜 去穢

杜仲 剉蘆汁去絲

草薢

右等分為細末、酒煮麩糊為圓、如梧桐子大、每

服參拾圓、溫酒或鹽湯下、食前服、

又方、專治壹切脚氣、腿膝疼痛、

花木瓜 壹箇切下頂

附子 壹隻炮去皮

右將附子末、安在木瓜內、再以熟艾實之、將頂

蓋之用竹簽簽定、復以麻線縛之、用米醋不拘

多少、於甕器內煮爛、石器中爛研為膏、却用貳

參隻、枕以匙攤於枕內、自看厚薄得所、連枕覆

於焙籠上、慢火焙、時時以手摸、如不沾手、以匙

抄轉、依前攤開、勿令面上焦乾、恐成塊子、如此

數次、看乾濕得所、方可為圓、空心用溫酒送下

參伍拾圓、此方前後屢効、

牛膝木瓜圓

牛膝去蘆

肉苁蓉洗去沙土酒浸

乾木瓜

何首烏

綿黃耆炙

天麻

已上陸味各伍兩除何首烏別用木拍內搗碎磨為末不要鐵器餘藥用酒壹斗浸柒日浸乾焙為末

金毛狗脊去毛

川續斷

草薺各壹兩

右用大木瓜貳箇重斤半以下者切開留頂去穰入青鹽貳兩在內紙裏蒸爛研成膏拌前件

藥末和圓如梧桐子大每服參拾圓食

貳服溫酒鹽湯送下年老人入黑附子尤佳此

藥無毒平補性溫如木瓜膏子少添煉蜜少許

乳香沒藥圓治風濕相搏骨節疼痛腰脚無力

乳香

沒藥各貳錢半並別研

川烏頭炮去

黃耆炙

五靈脂研別

草薺

熟乾地黄洗

當歸酒浸

歲靈僊去泥各半兩

木瓜炙錢

右為細末好醋打麵糊為圓如梧桐子大每服

貳拾圓食前溫酒下

指子仁圓論曰於此有人臂痛筋脉攣急不得屈伸遇寒尤甚者由肝虛風邪氣留於血脉客搏於筋筋得寒則急又曰寒凝則血不流血不流則筋不榮筋不榮則乾急而痛其脈緊細宜服此藥

指子仁炒去殼

黃耆炙

枳實去穰

覆盆子

五味子去核

附子炮去

白茯苓去

金釵石斛酒浸

酸棗仁湯浸去

鹿茸去毛

肉桂去粗皮

池香不見

熟乾地黄

右等分為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服參拾圓食前溫酒下

鹿茸四斤圓補氣血壯元陽強筋骨除風濕理腰重脚弱筋骨酸疼倦怠無力常服極妙

肉苁蓉酒浸壹宿

牛膝去蘆酒浸

乾木瓜去心

天麻通明者

鹿茸去毛

虎脛骨今醋炙

附子炮去

杜仲去皮制酒炒

北五味子 去枝研砂 川當歸 淨洗酒浸壹
 右為細末、煉蜜為圓、如梧桐子大、每服參拾圓、
 至陸拾圓、溫酒鹽湯下、脚疼木瓜湯下、空心食
 前服、

舒筋圓、治血弱氣虛、風濕乘之、筋脉不舒、頸項緊
 痛、不能轉側、連耳皆痛、

- 天麻
- 當歸 酒浸
- 宣木瓜
- 全蠍 酒浸
- 沒藥 研別
- 肉桂 去麩皮
- 白附子 炮
- 川烏頭 炮去
- 防風 去蘆
- 乳香 研別
- 川椒 去目炒

右為細末、酒煮麪糊圓、如梧桐子大、每服參拾
 圓、加至伍拾圓、黑豆酒下、不拘時候、

神功異寶圓、治年深日近、乾濕諸般脚氣、此乃秘
 藏之方、

- 附子 大者壹隻
- 雄烏豆
- 青鹽 研別
- 破故紙 酒浸壹宿
- 赤小豆
- 川獨活
- 川練子 取肉
- 川草薢

- 黑牽牛 生用
- 川烏頭 生去錢半
- 地龍 拾肆條、去土
- 蚰螂 拾肆條、去土
- 蜈蚣 拾肆條、去土
- 大木瓜 貳
- 牛膝 浸壹宿
- 草烏頭 生去錢半
- 舶上茴香 生去錢半

右將青鹽熟艾、拌入在木瓜內、用頂蓋定、蒸拾
 數次、爛為度、研成膏、再入少無反酒、煮麪糊為
 圓、如梧桐子、每服拾伍圓、拾日後、加伍圓、至參
 拾圓止、空心溫酒或熟水下、

四蒸圓、治新舊脚氣、不論乾濕、男子久服、輕身、壯
 脚有力、

- 歲靈仙
- 黃蓍 炙
- 烏藥
- 蒼朮 去麩皮炒
- 松節
- 橘皮 去
- 苦亭蘆 炒
- 續斷

右各半兩、剉塊、用大花木瓜肆箇、每箇可容壹
 兩藥者、切蓋子去穢、留蓋、令皮厚、作甕子、裝藥
 在內、將頂蓋合定、入籠、末慢火無灰濃酒蒸香
 熟、日中照、如是參日、方取諸藥、焙碾、為末、將木

瓜研成膏子圓如梧桐子大每服伍柒拾圓加至百圓鹽湯溫酒下空心食前服脚氣痛甚者入黃連乳香各半兩服之立效

五香蠲痛圓治脚氣攻刺連腹疼痛大便閉澀

木香不見火 藿香葉去土

沈香不見火 鹿射香參錢

乳香研別 牽牛剉兩末

右為細末滴水為圓如梧桐子大每服伍拾圓

熟水吞下不拘時候

七宣圓治脚氣之後臟腑不順利者

木香不見火 羌活

枳殼去穢炒 川芎各壹兩

訶子去核 大黃壹兩

當歸各半兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服參拾圓至伍拾圓米飲下不拘時候

輕脚圓治風寒濕留滯肝腎二經下部虛大發則攻築臍腹俱痛自汗惡心嘔吐涎沫肢體酸削不進飲食

宣州木瓜或枚用竹刀切下蓋子剉去子却填熟艾令滿以蓋子蓋子用

肉蓯蓉酒浸壹宿

草薢各貳兩

防風去蘆者

大麻

青鹽

甘草炙

沒藥研各半兩

右為細末用川烏頭伍兩炮去皮臍為末酒煮為圓如梧桐子大每服參拾圓漸加至肆伍拾

圓溫酒送下鹽湯亦得早晚食前各壹服

壯脚膝補虛損下部之疾更不再發

除濕巡經圓祛寒治濕生腎水輕腰脚尋痛定疼

壹切脚氣

好川椒

右用大木瓜壹箇切壹頂蓋去子及穢將椒末

實填於內再以前頂合定外以紙封縫於飯上

蒸令爛熟去外皮將藥并木瓜壹併研細如膏

圓如梧桐子大焙乾每服參伍拾圓加至柒捌

拾圓空心溫酒下日進參服

竹釘簽定入飯甑內蒸爛然後以文武火焙乾入後藥

牛膝酒浸

金毛狗脊淨去毛

海桐皮去麩

全蠍去毒

川續斷各壹兩

乳香研別

煨腎圓治五種脚氣張鄂州

連珠甘遂

桔梗各壹兩

木香不見

檳榔壹箇

右生為末每服貳錢量虛實增減用雄猪石
子貳隻破開去膜入藥摻在內外用葱白漢椒
鹽少許紙裏煨香熟伍更初細嚼無灰酒下天
明取下毒物或鷄子白或黃或黑如鷄冠塊子
是積也或腎藏有積風氣及腰背疼竝可服之
如瀉下病源即用白粥補之如喫此藥後竝忌
諸湯藥切忌有甘草相反也

承氣轉精圓治脚氣衝心痛初用此藥下之只
壹服

木香切不見

甘遂洗淨

半夏洗淨

黑牽牛瓦上炒

枳殼各壹分

右同細末以酒煮粥糊圓如梧桐子大每服貳

拾圓木瓜數片煎酒送下貳更時服如病重壯

人壹服可增作肆伍拾圓服後陸拾日內不得

服甘草之藥

趁痛圓姜子

魏氏家藏方 卷八

附子壹隻生去皮黑牽牛兩壹

右件炒附子令黃仍同牽牛卷附子壹宿來日

去牽牛只將附子碾為細末薄酒粥糊圓如梧

桐子大每服參拾圓食前鹽湯或酒送下

蠲毒圓治脚氣

黑牽牛壹斤炒

破故紙各肆兩修

白膠香

不蚌皂角錢拾

右將皂角槌碎滾湯中泡濃汁以絹濾過熬成

補瀉圓治乾濕脚氣及膝腿無力行步艱難

南木香不見

檳榔

牛膝去蘆

大黃各參

哩附子炮去

續斷

五加皮

山茱萸各貳

羚羊角屑

川芎

大麻仁去皮研

枳殼去穢

官桂去麩皮

草薢

杜仲去皮薑製

防風去蘆

生犀角屑

訶子肉各壹

右為細末次入大麻仁拌和蜜為圓如梧桐子

五九九

大空心食前溫酒送下參拾圓加至伍拾圓已魚
麵生果熱物如常服無忌神效不可具述一方
不用續斷杜仲防風五加皮却用獨活前胡

神方脚氣圓

橘皮肆兩

乾生薑兩貳

右貳味以蜜半斤煉化去上沫下藥在內熬成
膏可圓即圓如梧桐子大每服參拾圓薑湯下
不拘時候

神効木瓜湯治脚氣夫脚氣之由皆因風濕毒氣
乘虛攻注下經為病治之宜先疎導毒氣去體
後以補腎驅風藥調治之

吳茱萸陳者以沸湯洗

乾木瓜細剉焙乾 橘葉洗焙乾

大腹子貳兩半

右肆味各判如米粒大拌和每服秤貳錢半重
水貳盞先浸壹食久然後以慢火煎至捌分去
滓澄清汁柒分盞溫服早晚食前臨卧時各壹
服日計參服先服此藥約年月餘日却服後牛
膝圓

兔絲子水淘去浮者曝乾酒浸壹宿去酒
蒸壹次砂盆內爛研成膏作餅焙

熟乾地黃焙切

白茯苓皮去

五加皮有椒攪香為真去

肉桂去麤皮

附子炮去

右為細末用大木瓜去皮穰蒸令糜爛研膏和
搜前藥令均調入木石臼內杵餘下圓如梧
桐子大焙乾用潔砂甕貯之每日空心及晚
食前用水瓜湯或鹽酒吞下參拾圓漸加至伍
拾圓日進貳服此藥專治腎虛風濕容於經絡
毒氣每發則筋骨拘攣腰脊脚腿腎痛足心癢
痛不能步立者服之無不驗也

五倍湯慶元靈濟庵僧

白朮炒

防風去

薑黃

右等分判如麻豆大每服參錢水壹大盞生薑
參片煎至柒分去滓食前溫服

左經湯治風濕所搏肢體沈重

羌活

前胡

羌活

甘草炙

熟苡仁兩各貳

牛膝去蘆酒浸

石楠葉漫火炙

防風去蘆各

附子炮去

五加皮有椒攪香為真去

蒼朮 宿去 汭水 浸壹

白茯苓 去皮 炒各

枳殼 去穢 炒

甘草 兩 各 半

附子 皮生去 臍

乾薑 炮洗 各

人參 去 壹

川芎 炒

桔梗 炒

官桂 去麤皮 不見火

乾木瓜

右咬咀每服貳錢半水壹盞半生薑參片薄荷兩葉煎至柒分去滓食前服

蠲痺湯治氣弱當風飲啜風邪容於外飲濕停於內風濕內外相搏體倦舌麻甚則惡風多汗頭目昏眩遍身不仁

當歸 酒去 浸

甘草 兩 各 半

芍藥

黃耆 炙

薑黃

羌活

白朮 炒

附子 生去皮 臍

防風 去 薑

薏苡仁 各 參

右咬咀每服參錢水兩盞生薑伍片棗子壹枚慢火煎至壹盞取清汁服不拘時候

白芍藥 兩 壹

甘草 兩 壹

右貳味咬咀每服秤貳錢半用水壹盞煎至陸分去滓入無灰酒少許再煎數沸食前熱服

沙節湯治風毒脚氣下注兩腿疼重淋燥

橘葉 皮 亦

木通

川椒 兩 各 半

葱白 握

右為散水參升煎至減半通手淋洗再煖可兩日用

雙和湯治脚腫

以四物湯小續命湯各壹兩合和每服肆錢水壹盞半薑參片煎至柒分去滓食前服章謚靜

之節推云常有人卒患脚腫脹之遂愈

菜菔湯治脚氣入腹困悶欲死腹脹方

吳茱萸 陸升 湯 泡

木瓜 兩 顆

右貳味以水壹斗參升煮取參升分參服相去

如人行伍里再進壹服或吐或利或大熱悶即

差此起死方

小風引湯治中風脚痛虛弱者

獨活

白茯苓 皮 去

立驗元忠家一圃人因夏月大雨中治圃中濕四肢發熱如火腰膝痛楚如刀刺直聲號叫祈死不能投之參服即安元忠總領淮東軍馬錢糧屯軍鎮江凡軍士及婦人痛風寒濕血氣痺五者服之無不効驗前後合此藥幾千餘斤濟人真愈疾萬全神方也

片子薑黃 肆兩

白朮 肆兩 春月 減半炒

右咬咀每服參錢水壹大盞生薑拾片煎至柒分去滓稍熱食前服

蠲痛湯治濕痺脚疼痛

金毛狗脊 先用火燎去黃毛令淨

川草薺 剉碎再炒以香為度

大附子 炮去皮臍

酸棗仁 溫湯洗過

杜仲 去麤皮剉又武火炒

白朮 栝子仁 生

甘草 炙分

川續斷 焙去苗 當歸 片 溫水洗淨切

右咬咀每服肆大錢水壹盞半生薑拾片或柒

片煎至柒分去滓通口服食前日進貳服順氣散治久有脚氣時上攻衝往來不定流傳腸胃轉氣雷鳴茲皆治之

橫柳 拾箇 訶子 拾箇 去核生用

沈香 壹分 下

右咬咀作壹服水貳椀入紫蘇參拾葉煎至貳盞去滓作貳次服不拘時候

虎骨散治壹切風濕脚疼痛不可忍

虎骨 貳兩 酥 羚羊角 壹兩 白芍藥 貳兩 雨

右咬咀酒伍升春浸伍日夏參日秋冬柒日候日足每取柒分盞食前溫服即再用酒柒分盞入藥內如痛未退再換藥浸酒服之

烏藥散治中濕頭疼身熱腰痛及乾脚氣

天台烏藥 川蒟蘿

右貳味各炒黃色同為細末溫酒下貳錢若乾脚氣用苦練子壹箇擘破漿壹升煎至伍合調下空心服

芎藭散治腰脚冷痺風麻肢節疼痛不思飲食

牛膝 貳兩 酒浸 白茯苓 壹兩 去皮

桂心 去麤皮 下見火

防風 去蘆

附子 炮去

川烏頭 炮去皮臍 各壹兩

甘草 壹分炙

右咬咀每服參錢水壹盞半生薑伍片棗子參

枚煎至柒分去滓不計時候温服

七聖散治老人脚膝疼痛不可履地

杜仲 去皮剉薑 製炒去絲

草薺

獨活

甘草 炙

右等分爲細末酒調下貳錢食前服

續斷散治老人風冷轉筋骨痛

續斷 兩

右爲細末温酒調下貳錢食前服

續斷散治脚氣上攻頭面四肢浮腫上氣喘急

乾生薑

陳橘皮 須久年 皆去白

右等分咬咀每服參錢水或盞煎至捌分去滓

川芎

人參 去蘆

當歸 去蘆剉 微炒

羌活 各參 分

白朮 各半 兩炒

牛膝 去蘆酒 浸壹宿

防風 去蘆

續斷

下攪擲末貳錢再煎參數沸食稍空時服之徐

舒筋散治脚膝疼痛不能久立

用自合五積散每服貳錢水壹大盞生薑參片

棗子壹枚煎至柒分入麝香當門子未少許食

前服之不過參兩服

治脚氣淋深藥固暖去風

川椒 兩

紫梢花 肆錢

甘松 壹兩

細辛 兩

右爲麤末煎湯薰洗

附子除濕酒

附子 壹隻炮去皮 臍切片子

牛膝 紙裹煨去濕氣 淨

白朮 切片各壹兩

右爲麤末作壹生絹袋以無灰酒參升浸之夏

參日春秋伍日冬柒日每日取半盞和酒半盞

頓熱飲之當留壹半酒養藥將服過半即增酒

蛇床子 兩

吳茱萸 兩

薑朮 兩

木瓜 須宣木瓜 乾者亦得

杜仲 薑製炒 斷絲

虎骨酒去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎脛骨真者

草薺

仙靈脾

薏苡仁

牛膝

熟乾地黄洗

右等分細判絹袋盛浸酒貳斗夏參日春秋伍日

冬柒日取壹盞溫服再入壹盞服佰日婦人去牛膝

治大腿骨內痛熨法

生薑半斤洗淨曬乾入好真麝香壹錢半砂盆

內研細於痛處才良久將薑鋪於痛處用綿絮

包裹著熨斗用火些小熨之移時薑乾疼即住

未熨時先飲酒兩參蓋充妙

沈香飲子

沈香不見

檳榔

香附子去毛

人參去蘆各兩

木香根

白豆蔻仁

甘草炙

青皮去穢

白朮炒各壹分

右咬咀每服參錢水壹大盞煎柒分去滓服不

拘時候

木香飲子治陰氣冷積臍脹滿衝心嘔逆及氣

促隔塞不通飲食不下腹脇滿痛小腹頑痺脚膝

冷疼並皆治之

木香捌分下

吳茱萸湯泡柒

桔梗各陸分炒

大腹子伍筒

大黃肆分

厚朴捌分去麩皮生薑自然汁浸慢火炒

右咬咀每服參錢水壹大盞入生薑參片同煎

至柒分去滓食前溫服如人行拾里再服良久

氣通乃差大便秘可服大便通住服

三建登僊酒治中風癱瘓及脚膝軟弱不能行步

頑麻疼痺及老人虛人產婦壹切脚氣等疾並宜服之

牛膝去蘆酒浸

肉蓯蓉

當歸去蘆酒浸

熟乾地黄

天麻生

草薺

杜仲去皮剉薑製炒去絲

羌活

獨活

附子生去皮

薏苡炒略

肉桂去麩皮各半兩下見火

防風去蘆

川烏頭生去皮臍

人參去蘆

白茯苓去皮

腰痛

右改胆以好酒伍升每升參壹盞浸春伍日夏參日秋冬柒日每取酒壹盞湯盪命熱空腹飲之如空心日午臨臥服使酒氣醺醺相續如能飲兩盞亦不妨不能飲者可作伍陸日飲盡則病自除如未効更壹料其病可除矣此藥累用有奇效

磨腰丹

史越王方

- 木香 不見火
- 辰砂 研別
- 沈香 不見火
- 乾薑 洗
- 硫黃
- 肉桂 去麤皮
- 麝香 研別
- 母丁香 不見火
- 附子 炮去
- 藿香 去
- 零陵香 不見火
- 陳橘皮 去
- 吳茱萸 湯泡
- 膩粉 各壹兩

右為細末煉蜜為圓如雞頭大每用時先以生薑自然汁半盞於鉢內煎令沸頓藥在盞內浸

少時以指頭搗研令盡放溫於密室中令人煎藥膠上摩之用至拾圓骨健身輕精華氣至骨體堅實

定痛圓治腰疼

菴藿

糖迷子 生

橘核 炒微

右等分為細末酒麵糊為圓如梧桐子大每服參拾圓空心溫酒下

補髓青娥圓

破故紙 酒浸壹宿以

兔絲子 淘淨酒浸壹宿

胡桃 各肆兩

韭子 炒

胡椒 研

右先將前參味同為細末煉蜜與胡椒肉同攪和圓如梧桐子大每服參拾圓空心食前鹽湯溫酒任下

神效定痛圓治腰痛不忍生立不得

破故紙 炒

茴香 淘去

延胡索 兩

黑牽牛 炒兩

右為細末研蒜膏子為圓如梧桐子大每服貳拾圓細嚼胡桃酒下空心食前服

倍力圓治腰痛

牛膝酒去蘆

巴戟心去

天麻浸酒

草薺生

茴香沙淘去

附子地土去

青鹽別各壹兩

木香裏濕紙

右為細末用黑牽牛肆兩微炒取粉和麵同煮

糊圓如梧桐子大每參拾圓食前鹽湯下

神倦青娥圓胡應

肉苁蓉洗

川草薺各貳兩

山茱萸淨

用好酒浸春夏參日秋冬陸日漉出焙乾

川練子作肆片

胡蘆巴炒

附子壹隻

右為細末用前浸藥酒煮麵糊為圓如梧桐子

羌活土

官桂去麤皮

狗脊生去

杜仲去皮薑汁

桐皮

川烏頭炮去

沒藥研

防風去蘆洗

右為細末用黑牽牛肆兩微炒取粉和麵同煮

糊圓如梧桐子大每參拾圓食前鹽湯下

川牛膝洗去

川椒目去

船上茴香各壹兩

破故紙肆兩

白茯苓去皮各

白茯苓去皮各

白茯苓去皮各

白茯苓去皮各

白茯苓去皮各

大每服參伍拾圓空心鹽酒下服之延年不老

烏髭治口齒活血駐顏大壯筋骨補虛損并壹

切虛勞如乾濕脚氣以木瓜酒下婦人諸疾血

氣煎艾醋湯下壹切小腸氣膀胱疝氣竝主之

川韭圓治氣虛腰腿痛小腸頻數不進飲食

破故紙不拘多少略以鹽炒為末用猪腰子薄

切片子乳鉢內研細去盡筋膜和藥同研得所

圓如梧桐子大每服伍陸拾圓溫酒送下食前

空心服若難圓以酒麵糊同圓更加茴香與破

故紙等分亦得

左經圓治筋骨諸疾疼痛通榮衛導經絡專治心

腎肝三經之疾服後小便便淋瀝乃其驗也

草烏頭內白者生

白膠香研

當歸去蘆

右為細末用黑豆去皮生研杵粉壹片醋煮麵

糊為圓如雞頭大每服壹圓酒磨下筋骨疾但

不曾針灸傷經絡者肆伍圓必效

宣經圓治腰疼兼治經絡邪熱瘡腫腮腫

芍藥兩

藏靈僊取壹兩

牽牛伍兩內取 右為細末、淡麵糊為圓如梧桐子大、米飲送下、不拘時候、
勝金圓治腰疼、

補骨脂炒

延胡索炒

當歸去蘆洗

杜仲去麋皮薑
牛膝去蘆酒浸

右為細末、酒煮麵糊圓如梧桐子大、每服參拾

圓細嚼、胡桃酒送食前服、

憎愛圓又名忘杖圓、

黑牽牛炒

延胡索炒

當歸去蘆各

破故紙壹兩參分酒浸

右為細末、以獨頭蒜濕紙裹煨熟、研為膏子、圓

如梧桐子大、每服拾圓至拾伍圓、溫酒空心食

前日進貳服、

巴戟散治腎臟風濕腰痛行立不得、

巴戟心去

草薢

牛膝去蘆酒浸

石斛根去

白茯苓皮去

桂心去麋皮不見

附子壹兩炮

五加皮兩

防風半兩

右咬咀、每服肆錢水壹盞中盞煎至伍分、次入酒

壹合、更煎參兩沸、去滓、食前溫服、

追痛散治腰疼不可忍、

芫花子炒

菴藷子

橘核取仁炒

右等分為細末、每服壹大錢、酒壹盞煎至柒分、

空腹熱服、日參服、

神金散治腰痛、

黑牽牛兩

延胡索兩

黃丹錢

甘草錢

右壹處炒、令牽牛裂為度、為細末、溫酒調下、食

前服壹大錢、

魏氏家藏方卷第捌

魏氏家藏方卷第九

消渴

水葫蘆圓治渴生津液

百藥煎兩參

白梅肉研成膏搜入衆藥

烏梅肉

乾葛

訶子炮取

右為細末用好黃蠟鎔去滓將上件藥末火上
和圓如櫻桃大每服壹圓含化

清中圓治渴有奇功

宣連不以多少對以好酒浸過壹指許約壹伏時曬出焙乾

右為細末用醋糊為圓如梧桐子大熟湯下參

伍拾圓不拘時候

清心圓治消渴

蜜陀僧兩貳

黃連兩壹

右為細末湯泡蒸餅為圓如梧桐子大濃煎茄
根空壘湯下伍圓至拾圓或參拾圓止臨臥覺

惡心住服

滋渴湯趙顯學傳

綿黃芪壹兩生

乾生薑

烏梅肉

甘草兩各半炙

右切成片子每服壹兩用水兩碗煎壹碗許纔

遇渴時暖壹半以壹半冷者和之作熟水飲若

脾泄人加草菓半兩

加料樂令黃芪湯

用筒坊樂令黃薯湯合下壹料如方煎服只用

多椹枸棘本草云大治上焦熱根葉花枝皆可

用每斤縛作壹小把用木壹碗煎取壹半却用

煎下枸棘汁煎上件藥婦人只煎當歸建中湯

下亦得

竹龍散治渴大效

五靈脂研別

黑豆生去

右等分為細末每服貳錢冬瓜煎湯調下瓜葉
子皆可壹日兩服小渴者只壹服瘧渴止之後

宜服八味圓仍以五味子代附子沈存中載於

靈苑方得效者甚多頃問官有渴者飲水無數

日食蔗貳拾條與之兩服遂不飲水不食蔗矣

解渴飲子生津液除煩燥止渴

人參去蘆

麥門冬去心

枇杷葉刷去毛

甘草壹兩

生薑兩各半

綿黃芪炙

乾葛有粉

生木瓜去皮各

烏梅肉

右件細剉用水約斗餘銀石鍋內煮佰拾沸候
欲飲時溫半盞許自在飲之須食後服

吐血

蒲黃散治卒吐血不止

用蒲黃壹錢煎湯調下服之立止

靈脂散治吐血不止

用吊藤半兩沒藥半兩五靈脂壹兩搗羅為末

每服壹錢溫酒調下不拘時候

又方治吐血至壹斗者

大小蘗不拘多少生研取濃汁調白及末貳錢

不過參服止

又方

糯米貳合洗淨煮粥入阿膠壹片小者貳片生薑少許待溫入人參末半錢攪和服不拘時候

又方

甘草參兩白礬貳兩生用同搗細作壹服以酒壹勝童子小使半勝壹處煎至壹大盞放溫徐徐服盡

又方

藕節拾箇

生地黄無生者則用生

青薄苛如無乾者亦得

右等分砂盆內研取汁壹盞分作兩服併喫貳服如未止再依前作貳服

又方

熟艾三雞子大水參盞煮壹盞頓服

又方

燈心燈上燒灰為末溫水調下壹盞食後服

治咯血

側柏葉伍兩水伍盞煎至參盞分作參服

六乙散治咯血發寒熱

黃菴陸兩

甘草壹兩

右為細末如常煎服不拘早晚乾喫亦得

血妄行

應聖圓調榮衛斂血歸氣專止大腑失血神效

阿膠拾粉

熟乾地黄洗

黃耆酒蒸各

木賊燒存性

五倍子燒存性

搜櫚性煨存性

艾葉

鷄冠花燒存性

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服肆拾圓

空心米湯下

黑聖散治吐血過多傷酒食飽低頭掬損嘔血不止并血妄行口鼻中俱出但聲未失者投之無不見效

見效

百藥霜不拘多少研羅為細末吐血便血用糯米飲調下壹貳錢立效鼻衄搗壹字入鼻中立

差皮肉破處及灸瘡出血百般用藥不止者搽

半錢或壹字立止

順氣散順血今有所歸

四物湯如法煎調真蒲黃末貳錢不拘時候服

如上膈虛熱壅滿更煎蘇子降氣湯服之

固經散治鼻海膿血者

夜明螺亦名蚌時螺殼大

魏氏家藏方 卷九

地榆炒寸焦

槐花炒

卷柏炒

蒲黃編紙炒

人參去蘆

赤石脂煨分

右為細末用貳錢降真末半錢同和臨時用腦麝些小以紙撚點藥入鼻中每壹番用紙撚壹番換藥壹日參次仍間服金沸草散

又方

皂角刺紫嫩者以白瓷器鋒刮下不得用鐵器

但取刺尖處皮兩寸許不見火燥乾不拘多少

以多為上但揀紫皮刮淨秤作貳兩磨成末用

乳香壹兩麝香腦子各用少許同為細末用無

灰酒調下每服貳錢許食後服日進參服與前

方相間用之

止血散治鼻中膿血非衄血

千葉石榴花為細末吹鼻中立愈

又方

用葱連白炒貼脚心及將朴消與生地黃研細

用紙貼脚腕立止

治血妄行吐血

熟乾地黃洗去土焙乾為細末用好真京墨新

汲水磨半盞許分作貳服調地黃末服之

鼻血

神功散

六一一

用白及壹味為細末、雪水調令稀稠得所、塗遍鼻上、頻用雪塊、熨藥上、無雪、只用冷水掃、仍用掠頭子於髮際緊繫、如婦人無掠頭子、止用頭鬚相接、亦得其效如神。

又方

香白芷 太平州者尤佳

右為細末、用茅花煎湯下、無花取根用。

又方

用紙燃蘸清麻油、於鼻中搗之數遍。

又方

用黑錫丹、以棗湯仕下、面青身冷、虛弱人、方可服、須子細用之。

水腫

通氣圓、治脾腎氣虛、腎水流溢、四肢作腫、面目虛浮、腰脚腫脹、遊走不定、小便赤澀、大便秘結、脹滿氣痞、脚膝無力、食少倦怠、漸成水證。

附子 大者壹隻、生去皮

大蒜頭 伍枚、剝去皮 赤小豆 伍兩

已上參味、同於砂鍋內、用水伍勝、慢火煮乾為度、先用水參勝煮、漸添至伍勝。

只取附子焙乾為末、餘藥不用。

白花商陸根 兩

南木香

沈香 貳錢、不見火

車前子

右同附子為細末、用薏苡仁末、水煮作糊為圓。

如梧桐子大、每服肆伍拾圓、薏苡仁煎湯下、空心食前、日進參兩服、病甚者、日進伍服、不妨其效如神。

餘糧、白朮圓、專治男子婦人氣血虛損、頭面四肢浮腫。

效如神

白朮 炒 木香 濕紙裹煨

白豆蔻 剝囊煨

乾薑 炮洗

茴香 淘去沙炒

白茯苓 剝去刺

肉桂 去麤皮不見火

京三稜 炮

川芎

附子 炮去皮臍

青皮 去穢

牛膝 酒去蘆

白茯苓 皮去

羌活

蓬莪朮 炮

當歸 去蘆洗淨酒浸

蛇含石 火煨醋研

當歸 去蘆洗淨酒浸

禹餘糧 火煨醋研

當歸 去蘆洗淨酒浸

鐵砂 火煨醋研

當歸 去蘆洗淨酒浸

鐵砂 火煨醋研

當歸 去蘆洗淨酒浸

右為細末水泡蒸餅作糊搜和杵什餘下圓如梧桐子大每服伍拾圓溫酒下白湯亦得空心食前服

橘薑圓治腫脹此藥不瀉不利小便只泄氣自退須服半月日間方見功效

蓬莪朮炮

生薑

青橘皮穰去

右等分用好醋煮令爛只取青皮壹味為末煮粟米粥為圓如梧桐子大每服伍拾圓食前淡薑湯吞下茶酒亦得

內消圓通水道

煇消兩壹

胡椒肆拾粒

號丹壹字

右為細末飯為圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓止用滑石末通煎湯送下欲使之通水道也

狼毒圓治腹脹水腫等疾

雄黃生

狼毒

肉桂去麤皮不見火肆錢

大附子炮去臍

漢椒出去汗炒

乾漆絕炒煙

魏氏家藏方 卷九

甘遂兩貳錢

當歸兩

芫花炒

川大黃生

檳榔壹兩半

大戟生

桃仁炒皮

萊菔生

厚朴去皮薑製

乾薑炮

枳殼生去穰

犀角壹兩

鼈甲炙

銀州柴胡兩肆錢

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服拾圓溫湯下

椒巴圓治十種水氣

胡椒肆拾粒

巴豆拾粒去皮膜心用紙油盡為度

右為細末醋煮麪糊為圓如菜豆大每服壹圓食後淡薑湯下實者貳服虛者壹服以小便頻數為效壹兩日不妨忌食鹽物淹藏之類大忌濕麪

沈香散療脹滿喘急眠睡不得

沈香不見火

木香不見火

枳殼各半兩

蘿蔔子壹兩

右為吹咀每服貳錢水壹盞半生薑伍片煎茶

六一三

分去滓服不拘時候
羗活散治一切腹脹急

羗活

蘿蔔子

右各壹兩剉同炒香為麤末分作參服每服水
貳盞入藿香葉大蘇參莖切碎同煎捌分去
滓腹空時連進參服以泄氣為度後服半硫圓
調補更合硫黃黑錫藥常服以壓虛氣所以不
用黑錫丹為有導氣藥故也

快氣消塊散去積除痞癖氣塊腫硬疼痛噎塞服
之立效

陳皮

炒去白

京三稜

切炒

石菖蒲

節密

益智

大者剪破尖用參麩炒

北細辛

真者去葉

蓬莪朮

青木香

吳茱萸

湯泡

右為細末每服貳大錢水壹盞半煎至捌分空

心溫服日進參服

治水氣

綠豆

合參

高陸

半

右同煮候豆熟為度只喫豆盡後小便出此方

甚妙不拘時候

淋瀝

小便閉

藟麥散治淋如神

藟葉

壹兩燒

滑石

半兩

右為細末入麻油數點臘茶湯調下不拘時候
瞿麥散治心臟積熱小便赤澀及一切五淋沙石
旋血痛不可忍

瞿麥

葵子

滑石

研別

木通

去

防風

去

夏枯草

生乾地黃

細剉

熟炒

甘草

炙

右為散子每服貳錢水壹盞用燈心壹小束葱
參寸同煎陸分不計時候溫服甚者不過參服
又方治小便淋瀝小腹脹痛

滑石末壹兩用斑猫拾肆枚去頭足翅同滑石

炒去斑猫不用將滑石不用生葱研汁圓如梧

桐子大每服柒圓用麝香湯送下空心食前服

木通散治脚氣服補藥太多林閉腹脹

當歸

去

梔子

仁

芍藥

甘草

炙

用亦得

赤茯苓皮去

木通皮去

右等分爲散子每服參錢水壹大盞煎至米分
去滓不拘時候服

治冷淋

乳香內白石研細溫酒下食前服

小便閉澀

真琥珀不拘多少爲細末燈心棗湯下食前服

八味圓見局方老人及虛弱人小便不通當服

八味圓之屬不宜服涼心經疎導之藥暑月多
誤以爲伏熱尤宜詳審

積滯

軟紅圓

每用巴豆采粒以黃連參塊如巴豆大同煮壹
沸去黃連取出巴豆去殼剝去心膜用紙裹於
瓦上捍去油拾分淨成霜用號丹壹錢先將巴
豆在乳鉢內旋入些小號丹同巴豆研細方入
盡號丹再研須研令極細如粉不爾藥不均恐
服時緊慢無準也然後以黃蠟如母指大者壹
塊稍多不妨先就茶盞內鎔開撥去黑滓令淨
方以研了巴豆號丹旋入攪和火上再煮頻攪

令均候黃丹微赤色取出捻作錠子收起旋圓
如棗豆大每服壹粒至參粒溫陳米飲下不拘
時候如藥收多時堅硬即於火上烘動圓之
皂香圓磨積快脾氣

五靈脂別研

巴豆別去油研

丁香不見

沈香不見

安息香別研

肉豆蔻別研

青皮去穢各

杏仁去皮尖各

木香不見

胡椒各壹

檳榔各

乾薑炮洗各

右爲細末水煮麪糊爲圓如梧桐子大每服貳
圓薑湯任下血氣菖蒲湯下

丁香內化圓治食積腹痛兼治冷痢

巴豆壹兩去殼穢穿烏梅貳兩

丁香參兩不見縮砂肆兩

胡椒伍兩

右爲細末用陳米飲攪和杵仔餘下圓如小梧
桐子大每服采粒溫水下不拘時候

眼目

清明丹明目補肝清膽還元固本退翳瘴黑花暗

物茫茫之疾升降上熱下冷有奇功

好猪肝壹具用竹刀切作片所令極細

木賊草炒

蒼朮米泔水浸壹宿再炒

遠志心去

荆芥穗

川烏頭炮去

車前子炒

地膚子炒

黃芩

人參去

雄黑豆各壹兩

川芎

麥門冬貳兩

蟬退去

薺菜子春收者各半兩

右為細末用前猪肝為圓如彈子大如肝少入蜜每服壹圓食後荆芥茶湯下

八味圓補肝腎明眼目

牛膝去蘆酒浸壹宿 當歸去蘆酒浸壹宿

兔絲子洗淨酒浸參地

遠志湯心

綿黃耆蜜炙

石菖蒲去毛

熟乾地黄去

右等分為細末酒煮山藥糊為圓如梧桐子大每服伍拾圓空心鹽湯送下

兔絲子圓治眼暴赤退腫除冷淚出痛

兔絲子洗淨酒浸

香白芷爛研成餅

人參去蘆

麝香別壹兩研

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓不拘時候日進參服

夜光圓治男子肝腎風虛目多昏痛時有黑花當風有泪羞明怕日翳膜障遮視物不明久服補肝明目髮白再黑強志爽神此藥神效不可盡述

菊花

川椒壹拾貳兩去目微炒

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓空心日午鹽湯下忌食動風等物

還睛圓

川芎 荆芥

防風蘆去

白茯苓皮去

青箱子淘去

白朮炒

兔絲子淘去土酒浸

蔓荊子去土

羌活蘆去

覆盆子去

右等分爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服參

拾圓食後麥門冬湯下

生地黄煎補肝明目

生地黄淨洗

狗忌子去

五味子去

右等分不犯銅鐵器搗爲細末煉蜜圓如梧桐

子大每服茶拾圓食前鹽酒鹽湯米飲任下

菊花散治男子婦人風毒氣毒翳膜遮障羞明怕

日倒睫多淚緣眶赤爛及治婦人血風攻症及暴

赤眼腫痛但是一切眼疾及小兒膚瘡熱毒入眼

生翳膜

菊花壹斤拾貳

荆芥穗

旋復花去核各壹

甘草肆兩

決明子炒

木賊

蒼朮壹拾壹兩米泔

狗忌子陸兩

右爲細末每服壹錢半清茶泔水或薄荷蜜湯

調下食後服之

治目疾不能視物

歲靈僊

僊靈脾各等分

右爲細末茶調下食後服

治兩目清盲

臘月黃牛膽入黑豆不拘多少須揀拾分圓者

經壹佰日取出豆去膽不用每服豆肆拾玖粒

食後白湯嚥下

七竅湯洗眼目婦人患眼可煎服却用滓再煎湯

洗之

生乾地黄洗

川芎

白芍藥

當歸洗各壹兩

甘草

鷹爪黃連

秦皮各參錢

右爲麤末每服患重者伍錢輕者參錢水柒分

梳煎至半梳先熏眼候溫去滓洗再溫再洗日

伍柒次別換

三神湯治肝腎俱虛虛熱上衝眼目隱澀或生翳

膜侵睛迎風有泪視遠無力及眼暴赤腫目暗痰

痛熱泪如湯者宜用之

川黃連 去鬚 壹兩

川當歸 去蘆洗 淨半兩

杏仁 去皮尖壹分 並不見火

右取咀、每用參錢以軟淨生絹片包、線繫定、銀盞盛水半盞、重湯煮、令水減參分之壹、候冷、時以藥包蘸藥汁洗眼、入眼中、漸漸化翳膜、成淚消去、每次煎可用參伍日、每用畢、須以淨物密蓋、勿為塵垢入藥。

治眼赤疼

秦皮

甘草

黃相皮 梅

黃連

右等分、為麤末、入砂糖壹塊、如彈子大、用水貳椀煎至壹椀、去滓、乘熱洗眼、候冷再煎、再濾洗之、如此可用伍度、奇妙。

聖效散洗眼

爐甘石 壹兩 火煨

黃連 兩半

海螵蛸 肆兩 水浸 每日換水

青鹽 別研

白礬 枯

號丹 水飛

輕粉 各壹兩

右研極細末、每用壹字、湯泡洗眼、點亦得。

治暴赤眼

宣連 參兩 去鬚

砂糖 貳拾

當歸 去蘆

赤芍藥 各貳兩

右為細末、綿裹藥伍錢、入水壹盞、半蒸、頓令濃、別用小綿毬蘸洗赤處、候口苦為度、少時再頓、令熱如前法洗之。

治赤眼

銅青 拾伍文

地龍 拾文

右用水兩椀、煎至壹椀、白器內澄清、每用半盞、溫過洗之、又眼赤則用消風散、搐鼻、左搖左鼻、右搖右鼻。

又方

用好乾薑湯浸洗之、奇效。

治爛眶風眼

銅青

白堊

右等分、細研、每用壹錢許、衰湯泡澄、取清汁洗、每服可洗參次。

羌活膏

羌活

芙蓉葉

黑豆

麪

黃皮根子

右等分爲細末、生水調、用青皂紗貼之、

金線膏、治風毒氣赤眼、壹兩日見效、及翳膜遮障、紅赤瘀肉、壹月日洗下、

黃丹 貳兩 用銀銚炒、紫色

朴硝 兩

白砂蜜 肆兩 與炒了黃丹壹處、於銀石器內、重濾去汁、其滓再熬、

右每用壹皂子大、於淨器中熱湯化開、先將藥熏眼、候湯溫洗眼、拾餘遍了、便睡、藥且留用、參伍次功效不可具述、

點眼方

黃連 貳兩 研極細

黃丹 壹錢 研極細

蜜 兩

右用銀盃盛在重湯中、以文武火同煎成膏、筋挑放水中、點成珠、方取出、候溫將蜜絹兩重濾過、用或點或泡湯熏洗、如眼昏澀障翳、亦可去、

又方

用黃連當歸各半兩、溫水壹貳次洗去泥、令極淨、然後用銅刀切片、竹刀亦得、以水壹大掬、銀

銅器內煎、如水乾、未濃、再添少水、覺汁濃、去滓、只將汁再熬成膏、每用銅筋點眼、點時須仰面、令人點覺、口中有苦味、方是藥透、却以鹽湯漱口、此藥退赤脉、日日點之、久而目明、睛黑、方知效驗、

玉龍膏、治諸風毒、眼赤澀眵、淚隱痛、或生瘀肉、翳膜、悉皆治之、

麩仁 肆拾箇 去皮

杏仁 柒箇 去皮

以上貳味、同研如膏、攤在磁碗內、用熟艾如雞子大、燒煙熏、令如粟米色、取下細研、

鵬砂 透明者 大

滴乳香 大

牙硝 大 黑豆

輕粉 壹大

腦麝 各少許

右同研、入白蜜少許、研爲膏、用瓷合盛、每點半粟米許、

一輪雪、治暴赤眼腫、脹疼、不可忍者、壹點立效、朴硝壹兩、用熱湯泡開、用皮紙濾過、在建盞內、火上煨水乾、括出朴硝、入腦子少許、研細、尾器藏之、每用壹茶豆許點之、

治障眼

虎骨貳錢

孕婦手甲拾枚

右為細末點之如見物則不用再點
治爛弦風眼

覆盆子

右件取葉按碎以汁滴眼中即有蟲出
治赤眼

用蘿蔔如鴨子大去中肉却用黃連壹拾文為
麤末用取下蘿蔔肉再入蘿蔔內以濕紙裹之
灰火煨熟去紙取汁點眼極妙
治眼白赤

鬱金

焰硝

右各少許研細搐鼻中熱淚出即愈

耳疾

穿珠圓治上壅耳聾

石菖蒲

節密者去
毛半兩

麝香錢

右為細末鎔黃蠟半兩和為塊每用小石蓮大
中間以大鍼穿竅夜間安兩耳內日間取去
紅綿散治聾耳出膿奇效

白礬

不拘多
少枯

右每用壹錢入胭脂壹字麝香少許再同研和
先以小杖子綿纏繳去耳內膿水盡別用綿杖
引藥入耳或用葱管吹入亦可如壯盛人積熱
上攻耳出膿水不能瘥者用涼藥瀉之即愈

治耳聾

用綿裹甘遂塞耳中便嚼甘草少時拔去甘遂
氣自通快蓋甘遂甘草相反故也切不可貳物
同嚼之

治耳聾多年不聽者

浮石不以多少火煨通紅取出用紙壹張盛藥
於地上出火毒壹伏時研細每服貳錢米飲下
食後日參服近年者拾餘日漸聽遠年深者月
餘見效

治耳鳴

生川烏頭火

雄黃

右為細末用綿裹塞耳內

又方

葱管入地龍末塞耳內

治龍耳

不問年深相近取小鼠膽令人側卧瀝膽入耳

中須臾膽汁透下初益龍耳半日方可雖參拾年者亦差

牙齒

異香丹治勞心思慮過度胃中客熱上攻口氣齒血時時血出牙齒浮動或疼痛不能咀嚼飲食並宜服之

白芷

藿香葉新者淨洗

零零香葉

木香不見

桂花不見

香附子去毛淨洗

甘松淨洗

丁香不見

雞心檳榔

白豆蔻仁各壹兩

榆柑乾去核

當歸去蘆洗淨酒浸壹宿焙乾用半錢淨

右為細末用甘草膏子為圓如小雞頭大每服壹粒含化柒日後口有異香面色光澤久服身體皆香行步輕健

又方

甘草不拘多少炙黃碾為細末煉蜜為圓如雞頭大每服壹粒含化

紅娘圓治牙淨智莊大師傳

紅娘圓治牙淨智莊大師傳

紅娘子

福馨杜

全蠍

真石灰

右等分先將餅藥於盞內火上煎候微沸即投石灰次投諸藥末使圓微乾看坤花大小圓以綿包安患處

香烏圓治風蛀牙疼不可忍者

透明乳香

川烏頭尖

右等分滴水為圓如梧桐子大安在蛀牙處子外噤定須是食頃涎多吐出溫水嗽口如無蕞子旋用藥末擦傅牙縫噤定食頃涎多吐出溫水漱口如此用藥參兩次即愈

枯痛圓治蛀孔

龍骨

乳香

血竭

生附子尖

蠟梢各等

右研細末水圓成塊塞蛀孔中

鶴膝湯治牙疼

鼓椎草又名鶴膝草

右件煎湯灌漱即妙

蒼耳湯

蒼耳根

右件濃煎湯熱漱壹椀以下復定或用五積散入麝香少許同煎服亦可

升麻細辛湯治風牙疼

升麻

防風去蘆各半兩

荆芥穗細辛壹兩去上

右為麤末每服肆錢水壹盞半煎至壹盞去滓熱服漱令冷吐之為細末揩齒良久吐出溫鹽湯漱之亦得

竹葉湯治齒血

苦竹葉

右不拘多少濃煎湯漱之

大牢牙散治齒痛及血出齒疎肉爛惡氣齒脫用藥再生疎者則密有蟲則消兼通腎氣亦治纏喉風小兒走馬疳

白礬枯

乾薑洗地

草烏頭炒

地骨皮

百藥煎炒

華撥各壹兩

川烏頭炒

縮砂各半兩

右為細末每服用揩牙少頃溫水或鹽湯漱口

忌鹹酸鮓醬每日食後及早晚使尤妙

堅牙散治一切風牙疳牙小兒亦可用

升麻

細辛

猪牙皂角

香白芷

華撥

半夏泡半兩湯

右為細末每用半錢手點揩牙溫湯漱如痛多者用薑錢點搯

失笑散治牙疼

華撥

天南星

胡椒

地龍去土

川烏頭

右等分為細末先用刷牙灌漱牙淨用藥乾傳痛處隨手見效

立應散大治齒痛

草烏頭壹箇揀光淨極大者去皮臍生用

香白芷兩

右為細末每日兩次擦如有熱涎吐之少時用

溫水漱痛自定

玉池散治風虫牙疼痛痒宣露動搖血出煩悶口氣每服以手揩牙腫處良久漱嚙無妨如大段為搜者亦可用

地骨皮

川升麻

細辛

川芎

藁本

香白芷

防風

槐花

當歸

甘草

右等分為細末每服參大錢水或盞入黑豆半合生薑參片同煎至壹盞半和滓隨宜漱之

青鹽散治牙齒疼痛時時浮動

蠟梢

乾薑

胡椒

青鹽

右為細末入磁合內旋旋搵搦齒間良久鹽湯

漱之

全蠍散治牙疼甚妙壯盛人方可用之

腦子

南鵬砂

全蠍

血竭

乳香

右等分為細末搦之

香芥散治風牙疼不可忍者

荆芥穗

香附子

右等分為麤末每服伍錢水壹椀煎至半椀去滓頻頻嗽之

灸皂散治風牙疼

不虫皂角

生薑

取自然汁

右以皂角蘸汁慢火灸盡為度每日早晨以牙刷刷牙角濃汁出揩牙旬日後更無一切齒疾

養源散

熟乾地黄

青鹽

右先將地黄炒令焦次入破故紙同炒令爆聲

定却入青鹽同炒碾為細末臨睡搦牙早晨用亦得

烏石散

草烏頭

寒水石

蔓荆子

升麻

細辛

右為細末，搯牙，少時以溫鹽湯漱之。
薑黃散治牙痛不可忍者。

薑黃

細辛

白芷

右等分為細末，併擦兩參次，鹽湯漱之，立效。政和八年，胡長文給事之父牙疼不可忍，面腫，偶無薑黃，檢本草云：川芎亦治牙疼，遂以代之。坐間便見腫消痛止，後用川芎代之亦驗。
香椒散治牙疼。

草烏頭生去皮尖

胡椒

乳香研別

蠟稍毒

右等分為細末，每用少許，搯牙疼處，吐出頑涎，立止。

內補散補腎去風，牢牙定疼。

皂角

不蛀者，刮去皮，子以炭火燒為灰，略存性，壹兩。

青鹽

別炒乾，北細辛各壹錢。

香附子

炒去毛，用麤礮擦。

舶上茴香

去麤皮，洗淨，貳兩。

右為細末，和調以密器收貯，每用搯牙，五倍子散，口齒疳蟲，匿。

五倍子分參 黃州分壹
右為細末，以綿裹貼斷上，塗之亦得，日可用參伍次。

黃蘗散，口臭，蟲蝕作孔。

黃蘗壹兩

青黛兩半

麝香壹錢

右為細末，每取少許，搯貼疼處，壹日上參肆次，殊聖散治牙疼。

白礬

膽礬

右等分，研細末，飛過，入麝香擦牙。

臘脂散治牙疼。

百藥煎

坯子

右等分為細末，搯牙津吐之。

芫花散治牙痛，諸藥不效者。

芫花碾為末，擦痛處，令熱，立效。

赤荆散治牙宣。

赤土荆芥同為細末，搯齒上，以荆芥湯漱之。

燒茄散

用糟茄切片，新瓦上烘，金乾，黑色為末，傳之。

治牙疼。

細辛

麻黃

前胡

右等分爲細末以米醋同煎灌漱立効

治風虫牙疼

獨活洗淨切片濃煎熱漱冷吐之

治風牙腫痛

巴豆壹粒切開作兩邊入麝香乳香末各少許

摻在巴豆中捻合用線繫定如左邊痛以右邊

巴豆塞之右邊痛以左邊巴豆塞之以涎出盡

爲度

又方

生薑

升麻

川地黃

旱蓮

木律

荷蒂

青鹽

猪牙皂角

槐角

細辛

右等分壹處入在甕合內鹽泥固濟煨成炭取出爲末先漱灌後搯擦之亦無害其驗不可

具述

發背癰疽

猪蹄湯洗瘡屢効

猪蹄壹隻洗淨用水參研煮令拾分爛熟去蹄取清汁用入後藥

黃耆

黃連

赤芍藥兩

黃芩

狼芽根

薔薇根各貳兩

右剉碎用猪蹄汁煎約乾參分之壹憑滓以汁分作參次用筆洗瘡去惡肉甚快用膏藥傳之

加減香連湯治諸般癰疽發背已破未潰惡證並皆治療

木香不見

沈香不見

檀香不見

乳香研

雞舌香研

藿香去

赤芍藥

連翹

桑寄生

當歸去

升麻

黃耆去

大黃

右等分爲細末酒水合和同煎服視病輕重加減大黃同煎

立效木香散治諸般惡毒發背癰疽已破未潰者並皆治之

生乾地黄 洗

木香 不見火

麥門冬 心去

升麻

羌活

芍藥

白芷

川芎

肉桂 不見火 去麋皮

木通 皮去

當歸 去

黃芪 炙

桔梗

甘草 炙

連翹

右等分爲細末，溫酒調服。初用而患人大便未
曾泄，即多加大黃服之。如以水合酒煎之尤佳。

若以十全內補散加木香以酒煎之，亦有火

效。緩急以十全內補散搜雲母膏貳兩，或壹兩

爲圓，仍以木香酒調內補散任下。

破膿如神。散應未潰者服之即潰。

老紫皂角 鐵 煨炒 令 黃色 當歸 去 蘆

赤芍藥 川芎 不見火

右等分爲細末，每服貳錢，入乳香少許，酒壹大

盞煎壹貳沸服之，不潰再服。

大托裏散

菜豆

甘草 各半 兩炙

大括葉 壹箇取 子炒

乳香 或錢 別研

沒藥 別研

右爲細末，用無灰酒參勝熬壹勝頓服，毒未消

再服。

黃芩散治癰疽大小便不通。

麥門冬 心去

大黃

赤茯苓 皮去

木通 皮去

甘草 各半 兩炙

燈心 壹 念

右吹咀，每服參錢，水壹大盞煎至捌分，去滓空

心溫服。

又方治癰疽發背未成，即散已成，即潰。

日疼可用銀星草，夜疼即用金銀花 鷲鷲

日夜俱疼全不止，貳方等分，勿令差。

右吹咀，水酒煎服。

清涼膏治初腫發未成膿者，貼之即散，有膿者已

破而尚腫，亦可用之。

木鼈子 去 殼

黃蘗

敗荷葉

黃芩

芙蓉葉

黃連

草烏頭

朴硝 別研

髮藥
右等分爲細末用薑汁調成膏傳上如熱甚即以水并蜜調傳外以紗片掩其上乾即再換多傳尤佳如痛甚即加乳香沒藥如有絲瓜取自然汁調傳之亦妙

揭毒膏

- 生乾地黄
- 狗忌子
- 木鼈子
- 赤芍藥
- 桑白皮
- 猪牙皂角
- 白歛
- 防風
- 柳枝
- 槐枝
- 乳香
- 黃丹
- 玄參
- 大黃
- 白芷
- 當歸
- 肉桂
- 連翹
- 升麻
- 桔梗
- 桃枝
- 桑枝
- 沒藥
- 男子髮

右用麻油浸沒過半寸許春秋伍早夏參日冬柴日和藥壹處入髮煎用慢火熬候白芷色黑

髮脆斷即瀝去衆藥再煎以柳枝不住手攪之約兩箇時辰許其油覺稠粘即取起令溫却入黃丹攪均再煎令沸又挈起凡參伍次方定又煎試以壹貳滴滴水中不散即入乳香沒藥再煎仍試滴水中成珠子即入瓶收覆地上出火毒貳宿

生肌藥生新肉去惡肉膿毒漸令口合

右爲細末用麻油調塞瘡口仍於外以揭毒膏貼之壹日壹換

收瘡口藥

- 石膏
- 當歸
- 乳香
- 訶子
- 桑白皮
- 紫藤香
- 黃丹
- 木香
- 檳榔
- 五倍子
- 膩粉

右等分爲細末乾摻如瘡乾即以麻油調傳之三月散治內外腫瘡及諸般惡瘡

三月羊糞濟入瓶內鹽泥固

右等分、拌和、先以溫水淨洗瘡、去皮、用壹匙擦放瘡上、

治軟癬

用久使銀鍋底墨、碾為細末、水調塗之、或鷄子

清絲、以汁調傅之、亦妙、

抵聖散、治癩癧、

雄鷄、鷓鴣、各肆兩、好、小、捷、緊、細、首、

南木香、壹兩、見、火、下、 蚌螺、壹兩、是、 臘茶、貳兩、新、香、

右為細末、每服貳錢、食後茶清調、

白欵散、傅瘡、長肉、生肌、

白欵

遠志

梨蘆粉、壹分

白芷、兩壹

右為細末、以臘月猪脂調傅之、

梨蘆粉、治諸般癬瘡、

梨蘆

斑猫、拾枚、去、翅、

右為細末、以清油調和、候癬痒發、先以布揩擦、

動、次用藥塗之、

硫黃、各半錢、研、

膩粉、壹錢、研、

白礬、研、

雄黃、研、

麝香、研、

鹿香散、治下疳瘡、

鹿角燒灰、入麝香少許、乾摻、神效、

六物散

五倍子、半兩、

當歸、壹兩、

白礬、壹兩、

右研令極細、以鹽水洗瘡、拭乾、傅之、

積熱喉閉、舌腫、口瘡、

甘草圓、治口乾、舌澀、

人參、壹兩、

烏梅、壹兩、

右為細末、以棗肉同煉蜜和、杵參貳佰杵、圓如

彈子大、綿裹含化、

神巴圓、治喉閉、

巴豆、壹粒、

右和圓如菜豆大、每服參粒、置口中、立效、如牙

關閉者、用少許揩牙、即開、

清膈圓、治膈上壅熱、舌焦、口瘡、驅風涼血、

當歸、壹兩、

羌活、壹兩、

黃蘗

膩粉

漏蘆、壹兩、

甘草炙

生乾地黃、貳兩、

烏梅肉、壹箇、

防風、壹兩、

大黃

乾葛

荆芥

甘草參分

右為細末用糕糊為圓如大雞頭大每服壹貳

圓食後臨卧細嚼嚥下能飲酒人醉後臨睡化

壹圓甚妙

瀉心湯

人參去蘆

乾薑洗地炮

甘草炙

黃連

黃芩

川芎各半

薄荷葉各壹分

白芍藥壹兩

右等分為細末每服參錢水壹盞半生薑拾片煎至柒分去滓温服

玉礬湯治喉閉不通水穀

白礬研化以竹筒盛猛灌之

馬銜湯治喉閉深腫連頰吐氣名馬喉閉

馬銜鐵壹具水參盞煎至壹盞温服

吹喉散治大人小兒喉閉腫塞不下水漿須臾不

療宜用此方

鵬砂

青黛各壹錢

龍腦

馬牙消

白礬

硝石錢參

右各研細拌和每用筆管抄少許吹在咽喉內

立效

碧雲散治喉閉

明淨白礬為末壹錢瓦上鎔成汁入巴豆去殼

壹粒在礬內候礬乾為度細研分為肆服每服

壹字以竹管吹入咽中以涎出為效壹方用

回生散治諸般喉閉危急之疾王醫師傳

鴨背膽礬研

草烏頭不去皮

右等分為細末和調過喉閉吞嚥不下以蘆管

吹壹字入鼻中先含水壹口藥入咽中即時涎

出若覺涎少復用川大黃參塊如散子大水壹

盞煎至柒分入朴硝壹錢再煎壹沸令温服搖

鼻了咽喉即開吞嚥無阻纔得利後病如失去

神効不可具述

立應散治咽喉腫痛語聲不出者

大鵬砂錢參

右研細用筆管吹入喉中

追涎散治喉閉

石綠臘茶等分分用薄荷酒調下、嚥入喉中、吐涎即止、

白蠶蠶散治纏喉風、并急喉閉、喉腫痛者、

白蠶蠶真好白色者壹兩新瓦上炭火略炒微黃色

天南星白者壹兩炮裂

右為細末、每服壹字、用生薑自然汁少許調藥末、以熱水投之、呷下、吐出涎痰、即快、不時服之、

壹方只用白蠶蠶

又方

白殭蠶半錢為細末、薑汁調服之、如自服不得

灌下、若痰涎壅塞不能吐、却下蘇沈良方內一

字散、以薄荷搽碎、拍藥指牙及咽喉、取痰涎

青礬散治喉閉

白殭蠶

白礬

銅綠螺青亦得各半兩

甘草壹錢

右件同於鐵鈿內煎、令白礬枯、每服壹錢、生薑汁調下、涎出立愈、如口不開、即灌之、

硝石散

硝石

青黛

蒲黃

甘草

右等分為細末、乾搽口中、津嚥下、開咽喉捷法速効方

巴豆壹粒、去殼微煨、以紙熱捲令緊、中心切斷、隨所患安在右鼻中、衝破即去之、

寬咽酒治喉閉、遂巡不救

酒壹盞、皂角半條、就酒揉按、濃汁出、急煎壹沸、淘濕與服、立便衝破、吐出水及痰血、此方經驗極妙、如口噤、吞嚥不得、即以麻油揉按皂角灌

酒煮礬治喉閉、咽喉腫痛

白礬

明產有瑞昌者伍兩或拾兩

右為細末、砂石器內、以無灰酒煮至紫黑色、為度、入砂合內、收與面油膏相似、每用半匙許、含化、候取出痰、即消、此藥煮時須慢火煎熬、熟時須攪稀、放冷、如稍健、硬即又添酒煮、直至紫色為度

玉筋硝治喉閉

硝砂

少許為君

馬牙硝

壹分

黃丹

伍方錢

白礬

皂子大

硝石

肆兩為

巴豆

陸陸甲粒為

蛇蛻壹條全首
為米搗碎

右用瓦鍋子依次第逐旋下藥下到已豆時須逐箇咬破下候火蝴蝶盡方再下壹箇如此陸次然後旋下蛇蛻方成候冷罐子自破藥作塊每用壹字以竹筒子吹入喉中如些小咽喉不利只含化少許合時忌鷄犬婦人見

魏氏家藏方卷第九終

魏氏家藏方卷第拾

婦人

拱辰丹溫煖子宮久服能令有孕

鹿茸酥炙去毛

山茱萸枝去核

沈香貳錢不

右為細末消麵糊為圓如梧桐子大每服伍拾圓空心溫酒鹽湯任下

後癩疾

後癩疾

官桂去麩皮

川椒去目并口

地黃酒浸

糯米炒

腦子許

大蘇仁生去殼

防風蘇

甘草炙各兩

豆卷黑豆芽

右為細末煉蜜為圓作棗拾粒每服壹粒細嚼溫酒下食前服產前入月一日可服壹粒臨蓐極減腹疼更無他苦產後每日壹粒至滿月極今人易將理強健胎衣不下子死橫生暈絕不語以壹粒濃煎藥湯調灌之即甦

真人續德圓

白艾葉伍兩用陳米醋潤炒

川芎微炒兩

熟乾地黃酒浸兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓

米飲下空心食前服

艾茸圓治婦人下臟久虛沈寒痛冷

白艾葉細剉末醋半盞同煮盡為度

當歸酒去蘆

赤芍藥

吳茱萸湯泡炒

天雄炮去灰脂剉再炒

草撥

沈香壹分不見火

右為細末醋麵糊為圓如梧桐子大每服伍拾

圓空心溫酒鹽湯下

地黃鹿茸圓補虛調經

鹿茸燼去毛

山藥兩各參

五味子枝

卷栢

當歸去蘆酒浸

官桂皮壹兩不見火

白芍藥兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓

米飲下空心食前服

艾茸圓治婦人下臟久虛沈寒痛冷

白艾葉細剉末醋半盞同煮盡為度

當歸酒去蘆

赤芍藥

肉桂去蘆不見火

沒藥研別

木香各半兩不見火

右為細末醋麵糊為圓如梧桐子大每服伍拾

圓空心溫酒鹽湯下

地黃鹿茸圓補虛調經

續斷洗乾

白艾醋炒

白薇炒

阿膠炒剉成珠粉

黃耆炙

厚朴去麩皮薑製

肉苁蓉酒浸兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓

鹽湯下空心食前服

鹿茸圓治經候過多其色瘀黑甚則崩下吸少

力臍腹如冰冷汗如雨衝任虛損風冷之氣客於胞中氣不禁固

禹餘糧石煨末醋研

熟乾地黃洗

白艾葉洗

麒麟竭研別

赤石脂研別

續斷酒浸兩

右為細末酒麵糊為圓如梧桐子大每服參肆

拾圓空心食前溫酒或淡米醋湯下

紫石英圓治婦人血虛生熱益氣補不足

紫石英別火研紅

赤芍藥

川芎

阿膠炒剉成珠粉

澤蘭

熟乾地黃酒浸兩

肉苁蓉酒浸兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓

鹽湯下空心食前服

鹿茸圓治經候過多其色瘀黑甚則崩下吸少

力臍腹如冰冷汗如雨衝任虛損風冷之氣客於胞中氣不禁固

禹餘糧石煨末醋研

熟乾地黃洗

白艾葉洗

麒麟竭研別

赤石脂研別

續斷酒浸兩

右為細末酒麵糊為圓如梧桐子大每服參肆

拾圓空心食前溫酒或淡米醋湯下

紫石英圓治婦人血虛生熱益氣補不足

紫石英別火研紅

赤芍藥

川芎

阿膠炒剉成珠粉

鹿茸煨去毛

白朮兩各半

熟乾地黄酒浸

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓

空心溫酒下

兔絲子圓治婦人本虛經弱陰陽不升降小便澀

白濁出無度男子精滑不固並宜服之

鹿角霜

兔絲子浸研成餅

右為細末酒麵糊為圓如梧桐子大每服貳拾

圓空心食前溫酒醋湯下漸加至參肆拾圓

黃耆除熱圓治氣血虛弱或寒或熱四肢乏力男

子婦人小兒皆可服

熟乾地黄酒浸

地骨皮

黃耆貳兩

川芎分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓

空心米飲下

紫靈圓治氣虛後血崩

官桂不見火

柏子仁別研

當歸圓治婦人氣血俱虛經候過多羸瘦全不思食身體倦疼

倍子末壹分同煮

湯下不拘時候

赤石脂煨別

牡丹皮

延胡索炒粉

白芍藥

白茯苓皮去

川芎

藜蘆去土

沒藥研別

右等分為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓

陽起石煨

熟乾地黄酒浸

牡蠣粉半錢

赤石脂煨各

當歸各貳兩

當歸去酒

人參去

白朮炒

甘草炒

白薇去

白芷炒

官桂去臘皮

乳香研別

食前温酒化下、
勝金圓治男子婦人諸虛不足小便白濁婦人子
宮久冷、

熟乾地黄酒洗
白茯苓皮去
桑螵蛸酒浸
附子炮裂
右為細末以肉桂酒浸
壹升煮乾研成膏投圓
食前鹽湯温酒下子宮久冷醋湯下、
每服參拾圓、
用好酒

又方治婦人胎前產後百病、

延胡索炒粉
白芍藥炒
赤石脂研別
白茯苓皮去
龍骨研
官桂不見火
沒藥研
右為細末煉蜜搜和圓如彈子大每服壹粒温

艾煎圓

吳茱萸湯泡
乾薑炮
陳橘皮白去
牡蠣煨
禹餘糧石
香附子毛
右為細末醋麵糊為圓如
空心艾醋湯下、
澤蘭圓治久患虛羸肢體冷臍下冷、
每服伍拾圓、

肉蓯蓉酒浸
熟乾地黄酒洗
山茱萸核去
五味子炒
延胡索炒粉
藥麩
山藥
藥本各壹
麥門冬心去
栝子仁各壹
防風蒸
芎藭
細辛
牛膝去
當歸去
石膏飛
桂心不見火
人參去
金釵石斛酒去
澤蘭兩

鐘乳粉各兩
甘草各錢

艾葉微炒

右為細末、煉蜜和搜、梓參伍佰下、圓如梧桐子、大每服參拾圓、空心及晚食前、温酒下、靈脂圓、治脾血氣心疼、

五靈脂炒

南歸酒去蘆

良薑半兩

右為細末、煉蜜為圓、如梧桐子大、每服參拾圓、加至伍拾圓、米飲下、

三香圓、治血虛及冷傷血、

五靈脂半兩

沒藥各錢

右為細末、醋麵糊為圓、如麻子大、每服參肆拾圓、醋湯下、不拘時候、

十補圓、治婦人虛損血敗不足、

熟乾地黃壹酒浸

川續斷中心有絲

肉蓯蓉酒去蘆壹宿

當歸各酒浸壹宿

艾葉薄醋過炒

鹿茸壹去毛酒

阿膠炒去灰

牡蠣鹽炒去泥

赤石脂研別

附子炮去皮臍

右為細末、煉蜜為圓、如梧桐子大、每服參伍拾圓、温酒或用白湯任下、空心食前、

滋養圓、治婦人真血損、經絡乾枯、精髓既虧、肌肉瘦悴、百節倦疼、蓋以津液耗少、若藥性稍温、則上炎微寒、則自利、但用膏潤之藥、滋養自然、諸疾並愈、

肉蓯蓉酒浸壹宿

栢子仁炒

酸棗仁炒

鹿茸炮去毛

附子半兩炮

右為細末、用生地黃自然汁熬成膏、搜和為圓、如梧桐子大、每服肆拾圓、用猪腰子湯任下、空心食前服、

安經圓、治婦人赤白帶下、

香附子生毛

木香生

石燕子醋炒

右為細末、湯浸蒸餅為圓、如梧桐子大、每服貳

山茱萸去核

當歸酒浸

乾木瓜

白茯苓去皮各

牡蠣貳兩

木通生各

丁香壹錢

拾圓温酒鹽湯下、
內灸圓補煖血海、

白艾葉半斤用糯醋漿過焙
附子炮片皮今切 當歸各去蘆酒浸
海螵蛸各壹兩

白芍藥 丁香炒半兩

右為細末米醋麵糊為圓如梧桐子大每服參

拾圓米飲或醋湯下食前服

琥珀圓治血海久冷月經不調久服自然有孕

熟乾地黄

白朮去蘆炒

續斷酒洗

附子炮片

蓬莪朮各兩

雄黑豆去殼炒熟

劉寄奴各兩

當歸酒洗

白芍藥

青橘皮去穢

延胡索炒粉

茴香炒去

牡丹皮炒

烏藥炒

蛇床子炒

陳橘皮去白

金釵石斛去蘆酒浸壹宿

白芷炒兩

已上並以米醋無灰酒各參升同煮乾焙燥入後藥

防風去蘆炒

桔梗炒

官桂去麩皮不見

右並為細末醋麵糊為圓如梧桐子大每服參

拾圓空心食前米飲或温酒下

追氣圓治血氣成塊刺痛走注

莖薑子微炒

良薑略半

官桂皮不見火

右為細末醋麵糊為圓如梧桐子大焙乾每服

拾伍圓空心温酒下

龍骨圓治婦人血滑崩漏者緣血氣虛寒榮衛不

調衝任經虛即血脈不禁而崩下或墜胎下漏並

宜服之此藥固養血脈温下元止崩漏帶下暖子

臟神效無比血崩日夜不止者即日見效

禹餘糧石火研

鹿茸去毛切

烏魚骨煨半兩

附子炮片

白龍骨煨兩

右為細末粟米粉煮糊為圓如梧桐子大每服

參拾圓温酒或淡醋湯下空心日午晚食前服

陽起石圓專治血氣虛冷久無子息

陽起石煮兩白

吳茱萸或經炒

熟乾地黃酒兩

牛膝酒去蘆

白朮炒各肆

乾薑炮兩半

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓

食前溫酒任下

十味養榮湯治婦人勞疾臟腑血氣不足衝任虛

損臍腹痛寒熱往來心忪恍惚憂不樂面少

光澤月水不調顏色多變氣道壅塞倦好睡

熟乾地黃酒

黃耆燉兩各

五味子枝

肉桂去心

牡丹皮炒

白芍藥炒

白茯苓去蘆

當歸酒去蘆

川芎各壹兩

甘草炙錢

右以咀每服伍錢水壹盞半生薑參片棗子壹

枚煎至柒分去滓食前空心服又方加人參地

骨皮各壹兩

十三味當歸補虛湯治婦人諸虛不足心胃痞悶

四肢倦怠頭目昏眩心間恍惚飲食多傷或時惡

寒惡熱一切虛寒並皆治之

當歸酒去蘆

黃耆槌破壹兩

熟乾地黃洗

附子炮去

白朮炒

乾薑洗

白芍藥

人參去蘆

甘草炙

川芎各半

吳茱萸去枝梗湯

杜仲炒去皮

良薑各壹兩

右以咀每服貳錢水壹大盞生薑伍片棗子貳

枚煎至伍分去滓空心服

活絡湯治血虛氣短面目浮腫四肢乏力

五加皮

續斷酒去蘆

白芍藥

當歸酒去蘆

白朮各壹兩

官桂去心

甘草炙兩

附子去蘆

右以咀每服肆錢水壹盞半生薑伍片棗子壹

枚煎至捌分去滓入酒少許食前服

羊肉湯

精羊肉半斤煮熱去肉取汁拾餘盞掠去

當歸酒去蘆

川芎各半

生薑連皮

右咬咀以羊肉汁於盞煎至參蓋分爲肆分腹
空服之壹日內服盡來日再爲之兩日淨合煎
再爲壹服此方廼古方及必用方有之恐人不
知此藥補氣血其功效如神故重錄于此
中嶽湯治婦人室女血海不調發熱疼痛

白芍藥兩伍 甘草半兩
右咬咀每服伍大錢貳盞煎至捌分去滓食前
服

琥珀衛生散治產後諸疾證候危惡者但服之以
正氣血後却委曲調治

百草霜 琥珀者南 朱砂者透明 髮灰已研上並 白蠟別已研各半兩
京墨紅燒 白附子炮 當歸蘆酒去

右爲細末打和入麝香肉壹分研細再和每服
貳大錢炒薑酒調下產後第貳叁日服之敗血
不停不變他疾

佛手散治婦人血下過多崩墜等疾
白龍骨研煨別 晉礬枯

救脫散治婦人血氣不調所下臭穢經年不止

烏賊骨皮去 牡蠣研煨別 乾栢葉 阿膠炒 芍藥各壹 檳榔各壹 乾茜錢半 櫻攔灰兩半 赤石脂研別 地榆 續斷 乾薑洗炮 木香炮 甘草炙 當歸蘆酒浸

右爲細末空心日午溫酒或陳米飲調下
右等分爲細末每服貳錢麝香當歸酒調下不
拘時候
安宮散活血定痛

烏龍尾是倒懸 伏龍肝炒 門伏兔塵門白上 梁上塵炒 櫻攔灰燒 安息香 甘草炙 香附子去毛各 白芍藥兩壹 沒藥各壹 當歸蘆酒去 烏梅肉貳錢 乳香別研

右為細末每服參錢水壹盞半煎至柒分入酒壹大呷食前服

半夏散治產後中風不省人事

半夏末如豆許用竹管吹入鼻中立醒

參訶散治產後大便不通

人參訶子各等分為細末每服貳錢空心温米飲調下

地黃散

治產後惡物不盡及腹內疴痛等疾服之甚妙

川當歸酒

生乾地黃

生薑肆兩細切加鹽炒令熟煙起為度用半兩

右為細末每服壹錢用生薑炒酒調下

推陳散治產後或失血後驚滯氣種種節滯敗血

一痰內惡物下及敗血作病或脹或痛胃膈脹悶

發寒發熱四肢疼痛

四物湯加延胡索沒藥香白芷等分為細末每服貳錢淡醋湯或童子小便調下

蠟香散治血崩

煨獨活

煨獨活

牡蠣粉

右拌和入麝香少許空心米飲調下

鹿角散治血海虛損經水不止漏下白水

烏賊骨

牡蠣粉

鹿角

白龍骨

右為細末每服貳錢煎烏梅甘草生薑湯調下

温酒米飲亦得空心食前服

獨芎散治血崩久不止百藥不効

大芎

右為細末每服貳錢水壹盞入木賊草去根節細剉用壹撮許同煎至柒分去滓温服不拘時

候

卷栢散治體虛經水不止便血妄行

烏賊骨

白龍骨

右為細末每服貳錢空心米飲或温酒調下

歛經散治婦人敗血及經脈過多

川白薑

烏梅

綿子

右等分燒為灰每服貳大錢煎菊花酒調下只參服便住

化榮散治室女經脈妄行胞絡枯澀

赤茯苓皮去 白芍藥

赤芍藥各參 黃芩炙

熟乾地黃酒浸 當歸酒去蘆

栝子仁炒 阿膠蛤粉炒

右為細末煎烏梅湯調下貳錢不拘時候日進

貳服

赤豆散治婦人大便下血困倦全不思食

赤豆生半兩 當歸去蘆酒洗

右為細末每服貳錢温酒調下不拘時候

三龍散治婦人赤白帶下神効

烏龍尾鹽上 赤龍類峻稠皮燒

黃龍肝大龜下

右等分為細末温酒調下

消毒膏治婦人乳赤腫欲作癰者

天南星為末生薑自然汁調塗之自散甚妙

草麻膏治婦人生產數日不下及胞衣死胎不下

草麻肆拾玖粒去殼研如泥塗足心纔下便急

洗去之如生腸出不收用藥塗項心其腸即收

靈脂酒大治崩漏

五靈脂新者不拘多少燒存參分性出火毒為

維末每服貳錢却以炭灰燒鐵秤鎚俟通紅以

銀盃盛以無灰酒貳叁升投之用酒調藥服之

謂之霹靂酒五靈脂須用成塊則力緊易取效

此藥志誠漸進壹錢至貳錢有一老媪年八十

崩漏凡數年得此藥服則病失去家間常試之

亦效 治婦人經候淋瀝不斷

用四物湯加側栝煎服

催生

側金盞子七七粒 細碾將來水調服

不問橫生與倒生 子母團圓免悲泣

右側金盞子迺黃蜀葵花子也難產之時作壹

服暖順流水調下

小兒諸疾

斬邪丹治小兒胎驚積在內時發肚疼咿啼不出

身體發熱腹內虛鳴小便不通冷熱腹痛眠睡不

穩正睡多驚但是小兒驚積實熱疾並宜服之

郁李仁

蠟梢燻兩

青黛各參兩

麝香壹錢或分半

巴豆霜於兩去殼皮研如粉

右伍味計捌兩初生錢柒分半為細末酒煮麵糊

為圓如黍米大初生孩兒每服壹粒貳歲者伍

粒參歲者拾粒用鈞藤挑條煎湯嚥下如無鈞

藤只用挑條亦得忌生冷油膩等物

碧玉丹治小兒虛冷癩上此藥有扶危起死之功

用扁金丹兼此服之無不更生但存微喘以藥錢

陽起石煨酒煮

黑附子煨去皮研

寒水石煨

白附子生

太陰玄精石煨

青黛

天南星製

半夏湯洗

右為細末再研極細無聲為度麵糊為圓如麻

子太每服貳拾圓薄昔湯下量歲數與服如大

人霍亂吐瀉亦可服圓如梧桐子大每服參伍

拾圓用井底泥水下

扁金丹治小兒胎風諸癩子足癢癢日睛上視搖

頭弄舌頸項強直牙關緊急口吐痰沫反拗多啼

精神不寧睡臥多驚吐刺生風昏寒如醉之疾並

宜服之

天南星炮

全蠍去毒

草烏頭炮

乳香

白花蛇酒浸

麝香研

蜈蚣條

朱砂並別研

右為細末酒浸蒸餅攪作餅子如雞頭大每服

川黃連去

胡黃連去

白蕪荑

羌活

木香不見

肉豆蔻炮

蘆薈

龍甲酥炙

右為細末用豬肚壹箇洗刮淨先以香白

芷貳兩入在豬肚中蒸熟去白芷不用却入前

藥在肚內縫合再蒸令極爛同研拌貳叁佰下

成膏圓如黍粟大每服拾粒米飲下不拘時候

量小兒大小加減服之
太一丹治小兒諸風驚癇潮發搐搦口眼相引顛

皆治療

天南星 炮

乾蠍 微炒 錢半

天麻 蘆去

大附子 炮 臍去

已上為細末以水壹升調浸參日以寒食麩壹

斗拌均踏作麩須陸月陸日以諸葉菴米日取

出逐片用紙袋裏掛當風處拾肆日方可用每

翻末壹兩入後藥

琥珀 壹兩

雄黃 參錢

右研細煉蜜為圓如雞頭大每服壹圓溫水化

下不計時候

鎮心安神丹治風痰壅盛神思不爽多困少力

防風 蘆去

人參 蘆去

白附子 炮 錢壹

全蠍 壹拾箇

牛黃

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服壹圓煎

烏蛇 酒浸取肉

白附子 炮 錢

麻黃 節去 根

白蠶 蠶 棟淨碎

辰砂 壹錢

甘草 半錢 炙

天麻

天竺黃 錢貳

蠶 蠶 條直者

朱砂 壹錢

麝香 並別研

天麻

天竺黃 錢貳

蠶 蠶 條直者

朱砂 壹錢

麝香 並別研

天麻

天竺黃 錢貳

蠶 蠶 條直者

朱砂 壹錢

麝香 並別研

薄荷湯下不計時候 溫胃丹治腹痛啼哭不止

人參 蘆去

木香 各壹兩 不見火

當歸 洗去蘆

右為細末白麩糊為圓如黍米大每服拾粒米

飲下

真珠圓治小兒諸驚疾

真珠末

川烏頭尖

蛇含石 煨

右等分為細末粟米糊為圓如黍米大半歲小

兒每服伍圓周歲拾圓參歲拾圓加至拾伍圓

昏困冬瓜子煎湯下驚搐金銀薄荷湯下夜卧

不安薄荷湯下夜啼乳香湯下腸急五皮湯下

安神圓治小兒驚鎮心臍熱化痰涎小兒常服永

無驚悸之疾

琥珀 如無以茯

遠志 心去

花蛇肉 酒浸 去骨

白朮 炒

五味子 枝去

高良薑 兩各半 炒

生附子尖

蠍梢

半夏 麵

人參 蘆去

天麻

白附子 炮

天麻

白附子 炮

天麻

白附子 炮

天麻

白附子 炮

天麻

白附子 炮

天麻

白附子 炮

麻黃節去

大川烏頭炮去

南木香不見

白蠟直者炒

朱砂別研

麝香別研

右為細末煉蜜為圓如龍眼大朱砂為衣壹圓

作肆服用薄苛湯下

五癇圓治小兒五癇驚悸狂呼發搐上盛涎潮等疾如尋常涎盛緊慢服之此藥不動臟腑養小兒

家宜預合以應倉卒之用其驗如神

皂角去皮槌碎水參肆升浸取汁濾去

白礬去於銀器內重湯頓熬成膏子

辰砂別研

蠟梢炒

雄黃研別

烏蛇酒浸去骨

蜈蚣頭大者壹條去

右為細末先用皂角膏子和次以生薑汁煮糊為圓朱砂為衣小兒壹貳歲圓如麻子大每服

羌活

蟬蛻洗去土并

真珠末

全蠍生薑汁炙

金銀箔各半兩

壹貳拾圓參肆歲貳參拾圓陸柒歲圓如菜豆

大每服參肆拾粒並用薄苛湯下

牛黃圓治小兒癇發即迷悶手足抽掣口內多涎

良久方醒

牛黃

乾蠍

蟬殼各壹

白附子炮

天麻各半

右為細末以棗參柴枝微煮去核皮水銀壹兩

同棗研令星盡入藥末和圓如菜豆大如隔日

發者煎黃牛乳汁下參圓日進參服如驚風煎

荆芥湯下兩圓

龍腦圓治小兒驚風墜痰

鉛白霜錢

朱砂別研

右為細末水浸蒸餅為圓如梧桐子大每服壹

圓薄苛湯下壹月小兒服半圓

青龍圓治小兒驚積實熱及急驚風

青黛

輕粉各壹

蠟梢參

麝香少許

巴豆貳粒去油盡

麝香半錢別研

乾蠟壹兩慢火炒令熟

右先將巴豆於乳鉢內研如麪次入諸藥研極細圓如粟米大朱砂為衣每服參圓薄芎湯下

小兒瘦減圓救服

又方治小兒驚積實熱鎮心臍化痰涎

又方治心包久蓄驚痰發作不時大人亦宜服之

天南星陸錢炮

白附子炮

白蠟各貳錢直

全蠟去毒

大葉薄芎乃壹錢

川芎肆錢

右為細末水煎白芎糊為圓如麻子大大人梧

桐子大量大小加減服之荆芥湯下

朱砂圓治傷寒及小兒熱鎮心壓驚

黃牛膽壹枚者大小入天南星末在內懸在透

風處肆拾玖日取合時用朱砂參錢麝香壹錢

同南星末研細以牛膽皮子煎湯為圓如鷄頭

大每服伍圓用新汲水嚼下薄芎湯亦得

又方治小兒鎮心壓驚墜涎

朱砂細研過

白蠟炒去絲取直

白附子紙飛過

天南星炮刮去麩

右為細末麪糊為圓如粟米大每服拾圓煎金

銀薄芎湯下如遇驚取下痰涎後且以此藥服

壹貳服無不效驗或有虛汗用麻黃根煎湯下

又方治小兒驚積實熱鎮心臍化痰涎

朱砂壹分

巴豆拾粒去皮

杏仁伍箇於熱湯內

半夏貳錢湯

右為細末麪糊為圓如菉豆大荆芥薄芎湯下

貳歲只壹圓參歲如壹圓伍歲服參圓如是驚

伏痰在內即通利藥出如無驚不必更下甚妙

且穩亦不可多服

龍腦青金圓鎮心壓驚退潮熱治盜汗殺疳蛔療

腹大醫瀉痢安五臟益顏色治瘡疥長肌膚

腦麝壹分

青黛別研

雄黃別研

朱砂別研

胡黃連別研

蘆薈別研

膩粉壹分

右為細末猪膽浸蒸餅為圓如菉豆大噉乾入

甕器內貯之每服貳圓至參圓一切驚悸體熱

瘡疥薄芎湯下一切疳氣瀉痢蛔蟲米飲下常

服百病不生
辰砂安驚圓、理風熱涎盛、身體拘急、睡中不穩、鎮心止驚。

天麻

白附子 炮各壹分

防風 去蘆

川芎 錢貳

右為細末、煉蜜為圓、如鷄頭大、每服壹圓至兩

圓用薄荷荆芥湯下、

鎮驚圓治小兒驚風

天麻

蟬殼

朱砂 研別拾肆箇

全蠍 去毒

白附子 炮

金箔

右為細末、乳汁為圓、如梧桐子大、每服壹貳圓、

薄荷湯下、

天麻圓治小兒諸驚

天麻 兩半

全蠍 去毒壹錢炒

甘草 炙

人參 去蘆

茯神 去木各半兩

朱砂 錢貳半留

天南星 片

防風 去蘆

蠶蠶 直者微炒去絲各壹分

雄黃 研別

麝香 別研各壹分

銀箔 各貳拾片

天南星 炮去皮半兩

白蠟 蠶

右為細末、酒煮麪糊為圓、如大麻子大、壹歲每服拾圓至拾伍圓、荆芥湯下、此藥性溫、可以常服、永除諸風疾、

肥兒圓、小兒疳病者、多因闕乳、喫食太早、或因久

患臟腑、胃虛蟲動、日漸羸瘦、腹大不能行、髮豎發

熱無精神、

黃連

大麥蘖

史君子肉

檳榔 半兩不見火

右為細末、麪糊為圓、如蘿蔔子大、每服參伍拾

粒、量歲數加減、熟水吞下、食空服、

補氣溫疳圓、補虛羸、退疳氣、進飲食、生肌肉、

肉豆蔻 壹兩兩、麪裹、乾煨、用

史君子仁 壹兩兩、麪裹、乾煨、用法

訶子皮 兩半

右肆味、同裹藥、麪為細末、水和成劑、圓如菉豆

大、每服伍拾圓、溫米飲下、食前、

龍血煎圓治小兒諸般疳疾、

木香 炒半兩

當歸 壹兩 去蘆

茯苓 壹兩 去皮

檳榔 壹兩

龍甲 貳兩 醋

蘆薈 別錢半

右為細末，麪糊為圓，如麻子大，每服貳拾圓，米飲下，不計時候。

金連圓治小兒疳氣。

胡黃連 壹兩 去蘆

木香 半兩 不見火

右為細末，神麪糊為圓，如麻子大，每服參拾粒。

陳米飲吞下。

連胡圓治疳熱。

黃連 去鬚

神麪 炒

柴胡 去梗

白茯苓 壹兩 去皮

右為細末，猪膽汁為圓，如麻子大，每服貳拾圓，米飲下。

苦練圓治疳。

苦練子 枝參兩 去核

川黃連 壹兩 去鬚

右為細末，藟葉裏粟米煨成飯圓，如黃米大，每服拾伍圓，至貳拾圓，空心米飲送下，日參服。

木香圓治小兒疳氣。

木香 不見火

白茯苓 皮去

陳皮 去白

京三稜 壹兩 炮

右為末，麪糊圓，如麻子大，每服拾圓，薑湯下。

神麪豆蔻圓治小兒疳氣，羸弱，臟腑虛怯，及滑泄不止，飲食減少，腹脹寒熱，面黃肌瘦，引飲無度。

神麪 炒半兩

麥蘖 炒半兩

史君子 拾肆箇 去殼

蘆薈 壹分 各研

右為細末，用猪膽汁浸麪作糊，為圓，如黍米大，每服貳拾圓，飯飲空心吞下。

木香分氣圓治小兒脾胃虛弱，飲食過傷，積滯內

木香 不見火

人參 去蘆

燕萸 兩

青皮 去穢

肉豆蔻 麪裏煨已

肉豆蔻 壹分

宜連 半兩 去鬚

燕萸 壹分

停或多吐逆、胃膈不快、面黃腹急、下痢無度、

香附子水浸壹宿、搗去皮、毛、今、潔、飯、上、蒸、過、壹、次、焙、乾、秤、壹、兩、

甘草半兩

縮砂仁壹兩

薑黃半兩、米泔浸、壹宿、切、焙、

右為末、用白麪糊為圓、如黍米大、每服貳拾圓、飯飲吞下、

消食圓、治小兒宿食不化、瘦悴、

神麪炒

青皮去穢

丁香不見火

陳皮去白

乾薑洗、炮

右拾味、各等分、為細末、用神麪糊圓、如麻子大、

每服拾伍圓、生薑湯吞下、大人圓、如梧桐子大、

亦可服、

茱萸圓、治小兒脾臟虛泄瀉不止、

猪臟頭壹兩

右將吳茱萸、納在猪臟內、兩頭緊緊繫定、用好

酒參升、煮令極爛、入沙盆內、研細、圓、如茱萸豆大、

每服參貳拾圓、米飲下、

實脾圓、治小兒脾虛、不美飲食、兼治乳食不消、黃

瘦等疾、

人參去蘆

縮砂仁

麥蘖各半、炒

半夏錢參、炒

右用蒸餅糊為圓、如黍米大、每服參伍拾圓、白

湯吞下、食前服、

四君子圓、治脾虛不化、乳食能充肌體、悅顏色、

縮砂仁

陳皮去白

右肆味、等分、為末、棗肉圓、如麻子大、每服參拾

圓、至伍拾圓、棗湯熟水下、

安心圓、治小兒慢驚、張、愈、傳、醫、者、

附子壹兩、炮、去皮、

右件為末、麪糊圓、如黃米大、朱砂為衣、每服貳

拾圓、米飲下、

消乳痰圓、醫者謂此乃得之於入、

大半夏醫者謂此乃得之於入、

人參錢半去蘆頭 右貳味焙乾同為細末生薑自然汁煮糊圓如
茶豆大每服貳拾圓薑湯食後服量小兒大小
加減

半夏圓治小兒痰疾并嗽

半夏菜箇圓大者湯泡菜
次切上薑汁浸壹宿

定粉 北礬灰分壹

右參味為細末麪糊圓如茶豆大濃煎白茅根
湯下伍圓至柒圓食後服

白朮半夏圓化痰治小兒咳逆寬利胃膈思乳食

半夏半兩湯泡半
次洗去滑 白朮炒

人參去蘆 甘草炙

乾薑各貳錢
半泡洗

右伍味為細末生薑汁打麪糊為圓如茶豆大
每服拾圓乳食後稍空煎生薑湯下

神白圓小兒利膈下涎去心胃噎塞并嗽胃虛不
宜服

天南星湯泡
菜次 半夏湯泡菜
各半兩

白蟻直者炒
去絲

白礬生用各
壹分

右為末用杏仁柒箇去皮尖巴豆壹粒去心膜
同研和再用去皮生薑汁為圓如梧桐子大陰
乾每服伍圓麩嗽生薑湯下久嗽嚼胡桃肉黃
蠟各少許吞下

溫疳圓

平胃散加蘆薈豬膽為圓如麻子大每服貳拾
圓米飲下

小定志圓治嬰孩稟賦不足心神睡卧不寧常服
壓驚邪止夜啼

酸棗仁去皮炒

人參去蘆

白茯苓各貳錢
去木

遠志去心水
微炒壹錢

乳香半錢
別研

右為細末煉蜜和圓如粟米大每服貳拾粒別
研生珠砂為衣人參湯下

小鹿茸圓治小兒胎氣不足精血虛少頭大開解

鹿茸酒浸

菴蓉酒浸

當歸去蘆
酒浸

熟地黃洗

茴香淘去
沙炒

破故紙炒

石斛酒浸

人參去蘆

白朮炒

五味子各壹
兩

右為細末、酒煮麪糊為圓、如麻子大、每服貳拾圓、鹽湯吞下、空心食前、

內消圓、治小兒頭面手脚虛浮、

青橘 伍箇湯浸去核

木香 壹錢炮

丁香 拾粒不見火

巴豆 柒箇去殼

防己 壹錢半

右青橘同巴豆炒蒼色、去巴豆不用、以其餘藥為末、蒸餅圓如麻子大、每服貳參歲伍圓、肆伍歲柒圓、或拾圓、男孩兒陳皮湯下、女孩兒煎艾葉湯下、日參服、

大朱砂圓、治小兒心氣不足、不省人事、多恐懼、

朱砂 研別

石菖蒲

麥門冬 心去

茯神 去木各半兩

全蠍 石灰炒去毒

麝香 少許別研

人參 去蘆

遠志 心去

甘草 炙

酸棗仁 去皮炒別研

杏仁 去皮尖各壹分

右為末、煉蜜為圓、如鷄頭大、每服半圓、煎木香

麥門冬湯化下、

八物參朮圓、平補心氣、安神鎮驚、除高熱痰賢、

麥門冬 心去

菖蒲

白茯苓 去皮各壹兩

人參 壹兩去蘆頭

右同為細末、次研入牛黃、煉蜜圓、如黍米大、以朱砂為衣、每服貳參拾圓、熱水下、

猪肚圓、治小兒肌體黃瘦、不思飲食、身體潮熱、四肢無力、

柴胡 壹兩去蘆頭

胡椒 壹百粒

胡黃連 壹兩

麝香 少許別研

遠志 心去

茯神 去木

白朮 炒洋兩

牛黃 貳錢別研

右為細末、用糯米入猪肚內、縫定、煮爛、去糯米、細切猪肚、和藥末、搗為圓、如小菘豆大、米飲空心食前下、貳拾圓、

大黃圓、治小兒增寒壯熱、發渴、腹中結實、不能乳食者、

雄黃 壹兩

木香 壹分不見火

雄猪肚 壹兩

雄黃 別研

雄猪肚 壹兩

雄猪肚 壹兩

雄猪肚 壹兩

雄猪肚 壹兩

雄猪肚 壹兩

雄猪肚 壹兩

雄猪肚 壹兩

雄猪肚 壹兩

雄猪肚 壹兩

桂心 去麤皮 不見火 枳殼 去穢 炒

桃仁 湯浸去皮尖雙仁 炒黃各壹分

右為末蜜圓如麻子大每服以溫水下伍圓日

參服量兒大小與之

梅連圓治小兒大便下血

黃連 去鬚 當歸 去蘆各 貳錢半

烏梅肉 兩半

右為末煉蜜圓如棗豆大粥飲下不拘時候

截風生胃湯治小兒稟受氣弱臟腑泄瀉乳孀不

化或湯青水此乃驚證之漸也宜急服神妙

天南星 壹箇須半兩以上 者慢火炮熱細剉

好人參 不拘多少 焙乾細剉

右貳味各壹錢半水壹盞生薑貳小片大棗壹

枚冬瓜子仁拾肆粒慢火同煎取濃汁用注兒

灌下每服作參兩次喫仍先嗜過恐生麻兒口

四君子湯加神麩麥蘗黃耆治小兒病後脾胃怯

弱五心煩熱不美飲食

白朮 炒 人參 去蘆

白茯苓 皮去 黃耆 各壹兩 蜜炙

神麩 炒 麥蘗 各壹兩 炒

甘草 壹分

右為細末沸湯點服壹錢

飯虎湯治脾虛不思飯食

人參 去蘆 壹兩

高良薑 炒 兩

陳橘皮 去白 兩

甘草 兩

右件為細末入鹽沸湯點下食前

沈香磨脾湯治小兒脾胃不和黃瘦多汗不食

香附子 壹兩 去毛

人參 去蘆

麥蘗 炒

甘草 兩

右為細末每服壹錢沸湯調下不拘時候

山藥湯治脾胃怯弱不喜飲食

山藥 炒 兩

粟米 壹分 炒

人參 去蘆 兩

右為細末每服貳錢水半盞入陳紫蘇壹大葉

同煎至壹半去滓溫服食前

白朮 炒 兩

木香 壹錢 紙裏煨

甘草 壹錢

神麩 炒

沈香 不見火

蘇香湯平小兒心肺消痰壅欬嗽

紫蘇葉

人參去蘆各壹兩

五味子枝去

木香不見

甘草炙

陳橘皮各半兩去白

右為細末每服半錢入生薑自然汁少許同煎芥湯調下

和解湯治小兒四時感冒寒邪壯熱煩燥鼻塞多涕驚悸自汗肢節疼痛及發瘡豆瘡已發未發者皆可服

羌活

人參去蘆各壹兩

川升麻若輕

防風去蘆

乾葛

甘草微炙各半兩

右陸味為麤末每服參歲兒壹錢水參分蓋生薑半片棗子少許同煎至貳分去滓溫服不拘時候量兒大小加減化毒湯治小兒瘡豆已出未出並可服之

紫草嫩者

甘草炙各半兩

升麻

右劉如麻豆大以貳錢糯米伍拾粒煎壹盞去滓溫服

活脾圓治小兒脾困成慢脾風吉氏家傳

天南星炮去

白附子炮

半夏湯泡

右等分為末煉蜜圓如菜豆大服參圓或大段吐瀉米飲下

銀白散治小兒胃虛吐瀉煩渴成慢脾者醫官刊

乾葛

白茯苓去皮

半夏湯分壹兩製成餅炒黃

白匾豆各半兩炒

山藥

糯米

右件同為細末每服貳錢水捌分生薑貳片同煎陸分溫服

治走馬疳

枯礬入些甘草麝香頻擦蝕牙處麴香散治小兒慢驚皆因吐瀉所致若大吐數日不止便作驚候急服此藥即可止吐

赤麴

丁香不見

藿香葉各半兩去土

肉豆蔻麴炙錢

右為細末每服壹錢壹歲嬰孩半錢煎香楠木湯調下楠木定驚止吐神妙不可言

天竺黃散退風熱驚熱驚風

天竺黃

蟬蛻洗

蠟直者炒

山梔子

甘草炙

鬱金

右等分爲細末每服壹錢熟水調下

朱砂散治小兒驚熱和氣劉氏家傳

朱砂研

白茯苓去皮

人參去蘆

山藥各等分

甘草減半生半炙

右爲末金銀薄可湯下和氣米飲下發熱竹茹

煎湯下量大小壹字或半錢或參字

蠟附散醒脾去虛風張氏家傳

大附子壹錢炮

大全蠟壹錢

大白附子壹錢炮

天麻壹錢

右件爲末每服半錢濃煎冬瓜子湯調下

人參黃耆散治小兒身熱肌瘦自汗

人參去蘆

綿黃耆壹錢

白茯苓去皮

山藥

百合

甘草炒各壹兩

右爲細末每服貳錢濃煎麥門冬湯點服不以

時候小兒服壹錢頻服甚妙

牡蠣散治卧時盜汗風虛頭痛忪悸恍惚口乾羸瘦者

牡蠣煨

白朮炒

防風去蘆各參兩

右同爲細末每服壹小錢溫酒或米飲調下止汗有驗

香珠散治小兒盜汗

香白芷壹兩對碾

朱砂壹錢研細

右爲壹處同和每服壹錢濃煎小麥湯調下

龍骨散治小兒夜後常有盜汗黃瘦

白龍骨煨

牡蠣粉

黃耆對

人參去蘆

熟乾地黄洗

甘草炙

麻黃根各半

麥門冬壹兩去心

右件搗羅爲末每服壹錢水壹盞煎至伍分

和滓不計時候溫服量大小與之

止汗散治小兒頭汗盜汗

白茯苓去皮

牡蠣粉各肆兩

右等分爲末遇有汗處撲之汗自止

歡喜散治小兒外感風邪發熱頭痛無汗惡風或些小溫熱鼻塞清涕淚出噴噴並皆宜服

防風去蘆

人參去蘆

甘草炙

天麻

前胡各錢半

細辛

柴胡各錢壹

白茯苓去皮

桔梗各錢壹

枳殼去穢

川芎錢參

右為細末每服參歲以上抄壹錢用水陸分盞薄荷兩葉同煎參兩沸通口服不拘時候量大

小加減服之

紅綿散治小兒夾驚傷風渾身壯熱睡卧多驚眼目上眵潮搐不定風邪相干此藥大有功效兼治一切驚風

全蠍去毒

天麻細剉用酒

天南星炮大者取洋已上各半兩

麻黃去節

人參去蘆壹分

白附子兩隻

朱砂伍錢好者入

右件壹處為細末壹歲每服用小半錢參肆歲每服壹小錢水用壹燈蓋肆歲用水小半盞

用白綿約壹皂子大同煎候綿色轉紅為度却去綿不用只服藥汁如發或驚搐緊無時與服如夾驚傷風壹日兩服申時臨卧進兩服須臾即愈

龍腦散治一切風熱

龍腦薄荷

蟻蠶直者炒

川芎

防風去蘆

甘草半兩

細辛錢半

右件為細末每服半錢米飲調下臨時有病隨證用湯使

化毒散治瘡豆出不透倒壓頭焦

白芍藥

右為細末用蒲桃研細入白湯內去滓只用白湯調服壹錢其豆子即出若患腹痛連進貳服若無新蒲桃以番蒲桃代之亦妙

烏梅散治小兒冷熱痢心神煩渴腹痛胃膈滯悶

烏梅肉微炒

訶梨勒煨用皮

甘草伍分

右為細末水壹盞煎伍分去滓放溫不計時服紅粉散治小兒渾身虛腫氣喘不思飲食

朱砂研別

檳榔錢各壹

輕粉錢半

右為末每服壹字及半錢薄芎湯調下喫壹服則大便微通利仍用觀音散人參散調其胃氣忌生冷麤硬等物若是脾虛不可服此更宜詳審用之

六神散治小兒泄瀉後脾虛身體發熱

人參去蘆

當歸去蘆

川芎

地黃洗

地骨皮

甘草炙

右等分為麤末每服貳錢水捌分去蘆薑貳片煎

至陸分去滓食後下

麥門冬散治小兒嘔吐脉數有熱

麥門冬去心

半夏麩

人參去蘆

白茯苓各參分去皮

甘草壹分炙

右為細末每服貳錢水壹盞薑參片煎至伍分

去滓溫服日貳參服

茯苓散治小兒諸渴不止

白茯苓壹兩去皮

烏梅貳錢半微炒

乾木瓜兩半

右為細末每服壹錢熟水調下不拘時候龍膽散治小兒一切疳日漸黃瘦無間遠近皆效

龍膽

木香不見火

蝸牛

夜明砂

地龍去土

熊膽

蘆薈

麝香研別

朱砂研別

青黛各壹分別研

乾蟾頭壹箇炙令黃焦

右件藥為末每服以粥飲調下半錢量大小以

意加減更吹少許入鼻中蟲子自出黃白色可

醫黑色難療

加味觀音散補虛調胃氣進乳食止吐瀉

白匾豆微炒

石蓮肉炒去心

人參焙去蘆各壹分

白茯苓壹錢半去皮

神麩貳錢炒

甘草炙

香白芷

綿黃耆槌碎用蜜水拌炙

木香壹錢炒各

白朮炒壹錢半

右為末每服嬰兒用壹字貳參歲半錢肆伍歲

壹錢用水壹小盞或半銀釵棗子半箇煎拾數

參分去滓不拘時候旋旋與服
越桃飲子退小兒積熱

山梔子

甘草

大黃

紅芍藥

連翹

黃芩

右件為細末每服半錢至壹錢蜜湯調下大退積熱

木香煎治食不知飢飽積滯內停脚大脚細下痢無度

南木香

肉豆蔻

乾蟾

胡黃連

史君子

五靈指

巴豆

麝香

右為細末拌和福水於石杓中搗壹貳佰下為圓如黍米大每服參粒溫生薑湯下乳後量兒大小加減服之

辰砂膏壓驚化涎理嗽利膈退風熱

天南星

辰砂

蠶蠶

乳香

蠍梢

麝香

右陸味並須製訖秤再研和煉蜜少許和劑蜜不欲多每服量多少煎金銀湯或熟水化下乳後服之

把搗膏治小兒一切驚風

藿香葉

天南星

白附子

麻黃

天麻

白蠶蠶

蠍梢

腦麝

蜈蚣

右件為末煉蜜為圓如鷄頭大每服壹圓葱白湯化下

烏犀膏治小兒傷風寒邪諸癇驚風壯熱手足瘈瘲漸成慢驚風候痰涎壅滯眼目上視及冒冷彈身壯熱並皆治之

川烏頭

天南星

玄參末

薄芎末

右研細用煉蜜為圓如鷄頭子大每服壹圓小兒半圓薄芎湯下筋力緩急乳香葱白湯下羌活膏散風熱化痰安驚

羌活

甘草 各半 兩灸

白附子 炮

川芎

朱砂 壹半入藥壹半 為衣各貳錢

桔梗 洗去蘆頭 兩

右為細末煉蜜為圓如鷄頭大每服壹圓至兩

圓用薄荷荊芥煎湯化下

住唇膏小兒常服永不生風痰證心無驚面多紅

潤唇臉如丹常服無疳積諸癖疾患

白蠟

壹兩去頭足絲直者生為末以薑汁和為餅子於火上炙乾又再炙

朱砂 貳錢細研用水壹碗浸淘參通

朱砂

去黃也傾紙上候乾研如粉細

右同合和研煉蜜為膏入甕合子內貯每用如

鷄頭大參歲只可壹圓如參歲已下更分用之

飲湯熟水化下

烏金膏治小兒疳氣灌入陰間黃亮色

通草

黃皮

大黃 各壹分 燒留性

右為末每服壹錢積猪膽調成膏於陰上塗如

未退煎蛇床子湯洗後再調塗之

人參膏應一切脾胃不和並宜服之

人參 壹兩去蘆

丁香 不見

白豆蔻

藿香葉 各半兩

右件為細末煉蜜為圓如鷄頭大每服壹粒至

貳粒米飲化下乳前服

助胃膏治小兒脾胃虛弱或吐逆泄瀉臍腹疼痛

不進飲食

白茯苓 皮去

川厚朴 去皮薑製炒

甘草

人參 去蘆

木香 煨

丁香 不見

沒石子 筒伍

白朮 炒

藿香葉 洗去

訶子 煨去

陳皮 去白各半兩

草菓 皮去

肉豆蔻 麩裏煨各貳錢半

右碾如粉煉蜜為圓如鷄頭大每服壹歲以上

兒壹粒煎生薑棗湯下食前其餘大小更以意

加減如覺兒胃有寒脾脈弱小兒白而多大便

或青黃不定常常服之甚妙

牛黃膏治膈熱及諸熱鎮心解毒

川鬱金 半兩、用皂角參寸、巴豆柒粒、水壹塊、銚內煮乾、不用皂角、巴豆

甘草 半兩 朱砂 壹錢

馬牙硝 鵬砂

寒水石 各壹分 腦麝 許少

右為末、煉蜜為膏、圓如梧桐子大、每服壹圓、麥

門冬熟水化下、

朱砂餅子、治小兒急慢驚風、

天南星 炮 白附子 炮

白蠟 壹分 白花蛇 參錢去皮骨

右為細末、用天麻末白麪少許煮糊為圓、如梧

桐子大、每服壹餅、朱砂為衣、用金銀薄荷湯化

下、不拘時候、

諸雜方

千鍾酒解酒毒、

蜜曲陸 貳兩、又名雞橫子、研為膏、入白附子末壹兩、研和作餅、懸於風處、陰乾、作餅

縮砂仁 白薑 炮各壹兩

右為細末、稀麪糊為圓、如梧桐子大、每服參拾

圓熱鹽湯下、少頃便蘇醒、

治腋氣、

蜜陀僧黃丹等分、為細末、每用時先以皂角水洗淨腋間、然後以蒸餅兩箇夾在腋間、少時然後用藥摻傅、

又方

用開通錢拾文、火煨醋焯盡為度、去醋、以其蓋底者細研如粉、入蜜陀僧半兩、枯礬壹錢、輕粉壹字、麝香壹錢半、同研為末、候浴了、剝却腋毛、以生薑壹塊、厚切作片、蘸藥自抹、不得用他人手、左右更互上之、易三度、則自然除也、

又方

金粉 黃丹 槐花

黃連

右等分、為細末、至夜以少蜜和水調傅之、拾日見效、

又方

土礬 錢伍 蜜陀僧 錢參

膩粉 錢拾 龍骨 錢參

右為細末、每用半錢、以生薑自然汁調得所、塗之、立效、

神僊救人圓、治體氣不問參貳拾年者、用之、不過

參伍次除根

風化石灰 壹錢 壹字

泥礬 參錢 壹字

真膽礬 枯

白礬

膩粉 各貳錢

右研如粉細入腦子輕粉少許再研先用湯洗兩腋却以藥末壹錢濃米醋調塗之

治湯火傷清涼膏

南粉 肆兩 細研

右用臍月猪脂壹斤銀瓦器內煉去滓趁熱入新磁器內次入南粉待其溫用竹篦攪庶不上清下澄湯火所傷用篦子取藥塗上痛所並無瘡癥

又方

炒脂麻出火毒碾為細末麻油調塗之甚妙

治誤吞錢方

爛嚼鳧虱嚙之多為妙生熱皆可

又方

用活鵝撲背倒提良久放手開背內涎出以梳貯之入生麻油參兩滴令小兒飲之少頃喫少溫白湯即惡心其錢吐出

治諸骨鯁

砂糖如鷄子大爛嚼仰面以熱酒嚙下骨隨酒便下

又方

草麻子柒粒去殼研細入寒水石末纏令乾濕得所以竹篦子挑貳參錢入喉中少頃以水嚙之即下

治魚骨鯁

白梅取肉去核以砂糖含化須臾骨軟自下此方甚驗

又方

象牙屑和砂糖作圓含化

治寸白蟲

酸石榴樹根向東行者取皮練樹根皮各參錢用水兩碗煎捌分夜露壹宿次日候腹空待飢以食時先炙猪肉數片食訖即將前藥服之當有所下服藥後微似有頭暈勿怪甚者只兩服除根

又方

用雞子壹箇入韶粉壹錢重打和於飯甑上蒸

熟次日五更再於湯瓶上頓熱細嚼嚥下忘葷
味伍柒日候蟲下盡方住服

又方

生榧子拾數箇五更細嚼嚥下

治一切蛇毒所傷

赤脚蜈蚣壹條凡上焙乾

透明雄黃

巴豆霜錢壹

麝香許少

右為細末用杏核數箇各磨成壹竅去仁填藥
在內令滿實却用蠟圓子塞竅臨時用開蠟圓
以針挑藥末少許塗所傷處候黃水出即瘡用
畢復以藥圓子塞其竅壹枚可救拾數人

又方

取金錢草研爛入生薑蜜酒合和飲了藥到傷
處恐人倒用扶兩手蛇毒即消

誤食毒藥咽喉急閉

用羊蹄根細研醋調飲吐出涎灌蜜水聲方出

治中砒霜巴豆毒

用黃連汁飲壹杯即醒

解毒方

用苦參為末冷水調下壹大錢藥毒吐出即瘡

解百藥毒方

用出了蠶子紙燒灰研為細末每服壹錢新汲
水調下即愈

解一切毒

大甘草不拘多少於麻油瓶內浸愈久愈佳每
日空心切壹片食之遇毒即吐

染髭髮方

針砂醋煎

訶子麸炒去核

五倍子

百藥煎

蕎麥壹錢如無以少粉用

右為細末醋煮蕎麥粉為糊稀稠得所先淨洗
髭鬚了揩拭令極乾然後用前藥塗染却用荷
葉包裹不黑再染壹兩度自黑

烏髭方

蛤粉兩肆

韶粉兩肆

輕粉貳字

黃丹兩肆

烏賊骨貳字

杏仁伍箇去皮尖去

乳香貳字大別研

塊子石灰兩壹

右研令極細用甕合收勿透氣先以溫水洗髭
令淨量多少用荷葉濃煎水調塗用煮荷葉包

裏緊繫臨睡用來早再用皂角水澤去其髭菜軟而直不脆用藥須帶熱厚為佳

又方

每用水銀壹錢重就石榴樹上揀梢頭極大者壹箇就蒂開壹竅入水銀在內令盡以蠟固濟其竅候經霜了就樹搖動聽得已化作水則取出每用些小拭髭其黑如漆

尋痛圓治腰背并骨節因撲損疼痛發作

杜仲去麤皮薑汁炒貳兩

當歸去蘆酒浸

延胡索各半兩炒

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓鹽酒嚼下不以時候

治打撲傷損骨碎痛楚不可忍

水蛭壹兩同自然銅壹兩於砂鉢中炒候水蛭焦蘇去自然銅不用只將水蛭為細末每服壹錢燒竹膜灰壹錢燒絲灰壹錢麝香少許同和溫酒調下其痛立止其骨損處先以薄舊綿包令骨齊整次用薄杉木片子夾之外以軟帛扎定損處甚者服藥參日每日食前貳服曾經治壹人第參日後其損處覺如蟲行而痒漸可屈

伸觀之如黃膠纏滿損處後平復如故累有效

又方

骨碎補去苗為細末以黃米或糯米作粥和藥末裹傷處痛止腫消

又方

生地黄壹斤生薑肆兩搗細入糟壹斤同炒和乘熱以布裹發傷損處冷即易之先能整痛後整骨大有神效乾德中冀州士人徐蟠因墜馬傷損手足疼甚醫方用一法

治筋斷須續者

旋復花根絞取汁以筋相對取汁塗而封之即續如故

治癩撲閃胛疼痛

用艾葉細切同糟拌和攤在痛處以綿帛縛定久之自愈

又方

牛皮膠拾文好米醋壹大盞浸膠令軟慢火上煎約參肆分入馬屁亭貳文同煎數沸看痛處隨大小上用紙貼之壹日壹換候痛定即愈洗面藥治粉刺

蓋母草以多為妙先燒作黑灰熱灰狀不可燒

今大過用飯飲作團、炭火中煨過、隔壹宿、打碎、再用飯飲作團、重煨似此伍柒次煨、候如粉可用、如面藥須先用皂用洗面、然後用藥壹字、不可多、欲取粉刺、隔夜先以酸漿洗面、就調此藥、傳之、來早洗去。

諸湯

香橘湯

小橘壹斤、以木架在盆上、薄切作小片子、核、用甘草參兩炙、鹽參兩生、薑陸兩同橘漿淹壹宿、焙乾、如尚有餘漿、焙時頻蘸、令盡、碾為細末、數服、吉味極佳、

醃醃湯

梅捌甘草柒

桂貳乾薑壹

夏着陸兩鹽

甜似波羅蜜

慶僊湯

好茴香淘去沙皮

甘草炒

右等分、為細末、入鹽沸湯調下、

鳳池湯

烏梅肆兩去仁、連核用

桔梗去蘆、炒

甘草炙

鹽各參分

右為細末、每服壹錢、沸湯調下、

清芬湯

伍月伍日取菖蒲、切作片子、每肆兩、用鹽壹兩、淹壹宿、焙乾、入甘草壹兩、檀香貳錢、壹處碾為末、點服、重午菖蒲不苦

紫薑湯

生薑壹斤炒

舶上丁香皮

鹽

甘草兩

丁香伍拾粒、不見火

石為細末、沸湯點服、

清韻湯

縮砂兩參

石菖蒲壹兩

甘草肆兩炒


右為細末、入鹽沸湯調下、

玉塵湯

半夏兩陸

白礬貳兩

右為細末、以磁瓶盛水、浸、春夏伍兩、秋冬柒兩、每日易水、以不渾為佳、用灰池紙、槩乾、用生薑自然汁、搜作餅、入炙甘草貳兩半、丁香壹錢、同為細末、鹽湯點服、



ZW 21101000784338

S
Z121.5
15b(1000)

續修四庫全書
子部
醫家類

六六四

魏氏家藏方卷第拾終

文政九年丙戌上巳前一日校合切誤