


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇二八・子部・醫家類

- 柳選四家醫案八卷〔清〕柳寶詒選評……………一
- 醫經正本書一卷〔宋〕程迥撰……………一七一
- 折肱漫錄七卷〔明〕黃承昊撰……………一七九
- 裴子言醫四卷〔明〕裴一中撰……………二四三
- 侶山堂類辯二卷〔清〕張志聰撰……………三一七
- 醫貫砭二卷〔清〕徐大椿撰……………三七三
- 慎疾芻言一卷〔清〕徐大椿撰……………四〇九
- 吳醫彙講十一卷〔清〕唐大烈輯……………四二三
- 吳鞠通先生醫案五卷〔清〕吳瑭撰……………五三七

柳選四家醫案

王家樞署

江陰實之
精造書籍

光緒三十三年
辛丑冬鑄版

柳選四家醫案 跋

四家醫案跋

或問醫案古有之乎
曰古有診籍扁鵲居
公傳所記是也曰驗乎
曰書今不同其品齊輕

重不可得而志也然則
柳先生奚為輯是書
也曰時近而文顯時近
則陰陽之診同文顯則
質直而易曉抑且商

推微眇稱量而出不啻
其自為之也

先生所輯者八家今先
刊者四種其門人王君
吉臣柳君頌餘金君蘭

升旬資成之三君守師
法篤風義良之稱述
金君屬叙於余：不知
醫勉贅數語以質世
之善讀書者時

光緒甲辰四月

常熟公祠同錄



江陰柳氏惜餘小舍醫學叢書總目

第一種 素問說意

第二種 溫熱逢原上中下三卷

第三種 瘧痢逢原兩卷

第四種 惜餘醫話四卷

第五種 評選靜香樓醫案上下兩卷

第六種 評選繼志堂醫案上下兩卷

第七種 評選環谿草堂醫案上中下三卷

第八種 評選愛廬醫案一卷

第九種 評選琴川醫案三種

柳氏叢書

卷首 總目

第十種 梓賢醫案十六家

第十一種 清芬醫案

第十二種 鴻雪醫案

惜餘小舍評選各家醫案編目次序

內傷雜病 勞倦 七情 脾胃

類中 中風 類中

痿痺 痿躄 痺痛 麻木 拘攣

內風 肝風 癱厥 眩暈

神志 顛狂 癇 怔忡 驚悸 健忘 不寐

痰火

痰飲 飲證 痰閉

欬喘 欬嗽 喘哮 失音 喉痺 肺癰 肺痿

失血 欬血 衄血

柳氏叢書

卷首 編目

虛損

汗

消

諸鬱 氣鬱

嘔噦 嘔吐 噎膈 反胃 呃逆 噎噎 饋雜

伏氣 溫熱

外感 風溫 胃寒 雜感

暑 中暑 傷暑 伏暑

濕 濕熱 寒濕

痧疫 痘疫 霍亂 時痧

瘡疾
黃痺
痺氣 胸痺 肺痺 腸痺 胞痺
腕腹痛 腕痛 腹痛 少腹痛 厥痛
疝氣
癥瘕 癥瘕 積聚
腫脹 鼓脹 痞滿 浮腫
頭痛 頭風
肢體諸痛 肩臂胸背脇肋腰脊膝肢節諸痛
諸竅 七竅 咽喉
柳氏叢書 卷首 編目
脚氣
遺精
小便 淋濁 癃閉 洩血
泄瀉
痢疾
大便 便血 痔漏 脫肛 便閉 交腸
蟲 狐惑 諸蟲 蟲毒
內癰
外瘍雜證 痰癧
婦人 胎前 產後 經帶 雜病

小兒
凡編選醫案其分列門類最難清楚蓋一病中每有兼證錯見既可列於此門亦可入於彼類也此
次擬定總目四十而以子目分註於下凡集中錄
案多者標明總目分門編列如錄案無多即不復
分標門類而編列前後則仍依此目為序以便讀
者可依目檢尋也
柳氏叢書 卷首 編目
四 惜餘小舍

江陰柳氏醫學叢書之五

評選靜香樓醫案兩卷

此案為尤在涇先生所著先生名怡字在涇自號
 飼鶴山人江蘇長洲縣人邃於醫學於仲景書尤
 能鑽研故訓獨標心得時吳下以醫名者如葉氏
 桂徐氏大椿王氏子接均煊燿一時先生與之聯
 鑣接軫輝映後先於醫道中可謂能樹一幟者所
 著有傷寒論貫珠集金匱心典醫學讀書記均刊
 行惟此案未經授梓其附刻於讀書記後者僅有
 三十餘條非全本也此本為吾邑吳氏所鈔藏咸
 靜香樓醫案 卷首 惜餘小舍

豐兵燹後詒於詹文橋張氏齋頭見之假歸鈔錄
 復就其中選精粹者得十之五評錄如左分上下
 兩卷竊念近時醫學荒廢其簡陋剽襲毫無心得
 者無論已間有鑽研古籍不知通變者動輒以仲
 景為家法而咎今人不能用古方目為庸陋其實
 古方今病往往柄鑿不相入執而用之債事者多
 矣及讀先生此案而不覺憬然有悟也先生博極
 羣籍尤服膺仲景之書所著傷寒論金匱兩注上
 溯仲景心傳獨抒己見讀其書者無不知先生之
 於仲景不啻升其堂而入其室已乃觀此案論病

則切理鑿心源流俱澈絕不泛引古書用藥則隨

證化裁活潑潑地從不蹈襲成方可見食古期乎

能化裁制貴乎因時彼徒執古書者不且與王安

石之周官房琯之車戰其弊適相當哉是故讀他

人之案有不用古方者或猶疑其服古未深未能

得力於仲景也若先生則讀書不可謂不多用功

不可謂不切其沈酣於仲景之書尤不可謂其不

深乃其論病之平易近情也如是立方之妥帖易

施也如是是則此案不第為治病之良規并可為

讀古之心法已用書之以讀後之讀此案者光緒

靜香樓醫案 卷首

六 惜餘小舍

二十六年庚子二月下旬江陰後學柳寶詒識

評選靜香樓醫案上卷

江陰柳氏醫學叢書之五

長洲尤怡在涇著

江陰柳實詒毅孫選評及門諸子 參校

內傷雜病門

○陰虧於下。陽浮於上。服八味丸不效者。以附子走竅。不能收納耳。宜加減法。

桂都氣丸

詒按。議論精細。可為用藥者開一悟境。

○肝陽盛。肝陰虛。吸引及腎。腎亦傷矣。益肝體。損肝用。靜香樓醫案 卷上 內傷雜病 借餘小舍

滋養腎陰。俾水木相榮。病當自愈。

生地 白芍 小薊 赤芍 當歸 血餘 丹皮 阿膠 甘草 茅根

詒按。此必因肝火而見血者。故方藥如此。

○左關獨大。下侵入尺。知肝陽亢甚。下吸腎陰。陰愈虧。則陽益張矣。滋水清肝。乃正法也。

知藥八味丸加天冬 龜板 杞子

詒按。方中似宜再增清肝之品。

○陰不足者。陽必上亢。而內燔。欲陽之降。必滋其陰。徒恃清涼無益也。

生地 知母 甘草 黑梔 麥冬 元參 丹皮 地骨皮

詒按。案語精粹。有名雋氣。

○腎精不足。肝火乘之。故有筋攣骨痠耳。竅二陰氣出。等證。夫肝火宜泄。腎精宜悶。於一方之中。兼通補之法。庶幾合理。然非旦夕所能奏功也。

生地 川棟子 茯苓 阿膠 丹皮 女貞子

詒按。論病深中肯綮。方中可增白芍牡蠣。

○肝陰不足。肝火偏勝。傷肺則欬。自傷則脇痛。

阿膠 兜鈴 丹參 炙草 歸身 白芍

靜香樓醫案 卷上 內傷雜病 借餘小舍

玉竹 川斛

詒按。既有脇痛見證。似當兼與通絡清肝。宜加丹

皮山梔青皮橘絡旋覆等味。

○咯血脇痛。項下有核。脈數惡熱。咽痛便溏。此肝火乘脾之證。反能食者。脾求助於食。而又不能勝之。則痞耳。治在制肝益脾。

白芍 茯苓 川連 牡蠣 炙草 木瓜

益智 阿膠

詒按。論病明快。方中擬加丹梔夏枯草。

○飲食既少。血去過多。陰氣之傷。益已甚矣。茲復憂勞。

驚恐志火內動陰氣益傷致有心煩體痛頭疼等證是當滋養心肝血液以制浮動之陽者也。

生地 石斛 麥冬 丹皮 元參 知母

茯苓 甘草

論按肝陰既虧肝火上升宜再加歸芍以滋養之。羚羊菊梔以清泄之。

○肝藏失調侵脾則腹痛侮肺則乾欬病從內生非外感客邪之比是宜內和藏氣不當外奪衛氣者也。但脈弱而數形瘦色槁上熱下寒根本已漓恐難全愈。

歸身 白芍 炙草 茯苓 桂枝 飴糖

靜香樓醫案 卷上 內傷雜病 三 惜餘小舍

論按此內補建中法宜於腹痛而不宜於乾欬宜加清肝保肺之味乃為周匝。

○形盛脈充兩尺獨虛下體麻痺火浮氣急此根本不固枝葉雖盛未足恃也。

熟地 山藥 沙苑 杞子 丹皮 茯苓

桑椹 牛膝

論按如此脈證似可參用腎氣法以溫攝之。

○真陽以腎為宅以陰為如腎虛陰衰則陽無偶而蕩矣。由是上炎則頭耳口鼻為病下走則膀胱二陰受傷。自春及秋屢用滋養清利之劑欲以養陰而適以傷陽。

不能治下而反以戕中內經所謂熱病未已寒病復起者是也。鄙意擬以腎氣丸直走少陰據其窟宅而招之。同聲相應同氣相求之道也。所慮者病深氣極藥入不能制病而反為病所用則有增劇耳。

腎氣丸

論按立論透切醫案中僅見之作。

○真陽氣弱不榮於筋則陰縮不固於裏則精出不衛於表則汗泄此三者每相因而見其病在三陰之樞非後世方法可治古方八味丸專服久服當有驗也。

八味丸

靜香樓醫案 卷上 內傷雜病 四 惜餘小舍

論按見識老到議論明確此為可法可傳之作。

○胃寒背冷食入則倦喜溫惡清以背為陽位胃為陽土土寒則食不運陽傷則氣不振也。治宜溫養陽氣。

人參 桂枝 益智仁 厚朴 炮薑

茯苓 炙草 白朮

論按此溫中和氣平正通達之方。

○中氣虛寒得冷則瀉而又火升齒衄古人所謂胸中聚集之殘火腹內積久之沈寒也。此當溫補中氣俾土厚則火自斂。

四君子湯加益智仁 乾薑

詒按議病立方均本喻氏近時黃坤載亦有此法

類中門

○類中偏左於法為逆猶幸病勢尚輕可以緩圖取效原方補少通多最為合理惟是陽脈則緩陰脈則急所以指節屈不能伸此亦病之關鍵處不可忽也經云肝苦急宜食甘以緩之於前方中增進陰藥之甘潤者一二更為美備

人參 茯苓 半夏 白朮 炙草 橘紅
麥冬 竹瀝 薑汁

詒按此六君加麥冬竹瀝薑汁也

靜香樓醫案 卷上 類中 五 借餘小舍

再診 加當歸

○脈虛而瀉左半手足麻痺食不知味此氣血不能運行周體乃類中之漸也

桂枝 茯苓 歸身 半夏 炙草 黃耆
天麻 首烏

詒按滋養疎化虛實兼到

○內風本皆陽氣之化然非有餘也乃二氣不主交合之故今形寒跗冷似宜補陽為是但景岳云陽失陰而離者非補陰無以攝既散之元陽此證有升無降舌絳牽掣瘡不出聲足蹇不堪行動當與河間肝腎氣厥同

例參用丹溪虎潛法

熟地 萸肉 牛膝 鎖陽 虎骨 龜板

詒按持論明通立方簡當

再診 地黃飲子去附子加鹿鞭子煎膠打丸

○熱風中絡口歪舌蹇咽痛治以清滋

羚羊角 元參 鈎藤 甘菊 甘草

石菖蒲 生地 竹瀝

再診 生地 阿膠 麥冬 知母 貝母 甘菊

甘草 元參

三診 咽喉乾痛滋清不愈宜從降導

靜香樓醫案 卷上 類中 六 借餘小舍

腎氣丸 淡鹹湯送下

詒按先清之繼滋之終用引火下行之法步伐井然凌躐急功者可取法焉

○方書每以左癱屬血虛右癱屬氣虛據述頻年已來齒疼舌赤常有精濁納穀如昔卒然右偏肢痠舌強口喎語蹇脈浮數動此乃肝腎兩虛水不涵木肝風暴動神必昏迷河間所謂肝腎氣厥舌瘖不語足非無力之證但腎屬坎水真陽內藏宜溫以攝納而肝藏相火內寄又宜涼以清之溫腎之方參入涼肝是為複方之用地黃飲子去桂附 加天冬 阿膠

論按即古法而化裁之。參詳脈證。斟酌盡善。

○寒熱後邪走手少陰之絡。猝然不語。肩背牽引不舒。宜辛以通之。

菖蒲 遠志 甘草 木通 當歸 丹皮

丹參 茯苓

論按方法輕靈。恰合餘邪入絡治法。

○脈濡按之則弦。右肩及手指麻木。兩腿痠癢。難以名狀。此脾飲肝風相合為病。乃類中之漸。不可不慎。

首烏 天麻 刺蒺藜 羚羊角 炙草

茯苓 半夏 白芍 丹皮 廣皮 薑汁和竹瀝

靜香樓醫案 卷上 類中

七 惜餘小舍

泛丸

論按以二陳薑汁竹瀝除痰飲。以丹芍羚羊首烏

天麻治肝風。兩層俱到。就見證論。歸身牛膝橘絡

亦可加入。

痿痺調

○脈虛而數。兩膝先軟後腫。不能屈伸。此溼熱乘陰氣之虛而下注。久則成鶴膝風矣。

生地 牛膝 茯苓 木瓜 丹皮 薏仁

山藥 萸肉 澤瀉 草薢

論按正虛着邪。故補散宜並用。溼而兼熱。故滋燥

不可偏。此以六味治陰虛。增入牛膝木瓜薏仁草薢以除溼熱。所謂虛實兼顧也。

內風調

○肢麻頭運。此肝病也。便溲食減。脾亦病矣。宜節勞養氣。毋致風動為佳。

羚羊角 白朮 刺蒺藜 茯苓 炙草

天麻 白芍 廣皮

論按肝脾兩治。方法周到。

○眩暈嘔惡胸滿。小便短而數。口中乾。水虧於下。風動於上。飲積於中。病非一端也。

靜香樓醫案 卷上 內風

八 惜餘小舍

羚羊角 細生地 鈎勾 天麻 茯苓

廣皮 半夏 竹茹

論按病非一端。方卻打成一片。非熟於制方之義者不能擬。再增生牡蠣。

再診 前方去生地 加麥冬

三診 人參 茯苓 麥冬 羚羊角 天麻

半夏 炙草 石斛 廣皮

○肝陰不足。則火動生風。脾失健運。則液聚成痰。調理肝脾。當漸愈也。

半夏 茯苓 廣皮 鈎勾 生地 竹瀝

麻仁汁

論按案屬通論方中宜加用白芍方能顧到肝經再診 和養中氣

人參 陳皮 生穀芽 石斛 茯苓 木瓜

○肝陽化風。逆行脾胃之分。胃液成痰。流走肝膽之絡。右腿麻痺。胸膈痞悶。所由來也。而風火性皆上行。故又有火升氣逆。鼻衄等證。此得之飢飽勞鬱。積久而成。非一朝一夕之故也。治法清肝之火。健脾之氣。亦非旦夕可圖已。

羚羊角 廣皮 天麻 甘草 枳實 半夏

靜香樓醫案

卷上

內風

九

惜餘小舍

茯苓 白朮 麥冬

論按持論明通。立方周匝。看似平淡無奇。實非老手不辦。○亦當加入白芍。

○此肝風挾痰上逆之證。肢冷自汗。有似陽脫。實非脫也。目與唇口牽引。時復歌笑。治宜先卻邪氣。而後養正。

羚羊角 白茯苓 竹茹 鬱金 半夏

甘草 鈎勾 橘紅

論按治法的當。○時復歌笑。是心藏受邪之象。菖蒲遠志。膽星。清心牛黃丸之類。均可選入。

○肝屬風木。性喜衝逆。其變動為振搖強直。其治法宜

柔木熄風

細生地 鈎勾 歸身 茯苓 阿膠 天麻

羚羊角 山藥 柏子仁 刺蒺藜

論按此方可加木瓜白芍

○脾失運而痰生。肝不柔而風動。眩運食少。所由來也。

白朮 天麻 首烏 廣皮 半夏 羚羊角

茯苓 鈎勾

論按案語簡鍊。方亦純淨。

○四肢稟氣於脾胃。脾胃虛衰。無氣以稟。則為振顛。上虛木必搖。故頭運也。

靜香樓醫案

卷上

內風

十

惜餘小舍

歸芍六君子湯加黃耆 天麻

論按案語說理樸實。立方以扶正為主。似宜再加熄風之品。其所加之黃耆。恐非肝風升動者所宜。

○木旺乘土。土氣不宣。痰涎鬱聚。傳走經絡。故頭旋脚弱。有似虛象。實則未可徒補也。

首烏 橘紅 茯苓 薏仁 木瓜 鈎藤

刺蒺藜 半夏 炙草

論按首烏似嫌其瀉。不如用生於朮為安。擬再加牛膝竹瀝薑汁

神志門

○驟雨觸驚神出於舍舍空痰入神不得歸是以有恍惚昏亂等證治當逐痰以安神藏

半夏 膽星 鈎藤 竹茹 茯苓 橘紅
黑梔 枳實

論按敘病如話如畫此等方案非有切實功夫者不能所謂成如容易卻艱辛也

○驚悸易泄腰疼足軟有似虛象而實因痰火蓋脈不弱數形不枯痺未可遽與補也

半夏 炙草 秫米 橘紅 茯苓 竹茹
遠志 石菖蒲

靜香樓醫案卷上 神志 二 惜餘小舍
論按此秘夏合温膽加味也認證既確立方自然入殼

○搖擗厥逆合目則發此肝膽痰熱得之驚恐病名癩厥

半夏 橘紅 竹茹 膽星 炙草 石菖蒲
枳實 茯苓

論按痰火之邪因驚恐而直犯肝膽故見證如此卧則陽氣入於陰合目則發是陽氣擾動陰藏致

痰火猝發而病作也方中擬加羚羊角黃連
○驟驚恐懼手足逆冷少腹氣衝即厥陽縮汗出下元

素虧收攝失司宜乎山陽以鎮納第消渴心悸忽然腹中空洞此風消肝厥見象非桂附剛劑所宜

炒黑杞子 舶茴香 當歸 紫石英 細辛
桂枝

論按風消肝厥之證當於温養中佐以滋陰方中細辛一味不識何意愚意再加牛膝白芍牡蠣

○肝火挾痰上逆為厥顛疾
半夏 鈎藤 茯苓 枳實 廣皮 竹茹
鬱金 羚羊角

論按方極清穩

靜香樓醫案卷上 神志 三 惜餘小舍
○肺飲

紫苑 半夏 桑皮 白前 杏仁

論按飲邪在肺不及於胃故專用肺藥
○飲邪射肺為欬

半夏 杏仁 乾薑 北五味 白芍 炙草
茯苓 桂枝

論按此治飲正法也

○秋冬欬嗽春暖自安是腎氣收納失司陽不潛藏致水液變化痰沫隨氣射肺擾喉喘然不能卧息入夜更

重清晨稍安。蓋痰飲乃水寒陰濁之邪。夜為陰時。陽不用事。故重也。仲景云。飲病當以溫藥和之。金匱飲門。短氣倚息一條。分外飲治脾。內飲治腎。二藏陰陽含蓄。自然潛藏固攝。當以腎氣丸方。減牛膝肉桂。加骨脂以斂精氣。若以他藥發越陽氣。恐有暴厥之慮矣。

腎氣丸減牛膝肉桂 加補骨脂

詒按。此案推闡病原。極其精鑿。

○往昔壯年。久寓閩粵。南方陽氣易泄。中年以來。內聚痰飲。交冬背冷喘嗽。必吐痰沫。胃脘始爽。年逾六旬。惡寒喜暖。陽分之虛亦所應爾。不宜搜逐攻劫。當養少陰。靜香樓醫案 卷上 痰飲 三 惜餘小舍

腎藏仿前輩水液化痰阻氣。以致喘嗽之例。

腎氣丸減牛膝肉桂 加北五味 沈香

詒按。議論明確。立方亦極精當。

○久遺下虛。秋冬欬甚。氣衝於夜。上逆不能安卧。形寒足冷。顯然水泛而為痰沫。當從內飲門治。若用肺藥則謬矣。

桂枝 茯苓 五味 炙草 白芍 乾薑

詒按。古人云。內飲治腎。據此證情。似可兼服腎氣丸。以攝下元。

○肝風與痰飲相搏。內壅藏府。外閉竅隧。以致不寐不

飢。肢體麻痺。迄今經年。脈弱色悴。不攻則病不除。攻之則正益虛。最為棘手。

鈞藤 菖蒲 刺蒺藜 遠志 竹瀝 鬱金

膽星 天竺黃 另指迷茯苓丸臨卧服

詒按。病屬難治。而立方卻周匝平穩。非學有本原者。不能辦此。

○肝陽因勞而化風。脾陰因滯而生痰。風痰相搏。上攻旁溢。是以昏運體痛等證見也。茲口膩不食。右關微滑。當先和養胃氣。蠲除痰飲。俟胃健能食。然後培養陰氣。未為晚也。

靜香樓醫案 卷上 痰飲 四 惜餘小舍

半夏 秫米 麥冬 橘紅 茯苓

詒按。審察病機。以為立方步伐。臨證者宜取法焉。

○風熱不解。襲入肺中。為欬為喘。日晡發熱。食少體倦。漸成虛損。頗難調治。勉擬錢氏阿膠散。冀其肺寧喘平。方可再商他治。

阿膠 茯苓 馬兜鈴 薏米 杏仁 炙草

糯米 芡實

再診 青蒿 丹皮 鱉甲 茯苓 石斛 甘草 歸身 廣皮 白芍

論按此正虛而兼感外邪之證。乃內傷挾外感病也。

○久嗽脈不數。口不乾。未必即成損證。此為肺飲鬱伏不達故也。

厚朴 煨薑 桑皮 杏仁 廣皮 甘草 半夏

論按此屬飲寒傷肺。乃內因之實證也。

○體虛邪滯。肺絡不清。脈弦而細。幸不數耳。

沙參 桑葉 杏仁 茯苓 馬兜鈴 貝母 甘草 杭米

靜香樓醫案 卷上 效喘

五 惜餘小舍

論按案語得看病之竅。最宜留意。

○肺陰不足。肺熱有餘。效則涕出。肌體惡風。此熱從竅泄而氣不外護也。他藏雖有病。宜先治肺。

阿膠 貝母 沙參 馬兜鈴 杏仁 茯苓 炙草 糯米

論按此等證。虛實錯雜。若粗工為之。或與疏散。或與補瀉。均足致損。

○肺病以中氣健旺。能食便堅為佳。茲喘效已久。而大便易澆。能食難運。殊非所宜。診得脈象與前無異。但能節飲食。慎寒煖。猶可無虞。

沙參 貝母 炙草 杏仁 薏仁 橘紅 枇杷葉

又丸方 六味丸加五味子 肉桂

論按不刊之論。讀者最宜記好。

○效嗽食後則減。此中氣虛餒所致。治宜培中下氣法。

人參 半夏 杭米 南棗 麥冬 炙草

枇杷葉

論按此證不甚多見。學者須記之。

○久嗽便澆。脈虛而數。脾肺俱病。培補中氣為要。恐後泄不食。則瘦削日增也。

靜香樓醫案 卷上 效喘

六 惜餘小舍

人參 白芍 扁豆 薏仁 廣皮 茯苓

炙草 山藥 蜜炙炮姜炭

論按此亦脾肺兩治之法。較前數方為切實。亦以此證中氣虛寒。無咽乾渴滿等。虛熱亢炎之證。故

用藥稍可着力耳。然欲求效難矣。

○陰虛於下。陽浮於上。效嗆火升。甚於暮夜。治肺無益。法當補腎。

法當補腎

熟地 杞子 天冬 白芍 茯苓 山藥

丹皮 龜板

論按此方即胡桃五味均可加入。

○乾欬無痰是肝氣衝肺非肺本病仍宜治肝兼滋肺氣可也

黃連 白芍 烏梅 甘草 歸身 牡蠣

茯苓

詒按方中少潤肺之品擬加北沙參桑白皮再肝之犯肺必挾木火梔丹亦應用之藥也

○風傷於上濕傷於下上為欬嗽痰多下為跗腫痠痛宜先治上而後治下

薄荷 杏仁 桔梗 旋覆花 甘草 象貝

運翹 前胡

靜香樓醫案 卷上 欬喘 七 惜餘小舍

詒按肺主一身之治節故以治肺為先

○欬甚於夜間肌熱於午後此陰虧也濁痰欬唾鼻流清涕是肺熱也病本如是奏功不易擬甘鹹潤燥法

阿膠 燕窩 沙參 海浮石 瓜蒌霜 川貝

杏仁 甘草

詒按此證痰必乾黏故用藥如是

○內熱與外熱相合肺胃受之則欬而不能食頭脹肌熱心煩宜清上中二焦

竹葉 蘆根 花粉 杏仁 貝母 知母

桔梗 橘紅

詒按此外感溫燥之欬故專用清泄

○脈細數促是肝腎精血內耗欬必吐嘔清涎濁沫此衝脈氣逆自下及上氣不收納喘而汗出根本先撥藥難奏功醫若見血為熱見嗽治肺是速其凶矣

人參 秋石製 熟地 五味子 紫衣胡桃

詒按此難治之證在欬嗽門中亦別是一種也

○脈虛數額紅聲低欬甚吐食哺時熱升多煩躁此肝腎陰虧陽浮於上精液變化痰沫病已三年是為內損非消痰治嗽可愈固攝下焦必須絕慾以飲食如故經年可望其愈

靜香樓醫案 卷上 欬喘 六 惜餘小舍

都氣丸加女貞子 枸杞子 天冬

詒按用藥頗為切實

○脈微小形寒久嗽失音是氣餒陽損議固胃陽取甘溫之屬

蜜炙生薑 炙草 白芍 黃耆 大棗

詒按此亦虛欬中另一法門

○咽痛聲啞有肺損肺閉之分所謂金破不鳴金實亦不鳴也此證從外感風熱而來當作閉治溫補非宜所慮者邪不外達而內併耳

阿膠 杏仁 桔梗 貝母 牛蒡 元參

阿膠 杏仁 桔梗 貝母 牛蒡 元參

甘草 杭米 馬兜鈴

詒按此錢氏補肺之類乃虛實兼治之法

○用復脈汁潤法。噲止音出。得益水濡潤之力也。無如胃弱便澹。此藥不宜再用。仿金匱麥門冬湯義。取養土之陰。以生肺金。

麥門冬湯

詒按此用藥轉換法也。

○久欬便澹腹滿。脾肺同病。已屬難治。况脈數口乾潮熱。肝腎之陰亦不足耶。

白芍 薏仁 茯苓 蓮肉 炙草 廣皮

靜香樓醫案 卷上 嗽喘 五 惜餘小舍

扁豆

詒按病重藥輕恐難奏效。且於肝腎亦未顧到。擬

加用水泛六味丸一兩。絹包入煎。

○欬而吐沫。食少惡心。動作多喘。中氣傷矣。非清肺治欬所能愈也。

人參 半夏 麥冬 炙草 茯苓 杭米

大棗

詒按此胃虛欬嗽也。方宗金匱大半夏麥門冬兩湯之意。

○欬而嘔。陰不足。火內動也。惡心不食。宜先治胃。

竹茹 杭米 廣皮 石斛 貝母 杏仁

詒按既有火動而嘔見證。宜兼清降。

○浮腫欬喘。頸項強大。飲不得下。溺不得出。此肺病也。不下行而反上逆。治節之權廢矣。雖有良劑恐難奏效。葶藶大棗瀉肺湯

詒按此痰氣壅阻之證。故重用瀉肺之劑。

○脈寸關大而尺小。口乾上氣不下。足冷不溫。此陽氣不潛。當用陰中陽藥治之。

六味丸加牛膝 車前 五味 肉桂

詒按此兼腎氣都氣兩方之意。

靜香樓醫案 卷上 嗽喘 五 惜餘小舍

○脈數減欬亦緩。但浮氣不得全歸根本。宜補益下焦。以為吸受之地。

六味丸加五味子 兔絲子

又丸方六味丸加五味子 杜仲 芡實 蓮鬚

兔絲子 杞子 蜜丸每服五錢

詒按議論穩實。方亦妥帖。

○氣喘足冷至膝。唇口乾。鼻塞。脈虛小。下氣上逆。病在根本。勿以結痰在項而漫用清剋也。

腎氣丸三錢鹽花湯送下

詒按識見老當。

○久欬喘不得臥。顛赤足冷。胸滿上氣。飢不能食。此肺實於上。腎虛於下。脾困於中之候也。然而實不可攻。姑治其虛。中不可燥。姑溫其下。且腎為胃關。火為土母。或

金匱腎氣丸

治按擬再用旋覆代赭湯送下。則上中兩層亦可關會矣。

○兩寸浮大。關尺沈小。氣上而不下。喘欬多痰。肝腎之氣上衝於肺。宜以腎氣丸補而下之。

腎氣丸

靜香樓醫案 卷上 欬喘

惜餘小舍

治按此治本之法。

○下虛上實。當治其下。勿清其上。真氣歸元。痰熱自降。宜以十味腎氣丸主之。

十味腎氣丸

治按識見卓老。

失血門

○絡熱血溢。時氣所觸。非陰虛火浮之比。慎勿以滋膩治也。

荆芥 丹皮 羌蔚子 丹參 鬱金 藕汁

細生地 小蘗炭

治按勘證用藥。老眼無花。

○吐血得勞與怒。即發。脈小數微喘。病在肝心。得之思慮勞心。宜早圖之。勿使延及肺家則吉。

阿膠 丹皮 牛膝 丹參 小蘗炭 三七 藕汁 童便

治按此治吐血之正法。能止血而無留瘀之弊。最為穩當。

再診 前方去丹參三七。藕汁童便。加生地。

白芍 羌蔚子

又丸方 六味丸加阿膠 五味子 小蘗炭

靜香樓醫案 卷上 失血

惜餘小舍

蓮鬚 水泛丸

○失血欬逆。心下痞滿。暮則發厥。血色黯。大便黑。肝脈獨大。此有瘀血積留不去。勿治其氣。宜和其血。

製大黃 白芍 桃仁 甘草 當歸 丹皮 降香

治按此專治瘀積之法。

○病後失血。色紫黑不鮮。此係病前所蓄。胸中尚滿。知瘀猶未盡也。正氣雖虛。未可驟補。宜順而下之。

小蘗炭 赤芍 生地 犀角 鬱金 丹皮 羌蔚子 童便

詒按此必尚有鬱熱見證故方中用犀角既有留
痰未盡可加醋炙大黃炭

○凡有瘀血之人其陰已傷其氣必逆茲吐血紫黑無
多而胸中滿悶痰猶未盡也而舌絳無苔此陰之虧也
嘔吐不已則氣之逆也且頭重足冷有下虛上脫之慮
惡寒譫語為陽弱氣餒之徵此證補之不投攻之不可
殊屬棘手

人參 茯苓 三七 吳萸 烏梅 牡蠣

川連 鬱金

詒按論病則層層俱透用藥亦步步着實此為高

靜香樓醫案

卷上

失血

重

手

○失血後氣從下逆上足冷頭熱病在下焦真氣不納

六味丸加五味 牛膝 牡蠣

詒按方亦妥當若再進一層可用金匱腎氣法以
導火下行

○血去過多氣必上逆肺被其衝故作欬嗽此非肺自
病也觀其衝氣甚則欬甚衝氣緩則欬緩可以知矣擬
攝降法先治衝氣

金匱腎氣丸去肉桂 加牡蠣

詒按認證獨的法亦老當

○脈寸靜尺動屢經失血覺氣從下焦上衝則喘勞動
則氣促不舒此病不在肺而在腎治嗽無益宜滋腎陰

熟地 天麻 牡蠣 茯苓 杞子 黃肉

五味子

詒按病與上條相同方中用天麻不知何意

○心脈獨大且乾易汗善怒血逆此心陰不足心陽獨

亢宜犀角地黃湯

犀角地黃湯加茅根 甘草 山梔

詒按方案均精簡熨帖

○痰中有血點散漫此心病也口乾心熱當是傷暑因

暑喜歸心故耳

靜香樓醫案

卷上

失血

重

惜餘小舍

生地 茯神 扁豆 甘草 丹皮 竹茹

麥冬 藕汁

詒按方法清靈可喜

○葛可久論吐血治法每於血止痰消之後用獨參湯

以益心定志茲以陰藥參之慮其上升而助肺熱也

人參 沙參 生地 阿膠 牛膝 茯苓

詒按此失血後服人參一定之法

○勞傷失血心下痛悶不當作陰虛證治但脈數欬嗽

潮熱恐其漸入陰損一途耳

生地 桃仁 查炭 鬱金 赤芍 製大黃

甘草 丹皮

論按此證如早服補劑則留瘀化熱最易致損須看其虛實兼到絕不犯手

○陰不足而陽有餘肝善逆而肺多鬱脈數氣喘欬逆見血脇痛治宜滋降更宜靜養不爾恐其血逆不已也

小生地 荆芥炭 白芍 童便 鬱金 藕汁

小蘗炭

論按此亦氣火上逆之證可加牛膝丹皮

○離經之血未淨而鬱於內寒熱之邪交煽而亂其氣

靜香樓醫案

卷上 吐血

惜餘小舍

是以腹滿嘔泄寒熱口燥治當平其亂氣導其積血元氣雖虛未可驟補也

丹皮 查炭 澤蘭 赤芍 鬱金 丹參

牛膝 小蘗

論按此證挾外感之邪可加荆芥炭黑穉豆衣

○久欬見血昏痛咽痛乍有寒熱此風寒久伏傷肺成勞擬錢氏補肺法聲出則佳

阿膠 杏仁 馬兜鈴 牛蒡 薏仁 貝母

糯米

又膏方 阿膠 貝母 甘草 橘紅 杏仁

蘇子 米糖 白蜜 薑汁 紫苑 木通

梨汁 桔梗 牛膝 蘿蔔汁 茯苓

論按此正虛邪實之證用藥能兩面兼顧尙稱穩適

虛損

○虛損至食減形瘦當以後天脾胃為要異功散五六服頗得加穀今春半地氣上升肝木用事熱升心悸汗出復欬欬甚見血肝陽上熾絡血遂沸昨進和陽養陰之劑得木火稍平仍以前方加白芍制肝安土

生地 白芍 麥冬 阿膠 女貞子 甘草

靜香樓醫案

卷上 虛損

美 惜餘小舍

論按方亦穩合可加牡蠣丹皮

○羅氏論虛勞之證多因邪伏血鬱而得不獨陰虧一端也臨晚寒熱時減時增其為陽陷入陰可知滋腎生肝最為合法略加損益不必更張也

熟地 白芍 茯苓 丹皮 山藥 柴胡

炙草 鱉甲

論按於養陰中加柴胡以達邪佐鱉甲以搜陰虛實兼到極為靈巧然既云邪伏血鬱似宜加當歸

再診 熱漸減頭中時痛脈數不退喉中痰滯不清

青蒿 丹皮 熟地 鱉甲 炙草 牛膝

茯苓 小麥

論按似當兼清痰滯。○兩方中熟地。不如改用生地為穩。

三診 體雖不熱。脈仍細數。宜養陰氣。

六味丸去黃肉澤瀉 加白芍 牛膝

青蒿 鼈甲

○面鰲形瘦。脈虛而數。欬嗽氣促。腰膝無力。大便時溏。此先後天俱虛。慮其延成虛損。清潤治肺之品。能戕中氣。勿更投也。

紫河車 熟地 山藥 黃肉 五味子 丹皮

靜香樓醫案

卷上

虛損

毛

惜餘小舍

茯苓 杜仲 澤瀉 牛膝 加蜜丸每服五錢

論按案語得治虛要旨。方亦精當。

○絡脈空隙。氣必游行作痛。最慮春末夏初。地中陽氣上升。血隨氣溢。趁此網繆。當填精益髓。蓋陰虛欬嗽。是他藏累及於肺。若治以清涼。不獨病不去。而胃傷食減。立成虛損。難為力矣。

熟地 金櫻子膏 鹿角霜 五味子 湘蓮子

黃肉 山藥 茯苓 海參 漂淨熬膏

右為細末。即以二膏搗丸。

論按此必有遺精腰痠等證。故用藥亦不重在欬。

嗽也。

攝為當。

○汗山偏沮。肝來不柔。時自歇止。知肝陽有餘。而胃陰不足。於是稠痰濁火。擾動於中。壅滯於外。目前雖尙安和。然古人治未病。不治已病。知者見微。知者須加意調攝為當。

人參 川石斛 麥冬 南棗 製半夏 丹皮

茯苓 炙草 小麥

論按此想係左半有汗。右半無汗之證。細釋案語。是防其將患偏非之意。

靜香樓醫案

卷上

汗

天

惜餘小舍

○心陰不足。心陽易動。則汗多善驚。腎陰不足。腎氣不固。則無夢而泄。以汗為心液。而精藏於腎故也。

生地 茯神 甘草 麥冬 川連 柏子仁

元參 小麥 大棗

論按案語心腎並重。方藥似專重於心。再加五味子牡蠣沙苑等。攝腎之品。則周匝矣。

諸虛門

○中年脫胃。多嘔多欬。此氣鬱不解也。納穀已減。未可破泄耗氣。宜從胸痺例。微通上焦之陽。

薤白 瓜蒌 半夏 桂枝 茯苓 薑汁

詒按方法輕靈

鬱氣凝聚喉間吞不下吐不出梅核氣之漸也

半夏 厚朴 茯苓 蘇梗 旋覆花 橘紅

枇杷葉 薑汁

詒按此於金匱成方中加旋覆杷葉最有巧思

寒熱無期中腕少腹遽痛此肝藏之鬱也鬱極則發為寒熱頭不痛非外感也以加味逍遙散主之

加味逍遙散

詒按此木鬱達之之法

病從少陽鬱入厥陰復從厥陰逆攻陽明寒熱往來

靜香樓醫案

卷上

諸鬱

完

惜餘小舍

色青顛頂及少腹痛此其候也泄厥陰之實顧陽明之虛此其治也

人參 柴胡 川連 陳皮 半夏 黃芩

吳萸 茯苓 甘草

詒按此從左金逍遙化裁而出若再合金鈴子散似更周到

此血鬱也得之情志其來有漸其去亦不易也

旋覆花 薤白 鬱金 桃仁 代赭石 紅花

詒按此必因血鬱而絡氣不通有胸膈板痛等見證故立方如此

嘔噦門

胃虛氣熱乾嘔不便

橘皮竹茹湯 加蘆根 粳米

再診 嘔止熱退

石斛 茯苓 半夏 廣皮 麥冬 粳米

蘆根 枇杷葉

三診 大便不通

生首烏 元明粉 枳殼

四診 大便通脈和惟宜滋養

石斛 歸身 秦朮 白芍 丹皮 炙草

靜香樓醫案

卷上 嘔噦

三

惜餘小舍

茯苓 廣皮

詒按迭用四方運意靈巧自能與病機宛轉相赴

下既不通勢必上逆而為嘔所謂幽門之氣上衝吸門是也治法自當療下但脈小目陷中氣大傷宜先安中止嘔嘔定再商

人參 茯苓 刺藜 竹茹 半夏 廣皮

蘆根 石斛

詒按似當兼通幽門乃能止嘔擬加生枳實

痛嘔之餘脈當和緩而反搏大頭運欲嘔胸滿不食神倦欲臥慮其土墮木張漸致痙厥法當安胃清肝亦

古人先事豫防之意

半夏 茯苓 廣皮 白風米 鈎藤 竹茹
枇杷葉 鮮佛手

詒按議論極是。但恐藥力不足以濟之。然方卻清穩。○所謂清肝者。只不過鈎藤竹茹而已。擬再加木瓜白芍。較似有力。

○病從肝起。繼乃及胃。茲又及於肺矣。然當以胃氣為要。久病之體。必得安穀不嘔。始可圖功。

石斛 蘆根 茯苓 麥冬 廣皮 木瓜
枇杷葉 杭米

靜香樓醫案 卷上 嘔噦 三 惜餘小舍

詒按敘病簡要。非續學者不能。方亦中窾。

○胃有火邪。故嘔而不食。膽有熱邪。故合目自汗。

橘皮竹茹湯 加石斛

詒按山梔必不可少。以其專清膽熱故也。川連亦在應用之列。

再診 前方去石斛。加木瓜。

○嘈雜得食則已。此痰火內動。心胃陰氣不足。

生地 山梔 半夏 麥冬 茯苓 丹皮
竹茹 炙草

詒按陰虛而挾痰者。用藥最難。恰好。方中可加石

斛廣皮

○痰氣阻逆。咽喉時自嘔惡。此證利在清降。失治則成噎隔。

半夏 枇杷葉 旋覆花 竹茹 茯苓 麥冬
橘紅 鬱金 生薑

詒按用藥靈動。

○氣鬱痰凝。阻隔胃脘。食入則噎。脈瀆難治。

旋覆花 代赭石 橘紅 半夏 當歸 川貝
鬱金 枇杷葉

詒按旋覆代赭為噎隔正方。食入則噎。肺氣先鬱。

靜香樓醫案 卷上 嘔噦 三 惜餘小舍

故加鬱貝枇杷葉。惟脈瀆者正虛。可加人參。

○脈疾徐不常。食格不下。中氣大衰。升降失度。

旋覆花 代赭石 麥冬 茯苓 半夏 廣皮
人參 枇杷葉

詒按此因中氣大傷。故用人參。

○朝食暮吐。肝胃克賊。病屬反胃。

旋覆花 代赭石 茯苓 半夏 吳萸 生薑
杭米 人參 枇杷葉

詒按此專治吐。故加薑萸。

○穀之不入。非胃之不納。有痰飲以阻之耳。是當以下

氣降痰為法代赭之用先得我心矣。

旋覆代赭湯

詒按識既老當筆亦爽健。

○因氣生痰痰凝氣滯而中焦之道路塞矣。由是飲食不得下行津液不得四布不飢不食口燥便堅心悸頭運經兩月不愈以法通調中氣庶無噎隔腹滿之慮。

旋覆代赭湯加石菖蒲 枳實 陳皮

詒按論病則源流俱澈用藥則標本兼到細膩熨帖傳作何疑。

○中氣叠傷不能健運朝食暮吐完穀不腐診得脈虛

靜香樓醫案

卷上

嘔噦

三 惜餘小舍

色黑腰脚少力知不獨胃病腎亦病矣此豈細故哉。

人參 附子 川椒 茯苓 益智仁

再診 前方去川椒益智 加川連 肉桂

詒按完穀不腐色黑腰軟腎傷之徵也改方加桂連是交濟法。

門入趙樹誠同校 族弟寶慶

評選靜香樓醫案卷下

長洲尤 怡在涇著

江陰柳寶詒穀孫選評

及門諸子 參校

伏氣論

○肝陰素虧溫邪擾之發為瘧病神昏齖齒瘧症不定法當滋養肝陰以榮筋脈清滌痰熱以安神明者也若能應手尚可無慮。

羚羊角 茯神 鈎藤 貝母 阿膠 鮮菖蒲

竹瀝

靜香樓醫案

卷下 伏氣

一 惜餘小舍

詒按此證若表邪未解當去阿膠加小生地或鮮生地。

又按此係伏氣發溫之證與外感風溫有外內之別此證邪由少陰外發潰入厥陰故見證如此羚羊角鈎藤熄風清熱皆治標之品也若圖其本當從陰分托邪俾得外達三陽再與隨經清泄乃奏全功病原治法詳載溫熱逢原中茲不贅述。

○熱傷津液脈細口乾難治

蘆根 知母 川斛 蔗漿 細生地 麥冬 甘草 梨汁

詒按此存陰泄熱之正法。所云難治。想因脈細之故。

○熱不止。頭痛不已。紫斑如錦紋。咽痛表裏邪盛。最為重證。

犀角 豆豉 赤芍 元參 牛蒡 丹皮 黃芩 甘草

詒按當加鮮生地

再診 去豆豉丹皮 加桔梗 鮮生地 射干

○熱病十二日不解。舌絳口乾。胸滿氣促。邪火為患。亦已甚矣。宜景岳玉女煎清熱而存陰。否則神識昏冒矣。

靜香樓醫案

卷下 伏氣

二

惜餘小舍

鮮生地 石膏 麥冬 知母 竹葉 甘草

詒按此氣血兩燔之治法。

○熱病四日。不汗而舌黃。腹中痛下利。宜先裏而後表。不爾恐發狂也。

大黃 柴胡 枳實 厚朴 赤芍

詒按先裏後表。因裏證已急。於病機固當如是。

○舌乾脈數。汗為熱隔。雖發之亦不得。惟宜甘寒養液。雖不發汗。汗當自出。然必足溫而後熱退乃吉。

青蒿 知母 蘆根 生地 蔗漿 竹葉 詒按養液以為作汗之源。是治溫要旨。

外感門

○頭面腫痛。此風邪上盛。宜辛涼解散。

荆芥 杏仁 桔梗 牛蒡 薄荷 甘草 馬勃 蒼耳子

○風溫挾痰。留滯上焦。辛涼解散。原為合法。時至自解。不足憂也。

牛蒡 連翹 薄荷 川貝 豆豉 杏仁 桔梗 葱白

詒按此風溫初起之方。

○風溫鬱於肺胃。欬而胸滿痰多。脇下痛。脈數口乾。

前香樓醫案 卷下 外感 三 惜餘小舍 蘆根 薏米 瓜蒌 甘草 杏仁 紅花

桃仁 貝母

詒按桃仁紅花。因脇痛而用之。以和血絡也。若邪鬱可加豉。口乾可加翹。芥。

○脈右大舌黃不渴。嘔吐黏痰。神躁語言不清。身熱不解。此勞倦內傷。更感溼溫之邪。須防變端。

厚朴 茯苓 滑石 陳皮 竹葉 蔻仁 菖蒲根汁

詒按此溫邪而挾溼者。溼熱上蒙。故證情如是。此方可以為法。

濕病

○臍中時有濕液腥臭。按脈素大。此少陰有濕熱也。六味能除腎間濕熱。宜加減用之。

六味丸去山藥 加黃蘗 葶藶 女貞子 車前子

論按六味治腎間濕熱。前人曾有此論。借以治臍中流液。恰合病機。

瘧疾

○暑風成瘧。惡心胸滿。和解則愈。

半夏 黃芩 茯苓 知母 厚朴 陳皮

竹葉 生薑

靜香樓醫案

卷下 瘧疾

四

借餘小舍

論按小柴胡法之和解。和其表裏兩岐之邪也。此

之和解。和其濕熱兩混之邪也。薑夏朴廣去其濕

也。芩知竹葉清其熱也。兩意兼用。故亦云和解也。

又按此濕熱並重者。故清燥兼用。此與下條皆暑

濕內伏發為時瘧之病。苦辛宣泄。最為合法。若拘拘

於瘧疾之成方。概用柴胡。則誤矣。

○暑風相搏。發為時瘧。胸滿作噦。汗不至足。邪氣尚未

清解。當以苦辛溫法治之。

藿香 半夏 杏仁 通草 厚朴 廣皮 竹葉

論按此濕重於熱者。故用藥稍偏溫燥。

○瘧發而上下血溢。責之中虛。而邪又擾之也。血去既多。瘧邪尚熾。中原之擾。猶未已也。誰能必其血之不復來耶。謹按古法。中虛血脫之證。從無獨任血藥之理。而瘧病經久。亦必固其中氣。茲擬理中一法。止血在是。止瘧亦在是。惟高明裁之。

人參 白朮 炮薑 炙草

論按識見老確。議論精切。所立理中一法。誠屬血脫益氣固中止血之要藥。惟愚意所欲商者。瘧來而上下血溢。必因瘧疾之熱。擾及血絡。而然於理中法內。參用安營清絡之意。似乎更為周到。且標

靜香樓醫案

卷下 瘧疾

五

借餘小舍

本兼顧於立方正意。亦不相刺謬也。

○三瘧是邪伏陰分而發。非和解可愈。久發不止。補劑必兼升陽。引伏邪至陽分乃愈。

人參 歸身 鹿角膠 杞子 鹿茸 附子

茯苓 沙苑

論按陰瘧本有此法。而不能概用此法。須相題為之。

○瘧病方已。遂得脾約。脾約未已。又增厥疼。心腹時滿。時減。或得身熱汗出。則疼滿立止。明係瘧邪內陷於太陰陽明之間。是必邪氣仍從少陽外達。則不治疼而疼

自止。不治脹而脹自消矣。

詒按論病已得受領。惜方佚未見。

○瘡後脇下積癖作疼。夜熱口乾。溺赤陰虛邪伏。宜龍
甲煎。

龍甲 白芍 青皮 丹皮 首烏 柴胡
知母 炙草

詒按此邪伏陰分之治法。當歸亦可加入。

○瘡後脇下積痞不消。下連小腹作脹。此肝邪也。當以
法疏利之。

人參 柴胡 青皮 桃仁 茯苓 半夏
甘草 牡蠣 黃芩 生薑

詒按此小柴胡法也。加青皮以疏肝。桃仁以和瘀。
牡蠣以軟堅。用意可云周到。惟小腹作脹。乃肝邪
下陷之證。若再加川棟子歸尾延胡似更完密。

○瘡止復發。汗多作嘔。中氣虛逆。宜益陽明。
半夏 茯苓 廣皮 人參 石斛 蘆根 薑汁

再診 寒熱已止。汗嘔並減。宜和養營衛。
人參 桂枝 石斛 廣皮 歸身 炙草
麥冬 白芍

詒按此膏梁虛體治法。兩方俱清穩熨帖。

黃疸門

○面黑目黃。脈數而微。足寒至膝。皮膚爪甲不仁。其病
深入少陰。而其邪則仍自瀆濕得之。及女勞也。

腎氣丸

詒按此證載在金匱。近於愛廬醫案中。見一方甚
佳。○此病兼有瘀血。不但濕也。腎氣丸能否見效。
尙未可定。

○面目身體悉黃。而中無痞悶。小便自利。此仲景所謂
虛黃也。即以仲景法治之。

桂枝 黃耆 白芍 茯苓 生薑 炙草
靜香樓醫案 卷下 黃疸 七 借錄小舍

大棗

詒按案明藥常。
○濕停熱聚。上逆則咽隘不利。外見則身目為黃。下注
則溺赤而痛。

茵陳 厚朴 豆豉 木通 猪苓 橘紅
茯苓 黑梔

詒按論病能一綫穿成。用藥自絲絲入籠。
又按咽隘不利。可加桔梗前胡之類。

痺氣門

○胷背為陽之分。痺着不通。當通其陽。蓋陽不外行而

鬱於中則內反熱而外反寒通陽必以辛溫而辛溫又礙於藏氣擬辛潤通肺以代之

紫苑三兩煎湯服

詒按此巧法也特未知效否若何

○濕邪鬱遏陽氣不宣外寒裏熱胸滿溺赤宜開達上焦

紫苑 桔梗 鬱金 白蔻 枳殼 杏仁

貝母 甘草

詒按此治肺痺之正法

○氣窒不散便閉喘急不能偃卧猝難消散也

靜香樓醫案 卷下 痺氣 入 惜餘小舍

紫苑 葶藶 厚朴 杏仁 橘紅 鬱金

枳殼

詒按此證較前更急兼有便閉故用藥從中焦泄

降

再診 大黃 厚朴 檳榔 枳殼 杏仁

詒按輕劑不效故更與通腑以泄肺

○胸中為陽之位陽氣不布則窒而通宜溫通不宜清開愈開則愈窒矣

桂枝 茯苓 乾薑 炙草 益智仁

詒按再參入開痺之品如杏苑橘桔等似更靈動

○食入則胸背痞塞作脹噫氣不舒此陽氣不通宜辛通之法

草蔻仁 半夏 桂枝 茯苓 乾薑 炙草

詒按此證亦與胸痺相似

腸腹痛

○虬厥心痛痛則嘔吐酸水手足厥冷宜辛苦酸治之

川連 桂枝 歸身 延胡 烏梅 川椒

茯苓 川棟子 炮薑

詒按此烏梅丸法也

○此腎厥也心疼背脹引及腰中議用許學士香茸丸

靜香樓醫案 卷下 脫腹痛 九 惜餘小舍

鹿茸 杞子 沙苑 大茴香 麝香

詒按寒襲於腎而氣上逆故用溫養脹及腰背者

督陽不用也鹿茸溫通督脈麝香開泄濁陰故以

之為君

○脈絛小腹痛食後胃脘痛上至咽喉肝火乘胃宜泄

厥陰和陽明

川棟子 木通 茯苓 甘草 石斛 木瓜

詒按擬加延胡山梔仁

○心腹痛脈絛色青是肝病也

川棟子 歸身 茯苓 石斛 延胡 木瓜

治按立方穩合

痲癖

○臍下積塊。捫之則熱。病者自言前後二陰俱覺熱痛。其為熱結可知。况自來之病。皆出於肝耶。鄙見非泄厥陰不能獲效。

龍薈丸五十粒酒下

○絡病痲痺。左脇板實。前年用蟲蟻通血。升降開發已效。但胸腕似是有形。按之微痛。前藥太峻。茲用兩調氣血以緩法圖之。

醋炒延胡 薑黃 阿魏 桃仁 生香附

靜香樓醫案

卷下 痲癖

十一 借餘小舍

麝香 歸鬚 為末蜜丸每服二錢

治按承前方來。雖曰兩調氣血而仍以疏瘀為主。○脈虛數。色白不澤。左脇有塊。杯大。大便小便自利。病在肝家。營血不和。此為虛中有實。補必兼通。

白朮 歸身 炙草 白芍 生地 茯苓

琥珀 廣皮 桃仁 紅花 沉香 鬱金

治按方治親切不膚

○時病食復。至今不知飢飽。大便不爽。右脇之旁。虛里天樞隱有形。此陽明胃絡循行之所。多噯氣不化。並不煩渴。豈是攻消急驅實熱之證耶。擬用丹溪泄木安

土法

小溫中丸 如半月後有效。仍以前法。

治按此中焦濕積阻結之證。

○左脇積塊。日以益大。按之則痛。食入不安。凡痞結之處。必有陽火鬱伏於中。故見煩躁口乾心熱等證。宜以苦辛寒藥清之。開之。然非易事也。

川連 枳實 香附 川芎 神麴 茯苓

青皮 赤芍

治按脇塊有形益大。則營絡必窒。似宜兼通乃效。

○大腹右有形為聚。脈大食入即作脹。治在六府。

靜香樓醫案

卷下 痲癖

十一 借餘小舍

白朮 茯苓 廣皮 生香附汁 三稜 厚朴

草果 山查

治按方以疏通氣分為主。

○心下高突。延及左脇有形。漸加腹脹。思正月暴寒。口鼻吸受冷氣。入胃絡膜原。清陽不用。濁陰凝阻。胃氣重傷。有單腹之累。殊非小恙。

厚朴 草果 半夏 乾姜 茯苓 藜蘆

另蘇合香丸一粒化服

治按寒邪閉於營絡。故用溫通方中可加桂枝。

腫脹

○脈遲胃冷腹脹氣攻胸脇惡心少食泄瀉宜振脾胃之陽。

乾薑 益智仁 半夏 厚朴 神麴 檳榔 川椒 茯苓

論按此溫中調氣法也。

○命門陽衰脾失溫養不克健運食入輒脹法當溫補下焦。

腎氣丸去桂 加沉香椒目

論按此補火生土之法。

○濕熱內陷太陰而成脹。

靜香樓醫案 卷下 腫脹 三 惜餘小舍

茅朮 川藜 厚朴 陳皮 桑皮 木通

澤瀉 大腹皮 草果仁

論按此專治脾土濕熱古方小溫中丸亦可服。

○脈微遲左脇宿痞腹漸脹大便溏溺少此是濁陰上攻當與通陽。

熟附子 遠志 椒目 小茴香 澤瀉 茯苓

論按此溫通治脹之正法。

○脾氣本弱而更受木尅則益弱矣由是脾健失職食入不消遂生脹滿脾愈弱則肝愈強時時攻逆上下有聲半載之疾年逾六旬非旦夕可圖也。

人參 茯苓 川棟子 查核 甘草 木瓜 白芍 吳萸 橘核

論按此肝脾兩治而偏重於肝者以其不特脹滿而兼有攻逆之證也。

○脈絃中滿病在肝脾。

人參 吳萸 木瓜 厚朴 廣皮 半夏

論按此肝脾兩治之正法立方精簡可法。

○右關獨大而搏指知病在中焦飲食不化痞悶時痛積年不愈喉間自覺熱氣上衝口乾作苦舌苔白燥此脾家積熱鬱濕當以瀉黃法治之。

靜香樓醫案 卷下 腫脹 三 惜餘小舍

茅朮 葛根 茯苓 石膏 藿香 木香

論按此病滿門中不常見之證存之以備一格。

○脈證合參乃氣結在上津不運行蒸變濁痰由無形漸變有形徐之才謂輕可去實非膠固陰藥所宜。

白蔻 薏仁 杏仁 厚朴 枇杷葉汁 降香汁

論按此方具有輕清靈三字之妙。

○勞鬱交傷營衛不和胸中滿痛時有寒熱與六淫外感不同治宜和養氣血。

逍遙散

論按再增枳朴等寬中之品則更周到矣。

○脾以健運為職。心下痞不能食。食則滿悶。脾失其職矣。但健運之品。迂緩無功。宜以補瀉升降法治之。

人參 乾薑 半夏 茯苓 川連 枳實

陳皮 生薑

論按此方仿瀉心法加味。

○脇下素有痞氣。時時衝逆。今見中滿。氣攻作痛。吞酸嘔吐。能俯而不能仰。此厥陰鬱滯之氣。侵入太陰之分。得之多怒且善鬱也。病久氣弱。不任攻達。而病氣久鬱。亦難補養。為掣肘耳。姑以平調肝胃之劑。和之。痛定食進。方許萬全。

靜香樓醫案

卷下 腫脹

五

惜餘小舍

半夏 廣皮 川棟子 橘核 茯苓 青皮

炙甘草 木瓜

論按。審察病機。至為精細。立方亦周到熨帖。

○胃陽衰憊。氣阻痰凝。中脘不快。食下則脹。宜辛溫之品治之。

草果仁 厚朴 茯苓 半夏 甘草 檳榔

論按此溼痰阻遏中宮之證。

○熱結氣閉。腹脹便難。

厚朴 杏仁 滑石 黃芩 大腹皮 茯苓皮

木通

論按此運中兼泄熱法也。
○腹脹面浮跗腫。食不下欲嘔。脾虛受溼。健運失常。非輕證也。

茅朮 茯苓 廣皮 桑皮 木通 厚朴

澤瀉 半夏 猪苓

論按此運中利溼法也。

○面黑目黃。腹滿足腫。囊腫溼熱壅滯。從脾及腎。病深難治。

蒼朮 製軍 厚朴 陳皮 木通 茵陳

猪苓 椒目 澤瀉

靜香樓醫案

卷下 腫脹

五

惜餘小舍

論按邪機壅滯。正氣已傷。故云難治。

○卧則喘息有音。此腫脹乃氣壅於上。宜用古人開鬼門之法。以治肺通表。

麻黃 杏仁 薏仁 甘草

論按此兼喘逆。故專治肺。

○風溼相搏。面浮腹滿。足腫大小便不利。

杏仁 蘇子 厚朴 陳皮 猪苓 大腹皮

薑皮 木通

論按此表裏兩通法也。

○腫脹之病。而二便如常。肢冷氣喘。是非行氣逐水之

法所能愈者矣。當用腎氣丸行陽化水。然亦劇病也。

腎氣丸

論按此病陽衰氣窒。不治之證也。

頭痛門

○火升頭痛耳鳴。心下痞滿。飯後即發。此陽明少陽二經痰火交鬱。得食氣而滋甚。與陰虛火炎不同。先與清理。繼以補降。

竹茹 茯苓 橘紅 炙草 半夏 羚羊角

石斛 嫩鈎藤鈎

論按案語分析病機極其圓到。惟立方似未恰合。

靜香樓醫案

卷下 頭痛

共 惜餘小舍

陽明藥少宜加知母枳實。

○頭疼偏左耳重聽目不明脈寸大尺小風火在上始為清解。

羚羊角 生地 甘草 菊花 丹皮 石決明

連翹 薄荷

論按此內風而兼外感者。故清散兼施。

○風熱上甚頭痛不已。如鳥巢高巔宜射而去之。

製軍 犀角 川芎 細茶

論按此雖前人成法。而選藥頗精簡。○據此則大黃當用酒炒以使之上行。

肢體諸痛門

○風邪中入經絡。從肩膊至頂強痛。舌乾唇紫而腫。痛處如鍼刺之狀。此是內挾肝火。不宜過用溫散。惟宜養陰熄肝火而已。

羚羊角 細茶 甘菊 黃芩 鈎鈎 秦朮

丹皮

論按因唇紫舌乾。故知內挾肝火。方中黃芩。不若山梔為當。

○頂背痛如刀割。治宜養血通絡。

桂枝 鈎藤 白芍 知母 羚羊角 阿膠

靜香樓醫案

卷下 肢體諸痛

共 惜餘小舍

炙草 生地

論按擬去知母。加歸鬚刺蒺藜絲瓜絡。

○身半以上痛引肩臂。風溼在於太陰之分。行動則氣促不舒。胸膈高起。治在經絡。

大活絡丹

論按擬用旋覆新絳湯送下。

○脾腎寒溼下注。石膝腫痛。而色不赤。其脈當遲緩而小。促食少輒嘔。中氣之衰亦已甚矣。此當以和養中氣為要。腫痛姑置勿論。蓋未有中氣不復而膝得愈者也。人參 半夏 木瓜 炒秫米 茯苓 廣皮

益智仁

詒按、議論明通。

○背脊為督脈所過之處。風冷乘之。脈不得通。則惡寒而痛。法宜通陽。

鹿角霜 白芍 炙草 桂枝 歸身 半夏

生薑 南棗

詒按、方中半夏無所取義。擬再加杜仲狗脊以通陽。

○身痛偏左。血不足。風乘之也。

半夏 秦朮 歸身 廣皮 茯苓 丹參

靜香樓醫案 卷下 肢體諸痛 六 惜餘小舍

川斷 炙草

詒按、案只一二句。却有簡逸之致。

○久欬脇痛。不能左側。病在肝。逆在肺。得之情志難。以驟驅。治法不當求肺。而當求肝。

旋覆花 丹皮 桃仁 鬱金 狸絳 甘草

牛膝 白芍

詒按、審證用藥。巧力兼到。○擬再加青皮桑皮紫蘇山梔瓦楞子殼。

○脇疼遇春即發。過之即止。此肝病也。春三月肝木司令。肝陽方張。而陰不能從。則其氣有不達之處。故痛。夏

秋冬肝氣就衰。與陰適協。故不痛也。

阿膠 白芍 茯苓 丹皮 茜草 炙草

鮑魚湯代水

詒按、樸實說理。絕無躲閃。方用膠芍鮑魚。滋肝配陽。亦覺妥帖易施。

○風氣乘虛入於腎絡。腰中痛引背脇。宜寄生湯補虛通絡祛風。

生地 歸身 黑豆 獨活 山藥 白蒺藜

杜仲 炙草 桑寄生

詒按、立方妥帖。層折俱到。

靜香樓醫案 卷下 肢體諸痛 六 惜餘小舍

○脈數耳鳴吐痰。天柱與腰膝痠痛。兩足常冷。病屬陰虧。陽升。法當填補實下。

熟地 鹿角霜 兔絲子 山藥 萸肉 杞子

龜板膠

詒按

○風熱著於腦髓。發為鼻淵。五年不愈。此壅疾也。壅則宜通。不通則不治。

犀角 蒼耳子 黃芩 鬱金 杏仁 蘆根

詒按、既欲其通。則辛夷白芷似不可少。

○肺之絡會於耳中。肺受風火。久而不清。竅與絡俱為

之閉所以鼻塞不聞香臭耳聾耳鳴不聞音聲也茲當
清通肺氣

蒼耳子 薄荷 桔梗 連翹 辛夷 黃芩

山梔 杏仁 甘草 木通

詒按語云耳聾治肺觀此信然

○少陽之脈循耳外走耳中是經有風火則耳聾而鳴
治宜清散

薄荷 連翹 甘菊 芍藥 黃芩 刺蒺藜

甘草 木通

詒按案既老當方亦清靈

靜香樓醫案

卷下 諸藪

三

借餘小舍

○腎虛齒痛入暮則發非風非火清散無益

加減八味丸 每服三錢鹽花湯下

詒按立方精到

脚氣門

○厥陰之邪逆攻陽明始為腫痛繼而腹疼胸滿嘔吐
此屬脚氣衝心非小恙也擬外臺法治之

犀角 檳榔 茯苓 枳實 杏仁 橘紅

半夏 木通 木瓜

再診 半夏 木瓜 廣皮 蘆根 枳實 茯苓

竹茹 枇杷葉

詒按脚氣一證前人歸入類傷寒中必憎寒壯熱
病與傷寒相似甚則有衝心之患故謂之重證外
臺有大犀角湯及風引湯後人有雞鳴散等方均
為專治脚氣之重劑乃今時所謂脚氣者則以脚
膝痠爽而腫者謂之溼脚氣不腫者謂之乾脚氣
專用防己木瓜牛膝薏米等風溼之藥治之與前
人所稱者大相逕庭學者不可不辨

遺精門

○遺精無夢小勞即發飢不能食食多即脹面白唇熱
小便黃赤此脾家溼熱流入腎中為遺滑不當徒用補

靜香樓醫案

卷下 遺精

三

借餘小舍

瀉之藥恐積熱日增致滋他族

萆薢 砂仁 茯苓 牡蠣 白朮 黃蘗

炙草 山藥 生地 猪苓

詒按此等證早服補瀉每多愈服愈甚者先生此
案可謂大聲疾呼

再診 服藥後遺滑已止唇熱不除脾家尚有餘熱故

也

前方去砂仁黃蘗 加川連苦參

詒按唇熱屬脾

○少陰為三陰之樞內司啟閉虛則失其常矣法宜填

補少陰。或通或塞。皆非其治。

六味丸去瀉。加兔絲子沙苑杞子。

治按此補腎之平劑。可以常服無弊。

○遺精傷腎。氣不收攝。入夜臥著。氣冲上膈。腹脹呼吸不通。竟夕危坐。足跗浮腫。清冷小便漸少。此本實先撥枝將敗矣。難治之證也。

都氣丸 加牛膝肉桂

治按此陰陽兩損。氣不攝納之重證。舍此竟無良法。然亦未必效也。

○陰虧陽動。內熱夢泄。

靜香樓醫案 卷下 遺精

六味丸 加黃蘗砂仁

治按六味合封髓法也。亦妥帖易施。

小便閉

○兩尺軟弱。根本不固。小便渾濁。病在腎藏。久久不愈。則成下消。

六味丸 加天冬 麥冬 杞子 五味子

治按方法穩切。

○形體豐腴。脈得小緩。凡陽氣發泄之人。外似有餘。內實不足。水穀之氣。不得陽運。便下注。而為濁病。已三四年矣。氣墜宜升陽為法。非比少壯陰火自灼之病。

三 惜餘小舍

兔絲子 茴香 車前子 韭子 漢藜 茯苓 覆盆子 蛇床子 黃魚骨搗丸每服五錢
治按此證當以脾土為主。但與溫養下元。尚非潔源清流之道。

又按此與相火下注者不同。故用藥如是。

○煩勞四十餘天。心陽自亢。腎水暗傷。陽墜入陰。故洩數便血。不覺管壅痛痺。實與淋證不同。其中雖不無溼熱。而寢食安然。不必溲泄利溼。宜甯心陽。益腎陰。宜通腎氣以和之。

熟地炭 人參 覆石斛 丹皮 澤瀉 茯苓

靜香樓醫案 卷下 小便泄瀉

遠志 柏子仁 湖蓮肉

治按此治本之方。由其論病親切。故立方自穩。

泄瀉

○惱怒傷中。溼熱乘之。脾氣不運。水穀併趨大腸。而為泄。腹中微疼。脈窒不和。治在中焦。

藿梗 川朴 神麴 澤瀉 茯苓 陳皮

扁豆 木瓜

治按此方妙在木瓜一味。兼能疎肝。須知此意。乃識立方選藥之妙。又按案中脈窒句。不甚明了。

三 惜餘小舍

痢症

○暑溼外侵經絡則為瘧。內動腸藏則為痢。而所恃以攘外安內者。則在胃氣。故宜和補之法。勿用攻削之劑。恐邪氣乘虛。盡入於裏也。

治按案語殊妙。惜此方之佚也。

大便閉

○氣鬱不行。津枯不澤。飲食少。大便難。形瘦脈澀。未可概與通下。宜以養液順氣之劑治之。

生地 當歸 桃仁 紅花 枳殼 麻仁

甘草 杏仁

靜香樓醫案 卷下 痢疾大便 惜餘小舍

治按此氣阻液枯之證。擬加鮮首烏。

○大便閉結。水液旁流。便通則液止矣。

大承氣湯 加甘草

治按據吳鞠通之論。用調胃承氣法為穩。

再診 前方加當歸 白芍

三診 改用製軍 加薤白 厚朴

○下血後。大便燥閉不爽。繼而自利。白滑膠黏。日數十行。形衰脈沈。必因久伏水穀之溼。府病宜通。以溫下法。

生茅朮 製軍 熟附子 厚朴

治按自利膠滑。有因燥矢不行。氣迫於腸。而脂膏

自下者。當專行燥矢。兼養腸液。未可概以溼論也。○脾約者。津液約束不行。不飢不大便。備嘗諸藥。中氣大困。仿古人以食治之法。

黑芝麻 杜蘇子

二味煎濃汁如飴。服三五日。即服人乳一杯。燉溫入薑汁二匙。

治按此無法之法也。良工心苦矣。

○便血不獨責虛。亦當責溼。所以滋補無功。而疏利獲益也。茲足痿無力。其溼不但在脾。又及腎矣。當作脾胃溼熱成痺治之。

靜香樓醫案 卷下 大便 惜餘小舍

草薢 薏仁 白朮 石斛 牛膝 生薑

治按案語明確。方亦簡當。

○瀉痢便血。五年不愈。色黃心悸。肢體無力。此病始於脾陽不振。繼而脾陰亦傷。治當陰陽兩顧為佳。

人參 白朮 附子 炙草 熟地 阿膠

伏龍肝 黃芩

治按此理中合黃土湯法也。方案俱切實不膚。○鼻癢心辣。大便下血。形瘦脈小。而數。已經數年。

黃芩 阿膠 白芍 炙草

治按此陰虛而有伏熱之證。方特精簡。

平陽

○肝經液聚氣凝為項間痰核。病雖在外。其本在內。切不可攻。攻之則愈甚矣。

首烏 象貝 白芍 牛膝 甘草 牡蠣粉

歸身 生地 丹皮

論按。議論平和。立方清穩。○牡蠣粉一味。可以化痰消堅。

○瘍證以能食為要。茲先和養胃氣。

石斛 茯苓 益智仁 穀芽 木瓜 廣皮

論按。案語片言居要。惟用藥嫌少力量。

靜香樓醫案 卷下 外傷 惜餘小舍

○脈虛細數。陰不足也。鼠漏未愈。熱在大腸。

六味丸 加梔子 天冬 龜板 黃蘗 知母

五味子

論按。此肛門漏也。名為鼠漏。未知所本。脈證已屬損象。故以滋補肝腎為主。

婦人門

○脾虛生溼。氣為之滯。血為之不守。此與血熱經多者不同。

白朮 澤瀉 白芍 廣皮 炙草 茯苓

牛角腮灰 川芎

論按。認證既的。藥亦絲絲入筴。

○腹滿足腫泄瀉。此屬胎水。得之脾虛有溼。

白朮 茯苓 澤瀉 廣皮 厚朴 川芎

蘇葉 薑皮 黃芩

論按。方案俱老當。

○胎前喘欬腫滿。是脾濕不行。上侵於肺。手足太陰病也。治在去溼下氣。

茯苓 陳皮 白芍 澤瀉 厚朴 當歸

蘇梗 杏仁

論按。方頗靈動。再加紫苑。枇杷葉。何如。

靜香樓醫案 卷下 婦人 惜餘小舍

○產後惡露不行。小腹作痛。漸見足腫。面浮喘欬。此血滯於先。水漬於後。宜兼治血水。如甘遂大黃之例。

紫苑 茯苓 桃仁 牛膝 青皮 杏仁

山查肉 小川朴 延胡

論按。用其例而易其藥。因原方太峻也。

再診。瘀血不下。走而上逆。急宜以法引而下之。否則衝逆成厥矣。

歸身 滑石 蒲黃 通草 牛膝 瞿麥

五靈脂 赤芍

三診。膈寬而腹滿。血瘀胞中。宜以緩法下之。

三診。膈寬而腹滿。血瘀胞中。宜以緩法下之。

大黃 青皮 炙草 丹皮 桃仁 赤芍 歸身

又丸方

牛膝 一兩 赤芍 延胡 蒲黃 五靈脂 川芎

桂心 桃仁 各五錢 歸尾 丹皮 各八錢

詒按迭換四方一層深一層次序秩然恰與病機

宛轉相赴

○胎前病子腫產後四日即大泄泄已一笑而厥不省人事及厥回神清而左脇前後痛滿至今三月餘矣形瘦脈虛食少少腹滿足腫小便不利此脾病傳心心不受邪即傳之於肝肝受病而更傳之於脾也此為五藏

靜香樓醫案 卷下 婦人 夫 惜餘小舍

相賊與六府食氣水血成脹者不同所以攻補遞進而絕無一效也宜泄肝和脾法治之

白朮 木瓜 廣皮 椒目 茯苓 白芍

詒按此等證情非胸中有古書者不能道隻字

門人趙樹誠 族弟寶慶同校

江陰柳氏醫學叢書之六

評選繼志堂醫案兩卷

右繼志堂醫案兩卷曹仁伯先生所著也先生諱

存心字仁伯別號樂山係常熟之福山人幼時讀

書穎悟長老咸目為令器願以家道不豐一矜不

足裕衣食遂謀習醫從薛性天先生遊薛故郡中

名宿得先生劇賞之謂將來光吾道者必曹生也

先生居薛所十年檠燈燐掌上自靈素下逮薛喻

諸家無不研求貫串乃出應病者之求輒奏奇效

先生嘗言醫者存心須視天下無不可治之病其

繼志堂醫案 夫 惜餘小舍

不治者皆我之心未盡耳故其臨病人也研精覃

思直以一心貫乎病者之食息起居而曲折無不

周至每有劇病他人所棄而不治者先生獨能運

以精思而以數劑愈之古人謂生死肉骨先生誠

有之焉先生又言每遇病機叢雜治此礙彼他人

莫能措手者必細意研求或於一方中變化而損

益之或合數方為一方而融貫之思之思之鬼神

通之苦心所到必有一恰合之方投之而輒效者

以是知醫者之於病稍涉危疑即目為不治而去

之者其不盡心之過為不少也嗟乎先生之言如

此卽先生居心之篤厚與藝事之精能蓋皆卽是而可見矣先生所著有琉球百問繼志堂語錄過庭錄延陵弟子紀略諸書經先生之孫博泉五年哀集鈔行楊太常濱石序之先生之行誼備詳於許君廷誥所撰家傳中先生以醫名著繼葉薛諸公而起德被吳中名馳海外至今人能道之特其所著醫案於過庭錄延陵弟子紀略外未有傳本今年夏偶於友人處得見其門弟子所錄存者惜中多闕誤因假歸鈔錄爲之次第整理刪其繁亂損其精粹間或贅以評語以發明其用意之所在

繼志堂醫案

二 借餘小舍

鈔成上下兩卷俾後人讀之猶可想見其診病時危坐構思旁若無人之概云光緒二十六年庚子八月江陰柳寶詒識

評選繼志堂醫案上卷

江陰柳氏醫學叢書之六

常熟曹存心仁伯著

江陰柳寶詒穀孫選評

及門諸子 參校

內傷雜病

○心營與腎水交虧。肝氣挾肝陽上逆。胸中氣塞。口內常乾。手震舌掉。心煩不寐。卽有寐時。神魂游蕩。自覺身非已有。甚至便溏納少。脾胃亦衰。脈形細小無神。而有歇止之象。逐證施治。似乎應接不暇。因思精神魂魄。必令各安其所。庶得生機勃勃。否則悠悠忽忽。恐難卜其

繼志堂醫案

卷上 內傷雜病

一 借餘小舍

旋元吉擬許學士眞珠母丸法

石決明鹽水煨 人參錢一 歸身錢半 犀角五分 龍齒錢三 茯神錢三 生地錢四 麥冬錢二 棗仁錢二 炙草三分 淮葯錢三 沈香三分 另珠粉四分先服

詒按此方於肝氣一層。嫌少理會。愚意去山葯甘草。加木香陳皮。則胸中之氣塞亦平矣。

又接服方

生地 白芍 人參 丹皮 橘紅 茯神 棗仁 石決明 龍齒 桃米 佛手

再診 脈之歇止向和。便之溏泄不作。氣塞稍平。手震

亦定。但磨多麻少。內藏之魂魄未安。胸痞腕悶。上壅之濁痰未降。容將通陽鎮逆法。參入前方。冀相與有成耳。

真珠母丸 真珠母 熟地 常歸 人參 棗仁 柏子仁 茯神 犀角 龍齒 沉香

去柏子仁 當歸 加旋復花 錢五分 代赭石 錢三

陳皮 七分 炙草 五分 白芍 錢二 麥冬 錢三 甘瀾水煎竹

瀝一兩冲服

論按案云。通陽鎮逆。方中用旋赭鎮逆。而尤芍麥草。則未可謂之通陽也。

三診 夜半得寐。心腎已交。肺魄肝魂。自能各安其藏。無如心易煩動。神反疲乏。氣猶短促。胸遺痞悶。脈仍細

繼志堂醫案 卷上 內傷雜病 二 惜餘小舍

小兩足不安。脈虛證虛。是謂重虛。而兼有濕痰從之。為患。夫痰即有形之火。火即無形之痰也。法當固本為主。消痰佐之。

人參固本丸 加龜板 五錢 茯神 三錢 棗仁 二錢 白芍 三錢

淮麥 三錢 陳皮 一錢 旋覆花 五錢 柏子仁 一分 冬朮 半錢

另珠粉二分 竹油二十匙 雞子黃一枚 和服

論按於痰病重投冬地。得無嫌其滋膩否。

四診 風火痰三者之有餘。留滯肝經。以致臥血歸肝。魂不能與之俱歸。筋惕肉瞤。而醒前次氣短等證。莫不

因此而又起。於有年病後。氣血兩虧。何堪磨耐。所治之

方。不出許學士法。加減。現在脈息細小。帶弦。雖無止歇之形。尚有不靜之意。究屬難免風波。未可以能食為足恃也。

石決明 鹽水煨 三錢 麥冬 二錢 犀角 五分 柏子仁 三錢 龍齒 三錢

棗仁 鹽水炒 三錢 歸身 七分 大熟地 浮石粉拌 炒大錢 羚羊角 一錢

冬朮 五分 白芍 錢三 陳皮 一錢 人參 二錢 茯神 三錢 銀花 一錢

薄荷 五分

另金箔 二張 竹瀝 兩 真珠粉 分三 薑汁 一匙 冲服

論按方中用銀花薄荷兩味。不識其意何居。

五診 前夜熟睡。昨又變為少寐。寐之時適在子時。以

繼志堂醫案 卷上 內傷雜病 三 惜餘小舍

後。肝膽兩經。尚有餘邪。可知。更兼痰火阻氣。時逆時平。其氣逆時。必面赤心悸。甚則肉瞤筋惕。煩熱不安。脈亦隨之變異。所謂心火一動。相火隨之是也。調治之外。必須靜養。俾心火凝然不動。方可漸入坦途。

人參 丹參 麥冬 元參 各二錢 旋覆花 冬朮 各一錢

橘紅 一錢 小麥 五錢 棗仁 川連煎 汁拌炒 茯神 川貝 各三錢

炙草 四分 枇杷葉 竹茹 各三錢 珠粉 沖三錢

論按相火屬少陽。即膽火也。方中川連竹茹。恰合

病機。

六診 所患小恙。無一不除。蓋以清之化之補之養之。

無微不至。而得此小效耳。所嫌者。寐非其時。寤非其時。心陽太旺。神氣外馳。是衛氣獨行於陽。陽驕脈滿。滿則不入於陰。陰分之虛明矣。將滋陰之品。參入前方。未識能弋獲否。

前方加大生地錢五陳膽星五分

另真珠母丸 硃砂安神丸各五十粒

論按此證不寐。乃肝膽有痰火所致。案中引內經陽驕脈滿之文。本屬強為牽合。至以經言陰虛。指為陰血之虛。尤非經文本旨。

七診 人可以參天地之幹者。莫貴於眠食如常。今食

續志堂醫案 卷上 內傷雜病

四 惜餘小舍

能知味。眠則未安。昨夜忽寐。忽醒。醒則不爽。寐則不安。以昭衛氣不得入於陰。獨留行於陽之意。按案語牽合認經文陰字。故說來總不入理。是陽驕脈滿。營血不能充足。肌肉不能潤澤。苟非陽生陰長。陰足戀陽。何以漸入佳境。然營中之血。既不生之於心。烏能藏之於肝。統之於脾。而欲藉草木之無情。俾血肉之有情者。以生以長。談何容易。況當此痰火易煩。得食暫安。以及虛風內動。筋惕肉瞤。支體牽搖。大便難通之候。更難為力矣。急宜加意調理。

前方去元參。旋覆珠粉丹參。加黃耆錢一遠志三分

歸身錢半夏錢一木香三分圓眼肉三枚

另真珠母丸 四十粒 硃砂安神丸 三十粒

論按黃耆與此證不甚合。膽汁炒半夏。思路新穎。八診 徹夜好眠。神魂已定。是佳兆也。但脈形細小。而兼滑數。數為有火。滑為有痰。細屬陰虛。小屬氣弱。虛弱之中。兼有痰火。有時面紅。有時欬嗽。有時氣痞。而短有時煩熱不安。更兼大便燥而小便短。筋惕肉瞤。支體動搖。神情困倦。語言無力等證。均未平復。還宜謹慎。小心。前方加柏子仁三錢

另硃砂安神丸 三十粒 真珠母丸 四十粒

論按此好眠是痰蒙所致。未必定是佳兆。

續志堂醫案 卷二 內傷雜病

五 惜餘小舍

九診 臟之為言藏也。心之神。肝之魂。肺之魄。脾之意。腎之志。無不各得其藏。五臟和矣。即有不和。因藏真不足。蓋有待也。而與藏相表裏者。為府。府以通為補。與藏之以塞為補者。有間。因思胃主下行。腸主津液。津液不充。下行失令。故大便燥結。而難通。此際不以滋養營陰。俾得施潤澤。非計也。目前之治如此。將來或痰或火。或感或傷。偶有違和。事難逆料。斷無預定之理。隨時斟酌為囑。

麻仁 郁李仁 柏子仁 松子仁 各三錢 桃仁 七分 陳皮 人參 蘇子 各二錢

另朝服膏滋藥晚服丸藥

此王江涇王姓病也。是人素有肝火上升之病。想熱病之後。必有餘邪餘火。留於肝膽。乘虛竊發。氣塞而不能卧起者。中有實痰。加於短氣。不足以息之體。神魂搖蕩。身非已有。虛之甚矣。用真珠母丸法。先以犀角治實火。參地補氣血。俾相火得清而莫安。第二方即參入陳皮竹油。赭石旋覆花。扶補挾化。第三方人參固本。入龜板耆芍雞黃。第四方加入羚羊銀花。清藥與補藥。俱加倍用之。第五六方。竟是十味溫膽。喫重痰火一層。用藥心

繼志堂醫案

卷上

內傷雜病

六

惜餘小舍

細手和。既沈着。亦靈敏。洵可法可師之作。

○陽絡重傷。欬無虛日。而於五更為甚。口乾盜汗。溺赤便溲。脈數而身熱。欲成損證也。咽中已痛。慮其加喘。生變。權以清熱存陰。

黃芩湯合猪膚湯加牡蠣

再診 所見病情。與前無異。喜食藕汁。咽中乾痛稍輕。大便溏泄更甚。雖屬肺熱下移於大腸。而實則中氣已虛。失其所守也。

六味丸 加牡蠣 川貝 元參 淡芩

詒按大便溏泄。虛證中所最忌者。此證始終大便

不堅。故再三反復。終不復元也。

三診 溏泄已止。欬嗽未除。咽痛盜汗。脈數。肺經尚有

熱邪。

補肺阿膠散 加白芍 生地 淡芩 元參

山藥

四診 便泄稀。身熱輕。咽喉乾痛。亦漸向愈。而欬嗽腹鳴。神疲納少。脈小帶數。想是風熱遞減。氣陰兩虧。而脾中之溼。又從而和之為患。補三陰。通三陽之外。更以崇土化溼佐之。

六味丸 加牡蠣 淡芩 於朮 防風 陳皮

繼志堂醫案

卷上

內傷雜病

七

惜餘小舍

炙草

詒按陰虛而挾脾溼。陽虛而挾肺火。邪實正虛。彼此相礙。凡治此等證。總須權其輕重緩急。又須心靈手敏。方能奏效。若稍涉呆滯。則效未見。而弊先滋。如此證屢用六味。雖於證情亦合。究嫌落筆太重。少靈動之機括也。

五診 氣陰得補。漸利。不意又有燥風外感。襲入溼痰之中。微有寒熱。咽痛。欬嗽不止。權以清養法。

六味丸去黃 加桑葉 杏仁 陳皮 川貝

炙草

六診 發熱惡風汗多。是屬傷風之象。但傷於壯者。氣行則已。傷於怯者。難免不着而為患也。大為棘手。

六味丸合玉屏風散 加桑葉 元參 川貝

橘紅 甘草

七診 多汗惡風之象漸輕。新風解矣。而欬嗽咽痛。大便澀。飲食少。仍是脾肺腎三藏皆虛之候。幸未氣喘。

玉竹飲子

玉竹茯苓甘草桔梗陳皮川貝紫苑薑

合猪膚湯

玉屏風

散 加麥冬 山藥

八診 脾虛則便澀。肺虛則欬嗽。腎虛則虛火上炎。咽喉乾痛。脈弱無力。元氣傷矣。急宜補氣育陰。

繼志堂醫案

卷上 內傷雜病

入

惜餘小舍

人參 二冬 二地 黃耆 陳皮 阿膠

杏仁 百合 甘草

治按此方究非便澀所宜。

九診 精生於穀。腎之精氣。皆賴穀食以生之。而穀食之化。又賴脾土以運之。今使澀納少。脾失運矣。急宜補脾為要。

都氣丸合四君子湯 百花膏

另八仙長壽丸參湯下

治按此方亦嫌少靈活之致。

又按此證前後方案九則。議論頗有精當處。惟用

藥未能面面照顧。總緣陰虛而兼便澀。彼此相礙。難於受量。受也。

○先生之病。素稟溼熱。又挾陰虛之病也。溼者何地之氣也。熱者何天之氣也。天地鬱蒸。溼熱生焉。溼熱稟於先天者。與元氣混為一家。較之內傷外感之溼熱。屬在後天者。豈可同日語哉。設使薄滋味。遠房幃。不過生癆出血而已。乃從事膏粱。更多嗜慾。斯溼熱外增。陰精內耗。藏府營衛。但有春夏之發。而無秋冬之藏。無怪乎風火相煽。而耳為之苦鳴也。當斯時也。靜以養之。猶可相安無事。何又喜功生事。火上添油。致陡然頭暈面赤。其

繼志堂醫案

卷上 內傷雜病

九

惜餘小舍

一派炎炎之勢。蓋無非肝經之火。督脈之陽。上冒而為患。近聞用引火歸原之法。以為甘溫能除大熱。嗟乎。未聞道也。夫甘溫除大熱者。良以下極陰寒。真陽上越。引其火歸其原則。坎離交媾。太極自安。若陰虛溼熱。蒸動於上者。投以清滋。尚難對待。况敢以火濟火。明犯一誤。再誤之戒乎。逮後清已有法。滋亦頻投。飲食能增。身體能胖。而坐立獨不能久者。則是外盛中空。下虛上實。用藥殊難。嘗見東垣之清燥湯。丹溪之虎潛丸。潤燥兼施。剛柔並進。張氏在贊此兩方。謂必互用。始克有濟。何故而不宗此耶。然猶有進於此者。治病必資藥力。而所以

載行藥力者胃氣也。胃中溼熱熏蒸致吐血痰嗽鼻塞噫氣二便失調所謂九竅不和都屬胃病也。然則欲安內藏先清外府。又為第一要着矣。至秋末冬初病甚者十月坤卦純陰天已靜矣而溼熱反動腎欲藏矣而溼熱仍露能勿令病之加劇乎。附方謹復。

青鹽四兩 甘草八兩 葶藶一斤 海蛇二斤 草薺一斤 飴糖八兩

刺蝟皮一斤 霞天麩五錢 十大功勞葉一斤 橘葉五兩

共為末竹瀝和水泛丸每朝四錢服完後合虎潛丸

全料全合常服按方中海蛇葶藶不能作丸此

鹽以下數味為末而用葶藶海蛇煮汁和飴糖竹瀝泛丸乃合

續志堂醫案 卷上 內傷雜病 十 惜餘小舍

原註起手提清溼熱之病陰虛之體發明先天素稟溼熱之故第二段一折折出嗜欲膏粱因此更

加陰虛第三段再折折出動火傷陰第四段直闢

用熱之謬下乃歸到治病先治胃通篇說理既精

筆力遒老饒有古文筆意

詒按推論病原指陳治法言言切實絕無模糊影

響之談最後推出先清胃府一層尤為洞中窺要

深合機宜凡治陰虛溼熱者於此可悟出法門矣

○身熱手心熱少力神倦淋利脈濡此脾陽下陷陰火

上乘甘溫能除大熱正為此等證設也

補中益氣湯 加鼈甲

詒按此脾虛內熱證也。用東垣法最合。

○勞倦而招風溼右脈濡小左脈浮弦舌苔薄白溺赤

便澹肢體痠楚神倦嗜臥少納口乾

升陽益胃湯參北耆草夏陳苓澤 青皮

詒按此與前證略同故用藥亦相似

○胃虛則納食無味脾虛則運化無常

六君子湯合治中湯 加熟地 益智仁 杭米

詒按脾喜溫升宜香燥胃喜清降宜柔潤脾陽健

則能運胃陰充則能納凡脾胃同治者用藥須識

續志堂醫案 卷上 內傷雜病 十 惜餘小舍

此意 愚意去熟地 加石斛似與胃虛者更宜

○五藏六府皆有營衛營衛不調則寒熱分爭此病分

爭之後肌肉暗消因思脾主肌肉肌肉暗消正所以昭

脾之營衛虛也無怪乎腕瘕納少力乏嗜臥脈形軟弱

有種種脾虛見象於法當健脾為主而八入已過之年

陽氣必衰又宜兼壯元陽使火土合德尤為要務

烏龍丸合香砂六君丸 加首烏 當歸

○心脈宜大者反小腎脈宜沈者反浮浮則為傷小則

為虛想是讀書攻苦心腎不交失其封藏之職夫心腎

即嬰兒姤女欲其交者須得黃婆為之媒合黃屬中央

脾土所主。舍補中宮之外。皆屬徒然。

歸脾湯

論按借丹訣以談醫理原一貫也。此案說理頗精。惜未能指列病狀。

○晝為陽。陽旺應不惡寒。夜為陰。陰旺應不發熱。茲乃口間惡寒。夜間發熱。何以陰陽相反。若是耶。此無他。陽虛則惡寒於口。陰虛則發熱於夜。陰陽之正氣既虛。所有瘧後餘邪。無處不可為患。足為之浮。腹為之滿。溺為之短。一飲一食。脾為之不運。生飲生痰。肺為之欬。嗽脈從內變而為細弦。夫形瘦色黃。舌白。陽分比陰分更虧。繼志堂醫案卷上 內傷雜病 三 惜餘小舍 極易致喘。

桂枝加厚朴杏仁湯 加附子 乾薑 冬朮 半夏 橘紅

原註案則一續穿成藥。則理中去參。以理其本。桂枝以和其標。二陳朴杏以化其邪。乃絲絲入筵之方。

○脾為陰土。胃為陽土。陽土病則見嘔惡。陰土病則見泄瀉。二者互相為患。此平則彼發。令人應接不暇。現在嘔止而泄。似脾病而胃不病。不知脾胃屬土。木必乘之。不乘胃土而嘔。必乘脾土而泄。治病必求其本。本在木。

當先平木。必使陽土陰土皆不受所乘。方為正治。

理中湯

烏梅丸 吳仙散 吳萸 加 白芍

論按推究病機。既能融會貫澈。斟酌治法。自然入彀。

○舌乃心之苗。舌上之苔。剝落不生者久矣。是心陰不足。心陽有餘也。

黃連阿膠湯去芩 加大生地

論按胃陰枯涸者。每有此病。心陰不足之說。亦可備一法也。

繼志堂醫案

卷上 內傷雜病

三

惜餘小舍

○類中之餘。足不任身。手難舉物。尺脈無力。陰陽並弱。擬用河間地黃飲子法。

熟地 茯苓 川附 牛膝 石斛 遠志 巴戟 甘菊

再診 手之舉動稍和。足之步履如舊。蓋緣陽氣難於充足耳。

六君子湯 加熟地 巴戟 白芍 川附 虎骨 又方 歸芍六君子丸 加虎骨 巴戟 兔絲

茯苓 首烏 杜仲 萆薢 三診 足部有力。步履不艱。補方得力可知。仍以前法。

地黃飲子 地巴莖 黃芩 麥冬 附子 芍藥 薄味 附桂 去麥味 葛合異功散

加當歸 芍藥 蝎尾 竹油

論按此病之由乎虛者故用藥專以補養收功○

從前並未用疏風化痰之藥案中亦無見證至末

方諸恙就痊而忽加蝎尾竹油二味想必另有風

痰見證也

○怒則氣上痰即隨之陡然語言蹇澀口角流涎月餘

不愈所謂中痰中氣也然痰氣為標陽虛為本所以脈

息遲弦小水甚多肢麻無力法宜扶陽為主運中化痰

佐之

繼志堂醫案

卷上 中風

古

山餘小舍

六君子湯 加川附 白芍 麥冬 竹油 蝎尾

論按立方虛實兼到所謂看似尋常最奇特也勿

以平易忽之

○左肢痿而不用口歪流涎舌苔起膩便溏溺少脈形

弦遲以中虛溼勝之體易於生痰動風內風既動未有

不招外風者也

牽正散 白附 蝎尾 白附 合二陳湯 加川附 桂枝 白芍

製蠶

再診 肢體稍和流涎略減仍以前方增減

前方去芍 加首烏 川斷 竹油

論按方案均切實不浮

○膝骨日大上下漸形細小是鶴膝風證乃風寒溼三

氣合而為病痺之最重者也三氣既痺又挾肺金之痰

以痺肘所謂肺有邪其氣留於兩肘肘之痺偏於左屬

血屬陰陰血久虧無怪乎腰脊突出接踵而來至於欬

嗽鼻流清涕小水色黃肌肉暗削行步無力脈形細小

左關獨見弦數是日久正虛風寒溼三氣漸見化熱之

象擬用痺門麋羊角散加減

麋羊角 歸身 白芍 杏仁 羌活 知母

繼志堂醫案

卷上 痿痺

古

山餘小舍

桂枝 薏米 秦艽 製蠶 茯苓 竹瀝 桑枝

論按由膝而肘而脊病情漸引漸深方中於膝肘

之邪已能兼治於脊突一層似未能兼顧及之擬

再加鹿角霜川懷牛膝等味

○素患鼻衄入夏又發下體痿軟無力欬嗽口乾溺黃

膚熱想是鼻衄屢發上焦陰液久耗而胃中溼熱之邪

薰蒸於肺肺熱葉焦則生痿躄也

清燥湯 參耆草朮歸地連猪茯苓麥味蒼柏瀉 去朮升柴 加白芍

茅花 枇杷葉

論按此證自當滋清營液為主東垣清燥湯立法

未純。前人頗有議之者。用者當審之。○案語開發
病情極其熨帖。

○人年四十陰氣自半。從古至今如是。惟尊體獨異者。
蓋以溼熱素多。陽事早痿耳。近又患臂痛之證。此非醫
書所載之夜卧臂在被外。招風而痛。乃因久卧竹榻。寒
涼之氣。漸入筋骨。較之被外感寒。偶傷經絡者。更進一
層。所以陽氣不宣。屈伸不利。痛無虛日。喜熱惡寒。仲景
云。一臂不舉為痺。載在中風門中。實非真中。而為類中
之機。豈容忽視。現在治法。首重補陽。兼養陰血。寓之以
祛寒。加以化痰。再通其經絡。而一方中之制度。自有
繼志堂醫案 卷上 痿痺 共 惜餘小舍

君臣佐使焉。

熟地八兩當歸四兩白芍二兩虎掌一對阿膠三兩半夏四兩

橘紅二兩枳殼二兩沉香五錢黨參四兩於朮四兩茯苓二兩

熟附兩炙草兩風化硝兩桂枝兩羌活兩綿耆兩

薑黃兩海桐皮

共為末。用竹瀝薑汁和蜜水泛丸。

詒按。立方清切周到。可法可師。

神志門

○神識不清。自言自語。起坐無常。腐麻失度。脈形小滑。
舌苔白膩。此痰熱內鬱。心包無路可出。而作心風也。久

久歸入癩癩毋忽。

導痰湯 芥夏枳星 加菖蒲 遠志

另白金丸

詒按。病情已屬癩證。再加犀角龍牡等清鎮之品。
似更得力。

○陽明之脈。環於唇。唇起紅筋。即發牽動而厥。厥醒吐
沫。欬血鼻衄。二便失調。脈弦滑數。顯係胃有積熱。動血
生痰。又被肝火所衝激。乃癩證之根毋忽。

六味丸 加川貝 石決明

另虎睛丸 虎睛一對 製單一兩 遠志五錢 犀角

另虎睛丸 一兩 黑梔 一兩 蜜丸 每服二十一粒

詒按。既曰胃有積熱。似非六味所能勝任。且方中

如莢肉之酸溫。亦宜避去。○又按。積熱者。蓄積之

熱也。與積滯之積不同。虎睛丸中大黃黑梔。即為

泄熱而設。

○癩證之因。未有不由于龍雷之火上升。此則更有溼
熱之痰。從而和之為患。

六味丸 加龍齒 石決明 橘紅 黑梔 川貝

川連 竹茹

詒按。連讀癩證數案。皆以六味丸為主。查六味為
通補三陰之方。先生習於內經。重陰者癩。一語謂

癇證必挾龍雷之火。而以滋水柔木為主。故用藥如此。其實癇證有因於胎驚者。有因於先天陰虛者。亦有因於驚痰內擾者。當隨所因而治之。初非可執一端以論也。

○驚則氣亂。神出舍空。痰涎襲入。此心悸形呆。善忘不語所由來也。至月事不至。血從內併。用藥亦須兼及。

茯苓 香附 沈香 半夏 橘紅 遠志 膽星

牛膝

另驚氣丸 白花蛇 蝎 蠶 麝 辰砂 白附 麻黃 天麻 橘紅 南星 蘇子

詒按擬加丹參琥珀歸鬚等。兼顧血分。乃與案語

繼志堂醫案 卷上 神志 大 惜餘小舍

相合。

○心悸初從驚恐得之。後來習以為常。經年不愈。手振舌糙。脈孔帶滑。不耐煩勞。此係心血本虛。痰涎襲入也。

人參 元參 丹參 棗仁 天冬 麥冬 菖蒲

茯苓 茯神 當歸 遠志 五味 桔梗 半夏

生地 橘紅 枳殼 柏仁 炙草 竹茹

原註此天王補心丹合十味溫膽湯法也。心血本虧。補心丹主之。痰涎襲入。十味溫膽湯主之。

○溼熱生痰。留於手足。少陽之府。累及心包。心驚膽怯。性急善忘。多慮多思。舌苔濁膩。帶黃。胸腕內熱。清化為

首。

黃連溫膽湯 加洋參 枇杷葉

原註舌苔濁膩帶黃。加入黃連一味。苦燥化溼。再加洋參補陰。枇杷葉清肺。想是火旺之體。肺液必虧。且以救二陳之過燥也。

○神蒙善忘。包絡之病為多。然左寸脈息上浮。關部獨帶弦數。右寸與關小而帶弦。白苔滿布。大便久瀉。肢體無力。倦怠嗜卧。脾經之溼痰。被肝火所衝激。累及心包也。

藿梗 黨參 於朮 半夏 陳皮 香附 砂仁

繼志堂醫案 卷上 神志 九 惜餘小舍

木香 沈香 遠志 枳殼 葛根 菖蒲 竹油

詒按此必兼有脹滿之候。故方中多香燥和脾之品。用葛根藿梗。乃兼清暑溼之意。

再診 痰因溼釀。溼自脾生。脾若健運。則無溼以生痰。所患善忘等證。自可化為烏有。然則健脾一法。在所必需矣。

香砂六君子湯 加沙苑 遠志 穀芽

原註苔白便溼。乏力嗜卧。皆脾倦見證。故用健脾化溼法。

續修四庫全書

○胃為貯痰之器。上逆心包。輕則胸悶。重則神蒙。導痰湯合溫膽湯

另白金丸

論按此治痰蒙之正法也。在此證尚屬輕劑。

○曾經失血。現在內熱吐痰。夜來大魘。脈象滑數。陰虛挾痰所致。

十味溫膽湯 加麥冬 歸身

論按陰虛挾痰之證。用藥最難恰好。○十味溫膽湯。即溫膽湯去竹茹。加參地棗仁遠志五味。治寒涎沃膈。膈寒肝熱。心悸不寐。

續志堂醫案 卷上 痰火

三 惜餘小舍

○積飲成囊

平陳湯

另丸茅朮斤一 芝麻斤半 棗肉丸如使血山梔湯下

論按此病不易除。根煎丸兩方極為熨帖。特未識能奏膚功否

○鼻血遺精。肺腎俱病。寒熱盜汗。營衛並傷。必須大補為是。無如脈息細弦。舌苔滿布。二便失調。飲食不舒。脾家又有溼痰為患。先宜化溼健脾。再商補劑。枳砂二陳湯 加烏梅 生薑

論按方中烏梅一味。似不入格。查醫通載二陳湯。古方本有烏梅。取斂護胃陰之意。先生用此其意或在是乎。

○動則氣喘。言則亦然。是下虛也。宜其俯仰不適矣。至於腕中拒按。隱隱作疼。築築而跳。脈息中部太弦。必有溼熱痰濁。交阻於胃。失下行為順之常。未便獨以虛治。

川貝 陳皮 茯苓 白芍 牛膝 海蛇 葶薺

另水泛資生丸

論按此必挾有痰飲。阻於中脘。宜從飲門用意。

再診 俯仰自如。漸通之兆。所見言動之氣喘。腕腹之

續志堂醫案 卷上 痰飲

三 惜餘小舍

拒按。已日輕一日。大妙事也。動氣攻築。獨不能除。且兼氣墜少腹。卧則可安。此則非胃氣之能降。而實脾氣之不升也。

香砂六君丸合雪羹 加神麴

另資生丸

論按立論精當。明了。惟用藥尚不甚得力。

○年逾古稀。腎氣下虛。生痰犯肺。欬喘脈微。當與峻補。

金水六君煎 夏地橘 合生服散 加桃肉

另八前長壽丸 腎氣丸

原註補命門之火以生土清其生痰之原則肺之
欬喘自甯煎方金水六君煎以治脾胃生脈以養
肺桃肉以補命門其奠安下焦之劑另用丸藥常
服斟酌可謂盡善矣

○氣喘痰升胸痞足冷是中下陽虛氣不納而水泛也
已進腎氣湯可以通鎮之法繼之

旋覆代赭湯去薑棗合蘇子降氣湯去桂前草薑
加薤白 車前 茯苓 枳殼

詒按於腎氣後續進此方更加旋赭以鎮逆薤白
以通陽用意極為周到

繼志堂醫案 卷上 欬喘 惜餘小舍

○交冬欬嗽素慣者也今春未罷延及夏間當春已見
踰腫入夏更增腹滿口燥舌剝火升氣逆右脈滿數左
脈浮弦風邪溼熱由上而下由下而及中即經所云
久欬不已三焦受之三焦欬狀欬而腹滿是也際此天
之熱氣下行小便更短足部尚冷其中宮本有痞象亦
從而和之為患用藥大為棘手姑擬質重開下法佐以
和胃泄肝之品

豬苓 鷄金 白朮 石膏 寒水石 雪羹
肉桂 枇杷葉

原註風邪結於肺脾氣素虛者由肺而陷入於

脾尚是一綫加以口燥舌剝陰虛有火之體更屬
難治用河間甘露之意質重開下方則極妙未識
效否

詒按病情紛錯實難著手以桂苓法增減出之已
屬苦心經營特於痞滿一層尚恐與兩石有礙方
中茯苓滑石似不可少

○寒熱後欬嗽痰濃頭疼口渴舌紅脈數大便溏泄冬
溫之邪鬱於肺分而從燥化當泄之清之

葦蕤湯 葦蕤石青青木香
薇麻芎藭羌草杏

原註此冬溫欬嗽也麻杏開泄外罩之涼風羌活

繼志堂醫案 卷上 欬喘 惜餘小舍

葛根佐之石膏清內伏之溫熱白薇玉竹佐之冬
溫必頭痛便泄青木香治便泄之藥也病比傷寒
多一溫字方比麻黃去桂枝一味加入石膏以治
熱有因方成法遇圓為璧之妙
詒按此病既見痰濃口渴則已有邪鬱化熱之徵
方中羌防葛根似宜酌用

○寒必傷營亦必化熱欬嗽不止嘔吐紫血咽中乾痛
苔白邊青脈緊而數近更欬甚則喘氣息短促肺胃兩
經皆失其清降也鬱欬成勞最為可怕

荊芥 杏仁 紫苑 桑皮 地骨皮 蘇子

麥冬 金沸草 玉竹

再診 白苔已薄。舌邊仍青。痰出雖稀。欬逆未止。觀其喘急。嘔逆多見於欬甚之時。正所謂肺欬之狀。欬而嘔。胃欬之狀。欬而嘔也。

桑皮 骨皮 知母 川貝 淡芩 浮石 桔梗

甘草 紫苑 麥冬 蘆根 萊菔汁

原註。風寒之邪。鬱於肺胃。久而化火。遂至見血。先用金沸草散瀉白散。以搜剔其邪。第二案即加入蘆根知母。清營中之熱。用法轉換。層次碧清。詒按。此證先曾吐痰。加以舌邊色青。似有瘀血鬱。

續志堂醫案 卷上 欬喘

五 惜餘小舍

阻。方案中何以並不理會及此。

○傷風不醒。欬嗽嘔惡。所見之痰。或薄或濃。或帶血色。左關脈獨見浮弦且數。小有寒熱。此損證之根也。千金法治之。

蘇葉 黨參 川連 烏梅 橘紅 川貝 柴胡

杏仁 桑皮 地骨皮

原註。此用柴前連梅煎。意千金法也。欬嗽由來十入般。只因邪氣入於肝。即是此方之歌訣。○此方效。轉方加竹茹一味。

詒按。弦數獨見於左關。故知其病專在肝。

○欬嗽吐出青黃之痰。項強惡風。音燥。寒熱分爭。是名勞風。服秦芫龍甲。而更甚者。當進一層治之。

柴前連梅煎 柴胡前胡黃連烏梅薤白 猪膽汁童便猪脊髓

附 秦芫龍甲煎 秦芫龍甲地骨皮柴胡 青蒿歸身知母烏梅

再診 進前方。欬嗽大減。所出之痰。仍見青黃之色。身熱雖輕。咽中苦痛。脈形弦細數。風邪未盡。中下兩虛。制小前方之外。參入猪膚法。一治身熱。一治咽痛。

柴前連梅煎合猪膚湯 加黨參 花粉

原註。此方治傷風不醒成勞。比秦芫龍甲。又進一層。其見證每以欬吐黃綠青痰為據。

續志堂醫案 卷上 欬喘

五 惜餘小舍

○欬嗽時盛時衰。粉紅痰後。變為青黃。勞風之根也。

柴胡 前胡 烏梅 川連 薤白 童便

猪膽汁 猪脊筋

詒按。童便易秋石甚妙。

再診 進勞風法。欬嗽大減。紅痰亦無。但痰色尚帶青黃。左關脈息弦硬不和。肝膽留邪。容易犯肺胃俞也。母忽。

麥冬 沙參 淡芩 炙草 白芍 川貝 青黛

廣皮

原註。此方極玲瓏。先生用之。每靈。大約風喜傷肝。

風鬱於肝久而不出必有青黃之痰所謂勞風是也

論按先生案中治勞風一證必用柴前連梅煎自云法本千金用之神效查千金方所載勞風治法及所敘病原與此不同即所用之柴前連梅煎僅見於吳鶴臯醫方考千金方中並無此方先生偶誤記耳

○右脈弦滑而數滑為痰弦為風風鬱為熱熱鬱為痰阻之於肺清肅不行欬嗽自作

金沸草 前胡 半夏 荆芥 甘草 赤苓

繼志堂醫案 卷上 欬喘 惜餘小舍

川芎 枳殼 紫苑 杏仁 桑白皮 萹皮

竹瀝

原註方中芎枳二味是升降法也必有一團寒風化熱鬱閉於肺用芎之升枳之降以挑鬆其火若火重者不可用有陰火者更不可用恐火升則血易動耳

論按此金沸草散去麻芍加芎枳以挑動之苑杏以宣泄之桑萹以清降之細玩其加減可識其心思之細密用意之周到矣案語亦簡鍊老潔○晨起欬嗽勞倦傷脾積溼生痰所致久而不已氣喘

畏風金水因此而虛補中寓化一定章程現在身熱口乾苔白脈息細弦而緊緊則為寒寒風新感必須先治新邪權以疎化法

香蘇飲合二陳 加枳殼 桔梗 杏仁 通草 又接服方

麥門冬湯合二陳 加旋覆 冬朮 牛膝

論按此即六君加麥冬旋覆牛膝也恰合脾虛有溼痰而傷及金水者之治

○內經云秋傷於溼冬生欬嗽喻氏改作秋傷於燥冬生欬嗽豈知初秋之溼本從夏令而來原為正氣若論

繼志堂醫案 卷上 欬喘 惜餘小舍

其燥則在中秋以後其氣亦為正令二者相因理所固然勢所必至仲景早已立方獨被飛疇看破今人之用功不如古人遠矣

麥冬 半夏 甘草 玉竹 紫苑 瀉白散

原註此麥門冬湯也先生以肺燥胃溼四字提之故此案以燥溼二字為言

○去冬欬嗽今春寒熱至秋令而欬嗽或輕或重惟喉癢則一所謂火逆上氣咽喉不利此等證是也最易成勞未可以脈未促氣未喘為足恃

麥門冬湯合瀉白散 加橘紅 茯苓 甘草

玉竹

再診 內熱已除。欬嗽亦減。氣火之逆上者漸有下降之意。靜養為佳。

前方加枇杷葉

原註此病必有舌苔而不夜欬。所以與四陰煎證有異。

○肺經欬嗽。嗽則喘息有音。甚則吐血。血已止。欬未除。右寸脈息浮弦。弦者痰飲也。良以飲食入胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。而肺氣虛者。不能通調水道。下輸膀胱。聚液為痰。積滯為飲。一俟誦讀煩勞。欬

繼志堂醫案

卷上

欬喘

天

惜餘小舍

而且嗽。自然作矣。補肺健脾。以絕生痰之源。以清貯痰之器。

麥門冬湯合異功散 加薏仁 百合

原註此曲曲寫出痰飲之所由來。用二陳以化痰。佐以薏米。用麥冬以養肺。佐以百合。用白朮以健脾。佐以黨參。味味切當。製帖看似尋常。實是功夫純熟之候。

詒按以上數案。均是麥門冬湯證。乃燥溼互用之

附錄欬嗽證治括要

欬者利諧聲也。其音開口而出。彷彿亥字之音。故有聲無痰為欬。嗽則如水之灌。漱然有物在喉。漾漾欲出。故從口。從收。後人遂以有痰為嗽。然則欬嗽之病。胡從生也。曰病有萬變。要不出內傷外感兩端。請先明外感。外感者。風寒暑溼燥火六者盡之。論其常則各主一時為病。論其變則四時皆可以受六淫之邪。今則即風寒論。感風者。鼻塞身重。惡風清涕。此證也。左脈浮弦。此脈也。感寒者。惡寒體痛。發熱脈緊。此寒之證與脈也。而風之中。又有辨。春則為溫。風肝木用事。受風者必傷肝。而又

繼志堂醫案

卷上

天

惜餘小舍

有中血中氣之別。風傷衛則參蘇飲。風傷營則芍蘇飲。夏則為熱。風傷心包。而亦有涼熱之別。涼風香薷飲。熱風鷄蘇散。秋為涼風。傷肺。敗毒散。金沸草散。冬為寒風。傷膀胱。桂枝厚朴杏仁湯。麻黃湯。儻冬時天熱而感寒風。則當用葳蕤湯。陽旦湯。此冬溫之邪也。惟秋分以後。少暑溼。春夏無燥氣。他如先傷風。而後傷熱。為熱包寒。葳蕤湯。肺素熱而感寒風。為寒包熱。金沸草散。一嗽而痰出稠黏者。脾溼勝。二陳之類。連嗽無痰者。肺燥甚。清燥救肺湯。此皆外感欬也。言風一端。而六氣可類推矣。若夫內傷大法。惟痰飲津傷兩種。痰飲多陽虛。津傷多

陰虛其陽虛痰飲尚淺者六安二陳之類有火者溫膽湯夾陰虛者金水六君煎陽虛甚兼夾痰火不可攻者玉竹飲子鹹降法喘者降氣湯貞元飲此陽虛痰飲一端也他如陰虛者陰火易於上升胃氣不清者麥門冬湯曾見血者四陰煎痰多而濃無胃氣者六君子湯痰少而喘乾胃氣未絕者六味丸都氣丸八仙長壽丸此粗舉內傷之一端也此外又有勞風一門欬吐濁涕青黃之痰由勞碌傷風繼而不化最為難治淺者秦艽龍甲表虛汗多者黃耆龍甲深則柴前連梅煎千金法也此皆勞風之治也至於芎枳二味以治寒鬱化火之欬

續志堂醫案 卷上 惜餘小舍

合二母以瀉肺之母瀉白散以清泄肺藏四物補燥湯以引清血分皆在所常用也似此某證某方條分縷析須平日有格致功夫試觀先生臨證之方似乎夾雜含之病人之證則無一味可以增減先生嘗曰吾門之病如時文割截隔章隔節之題他人無處下手左支右障余能以心思靈空貫串合奏一方令病安穩此無他外感多與內傷同病內傷每因外感而發更遇雜藥亂投之醫治絲而勢愈難就緒治此者不能不兼采眾方就中另出一方其立方之意在案中宣露明白噫執此意以尋先生之門徑思過半矣

失血門

○飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五藏陰陽揆度以為常也此乃飲歸於肺失其通調之用飲食之飲變而為痰飲之飲痰飲之貯於肺也己非一日今當火令又值天符相火加臨兩火相燥金病更甚於前然則痰之或帶血或兼鼻鼻之或乾無涕口之或苦且燥小水之不多大便之血沫何一非痰火為患乎

旋覆花 桑皮 川貝 橘紅 浮石 炙草
沙參 茯苓 麥冬 竹葉 絲瓜絡

續志堂醫案 卷上 失血 惜餘小舍

論按此證乃素有濁痰鬱熱壅結熏蒸於內再受時令火邪熏灼肺胃所致如此立論似亦直捷了當何必用飲食入胃及天符相火如許大議論耶可參用葦莖湯

再診 接閱手書知欬血夢遺畏火三者更甚於前因思天符之火行於夏時可謂火之淫矣即使肺金無病者亦必暗受其傷而况痰火久踞肺金久傷再受此外來之火而欲其清肅下降也難矣肺不下降則不能生腎水腎水不生則相火上炎此欬逆夢遺之所由來也至於畏火一條內經載在陽明脈解篇中是肝火乘胃

之法。法宜瀉肝清火。不但欬血夢遺畏火等證之急者。可以速平。而且所患二便不通。亦可從此而愈。懸而擬之。未識效否。

鮮生地 蛤殼 青黛 桑皮 龍膽草 川貝

地骨皮 黑梔 竹葉 大黃鹽水炒

三診 陽明中土萬物所歸。現在肝經溼熱之邪。大半歸於陽明。以著順乘之意。而逆克於肺者。猶未盡平。所以睡醒之餘。每吐青黃綠痰。或帶血點。其色非紫即紅。右脇隱隱作痛。脈形滑數。獨見肺胃兩部。宜從此立方。

小生地 桑皮 羚羊角 阿膠 冬瓜子 薏米

續志堂醫案 卷上 失血 三 惜餘小舍

蛤殼 川貝 杏仁 忍冬藤 青黛 功勞露

蘆根 絲瓜絡

原註。肝經久病。克於土者為順。乘犯於肺者為逆。克。

論按。前方實做。不若此方之空靈活潑也。

四診 痰即有形之火。火即無形之痰。痰色漸和。血點漸少。知痰火暗消。大可望其病愈。不料悲傷於內。醫加於外。內外交迫。肺金又傷。傷則未盡之痰火。攻逆經絡。右偏隱隱作疼。旁及左脇。上及於肩。似乎病勢有加。無已。細思此病。暑從外來。悲自內生。七情外感。萃於一身。

不得不用分頭而治之法。庶一舉而兩得焉。

桑皮 骨皮 知母 川貝 阿膠 枳殼

金針菜 薑黃 菘豆衣 藕汁 佛手

原註。痰帶血點。鼻乾口燥。小水不多。大便血沫。總屬痰火為患。第一方用清金化痰不效。○第二方案。加欬血夢遺畏火三證。歸於肝火。一派清肝。略加養胃。○第三方從肺胃立方。略佐清肝之意。○第四方全以輕淡之筆。消暑化痰。

論按。統觀前後四案。議病用藥。均能層層熨帖。面面周到。於此道中。自屬老手。惟所長者。在乎周到。

續志堂醫案 卷上 失血 三 惜餘小舍

穩實。而所短者。在乎空靈活潑。此則固乎天分。非人力所能勉強矣。○第一方就病敷衍。毫無思路。

○第二方清泄肝火。力量頗大。○第三四方則用藥空靈不滯。是深得香巖師心法者。

○欬嗽而見鼻痰絡血。或夜不得眠。或臥難着枕。大便乾結。白苔滿布。時輕時重。已病半年有餘。所謂熱在上。焦者。因欬為肺痿是也。左寸脈數而小。正合脈數虛者。為肺痿之訓。而右關一部。不惟數疾。而且獨大。獨弦。獨清。陽明胃經。必有溼生痰。痰生熱。熏蒸於肺。母病及子。不獨肺金自病。此所進之藥。所以始效而終不效也。夫

肺病屬虛。胃病屬實。一身而兼此虛實兩途之病。苟非按部就班。循循調治。必無向愈之期。

紫苑錢一 麥冬錢二 桑皮錢半 地骨皮錢半 阿膠錢一 薏仁錢五

忍冬藤兩 川貝錢半 蛤殼兩 橘紅錢一 茯苓錢三 炙草錢二

詒按論病選藥。俱極精到。此方亦從葦莖湯套出。

可加蘆根。

再診 諸恙向安。右脈亦緩。藥能應手。何其速也。再守之。觀其動靜。

前方加水飛青黛三分

三診 右關之大脈已除。弦滑未化。數之一字。與寸相

繼志堂醫案 卷上 失血 惜餘小舍

同溼熱痰三者。尚有熏蒸之意。肺必難於自振。

前方加大生地錢三 蛤粉錢半 沙參錢三 蜜陳皮錢一

四診 疊進張氏法。肺金熏蒸。日輕一日。金性漸剛。頗為佳兆。然須振作。以著本來之清肅乃可。

前方去薏米 加麻仁

五診 夜來之欬嗽。尚未了了。必得肺胃漸通乃愈。

前方去蛤殼茯苓 加川斛 百合

六診 肺虛則易招風。偶然欬嗽加劇。而今愈矣。脈數

右寸空大。陰氣必虛。自當養陰為主。然陽明胃經。溼熱

熏蒸之氣。不能不兼理之。

前方去百合 加知母

七診 右脈小中帶數。肺陰不足。肺熱有餘。其所以致此者。仍由胃中之溼熱熏蒸也。

前方加絲瓜絡 冬瓜仁 葦莖

八診 肺屬金。金之母土也。胃土溼熱未清。上焦肺部。焉得不受其熏蒸。所謂母病及子也。肺用在右。右胸當

欬作疼。未便徒補。必使其清肅乃可。

前方加薏仁 杏仁

九診 來示已悉。因思動則生火。火刑於金。則欬逆火入於營。則吐血。此十七日以後之病。失於清化。以致毛

繼志堂醫案 卷上 失血 惜餘小舍

竅又開。風邪又感。欬嗽大作。欲嘔清痰。血絡重傷也。事難逆料。信然。懸擬以覆。

桑皮 地骨皮 杏仁 甘草 淡芩 茅根

知母 川貝 葦莖 忍冬藤

兩劑後去淡芩 加麥冬 沙參 生地

又 丸方

大生地 白芍 丹皮 澤瀉 沙參 茯苓

山藥 麥冬 阿膠 用忍冬藤十斤煮膏。蜜丸

原註。此病道理。盡具於第一案中。先生平日所言。

起手立定根脚。以下遂如破竹。大約此病。括定胃

起

起

火熏蒸四字。方中得力。尤在忍冬藤一味。
○宿積黑血。從此而出。胸之痞塞。少和。肺之欬嗽。略減。
是瘀血也。從上出者。為逆。非善狀。

瘀熱湯 旋降葱 葶葉 參三七 磨沖

詒按。可加酒炙大黃炭數分。研末沖服。以導血下行。

再診。所瘀之血。從下而行。尚屬順證。因勢導之。原是一定章程。

當歸 丹參 桃仁 蘊脂 蒲黃 茯神 遠志

詒按。仍宜加牛膝三七等導下之品。

繼志堂醫案 卷上 失血 惜餘小舍

○昨日所溢之血。盈盆成塊而來。無怪乎其厥矣。幸得厥而即醒。夜半得寐。其氣稍平。今日仍然上吐。脈來乳數。火升額紅。欬逆時作。大便不爽。而黑。陽明胃府必有伏熱。防其再冒。再厥。

犀角地黄湯 加三七 牡蠣 龜板 枇杷露

詒按。此與下條皆木火亢盛。陰血沸騰之證。

○久嗽失血。鮮而且多。脈數左弦。苔黃心饑。金受火刑。木寡於畏。以致陽絡被傷也。防冒。

犀角地黄湯 加二母 側柏葉

另歸脾丸

原註。吳鶴皋曰。心火也。肺金也。火為金之畏。心移熱於肺。乃欬嗽。甚則吐血而赤。名曰賊邪。是方也。

犀角能解心熱。生地能涼心血。丹皮芍藥。性寒而酸。寒則勝熱。酸則入肝。用之者。以木能生火。故使二物入肝。而瀉肝。此拔本塞源之治。

○陽絡頻傷。胸前窒塞。欬逆不爽。舌紅苔黃。脈形弦數。此係瘀血內阻。鬱而為熱。肺胃受傷。極易成損。慎之。

旋覆 狸降 葱管 蘆根 枇杷葉 忍冬藤

蘇子 桑皮 川貝 知母 廣鬱金 參三七

竹油 地骨皮

繼志堂醫案 卷上 失血 惜餘小舍

原註。前五味名瘀熱湯。是先生自製之方。治瘀血內阻。化火刑金。而欬不去。其瘀病終不愈。此為先生獨得之秘。

詒按。合二母。瀉白以清肺。佐蘇鬱三七以通痺。立方周到之至。

○脫脇痞結作痛。形寒如癘。苔濁不納。渴欲熱飲。神情憊乏。此血絡凝泣。溼邪附之。欲化熱而未能透出也。

瘀熱湯 加香附 川連 歸鬚 青皮 白芍

橘絡

○瘀血先阻於中。一經補味。胸中遂痞。紫黑之血。從此

而來。

癩熱湯 加鬱金汁

原註此方大效

詒按再加三七磨冲更妙

虛損

○疹子之後。欬嗽四月。頸旁歷串。欬甚則嘔。納少形瘦。膚熱脈細。想是餘邪內戀。陰分大虛。欲成損證也。

四物湯 加香附 川貝 元參 牡蠣 麥冬

蘇子 一本作蘇葉

詒按方中元參牡蠣為項戀而設。無此證者可減

繼志堂醫案

卷上 虛損

表 惜餘小舍

也。

○溫邪發痧之後。欬嗽失血。血止而欬嗽不減。所吐之痰。或黃或白。或稠或稀。舌質深紅。其苔滿白。喉癢啞乾。脈弦帶數。漸作痧勞之象。

四物湯 加紫蘇 桑皮 骨皮 川貝 知母

前胡 淡芩

原註此痧後餘邪。留戀營分。而成欬也。先生嘗云。余自製兩方。一為癩熱湯。一為此湯。尚未立名。以治痧後欬嗽極效。蓋四物是血分引經之藥。將溫散化痰之品。納入其中。引入營血中。散邪清熱。每

川必靈。此可悟川四物之法。

○欬嗽五月。有冷。黃昏為甚。肌肉暗削。肢體無力。容易傷風。或頭脹。或溺黃。總由陰分下虛。浮火夾痰。上擾所致。

四物桔梗湯 四物加桔梗 加桑皮 地骨皮 川貝

知母 甘草 青黛 蛤殼 枇杷葉

原註此方之眼。在欬嗽黃昏為甚。畢竟風邪陷入

陰分為劇。余目睹效者甚多。

詒按此四物合瀉白加二母蛤黛法也。

○金能克木。木火太旺。反侮肺金。金藏尚受木克。則其

繼志堂醫案

卷上 虛損

詒 惜餘小舍

吸取腎水。疏泄腎精。更屬易易。此夢遺欬嗽之所由作也。

天冬 生地 黨參 黃柏 甘草 砂仁 白芍

龍膽草

原註此三才封髓丹。加白芍龍膽也。其人面必黑。瘦有一團陰火熾甚。克肺傷腎。用之極效。

詒按此方以清泄肝火為主。竟不兼用肺藥。所謂治病必求其本也。

○子後欬嗽。天明而緩。脈形弦數。聲音不揚。肝膽之火未清。金受其刑。水必暗虧也。

補肺阿膠湯合四陰煎瀉白散 加川貝 青黛

海浮石 橘紅 竹茹

詒按此與前案均屬水火刑金之證。前方治肝而絕不及肺。想因欬勢不甚而下注遺泄之證。却急故用藥如彼。此證則欬甚音低。肺金受損已深。故於清火之中偏重補肺。觀乎此而臨證用藥之權衡可識矣。

○欬嗽失血音燥咽乾。近來小有寒熱頭痛喉疼。脈浮促而數。肺陰久傷。又兼燥氣加臨。補肺之中當參以辛散。

繼志堂醫案 卷上 虛損

罕 惜餘小舍

補肺阿膠湯 加桑葉 枇杷葉

再診 頭痛咽疼已止。寒熱亦輕。新受之燥邪。漸得清散。無如金水兩虛。失血久嗽。音燥咽乾等證。仍如損象。即使靜養。猶恐不及。

四陰煎合瀉白散 加川貝 杏仁 阿膠 茯苓

石決明

原註此病肺藏已損。再受燥邪。小有寒熱頭痛咽疼。是其的據。先用補肺阿膠湯。以其中有牛蒡杏仁。加桑葉枇杷葉。去其燥邪外證。後用四陰煎。加味以圖其本。

○陽絡頻傷之後。欬嗽痰濃。內熱喘乾。脈乳數。左關獨弦。此肝火刑金。金氣不清之候。容易成損。慎之。

四陰煎 加二母 羚羊

另瓊玉膏 地冬參蜜流香珀

原註肝火刑金。於左關獨弦見之。所以四陰更加羚羊。

○失血後。欬嗽夢遺。脈數左關弦急。必有肝火在裏。既犯肺金。又泄腎氣也。久延勢必成勞。

四陰煎 加陳皮 川貝 海浮石 青黛

龍膽草 六味湯

繼志堂醫案 卷上 虛損

罕 惜餘小舍

原註肝火上下交征。故加龍膽以泄之。

詒按六味湯想係轉方。增入者。但其中有萸肉之酸溫。專補肝陽。尚宜酌用。

○失血久欬。陰分必虛。虛則不耐熱蒸。食西瓜而稍退。脈數左弦。唇乾苔白。色滯溺黃。加以咽痛。久而不愈。想是水不涵木。陰火上衝。胃氣不清也。勢欲成勞。早為靜養。以冀氣不加喘。脈不加促。庶幾可圖。

生地 白芍 茯苓 澤瀉 丹皮 花粉 元參

甘草 豬膚 青蒿露 枇杷葉露

再診 濁痰雖少。欬逆仍然。陰分之火上衝於肺。肺屬

至金受火。則水之生源絕矣。能不慮其脈促氣喘乎。知命者自能靜以養之。

八仙長壽丸 加元參 阿膠 陳皮 甘草

枇杷葉露

三診 欬嗽夜來有或重或輕之象。想是陰火靜躁不同耳。

前方加洋參 龜板 杏仁

四診 所進飲食不化為津液。而變為痰涎。一俟水中火發。欬嗽作焉。權以化法。

玉竹飲子 玉竹 荅草 桔 橘 苑 貝 姜 合麥門冬湯 加阿膠

繼志堂醫案 卷上 虛損 星 惜餘小舍

百合 欬冬

原註前兩方六味加減法也。脈數左弦咽痛。水不涵木。陰火上衝。惟苦白二字。為胃氣不清之證。此病頭緒甚繁。方中一一還他的對之藥。

論按此等證本無必效之方。似此斟酌妥帖。即使難期必效。亦覺心苦為分明矣。

○脈形細數。細屬陰虧。數為有火。火上刑金。水即絕其生源。未可以欬嗽小恙目之。幸而氣息未喘。脈象未促。尚能靜養。猶可以作完人。

生地 麥冬 沙參 石決明 地骨皮 桑皮

阿膠 枇杷葉露
論按此清滋金水兩藏之平劑。但患陰虛而不挾別項邪機者。可仿此調之。

門生 趙樹誠 全校

繼志堂醫案 卷上 虛損 星 惜餘小舍

評選繼志堂醫案下卷

江陰柳氏醫
學叢書之六

江陰柳寶詒穀孫選評

及門諸子 參校

嘔噦

○上焦吐者從乎氣。氣屬陽。是陽氣病也。胸為陽位。陽位之陽既病。則其陰分之陽更屬大虛。不言而喻。恐增喘汗。

吳萸 乾薑 人參 川附 茯苓 半夏

木香 丁香 炙草 飴糖 食鹽 陳皮

續志堂醫案 卷下 嘔噦 二借餘小舍

再診 進溫養法。四日不吐。今晨又作。想是陽氣大虛。濁陰上泛。究屬膈證之根。不能不慮其喘汗。

前方去乾薑 加當歸 生薑

原註陽氣大虛。濁陰上泛。此病之樞紐也。吳茱萸湯補胃陽。佐以熟附丁香溫之至矣。輔以二陳燥其痰。飴糖去其垢。更加炙草以和中。食鹽以潤下。用意極其周密。

○食則右脇下痛。痰自上升。升則得吐而安。右脈弦滑。左關堅急。寸部獨小。此心氣下鬱於肝經。脾弱生痰為膈。放開懷抱。第一要義。

旋覆代赭湯去薑 加生於朮 白芥子 炙草

廣皮 竹油

另丸方 六君子湯 加當歸 白芍 生地

茯苓 沉香 白芥子 竹油薑汁泛丸

原註心氣下鬱。脾弱生痰。方中於朮乾薑二陳竹油。補脾化痰之藥也。更有白芥子消膜外之痰。旋覆花開心氣之結。赭石鎮肝氣之逆。用意層層都到。

○食則噎痛。吐去濁痰而止。胸前常悶。脈象絃滑。舌苔滿白。肌肉瘦削之人。陰血本虧。今陽氣又結。陰液與痰濁交阻上焦。是以胃脘狹窄也。久則防膈。

乾薑 薤白 炙草 枳頭棟 神麴 丁香

木香 熟地 白蔻仁 歸身 白芍 沉香

牛黃 竹油

再診 胸前所結之邪。原有化意。無如陰之虧。湯之結。尚與前日相等。非一兩劑所能奏效。

乾薑 薤白 炙草 茯苓 丁香 木香 陳皮

麻仁 旋覆花 代赭石 歸身 白芍 枳子

牛黃 竹油

詒按此氣結痰阻之證。用藥極周到。

○嗜酒中虛。淫熱生痰。痰阻膈間。食下不舒。時欲上泛。年已甲外。營血內枯。氣火交結。與痰相併。欲其不成。膈也難矣。

七聖散 加歸身 白芍 薤白 代赭石

藕汁 紅花

原註。嗜酒者必多溼熱。須用竹茹連薤。又易挾痰。參入藕汁紅花薤白。辛而兼滑。又是一格。絕去溫熱剛燥之品。先生曰。惟善用溫藥者。不輕用溫藥。信然。

○向患偏枯於左。左屬血。血主濡之。此偏枯者。既無血

繼志堂醫案 卷下 嘔噦 三惜餘小舍

以濡經絡。且無氣以調營衛。營衛就枯。久病成痼。然一飲一食。所吐之中。更有濁痰紫血。此所謂病偏枯者。原從血痺而來。初非實在枯槁也。勉擬方。

每日服人乳兩三次 間日服鷲血一二次

論按。偏枯已屬難治。更加以膈。愈難措手矣。方祇參參兩味。而潤液化痰。通痺開結。面面都到。此非見理真切。而又達於通變者。不能有此切實靈動之方。愚意再增韭汁一味。似乎更覺親切。

○脈形細澁。得食則噎。胸膈隱隱作痛。痰血內阻。胃絡不通。此膈證之根。

歸鬚 白芍 白蜜 蘆根 瓦楞子 醋韭汁 人參 桃仁

論按。此痰血膈也。脈證均合。用藥亦專。注在此。○痰血挾痰。阻於胸膈。食則作痛。痛則嘔吐。右脈澁數。惟左關獨大且弦。是痰瘀之外。更有肝經之氣火。從而和之為患。乃膈證重候。慎之。

歸身 白芍 蘆根 瓦楞子 紅花 絲瓜絡 橘絡 竹油 白蜜

原註。以上三病。皆痰膈也。第一證從偏枯中。想出

血痺。用人乳以潤其枯燥。鷲血以動其瘀血。此證繼志堂醫案 卷下 嘔噦 四惜餘小舍

非特剛劑不受。并柔補之藥。亦不可投。萬不得已。而為此法。仍是潤液化痰之意。柔和得體。○第二證從胸前隱痛。而知其痰阻胃絡。用桃仁醋煨瓦楞子以化其痰。此證血瘀液涸。無論乾薑不可用。即薤白辛溫通氣。亦與此隔膜。然非辛不能通計。惟用濡潤之韭汁以通之。蜜蘆歸芍。奠安營分。以其液潤也。此病不見痰。所以純從濡潤去痰之法。○第三證見痰。所以瓦楞子紅花外。又加竹油一味。

○淫熱生痰。阻於胃脘。得食則噎。噎甚則吐。此膈之根。

也。

半夏 陳皮 川連 竹茹 白朮 生薑

雞距子 枇杷葉 查炭

原註指為溼熱。想因苔帶黃色也。用七聖散者。中有橘皮竹茹湯。又有溫膽湯。兩方在內。更加枇杷葉泄肺。查炭消痰。雞距子消酒積。總不外溼熱二字。此猶是脈之流者。

○食已即吐。脈弦苔白。便溏溺清。溼痰內勝。被肝經淫氣所衝。

旋覆花 代赭石 陳皮 半夏 萊菔子 生薑

繼志堂醫案 卷下 嘔噦 五惜餘小舍

茯苓 雪羹湯

再診 吐逆大減。胸前尚痞。噯氣不舒。

旋覆代赭湯 雪羹湯

詒按此證陰液未曾大虧。通陽開結。專理其痰。降而嘔逆自滅。尚非證之重者。

○咽中介介。如有炙餅。痰氣交阻為患。

蘇葉 半夏 川楝 茯苓 竹茹 陳皮

石決明 牛膝

原註此咽膈也。痰結於肺。用四七湯以理其氣。合溫膽湯以化其痰。去似實換牛膝者。欲其達下焦也。

也。

○得食多噦。許氏法主之。

丁香 陳皮 川朴 半夏 茯苓 甘草

枇杷葉 茅根

原註此枇杷葉散。去香薷一味也。此另是一種。邪挾寒飲內停。或食瓜果。致中氣不調而嘔噦者。不當深求之裏也。去香薷者。無表證也。

○食已即吐。本屬胃病。宜用溫通。然口雖乾。苔反白。將吐之時。其味先酸。此必有肝火鬱於胃府。似與胃家木病有間。

繼志堂醫案 卷下 嘔噦 六惜餘小舍

左金丸合溫膽湯 雪羹湯

詒按辨證精細。用藥妥切。

○脾胃

○脾陽不足。溼濁有餘。少納多脹。舌白脈遲。

茅朮理中湯合四七湯

詒按此溼滯而兼氣鬱之證。

○胸膈

○胸膈微背。是名胸痺。痺者胸陽不曠。痰濁有餘也。此病不惟痰濁。且有瘀血。交阻膈間。所以得食梗痛。口燥不欲飲。便堅且黑。脈形細澀。昨日紫血從上吐出。究非

順境必得下行爲安。

全瓜蒌 薤白 旋覆花 桃仁 紅花 瓦楞子
元明粉 合二陳湯

詒按方法周到不蔓不支擬加參三七磨沖○胸痺證前人無有指爲瘀血者如此證納食梗痛乃瘀血阻於胃口當歸入噎膈證內論治矣

○心痛徹背是名胸痺久而不化適值燥氣加臨更增欬嗽咽乾痰中帶紅脈形細小治之不易

瓜蒌 薤白 枳殼 橘紅 杏仁 桑葉
枇杷葉

繼志堂醫案 卷下 痺氣 七情餘小舍

詒按既因燥氣加臨痰紅噎乾似當參用清潤如喻氏法擬加旋覆花南沙參麥冬桑皮

腕腹痛

○心痛有九痰食氣居其三三者交阻於胃時痛時止或重或輕中脘拒按飲食失常痞悶難開大便不通病之常也卽有厥證總不離乎痛極之時茲乃反是其厥也不發於痛極之時而每於小便之餘陡然而作作則手足牽動頭項強直口目歪斜似有厥而不返之形及其返也時有短長如是者三矣此名痲厥良以精奪於前痛傷於後龍雷之火挾痰涎乘勢上升一身而兼痛

兩病右脈不暢左脈太弦蓋弦則木乘土位而痛又挾陰火上衝而厥必當平木爲主兼理中下次之蓋恐厥之愈發愈勤痛之不肯全平耳

川椒 七烏梅 分三青鹽 分一龍齒 錢三查炭 錢三神麩 錢三
萊菔子 錢三延胡 錢半川棟子 錢半青皮 分七橘葉 錢一竹油 兩

詒按厥發於小解之時其厥之關於腎氣可知矣用藥似宜兼顧○立方選藥熨帖周到

再診 據述厥已全平痛猶未止便黑溺黃右脈反弦想諸邪都合於胃也胃爲府以通爲補懸擬方

芍藥 青皮 陳皮 黑梔 川貝 丹皮
繼志堂醫案 卷下 腕腹痛 七情餘小舍

查肉 竹油 萊菔子 青鹽 延胡
詒按諸邪都合於胃從右脈之弦看出是病機緊要處

要處

三診 痛厥已平尚有背部隱疼之候腰部亦疼氣逆欬喘脈形細數想肝腎陰虛氣滯火升肺俞絡脈因之俱受其傷也

四物湯 旋覆花湯 二母 雪羹湯
四診 腰脊尙疼欬嗽不止苔白底紅脈形弦細是陰虛而挾溼熱也

豆卷 茯苓 黑梔 川芎 歸身 麥冬

沙參 甘草 雪羹湯 半夏

原註此素有痰積。又腎虛而相火上衝於胃。胃中痰飲。阻滯竅隧。癩厥見焉。第一方用泄肝和胃法。以化其阻滯。合金鈴子散。以清肝火。加查麴以消食。煎子竹油以化痰。厥平而痛未愈。故第二方用景岳化肝煎。以代金鈴子散。兼以化痰。第三方通其絡。第四方仿白痰藜丸。專於治痰。

論按此證得力。全在前兩方。疏肝化痰。絲絲入籠。脾氣素虛。溼鬱難化。而木之鬱於內者。更不能伸。所以酸水酸味。雖有滅時。而灰白之苔。終無化日。無怪乎

繼志堂醫案 卷下 九情餘小舍

脈小左弦。腕脇脹痛也。此厥脹之根。毋忽。

附子理中湯合二陳湯 加川朴 香附 川芎

神麴

論按似可參用柴芍輩於土中泄木。

○病分氣血。不病於氣。即病於血。然氣血亦有同病者。即如此病。胃腕當心而痛。起於受創。得食則緩。豈非氣分病乎。如獨氣分爲病。理其氣即可向安。而此痛雖得食而緩。午後則劇。黃昏則甚。屬在陽中之陰。陰中之陰之候。其爲血病無疑。况但頭汗出。便下紫色。脈形弦細而數。更屬血病見證。但此血又非氣虛不能攝血之血。

乃痛後所瘀者。瘀則宜消。虛則宜補。消補兼施。庶幾各得其所。

治中湯合失笑散

另紅花 元明粉 爲末和勻。每痛時服二錢。

原註分明兩病。一是脾虛。氣分不能暢達而痛。得食則緩。宜補可知。然人每疑痛無補法者。以痛必有痰氣凝滯也。先生用理中以補脾。即加青皮陳皮以通氣。至便紫脈弦數。肝家之血。必有瘀於胃脫者。此時不去其有形之瘀滯。痛必不除。痛根不拔也。此種病。世醫不能治。往往以爲痼疾。不知不

繼志堂醫案 卷下 十情餘小舍

去瘀則補無力。徒去瘀則脾胃更傷。先生則雙管

齊下。立案清徹底盡金鍼。非名家惡能如是。

○胃腕當心而痛。少腹氣升。嘔吐酸苦痰涎。脈形弦數。顯係寒熱錯雜之邪。鬱於中焦。肝屬木。木乘土位。所有積飲。從此衝逆而上。病已年餘。當以和法。

附子理中湯 加川連 薑汁 川椒 黃柏 歸身

細辛 半夏 桂枝 烏梅肉

原註此連理湯合烏梅丸。吐涎酸苦。是胃中錯雜之邪。用姜連半夏以化之。逆衝而上之肝氣。用烏梅法以和之。

論按半夏反附子。在古方多有同用者。然可避則避之。亦不必故犯也。

○胃脘當心而痛。脈形弦數。舌絳苔黃。口乾苦。小便赤。一派火熱之象。氣從少腹上衝於心。豈非上升之氣。自肝而出。中挾相火乎。

化肝煎 芍青施澤丹陳貝

○腕痛下及於臍旁。及於脇口。乾心悸。便栗溺黃。脈弦而數。此鬱氣化火也。

化肝煎合雪羹

原註此景岳化肝煎也。必肝有實火者可用。口乾

繼志堂醫案 卷下 腕腹痛 十一 惜餘小舍

脈數溺黃。是其的證也。

○中焦失治為痛。以治中湯為法。是正治也。不知中焦屬土。土既虛。不能升木。木即鬱於土中。亦能作痛。以逍遙散佐之。更屬相宜。

治中湯 逍遙散 雪羹

論按此木鬱土中之病。立方妥帖易施。

○瘀血腹痛。法宜消化。然為日已久。脾營暗傷。又當兼補脾陰為妥。

歸脾湯去耆朮 加丹參 延胡

論按此病用補。是專在痛久上着眼。

○當臍脹痛。按之則輕。得食則減。脈形細小而數。舌上之苔。左黃右剝。其質深紅。中虛伏熱使然。

治中湯 加川連 雪羹

論按此等證不多見。立方亦甚難。須看其用藥的當處。

○少腹久痛未痊。手足攣急而疼。舌苔灰濁。面色不華。脈象弦急。此寒溼與痰。內壅於肝經。而外攻於經絡也。現在四肢厥冷。宜以當歸四逆湯加減。

當歸 小茴香炒 白芍 肉桂炒 木通 半夏 苡仁 防風 茯苓 橘紅

扶苓 橘紅

繼志堂醫案 卷下 腕腹痛 十二 惜餘小舍

論按寒溼入於肝經。病與疝氣相似。治法亦同。

再診 少腹之痛已止。惟手冷攣急未愈。專理上焦。

蠲痺湯 防羌姜黃歸 去防 合指迷茯苓丸

○少腹作痛。甚則嘔吐。脈右弦左緊。俱兼數。舌苔濁膩。口中乾苦。頭脹溺赤。此溼熱之邪。內犯肝經。挾痰濁上

升所致。泄之化之。得無厥逆之虞為幸。

旋覆花湯 三子養親湯 蘇子白芥子萊菔子 金鈴子散

另烏梅丸

論按旋覆金鈴以止痛。三子以除痰。更用烏梅丸以泄肝。所以面面都到也。

再診 嘔吐已減。白苔稍化。頭脹身熱亦緩。惟腹之作痛。便之下利。脈之緊數。以及口中之乾苦。小水之短赤。尚不肯平。肝經寒熱錯雜之邪。又挾食滯痰濁為患也。仍宜小心。

葛根黃芩黃連湯 加延胡 查炭 赤苓

陳皮 萊菔子

另烏梅丸

詒按。想因下利較甚。故用藥如此轉換。

三診 餘邪流入下焦。少腹氣墜於肛門。大便泄。小便短。舌苔未淨。更兼痔痛。

繼志堂醫案 卷下 脘腹痛 三 惜餘小舍

四苓散合四逆散 加黃芩 黃柏 木香

詒按。至此而內伏之溼熱。從兩便而外泄矣。

○肝脈布於兩脇。抵於少腹。同時作痛。肝病無疑。肝旺必乘脾土。土中之痰濁溼熱。從而和之為患。勢所必然。

逍遙散 柴胡 芍藥 白朮 茯苓 甘草 加 枳殼 木香 化肝煎

詒按。此治肝氣脇痛。誠然。合劑案所云。溼熱痰濁。

雖能兼顧。嫌未着力。

○氣結於左。自下而盤之於上。脹而且疼。發則有形。解則無跡。甚則脈形弦數。口舌乾燥。更屬氣有餘。便是火之見證。急須化肝。

化肝煎

詒按。凡肝氣上逆者。多挾木火為病。故化肝煎為要方。

○中脘屬胃。兩脇屬肝。痛在於此。忽來忽去。肝胃之氣。滯顯然。已歷二十餘年。愈發愈虛。愈虛愈痛。氣分固滯。血亦因之乾澀也。推氣為主。逍遙佐之。

肉桂 枳殼 片姜黃 延胡 炙草 逍遙散

再診 病勢不增不減。診得左脈細澀。右部小弱。氣血久虛。致使營衛失流行之象。非大建其中不可。

肉桂 歸身 白芍 川椒 飴糖 乾薑

繼志堂醫案 卷下 脘腹痛 四 惜餘小舍

陳皮 炙草 砂仁

原註。前方嚴氏推氣散也。先生謂左脇作痛。是肝火用抑。青金即左以瀉心平木。右脇作痛。是痰氣用推氣法。以理氣化痰。○按。姜黃入脾。能治血中之氣。蓬朮入肝。能治氣中之血。鬱金入心。專治心胞之血。三物形狀相近。而功用各有所宜。

詒按。久病中虛。改轉方用大建中法。

○腹左氣攻脹痛。上至於脘。下及少腹。久而不愈。疝瘕之累也。痛極之時。手足厥冷。嘔逆當從肝治。

當歸四逆湯 歸身 芍藥 甘草 通草 薤白 辛通 薑棗 合二陳湯 吳仙散 茯苓

論按病偏於左。更加支厥。此肝病確據也。再診。痛勢已緩。尙有時上時下之形。邪未盡也。

吳仙散合良附散 一陳湯 去甘草

加當歸小茴香炒 肉桂炒

如氣門

○狐疝卧則入腹。立則出也。

補中益氣湯

另金匱腎氣丸合小安腎丸香附川烏茴香 椒目川棟熟地

原註。疝氣一證。論其本。未有不由氣虛。而溼濁隨之下陷者。故以補中益氣湯爲主方。俾脾之清氣

繼志堂醫案 卷下 疝氣 五情餘小舍

得以上升。則小腸膀胱之濁氣。自然下降。又有挾勞倦外感而發者。方中柴胡。借用亦妙。寒加溫藥。溼火甚加知藥。

論按此因下墜過甚。故用補中以升清氣。其實亦非治疝正法也。

○脾宜升主健。胃宜降主和。此病氣升而嘔。胃不降也。疝氣下墜。脾不升也。而所以升降不調者。由脾虛下陷。溼痰中結。而衝逆於胃脘也。理其中陽。則上下自調。

六君子湯 加乾姜 青皮 小茴香 萆薢 九香蟲

論按此因嘔吐。有上逆之勢。故不用補中。而變法治之。

又按此證若用烏梅丸。則上下均在治中。緣痛嘔疝氣。均由肝病故也。

再診。治中胃痛已和。疝氣仍然下墜。擬於補脾之外。佐以補腎。使其火土合德。則陽旺於中。而生氣勃然。不升自升矣。

香砂六君丸合金匱腎氣丸

論按此證從肝經着意。似較靈動。專補脾腎。猶恐涉於呆實。

繼志堂醫案 卷下 疝氣 去情餘小舍

○狐疝原屬肝經之溼。隨氣下陷。脾陽必衰。而今夏多食冷物。陽氣又被所遏。苔白不乾。指冷脈小。右舉丸脹大。當以溫散。

大順散乾薑肉桂 杏仁甘草 加當歸 木香 荔枝核

論按此因生冷傷中。故用大順。亦非治疝正法。

○寒氣客於腸外。與血沫相搏。臍下結瘕。脹大下墜。不時作痛。痛則氣升自汗。脈形弦澀。此爲鼓脹之根。毋忽。

吳萸 茯苓 當歸 川棟子 橘紅 烏藥 香附 查肉

論按既因於寒。似可再加溫通之品。既與血沫相搏。似宜兼和營血。
○痕聚腕中久而不化。變為攻痛。升逆妨食便堅。理之不易。

川棟子 延胡 當歸 白芍 陳皮 鼈甲
紅花 血餘 茯苓 牛膝 丹皮

論按此病之偏於血分者。故方中兼用疏瘀之品。特所敘病情。尚無瘀血的據。

○最虛之處。便是容邪之處。肝絡本虛。隱癖久踞。中宮又弱。隱癖潛入其間。欲治此病。培補肝脾為主。和化次之。
繼志堂醫案 卷下 瘦癖 七 惜餘小舍

歸芍六君子湯 加雞內金
另小溫中丸

論按此亦虛實兼治之法。然而收效甚難。脈來細而附骨者。積也。已經半載。不過氣行作響而已。而其偏於腸下者。牢不可破。是寒食挾痰。阻結於氣分也。此等見證。每為脹病之根。

理中湯 加神麴 茯苓 半夏 陳皮 麥芽
旋覆花 枳殼 歸身
再診 腸下隱癖。牢不可破。其氣或逆或攻。必溫化以

絕脹病之根。

理中湯合二陳湯 加川朴 枳殼 神麴
竹油 旋覆花 白芥子

論按讓論則見微知著。用藥則思患豫防。此為高識。

○食入而痛。是有積也。積非一端。就脈弦數。二便黃熱。乾欬不爽。面黃苦白言之。必有溼熱痰食。互相阻滯。經年累月。無路可出。無力以消。

茅朮 川芎 查炭 神麴 川貝 山梔
赤苓 枇杷葉露 杏仁

繼志堂醫案 卷下 瘦癖 七 惜餘小舍
論按此越鞠丸加味也。愚意再加白芍枳實。

○寒熱後。腕左隱癖作疼。脈形弦細。舌苔濁厚。溼熱痰食。交相為患。

二陳湯去甘草 合雞金散 砂沈陳加蘇梗
查肉 青皮

論按此尚是初起實證。故用攻消法取效。立方亦極平穩。

再診 腕左之隱癖漸消。舌上之濁苔漸化。仍宗前法。參入補脾之品。
前方去蘇梗 加於朮 炙草

另服水泛資生丸

○隱癖踞於脇下。肝經病也。

化肝煎

詒按此亦初起之病。想由肝鬱而起。故專從泄肝立法。但恐藥輕不能奏效耳。

原註前證溼熱居多。此證肝火為重。相機而治。各有條理。

○瘧久邪深入絡。結為瘧母。瘧母在左。自下攻逆。加以右脇結癖。上下升降俱窒。無怪乎中宮漸滿。理之不易。

雞金散 加枳殼 薑黃 白芥子 竹油

續志堂醫案

卷下

瘧癖

九 惜餘小舍

另隨甲煎丸

原註左屬血為肝。瘧邪滯於血中。主以隨甲煎丸。右屬氣屬胃。或痰或食。主以雞金推氣。加竹油白芥子。

詒按此兩層兼治之法。

腫脹

○營血本厥。肝火本旺。責在先天。乃後天脾氣不健。肝木乘之。所進飲食。生痰生溼。貯之於胃。尚可從嘔而出。相安無事。遲之又久。滲入膜外。氣道不清。脹乃作焉。脾為生痰之源。胃為貯痰之器。若非運化中宮。兼透膜外。

則病勢有加無已。成爲臌病。亦屬易易。夫脾統血。肝藏血。病久血更衰少。不得不佐以和養。古人之燥溼互用。正爲此等證設也。

歸芍六君子湯去參草 加白芥子 萊菔子 車前子 川樸 蘇子 腹皮 竹油 雪羹

詒按用藥虛實兼到。親切不浮。

○諸腹脹大。皆屬於熱。諸溼腫滿。皆屬於脾。脾經溼熱。交阻於中。先滿後見腫脹。膚熱微汗。口渴面紅。理之不易。

防已 茯苓 石膏 腹皮 陳皮

續志堂醫案

卷下

腫脹

三 惜餘小舍

再診 溼熱滿三焦。每多腫脹之患。如邪勢偏於下焦。小便必少。前人之質重開下者。原爲此等證而設。然此病已久。尚盛於中上二焦。胡以中上兩焦法施之。諸恙不減。或者病重藥輕之故。將前方制大其劑。

竹葉 石膏 鮮生地 麥冬 知母 半夏

五皮飲

原註此十二歲女子。腹暴脹大。而面俱腫。面紅口渴。小便黃。此證屬熱。所見甚少。

詒按此等方治脹病。非有卓見者不能存之爲臨證者。增一見解。

○腕腹膨脹。二便失調。經絡痠痛。四肢無力。脈形弦細。舌苔白膩而厚。此溼邪內鬱。當用苦辛宣泄。

茅朮 川芎 香附 黑梔 神麴 腹皮
川樸 赤苓 澤瀉 薑皮

詒按。此亦溼鬱而化熱者。故兼川樸薑皮清泄之品。再診 諸恙向安。肢體無力。健脾為主。

香砂六君子湯

原註。此越鞠改方。而加胃苓之半。本方治溼鬱。其眼在舌苔白膩而厚。在所必效。余每借以治黃疸。

亦效。挾痰頭項痛亦效。

繼志堂醫案 卷下 腫脹 三惜餘小舍

○脾上溼。溼因脾虛而鬱。鬱蒸為熱。所以隱癖偕逆中宮。大腹脹滿。納少便溏。面黃溺赤。欬嗽身熱。時作脈息弦細。極易成臌。

越鞠丸 附蒼朮 雞金散 加赤苓 青蒿
黃芩 川樸

原註。此越鞠證。而兼隱癖。溼化熱者。故合雞金消癰。芩蒿化熱。

原註。以上越鞠丸證。大約越鞠治無形溼熱之痞。從瀉心化出。雞金治有形食積之癖。從陷胸化出。且如腕痛門中。鬱痰作痛。脈數多渴者。用清中蠲

痛湯。山柃薑汁炒乾。薑川芎。童便炒黃連。薑汁炒炒。若光童便浸切。麻油炒香。神麴薑汁炒。火礬作痛發熱。中寒熱。中寒熱為主。即越鞠加薑連橘棗可知。此方治氣火溼食血五者之鬱。信極妙矣。說者以梔主火。朮主溼。香附主氣。芎主血。麴主食。分爲五鬱。似可不必。正如五音必合奏而始和也。

○大腹脹滿。已經四十餘日。近來氣更急促。足跗浮腫。滿黃口乾。脈形弦數。溼熱之邪。因氣而阻。因食而劇。理之不易。

廓清飲 廓清飲用芥陳。樸枳。澤。茯苓。同大腹。去芥枳。煎子生研。壅滯通氣。逆虛。均堪服。去芥枳。

繼志堂醫案 卷下 腫脹 三惜餘小舍

加黑梔 猪苓 蘇梗 川連 香附
原註。溫藥留手處。在口乾溺黃四字。

○脾虛則溼熱內鬱。爲臌。從去鬱陳莖劑治之。廓清飲去芥 加蘇葉 香附 冬朮

另小温中丸。朝暮各錢半。

詒按。腹滿由於脾之不運。其所以不能運者。痰也。溼也。濁也。氣也。痰也。故方中多用疏氣化痰。清利溼熱之品。

○大腹主脾。腹大而至臍突。屬脾無疑。然脈無虛日。痛又間作。舌苔薄白。脈息沈弦。兄於經期落後之體。顯係

血虛不能斂氣。氣鬱於中。寒加於外。而脾經之溼。因而
不消。

逍遙散合雞金散 加香附

論按沈弦與沈細不同。沈細色萎。則理中證。此證
拈住鬱字。故用逍遙。

○單腹脹脾氣固處。久則脾氣亦虛。大便溏者。氣更散
而不收矣。所用之藥。比之尋常溫補脾腎者。當更進一
層。然用之已晚。惜乎。

附桂理中湯 加肉桂 當歸 牡蠣 木瓜

茯苓 生脈散

續志堂醫案 卷下 腫脹

惜餘小舍

論按案云。較之尋常溫補。更進一層。觀方中所加
肉果當歸。是啟峻法也。

○大腹脹滿便溏。舌苔冷白。乾喜熱飲。膚熱脈數。脾陽
大虛。無力運化溼濁。而成臌也。理之棘手。

附桂治中湯 加木瓜 草果 當歸

再診 進溫補四劑。腹脹漸和。其邪從下焦而泄。所以
大便作瀉。然膚熱未退。小便未長。乾欲熱飲。胃不思穀。
白苔已薄。舌質轉紅。中陽稍振。溼熱未消。

理苓湯

原註。舌苔冷白。是桂附把柄。四劑而能便泄。邪從

下出。中陽尚好。脾氣尚未衰盡。更以舌質轉紅。知
溼熱壅甚。所以轉方。減去附桂。參朮已足扶脾外。
加四苓驅溼而已。

○大便作瀉。小水又長。肝脾腎三經。即有陰邪。亦可從
此而消。何以隱癖尚踞於中。腹脹不和。是陽虛也。

四君子湯 加黃耆 當歸 桂枝 附子 陳皮
肉果 沉香 乾薑 牡蠣 龍甲 雞內金

原註。此啟峻湯也。附子理中。加黃耆當歸肉果。比

附子理中。更進一層。

○太陰腹滿。寒溼有餘。真陽不足。脈弦下體不溫。乾不

續志堂醫案 卷下 腫脹

惜餘小舍

欲飲。妨食氣短。其勢頗險。擬以溫通化溼法。

附子茅朮治中湯 加川樸 半夏

論按。此亦通補兼施之法。

○溫補元陽。浮腫脹滿。有增無減。陽之衰也。極矣。臍平
脈遲之候。非溫不可。非補亦不可。然溫補亦不見長。蓋
下泄者。腎更傷耳。

附子理中湯合四神丸 來復丹

論按。此法較腎氣丸。更進一層。

○太陰腹滿。寒溼使然。陽若不旺。勢必成臌。

附子理中湯 加川樸 大腹皮 澤瀉 猪苓

論按此脾陽不振。寒溼停滯之證。故用溫化法。
○中滿者。塌之於內。其始非不運消。其後攻之。不消矣。
其後再攻之。如鐵石矣。此病雖不至如鐵石。而正氣久傷。終非易事也。

治中湯 五苓散

原註以上皆理中加減法也。因記當年侍先生時。問理中之變換如何。曰理中是足太陰極妙之方。如以中宮之陽氣不舒。用乾薑者。取其散。少腹之陽氣下陷。用炮薑者。取其守。其變換在大便之溏與不溏。溼甚而無汗者。用茅朮。溼輕而中虛者。用

續志堂醫案 卷下 腫脹

五 惜餘小舍

冬朮。其變換在舌苔之濁與不濁。此本方之變換也。設脾家當用理中。而胃家有火。則古人早定連理一方矣。設氣機壅滯。古人早定治中一方矣。設脾家當用理中。而其人真陰虧者。景岳早有理陰煎矣。其腎中真陽衰者。加附子固然矣。其衰之甚者。古人又有啟峻一方矣。此外加木瓜則名和中。必兼肝病。加枳實茯苓。治胃虛挾食。古人成方。苟能方方如此用法。何患不成名醫哉。因附錄之以為用理中之法。
○諸溼腫滿。皆屬於脾。因勞倦所傷。內溼與外溼合而

為一。鬱於土中。致太陰之氣化不行。治病必求其本。先以實脾法。

川附 於朮 茯苓 陳皮 草果 大腹皮
烏藥 木瓜 澤瀉

論按案云實脾。而方中仍屬溫通之品。此非實脾正法也。

○初起痞滿。繼增腹脹。臍突筋露。足跗浮腫。大便溏泄。此溼熱內壅。中虛不化。勢從下走也。用藥最為棘手。且從口苦舌紅。小便短赤。立方。

桂心 茯苓 猪苓 白朮 澤瀉 石膏
續志堂醫案 卷下 腫脹
五 惜餘小舍

寒水石 滑石

論按此河間甘露飲也。用五苓以降溼。三石以清熱。

○欬而腹滿。經所謂三焦欬也。苔黃乾苦。臥難着枕。肢冷陽縮。股痛囊腫。便溏溺短。種種見證。都屬風邪溼熱。滿布三焦。無路可出。是實證也。未可與虛滿者同日而語。

桑皮 骨皮 苓皮 薑皮 大腹皮 薑皮
防己 杏仁 蘇子 葶藶子 車前子

論按溼熱壅盛。脾不輸運。脾不肅降。故立方專用

疏化仿五皮五子法。

○中陽不足寒溼有餘。脘痞納少。舌白便溏。脈細小。法當溫化。即平為妙。

茅朮理苓湯 加大腹皮 雞內金 葛花 川樸

再診 溫化不足以消脹滿。陽之虛也甚矣。重其制以濟之。

茅朮 錢半 川附片 錢半 乾薑 錢半 黨參 錢三 肉桂 七分 防風 錢二

茯苓 錢三 五茄皮 錢三 陳皮 錢一

三診 諸恙向安。仍守前法。以祛留溼。

川附片 錢一 桂枝 錢一 黨參 錢三 生於朮 錢半 茯苓 錢半

繼志堂醫案 卷下 雜症 五積散小治

詒按茅朮改於朮。想重濁之白苔已化也。○此證

純以溫化得效。所謂陽運則溼自化也。

○隱癖日久。散而為脹。所以左脇有形作痛。大腹漸滿。

便出紅色。垢積更兼脘中因食而痛。久吐痰涎。帶痰。元

氣益虛。竟有不克支持之象。收散兩難。洵屬棘手。

香圓皮 人中白 桃仁泥 雞內金 炙鹽甲

射干 牡蠣 川貝母 陳皮 砂仁 雪羹

詒按別錄謂射干治老血作痛。

再診 大便之紅積已除。胃中之痰涎仍泛。大腹之脹滿如此。何堪磨耐。

前方去陳貝 加瓦楞子 延胡 丹參 鮮藕

原註此癖散成脹。上下見血。分明有瘀。消痰消癖。

一定之理。無如此證。元氣大虧。不任攻消。又不可

補。乃組織此化痰化癖。不甚剋伐之方。病雖減半。

究屬難痊。

○素有隱癖。肝脾之不調可知。去年血痢於下。痞結於

中。久未向愈。大腹脹滿。潮赤舌黃。脈形弦細而數。溼熱

內聚。脾虛無力。以消極易成脹。毋忽。

歸芍異功散 加川連 川樸 木香

另枳實消痞丸 小溼中丸

繼志堂醫案 卷下 雜症 五積散小治

詒按立方穩實。惟歸芍異功似嫌補多消少。

○脹者皆在藏府之外。此病之脹。不從腹起。自足跗先

腫。而後至腹。是由下以及上。因脾虛不能運溼。溼趨於

下。尚在本經。腫脹及中。又屬犯本也。腫脹之處。按之如

石。陽氣大傷。理之棘手。

附桂治中湯 加肉果 當歸 防已 牛膝

另腎氣丸

詒按方中防已外。無抬溼之品。據證情論。似當兼

參滲利。

○隱癖偕逆中宮。臍雖未突。青筋漸露。勢欲散而為脹。

况大便時澀時結。脾氣久虛。更屬棘手。擬以攻補兼施法。

枳實消痞丸 枳連樸加夏苓參蘆麥芽草 加雞內金 當歸

龍甲 白芍 牡蠣

論按此已成脹病矣。而中宮先虛。又難攻剋。此等證。最費經營。而又最難得效。

頭痛

○頭痛取少陽陽明主治。是為正法。即有前後之別。不過分手足而已。

石膏 竹葉 生地 知母 甘菊 丹皮

續志堂醫案 卷下 頭痛 五 惜餘小舍

黑梔 橘紅 赤苓 桑葉 蔓荊子 天麻

論按此頭痛之偏於風火者。故用藥專重清泄一面。

○脈弦數大。苔厚中黃。頭痛及旁。陽明溼熱。挾膽經風陽上逆也。

大川芎湯 川芎天麻 合茶酒調散 芷草羌荆芎辛防博 二陳湯

加首烏 歸身 白芍

論按此亦少陽陽明兩經之病。但風陽既已上逆。似當參用清熄之意。乃合芎辛羌芷。未免偏於升動矣。

○高巖之上。惟風可到。到則百會腫疼。且熱。良以陰虛之體。陰中陽氣。每易隨之上越耳。

生地 歸身 白芍 羚羊角 石決明 煨天麻

甘菊 黑梔 丹皮 刺蒺藜

論按此陰虛而風陽上越者。故用藥以滋熄為主。

肢體痛

○肝居人左。左脇不時攻痛。甚則厥逆。左關沈小帶弦。是肝氣鬱而不升也。右脈絃滑。舌苔薄白。喜飲熱湯。又有溼痰內阻。當兼治之。

推氣散合二陳湯

續志堂醫案 卷下 肢體痛 五 惜餘小舍

論按用推氣散以疏肝鬱。合二陳湯以治溼痰。竟

如兩扇題作法。

○脈沈弦滑。腿脛刺痛。腰部痠疼。背脊作响。諸節亦然。舌苔白濁。風溼痰三者。着於肝腎之絡也。

肝着湯合腎着湯 苓朮桂枝湯

論按此證病在於絡。當從經絡着意。

腰痛

○腎者主封藏之本。精之處也。精之所以能安其處者。全在腎氣充足。封藏乃不失其職。虛者反是。增出脛瘦。體倦。口苦。耳鳴。便堅等證。亦勢所必然。然左尺之脈。

浮而不靜。固由腎氣下虛。而關部獨弦。獨大。獨數。舌苔黃燥。厥陰肝藏。又有溼熱。助其相火。火動乎中。必搖其精。所謂肝主疏泄也。虛則補之。未始不美。而實則瀉之。亦此證最要之義。

天冬 生地 黨參 黃柏 炙草 砂仁

龍膽草 山梔 柴胡

論按此三才封髓丹。加膽梔柴胡。方與案若合符節。

再診 大便暢行。口中乾苦。亦愈。左關之脈大者亦小。惟弦數仍然。尺亦未靜。可以前方增損。

雜示登醫案 卷下 遺精

至惜餘小舍

三才封髓丹 加扶神 龍膽草 柏子仁

三診 久積之溼熱。下從大便而泄。然久病之體。脾胃元氣內虧。又不宜再瀉。當以守中法。

異功散 加白芍 荷葉蒂 秫米

四診 大便已和。脈形弦數。數為有火。弦主乎肝。肝經既有伏火。不但順乘陽明。而且容易搖精。精雖四日未動。究須小心。

三才封髓丹 加陳皮 白芍

另猪肚丸 苦參 白朮 牡蠣 猪肚

原註此證拈定左關獨大。獨弦。獨數。所以重用膽

藥異施。直折其肝家鬱火。俾溼熱之邪。從大便而出。

○金木制木。今木火太旺。反侮肺金。肺金尙受其剋。則其吸取腎水。疏泄腎精。更屬易易。此夢泄欬嗽之所由承也。

三才封髓丹 加白芍 龍膽草

再診 按來札。知所言夢遺者。有夢而遺者也。比之無夢者。大有分別。無夢為虛。有夢為實。就左脈弦數而論。弦主肝數主熱。熱伏肝家。動而不靜。勢必搖精。蓋腎之封藏不固。由肝之疏泄太過耳。

雜示登醫案 卷下 遺精 至惜餘小舍

三才封髓丹 加牡蠣 龍膽草 青鹽

三診 疊進封髓元。而仍不主整。細診脈息。左關獨見沉弦。且數。肝經之疏泄顯然。

草解分清飲 益智青鹽 去葛合三才封髓丹 加龍膽草

四診 病已大減。仍守前法。前方加白芍。

原註病得草解瞿麥而大減。是溼重於火也。

論按首案遺泄欬嗽並提。方凡四易。而未曾有一味顧及欬嗽。想以肝火為本。治其本而標病可置。

之耳。

○夢中遺泄久而無夢亦遺。加以溺後漏精。近日無精。而小水之淋漓而下者。亦如漏精之狀。始而氣虛不能攝精。繼而精虛不能化氣。

三才封髓丹 加蛤粉 芡實 金櫻子

治按此腎中精氣兩損之證。再合腎氣聚精等法。較似精密。

○曾經失血。現在遺精。精血暗傷。當臍之動氣攻築。漫無愈期。肢體從此脫力。語言從此輕微。飲食從此減少。無怪乎脈息乳而無神也。病情如此。虛已甚矣。而舌苔

繼志堂醫案

卷下 遺精

善惜餘小舍

膩濁。中宮又有溼邪。治須兼理。

杞子 熟地 芡實 查炭 石蓮子 當歸

茯苓 金櫻子 蓮須

另清暑益氣湯去北瀉草

原註此九龍丹也。吳鶴臯云。主治精濁。

再診 前方小效。小變其制。

九龍丹 加於朮 半夏 茯苓 陳皮 五倍子

煎送威喜丸

治按陰虛而挾溼邪。最難用藥。須看其兩面照顧處。

○白濁久而不痊。以致腎失封藏。夢遺更甚。少寐少納。面痿脈小。

九龍丹合天王補心丹

另猪肚丸

原註膏淋有便濁精濁兩種。便濁是胃中溼熱。滲入膀胱。與腎絕無相干。精濁牽絲黏膩。不溺亦有。是腎虛注火易動。精離其位。漸瀆而出。治宜滋腎

清心健脾固脫。○九龍丹方中杞地歸滋陰以制陽。樓蓮芡潛以固脫。石蓮子苦寒清心。心清則火不熾。白茯苓甘平益土。以制腎邪。尤妙在山查一

繼志堂醫案

卷下 遺精

善惜餘小舍

味能消陰分之障。○前一案氣虛挾溼熱。故合清

暑益氣。後一案心火挾溼熱。故合補心猪肚。

○氣虛不能攝精。精虛不能化氣。所進飲食。徒增痰溼。

六君子湯 加兔絲餅 炮薑炭 菹菜子

原註純從脾藏氣虛立案。

治按案語簡潔。老當方亦周到。

小便門

○陰虛之體。心火下鬱於小腸。傳入膀胱之府。尿中帶血。時作時止。左脈沈數。小水不利。

生地 木通 甘草 竹葉 火府丹

另大補陰丸

詒按此用導赤散合火府丹以清心火卽用大補陰丸以滋陰虛實兼到

○經曰胞移熱於膀胱則癰溺血又曰水液渾濁皆屬於熱又曰小腸有熱者其人必痔具此三病於一身若不以涼血之品急清其熱遷延日久必有性命之憂

導赤散合火府丹 加燈心

又丸方 固本丸合大補陰丸 猪脊髓丸 加葶藶

詒按火甚者陰必傷火清之後隨進丸藥以滋其陰

續志堂醫案 卷下 小便

幸 惜餘小舍

○膏淋血淋同病未有不因乎虛亦未有不因乎熱者熱如化盡則膏淋之物必且下而不痛始可獨責乎虛

大補陰丸 加瓜蒌 瞿麥 牛膝 血餘

詒按議論雋爽方亦切實

再診 所下之淋薄且少矣而當便之時尙屬不利既便之後反覺隱痛肢膝不溫脈小弦唇紅噙乾熱未全消虛已漸著

瓜蒌瞿麥去附湯 加麥冬 葶藶 黑梔

猪脊筋

詒按便後隱疼膝冷咽乾皆虛象也似當兼用滋

養

○曾患淋證小便本難近來變爲癰閉少腹硬滿小便腫脹苔白不渴脈小而沈下焦溼熱被外寒所遏膀胱氣化不行最爲急證恐其喘汗

肉桂五苓散 加木香 烏藥 枳殼

另葱一把麝香三厘搗餅貼臍

詒按此溫通法也惟由淋變癰氣分必虛補中腎氣等法亦可隨宜佐用

泄瀉

○殮泄不由乎胃滯卽係乎陽弱此乃兼而有之脈遲

續志堂醫案 卷下 泄瀉

幸 惜餘小舍

暖腐脘痛

附子理中湯合二陳湯 加川樸 吳萸 防風

詒按暖腐脘痛食滯頗重擬去二陳加神麴砂仁

腹子

○下利轉瀉腎病傳脾脾因虛而受邪溫化爲宜

理中湯合四苓散 加陳皮 防風 伏龍肝

詒按由利轉瀉或有因溼邪未淨者方中用四苓

伏龍肝卽此意否

○發熱之餘腹痛便溏表邪下陷也

小柴胡湯 加白芍 木香 茯苓 澤瀉

詒按此時邪下陷之證。

大便閉

○脾虛不能化溼。焉能統血。血雜於水溼之中。下注不止。

茅朮 地榆皮 槐花炭 鬱金

再診 無毒治病。不必愈半而不取也。仍服原方可耳。

原註此茅朮地榆湯。其人便血挾水而下。已及半載。人不困憊。而面黃。大約溼熱有餘之體。此病兩帖愈半。四帖全愈。

詒按審證的確。用藥精當。有以匙勘鑰之妙。

續志堂醫案 卷下 大便

惜餘小舍

○腸澼便血。時重時輕。或痛或否。脈形細小。飲食少。此虛也。恐增浮喘。

歸脾湯 加薺菜花 荷葉 杭米

詒按此補脾攝血之正法也。稍加和胃之品。如廣皮砂仁輩。更為周密。

○便血之前。先見盜汗。盜汗之來。由於寒熱。寒熱雖已。而盜汗便血之證不除。脈小而數。氣陰兩虛之病也。

歸脾湯去桂圓 加丹皮 山梔 地榆 桑葉

詒按此證營分中。必有留熱。宜於清營一邊着意。但顧其虛。猶未周到。

○陰絡傷則血內溢。為日久。陰分固傷。陽分亦弱。而身中素有之溼熱。仍未清楚。恐增浮喘。

大熟地 伏龍肝 阿膠 白朮 赤小豆 附子

黃芩 炙草 當歸 地榆炭 烏梅肉

詒按此金匱黃土湯加味。陰陽並治。而兼清溼熱。立方頗為周到。

○溼熱傷營。腹脹便血。久而不愈。左脈細澀。右芤寸大尺小。加以浮腫。氣分亦虛。不但不能攝血。而且不能清化溼熱。防喘。

黃土湯 草朮 地朮 加大腹皮 桑皮 五茄皮

續志堂醫案 卷下 大便

惜餘小舍

黨參 槐花

原註原方之妙。附子扶脾之母。黃芩清肝之熱。熟地滋腎之陰。白朮培脾之本。阿膠涼血之熱。各藏照顧。非仲景不能作也。

詒按增入之藥。亦能與病機恰當。

○紅白痢變為便血。當時血色尚鮮。後又轉為紫黑。或帶血水。而不了結。暑溼深入營中。氣虛無力。以化降而不升也。

駐車丸 連膠 加廣木香 黨參 甘草 伏龍肝

薺菜花

論按此證血分中有留邪尚宜參用和血之品
再診 血雖漸止氣猶降而不升

補中益氣湯去陳皮合駱車丸 加赤芍 伏龍肝

○痔疾下痢藏毒三者皆屬下焦溼熱為患

地榆散合三奇散者防加廣木香

論按立方精到擬再增銀花丹皮

○大小便易位而出名曰交腸驟然氣亂於中多屬暴
病此症乃久病良由瘀血內阻新血不生腸胃之氣無
所附而失治故所食之水穀悉從前陰而出所謂幽門
者不可必別清濁而闢為坦途比之交腸證有似是而

繼志堂醫案 卷下 大便 弄 借餘小舍

實非者此時論治主以化痰潤腸必大腸之故道復通
乃可撥亂者而返之正

旋覆花 狸絳 葱管 歸鬚 首烏 柏子仁

薺菜花

另舊紗帽一只炙灰每服一錢五分酒下

原註紗帽一髮漆膠黏而成其亦取通瘀之意耶

論按論證用藥均有巧思特未知效否何如憶喻

西昌寓意草中所載姜宜人交腸病與此相似特

病原有虛實之異耳學者當參觀之

戰病門

○陽絡曾傷陰氣素虛更有溼熱鬱於營分日久生蟲
擾亂於上中下三焦以致欬嗽喉痺惡聞食臭起臥不
安肛部不舒舌質深紅其苔黃濁即仲景所謂狐惑病
是也久延不愈即入勞怯之途

川連三分犀角三分烏梅五分人中白一錢百部一錢丹皮一錢

甘草三分

論按讀金匱狐惑病一節此證之原委乃明

○腕腹作痛滿腹苦熱初起得食則痛繼而不食亦痛
此肝胃不和溼熱生蟲之狀

烏梅丸 加青皮 白芍 金鈴子

繼志堂醫案 卷下 蟲 早 借餘小舍

論按初起得食即痛得無兼有食積否

再診 服前方腕腹之痛而苦熱者時作時止止則右
脇下必有一塊攻築是屬蛔未安也

旋覆花湯合金鈴子散 加杏仁 雷丸 樵子

論按蛔未安者似宜仍用烏梅丸此則因右脇攻

築故用金鈴子散以泄肝耳

○溼熱挾風生蟲作癢有似攻注之形無處不至難治
之證也

獺肝一錢磨開水冲服

再診 攻注有形而不攻注時無跡溼熱風蟲踞於痰

中所致。

推氣散 枳殼桂心
薑黃草 加白芥子 橘紅 羌活

懶肝 竹油

另醫通沈香化氣丸 大黃黃芩沈香六麩
辰砂參朮竹油薑汁

治安頓肝台盪法本千金惟案中云攻注有形

無處不到究竟或在肢體或在腹裏均未敘明無

從揣測也。

○人之涎下者何氣使然曰胃中有熱則蟲動蟲動則

胃緩胃緩則廉泉開故涎下

黃連丸 連萸木香
訶子龍骨 合烏梅丸

總志堂醫案

卷下

惜餘小舍

詒按方案俱高簡穩實。

門人趙樹誠同校
族弟賈慶

江陰柳氏醫學叢書之七

評選環溪草堂醫案三卷

環溪草堂醫案三卷梁溪王旭臯先生所著也先

生名泰林字旭臯世為無錫人嘉道間有以瘍醫

馳名江浙者曰高錦亭先生著有外科心得集景

岳方歌括等書行世即旭臯先生之舅氏也高先

生歿後先生傳其業其始先以瘍醫行逮後求治

者日益多寢及內科無不應手奏效於是遂專以

內科行門下士習業者每年以十數計先生讀書

上自軒岐下迄 國朝諸家無不精心貫串於古

環溪醫案

惜餘小舍

書則研求故訓於後人書則必分別疑似所著有

西溪書屋夜話錄醫方歌括串解及環溪草堂醫

案諸書均未梓行其醫案為門弟子隨時鈔錄未

經分別去取不免繁複者多余所得見者蓋有五

六本詳略互異因屬及門諸子刪其繁亂重為鈔

輯最後得王家橋顧君蓮卿本係先生晚年之作

又得方君畊霞新刊本案甚繁富頗有方案足取

而為他本所未載者一弁補錄簡其精粹分為三

卷間有未盡之意隨加按語以闡明之閱一年而

竣事先生居錫城去余家不百里余弱冠時猶及

評選環溪草堂醫案上卷

江陰柳氏醫學叢書之七

無錫王泰林旭高著

江陰柳實詒孫選評

及門諸子 參校

丙傷雜病門

○病將一載。肝氣橫逆而不平。中氣久虛而不振。惟肝逆故胸脘阻塞而攻衝。惟中虛故營衛不和而寒熱。凡大便溏。飲食少。右脈細。左脈弦。是其證也。四君子合道。遙加左金。是其治也。

黨參 冬朮 陳皮 茯苓 歸身 神麴

環溪醫案

卷上 丙傷

一 借餘小舍

白芍 柴胡鹽水炒 香附鹽水炒 川連吳黃炒 穀芽

玫瑰花

詒按案語爽朗。方亦的當。擬再加沉香鬱金。

再診 陽虛惡寒。陰虛發熱。脾虛則便溏而乏力。木旺則脘痞而氣塞。前方補中泄木。肝氣已平。合以益火生土。氣血雙補。

黨參 冬朮 菴蓉 鹿角霜 杞子 木香

兔絲子 歸身 白芍 陳皮 茯苓 杜仲

砂仁 玫瑰花

詒按肝氣平後。續用培補。是一定層次。惟既有寒

見之吾鄉有疑難證無不求治於先生者先生必

沈思渺慮疏方與之厥後或效或否或有無力再

往者先生必訪悉之令其再診以竟厥功故其所

存方案無不光堅響切無模糊影響之談蓋較近

賢之專以靈變取巧者不啻上下牀之別矣先生

博極羣書所用諸法如治小兒喘嗽之藥棗從葛

可久之白鳳丹化出治上熱下寒之八味丸用紫

雪為衣從喻西昌外廓之論悟出若此之類不勝

枚舉是皆因古法而變化出之彼胸無古書者每

讀之而猝難領會余於此等處均為一一指出學

環溪醫案

二 借餘小舍

者苟能即是而得讀書用古之法焉則庶乎不負

先生之苦心也夫光緒二十六年重陽日江陰柳

實詒謹識

熱見證似可參用桂枝建中之意以和之。

○三焦相火。挾肝陽而上升。每日侵晨則氣自臍左而上衝。心胸痞塞。自覺胸中熱。舌赤辣。面色紅。過午則氣漸下降。至夜則安。而火降則下。或遺泄。此皆無形之火為患也。推其原始。由乎陰虛。今則相火妄行。蒸鍊胃液成痰。所以吐痰黏膩。灰黑而咽噎。胃管之間。常覺不流利也。法當清相火。導虛陽而下歸窟宅。更佐以化痰鎮逆。病來已久。難期速效。

黃柏鹽水炒一分 桂心三分 砂仁炒三分 蛤殼兩 甘草三分

知母鹽水炒一分 川連鹽水炒四分 茯苓三元 精石三元

環溪醫案 卷上 內傷 二 惜餘小舍

長流水煎

詒按此方取交濟封髓之法。用意極為精到。惟病因肝腎不攝。虛陽浮逆。擬再加牡蠣龜板以攝下。旋覆竹茹以清上。似於病情更為周匝。

○痰之標在肺胃。痰之本在脾腎。腎虛則水泛。脾虛則溼聚。二者均釀痰之本也。經曰。脾惡溼。腎惡燥。脾腎兩虛。法當滋燥兼行。而痰戀肺胃。又宜標本同治。

熟地 茅朮炒 陳皮 川貝 茯苓 半夏

紫苑

詒按案語斟酌病機。切實不泛。用藥亦絲絲入籠。

○用黑地黃法。以兩補脾腎。合二陳以和胃。苑貝以利肺。藥品無多。而層層都到。非有簡鍊工夫。不能作此。

○凡藏邪惟虛則受之。而實則不受。惟實者能傳。而虛則不傳。仲景云。肝病實脾。治肝邪之盛也。內經云。肝病緩中。治肝體之虛也。此證肝氣有餘。肝血不足。法宜兩顧為得。

歸身 白芍 沙苑 杞子 冬朮 茯神

青皮 陳皮 香附 金鈴子 砂仁

詒按議論確鑿。非胸中有古書者不能道。方亦精到。

環溪醫案 卷上 內傷 三 惜餘小舍

○方中歸芍杞苑。所以養肝血。青陳香鈴。所以疏肝氣。藥品看似平常。用意恰已周到。

○腎水不足。君火上炎。相火下熾。心中如燔。舌光如柿。陽事易舉。陰精易泄。擬清君火。以制相火。益腎陰以制肝陽。所慮酷熱炎蒸。恐藥力無權。將亢陽為害而增劇耳。

川連鹽水炒 黃芩 黃柏 阿膠 生地 甘草

雞子黃

另大黃錢三 研末將雞子一個 破頭納大黃錢三 蒸熟每日

服一個

再診 投苦鹹寒。堅陰降火。以制亢陽。心中之燔灼。與舌色之光紅。俱減三分之一。然上午之身熱如燎者未退。幸納食頗增。苦寒可進。再望轉機為妙。

川黃連 阿膠 生地 元精石 黃芩 甘草

元參 蛤殼 雞子黃

三診 舌乾紅。知飢善納。水虧陽亢。土燥於中。鹹苦堅陰之劑。雖衰其燔亢之勢。而未能盡除其焰。時當炎暑。溼熱與相火蒸騰。擬復入清中固下。祛溼之法。仍不出鹹苦之例。

洋參 石膏 知母 甘草 麥冬 川連

環溪醫案

卷上 內傷

四 惜餘小舍

阿膠 生地 蛤殼 黃柏 猪膽汁九每朝服三

錢

詒按君相交燔。腎陰被灼。所謂一水不能勝二火。此證是也。僅與壯水。猶難勝任。必得苦以泄之。鹹以制之。而火乃退。更得苦以堅之。鹹以滋之。而陰乃復。

○營陰虛則氣火易升。肝木橫則脾土受侮。腹滿頭暈。肝脾之病。耳鳴喉燥。虛火之愆。陰虛生內熱。腎虛故腰痛。擬補陰潛陽。扶土抑木法。

生地 砂仁炒 茯苓 山藥 黃肉 酒炒

丹皮 酒炒 澤瀉 炒 龜板 炙 沙苑 鹽水炒 黨參 炒 杜仲 鹽水炒 歸身 酒炒 白芍 炒 石決明 煨 四

右藥為末。煉蜜打和為丸。曬乾。泛上後藥。

香附 三分 醋炒 一分 鹽水炒 一分 陳皮 鹽水炒 沉香 錢 神麴 兩

右藥為末。用橘葉湯。泛上前丸為衣。

詒按以補藥為丸。而以和氣之藥末。泛上為衣。與喻嘉言藥川外廓之意相合。雖無精義可取。而心思靈巧。可備一格。

環溪醫案 卷上 內傷 五 惜餘小舍

環溪醫案

卷上 內傷

五 惜餘小舍

○夜涼晝熱。熱在上午。此東垣所謂勞倦傷脾之證也。上午熱屬氣虛。用補中益氣湯。補氣升陽。

補中益氣湯 加神麴 茯苓

詒按論證立方。如開門見山。心目俱朗。

○泄為脾病。嘔為胃病。脾胃屬土。居中而司升降。脾宜升。不升則泄。胃宜降。不降則嘔。上衰則木橫。木橫而土益衰。高年當此。頗慮土敗木賊。古人治肝當先實脾。况茲土弱。尤當先補其中。稍佐平肝可也。

理中湯 加茯苓 橘餅

詒按案語理明詞達。方法切實不浮。但既有嘔惡

見證。則半夏似不可少。擬再加木瓜白芍砂仁。○有時驚悸。有時肌肉頑木。或一日溇泄數次。或數日一大便而堅乾。惟小便常紅。此心氣鬱結。脾氣失運。失運則生溼。鬱結則聚火。火則傷津。溼則阻氣。而氣機不利矣。擬荆公妙香散加味。以補益心脾。

山藥 洋參 黃耆 茯苓 赤苓 桔梗

炙草 遠志 麝香 硃砂 木香 川連

麥冬

右藥為末。用藿香陳皮湯泛丸。每服三錢。開水送下。

詒按專主心脾立論。思路精確。

環溪醫案

卷上 內傷

六 借餘小舍

○血不養心則心悸。少寐。胃有寒飲則嘔吐清水。虛火燦金則咽痛。肝木乘中則腹脹。此時調劑最難。擬貼蓋補養心血之藥。多嫌其滯。清降虛火之藥。又恐其滋。欲除胃寒。慮其溫燥劫液。欲平肝木。恐其克伐耗氣。今仿胡洽居士法。專治其胃。以胃為氣血之鄉。土為萬物之母。一舉而三善備焉。請試服之。

黨參 冬朮 茯苓 半夏 棗仁 扁豆

陳皮 山藥 秫米

詒按於無可措手中。尋出養胃一法。自屬扼要之圖。擬再加木瓜白芍以和肝。竹茹麥冬以清肺。似

更周匝。

○骨格瘦小。先天元氣不足。夏秋寒熱。至今不已。脈細數弱。氣血兩虧。頭不痛。而但身痛。或口沃清水。此胃陽虛憊也。當商溫補。倣東垣法。

黨參 茯苓 陳皮 桂枝 柴胡 黃耆

半夏 神麴 當歸 乾薑 砂仁

詒按少陽生氣被鬱。故寒熱不已。東垣升陽益胃法。用之恰合。加乾薑者。助胃陽也。

再診 前方補中益胃。溫衛氣。開腠理。諸恙皆減。仍依前法。

環溪醫案

卷上 內傷

六 借餘小舍

前方去神麴乾薑。加白朮 白芍

○衛氣虛則洒洒惡寒。營氣虛則蒸蒸發熱。營衛並出中焦。總以脾胃為主。補脾胃則金有所恃。不必治肝而肝自馴矣。

黨參 冬朮 當歸 川貝 黃耆 茯苓

白芍 陳皮 玫瑰花

詒按為虛損證。探原立論。方亦精到。

○營陰內虧。頭眩心嘈。下午微寒。內熱。能食無力。胃中有熱。則消穀。脾虛氣弱。則無力也。

黨參 沙苑 茯苓 川連 棗仁 知母

女貞子 白芍 冬朮 麥冬 竹茹

○左脈空大。腎水虧也。倦怠無力。脾氣弱也。食少則陰虛。陰虛生內熱。證屬內傷。

補中益氣湯加黑山梔 白芍

另六味丸每朝服四錢

○思慮傷脾之管。勞碌傷脾之氣。歸脾湯補脾之管也。惟左脈空大方中升柴兩味。尚宜斟酌耳。

○思慮傷脾之管。勞碌傷脾之氣。歸脾湯補脾之管也。補中益氣湯補脾之氣也。今將二方併合服之。

環溪醫案 卷上 內傷 借餘小舍

黨參 黃耆 冬朮 茯神 歸身 炙甘草

砂仁 棗仁 升麻 柴胡 木香 半夏

陳皮

詒按。同是脾病。而病原用藥。確有氣營之別。一經指點。便覺頭頭是道。

○腎氣虛逆。非滋不納。脾弱運遲。滋則呆滯。然則如何而可。曰。補腎之陽。即可以轉運脾氣。從仲景腎氣丸化裁。

熟地 附子三 五味子 茯苓 山藥 肉桂心
麥冬 元米 牛膝 鹽水 山萸肉 陳皮 紫石英

補骨脂 鹽水 胡桃肉

詒按。補腎即可以補脾。益火以生土也。用腎氣丸恰合。

○久病之軀。去冬常患火升。交春木旺。肝膽陽升無制。倏忽寒熱。頭面紅腫。延及四肢。焮熱癢痛。殆即所謂游火。游風之類歟。匝月以來。腫勢已減。四五日前。偶然俱體傷風。遂增欬嗽。音啞痰多。口乾舌白。續發寒熱。胃氣從此不醒。元氣愈覺難支。風火交煽。痰濁後甚。陰津消涸。陽不潛藏。此時清火養陰。計非不善。抑恐滋則礙脾。化痰扶正。勢所必需。又恐燥則傷液。立法但取其輕靈。

環溪醫案 卷上 內傷 九 借餘小舍

用藥先求其無過

北沙參 知母 鮮生地 蛤殼 海浮石

蟬衣 豆卷 青果 海螵 地栗 百合

另珠粉 朝晨用 燕窩 湯送下三分

原註。右方金匱百合知母地黃湯。合本事神效雪羹。取其清火化痰。不傷脾胃。生津養液。不礙痰溼。酌古參今。歸於平正。詒按。議病用藥。均歸精細。躁心人不能領取也。

中風門

○兩手關脈皆見一粒厥厥動搖之象。此土虛木勝內

風動躍之候也。左半肢體麻木不仁。頭眩面麻。病屬偏枯。慮延仆中。

首烏 當歸 白芍 茯苓 陳皮 秦艽

菊花 天麻 石決明 鈎鈎 刺蒺藜

桑枝

再診 動搖之脈大減。內風有暗熄之機。左手屈伸稍安。左足麻木未和。擬補腎生肝為治本之計。

地黃飲子 地山黃附子 五味葛蒲遠志茯苓巴戟藥 去桂附

詒按未雨綢繆。故易於奏效。兩方用藥亦能與病機宛轉相赴。

環溪醫案

卷上 中風

十 惜餘小舍

○體肥多溼。性躁多火。十年前小產血崩。血去則陰虧而火亢。肝風暗動。筋絡失養。已非一日。去秋伏暑後變三瘧。瘧久營衛偏虛。遂致風痰擾絡。右半肢體麻痺。而為偏廢之象。調理漸愈。今但右足麻辣熱痛。痛自足大指而起。顯係肝經血虛失養。據云。腿膝常冷。足脛常熱。此非足脛有火。而腿膝有寒也。想山溼火乘虛下注。故痛處覺熱。而腿膝氣血不足。則覺寒耳。至於左脛外廉。皮肉之內結核如棉子。發作則痛甚。此屬筋節是風痰瘀血交凝。入絡而成。與右足之熱痛麻辣不同。今且先治其右足。

生地 阿膠 五茄皮 歸身 木瓜 天麻
冬朮 獨活 絲瓜絡 牛膝 茯苓 草薢

詒按論頗明透。方亦平穩。

○年已六旬。腎肝精血衰微。內風痰涎走絡。右偏手足無力。舌強言澁。類中之根萌也。溫補精血。兼化痰涎。冀免偏枯之累。然非易事也。耐心調理為宜。

菴蓉 巴戟 茯神 木瓜 半夏 枸杞 鹽水炒
遠志 甘草湯製 海風藤 茱萸 酒炒 牛膝 杜仲 鹽水炒

詒按此與下條均因有類中之萌。作未雨綢繆之計。故用藥力求平穩。不敢喜事以邀功也。

環溪醫案

卷上 中風

十一 惜餘小舍

○腎藏精而主骨。肝藏血而主筋。腎肝精血衰微。筋骨自多空隙。溼熱痰涎乘虛入絡。右偏手足無力。舌根牽強。類中之根。溫補精血。宣通經絡。兼化痰涎。守服不懈。加以靜養。庶幾卻病延年。

菴蓉 黨參 元米炒 牛膝 半夏 杞子 鹽水炒
陳皮 續斷 茯苓 巴戟 桑枝

又丸方

菴蓉 二兩酒煮 黨參 三兩元米炒 熟地 四兩酒拌蒸 歸身 二兩酒炒
麥冬 二兩去心 棗仁 三兩研 巴戟 三兩水炒 歸身 二兩酒炒
草薢 三兩炒 首烏 四兩製炒 茯神 三兩 牛膝 三兩水炒 半夏 二兩

天冬二兩去心 陳皮五兩 杜仲三兩 虎骨三兩
葛蒲一兩 杷子四兩
右藥各選道地如法製炒其研細末用竹瀝四兩薑汁三兩搗入再將白蜜為丸如黍米大用磁器裝好每朝服五錢開水送下

履厚門

○先天不足骨儲空虛常以後天滋補栽培脾胃脾胃得補溼熱壅滯形體驟然充壯而舌本牽強兩足痿軟不能行走上盛下虛病屬痿躄經云溼熱不攘大筋軟短小筋弛長軟短為拘弛長為痿是也今擬法補先天之精氣強筋壯骨以治其下扶後天之脾胃運化溼熱以治其中然必耐心久服確守弗懈庶克獲效倘朝秦而暮楚恐難許收功也

環溪醫案

卷上

痿痺

三惜餘小舍

熟地四錢 附子三錢 茯苓三錢 牛膝一錢五分 桑枝一兩
虎脛骨錢三 川斷錢三 巴戟錢三 黃柏一錢
蒼朮錢五 草薢錢二 竹瀝錢二 薑汁一匙

另洗方

狗活錢三 當歸錢五 紅花錢一 陳酒糟兩二 猪後脚骨二隻
葱白頭三個 煎湯日洗一次

詒按此等證本難奏效其立方仍從丹溪虎潛法

加味用藥固未嘗不切當也

○伏熱留於肺胃胃熱則消穀易飢肺熱則蹙痿難行熱氣熏於胸中故內熱不已延今半載節屆春分天氣暴熱病加不寐據述先前舌苔黃黑今則舌心乾紅其陰更傷仿仲景意用甘寒法

生地錢三 知母錢一 茯苓錢三 棗仁錢一 麥冬錢二
滑石錢三 夜合花錢五 沙參錢三 百合錢一 泉水煎服
詒按金匱百合病篇有以百合配知母地黃滑石等法此方即用其意

環溪醫案

卷上

痿痺

三惜餘小舍

再診 經云肺熱葉焦則生痿躄前方清心肺而退熱已能起牀步履但夜不安寐是腎氣不交於心陰虛陽亢故也清金麗水取坎填離為治
生地 天冬 麥冬 棗仁 山藥 元參
沙參 洋參 百合

另虎潛丸

詒按經云肺熱葉焦則生痿躄又云治痿必取陽明經訓昭然守此二語治法不外是矣

三診 陰虛未復夜寐未安熱退不清仍宜養陰自云腹中微微撐痛此屬中虛治當補益脾陰兼清心肺之熱

生地 沙參 洋參 山藥 麥冬 棗仁
薏米 茯神 甘草 白芍 赤芍 百合
另歸脾丸

○冷雨淋背於先。竭力鼓棹於後。勞碌入房。挾雜於中。病起身熱。欬嗽。至今四十餘日。痰氣腥臭。飲食能進。臥牀不起。形肉消脫。是肺先受邪。而復傷其陰也。經云。陰虛者陽必湊之。肺熱葉焦。則生痿躄。又云。一損損於肺。皮聚毛落。至骨痿不能起牀者死。合經旨而互參之。分明棘手重證矣。

沙參 紫苑 茯苓 地骨皮 川貝 玉竹
環溪醫案 卷上 痿痺 五惜錄小舍
薏仁

再診 肺爲水源。百脈朝宗於肺。猶衆水朝宗於海也。肺熱葉焦。則津液不能灌輸於經脈。而爲痿躄。卧牀不能行動。形肉消削。欬嗽痰臭。舌紅無苔。脈細而數。是皆津液消耗。燥火內灼之象。考經論治痿。獨取陽明者。以陽明主潤宗筋。胃爲氣血之源耳。今擬生胃津以供於肺。仿西昌喻氏意。

沙參 阿膠 杏仁 甘草 元參 火麻仁
天冬 麥冬 玉竹 茯苓 桑葉 枇杷葉

詒按議病立方。內經痿論之旨。
三診 投清燥救肺法。病情稍安。仍宗前制。

桑葉 杏仁 麥冬 川貝 百合 元精石
阿膠 沙參 元參 枇杷葉 野麥白根
○長齋廿載。精血久枯。大雨淋身。淫侵入骨。腿股痿重。不能舉動。法以宣通關節。佐以養血生津。

麻黃 蒼朮 白芷 當歸 川芎 白芍
防風 熟地 桂枝 獨活 牛膝 桑枝

詒按此從陽和湯增減。因係淫邪。故加蒼朮。

○風寒溼三氣。伏留於骨。骨節痠痛。自冬而起。所謂骨痺也。骨痺不已。內舍於腎。則發熱淹纏。卽成勞損。

秦朮 杜仲 五茄皮 生地 地骨皮
當歸 續斷 牛膝 草薢 茯苓

詒按邪鬱化熱。則傷及陰血。故易入損。○方內再加丹皮桂枝。更覺周到。

○寒溼之氣。從外而入於內。遍體歷節疼痛。而又胸滿嘔痰。經云。從外之內者。治其外。又云。胃爲藏府之長。束筋骨利機關。皆胃氣之流行。然則外通經絡。內和胃氣。便是治法之綱領矣。

川附 茯苓 南星 半夏 陳皮 木瓜

竹瀝 薑汁

論按骨節痛與嘔痰自是兩途之病用藥兩面照顧亦為合法案中以胃氣一層牽合筋節雖似有理而實非內經本旨○方中木瓜竹瀝是筋絡藥擬再加桂枝秦朮獨活桑枝牛膝

內風門

○病起肝風繼增痰飲吐酸所以口目筋掣而胸膈不利也近因暑熱上蒸咽喉碎癢暫投涼劑喉患雖減而胸膈愈覺撐脹夫肝風之動由於陰血之虛痰飲之生又係胃陽之弱病涉兩岐法難並用今日宣化胃溼以祛痰稍佐平肝降逆之品

環溪醫案

卷上

內風

去借餘小舍

半夏 茯苓 陳皮 旋覆花 麥冬 杏仁
川貝 鬱金 丹皮 黑山梔 竹茹 薤仁

論按此等兩礙之病最難用藥須看其周到熨帖處○方中旋覆貝杏是兼參胸痺治法

○肝為風藏而主筋心為火藏而主脈心包絡與三焦相為表裏俱藏相火心包主裏三焦統領一身之絡此病起於病後心中餽熱胸前跳躍繼而氣攻背脊如火之灼或大或小或長或短皆在經絡脊脈之中良由病後絡脈空虛相火內風走竄入絡非清不足以熄火非

鎮不足以定風然而絡脈空虛使非堵截其空隙之處又恐風火去而復入故清火熄風填竅三法必相須為用也第此證實屬罕見醫者意也以意會之可耳倣仲景法

羚羊角 寒水石 滑石 紫石英 龍骨

石決明 生石膏 磁石 赤石脂 牡蠣

大黃 甘草 各三錢

右藥研末每服一錢一日三服用大生地一兩百合一兩煎湯調服

論按金匱中風門有侯氏黑散風引湯二方其用意以填竅為主喻西昌論之詳矣讀者取喻氏之論觀之即識此方之意

環溪醫案

卷上

內風

去借餘小舍

○先嘔數日嘔止而發痙厥日三五次此乃肝逆犯胃聚液成痰內風煽動陽氣偏張痰亦從之為患擬清熄風陽兼和其胃

羚羊角 鈎鈎 半夏 陳皮 茯苓

石決明 山梔 菊花 元參 竹茹

再診 痙厥日數發口噤不能言而心中了了病不在心而在肝夫心為君主肝為將軍當氣逆火升風動之際一如將在外君命有所不受君主雖明安能遽禁其

強暴哉。况胃為心之子。胃家之痰。與肝家之風火互結。黨援相助為虐。今舌紅碎痛。一派炎炎之勢。漸迫心君。故欲化胃家之痰。必先清泄肝家之風火。而安鎮靈臺。使心君無震撼之虞。尤為要着。

羚羊角 鮮生地 犀角 茯神 山梔 元參

石決明 天竺黃 鈎鈎 棗仁川連 竹瀝 薑汁

金箔

詒按。議論明快。立方熨帖。○擬去犀角加川連。更為親切。

○久患肝風眩運。復感秋風成瘧。瘧愈之後。週身筋脈

蹇躓。甚則發厥。此乃血虛不能涵木。筋脈失養。虛風走

絡。痰涎凝聚所致。擬養血熄風。化痰通絡。

製首烏 紫石英 白茯苓 半夏 茯神

羚羊角 石決明 煨天麻 棗仁 洋參

陳皮 竹瀝 薑汁

詒按。歸芍似不可少。

○五藏六府之精氣。皆上注於目。目之系上屬於腦。後出於項。故凡風邪中於項。入於腦者。多令目系急而邪視。或頸項強急也。此證始由口目牽引。乃外風引動內風。內風多從火出。其原實由於水虧。水虧則木旺。木旺

則風生。至於口唇乾燥赤碎。名師唇風。亦肝風胃火之所成也。治當清火熄風。養陰為法。

大生地 丹皮 沙參 鈎鈎 桑葉 羚羊角

石決明 白芍 芝蔴 蔗皮 梨皮 元參心

川石斛

○肝苦急。急食甘以緩之。

生甘草研末一斤 紅棗一斤 煑爛去皮核與甘草打和為丸

每服三錢開水送下

原註。此人並無表証。又不內熱。一日數十症。服此

二料即愈。

環溪醫案 卷上 內風 尤惜餘小舍

詒按。前兩方是風火致瘧者。通治之方。後一方雖依經用藥。但平實無靈機。如此重病。而服之竟效。奇哉。

奇哉

神志門

○上年夏季。痰火迷心。神呆語亂。治之而愈。至今復發。

脈浮小弱。舌心紅而苔薄白。語言錯亂。哭笑不常。憑脈

而論。似屬心風。蓋由風入心經。蘊熱蒸痰所致。用本事

獨活湯法。

獨活 防風 黃芩 山梔 元參 石菖蒲

膽星 茯苓 橘紅 甘草 竹葉 鮮生地

論按論證確鑿。此為學有本源。○查許學士獨活湯原方。僅有獨活防風茯苓三味相同。此蓋用其意而不襲其成方也。

○情志鬱勃。心肝受病。神思不安。時狂時靜。時疑時怯。心邪傳肺。則心悸不寐而欬嗽。肝邪傳膽。則目定而振慄。其實皆鬱火為患也。擬清心安神壯膽為主。平肝和脾佐之。

川連 茯神 菖蒲 龍骨 遠志 北沙參

棗仁 膽星 川貝 鐵落 石決明

猪膽一個用川芎五分研納入以絨絮好入煎

環溪醫案

卷上 神志

三 惜餘小舍

論按清心化痰。涼肝鎮怯。立方周到。熨帖尤妙。在川芎一味入猪膽內。可以疎木鬱。壯膽氣。開後人無數法門也。

○寡居十載。愁惕苦心。牙齦山血。有時若癩。其病已久。茲一月前。猝遭驚恐。遂神糊語亂。口吐紫血。腹脹不食。兩脈模糊。難以捉摸。此乃驚動肝陽。神魂擾亂。血隨氣逆。是即薄厥之屬。今兩足常冷。陽升於上。急以介類潛陽。重以鎮怯。冀其厥止再商。

川連吳黃炒 牡蠣 阿膠 茯神 棗仁 石決明

羚羊角 龍骨 茜草炭 紫石英 代赭石

白芍 金箔

論按病深且久。病氣內涉於藏。實難取效。但就病論治。隨證用藥。已能處處熨帖。自屬可存。

再診 風陽稍熄。神志未安。仍從前法增損。

川連吳黃炒 石決明 牡蠣 茯神 龍骨 遠志

羚羊角 紫石英 阿膠 棗仁 白芍 橘紅

石菖蒲 金箔

另硃砂安神丸

○肝風胃滯。凝聚成痰。每逢勞碌。則氣逆而痰湧。驟然昏迷。少頃復醒。醒後數日無力。此屬癩類。其原總由水虧不能涵木所致。煎方無效。宜用丸藥。

環溪醫案

卷上 神志

三 惜餘小舍

生地 茯神 山藥 丹皮 棗仁 茯苓

萸肉 澤瀉 磁石

右藥為末。煉蜜搗作小丸。將後藥泛上。

半夏 南星製 陳皮 青黛 蛤殼 鬱金

石決明 沉香 琥珀

右藥為末。泛上前丸為衣。曬乾。每服五錢。淡鹽花湯送下。

論按作丸之法。頗極精妙。

○肝火痰涎。內蒙心竅。外竄經絡。時發癩證。

洋參製三 天竺黃兩 明礬兩 首烏兩 製四 茯神兩

半夏兩 川貝兩 附子錢五 雄精錢五 辰砂錢五 南星兩

石決明兩 煨四 川鬱金兩 陳皮兩 丹皮兩 炒各

右藥爲末用金箔濂珠血珀玳瑁獺肝羚羊角另研

細末用鈎鈎三兩煎濃湯沖入竹瀝一杯薑汁一杓

將上藥末泛丸每早服二錢橘紅湯送下

詒按前方兼顧水虛此方專治痰火見證不同固

各有所當也

痰火門

○心境沉悶意願不遂近因患瘧多飲燒酒酒酣之後

環溪醫案 卷上 痰火 至 惜餘小舍

如醉如狂語言妄亂及今二日診脈小弦滑沉舌苔薄

白小水短赤大便不通渴欲飲冷昏昏默默不知病之

所因思瘧必有痰酒能助火痰火內擾神明不安此

少陽陽明同病而連及厥陰也少陽爲進出之樞陽明

爲蔽邪之藪今邪併陽明瀰漫心包故發狂而又昏昏

默默也仿仲景柴胡加龍牡湯主之

柴胡 黃芩 半夏 茯苓 龍骨 甘草

牡蠣 鉛丹 菖蒲 大黃 竹瀝 薑汁

詒按病之來原去路一指出藥亦的當

○寐中常坐起而不自知日間靜則瞌睡此濁痰迷閉

清陽陽氣鬱而不宣也

膽星 川貝 茯苓 陳皮 枳實 半夏

黨參 遠志 菖蒲

再診 體肥多溼之人溼熱蒸痰阻塞肺胃喉中氣粗

呼吸如喘臥寐之中常欲坐起仍然寐睡而不自知所

以起坐之故蓋痰阻氣鬱蒙閉清陽陽氣鬱極則欲伸

故寐中欲坐起也病屬痰與火爲患茲擬煎方開其肺

痺另用丸藥化其痰火痰火一退清陽得伸病自愈矣

射干 橘紅 冬瓜子 杏仁 桔梗 蘇貝

竹瀝 薑汁 葶藶子 蘇子 枇杷葉

環溪醫案 卷上 痰火 至 惜餘小舍

另黑丑三錢取頭末 萊菔子三錢 檳榔三錢 大黃三錢

研末蜜丸作十二粒每午後一丸臨臥一丸嚙化嚥

下

詒按審病既得其真諱用藥自然入殼○丸方中

加入菖蒲膽星鬱金東丹等以開鬱墜痰較似得

力

○膽虛則神自性氣鬱則痰自凝於是咽喉若塞氣短

似喘偶值煩勞夜寐多驚無形之氣與有形之痰互相

爲患遂至清淨無爲之府與虛靈不昧之神均失其甯

謚之常欲安其神必化其痰欲壯其膽必舒其氣故清

之化之。和之益之。必相須為用也。

沙參 棗仁川連炒 半夏 膽星 遠志 茯神

神麴 石菖蒲 橘紅 金箔 竹瀝 薑汁

另膽星三琥珀一錢 金箔五張 黑白丑取頭末各一錢五分

右藥另研和一處共為細末。每服三分。橘紅湯送下。

又方 黨參薑汁炒 半夏 膽星 茯神 遠志

棗仁 川貝 橘紅 蛤殼 神麴 竹瀝

薑汁

痰飲門

○痰飲阻於胸中。欬而短氣。心悸。用四君補氣。二陳化

環溪醫案 卷上 痰飲 蓄 惜餘小舍

痰。桂枝通陽。欬冬止欬。加減成方。仍不越苓桂朮甘之

制。若舍仲景而別求良法。是猶廢規矩而為方員也。詎

可得哉。

桂枝 茯苓 白朮 甘草 半夏 陳皮

黨參 欬冬花

詒按方論俱平正通達。可以取法。

再診 用補氣化痰通陽。獨飲欬而短氣俱減。但心仍

悸。參以益智。

茯苓 白朮 甘草 黨參 陳皮 半夏

桂木 欬冬花 益智仁 棗仁

○胸中之元陽不足。胸中之火用不宣。痰飲伏於心下。胸前如盤大一塊。常覺板冷。背亦惡寒。三四年來。每交子後。則氣喘。陽氣當至不至。痰飲阻遏。其胸中陽微陰勝故也。天明則陽氣張。故喘平。至欬嗽。心悸。易於驚恐。皆陰邪竊踞胸中之病。其常若傷風之狀者。衛外之陽亦虛也。圖治之法。當祛寒飲而逐陰邪。尤必斡旋其陽氣。俾如離照當空。而後陰邪盡掃。用仲景苓桂朮甘法。先通胸中之陽。再議。

茯苓細辛一分泡 桂木 冬朮熟附二分煎汁拌炒 陳皮

甘草湯拌浸焙 炮薑五味子五粒同焙 補骨脂鹽水炒焦

環溪醫案 卷上 痰飲 蓄 惜餘小舍

黨參薑汁炒 半夏 紫石英 胡桃肉 蠅螺殼

詒按審證清切。方中以辛烈之品。煎汁收入甘平藥內。用意頗巧。骨脂桃肉。參入補腎之意。尤為周到。

○此證陽微飲踞。自屬確不可易。惟所吐之痰。是否清稀。抑係乾黃黏厚。案中未經敘明。其常若傷風之狀。衛陽虛者。固有此候。亦有痰濁化熱。蘊於胸中。以致招引外風者。亦多此證。不可不細為之辨。

○欬嗽口不渴。當臍痛而脈細。頭常眩暈。此乃手足太

陰。二經有寒。飲積滯。阻遏清陽之氣。不能通達。故一月

之辨。

○欬嗽口不渴。當臍痛而脈細。頭常眩暈。此乃手足太

陰。二經有寒。飲積滯。阻遏清陽之氣。不能通達。故一月

之辨。

○欬嗽口不渴。當臍痛而脈細。頭常眩暈。此乃手足太

陰。二經有寒。飲積滯。阻遏清陽之氣。不能通達。故一月

之辨。

○欬嗽口不渴。當臍痛而脈細。頭常眩暈。此乃手足太

之中必發寒熱數次。乃鬱極則欲達也。病將四月。元氣漸虛。寒飲仍戀而不化。先以小青龍湯。蠲除寒飲。宣通陽氣。再議。

麻黃 桂枝 白芍 細辛 乾薑 半夏 五味子 甘草

詒按此內飲而兼外寒之方。一月中寒熱數次。或因兼感外邪。則此方的對矣。

○脈沉取之數。其陰內虧。其熱在裏。病延日久。勞損之候。證見欬唾白痰。腕腹時痛。痛則氣滿。得天氣則稍寬。病由肝鬱而成。據云。欬已三年。初無身熱。是其根。又有

環溪醫案

卷上 痰飲

主 借餘小舍

痰飲也。經訓治病必求其根。茲從痰飲氣鬱例治之。

半夏 茯苓 桂木 丹皮 白芍 香附 沉香 神麴 歸身 甘草 冬朮 陳皮

金橘餅

詒按此苓桂朮甘合二陳。加歸芍丹皮以養肝。沉附麴以化氣也。立方平穩。與帖。

○痰飲欬逆。肺腎兩虛。胃溼不化。用苓桂朮甘湯合二陳治其胃。都氣丸治其肺腎可也。

苓桂朮甘湯合二陳湯 加川貝 杏仁 沉香 另都氣丸每服四錢。淡鹽湯送下。

詒按虛實兼到。親切不舒。

○痰飲欬嗽已久。其源實由於脾腎兩虧。柯氏云。脾腎為生痰之源。肺胃為貯痰之器也。近增氣急。不得右臥。右卧則欬劇。肺亦傷矣。血門漏瀉。邇來糞後有血。脾腎虧矣。幸胃納尚。可議從肺脾腎三經同治。然年已六旬。宜自知愛養為要。否則慮延損證。

熟地 砂仁 五味子 炮薑 半夏 陳皮 茯苓 阿膠 蒲黃 款冬花 冬朮 歸身 川貝

原註此金水六君煎。合黑地黃丸。加阿膠。款貝。三味。直補金土水之虛。上能化痰。下能止血。其中雖

環溪醫案

卷上 痰飲

主 借餘小舍

有炮薑。勿嫌其溫。蓋有五味以攝之也。

詒按此等病立方。最難安放平穩。似此周到。與帖自非老手不辦。

○飢飽勞碌傷胃。寒痰凝聚。氣血稽留。阻於胃絡。因而胃脘脹痛。嘔吐黏痰。初起一發即平。後來發作愈勤。今則殆無虛日。飲食從此減少。病日益甚。胃日益虛。倘不加謹。恐延脹滿。不易圖治。

黨參 炮薑 冬朮 熟附 半夏 良薑 陳皮 茯苓 薏仁

再診 溫胃化痰。從理中二陳平胃三方化裁。

六君子湯 加川朴 熟附 炮薑 蒼朮

三診 寒積中焦。胃陽不佈。痰飲竊踞。為痛為脹。為吐為噦。法當溫運中陽。但病根已深。必耐心久服。乃效。

黨參 炮薑 半夏 茯苓 陳皮 川椒

熟附 薏仁 白朮

四診 中虛非補不運。寒飲非溫不化。益火生土。通陽

獨飲。苓桂朮甘湯主之。附子理中湯亦主之。

黨參 桂木 炮薑 半夏 茯苓 熟附

冬朮 陳皮 薏仁

五診 病有常經。方有定法。藥已見效。無事更張。袁詩

環溪醫案 卷上 痰飲 天惜餘小舍

云莫嫌海角天涯遠。但肯搖鞭有到時。

附子理中湯合二陳湯 加桂木 老薑

詒按。前後五方。看病的確。用藥的當。案語亦親切。

簡老。於此道中。自推老手。

痰喘

○樵齡形瘦色黃。痰多食少。晝日微欬。夜寐則喉中啞。吼有聲。病已半載。而性畏服藥。此脾虛而溼熱蒸痰。以阻於肺也。商用藥棗法。

人參 三錢 蒼朮 土炒 一錢 茯苓 三錢 川樸 薑汁炒 一錢 梔子 三錢

炙草 一錢 陳皮 一錢 鹽水炒 川貝 三錢 朱製半夏 三錢 冬朮 三錢

右藥各研末。和一處再研。聽用好大棗一百枚。去核。

將上藥末。納入棗中。以綫紮好。每棗一枚。大約納入

藥末二分。為准。再用甜葶藶一兩。河水兩大碗。同棗

煮。俟棗軟熟。不可大爛。將棗取出。曬乾。每飢時將棗

細嚼。嚥下一枚。一日可用五六枚。餘下棗湯。去葶藶

再煎濃。至一茶杯。分三次先溫服。俟棗乾。然後食棗。

原註。此平胃六君湯。加川貝。梔子。製法極好。以治

脾虛溼熱。蒸痰阻肺。喉中痰多者。極妙。此法從葛

可久。白鳳膏化出。頗有巧思。此病服之。遂愈。

詒按。靈心巧想。可法可師。

環溪醫案 卷上 痰喘 天惜餘小舍

○肺為吐痰之器。脾為生痰之源。肺虛則痰不易化。脾

虛則溼不能運。痰上逆而喘欬。溼下注而足腫。腫之與

喘。無非氣失升降。而乏運行之權也。今擬脾肺同治。冀

痰溼運行乃吉。

黨參 葶藶 杏仁 澤瀉 大腹皮 半夏

赤苓 陳皮 通草 冬瓜子 枇杷葉 棗

詒按。論病用藥。俱能得其要領。

○年過花甲。腎氣必虧。即使善自調攝。亦不過少病耳。

及至既病。則各隨其見證。而施治焉。今欬嗽氣升。食少

倦怠。證形在於肺脾。自宜從肺脾求治。然氣之所以升

者即腎水虛而不能藏納肺氣也。食單油則大便溏者。即腎陽虛。不能蒸運脾土也。然則補腎尤為喫緊。雖不治脾肺而脾肺得陰矣。

黨參 五味 山藥 紫石英 補骨脂 苒肉 胡桃肉 茯苓

身金匱腎氣丸錢三

詒按立論頗能探入深處。用藥亦親切不浮。

○氣上逆而欬甚。舌心紅而邊白。此陰虛痰滯下虛上盛之候也。病已月餘。消痰恐劫其陰。養陰恐增其濁。擬以降氣化痰少佐益陰為法。

環溪醫案 卷上 欬喘

辛 惜餘小舍

蘇子降氣湯去桂

另都氣丸錢五

詒按立方切當。

○病將一載。欬嗽內熱。行動喘促。少腹牽痛。此腎氣虛而不納也。仿都氣法。

生地 苒肉 茯苓 丹皮 山藥 五味子

澤瀉 麥冬 川貝 沉香

詒按立方精當。

再診 壯水生金補子益母

前方 加黨參 胡桃肉

○多年欬喘。逢寒遇勞輒發。汗多氣升。肺傷及腎。腎氣虛而不納矣。法當補腎以納氣。

熟地 懷牛膝 北沙參 半夏 陳皮 茯苓

麥冬 五味子 紫石英 蛤殼 沉香

再診 寒入肺底。久而化熱。同一痰喘。先後不同也。初病在肺。久必及腎。同一欬逆。虛實不同也。補腎以納氣。清肺以化痰。須兩層兼顧為穩。

北沙參 五味子 麥冬 川貝 杏仁 蛤殼

懷牛膝 地骨皮 熟地 梨皮 枇杷葉

詒按前方用藥切當。此方案語圓融。

環溪醫案 卷上 欬喘

辛 惜餘小舍

○痰飲欬喘。腕中脹滿。時或微痛。雖脾腎肺三經同病。而法當責重乎脾。以脾得運而氣化通。則痰飲有行動之機也。

乾薑五味子 半夏 陳皮 茯苓 補骨脂

北沙參元米 杏仁 川朴 澤瀉 胡桃肉

再診 痰飲停於心下。上則喘欬。下則腕脹。多由清陽失曠。痰濁內阻。轉胸中之陽以安肺。運脾中之陽以和胃。欬喘與脹滿當鬆。

瓜萋皮 枳實 乾薑 川朴 半夏 陳皮

薤白頭 茯苓 澤瀉

詒按此證欬脹兩證並重故治法亦脾肺兼顧
○痰飲久留於肺胃或欬或喘或脫脹皆痰氣之為病也化胃中之痰宜苓半化肺經之痰宜橘貝從此擴充以立方

二陳湯合苓桂朮甘湯 加川貝 杏仁 蛤殼 紫苑

詒按此病因有脫脹而無腎虛見證故始終以運脾化痰之法

○欬嗽痰多氣急其標在肺其本在腎歷年既久自淺及深自肺及腎法當治其本矣

環溪醫案 卷上 欬喘 三惜餘小舍

熟地 懷山藥 懷牛膝 半夏 陳皮 茯苓

蛤殼 五味子 紫石英 沙苑 胡桃肉

再診 補腎納氣水不泛而痰自化培土運溼溼不停而痰可降矣

懷牛膝 懷山藥 半夏 陳皮 茯苓 熟地

紫石英 銀杏肉 杞子 五味子 胡桃肉

詒按兩方案語清簡用藥切實○方中再加於朮於培土較似有力

○腎司納氣而開竅於二陰此病每因勞碌之餘必先類轉矢氣而後氣升上逆短促如喘飲食二便如常其

病在少陰之極宜補而納之

六味地黃丸合生脈散 加青鉛

詒按腎為作強之官過於勞動則收攝無力故見此證與尋常喘促又是一種認證既確立方亦切實不庸○擬再加砂仁胡桃肉

○暑風從背俞而內薄於肺溼熱從胃脈而上熏於肺外內合邪其氣併於胸中氣不得通因而上逆氣升作欬舌苔薄白口膩不渴治屬飲家

冬瓜子 半夏 茯苓 射干 通草

馬兜鈴 枳殼 杏仁 橘紅 枇杷葉

環溪醫案 卷上 欬喘 三惜餘小舍

詒按此方輕靈可喜擬再加滑石薏仁既有暑風內薄宜再參用疎泄之品

○閱病原知繇痰飲久留脾肺腎三藏交傷下則腎虛不能納氣中則脾虛不能運氣上則肺傷不能降氣繇是欬喘不得臥肢腫腹脹神氣疲憊虛亦甚矣治上無益當治中下

熟地 懷牛膝 茯苓 五味子 胡桃肉

沙苑 懷山藥 蛤殼 紫石英 補骨脂

麥冬

另黑錫丹每朝鹽花湯送下一錢

詒按病候已造極深之域。用藥如此。亦背城借一之計。

○喘哮氣急。原由寒入肺俞。痰凝胃絡而起。久發不已。肺虛必及於腎。胃虛必累於脾。脾為生痰之源。肺為貯痰之器。痰戀不化。氣機阻滯。一觸風寒。喘即舉發。治之法。在上治肺胃。在下治脾腎。發時治上。平時治下。此一定章程。若欲除根。必須頻年累月。服藥不斷。倘一暴十寒。終無濟於事也。

發時服方 欵冬花 桑白皮 紫苑 蘇子

沉香 茯苓 杏仁 橘紅 製半夏 黃芩

環溪醫案 卷上 欵喘 善借餘小舍

平時服方 五味子 紫石英 煨陳皮 半夏

茯苓 薏仁 蛤殼 胡桃肉 杜仲 熟地

詒按論病則源流俱到。層折畢清。用藥亦周到。賦帖絕不浮泛。洵非老手。不能到此地位。

再診 喘哮頻發。脈形細數。身常惡寒。下焦陰虛。中焦痰盛。上焦肺弱。肺弱故畏寒。陰虛故脈數。喘之頻發。痰之盛也。有所感觸。病遂發焉。病有三層。治有三法。層層護衛。法法兼到。終年常服。庶幾見效。否則恐無益也。

發時服方 桂枝 欵冬花 橘紅 鹽水

杏仁霜 萊菔子 桑白皮

右藥共研末。用枇杷葉十斤去毛煎湯。再用竹瀝半。茶杯薑汁一酒杯。相和一處。將上藥末泛丸。發喘時。每至臥時。服此丸二錢。薏仁橘紅湯送下。

平時服方 熟地 砂仁 丹皮 鹽水 山萸肉 酒

茯苓 牛膝 鹽水 澤瀉 鹽水 肉桂 山藥 炒

五味子 鹽水 磁石

右藥為末。用煉白蜜搗和。撚作小丸。丸須光亮。俟半

乾。再用製半夏三兩。陳皮二兩。炙甘草一兩。研極細

末。泛為衣。每朝服二錢。發時亦可服。

○心欵之狀。欵則心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽腫喉

環溪醫案 卷上 欵喘 善借餘小舍

痺。蓋因風溫襲肺。引動心包之火上逆。故治法仍宜宣

散肺經風邪。參入甯心緩火之品。仲景方法。畧示其端。

但語焉未詳。後人不能細審耳。

前胡 杏仁 象貝母 桔梗 射干 麥冬

遠志 甘草 沙參 小麥一兩煎湯代水

詒按心欵屬心火刑金之病。宜畧加竹葉元參等。

清心之品乃合。○小麥湯代水。頗有巧思。

○煩勞罷極。則傷肝。肝傷則氣逆。而上迫為脇痛。為欵

嗽。秦氏所謂先脇痛而後欵者。肝傷肺也。治法不在肺

而在肝。夏令將臨。恐有失血之虞。

旋覆花 桃仁炭 杏仁 川貝 蘇子
冬瓜子 黑山梔 丹皮 鬱金 薏仁

枇杷葉

詒按。審證清切。立方諦當。愚意再加歸鬚桑白皮

白芍。

○五臟皆有欬。總不離乎肺。肺為嬌藏。不耐邪侵。感寒則欬。受熱則欬。初起微有寒熱。必挾表邪。邪戀肺虛。脈形空大。前方降氣化痰。保肺滌飲。俱無少效。據云得汗。則身體輕快。想由肺氣雖虛。留邪未淨。補虛而兼化邪。亦一法也。用錢氏法。

環溪醫案

卷上 欬喘

惜餘小舍

牛蒡子元米炒

馬兜鈴

杏仁

阿膠蛤粉炒

蘇子

桑白皮

款冬花

炙甘草

茯苓

枇杷葉

桑葉

詒按。此肺虛受邪。虛實兼顧之法。

○脈虛軟而似數。內傷虛弱矣。疑夫邪之所湊。其氣必虛。虛處受邪。其病則實。欬嗽雖由外感。而實則因於氣虛。以為風寒固不可。以為虛損亦未必可。玉竹飲子主之。

玉竹 杏仁 蘇子 桑白皮 款冬花

象貝 橘紅 沙參元米炒 旋覆花 枇杷葉

詒按。將虛實二字。說得六通四關。○此玉竹飲子加減潤肺疎邪虛實兼到。

○寒嗽交冬則發。兼患頸項強急。

熟地六錢 煎汁浸炒 茯苓三錢 煎汁浸炒 胡桃肉四錢

五味子八分 乾薑炒 陳皮二錢 鹽炒 半夏一錢 五分 川貝三錢

款冬花三錢 薏仁四錢 杏仁三錢 歸身三錢 黨參三錢 木炒

右藥為末。煉蜜為丸。每晨開水送下三錢。

詒按。此陰虛而挾痰飲者。故用藥如此。再增桂枝一味。則頸項強急亦在治中矣。

○陰虛而兼痰濁。致為欬嗽。用金水六君煎。

環溪醫案

卷上 欬喘

惜餘小舍

半夏

陳皮

茯苓

炙草

當歸

川貝

杏仁

紫苑

熟地砂仁拌炒 鬆後入暑煎一兩沸

原註。做飲子煎法。濁藥清投。取其益陰。而不膩滯痰濁也。

詒按。陰虛而挾溼痰。最難用藥。此亦無法中之一法。

○欬嗽四年。曾經失血。今已音啞。脈形細弱。真陰元氣皆虧。勞損根深。藥難見效。猶幸胃氣尚可。大便未澀。姑擬甘潤養陰。希圖苟安而已。

北沙參 麥冬 杏仁 川貝 玉竹 扁豆

生甘草 茯苓 橘餅 枇杷葉
再診 欬嗽止而失血音啞津液枯槁勞損成矣脈形
細弱精氣兩虧內經於鍼藥所不及者調以甘藥金匱
遵之而用黃耆建中湯急建其中氣俾得飲食增而津
液旺冀其精血漸充復其真陰之不足蓋捨此別無良
法也

黃耆 秋石 白芍 桂炒 北沙參 炙甘草 玉竹

麥冬 川貝 茯苓 橘餅

論按此與前方看似無聊應酬之作其實精到熨
帖所謂舍此無良法也

瓊溪醫案 卷上 欬喘 美惜餘小舍

○痰飲欬嗽飽則安飢則欬乃胃虛也

黃耆 甘草 冬朮 陳皮 白芍 玉竹

茯苓 杏仁 桔梗

論按再加黨參薏仁何如

○欬嗽月餘痰腥帶血氣升喘逆脈絃滑數風溫久戀
化火蒸痰灼金耗液證屬肺癰非輕候也

冬瓜子 淡芩 薏仁 紫苑 川貝 桑皮

甜杏仁 蘇梗 沙參 蘆根

附錄張氏醫通云薏仁根搗汁頓熱服之下咽臭
痰即解有蟲者蟲即死出薏仁為肺癰專藥然性

燥氣清服之未免上壅不及根汁之立能下奪已
潰未潰皆可挽回陳芥菜汁溫服灌吐最妙一方
用薄荷濃煎稍入白蜜已潰未潰皆效

再診 欬熱痰腥帶血脈形絃硬面色暗晦肺氣失降
木火上逆防加喘急

羚羊角 鮮生地 川貝 甜杏仁 蛤殼

石決明 桑白皮 紫苑 枇杷葉 蘆根

○欬吐臭痰如膿血此屬肺癰舌苔濁厚痰濁膠黏做
仲景法

葶藶子 冬瓜子 桃仁 桔梗 桑皮

瓊溪醫案 卷上 欬喘 美惜餘小舍

瓜蒌仁 旋覆花 蘇子 川貝 蘆根

論按此治肺癰初潰之主方

又按肺癰之病皆因邪痰阻於肺絡久蘊生熱蒸
化成膿故其證初起病在此葉者不及彼葉初用
疎痰散邪瀉熱可冀其不成膿也繼用通絡托膿
是不得散而托之使速潰也再用排膿泄熱解毒
是既潰而用清泄使毒熱速化而外出也終用清
養補肺是清化餘熱而使其生肌收口也凡此皆
肺癰治法之一定層次也乃有一種外感欬嗽其
初起並非肺癰祇因濁痰蘊熱阻結於肺復為外

涼所束。或為油膩所黏。附室竅。隨濁熱蒸悶。藉精不解。致吐痰臭穢。胸膈隱痛。甚則失音氣促。蒸熱喘汗。病情與肺癰無異。其初終治法。亦與肺癰相同。但肺癰多實證。而此則每涉於虛。最易流入損途。其難治較甚於肺癰。或以其虛而漫指為肺痿。其實與前人所論癰痿。均不相合。茲特表而出之。俾學者不至淆惑焉。

○肺花瘡。乃肺虛火炎。金受其戕。音啞欬喘。勞損之根。不易見效。

北沙參 元參 桑皮 杏仁 川貝 款冬花

環溪醫案 卷上 嗽喘 惜餘小舍

失血門

○脈數血不止。胃氣大虛。胸中痞塞。大便常澀。是痞為虛病。數為虛數。欬血三月。今忽衝溢。唇白面青。斷非實火。大凡實火吐血。宜清宜降。虛火吐血。宜補宜和。古人謂見痰休治痰。見血休治血。血久不止。宜以胃藥收功。今擬一方。援引此例。未知有當高明否。

人參 扁豆 川貝 茯神 藕汁 京墨

論按此方於扶胃藥中。參以止血之意。固屬正治。惟唇白面青。既見虛寒確據。似宜於此方中。參入炮薑等溫攝之品。以斂浮陽而止血也。

再診 脈數退。血少止。藥病相當。頗得小效。而反惡寒汗出者。蓋血脫則氣無所依。氣屬陽。主外衛。虛則不固。故惡寒而汗出。最怕喘呃暴脫。措手莫及。猶幸胸痞已寬。稍能容納。仿血脫益氣之例。經曰。陽生陰長。是之謂耳。

人參 扁豆 五味子 炙甘草 炮薑

山藥 鮮藕汁

論按此與前方同意。以惡寒故加炮薑。

三診 血脫益氣。昔賢成法。今血雖大止。而神氣益憊。唇白面青。怕其虛脫。欲牢根蒂。更進一籌。

環溪醫案 卷上 失血 惜餘小舍

人參 扁豆 炒五味子 熟地 炒附子 秋石 水炒

麥冬 冬朮 炮薑 陳皮 伏龍肝湯代水

論按伏龍肝未審何意。○此方大意。亦與第一方相似。漸參溫補之意。以防其虛脫故耳。

四診 肝腎之氣。從下泛上。青黑之色。滿於面部。陰陽離散。交子丑時防脫。勉擬鎮攝。希冀萬一。

人參 熟地 五味子 麥冬 茯神

坎炁 肉桂 紫石英 青鉛

論按此方急於固脫。故用藥如是。

五診 血止三日。而痰吐如污泥。且臭。是胃氣大傷。肺

氣敗壞而成肺痿。痿者萎也。如草木之萎而不振。終屬勞損沉痾。極難醫治。外臺引用炙甘草湯。取其益氣生津。以救肺之枯萎。後人遵用其方。恆去薑桂之辛熱。此證面青不渴。正宜溫以扶陽。但大便溏薄。除去麻仁之滑潤可耳。

人參 炙甘草 麥冬 阿膠 生地 炮薑

肉桂 五味子 紫石英

詒按。痰如污泥。是必血液敗腐。日久而然。並非肺痿。惟所用炙甘草湯。養血滋液。尙與病情不肯。意加入薏仁丹皮。略倣內癰治例。似乎稍合。

環溪醫案 卷上 失血 望情餘小舍

六診 病勢依然。仍從前方加減。

前方加重炮薑。再加製洋參。

詒按。以後方均是復脈加減。

七診 連進炙甘草湯。病情大有起色。但欬喘則汗出。肺氣耗散矣。散者收之。不宜再兼辛熱。當參收斂之品。

人參 熟地 炙甘草 阿膠 五味子

黃耆 罌粟殼 大棗

○久欬失血。精氣互傷。連進滋培。頗獲小效。但血去過多。驟難充復。從來血證。肺腎兩虛者。宜冬不宜夏。蓋酷暑炎蒸。有水涸金消之慮耳。今雖炎暑未臨。而已交仲

夏。宜與生精益氣。大滋金水之虛。兼扶胃氣。則金有所恃。且精氣生成於水穀。又久病以胃氣為要也。

洋參 麥冬 五味 熟地 生地 黨參

黃耆 山藥 炙草 陳皮 茯苓 扁豆

詒按。層層照顧。可謂慮周。藻密。方中擬再加百合沙參。

再診 血止胃稍醒。仍以原法為主。

前方加蜜炙粟殼。

另用白芨一味為丸。每朝鹽花湯送下三錢。

○素患嘔血。血止復發。現有胸痛。時時噎氣。舌苔白膩。

環溪醫案 卷上 失血 望情餘小舍

脈細而遲。此胃中有瘀血。挾痰濁為患也。

旋覆花 鬱金 杏仁 紫苑 瓜蒌仁

代赭石 茯苓 貝母 枳殼 枇杷葉

詒按。血證中之變例。擬加丹參桃仁。

○血色紫而有塊。此屬肝火乘胃。瘀凝上泛也。仿繆仲

醇法。

鮮生地 大黃 阿膠 丹皮 黑山梔

蘇子 白芍 扁豆 枳殼 枇杷葉 藕汁

詒按。此肝火衝激於血絡所致。最易留瘀致病。故用藥如此。若再加茜根炭三七。似於瘀血一面更

為着力

○始由寒飲欬嗽繼而化火動血一二年來血證屢止屢發而欬嗽不已脈絃形瘦飲邪未去陰血已虧安靜則欬甚勞動則氣升蓋靜則屬陰飲邪由陰生也動則屬陽氣升由火動也陰虛痰飲四字顯然擬金水六君同都氣丸法補腎之陰以納氣化胃之痰以蠲飲飲去則欬自減氣納則火不升也

生地海浮石半夏青鹽麥冬元米五味子炒訶子炒

紫石英 丹皮炭 牛膝鹽水懷山藥炒蛤殼打

茯苓 青鉛 枇杷葉蜜炙

瓊溪醫案

卷上 失血

聖情餘小舍

詒按陰虛而兼痰飲用藥最難須看其兩不礙手處

○去秋欬嗽些微帶血已經調治而痊交春吐血甚多欬嗽至今不止更兼寒熱朝輕暮重飲食少納頭汗不休真陰大虧虛陽上亢肺金受燥脾胃傷戕津液日耗元氣日損脈沉細澹口膩而乾虛極成勞難為力矣姑擬生脈六君子湯保肺清金調元益氣扶過夏令再議

洋參 沙參 麥冬 五味子 扁豆

製半夏 茯苓 陳皮 炙甘草

另枇杷葉露 野薔薇露 各一杯沖服

原註生脈散保肺清金六君子去朮嫌其燥加扁豆培養脾陰土旺自能生金也不用養陰退熱之藥一恐滋則滑腸一恐涼則妨胃耳從來久病以胃氣為本經云有胃則生此其道也

詒按此平正通達調補方之久服無弊者

○欬嗽內傷經絡吐血甚多脈不數身不熱口不渴切勿見血投涼法當益胃擬理中加味

黨參元米扁豆炒炙甘草 炮薑 歸身炭

血餘炭 丹皮炭 白芍 杏仁 陳粳米

燕節

瓊溪醫案

卷上 失血

聖情餘小舍

詒按見識老到立方精卓

○內則陰虛有火外則寒邪深襲失血欬嗽又兼三瘧病已數月瘧來心口痠痛胸腹空豁難通經云陽維為病苦寒熱陰維為病苦心痛此陰陽營衛之偏虛也擬黃耆建中法和中藏之陰陽而調營衛復合生脈保肺之陰復脈保腎之陰通盤打算頭頭是道矣

歸身炭 炙甘草 大生地砂仁五味子 鱉甲

黃耆 青蒿 沙參 白芍桂枝三阿膠 麥冬

煨生薑 紅棗

詒按正虛而兼有寒邪故立方如是

○肝胃不和。脘痛嘔酸。兼以酒溼熏蒸於胃。胃為多氣多血之鄉。故吐出瘀血甚多。血止之後。仍脘中作脹。嘔吐酸水。法宜調和肝胃。切戒寒涼。

製半夏 陳皮 茯苓 鬱金 烏藥 延胡

桃仁泥 炮薑炭 香附 雞距子 蘇梗

論按此與陰虛失血不同。更兼氣阻溼鬱。故用藥

如是。

○少陰水虧。陽明火亢。鼻血不止。擬玉女煎。合四生飲法。

生地黄 鮮地黄 龜板 石膏 知母 元參

環溪醫案 卷上 失血 擬玉女煎 小合

北沙參 懷牛膝 茜草炭 血餘炭 茅根汁

側柏葉汁 鮮荷葉汁 艾葉汁

論按案方俱精潔不支。

虛損

○失血後效。嗽音啞。氣升則欲效。乃腎虛不納也。

熟地 阿膠 麥冬 沙參 川貝

紫石英 元參 藕

再診 腎氣稍納。上氣稍平。但效尚未止。四支無力。真陰與元氣。虛而不復。時當炎暑。暑溼熱三氣交蒸。虛體最易幻變。保養為上。用景岳保陰煎。

生地 熟地 天冬 麥冬 沙參 玉竹
川貝 五味子 紫石英 阿膠 東白芍
百合煎湯代水

論按前方用紫石英以鎮納腎氣。此方用百合以清保肺金。此用藥諦當處。學者宜留意焉。

○歷春夏秋三季。血證屢發。診脈虛弱。形容消瘦。年方十七。精未充而早泄。陰失守而火升。異日難名之疾。恐犯褚氏之戒。治當滋水降火。須自保養為要。

生地 阿膠 麥冬 丹皮 山藥 茯苓

洋參 扁豆 茜草根 蓮肉 茅根 鮮藕

環溪醫案 卷上 虛損 擬玉女煎 小合

論按案語擷古籍之華。方亦清穩。

○先吐血而後效。逆喘急。延及半載。寒熱無序。營衛兩虧。舌色光紅。陰精消涸。不能右臥。為肺傷。大便不實。為脾傷。水落石出之時。難免致劇。

北沙參 茯苓 扁豆 玉竹 五味子

金石斛 川貝 百合 麥冬 功勞葉

論按上兩案均屬陰損已成之候。調治不易奏效。而此證大便不實。難進清滋。較前證更劇。然用藥亦不過如此。少年自愛者。當慎之於早也。

○陽維為病。苦寒熱。陰維為病。苦心痛。陽維維於陽。陽

氣弱則腹痛而便溼。陰維維於陰。營陰虛則心痛而舌紅也。脈微形瘦。陰陽並損。損及奇經。當以甘溫。

黃耆 桂枝 當歸 炙甘草 白芍 川貝

陳皮 砂仁 鹿角霜

再診 但寒不熱。便溼脈細。支體面目俱浮。悉屬陽虛見象。惟舌紅無苔。此屬陰傷之候。但口不乾渴。乃君火之色外露。治當引火歸元。

附桂八味丸 加鹿角霜 黨參 冬朮

詒按論病貫串。認證真切。至用藥之淺深輕重。亦覺步步穩實。

環溪醫案

卷上 虛損

吳惜餘小舍

○先後天俱不足。痰多鼻血。陰虧陽亢之徵。納少腹疼。本旺土衰之兆。是以年將及冠。猶如幼穉之形。面白無華。具見精神之乏。治先天當求精血之屬。培後天須參穀食之方。久久服之。庶有裨益。若一暴十寒。終無濟也。

六君子湯去半夏 加山藥 扁豆 砂仁

黑芝蔴 蓮肉 陳梗米

右藥為末。米飲湯調服。或白洋糖湯。棗子湯調服亦可。

支丸精不足者。補之以味。當求精血之屬。治其腎也。

熟地 兔絲子 牛膝 白芍 龜板 杞子

山藥 五味子 當歸 杜仲 丹皮 黃柏

茯苓 鹿角膠 黃肉 天冬 澤瀉

右藥為末。用河車一具。洗淨煮爛。將藥末搗和為丸。

詒按煎丸兩方。亦尋常調補之法。好在培補先後

二天。選藥精當。一絲不雜。

○左寸關搏。指心川之陽亢。右脈小緊。脾胃之虛寒。是以腹中常痛。而大便不實也。病延四月。身雖微熱。是屬虛陽外越。近增口舌碎痛。亦屬虛火上炎。津液消灼。勞損何疑。今商治法。當以溫中為主。稍佐清上。俾土厚則火歛。金旺則水生。古人有是論。幸勿為世俗拘也。

環溪醫案

卷上 虛損

吳惜餘小舍

黨參 於朮 茯苓 甘草 炮薑 五味子

麥冬 燈心

詒按此陰虧而虛火上炎之證也。方以理中合生脈法。溫中清上。兩面都到。所云土厚則火歛。金旺則水生。見理極精。非淺學所能學步。

○北門之籬得守。則陽氣固。坤土之陽得運。則溼濁化。溼濁化則津回。陽氣固則精守。所嫌肌肉盡削。夫肌肉猶城垣也。元氣猶主宰也。城垣傾頽。主宰窮困。是非大補元氣不可。

人參 熟地 黃肉 杞子 杜仲 炙草

歸身 山藥 茯神 於朮 陳皮 麥冬

半夏 茯苓 穀芽炒

論按案語精切。○此六君合景岳大補元煎之方也。脾胃兩顧。用以填補。則可特嫌少靈光耳。

○脾胃兩虛。而溼熱又甚。雖腰疼夢泄。自汗盜汗。而口膩味甜。大便溼薄。腎陰虛而不充。脾陽困而不振。進求治法。祇可先運脾陽。

茅朮炒 乾薑 熟地 山藥 五味 牡蠣

黨參 茯神 棗仁 浮麥 紅棗

論按此黑地黃丸加味。確合脾胃兩補之法。○方

環溪醫案 卷上 虛損 辛 惜餘小舍

中乾薑宜炮黑用

再診 溫運脾陽。補攝腎陰。做繆仲醇雙補丸法。

茅朮製 炮薑 牡蠣 黨參 茯苓 補骨脂

熟地 杜仲 山藥 首烏製 浮麥 五味子

紅棗

三診 脾陽稍復。腎陰仍弱。節交夏至。陽盛陰衰之候。大劑養陰。以迎一陰來復。兼化溼熱。以調時令之氣。

熟地 生地 黨參 冬朮 茅朮製 黃柏鹽水炒

茯神 麥冬 五味 牡蠣 龍骨 杜仲

消證

○脈沉細數。瀉血虛氣鬱。經事之不來宜也。夫五志鬱極。皆從火化。飢而善食。小水澄脚如膿。三消之漸。匪伊朝夕。然胸痛吐酸。肝鬱無疑。肝為風藏。鬱甚則生蟲。從風化也。姑擬一方。平中見奇。

川連一錢 吳麥冬三錢 薑蛤殼五錢 建蘭葉三錢

鮮棘樹根皮兩 洗一

論按病屬陰虛火旺。案中生蟲一層。未免蛇足。

再診 服藥後。大便之堅且難者。化溼糞而易出。原屬苦泄之功。然脈仍數。瀉究屬血虛。而兼鬱熱。鬱熱日甚。

藏陰日鍊。舌紅而碎。口渴消飲。所由來也。月事不至。血

環溪醫案 卷上 消 辛 惜餘小舍

日乾而火日熾。頭眩目花。帶下皆陰虛陽亢之見證。補

藏陰為治本之緩圖。清鬱熱乃救陰之先着。轉輾思維。

寓清泄於通補之中。其或有濟耶。所慮病根深固。未易

奏績耳。

川連 黃芩 黑梔 生地 當歸 阿膠

川芎 白芍 建蘭葉

另大黃廬蟲丸。每早晚服五丸。

論按寓清於補。恰合病機。

三診 諸恙皆減。惟內熱未退。帶下未止。經事未通。仍

以前方增損。

川連 當歸 洋參 白芍 女貞子 茯苓
生地 麥冬 丹參 沙苑

四診 經云二陽之病發心脾不得隱曲女子不月其
傳為風消風消者火盛而生風渴飲而消水也先輩謂
三消為火疾久而不已必發癰疽余屢用涼血清火之
藥職此故也自六七月間足跗生疽之後所患消證又
稍加重其陰愈傷其火愈熾今胸中如燔牙痛齒落陽
明之火為劇考陽明之氣血兩燔者葉氏每用玉女煎
姑倣之

鮮生地 石膏 知母 元參 牛膝 川連
環溪醫案 卷上 補 聖 惜餘小舍

大生地 天冬 麥冬 茯苓 甘草 枇杷葉

詒按此亦消渴門中應有之證不可不知
○一水不能勝五火火氣燔灼而成三消上渴中飢下
則溲多形體消瘦身常怕熱穉齡犯此先天不足故也

生地 北沙參 知母 花粉 石膏 甘草
麥冬 五味子 牡蠣 茯苓 川連

詒按穉年患此多在炎暑之時其證有兼見風症
煩躁者余嘗以此法參用涼肝之品以黃蘗煎
湯代水頗有效驗

○血虛而有瘀氣虛而有滯血虛則心跳血瘀則少腹
結塊且多淋帶氣虛故無力氣滯故胸脹滿也補而化
之調而理之

黨參 川芎 茯神 陳皮 川斷 歸身
香附 白芍 木香 砂仁 玫瑰花

詒按補而不滯暢而不尅此之謂調理此等方看
似尋常其實頗費斟酌
○營虛氣鬱營虛則內熱氣鬱則脘脹法以養營舒鬱
丹參 香附 川貝 茯苓 歸身 棗仁
陳皮 牛膝 首烏 續斷 砂仁 紅棗

環溪醫案 卷上 諸 聖 惜餘小舍

詒按此虛實互治之法

○心胸覺冷經事數月一來食入則腹中脹痛寒痰氣
鬱凝滯不通當以辛溫宣暢遵熟料五積意

半夏 茯苓 桂枝 蒼朮 白芍 川芎 丹參
歸身 川朴 甘草 陳皮 枳殼 良薑

詒按此照五積原方去麻桔芷加丹參用藥極其
熨帖

再診 苦辛溫通之劑能調經散痞用之而效益信古
人言不妄發法不妄立在用者何如耳

前方去良薑加菴蔚子 砂仁

評選環溪草堂醫案卷中

江陰柳氏醫

無錫王泰林旭高著

江陰柳寶詒穀孫選評

及門諸子 參校

嘔噦門

○胃陽虛則水飲停。脾陽虛則穀不化。腹中漉漉。胸膈脹滿。納入輒嘔。酸水清涎。或嘔腐氣。以溫通法。崇土利水。

炮薑 陳皮 蒼朮 半夏 茯苓 熟附

白朮 黨參 澤瀉 枳實 蔻仁 穀芽

環溪醫案

卷中嘔噦

二 惜餘小舍

詒按。中陽不運。痰溼易停。故用治中合二陳法。

○胃中素有酒溼。適因鬱怒。引動肝膽之火。與胃中之痰相搏。致心跳少寐。食入則嘔。兩手脈沉。是氣鬱也。用溫膽加味。

半夏 石菖蒲 陳皮 甘草 枳實 棗仁

茯神 雞距子 竹茹 薑汁

詒按。既有木火內擾。則川連梔丹本不可少也。

再診

溫膽湯加沙參 川連 丹皮 旋覆花

黑梔 雪羹煎

○坤土陽微。溼勝。腹中不和。用平胃理中合劑。

焦朮 川朴 陳皮 炙草 黨參 炮薑

茯苓 延胡

原註。方中橫插延胡一味。想其中兼有痰凝也。

詒按。立方老潔。

再診。前投溫中運溼。腹中呱呱有聲。朝食則安。暮食則滯。臥則筋惕肉瞤。時吐酸水。中土陽微。下焦濁陰之氣上逆。病成反胃。溫中不效。法當益火之源。捨時從證。用茅朮附子理中湯。合真武湯意以治之。

茅朮 附子 炮薑 炙草 陳皮 茯苓

環溪醫案

卷中嘔噦

二 惜餘小舍

生薑

詒按。較前方深一層。是亦一定步驟。

○朝食暮吐。完穀不化。病成反胃。始由寒疝。腹中結塊。氣從少腹上攻。胃脘作痛。吐酸而起。此中下之陽氣不振。肝木侮脾。脾不磨化。幽門不通。大便艱澀。法以溫運通陽。

鮮茯苓 漂淡去甲 半夏 陳皮 枳殼 沉香

柏子仁 桂心 牛膝 吳萸 乾薑

○腹中痛甚。則有塊。平則無形。每每嘔吐酸水。此屬中虛。陽氣不運。當與大建中湯。

黨參 蜀椒 乾薑 金橘餅

詒按簡明切當如老吏斷獄

○反胃而兼浮腫小便莖中微痛此中焦陽氣不運而下焦有溼熱也

蕁撥 三匙 薑汁 三匙 韭根汁 三匙 藕汁 三匙 黃牛乳 兩 煎飲

另用沉香末 錢一 血珀 錢一 研末分六服

再診 內經云三陽結為之膈三陰結為之水此證反胃而兼浮腫是三陰三陽俱結也陰陽俱結治法極難

前方用蕁撥牛乳飲調服沉香血珀末撥動其陰陽俱結之氣幸反胃之勢已平是其三陽之結已解今腹滿

雖寬而腿足之腫仍若是三陰之結猶未解也蓋太陰無陽明之陽少陰無太陽之陽厥陰無少陽之陽則陰

獨盛於內而陽氣不通陰氣凝滯膀胱不化而水成焉其脈沉細蓋重陰之象也凡補脾崇土溫潤通陽如理

中腎氣丸之屬固亦合法然不若周慎齋和中丸之制為尤妙以其用乾薑能回陽明之陽於脾肉桂回太陽

之陽於腎吳萸回少陽之陽於肝則三陽氣勝而三陰之結解水自從膀胱出矣

周慎齋和中丸

乾薑 兩 切片作四分 一分用人參五錢煎湯浸收 乾炒黑一分用青皮二錢煎湯

拌炒黑一分用陳皮三錢煎湯拌炒黑

肉桂 去皮 兩 切片作四分 一分用益智仁一錢五分研

五分煎濃湯同煮收乾一分用茴香一錢五分同煮收乾一分用補骨脂二錢五分研同煮收乾

吳萸 五錢 作二分 一分用青鹽五錢煎湯拌炒一分

黨參 元米炒 茯苓 兩 焙一製半夏兩 甜杏仁 兩

茅朮 三錢 用米泔同 浸煮乾去茅朮

右藥為末用神麴兩磨粉黃糊搗丸每朝服一錢暮服五分用薏仁三錢陳皮五分煎湯送下

詒按議論精當方法亦清切靈活此等方案固自可法可傳○案中論病頗合機宜惟所解內經三

環溪醫案 卷中 喉職 四 惜餘小舍

陰三陽等語卻與經旨不合○氣鬱痰凝胸中失曠背寒脊痛納少哽噎甚則吐出

膈證之根 旋覆花 代赭石 桂枝 半夏 瓜蒌皮

薤白 杏仁 茯苓 竹茹 詒按此證初起痰氣阻於上焦故立方專從肺胃

着意以後五方於用藥層次均能絲絲入籠再診 諸恙仍然痰稍易出

桂枝 薤皮 薤白 陳皮 鹿角 乾薑 旋覆花 竹茹 枇杷葉

三診 背為陽位。心為陽藏。心之下即胃之上也。痰飲竊踞於胃之上口。則心陽失其清曠。而背常惡寒。納食哽噎。是為膈證之根。蓋痰飲屬陰。碍陽故也。

川附 桂枝 薤白 丁香 杏仁 瓜蒌皮

白蔻 豆豉 神麴 旋覆花 竹茹 枇杷葉

四診 服溫通陽氣之藥。嘔出寒痰甚多。未始不美。惟納食未順。哽噎之勢未和。膈證之根尚在。仍以溫通再觀動靜。

川附 桂枝 薤白 半夏 陳皮 瓜蒌皮

杏仁 桃仁 薑汁 白蜜 韭菜根汁

環溪醫案 卷中 嘔噎 五情餘小舍

五診 上焦吐者從乎氣。中焦吐者從乎積。此納食哽噎。少頃則吐出數口。且多清水黏痰。是痰積在中焦故也。究屬膈證之根。勿得輕視。

瓦楞子 白芥子 萊菔子 蘇子 旋覆花

桃仁 川附 半夏 陳皮 葶藶 薑汁

白蜜

詒按此證因痰氣兩阻。故用藥始終如是。

○瘧後痰氣阻滯。胃脘清陽不舒。氣升作呃。納食輒嘔。已經半月。防成膈證。且與仲景法化痰鎮逆。

旋覆花 赭石 乾薑 半夏 香附 赤苓

丁香 柿蒂

詒按方案俱簡當可法也。

○據述病由喪子悲傷。氣逆發厥而起。今診左脈沉數。不利。是肝氣鬱而不舒。肝血少而不濡也。右關及寸部。按之滑搏。滑搏為痰火。肺胃之氣失降。而肝木之氣上逆。將所進水穀之津液。蒸釀為痰。阻塞氣道。故咽噎胸膈之間。若有膈塞。而納穀有時。嘔噎也。夫五志過極。多從火化。哭泣無淚。目濇昏花。皆屬陽亢而陰不上承之象。目今最要之證。乃胸膈咽噎阻塞。的係膈氣根萌。而處治最要之法。順氣降火為先。稍參化痰。復入清金。清自能平木也。

環溪醫案 卷中 嘔噎 六情餘小舍

蘇子 茯苓 半夏 枳實 杏仁 川貝

沙參 橘紅 麥冬 海螵 竹茹 葶藶

原註此七氣湯溫膈湯麥門冬湯三方增減降氣化痰生津和胃。大抵病起於肝戕及肺胃。故立方當從肺胃為主。

詒按細勘病機。斟酌虛實。立方似覺平淡。實已慘

淡經營。

○七情鬱結。痰氣凝聚。胸膈不利。時或嘔逆。證將半載。脾氣大虛。前方四七二陳降氣化痰。舒其鬱結。今再參

入理中兼培中土治標兼固本也。

四七湯 夏朴苓 合二陳湯 理中湯 加丁香 木香 蔻仁

詒按此證痰氣兩層必須兼到。

○操勞抑鬱營虛火亢胃液枯槁飲食哽噎噎中一條。如火之焚有時呱呱作聲此氣火鬱結使然也病關情志非徒藥力可瘳宜自怡悅。

旋覆花 赭石 沙參 黑梔 茯苓 川貝 神麴 麥冬 甜杏仁 竹茹 枇杷葉

詒按立方輕清穩適緣病在上膈且屬氣火無形。

項溪醫案 卷中 嘔噎 二惜餘小舍

固非可以重劑邀功者也。○方中焦麴可去之。

再診 氣火上逆咽喉不利痛至胸腕飲食哽噎呱呱有聲膈證已成圖之非易况年逾六旬長齋三十載胃液枯槁草木無情何能使之濡潤宜自開懷怡悅為佳。

前方加洋參 半夏

○胃汁乾枯腸脂燥涸所進飲食盡化為痰不生津血是以納食則吐而痰隨吐出膈證之根漸深高年靜養為宜。

鮮菝蓉 兩 茯苓 陳皮 鹽水 枳殼 青鹽 半夏 當歸 酒 沉香 磨 坤

詒按此病已深用藥雖合未必能愈矣。

再診 津枯氣結噎膈菝蓉丸是主方。

前方加柏子仁 炒 雪羹煎 每日用柿餅一個飯上蒸軟隨意嚼嚥。

○吐血後呃逆作止不常迄今一月舌苔白膩右脈沉滑左脈細弱其呃之氣自少腹上衝乃瘀血挾痰濁阻於肺胃之絡而下焦相火隨衝脈上逆鼓動其痰則呃作矣病情並見安可模糊若捕風捉影無感乎其不效也今酌一方當必有濟幸勿躁急為要。

半夏 茯苓 陳皮 當歸 鬱金 丁香柄

項溪醫案 卷中 嘔噎 八惜餘小舍

水紅花子 分 柿蒂 二 藕汁 薑汁

另東垣滋腎丸 錢 陳皮生薑湯送下。

詒按用煎劑以通肺胃之絡阻用丸藥以降衝逆之相火思路精細自然熨帖。

○納食輒嘔清水涎沫米粒病在胃也曾經從高墮下。脇肋肩膊時痛是兼有瘀傷留於肺胃之絡故嘔有臭氣擬化痰和胃降逆止嘔為治。

旋覆花 歸鬚 鬱金 杏仁 半夏 丹皮 查炭 茯苓 橘紅 蔻仁

詒按此屬初起輕淺之劑病深者尚宜加重。

伏氣門

○舌乾而絳。齒燥唇焦。痰氣喘粗。脈象細數。無形之邪熱。熏蒸於膈中。有形之痰濁。阻塞於肺胃。而又津枯液燥。正氣內虛。恐有閉厥之變。擬化痰滌熱。以治其標。扶正生津。以救其本。必得痰喘平。神氣清。庶幾可圖。

羚羊角 鮮生地 元參 葶藶子 旋覆花
代赭石 蘇子 杏仁 川貝 沉香 竹瀝
薑汁 枇杷葉 茅根肉
另滾痰丸三人參湯送下

詒按。虛實兼到。立方頗為詳盡。○方中藥品已多。環溪醫案 卷中 伏氣 九 惜餘小舍

蘇子旋藉可以去之。

再診 頭汗淋漓。痰喘不止。脈形洪大。面色青晦。舌紅乾涸。齒板唇焦。此少陰陰津不足。陽明邪火有餘。火載氣而上逆。肺不降而為喘。證勢險危。深防厥脫。勉擬救少陰之陰。清陽明之火。益氣以收其汗。保肺以定其喘。轉輾圖維。冀其應手為妙。

大生地海浮石拌炒 洋參 五味子 牛膝 麥冬
石膏 炙草 桑皮 川貝 陳梗米煎湯代水
另用人參錢一煎湯冲服
原註此玉女煎合生脈散。蓋溫病以救陰為急也。

詒按。前後三案。均有齒垢唇焦。見證其胃府中有垢熱可知。用玉女法。清胃救腎。大致亦合。若於中稍參泄熱之意。則見效更速矣。○方中五味酸飲。炙草粳米甘膩。均不相宜。

三診 頭汗稍收。痰喘稍平。脈大稍軟。但氣仍急促。而心中煩躁。舌紅乾涸。齒垢唇焦。津液猶未回。虛陽猶未熄。上逆之氣。猶未下降。雖踰險嶺。未涉坦途。現今心腹似有透痞之象。是亦邪之出路。仍擬救少陰清陽明。再望轉機。

洋參 北沙參 元參 大生地蛤殼拌炒 鮮生地
環溪醫案 卷中 伏氣 十一 惜餘小舍

五味子 麥冬 牛膝 豆卷 通草 竹葉
枇杷葉 陳梗米煎湯代水

詒按此與前方同意。

四診 陰津稍回。氣火未平。仍宜步步小心。勿致變端為幸。

沙參 洋參 元參 生地 麥冬 鮮石斛
茯神 澤瀉 石決明 天竹黃 蘆根

詒按。仍以養陰之法收功。

○溫邪襲肺。肺失清肅。溼夾熱而生痰。火載氣而上逆。喘息痰嘶。舌乾口膩。昨日之脈。據云弦硬。現診脈象小。

而清敷。陰津暗傷。元氣漸餒。頗有喘汗厥脫之慮。夫溫邪病。隸乎經。肺位最高。治宜清肅。痰隨氣湧。化痰以降氣。為先。氣因火逆。降氣以清火為要。姑擬一方。備候酌奪。

鮮斛 射干 杏仁 象貝 沙參 冬瓜子

桑皮 蘇子 沉香 蘆根 竹瀝 枇杷葉

薑汁

原註。凡時證之脈。先大而後漸小。先強而後變弱。其熱不退。而病反增者。必死。○此死證也。無能為力。立方用藥。無甚深意。

環溪醫案 卷中 伏氣

土 惜餘小舍

詒按。此要訣也。最須記好。○初病之脈。硬大者。邪正相搏也。轉為弱小。正氣餒矣。而病象不退。而反增。正氣不能敵邪也。病日進而正日虧。不死何待。○溫邪五日。舌苔乾黃。壯熱無汗。胸腹板滿。硬痛。手不可近。此屬結胸。煩躁氣促。口吐涎沫。防其喘厥。

瓜蒌仁 川連 枳實 柴胡 黃芩 元明粉
葶藶子 杏仁 豆豉 黑梔 大黃 皂莢子

原註。凡結胸證。最忌煩躁氣促。此大柴胡大小陷胸。梔鼓湯合劑。
詒按。葶藶治痰喘之屬實者。若身不熱而脈微者。

忌之、

再診。下後結胸之硬滿已消。而煩躁昏狂。略無定刻。舌苔乾燥。渴欲飲冷。壯熱無汗。邪氣猶留於氣分。以苦辛寒清裏達表。冀其戰汗。無變為幸。

豆豉 黑梔 黃芩 石膏 生草 石菖蒲

赤苓 天竹黃

另益元散 錢五薄荷湯送下

詒按。此三黃石膏湯。合梔鼓雞蘇散也。幸其壯熱無汗。可冀戰汗。若汗出而仍壯熱。則內陷矣。

三診。戰汗已得。脈靜身涼。邪已解矣。舌黃未去。胃中

環溪醫案 卷中 伏氣

土 惜餘小舍

餘濁未清。尚宜和化。

豆豉 炒黑梔 川貝 炒枳殼 炒連翹 赤苓
滑石 通草 竹茹

原註。凡戰汗後。脈靜身涼。用方大法。不外乎此。總以和胃氣。化溼熱為主。

○胸悶頭痛。寒熱往來。邪在少陽。有汗熱仍不解。是傷於風也。舌心苔薄。邊色乾紅。陰虧之體。邪未外達。而津液暗傷。漸有化燥之象。證經七日。中脘拒按。似欲大便秘而不得出。少陽之邪傳及陽明。胃氣將燥實矣。防其譫語。擬少陽陽明兩解法治之。

柴胡 黃芩 半夏 枳實 甘草 瓜蒌仁

豆豉 黑梔 桔梗 竹茹

另滾痰丸一錢五分

詒按溫邪深伏者往往有汗不解未必皆因於風也。○少陽陽明合病是大柴胡證想因將燥未燥故不用大黃稍用滾痰丸以示意也。

再診得汗得便邪有鬆達之機是以胸悶心跳煩燥等證悉除而頭痛略減也雖自覺虛餒未便多進穀食亦未可即投補劑但和其胃化其邪可耳。

豆豉炒 豆卷 半夏 川貝炒 陳皮 赤茯神

環溪醫案 卷中 伏氣 古惜餘小舍

鬱金 石斛 通草 竹茹

詒按方極妥洽

三診得汗得便之後用和胃化邪法一劑頗安兩劑反劇良以畏虛多進穀食留戀其邪不能宣化鬱於心胃之間溼蘊生痰熱蒸液燥遂見煩躁惡心錯語等證兩手寸關脈細滑數兩尺少神舌邊乾紅心苔黃膩皆溼熱鬱蒸將燥未燥欲陷未陷之象當此陰虧之體能不慮其內陷乎擬導赤瀉心各半法生津化濁和胃清心。

犀角 川連 半夏 枳實 赤苓 鮮石斛

連翹 橘紅 黑梔 生草 通草 鬱金

竹茹 蘆根

另萬氏清心丸六分

詒按推論病原未嘗不細意研求但伏溫之邪每多一層解後停一二日再透一層且每有後一層之邪更甚於前者此證乃第二層之邪發作耳觀後數案病情自明若謂穀食戀邪與以後病情不合矣且不至有如此重候也。○查萬氏原方中山梔川連鬱金均已入煎劑所少者牛黃一味耳且似此病情可不必加用。

環溪醫案 卷中 伏氣 古惜餘小舍

四診證交十二日身熱不揚神昏舌短苔霉邪入膈中閉而不達急急清洩芳開希冀轉機為妙。

犀角 鮮生地豆豉四錢同打 連翹 元參 牛蒡子

枳實 鬱金 天竹黃 石菖蒲 鮮石斛

鮮薄荷根 蘆根

另紫雪丹五分

詒按此按病情大是可危

五診神情呼喚稍清語仍不出邪欲達而未達也胸膈紅點稍現跡稀不顯班欲透而未透也口臭便秘矢氣陽明燥實復聚也舌短心焦邊絳膈中邪火方熾也。

芳香開泄之中。參以生津蕩實。竭心力而圖之。冀挽回於萬一。

前方加沙參 生地 大黃 元明粉

詒按服此方後想已得有大解。氣分之邪熱得泄。故下方專於清營。

六診 口臭噴人。胃火極甚。斑疹雖見。透而未足。目赤神糊。脈洪口渴。急速化斑為要。古法化斑以白虎為主。仍參入犀地清營解毒。再復存陰。又適合玉女煎法。未知能應手否。

鮮地豆豉同打 石膏薄荷同打 犀角 天竺黃 知母

環溪醫案 卷中 伏氣 五惜餘小舍

人中黃 麥冬 沙參 洋參 大生地

石菖蒲 蘆根

詒按此方與後方。如仍加大黃。以通胃府。則伏熱得洩。可免後來許多周折。

七診 目能識人。舌能出口。證勢漸有生機。法以大劑存陰。冀其津回乃吉。

大生地 洋參 麥冬 鮮地 鮮斛 元參

北沙參 犀角 石膏 生草 蔗汁

詒按至此始有轉機。亦險矣哉。

八診 黑苔剝落。舌質深紅。陰津大傷。燥火未退。左脈

細小。右脈洪數。是其徵也。此際陰傷火旺。少陰不足。陽明有餘。惟景岳玉女煎最合。一面瀉火。一面存陰。守過三候。其陰當復。

鮮生地 石膏 元參 洋參 知母 生草

大生地 沙參 黑梔 連翹 蘆根

詒按有形之垢已去。無形之熱猶存。用藥仍宜虛實兼顧。不敢稍忽也。

九診 頻轉尿氣。咽喉乾燥。燥則語不出聲。此陽明燥火熏蒸。津不上承。重救其陰。兼通其府。再商。

大生地兩 鮮生地兩 沙參兩 麥冬三錢 海參二兩

環溪醫案 卷中 伏氣 五惜餘小舍

元參五錢 大黃三錢 元明粉三錢 生草四分

詒按此吳鞠通增液承氣法也。因府中垢熱又聚。故用藥如此。如前第六七方中。仍兼大黃用之。則無此波折矣。海參腥穢不堪入口。擬去之。仍加

洋參石斛。

十診 下後陰液未回。急當養陰醒胃。

大生地 洋參 茯苓 橘紅 麥冬 石斛

北沙參 元參 穀芽 蔗皮

十一診 耳聾無聞。舌乾難掉。陰津大傷。用復脈法。

大生地 阿膠川連末拌炒 麥冬 洋參 炙甘草

元參 雞子黃

論按熱去陰傷此後可專意養陰矣然耳聾未聰則陰經尚有餘熱未洩也

十二診 疊進滋陰大劑生津則有餘濕火則不足今交三候齒垢退而復起神色已清非陰之不復乃燥火未清耳賢者觀過知仁智者見微知著今當轉筆法取輕清

洋參 枳殼炒 川貝 橘紅鹽水炒 棗仁猪膽汁炒
赤苓 川連鹽水炒 竹茹 雪羹煎

論按此方用意不甚親切緣此時仍宜養陰泄熱

兩層兼到方合病機

十三診 諸恙向安每吸稀粥必汗出沾濡非虛也乃津液復而營氣敷布周流也小便澀痛餘火未清惟宜清化而已

冬瓜仁 甜杏仁 鮮石斛 黑梔 甘草梢
生穀芽 通草

論按小便澀痛宜參導赤各半法加生地木通連柏

十四診 病退之餘日間安靜至夜發熱神糊乃餘熱留於營分也小便熱痛心火下趨小腸仿病後遺熱例

瓊溪醫案

卷中 伏氣

七借餘小舍

用百合知母滑石湯合導赤散

鮮生地 木通 甘草梢 竹葉心 川百合
知母 滑石 泉水煮湯煎藥

論按病後餘波亦題中應有之義方亦輕清合度○伏邪挾積但熱不寒頭痛鼻血便洩稀水表裏兩室而熱甚於裏擬清裏解表法

葛根芩連湯加豆豉 連翹 枳實 黑梔
原註鼻血便洩稀水知其為熱不用犀角者其舌

苦白也不用大黃者其腕腹按之不痛也
論按此證專意解表想因未得汗解故也

瓊溪醫案

卷中 伏氣

七借餘小舍

○陰虛挾溼之體感受時令風邪初起背微惡寒頭略脹痛欲欬不爽發熱不揚舌苔白膩大便澀泄此其常候也峻投消散暗劫胃津以致飢而欲食嗜卧神糊呃忒斷連斑疹隱約證方八日勢涉危機閱周先生方洵稱美善鄙意借加甘草一味以和之其生津補中之力未始非贊襄之一助也若云甘能滋溼甘能滿中孰不知之須知苔薄白而光滑胸不滿而知飢乃無形溼熱已有中虛之象此葉氏所以深戒苦辛消克之劑也幸知香察焉

牛蒡子 石菖蒲 前胡 橘紅 鬱金 桔梗

天竺黃 刀豆子 神麩 連翹 甘草 薄荷
竹茹 枇杷葉

詒按審證精細論亦透徹○苔白滑而光亮無津此溼蘊津傷之候專投香燥每每涸液增變案中議論洵屬閱歷之言

再診 證逾旬日的係溫邪挾溼病在氣營之交苔白膩而邊紅疹透點而不爽寐則譫語脣則神清呃聲徐而未除脈象與而小數周先生清營洩衛理氣化濁恰如其分僭加一二味仍候主裁

犀角 天竺黃 川連 鮮薄荷根
連翹 牛蒡子 通草 柿蒂 青鹽半夏

丁香 竹茹 茅根 枇杷葉

三診 熱處溼中神蒙嗜卧呼之則清語言了了驗舌苔之白膩參脈象之與數知非熱陷膈中乃溼熱瀰漫於上焦肺氣失其宣布耳呃尚未除胃濁未化擬從肺胃立法

旋覆花 代赭石 冬瓜子 射干 杏仁

川貝 桔梗 鬱金 橘紅 沙參 通草

竹茹 茅根 枇杷葉

詒按論病清切○此時若誤認入營而投清營之

品則邪機愈逼而增病矣○以中虛陰弱之體患溫邪挾溼之病過投辛燥則陰涸過與消克則中傷若回護其虛又恐助濁增病此等證用藥最難觀前後六案論病親切用藥清靈疎邪扶正虛實兼顧自非老手不辦

四診 呃忒已除舌苔稍化欲飲不揚仍以前法加減前方去赭石 加蛤殼 赤苓 雪羹煎

五診

前方去旋覆花 射干 桔梗 加豆卷

六診 便泄數次黏膩垢污胃濁以下行為順未始不

美故連日沉迷嗜卧昨宵便惺惺少寐但少寐則神煩

自覺有不安之象且屢起更衣愈覺倦乏不堪耳今便泄未止舌苔仍白身熱已和酒客中虛溼勝擬和中化濁仿子和甘露飲

野於朮 洋參 赤苓 澤瀉 滑石 藿香

雞距子 葛花 木香 橘紅 通草 竹茹

七診 病已退溼未楚前方加減

前方加參鬚 神麩 穀芽

○凡證於陰陽虛實疑似之間最當詳審此證音低神倦似虛而便泄臭水中脘按痛實也故冷脈細似陰而

小便熱痛陽也。至於舌白謔語。乃痰蒙火鬱之徵。而日暮煩躁。為陰虛陽盛之兆。鄙意百般怪證。多屬乎痰。痰蒙火鬱。清化不解。須從下奪。即使正虛。而虛中夾實。亦當先治其實耳。

羚羊角 天竺黃 石菖蒲 膽星 鮮石斛
茯神 橘紅 鬱金 竹瀝 薑汁

另滾痰丸

詒按議論明快。立方切實。的是此道中高手。

再診 風火熾盛。痰迷竅絡。神昏不語。耳聾目張。瘵厥之兆。立至。證屆兩候。正在關節之期。勉擬一方。以盡人事。

環溪醫案

卷中 伏氣

三 惜餘小舍

犀角 羚羊角 鮮石斛 鮮生地 石決明

茯神 天竺黃 石菖蒲 元參 膽星

三診 無形之風火。鴟張故。神識昏蒙不醒。而有形之痰濁上泛。故舌苔反見濁厚。清開不應。擬進苦洩。再望轉機。

川連 枳實 膽星 半夏 石決明 橘紅

赤苓 滑石 竹瀝 薑汁 羚羊角

另當歸龍薈丸

四診 有汗發瘧。謂之柔瘧。瘧盛神昏。風淫火熾極矣。

夫內風多從火出。欲熄其風。先須清火。欲清其火。必須鎮逆。考古有風引湯一法。多用石藥。其原論云。瘵發不止。醫不能療。風引湯主之。良由風火熾盛。草木諸藥。不能平旋動之威。非用石藥之慄悍。滑疾者。不足以勝之。故曰醫不能療也。病極凶危。醫宜盡力。其然其否。尚祈高明裁正。

石膏 寒水石 紫石英 靈磁石 紫蛤殼

滑石 石決明 生地 砂仁 阿膠 赤石脂 拌炒 鈎鈎

牛膝炭 竹瀝 薑汁

詒按。疊進清火豁痰三方。而病勢未平。仍有昏瘵

環溪醫案

卷中 伏氣

三 惜餘小舍

之狀。不得已而出此方。竊思溫邪乃伏氣內發之病。每多已發之邪。化熱而為瘵厥。未發之邪。仍舊鬱伏不動。及外一層經清化而解。然後內伏之邪。再逐層外露。故於清化之後。再用透托者有之。再用下洩者有之。再用清營通絡者有之。此證病情如此。疑其尚有伏邪在內所致。金匱風引湯所治之證。究與時邪發瘵之證有別。始存之以備一法可也。

○素有肝胃病。適挾溼溫。七日汗解。入日復熱。舌灰唇焦。齒板口渴。欲得熱飲。右脈洪大數疾。左亦絳數。腕中

仍痛。經事適來。靜思其故。假令肝胃病。木來乘土。氣鬱而痛。若不挾邪。斷無如此大熱。又大便堅硬而黑。是腸胃有實熱。所謂燥屎也。考胃氣痛門。無燥屎證。惟瘀血痛門。有便血。而此證無發狂妄喜之狀。又斷乎非蓄血也。渴喜熱飲。疑其有寒似矣。不知溼與熱合。熱處溼中。溼居熱外。必飲熱湯而溼乃開。胸中乃快。與真寒假熱不同。再合脈與唇觀之。其屬溼溫挾積無疑。傷寒大白云。唇焦為食積。此言諸書不載。可云高出千古。

豆豉 鬱金 延胡 山梔 香附 瓜蒌皮
連翹 赤苓 竹茹

環溪醫案 卷中 伏氣 惜餘小舍

外用葱頭十四箇。鹽一杯炒熱熨痛處。

原註病本溼溫挾食。交候戰汗而解。少頃復熱。為一忌。汗出而脈躁疾者。又一忌。適值經來。恐熱邪附入血室。從此滋變。亦一忌。故用豆豉以解肌。黑梔以清裏。一宣一泄。祛表裏之客邪。延胡索通血中氣滯。氣中血滯。兼治上下諸痛。鬱金苦泄以散肝鬱。香附辛散以利諸氣。二味合治婦人經脈之逆行。即可杜熱入血室之大患。瓜蒌通府。赤苓利溼。加竹茹連翹。一以開胃氣之鬱。一以治上焦之煩。外用葱鹽熱熨。即古人摩按之法。相贊成功。

論按此等證最易混淆。案語層層搜剝。可謂明辨以晰。惟既見挾積。方中似應加用枳實山查。此證汗解復熱。凡伏氣發溫。逐層外出之證。往往有此。不必疑其別有他邪也。用藥兩疏表裏。大致亦合。惟既見舌灰唇焦。則中焦有濁積無疑。疏裏之藥。尚宜加重。倘苔灰而燥。即大黃亦可用也。

再診。服藥後大便一次。色黑如栗者數枚。兼帶滯糞。脘痛大減。舌霉唇焦俱稍退。原為美事。惟脈數大者變為虛小無力。心中覺空。是邪滅正虛之象。防神糊痙厥等變。今方九日。延過兩候乃吉。

環溪醫案 卷中 伏氣 惜餘小舍

香豉 青蒿 沙參 赤芍 川貝 鬱金
黑梔 竹茹 稻葉 金橘餅

論按大解後熱平脈轉弱小。倘內伏之熱邪已淨。或稍有餘熱而不甚重。則從此各候俱平。祇須清養而已。若停一二日。伏邪再熾。則脈隨病變。或仍轉數大。亦未可知。若熱勢盛而脈虛小。是邪盛正虛之重候。仍當隨見證治之。不得以九日兩候等語為憑也。

醫病門

○素有痰飲欬嗽。今夏五月。曾經吐血。是肺受熱迫也。

茲者六七日來。伏暑先蘊於內。涼風復襲於外。病起先寒。慄而後大熱。熱勢有起伏。表之汗不暢。清之熱不退。所以然者。為痰飲阻於胸中。肺胃失其宣達故也。夫舌色底絳。而望之黏膩。獨舌心之苔白厚如豆大者。一辨此。即伏暑挾痰飲之證。而况氣急痰嘶乎。據云廿六日便泄數次。至今大便不通。按腹板窒。卻不硬痛。小水先前紅濁。今則但赤不渾。此乃溼熱痰濁聚於胸中。因肺金失降。不能下達膀胱。故溼濁不從下注。而反上逆。為痰氣喘咳之證也。病機在是。病之凶險亦在是。當從此理會。滌痰泄熱降氣清肺。乃方中必需之事。但清肅上焦。尤為要務耳。

環溪醫案

卷中

惜餘小舍

葶藶子 枳實 鬱金 杏仁 羚羊角 川貝

膽星 連翹 赤苓 竹瀝 薑汁 枇杷葉

滾痰丸

入煎

語按案語精當。方藥親切。迥殊率爾操觚。

○暑乃鬱蒸之熱。溼為濡滯之邪。暑兩地溼。溼溼熱鬱。惟氣虛者受其邪。亦惟素有溼熱者感其氣。如體肥多溼之人。暑即寓於溼之內。勞心氣虛之人。熱即伏於氣之中。於是氣機不達。三焦不宣。身熱不揚。小水不利。頭額獨熱。心胸痞悶。舌苔白膩。底絳尖紅。種種皆溼遏熱

伏之徵。顯係邪蘊於中。不能外達。擬以梔豉上下宣洩之。雞蘇表裏分消之。二陳從中以和之。芳香宣竅以達之。冀其三焦宣暢。未識得奏微功否。

六一散 黑梔 薄荷 豆豉 半夏 陳皮
石菖蒲 赤苓 鬱金 薤仁 通草 竹茹
荷梗

語按議論親切。用藥得輕清靈三字之妙。

再診 形體豐肥者必多溼。肌肉柔白者必氣虛。況暑病必有溼邪。遇伏中氣受戕。前用微苦微辛。宜通三焦。服後大便通調。胸中寬暢。原得小效。要知溼性濡滯。本

環溪醫案

卷中

惜餘小舍

難霍然即愈。若用辛雄燥溼。苦寒洩熱。是亦一法。然恐非肥白氣虛者所能勝任。拙見仍守前法。毋存欲速之心。反致耗氣之弊。惟高明裁之。

前方去薄荷 加杏仁

三診 白苔漸退。而舌心反見裂紋。是溼轉燥矣。不飢不思食。小便仍不爽利。餘熱猶滯。三焦之氣未盡宣達也。三焦者。一氣之周流。而各司其職。上焦主納而不出。下焦主出而不納。中焦則輸其出納。清陽出上竅。濁陰走下竅。三焦自協於平。今議從中升降其上下。所謂升降者。亦升其清。而降其濁耳。

葛根 杏仁 赤苓 陳皮 紫苑 薏仁
 川貝炒澤瀉 血珀 竹茹 大麥 稻葉
 ○外有寒熱起伏之勢。裏有熱結痞痛之形。上為煩懊。嘔惡。下則便泄溇臭。此新邪伏邪。溼熱積滯。表裏三焦同病也。易至昏呃變端。擬從表裏兩解。佐以芳香逐穢。冀其轉機為妙。

柴胡 瓜蒌仁 黃芩 半夏 赤芍 薤仁
 枳實 石菖蒲 大黃 川連 鬱金

詒按。頗合病機。藥品亦切實不膚。

再診 投兩解法。得汗得便。竟得安然兩日。昨已起牀。

環溪醫案 卷中 暑 三惜餘小舍

照鏡。啟窗看菊。須臾之間。漸漸發熱。熱甚神糊。兩目上視。幾乎厥脫。迨至黃昏。神識漸清。熱勢漸減。然脈沉不起。據述熱時舌色乾紅。熱退舌色黃膩。此乃溼遏熱熾。將燥未燥。但陽證陰脈。相反堪虞。勉議河間甘露飲子。於滌熱燥溼之中。更藉桂以通陽。苓以通陰。復入草果。祛大陰溼土之寒。知母清陽明燥金之熱。未識得奏膚功否。

寒水石 石膏 茯苓 澤瀉 茅朮 桂枝
 葱白頭 猪苓 草果 知母 薑汁

詒按。此是正氣已衰。餘邪復聚之證。所擬之方。大

致頗合。但嫌藥味粗獷。未能絲絲入寇耳。
 ○年過花甲。病逾旬日。遠途歸家。舟輿跋涉。病中勞頓。雪上加霜。欲詢病原。無從細究。刻診脈象沉糊。神識蒙昧。舌強色白。中心焦燥。身熱不揚。手足寒冷。氣短作呃。便泄溇臭。憑理而論。是屬伏邪挾積。正虛邪陷之象。深恐有厥脫之虞。勉酌一方。還祈明正。

人參 大黃 附子 柴胡 半夏 茯苓
 陳皮 黃芩 丁香 當歸 枳實 柿蒂

澤瀉 竹茹

詒按。虛寒積熱。層層照顧。處處着力。此等方。非學

環溪醫案 卷中 暑 三惜餘小舍

力極深者。不能下筆。

再診 證勢尚在險重。擬方再望轉機。

柴胡 桂枝 人參 白芍 半夏 川連姜汁炒

枳實 丁香 橘皮 炙草 薤仁 竹茹

三診 伏暑化燥。劫津動風。舌黑唇焦。鼻煤齒燥。神識昏糊。手指牽引。今早大便自通。據云病勢略減。然兩脈促疾。無倫陰津消涸。邪火燎原。仍屬險象。

鮮生地 鮮石斛 犀角 元參 鈎鈎
 連翹 天竹黃 北沙參 通草 蘆根

竹葉 羚羊角 六一散 枇杷葉

另珠黃散冲服

詒按幸得大便自通尚有一線生機

○伏暑為病溼熱居多陰虛之體邪不易達此其常也然就陰虛而論大有輕重之分須知此證虛亦不甚邪亦不多即據耳鳴眩悸苔濁胸痞微寒微熱脈形絃數立方未便着手大補亦不可重劑攻邪但得脈情無變可保無虞慎勿徒自驚惶反增他變

洋參 茯神長砂 甘菊 薏仁 陳皮 青蒿

鈞鈞 刺蒺藜 半夏 秫米 豆卷 竹茹

詒按不沾沾於補虛不斤斤於洩邪而所用藥品

環溪醫案

卷中

辛 惜餘小舍

按之證情無不絲絲入筮所謂成如容易卻艱辛非學識兩深者不易辨此

○餘邪餘積雖留戀而未清元氣元陰已耗損而欲竭暫停苦口之藥且投醒胃之方化滯生津忌夫重濁變湯蒸露法取輕清效東垣而化裁希弋獲以圖倖

清暑益氣湯加荷葉 稻葉

蒸露一日溫飲四五小杯

詒按伏暑久淹正虛邪戀胃弱不勝重藥者此法當仿

瘧疾門

○伏邪挾積阻塞中宮瘧發日輕日重重則神糊煩躁起臥如狂此乃食積蒸痰邪熱化火痰火上蒙怕其風動痙厥脈沉實而舌苔黃邪積聚於陽明法當通下仿大柴胡例

柴胡 黃芩 川朴 枳實 瓜蒌仁 半夏 大黃

詒按脈舌與證合參大柴胡是的對之藥

再診 下後熱淨神清竟若脫然無恙惟是病退太速仍恐變幻莫測擬方再望轉機

川連姜汁 半夏 陳皮 豆豉 黃芩 枳實

環溪醫案

卷中

辛 瘧疾 惜餘小舍

瓜蒌仁 鬱金 神麴 竹茹

原註病退太速仍恐變幻老練之言宜省凡下後方法總以瀉心加減仍用瓜蒌枳實想胸痞未舒舌苔未化耳

三診 昨日瘧來手足寒冷即時腹中氣脹上塞咽喉幾乎發厥但不昏狂耳此乃少陽瘧邪挾內伏之痰濁上走心胞為昏狂下乘脾土為腹脹前日之昏狂病機偏在陽明故法從下奪今腹脹舌白脈細病機偏在太陰法當辛溫通陽轉運中樞為要矣隨機應變急者為先莫謂用寒用熱之不倖也

乾薑炒 陳皮 茯苓 草果 熟附 川朴

蔻仁 枳榔 丁香 通草

原註前方用寒後方用熱隨證用藥轉換敏捷不避俗嫌的是一腔熱血

詒按此人必中氣素虛故痰濁乘虛上僭也

四診 投果附達原神香二陳合劑服藥後喉中汨汨有聲上逆之氣即平腹脹遂鬆今脈緩大神氣安和腹中微覺脹滿痰多粘膩脾藏陽氣雖通寒溼痰涎未化仍從前法輕減其制

前方去附子 枳榔 加大腹皮 半夏

環溪醫案 卷中 瘧疾 至 惜餘小舍

五診 腹中之氣稍平溼熱餘邪未盡所以微寒微熱仍歸瘧象頭脹身疼知飢能食法擬疎化兼調營衛

青蒿 豆卷 半夏 陳皮 穀芽 秦朮

神麴 茯苓 薑 棗

○陳無擇云瘧家日久必有黃痰宿水聚於胸腹膈膜之中須得脾土旺而後宿水自行元氣復而後溼痰自化余見久瘧有泄水數次而愈者即宿水自行之效也

六君子湯加炮薑 木香 神麴 砂仁

詒按前曾見治老瘧之法用逐痰瀉水之藥入雞子中煮服得泄黃水即愈其意與此正同但用藥

有虛實之分耳

○三瘧久延營衛兩傷復因產後下焦入脈空虛今病將九月而瘧仍未止腹中結塊偏左此瘧邪留於血絡聚於肝膜是屬瘧母淹纏不止慮成瘧勞夏至在通乃陰陽剝復之際瘦人久病最怕陰傷趁此圖維迎機導窾和陽以生陰從產後立法稍佐搜絡以杜瘧邪之根製首烏 杞子 地骨皮 當歸 白芍桂枝炒 冬朮 川芎 青皮 香附 烏梅 另髓甲煎丸

原註用四物湯去地換首烏從產後血分立脚

環溪醫案 卷中 瘧疾 至 惜餘小舍

再診 瘧久結癖夏至前投和陽生陰通調營衛參入搜絡方法節後三瘧仍來但熱勢稍減癖塊略小然口渴心悸營陰大虧情懷鬱勃多致化火傷陰木曰曲直曲直作酸瘧來多沃酸水蓋肝木鬱熱挾胃中之宿飲上泛使然夫養營陰須求甘潤理肝鬱必用苦辛久瘧堪截癖塊宜消惟是體虛胃弱諸宜加謹為上

黨參 髓甲醋炒 當歸 茯苓 棗仁 香附

川連吳萸炒 冬朮 陳皮 牡蠣 三稜醋炒

詒按因病化裁頗不沾滯○方中白芍似不可少 另用川貝兩半夏兩知母兩研末薑汁醋各半泛丸

每服三錢。開水送下。

詒按。此半貝丸成法也。增入知母一味。嫌其偏於涼潤。尚有可商。

○但寒不熱。此為牝瘧。柴胡桂枝湯主之。

柴胡 桂枝 乾薑 半夏 陳皮 茯苓

川朴 草菓 炙草 薑 棗

再診。瘧發間日。但寒而不熱。口膩多涎。乃寒痰鬱於心下。陽氣不得宣越故也。

蜀漆 桂枝 半夏 陳皮 茯苓 羌活

石菖蒲

環溪醫案 卷中 瘧疾

重 惜餘小舍

另用獨頭蒜一個。黃丹錢一。雄黃分五。共搗丸。朝向東方服。

三診。舌白脛悶。背寒獨甚。擬宣通陽氣。以化痰濁。

麻黃 桂枝 杏仁 炙草 半夏 茯苓

陳皮 鹿角霜 石菖蒲

原註。以上三方。皆金匱法。

四診。瘧止。當和胃氣。

半夏 茯苓 甘草 陳皮 白蔻 薑 棗

詒按。牝瘧不多見。大略由乎陽虛痰聚。阻遏邪機。不得外越所致。用藥總以通陽宣濁為主。

○少陽過升。陽明失降。瘧來煩悶痞嘔。當變柴胡之制。

而為瀉心之法。和陽明即所以和少陽也。

川連 薑汁 半夏 陳皮 薤仁 蘆梗 生薑

竹茹 薑汁

原註。此病舌色。左半邊光紅。右半邊白苔溼滑。如水晶粉團之色。因過服柴胡升陽。以劫其營。而痰濁又變於胃。以致痞嘔。故用瀉心之法。初用生薑。

一片無效。後加至三片。痞嘔乃止。瘧亦不來。

詒按。用古法而能通其意。心靈手敏。此為善讀書人。

○素有痰飲。欬嗽。近復涼風外薄。食積內停。寒熱似瘧。

環溪醫案 卷中 瘧疾

重 惜餘小舍

脈絃數。額角痛。胸脘痞脹。大便不通。是有表復有裏也。

擬以疏裏解表。

柴胡 黃芩 半夏 枳實 川朴 大腹皮

橘紅 竹茹

詒按。立方用藥。不深不淺。如初揭黃庭。恰到好處。再診。脈絃數。兩手掌心獨熱。大便五日不通。舌苔薄白。不黃。燥屎尚未全結。欲通其腑。緩法為宜。

川連 薑汁 枳實 磨 薤仁 研 半夏 萊菔子 炒 竹茹

詒按。先用緩法通府。此亦病機所在。不可不知。

黃連 枳實

○三瘧止而復作。腹滿平而又發。今日黃脈細。面黑溺少。防延黑瘧。然瘧而腹滿者難治。始與分消。

茵陳 山梔 赤苓 滑石 陳皮 大腹皮

附子 通草 麥芽 瓜蒌皮

再診 面色黎黑。腹滿足腫。脈沉而細。此脾胃之陽不化。水溼阻滯於中。證防增重。且與通陽溼溼。

肉桂 去粗皮 茯苓 猪苓 澤瀉 大腹皮

白朮 川朴 廣皮 神麴 細辛 麥芽

香圓

論按。此肉桂五苓散。加味溫中疎溼。前人所謂陰

環溪醫案 卷中 黃瘧 惜餘小舍

黃想即指此等證而言。

○兩目及身體皆黃。小便自利而清。此屬脾虛。非溼熱也。名曰虛黃。

黃耆 兩 白芍 兩 地膚子 兩 茯苓 兩 酒浸服

論按。此瘧病中另自一種。以小便利為據。證不多見。錄之以備一格。

○伏暑溼熱為黃。腹微滿。小便利。身無汗。用麻黃連翹赤小豆湯。

麻黃 連翹 豆豉 茵陳 赤苓 川芎

枳殼 通草 神麴 杏仁 赤小豆 煎湯代水

論按。此溼熱在表而無汗者。

○面黃無力。能食氣急。脫力傷脾之證也。用張三丰伐木丸加味。

皂礬 一兩 坭土 包固 置鐵火中 煨一日 川朴 五錢

茅朮 一兩 米泔 製半夏 兩 陳皮 二兩 鹽 茯苓 兩

炙甘草 五錢

共研細末。用大棗肉煮爛為丸。每服二錢。開水送下。飲酒者酒下。此方頗效。

論按。此方以皂礬為君。合以平胃二陳。明為消除垢積之劑。案云。脫力傷脾。便與此方。不合。當云脫

環溪醫案 卷中 黃瘧 美 惜餘小舍

力脾困。痰溼不化。乃合然。此方用之頗靈。其功效自不可掩。

痺氣

○胸中為陽之位。清陽失曠。則胸痺而痛。下午屬陰。故痛甚也。用苓桂朮甘湯加味。

茯苓 甘草 桂枝 白朮 瓜蒌 薤白

半夏 陳皮 乾薑 白蘘

論按。方藥均親切不浮。

再診 胸痺痰飲脫痛。甚則嘔酸。脈細胃陽不布。先以通陽。

吳萸 乾薑 白蔻 炙草 桂木 瓜蒌

薤白 枳實 半夏 茯苓 陳皮

主。詒按。胸脘陽微而窒。立方兼治上中。而以中焦為主。

三診。胸痺腹痛。夜甚晝安。清陽不振。濁陰僭逆。法必通陽。

黨參 茯苓 冬朮 炙草 陳皮 半夏

桂木 川椒 乾薑 川附

詒按。此六君加桂附薑椒也。用藥可謂切實矣。

脘腹痛門

環溪醫案 卷中 痺氣

老惜餘小舍

○肝胃氣痛。痛久則氣血瘀凝。曾經吐血。是陽明胃絡之血。因鬱熱蒸迫而上也。血止之後。痛勢仍作。每發於午後。診脈小緊數。舌紅無苔。乃血去陰傷。而氣分之鬱熱。仍阻於肝胃之絡。而不能透達。宜理氣疎鬱。取辛通而不耗液者為當。

川棟子 延胡 鬱金 香附 茯苓 陳皮

全覆花 山梔 薑片 白蠟 螺殼 左金丸

詒按。方法輕靈。自然中病。

○肝氣與飲邪相合為病。脘腹作痛。嘔吐酸水。擬苦辛泄木。辛溫獨飲。

川連 吳萸 陳皮 木香 丁香 蔻仁 乾薑

川棟子 延胡 香附 川椒

詒按。肝氣病兼證最多。須看其立方融治處。

○脈雙弦。有寒飲在胃也。脘痛吐酸。木克土也。得食則痛緩。病屬中虛。當和中泄木。祛寒。小建中湯加味主之。

白芍 桂枝 乾薑 炙草 半夏 橘餅

川椒 黨參 白朮

詒按。大小建中合劑。方藥穩切。

○脘痛肢冷。脈伏。頭汗淋漓。防厥。

金鈴子 五靈脂 延胡 旋覆花 赭石

環溪醫案 卷中 脘腹痛

老惜餘小舍

乳香 沒藥 丁香 蔻仁 香附

詒按。此肝氣挾痰之證。故立方如此。

再診。脘痛甚則防厥。

姜黃 半夏 陳皮 茯苓 香附 吳萸

旋覆花 赭石 蔻仁

○肝木挾下焦水寒之氣。乘於脾胃。脘痛攻脇。嘔吐酸水。脈細而絛。擬溫中禦寒。扶土抑木方法。

炮薑 川椒 吳萸 黨參 桂枝 白芍

白朮 茯苓 香附 砂仁

詒按。此肝氣挾感寒治法。用藥頗精到。

○素有肝胃氣痛兼有寒積脘痛脹滿痛及於腰刻不可忍舌苔白膩渴不欲飲大便似利不利脈象沉絃而緊按證恐屬藏結頗為險候非溫不能通其陽非下不能破其結仿許學士溫脾法

乾薑 附子 肉桂 川朴薑汁炒 枳實 大黃

再診 脘腹脹滿上至心下下連少腹中橫一紋如亞腰葫蘆之狀中宮痞塞陰陽格絕上下不通勢瀕於危勉進附子瀉心法通陽以泄濁陰冀大便秘得通為幸否則恐致喘汗厥脫難以挽回

附子 川連薑汁炒 川朴薑汁炒 大黃酒浸 長流水煎

瓊溪醫案 卷中 脘腹痛 五 惜餘小舍

再服備急丸乾薑 巴豆霜 大黃 七粒砂仁湯下

三診 兩投溫下大便仍然不通胸腹高突湯水下咽嘔支漸冷脈漸細鼻煽額汗厥脫堪憂按結胸藏結之分在乎有寒熱無寒熱為別下之不通脹滿愈甚乃太陰脾藏受戕清陽失於轉運崔行功有枳實理中一法取其轉運中陽通便在是挽回厥脫亦在是

人參 枳實 炮薑 川附 陳皮 冬朮

詒按兩投溫通重劑不得小效枳實理中力量不及前方之大恐未必能奏效也○閱夜話錄中所載一證與此相似治之未效後擬用溫藥下來復

丹未及試用正可與此參觀

○三四年來腹痛常發發則極甚必數日而平此脾藏有寒積肝經有溼熱故痛發則腹中覺熱擬溫脾法兼佐涼肝

金鈴子 延胡 陳皮 茯苓 白朮 川椒

乾薑 白芍吳萸炒 神麴 砂仁

再診 腹中寒熱錯雜而痛古方越桃散最妙變散為丸常服可耳稍為加減以合體氣

乾薑 山梔 吳萸 白芍 炙草

共為末神麴糊丸每服三錢開水送下

瓊溪醫案 卷中 脘腹痛 五 惜餘小舍

原註越桃散惟薑梔二味加吳萸白芍者復以戊己法也甘草者取其調和也

詒按病邪錯雜用藥卻須一綫乃佳如此丸方即合法也

○腹痛便澀脾陽弱也周身疼痛衛陽弱也補中土益衛氣黃耆建中湯主之

黃耆 桂枝 白芍 白朮 炙草

詒按方案俱老到

○便血之後餘瘀凝於肝絡餘熱留於小腸故少腹疼而小便熱痛也化瘀洩熱為治

桃仁炒 丹皮 鮮生地 木通 黑梔 滑石
歸身 查炭 生蒲黃 新絳
另回生丹粒一

論按理法雙清

○用五積合通聖溫通散寒便通而痛未止脈遲喜食甜味痛在當臍後連及腰身常慄慄惡寒此中虛陽弱寒積內停擬通陽以破其沉寒益火以消其陰翳

四君子去甘草 加肉桂 附子 木香
烏藥 茯苓 元明粉

論按方中元明粉一味不甚妥洽擬去之

環溪醫案 卷中 脘腹痛 聖 惜餘小舍

酒氣

○中陽虛弱厥陰寒疝僭逆腹痛筋急大便堅結痛甚則嘔吐擬大建中湯

川椒 炮薑 黨參 附子 半夏 橘餅

論按此寒疝證之偏於虛者故用藥專於溫理

○寒淫伏於厥陰久則化熱兩胯凹筋脹左翠丸偏墜發作則身有寒熱而囊皮腫脹出水此謂淫疝也屢發不已防有囊癰之變

川棟子 巴豆二枚同炒 焦去豆三錢 茴香 鹽水炒 吳萸 黃柏
查炭 黑梔 橘核 葶藶 荔枝核

論按淫鬱則化熱故須寒熱互用○既屬淫疝似宜參用蒼朮苡仁燥溼之品

又疝氣方

川棟子 巴豆七粒同炒 焦去豆五錢 小茴香 鹽水炒 青皮 炒
木香 晒不見火三錢 當歸 酒炒三錢 全蠍 酒洗炙七個 昆布 漂淡炒三錢
查炭 三錢

共研末用非汁一杯葱頭汁一杯絲瓜絡煎濃汁二兩 泛丸每
日服一錢

論按此方溫肝通陽驅邪理疝用意頗佳可以為法

環溪醫案 卷中 疝氣 聖 惜餘小舍

○子和論七疝都隸於肝近因道行勞倦奔走傷筋元氣下陷其疝益大蓋筋者肝之合也舉丸者筋之所聚也大凡治疝不越辛溫苦泄然勞碌氣陷者苦泄則氣益陷當先舉其陷下之氣稍佐辛溫是亦標本兼治之法

補中益氣湯加茯苓 茴香 延胡 全蝎

木香

又丸方

黨參 白朮 茯苓 吳萸 烏藥 川棟子
木香 茴香 當歸 茯苓 枸杞

詒按論病親切不浮

腹瀉

○前年秋季患伏暑淹纏百日而愈病中即結癥積居於左脇之下入春以來每至下午必微熱清晨必吐痰食麩必澹洩此必當時熱邪未盡早進油膩麩食與痰氣互相結聚於肝胃之絡當漸消之否則或脹或鼓均可慮也

柴胡 鹽水青皮 巴豆同炒黃 三稜 醋炒 雄黃 兩

大黃 皂莢丁三粒同煮 醋炒 五錢

右藥為末神麩糊丸每服一錢橘紅湯下

環溪醫案

卷中

癥瘕

聖 惜餘小舍

午後服六君子丸三錢

詒按用藥思路可取

○少腹兩旁結塊漸大漸長靜則夾臍而居動則上攻至脘旁及兩脇八九年來如是據云當年停經半載皆疑為孕及產多是污穢臭水嗣後遂結此塊想係水寒氣血瘀聚而成當溯其源而緩圖之

甘遂 麩包煨 香附 鹽水炒 三稜 醋炒 莪朮 醋炒

桃仁 錢炒 肉桂 另研 五靈脂 醋炒 地鼈蟲 酒浸廿

川棟子 巴豆七粒同 炒去豆五錢

共研末煉蜜為丸每服十九一日三服

詒按久病緩攻方法頗穩

○臍以上有塊一條直攻心下作痛痛連兩脇此屬伏梁為心之積乃氣血寒痰凝聚而成背脊熱而眩悸營氣內虧法以和營化積

當歸 半夏 瓦楞子 香附 丹參 茯神

陳皮 木香 川棟子 延胡 砂仁

詒按方亦平穩熨帖

再診 投和營化積伏梁之攻痛稍緩而脊背之熱亦減久延絡虛當以緩圖無事更張仍從前制

前方去茯神 瓦楞子 木香 加茯苓 玫瑰

環溪醫案

卷中

癥瘕

聖 惜餘小舍

○肝之積在脇下名曰肥氣日久撐痛痼疾難圖

川棟子 延胡 川連 青皮 查炭 歸鬚

五靈脂 莪朮 三稜 茯苓 木香 砂仁

詒按用藥精當

再診 左脇之痛已緩夜增欬嗽寒熱邪氣走於肺絡擬肺肝同治

旋覆花 三稜 醋炒 杏仁 茯苓 川棟子 狸絳

款冬花 莪朮 醋炒 半夏 陳皮 青葱管 歸鬚

詒按暢氣疏瘀平肝通絡此等證用藥不過如是

○少腹結塊漸大如盤上攻則痛下伏則安此屬腸覃

氣血凝滯而成。擬兩疏氣血法。

香附 丹參 紅花 當歸 澤蘭 桃仁

延胡 廣皮 砂仁 五靈脂

另大黃蘆蘇丸每服二十粒

○久患休息下痢。或作或輟。四月下旬。痢止數日。忽然氣攻胸腕板痛。上下不通。幾乎發厥。及至大便稍通。板痛遞減。匝月以來。大便僅通三次。今又不通十餘日矣。而其腕中之板痛者。結而成塊。偏於右部。是脾之積也。脈極細而沉緊。面色晦滯。陽氣鬱伏。濁陰凝聚。當與溫通。

環溪醫案

卷中 瘕癖

聖 惜餘小舍

附子 乾薑 川朴 陳皮 茯苓 香附

延胡 大腹皮

另東垣五積丸 沉香化氣丸

再診 大便已通。腕腹之塊未化。脈象沉絛而緊。面色之晦滯已明。陽光一現。陰凝漸通之象。仍以溫通。

附子 乾薑 陳皮 茯苓 木香 砂仁

通草 水紅花子 白蠟螺殼

詒按。凡陽氣鬱伏者。與陽虛不同。於溫藥中。宜兼清泄之意。乃妥。

○脈遲細。腕中有塊。納食撐脹。腹中漉漉有聲。噯腐吞

酸。大便堅結。此脾胃有寒積也。當以溫藥下之。仿溫脾法。

茯苓 大黃 附子 乾薑 桂木 川朴

陳皮 枳實 半夏

詒按。小承氣合二陳。加薑桂附。驅寒飲導積滯。立方簡當。

○脈右關滑動。舌苔黃白而膩。是痰積在中焦也。左關絛搏。肝木氣旺。故左肋斜至臍下。有梗一條。按之覺硬。乃肝氣入絡所致。尺寸脈俱微緩。泄痢一載。氣血兩虧。補之無益。攻之不可。而病根終莫能拔。病根者何。痰積

環溪醫案

卷中 瘕癖

聖 惜餘小舍

淫熱肝氣也。夫淫熱痰積。須藉元氣以運之外出。潔古所謂養正積自除。脾胃健則淫熱自化。原指久病而言。此病不為不久。攻消尅伐。何敢妄施。茲擇性味不猛而能通能化者用之。

人參 茯苓 於朮 青陳皮 炙草 澤瀉
枳殼 神麩 茅朮 當歸 土炒 白芍 吳黃 三分
黃耆 防風根

詒按。擬加金鈴延胡木瓜以疏肝。較為周到。

又丸方

製半夏 三分 六分 一分 木香 二錢 煎汁 拌炒 一分 白芥子 二錢 煎汁 拌炒 一分 烏藥 三

錢煎汁拌炒一分金鈴子三錢煎汁拌炒一分猪苓
錢煎汁拌炒一分醋拌炒
炒畢去諸藥僅以半夏為末入雄精三研末射香分
獨頭蒜三打爛用醋一茶打和為丸每晨服一錢五
分開水送下

詒按丸藥製法精巧開後學許多悟境

○心之積名曰伏梁得之憂思而氣結也居於心下胃
脘之間其形豎直而長痛發則嘔吐酸水兼挾痰飲肝
氣為患也開發心陽以化濁陰之疑結兼平肝氣而化
胃中之痰飲

桂枝 半夏 川連吳黃炒 茯苓 陳皮 薏仁

環溪醫案 卷中 癥瘕 吳惜餘小舍

鬱金 延胡 川棟子 石菖蒲 瓦楞子

詒按論病立方精到熨貼

○病由肝氣橫逆營血不調腹中結癥脘脇攻痛漸致
食減內熱欬嗽痰多當臍動跳心悸少寐口乾腸燥是
皆血痺虛勞之象極難醫治始仿仲景法

黨參 茯苓 棗仁 乳香 沒藥 桃仁

當歸 川貝 香附 地鼈蟲酒炙 白蜜

再診 前方養營化痰得下血塊兩枚腹滿稍軟內熱
欬嗽未減今且和營啟胃退熱止欬再望轉機

黨參 茯苓 丹參 陳皮 川貝 杏仁

當歸 阿膠 血餘炭 地鼈蟲

詒按前兩方仿金匱血痺治法確有見地後來欬
嗽不止已屬內熱傷肺之象腹中滿痛肝氣不平
也愚意仍用潤肺疏肝清陰養血法治之

環溪醫案 卷中 癥瘕 吳惜餘小舍

族弟 鍾慶 同校
門人 趙樹誠

評選環溪草堂醫案卷下

江陰柳氏醫學叢書之七

無錫王泰林旭高著

江陰柳實論穀孫選評

及門諸子 參校

腫脹

○病起欬嗽。欬止而反氣升。入暮尤甚。面跗龐然浮腫。腹雖未滿。而按之不軟。此屬腎風。蓋風邪乘虛而入於腎。腎氣上逆。故入暮而氣升為甚。用五苓通膀胱。導出腎中之邪。加細辛以微少陰之寒風。晚上再進都氣丸。以安其腎。庶幾久蘊之邪得解。而腎藏無傷。切弗輕視。

長真醫案

卷下 腫脹

一 惜餘小舍

此病須防腹滿之虞。

五苓散 加大腹皮 陳皮 細辛 肉桂

另晚服都氣丸。鹽湯送下。

詒按。腎風之名。出於素問風論。其所列證狀。與此不甚符合。但理可相通。此案所立治法。亦頗有精意。蓋邪入於藏。必借所合之府為出路。以五苓加味治其膀胱。以導出腎邪。隨用都氣以培腎藏之本。邪正虛實之間。面面周到。率爾操觚者。固不能辦此也。

○風溼相搏。一身悉腫。咽痛發熱。欬而脈浮。擬越脾法。

麻黃 石膏 赤苓 甘草 杏仁 大腹皮

通草

詒按。欬而咽痛。肺有鬱熱。故用越脾。

○風水者在表之風邪。與在裏之水溼。合而為病也。其證頭面肢體浮腫。必兼欬嗽。故為風水。更兼食積。其腹必滿。三焦不利。法當開上疏中達下。若不避風。恐其增重。

羌活 防風 枳殼 萊菔子 杏仁 橘紅

川朴 茯苓 澤瀉 大腹皮 桑皮 葱

薑皮

環溪醫案

卷下 腫脹

二 惜餘小舍

詒按。證屬外風與內溼相合。故用藥從表裏兩解之法。

○內有溼熱。外着風邪。風與水搏。一身悉腫。此屬風水。當發汗。

羌活 香薷 陳皮 防風 赤苓 焦六麴

通草 生薑 葱白

○水腫自下而起。腿足陰囊大腹胸膈咽喉。無處不受其災。水勢泛濫。浩浩莫禦矣。今先從上瀉下。蓋肺主一身之氣。又曰水出高源。古人開鬼門。潔淨府。雖曰從太陽着手。其實亦不離乎肺也。

葶藶子 杏仁 川朴 陳皮 茯苓

椒目炒出 薑 棗

另控涎丹每服七分 薑湯送下

論按病象已劇。川藥自須從猛。但控涎丹藥力猛。銳不宜過於多服。須酌之。

○病後脾虛氣滯。浮腫食少。大便瀉泄。法當溫運脾陽。

黨參 茯苓 澤瀉 木香 冬朮 炮薑

苡仁 神麴 砂仁 穀芽

論按病後浮腫屬虛。故兼培補。○以上諸案均屬浮腫之病。與鼓脹單腹脹諸證之關乎藏氣者。輕

環溪醫案 卷下 腫脹

三 惜餘小舍

重淺深。迥乎不同。臨證者當細意分別。勿混視也。

其有脘腹堅硬結塊者。須與積聚癥癖門各案參看。

○淫熱內阻腸胃之間。橫連膜原。膜原者。藏府之外。肌肉之內。膈膜之所舍。三焦決瀆之道路。邪留不去。是為腫脹。脹屬氣。腫屬水。是必理氣而疏決瀆。以杜腫脹之萌。

黑白丑各五錢 萊菔子兩 砂仁兩 川陳葫蘆一枚 將上

三味納入。再入陳酒一大杯。隔湯燉一炷香。取葫蘆

中藥炒研為末。再以葫蘆炙灰共研和。每服二錢。

論按立方取義頗佳。凡腫脹初起者。可以取用。

○病後陽虛。水溼不化。腹滿面浮。足腫而色青黃。脈細。慮延鼓脹重證。擬溫通脾胃之陽。疏利決瀆之氣。冀其脹消腫退為妙。

川附 肉桂 白朮 澤瀉 茯苓 猪苓

川朴 陳皮 通草 冬瓜皮

論按病後陽虛腫脹。故用胃苓法。加溫運之品。○腹暴脹而足腫。納食則脹益甚。淫熱挾氣。填塞太陰。鼓脹重證。

川朴 赤苓 大腹皮 青皮 澤瀉 枳殼

環溪醫案 卷下 腫脹

四 惜餘小舍

查炭 黑丑 甘遂麩包 通草 薑皮

再診 腹滿稍寬。足仍浮腫。運脾化溼。冀其漸平。

川樸 茯苓 大腹皮 椒目 澤瀉 通草

陳皮 黑丑 蒼朮 神麴 枳殼 薑皮

三診 腹滿月餘。得食則脹甚。兩進攻消運脾之法。胃脘之脹已鬆。大腹之滿未化。再議疏通消導。

旋覆花 五加皮 澤瀉 雞內金 赤苓皮

檳榔 木香 黑丑 通草 砂仁

論按此三方治腹脹之由于淫積者。初起通用之法。

附錄葉天士按云。徐姓小兒。單脹數月。百藥無效。余用肥兒丸。萬安散。磨積丹。雞肫藥。俱不效。余謂氣分不效。宜治血絡。所謂絡瘀則脹也。用歸鬚桃仁。延胡。山甲。蟻。螂。麝。靈。脂。山。查。之。類。為。丸。十。日。全。愈。

詒按。此等證。本不多見。但已經治驗。自可存之。以備一格。

附錄吳按云。腫脹久延。腰痛帶下。濕陰愈盛。元氣已衰。補則恐其助脹。滲則慮其傷元。擬早上服金匱炒焦方。但取其氣。不取其味。亦有離照當空。陰霾四散之義。晚仍進清滲之方。以膀胱為氣化運行之府也。

環溪醫案

卷下 腫脹

五 惜餘小舍

表裏兼治。漸次圖功。庶木德盛行之候。不致加劇耳。

詒按。病難着手者。不可無此巧法。有以五苓五皮煎湯。送炒黑金匱腎氣丸者。正與此相似。

○瘧後溼熱。內蘊於脾胃之中。熱上蒸而為口糜。溼內蘊而為腹脹。擬和中清化溼熱為法。

川連酒炒 川朴 焦麴 赤苓 枳殼 大腹皮

澤瀉 陳皮 黑梔 砂仁

詒按。案方俱平。正通達。特未知能否奏效耳。

○病由肝鬱。木橫克土。溼熱不化。先有淋濁。愈後漸漸腹脹。左脇微覺隱痛。身微有熱。脈象絳絳。太鬱不達。慮

延鼓脹。勿輕視之。

柴胡 茯苓 白朮 香附 川芎 山梔

神麴 丹皮 白芍 青皮 川樸 香圓

另左金丸

詒按。立方精當。雖不見出色。而已恰到好處。

○氣鬱於胸為膈。氣滯於腹為鼓。飲食不納。形肉頓瘦。陰氣凝聚。陽氣汨沒。脈細如絲。將何療治。姑與扶正培土。通陽化氣為法。

黨參五錢 熟附五錢 肉桂五錢 澤瀉五錢 白朮五錢 茯苓五錢

大腹皮

環溪醫案

卷下 腫脹

六 惜餘小舍

另來復丹錢一

詒按。病已造乎極重。此方藥力之猛。足以制之。從此得效。尚可勉圖。

○痞塊由大瘧日久而結。多因水飲痰涎。與氣相搏而成。久則塊散腹滿。變為臌脹。所謂癖散成臌也。脈細如絲。重按至骨。乃見絳象。是肝木乘脾也。口乾小便短少。是溼熱不運也。匝月腹日加大。急宜疏通水道。泄木和中。

五苓散 加川朴 川連薑汁炒 青皮 陳皮

大腹皮 木香 車前子 通草

另服古方厚朴散 川朴薑汁炒 枳殼三錢 巴豆七
 巴木香醋炒 青皮醋炒 陳皮鹽水炒 甘遂麩包煨
 大戟水浸晒乾 乾薑炒黃

共為末每服一錢 川砂仁車前子泡湯調下
 論按此治癖散成臆之妙劑凡遇此等大證必乘
 早圖治若日久正虛便費周張矣錄此以為臨證
 者一隅之取

○暑溼挾積阻滯腸胃中州不運大腹驟滿腹中時痛
 痛則大便黏膩色紅似痢小水短少診脈沉而滑數是
 積之徵也擬大橘皮湯送下木香檳榔丸

環溪醫案 卷下 腫脹 七 惜餘小舍

橘紅 白朮 赤苓 澤瀉 猪苓 大腹皮

滑石 木香 砂仁 川朴

另木香檳榔丸三錢

論按病兼滯利故須先從腸府疎導

再診 氣與水相搏大腹驟滿小便不利大便欲泄而
 不泄法以疎氣逐水

香薷 荷香 澤瀉 枳殼 赤苓 萊菔子

甘遂 大戟 黑丑 白丑 生薑

論按此方專逐水積力量頗猛想其正氣尙旺故
 可放手用之

○情懷鬱勃肝膽風陽上升右目昏蒙左半頭痛心餽
 不寐飢而善食內風掀旋不熄痛勢倏忽無定營液消
 耗慮其痙厥法以滋營養液清熄肝陽務宜暢抱庶克
 臻效

大生地 元精石 阿膠 天冬 羚羊角

石決明 女貞子 滁菊 鈎鈎 白芍

再診 服滋陰和陽法風陽稍熄第舌心無苔心餽善
 飢究屬營陰消燦胃虛而求助於食也議滋柔甘緩

大生地 石決明 麥冬 阿膠 火麻仁

環溪醫案 卷下 頭痛 八 惜餘小舍

女貞子 洋參 白芍 茯神 橘餅

論按此養陰柔肝之正法與前人復脈定風阿膠
 雞黃等法用意相合

○鬱怒傷陰木火上乘竅絡耳生瘰肉名曰耳菌最屬
 淹纏久久不已防有血出翻花之變

生地 丹皮 北沙參 元參 遠志 鈎鈎

羚羊角 石決明 刺蒺藜 滁菊

另用藜蘆 腰黃 礞砂

上三味皆少許為細末點入耳中立效

○膽熱移腦爲鼻淵。肝熱移肺爲鼻痔。病根日久。難以卒效。

羚羊角 丹皮 黑梔 甘菊 元參 辛夷 蒼耳子 石決明

另用雄黃月石冰片研末搐鼻

詒按耳菌鼻痔均屬外證。須另用專方治之。先生長於外科。故用藥自然絲絲入竅。

○暑邪溼毒。走入營中。遍身驟發紫黑斑。鼻血膿腐。此屬發斑牙疳之險證。倘至壯熱神昏。不可挽矣。

羚羊角 犀角 黑梔 丹皮 銀花 連翹
環溪醫案 卷下 諸般 九 借餘小舍

鮮石斛 鮮生地 知母 蘆根

詒按此證於清營中宜稍參疏透之意。

○少陰腎水不足。陽明胃火有餘。牙宣出血。晡時微寒壯熱。而其脈極細。此素體之陰虧也。當憑證論治。用景岳玉女煎。

生地 知母 牛膝 川連 石膏 麥冬

薄荷 蘆根

詒按此證之脈細。想係素稟如是。若云陰虛。未必脈細也。總之須見證確有可據。乃可舍脈從證。未可冒昧以將事也。

痧症

○爛喉痧證。來勢甚暴。甫周一日。丹疹密隱。咽喉已腐。壯熱無汗。大便泄瀉。煩躁渴飲。腕腹按之痛。邪不外達。熾盛於裏。燎原之勢。不可嚮避。恐其遽爾內陷。昏喘生變。現在方法。辛涼透散。通同一律。無所短長。鄙見莫若且用涼膈散。上者上達。表者表達。裏者下達。庶幾熱從外出。而痧透。火從下洩。而躁安。按內經病機。暴注下迫。皆屬於熱。仲景方論。急下之法。正以存陰。幸勿拘現患泄瀉。而遂謂不可再下也。雖然。智愚千慮。各有得失。尚祈高正是荷。

環溪醫案 卷下 痧症 十 借餘小舍

涼膈散 加牛蒡子 桔梗 枳實

詒按既患丹痧。則營絡中必有熱邪。方中丹皮鮮地銀花元參等味。斷不可少。

再診 投涼膈散。煩躁略安。腕痛已止。胸膈之燔。稍衰其勢。而咽喉紅腫。乾欬嗆逆。上炎之火。未熄其威。况丹痧一片。點粒模糊。證交三日。正屬邪張之際。尚在險途。未歸坦境。擬方再望轉機爲妙。

犀角 連翹 元參 川貝 桔梗 鮮石斛 牛蒡子 鮮薄荷根 蘆根

○痧回熱減。溫邪初退之餘。咽喉反腐。虛火又從而附。

之良由久患喉痺陰虛火亢熱滯搖動亢儀復張用方最宜加謹過清恐傷脾胃早滋恐戀餘邪姑擬甘涼法平調肺胃冀得上焦清肅

鮮石斛 大貝 元參 生草 丹皮 沙參 羚羊角 扁豆 稽豆衣 雪梨

詒按看似平淡無奇實已斟酌盡善

脚氣門

○暑雨潮溼溼從下受人於經絡兩足腿股痠楚不能屈伸起卧轉側均覺艱難此屬脚氣適值經行之際少腹窒塞小便澇痛溼熱自氣傷營故舌苔白而底絳脈

環溪醫案 卷下 脚氣

十一 惜餘小舍

形濡身微寒熱慮其有氣逆衝胸之變擬東垣防已飲加減

防已 薏仁 草薢 秦朮 獨活 桑寄生

牛膝 木通 防風 歸尾 延胡 威靈仙

澤蘭 絲瓜絡

詒按此溼熱注於經絡之病與載人類傷寒中之脚氣宜用雞鳴散者不同

再診 兩足稍能行動溼熱有流通之機仍宗前法增損兼參健步丸意

防已 草薢 獨活 牛膝 杜仲 晚蠶砂

木瓜 當歸 延胡 秦朮 桑枝 絲瓜絡

遺精門

○病由喪子悲憤抑鬱肝火偏盛小水淋濁漸至遺精一載有餘日無虛度今年新正加以左少腹舉丸氣上攻胸心神狂亂眼目青皆肝火亢盛莫制也經云腎主閉藏肝司疏泄二藏皆有相火而其系上屬於心心為君火若不制相相火妄動雖不交合精亦暗流而走泄矣治法當制肝之亢益腎之虛宗越人東實西虛瀉南補北例

川連 黑梔 延胡 赤苓 沙參 川棟子

環溪醫案 卷下 遺精

十二 惜餘小舍

鮮地 知母 黃柏 龜板 芡實

另當歸龍薈丸一錢開水送下

詒按遺泄有專屬乎肝者此等證是也此方可引以為例

再丸方 川連 鹽水炒 苦參 煨 白朮 米泔浸晒

牡蠣 煨 三

共研末用雄豬肚一個將藥末納入肚中以綫紮好以水酒各半煮爛將酒藥末共打如嫌爛加建蓮粉拌乾作丸每朝服三錢

詒按此劉松石猪脂丸方也加川連一味

○左尺極細寸關微而似數右三部俱絃滑下有遺精
暗疾肛門癢而水上則頭眩耳鳴舌苔粉白以脈合
證腎陰下虧而溼熱相火下淫上混清敷爲之蒙閉法
當補腎之陰以清相火清金和胃分利膀胱以化溼熱

大生地蛤粉炒龜板 牡蠣 懷山藥 麥冬

革薺 澤瀉 赤苓 丹皮 知母 黃柏

半夏

詒按病源分析極清用藥亦熨貼周到

又丸方

大生地砂仁陳酒拌蒸冬朮土炒黃連鹽水炒苦參 天麻

環溪醫案

卷下 遺精

三 惜餘小舍

懷山藥 丹皮鹽水炒牡蠣 麥冬元米炒龜板炙

川芎 半夏 芡實 草薺鹽水炒澤瀉鹽水炒

赤苓 黃柏鹽水炒知母鹽水炒

右藥爲末用建蓮粉四兩神麩四兩丸

詒按此方用丹溪大補陰丸合封髓猪脂分清等
法而成腎虛有溼熱者用之頗合或乃以苦寒疑
之是未識製方之妙義也

小便閉

○先腹痛數日遂至小便不利少腹脹滿如鼓今已半
月屢用通利之藥小便雖通不爽少腹脹滿益甚診脈

絃緊舌苔白膩飲食少納身無寒熱大便頻泄黏膩如
痰此中陽不足水溼泛溢膀胱氣化無權法當溫土以
禦水寒通陽以化溼濁

乾薑炒肉桂 茯苓 澤瀉 茅朮 木香

茴香

詒按因舌膩便痰故知其爲寒溼惟先曾腹痛則
方中又宜兼通氣分擬再加牛膝烏藥

再診 張先生用平胃化胃中之溼濁五苓通膀胱之
氣化簡淨的當無從增損愚意復入半夏一味暗合通
澈陰陽之路使水溼痰涎從小便出是亦古人加減成

環溪醫案

卷下 小便

古 惜餘小舍

方之心法也

半夏 茅朮 川朴 陳皮 甘草 茯苓

猪苓 肉桂 澤瀉

○腎虛精關不固溼熱混於坎宮精從溺後而出左脈
虛細右脈洪大陰虧而相火勝也補腎陰化溼熱用涼
入味法

涼入味湯加草薺

另威喜丸錢三淡鹽湯送下

再診 精濁稍止而兩足重墮無力欬嗽胸痛金水兩
虧溼熱不化擬清暑益氣以化溼熱兼固腎陰

洋參 黃耆 茯苓 五味 神麴 麥冬
蒼朮 白朮 陳皮 前胡 通草
另知柏八味丸

三診 精濁已止。腿足重墮無力。舌苔白而惡心。坎宮之溼熱雖清。胃家之溼熱猶戀。擬和中化溼法。

豆卷 半夏 茯苓 陳皮 麥冬 沙參
扁豆

另資生丸

四診 腎虛胃溼。胸悶惡心。口沃清水。凡大便時。則精敷自滲如膩。濁擬滲胃溼。固腎精。

環溪醫案 卷下 小便 圭 惜餘小舍

熟地 五味 蒼朮 白茯苓 沙苑

炮薑 黃柏 建蓮

另威喜丸

治按。凡腎虛胃溼之病。用藥甚難着手。第一方專顧腎。第二方腎胃兼顧。第三方專治胃。第四方兩層合治。從黑地黃丸加味。最有巧思。

○淋濁日久不痛。口常甜膩。此腎虛而有溼熱也。

蒼朮 四分 分作四分 水炒一分 用米泔水浸透 晒一分 用鹽三錢 研末 拌炒去故紙

黃柏 兩 分作四分 分用益智仁末三錢 拌炒去益

仁智 蓮蕊鬚 馬料豆 製首烏 茯苓 生草
共研細末。懷山藥粉。煮糊為丸。

治按。腎虛而兼溼熱者。用藥甚難。觀此方取意極佳。惟於腎虛一面。尚可增入沙苑。兔絲。龜板之類。

○腎開竅於二陰。前有淋濁之新恙。後有腸紅之舊疾。皆由於陰虛而有溼熱也。寓育陰於利水清熱之中。猪苓湯。合加味槐花散主之。

茯苓 猪苓 阿膠 生地 槐米 枳殼

六一散 血餘炭 側柏炭

環溪醫案 卷下 小便 圭 惜餘小舍

治按。兩證貫串一綫。用藥自然親切。

再診 便血已止。淋濁未清。今當固本。

芡實 炙草 洋參 麥冬 黃柏 生地

茯苓 沙苑 砂仁 蓮肉 懷山藥

另八仙長壽丸。每服三錢。開水送下。

○小便頻數。溺後有血絲血塊。此膀胱有熱。腎虛有火。逼衝任之血。而下走前陰也。法當通瀉兼行。

生地炭 阿膠 蒲黃 川連 龜板 赤苓

黃柏 鹽水 大黃 醋炒 血餘 車前子 藕

另血餘炭 錢 血珀 錢 研末分兩服。雞子清調下。

再診 血止小便頻數氣墜擬補陰升陽法。

生地 牡蠣 茯苓 龜板 懷藥 丹皮

杜仲 黨參 建蓮 鹿角霜

詒按兩方用藥極為周到所嫌者平實而已。

○淋濁三年不止腎虛溼熱不化陰頭碎癢筋骨微疼六味補腎能化溼熱耐心久服莫計效遲。

大生地 懷藥 茯苓 萸肉 丹皮 澤瀉

五味 麥冬 益智仁 湘蓮肉

詒按六味能化溼熱其理頗精擬再加黃柏牡蠣又按此證陰頭碎癢筋骨微疼疑有瘡毒內戀而

環溪醫案 卷下 小便 七 惜餘小舍

然。

○雜藥亂投諸病不除中氣早戕故腹中不和大便不暢至於本病精濁滑混亦脾虛溼熱所致。

草薢 益智仁 半夏 陳皮 黨參 黃柏

烏藥 石菖蒲 兔絲子

詒按精濁滑混四字將病情包括無遺用藥亦清

靈不滯。

痢疾門

○從來肺有積熱者大腸必燥以相為表裏故也三五年來屢發喉證肺熱可知今秋眼腫出血多服涼藥及

西瓜等物遂患下痢赤白常有乾糞夾雜其中延及百日近見堅栗而痢反更甚此必有故夫脾受瓜果之寒溼既下流於大腸而為痢則大腸之燥當除今獨不然竟若燥與溼各樹旗幟相為犄角之勢豈非以脾屬中土而主溼大腸屬燥金而主津津虧則燥益堅脾虛則溼愈甚耶昔秦氏論痢有溼火傷氣燥火傷血之分此則溼燥兩傷擬撰一方潤燥兼行氣血兼理或通或塞均非所宜。

全瓜蒌 六當歸 五分 木香 五分 川連 五分 甘草 四分

升麻 三分 藕 兩 陳火腿 足骨 一錢

環溪醫案 卷下 痢疾 七 惜餘小舍

詒按論病切實不浮方亦穩適微嫌氣分藥尚少恐機關不能靈動耳。

○伏暑溼熱之邪挾積內蘊胸痞嘔惡發熱舌燥通府之後變為下痢痢色紅白膩凍仍然痞塞嘔惡飲食不納勢成禁口重證須得胃開納穀痢減不嘔為妙閱諸高明方層次轉折各有主意姑擬一方商正。

川連 酒炒 五分 黃芩 酒炒 八分 白芍 炒 錢 青皮 八分 川朴 五分

陳皮 鹽水炒 八分 神麴 錢 茯苓 錢 北沙參 錢 砂仁 八分

生熟穀芽 各二錢 玫瑰花 二朵

原註此病嫌其兩脈虛濡脾胃元氣大弱似乎宜

參入扶正為善。然下痢一證。古稱滯下。起於溼熱居多。早補早飲。往往受累。此河間苦辛宣通府滯之法。所以為痢門必採之方。若夫深刻工夫。補陰補陽。治脾治腎。都為久痢而設。尚非此時議論。所以甯落輕淺。不用深重之劑。蓋行遠自邇之意云爾。

詒按。閱是方者。有病重藥輕之疑。故方後申言其意。

○奔走遠行。傷飢飲酒。脾胃受病。病成休息。下痢。痢經兩載不愈。許學士香茸丸最妙。但嫌其價昂。且藥肆無

環溪醫案 卷下 痢疾 九 惜餘小舍

此現成丸料。今始師其意。而變湯服。

木香 丁香 杜仲 當歸 白芍 炮薑

茯苓 砂仁 鹿角霜 兔絲餅

詒按。此脾腎兩治。而專重於腎者。○查原方。皆用

鹿茸。沉香。麝香。無用丁香者。煎劑中。宜改用沉香為穩。

○脈經云。代則氣衰。細則氣少。多指陽氣而言。今下痢而得是脈。脾腎之陽微特著。况形衰畏冷。而小便清長乎。惟下痢赤者。屬血分。腹中痛者。為有積。立方當從此設想。蓋尋其罅而通之。補之。亦治病之巧機也。

附子枳實理中湯。送下駐車丸。

詒按。看病於虛中求實。極其精審。方亦的當。

○便痢白膩。如水晶魚腦色。小便不利。少腹偏右板窒。諸醫以為腸癰。固亦近是。然考腸癰為病。有寒有熱。金匱並出二方。如大黃牡丹湯。薤仁附子敗醬散。概可見矣。此證則屬寒積。試觀脈絃緊而不數。面色青而不渴。是其徵也。鄙意宜用溫通。備候商訂。

肉桂五苓散 加砂仁 查肉

再診 溫通已效。仍從前法。

原方 加炮薑 木香

環溪醫案 卷下 痢疾 三 惜餘小舍

三診 欲瀉不爽。瀉後氣向下墮。便痢白膩。雖稀。然腰尻痠痛如折。全屬陽虛氣陷之象。仿東垣意。參入前法。

黨參 升麻 肉桂 茯苓 澤瀉 冬朮

炮薑 木香 訶子 砂仁 鹿角

原註。此證並非腸癰。乃寒積下痢耳。因諸醫皆云。余只得委曲周旋。但從腸癰為病。有寒有熱。輕輕轉筆。折入溫通方法。既不得諸醫。又與病相合。不得不然之事也。○此方連服三劑。大便白膩全無。脾胃已起。

詒按。認證已確。用藥自然。鍼芥相投。

○休息下痢。延及半載。色紅而黏。脈絃是風邪久羈於腸。藏營分之中。而莫能出。近日畏風身熱。是又感新風於外也。補中升陽兼涼血為法。

黨參 白朮 防風 麩砂 茯苓 升麻

神麴 砂仁 陳皮 炙草 椿根皮炭

另駐車丸

詒按方中於新感一層。未曾顧到。○腸中有風邪。惟蠶砂能治之。煎方中宜加黃耆。

○陽樞之瘧邪。轉入陰樞為痢。痢色紅而後重。氣墮。肚

門覺熱。是下焦廣腸有熱也。白頭翁法甚當。然今瘧止

又來。仍從陰樞達出陽樞。立法佐以和中。使以泄熱。

四逆散 異功散 黃芩湯 加生熟穀芽

詒按推論病機。轉折極清。立方自然熨帖。

○痢而滑脫。證已險逆。溫固藏真。一定成法。然須得效。

庶可回春。

熟地 杞子 龍骨 茯苓 煨肉 從蓉

杜仲 烏梅 炙草 山藥 鹿角膠赤石脂炒

龜板禹餘糧炒 穀芽 煎湯代水

詒按用藥極其切當。惟病象已深。未識能挽回否。○紅痢三年。腹中結塊。板硬不移。按之則痛。漉漉有聲。

即便下利。此瘧疑寒積。久留於腸府。當以溫通下之。

川附 當歸 蒼朮炭 枳實炭 地榆炭

茯苓 通草 桃仁炒 大黃

詒按溫通瘧積。方極穩當。惟病人正傷。或再加扶正之品。更為周到。

○瘧邪挾積。內陷為痢。痢下紅膩。腹中陣痛。舌苔黃指。瘧勢仍來。形容大削。元氣內虧。慮有變端。治之不易。

神麴 川朴 茯苓 秦皮 川連 黃芩

白頭翁 柴胡 白芍 枳實 炙草

詒按此白頭翁湯。合四逆散。是由瘧轉痢。淫熱挾積之的方。

積之的方。

○紅痢匝月。仍然腹痛後重。據云先曾發瘧三次。此屬中虛表邪傳裏。現今脈細肢寒。中焦陽氣已弱。小便艱難。膀胱氣化又鈍。擬連理兼化其淫熱。柴苓以解其表邪。是亦表裏兩解之法也。

柴胡 桂枝 茯苓 澤瀉 川連 木香

黨參 白朮 炮薑 炙草 砂仁

詒按論病立方。均熨帖老到。○此理中湯加香連。

五苓散加柴胡。

○肝胃不和。淫熱積滯為痢。延及半載。仍然腹痛。脫脹。

惡心。治以苦辛泄肝和胃。佐以分消運化。

川連 茯苓 川朴 木香 查肉 陳皮

青皮 赤苓 白芍 砂仁

另駐車丸二錢烏梅丸一錢和服

再診 痢減腹中猶痛。肝胃不和也。現值經來。脈絃寒

熱。血虛木鬱。擬以養血疏肝。

歸身 白芍 香附 茯苓 冬朮 木香

陳皮 神麴 川芎 生熟砂仁

另駐車丸錢一烏梅丸錢一歸脾丸錢一和服

詒按前後兩方均親切不浮。此方中可加醋炙柴

環溪醫案

卷下 痢疾

借餘小舍

胡五分醋炒青皮一錢。

便血關

○痔血雖自大腸來。亦屬脾虛溼熱。至於大瘡。古云邪

伏三陰。薛立齋云。三陰者脾也。上年瘧止。直至今夜復

作。未免又有暑邪內伏。近日痔血。相兼為患。擬用清暑

益氣湯加味。內化溼熱。外解新邪。總以益氣扶中為主。

俾中樞一運。自然內外分消矣。

黨參 炙草 黃耆 蒼朮 冬朮 當歸

麥冬 五味 青皮 陳皮 神麴 黃柏

葛根 升麻 澤瀉 防風 蜀漆 赤苓

煨薑 大棗

詒按宿病兼新邪而發。須先治新感。仍照顧宿病。

乃能得手。此方是也。○經云。三陰瘧疾。此三陰專

指太陰脾藏言。與統指肝脾腎三藏者不同。

再診 素有便血之證。而患大瘡日久。凡患大瘡。其始

必有寒邪。邪入三陰。大瘡成焉。若陰虛之人。寒久必化

為熱。熱陷三陰。便血作焉。而三陽之寒仍在也。溫三陽

之陽。以少陽為始。清三陰之熱。以少陰為主。然血既由

大腸而出。又當兼清大腸。方用棉子肉。內具生氣。溫少

陽之陽也。鮮首烏性兼潤血。清少陰之熱也。柿餅灰性

環溪醫案

卷下 便血

借餘小舍

涼而瀉。清大腸之血也。標本並治。雖不中不遠矣。

棉子肉四兩炒黑柿餅灰兩四二味研末用

鮮首烏斤二搗自然汁取汁去渣以汁調

神麴兩一黃爛將上藥末搗丸每服三錢棗湯下

詒按凡久病氣偏。尋常湯藥。性味牽制。不能奏績。

必用性味專簡之方。乃能見效。此方即用此意。

○脾虛不能攝血。便後見紅。脾虛不能化溼。腹股足腫。

病根日久。腎陰亦傷。腎司二便。故小便不利。是皆脾腎

二經之病也。法以溫攝雙調。

熟地 炮薑 茯苓 澤瀉 陳皮 車前子

川朴 茅朮 五味 丹皮 山藥 阿膠
論按凡脾腎兩傷者當斟酌於潤燥之間用藥極難古方惟黑地黃丸最佳方亦從此化出

再診
熟地 茅朮炭 白頭翁 黃柏鹽水炒 炮薑炭
阿膠 五味 秦皮

三診
山藥 川連酒澤瀉 車前子 茯苓 川朴
陳皮鹽水炒 伏龍肝 煎湯代湯

環溪醫案 卷下 便血
鹿角霜 益智仁
原註第一方用黑地黃丸加阿膠治脾腎兩虛兼以攝其陰血第二方用白頭翁湯清厥陰之熱以止血第三方暗用平胃散以化滯治其腹鳴外合車前子澤瀉山藥乃用六味地黃意補其腎以利膀胱而通水道也又再加伏龍肝乃暗合黃土湯意治少陰便血層層回顧如此

○便血腸燥脈大氣虛補氣則清陽自升清腸則便血自止
黃耆炒 防風根 阿膠 地榆炭 當歸炭

五味 荷蒂炭
另金銀花炒黑 柿餅灰一兩 槐米炒 猪膽汁泛丸每朝服一錢

論按立方用藥頗有思路可取丸方尤佳
○腸胃有溼熱溼鬱生痰熱鬱生火大便下血晨起吐痰熱處溼中溼在上而熱在下治上宜化痰理溼治下宜清熱退火用二陳合三黃為法

半夏 陳皮 茯苓 川連 黃芩 杏仁
胡黃連 地榆皮 側柏葉 百草霜

環溪醫案 卷下 便血
○腸痔脫肛便血其根已久有時舉發而脈象細數營陰大傷面黃少神脾氣大困兼之腹中鳴響脾陽且不振矣一切苦寒止血之藥非惟少效抑恐碍脾擬東垣黑地黃丸法

熟地砂仁拌炒 炮薑四分 黃耆錢三 茅朮米泔浸炒
五味炒五分 黨參錢三 荷葉蒂兩個
又原方 加阿膠 伏龍肝
論按方極正當凡陰虛而脾陽困頓者當取以為法

盡病門

○閱病源是屬蟲病無疑。蟲由脾土不運。溼熱蒸化而生。其發於月底之夜。乃由脾胃虛寒。寒屬陰。故夜發也。寒久化熱。土虛木強。其發移於月初。必嘔吐胸熱。乳下跳動。蟲隨酸苦痰涎而出。多寡不一。時或見於大便。腹中微痛。雖渴甚不能嚥水。水下復嘔。嘔盡乃平。至中旬則康泰無恙矣。所以然者。月初蟲頭向上。且病久多嘔。胃陰虧而虛火上炎。故胸中覺熱也。虛里跳動。中氣虛也。中氣者。乃胸中大氣。脾胃冲和之氣。皆歸所統。今中氣虛甚。故跳躍也。病延一載。蟲屬盤踞。未易一掃而除。圖治之法。和中調脾。以杜生蟲之源。生津平肝。以治胸

環溪醫案

卷下 蟲

天惜餘小舍

熱口渴。化溼熱。降逆氣。以治嘔吐。久服勿懈。自可見功。欲求速效。恐不能耳。

川棟子 蕪荑 黨參元米炒 白朮 使君子肉

半夏 陳皮 青皮 白芍 茯苓 焦六麩

乾薑 樞子 蔻仁

詒按論病頗切實。惟立方專於顧本。似難取效。擬另服殺蟲丸藥以佐之。

○喜食生米。積聚生蟲。腹痛面黃。口流涎沫。蟲之見證無疑。先擬健脾化蟲。

茅朮米泔水浸 青皮 鶴虱 樞子炒打 蕪荑 檳榔

陳米炒黃
詒按此治蟲病初起最輕之方。痛時口流清水。是蟲病的據。

內經門

○熱在中焦部分。時吐紅痰帶臭。不甚效。嗽病在於胃。有留熱伏於中宮。法當清泄。

犀角 射干 桃仁 當歸 薏仁 冬瓜子

連翹 銀花 川貝 大黃 元明粉

再診。不效。嗽。但吐紅痰如膿。自覺灼熱。在於胃脘之中。將及三月。非肺癰也。乃痰熱留於胃中也。當以清化。

環溪醫案

卷下 內癰

天惜餘小舍

當歸 薏仁 冬瓜子 沙參 連翹 川貝

石斛 銀花 赤小豆 蘆根

三診。吐痰如膿已止。脘中之熱已退。時覺微寒微熱。餘火未清。仍從前法加減。

黨參 當歸 薏仁 杏仁 沙參 冬瓜子

丹皮 黃芩 甘草 茅根 蘆根 赤小豆

詒按此病得力在第一方。故知其非肺癰。然紅痰如膿而臭。究與脘癰無異。作胃脘癰治。當不致誤。

○者邪挾積。阻滯腸胃。脘腹疼痛。大便泄出。如膿如血。證屬盤腸流注。非輕證也。

川連 木香 檳榔 當歸 查肉 神麴

黃芩 枳殼 赤芍 砂仁

治按膿血痢而名流注說頗新奇閱方仍是治痢之藥憶蔣問齋醫略中論痢疾一證謂是腸中作膿當用外場治法與此案正相合也

外場門

○多年溼毒左足前膝腐爛今則膝骨臂股上及缺盆疼痛而木腫此溼得熱而蔓延循經竄絡病在陽明名溼毒流注口苦帶膩脈緩而小溼勝於熱熱伏溼中仿防已飲法

環溪醫案 卷下 外場 无 惜餘小舍

防已 蒼朮 黃柏 南星 木通 威靈仙

防風 歸身 獨活 紅花 草薺 羚羊角

滑石

治按此治外場正法是瘍證之偏於陽者

再診 前用防已法宣通關節以化溼熱膝股之痛稍緩惟缺盆處欬嗽引痛不平擬參以清肺化痰

前方去羚羊角 防風 木香 紅花

加薏仁 杏仁 川貝 沙參

○周身碎癢而痛似疥癩狀心中煩熱膚上出膿水證屬肺風

馬勃 象貝 荆芥 黃芩 杭菊 蒺藜

治按此溼熱走於血分之病當兼疏血絡擬加歸

類丹皮赤芍忍冬藤浮萍細生地

○寒痰凝阻煩車不利高而腫硬色白不紅此屬陰寒骨體與色紅身熱者不同

熟地 麻黃 桂枝 防風 製蠶 白芥子

當歸 秦艽

治按此病挾肝火者十之八九此獨不然於此可悟辨證之不可膠執也

○溼久蘊於下焦氣血凝滯而結湯生於合暴之旁滋

環溪醫案 卷下 外場 无 惜餘小舍

蔓疝腎之際初起數日即潰火甚毒甚可知潰後爛孔

極深迄今四五十日新肉雖生而嫩疝腎餘腫仍偃久

臥牀稱脾胃之轉輸自鈍刻當痛楚形容之色澤尤枯

調治方法自宜補益高明見解大略相同愚意慮虛固

虛而實處仍實擬用煎丸二方各走一經虛實兼顧

六君子湯去半夏 茯苓 加黃耆 歸身

白芍 穀芽

又丸方

川連 酒炒 胡連 酒炒 苦參 炒 黃柏 錢 當歸 錢
乳香 錢 沒藥 錢 白芷 錢 犀黃 分 血珀 分 白礬 錢

刺蝟皮錢一 象牙屑錢三 海蝶蛸錢三

共為末用黃占焯化作丸每劑服五分

原註凡極苦之藥直入下焦堅陰而化溼熱用蝟皮牙屑之專消漏管者引入患處更用黃占以滴之固之俾上中不受苦寒之藥氣俾入下焦其性始達

論按丸方用意極精

○溼熱結疔初起腎囊紅腫漸至氣上攻脇脇肋腫痛已及半月防成肋癰病在肝絡肝性善升甚則恐致氣升發厥非輕證也

環溪醫案 卷下 外瘍

惜餘小舍

川棟子 延胡 青皮 香附 查炭 枳殼

旋覆花 桃仁 赤苓 狸絳 葱管

論按方治疔氣而肋癰即在其中內病外瘍一以貫之也

○木鬱不達乳房結核堅硬胸脇氣撐腰脊疼痛氣血兩虧鬱結不解論其內證即屬鬱勞論其外證便是乳岩皆為難治

黨參 香附 川貝 當歸 白芍 青皮

橘核 狗脊 杜仲 砂仁

論按論病簡潔老當

○乳房結核堅硬雖皮色不紅而推之鬆動此非乳痰仍屬乳癰肝鬱所致身微寒熱防滋蔓難治

柴胡鹽水炒 當歸 白芍 黑梔 川貝 香附

瓜蒌皮

另金針菜炙脆 皂莢子錢三 射干錢三

研末分三服飲酒者酒下否則砂仁湯亦可

論按煎方用逍遙散亦通套方也好在有末藥以佐之

再診 乳癰已潰寒熱亦止第餘塊未化惟和其氣血調其鬱結而已

環溪醫案 卷下 外瘍

惜餘小舍

當歸 白芍 香附 川貝 遠志 砂仁

丹參

○肝鬱結成乳痰延及旬月堅中帶軟頂色轉紅勢將穿潰潰後見膿乃吉若血多膿少非所宜也

川棟子 當歸 青皮 白芍 橘紅 川貝

香附 茯苓 砂仁

再診 乳痰穿破有血無膿乃氣虛不能引血化腐為膿也防變乳岩不易收功

黨參 歸身 白芍 茯苓 棗仁 川貝

香附 陳皮 牡蠣 砂仁 甘草 橘葉

論按此等鬱痰證。須正氣不虧。更能曠懷自遣。乃可醫治。二者缺一。不可治也。

又單方

川貝三錢橘紅五錢萊菔子炒三錢蓮蓬皮另炙灰五錢

○痰癥二載。自頸延脇。或已潰。或未潰。或潰而不斂。或他處續生。累累然如貫珠。如疊石。潰後色黑而膿稀。外軟而內堅。診脈不甚虛。飲食尚可。細詢病由。氣鬱而起。鬱則肝膽三焦之火。循經上走於絡。結成癥核。小則為癥。大則為痰。收功非易。必放開胸襟。曠觀物理。乃佳。

夏枯草五錢昆布三錢山茨菇三錢遠志甘草湯元參二錢

環溪醫案 卷下 外傷 三 借餘小舍

川貝二錢歸身二錢天葵草三錢香附五錢功勞葉二錢

論按此病亦與失管證相類。幸脈實能納。故用藥專從痰火着想。

○翻花腎岩。法在難治。怡情安養。庶幾可圖。然非易事也。

鮮首烏一兩馬料豆一兩銀花一兩甘草稍一兩

煎濃服

西黃一分川連五分血珀五分藥珠三分燈心灰五分

大貝二錢人中黃一錢

研末分十服。每朝一服。

論按此腎虛而兼瘡毒之變證也。

○先天元氣不足。胎中伏毒。因虛竄絡。頸項結核。或已潰。或未潰。或潰而不斂。兼以耳聾鼻塞。腦門遇陰雨則脹痛。效嗆牙關不利。皆陰虛陽亢。毒邪上蒙清竅之見端也。若徒治其虛。伏毒何能宣化。擬養陰化毒。

北沙參三錢花粉三錢當歸三錢海蝶蛸三錢仙遺糧三錢

川貝二錢防風一錢銀花三錢稽豆衣三錢珠粉一分

血珀五厘西黃五厘

論按鼻塞腦痛。皆餘毒內戀之象。擬再用化毒丹佐之。

環溪醫案 卷下 外傷 三 借餘小舍

○廣風自頭而起。漸延遍體。溼熱穢毒之邪。從鼻而受。為日既久。未易掃除。擬用金蟾脫甲酒意。

金銀花三兩蟾蜍去腸一隻苦參三兩大黃一兩皂莢子十粒

川芎一兩白鮮皮二兩一本有蛇脫一兩甲片二兩

用陳酒五斤。浸七日。每日飲杯許。

論按此與前條之證。皆係餘毒所致。

○肝經鬱火。乘犯陽明。牙齦癢痛。出血而發牙疳。舌紅碎裂。頭眩心煩。是營陰內虧。而納穀氣。擄又屬脾氣虛也。猶喜大便燥結。可用清滋法。先平其炎上之火。

羚羊角 鮮生地 鮮石斛 元參 麥冬

石決明 女貞子 茯苓 棗仁

詒按立方專於養陰熄肝。尚意再加廣皮雞內金。以健運脾氣似更周到。

○陰虧火亢。繞頸生痰。寒熱似瘧。而實非瘧也。少陰水虧。不能涵木。少陽火亢。更來燥金。金木交戰。乃生寒熱。飲食少。脾胃弱。慮延勞損。

六味地黃湯 加牡蠣 黨參 麥冬 柴胡 白芍 五味

詒按方以六味滋腎。生脈保肺。合柴芍以清肝。立方周到。髮帖。愚意擬去溫肝之黃肉。再加清膽之

環溪醫案 卷下 外傷 惜餘小舍

菊

○牙齦滲膿。二載不愈。此屬牙漏。腎虛而胃有溼熱所致。

六味丸 資生丸

相和每朝四錢淡鹽湯送下

詒按六味補腎固住。資生清溼熱似嫌力量不到。

○本原不足。兼挾風濕發熱。頸間結核成痰。二十餘日。不紅不腫。不消散。亦不作膿。屬半虛半實。慎柔方有良法。用四君子加牛蒡。世所未知。余曾驗過。

四君子湯 加牛蒡子 象貝 桑葉

詒按四君補虛。加勞貝以消風化痰。桑葉以清肺通絡。虛實兼顧。絕不犯手。

再診 昨用慎柔方。是托散法。服下若汗出熱退。則數劑可消。若汗不出。仍發熱。則數劑成膿。亦易潰斂。

前方 加鈎鈎

三診 三歲孩童。但哺乳汁。不進穀食。脾胃虛弱可知。頸結痰核。而有寒熱。必挾風濕。屬半虛半實。今將一月。熱退復熱。其塊不消。不作膿。大便溏。脾胃不足。氣血兩虛。

黨參 冬朮 陳皮 荆芥 黃耆 歸身

環溪醫案 卷下 外傷 惜餘小舍

防風 葛根 砂仁 桑葉

詒按因慎柔方不效。轉擬此方。其實遠不及前方之靈動也。

○瘍漏久而成管。用消管丸。緩緩治之。

胡黃連 兩 刺猬皮 兩 象牙屑 兩 五倍 兩

蟾酥 酒化 三錢 陳硬明角燈 二兩

右藥為末。煉蜜丸。用上好雄精。泛上為衣。每朝服三錢。金銀花湯送下。

詒按方意極佳。惟蟾酥大毒走竄之品。擬減半用之。

婦人門

○目之烏珠屬肝。瞳神屬腎。病因經行後。腰痛口乾。烏珠起白翳。怕日羞明。瞳神散大。此肝腎之陰不足。而相火上炎也。補陰之藥。極是。再稍參清洩相火之品。

女貞子 旱蓮草 生地 杞子 黃柏三分 煎汁炒

潼沙苑 穀精草 丹皮 元參 桑椹子

黑芝麻 另磁硃丸

再診 血虛則木旺。木旺則脾衰。脾衰則痰溼不化。肝旺則氣火易升。是以腹中時痛。臍右有塊。目中乾澀。口常甜膩。舌苔白。而經水不調也。治法不宜制肝。制則耗

環溪醫案 卷下 婦人 惜餘小舍

其氣。但當養陰以和肝。不可燥溼。燥則劫其陰。祇宜和脾以運氣。此仲景治肝補脾之要法也。

黨參 當歸 白芍 茯苓 冬朮 半夏

陳皮 丹皮 香附 橘葉

三診 脈輕按虛微。是為元氣之虛。重按細數。是屬營陰之損。左尺細弱。腎水虧也。歷診病情。每遇經來。其熱輒甚。舌上即佈白苔。良以胃中溼濁。因裏熱熏蒸而上泛也。少腹有塊。攻痛聚散無常。是名為瘕。瘕屬無形之氣。隸乎肝腎為多。揆其致病之由。因目疾過服苦寒。戕伐生生之氣。胃受寒則陽氣鬱而生溼。肝受寒則陰氣

凝而結瘕。陽氣鬱於胸中。故內熱。陰氣凝於下焦。故腹痛。經事過則血去而陰虛。故其熱甚。甚則蒸溼上泛。故舌苔濁厚也。刻下將交夏令。火旺水衰。火旺則元氣耗而不支。水衰則營陰涸而失守。惟恐增劇耳。圖治之法。補脾胃以振元氣。培肝腎以養營陰。是治其本也。稍佐辛溫。宣通下焦陰氣。是兼治其瘕痛之標也。

黨參 黃耆 冬朮 茯苓 炙草 歸身 酒炒

萸肉 酒炒 首烏 木香 白芍 吳萸三分 煎汁炒 馬料豆

生熟穀芽

詒按三案論病則委曲周至。用藥則細膩熨帖。看似平淡無奇。實則苦心斟酌以出之。誠以調理內傷久病。與治外感時邪不同。病久正虛者。病機必多錯雜。礙手之處。用藥必非一二劑所能奏效。故立方必須四面照顧。通盤打算。不求幸功。先求無弊。此等功夫。非老手不能擅場。

○崩後不時寒熱。腹中有塊。口發牙疳。營虛有火。氣虛有滯。調之補之。

黨參 陳皮 當歸 白芍 丹皮 茯苓

麥冬 元參 黑梔 女貞子 建蓮肉

再診 血虛木橫。兩脇氣撐脹痛。腹中有塊。心蕩而寒。

熱病根日久。損及奇經。經云衝脈為病。逆氣裏急。任脈為病。男疝女瘕。陽維為病。苦寒熱。陰維為病。苦心痛。合而參之。謂非奇經之病乎。調之不易。

黨參 黃耆 當歸 白芍 沙苑 茯神
杞子 香附 陳皮 白薇 紫石英

詒按擬再加牛膝青皮沈香。

三診 和營衛而調攝奇經。病勢皆減。惟腹中之塊未平。仍從前法加減。

前方去杞子 加砂仁 冬朮

詒按古無專屬奇經之病。亦無專入奇經之藥。考

環溪醫案 卷下 婦人 表 惜餘小舍

內經入脈行度。及前賢議論。均謂十二經氣血有餘。則溢入奇經。有病者亦必日久病深。由正經而侵入之。然則用藥治病。自當仍以正經為主。學者須明此意。勿為近賢議論所蒙也。

○內熱日久。經停兩月。投養陰調血通經之劑。得熱絀。經行。可謂效矣。然猶未也。脈數不和。舌仍光赤。乃陰津未充。虛陽未斂也。仍宜小心安養為善。

生地 當歸 白芍 丹皮 阿膠 香附
黨參 茯苓 陳皮 地骨皮

詒按平正妥帖。

再診 脈數已和。舌色光紅已退。但有時尚覺微熱。仍以前法增損。

前方去丹皮 阿膠 加麥冬 狗脊

○經事不來。足腫腹滿。臍下偏左有塊。上攻作痛。此痰凝氣滯。病屬血分。慮延成癥。

三稜 醋莪朮 香附 當歸 神麩 查肉

延胡 砂仁

另大黃蘆蟲丸。每服五粒。日三次。

詒按此氣血兩疎之法。用藥切實不浮。好在丸藥緩攻。不嫌其峻。

環溪醫案 卷下 婦人 表 惜餘小舍

再診 經停腹滿。形瘦色黃。氣血瘀凝。防其成癥。

香附 延胡 枳殼 茯苓 蘇梗 川樸

大腹皮 冬瓜皮

另大黃蘆蟲丸。

○憂愁抑鬱。耗損心脾之營。而肝木僭逆。胸中氣塞。內熱夜甚。經事兩月不來。脈沉而數。熱伏營血之中。擬用柴胡四物湯。和營血以舒木鬱。

黨參 冬朮 生地 當歸 白芍 香附
青蒿 白薇 生熟穀芽

詒按此等證調治失當。最易入於損途。○擬再加

丹皮丹參

○經後少腹痛連腰股。肛門氣墜。大便不通。小便赤澀。擬泄肝經之鬱熱。通絡脈之凝滯。

金鈴子 延胡 郁李仁 歸尾 黑梔 柴胡

龍膽草 大黃酒炒 旋覆花 狸絳 青葱管

治按病情於小便上得之。

○經行後少腹作痛。上及胸脘腰脇。內熱口乾。大便不通。小便熱痛。此肝氣挾瘀所致。

川棟子 延胡 桃仁 香附 山梔薑汁炒

澤蘭 川連吳黃炒 丹皮

環溪醫案 卷下 婦人 聖惜餘小舍

另當歸龍薈丸錢三淡鹽湯送下

治按病情與前條相似。方亦近之。惟當歸龍薈丸。用得太重。宜減半服之。

○年將五十。經事頻來。且多是衝脈不司收攝。故也。防其崩決。補之攝之。

黨參 黃耆 當歸 於朮 棗仁 陳皮

茯神 阿膠 荷葉蒂 藕

治按此方從歸脾增減。補則有之。攝則未也。擬加牡蠣龜板茜草炭烏賊骨以佐之。

○病起當年。產後。雖經調理而痊。究竟營虛未復。是以

至今不育。且經事乖而且多。亦營虛而氣不固攝之故。自上年九秋。又感寒邪。入於肺為欬嗽。痰中帶血。此謂上實下虛。血隨氣逆。蔓延旬日。加以內熱。漸成勞損。姑仿仲景法。扶正化邪。以為下虛上實之法。

生地 黨參 炙草 當歸 豆卷 前胡

茯苓 懷藥 麥冬 阿膠 川貝 杏仁

桂枝 枇杷葉

治按趨步古人。非胸羅經訓者不能。時下隨證敷衍。烏能望其項背。

再診 進薯蕷丸法。補氣血。生津液。徹風邪。欬嗽已減。

環溪醫案 卷下 婦人 聖惜餘小舍

所謂上實下虛。病情不謬。據云當年產後。腹中常痛。至今未愈。顯見營分有寒。已非一日。但內熱淹纏。心悸頭眩。久虛不復。終為勞損。茲從入珍加減。復入通補奇經。王道無近功。耐心安養。為是。

十全去耆芎 加阿膠 艾 炮薑 紫石英

陳皮 麥冬 欵冬花 川貝 神麴 大棗

三診 溫補奇經。病情俱減。今仍前制。

十全去耆芎草 加阿膠 香附 炮薑

陳皮 吳黃

○兩次血崩之後。赤帶連綿不斷。迄今半載有餘。脈象

虛微氣血大虧。是以頭眩心跳。腰痠足軟等證。均見也。近日腹痛食減。恐其復致崩決。擬方固攝奇經。

女貞子 烏賊骨 茜草炭 旱蓮草 黨參

茯苓 白芍 丹皮 阿膠 蓮肉 荷葉蒂

藕節

另震靈丹二錢

再診 固攝奇經。病情不減。崩漏不止。腹痛不已。用升陽固陰法。

陽固陰法。

鹿角霜 沙苑 龍骨 牡蠣 懷藥 杜仲

女貞子 杞子 茯苓 棕炭

環溪醫案

卷下 婦人

聖借餘小舍

詒按。固攝不效。進用升澁。此用藥轉換。一定層次。

○痛而經來。肝木橫也。經事參前。血分熱也。色黑有瘀。和而化之可也。

川棟子 延胡 丹皮 當歸 白芍 澤蘭

香附醋炒 木香 茯苓 查炭 砂仁

詒按。立方平善。

再診 經來色黑而痛。當與化痰。

生地 桃仁炒 紅花 澤蘭 黑梔 香附醋炒

當歸 川芎 醋炙大黃炭

○養血以調經理氣。以止痛。補肝之虛。以平眩暈。助脾

之運。以除惡心。

熟地六分 三分一分 砂仁一分 枰一分 炒鬆一分 薑汁一分 炒焦一分

當歸兩分 三分一分 吳萸一分 煎汁一分 炒一分 茴香一分

白芍兩分 二分一分 肉桂一分 煎汁一分 炒一分

香附兩分 四分一分 黑梔三分 煎汁一分 炒一分 鹽水一分

川芎酒炒 沙苑鹽水炒 茯苓三兩 陳皮鹽水炒

黨參兩分 丹參三兩 酒浸兩分 乾再兩分 再晒兩分 如此兩分 七次兩分 焙研

詒按。此方製法精巧。養血理氣。兩擅其長。木香砂仁。亦可酌增。

○欬嗽發熱日久。前投補益脾胃之藥。六七劑。食穀加

環溪醫案

卷下 婦人

聖借餘小舍

增起居略健。但熱勢每交寅卯而盛。乃少陽旺時也。少

陽屬膽與肝。相為表裏。肝膽有鬱熱。戕伐生生之氣。肺

金失其清肅。脾胃失其轉輸。相火日益熾。陰津日益涸。

燎原之勢。不至涸極不止也。其脈絃數者。肝膽鬱熱之

候也。刻下初交夏令。趁其胃旺加餐。擬進酸苦法。益陰

和陽。清徹肝膽之鬱熱。考古方柴前連梅煎。頗有深意。

錄出備正。

柴胡猪膽汁浸 川連鹽水炒 白芍錢 前胡錢

烏梅五分 麥冬錢 黨參錢 秋石分 炙草分 薤白分

原註。此方服後。熱勢竟退。此時已經停兩月。以後

或熱或止。喜其能食。至四五月後。方知其有孕。治按此等證最易認作虛損。得此議論。大開後人眼目。又按此必有微邪。伏於肝膽之間。挾木火而發。煎熬津液。日就乾涸。古人所謂營風者。曹仁伯謂卽是此証。

○寒氣客於下焦。痰凝停於少腹。阻塞胞門。膀胱陽氣失化。以致癰閉。產後八日。而小便不通。脈細肢寒。腹中覺冷。恐其氣逆上攻。發厥。法以溫通下焦。化痰利水。冀其應手爲妙。

當歸八錢 川芎四錢 查炭五錢 炮薑五錢 桃仁三錢 車前五錢
環溪醫案 卷下 婦人 吳惜餘小舍

益母草湯同陳酒各一碗代水煎藥

另肉桂五分 血珀五分 甘遂三分 共研末藥汁調服

治按末藥方甚佳。煎方中擬加澤蘭牛膝吳萸。

此證甚急。用藥能絲絲入籠。迥異膚浮家數。

再診 小水癰閉已通。痰凝未下。少腹仍然板滿。再以溫通洩濁。

肉桂 延胡 紅花 桃仁 丹參 兩頭六

歸尾 查炭 牛膝 炮薑 冬葵子 車前

○前年小產。惡露數日卽止。因而腹痛結塊。心神妄亂。言語如顛。此所謂血風病也。胞絡下連血海。上系心胞。

血凝動火。火熾生風。故見諸證。診脈絃搏。肝陽有上亢之象。防加吐血。治法當以化痰爲先。稍佐清火可也。

丹參 延胡 五靈脂 川連 川貝 赤苓 蒲黃 黑梔 荊芥子 香附

另回生丹一粒

治按疏證病原。切實指點。與膚浮影嚮者不同。

○產後腹痛年餘。營虛木鬱。脾胃受戕。時作惡心。時沃酸水。用千金當歸建中湯。

當歸 白芍吳萸炒 炙草 炮薑 肉桂 川椒

南棗 橘餅

環溪醫案 卷下 婦人 吳惜餘小舍

治按用藥切當。無支湊幫貼之病。自是老手。

再診 前投建中法。腹痛已止。復因經行之後。勞碌受寒。腹中又痛。加以哺熱。飲食減少。舌苔乾白。此屬血虛肝鬱。脾虛木橫。用歸脾法加減。

黨參 黃耆 茯苓 陳皮 冬朮 歸身 炮薑 木香 砂仁 白芍吳萸炒 橘餅

○產後痰凝未淨。新血不生。身熱日久。少腹疼痛。小溲淋漓。帶下血筋。此肝經鬱熱。兼挾凝痰爲患。殊非小恙。姑擬洩肝和營。化痰爲法。

鮮生地薑汁拌炒 生薑渣鮮地汁拌炒 黑梔 延胡

金鈴子 龍膽草 丹參 赤苓 歸鬚 狸絳

甘草稍 青葱管

詒按。恰合病機。惟少腹痛者。於化痰一層。尚須着意。擬加西珀烏藥紅花。

○經事來多去少。似崩非崩。是血虛有熱也。所謂天暑地熱。則經血沸溢。用白薇湯加阿膠主之。

女貞子 白薇 阿膠米粉炒 黃芩醋炒 歸身炭

沙苑鹽水炒 黃栢 白芍 旱蓮草 蓮心

詒按。立方精到。敷貼。

○經停少腹痛。小洩淋漓。有血縷。此肝火與凝瘀交阻。當導而通之。

環溪醫案

卷下 婦人

聖 惜餘小舍

龍膽草 小薊炭 桃仁 大黃酒炒 山梔

冬葵子 延胡 車前子 丹皮 海金沙

詒按。立方切實。

○經行後奔走急路。冷粥療饑。少腹疼痛連腰脇。兼及前陰。此肝腎受傷。又被寒侵而熱鬱也。經云。遠行則陽氣內伐。熱舍於腎。冷粥入胃。則熱鬱不得伸。故痛也。遵寒熱錯雜例。兼腹痛治法。

川連酒炒 炮薑 桂枝 白芍吳萸三分煎汁炒 全當歸

木通 香附 查炭 黑梔 旋覆花 狸絳

詒按。推究病原。親切不膚。

○內經有石痕石水之證。多屬陽氣不布。水道阻塞之證。少腹有塊。堅硬者為石痕。水氣上攻而腹滿者為石水。此證初起。小便不利。今反小便不禁。而腹漸脹滿。是石水之象。考古石水治法。不越通陽利水。淺則治膀胱。深則治腎。久則治脾。茲擬一方備採。

四苓散去猪苓 加大腹皮 陳皮 桑白皮

川樸 烏藥 桂枝 雞內金

另朝服腎氣丸錢二

詒按。煎方治膀胱。丸方治腎。方中桂枝。擬改用肉桂。

環溪醫案

卷下 婦人

聖 惜餘小舍

桂。

○體氣素虧。頻年屢患欬嗽。今春產後悲傷。欬嗽復作。背寒內熱。氣逆痰多。脈虛數。大便溏。延今百日。病成羸勞。按產後血舍空虛。八脈之氣先傷於下。加以悲哀傷肺。欬嗽劇發。震動衝脈之氣上逆。經云。衝脈為病。逆氣裏急。陽維為病。苦寒熱。頻進疎風清熱脾胃再傷。以致腹痛便溏。食減無味。斯皆見欬治欬之弊。越人謂上損及脾。下損及胃。俱屬難治。姑擬通補奇經。鎮攝衝脈。復人扶脾理肺。未能免俗。聊復爾爾。

熟地砂仁當歸小茴香三分炒炭 當歸小茴香三分炒 白芍桂枝三分炒 紫石英

牛膝水炒 茯苓 川貝

詒按用熟地歸茵牛膝紫石英溫攝衝任用歸芍以調陽維用藥頗為親切擬再加胡桃人參山藥

沙苑牡蠣

○心胸覺冷經事數月一來食入則腹中脹痛寒痰氣鬱凝滯不通當以辛溫宣暢導熟料五積意

半夏 桂枝 茯苓 蒼朮 白芍 川樸

川芎 歸身 丹參 炙草 陳皮 枳殼

高良薑

再診 苦辛溫通之劑而能調經散痞用之果效益信

環溪醫案

卷下 婦人

惜餘小舍

古人言不妄發法不虛立在用者何如耳

前方去良薑 加羌蔚子 砂仁

○乳房屬胃乳汁血之所化無孩子而乳房膨脹亦下乳汁此非血之有餘乃不循其道以下歸衝脈而為月水反隨肝氣上入乳房變為乳汁事出反常非細故矣夫血猶水也氣猶風也血隨氣行如水為風激而作波瀾也然則順其氣清其火熄其風而使之下行如風迴波轉可也正何必參堵截之法澁其源而止其流哉噫可為知者道難與俗人言也

元精石 赤石脂 紫石英 寒水石 牡蠣

大生地 白芍 歸身 茯苓 烏藥 麥芽 郁李仁

詒按此等議論全是精心結撰毫無依傍非胸有積理者不能道○於乳汁變化之道確鑿指出非見理精到者不能○方擬去石脂郁李加丹參丹皮牛膝

小兒門

○幼穉伏邪挾積阻滯腸胃熱痰化熱肺氣窒痺是以先瀉而後欬更繼之以發熱也今者便泄已止而氣急痰嘶肺氣阻痺尤甚法當先治其肺蓋恐肺脹則生驚

環溪醫案

卷下 小兒

惜餘小舍

發搐其變端莫測耳

葶藶子錢三 萊菔子錢三 六一散錢三 枇杷葉錢三

再診 痰嘶氣喘逆平其大半熱勢起伏退而復作時下多瘧須防轉瘧

白蘿蔔汁杯一 鮮薄荷汁杯半 二味煎濃去上沫加入冰糖錢三 烱化薑汁滴 冲服

詒按兩方用藥俱清簡可法於小兒尤宜

○先痢而後瘧已經兩載面黃內熱腹滿足腫脾氣大虛舌紅形瘦陰液大傷童勞證也

黨參 茯苓 於朮 陳皮 黃耆 澤瀉

川連 神麴 防風根

再診 瘡痢三年脾胃元氣大傷脈數舌紅腹滿足腫

小洩短少前投升陽益胃熱勢略減今擬補益脾陰兼

以化濁然童穉陰虧病延日久夏令防其增劇

黨參 懷藥 冬朮 麥冬 五味 白芍

陳皮 茯苓 砂仁 雞內金

治按小兒虛證自以後天脾胃為主然脈數舌紅

陰液亦損亦當稍參養陰之意

○先天不足三陰虧損筋絡空虛兩足蹠攣身熱骨瘦

童勞痼疾難治

環溪醫案 卷下 小兒

生地 當歸 牛膝 川斷 狗脊 苡米

龍甲 羚羊角 桑枝

治按用薏米桑枝於補劑中稍參風溼治法

○斷乳太早元氣薄弱欬嗽發熱已逾四月形瘦骨立

疳勞重證唇紅而善食腸胃有疳蟲也

川貝 杏仁 茯苓 百部 川連 黨參

地骨皮 陳皮 蕪黃 欵冬花 桑白皮

治按此方專以殺蟲為主愚意當另擬培元之法

以佐之

○馬脾風極重險證危生倏忽姑與牛黃奪命散

大黃生切 檳榔一錢五分 黑牽牛三錢

共研末分二服白蘿蔔汁調服

治按此古方也病情急重非此亦無法可挽或有

痰熱壅甚者服越脾或麻杏甘石湯亦效

○音啞喘欬痰聲啞咯風痰襲肺肺脹夾驚險候

麻黃 杏仁 射干 桔梗 枳殼 菖蒲

前胡 白前 紫苑 桑白皮

另白蘿蔔汁沖服

治按此證風痰壅閉與喉科中馬脾風相類治之

稍遲即不可救學者最宜留意

環溪醫案 卷下 小兒

○痧後挾積移熱於大腸腹中熱痛每交寅卯二時則

痛甚擬開肺金之鬱倣丹溪論參越桃意

良薑 桔梗 川連 通草 滑石 黑梔

查炭 砂仁 焦麴

再診 痧後腹痛甚於黎明腸氣為陰寒所遏欲升而

不得升故痛甚於黎明也前用溫寒並進見效今仍以

前法加減

桂枝 乾薑 吳萸 木香 延胡 香附

查炭 檳榔 赤苓 黑梔 白蔻仁

治按此寒熱錯雜之證大抵熱為寒鬱故立方以

寒熱互用奏功

環溪醫案

卷下

小兒

門人趙樹誠
族弟寶慶同校

聖借餘小舍

江陰柳氏醫學叢書之八

評選愛廬醫案二十四條

右愛廬醫案若干條皆江張大儀仲華所著也仲華道光時人以醫術馳名江浙間原刻上下兩卷共一百餘案咸豐時刻於蘇州未幾燬於兵燹遂少傳本甲午夏詒於友人案頭得見鈔本假歸讀之見其論病選藥思路深細用法精到頗能獨開生面發前人所未發惟刻意爭奇不肯稍涉平境因之議論有過於艱深者立方有流於纖巧者竊念方藥之道動關性命非如詞章曲藝可以隨人

愛廬醫案

借餘小舍

好惡各自成家是必博稽精采慎所從違庶幾可法可師不致貽誤來學因就所鈔本精選而加評焉共得二十四條令門人錄而存之後之學者苟由此而觸類旁通隨機應變不至如趙括之讀書也斯可矣光緒己亥七月柳寶詒識

許選愛虛醫案

江陰柳氏醫
學叢書之人

胥江張大曦仲華著

江陰柳寶詒穀孫選評

及門諸子 參校

內傷雜病門案一

○病經匝月。表熱解後。杳不思納。脈靜舌淨。神倦言懶。既無外感留戀。又非老景頹唐。晴光流動。而色開曠。問所服之藥。苦寒沈降者多矣。諒係胃氣為藥所困。非病也。亦非衰也。且進和中醒中。以悅脾胃。令其納穀。乃具人參鬚五分。炒麥冬一錢。炒橘白五分。北沙參三錢。甘草三分。借餘小舍。

愛虛醫案

霍石斛三錢。生穀芽一兩。煎湯代水。野薺薇露一兩。沖服。

服藥後。令煮糜粥。以備半夜病人思納。切囑不可多與。

詒按此方清潤有餘。尚欠流動。如胃氣呆鈍。稍加香砂。胃有寒涎。稍增薑夏。欲專和胃。加扁豆蓮子。欲兼和肝。加木瓜烏梅。均可於此方。隨宜增入也。再診。胃氣乍醒。脈形軟弱。久飢之後。藏府之氣尚微。納穀以勻為穩。至於用藥。尚利輕靈。須俟胃氣日隆。方可峻補。蓋凡投補劑。必藉胃氣敷布故也。經云。百病以胃氣為本。又云。安穀則昌。其斯之謂歟。

人參鬚 益智仁 四分 炙甘草 三錢 伏神 三錢 南棗 兩 北沙參 二錢 炒麥冬 五分 橘白 七分 香穀芽 兩

詒按名言至理。凡進補劑者。須識此意。

○竟日悲思。平載納減。詢非驚怒感觸所致。在病人亦不知悲從何來。一若放聲號泣。乃能爽快。睡醒之際。特甚。餘如默坐亦然。韓昌黎云。凡人之歌也。有思。哭也。有懷。出於口而為聲者。其皆有不平者乎。夫悲哀屬肺。寢則氣窒。醒則流通。想其平寢之際。應通而猶窒焉。是以特甚。揆之脈象。右寸細數而小滑。伏火挾痰有諸。或更有所驚恐。驚則氣結。結則成痺。痺則升降失常。出納呆

愛虛醫案

鈍。胃氣所以日餒耳。擬以開結通痺為先。毋急急於補也。

旋覆花 一錢 元參 一錢 炒竹茹 五分 瓜蒌皮 一錢

菴白頭 三錢 紫苑 七分 橘絡 一錢 安息香 三枝 生鐵落 兩 用鐵錘於搗盆內和開水。研至數百轉。取汁沖入一小盃。

詒按推想病情。思路曲折以達。

再診。兩進開結通痺之後。悲哀之態頓釋。咯痰黃厚。胃納稍思。脈之滑數亦緩。其為痰火痺結也明矣。擬以清泄通降。繼之補不可投。豈妄談哉。

炙桑皮 一錢 炒竹茹 五分 瓜蒌霜 五分 杏仁 三錢

黑梔一錢五分 丹皮一錢五分 橘絡一錢 冬瓜子三錢 紫苑五分
 絲瓜絡錢

內風門案一條

○眩暈多年。每發於溼蒸之令。今年初夏。潮溼過重。發亦頻頻。診脈濡細。舌苔膩白。考古法眩暈一語。概從內經諸風掉眩。皆屬於肝之論。大旨不外乎風陽上旋。更辨別挾火挾痰以治之。今按脈證。乃溼鬱上泛。挾濁痰膩膈所致。因前人未經論及。而臨證亦罕見也。擬辛香運中。以化溼化痰主之。

製厚朴一錢 煨草果四分 炒蘇子一錢五分 旋覆花一錢五分

愛廬醫案

茅朮一錢 製半夏一錢五分 陳皮一錢 白芥子七分 椒目五分

赤苓錢

論按所論病機極合。方中尙宜參入清泄肝陽之品。如白芍、蒺藜之類。方穩。蘇子似不必用。

又按黃坤載四聖心源中。論此等證最詳。每以木燥土溼為言。勿謂前人未及也。

再診 眩暈不復作。舌白依然。脈濡便溼。腕中較爽。信係體肥多溼。嗜酒多溼。臥於地坑之上。亦感溼。好飲冷茶。亦停溼。倘泥於古法。而投滋降。不亦遠乎。再擬昨方加減。仍守太陰陽明主治。

茅朮一錢 煨草果五分 製半夏一錢五分 土炒白朮一錢五分
 佩蘭葉五分 製厚朴一錢 旋覆花一錢 薑梗一錢
 陳皮一錢 通草錢

論按眩暈由於溼痰壅遏者。亦所時有。然其中必有木火內鬱。為痰濁所蔽。治當於疏化溼痰之中。仍參清泄之品。乃合。

內風門案一條

○形凜汗漬。脈濡神糊。舌如傅粉。沈睡痰迷。素係嗜酒之體。溼痰瀰漫。蒙退清陽。擾亂神明所致。非陷也。亦非閉也。慎勿開泄。擬達原飲意。

愛廬醫案

製厚朴一錢五分 煨草果五分 枳實四分 炒陳皮一錢五分

茅朮一錢 白芷一錢 法半夏一錢 山茨菇五分

論按論病確鑿。方亦的當。宜其效若桴鼓也。

再診 汗漬已收。神志轉清。藥後嘔痰盈碗。嘔出漸醒。脈猶濡細。舌苔白膩。瀰漫之勢雖除。尙宜燥溼祛痰。從太陰陽明主治。

茅朮一錢 煨草果三分 製半夏一錢五分 椒目五分 厚朴一錢
 炒青皮一錢 白朮一錢 陳皮一錢 通草錢 白芥子一錢

○鼻衄盛發。成流不止者。已三日。面赤足冷。至膝脈數。

寸關尤甚。血去過多。心蕩神馳。陰虧內熱之體。厥陽化火上逆。擾動脈絡。血行清道。從高灌注而下。非若世紅之易定。血有幾何。豈堪如此長流。擬仿志火升騰治例。用涼血滋降法。

犀角七分炒女貞子一分黃連五分熟地六錢青鉛一分

炙龜板兩旱蓮草錢煨磁石錢阿膠錢蛤粉五分炒

水炒牛膝一分

詒按此證甚險。用藥尙稱得力。○方中當加重便

冲入

再診 鼻衄雖止。而面色唇口皓白。虛陽雖降。而額汗

愛虛醫案

五 借餘小舍

心悸畏明。脈虛而數。舌光而顛。氣乏血涵。血無氣護。陰陽有離脫之象。氣血有渙散之險。急進雙補法。庶幾有所依附。再佐鹹降酸收以攝之。

人參錢天冬一分炒棗仁錢秋石二分熟地兩

枸杞炭錢白芍一分阿膠錢茯神錢大棗二枚

消諸門案一條

○乍納又飢。消燥迅速。如火之燎於原。遇物即為灰燼。病此半月。肌肉盡削。詢係失意事多。焦勞苦思。內火日熾。胃液日乾。藏陰既損。而充斥之威。愈難撲滅耳。姑擬五安煎加味。

大生地兩麥冬錢元參錢阿膠錢知母錢
石膏兩炒白芍錢女貞子錢旱蓮草錢
甘草錢

再診 兩進甘涼救液。大勢僅減二三。渴飲反甚。溲渾

而濁。上中之消。又轉到腎消矣。三焦兼涉。津液必至告竭。證情極險。再擬從治之法。宗河間甘露法。必得十減

七八乃幸。

熟地錢石膏錢肉桂分生地錢麥冬錢炙甘草分

白芍錢人參錢鹹水炒黃蘗錢

三診 從治之法。如也依然。藥三進而納日退矣。小水

愛虛醫案

六 借餘小舍

渾濁轉清。舌苔光紅亦淡。擬宗前方。小其制。仍與上中下三焦並治。

熟地錢烏梅分炙甘草分川連分川椒分生地錢

肉桂分人參錢麥冬錢

四診 連進固本從治之法。並參苦辛酸安胃。允推應

手。今胃納安常。諸恙皆平。而津液受傷已極。善後之法

自當立中育陰以冀其復。

人參錢熟地錢天冬錢洋參錢北沙參錢

知母錢麥冬錢石斛錢炙甘草分

詒按第一方力量之大。二方立法之巧。三四方用

意之周匝。隨機而應。步伐井然。具此見解。庶可談醫。然已難其人矣。

嘔逆門案

○惱怒傷肝。木火犯胃。入膈支撐。胸背嘔吐血塊痰涎。不納不便。舌白苔膩。胃為水穀之海。多氣多血之府。性喜通降。所畏倒逆。經此氣火衝激。溼濁乘機。錯亂倘肆。其猖狂厥勢。立至若再侮脾土。脹滿必增。左脈絃硬。右脈細軟。穀不沾唇者。已五日。胃氣憊矣。而嘔尚甚。中無砥柱。何恃而不恐。諸先生所進苦寒沈降。蓋欲止其嘔而順其氣。誠是理也。然內經云。百病皆以胃氣為本。苦

愛廬醫案

七

惜餘小舍

寒性味。又屬伐胃。胃不能安。藥力何藉。拙擬苦寒以制肝之逆。苦辛以通胃之陽。而必參以奠安中氣。庶幾倒逆之勢得緩。幸勿拘於見血畏溫之議。

人參一錢 吳萸二分 旋覆花五分 川棟子七分 川椒二分

法半夏一錢 茯苓二錢 川連三分

另肉桂四分 酒炒龍膽草三分 二味同研 飯丸煎藥送下。

詒按論病頗有卓見。立方亦穩。惟丸方肉桂合龍膽一寒一熱。似不如肉桂合川連。取交濟之意更佳。

再診 嘔逆已止。脹痛亦緩。左脈絃硬固平。右脈歇止。漸見土德大穰。中氣亦竭。急進補中立中。仍參約脾制肝之法。惟望胃納能醒是幸。

人參一錢 肉桂三分 炙甘草三分 白朮一錢 茯苓三錢 炒白芍五分

詒按此建中合四君法。

三診 脹痛大減。嘔逆未平。稍能納粥。脈俱濡細。胃氣漸有來復之機。經云。納穀則昌。信不誣也。

人參一錢 煨肉果三分 白芍一錢 橘白七分 白朮一錢 炙甘草三分 煨木香三分 茯苓三錢 穀芽兩

愛廬醫案

八

惜餘小舍

詒按此養胃和中善後之方。

外感門案

○得食則嘔。已延月餘。形神疲乏。宛如膈證。聽其言觀其人。惟知明而動晦。而休務農無怠者。流診左關脈數。右關細軟。舌白口苦。寒熱往來。汗之有無。病者不知。蓋少陽見證。原有嘔惡。揆其病情。是任其嘔逆。以致反胃厥穀。胃氣日逆。似乎噎膈。實由邪蘊於少陽。一經胃被邪克。氣不通達。據是脈證。宜先泄少陽之邪。為要。擬小柴胡法佐以辛通。

柴胡七分 製半夏五分 製厚朴七分 蘇葉七分 蘇子一錢

炒川椒二分橘皮錢一青皮錢一淡薑渣五分
後入

論按治病不難難在採取病情能得其諦

再診 前方囑服兩劑據述服後壯熱大汗溼透衣被
即思納粥因其效驗連服一劑今已喫飯惟力不充耳
診其脈左關已軟右脈尚細續與和心

黨參三錢歸身錢一續斷錢一白朮錢一茯苓錢一陳皮錢一

炙甘草三分前胡三分煨木香三分

論按方中歸身續斷似非此證所宜

○發熱惡寒頭項強痛無汗胸痞脈浮緊細證屬正傷
寒南方所罕見詢係連朝營墓辛勤屈在嚴寒又居

愛廬醫案

九 惜餘小舍

野太陽表證悉具宗仲聖不汗出而煩躁者大青龍湯
主之

麻黃五分桂枝五分防風錢一杏仁錢二甘草四分羌活七分

生石膏錢三生薑五分大棗二枚

論按證在初起似不必遽用石膏就案中所述乃

麻黃湯的證

再診 病甫兩日太陽證未罷而陽明少陽證已悉具
可知南人稟賦柔弱其傳經之迅速若此汗既未暢擬

三陽並泄

麻黃四分柴胡四分白芷七分葛根七分羌活五分杏仁三錢

連翹一錢黑山梔五分薑渣五分大棗三枚

三診 汗暢熱解煩躁已除脈轉細小形疲體瘦嗜臥
而思納穀矣其發也凶悍其傳也迅速其退也亦易易
究屬質弱者易感易遠不若北方風氣剛勁稟賦厚而
膜理實必至傳徧六經乃已。是證若宗三時六氣治之
勢必淹纏幾候耳擬和營衛法

桂枝四分橘白錢一薑渣三分防風七分茯苓錢三桑枝錢五

秦朮五分大棗二枚

論按南方少正傷寒護方案雖平淺宜存之以擴
開見

愛廬醫案

十 惜餘小舍

○表熱九日有汗不解舌絳起刺煩渴引飲間作寒戰
之象熱甚下午至夜神志時糊脈洪無力陽明經分之
邪又傳少陽陽明府分之滯灼傷津液極似大柴胡證
而與脈情不符細釋病情正虛津竭既非陷裏之神糊
如何香開致使內傳欲其府滯能通必俟津回液復擬
宗仲聖人參白虎湯意參入景岳柴胡煎庶與脈證符
合諸先生以為何如

參鬚錢一柴胡四分石膏錢七鮮石斛錢七元參錢一竹葉錢三

麥冬五分黑山梔五分知母五分

論按於虛實進退之間慘淡經營良工心苦

再診 汗熱煩渴已減。舌絳淡而尖刺已少。津液稍回。正氣較振。脈數未平。神志已爽。少陽陽明之表分。既清既泄。而府分之滯。尙待清潤育陰而下也。切勿因滯而遽投蕩滌。審證二字。其難其慎。臨時應變。平日之工夫也。

生地 錢四分 知母 錢五分 銀花 錢五分 赤芍 錢五分 麻仁 錢三分
瓜蒌仁 錢三分 花粉 錢五分 丹皮 錢五分 鮮薑石斛 兩

治按此取增液以行宿滯之意

○表熱四候。額汗如淋。汗時膚冷。汗收熱灼。消滯泄邪。
愛盧醫案 借餘小舍

清補諸法。已遍嘗矣。診脈虛細。惟尺獨滑。舌苔已淨。胃納稍思。細繹脈證。病邪不在三陽。而在三陰。考仲聖有反發熱一條。是寒邪深伏少陰之陽分。今乃溼溫餘邪。流入少陰之陰分。良由少年腎氣不藏所致。治當宗其旨。變其法。擬補腎陰。泄腎邪。一舉兩得。庶可許熱解汗收。

熟地 錢五分 枸杞炭 錢一分 獨活 錢五分 茯苓 錢三分 五味子 七粒
細辛 錢三分 牛膝 錢五分 丹皮 錢一分
治按能從對面勘出。此爲善讀書人。惟方中熟地似不如生地爲得。

再診 熱解已淨。自汗亦收。脈滑已和。純乎軟弱。精神向倦。而虛象旋著。擬轉用補養。

參鬚 錢一分 枸杞子 錢一分 山藥 錢三分 丹皮 錢五分 福澤瀉 錢一分
熟地 錢五分 杜仲 錢三分 茯苓 錢三分 牡蠣 錢七分 萸肉 錢一分 炙甘草 錢三分

治按論證明確。方亦老當。絕無幫貼膚湊之弊。

○壯熱神糊。陡然而發。脈數大而混糊無序。舌垢膩而層疊厚布。矢氣頻轉。小洩自遺。脘腹痞硬。氣粗痰鳴。既非尋常六氣所感。亦非真中類中之證。觀其濺濺自汗。汗熱而不黏。指轉側自如。四體無強直之態。舌能伸縮。斷非中風。設使外感。何至一發便劇。而安能自汗。倘守

愛盧醫案 借餘小舍

傷寒先表後裏。下不嫌遲之例。是坐待其斃矣。亦曾讀吳又可先裏後表。急下存陰之論否。蓋是證也。一見藍痰。則胃已爛。而包絡已陷。迅速異常。盍早議下。尙可僥倖。諸同學以爲然否。

厚朴 錢一分 大黃 錢八分 黃芩 錢一分 枳實 錢一分 檳榔 錢一分 草果 四分
知母 錢五分 陳皮 錢一分

再診 神志得清。表熱自汗。腹猶拒按。矢氣尙頻。便下黏膩極穢者未暢。小水點滴如油。脈數畧有次序。舌苔層布垢濁。胃中穢濁蒸蘊之勢。尙形燔灼。必須再下。俟

裏滯漸楚。然後退就於表。吳又可治疫之論。闡發前人所未備。甚至有三四下而後退走表分者。若作尋常發熱論治。豈不謬乎。

大黃 錢五分 枳實 錢五分 銀花 錢二 知母 錢五分 細川連 錢五分

丹皮 錢五分 滑石 錢三分 元明粉 錢五分 厚朴 錢五分

論按此等證。有下至三四次而後清者。必須有膽有識。方能奏功。○後二方亦層次井井。的是老手。

三診 大腑暢通。悉是如醬如飴。極穢之物。腹已軟而神已爽。表熱壯而汗反艱。舌苔半化。脈數較緩。渴喜熱飲。小水稍多。此際腑中之蒸變乍平。病已退出表分。當

愛盧醫案

三 惜餘小舍

從表分疏通。先裏後表之論。信不誣也。

柴胡 錢五分 枳實 錢一 通草 錢一 紫厚朴 錢七分 法半夏 錢五分

連翹 錢五分 橘皮 錢一 赤苓 錢三 大腹皮 錢五分 藿香 錢一

四診 表熱隨汗就利。舌苔又化一層。脈轉細矣。神亦倦矣。病去正虛之際。當主以和養中氣。佐輕泄以滌餘熱。守糜粥以俟胃醒。慎勿以虛而早投補劑。補之則反覆立至也。

桑葉 錢五分 石斛 錢三 扁豆 錢三 神麴 錢五分 丹皮 錢五分

豆卷 錢三 甘草 錢三 橘白 錢一 薏仁 錢三 半夏 錢五分

瘧疾門案一條

○間瘧止後復發。發不歸期。或二三日。或七八日。發則寒戰熱甚。兩三月如此。從無汗泄。脈沈而細。形瘦骨立。胃納式微。證由久瘧傷陰。陰損不復。其為勞瘧顯然。現屆夏令。已得可汗之時。且服存陰泄邪。以冀汗泄於表。陰復於裏。轉準瘧期。庶有畔岸可依。擬少陽少陰並治。

柴胡 錢四分 大生地 錢四分 地骨皮 錢三 黃芩 錢五分 龍甲 錢七分

青蒿 錢五分 歸鬚 錢一 細辛 錢三分 丹皮 錢五分

論按此病若認作虛證。而投膩補。則愈補愈熱。不死不休矣。幸遇明眼人識破。乃能得此生機。

再診 藥四服而值瘧來。寒戰依然。熱勢轉短。熱退時

愛盧醫案

古 惜餘小舍

汗已暢達。脈沈轉出。神氣覺爽。而食物有味。察其轉輕之象。皆從汗後。究由外感乘虛蘊伏。愈伏愈深。延為怯象。茲有向外泄化之機。仍宗前議。加減必得轉為間瘧乃妥。

黃芩 錢五分 炒歸須 錢五分 炒知母 錢一 青蒿 錢五分

龍血炒柴胡 錢五分 丹皮 錢一 炒秦艽 錢一 小生地 錢四分

荆芥炭 錢一 豆卷 錢三

論按得汗即是生機。仍可用大生地歸身。以助陰

達邪。

三診 瘧準日作。解後有汗。寒熱之勢大減矣。脈形細

小舌不生苔。久瘥陰傷。復其陰可耳。證屬轉機。已得坦途。凡腥膻鮮發。以及麥食等。均須慎禁。擬清養法。參以泄化。

洋參一錢 桑葉一錢 炙龜甲一兩 石斛三錢 丹皮一錢

青蒿五分 稽豆衣二錢 穀芽兩 秦朮一錢

治按此善後之法。凡歸地等養陰之品。似不可少。

黃暉案

○瘡證多種。黑者屬腎。腎氣過損者。曰女勞黑瘡。今肌膚舌質盡黑。手指映日俱黯。強壯之年。膏陽早已不舉。體雖豐腴。腰軟不耐久坐。脈弱神疲。納減足冷。顯屬腎

愛盧醫案

惜餘小舍

臟傷殘太甚。尚謂北路風霜所致乎。昔有人患此。遍處醫治。皆曰風毒。後遇顧西疇道破證名。宗溼熱流入腎經。主治。試以此證較之。證雖同而虛實又異矣。現屆深冬。姑先治本。需春暖陽和。再商他法。

血餘兩 猪油一兩 煎至髮枯。取油。盛於一切食物中。可以用油者俱用之。

煎製附子七分 炒枸杞五分 炒黃蘗一錢 兔絲子一錢

茯苓三錢 牡蠣七錢 茵陳五分 杜仲三錢 熟地六錢

再診 前方已服二十餘劑。肌膚之黑半化。其勢漸轉陰黃。形神大振。胃納加餐。且可耐勞理事矣。春令雖交。和煖未回。再擬補養脾胃。耐性攝養為屬。

人參一錢 沙苑三錢 山藥三錢 杜仲三錢 熟地一兩 茯苓三錢 白朮一錢 茵陳五分 杞子一錢 續斷三錢 兔絲子二錢 澤瀉一錢

治按此方中。亦當再添溫潤之藥。

三診 膚色花斑。證轉陰黃。較之黑瘡。淺一層矣。培植脾胃之藥。已進四十餘劑。形神色脈。俱屬平善。節令將交。驚蟄春暖之氣。已和。治當開泄腠理。以滌膚斑。內經云。必先歲氣。毋伐天和。易曰。待時而動。何不利之有。擬宗仲聖茵陳四逆法。加減三劑。即停。接服丸藥。可耳。黑色退盡之時。當在夏初。

愛盧醫案

惜餘小舍

製附子五分 白朮一錢 赤小豆三錢 麻黃五分 炒黃柏一錢 茵陳五分 連皮苓五錢

治按此證。即非冬時。亦當先以溫煦脾胃為主。務使身中陽和之氣。漸漸煦動。然後投以此劑。方能奏效。○接服丸方。未見擬入味丸。去黃桂。加朮藥。此病證情頗與。治法亦奇。

腹瀉案

○脾胃之陽素虧。醉飽之日。偏多。腹痛拒按。自汗如雨。大便三日未行。舌垢膩。脈沈實。淫痰食滯。團結於內。非下不通。而涉及陽虛之體。又非溫不動。許學士溫下之

原從仲聖大實痛之例化出今當宗之

製附子五分 肉桂四分 乾薑五分 生大黃錢四分 枳實一分

厚朴錢

詒按論病立方如良工制器極樸屬微至之妙

再診 大府暢行痛止汗收神思倦而脈轉虛細擬養

胃和中

北沙參三錢 甘草三錢 橘白一錢 白扁豆三錢 丹皮一錢

石斛三錢 白芍錢

○旬日內遍體俱腫膚色鮮明始也原有身熱不慎風

愛廉醫案

主 惜餘小舍

而即止亦無汗泄診脈浮緊氣喘促小便閉舌白不思

飲證係水淫之邪藉風氣而鼓行經隧是以最捷倘喘

甚氣塞亦屬至危之道治當以開鬼門潔淨府為要著

麻黃五分 杏仁三錢 赤苓三錢 蘇子二錢 桂木五分 薏仁三錢

紫苑七分 椒目五分 浮萍一錢 大腹皮五分

外用麻黃紫蘇羌活浮萍生薑防風各五錢閉戶煎

湯遍體措熨不可冒風

詒按病名風水立方清靈流動頗得輕可去實之

旨

原從仲聖大實痛之例化出今當宗之

○少腹塊磊上攻及腕其力猛而痛勢劇轉瞬之間腹

中鳴響則塊磊一陣向下即平證名奔豚者因其性情

踪跡行止類似江豚耳然考其證有三犯肺之責厥屬

心火犯心之責厥屬腎寒臍下悸欲作責厥者屬水邪

今係腎水寒邪所發體屬陽虧所致擬以真武湯參賁

豚湯意

茯苓五錢 川芎五分 小茴五分 歸尾錢 附子五分 白芍一錢

半夏一錢 橘核三錢 李根皮兩

詒按案語明辨以哲立方精切不浮

愛廉醫案

主 惜餘小舍

○腹痛下痢晝夜無度汗冷肢冷脈細舌白暑溼熱挾

滯互結病經五日不減嗜酒中虛之體邪不能化熱外

透而見多汗傷陽多刺傷陰之險凡裏急後重腹痛者

治法宜通口燥煩躁便秘者又當清滲此證中陽先餒

不能托化邪滯未動虛波已至誠屬棘手姑擬溫清並

進宗瀉心湯意參以疏邪化滯若正氣保和之類何足

特耶

製附子五分 厚朴七分 桂木五分 薑梗五分 建麴一分

赤苓三錢 木香三錢 薑渣三錢 酒炒黃連五分

詒按此正虛不能托邪之證若僅與苦寒香燥劑

門之套。藥烏能挽回。前後三方。扶陽托邪。選藥俱
絲絲入筮。所以奏效。

再診 下痢減半。赤白相雜。服冷較和。汗亦稀少。舌白
苔膩不化。裏急後重已緩。診脈沈細。腹中猶痛。究屬中
虛溼勝。暑積阻結。不能藉陽和運動。尚非坦途。再擬溫
中運邪一法。

製附子五分 厚朴七分 黃連三分 白朮五分 淡乾薑四分
防風錢一 木香三分 枳實七分 丹皮錢一 赤苓錢三

三診 痢下大減。舌苔漸化。腹痛除而宿垢亦通。小溲
赤而兩三度。脈象起矣。穀食思矣。中陽既得運動。無慮

邪滯不化也。尚當和中。

白朮五分 佩蘭錢一 青皮七分 蒼朮五分 建麴一分
厚朴七分 扁豆錢三 桔梗五分 肉果四分 滑石錢三 苡仁錢三

○暑溼熱病下痢。始係赤白垢膩。晝夜數十餘次。旬日
後痢雖減。而純下血矣。傷及肝腎。病情最深。非易治者。

姑先清熱存陰。宗厥陰下痢之條。擬白頭翁湯。合黃連
阿膠湯意。

白頭翁錢三 秦皮五分 丹皮一分 黃連錢一 地榆炭錢二
白芍五分 荷蒂三個 炒黃蘗錢一 阿膠一錢 蛤粉拌炒五分
詒按方論俱明當。

再診 下血較昨減半。而其來必陣下。腸中滑泄已甚。
關開盡撤。腎氣有下脫之慮。擬用昨方。參桃花湯意。

赤石脂錢四 地榆錢一 乾薑炭五分 白芍錢一 丹皮錢一
阿膠一錢 蛤粉拌炒五分 炙草三分 炒黃蘗錢一 粳米錢四 黃連四分

詒按病雖稍減。尚係緊要關頭。不可鬆手。

三診 血下緩而大減。脈微神倦。氣陰並乏矣。堵塞存
陰之藥。尚不可撤。擬就昨方。加立中意。

原方加人參錢一 另煎沖入

○大小便易位而出。證名交腸。當得之大怒大飽之後。

愛廬醫案

氣火錯亂。升降失常。以致清濁混淆。水滓不按常道而
行。久則難治。

明礬七分 鼓如菜豆大 用麻衣五層包 裝淡鹹湯送下 日三服 三日九服可
愈

詒按立方簡當

外傷門案一條

○惱怒悒鬱。內火自生。火能燥痰。則氣結痰凝。火性上
炎。則痰隨之上竄。結核成串於左項。安保右項之不發。
壯年樸實之體。而得斯疾。諒亦偏於性情之固執也。倘
能暫拋誦讀。專以舒悶暢懷為事。則癥痰之消。猶可計

日而待。蓋不若自戕本元者之水虧火旺。而燥痰成串也。設聽其在絡內四竄。久延必至於潰。則終身之累矣。後悔莫及。聊贈數言。然乎否乎。

旋覆花 一錢五分 橘絡 一錢五分 白芥子 七錢 杏仁 三錢 蘇子 一錢

海藻 一錢五分 昆布 一錢五分 丹皮 一錢五分 竹茹 一錢五分

香附 一錢五分

再診 通絡化痰。理氣開鬱之方。已投七服。左項痰核軟而可推。餘絡未竄。脈仍絃數。大便五日不行。內火猶熾。再議化痰通絡之法。

海藻 一錢五分 龍甲 一錢五分 黑梔 二錢 昆布 一錢五分 丹皮 一錢五分

愛虛醫案

三 借餘小舍

旋覆花 一錢五分 薑皮 一錢五分 炙甲片 七分 白芥子 七分 竹瀝 兩

三診 前方五服。痰核已消三粒。所剩四粒。亦軟而小。其勢不至四竄矣。脈弦小軟。大便已暢。再擬消痰以冀速除。然方藥雖效。亦半藉怡養工夫耳。

橘核 一錢 川棟子 一錢 炙山甲 七分 土貝母 三錢 昆布 一錢

丹皮 一錢五分 旋覆花 一錢 海浮石 三錢 黑梔 一錢 竹瀝 兩

詒按此案三方。藥力不甚結實。而用意頗玲瓏。在應酬方中。可云完善。

婦人問案三條

○痛經數年。不得孕育。經水三日前必腹痛。腹中有塊。

疑滯。狀似癥瘕。伏梁之類。納減遲遲。形瘦神羸。調經諸法。醫者豈曰無之。數載之中。服藥無間。何以漠然不應。詢知閉閣之時。無是病。既嫁之後。有是疾。痛之來源。良有以也。是證考古。卻無曾見於濟陰綱目中。姑勿道其名目。宗其意而立方。不必於平時服。俟其痛而進之。經至即止。下期再服。

荆三稜 一錢 莪朮 一錢 延胡 五分 香附 一錢 製軍 一錢

歸身 一錢 丹皮 一錢 川芎 四分 桃仁 二錢 枳實 七分

再診 前方於第二期經前三劑。經來紫黑。下有似胎非胎一塊。彌月不復痛。而經至矣。蓋是證亦係凝結於胞中者。今既下矣。復何慮乎。

愛虛醫案

三 借餘小舍

白芍 一錢 石斛 三錢 川芎 五分 醋炒柴胡 三錢 橘白 一錢

白朮 一錢 歸身 一錢 丹皮 一錢 穀芽 兩

○經停三月。驟然崩衝。閱五月。而又若漏卮。詢係暴崩。屬虛。虛陽無附。額汗頭震。聞聲驚惕。多語神煩。脈微虛軟。勢將二氣脫離。其危至速。擬回陽攝陰法。急安其氣血。

附子 五分 鹿角霜 一錢 杞子 一錢 熟地 七錢 五味 七粒

白芍 一錢 人參 一錢 龜板 兩 天冬 一錢 山藥 三錢

詒按證情已急。須得重劑。方可挽回。方中選藥。

合特嫌分量太輕耳。

再診 脫象既除。經漏較稀。脈猶濡細。神思尚怯。氣血乍得依附。再宗暴崩屬虛之例。擬溫補法。

人參 一錢 熟地 兩 枸杞 一錢 鹿角膠 一錢 杜仲 三錢

巴戟 一錢 白芍 一錢 歸身 一錢 阿膠 一錢 天冬 一錢

○上臘嚴寒生產。受寒必甚。當時瘀露未暢。臍下陣痛。迄今五月未止。閱所服藥。皆宗產後宜溫之例。固屬近是。惜未考經穴經隧耳。譬諸鎖則買矣。何以不付以匙。買者不知。賣者當知。病者不知。醫者當知。致使遠途跋涉。幸遇善與人配匙者。

愛廬醫案

精餘小舍

肉桂 二錢 細辛 五分 同研末飯丸 勻五服 每晨一服。

詒按方頗奇特。

愛廬醫案終

門人 趙樹誠 族弟 寶慶 同校



醫經正本書

文林郎知隆州府建寧縣丞勸農營恩少隨程過議

叙曰古今方士言醫道者多矣宜折衷於素問難經甲乙張仲景王叔和等書如言治道者有五經語孟皆可據依不當別有異論蓋有采之道聽途說而不本乎此是謂無稽之言人命至重奈何弗敬至有舉世緇誤傷風敗俗殞絕生命而醫家俯首和附莫敢指其非者如至親危病妄言傳染遂相棄絕古之人無有也醫經不道也嫂溺不援比諸豺狼顧君子之為政化亦置此事於度外使下民日益龍聳驚冤塞于冥漠余竊悼之此醫經正本書所由作也醫經者黃帝岐伯之問答方書之本也本正則邪說異言不勝也其書也脫或達于君子之前察其稽考之久

見於試用之勤開喻氓俗務廣傳布庶為風教之助去淳熙丙申十月庚寅序

有唐醫政第一

太醫令掌諸生醫療之法其屬有四醫師針師按摩師呪禁師皆有博士以教之其考試登用如國子監之法丞二人從八品下醫官四人從八品下醫正四人從九品下諸生讀脈訣者即令迺相診候使知四時沉浮滑澀之狀諸生讀本草者即令識藥形狀知其藥性讀明堂者即令驗其圖識孔穴諸生讀素問黃帝鍼經甲乙脈經皆所精熟博士一試醫官丞並季試也藥園師以時種蒔收採諸藥京師置藥園一所良田三頃取庶人十六以上二十以下充藥園生業成補藥園師凡藥有陰陽配合子母兄弟根

醫經正本書 序

其華實草有骨肉之異及有毒無毒陰乾曝乾採造時月

皆分別焉九藥八百五十種三百六十一種農本經一百十五新修本草入州土一百八十一名醫別錄一百九十三有名無用皆辯其所出醫博士一人正八品助教一人從九品掌以醫術教授諸生習本草用甲乙脈經分為業焉一體療二瘡腫三少小四耳目口齒五角法諸生既讀經訣乃業教習率二十人以一十人學體療三人學瘡腫三人學少小二人學耳目口齒二人學角法體療七人成瘡腫少小五年成耳目口齒四年成角法三年成針博士一人從八品助教一人九品下掌教針生以經脈孔穴使知浮沉滑澀之候又以九針為補瀉之法凡此九針有種以法九州九野之分九針疾先察五藏有餘不足而補瀉

之心藏神肺藏氣所藏筋脾藏肉腎藏志內連骨髓外通津液以成四支九竅十六節三百六十五部必先知其所在也九針生習業教之如醫生之法針生習業素問黃帝針經明堂脈訣兼習流注偃側等圖赤烏神針等經業成者試素問四條黃帝針經明堂脈訣各二條按摩博士二人從九品下掌按摩也崔寔正論云熊經鳥伸延年之術故華佗有六禽之戲仙經云戶樞不蠹流水不腐謂欲使骨節調和血脉通宣即其事也禁博士掌教禁呪生以禁呪除邪魅之為厲者有道禁出於山居又有呪禁出於釋氏五法禁之一曰存思二曰禹步三曰營月四曰掌五曰手印

本朝醫政第二

本朝醫政第二

元豐中書備對太醫局九科學生額三百人大方脉一百二十人風科八十人小方脉二十人眼科二十人瘡腫煎折傷二十人產科十人齒兼咽喉科十人針兼灸科十人金鏃兼書禁科十人乾道重修格疾醫置職醫助教京府及上中州職醫助教各一名醫生人數京府節鎮十人餘州七人万户縣三人每万户增一人至五人止餘縣二人試所習方書義一十道所習方書大方脉難經素問張仲景傷寒論各一部巢氏病源二十四卷小方脉難經一部巢氏病源六卷太平聖惠方一十二卷 乾道令諸州職醫闕遷助教充助教關於本州縣醫生內選術優效著者充無其人選能者比試雖非醫生聽補諸醫生每三人內置小方脉一名止有二人亦置一名有關者許不曾

犯罪經決人投家狀召品官或職醫助教一名保明仍三人以上為保就本州差官試所習方書義以五通為合格二粗比一通給帖補充免醫行祗應諸職醫助教醫生醫業不精治療多失者長吏驗實聽行別補諸醫願充大醫局學生者如不曾犯罪經決許經所屬投家狀試其藝業諸州縣醫藥方書州職醫醫學生掌之置印曆聽借人傳錄諸災傷及流民所聚疾疫稍多而歲賜藥錢不足者申監司審量以係省不係省頭子錢增給不得過歲賜錢數之半給賜格歲賜病囚合藥錢京府節鎮一百貫餘州五十貫大縣三十貫小縣二十貫藥錢歲賜京府節鎮二百貫餘州一百貫

辯傷寒溫病熱病並無傳染之理第三

按素問熱論傷寒曰人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死又曰凡病傷寒而成溫病者先夏至日為病溫後夏至日為病暑又曰藏於精者春不病溫初無傳染之說張仲景曰陰陽大論云冬時嚴寒方類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也中而病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚孫真人作肌骨之中至春變為溫病至夏變為暑病熱極重於溫也是以辛古之人春夏多為溫熱病皆由冬時觸寒所致又曰十一月十二月寒烈已嚴為病則重迥考素問仲景及諸家之論皆云冬時觸冒寒毒所致非是猝然傳染也

辯五運六氣感傷各曰時氣亦無傳染第四

按陰陽大論七篇論五運太過不及乘剋勝剋為病皆由藏氣虛實致有感傷并六氣所管每氣六十日八十七刻有畸主客勝復發亦隨藏氣虛實致病初不能相染

辯四時不正之氣謂之天行即非傳染第五

按疫論云非其時而有其氣是謂天行仲景謂與傷寒之病大相異所謂春當溫而有清氣折之則責邪在肝夏當暑而有寒氣折之則責邪在心秋應涼而有熱氣折之則責邪在肺冬應寒而有暖氣折之則責邪在腎長夏責邪在脾以土無正氣因人而名故附金木水火而變病今俗間以傷寒時氣天行通言疫病夫疫之所發蓋有歲中流行於一方一所之時皆是氣血中感此異氣大非傳染蓋有

捨病人遠去自於它處致疾者亦有與病人同床共舍居
然不病者是知非傳染也昔岷州之俗一人病疫闔家避
之病者多死隋辛公義為刺史命皆輿置己之廳事暑月
病人數百公義設榻晝夜處其間以糝祿具醫藥病愈召
其親戚戒諭之曰死生有命豈能相染若相染者吾死久
矣皆勸謝而去其後病者爭詣使君其家親戚固留養之
始相慈愛風俗遂變本朝人原侯可至和中調巴州化成
縣巴俗尚鬼而廢醫惟巫言是用雖父母之疾皆棄而弗
視可誨以義理嚴其禁戒或親至病家為視醫所活既衆
人亦知化其事見吾家明道先生文集迥及見中原之人
不信醫親人屏去故多死迥平生於親戚朋友部曲僕使
之病皆親至臥內款曲候問商量藥證不啻數十百輩矣
考古驗今是知決無傳染今乾道勅同居親戚病輒相棄
絕者杖一百蓋謂有此陋俗故立法也

論醫書第六

皇甫謐曰按七略藝文志黃帝內經一十八卷今有鍼經
九卷素問九卷亦有所亡失其論遐遠稱多而切事少又
不編次比按倉公傳其學出於素問素問論精辯九卷
是原本經脈其義深奧不可容易覽也之有明堂孔穴鍼灸
治要皆黃帝岐伯遺事也三部同歸文多重複錯于非一
謐又曰仲景論廣伊尹湯液為十數卷用之多驗近代太
醫王叔和撰次仲景餘論甚精皆可施用
吳人朱肱作治傷寒活人書武夷張藏先得百問於三茅

山後與肱遇于杭盡得其書序之曰作於元祐己巳成於
大觀戊子釐為二十卷肱嘗自序其書後四年肱以奉議
郎致仕遣男遺直詣闕獻焉又八年肱校正善本命工刊
于杭州大隱坊且曰肱乞未秋以罪去國明年過方城見
同年范內翰令合證與方為一至睢陽見王先生言成都
湖南福建兩浙皆刊其書惜乎錯誤頗多至是改百餘處
或曰起肱休致仕于朝以謹直忤宰相引去所謂王先生
者不著其名范蓋致虛也今建州饒州民間各刊舊本池
州公庫刊校正本然二本互有得失近有尚書左司郎姑
熟李樞與幾作治傷寒要旨發明仲景論其言曰傷寒
病有定證治有定法如響應聲毫髮無差其病不過三陰三
陽與夫併合之證其治不過汗吐下其定雜證皆誤醫所

致亦有治法世人不法仲景妄作常病治之十失八九人
命何辜深可痛惜仲景論妙通造化證治明白其用心詳
細唯恐後學之不審故其書詳悉不免重複然皆有至理
予慮學者開卷之初未易得其端緒遂以仲景論所用藥
方凡一百四道每方為一門凡證之用此方者悉列于左於
本論無一字遺落世之明醫固不假此或所未聞而命醫
之際醫謂合用其藥即檢其方一門遍讀之與此相合則
無疑矣苟無此證而服之必致害人謹勿妄投也此書不
滿万言人能輟暇熟記之治傷寒如反掌耳仰事俯育大
不可闕此也樞又作傷寒治法撮要發明活人書去其繁
蕪撮其精要然所取者舊本也豈與幾未嘗見校正本邪
辨本草千金方權量度第七

古者度以北方秬黍中者一黍之廣為分十分為寸十寸為尺十尺為丈量容一千二百黍為龠二龠為合十合為升十升為斗十斗為斛權以百黍之重為銖二十四銖為兩十六兩為斤今文諸度量權稱以北方秬黍中者為準調鍾律測畧景合藥劑制冠冕則准式用之餘悉用大者謂一尺二寸為一大尺三寸為一大斗三兩為一大兩

麟臺故事嘉祐二年置校正醫書局于編脩院詔以直集賢院檢討掌禹錫秘閣校理林億張洞蘇頌太子中舍陳檢並為校正醫書官

迴按林億等所校本草千金方權量度皆曰十黍之重為一銖考古今文漢書律歷志唐杜佑通典皆曰百黍之重為一兩蓋誤以百為十其差十倍也又曰藥升方作上徑一寸下徑六分深八分以此為升僅容一勺龠容一勺蓋誤以龠為升其差二十倍也又曰芫絲九兩准一升迴以芫絲九兩黍秤制為升蓋容所謂藥升者二十也又曰棗三枚准一兩蓋用黍秤曰附子烏頭半兩准一枚復是大秤蓋所差三倍也故龐安常曰附子一枚准半兩是一錢三字使人疑誤蓋後人妄增古書如是不審耳億輩校讎何不少覺悟也

古以四圭為撮十撮為勺兩勺為合所謂圭者蓋三十黍也一乃圭者乃言其七形也今本草千金方言刀圭者十分方寸匕之一准如梧子一以三十黍約之又以方寸匕藥末蜜和作粒蓋亦近之孟康注漢書曰六十四黍為圭者非是

按唐志武德四年鑄開通元寶錢積十錢重一兩計一千重六斤四兩蘇冕曰今錢為古秤七銖以上比古五銖則加重二銖以上今今文官物計兩之餘稱錢分釐毫絲忽今等秤有錢無銖迴謂一大兩為七十二銖則一錢為七銖奇十分銖之二

按諫垣存崇韓忠獻公定阮逸胡援等鍾律謂命徑闊九分深七分二釐迴以積分布筭為五百八十三分二釐今本草千金方藥升積五百四十四分蓋黍自有小大故如是不等也

迴嘗得阮逸胡援皇祐累黍尺與司馬備刻宋尺後周尺今太常寺樂律尺必府監景圭渾儀尺大二分其後韓忠獻公丁度定嘉祐累黍尺比阮尺小三分半比司馬備刻周尺漢劉歆尺音前尺高敏之以漢錢五物參定尺大二分今以韓尺制方寸匕其藥物稱尺者自有所准銖兩矣

辨弦脉屬陰第八

張仲景云脉大浮數動滑此名陽也脉沈瀯弱弦微此名陰也陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死又曰弦脉而大弦則為減大則為托減則為寒托則為虛王叔和脉經九浮數動長滑為陽沉瀯弱弦微短為陰活人書弦則多熱洪數又有沉細而弦疾者金匱方弦屬少陽膽之經脈訣七表脉屬陽弦為七表脉之一許叔微本事方曰傷寒方當從仲景迴考諸家之論混淆如此弦脉屬陰當從仲景王叔和其兼洪數者即脉經所謂一陰二陽也其兼沉細者乃純陰也陳無擇曰脉訣五代時人作託去叔和劉元

賓注號通直子元賓亦去其辭語艱澁俗疑非叔和

辨傷寒兩感不治第九

素問曰帝曰其病兩感於寒者其脉應與其病形何如岐伯曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食謔言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水將水不入不知人六日死帝曰五臟已傷六府不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也其血氣盛攻不知人三日其氣已盡故死矣仲景曰九兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷生意者乃云神丹甘遂合而飲之且解其表又除其裏言巧似是其理實違夫智者之舉錯也常審以謹愚者之動作也必

果而速安危之變豈可苟哉無治法亦言兩感於寒者六日死

活人書第三十六問曰仲景兩感無治法但云治有先後尋至第三卷中言傷寒下之後得下利不止身疼痛者當急救裏宜四逆湯後身體疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯遂以音字比效治兩感有先後宜先救裏表若陽氣內正即可醫也內才正急當救表蓋內尤為急才溫內則急當救表亦不可緩也又曰唯兩感不治迴聞孫真人論膏肓輸去昔秦緩不救晉侯之疾以其在膏肓之上育之下針藥所不及即此穴也時人拙不能求得此穴所以宿病難遣事固有後人工於古人者然肱之說得於帛上非類也兩感之病不治當如素問

辨活人書以湯為煮散第十

仲景治傷寒為方百一十有三其間為湯者百有八如桂枝湯五味十有五兩水七升煮三升適寒溫服一升若活人書務省藥料但如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑四片棗一枚煮至八分溫服昔之三服者今約為十五服矣肱又曰病勢重者當依古劑法魏炳記於龐安常方後曰吹咀者今之散末是也每四錢水一盞半煮八分內有半夏附子有毒藥之類每四錢水二盞入生薑三片煎七分內或用朴硝何膠飴糖焰硝雞子黃等物皆煎成湯後去滓下之或用竹瀝煎者每四錢水一盞二分煎至七分下竹瀝三分再煎至七分內或用大黃者虛人入大黃同煎之如難得通利人每服四錢水一盞半煎至一盞別入大

黃半錢同煎至七分又難得利者以湯浸濃大黃汁三二分同煎之以取利為度迴謂活人書不立九例煎者未有定法可視魏炳為約法也龐安常有不可為煮散者十四方即肱所謂依古劑法之類若用古劑減半或三之一猶愈於煮散也

千金方古人湯劑雖大而日飲不過三數服而且方用專一今又數藥並進豈不反多乎又昔人長將藥者多作者散法蓋取其積日之功云

辨發汗宜對證不論早晚第十一

王叔權既效方許叔微本事方皆載南史記范雲為梁武帝屬官武帝有九錫之命在旦夕矣雲忽感傷寒惡不得預慶事召徐文伯診視以實懇之曰可便得愈乎文伯曰

使差甚易政恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死猶可况二年乎文伯以火燒地布桃葉設席置雲於上頃刻汗解裹以溫粉翌日愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒取汗先期尚促壽每見病家不耐病未三四日晝夜促汗醫者隨情順意鮮不敗事過謂此說非也傷寒病在表者可汗在胃隔者可吐表證可下此仲景不易之論也若可吐可下之證而發汗其病不除因以增劇安得便愈却至二年而卒乎若表證可汗正宜汗之不厭其早也文伯各醫豈不知此但史目所記差舛後人妄為之說耳張右史記龐安常墓誌碑陰云大理少卿林英女病傷寒死已一日為診之曰尚活不死也灌之以桂枝湯而蘇殊不知桂枝乃發表藥表證無昏若死者與南史同失故併見之

辨方士著書言用心三十年而後成頗與名儒賢卿交

世有方士著書言用心三十年而後成頗與名儒賢卿交游又知書史故大得各聲然或割出新意多與醫經背戾如曰溫疫自生臭穢人聞其氣即時以紙筋探鼻嚏之不爾邪氣入上元宮遂成斯病今備考醫書無上元宮名稱夫人聞臭穢者鼻通於肺耳然傷寒六經傳變只傳足經謂腎脾肝經絡起於足指其心肺經絡自起於手指是斯人未識經絡也以其說助傳染之妄故為指擊

記仲景事實頁第十三

傷寒論記仲景宗族素多向餘二百建安紀年以來猶未十餘其死亡者三分有二傷寒十居其七由此發憤遂為

醫家百世之師皇甫士安記仲景見侍中王仲宣時年二十日君有病四十當眉落半年死令服五石湯可愈仲宣嫌其言忤受湯而不服居三日仲景曰服否宣曰已服矣景曰也候固非服湯之診也君何輕命也宣猶不信後二十年果眉落一百八十日而死士安曰此事雖扁鵲倉公無以加也迺謂今之人至親疾病而輒棄去者不但小人俚俗為然雖士大夫亦有之只是不曾識破道理也既致親人于死地雖奄奄度世竟與草木俱腐聞仲景之風亦可少愧矣

與內弟襄陵許進之論醫書第十四

迺近寄上醫經正本書來書曰所謂傳染之說素所不信或云傷寒無傳染而溫病一門雖素問難經仲景等書皆不言傳染而其公方雖無傳染議論却有治療雄黃圓等諸方不知可以破其說否迺謂某公方於傷寒門引小口即華佗王叔和陳廩立等論而不及仲景曰江南諸師秘仲景要方不傳初得病但列火灸心下三處似是未嘗見仲景書如楊雄未嘗見古文尚書也然桂枝青龍抵牾等方亦粗用仲景法恐憑憑作書引用而割出辟溫一篇以屠蘇酒為之冠今此藥天下盛行其方曰一人飲一家無疫一家飲一里無疫然民間有疫病者往往嘗服屠蘇是其方不効也雄黃圓方去市中疫鬼數百十皆驚怖而走有鬼王求受道法夫舍氣血而明鬼物固非醫家之正論也且一時不正之氣着人則不論老幼病證皆同非是病人相為傳染如辟溫篇中言令人不染溫病只是不着異氣

耳其曰轉相傳染者始繆誤矣有名醫謂過曰此言餘嘗
然某公有深功於醫家恐不知者棄其所長迥曰瑜不掩
瑕忠也唯知其疵然後能見其美也

知洪州龍學范致虛謙叔榜文附

民戶偶患瘟疫止信師巫謂之門師為其設像以祠瘟鬼
請之結座禁其服藥以與鬼競專一奉鬼謂之具願祭于
壇場謂之博替隔絕往來謂之避難偶自獲安邀求衣物
謂之代厄病人死亡祭以遣鬼謂之解願禁其哭泣媿於
怨鬼皆悖禮犯義昔李德裕之觀察浙西以南方信機
巫雖父母孺疾子棄不敢養德裕擇長老可語者諭以孝
慈大倫患難相收不可相棄之義使歸相曉勅違者顯實
以法數年惡俗大變天子下詔褒揚今太守德薄不足以
望此然賴學士大夫名家巨室邦之耆老鄉之善士相與傳
諭告誡推而達之俾流風丕變共承
國家美化善俗之意躋于仁壽導之孝慈亦為桑梓之
美乎

醫經正本書



醫經正本書 跋

言幼觀素問若有所得思竟其業於是研精覃思至
老而不厭以之看扁鵲倉公以來諸家方論其得失
淺深真贗輒能辯之如視黑白而數一二也常恨士
大不肯為此學一有疾病委性命于市井膚淺之人
每為嘆息淳熙丁酉之孟夏獲與

進賢令君程公可父會于松陽辱示醫經正本書一
卷九十四篇大指言傷寒疫疾並無傳染以按世俗
親人自相棄絕之繆因沈出

本朝李唐兩代醫政與夫權量脈診湯液方論贊其
是而絀其否可謂精且博矣因與講論久之無一辭
不契合者不覺悚然起敬曰公之書必盛傳傳則助
風教而長慈愛正人心而革媮薄當與長沙太守之

名並見於永以豈曰小補云乎哉公名迥可以其字
也睢陽沙隨人由太學生登隆興元年進士第六六
月一日鶴溪老人陳言無擇跋



一七七

黃承昊著



折肱漫錄

修敬堂藏板

折肱漫錄序

狄懷英司馬

黃承昊

序

折肱漫錄

岐之道懷英以神鍼活人兒奇疾却其饋謝千練

曰我以行志非售術者君實罷官居洛日抄集經

驗方書遇病人輒疏方示之兩公俱療寓宙瘦痺

之人蘇黔黎瞑眩之手小大繇之其為康濟一爾

余年兄黃闇齋先生岐嶷善病最謹衛生雖日親

醫而斟酌至當則審以虛衷揆之定理不敢一狗

折肱漫錄 全序

成案執臆見為誤故自諸生以下惟攻苦為鏤心

劇腑之文取科甲肩仕任出入諷議中外歛歷為

大諫參藩所在於國事民瘼握其對病之藥石匡

危起痼不遺餘力而氣體不衰精神加旺其得於

執玉捧盈維持調護者精矣乃股然思嘉惠同人

借臻康強而勤職業也疏其從來醫藥所宜胸懷

所見付劄劄曰折肱漫錄余於臥疴間閱之犬指

謂人之致疾無不起於元氣單虛寒暑之外侵飲

食之內停茂不因此養生之家但當保護其真元專扶其根本間或相宜微佐以消導正氣固則邪自漸除必不可求速效而輕用表散之劑漫加削伐之品以致噬臍每篇之中叮嚀戒慎不啻數反覆焉肯哉言乎何獨養生之家盱衡治道亦猶是也當運會疴羸民生顛頓譬之病久虛弱善醫國者宜一切與民務休息無為寬疎節目待其元氣之自回若紛然攻砭卽或取快暫時久之或雜病

折肱漫錄

金序

二

心導樓

蜂起所政治在此而意外疾生在彼故無論治身治天下皆當虛心守一不可持以躁心鞅之相秦參之相漢其明證矣秦越人視疾隔垣洞見五臟而後敢以五分之燧八滅之劑投之無不如意降此則藥草不能自言臟腑無所籲訴謹守管衛必不敢輕嘗試者聞齋此論中多情深極致之言匪徒可保護色身併可滋培慧命其存心濟物與懷英君實今古同符所稱衛生之明鏡醫國之良規

非耶茲聖明願治方殷亟求啟沃是錄以獻股肱惟人可也無徒云折肱矣

丁丑孟夏望日年眷弟金麗兼拜書

折肱漫錄

金序

三

心導樓

折肱漫錄序

今之求醫者率擇齒危之老或且乘青雀曳羅縠蒼頭廬兒美衣刺肥曰是所謂名醫者也不則矜世傳哆禁方目不識六七寫杜仲爲土中書枳殼爲只壳而病者亦禮而進之曰是所謂專醫者也嗟乎儒之於世務槩不能竟其施而獨於醫則尤相桷鑿曰吾儒人也而談醫病者必唾其面嗟乎此豈非天擠馮生而難爲俗人道耶予嘗考醫之

折肱漫錄

陸序

一

心導樓

起於名儒者伊尹湯液最爲老師以至漢奉張機嘗爲太守魏稱華佗亦擢孝廉皇甫謐序重三部著經甲乙殷中軍清言能品頗善經方而陶宏景有別錄之書梁簡文著勸醫之論若此之倫更僕難數蓋以搢紳先生之徒學緣博而獲中識因微而造巧故其所詣必非僉工所敢望而奈何以儒之敏瞻穎灼爲反足累於醫乎卽近世節齋念西諸先生亦未嘗不繇甲科高第治靈蘭家言而卒

以起沉痾擅神明之譽遂乃著書滿家訓流來葉

彼羣醫者持一布鼓作蒼蠅聲蹙蹙何地耶予自

業醫以來得閣齋先生折肱一編伏而讀之知其

覃精桐跗之元鈞智陽里之秘且於昔之易州東

垣今之天民新甫同尙資調徑轍有合而又以身

所歷踣者著爲勸戒嘘枯吹生明道解惑此書之

成實蒼生之厚幸也且先生犖犖治行敷歷中外

迴翔臺閣筆不勝書而及乎天步榛蕪則又杜門

折肱漫錄

陸序

二

心導樓

廣武息駕彭澤有礪俗長往之志予嘗欲執弟子禮請見先生盡發其所藏今年乃得與次君復仲定交而先生亡矣嗚呼予之爲儒欲師大樽先生而大樽就殞及其爲醫欲師閣齋先生而閣齋繼亡天使予沉淪轉徙於四民雜流之中而所至旋奪其師吾將安放何其痛也况能與名醫專醫爭一日之慕用乎哉

西陵後學陸圻景宣氏拜譔

折肱漫錄小引

古人云不為良相則為良醫意在濟世也予少年病羸徽纏一二十年備嘗諸苦少不知醫多誤藥苦迺彌甚當茹荼時苦極而悔悔極而恨恟恍惘惘幾濱於死私自矢曰吾病得愈吾年得老必揭此以告同患者使毋蹈予之覆轍有所苦隨筆記之久而成帙迨後病得漸瘥更得致身雲路碌碌世緣未暇問此且念吾年未老閱歷未深恐識見

折肱漫錄小引

一 心導樓

尙有誤以誤人姑笥而藏之今歸田無事年已六十矣閱歷深識見定矣庶可災梨以告同患乎乃搜故簾所存而益以近記題曰折肱漫錄蓋取三折肱成良醫之義一曰養神一曰養形一曰醫藥非身所親歷口所親嘗目所親視都不敢混載以欺人蓋予生平凡方書所載之症十患四五本草所載之藥亦十嘗四五夫豈勦陳言拾道聽以侈觀覽者子宮雖不甚顯而宦轍所到必孜孜以利

濟為事今梓是編亦一片婆心所使上不能為良相而頗存良相之心下不能為良醫而畧明良醫之道云爾

崇正乙亥菊月朏樂白道人黃承吳題於樂白軒

折肱漫錄小引

二 心導樓

折肱漫錄卷之一

樵李黃承業履素撰

古吳程永培瘦樵校

醫藥篇一

總論 虛損 卒中 脾胃 腹痛

內經云氣口獨為五藏主又曰胃為水穀之海六府之大原也故人生以胃氣為本善養生者毋輕傷胃氣苦寒之藥不可多服致損化源丹溪發陽常有餘陰常不足之論於虛勞潮熱盜汗等症立

折肱漫錄

卷之一

心導樓

方以四物湯加知母黃柏治之經謂內熱未除寒中復起正犯斯禁前賢闢之已詳東垣立論則以人之一身脾胃為主而特創補中益氣湯以垂後世至薛立齋紹而述之動輒以此湯為前矛遇陰虛之症則謂陰虛乃足三陰虛尤當補脾陰為主亦用此湯以滋化源化源者何蓋補脾土以生肺金使金能生水水足木自平而心火自降又佐以六味地黃丸以溫存肝腎發前賢所未發開千古

之尊曠功莫大焉夫李朱二賢各有所長未敢輕

為軒輊然以區區管窺蠡測則謂造化生物惟此

春溫之氣鴨子以火溫而雛蠶種以人懷而育陽

春一轉草木甲拆惟此溫和故也盛暑則萬物焦

隆冬則萬物萎秋氣清肅萬物以凋彼大寒大熱

之藥猶之盛暑隆冬而清涼之劑則秋金之令也

獨此甘溫之品煦之育之可使生機勃發而滿腔

皆春東垣信有卓識若用寒藥補陰則胃氣先傷

折肱漫錄

卷之一

二

心導樓

五藏皆無生氣常見遵丹溪之法以治勞症往往脾敗以至不救不能不歸咎於丹溪之作補予少年多悞後確守立齋之法得延殘喘以迄於今藥者人生之大利大害也不遇良醫不如不藥不藥而悞也悞藥而悞也亦悞然不藥之悞小悞藥之悞大

病者所忌自酒色勞役飲食及一切例禁外所大

忌者有二認病為真終朝佗條一也求速效而輕

用醫藥二也予病中守戒甚嚴獨犯此二者以是久而不痊慎之哉

子輿氏曰盡信書則不如無書在岐黃家尤甚蓋見解不同識古今不同運在智者神而明之若執書以治病為悞滋多或因書以生憂反受其害予所親試者如盛稱枳朮丸之能健脾可常服也而反以傷脾如言玉屏風散之能禦風寒也而反以開腠理如侈口葶菴丸之能延年也而反以耗精

折肱漫錄

卷之一

三

心導樓

神如謂痰中縷血之最重難治也火起九泉之下之百不救一也予少年患此憂不可言而尙延殘喘雖予之能慎疾勤服藥得免於死而方書不足盡信大槩如此矣

王節齋遵丹溪之旨立補陰丸方論以治勞症世上依法醫治百無一効反致胃氣傷損而殞命者多矣薛立齋王宇泰兩先生力辨其非可為大有功於民命夫陽常有餘陰常不足其論固是而必

抑陽以扶陰則其見謬矣曷言之天地間之理陽自先乎陰陽生則陰長故天包乎地外月借日之光以為光晝動夜靜君令臣共夫倡婦隨大易之理每每扶陽而抑陰修仙之道必期純陽而後已陽之貴於世也久矣須知陽原該有餘陰原該不足乃欲以陰沉之藥抑陽以扶陰陽消而陰能獨長乎哉相傳丹溪之書多雜以贗本故有頗謬處或者其然

折肱漫錄

卷之一

四

心導樓

薛立齋先生之論陰虛發前賢之所未發其謂陰虛乃足三陰虛也足三陰者足太陰脾足少陰腎足厥陰肝也而脾屬土尤為至陰而生血故陰虛者脾虛也補陰宜自補脾始大凡足三陰虛多因飲食勞役以致腎不能生肝肝不能生火而害脾土不能滋化但補脾土則土生金金生水木得平而自相生矣先生治一人飲食失宜患嘔熱口乾體倦小便赤澀兩腿酸痛令服補中益氣湯彼不

情而服四物湯知母黃柏之劑變症百出後仍服甘溫等藥而愈蓋脾稟於胃故用甘溫之劑以生發胃中元氣而除大熱顧乃反服苦寒復傷脾血耶若前症果屬腎經陰虛亦因腎經陽虛不能生陰耳經云無陽則陰無以生無陰則陽無以化又云虛則補其母當用補中益氣六味地黃以補其母尤不宜用苦寒之藥世以脾虛俱爲腎虛輒用黃柏知母之類反傷胃中生氣害人多矣

折肱漫錄

卷之一

五

心導樓

立齋云若人少有老態不耐寒暑不勝勞役四時迭病皆因少時氣血方長而勞心虧損或精血未滿而御女過傷故其見症難以悉狀此精氣不足但滋化源其病自痊又若飲食勞役七情失宜以致諸症亦當治以前法設或六淫所侵以致諸症亦因真氣內虛而外邪乘襲尤當固胃氣爲主蓋胃爲五藏之根本故黃柏知母不宜輕用恐復傷胃氣也凡雜症屬內因乃形氣病氣俱不足當補

不當瀉傷寒雖屬外因亦宜分其表裏虛實治者審之先生此論提綱挈領滋化源固胃氣一語眞醫雜病者之龜鑑也經云安穀則昌人之有生也先天元氣全賴後天之穀氣以助之故脾胃不傷卽有他病猶可調治若脾胃壞飲食少本根之地旣搖則雜症蜂起而難爲力矣故切脉先看胃氣有胃氣則生無則死養病家第一先須於脾胃上着力每治他病切須照顧脾胃不可一意攻伐忘

折肱漫錄

卷之一

六

心導樓

其本根予自恨年少不知醫受累已多故特揭此以告患者

薛立齋先生治虛勞諸症大槩以補中益氣湯六味地黃丸二藥兼服取効最爲純正妙理但王者必世後仁此藥亦須歲時方効若服之三四月輒以爲無大效而置之則謬矣予初病時亦曾遵此法以自服藥一兩月未見効遂爾易方醫藥亂投幾殆比受苦二十年後來畢竟以此收功悔之無

及

王節齋極言陰虛之症不可服人參服人參過多者不治人參爲中和之妙藥雖云補氣佐以血藥亦能補血者何得槩禁勿服予初守此戒凡遇肺火衝激痰涎壅盛輒禁參朮不入口而服清涼之劑殊不効後讀他書有悟卽痰盛喉腥亦服參朮不輟究竟不見助火而肺氣旋清始知肺中實火方忌人參若虛火非參不治土爲金母虛則補其折肱漫錄 卷之一 七 心導樓

母故服參朮等藥而痰火反愈妙理昭然王氏之言悞人不淺予生平善病方書所載之症候十患其五本草所載之藥品亦十嘗其五於病之情狀藥之利害知之已深今年六十餘矣而後知治病必以脾胃爲本東垣立齋之書養生家當奉爲著蔡者也至於脾土補之不應則求端於其母而補命門之真火以生之立齋之論尤精

方書言治病者衰其大半而止不可過劑過則反傷元氣大凡以藥攻病者去其大半卽宜養正氣而佐以祛邪正氣充則邪氣自盡若必欲盡去其邪而後補正將正氣與邪氣俱盡而補之難爲力矣予少不知此理每爲人言所悞王節齋論治痰謂中焦之痰胃亦賴其所養難以盡去去盡則胃虛而難治亦同此理常聞庸醫有祛邪務盡之語大是悞人

折肱漫錄 卷之一

八 心導樓

玉機微義其議論多精妙處亦醫書之上乘也腠理虛爲陽虛爲表虛爲衛虛人身中清陽之氣上升達表所以固皮毛而實腠理謂之衛氣衛氣象天天包地外一氣之所攝持猶衛氣包護一身而使內者不出外者不入故衛得其養則陽氣自覺常充汗少泄風邪自不能中內經云陽密乃固陽密卽腠理密矣此氣蓋本於胃而主於肺故胃充卽衛充肺虛卽衛虛益氣湯以甘溫養胃中生發

之元氣以升柴提下陷之清陽濟陽上升衛氣自實汗不斂而自固矣又謂脾氣一虛肺氣先絕汗乃大泄故先以參朮壯其脾使土王金生則腠理自密而汗乃戢蓋養胃助脾卽所以補肺之母而充固衛氣無他法也若陽氣虛甚而津脫不止者前湯不能取効須加熟附子以固其陽陽回衛氣斯復矣要知畏風多汗易於感冒等症總皆陽氣不足所致也

折肱漫錄

卷之一

九

心導樓

立齋云凡人元氣素弱或因起居失宜或因飲食勞倦或因用心太過致遺精白濁自汗盜汗或內熱晡熱潮熱發熱或口乾作渴喉痛舌裂或乳膨脹脇肋作痛或頭頸時痛眩暈目花或心神不寧寤而不寐或小便赤澁莖中作痛或便溺餘滴臍腹陰冷或形容不充肢體畏寒或鼻氣短促或更有一切熱症皆是無根虛火但服十全大補湯固其根本諸症自息若攻其風熱則悞矣此千古格

言不可不察

沉香化氣丸最爲猛烈無經不傷無臟不損不可輕用者

倒倉之法不宜施於老弱曾聞有以倒倉而不起者

陰絡傷則下血陽絡傷則吐血悞服攻積之藥故傷陰絡悞服破氣之藥故傷陽絡

予當夏令時患小便黃濇短少時值秋冬又患小

折肱漫錄

卷之一

十

心導樓

便頻多而利予總聽之不治亦無大害古人云凡老人小便短少便是病進之兆亦未必盡然

王節齋先生亦醫家名手但所著明醫雜著議論多偏薛立齋每條下一註脚而梓行於世蓋恐後人悞信貽害不淺故特爲剖折其是非其有功德世也大矣

王節齋論東垣用藥如韓信將兵多多益善丹溪不過能將十萬故不敢効其多二公醫品原自徑

庭況丹溪之書所傳失真故遵其法以治病多至悞人學醫者其察之

立齋曰異法方宜論云東南之域卑下濕熱其人腠理踈通汗液妄泄陽氣內虛故宜食椒薑辛熱之物以助其陽西北之域高陵風寒其人腠理緻密汗液內固陽氣充實不宜食椒薑辛熱之物反益其陽昔東坡先生仕黃州其民疫癘流行先生以聖散子治之甚效蓋其地卑濕四時鬱熱腠理

折肱漫錄

卷之一

七

心導樓

踈通陽氣虛寒是以相宜西北疫癘民用之死者接踵風氣各別治法不同不可不知也
立齋云王太僕先生曰大寒而甚熱之不熱是無火也大熱而甚寒之不寒是無水也晝見夜伏夜見晝止不時而動是無火也大抵病熱作渴欲冷便秘此屬真熱或惡寒發熱引衣踈臥或四肢逆冷大便清利此屬真寒或躁擾狂越欲入水中不欲近衣此病屬虛乃外假熱而內真寒也故虛勞

發熱之症治以寒藥而反甚者此也由此觀之則熱症常少而寒症常多芩連梔柏等藥豈宜輕用無火者益火之源以消陰翳八味丸是也無水者壯水之主以鎮陽炁六味丸是也此治法之大畧也

臨川陳先生云醫風先醫血血行風自滅蓋肝藏血而主風又肝氣為陽為火肝血為陰為木若肝火王則肝血必虛故凡風病多因肝經風火為患

折肱漫錄

卷之一

七

心導樓

當推五臟相勝相生以益其血經云腎藏精而主骨故腎虛則骨中熱或湧泉穴或兩脛兩足內熱多患骨痿以致不起屬足三陰虧損之虛熱耳滋其化源庶可保其生

立齋云針灸各有所忌經曰形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可刺之刺之則重不足重不足則陰陽俱竭血氣俱盡老者絕滅壯者不復矣東垣曰脈浮數而發熱咽乾面赤時渴者皆熱在

外也不可炙炙之災害立至俱不可不慎

予父子母子兄皆以卒中不起父母病時予醫理未透予兄病時予在燕京皆隨俗先進牛黃清心丸延到時師皆用祛風化痰之劑絕無一効及閱立齋醫案治王車駕卒中昏憤口眼喎斜痰氣上湧咽喉有聲六脉沉伏此真氣虛而風邪所乘以三生飲一兩加人參一兩煎服卽甦卽五不治症用前藥亦有得生者夫前飲乃行經絡治寒痰之

折肱漫錄

卷之一

三

心導樓

藥有斬關奪旗之功每服必用人參兩許駕驅其邪而補助真氣否則不惟無益適足以取敗矣觀先哲用芪附參附等湯其義可見卽立齋先生之言要知牛黃丸乃香散通經之藥亦宜用人參兩許煎湯調服方可若單服則真氣愈散矣竟以不知醫而誤用可勝痛恨爲人子者不可不知醫信夫雖然前條治法以施於中風中寒諸症妙矣又有虛火衝逆熱痰壅塞以致昏憤顛仆者狀類中

風恐附子非所宜服立齋治王進士勞役失於調

養忽然昏憤謂是元氣虛火妄發挾痰而作急灌童便神思漸爽更用參芪各五錢芎歸各三錢元參柴胡山梔炙草各一錢服之稍定察其形倦甚又以十全大補湯加門冬五味治之而安予從弟履中年方強仕以勞心憂鬱而得斯症痰升遺溺眼科視逾時不醒竟類中風亦灌以童便而甦此等症候皆火挾痰而作又非三生飲所可治者并

折肱漫錄

卷之一

四

心導樓

薑湯亦不相宜也同一卒然昏憤而所因不同須細審而治之

海寧陳月坡云凡卒中者不宜雜飲以湯卽姜湯亦不可與飲飲便亂經脈陳有刺穴法甚妙先學士葵陽公年近六十精神正王苦瘍悞信友人草方服大黃下之遂致精神頓衰肌肉盡削調理半載竟不可復後又患泄瀉遂得前症立齋治法正相宜恨不蚤究心此書尤恨時師何無一人讀此

書而皆質質也

風自火出故熱則生風試觀天道每遇伊鬱之極則發大風必然之理故中風之症多生於內熱若血涼水足風自何生六味丸益氣湯所以當常服也風不必皆外感常從內生不可不知薛立齋治風症亦間用愈風丹然佐以八珍湯六味丸非單服前丹也

凡人精神極壯實者偶患痰厥可服牛黃丸友人折肱漫錄卷之一 圭 心導樓

屠伯尙忽然痰壅不能語服牛黃丸立愈子姊丈周公美一日忽神呆目怒頃之痰湧手揚足擲有類中風不服藥次日自愈此等稟賦百無一二凡人脾胃氣虛而飲食難消者必以參朮為主治而少佐以消導初服頗覺迷悶悶後必得漸爽若專治其食則愈消愈虛而食愈不消矣此與治痰同理蓋治病必窮其本見病治病豈為良醫乙巳之夏予患中脘痛既而泄瀉偶遇姑蘇一名

醫令診之驚曰脾胃久傷不治將滯下子體素弱憚服攻剋之劑因此醫有盛名一時惑之遂服枳實黃連厚朴山查木通等藥數劑又服枳朮丸一月以致脾胃大傷是秋遂溲洩不止漸覺飲食難化痞悶倒飽深自悔恨服參朮等藥及八味丸十餘年始得愈然而中氣終不如故苦不耐饑稍飢則中氣大虛其憊不可狀凡山查等消導之物入口即虛脾胃之不可妄攻如此方書極言枳朮丸

折肱漫錄卷之一 未 心導樓
之妙孰知白朮雖多不能勝枳實之迅利子友胡孝轅刺史亦悞服枳朮丸而大病可見此丸斷非健脾之藥或飲食停滯偶一二服可見耳
參朮膏補脾之功最大人不能多飲食者多服此膏能令飲食大進子長子寅錫服此甚驗
予生平飲食喜熱而畏冷係中氣虛寒常服六君子湯加炮姜氣滯更加木香甚効
凡人脾病服補土藥不效即宜服八味丸以補其

母子服此甚効許學士云有人全不進食服補脾藥不効予授以二神丸服之頓能進食蓋治法虛則補其母不能食者戊已虛也火乃土之母故以破故紙補腎爲癸水以肉豆蔻厚腸胃爲戊土戊癸化火同爲補土母之藥再加木香以順其氣使之斡旋空虛倉廩自能受物凡人腎氣怯弱真陽衰虛坎水不溫不能上蒸脾土是以飲食不進或食而作脹大腑滯泄譬諸鼎釜之中置諸水穀下

折肱漫錄

卷之一

七

心導樓

無火力終日米不熟黃魯直常記服兔絲子淘淨酒浸曝乾日挑數匙以酒下之十日外飲噉如湯沃雪服二神丸兔絲子與服八味丸同一理是千古不易之妙法嚴用和云古人謂補腎不如補脾予謂補脾不如補腎腎氣若壯丹田火盛上蒸脾土脾土溫和中焦自治膈開能食矣立齋云凡停食泄瀉之症若食已消而泄未已宜用異功散以補脾胃如不應用補中益氣以升發

陽氣凡泄利色黃脾土虧損真氣下陷必用前湯加木香肉豆蔻溫補如不應當補其母宜八味丸又參之瘧疾門有云凡停食症宜用六君子湯加枳實厚朴若食已消而不愈用六君子湯立齋治停食泄瀉等症必以參朮助正氣而佐以消導庶不傷元氣真爲良法子見時師治泄瀉未有不以消導分利爲常法者陰損人元氣而人不知亦可嘆也又攷王節齋云凡泄瀉病悞服參芪等甘溫

折肱漫錄

卷之一

六

心導樓

之藥則病不能愈而或變爲黃疸蓋泄屬濕甘溫之藥能生濕熱故反助病邪久則濕熱甚而爲疸也卽立齋醫案中亦言李少宰泄瀉悞服參芪變爲黃疸然則泄瀉初起益氣湯所宜禁者歷攷立齋治泄瀉大都用六君子加木香神麩等藥蓋六君子無黃芪當歸而又加苦泄之藥自非甘溫比耳予脾胃本虛在時悞服消尅之藥頓覺中氣下陷

胃脘中空空然神氣倦怠虛汗不止手足不温大便亦無氣推送急服益氣湯等藥連服十餘劑中氣乃漸復消尅之藥不可輕服也如此俗有以食消食之法以飯肉等所傷之物燒灰存性爲末用酒或陳皮湯下之頗効此物似不甚傷脾可用王宇泰先生準繩中亦曾載之又有以酒藥燒灰服者便覺傷脾更有服生酒藥者最爲峻厲不宜用立齋云大凡食積痞塊症爲有形所謂邪氣勝則

折肱漫錄

卷之一

九

心導樓

實真氣奪則虛惟當養正則邪積自除矣雖云堅者削之客者除之若胃氣未虛元氣尙實乃可用攻削或病久虛羸或元氣素弱者但當固本爲主而佐以消治不然反致病滿不食而益其病矣玉機微義之論治積亦同此見是千古格言不可忽也予在臨江時誤服厚朴傷中氣之後偶食大肉一塊遂覺停滯時中氣正虛不敢加山查等藥攷本草食大肉不消煮蘆根汁飲之可消予如法煎

飲覺右脇下微痛次日大痛殊不可解自是日甚一日坐臥皆妨反側痛如刀刺右脇下按之有物如雞子方書言右脇痛屬食積痰積有謂須攻治者有謂不宜攻必須助正以消邪者時有醫主攻治謂不治將成痞塊予不以爲然確守助正之說當痛極時不敢服藥靜以守之俟痛小定氣雖痞卽用六君子加木香等行氣之藥以漸調之竟得痊可若悞信攻伐不知死所矣

折肱漫錄

卷之一

三

心導樓

脾胃好煖而惡寒脾虛必宜温煖之藥予內人少患脾有冷痰時患嘔吐不止服聶邈元五炁丹數丸遂不復發予近患脾不和不時溲泄服參朮兩三月不効服胡與辰金鉛一丸脾氣頓佳得兩三月安妥家庵中有一比丘尼久患脾疾甚殆肛門不收穢水任出服金鉛一丸肛門頓斂漸調而愈其神効有如此者故知脾病之宜於温煖也胡乃儀真人

痢之初起用芍藥湯而加大黃以蕩滌其滯此常法也然稟質有強弱歲運亦有不同槩服大黃常有至隕命不可不慎

脾胃爲五臟之本餌木不宜獨後於人參以木一兩佐參五錢煎膏最能補中氣近有以木二斤佐陳皮半斤煎膏服之亦妙予餌木常不輟計一歲所服可得五六斤參則僅一斤許耳

時師見小便不利大便不實多用茯苓澤瀉等淡

折肱漫錄

卷之一

主

心導樓

滲之藥不以爲意立齋每謂淡滲導損陽氣反益其病而兢兢乎慎之絕不用以治此症識見超出等夷吾人不宜輕忽淡滲之劑而頻服之也

傷飲食者醫多妄下使清氣下陷則濁氣不得降反生腫脹故東垣治以補中益氣湯所以升舉其下陷之清氣則濁氣自降不治而愈也

立齋論傷食不消若傷性熱之物用二陳湯加黃連山查若傷濕麩等物用二陳加神麩麥芽若傷

米食用六君子加穀蘖傷麩食者六君子加麥蘖傷肉食者六君子加山查傷魚腥者六君子倍加

陳皮傷角黍炊飯者六君子倍加酒麩若食已消而泄未愈者此脾胃受傷也單服六君子湯若飲食減少或食而難化者屬脾胃虛寒加炮薑木香肉果不應加五味子吳茱萸補骨脂若脾腎虛寒者服八味丸否則多患脾虛中滿之症其神麩麥芽雖取戊土以腐熟水穀然麥芽一味子常以治

折肱漫錄

卷之一

主

心導樓

婦人喪子乳房脹痛欲成癰者用一二兩炒熟煎服卽消其破血散氣可知矣丹溪云麥芽消腎婦人良方云神麩善下胎皆尅伐之劑不宜輕用立齋云凡久瀉脾虛飲食難化之症多由泛用消食利水之劑損其真陰元氣不能自主持遂成久泄若非益氣湯四神丸滋其本源後必胸痞腹脹小便淋瀝多致不起

痛無補法自古記之然立齋治唐儀部腹痛面色

黃中見青左關弦長右關弦緊用益氣湯加半夏木香而愈治李儀部腹痛面色黃中見青兼赤肝脉弦緊用益氣湯加山梔而愈蓋木本尅土土衰則木愈勝而乘之故脾病多受肝累然察色須審黃乃脾色青乃肝色黃中見青乃爲木乘土兼赤則是木土又生火矣故用山梔以清之益氣湯本不宜於治痛加半夏木香等藥則補而不壅矣此先生妙手非他人所及

折肱漫錄

卷之一

三

心導樓

大凡腹滿痛按之不痛爲虛痛者爲實蓋此症須細察虛實虛則用立齋之治法實則當守痛無補法之戒至若霍亂腹痛悞飲米湯卽死屢屢見之不可不慎也

予少患下元氣虛不能多言稍不戒則氣怯不可狀丹田若無物者甚則夜半陰極之時陽氣欲脫手足厥冷汗大洩一交子丑氣乃漸復此係腎陽衰弱之候常服溫腎之藥於滋陰料中多用兔絲

子枸杞子肉蓯蓉五味子鹿茸紫河車之屬遂得漸愈前症因日病悞服黃連丸頓劇要知陽衰之症寒藥所最忌如知母黃柏之屬最傷胃中生發之氣卽平人亦不宜多服者又本草云升麻川芎下虛人忌服子服四物湯川芎稍多服補中益氣湯失加人參皆頓覺下虛前病陡發藥之響應如此

予自二十四歲患下元虛怯中年大受其累終日折肱漫錄

卷之一

四

心導樓

以三緘爲戒至四十後漸充老年反無此苦豈壯年氣反不足耶抑老來得力於服藥之久耶予弱冠患傷風不遠牀第每晨起卽鼻重流涕竟日痰不絕口留連月餘遂見痰中縷血遺害無窮諺云傷風不醒結成勞蓋金水二藏情關子母金傷則不能生水子瀉則其母愈虛水不能制火火乘金而金益敗此勞嗽之症所由成耳信乎傷風雖小病最不可不慎者故補脾保肺乃養生家第一義

而肺病極宜斷色慾相關相應捷於影響

予臨場慮不耐風寒合玉屏風散服之反自汗津
津不止蓋防風與黃芪各等分之謬也本草云黃
芪得防風其功愈大用黃芪七分配防風三分斯
得之矣

予弱冠患痰中縷血憂惶特甚治以清痰涼血之
藥殊不效以憂病病日進面熱而手冷喉膩而口
乾兩背不舒夜作微熱幾成瘵症就醫吳門醫者

折肱漫錄

卷之一

三

心導樓

投以芩連之劑甫兩服忽然手冷過肘足冷過膝
陡覺鼻中出冷氣神魂飄忽如從高橋下墜陰陰
然莫測所止之狀亟呼薑酒飲之速煎人參湯加
薑服之神稍定延名醫張蓮水診之云無害平調
之可矣勿以寒藥傷而遽服熱藥也治以八物湯
加天麻予遵服二三十劑神氣雖稍寧然自此陽
氣頓衰三冬必以火自隨而慘慘淅瀝之象幾無
生人之樂矣予後閱方書云鬱火之症最忌寒涼

犯之當死予本以憂鬱成此火症竟犯此忌不死

幸耳初以陰虛致疾到此則陰陽兩虛乃大服溫
補氣血之藥及紫河車紅鉛秋石之屬病乃稍瘥
縷血之症十餘年間不時乍發後來置之度外不
復省視竟爾相忘予觀友人患此症者頗多俱未
見天折要知此症亦非難治之症也

壯熱是火不時發熱是無火火衰而浮火不歸源
故反致發熱

折肱漫錄

卷之一

三

心導樓

立齋云凡人飲食起居失宜見一切火症悉屬內
真寒而外假熱故肚腹喜暖口畏冷物此乃形氣
病氣俱屬不足法當純補元氣為善內傷症似外
感一時難辨立齋以腹喜暖口畏冷物二者別之
最為良法

心為君火可以水折可以涼治相火為龍火不可
以直折當從其性而治之故世間之火可以水滅
至於龍雷之火及火井之火見水則熾得火則滅

此亦絕可異事而有妙理存焉蓋真陽虛耗故火不歸源而變為假熱之症此必用桂附等佐補藥引火歸源而後游行之火始伏乃信此理微妙世醫少知

又有腎陰虛陽無所附而發於外亦見假熱之症王太僕云大熱而甚寒之不寒是無水也當峻補其陰用加減八味丸大料多加肉桂以恣飲之陰虛而用肉桂者寒因熱用之意也大凡以熱藥治

折肱漫錄

卷之一

三

心導樓

寒症以寒藥治熱症一時格拒不入故用一味引而從之其理至妙有熱藥冷飲寒藥熱飲之法亦即此意

大凡勞心好色者久則陰虛火盛若入房而驟病者多屬陽虛火衰

勞則發熱無時此係氣血俱虛之症但補其虛不宜治其熱此予所經患者

丹溪醫案有人足熱不可加綿自誇壯實丹溪云

此陰虛也不治將痿其人不信年近四十患痿而死又云人有熱氣從臍下起者此名陰火又有從湧泉穴起入腹者此為火起九泉之下百不救一予久病後患左腎常熱年餘忽覺足熱其火遊移不定或發於足面或發於足心或發於兩腿雖不至如所云起自足心衝入腹內然大槩相類此症不勝憂疑據丹溪治法須用四物湯加知母黃柏等劑予向忌寒涼不敢依此治法仍用溫暖之藥

折肱漫錄

卷之一

三

心導樓

竟無大害蓋腎熱足熱其為陰虛水少此不待智者知之但治以寒涼非徒無益而又害之惟用補腎養血之藥而以煖藥引經則以火伏火其火自平此即龍火并火見火則滅之義予此病十年方愈後亦間發惟能堅信確守無欲速之心如法調治與病相忘久而自去若遵丹溪之法以求速效此時墓木已拱矣謹揭以告同患

面赤吐痰多是虛火不可作實治予少時患面熱

手冷喉膩多痰夜熱認爲火症不服溫補之藥以是久而不愈

王損庵先生論陰虛之症謂自子至巳屬陽自午至亥屬陰陰虛則熱在午後子前寤屬陽寐屬陰陰虛則汗從寐時盜出也升屬陽降屬陰陰虛則氣不降氣不降則痰涎上逆而連綿吐出不絕也脈浮屬陽沉屬陰陰虛則浮之洪大沉之空虛也治法不宜遵丹溪四物湯加知母黃栢之方宜用

折肱漫錄

卷之一

五

心導樓

薏苡仁百合天門冬麥門冬桑根白皮地骨牡丹皮枇杷葉五味子酸棗仁之屬佐以生地黃汁藕汁乳汁童便等如咳嗽則多用桑皮枇杷葉有痰則加貝母有血則多用薏仁百合加阿膠熱盛則用地骨皮食少則用薏仁至七八錢而麥門冬常爲之主以保肺金而滋生化之源無不應手而効蓋諸藥皆稟燥降收之氣氣之薄者爲陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼是也以施於陰虛火動

之症猶當溽暑伊鬱之時而商飈颯然條動則炎歎如失矣與治暑熱用白虎湯同意然彼是外感爲有餘故用寒沉藏之藥而後能輔其福此是內傷爲不足但用燥降收之劑而已得其平矣予病時前方亦常用之頗爲相宜○又云虛勞之疾百脈空虛非粘膩之物填之不能實也精血枯涸非滋濕之物濡之不能潤也宜用人參黃芪地黃天麥門冬枸杞子五味子之屬煎膏另用青蒿以童

折肱漫錄

卷之一

三

心導樓

便熬膏及生地汁白蓮藕汁人乳汁薄荷汁隔湯煉過酌定多少并麋角膠霞天膏合和成劑每用數匙湯化服之按此膏補益之功甚大予病時常煎此服之頗得其力○大畧前言薏仁之屬治肺虛後言參芪地黃膏之類治腎虛昔時治吐血者皆言犀角地黃湯近世醫家亦多悟此症不宜以寒涼遏之治法稍稍異矣有言此病只須服六味丸者予亦常聞之至立齋兼用益

氣湯則先生之獨見而時師不敢措手者也人謂此症係血熱妄行但知求端於陰血而不知陰陽互為其根非兩截不相關者先生透明此理故每兼用六味丸及益氣湯以取効此症畢竟大吐者危於欬血者世醫皆言痰中咳血甚於吐血未必其然大都火盛欬頻而血多者方是危症若欬稀而血少此偶傷於熱或傷於酒而然但遵立齋法湯丸並進久常自愈不必視為重病而介介也

折肱漫錄 卷之一

三

心導樓

內傷發熱有陽虛陰虛之別王節齋云脉大而無力為陽虛脉數而無力為陰虛薛立齋云陽虛宜益氣湯八味丸陰虛宜六味丸陰陽兩虛宜十補丸總論二症雖有陰陽氣血之分實則皆因脾胃陽氣不足所致其發熱屬形氣俱虛故禁服知母黃栢恐復傷陽氣以致元氣下陷腹痞作瀉則不可救耳

立齋論勞嗽見血之症有勞傷元氣內火妄動而

傷肺者有勞傷腎水陰火上炎而傷肺者有因多服天門冬生地黃寒藥損傷脾胃不能生肺氣而不愈者有因誤用黃栢知母之類損傷陽氣不能生陰精而不愈者凡此皆脾肺虧損而腎水不足以致虛火上炎真臟為患也須用益氣湯補脾土而生肺金六味丸滋腎水而生陰精否則不救立齋云大凡病久氣虛血弱必致發熱須用四君子之類調補脾胃脾胃一健氣血自生若認為血

折肱漫錄 卷之一

三

心導樓

虛而用四物沉陰之劑徑生其血則脾土傷而諸臟皆病虛症蜂起反為難治甚至不救立齋云瓊玉膏固本丸坎離丸皆沉陰瀉火之劑非腸胃有燥熱者不宜服若足三陰虛發熱者久服之則大便不實飲食少思且兼陰痿無子蓋損其陽氣則陰血無所生故也

予少時患陰虛內熱久服六味丸甚効此丸性甚寬緩加首生河車一具其方便厚

天王補心丹氣味多寒而濕脾胃虛弱大腑滯泄者不宜服予服此藥即苦脾病蓋火旺脾健人宜服脾弱人患心血不足者止服龍眼膏

予里屠諭德公夫人患怔忡聞聲即驚怵服天王補心丹立効則知肝王人此丹原自宜服也

手少陰經不足之症亦要分氣虛血虛心血虛者必有火以天王補心丹之類補之心氣虛者神思恒怯須以人參黃芪之屬補之

折肱漫錄

卷之一

三

心導樓

春夏之交患頭疼足軟食少體熱之症名曰注夏蓋因三冬閉藏之際不遠女色及三夏為火土太旺金水衰涸之時不行獨宿淡味所致治用六味丸及益氣湯去升柴加麥門冬五味子或炮薑或肉桂

折肱漫錄卷之一

折肱漫錄卷之二

構李黃承昊履素撰

古吳程永培瘦樵校

醫藥篇二

遺精 接痺 感胃 鬱 瘧 雜治

夢遺之症其因不同治亦罕效此病患之者甚多非必盡因於色慾過度以致滑泄大半起於心腎不交凡人用心太過則火亢而上火亢則水不升而心腎不交矣士子讀書過勞功名心急者多有

折肱漫錄

卷之二

一

心導樓

此病其心一散則火降水升既濟而病將自愈凡病起於心大部非藥石之所能療先大夫少年極苦此病蓋用功過苦名心太急所致每臨場則愈頻陽事少着物即遺苦無可奈將牀席俱穿一大孔以臥使其無着是科發解武林居停邀其親戚女客飲喜酒相率觀解元公書室則牀席有大孔皆莫解其故以為笑談一自發解後夢泄便希及登第後則愈希矣予少年亦苦此迨登第後頓希

漸老愈減於是益信此病關心不可獨責於腎而心病非藥石所能療故治遺少良方也

不夢而遺謂之遺精予年三十二曾患之龜頭時有精微微流出晝夜常然予初時驚懼特甚人身中幾許精血而堪此涓涓不絕乎醫之高明者慰予無害但毋服滋藥予病以悞服附子得之知是火症勸予涼補而勿熱補仍服六味丸加沙苑蒺藜兔絲子及炒黃柏少許等藥將此病付之度外

折肱漫錄

卷之二

二

心導樓

莫實諸懷如常將理凡兩年而始全愈龍骨牡蠣等藥從未入口蓋人身中惟氣血周流斯快暢豈可澁之使滯雖得暫効胎害實深患者審之予初有懼心及兩年間應酬如常絕無倦態豈此精與交媾之元精不同故無大害耶

肌肉蠕動方書亦指爲風薛立齋獨主氣血虛熱不作風治此論高出等夷予向患指麻時亦見此症但補氣血不治其風故不受其害

予四十七歲忽患小指麻軟時作時止每夏愈而冬甚素聞指麻當防中風固講求預防之法有言宜祛風化痰者其說大謬有言宜順氣活血者謂氣行則痰自消血活則風自滅其言近是及讀薛氏醫案治蔣州判中滿吐痰頭暈指麻先生云中滿者脾氣虧損也痰盛者脾氣不能運也頭暈者脾氣不能升也指麻者脾氣不能周也遂以補中益氣湯加茯苓半夏以補脾土用八味地黃丸以

折肱漫錄

卷之二

三

心導樓

補土母而愈後惑於乾坤生意方云凡人手指麻軟三年後有中風之疾可服搜風天麻二九以預防之乃朝餌暮服以致大便不禁飲食不進而歿夫預防之理當養氣血節飲食戒七情遠幃幙可也若服前丸以預防適所以招風取中也予讀之快然遂確守先生之法益於今十有三年矣予既信服立齋之書又遇海昌名醫陳月坡診予指麻之症議與薛合將補中益氣湯加減令予作

丸服之醫家守古方皆謂湯不可丸丸不可湯獨
月坡以湯爲丸殊是創見予遵而服之其力大勝
於湯予病後弗能勝勞服前湯未効自服此丸遂
覺勞而不病然則古人所立湯丸之方亦不必守
膠柱之見也

立齋謂指麻是脾氣不能周真確論惟脾氣不周
又不加意調攝以致虛而愈虛故忽有中風之症
若認指因風而得麻而預餌祛風之藥以防之真

折肱漫錄

卷之二

四

心導樓

所謂招風取中矣蓋搜風等丸多戕賊脾胃之藥
斷不可輕服凡人脾氣不傷雖病可療若脾元一
敗盧扁却走乾坤生意等書悞人不淺故非明理
之儒醫書不可亂讀

凡臂痛指麻等症粗工無不以風治至於口斜語
澁痰湧更無不確信以爲風者薛立齋治法獨推
本於脾而必以補脾肺之藥奏效斯真元元本本
之論不可爲粗工道者

立齋治高僉憲兩腿痿軟無力勞則作痛如刺人
皆以爲風立齋曰此肝腎陰虛火盛所致痿軟者
眞病之形作痛者邪火之象用壯水益腎之藥而
愈前症往往認爲風輒用發散而促其死者多矣
予已酉夏應試南都與姊丈吳公甫聯社課執見
公甫步履微有不便云苦腿痛精神固無恙也聽
庸醫之言以爲風濕遂專服祛風燥濕之劑形容
日槁八月間見咯血之症肌肉盡削至冬而歿卽

折肱漫錄

卷之二

五

心導樓

此驗之則腿足酸疼不可槩作風治也蓋明矣腿
足皆足三陰部位多係肝腎陰虛法宜滋補顧反
服風藥以耗之寧不速其死

王節齋云凡中風偏枯麻木症之痰必用南星半
夏立齋云先用前藥清其痰卽用六君子之類扶
胃氣痰自不生若槩用風藥耗其陽氣而絕陰血
之源適足以成其風益其病耳

時師治人感冒不論形氣虛實輒忌人參不知古

人論虛人感冒不任發表者服補中益氣湯夫參且忌之而今服芪朮有不驚而咋舌者乎予初病外感憚不敢服參名醫朱心閣始教我助正疎邪不妨並劑及覽方書亦有觸發遂敢補散兼施頗覺相宜後至黃芪與防風並用亦未見壅閉外邪大槩醫家立論不同止有二說一則謂外感之候必須先散而後補停食之候必須先消而後補一則謂攻補可以兼行兩說每致枘鑿予初亦不能

折肱漫錄

卷之二

六

心導樓

無惑乃後屢以身試始悟氣體壯實者可以散之消之而後補若氣體虛弱之人必先扶其正而後可以攻其邪一補一攻邪氣乃去倘泥於先攻後補之言則邪氣未即去而元氣已先傷矣可不戒哉

凡人感風寒醫家必云不治邪將入內須及其在表而散之殊不知然予遇體中不快或時發熱未審是外感是勞傷將補藥表藥一槩停止惟避風

靜養禁葷啖粥以守之恒得漸愈蓋外感勞傷病形相似悞藥有大害即曾悞服紫蘇湯數口體便狼狽每至夜分後即自汗大費調理不可不慎外感肩背拘急勞傷亦然不可悞認其餘方書辨之甚詳

人感風寒兩背必覺拘束不快及服表散藥汗之而拘束猶故此榮衛傷而血氣不充故也若外邪猶未盡而再表之則受虛虛之禍矣

折肱漫錄

卷之二

七

心導樓

立齋云凡感冒咳嗽若悞行發汗過多喘促呼吸不利吐痰不止必患肺癰今人但遇傷風咳嗽即服疎散之劑請以此語為鑒

凡惡風寒流涕及寒噤噴嚏等症只宜茹素避風好自調理不可輕服散風之藥薛氏醫案中載悞服疎風藥致體麻痰壅狀類中風治以益氣湯加門冬五味而愈可不慎歟予賸理素虛自幼畏風風寒一襲涕嚏隨至甚則發熱汗津津不止少

時不知醫理謂必先散其風而後服參芪以實之
豈知愈散愈虛外感益易四十歲以後方悟此理
遂以補中益氣湯丸為常服之藥若值外感但在
服益氣湯而疎散之藥禁不入口茹素避風以守
之數日自愈而元氣不傷要知腠理疎豁之人即
感冒亦不可輕易發表慎之慎之

立齋論咳嗽云肺氣虛則腠理不密風邪易入治
法當解表兼實肺氣肺有火則腠理不閉風邪外

折肱漫錄

卷之二

八

心導樓

乘治法當解表兼清肺火邪退即止若數行解散
則重亡津液邪蘊而為肺疽肺痿矣

又云夏月尤當服六味丸壯水以鎮陽光

凡痰火症時師必禁用熱地以其賦也多用橘紅
貝母天花粉等藥以消痰及涼藥以降火常觀先
賢用六味丸稍加別藥以治痰而奏効蓋痰因火
動補其陰則火降而痰自消若專治其痰脾胃先
傷而痰終難治矣況又有腎虛而水泛為痰者尤

宜服六味丸予常患痰症不輟六味丸未見賦膈
助痰而屢以得効

立齋治痰每言腎虛水泛為痰法當補腎予壬申
秋咳嗽多痰自知因於色遵先生法恪服六味丸
更不治痰嗽月餘竟愈時師治痰最忌熱地以為
賦膈是烏知箇中妙理哉

歸脾湯治脾而開鬱逍遙散治肝而疎鬱治鬱此
為妙劑他藥恐耗散元氣宜慎用之

折肱漫錄

卷之二

九

心導樓

立齋云大凡久瘧乃屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血
虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒
熱交作或吐涎不食泄瀉腹痛手足厥冷寒戰如
慄若悞投以清脾截瘧二飲多致不起按山瘧久
不止者多成壞症想不遵此治法而醫藥亂投之
故予表兄沈鴻生孝廉精神素王自閩游歸患山
瘧幾一載元氣都耗後瘧雖止而面黑眼黃見者
驚異如是又二載卒以披脹亡先生指久瘧為元

氣虛寒信為確論

立齋截瘧法以參朮各一兩生薑四兩煨熟煎服
即止或以大劑補中益氣湯加煨薑尤効生薑一
味亦効

立齋治瘧與時師迥異時師大都用黃芩柴胡之
類謂必先散其邪而後用補劑予少時曾患此雖
不敢服清脾截瘧等藥而所服皆柴胡黃芩之劑
十四五伐方得止亦甚狼狽矣此病最忌生冷葷

折肱漫錄

卷之二

十

心導樓

腥使滋味澹泊邪氣自衰予病時守戒甚嚴瘧止
後茹素者半月饑極乃葷以是脾胃頓開飲食較
未病前倍增精神始王

立齋治好飲酒而致脾虛濕熱者用六君子加葛
根神麴山梔益葛根葛花能解散酒神麴能消酒
積山梔能瀉火然葛根葛花解肌疎腠理神麴伐
脾敗血山梔性寒體弱人亦宜審用王宇泰先生
準繩中載有飲酒發熱人治以補劑加乾葛猶不

禁其散而極言治酒病者無如枝矩子之妙此物
一名枳椇一名木密俗乎癩漢指頭北人名曰爛
瓜江南謂之白石樹杭州貨賣名密屈立詩所謂
南山有枸是也樹形似白楊其子着枝端如小指
長數寸屈曲相連春生秋熟經霜後取食如飴美
以此木作屋柱令一室之酒味皆淡薄趙以德治
酒人發熱用枝矩子而愈即此也又曰此物蘇州
亦有呼為密六曲嶽州最多呼為金鈎子九月有

折肱漫錄

卷之二

十一

心導樓

之予留意徧訪尚未得見也

立齋云凡傷酒泄瀉之症若濕熱壅滯當用葛花
解醒湯分清其濕濕既去而瀉未已須用六君子
加神麴實脾土化酒積此雖為酒而作實因脾土
虛弱不可專主濕熱

古方治目赤多用疏散寒涼之藥本體虛弱人不
宜服此予乙亥春患目竟不服藥俟其勢稍殺即
服四物湯加甘菊決明等養血之藥三七方愈雖

無速効而氣血不傷

予少時神氣不足患目每用目稍過輒酸澁無光者累日博攷方書多云六味地黃丸可治目予連服二三料目疾轉甚改服別方補腎養氣血之藥始得稍愈後讀醫學鈞元有目病不宜服六味丸辨謂澤瀉茯苓滲水山茱萸不宜於目言之甚詳以予驗之此論良是予從今思之目病有屬血虛亦有屬氣虛者予血固不足氣則尤虛薛立齋治

折肱漫錄

卷之二

三

心導樓

兩目緊澁不能瞻視以爲元氣下陷用補中益氣湯倍加參芪而愈予悔往時不多服前湯而專事於補腎養血以致久不痊治四十後以指麻多服前湯原無意於治目而目光漸充始信往時之悞予幼時患風弦爛眼甚受其累百藥罔効遇一陳姓醫士於長安邸授予白朮藥令敷於眼背患處隨敷隨愈取効如神不肯傳方予畧訪之云有吐蛔在內吐蛔者小兒口中吐出蛔虫收乾候用其

予想更有製就蘆甘石配之者真奇方也

立齋引東垣先生之言曰五臟六腑之精氣皆稟受於脾上貫於目脾者諸陰之首也目者血脈之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也主百脈皆榮於目若勞役過動勢乃妄行又因邪氣所并而損血脈故目病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標而不治

折肱漫錄

卷之二

三

心導樓

本是不明正理也若槩用辛涼苦寒之劑損傷真氣將促成內障矣

予中年患痔點洗都不効惟白蘿蔔煎湯頻洗差佳近讀瑯嬛集中載經霜冬瓜皮同朴硝煎洗翻花痔立愈又法以白蘿蔔代冬瓜亦效冬瓜未之試蘿蔔已驗矣

予座師茅五芝先生長公茅子京偶於醫間患一毒地非要害直易視之子京素知醫恐痛傷元氣

輒服人參其毒愈甚發寒熱乃始延醫又遇粗工
潰後猶應服參芪反不能多服竟致不能收口
而沒蓋癰疽初起先宜瀉毒而後議補若補之大
早遂有此禍可鑒也

凡臃腫結核等症世人多視爲外科之症而付之
瘍醫立齋以爲此屬腎水虧損肝火血燥筋攣法
當滋腎水生肝血用六味丸益氣湯治之其有胸
脇等處大如升斗或破而如菌如榴不問大小俱

折肱漫錄

卷之二

丙

心導樓

治以前法

立齋論癰疽乃脾經血燥當清肝火滋腎水不宜
令外科竟作癰治多成壞症

予年三十時醫一小瘤根細如線而頭如豆大
越十年而漸大如荔有妨跨馬予有鑒於决瘤之
說不敢醫常嘆曰吾年若六七十此瘤當如碗大
必妨行坐矣奈何既而嘆曰吾若得至六七十卽
礙行坐亦何妨遂安意養之及四十七歲時偶擦

傷痛皮水滲出不止予懼其成漏乃延潘慧峯商
之潘云欲去此瘤甚易欲塞此漏甚難瘤去則漏
自滿矣予不得已聽其治潘以藥塗瘤甚痛其肉
盡黑少頃血出津津予甚懼且悔不復求治但求
止血之藥越宿則黑肉已堅如石片數日脫去其
根尚存如豆水出仍不止予復商之潘潘云不去
其根漏仍不可塞也又以前藥點之痛甚肉黑如
初次日復點凡三次內服托裏散每劑用黃芪五

折肱漫錄

卷之二

壬

心導樓

錢凡旬日堅肉脫去則根已平仍服托裡散外用
長肌收口藥絕慾息勞以漸收滿肌肉完好予之
服藥守禁固勤且慎而潘君亦可謂妙手矣

予窗友賀立庵方伯常言其伯父賀岳精於醫刻
有醫經大旨曾治一孕婦將坐草患小便不通百
藥不効愈飲愈飽束手待斃賀君診之曰此乃脾
氣虛弱不能勝胞故胞下墜壓塞膀胱以致水道
不通大健其脾則胞舉而小便自通矣以白朮二

兩土炒加炒砂仁數錢別加一二輔佐之藥服一劑小便立通其神如此予常記此言于懷中壬寅歲予內人有妊臨月竟同此症醫藥無功危甚予以此法告於醫者喜醫者虛心如賀法治之立効遂舉長子寅錫予若不聞此言母子均殆矣

予家有女流患便癰兩拘腫痛不能起瘍醫用散毒藥十餘劑以圍藥逼之出膿腫痛愈甚予查薛立齋外科樞要此症皆因鬱怒傷肝得之治用加

折肱漫錄

卷之二

六

心導樓

味歸脾湯加味逍遙散間服遂遵而服之不三劑而腫痛減半六劑而起藥能中病神効有如此者予孫孟溥出痘起發貫漿俱如法惟回漿太早九朝左臂發一痘毒醫家通用清熱解毒之藥不四劑而寒戰咬牙之症作矣醫家泥於痘毒不敢用參朮止用歸芪而尚欲兼解毒予謂痘後氣血俱虛復以寒藥傷脾故見斯症陽氣已虛甚即有歸芪亦何能濟而況尙兼清解乎必無幸矣於是詳

攷立齋保嬰撮要寒戰咬牙門用十全大補湯即痘毒門初發時只用仙方活命飲一二劑旋用托裏散助其元氣則未成可消已成可潰設使氣血不充則不膿不潰難以收拾予於是斷以已意服十全湯三劑而寒戰止再敷劑而咬牙定乃延瘍醫妙手外治其毒內服參芪歸朮不輟凡匝月而全愈當寒戰症作臂腫方掀用藥頗多疑慮人參且不敢多用而況白朮至於桂更不敢用至三分

折肱漫錄

卷之二

七

心導樓

者予嘆曰予生平服立齋之書立齋不悞我豈獨悞此孩乎即悞寧悞於立齋遂決意用大劑參朮加桂至五六分不惟寒戰咬牙之症得痊而臂毒亦旋愈立齋之治幼科其妙亦如此

余媿申氏多鬱怒忽患不月腹漸大疑有妊醫者視之亦以爲妊也十餘月而弗產諸症動見乃始疑之醫者亦以爲畜血之症時有欲下之者衆議以爲體弱不能勝止可暗消於是久用行血調血

之藥而不敢用下血之藥竟弗效厥後醫藥雜投
 遂至不起余一日偶閱震澤紀聞載盛啟東汴東
 宮妃一案大為悔悼永樂中東宮妃張氏經不通
 者十閱月衆醫以為胎也而脹愈甚上命太醫院
 盛啟東診之一一如見妃喜甚及出而疏方皆破
 血之劑東宮大怒曰早晚望誕育而用此方其可
 乎寘之數日病益劇乃復召診啟東仍疏前方東
 宮用其藥而禁其人家家人惶怖以為不免越三日
 折肱漫錄 卷之二 六 心導樓

歸紅棍前呼賞賜甚盛蓋妃服藥下血數斗而疾
 平也予媳病正與此符當十月外既確知非姪即
 宜大膽下之當可得生惜醫家無此膽不亦傷乎
 予倩孫培之得胡與辰金鈎丸有一比邱患山瘡
 久不止與一丸服之減半再與一丸頓止蓋山瘡
 屬元氣虛寒金鈎丸能助陽氣故兩丸而竟愈也
 予家有庖丁王姓者生平多慾年四十患脚痛往
 針于茗上子謂此足三陰虛針無益也數年後患

痰喘胸中痛晝夜不能眠予謂此腎虛氣不歸源
 峻補其下則氣自降適名醫陳月坡來診其持論
 與予畧同奈病者服陳藥嫌其作悶別尋粗工治
 之大服降氣寬中之劑服後覺寬寬後復發病者
 尙以暫寬為効信服之以至于死良可嘆也大凡
 此等病服藥初覺悶久當漸寬漸愈愚者嫌悶而
 別求寬藥死者比比而是如脾虛者亦然初服未
 必作悶久則自寬破氣消導之藥服之覺寬久乃
 折肱漫錄 卷之二 元 心導樓

愈悶以至不可救病者不可不知

折肱漫錄卷之二

一第1072 折肱漫錄卷之二 4 頁五內

折肱漫錄卷之三

構李黃承吳履素撰

古吳程永培瘦樵校

醫藥篇三

品藥

人參固補氣亦能補血蓋補氣而血自生陰生於陽甘能生血也王節齋謂勞疾陰虛服人參過多者不治恐是一偏之論蓋節齋方論用參最少與時師動必用參者其弊相等惟肺受火邪實熱與折肱漫錄卷之三 一 心導樓

夫陰虛勞極而喘急者則忌用耳予幼時參價甚賤十五六歲時亦時服參憶一兩止價三錢耳後日漸騰貴不數年價即與銀等迨後價益高甚至三緩東事敗後參之騰湧無足怪前此何以頓貴耶蓋前此醫者多不敢輕用參每等於附子用者少故價賤後來服參如果無人不用且世俗日益奢參之價勢不得不日高乃世變使然亦可慨也乾地黃性寒而鮮地黃尤寒不宜單服恐傷脾胃

鮮地黃搗取自然汁不見水煎膏貯磁瓶經年不壞懷慶土疎而田多山泉故質大而味厚予曾陪巡懷慶用意覓大地黃不可得土人云上等地黃一出即為客人販往蘇州本地止存次等者諺云出處不如聚處信然

黃芪之功不下人參但性太綿密能閉腠理有邪者禁服不如人參之補而能宣耳然補益之功似出人參之上我郡岐黃家多不敢用芪惟恐悞補折肱漫錄卷之三 二 心導樓

邪氣王宇泰先生用芪最多予少病時因服芪不多終不能勝勞而汗症莫療四十歲後大服補中益氣湯計一歲服四五斤然後能勝勞而汗症漸減往時多服參而無濟後來兼服芪而始効予故駕其功于人參外科毒潰後用生芪補托予醫後生一瘤醫用藥點去幾成漏每日加芪五錢于諸藥內服之竟得收功

王節齋云藥之氣味不同如五味子之味厚故煎

垣方少者五六粒多者十數粒今世醫或用二三錢深以為非吾地時師悉遵此法獨王宇泰先生及繆慕臺用藥五味子甚多王先生治夢遺單煎五味子膏一味考元和紀用經五味子散止一味近來兒曹苦夢遺以五味子一味為丸服之良效又種子方以五味子肉蓯蓉各等分丸服則東垣之言似亦不必拘也

白芍藥為助脾瀉肝之要藥治瀉補脾方中多用折肱漫錄卷之三 三 心導樓

之薛立齋獨言有損於脾罕用此藥想以其性寒耶養生家審之

凡汗症人桔梗薄荷亦不宜輕服紫蘇人忽視之其發散更甚鮮者其力尤猛非真有感冒不可混食本草發明云若下元虛及怒氣上升不可服桔梗升麻

砂仁能下氣凡中氣虛人不可服

石菖蒲能通心氣養心丹中多用之然心氣不足

者少用以能散氣也

腎藏志故補腎藥中用遠志

菊花清香妙品又能益血祛風點茶釀酒俱快事同地黃釀酒能黑髮作枕治頭風明目葉亦明目香不減花人不多用之何耶

肉蓯蓉五味子各等分加蜜丸助陽種子友人言有奇効予未之試

澤瀉一味有醫多用之十劑而五者薛立齋每言折肱漫錄卷之三 四 心導樓

淡滲之藥不宜輕用惟泄瀉水火不分時暫用一二劑以分利既分即不可滲洩恐導損陽氣變成脹滿之症治者審之

大黃極不宜輕用因大黃妄下而致殞者予目中蓋屢見矣即痢之初起大槩宜早下然亦須審形症是強是弱而後斟酌用藥方書中原有老弱不可下之說慎勿可輕

仙茅助陽原非常用之藥有人極贊其功效予宦

南安攜十餘劬歸以遺友應大室方伯不受復予
東云此藥有毒能殺人予遂不敢以相遺尚容再
攷

附子信不宜輕用予少患下元氣虛悞服寒藥以
致夜半氣脫虛汗大洩不止飄飄似將絕者心中
惶懼煎參附湯服之用熟附至錢餘病雖少定而
火症大發旋患遺精兩載方愈近年曾因中氣悞
服尅伐之藥以致頓虛參朮芪等藥服之竟不應
折肱漫錄卷之三 五 心導樓

遂於補中益氣湯內加熟附子三分服一劑便覺
腰熱之病復發後患鼻衄左鼻管中時時有乾血
在內調養一年餘方得愈附子之氣烈乃爾若加
於地黃丸內則有柔養陰之藥和之便不覺其熱
矣

予常閱本草成都節度張益州進蒂簽丸表頌其
功用之妙不可殫述及闕繆慕臺本草經疏言凡
病人患麻痺骨節疼腰膝無力由於脾腎兩虛陰

血不足非因風濕所中而得者不宜服此予深服
其言蓋蒂簽之性輕揚而香治風治濕信有神功
斷非補益之藥若悞信而久服必損神氣

向讀本草贊蒂簽丸之妙久服可以輕身延年予
初患指麻人咸謂宜服此丸予以爲雖祛風而無
傷元氣制之與補劑兼服然心疑之天下無祛風
而不傷元氣之理友人徐顯甫在燕亦患指麻單
服前丸一月餘精神大減步履俱艱遂改服補藥
折肱漫錄卷之三 六 心導樓

一月餘步履始得如故乃知此藥亦是耗損元氣
之物本草之言未足信也
本草云人知蘭花之香不知蘭葉之妙散陳鬱之
氣治消渴利水道益氣生津潤膚逐痺如此妙藥
而人多棄之不用可惜也蘭乃幽蘭

忍冬花摘鮮者釀酒清香可愛此藥久服可免癱
疝等症香而有益不服亦愚矣
枳實性烈而速下有推墻倒壁之力若中氣不足

者雖兼補劑亦不可用方書極言松木丸之妙予服之閱月脾胃久傷終身受害慎之慎之

厚朴性亦猛厲虛弱之人宜審用本草言悞服脫人元氣予中氣素弱每因腹痛悞用少許即覺中氣衰憊無不立見有時加於六君子湯中亦覺大傷中氣要知此藥非純善之物即參朮同用亦不能勝也

藿香須自種乃真

折肱漫錄

卷之三

七

心導樓

吳茱萸辛熱氣猛下氣甚速要知茱萸醬雖快口亦不宜常服者

蘇合香甘溫而性走竄能散氣故蠟丸不宜輕服竹葉竹瀝皆取淡竹者為佳世多不辨混取雜竹而用之安能對症療疾又淡竹草開翠花者俗亦名淡竹葉鄉人不識藥性有妄認以為是者益謬矣

橘皮下氣脾虛人不宜常食予常於中氣虛時偶

服一二片即覺氣虛不堪以是知亦所宜忌

龍眼肉本草言其能補心脾功與人參並若患心血少以龍眼煎膏收貯任意酒飲之予少時思慮傷神後來每遇勞心輒覺心中枯燥幾有心火自焚之象服此膏屢効

山查消肉食亦疏肝氣亦去食積痰然有積滯者宜食無滯不可用棠毳大於山查其消食亦同每見人造查膏及查丁以為食用之供脾弱人不宜

折肱漫錄

卷之三

八

心導樓

混食傷脾予中氣素弱每傷肉食用六君子湯加山查煎服不覺其消有時而暢或胸中無食滯而悞服前劑即覺中氣頓虛乃知此藥亦非和緩之劑故參朮不能勝其消尅也

人陰毛中生蟲名八角子貼伏毛根最癢惱人相傳此蟲不醫延及頸髮眉毛其人當死治法以生銀杏搗爛敷合毛上隔宿其虱盡死予少年曾患此用此法神効有友為予言生此虱者運會將否

之兆予患此之後抱病十餘年備嘗苦楚其言果驗

胡麻最有補益古人稱爲仙人飯配別藥名胡麻丸又方獨製一味爲胡麻餅用紫色胡麻擇淨淘洗攤於蒸籠內以滾湯從上澆之此藥油最多蒸籠下如絲流掛久而不止俟掛盡上鍋蒸之蒸熟曬乾又如前法入蒸籠內以滾湯澆之又蒸又曬九度乃止牽搗爲末煉蜜爲餅饑時可以當飯用

折肱漫錄

卷之三

九

心導樓

酒下之頗香甜可食久服明目延年但苦油多不宜於溇泄者亦不宜以茶湯下之予游宦常攜此以充飢代飯

神麩能消麩穀等宿食人皆視爲和易之藥殊不知性亦尅伐能墜胎予常悞服中氣頓虛故知亦不宜輕用者

大麥芽能消食如神麩但能消腎水不宜多用吳中所造豆豉味美而不可入藥本草所載淡豆

豉出江西予宦湖西始嘗此味泰和產者良其味亦有韻可下酒粗人不識也

予家有僕婦患小便不通之症時師藥以九節湯腹漸滿而終不通幾殆矣有草澤醫人以白蘿蔔子炒香白湯吞下數錢小便立通此予親見之者薄荷性涼能散熱紫蘇性溫能散寒皆散氣之劑世人不識藥理暑月每點薄荷湯代茶紫蘇以作餅作蔬忽爲食物不知多食大損人氣

折肱漫錄

卷之三

一

心導樓

香薷乃散陽氣導真陰之劑真中暑方可用今人畏暑輒浸冷而快服之適所以招暑而取病耳若元氣素虛及房勞過度者尤不宜服立齋云人有患暑症沒而手足指甲或肢體青黯者皆不究其因不溫補其內而泛用香薷之類所悞也丹砂雄黃乃金石之藥非水飛極細者不可服用亦不宜多

元明粉性涼消痰予曾聽方士煉服亦未見效本

草發明云仙經雖備述其功浩大若臍腑虛寒脾胃氣弱不可服此為格言

六一散非盛暑中奔走極熱不宜服能損脾胃蓋此藥乃利竅滲濕熱之劑悞服之則愈耗津液矣
爐甘石煨過治風弦爛眼甚効

亂髮煨成血餘入藥最能補血胎髮更効

麋鹿是二物麋乃鹿之大者麋茸性熱補陽鹿茸性溫補陰麋角冬至解鹿角夏至解大有分辨今

折肱漫錄

卷之三

七

心導樓

人槩指為鹿茸鹿角而混用之何耶世上通行鹿膠不甚効須加毛角數枝方有力

鹿角膠人皆以透明者為佳殊不知毛角制就者其色黑暗品之優劣全不係明暗也聞善製此膠者將角入竹籃內置長流水中任其流滌候淨盡煎之則毫無渣滓照之色如琥珀可愛然渣滓滌盡血氣亦無存矣亦何益於治病徒為觀美則可耳

阿井之水相傳是濟水其色綠其性急而沉其體較他水頗重予曾至其井取試之蓋濟性清而下故阿膠能益肺降火膠必得烏驢皮煎者兼補腎臟斯為合法然世間阿膠皆雜驢皮所煎非親製不可得也

羚羊角相傳明日益肝予因目病服之殊無効

敗龜板取其白死者血肉盡滲甲中氣性全具故

佳耳予聞之王宇泰先生云龜性最戀軀殼故死

折肱漫錄

卷之三

七

心導樓

後其甲尚靈可占吉凶有人久服龜板腹中滋生小龜無數以此病死確有証驗故王先生用藥多不用龜板

鍊服紅鉛實為有益予之得延藉力於此非淺予行時病丹田氣怯不能言百藥不効遇一醫家以五炁丹授予纔兩三服即覺氣充能言其効如此是後自畜鼎器廣收紅鉛製服較之草根樹皮功真倍蓰烏衣巷蓋邇元之五炁丹名聞海內予曾

服之果効李鴻臚進光廟之丹予亦曾嘗有友張中吳以紅鉛製為一粒丹用乳調勻灌於鼻內男左女右以鼻孔向上仰承之名為進大藥密室中避風避勞或三七或二七日淡味將理斷慾百日果有奇効能回陽助元予曾兩試之

予生平亦甚得紫河車之力多乾河車不佳性熱動火取鮮者長流水洗去惡血其淡紅水不必盡去再用酒漉一遍瀝去酒入磁瓶封固重湯煮之

折肱漫錄

卷之三

三

心導樓

一晝夜熟爛為度配以藥末搗為丸如藥末多仍加蜜其藥方視人症候所宜大約入補陰藥中最合有人謂河車性熱有火人不宜服此說最悞人河車乃是補血補陰之物何常性熱但以其力重故似助火耳配藥緩服之何能助火 胞上紫筋有謂宜盡挑去者非是此乃自然之血筋非惡血比挑去則損功力 秋石入藥必須水鍊者佳古人取秋露鍊成故名

秋石今露不可多得惟以清水鍊之若火鍊者則精華已去徒存鹽質恐未必能補陰且鹽濕亦難以入藥古方所指秋石決指水鍊者而言

附子加于八味丸中有地黃等陰藥佐之便不覺其熱加于補中益氣湯中其性便熱予曾加三分服一劑鼻衄頓發數載受其患

古方用何首烏以赤白各等分用今以得何首烏一時難兼二種勉強成丸服之亦効近來吾鄉多

折肱漫錄

卷之三

四

心導樓

不可得大者若重二觔便為奇貨出山西者最大六七觔者甚多予宦于虔州覓此藥亦有重三四觔者但人言此藥出越中者良他地所產服之多不効予虔州所得以製七寶丹功力果遜人言或者其然

七寶丹古方服之甚有益加杜仲四兩名八珍丹人稱其更佳此藥若得大何首烏重三四觔者更得赤白相配恰合則功力當更有大焉

卷之三

折肱漫錄卷之四

橋李黃承吳履素撰

古吳程永培瘦樵校

養形篇上

人身中精氣雖分陰陽然真陰真陽原有互根之妙相生之理天下未有真陽固密而陰精不足之人亦未有陰精充滿而元陽不壯者但燥熱之陽乃能傷陰沉寒之陰乃能傷陽經固有少火壯火

折肱漫錄

卷之四

一

心導樓

之別則陰可類推矣至若飲食藥物之陰陽積寒積熱必能傷氣傷精又不可不慎陰陽均不可偏然凡人調攝則助陽必兼助陰陽辟則火也陰辟則油也火有氣有形而無質油則純以質用矣氣非形質則無所附麗厚其形質元氣乃充故如螢者此火燎原者亦此火火原無衰旺因所附以爲衰旺吾人日用飲食總是補之以味總是補其精精補則氣自足若舍形下之器別無形上之道

補虛助弱用藥槩須溫和久服自能奏功乃無留害如知母黃柏之屬太寒傷氣桂附之屬太熱傷精卽有陰虛勞瘵亦宜投以清和之劑若折以苦寒火未必退脾家元氣先傷卽有陽虛怯弱亦宜佐以溫養之方若助以辛熱少火未生壯火先灼養生者慎之

人身如天地和煦則春慘鬱則秋春氣融融故能生物秋氣肅肅故能殺物明乎生殺之機者可與折肱漫錄

卷之四

二

心導樓

論養生

心爲一身之宰脾爲萬物之母養心養脾攝生最要

王節齋云涼風寒露霧濕氣體弱者常須避之汗出及脫衣去襪之時莫當風取涼最易感冒惱怒尤忌之酒後亦忌當風取涼脫巾襪後使用手多磨擦令毛竅閉爲妙法子生平確守此忌蓋氣血本虛之人又以不慎招外邪再傷其氣血大非所

一冊 1028 冊 續修四庫全書 3 卷之四

宜耳

子病時俗人相慰云常病大仙子時笑以為迂後見強壯者忽登鬼錄而多病者或得綿延始信恒言却有至理蓋無病者以有所恃而縱恣常病者以有所懼而冰兢故得失相反如此子當年筮病得否之九五曰其亡其亡繫于苞桑意正與此合慎之時義大矣哉

頰浴亦非病者所宜能耗元氣

折肱漫錄

卷之四

三

心導樓

子生平有滿奮之畏然有時衝風行路雖大風不感有時坐臥間居偶微風竟病子深維其故蓋行路時精神勇往向前我氣勝故風不能入坐臥時精神懶散則腠理疎故風得襲之耳風中尤不可睡睡即腠理開邪最易入也

子中氣為誤藥所傷遂覺虛弱不能耐饑丁巳歲隨同邑卿大夫謁上臺談三邑田糧事日肝不了子受饑一時中氣虛怯倦怠自汗服補中益氣湯

數十劑中氣方稍稍復然自此益不能耐饑子每出必以乾糧從而對客多不便食子乃製補脾藥為大丸日攜之囊中偶值饑不得食即服數丸腹便果然子歷宦途幾二十載而脾胃不受病者賴此藥之功

體弱人每事當知所節節慾節勞節飲食此其大要子瞻云傷生之事非一而好色者必死人當好色情濃時特提死之一字敵之可得衰減凡用心

折肱漫錄

卷之四

四

心導樓

用力及用目用耳一切事稍覺其勞即便却去以節省之稍息再勞庶不至受病若待病而後調之費力多而取效難矣失饑傷飽脾胃乃傷養生家有言未饑先食稍飽即止此是保脾胃良法然世途中人安能如此愜適但常存此心便不至於大饑大飽以傷天和矣

醉之為害不可勝言其於節慾更須戒醉醉後最易犯慾內經言醉以入房養生大忌能致百病蓋

醉裏乾坤另一光景生平謹凜頃刻恣睢尊生一念遂置度外故攝養家切忌縱飲

凡人患膿癩疔子雖曰濕曰熱曰氣血不和畢竟還是氣血有餘故少年人多患此予弱冠前亦然及病以後永無此患想血氣不旺之故也至若癰疽之毒則有所以致之有因心懷鬱結者有因好飲火酒喜炙燻者有因陰血枯涸者不可不慎其因昔王損庵先生曾對予言人參養榮湯若人終

折肱漫錄

卷之四

五

心導樓

身服之可永免癰疽之患蓋以能調和氣血也忍冬藤時時釀酒服之亦可以解此

古人言毋以脾胃熱冷物毋以脾胃軟硬物毋以脾胃熟生物可謂至言

暑月勞役於暑中及炎房逼淺受暑而病者名中暑暍其避暑納涼於深林大廈之間而病者名中暑攝養家於三伏之候但居於寬敞稍涼之處使不至中暍即已切不可因熱貪涼處於陰寒之地以

為快暑中勞役非人情所樂此必出於不得已然名利與此身亦須稍分輕重至於遇涼招疾乃所自取於人何尤

四時偶遇怪風切須謹避內經所言厲風殆謂此內經論風之為害獨詳要知避風亦是攝養家要事古云避風如避箭避色如避仇真藥石之言也風固宜防露尤須避風屬陽露屬陰陰氣中人最易得疾故夏月不宜久坐露下納涼秋來多致患

折肱漫錄

卷之四

六

心導樓

瘧每日將昏時即有露氣其氣能直透房櫳故夜臥須閉窗而後睡次日體自舒健

諺云早飯要蚤中飯要飽夜飯要少語語皆格論空腹莫多言最能傷氣中午必須飯飯必滿量而止則神氣自旺晚餐微酣不可過醉亦不可過飽自然神清氣爽

予少年血氣不足十日九病自慮不能老幸延殘喘以迄於今中丞給諫兩兄生平精神大王竟年

不滿六旬蓋予以病萬分加意保攝所以得全其
生兩兄役役世法中藥餌調攝不知爲何事以有
所恃而促其算子病原因於色後來極其節慾騰
理虛不禁風坐臥必於屏風處不敢肆覺饑卽食
覺寒卽衣覺煖卽減覺勞卽息不敢強力以作生
平藥餌無一日輟初未知醫藥頗有誤後識岐黃
妙理大得其益居官甚有碍於調攝上鑒兩兄皆
以勞心政務得疾而殞故未老卽掛冠予之重養
折肱漫錄 卷之四 七 心導樓

生也蓋如此
晉侯求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可爲也
是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志公曰女
不可近乎對曰節之而引樂以爲喻謂五降之後
不容彈矣於是乎有煩手淫聲滔堙心耳物亦如
之至於煩乃舍也已無以生疾又以六淫配六疾
曰陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫
惑疾明淫心疾女陽物而晦時淫則生內熱惑蠱

之疾今君不節不時能無及此要知女色不能絕
必須節之淫則犯兩疾人皆知女爲陰不知其外
陰而內陽元門亦有取坎填離之說故好色最能
傷陰以其熱也凡人獨宿書齋自有一種清明之
氣日與婦人作緣便覺志意昏憤故謂之惑疾子
產聘晉問疾叔向問焉子產謂君子有四時朝以
聽政晝以訪問夕以修令夜以安身於是乎節宣
其氣勿使有所壅閉湫底以露其體今無乃壹之

折肱漫錄 卷之四

人

心導樓

則生疾矣蓋壹與節相反壹則耽於女色而聽政
訪問諸務俱廢安得無疾然則吾人應酬交際小
勞其身不能以了世法亦所以節宣其氣而養生
調性之道也無論一於好內者之必生疾卽一於
安逸者恐亦非保身之道耳古人之言不可不省
清淨家尊老氏守中之說大都心息相依以神御
氣而守之之處言人人殊有主臍下一寸三分者
有主臍上一寸三分者有主臍內一寸三分者有

主性門腦頂者有主極陰毛際上空穴者總不如
臍上一寸三分之說爲正此是中宮心腎交通處
試一凝神其際便覺渾身和煖此其驗也中州武
弁越効忠年已七十精神強王提戈上陣猶同少
年傳予一法則守眉心此從來無人道及者每凝
神其際卽覺滿口津生此亦可異則此法或秘傳
也此君與流賊戰歿可惜

彼家之術有損無益除非鍊習其心如所云枯木

折肱漫錄

卷之四

元

心學要

倚寒巖三冬無煖氣然後可至此地位豈凡夫所
可到而顧浪言採藥哉色心一動金水暗消非徒
無益而又害之此病家所宜切戒者也

丙申歲有一老人到禾自稱一百二十餘歲卽昔
之王鉞先大夫邀往碩寬堂者累月其人狀貌雄
偉乃白社日所生皮紅髮白果似高年形像叩之
亦無他秘訣惟有撈龜之法未必果佳又極贊茯
神香附二味丸方爲延年之藥此方本草綱目中

載之又每戒人勿坐冷石蔥有兩丫者勿食啖飯
以白米爲佳

王聖俞會心言有云伐天和以成就世事辟猶割
肉飾俎刺血染裳然究竟成就亦歸虛幻徒自伐
其天和而已語有之寧可疎慵乖物議莫將性命
當人情此二言可書座右

幽靜之趣最宜於山居然孱弱之軀卽山居亦有
不宜處山中多嵐濕雲霧之氣久處能傷脾氣子

折肱漫錄

卷之四

一

心學要

宦延平署在山麓是春患脾泄小便黃澁之症胸
膈不舒飲食頓減近年借隱茗上之妙喜亦在山
麓所患復如是俱服入味丸補中益氣湯間服清
暑益氣湯而痊若多服分利之劑則誤矣

人身中惟心腎不交百病生焉造化至春天氣下
降地氣上升是成三陽泰卦而萬物萌生人若心
火太炎則天氣不降矣腎氣不盛則地氣不升矣
是爲否象精氣何從生心君火也火性炎上故念

一起卽火炎念若滅卽火息吾人有一時無念者乎此火所以日炎而水所以日涸也若常常止念靜觀則心氣自降心氣常降則腎氣自漸升而還泰象矣朱大復先生教人心常放下目亦常向下上者降則下者自升亦交心腎之法也臍之內兩腎之中有一竅名命門穴乃生氣之源吾人生身立命之蒂也常冥心內照使心常在腎此亦交心腎之法也

折肱漫錄

卷之四

二

心導樓

每見卯中雛最初生目而後有首以及于身目雖竅於肝而瞳原屬腎此天一生水之義也人之機神盡在目故目疾犯色光乃不復此立竿見影不可不慎

古人分一身之氣爲三焦子親驗之而信子初患下氣虛覺丹田無物者然繼患中氣虛覺中宮無物者然或有時中虛而下否有時下虛而中否有時服消導破氣之藥則中氣頓陷於下覺中虛而

下反實乃知氣有分屬固如斯其有界限也酒色同爲伐性斧斤戒色固難戒酒尤不易子葆甚嚴却遠帷幙動經歲時獨是斜陽掛樹暝色入窓思歡伯甚亟非此便覺無聊乃知遠色尤易斷酒極難郭子云三日不飲酒覺形神不復和若能少飲養血壯氣未嘗不益人其如相知晤對舉盞忘懷有不酩酊不休者可奈何子生平頗善攝生獨苦不能戒酒

折肱漫錄

卷之四

三

心導樓

人設醴以誘猩猩猩猩明知而故犯人笑其愚吾儕亦明知過飲傷人而每至酩酊而不覺其異於猩猩者幾何子竊見多飲酒而少食穀者往往不壽尤非所宜

凡人形體壯偉不慎酒色多有卒中之症而每得之於勞怒蓋勞則元氣頓虛而虛火暴熾怒則肝木經云歲木太過風氣流行風木一類故怒則肝火熾而風卽隨之也又憂懼亦能致此病子姪中

錫在燕適值戒嚴憂惶兼以多愁竟卒中而亡年止四十七耳予患指麻時彼亦患指麻皆以此病為憂予以慎疾得延彼以不慎不免耳

鬱怒傷肝尤甚蓋鬱則火內遏肝血燥而大風發多致卒中之症故廣識平情養生要務

丹溪先生云腎主閉藏肝主疎泄二藏俱有相火而其系上屬於心心為君火為物所感則易於動心動則相火翕然而隨雖不交合其精亦暗耗矣

折肱漫錄

卷之四

三

心導樓

故童子未室亦有腎虛之症又精血篇云男子精未滿而御女以通其精則五臟有不滿之處異日有難狀之疾治法亦兼用益氣湯六味丸二藥為童子者何不安心靜守數年以儲一生受用而甘虛喪此先天一元真炁耶亦愚甚矣

養生者貴開發其生機生機一發則源源不窮此謂濬於不涸之府生機有二使此心常自怡適而不以憂鬱窒其生機一也助養脾土以滋化源則

四藏都有生氣二也若不知此機括雖日服補益良劑所補曾幾何

丹溪先生云天地以五行更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月屬巳五月屬午為火大旺火為肺金之夫火旺則金衰六月屬未土大旺土為水之夫土旺則水衰況腎水常藉肺金為母以補其不足古人於夏月必獨宿而淡味保養金水二臟經曰冬藏精者春不病溫十月屬

折肱漫錄

卷之四

四

心導樓

亥十一月屬子正火氣潛藏之候必養其本然之真而為來春發生之本若於此時不恣欲以自殘至春升之際根本壯實何病之可言哉要知冬夏二季壯年以寡慾老年宜絕慾斯為攝生之道內經云腎有久病者可寅時面向南淨神不亂思閉氣不息七遍以引頸嚙氣順之如嚙甚硬物如此七遍後餌舌下津納氣自是元門要領後世千門百竅總不能出此範圍

內經云暑當與汗皆出勿止又云夏月汗不出者
秋成風瘧要知盛暑汗出乃時令使然非泄氣散
液之比常於暑月夜臥閉窗汗出淋漓次日反健
若臥於涼處次日必倦卽此可知故盛暑避於陰
涼之地雖一時快意必至成疾雖然若奔趨名利
酷暑襍穢以致大汗不止者其泄氣傷生又不可
同日道矣

折肱漫錄

卷之四

五

心導樓

折肱漫錄卷之四

折肱漫錄卷之五

樵李黃承吳履素撰

古吳程永培瘦樵校

養形篇下

飲食但取益人毋求爽口本草須常考訂毋食病
體相妨之物子脾胃素弱平生不多食生冷瓜果
雖佳品在列未嘗染頤油膩炙燂亦不敢食一切
難消之物俱兢兢慎之故能保此殘喘縱口腹之

折肱漫錄

卷之五

一

心導樓

欲而不自惜其身不可謂智

凡炙燂煎炒病家最忌助火銷陰損人不淺卽平
人亦不宜食腫毒牙疼諸症半因於是

北方人以麵爲命食麵方飽而有力食米卽弱則
麵乃大補益人之穀但本草言其擁熱少動風氣
則亦不宜多食者至若南方麵更爲助濕所宜禁
食者也

北方蕙酒原非蕙釀皆以黍米爲之黍氣薄味清

初飲似清冽然味薄易醒不至如南酒之動火生痰也

酒能少飲益人甚多一遇飲至醉則傷人不淺多少之間損益霄壤

河豚魚最發病攝養家尤不宜食

酒與茶雜飲能致酒積予見人多雜飲獨予守戒

甚嚴北人稟厚與南人大不同常見北人於暑月

以冰為命飲之自謂有益冰果茶酒相兼雜下而

折肱漫錄 卷之五 二 心導樓

脾胃不傷南人寓北者罕見有此

牛乳同酒飲此常事耳薛立齋云酒不可與乳同

飲豈指人乳言耶然兩者同飲亦往往見之想不

知應忌耳

予每遇冬月常以熱酒飲乳酪已酉在南都有方

士令予以牛乳下丸藥原不言與酒同飲予不耐

羶氣急呼酒飲之乳下喉未全到胃遇酒即凝膈

上遂苦痞悶有妨飲食消導俱無効大是可憂予

精思之此乃乳滓質凝於胸前而不化酥者乳之精華取酥與消導藥同飲當得去此碍膈之物遂如法治之果一服即消物理相制之妙如此

人皆指西瓜能辟暑生冷中不甚忌之殊不知暑

中奔走後覺胸中熱氣填塞浸冷食之信可辟暑

若晏坐高堂日以為常供則有損脾胃秋來瘧痢

當防

生薑秋不宜食洩氣損壽元蓋秋味辛辛乃秋之

折肱漫錄 卷之五 三 心導樓

本味故忌之

枸杞葉作茶啜治消渴強陰解麵毒何不以代茶

桑椹曬乾蜜丸服開關利竅通血脉安神魄聰耳

明目又絞汁熬稀膏蜜調服能去火毒解金石燥

熱止消渴本草著其功效如此人何不多取而服

之耶採桑條作寸斷炒黃色煎湯可以代茶最益

人

五加皮本草原言取皮用今人多摘其芽此未可

解

胡椒大熱本草言多服損肺走氣又能發癰疽大損陰氣所當痛戒

飲茶宜熱冷則聚痰多飲則少睡久服則消脂茶味最清香令人嗜飲然虛弱人止宜候渴而飲適可而止若亦欲慕清客之名勉強飲啜所損脾胃不小序云釋滯消壅一日之利暫佳損氣侵精終身之累斯大此可謂嗜茶者之戒

折肱漫錄

卷之五

四

心導樓

橙皮多食傷肝氣不宜與猪肉同食發頭旋惡心蓮子生食微動氣乾食作悶鮮蓮亦不宜多食終是生冷惟煮食養神子時食此不輟和米煮粥禁精泄清心治腰痛止痢磨作飯令肢體強健生食須去心否則恐成霍亂

藕煮食最益人同蜜食令人腹臃肥不生諸虫秋間予以此作蔬下酒

菱性冷不可多食煮食則不冷然作悶不益人本

草言冷臙損陽氣痿陰飲熱酒可解熱食作悶亦用酒消

栗能益腎然生食發氣熟食滯氣惟風乾者佳枇杷能潤五臟然多食發熱生痰

甘蔗其酒食發痰亦傷脾

沙糖與鯽魚同食成疔虫與葵菜同食生流癖與笋同食不消成血瘕

龍眼肉本草言其補益心脾功與人參並聞華亭

折肱漫錄

卷之五

五

心導樓

陸平泉宗伯年幾及百平日常食龍眼不輟口予少年多食此果老來食之齒輒痛以是不能食但常服龍眼膏

柿不可與蟹同食此人所知也本草言紅柿忌與醇酒飲易醉人且患心痛至死席間常設紅柿易於同酒飲此不可不知

乾柿氣平不寒食之無害

石榴味酸性滯能戀膈成痰不宜食

胡桃甘溫能補然動風痰助腎火

白菓多食動風作痰小兒食之發驚本草言如食

一千令人少亡此菓儘可不食

楊梅性雖熱亦有消食下酒之功

榛子大有益宜食

梨性流利下行雖能消痰止嗽多啖令人寒中血

虛與脾虛者忌食

丹溪云飴糖大發濕中之熱以其甘能滋濕濕以

折肱漫錄

卷之五

六

心導樓

助熱也

本草云麻油煎煉餅食與火無異齒痛及脾疾人

切不可食

世人皆言糯米補人考之本草云主溫中令人多

熱久食令人身軟發心悸又云多食令人多睡發

風動氣則不如粳米多矣

大豆性本平炒食則熱作豉則冷作腐則寒而動

氣煮汁則涼而解熱毒

黑小豆即俗名馬料豆最益人

赤豆利水逐精久服虛人

菜豆肉平而皮寒脾弱人亦不相宜花能解酒

蠶豆雖發氣而能調榮衛

醋切忌與蛤同食

白萊菔大能下氣耗血消食較之藥物更迅厲中

氣虛者切不可食予常受其害煮食又多停膈間

成溢飲之症總非佳品其子更甚有推墻倒壁之

折肱漫錄

卷之五

七

心導樓

功

葱白通陽發散更勝於他藥氣虛人勿服予常受

其害能令頭汗津津不止且動火不可輕用

韭大益人五月勿食與牛肉同煮食生寸白虫同

蜜糖食殺人此易犯者謹識之

胡蒜生嗽傷肝氣損目久食傷脾肺引痰養生者

節慎之

茄子性冷多食損人白茄蒂與何首烏陰乾白茄

蒂七枚何首烏各等分煎服治對口瘡

芹菜養精益氣保血脈令人肥健嗜食常用最佳
蓴菜性冷而滑不可多食不可與醋同噉令人骨
痿瘟疫病後食之多死

經霜冬瓜皮同皮稍煎湯洗痔極效如無冬瓜白
萊菔代之此予所親試而效者

井華水平旦時未曾打動第一汲者與諸水異其
功廣補陰虛清頭目蓋天一真氣浮結水面而未

折肱漫錄

卷之五

八

心導樓

開以造酒醋亦不壞

秋露水清金降火子曾取以釀酒其鮮甘之味難
以名狀

脾弱人宜飲河水得土氣乃佳不宜久飲山泉氣
寒傷脾

人乳雖養血妙品然滑腸脾弱人亦不宜多服
牛乳以熱酒點服味甚佳有言其補益者有言其
助痰者想少飲則益多則助痰理或然也

羊肉補益之功至于黃芪同然性易凝結脾弱人

真火衰微薰蒸力少難於消化不食為穩著

犬肉助火興陽陰虛火動者不宜食其肉較豕頗
覺難化不宜炙食令人渴同蒜食損人

猪肉性熱助火生痰不宜多食小兒尤宜戒之

猪腰子性冷久食令人少子冬月不可食損真氣
兼發虛壅

兔肉不可多食傷元氣絕血脈損房事不可同薑

折肱漫錄

卷之五

九

心導樓

橘食不可同白鷄肉食兔死合眼者勿食二月食
之傷神

鹿肉多食能動人癩疾

食戒云鷄具五色者食之致狂六指元鷄白頭家
鷄及鷄死爪不伸者凡鷄無故暴死者食之並傷

人合水鷄食作遁尸和魚汁食成心瘕又不可合
胡蒜及李子食不可合大肝腎食不可合芥菜蒸
食有風疾者不可食雉鷄

雞子和葱食短氣同鱉食損人

雉久食令人瘦發痼疾不可合胡桃蕎麥香蓋木

耳等食自死爪不伸者食之殺人春夏不宜食丙

午日勿食此禽益少損多食者慎之

綠頭鴨白眼者食之殺人忌與鱉肉同食

鴨卵滯氣灰食即無妨

野鴨不可與木耳胡桃豆豉同食

鶩能動濕疸病與水腫忌食俗云能動風鶩子雖

折肱漫錄

卷之五

十

心導樓

補中益氣勿多食

麻雀不可和李子食亦忌與醬食

鴿肉能減藥力服藥人不可食

七月不宜食生蜜恐暴霍亂

多食蜆發嗽冷氣消腎

鱉肉合烏雞食成痼合雞子食殺人合莧食生瘰

合芥子食發惡疾三足者赤足者腹下有十字王

字五字形者頭足不縮者目凹陷者腹下紅有蛇

綫者及生旱地者俱有毒不可食中其毒者藍汁

可解

蟹性冷傷脾胃多食發風疾未經霜者有毒足斑

目赤獨螯獨目或兩目相向腹下有毛腹中有骨

六足四足者並有毒不可食中其毒者豉蒜冬瓜

黑豆紫蘇煎飲並可解

蟛蜞傷脾不宜食

蟛音越

淡菜雖益人然多食亦令人目闇頭悶

折肱漫錄

卷之五

十一

心導樓

鯽魚雖益人然多食亦能動火忌與猪肉同食又

忌犯天門冬同芥菜食成水腫同沙糖食成疔虫

忌同猪肝雞肉食二三月忌食頭

天行病後忌食鯉又忌食鯉再犯即死有宿瘕者

勿食鯉亦忌天門冬治鯉須去黑血及脊上兩筋

有毒誤中者浮萍可解鯉魚子不可同猪脾食鯉

魚鮮不可同豆藿食

有瘡者忌食黑魚令人白癩

患疳痢者不可食魴魚

鱒性大溫多食令人霍亂亦動風氣

青魚忌與葵藿葫荇同食亦忌蒼朮

鱸魚不可與乳酪同食

鰻鱺水行昂頭者有毒

蝦不宜多食發瘡動風又一種無鬚蝦及煮色白

腹下通黑者並有毒作鮮能毒人

食餽飽過飽飲餽飽原汁卽消食一切肉過飽飲

折肱漫錄

卷之五

三

心導樓

熟食店中所儲原汁亦可消葢店中所儲之汁以

之煮肉一滾卽爛故店家珍重此汁而藏之以此

消肉有至理焉凡食某物過多停滯者卽燒此物

成灰存性服之卽消有人食乾柿過多欲死食以

柿霜卽愈市上索粉中多雜以小粉食此過傷者

飲以黃漿立消予向以酥消牛乳之停總此一理

耳

申元渚司馬云吳中何公良俊之父年百歲餘問

以服食調養之法何云別無他法惟每辰食糯米

團子而已世俗多言糯米補益人攷之本草又言

其性熱不可多食久食是未可解

曾覽高氏尊生八牋註萱草花苗皆可作蔬食干

葉者食之殺人予向戒不食後見北路所種多干

葉者心疑之子家園中有千葉花人多采食之絕

無恙予因諦審之此花地瘦卽單葉地肥卽變干

葉原非兩種高氏之言蓋承訛非親試也

折肱漫錄

卷之五

三

心導樓

折肱漫錄卷之五

折肱漫錄卷之六

構李黃承昊履素撰

古吳程永培瘦樵校

續養形篇上

五穀皆補養脾氣之物一煨成灰反能消食者何蓋火能軟堅化物燼從火化故也諸灰能消食亦能傷脾功用不減于山查神麩不可忽之以為食物而多服常服也

折肱漫錄

卷之六

一

心導樓

予半百時微有怔忡之意若犯房室則是早怔忡特甚即不犯房而不遠女色或其寢未免動火則亦微覺怔忡但不甚耳如獨宿則泰然自六旬絕慾以來此病遂愈即勞心亦不發要知心腎一脉相通怔忡之症未可專求之心也
已卯冬仲予患沿爪出水而癢有友教予頻以重石壓之壓出血水多多許即愈不復作膿作痛其効亦神矣

粵東陳探花諱子壯者專服黑小豆初一日服一粒初二加一粒以後漸加至十五粒至十六日則減一粒以漸而減至次月朔又服一粒起如是循環無窮用白湯生吞下不為末久久大得益補腎烏鬚髮大有奇効

泉州黃宗伯諱汝良者年九十餘猶然精神不衰飲噉如故平日服補中益氣湯還少丹二藥故是佳品宜其得力還少丹與打老兒丸相同止少續

折肱漫錄

卷之六

二

心導樓

斷一味

予同年朱司寇廣原第二子諱茂昭字子藻者少年時眉絕少有風鑑相之云如此好眼若有眉稱之必得駿發子藻每從人求長眉之法有一方士自言有藥但服數厘眉即生矣遂進末子藥六七厘戒以服藥後切須避風服之夕即有汗偶值有賊至乃出庭除及歸寢大汗不能止綿被俱濕透幾至亡陽遂大憊自後服人參數十筋補藥無等

閉戶調理十餘年始得復元後亦不壽藥之不可輕服也如此或云此藥是開揚花未知是否方士已遁莫可問也

寢臥不得多言笑譬五臟如鐘磬不懸則不可發聲以下出昨非齋日纂

養性之士睡不至遠行不疾步耳不極聽目不極視坐不久處立不至疲先寒而衣先熱而解先飢而食先渴而飲不欲甚勞不欲甚佚不欲多啖生

折肱漫錄

卷之六

三

心導樓

冷不欲飲酒當風不欲數數沐浴不欲規造異巧冬不欲極溫夏不欲極涼大寒大熱大風大霧皆不欲冒之五味不欲偏多酸多傷脾苦多傷肺辛多傷肝鹹多傷心甘多傷腎此五行生尅自然之理也

太素丹景經曰一百之上常欲得兩手摩之使熱高下隨形皆使極匝令人面有光澤皺班不生行之五年色如少女先當摩切兩掌令熱然後以拭

兩目又順手摩髮如理櫛之狀兩臂亦更互以手摩之使髮不自脉不浮

續養形篇下

蠣黃肉本草載甘溫煮食治虛損調中治丹毒酒後煩熱止渴炙食甚美令人細肌膚美顏色海錯大約多損脾獨此補益且其味亦冠海錯予於閩中備嘗海產無如此味之佳但煮食腥氣不堪必以厚味先煎後煮乃佳耳炙者罕見惟於泉州有

折肱漫錄

卷之六

四

心導樓

一友見餉乾者其味果佳大勝淡菜粵東亦有此頗大而味不佳

水蘄卽芹菜本草載甘平養精保血脉益氣令人肥健嗜食本草中佳品也但生於水田中者多有螞蟻匿其中難于選擇不可輕食本草又云水芹生黑滑地食之不如高田者宜人名白芹餘田者皆有蟲子在葉間視之不見食之令人爲患石耳生於石上故名本草載甘平久食益色至老

不改令人不饑又云明目益精作茹勝木耳蓋佳品也此品入素蔬平平耳以之煮肉則味絕佳予于九江時食之蓋產自廬山者

絲瓜之性世俗相傳以為至寒食之敗陽及考本草綱目則云甘平又載生生編指為煖胃助陽抑何相反之甚也竊觀本草載此瓜除熱利腸去風化痰涼血解毒治痔漏下血等症又載其通經絡行血脈則知此瓜應是甘涼之氣味若曰助陽則

折肱漫錄 卷之六 五 心導樓

何以涼血解毒若曰性冷冷則凝又何以通經行脈確然甘涼啖之無損

冬瓜俗傳為煖肚之物考之本草甘微寒大能散熱毒利小便則非煖腹可知

黑小豆本草所不載止載大豆及綱目註何首烏有用黑小豆蒸曝之語世傳黑小豆方藥功用甚盛不知本草何以獨遺惟食物本草載一種黑小豆最佳陶節菴以此豆入鹽煮熟時常食之謂能

補腎要知此豆功川更勝大豆也又皇甫本草發明載黑小豆即藿豆本經只言黑豆小者入藥並無馬料豆藿豆之名蓋即此豆是也此豆北方最多以之喂馬故名馬料豆販此至者只至常州而止並無粒豆到三吳覓之苦不可得是不可解往時吳中少馬故此豆不來今大亂之後北馬在三吳武林者甚多而此豆終不至更不可解

折肱漫錄 卷之六 六 心導樓

食粳米以晚白米為上以其性涼益人李時珍曰六七月收者為早粳止可充食八九月收者為遲粳十月收者為晚粳北方氣寒粳性多涼八九月收者即可入藥南方氣熱粳性多溫惟十月晚稻氣涼乃可入藥遲粳晚粳得金氣多故色白能入肺而解熱也早粳得土氣多但益脾胃

丈人責子路五穀不分吾輩自思之吾亦不能分晰確然也稱黍稷麥菽為五穀見於朱註矣其所稱粟與粟又是何物考諸本草各家之說紛然總

非確論惟綱目李時珍所訂庶幾近是然以稻獨指爲糯米竊以爲未然稻是大米之總稱爲粳爲糯爲粳總皆稻之類也而粳有早中晚水旱之殊糯與粳有赤白水旱之別或有芒或無芒據鄉人分別不下一二十種總以稻冠之可也黍與稷是小米之總稱時珍曰稷與黍二類而二種粘者爲黍不粘者爲稷稷可作飯黍可釀酒猶稻之有粳與糯也竊見北人總呼爲小米爲黃米然稷之生

折肱漫錄

卷之六

七

心導樓

粟米卽小米則更可疑竊見北地頗多種蘆粟者呼爲膏粟亦是粱卽粟之一証然日用嘗食盡是稷米呼爲小米膏粱間取以佐食不以爲正糧也釀酒之黍米亦呼爲小米未聞呼蘆粟爲小米今本草指爲卽小米毋迺混淆而無別耶至于南人種蘆粟甚罕普天下多食粳粳二種今言粱卽是粟則食粟者寡矣何以粱之名目古今稱之比比耶愚見竊謂五穀之名見於經傳穀當以五爲準

折肱漫錄

卷之六

八

心導樓

是矣又云粟之粘者為秣豈其然乎予宦九江二載從未見有小米酒則陶之秣斷是大米無疑也食物本草所載諸穀訛亂尤甚亦可謂立穀不分者矣

折肱漫錄卷之六

折肱漫錄卷之六

九

心導樓

折肱漫錄卷之七

橋李黃承吳履素撰

古吳程永培瘦樵校

續醫藥篇

五運六氣之說內經詳言之後賢疏註更詳但至于今而按之天時民病多不相合豈古今氣運不相同耶近者武林徐季孺刻有運氣商言之尤悉其於間氣闡發極精乃按之天時民病亦多不合折肱漫錄卷之七 一

心導樓

也是不可解竊謂治病者得是說而存之用藥時稍為照顧如相火司天又兼行火運則用藥不可過熱遵熱無犯熱之禁於寒亦然如相火司天而行水運即用熱亦無妨或行金土運亦似可不拘若膠柱鼓瑟而斤斤株守恐反多窒礙而致悞矧原有捨時從症之訓則不可違症以從時也明矣經云必先歲氣無伐天和二語須認明白如先哲熱無犯熱寒無犯寒之說則是夏不可用熱藥冬

不可用寒藥春不可助木秋不可助金矣又讀本草綱目李時珍之言曰春宜加辛溫之藥以順春升之氣夏宜加辛熱之藥以順夏浮之氣秋冬准此以上二說相背當何適從獨不觀經又云乎升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之斯二言可爲定案矣春宜順春升之氣以升之秋宜順秋降之氣以降之至於夏浮冬沉非謂必以辛熱苦寒浮之沉之也薄荷香薷等非浮劑耶地黃牛膝等非沉劑耶此四時不可以一例論也所謂逆之者寒則熱之熱則寒之溫則涼之涼則溫之也豈與升降浮沉例論乎經又云春省酸增甘以助脾夏省苦增辛以助肺云云春則木王土虧故欲抑木以助土夏則火王金衰故欲抑火以助金則逆之說更了然矣至於順之說亦槩論用藥之理宜然又有當捨時從症者不可泥也升之不已爲浮浮之義何居如陽氣外浮夏月多汗理之常也若居處太

折肱漫錄

卷之七

二

心導樓

涼飲食過冷或過服斂藥使汗不泄秋必生疾此其一端可類推矣故謂夏月伏陰在內不宜飲冷固是然夏至一陰生正宜保護微陰其可輕服桂附等藥以銷之乎則夏令宜辛熱之藥其說非也降之不已爲沉沉之義何居如陽氣潛藏神氣宜斂若內外煩勞精氣多洩或服升散之藥使氣耗散春必生疾也故謂冬月陽藏于密不宜又服熱藥固是然冬至一陽生正宜保護微陽豈可輕服

折肱漫錄

卷之七

三

心導樓

連栢等藥以傷之乎則冬令宜苦寒之藥其說非也知此則無伐天和之奧義可明矣上總論運氣崇正戊寅之冬武塘錢仲馭進士患肺癰諸藥不効有人教服陳年醃芥菜滷一服輒効甚以爲奇後晤友人沈聖思言其母氏當年曾患斯症亦賴斯物以救瀕危又一僕人母亦然此滷頗有藏之者天寧寺某僧房慣貯之詢知用醃芥菜滷貯于磁罈埋地中其地須有人往來踐踏者方有効埋

數年乃用之愈久愈妙但飲一二甌即効繆慕臺本草經疏亦載此方則云用百年芥菜瀘人嘗地中者飲數匙立効其義以芥辛溫得鹽水久嘗之氣變為辛寒辛寒能散痰熱芥菜主通肺氣所以治肺癰有神効也然不須百年嘗數年即可用矣本草經疏中魚腥草下又註單用搗汁入年久芥菜瀘飲之治肺癰有神然可不須也肺癰小便淋瀝乃腎氣虛不能注射而然試觀童子溺

折肱漫錄

卷之七

四

心導樓

如一線且能遠射男子漸散如珠至於淋瀝則腎病可憂矣余嘗患此服八味地黃丸更加紫河車淋瀝甚効

余辛巳秋自潯陽遷閩海患脾泄乍止乍發藥之不効壬午春出汛漳泉又代署興泉道篆陪直指出巡飲食不得調病乃大劇脾泄不止飲食減少五更脹滿小便淋瀝幾成中滿之候矣亟服八味地黃丸及間服金匱腎氣丸佐以補中益氣六君

子二湯自五月朔服至八月病乃漸瘥至冬而脾大健癸未宦於廣州至秋而前病復發及甲申之春而更劇諸症俱至此時則八味丸等藥亦無効矣子乃覓首生紫河車一具加于八味丸內服之頓効乃知河車功力信不可誣脾胃

壬午之秋余自閩調粵東臬長以重陽後十日行閩十一月望後度梅嶺時余脾健體佳甚樂也南雄一路最苦無酒所飲皆瓶酒有蘇合等諸香氣

折肱漫錄

卷之七

五

心導樓

余素所忌者不得已強飲之是月終旬舟望江口驛此時余患瘡疥者一年矣不服別藥惟飲金銀花酒偶以此花五六錢煎湯半甌攪酒飲之時已申刻矣酉刻抵江口將祭江以腹饑復飲瓶酒數杯忽覺虛汗發額頰之又覺頭暈勉強了祭江事急登舟則漸入昏沉去矣時次兒子錫隨任急過喚余喚數聲始應又復昏去不醒舉家驚訝以為中風也急煎獨參湯次兒喚余復醒兒問曰此可

服否余首肯服之停數刻吐痰半杯少覺清爽次
兒問余應用何藥余口授次兒筆之余曰此必蘇
合香散氣使然且服獨參湯因就寢則心已明朗
不復昏沉矣小睡而醒以手捫身捫一處麻一處
大是可畏次日食粥服藥調理稍安越二日舟望
平圃日方午余體漸健開窗看山因啖飯先飲酒
數杯爾時只謂受香酒之累且以金銀花爲治瘡
佳藥也復以花入酒飲之飯甫畢而頭暈復發一

折肱漫錄

卷之七

六

心導樓

如向晚之候翌日而蘇乃始疑金銀花之作祟時
有僕鳳鳴者以手背生毒亦煎此花酒服之輒患
暈眩乃益信此花之毒不然一服即眩何立竿見
影之如是而悞咎蘇合則冤矣蓋此花非余所親
收乃從樟樹鎮肆中市來之物不知雜何毒草在
內以至害人爾爾信乎藥物不可不慎尼父沽酒
市脯不食豈無見乎幸不大病數日即平復臘月
十八日履任後不復患此症則知悞藥之因而非

本原之病矣於此見宦游不可不攜知事子弟設
是時次兒不侍家人延庸醫悞進他藥又不知作
何狀矣 中毒

凡人腿足酸疼軟弱等症大半是足三陰虛損見
人用針者多不効不惟無効且促其壽予親見有
二人矣慎之 腿足酸疼

鉛粉即女人擦面之物最能解毒子次子痘後磨
有未落者好以手搔爬血肉淋漓敷藥不効一人

折肱漫錄

卷之七

七

心導樓

教以鉛粉塗之即塗即磨而愈此神方也後以撲
諸書俱妙 痘瘡

寧都曾友懋素園攜一姑蘇僕來偶園丁有子患
痢蘇僕即傳一方與之用大鱖魚骨一條併頭新
瓦炙存性爲末黑糖調薑湯下服之旋愈適友人
朱伯思之子亦患噤口痢甚危轉傳此方服之亦
即愈 滯下

子少病目神無力多視便覺酸澁時醫多勸予服

養血滋陰之藥就診于王宇泰先生遺子手扎云
治目之藥世醫多主滋陰降火而先代名醫皆主
升陽補氣雖互有得失而古人之說為長況尊目
能見細字絕無昏花但不耐久此其不足不在陰
精而在陽氣明矣正宜服益氣聰明湯今畧為更
定如左其方蜜炙黃芪人參各二錢升麻柴胡各
七分半甘菊白芍藥各一錢枸杞二錢炙甘草黃
柏各五分煎空心服再煎食遠服三煎臨臥服後
折肱漫錄卷之七 八 心導樓

來驗之畢竟養血無効而升氣得力先生誠有卓
見目疾

牙齒上齧痛腫連面頰係足陽明胃經風熱子患
此服清胃散半劑即愈藥如中病効同如此王先
生所刻證治類方載此方升麻用一錢牡丹皮五
分當歸生地黃連各三分而薛立齋所刻內科摘
要載此方黃連用一錢六分升麻二錢其餘各一
錢王方分兩太不勻薛方似妥蓋薛所刻方皆經

立齋刪定甚有斟酌較之他本分兩多有不同如
藿香正氣散薛本少白朮等四味更覺清楚齒痛
乙酉歲六月間予避亂小船奔走冒暑而不覺處
暑前即患血痢予年老不敢服下藥但調之而已
凡七日而愈然痢雖愈而血未止兼以大便燥結
艱難為苦治之半月無効讀玉機微義有柿乾燒
灰末之米飲調服一方考之本草綱目亦載此方
之効驗甚詳因覓此藥服之不及一兩即愈可謂
折肱漫錄卷之七 九 心導樓

神方矣 使血

是歲小雪前在山中又患瘧間日而發予不患此
病者五十餘年矣未有大感冒而得此想山中之
氣時行使然初次發于黃昏方書云發于子後午
前者屬陽易愈發于午後子前者屬陰難愈予憂
之又讀丹溪論云凡邪深入于臟者必提出於腑
達于表一汗可解予因多服升提之藥而不甚攻
其邪二次即升至申時三次升至巳時四次升至

辰時五次升至寅時即愈 瘧疾

薛立齋治瘧極言補中益氣湯之妙醫案內雖開列仲景諸方云若不應分六經表裏而治之說見各方然觀薛先生所治諸人之案並未見用各方而所用之藥大都是補中益氣湯而極論不宜過於發表攻剋致傷脾胃反致綿延不已近世名醫惟陳月坡宗先生之法以之治瘧頗效蓋仲景去今千餘年氣運大變治病亦須因時制宜若執古折肱漫錄 卷之七 十 心導樓

方以治今病是猶以結繩而治今之世也其可乎 瘧疾

友人丁靜公又字不二長興人寓嘉興予家延為西席者甚久乙酉仲夏移歸湖州郊外逢大亂藪水蠱疾腹大如鼓頭面手足俱腫小便不通大便日瀉數次危殆已甚聞隣家葱煎豆腐甚香思食食之覺快口食後小便即通於是連日食之小便愈通大便漸減再以半生熟之葱食之腹漸小腫

漸消遂可步履謁客予初在妙喜山中見其狀深以為憂殆將不起月餘丁再至山中則面腫已平精神已王告予得生之故如此夫水蠱劇疾也而以葱腐獲療聞所未聞特為記之 腫脹

治一切腫毒傳來一方甚効驗凡臃腫作痛毒將發時即服此方無不內消余次子臂漫腫作痛一服即消以後服者俱効丁亥在山中有管庄人腿患毒腫硬無頭痛甚數日漫腫如故醫藥不効子折肱漫錄 卷之七 十一 心導樓

與此方連進三服小便出濁物升許竟爾消散數日即平復真可謂神方矣方用生黃芪五錢當歸梢八錢金銀花五錢黃柏三錢水酒各一鍾煎一鍾服之 又一方加皂角刺 腫毒

外科方書每言生肌收口之藥不宜早用薛立齋指摘生肌散之害人而言毒盡時但用當歸膏為妙生肌最速並無他害予家人歷試之頗驗原方生地當歸各一兩麻油四兩白蠟五錢或黃蠟則

用一兩以歸地入油煎黑去滓用蠟投之鎔化成膏予試之膏太軟爛不便貼或當增藥減油

腫毒

本草言防風能瀉肺實悞服瀉上焦元氣及後列方則又云自汗不止以防風二錢用浮麥湯調服又云治盜汗以防風二兩芎藭二兩人參半兩末服夫既稱瀉肺實則其性發散矣而又欲以止汗豈不自相矛盾耶予曾冒風而病以體素弱用六君子湯加防風桔梗服之頓覺疎散欲汗一時勞

折肱漫錄

卷之七

三

心導樓

倦以參朮與防風同用尚不禁其疎散若服前方以止汗是愈泄其汗矣誰敢嘗試乎

傷風

子甥孫爛溪周祥侯年四旬患痰火上衝吐痰甚多喘嗽不能眠醫者以清火降痰治之愈甚幾危祥侯自謂宜服人參告諸醫者請以數分試之醫者曰若用則須多不可少更宜加桂遂治藥服之安平無事乃放膽連服數劑竟愈引火歸源先哲已言之而醫者不識耳猶幸此醫能虛心商量得

免於危

瘰癧

旱蓮草一名纏腸俗名涼筒以醫促織者斷其根少頃其口即黑者是最能烏鬚予表兄卜叢父太守有人傳與一方單用此草搗汁熬膏蜜收貯之磁瓶日日以酒服之久服鬚髮不白卜叢父守而服之六十外鬚果不白但皮肉亦漸黑且不利于脾故予知而不服

烏鬚

予生平雖多病而腫毒則未之患也歲在戊子行

折肱漫錄

卷之七

三

心導樓

年七十有三矣其冬暮頭之右偏忽患一毒嗣是右肩右背連患二毒受累凡四閱月予久聞薛立齋先生外科樞要精要二書知毒之初起最要是隔蒜炙予遵之惟謹畢竟得力不至瘡大難收方書云惟頭項不宜炙而立齋則云亦宜炙之為妙但艾壯宜小而數宜少多不得過三七壯也予亦遵之竟有益而無害益信立齋之言不誣蒜以獨囊者為佳方書言切三分厚者有言三文錢厚者

以予試之三分太厚炙火全不覺恐是三錢厚者
有力凡患毒者多服十三方仙方活命飲以敗毒
但老弱之人不能堪此立齋以托裏敗毒散易之
俟潰後卽去連翹白芷金銀花而竟服托裏八味
散予遵之幸不受藥物之害此議論識見實超時
醫之上者也今患毒者時醫輒以圍藥膏藥等治
之夷考古人之書頗論圍藥敷藥膏藥之害豈古
今氣運有不同耶是在智者審之

腫毒

折肱漫錄

卷之一

古

心導樓

予右肩患毒以年老潰後不多得厚膿時有清水
流出不絕時醫以搽藥膏藥治之少頃藥皆浮移
他處矣屢搽皆然頗爲可懼時有請仙者甚靈予
命兒輩祈之仙云無妨疏一方見示用珍珠人參
輕粉血竭五色花龍骨若白者不効各等分爲細
末搽之予一搽水卽緩而少藥卽成痂濕處補搽
二三次水不復來遂爾獲愈亦神矣哉清水謂之
毒水多出亦無妨不可早止之止之太早將復發

腫毒

折肱漫錄卷之七終

折肱漫錄

卷之七

古

心導樓

黃履素簡明萬歷丙辰進士幼而賦質虛弱年至七十餘歲自云藥品十嘗四五則一生無日不在病中矣有妄投峻劑爲醫誤者有調理不善而自誤者歷驗親切遂著折肱漫錄一書一則曰養神篇一則曰養形篇一則曰醫藥篇其意是惕病者之鑑戒原非爲醫家立說也會收入杏林法海書目中蓋欲醫與病者皆不可粗忽也沈存中有五難之說此非二難乎如陰虧質弱之人或一流覽折肱漫錄

跋


一

心導樓

則病情不致於固結醫藥不致於輕試則此書之功亦不淺矣但養神篇雖所採皆子史傍及釋道其說頗雜莫如案頭置鶴林玉露等書更勝矣故不刊木

乾隆五十九年三月古吳瘦樵程永培跋于紫藤

花下讀書軒



是書篇張尙多今僅刻十之一二急欲請正遠近諸同
志先此印行後旋續布更有裴子言藥素重類錄林
要旨証治藥劑濁原病式等書共三十餘卷不日發梓

裴子言醫

本館藏板 翻刻必究

序

余少時遭時多憂有感於項籍學
書不成去學劍之語故於武經諸
書恣意探討為其所以毒害六也卒
不過無所用後有發於范文正不
為宰相嘗為良醫之語又於岐黃
素片

諸書樂為尋索為其可以生天下也
始得其大素完不敢用第出則必挾
此心以俱去素同潘詠瞻年元舟
次維揚寒途窳窳取趙伯離評
點武經世隨因嘆古之善用兵者
類之生而必不可殺將少時雄心幾

後熾德出紫子言醫一帙余為嗜
嘉嘆特非今時人詠瞻曰此予友
人益友紫北期也其照則葉鏡劬
則蘊井其於醫學真發前人無
未發子何見之晚也相與讀其序
至卒知醫業之於人豈有死而

張序

二

生舉余向時欲生天下之心糧種
汗下讀王篇中見保國與保身無
二理用業與用兵無二術又余從
日學劍之雄心凌漢楚水將走也
紫子之料病如孔明之識用藥如
子龍之騰奔中如由基之性輒破

的程統、為此况下此者予乃知
保身如紫子者始可與言保國用業
如紫子者始可與言用兵蓋天下
生之六俱匪異人任敢藉詠賡沈
之紫子

張序

三

四明社草張應麟抄仲甫書

廣陵舟次

言醫序

嘗讀物理論醫者非仁愛
不可託非聰明理達不可
任非虛潔淳良不可信然
則操岐黃之術者凡幾
多少湯頭認我許藥味務

毛序

為名高以自炫也裴子兆
期六技回家貫函達漸起
竅五臟熟乾參兩更剖示
生分錄區第十日有療著
論經探玄奧庶幾九朽為
良古所稱可託可任可託

此明殆系同而隱括之在

之服其業者不可不讀其
書而孤讀其書者尤緣欲
其業重待飲上池之水務
終歲之功此稱名醫藥雖
然乃名而良者有無名而

毛序

良者醫原不在名也昔扁
鵲為魯公扈捐膏藥治疾
一志強而氣弱一志弱而
藥強剖身探心易置之而
稱善此乎此凡聰明
理達虛潔淳良本該仁者

河易語此北仍將安所取
法乎玉原東濱大海外
三神山在焉應多生奇人
以壽世他日功成十全久
視飛僊愛六一于夢液改
三七於銀丸屯朔之書且

三序

三

與中經內籍竝觀矣

楚免陵毛一駿題



裴子言醫序

吾快讀裴子之書而異之也學不貫今古識不
通天人不近僊心不近佛者寧畊田織布取
衣食耳斷不可作醫以誤世醫同神聖之業非
後世讀書未成生計未就擇術而居之具也是
必慧有風因念有崇習窮致天人之理精思竭
慮于古今之書而後可言醫每見庸工治病十
失其五良工治病亦十失其一由一以循累之

趙序

誤亦未忍言也即能窮致天人之理精思竭慮
古今之書而病伏于內醫測于外病以奇伏醫
以意測幸而得則竟得矣或偶不得則不為二
監所笑者無之此扁鵲所以需上池之水而思
邀所以藉龍宮之方也夫上池之水不易得龍
宮之方不再傳則惟窮理讀書以學識參造化
之權而後可若裴子者斯其人矣若裴子者固
數百年所未出之人也古今之有學識者當首

推張戴人及劉河間能與病血戰而不奉表稱
臣于病第未免過甚耳其餘諸家立法非不善
實為鄉忽通逃之藪故謂醫有成心不可也謂
醫有成理尤不可也無成理而有成效醫信難
言哉裴子之言曰以生死易視者易之固數百
年所未出之言也獨謂裴子學貫今古識通天
人才則德而心則佛信也非譽矣誦其言皆軒
岐所欲言而深悔未及言亦諸大家所欲言而

趙序

二

格格不能言豈 帝憫枉札之禍助其神智而
授之使言歟推此而失者可得難者可易而謂
醫無成理尤不可也余以多病學醫日為醫而
醫日下初似可游亦通皆茫然抑鬱焦思徒廢
寢食行將耕田織布棄醫而去以求無誤于世
今秋得晤个亭先生極口訛期裴子學識且示
以所著書余向慕裴子名而不圖其貫通至此
也一再讀之豁乎快有所獲裴子教我矣何時

共晨夕而相詰晰究竟此神聖之業哉

歲在丁酉中秋日友弟趙善鳴聲伯父題

友弟陳龍運階尺父書

自序

或問醫易乎。裴子曰：以生死易視者，易之若余則未敢自信。管先君子以醫鳴世，余見其治，輒嚮應，亦嘗私易之而不知人之有生死，非不知人之有生死，不知醫藥之於人有生與死耳。先君子沒而余世其業，乃較譬岐黃靈素與諸大家遺書，凡七更年數四過，始惺然有覺而知醫藥之於人有生又有死，自謂於斯有得及臨證則疑焉。罔決者猶十七治上矣。又攻其下療彼矣，更顧其此色既呈而脈難合，診或得而

裴子言醫 自序

証不形測以寒寒未除而熱已起，擬以熱熱未去而寒復生，欲祛寒則思熱不前，欲救熱則思寒且止，大實似虛補之慮，其實實至虛似盛瀉之犯，其虛虛眩惑，意縮十有年則又知醫藥之於人死者多而生者少矣。以是夙夜彌勤，眠食盡損，研窮義易博採空玄，舉天地間氣運物理，古今治亂興衰吉凶進退及傳記百家之書，有可與斯道推類而長者，祭稽亦已逮半更訪前哲如張子綱神醫也，幾以承氣而誤已之。子張仲景醫聖也，猶有急下急溫半劑少與，暨微和

胃氣之戒慎，丘子得許學士而生全范雲，因武帝亡錫之命而夭折，所爭僅汗遲與汗蚤毫厘，疑似輕重疾徐之間，死生易如反掌，誠非細故，究其極則人之所以病而病之所以治，又不在形骸藥石先聖賢陳跡上探求者，敢謂醫學無難哉。卒知醫藥之於人幾有死而無生矣。自此纖微倍凜，皮毛疥癩視若膏肓，甘草陳皮畏如醜毒，雖或羣起而爭曰：易吾勿信也。嗟嗟，余之漁獵醫林以醞釀乎丹府，有年矣，不可謂草草也。夫何歷一境轉深一境之難乎。今老矣，或云

裴子言醫 自序

優矣，乃益茫若望洋莫測其際，仍然未學時不知醫藥之可以生死人也。已語云：無學者不可與言醫，有學者亦未可與言醫。厥有旨哉。雖然，世固有不經研索，夕拮据而旦施行者矣。此聰敏過人，是天授，非人力謂之易也。亦宜時崇禎十七年歲在甲申春莫復，菴居士裴一中兆期父序。

序

今江浙之稱去醫者必宗裴氏而裴氏之克紹箕裘卓絕當代者惟健飛一人而已健飛在屋承親之武原邑其尊公兆期先生與余執手交窮天人之秘聞靈蘭之奧數十季間孜孜博濟躋斯在於仁壽之域全活者以萬計凡黃童白叟綠綬青衫無不交口而頌先生之德今健飛業洪繼述道尚淵源四方仰

陳序

冀一匕者若金堂仙露疑是殆有神授非可測識誰謂上池之水獨擅譽于當季詎宮之方不再見于今日耶舉去駭其靈奪咸目裴子為天縱余曰從古無不學問之神仙裴子天資敏悟學力沉酣凡三墳五典五運六氣金匱玉函之精丹臺瓊冊之密悉廣稽博覽融洽淹通雖隔垣之視不足云也諸如六淫外侵七情內作表裏虛實之宜補瀉宣通之

上下千古確有定見至於先天資始之源後天生物之本乙癸同源之理變化疑似之微鮮不洞燭人但知其能拯九死之症而不知其曾讀未見之書也今之醫師知以寒治熱以熱治寒以通治塞以塞治通而已矣而健飛獨明于塞因塞用通因通用寒因熱用熱因寒用用熱遠寒用寒遠熱各有妙諦更淺究夫窮源探本之論謂見痰休治痰見血

陳序

休治血無汗不發汗有熱莫攻熱喘生毋耗氣精遺勿瀉洩種種人所難知健飛澄心味道頗得個中之趣是以疏方用劑絕不類時師而其得心應手斡旋造化應若桴鼓真猶龍之老氏豈可憶度而管窺乎辛亥之夏余同善長孫洽師禱而吳山甘霖大霑因訪健飛于育嬰堂堂之主人乃余友陸宗黃也誠心保赤樂善不倦向與兆期為比鄰至交出

其所鑄言醫四卷言言玉髓字字金銳如唐之巫咸周之長桑秦之紀緩宋之文摯鄭之扁鵲漢之陽慶倉公更如長沙河間東垣丹溪立齋肯堂諸大家各有著述無不表表今誦兆期之篇博綜反約採珠幾于淵藪微性命之精微挈領朝宗臻于盡善立德立言上有功于千聖為後學津梁真金石不磨裴子健飛上承父志悟其神理播其仁術凡刀圭

陳序

三

之入口者靡不頃刻立起寧止徒讀父書實甲見之經濟宜乎其名不脛而馳遠邇嚮慕爭赴燕虛日也余于裴氏喬梓為通家茲講素交最久聞見最真不敢浪作浮譽故直泐數言以弁其首

通家眷弟陳之遵道升氏題



凡則

一醫之道難言矣余何人斯敢僭言也唯是醫教衰而醫日流於弊古聖賢仁壽之傳幾歸淪沒遂不自禁其婆心之熱率蠡見而僭言之也知我罪我其在茲乎

一是帙余之隨筆也倘有得隨筆而載之雖不及別門序類一一詳言而其理則無一不貫蓋醫者意也言不足以盡觸此便可通彼耳善讀書者當不作殘編斷簡觀

裴子言醫 凡則

一

一帙中一畫小心治虛傷藥傷飲久病後金匱丸大補脾丸不執本草主治諸篇皆言古人所未言者命門二火陰証用權補中湯陰陽氣血流溼潤燥相濟水火辨諸篇皆言古人所已言而未得其旨者勿藥王霸產後胎前執流守主內傷元氣脾胃統論好古節齋人參論諸篇皆言古人言不克竟與邪說亂真而未經補救者餘則但言常變時宜平易近情道理以挽習俗之非

一醫書生死書也。最忌迂而不切，晦而不明。以滋學者之惑。此余所不得已而作此。既明且切之言，以便學者觸眼即豁，不致低徊沉索也。雖然，言非徒言，恐又不可因其觸眼即豁而不低徊沉索也。

一人身所賴唯脾胃。脾胃所賴唯元氣。元氣非脾胃不能運行。脾胃非元氣不能生化。此形上形下不得相離之至理。以故本帙中無一字一句不是矧頤脾胃元氣之言。是在閱者沉心理會。

裴子言醫 凡則

二

始見但其間理微而費不克盡。余所欲言心竊未快。

一近來言醫者類重方藥而輕調攝。若余則重調攝而輕方藥。蓋方藥止優於卻病而不優於養生。調攝則不止優於養生而更優於卻病。在昔岐黃靈素醫學祖也。千萬語言只是教人節飲食慎起居少嗜欲適寒溫勿失養生之道而已。曷嘗有所謂方藥哉。深於醫者以為然否。

一帙中所載治案有虛反攻而實反補者有寒治

裴子言醫 凡則

寒而熱治熱者有取彼得此而取此得彼者有病同藥異而病異藥同者有處變視之以常而處常視之以變者是皆因其病用其法非故設不經之奇幟以炫已而欺人也。第邇來諱疾者恒眾故只就病載病不表姓名。

一古來明醫家鮮有不知太極之理者。知有太極則知人有所以生而非形矣。形有所以死而非病矣。病有所以治而非藥石矣。余雖不敏早歲時已參其旨嗣後攻苦日深漸臻悟境便不為

裴子言醫 凡則

三

形下之學所拘。故此書雖不言言及太極而大極之理無勿寓。噫此固造化根也。眾妙門也不止醫學所從出也。

一帙謬序楚中毛槐眉吳門金聖歎雲間蔣斧山四明張振仲武林趙聲伯禾郡朱子若同邑鍾禧西胡孝轅陳則梁諸先生各錫瑤序并其首是無異蠅之附驥不難千里行矣。第皆獎借過實大非涼德所堪。用是懷慚不敢遽梓。僅自序其略焉耳。

裴子言醫卷之一

鹽官裴一中兆期著 男裴翰從飛 較正

語水 孫 晉颺接三訂

人之生有所以生而非形也。耳目鼻舌手足與藏府
經絡骨肉皮毛皆形也。非生也。其各有所司。以供
不窮之用者。亦生也。而非所以生。所以生者何。曰
命。命果何物。謂有物焉。而無形。謂無形焉。而又非
無物也。命之門安在。曰。腎有二。生于脊骨十四椎
下兩傍。後天之有形也。先天之無形。則寓乎兩腎。

裴子言醫 卷之一

之間而為後天有形之用。後天有形者。兩腎也。先
天無形者。水火也。水與火互藏其間。而為命之門
也。曰。水得火而潤。火得水而熄。勢不兩立。安能互
藏。曰。後天之水火有形。而先天者無形。有形者相
克。而無形者相生。試思太極未分。原只一氣。自一
氣而分為水火。火即水所從出。水即火所繇生。二
者交合變化。雖二體而實為一體。雖二用而共為
一用。故造化于此不息。鬼神于此不遺也。人身一
太極也。當父母媾精。未有形象。先結河車。中間透

所以生三字是此書一大宗旨
從形說到生從生說到所以生
絕無形者非生破滿國者不能
人之兩腎其精果教諸實之所
岐子岐子無中生山
前中即先
天無形之
深得陰陽
五根之理

根理人即說不出

水與火也

聖人所以字子命也

起一莖莖端一點如蓮蕊初生而水火二氣已交
合變化于其中而為生身立命之根矣。緣此一點
兩傷生出兩腎。形如豇豆相並而交函于水火之
外。以象圖之不宛然。一太極乎。次而生心生肺生
脾肝與百骸九竅而形備。形既備則氣之溫者。即
火也。溫而不至熱。火中有水也。氣之涼者。即水也。
涼而不至冷。水中有火也。水中有火其精不竭。火
中有水其明不熄。因是而耳之聰目之明鼻舌之
臭味手足之持行水穀之蒸為血液而充藏府榮

裴子言醫 卷之一

經絡灌溉乎骨肉皮毛。將生生于不窮。苟水自水
火自火。陰獨陽孤。而化源息矣。安望其能聰能明
能臭味能持行而藏府官骸不盡屬灰稿木也。
哉。故曰。人之生有所以生而非形也。究言之。命本
名耳。天地之秘。聖人無從指其實。不得已而強名
之。耳。管伏羲氏仰觀俯察。近取遠求。不能多語。只
信手一畫。一畫者。命之原也。亦即水火之原也。先
乎天而無始。後乎天而無終者也。至謂左腎為腎
右腎為命門。又謂男子以右腎為命門。女子以左

識者心法
象者何

無可名不
得不用意
立名

子聖相傳
不二法門

腎為命門甚謂兩腎總號為命門噫命之門固在
腎夫腎豈即命邪苟能于有形之中求無形之意
則思過半矣

自天地而人物莫不從伏羲所演之一畫中流出其
一畫以前果何景象曰一畫前之景象即吾心之
景象也識吾心之景象則一畫以前可反觀而識
識矣答伏羲慧徹天根欲悉吾心之妙無可擬其
端倪不得不借此以啓後人謂其有景象不可也
謂其無景象亦不可也是故聖賢述相垂教各因

素子言醫 卷之一

意立名而無實如曰乾曰元曰天曰命曰善曰仁
曰理與道曰不二與空與無及精一執中而一貫
而明德而性而誠以至浩然之氣玄牝之門天地
之始無極而太極皆虛名也無一而非描寫一畫
前之景象也亦無一而非描寫吾心之景象也且
觀天地間時之行物之生其所以行所以生者何
焉之飛魚之躍其所以飛所以躍者何至于人之
視聽言動喜怒哀樂其所以視所以聽所以言動
而喜怒哀樂者何蓋有物焉先乎無行無生無飛

說得天花
亂墜初原
亦能點頭

形容盡矣
遠說形容
不得

填帶白閃
是物

無。躍。無。視。聽。無。言。動。無。喜。怒。哀。樂。而。為。有。行。有。生。
有。飛。有。躍。有。視。聽。有。言。動。有。喜。怒。哀。樂。之。主。耳。知。
此。則。時。行。非。時。行。物。生。非。物。生。焉。飛。非。焉。躍。非。焉。躍。
非。魚。躍。而。視。聽。言。動。喜。怒。哀。樂。亦。非。人。之。所。能。矣。
又。何。疑。乎。一。畫。前。之。景。象。乎。是。在。善。悟。者。神。領。之。
言。語。形。容。不。得。也。須。知。伏。羲。自。無。畫。而。化。有。畫。自。
一。畫。而。化。千。畫。究。也。千。畫。還。歸。一。畫。一。畫。還。歸。無。
畫。也。已。

素問謂七節之傍中有小心從之有福逆之有咎

素子言醫 卷之一

與周子太極圖說無異但周子統天地人物言此
則專指人身言耳其曰七節者脊骨之自下數上
第七節也傍有兩腎而中間則有小心小心者即
太極圖中之白圈也潛藏於兩腎而為一身之太
極也以其無可睹無可聞至微至隱名之曰小非
真小也從之有福逆之有咎即君子修之吉而小
人悖之凶也釋者不察而以上焦之包絡為小心
則失之遠矣曰心在胸中而子獨言在腎顛倒拂
常則曷以解曰在胸中者後天有形之心也其感

此說從經
七情說以
無形說取
得此說極
受用不子
也

心在道裏

可補兼治
諸病所不
及

本來面目
誰肯識認

通不窮之用。雖從此出。而其所以為感通不窮之
用者。則寂然不動。而藏于兩腎之中也。夫寂然不
動。而藏于兩腎之中。先天無形之心也。無形者。必
托于有形。而後見。而有形者。又必賴無形。而始靈。
智者當悟無子。有不可因。有而遂溺于有也。世之
言心者。唯知有形而已矣。間有以為無形者。亦唯
知起滅乎胸中而已矣。身知夫兩腎中間。是其棲
息之官府也。邪曰。心既無形。則無可在。而亦無不
可在矣。安見其在。下而不在此也。曰。獨不見天地

葉子言醫 卷之一

五

之心乎。冬至子之半。一陽復于至陰之下。其復于
至陰之下者。即天地之心也。象之所謂雷在地中
也。與吾心寂然不動。時無以異也。至其雲蒸雨施
以發交通之妙。則天地之心。又恍乎其上矣。象
之所謂雷在天上也。與吾心感而遂通。時無以異
也。以天地之心。證吾人之心。則吾人之心。在下而
不在上也。明甚此。余所以揭太極之微。而直指其
歸元之路。冀世之學者。皆識本來之所在。而求之
底性。有所見德。有所明道。有所貫而精神魂魄意

一語破
大機

若相表
莊

亦有所寧。一而深潛。大則可以臻賢詣聖。小則可
以却病延年。耳豈故為怪誕不經之說。而惑世以
欺人哉。惜終身繇之。而不知者。眾與語之。而不入
也。

問朱丹谿何柏齋兩先生君相二火論。孰是而孰非。
歟。曰。皆似是而非者也。火乃造化之元陽。一而
矣。易君相之可分哉。其所以有君相之分者。即一
火之體用而分之也。豈既有君火。而又有所謂相
火邪。夫君火者。即相火之本體也。潛藏于天地之

葉子言醫 卷之一

六

間。雖具熱性。而不發。實為造化之根蒂。猶王者深
居九重。無為而治。故君名焉。相火者。即君火之發
用也。流行于天地之間。以布生生之化。于不窮者
也。正與宰相奉君行命。同其義。故相名焉。非有三
也。丹谿柏齋兩先生之論。則不然。丹谿曰。陽動而
變。而生水火木金土。夫曰陽者。君火也。其動而變
即相火也。凡五行之物。皆所繇生也。先生所謂天
非此火不能生物。人非此火不能有生者。正此義
也。大哉言乎。永開學曠。二火之旨。亦既詳且盡。何

如此明辨
兩先必
重在天
亦心折

重理

復以君火為人火以相火為龍火雷火邪龍火雷
火即相火流行之徵兆乃生木之火也人火即人
間烹飪之火乃木生之火也豈相火且生木而君
火反為木所生邪相火既為生木之火則不出于
木明矣而下文又有出于木之說其謂之何柏齋
先生欲救其弊以君相合一為辨功其溥矣惜乎
以天氣人氣明白顯現為熱之相火反名君火以
藏而不發動之君火反名相火不已失乎且曰在
天藏于木之中在人藏于精血之中在人藏于精

素子言醫 卷之一
血之中則似矣在天藏于木之中將安解乎豈造
化之元陽僅藏于一木之中乎是欲救其弊而適
以踵其弊矣予逆推之則知兩先生之誤皆執素
問五運六氣之中有君相二火耳不知君相二火
雖列于五運六氣而五運六氣之推遷實經二火
宰制于太虛之中乃能始風木而終寒水也譬猶
乾卦之列于眾卦之中而眾卦未有不統乎乾元
之陽而能帝乎震齊乎巽以至勞乎坎而成言乎
艮者也是則五運即火之五運六氣即火之六氣

較下詳釋
此之旨自
此所如口

順表

以與字類
皆字也

而兩先生不求其肯唯知一風木二君火三相火
之說遂謂二火皆生于木所以遺晦于今而未明
耳須知君火者寂然不動之火也未發也誠也相
火者感而遂通之火也已發也幾也故曰君火即
相火之本體而相火即君火之發用非有二也至
五行之火是其所從出者也烏得以君相名之管
見如斯更望政于後之君子
陽虛氣虛陰虛血虛自各有別不思者以為氣屬陽
氣虛便是陽虛血屬陰血虛便是陰虛噫何謬哉

素子言醫 卷之一
夫陰陽謂水火潛藏于兩腎而為人身之先天血
氣謂營衛滋生于脾胃而為人身之後天故血虛
者營虛也四物湯主之氣虛者衛虛也四君子湯
主之陰虛者水虛也治宜補血藥中加知柏等味
及補陰丸之類陽虛者火虛也治宜補氣藥中加
桂附等味及理中湯之類其有別也蓋如此或曰
以子言之則古人謂氣屬陽血屬陰之義何居余
曰屬猶根也言氣根于陽血根于陰也血根于陰
則血不即陰而出于陰所謂陰中之陽是也氣根

于陽則氣不即陽而出于陽所謂陽中之陰是也
是則血虛為陰中之陽虛陰虛之微者也陰虛為
陰中之陰虛血虛之甚者也氣虛為陽中之陰虛
陽虛之微者也陽虛為陽中之陽虛氣虛之甚者
也故東垣先生于補中益氣湯有曰氣虛之甚者
加附子以行參者之功虞天民曰血脫補氣血虛
者須參者補之若真陰虛極而為勞瘵者參者不
可驟用緣此觀之得非有氣虛又有陽虛有血虛
又有陰虛之別乎夫何謾不加察而執四君子湯

裴子言醫 卷之一

九

以語人曰此補氣藥也勿論氣虛陽虛混之而施
執四物湯以語人曰此補血藥也勿論血虛陰虛
雜焉以進有不背聖經而戕民命者恐未之前聞
試印二湯之旨言之亦各有陰陽互濟之理在如
氣用四君子湯而人參白朮則是氣中之陽藥茯
苓甘草則是氣中之陰藥矣血用四物湯而當歸
川芎則是血中之陽藥地黃芍藥則是血中之陰
藥矣以故血弱有寒禁服地黃芍藥陰虛吐衄禁
服當歸川芎氣虛下陷茯苓不可多用氣虛火盛

人參不可頓加氣虛嘔吐不宜甘草氣虛喘嗽不
宜白朮一湯之中亦各有陰陽順逆之理可謂氣
虛便是陽虛血虛便是陰虛而設然施療乎
人之身無非病也亦無非藥泥金石草木鳥獸虫
魚為藥偏矣亦後矣飢飽待時飲食藥也寒溫適
所衣服藥也動靜有常起居藥也色不視邪則目
明聲不聽淫則耳聰口無莠言行無顛步則口體
正均藥也使人焉知填精而不知寡欲知養氣
而不知守默知保神而不知絕慮亦焉往而得藥

裴子言醫 卷之一

十

素問醫之六經也但言順四時少嗜欲節飲食不
為邪氣凌犯初未嘗以藥言其五志為病者即以
五志為藥如曰悲勝怒病怒者悽愴哀苦以感之
喜勝悲病悲者謔浪佚豫以娛之恐勝喜病喜者
迫遠危亡以怖之怒勝思病思者汚辱欺妄以激
之思勝恐病恐者沉疑搜剔以緩之至如逆可治
勞靜可治躁處陰以避暑就煖以避寒凡此之類
皆非熱非寒非酸非苦無煩採製不費咬咀隨在
而得之之聖藥遠逾草根木皮萬萬也則請為尊

野流遺稿

本脾胃之義置而勿講如脾虛氣短似痰喘耳泥
為肺熱痰壅瀉以石膏蘇子脾虛發熱似外感耳
認作風寒外束表以羌活麻黃脾虛下陷變為後
重裏急猶謂滯積不行下以硝黃枳朴脾虛不運
變為水脹中滿猶謂宿食未化導以巴豆牽牛產
後脾虛飲食停滯而嘔吐脹悶擬敗血攻心恣
餌桃仁四物勞瘵脾虛飲食減少而惡心瘡瀉倘
執滋陰降火偏需知栢二冬投之不愈更恣投之
脾胃轉傷而疾轉篤技窮莫措命于數時弊如

裴子言醫 卷之一

三

五

斯句可勝計無他未明至氣之說故也至氣實而
攻之則病易愈至氣虛而攻之則病反加非藥不
能治病也至氣不行藥力也況當世之人氣稟寔
薄兼多沉湎于酒耽縱于色汲汲沽名皇皇求利
又復傷于勞思者更不少也司命者其可不亟講
于斯
補虛之最切要者在扶胃氣胃氣強則飲食進飲食
進則血氣生補何如之所謂得穀者生失穀者死
理甚易明耳今之不善補虛者果用當歸地黃人

東垣先生
脾胃論
卷之五
論虛損

大熱夫

此假理耳
病來不知
發實亦不
知虛性天
枉言之矣

胃氣不清
健用補中
益氣湯可

可矣

參白朮甘草黃耆等類以為補虛之法莫此若矣
不思此等品類雖能補虛要皆甜膩壅隔之性胃
之強者則幸矣胃之弱者其可當乎不脹則瀉不
瀉則嘔吐而不能食矣有謂病不轉加于此誰其
信之
病有以藥傷而變重者甚有變證莫識而卒致危
者不可不知不可不慎昔一婦患經閉服血藥過
多血不行而飲食反減又增寒熱嘔逆醫猶為瘵
血攻心倍加峻劑病者忽發神昏齒噤口角流涎

裴子言醫 卷之一

古

五

狀類中風脈其脈伏而微心下按之滿急且有聲
曰此飲証也詢之乃為藥所傷非涌法不可急取
油鷄翎探之一涌而出酸水四五升隨醒先用燥
濕寬中藥次與補脾健胃俟飲啖起居如故始進
通經丸血乃行一人病瘵兼旬胸滿而畏食胃氣
不清故也醫不審與以加減補中益氣湯二服瘵
反大劇易用龍甲何首烏等藥作大劑以截之更
服嘔不勝湯飲俱廢或疑其誤服補藥與陳皮某
輩等湯病益加予診之六脈濡弱此濕氣滿胸膈

醫方在此
一吐
傷寒証狀
掃為無道
學者須細
心理有方
行有見

此言
之

裴子言醫

卷之一

主

也以蒼朮為君佐半夏厚朴澤瀉豆仁等少加薑
汁食鹽徐與之不食頃既欲吐即探引得吐
黃涎惡水甚多始平瘧亦漸止又一小兒甫三歲
得心腹痛疾醫者處劑太重煎汁又濃更灌之乳
食後反增嘔吐發寒熱而兼喘更數醫咸罔効漸
變昏瞶不醒人事其家以為不可救遂勿藥以俟
之自晨至昏忽聞腹中汨汨聲上下者數四遺穢
汁斗許而蘇凡此等病患者甚多不能悉舉總之
人身以胃氣為本胃氣傷雖對病之藥皆不能運
化而取効反生他証今之病家醫家均不之察凡
有病輒投以藥不愈更醫以藥旋已旋藥甚至病
久脾虛飲食不進不思顧其生化之源而猶亂投
湯劑致中氣受傷變証百出而死者不少矣可不
慎歟

丹谿先生謂產後大補氣血為主以產後血氣大虛
不可大清導大發散大寒涼至犯虛虛之戒耳又
云雖有雜病以末治之則不能無遺疑焉何也如
血凝腹痛食滯胸膨或惡心或泄瀉或外感風寒

如此補
效功何
也

當字世
左可以作
也或以作
也或以作
也或以作
也或以作
也或以作

裴子言醫

卷之一

主

等類產後或不免此皆不足中有餘之候遠可
以大補為主而未治之手以理揆之則此二語恐
亦非出於丹谿先生之筆傳為日久魚魯之訛未
可知也余敢以如字易雖字權字易末字于義始
固高明者為何如
藥無所謂王霸也用藥亦無所謂王霸也而有王道
霸道之喻亦用之者之有王霸耳用藥者嘗變以
審時經權以濟事當補即補當攻即攻當寒即寒
當熱即熱苟王霸之有分哉用之者善甘草參者
裴子言醫 卷之一
王也附子附黃亦王也春生秋殺之天道也當即
無藥非王也用之不善則附子附黃霸也甘草參
者亦未始非霸也冬煥夏寒之愆咎也不當即無
藥非霸也是則王霸不在藥而在所用亦不在于
用而在善用與不善用今世之談醫者咸以參者
甘草類能補益稱為王道硝黃附子類能攻伐稱
為霸道是泥于藥之有王霸矣泥藥之有王霸遂
泥于用之亦有王霸矣噫果用藥有王道霸道之
岐哉此唯可與知者言也

牛屎有殺
虫之功
中天地

天下居之
不故者
止此二小
人哉

大醫家

藥有偶中而病愈者有誤中而病愈者未可居功於
不疑當猛然省豁然悔惶悚無地則學日長而識
日高昔如一木匠趙與一鐵匠杜行次乞宿其家
有病人不納杜給曰此趙君世醫家也蒙上司見
召失路至此必病者之當愈也主人遂延入診之
曰一藥可愈潛出得牛糞一塊作三十粒下以溫
水胸中頓覺如虫行一涌而出小蛻蝦狀者二三
升病如脫越宿禮饌而去嗚呼此二人小人也欲
苟一宵之寢以穢物治人蓋偶中耳竊恐二人此

裴子言醫 卷之一

去必且謂醫學無難而居然一世醫家幾不自識
其初心矣又有一病身冷而脉沉伏者醫認爲陰
投以桂附等熱藥一婢煎之適傾廢落無以應借
黃連香薷飲一杯代之不謂一飲而瘥是何也陽
証似陰非陰也醫誤以爲陰也設藥不爲婢誤醫
之誤不可言矣設藥不爲醫誤婢之誤不可言矣
幸其相誤而因誤以中病乃得生耳吾不知此醫
亦居功不自疑否如居功恐又爲此婢竊笑也此
二事深可爲近世醫家提醒故戲志之

一之字誤
可味

大醫家下
說方之選

人皆以黃耆人參白朮甘草當歸陳皮升麻柴胡八
味爲補中益氣湯噫此固補中益氣湯也特元氣
下陷之補中益氣湯耳蓋中者脾胃也氣卽脾胃
之氣元氣也立方者以參耆甘朮等藥善補中州
之元氣而用之也因元氣之下陷不得不佐升柴
以舉之非升柴之能補中氣亦非中氣之必佐升
柴而後補也中氣旣不必佐升柴而後補則凡有
以參耆甘朮相須而立方者皆補中益氣湯也不
必定有升麻柴胡也如有因小兒慢驚與痘漿不

裴子言醫 卷之一

足用參耆甘草三味名保元湯者有脚氣久衰用
人參白朮茯苓甘草爲四君子湯者脾虛有痰有
濕四君子加陳皮半夏名六君子湯者飲食少進
更加香砂仁爲香砂六君子湯者有虛痰眩暈
以參耆甘朮合天麻半夏等藥爲半夏白朮天麻
湯者又有合棗仁遠志龍眼當歸爲歸脾湯者有
大病後調理元氣用參朮膏參朮湯與參苓白朮
散者有元氣暴脫脉微欲絕用人參一味爲獨參
湯者有善傷元氣用生脉散清暑益氣等湯與氣

虛微寒子
中益氣之
其矣

此全附九
皆從照
可明

天一生水
水之成
虛微是上
土中之堅
者便全
也水在上
上生金此
也其五
之妙可知
生者皆此

虛寒而用人參理中湯附子理中湯者凡此之
類皆謂之補中益氣湯也皆謂之元氣不下陷
之補中益氣湯亦可也但其間所夾之証與所兼
之藥有不同故命名亦各不同耳究其肯何一
不在中氣二字上着意哉

或問喘肺病也腫脾病也金匱九是腎藥服之而兩
証皆驗其故何也予曰腫雖屬脾而實因于水喘
雖屬肺而實原于氣經曰腎者胃之開關門不利
則聚水而為腫直指曰腎為氣之本腎虛不能為

裴子言醫 卷之一

九

胃行其水則不能納氣喘原而喘以作是則喘與
腫即謂之腎家病可也金匱九既是腎藥其奏平
腫息喘功正所謂虎向水中生者此也所謂地黃
有補脾利水之功無陰則陽無以化者亦此也兩
証之俱驗疑總之水土金為先天之一元此微
深詣其微耳
一宦者年已近老因勞倦傷脾脾虛病瘧瘧愈而脾
胃之虛日益旋病腫焉此時飲食尚進起居亦不
甚衰正宜補中益氣湯隨証加減以調脾胃元氣

不已二
大也

此不
致亂

裴子言醫 卷之一

子

後用金匱腎氣丸補腎而行水使腫自消始為至
治不謂日以澤瀉猪苓柴胡葛根厚朴陳皮等藥
暮餌朝餐恬不知返兩月來真氣被賊無餘腫脹
彌劇喘息不得眠者六晝夜更一醫猶以為肺病
而用蘇子芥子二母二冬之類卒致湯飲俱廢而
死王宇泰曰手足浮腫未必成水也服耗氣利水
之藥而不已則水病成矣趙養葵曰腎虛不能納
氣喘元而作喘徒從事于肺者執流而忘源也惜
哉

安胎之說不可拘泥有無病而胎不安者有病而
胎不安者無病而胎不安者杜仲人參地黃續斷
熟艾阿膠條芩歸朮等類豈曰無功若有病必當
先去其病病去而胎自安矣若不去其病而徒用
安胎之藥則邪氣留而不去雖安亦不安矣如痢
疾腹痛積滯壅凝不先乘其胎氣未虛之時而蕩
滌之病何緣滅瘧疾寒熱胃口必多壅滯遺用補
血安胎之法瘧疾何自而衰傷食作痛飲食難下
不先消導開胸飲食何緣得進傷寒熱結在裏舌

此病何由

此病何由 此藥何由

上生胎大便不通不用涼藥蕩滌邪熱何難而已
故凡有如此等病必令早去一日則胎便早安一
日不則日久胎虛鮮不致墮昔黃帝問於岐伯曰
婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞此之謂也
一富室婦崩暈交作已三踰日不得愈諸醫治法不
外阿膠地黃當歸白朮山藥人參及止崩止暈之
藥益劇余診之六脉小而堅右關細滑有力且多
呃呃欲吐狀心下按之硬滿而痛飲食不進大便
不通此正與王節齋夫人崩暈証甚相類受病在

表一 言醫 卷一

主

腸胃無疑法當先行腸胃中積滯使真氣流行脾
得健運而統血崩自止暈自寧矣遠用前藥是以
滯益滯矣怪乎無功遂屏諸藥先用導滯丸一服
不動再一服大便始通神少清而崩亦少止改服
開胃醒脾藥二劑崩暈頓減繼服大補脾丸甫半
月飲啖起居如故若泥血病而專用補血等藥其
與刻舟求劍膠柱鼓瑟者何以異
一宦妾年甫兼旬不甚得所抑鬱傷脾飲食漸減幾
半歲後乃月事不來日脯潮熱醫皆養血滋陰為

前篇第一 註此此証 與此受病 十腸胃則 同也清者 參之

表二 言醫 卷一

主

治寢至肌肉消燼喘息不眠惡心不能食大便不
通脈來數且弦右關特細素問謂二陽之病發心
脾有不得隱曲女子不月其傳為風消為息責者
即此類也在法不治乃辭餘旬果卒夫二陽胃與
大腸也病傳化失常飲食少進也痰心脾始於心
脾也因不得遂其隱曲之情心脾鬱結而發也心
主血脾統血腸胃既病則心脾無所資而血脉枯
故不月血既枯則陰不勝陽而生熱熱盛則生風
而肌肉消燼矣故曰風消肺屬金主氣金為熱迫
則氣上責而喘息不寧矣故曰息責初治時即開
導腸胃中積滯使真氣流通胸膈寬利能飲能食
始用血分等藥調月事之不來退日脯之潮熱方
為至治乃不審二陽因抑鬱久而積滯不行為受
病之根設執月事不來日脯潮熱是血少陰虛病
不遺遙散則四物湯朝養暮餌而卒至于死良可
嘆也女人患此甚多故詳著其証并釋經義云
學不博不可以為醫徒博亦不可以為醫醫者意也
聖賢之精繼形而上者之道也布在方策者言也

形而下者之教也。學者欲求聖賢之意，不得，不因言以求之，非廣博不可也。所謂教非道不立，道非教不明也。不求其意而徒事於言，則雖讀盡天下古今奇書，皆糟粕矣。何異饕餮百種珍饈，填塞胸中而不化者乎？

病有一二劑而愈，有數十劑或百劑而愈者，感有淺深故也。感有淺深，則其所以治之者，非可槩為欲速也。欲速則寒熱溫涼行散補瀉，能無過當乎？如寒藥療熱者也，寒太速則熱未已而冷疾隨生，熱

藥攻寒者也，熱太速則寒未除而熱邪又起。表者汗裏者下，汗速則心陽下，速則心陰矣。虛者補實者瀉，補速則邪熾，瀉速則正傷矣。功未奏而害已滋，不可不深為之意也。昔許學士治一人發熱，頭疼，脈浮數，麻黃湯證也。尺獨遲而弱，以仲景論尺遲者營不足，未可遽汗。進以建中湯加歸者，越宿脈尚爾。其家欲速汗解，許只建中湯調營而已。五日尺方應，始投麻黃湯二服，汗出而解。設不顧虛實，不待時日，禍旋踵矣。南史載范雲遇武帝九錫

裴子言醫 卷一

三

此水運
快子必背
共終必有
傷

之命忽傷寒，恐不得與慶事。召徐文伯診，懇曰：可速瘥否？徐曰：易，恐二年後不復起。曰：朝聞道，夕死猶可。況二年乎？徐卽以火煨地，布桃栢葉，置雲于上。頃刻汗出，撲以溫粉，明日愈。雲甚喜，徐曰：不足喜。後二年果如其言。凡病欲速愈而不顧其為後患者，皆不必有佐命之誓，榮而甘為久死之續者也。

張子言辭卷之二

鹽官裴一中著 男裴翰健飛 較正

同邑吳蕃昌閱 孫 晉風接三司

何柏齋先生水腫論曰造化生物水火而已矣不可使之偏勝太早物不生火偏盛也太滂物亦不生水偏盛也水火和平則物生矣人之飲食運化於脾胃實繇水火二氣非脾胃所能也火盛則脾胃燥水盛則脾胃濕皆不能化物水腫之病蓋繇水盛而火不能化也火衰則不能化水故水之入于

張子言辭 卷二

脾胃皆滲入血脈皮肉而為腫此自然之理也其水水氣少減復補其火使二氣和平則病去矣余每讀此論未嘗不嘆何先生之寤理也而又未嘗不歎何先生之不甚寤理也何也造化生物之水火與脾胃運化之水火是人與物所自有也非外來者也早滂之水火與作腫作燥之水火非人與物所自有也是外來者也外來者可見之水火也養人物者也自有者不可見之水火也生人物者也先生之所謂水腫之水乃可見之水也邪水

湯出生矣
此其書矣
六不愛

道假口于
張子乎

有止之誤
即如日月
之明

所補火之
水音

辨河理之
未安

也所謂火衰之火乃不可見之火也真火也真火邪水絕非對體之物先生以之對待而言將認水腫之水為真水乎邪水乎將認火衰之火為邪火乎真火乎抑認作腫作燥之水火即脾胃運化之水火乎非脾胃運化之水火乎邪正固明客主無辨先生不認賊為子必認子為賊矣嗚呼先生胡為作此論也以昔人治水有補火之一說爾不思補火之說即虛則補母之說也其意蓋曰水腫之病繇脾虛不能運化脾虛不能運化繇火衰不能

張子言辭 卷二

生土法當補真火于脾土之中則土旺而水有所畏不為腫矣是知補火者補火以生土也非補火以勝水也先生乃謂火衰則不能化水水氣少減復補其火使二氣和平則病去豈理也哉余敢以火衰則下添入脾虛兩字使二氣和平五字直刪去于義始圓爾雖然治水亦不一法矣有補脾而愈者有瀉氣而愈者有針刺而愈者有祛風清熱毒而愈者有開鬼門潔淨府而愈者有解瘡瘍逐痰飲消陳積與行瘀血而愈者豈補火一說足盡

計治測之
鄭執

世風之衰
天下人也

法之變乎既云補火則熱藥矣熱藥則附子肉桂
乾薑矣設遇乾咳吐血聲啞咽疼骨蒸盜汗與夫
鬱熱內實之人而兼水腫之病豈可遽執補火一
說而以熱藥投乎又豈補脾瀉氣針刺祛風清熱
諸法可悉置勿問乎執其一廢其百吾知其誤人
也多矣王守泰謂先生醫學未精論水火則從所
未發噫柏齋先生儒者也雖不精醫安足病守泰
先生儒而精醫者也不克補偏救弊而猶深取其
說誠可惜也夫誠可惜也夫

裴子言醫 卷二

三

四十年前之人雖多服久服當歸地黃門冬知母等
濕潤之藥不見有傷脾之患今時之人則不必多
服久服而食減胸膨肌浮腸滑之証旋接踵焉噫
嘻是豈養血滋陰之法儘可行于四十年前而
不可行于四十年之後邪非也世風衰而真元薄
也雞豚牛羊之餘食蔬者有幾瓜梨葡萄之餘食
粟者有幾醇漿乳酪之餘食羹者有幾其助則姜
桂椒蒔其和則油鹽醃醬嘗而煎炒燒炙異而脯
腊膾糝醉醢蒸酥與凡百巧為滋味以佐長夜之

中下深中
請之心象
任調其統
其意也止
城喻而已

此則不可
可少

其所以能
乾乾不息
者果何物
乎

古何謂則
為都而都
市者四方
商賈上聚
商賈下散
是火也

豪觴富貴之家斯已濫矣市井之輩靡有止焉且
也義命之理茫然怨慕之心橫起趨利趨名視昔
孰冷而孰熱患得患失視昔孰淡而孰濃世故紛
撓晨昏競出酬應之間視昔孰勞而孰逸至有素
風為囑恬退自公之人則又世網彌天人情叵測
而憂思驚怖之懷更不知其孰多而孰少也如是
而欲求脾胃元氣之不薄于今日則夏夏乎難之
矣而謂當歸地黃門冬知母等濕潤之藥可恣投
而勿顧乎

裴子言醫 卷二

四

或曰養血滋陰之藥世皆用之以補虛勞不足者也
予且謂有傷脾之患而大補脾丸中反多耗氣之
藥則何如曰此深有當乎脾胃元氣本然之妙而
人不知也夫脾胃元氣本然之妙乾乾不息者也
晝夜循環于藏府肢骸官竅間若天行之健而未
始或停也丹谿所謂脾具坤靜之德而有乾健之
運是也故此方雖用人參白朮補氣為君而又以
滲濕消痰之茯苓半夏為臣更以開滯疏壅之枳
實山查陳皮厚朴木香砂仁黃連神麩芽穀為佐

必旋來旋
散乃為天
下生之化
源若來而
不去其面
不故何生
化之有此
方如合此
也

使名為大補而實無有所謂大補之藥唯使腸胃
通調胸膈和利能飲能啖不失其嘗降濁升清時
靡有間旋推以陳旋致以新助彼乾乾不息之妙
而已矣雖無所謂大補之藥而大補之理實具焉
以故每施脾胃氣衰之人為脹為腫為痞為痰為
久瘧久痢與高年百損產後諸虛而不克加餐等
病屢獲奇效不然則山查枳實厚朴陳皮等藥耗
元氣者也曷有補于人哉

夫既曰為脹為腫為痞為痰為瘧為痢為高年百損

與產後諸虛是不一其病矣不一其病則亦當不
一其治子乃以一大補脾丸而通治之抑又何也
曰天下事從綱則簡而易得從目則積而難求理
之必然也不善為治者從病之目從目則脹以脹
治腫以腫治痞以痞治痰以痰治瘧痢以瘧痢治
高年與產後亦以高年產後治不勝治靡知統
宗矣善為治者從病之綱從綱則唯知有脾胃而
已矣知有脾胃則條目在彼綱領在我而脹者腫
者痞者痰者瘧者痢者高年百損與產後諸虛者

皆可勿問矣何也脾胃者化水穀而生元氣者也
元氣生則自能運行其滯而脹者寬痞者平矣自
能運行其濕而痰者消腫者退瘧痢亦可止矣又
自能運行其營衛以充養乎形軀則高年無百損
而產後無諸虛矣素問曰知其要者一言而終不
知其要者流散無窮不可不深察也

先哲有言曰脾胃氣衰諸病未有若參苓白朮散之
多驗噫信斯言也則參苓白朮散亦可謂大補脾
藥矣何不以此治脾胃氣衰諸病而必用有消導

藥之大補脾丸哉曰參苓白朮散者治無邪氣之
脾胃氣衰者也大補脾丸者治有邪氣之脾胃氣
衰者也有邪氣之脾胃氣衰者不足而兼有餘也
故不得不寓攻于補又不得不寓補于攻寓補于
攻則補而不滯雖補亦可借以為攻寓攻於補則
攻而不峻雖攻又未嘗不因為補也二方雖同
其旨而實不同其用若遽執脾胃元氣不足不顧
所夾有餘之邪而唯事補是益有餘而損不足必
致脹者愈脹痞者愈痞瘧者愈瘧痢者愈痢而脾

裴子言醫 卷二

六

二語可解
從來參苓

又中言大
補脾丸

此例更不
可少

長世源心
復何以加

之平大可
亦

此鐵河車
補脾者幾
人

胃之元氣亦益以傷敗不能食且飲而死已不但
誤天下人盡視人參白朮為鳩毒而不敢用并誤
學者將脾胃元氣之肯等之弁髦而凡遇似有餘
實不足之候亦寧俟其死而勿救矣流弊曷有極
哉

一宜者以積勞後間發往來之熱寢至形神枯稿懶
於動止水穀日損不知味累越月矣諸醫皆作脾
虛治而用補中湯歸脾湯參苓散及大補脾丸等
藥未嘗非也而究皆罔效余視之六脈溼且濡兩

裴子言醫 卷二

七

尺特甚曰此固脾虛病也然不直脾虛病也乃腎
虛之脾虛病也治當於兩腎中培化原之本則脾
始充而病斯已矣若徒事於末安效之臻遂屏諸
藥以紫河車一具為君熟地黃二兩為臣杜仲山
茱萸破故紙山藥芡實各一兩茯苓益智宿砂青
鹽各八錢為佐使製每如法即以河車地黃二味
酒煮搗丸如桐子命名河車補脾丸俾服之不踰
月而形氣俱如初病旋已或叩而問其故曰
無他虛則補其母爾或乃顧余大聲曰子悞矣脾

之得
之得

之來
天機

方不
誤

裴子言醫 卷二

八

屬土火能生土欲補其母則當補心於腎何與曰
心但屬火非即火也火乃人身之元陽與坎水互
藏于兩腎脾土生化之原悉根于此乃真母也此
子所以不補心而補腎也夫既補火而不用桂附
乾薑等熱藥者獨何與素問曰壯火食氣少火生
氣桂附乾薑乃壯火食氣之品虛寒甚者則可用
今此病未至虛寒之甚故僅取河車故紙益智菜
黃等少火之品以補之爾夫既補火而又兼補水
之藥者獨何與噫子但知火能生土而不知水亦
能生土脾坤土也為離火所生胃艮土也又為坎
水所生子如不信請觀卦位坤土何以居離火之
次而艮土又何以居坎水之次邪是則人參白朮
乃補脾勝藥獨置之勿用者又何與曰此方以腎
氣虛而脾無所稟急欲下達以固腎而救脾故不
但用辛能潤腎之縮砂為向導而又加鹹能下降
之青鹽為直入之兵毫不敢雜他藥以分其勢
遂加參朮則參朮乃脾家藥勢必顧戀乎中州不
能無遲遲失前之弊急欲入腎以培土而加養謂

將能乎或始為之唯唯

久病後不可恣投以藥且無論藥之謬即對病者亦不可不慎何也人之元氣以胃氣為本胃氣又以殺氣為本久病之人與殺氣久疎則所喜者食物所惡者藥物理之自然也此際正當以食物投其所好以養胃氣胃氣旺則元氣亦旺不補之中有至補者在何用此佛意之物妨碍胃氣邪素問曰得殺者生失殺者死未嘗曰得藥者生失藥者死也矧藥之攻疾猶刑罰之除殘食之養生猶德教

是 家或幸 者天 宜

病後好 者醫之

表子言醫 卷二

九

之治平也疾已而猶藥之不幾於刑罰治平同類而用邪今之醫者不明此理每遇病久乍痊必謂氣血兩虛還須大補其藥不外當歸地黃枸杞故紙山藥菴蓉參耆朮等類不煎則丸恣投無憚有服之而飲食反減者有服之而作瀉作嘔與腫滿者甚至膈脹不能食而反生他証者各為補人而實害人

病蓋有縱口吻而死者矣亦有絕其穀而視其死者焉世都不察幽潛沉寃者衆矣念及此深為酸鼻

是 家或幸 者天 宜

病後好 者醫之

表子言醫 卷二

十

夫飲食養生物也可節而不可縱然亦不可使之絕故節之則生不節而縱且絕則死縱而死病者之責矣絕而視其死伊誰之責邪如傷寒傷風傷食等有餘之病或脹或痛或嘔或吐感之暴而脉躁疾有力且無虛証之兼者雖不與之食亦可也此不可與而不與是節之非絕之也及久病久虛久不飲食之人陡覺殺氣馨香欲求啖而不敢啖正胃氣將回之候法當徐投藥粥或少與適口不助邪之物以充胃氣胃氣充則元氣亦充而病

自無不愈若概視飲食為毒藥而不與是絕之非節之也則幾微之胃氣將安恃乎

士人年近五十因勞病暑身熱煩躁醫為傷寒輒表之遂汗多不止氣短神疲口大渴脉細疾而無倫按之甚弱余曰寒傷形為有餘暑傷氣為不足六脉虛疾若証明矣急宜先保元氣用人參二錢麥冬三錢五味十粒煎服次日脉証俱減再以前湯合四君子與之二劑後進粥旋許繼而漸倍亦可謂安穀者昌矣甫越宿汗復大出手足冷至肘

病後好 者醫之

正所謂... 十分... 十分... 十分...

中庸之道

用千古俗人之法

凡可他陰... 家之証者... 家無道... 家無道... 家無道...

脈微且數按之如無曰虛極矣汗多亡陽所致耳急煎參者各五錢桂附疇術各二錢日再進脈証仍爾奈何余颯然悟曰藥之取効必賴胃氣之運化胃氣虛雖對証之藥咸疇罔効計必得適口之味以充胃氣參者自然得力隨詢喜羊肉食否病者疑其不敢諾曰肉者胃之藥也羊肉補氣與參者同功參者不能補明是胃虛以肉充之胃氣自強強則運化參者而淡効矣即取羊肉酒煮成糜與之食已煎前藥投之立驗或曰子真好奇

裴子言醫 卷二

七

大病後水穀且不敢輕進況于羊肉不死幸矣曰古人業有人參羊肉湯大培虛損予乃效之特分用耳何奇之有或默然陰証俗論必疇房勞又必疇傷寒而不及雜病且專責男子而不及婦人小兒殊為可怪夫陰証即虛寒証亦即陽証也男女老幼雜病傷寒皆可犯何見而必疇之房慾邪如產婦亡血及崩漏過多又如卒然大吐血不止與霍亂吐瀉無度有因汗吐下太過及為寒涼藥所傷或暑月恣意追涼冬

裴子言醫 卷二

月忍飢勞倦為寒所中凡此之類皆能令人元氣暴脫忽變為手足厥冷體疲無氣脈微欲絕與房慾脫陽之証狀無纖毫異而治法總不外人參附子肉桂乾薑救之急則生緩則死同疇一轍矣可岐而二之哉通乎此則陰証未嘗不犯于有慾之人而無慾之人之証亦未可遽謂必不犯此也從未有發敢爾僭及一人咽喉痛不能飲食時作時止者半歲吹喉藥消痰降火藥草汁藥咸罔効予診得兩寸洪大而虛

裴子言醫 卷二

七

尺部沉而無力兩足喜暖畏寒口喜冷飲甫下咽旋越出此腎火虛而充上下真寒上假熱也斷不可用寒冷反治之藥法當從其性而伏之隨處六味丸料加肉桂附子炒黑乾薑水煎入青鹽少許為向導冷而與之三劑旋愈或問熱藥冷飲何以解曰上焦是假熱下焦是真寒以真熱之藥冷與之則下咽之初暫得冷藥以自快漸達下焦熱性始發從其窟宅而招之同氣相求火下降矣即韓氏假對假真對真之義也亦即素問寒因熱用熱

因寒用之義也。嗚呼。甚有陰盛格陽而為面紅口
渴煩躁喘咳發狂之証。誤認有餘之熱。以寒涼之
藥進而斃者。吾不知其幾矣。

六氣之理。如權衡然。既燥則不濕。既濕則不燥。曷有
所謂流濕潤燥。並行不悖邪。口流濕與潤燥。非兩
事所重。只在流濕一邊。蓋燥本乎濕。流濕便可潤
燥。非既流共濕。又潤其燥也。如一人瘧久不已。發
時必燥。渴恣飲。更嘔噦胸膨而面黃。瘵此濕盛為
原之候也。醫不審。日以補中湯加知母。門冬。烏梅

裴子言醫 卷二

花粉等類治之。益劇。余以蒼朮三兩。半夏茯苓澤
瀉厚朴陳皮砂仁黃連各五錢。作丸。俾服。每二錢
日再進。旬餘而安。噫嘻。服潤劑而渴彌增。服燥藥
而渴反止。其故何也。流濕以潤燥也。凡久瘵之人。
必多黃涎。惡水聚於中宮。中宮濕甚。則生熱。熱甚
則生燥。所以作渴而多飲。是燥本于熱。熱本于濕。
流其濕。則熱不生。熱不生。而燥自潤矣。遠用滋潤
之藥。以止渴。適所以助其濕。助其濕。有不愈。助其
燥。平理。善易明。前賢不我欺耳。

藥品如熟附子牛膽製南星瓜蒂人中白牛黃蘇合
香與急用應病丸散等。務必平時預蓄。以應不時
之需。苟為不蓄。而欲絲死。更生於旦夕之間。恐軒
岐後起。亦不得展其奇矣。醫家之蓄藥。與國家之
蓄人才。其重同爾。

煎製藥餌。務必得人得法。不則雖與証對。無效矣。嘗
見治藥之家。法曰酒漬者。水代之。法曰炮炙者。生
用之。或烈火速乾。而真液未出。或真液沸溢。而別
入茶湯。又如藥材爛惡。銚器腥汚。水類不潔。與他

裴子言醫 卷二

物及土塵之雜者。尤為不少。如是而欲勉強圖功。
不亦難乎。雖然。此僅害之細故耳。甚有仇好之子。
嫉妒之徒。潛布挑生之術。而為禍大不可言者。可
不慎乎。可不謹乎。
醫者勿以其人之病。輕淺而易視。易視。則輕者必變
而為重。甚至不可救者有矣。凡有治療。勿論病之
大小。皆須盡心力。以期萬全。無使滋蔓難圖。而遺
人以天殃也。傳曰。履霜。堅冰至。以言乎漸。是謹也。
視以為難。難斯易。忽以為易。易斯難。能漸是謹者。

君不能
其所不能

雖有非帶之臨可坐而定已不則勢維微苟有極焉

病到危急時非峻重之藥不能救百中之一二今之醫者皆重惜名譽姑以輕平之劑冀其偶中幸而不死則曰是我之功不幸而死則曰非我之罪恐真心救世者不應如此也真心救世者必慨然以死生為己任當寒即寒當熱即熱當補即補當攻即攻不可逡巡畏縮而用不寒不熱不補不攻如診所謂不治病不損命之藥嗟嗟既不治病欲不

裴子言醫 卷二

五

損命有是理乎倘于此認不的確不妨闕疑以待高明慎勿嘗試以圖僥倖庶不負仁者之初心醫之道極難知無學者不知有學者未便知無才者不知有才者未便知有才有學矣不克隨時取中者亦不知甚矣知醫者之難也今有一等人謾說某某知醫某某不知醫噫知醫固難而知知醫者恐亦不得容易也
醫有上工中工下工上工者良工中工者庸工下工者謬工蓋謂庸工之不若良工謬工之不若庸工

前切

也以理言之庸工豈止不若良工哉并不若謬工耳謬工之殺人殺人而見其跡者也見其跡則人所易知而易遠其為天下之害少庸工之殺人殺人而不見其跡者也不見其跡則人所易忽而易近其為天下之害多譬猶暴君為不善其凶雖速而天下之害不甚深庸君未必能為大不善而天下之元氣陰受其賊而不知其凶雖緩而為害於天下不既深乎嗚呼庸君誤天下庸醫誤病人一理也

裴子言醫 卷二

六

醫到病家未診視不可先講病必待望而問而切脈証詳明始可斷為是寒是熱是實是虛病在某經當于某經用藥某日當瘥某日當危庶藥與証對而不踴妄投之弊近有急欲見長者未見病人顏色輒抵掌而談曰某藥可以治某病此必某病也當以某藥治之噫是猶未命題而先作文以待矣鮮有不背聖經而誤人命者
醫者胸中預擬一成見不得離病者不為白諱詳告諄諄亦未可遽執為真病情真病本也且待診視

此地位
便難

所謂滿在
上面治反
在下也

後參較果否耳。至若侍奉者之傳言延醫者之預
達尤不足憑。蓋學者胸懷空曠了無執着始得應
變無方耳。先哲云凡讀書不可先看註解且將本
文反覆詳味待自家有心得卻以註解參較庶義
理昭然不為他說所蔽若先被其說橫吾胸中自
家竟無心得矣。吾于醫學亦云。
或問癆瘵痰嗽治以二冬二母款花紫苑之屬十九
不効者何也。曰癆瘵痰嗽非肺病也。原于先天腎
陰虧敗不能制火。火無所畏而刑金。金極則鳴。

裴子言醫 卷二 七

耳此謂水泛為痰之嗽。非風痰熱痰痰飲痰涎作
嗽者比。法當峻補腎中真陰及佐味鹹下降之藥。
徐徐引之。始善。若泥肺病以冀近功。是從來
而遺本矣。然則補陰下降之物其孰為優。唯童便
一味為上。藥爾童便味鹹性溫溫可養元。鹹則歸
腎。速而能引火下。實人身中之氣血藥也。用治木
元虧損之病。則同氣有情而易入。較効于偏性之
草根木皮甚遠。褚氏謂服寒涼百不一生。飲溲溺
百不一效。良以此也。雖然苟非病者真心怕灰于

加胃氣不
足者以
中乾氣海
二穴以作

先投大元
氣使飲食
不致虛氣
不致其步
引也

微病之時便能節飲食絕嗜欲。慎起居息妄。想忘
日忘年內觀靜養以佐藥。何之不迫。亦未見其能
治也。

一人年三十餘積勞而多欲。遂夜熱兼旬無盜汗。六
脈近數。飲食不減。此癆証之微而未深者也。正與
養血滋陰治法甚相合。藥用生地黃三錢。鱉甲醋
炙二錢。知母當歸柴胡牡丹皮山茱萸各一錢。黃
芩六分。煎服六劑。而熱平。迨灸百勞一穴。膏肓二
穴。以杜其根。更以河車丸與之調理。不百日形氣

裴子言醫 卷二 八

飲食脈候俱如初而愈。葛可久曰癆証最為難治。
當治于微病之時。莫治于已病之後。今此病正當
微發之時。故能取効于旦夕間耳。若忽于微而不
早為之治。未有不寢至乾咳聲嘶肌消腸滑食減
臥牀脈來細數而挽之無從者矣。患此者不可不
防微而杜漸也。
婦頭眩耳鳴肉瞶筋惕恍惚不得寐。乍作乍止。半
載矣。後乃阻經四月小腹如懷。子醫者疑其姪而
安之。忽一日下紫黑血少許始識經閉。改用通經

藥數劑腹不減反增惡心嘔噦飲下嘔旋越出
咽喉焦痛舌黑無津衆醫不能解余診得六脈弦
細而滑兩關尤甚曰此頑痰閉滯血海壅瘀月事
乃阻耳何以徵之其脈細而滑者痰脈也頭眩耳
鳴恍惚者痰証也嘔吐不食者痰客中焦也舌黑
無津咽喉焦痛者痰生熱而然也素問謂治病必
求其本今病本於痰必以治痰為首務遂投礞石
滾痰丸八十九不動再投七十九小腹微痛次日
又服如數小腹痛不可忍將夜半下如猪肝者四

裴子言醫 卷二

五塊每幾盈尺更下如破絮脂膜者無計又累累
若石榴子紅白攢綴連絡而下者不啻二三斗小
腹頓平痛亦如失其最異吐痰碗許俱如綠草汁
色口角流涎忽變如琴絃之堅因憶丹溪先生謂
怪病是痰十居八九良然時响次未平飲食
少進用橘紅茯苓各一錢枳實黃連半夏麩各八
分水煎入薑汁二匙竹瀝半酒杯二劑後以六君
子湯加減更服加味潤下丸調理百喻日乃愈逾
年生一子

日小瀉日
半小瀉日
少腹何等
痛重非深
得神思心
皆皆光瑛
此

亦有先攻
後補者也
旋復從補
則庶幾耳
但補與攻
皆當以漸
而毋驟

裴子言醫 卷二

有病傷寒傳裏熱結不通者已屢經下而腹中按之
則仍繞臍堅結若仰瓦然且其人伏枕不起又累
旬肌肉盡燥湯飲幾廢甚至氣怯不足以佈息當
此之際攻補不能施其巧計將安出曰論營法在
所必攻不攻則腸胃無絲清液無絲進元氣無
絲復而人易以生若遽攻則此立稿之形垂絕之
氣能堪之乎計必先行補法而後察邪正之緩急
輕重以攻之攻後旋復從補補後旋復從攻而
旋復從補則庶幾耳但補與攻皆當以漸而毋驟

其始也且以小劑生脈散加陳皮煎飲半小既飲
後移時無反覆復少與繼則或可漸倍并商攻法
也如腹中鬱熱未清渴欲冷飲遂當啖以橘藕瓜
梨之屬潤其喉吻飲食久疎胃必弱甚又當開與
焦米湯大棗湯或扁豆筍蕨菜蕪豈怡糖等湯隨
所好以蘇胃氣凡此皆余平時所謂適口不助邪
之物佐藥何以及者也皆補法也補既得方可
議攻攻則唯玄明粉一味為佳生何首烏煎服亦
佳蜜導膽導尤為良法不應須詳脈之虛實氣之

三

傷人

老到

陽証陰
者甚眾
此
理每以
人長可
也

盛衰邪之深淺以導滯丸或小承氣加當歸微下
之下後仍須熾管元氣非徑前而勿顧其有虛虛
也倘其候果可授餐亦勿得驟之以濃厚先以焦
米煎汁飲之次煮熟梨熟棗熟萊服等少與之無
忤始可徐投藥與他物耳須知此証腹中攻不
克盡與傍流者恒多唯期脉靜身涼口不渴便可
圖進水穀慎勿過攻俟其水穀融液腸胃充盈不
攻亦可自去若必欲去盡而後與之食不將速其
死乎雖然此皆陽証之攻補法也亦有元氣內損

斐子言醫 卷二

主

之病治療失宜損中後損內雖熱結外則手足未
冷而鼻先寒六脉沉遲或虛疾無倫次則又是陽
証變陰之候急當以桂附參薑酌微甚而溫補之
又不可與瓜粿藕承氣玄明粉同日而語治者
矣智者於此不可不熟審而通其變噫嘻豈特傷
寒為然哉凡雜病日久鮮有不犯此証者余於治
按中每詳言之矣
一婦年五十許傷寒旬越不得汗其家欲取其汗肩
戶寒肅垂幕多衾以劫之病者煩躁悶亂譫妄欲

此水攻法

此水攻法

狂急延余治甫入臥室便熱穢薰蒸不可近速令
開牕啓幕揭去所覆者大半病者始揚手伸吟有
喜涼良熱狀微其而則赤舌則焦燥有胎詢喜冷
水飲否病者不能言唯頷之遂與新汲水一大碗
飲盡不食頃輒戰慄須臾通身大汗而解或問辛
溫發散藥服十餘劑不能取汗消滴飲以水汗反
大出其故何也曰是即水火既濟之義也譬火燃
釜枯以水沃之氣液沸騰必然之理又何疑焉衆
皆慨然自失

斐子言醫 卷二

主

無病服藥之流弊久矣而今為甚此皆執前人服藥
于未病與上工治未病之說而謬焉者也不知服
藥於未病者即致治于未亂保邦于未危也善致
治者尊賢使能振綱肅紀則政修民和苞桑萬世
在茲矣若無故典師則內生反側外兆邊塵不反
自貽伊戚哉然則保國保身無二理用藥用兵無
二術善衛生者能於平時節飲食慎起居少嗜欲
寡榮慮使五官安職百體清和將遊華胥而躋喬
松矣苟思患預防審醫可也問藥性可也讀岐黃

法可及
者下

裴子言醫 卷二

三

者假為棲真玄牝之丹。縱慾者泥為嬰兒姪女之術。岐黃帶戒視若弁髦。伐性斧斤恬如衽席。是以病端呈現種種乖謬。帶固根深。卒難期劫。而猶咎刀圭無補。非乃愚乎。

本草謂上品藥為君。至養命。中品藥為臣。至養性。下品藥為佐使。至治病者。特言其性之剛柔耳。非內經君臣佐使之旨也。王節齋曰。至治者為君。輔治者為臣。與君相反而相助者為佐。引諸藥達于病所者為使。如治寒以熱。則熱藥君也。凡溫熱之藥。

裴子言醫 卷二

三

皆輔君者也。臣也。然恐熱之太過也。少加涼藥為監制。使不致有偏熱之虞者。佐也。至臟腑經絡受病之處。又須各加引導之藥。而使之入。此則所謂使也。若遵本草之說。則發表之麻黃。攻裏之大黃。獨不可以為君。邪且性與命亦豈藥力之所能及邪。

王節齋曰。畏其制我。不得自縱。惡其異我。不能自如。此二者不深害。蓋彼既畏我。我必惡之。我既惡彼。彼亦畏我。我雖惡彼。彼無念心。彼雖畏我。我能制彼。如牛黃惡龍骨。而龍骨得牛黃。畏黃者畏防風。而黃耆得防風。其功愈大之類是也。至相反則兩仇不共。共必為害。然大毒之病。又須大毒之藥。以劫之。甘草芫花相反藥也。而蓮心飲以之。治癆瘵。藜蘆細辛相反藥也。而二陳湯以之。吐風痰。又四物湯加入參。五靈脂以消血塊。感應丸以巴豆牽牛同劑為攻。墜破積之需。相反之中。亦有相成之妙。此古人達至理于規矩準繩之外。故用之。反以為神。非好奇之私。而以人命為僥倖也。

錄本后入

高年紳患怔忡不得臥且兼情雜惡心不知味三証其脈數而滑右關特甚此濕痰凝碍中州使然

表子言醫 卷二

三五

証兼之者今有之信非其為心病矣然則其不得臥者何病耶曰素問謂胃不和則臥不安亦胃病也

自得神

痰積無計頓使病者氣清神爽百苦盡脫快不可

人以此述

昔蒲遠志天麻膽星茯神酸棗以及琥珀牛黃丹砂龍齒之屬遂巡數年日以增劇甚至煩躁靡寧不餐不寢者踰月余診之脈來數且洪而右關益以滑此胃中有火有痰之明驗也先投小胃丹五十九胸中便有旋轉勢而神情亦稍安即以鐵鑄水一碗煎半夏五錢橘紅茯苓枳實黃連人參白豆仁各一錢服之遂得安枕通宵并索食焉繼製礞石滾痰丸日服三十餘顆未兼旬而大便積去痰積無計頓使病者氣清神爽百苦盡脫快不可

表子言醫 卷二

三五

言後以艾火灼其腰之中腕巨關以絕生痰生火之源更以大補脾丸倍加參朮以保胃中元氣証雖有異而治未嘗有以異也但此病由于七情抑鬱心志不克舒伸而得終非醫藥所能療必也中懷坦若不以既往之得失與廢戀其心庶不更作商亦頗是有見家事悉付妻兒新置一婢遣之出嫁日同二三知己飲酒豪遊忘年忘日逍遙于世外之天三十年來不唯病不更作抑身年雖壽而不衰

選

昔一犯腰痛者衆以為腎虛而用杜仲山茱當歸續斷故紙地黃之類久而彌甚乃就質于余余細察之則知其病在胃中耳何也其飲食減少時發惡心嘔吐者非胃中有濕有痰之候乎且其痛臥重而行輕每臥欲起則腰勝重墜不能轉側必將此身徐徐擺動始克強起而行迫行則又漸覺舒和矣此蓋濕痰之乘氣靜而陷于腰勝之間故作痛乘氣動而流散于腰勝之外乃得舒和耳若果腎虛則臥而逸痛必當輕行而勞痛必當重抑何足

裴子言醫 卷二

三

之反歟初與小胃丹五十粒連下宿水四五行繼以二陳湯去甘草加蒼朮澤瀉砂仁三劑痛勢頓減隨與蒼朮為君之大補脾丸服未旬餘痛即如失
余臨症施治必用自家主意不敢遽因病人之所告與傍人之所傳為實據蓋病自有真非傍人所能知并非病人可得言其詳也余陳人一少年偶肆姪于妓者家歸來自以為損也乃饗餐厚味以補之次日即發熱頭疼畏寒不得汗余視之病者全

有恙

古博老醫 非老年乃 老到耳

有恙

不以自謙實告于余欲余作陰証治不意診其脈浮數而不虛且語言動止皆壯厲而有力並不見有所損之候是雖犯姪實陽証也酌與羌活冲和湯一劑病者自負知醫疑而勿服更一醫年已老而亦頗有名可無誤矣乃漫不加察輒從病者之所告以參薏桂附等藥誤投之曾未之夕即躁擾狂越遍體紅斑九竅流血而卒至于死一農家子年甚壯又形偉而氣強忽患身熱病遣其兄延余治余未往先囑之曰我弟無他病只連日醉飽更

裴子言醫 卷二

夫

大嚼羊肉麩食與新米飯耳須得大消導藥乃可療余竊謂知弟莫若兄且傷食又農家嘗習言雖未確或亦近之及往視則大不然六脉洪數而虛極頭不疼腹不悶言語輕微而更懶于動止此內傷元氣之虛熱非有餘病也連進補中益氣湯十餘劑參耆加至四五錢兼以肉食等味而調補之月踰始愈嗚呼信兄言也則為弟者必含枉而歸泉矣即此推之而謂傍人之言可據乎病者之言可據乎

酒之為人利也。禦霧疎風，祛寒敵暑，快氣舒脾，聚歡消悶，其為害也。腐腸爛胃，潰髓蒸筋，傷神損壽，債事招尤，利則當歸功于酒，害則當歸過于酒。世之蒙害于酒者，未有不歸過于酒。嗚呼！酒固未嘗害人人，自害于酒耳。胡勿思之甚也！民非水火不生，活何嘗有害于人，然亦不能無蹈水火而死者。遂歸過于水火可乎。

世皆以飲量過人者稱為善飲。酒噫，善之一字，豈僅飲之過人者遂足當其稱乎？非也。謂善得酒中之

味而飲之，不失其宜也。或值花朝，或當月夕，或遇天寒，或為雨悶，或撫今追昔，或即景興懷，或肢體怠和，或神思冷淡，或與故人聚首，或與知己談心，或與韻士高人論詩論文，論世外事，隨境之可借酒娛情于此，而能多飲者，固謂之善飲。酒不能多飲者，亦謂之善飲。酒即涓滴不飲，而酒致酒情不多，讓于過人之量者，亦未嘗不謂之善飲。酒也。若適以無節無厭，日日沉醉之輩，而稱之曰善飲，酒竊恐未嘗酒後偶及，敢請政之善飲酒者。

此可移用
使可移病
之何也
遂升瓦上
焚而與方
也

長言醫 卷二

三

可見酒之
不沈酒

張本斯五湖漫聞有云：余于都太僕坐中，見一張翁年一百十三歲，普福寺見王瀛洲年一百三十歲，毛閒翁一百三歲，楊南峰八十九歲，沈石田八十四歲，吳白樓八十五歲，毛礪菴八十二歲，俱精敏不衰。升降如儀，問其願養，皆不飲酒。即如文衡山、施東岡、葉如巖，動靜皆與壯年不異，亦是俱不飲酒者。

推蓬寤語云：人生類以眠臥為晏息，飲食為願養。不知眠臥最不可嗜，飲食最不可多。飲食過多，則陽

氣抑塞，嗜臥過多，則神氣暗消。將以養生，適以殘生。君子夙興夜寐，嘗使清明在躬，淡味少食，嘗使中懷舒泰。素問有所謂用寒遠寒，用熱遠熱之說者，論無病之嘗也。所謂不遠寒，不遠熱之說者，論無病之變也。今之人，但知其嘗，不知其變。時當夏令，不論有病無病，樂不敢用桂附乾姜，以犯司氣之熱。時當冬令，亦不論有病無病，樂不敢用石膏芩連，以犯司氣之寒。竟不思天令雖熱，而受病在寒，即桂附乾

張子言醫 卷二

三

合時從証
自然之理

東垣先生
有知也矣

總之脾虛
不能攝血
歸元不可
仍作血病
治

姜亦所勿忌。易得因其天令之熱而遠之。天令雖寒而受病在熱。即石膏苓連亦所勿忌。易得因其天令之寒而遠之。須知寒熱之藥乃治寒熱之病。在人身者耳。非治天之寒熱也。

滋陰養血之藥予固未嘗廢也。世俗則謂我廢而不用。不既究乎唯是世之季也。虧敗脾元者十人而九。故不敢濫用濕潤之藥。以戕既敗之脾元耳。豈乘廢而不用哉。試舉一二最明白最顯現者以例之。則世之謂我廢而不用者。自迎刃而解矣。如產

表二言醫 卷二

三

後諸病。夫人而知其為陰血虛也。倘其人兼有胸腹不利。飲食少餐。或惡心。或嘔吐。或作瀉。作脹。而為產後之脾胃病者。豈可擬以血藥投之乎。虛癆諸証亦夫人而知其為陰血虛也。倘其人兼有胸腹不利。飲食少餐。或惡心。或嘔吐。或作瀉。作脹。而為虛癆之脾胃病者。豈可擬以血藥投之乎。腸風下血。血藥亦所必需也。而或兼有脾胃諸証者。豈可使以血藥止之。而不思更有所以治之乎。崩漏下血。血藥亦所必需也。而或兼有脾胃諸証者。豈

陰虛陽虛
不可不
辨也
血病
不可
不
辨

可便以血藥止之。而不思更有所以治之乎。世間類是者甚眾。故予不敢妄用血藥以誤人。非真廢而不用也。

或問補中益氣湯。凡為虛証者。服之無不驗。唯施于癆瘵骨蒸之人。病必增劇。果何謂哉。曰。此方乃東垣先生為內傷勞倦而生虛熱者設也。夫內傷勞倦而生虛熱者。陽氣虛也。參耆甘草專補陽氣之虛。故用之無不驗也。佐以升麻柴胡者。因其氣之下陷也。所謂治氣者主陽而升也。至若癆瘵骨蒸

表二言醫 卷二

三

之人是陰血虛也。陰血虛者。法當用地黃當歸玄參。知母。鱉甲。門冬。沙參。牡丹皮。銀柴胡。以及秋石。童便之類。補其陰而降下之也。所謂治血者主陰而降也。適用溫補升提之藥。是助陽矣。助陽則耗陰血矣。病有不致增劇者幾希。

昔南人有言曰。人而無恒。不可以作巫醫。朱子竟認巫醫為兩事。一註以交鬼神。一註以寄死生。岐而二之。恐為未當。夫醫之道。始于神農。闡于黃帝。著有素問內經。以救民疾苦。所謂墳典之書。至尊至

貴莫之與並豈可與巫覡之徒同日而語哉但醫
有不同名稱亦是有別精于醫者曰明醫善于醫
者曰良醫壽君保相者曰國醫粗工褊淺學未精
深者曰庸醫但有時運造化者曰時醫至若擊鼓
舞趨祈禳疾病不以醫藥為事者則謂之巫醫耳
世之稱為端公太保夜行卜士北方稱為師婆皆
此也正南人謂之巫醫也蓋謂一切虛誕之輩亦
是不可無恆也

齊統云世之行醫者有一要訣不必博羣書明道理

裴子言醫 卷二

只須畧讀難經脉訣抄些經驗成方此外唯整修
醫具周匝世情奔走豪門結歡僕隸廣賂巫卜遍
囑姑婆能如是則到處彰名彰譽謂有不行者天
下鮮矣又須老着面皮不顧慚恥口口異人傳授
言言接命神丹談及富家巨室不親是親不族是
族不相知是至相知肆大其誇駭他碌碌庸庸之
輩自然假可作真耳可當日偶而僥効竟冒其功
設也誤傷委命無怨矣縱有識者洞見肺肝亦只
任他笑談錢財我自待之耳何必孜孜為學徒自

可增入者

時流行狀
庸醫無遺
不知畏了
小語此實

裴子言下

勞苦哉嗚呼醫日流于弊也至此矣無怪乎有道
者之鄙賤矣欲求得一真醫亦已難矣

近有一等行醫者偶得一方一藥輒滿顏矜色抵掌
做笑而言曰我藥能救人之命噫命果何物而可
醫藥救之也哉即古昔大聖至神靈至慈愛亦不
過能以藥治人之病未聞有救人之命者今且無
論不能救人之命即欲求其能治人之病者亦不
多見矣予雖不敏誦讀于斯者有年博採于斯者
有年心食廢寢默契神泰以至歷危際險者又有

裴子言醫 卷二

年亦僅知探虛實測淺深權緩急能治人之病還
其不死而已豈遂因以為功而曰我藥能救人之
命哉從未之敢也
宋張子綱神醫也居鄭州刑部尚書慕容彥逢為母
夫人病召子綱於鄭至則死矣時方暑月將就木
子綱欲入視彥逢不忍意其欲求錢乃曰道路之
費當悉奉償實不煩視子綱曰傷寒法有死一晝
夜而復生者何惜一視彥逢不得已延入子綱揭
帛注視呼作匠語之曰曾見夏月死者面色赤乎

識力一五
可也

老到一至

此

李心一至

曰無然則汗不出而屢爾不死也幸無亟飲趨出
取藥命急煮灌之戒曰善守至夜半大瀉則活矣
子綱舍於外館至夜半忽聞病者腹中勃勃聲遺
穢物斗許而甦舉家驚喜遽叩呼子綱子綱曰吾
體倦莫能起然亦不必起明日方可進藥也遲明
徑命駕歸鄭彥逢請其室但留平胃散一貼而已
其母服之數日良愈蓋子綱以彥逢有求錢之疑
故不告而去後紹興王和叔遇子綱問之曰公之
術古所謂十全者幾是歟曰未也僅能七八爾吾

裴子言書 卷二

美

長子病診脉審証察色皆為熱命煮承氣湯將飲
後疑以至再四勢必飲矣一似有掣吾肘者姑持
杯以待兒忽發顛悸覆綿衾至四五始稍定汗出
如洗明日愈使吾藥入口則死矣安得謂之十全
哉嗚呼子綱往矣予且未暇高其才高其識獨是
品彙絕倫大可畏服千秋而下願為執鞭因誌之
以自勵
膏梁之人與藜藿之人處境固是不同而形質亦大
有別凡有治療斷不可同病而拘一例而藥也如

子敬天

皆外感病也而膏梁之人不可太發散皆停滯病
也而膏梁之人不可太消導皆有火有熱病也而
膏梁之人不可太寒涼一或過常則元氣必致有
傷虛証立見多死少生矣正猶柔脆之物不克勝
任風霜故也

世間有一種太陽之人有一種太陰之人太陽之人
雖當冬會身不須綿口嘗飲水色慾無度大便數
日一行茶連知栢大黃苳硝恬不知怪太陰之人
雖在暑月不離襪衣食飲稍涼便覺腹痛泄瀉參

裴子言書 卷二

美

木蕤桂時不絕口一有慾事則呻吟不已此兩等
人各稟陰陽之一偏者也與之談醫各執其性之
一偏而目為全體嘗試而毀為之雖與之言必不
見信其為誤也可勝道哉
趙養葵曰冬至一陽生夏至一陰生此二至最為緊
要至者極也陰極生陽絕處逢生自無而有陽極
生陰從有而無陽變陰化之不同也若春分秋分
不過從其中平分之耳然其尤重者獨在冬至易
曰先生以至日閉關閉關二字須看得廣月令云

是月齋戒掩身以待陰陽之所定則不止關帝之門矣

又曰冬至一陽生當漸溫暖何為臘月大寒冰雪反盛夏至一陰生當漸清涼何為三伏溽暑酷熱反熾曰此將來者進成功者退隱微之際未易以明也蓋陽復于下逼陰于上井水蒸而堅冰至也陰盛于下逼陽于上井水寒而雷電合也凡病面紅口渴煩燥喘咳者誰不知是火盛之極抑亦自有腎中陰寒所逼而然者豈可槩用寒涼之藥害人

表二言醫 卷二

三

生命乎

何栢齋先生曰劉河間論三消之證皆由濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太盛所致玉機微義深取其說且謂治此疾者補腎水陰寒之虛瀉心火陽熱之實則病自已復斥世論以煖藥補腎之悞不知世論大是有理特詞不足以發之耳蓋腎主元陽元陽之火盛則能升腎藏之水使津液上行以制心火而為既濟元陽之火衰則腎藏之水不升水之入于腸胃者皆從其降下之性而不升散故心

從未有發

透快驚人

格理精微

火無制熾盛而作渴此蓋水火未濟而未可遽謂濕寒之陰氣極衰也若謂補其腎水陰寒者虛便可止渴則水固陰寒之物也渴者飲水不絕何以不能補其陰寒之虛而止其渴耶其論之非明矣世論用煖藥補腎使腎水上升以制心火不為無見但消渴之証必燥熱之陽氣有所鬱結而成若不求而去之輒用煖藥補腎則藥病扞格煖藥未得收補腎之功而先有助邪之害則消渴愈甚又不可不慮也法當用涼藥食後服之以清其上更

表子言醫 卷二

三

用煖藥空心服之以培其下權其輕重緩急而施治之庶無偏弊耳世傳有渴病候飲綠絲湯而止者蓋綠絲湯所煮者蚕蟹也蚕性極熱煮而為湯澄冷而飲之則熱性歸下而不扞格故能升腎水以制心火而止其渴所謂熱因寒用者也世人雖知有此治而未能明其旨茲故及之

朱丹谿先生曰西北之地多風寒故患外感者居多東南之地木平濕故患濕熱者恒衆蓋北方高阜天不足西北而多風東南卑下地不滿東南而多

濕方土之候各有不齊所生之病多隨土著醫者
必須因時處治。隨地判宜。治北人之病。宜以攻伐
外邪為多。治南方之疾。宜以保養內氣為本。何也。
西北氣厚。飲食倍常。居室儉素。元氣不戕。一有疾
病。輒用疎利。其病如脫。若夫東南。體盾柔脆。勝理
不審。飲食色慾。與西北迥別。築用疎利。不几于操
刃殺人耶。雖然。西北固厚。安能人人皆實。南方雖
薄。安得人人皆虛。必觀其人。因証而藥。斯無一偏
之弊耳。

裴子言醫 卷二

完

王節齋先生曰。或問。今人有言。東垣之法。宜用于北。
丹溪之法。可行于南。如何。曰。東垣北醫也。羅謙甫
傳其法。以聞于江浙。丹谿南醫也。劉宗厚世其學。
以鳴于陝西。果如其言。則本草內經。皆神農黃帝
岐伯之說。亦止宜施于北方耶。夫五方所生異病。
及治之異宜。內經異法。方宜五常。政大論已詳言
之矣。又如北方多寒。南方多熱。江閩多濕。嶺粵多
瘴。謂其得此氣多。故亦多生此病。非謂北病無熱。
南疾無寒也。至于治寒以熱。治熱以寒。則五方皆

同。豈有南北之異耶。
又曰。或問。人言。東南氣熱。可服寒藥。西北氣寒。須服
溫藥。然今東南之俗。胡椒薑桂。人常食之。不見生
病。而北京士大夫。畏食胡椒。辛熱之物。何也。曰。東
南雖熱。然地卑多濕。辛熱食藥。亦能劫濕。西北雖
寒。然地高多燥。辛熱食藥。卻能助燥。故耳。川藥者
宜識此意。

裴子言醫卷之三

鹽官裴一中著 男裴翰徙飛 較正

雲間蔣平階閱 孫 晉嗣接三訂

或問醫之療病須善用權。權之義安解乎。裴子曰。權者無心物也。朱子譬之秤錘。以其稱物平施。可輕亦可重也。用之者胸中不得預擬一成。見當在兩秤錘。不得不在兩。當在斤。秤錘不得不在斤。本非一定不移之物。而有一定不移之理。有一定不移之理。而無一定不移之心。醫者必如是。而後能乘

萬古不磨 定論

安得圓機 之上而正 之

時制宜以濟人之危。而無弊。如虛可補也。雖有精乎不可補。而因攻以爲補。實可攻也。容有時乎不可攻。而假補以爲攻。病在此而治未嘗必在此。病在彼而治未嘗必在彼。病同而治或不與之同。病異而治或不與之異。硝黃之寒也。以之攻寒。桂附之熱也。以之攻熱。羌防發汗。而還以斂汗。蒼半傷津。而即以生津。地黃之濕。亦有補脾利水之功。茯苓之通。亦有止瀉塞精之益。至于敗湯作丸。變丸爲散。朝黃連暮附子。與怒勝思。思勝恐。恐勝喜。喜

不似尋常 惟義全無 之品

勝悲之類。無非權也。用之者不知有所謂權也。唯知時所不可不執。素所守之。可以爲可。時有所可。不執素所守之。不可以爲不可。耳。夫不執素所守之。可爲可。所不可爲不可。而以時之所可爲可。所不可爲不可者。乘乎時之所宜也。時之所宜。雖欲不權。不可得也。然則權豈易言哉。非有才有胆。有識有學。而又虛其心者。不能也。何也。蓋權之用在理。而理之明在心。故必使此心不致有纖微之蔽。庶乎理可徹。而用可隨。

裴子言醫 卷三

心苟不虛。心且受蔽。理何明乎。縱有學焉。無識也。學已縱有識焉。無學之識。已縱有才焉。胆焉。皆浮氣已安。遠能乘時制宜。而無弊耶。由此言之。則不獨無才無胆無識無學者。不可以用權。即有才有胆。有識有學者。亦未可以用權。必有才有胆。有識有學。而又虛其心者。始可以用權耳。噫。權豈易言哉。夫方之能對病。而取驗者。自有所以對病取驗之理。在不可專執本草中主治。而曰某某定是治某病。

其病定是用其藥而已也。如一婦人年已三踰月，胞水盡行，不得下，浸變眩暈，無知，牙關緊閉，手足無氣，以自動。當此之際，若論催生之藥，則當歸、川芎、人參、益母、冬葵子之類，其主治者矣。余獨不以此，以半夏為君，蒼朮、澤瀉、茯苓為臣，人參、黃連、厚朴、橘紅、豆仁、姜汁為佐使，急煎俾飲一飲而醒，再煎而產。是豈蒼朮、半夏、黃連諸藥能催生者乎？蓋自有所以催生之理，在本草未及也。又一士人，大病久虛後，已大受餐，且服大補氣血之藥，藥初甚

裴子言醫 卷三

宜其起矣。不謂飲食頓減，遍體畏寒，自汗盜汗，晝夜無寧。已二三名家，僉擬多汗、亡陽，專以桂附藥者為治。汗益多而寒益甚。卒加參耆至兩許，仍爾也。余則以羌活防風為君，蒼朮、半夏為臣，黃連、皮、砂仁、厚朴、茯苓、桂枝、浮麥為佐使，甫一劑而汗旋收，并不畏寒矣。隨製人參大補脾丸與之，調理不踰月而康。是豈羌活防風、蒼朮、半夏、黃連諸藥能治大病日久之虛汗虛寒者乎？蓋自有所以汗止寒又無損于大病久虛之理，在本草未及也。

非道也 然安克致 此但見知 已人不得 奈何

非水居人 亦能辨

也。或曰：敢問香燥藥之能催生，飲汗止虛寒者，果何謂耶？曰：此從病之本而舉病之名也。論病之名，雖有難產、多汗、畏寒之不同，而其受病之本則皆痰涎壅閉胃、口、耳、胃、口者。真氣運行之樞所也。彼難產者，真氣本滯，且經連日困頓，飢飽難調，飲食疎而湯飲雜，勢必釀作痰涎，以閉胃口，則真氣滯而不行，視其喉，眩暈無知，若中狀可徵也。故不得不用蒼朮、半夏等藥，開豁痰涎，使真氣得行而胎產耳。若專事催生之藥，適足為胃增邪，不至氣

裴子言醫 卷三

閉絕而子母盡傷不止矣。至夫大病久虛後之參汗畏寒者，亦猶是大病久虛後，胃雖強而氣尚弱，易于加餐，難于運化，且兼湯藥之補無虛日，則濕熱必鬱于中宮而為痰涎矣。故飲食頓減而多汗多寒耳。或曰：痰病食減亦誠有之。若汗與寒則安所解？曰：人身捍衛之氣出于胃，胃既為痰涎所閉，則捍衛之氣不能布皮毛，充腠理，而多汗多寒矣。先哲謂中脘有痰，令人多寒，脾濕不流，令人多汗，未知之乎？其多汗而反用羌防者，以多汗而腠理

誰敢贊一

臨世利知
殊不切得

有陽無陰
四字不可
深也

開風氣乘虛來客必先去其風而汗始易收也其
畏寒而反用黃連者以寒非虛寒乃濕熱生痰所
致之寒濕熱清而寒自止也。有此病用此藥何嘗
不遵本草中之主治哉。但不執其主治之名而從
主治之本耳。

昔王好古論人參曰肺熱用之則傷肺王節齋論人
參曰陰虛血証忌服服之過多必不治余深味之
皆千古不可移易之繩墨何後之妄議其非者
然也是豈詞不足以發其理而人莫之解歟非也

表二言醫 卷三

五

唱和成風耳熱心痼遂不復有揭其理而正其說
者矣。謂非吾道之一大不幸哉。夫所謂肺熱者即
陰虛之肺熱也。所謂陰虛者即肺熱之陰虛也。蓋
肺熱謂陽獨盛陰虛謂陰獨虛。陰虛則陰不足
以化陽而火熾火熾則燥金而咳血咯血乾嗽
嘶諸肺熱之候所從出矣。此正有陽無陰之癥病
治當曲盡養陰之法以化陽而救熱。用人參助
其陽氣則肺愈熱而陰愈虛。喘嗽痰血不愈。甚乎
此兩先生所以垂戒諄諄乃爾。後人不察悉誤以

近有願生
欲論亦切
此日吻安
誠兩先生
可笑

表二言醫
卷三
且重光

素問無陽則陰無以生之旨。認作陰虛之病論。則
曰造化之理。陰從乎陽。凡陰虛者必皆用人參補
陽而生陰。又執朱丹溪虛火可補。參耆之屬。暨張
潔古入參補上焦元氣而瀉肺中水邪。以及李東
垣人參補元陽生陰血而瀉陰火。諸論以為乳
虛火。肺火。陰虛之火。無不可用人參以補之。遂
然侈口而斥兩先生之非。嗚呼。何其不明也。甚耶。
素問謂無陽則陰無以生。論陽虛之病耳。非所論
于陰虛也。其所論於陰虛者。已自有無陰則陽無

表二言醫 卷三

六

以化之句。與此彰彰。載于書。豈無。勿講乎。
一則因其無陽也。治當補陽而生陰。一則因其無
陰而有陽也。治當補陰以化陽耳。明乎此。則知其
無陽者可以補陽而有陽者不可以補陽矣。若以
補陽氣不足之人。參耆加於肺熱陰虛之病。是有
陽而又補其陽矣。矣。可哉。若夫丹溪謂虛火可補
謂其可補氣虛之虛火也。非謂人參可補陰虛之
虛火也。氣屬陽有餘便是火不足而補火自退。有
餘而補火愈熾矣。潔古謂人參補上焦元氣而瀉

人

有此轉語
後氣足
理透

再能解結

肺中火邪者亦指其補上焦元氣不足而瀉肺中
火邪也非謂人參能補陰血不足而瀉肺中火邪
也至東垣謂人參補元陽生陰血而瀉陰火亦因
元陽之不足不能生陰以制火故補之非為元陽
之有餘也不究其理而妄議其非不大謬哉或曰
然則四物湯之加知柏人參以治陰虛潮熱者
膏之用人參以治肺腎陰虛嗽血癆瘵方之用人
參為末鷄子清調服以治上氣喘急咳血唾血其
大吐血後之不用血藥以獨參湯專補陽氣而生

裴子言醫 卷三

七

陰血豈盡欺人者乎曰其喘嗽潮熱咳血吐血等
証固不可不謂之陰虛不謂之肺熱其與兩先生
之所謂陰虛謂肺熱者則不同也何也兩先生之
所謂陰虛謂肺熱者謂陰獨虛而陽獨盛者也若
四物加人參等方則是治陰虛陽亦虛之候也
至于陰獨虛而陽獨盛也或曰陰與陽若權一
虛則必一盛豈有陰既虛而陽亦虛之理乎曰陰
虛陽必盛勢固然也但陰之虛必自漸而虛陽之
盛亦必自漸而盛陽自漸而盛僅可謂之陽漸盛

吳希叔

漢

未可謂之陽獨盛也未可謂之陽獨盛雖謂之
亦虛亦可也蓋此時亦尚有可受補陽藥之餘地
在故不得不用人參乎補陰藥中以佐獨陰之不
長不如是則陰無以生矣然用人參者務須以陰
陽盛之淺深為增損如四物湯治陰虛潮熱者
人參又加知柏為監制瓊玉膏治陰虛嗽血以
地黃為君而人參僅佐十五分之一亦皆衡量而
施不敢多用以助陽之盛節齊先生後有過參不
治一語良有苦心若至陰虛漸深陽盛亦漸深則

裴子言醫 卷三

八

未有不至陰獨虛而陽獨盛者矣至此便是有陽
無陰之療病無論人參不敢多用即最少如瓊玉
膏之法恐亦不無抱薪救火之虞矣垂花方者乃
治元氣大虛脈來無力之咯血唾血者耳獨參湯
者乃治卒然大吐血後氣敗神疲六脈幾絕所謂
陰竭而陽暴脫者耳更非所以治陰虛治肺熱也
豈可遽執古方皆用人參遂指兩先生為非哉若
遂指兩先生為非而設加人參以誤有陽無陰之
証於非命俗流必視人參為蛇蝎并視無陽則陰

無以生之古為空言而凡遇陰虛陽亦虛之候盡
畏人參而不敢前矣其為禍於萬世蒼生寧有既
耶

或問痢之初發吐之無度新產之昏暈大吐血之不
止傷寒發熱不休腹中痞堅如石胸痺腫突如蠶
胃腕脹悶不能食氣喘痰升不得眠以至冷氣鎗
心狂言奔走坐臥不寧腹中按之硬痛大便不通
之數証世皆執為有餘之証而不敢用人參以補
之者子獨於此數証之間屢用人參而屢獲驗果

裴子言醫 卷三

何謂哉曰此皆似有餘而實不足之証非真有餘
也不用人參以補之則虛虛之禍曷可勝言曰何
以知其似有餘而實不足也曰全憑乎脈而兼徵
形色之榮枯呼吸之衰旺與手足而鼻之寒溫乃
得之耳曰既憑乎脈其所現之証似有餘而所現
之脈或不足猶可憑其脈而斷其虛若所現之証
似有餘而所現之脈亦似乎其有餘者則將何所
憑而斷其虛乎曰其所現之脈似乎有餘者非洪
大則數極耳人見其脈之洪大遂謂有餘殊不知

心細如髮
不知從何
來

脈雖洪大而以指按之必隨指而散不能與指
相搏矣素問所謂脈至而從按之不鼓者此也至
於數極之脈似為有熱而不思有熱之數數而有
叙無熱之數數而無倫無倫者言脈來之數極而
至數不克整齊耳既得其脈而又以形色呼吸
足而鼻之虛實而推測之則其似有餘而實不足
之証自無可匿其情矣此時縱有大實大滿大熱
之候豈可遂執堅者削之留者攻之升者降之熱
者寒之之法而悞人於非命哉

裴子言醫 卷三

世俗謂產後五日内不可用人參測其意恐瘀血之
不行耳噫果瘀血之不行而謂不可用誠是矣設
有行之不止以至昏眩無知六脈幾絕手足盡冷
而為血脫陽亡之候其亦可以不用乎竊恐此際
即立資人參薑桂急救之亦有不及濟者矣安問
三日與不三日也今之病家醫家未經察究每遇
產後但知有瘀血不行之可慮而不知有血脫陽
亡之可危恒坐視人之死而不救可悼也夫
一巨家室五月而小產產不踰時而即血崩不止六

世俗通弊
亦世間通

裴子言醫
卷三

脉虛微。神情昏倦。此血欲脫而陽欲亡之候也。予甚惶怖。急以人參一兩。肉桂二三錢。不切而咀。即注爐頭沸水。急急煮飲。以追既耗之元陽。未半而室已運去。更視之。則六脉幾絕。手足冷而通體涓涓汗矣。予惶怖益甚。忙取二大磁甌。不待參味。盡全旋以。一注參汁。少許。急持與飲。復以。一又注少許。急持與飲。如此。遞相持飲。盡即脉起。神旺。手足溫。而汗已收矣。既而胸中作滿。疑故于參。予謂此非參故。乃湯飲多而不能頓行。故也。頃候咳

裴子言醫 卷三

中有汨汨行下聲。自平耳。未幾果然。然其所以用參之不切。而咀而又以沸水急煮者。何也。恐稍緩不及濟事耳。其注參汁于大甌。而遞相少進者。又何也。恐參汁熱而驟難下。口轉致遲遲耳。非有他。也不如是。則徒有救人之心。而無救人之術。與不救者何以異。甚哉。成見之誤人也。予昔治一女人。難產後。即發熱不止。汗甚多。而語甚錯。六脉洪大而虛。且又坐臥靡寧。五六晝夜。會不經一合眼。一合眼。此身不啻

飄飄浮雲中。則明是一箇氣血大虧。以致虛陽亢上的証候。夫何以參朮歸耆丹皮童便及炒黑乾薑之類。屢進而屢不驗。且不止不驗。反增頭眩耳鳴惡心。情雜欲嘔。不得嘔。數証。則知其非氣血之大虧。乃痰涎之壅盛矣。遂更一方。半夏三錢。天麻二錢。茯苓橘紅豆仁厚朴黃連枳實各一錢。竹葉三錢。鐵銹水煎服。不二劑。而氣爽神清。身涼脉靜。矣。繼以人參大補脾丸。日進二服。以培胃中元氣。數日後。漸覺飲啖加餐。月餘全愈。然則予之所以

裴子言醫 卷三

誤認爲氣血之虧者。孰產後之成見于胸中耳。須知學者不可不虛其心。而廣其識也。一士人于冬月患痢。晝夜幾百餘度。裏急後重。惡心不能食。腹中按之硬痛。六脉細數。無倫手足而鼻俱青冷。雖當初痢。卻屬陽虛。大非木香檳榔黃連大黃之所能治者。急煮人參一兩。桂附乾薑各一錢。不食頃已再進。竟不見有溫補之驗。續與倍加桂附者二劑。而後手足漸溫。惡心漸止。飲食亦漸進。特痢未之減耳。更以人參爲君之大補脾丸。仍

人皆不知

加桂附俾且晚服之以扶胃氣而加餐飲食此治
本之第一要圖也半月來約服人參八九兩附子
三枚脈始洪長有力口復燥渴而思飲冷其始則
陰繼則為陽耳仍以大黃黃連檳榔芍藥之類滌
去腸中宿垢後以加減參苓散作丸與之保全元
氣

昔余母年七十時先已熟病有年矣復于除夕陡然
病痢痢次之頻不可以數計加之神昏不語雙眸
倦開身發熱而面赤氣奔迫而脈洪大以虛默想

養子言醫 卷三

五

如此高年如此久病如此脈証豈可遽以常病常
法療之也哉且察其所病之勢甚頻而滑又不見
裏急後重則明示以當補不當瀉之候隨取人參
蓮肉各一兩砂仁一錢不間晨夕濃煎灌之至五
日果得痢減神清身涼脈靜并素食矣自此日用
補中益氣湯加桂附少許服至四十餘劑始得飲
啖神情俱如故後幸終其天年度八十歲有奇而
去

一十八年三十餘性偏壅滯而多房慾忽于暑月腸

此際極易

胃堅結不行腹中按之硬痛且氣弱神疲不能食
其脈則遲細而虛曾已快藥下者數四子謂此元
氣大虛不能運行所致絕非有餘証更用前藥請
勿復敢見矣遂違眾以人參二錢肉桂一錢大棗
五枚不終朝而二劑雖不覺有補助之功然亦安
妥而無忤後以補中益氣湯人參加至四五錢連
服五六劑始克脈旺神昌頓餐粥食大便不攻自
行

一貴室婦傷寒汗下後脈洪大而熱不止口不渴腹

養子言醫 卷三

古

不滿身不畏寒熱只氣乏神疲昏迷似睡叫呼不
能以語應眾醫咸聚有謂傷寒兼中痰者有謂是
狐惑傷寒者有謂腹中尚有燥屎更須通利者有
謂餘熱未清更須和解者予曰皆非也乃元氣之
大虛也以人參五錢當歸三錢炒黑乾薑二錢五
味子三十粒不間晨夕者七餘服果得身涼脈靜
氣爽神清

偶得往來潮熱之候未可遽執為外感風寒輒服發
表之藥蓋其間亦或有元氣內損而然者一或少

細心詳察

好明師

好明師

差則陰証立至多死少生當此之際務期反心自
付數日以前數日以後有無勞倦之傷有無飢餓
之失有無房慾之非反復加詳庶不致為醫藥所
誤

吾鹽一高年紳止一子年三十餘素恃形氣強偉全
不以醫是慎忽于癸未六月間因母壽筵宴客連
日以致應酬勞頓遂發往來之熱類乎外感渠宿
與一醫交善即邀以治之醫值他適其徒代為之
視輒與羌活紫蘇防風等發散之藥一劑服後汗

裴子言醫

卷三

三

夫出而熱益不止乃求治于余余往視則形氣雖
不減于平時而六脉已細數無倫矣嗚呼本屬內
傷又復大汗為之奈何即取人參黃芪各五錢附
子肉桂各二錢當歸三錢浮小麥一撮急煎俾飲
以冀其倖不謂處劑方成而渠師適至則亦認為
外感概棄子藥復以前湯表之汗更大出不止會
不移時絕不見有纖毫脉矣深夜而斃須知膏粱
子弟外實內虛不可拘其氣強形偉違恃之為大
格也

解木病而
神先病其
內也

昔子一故人賦性沉滯思慮偏多年至四十有六始
生一子又值留帶亾之次年抑鬱之懷勢必倍于
時昔則真氣內傷非伊朝夕也明矣忽當暑月復
因時變奔馳失調飢飽隨病往來寒熱一似瘧焉
時子近跡山中聞問都存不得與之候延一醫以
為寒客而以羌活防風柴胡葛根等類汗之更始
醫以為食滯而又以枳殼山查陳皮厚朴等類瀉
之若飲食則絕然不與病日增而體日困偶子入
邑聞之急趨候而已身汗如淋兩脉盡脫莫之挽

裴子言醫

卷三

六

矣每念及此深為痛心
一孝廉往為諸生時以遷居繁擾旦暮為勞且亦兼
有少年事內傷元氣業已久之而于秋盡冬來忽
發日晡之熱渠頗自負知醫恬不以意予為診之
則六脉已虛疾無倫殊為可駭渠時見子有畏難
色反笑而迂之曰某瘧耳安足慮予曰勞且隨劇
易以瘧云即處一湯以人參五錢桂附歸朮各二
錢囑曰急急煮飲差可無虞渠猶泄泄未之遽信
曾不移時輒汗流如洗手足冷而目眩神疲就枕

黃為可頌

如此較之
重惜名與
若不會天
為我

可見胃氣
便克元氣

諱為天相
神假子千
雲生

不能佈語矣始信予言之不謬急以前湯連服五
六劑人參加至一兩餘勢乃定于是自家而族而
親友僉相頌曰功莫大矣感何如之子曰未也三
日內無變証方為佳兆眾疑而問其故子曰脉尚
幾幾欲絕耳越日更往視則脉狀仍然而汗復以
時至予心憂甚即止宿于渠家不避晝夜以猛圖
事之必濟旋用人參一兩附子半枚另用黃耆二
兩煮湯煮之如此大劑不須更而二進汗竟不止
三進亦不止至四進猶復不止時參已竭而漏鼓

裴子言醫 卷三

卷三

七

已三沉矣家居郊垆無參可市為之奈何不得已
復以煮過人參四兩咀而味之則亦尚有餘性即
合煮汁以濟權時之竭卒至子後陽生之分補力
方到而胃氣方回得啖糜粥二既肉食數箸而汗
始止脉亦自此有叙不至虛疾無倫矣遲明急市
人參以繼之後全愈四踰年得舉鄉試時有聞其
捷音者握子手而言曰某貴矣必憶當年用藥人
也予曰今日可貴昔日自然天相于裴生乎奚有
聞者曰某鄰人也幾以陋俗者陋子矣

日月中天

此竹枝詞
補之法也

取會使人
心厚

長病與高年病大要在保全胃氣保全胃氣在食不
在藥萬不可專攻于藥致妨于食倘其力所能食
時所當食寧可因食而廢藥不可因藥而廢食
人當病愈後胃氣必虛固不可恣情口吻尤不可小
心太過絕口不沾肉味或曰本草謂猪肉助火生
痰發風動氣于人有損無益子何出此言也子曰
人以血氣成軀虛則當以血氣之味為補助此固
自然之至理岐伯所以有肉為胃藥之稱孟氏所
以有非肉不飽之論也朝與夕親習以成性雖有

裴子言醫 卷三

卷三

六

助火生痰發風動氣之害亦與之俱化矣子有二
譬焉譬之藥中之大黃非所稱有損無益者乎而
或重生其間則必不能離大黃以為命設取而飼
之人參自木之中其重反不得所而死矣此各隨
其質之所由生性之所由習豈藥論物味之損與
益哉又如污泥糞壤孰不以為穢惡之物唾而遠
也其間或生重焉則亦必藉污泥糞壤以為命矣
倘憐而愛之者將畜之于清谿冽澗之中其為重
也得更有踰時之命乎由此推之則猪肉之于人

從麻不從
詞者此也

有大議有
大解

記好決詳

趨也

以勢使然

未嘗有損而無益也

激川一故人子傷寒旬日後身熱不止形氣衰疲語
言低怯頗近危困及脈之則兩手皆平一似無所
病者隨詢之曰腹中飢否曰飢甚急取糜粥一椀
與之食便覺神情甦若有生趣矣頃之復思雞子
食即以雞子二枚攪勻和水熟而食之更覺神情
愉悅語言多力矣未幾聞有肉絲與笋菜調羹香
美欲食遣婢問余余沉思良久曰食亦不碍隨與
肉絲羹梳許一啖而盡半日間神情頓為清徹并

裴子言醫 卷三

北

不知其熱之于何而解矣時渠尊老自山中請卜
而歸張皇殊甚未交揖輒問予曰此兒可得復生
乎予故戲之曰不能曰是則奈何不識尚可用藥
否曰頃已三劑矣一粥二雞子三肉絲羹渠老不
覺驚喜交集撫予肩背而大澤曰是何治法曰
他病已去胃已虛所少者食物耳何必醫三片藥
二枚服不拘時渣再煎也
傷寒初起時則畏寒喜熱數日後寒邪傳裏變為熱
邪不畏寒反畏熱矣此際慎勿扇門塞牖垂幕多

余以助其勢倘更畏熱之甚渴欲飲水躁欲裸形
亦便當權時任性勿得過為拘忌不止傷寒為然
凡雜病有餘之熱法亦同之

傷寒熱極狂躁渴欲飲冷而以橘藕瓜梨之類及新
汲井水涼而解之者先賢之立法也世人不曉謂
是子之憶說而不敢用其為悞也可勝言哉類編
所載程元章夫婦皆嗜鯨一婢日主烹飪不適口
即捷之偶一日得一鯨頗肥大夫婦以足充其嗜
喜甚婢操刀欲屠忽不忍其伸縮乃釋縛而置之

裴子言醫 卷三

手

後園池中夫婦以鯨失怒而重捷越二年婢患熱
病昏瞶幾死遂移棄後園池亭以待盡不謂天未
曉後宅有扣扉聲眾疑為鬼婢曰是某耳啓之果
然眾驚問其故對曰夜將半彷彿一黑物將濕泥
萍草徧覆週身頓覺肢體清涼百苦盡脫始知獨
臥亭子上夫婦異甚追尋復使往効昨夕所為而
密伺之見一大鯨負水藻泥萍自池中出夫婦不
省所以婢遂實以往事告急洵其池果得一鯨已
倍大于昔矣尾後穿窬猶存即遣使送至深淵自

古人多矣

水

此

此夫婦感悟永不食驚嗚呼一水族之微而亦識
熱者寒之之法不亦深可慨哉

傷寒本是陽証若至日久不痊須防陰証蓋傷寒日
久元氣已虛更或寒涼與汗下之藥太過則元氣
之虛益甚陽証變陰恒有之耳其脈則洪數無根
或斷續不整與細疾無倫次手足則乍溫乍冷或
手足未冷而鼻端先冷此時縱有躁渴狂譫舌胎
便結等熱証不可更用涼藥矣急當以桂附參薑
酌微甚而溫補之溫補之後倘或復見陽証陽脈

裴子言醫 卷三

三

者不妨仍用陽証之藥

煮藥用水天泉為上山水次之河水又次之至于井
水則陽和微而陰濁勝非病所堪唯傷暑傷寒之
熱極宜新汲而飲之彼城市中人日用井水而不
深害者習之熟也若有病則又是不用井水為良
張子和曰余昔訪靈臺間太史見銅壺之漏水焉太
史召司水者曰此水已三環週水滑則漏迅漏遲
則刻差當易新水余割然悟曰天下之水用之減
火則同濡稿則同至于性從地變質與物遷未嘗

罔焉故蜀江濯錦則鮮濟源烹楮則溫南陽之澤
漸于菊其人多壽遼東之澗通于棧其人多髮晉
之山產礬石泉可愈痘戎之麓伏硫黃湯可浴
又如冰水咽而霍亂息流水飲而癰閉通雪水洗
目而赤退鹹水濯肌而癩乾干派萬種言不容盡
至于井之水一也尚數名焉及酌而傾曰倒流出
瓮未放曰無根無時初出曰新汲將旦首出曰井
華一井之水而功用不同豈烹煮之間將行藥熟
獨不擇夫水哉用水者其熟察之

裴子言醫 卷三

三

煮藥之法取味者火宜緩取氣者火宜速若遇倉卒
之病則不論取氣取味皆宜速緩則病邪滋蔓
難圖也余每到病勢危篤之家未診視先令急煮
水診視峻水即湯湯矣取藥煮之差可濟急
世俗服藥之弊有六有食已而即藥者有藥已而即
恣飲茶湯者有藥食雜進而恬不之忌者有纒服
此醫之藥而旋以彼醫之藥繼之者有明受此醫
之藥而陰則服彼醫之藥不肯明言以欺人者更
有苦于服藥所授湯丸必潛傾廢中外待人又為

此舉世通
其病家不
知醫家亦
知如斯

病無他
是黃連
水藥于
官得家
不如竟用
之藥

互隱而無可措者病或偶減固無論已設或偶增咎將安責

病中固宜節食尤宜節飲食傷人所易知飲傷人都

不覺不唯茶湯漿酒以及水泉瓜果之傷謂之傷

飲即服藥過多亦謂之傷飲其見証也輕則腹滿

腸鳴為嘔為吐重則腹急如鼓為喘為呃甚則紫

閉牙關涎流口角昏憤不醒人事狀類中風患此

証者酒酒皆是或未有識不得不為來者言之

世俗謂病瘧之人忌茶忌藥不則令人中滿余深味

表子言醫 卷三 三

之亦甚有理特詞未之達耳所謂忌茶者非忌茶

也忌茶湯也謂病瘧之人茶湯不可過飲也忌藥

者非忌藥也忌湯藥也謂病瘧之人湯藥不可恣

投也蓋病瘧之人中宮多濕若更過飲茶湯恣投

湯藥則以濕助濕矣鮮有不敗脾元而成中滿之

候者孰謂恒言無補于世哉

脾胃者養生家第一要具也不可使之熱生生物熱

物軟硬物雖然竟是有食生而不見為生所積食

冷而不見為冷所凝食硬而不見為硬所碍者此

今人皆徒
治其末而
不治其本
所以十病
九失

病後口不
甘也

合此無功

皆逞脾胃強旺之勢于一時實不足為養生訓也

舉凡胸腹中有痰有飲有積有痞或脹或痛或酸或

嘈或吐或瀉一二症時止時作經年不瘥者急須

猛意以圖全愈毋俟他日別病相加掣肘莫措然

其所治之法則灼艾先而藥石次蓋灼艾治病與

藥石不同藥石固能治病久之必動腸胃妨飲食

而壞元氣灼艾則不唯能治病并不動腸胃妨飲

食以致壞元氣耳嗟嗟世之人喜藥石而惡灼艾

者多矣而抑知灼艾之為功遠踰草根木皮萬萬

表子言醫 卷三 三

灼艾後唯節飲食三字為首務不可養養厚味致傷

胃氣今之人一經灼艾便以食不勝人為憂其始

也胃氣未傷猶能勉力啖嚼數日後胃氣被傷即

脹滿而不能食不瀉則吐不吐則瘧與痢所從出

矣且更不思自貽伊戚而猶咎施艾者之無功良

可笑也良可悲也

虛勞病唯于初起時急急早灸膏肓等穴為上策外

此則絕房室息妄想戒惱怒慎起居節飲食以助

李時珍治
致言了微
未有能出
其右者

大啟信人
之述

普世康言

火攻之不逮一或稍遲脈旋增數雖有良主勿克
為已葛可久日癆証最為難治當治于微病之初
莫治于已病之後深有肯也至夫藥餌則貴專而
少不貴泛而多萬不可設聽名流積月窮年不撤
潤肺滋陰之藥潤肺滋陰之藥擅名固美釀禍極
深不可不知不可不慎

世俗謬以週身刺痛為鬼箭打不知此病乃是濕痰
與氣交滯而成滯于腰則腰痛滯于背則背痛滯
于胸肋則胸肋痛豈有鬼箭之理哉治當破氣而

素子言醫

卷三

三

兼燥濕消痰之藥痛無不止今世俗有以針挑指
擦而痛亦能止之者卻合此破氣行滯之一法未
可逃指為非也唯是草藥油酒與穢惡不堪之異
味害人不淺耳胃之強者間可侍生胃之弱者卒
無一人免于死痛哉
凡胃氣不足之人斷不可謾服草頭藥汁草頭藥汁
最能傷胃胃氣虛者服之必死縱或不死胃氣終
難完復且更有草類相似收採不真誤中殺人
之毒于頃刻間而莫之救者矣歷有明驗言之慘

人

紹興有僧名希賜者從客舟自番禺至舟中有士人
携一僕病脚弱不能行僧憫之曰吾有一藥能治
効如影响餌之而瘥者不可勝計僧時寒廟軟頗
醉即入山採藥遽投酒中投病者服之方入口輒
呻吟云腸胃痛極如刀割截遲明死士隨以咎僧
僧曰安有此事即取昨夕所餘藥自投酒服之不
踰時亦死蓋由山中多斷腸草人食之即死僧之
所採想為根蔓所纏結因醉不之擇是以及于禍

素二言醫

卷三

三

信知草藥不可輕服也
一人年已望六熟病半載矣飲食少進體中倦怠怒
患黃疸証有授以草頭藥汁連服三日疸未除而
吐瀉交作矣遂致絕粒卒至不救遵生者鑒之
凡瀉痢病虫病疳病水病酒病疸病于初愈時斷
不可驟服滋補之藥蓋此救病以濕熱為原滋補
之藥乃助濕熱之尤者驟爾服之鮮不致害
昔當湖一孝廉與子通家世講也其為人偏滯而多
思每無事而恒戚戚偶于甲午秋初忽病疽後雖

如此美不
之藥安忍
真舍

全愈用飯未能嚼嘗則脾尚虛而濕未清也。會值
公車北上有一醫製以天王補心丹數斤為噍奈
一往舟中餌無虛口未中途漸覺胸膈有碍飲食
復以日退全不察其藥之有為害也仍日餌之無
間人春而疽病復作迨歸而形容枯槁僅存皮骨
其廢靡然按之若石始則為疽繼則為鼓也皆
虛坐濕之所從出也。招予往治真氣已衰敗無
無可着手處矣。越旬湯飲俱絕而死此亦誤投滋
補之一驗也。

裴子言醫 卷三

三

昔一好補者于暑月暴瀉服蒼朮厚朴澤瀉蒼朮黃
連砂仁等藥二劑業已愈後唯節飲節食以全胃
氣可耳不必更事藥也好補者以為既瀉之後元
氣必虛輒用人參白朮甘草黃耆米仁山藥之類
一服頓爾胸中滿悶大便窒澀不通且三四日不
能飲與食乃就瘖于子。子曰暴瀉初安濕邪未盡
遽投大補之藥是齋盜糧養寇兵矣。奚怪其為瘖
也。即取蒼朮為君佐以枳實厚朴澤瀉陳皮砂仁
半夏木香山查之屬作丸俾服而痊。語云病去勿

以日養血
兩日養氣
原出尋常
為常

得埃加攻補良有至理

凡近產不可祈占問卜聽彼巫覡之徒乘機哄嚇以
吉為凶當何禱神當何求佛致使孕者憂疑恐懼
夢想多成危境真氣反因鬱結而不舒臨產之際
不難產亦自難產矣。患此候者急用人參白朮當
歸川芎砂仁枳殼蘇梗大腹皮之類日煎服之以
舒鬱氣而扶真氣。
人但知臨產可危而不知既產尤可危人但知難產
可危而不知易產尤可危人但知病產可危而不

裴子言醫 卷三

三

知健產尤可危是何也。臨產難產病產在勢為逆
逆則人人皆懼懼則心倍兢持未或有失既產易
產健產在勢為順順則人人皆忽忽則心恒懈弛
反致多虞。呂氏曰懼者福之門忽者禍之源理固
然也。
妊婦調押之要單在養氣。養氣即是養力能養其力
則產固不難亦更無他病。其養氣之法勿過勞勿
過逸勿過飢勿過飽更勿得為憂為悲為驚為恐
與怒而後以參朮芎歸砂仁枳殼之類補助之則

真氣自能充塞流行于身而不息有荷產之足慮而病之足虞也若不知此養氣之法而過勞則氣為之耗過逸則氣為之滯過飢則氣為之衰過飽則氣為之閉更若憂焉則氣結悲焉則氣消驚焉則氣亂恐焉則氣下怒焉則氣逆矣又何產之不足慮而病之不足虞也
最險是橫生逆產此皆少不經事用力太早之誤蓋兒若母腹未產時頭則向上迨將產勢必轉身覓路而生頭乃向下若兒身方轉頭未向下竟被產

養子言醫 卷三

五

母用力一逼兒將錯路無門不橫生便逆產矣其轉身時痛楚難忍只宜寬心少待待兒轉身既定頭已向下腰痛如刀割截方可用力至期須得諸事穩妥與老成人侍奉庶不誤事
臨產勿得妄用催生藥催生藥者因產之難而設也產若不難催必反害孕婦臨月常有試月與弄胎兩候其候似乎即產忽不踰時而胎後安焉如故更越旬餘或二旬始得正產倘不加察妄意催之禍旋踵矣余于臨產止用獨參湯佛手散益母膏

身字大可

產固宜不產亦無不宜也
凡勞心與勞力之人須時偷閒調息以保既耗之元氣蓋氣根于息息調則氣調氣調則一身之中無不流通四達而百脉安和神情清泰雖勞不甚苦人矣調息之法端默靜坐謝境澄心口目俱閉止于鼻中徐呼徐吸任我自然勿得作意思為着力太重反使本來不息之真室而不利
讀書家必習養生法能習養生法不唯于身利更于心利舉其要莫先于少睡少睡則神靈神靈則氣

養子言醫 卷三

五

真氣與神靈心自然交利矣然少睡之工有六
靜而勿躁一也疎遠房室二也常收此心于腔中三也深夜勿寒勿餓四也行住坐臥不怠調息想五也每日將晡神氣昏濁輒偷閒一憩六也
六者行之日久不自知其惺惺少寐矣善讀書者幸勿以此為迂
凡用補藥必兼瀉邪邪去則補藥得力譬之滌衣先除垢膩而後粉飾可加耳若常事補而不知邪氣之當瀉補必為害

中氣之道
易而難

此本者
多便多
安矣

無病時之脈各有不同或偏洪大而浮者或偏細小

而沉者或偏有力而數者或偏無力而遲者此各

本來所賦使然非關病也必于平時預與善診者

審究詳明熟識本來脈狀庶有病之時易為推測

而無認彼作此之誤

瀉病無他治寧機毋飽是其治也諺云吐瀉無藥

候到日蹉西言維俚鄙切中病情不可不為之三

後然可戒而不可犯者有五一酒二晚餐三湯飲

四生冷五油膩腥羶戒之而瀉不愈者未之有也

裴子言醫 卷三

三

愈之而瀉得愈者未之有也

病之加於小愈者因小愈而放其心也天下事處道

者恒多易處順者反多難病當未愈而求愈時欲

不得逞志不敢肆凡語言動止饑飽寒溫以及情

性喜怒之間無不小心翼翼自然逆可為順不期

愈而不愈者鮮矣愈則此心不覺康強自慰保養

漸疎恣口吻也爽寒溫也多語言也費營慮也近

房室也順情性而煩惱也廣應酬而不自知為勞

且傷也有謂病不反加於此者無之矣因德孟未

子生於憂患死於安樂之說信不可不書紳而銘

座右也

人咸謂神昏之病原於心心清神乃清愚謂神昏之

病原於胃胃清神乃清或疑神藏於心於胃何與

曰藏神者心而攝神者氣氣出於胃胃氣不清則

不能攝神歸舍而心神之昏昧也必矣子如不

不觀醉酒之人乎醉酒之人醉胃不醉心也何以

神昏而語言錯亂也不觀飽食之人乎飽食之人

飽胃不飽心也何以神昏而頽然欲寐也不觀痰

涎壅塞之病乎痰涎壅塞之病病於胃未嘗病於

心何以神昏而暎眩無知若中狀也不觀陽明內

實之病乎陽明內實之病病於胃未嘗病於心何

以神昏而躁妄狂譫如崇憑也或乃為之撫然曰

命之矣

凡有以問疾來者勿得與之相接一人相接勢必人

人相接多費語言以耗神氣心所契者又因契而

怠倦心所憎者又因憎而生嗔甚或坐盈一室競

起談風縱不耐煩又不敢直辭以去嗟嗟有病之

裴子言醫 卷三

三

何行正氣

人亦克幾何而堪者此恐不終朝而病已增劇矣然此猶為害之小者耳更有一等搖唇鼓舌好事生非病者一或輕聽必致惱怒填胸不知自愛而其為害又不可言智者于此休將性命做人情病中但可安分調攝不可偏信師巫殺害生命不唯損費造業更使心志狐疑溺情鬼窟而切身珍愛之圖反置勿問愚孰甚焉
病人臥榻不可薄以茵褥致使隱寒犯背寢傷五藏之陽變証增邪莫此為甚仙經曰背以陽為主而

素子言醫 卷三

五

五藏之俞穴通焉一被寒侵則寒氣緣俞入藏而藏寒藏寒則陰盛陰盛則陽衰陽衰則轉輸遲滯傳送乖違氣血亦為之損敗輕病必重重病必至于死矣可不慎乎不特病時不可即平時亦是不可
有有病素不服藥者不為無見但須知得病從何來當從何去便是藥耳如飢則食食即藥也不飢則不食不食即藥也渴則飲飲即藥也不渴則不飲不飲即藥也惡風知傷風避風便是藥惡酒知傷

世無一五

世無一五

此理

示日作人
參白木之
濕而日佐
山藥扁豆
等藥之滯
其性
之妙者也

酒戒酒便是藥逸可以治勞靜可以治躁處陰以卻暑就煥以勝寒衰于精者寡以慾耗于氣者守以默怯于神者絕以思無非對病藥也人唯不自知耳

崩漏與腸風日久鮮有不至脾胃愈和飲食無味而後腫發黃者一見此証便當從脾虛不能攝血歸元為治萬不可仍執血分之病而用血分之藥此說業有詳論似毋庸贅但恐成心不化者既欲補脾而復施泥帶水又兼補血之藥于補脾之中不

素子言醫 卷三

五

得不發耳既補其脾又補其血在飲食未至減者猶可若飲食大減又加惡心嘔吐而胸膈不舒者不將速其死乎法當常用參苓白朮散少加燥濕寬中之屬以佐山藥扁豆蓮肉米仁之滯有熱加黃連有寒加桂附飲食少進者先服大補脾元氣下陷者兼用補中益氣末有不瘳者也
飲食何以能養人也由脾胃之運化非飲食所能也藥餌何以能治病也亦係脾胃之運化非藥餌所能也然則脾胃何以能運化飲食與藥餌也實由

五... 之學

也... 也

不作

此... 何

水火二氣又非脾胃所能也有司命之貴者其奈

人當臥病務須常存退步心能退步則方寸之間
可使天寬地曠世情俗味必不致過戀于心縱有
病焉可計日而起矣不則今日當歸芍藥明日甘
草人參是以江河填漏窟維多無益也先儒有言
予臥病時常于胸前多書死字每書數過頓覺此
心寂然不動萬念俱灰四大幾非我有又何病之
足慮哉雖然此惟可與達者言也

裴子言醫 卷三

重

縉紳子年三十餘囊固饒裕良田又幾二十頃且
已有子亦可謂無不如意者矣後忽心志改常
六時中無刻不咨嗟太息愁怨不勝如此者四五
年遂患驚悸怔忡恍惚不得寐等証遠近醫家延
之迨遍有安神者有養血者有補氣生精者有消
痰與降火者備餌藥劇卒至如迷如昧如顛如狂
捶胸嚼舌而死究其病所從來則為數年前訟費
千餘金耳嗚呼如此富家但知有身外之微而不
知有性命之大縱可憐不足惜也世間類是者頗

所謂心病
心集醫也

衆因誌之以為後鑑

羅先生曰收拾一片真正精神揀擇一條直捷路徑
安頓一處寬舒地步共好朋友涵泳優游忘年忘
世俾吾心體既與天地為徒吾心意況共鸞魚活
潑其形雖止七尺而其量寔包太虛其齒雖近壯
衰而其真不減童穉每讀一過頓開無限心胸勝
服百劑清涼散也

聊子元由翰林補外十餘年矣不得賜還嘗佗僚無
聊遂成心疾每疾作輒昏噴如夢或發謔語有時

裴子言醫 卷三

重

不作無異平時或曰真空寺老僧不用符藥能治
心疾往叩之老僧曰相公貴恙起于煩惱生于妄
想夫妄想之來其幾有三或追憶數十年前榮辱
恩讐悲歡離合及種種閒情此是過去妄想也或
事到跟前可以順應若乃畏首畏尾三番四復猶
豫不決此是見在妄想也或期日後富貴榮華皆
如所願或期功名遂告老歸田或期子孫登榮
以繼書香與夫不可必成不可必得之事此是未
來妄想也三者妄想忽然而生忽然而滅禪家謂

之幻心能昭見其妄而斬斷念頭禪家謂之覺心故曰不忠念起惟忠覺遲此心若同太虛煩惱何處安脚又曰相公貴恙亦原于水火不交何以故凡溺愛治容而作色荒禪家謂之外感之欲夜深枕上思得冷容或成宵寐之變禪家謂之內生之欲二者之欲網纏染著皆消耗元精若能離之則腎水滋生可以上交于心至若思索文字忘其寢食禪家謂之理障經綸職業不告劬勤禪家謂之事障二者之障雖非人欲亦損性靈若能遣之則

素子言醫 卷三

三

心火不致上炎可以下交於腎故曰虛不相緣根無所偶返流全一六慾不行又曰苦海無邊回頭是岸子元如其言乃獨處一室掃空萬緣靜坐月餘心疾如失

昔汪石山治一婦年三十餘形瘦而色若忽患狂病語言譁妄披髮裸形不知羞惡眾皆以為心風有欲吐以痰藥有欲飲以糞清不之決注診其脈浮緩而濡曰此蓋絲忍飢勞倦致傷胃氣而然耳經云二陽之病發心脾二陽者胃與大腸也忍飢過

有一與此
同証者
使人參伏
之而愈

此其子以
心學境耳
以境樂心
也

在在有此
三種人

如字者得

勞胃傷而火動矣發心脾者延及於心脾也延及心脾則心所藏之神與脾所藏之意皆投亂無依而病狂矣內傷發狂陽明虛也法當補之遂用獨參湯加竹瀝飲之數日愈
予自來歷境多艱而此心則未嘗不樂天生我為人非樂何身有管疾不敢恣嗜慾適足養生非樂何交有良朋日聆格言莊語頗知敬畏非樂何性偏疎懶省卻營營苟苟此身嘗覺自在非樂何雖無厚望在人不見斥於有道非樂何不讀書亦時得

素子言醫 卷三

三

會心語不坐禪亦時得見自性非樂何世固有日處樂而不知樂有日處樂而反不樂有日處樂而不安其樂必置身於不樂吾不知其解矣

偶于乙未春百疾并乘臥榻不起者累日深悔平時少一節字已而思之節字該得廣豈止關於疾哉凡家居日用以及交與應酬語默動止之間隨時隨處無一不因節而得不因不節而失者也然節者中也正先儒所謂行乎其所以行止乎其所以行所不得不止也設當止焉而勿止非節矣設當行

焉而遠止亦非節矣唯深於中道者乃可與言
舉世診脉都用簡篇為墊手之具不思簡篇所載悉
聖賢經傳昭垂萬古至尊至貴豈可輕為借用甚
且衰之于牀第之間汚之以穢惡之手有人心者
安乎否也習以成風竟無覺者惟予友錢商隱一
人深以是嚴更欲以是嚴天下因命予筆之以廣
其勸是亦與敬惜字紙者同旨也幸勿見迂為望

居世思危
延有思變
保身之口

八情世態
大抵如斯

裴子言醫卷之四

鹽官裴一中著

男裴翰德飛

校正

同邑劉宗旭開

孫

晉颺按三訂

擇醫療病不在臨時而在平日能于平日知得深信
得確則臨病相延不患不濟事也今夫世之擇醫
者在平日則恬不經心及有病即手忙脚亂矣聽
後從有謂此良遂延此者有謂彼良更延彼者甚
至道途之人絕不曉醫為何事而或徇其舉薦之
情無一不可延之者幸而愈以為得人不愈則曰

裴子言醫 卷四

疾既已劇無可奈何其下泉而不悔矣愚者不足
怪智者亦比比如之可勝悼歎

醫家之誤人有六有學無識一也有識無膽二也知
嘗不知變三也意有他屬四也心煩允沓時五也
偶值精神疲倦六也為醫者不可不深加自省也
至有一等重惜名譽知有生機而袖手更有一等
中懷勢利因貴賤貧富而岐心甚有一等未經明
理強作知醫而率意投湯劑以致誤彼蒼生者
又不可與醫類同日而語也

善問者必

昔胡孝轅先生深痛醫道之衰。忽不自覺其失。聲曰：善醫者吾不得而見之矣。得見善學者斯可矣。予曰：善學者吾不得而見之矣。得見善問者斯可矣。自此三十有年來。絕不見一善問者。

徐東臯云：古醫十四科而今亾之矣。道藏經中頗有是說。自宋元以來。止有十三科。考醫政其一為風科。次傷寒科。次大方脈科。次小方脈科。次婦人胎產科。次針灸科。次眼科。次咽喉口齒科。次瘡瘍科。次正骨科。次金鏃科。次養生科。次祝由科。國朝亦

裴子言醫 卷四

二

唯取十三科而已。其脾胃一科。終莫之續。元之李東垣先生著脾胃論。極其精詳。但不言十四科之缺。不知其得舊本而加已意。抑盡為創著。而得上古之同然歟。是誠醫道之大幸也。凡本病中有兼胸腹不利。飲食少餐。與惡心。嘔吐。痞悶。作痛。作脹。作瀉。一二症者。便是脾胃有病。當先調治脾胃。而後用本病之藥。亦有不必要用本病之藥。而本病亦自能因脾胃之愈而與之俱愈者。即或本病之勢不容緩。不得不舍脾胃而先治。

性命關頭

四古名書

形而
之數
學非

之者亦勿得終置脾胃於罔聞也。何也。脾胃者。元氣轉輸之關也。宜行不宜滯。一有滯。元氣即不克轉輸。藥石亦因以滯而不化。不能取驗矣。東垣所謂非藥之不能治病也。元氣之不行。藥力也。此固人身中自然之至理。知之則能令人生。不知則未有不致人於死者。以故本刻中不避重複之嫌。每曉曉不已。惜乎世都不明此理。每聞予言。輒掩耳而走曰：此老生常談耳。及察其臨証所施之法。所裁之方。則又似絕不知老生常談者。見寒病唯知

裴子言醫 卷四

三

有治寒之藥而已矣。見熱病唯知有治熱之藥而已矣。見血病唯知有治血治氣之藥而已矣。全不計及脾胃之有病不病也。即或有能計及者。亦不過述前人所謂脾胃為一身之主。而以白朮參苓山藥薏苡仁之類。加減於治寒治熱治血治氣之藥中而已矣。更有他乎。噫嘻。此皆不知調治脾胃之法之不易。故耳。調治脾胃之法。有從主不從客者。有從客不從主者。有從攻之而先補之者。有欲補之而先攻之者。有補多而瀉少者。有補

少而瀉多者有舍湯就丸而變丸為散者有且同
夕異而旦異夕同者又自有勿藥而愈節飲而愈
灼艾而愈專事適口之味而愈者不可以成見拘
古方執與語言盡也何以謂之從主不從客昔一
人腸胃堅結大便不行客邪其實矣余見其形瘠
而脈遲知為中氣虛寒之候專以參歸薑桂連膠
五六月絕不行結而結自行又一人腸血與寒熱
皆都舍脾而瀉治余診之關濁沉而惡心不知味
則知其積飲傷脾致生寒熱并不能攝血歸經耳

裴子言醫 卷四

與之逐飲扶脾而諸証咸失舉若此者即從主不
從客之調治脾胃法也何以謂之從客不從主昔
一人脾泄經年補之濕之從無驗脈來滑以洪脈
聞候欲嘔此痰火客於中宮與水液混淆而作泄
治以橘半若連燥濕清痰火諸藥而泄自止又一
人卒倒無知六脈幾絕衆皆測以虛極迫細審則
胃中大滿而且堅此由食物之傷氣閉不行所致
急投破氣攻堅之藥頓覺脈復而神甦舉若此者
即從客不從主之調治脾胃法也何以謂之欲攻

而先補如一人痞滿塞塞不能食在法似宜攻
謂六脈皆衰形色瘁而不澤先用補中益氣湯五
六劑俟其脈旺神強而後繼之消伐始克無虞又
一人滯下初成勢難驟補卻見其手足厥冷脈數
無倫而為元陽之虛極急灸參薑桂附等藥盡進
之後覺脈有序而肢體溫熾行通利而獲療如此
之類皆欲攻先補之調治脾胃法也何以謂之欲
補而先攻如婦胎前日久似宜從補不意腹中
多滯而脈實尚在可攻不可補之候余即乘其可

裴子言醫 卷四

而攻之攻後痢即減隨進人參大補脾丸以培胎
氣又一婦崩帶交發百藥不差其脈甚沉滑而腹
中實且堅此食滯於脾胃虛氣弱崩帶無從施效
耳旋用導滯丸導其滯崩帶頓止續與參苓散而
痊如此之類皆欲補先攻之調治脾胃法也所謂
補多而瀉少者邪已去而胃已清胸膈無膩凝之
患飲啖漸可通耳補少而瀉多者邪雖去而胃未
清胸膈尚多壅碍未便加餐耳舍湯就丸者胃虛
有濕不敢恣投湯藥轉傷胃氣耳變丸為散者丸

緩而散。速使藥力易行。而胃易清。耳且同。久異。且異。久同。者因藏府殊途。虛實交併。一藥不能獨治。耳勿藥而愈者。服藥過多。胃氣為藥所傷。勿得更加攻補。耳節飲而愈者。飲聚胸中。不能思食。耳灼艾而愈者。病根深固。多藥必妨腸胃。必藉火攻。而後驗。可臻耳。事適口之味。而愈者。胃氣久虛。非味莫之起耳。語云。口滋味。而百節飽。亦養正邪。自除之義耳。雖然。此但言其調治脾胃中之脾胃病。有如此。而五藏之中。各有脾胃病之說。又不可不

素子言醫 卷四

六

察也。東垣曰。五藏生化之源在脾胃。虛則五藏之邪不一而集。如人右關脈緩而弱。脾胃之本脈也。食少肌虛。惡心嘔吐。情雜吞酸。作瀉作腫。脾胃之本病也。而或兼見弦急。弦長之脈。與肋滿筋掣。諸風掉眩。寒熱往來。諸証者。乃肝之脾胃病也。而或兼見洪數。洪散之脈。與煩躁肌熱。口苦而紅。怔忡驚悸。盜汗自汗。諸証者。乃心之脾胃病也。而或兼見浮短。浮濇之脈。與喘哮咳嗽。喉癢咽疼。皮膚癢裂。諸証者。乃肺之脾胃病也。而或兼見沉微。沉細

之脈。與足軟。腰疼。骨蒸。盜汗。遺溺。遺精。諸証者。乃腎之脾胃病也。又當各隨所兼脈証。而調治之。不可泥定脾胃之病。只在脾胃之中。而不博考週詳。以知其徧。如頭眩耳鳴。之用半夏。白朮。天麻。湯脾弱。經愆往來。寒熱之用逍遙散。者非即肝之脾胃病乎。思慮傷脾。以致怔忡驚悸。之用歸脾湯。食少肌虛。不得寐。之用辰砂。遠志。九者非即心之脾胃病乎。唾咯痰涎。胸膈不利。之用潤下丸。二陳湯。脾虛咳嗽。之用保脾清肺丸。者非即肺之脾胃病乎。

素子言醫 卷四

七

泄瀉之用四神丸。脾虛之用八味丸。水氣日久之用金匱腎氣丸。者非即腎之脾胃病乎。人自不察耳。唯不察。所以但知調治脾胃。而不知調治脾胃。有如此之微。如此之費。如此之難。耳。嗚呼。如此之微。如此之費。如此之難。有淺陋拘隘者。所克窺其。籊籊哉。毋惑乎。老生常談之。不屑聞掩耳而走也。吾因是而深有望焉。烏乎。望天下同志之人。無一不惕然於生死之關。而猛然於脾胃淵源之學。吾道其幸乎。若生其幸乎。

正作之

之陰証

莫謂產後之熱無實熱而不知有寒涼也。莫謂實熱之熱終實熱而不知有溫補也。有一婦產後五辰得發熱之候手揚足擲譫妄欲狂大渴思冷飲而脈數且洪余以產後氣血兩虧縱多熱証不可遽用寒藥止取生地黃為君常歸為臣柴胡玄參牡丹皮為佐炒黑乾薑為從治而兼引用更加童子小便以裏清熱之功宜其當矣不謂一飲猶是再飲猶是加人參一錢飲之亦猶是後細審脈加旺而諸証悉有餘雖為實熱改用大參白虎及黃連

裴子言醫 卷四

解湯等湯五六劑并啖梨橘寒泉諸涼快之味而熱始解若執產後之熱無實熱其不失者幾希矣一少年子病傷寒始則身熱頭疼畏寒脈浮數醫從而汗之表已罷而傳及裏不長寒反長熱躁渴狂澀不得臥六脈數而洪實熱無疑矣夫何以涼藥攻之而熱益以劇不止熱劇而脈亦益以數一息之間幾近入至且至勢之來踟躕不整一似趨不旋踵而時蹶者蓋由真氣之虛不克管束脈道而然此是不足之數非真有餘熱也即以人參三

此若受此

與此有至理

之疑

錢煎注入童便一盃飲之脈勢漸退而熱亦少解更以人參麥冬五味煎飲數劑而愈若執傷寒傳裏之實熱為終實熱其不失者幾希矣噫可不慎哉

或問富家之養子恒柔脆而多疾貧家之養子每堅強而寡病伊何說也裴子曰貧家有暗合養子之道與富家異蓋小兒受病有五一日煖小兒質稟純陽而火偏勝保護無容過煖禮曰童子不衣裘裳此其

裴子言醫 卷四

義也富家之子一出母胎即蒙頭裹足煖室藏之加以覆衾垂幕稍長則木寒先寒疊加絨纈更日置之干火爨其未足之陰積熱諸病從此變生而柔脆者多矣貧家之子則薄被單衣隨地而擲雖不無風冷交侵動人憫念而不知正得抑陽扶陰之至理與富家異其暗合養子之道一二曰飽人身腸胃以清虛為和順在小兒則尤要小兒腸胃柔窄受盛無多且不自知飢飽旋與旋啖而富有之家則又脂味充盈易恣情而多啖脾胃諸病從

不止小

易起怒 而不知 適所以 益病也 其原皆 由子自 勃然性

既呼能 氣和能 火也氣 有餘便 是火

此變生而柔脆者多矣。貧家之子則無物可食，即食亦自有膏，必不能使之厭，候在口腹固為清簡，而不知正得腸胃清虛之至理。與富家異其暗合。養子之道，三曰怒。小兒獨陽無陰，恒易躁而多怒。惟抑怒可使全陰。富家之子種種任性，驕怒之習，越于恒情，本無可怒，怒無已時，怒由肝木，木旺生風，風木乘脾，驚癇諸病從此變生。而柔脆者多矣。貧家之子則素居窮寒，不縱其性，自能貶損，意氣無怒，敢發處境似乎拂逆，而不知正得抑怒全

養子言醫 卷四

陰之至理。與富家異其暗合。養子之道，三曰暹，號。號云兒號，即兒歌。老子云：終日號而不啞，則知兒之號出于不自知，不自識，莫或使然，猶天籟也。豈有過之之理？况小兒陽氣偏隆，最多火病，藉此呼號以泄之，不為無益。而富家之父若母者，反生不忍，動以食慰，而過其號，鬱滯諸病從此變生。而柔脆者多矣。貧家之子則聽其號呼而勿恤，見者聞者以為心忍而不知正得順適天和之至理。與富家異其暗合。養子之道，四曰傷藥。藥乃攻邪

脾限以 皮以 養病 不足 養生 病有 病而 服藥 者

富家 貧家 皆 以 為 道

養子言醫 十一

物非養生物也。多服久服，鮮有不致傷生者。富家之子則不論有病無病，日餌無虛，甚至旦暮更醫，亂投湯劑而不知忌，有謂無傷吾勿信也。且藥之傷人甚於傷食，食傷醫所易知，藥傷醫多不識，病外諸病從此變生。又不止於柔脆矣。貧家則不服求醫，無費取藥，縱兒多疾，安意守之。在傍人以為失護，而不知正得有病不服藥為中醫之至理。與富家異其暗合。養子之道，五曰噫。是豈富家不善養子乎？非也。境也因境以成，其不善養子也。是豈貧

家善養子乎？非也。境也因境以成，其善養子也。

嘗見延醫之家，陳餼設醴，固不啻事神事鬼之誠且敬也。要皆出自不得已之苦心。醫者于此自當設身處境，深用不安，適可則止。莫謂分所宜然，恣情長夜之飲，而絕不一回念。在暴病家，猶不及覺，若久病則中外主人俱已晨夕焦勞，臥餐且廢，復何以堪。語云：一人向隅，滿堂為之不樂。有病之家，則不止一人向隅，滿堂亦幾向隅矣。一人豈能獨樂哉？有仁心者，必不然也。更有一等嗜習而成僻者，

凡

嗜博奕但知有博奕而不知有病人嗜呼盧但知有呼盧而不知有病人更有一等趨競公門奔馳世務之輩則又心無二用但知有趨競奔馳而不知有病入願同志者勿類是

針灸諸病從未有以時令拘也而世俗則專泥于伏暑之月不思病之感也有淺有深其治療也有緩有意豈可槩至伏暑之月而後針且灸耶考諸素問靈樞以及月令禁忌等書並不見有伏暑始宜針灸之說不知世俗何所據而云然但一歲之中

裴子言醫

十一

所時尤宜謹戒
房事夏
至前後
亦然亦
何及行
針灸耶

故不可犯者獨在冬至左右旬餘日蓋此時正在剝極復生陰盛陽微之候君子于此自宜深潛玩密保護微陽而不可有所泄易謂先王以至日閉關商旅不行后不省方素問謂蟄蟲周密君子居室去寒就溫無泄皮膚皆此義也當此之際則又不可遽執四時俱宜針灸之說賊及天和也何栢齋曰運氣之說起于素問本為四時之變而設蓋以春為木夏為火秋為金冬為水夏秋之變為上以此察天地之氣候辨人物之病証以為治療

不可不知運氣
不可徒泥運氣

裴子言醫

卷四

十一

之主耳素問六節藏象論謂五運相襲而皆治之終期之日周而復始又謂春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春且以一期三百六十日分為六氣每氣主六十日則其意可見矣紀以天干則曰五運紀以地支則曰六氣其實一也傳久致訛至天元紀大論等篇則遂以年歲之支干分管六氣蓋已失先聖之旨矣蓋年歲之干支天下皆全且通四時不變也天氣之溫暑寒涼民病之虛實衰旺東西南北之殊方春夏秋冬之異候豈有皆同之理此其妄誕蓋不待深論而可知也近世傷寒鈴法悉以得病日之干支為主其源亦出于此決不可用蓋五行之氣各主一時當時則為主氣為司天非其時而有其氣則為客氣與時正相反者則謂在泉為其氣伏于黃泉之下而不見也治療之法用熱遠熱用寒遠寒所謂必先歲氣勿伐天和者是也春時木氣司天則四方皆溫夏時火氣司天則四方皆熱夏秋之交土氣司天則四方皆濕秋則皆涼冬則皆寒民病往往因之但當因

之矣

之矣

伏○皆○有○從○治○均○之○伏○其○所○惡○誘○其○所○好○也○兵○有○哨
探○醫○有○消○息○均○之○欲○窺○其○虛○實○也○兵○有○間○謀○醫○有
轉○藥○均○之○欲○離○其○動○邪○也○先○補○後○攻○得○非○足○食○而
後○足○兵○之○謂○乎○先○攻○後○補○得○非○大○兵○之○後○瘡○痍○荆
棘○即○為○撫○綏○之○策○乎○攻○補○交○施○得○非○且○戰○且○屯○且
和○之○計○乎○大○積○大○聚○殺○其○大○半○而○止○得○非○殲○厥○巨
魁○脅○從○固○治○之○義○乎○病○去○而○勿○妄○加○攻○補○得○非○窮
寇○勿○追○歸○師○勿○拚○之○說○乎○不○當○補○而○補○齋○盜○糧○養
寇○兵○也○不○當○攻○而○攻○嘉○兵○者○不○祥○也○或○以○正○或○以

奇○或○援○兵○尾○其○後○或○先○鋒○銳○其○始○與○醫○之○正○治○奇
消○先○後○劑○輕○重○法○何○異○焉○且○無○恒○者○不○可○以○作○醫
兵○之○貴○信○也○無○活○人○心○者○不○可○以○作○醫○兵○之○貴○仁
也○醫○不○可○以○執○方○兵○之○貴○智○也○醫○不○可○以○貪○利○兵
之○貴○義○也○急○攻○之○急○下○之○急○補○之○兵○之○貴○勇○也○器
械○不○精○以○其○卒○予○敵○也○藥○品○不○精○製○乎○部○伍○不
整○以○其○將○予○敵○也○立○方○可○不○嚴○整○乎○君○不○擇○將○者
敗○醫○不○可○不○擇○也○闕○外○不○專○者○敗○醫○不○可○不○任○也
忿○兵○者○敗○醫○兵○者○敗○即○列○忍○予○者○敗○醫○獨○可○忿○可

使養子而後醫心能料敵如神

論至此始全

北論卷八

醫○可○否○否○也○病○在○此○而○治○在○彼○無○過○之○地○妄○加○斬
伐○也○有○是○病○而○用○是○藥○王○師○所○至○勿○犯○秋○毫○也○執
一○不○通○趙○括○之○讀○書○也○一○治○有○五○孫○子○之○用○兵○也
有○一○二○味○成○一○方○者○武○穆○之○以○寡○禦○衆○也○有○一○二
十○味○成○一○方○者○淮○陰○之○多○多○益○善○也○有○半○劑○或○一
劑○而○愈○者○武○之○西○伐○會○朝○清○明○也○有○數○十○劑○或○百
劑○而○愈○者○周○之○東○征○三○年○始○得○也○以○至○于○占○風○象
度○地○勢○察○人○心○與○醫○之○審○地○宜○先○歲○氣○望○問○切
均○不○可○以○岐○視○者○用○藥○與○用○兵○同○有○如○此○雖○然○兵

家○之○虛○者○則○示○之○以○實○實○者○則○示○之○以○虛○與○醫○之
虛○者○實○之○實○者○虛○之○其○理○相○似○而○兵○家○之○虚○者○示
之○以○虚○實○者○示○之○以○實○尤○為○致○勝○之○妙○美○而○醫○家
之○虚○者○虚○之○實○者○實○之○則○敗○不○旋○踵○何○也○兵○家○之
所○謂○虚○者○兵○食○不○足○也○在○我○之○元○氣○虚○也○所○謂○實
者○兵○食○足○也○在○我○之○元○氣○實○也○醫○家○之○所○謂○虚○者
元○氣○虚○也○所○謂○實○者○邪○氣○實○也○邪○氣○者○譬○之○兵○家
之○敵○人○非○在○我○者○也○此○其○所○以○異○也○用○藥○與○用○兵
之○不○同○又○如○此○今○之○不○知○醫○者○固○不○知○如○用○兵○之

家子言醫 卷四

十九

說知如用兵之說者亦但曰醫之不可輕用耳孰知醫之與兵有同異一至于此也故曰善將兵者而後可以語醫識虛實者而後可以語醫

有客過余而問之曰一大病久虛人容顏黃瘁飲食減養兩足浮腫已半歲氣虛下陷無疑矣連進補中益氣湯反致肋滿胸膨嘔噦不能食則奈何余曰據子所言是誠氣虛下陷之病矣補中益氣湯亦誠對病之藥矣服之而病反劇者徒遵章句中所謂不足者補下陷者升耳不思古人立教言有

盡而意無盡雖言不足者補而不足之中未始不兼有餘病于此而謾補焉則不足者未補而有餘者日必熾矣雖言下陷者升而清氣下陷者未必絕無濁氣之在上于此而謾升焉則清氣未升而濁氣已先橫矣子之所謂升補而反劇者大率近是客曰何以知其不足中之有餘清氣上之濁氣耶曰有証之見于外而知之耳夫証之見于外者如惡心膨滿痰嗽喉疼腹痛作瀉與飲食有妨之類是也此即所謂有餘之病兼在上之濁氣也升

其無不
養子胸
中有未
成者
不至
之不
不預也

而量
字類
不從
方

之及
女家妙
之門天
地萬物
皆從此
出可
也

補之法便須酌量而施之然此乃見証之顯者至有証雖見而實隱却又難察也本不惡心而胸中則時懊惱本不膨脹而肋間隱然刺痛本不痰嗽喉疼而喉忽似哽似噎本不作痛作瀉而大便不時至欲解不解本不有妨飲食而亦自有厭食而難安如此之病亦即有餘之病兼在上之濁氣也升補之藥須酌量而施也非用心精而晰理密者不能也故用補中益氣湯必熟審之當而察之詳者為得焉耳

或問尹真人謂人身祖竅真際舉世鮮知者果安在耶曰祖竅之真際即老氏所謂玄牝之門也悟真篇云要得谷神長不死須憑玄牝立根基故紫陽修煉金丹全在玄牝一竅玄牝一竅採取在此交媾在此烹煉在此沐浴在此溫養在此結胎在此即脫胎神化亦無不在此修真之士誠能知此一竅則金丹之道無遺義矣所謂得其一萬事畢也但從來聖聖相傳悉有虛名而無實據如曰先天主人萬象主宰太極之蒂混沌之根至善之地

結之所虛無之谷造化之源不二法門甚深法界
歸根復命關中黃宮希夷府總持門極樂國虛
空藏西南鄉戊巳門真一處黃婆舍守一爐淨土
西方中黃正位這個神室真土黃庭種種虛名總
是言此一竅此一竅者非心非腎非肺非肝非脾
胃非臍輪非尾間非明堂泥丸非關元氣海非兩
腎中間一穴非臍下一寸三分不可以方所執形
相求聲臭逐唯取生身受氣之初而已矣生身受
氣之初即父母交感時一點先天混沌無形之氣

表二言醫 卷四

三三

挾精而入子宮者是也。是即吾儒之所謂無極而
太極也。交感之後而此氣為精血所包則又太極
而兩儀矣。由是而生臟腑生官竅四肢百骸以至
能知能覺能運動能屈伸能喜怒哀樂能仁義禮
智能神聖文武都從受氣初之一點中出來者耳
玄牝之門乃自有焉。故老氏曰玄牝之門是天地
根。夫玄牝之門而曰是天地根則吾身天地之根
固吾身玄牝之門矣。然吾身玄牝之所從出者又
何根也。又必有先玄與牝以為根而後能分玄與

牝。夫分玄與牝者太極也。先玄與牝者無極也。無
極者吾身之中也。即堯舜允執之中。孔子時中之
中。釋迦空中之中。老子守中之中。也不止吾人一
身之內有此中。即一身以外。遍滿天地。亦皆吾身
之中也。正所謂周流六虛之外。而無不足。退藏一
身之內。而非有餘也。故曰一竅能納太虛。然則此
一竅之真際。果安在耶。道藏經曰。天之極上處。距
地之極下處。相去各八萬四千里。而天地之相接
適當四萬二千里之際。人身一小天地。心臍相去

表二言醫 卷四

三三

八寸四分。而人身天地之相接。適當四寸二分之
際。此際想不在乾之下。坤之上。震之西。兌之東。無
在而實無不在。無不在而實無所在也。雖然竅非
徒竅有妙存焉。妙者何。昔人有言。竅是中而妙是
一。若知竅而不知妙。猶知中而不知一。蓋一生乎
中有中。定有一。一即執一之一。一貫之一。歸一之
一。守一之一。執一者以其中之一而執之也。一貫
者以其中之一而貫之也。歸一者以其中之一而
歸之也。守一者以其中之一而守之也。伏羲氏之

此未經
之中所
謂元神
是也

此已於
之和中
所

河圖而虛其中者先天也。乃吾身祖竅之中也。即
孔子謂先天而天勿違。老子謂無名天地之始。釋
氏謂茫乎無朕。一片太虛。道家謂一點靈光。露出
端倪也。神禹氏之洛書。而實其中者。後天也。乃吾
身祖竅之一也。即孔子謂後天而奉天時。老子謂
有名萬物之母也。夫河圖中矣。中而未始不一。洛
書一矣。一而未始不中。中不離乎一。一不離乎中。
豈非無為之神機。精微之妙道。與故曰多言數窮。
不如守中。丹書萬卷。不如守一。修身至要在乎守

表三言醫卷四

中抱一而已。守中者守此祖竅之中也。抱一者

此祖竅之一也。蒙莊所謂南海之儵。北海之忽。

過于混沌之鄉也。修身之士。不明此竅。則真息不

住。而神化無基。大丹不結。須知此竅。是個性命根

源。無形相。無方所。無聲臭。不可以有心守。不可以

無心求。有心守之。則着相。無心求之。則落空。先師

曰。空洞無涯。是玄竅。知而不守。是工夫。斯得之
矣。

語鶴李子云。不知易者。不可與言醫。易中太極

無極陰陽之理。即吾人性命之根也。
天之命於稊不已。故吾人命
身之主宰。心志耳目口鼻。

進傳醫宗乃啓以故
以救疾



侶山堂類辯序

余家胥山之陰。峩嵒之麓。有石壘焉。紛出。余因其屹然立者。植之為峰。塊然枵者。依之為岡。峭然削。洞然谷者。綴之為曲。屈為深窈。就其上。築數椽。而南則構軒。臨其山。客有訪余者。望其蔚蔚陰秀。咸低徊留之。擬冷泉風况焉。余日坐臥軒中。幾三十年。凡所著述。悉于此中得之。去冬素問成。漸次問世。偶慨嘆曰。既闡聖緒。仍任習訛。譬比倒瀾。等同鷗泛。爰是錯綜。盡蘊參伍。考詳隨類。而辯起焉。雖然。惡乎辯哉。夫天下有理所同者。同無容辯。天下有理所異者。異亦無容辯。即天下有理之同。而勿為理之所異。理之異。而或為理之所同者。同中異。異中同。又無容辯。惟是理之同矣。而同者。竟若異。理之異矣。而異者。竟勿同。同之不可為異。異之不可為同。又何容無辯。辯之而使後世。知其同。即知其所以異矣。知其異。即知其所以同矣。知其同不為異。異不為同。即知其所以同。所以異矣。無事辯矣。若曰。予好。豈敢云然。

康熙歲次庚戌正陽月西冷隱菴張志聰書于崑池之花闌

侶山堂類辯目錄

卷上

- | | |
|------------------|-------|
| 辯血 | 辯氣 |
| 辯兩腎 | 辯三焦 |
| 辯包絡 | 辯督脉 |
| 辯藏府陰陽 | 辯九竅 |
| 辯七門 | |
| 春傷于風夏生飧泄秋傷于濕冬生欬嗽 | |
| 冬傷于寒春必病溫夏傷于暑秋必痲瘧 | |
| 亢則害承迺制則生化 | |
| 侶山堂類辯目錄 | |
| 上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死 | |
| 東方實西方虛瀉南方補北方 | |
| 鍼經論 | 傷寒書論 |
| 金匱要畧論 | 診法論 |
| 識脉論 | 音聲言語論 |
| 望色論 | 問因論 |
| 傷寒傳經辯 | 陰證陽證辯 |
| 陽劇似陰陰劇似陽辯 | |
| 陰證本于陽虛辯 | 邪正虛實辯 |
| 陽脫陰脫辯 | 病有新故辯 |

飲酒傷脾辯	發汗利水辯
癱勞鼓膈為難治之因辯	
能醫傷寒即能醫痘疹能醫痘疹即能醫癰毒	
辯	
乳癰鼠瘻辯	能食而肌肉消瘦辯
奇恒論	利論
中風論	頭痛論
心痛論	腹痛論
消渴論	欬嗽論
砂證論	痘論 <small>附五類救逆丹百祥九玄免九</small>
疔口堂類辨目錄	
瘡論 <small>附方</small>	胎前論
產後論	急下論
急溫論	汗下論
往來寒熱論	潮熱論
傷寒論編次辯	風傷衛寒傷榮辯
醫學入門	醫以力學為先
中庸之道	雜證論
十干化五行論	
卷下	
本草綱領論	藥性形名論

草木不凋論	四時逆從論
大棗	梔子
枇杷	欬冬花
澤瀉	芍藥
牡丹皮	括樓
麥牙	薯蕷
枸杞	紅花
石膏	女貞實
蓮實	桑上寄生
紫草茸	枳實
橘皮	麥門冬
防已	附子
丹雄雞	黑豕
鱗類	蚌蛤
血餘	龜板鹿茸
半夏天花粉	百合紫蘇
羌活防風	雞子金銀花王不留行
沙參人參黃芪	薑附辯
炮製辯	畏惡反辯
奇偶分兩辯	寒熱補瀉兼用辯

官料藥辯

金匱腎氣丸論

枳朮湯論

膠艾湯論

戊癸合化論

太陰陽明論

虻蟲

侶山堂類辯卷上

西陵隱菴道人撰

同學弟開之合泰

辨血

經云營氣之道。內穀為寶。穀入于胃。乃傳之肺。流溢于中。布散于外。精專者行于經隧。是血乃中焦之汁。流溢于中。以為精。奉心化赤而為血。衝脈與少陰之大絡起于腎上。循背裏為經絡之海。其浮而外者。循腹右上行。至胸中而散。充膚熱肉。滲皮膚。生毫毛。男子。上唇口而生髭鬚。女子。月事以時下。此流溢于中。

侶山堂類辯卷上

之血。半隨衝任而行于經絡。半散于脈外而充于膚。腠皮毛。臥則歸于肝藏。是以熱入血室。刺肝之期門。臥出而風吹之。則為血痺。此散于皮膚肌腠。故曰布散于外。乃肝藏所主之血也。故婦人之生。有餘于氣。不足于血。以其月事。數脫于血也。時俗皆謂男子血不足。女子血有餘。此血或因表邪太盛。迫其妄行。以致吐衄者。有因肝火盛者。有因暴怒。肝氣逆而吐者。吐則必多。雖多不死。蓋有餘之散血也。又心下包絡之血亦多。此從衝任通于心包。為經絡之血者。乃少陰所主之血也。如留積于心下。胸中必脹。所吐亦多。而或有成塊者。此

因焦勞所致。治法宜引血歸經。若屢吐不止。或咳嗽而成勞怯。或傷腎藏之原。而後成虛脫。所謂下厥上竭。為難治也。其精專者。行于經隧。心主之血也。中焦蒸水穀之津液。化而為血。獨行于經隧。以奉生身。莫貴于此。榮行脈中。如機緘之環轉。一絲不續。乃回則不轉。而穹壤判矣。是以有吐數口而卒死者。非有傷于血。乃神氣之不續也。有因咳嗽而夾痰帶血者。肺藏之血也。有因腹滿而便血唾血者。此因脾傷而不能統攝其血也。學者先當審其血氣。始出入之源流。分別表裏受病之因。證或補或清。以各經所主之

信口堂類辨卷二

上

藥治之。未有不中于竅卻者矣。近時以吐血多者。謂從胃出。以陽明為多血多氣耳。不知陽明之所謂多血多氣者。以血氣之生于陽明也。而太陽太陰厥陰亦主多血。非獨陽明試觀剖諸獸腹。中心下夾脊包絡中多血。肝內多血。心中有血。脾中有血。肺中有血。腎中有血。胃實未嘗有血。而可謂多乎。

辨氣

或曰。人秉陰陽水火而生。總屬一氣血耳。余觀傷寒論註疏。子以皮膚肌腠五藏六府各有所主之氣。恐于陰陽之理相背。歟。曰。子不明陰陽離合之道。合則

為一離則有三。太陽之氣生于膀胱。而主于膚表。少陽之氣生于腎藏。而通于肌腠。故靈樞經曰。三焦膀胱者。腠理毫毛其應。蓋太陽之氣主皮毛。三焦之氣充肌腠。此太少之氣由下焦之所生。若夫陽明之氣乃水穀之悍氣。別走陽明。即行陽行陰之衛氣。由中焦之所生。此三陽之氣各有別也。三陰者。五藏之氣也。肺氣主皮毛。脾氣主肌肉。心氣通血脈。肝氣主筋。腎氣主骨。此五藏之氣各有所主也。夫氣生于精。陽生于陰。胃府主化生水穀之精。是以榮衛二氣生于陽明。膀胱者。州都之官。精液藏焉。而太陽之氣生于

信口堂類辨卷二

三

膀胱。腎為水藏。受五藏之精而藏之。故少陽之氣發于腎藏。水穀入胃。津液各走其道。五藏主藏精者也。是三陰之氣生于五藏之精。故欲養神氣者。先當守其精焉。夫一陰一陽者。先天之道也。分而為三。陰三陽者。後天之道也。子不明陰陽之離合。血氣之生始。是謂失道。客曰。三陰三陽。敬聞命矣。請言其合也。曰。所謂合者。乃先天之一炁。上通于肺。合宗氣而司呼吸者也。夫有生之後。皆屬後天。故藉中焦水穀之精。以養先天之精。蒸復藉先天之元炁。以化水穀之精。微中下二焦。互相資益。故論先後天之精氣者。養生

之道也。分三陰三陽者。治病之法也。如邪在皮膚。則傷太陽之氣。或有傷于肺。邪在肌腠。則傷少陽陽明。或有傷于脾。邪中少陰。則有急下急溫之標本。邪中厥陰。則有或寒或熱之陰陽。此在天之六氣。傷人之三陰三陽。猶恐其不能分理。而可以一氣論乎。若謂正氣虛者。補中下二焦之元氣。以禦六淫之邪。則可。

辨兩腎

門人朱濟公問曰。有云兩腎皆屬水。命門居兩腎之中。在脊之十四椎內。為三焦生氣之原。有如坎中之滿。此說甚為有理。曰。此不經之語耳。夫醫道始于黃

侶山堂類辨卷二

曰

岐。藏府血氣之生始出入。非生知之聖。孰能究其精微。奈何後學不體認聖經。反好為異說。夫人之始結胚胎。猶太極耳。三月而成形。先生兩腎。猶太極而生兩儀。天一之水。生木。木生火。地二之火。生土。土生金。是先天止有水火。後天始備五行。五行之中。有二火。合而為三陰三陽。以配六藏六府。故靈樞本輸篇曰。少陽屬腎。腎上連肺。故將兩藏。蓋少陽乃三焦之生氣。發于右腎。上合包絡。為相火之原。左腎屬水。上連于肺。故為兩藏也。腎上連肺。詳又本藏篇曰。腎合三焦。膀胱。蓋右腎之氣。上合于心。至包絡而為一藏。又

素問欬論曰。腎欬不已。則膀胱受之。久欬不已。則三焦受之。是內經止曰。腎而原無命門之名。蓋以一腎合三焦。一腎合膀胱。是為兩藏而配合兩府者也。夫入乘陰陽水火而生。若以兩腎象坎中之滿。又將何藏以象離中之虛乎。潛心聖經。自不為前人所惑。

濟公復問曰。難經謂右腎主男子藏精。女子繫胞。師言為相火生氣之原。是左腎主水。右腎主火。精水止生于左。而胞當偏于右矣。曰。非此之謂也。夫天地陰陽之道。在無形之氣。曰陰曰陽。有形之徵。曰水曰火。在人之元神。曰氣曰精。天一生水。地二生火。陰中有

侶山堂類辨卷二

五

陽。陽中有陰。兩腎之氣。交相貫通。左右之皆有精有氣。水即是精。火即是氣。陰陽水火。互相資生。否則孤陽不生。獨陰不長矣。夫藏精繫胞之說。亦不過分別男女而言。然在女子。未嘗不藏精。在男子。亦可以結胎者。也。胞之所繫。蓋言天主生物。地主成物。故繫于右。乃氣之所感。非胞之連絡于右腎也。如云日月星辰繫焉。亦大氣之所載。日月運行。星移斗轉。又何嘗有所繫帶乎。

辨三焦

已酉之秋。內經甫竣。興懷山水。八月既望。借二三知

已夜泛西冷時月明雲斂天高氣清呼盧暢飲幾忘寤寐偶論及三焦有云無形之氣者有云有形之經者聚訟不已質之于余余曰有形無形皆是也但各偏執一見而不能通貫耳靈樞經曰三焦膀胱者腠理毫毛其應金匱要略云腠者是三焦通會元真之處理者皮膚藏府之文理也蓋三焦乃少陽相火即精水中所生之元陽壯則為火和游行于上中下之間通會于腠理之內實無形之氣也若游行之氣不應屬一府而有經穴矣經脈篇曰三焦之脈入缺盆布膻中散絡心包下膈循屬三焦下膈乃胃分循榮者循于三部也

衛生會篇曰上焦出于胃上口中焦亦並胃中下焦者別迴腸平脈篇曰三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢吞中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺洩是三焦之氣發原于腎藏歸着于中胃上下之間靈樞經所論之山處即平脈論所歸之部署也有有形之部署則有經脈氣穴而為一府矣藏府血氣之生始出入先聖賢多詳論于諸經之中奈何後人不能博覽群經又不能貫通會悟是以各執一見而為一偏之辭嗟嗟三焦之理數千年以來尚議論紛紜無惑乎諸君之折辯也

辯包絡

越人謂心主包絡與三焦為表裏俱有名而無形後人有以命門為包絡者皆非通論也少陽三焦之氣生于腎藏即相火也相火者先天所生之元陽也包絡者包絡于心下多血而主脈為君主之相其脈起于胸中出屬心包絡下膈歷絡三焦在三焦曰循在循分歷于中胃上下之間是包絡在膈上三焦在膈下皆屬有形之藏府也但包絡三焦之氣並出于腎一游行于上中下而各有所歸之部署一入于心下包絡而為君主之相靈樞經云腎合三焦膀胱乃腎氣猶腎與膀胱上合于心包猶膀胱之歸于部署

太陽與君火標本之相合也腎中之元陽先天之水火也君火與包絡後天之二火也包絡三焦皆以有形無形之間求之則得矣

辨督脈

骨空論曰督脈者起于小腹以下骨中央女子入繫庭孔其孔溺孔之端也庭孔陰戶也溺孔之端戶內之產門也此言督脈起于小腹之內故舉女子之產戶以明之是男子之督脈亦起于小腹內宗筋之盡處故下文曰其男子循莖下至纂與女子等蓋此節舉女子則男子可知下節舉男子則與女子等也其

絡循陰器合纂間繞纂後別繞腎至少陰與巨陽中
絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎纂初患切腎音
屯○纂間前後二陰相交之處此言督脈循陰器之
下從後腎貫脊在十四椎之間從命門而入內屬腎
蓋命門乃督脈所入之門故越人以右腎名爲命門
謂督脈至陽而右腎屬火也與太陽起于目內眥上
額交巔上入絡腦還出別下項循肩膊內夾脊抵腰
中下循脊絡腎根結篇曰太陽根起于至陰結于命
門命門者目也督脈之從上而下者起于太陽之命
門上額交巔絡腦出項循肩抵腰下循脊絡腎是起于
陽者出于上之命門而入于下之命門也蓋太陽與
督脈乃陰中之生陽本于先天之水火爲性命始生
之門故上下出入之處皆名命門上節曰貫脊屬腎
此節曰循脊絡腎循藏脈之屬藏絡府脈之屬府
絡藏絡脈之從下而上從上而下皆從命門而入屬
絡于兩腎者也出于庭孔者起于陰而貫脊屬于左
腎與太陽起于目內眥者起于陽而下脊絡于左腎
是以陰陽陽以陽絡陰陰陽交互之妙用也夫男左
女右按上節論女子此下論男子良有以夫其男子
循莖下至纂與女子等其少腹直上者貫齊中央上

貫心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央齊同膈○
此言督脈之原起于少腹之內而分兩岐一從後而
貫脊屬腎一從前而循腹貫齊直上繫兩目之下而
交于太陽之命門是督脈環遶前後上下一周猶天
道之包乎地外也世人咸謂背爲陽腹爲陰督脈循
于背總督一身之陽任脈循于腹統任一身之陰又
不明越人以右腎爲命門之義故已詳註于素問而
復申明之督脈分兩岐而內絡兩腎越人尚不能
詳析經義○出分兩岐而入亦分兩岐
辨藏府陰陽
經云太陰之上濕氣治之而有肺金之燥燥濕之相
濟也是以脾喜燥而肺喜潤陽明之上燥氣治之而
胃合太陰之濕藏府雌雄之相配也是以陽明不從
標本從中見太陰之濕化陰陽和平燥濕相合則飲
食消化津液運行而肌肉豐厚如陰陽不和則能食
而瘦矣故脾胃之陰濕太過者宜燥之溫之陽明之
燥熱已甚者宜苦寒以洩之肺與大腸病秋金之燥
者宜清涼以潤之感太陰之濕者宜溫熱以燥之此
平治陰陽燥濕之道也少陰之上君火主之而有腎
藏之水太陽之上寒水主之而有巨陽之陽陰陽標
本之相合也是以水上火下斯成既濟之無咎若水

不上濟則火盛而心懸如病飢火不下交則下焦寒而足膝厥冷故當調攝其水火之升降焉厥陰之上風氣治之而有包絡之火少陽之上火氣治之而有甲木之風蒸火生于木風自火出風火之相生也故火熾者當先平其風木風烈者宜先息其火炎此陰陽五行雌雄配合各有平調之法焉故善養生者非惟苛疾不生更可以延年不老

辯九竅

經云天氣下降氣流于地地氣上升氣騰于天天地交而生化萬物人秉天地陰陽之氣而生是以人之

信山堂類辨卷上

廿

形身應天地之日月五星山川谿谷而人之九竅亦應地天之泰卦也上三竅皆偶下三竅皆奇肺心肝之陽而開竅皆偶脾腎為陰中之至陰為陰中而開竅皆奇此天地爐錘之妙用也奇偶之間名曰人中蓋以此中分人之上下陰陽也肺開竅于鼻心開竅于耳肝開竅于目脾開竅于口腎開竅于二陰玉師曰腎將兩藏故開竅于二陰是五藏五陰之氣通于九竅者也六府不和則九竅為之不利是六府六陽之氣通于九竅者也九竅為水注之氣是藏府之津液外注于九竅者也陰中有陽陽中有陰陰陽交互上下和平水隨氣而運行于外是天地交而九竅通也若陰

陽不和則九竅閉塞水道不行則形氣消索矣

辯七門

越人四十四難曰唇為飛門齒為戶門會厭為吸門胃為賁門太倉下口為幽門大小腸會為關門下極為魄門是謂七衝門人但知飲食從飛門而入糟粕從魄門而出不知所謂門者有開有關有旋轉之樞神氣之有出有入皆由此門如曰吸門必先呼出而後能吸入有如轆轤之有升有降也夫人之所以養生者莫先乎飲食如飲食不下二便閉塞多有因于氣機不轉入但知降下而不知升提有如轆轤之繩

信山堂類辨卷上

二

西不能下因東之碍而不升故曰將欲下之必先舉之此之謂也開之曰有碍于升者有碍于降者宜審別治之又不可必其升而後降也

春傷于風夏生飧泄秋傷于濕冬生咳嗽

東方生風春之氣也中央生濕土之氣也至于夏秋之交故曰秋傷于濕玉師曰土至四氣之七月八月故秋傷于濕夫身半以上為陽身半以下為陰腰以上為天腰以下為地故陽者天氣也至外陰者地氣也至內故喉至天氣嗑至地氣嗑乃胃土之門脾脈貫胃絡嗑陽受風氣陰受濕氣風乃陽邪故傷于風者上先受之陽病者上行極而下故

春傷于風。夏生飧泄。濕乃陰邪。故傷于濕者。下先受之。陰病者。下行極而上。故秋傷于濕。冬生咳嗽。此天地陰陽之邪。隨人氣之上下升降者也。夏生飧泄。是于地也。肺主天。冬生咳嗽。是地氣之上騰于天也。

張開之曰。因上受之邪。而生在下之病。下受之邪。而生在上之病。故曰。生謂從上而生于下。從下而生于上也。

冬傷于寒。春必病溫。夏傷于暑。秋必痲瘧。

溫病瘧病。皆邪伏于內。而後發者。寒乃陰邪。冬時陽氣內盛。故邪伏于外。皮膚之間。冬至一陽始生。至

召山堂類辨卷二

七

春陽氣盛。長外伏之陰邪。與陽相遇。邪正相搏。寒已

化熱。故春發為溫病也。陰遇陽則化熱。陽遇陰不隨

乎。暑乃陽邪。夏時陽氣在外。裏氣虛寒。故邪伏于裏。

陰募原之內。夏至一陰始生。至秋陰氣盛。長內伏之

陽邪。與陰相遇。邪正相持。故發為往來寒熱之瘧瘧。

瘧瘧。陰病也。陰邪發。陽病陽。此天地陰陽之邪。隨人

邪發。陰病皆人氣之所化。氣之外內出入者也。夫內經首重天地陰陽之氣。寒

暑往來。升降出入。人居天地氣交之中。隨四時之寒

暑往來。而四時之風寒暑濕。又隨人氣之升降出入。

東垣不明經旨。反穿鑿綴緝。而妄道譏之。妄道譏之。

而亦不能闡發其經義。是使後人而復譏後人也。開之曰。春時陽氣盛。長秋時陰氣盛。長伏邪必隨氣而外出。故曰必。

亢則害。承迺制。制則生化。古文制。生則化。今文改為制。則生化。

帝曰。願聞地理之應。六節氣位。何如。岐伯曰。顯明之

右。君火之位也。君火之右。退行一步。相火治之。以臣

故曰退行一步。復行一步。土氣治之。復行一步。金氣治之。復

行一步。水氣治之。復行一步。木氣治之。復行一步。君

火治之。相火之下。水氣治之。水位之下。土氣承之。土

位之下。風氣承之。風位之下。金氣承之。金位之下。火

召山堂類辨卷二

三

氣承之。君火之下。陰精承之。帝曰。何也。岐伯曰。亢則

害。承迺制。制則生化。此論地之六節。以應四時之六

氣也。天道左旋。地道右轉。故曰顯明之右。顯明者。寅

正之時。日方顯而明。故曰顯明。乃厥陰風木所主之

時也。君火之位。乃二之氣。少陰所主之六十日也。相

火之位。乃三之氣。少陽所主之六十日也。出氣之位

乃四之氣。太陰所主之六十日也。金氣之位。乃五之

氣。陽明所主之六十日也。水氣之位。乃終之氣。太陽

所主之六十日也。復行一步。木氣治之。若周而復始

也。復言水氣。以便接前歲之金。制水生。步者。六十日為一步。以至時之

氣紀步也。治主也。承者下承上也。蓋以主時之氣在上而行過之氣在下也。如四之氣太陰濕土主氣而無承制則土亢矣。少生氣則不及矣。有木制火生于下則土化而和平矣。又如初之氣乃厥陰風木主氣如無承制則木盛矣。少生氣則不及矣。有金制水生于前則木化而和平矣。化者即天地陰陽之造化。若太過不及則有災眚之變而不能化生萬物。故曰制生則化。謂有制而有生則化矣。元人王安道謂改制則生化為是。蓋亦不明經義者也。此總論五行生剋之道。可一言以蔽之。奈何前人偏規渠而改錯雕鏤

信山堂類辨卷上

古

深刻議論紛更。所謂道在邇而求諸遠。事在易而求諸難。非惟求之不得。且使邇者易者。反可黃可黑矣。

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死

難經十三難曰。上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死。上部無脉下部有脉雖困無能為害。所以然者。脉之有尺。譬如樹之有根。枝葉雖枯槁。根本將自生。脉有根本。人有元氣。故知不死。此越人論脉之生于中胃。寸生于尺。陽生于陰也。夫藏氣者不能自至于手太陰。必因于胃氣。乃至于手太陰也。尺者脉之根也。故善調尺者不待于寸。是以上部有脉下部無脉

其人當主吐傷中胃而見此脉也。若不因吐而見此脉者。生氣已絕于內。即所謂寸口脉平而死者是已。故上部無脉下部有脉。如樹之有根。雖困無害。上下交義。一氣呵成。張氏圖註云。凡人之脉。上部有而下部無。乃邪實在上。生氣不得通達。故當吐其邪而升其氣。否則源塞。故知必死。是張氏以上節論邪下節論正。一段氣脉分為兩截矣。且邪壅于上而下氣不得疏達者。下部之脉必有力。而沉緊。未有氣壅于下而反無脉者也。若以無根之脉而再令吐之。是促之速死矣。予嘗診霍亂之脉。寸尺皆無。脉復者生。不復

信山堂類辨卷上

五

則死。要知始吐之時。先下部無脉。待師至診之。并上部皆無矣。越人註難經八十一篇。乃採摛內經設為辨難。雖義理明顯。然其中亦有錯誤。若再疏註。差訛又為越人之罪人矣。噫。著述難而箋釋亦不易易。

東方實西方虛瀉南方補北方

七十五難曰。經言東方實西方虛瀉南方補北方。何謂也。然金木水火土當更相平。東方木也。西方金也。木欲實金當平之。火欲實水當平之。土欲實木當平之。金欲實火當平之。水欲實土當平之。東方者肝也。則知肝實西方者肺也。則知肺虛瀉南方火補北方

水南方火火者木之子也北方水水者木之母也水勝火子能令母實母能令子虛故瀉火補水欲令金不得平木也經曰不能治其虛何問其餘此之謂也夫遠曰金欲實火當平之水欲實土當平之是五行之氣皆有亢有制也奚止東方實而南方當瀉乎要知上二句乃啟下之文下二句乃承上之辭也意若曰假如東方實西方虛者當瀉南方而補北方也瀉南方者瀉東方之實實則瀉其子也補北方者補西方之虛子能令母實也肺主呼吸而腎為生氣之原故經言腎為本肺為末荀子曰未有子富而父貧者

侶山堂類辨卷上

七

即此義也然者味經義重在補虛首末是經義中故段是越人釋經故曰不能治其虛何問其餘當知瀉南方亦所以補西方也何問其餘者言五行之氣皆可推而論之設使西方實東方虛又當瀉北方而補南方矣雖然東南主生長之令其氣多實西北主收藏之氣其氣多虛故曰歲半以上勝之常也夫金欲實火當平之水欲實土當平之分論至時之氣而各有太過也東實西虛瀉南補北統論一歲之氣而有虛實也以歲氣而兼論人身之五行皆可參論經義可分可合庶為得之

鍼經論

靈樞古名鍼經隋書經志籍謂之九靈唐王冰改為靈樞蓋亦有所本也其中論藏府陰陽雌雄配合精神氣血生死原流營衛之經行出入經脈之終始循環三陰三陽有血氣之多少手經足經分寸之短長五藏五行之氣外合皮肉筋骨四方四時之令內通肺腎心肝十二經脈合地之十二經水十一藏府應天之六律五音天地日月配形身之上下人與天地參也生長收藏隨寒暑之往來而人亦應之脈隨呼吸應周天之二十八宿營隨衛轉合晝夜之百刻陰陽十二經中分是動所生之病證五藏脈法有緩

侶山堂類辨卷上

七

急滑濇之提綱論五藏神內含五情五志分五形人外具五色五音察面王即知藏府之凶吉審形氣便知壽命之短長論氣之陰陽清濁有順有逆味之酸辛甘苦有忌有宜論內傷之病分別陰陽喜怒外感之疾各有部署形層百病之起有寒熱虛實湯液之法有補瀉溫涼其間義理精微不能盡述苟非生知睿聖焉能洞察隔垣誠三才之原始實醫學之上乘後世視為鍼經而忽之醫者能明正氣之生始出入而後知邪病之虛實淺深舍根本之大道而反循末務設遇盤根錯節靡不意亂心迷若能潛心此經自

然出類拔萃

傷寒書論

世傳傷寒論乃斷簡殘編藉王叔和編次聿稽仲景生于東漢叔和西晉時人相去止百餘歲不遭秦火之劫奚為斷殘乎第經義淵微鮮有通其義者故輒詆傷寒論為非全書聳聳來學實仲景罪人也今世之醫有終身目不識者獨執陶氏六書以為枕中鴻寶夷考陶氏剽南陽唾餘分別門類將經中語氣皆為斷截若學者熟讀全書細心體會其中義理如神龍出沒首尾相顧一字一句條分縷析鱗甲森然得

名山堂類辨卷上

六

其蘊奧自有精華滋味非比塵垢糠粃以上多係玉肯堂語

金匱要畧論

所謂要者得其綱領也知其要者一以貫十以貫百可千可萬一言而終不知其要流散無窮此之謂也內如婦人娠妊章云懷身七月太陰當養不養此心氣實當瀉勞宮類而推之則知八月有手陽明之當養不養矣十月之中各分主養之藏府而各有當養不養之患若止以七月論之是舉一隅而不以三隅反也學者潛心此書得其要而引伸之天下之理其庶幾乎

診法論

夫診脉察色昉于靈素諸經西晉王叔和因傷寒論金匱要略編緝脉經十卷內雖採用經語其中不無杜撰且多七表八裏之蛇足圖畫七奇八怪之形狀疑惑後學反多岐路之悲五代高陽生假叔和名撰脉訣二卷然亦有所長在叔和脉經又未可為全璧是以學者當宗法靈樞素問及仲景平脉辨脉諸法靈樞有緩急大小滑濇之提綱素問有左右前後上下之診法蓋以形身之上下四旁以應天地六合之道又三部九候之法有天道焉有人道焉有地道焉

名山堂類辨卷上

九

謂人居天地氣交之中人與天地參也經脉篇論六藏脉屬藏絡府六府脉屬府絡藏脉要精微論以尺脉候腎左附上以候肝心右附上以候脾肺蓋以兩腎為先天始分之水火而生木火土金之五行也藏府之雌雄配合經脉之屬絡相連是以高陽生有左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命之歌蓋亦有所本也本論以右附上候脾胃則心與小腸肺與大腸不言而可知矣後人妄生別論皆未嘗參究內經平脉篇有三菽六菽之診法謂皮脉肉筋骨乃肺心脾肝腎之外合故以舉按輕重以候五藏之氣也此四診之法咸宜明了于心中隨機應變于指下兼之

審證察色而診道始備至如褚澄儲泳諸君之論不
狗經理反覆陰陽顛倒藏府置之勿問可也

識脈論

或曰識脈其難乎余曰子但知識脈之難而不知審
脈之更難也所謂識脈者如滑伯仁之診家樞要曰
浮不沉也沉不浮也遲不及也數太過也虛不實也
實不虛也滑不澀也澀不滑也長不短也短不長也
大不小也小不大也緩不速也弱不盛也伏不見也
冥無力也微不顯也散不聚也洪洪大也細微細也
代更代也牢堅牢也動者滑大于關上也弦者狀如

侶山堂類辨卷上

三

弓弦按之不移繫者如轉索無常也芤者浮大而按
之中空革者中空而外堅也結者緩而有止促者數
而有止也以對待之法識之猶易分別于指下所謂
審脈者體認所見之脈何因所至之病何證以心印
之而後得也平脈篇曰浮為在表沉為在裏數為在
府遲為在藏又曰浮則為風浮則為熱浮為氣實浮
為氣虛浮則無血浮則為虛是將為外感乎為內傷
乎為氣乎為血乎為實乎為虛乎是必審其證之表
裏陰陽寒熱虛實病之久病新病脈之有力無力而
斷之以意也如扁鵲知桓侯疾之淺深望而知之也

知號太子不死問而知之也華佗聞呻吟之聲而取
蛇毒聞而知之也後人惡能及二君之神智然必四
診咸備而後可保萬全故曰審脈之更難也

音聲言語論

音聲者五音之聲嘹唳而有高下者也語言者分別
清濁字面發音而有語句者也土者其數五五者音
也故音主長夏是音聲之發于脾土而響于肺金也
在心主言肝主語心開竅于舌舌者音聲之機也肝
脈循喉嚨入頰頰喉嚨者氣之所以上下者也頰頰
者分氣之所泄也肝心氣和而後言語清明也然又

侶山堂類辨卷二

三

從腎間動氣之所發故腎氣虛者音聲短促上氣不
能接下氣矣是以發言歌咏出于五藏神之五志故
有音聲而語言不清者當責之心肝能語言而無音
聲者當責之脾肺能言語音聲而氣不接續者當責
之兩腎聞為四診之一不知音聲之原委又安能審
別其病情乎

望色論

盧不遠先生曰嘗讀桓公合諸侯衛人後至公朝而
與管仲謀伐衛退朝而入衛姬望見公下堂再拜請
衛君之罪公曰吾于衛無故子盍為請曰妾望君之

入也。足高氣強，有伐國之志也。見妾而有動色，伐衛也。明日君朝，揖管仲而進之。管仲曰：君舍衛乎？公曰：仲父安識之？仲曰：君之揖朝也，恭而言也。徐見臣有慙色，臣是以知之。又公與管仲謀伐莒，謀未發而聞于國。桓公怪之，仲曰：國必有聖人也。公曰：諱日之役者，有執柝杵而上視者，意者其是耶？乃令復役。少頃，東郭牙至，管子曰：子邪言伐莒者？對曰：然。仲曰：我不言伐莒，子何故言伐莒？對曰：臣聞君子善謀，小人善意，臣其意之也。仲曰：子何以意之？對曰：臣聞君子有三色：顯然善樂者，鍾鼓之色也；愀然清靜者，衰經之色也；艱然充盈手足矜者，兵革之色也。日者，臣望君之在臺上也。艱然充盈手足矜者，此兵革之色也。君喏而不驗，所言者莒也。法張口貌君舉臂而指，所當者莒也。臣竊以虛諸侯之不服者，其惟莒乎？此例于醫為望法之第一義也。何必五色精明象見哉？此三人者，專心事桓，故見其動容貌而知其用舍。若能專心事病人，則一望所楚深達其自己欲言而未能者矣。死生吉凶，其未事乎？若季札聞樂所言，是又聞法之第一義也。

問因論

石口堂類辨卷上

三

內經曰：治之極于一。一者因得之，閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意，得神者昌，失神者亡，蓋得其因，則能定其名，能定其名，則知所以治矣。夫病又有脈證之相應者，有不相應者。有病久而重感于新病者，有外感風寒而復內傷五志病，不以次入而乘傳者，故當詳審其受病之因，所病之苦，察其志意得失，神氣存亡，飲食嗜欲，居處房勞，參合脈證，以意逆之。然又不可惑于病家之言而無果斷也。予治一少年，傷寒三四日，頭痛發熱，胸痛不可按，病家曰：三日前因食麵而致病者，予曰：不然，麪飯糧食，何日不食，蓋因外感風寒，以致內停飲食，非因食麵而為頭痛發熱者。故凡停食感寒，只宜解表，不可推食。如裏氣一鬆，外邪即陷入矣。夫食停于內，在胸下胃脘間，按之而痛，今胸上痛，不可按，此必誤下而成結胸病家云。昨延某師，告以食麵之因，醫用消食之藥，以致胸中大痛。予診視外證，尚有，仍用桂枝湯加減一服而愈。又一隣女，年十三四，始出痘，至七八日，漿尚未化，醫措藥竟其父云：家中事務俱是此女料理，平日極辛苦者，醫聞之，復大加黃芪白朮，服後甚覺不安。次日醫知誤投，投葑朮，復用清涼解毒，角刺甲片攻之，毒不

石口堂類辨卷上

三

能化遂成不救此皆惑于病家之言不能主持過耳聊記此二者以為聽言之鑑

傷寒傳經辨

夫陰陽之道一陰一陽分而為三陰三陽三陰三陽應藏府之十二經脈是無形之氣合于有形之經在經脈有手足之分在六氣止論三陰三陽而無分手與足也風寒暑濕燥火天之陰陽也在人亦有此陰陽之六氣如太陽之上寒水至之寒水者膀胱之水也太陽者巨陽之氣水中之生陽也靈樞經曰膀胱者毫毛其應是太陽寒水之在下而巨陽之氣衛于

傷山堂類辨卷上

看

通體皮毛之間夫邪之中人必先始于皮毛故凡傷于寒則為病熱是天之寒邪病太陽之陽氣得陽氣而寒反化熱也天之寒邪病太陽之陽氣得陽氣而寒反化熱也太陽寒水之經脈上循于頭項故見頭項強痛之證此病氣而及于經非經氣之兼病也如邪留于經則為桃仁承氣之下證不復再傳陽明矣經曰厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治之少陽之右陽明治之陽明之右太陽治之是以一日太陽二日陽明三日少陽四日太陰五日少陰六日厥陰七日來復于太陽如不作再經而病自愈矣此六氣之相傳也

如邪留于陽明則見白虎湯之渴證承氣湯之燥證不復再傳少陽矣如邪留于少陽則見往來寒熱之柴胡湯證不復再傳太陰矣如邪留于太陰則見脾家實腹滿時痛之腹證不復再傳少陰矣如邪留于少陰則見自利而渴之經證不復再傳厥陰矣如邪留于厥陰則見下利膿血之熱證不來復于太陽矣此始病太陽之氣得陽氣已化熱故雖傳留于三陰而皆為熱證至于不能化熱及直中三陰之陰證又當別論夫六氣相傳止見太陽之頭痛至七日以上自愈者以行其經盡而來復于太陽不見六經之證

傷山堂類辨卷上

看

也如見少陽證則為邪留少陽見少陰證則為邪留少陰非病在少陽而再傳太陰病在少陰而再傳厥陰之理也先賢見太陽病而復見陽明證者曰此循經傳也見太陽病而後見少陽證者曰此越經傳也見太陽病而後見太陰證曰此誤下傳也見太陽證而後見少陰證者曰此表裏傳也越經傳下之說皆係杜撰夫太陽之邪傳留于某經則見某經之病不復再傳別經非六氣相傳而七日來復于太陽之傳經也皆緣不明陰陽經氣之道不識仲景之書而妄為臆說如此又太陽標陽而本寒少陰標陰而本熱陰陽水火之

氣交相感各故有病太陽而傳于少陰者此亦氣相感而不涉于經也有病在太陽而為心下煩悶者先輩曰此壬水逆傳于丙丙丁兄妹相傳此更為不通之說也以上論六氣相傳以下論傳足不傳手夫六氣運行四時代序總屬寒暑往來而皆歸于地故人亦應之如君相二火發原在腎太陽之氣生于膀胱風氣本于肝木濕氣本于脾土燥氣本于胃金腰以上為天腰以下為地三陰三陽之氣皆從陰而生自下而上故素問厥論曰陽氣起于足五指之表陰氣起于足五指之裏是以陰陽六氣止合足之六經靈樞本輸篇曰五藏六府之輸五五二十五輸六六三十六輸六府皆出足之三陽上合于手者也是三陰三陽之氣止合足之六經足之六經上合于手者也是以天之寒邪始病太陽膀胱之氣六氣相傳止見足經之證而不與手經相涉天之六氣病人之六氣太陽之上與氣治之與手太陽之小腸火毫無干涉先輩有以手經皆為有餘足經皆為不足之說者有以足六經屬水土木手六經屬金與火之說者有以上體多受風熱下體多感寒濕之說者嗟嗟傷寒之理甚難挈其綱領示以大道尚不能窺仲景之藩籬若再多旁岐之說使後學更無歸着矣予故設此辯匪

敢政前賢之是非聊以俟後人之詳審爾

陽證陰證辯

夫內經之所謂未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已蓋謂熱病而言也故篇名熱論熱病者寒邪在于表之三陽寒已化熱故可汗而已如不從汗解則熱邪已入于裏陰故可下而已若寒邪在表而不能化熱及表陽虛脫者太陽經有四逆湯之寒證寒邪直中于裏陰感君相二火之熱化者少陰經有急下之火證厥陰經有便膿血之熱證此皆從人身中之氣化也故邪在三陽曰陽證能化熱曰熱證不能化熱曰寒證在三陰曰陰證病陰寒曰寒證得火化曰熱證又不可以病在陽而定為熱病在陰而必為寒也

名山堂類辨卷上

毛

、陽劇似陰陰劇似陽辨
陽劇似陰者謂厥深熱亦深也厥陰篇曰傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微所謂傷寒一二日者謂一日病在太陽二日病在陽明寒已化熱至四五日而后傳入于裏陰故曰必發熱言傷寒一二日必前發熱至四五日而后厥也深重微輕也蓋熱邪深入而裏氣

、陽劇似陰陰劇似陽辨
陽劇似陰者謂厥深熱亦深也厥陰篇曰傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微所謂傷寒一二日者謂一日病在太陽二日病在陽明寒已化熱至四五日而后傳入于裏陰故曰必發熱言傷寒一二日必前發熱至四五日而后厥也深重微輕也蓋熱邪深入而裏氣

不能外達故熱深而厥亦深也如此者當知一二日
之間邪在表陽曾發熱而後傳入于裏陰也一日必
痛之頭所謂陰劇似陽者乃寒邪直中于裏陰盛而格
陽于外是以喜寒惡熱揭去衣被欲臥涼處如此者
其人必躁其脉沉細或虛浮而亂其舌必滑其面色
必清或赤浮于外其膚必涼或發熱者必先涼而后
熱以手按之始覺壯熱久之反涼此二者先詳審其
因證而假象自露矣若猶恐陽劇似陰陰劇似陽先
以此搖惑于心中則反有差誤

陰證本于陽虛辨

侶山堂類辨卷二

三

陽者天氣也至外陰者地氣也至內故陽在外陰之
使也陰在內陽之守也是以人之三陽猶外之重門
人之三陰猶內之堂室邪中于陰而為陰證者乃重
門不固本陽虛也雖然外城已破內城尚可固守蓋
陽生于陰裏氣實者猶能外禦其侮若表氣微虛裏
氣不守則使邪中于陰矣有一方士華興盛服昂昂
然至病者之家審其脉證虛寒曰此陰證也病者曰
不然予保養數月矣病者之妻亦大愠于側佯哂而
譏之方士報言語澀遂不敢用溫熱之藥貿貿然而
出若有所失悲夫不明陰陽之道而為醫猶未能操

戈而使之戰也
開之曰陰陽之道陽密為要如陽氣不固則邪不以
次入憂恐悲喜怒皆傷五藏邪即隨所傷之藏而乘
之又非獨腎精之能固守也

邪正虛實辨

岐伯曰夫百病之始生也皆生于風雨寒暑陰陽喜
怒飲食居處大驚卒恐則血氣分離陰陽破散經絡
厥絕脉道不通陰陽相逆衛氣稽留經脉虛空血氣
不次乃失其常通評虛實論曰邪氣盛則實精氣奪
則虛又曰邪之所湊其正必虛是凡病未有不為邪

侶山堂類辨卷二

三

氣所傷而即為正氣虛脫者也是以大骨枯槁大肉
陷下胸中氣滿喘息不便皆因外感風寒內傷五志
之所致故凡病當先却其邪調其血氣順其所逆通
其所稽則陰陽和平而正氣自復若止知補虛而不
清理其病邪病一日不去正氣一日不復漸積至久
而成不救之虛脫矣又常見少年子女因感外邪而
為發熱欬嗽或為唾血或為夜熱不行清理其邪而
致陰陽破散血氣乾枯有不數月而死者有不周歲
而死者而曰此百日怯也此周年怯也悲夫夫少壯
之人精神日盛血氣日生若不因邪病而成虛怯未

之有也存不因邪病而成虛怯者奇恒之病也內傷故奇恒大奇篇曰胃脉沉鼓濇胃外鼓大心脉小堅急皆鬲偏枯男子發左女子發右年不滿二十者三歲死從內而外夫人之榮衛血氣皮肉筋骨皆資生于胃府水穀之精胃脉沉鼓濇者胃虛而生氣衰也血氣不能榮養于身故成偏枯之證年未滿二十者精神正盛血氣方殷而反見此衰敗之證此因先天所秉之元氣虛薄而後天不能資培斯成自損之病然亦至三年之久而不致于速死審辨邪正虛實臨證要緊關頭名醫之門多疾若能分別救治庶幾其有瘳乎

石山堂類辨卷上

三

陽脫陰脫辯

陰陽虛脫有外因內因之分有偏勝偏絕之別如邪中于陰手足厥冷脉微欲絕此陰盛而生陽之氣欲絕于內也如欲冷飲欲臥涼地揭去衣被躁而不安此陰盛于內而陽欲脫于外也急宜參附薑桂以救之如發汗不解身反太熱此陽盛而陰絕于內也如陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯此陽盛于內而陰液外脫也此外因之陰陽偏勝而偏絕也若夫內因之陰陽陽生于陰陰生于陽陽生于陰者陽

石山堂類辨卷上

三

氣生于陰精也陰生于陽者陰精之生于陽化也陽化者陽氣化水穀之精微而生此精也陰陽和合交相生化是為平人如孤陽不生獨陰不長此陰陽之生機欲絕于內也難經曰脫陽者見鬼脫陰者目盲蒸陽脫者從下而脫于上陰脫者從上而脫于下故脫陰而目盲者尚有餘命之苟延脫陽而見鬼者不計口而死矣夫陽脫之患多有本于陰虛如年老之人足膝寒冷此元陽之氣漸衰而欲絕于下宜用參附半硫之類以助生陽如或因脾胃虛而穀精不生或入房甚而腎精日損或憂恐而藏精漸消或煩勞而精神日耗以致陰氣日衰而陽將外脫矣故治未病者見陰精有虧乃陽脫之漸預培養其陰焉若待陽氣外脫用桂附而欲其引火歸原不知陰精者陽氣之生原也其原已絕又安所歸乎故陽脫而用桂附救之者外因之脫也治內因而用桂附者助陽氣之衰于下也若陰虛而陽脫者非桂附可救故曰陰陽虛脫有外因內因之分有偏勝偏絕之別

病有新故辯

夫新病者多宜于清解久病者多宜于補養根結篇曰形氣不足病氣有餘是邪勝也急瀉之形氣有餘

病氣不足急補之。形氣不足病氣不足。此陰陽俱不足也。不可刺之。刺之則重不足。重不足則陰陽俱竭。血氣皆盡。五藏空虛。筋骨髓枯。老者絕滅。壯者不復矣。形氣有餘。病氣有餘。則陰陽俱有餘也。當瀉其邪。調其虛實。故曰有餘者瀉之。不足者補之。此之謂也。脉要精微論曰。徵其脉小色不奪者。新病也。徵其脉不奪其色。奪者。此久病也。徵其脉與五色俱奪者。此久病也。徵其脉與五色俱不奪者。新病也。是凡病皆當審其形氣色脉。而分別其新故焉。然又有病久而重感新病者。又當清解其邪。而調其虛實。若見其病氣有餘。則以為病久而變劇。仍用久病之法治之。以致中道。天而不終其天年。乃不審新故之過耳。夫血氣壯盛者。尚為邪所中。况久病之人。血氣虛衰。糜理不密。寧保其不復為邪氣之所傷乎。

飲酒傷脾辯

夫飲入于胃。遊溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。是入胃之飲。從在內之脾。肺四布于皮毛。下輸于決瀆。而為津。為溺。乃從內而外也。酒入于胃。隨衛氣而先行。皮膚先充。絡脉絡脉先盛。衛氣已平。轉入于經。而經脉

侶山堂類辯卷二

三

大盛是反從外而內也。蓋酒者水穀之悍液。衛者水穀之悍氣。故隨衛氣而先行皮膚。是以飲酒者。面即赤而小便獨先下。乃先通調于外而下輸也。其充滿于經脉者。復歸于脾肺。是以醉飽入房。多成中滿。咽隔欬嗽吞酸之病。蓋留積于內。不復通調于外。致傷脾肺故爾。

發汗利水辯

夫汗之生源有二。一出于皮膚熱肉之血。血之液化而為汗。此表汗也。一出于陽明胃府。乃水液之汗也。是以表汗止可微取。恐血液傷而陽氣脫。若水液之

侶山堂類辯卷二

三

汗不妨如水淋漓。麻黃湯發表之劑也。麻黃空細如毛。能開發皮毛間之閉邪。植麻黃之地。冬不積雪。能通陽氣于至陰之下。又肺主皮毛。故配杏子以利肺氣。葶內竅通而外竅始通也。如配石膏。乃直從陽明而發水液之汗。又非發表之劑矣。配一味即大相運。忽如小便不利者。用麻黃杏子配八正散。內加二味。其應如響。葶外竅通而內竅通。上竅通而下竅即利矣。子在菖溪。治一水腫者。腹大膚腫。久服八正散。琥珀散。五子五皮之類。小便仍淋漓。痛苦萬狀。予曰。此雖虛證。然水不行則腫。不消腫。不消則正氣焉能平。

復時值夏月。予不敢用麻黃。恐陽脫而汗漏不止。以蘇葉防風杏子三味各等分。令煎湯溫服。覆取微汗。而水即利矣。次日至病者之室。牀之上下。若傾數桶。水者。被褥幃簿無不濕透。病者云。昨服藥後。不待取汗。而小水如注。不及至溺桶。而坐于牀上。行之。是以牀下如此也。至天明。不意小水復來。不及下牀。是以被褥又如如是也。今腹滿腫脹俱消。痛楚盡解。深感神功之救我。予曰。未也。此急則治其標耳。子之病因火土傷敗。以致水泛。乃久虛之證也。火即人之元氣。必待脾氣元氣復而后可保其萬全。予即解維寫一六

信口堂類辨卷二

三

君子方去甘草加蒼朮厚朴炮薑熟附子每日令濃煎溫服。即以此方令合丸藥一料。每日已未時服之。即止其湯藥。半載後病者之兄備土物來謝曰。吾弟已全愈矣。予曰。如此之證。水雖行而正氣不復。後仍腫脹而死者比比。此命不應絕。非予之功也。雖然。邪之所湊。其正必虛。若初腫之時。行去其水。正氣易于平復。醫者不知發汗行水之法。惟以疎利之藥利之。腫或減而無尾。鬪之洩。猶以隣國為壑耳。如久服疎利之藥。則正氣日消。水留日久。則火土漸滅。然後以此法行之。無濟于事矣。

、癱勞鼓膈為難治之因辨

夫飲入于胃。猶海之行雲氣于天下。穀入于胃。由脾土之轉輸于四旁。是以水穀之津液。各走其道。五藏六府皆以受氣。皮肉筋骨咸以資生。故曰清陽發腠理。濁陰走五藏。清陽實四支。濁陰歸六府。是止濁中之濁者。歸于大腸小腸膀胱。而為糞為溺也。夫勞怯膈脹之證。或久嗽而傷肺。或鬱怒以傷肝。或不得志。意而心脾之氣不舒。或過于勞傷。而腎藏之精漸絕。入胃之藥食不能輸布于五經。惟走腸胃而為穢滯。故雖久服而毫無效驗也。即悞服其藥。餌亦不覺其

信口堂類辨卷二

三

有損。用參苓之神品。亦不能受其精華。此皆鬱逆之為故耳。以致精神日減。肌肉日消。而漸無生氣矣。脹滿之病。在于腸胃之外。郭郭之中。如脾不運行。則藥食更不能及。知陰陽升降之理。五行運化之道者。先當理其脾胃焉。土氣化而灌溉四旁。坤德厚而資生萬物。津液生而陰火伏。地天泰而否隔消。脾氣運行。則脹滿日減。筋骨濡潤。則癱瘓可強。此端本澄源之大道也。若不知治本。惟以涼潤之藥。欲其降火生津。潤下飲食。夫脾喜燥而肺惡寒。脾土濕則不能輸運。肺氣寒則不能通調。以致津液不生。痰涎反甚。陰火

炎而欬嗽。痲上下否而隔脹愈劇矣。陰火不可撲滅。遇水愈熾。得所生之真精而后能制之。

能醫傷寒即能醫痘疹能醫痘疹即能醫癰毒

辯

學士許叔微曰能醫傷寒即能醫痘疹能醫痘疹即能醫癰毒蓋能醫傷寒者知表裏陰陽寒熱氣血邪正虛實耳傷寒之邪從外而內痘疹之毒從內而外若夫癰毒有因于風寒暑濕之外襲者有因于喜怒飲食之內傷者是以傷寒痘疹癰毒皆當審其表裏虛實而治之如痘證之表實者當清解其表裏實者

侶山堂類辨卷上

三

即疎利其裏血熱者涼血氣逆者理氣邪毒盛者急宜清熱解毒正氣虛者又當兼補其正焉氣虛者補氣血虛者補血表虛者固表裏虛者實裏是以治痘有寒熱溫涼之方有攻解補瀉之法蓋瀉者瀉其熱毒補者補其正虛昔錢氏痘方多用清涼謂當清熱解毒為要陳氏專用溫補謂血氣充足而后能化毒成漿此皆偏執一見而不得中正之道者也故為兒醫者當以二氏之方折中其間審其邪正虛實而治之萬無一失矣至于癰毒之證與痘證無二而治法亦同如陰毒在內而不起發者即痘毒之內陷也根

盤收斂而高聳者即痘之界地分明而起脹也膿稠者即痘之漿厚也無膿者即痘毒之不化也能食者即痘毒之盡發于外也不能食者毒氣尚壅滯于內也收口者即痘之結痂也臭爛者即痘之珊爛不收也或解或攻或補或瀉皆當以治痘之法治之古來瘍醫咸以為疔癰瘡瘍皆屬于火惟以寒涼之藥治之或毒反冰伏而不起者或始終用攻利之藥致正氣虛脫而後成不收者噫為兒醫瘍醫者能潛心于靈素仲景諸善功德無量矣

乳癰鼠瘻辯

侶山堂類辨卷上

三

一婦人產後乳上發癰腫脹將半月周身如鍼刺飲食不進余診之六脉沉緊有力視左乳連胸脇皆腫予用麻黃葛根荆防杏子甘草石膏令溫服取汗次日復視之曰昨服藥後身有大汗而周身之痛盡解乳上之腫脹亦疎飲食亦進服藥不啻十有餘劑毫無效驗矣此劑有如是之功也予曰金匱要畧云產後婦人喜中風生氣通天論曰開闔不得寒氣從之榮氣不從逆于肉理乃生癰腫此係風寒外壅火熱內閉榮衛不調以致腫痛諸醫止以涼藥治熱而不知開闔故也今毛竅一開氣機旋轉榮衛流行而腫

痛解矣。內經云：食氣入胃，散精于肝，此腫屬陽明脈。陰二經是以飲食不進，今經氣疎通，自然能食矣。又一老嫗兩頰浮腫，每邊有核如梅子，大嫗曰：予一姪女，因生鼠瘻而死，又一甥女亦患鼠瘻而歿，今心甚憂之。余診其脈，兩寸口皆浮大，其證則頭痛發熱，予曰：不妨汝證乃風寒陷于脈中，而為癰，用解肌蘇散之劑，則愈。與姪女甥女之瘻不同，二女子之瘻其本在藏，其末在脈，原係惡疾，有灸刺之法，載在內經骨空篇中，能依法治之，亦不至于死，此緣失于救治者也。吁！治癰瘍者，可不知內經乎？

侶山堂類辨卷上

三

能食而肌肉消瘦辨

胃乃受納之府，脾為轉運之官，故水穀入胃，得脾氣之轉輸而後能充實于四支，資養于肌肉，胃為陽，脾為陰，脾與胃以膜相連，陰陽相交，如能食而瘦者，陽與陰絕也。夫陽明不從標本，從太陰中見之化，陽明乃燥熱之府，不得太陰之濕化，則悍熱之氣更盛，脾不得稟水穀之氣，則太陰之氣愈虛，是以胃中熱則消穀善飢，脾氣虛則肌肉日瘦，盛者愈盛而虛者愈虛，漸至五有餘而二不足，則死不治矣。夫人參、甘草、半夏、橘皮、生薑之類，乃助胃之品也；白朮、蒼朮、山藥

黃芪、厚朴、茯苓、乾薑、大棗之類，乃助脾之品也。枳實、黃連、大黃、石膏、麻仁、芍藥之類，乃抑胃之藥也。經言：強者抑之，弱者扶之，不知藥性之所主，不分強弱之資，抑是以強者仍強，而弱者仍弱矣。陽明篇曰：胃氣生熱，其陽則絕，又曰：浮則胃氣強，其脾為約，麻仁丸主之。此陽與陰絕，而用抑強之法也。

張開之曰：此外因之新病，故止用抑強之法。如病久而肌肉消瘦者，當以助脾之藥為君，宜胃之藥為臣，使胃氣與脾氣相通，瀉胃之藥為佐，斯為正治之法。

奇恒論

侶山堂類辨卷上

三

夫病之生于內傷外感，人所共知，而奇恒之病，知之者鮮矣。所謂奇恒者，異于恒常也。乃陰陽偏勝五行逆傳，審證辨脈，大有徑庭。內經之論疾病者，不及二十餘篇，論奇恒之章，有八。學者當用心參究，庶免五過之責。

利論

古文作利，今文作痢。

夫利有三因：因于外感風寒暑濕，而為下利膿血者，有死有生；有氣有血，宜補宜瀉，宜寒宜熱，具在傷寒論。金匱要略及千金諸方，各宜隨證而分別治之。又有陽中霧露之氣，陰中渾濁之邪，血凝自下，狀如豚

肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不闔清便下
重今便數難臍築湫痛命將難全詳論辨脉篇中此
外因之下利也有因食飲不節起居不時陰受之而
入五藏則填滿閉塞下為殄泄久為腸澼此內因之
下利也有因于奇恒之下利者乃三陽并至三陰莫
當積并則為驚病起疾風至如礪礪九竅皆塞陽氣
滂溢乾澀喉塞并于陰則上下無常薄為腸澼其脉
緩小沉澇血温身熱死熱見七日死蓋因陽氣偏劇
陰氣受傷是以脉小沉澇此證急宜大承氣湯瀉陽
養陰緩則遂成不救醫者不知奇恒之因見脉氣和
緩而用平易之劑又何異于毒藥乎予故曰服平和
湯而愈者原不死之病勿藥亦可服平和湯而後成
不救者醫之罪也

· 中風論

夫邪之中于人也。有皮肉筋骨府藏之淺深。有陰陽
寒熱燥濕之氣化。况風之善行而數變。是以傷于皮
毛則為頭痛發熱欬嗽。傷于筋則為痺。傷于肉則為
痲。或為拘攣。或為偏枯。邪入于腹。或為殄泄。或為燥
結。邪入于腑。即不識人。邪入于藏。舌即難言。口唾痰

侶山堂類辯卷上

四

侶山堂類辯卷上

四

涎。此邪入之有淺深而病之有死生輕重也。夫天有
六淫之邪。人有六氣之化。邪襲于陽。則為熱化。中于
陰。則為陰寒。濕盛者。則痰涎上壅。燥盛者。則腸胃下
結。邪氣盛者。則病氣形氣皆盛。正氣虛者。則病氣形
氣皆虛。總屬天之風邪。而人身中有寒熱燥濕虛實
之化。是以河間謂中風主于火。丹溪謂主于痰。東垣
謂主于氣。又曰中風之病。惟年老者有之。此皆未明
陰陽氣化之道也。夫喎僻拘攣。目斜不語。在童稚。則
為急慢驚風。在少壯。則為中風。卒暴于一姪女。年二
十餘。體甚豐厚。精神強旺。六月盛暑。恒貪風涼。臨窗
露臥。忽一日頭大痛。身熱無汗。口不渴。而躁手足拘
急。口眼喎斜。余診之。六脉沉細。予曰。邪已入藏。此危
證也。次日即不能言。口唾涎。藥亦不受。病三日而死。
如此之候。年少壯盛者比比。又非獨于老人也。經曰。
夏傷于暑。冬傷于寒。是夏月止有風暑。而無寒邪。即
見陰寒之證。而宜于薑附之熱藥者。乃邪中于裏。陰
而不得陽熱之化。非天之寒氣也。夏月陽氣盡發。越
于外。而裏氣虛寒。
時下名流。咸以此證為中寒。予微哂之曰。是固知年
少之無中風也。若謂少壯之人。血氣充實。而不為風
邪所中。是亦不應中寒中暑矣。此習俗之固弊。牢不

可破者也。或曰：然則老年之多中風者，何氣使然？曰：年老者，人天癸已絕，血氣虛衰，腠理不密，故易于受風。且精氣竭而痰火盛，是以有因痰因火因氣之說焉。夫客氣邪風，中人多死。若五藏安和，元真通暢，不使形體有衰病，則無由入其腠理。靈樞經曰：八風之邪，皆從其虛之鄉來，乃能病人。三虛相搏，則為暴病卒死。兩實一虛，則為淋露寒熱。其有三虛而偏中于邪風，則為擊仆偏枯。故聖人避風如避矢石，是聖人之教化。又何嘗有年老少壯之分也。

頭痛論

伯口堂類辨卷上

聖

夫但知三陽之脈上循于頭而為頭痛，不知厥陰與督脈會于巔而少陰之骨髓通于腦也。止知風寒火熱在頭而為頭痛，又不知足六經之證上逆于頭而為厥頭痛也。足六經之氣能厥逆于頭而為頭痛，又當知寒邪入腦亦能傳于厥陰少陰而為陰證也。真頭痛者，頭痛甚，腦盡痛，手足寒至節，死不治。

心痛論

夫咸謂心痛者，乃胃脘當心而痛，不知有厥心痛也。厥心痛者，四藏之氣逆客于心下而為痛也。心痛與背相控，善瘳如從後觸，其心僂僂者，腎心痛也。心痛

如以錐鍼刺其心，心痛甚者，脾心痛也。心痛色蒼蒼如死狀，終日不得太息者，肝心痛也。臥若徒居，心痛間動作痛益甚，色不變，肺心痛也。胃脘當心而痛者，上支兩脇，膈咽不通，食不下，各審其脈證而隨經取之，分別寒熱虛實而治之，無有不效者矣。若真心痛者，手足青至節，心痛甚，且發夕死，夕發旦死。

腹痛論

伯口堂類辨卷上

聖

腹者，太陰之宮，域腸胃之郭，郭病滿痛者，有入府于藏之分，有緩急輕重之別。如卒暴絞痛，面青肢冷，此邪直于陰分，急宜刺洩其邪，如暴吐下利，此邪傷陽明，名曰霍亂。若發熱頭疼，為欲愈也。如厥逆脈脫，急宜理中圓，甚者加附子。晡時脈還，手足溫者，生，不復則死。此邪甚而胃氣絕也。如腹痛下利而能食者，乃邪入于腸中，利止則愈。此皆直中于內，而有藏府輕重之分焉。又有邪傳五藏而為腹痛者，始發于皮毛，腠理正氣不能禦邪，泮衍于血脉中，而傳溜于內，大氣入藏，腹痛下滯，此滯傳敗絕之證，不及二十日而死。雖虛扁再生，亦不能救。此證多有不究心者，悠悠忽忽，反為病家怨尤。

消渴論

病陽明之燥熱而消渴者白虎湯主之。此外因之渴也。胃氣弱而津液不生者人參湯主之。此內因之渴也。有脾不能為胃行其津液。肺不能通調水道而為消渴者。人但知以涼潤之藥治渴。不知脾喜燥而肺惡寒。試觀泄瀉者必渴。此因水津不能上輸而惟下泄。故爾以燥脾之藥治之。水液上升。即不渴矣。故以涼潤治渴。人皆知之。以燥熱治渴。人所不知也。

、欬嗽論

欬者肺證也。有邪在皮毛而為肺欬者。有五臟受邪。各傳與之肺而為欬者。此外因之欬也。有寒飲食入

侶山堂類辨卷上

胃

胃從肺脉上至于肺。則肺寒而欬者。有藏府之鬱熱。上蒸于肺而為欬者。此內因之欬也。蓋肺者五臟之長也。輕清而華蓋于上。是以藏府之病皆能上傳于肺而為欬。然其標見于肺。而其本在于藏府之間。故當以標本之法兼而行之。治無不應矣。欬論曰。肺欬之狀。欬而喘息有音。甚則唾血。心欬之狀。欬則心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽腫喉痺。肝欬之狀。欬則兩脇下痛。甚則不可以轉轉。則兩脇下滿。脾欬之狀。欬則右脇下痛。陰陰引肩背。甚則不可以動。動則欬劇。腎欬之狀。欬則肩背相引而痛。甚則欬涎。胃欬之狀。

欬而嘔嘔甚則長蟲出。膽欬之狀。欬嘔苦汁。大腸欬之狀。欬而遺矢。小腸欬之狀。欬而失氣。氣與欬俱失。膀胱欬之狀。欬而遺溺。三焦欬之狀。欬而腹滿不欲食飲。

砂證論

所謂砂者。身上有斑點如砂。或用麻刮之。則鬚鬣如硃砂。故名曰砂。此乃風寒濕邪。或山嵐瘴氣。襲于肌皮之間。皮者肺之合。肌者脾之合。肺主氣而脾主腹。邪內于肺。則氣逆而面青。支冷。干于脾。則腹中絞痛。故淺者刮之。深者刺之。使邪氣外洩而痛可止。若邪甚而失于救刺。則邪干藏而氣機不轉。即不能救。

侶山堂類辨卷上

聖

矣。近時名曰斑砂。宜刺百會。蓋刺百會出血。名為開瘡門。瘡即斑疹。故以治瘡之法治之。若非熱盛發斑。又不必取百會矣。虞天民醫學正傳曰。治砂證。或先用熱水蘸搭臂膊。而以苧麻刮之。甚者鍼刺十指出血。或以香油燈照視胸背。有紅點處皆烙之。是斑點之說。其來舊矣。焯烙之法。有行之矣。近時以為新有之斑砂。乃失于涉畧故耳。夫熱邪在于皮膚。或寒邪化熱而後成斑。若卒中而即入于內者。面青支冷。有何斑點。若不急刺。則為卒死。又何假于照焯乎。

痘論

痘疹之論自昔及今不啻百有餘家然不察究靈素諸經不知藏府血氣之生始出入是以止知順險逆之證而不知順險逆之因不知其因則不能用救治之法矣夫人秉陰陽水火之氣而成此形蓋有正氣必有邪滯此天地自然之理也在天地亦有滯氣是痘之毒氣已萌于有生之初猶太極也三月而成形先生兩腎猶太極而分兩儀是痘之根原在腎腎為水臟主藏精而化血又為生氣之原少陽之氣乃水中之生陽上與心主包絡相合故痘之起發隨少陽之正氣而上達于心包腎氣之交于心包必從中焦而上邪在陽明則

信山堂類辨卷二

為嘔逆陽明熱盛則為發狂故痘前發驚者可治若發于肝脾肺外合之皮膚肌肉間毒邪不解反內傷于肝則發驚傷脾則泄瀉傷肺則心主血而包絡至脈則喘急是以痘後發驚者不治故毒從經而脈脈而絡絡而孫從孫絡而出于皮膚者順也蓋痘乃精血中之火毒故走于血分而後能貫膿結痂若走于氣分則為水泡白殼矣夫經絡為血分皮膚肌肉為氣分皮毛者肺之合肌肉者脾之合皮膚肌肉之中有充膚熱肉之血肝所主也亦為氣分故痘之順者從經絡而出于皮膚是以陸續出而參差大小不齊根窠收斂界地分明蓋界地乃皮膚肌肉而不為邪毒所傷故也血華色而潤澤根紅

頂白氣領成漿蓋氣行脈外而血隨氣化也所謂逆證者走于皮膚之氣分則一齊湧出如痂時俗所謂肺經痘者此也如走于氣分而留于肌腠則唇腫眼脹肉先浮而痘反平塌時俗所謂脾經痘者此也如走于氣分而留于充膚熱肉之血間則皮薄而嬌紅可愛光亮如燈三者皆無血以成漿終為不救此因毒隨氣而走于肺脾肝外合之皮膚肌肉間實非肺經脾經肝經之痘毒也又有一種夾疹之痘此分走于氣分血分故尚為可治若純走于氣分雖智巧之士不能為無米之炊矣夫所謂險證者乃火毒太盛

信山堂類辨卷上

或阻滯于腎臟或留畜于心包毒滯于腎臟則為膿則紫斑黑陷毒留于心包則壯熱煩躁便血神昏此事在良醫急施妙用表實者解表裏實者疎裏熱毒盛者急宜清解不起發者攻發為先此乃可生可死之急證匪延時日者也故證有重輕方有緩急若服平和湯而愈者原不死之證勿藥亦可服平和湯而後成不救者醫之罪也夫救逆之法方書原有冰肌散治痘一齊湧出服之復能斂入予謂此方平易淺薄焉能救其大逆門人金西銘在丹陽得一救逆湯方予于正漢冲先生處得一丸方以此三方斟酌增減合為一方名曰五類

救逆丹逆證險證服之皆有奇驗至于表裏血氣寒熱虛實又在臨證之士兼以湯藥治之可也

五類救逆丹

龜板用大龜底板 鹿茸大茄茸酥

犀角烏魚尖鎊以人氣 地龍去土焙

川山甲錢炒三 落花生如芋者是切

血餘封用童男童女者入新礮內填滿鹽泥

天花粉錢 銀柴胡一錢

當歸片大歸頭酒洗切 芎藭真川產而

牡丹皮焙酒浸一宿切片 茜草酒洗淨

京參焙一兩 地骨皮厚大者

兔絲子煮出絲焙 連翹七錢

附子錢生用 赤桂二錢桂附能導命門

大生地黃汁一筋洗淨搗取自然

右為極細末入犀角髮灰和均用生地黄汁和杵為丸如龍眼核大以上好硃砂飛過為衣天泉煎湯空心調服一九兒小者半丸大者可服二三丸如見其形證不順預服此丹若十分中有三分成膿者即有生氣矣如險證透發不起者服之即起如毒盛而起發不快日可服二三次

如患逆證而兒能飲酒者服藥一服時飲以甜酒一盞或少少頻飲幾次亦可蓋酒隨衛氣先行皮膚先充絡脉前方乃通經絡清熱毒心腎血分之藥使在內之餘毒仍走于經絡而出于皮膚復飲以酒漿使在外皮膚之毒復與絡脉相通此血氣出入之妙用也

附百祥丸說

兒醫錢乙字仲陽載在宋史一代之名流也專用百祥丸治痘之黑陷甚者謂能轉禍為福故有百祥之名後人置之不用者不知物性故耳夫大戟性能洩

信山堂類辨卷上

水味苦寒而色紫赤能瀉水中之火毒浸于水中其色青翠蓋從子以洩母也夫痘毒發原在腎如初起腰疼肚痛寒戰咬牙乃熱毒太盛不能透發此危在俄頃非大戟大黃芒硝之類為釜底抽薪之法則束手待斃矣故表而出之疎殺其表則透發于外矣張開之日痘之初發三日主春生起脹三日主夏長貫膿三日主秋成結痂三日主冬藏若秋冬之不能收成者多緣病釀于春故熱毒雖盛而能生長透發內無留畜至秋冬無有不收成者即正氣虛脫不妨大用溫補如使邪毒留滯外內不清邪之所湊其正

必虛欲補其正氣則碍于熱毒欲清其熱毒又妨于正虛是以熱毒盛而不能透發者死于三五之期雖透發而裏氣不清者終成批稗善治痘者當預防其初焉

京兔丸

夫稀痘之方法雖多未有如京兔丸之理甚精微驗若桴鼓蓋痘乃先天之毒天一生水地二生火水火相濟陰陽互交乃水中之火毒也京乃水天之色參者參也參天地之化育者也兔絲子一名女蘿爾雅名爲玉女蓋兔乃月魄純陰之物故有玉女之稱抱

佛山堂類辨卷上

五

朴子云兔絲初生之根其形如兔握割其血以和丹藥立能變化神異之品也夫凡物得清涼水土之氣而後能發芽兔絲秉純陰之性故得火煖而絲長此物理陰陽之妙用也內經云腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也是肺腎天水之相通也肺屬天京參具水天之性色能于水中以清發其天花兔絲有陰陽之妙用能于至陰之中而透其陽毒是以嬰兒在百日内與此丸服之或服至三歲則毒盛者稀而毒微者不出矣即熱毒盛者亦無險逆之虞同邑盧子由先生五十無

子得一種子奇方即生二男皆爲痘壞蓋種子方中不無多熱藥耳後復生子皆以京兔丸服之至六十有五連舉六男六女俱已長成皆不爲痘疹所壞京兔之功效豈淺淺哉盧氏以此爲秘方

疹論

古今名疹

痘乃先天之毒疹屬後天之邪先天止有水火後天始備五行產下發聲吮乳肇自後天是以發聲之時口中有毒即嚙下而歸于陽明故瘡之毒氣發于陽明上達于肺出于皮毛肺主氣而外合皮毛是以痘毒走于血分而氣以化之爲順瘡毒走于氣分而血

佛山堂類辨卷二

三

以和之爲順若走于血分而見雲頭紫赤者逆也瘡乃氣分之毒更速于痘若停留于胃則爛牙齦阻滯在肺則爲鼻扇喘急發表疏裏清熱解毒事在良醫之臨證妙用者也夫氣爲陽血爲陰痘乃精血中毒故應四時之生長收藏以合地支之數瘡乃氣分之毒是以一日三烹三而三之以應陽九之終痘發于陰故宜頭面稀疏不喜獨察陽位瘡發于陽故喜大烹頭面不宜惟在心胸此人之陰陽血氣應天地自然之道也男玉師問曰相傳痘先出而瘡後出者爲順如瘡在痘先後要復出此亦應先天後天之義

缺下有
缺文

治瘡三方

葛根

桔梗

荆芥

防風

杏仁

甘草

牛蒡子

橘皮

右方用泉水煎服再隨四時之氣而加減用之如
寒閉者宜麻黃熱閉者宜石膏食閉者宜枳朴山
查熱甚者加黃芩黃連毒甚者加白花地丁西河
柳渴者加知母喘者倍杏仁裏實者加葶藶牽牛
蓋痘疹有血氣之分而用藥亦宜分別如大黃大
戟血分之瀉藥也葶藶牽牛氣分之瀉藥也黃連

侶山堂類辨卷二

三

形壘如連珠瀉心火之藥也黃芩外肌皮而內腐
空故名空腸又名腐腸乃瀉肺而清肌表之藥也
肺主氣而心主血故清痘之熱毒宜以連為君而
芩為佐清瘡之熱毒宜以芩為君而連佐之又如
金銀花開黃白藤名忍冬能散陰氣而解氣分
血分之熱毒蓋黃走血而白走氣也故解痘毒者
宜之而瘡毒亦可若夫白花地丁又專于瘡證者
也此用藥之大關目學者引伸觸類微妙無窮

胎前論

易繫曰男女媾精萬物化生是五類昆蟲咸感陰陽

精氣而成孕育腎主藏精為生氣之源故胎之根本

在腎假血以成形衝任之血肝所主也故始于肝藏

至養肝氣暴虛故多思酸作嘔夫人生于寅故始于

厥陰木藏府之精氣次序資養至十月而五行之陰

陽已周十干之氣已化歸于壬癸而生戊癸化火此

天地生成之道也一月肝木二月膽木三月君火四

月相火五月脾土六月胃土七月肺金八月大腸金

九月腎水十月壬水藏府陰陽之氣循序相生如主

養之氣不足則胎亦不長矣胎長如瓜若不長金匱

要略云懷身七月太陽當養不養此心氣實當刺瀉

侶山堂類辨卷二

三

勞宮蓋因火制其金也故如土氣主養當培其土而

抑其木金氣主養當瀉其火而資其金以逐月主養

之藏府審其虛實而調之此養胎之大要也又火能

速物是以三月四月多有半產之虞火能尅金故七

月亦有不足之慮如胎氣熱者當預防之胎以腎為

本故養胎以地黃杜仲為君坤德厚而資生萬物故

白朮大棗為安胎之聖藥胎從血長是以四物湯乃

胎產之要方胎寄而生故桑上寄生川續斷力能繫

胞火能速物故芩連益母皆為要藥氣化則血行而

胎長故砂仁橘皮紫蘇枳殼宜兼用以疎氣夫天地

交而萬物生。水火濟而陰陽平。是以阿膠艾葉香附
茯苓得交感之妙用者也。至于胎前百病以治病養
胎之法兼而行之。此胎前之大綱領也。婦人小兒總
止多胎產痘疹耳其餘百病皆歸一法是以
虛素諸經不通分別數條學者當明此理
開之曰肺屬天七月而生者得乾金之氣故能育而
且壽九月感天癸之氣十月得化運之全若八月則
不育矣

產後論

產後氣血兩虧宜于溫補但初產者惡血未行先宜
導滯以防上壅新產婦人喜中風產後土虛能停食
產後燥結多血阻此三者是為實證宜于清補相兼
如無此三證氣虛者補氣血虛者補血寒者溫之熱
者涼之隨其所利而行之此產後之大法也予嘗用
大劑人參薑附救產後虛脫之危證用芍藥以利熱
燥之留停又何嘗忌人參之補薑附之熱而芍藥亦
未嘗酸斂也

急下論

陽明篇曰傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏
證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯
陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯發汗不解

信山堂類辨卷上

證

急溫論

少陰篇曰少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯太陽篇
曰病發熱頭疼脈反沉身體疼痛當救其裏宜
湯夫急溫急救之在少陰太陽者有水火寒熱之氣
化也病在少陰感君火之甚者急下之病陰寒之劇
者急溫之寒傷太陽欲如連樞神氣乃浮脈反沉者
陽反內陷也故當救其裏二者止見脈沉若待其厥
冷脈絕則不救矣故所謂急者如人墮于水火之中
緩即焚溺矣

信山堂類辨卷上

證

汗下論

一薰一蕪十年遺臭。故去邪莫如速也。曰汗多亡陽。如表邪盛者。汗之而解。以養陽也。曰下多亡陰。如裏邪實者。下之而解。以養陰也。多者謂其太過也。太過不可。而况妄行乎。靈樞經曰。上焦開發。宣五穀味。熏膚充身。澤毛。若霧露之溉。是謂氣。蓋氣化而汗出。溱溱也。又曰。奪血者無汗。是血氣不足。邪不得從汗解也。傷寒論曰。微則陽氣不足。濇則無血。下之則心下痞。鞭是血氣不足。又難從下解也。當知邪賊宜攻。而正氣又當培養。夫邪正相持。則為寒熱出入。邪負則愈。正北則危。汗下之法。猶援兵也。善用兵者。寡可以敵衆。弱足以勝強。若不審虛實。不識形勢。而妄攻之。反為賊害矣。

往來寒熱論

辨脈篇曰。病有灑淅惡寒。而復發熱者。何。答曰。陰脈不足。陽往從之。陽脈不足。陰往乘之。曰何謂陽不足。答曰。假令寸口脈微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則灑淅惡寒也。曰何謂陰不足。答曰。尺脈弱。名曰陰不足。陽氣下陷入陰中。則發熱也。陽脈浮。陰脈弱者。則血虛。血虛則筋急也。其脈沉者。榮氣微也。其脈浮而

侶山堂類辨卷二

五

侶山堂類辨卷上

五

汗出如流珠者。衛氣衰也。榮氣微者。加燒針。則血流不行。更發熱而躁煩也。夫藏脈為陰。府脈為陽。血為陰。氣為陽。榮為陰。衛為陽。內為陰。外為陽。此所言陰陽者。非此之謂也。乃陰陽之氣耳。陰陽之氣者。先天之水。火也。在地為水。在天為寒。在地為火。在天為熱。無形之氣。曰陰。曰陽。有形之徵。曰水。曰火。陰陽氣交。是為平人。乘于脈中。則為往來寒熱矣。故始曰陰脈。曰陽脈。復曰寸口。曰尺脈。曰陰氣。曰陽氣。曰陰中。曰陽中。謂陰陽之氣相乘。入于脈中。而見于寸尺也。蓋以寸尺分陰陽。非藏脈為陰。府脈為陽。脈也。又非謂內絡于藏府者為陰。脈外絡于形身者為陽。脈也。中脈中也。陰中陽中者。謂身半以上為陽。身半以下為陰。故曰上入下陷也。此陰陽之氣。乘于脈中。而為寒為熱。非脈中之血虛。故曰陽脈浮。陰脈弱者。則為血虛也。血虛則筋急者。謂血行脈中。滲于脈外。肝藏所主。而血自有陰陽之分也。脈內為陰。榮氣微者。其脈沉。衛氣衰者。其脈浮。謂陰陽相乘者。見寸口脈微。尺中脈弱。非榮衛之為陰陽。而脈之浮沉也。如燒鍼。則血流不行者。謂血隨榮轉。非隨陰陽之氣。而往來也。更發熱而躁煩者。謂榮氣之生于陽明。而至于心

腎也。燒鍼之火氣傷陽明，則發熱傷心腎，則躁煩。此言榮血生于後天水穀之精，陰陽本于先天水火之氣，乃陰陽之氣乘于脉中而為寒為熱，非榮血之為寒熱也。男玉師曰：何以治之？曰：金匱腎氣丸為主方，配四物以養血。

潮熱論

胃為水穀之海，而外合海水，是胃氣晝夜升降如潮。往來但平人有潮而不為熱也。如有邪病留于肌肉筋骨間，隨潮而出則為發熱。故當審其先發于何部，何處獨盛，分六經而治之，與夜熱之不同也。夜熱本

信山堂類辨卷上

五

于陰虛潮熱，因于病氣潮熱，一潮而退，夜熱至旦方

涼，因證不同，治法亦異。傷寒潮熱列于陽明篇中

傷寒論編次辯

仲祖傷寒論，其中條緒井井，原係本文，非叔和所能編次。蓋謂斷簡殘篇者是，因訛傳訛也。如痙濕暍三種，非傷寒之病，因病在太陽而與傷寒相似，故先提出于太陽篇外。溫病風溫，原因傷寒所致，然非卒病之風寒，故先分別于太陽篇中。太陽為諸陽主氣，故首提太陽之為病。次中風。風即寒中鼓動之氣，故篇名傷寒論而反先提中風次傷寒。次傳經。次桂枝湯證。次麻黃湯證。如六經篇

首則曰：某經之為病，若六經所繫論者，總歸于太陽之首篇。其間條分縷析，有斷有續，予于斷續間首加一闕，如學庸孔孟之分章，便後學之體認。此皆仲祖位置，非叔和編次也。

再按仲祖一百十三方，為形層淺深陰陽寒熱而設。無分風與寒也。如邪在皮毛者，宜麻黃湯在肌腠者，宜桂枝湯。故曰：桂枝本為解肌，然中風之用桂枝者，始受之風邪，不閉于皮毛而入于肌腠，故桂枝湯為中風之首方。如寒邪發汗不解而入于肌腠者，亦屬桂枝湯證。故邪病太陽而無分風與寒者，則曰太陽

信山堂類辨卷二

五

病有風寒之分者，則曰太陽中風。曰中風發熱，曰傷寒如風寒之邪，皆可為柴胡湯證者，則曰傷寒五六日中風，皆可為陷胸湯證者，則曰浮則為風，曰傷寒五六日結胸熱實，如瓜蒂散證，則曰傷寒中風。蓋始受之時，有風寒之分者，分中風傷寒。如病在太陽，感太陽之熱化者，則曰太陽病。病在陽明，感陽明之燥化者，則曰陽明病。而無分風與寒矣。至如大小青龍湯證，乃病太陽寒水之氣者也。太陽之上，寒氣主之，故太陽標陽而本寒。大青龍證，太陽標本之為病也。小青龍證，病太陽之陽而動其水氣也。曰太陽中風

謂風中太陽之氣也。脈浮緊者，浮則為風，緊則為寒。乃天之風邪與太陽之寒氣相搏而見于脈也。發熱者，風在太陽而為熱也。惡寒者，病太陽之寒氣也。身疼痛者，風寒之邪尚及于形身，不汗出者，邪正之氣陷于內也。煩躁者，太陽標本之氣化也。此風中太陽之熱邪而兼病其本寒，故用麻黃桂枝之複方去芍藥之苦，平易石膏之甘辛，直從內而透發于外也。如汗出惡風者，風邪在外，故不可服，蓋汗之生原有二：一出于表者，血液之汗也；一出于裏者，陽明水穀之汗也。麻黃湯發表汗之劑也，桂枝湯解肌腠之邪也。

侶山堂類辨卷二

李

如麻黃配石膏乃直從裏而發陽明水液之汗矣。邪不在裏而妄動其陽明是以筋惕肉瞤，陽明主肌而主宗筋也。又如傷寒脈浮緩者，乃寒傷太陽而邪正之氣並陷于內也。夫天之寒邪與太陽之陽氣相搏于膚表之間，其脈則緊。風與寒搏與陽搏乃此寒陰陽相搏其脈皆緊傷太陽寒已化熱邪正相合而陷于內，故止見虛浮之緩脈也。身不疼者，邪在內也。但重者，陽氣陷也。乍有輕時者，正氣欲出也。太陽與少陰標本相合，如寒傷太陽而見少陰證者，則為一身手足盡熱，以熱在膀胱必便血也。蓋太陽與少陰有標本寒熱之合化。

寒在太陽則病反其本而為熱矣。及于裏陰則同氣相感于少陰之火氣矣。故曰無少陰證者，大青龍湯發之。上章乃風動之邪入于裏而尚涉于形身，故見浮緊之脈，疼痛之證，宜大青龍湯主之。此乃寒凝之氣入于裏而無形身之痛，故恐轉屬于少陰，藉陽氣之欲出，乍有輕時，而以大青龍湯發之。此風寒之邪病太陽之標陽而兼動其本氣者也。又傷寒表不解，心下有水氣者，病太陽之陽而動膀胱之水氣也。乾嘔者，水氣上逆也。水火相交者正氣也，水氣上乘者邪氣也發熱者，寒在太陽而為熱也。欬者，水氣上通于肺也。病表陽之氣

侶山堂類辨卷二

李

而動其水氣，則氣不化而水不行，故有或渴或利或噎，或小便不利，少腹滿，或喘之證也。宜小青龍湯主之。用麻黃桂枝甘草芍藥以清肌表之邪，用乾薑半夏細辛以助火土之氣，用五味子之酸助春生之木氣，以洩冬令之寒水也。渴者火鬱于上，水逆于下，故去半夏之燥，加栝蒌根通水液，以上滋利者，寒水在下，火氣不能下交。薤白性寒屬水，用花萼之在上者，如雞子大，熬令赤色，皆取其象心導火氣，溫熯于下也。水得寒氣冷必相搏，其人即噎，故加附子以散寒。小便不利，少腹滿者，土受所勝之侮而不能制化，故

加茯苓補中土以伐水邪喘者加杏子以利肺氣此在表之邪入于裏而動其水氣故並去其麻黃又傷寒心下有水氣欬而微喘發汗不得服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯至之此表邪已解而寒水之氣上逆也欬而微喘者水氣上乘于肺也發熱不渴者得太陽之氣化也服湯已渴者水寒之氣外散而復傷太陽之氣也故仍以小青龍至之經曰太陽之上寒氣至之在天呈象在地成形在天為寒在地為水天有六氣地有五行人秉天地之氣而生兼有此五行六氣是以大青龍證病太陽之陽而動其寒氣

仙山室類辨卷上

三

者也故宜大青龍湯以發汗謂在天之龍能行雲而施雨也小青龍證病太陽之陽而動其水氣者也故宜小青龍至之謂潛藏始蟄之龍能洩冬令之寒水也又如少陰病真武湯至之者病少陰而動其水氣也四逆散至之者病在少陰得君火之熱化而動其水氣也蓋太陽少陰乃水藏水府皆有寒熱之氣化者也若夫外因之水停飲于中焦者又屬五苓散證蓋其因有不同而治法亦別是以有發表之方有解肌之方有散寒之方有行水之方有氣分之方有血脈之方有胸脇之方有腹胃之方有却邪之方有補

正之方有大涼之方有大熱之方有大補之方有大瀉之方有和解之方有寒熱補瀉兼用之方皆從形層外內之淺深寒熱虛實之氣化麻黃桂枝分形層大小青龍論氣化不然止屬風寒二邪奚有三百八十九證之分耶明乎形層氣化之道傷寒大義思過半矣

風傷衛寒傷榮辨

風乃天之陽邪傷人衛氣寒乃陰邪傷人榮血同氣相感耳辨脈篇所謂風傷衛寒傷榮者謂風寒兩感榮衛俱傷風則傷衛寒則傷榮以言其大槩若夫天之風寒傷人氣血或中于陰或中于陽無有恒常者

仙山室類辨卷二

三

也人之皮毛肌腠氣分為陽血脈為陰榮行脈中衛行脈外風雨寒暑之中人也始于皮膚皮膚緩則腠理開開則邪從毛髮入入則抵深深則毛髮立毛髮立則淅然故皮膚痛留而不去則傳舍于絡脈是風寒之邪皆始傷皮毛之氣分留而不去而後傳舍于經榮者也靈樞經曰寒傷形乃病形風傷經脈經脈乃應金匱真言曰八風發邪以為經風觸五藏邪氣發病是又寒傷氣而風傷榮矣蓋陰陽之道變化不測故內經自有矛盾之文以意逆志庶為得之若膠執文辭又不可與論陰陽矣至于傷寒論之中風更

一五〇〇〇〇 丹黃參日年三書第 4 版文內

為不同非春傷之風亦非四時所中之風即嚴寒鼓動之氣故中風首節曰膏肓惡寒漸惡風寒乃陰凝之邪閉于皮毛之間故用麻黃湯以發散風乃鼓動之氣開發皮毛入于肌腠故宜桂枝湯以解肌是又寒在皮毛而傷氣風入腠理而將傷于榮矣太陽之氣至于皮毛之間寒傷太陽是以六氣相傳七日來復若入于經榮則為桃仁承氣抵當湯之血證不復再傳陽明矣寒傷氣故曰傷寒一日太陽受之脉若靜者為不傳頗欲吐若躁煩脉數急者為傳也又曰傷寒二三日陽明少陽證不見者為不傳也此寒在太陽之表故有六氣之相傳風入于肌腠故不為傳經之邪也至于春傷之風四時所中之風或傷于皮毛則為嚏淚喘欬入于肌腠則為肌膚不仁傷于筋骨則為痛痺拘攣入于脉中或為鼠癩或為厲癆久風入中則為腸風飧泄或中于府即不識人或中于藏舌即難言口吐涎此在靈素金匱諸經中求之與傷寒論之中風不相同也

醫學入門

金匱要略曰千般疾難不越三條疾丑刃一者經絡切音越受邪入藏府為內所因也二者四肢九竅血脉相搏

傷山堂類辨卷二

金

壅塞不通為外皮膚所中也三者房室金刃蟲獸所傷以此詳之病由都盡金匱二條皆重外因宋成無已曰病有三因一者外因于天二者內因于人三者不內外因外因于天者風寒暑溼之六淫也內因于人者喜怒憂恐之七情及飲食房勞也不內外因者金刃跌撲蟲獸管杖之所傷也人之百病不外此三者夫傷寒外因也而傷寒經旨風寒暑溼之六氣咸所具載矣其間分析表裏陰陽寒熱氣血邪正虛實內外百病不靡不備悉明乎傷寒之道千般病難不出于範圍焉故醫學入門當從傷寒始先難其所難而後易其所易蓋外因之病暴而危內因之病徐而持中風癰痢痿痺疝厥頭腹諸痛多係外因故治外感者可以活人可以死人治內傷者或少有失悞未即為害是以能醫內傷而不諳治傷寒者未可醫名也能醫傷寒而不諳治內傷者未之有也

醫以力學為先

月三六九晨集及門說內經及傷寒論講畢謂諸生曰時俗相沿云行醫全憑時運予以為不然諸生來學當苦志讀書細心參究庶可免庸醫之責若憑時運則何業不可為而習此苦難之事設使殺一不辜

傷山堂類辨卷二

金

而救百人其功不能贖罪蓋救人乃醫家分內事况多有病之輕者有病之自能愈者或病雖劇而可救者越人曰僕不能生人耳不起之病僕能起之是非必死之病而醫能活之若使病者不死于病而反死于醫又何異于梃刃是以救人之功小悞傷之罪大試觀裁杏叟尚悞投藥傷及母子二命况平人乎然此亦警世之事也古今名流皆生前根氣豐厚若再加培植即可名登仙籍惜乎不能何也既已名擅當時焉肯虛心下士况一人之精神有限或忙中有錯即悞用其藥亦不自知其非病家延請惟艱幸而

石口堂類辨卷上

至

至之焉敢論其是非即服藥有悞反歸于死者之命是以運之小者其過小運之大者其過大諸生能鑑予言潛心好學將來運之小者可大運之大者可無過矣開之曰歷觀古今醫家有子孫顯達者有子孫式微者大有霄壤之分若不圖名不貪利虛衷受益存心活人有不永昌厥後者乎又曰古稱醫士為山中宰相謂能變理陰陽調和氣味操生殺之柄耳記云醫不三代不服其藥許學士曰謂能讀三代之書予以為世代相傳又能讀書好學猶簪纓世胄士之子而恒為士也若僅守遺方以

為世傳何異按圖索驥夫天有四時之氣地有五方之異人之百病變幻多端即如傷寒一證有三百八十九法可膠執遺方能通變時疾乎趙括徒讀父書尚至喪師敗績况無遺書可讀耶守祖父之業而不好學者可方草廬諸葛乎伊川先生曰醫不讀書縱成倉扁終為技術之流非士君子也盧不遠先生曰當三復斯語及門者多係世醫子弟故復言此以戒之

中庸之道

中者不偏庸者不易醫者以中庸之道存乎衷則虛者補實者瀉寒者溫熱者涼自有一定之至理若偏

石口堂類辨卷上

至

于溫補偏于涼瀉是非中非庸矣夫醫道上通天之四時六氣地之五方五行寒熱溫涼升降浮沉信手拈來頭頭是道急者急治緩者緩治若僅守平和之橘皮湯者又執中無權也遡觀古今多有偏心偏于溫補者惟用溫補偏于清涼者慣用清涼使病人之宜于溫補者遇溫補則生宜于涼瀉者遇清涼則愈是病者之僥倖以就醫非醫之因證以治病也豈可語于不偏不易之至道哉

雜證論

雜證者謂一人之病見證龐雜當知始受之因則一

久久不去漸至蔓延故治雜病如理亂繩得其頭緒
一路理清不則愈理愈亂矣所治之藥亦專取其要
多則雜雜無功經曰一者因得之又曰治之在于一
嗟乎精一之道難矣人秉天地之氣所生此身中有
上下陰陽之氣交五運六氣之變化榮衛血氣之貫
通五藏六府之生始知其推數無窮而後可歸于一
非細察靈素諸經不易得也

十干化五行論

黃帝問曰五運之數土主甲己金主乙庚水主丙辛
木主丁壬火主戊癸願問其所始也岐伯曰昭乎哉

侶山堂類辨卷二

矣

問也臣覽太始天元冊文丹天之氣經于牛女戊分
齡天之氣經于心尾己分齡音金蒼天之氣經于危室
柳鬼素天之氣經于亢氏昂畢京天之氣經于張翼
婁胃所謂戊己分者奎璧角軫則天地之門戶也夫
候之所始道之所生不可不通也此岐伯論五行之
化始于五方之天象丹赤色火之氣也牛女在癸度
經于牛女戊分戊癸合而化火也齡黃色土之氣也
心尾在甲度經于心尾己分甲己合而化土也蒼青
色木之氣也危室在壬度柳鬼在丁度丁壬合而化
木也素白色金之氣也亢氏在乙度昂畢在庚度乙

庚合而化金也京黑色水之氣也張翼在丙度婁胃
在辛度丙辛合而化水也夫丹齡蒼素京天之五氣
也丹齡蒼素京天之五色也青黃赤白黑地之五色也金木水
火土之五行也天之十干經于五方之分陰陽配
合而化生五氣天之五氣化生地之五行所謂在天
成象在地成形五行之中有二火在地為木在天為
風在地為火在天為熱在地為土在天為濕在地為
金在天為燥在地為水在天為寒在地為火在天為
暑是地之五行化生天之六氣此天地之陰陽交相
生化者也故曰寒暑燥濕風火天之陰陽也三陰三

侶山堂類辨卷二

矣

陽上奉之水火土金水火地之陰陽也生長化收藏
不應之三陰三陽者子午為少陰君火丑未為太陰
濕土寅申為少陽相火卯酉為陽明燥金辰戌為太
陽寒水己亥為厥陰風木是天之十干化生地之五
行地之十二支上承天之六氣後人不察究上古聖
經不明天地陰陽之化運有以逢辰則化之說者有
以制尅則化之說者此皆技術家之迂論也

侶山堂類辨卷上終

侶山堂類辨卷下

西陵隱菴道人撰

錢塘楊元如叅訂

本草綱領論

天地所生萬物皆感五運六氣之化故不出五氣五味五色五行寒熱溫涼升降浮沉之別經云五味陰陽之用辛甘發散為陽酸苦湧洩為陰淡味滲洩為陽鹹味湧洩為陰六者或收或散或緩或急或燥或潤或硬或堅隨所利而行之此物性之綱領也五氣五味各歸所喜酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先

侶山堂類辨卷下

入肺鹹先入腎肝色青宜食甘心色赤宜食酸肺色白宜食苦脾色黃宜食鹹腎色黑宜食辛辛散酸收甘緩苦堅鹹爽毒藥攻邪五穀為養五果為助五畜為益五菜為充氣味合而服之以補益精氣四時五藏之病隨五味所宜也又肝苦急急食甘以緩之欲散急食辛以散之用辛補之酸瀉之心苦緩急食酸以收之欲爽急食鹹以爽之用鹹補之甘瀉之脾苦溼急食苦以燥之欲緩急食甘以緩之用苦瀉之甘補之肺苦氣上逆急食苦以泄之欲收急食酸以收之用酸補之辛瀉之腎苦燥急食辛以潤之辛又能潤為能

開發臟腑也欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之又辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病無多食鹹苦走骨骨病無多食苦血鹹走骨甘走肉肉病無多食甘酸走筋筋病無多食酸此五味補瀉宜忌之綱領也夫百病之生也不出乎表裏陰陽寒熱虛實虛者補之實者瀉之寒者熱之熱者寒之堅者削之客者除之勞者溫之凡甘溫辛溫皆從補結者散之留者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者溫之逸者行之盛者折之驚者平之高者抑之下者舉之微者逆之甚者從之上之下之摩之浴之薄之劫之開之發之適事

侶山堂類辨卷下

為故逆者正治從者反治此治病之綱領也萬物各有自然之性凡病自有當然之理即物以窮其性即病以求其理得其性理豁然貫通則天地所生之萬物人生所患之百病皆歸一致矣用之可十可百推之可萬可千豈不綽然有餘裕哉

藥性形名論

按本草綱目金石草木禽獸果穀自神農及今計一千六百餘種命名之義各有思存如黃連白芷青黛玄參之類以色而命名也甘草苦參酸棗細辛之類以味而命名也寒水石溫胸臍火硝香薷之類以氣

四氣逆從論

經云升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之謂春宜用升以助生氣夏宜用浮以助長氣秋時宜降以順收令冬時宜沉以順封藏此藥性之宜順四時者也春氣溫宜用涼夏氣熱宜用寒秋氣涼宜用溫冬氣寒宜用熱此用氣之宜逆四時者也而病亦如之然時氣病氣又皆有常有變知其常變反其逆從可以把握陰陽裁成造化矣

大棗

棗色黃味甘脾家果也夫木末之實而為心家果者

信山堂類辨卷下

三

生化之道也木末之實而為脾家果者制化之道也蓋天地所生之萬物咸感五運六氣之生化明乎陰陽生剋之理則凡物之性可用之而生化于五藏六府矣○元如曰桃為肺之果核主利肝血杏為心之果核主利肺氣亦制化之理然與

梔子

梔子冬不隕葉五月感一陰之氣生花六出潔白芬香得金水之氣也其實結于枝稍圓小赤色味苦性寒乃陰中之陽腎之心品也故炒黑而成離中之虛導心火以下交于腎○元如曰六者陰之終也花多

五瓣如雪花梔子花玄精石皆感陰氣生成

枇杷

枇杷四季長青葉上多毛凡草木之生毛者皆至治肺多刺者花開于秋者皆得堅金之氣而能制風枇杷初秋結蕊深秋放花夏時果熟又得冬令之氣能引寒水以上滋利肺氣以下降故至治欬嗽卒喘并下氣消痰

欬冬花

欬冬花氣味辛溫生于園中及雍州山谷溪水間冬時發條結葇于冰雪中故名欬冬西北氣寒冰雪至夏不消欬冬辛溫

信山堂類辨卷下

六

可為大士人謂之看燈花又曰敲冰取欬冬謂在正月前半月採之如過元宵燈節花即大放矣此陰中之陽升也如形寒飲冷肺氣虛寒作喘者宜之若陰火上炎肺葉焦滿恐益銷燬毀傷矣

澤瀉

澤瀉水瀉也凡水草石草皆屬腎其性主升蓋天氣下降地水之氣上升自然之理也凡物之本乎上者性升本乎下者性降澤瀉形圓無下行之性矣春時養生于水中獨莖直上秋時白花作叢腎之肺品也易曰山澤通氣能行在下之水隨澤氣而上升復

使在上之水隨氣通調而下瀉故名曰澤瀉。○元如曰如何首烏形圓莖蔓其性惟升牛膝形細而長其性惟下故主治在下諸品可類惟之。

芍藥

芍藥氣味苦平苦走血故為血分之藥苦下洩故本經主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱因其破洩故太陰篇云太陰為病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也今人咸云芍藥至酸斂而不知有大黃之功能。○元如曰芍藥乃神農中品之藥本經曰氣味苦平後人增曰酸而

仙山堂類辨卷下

實未嘗酸也。盧子由曰市肆一種赤芍藥不知為何物草根兒醫瘍醫多用之此習已而不察其為害殊甚。

牡丹皮

牡丹皮色赤氣味辛寒血分之藥也不緣子生故名曰牡陰中之陽升也其味辛故主發散中風寒熱邪氣除癥堅瘀血寒能涼血故主痺癢驚癇凡骨蒸勞熱腫瘡癩丹皮為要藥若吐血衄血大非所宜以其上升故也。○元如曰若因風寒而衄血者宜之如陰火上炎者大忌。

括樓

凡草木之根其性上升稍秒子實性復下降物之理也括樓蔓延結實則根粉盡消實黃赤而子白潤氣味苦寒是以天花粉能啟陰液以上滋于心肺括樓實復能導心肺之氣以下行故本經主治胸痺。○元如曰如蘇子蘿菔子白芥雲臺之類性皆下行所謂上行極而下也。

麥芽

麥春長夏成得木火之氣故為肝之穀透發其芽能達木氣以制化脾土故能消米穀之實經云食氣入胃散精于肝淫氣于筋人之食飲不化而成反胃咽

仙山堂類辨卷下

八

膈者多因肝氣鬱怒所致予治此證于調理脾胃藥中倍加麥芽多有應手蓋醫者但知消穀而不知疎肝。○玉師曰可類推于穀芽黍芽大豆黃卷。

薯蕷

薯蕷古名也避唐宋帝諱改名山藥種植之法切作薄片隨所杵之竅而長之。盧子由先生治一血利久矣山藥隨所杵之竅而長滿性能塞管又百合之山藥為君配血藥而愈此乃意度之妙用又百合之白花者摘碎埋于土中一瓣即生百瓣而成一蒲夫凡物切碎皆成腐穢二品所生之異蓋得本體之精感氣化而生長山藥肉內多涎仲景用百合湯以水

浸一宿。出其白沫。涎沫乃其精也。氣生于精。二品得精氣之盛。故主補中益氣。長肉強陰。元如曰。凡物多精汁者。皆主養精補血益氣生肌。

枸杞

神農本經總名枸杞。無地骨皮。枸杞子之分。蓋狗字諧狗。杞字諧已。狗屬戌。而戌主右腎。腎主骨。而已屬陰土。故有地骨之名。而久服能堅筋骨。氣味苦寒。能清熱中消渴。蓋能助水土之氣。上滋心肺者也。其子色赤。性寒。能補兩腎之精氣。骨之精為瞳子。故助瞳子之光明。

佛山堂類辨卷下

九

紅花

紅花色赤多汁。生血行血之品也。陶隱居主治胎產血暈。惡血不盡。絞痛。胎死腹中。金匱方紅蘭花酒。治婦人六十二種風。又能主治癩瘡。臨川先生曰。治風先治血。血行風自滅。蓋風乃陽邪。血為陰液。此對待之法也。花樣莖葉且多毛刺。具堅金之象。故能勝制風水。夫男女血氣相同。仲祖單治婦人六十二種風者。良有以也。蓋婦人有餘于氣。不足于血。所不足者。乃衝任之血。散于皮膚肌腠之間。充膚熱肉。生毫毛。男子。上唇口而生髦鬚。女子。月事以時下。故多不足。

也。花性上行。花開散蔓。主生皮膚間散血。能資婦人之不足。故主治婦人之風。蓋血虛則皮毛之腠理不密。而易于受風也。此血主妊娠。故專治胎產惡血。靈樞經云。飲酒者衛氣先行皮膚。故用酒煎以助藥性。癩邪亦伏于募原之腠理間。故能引其外出。夫血有行于經脈中者。有散于皮膚外者。而所主之藥亦有不同。如當歸地黃茜草之類。主養脈內之血者也。紅蘭花。主生脈外之血者也。川芎芍藥丹皮紅麴之類。又外內之兼劑也。學者能體認先聖用藥之深心思。過半矣。

佛山堂類辨卷下

十

石膏

石膏氣味辛甘微寒。神農本經主中風寒熱。心下逆氣。驚喘。口乾舌焦。不能息。腹中堅痛。除邪鬼。產乳。金瘡。仲景用麻黃配石膏。能發陽明水液之汁。白虎湯解陽明燥熱之渴。又主風熱發斑。是神農仲景皆用為發散之品。蓋氣味辛甘而體質疎鬆。如肌理。但其性沉重。色白若金。故直從陽明而達于外也。後人咸謂清內熱而主降下。乃不明經義物性故耳。夫凡物有可升可降者。配發散之藥。則升。配破洩之藥。則降。如厚朴之氣味苦溫。本經主中風傷寒。頭痛寒熱。乃

發散之藥也。仲景承氣湯配枳實、大黃、芒硝為急下之劑。經云：酸苦湧泄為陰。蓋酸苦之味能上湧而下洩也。同升藥則升，同降藥則降。立方配合，乃醫家第一義，詎可忽諸。

女貞實

女貞子乃本經上品。氣味苦平，主補中、安五藏、養精神、除百病。久服肥健，輕身不老。強陰、健腰膝、變白髮、明目。即蠟樹也。立夏前後取蠟蟲種子，裹置枝上半月後，其蟲化出，延緣枝上，造成白蠟，堅白如凝脂。猶蠶食桑而成絲，連綿溫暖，皆得樹質精華，是以桑根

俗山堂類辨卷下

七

白皮，主傷中、五勞、六極、羸瘦、崩中、絕脈、補虛、益氣。女貞雖與冬青同名，其種實異。冬青名凍青，葉微圓，子赤色，蟲不造蠟為別也。世俗混用凍青實，二物功用迥別，采擇者不可不辯。

蓮實

蓮子本經上品。氣味甘平，主補中、養神、益氣力、除百疾。久服輕身耐老，不飢延年。夫蓮莖色青，味澹，中通外直，具風木之象。花紅，房白，鬚黃，子老而黑，有五行相生之義。故能補五臟不足，五臟主藏精者也。腎為水臟，受藏五臟之精。石蓮子色黑，味澹，故用之以固

精氣。今市肆一種狀如土石，味極苦澀，不知為何物。盧子由先生曰：食之令人腸結，宜于建蓮子中揀帶殼而色黑者為是。有云：假石蓮子乃樹上，所生即苦珠子之類。

桑上寄生

桑寄生生于近海州野及海外之境，地暖不蠶，桑無剪採之苦，氣厚意濃，兼之鳥食榕實，糞落桑上，乘氣而生。榕乃易生之木，枝葉下垂，即生根作本，故其樹極大多，生于海山中。是以子附于桑，則為桑上寄生。蓋感桑之精氣，故其功力一本于桑。若寄生他木上者，不惟氣性不同，且反生災害矣。今市肆者乃柴枝

俗山堂類辨卷下

七

也。有一種色黃，莢脆，狀如金釵石斛者，庶幾可用。寇宗奭曰：子從官南北徧搜，不可得，故非親採，難以別真偽。要知市賣者皆偽也。予故以依附桑上之藤葉如三角楓者取之，安胎甚效。蓋亦得桑之精氣者也。

紫草茸

按本草綱目，紫草發明下。李時珍曰：紫草氣味苦寒，如痘疹欲出未出，血熱毒盛，大便閉澀者，宜之。已出而紫黑便閉者，亦可用。若已出而紅活，及白陷大便利者，切宜忌之。直指方云：紫草治瘰，能導大便，使發出亦輕。活幼新書云：紫草性寒，小兒脾氣實者，猶可

用脾氣虛者反能作瀉故古方惟用紫草茸取其初得陽氣以類觸類所以用發瘧瘡今人不達此理一槩用之非矣夫所謂茸者即初生之蒙茸非紫草之外另有茸也又有如麒麟竭者謂之紫草茸非也乃紫鈿耳酉陽雜俎云紫鈿樹出真臘波斯二國樹高盈丈枝葉鬱茂經冬不凋天有霧露及雨沾濡則枝條出鈿狀如糖霜纍纍紫赤破則鮮紅能出痘毒此物產于異域殊不易得近有市利之徒以偽物假充索價甚厚非徒無益而反害之不若用草之為當也

枳實

和山堂類辨卷下

三

考工記云橘逾淮而北為枳蓋橘得江南溫熱之氣故氣味辛溫能達中土之氣通灌于四旁枳乘江北寒涼之氣性味苦寒能去寒熱之邪下洩是一物而性不同因天地之氣也本經至大風在皮膚中如麻豆苦痒者能啟寒水之氣以對待其陽邪枳葉經冬不凋得寒水之夫橘至成熟而後採摘其氣充滿故能橫徧于四體枳乃初生之小者其氣收斂故專主下泄若夫枳殼之苦洩其性又能橫充所以本經止云實而無殼至宋開寶間始有殼實之分如病胸腹實而當下者應用實而以殼代之乃識見淺而無力量處

橘皮

橘皮臭香色黃味甘而帶辛甘香黃主土辛主金夫胃土主脈絡胃又屬陽明其色白脾土主肌肉肺金主皮毛橘皮在內之白膜如胃府所至之絡脈皮內之白若肌肉皮外之宗眼如毛孔是從中達外由脈而絡絡而肌肌而皮也橘皮能宣發陽明之汗解胃氣之逆呃蓋能宣達胃氣外出于皮毛若夫皮膚之邪逆于內而為喘急膈上之痰結于上而為欬嗽欲消痰降氣而從下解者是又從肌而絡絡而脈脈而胃也是邪正之氣欲出欲入而用橘皮為導引者皆藉皮內之白膜如去其膜白則斷截出入之道路故本經止曰橘皮而並無留白去白之分

和山堂類辨卷下

四

麥門冬

經云人之所受氣者穀也穀之所注者胃也胃者水穀血氣之海也海之所行雲氣者天下也胃之所出血氣者經隧也經隧者五臟六腑之大絡也是藏府受水穀之精氣由胃府之大絡通于藏府之經麥門冬主傷中傷飽胃絡脈絕以其根鬚從中而貫如絡脈之貫于募原之中是通胸絡之氣藉中心之貫通也麥冬經冬不凋能啟陰氣上滋于心肺故主心腹

結氣。咳嗽虛勞。腎脈上貫肝膈入肺中。從肺出絡心。是腎氣之上交于心肺。心肺之痰熱欲從下解者。又咸藉麥冬之心而導引于脈中也。蓋凡物之寒涼者。其心必熱。熱者陰中之陽也。人但知去熱而不知用陽。得其陽而後能通陰中之氣。

防已

經云水道不行則形氣消索。是水有隨氣而運行于膚表者。有水火上下之相濟者。如氣滯而水不行則為水病。癰病矣。防已生于漢中者。破之紋作車輻。莖蔓空通。三通氣行水。以防已土之制。故有防已之名。

侶山堂類辨卷下

五

金匱方治水病有防已黃芪湯。防已茯苓湯治痰飲。有水防已湯。防已加茯苓。芍藥湯。孫思邈治小便閉。澀有三物水。防已湯。葶氣運于上而水能就下也。今相沿為下部之藥。緣前人創論于前。後人隨文附會。爾泉曰。防已如險峻之人。幸災樂禍。首為亂階。若善用之。亦可敵兇突險。此眩眩之藥也。故聖人存而不廢。如上焦氣分之病。皆不可用。乃下焦血分之藥耳。噫。如此議論。不知從何處參出。夫氣化而後水行。防已乃行氣利水之品。反云上焦氣分不可用。神農本草分上中下三品。以養生補益。延年不老者為上品。

治病者次之。毒藥為下。防已能運行去病。是運中有補。故本經列于中品之前。奚為存而不廢。且氣味辛平。無毒。奚為眩眩之藥。如此議論。不能枚舉。無裨治道。反疑惑後學。予觀今世惟盧子田先生學識淵博。惟宗聖經。獨不為前人所愚。

附子

附子如芋子。附母生。故名附子。旁之小子曰側子。土人欲重其効。兩用水坯將側子敲平于上。然母子之體不相合。故須揀子之少者。又當估去小子。有一兩餘。方可用。若連子而重。一兩五六錢。更為有力。近時

侶山堂類辨卷下

六

俗人咸謂乙兩外者為天雄。不知天雄長三寸以上。旁不生子。故名曰雄。土人尤忌生此。以為不利。即禱之。謂其不能生子。母之相生也。今人多取重一兩者。若側子多而去其二三錢。則母身止重七八錢之川烏矣。此緣失于考究。故沿襲時俗之訛。又如附子之尖。乃下行之根。其性趨下。有欲治上而用其尖者。顛倒物性。尤為可笑。

丹雄雞

羽蟲三百六十。乘火運而生。故飛翔于上下。雞在卦屬巽。冠羽皆丹。感水火之氣者也。在支屬酉。又得金

之制化。故鳴于寅酉二時。鳴則先鼓其翼。風之象也。鳴者金之聲也。玉師曰木擊金則鳴。其性好鬪。秉肅殺之氣也。故至女子崩中漏下赤白。蓋崩中漏下。肝主之血也。夫凡物各有自然之性。得其物性。施于治道。若合符節。故舉一以推之。

黑豕

猪屬亥水之畜也。故氣味鹹平。豕性甚躁。玉師曰故燥屬陰。行不舉足而狂奔。故無病之人。食之補腎生精。如感于風寒者。食之生痰發喘。以其善奔水氣于上也。按毛蟲三百六十。感木氣而生。而牛羊犬馬。又秉火土

信山堂類辨卷下

之化。豕屬水而性寒。羽蟲感火氣之化。而生長于水中者。又居其半。鵝鴨鳧鶩之類。蓋五類之蟲。雖感五行之氣而生。而五行之中。有變有化。明乎變化之道。可與參天地之生物矣。

鱗類

鱗蟲三百六十。而龍為之長。感水運而生。水者至陰也。陰極陽生。故戊癸合而化火。火生于水也。玉師曰龍身有火。是以魚屬火而有水火相濟之功。

蚌蛤

介蟲三百六十。皆具堅甲之象。感金氣而生。金生水

也。外剛內柔。離之象也。故蚌蛤之肉。皆至清涼在外。之殼。又能燥濕。是一物而有水火寒熱之分焉。非惟蚌蛤之為然也。如坎為水。水生木。其于木也。為堅多心。是木皮之清涼者。其心則熱。又非惟木之為然也。凡物之極寒者。必有熱。極熱者。必有寒。蓋物極則變。變則生化。○玉師曰。如麻黃大發汗。而根節又能止汗。西瓜大涼。而子性大熱。

血餘

腎藏精。其榮在髮。心主血。髮乃血之餘也。夫血乃所生之精汁。奉心神而化赤。故曰血者神氣也。本經髮

信山堂類辨卷下

髮至五癰。關格不通。療小兒驚。大人癰。仍自還。神化謂血化之餘。榮仍自還于神化也。血脉流通。精神交感。則關格通。而驚癰自解。是以痘方用血餘者。取其能導腎精中之毒氣。歸于心神。行于脈絡。而又能敗毒。

龜板鹿茸

李時珍曰。龜鹿皆靈。而有壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其甲以補心。補腎補血。皆以養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角以補命。補精補氣。皆以養陽也。乃物理之玄微。神工之能事。按任脈起于中

極之下。以上毛際循腹裏上開元至咽喉上頤循面督脈環遶一身循腰脊歷絡兩腎龜板治小兒顛不合鹿茸生齒不老。菘二品皆屬于腎腎主骨也任督二脈為陰陽百脈之宗又皆出于腎故痘方用之者一取其養陰而清熱一取其透頂以敗毒導腎中之火毒從百脈而外出于皮膚。龜板又能達于四肢故至治四肢重弱○

上古上蒸煎而用之若敗龜板者乃病死枯敗之物絕無靈氣又何所取焉

半夏天花粉

月令五月半夏生當夏之半也其形圓其色白其味辛陽明胃府之藥也陽明秉秋金之燥氣半夏啟一陰之氣上與戊土相合戊癸合而化火故陽明為燥熱之府能化水穀之精微天花粉別名瑞雪根粉潔白氣味苦寒莖引藤蔓能啟陰液從脈絡而上滋于秋金。藤蔓者走經脈故有天花瑞雪之名菘水陰之氣上凝于天而為雪花者天雨之六花也一起陰氣于脈外上與陽明相合而成火土之燥一起陰液于脈中

天癸相合而能滋潤其燥金是以傷寒金匱諸方用半夏以助陽明之氣渴者燥熱太過即去半夏易花粉以滋之先聖賢立方加減豈輕忽歟

百合紫蘇

庭前植百合紫蘇各數莖見百合花晝開夜合紫蘇葉朝挺暮垂因悟草木之性感天地陰陽之氣而為開闔者也如春生夏長秋成冬殞四時之開闔也晝開夜合朝出暮入一日之開闔也是以一歲之中有四時一日之中有四時而人物應之百合色白氣平其形象肺能助呼吸之開闔故至邪氣腹脹心痛菘氣行則邪散而脹痛解矣至利大小便者氣化則出也至補中益氣者氣之發原于中也蘇色紫赤枝莖空通其氣朝出暮入有如經脈之氣晝行于陽夜行于陰是以蘇葉能發表汗者血液之汗也。白走氣分赤走血分

佛山堂類辨卷下

枝莖能通血脈故易思蘭先生常用蘇莖通十二經之關竅消咽膈飽悶通大小便止下利赤白亦常用香蘇細莖不切斷治反胃膈食吐血下血多奏奇功菘食氣入胃散精于肝濁氣歸心肝主血而心主脈血脈疎通則食飲自化經云陽絡傷則吐血陰絡傷則下血通其絡脈使血有所歸則吐下自止夫茜草歸芎之類皆能引血歸經然不若紫蘇晝出夜入之行速耳於戲陰陽開闔天地之道也進乎技矣

羌活防風

按神農本草三百六十種以上品一百二十種為君

中品一百二十種為臣。下品一百二十種為使。羌活防風皆本經上品。有謂羌活治一身盡痛。乃却亂反正之君。主防風治一身盡痛。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。噫。神農列于上品之君。藥後人改為卑賤之卒伍。何防風之不幸也。夫君令傳行。亦隨郵使所引。徧及萬方。若以隨所引至為卑賤。則羌活亦可為卒伍矣。如此議論。雖不大有關係。但使後人從而和之。則陋習終不可挽回矣。

雞子金銀花王不留行

天地之形如鳥卵。仲景即以雞子白補氣。卵黃治血。

信山堂類辨卷一

三

脈金銀花。花開黃白。藤名忍冬。得水陰之氣而蔓延。陶隱君謂能行榮衛陰陽。主治寒熱腹脹。敗毒消腫。蓋榮衛行而寒熱腫脹自消。得陰氣而熱毒自解。故又治熱毒下痢。飛尸鬼疰。喉痺乳鵝。王不留行亦花開黃白。故名金盞銀臺。其性善行。言雖有王命不能留其行也。陶隱君亦取其能行氣血。主治金瘡癰腫。痛痺產難。下乳汁。利小便。出竹木刺。夫血氣留阻百病皆生。榮衛運行精神自倍。故二種皆為上品。並主輕身耐老。益壽延年。雞卵用形。二花取色。一因其延蔓。一取其善行。夫醫者意也。本草大義亦以意逆之。

則得矣。開之曰人。但知金銀花敗毒消腫。不知有行榮衛血氣之功。得冬令寒水之氣。

沙參人參黃芪

沙參人參黃芪皆神農本經上品。咸主補養元氣。沙參色白。氣味甘苦微寒。主補中益肺氣。肺氣者胃府所生之宗氣。上出于肺。以司呼吸。人一呼則八萬四千毛竅皆闔。一吸則八萬四千毛竅皆開。故肺主皮毛。補中者宗氣生于胃府也。人參色白微黃。氣味甘溫。資胃府之精氣者也。故主補五藏安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目開心。益志。蓋五藏之精氣神志。

信山堂類辨卷一

三

胃府之所生也。黃芪色黃。氣味甘溫。補益脾氣者也。脾氣者元真之氣也。元真者先天之真。元生于地。水之中。三焦通會元真于肌腠。故脾主肌肉。黃芪主癰疽久敗。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。蓋血氣留滯于肌肉。則為癰腫。肌腠之氣運行。則肌肉生而膿腫消矣。大風癩疾。乃風邪傷榮。而熱出于腑肉。其氣不清。故使其鼻柱壞而色敗。皮膚癢潰。經云腸辟為痔。蓋脾氣孤弱。五液注下。則生痔漏。鼠瘻者邪氣留于脈中。而為癭。留于肉腠。則為馬刀。俠癭。蓋脾土盛而元氣行。則癰癢諸病皆解矣。補虛者補肌肉羸瘦也。主

小兒百病者。小兒五藏柔脆。中土之氣未足。若過于飲食。則脾氣傷而不能運化矣。脾弱則胃強矣。胃強則消穀善飢。脾弱則肌肉消瘦。胃熱則津液不生。而熱疳食疳之病生焉。是以黃芪白朮黃連枳實爲小兒之要藥。蓋清其胃熱。脾氣運行。則無五疳五癆之病矣。腠理固密。則無急慢驚風之證矣。三者皆補中之品。而各有所至之分。按本草千種有奇。愚所論者。錯綜辯証。百不及一。同志高明。引伸觸類。一可貫十。十可隲百。至參閱前人議論。是則曰是。非則曰非。關先聖之奧義。以開來學。是予所深望焉。

侶山堂類辨卷下

三

薑附辨

乾薑甘草人參白朮黃芪。補中氣之品也。是以吐傷中氣者。用理中圓。乃人參甘草乾薑白朮四味。附子乃助下焦之生氣者也。是以手足厥冷。脈微欲絕者。用四逆湯。乃附子乾薑甘草三味。夫啟下焦之生氣者。宜生附。補下焦之元氣。或汗漏不止。而陽欲外脫者。宜熟附。以固補之。蓋元氣發原于下。從中焦而達于四肢。故生氣欲絕于下者。用下焦之附子。必配中焦之甘草。乾薑。或加入人參白朮。若止傷中氣而下焦之生原不傷者。止用理中。而不必附子矣。不格物性。

中下之分。不體先聖立方之意。有以生附配乾薑。補中有發。附子得生薑。則能發散之。說者有以附子無乾薑。不熱得甘草。則性緩之說者。蓋以薑附爲同類。疑惑後人。悞事匪細。如生氣欲絕于下。所當急溫者。若不用附。而以薑試之。則不救矣。○元如曰。不敢用附。而先以桂代之者。亦悞事不淺。

炮製辨

上古以司歲備物。謂得天地之專精。如君相二火。司歲則收取薑桂。附子之熱類。如太陽寒水。司歲則收取芩連。太黃之寒類。如太陰土氣。司歲則收取芩朮。

侶山堂類辨卷下

三

參苓山藥黃精之土類。如厥陰風木。司歲則收取羌活防風。天麻獨活之風類。如陽明燥金。司歲則收取蒼朮桑皮。半夏之燥類。蓋得至歲之氣。以助之。則物之功力倍厚。中古之世。不能司歲備物。故用炮製。以代天地之氣。如製附子曰炮。製蒼朮桑皮曰炒。蓋以火助熱。以炒助燥也。製白朮以土拌。製黃連以水浸。皆所以助之也。近有製附子以水煮。曰陰製。用芝麻炒蒼朮。以蜜拌桑皮。曰潤燥。以薑酒炒芩連。按傷寒方。連以半夏作餅。此皆由狐疑而無力量故也。昔齊相徐之才論藥。有宣通補洩輕重滑澀燥濕之

十劑元人王安道補出寒熱二種是宜用寒者專取其寒用熱者專取其熱宜瀉者專取其燥宜洩者專取其滑若反制其性而用之何異束縛手足而使之戰鬪哉

畏惡反辯

藥之相須相使相惡相反出北齊徐之才藥對非上古之論也聿考傷寒金匱千金諸方相畏相反者多並用有云相畏者如將之畏帥勇往直前不敢退却相反者彼此相忌能各立其功圓機之士又何必膠執于時襲之固陋乎

奇偶分兩辯

至真要論曰近者奇之遠者偶之汗者不以奇下者不以偶夫近奇遠偶者謂奇上而偶下猶天地之定位也下宜奇而汗宜偶者以降者謂天升者謂地地氣升而後能為雲為雨也夫天地陰陽之道天氣下降氣流于地地氣上升氣騰于天不則天地四塞而汗從何來有不明天地氣交之道者泥于近奇遠偶之句反改為汗不以偶下不以奇此不通之甚也大要曰君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之制也近而奇偶制小

其服遠而奇偶制大其服大則數少小則數多多則九之少則二之蓋數少而分兩重者為大方數多而分兩少者為小方是以上古之方少者一二三味其分兩各三四兩多者不過八九味分兩亦各有兩數古之二兩今一兩也皆有君臣佐使之分焉有獨贊東垣能用大方如韓信將兵多多益善噫此但知有東垣而不知有內經者也夫東垣之大方不過以數方合用是為複方如清暑益氣湯以補中益氣湯內加二妙生脉二方焉能如先聖之大方乎上古大方試觀鱉甲煎丸用至二十四味其間參伍錯綜如孔明陣

圖人莫能識

寒熱補瀉兼用辯

夫治病有專宜于寒者熱者補者瀉者又宜寒熱補瀉之兼用者如傷寒有附子瀉心湯用大黃芩連附子寒熱之並用者有柴胡加龍骨牡蠣湯以人參大黃黃芩薑桂補瀉寒熱之並用者金匱有大黃附子細辛湯有大黃乾薑巴豆之備急丸此皆先聖賢切中肯綮之妙用當參究其所用之因而取法之今時有用涼藥而恐其太涼用熱藥而恐其太熱是止知藥之寒熱而不知病之邪正虛實也然亦有並用寒

熱補瀉而切當者。反爲不在道者笑之。○開之曰寒熱補瀉兼用在邪正虛實中求之則得矣。

官料藥辯

所謂官料藥者。乃解京納局之高品。近時有謂火癰黃疸腫脹諸證。不宜服官料藥者。真齊東野人之語也。夫官料亦多係草根木皮。又何分草藥之非官料。而官料之非草藥乎。夫草藥自神農至今計六百一十餘種。又雜草九種。有名未用者一百五十三種。內多有名而不識其草者。有草而不知其名者。若按圖經以對草之形。以草之主治何病以對經。未嘗不可。

信山堂類辨卷下

三

金匱腎氣丸論

腎氣丸乃上古之聖方。藏之金匱。故名金匱方。夫八乘先天之陰陽水火而生。水火土金之五行。此方滋補先天之精。而交通于五臟。故名腎氣丸。用熟地黃八兩以滋天乙之精。八者男子所得之陰數也。用附子一枚重一兩者以資地二之火。兩爲陰數之終。一乃生陽之始。助陰中所生之陽。蓋兩腎之水火互

交陰陽相合。是以用地黃附子以助先天之水。火精。炁者也。用桂通腎氣以生肝。桂色赤而爲百木之長。肝主血而屬木也。古方原用桂枝用牡丹皮通腎氣上交于心脾丹屬火而主血。牡乃陰中之陽升也。夫腎與肺皆積水也。澤瀉能行水上。復能瀉水下。行主通水。天一之炁。是以配肉桂丹皮澤瀉者。導腎臟之水火上交于四臟者也。茯苓歸伏心氣以下交。山藥培養脾土以化水。山茱萸乃木末之實。味酸色赤。復能導肝氣交通于腎。是以配茯苓山藥山萸澤瀉者。導四臟之氣而下交于腎也。心肺爲陽。故用三兩之奇。肝脾

信山堂類辨卷下

三

爲陰。故用四兩之偶。此培養精神氣血。交通五藏五行之神方。不可缺一者也。宋錢仲陽以爲陽常有餘。陰常不足。去桂附而改爲六味地黃丸。夫精血固宜補養。而神炁不可資生乎。後人因有知母黃柏者。有加枸杞菊花者。有加麥冬五味者。竟失本來面目矣。夫加減之法。因陰虛火盛之人。以之治病則可。若欲調攝陰陽存養精氣和平。水火交通五行益壽延年。神仙不老。必須恒服此金丹矣。○元如曰。精生于五藏而下藏于腎。腎氣上升以化生此精。是以五藏交通而後精氣充足。

枳木湯論

金匱要畧用枳木湯治水飲所作心下堅大如盤蓋胃為陽脾為陰陽常有餘而陰常不足胃強脾弱則陽與陰絕矣脾不能為胃行其津液則水飲作矣故用木以補脾用枳以抑胃後人不知胃強脾弱用分理之法咸謂一補一消之方再按局方之四物湯二陳湯四君子湯易老之枳木丸皆從金匱方套出能明乎先聖立方大義後人之方不足法矣

膠艾湯論

艾名冰臺削冰令圓以艾向日取火是能啟兩腎水

借山堂類辨卷下

三

火之氣上交于心肺者也故曰陷下阿膠用阿井水煎驢皮而成阿水乃濟水伏行地中千里來源其性趨下夫心合濟水肺至皮毛阿膠能降心肺之氣以下交于兩腎者也水火交而地天泰則血氣流行陰陽和合又何病之有明乎陰陽升降之道五行生化之理立方大意思過半矣鐵叢申先生之交感丸亦從此中化出

戊癸合化論

順治辛卯歲予年四十有二八月中生一胃脘癰在鳩尾斜下右寸許微腫不紅按之不痛...隱然如一

雞卵在內姚繼元先生視之曰此胃脘癰也一名捧心癰速宜解散不則有性命之憂與一大膏藥上加末藥二三錢午間烘貼至暮手足蘇軟漸至身不能轉側仰臥于書齋心煩意亂屏其家人至初更時癰上起一毒氣從左乳下至肋下脇入于左腎入時如燒錐刺入眼中一陣火光如車輪神氣昏暈痛楚難言火光漸搖漾而散神昏始蘇過半時許其氣復起其行如舊痛楚如前如此者三四次予思之此戊與癸合也然腑邪入臟自分必死妄想此毒氣不從脇下入腎得從中而入于腸胃則生矣如此靜而行之初次不從二次即隨想而仍從左乳下入于腸中腹中大鳴無從前之痛楚矣隨起隨想因悟修養之道氣隨想而通用者也選氣法大能起鼓膈之證勞怯咳嗽亦妙至天明大泄數次胸膈寬疎繼元先生復視之曰毒已解散無妨事矣予因問曰膏藥乃毒藥耶曰非也上撒之末藥名曰端午藥純用砒霜巴豆于端午日配製無此毒藥焉能透入皮肉之內予曰何不早言昨晚以為必死于毒今早始悟膏藥中必有毒藥而得生于毒矣毒藥攻疾有如此之妙也至次年中秋復發仍用膏藥末藥毫無前番之狀而腫亦不消予因想運

借山堂類辨卷下

三

氣之妙。經行坐臥。以手按摩。意想此毒氣。仍歸腸胃。而出。如此十餘日。而散。至次年中秋。又發。予對繼元先生曰。去歲膏藥。不應。今須另法治之。姚曰。部院劉公之夫人。生此毒。曾另置末藥。比前藥更毒。貼之。要起大泡。此藥用去。無有不應。貼上數日。並不起泡。腫亦不消。予想此證。已頑。不受毒藥之制。膏藥尚且不應。況乎和湯之治。即揭去膏藥。用大艾圓。迎頭灸九壯。其毒隨久病乎。火氣四散。嗣後永不發矣。予想陽明之毒。準在中秋。金旺之時。而發。初從毒攻。而解。次隨氣運。而散。後因勝制而消。因悟氣運制化之道。有如此之妙用。五行

侶山堂類辨卷下

三

合化之理。人與天地相參。即以此理推治百病。奇妙異常。王紹隆先生曰。業醫人。須病病經過。始得之矣。

太陰陽明論

三陰三陽者。天之六氣也。五藏六府者。有形之五行也。胃屬土。而陽明主秋。令之燥。陽明者。胃之悍氣。別走陽明。猶膀胱乃津液之府。而太陽之氣。為巨陽。五行六氣之有別也。夫兩陽合明。故曰陽明。陽盛之氣也。故胃土之氣。柔和。土主柔順。而陽明之氣。燥熱。是以陽明得中。見少陰之濕化。則陰陽相和矣。胃土得戊癸之合。則火土之氣盛矣。故陽明之氣。宜于和柔。胃土

之氣。宜于強盛。如火土之氣弱。而又秉太陰之濕。則水穀不消。而為虛泄矣。此宜人參橘皮甘草半夏之類。以助胃。白朮蒼朮厚朴茯苓薑棗之類。以益脾。甚者加附子以助癸中之火。若陽明悍熱之氣盛。而不得太陰之化。則陽與陰絕。漸能食而瘦矣。此又宜黃連枳實之類。以抑胃。莖朮薑棗之類。以扶脾。易老東垣以枳朮丸為半補半消之法。皆不得五行六氣之理。先聖立方之意。

虻蟲

侶山堂類辨卷下

三

余于南軒臨窗註書。十有餘歲矣。自晨至暮。未嘗離此窗。前堵砌雖小而甚清潔。每于夏月大風雨後。即有蜣螂如母指大者。蝸牛如田螺者。生長極易。此感天地之風濕而生。所謂四生中之濕生也。人秉天地之五行六氣而生。身中亦具此六氣。如傷寒病在厥陰。感厥陰之風氣。而虻生于中土。蓋亦因風濕所生。一時即能長大。亦如蚰蝸之易生。易大者也。又常聞人之藏府。與猪相似。余因見剖猪處。稍住足觀之。偶見一猪小腸內。有虻蟲長尺許。盤旋于內。與人之虻蟲無異。要知人病虻厥作痛。或常吐虻。便虻多。因脾胃濕熱而生。無病之人。未常有虻也。俗人相沿云。胃

中有虬故能消食謬矣

聞之者老自順治至康熙之初四十年間外郡人稱武林爲醫藪蓋其時盧君晉公以禪理參證醫理治奇疾輒效名動一時張君隱菴繼之而起名與相埒埒侶山堂招同學友生及諸門弟子講論其中參考經論之同異而辨其是非于是談軒岐之學者咸向往于兩君之門稱極盛焉兩君所著書皆堪傳世張氏所輯者俱已授梓行世甫及百年流傳日少其針灸秘傳及侶山堂類辨二種已難

侶山堂類辨卷下

卷

得購余尋之有年始得類辨一種觀其準古衡今析疑糾謬足爲後學規矩準繩亟爲重梓以廣其傳後之學者苟以此爲指南庶能得正道而由之寧有岐路之迷邪徑之誤哉隱菴初爲糧道書吏糧道患癰閉諸醫用藥皆罔效或薦隱菴隱菴以補中益氣湯投之一劑而愈或問之曰人治以降利之藥而不效子易以升提之藥而效其理安在隱菴曰公不見夫水注子乎閉其上而倒懸之點滴不能下也去其上之閉而水自迴流非其法

耶今閱編中所釋將欲下之必先舉之而引輓轡之繩以喻正是此理人能以此法觸類而通之醫法固無盡藏哉茲事余蓋聞之黃君觀石者如是近又聞張君東扶言盧晉公事糧道患內閉溺不得下勢甚亟諸醫皆束手晉公先生以人參麻黃各一兩定劑諸醫囁嚅不敢謂是糧道不疑而飲其藥不踰時溺下糧道喜以千金贈晉公與予前所聞者異辭予意盧張二君所治各一當事而傳者均屬之糧道致有異同之疑耳黃張二友皆

侶山堂類辨卷下

卷

非妄言者故並紀之以爲治癰閉之法并以證此帙中名言精理所蘊不少人當殫思細參以收其益慎毋視爲淺近而忽之也乾隆己丑三月五日戊子胥山老人王琦跋憶甲子歲暮以事往來橫山大嶺問道中憇一農家農家方解豕析其前蹄有清水流出約二升許異而詢之農家子曰此豕自么時卽患足弱不能行立恒臥而食此其病之所由來也予因是悟人之病手足不良而不任持行者蓋因水濕之氣留滯其中者亦如此

矣茲閱隱菴所記因豬腸之虬而知無病之
人未嘗有虬其事固可類觀也穀雨後三日
庚子校勘已畢重閱此條因泚筆附記于後



吳江徐靈胎著

醫貫砭

半松齋藏板

醫貫砭卷上

吳江徐靈胎泐溪著

男 熾鼎和



十二官論

心者君主之官也神明出焉肺者相傳之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣凡此十二官者不得相

醫貫砭

卷上

失也故主明則下安

王明主字緊頂上文主字來下文何得云別有一主

以此養生

則壽殛世不殆以為天下大昌主不明則十二官危使道閉塞而不通形乃大傷以此養生則殃以為天下者其宗大危戒之戒之至道在微變化無窮孰知其原窘乎哉消者懼懼孰知其要閔閔之當孰者為良恍惚之數生於毫釐毫釐之數起於度量千之萬之可以益大推之大之其形乃制此書專為入味六味而作欲表章二方必先講明所以然之故徧閱經文並無其說只有心主之官一語又是斷斷不可用二方者只得將命門二字增入然後二方可為十二官之主藥其作偽之心如此玩內經註文即以心為主愚謂人身別有一主非心也

即內經此乃邪說之根謂之心主之官當與十二官平等不得獨尊

心之官為主若以心之官為主則下文主不明則十二官

危當云十一官矣此理甚明何註經者昧此耶明明說君

之稱矣何以不得尊之其曰十二官危者蓋主不明則心

亦自病也若曰十一官則主不明之病反不在內於義為

不備蓋此一主者氣血之根生死之關十二經之綱維也

或問心既非主而君主又是一身之要然則主果何物耶

何形耶何處安頓耶余曰悉乎問也若有物可指有形可

見人皆得而知之矣惟其無形與無物也故自古聖賢因

心立論而卒不能直指其實因心立論仍是說心不是說

命門也據爾言則從古聖賢

當以命門立論矣 孔門之一貫上紹精一執中之統維曾子子貢

得其傳而二子俱以心悟而非言傳也設以言傳當時門

人之所共聞不應復有何謂之問也後來子思衍其傳而

作中庸天命之性以中為大本而終於無聲無臭孟子說

不動心有道而根於浩然之氣而又曰難言因外感

疾病用草木金石之藥補之瀉之寒之熱之其氣此

乃極平常之理編要而到四書六經談性談命傳道等語

與疾病何涉即內經所云司天運氣義極精微

亦不過指六淫之氣感入耳何嘗大言欺人耶老氏道德

經云谷神不死是曰玄牝玄牝之門造化之根又曰恍恍

惚惚其中有物佛氏心經云空中無色無受想形識無眼

耳鼻舌身意又曰萬法歸一一歸何處夫一也中也性也

浩然也玄牝也空中也皆虛名也不得已而強名之也立

言之士皆可以虛名著論至於行醫濟世將以何味的為

君主之藥而可以綱維一身之疾病耶此段乃其邪說之

大本難言萬法歸一皆暗指命門為言則古聖賢道統之

傳並與心上毫無干涉祇是傳此腎中命門之訣而入味

六味二方乃是一貫大本難言萬法歸一之補藥此等怪

論自開闢以來未之或有小人之欺世至於此極而粗通

文理之人觀之不但不怪且以此人

為真知孔孟之學者亦大可怪矣

腎有二精所舍也生於脊脊十四椎下兩旁各一寸五分

形如豇豆相並而曲附於脊外有黃脂包裹裏白外黑各

有帶二條上條係於心包下條過屏翳穴後趨脊骨兩腎

但屬水但一邊屬陰一邊屬陽越人謂左為腎右為命門

非也命門即在兩腎各一寸五分之間此本舊說然亦影

響杜撰之語與內

經全不當一身之中易所謂一陽陷於二陰之中內經云

七節之旁有小心是也名曰命門是謂真君主內經何不

言命門者君主之乃一身之太極無形可見既云小心兩腎之中是

其安宅也按內經並無命門之說惟靈樞經結篇云太陽

命門者目也素問陰陽離合論云太陽根於至陰結於

命門王啓立註云命門者目也素問陰陽離合論云太陽根於至陰結於

隨時於門字義為切若腎中一
點真陽而謂之門義亦不合
其右旁有一小竅即三焦

內經明云上焦如霧中焦如漚
下焦如瀆乃指腎旁小竅杜撰不倫
三焦者是其臣使之官

經云三焦者決瀆之官膈中者
臣使之官前段明明引過今乃以
三焦為命門臣使之官何顛倒如是
稟命而行周流於五藏六府之間而
不息名曰相火相者言如

天君無為而治宰相代天行化
此先天無形之火與後天
有形之火不同

命門而指為天君尤為支離
其左旁有一小竅乃真陰真水氣也亦無形
火無形猶可水如何說無

三焦及此竅為真火真水將
火假水耶且前竅名三焦此竅
又名何物邪上行夾脊至

腦中為髓海泌其精液注之於脈
以榮四末真陰之氣所
必者何物之

醫貫砭 卷上 四

精液且何以見得必
從髓海中到四末 內注五藏六府以應刻數亦隨相火

潛行周身與兩腎所主後天有形之火不同
按靈樞管衛

焦云此所受氣者泌精液化其精微
上注於肺脈乃化而為血以奉生身莫貴於此
故獨得行於總經命曰

營氣又云上焦亦與營俱行於陽
二十五度行於陰二十五度一周也
經文靈樞皆指營氣而言今乃移作腎中水

氣杜撰不倫顛倒 但命門無形之火在兩腎有形之中為
錯亂真證語也

黃庭無形之火前指三 故曰 是誰
五藏之真惟腎為根

為五藏之假耶 褚齊賢云人之受胎始於任之兆惟命門
先具有命門然後生心心主血有心然後生肺肺主皮毛

有脾然後生腎腎主骨髓有腎則與命門合二數備是以

醫貫砭 卷上

腎有兩岐也 前云命門在中腎在兩旁今又引腎與命門
合為二仍是左右對待之義前後交離如此
可見命門為十二經之主腎無此則無以作強而技巧不
出矣膀胱無此則三焦之氣不化而水道不行矣 膀胱與

然兩府云膀胱無命門 脾胃無此則不能蒸腐水穀而五
則三焦不化如何接續 脾胃無此則不能蒸腐水穀而五
味不出矣肝膽無此則將軍無決斷而謀慮不出矣大小
腸無此則變化不行而二便閉矣心無此則神明昏而萬
事不能應矣 命門尚是當君主之稱耶 此所謂主不明
則十二官危也 亦以命門為主無忌憚已極 余有一譬焉
譬之元宵之熬山走馬燈拜者舞者飛者走者無一不具

醫貫砭 卷上 五

其中間惟是一火耳火旺則動速火微則動緩火熄則寂
然不動而拜者舞者飛者走者軀殼未嘗不存也 走馬燈
皆是死物所以惟恃火氣衝突機關而動若五藏六府各
有生氣豈專恃命門耶惟其視五藏六府皆為死物所以
後文別無治五藏六府之方專恃一八 故曰汝身非汝所
味九治五藏六府之病其根皆在此也

有是天地之委形也 引莊子語亦 余所以諄諄必欲明此
論者欲世之養身者治病者的以命門為君主而加意於
火之一字 養身補火已屬偏見况治病必視其病 夫既曰
立命之門火乃人身之至寶何世之養身者不知保養節
欲而日夜戕賊此火 不節欲亦非專於戕賊此火倘以節
喪之人一概補陽又為殺人之術矣

既病矣治病者不知溫養此火而日用寒涼以直滅此火焉望其有生氣耶治法多端原不是專用寒涼亦不是專於補火也經曰主不明

則十二官危以此養生則殃戒之戒之余今直指其歸元之路而明示其命門君主之火命門竟指為君火乃水中

之火相依而永不相離也永不相離何以火之有餘緣真

水之不足也毫不敢去火只補水以配火壯水之主以鎮

陽光上文俱為八味作地步又恐遺却六味此處忽然轉

心勞出小不足之論邪說害人其苦心亦如此所謂作偽

也得為水之有餘若是水腫等證亦不得專亦不必瀉水就

於水火總是有欺人之大言殺人之捷徑耳亦不必瀉水就

醫貫疏 卷上

於水中補火益火之原以消陰翳所謂原與主者皆屬先

天無形之妙非曰心為火而其原在肝腎為水而其主屬

肺蓋心脾腎肝肺皆後天有形之物也須以無形之火配

無形之水直探其君主之穴宅而求之是謂同氣相求文理

不斯易以入也所謂知其要者一言而終也若夫風寒暑

濕燥火六者入於人身此客氣也非主氣也主氣固客氣

不能入六淫未入之先專一用補藥入味六味無甚害若

反補邪氣矣能不殺人耶且無病之人亦何必服藥既服

藥則必視人之氣體如何而後製方亦何得專用二方也

今之談醫者徒知客者除之漫不加意於主氣何哉縱有

言固主氣者專以脾胃為一身之主焉知坤土是離火所

生而艮土又屬坎水所生耶命門既是大極何以又屬坎

離火又屬心仍若以坎論則坎水固屬腎而

不關乎命門矣明乎此不特醫學之淵源有自聖賢道統

之傳亦自此不昧將命門為道統言而所謂一貫也浩然

也明德也假如孔子云參乎吾道是火孟子云吾善

也空中也太極也同此一火而已太極是一團為聖賢為

仙為佛不過克全此火而歸之耳小子之一論闡千古之

未明見者慎勿以為迂仙佛我不能知若全此火即為聖

闡千古之未明也此篇之論專為盡天下之病皆用入

味而設便講出儒釋道三教之合一以見入味之不可不

醫貫疏 卷上

用此等亂道無一字連貫稍通文理之人見之宜無不知

其狂悖即使其醫道果精見此等議論亦非其醫道而疑

之乃世之號為通文理者讀之反以為真知性命之理因

此益信其醫學之精而入味竟不但為治病之藥實性命

之所係一日不可廢者嗚呼吾憐趙氏尤憐讀

趙氏之書而崇信之者其愚更勝趙氏百倍也

陽火 金 太極圖中之白圈和傳無二蓋陰陽未

○ 土 二點為一陰一陽之象然後生出太極

陰水 木 矣太極圖可改則古聖之書何一不

繫辭曰易有太極是生兩儀周子懼人之不明而製為太

極圖 無極而太極無極者未分之太極也惟其未分所

有未分之時為無極已分之時為太極

太極已分則陰陽矣尚得為太極耶 太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

太極者已分之陰

陽也既名陰陽則不可名太極矣蓋太極動而生陽靜而生陰豈有分爲陰陽而猶稱太極者性理之說原不足與此等無知妄人辨吾恐世之讀之者偶不經意卽爲所惑貽誤不小也

兩腎俱屬水左爲陰水右爲陽水

以右爲命門非也命門在兩腎中

○命門左邊小黑圈是眞水之穴



右邊小白圈是相火之穴此一水

一穴俱無形日夜潛行不息○兩

腎在人身中合成一大極

醫貫砭

卷上

八



云兩旁俱是腎命門在中間雖非經管而其言尚有影響至分左爲陰水右爲陽水又陰水爲眞水陽水爲相火又左一黑圈爲眞水之穴右一白圈爲相火之穴種種杜撰艾離眞屬謬語○按甲乙經脊骨十四椎下有命門穴膈下二寸亦有命門穴此穴名也非眞有物如小心者在脊骨之內爲太極也若穴而必有物可指將周身七百二十穴竟有七百二十如小心者耶

命門在人身之中對臍附脊骨自上數下則爲十四節自

下數上則爲七節內經曰七節之旁有小心是也此句出素問刺

禁論云高脊之上中有父母七節之旁中有小心王註云小心謂眞心神靈之宮室乃指心包言似得小字之意按靈邪客篇論云心者精神之所舍也其藏堅固邪勿能容也故諸邪之在心者皆在心之包絡可知心藏於內必有出入之處別有脂膜結聚於包絡之間形如小心似有此理鍼者中之卽有害故在刺禁之列並非表明小心卽命

門爲十二經之主也豈可因此刺禁中偶及之語遂以一卻內經專爲小心立論而天下之病專治小心則無不愈乎卽晚村亦辨之云曰父母曰小心尊卑自見趙氏單據此句是欲以小心爲父母之主也恐與經旨不合此晚村一隙之明也

或又問曰如上所言心爲無用之物耶古之聖賢未有不

以正心養心盡心爲訓與醫病而先生獨外心以言道恐

心外之道非至道也余曰子細玩經文自得之矣經曰神

明出焉則所係亦重矣豈爲無用哉蓋不觀之朝廷乎皇

極殿是王者向明出治之所也乾清宮是王者向晦晏息

之所也指皇極殿而卽謂之君身可乎蓋元陽君主之所

醫貫砭

卷上

九

以爲應事接物之用者皆從心上起經綸故以心爲主至

於棲眞養息而爲生生化化之根者獨藏於兩腎之中故

尤重於腎其實非腎而亦非心也云元陽爲君身是皇極殿腎是乾清宮是君

身在皇極殿則不在乾清宮在乾清宮則不在皇極殿其

理甚彰然則元陽到心則有心火而無腎火到腎則有腎

火而無心火有心火之時腎惟一團陰頑之氣有腎火之

時心遂爲空空蕩蕩之物向也以命門爲主今又以命門

之君主卽心之君主心之君主卽命門之君主而心與命

門皆是空器皆非君主前後背繆眞乃隨口亂道非其人

批云此段語甚活大抵呂氏之心先死也

呂氏評曰自許學士開補脾不如補腎之理薛院使因之用八味六味通治各病通治各病四字何等不通趙氏又

從薛氏發明其要一歸之命門一歸之八味益火二字乃全書之宗旨也其提開快當親切處有前此所未及者真

立齋之功臣矣薛氏所謂其父殺人報仇其子必且行切正此之謂也願病機傳變

輒轉相因治法逆從淺深異用趙氏所言皆窮原反本之

論撥亂救弊功用甚大各病有各病之本原各病有各病之偏弊若一概用八味一方則正

道矣然以之治敗證則神效上下之不同若一概用八味則八味直是

起死之金丹矣而以治初病則多疎蓋緣主張太過立言

不能無偏遂欲執其一說而盡廢諸法亦不可行也學者

識其指歸以明生化斡旋之機又當詳考古今立法相因

醫貫砭 卷上

異用之故斯為十全若徒喜其直捷簡易以為高則齒莽

滅裂天枉無窮亦非趙氏所以濟世之心也此人直是欺世亦何嘗有

濟世之心且彼亦並不料世之盡為所欺至於如此之貽害量彼亦深悔於九原也

陰陽論

陰陽之理變化無窮不可盡述姑舉其要者言之夫言陰

陽者或指天地或指氣血或指乾坤此對待之理其實陽

統乎陰天包乎地血隨乎氣故聖人作易於乾則曰大哉

乾元乃統天於坤則曰至哉坤元乃順承天古人善體易

義治血必先理氣血脫益氣故有補血不忌四物湯之論

四物湯本為補血而設謂不可如血虛發熱立補血湯一方得專用則可謂不用則不可如血虛發熱立補血湯一方

以黃芪一兩為君當歸四錢為臣氣藥多而血藥少使陽

生陰長又如失血暴甚欲絕者以獨參湯一兩頓煎服純

用氣藥斯時也有形之血不能速生幾微之氣所當急固

使無形生出有形血驟脫者氣亦隨之而脫勢極危殆故用補血之品以填之生之非謂一時之氣即能生血也即

氣固之後仍當大補其血而以氣藥佐之亦非專補氣也

蓋陰陽之要原根於無也故曰無名天地之始忽引老子語其覺無

論 生死消長陰陽之常度豈人所能損益哉聖人裁成

天地之化輔相天地之宜每寓扶陽抑陰之微權方復而

醫貫砭 卷上

先憂七日之來未濟而預有衣衾之備血脫之後陰已大

全然無陰而後已耶且既欲抑之又何必補氣以生之蓋

扶陽抑陰又是一義非補氣不補血之謂若云聖人扶氣

抑血成何語耶總之此人心理已絕凡所引證皆全

然不思隨口亂道本無足責所恨者崇信之人耳防未

然而治未病也現在血脫而將死此時救之不暇神農嘗

藥按陰陽而分寒熱温涼辛甘酸苦鹹之辨凡辛甘者屬

陽温熱者屬陽寒涼者屬陰酸苦者屬陰陽主生陰主殺

司命者欲人遠殺而就生甘温者用之辛熱者用之使其

躋乎春風生長之域一應苦寒者俱不用神農本草上品

內經論司氣勝復宜寒宜熱亦相半歷古以來所傳養生

一應其寒俱不用此真喪心之語據所云則神農本草中
只收溫熱諸品其餘俱編入毒藥條內禁用可也要之服
藥原是治病無病本不必服藥內經云五穀為養五果為
助五菜為充五藥攻邪凡藥用之不肯而或太過皆有毒
故古人謂人參甘草皆能殺人惟六淫七情有偏勝則以
藥救之且內經云寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫
之何等明白乃不問病之何因而特苦寒不用至於涼
一概禁寒用熱能不一發其五耶不特苦寒不用至於涼
者亦少用蓋涼者秋氣也萬物逢秋氣不長矣服藥原為
治病而設
並非藉以生
長氣血也

天上地下陰陽之定位然地之氣每交於上天之氣每交
於下故地天為泰天地為否聖人參贊天地有轉否為泰
之道如陽氣下陷者用味薄氣輕之品若柴胡升麻之類
醫貫砭 卷上 主

舉而揚之使地道左旋而升於九天之上陰氣不降者用
感秋氣肅殺而生若罌麥扁蓄之類抑而陷之使天道右
旋而入於九地之下此東垣補中益氣湯萬世無窮之利
不必降也升清濁自降矣動筆便自相背總據云地天為
泰天地為否則宜乎陽降而陰
升矣乃反欲升陽而降陰是欲反泰為否也據云聖藥扁
蓄降濁降陰於九地之下又云不必降也升清而濁自降
矣種種背繆總是以大言欺人全不思其中義理所以
如此須知轉否為泰何等關係而僅以升柴聖藥扁蓄之
無是理且補中益氣湯不過因胃陽因濕下
陷以此提出陽分耳不必著此大話頭也
年月日時皆當各分陰陽此其大略也獨甲子運氣內經
雖備言之往往不驗當時大撓作甲子即以本年本月本

醫貫砭 卷上

日本時為始統紀其數如此未必直推至上古甲子年甲
子月日時為曆元也將千古聖人不易之論竟泯然斷定
指為無稽之談爾知上古甲子確是
何年何月大撓且不足憑誰為可憑者耶小人之無忌憚
固不足責讀者見此等荒唐而不駭亦有喪心之疾者也
內經特明氣運有如許之異民病亦有如許之別如此讀
內經者不可執泥譬如大明統曆選擇已定竟將千古陰
陽家言及選
擇祿命占候等書一味抹殺翻覺
痛快細思之不能不啞然失笑也可信乎不可信乎
陽一而實陰二而虛蓋陰之二從陽一所分故日乘全體

月有盈虧人之初生純陽無陰賴其母厥陰乳哺而陰始
生如此說則小兒止有命門並無左腎直待乳哺足方生
出左腎來蓋純陽無陰者謂小兒正當發生之時乘初
陽之氣生氣極旺猶如四時之春陽氣方張不必
更助其陽非謂其體中全無陰氣也何得批合是以男
子二八而精始通六十四而精已竭女子二七而經始行
四十九而經已絕人身之陰止供三十年之受用可見陽
常有餘陰常不足前段要扶陽抑陰此處又要
扶陰抑陽總是隨口亂道况縱慾者
多節慾者少故自幼至老補陰之功一日不可缺此陰字
指陰精而言不是泛言陰血今之四物湯補陰者誤也補
血
亦有時必用何以必不可補蓋補陰補血補精確是三項
事補陰不專指精血言而精血則皆屬陰也此段議論專
要放出六味來
所以作此地步

談陰陽者俱曰氣血是矣詎知火為陽氣之根水為陰血
醫貫砭 卷上 主

之根易有太極是生兩儀兩儀生四象則五行乃陰陽所分豈有水火反為陰陽之根者蓋觀之天地間日為火之精故氣隨之月為水之精故潮隨之然此陰陽水火又同出一根朝朝稟行夜夜復命周流而不息相偶而不離惟其同出一根而不相離也故陰陽又各互為其根陽根於陰陰根於陽無陽則陰無以生無陰則陽無以化從陽而引陰從陰而引陽各求其屬而窮其根也世人但知氣血為陰陽而不知水火為陰陽之根能知水火為陰陽而誤認心腎為水火之真此道之所以不明不行也試觀之天上金木水火土五星見在而日月二曜所

醫家類

卷上

五

以照臨於天地間者非真陰真陽乎內經之論陰陽極為明白曰陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也又曰陽化氣陰成形又曰水為陰火為陽又曰陰勝則陽病陽勝則陰病又曰陰陽者氣血之男女也左右者陰陽之道路也水火者陰陽之徵兆也陰陽者萬物之能始也故曰陰在內陽之守也陽在外陰之使也其言陰陽也詳而且明故五臟合言之則心肝脾陽而肺腎陰分言之則五臟各有陰陽惟腎有兩則左屬水而為陰右屬火而為陽人之元氣藏於腎中腎之陰陽必宜保護不宜戕賊此諸臟為尤重何等明白乃幻成真假無形有形根源太人極等語其說愈微妙愈俚鄙荒唐意在欺世實自欺耳身心肝脾腎五行具存而所以運行五藏六腑之間者何物乎有無形之相火行陽二十五度無形之腎水行陰亦二十五度行陽行陰內經指營衛言詳見前而其根則原於先天太極

之真此所以為真也一屬有形俱為後天而非真矣非根矣謂之根如木之根而枝葉所由以生也如此說則八味陽真陰竟是補太極矣嗟乎五臟六腑孰非有形之體草根木皮亦孰非有形之物不過氣性各殊借以補偏救弊耳何必過高其論自投魔境乎

既有真陰真陽何謂假陰假陽曰此似是而非多以誤人不可不知如人大熱發躁口渴舌燥非陽證乎余視其面色赤此戴陽也切其脈尺弱而無力寸關豁大而無倫此係陰盛於下逼陽於上假陽之證余以假寒之藥從其性而折之頃刻平矣如人惡寒身不離複衣手足厥冷非陰

醫家類

卷上

五

證乎余視其面色滯切其脈濇按之細數而有力此係假寒之證寒在皮膚熱在骨髓余以辛涼之劑溫而行之一汗而愈此亦有不可不察者凡此皆因真氣不固故假者得以亂其真陰盛格陽陽盛格陰此病變之不同何得指假陽者不足而示之有餘也假陰者有餘而示之不足也此假字又與前真字不對前所云真者謂先天真元之氣非後天及諸臟之氣耳此乃以陰盛似陽陽盛似陰之證對真而言則前所云真乃指熱為實寒為實寒也不荒謬之甚乎總之既已真字本不通之至一身之中原無所謂假陰假陽也既已識其假矣而無術以投其欲彼亦扞格而不入經曰伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使去邪而歸於

正矣

五行論

以火言之有陽火有陰火有水中之火有土中之火有金中之火有木中之火陽火者天上日月之火生於寅而死於酉陰火者燈燭之火生於酉而死於寅此對待之火也水中火者霹靂火也即龍雷之火無形有雷即有電而有聲不焚草木得雨而益熾見於季春而伏於季秋原夫龍雷之見者以五月一陰生水底冷而天上熱龍為陽物故隨陽而上升驚蟄改後龍已漸升何待五月欲遷就已說遂不顧義理如此冬至一陽來

醫貫砭

卷上

六

復故龍亦隨陽下伏

然則冬至已前一陽未生水底終日寒冷龍竟日在天上耶豈非笑談

雷亦收聲人身腎中相火亦猶是也平日不能節慾以至

命門火衰腎中陰盛不節慾有傷陰者有傷陽者何得專指為火衰若云陰盛則精脫者必陰

虛豈有陰反盛者耶龍火無藏身之位故遊於上而不歸是以上焦

煩熱咳嗽等證善治者以溫腎之藥煩熱咳嗽明係陰虛溫腎藥豈可亂投

從其性而引之歸原使行秋冬陽伏之令而龍歸大海此

至理也奈何今之治陰虛火衰者以黃柏知母為君而愈

寒其腎益速其斃良可悲哉滋陰以治虛火苦寒以治實火此一定之法至庸醫之誤

治原非正法也

金中火者凡山中有金銀之礦或五金埋瘞之處夜必有

火光此金氣非火光也此金鬱土中而不得越故有光耀發見於

外人身皮毛空竅中自覺針刺蚊咬及巔頂如火炎者此

肺金氣虛火乘虛而現肺主皮毛故也肺家之火何得專

咳而熱氣悶肺痿肺癰吐血消渴渴種經曰東方木實因

西方金虛也既曰肺火何補北方水即所以瀉南方火雖

曰治金中之火而通治五行之火無餘蘊矣

金中之水礦中之水銀是也水銀乃未成之金在人身為

骨中之髓至精至貴人之寶也木中水者巽木入於坎水

而上出其水即木中之脂膏巽木入坎水乃是井卦之象

之水皆木中之脂膏耶欲欺人木中之水耶然則凡井中

指為水人而又不深思遂亂道如此人身足下有湧泉穴湧泉屬

中之水肩上有肩井穴此暗水腎何以滑行之道凡精液潤布於

皮膚之內者皮膚之內亦皆井泉水也夫水有如許之不

同總之歸於大海天地之水以海為宗人身之水以腎為

源而其所以能晝夜不息者以其有一元之乾為太極耳

元之乾為太極試看此七字有一字連貫否醒生夢此

死之人談理談性本不足與辨特無恥已極為可厭耳

中風論

中風之疾愚意謂邪之所湊其氣必虛外感者間而有之

間字當作五百年間出之間當專主虛論不必兼風

中風乃非但云不盡是風并云不必兼風當時聖人何不

竟云純虛之證反將五百年間出之病立為名號使人因

名責實竟作風病治誤人不淺耶譬如論中暑病而曰不

必兼暑中寒病而曰不必兼寒即有之亦五百年間出之

事豈成說話乎蓋真中風則專以風治類中風則病各有

因視其所感何因而分別治之何等明白豈當要其意專

欲以八味六味二方治此病則不得不

先以此病為純虛之證也是何肺腸

河間東垣治中風專治本而不治風可謂至當不易之論

既名中風又專治木而不治風則是本原虛弱之病不是

中風矣况劉李之書其在雖各有所偏並無專治本不治

風之說豈學者必須以陰虛陽虛為主自後醫書雜出使

醫貴秘

後學狐疑不決

陰虛用六味陽虛用八味自古並無以此

專用二方耶

或問人有半肢風者必須以左半身屬血右半身屬氣豈

復有他說乎曰未必然人身勞中分陰陽水火男子左屬

水右屬火女子左屬火右屬水男子半肢風者多患左女

半肢風者多患右即此觀之可見以陰虛為主

何嘗以男女而別蓋左屬陽而右屬陰男陽女陰故病亦

分屬然亦非盡如此者若以此為一定之病則男子患右

此仲景金匱要略治冬月直中風寒之方即麻黃桂枝
之變方也 此又亂道直中風寒四字已屬不接冬月二字
下乃風痺風痲之風與麻黃桂枝治傷寒傷風者何涉其
方下註云治中風痲身不能自收口不能言冒昧不知
痛處或拘急不得轉側 其間隨六經之形證逐一加減未
何等明白曾不一見耶 中風之證雖亦有各經之殊然
便可按方統用其全方也 亦不過有一二現證豈如傷寒
之鑿鑿可分者加減法皆後 如太陽無汗於本方中倍麻
人所擬非金匱原方所有也 黃杏仁防風如有汗惡風於本方中倍桂枝芍藥杏仁如
黃杏仁防風如有汗惡風於本方中倍桂枝芍藥杏仁如
陽明無汗身熱不惡風於本方中加石膏 無汗不得用石
膏 知母甘草有汗身熱不惡風於本方中加葛根 有汗不
醫貴秘 卷上 九

何得反 桂枝黃芩如太陽無汗身涼於本方中加附子乾
用葛根 薑甘草少陰經中有汗無熱於本方中加桂枝附子甘草
凡中風無此四證六經混淆係於少陽厥陰或肢節攣痛
或麻木不仁每續命湯八兩加羌活四兩連翹六兩此係
六經有餘之表證須從汗解如有便溺阻隔宜三化湯或
局方麻仁丸通利之雖然邪之所湊其氣必虛世間內傷
者多外感者少間而有之 既云邪之所湊則 此方終不可
輕用 考補小續命湯

麻黃 人參 黃芩 白芍 防己 桂枝 川芎
防風 甘草 附子 杏仁 石膏 當歸

傷寒論

傷寒專祖仲景凡讀仲景書須將傷寒與中寒分為兩門

始易以通曉傷寒從來無人以中寒併為一病者即同一

為因年久殘缺補遺註釋者又多失次錯誤幸歷代考證

者漸明逮陶節菴六書吳綬蘊要二書刊行而傷寒之理

始著二書却呈自開簡便門戶不足以發予於至理未暇

詳辨先將傷寒中寒逐一辨明庶不使陰陽二證混亂中

醫貫砭

卷上

三

寒其意蓋指直中陰經之傷寒言若雜證之中寒別是一
病非傷寒也非直中也乃寒邪太甚入於肌膚血脈或內
連臟腑陽氣為寒氣所束不能和通現種種畏寒等證不
依經傳變亦不必盡在冬月此感冒之至重者其法以溫
中散寒為主亦不得驟用辛熱之藥使夫傷寒治之得其
寒氣與熱氣相爭而無出路則立死矣
綱領不難也若求之多岐則支離矣先以陽證言之夫既
云傷寒則寒邪自外入內而傷之也其入則有淺深次第
自表達裏先皮毛次肌肉又次筋骨傷寒之病不入筋骨腸胃此其
漸入之勢然也若夫風寒之初入必先太陽寒水之經便
有惡風惡寒頭痛脊痛之證寒鬱皮毛是謂表證三陽皆
何獨以太若在他經則無此證矣三陽亦脈若浮緊無汗
陽為表

為傷寒以麻黃湯發之得汗為解浮緩有汗為傷風用桂

枝湯散邪汗止為解桂枝湯非止汗之藥乃解肌之藥也

已故用桂枝湯和其營衛仍令微微出汗而解此謂之正

汗但不若麻黃之發汗為稍甚耳若云汗止則桂枝反為

將何從出耶若無頭疼惡寒脈又不浮此為表證罷而

在中印者何表裏之間也乃陽明少陽之分脈不浮不沉

在乎肌肉之間謂皮毛之下也然有二焉若微洪而長即

陽明脈也外證鼻乾不眠用葛根湯以解肌脈弦而數少

陽脈也其證脇痛耳聾寒熱往來而口苦以小柴胡湯和

之蓋陽明少陽不從標本從乎中治也若有一毫惡寒尚

醫貫砭

卷上

三

在表雖入中還當兼散邪過此為邪入裏為實熱脈不浮
不沉沉則按至筋骨之間方是若脈沉實有力外證不惡
風寒而反惡熱譫語大渴六七日不大便明其熱入裏而
腸胃燥實也輕則大柴胡湯重則三承氣湯大便通而熱
愈矣以陰證言之若初起便怕寒手足厥冷或戰慄倦臥
不渴兼之腹痛嘔吐泄瀉或口出涎沫面如刀刮不發熱
而脈沉遲無力此為陰證上文說三陽經證此處便當按
以直中陰經之不從陽經傳入熱證治例直中陰經固宜
證當之何也陽經傳入三陰之證其間熱極宜涼者固多如上文諸寒
證亦復不少即下文理中黃芩湯等湯皆仲景治陽經傳入

陰經之方未嘗為直中陰經設也 更當看外證如何輕則理中湯重則薑

附湯四逆湯以溫之由此觀之可見傷寒者由皮毛而後

入腑臟初雖惡寒發熱而終為熱證 傳人三陰亦非盡熱證矣 其人必

素有火者 有火之人卒遇大寒 中寒者直入臟腑始終惡

寒而並無發熱等證其人必無火者 無火之人熱邪入裏

如此則仲景當時著傷寒論不必細細分別 祇一則發表

攻裏一則溫中散寒兩門判然明白何至混雜使人疑誤

耶 此則以傳經為陽證直中為陰證至傳經之三陰證則

耶 置而不論 傳經即直中耶抑三陰宜溫之證亦陽證

耶 蒙混 醫貫 卷上 圭

桂枝湯 治太陽經傷風發熱自汗惡風 桂枝 芍藥

甘草 桂枝湯中薑棗為至要之品成無已詳云以甘緩

二味 何耶 以辛散之是也開卷第一方而五味之中遺去

葛根湯 赤芍 葛根 蔥白 生薑 桂枝 麻黃

甘草 大棗 古時芍藥赤白不分而傷寒方亦從無用赤

芍藥之品不宜用於疎表之力也然則桂枝湯亦用赤芍

耶 葛根湯中並無蔥白傷寒論中惟少陰經中白通湯

等三四方溫經散寒治陽明胃經目痛鼻乾不寐如有惡

寒證本方加麻黃 惡風加桂枝 如正陽明肺病不惡

寒有汗而渴當用白虎湯 正陽陽助肺病是胃家實也承

虎則治陽明經汗出煩渴之證與肺病迥別此最大關節經文鑿鑿誤治立死矣

小柴胡湯 治少陽胆經耳鳴脇痛寒熱往來口苦 柴

胡 黃芩 甘草 小柴胡只載三味遺去人參半夏夏枯草

得名專以有人參也 用大黃則為大柴胡矣 今人參已

失原方之義况并去半夏之辛散以治煩嘔去薑棗之甘

味何以治少陽諸證耶 此經無山人路不可汗下止有此

湯和解之如兼陽明證本方加葛根芍藥如尚有惡寒等

證用大柴胡湯 惡寒則病尚在表大黃豈可兼表兼下

大柴胡湯 表證未除而裏證又急汗下兼行 柴胡

黃芩 芍藥 半夏 人參 大黃 枳實 大柴胡本無

人參小柴胡原有人參偏去 枳實 人參偏加入

白虎湯 治身熱大渴而有汗脈洪大者如無渴者不可

用此藥為大忌倘是陰虛發熱服之者死若五六月暑病

者必用此方又當審其虛實 石膏 知母 甘草 人

參 竹葉 糯米 此又蒙混之極者白虎湯治陽明外熱

煩渴甚者用白虎加人參湯又是一方至於人參竹葉同

用又是竹葉石膏湯中之藥俱不得竟指為白虎湯也至

以糯米 尤為不典 小承氣湯 治六七日不大便腹脹滿悶病在太陰無表

證汗後不惡寒潮熱狂言而喘者 此又大誤害人者太陰

病皆屬寒邪傷寒太陰

全篇無純用寒下之法即有用大黃者亦與桂枝同用謂之溫下一用寒下必斃此第一大關節也乃以此為太陰之藥是不誤極蓋小承氣乃陽明正藥正與太陰相反况太陰病豈有汗後潮熱狂言等證真乃自得狂疾發此狂也
大黃 厚朴 枳實

大承氣湯 治陽明太陰證語 太陰無用承氣法辨在前五六日不大

便腹滿煩渴并少陰舌乾口燥日晡發熱少陰並無日晡

發熱者脈沉實者 大黃 厚朴 枳實 芒硝

四逆散 治陽氣亢極 此是熱邪漸深至於少陰壅遏經絡故用此以宣通之若云陽氣亢

極則惟有急下之法四逆諸品何能愈之故成無已云邪在三陽則手足熱在少陰則手足冷在少陰則熱深手足逆而不溫也用四逆散

以散傳經之熱此為正解 血脈不通四肢厥逆在臂脛之

醫貫砭 卷上 毒

下若陰證則上過乎肘下過乎膝以此為辨也 柴胡

芍藥 甘草 枳實

仲景傷寒論中諸方字字金科玉律不可增減一字猶之錄六經四子語豈可擅自刪改將杜撰之語混入耶惟臨

病增減未嘗不可因證出入若涉錄古方先為變易仍指為某方則大亂之道矣此人凡引錄唐宋諸方皆非原本

其方本非聖經始不置辨乃漢以前諸方歷古無人敢易一字而錯誤如此則後人以謬傳謬全失製方之義為害

不小矣

初病無熱便四肢厥冷或胸腹中滿或嘔吐腹滿痛下利

脈細無力此自陰證受寒即真陰證非從陽經傳來便宜

溫之不宜少緩經云發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者

發於陰也治宜四逆湯 此又亂道之至者發於二句傷寒

人人皆見何嘗以無熱句為陰證耶無熱惡寒乃太陽經

宜麻黃湯發汗之證四逆湯乃太陰少陰經宜溫裏之證

遠隔三四經將治宜四逆湯連屬上 腹滿腹痛皆是陰證

文治正相反一投即斃可恨極矣

只有微甚不同治難一槩腹痛不大便桂枝芍藥湯腹痛

甚桂枝大黃湯 此又殺人之術也仲景治太陰條中云大

陷入太陰故兼表兼下若以之治直中純寒之證 若自利

腹痛小便清白宜溫中理中四逆看微甚用輕者五積散

重者四逆湯無脈者通脈四逆湯使陰退而陽復也

子又有說焉若讀傷寒書而不讀東垣書則內傷不明而

醫貫砭 卷上 毒

殺人多矣讀東垣書而不讀薛氏書則真陰真陽不明而殺人

多矣讀丹溪書而不讀薛氏書則真陰真陽不明而殺人

亦多矣 此又隨口亂道矣豈有仲景不知內傷更垣不知

真陽之論此乃薛氏有創之邪說已前諸公豈能預料後

世有創造邪說之人而先講明之耶蓋仲景論傷寒則說

傷寒傷寒中何得以內傷立論東垣論內傷則說內傷內

傷中何得以陰虛立論丹溪論陰虛則說陰虛陰虛中何

得以真假立論彼所謂真者指腎中之陰陽也然東垣曰

謂五臟各有陰陽則可謂腎為真陰為假則不可 東垣曰

邪之所湊其氣必虛世間內傷者多外感者間而有之此

問字當作五百年間出之問甚言其無外感也 明明云邪

云非外感則邪是何邪湊將安湊耶若五百年間出之問

則是千中無一直云內傷中無傷寒可矣何以又入傷寒

見內 東垣脾胃論與夫內傷外感辨深明飢飽勞逸發熱

等證俱是內傷悉類傷寒切戒汗下 東垣原指內傷之類

治並非指天下之傷寒皆內 傷寒者不可從傷寒

傷也引書失旨自誤誤人 以為內傷多外感少只須溫

補不必發散外感多而內傷少者溫補中少加發散以補

中益氣湯一方為主加減出入如內傷兼傷寒者以本方

加麻黃兼傷風者以本方加桂枝兼傷暑者本方加黃連

兼傷濕者本方加羌活 查東垣脾胃論謂中益氣條下並

時方法之亂原自東垣其端然尚不至如此之甚總之

治病必求其本一病自有一方自然隨手皆效必立

以治盡天下之病簡便之略為下愚立法則必自陷於

下愚之境蓋醫者人命所關固至難極重之事原不可令

醫員校 卷上

下愚之人 實萬世無窮之利東垣特發明陽虛發熱之一

為之也 陽虛發熱從來所無經云陽虛生外寒未聞陽虛反

門也 發熱者若陽虛外越之證則又是一類正與補中益

氣治法相反投 然世間真陰虛而發熱者十之六七亦與

升柴即死也 傷寒桂枝麻黃二證具在豈有 反不論及何哉

傷寒無異 陰虛發熱而類此者真怪談也 今之人一見發熱則曰傷寒須用發散發散而斃則曰傷

寒之法已窮奈何豈知丹溪發明之外尚有不盡之旨乎 予嘗於陰虛發熱者見其大熱面赤口渴煩躁與六味地

黃大劑一服即愈 若係有外邪者服六味未必即死而病

者不可勝計所以痛心疾首而此此書若其 如見下部惡

偶愈者則必其邪氣甚微兼有浮火之人耳

寒足冷上部渴甚躁極或欲飲而反吐即於六味湯中加

肉桂五味甚則加附子冷飲下嚥即愈 此陽虛之證附且

氣未盡則熱地五味黃 且舉傷寒口渴一證言之邪熱入

於胃府消耗津液故渴恐胃汁乾急下之以存津液其次

者但云欲飲水者不可不與不可多與並無治法縱有治

者徒知以芩連知柏麥冬五味天花粉甚則石膏知母以

止渴此皆有形之水以沃無形之火安能滋腎中之真陰

乎若以六味地黃大劑服之其渴立愈何至傳至少陰而

成燥實堅之證乎 口渴宜下有二證一則熱邪在陽明一

則熱邪傳少陰下之所以熱邪使也

醫員校 卷上

若以熱地黃肉補之斂之安有不死者况六味為腎經滋

補之藥當邪火未入少陰之時反引入少陰使邪氣斂藏

而無出路從此之後雖小疾亦無愈期而多變證矣近日

庸醫凡遇有邪而用此藥者以後百藥不效不咎其用六

味之害反以為醫用過六味而 既成燥實堅之證仲景不

猶不效真絕證也嗚呼傷哉 得已而以承氣湯下之此權宜之霸術然諄諄有虛人老

弱人之禁故以大柴胡代之 八味湯即仲景之方也去桂

附而為六味亦可深思而 得之乃計不出此而造承氣之霸術又自知此方之為害

造大柴胡代之仍舊不離大黃等峻藥其幾劫仲景之愚

昧誤人如此嗚呼下愚之無忌憚至於此極真病狂之人

本不足與辨所以辨者為天下有一隙之明者亦為所惑

而不 陶氏以一順氣湯代之豈以二湯為平易乎代之

而愈所喪亦多矣况不愈者十之八九哉又一不知 當時

若多用六味地黃飲子大劑服之取效雖緩其益無窮傷寒死不旋踵耳况陰虛發熱者小便必少大便必實其上證口渴煩燥與傷寒無異云與傷寒無異則真非傷寒矣前後背謬如此彼之承氣者不過因亢則害下之以承真陰之氣也何承氣話也子今直探其真陰之源而補之如亢旱而甘霖一施土木皆活頃刻為清凉世界矣何不可哉况腎水既虛矣復經一下之後萬無可生之理如果腎虛之證則絕不足傷寒仲景仲景嘗以承氣治虛勞如係傷寒則一矣竟無一生者耶慎之慎之吾為此懼故於補天要論中詳言之

醫貫秘

卷上

表

合而言之真知其為陽虛也則用補中益氣湯陽虛者最善反用升柴以提之乃速之死也東垣製此方為胃陽下陷而設非泛指陽虛也如此誤解即東垣亦不暇日於地下矣真知其為陽虛直中也則用附子理中湯真知其為陰虛也則用六味腎氣湯如有邪不得用真知其為陰虛無火也則用八味腎氣湯有邪亦不得用其間有似陰似陽之假證也則用寒因熱用之法從之不可少誤惟以補正為主不可攻邪正氣得力自然推出寒邪汗出而愈前此泛說不辨邪之有無已屬糊塗此處直云不可攻邪竟不論何經傷寒只將六味八味二方大劑與服使熱地桂附等發汗而愈將仲景當日一片苦心千年奉為章程者一齊抹却下愚之無忌憚乎此而極可悲也夫攻之一字仁人之所惡

也善好家盜百戰百勝戰之善者也不戰而屈人之兵善之善者也故曰善戰者服上刑傷哉仲景殺無赦矣呂氏曰正氣得力二句灼然妙理與景岳論參看更明白然二字妙甚從東垣補中益氣論來此等純滅天理之談其庸庸亦不可問矣

溫病論

治溫病者將如何予有一法經曰不惡寒而渴者是也不惡寒則知其表無寒邪矣曰渴則知其腎水乾枯矣溫病陰之證且渴者多屬陽明何以知其必腎乾也蓋緣其人素有火者冬時觸冒寒

醫貫秘

卷上

表

氣雖傷而亦不甚惟其有火在內寒亦不能深入所以不即發而寒氣伏藏於肌膚溫是天氣非指人之本體也如此說將無火之人入春便變為寒病耶是何等人自冬至三四月歷時既久火為寒鬱於中亦久將腎水熬煎枯竭從無外感之邪藏於腎中半年而發者蓋甲木陽木也藉癸水而生腎水既枯至此時強木旺無以為發生滋潤之本故發熱而渴非有感冒也明明說是冬時觸冒何前後海藏謂新邪換出舊邪非也換字何若復有所感表又當惡寒矣予以六味地黃滋其水以柴胡辛涼之藥舒其木鬱隨手而應此方活人者多矣柴胡為少陽散之藥加入腎經滋

補藥中將引六味入少陽耶將并柴胡
之義已絕被會駁人參不可入六味中
味真喪心 子又因此而推廣之凡久時
之談也 傷寒者亦是鬱火

證何云鬱火 若其人無火則為直中矣
天下竟無傷經正傷寒矣且直中是至
險之證豈可派定無火人必患此耶

毛而肌肉而腑臟 傷寒無不由皮毛入
者 今人皆曰寒邪

傳裏寒變為熱既曰寒邪何故入內而
反為熱又何為而

能變熱耶不知即是本身之火為寒所
鬱而不得泄一步

反歸一步日久則純熱而無寒矣所以
用三黃解毒解其

火也升麻葛根即火鬱發之也三承氣
即土鬱奪之小柴

醫貫花 卷上

胡湯木鬱達之也此理甚簡而易只多
了傳經六經諸語

支離多岐 傷寒傳經之說自內經熱論
及仲景傷寒論諸

少有所誤非殺人即寡效然無有能出
範圍者今乃敢肆

然以為無傳經六經等法且譏誦古聖
以為支離多岐此

天理絕滅之談原無足辨但恐世之崇
信者終無悟日故又不能已於言也

皆有頭疼項強目痛鼻乾脇痛口苦等
證何必拘為傷寒

局傷寒方以治之也 雜證原不必守定
傷寒法但傷寒諸

則斷斷無治 余於冬月正傷寒獨麻黃
桂枝二方作寒鬱

雜感之理也 治鬱亦其餘但不惡寒者
作鬱火治 寒類也此二語專為

欲用道途 此不佞之創論也聞之者孰
不駭然吐舌及問

散而設

虞天民醫學正傳傷寒篇云有至人傳曰傳經傷寒是鬱
病如此亂道不知 余一見之不覺竊喜以為先得我心之
同然及考之內經帝曰人傷於寒而傳為熱何也岐伯曰

寒氣外凝內鬱之理 何等文字 勝理堅緻玄府閉密則氣

不宣通濕氣內結 何與 中外相薄寒盛熱生 寒極生熱改

便不 故人傷於寒轉而為熱汗之則愈則外凝內鬱之理

可知觀此而余以傷寒為鬱火者不為無據故特著鬱論

一篇 此偽造內經又怪異之極者內經熱論云人之傷於

寒也則為病熱熱甚不死其兩感於寒而病者必

不免於死帝曰願聞其狀下文岐伯即以傷寒傳經及兩

感病狀分別言之明白詳悉何嘗有外凝內鬱等語偽造

醫貫花 卷上

經文無忌憚已極至云傳而為熱尤不備人專論傷寒第
一日在太陽即已發熱不必傳也故本經必為熱論今改

則字為傳字彼固不知寒之何以為熱

所以上文造出有火無火等邪說也

鬱病論

內經曰木鬱則達之火鬱則發之土鬱則奪之金鬱則泄

之水鬱則折之然調其氣過者折之以其畏也所謂瀉之

內經五法之註乃出自張子和非啓玄舊文故多誤

之談隘口 予既改釋其誤又推廣其義以一法代五法自

從無一法可代幾法者若爾此書何止可代五法而明之

法直以六味八味代諸自古以來商病萬法也神而明之

屢獲其效故表而書之 蓋東方先生木木者生生之氣即

火氣空中之火附於木中木鬱則火亦鬱於木中矣在木中則非空不特此也火鬱則土自鬱土鬱則金鬱而水亦鬱矣然則非五鬱此五行相因自然之理惟其相因也予以一方治其木鬱則諸鬱皆因而愈一方者何道遙散是也方

中惟柴胡薄荷二味最妙蓋人身之胆木乃甲木少陽之氣何以是肝氣尚柔軟象草穿地始出而未伸此時被寒風一鬱何以鬱必即萎軟抑遏而不能上伸上伸則

下尅脾土而金水併病矣何以一病惟得溫風一吹鬱氣即暢達蓋木喜風肝為風藏最惡者風反云喜風風搖則舒暢若寒風則

醫貫砭 卷上

畏矣溫風者所謂吹面不寒楊柳風也木之所喜也柴胡薄荷辛而溫者柴胡薄荷正驅風之藥非即風也真乃亂道惟辛也故能發散

溫也故入少陽立方之妙如此其甚者方中加左金丸左金丸止黃連吳茱萸二味黃連但治心火吳茱萸氣燥

獨非寒藥乎且肝最畏燥者以風為燥氣又燥能傷血也肝之氣亦燥同氣相求故入肝以平木同氣相求如木平則不生心火火不刑金而金能制木不直伐木而佐金以制木此左金之所以得名也

此又法之巧者然猶未也一服之後繼用六味地黃加柴胡芍藥服之以滋腎水俾水能生木此處又要生水而後

心火又旺銷鑠肺金左金又無用矣其意專為要用六味而鬱證則六味斷難下所以立出生木一法來則六味又為必用之方作道遙散者風以散之也地黃飲子者雨以潤之也木不得其天者乎此法一立木火之鬱既舒木不尅脾土且土亦滋潤無燥熯之病金水自相生予謂一法可通五法者如此必率連說下方可一法代豈惟是哉推之大之千之萬之其益無窮凡寒熱往來似瘧非瘧惡寒惡熱嘔吐吞酸嘔雜胸痛脇痛小腹痛悶頭暈盜汗黃疸痘疫疝氣殞泄等證皆對證之方也一法可代推而至於傷風傷寒傷濕除直中凡外感者俱作鬱看可代

醫貫砭

卷上

三

傷寒諸法余所謂不但一法可代五法凡天下萬病皆法俱可代者誠然哉誠然哉嗟乎古人治病不但病名之異者各有治法即一病之中亦千頭萬緒種種各別乃竟以一方了之真喪心病狂之人也以道遙散加減出入無不獲效如小柴胡湯四逆散羌活湯大同小異然不若此方之響應也神而明之變而通之存乎人耳所謂神明變通者倘一服即愈少頃即發或半日或一日又發發之愈頻愈甚此必屬下寒上熱之假證鬱病本無此等其所以又轉此語者此方不宜復投當改用溫補之劑如專為要用八味也陽虛以四君子湯加溫熱藥陰虛者則以六味湯中加溫熱藥甚者尤須寒因熱用少以冷藥從之用熱藥冷探之

法不則拒格不入非惟無益而反害之病有微甚治有逆從立機之士不須予贅

古方逍遙散 柴胡 薄荷 當歸 芍藥 陳皮

甘草 白朮 茯苓

呂氏曰六味加柴芍亦立齋法也合逍遙散謂腎肝同治

但立齋去芍藥趙氏單用芍藥為不同二方同用無此理薛氏木庸醫之

首經此二人一表章尤悞人無盡矣

呂氏又曰以加味逍遙散六味丸治鬱自薛長洲始也邪說

宗然長洲之法實得之丹溪越鞠之芍藥即逍遙之歸芍

醫貫

卷上

書

也越鞠之蒼朮即逍遙之白朮也越鞠之神麴即逍遙之

陳皮也越鞠之香附即逍遙之柴胡也越鞠之梔子即逍

遙之加味也但越鞠峻而逍遙則和矣越鞠燥而逍遙則

潤矣此則青出於藍後來居上亦從古作述之大凡如東

垣之補中益氣比枳朮萬全無弊矣然豈可謂枳朮之謬

而禁不用哉此段議論不但明末庸醫之技量盡見而且

病有一病之方一方有一方之藥一藥有一藥之性一藥

增損方名即別七情六淫各有專治譬如父子夫婦有天

生者有配合者分毫不可假借肉桂不容易以附子黃連

何得易以石膏此醫道之所以難也今云此藥即可當某

藥倘有人曰某人即我之父也某人即我之夫也人盡以

為亂倫矣為此說者於古人治病之法立方之義用藥之

妙例皆

醫貫卷上終

醫貫

卷上

書

醫貫砭卷下

吳江徐靈胎泐溪著

男 煖開和校

論血證

六淫中雖俱能病血其中獨寒氣致病者居多寒氣致病偏要以此為主是何肺腸何也蓋寒傷榮風傷衛自然之理又太陽寒水少陰腎水俱易以感寒一有所感皮毛先入肺主皮毛水冷金寒肺經先受血亦水也故經中之水與血一得寒氣皆凝滯而不行咳嗽帶痰而出問其人必惡寒切其脈必緊視其血中間必有或紫或黑數點此皆寒淫之驗也

醫貫砭

卷下

以上數證熱極之病何醫者不詳審其證便以為陰虛火動而概用滋陰降火之劑病日深而死日迫矣余嘗用麻黃桂枝湯而愈者數人皆一服微汗而愈蓋汗與血一物也奪血者無汗奪汗者無血此二語出靈樞管衛生會論不可再發其汗汗多之人不可再去其血乃反引為脫血者必更出汗之證其顛倒至於此極而呂氏偏以至理二字贊之癡人說夢深信不疑真可憐也 余讀蘭室秘藏而得此意因備記以廣其傳

麻黃桂枝湯

人參 麥冬 杜枝 當歸 甘草

黃芪 白芍 五味子

此方出東垣蘭室秘藏治吐血門寒鬱為火而得吐血證者仍從表

散原有此理但亦須有先後次序即使一方之中欲兼顧本原亦須擇其兩不相礙占人曾有合用者用之始不害製方之義乃散者微者寒者熱者上者下者輕者重者表者裏者燥者潤者一齊并用將使此劑何所適從哉蓋藥味既亂生人固難殺人亦不易服之或不平於延而竟愈亦間有之但古聖立方原有一定法最為嚴謹主君人專重藥性規矩略寬然古法仍不甚失至宋末猶有存者自東垣出而法度乃遂蕩然特功夫頗深自成一家推崇已以有言不信惟願天下後世將內經及金匱傷寒等書沉潛參究有得於心自能明辨其是非也

客曰吐血可用辛熱為扶陽抑陰始聞命矣然復有真陰真陽之說可得聞乎曰世之言陰陽氣血盡之矣誰則豈知火為陽氣之根水為陰血之根乎陰陽屬二氣水火屬五行吾所謂水火又非心腎之謂人身五行之外另有一

醫貫砭

卷下

無形之火無形之水流行於五臟六腑之間陰陽二氣內謂之氣自然無形謂之水火則有形矣方又云無形之火故作乎妙之說以欺世其實只見其支離耳惟其無形故人莫知試觀之天日為火之精故氣隨之月為水之精故潮隨之日月水火無形如星家看五行者必以太陽太陰為主然此無形之火又有一太極為之主宰將幸熱之遠涉則又微乎微矣此天地之正氣而人得以生者是立命之門謂之元神無形之火謂之元氣無形之水謂之元精寄於兩腎中間故曰五臟之中惟腎為真餘臟皆假此真水真火真陰真陽之說也

又問曰真陰真陽與血何干乎曰子但知血之為血而不知血之為水也人身涕唾津液痰汗便溺皆水也獨血之水隨火而行故其色獨紅腎中之真水乾則真火炎血亦隨火而沸騰腎中之真火衰則真水盛血亦無附而泛上從未聞有真水盛而得病者。火無附而升理之所非水亦無附而升非笑談乎水之為物何必有附也惟水火奠其位而氣血各順布焉故以真陰真陽為要也

醫貫

卷下

三

呂氏云此證今人必混入歸脾矣看古人分明不苟處傷肺氣吐血用歸脾湯開或有之但斷不用補中益氣耳况補中益氣湯中門冬五味熟地與升柴同用惟薛氏效法東垣者有之於古人製方之義全失繆種流傳至趙氏等而極真堪痛心者也或云既如此不通何以服之有效蓋製方與選藥原屬二道苟其藥不盡與病相反一味合宜即有小效但藥是而不成方或不能速愈或不能全愈或愈而有弊耳非謂製方無法人參竟不補附子竟不熱也惟急證危證大證奇證緊要關頭而製方有乖則徒有害而無益學者可因其有小效而遂奉為章程耶且安知無陰受其害而不覺者亦安知無明受其害而諱言者

論八味丸

八味丸 治命門火衰不能生土致脾胃虛寒飲食少思大便不實下元衰憊脘腹疼痛夜多漩溺等證 熟地

山藥 山黃 丹皮 茯苓 澤瀉 肉桂 附子 於仲景金匱要略中凡五見一見於第五篇云治脚氣上入少腹不仁再見於第六篇云虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎氣丸主之三見於第十二篇云夫短氣有微欲常從小便去之腎氣丸主之四見於第十三篇云男子消渴小便反多飲一斗小便亦一斗腎氣丸主之五見於第十四篇云婦人轉胞不得溺但利小便則愈腎氣丸主之觀此五條皆謂少腹脹滿之疾為多蓋腎氣丸虛惡燥故又用熟地黃肉桂等滋陰之藥又水為寒邪附桂等助陽通痺之藥相濟而相成總以通腎氣利小便為主此八味之正義也就知薛氏竟以之為補先天真火并能補太極之方不但仲景之所不料即自古造方者亦不料也。又按古法只有乾地黃生地黃煎無熟地黃熟地黃乃後人製法以之入滋補下焦藥中頗為得宜若入湯劑及涼血等藥其屬不合蓋地黃專取其性涼滑利熱則膩滯不能流行矣况外感未消痰火未除一藥用熟地

醫貫

卷下

四

房目加減不依易老亦不效今人有加人參者人參乃是脾經藥到不得腎經人參不可加紫 有加黃柏知母者有欲減澤瀉者皆不知立方本意也 加知柏不知立方之本意乎

水火論

坎乾水也氣也即小而井大而海也兌坤水也形也即微而露大而雨也 井海之水為氣雨露一陽陷於二陰為坎坎以水氣潛行地中 坎為水何以云坎以水氣為萬物受命根本故曰潤萬物者莫潤乎水一陰上徹於二陽為兌兌以有形之

水普施於萬物之上兌澤也如何普為資生之利澤故曰

說萬物者莫說乎澤明此二水可以悟治火之道矣心火

者有形之火也相火者無形之火也無形之火內燥熱而

津液枯然則命門之真以五行有形之兌水制之者儲也

兌水是身中何物吾身自有上池真水氣也無形者也

如何是制之之法無形之水又是身中何物如何是

無形之水沃無形之火沃之之法一味胡言即彼亦不能

自解常而可久者也是為真水真火升降既宜而水火既

濟矣醫家不悟先天太極之真體更說到太極不窮無形

水火之妙用而不能用六味八味之神劑者其於醫理尚

醫貫砭

欠大半上文說乾說坤說坎說巽以及有形無形真水真

化之治法乃竟不過六味八味二方而八卦太極之道已

無不貫串過天徹地學問只要記此二方足矣豈非夢寐

六味丸治腎虛作渴小便淋秘氣壅痰涎頭目眩暈眼

花耳聾咽燥舌痛腰腿痠軟等證及腎虛發熱自汗盜汗

便血諸血失音水泛為痰之聖藥水泛為痰是濕在上焦

血虛發熱之神劑又治腎陰虛弱津液不降敗濁為痰豈

濕所或致欬逆將痰火補住永成勞怯矣又治小便不禁

收精氣之虛脫為養氣滋腎制火導水使機關利而脾上

健實熟地黃肉桂 熟地 黃肉 山藥 丹皮 茯苓

澤瀉

地黃山藥澤瀉皆潤物也此方所補之水無形之水六味

之藥何以能補無形之物物之潤者亦無形此又亂道之

愈說得高愈淺陋矣天下有形之物皆燥者耶故用之

呂氏曰明薛新甫治陰虛火動用丹溪補陰法不驗者以

六味代之立應自此以來為補陰之神方矣趙氏得力於

薛氏醫案而益闡其義觸處旁通外邪雜病無不貫攝外

雜病一方治盡附有而六味之用始盡然趙氏加減之法

知識者決不為此言而六味之用始盡然趙氏加減之法

醫貫砭

甚嚴又稍異於薛氏高鼓峰嘗詳論兩家加減之法而附

以已意呂氏之學實得之高鼓峰高鼓峰則首宗趙氏之

呂氏選時文講性理之故而併信其醫且只記兩方可治

盡天下之病愚夫又甚樂從貽害遂至於此極所以罪首

禍魁高不能辭而承流揚波呂之造孽更無窮世所刻鼓

峰心法高呂醫案等書一派相承辨之不勝其辨知趙氏

之謬則餘者以授其門人甚辨今述之左

六味丸薛氏一變而為滋腎生肝飲用六味減半分兩而

加柴胡白朮當歸五味合逍遙而去白芍藥加五味合都

氣意也柴胡白朮自是二藥何以見得必以生肝故去芍

藥而留白朮甘草以補脾六味方中何以補脾考三金而

制木也以制為生相生之法別是一義不得如此謂若云白木補脾生金而制木遠隔幾載則六味補腎印便生天地自然之序也又一變而為人參補氣肝奈何奈何

湯其義愈變化無窮真游龍戲海之妙去澤瀉而加參芪木歸陳皮甘草五味門冬參芪未陳又加夫白木之與六味其化相反焉得合之曰從合生脈來生脈中無白木且何以即

耶則有自然相逆之義借茯苓以合五味異攻之妙來是與攻用當歸黃芪以合養血之奇其不用澤瀉者蓋為發熱作渴小便不調則無再竭之理理無再竭便當急生云生脈則非

生小便也生脈之所由來既當生脈異攻之可以轉人

也且水生高原氣化能出肺氣將敗故作渴不調此所以急去澤瀉而生金滋水復崇土以生金其苦心不可不知哉枉勞

苦心又一變而為加味地黃丸又名抑陰地黃丸陰如何

必欲抑之加生地柴胡五味復等其分愈奇矣柴胡從道遙來生地從固本來五味仍合都氣一方自是一方一藥

併名曰偶方之外絕無可以牽連之道乃必指方中某藥從某方來則六味之中熟地從何方來黃肉從何方來耶

其曰耳內疼痛或眼昏痰喘或熱渴便澀而總為肝腎陰虛則知其陰虛半由火鬱而致也柴胡以疎之鬱火非生地不能涼用五味仍瀉丁以補金補金以生水也曰抑陰

非疎不可疎之所以抑之生地涼血便有瀉義瀉之所以抑之也生地又是瀉陰之藥非但前後背謬更是千古怪談又一變而為九味地黃丸以赤茯苓換白茯苓加用棟子當歸史君子川芎此更怪者史君子治小兒疳積疳蟲俱在腸胃之中若同六味入腎將疳蟲已入腎耶又川芎乃升提之品將提六味於何處耶抑欲令盡是直瀉厥陰風木之藥仍是肝腎同治川芎亦入腎也

之法緣諸疳必有蟲皆風木之所化肝有可伐之理但伐其子則傷其母故用六味以補其母去澤瀉者腎不宜再洩也趙氏則以為六味加減法須嚴其善用六味雖薛氏啓其悟端而以上變化藥未透其根底故盡廢而不能見其能合當歸柴胡而去芍藥則反用芍藥為疎肝益腎此則其聰明也乃謂白木與六味水上相反人參脾藥不入腎此二句乃趙氏一隙之明但不其論亦高簡嚴密然

細參薛氏畢竟趙氏拘淺薛氏諸變法似乎寬活然其實嚴密學者當善悟其妙薛氏諸加減法昏憤已極趙氏之意蓋以為六味一方不必多用加減之法而已無病不治

耳然其以薛之加減為未當不可謂其無一隙之明乃呂氏又不以為然而轉崇薛氏則其昏憤更甚於趙矣古

人製方之法有上下大小燥濕寒熱緩急補瀉內外升降氣血陰陽輕重奇偶種種不同絲毫不可假借其間亦有

方中曾有合用者乃可加入否則即為杜撰其云從某方某方來更屬可笑夫一藥乃萬方所共安見此味必根於

醫貫秘 卷下 八

醫貫秘 卷下 七

醫貫秘 卷下 六

醫貫秘 卷下 五

醫貫秘 卷下 四

某方如有人作文自註云此也字從某書來此者字從某
文來豈不令人噴飯耶呂氏述其說而稱之我不慨薛氏
而慨呂氏矣 而以意通之大旨以肝腎為主而旁救脾則安
頓君相二火不必提起而自然帖伏矣亂道一篇到底其
其心殆如 說何病糊塗至此
糞土矣

八味丸證

君子觀象於坎而知腎中其有水火之道焉夫一陽居於
二陰為坎此人生與天地相似也今人入房盛而陽事易
舉者陰虛火動也陽事先痿者命門火衰也真水竭則隆
冬不寒真火息則盛夏不熱素問謂經論云陽虛則外寒
陰虛則內熱陽盛生外熱陰

醫貫

卷下

九

盛生內寒蓋陰陽或偏則畏寒畏熱此之謂病若陰冬不
寒盛夏不熱則是陰陽充足之候去天神不遠矣豈反是
真水真火已竭為將死之人乎是方也熟地山萸丹皮澤瀉山藥茯苓皆
濡潤之品澤瀉茯苓丹皮所以能壯水之主肉桂附子辛
潤之物能於水中補火所以益火之原水火得其養則腎
氣復其天矣益火之原以消陰翳即此方也蓋益脾胃地熱
英肉並不 能益脾胃而培萬物之母其利溥矣

相火龍雷論

火有人火有相火人火者所謂燎原之火也遇草而熱得
木而燔可以濕伏可以水滅可以直折黃連之屬可以制

之相火者龍火也雷火也得濕則燔遇水則燔不知其性
而以水折之以濕攻之適足以光焰燭天物窮方止矣識
其性者以火逐之則焰灼自消炎光撲滅今人率以黃柏
治相火是水滅濕伏龍雷之火愈發矣龍雷之火每當濃
陰驟雨之時火焰愈熾或燒燬房屋或擊碎木石其勢誠
不可抗惟太陽一照火自消滅此得水則熾得火則滅之
一驗也桂附引火歸原引之下達耳是補龍雷之火
非滅之也不顧文理專以大言惑愚人耳
陰虛發熱論

醫貫

卷下

十

世間發熱類傷寒者數種至於勞心好色內傷真陰真陰
既傷則陽無所附故亦發熱其人必面赤煩躁口渴引飲
骨痛脈數而大或尺數而無力者是也惟丹溪發明補陰
之說以四物湯加黃柏知母此用血藥以補血之不足者
也世襲相因屢用不效何耶蓋因陰字認不真誤以血為
陰耳當作腎中之真陰即先天也內經曰諸寒之而熱者
取之陰諸熱之而寒者取之陽所謂求其屬也王太僕先
生註云大寒而盛熱之不熱是無火也大熱而盛寒之不
寒是無水也又云倏忽往來時發時止是無火也晝見夜
伏夜見晝止時節而動是無水也當求其屬而主之無火

者宜益火之原以消陰翳無水者宜壯水之主以鎮陽光
 必須六味八味二丸出入增減以補真陰此又自造王太
 寒之五句出素問至真要大論王註言益火之源以消陰
 翳壯水之主以制陽光故曰求其屬也此五句是原文
 餘俱增出者註之意蓋謂熱病以寒藥治其熱宜自退
 乃熱仍在此不可以驅當於陰分增其水以配火則陰
 盛而陽自伏不用瀉而補所謂壯水之主也寒病以熱
 藥治其寒宜自瀉而補所謂壯水之主也寒病以熱
 益其火以配水則陽旺而陰自衰亦不用瀉而補所謂
 益火之源也何等明白下文即接云但益心之陽寒亦通
 行強腎之陰熱之猶可明指心為陽腎為陰即經文司天
 逆氣以心為火腎為水之說誰不指腎中之陰陽也專指
 腎言已屬不倫又造出無數亂道且接出必須六味八味
 九一句似亦太僕之言何等荒唐自此說行人竟以
 益火之源二句鑿鑿指腎經言而六味八味真王太僕
 王太僕以來不易之神方矣嗚呼豈不冤哉 屢用屢效

卷下

十一

若有產後及大失血後陰血暴傷必大發熱亦名陰虛發
 熱此陰字正謂氣血之陰若以涼藥正治立死正所謂象
 白虎湯證悞服白虎湯必死當此之時偏不用四物湯有
 形之血不能速化幾希之氣所宜急固須用獨參湯或當
 歸補血湯使無形生出有形來血脫氣亦脫故急固其氣
 劑非始終用參亦非一用參而不必服藥也若可用大補之
 云生出非但緩不及事且全失用參之義矣 此陽生陰
 長之妙用不可不知也或問曰子之論則詳矣氣虛血虛
 均是內傷何以辨之予曰悉乎子之問也蓋陰虛者面必
 赤無根之火戴於上也若是陽證火入於內面必不赤

之證陽明火旺面固赤腎火上其口渴者腎水乾枯引水
 浮面亦赤何云陽證無面赤者其口渴者腎水乾枯引水
 自救也湯最甚但口雖渴而舌必滑脈雖數而尺必無
 力甚者尺雖洪數而按之必不鼓此為辨耳雖然若問其
 人曾服過涼藥服亦有力而鼓指矣戴復菴云服涼藥而
 脈反加數者火鬱也宜升虛人敗證總無升宜補切忌寒
 涼犯之必死臨證更宜詳辨毫釐之差枉人性命慎哉

咳嗽論

外感風寒而咳嗽者今人率以麻黃枳殼紫蘇之類發散
 表邪謂從表而入者自表而出如果係形氣病氣俱實者

卷下

三

一千而愈若形氣病氣稍虛者宜以補脾為主治嗽正與
 安是有外感咳嗽而佐以解表之藥補脾中如何容得解
 而自芪朮等藥者表之藥宜立方之盡
 不通何以故蓋肺主皮毛惟其虛也故湊理不密風邪易
 以入之若肺不虛邪何從而入耶然則竟不必問其何
 人所以製參蘇飲中必有參人參本不為補脾而設且
 枝湯中有芍藥甘草解表中兼實脾也芍藥甘草並非為
 家註甚明以桂枝脾實則肺金有養皮毛有衛已入之邪
 亦非治嗽方也脾實則肺金有養皮毛有衛已入之邪
 易以出邪已在內而補之則補邪矣世有賊未去而堅築
 天之外邪牆垣以為如此則賊易去者非至愚乎當改云已
 身不出後來之邪無自而入矣若專以解表則肺氣益

虛湊得益疎外邪乘間而來者何時而已耶須以人參黃
芪甘草以補脾兼桂枝以驅邪此亦非咳嗽所宜用之品此子謂不治
肺而治脾虛則補其母之義也此句不如解蓋此乃隔二隔三之治以治藏邪久
病則然若感冒乃風火之疾能待藏氣相生耶

仁齋直指云肺出氣也腎納氣也肺為氣之主腎為氣之
本凡咳嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上者此
腎虛不能收氣歸元當以地黃丸安腎丸主之此亦嘗問
邪母徒從事於肺此虛則補子之義也補子未余又有說
焉五行之間惟肺腎二臟母盛而子宮受邪何以獨此二
藏為然且盛

醫貫疏 卷下

則何以何則肺主氣肺有熱則氣得熱而上蒸不能下生
於腎而腎受邪矣不生則從何來腎既受邪則肺益病此
又何也蓋母藏子宮子隱母胎凡人肺金之氣夜臥則歸
藏於腎水之中今因肺受心火之邪又增出欲下避水中
而腎水乾枯有火何以腎無可容之地於是復上而病矣
是肺自病耶是邪病耶若是肺病肺氣歸肺不得為病
若是邪病則爾必欲肺之邪藏於腎而後為不病乎

吐血論

問吐血多起於欬嗽欬嗽血者肺病也方家多以止嗽藥
治肺兼治血而不效何也曰諸書雖分咳血嗽血出於肺

咯血唾血出於腎余謂咳嗽咯唾皆出腎蓋腎脈入肺循
喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胸中故二臟相連病
則俱病而其根在腎吐血五臟皆有獨肺為多偏要說皆
每語必與古人相戾誠何心也謂腎病必關於肺則可
下焦之血必由咳吐也其所以專指為腎者不過欲獨用
六味八味嗟乎六味八味兩藥方耳不知與趙氏何恩每
病非此不治即使與此病毫無干涉必先將此病牽到腎
繼然後用此二方其或斷斷不可牽者則以真陰真陽太
極機之失陰陽太極則處處可假借者於是二方褚氏遺
不可須臾離矣故吾謂醫者亡明之妖書也

書津液論云天地定位水位乎中人肖天地亦有水焉在
上為痰在下為水遺書云在下為精今收為水與伏皮為
醫貫疏 卷下

血從毛竅中出為汗可見痰也水也血也一物也此又失
意者褚氏明人身上下皆有水並非謂血之帶痰而出者
四者即一物也其動輒謂古人如此痰是一物則指為痰惟六味地黃
乃腎水挾相火炎上也帶痰而出亦可耶性不寒涼
九獨補腎水如有咳嗽等疾及肺氣未清者亦
不損脾胃久服則水升火降而愈又須用人參抹肺肺氣
逆咳嗽者補胃藥收功使金能生水蓋滋其上原也

喘論

經云諸喘皆屬於上又云諸逆衝上皆屬於火故河間叙
喘病在於熱條下華佗云肺氣盛為喘活人書云氣有餘

則喘後世集證類方不過遵此而已獨王海藏辨云氣盛

當作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛與有餘則清肅下

行豈復為喘以其火入於肺炎燦真陰衰與不足而為喘

焉盛衰二字誤解不得經云邪氣盛則實精氣奪則虛故凡言盛者皆指邪氣凡言虛者皆指精氣然虛有二種有外感及別藏之氣乘虛而感者有本經之氣血結聚而感者有外感及別藏之邪清伐而虛者有本經之氣血

衰少而虛者病精不同治法亦異嗟乎盛衰二字極淺極易而醫者聚訟紛紜千古夢夢可勝長嘆所言盛

與有餘者非肺之氣也肺中之火也此何勞辨即如腎有

豈指血多耶至言肺中之火又屬一偏六淫之氣皆為有餘何但火哉

海藏之辨超出前人發千古之精奧惜乎起其端未竟其火之所由來愚謂火

醫貫砭

卷下

之有餘水之不足也此專為要用六味然外來陽之有餘

陰之不足也凡諸逆衝上之火皆下焦衝任相火出於肝

腎者也故曰衝逆腎水虛衰相火偏勝壯火食氣銷鑠肺

金烏得而不喘焉內經云腎者主水主臥與喘也喘何嘗不喘雖屬腎而因各不同治法亦異非六味一方所能盡耳須用六味地黃加門冬

五味大劑煎飲以壯水之主如上焦未清痰涎湧結服此非惟不能下達且氣逆延升

終無愈則水升火降而喘自定矣蓋緣陰水虛故有火有

火則有痰有痰則咳嗽咳嗽之甚則喘謂凡喘證只此陰

豈不當與前陰虛相火論參看

孟浪

喉咽痛論

喉與咽乃一身之緊關橐籥也經曰足少陰所生病者口

渴舌乾咽腫上氣嗌乾及痛素問云邪客於足少陰之絡

令人咽痛不可納食又曰足少陰之絡循喉嚨通舌本凡

喉痛者皆少陰之病此又亂道靈素手足太陰是厥陰少

咽之證今皆抹殺專指為腎經之疾但有寒熱虛實之分

然後可獨用六味八味真苦心也

少陰之火如奔馬逆衝到咽喉緊鎖處氣鬱結而不得舒

故或腫或痛也其證必內熱口乾面赤痰涎湧上其尺脈

必數而無力蓋緣腎水虧損亦有實火者相火無制而然須用

醫貫砭

卷下

六味地黃門冬五味大劑作湯服之喉痛之挾風火者十

而五不但服溫燥之藥者立斃即清涼之藥而少加重濁

者尚且不救余治以百數皆以辛寒清涼藥又有色慾過

度元陽虧損無根之火遊行無制客於咽喉者須八味腎

氣丸若遇陽明有火者不立斃乎大劑煎湯冰冷與飲使引火歸原庶

幾可救此論陰虛咽痛治法如此正褚氏所謂上病療下

也人之喉咽如曲突曲突火炎若以水自上灌下突爆裂

矣如曲突之火已熾炎及惟竈牀下以盆水映之上炎即

熄此上病療下之一驗也

有急喉痺者其聲如鋸痰如拽鉗此為肺絕之候此乃氣上脫之證宜入類中風條非急喉痺乃風火之證耳不得誤引且果係喉痺人參薑汁豈不止殆耶速宜人參膏用薑汁竹瀝放開服如未得膏先煎獨參湯救之服早十全七八次則十全四五遲則不救

眼目論

經曰五臟六腑之精皆上注於目而為之精腎藏精故治目者以腎為主明則說為之精則即眼之精矣明則說五臟六腑之精則五臟六腑各有精矣若指腎藏精之精即是此精將目中之脂膏盡在腎中耶目雖肝之竅子母相生腎川同一治也併肝腎為一總要專用六味一方耳

醫貫砭

卷下

七

又有陽虛不能抗陰者若因飲食失節勞役過度脾胃虛弱下陷於腎肝濁陰不能下降清陽不能上升天明則日月不明邪害空竅令人耳目不明夫五臟六腑之精皆稟受於脾土而上貫於目此精字乃飲食所化之精非天之元精也內經明云五臟六腑之精皆上注於目而為之精又云目者五臟六腑之精也營衛魂魄之所常營也神氣之所生也其鑿鑿如此偏要說是脾上飲食所化之精反經背道已極至稟受脾上二句又是假造經文用東垣益氣聰明湯

張子和云目不因火則不病白輪病赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被翳火乘肝與脾也赤脈貫目火

自甚也能治火者一句可了亦一偏之見六淫之邪皆能傷目也但子和一味寒涼治火余獨補水以配火亦一句可了若係邪火豈至於六淫七情錯雜諸證詳倪仲賢原機啓微此書甚好而薛立齋又為之參補深明壯水之主益火之原甚有益於治目者也若係六淫則壯水之六味益火之八味何可耶

口瘡論

口瘡上焦實熱中焦虛寒下焦陰火中焦何以必定虛寒焦何以必定陰火豈無胃實火者下虛寒而逼陽於上者各經傳變所致當分別而治之如發熱作渴飲冷此實熱也輕則用補中益氣實熱反用升補重則

醫貫砭

卷下

六

用六君子湯實熱而至發熱作渴反用參不橋半是何肺腸飲食少思大便不實此中氣虛也亦有邪火作渴者用人參理中湯大熱大補之藥用於口瘡之證其不變為危險手足逆冷肚腹作痛此中氣虛寒用附子理中湯此是口瘡兼證或是口瘡本證兼證者因口瘡誤治釀成此等敗證也幸證皆本有虛寒之證逼火而成瘡也此則不治瘡而治本不以此為治口瘡之方也且口瘡治法多端豈其熱虛實四字所能盡補熱內熱不時而熱此血虛也用八物加丹皮五味麥冬發熱豈宜用五味發熱作渴唾痰小便頻數此腎水虛也用八味丸作渴吐痰何得用八味且小便數日晡發熱或從少腹起陰虛也用四物亦不盡屬虛寒也日晡發熱或從少腹起陰虛也用四物參朮五味麥冬不應用加減八味丸口瘡而日晡發熱則屬陽明矣以下兩方

皆不合且四物湯加入參朮無非治口瘡之法又
不應而忽改作八味丸則是以人試藥矣○按不應二字
出之薛氏醫案薛氏治病每云某病余投某藥不應必改
某藥又不應乃曰然則非此病矣又換某藥數十劑而愈
如此極多明明是以藥試病矣幸而天命未絕能待換方
而愈豈無不應之時不及換方而死且再換一方仍不應
而致死者豈少哉蓋能繫繫審為何病猶恐藥力不至不
能有功况全然相反以藥試之耶醫案但鄙庸醫遊移恍
惚至詳而極後人猶奉 或問虛寒何以能生口瘡而反用

附子理中耶蓋因胃虛穀少則所勝者腎水之氣寒亦何
之氣或因他感或因本藏上盛必腎水
則下虛上熱則下寒無一定也 逆而承之反為寒中脾胃

衰虛之火被迫炎上作為口瘡經曰歲金不及炎火乃行
復則寒雨暴至陰厥乃格陽反上行民病口瘡是也故用

醫貫疏

卷下

五

參朮甘草補其土薑附散其寒既成瘡則火已凝結一不先
散解降納而惟峻補助火
安有不則火得所助接引而退舍矣

消渴論

消渴之疾余有一說焉人之水火得其平氣血得其養何
消之有其間攝養失宜水火偏勝津液枯稿以致龍雷之
火上炎熬煎既久腸胃合消五臟乾燥令人四肢瘦削精
神倦怠故治消之法無分土中下先治腎為急內經云心
移熱於肺
傳為高消大腸移熱於胃善食而瘦謂之食亦則上中二
消明明是心與大腸之火與腎無干反盡從腎治耶况腎
火上衝之證往往不甚渴即渴亦不能多飲蓋腎中之水
既上則下焦之陽衰陽衰則陰盛水為陰屬故不能多飲

也凡辨陰火實火之法俱視此 惟六味八味及加減八味
丸隨證而服降其心火滋其腎水則渴自止矣

或問曰下消無水用六味丸以滋少陰腎水矣又加附子
肉桂者何蓋因命門火衰不能蒸腐水穀水穀之氣不能

薰蒸上潤乎肺如釜底無薪鍋蓋乾燥故渴至於肺亦無
所稟不能四布水精並行五經其所飲之水未經火化真

人膀胱正謂飲一升溺一升飲一斗溺一斗此是下消之
證與肺又無

試嘗其味甘而不鹹可知矣故用桂附之辛熱壯其少
陰之火竈底加薪枯籠蒸溽稿禾得雨生意維新惟明者

醫貫疏

卷下

羊

知之味者鮮不以為迂也昔漢武帝病渴張仲景為處此
方仲景是漢獻帝時人與武帝相去二百餘年明明可考
乃造出此語何耶趙氏所談無往非夢而此則又夢之
最不 至聖玄關今猶可想八味丸誠良方也瘡疽痊後及

將痊口渴甚者舌黃堅硬者及未患先渴或心煩燥渴小
便頻數或白濁陰痿飲食少思肌膚消瘦及腿腫腳軟口

齒生瘡服之無不效經云諸痛瘡皆屬於火又云水液
薄濁皆屬於熱况經大洩膿血之後
陰血大傷作渴煩躁孤陽欲越乃反

以辛熱逐水之藥連之死誓何深也

氣虛中滿論

中滿者證與鼓脹水腫無異何故屬之氣虛請得明言之

否曰氣虛者腎中之火氣虛也好此該腎中滿者中空似

鼓虛滿而非實滿也夫略皆脾腎兩虛所致故治腫者先

以脾土為主須補中益氣湯或六君子湯溫補之水未去

則補其而補之俾脾土旺則能散精於肺通調水道下輸膀胱水

精四布五經並行矣或者疑謂喘脹水滿而又加純補之

劑恐益脹滿必須補藥中加行氣利水之品方妙此說深

似得病情終非大方家體治病而講體蓋肺氣既虛不可

復行其氣腎水已衰不可復利其水利邪水正所以衛正

以保正氣豈并腎純補之劑初時似覺不快過時藥力得

精而亦利之耶

醫貫砭

行漸有條理矣

至於補腎以治腫其說難明蓋禹之治水行其所無事也

若一事疏繫則失之矣當時禹亦何嘗不涇川澮河黃據

水之源今人之治腎水者牽牛大戟粗工之小智正禹之

所惡也間有用五苓五皮者以為中正亦轉利轉虛腎氣

愈衰而愈不能推送矣故須用補腎經曰腎開竅於二陰

腎氣化則二陰通二陰閉則胃膜脹故曰腎者胃之關關

門不利故水聚而從其類也可知要利關門不是要補關

又曰腎主下焦三焦者決瀆之官水道出焉可知以決瀆

瀆為主

勝

醫貫砭

卷下

胱者州都之官津液藏焉必待三焦之火化始能出也改

經文氣化二字為火化意在八味也孰知換此一字其弊遂百出乎經曰三焦病者氣滿小

腹光堅不得小便溢則水而為脹日溢曰水雷尚惟張

仲景製金匱腎氣丸補而不滯通而不泄誠治腫之神方

薛立齋屢用屢效詳載醫案余依其案試之甚驗故詳著

焉世有患此幸無誕之乎

金匱腎氣丸 白茯苓 附子 牛膝 肉桂 澤瀉

車前子 山藥 山萸 丹皮 熟地

中滿之病原於腎中之火氣虛不能行水此方內八味丸

醫貫砭

為主以補腎中之火八味為利水之劑澤瀉俱制土驅濕之藥而水為陰類

故以滑子溫之肉桂通之惟生地黃向為能滋潤以保腎

陰然起猶不即用須略加通利之後始用之而效此仲

景製方之義也知腎氣丸為治水之藥即可知非全補真

陽太極之藥若以此方治盡天下之病則可知非全補真

皆以治水腫之法治之則三焦有所稟命浩然之氣塞乎

天地不必作如腎氣不虛而能行水矣內有附子肉桂辛

熱之品熱則流通又火能生土上實而能制水矣又有牛

膝車前二味最為切當方見金匱要略故名金匱腎氣丸

金匱並無車前牛膝乃後

人所加亦後人所名也

又有一等純是陰虛者六一純字專為要用其證腹大臍

六味而病情又失矣

醫貫砭

卷下

腫腰痛兩足先腫小水短澀喘嗽有痰不得臥甚至頭面皆腫或面赤口渴但其人飲食知味大便反燥醫見形腫氣喘水證標本之疾雜用利水之藥而益甚不知陰虛三焦之火旺與衝脈之屬火者同逆而上由是水從火溢水不能相合豈有水反從火溢者即有上積於肺而嗽甚則之亦宜引火達下不得用純陰藥也為喘呼不能臥散聚於陰絡而為跗腫隨五臟之虛者入而聚之為五臟之脹皆相火泛濫其水而生病也

醫貫砭

卷下

三

則真陰又無著落所以幻出陰虛一種則六味仍不可缺六味有知亦感此周旋之德否以六味地黃加麥冬五味大劑服之滋之不足尚欲親試有驗故錄

噎膈論

內經曰三陽結謂之膈三陽者大腸小腸膀胱也太陽為明為二陽少陽為一陽此處三陽皆指手太陽小腸足太陽膀胱言乃增出大腸來蓋以三陽為三陽經也結結熱也大腸主津小腸主液大腸熱結則津涸小腸熱結則液燥膀胱為州都之官津液藏焉膀胱熱結則津液竭然而三陽何以致結熱皆腎之病也然則內經何以不蓋腎主五液又腎主大小便腎與膀胱為一臟一腑腎水

既乾陽火偏盛蒸煎津液三陽熱結則前後閉澇下既不通必反于上直犯清道上冲吸門喉咽所以噎食不下也何為水飲可入食物難下蓋食入於陰長氣於陽豈有食之時陽氣已反引動胃口之火故難入水者陰類也同氣相投故可入水自然比食易下不必過高其說若胸中白沫者所飲之水沸而上騰也既同氣相投糞如羊矢者食入者少渣滓消盡腸亦乾小而不寬大也非因食少王太僕云食入即出是無水也食久反出是無火也無水者壯水之主無火者益火之原水也數語今改作治瀉胃法

醫貫砭

卷下

三

以添上六味八味二方我想其作偽之心不知如何詭秘也直須以六味地黃丸料大劑煎飲久服可挽於十中之一二又須絕嗜慾遠房幃薄滋味可也若曰溫胃胃本不寒何以必若曰補胃胃本不虛此則又亂道矣爾論病必曰邪之所湊其若曰開鬱香燥之品開鬱亦不必適以助火局方發揮已有明訓河間劉氏下以承氣鹹寒損胃津液愈竭無如補陰此證多痰補陰者焰光自滅

夢遺并精滑論

治以腎肝為主經曰陰陽之要陽密乃固陽強不能密陰

氣乃絕陰平陽秘精神乃治陰陽離決精氣乃絕大所謂
 陽強者乃肝腎所寄之相火強也所謂陰絕者乃腎中所
 藏之真陰也山腎為陰主藏精肝為陽主疎泄惟此處疎泄不係肝
 也是故腎之陰虛則精不藏肝之陽強則火不秘明明是
 火偏要說是肝火凡肝火動者必上升而腎中相以不秘之火加
 臨不藏之精有不夢夢即泄矣薛立齋專用六味地黃以
 補腎而治夢遺屢效縱有相火水能滋木水升而木火自
 息矣倘有脾胃不足濕熱下流者以前九為主煎服補中
 益氣湯以升提之此又怪異之極者濕熱如何提得且已有濕又屬脾胃亦何可用六味也

醫貫砭

卷下

五

論補中益氣湯

補中益氣湯 黃芪 當歸 人參 炙甘草 陳皮
 升麻 柴胡 白朮

或問曰古今稱補中益氣湯為萬世無窮之利其義云何
 曰此發前人所未發繼仲景不倫河間而立意義深遠也世
 人一見發熱便以為外感風寒暑濕之邪非發散邪從何
 出又不能灼見風寒暑濕對證施治乃通用解表之劑雜
 然並進因致斃者多矣東垣深痛其害創立此方以為邪
 之所湊其氣必虛內傷者多外感者間或有之辨在前立此方以治

內傷而乘外感者何等牛常必云天下竟無外感之病則
 亂道矣此人每舉一方必說此方能治盡天下之病不
 必更用別方縱有外邪亦是乘虛而入但補其中益其氣
 而邪自退不必攻邪將歷古治病之方齊刪却攻則虛者愈虛而危
 亡隨其後矣攻邪不是攻正何以虛者愈虛倘有外感而內傷不甚者即
 於本方中酌加對證之藥而外邪自退所謂仁義之師無
 敵於天下也仁義之師亦非竟不用兵亦非
 或問曰余見先生動輒以先天後天立論余攷之易中先
 天後天之圖乾南坤北離東坎西等卦位於醫中甚無所
 合而先生屢言之不已其義云何曰怪乎子之問也余所
 謂先天者指一點無形之火氣也以火氣為先天其玄妙如此後天者
 指有形之體自藏府及血肉皮膚與夫涕唾津液皆是也
 既曰先天此時天尚未生何況有乾南坤北八卦對待之
 圖乎先天在天未生之前却不知到在人腹中專恃八味養之豈非夢境曰然則伏羲此圖
 何為而設也余曰此非先天之圖乃中天八卦之圖歷古天
 天之圖造出此名以遷就自已亂道此等直是無人心者天位乎上地位乎下日出乎
 東水源乎西亦足怪論風雨在天上山雷在地下人與萬
 物位乎中予嘗見誰不邵子排列如此有先天八卦數其
 當今所用者止一文王後天圖此用出乎震齊乎巽相見

醫貫砭

卷下

五

乎離致役乎坤悅言乎兌城乎乾勞乎坎成乎艮以春秋
晝夜十二時相配因以定陰陽決生死推而天文地理星
相醫卜無一不以此圖為則至於先天者無形可見前圖

無形可見後天圖之有形可即易中帝出乎震之帝神也
見在何處種種欺人胡說

者妙萬物而為言之神是也此二句却是文王後天圖之
語又與上文先天圖說不合

帝與神即予先天要論中所稱真君真主本係無形何出
在後天

圖說內不得已而強立此名以為主宰先天之體以為流
行後天之用東垣先生獨會其宗而以補中益氣方中用

柴胡升麻者正以升發先天之氣於脾土之中先入之氣前要用六

醫貴秘下

味八味則云在腎中此要用補中益氣則云在脾土中况
先天之氣立於天尚未生之前獨升麻柴胡足以左之右

之真乾坤在真萬世無窮之利余所以諄諄為言也若飲
手之神技也

食失節寒溫不適脾胃乃傷喜怒哀憂恐損耗元氣脾胃氣
衰元氣不足而火獨盛火者陰火也起於下焦元氣之賊

也壯火食氣少火生氣火與元氣不兩立必要將火滅盡元氣方存豈非

胡一勝則一負脾胃氣虛則下流肝腎名曰重強何以虛則反下

流且流去是何物內經重強二字亦不知此講經云脾脈
太過則令人四肢不舉其不及則令人九竅不通名曰重

強此乃指脾之病脈言脈病則五臟陰火得乘其土位故
皆不和順也何嘗指下流肝腎耶

脾證始得則氣高而喘身熱而煩脈洪大而頭痛或渴不

止其皮膚不任風寒而生寒熱又辨外證蓋脾之氣下流

使穀氣不得升浮是春生之令不行皆學舌也則無陽

以護其營衛衛即衛身之陽氣也如遂不任風寒而生寒

熱此皆脾胃之氣不足所致也

傷寒發熱拂拂如羽毛之熱熱在皮毛三陽俱有壯熱之

肌膚為尤劇如內傷者肌體壯熱捫之烙手內傷雖微總

何皆只微熱甚如何反右手氣口脈大於左手人迎三倍此又亂道脈

以爲極熱右脈急大而數時一代而瀉代脈亦是

格之脈危證其氣口脈急大而數時一代而瀉危證安得

內傷即現此脈且瀉是肺之本脈代是氣不相接乃脾胃
脈亦不可派定也

醫貴秘卷下

不足之脈大是洪大洪大而數乃心脈刑肺急是弦急乃

肝木挾心火克肺金也其右關脈屬脾比五脈獨大而數

數中時顯一代此不甚勞役是飲食不時寒溫失所以何

擊派定胃脈損弱隱而不見惟內顯脾脈如此以上語語

如此傷肺又俱說肺金若外傷則人迎脈大於氣口也

或問曰丹溪云東南之人陽氣易以升不可服補中益氣

湯當今江以南之人果盡不當服乎曰東南指人之臟腑

而言也何不云東南之臟不可服補中益氣湯耶然則肺

其人上感者必下虛其腎氣大虛矣急須補北力先天

之元氣為要總而言之先天後天不得截然兩分上焦元氣不足者下陷於腎中也元氣本不在上焦即使上焦當取之至陰之下下焦真陰不足者飛越於上部也陰氣如越焉可不引而歸原耶引陰歸而從未前問是以補中益氣湯與腎氣丸並用即前怪法朝服補陽暮服補陰互相培養

傷飲食論

大凡元氣完固之人多食不傷過時不飢若夫先因本氣不足致令飲食有傷矣剋劑之藥一用飲食雖消但脾胃既已受傷而後經此一翻消化愈虛其虛明後日食復不化

醫貫砭

卷下

老

猶謂前藥已效藥力欠多湯丸並進展轉相害羸瘦日增良可悲哉消化之藥原不致人長服也余痛此弊因申言之凡太平丸保和丸肥兒丸之類其名雖美俱不敢用蓋名之美者其藥必惡然則陷胸抵當等名皆大補之劑故以美名加之而天真大造等方皆傷生之藥耶以欺人耳目非大方家可用也古人立此名專為欺人而欲騙人人其全中那人方家以其名之美夫有醫術有醫不可用然則大方家所用皆惡名之方耶道術可暫行一掃道可流傳千古道中無術術中無道有俗方余以為今人不及古人不敢自立一方六味八味

醫貫砭 卷下

醫貫砭

卷下

老

用原不必更立方也若脾胃惟東垣為聖選而用之以調中益氣補中益氣二方出入增減真知其寒物傷也本方中加熟藥如薑桂之類熱物傷也加黃連之類真知有肉食傷也加山查數粒酒食傷也加葛花一味隨證調理二方誠有用則怪談矣此東垣之法方士之繩墨也然以寒治熱而熱不去以熱治寒而寒不除奈何經曰寒之不寒是無水也熱之不熱是無火也壯水之主益火之原此東垣之未及也治脾胃原不專講寒熱蓋飲食勞倦所謂不外因與起遂著此如有食填太陰名曰食厥者上部有脈下部無脈不吐則死此語出難經謂上部有脈下部無脈者若其部暫時無脈吐定之後氣平而脈自復非謂無脈之夫必令其吐也又並非指食厥而言况食厥證又未必平脈腹脈者句急以陰陽鹽湯探吐其物即愈如有食積腸腹絞痛于不可按者不得不下食未消化審知其為寒積必用巴豆感應丸何不用八審知其為熱積必用大黃承氣湯何不用六味加下藥下之不當死生立判慎之哉

旺亦補陰以配之將配到幾千百分而後平耶宜其治傷寒陽明壯熱等疾皆用六味也譬之天平此

重即彼輕一邊重者只補足輕之一邊決不鑿去馬子蓋

馬子一定之數今人欲瀉水降火者鑿馬子者也據兩亦知馬子

一定若一頭物重必要增馬子耶

或曰正當胸膈飽悶之時數日粒米不下陳皮枳殼木香

烏藥日夜吞咽尚且不通復可補乎曰此正因初生不知

補益擅用發散尅伐太過虛痞之病也經曰下文經語皆憚已極想彼料天下人斷無看內經者故耳下焦虛乏中焦痞滿欲治其虛則

中滿愈甚欲消其痞則下焦愈乏庸醫值此難以措手疏

醫貫砭

卷下

三

啓其中峻補其下少用則邪壅於上多用則峻補於下所

謂塞因塞用者也善用者能以人參一兩或七八錢少加

升麻一錢反用升提且二味亦不成方大劑一服即愈此內經之妙用

內經何嘗有此方不可不知也

中暑傷暑論

中暑者面垢自汗口燥悶倒昏不知人背冷手足微冷或

吐或瀉或喘或滿是也當是時切勿便與冷水或臥冷地

如行路暈死者即置日中熱地上以小便溺熱土上取熟

土菴病人臍上急以二氣丹同蘇合香丸湯調灌下如無

二氣丹研蒜水灌之亦可蓋中傷暑毒外陽內陰諸暑藥

多用暖劑如大順散之用薑桂枇杷葉散之用丁香蒜亦

辛熱之物又蒜氣臭烈能通諸竅也中暑用熱又是暑中

因好涼太過或其人本屬虛極或因暑邪入中汗出太過

陽越於外古方仍有用辛熱者然必審其沉寒之應證全

具方可一用乃以為暑證盡然則殺人如麻矣此人

凡論一病必以此病中之極少者立論真可恨也

傷暑而苦頭痛發躁惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗

大泄齒燥無氣以動乃為暑傷氣蒼朮白虎主之有暑而

醫貫砭

卷下

三

蒼朮亦若人元氣不足用前藥不應惟清暑益氣湯或補

中益氣湯為當自汗多而氣上反用升柴熱氣未清反用參朮與爾何仇必欲殺之大抵夏

月陽氣浮於外爾亦知陽浮何陰氣伏於內若人飲食勞

倦內傷中氣或酷暑勞役外傷陽氣者多患之法當調補

元氣為主暑氣未清而補即補暑矣夏月服補而卒死者我見亦多矣皆此等邪說殺之也而佐

以解暑若陰寒之證用大順散桂附大辛熱之藥此內經

舍時從證之良法內經何嘗有此議論不可不知

清暑益氣湯 黃芪 蒼朮 升麻 人參 白朮

陳皮 神麴 澤瀉 甘草 黃柏 葛根 青皮

當歸 麥冬 五味雜出不倫古人製方之義至此而盡醫道之一厄也

白虎湯 石膏 知母 甘草 人參 糯米此是白虎加人參湯

不得祇名 此方是暑月熱病發熱之正方白虎湯仲景治傷寒汗後裏熱
白虎湯 亦證如人參名入參白虎湯治汗後裏熱之證金匱
亦借以治太陽中暈之證乃隨手錄一方而有數誤焉非
治暑方一也以白虎加人參湯指為白虎湯二也以梗
米改糯米三也以爲祇夏月可用餘月不可用四也其每
動必誤 如此

濕論

東垣曰治濕不利小便非其治也又曰在下者引而竭之
聖人之言雖布在方策其不盡者可以意求耳夫濕淫從
外而入裏若用淡滲之劑是降之又降乃復益其陰而重
竭其陽利濕如何是益陰竭陽豈濕氣是陽耶則陽氣愈消而精神愈短矣

醫貫砭

卷下

毒

是陰重強陽重衰反助其邪之謂也濕而利之是助何邪故用升陽
風藥即瘵以羌活獨活柴胡升麻各一錢水煎熱服四味風藥
亦不成方大法云濕淫所勝助風以平之又假造內經經云濕淫利水之義乃指出此怪語是何肺勝又曰下者舉之
是以曲而爲之直也利水即是除客反要提在「焦將」夫
聖人之法可以類推是舉一而知百也有脚氣類傷寒者
發熱惡寒必脚脛間腫痛俱從濕治脚氣人因濕爲多然治法亦不一也
有濕熱發黃者當從鬱治凡濕熱之物不鬱則不黃禁

茵陳五苓散茵陳五苓散治濕之正方也凡古人相傳治病
茵陳五苓散 蘇下之則加減法也或米或麥之不同則審用法也或
五果五菜之甲食則變通法也若謂古方不可用則猶云
凡飢者禁食五穀服者十不一 凡見用茵陳五苓散者十
不一生仲景殺過幾人當用逍遙散方見鬱論

予一日患陰丸一个腫如鴨卵發熱以濕熱證治之不效
細思之數日前從定海小船回有濕布風帆在坐下比上
岸始覺以意逆之此感寒濕在腎丸也乃用六味地黃加
柴胡吳萸肉桂各一錢獨活五分知其爲濕仍必用六味
服此而病倏愈者蓋一時輕疾得柴萸肉桂一服熱退再
獨活等辛散之藥自然六味不能爲害耳

醫貫砭

卷下

毒

服腫消後有患偏墜者此方多效
瘧論
或問曰經云夏傷於暑秋必病瘧前人雖備言之旨殊未
暢盡明示諸曰不發於夏而發於秋此亢則害承乃制子
來救母之義內經瘧論言之甚詳不容再贅一語偏要扯
不曉其義出大節氣位亢害承制之論以欺人又全然
豈不汗顏蓋暑令當權君火用事肺金必受傷尅火位之
下水氣承之腎水爲肺之子因母受火傷子來承之如此
乃肺病而寒熱則心腎交戰則瘧
之病也亂道無理一至於此以制火救母於是水火相戰
陰陽交爭大勝則大復小勝則小復此陰陽勝復之常理

瘧之所由作也然而有病者蓋邪之所湊其氣必

虛故其人元氣不固者暑邪得以承之所以治瘧以扶元

氣為主瘧邪方熾如何扶元且爾所謂扶元必是六味助了腎水以滅君火火氣從此大敗其人遂終冷不

奈何熱奈何

發在夏至後處暑前者此三陽受病傷之淺者近而暴也

發在處暑後冬至前者此三陰受病陰陽受病之故內經

之前後分陰陽傷之重者遠而深也

至於陰虛者其寒熱亦與正瘧無異而陰瘧中又有真陰

真陽之分此做入味地人所不知經曰晝見夜伏夜見晝止

醫貫砭

按時而發是無水也晝見夜伏夜見晝止倏忽往來時止

時作是無火也又假造經文以寒熱準者皆是無水不準者皆是無火豈非亂道無水者

壯水之主以鎮陽光六味湯主之無火者益火之原以消

陰翳八味湯主之二方豈是治寒熱之藥非但作書者可厭即辨者亦可厭矣世患夫

瘧而不愈者非瘧不可愈乃治之不如法也丹溪云夜發

者邪入陰分宜用血藥引出陽分當歸川芎紅花生地黃

柏治之亦未及真陰真陽之至理徧攷諸書瘧論並未

露其意天下之病盡用六味八味千古只有爾獨得之秘非但治瘧無人能得此意也且余常試

有神驗故特表而出焉

痢疾論

世有瘧後痢者亦有痢後瘧者夫既為瘧後發洩已盡必

無暑熱之毒復為痢疾瘧邪未清中氣復虛邪從內陷此正暑毒陷入臟腑之疾最為險證

也此是元氣下陷脾氣不能升舉似痢非痢也非痢將指

既為痢後下多則亡血氣又隨痢散陰陽兩虛陽虛則惡

寒陰虛則惡熱故寒熱交戰似瘧非瘧也雖係氣血兩虛既復寒熱交爭

則是邪仍向外仲景傷寒論中凡陰病轉陽皆易愈之候

此乃病轉為瘧病屬可治若不指為瘧竟作陰虛陽虛論

則久病壞證死期將至亦非補中益氣所能愈也則俱作虛論俱用補中益氣加

溫補其病自愈細閱此書何必曉曉著成數卷只兩言括之日陰虛用六味陽虛用八味足矣讀者

醫貫砭

亦不必終日只記二方而千聖之妙訣已傳濟世之良法

已盡所以天下庸醫一見此書無不狂書以為天下有如

此做名醫之捷徑恨讀之猶晚也殺人之法從此徧天下

矣嗟乎無源亂道何地無之原不足與辨因晚村輩力為

崇奉而流毒遂無盡故作書者之罪小而表章者之罪大也

醫貫砭卷下終

吳江徐靈胎先生著

慎疾芻言

半松書屋珍藏

序

嘗讀小倉山房文集有徐靈胎先生傳知先生名大椿字靈胎吳江人隱於泖溪晚號泖溪老人凡星經水利音律武藝靡不通貫尤精醫術及讀先生所注難經醫學源流論根未能盡讀先生著作今夏五月福建學政彭詠我母舅知字習醫三載矣因由閩中寄慎疾芻言一卷囑付重刊原本多魯魚之誤遂加校讐而梓之按是書係先生六十餘歲所作閱歷既深言皆老當觀引首數言更見先生之心有大不得已於言者故不自覺其言之太過而惟恐不痛切不暢悉不能令人惕目驚心以致民命不長異端不媿斯道不傳在先生不得不盡言以開其悟而凡病者醫者皆不可不慎也

道光戊申仲夏長洲謝嘉孚蓉初氏序

慎疾芻言

序

一

小倉山房

慎疾芻言 序

引

余弱冠時家多疾病先世所藏醫書頗多因隨時翻閱不
過欲稍識方藥而已循習漸久乃上追靈素根源下沿漢
唐支派如是者十餘年乃注難經又十餘年而注本草又
十餘年而作醫學源流論又五年而著傷寒類方五十年
中批閱之書約千餘卷泛覽之書約萬餘卷每過幾時必
悔從前疎漏盡學以年進也及世之醫者全廢古書隨心
自造以致人多枉死自擊心傷數年前曾作芻言一冊欲
以醒世而鮮克聽從竊思生長

慎疾芻言

引

川石

聖朝毫無益於此世而半生攻苦雖存著述幾種皆統談
醫學無驚心動魄之語足令人豁然開悟因復扼心挖骨
即芻言原本更加痛快部悉實因悲憫填胸不能自已願
覽者諒其苦心虛懷體察以之治人則敬慎可以實過以
之治已則明哲可以保身冀遇信從之有人庶綿斯道於
一綫

乾隆丁亥秋七月巧日洞溪徐靈胎識

慎疾芻言

補

學問之道必由淺入深從未有淺近不知而專求怪僻者
况醫法一談必至傷生害命尤不可不慎也夫所謂淺近
者如傷風則防風荆芥威寒則蘇葉葱頭咳嗽則蘇子杏
仁傷食則山楂神麩傷暑則香薷廣藿瘧疾則柴胡湯加
減痢疾則黃芩湯加減婦人則四物湯加減小兒則異功
散加減此皆歷聖相傳之定法千古不能易也至於危險
尋難之症則非此等藥所能愈必博考羣方深明經絡實

慎疾芻言

一

川石

指此病何名古人以何方主治而隨症加減今則以古聖
之法為卑鄙不足道又不能指出病名惟以陽虛陰虛肝
氣腎弱等套語概之專用溫補以致外邪入裏馴至不救
間有稍馴謹之人起病時仍用切近之藥一二劑未即有
效即轉而改用溫補不思病之中人有愈必有漸不可因
無速效而即換方也况所服之方或未盡善不思即於前
方損益萬妥而據求變法又不肯先用輕談之劑探測病
情專取性雄力厚之品大反前轍必至害不旋踵總由朋
無定見之故當思人之有病不外風寒暑濕燥火為外因

喜怒哀思悲驚恐爲內因此十三因試問何因是當補者
大凡人非老死卽病死其無病而虛死者千不得一况病
去則虛者亦生病留則實者亦死若果元氣欲脫雖浸其
身於參附之中亦何所用乃謬舉內經曰邪之所湊其氣
必虛氣虛固當補矣所湊之邪不當去耶蓋邪氣補住則
永不復出重則卽死輕則遷延變病或有幸而愈者乃病
輕而元氣漸復非藥之功也余少時見問疾者聞醫家已
用補藥則相慶病者已愈今則病勢方張正羣然議進參
附熟地豈不可駭其始也醫者先以虛脫嚇人而後以補

慎疾芻言

二

藥媚人浙江則六味八味湯加入參麥冬等藥江南則理
中湯加附桂熟地鹿茸等藥於是人人習聞以爲我等不
怕病死只怕虛死所以服補而死猶恨補之不早補之不
重并自恨服人參無力以致不救醫者虛脫之言真有先
見之明毫無疑悔若服他藥而死則親戚朋友羣誦病家
之重財不重命死者亦目不能瞑醫者之罪竟不勝誅矣
所以病人向醫者述病必自謂極虛而旁人代爲述病亦
其指爲極虛惟恐醫者稍用攻削之劑以致不起或有稍
識病之醫卽欲對症擬方迫於此等危言亦戰戰兢兢擇

慎疾芻言 引

至補之藥以順其意既可取容更可免謗勢使然也此風
之起不過三十餘年今則更甚不知何時而可挽回也

用藥

醫道起於神農之著本草以一藥治一病但一病有數症
統名爲病如瘧痢之類分明爲症如後之聖人取藥之對
症者合幾味而成方故治病必先有藥而後有方方成之
後再審其配合之法與古何方相似則云以某方加減竝
非醫者先有一六味八味理中等湯橫於胸中而硬派人
服之也至其辨症用藥之法如有人風寒痰食合而成病

慎疾芻言

三

必審其風居幾分寒居幾分痰食居幾分而藥則隨其邪
之多寡以爲增減或一方不能兼治則先治其最急者所
以無一味虛設之藥無一分不斟酌之分兩也况醫之爲
道全在自考如服我之藥而病情不減或反增重則必深
自痛懲廣求必效之法而後已則學問自能口進若不能
何病總以幾味溫補投之愈則以爲已功死則以爲病本
不治毫無轉計此則誤盡天下而終身不自知也又其所
名陳方者用柴胡一味卽名柴胡湯用大黃一味卽名承
氣湯於古人制方之義全然不知隨其口之所指而已其

醫夾則幾幾句陰陽虛實五行生剋籠統套語以為用
補之地而文人學士又最易欺見有陰陽五行等說即以
為有本之學深信不疑其人亦自詡為得醫學之捷徑將
千古聖人窮思極想所製對症之方數千首皆不必問而
已稱名醫矣夫醫者欲行其道相習成風猶無足怪獨是
間居涉獵之人亦俱蹈襲此等謬說與醫者同聲合氣知
親友有病即往幫助醫者用危言拿住本家使之不得不
用溫補貴重之藥以明關切因而致死死則以為用此等
藥原未嘗云病者服之必效不過如此門第之家於理不

慎疾芻言

四

川上七

該服價錢之藥耳若已生疾又有人亦以此法斃真屬可
憫數十年前亦有涉獵醫學者頗能辨為藥性博覽經方
今乃相率而入於魔道其始起於趙養葵張景岳輩全不
知古聖製方之義私心自用著書成家彼亦不知流弊至
於此極也我知天心仁愛其轉移必不久矣

中風

中風北人多屬寒宜散寒南人多屬火宜清火而祛風消
痰則南北盡同古方白仲景侯氏黑散風引湯而外則續
命湯為主方續命湯共有數首不外馳風其隨症加減皆

有精義從未有純用溫熱滋補不放風寒痰火一毫外出
以致重病必死輕病則便之不死不生惟日服人參以破
其家而戀其命最可傷也又有稍變其說者用地黃引子
以為得陰陽兼補之法亦大謬也此方乃治少陰氣厥不
至舌瘖足痿名曰痲症乃純虛無邪有似中風與風寒痰
火之中風正相反劉河間之書可考也乃以此方治有邪
之中風其害相等余每年見中風之症不下數十人遵古
治法十愈八九服溫補之藥者百無一愈未甚服補藥者
尚可挽回其不能全愈或真不治者不過十之一二耳奈

慎疾芻言

五

川上七

何一患此症遂甘心永為廢人旁人亦視為必不起之症
醫者亦惟令多服重價之藥使之直得一死而可無遺憾
豈不怪哉願天下之中風者斷勿以可愈之身自投於必
死之地也

咳嗽

咳嗽由於風寒入肺肺為嬌藏一味誤投即能受害若用
熱地麥冬荳肉五味等滋膩酸斂之品補任外邪心手略
血失音喉癰肛瘻喘急寒熱近者半年遠者三年無有不
死蓋其服此等藥之日即其絕命之日也間有見機而停

藥者或能多延歲月我見以干計故今之吐血而成癆者大半皆因咳嗽而誤服補藥所致也或云五味子乃仲景治嗽必用之藥不知古方之用五味必合乾薑一散一收以治寒嗽之症非治風火之嗽也况加以熟地麥冬則受禍尤烈又嗽藥中多用桔梗枳梗升提甘桔湯中用之以載甘草上行治少陰之喉痛與治嗽宜清降之法非宜服者往往令人氣逆痰升不得著枕凡用藥當深知其性而屢試屢驗方可對病施治無得冒昧也

吐血

慎疾芻言

六

川人

五十年前吐血者絕少今則年多一年其症本皆可愈而多不治者藥誤之也蓋血症因傷風咳嗽而起者十之七八因虛勞優以而起者十之一二乃醫者概以熟地人參麥冬五味等滋補酸斂之藥將風火痰瘀俱收拾肺管令其咳嗽不止元氣震動津液化痰不死何待凡風寒補任必成癆病無人不如今竟無一人知之矣蓋吐血而嗽者當清肺降氣畧進補陰之品其不嗽者乃喉中之結破故血從絡出井不必服藥其甚者祇取補絡之藥以填損處自可除根即不服藥亦能自愈應試不爽乃病者進以不

慎疾芻言

藥之說則雖或而從皆後必非笑隨之進以熟地麥冬人參五味等藥則甘心就死前者死矣後者復然豈非命乎

中暑

暑字之名義與寒字相反乃天行熱毒之病也其症脈微少氣煩渴燥熱甚則手足反冷若汗出不止用人參白虎湯至之如或身熱服痛脹滿嘔吐瀉痢厥冷則名熱霍亂人參斷不可用當用香薷飲藿香正氣散至之皆治暑之正法也若傷寒論中又有寒霍亂一症此乃寒邪入陰用

慎疾芻言

七

理中湯至之此治寒霍亂之法也與暑熱之霍亂絕不相干乃後之醫書於熱霍亂門中附入寒霍亂一方名大順散用肉桂乾薑即理中湯之變法其方下亦注明治夏月傷冷飲之症其說甚明乃昏昧之人耳聞有此方竟以之治暑熱之霍亂以示奇異其死也宛轉呼號唇焦目裂七竅見血熱歸於內則手足反冷而脈微欲絕所謂熱深厥亦深也手足冷謂之厥厥者逆也乃病者醫者不知此理以為服熱藥而更冷其為陰症無疑故目覩其慘死而無所悔以後復治他人熱藥更加重矣與治暑熱病者之用四逆湯其害

正同舉世盡以為必當如此雖言不信也

痢疾

痢有數種誤治則生死立判凡脾氣不實飲食不化晝夜無度無紅白積者此為脾瀉其方不一當隨症施治若傷寒傳入陰經下利清穀脈微厥冷此為純陰之危症非參附乾薑不治患此者絕少若夫夏秋之月暑邪入腑膿血無度此名滯下全屬暑熱之毒蒸腸爛胃與陰寒之痢判若水火仲景以黃芩湯為主而因症加減此千古不易之法今乃以暑毒熱痢俱用附桂薑茸始則目赤舌焦號痛

慎疾芻言

人

欲絕其色或變如豆汁或如敗肝熱深厥深手足逆冷不知其為熱厥反信為真寒益加薑附以至胃爛腸裂哀號宛轉如受炮烙之刑而死我見甚多惟有對之流涕更有用六味湯及參耆等補藥者於人痲虛乏之人或有倖中若邪氣未清非成痲疾即至不救蓋治痢之方甚多博考古書自能窮其變化何得以不入痢症之藥每投必誤也

陰症

六淫之邪不但暑燥火屬熱即風寒濕亦變為熱經云熱病者皆傷寒之類也又云人之傷於寒也則為病熱故外

感總以散熱為治惟直中陰經之傷寒必現脈緊便青者倦臥不喜飲舌無胎種種寒象當用溫散此干不得一者也何近日之醫舉天下寒熱雜感病勢稍重者皆指為陰症即用參附薑桂服後而熱更甚並不疑為熱藥之故即用熱地麥冬等以為補陰配陽之法竟忘其為外感矣要知陰症無發熱之理間有寒極似陽而外現熱症者其內症必現種種寒象然亦當驅散其寒如麻黃附子細辛湯之類亦並無補寒之法也乃以溫熱之邪硬派作陰症而全用溫補真千古之奇聞也又有以夢洩房勞之後而

慎疾芻言

九

九〇一

得外感者為陰症更屬笑談夫邪果入陰經即無房勞等事亦屬陰症如邪不入陰經則自有本症治法與陰何干若云外邪乘虛入腎則尤當急驅腎中之邪豈可留邪燦腎又有用熱藥之後其熱勢益增忽轉而改用大寒乃是藥試病矣要知一病有一病之方豈無對病和平之藥乃始投之火即轉而投之水何也然其死也病家不咎熱藥之誤而咎寒藥之誤何也蓋人之死也必漸冷服熱藥而反冷則信以為非藥之故若服寒藥而冷則明明以藥使之冷矣故熱藥之殺人不覺而寒藥之殺人顯然所以

醫者寧可用補用熱雖死而猶可免咎也

老人

能長年者必有獨盛之處陽獨盛者當補其陰陰獨盛者當益其陽然陰盛者十之一二陽盛者十之八九而陽之大盛者不獨當補陰并宜清火以保其陰故老人無不頭熱耳聾面赤便燥現種種陽症乃醫者為老人立方不論有病無病總以補陽為上熱盛生風必生類中等病是召疾也若偶有風寒痰濕等因尤當急逐其邪蓋老年氣血不甚流利豈堪補住其邪以與氣血為難故治老人之有

慎疾芻言

十 川可七

外感者總與壯年一例或實見其有虛弱之處則用輕淡之品而量為補托若無病而調養則當審其陰陽之偏勝而損益使平蓋千年之木往往自焚陰盡火炎萬物盡然也故治老人者斷勿用辛熱之藥竭其陰氣助其亢陽使之面紅目赤氣塞痰壅脈洪膚燥當者艾之年而加以焚如本慘也

婦人

婦人懷孕胞中一點真陽日吸母血以養故陽日旺而陰日衰凡半產滑胎皆火盛陰衰不能全其形體故也近人

慎疾芻言

有胎前宜涼之說頗為近理至於產後則陰血盡脫孤陽

獨立藏腑如焚經脈如沸故仲景專以養血消瘀為主而石膏竹茹亦不禁用余每遵之無不立效及近人造為產後宜溫之邪說以薑桂為主藥夫果陰陽俱脫脈遲畏寒血水淋漓面青舌白薑桂亦有用時乃血乾火燥純現熱症亦用熱藥則經枯脈絕頃刻而斃我見以百計更有惡露未淨身熱氣塞煩燥不寐心煩腹痛皆由敗血為患亦用薑桂助其火而堅其痰重則即死轉則變成褥勞世之所謂女科名家一例如此蓋胎產乃天地生育之機絕少

慎疾芻言

十一

死症其死皆藥誤也造為此等邪說者九死不足以蔽其

小兒

小兒之疾熱與痰一端而已蓋純陽之體日抱懷中衣服加煖又襁褓之類皆用火烘內外俱熱熱則生風風火相煽乳食不歇則必生痰痰得火煉則堅如膠漆而乳仍不斷則新舊之痰日積必至脹悶啼哭又強之食乳以止其啼從此胎高氣塞目睛手搐即指為驚風其實非驚乃飽脹欲死耳此時告其父母令減衣停乳則必大暈謂虛驚

若此反令其凍餒無不唯罵醫者亦不明此理非用剛燥之藥即用參耆滋補至痰結氣凝之後則無可救療余見極多教之適其寒温停其乳食以清米飲養其胃氣稍用消痰順氣之藥調之能聽從者十愈八九其有不明此理反因爲狂言者百物一生至於痘科尤屬怪誕痘爲小見之所必不免非惡疾也當天氣温和之時死者絕少若大寒大暑其元氣虛而稠密者間有不治其始欲透發其後欲漿滿皆賴精血爲之乃未發以前即用大黃石膏數兩以遏其生發之機而敗其元氣既而即用虬蚶數十蟬蟾

慎疾芻言

十一

數個及一切大寒大毒之品如蜈蚣蝎子雞頭猪尾之類又將地不銀花等粗糲之品數兩煎汁而灌之增其毒而倒其胃此等惡物卽令醫者自服之亦必胃絕脹裂而死况孩提乎凡用此等藥者必豫決此兒死於何日十不失一其父母翻盛稱其眼力不爽熟知其卽死於彼所用之藥也或有元氣充實幸而不死者遂以爲非此等大藥不能挽回而人人傳布奉爲神方矣更可異者強壯之年醫者黃芩麥芽俱不敢用以爲剋伐孩提之子則石膏大黃成兩成斤毫不顧慮忍心害理至此而極無奈呼天搶地

以告人而人 不信也又有造爲螳螂子之說割開頤內取出血痰此法 起於明末海濱妖婦騙財之法惟蘇松二處盛行割死者 甚衆蓋小兒有痰火者吃乳數日必有一二日頤種厭食 名曰始乳用薄荷朴硝爲末搽一二次卽愈卽不治亦愈 至所割出之痰塊或大或小人因信之不知頤內空虛之 處人人有此割則復生并非病也不然何以普天下之小 兒從未有患螳螂子而死者獨蘇松有此病耶此亦一害 故并及之

外科

慎疾芻言

十三

治外症始起 欲其不大將成欲其不痛大則傷肌爛膚腐骨穿筋難於 收口痛則沖心犯胃耗血亡津惡症叢生矣故始起之時 最重圍藥束其根盤截其餘毒則頂自高而膿易成繼則 護心托毒治其內化腐提膿治其外自然轉危爲安乃始 則不能束毒使小又無護心定痛之方惟外用五灰三品 內服附桂熱毒等藥必至腐腸爛肉更輕用刀鍼割肉斷 筋以致呼號驚亂神散魂飛宛轉求死仁人之所不忍見 也况癰疽用刀大早最難生肌收口凡毒藥刀鍼只宜施 於頑肉老皮餘者自有提膿呼膿之法至於

惡肉自有消腐化水之方故能使患者絕無痛苦此功速而精神易復乃此等良法一切不問豈傳授之不真抑或別有他念也更可駭者瘡瘍之症最重忌口一切鮮毒毫不可犯無書不載乃近人反令病者專服毒物以毒攻毒夫解毒尚恐無效豈可反增其毒種種謬誤不可殫述間有患外症之人若用安穩治法全不以爲妙用毒藥刀鍼者血肉淋漓痛死復活反以爲手段高強佩服深摯而偏處薦引因知病痛生死皆有定數非人所能自主而醫者與病人以苦楚亦病者有以召之也

慎疾芻言

十四

川上

治法

凡病祇服煎藥而愈者惟外感之症爲然其餘諸症則必用丸散膏丹針灸砭鑱浸洗熨湯蒸提按摩等法因病施治乃今之醫者既乏資本又惜功夫古方不考手法無傳寫一通治煎方其技已畢而病家不辭遠涉不惜重聘亦祇求得一煎方已大滿其願古昔聖人窮思極想製造治病諸法全不一問如此而欲愈大症痼疾無是理也所以今人患輕淺之病猶有服煎藥而愈者若久病大症不過遷延歲月必無愈理也故爲醫者必廣求治法以應病者

慎疾芻言

之求至嘗用之藥一時不能節合者亦當豫爲修製以待急用所謂工欲善其事必先利其器奈何欲施救人之術而全無救人之具也

劑劑

古時權量甚輕古一兩今二錢零古一升今二合古一劑今之三服又古之醫者皆自採鮮藥如生地半夏之類其重比乾者數倍故古方雖重其實無過今之一兩左右者惟千金外臺間有重劑此乃治強實大症亦不輕用也若宋元以來每總製一劑方下必注云每服或三錢或五錢

慎疾芻言

十五

亦無過一兩外者此煎劑之法也未藥則用一錢七九藥則如桐子大者十九加至三十九試將古方細細考之有如今日二三兩至七八兩之煎劑乎皆由醫者不明古制以爲權量與今無異又自疑爲太重爲之說曰今人氣薄當略爲減輕不知已重於古方數倍矣所以藥價日貴而受害愈速也又有方中熟地用三四兩餘藥只用一二錢者亦從無此輕重懸殊之法要知藥氣入胃不過借此調和氣血非藥入口卽變爲氣血所以不在多也又有病人粒米不入反用膩隔酸苦腥臭之藥大碗濃煎灌之卽

使中病尚難運化况與病相反之藥真寒胃中即不藥死亦必灌死小兒尤甚又不論人之貧富人參總為不挑之品人情無不貪生必竭蹶措處孰知反以此而喪身其貧者送終無具妻子飄零是殺其身而并破其家也吾少時見前輩老醫必審貧富而後用藥尤見居心長厚况是時參價猶賤於今日二十倍尚如此謹慎即此等存心今人已不逮昔人遠矣

煎藥服藥法

煎藥之法各殊有先煎主藥一味後入餘藥者有先煎眾

慎疾芻言

十六

味後煎一味者有用一味煎湯以煎藥者有先分煎後併

煎者有宜多煎者

補藥

有宜少煎者

散藥

皆然有宜水多者有

宜水少者有不煎而泡漬者有煎而露一宿者有宜用猛

火者有宜用緩火者各有妙義不可移易今則不論何藥

惟知猛火多煎將芳香之氣散盡僅存濃厚之質如煎燒

酒者將糟久煮則酒氣全無矣豈能和營達衛乎須將古

人所定煎法細細推究而各當其宜則取效尤捷其屢藥

亦有益古方一劑必分三服一日服三次并有日服三次

夜服三次者蓋藥味入口即行於經絡驅邪養正性過即

已豈容間斷今人與每日服一次病久藥暫此一暴十寒

之道也又有寒熱不得其宜早暮不合其時或與飲食相

雜或服藥時節勞動冒風不惟無益反能有害至於傷寒

及外症痘症病勢一日屢變今早用一劑明晚更用一劑

中間間隔兩晝一夜經絡已傳病勢益增矣又發散之劑

必緩覆令汗出使邪從汗散若不使出汗則外邪豈能內

消此皆淺易之理醫家病家皆所宜知也又惡毒之藥不

宜輕用昔神農遍嘗諸藥而成本草故能深知其性今之

醫者於不常用之藥亦宜細辨其氣味方不至於誤用若

慎疾芻言

十七

耳聞有此藥並未一嘗又不細辨古人用法而輒以大劑

灌之病者服之苦楚萬狀并有因而死者而已亦茫然不

知其何故若能每味親嘗斷不敢冒味試人矣此亦不可

不知也

延醫

疾病為生死相關一或有誤追悔無及故延醫治病乃以

性命相托也何可不加意慎擇如無的確可信之人寧可

不服藥以待命乃世人獨忽於此惟以耳為目不考其實

學何如治效何若聞人稱說即延請施治服藥無效毫不

轉念甚而日重一日惟谷已病之難痊不咎醫者之貽誤孰知藥果中病即不能速愈必無不見效之理不但服後奏功當服時已有可徵者如熱病服涼藥寒病服熱藥之類聞其氣已馨香可愛入於口即和順安適如不中病之藥則聞其氣必厭惡入於腸必懊懣內經云臨病人問所便此真訣也今人則信任一人即至死不悔其故莫解想必冥冥之中有定數也又有與此相反者偶聽人言即求一試藥未盡劑又易一醫或一日而請數人各自立說茫無主張此時即有高明之人豈能違眾力爭以遭謗忌亦

慎疾芻言

十八

川上

推隨人唯諾而已要知病之傳變各有定期方之更換各有次第藥石亂投終歸不治二者事異而害同惟能不務虛名專求實效審察精詳見機明決庶幾不以性命為兒戲矣

秘方

古聖設立方藥專以治病凡中病而效者即為秘方並無別有奇藥也若無病而服藥久則必有偏勝之害或有氣血衰弱藉藥滋補亦必擇和平純粹之品審體氣之所偏而稍為資助如世所為秘方奇術大熱大補之劑乃昔人

慎疾芻言

所造以欺一者若其方偶與其人相合或有小效終歸害其不相合者無不傷生更有一等怪方乃富貴人賄醫所造者余曾遇一貴公子向余求長生方余應之曰公試覓一長生之人示我我乃能造長生之方若長生者無一人則天下無長生之方矣其人有愠色是時適有老醫在其家因復向老醫求得之乃傲余曰長生方某先生已與我矣公何獨吝也余視其方乃聚天下血肉溫補之藥故難其製法使耳目一新者余私謂老醫曰先生之長生方從何傳授老醫曰子無見晒子非入世行道之人耳凡富

慎疾芻言

十九

貴之人何求不得惟懼不能長生縱慾耳故每遇名醫必求此方若長生方不知何以得行其道我非有意欺彼其如欲應酬於世自不得不然耳後果得厚酬余因知天下所傳秘方皆此類也此即文成五利之餘術萬勿以為真可長生也速死則有之耳識此以醒世之求長生而覓秘方者

詭誕

醫藥為人命所關較他事尤宜敬慎今乃眩奇立異竟視為兒戲矣其糾始之人不過欲駭愚人之耳目繼而互相

四一九

效尤竟以為行道之捷徑而病家則以為名醫異人之處
在此將古人精思妙法反全然不考其弊何所底止今各
舉數端於左

人中黃 腸胃熱毒 偶有用入丸散者今人 人中白 飛淨入
煎服是以 鹿茸 麋茸 俱入丸散外症症偶入煎藥又
汁灌人矣 河車脂 帶 補腎丸藥偶用今人煎劑腥穢不堪
腸而死 大寒傷胃 前人有用一二匙治陽明熱毒 蚯蚓症
之蚌水 今人用一 屬不與今用 蜈蚣蟻蟻 桑 蝎子胡蜂
用一二條酒沖已 屬不與今用 蜈蚣蟻蟻 桑 蝎子胡蜂
三四十條大毒大 服者多死 蜈蚣蟻蟻 桑 蝎子胡蜂
皆極毒之物用者多 石決明 眼科磨光鹽水煮入末藥今
死間有不死者幸耳 亦以此法入一切煎劑何義

慎疾芻言

二十

白螺殼 此散濕修 藥亦入 雞子黃 此少陰不寐引經
煎劑其味 何在 海參淡菜鹿筋丑 筋魚肚鹿尾 皆食品不入藥劑必須洗
可入口今與熟地 麥冬 醋炒半夏醋煨楮石麻油炒半夏
附桂同煎則腥臭 欲嘔 醋炒半夏醋煨楮石麻油炒半夏
皆能傷肺令 橘白 橘內筋荷葉邊枇杷核查核扁豆殼 皆
人所棄今偏 更有宜炒者反用生宜切者反用團圓此類
取之以示異 不可枚舉以上各種其性之和平者服之雖無大害亦有
小損至諸不常用及腥毒之物病家皆不能泡製必至臭
穢惡劣試使立方之人取而自嘗之亦必伸舌攢眉嘔吐
噦送入腹之後必至脹痛齋亂求死不得然後深悔從前

服我藥之人不知如何能耐此苦楚恨嘗之不早枉令人
受此荼毒也抑思人之求治不過欲全其命耳若以從未
經駁之方任意試之服後又不考其人之生死而屢用之
則終身無改悔之日矣嗟乎死者已矣孰知其父母妻子
之悲號慘戚有令人不忍見者乎念及此能不痛書考古
以求萬穩萬全之注者非人情也以上所指皆近時之弊
若後世此風漸改必不信世間有如此醫法反以我言為
太過者豈知並無一語虛妄者乎又有疑我為專用寒涼
攻伐者不知此乃為慣用溫補者戒非謂溫補概不可用

慎疾芻言

二十一

川上

也願世之為醫者真誠敬慎勿用非法之方世之求治者
明察知幾勿服怪誕之藥則兩得之矣

宗傳

一切道術必有本源未有目不睹漢唐以前之書徒記時
尚之藥數種而可為醫者今將學醫必讀之書并讀法開
列於主果能專心體察則胸有定見然後將後世之書備
觀博覽自能辨其是非取其長而去其短矣

靈樞經 此明經絡臟腑之所以生成疾病之所由傳
針灸家不可不詳考方脈家略明大義可也

素問 此明受病之源及治病之法千變萬化無能出其

紀剛如不能全讀擇其精要切實者孰記可也

傷寒論 此一切外感之總訣非獨治傷寒也明於此則

六淫之病無不通貫矣

金匱 此一切雜病之祖方其諸大症已無不備能通其

理天下無難治之病矣

神農本草 神農本草經止三百六十種自陶宏景以後

藥味日增川法益廣至明李時珍綱目而大備其書

以本經為主而以諸家之說附之讀者字字考驗則

慎疾芻言

三十二

川〇八

能知古人製方之妙義而用之不窮矣

外台秘要

千金方 二書滙集唐以前之經方秘方及婦科兒科外

科無所不備博大精深必明乎靈素仲景之書方能

知所審擇不至泛濫而無所適從矣

婦科

兒科 婦人除經帶胎產之外與男子同小兒除驚癇疳

痘而外與老壯同所以古人竝無專科後人不能通

貫醫理只習經產驚痘等方藥乃有專科若讀前所

慎疾芻言

列之書均已無所不能更取後世所著婦人良方幼

幼新書亦參觀可也

外科 其方亦具千金外台後世方愈多而法愈備如寶

氏全書湯科選擇俱可採取惟惡毒之藥及輕用刀

鍼斷宜切戒

御纂醫宗金鑑 源本靈素推崇傷寒論金匱要略以為

宗旨後乃博採衆論嚴其去取不倚新奇不無偏

執又雜科不備真能闡明聖學垂訓後人足徵

聖朝仁民之術無所不周習醫者即不能全讀古書祇

慎疾芻言

三十三

川〇八

研究此書足以名世何乃不此崇信而反從事於此

世杜撰無稽之說也

四二二



乾隆壬子歲新鐫

唐笠山纂輯

醫道集

吳醫彙講

凡屬醫門佳話發前人所未發者哀集成編諸同學
如有高論並望光增 附各書校訛 傷寒辨症歌
週身經絡總訣

吳醫彙講 序

余薄官江蘇以來凡署中卷
屬等有疾即延笠山唐君診
治无不應手而愈今將三十載
不第識其醫理之精深且重
其為人之謹慎也茲手輯吳醫
彙講一編請序於余之披閱其書

乃廣搜博採扶擇精詳以補前
人所未發以啓後人所未悟
之一言益奏萬下疾徐同聲相
應至特磬一擊而金石絲竹秩
然不紊是真可謂醫門之鼓吹
矣夫以文會友聖人之所訓又

講之義大矣猶夫軒皇講自遠古而造化之秘洩步沙講於炎劉而湯液之用廣先聖後聖系合符節他如活人海辛慈祇和濟溫中河間濟源解東垣濟升降丹溪講兩腎子和濟三

序

五

法隱菴令韶之派濟止氣中行
忘已之儔濟三綱講溫補者景岳講秋燥在嘉言吳又可濟疫汪苓友講心此數子在傍牆壁獨抒心得於餘百家之說或伐異而黨同或直收而博採要其

所攷、疏、者莫非講此而版靈蘭之與以期之壽世而濁時溥曰學書費紙學醫費人操司命之責何如其鄭重耶夫依古以來盜意為走捷徑未始非名士也鴛黨援工口給未始非名

序

三

醫也然而有實學斯且實用焉吳久獻之邦明理之彥林立唐君笠山於著述之餘患羅而致之擇其言之雅馴在裏絃成集顏曰吳醫彙海而授之梓鈔以千金之裘非一狐之腋

甚至榭之檉此一木之枝其愛博
而於懷、於學之誨真無愧古
人之用心矣推是心也與夫士之
通經致用為蒼生福者又何以
異哉故樂綴言以弁其首

乾隆五十有七年歲次壬子桂月

序

四

吳趨繆遵義識 時年八十有三



司馬溫公曰達則為良相不達則
為良醫蓋以殫其利濟之心窮
通一也夫坐而言然後能起而
行士當十年待字讀聖賢書
誦天下事於經天緯地之業必
誦明而切究之夫乃可寄以大

序

十一

任而不疑醫之為道也於舉夫
天地人之理百運六氣之驗經
絡府俞之次八脉九候十二經
之分莫不備之素而編之詳夫
乃可托以死生而不惑是故大易
著彖習之文傳記有誦法之編

善論古孟子言之之儒者如斯
 醫者宜然軒岐作者之聖也猶
 聚君臣於一堂而相為辯難儒
 者之業是術者可不有奇共
 賞為疑與折乎今望山為醫
 林秉鐸領袖群英彙訂成
 集俾斯道之精微研窮益
 廣歐陽文忠有曰物常聚
 於所好信不誣也吾知風教
 鼓舞當必有遠方之士無
 感而來者正未有艾也豈
 止吳醫而已哉

乾隆癸丑仲春桂林蔣棟書
 於鴻城官舍



序

三

自序

粵稽炎暉紀物首垂本草之經雲瑞名官肇
啟靈蘭之笈宗傳歷代各立家言派衍迄今
尤工蒐錄篁南江氏有類案之編東逸羅君
有彙粹之選惟淵源之有自斯繼述之多人
矧吾吳文獻之邦迺良醫薈萃之域韓門昆
季擅盧扁之稱葛氏喬梓紹張劉之學新甫
啟東廿子前朝之著述已繁生洲路玉諸公

自序

聖代之闡揚亦夥應機草識元儀臨證之慎重讀
書記知在淫學業之深沉凡此各自成書出
自諸家見地康熙時有過君繹之者哀集衆
賢治案合鑲為書名曰吳中醫案此又片善
悉錄一藝必庸旁搜博採而成者也夫廣羅
成效固以誌鄉先輩之典型而各抒論言亦
以徵諸君子之詣力况乎精是業者高才不
少明其理者卓識自多匪采韜光非乏枕中

之秘靈機妙緒詎鮮囊底之珍凡屬蘊藏可
勝惋惜僕謹倣吳中醫案之舊帙更輯吳醫
彙講之新編與義顯詞統為求教長篇短節
並曰無拘苟步武之克追期當仁之不讓乃
荷同志弗靳輝光共表深思互相賞析或疏
往訓既發覆而摘微或出心裁尤領新而標
異詮玉版之秘要欣符麗澤之占索金匱之
真言胥協盍簪之慶勿謂禁方三十獨推思

自序

邈得其奇須知肘後四編不惟抱朴窮其蘊
縱釀花為蜜未免書癖之譏而集腋成裘堪
補藝林之闕
乾隆壬子仲秋長洲唐大烈立三氏書於問
心草堂



凡例

一是集凡屬醫門佳話發前人所未發可以益人學問者不拘內外女幼各科無不輯入其有人云亦云者舊籍已繁茲不復贅

一諸公所著各於條論之前分列姓字下註諱號爵里如先世所遺舊稿并註生年卒歲及令嗣某付梓畧仿小傳之意也又各分版頁不相連屬以便續增

吳醫彙講 凡例

一凡高論賜光隨到隨鐫不分門類不限卷數不以年齒次先後亦不以先後寓軒輊以冀日增月益可成大觀或尊居遠隔並不妨郵寄寒廬併登梨棗

一各人之趨向不同集衆說以成書不免或有互異若存此而去彼竊恐印定人眼目非所以云講也苟能各通一理不妨兩說並採惟在閱者之取舍亦擴充學問之一道也

一是集係聚諸同學各抒心得析疑賞奇不襲老生恒談惟其中有泛閱之似乎陳言而味其立意處

必有幾句獨開生面之語不過從頭敘述不得不引舊書之言以為襯幸勿以勦襲目之

一集中諸作或有文辭典雅者亦有簡直隨俗者要惟各適其宜取其達意而已矣文固可諷質亦可傳

一凡新書一出坊間每即翻刻雖云必究然而此弊久延矣今余是集係就先見教者先為付梓現在廣以奉徵正無已時即余拙撰積稿頗繁現因卷帙不勻故亦先刻幾條俟諸同學陸續賜教余亦

吳醫彙講 凡例

漸次補鐫非止限此幾卷便為完書也購閱者須認本堂原板乃得卷以日增若夫翻刻之本焉能隨補隨翻決非全集願諸公辨之

笠山謹識

吳醫彙講卷一目錄

王雲林

禱告藥王普疏

葉天士

溫證論治 計二十則

陳獻傳

人身一小天地論

顧雨田

書方宜人共識論

吳醫彙講 卷十目錄

吳醫彙講卷一

長洲唐大烈立三氏纂輯

門人沈文燮王調氏校訂

王雲林

諱家瓚號絨齋贈翰林郎徐州府學教授年六十六歲歿於康熙庚寅此篇係令曾孫繩林授梓繩林名丙號樸莊吳縣恩貢生世居包衙前

禱告藥皇普疏

康熙三十一年壬申長至日王家瓚謹以清香禱告於藥皇曰竊聞詩云上帝臨汝無貳爾心書曰作善降之百祥作不善降之百殃又曰惠迪吉從逆凶惟

吳醫彙講

卷一

影響此列聖所垂之明訓也微氓如家瓚生既不辰命復多舛蓋自先祖母五十餘年撫孤植節一縷單傳以迄於今吾父衰齡望八吾母見背兩弟繼歿俱無嗣息瓚所生兒女六人亦皆以痘殤孤危至此無日不返躬自責也惟此瘍醫世業謹守家傳凡見諸苦惱無論貧富先懷悲憫耿耿此心惟天可表第自揣以褊淺之見識荷司命之擔當任大責重豈盡無訛清夜深思愈增憂懼幸而歲戊辰竟得子巳巳冬出痘矣庚午又得子今冬又出痘矣家瓚向天稽首

未由報答鴻麻誠恐遷善不力惡將蝟集舜蹠之分
 間不容髮敢矢誓願為承先裕後之基址其首重者
 忍辱安貧畢生兢守誓不趨時夸耀或遇瀕危之症
 悉心療治誓不惜名忍置或遇輕淺之疾即時安慰
 誓不張皇顯功或病果疑難學識未到必詳審以待
 高明誓不耽延貽誤或遇富厚之家誓不倖災攬利
 或遇貧困之人隨力救援誓不市恩而沾譽或遇當
 道指紳隨緣調治誓不媚諛以玷祖先嗟乎人命至
 重真報難逃執一得以誤人昧良心而罔利均弗為

吳醫彙講

卷一

二

不敢妄祈不勝戰慄投誠之至
 丙午之秋東作陰陽文頌言畢復命兒輩於祖筆
 一卷中檢先大父緘齋公禱告藥皇誓疏底稿讀
 之怦怦心動嗚呼以慈悲為命脈以神明為監史
 以忍辱為安貧之極致以種德為詒謀之首務苟
 非深明於天人相與之微有能如是之憂勤惕厲
 者乎東老矣幸食舊德以迄於今綿及曾元識字
 讀書皆先人之賜也謹錄一通俾兒孫朝夕觀省
 相與動心忍性温温惓惓無忝所生是則予小子
 之責也夫孫代百拜謹識時年七十有三

吳醫彙講

卷一

三

此篇誓疏雖非講學之文然惟有此實心斯有實
 學則是此心亦吾醫所宜亟講也雲林先生之後
 迄今五世矣不僅良醫代出抑且書香相繼安知
 非此存心之報哉當弁卷首以誌我儕講學之一
 證大烈識

之若知之而自犯之是自絕於天也設家瓚世味擾
 心初終易轍陽譴陰誅交加不悔神祇在上其明鑒
 之惟是力有所不逮情有所不忍目擊貧病無告煙
 火不繼之家每有不堪之慘徹底躊躇點金乏術今
 擬於薪水布袍之外量為留餘製諸藥餌為救療貧
 病之萬一猶以母靈暴露力不從心然一安慈魄此
 事亦誓必為之也所仰祈者老父壽而康寧優游晚
 景二子克自振立以延列祖書香以報張太君之苦
 節則臣願足矣若夫一身之榮辱則家贊命相已定

一書 1022 丹 庚 參 日 庚 全 書 第 7 卷 三 下

葉天士

名桂號香巖世居閩門外下塘所著溫證論治二十則乃先生遊於洞庭山門人顧景文隨之舟中以當時所語信筆錄記一時未加修飾是以辭多結屈語亦稍亂讀者不免晦目烈不揣冒昧竊以語句少為條達前後少為移掇惟使晦者明之至先生立論之要旨未敢稍更一字也

溫證論治

溫邪上受首先犯肺逆傳心胞肺主氣屬衛心主血屬營辨營衛氣血雖與傷寒同若論治法則與傷寒大異蓋傷寒之邪留戀在表然後化熱入裏溫邪則化熱最速未傳心胞邪尚在肺肺合皮毛而主氣故

吳醫彙講

卷一

四

云在表初用辛涼輕劑挾風加薄荷牛蒡之屬挾濕加蘆根滑石之流或透風於熱外或滲濕於熱下不與熱相搏勢必孤矣不爾風挾溫熱而燥生清散必乾謂水主之氣不能上榮兩陽相劫也濕與溫合蒸鬱而蒙痺於上清竅為之壅塞濁邪害清也其病有類傷寒驗之之法傷寒多有變症溫熱雖久總在一經為辨

前言辛涼散風甘淡驅濕若病仍不解是漸欲入營也營分受熱則血液受劫心神不安夜甚無寐或斑

點隱隱即撤去氣藥如從風熱陷入者用犀角竹葉

之屬如從濕熱陷入者用犀角花露之品參入涼血清熱方中若加煩躁大便不通金汁亦可加入老年及平素有寒者以人中黃代之急速透斑為要若斑出熱不解者胃津亡也主以甘寒重則玉女煎輕則梨皮蔗漿之類或其人腎水素虧病雖未及下焦每多先自徬徨此必驗之於舌如甘寒之中加入鹹寒務在先安未受邪之地恐其陷入耳若其邪始終在氣分流連者可冀其戰汗透邪法宜益胃令邪與汗

吳醫彙講

卷一

五

併熱達滕開邪從汗出解後胃氣空虛當膚冷一晝夜待氣還自溫暖如常矣蓋戰汗而解邪退正虛陽從汗泄故漸膚冷未必即成脫症此時宜安舒靜臥以養陽氣來復旁人切勿驚惶頻頻呼喚擾其元氣但診其脈若虛軟和緩雖倦臥不語汗出膚冷却非脫症若脈急疾躁擾不臥膚冷汗出便為氣脫之症矣更有邪盛正虛不能一戰而解停一二日再戰汗而愈者不可不知

再論氣病有不傳血分而邪留三焦猶之傷寒中少

陽病也彼則和解表裏之牛此則分消上下之勢隨
 症變法如近時杏朴苓等類或如溫膽湯之走泄因
 其仍在氣分猶有戰汗之門戶轉滯之機括也夫凡
 看法衛之後方言氣營之後方言血在衛汗之可也
 到氣纔宜情氣乍入營分猶可透熱仍轉氣分而解
 如犀角元參羚羊等物是也至入於血則恐耗血動
 血直須涼血散血如生地丹皮阿膠赤芍等物是也
 若不循緩急之法慮其動手便錯耳且吾吳濕邪害
 人最多如面色白者須要顧其陽氣濕勝則陽微也
 吳醫彙講 卷一 六
 如法應清涼用到十分之六七即不可過涼蓋恐濕
 熱一去陽亦衰微也面色蒼者須要顧其津液清涼
 到十分之六七往往熱滅身寒者不可便云虛寒而
 投補劑恐爐煙雖熄灰中有火也須細察精詳方少
 少與之慎不可漫然而進也又有酒客裏濕素盛外
 邪入裏與之相搏在陽旺之軀胃濕極多在陰盛之
 體脾濕亦不少然其化熱則一熱病救陰猶易通陽
 最難救陰不在補血而在養津與劑汗通陽不在溫
 而在利小便較之雜症有不同也

再論三焦不從外解必致裏結裏結於何在陽明胃
 與腸也亦須用下法不可以氣血之分謂其不可下
 也惟傷寒熱邪在裏劫燥津液下之宜猛此多濕邪
 內搏下之宜輕傷寒大便溏為邪已盡不可再下濕
 濕病大便溏為邪未盡必大便硬乃為無濕始不可
 再攻也再人之體脘在腹上其位居中按之痛或自
 痛或痞脹當用苦泄以其入腹近也必驗之於舌或
 黃或濁可與小陷胸湯或瀉心湯隨症治之若白不
 燥或黃白相兼或灰白不渴慎不可亂投苦泄其中
 吳醫彙講 卷一 七
 有外邪未解裏先結者或邪鬱未伸或素屬中冷者
 雖有脘中痞痛宜從開泄宜通氣滯以達歸於肺如
 近世之杏蔻橘桔等輕苦微辛具流動之品可耳又
 有舌上白苔粘膩吐出濁厚涎沫者其口必甜此為
 脾痺乃濕熱氣聚與穀氣相搏土有餘也盈滿則上
 泛當用佩蘭葉芳香辛散以逐之若舌上苔如礮者
 胃中宿滯挾濁穢鬱伏當急急開泄否則閉結中焦
 不能從募原達出矣
 再舌胎白厚而乾燥者此胃燥氣傷也滋潤藥中加

甘草令甘守津還之意舌白而薄者外感風寒也當
疎散之若薄白而乾者肺液傷也加麥冬花露蘆根
汁等輕清之品爲上者上之也若苔白而底絳者濕
遊熱伏也當先泄濕透熱防其卽乾也此可勿憂再
從裏而透於外則變潤矣初病舌卽乾神不昏者宜
急養正微加透邪之藥若神已昏此內匱不可救藥
矣

前云舌黃或濁常用陷胸瀉心須要有地之黃若光
滑者乃無形濕熱已有中虛之象大忌前法其臍以
吳醫彙講

卷十

八

上爲大腹或滿或脹或痛此必邪已入裏表症必無
或存十之一二亦須驗之於舌或黃甚或如沉香色
或如灰黃色或老黃色或中有斷紋皆當下之如小
承氣湯用檳榔青皮枳實元明粉生首烏等皆可若
未現此等舌不宜用此等藥恐其中有濕聚大陰爲
滿或寒濕錯雜爲痛或氣壅爲脹又當以別法治之
矣
再黃胎不甚厚而滑者熱未傷津猶可清熱透表若
雖薄而乾者邪雖去而津受傷也苦重之藥當禁宜

甘寒輕劑養之

再論其熱傳營舌色必絳絳深紅色也初傳絳色中
兼黃白色此氣分之邪未盡也泄衛透營兩和可也
純絳鮮澤者胞絡受邪也宜犀角鮮生地連翹鬱金
石膏蒲等清泄之延之數日或平素心虛有痰外熱
一陷裏絡卽閉非菖蒲鬱金等所能開須用牛黃九
至寶丹之類以開其閉恐其昏厥爲瘥也

再論舌絳而乾燥者火邪劫營涼血清血爲要色絳
而舌心乾者乃心胃火燔劫燥津液卽黃連石膏亦
吳醫彙講

卷十

九

可加入其有舌心獨絳而乾者亦胃熱而心營受灼
也當於清胃方中加入清心之品否則延及於火爲
津乾火盛之候矣舌尖獨絳而乾此心火上炎用導
赤散瀉其腑若煩渴煩熱舌心乾四邊色紅中心或
黃或白者此非血分也乃上焦氣熱燥津急用涼膈
散散其無形之熱再看其後轉變可也慎勿用血藥
反致滋膩留邪至舌絳望之若乾手捫之原有津液
此津虧濕熱薰蒸將成濁痰蒙閉心胞也舌色絳而
上有粘膩似苔非苔者中挾穢濁之氣急加芳香逐

之舌絳而抵齒難伸出口者。痰阻舌根。有內風也。舌絳而光亮。胃陰亡也。急用甘涼濡潤之品。舌絳而有碎點黃白者。將生疔也。大紅點者。熱毒乘心也。用黃連金汁。其有雖絳而不鮮。乾枯而痿者。此腎陰涸也。急以阿膠雞子黃地黃天冬等救之。緩則恐涸極而無救也。

十。

再有熱傳營血。其人素有瘀傷宿血。在胸膈中。舌色必紫而暗。捫之潮濕。當加散血之品。如琥珀丹參桃仁丹皮等。否則瘀血與熱相搏。阻遏正氣。遂變如狂。

吳醫彙講 卷十

發狂之症。若紫而腫大者。乃酒毒衝心。紫而乾晦者。腎肝色泛也。難治。

十一。

舌苔淡紅無色。或乾而色不榮者。乃是胃津傷而氣無化液也。當用炙甘草湯。不可用寒涼藥。

十二。

再有不拘何色。舌生芒刺者。皆是上焦熱極也。當用青布拭冷薄荷水。揩之即去者。輕旋即生者。險矣。

十三。

舌苔不燥。自覺悶極者。屬脾濕盛也。或有傷痕血跡者。必問曾經搔挖否。不可以有血而便為枯症。仍從濕治可也。再有神情清爽。舌脹大不能出口者。此脾

五。

濕胃熱鬱極化風而毒延於口也。用大黃磨入當用劑內。則舌脹自消矣。

舌無苔而有如煙煤隱隱者。慎不可忽視。如口渴煩熱而燥者。平時胃燥也。不可攻之。宜甘寒益胃。若不渴肢寒而潤者。乃挾陰病。宜甘溫扶中。此何以故。外露而裏無也。

六。

舌黑而滑者。水來尅火。為陰症。當溫之。若見短縮。此腎氣竭也。為難治。惟加入參五味子。或救萬一舌黑而乾者。津枯火熾。急急瀉南補北。若黑燥而中心厚。

吳醫彙講 卷十

者。土燥水竭。急以鹹苦下之。

七。

若舌白如粉而滑。四邊色紫絳者。溫疫病初入募原。未歸胃腑。急急透解。莫待傳入。而為險惡之症。且見此舌者。病必見凶。須要小心。凡癰疹初見。須用紙燃

照看胸背兩脇。點大而在皮膚之上者。為斑。或雲頭

隱隱。或瑣碎小粒者。為疹。又宜見而不宜多見。按方

書謂。斑色紅者。屬胃熱。紫者。熱極。黑者。胃爛。然亦必

看外症所合。方可斷之。春夏之間。濕病俱發。癰疹為甚。如淡紅色。四肢清。口不甚渴。脈不洪數。此非虛斑。

前屬陰斑。或胸前微見數點。面赤足冷。或下利清穀。此陰盛格陽於上。當溫之。若斑色紫而點小者。心胞熱也。點大而紫。胃中熱也。斑黑而光亮者。熱毒極熾。雖屬不治。然其人氣血充者。依法治之。或有可救。若黑而晦者。必死。黑而隱隱。四旁赤色者。乃火鬱內伏。大用清涼透發。間有轉紅。而可救者。又有夾斑帶疹。皆是邪之不一。各隨其部而泄。然斑屬血者恆多。疹屬氣者不少。斑疹皆是邪氣外露之象。發出之時。宜神情清爽。方為外解裏和。如斑疹出而昏者。此正不

吳醫彙講

卷一

十一

勝邪。而內陷。或胃津內涸之候矣。

再有一種白痞。小粒如水晶色者。此濕熱傷肺。邪雖出而氣液枯也。必得甘藥補之。若未至久延。氣液尚在。未傷。乃為濕鬱衛分。汗出不徹之故。當理氣分之邪。枯白如骨者。多凶。氣液竭也。

再溫熱之病。看舌之後。亦須驗齒。齒為腎之餘。齦為胃之絡。熱邪不燥。胃津必耗。腎液且二經之血。走於此處。病深動血。結瓣於上。陽血色紫。紫如乾漆。陰血色黃。黃如醬瓣。陽血若見。安胃為主。陰血若見。救腎

十

九

為要。然豆瓣色者。多險。惟症尚不逆者。猶可治。否則難治矣。此何故耶。蓋陰下竭。陽上厥也。齒若光燥如石者。胃熱甚也。證見無汗惡寒。衛偏勝也。辛涼泄衛。透汗為要。若如枯骨色者。腎液枯也。為難治。若上半截潤。水不上承。而心火上炎也。急急清心救水。俟枯處轉潤。為妥。若咬牙齧齒者。濕熱化風。痙病但咬牙者。胃熱氣走其絡也。咬牙而脈症皆衰者。胃虛無穀。以內榮也。此何以故。虛則喜實也。舌本不縮而硬。牙關咬定難開者。此非風痰阻絡。即欲作

吳醫彙講

卷一

十二

痙症。用酸物擦之。即開。酸走筋。木來泄土故也。

若齒垢如灰糕樣者。胃氣無權。津亡而濕濁用事。多死。初病齒縫流清血。痛者為胃火衝激。不痛者為龍火內燔。齒焦無垢者死。齒焦有垢者。腎熱胃劫也。當微下之。或玉女煎清胃救腎可也。

再婦人病溫。與男子同。但多胎前產後。以及經水適來。適斷。大凡胎前病。古人皆以四物加減用之。謂恐邪來害妊也。如熱極者。有用井底泥及藍布浸冷覆蓋腹上等。皆是護胎之意。然亦須看其邪之可解而

用之。如血脈之藥不靈。又當審察。不可固執。仍宜步
 步保護胎元。恐正損邪陷也。至於產後。方書謂慎用
 苦寒。恐傷已亡之陰也。然亦要辨其邪能從上中解
 者。稍從症用之。亦無妨也。不過勿犯下焦。且屬虛體。
 當如虛怯人病邪而治。況產後當血氣沸騰之際。最
 多空竇。邪必乘虛內陷。虛處受邪。為難治也。如經水
 適來適斷。邪將陷於血室。少陽傷寒。言之詳悉。不必
 多贅。但數動與正傷寒不同。仲景立小柴胡湯。提出
 所陷熱邪。參朮以扶胃氣。因衝脈隸屬陽明也。此惟
 吳醫彙考 卷一 南

虛者為合治。若熱邪陷入。與血相結者。當宗陶氏小
 柴胡湯。去參朮。加生地。桃仁。查肉。丹皮。或犀角等。若
 本經血結自甚。必少腹滿痛。輕者刺期門。重者小柴
 胡湯。去甘藥。加延胡。歸尾。桃仁。挾寒加肉桂。心氣滯
 加香附。陳皮。枳殼等。然熱陷血室之症。多有謔語如
 狂之象。與陽明胃熱相似。此種病機。最須辨別。血結
 者。身體必重。非若陽明之輕便者。何以故耶。陰主重
 濁。絡脈被阻。身之側旁氣痺。連及胸背。皆為阻室。故
 去邪通絡。正合其病。往往延久。上逆心胞。胸中疝痛。

即陶氏所謂血結胸也。王海藏出一桂枝紅花湯。加
 海蛤。桃仁。原欲表裏上下一齊盡解之理。此方大有
 巧妙焉。

吳醫彙考

卷一

五

陳獻傳

名嘉琛號絨齋長
庠生住虎邱山塘

人身一小天地論

造化一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也無極之前陰含陽也有象之後陰分陽也陰為陽母陽為陰父陽生於子極於巳而一陰來姤陰生於午極於亥而一陽來復震為長男屬火火生於寅胞胎在巳巽為長女屬水水生於申胞胎在亥巳亥為天地之門戶陰陽之根本也人稟健順之德以生五行之氣隱於五臟見於六腑呼吸即陰陽運輸也津液即雨露灌溉也光澤即花木榮繁也耳目即日月晦明也

吳醫彙講

卷一

素

人身一小天地信哉善觀脈者知陰則知陽知陽則知陰可以心察可以指別可以類求可以意會可以萬全至道淵微莫逾於此順而調之真氣乃安邪氣乃正反之則病實則氣入虛則氣出氣實則熱氣虛則寒治之若何溫涼各隨其候補瀉各有其宜無虛虛無實實無太過無不及上應天光星辰象緯下副四時五行貴賤以明三部九候以察八正八風陰陽升降配天象地之說是在神悟靈機心識微妙者矣

顧雨田

名文燠號西疇國
學生世居南城下

書方宜人共識說

國家徵賦單曰易知良將用兵法云貴速我儕之治病亦然嘗見一醫方開小草市人不知為遠志之苗而用甘草之細小者又有一醫方開蜀漆市人不知為常山之苗而令加乾漆者凡此之類如寫玉竹為萎蕤乳香為薰陸天麻為獨搖草人乳為蟠桃酒鴿糞為左蟠龍龍心土為伏龍肝者不勝枚舉但方書原有古名而取用宜乎通俗若圖立異矜奇致人眼

吳醫彙講

卷一

素

生不解危急之際保無誤事又有醫人工於草書者醫案人或不識所係尚無輕重至於藥名則藥舖中人豈能盡識草書乎孟浪者約畧撮之而貽誤小心者往返詢問而羈延可否相約同人凡書方案字期清爽藥期共曉再如藥引中生薑常寫幾片燈心常寫幾根竹葉橘葉常寫幾瓣蔥管荷梗常寫幾寸余謂片有厚薄根有短長瓣有大小寸有麤細諸如此類皆須以分兩為準又煎藥宜囑病家各藥各罐勿與他人共用恐彼煎攻冠此煎補益彼煎寒涼此煎

溫熱譬如酒壺泡茶雖不醉人難免酒氣此說偶見於願體集中竊以為先得我心故亦摘而贅之

吳醫彙講

卷一

六

吳醫彙講卷二目錄

薛生白

日講雜記 計八則

唐立三

金匱上工治未病一節辯

辯金匱榮衛之譌

二陽之病發心脾解

維脈為病論治

張劉李朱後當以薛張吳喻配為八大家論

吳醫彙講 卷二目錄

醫宜博覽論

讀傷寒補天石貫珠集二書合記

妊娠陰脈小弱論

讀書十則 有小序

讀書須看反面

讀書須看對面

讀書須識正旨

讀書必須彙參

讀書須立主見

讀書必須隅反

讀書須善比例

讀書須別錯處

讀書須汰衍說

讀書須辨訛字

餘稿頗繁分卷續鐫

吳醫彙講

卷二目錄

吳醫彙講卷二

長洲唐大烈立三氏纂輯

門人王 濤文海氏校訂

薛生白

名雪號一瓢兩徵鴻博不就所著詩文甚富又精於醫與葉天士先生齊名然二公各有心得而不相下先生不居以醫自見故無成書年九十而歿此自講雜紀今令曾孫東來所述東來名啓潛字應枚在緝蓮巷即承祖業

在易先天圖三在上在南後天圖三在下在西北與內經之旨正合體用互呈生成供著人身一小天地豈不信哉繫辭釋先天圖圖云數往者順知來者逆

吳醫彙講

卷二

一

數往者順即後天之用五行相生之謂內經人壽可得百年之說也知來者逆即反五行之相尅者為相生軒岐治病之秘旨也從後天圖經逆到先天圖位便是金丹大道撥簇五行作用余嘗言人須到得半個神仙身分方當得起名醫二字實非浪語凡大疫之年多有難識之症醫者絕無把握方藥雜投天枉不少要得其總訣當就三年中司天在泉推氣候之相垂者在何處再合本年之司天在泉求之以此用藥雖不中不遠矣

謂素問耳兼心腎與靈樞合看則又兼肺可見每竅皆兼五行如天地之互相入者

喻江西才宏筆肆專以大言欺人惟論溫則自呈敗

缺不少人不知其牽混也溫瘟二症絕無界限使後

學亦往往混讀而不甚分明余故於此三致意焉

長沙夫子用阿膠何曾云炒後人盡蛇添足耳阿膠

之用專為濟水伏流也炒之濟水何在哉

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒表之熱寒之用裏之

寒熱之體言熱病本於寒寒既病而為熱矣則體用

皆熱也漢之文法如此

婦人手少陰脈動甚者妊子也陰搏陽別謂之有子

手少陰脈盛是宜妊子之象及并之子亦有之者過

此不得亢極為病比比然也若陰搏陽別已有子也

一句虛看一句實看方是女子尺脈常盛寸脈常虛

此言陽別者猶云與平日之脈有別至是而寸脈亦

覺洪滑故云少陰脈動甚者妊子也

內經夢事雖分臟腑陰陽大要總繫心肝兩臟為主

何也未有神魂靜而夢寐顛倒者也

唐立三 名大烈號笠山一號林燈長庠生

金匱上工治未病一節辨

此節諸家註釋皆隨文敷衍惟尤在涇以酸入肝以

下十五句謂疑非仲景原文後人謬添註脚編書者

誤收之也細按語意見肝之病以下是答上工治未

病之辭補用酸三句乃別出肝虛正治之法觀下文

肝虛則用此法實則不在用之意可見矣烈謂在涇

所云註脚之說可稱千古隻眼惟是此節專為治未

病而設補用酸三句非皆肝虛之治兼出實脾之法

吳醫彙講 卷之二

蓋言肝若虛者用酸補之若實者用焦苦補火以助

土甘味直益其土也酸入肝三句與上三句針對尚

可為上三句申明其義可毋謂之謬註脾能傷腎以

下十二句無論補脾以傷腎縱火以燦金然後使肝

無伐獲益者少受傷者反多已屬不經且於治法亦

隔四臟迂迴極矣更脾得補而生肺金來尅木僅隔

二臟脾土勝而尅水少於涵木亦隔二臟忘其近者

而以迂遠之說強為穿鑿謬註顯然况凡臟病惟虛

者受之而實者不受臟邪惟實者傳仇而虛者不傳

故治肝虛者直補其肝以禦外侮治肝實者先實脾
士以防滋蔓此正治也肝虛則用此法實則不在用
之二句愚見亦以為謬註刪此十四句則下文虛虛
實實等句一氣貫穿矣

辨金匱榮飪之譌

金匱第十三節清邪中上濁邪中下大邪中表小邪
中裏之下魏栢鄉諸本作榮飪之邪徐忠可諸本作
榮飪之邪醫以榮字讀作穀字者居多以致金匱心
典竟作穀飪之邪矣蓋因梅誕生字彙無此榮字而

吳醫彙講

卷二

四

飪字註云麴屬故誤以穀字配之而為難化之物
也考康熙字典榮字註云讀與馨同即以金匱榮飪
之邪句實之按飪為烹調生熟之節則此句當作馨
香可口過食之而停滯應讀馨音飪為是以榮讀穀
以飪作飪及竟作穀飪者皆非也

二陽之病發心脾解

二陽者足陽明胃手陽明大腸也其病發於心脾蓋
因思為脾志而實本於心其始也有不得於隱曲之
事於是思則氣結鬱而為火以致心營暗耗既不能

下交於腎脾土鬱結又轉而尅腎是以男子少精女
子不月無非腎燥而血液乾枯也且夫脾有鬱火則
表裏相傳胃津亦涸大腸為胃之傳道故併大腸而
亦病也此二陽之病當以燥火之證言在胃則為消
為格在腸則為閉為鞭至於胃腑既燥而脾無以行
其津液則為風消風消者火甚而生風脾憊而肌肉
消削也大腸之燥傳入於肺則為息奔息奔者息有
音而上奔不下也四臟二腑交相燔灼陰液盡耗故
直斷為死不治昔王安道以腸胃有病延及心脾顛

吳醫彙講

卷二

五

倒其說於不得隱曲之故闕而未詳喻嘉言闡發稍
明亦但言其所當然而未窮其所以然故更詳之
維脈為病論治

二十九難曰陽維為病苦寒熱陰維為病苦心痛越
人但有是說而無治法後人以桂枝湯為治可謂中
肯蓋陽維維於陽屬於衛也故為寒熱陰維維於陰
屬於營也故為心痛桂枝湯有和營衛調陰陽之力
適合比例以治也

張劉李朱後當以薛張吳喻配為八大家論

仲景
傷寒
暑傷
外感
東垣
溫補
滋補
皆傷也

自有軒岐越人以來著書立說者不下數百家而久
推張劉李朱為四大家者蓋以仲景首論傷寒立法
立方實為醫祖守真復以春溫夏熱立言補仲景之
未備東垣詳辨脾胃內傷與外感懸殊又補張劉之
未備丹溪又專論補陰再補東垣之未備各有見地
造為補關已有李士材論之曉暢矣而余謂言外感
者張劉言內傷者李朱似乎備矣而實有未盡明之
薛立齋謂十三科一理慨外科固執成方不窮病本
特發內外合一之論又以風會不齊今人虛薄痛戒
寒涼多行溫補此又補丹溪之未備而擴人胸臆者
由是張景岳李士材輩著述頗行實皆立齋之餘韻
也雖然內傷諸症脾胃獨詳於李氏陰陽分擅於朱
薛可謂無遺蘊矣而外感風寒溫熱之外尚有夏月
直受暑邪者雖潔古東垣輩以動靜分陰陽似屬近
理自有張鳳達申明傷暑之理蘊特著全書可云見
老復有喻嘉言不獨從仲景書中悟出冬溫春溫伏
氣為病於千百年無人道破之書一旦揭其微義誠
為暗中一大炬更悟出秋燥一門指破內經秋傷於

濕之誤可稱千古隻眼至此而天之六氣方云大備
更有不關六氣而亦屬外受之疫邪諸書中雖亦有
所闡發而莫如吳又可直窮變態反覆詳明此又於
講求外感諸家補其未備者也其外載籍充棟縱各
有可採之論可傳之方無論醇於此者疵於彼難稱
完璧即有腹笥廣博卷帙充盈者要不及薛張吳喻
四先生各開生面以補張劉李朱之闕也讀其書不
敢沒其功故特以八大家推之

醫宜博覽論

病有常變治亦有常變無不備載於書中固在乎人
之善於取裁也然而世人之病不獨變端莫測談非
容易更有證出希奇人難習見當此時也將束手而
待斃耶抑漫然而嘗試耶載籍極博奇妙不少試舉
一二言之辛亥春元墓墳丁沈長觀大腸頭忽出寸
許痛苦難忍乾則退落又出又落二十日餘如是者
三次就治於外科始有稱為肛癰者繼則莫能治之
一日赴城中王士林家求治士林曰此名截腸病出
於夏子益怪疾奇方此時尚可治之再出再落則不

可救矣令以醫坐浸於芝麻油內再日飲麻子汁數
蓋不數日而愈夫夏子益書今已無傳不過散見於
本草綱目王子留心及此其博記可知又已亥歲春
有泰興縣人繆志文被訟管押驟然週身發泡流水
皮癢毫無空隙卽行斃命屍屬具控奉撫臬各憲調
發蘇州府審辦郡侯楊公轉行府醫學翁公查議是
否毒發有無此瘡翁公以係內科請飭外科查覆聞
郡外科皆無以對翁公偶過寒齋談及此事余曰曾
見彭用光普濟良方載有虜瘡云建武中南陽擊虜
吳醫彙講 卷二 八

如其言衆皆異之余於附近視症聞之亦異後遇陸
子詢其故答曰診其脈惟稍瀉餘無病象并問其素
常裹足過緊因知此症不過血脈受寒冰凝不運於
是肌肉潰爛耳此乃切問精詳又不張大顯功殊可
欽也又丙午春有海門人王潮患病延醫張勝林用
桂附等藥病已漸輕換醫陳若山因王潮面帶赤色
身不惡寒用犀角等味涼藥越日卽死其父王德甫
毆傷陳若山身死奉臬憲常公提至省城審辦因余
有府醫學之任下余辨議余以傷寒論少陰病裏寒
吳醫彙講 卷二 九

所得與此證情形悉合須以蜜煎升麻拭摩若不卽
療數日必死等語綱目蜂蜜註中亦有是說翁卽借
去此書并卽申明於內科醫生唐立三家借得簽呈
詳覆而定案於是縣差之罪得雪設使是時苟無此
書幾成冤獄矣又庚戌冬南營高姓女兩足指忽青
黑紫爛不知痛癢漸延至跗脛踝間請治於外科多
人有云脫疽者有云落脚傷寒者並有推爲冤業症
者咸稱不治及邀蒞門陸鳳翼視之云此不成爲病
止服溫通氣血之劑外用臘糟煎洗不數日可愈果

外熱身反不惡寒其人面色赤通脈四逆湯主之一
條與此案前醫所用之藥相符又景岳寒熱篇云凡
真熱發熱而假熱亦發熱其病亦爲面赤躁煩等證
昧者見之便認爲熱妄投寒涼下咽必斃等語又與
服犀角等藥越日卽死相符其爲陳若山誤治而死
無疑詳覆定案於是王德甫痛子毆醫罪得輕減又
已酉歲表甥陸灌園患瘧半年大肉盡削後變黃疸
繼而兩膝腫痛大如鶴膝兩股胛膈皆青黑痛甚而
冰冷又上下牙齦紅腫形如榴子色若塗珠日漸潰

爛滿口熱如火烙舌亦紅紫而痛湯粥難下病勢可危編請外科圖治皆云下部陰寒上焦火亢殊為棘手余素不諳外科亦同聲無措一日延山塘劉玉如來云此一症也名曰青腮牙疳載於

御纂醫宗金鑑如方調治而愈夫醫宗金鑑人所應讀之

書也延過外科數位無人或識惟劉子知之多見其有學也即此五病失治則死得治則生一死一生出乎醫手由是觀之書可不覽哉覽可不博哉司人性命者豈僅粗知經絡藥性脈訣湯頭遂可云勝任哉

吳醫彙講 卷之二

讀傷寒補天石貫珠集二書合記

傷寒一症頭緒繁多自仲景立法立方以來叔和編次無已註釋理蘊為之一顯迨後續為註釋者不下數十家互相訾詆殆無底止余謂數十家中吳蒙齋之指掌固為捷徑雖李士材亦以為善然而與義深微未由參究方中行起而條辨洵為卓識程郊倩拾其唾餘徒滋浮衍柯韻伯立言雖暢不免穿鑿至如張路玉周禹載諸君詮發各極精詳又或嫌其叢蔓獨有喻氏之書膾炙人口者以其繁簡得宜通平眾

耳然以尤在涇先生貫珠集較之則又逕庭矣即如首篇云寒之淺者僅傷於衛風之甚者并及於營衛之實者風亦難洩衛之虛者寒亦不固但當分病症之有汗無汗以嚴麻黃桂枝之辨不必執營衛之孰虛孰實以證傷寒中風之殊立為正治法權變法斡旋法救逆法類病法明辨法雜治法等仲景著書之旨如雪亮月明令人一目瞭然古來未有何其金匱心典梓行於世并採入

御纂醫宗金鑑而貫珠集一書尚未傳播良可惜哉至於

吳醫彙講 卷之二

變通其法而云今昔異宜者如陶節菴高鼓峯輩雖亦代有傳書而莫如戈存橘之補天石為最舉凡四時感症無論正傷寒類傷寒分條辨治各極其妙可謂博而詳詳而約矣其書板廢之後莫之再鐫者余實不得其解欲將戈九二君之書合鑄行世一則由證以立法一則由法以辨證相為經緯瞭如指掌竊以為凡屬感症止須讀此二書思過半矣無如力不從心因循未鐫今老矣有志而不逮矣爰紀數語以俟諸同學或有意見相同者否

妊娠陰脈小弱論

內經言手少陰脈動甚謂之有子陰搏陽別謂之有子曰動曰搏皆有力之象也而金匱復以陰脈小弱其人渴不能食無寒熱者為妊娠二說何其相反耶蓋內經所云者一謂手中少陰腎脈血聚氣盛故脈動一謂陰得胎氣而強故陰脈搏指而陽脈反與之有別此皆於三月之胎診之始驗其金匱所云者謂下焦之氣血驟為胎蝕暫似有虧故脈小弱此惟於兩月左右驗之過此則不然矣是以下文有於法

長壽書

卷二

七

六十日當有此證句由是觀之二書似反而實同也然更以千金所云初時尺脈微小呼吸五至三月數之語合而參之斯得圓通之妙焉

讀書十則有小序

嘗讀喻西昌書有曰邇來習醫者眾醫學愈荒無方之書全不考究有方之書奉為靈寶云云可知吾儕之學問全在乎無方之書為根本也然而典墳具在蘊奧良多何以考之何以究之哉聊紀數則以為引伸之鑒

讀書須看反面

丹溪曰方書瘦胎飲一論為湖陽公主作也予族妹苦於難產予甚憫焉視其形肥而勤於針術構思旬日忽自悟曰此正與湖陽公主相反彼奉養之人其氣必實耗其氣使和平故易產今形肥知其氣虛久坐知其不運令其有孕至五六月遂於大千方紫蘇飲加補氣藥與十數貼因得男兒甚快烈按同一難產而有虛實之別補氣之方反從瘦胎飲悟出故凡前賢議論必明其正義又必於反面構思方不為其所囿可見讀書不可獨泥於正面也

吳醫彙講

卷二

七

讀書須悟對面

趙養葵水火論曰世人皆曰金生水而予獨曰水生金夫肺出氣也腎納氣也凡氣從臍下逆奔而上者此腎虛不能納氣歸元也毋徒從事於肺或壯水之主益火之源肺向水中生矣按水生金乃金生水之對面也世人但知其一面而不知又有彼一面凡此之類自在人善悟之耳

讀書須識正旨

素問通評虛實論曰帝曰腸澼便血何如岐伯曰身熱則死寒則生吳鶴臯註云身熱則血收而孤陽獨存故死烈按腸澼便血之身熱有三一則表邪下陷於陽明藥中加葛根胃氣得升即愈一則陰盛格陽雖為危候亦有用溫藥而得生者惟陰氣已竭之身熱於法不治吳鶴臯但註得孤陽獨存可知陽陷與格陽不在此例也苟使泥於吳註幾疑此症惟有孤陽獨存矣并疑凡身熱者皆死矣故曰讀書須識正旨

吳醫彙講

卷二

讀書必須彙參

李念莪腫脹論引內經實脹四條虛脹二條寒脹三條熱脹一條又五運六氣各有腫脹然有提其綱者曰諸濕腫滿皆屬於脾又曰其本在腎其末在肺皆聚水也又曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也可見諸經皆有腫脹無不由於脾肺腎三者烈按今醫之各有所偏者因看書時不能參考異同以致囿於一說遂為成見張路玉醫通凡例曰從古立言止就一端而論誠哉是言也故引此以為讀書

必須彙參之法

讀書須立主見

景岳全書關格門歷引經文而曰關格一證內經本言脈體以明陰陽離絕之危證又歷辯越人以上魚為溢為外關內格入尺為覆為內關外格及仲景叔和東垣等以在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆之非而獨創論曰人迎察六腑之陽氣口察五臟之陰人迎盛至四倍以上此孤陽獨存故曰格陽格陽者陰格於陽也氣口盛至四倍以上此元陰

吳醫彙講

卷二

十五

無主故曰關陰關陰者陽關於陰也若人迎寸口俱盛至四倍以上且大且數此陰陽相離故名關格也總由傷腎傷精陽不守舍雖與勞損症不同實即勞損之別名也烈按關格二字諸先哲久已相傳為下關上格矣一旦獨闢為陰陽離絕之脈證不囿於相傳舊說觀此可以開我儕自立主見之一助

讀書必須隅反

王損菴曰內經言溫瘧在臍者止以風寒中於腎言單瘧者止以肺素有熱然冬令之寒既得以中於腎

則其餘令氣之邪又寧無入容於所屬之臟者既肺本氣之熱爲瘧則四臟之氣鬱而爲熱者又寧不似肺之爲瘧乎此始舉一可以三隅反也烈按內經止說得冬令之寒而損菴卽於冬令推到春夏秋令氣之邪內經止說得肺素有熱而損菴卽於肺臟推到心肝脾腎可見讀書貴乎隅反不可固執一說也

讀書須善比例

喻嘉言治金鑑一案曰觀其陽症陰症混在一區與兩感傷寒無異仲景不立治法然曰發表攻裏本自

吳醫彙講

卷二

十六

不同又曰活法在人神而明之未嘗教人執定勿藥也於是以麻黃附子細辛湯兩解其在表陰陽之邪附子瀉心湯兩解其在裏陰陽之邪而愈烈按春溫之症本無兩感嘉言以其病情同於兩感而卽以仲景之方比例治之真所謂活法在人神而明之也今人奇疾甚多治法宜從權變故引此以爲比例之法

讀書須別錯處

王安道內傷餘議曰東垣內外傷辨有曰飲食勞倦傷而內熱者乃陰火乘其坤土也又曰勞者溫之損

者溫之惟宜溫藥以補元氣而瀉火邪內經曰溫能

除大熱耳按陰火二字靈素難經未嘗言而東垣每

每言之又勞者溫之所以調其飲食適其起居澄心

息慮以待其真氣之復常也禮記所謂柔色以溫之

正與此同今東垣謂宜溫藥補元氣而瀉火邪又易

損者益之爲損者溫之又以溫能除大熱爲內經所

云而徧考內經並無此語此亦不能無疑者也烈按

東垣乃醫賢中翹楚尙有舛錯內經之處況其他書

哉讀書者豈可苟焉從事哉故引此以爲一鑒

吳醫彙講

卷二

十七

讀書須汰衍說

張會卿曰瘧疾一證內經言已詳盡後世議論煩多及滋疑貳茲舉陳氏三因之說以見其槩如內因五臟之瘧在內經所言不過爲邪在何經之辨原非謂七情所傷也再若不內外因或以瘧邪亂神因致狂言似鬼者有之豈鬼祟果能爲瘧乎至若胃瘧旣云飲食明是內傷且凡先因於瘧而後滯於食者有之未有不因乎外邪而單有食瘧者也陳氏之說旣以三因立論故不得不敷衍其說不知響影之談不但

無益而且亂人意見烈按此類之衍說甚多如士材之診家正眼每脈中必以寸關尺為主病甚至將遲數之脈亦復分之而云寸遲上寒關遲中寒尺遲火衰夫三部之脈數則俱數遲則俱遲如何提出一部之獨遲獨數以為主病乎此亦景岳所謂敷衍其說也諸如此類不可為其所惑

讀書須辨訛字

喻嘉言秋燥論曰生氣通天論謂秋傷於燥誤傳傷燥為傷濕解者竟指燥病為濕病遂至經旨不明烈

吳醫彙講

卷五

六

按此一字之訛而有毫厘千里之謬諸書中傳寫訛字頗多讀書者自須具眼

凡所見詞
夏江明陽宮史有淨慈錄又有吳律二卷憾悔一卷修齊家法
子二條壽嬰本草三卷測海蠡四卷與在蘇州府志亦史同纂蜀漢拾遺
十卷及南唐陸宋嗣出

吳醫彙講卷三目錄

孫慶增

石芝醫話計十二則

傅學淵

管見芻言計八則

江朝宗

核骨踝脛臑踰辨

唐迎川

爛喉丹痧論

吳醫彙講

卷三目錄

臟腑受盛辨

大溫中飲炙甘草湯合論

論柴胡

論犀角升麻

辨紫茸之偽

辨鬱金之訛

周思哲

大豆黃卷辨

瘟疫贅言

蔣星堦

合論丹溪景岳相火大意

升降出入說

寸口跌陽緊脈不同論

中腑中臟辨

吳醫彙講

卷三目錄

三

吳醫彙講卷三

長洲唐大烈立三氏纂輯

門人程德銓峻天氏校訂

孫慶增

名從添號石芝常熟人遷居郡城葑溪年七十六歲歿於乾隆丁亥所遺石芝醫話今命姪孫名森字天桂節錄付梓

石芝醫話

人之生命天氣最急地味次之二時不呼吸絕天氣而死七日不飲食絕地味而死此其緩急可知也保命當先納天氣以接元氣食地味以納天氣素問曰

吳醫彙講

卷三

十

天食人以五氣地食人以五味

人身之否泰與易理相同地天則泰天地則否耳兩竅目兩竅鼻兩竅合為坤象鼻之下人之中也口一竅前陰一竅後陰一竅合為乾象頭至唇不動地道也口至足皆動天道也頭之上天足之下地人身上下合之故能中立逆之則泰順之則否理所當然人自不察耳

人身前面可動者陰用陽也後面不動者陽用陰也故曰前抱陽後負陰

西洋自鳴鐘以比人身氣血之周流最為切肖
水不升為病者調腎之陽陽氣足水氣隨之而升火
不降為病者滋心之陰陰氣足火氣隨之而降則知
水木陽火木陰坎中陽能升離中陰能降故也
火上浮則右尺虛不獨腎寒尺虛食下行則右尺大
不獨腎虛尺大蓋以命門大腸同居於下也
氣之性善升而易散育與固養氣之妙法惟靜存守
中善養氣者矣血之性善降而易凝和與溫養血之
妙法惟運動調中善養血者矣

吳醫彙講

卷三

十一

臟病入腑即愈惟咳嗽症入腑即危蓋肺與大腸為
表裏胃傷則飲食不進故也

經寒絡熱者溫經清絡絡寒經熱者溫絡清經但經
直絡橫溫甘通經辛香通絡為別

傷於情志和肝開心醒脾解鬱為主然必緩治用輕
藥漸可向愈重藥則反傷胃陽元氣不復血氣耗散
矣

口授丹方無不誇張效驗而又藥物輕賤便於採取
故人樂於聽聞不辨病之陰陽表裏淺深虛實漫以

試之禍不旋踵者多矣鄉愚之人往往蹈此哀哉
看病認不真切則靜坐思之總於望問問切四者中
搜求病機必有得心之處胸中了了用藥方靈若終
於疑惑而勉強投方竊恐誤人性命也

吳醫彙講

卷三

十一

傅學淵名存仁號約園國學生住葑門外狹河

管見芻言

春溫夏熱秋涼冬寒時之正也而風實應之凡治感冒取用表散自宜隨時制方若應熱反涼病隨時變施治尤貴圓通至久晴久雨燥濕異宜臨症更宜留心不可槩執常例

凡外感病挾食者頗多常思食為邪裏散其邪則食自下若雜消導於發散中不專達表胃汁復傷因而陷閉者有之至若風多挾暑濕寒或挾燥火或惱怒

吳醫彙講

卷三

四

或勞倦或房事及肝氣宿痕諸血症皆外感病之無有挾者所貴隨症制宜斟酌盡善庶無差誤也

凡內傷病損上損下損及中州在氣在血在腑在臟用藥補救宜專任宜的對無論已設或挾有外感最當留心補臟即不可施當以輕劑調停庶不致粗疎誤事共有上損宜治下下損宜治上或砥柱中流或作隔二隔三之治古人具有良法可師不敢多贅

病變無常方難執一然無定之中自有一定之法此即中無定體隨時而在之道也葢離規矩不可以為

方圓執規矩亦不可以為方圓每見前人用古師其意而不泥其方或採取其二三或減增其一二得心應手方推能事

君臣佐使制方自有定法然品味不可拘泥陸清獻曾論仁義禮智信隨時迭相為用比之醫家之於君臣佐使也有然即如參苓朮草四君子隨症從宜因時取用當亦如十二律之旋相為宮也

寒熱溫涼有一定之藥無一定之治入腑入臟或補或攻其氣味與性不可不細按也故有正用亦有反

吳醫彙講

卷三

五

用有獨用又有兼用併有活用借用之不同如用寒可以治熱反用可以入寒獨用寒而熱可除兼用寒而熱可制微行消導大可和中稍藉清滋自能表汗偶反焉而取資無盡矣

外感內傷為證治兩大關鍵然去其所本無復其所固有兩言可盡之也葢六淫外襲身中氣血日失和平一切外感有餘之症有須汗吐下和之治皆是去其所本無也若七情受傷腑臟有損身中氣血日就虧耗一切內傷不足之症有須滋填培補之治皆是

復其所固有也

讀古人書須識其補偏救弊一片苦心互相抵觸卽是互相闡發處所貴多讀多看融會貫通由博反約以求理明心得臨症無望洋之苦是已若好爲指摘棄瑜錄瑕殊失欽承前哲之道至於家秘而執成法頭痛醫頭尋方覓藥一切無方之書置之高閣此又孟浪之流不足與語斯道者矣

吳醫彙講

卷三

六

江朝宗 名誠立住 平江路

核骨踝脛膈踠辨

靈樞經脈篇脾足太陰之脈起於大指之端循指內側白肉際過核骨後

汪詡菴註核骨俗名孤拐骨足跟後兩旁起骨也按張景岳曰核骨卽足大指本節後內側圓骨也滑氏言孤拐骨者非李士材亦宗之當以張李之註爲是汪註未確論詳下節

上內踝前廉

吳醫彙講

卷三

七

汪註脛兩旁內外曰踝 按字彙踝字華上聲俗有從其便者卽從旁讀作果音諺云脚果骨當卽此字孤拐骨亦卽此也汪註以踝爲核骨而以脛兩旁爲踝夫脛者膝以下至足之總名俗名小腿者是也與俗名大腿之股相配是四肢中分出之四大名目上肢曰肱曰臂下肢曰股曰脛也故皆從月若踝者近足之突骨也故從足若曰踝在脛下則可而謂脛旁卽踝未可也

上膈內

按肫字張景岳類經及汪詒菴類纂李士材知要皆刻從足類纂註先曰肫音短足跟也又曰一作肫音善足肚也此因誤刻從足故其言岐疑無定類經與知要皆註足肚曰肫此註不誤而字之從足者皆誤刻也按從足之肫字考諸字彙字典玉篇皆曰足跟也脈由大指而上內踝已交於脛自此上行則在脛中矣豈有反下八足跟之理哉若入足跟常用下字不當用上字而曰上肫內矣故知其誤刻從足也

吳醫彙講

卷三

八

循脛骨後

統釋四節自核骨而上踝自踝而上肫自肫而循脛骨後可知踝在肫之下而脛不在肫之下矣欲明經脈必當明其部位雖分寸不得混淆也

唐迎川

名學吉號載張英縣醫學訓科住西城橋

爛喉丹痧論

近來丹痧一症患者甚多患而死者亦復不少世人因方書未及治亦無從措手或云辛散或云涼解或云苦寒泄熱俱師心自用各守專門未嘗探其本源按仲師金匱書陽毒之爲病面赤斑斑如錦紋咽喉痛吐膿血五日可治七日不可治升麻鱉甲湯主之之文細釋其義實與此症相類何會心者之絕少耶惟是升麻鱉甲湯蓋以升麻升透厲毒鱉甲泄熱守神當歸和血調營甘草瀉火解毒正內經熱淫於內治以醎寒佐以苦甘之旨而內有蜀椒雄黃似當加於陰毒方中或因傳寫之訛耳一轉移間則於陽毒陰毒之義尤爲貼切而人之用之者亦鮮疑畏矣今如遇此丹痧一證當於經義詳之毋謂古人之未及也不揣愚陋用敢質之同人

臟腑受盛辯

讀難經四十二難有臟腑之長短輕重廣狹受盛之數余竊以爲未必然如人輕重長短不齊飲食多寡

吳醫彙講

卷三

九

不一即可類推也即長短尚有以中指屈曲而取中節之郛角以量之論而受盛水穀之升合迥然各異可見吾儕看書要在圓通活潑未可拘泥成說也

大温中飲炙甘草湯合論

閱景岳新方中於大温中飲方下有從補血之散雲騰致兩之妙仲景猶所未及句竊謂傷寒方中仲師用炙甘草湯有桂酒地麥膠麻之品非陽根於陰汗化於液雲騰致兩之妙乎未可謂其未及也

論柴胡

吳醫彙講

卷三

十

按柴胡為少陽藥者因傷寒少陽證之用柴胡湯也夫邪入少陽將有表邪漸解裏邪漸著之勢方以柴芩對峙解表清裏的為少陽和解之法而柴胡實未印定少陽藥也蓋以柴胡之性苦平微寒味薄氣升與少陽半表之邪適合其用耳乃有病在太陽服之太早則引賊入門若病入陰經復服柴胡則重虛其表之說此恐後人誤以半表半裏之品為認病未清者糝糊混用故設此二端以曉之也不觀之景岳新方中諸柴胡飲柴芩煎柴胡白虎煎諸方信手拈用

頭頭是道是誠知柴胡之用而先得我心之所同然矣再古方中有逍遙散之疎解鬱熱歸柴飲之和營散那補中益氣湯之升發清陽提邪下陷疎肝益腎湯之疎肝清熱養陰透邪其妙難於僕數何至重虛其表乎余於風邪初感之輕症及邪氣淹留表熱不解之久病用之並臻神效奈何將此有用之良品拘泥成說而畏之即用亦準之以分數竟至相沿成習不得不為置辯

論犀角升麻

吳醫彙講

卷三

十一

按朱南陽有如無犀角以升麻代之之說以其同於一透也朱二允以此二味升降懸殊為辯余謂尚非確論夫犀角乃清透之品升麻乃升透之味一重於清一重於升其性不同其用自異未嘗聞有異而可代者也若夫風寒壅遏疹點未透者斯為升麻之任而温邪為病丹斑隱現者又係犀角之司如以升麻為代其肺氣熱者必致喉痛甚增喘逆營分熱者必致吐血輕亦動宣其誤若此豈可代乎又角生於首故用為透劑二允以為下降之品亦不可不辯余非

敢輕議前輩實出婆心之不禁耳故謹論之

辨紫茸之偽

痘科所用紫茸卽紫草之嫩苗也活勿新書云紫草性寒小兒脾實者可用脾虛者友能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類用發痘瘡今人於前四朝涼血利竅則用紫草若痘局佈齊後改用紫茸以血熱未清於涼血中兼寓升發之義也今肆中所用色紫而形如松膏者乃係洋內樹脂與紫草茸迥異醫俱不察而用之不可不急爲之辨

吳醫彙講

卷三

十一

辨鬱金之誤

鬱金一物出於川產野者色黑不可多得其川中所種者皆係外白內黃卽今人誤呼爲薑黃子者也至肆中所用川鬱金乃莪述中揀出莪述之子因其色黑與川中野鬱金相似而混之也醫俱不究反以川中種本之黃鬱金謂廣鬱金或謂薑黃子殊堪捧腹余於弱冠時入川卽曾深究此品當以種本之外白內黃者爲是勿泥薑黃子之說而廢之

周思哲 名桂號香林

大豆黃卷辯

大豆黃卷古人罕用本草載其性曰治濕痺筋攣膝痛五臟不足益氣宜胃破婦人惡血除胃中積熱消水氣脹滿卽金匱虛勞門薯蕷丸於氣血並補方中佐之後之著方解者有宜發腎氣之論亦未謂其發表也近來誤作表藥者其故何歟蓋因吾吳人喜服輕方而昔之治病俱於醫家取藥有云馬元儀先生預用麻黃湯浸豆發藥凡遇應用麻黃者方開豆卷

吳醫彙講

卷三

廿

俾病家無所疑懼渠得藥投中病曲以兩全此心亦良苦矣後醫不明細底竟認豆卷與豆豉同類公然影射作爲表劑但肆中豆卷豈亦有麻黃湯浸發者乎卽以格致之理論之豆得水而發藥或能些微宣濕亦不能爲通用表藥也若用二三錢之豆卷卽可表汗世人以此爲蔬菜者每食盈盞何不汗至亡陽耶一笑

瘟疫贅言

春溫夏熱秋燥冬寒固病之常若夫疫者穢惡之氣

互相傳染吳又可論之詳矣惟吳氏謂從口鼻而入
即踞膜原愚謂既由口鼻吸受肺為出入之門戶無
有不先犯肺者疫皆熱毒肺金所畏每見此症之身
熱先有憎寒肺先病也繼而充斥三焦或有徑入心
胞者所云厲氣無非替熱是以喻西昌所講瘟溫二
字未嘗區別蓋亦有見乎此耳况所云上焦如霧升
逐解毒中焦如瀉疏逐解毒下焦如瀆決逐解毒總
不脫一毒字者其為替熱意在言表矣更有患此病
者縱飲冷水亦能大汗而解此非熱毒之明驗乎至

吳醫彙講

卷三

十四

於疫邪雖解而肺蓄餘熱每多咳嗽肌熱自汗等證
亦所謂肺先受病而未愈之明徵也又有大旱之年
水涸日烈河水每多熱毒飲其水者多發疫痢以痢
門常法治之無効余於治痢方中加以貫眾之苦寒
解毒無不應手取効此亦熱毒之一驗也合併志之

蔣星堦

名廷秀號沁如吳
生世居飲馬橋

合論丹溪景岳相火大意

丹溪論陽有餘陰不足所謂陽者相火也景岳駁之
謂陰有餘陽不足而著相火以位之辨各樹旗幟幾
如冰炭之不相入矣嘗舉二者參之丹溪大旨根周
子主靜立說謂相火一動則五志厥陽之火並煽煎
熬真陰故東垣目為元氣之賊此論相火二字專從
後天之變動者言與景岳之主命門有源流之別夫
天非此火不能生物人非此火不能有生考前哲如

吳醫彙講

卷三

十五

褚氏趙氏人生先具命門及相火行陽二十五度之
語參之景岳所云相得益彰蓋靜而守位者此相火
靜則溫養動而无方者亦此相火動則燔灼譬之天
與日太陽之火也雖烈而不能焚物以陽燧取之不
過星星之火其用即可燎原故景岳之說日也失其
所則折壽而不彰丹溪之說日而火也飛走狂越莫
能禦之今將指日為火固失之而指火為日亦豈云
得乎陰陽應象大論壯火之氣衰少火之氣壯壯與
少之別即兩家宗旨所分故必合兩家所論義始完

備若偏執一說於道失之

升降出入說

素問六微旨大論出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危嘗謂傷寒所論傳經即是出入精義蓋正氣之出入由厥陰而少陰而太陰而少陽陽明以至太陽循環往復六淫之邪則從太陽入一步反歸一步至厥陰而極此邪氣進而正氣退行不復與外氣相通令韶張氏謂之逆傳養葵趙氏謂之鬱證卽此義也故開闔樞三者乃其要旨夫分言之爲出人爲升

吳醫彙講

卷三

其

降合言之總不外乎一氣而已矣觀東垣脾胃論浮沉補瀉一圖以卯酉爲道路而歸重於蒼天之氣考其所訂諸方用升柴苓澤等法實卽發源於長沙論中葛根柴胡五苓之意以引而伸之所謂升之九天之上降之九地之下雖內傷外感殊科而於氣之升降出入則總無以異耳王氏曰凡竅橫者皆有出入往來之氣竅堅者皆有陰陽升降之氣蓋人在氣中如魚在水中人不見氣如魚不見水上下九竅外而八萬四千毛孔皆其門戶也氣爲之充周而布濩雖

有大風苛毒莫之能害是故邪之所湊其氣必虛內陷者有入而無出下陷者有降而無升此升降出入四字爲一生之橐籥百病之綱領

寸口跌陽緊脈不同

詳考傷寒論中寸口之緊與跌陽之緊雖同日緊而義自各別蓋緊見於寸口是客邪所致之病脈緊見於跌陽跌陽是胃之本脈平脈篇云跌陽脈微而緊緊則爲寒又云跌陽脈沉而數沉爲實數消穀緊者病難治夫緊則爲寒數則爲熱既曰數又曰緊不幾

吳醫彙講

卷三

其

寒熱混淆歟盧子孫疏云緊則爲寒爲其嫌於無陽蓋此寒字非寒邪之寒針對陽字而言乃是形容無陽意思無陽者無胃腕之陽也卽所云知陰常在絕不見陽意知陰常在絕不見陽以尺脈言是腎陽此以跌陽言是胃陽人以胃氣爲本故診跌陽須知遲緩診寸口當求濡弱皆胃陽敷布之象卽經文無胃氣曰死之要旨耳至於寸口脈浮而緊寸口脈陰陽俱緊此緊字以寒邪言細參之要自有濡弱者有所謂濡弱何以反適十一頭爲五臟六腑之主脈之骨

也不得與跌陽之緊混同而論

中腑中臟辨

病機機要云中腑者宜汗之中臟者宜下之此腑臟二字實是指經腑言腑無汗法入臟亦豈有下法五臟者藏精氣而不寫故滿而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不能滿此臟宜補腑宜通之要旨也考長沙三百九十七法邪歸中土乃可議下其少陰急下三條指轉入陽明腑證者言仍是土鬱奪之之義如已臟真失守而復瀉之是虛虛也古於汗下之

吳醫彙講

卷三

六

法禁例甚嚴豈宜如是之倒行逆施乎觀其論中腑日脈浮惡風寒則明是中經論中臟日大便秘結則明是中腑辨名正誤庶於立言之旨有合云

吳醫彙講卷四目錄

沈受益

人身一小天地亦有南北兩極論

命門脈診辯

沈悅庭

治肝補脾論

沈實夫

四維相代陽氣乃竭解

膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣解

吳醫彙講

卷四目錄

膀胱上口論

五苓散解

沈思劬

辯素問濁氣歸心之訛

周蘊石

祖氣論

連珠計十首

長洲唐大烈立三氏纂輯

門人倪士俊南吉氏校訂

沈受益

諱謙號牧菴儒而以醫聞緒紳先生常詩文往來當道亦多契合然非治病不輕入

室生三子長笠船業儒兼通醫學府庠歲貢生選卓雅集行世次悅庭考拔吏日以醫問次詹所吳岸生地贈修職郎溧陽縣學教諭有友晉閣帖行世長孫旭岑芸齋並登科甲火箬邦國學生好醫未嘗釋卷而不臨證次丹山實夫登會孫思幼維祥俱業醫先生年六十四歲歿於雍正壬子世居荊溪烏鵲橋東

人身一小天地亦有南北兩極論

吳醫彙講

卷四

按周天三百六十五度四分度之一其間日月星辰之周流循環而不息者有南北兩極以為樞紐二極居其所而眾星共之星動而極不動動主於靜也靈樞五十營篇曰人經脈上下左右前後二十八脈以應二十八宿一呼氣行三寸一吸氣行三寸一萬三千五百息氣行五十營於身水下百刻日行二十八宿漏水皆盡脈終矣夫人之營衛運行無極以統之焉得常周不休心主與命門即人身之南極北極也心者神之舍也神藏不露而無為五藏六府之運行

莫不以心為君主故經言主明則下安主不明則十

二官危心之元神即天之南極也命門一點為生氣

之原藏於兩腎中間以為十二經脈之根本必須鎖

鑰閉固即經所云陰平陽秘精氣乃治腎之元氣即

天之北極也天之南極入地三十六度而位乎南下

為陰而南為陽居陰位之陽也人之心君位乎腹之

上腹為陰而上為陽亦居陰位之陽天之北極出地

三十六度而位乎北上為陽而北為陰居陽位之陰

心入之命門位乎背之下背為陽而下為陰亦居陽

吳醫彙講

卷四

二

位之陰天之三極對待以為中樞而後運行不息人之心君與命門亦必神氣相合而後營衛得以周流不息顧靜者動之根也心為十二官之君主而主乎靜定命門為十二經脈之根本而主乎秘密是即兩極之居其所而不動也

命門脈診辨

張景岳三焦胞絡命門辨云命門為陽氣之根故墮三焦相火之脈同見於右尺按命門居兩腎中間即人身之太極乃陰陽之根底既為陽氣之根亦為陰

氣之根景岳真陰論云命門之火謂之元氣命門之水謂之元精論理並無偏倚及至論及脈位則但將右尺以候陽氣之根將謂左尺不可以候陰氣之根乎將謂陰氣之根亦於右尺診之乎將謂命門但候元氣不必候其元精乎此景岳之偏於溫補其誤即在於此所謂差之毫厘者也按命門原氣稟於有生之初得父母之兩神相合而化形如露珠之一滴升於丹鼎之上以為生身立命之根天地陰陽五行之精亦即妙合於是五臟六腑四肢百骸由此而生不

吳醫彙講 卷四 四

可以言水火并不可以言精氣乃精氣神三家會合而始成此一點莫可名言而曰命門指人身有生之根天之所命而名之左氏曰民受天地之中以生所謂命也此之謂歟命門一點藏於兩腎中間以運行陰陽之氣全藉腎中陽氣陰精以為之養在有生以前則精氣生長於命門在有生以後則精氣之生於命門者命門反須精氣以養焉精氣不足猶可峻補以救之至精氣大傷而命門生氣之原絕則非補精氣之所能挽回故言至水火精氣已屬腎陰腎陽而

非命門矣夫命門為生氣之原非特右尺不能候即兩尺亦不能候且六部俱不能候是當以難經為斷也八難曰十二經脈者皆係於生氣之原所謂生氣之原者謂十二經之根本也謂腎間動氣此五藏六腑之本十二經脈之根呼吸之門三焦之原一名守邪之神故氣者人之根本也根絕則莖葉枯矣寸口以脈平而死者生氣絕於內也獨是一難獨取寸口以決死生而八難言寸口脈平亦死是何其自相悖謬乎蓋寸口為脈之大會可決死生乃穀氣之變見後

吳醫彙講 卷四 四

天有形之可脈也生氣之原絕則寸口脈平猶死乃元神之聚散先天無形之不可脈也然則命門之絕將不可脈之而已乎經曰望而知之謂之神在醫者之以神照神乃神聖之能事誠非下士之所能窺測而以右尺為診則固知其非也

溪以此二句為衍文。此求其說而不得。從而為之辭。亦不知為不知之義也。但無此二句。則語氣未全。且於義理亦未周足。至注詁卷。以陽氣乃竭之竭字作壞字。未知本於何人。竭之與壞。其義不甚遠。始置不

論。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。解

王太僕註曰。得氣海之氣。施化則溲便注泄。氣海之氣不及。則閼隱不通。故曰。氣化則能出矣。王太僕為註釋之。開山宋元明歷代諸家。各仍其說。莫不以津

液即為溲便。殊不思。氣化則能出者。言膀胱之津液。得太陽之氣。而後能出於皮毛。非津液下出之謂也。

且津自津液自液。小便自小便。逐字考之內經。各有明文。靈樞決氣篇曰。腠理開。泄汗出。溲溲是謂津。穀入氣滿。淖澤注於骨。骨屬屈伸。洩澤補益。腦髓皮膚。潤澤是謂液。又曰。津脫者。腠理開。汗大泄。骨屬屈伸不利。又五癃津液別篇曰。三焦出氣。以溫肌肉。充皮膚。為津。其流而不行者。為液。是經文津液二字各有着實。註解者不得以津液小便混而莫辨矣。自古以

來接內經之統。以繼往開來者。其惟仲景先師傷寒論乎。其治太陽病。無汗用麻黃湯。有汗用桂枝湯。此津藏於膀胱。氣化則能出之一證也。金匱用括莢桂枝湯。以治柔痙。葛根湯。以治剛痙。因邪傷太陽液。不養筋。故助太陽之氣化。以運行於皮毛。以流通津液。則筋脈得以濡潤。此液藏於膀胱。氣化則能出之又一證也。以經註經。已甚明矣。而仲景治法。又與經旨符合。則津液之非小便。尚何疑哉。又水飲入於胃。上升於肺。以下布於三焦者。謂之水。水濕壅而不通。則

小便不利。輕為腹膨。重為腫脹。此水在三焦。而未入膀胱者也。其既入膀胱。以後水之上升。而汗出溲溲者。謂之津。所謂下輸膀胱。水精四布也。貯於膀胱。而

下出者。則謂之溺。溺孔閉。澇則為癃。秘內經之胞痺等症是也。素問宣明五氣篇曰。膀胱不利。為癃。不約為遺溺。靈樞本輸篇曰。實則閉。癃府則遺溺。經脈篇曰。肝所生病者。遺溺。閉癃。又曰。足少陰實。則閉癃。竊意三焦不能化入膀胱者。其病多虛。故歷來治水腫水脹者。總以氣不化水為主也。因溺竅不通。膀胱之

內水脹者其病多實故統觀內經諸篇瘧閉則皆有實而無虛也又按津之外出者為汗津之內出者為溺故汗多不得利小便恐陰從下脫也失小便者亦不得發汗慮其陽從上脫也小便之與汗俱為津之所化是同出而異名者也液為水穀之精華即津之流而不行隨氣以運於周身則潤皮膚澤筋骨補腦髓聚於膀胱布於經絡宜藏而不宜出故十二官之神明等俱言出而此獨曰藏者言津之液藏也氣化則能出者但可指津而言也若液從溺竅而出則為

吳醫彙講

卷四

九

膏淋等症矣尚得謂之氣化哉

膀胱上口論

膀胱上口靈素未言有無後世聚訟紛紜或言有上口而無下口者乃以氣化則能出之句而誤會也若無下口焉得氣一化則遂若此通利哉是無下口之說不必論矣或言有下口而無上口者張景岳李士材俱主是說因景岳士材之書近世風行海內故入皆以為無上口矣第無上口則交腸之易位而出者糞從何處入於膀胱乎張三錫以為上下俱有口者

是矣但語焉而未詳也夫水道既從小腸下口以入膀胱則清濁不分者何獨併於大腸之水瀉人所常有而糞入膀胱之交腸患者甚少乎諦思其故必係膀胱有上口而常閉乃為平人之常水之入於膀胱者仍是三焦化入而非從上口以入者也或腑氣大虛則力乏而竅不能閉或邪熱傷腑則熱主開泄而竅亦不能閉以致糞從小腸下口入於膀胱上口並隨小便而出矣譬如人身之外竅亦有常閉而不通者臍孔與兩耳兩乳無故則常閉而不開有故則或

吳醫彙講

卷四

十

出膿血或通乳汁膀胱之上口亦可以類推矣世人皆以為無上口者一則宗景岳士材之書一則見獸脬之止有下口也不思天地之生物各有不同者如毛蟲則五臟俱全羽蟲則無肺而無前陰即人身亦有不同者男子肋骨二十有四女子肋骨二十有八男子頭骨八塊女子頭骨六塊人與人尚有異焉人與獸豈無異乎

五苓散解

此治小便不利之主方乃治三焦水道而非太陽藥

也。素問經脈別論曰。飲食入胃。游溢精氣。土輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。此方用桂。以助命門之火。是釜底加薪。而後胃中之精氣上騰。再川白朮健脾以轉輸於肺。而後用二苓澤瀉運水道之升已而降。其先升後降之法。與內經之旨。滴滴歸源。復與太陽何涉。傷寒論治小便不利。汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。蓋渴為陽氣不足。水不上升也。不升則不降。故用肉桂以升之。二苓澤瀉以降之。而用白朮一

吳醫彙講 卷四 十一

味以為中樞。乃註者莫不以渴為熱入膀胱津液被劫所致。如果熱入而復用桂朮以溫液耗津。又二苓澤瀉以滲之。是熱之又熱。耗之又耗。速之斃矣。且不渴者。反不用五苓而用茯苓甘草湯。可知不渴則無需桂朮之蒸騰津液。而桂朮之非治太陽而治三焦。更不待言矣。有小便不通。而以桂枝易桂者。此必命門之火未衰。而外有太陽表症。因邪傷太陽傳入三焦。故表邪未解。而三焦之水道不利。即傷寒論所謂中風發熱。六七日不解。而煩。有表裏證。渴欲飲水。水

自此凡此五
表裏證
五苓散可也

入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。是也。表症為太陽不足。故用桂枝以宣陽氣。通津液於周身。即經文水精四布。五經並行之旨。非用之以通水道。下出也。表症為三焦之氣化不宜。故用二苓朮瀉以通三焦之閉塞。非開膀胱之溺竅也。夫下焦之氣化不宜。則腹膨而小便不利。水蓄膀胱。此乃水蓄於膀胱之外。不能化入膀胱。故用五苓以化之。亦有用桂枝而効者。因衛出下焦。助太陽氣化以運之。非為太陽腑內之水蓄也。如三焦既將水氣運化入於膀胱。而不出。此

吳醫彙講 卷四 十一

真太陽府內痺而不宣。即胞痺症也。素問痺論曰。胞痺者。少腹膀胱按之內痛。若沃以湯。澁於小便。上為清涕。水在膀胱之內。是膀胱脹滿。而非腹脹。故按之內痛。若沃以湯。其溺孔之道痺而不通。故澁於小便。膀胱痺。氣隨太陽經脈之行。以從巔入腦。故上為清涕。此真太陽本府水結膀胱之內。而非腹中膨脹之小便不利也。總之。水入膀胱之內。方屬太陽。若水在膀胱之外。腹膨滿而小便不利者。此臟腑之外。軀殼之內。三焦主之。虞天民曰。三焦者。指腔子而言也。故

易 猶代也

治腹滿腫脹之症。設使一味利水。則三焦之氣更不
能施化。而膀胱津液為之下竭。非仲景五苓之意也。

吳醫彙講

卷四

七

沈思劬

名家受業於叔實夫得其傳

辨素問濁氣歸心之訛

讀素問至食氣入胃濁氣歸心淫精於脈節此濁氣
歸心不得其解因思心者君主之官神明出焉如果
濁氣歸心焉得虛靈不昧具眾理而應萬事乎按此
心字必因千百年相傳之書脾字誤為心字考靈樞
陰陽清濁篇曰受穀者濁受氣者清又曰管者水穀
之精氣也調和於五臟灑陳於六腑又曰陰清而陽
濁又曰諸陰皆清足太陰獨受其濁夫腑為陽臟為
陰既曰諸陰皆清則心之受清可知既曰足太陰獨
受其濁則濁氣歸脾之外更無一臟再受其濁可知
是濁氣歸脾經文無不印合竊以為一字之訛敢以
質諸高明

吳醫彙講

卷四

七

周蘊石諱邦彥別字瑛圃居葑溪吳衙場

祖氣論

夫綱緼鼓蕩於天地之間者孰推行是孰發育是無非一氣為之橐籥而已天以五行化生萬物人以五臟應之天一水也故兩腎為先天之本天五土也故脾胃為後天所資此東垣丹溪之論後人皆起而宗之至汪氏苓友獨主一心其言曰萬病皆起於心五臟六腑皆系於心天有日則晝夜分四時序萬物生世有君則尊卑定貴賤明兆姓治心者君主之官也

吳醫彙講

卷四

五

在天以日為主在人以心為主論凡數萬言直與前賢鼎立其嘉惠來茲豈淺鮮哉特是三家之說一指脾一指腎一指心則猶是以有形之臟體言也夫氣者形之本也人自賦形以後陽曰氣陰曰血而先天無形之氣則宰乎陰陽血氣之先修養家謂之祖氣即天地生生之氣也緯書之言曰有生皆在氣中凡夫負陰抱陽昆蟲草木之屬莫不感此氣而生故氣在則形存氣去則形壞孔子曰純子食於其死母者少焉胸若皆棄之而走所愛其母者非愛其形也愛

使其形者也使其形者何也氣也生氣通天論曰藉天之氣清淨則志意治順之則陽氣固又曰服天氣而通神明靈素之言汪洋浩瀚其要旨止歸一氣字夫涕唾津精汗血液七般靈物皆屬陰陰者死質也氣者生陽也方書中往往以血肉有情為煉石補天之具不知吾身中生陽之氣既若存而若亡則此塊然者亦漸鄰于朽腐之鄉乃反恃此物之朽腐者以却病延年不其難乎是故治形必先治氣形特氣之宮城治氣必先治心心實氣之主宰先天之植此形

吳醫彙講

卷四

五

者惟氣後天之帥此氣者惟心斗柄招太陽徑寸混三才三奇論之祖氣即于輿氏之言養氣求放心也古人云行醫不識氣治病從何據蓋無此冲和不息之氣則心何由而藏神脾何由而載物腎何由而為蟄藏之本經曰知其要者一言而終其斯之謂歟

連珠

連珠之作肇自漢章之世義取貫珠文多假喻節短而韻長言近而旨遠蓋詞賦之流派也前賢葛稚川論醫用連珠文今倣其體

蓋聞天動星廻而辰極居其所瓊旋輪轉而衡軸執其中是以位定坎離握樞紐於南北緯纏卯酉分升降於西東

蓋聞水障於土還以潰其土火生於木仍自焚其木是以植千章之嘉樹必溉清渠築百丈之脩堤先疏支瀆

蓋聞漏滴銅壺水滑必迅灰傳葭管氣至斯飛是以虧天一之真脉行必速于常度定甲乙之候節令每決於先幾

吳醫彙講

卷四

七

蓋聞熱獸炭之盈爐煖勝三春而不能代燭龍之照焚蘭缸之寸燼光逾四壁而不能代暘谷之暄是以鏡本非臺君以名而離精獨炳薪傳有火相以位而泉水常溫名字借用王氏註

蓋聞陽為陰逼不走即飛陰遇陽消非枯則槁是以蟄雷之性激以暴雨而勃升旱魃之災沛乎甘霖而却掃

蓋聞蝨處頭而黑麝食柏而香頸依嶮而瘦齒居晉而黃是以漸染深而變質方宜之異服用久而增氣

物化之常

蓋聞熬山之燈名走馬旋轉于點火之光西洋之鐘號自鳴循環於周天之度是以桃梗土偶形本氣而運行肝丑肺寅經隨時而流注

蓋聞機引桔槔不敵尾閭之洩戕從萌蘖何假甘露之滋是以叅同契之金華難填慾海悟真篇之首經詎起枯枝

蓋聞樹合歡于繡閣不怕思婦之顏栽萱草於蘭庭無解愁城之織是以七情相倚針石何施五欲交攻

吳醫彙講

卷四

六

刀圭莫塞

蓋聞朔雪嚴風不解燎原之熱流金爍石難廻冰室之涼是以五方之里攸分性殊寒燠六氣之中異所臧別陰陽

吳醫彙講卷五目錄

薛鶴山

痘毒藏脾經說

痘出同時論

痘山太陰轉屬陽明論

題費建中救偏瑣言

迴瀾論

葵萊預解痘毒說

薛公望

吳醫彙講 卷五目錄

擬張介詔傷寒直解辨症歌

辨表分寒熱

辨表分虛寒虛熱

辨裏寒 裏熱

辨裏虛寒 裏虛熱

辨假虛寒 假虛熱

辨渴

辨舌

辨虛寒舌燥 實熱舌燥

辨寒頭痛 熱頭痛 虛頭痛

辨風寒骨痛 虛骨痛

辨虛寒腹滿 實熱腹滿

辨虛寒不大便 實熱不大便

辨小便不通

辨嘔

辨吐衄

辨汗

辨謔妄

吳醫彙講 卷五目錄

辨面目赤

辨下利

辨厥

辨腹痛

辨脈脫

吳醫彙講卷五

長洲唐大烈立三氏纂輯

門人顧英沅芳氏校訂

薛鶴山

名景福號松莊世居長春里王百毅紅梅閣舊址間有春熙堂春兩樓相平晚年灌

杞藝菊日與門弟子講貫經史百家著杞菊廬記白樂天真年六十有九子一名承

基字公望趨承家學焉

痘毒藏脾經說

痘之毒當由姪婦飲食中得來曾見伍氏痘科論毒藏脾經云飲食氣味屬濕濕本從脾胎孕賴脾氣生

吳醫彙講卷五

養母脾氣有濕熱蘊於子之脾經猶豆種土中非時則寂然不動必待陽氣外鼓萌芽內生然後苗而秀秀而實矣且物入水則腐入木則蠹入火則焚金堅不容物惟土受物則可久又能植物又能生實也按此論最為有識其云痘毒藏脾祇是太陰經氣有未純處毒字亦勿太泥即此知古人保嬰用拭口法及殊密等方逐下穢糞亦非不見到者命門藏毒之說從此無容印定矣

痘出同時論

痘本天瘡其始也無不因天時驟暖氣從外洩濕熱

乃蒸而為痘譬如大人病春溫同一自內達外之象

所以溫病禁汗下痘瘡亦禁汗下病痘者多則痘氣

薰蒸飄泊遠近天氣通於鼻竅筋相感引動而出故

證候相同而亦各隨其人之體氣為變動治法以和

其陰陽為主而升發尤為喫緊蓋諸瘡屬火火鬱則

發沉氣從鼻入在上者尤宜引而越之若毒厲深重

必直行膜原擾動三焦與素有之濕熱兩相搏激阻

遏氣機則當如喻嘉言論疫之法上焦如霧升而逐

吳醫彙講卷五

之兼以解毒中焦如樞疏而逐之兼以解毒下焦如

瀆決而逐之兼以解毒乃為調劑無誤樂衛得通痘

出自順務宜先達其邪而後聽其元氣之收發括之

歛之貴在行所無事而已蓋痘雖本胎中濕熱然為

毒皆不甚重惟穢惡之氣乘內氣不實而潛入者痘

發乃密今種痘之法盛行而選苗不善易涉險候其

明驗也故毒重者須分別三焦以逐其邪即宜昭顧

中氣以扶其正但云見痘治痘急於清解無惑乎與

尸而歸矣至於必先歲氣無伐天和道理極變通極

精微內經至真要大論詳列司天在泉間氣主客勝復之治法最難執一非子干火燥治皆清潤丑未濕寒治皆溫補之謂也苟能於陰陽表裏虛實寒熱標本先後之間因病施治即於歲氣天和之道無不合矣

痘由太陰轉屬陽明論

疹屬肺而達於皮毛從太陽而洩痘屬脾而達於肌肉從陽明而透其宜於溫補者大陰虛寒也異攻保元所以得效其宜於涼瀉者陽明鬱熱也承氣白虎

吳醫真講

卷五

三

所以致勝祇因由內達外激動真氣症候似旁涉五臟非相傳也傷寒邪自表入痘瘡毒自裏出毒由太陰轉屬陽明土為萬物所歸無所復傳灌漿收靨計日可愈故順者能自出者也險者欲出而不能自出者也逆者不得出者也然則痘瘡之首尾重陽明一經從可知矣胃為十二經之海氣血俱多外鄰太陽為之閘關自能領毒出戶鼓清陽而上升務使毒火透出肌肉夫然而內火得化膿之灌漿之養何莫非陽明融化之功乎即如升麻葛根湯古人以為首尾

可用深得鼓舞陽明之旨若妄執解毒之說承氣入胃切盡真陰白虎下咽鑊盡元陽中土一餒後天本撥矣明者必計不出此

題費建中救偏瑣言

是書也今人家置一編而究竟解悟者亦少夫既云救偏原為兩時偏尚溫補者說法集中雖虛實並舉而虛症作實意以人所共知者不妨從畧也實症作主意以人所未悉者不嫌縷述也苟順口念去眼光都注定實火一邊直以痘為有實無虛矣又每條詳

吳醫真講

卷五

載治驗全以大黃石膏等收功然其詳述病情處甚明無一症非身熱如火躁亂異常口膩如脂者夫身熱而口如火陽明熱盛也躁亂而口異常三陽熱極也口燥咽乾亦少陰中急用承氣湯症也建中治法原自中窾此所述痘點不日形色紫黯即日按之板實可知脈象亦必滑數實大實火有餘於茲可悟然則表症苟非壯熱之極內症苟非躁亂之極咽中苟非乾燥之極痘粒苟非紫黯板實之極脈象苟非滑數實大之極者斷不宜參用大黃石膏等藥矣建中

未始非錚錚者即所著瑣言亦一片婆心惜語意太
責重熱毒治驗復多誇蕩滌且又雜撰覆釜鱗座及
游蠶疊錢諸名目槩用寒涼攻發全不顧慮氣血和
其陰陽俾灌漿周浹以偏救偏語刺刺不能休使無
識者奉為指歸更無隅反則建中與有罪焉嘗考吳
又可論治疫而及痘症專以承氣為制勝之法且云
諸家論痘從未言及但知揚湯止沸不思釜底抽薪
則古來小兒不死於正命者多矣此論當為建中開
山之祖顧下奪之法雖不可偏廢祇是全體中一隅
長醫彙講 卷五 五

去蘇郡雖遠或症治自當不同然安知喻氏所謂活
者入又可手而不誤藥耶著書垂後為萬世計也病
變何常而師心自用據目前得効之方自詡為不易
之法多見其不知量耳
迴瀾論
痘瘡關係生死非精於內經傷寒論者不能察一有
專門則局量不闊識見不廣沿流而昧其源此道遂
絕即如建中濫觴釀成今日之倒懸究其變本加厲
之故因見痘初起血有熱駭為毒火峻用苦寒逆折
吳醫彙講 卷五 六
在爾時火勢勃勃欲出雖經冰伏尚相持不下不致
入口即斃醫者遂信為用熟無碍於是氣機鬱遏紅
暈轉深倍增煩熱益共信為血熱毒重恣用寒涼以
誤傳誤其弊一也遇真險症即作危言斷以不治而
按日處方尤害在手口相應到得送終病家不咎其
手法之辣轉贊其眼力之高醫者益嚶嚶自負無復
變計斷決愈精聲名鵲起其弊二也病家樂聞清解
之說婦姬嘈嘈總以瀉食積降火毒為第一着苟不
迎合其意即使收功後稍有咳嗽及痊癒尚認為未

曾解毒所致歸咎前醫其或過十餘朝諸法並窮不得已加人參入清攻藥中為江心補漏徒見氣喘冒高死後心頭猶熱無識者益悔用補之誤視同醜視時醫深於世故務求不失人情其弊三也刻板方治通國皆然稍有異同便無聲援入附出汚顯成時局彼此互薦方同一律成固可以居功敗亦可告無罪醫道之行惟此為嚆矢矣彼惟急於道之行寧復知其術之謬況箕裘如是衣鉢如是數頁方書錦囊具在眼光本不盈尺更無從參悟靈機其弊四也具

吳醫彙講

卷五

七

此諸弊種種相因禍祿何知遭此巨劫謹披肝胆吐心腹而告諸為人父母者曰順痘本無不生之症而誤藥轉有致死之因險痘極有可生之路而誤藥必無不死之倖逆痘尚有求生之法而誤藥反為速死之方與其誤藥毋寧不藥年來痘疹甚行比戶哭聲順而死者猶十之三險而死者已十之七幸而獲愈者非痘出極稀即貧家無力延醫或兒性倔強滴藥不肯沾唇否則藥雖下咽立即嘔出如有神助求其因藥而愈者百不獲一也曾有一幼醫之女痘殤哭

甚哀余笑謂之曰君當取左傳語自為懺悔因朗誦余殺人子多矣能無及此乎嗟嗟余豈好為詬病哉亦思稍挽狂瀾為嬰兒開一線生路耳苟能明不服藥為中醫之訓則全活已過半矣況由內經傷寒論而精之者哉

葵菜預解痘毒說

預解痘毒萬氏有代天宣化丸但可預防天行究於內毒無涉若餌珠砂珍珠黃連犀角兔血鶴卵之屬總因視為慾火之毒故專入少陰方雖新奇試多無

吳醫彙講

卷五

八

効或陰草蔗膏浴鱧魚湯欲提毒出外亦取末舍本余究心格致獨主毒襲脾經之說又得松槃山人筆記詳言葵菜解毒之驗按葵性涼滑入脾清濕熱有功喜其言之信而有徵也今附載於後

葵一名甜菜一名女菜一名滑菜一名蒼蓬蓋百菜之主也四時可種為蔬秋種者更佳故冬葵子尤為藥品所尚嘗閱本草綱目李氏開載葵菜之功萬不失一而歷代流傳疑信相半遂從菜部改入草部且因葵性寒滑恐傷脾胃不敢輕試遂命

對病妙藥棄置不用而惡毒流染坐致痿頓心甚傷之久有此疑無從辨識十數年間廣詢博訪乃知為甜菜無疑問令童稚餌之雖無傷害而功效未顯未敢輕傳比年以來數經此症盛行見不治者十有八九而嘗食此菜者百無一失乃知相傳之訛致神功之久湮也可勝慨哉方敢形之諸著以廣其傳嗟乎因慎重而坐令陸沉因未廣而猶然胥溺失今不傳後悔奚及乃開列其方以公諸天下後世蓋其寒滑者性也洩利者毒也與脾胃

吳醫彙講

九

根本何與且未病而先藥病受之病去本完最為上策即見點而後食猶將收大半之功不猶愈於坐火觀薪者乎又豈若俗醫見危迫輒進芩連慘均劑亦者乎噫是在信不信試不試之間耳安敢以人命為等閑而冀其必售乎其法采此菜熟之以供蔬食愈久愈佳余所為懇懇款款祈人之必信必傳者聊以道通慢之愆而為不可復生者志痛耳余何慕焉天啓乙丑歲三月吉日慈溪松槃山人姜應麟筆記

薛公望 名承基號性天鶴山子世居長春里
擬張令韶傷寒直解辨證歌

辨表分寒熱

先提清表分

晝夜頭疼渾不了身熱脈浮邪在表病症看來似一般表寒表熱須分曉或有汗或無汗汗少汗多且莫管只就脈浮中分出兩條線表寒浮緊或兼弦表熱浮數兮或兼滑長與弦緩寒者身疼慣怕寒頻求衣被遮溫暖熱者雖然也畏風無風便欲開帷幔寒不

吳醫彙講 卷五

十

渴兮熱或渴寒舌白苔熱黃澤寒者口和熱口苦寒減食兮熱能食表寒散以辛溫味表熱辛涼非一例表寒切勿先消食惟恐引邪入裏去表熱切忌是辛溫變成燥熱為難治

辨表分虛寒虛熱

表也 或兼大脈 虛也

頭痛脈浮或兼數兼弦按無力表分虛同寒熱別表若虛寒必惡寒屢進辛溫汗難出若用辛涼必致汗氣擾翻教身體麻或大熱兮或微熱胸前微滿且欲

裏
個字
個字

嘔口淡或渴或不渴表如虛熱口亦淡必兼微渴思潤澤服過辛涼身反痛舌形定現微苔色不論大汗

與無汗但查熱勢加猖獗兩症皆須補益來寒加姜

桂宜用桂枝湯加茂木其則加人參乾炮姜之類柴宜柴芩歸芍茂木之類甚則加人參熱熱茶

辨裏寒

裏寒脈沉緊或兼緩與遲惡寒骨節痛表症似而非

胸腹滿痛且欲嘔或吐或利俱有諸或熱或不熱手

足指冷厥喉有冷涎苔白滑或如猪腰或茶褐此宜

桂枝湯去芍加乾姜裏寒溫補是良方甚則加桂附

可以復其陽

辨裏熱

裏熱脈沉數或緩滑以長無論其神昏與清無論其

身熱與涼唇焦齒黑譏語現舌短苔黑或起芒裂破

出血反不渴或渴飲冷小溲長或利清水或便鞭聲

音洪厲力氣強狂發登高棄衣走否且循衣而摸牀

面目或赤或不赤其色垢濁如薰黃此宜芩連石膏

類甚則芒硝與大黃

辨裏虛寒

裏若虛寒者脈必沉而緩主脈微細按無神救之惟愁晚

手足常四逆面色青黑黯渴而不欲飲但覺口中淡

惟喜極熱湯稍解胸中滿或嘔或吐或下利或不大

便心下悸心煩喜躁不思食踈臥恍惚每獨語舌帶

淡黑色或如猪腰或糙米或白苔而潤或無苔而燥

短縮不能伸望之萎且槁理中四逆急溫之否則神

昏汗脫了

辨裏虛熱

欲知裏虛熱脈沉而數按無力身熱退不淨口渴神

恍惚與湯則飲之不與亦不討有時思食來食到便

先飽舌上畧覺燥得湯燥即好或有微苔或無苔或

淡紅色如桃腮此為裏分少津液瀉心導赤佐生脈

辨假虛寒

脈沉細兮或緩長出則遲兮入則疾或伏筋骨按有力口中不渴舌燥短不但身涼且四逆神昏譫語口目動狀若驚風作瘧厥或利清水或不便解下或如爛桃色人事不知歌且哭身輕偏自能起立或吐衄重口苦辣小便行時長且赤此是虛寒假症現應須解毒和涼膈

辨假實熱

脈弦而大或洪數無奈按之全不見任他熱勢如燎

吳醫彙講

卷五

七

原真底實板已先現苦白或黑短不燥或如猪腰或米糙面目俱赤為戴陽譫語發狂手足躁或有汗兮或無汗坐臥只求井中蹈舌腫唇焦齒出血渴飲湯水常不絕內是真寒外假熱理中八味合生脈煎成冷飲代茶湯庶幾虛火歸源得誤用芩連增躁渴成死庸師到此休饒舌

辨渴

渴症須分寒與熱熱者脈數而口苦身熱汗出喜冷

飲或兼湯水百杯可此宜花粉與川連加味參同伴白虎虛寒而渴者脈必細兼遲即教洪且大終是數而虛渴喜極熱湯稍溫便嫌冷有時思得水仍復不能飲此宜生脈中姜附辛以潤又有汗下之後亡津液生津之品始為得不宜涼藥不宜溫何況諸多辛與熱

辨舌

胃氣現於舌上有淡白苔俗醫漫消食必致光無胎

吳醫彙講

卷五

西

調理到思食苦白漸生來君不見病有厚苔滿舌者忽然退去光而燥乃為胃氣絕之徵從此參詳便分曉又有大紅舌色無苔者君火之色浮於外盛極將衰欲化灰無病之人亦常有之宜用附子引火歸源得退舌色純氣素虛之人無他症而忽現此舌者用附子引火歸源固合又若敖氏傷寒金鏡錄載純紅為將癰舌乃熱畜于內而病將發也不問何經宜又有舌黑如淡川透頂清神散搖鼻法亦不可不知又有舌黑如淡墨更不須分燥與濕摠歸腎水克心火陰盛陽衰須早識除非黑起芒刺燥而裂陽邪熱結何消說

辨虛寒舌燥

舌燥有多般或淡黃或淡白或起微刺或灰色更有望之如燥捫之澤其色或紫而或黑必兼吐利而厥逆神昏謔語詞審澀舌燥而語言不清因燥而不清雖欲言舌不虛寒定本可治舌潤而語言不清所謂口得前死症也脈形微細定如絲或雖洪大終無力急用生脈以養津附姜苓草和茂木俗醫謂五味味厚則七八粒此不通之論必須鏤餘方効

辨實熱舌燥

吳醫彙講 卷五 主
實熱舌燥先有地或黃或黑起芒刺即使苦輕偏破裂必兼身熱焦唇齒渴喜飲冷面目赤並無吐利與厥逆讖語便閉諸症現洪數滑長脈可驗白虎承氣隨變換

辨寒頭痛

寒頭痛脈浮而紫主腦或弦或沉更兼遲惡風與寒四肢冷頭喜熱物包裹之更有劉河間論頭痛屬熱者亦惡寒喜熱緣熱為寒閉則其痛甚熱氣流通則痛止也然止後必復作而益甚為驗脈亦必有異理中參入桂天麻

附子細辛重者加少佐羌防法亦精

辨熱頭痛

熱頭痛脈浮而數或滑而長亦有諸口苦舌乾渴飲痛連風府與風池惡熱其常惡風暫此為風熱症大証據已顯羌防柴葛連翹苓甚則石膏用之驗

辨虛頭痛

虛頭痛脈弦而大弦則為寒大則虛痛極不堪喜得按日夜呼叫語聲嘶其痛或專在額上遍頭皆痛亦大証據

吳醫彙講

卷五

主

有之急宜參苓芪朮加附子此症失治危即死

辨風寒骨痛

風寒骨痛脈弦緊或遲而緩亦有準身熱惡寒手足冷舌上白苔口不渴拘攣遍體痠難忍甚則上嘔下利併桂枝湯內用天麻有濕去芍加附穩大証據

辨虛骨痛

脈弦而大數無力或發熱兮或不熱惡風兮拘急口淡兮神思恍惚痛在骨節兮服發散藥而痛愈劇此大証據

神氣傷也合用桂枝與芪朮大凡人身諸骨節其數
三百有六十是神氣之所遊行而出入君不見仲景
新加湯重用參姜以復陽

辨虛寒腹滿

出內經 藏寒生滿病脉遲緩兮或沉緊或虛大兮按無力腹
証據出金匱 滿時減減又甚不欲食兮食即嘔或泄瀉惡寒兮而
渴喜熱飲姜桂香砂溫散之不應再加參朮芪

辨實熱腹滿

吳醫彙講

卷五

七

脉沉而實兮主或滑與長兼腹滿不減兮減亦不足言

大便雖解而不暢兮或得解而少寬滿腹硬痛不可

按兮無吐暈等虛症之相參此宜枳朴以消之甚則

加大黃參其間

辨虛寒不大便

大便不通羣呼熱不知寒凝亦欬結腹不滿兮口不
定案 渴白滑胎兮弦緊脉此屬虛寒無浪攻照常飲食且
從容切不遲之一二十日後溫補足時氣自通

辨實熱不大便

脉數有力長滑甚煩渴腹滿按之硬或潮熱兮食即
脹時有濁氣從後逆此為胃熱宜下之一有虛症須
細審大約實症一下即愈一有虛症便須細審即必
當下者亦只用涼膈以微利之解毒以和之陶
氏黃龍湯以補而下之

辨小便不通

小便不通分虛實虛則三焦失其職屢經利水不相
合此宜金匱腎氣丸治其三焦決瀆官象牙生煎服

吳醫彙講

卷五

六

亦安實者人素強或好食熱物肺熱不能通水道以

致膀胱成熱結宜用猪苓澤瀉梔滑石用後仍不効

須向膀胱尋外竅經說毫毛是其應經曰三焦膀胱

應是三焦主腠理膀胱主毫毛膀胱有出竅而無人

竅濟泌別汁而滲入于膀胱者也毫毛是其外竅譬

如水注塞其上竅則水不能出矣如人不虛利小便

而仍不通者宜發其汗外竅通而內竅亦通此所謂

開鬼門也改從發汗最為妙又有動其胞中血虛寒實熱
隨症別虛寒便溫補熱則清熱而養血因症施方不
可執

辨嘔

其人受暴寒或食生冷物吐酸并乾嘔平胃正氣合

脈滑胃有餘飲冷不喜熱服溫熱藥嘔愈甚黃連竹

茹佐姜汁兼虛參以參加入脈或虛大數無力嘔吐

清涎及冷沫胃虛不能容穀食間食即嘔食反出入

參理中最高為良丁香附子加亦得脈滑有力症不虛

胃滿按之痛愈劇合用朴實與二陳此謂中焦之嘔

從乎積

吳醫彙講

卷五

黃

辨吐衄

熱厥吐衄必多神情清楚脈形和隨生隨吐無煩

躁瀉其濕熱勿蹉此厥陰傷寒屬風木吐衄兼吐水

清綠手足厥冷煩躁甚烏梅丸義君須請

辨汗

虛汗須分陰與陽陽虛自汗補其衛其人素虛或勞

理虛陽不能衛外而為固則自汗宜川參芪五味苓

木甚則加桂附如乾姜半夏陳皮開達之藥皆不可

用盜汗歸之陰氣虛參歸甘地從其類人則血歸

不能為守則盜汗宜參苓芪 惟有陽明邪併來熱氣

木五味歸芍生熟地之類

薰蒸毛竅開汗出溱溱常不止但宜涼解得和諧汗

心家血液之汗太陽津液之汗俱不可出惟陽明水

穀之汗雖出無害故陽症傷寒熱氣薰蒸毛竅開發

溱溱而自出亦猶滾湯貯于器中熱氣上蒸而外濕

也若汗不出熱氣不得泄必鬱而發黃即宜用清涼

以解其熱而汗自止 更有傷寒病久無汗出大劑參

芪柴桂合頓然出汗退其熱景岳書中亦曾說

辨謔妄

讖語是多言皆因胃汁乾就中讖語有實象讖字从

嚴侃侃然旋轉風輪難自主纔呼李四便張三鄭聲

氣短神蕭索鄭重煩煩不厭複一樣逢人講話多不

曾說南又道北設使讖與鄭大半屬無稽是則名為

妄虛實皆有之若夫似睡非睡間隱隱躍躍如交談

此為獨語未全亂各從脈症細詳參

辨面目赤

面目赤有三須從脈症察陽氣鬱於表辛涼可散焉

裏熱薰於上白虎及黃連無根火外浮此是內真寒

八味生脉煎冷飲假對假兮古所傳

辨下利

下清穀者為虛寒下清水者為實熱惟有膿血稀澇和汁沫此三件中細詳別假如作嘔不食兮腹痛喜按心恍惚而煩兮或動悸與頭眩燥而不欲飲兮頭眩耳鳴而口淡後重逼迫兮既解而仍不減脉弱數而虛大兮皆虛寒之外現苟脉症之反是兮即實熱之証驗

吳醫彙講

卷五

三

辨厥

手足冷時為四逆厥者其冷過肘膝伸身傷寒俱禁汗無論陽厥與陰厥陽厥是傳經病自三陽并入陰熱極必兼勝化行還有始熱終寒因藥誤也能轉入陰寒路執定傳經亦是錯陰厥是直中喻氏中寒論當誦寒邪斬關直入來急救真陽休夢夢還怕熱邪深入血頓然厥冷身無熱君不見吞痧樣子忌熱湯不比中寒一例說摠之脉症要詳參葦葦拈來生殺

間陽厥譫渴陰吐涎陽者身輕陰者蹇復看其人唇爪甲青紫為熱青黑寒又有痰厥食厥和尸厥病久陰陽二氣虛亦厥各等各樣在準繩步步須求脉症合

辨腹痛

腹痛是虛喜揉按虛者必寒病涉陰脉遲緩兮或虛大諸多虛象察其因理中桂附可施行熱者面黃澤加以長滑脉宜用黃連苦清熱少佐姜黃亦相得更

吳醫彙講

卷五

三

有欲嘔不嘔腹痛多寒熱其如錯雜何黃連湯內乾姜桂好共參甘兩下和食痛應消食難在虛寒兼食積學士溫脾法可宗許學士有溫脾湯見本事方化為煎法尤熨貼有虛寒之人患腹痛服溫補藥而相安時止時作痛仍不解甚則利清水或白沫此虛中有實或先有宿食在腸中即一或病中腸胃虛不能運化所食之物停于腸中即一二現宿糞亦能作楚宜用溫補藥煎好去渣入大黃一錢不甚虛者可加一錢五分滾四五沸服之宿食自下正氣不傷而病隨愈此屢試屢驗之妙法也蟲痛面黃吐涎沫食酸即安甜即劇虛實寒熱要分曉殺蟲方中求配合氣痛因鬱懣必連胃

腕與兩脇病久人必虛滋補兼疏鬱痛不可近者按
之濡軟為畜血不比硬滿為熱結重則桃仁承氣湯
輕者宜通微下奪別有吞痧一症現濕熱薰蒸邪變
幻急刺委中出血良磨服玉樞丹亦善最怕是三陰
寒症認為痧不飲溫湯飲冷茶亂進丹丸并放刮臨
危空自悔前差

辨脉脫

六脉俱脫者大命垂危矣神昏脉脫者死神
清脉脫者亦死通脉四

與醫彙編

卷五

三

逆急服之還怕脉因暴出死但得脉來微續生更需
附子四五枚人參小半斤周時服盡休間斷隨進米
粥始回春參力偶不繼前功必盡棄平時無學力到
此滋疑懼每見虛寒之極服溫補躁亂不寧嘔且吐
此為藥力尙未全切莫心疑換別路大約三陰病症
露危劇急則六日或三日緩則行期十二日幸而君
火未全衰反見舌乾等症出更須姜附助其陽漸得
陽回舌生液若見舌乾投涼劑壞乃百年人壽事起

手果然認得真斷不朝三與暮四君不見景岳全書
用法精十補一清巧相濟又不見嘉言寓意重叮嚀
陰症轉陽必自愈濟困扶顛道在斯一有游移便錯
去更有虛寒服藥來溫補不安涼適意兩寒相得從
其類正氣收壞決不治至于實熱失汗下脉伏似脫
君休怕大承十棗用即安神氣分明現真假須知實
熱治可緩涼瀉一投撥便轉不比虛寒救濟難仁術
全憑思與辨

與醫彙編

卷五

三

吳醫彙講卷六目錄

康作霖

三皇藥王考

顧祖庚

脈訣正訛

三焦論贅言

認疫治疫要言

何桂巖

趨庭雜記 計四則

吳醫彙講 卷六目錄

劉九疇

辨醫書音義 計三則

夏月忌枳說

翁壽承

喜傷心恐勝喜解

恐傷腎思勝恐解

思傷脾怒勝思解

怒傷肝悲勝怒解

憂傷肺喜勝憂解

陶厚堂

百合病贅言

吳醫彙講

卷六目錄

吳醫彙講卷六

長洲唐大烈立三氏纂輯

吳門汪元軾正希氏參訂

康作霖

名時行號竹林園學生松江吳縣人遷居蘇城王天井巷年六十八歲歿於乾隆壬辰此稿係高弟周泰來付梓泰來名稷即住先生故宅

三皇藥王考

自古三皇畫卦而分陰陽辨藥而作本草論病而垂內經吾醫開教於三墳至今尚讀其傳書內而醫院外而醫學並奉為主祀列入條編者也至唐而有韋

吳醫彙講

卷六

氏名訊道號慈藏者施藥濟人世入共仰為藥王醫史可考則是藥王之距 三皇已隔唐虞夏商周秦漢晉及南北朝十餘代矣今有無知僧道以藥王之像塑為卉服與 神農之像無異藉以通書所載每年四月二十八日藥王誕之語影射混淆惑人酬款以致庸俗之人誤稱 三皇為藥王殊為可笑查

欽定禮科則例現載

京師先醫廟奉

三皇於南向配勾芒等四位於東西向又分列僦貸季等二十四位於兩廡由上古而遞次

及唐藥王韋慈藏現與啓元子王冰東西對列則例彰彰吾醫之有 三皇猶儒者之有 孔子也若夫藥王較之程朱諸子尚有間焉譬諸范歐諸儒庶幾相近今以若賢若神之號而與開物成務之大聖人相混褻慢甚矣故特考而辯之

吳醫彙講

卷六

七

顧祖庚 名彭年號雁庭國學生住郡城官巷

脈訣正訛

四言脈訣始自崔紫虛嗣後校者纂者頗多迨至明季李士材醫宗必讀中之所著固為盡善而亥豕之訛尚有未正 彭也 不才謹陳管見以俟 高明鑒定
脈形主 沉弱陰虧句陰字誤刻當作陽字蓋沉弱皆病脈有陰無陽豈非陽虧況上文有浮濡陰虛句是此句之緊對面為可徵也註中即作陰字解乃因訛承誤

吳醫彙講

卷六

三

奇經八 尺外斜上至寸陰維尺內斜上至寸陽維句
註中以二脈分左右恐未必然李瀕河云陽維起於諸陽之會由外踝而上行於衛分陰維起於諸陰之交由內踝而上行於營分所以為一身之綱維也既為一身之綱維何得以左右分言之且言經位仍以三焦列於右尺小腸列於左寸與所著脈法心參之三焦分列三部小腸列於右尺之論自相矛盾此亦有訛

五臟本 腎在左尺沉石而濡句字必有訛按訣中曰

浮小為濡又本集脈有相似宜辨篇中曰濡與弱皆細小也濡在浮分重按即不見也弱主沉分輕取不可見也如此則濡脈不得與沉脈並見而此處又何以並稱耶考諸內經云平腎脈來喘喘累累如鈞因思而濡二字形似喘喘二字所以誤刻當作喘喘讀之但久訛莫正此何故耶豈因喘喘義與庸淺按錄反以喘喘為誤而改之繼而蕪蕪悅口習焉而不察耶抑因濡字有奐音從來賢哲止作奐音讀之即作奐字解之而不作脈名則於脈義似乎不犯所以未

吳醫彙講

卷六

四

之或按耶然既有濡脈而此又以非濡脈之濡字混淆不清恐不足以教天下 彭 反覆推勘終不若以內經喘喘二字易之非惟不與濡脈相混而與形容胃氣之義較濡奐二字更為超妙也

右尺相火與心同斷句疑有衍文蓋兩尺皆腎部也內經於中附上上附上皆言左右而於尺則獨曰尺外以候腎並不言左右可見兩尺皆腎一定之位右尺既亦屬腎脈亦宜同左尺之沉石矣若與心同則上文心脈是浮大而散豈此腎部亦浮大而散乎或

曰心字乃腎字之誤當作右尺相火與腎同斷其理固通但相火位居命門正中不偏不倚不過驗脈之法附於右尺其脈自宜以腎為主相火為附若讀作右尺相火與腎同斷則文法例裝主客不明愚意不若直貫之文作右尺亦腎相火同斷讀之方見得右尺亦屬腎部其脈自必同於左尺之沉石喘喘矣不過較其大小有力無力以徵相火之衰旺故曰同斷耳

三焦論贅言

吳醫彙編

卷六

五

嘗讀難經叔和啓元諸大賢三焦論皆謂有名無形又讀靈樞經曰密理厚皮者三焦厚粗理薄皮者三焦薄勇士者三焦理橫怯士者三焦理縱則似乎有形矣及觀李士材曰肌肉之內藏腑之外為三焦亦無形也而士材又以無形為誤而以靈樞之厚薄縱橫如霧如瀝如瀆以徵其形則三焦究屬有形耶無形耶謹贅一言以辨之夫三焦者即胸膈腹內三空處也諸大賢皆謂有名無形者所以別其不同於他藏他腑之自具一形耳非曰無形即無其處正欲指

空處故曰無形也靈樞謂厚薄縱橫者即借胸膈腹之腔子裏面為言非另具一形而為厚薄縱橫也經又曰如霧如瀝如瀆而中焦又有作如瀝者蓋即指胸膈腹內空處之水氣為喻如果有形則霧乃氣聚有時而散瀝為水泡時起時沒瀝是餘滴可有可無皆無常形豈可比之上中二焦乎至於下焦如瀆者亦不過以溝瀆中水道比下焦之水道非以溝瀆之穀子相比較也即士材所謂肌肉之內藏腑之外雖有其處原無其形何反以無形為誤豈其意以既有其處即不得謂之無形耶然處與形不同有其處內經所以云云無其形諸賢所以定論先聖後賢言似異而旨實同也惟陳無擇言有形如脂膜疑未妥協蓋脂膜乃身中原有之物三焦之形如之則又一層假脂膜也假脂膜與真脂膜其何以辨哉故敢謂其未妥

吳醫彙編

卷六

六

認疫治疫要言

疫癘之證病家每每忌諱醫家故不明言然口雖不
必明言心內還須認清若認之不清不但用藥無効

而且開口便差認疫若何於聞見中但有兩三人病情相同者便要留心留心若何病有來踪去跡怪怪奇奇傳變遲速不近情理較諸正傷寒風溫濕熱濕溫暑暘等門迥乎大異者即疫也脈證不必大涼而服大涼之藥似有害而終無害者即疫也脈證可進溫補而投溫補之劑始似安而漸不安者即疫也治疫之法總以毒字為提綱憑他如妖似怪自能體會無疑君如不信試觀古今治疫之方何莫非以解毒為主吳又可之專用大黃非解毒乎張路王之酷喜人中黃而以童便配葱豉為起手方非解毒乎葉天士之銀花金汁必同用非解毒乎至於犀角黃連生甘草等味十方九用非解毒乎故嘉言喻氏有要言不繁曰上焦如霧升而逐之佐以解毒中焦如瀉疏而逐之佐以解毒下焦如瀆決而逐之佐以解毒觀其旨上中下則有升疏決之異而獨於解毒一言叠叠緊接不分彼此豈非反覆丁寧示人以真諦也哉

吳醫彙講

卷六

八

何桂巖 各國棟號齋曾在吳縣醫學訓科世居
生所論心逸名馳號被萬年
五十五歲歿於乾隆庚子

趨庭雜記

憶余少時嘗讀內經云肺藏魄肝藏魂又云肺主氣肝主血夫既清陽之氣歸之於肺濁陰之血歸之於肝又何以清陽之氣不歸於肺金濁陰之血不歸於肝木哉以是析疑於先子先子曰噫汝之愚也然亦不可無此一問蓋人法天地稟賦陰陽先天皇極乾南坤北離東坎西是以東離日府反藏庚位之金雞西坎月宮又賴甲方之玉兔金中有木木中有金金情戀木木性戀金是天地沖和之道也肝魂肺魄更何疑哉

相傳孫思邈有降龍伏虎之說余問於先子先子曰此亦當時之寓言耳蓋今之肝氣橫逆脇痛嘔惡目張痙厥非猙獰之逆龍乎而肺氣不宜喘急痰壅便溺俱無非猖狂之猛虎乎當此之際有慧心明手一劑而其病如失是即思邈之降龍伏虎也子輩讀書由此說而隅反之自可日進於高明矣

吳醫彙講

卷六

八

竊怪今之人學術未精每咎於藥品之未醇或嫌膠之不陳或憎連之非川川桂無交趾之產川尤難於邑之真設辭卸責不知上古之世衣服官室尚有未全金石草木之品豈如今之悉備耶然古人未嘗不治人也且醫之有藥猶繪事之有色也青黃赤黑色之常也而淡紅微翠嫩綠嬌黃乃繪家均合之巧寒熱溫涼藥之範也而大小緩急奇偶輕重亦由醫者配合之微妙耳嗟乎可以醫而不如繪者乎

吳醫彙講

卷六

乙庚黑氣橫於丙辛青氣橫於丁壬赤氣橫於戊癸余潛心離對難以自明及讀天元問文有丹天之氣經於牛女齡天之氣經於心尾蒼天之氣經於危室柳鬼素天之氣經於亢氏昂畢元天之氣經於張翼婁胃因以張介賓所繪運氣圖玩索之始悉天干與二十八宿所處之向所合之位讀時雖少開茅塞然其合化之根源一定不移之法則尚難胸中明瞭確乎無疑由是問於先子先子曰天下之事不出乎五行而河圖為五行之祖今爾以合化之所以然而欲

逆流窮源蓋以河圖思之也夫河圖之數一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合試屈指天干之次第甲數居一已數居六乙數居二庚數居七丙數居三辛數居八丁數居四壬數居九戊數居五癸數居十即河圖生成之數土為萬物之母故以為首而相生合化也此至簡至易之事而人多未有悟及者也

吳醫彙講

卷六

十

浮 遲 滑 虛 長 洪
沉 速 澹 實 短 微

要 緊 弦 促 革 散
弱 緩 動 結 牢 伏

劉九疇名天錫號桐泉住閩門外河田

辨醫書音義

傷寒書有噫氣不除句今人以噫字讀作依字聲者居多因四書註噫心不平聲也但此噫氣田中氣不和胃氣上逆與心不平聲義不合攷字典音於介切應讀隘字之去聲為是

脈訣二十八脈內有濡脈註云與爛綿相似今人讀作如字聲者居多然非濡滯之義攷字典濡字有而囚如柔與五音莊子有濡弱謙下為表句與與字之

吳醫彙講

卷六

義頗合則此濡脈宜讀與字為是

痺者閉而不通之謂也字典兵糜切音秘今人多念作避字聲者非

夏月忌枳說

枳殼枳實皆破氣之品夏月乃熱傷氣之令二藥非宜故暑濕熱三氣門方中惟陽明實滿不得不與承氣湯者間有用之其餘皆不用此古人製方之意若有不謀而合焉今人未能體會每於暑熱之時任意用之是何讀古人書而漫然未覺耶或曰枳不宜於

夏令檳榔尤甚矣余曰不然夏月之邪三焦受者居多非檳不達故為要藥枳不能通三焦故為時令之禁

吳醫彙講

卷六

十一

翁壽承 名介壽號南軒曾在吳縣醫學訓科住珠明寺南

喜傷心恐勝喜解

心有所樂謂之喜何反謂其傷心哉凡人之氣以平為期不及者病過者亦病經曰心藏精神有餘則笑不休試即以不休二字味之乃樂之過而失其正也當此樂以忘憂之際有放心而不知求其心所藏之神不亦因之而渙散乎至於恐能勝喜其義維何蓋喜為心志恐為腎志水能制火既濟之道也抑更有顯而易見者人當極喜之時適有恐懼之事猝然遇之莫不反喜為憂者惟以喜之情緩於恐而恐之情急於喜也是僅以水火尅制之理言之或近傅會而不知勝復之道本乎人情實有沒相印合者

恐傷腎思勝恐解

恐為腎之志何即傷腎乎蓋腎者主蟄封藏之本喜靜而不喜動恐則氣下偏能動之如張子和云恐氣所致為骨痠痿厥為暴下清水為陰痿為懼而脫頤凡此諸症非皆傷腎之明驗歟若善思者處此即非常臨之自有定識豈得以恐懼搖其意見哉况思慮

之志出乎脾以思勝恐亦即以土制水論情論理亦適符也

思傷脾怒勝思解

脾志思而肝志怒木能尅土此其理也而曰傷曰勝義亦顯明岐伯曰思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣蓋脾處中州而屬土喜健運而惡鬱結思則氣結故曰傷也况思雖為脾志而實本乎心心者脾之母也今以多思而心營暗耗母氣既虛則所以助脾者亦寡矣若夫怒可勝思不言而喻嘗見人熟思審慮之時忽有拂逆之加一朝之忿無不為已前此之思之弗得弗措者至此而無暇計及矣此無他亦惟人之常情有緩與急而已矣

怒傷肝悲勝怒解

肝為木臟欲散而苦急經曰肝氣虛則悲實則怒又曰怒則氣上夫以將軍之官至剛之臟復以嗔怒而助其氣是急也非散也故曰傷也若夫悲者有所哀痛而然也經曰悲則氣消則當氣逆之時適以此消氣者值之謂之曰勝誰曰不然。或曰四志所勝皆

果醫彙編

卷六

七

果醫彙編

卷六

十四

與五行尅制之理合茲怒爲肝志何獨非肺志之憂勝之而云悲勝怒乎蓋喜怒哀思悲恐驚其情有七而五臟止有五志故遺去悲與驚二者以悲與憂相類皆屬不遂其心也驚與恐相類皆有所怯也惟悲之情較急於憂故其勝怒爲更切耳由是觀之卽謂之憂勝怒亦何不可

憂傷肺喜勝憂解

肺爲氣主忌乎膈鬱經曰憂愁者氣閉塞而不行是憂能傷肺之由也至於喜可勝憂其義何居亦考諸岐伯曰喜則氣和志達營衛通行故氣緩矣則以閉塞者而和緩之豈不得謂之勝乎然亦更有顯明者凡人有所憂愁每多胸膈不舒適逢歡快之事卽可情懷開曠此尤情性之常寧獨火可勝金而已哉

吳醫彙講

卷六

十五

陶厚堂

名宗瞻號龍庭住和豐倉前

百合病贅言

此症行止坐臥皆不能安自朱奉議以爲傷寒之變證後之註金匱者或言屬氣或言屬血論說紛紜余竊以爲皆未中肯夫百脈一宗悉致其病乃本乎心神渙散也心主脈故心病而脈爲之皆病矣惟其心神渙散故下文常默默不能食不能臥不能行數句無可奈何之態皆所以形容百脈悉病之語未經誤治病情如是者乃爲此病之正故用百合而加生地

吳醫彙講

卷六

其

黃汁顯爲五志之火消燦心陰於是以此救之經所云津液相成神乃自生之意也此外因誤治之變而隨症治之如金匱所立數方亦不過畧舉其槩以令人隅反設未用汗吐下三法而曾或寒或熱或補或瀉之藥以誤治者治法亦宜權變惟在法古者之外伸觸類耳趙以德衍義云病多從心主或因情欲不隨或因離絕菀結或憂惶煎迫致二火鬱之所成最爲切當情其有見及此而未明言心神渙散之故註中反雜以熱毒瘀血等解殊爲白璧之瑕昔張路王

治孟端士太夫人此病用生脈散加百合茯苓龍齒
 稍兼黃連而病愈蓋以百合攝神之法而推廣之洵
 為能讀仲景書者矣第安神之藥不一而專取乎百
 合者因其形像心瓣瓣合抱取其凝合渙散之心神
 由是而百脈皆利矣嘗聞中吳紀聞云百合乃蚯蚓
 所化張路玉亦曾親見於包山土罅中有變化未全
 者大畧野生百合蚘化有之夫蚯蚓性動而專通經
 絡及至變而為百合則由動而靜由散而合用為主
 治即此意耳且百脈悉病則病變百出非經文數病
 之所能盡設或症不盡合乎經文而遇病態類此者
 亦宜體會其意而推測之不可泥定下文數症也當
 明欲食不能食等句乃無可形容之辭病為神病而
 難以形容醫者亦須神會而非語言文字之所能罄
 者矣景岳云無形者神也變幻倏忽換回非易引經
 文粗守形上守神二句而歎安得有通神明而見無
 形者與之共談斯道哉有哉是言也向來註者多以
 百合為消瘀血然消瘀血者乃赤花之山丹非百合
 也蘇頌以病名百合而用百合不識其義李士材曰

亦清心安神之効耳士材能見及此而未發明此症
 之機要殊缺典也

醫家類 卷之六 太

吳醫彙講卷七目錄

王鳴岡

辨脾胃升降

管象黃

氣有餘便是火解

東垣景岳論相火辨

古今元氣不甚相遠說

四時皆有傷寒說

姚德培

吳醫彙講卷七目錄

幼科似驚非驚辨

痘科伏毒急於悶症識

唐立三續刻

司天運氣贅言

週身經絡總訣 有小序

頭上諸脈 在手經諸脈 足經諸脈 臟腑中諸脈

吳醫彙講卷七

長洲唐大烈立三氏纂輯

吳門周 桂思哲氏參訂

王鳴岡

名鳳樞號牀山國學生世居十全街

辨脾胃升降

余嘗攷治脾胃莫詳於東垣求東垣治脾胃之法莫精於升降夫升降之法易知而升降之理難明其在經曰脾胃為倉廩之官五味出焉蓋脾主生化其用在於無形其屬土地氣主上騰然後能載物故健行而不息是脾之宜升也明矣胃者水穀之海容受糟粕其主納納則貴下行譬如水之性莫不就下是胃之宜降也又明矣故又曰清氣在下則生殮泄濁氣在上則生臃脹夫清氣何蓋指脾氣而言不然何以在下則殮泄也其濁氣何蓋指胃氣而言不然何以在上則臃脹也是非可為脾升胃降之一確證乎由此而推如仲聖所立青龍越脾等方即謂之升脾之清氣也可其所立三承氣諸方即謂之降胃之濁氣也無不可觸類引伸理原一貫先聖後聖其揆一也

考東垣所著補中益氣調中益氣升陽益胃各方其論雖詳於治脾胃於治胃而其意則一臟一腑升降各有主治顯然不可混者其與先聖之理又何嘗相悖而後先輝映足以發明千古良可師也苟其顛倒錯施俾升降失宜則脾胃傷脾胃傷則出納之機失其常度而後天之生氣已息鮮不夭扎生民者已余偶讀東垣書詳究脾胃以辨其升降之理如此

長壽堂講

卷七

七

管象黃 名鼎號純齋又號佛容世居蘇城雙門內平江路之管家園

氣有餘便是火解

昔賢有云氣有餘便是火此當專以病氣立論若元氣有不足而無有餘者也何則氣化於精精生於水穀故人情一日不再食則饑饉則氣怯而倦怠若飲食適宜起居有節始得元氣充流一晝一夜正合二萬三千五百息為人身之常度故聖人御氣如持至寶非以氣之易於不足乎自夫風寒暑濕燥火六淫之氣外侵營衛經府阻塞正氣流行出入之道遂致

長壽堂講

卷七

三

勝理閉塞胸膈痞滿二便不通種種顯病氣有餘之象而元氣已形內餒之機醫者但當察其所因如風則用和寒汗之類即不致化火而元氣復矣若治不中要病氣留着則六者皆可化火即熱病為傷寒之類而病機十九條屬熱者多是也故曰氣有餘便是火即七情之病亦莫不然如喜太過則喜氣有餘而心火熾怒太過則怒氣有餘而肝火炎此尤當從臟氣之陰陽虛實而調劑之若執是說以往不曰破氣降氣即曰清火瀉火吾恐少火生氣一傷則俱

傷一敗而難復非衛生之道也豈古人立言之旨哉

東垣景岳論相火辯

東垣曰相火者元氣之賊也丹溪述之景岳非之論曰情欲之火邪念也邪念之火爲邪氣非相火之所爲也二家之說俱有詞障夫相火者腎中之真陽稟自先天爲人生之根本云爲動作賴之以立衰則病息則死老子曰一生二周子曰無極而太極太極動靜而生陰陽是相火一人身之太極也太極不能無動然動而有節卽是少火以生氣動而無制則爲壯

吳醫彙講

卷七

四

火以害氣如水能浮舟亦能覆舟實一相火之所爲豈得另有邪火也故人之喜怒哀懼不過五藏之本志男女大欲則又萬物之化醇是皆天地間經常之理原不至於傷生惟狂蕩無節斯爲害耳然相火既定位於下焦蒸騰發育夫能使之理勝而安欲勝而危者則惟一心故心爲君火經曰君火以明相火以位又曰主不明則十二官危此其尤大彰明較著者也大學正心釋氏降伏其心養生者善治其心則推而極之爲聖賢爲仙佛守而持之康寧壽考若舍君

而言相無怪乎或爲元氣之賊或爲生氣之本意直岐趨則瀉火補陽爭門角立黨同伐異欲爲闡發前賢恐先與經旨相謬

古今元氣不甚相遠說

五方風土異宜古今元氣不同醫林每奉此二語爲治病立方之要旨以爲西北高燥多寒東南卑濕多熱高燥則筋骨勁強卑濕則肌肉柔弱此分形勢之剛柔非以判本原之強弱故內經異法方宜論五常政大論聖人早爲詳言之至古今元氣不同則愚竊

吳醫彙講

卷七

五

有說焉皇古之世壽稱千百薦紳先生難言之或者書缺有間未足徵信歟尚書載自帝堯以來則皆彰彰可考所謂元氣之厚薄必徵諸壽數之短長故古人之元氣不可見而古人之壽數有可稽唐虞三代已不聞有數百歲之人觀之孔顏尤明驗也仲師挺生於漢爲製方之祖其用藥也不啻數倍於今由其察脈真審證確任使精專一湯日作數服病愈或不察劑蓋有是病必用是藥去疾務盡斷然也然非謂漢時氣厚則可也古者以百歲爲上壽七八九十

者為老遞降而天殤自漢迄今果有異歟蓋至誠無息天地之體未有久而漸薄之理惟天地無心於造物人稟天地之氣以生者原各得此百年之用而修短不齊者人自有其厚薄耳今古一轍也不然軒岐垂教長沙祖述豈專為一方一代之言哉若謂今之人稟氣日薄則善乎徐泗溪有草木之性隨之亦薄之論此又不移至理也自元氣不同之說行羣以古法不宜於今麻桂慮其亡陽薑附畏其劫陰柴葛以升而代之硝黃以厲而製之即偶然一用不過數分

吳醫彙講

卷七

六

病則猶是也藥則不及矣安能奏效乎因是邪不素正立亡始之以謹慎愛之者終之以因循害之也故愚以為學者當專務審證辨脈既得證因之本幸勿拘元氣不同之見當宗古人用藥而稍減之矯今人立方而增重之庶幾病氣速除生機不息矣鼎也學識淺陋有志未逮書此以俟之

四時皆有傷寒說

三陽傷寒俱有表證至於三陰既無表證可據而又何必一日太陽二日陽明循經而傳卒然直中無拘

太少今試有人卒然患得三陰條脈證醫者診視將不知目為何病無論治之也故有謂南地無傷寒者非無傷寒實有之而難於識難於治也寒者天地之一氣傷寒者舉一以名書一百一十三方果皆治寒之劑哉猶魯史錯舉四時而名春秋也竊謂傷寒一證不特霜降以後春分以前有之即三時皆有之不過因時易名春溫夏暑其證治已全其於三百九十七法中在學者能通其變耳是傷寒實備六氣之治厥後或專論溫熱或專主三焦或主心營肺衛要不

吳醫彙講

卷七

七

過傷寒中之一氣一經未足以窺全豹也讀書貴在參悟不可如小僧縛律如邪中三陰不必皆寒故三陰亦有熱下證直中三陰多兼內傷故三陰每多溫補證又况外感不出六經內傷無過五臟然則傷寒一書并可以概雜病何時何地無之哉溯心源於長沙當必沉潛反覆於其書猶必詳審於無表證之治則宮墻雖峻庶幾可窺

姚德培

名本厚號芬溪世居圓妙觀東

幼科似驚非驚辨

幼科驚症自喻氏以食痰風驚四字立名大剖從前之訛實為確論葉香巖亦宗之然更有未盡者近多冬令氣暖失藏入春寒溫間雜小兒吸受其邪先傷肺經起自寒熱氣麤延綿失治漸從胞絡內傳上部雖有微汗而痰多鼻煽煩躁神蒙病家惶懼輒云變為驚症動用香開妄投金石以致陰液消亡執勢愈張正不敵邪肝風陡動漸見肢牽目竄痙閉發厥勢多傾敗若於病未猖獗之前先以辛涼開肺繼以甘寒化熱佐以潤劑降痰兩候自能痊可此蓋溫邪陷入陰液內耗而動肝風實非驚恐致病也若誤以驚藥治之恐幼穉之舍冤不少故為之一辨

痘科伏毒急於悶症說

痘之一症先賢立論甚詳但近時氣候變遷竟有不
同於向日者莫甚於伏毒而為時癘壅遏初起寒熱
悠悠腰腹並無痛楚兩潮而見點亦色潤而形單並
非要害之處身熱未解得嚏便通根窠雖立不易掀

發一到三朝神蒙氣喘癡點全無唇不腫而口不渴
火伏內攻迅如反掌痘未退縮即已喘閉告竭雖多
識者進以芳香雙解大劑劫奪一無奏績亦未如之
何也已矣

吳醫彙講

卷七

九

唐立三續刻

司天運氣贅言

內經氣交變大論詳言歲運六元正紀大論詳言司天在泉而今似有不驗者何歟蓋歲運已分太少而一歲之中再分為五運五運之中又分主客主客之中又分太少司天在泉再與間氣分而為六六氣之中又分主客是每候中必有歲運與司天在泉及主運客運主氣客氣六者矣角徵宮商羽與風火濕燥寒雜合於一時變化靡窮無怪執歲運之說者司天

與醫彙講

卷七

十

在泉不驗執司天在泉之說者歲運不驗執五運六氣之說者歲運與司天在泉皆不驗幾疑古聖賢書為不可盡信矣不知五運六氣經文雖逐一分言而未及合參之理然天元紀六微旨一篇論至天符歲會則參合而言如天符乃歲運與司天相會奉天行令而主半年譬之相輔也故曰執法也故中其病者危而速也歲會乃歲運與年辰相會猶為平氣而主一年譬之方伯也故曰行令也故中其病者徐而持也至於太乙天符則司天歲運年辰三者會合偏盛

極焉故中其病者暴而死也吾儕在醫喻醫如一方中純寒純熱其性自偏服之未有不驗者其非天符歲會之年五行錯雜猶之一方中苦辛相制寒熱雜陳則氣味皆輕自不覺其利害耳天符歲會如此可知五運六氣亦須參合以類推矣內經未言及此者提其綱而畧其目也然余更有說者經言中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死日中曰其乃指偏勝之時即中此偏勝之邪於是其病如斯非泛言其年得病無論風寒暑濕燥

與醫彙講

卷七

十一

火一槩如此斷也况偏勝之時雖必有其邪亦非舉世之人而盡中之也或起居不慎或寒暖失宜凡屬外感皆然再壯者氣行則散怯者着而為病則是中其邪者本非常有何謂經文之不驗耶愚意以為運氣之說如此抑更有釋天符太乙之說者謂非一年之病皆然當以得病之一日為言如戊子日亦稱天符戊午日即為太乙似乎近理而與中其二字究隔一層仍當作值其日而中其邪或合以其年其日而中其邪如此推之竊謂斷無不驗者

週身經絡總訣 有小序

治病須分經絡古人以經界喻之猶夫射之的御之
範也靈樞經脈一篇為我醫所必讀惟是其文參差
繁複習者苦之東垣編為歌訣 國朝注詁庵更為
諸暢可謂記誦無難矣惟是熟此經脈於逐經之起
止循行雖已了了而人之身體每一處有兩三經或
四五經錯綜循及者皆散見於各經之下臨證倉卒
未免或遺 烈不揣愚陋竊以人身自顛至足凡十二
經絡行及之所彙而輯之再奇經八脈除帶脈及陰
陽維躄皆簡明易曉可無纂輯外其衝任督三經亦
為摘入做四六之體編為俚句而不拘拈對不嫌粗
俗惟求便於記誦俾人之身體四肢一云某處便識
為某經某絡實為臨證辨經分經議治之捷徑但不
敢曰熟此總訣竟可置經文而不讀也譬之本草綱
目既已按藥而治病復有本草類方為之按病以集
方二者縱橫為用尤為心目瞭然耳

頭上諸脈

蓋問手之三陰從臑走手

手太陰肺少陰心厥陰心包

手之三陽

從手走頭 手少陽三焦陽明 足之三陽從頭走足 足太

陽膀胱陽明 足之三陰從足走腹 足太陰脾少陰

胃少陽膽 逐一而分言茲乃合編而便讀膀胱之脈交於巔肝

與督脈會於巔絡腦須知膀胱督 惟欲便於誦讀故

際循乎胃脈胃至額顛 髮際下 膽抵頭角上額者督

與膀胱 直上 出額者其惟肝脈 直出 目系連於肝脈

心之支者並繫目之內角名曰內眥小支至而膀胱

起胃經還約於其旁 小腸之支者至目內眥膀胱之

交頰中旁約太陽之脈 目之外角名曰銳眥 背膈接焦

下循鼻外 約一作納 支三焦之支者至目銳眥 小腸亦至目下為頤 音

皆膈脈起於目銳眥 兩旁為頰大小肝焦而上下 夾

橫骨為頰大腸貫頰小腸上頰 肝 小腸之支斜絡於

頰督脈至於鼻柱胃脈起於交頰 即山 大腸之支挾

鼻孔而交中挾口 從下齒還出挾口交人中左之右

交足陽 胃經之脈循鼻外而挾口環唇肝又環於唇

內胃又交於承漿 下唇 胃經之脈入上齒大腸之支

入下齒頰前大迎胃脈出而膽支下 頰下為頰領前

陷中為大迎 頰下為頤胃脈循而任脈上 胃脈循頤

乃胃經穴 後下廉

耳之上角焦支出而勝支至客主人穴膽出走而胃

脈過耳前上廉起骨日客主人乃膽經穴膽脈之支

人三焦之孫脈出走客主人前靈樞云經脈為裏支

者為孫此支之岐者故曰孫脈後仿此小腸與焦膽三支並入耳中膽

脈焦支繫於耳後膽支胃脈循在頰車耳下曲骨咽

有小心脾腎之脈小腸脈循咽心脈之支者喉為胃

支腎脈之循二脈循肝循喉後而人咽頰脈循喉

入咽頰頰頰一脾連舌本而散舌下腎脈拔乎舌

本胃支下在人迎結喉旁一寸五分動脈此為諸陽之會先須

吳醫彙講 卷七

廿四

大畧而陳

在身諸脈

原夫腦後為項膀胱督脈與焦支兩旁為頸大小腸

支同膽脈肩髃骨之前廉大腸出之肩後之下為脾

膀胱循也焦膽小腸交合於肩會於大椎者為肩腎經督脈

並貫於脊脊骨兩旁第一行相去各一寸五分挾脊

肉為脊膀胱循之而挾脊脊骨兩旁第二行相去各

三寸成片骨為胛音夾小腸繞而勝支貫至於肩前陷

下名曰缺盆焦膽胃腸並入其中是以膽脈循胸三

焦布膈上焦兩乳中乳內廉乃胃經直下腋之中分

膽經包絡心包絡亦有直者支者之分恐辭句繁複

以別之腋下為包絡之過心直下而肺橫出脇裏為

膽脈之循心包出而肝經布脇骨之下為季脇須識

膽經之過臍下四寸為中極當知在脈之起在脈起

之然而任脈當臍衝胃挾臍脾脈入腹胃支循腹肝

脈上抵乎小腹膽胃出入於氣街臍下毛際兩旁動

衝乃胃膽繞毛際為毛際肝環陰器此在身軀之

脈所當臚列而明

吳醫彙講 卷七

十五

臟腑中諸脈

其在臟腑之脈太陽與少陰為表裏手太陽小腸少

陰腎少陽與厥陰為表裏包手少陽三焦厥陰心陽明

與太陰為表裏足陽明胃少陰脾凡此六經脈皆

互絡手足同然無煩詳贅如肺經絡大腸大腸脈絡

更有肺之一臟心直上而腎直入胃之一腑肝脈挾

而肺小循肝脈挾胃肺脈還循心有腎支之絡肝有

腎經之貫脾支又注於心中肺脈自起於中焦心下

有膈淮膀胱為無涉十有一經皆上下而貫之膈心下

通隔濁氣不使上薰心肺惟膀胱之脈按此屬臟腑
春抵腰中入循脊絡腎屬膀胱故不貫膈

手經諸脈

論平肩肘之間乃號為膈音柔俗名大臂膈之內廉有三肺
循前而心循後包絡恰循乎其間膈之外廉有三小
循後而大循前三焦乃循乎其外膈下為肘三焦上
貫內廉尺澤包絡入之包絡之支者入肘肺則下於
內前心又下於內後肺脈下肘中心脈下肘內惟肺
別為小腸出於內側兩筋大腸入於外廉肘下為臂

吳醫彙講

卷七

十六

包仍在中即上文支者大循上而小循下心脈仍循內後

廉上骨下廉之內仍循肺脈臂外兩骨之間還出三

焦肺入寸口而循魚際腕前動脈為寸口大指後肉

心抵銳骨而入後廉心脈抵掌後銳骨包絡直入於

掌中從曲澤行掌後兩筋之間橫紋陷中入掌中三焦仍循平表腕大腸

出於合谷而上入兩筋之中合谷俗名虎口大腸經穴小腸循於

外側而出腕下之踝循手外側上腕出踝中肺脈出

於大指包絡出於中指次指為肺支腸脈之支肺脈

者直出次指內廉出其端四指為包孫焦脈之接三

焦又上出小次之間小指為心脈小腸之接所謂手
經大畧如斯

足經諸脈

至如尻上為腰膀胱脈抵背脊下橫骨為腰腰下為臀膀支
貫之兩旁捷骨之下各髀樞而膽橫膀過一名髀厭
髀厭中膀胱之髀厭者過髀樞前面氣街之下號髀關而胃經直下
股之內廉前廉脾而後廉腎又肝脈內循於股陰股
外為髀後膀支而前胃脈髀前膝上六寸起肉又膽
脈下循於髀陽循髀外行太陽陽明之間是以挾膝筋中為臑膝

吳醫彙講

卷七

十七

蓋仍屬胃經之直下而膝內脾經內前膝外膽脈外

膝後曲處為臑還是膀支之直入而腎出肝上俱在

內廉腎脈出臑內廉脾腎上於臑內臑足肚也二膀

支貫於臑外從臑中下貫臑臑下於外輔骨前而直

抵絕骨之端髀骨為輔骨外肝斜於脛胛內側而胃

循脛外之廉內踝有脾前腎後之分外踝有膽前膀

後之別跟上下兩旁大指節後為核骨脾經脈過足外

側骨為京骨膀脈支循腎入跟中胃膽循跗跗上廉

乃肝經循處足心中有腎脈斜趨湧泉大指甲後屬

膽支肝脈之交大指內側為胃支脾脈之按中指內
外分胃直胃支之入四指之間又膽經直入而終膽
支至於小指之外腎脈起於小指之下足經之脈又
如此也

吳醫彙講卷七終

吳醫彙講

卷七

七

吳醫彙講卷八目錄

朱應皆

木鬱達之論

頤壽頤字辨

方藥等分解

楊存耕

保護元陽說

楊立方

讀傷寒論附記

吳醫彙講

卷八目錄

屠彝尊

論白痞

李純修

爛喉痧論

祖鴻範

爛喉丹痧治宜論

陳元益

痧疹今昔不同治法亦異說

薛活人書婦人傷寒之說

唐立三再續

攝生雜話計八則

吳醫彙講 卷八目錄

吳醫彙講卷八

長洲唐大烈立三氏纂輯

門人顧 豐來吉氏校訂

朱應皆 名升恒號玉田國學生住宋仙洲巷

木鬱達之論

內經云木鬱達之古來註釋者以達為宣吐又云用柴胡川芎條而達之愚謂此不過隨文訓釋而於達之意猶有未盡然也夫木鬱者即肝鬱也素問云治病必求其本而鬱症之起必有所因當求所以因而

吳醫彙講 卷八

治之則鬱自解鬱者既解而達自在其中矣矧木鬱之症患於婦人者居多婦人情性偏執而肝病變幻多端總宜從其性適其宜而致中和即為達道彼若吐若升止可以言實未可以言虛也今人柔脆者恒多豈可槩施升吐哉其餘火土金水四鬱古人之註釋雖於經義未必有悖然亦止可以言實止可以言外因未可以言虛未可以言內因也蓋因鬱致疾不特外感六淫而於情志為更多調治之法亦當求其所因而治之則鬱自解鬱者既解則發奪泄折俱在

其中矣因者病之本本之為言根也源也君子務本本立而道生可師也

頤毒頤字辯

按時病之後多有發頤毒之症然古人又有云遺毒者愚謂當以此遺字為正蓋遺者遺留也謂餘邪未盡遺於經絡以致榮氣不從逆於肉理乃生癰腫也頤者但以部位相近而言也然今之患者發於耳下為多兩頤甚少按耳下者少陽之部也三陽以少陽為樞是餘邪從樞而出也兩頤者少陰之部也三陰

吳醫叢講

卷八

三

以少陰為樞是亦餘邪從樞而出也病在三陽發於耳下病在三陰發於兩頤此一定之理也張石頑云過用發散引邪泛濫而頤毒多有延及膺脇肘臂如流注者則去頤益遠尙可謂之頤毒乎

方藥等分解

嘗讀古方每有藥味之下不註分兩而於末一味下註各等分者今人誤認為一樣分兩余竊不能無疑焉夫一方之中必有君臣佐使相為配合况藥味有厚薄藥質有輕重若分兩相同吾恐駕馭無權難於

合嶽也即如地黃飲子之熟地黃蒲分兩可同等乎天真丹之杜仲牽牛分兩可同等乎諸如此類不一而足豈可以各等分為一樣分兩哉或曰子言是矣然則古人之不為註定而云各等分者何謂耶愚曰各者各別也古人云用藥如用兵藥有各品猶之將佐偏裨各司厥職也等者類也分類得宜如節制之師不致越伍而誹也分者大小不齊各有名分也惟以等字與上各字連讀其為各樣分兩意自顯然今以等字與下分字連讀則有似乎一樣分兩耳千里

吳醫叢講

卷八

三

之錯失於毫釐類如是耳窺先哲之不以分兩明示後人者蓋欲令人活潑潑地臨證權衡毋膠柱而鼓瑟也竊以為古人之用心如此不揣愚陋敢以質諸高明

揚存耕

名泰基字觀宸號勉齋生於乾隆丁卯列
成均厯開試業儒係丙戌狀元張西峯門
人業醫係崇天十社係鍾南紀門
人仕開門外資福橋存耕其堂名

保護元陽說

聖人作易爻先一畫是元陽為萬物資始神變化合
太和所以象詞獨稱其大耳讀仲景傷寒首論太陽
以桂枝湯為方祖誠一法立而諸法已悉具亦此經
治而他經可不傳無論太陽篇內輒用桂枝即陽明
表未解尚宜桂枝少陽柴胡症每合桂枝至於誤下
腹痛桂枝加芍藥桂枝加大黃等湯乃屬太陽矣若

吳醫彙講

卷八

四

夫少厥二陰風熱痰壅有半夏散及湯發表溫中有
管歸四逆液涸用復脈法虵動用烏梅丸凡此不以
桂枝命名者而仍不離夫桂枝可知仲景意不特陽
經宜用即陰經亦常兼顧及陽也再參金匱開卷論
臟腑經絡次章治瘧必先列括蕒桂枝其餘各症以
桂枝法加減者復不勝枚舉此非始終體乾行健教
人以保護元陽哉近來風氣畏溫熱而喜寒涼每見
元虛濕溫風溫等症舌白渴不欲飲者亦有用犀角
地黃竹葉石膏葶病本在氣分或反引入血分或胃

吳醫彙講 卷八

敗不納呃逆泄瀉輕病重病死深為扼腕試觀大
易以陽剛喻君子以陰柔喻小人若使陰道長則陽
道消何以輔相裁成躋斯人共登壽域以方位論五
穀利在東南以歲時論百卉敷榮春夏由此推之天
包乎地氣先於血元陽實生生之本亟宜保護醫當
活潑潑地雖不必偏熱而斷不可偏寒也明矣彼丹
溪陽常有餘陰常不足之說故景岳非之

洞見本源 江叔齋跋

古人云不知易者不足以言醫此論以易理闡明

吳醫彙講

卷八

五

醫理而以護陽立說并論及仲聖用桂枝諸方皆
從護陽起見誠為確論蓋陽氣一分不盡則不死
人能保護元陽則太和之氣充滿於身熙熙皞皞
共躋春臺矣易以陽喻君子吾於揚君亦云然
繆松心識

以儒理通醫理故其指遠以易理通傷寒金匱之
理故其辭文 年如家春弟葉元符拜讀
講易講醫三墳一理 受業門人程清泰百拜誌

五〇三

楊立方 名曰恒作
城中平橋

讀傷寒論附記

嘗謂長沙之論謹嚴之中皆活法也天之氣化不一有主氣有客氣人之臟性亦不一有陰臟有陽臟春溫夏熱秋燥冬寒四時之定位也厥陰風化為初之氣少陰熱化為二之氣少陽火化為三之氣太陰濕化為四之氣陽明燥化為五之氣太陽寒化為終之氣六節之常度也故寒必傷於冬而溫與熱必在於春與夏此其大較也然而以五運言之則土運金運

吳醫彙講 卷八

六

之遷代無常以六氣言之則司天在泉左間右間之加臨各別益之以勝復之理太過不及之數於是乎春夏亦有傷寒隆冬非無溫病所謂非時而有其氣不可膠於節候之常素問曰至高之地冬氣常在至下之地春氣常在靈樞曰以一日分為四時日出為春日中為夏日入為秋夜半為冬皆是以活法言之說者於傷寒必主冬月於桂枝麻黃三陰諸辛熱劑必主冬月之傷寒而不可用於春夏之時拘泥時令於變化之理得毋有未備歟通天篇曰有大陰之人

少陰之人太陽之人少陽之人陰陽和平之人及夫五五二十五人之政本職篇又言二十五變昔夏英公有異稟臥即身冷如僵常服仙茅鍾乳硫黃莫知紀極小吏竊食即發疽死而太陽之人則飲啖生冷而不知節恣情房室而不加疲此其陰陽之反何啻天淵是故有從化之說從者天之氣也化者臟之性也陰臟者多寒陽臟者多熱所謂陰從陽化陽從陰化熱從寒化寒從熱化亦皆以活法言之而尤不可泥於溫涼寒燥之常也夫以運氣主客之殊加之以

吳醫彙講 卷八

七

臟腑陰陽之別其病遂于熊萬狀而莫可窮詰仲聖述軒岐之蘊廣湯液之用約之以三百九十七法一百十三方而金匱不在其數其立法之妙為治之活於主客陰陽之變莫不融貫是在乎用之者之神而明之耳後之論足經論卒病論三綱論六氣論傷寒即雜證之一紛紛聚訟返而求之仲聖之書其活潑潑地者固無乎不包也故治病須用活法

屠彞尊名曉號疎村國學生浙
江烏程縣人僑寓平江

論白痞

白痞一症攷古方書無專條論及間有在癩疹門中
發明一二究未能盡其底蘊今溫熱證中每多發出
如糶如粟色白形尖者謂之白痞有初病即見者有
見而即愈者有見而危殆者有病經日久癩疹已見
補瀉已施之後仍然發此而愈者泛稱時氣所致殊
不知致病之由既異治療之法不同不可不與癩疹
詳辨而審處之也蓋傷寒傳經熱病汗出不徹邪熱

吳醫彙講

卷八

八

轉屬陽明多氣多血之經或由經入府受熱蒸灼營
傷血熱不散而裏實表虛熱氣乘虛出於膚腠故稀
如蚊跡稠如錦紋者為癩紫黑為胃爛而不治也時
行風熱之氣侵入肺虛血熱之體失於清透傷及手
太陰血分乘虛出於皮膚如沙如粟而色紅瑣碎者
為癩或歲當火運復感時厲之毒即咽痛而成丹痧
及爛喉痧之類為最劇者也至於白痞一症則溫熱
暑邪病中必兼濕為多蓋伏氣之發本從內出然必
因外感及人身素蘊之濕與外觸之邪互相蒸發上

甚為熱初病治法設不用清透滲解則肺為熱傷氣
從中餒不能振邪外解熱漸陷於營分轉投清營滋
化熱勢稍緩而肺氣亦得藉以自復所留之濕仍從
上焦氣分尋隙而出於是發為白痞以肺主氣故多
發於頤項肩背胸臆之間白為肺之色光潤為濕之
餘氣至此而邪始盡泄也甚有幾經補瀉之後病仍
不解忽然發此而愈者以其人之氣液內復邪自外
透故不治亦愈也若其根本已虛無氣蒸達多有延
為衰脫者故此症以元氣未漓色潤晶瑩有神者為

吳醫彙講

卷八

九

吉枯白乏澤空殼稀散者為氣竭而肉摠以形色之
枯潤卜其氣液之竭與否也大抵此症在春末夏初
暑濕之令為甚秋冬則間有之要不出乎手經受病
仍從手經發泄不比足經之邪可從下解也夫肺為
主氣之藏氣旺則邪從外解上泄而病愈氣衰則邪
正並竭雖發必朽白無神而難治觀內經暑與濕同
推仲聖痲濕喝合論益知暑熱溫邪症中多夾濕邪
更無疑矣一隙微明以俟高賢正之

李純修 名基德號雲浦國學生住齊門外蠡口

爛喉痧論

爛喉痧一症古書不載起於近時而并易傳染治之者每謂太陰陽明二經風熱之毒而至爛之由亦不可不詳察也譬之於物以盛火逼之祇見乾燥而不知濕熱鬱蒸所以致爛耳此症凡風熱者治宜清透濕熱者治宜清滲痰火凝結者治宜消降蓋邪達則痧透痧透則爛自止矣若過用寒涼勢必內陷其害可勝言哉夫症有可治有不可治口中作臭者謂之

泉醫彙講

十

回陽其色或淡黃或深黃者此係痰火所致皆可治之症他如爛至小舌者鼻塞者合眼矇眊者并有元氣日虛毒氣深伏色白如粉皮樣者皆不可治之症也總之因天地不正之氣感而受之故體有虛實之不同即症有重輕之各異耳其餘喉症痧症古人言之詳矣槩不復贅

祖鴻範 名世瑛號小帆住海紅坊巷

爛喉丹痧治宜論

夫丹痧一症方書未有詳言余究心是症之所來不外乎風寒溫熱時厲之氣而已故解表清熱各有所宜治之得當愈不移時治失其宜禍生反掌無非宜散宜清之兩途也其症初起凜凜惡寒身熱不甚並有壯熱而仍兼憎寒者斯時雖咽痛煩渴先須解表透達為宜即或宜兼清散總以散字為重所謂火鬱發之也苟漫用寒涼則外益閉而內火益熾咽痛愈

泉醫彙講

十一

劇潰腐日甚矣不明是理者反云如此涼藥尚且火勢勃然不察未散之誤猶謂寒之未盡於是愈涼愈遏以致內陷而斃者有之或有云是症專宜表散者余謂所見亦偏前所云寒熱之時散為先務俾汗暢而丹痧透發已無惡寒等症至此則外閉之風寒已解內蘊之邪火方張寒涼泄熱是所宜投熱一盡而病自愈矣若仍執辛散之方則火得風而愈熾腫勢反增腐亦滋蔓必至滴水下咽痛如刀割間有譏用清涼者乃以鬱遏之炎熱燎原殺人最暴此偏於

散而謗匪清者之爲害也彼言散之宜此言散之禍
彼言寒之禍此言寒之宜要惟於先後次第之間隨
機權變斯各中其窾耳再此症愈後每有四肢痠痛
難以屈伸之狀蓋由火燦陰傷絡失所養宜進滋陰
非同痺症此又管窺之所及敢以質之高明

陳元益 各冒齡號半帆
國學生住北涼
痧疹今昔不同治法亦異說

夫痧之與痘同一胎毒也而有府藏之分焉其發也
亦有出遲出速之異以伏藏之地有遠近也第痧之
一證古人治法惟以升麻葛根湯爲祖劑芫荽酒之
外治而已其有風寒外束內毒難出而喘急者麻杏
石甘湯主之若夫輕淺之證竟有不必延醫自用櫻
桃核粗草紙棉紗線煎湯飲之而愈者卽其發也不
過周時而透透之後亦僅二三日而自愈矣今之痧

也則不然有二三日而方透者有四五日而終未透
者或身肢雖達而頭面不透咳聲不揚喘逆氣阻悶
伏危殆者又有一現卽回旋增喘促狂躁悶亂吐之
隱早者更有痧雖外達而嫩紅紫滯或目封或眵亦
譎語神昏便秘腹痛或便泄無度種種熱盛毒深之
象以向來痧疹門方治之無濟仿治痘之法先以紫
雪芳透於前繼以犀羚芩連丹地石膏人中黃大劑
清涼解毒始得轉重爲輕易危爲安或有病深藥淺
而至於危變者幾同痘瘡有順險逆之別嗟嗟同一

痧也何今昔不伴若此耶揆其所以然大率邇年來種痘盛行胎毒未得盡泄借此痧症以泄其毒者有之抑或近來時厲之氣甚於昔日以致症之險重者有之要在臨此證者無執前人之治因時制宜因證立方圓機活潑勿以痘重痧輕而忽之庶無愧為司命矣

辯活人書婦人傷寒之說

嘗讀朱肱活人書云婦人傷寒治法與男子不同舉

男子調氣女子調血以為大畧似補前人之未及然

吳醫彙講

卷八

十四

愚謂此說未可一槩論也夫長沙張氏醫中之聖也其著傷寒論原為卒病而設故又謂之卒病論卒病者宜舍本而治標故一百一十三方皆男婦共用即熱入血室亦用小柴胡湯婦人之陰陽易亦用燒裨散自有活人書創立婦人治法異于男子之說後人宗之者多矣不思仲聖之方早合氣血為一致今試以藥攷之其立法用意自躍如也即如桂枝芍藥固營而閉衛非血藥乎麻黃防風雖謂之發汗本治乳子餘疾非血藥乎白虎小柴胡中知母則治腎柴胡

則詞經皆氣中之血藥也當歸地黃固不必言即白朮人參人皆以為氣劑而本草言能利腰膝間血可知亦為血藥也大抵用之在陽便為氣藥用之在陰便為血藥總之傷寒一證皆為營衛受病耳何必分男先調氣女先調血耶雲岐張氏好古王氏皆以朱氏之說為治雜病之常法誠所謂自具慧眼而不為前人所惑者也

本仲聖以論傷寒治法由正路也中幅詮疏氣血

陰陽尤妙獨開生面斯可謂用古而不泥古者乎

吳醫彙講

卷八

十五

今而後讀活人書者當知所擇矣 西疇顧業師評

唐立三 再續

攝生雜話

命門真火藏於兩腎之中性門真水藏於一心之內人但言命門真火而不參究性門真水何也因真陽之火能生真陰之水故也殊不知性命相生水火不可以一息不交天一所生之水為我生身之始水中能生真火人皆未究況保真陰之水則真陽之火常存而不散若真陰一衰則真陽無附飛揚上越變為邪火能返涸真陰之水豈不危哉

吳醫彙講

卷八

七

火性本燥烈發揚而腎中相火偏職閉藏水性本柔弱蟄藏而心精三合獨主清利則知性以位變水火本無二氣噓氣即有水陽化陰也蒸水即有氣陰化陽也燈因膏而不滅陽依陰也水因火而不冰陰依陽也相需如此可以知其情性矣

補心氣益心精而不見効者則知命門火衰腎水不足何也命門之火即心火之根腎水之精即心精之源心無水則孤火上逆腎無火則寒水下凝水弱火炎則肺金受尅陽焰飛揚於上焦而生欬喘咯血等

吳醫彙講 卷八

病下虛則上盛也火弱水剛則肝木失養濁陰凝結於下焦而生癰閉壅腫精寒等病上虛則下實也水火兩平陰陽斯無偏勝

脾之權在腎胃之權在心自下而上水滋土自上而下火生土也脾土屬陰生於相火而健行不息胃土屬陽傳道於大腸而容受無窮總在主納之腎於是士以火生也脾虛則胃滯而不食脾實則胃運而能食總在主出之肺於是氣機流動也故凡治脾胃當以調肺氣交心腎為先

吳醫彙講

卷八

七

人身之痰最能為害勢湧如潮勢衰如收風寒濕燥隨氣而生體實體虛隨人而致濁則濃清則稀五藏六腑無盛痰之所上下升降無時而定又與正氣不兩立殆猶天地間陰雲瘴霧耳

週身氣血無不貫通故古人用鍼通其外由外及內以和氣血用藥通其裏由內及外以和氣血其理一而已矣至於通則不痛痛則不通蓋指本來原通而今塞者言或在內或在外一通則不痛宜十二經絡藏府各隨其處而通之若通別處則痛處未知而他

五〇九

處反為掣動矣

補戒急授而驟奪伐戒亟奪而峻利用之不當皆能
致害故攻熱失宜熱未去而寒復作寒熱各踞於其
所反致溫涼並禁良醫莫措矣攻寒亦然

人但知冬不藏精者致病而不知夏不藏精者更甚
焉嘗見怯弱之人而當酷暑每云氣欲悶絕可知中
暈而死者直因氣之悶絕也夫人值攝精恒多氣促
與當暑之氣悶不甚相遠經曰熱傷氣又曰壯火食
氣余故曰夏令之炎威甚於冬令之寒苛不藏精壯
者至秋而發為伏暑怯者即中暈而死

吳醫彙講

卷八

六

吳醫彙講卷九目錄

徐叶堦

四大家辯

論醫示必讀

論讀景岳書不可專得其溫補之益

王繩休

方正古方權量說

吳醫彙講

卷九

一

長洲唐大烈立三氏纂輯

門人王與謙履安氏校訂

徐叶壩

名鏞號鉅臺松江南邑人弱冠入諸生即棄舉業專攻岐黃學

四大家辯

李士材讀四大家論一篇本自王節齋大意謂三子

補仲景之未備而與仲景並峙也然仲景醫中神聖

德備四時三子則伯夷伊尹柳下惠而已試觀玉函

金匱方中黃芩白虎已開河間之先也建中理中已

吳醫彙講

卷九

開東垣之先也復脈黃連阿膠已開丹溪之先也然

則謂三子得仲景之一德而引伸條暢之則可謂三

子補仲景之未備則未確也

論醫宗必讀

明季李士材先生我城人也所著醫宗必讀一書固

已膾炙人口矣然余竊有議焉夫必讀者軒岐之書

也越人仲景之書也下此而脈經千金外臺以及近

代諸名家書雖不能盡讀或取其十之六七或取其

十之三四不可不讀矣苟守張長沙博聞強識之訓

以探本窮源則是書又為淺醫書限之書矣改其名曰不必讀其庶幾乎

論讀景岳書不可專得其溫補之益

竊觀富貴之家投寒涼則思進溫補則合醫之喜用

溫補者遂有景岳派之名殊不知景岳亦溫涼補瀉

並收之書也觀其論症先述古而補以已見分劑先

古方而補以新方作者以全書名之讀者以全書貫

之舍其短而錄其長則上而溯諸南陽醫聖亦無不合也而

家無不合也更上而溯諸河間易水金華諸

吳醫彙講

卷九

得景岳之益者豈特在左歸右歸而已哉

王繩林名丙號樸莊吳縣恩貢生世居包衙前

攷正古方權量說

古方自靈素至千金外臺所集漢晉宋齊諸名方凡云一兩者以今之七分六厘準之凡云一升者以今之六分七抄準之謹攷定如左

凡古方權量皆起于律黃帝律尺九寸夏尺則加為一寸而為十寸今木工之曲尺是也

唐孫真人千金方論述針穴分寸云其尺用夏家古尺司馬法

六尺為步今江淮吳越所用八寸小尺是也據此知即今曲尺

無疑知此尺即黃帝律尺寸者以藥升之禽積與尺度攷得之

吳醫彙講

卷九

三

詳見律學淨聞

以曲尺之寸度作方徑一寸六分上下相等深七分八厘強其積

二千分即古藥升之容積

千金論藥升方作上徑一寸下徑六分深八分當作上下徑一

寸六分深八分弱按管子云金匱不得為後弁且計其容積僅

五百廿二分不應如此之小故知傳寫之誤也升口自乘得二

百五十六分以深七分八厘強乘之得二千分為容積云深八

分者舉成數言之也

藥升一升容黃鐘兩禽之實以秬黍二百四十粒為一兩但秬黍

之重今無可攷依千金論密一斤得藥升七合及靈臺儀象志水與密同積異重之比例若二十與廿九而次第以準測之古一兩今七分六厘也

古律禽容一千二百八十秬黍千金論一撮者四刀圭也六十

為圭半之撮為一勺勺即兩勺為一合合為升字之誤一升

也李時珍沿兩勺為一合之誤更增十合為一升則誤以傳誤

矣幸千金及外臺原文俱無此五字可證

秬黍一秤二米用以量禽取其圓滑而齊見攷工記輸入自劉

欽變剛古法置秤用秬前明鄭世子特覓秬黍權以今平每禽

吳醫彙講

卷九

四

一千二百粒重三錢未足為訓也鄭世子樂書身鑿附會其云

採入類經國翼知二百四十黍為一兩者千金云十黍為一銖圓翼謂十黍當

六銖為一分四分為一兩十六兩為一斤此則神農之秤也

攷正古權之法先作藥升滿曲尺二千分中容井水秤重一兩

二錢而推得其同積異重之比例假如水與密各貯一盞中容

積相等而水輕密重水若二十兩則密必二十九兩以此推算

一藥升之水重一兩二錢者則一藥升之密必一兩七錢四分

明矣

以三率明之

水二十

蜜二十九

相乘得數三十四兩八錢以第一率之二一為法除之得第四次一兩七錢四分

蜜一兩七錢四分

既得蜜一藥升之重以三率重測之如法乘除得蜜七合之重

藥升一升

蜜今重一兩七錢四分

藥升七合

吳醫彙講

卷九

司

蜜今重一兩二錢一分八厘

夫此七合之蜜今重一兩二錢一分八厘者即古蜜十六兩之數也依上法重測之得古一兩今若干之數

古十六兩

今重一兩二錢一分八厘

古一兩

今重七分六厘

以古方參之

麻黃湯麻黃三兩

準今二分三服中病即止每服止七分

小柴胡湯柴胡八兩準今六錢分三服每服止二錢

承氣湯大黃四兩準今三錢分再服中病即止每服止一錢半

白虎湯石膏一斤準今一兩二錢分三服每服止四錢

藥升之容積二千分以今倉斛之積寸准之古一升今六勺七抄也

立方算法滿千分為一寸曾以倉斛計之合曲尺之寸度積一

千四百九十七寸為今五斗則知曲尺二寸為六勺七抄

以古方參之

半夏秫米湯半夏五合準今三勺秫米一升準今六勺七抄甘瀾水

吳醫彙講

卷九

司

五升準今三勺煎取升半準今二合分三次每服飲一小杯杯如杯飲約可

手掬今比此尤小故曰小杯

四逆散每服方寸七準今一錢其泄利下重者加薤白一升煎服

禾藥少而一升之薤其少亦可知

方寸七者作七正方一寸依曲尺之寸度為之錢七者以五銖錢

為之開元錢亦同皆抄散取不落為度

古人用散藥以刀圭抄取之七亦刀圭之意也準前論一刀圭

為三十二黍方寸七者十刀圭也立方一寸積千分三除之得

三百三十三分為方一寸七之實容三百二十黍準今一錢準今

輕重不等今但就黍計之以得其大槩

千金論錢七者以大錢上全抄之若云半錢七者則是一錢抄取半邊耳並用五銖錢也錢五七者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度按五銖錢與開元錢徑相同準曲尺九分其羅六十三分以九分乘之得五百六十七分三除之得一百八十九分為一錢七之實乃以三百三十三分為首率重一錢為次率一百八十九分為三率得重五分六厘為四率是一錢七之重也半錢七者準今二分八厘錢五七者準今一分四厘也以古方參之

吳普本草

卷九

七

五苓散四逆散等方每服方寸七準今一分

桃花湯赤石脂末半斤每服方寸七日三服每方寸七準今之二錢石藥性也重

也重

燒禪散每服方寸七日三服必輕

大陷胃湯甘遂一錢七分二服每服是半錢七準今二分八厘

十棗湯強人服一錢七準今五分六厘

文蛤散一錢七藥性較輕

一撮者以三指為度

千金論一撮者四刀圭也得一百廿八黍準今四分

以古方參之

澤木鹿銜散藥共二十五分準今四錢七分五厘以三指撮為後飯服

四分日三服三日後病瘳而藥將盡矣

風引湯藥共五十五兩準今四兩一錢八分取三指撮并水煮服石藥性重

每服八分以五十餘日為度

凡丸藥如梧子大者準藥末一分如彈丸及鷄子黃者準藥末一錢

錢

千金論刀圭者十分方寸七之一準如梧相子大也一方寸七散以蜜和得如梧桐子十九為定如彈丸及鷄子黃者以十梧

相子準之準前論刀圭容三十分黍應重一分方寸七加倍

應重一錢

八

以古方參之

應重一錢

以古方參之

已椒蘆黃丸藥共四兩準今三錢蜜丸如梧子大飲服二九日三服每日每丸一分蜜在外十日而瘳可知也

薯蕷丸藥共百七十八分準今三兩三錢八分大棗百枚為膏和蜜丸

如彈子大空腹酒服一九一百丸為劑每丸藥末常重三分四厘因有大棗一枚

及蜜故得如彈子大也彈子大者或較小千鷄子黃然亦不甚相遠耳

理中丸藥共十二兩準今九錢一分蜜和丸如鷄子黃大以沸湯數

合和一丸研碎溫服之口三四服夜二服腹中未熱益至三

四九每九藥末一錢當得九九然不及湯湯法以四物依兩數切用

升煮取三升去滓溫服一升日三服作湯者即此九錢

疑九藥少湯藥多妄謂古方如鴉子黃者應是大九李時珍

宗之遂于古法如彈丸及鴉子黃准十梧子者舊筆增為四

十梧子謬也

脩急丸每服大豆許三四丸未差更與三九按千金十六黍

凡藥有云大升大兩者以神農秤三兩為一兩藥升三升為一升

千金論隋人以三兩為一兩權三倍故量亦三倍

以古方參之

外臺載廣濟方蒜煎主冷氣用牛乳五升準今三合四勺納刺淨蒜肉

二升煎候蒜消盡下牛膝一大斤末準今三兩六錢煎成酒和兩匙服

之乳經煎蒜後約存二合配三兩六錢

外臺載錄驗方杏仁煎瘧氣杏仁一升搗以水和研取三大

升汁準藥升九升煎取一大升酒服一匙日三以水九升研杏仁一

凡煮湯大畧古藥二十兩今一兩五錢用水一斗今七合煮取四

升今二今八勺勺二三服之

石藥皆以咀如豆大必水乘氣熱方始透入藥中既而藥乘水

沸乃始溢出汗間然且火欲其微沸欲其小絞以兩人助以尺

木澄去泥濁而後服之全欲得其氣之清而不欲多水以耗其

氣讀千金論自明

至于千金論諸藥權量互求之法往往不合則古今藥性不同故

也即如蜀椒吳茱萸地膚子蛇床子古取陰乾今皆晒爆爆則藥

性為之輕輕則各有差等而權與量不相合矣又如附子以一枚

準半兩古取其土中自養形癯神足者棗有大小以三枚準一兩

古以八月採爆乾尙皮不尙肉別錄云棗皮利肉補虛惟

如法宜與古不符也惟巴豆治淨以一分得十六枚準今

去心皮畢秤之曾如法修治其薄衣務盡去之約十六枚重分九厘苟能于古方中緒論求之蛛絲

馬跡非不可尋也

以古方參之

千金方治歷節諸風百節酸疼不可忍用松脂三十斤準今

六煉五十遍少亦須二十遍服方寸七日三百日方寸七

二十黍準今一錢此最足據者每日服三錢百日須三十兩

也以松脂煉去六兩適合百日之用則古一斤為一兩二錢

千金治結氣冷癥積在脅下及脚氣上入小腹腹中脹滿大

蒜去心三升搗令極熟以水三升和調絞汁更搗以水三升

和絞去滓更以水三升和之共成九升洋可桃類大藥却三

蒜肉研汁後滓儘如 以微火煎取三升下午乳三升合煎至

三升且起空腹一頓溫服令盡三升蒜汁可以一頓服升小可知至申時食

三日服一劑三十日服十劑止蒜汁最辛勞全不慮及而頻作服之升小可知

宋林億以古三兩為今一兩古三升為今一升龐安常亦云然此

誤以漢之權量為憑耳于古方不相涉也

古方以二龠為一升以二百四十秬黍為一兩此與劉歆所定

二十龠為升二千四百秬黍為兩者大相懸絕後儒悞信班志

遂以新莽刀布之重及銅斛之式斷為古律權量于是以古準

今遂有三兩為一兩三升為一升之謬而強合于醫方之權量

耳秦漢之量每一斗為今之二升見閻百詩四書釋地及沈彤周官祿田考附識于此

前明張介賓惑于鄭世子之樂書定為古方一兩今之六錢古方

一升今之三合三勺者尤為大謬

李時珍云古之一兩今之一錢古之一升今之二合半亦非也

以古方參之

肘後方治消渴以黃連三斤準今三斤六錢豬肚中蒸服依景岳說

八錢矣豬肚中能容之否

又肘後方治中風腹痛用鹽半斤準今六錢熬水乾着口中飲執湯

二斤得吐愈依張則四兩八錢能着口中即併能飲如許執湯耶

又肘後方治風毒脚氣用硫黃末一兩牛乳調服取汗北方人

用此多效依張則六錢可作一頓服耶

又肘後方治勞復用乾姜四兩為末準今三錢湯調頓服依張則為二兩四錢

之乾姜可一頓服耶

外臺載備急方治五尸以雄黃大蒜各一兩搗和如彈丸準今一錢

三分故速依張則一兩三錢納熱酒中服之能與彈丸相似耶

千金方治吞金銀錢用白糖一斤唐以前方用糖皆一頓準今指白糖非蔗糖也

又肘後方治霍亂大渴不止多飲則殺人黃梁米五升水一斗

煮精三升稍稍飲之若如今之一升不

外臺載集驗方療水腫用黃牛尿一飲三升準今二合若不覺更加

服之若謂是今之一升人糞牛尿誰堪多服者

肘後方治齒痛醋炙枸杞白皮一升取半升含嗽即瘥若如今六七勺如何合而飲之

依古準今古當作一斤古之豬肚大可能容之

外臺載崔知涕方治血痢石灰三升熬黃水一斗投之澄清
一服一升日三服每服準今三合三勺日三服豈石灰湯可多服耶

千金木膏治脚弱風虛用濕荆二十五束束各長三尺圍
各二尺五寸徑二寸燒灑三斗準今青竹三十束束各長三
尺圍各二尺五寸徑一寸燒灑三斗試知式取荆與竹燒之能取今一斗之灑否

千金耆婆萬病丸條下云服藥取微下三升惡水為良若三升為

千金第七卷雜方云治崩中下血一斛服之即斷若血下至三斗三升

吳醫彙講 卷九

千金紫苑湯云小兒六十日至百日服之谷半百日至
百日一服三合若如今之八勺有奇百日以內之小兒能頓服耶

夫以藥科藥升農軒叔造之法物晉宋以來遺失古意故梁陶貞
白先生著名醫別錄論用藥分劑法則一遵神農之秤而不用子

穀秬黍之制孫真人祖述其意定千金方首言今依四分爲一兩
爲定亦不依隋人以三兩爲一兩之法其述古藥升制度下即曰

今人分藥不復用此蓋有存羊愛禮之思焉繼此有王刺史者輯
外臺秘要每方必紀其所出凡六朝諸名家所定分兩升合皆就

就法守間有大升大雨必分別註明今良方具在顧以權量難求
棄若弁髦強作解事者從而武斷之而醫宗之微旨勢不至盡墜
于地不止

武斷之最者莫如景岳以其所宗者悉本之偽造夏律周禮之
鄭世子也

微旨者何聖人治病之樞機也升降浮沉之氣順者生逆者死但
得撥之使轉即行所無事矣故藥也者求其中歟不貴多也求其
循序不貴速也藥必有毒非毒無以馭病非節制無以馭毒故升
秤之以小爲度者誠慎之也

吳醫彙講 卷九

陶隱居曰一物一毒服一丸如細麻大二物一毒服三丸如大
麻三物一毒服三丸如胡豆四物一毒服四丸如小豆五物一
毒服五丸如大豆六物一毒服六丸如梧子從此至十皆以梧

子爲度按千金論如梧子者準上論以二大豆准之如大豆者
重五厘以二小豆准之如小豆者重二分以三大麻准之如胡豆者

重一厘以二大麻准之如大麻者重八厘准三細麻每一細麻重二毫八絲

今人疑古方立法太峻而不詳其用意之謹密反謂古人稟厚能
勝重劑則所見益顛倒矣得吾說而通之庶幾能師古之意用古
之法乎

千金論云古者藥在土中自養經久氣味真實今時藥力輕虛人多巧詐學者須加意重複用藥藥乃有力此亦不可不知也然觀東垣方藥味多而分量輕又宋時一切作煮散者每服皆以五錢為例可知仍不貴多也

古人疑漢方湯液大劑三十餘兩小劑十餘兩用水六七升煎取二三升並分三服若以古量水七升煎今之三十兩未淹得過又疑散末藥只服方寸刀圭七圓子如梧子大極至三十粒湯液豈得如此懸絕又疑風引湯一料計五十五兩每用三指撮水三升煮三沸去渣溫服一升觀其煮製每只三指撮未

其藥實請

應料劑如此之多今一旦收而正之疑盡釋矣

古方惟百合湯用百合七隻配水三升似與前說不相合頃友人言吾蘇陽山澄照寺前一片地上天然自產百合僅如錢大煮之清香絕勝療病極效可知百合八藥者以小為貴耳

唐立三三續

生氣通天論病因章句辯

丹溪格致餘論曰生氣通天論病因四章第一章因於寒之下欲如運樞三句與上文意不相屬皆衍文也當以第二章因於暑之下體若燔炭汗出而散二句移於因寒之下云云尤在涇先生深通經義者也獨於此論未甚研求乃於讀書記云因於寒因於暑二節丹溪重定章句為是烈謂因於寒之下欲如運樞句不必謂之衍文惟起居如驚神氣乃浮二句與

長壽集傳

下文體若燔炭汗出而散三句彼此外則僅以此四句互為移撥讀作因於寒欲如運樞體若燔炭汗出

而散因於暑汗煩則喘喝靜則多言起居如驚神氣乃浮意即貫串蓋謂因於寒者如樞運動寒氣自散如內經洗慰按摩等法是也若寒鬱為熱有似燔炭必須汗出而散如仲景麻黃湯之類是也因於暑者月君火為病故自汗喘喝而多言以及起居卒暴神氣浮越也丹溪在涇皆相承而誤

申明三年中氣候相乖化疫之說

本集第二卷薛一瓢先生日講雜記中有此一則而語焉未詳書出之後諸同學迭有來問此說者爰爲之詳說於左

此本諸素問遺篇刺法論雖經張景岳類釋於剛柔

失守之條甲丙戊庚壬五年爲陽于氣剛乙丁辛巳癸五年爲陰于氣柔應交而不布政者謂

守之失而尙未甚晰竊參鄙臆詳以明之假如甲子年

上半歲多風少暖爲上年司天之厥陰不退位本年

司天之少陰不遷正若下半年歲多涼爲在泉之陽明

得位甲子之在泉陽明已卯也在泉之于卯以司天之干相合者推之如

甲與已合乙與庚合也在泉之支以司天之支各就

四正四偏四維中陰陽相配者惟之如子與卯爲四

正中之一陰一陽寅與巳爲四偏中之一陰一

陽辰與未爲四維中之一陰一陽也餘倣此

年之司天臨本年之在泉則上癸下巳爲不利甲失

其位謂之木勝土虛甲巳木勝必金復指下年乙庚化金之歲言

金既復木必稍退而子年司天之少陰至矣木反助

火剋金其復必微而甲巳之土皆失守土鬱之久後

化爲疫早則丙寅晚則丁卯土疫至也丙辛化水之

方得勝之而爲病再次年丁壬化木木又剋土亢則

害而爲病也。土疫即濕疫今所謂濕溫之類是也

疫之微甚詳其年之司天在泉或盛或衰爲定又若

上半歲氣暖爲少陰司天布政而下半年歲多溫少涼

爲上年在泉之少陽不退位本年在泉之陽明不遷

正夫已卯之柔不至於下本年在泉屬陽則甲子之

剛孤立於上亦爲土虛後化爲癘此司天失守化爲

癘疫癘疫也土疫將至恐傷腎臟當先補腎俞次洩

土氣以去其鬱戒夜行遠行經本論刺法故以俞言

其餘詳載類經不必復贅餘年皆倣此。疫癘每發

於陽年除天刑六年其餘二十四年是也庚子庚午

運庚寅庚申相火刑金運戊辰戊戌寒水刑火運此

六年本非有餘故不發疫餘皆陽剛太過故作疫也

然此指陽運自勝而無邪傷者也若剛柔迭失其位

四時不節謂之失之按位即生大疫應司天而不司

在泉雖屬陽年亦爲不及不

必鬱至三年始發疫癘也

吳醫彙講卷十目錄

汪纘功

虛勞論附方

汪正希

讀先祖保陰煎謹記

沈香巖

六味地黃丸方解

八味地黃丸方解

唐立三四續

吳醫彙講卷十目錄

司天運氣徵驗

吳醫彙講卷十

長洲唐大烈立三氏纂輯

門人周兆麟世章氏校訂

汪纘功

名光爵號學舟太學生屢試不售考授州同知遂業醫治病多奇中載在吳縣誌及蘇州府醫學誌年五十六歲歿於康熙五十七年著有醫要若干卷未梓行世而同學多有傳抄為秘本者此篇係其孫明之正希節錄付梓明之名元亮號付香王午科舉人候選知縣正希名元亮號付香王午

虛勞論

虛勞之病皆由內傷而無外邪也。如酒傷肺則濕熱

吳醫彙講

卷十

薰蒸肺陰消燥色傷腎則精室空虛相火無制思慮傷心則血耗而火易上炎勞倦傷脾則熱生而內伐真陰惟忿怒傷肝有二鬱怒則肝火內熾而灼血大怒則肝火上升而吐血此五者皆能勞其精血道經云涕唾津精汗血液七般靈物總屬陰陰虛內熱而成虛勞之症大約酒色為多然有童子未室而患此症者或有先天不足或稟母氣陰虛其師尼寡婦室女愆期氣血鬱結以致寒熱如瘧朝涼暮熱飲食不思經期不準或致閉絕而成此病者多由鬱火內蒸

所致也。以上論致病之由。方書言此症者皆以氣虛血虛陰虛陽虛混同論治。不知氣虛者面白無神。言語輕微。四肢無力。脈來微弱。陽虛者體冷畏寒。手足逆冷。溺清便澹。脈沉小遲。此二者能服參芪溫補。乃為受補。可治。斯氣虛陽虛之症也。雖血脫者亦有補氣之法。乃指卒暴失血。素非血虛之人。如新產之類耳。其餘患此症者。經云一水不能勝五火。五火者五志之火也。一水者腎中真陰之水也。水即精也。即如女子二七而天癸至。男子二八而天癸至。非陰衰於前而陰成之難乎。又言人年四十而陰氣自半。非陰衰於後而陰凋之易乎。所謂陰者即我之精。而造我之形者也。人生全盛之數。前後止二十餘年。故丹溪引日月之盈虧。以為陽常有餘。陰常不足。而王節齋則以為陰虛成病者十有八九。陽虛成病者百無一二。蓋以節慾者少。縱慾者多耳。以下敘五藏虛證其為病也。在腎則為腰脊腿痠。或攸隱而痛。為骨蒸盜汗。或至夜發熱。為偏身骨痠。或疼痛如折。為夢洩遺精。為耳中鳴。為足心熱。在心則為驚悸怔忡。為掌中乾熱。為

吳醫彙講

卷十

五

虛煩無寐。或夢魘不寧。為口苦舌乾。或口舌糜爛。在肺則為痰嗽乾咳。為氣逆喘促。為鼻中氣熱。為額紅吐衄。甚則吐涎白沫。側眠咽痛。音啞聲嘶。在肝則為寒熱如瘧。為頸項瘰癧。為脇脹肋疼。為兩目澁痛。為頭暈。為眼花。為多怒。為吐血。在脾則為食減不化。為惡心嘔吐。為脹滿腹痛。為腸鳴泄瀉。肌肉消瘦。此皆五藏虛勞之本症。經曰治病必求其本。須審其因何致損。何藏受傷。如因于色者。則知腎傷。縱有他經現症。亦當補腎為主。而兼治他症。因於酒者。又當以清

吳醫彙講

卷十一

五

肺為先。以下敘標本既審標本。再明傳變。如腎傳心。心傳肺。肺傳肝。肝傳脾。脾再傳腎。此傳其所勝之藏。侮而乘之。謂之賊。尅大凶之兆。經曰諸病以此相傳者。死。謂五藏以次相傳而尅偏也。難經曰七傳者。死。謂如病始于腎。而脾復傳腎。是謂六傳已盡。一藏不可再傷也。又如腎病不傳心。而傳肺。此間一藏而傳于生我之母。以母子氣通也。如腎病不傳心。肺而傳肝。此間二藏而傳于已生之子。母病及子也。如腎病不傳心。肺肝而傳脾。此間三藏而傳已所不勝之藏。經

陰虛之症其寒
由虛而生陰指
其形而言以不同
區其性也

所謂輕而侮之也。傳乘不明。豈能療病。以下辨虛勞
一症偏于陰虛者居多。而醫之誤治者有七。試詳言
之一。曰。誤認陽虛命門之火。龍火也。亦謂之真陽。如
果腎中陰盛。龍火不能安其位。而為上焦假熱。面赤
煩躁。口渴等症。口雖渴而不欲飲。足冷過膝。小便清
長。右尺脈沉小而遲。或浮大無根。此陰盛逼陽之假
症。如夏至一陰生水。底冷而天上熱。龍為陽物。隨陽
而上升。宜用八味之屬。冰冷與飲。得引浮火歸元。如
冬至一陽來復。地中水暖。而龍歸大海也。至若虛勞

之症。是因腎水真陰虛極。水不攝火。火因上炎。而致
面赤唇紅。口鼻出血。齒痛齒齦。雖亦龍火上炎。與虛
陽上浮不同。縱有下部惡寒足冷。此因虛火上升。所
致。非真陽衰。而然。故其小便必黃赤。其脈必帶數。有
內熱的症。可據。設誤用引火歸元之法。是抱薪救火。
上焦愈熱。而效喘燥渴益甚。咽痛喉爛。諸症至矣。二
曰。誤認中寒腹痛之屬于虛寒者。綿綿痛而無增減。
喜熱手按。熱飲食泄瀉之屬于虛寒者。水穀不化。而
澄徹清冷。必有虛寒之脈。證可憑。然後用之。有效。今

此等虛勞
之症。其
形與
虛勞
不同
區其
性也

八。一見脹滿腹痛。食不消化。腸鳴泄瀉等症。便
虛寒。而投理中溫燥之劑。再補其陽。則陽益亢。而陰
益竭矣。更有見其脹滿泄瀉。遂引經文。清氣在下。則
生痰泄。濁氣在上。則生臌脹。而用補中益氣。反提陰
火上逆。以致咳喘頻增。吐衄交至。而立見危亡。此其
溫補得售者。不過助陽之藥。能使胃氣一時暫壯。飲
食增加。彼此相誇。至死不悟。良為可憫。三曰。誤認外
感世之真陰虛。而發熱者。十之六七。亦與外感無異。
火逆衝上。則頭脹微痛。火熱壅肺。則有時鼻塞。陰虛

陽陷入裏。則瀉泄惡寒。陰虛陽無所附。則浮越肌表
而熱。但其發時。必在午後。先瀝浙。惡寒少頃。發熱熱
至寅卯時。盜汗出而身涼。或無微寒。而但午後發熱。
必現腎虛症。或兼唇紅。舌赤。口渴煩躁。六脈搏數。或
虛數無力。此宜大劑滋陰。如保陰六味之屬。若誤為
外感。而表之。則魄汗淋漓。諸虛蜂起。或有失血之人。
表之無汗。經所謂。奪血者無汗也。再強發之。必然吐
衄。為下厥上竭之症。此尤孟浪之流也。四曰。苦寒瀉
火之誤。實火為病。可以直折。虛火為病。非寒可清。非

惟不能清熱。抑且敗其胃氣。食少瀉多。將何療治。其者見其燥結。肆用硝黃以通之。不知腎主二便。腎主五液。腎液既虧。自不濡潤。滋其陰。潤其燥。而便自通。彼既虧之陰。豈能勝硝黃之攻伐乎。五日。二陳消痰之誤。痰在脾經者。名曰濕痰。其痰滑而易出。或稀如水者。名曰痰飲。濕者燥之。半夏自為正治。若陰水不足。肺受火侮。津液凝濁。不生血而生痰。此當潤劑。滋陰。使上逆之火得返其宅。痰自清矣。三陳之燥。立見其殆。六日。參芪助火之誤。夫虛勞之可受參芪者。肺必無熱者也。肺脈按之而虛。必不數者也。故有土旺而生金。勿拘拘于保肺之說。古人每用之而奏功。今則火已燦金而咳矣。火蒸津液而化為濃痰矣。君相亢甚。而血隨上逆矣。猶引陽生陰。長虛火可補之說。漫用參芪。因之陽火愈旺。金益受傷。所以好古有肺熱還傷肺節。齋有食參必死之叮嚀也。七日。治療過時。上古聖人不治已病。治未病。如勞神者。常養其心。勞倦者。常補其脾。多怒者。常滋其肝。血多飲者。常清其肺。熱好色者。峻補其腎水。仲景曰。凡人有病。不時

吳醫彙講

卷一

六

卽治隱忍。冀延必成痼疾。所以終罕得愈者。以內熱之症人多易忽。自恃飲食如常。起居如舊。仍縱恣酒色。迨至病已成。而後藥之。譬之渴而穿井。闕而鑄兵。不亦晚乎。以下三。然而治之最難。有三大要法。不可不講也。一日。補腎水。經云。腎者主水。受五臟六腑之精而藏之。精藏於此。氣化於此。精卽陰中之水也。氣卽陰中之火也。故命門之水。火為十二臟之化源。火不畏其衰。力則畏其少。所以保陰六味。左歸之屬。皆甘寒滋水添精之品。補陰以配陽。正王太僕所謂壯水之主。以制陽光。丹溪所謂滋其陰。則火自降。譬之燈殘。火焰添油。則焰光自小也。然須制大其劑。長久服之。以陰無速補之法也。至若因於酒者。清金潤燥為主。而保陰之屬。仍不可廢。蓋補北方。正所以瀉南方。而救肺也。因於思慮者。清心養血為主。而佐保陰之屬。所謂水壯而火熄。勿亟亟於清心是也。因於勞倦者。培補脾陰為主。而佐保陰之劑。經曰。有所遠行。勞倦。逢火熱而渴。渴則陽氣內伐。熱會於腎。故知勞倦傷脾內熱者。必及腎也。若忿怒傷肝。動血。保陰六

吳醫彙講

卷一

七

葉香巖薛一瓢兩先生而著名。製此方以療虛勞者千百人。不僅為獨創之奇。實上探古人之精奧。世雖多高明之士。而治虛勞者。誰復能舍此而別求良法哉。予也。痛先人之已。逸。學。精。笈。之。猶。傳。思。濟。美。於。後。先有慚學術。讀祖書之良善。敢秘遺編。用是梓此新方。附於彙講。非徒求行世。亦以祈活人也。

吳醫彙講

卷中

七

沈香巖名家熊字惟祥。受愛曾孫實夫出。嗣子國學生世居封溪烏鵲橋東。

六味地黃丸方解

此為補陰之主方。補五藏之陰。以納于腎也。藏陰虧損。以熟地大滋腎陰。壯水之主。以為君。用山萸肉之色赤。入心味酸。入肝者。從左以納于腎。山藥之色白。入肺味甘。入脾者。從右以納于腎。又用三味通府者。恐府氣不宜。則氣鬱生熱。以致消燬藏陰。故以澤瀉清膀胱。而後腎精不為相火所搖。又以丹皮清血分中熱。則主血之心藏。血之肝。俱不為火所燬矣。又以

吳醫彙講

卷中

七

茯苓清氣分之熱。則飲食之精。由脾輸肺。以下降者。亦不為火所燬矣。夫然後門藏之真陰。無所耗損。得以攝納精液。歸入腎藏。腎受諸藏之精液。而藏之矣。從來因圖看過。未識此方之元妙。至於此極。今將萸肉山藥二味。分看一入心肝。一入肺脾。既極分明。而氣味又融洽。將熟地萸肉。由藥三味。總看既能五藏兼入。不致偏倚。又能將諸藏之氣。盡行納入腎藏。以為統攝藏陰之主。而不致兩岐。至澤瀉茯苓丹皮。與三補對看。其配合之妙。亦與三補同法。製方妙義。周

備若此非臻於神化者其孰能之惟其兼補五藏故
久服無虞偏勝而為萬世不易之祖方也

八味地黄丸方解

此方用附子肉桂補兩腎之陽非補兩腎中之命門
也附子補氣中之陽由肺以八於腎故陽虛肺氣喘
急者服之即止乃右腎之陽藥也肉桂補血中之陽
由肝以入於腎故陽虛肝火上浮者服之則納乃左
腎之陽藥也夫從左從右非兩腎之中可知命門居
中是以一而神非以兩而化附子肉桂一氣一血兩

吳醫彙講

卷中

五

相對待故非命門藥也如以附為補命門則以命門
屬氣桂不得為補命門矣以桂為補命門則以命門
屬血附不得為補命門矣總之命門為先天之氣本
于始生為生氣生血之根本非草根樹皮所能補者
藥餌人口從胃氣敷布然後輸入腎藏即係後天飲
食之氣所化但能補益藏腑不能補益先天故前人
加八地黄丸者不特附桂一氣一血即車前牛膝亦
是一氣一血知母黃柏亦是一氣一血一氣一血者
俱入兩腎而非命門也以命門為陽者此命門與兩

腎分陰陽則命門為陽兩腎為陰命門為始生之根
本即是萬物資始之乾元故為元陽象坎中之一畫
也非以火為陽也如以兩腎分折而論則左血為陰
右氣為陽亦非以水火分也如專以一腎而論則左
腎不獨有精氣亦有之右腎不獨有氣精亦有之精
即為陰氣即為陽此兩腎各有陰陽故八味地黄丸
各補其陰陽也

吳醫彙講

卷中

五

唐立三四續

司天運氣徵驗

余曾撰司天運氣贊言已鐫入是編第七卷矣愚意以每歲每候必有歲運與司天在泉及分五運之主客六氣之主客六者雜聚變化靡窮吾儕在醫喻譬譬如一方中純寒純熱其劑自峻若苦辛相制寒熱雜陳即有所偏蓋亦微矣故天元紀六微旨二篇論至天符歲會則有中其病者速而危徐而持暴而死之別天符歲會如此可知五運六氣亦須參合以類

吳醫彙編

卷十

七

推矣內經未言及此者提其綱而難於盡數其目也抑更有釋天符太乙者謂當以得病之一日為言如戊子日亦稱天符戊午日亦稱太乙之說茲嘉慶元年丙辰乃統一歲者太羽水運上半歲又值太陽寒水司天已為天符矣而初之主運值太角初之客運值太羽初之主氣又值厥陰風木則是六者之中三寒二風惟初之客氣值少陽相火一火孤立幾為羣水所掩初之運氣天候應寒也正月初九日丙辰又天符之日水寒會聚於去冬曾與隣金子東屏胡

子誠齋謝子由喬暨同道唐子迎川周子思哲朱子潤溶以及門人王文海輩談及是日防受寒邪不意至期果於雞鳴時烈風震屋積雪盈庭及午雪益密紅爐不暖絳纒無溫抵夜風更壯即重裊幕不啻大荒水窖矣迨詰朝風少息然寒威凜冽吹氣成凍不獨貯水缸罈插花瓶缶一旦都為冰泐甚至烟筒酒甕無不凝冰耆耄之老皆云有生以來未遇如此嚴寒諸隣友謂余曰推之何精也余亦未料如此其驗也因而追溯乾隆三十八年癸巳夏炎暑酷烈中

吳醫彙編

卷十

七

喝而死者難以僕數試亦以運氣推之乃少徵火運而值已歲所謂歲會也大暑後少陽相火在泉所謂同歲會也維時乃三之運四之氣客氣又值少陽相火則是七者之中火居其四至於主運少宮客運少商主氣太陰濕土五行中全未見水有陽無陰可謂亢害之至矣於是益知運氣之說不可執一而論當以六者之中角徵宮商羽與風火濕燥寒互相參究自無不驗縱不必備甚若此始能獲應亦須以此六者主客太少何勝何遜何遠何近窮究其微必有曲

驗卽此癸巳丙辰二歲可徵也。乃試以本年他運他氣推之除五行錯雜不甚偏乖者無庸瑣述小滿後交三之客氣乃太陽寒水與歲運司天相合且主客運氣之中客氣最爲切近是時應有寒徵又小雪後交終之氣主運太羽主氣太陽寒水與歲運之太羽三水會聚惟是主運主氣不過時令之常非比客運客氣加臨變化顯有異徵耳十一月十五日丙辰益以天符之日寒應倍之茲乃時當夏仲衣必續綿三之氣亦已驗焉前撰贅言可謂未謬試再觀終之氣

吳醫彙講

卷十

何如 五月初五日

吳醫彙講卷十一目錄

周省吾

三焦說

命門說

陰陽常變論

中道說

三百九十七法考

吳醫彙講

卷十一目錄

吳醫彙講卷十一

長洲周大烈立三氏纂輯

門人周兆麟世章氏校訂

周省吾名自開任常熟縣吏清慎論會通運氣則二書未刊節錄數篇附梓是集

三焦說

三焦有形無形之說越人華陀玉冰東垣皆曰有名無形餘則或言無狀或言有形紛紜無定愚意當以無形之說為是非若五藏五府各自成形可以定其象也營衛生會篇云上焦如霧中焦如漚下焦如瀆

吳醫彙講

卷十一

十一

此三焦定論也以其無形故舉功用之相似者以擬之也霧類乎氣決氣篇所謂若霧露之漑是也考漚瀆二字之義漚瀆也漸也漸瀆之使柔爛也則漚者狀腐熟水穀之義謂漸瀆以化也瀆濁也通也所以通垢濁也則瀆者皆分待清濁即決瀆之官水道出焉之義也其三焦字義承屬無形蓋火灼則焦火即是氣以少陽為相火即取焦字之義也上中下有分司之任故曰三也營衛生會篇云上焦出於胃上口竝咽以下貫膈而布胸中中焦亦竝胃中出上焦

之後必精粕蒸津液化精微為血以奉生身故獨得行於經隧命曰營氣下焦者別迴腸注於膀胱而滲入焉水穀者居於胃中成精粕下大腸而成下焦又云營出於中焦衛出於下焦五味篇云穀始入於胃其精微者先出於胃之兩焦以漑五藏別出兩行營衛之道細玩經文曰出於胃上口出上焦之後曰成下焦曰胃之兩焦皆見無形體之意焉而細釋經旨即營衛之氣所從出其職司功用莫非氣之所為故中藏經曰總領五藏六府營衛經絡左右上下之氣

吳醫彙講

卷十一

十一

也至本藏篇有厚薄緩急直結之說者孫東宿謂五藏五府五行正配合者也獨三焦無合故附膀胱而言非謂三焦有物如是也若論勇篇理縱理橫之說不過言其人之軀殼上下通體如此故以三字貫之而借焦字助語成辭與五味篇所云胃之兩焦句法相倣耳再以背俞篇五焦七焦之文觀之則三焦縱橫之句亦可不拘泥矣使必以無形之說為悞豈越人華陀其才智反在後乎下耶

命門說

命門者人身之真陽腎中之元陽是已非另是一物也後世立論有謂在兩腎中間者有誤引七春之旁中有小心爲命門者至謂其形如胡桃尤爲荒誕夫越人倡右腎命門之說而後人非之抑思不有越人又何從有命門之說乎其意以陽氣爲重人身左血右氣故歸之右也人之每藏每府各具陰陽腎爲一身之根祇元陽爲人身所尤重故特揭之也自古命門治法亦惟溫補腎陽而已別無他法也故虞天民兩腎總號命門之說最爲近理景岳亦有分而言之

吳醫彙講

卷十一

五

則左水右火合而言之爲水火之府陰陽之宅及命門總主乎兩腎兩腎皆屬於命門之論至以子陽當之又於理未安也孫東宿以生氣立論其意頗合竟指爲先天之太極亦非也近時靈胎徐氏謂腎之有兩則皆名爲腎不得名爲命門蓋腎爲牝藏其數偶命門之義惟衝脈之根祇其位適當兩腎之中真可稱爲命之門不得以右腎當之也夫以牝藏釋兩腎其說最的以衝脈當命門倡論似甚新奇細按亦非確當不過執兩腎中間之語而另開一說耳竊以爲

兩腎爲立命之門命門穴在中間似因腎而得名越人以腎爲命門又因穴而名之也總之三十六難曰命門者精神所舍原氣所繫男子以藏精女子以繫胞此真上補素靈之未及惟非皆皆知腎有一二語不免詞病以致後人辨論紛紛也

陰陽常變論

陰陽者一氣所分宜平宜合忌偏忌離或爲對待或爲流行有會處有分處本相生亦相尅天地萬物無一可以去之其理之精微實非易言者也考之醫籍

吳醫彙講

卷十一

五

或謂陰易虧而陽易亢務以益陰爲先或謂陰主殺而陽主生必以扶陽爲重若此之類各有至理而均非定論何也以未分常與變耳試以四時晝夜核之春夏爲陽秋冬爲陰兩分焉而毫弗參差夜則爲陰晝則爲陽總計焉而纖無多寡此陰陽之常也以天地之終論之時或亢旱即陽盛陰虛之錄必有待於甘霖彙或久陰即陽衰陰盛之徵是有積於皎日此各執其說者亦有至理也以人之病不期之多人乏非清涼無以較其燥原既不可專以之爲重氣脫神

覆非溫熱無以消其陰翳亦不可獨以陰為先非偏執之見均非定論乎考之先儒語其大綱一動一靜互為其根是為流行分陰分陽兩儀立焉則為定位言其體用天以陽生萬物以陰成萬物惟兩故化合而後能遂也以陽為用則尊陰以陰為用則尊陽隨時變易迭相為用也陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為唱陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅顧陰之為道利於從陽不利於抗陽陽之

吳醫集講 卷十

五

為性宜於潛藏不宜於發洩若夫陽主進而陰主退陽主息而陰主消進而息者其氣強退而消者其氣弱陽剛溫厚居東南主春夏而以作長為事陰柔巖凝居西北主秋冬而以斂藏為事作長為生斂藏為殺似乎以陽為重及觀天不地不生夫不婦不成又謂元不生於元而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散故不貞則無以為元而非生生不窮之道也又不必以陰為輕則先儒之說未嘗偏輕偏重也故陰陽得其正則平若權衡陰陽失其和則反如冰炭

自其變者而觀之陽主乎熱陰主乎寒不可混而為一自其不變者而觀之陰氣流行即為陽陽氣凝聚即為陰豈可分而為二且陰陽互藏其宅故傷其陽即及其陰傷其陰亦即及其陽陰陽消長無窮故陽之退便是陰之生陰之退便是陽之生內經亦曰陰陽之道如環無端是也如曰陽能生陰陰則不能生陽豈理也耶且果穀草木有生於春春者載於秋者亦有生於秋而成於春者惟獨陽則不生獨陰則不長耳要之論其常則毫釐不可輕重如其變則剛柔大

吳醫集講 卷十

五

有懸殊所以寒極則凍而死暑極則熱而斃過則生乎殺也晴明物不榮雨露物亦茂和則主乎生也惟今人之體偏勝者多在乎臨證者於向來偏執之說毋詆其短善用其長可也陰陽之理非一言可以盡之也

中道說

申之為道無所不涵無所不徹推之醫理尤不可忽蓋善病由於乖戾用藥惟以調和益其不足損其有餘溫涼攻補必歸於中而後可夫中者不偏不倚無

過不及之謂也故中無定體隨時而在一病有一中不可偏向一病而今日如此爲中明日如彼爲中慎勿固執且同一病而此則如此爲中者彼則如此而又非中無窮活變故中者如權之稱物如鏡之取火少越焉太過矣少退焉不及矣總在當機之順應也醫之中道非不寒不熱不補不瀉之謂中病即是中中病而毫無偏倚毫無過不及即是至中是以補如參地瀉如硝黃熱如姜附寒如膏連散如麻桂毒如蟲蛙合宜而用何一非大中之理乎是在平時窮理

吳醫彙講

卷十一

七

精而辨症明則臨病自生變化能統萬理於一原自能通一心於萬事也嘗怪前賢往哲代不乏人其聰明才辯之資縱橫反覆踔奇入險固皆醫林之傑也然而適中者寡矣書曰允執厥中子曰中庸不可能也醫雖小道何獨不然

三百九十七法考

仲景傷寒書爲叔和編次已失其真卽林億校本亦已難得今世所傳惟成無已註釋之本而已至三百九十七法莫不津津樂道而究鮮確指汪苓友亦云

前人所未明言其引張孝培傷寒類疏桂枝湯服後至以助藥力爲一法溫覆至如水流漓又一法稱與諸家不同願吾不知其何本而有此考前明有吾虞趙開美翻刻宋板傷寒論全文其三百九十七法於每篇之首註其幾法先則節錄原文開明第一第二次於原文之下復列一二三之數總計全書治法瞭如也但不知出自叔和出自林億今之傳本亡之者殆爲無已所刪乎後人未見宋刻茫然不曉如王安道亦未之見也 國朝王晉三雖於每方之下註以

吳醫彙講

卷十一

八

各法亦不過繼張孝培汪苓友之志而愛禮存羊究有未能悉洽者故愚以爲註書不應改移止宜就文辨論如朱子之賢闕文錯簡皆仍其舊無已何人而乃擅削以致迄今盈庭聚訟也

僕先祖笠山公精于醫理博及羣書臨症之眼

靜坐小齋手不釋卷雖至老不倦于暮年採取諸同學高論輯成吳醫彙講行世舊存見聞篇什及諸公送來佳作 先祖必反覆細閱再商

之二三老友考訂盡善方始付梓是以採取者
果多存止者亦復不少緣集行海內同人之公
論繫焉不苟採選可見 僕 先祖慎且重也選
至十一卷周吾省先生佳章之後忽抱沉痾于
辛酉歲辭世迄今十四載矣痛音容之已杳幸
彙講之流傳慶者 僅守遺板即以十一卷第八
頁吾省先生佳作為止慶者年幼無知不能克
承家學醫林典籍未經探討雖承佳章 賜教
不敢續入集內所以遵 先祖慎採之遺意也

吳醫彙講

卷十一

七

爰書數語附于簡末

嘉慶十九年歲次甲戌春正月孫男慶者百拜謹識

書吳醫彙講後

太史公言人之所病病疾多醫之所病病道少故於
扁鵲倉公列傳各載治驗切脈論病縷析條分詳哉
其言之也後長沙太守張仲景出著有傷寒金匱二
書是為醫林之淵藪後學之津梁自漢迄今專門名
家著述繼起燦然可觀其間或論說紛紜貪多務得
甚至勦說雷同不可枚舉竊謂讀書貴乎得間醫書
之浩汗尤貴採擇精當取舍在我有所作述務在心
得未可拾他人之唾餘以竊取傳會為能事也而笠

吳醫彙講

卷十一

山先生已先得我心矣先生學富思深醫林重之其
集前輩名醫及諸同人著作彙為一編名之曰吳醫
彙講而自著諸條考據精詳辨論明快能發人所未
發 僕 受而讀之知是編之集腋為裘洵可以傳世而
行遠矣方是編之初付劑劑也笠山先生旁搜博采
下及葑菲 僕 自曩時從學於松心夫子質疑問難涉
獵方書意見所及亦嘗紀載一二數年來奔走風塵
此道已存而不論况當珠玉在前益覺自顧形穢既
病道少又恐勦說雷同與尋常方術同類而共譏之

也既無以應笠山先生之問而又不能不贊一辭乃

自書其所見以附編末太史氏於扁鵲倉公列傳詳

載治驗篇終又引老聃之言以為戒寓意深遠亦先

敘後斷之例後人因之遂有卷尾作跋編末後序之

作其實皆贅疣也侯非敢效史遷之例而於二者之

間其有一得也夫壬子仲冬朱克柔書

朱子研漁不作首序而作後序謙抑之意也惟是


拙集不限卷數以俟陸續賜教隨時增訂故未便

以此篇殿於編末移置備端從權也 大烈識

吳醫彙講

後序

吳醫彙講 後序



吳氏醫案序

醫之有案猶國之有史也沿國者鑑於古代治亂興衰之故而後知所以為政
理民之道為醫者察於昔人起病拯危之神而後知所以治病用藥之方蓋皆
積所經驗以傳諸後世而資其師法者也其為書顧不重哉准陰吳鞠通先生
醫聲震海內蓋不特葉氏之高弟抑亦仲聖之功臣也生平著述有溫病條辨
醫醫病書及吳氏醫案諸書而醫案尤先生畢生精力之所蓄萃今條辨既傳
布全國為世寶貴而醫醫病書亦已由本社刊於去冬獨醫案一書向鮮傳本
偶有鈔錄藏者亦秘不示人遂使先生數十年經驗之良模不獲見知於世寧
不惜哉三十年前余曾向下灶胡氏處假錄一通常置案頭用資師法友人見
者均嘆為良書轉相傳鈔幾於日不暇給同社友吉生裘君有刊行醫藥叢書
之舉欲將此籍收入之以廣其傳因詳加校讎而付之天俾播古籍以嘉惠後
學吾人之責也若謂表章先賢則吾豈敢至案中有用暈過重處僉謂刊時可

吳氏醫案

序

一

刪去此余期期以謂不可蓋刊行古書須存古書真面俾後學得窺遺澤凡書
內之或是或非應在讀者各自加其主見倘妄行編次隨意割截不若自行著
作何必借古人之名而滅古人之實逞一己之私而貽後人之憾耶
丙辰二月後學高德僧汝賢謹序

吳鞠通先生醫案 卷一

目錄

暑溫
伏暑
溼溫
中燥
瘧
冬溫
傷寒

吳氏醫案

目錄

一

吳鞠通先生醫案卷一

高德僧汝
表吉生慶元校刊

暑濕

壬戌六月廿四歲暑濕邪傳心包譫語神昏右脈洪大數實而模糊勢甚危險
廿九日 連翹六錢 生石膏一兩 麥冬六錢 銀花八錢 細生地六錢 知母五錢 元參六錢 生甘草三錢 竹葉三錢 煮成三碗分三次服牛黃丸一丸 紫雪丹三錢 另服

七月初 溫邪入心包絡神昏痙厥極重之症

連翹三錢 生石膏六錢 麥冬三錢 連心五錢 銀花五錢 細生地五錢 知母二錢 丹皮三錢 生甘草一錢五分 竹葉一錢
今晚二帖明早一帖再服紫雪丹四錢

吳氏醫案

暑濕

壬戌七月十四日 周二歲世人悉以羌防柴葛治四時雜感意謂天地有冬而無夏不

亦冤哉以致暑邪不解深入血分成厥衄血不止夜間煩躁勢已膠鋼難解焉得速功

飛滑石三錢 犀角三錢 冬桑葉三錢 羚羊角三錢 元參五錢 鮮蘆根一兩 細生地五錢 丹皮五錢 鮮荷葉邊一張 杏仁泥三錢 今晚一帖明早一帖
十五 脈與熱似乎稍緩據云夜間煩躁亦減是其佳處但脈弦細沉數非痙厥所宜急育陰而戀陽復鹹以制厥法

生地六錢 生鱉甲六錢 犀角三錢 元參六錢 羚羊角三錢 丹皮三錢 麥冬三錢 連心八錢 生白芍四錢 桑葉三錢 日服二帖

十六 脈之弦剛者大覺和緩沈者已起是為起色但熱病本屬傷陰況醫者誤以傷寒溫燥藥五六帖之多無怪乎舌苔燥如草也讀啟腎液法
元參一兩 天冬三錢 丹皮五錢 沙參三錢 麥冬五錢 銀花三錢 犀角三錢 鱉

甲八錢 桑葉二錢 日服三帖

十七 卽於前方內加細生地六錢 連翹一錢五分 鮮荷葉邊三錢 再按暑熱之邪深入下焦血分身半以下地氣主之熱來甚於上焦豈非熱邪深入之

明徵乎必借芳香以為搜邪之用不然恐日久膠錮之邪一時難解也一日熱邪不解則真陰正氣日虧一日矣此紫雪丹之必不可少也
紫雪丹一錢五分 分三次服

十八 厥已回面赤舌苔乾黑芒刺脈沈數有力十餘日不大便皆下症也人雖

虛然亦可以調胃承氣湯小和之
大黃生五錢 元明粉沖三錢 甘草生三錢
先用一半煎一茶盃緩緩服俟夜間不便再服下半劑服前方半劑卽解
黑大便許多
便後用此方

吳氏醫案

暑濕

麥冬一兩 大生地一兩 鱉甲一兩 白芍六錢

十九 大下宿糞若許舌苔化而未滋潤脈仍洪數微有潮熱除存陰無二法
沙參三錢 大生地一兩 鱉甲五錢 麥冬六錢 生白芍六錢 牡蠣五錢 天冬三錢 炙甘草三錢 丹皮四錢 日服二帖

廿一 小便短而赤甚微咳面微赤尺脈仍有動數之象讓甘潤益下以治虛熱少復苦味以治不盡之實邪且甘苦合化陰氣而利小便也按甘苦合化陰氣利小便法舉世不知在溫熱門中誠為利小便之上上妙法蓋熱傷陰液小便無由而生故以甘潤益水之源小腸火腑非苦不通為邪熱所阻故以苦藥瀉小腸而退邪熱甘得苦則不呆滯苦得甘則不剛燥合而成功也

生鱉甲八錢 元參五錢 麥冬三錢 連心六錢 生白芍六錢 沙參三錢 麻仁三錢 古勇連一錢 阿膠三錢 丹皮三錢 炙甘草四錢 日二帖

廿一 已得效仍服前方一帖

廿二 復脈復苦法清下焦血分之陰熱

元參 五錢 鱉甲 生五錢 阿膠 化沖三錢 白芍 生六錢 天冬 二錢 丹皮 三錢 麻仁 五錢 麥冬 連心五錢 甘草 炙五錢 日服二帖

癸亥六月 王二十 暑溫舌苔滿佈色微黃脈洪弦而剛甚左反大於右不渴初起即現此等脈症恐下焦精血之熱遠甚於上焦氣分之熱也且舊有血

溢故手心熱又甚於手背究竟初起且清上焦然不可不心知其所以然

連翹 二錢 細生地 一錢五分 粉丹皮 二錢 銀花 二錢 苦桔梗 一錢 白茅根 二錢 麥冬 二錢 牛勞子 一錢五分 香豆鼓 一錢五分 元參 一錢五分 霍香梗 一錢 生甘草 一錢 薄荷 三分 日三帖

初六 熱退大半胸痞腹中自覺不和按暑必夾溼熱退淨存之故先清氣分

霍香梗 三錢 飛滑石 一錢五分 白扁豆 二錢 杏仁泥 一錢 連翹 二錢 廣鬱

金 二錢 生苡仁 三錢 銀花 一錢五分 白通草 八分 香豆鼓 二錢 日二帖

初七 病後六腑不和

霍香梗 三錢 飛滑石 三錢 香豆鼓 二錢 生苡仁 三錢 半夏 二錢 廣皮 一錢 廣鬱金 一錢 厚朴 二錢 日服一帖

初十 向有失血又屆暑病之後五心發熱法當補陰以配陽但脈澀而細不惟陰不充足即真陽亦未見其旺也議二甲復脈湯仍用舊有之桂枝棗

白芍 炒四錢 大生地 四錢 沙參 三錢 桂枝 二錢 生鱉甲 五錢 麥冬 四錢 麻仁 二錢 生牡蠣 五錢 生薑 二片 阿膠 化沖二錢 炙甘草 五錢 大棗 去核二枚 煮三杯分三次服

又丸方八仙九加麻仁白芍

麥冬 連心六兩 直熱地 八兩 山藥 三兩 茯苓 四兩 五味子 三兩 麻仁 三兩

澤瀉 三兩 山萸肉 酒炒三兩 白芍 酒炒六兩 丹皮 四兩 蜜丸如梧子大每服三錢 日三服

癸亥六月 馬三十 暑熱本易傷陰誤用消導攻伐重傷陰氣致令頭中耳中鳴無止時此係肝風內動若不急救肝腎之陰痰癱熱厥立至矣

大生地 六錢 麥冬 五錢 生牡蠣 五錢 炒白芍 六錢 丹皮 三錢 菊花炭 一錢 生鱉甲 五錢 桑葉 一錢五分 炙甘草 三錢 大便太稀去此 火麻仁 二錢 煮三盃分三次服

十二 外邪雖退無奈平素勞傷太過虛不肯復六脈無神非參不可

沙參 三錢 大生地 六錢 阿膠 三錢 元參 六錢 生鱉甲 六錢 丹皮 二錢 麥冬 六錢 火麻仁 三錢 甘草 炙四錢 白芍 生六錢 煮三杯分三次服 得大便後去元參加牡蠣 六錢 人參 三錢 桂枝 一錢 大棗 去核二枚 生薑 一片

吳氏醫案 暑溫 四

七月初 病後飲食不調又兼暑溼着裏腹中絞痛痛極便溼脈微數欲作滯下

議芍芍法奪其滯下之源 焦白芍 一錢五分 厚朴 二錢 廣木香 一錢 黃芩炭 一錢二分 枳實 一錢小 回炭 八分 南查炭 一錢五分 廣皮 炒一錢五分 雲連炭 八分 神麩炭 二錢 一二帖後腹痛除仍服復脈湯

乙丑六月 榮女十五 暑溫夾痰飲怒鬱故服托身熱而脇痛誤用足六經表藥

煩躁不甯六日不解至危之症 生石膏 四錢 杏仁 三錢 生香附 三錢 旋覆花 包三錢 連翹 三錢 霍香梗 三錢 廣鬱金 二錢 薄荷 一錢 煮兩盃分二次服三時一帖服二日大見效再

商 十三 於前方內加青橘皮 二錢 鮮荷葉 邊一枚 乙丑六月 富氏廿二 暑傷足太陽發為脹渴不欲飲飲則嘔身微熱舌白滑

十三 於前方內加青橘皮 二錢 鮮荷葉 邊一枚 乙丑六月 富氏廿二 暑傷足太陽發為脹渴不欲飲飲則嘔身微熱舌白滑

肢逆二便閉塞病在中焦居多以香開腑瀉為主

杏仁泥 三錢 半夏 五錢 小枳實 三錢 旋覆花 包三錢 厚朴 四錢 廣鬱金 一錢 生苡仁 三錢 香附 三錢 白蔻仁 一錢 藿香梗 三錢 廣皮 二錢 煮兩盃分

二次服今日一帖明日服二帖

乙丑閏六月十四日 孫四頭痛左關獨高責之少陽內風掀動最有損一日之弊若以

為外感寒則遠甚矣議清少陽膽絡法再此症除左關獨高餘脈皆緩所謂通體皆寒一隅偏熱故先清一隅之熱金匱為先治新病病當後治也

羚羊角 一錢 丹皮 一錢五分 茶菊花 一錢五分 苦桔梗 一錢 生甘草 一錢 薄荷 六分 刺蒺藜 一錢 桑葉 一錢五分 鮮荷葉 去蒂半張 鈞藤鈞 一錢 煮

兩盃服今日一帖明日兩帖

初八 前日左關獨浮而弦係少陽頭痛因暑而發用清膽絡法茲左關已平其

半但緩甚舌苔白厚而滑胸中痞悶暑中之熱已解而溼尚存也議先宣

吳氏醫案

暑溫

五

上焦氣分之溼

生苡仁 五錢 飛滑石 六錢 藿香梗 三錢 杏仁泥 五錢 半夏 五錢 廣鬱金 三錢 旋覆花 包三錢 廣皮 三錢 白通草 一錢 茯苓皮 三錢 白蔻仁 連皮二錢

煮兩盃今日服渣再煮一盃明早服

初九 諸症俱減舌白未除中溼尚多議進法於前方內

加生蒼朮 三錢 草果 炒一錢

乙丑閏六月十八日 暑傷兩太陰手太陰之症為多一以化肺氣為主

飛滑石 八錢 連翹 三錢 白通草 一錢 杏仁泥 五錢 金銀花 三錢 白扁豆花 一枝 生苡仁 五錢 厚朴 三錢 鮮荷葉 去蒂一張 藿香葉 一錢 白蔻仁 連皮

二錢 煮兩盃分兩次服今晚明早各一帖

初四 兩太陰之暑症昨用冷香台辛涼暑中之熱已退其半但裏溼與熱未克

即除故大便紅水胸中痞悶

飛滑石 六錢 猪苓 五錢 藿香梗 三錢 杏仁泥 三錢 澤瀉 五錢 廣鬱金 一錢

茯苓皮 三錢 生苡仁 五錢 白通草 二錢 白蔻仁 一錢五分 厚朴 三錢 煮三

盃服今晚明日各一帖

初五 舌苔白厚腹甚不和腸鳴泄瀉聚溼尚多急宜分泄以免延拖

飛滑石 六錢 半夏 五錢 藿香梗 三錢 茯苓皮 六錢 澤瀉 五錢 南蒼朮 三錢 生苡仁 六錢 椒目 五錢 白蔻仁 三錢 老厚朴 三錢 廣皮 三錢 水八碗 煮取

三碗分三次服渣再煮一碗服

乙丑七月廿四日 六脈俱大之極左手更甚目邪視怒氣可畏兩臂兩手捲曲

而癱瘓舌邪向不語三四日面赤身熱舌苔中黃邊白暑入心包膽絡以清心膽之邪為要先與紫雪丹

連翹 連心五錢 羚羊角 三錢 竹茹 三錢 金銀花 五錢 暹羅犀角 三錢 丹皮 二錢 麥冬 五錢 細生地 五錢 桑葉 三錢 天冬 三錢 鮮荷葉 去蒂一張 煮四

吳氏醫案

暑溫

六

盃分四次服又碧雪丹一兩 每服三錢涼開水調服以神清熱退為度現

在熱厥

廿三 肝熱之極加天冬涼肝於前方內

加天冬 三錢 其碧雪丹仍照前常服

廿四 暑入心膽兩經與清心絡之伏熱已見小效仍用前法而進之

烏犀角 五錢 連翹 連心四錢 粉丹皮 五錢 羚羊角 三錢 銀花 三錢 茶菊花 三錢 細生地 五錢 麥冬 連心五錢 冬桑葉 三錢 煮四盃分四次服

廿五 加黃芩 三錢 白扁豆花 一枝 山連 一錢五分 鮮荷葉邊 一枚

廿六 暑入心膽兩經屢清兩經之邪業已見效今日飲水過多水入微嘔蓋暑必挾溼議於前方內去柔藥加淡滲

茯苓皮 五錢 銀花 三錢 黃柏炭 一錢 生苡仁 五錢 連翹 連心三錢 眞川連 一錢 羚羊角 三錢 犀角 二錢 冬桑葉 三錢 黑山梔 三錢 茵陳 三錢 荷葉邊

二枚 煮三盃分三次服

廿七 暑熱退後嘔水身微黃熱退溼存

雲苓塊 連皮五錢 銀花 三錢 白蔻皮 一錢 生苡仁 五錢 連翹 三錢 黃柏炭

二錢 杏仁泥 三錢 茵陳 三錢 白通草 一錢 黑山梔 三錢 煮三盃分三次服

廿九 熱未盡退舌起新白苔胸痞暑兼溼熱不能純治一邊

飛滑石 六錢 銀花 三錢 藿香梗 三錢 雲苓皮 五錢 連翹 不去心三錢 真山

連一錢五分 杏仁泥 五錢 白蔻 打碎一錢五分 白通草 一錢 生苡仁 五錢

煮三盃分三次服

八月初 暑熱已退七八惟十餘日不大便微有謔語脈沈可與輕通陽明與增

液承氣法

細生地 六錢 元參 八錢 麥冬 不去心六錢 生大黃 四錢 煮成三盃先服一

孟約二時不大便再服第二盃明早得大便止後服否則服第三盃

吳氏醫案 暑濕

七

初三 溫病下後宜養陰暑濕下後宜兼和胃蓋暑必夾溼而舌苔白滑故也脈

緩與外臺茯苓飲意

雲苓塊 五錢 麥冬 不去心五錢 廣鬱金 一錢 生苡仁 五錢 半夏 三錢 白蔻

皮 一錢五分 藿香梗 三錢 厚朴 一錢 煮三盃分三次服

初五 暑溫熱退溼存故嘔腹不和而舌有白苔與三仁湯宜剛法

杏仁 五錢 益智仁 一錢 苡仁 五錢 半夏 五錢 藿香梗 三錢 黃芩 三錢 厚朴

二錢 白蔻仁 一錢五分 生薑 三片 煮三盃分三次服

丁卯六月 王三十 暑溫誤表汗如暴雨直流有不可猝過之勢脈洪托氣短與

白虎人參湯

生石膏 八兩 知母 二兩 粳米 一合 炙甘草 一兩 洋參 八兩 煮四碗一時許

服一碗以汗止為度不止再作服

十六 汗勢減照前方服半劑

十七 脈靜身涼汗止與三才湯三帖全愈

丁丑六月 吳四十 先暑後風大汗如雨惡寒不可解先服桂枝湯一帖為君之

桂枝用 二兩 盡劑毫無效驗次日用桂枝 八兩 服半帖而愈 鞠通自醫

丁亥閏五 月廿二日 某暑溫誤表致有謔語邪侵心包熱重面赤脈洪數手太陰症為多

宜辛涼芳香以清肺熱開心包陽有汗陰無汗及頸而遺極大症也

生石膏 一兩 連翹 連心三錢 丹皮 三錢 飛滑石 六錢 銀花 三錢 桑葉 三錢

細生地 五錢 知母 炒三錢 甘草 二錢 苦桔梗 三錢 煮三大盃分三次服外

服紫雪丹 五分

廿三 脈之洪數者少減熱亦少退舌心黑滑大便頻澀暑必夾溼況體厚本身

溼痰過重者乎議兩清溼熱

雲苓皮 五錢 連翹 連心三錢 藿香梗 三錢 生苡仁 五錢 銀花 四錢 六一散

三錢 薑半夏 三錢 黃芩 一錢 白蔻仁 一錢 煮三盃分三次服外服紫雪丹

吳氏醫案 暑濕

八

五分

廿四 脈洪大又減但沈數有力伏邪未淨舌中黑滑耳聾大便仍頻澀

雲苓皮 六錢 苡仁 五錢 黃芩 三錢 薑半夏 五錢 連翹 三錢 銀花 三錢 雅連

薑汁炒一錢 六一散 六錢 竹葉 三錢 煮三盃分三次服外服紫雪丹 五分

廿五 即於前方內連翹銀花加至 五錢 苡仁加至 八錢 紫雪丹仍服 五分

廿六 熱漸退而未盡脈漸小而仍數面赤減大便頻數亦少餘邪未盡

連翹 四錢 飛滑石 六錢 黃芩 三錢 銀花 四錢 雲苓皮 六錢 雅連 一錢 苡仁

五錢 薑半夏 五錢 甘草 一錢 白蔻 連皮一錢 煮四盃分四次服

廿七 照前方仍服一帖

廿八 即於前方內加桑葉 三錢 目白睛赤續故也

廿九 大熱雖退餘焰尚存耳聾與苦淡法

銀花 五錢 飛滑石 六錢 丹皮 三錢 連翹 連心三錢 雲苓皮 六錢 苡仁 六錢

雅連 炒一錢 苦丁茶 三錢 桑葉 三錢 牡蠣 五錢 龍膽草 一錢五分 煮四五分四次服

六月初 脈靜身涼熱已退矣舌有新白滑苔溼病有存者與三仁湯宣化三焦

通調水道

雲苓塊 連皮六錢 苡仁 五錢 晚蠶砂 三錢 杏仁泥 三錢 澤瀉 一錢 益智仁 一錢五分 薑半夏 三錢 白蔻 一錢五分 黃芩炭 一錢五分 檀香梗 三錢 通草 一錢 煮三盃分三次服

庚寅六月 吳二十 暑兼溼熱暑溫不比春溫之但熱無溼可用酸甘化陰鹹以補腎等法且無形無質之熱邪每借有形有質之溼邪以為依附此症一月有餘愈用大劑純柔補陰退熱法熱總未減而中宮痞塞得食則痛脹非抹不可顯係暑中之溼邪蟠踞不解再得柔賦膠固之陰藥與邪相搏業已喘滿勢甚重大勉與通宣三焦法仍以肺氣為主蓋肺主化氣氣化

吳氏醫案

暑溫

九

則溼熱俱化六脈弦細而沈洪

苡仁 五錢 生石膏 二兩 厚朴 三錢 杏仁 四錢 雲苓皮 五錢 青蒿 一錢 連翹 三錢 藿香梗 三錢 白蔻 一錢五分 銀花 三錢 鮮荷葉邊 一片 煮三盃分四次服兩帖

廿三 暑溼誤用陰柔藥致月餘熱不退胸膈痞悶前與通宣三焦今日熱減脈亦減但痞滿如故喘仍未定舌有白苔猶為棘手

生石膏 二兩 厚朴 三錢 藿香梗 三錢 飛滑石 四錢 連翹 三錢 小枳實 一錢 雲苓皮 三錢 廣皮 三錢 白蔻仁 一錢 生苡仁 五錢 煮三盃分三次服一帖

廿五 熱退喘減脈亦稍平惟仍痞且泄瀉皆陰柔之累始行溼止瀉

滑石 五錢 薑半夏 三錢 黃芩 炒二錢 猪苓 三錢 雲苓皮 五錢 廣鬱金 一錢 澤瀉 二錢 藿香梗 三錢 通草 一錢 苡仁 五錢 煮三盃分三次服二帖

廿七 喘止胸痞亦開熱雖減而未退瀉未止

生石膏 一兩 澤瀉 三錢 薑半夏 五錢 飛滑石 六錢 黃芩 三錢 藿香梗 三錢 雲苓皮 六錢 煮三盃分三次服二帖

廿九 諸症俱減惟微熱大便溼調理飲食為要

雲苓塊 連皮五錢 猪苓 三錢 藿香梗 三錢 生苡仁 五錢 澤瀉 三錢 炒黃芩 三錢 薑半夏 二錢 蘇梗 二錢 白蔻仁 一錢 杏仁泥 二錢 煮三盃分三次服四帖

伏暑

壬戌八月 周十四 伏暑內發新涼外加脈右大左弦身熱如烙無汗吐膠痰舌苔滿黃不宜再見泄瀉不渴腹脹少腹痛是謂陰陽並病兩太陰互爭難治之症議先清上焦溼熱蓋氣化溼熱亦化也

飛滑石 三錢 連翹 一錢 象貝母 一錢 杏仁泥 三錢 銀花 一錢 白通草 一錢 老厚朴 二錢 蘆根 一錢 鮮梨皮 一錢 生苡仁 一錢五分 竹葉 一錢 今晚一

吳氏醫案

伏暑

十

帖明早一帖

廿七 案仍前

飛滑石 三錢 連翹 一錢 鮮梨皮 一錢五分 杏仁泥 一錢五分 冬桑葉 一錢 銀花 二錢 老厚朴 一錢五分 薄荷 八分 扁豆皮 二錢 苦桔梗 一錢五分 蘆根 二錢 荷葉邊 一錢五分 炒知母 一錢五分 午一帖晚一帖明早一帖

廿八 兩與清上焦熱已減其半手心熱甚於手背謂之裏熱舌苔紅而厚為實熱宜宣之用苦辛寒法再按暑必夾溼腹中案之痛脹故不得不暫用苦燥法

杏仁泥 三錢 木通 一錢 真山連 薑汁炒黃一錢五分 廣木香 一錢 黃芩炭 一錢 厚朴 一錢五分 小茴香 炒黑一錢五分 括裏 連皮仁八分 炒知母 一錢五分 小枳實 打碎一錢五分 檳榔 八分 廣皮炭 一錢 煮三盃分三次服

廿九 腹之痛脹俱減舌苔乾燥黃黑肉色絳暗咳痰粘幼童陰氣未堅當與存

陰退熱

麥冬 不去心六錢 煨石膏 四錢 丹皮 五錢 沙參 三錢 細生地 四錢 杏仁 三錢 元參 五錢 炒知母 二錢 蛤粉 三錢 犀角 一錢 生甘草 一錢 煮三盃分三次服

二十 津液稍回潮熱因宿糞未除夜間透汗因邪氣還表右脈仍然浮大未可下宜保津液護火克肺金之嗽

細生地 六錢 元參 六錢 蘆石斛 三錢 焦白芍 四錢 麥冬 六錢 柏子霜 三錢 煨石膏 三錢 沙參 三錢 牡蠣粉 一錢五分 杏仁泥 一錢 犀角 一錢 煮三盃陸續服

廿一 諸症悉解小有潮熱舌絳苔黑深入血分之熱未盡除也用育陰法

沙參 三錢 大生地 五錢 牡蠣 三錢 麥冬 不去心六錢 焦白芍 四錢 丹皮 三錢 天冬 一錢五分 苧子霜 三錢 甘草 二錢 頭煎二盃二煎一盃分三次服

吳氏醫案

伏暑

十一

服

廿二 津液消亡舌黑乾刺用復脈法

大生地 六錢 麥冬 不去心六錢 柏子霜 四錢 炒白芍 六錢 丹皮 四錢 火麻仁 三錢 生鱉甲 六錢 阿膠 沖三錢 炙甘草 三錢 生牡蠣 四錢 頭煎三盃今日服二煎一盃明早服

廿三 右脈仍數餘邪陷入肺中咳甚痰艱議甘潤兼宣涼肺氣

麥冬 不去心一兩 細生地 五錢 象貝 三錢 沙參 三錢 杏仁泥 三錢 冬桑葉 三錢 玉竹 三錢 苦桔梗 三錢 甘草 三錢 丹皮 二錢 茶菊花 三錢 梨皮 二錢 一帖藥分二次煎每煎兩茶盃共分四次服

廿四 舌黑苔退脈仍數仍咳腹中微脹

細生地 五錢 麥冬 不去心五錢 蘆香梗 一錢 茯苓塊 三錢 沙參 三錢 廣藿香 一錢五分 杏仁粉 三錢 丹皮 三錢 生扁豆 三錢 苦桔梗 三錢 象貝 二錢

煮三盃渣再煎一盃分四次服

廿五 昨曉得黑宿糞若許潮熱退唇舌仍絳熱之所過其陰必傷與復脈法復其陰

大生地 八錢 麥冬 不去心一兩 火麻仁 三錢 炒白芍 六錢 沙參 三錢 阿膠 沖二錢 生鱉甲 五錢 元參 三錢 炙甘草 三錢 生牡蠣粉 五錢 丹皮 二錢 水八碗煮成三碗分三次服渣再煮一碗明早服

廿六 又得宿糞若許邪氣已退八九但正陰虛耳故不欲食晚間乾咳無痰

大生地 八錢 麥冬 不去心六錢 火麻仁 三錢 生白芍 五錢 天冬 二錢 牡蠣粉 三錢 北沙參 三錢 阿膠 沖三錢 炙甘草 三錢 煮三盃分三次服外用梨汁荸薺汁藕汁各一黃酒盃重湯燉溫頻服

廿七 熱傷津液大便燥微有潮熱乾咳舌赤用甘潤法

細生地 五錢 元參 六錢 知母 炒黑二錢 火麻仁 三錢 麥冬 不去心六錢 阿膠 一錢 郁李仁 二錢 沙參 三錢 梨汁 一盃 沖 荸薺汁 一盃 沖 煮三盃分三次服

吳氏醫案

伏暑

十二

服

廿八 伏暑內潰積出白疹若許脈較前恰稍和第二次舌苔未化不大便

麥冬 不去心六錢 大生地 五錢 元參 三錢 沙參 三錢 牛蒡子 炒研細三錢 阿膠 一錢五分 連翹 連心二錢 生甘草 一錢 麻仁 三錢 銀花 炒一錢 煮三盃分三次服服此晚開大便

九月初 潮熱復作四日不大便燥糞復聚與增液承氣湯微和之

元參 五錢 細生地 五錢 大黃 生二錢 麥冬 不去心五錢 炙甘草 一錢 煮二盃分二次服服此得黑燥糞若許而潮熱退脈靜以後與養陰收功

癸亥十二日 陳廿八 左脈洪大數實右脈陽微陰陽逆亂伏暑似瘧最難即愈謹領邪外出法

生鱉甲 二兩 麥冬 不去心八錢 粉丹皮 三錢 桂枝尖 三錢 沙參 三錢 炒知

母三錢 焦白芍三錢 青蒿四錢 炙甘草一錢五分 煮三碗分三次服

日十四 伏暑寒熱往來已愈不食不飢不便胸中痞悶九竅不和皆屬胃病

半夏五錢 茯苓地五錢 桂枝一錢五分 黨參三錢 生苡仁五錢 廣皮一錢

五分 青皮一錢五分 廣鬱金一錢 煮三碗分三次服

日十七 久病真陽虛則膈痛餘邪化熱則口苦正氣不復則肢倦

生洋參二錢 桂枝三錢 廣皮炭一錢五分 茯苓塊三錢 半夏三錢 炙甘草

一錢五分 焦白芍三錢 生薑二片 大膠棗一枚 黃芩炭一錢五分 煮三碗

分三次服

乙丑八月十九 斬歲不兼溼之伏暑誤治津液消亡以致熱不肯退唇裂舌燥四

十餘日不解咳嗽痰語口渴可先服牛黃清心丸清包絡而搜伏邪

湯藥與存陰退熱法

細生地三錢 麥冬不去心五錢 生扁豆三錢 生鱉甲五錢 沙參三錢 生甘

吳氏醫案 伏暑 吉

草一錢 生牡蠣五錢 炒白芍三錢 煮三碗分三次服

日廿四 暑之偏於熱者誤以傷寒足經藥治之以致津液消亡昨用存陰法兼芳

香開絡中閉伏之邪已見大效茲因小便赤甚而短熱雖減而未除議甘

苦合化陰氣法

一甲復脈湯加黃芩三錢 如有譫語牛黃丸仍服

日廿六 昨用甘苦合化陰氣法服後大見涼汗茲熱已除脈減舌苔盡退但六脈

重按全無舌仍乾燥議熱之所過其陰必傷例用一甲復脈湯重加鱉甲

甘草

乙丑九月 與六十月 四歲夏傷於溼冬必咳嗽況六脈俱弦木旺克土脾土受克則泄

瀉胃土受克則不食而欲嘔前曾腹脹現在胸痞舌白滑此寒溼病也而

脈反數思涼思酸物極必反之象豈淺鮮哉急宜戒惱怒小心一切為要

姜半夏二錢 飛滑石三錢 生以仁五錢 杏仁泥四錢 旋覆花包三錢 廣鬱

金一錢 茯苓皮五錢 白薤皮一錢 白通草一錢 水五盞煮取兩盞渣再煮

一盞分三次服

日十八 脈數甚思涼溼中生熱之故

飛滑石六錢 以仁六錢 白薤仁一錢五分 茯苓皮六錢 半夏四錢 廣鬱金

二錢 杏仁泥六錢 黃芩一錢 白通草二錢 藿香梗三錢 枳實一錢五分 水

八碗煮取八分三茶碗渣再煮一碗日三夜一分四次服

日二十 伏暑必夾火與溼不能單顧一邊至服藥後反覺不快乃久病體虛不任

開泄之故渴思涼者火也得水則停者溼也

生石膏六錢 半夏三錢 炒知母一錢五分 杏仁泥六錢 黃芩一錢 白薤仁

一錢 煮三盞分三次服

日廿一 於前方內去薤仁加

生石膏四錢 藿香梗三錢 炒知母五分 飛滑石四錢 白通草一錢五分 加

吳氏醫案 伏暑 吉

入前方內煮四盞分四次服

日廿七 飲居右脇不得卧格拒心火不得下通於腎反來乘喉故虛乾

姜半夏五錢 杏仁三錢 小枳實三錢 茯苓皮三錢 香附三錢 藿香梗二錢

旋覆花包三錢 廣皮一錢 蘇子霜三錢 煮三盞分三次服

十月初 小便不通於前方內加

飛滑石三錢 生以仁三錢 白通草一錢五分 前後共八帖

日初六 小便已通於前方內去滑石通草生以仁服五帖而全愈

巴歲八 面色青黃其為溼鬱無疑右脈單弦其為伏飲無疑噯氣胸膈合

之左脈弦其為肝鬱無疑上年夏日曾得淋症誤服六味湯丸酸甘化陰

致令暑溼隱伏久踞故症現龐雜無倫治法以宣化三焦使邪有出路兼

和肝胃能令食為要

生石膏八錢 半夏五錢 生以仁五錢 飛滑石一兩 藿香四錢 茯苓皮五錢

旋覆花 包三錢 香附 三錢 廣鬱金 二錢 杏仁泥 三錢 通草 一錢 晚砂 三錢

煮成四碗分早中晚夜四次服

此症方案失收姑不全錄自四月至八月一日不斷服藥諸症從而目青黃透筋退靜而愈其面青由額往下由耳往中約十日褪一暈及腿至鼻柱的月餘方亮皆誤服藥之弊所用不出此方故方不全而案可以載欲為隔年暑溼之症開一門路

丙寅六月 某其人本有飲咳又加內暑外涼在經之邪似瘧而未成在腑之邪

泄瀉未止恐成滯下急以提邪外出為要按六脈俱弦之泄瀉古謂之木

泄即以小柴胡湯為主方況加之寒熱往來乎六脈俱弦故謂脈弦者

寒也指中焦虛寒而言豈補水之生熟地所可用哉現在寒水客氣燥金

司天而又大暑節氣與柴胡二桂枝一法

柴胡 六錢 焦白芍 二錢 青蒿 二錢 桂枝 三錢 藿香梗 二錢 生薑 三錢 半夏 六錢 廣橘皮 二錢 大棗 去核二枚 黃芩 二錢 炙甘草 一錢 煮三盃分三次服

服

吳氏醫案

伏暑

五

初八 寒暑兼受成瘧則輕成痢則重前與柴胡二桂枝一湯現在面色青熱退

寒重痰多而稀舌之赤者亦淡脈之弦勁者微細不渴陽虛可知與桂枝

柴胡各半湯減黃芩加乾薑

桂枝 三錢 炒白芍 一錢五分 乾姜 三錢 柴胡 三錢 炒黃芩 一錢 生薑 五錢

半夏 六錢 炙甘草 二錢 大棗 去核三枚 煮三盃分三次服

初九 內暑外寒相搏既成瘧大便溏泄恐致成痢口乾不渴經謂自利不渴

者屬太陰也合之腹痛則更可知矣仲景為表急當救表裏急當救

裏茲表裏無偏急之象議兩救之救表仍用柴胡桂枝各半湯法以太少

兩經俱有邪也救裏與理中湯

桂枝 四錢 焦白芍 二錢 良姜 二錢 柴胡 四錢 黃芩炭 一錢 半夏 六錢 炙甘草 一錢五分 川椒炭 三錢 生薑 五錢 苡仁 五錢 白蔻仁 一錢五分 大棗 去核二枚 乾姜 三錢 煮三盃分三次服

核二枚 乾姜 三錢 煮三盃分三次服

初十 昨用兩救表裏已見小效今日仍宗前法而退之以脈中陽氣已有生動之機故也不可性急反致僨事

桂枝 三錢 炒白芍 二錢 炒厚朴 二錢 柴胡 三錢 炒黃芩 一錢五分 炙甘草 一錢五分 半夏 六錢 川椒炭 二錢 生薑 五錢 乾姜 一錢 煨草果 一錢 大棗 去核二枚 煮三盃分三次服

十一 內而痰飲蟠踞中焦外而寒暑擾亂胃陽連日已奪去成痢之路一以和中調飲為要蓋無形之邪每借有形質者以為依附也

桂枝 三錢 焦白芍 二錢 枳實 三錢 柴胡 三錢 黃芩炭 一錢五分 青蒿 三錢 杏仁 三錢 茯苓皮 五錢 廣皮 二錢 半夏 一兩 白蔻仁 一錢五分 生薑 三片 苡仁 五錢 煮三盃分三次服

十一 雜受寒暑再三分析方成瘧疾以伏暑成瘧則輕寒多熱少脈沈弦乃邪氣深入與兩陰陽之中偏於溫法

青蒿 三錢 藿香梗 三錢 枳實 二錢 柴胡 三錢 姜半夏 八錢 良姜 二錢 厚朴 三錢 瓜婁皮 二錢 生薑 五片 檳榔 一錢 黃芩炭 一錢五分 大棗 去核二枚 煮三盃分三次服

十四 寒熱少減胸痞甚去甘加辛去大棗加生薑

十六 脈弦細指尖冷陽微不及四末之故兼之腹痛便溏痰飲咳嗽更可知矣以和胃陽溫中陽逐痰飲立法

半夏 六錢 生苡仁 五錢 乾姜 二錢 杏仁 五錢 川椒炭 三錢 炒廣皮 三錢 桂枝 三錢 白蔻仁 二錢 生薑 三片 煮三盃分三次服

十七日 月張 伏暑酒毒遇寒涼而發九日不愈脈緩而頓滯下身熱澀語瀝熱發黃先清溼熱開心包絡

飛滑石 五錢 茵陳 五錢 黃柏炭 三錢 茯苓皮 五錢 黃芩 三錢 眞山連 二錢 生苡仁 三錢 通草 一錢 梔子炭 二錢 煮三盃分三次服先服牛黃清心丸

吳氏醫案

伏暑

六

一丸戌時再服一丸

叶八 熱退滯下已愈黃未解

飛滑石 五錢 茵陳 三錢 梔子炭 三錢 茯苓皮 五錢 萹蓄 三錢 眞雅連 八分

黃柏炭 三錢 杏仁 三錢 燈心草 一錢 白通草 一錢 煮三益分三次服

叶九 黃亦少退脈之軟者亦鼓指惟舌赤小便赤而濁餘溼餘熱未盡尚須清

飛滑石 五錢 茵陳 四錢 黑山梔 三錢 茯苓皮 五錢 半夏 三錢 眞雅連 八分

生苡仁 三錢 杏仁 三錢 廣皮炭 二錢 黃柏炭 二錢 萹蓄 三錢 煮三益分三

次服

日二十 黃退小便赤濁舌赤脈洪溼熱未盡

飛滑石 五錢 半夏 三錢 海金沙 三錢 炒梔皮 二錢 萹蓄 三錢 眞雅連 一錢

煮三益分三次服

吳氏醫案 伏暑 七

乙酉三月 王氏 廿八 上年初秋伏暑午後身熱汗出醫者誤以爲陰虛勞損不

食胸痞咳嗽舌苔白滑四肢倦怠不能起牀至今三月不解已經八月

之久深痼難救勉與宣化三焦兼從少陽提邪外出法

飛滑石 六錢 桂枝 三錢 白蔻仁 一錢 茯苓皮 五錢 青蒿 三錢 炒黃芩 一錢

姜半夏 五錢 苡仁 五錢 白通草 一錢 杏仁泥 四錢 廣皮 三錢 煮三益分三

次服 此方服二帖能進食服四帖飲食大進即起能行立後八日復診

以調理脾胃而愈

乙酉三月 王氏 廿六 伏暑咳嗽寒熱將近一年不解難望回生既咳且嘔而泄

瀉勉與通宣三焦俾邪得有出路或者得有生機何以知其爲伏暑而非

癆瘵勞之咳重在丑寅卯木旺之時溼家之咳在戌亥子水旺之時勞之

寒熱後無汗伏暑寒熱如瘧狀丑寅卯陽升乃有汗而止勞之陰虛身熱

脈必乳大伏暑之脈弦細而弱故知其爲伏暑而非癆瘵也再左邊臥不

着席水在肝也

桂枝 三錢 雲苓皮 五錢 鬱金 一錢 半夏 五錢 生苡仁 五錢 廣皮 一錢 青蒿

八分 旋覆花 包三錢 生薑 三錢 香附 三錢 白蔻仁 二錢 大棗 去核二枚 煮

三益分三次服 此方服四帖寒熱減去青蒿服之十帖全愈後以調理

脾胃收功

乙酉四月 金氏 三十 上年伏暑寒熱時發如瘧狀以通宣三焦立法補陰補陽

皆安也

半夏 四錢 雲苓皮 五錢 黃芩 二錢 杏仁 三錢 藿香梗 三錢 生薑 三片 青蒿

八分 白蔻仁 一錢五分 大棗 去核一枚 苡仁 五錢 煮三益分三次服

二月初 伏暑愈後以平補中焦爲要仍須宣通勿得粘滯

半夏 三錢 雲苓塊 五錢 蓮子 五錢 苡仁 五錢 益智仁 一錢 生薑 三片 廣皮

二錢 煮三益分三次服

吳氏醫案 伏暑 六

乙酉八月 裘氏 四十 酒客中虛溼重面色暗滯業已多日現在又感伏暑新涼頭

脹便溏舌白滑脈弦細中虛寒不能戒酒病斷不除蓋客症身除久病伏

溼虛寒難療也

雲苓皮 一兩 杏仁 三錢 藿香梗 三錢 姜半夏 六錢 青蒿 二錢 白蔻仁 三錢

生苡仁 一兩 廣皮 五錢 黃芩炭 二錢 煮三益分三次服頭脹除去青蒿七

帖全愈

乙酉九月 陶氏 五十 伏暑遇新涼而發舌苔白上加灰黑六脈不浮不沈而數

誤與發表胸痞不食此危症也何以云危蓋四氣雜感又加一層腎虛又

加一層肝鬱又加一層誤治又加一層酒客中虛何以克當勉與河間之

苦辛寒法一以通宣三焦而以肺氣爲主望其氣化而溼熱俱化也

飛滑石 五錢 杏仁 四錢 藿香葉 三錢 姜半夏 五錢 苡仁 五錢 廣皮 三錢

雲苓皮 五錢 黃芩 三錢 眞雅連 一錢 白蔻仁 三錢 廣皮 三錢 白通草 一錢

五錢 煮三碗分三次服

廿三 舌之灰若化黃滑而不燥唇赤脈之弦者化為滑數是溼與熱俱重也

滑石 一兩 雲苓皮 六錢 杏仁 五錢 苡仁 六錢 黃柏炭 四錢 雅連 二錢 半夏 五錢 白蔻仁 三錢 木通 三錢 茵陳 五錢 煮三碗分三次服

廿四 伏暑古之灰者化黃茲黃雖退而白滑未除當退苦藥加辛藥脈滑甚重加化痰小心復感為要

滑石 一兩 雲苓皮 五錢 鬱金 三錢 杏仁 五錢 小枳實 三錢 薏仁 三錢 半夏 一兩 黃柏炭 三錢 廣皮 三錢 苡仁 五錢 藿香梗 三錢 煮三碗分三次服

十月初 伏暑雖退舌之白滑未化是暑中之伏溼尚存也小心飲食要緊脈之滑大者已減是暑中之熱去也無奈太小而不甚流利是陽氣未充不能化溼重與辛溫助陽氣化溼氣以舌苔黃為度

吳氏醫案

伏暑

九

半夏 六錢 白蔻仁 研沖 三錢 木通 一錢 杏仁 五錢 益智仁 三錢 廣皮 五錢

廿六 伏暑之外感者因大汗而退舌白滑若究未化黃前方大用剛燥苔未盡除務要小心飲食毋使脾困

杏仁泥 四錢 煨草果 八分 川椒炭 三錢 姜半夏 五錢 蒼朮炭 三錢 益智仁 三錢 茯苓皮 五錢 老厚朴 一錢 白蔻仁 三錢 生苡仁 五錢 廣皮炭 五錢 神

麩炭 三錢 煮三碗分三次服

乙酉九月 薛氏 初因肝鬱繼而內欲招外風為病現在寒熱如瘧狀又有

伏暑內發新涼外加之象六脈弦細而緊兩關獨大而浮厥陰克陽助陽者全然不知病從何來亦不究脈象之是陰是陽一概以地黃等陰柔補陰以陰藥助陰病人命其何堪哉勢已沈重欲成噎食反胃勉與兩劑肝胃兼提少陽之邪外出法

吳鞠通先生醫案 卷一

桂枝 三錢 姜半夏 六錢 苡仁 三錢 杏仁 三錢 旋覆花 包 三錢 青蒿 一錢 白

廿八 寒熱減半嘔止舌苔滿黃但仍滑耳即於前方內加

炒黃芩 一錢 再服四帖如二三帖寒熱止去青蒿如腹痛止舌不滑不乾燥去川椒炭加茯苓皮 五錢

十月初 伏暑已解七八痰飲肝鬱未除下隼且有溼鬱

杏仁泥 四錢 苡仁 五錢 川草薈 五錢 旋覆花 包 三錢 香附 三錢 通草 一錢 白蔻仁 三錢 雲苓皮 五錢 晚蠶沙 三錢 姜半夏 五錢 廣皮 二錢 煮三碗分

乙酉十二月初 伏暑如瘧狀脈弦數寒熱往來熱多於寒解後有汗與青蒿

吳氏醫案

伏暑

十

半湯 雲苓皮 五錢 桂枝 三錢 鬱金 二錢 姜半夏 三錢 柴胡 三錢 黃芩 一錢

初八 伏暑新涼昨用各半湯一帖腹脹胸脇痛身痛已愈今日頭痛泄瀉身熱

寒多按自利而渴者屬太陰也與五苓散雙解表裏

桂枝 四錢 雲苓皮 五錢 苡仁 五錢 豬苓 三錢 益智仁 二錢 木香 二錢 澤瀉 三錢 蒼朮炭 一錢 廣皮 三錢 煮三碗分三次服

初九 伏暑新涼以頭痛身熱而又泄瀉之故用五苓散雙解表裏今日頭痛身

熱雖減而泄瀉未止咳嗽痰多與開太陽陽明法

初十 泄瀉已止熱退未淨咳嗽嘔惡未平頭偏右痛兼有肝鬱

五四七

日十一 伏暑身熱咳嗽嘔惡大便稀瀉兼有肝鬱偏頭痛舌絳口渴腹微脹溼中生熱與苦辛淡法
姜半夏 五錢 苡仁 五錢 炒炭黃芩 一錢五分 旋覆花 包 三錢 雲苓皮 五錢
香附 三錢 桑葉 三錢 蘇梗 三錢 廣皮 三錢 茶菊花 三錢 煮三盃分三次服

日十二 伏暑未解痰飲咳嗽太甚胃不和先與和胃治咳即愈
雲苓皮 六錢 滑石 六錢 通草 一錢 姜半夏 五錢 苡仁 五錢 廣皮 一錢五分
藿香梗 三錢 蔻仁 一錢五分 生薑 三片 黃芩炭 三錢 煮三盃分三次服

日十三 伏暑飲渴不寐昨與半夏湯法已寐惟大便仍溏咳未止口渴甚議湯者與豬苓湯加和胃止渴去阿膠以其滑膩也
飛滑石 六錢 豬苓 四錢 苡仁 五錢 雲苓皮 六錢 澤瀉 四錢 蘇梗 三錢 姜半夏 三錢

吳氏醫案

伏暑

三

夏六錢 煮三盃分三次服兩帖

日十五 伏暑已愈大半惟咳未盡除湯未全止暑中伏溼難清溼中生熱溼家之渴豬苓湯最合拍宗前法而進之
飛滑石 六錢 豬苓 五錢 蘇梗 三錢 雲苓皮 六錢 澤瀉 五錢 廣皮 一錢 苡仁 五錢 姜半夏 五錢 甘草 一錢 炒黃芩 一錢五分 煮三盃分三次服兩帖

庚寅九月 溼熱發黃已愈六七繼感勁金涼氣頭暈而痛身熱而嘔伏暑漫延三焦與苦辛淡滲法化氣氣化則溼熱俱化
飛滑石 五錢 豬苓 三錢 薄荷 八分 姜半夏 三錢 杏仁 三錢 桑葉 三錢 苦桔梗 三錢 茵陳 五錢 竹茹 二錢 荊芥穗 二錢 連翹 二錢 橘皮 二錢 白蔻仁 一錢 煮三盃分三次服

日十一 伏暑中之溼熱瀰漫三焦舌苔滿佈重濁脈弦一以化氣為要溼熱相搏徒治一邊無益也

日十四 溼熱瀰漫三焦前與化氣昨日汗大出今日大便通快舌苔已化惟小便未暢熱未除仍以化氣為要
豬苓 五錢 雲苓皮 五錢 茵陳 五錢 澤瀉 三錢 杏仁泥 四錢 木通 二錢 滑石 六錢 姜半夏 三錢 蔻仁 一錢 苡仁 五錢 黃柏炭 一錢 廣皮 一錢五分 煮四小茶盃日三夜一分四次服

日十七 伏暑已解七八餘熱未除且有痰飲
雲苓塊 連皮六錢 豬苓 四錢 小枳實 三錢 姜半夏 六錢 杏仁 四錢 藿香梗 二錢 生苡仁 五錢 廣皮 三錢 白蔻仁 一錢 煮三盃分三次服五帖

日廿二 伏暑諸症俱解惟餘痰飲少腹不爽
雲苓塊 五錢 炒小茴香 三錢 廣皮 三錢 姜半夏 五錢 生苡仁 五錢 杏仁泥 三錢 生薑 三片 小枳實 一錢 甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

吳氏醫案

伏暑

三

辛卯七月 齊氏六歲暑傷兩太陰身熱泄瀉腹微脹痛舌苔不甚黃口不甚渴煩燥不安晝夜不寐脈洪數業已十日以外為難治
連翹 不去心五錢 雲苓皮 五錢 杏仁 三錢 生苡仁 五錢 金銀花 三錢 雅連 一錢五分 豬苓 三錢 藿香葉 一錢 蔻仁 一錢 半夏 三錢 煮三盃分三次服

日廿九 即於前方內減去連翹二錢加半夏一錢又加小枳實一錢再服一帖
八月 脈小則病退諸症漸減惟心下痞悶與瀉心法
半夏 五錢 雲苓塊 連皮五錢 乾姜 三錢 炒黃芩 三錢 生苡仁 五錢 生薑汁 每盃沖三小匙少黃連 一錢五分 小枳實 一錢五分 煮三盃分三次服

日初 痞略減仍不寐微煩
連翹 三錢 雲苓皮 五錢 藿香 半梗半葉 二錢 銀花 三錢 姜半夏 五錢 蔻仁 一錢 豬苓 三錢 小枳實 三錢 橘皮 三錢 杏仁 三錢 炒黃芩 三錢 煮三盃分

徒治一邊無益也

三次服

初三 陽亢於上不寐脈洪數口渴惡人與火與閩陽明法

生石膏 二兩 苡仁 五錢 炒知母 三錢 茯苓塊 三錢 杏仁 三錢 炒黃芩 二錢

姜半夏 二錢 薏仁 一錢 生甘草 二錢 煮三盃分三次服

初四 氣上阻胸不寐

雲苓塊 五錢 生苡仁 五錢 白蔻 一錢 旋覆花 包三錢 杏仁泥 三錢 姜半夏 五錢 香附 三錢 炒黃芩 三錢 橘皮 三錢 小枳實 三錢 炒黃連 一錢五分 生

姜汁 每盃沖三小匙 煮三盃分三次服

初五 即於前方內去旋覆花減小枳實一錢

初六 伏暑夾肝鬱不寐煩燥雖減而未除

雲苓皮 五錢 滑石 六錢 炒黃芩 四錢 姜半夏 五錢 苡仁 五錢 炒黃連 一錢

杏仁泥 四錢 鬱金 二錢 白豆蔻 一錢 旋覆花 包三錢 香附 一錢 生甘草 一

吳氏醫案

伏暑

三

錢 煮三盃分三次服

初七 嘔甚即於前方內加代赭石 六錢 再服四帖

初九 伏暑已愈六七惟胸膈不舒腹微痛小便赤餘邪未淨

茯苓 五錢 炒黃芩 三錢 鬱金 一錢 苡仁 五錢 白蔻仁 一錢五分 香附 三錢

半夏 五錢 炒黃連 八分 橘皮 三錢 杏仁 三錢 淡吳萸 炒八分 煮三盃分三

次服

初十 伏暑小愈後又感燥金秋氣胸痞痛舌起新苔六脈弦緊與溫法

茯苓 連皮五錢 姜半夏 五錢 淡吳萸 一錢 桂枝 二錢 生苡仁 三錢 藿香梗

三錢 夏姜 三錢 川連 與萊菔同炒八分 姜汁 每盃沖三茶匙 川椒炭 三錢

廣皮 三錢 煮三盃分三次服

日十一 新感又減惟夜聞頭痛

桂枝 三錢 焦白芍 一錢 廣皮 三錢 茯苓 連皮五錢 川椒炭 三錢 吳萸 一錢

半夏 五錢 炒小茴香 三錢 黃連 與萊菔同炒八分 苡仁 五錢 煮三盃分三

次服

日十二 頭痛已止舊有之癥瘕上攻胃口有妨於食脈弦緊多汗

桂枝 五錢 公丁香 一錢 吳萸 三錢 雲苓 五錢 川椒炭 三錢 半夏 五錢 黃連

萊菔 同炒八分 炒小茴香 二錢 橘皮 三錢 夏姜 一錢 煮三盃分三次服外

服化癥回生丹 一錢

日十四 胃中之痛與煩躁係新受之燥氣腹中痞塊上攻係舊有之燥氣十數年

之久新舊並病猝難速愈

茯苓塊 五錢 吳萸 三錢 川椒炭 三錢 姜半夏 五錢 括樓皮 二錢 黃連 萊菔

同炒一錢 高良姜 一錢 廣皮 三錢 歸橫鬚 一錢 公丁香 一錢 煮三盃分三

次服二帖外間化癥回生丹 一錢

日十六 大用陽剛胃痛稍減未申後陰氣旺猶不爽胸痞陰邪未盡退也

吳氏醫案

伏暑

四

半夏 五錢 茯苓塊 五錢 厚朴 三錢 吳萸 二錢 川椒炭 四錢 廣皮 三錢 黃連

靛同炒一錢 小枳實 三錢 生薑 三片 良姜 一錢 公丁香 一錢 煮三盃分

三次服二帖仍間服化癥回生丹 一錢

日十八 燥氣之胸痞痛與純剛大燥七日方解議病減者減其製

茯苓塊 四錢 猪苓 三錢 藿香梗 三錢 姜半夏 四錢 厚朴 一錢 生苡仁 二錢

川椒炭 三錢 橘皮 一錢 炒黃芩 一錢五分 煮三盃分三次服三帖仍間服

化癥回生丹 一錢

日廿一 諸症向安惟病後氣弱舊有之癥瘕未除法宜通補陽氣兼之調和營衛

茯苓 三錢 焦白芍 一錢 廣皮 三錢 桂枝 三錢 柏子霜 三錢 生薑 三片 半夏

三錢 白蔻仁 一錢 膠棗 去核二枚 苡仁 三錢 川椒炭 一錢 煮三盃分三次

服四帖

日廿五 諸症皆愈惟欲便先痛便後痛減當責之積重且便後不爽恐成滯下俗

名痢疾少用温下法

生大黃一錢五分 厚朴一錢 川椒炭一錢 熟附子一錢 廣皮炭三錢 良姜一錢 南查炭三錢 炒神麩三錢 煮三盃分三次服服一帖如仍痛又服一帖

廿九 陰邪愈後兼有癥瘕無補陰之理即陽藥中之守補者亦不可用

茯苓五錢 姜半夏五錢 橘皮三錢 桂枝三錢 焦白芍三錢 生薑三片 苡仁五錢 炒小茴香三錢 煮三盃分三次服〇服二帖後凡五錢改作三錢凡三錢改作一錢再服三五帖俟大能飲食早晚各服化癥回生丹一錢以腹中癥瘕化盡為度

癸巳九月十九 伏暑誤表十數劑之多又誤下十數劑之多從古無此治法初五日 俞九 伏暑誤表十數劑之多又誤下十數劑之多從古無此治法以致正虛邪實泄瀉不止熱仍未退舌苔白滑脈弦細數急咳嗽喘急勉與宣通肺氣蓋肺主氣氣化則溼熱俱化萬一邪退再議補正

吳氏醫案

伏暑

重

生石膏八錢 猪苓五錢 姜半夏五錢 茯苓皮五錢 杏仁一錢 炒黃芩三錢 生苡仁五錢 橘皮三錢 白蔻仁一錢 煮三盃分三次服外間服紫雪丹一錢分三次涼開水調

初七 伏暑誤治前與宣通三焦仍以肺氣為主今日諸多見效熱亦退微見汗惟咳嗽未除

茯苓皮五錢 猪苓五錢 炒於朮三錢 姜半夏五錢 杏仁三錢 白蔻仁一錢 生苡仁五錢 橘皮三錢 生薑汁每盃沖三小匙 煮三盃分三次服收功 溼温

壬戌四月 王三十 證似温熱但心下兩脇俱脹舌白渴不多飲嘔惡噯氣則非温熱而從溼温例矣用生薑瀉心湯之苦辛通降法 茯苓塊六錢 生薑一兩 古勇連三錢 生苡仁五錢 半夏入錢 炒黃芩三錢 生香附五錢 乾姜五錢 頭煎水入盃煮三茶盃分三次服約一吋一盃二

煎用三盃水煮一茶盃明早服

廿三 心下陰覆已退溼已轉陽應清氣分之溼熱 煨石膏五錢 連翹五錢 廣鬱金三錢 飛滑石五錢 銀花五錢 藿香梗三錢 杏仁泥三錢 蘆根五寸 黃芩炭三錢 古勇連一錢 水八碗煮成三碗分三次服渣再煮一碗服

廿四 班疹已現氣血兩燔用玉女煎合犀角地黃湯法

生石膏一兩五錢 細生地六錢 犀角三錢 連翹一兩 苦楝根四錢 牛蒡子六錢 知母四錢 銀花一兩 炒黃芩四錢 元參八錢 人中黃一錢 薄荷三錢 水八碗煮成四碗早中晚夜分四次服

廿五 面赤舌黃大渴脈沈肢厥十日不大便轉矢氣譫語下症也議小承氣湯 生大黃八錢 小枳實五錢 厚朴四錢 水八碗煮成三碗先服一碗約三時得大便止後服不便再服第二碗

吳氏醫案

溼温

美

又 大便後宜護津液讓增液法

麥冬不去心一兩 細生地一兩 連翹三錢 元參四錢 炒甘草一錢 金銀花三錢 煮三碗分三次服能寐不必服

廿六 陷下之餘邪不清仍思涼飲舌黃微以調胃承氣湯小和之 生大黃二錢 元明粉八分 生甘草一錢 頭煎一杯二煎一杯分兩次服

廿七 昨日雖大解而不爽脈猶沈而有身熱不退而微厥渴甚面赤猶宜微和之但恐犯數下之戒議增液承氣合玉女煎法 生石膏八錢 知母四錢 黃芩三錢 生大黃三錢 另煎分三分每次沖一分 煮成三盃分三次服若大便稀而不紅黑後服止大黃

廿八 大便雖不甚爽今日脈浮不可下渴思涼飲氣分熱也口中味甘脾熱甚也議用氣血兩燔例之玉女煎加苦藥以清脾瘴 生石膏三兩 元參六錢 知母六錢 細生地一兩 麥冬不去心一兩 古勇連

三錢 黃芩三錢 煮四碗分四次服得涼汗止後服不渴亦止服

廿九 大用辛涼微甘合苦寒斑疹續出若許身熱退其大半不得再用辛涼重劑議甘寒合化陰氣加辛涼以清斑疹

連翹 三錢 細生地 五錢 犀角 三錢 銀花 三錢 天花粉 三錢 黃芩 三錢 麥冬 五錢 古勇連 二錢 薄荷 一錢 元參 四錢 煮三碗分三次服渣再煮一碗服

五月初 大熱雖減餘焰尚存口甘弄舌面光赤色未除猶宜甘寒苦寒合化

連翹 三錢 細生地 六錢 元參 三錢 銀花 三錢 炒黃芩 三錢 丹皮 四錢 麥冬 一兩 古勇連 一錢 水八碗煮三碗分三次服

初二 即於前方內加暹羅犀角 二錢 知母 一錢 五分 煮法服法如前

初三 邪少虛多宜用復脈去大棗桂枝以其人本係酒客再去甘草之重甘加 二甲丹皮黃芩 麥冬 一兩 大生地 五錢 阿膠 三錢 丹皮 五錢 炒白芍 六錢 炒黃芩 三錢 炙

吳氏醫案 溼溫 三

煎甲 四錢 牡蠣 五錢 麻仁 三錢 頭煎三碗二煎一碗日三夜一分四次服

此甘潤化液復微苦化陰又苦甘鹹寒法 尚有餘邪未盡以甘苦合化入陰搜邪法

初四 元參 二兩 細生地 六錢 知母 二錢 麥冬 不去心 八錢 生薑甲 八錢 粉丹皮 五錢 黃芩 二錢 連翹 三錢 青蒿 一錢 銀花 三錢 頭煎三碗二煎一碗分四次服

初九 邪少虛多仍用復脈法

大生地 六錢 元參 四錢 生白芍 六錢 生阿膠 四錢 麥冬 八錢 生薑甲 六錢 火麻仁 四錢 丹皮 四錢 炙甘草 三錢 頭煎三茶盃二煎一茶盃分四次服

乙丑四月 初七 二十面赤目赤舌苔滿佈如積粉至重之溫病也最忌發表且用 辛涼

苦桔梗 六錢 銀花 八錢 香豆豉 五錢 連翹 八錢 藿香葉 五錢 廣鬱金 四錢

荆芥穗 五錢 杏仁 五錢 生甘草 三錢 牛蒡子 五錢 薄荷 四錢 共為粗末分 八包一時許服一包蘆根湯煎去渣服

初九 面赤目赤舌苔滿佈至重之溫熱病脈反緩而弦外熱反不盛口反不渴 肢微厥所謂陽症陰脈乃本身陽氣不能十分充滿不肯化解耳茲與化 邪法

廣鬱金 二錢 杏仁 二錢 藿香 一錢 苦桔梗 一錢五分 荆芥穗 二錢 連翹心 一錢五分 銀花 二錢 青蒿 一錢 香豆豉 一錢五分 煮兩盃今晚一帖明早 一帖

十一 溫病未有不渴而燥者今舌苔滿佈而不渴雖黃而滑脈緩甚熱不壯蓋 夾溼之故也議從溼溫例治用苦辛寒法

生茅朮 三錢 杏仁泥 三錢 藿香 一錢 銀花 二錢 炒黃芩 一錢 白蔻仁 一錢 雅連 一錢 連翹 三錢 廣皮 二錢 鬱金 三錢 煮兩盃今晚一帖明早一帖

吳氏醫案 溼溫 三

丙寅四月 初八 張三十六 脈弦細而勁陰寒證脈也咳嗽稀痰陰溼咳也舌苔刮白 而滑陰舌苔也嘔吐泄瀉陰溼症也雖發熱汗出而解乃溼中兼風病自 溼溫天下有如是之陰虛症乎

茯苓塊 四錢 桂枝 三錢 炒白芍 二錢 姜半夏 五錢 於朮 三錢 廣皮炭 一錢 生苡仁 五錢 澤瀉 四錢 生薑汁 每盃沖三小匙 煮三盃分三次服

初十 痰飲兼風誤治成壞症前用溫平逐飲除風諸惡症俱減惟寒少熱多熱 後汗出未除現在面赤口渴晝夜譫語有風化熱之象但六脈尚弦未盡 轉陽也再咳嗽則胸膈小腹俱微痛又有金克木之象

桂枝 三錢 生石膏 六錢 青蒿 三錢 半夏 五錢 茯苓塊 四錢 生薑 三片 杏仁 三錢 焦白芍 二錢 大棗 去核 一枚 猪苓 二錢 炙甘草 二錢 煮三盃分三次 服

十四 脈弦數午後潮熱前有白苔茲變為黃嘔惡口渴頗有溼瘧之象但咳嗽

便溏又有溼溫之形伏邪內陷所致最難清理

生石膏 八錢 桂枝 四錢 生苡仁 五錢 飛滑石 六錢 知母 三錢 杏仁泥 三錢

茯苓皮 五錢 青蒿 二錢 炙甘草 二錢 煮三盃分三次服

初十 其失其年月 六脈俱弦而細左手沈取數而有力量面色淡黃目白睛黃自

春分午後身熱至今不愈曾經大瀉後身熱不渴現在雖不泄瀉大便久

未成條午前小便清午後小便赤濁與溼中生熱之苦辛寒法

飛滑石 六錢 茵陳 四錢 蒼朮炭 三錢 雲苓皮 五錢 杏仁 三錢 晚蠶沙 三錢

生苡仁 五錢 黃芩 二錢 白通草 一錢五分 海金沙 四錢 山連 一錢 煮三碗

分三次服

十三 於前方內去蒼朮炭加石膏增黃連黃芩

丁卯七月 文三十 溼溫舌苔白滑厚濁脈象模糊或弦細而濡用通宣三焦法

初二日 八歲 先寒熱繼微熱後不熱更方三十餘帖大抵不出溼滲之苦辛淡法四十

吳氏醫案

溼溫

无

五日以後方解後以兩理脾胃收功

中燥

乙酉四月 傅七歲 感受燥金之氣腹痛泄瀉嘔吐現在泄瀉雖止而嘔不能食

腹痛仍然舌苔白潤肉色刮白宜急溫之兼與行太陰之溼

雲苓塊 五錢 吳萸 二錢 川椒炭 三錢 姜半夏 五錢 良姜 二錢 益智仁 二錢

生苡仁 五錢 廣皮 三錢 公丁香 一錢 煮三盃分三次服

廿二 背仍痛於原方加良姜 一錢 吳萸 一錢 桂枝 五錢

廿七 已效陰氣未退再服三帖分四日服完

五月初 已服三帖痛減嘔與泄瀉俱止減川椒吳萸良姜之半又服六帖

十三 陰未化陽自不復且心下堅大如盤脈如故再服

乙酉四月 謝八歲 燥金感後所傷者陽氣何得以大劑熱地補陰久欠補之日

陽困頓無怪乎不能食而嘔矣六脈弦緊豈不知脈雙弦者寒乎

半夏 五錢 雲苓塊 五錢 廣皮 三錢 杏仁 五錢 川椒炭 三錢 生薑 三錢 乾姜

二錢 公丁香 八分 煮三盃分三次服

五月初 於前方內加桂枝 三錢 增乾姜 一錢 減川椒炭之半

十一 嘔痛皆止飯食已加惟肢軟無力陽氣太虛加甘草合前辛藥為辛甘補

陽方法

廿一 復感燥氣嘔而欲瀉於前方去甘藥加分量自愈六脈弦細如絲陽微之

極 桂枝 五錢 淡吳萸 二錢 半夏 五錢 雲苓 五錢 川椒炭 三錢 廣皮 三錢 乾姜

三錢 公丁香 一錢五分 生薑 五錢 煮三而分三次服

廿七 諸症悉減脈稍有神於原方中去吳萸丁香之剛燥加苡仁之平淡陽明

從中治也

乙酉四月 李六歲 胃痛脇痛或嘔酸水多年不愈現在六脈弦緊皆起初感受

吳氏醫案

中燥

手

燥金之氣金來克木木受病未有不克土者土受病之由來則自金始也

此等山外感而延及內傷者自唐以後無聞焉議變胃而不受胃變法即

用火以克金也又久病治絡法

雲苓 五錢 生苡仁 五錢 枳實 四錢 半夏 五錢 川椒炭 三錢 生薑 五錢 廣皮

三錢 公丁香 一錢 煮三盃分三次服

廿三 復診仍用原方

五月初 現在胃痛脇痛吐酸之症不發其六脈弦緊不變是胸中絕少太利之

氣議轉方用溫平剛燥不可以久任也

桂枝 四錢 生苡仁 五錢 廣皮 三錢 半夏 五錢 雲苓塊 五錢 生薑 三錢 白芍

四錢 炙甘草 二錢 大棗 去核 一枚 乾姜 一錢 煮三盃分三次服無弊可多

服

十一 診視已回陽原方去乾姜減桂枝之半

廿四 復診脈仍緊加益智仁餘仍照原方

桂枝 一錢 焦白芍 四錢 廣皮 三錢 雲苓 五錢 益智仁 一錢 生薑 三錢 半夏 五錢 炙甘草 二錢 大棗 去核一枚 苡仁 五錢 煮三盃分三次服

乙酉五月 余二十歲 胃痛脇痛脈弦午後更甚陰邪白旺於陰分也

初二日 半夏 五錢 川椒炭 三錢 吳萸 二錢 苡仁 五錢 公丁香 一錢五分 香附 三錢 降香 三錢 山查炭 二錢 廣皮 三錢 青皮 二錢 青橘葉 三錢 煮三盃分三次服接服解毒散

服接服解毒散

十七 診視病稍減脈仍緊加小枳實 三錢 減川椒炭 一錢 去山查炭 青橘葉

廿四 脈之緊者稍和腹痛已止惟頭暈不寐且與和胃令麻再商後法

半夏 一兩 小枳實 三錢 雲苓 五錢 苡仁 一兩 煮三盃分三次服以得寐為度如服一二帖仍不寐加半夏至二兩再服一帖

乙酉五月 譚四十七歲 感受金涼胸痺頭痛脈弦細而緊

吳氏醫案

中燥

主

桂枝 三錢 姜半夏 三錢 廣皮 三錢 薤白 三錢 生苡仁 五錢 生薑 五片 厚朴 二錢 川椒炭 三錢 大棗 去核一枚 良姜 二錢 煮三盃分三次服

十八 燥氣雖化六脈俱弦苦苔白滑與陽明從中治用苦辛淡法忌酸甘

姜半夏 四錢 廣皮 三錢 生苡仁 五錢 雲苓塊 四錢 香附 二錢 益智仁 一錢 川椒炭 二錢 乾姜 一錢五分 白薤仁 一錢五分 煮三盃分三次服

廿一 脈仍弦緊熱藥難退咳嗽減效不更方右脇微痛於前方內增香附 三錢

廿三 右脇痛甚脈弦緊如故於前方內加

旋覆花 包三錢 降香 三錢 蘇子霜 三錢

廿六 脇痛咳嗽皆止痰尚多脈弦末和於前方去香附蘇子霜旋覆花降香加 桂枝 四錢 乾姜 一錢五分 以充其陽氣行痰飲和弦脈

霹靂散方 主治中燥吐瀉腹痛甚則四肢厥逆腿痛轉筋肢麻起臥不安煩躁不寧再甚則六脈全無陰毒發斑疔瘡等症並一切癱瘓固冷積聚之疾

寒輕者不可多服寒重者不可少服以愈為度對症宜隨時服但非實在

純受溼燥寒三氣陰邪者不可服孕婦對症五不忌

桂枝 六兩 降香末 五兩 烏藥 三兩 薤白 四兩 薤油 五兩 吳萸 四兩 苡仁 五兩 川椒炭 五兩 乾姜 三兩 附子 三兩 青木香 四兩 檳榔 二兩 防己 三兩 五靈脂 二兩 細辛 二兩 良姜 三兩 公丁香 二兩 雄黃 五兩 草果 二兩 水菖蒲 二兩

方論按內經有五疫之稱五行偏勝之極皆可致疫雖病氣之至多見大症而燥金寒溼之疫亦復時有蓋風火暑三者為陽邪與穢濁異氣相參則為溫病溼燥寒三者為陰邪與穢濁異氣相參則為寒病現在見症多有肢麻轉筋手足厥逆吐瀉腹痛脇肋疼痛甚至反惡熱而大渴思涼者經謂霧傷於上溼傷於下此症乃燥金寒溼之氣直犯筋脈由大絡別絡內傷三陰臟腑所以轉筋入腹即死也既吐且瀉者陰陽逆亂也諸痛者燥金

吳氏醫案

中燥

主

寒水之氣所搏也其病思涼飲者少陰篇謂自利而渴者屬少陰虛則少陰真水受剋陰火上炎故飲水求救也其頭面赤者陰邪內逼於上陽不能降安其位所謂戴陽也其周身惡寒喜涼者陰邪蟄於內陽氣無附欲散且脫也諸斑疹者陰邪凝結於血絡同於陽火薰灼也陰病反見陽症所謂水極似火其受陰邪尤重也諸陽症畢現有認定為陰寒者然必當臍腹痛甚拒按者方謂陽中見純陰乃為真陰之症否則必有轉筋腿痛等寒症此處斷不可誤故立方會萃溫三陰經剛燥苦熱之品急溫臍真保住陽氣又經為陽明之上中見太陰又謂陽明從中治且重用芳香急驅穢濁一面由臟真而別絡大絡外山筋經絡以達皮毛一面由臟絡腑絡以通六腑外達九竅俾穢濁陰邪一齊立解大抵皆扶陽抑陰取義於雷震奮迅所謂離照當空羣陰退避也

後注再此證自唐宋以後醫者皆不識燥氣所干凡見前證皆名曰痧近時竟

有著痧症書者捉風捕影雜亂無章害人不淺卽以病論未有不干天地之氣而漫然成痧者究竟所感何氣不能確切指出故立方毫無準的其誤皆由前人謂燥不爲病又有燥氣化火之說亦爲其所誤故初刻溫病條辨時雖再三疑慮多方辨難見於雜說篇中而正文祇有化氣之火證無勝氣之寒證其燥不爲病之誤誤在陰陽應象大論篇中脫秋傷於燥一條將在夏傷於溼又錯秋傷於溼以爲竟無燥證矣不知天元紀氣交變五運行五常政六微旨諸篇平列六氣燥氣之爲病與諸氣同何嘗燥不爲病哉經云風爲百病之長按風屬木主仁大易曰元者善之長也得生生之機開生化之源尚且爲病多端況金爲殺厲之氣歐陽氏曰商者傷也主義主收主刑主殺其傷人也最速而暴竟有不終日而死者自擊神傷故再三致意而後補於原書云

有藥其爲細末開水和服大人每服三錢病重者五錢小人減半再病

吳氏醫案

中燥

畫

甚重者連服數次以痛止厥回瀉止筋不轉爲度

乙酉七月 趙三十歲 感受燥金之氣腹痛甚大嘔不止中有蓄水誤食水果

半夏一兩 川椒炭六錢 烏梅三錢 雲苓五錢 公丁香三錢 廣皮五錢 吳茱

四錢 小枳實三錢 生姜一兩 良姜四錢 以五碗水煮成二碗渣再煮三碗

另以生姜一兩 煮湯一碗候藥湯涼先服姜湯一口接服湯藥一口少停

半刻俟不吐再服第二口如上法以嘔止腹不痛爲度

廿五 燥氣腹痛雖止當臍仍堅按去微痛舌苔微黃而滑周身筋骨痛脈緩陽

明之上中見太陰當與陽明從中治例

桂枝六錢 焦白芍三錢 苡仁五錢 雲苓六錢 川椒炭一錢 防己三錢 半夏

五錢 公丁香一錢 生姜三錢 煮三盃分三次服用此身痛止

廿六 脈小於前身痛已止六脈未和舌黃苔白

雲苓五錢 大腹皮三錢 厚朴一錢五分 半夏五錢 川椒炭一錢 廣皮三錢

苡仁五錢 白朮仁一錢五分 生姜三錢 煮三盃分三次服

廿八 腹痛如故不寐加半夏一兩

八月初 太陽癰

飛滑石六錢 桂枝六錢 片姜黃三錢 雲苓塊五錢 杏仁五錢 晚籬沙三錢

生苡仁五錢 防己四錢 白通草一錢 煮三盃分三次服

初六 腹脹停飲於前方去滑石加苦辛之通

大腹皮三錢 厚朴三錢 廣皮三錢 小枳實三錢

初十 六脈俱弦胃口不開腹脹肢倦宜通六腑及勞者溫之之法也

雲苓塊五錢 桂枝六錢 大腹皮三錢 姜半夏五錢 厚朴一錢 小枳實一錢

益智仁三錢 廣皮五錢 川椒炭三錢 煮三盃分三次服用此方五帖而愈

張女十五 燥金之氣直中入裏六脈全無強臥如死四肢逆冷已過肘膝

腿痛轉筋與通脈四逆湯加川椒吳茱公丁香一犬劑厥回脈出一晝夜

吳氏醫案

中燥

畫

次日以食粥太早復中宛如前症脈復厥體厥又死去矣仍用前方重加

溫熱一劑厥回其半又一劑而復活後以補陽收功

顧五十 直中燥氣嘔少瀉多四肢厥逆無脈目閉無語睛不轉與通脈四

逆湯加人參川椒吳茱丁香一劑而效三劑脈漸復重與補陽而愈

楊室女五十 脇痛心煩懊憹拘急肢冷脈弦細而緊欲坐不得坐欲立不

得立欲臥不得臥隨坐即欲立剛立又欲坐坐又不安一刻較一刻脈漸

小立刻要脫與解懸散不住灌之約計一時服散約計四兩而稍定後與

兩和肝胃而全愈

鄭二十 先是三月初九日得太陽中風與桂枝湯已愈十二日晚已臥下

身有微汗因廚房不戒於火止穿小汗衫一件未著襪出外救火俟火熄

復臥一覺身微熱惡寒腹中脹痛脈弦數與桂枝柴胡各半湯汗出稍輕

究不能解以後外雖化熱而赤汗多如溫病狀以當臍之痛未休百白不

燥斷不敢用辛涼而辛溫之藥或進或退十日不解至二十四日反重用溫熱反佐頂高黃連三錢次日表症裏症一齊俱解如失後與調理脾胃兩陽而全愈

多十六燥淫於內表裏兼病面赤身熱舌黃燥口渴六脈洪數而緊經謂脈盛大以瀆者寒也大便秘小便短通體全似火症只有當臍一點痛拒按此謂陽中之陰乃為真陰與苦熱芳香一劑而熱退減分量三帖而病全愈

丁亥九月華二十感受燥金之氣陽明之上中見太陰胸膈痛腹脹泄瀉飲咳皆太陰病也誤服寒涼勢已重大勉與開太陽合陽明法
雲苓皮 五錢 猪苓 三錢 厚朴 二錢 姜半夏 五錢 澤瀉 三錢 乾姜 一錢 桂枝 三錢 川椒炭 三錢 廣皮 四錢 廣木香 一錢五分 煮三盃分三次服

十四 仍服一帖
吳氏醫案 中燥 薑

十五 燥症誤用涼藥泄瀉不止右脈如無左脈弦細而緊不寐痰飲咳嗽仍舊惟胸膈痛止
雲苓皮 六錢 猪苓 四錢 大腹皮 三錢 姜半夏 八錢 澤瀉 四錢 廣木香 三錢 南蒼朮 炒二錢 桂枝 四錢 廣陳皮 三錢 煮四盃分四次服

十六 再服一帖
十七 諸症皆退惟餘咳嗽口渴與辛能潤法
雲苓皮 五錢 蘇梗 三錢 杏仁泥 三錢 姜半夏 六錢 乾姜 二錢 五味子 一錢 生苡仁 五錢 廣皮 三錢 炙甘草 三錢 煮三盃分三次服

十八 於前方內減五味子一錢加炙甘草一錢改雲苓皮為塊
十九 咳嗽已止脈靜身涼惟舌白口乾尚有伏飲調理飲食要緊藥與通補脾胃兩陽
雲苓塊 三錢 益智仁 二錢 廣皮 一錢 姜半夏 三錢 桂朮炭 二錢 生薑 三片

生苡仁 五錢 炙甘草 二錢 大腹 去核一枚 煮三盃分三次服
二十 以後通補中焦可收功
丁亥九月 李氏 四十六 脈陽微之極弦細而緊內而飲聚外而燥痛兼之內苛飲食減少得食易嘔乃內傷生冷外感燥金之氣而然以急救三焦之陽與陽明之陽為要
桂枝 三錢 姜半夏 六錢 乾姜 三錢 降香 三錢 雲苓塊 連皮五錢 苡仁 五錢 吳茱 一錢五分 川椒炭 三錢 廣皮 三錢 雄白 三錢 公丁香 一錢 生薑 五大片 煮四盃日三夜一分四次服二帖

三十 陽虛已久急難復復餘有原案
姜半夏 一兩 雲苓皮 五錢 厚朴 三錢 小枳實 三錢 雄白 三錢 川椒炭 三錢 廣皮 五錢 乾姜 三錢 生薑 五大片 公丁香 一錢 煮三盃分三次服三帖
十月初 如是剛燥脈仍該緊受病太深之故於前方內去雄白加川椒炭 五錢
吳氏醫案 中燥 薑

再服三錢
初六 陽氣稍復痰飲上冲咳聲重濁晝夜不寐暫與蠶糧半夏湯和胃令得寐
姜半夏 二兩 廣皮 五錢 秫米 一合 雲苓塊 五錢 甘瀾水十盃煮成四盃日三夜一分四次服二帖

初八 陽微飲聚不寐與半夏湯已得寐但六脈無神陽難復復病久而又誤用陰柔苦寒之故一以復陽為要
姜半夏 八錢 桂枝 五錢 川椒炭 三錢 雲苓塊 六錢 乾姜 三錢 小枳實 一錢 杏仁泥 三錢 廣皮 三錢 炙甘草 一錢 甘瀾水八盃煮三盃分三次服一帖

初十 脈之緊者已和諸見症亦減但脈仍太細陽未全復
姜半夏 五錢 桂枝 三錢 焦白芍 三錢 雲苓塊 五錢 乾姜 一錢 川椒炭 一錢 小枳實 一錢五分 炙甘草 二錢 廣皮炭 三錢 煮三小茶盃分三次服四帖

十四 胃不和則臥不安飲以半夏湯脈又弦緊胃陽為痰飲所困皆目前過傷

生冷之故

姜半夏二兩 公丁香一錢五分 秫米一合 川椒炭三錢 煮三盃分三次服

二帖

十七 痰飲喘咳不得卧周身覺冷脈弦緊陽虛極矣

姜半夏一兩 桂枝五錢 乾姜四錢 小枳實五錢 杏仁四錢 廣皮五錢 川椒炭三錢 煮三盃分三次服 此方服至二十餘帖或作或止後以鷓鴣飲丸

收功

戊子十月 某 燥金克木由厥陰外犯太陽季脇偏右攻腰痛不發於春夏而

發於冬令不發於已前而發於午後六脈弦數其為陰邪留滯絡中沈者不移可知以故久而不愈此症當於絡中求之

霹靂散 四兩 每服二錢每日早中晚三次開水和服以清絡中之邪

又 金匱謂凡病至其年月日時復發者當下之此症病發時不得大便乃肝

吳氏醫案

中燥

三

主疏泄肝受病則不得疏泄但不可寒下耳

天台烏藥散 一錢 加巴豆霜 六厘 以泄絡中沈著之伏邪庶可拔其根也

戊子八月 瑞二 感受燥金之氣表裏兼受與各半湯加苦溫甘熱法

桂枝五錢 姜半夏四錢 廣皮三錢 柴胡三錢 川椒炭三錢 生薑二錢 吳茱萸三錢 炙甘草一錢 大棗去核二枚 黃芩三錢 煮三盃分三次服

廿三 十九至廿二日誤服他人苦寒藥今議陽明從中治燥中見溼故宗其法

桂枝木五錢 豬苓三錢 淡吳茱萸三錢 姜半夏四錢 川椒炭三錢 存性三錢 澤瀉三錢 雲苓皮六錢 乾姜三錢 炒真山連二錢 蒼朮炭三錢 煮三盃分三次服

服

廿四 六脈俱弦怯寒泄瀉表裏三陽皆虛仍與陽明從中治法

桂枝五錢 姜半夏五錢 吳茱萸三錢 豬苓三錢 雲苓皮六錢 乾姜三錢 澤瀉三錢 川椒炭二錢 廣皮二錢 蒼朮三錢 煮三盃分三次服

從中治法

澤瀉三錢 川椒炭二錢 廣皮二錢 蒼朮三錢 煮三盃分三次服

從中治法

廿五 燥症木屬陰邪誤用大苦大寒致傷胃陽晝夜無眠與胃不和則卧不安

例之半夏湯

姜半夏二兩 秫米二合 急流水八盃 煮取三盃分三次服二帖

廿七 燥症誤服涼藥胃陽受傷以致不食不飢不便不寐峻用半夏湯和胃

有轉機仍以和胃為要

雲苓 半塊 半皮五錢 姜半夏一兩 秫米一合 廣皮三錢 小枳實一錢 姜汁每盃沖三茶匙 煮三盃分三次服二帖

廿九 胃不和兩用半夏湯和胃已得眠食腹中疝瘕未消微痛脈弦夜閉身微

熱七日不大便小便短赤與辛通苦降淡滲法

姜半夏六錢 青皮一錢 公丁香七分 小茴香三錢 炒山連一錢五分 吳茱萸三錢 川椒炭三錢 廣皮二錢 煮三盃分三次服

九月初 腹脹甚於前方內加 生苡仁五錢 半夏一錢 炒山連五分 厚朴三錢

吳氏醫案

中燥

三

雲苓皮三錢 再服二帖分量加則力更進

初三 於前方內去丁香五分山連五分仍服二帖

初五 疝瘕寒熱俱未盡除

姜半夏八錢 吳茱萸三錢 炒小茴香三錢 雲苓塊五錢 厚朴一錢 青蒿一錢 川椒炭三錢 桂枝尖三錢 檳榔剪一錢 公丁香五錢 廣皮三錢 煮三盃分三次服服此方二帖方見大效

初七 前日大用剛熱下焦方知藥力其中寒甚可知猶宜溫熱兼之透絡

桂枝三錢 炒小茴香三錢 厚朴一錢 半夏五錢 川椒炭三錢 檳榔剪一錢 青蒿八分 吳茱萸三錢 公丁香一錢五分 廣皮三錢 良姜一錢 煮三盃分三次服二帖

已丑正月 檀氏 二十燥金克木連少腹久痛不休腿腳俱痛兼有溢飲與陽明

從中治法

從中治法

從中治法

從中治法

從中治法

姜半夏五錢 雲苓 牛塊半皮六錢 淡吳萸三錢 川椒炭六錢 益智仁三錢
良姜三錢 公丁香一錢五分 廣皮三錢 煮三盃分三次服七帖

瘧

癸酉七月吳廿五 但寒不熱似乎牝瘧然渴甚皮膚捫之亦熱乃伏暑內發新

涼外加熱未透出之故仍用苦辛寒法加以升提

飛滑石三錢 花粉二錢 藿香葉一錢 杏仁泥三錢 知母一錢 廣鬱金一錢
生苡仁三錢 青蒿一錢 白蔻仁一錢 老厚朴一錢 黃芩一錢 煮三盃分三
次服

十七 但寒不熱之瘧昨用升提已出陽分渴甚脈洪數甚熱反多昨云熱邪深

伏未會透出不得作牝瘧看非虛言也用苦辛寒重劑

生石膏八錢 厚朴三錢 廣鬱金三錢 飛滑石三錢 知母一錢 白蔻仁三錢
杏仁粉五錢 黃芩一錢 生甘草一錢五分 藿香梗三錢 煮三盃分三次服
吳氏醫案 瘧 完

丙寅正月伊氏二十 娠娠七月每日午後先寒後熱熱到戌時微汗而解已近

十日此上年伏暑成瘧由初春升發之氣而發病在少陽與小柴胡法

柴胡五錢 姜半夏四錢 生薑二錢 人參一錢 炙甘草一錢 大棗去核二枚
黃芩三錢 煮三盃分三次服一劑寒熱減二帖減大半第三日用前方三
分之一全愈

庚申八月宋三十 體厚木有小腸寒溼養後便血舌苔灰白而厚中黑滑嘔惡

不食但寒不熱此溼瘧也與劫法

茯苓塊五錢 生草果三錢 熟附子一錢 生蒼朮五錢 杏仁三錢 檳榔三錢
黃芩炭三錢 生苡仁五錢 煮三盃分三次服
廿八 前方服三帖而病勢漸減舌苔化黃減其製再服三帖而寒來甚微一以
理脾為主

姜半夏三錢 以仁二錢 白苡仁二錢 炒於朮三錢 廣皮三錢 黃芩炭一錢

益智仁二錢 煮三盃分三次服服七帖而胃開

孫四十四少陰三瘧二年不愈寒多熱少脈弦細陽微損及入脈與通補奇
經丸四兩 服完全愈

蕭三十少陰三瘧久而不愈六脈弦緊形寒嗜臥發時口不知味不渴腎
氣上泛面目黧黑與扶陽湯法

生剉未先 毛鹿茸三錢 桂枝三錢 當歸三錢 熟附子二錢 人參一錢 蜀漆
用酒煎 煮三盃分三次服四帖

乙酉四月鄭五十 脈雙弦伏暑成瘧問三日一至舌苔白滑熱多寒少十月之

久不止邪已深入急難速出且與通宣三焦使邪有出路勿得驟補
雲苓皮五錢 知母三錢 杏仁泥三錢 生苡仁五錢 炒黃芩一錢 青蒿一錢
藿香梗三錢 姜半夏三錢 白蔻仁二錢 煮三盃分三次服
廿六 加青蒿一錢 白蔻仁一錢 服四帖
吳氏醫案 瘧 單

五月初 脈緊汗多加桂枝三錢 服二帖

初六 脈已活動色已華寒大減熱亦少減其計減其半汗至足底時已早至八
刻議去青蒿加黃芩一錢 舌苔雖減而仍白餘藥如故再服四帖

十四 三瘧與宣三焦右脈稍大熱多汗多舌苔之白滑雖薄而未盡化溼中生
熱不能驟補與兩清溼熱

茯苓皮五錢 黃芩三錢 杏仁泥三錢 姜半夏五錢 知母三錢 生苡仁五錢
白蔻仁一錢五分 黃連姜汁炒二錢 白通草一錢 煮三盃分三次服

十九 加廣皮炭三錢 藿香梗三錢 服四帖

廿二 病減者減其製每日服半帖六日服三帖

廿九 病又減去黃連加益智仁以其脈大而尚緊也仍以六日服三帖
五月初 餘邪未盡仍以六日服三帖
十三 三瘧與宣化三焦十退其九白苔尚未盡退今日診脈弦中兼緩氣來至

靜是陽氣未充議於前法退 寒進辛溫

茯苓塊 連皮五錢 桂枝 三錢 檀香梗 三錢 杏仁泥 三錢 煨白芍 二錢 黃芩 二錢 煨半夏 五錢 苡仁 五錢 白蓮仁 三錢 益智仁 三錢 廣皮 三錢 煎 三盃分三次服

廿三 左脈弦緊右大而緩舌白未化癩雖止而餘瀝未消此方仍服去白蓮仁 一錢黃芩炭一錢益智仁一錢以後又服八帖

七月初 四癩已止胃亦開脈已回陽與平補中焦 茯苓塊 五錢 焦於朮 三錢 炙甘草 二錢 姜半夏 三錢 生苡仁 五錢 白蓮仁 一錢五分 生薑 三片 廣皮炭 三錢 大棗 去核二枚 煮三盃分三次服服七 帖後可加人參 一錢 服至收功

八月初 九方 癩後六脈俱微數與脾腎雙補法 茯苓 六兩 何首烏 四兩 炒黑杞子 四兩 野朮 四兩 沙蒺藜 二兩 薤仁 五錢 吳氏醫案

人參 四錢 五味子 二兩 蓮子 去心六兩 山藥 四兩 右為細末煉蜜為丸如 梧子大每服二三錢開水送每逢節氣以邊參三五分煎湯送

乙酉六月 高十六 閏三癩脈弦暑邪深入矣 滑石 五錢 茯苓皮 三錢 知母 二錢 杏仁 三錢 製半夏 三錢 黃連 三錢 柴胡 二錢 藿香葉 三錢 生薑 三片 青蒿 三錢 白蓮仁 一錢 大棗 去核二枚 苡仁 三錢 炙甘草 一錢 煮三盃分三次服

診脈數熱重加知母 一錢 減滑石 二錢 癩止熱退去知母柴胡青蒿生薑大棗改藿香梗 一錢

廿九 餘邪已輕再服數帖 朱 八歲 但寒不熱舌苔白滑而厚三四日灰黑而滑五六日黑滑可畏脈 沈弦而緊太陰寒溼之癩與牝癩相參但牝癩表寒重此則偏於在裏之 寒溼重也初起三日用桂枝蒼朮草果茯苓杏仁廣皮澤瀉猪苓三四日

加附于五六日又加蒼朮草果分量再加生薑舌苔始微化黃惡寒漸減 服至十二三日舌苔惡寒皆始退癩愈之後峻補脾腎兩陽然後收功

乙酉七月 姚 五歲 久癩不愈寒多舌苔白滑溼氣重也宜通宣三焦微偏於溼 杏仁 五錢 茯苓皮 五錢 青蒿 二錢 半夏 五錢 煨草果 一錢五分 廣皮 四錢 苡仁 五錢 炒黃芩 一錢五分 生薑 三片 薤仁 三錢 煮三盃分三次服

八月初 前方服六帖癩疾已止照原方去草果青蒿加滑石 六錢 益智仁 三錢 冬溫

甲子十一月 張 六十 舌黃口渴頭不痛而惡寒面赤日赤脈洪熱甚形似傷寒實 乃冬溫挾痰飲與伏暑一類 連翹 六錢 苦桔梗 八錢 荆芥穗 五錢 金銀花 六錢 廣鬱金 三錢 廣皮 三錢 半夏 八錢 藿香梗 五錢 甘草 三錢 杏仁 六錢 白通草 三錢 共為粗末分七 包一時許服一包蘆根湯煎

吳氏醫案 癩 冬溫

廿六 於前方內去芥穗通草 連翹 三錢 細生地 三錢 薄荷 一錢 銀花 二錢 苦桔梗 二錢 黃芩 一錢五分

廿七 冬溫餘熱未清 杏仁 三錢 炒知母 一錢 甘草 一錢 水五盃煮兩盃分兩次服

廿九 溫病渴甚熱甚面赤甚脈洪甚 石膏 八錢 苦桔梗 五錢 荆芥穗 三錢 連翹 三錢 杏仁泥 五錢 廣鬱金 二錢 銀花 二錢 姜半夏 四錢 甘草 三錢 薄荷 二錢 煮三盃分三次服

三十 溫病最忌食復況老牛氣血已衰再復則難治矣口渴甚痰多胸膈 銀花 五錢 苦桔梗 五錢 半夏 六錢 連翹 三錢 杏仁霜 五錢 薄荷 一錢五分 石苻 四錢 廣鬱金 三錢 甘草 二錢 煎成三盃分三次服

十二日 大勢已退餘熱尚存仍 須清淡數日無使邪復 連翹 二錢 細生地 五錢 元參 二錢 銀花 二錢 丹皮 一錢 黃芩 二錢 麥冬

不去心五錢 生甘草一錢 頭煎二盃二煎一盃分三次服

初三 脈洪滑即於前方內加半夏三錢

廿二 二月 某 脈不浮而細數大渴引飲大汗裏不足之熱病也用玉女煎法

知母四錢 生石膏一兩 甘草三錢 麥冬五錢 細生地五錢 京米一撮 桑葉三錢 煮三盃分三次服

廿三 溫熱大渴大汗脈數昨用玉女煎法諸症俱減平素有消渴病用玉女煎

大便稀澇加牡蠣一面護陰一面收下

牡蠣一兩 生石膏五錢 炙甘草三錢 麥冬五錢 大生地五錢 炒知母二錢

京米一撮 煮三盃分三次服

丙寅十一 某 冬溫脈沈細之極舌赤面赤謔語大便閉邪機純然在血分之

裏與潤下法

細生地六錢 元參六錢 粉丹皮三錢 生大黃五錢 麥冬不去心六錢 生汁

吳氏醫案 冬溫

草二錢 元明粉一錢 煮三盃先服一盃得快便止後服外服牛黃清心丸

二九

初二 冬溫謔語神昏皆誤表之故邪在心包宜急急速開膈中不然則內閉外

脫矣大便閉面正赤昨因潤下未通經謂下不通者死非細故也得藥則

嘔忌甘也先與廣東牛黃丸二三以開膈中繼以大承氣湯攻陽明之實

生大黃八錢 元參八錢 老厚朴二錢 元明粉三錢 丹皮五錢 小枳實四錢

煮三盃先服一盃得便即止不便再服

傷寒

癸亥二月 唐五十八歲 太陽中風尚未十分清解兼之暈痺脾痛

茯苓皮五錢 桂枝四錢 片姜黃一錢 杏仁三錢 防己三錢 厚朴二錢 陳橘

皮一錢五分 晚蠶沙三錢 炙甘草一錢五分 煮三盃分三次服一帖

初四 行經絡而利營衛則風痺自止

桂枝八錢 焦白芍四錢 生薑五片 防己六錢 生於朮五錢 大棗去核二枚

半夏五錢 炙甘草三錢 水八碗 煮取三碗分三次服頭一次飲稀粥令微

汗佳其二三次不必啜粥

初五 左脈沈緊即於前方內加 熟附子五錢

初六 脈洪大而數經絡痛雖解而未盡除痺也小便白而濁溼也

飛滑石五錢 桂枝三錢 生苡仁五錢 茯苓皮五錢 猪苓三錢 黃柏炭一錢

杏仁泥五錢 澤瀉三錢 白通草三錢 煮三碗分三次服

初七 昨膨開胸與大陽療法溼滯已下小便亦清身熱已退但大便與痰中微

有血跡症從寒溼化熱而來未便即用柔藥以清血分今日且與宣行腑

陽右脈仍見數大可加苦藥如明日血分未清再清血分未遲

飛滑石五錢 半夏三錢 生苡仁五錢 杏仁泥三錢 厚朴二錢 黃柏炭一錢

黃芩炭二錢 廣皮一錢五分 細蘇梗一錢 頭煎兩盃二煎一盃分三次服

吳氏醫案 傷寒

初八 舌苔仍有新白衣被稍薄而畏寒身熱已退陽虛溼氣未淨無疑

姜半夏五錢 桂枝三錢 焦白芍二錢 生苡仁五錢 厚朴一錢 生茅朮二錢

杏仁泥三錢 廣皮一錢五分 全當歸一錢五分 頭煎兩盃二煎一盃分三

次服一帖

初十 諸症向安惟營氣阻滯不和寐不實寐後自覺身涼以調和營衛為主

桂枝三錢 茯苓塊三錢 廣皮一錢五分 白芍三錢 生苡仁五錢 生薑三片

半夏六錢 炙甘草二錢 大棗去核二枚 頭煎兩盃二煎一盃分三次服六

日 營衛已和即於前方內增白芍一錢 加膠飴三錢 服七帖而安

癸亥二月 唐五十八歲 太陽中風漏汗桂枝加附子湯主之

桂枝六錢 焦白芍四錢 生薑三片 炙甘草三錢 熟附子三錢 大棗去核三

枚 煮三盃分三次緩服

日十七 中風漏汗兼之腎水上凌小心悸腹痛昨用桂枝加附子湯諸症悉退今

左脈沈緩右脈滑數表雖清而濁陰未退議桂枝伐腎邪歸荷溫脈吳
黃半夏生薑兩和肝胃白芍以收陰氣合桂枝而調營衛加黃芩一以清
風化之熱合諸藥為苦辛通法此外感之餘兼有下焦裏症之治法也

茯苓塊 五錢 桂枝 四錢 淡吳萸 三錢 姜半夏 四錢 青皮 一錢五分 全當歸
炒黑三錢 小茴香 炒黑三錢 生薑 三片 黃芩炭 一錢 焦白芍 一錢 甘瀾水
煮三盃分三次服

日九 脈緩濁陰久踞兼有滯物續下用藥仍不外苦辛通法稍加推蕩之品因
其勢而利導之大意通補陽明之陽正以驅濁陰之陰若其人陽明本旺
胃陰自能下降六腑通調濁陰何以能聚再胃旺自能坐鎮中州濁陰何
能越胃而上攻心下反覆推求病情自現

桂枝尖 四錢 厚朴 三錢 焦白芍 二錢 茯苓塊 三錢 青皮 一錢五分 小枳實
一錢五分 淡吳萸 三錢 烏藥 一錢 廣木香 一錢 小茴香 吳萸同炒黑 廣皮

吳氏醫案

傷寒

聖

一錢 黃芩炭 一錢 川棟子 一錢 煮三盃分三次服

日二 凡痛脹滯下必用苦辛通降兼護陽明固不待言前法業已見效細詢病
情已十有餘年以半產後得之誤用壅補而成按久病在絡再痛脹偏左
下至少腹振着其中必有瘀滯非純用湯藥所能成功蓋湯者蕩也滌滯
腸胃通和百脈固其所長至於細離密鑠緩行攻絡是其所短非兼用化
癥回生丹緩通不可且湯劑過重有痕散為蠱之虞不得不思慮豫防也
桂枝尖 一錢 半夏 三錢 廣木香 八分 炒白芍 二錢 厚朴 一錢 地榆炭 一錢
降香末 一錢 紅花 七分 炒桃仁 一錢五分 川棟子 二錢 小茴香 炒黑 二錢
廣鬱金 一錢 全當歸 炒黑 一錢 烏藥 一錢五分 兩頭尖 一錢 黃芩炭 一錢
黃連 八分 廣皮炭 八分 甘瀾水煎前後四盃日三夜一分四次服五帖
昔李東垣用藥有至三十餘味者張仲景煎甲煎亦有三十幾味後人學
問不到妄生議論不知治經治以急急則劑少而分量多治絡治以緩緩

則用多而分量少治新則用急治舊則用緩治急可獨用治舊必用眾獨
則無推諉而一力成功眾則分功而互相調濟此又用藥多寡之權衡也
兼服化癥回生丹 一丸

日七 官絡法兼兩和肝胃
炒白芍 六錢 半夏 三錢 炒丹皮 三錢 製香附 一錢 全當歸 三錢 川芎 五分
炒蒺藜 三錢 小茴香 炒黑三錢 炒青皮 八分 煮三盃分三次服

日八 麻仍不實於前方內加 生苡仁 六錢 半夏 一錢 服三帖
三月初
姜半夏 五錢 全當歸 三錢 製香附 一錢五分 降香末 一錢 良姜 一錢 桃仁
泥 一錢五分 小茴香 三錢 烏藥 一錢 廣皮炭 八分 乾姜炭 五分 青皮 八分
煮三盃分三次服

日初五 終於多年腹痛脹攻胃食後腹脹今搜去絡中瘀滯飢甚則如刀刮竹絡
吳氏醫案 傷寒 吳

氣虛也與通補絡法

炒白芍 六錢 丹參 三錢 炒杞子 一錢 白歸身 三錢 丹皮 三錢 桂圓肉 三錢
小茴香 一錢 煮三盃分三次服 九帖全愈

甲子二月 吳氏歲 頭項強痛而惡寒脈緩有汗太陽中風主以桂枝湯
桂枝 三錢 炙甘草 二錢 大棗 去核 二枚 白芍 二錢 生薑 三錢 水 五盃 煮
盃頭盃即啜稀熱粥令微汗佳有汗二盃不必啜粥無汗仍然

日四 不解於前方內加 羌活 五錢
日五 服前方業已脈靜身涼不肯避風因而復中脈緊無汗用麻黃湯法
麻黃 自去節 三錢 白芍 三錢 生薑 三片 桂枝 三錢 炙甘草 一錢 羌活 二錢
大棗 去核 二枚 煮兩盃分兩次服

日六 服前藥不知身重疼痛其人肥而陽氣本虛平素面色淡黃舌白溼氣又
重非加助陽勝溼之品不可於前方內加重

麻黃去節五錢 杏仁泥 三錢 白朮 三錢 桂枝 二錢 其熟附子 三錢 炙甘草 一錢 共成八錢

成三錢水 五碗 先煮麻黃去上沫入諸藥取二碗分二次服汗出而愈

甲子三月 唐九歲 頭風惡寒脈緊舌淡太陽中風雖係春季天氣

十六日 不得看作春溫早間陰晦雨氣甚寒以桂枝二麻黃一法

桂枝 六錢 杏仁 五錢 生姜 六片 麻黃 去節三錢 炙甘草 三錢 大棗 去核二枚

煮三盃先服一盃得微汗止後服不汗再服再不汗促役其開

於原方倍麻黃減桂枝加 附子 三錢 一帖

照原方服一帖

諸症悉減藥當暫停以消息之

中風表解後言寒減食則汗頭引痛舌白滑脈微緊宜桂枝加附子湯除

風實表護陽 桂枝 六錢 焦白芍 四錢 生姜 五片 附子 三錢 炙甘草 二錢 大棗 去核二枚

吳氏醫案 傷寒

水 五盃 煮二盃分溫二服渣再煮一盃服

表解後復中惡寒胸痞舌苔厚而白脈遲緊裏急

桂枝 六錢 茯苓塊 五錢 厚朴 三錢 以仁 五錢 熟附子 四錢 乾姜 三錢 茅朮 三錢 小枳實 二錢 廣皮 二錢 日二帖

於前方內去茯苓減以仁加 炙甘草 二錢 生姜 二兩 日二帖

諸證悉減當減其製照前方日服一帖

中風表解後餘邪入裏舌黃身熱胸痞瀉瀉心瀉瀉其痞

半夏 六錢 黃芩 炒半錢 三錢 生姜 五錢 乾姜 五錢 黃連 炒半錢 二錢 頭煎

兩盃二煎一盃分三次服

某 先寒後熱脇痛腰痛少陽症也講從少陽領邪外出太陽法

柴胡 六錢 檉參 三錢 甘草 三錢 桂枝 四錢 黃芩 三錢 羌活 一錢 五分 生姜 三片 半夏 一錢 五分 煮三盃分三次服

又 熱後寒退熱存脇脹

半夏 五錢 廣鬱金 二錢 生姜 三錢 黃芩 四錢 廣皮炭 一錢 五分 香附 三錢

大棗 去核二枚 生甘草 一錢 五分 煮三盃分三次服

今年風木司天現在寒水客氣故時近初夏猶有太陽中風之症按

太陽中風係傷寒門中第一關最忌誤下時人不讀晉唐以上之書故不

識症之所由來仲景謂太陽至五六日太陽症不罷者仍從太陽驅去宜

桂枝湯現在頭與身仍微痛既身熱而又仍惡風寒的是太陽未罷理宜

用桂枝湯但其人素有溼熱不喜甘又有微咳議於桂枝湯內去甘藥加

辛燥服如桂枝湯法

桂枝 六錢 半夏 四錢 廣皮 三錢 白芍 四錢 杏仁 三錢 水 八盃 煮成三盃先

服一盃即啜稀粥令微汗佳有汗二三盃不必啜粥無汗仍然

吳氏醫案 傷寒

法今日惡寒已罷頭昏已清惟胸痞特甚不渴舌白而壯熱泄瀉稀水頻

仍仲景法云病發於陽而誤下之成胸痞者瀉心湯主之今用其法

再經謂脈不動數者為不傳經也昨日以動數太甚斷無不傳之理可畏

在此

茯苓 連皮五錢 乾姜 五錢 生姜 三片 半夏 五錢 黃連 三錢 煮三盃分三次

服

太陽中風誤下前日先與解外昨日太陽症罷即瀉胸痞今日胸痞解惟

自利不渴舌灰白脈沈數經謂自利不渴者屬太陰也太陰宜溫但理中

之人參甘草恐不合拍議用其法而不用其方

茯苓 連皮一兩 蒼朮炭 四錢 乾姜 五錢 半夏 六錢 廣皮炭 一錢 生姜 五錢

煮三盃分三次服

太陽中風先與解外解已即與瀉誤下之胸痞痞解而現自利不渴之

太陰症今日口不渴而利止見山陰出陽也脈亦頓小其半古云脈小則病退但仍沈數身猶熱而氣粗小寐陷下之餘邪不淨仲景傷寒論謂其陰已虛陽邪尚盛之不寐用阿膠雞子黃湯按此湯重用黃芩黃連讓用甘草瀉心法

甘草瀉心法
半斤 五錢 黃芩 四錢 生薑 二錢 雲苓 三錢 山連 三錢 大棗 去核二枚 甘草 三錢 煮三盃分三次服

廿九 脈沈數陰經熱陽經不熱是陷下之餘邪在裏也氣不伸而噦噦者傷寒門中之大忌也皆誤下之故讓少用丁香柿蒂湯法加黃連以徹裏熱疏逆氣

公丁香 一錢 黃芩 三錢 柿蒂 九枚 真山連 一錢 廣皮 一錢 姜汁 沖二茶匙 煮二盃分三次服

初一 誤下成胸痞自利兩用瀉心胸痞自利俱止但陷下之邪與受傷之胃氣 吳氏醫案 傷寒 見

搏而成噦昨用丁香柿蒂湯去人參加芩連方雖易仍不外仲景先師苦辛通降之法病者畏而不服今日噦不止而左脈加進勉與仲景噦門中之橘皮竹茹湯其力量減前方數等矣所以如此用者病多一日則氣虛一日仲景於小柴胡湯中即用人參況誤下中虛者乎

廣皮 六錢 半夏 三錢 生薑 五錢 竹茹 五錢 炙甘草 四錢 人參 一錢 若無人參 以洋參代 之大棗 去核四枚 煮三盃分三次服

初二 誤下中虛氣結成噦昨與金匱橘皮竹茹湯今日噦減過半古謂效不更方仍用前法但微喘而舌苔白仲景謂喘家加厚朴杏子佳議以前方內加厚朴杏仁

廣皮 六錢 老厚朴 二錢 生薑 三錢 竹茹 五錢 杏仁泥 三錢 大棗 去核二枚 洋參 三錢 炙甘草 五錢 煮三盃分三次服

初三 於原方內加柿蒂 三錢

初四 誤下之陷症噦而喘昨連與金匱橘皮竹茹湯一而補中一而宣邪茲已邪遺諸惡候如失脈亦漸平但其人宗氣受傷不淺讓與小建中湯加橘皮半夏小小建中氣調和營衛兼宣胃陽令能進食安眠

焦白芍 六錢 桂枝 四錢 生薑 三片 新會皮 一錢 半夏 四錢 大棗 去核三枚 炙甘草 三錢 膠飴 一兩 去渣後化入 煮三盃分三次服

初五 病解後微有飲咳讓與小建中去膠飴加半夏廣皮茯苓杏仁薏仁杏仁桂枝 四錢 炒白芍 六錢 廣皮 三錢 半夏 五錢 茯苓塊 三錢 生薑 三片 苡仁 五錢 白薏仁 一錢 大棗 去核二枚 杏仁 二錢 炙甘草 三錢 煮三盃分三次服

初六 病後兩服建中胃陽已復脾陽不醒何以知之安眠進食是為胃陽復舌起白滑苔小便短大便不解脈作數是脾陽未醒而上蒸於肺也讓與宣利三焦法以醒脾陽

吳氏醫案 傷寒 辛 半夏 五錢 小枳實 三錢 苡仁 五錢 茯苓 五錢 益智仁 一錢 廣皮 三錢 杏仁 五錢 白通草 一錢 煮三盃分三次服

初八 大小便已利脈仍洪數舌白滑苔未除仍宜苦辛淡法轉運脾陽宣行溼熱 茯苓皮 五錢 半夏 五錢 黃柏炭 三錢 生苡仁 五錢 杏仁 三錢 蒼朮炭 二錢 白薏仁 一錢 五分 廣皮 一錢 五分 黃芩炭 三錢 煮三盃分三次服

初九 脈仍沉數舌苔反白滑仍宜建中行溼以除伏邪溼最傷氣非溼去氣不得健與急劫溼法

茯苓皮 五錢 製蒼朮 四錢 白薏仁 一錢 五分 姜半夏 五錢 生苡仁 五錢 黃芩炭 二錢 煨草果 四錢 黃柏炭 二錢 炒廣皮 一錢 五分 杏仁泥 三錢 益智仁 二錢 煮三盃周十二時服完

乙酉十一月十五日 吳六歲 內熱外寒兼發熱 飲喉啞咳嗽痰多頭痛惡寒脈浮與麻杏

石甘湯加半夏廣皮苦桔梗

生石膏六兩麻黃去節五錢 苦桔梗六錢 姜半夏一兩 廣皮四錢 炙甘草

四錢杏仁泥八錢 煮四盃先服一盃得汗即止不汗再服汗後避風

十四 肺脈獨浮去麻黃三錢

十七 脈浮喉啞咳嗽多

生石膏四兩麻黃去節三錢 桔梗五錢 半夏六錢 廣皮三錢 炙甘草一錢

杏仁六錢 煮三盃先服一盃得汗止後服

廿三 脈浮喉啞咳嗽多內飲招外風為病與大青龍湯法

麻黃去節五錢 生石膏四兩 廣皮五錢 杏仁八錢 姜半夏八錢 生薑三錢

桔梗五錢 炙甘草三錢 大棗去核二枚 煮二盃先服一盃得汗止後服不

汗再服

廿四 病減者減其製去麻黃三錢廣皮生薑大棗於原方加木通一錢 以小

吳氏醫案

傷寒

至

短也

廿七 喉復啞脈洪數小便已長照前方去木通加生石膏二兩

乙酉十一 趙歲 頭痛脈浮弦不甚緊無汗與杏蘇散法

杏仁二錢 羌活一錢 生薑三錢 蘇葉三錢 桔梗三錢 大棗去核二枚 防風

二錢 甘草一錢五分 煮二茶盃先服一盃覆被令微汗不可使汗淋漓得

汗止後服不汗再服第二盃又不汗再作服以得汗為度汗後避風只吸

粥須忌葷

丁亥十一 某四十 頭項強痛而惡寒脈浮而緊無汗的係傷寒法當發汗何得

妄為冬溫而恣用涼藥

麻黃去節六錢 杏仁四錢 甘草四錢 桂枝五錢 煮三盃先服一盃覆被令

微汗周身佳得汗止後服不汗再服○盡劑而汗始至足

廿二 傷寒與麻黃湯頭項痛已解脈不浮緊胃亦開但受傷太重陽虛體弱

畏寒與溫太陽經脈

桂枝六錢 焦白芍四錢 甘草三錢 防己一錢 杏仁泥三錢 生薑五片 廣皮

四錢 熟附子三錢 大棗去核二枚 煮三盃分三次服

十三 脈症仍舊陽未全復照前方加附子再服一帖服藥後不必啜粥

十四 痺症身痛大減惟足痛甚溼傷於下仍歸於下也仍與溫通太陽經絡

雲苓皮六錢 桂枝六錢 熟附子五錢 生苡仁六錢 防己四錢 片姜黃三錢

杏仁泥四錢 甘草三錢 海桐皮三錢 煮四盃分早中晚夜四次服

十五 諸症向安惟六脈陽微之極仍以補陽為要但去痺未遠宜通不宜守俟

三四日後毫無遺症再議守補

雲苓塊三錢 桂枝六錢 生苡仁二錢 熟附子三錢 苡薢三錢 炙甘草三錢

煮三盃分三次服二帖

十七 脈沉細背脊仍有畏寒之意舌白滑苔頗厚寒溼未清猶未敢呆補

吳氏醫案

傷寒

至

雲苓皮五錢 桂枝八錢 川草薢四錢 生苡仁五錢 防己二錢 白通草一錢

姜半夏四錢 廣皮二錢 炙甘草三錢 熟附子四錢 煮三盃分三次服

戊子正月 史三十 脈浮洪而數頭痛身痛惡寒有汗此為太陽中風但中風脈

緩今洪數有力恐傳經也桂枝湯主之

桂枝六錢 炙甘草三錢 大棗去核三枚 白芍四錢 生薑五錢 煮兩盃先服

一盃即啜稀熱粥一碗覆被令微汗佳得汗止後服不汗再服

十七 脈之洪大已減頭痛身熱惡寒俱減餘邪陷入少陽乾嘔口苦與小柴胡

湯渴者加天花粉

柴胡三錢 姜半夏五錢 生薑三錢 黃芩三錢 天花粉一錢五分 廣皮三錢

大棗去核二枚 炙甘草一錢五分 煮二大盃分二次服

廿八 脈靜身涼外感已解惟舌上白濁夾黃苔太甚胃口不清與宣通腑陽切

忌早食多食

姜半夏五錢 益智仁二錢 白瀝仁八分 雲苓皮五錢 小枳實三錢 廣陳皮三錢 杏仁泥三錢 炒神麩三錢 白通草八分 煮三盃分三次服二帖

乙丑正月 劉氏 餘歲 太陽中風 延五日不解 衝氣上動 宛若奔豚 腹滿泄瀉 而渴 兼有少陰症 矣 兩層兩感 太陽少陽並見 一兩感也 其人積怒內傷 又加外感 此二兩感也可畏之至 且先伐其衝氣

桂枝八錢 雲苓塊一兩 川芎一錢五分 當歸三錢 川椒炭二錢 生薑五大片 煮三盃分三次服

初六 太陽少陽兩感 衝氣上動 如奔豚 與苓桂重伐腎邪 今日一齊俱解 脈靜 身涼 衝氣寂然 可喜之至 微有痰飲 咳嗽 當與和胃令能食

雲苓塊六錢 桂枝三錢 生薑三片 姜半夏五錢 廣皮三錢 大棗去核二枚 焦白芍三錢 煮三盃分三次服

乙丑正月 錢四歲 太陽中風 汗多 誤與收瀉 引入少陽 寒熱往來 口苦 脈弦 茲與吳氏醫案

傷寒

語

小柴胡湯和法 其人向有痰飲 喘症 加枳實 橘皮 去人參

柴胡五錢 姜半夏六錢 生薑五錢 廣皮五錢 小枳實四錢 大棗去核二枚 炙甘草三錢 黃芩炭一錢五分 煮三盃 先服一盃 寒熱止 止後服盡劑 不止 再作服

甘三 風入少陽 與小柴胡湯已解 其半仍須用和法 寒多熱少 而口渴 較前方 退柴胡 進黃芩 加天花粉

姜半夏三錢 柴胡二錢 生薑三片 天花粉三錢 炒黃芩三錢 大棗去核二枚 炙甘草二錢 煮三盃分三次服

己丑十一月 某四十 風寒夾痰 飲喘 咳吐血 業已發汗 身熱不退 現已右脈洪大 數滑 病勢太重 勉與大青龍法 去表藥 加半夏

生石膏四兩 雲苓塊五錢 生薑汁沖三小匙 姜半夏六錢 杏仁泥五錢 甘澗水八盃 煮三盃分三次服

十七 傷寒夾痰 飲吐血 誤治 喘咳 脈數 極與大青龍法 去表藥 加半夏 身熱已退 喘已定 惟咳血未除 生石膏三兩 姜半夏六錢 橘皮三錢 雲苓皮六錢 杏仁泥五錢 生薑汁沖三茶匙 煮三盃分三次服

吳氏醫案卷一終

傷寒

語

目錄

中風 癱瘓 肝風 肝厥 脇痛 肝癰 癩狂 虛勞 吐血 衄血 便血 腫脹 單腹脹 腹脹 滯下 積聚 淋濁 泄瀉

吳氏醫案

目錄

中風

陶氏六十 左肢拘攣舌厚而蹇不能言上有白苔滴水不能下咽飲水則噎

此中風挾痰之實症前醫誤與膩藥補陰故陰道俱塞先與開肺

生石膏 四兩 杏仁 四錢 鮮桑枝 五錢 雲苓塊 五錢 防己 五錢 白通草 一錢

五分 姜半夏 五錢 麻皮 三錢 煮三杯分三次服 服一帖而飲下咽服七

帖而舌腫消服一十帖諸病漸減而無大效左肢拘攣如故舌腫雖消

而語言不清脈兼結余曰此絡中有塊痰堵塞皆誤補致壅之故非針不

可於是延邨七兄針之針法本高於舌上中泉穴一針出紫黑血半茶杯

隨後有物如蚯蚓令伊子以手探之即從針孔中拉出膠痰一條如勺柄

吳氏醫案

中風

長七八寸左手支溝穴一針透關左手背三陽之絡用小針針十餘針以

後用藥日日見效前方止減石膏之半服至七十餘帖而能策杖行矣服

九十帖能自行出堂上榻矣諸症悉除

哈六十

中風溼口歪臂不舉腿腫脈洪數口渴胃不開與辛涼開水道法

石膏 生四兩 茯苓皮 一兩 桂枝 三錢 滑石 飛一兩 晚蠶砂 三錢 防己 二錢

半夏 五錢 白通草 一錢 桑枝 五錢 煮三杯分三次服 二帖而效十四帖

葉氏三十

中風神呆不語前能語時自云頭暈左肢麻口大歪不食六脈弦

數此非中也與柔肝法

直生地 八錢 白芍 生三錢 左牡蠣 五錢 生鱉甲 五錢 麥冬 二錢 炙甘草 三

錢 煮三杯分三次服 一帖而神有清意人與之言能點頭也又於前方

加生阿膠三錢丹皮四錢三帖而半語七帖而大愈能食十二三帖而如

故

李氏二十伏暑夾痰飲肝鬱又加中風頭痛舌厚白苔言蹇畏寒脈洪數而弦
先與辛涼清之

連翹三錢 苦桔梗三錢 桑葉三錢 銀花三錢 茶菊花三錢 甘草一錢 薄荷
一錢五分 刺蒺藜二錢 煮三杯分三次服 四帖

又

頭痛畏寒舌厚漸消苦不退茲以通宣三焦兼開肝鬱

飛滑石六錢 半夏四錢 白薤仁二錢 雲茯苓連皮五錢 薏仁五錢 廣鬱金
二錢 杏仁泥五錢 香附二錢 白通草一錢 煮三杯分三次服 服二十餘帖
而大安一切

元復

癩癧

己卯七月 某氏其人本有肝風頭痛病根少陽鬱動真水不能上濟可知又現
伏暑內發新涼外加金來尅木木愈病矣少陽所致為癩癧理固然也勉

吳氏醫案

中風

二

與清膽絡兼清心包

犀角三錢 羚羊角三錢 茶菊花三錢 丹皮五錢 細生地五錢 鉤藤鈎二錢
桑葉三錢 苦桔梗二錢 鮮荷葉去蒂一枚 甘草一錢五分 煮三杯分三次
服 間服紫雪丹一二錢

又

此症肝風無疑昨服柔肝清熱之劑而燒退是外邪已解現在六脈弦細
手足發涼似有厥意治法熄風之中似宜添入開心胞之絡為是倘一二
天不醒便難挽回矣

細生地五錢 沙參二錢 生牡蠣三錢 羚羊角三錢 丹皮五錢 刺蒺藜二錢
生鱉甲三錢 阿膠二錢 石菖蒲一錢 茶菊花三錢 甘草一錢 嫩桑枝十寸
煮三杯分三次服 間服紫雪丹牛黃丸

又

用玉女煎加犀角丹皮

又

用玉女煎加犀角丹皮連翹銀花重用石膏知母

又

少陽頭痛甚急外因亦未盡解
生石膏一兩 連翹連心三錢 茶菊花三錢 細生地五錢 銀花三錢 冬桑葉
三錢 左牡蠣五錢 麥冬不去心五錢 鉤藤鈎二錢 羚羊角三錢 丹皮五錢
生甘草二錢 炒知母一錢 天冬一錢 煮三杯分三次服 間服紫雪丹三
分

肝風

癸亥正月 辛氏七十老年上虛下盛又當厥陰司天之年厥陰主令之候以故
廿八日 少陽風動頭偏右痛目係引急最有壞眼之慮刻下且與清上
羚羊角三錢 連翹一錢 刺蒺藜二錢 茶菊花二錢 桑葉二錢 生甘草八分
苦桔梗一錢五分 薄荷八分 煮二杯分二次服 日二帖 服二日

三十

少陽頭痛已止現在胸痞腸脹肝胃不和肢痛腰痛讓兩和肝胃之中兼
與宣行經絡

吳氏醫案

癩癧 肝風

三

桂枝尖二錢 半夏五錢 製香附二錢 杏仁泥三錢 廣皮一錢五分 生姜汁
三匙 廣鬱金二錢 青皮一錢 煮三杯分三次服 一帖

二月初

因食冷物晝寐中焦停滯腹不和泄瀉與開太陽關陽明法
桂枝五錢 茯苓塊五錢 肉果煨一錢五分 半夏三錢 生茅朮三錢 炮姜一
錢五分 猪苓三錢 藿香梗三錢 廣皮一錢五分 澤瀉三錢 廣木香一錢五
分 頭煎兩茶杯二煎一茶杯分三次服

初四

諸症向安惟餘晨泄左手脈緊宜補腎陽
茯苓塊五錢 補骨脂三錢 蓮子連皮五錢 生於朮三錢 煨肉果三錢 芡實
三錢 兔絲子二錢 五味子一錢 水五碗煮成兩碗分二次服渣再煮一梳
明早服

初七

即於前方內去兔絲子加牡蠣粉三錢

初十

太陽微風以桂枝法小和之

桂枝二錢 茯苓塊三錢 生姜二片 半夏三錢 炒白芍二錢 大棗去核一枚 廣皮二錢 炙甘草八分 煮二杯分二次服

日十一 右目澀小酉刻後眼前如有黑霧議鬆肝絡熄肝風益肝陰法

何首烏三錢 沙參三錢 菘菊一錢五分 沙蒺藜二錢 桔梗一錢五分 生

甘草八分 青箱子二錢 煮二杯分二次服 三帖後了然如故

癸酉二月 陶氏 右脈洪大尺部更甚左脈弦細上盛下虛卒中不能言如中

風狀乃肝風內動絡熱發閉之故證勢甚重

羚羊角一錢 沙參一錢五分 茶菊一錢五分 苦桔梗一錢 麥冬二錢 刺

蒺藜一錢 生鱉甲三錢 桑葉一錢 生甘草八分 細生地一錢五分 煮二杯

分二次服日三帖

日二十 上盛下虛竅閉不能言用輕清合芳香開上今稍能言但虛煩不眠心悸

頭暈仍係厥陰未熄茲用補心肝之體兼實下法

吳氏醫案

肝風

四

大生地五錢 沙參三錢 茯苓塊三錢 炒白芍六錢 麥冬不去心 炒杏仁三

錢 生薑板四錢 阿膠一錢 炙甘草三錢 整珠砂綿裹五錢 蓮子連皮心水

五杯煮取兩杯分二次服渣再煮一杯服

黃三十 肝風內動脈弦數乃真水不配相火水不生木故木強而直上行頭暈

甚即巖厥也久不治為非中醫云痰者妄也先與清瀟少陽膽絡繼以填

補真陰可也 此症最易錯

羚羊角三錢 桑葉三錢 苦桔梗一錢 黑芝麻研細三錢 丹皮一錢 鈞藤鈎一錢

茶菊花三錢 薄荷七分 生甘草一錢 煮三杯分三次服

丸方 定風珠

肝厥

乙丑十一月 高氏 肝陽上竄因怒即發十餘年矣經云久病在絡豈經藥可

效再肝厥之證亦有寒熱之不同此證脈沈而弦細其為寒也無疑大凡

寒厥必死今不死者以其為胸厥而非臟厥也現脇下有塊有聲經色紫

黑議先用溫通絡脈法

新絳紗三錢 半夏五錢 降香末三錢 川椒炒黑二錢 旋覆花包三錢 生香

附三錢 桂枝尖嫩三錢 歸蟻二錢 桃仁炭三錢 煮二杯分二次服 三帖

額氏二十 除夕日亥時先是產後受寒痺痛醫用桂附等極燥之品服之大

效醫見其效也以爲此人非此不可用之一年有餘不知溫燥與溫蓋不

同可以治病不可以養生以致少陰津液被劫無餘厥陰頭痛單顛頂一

點痛不可忍畏明至於窗間有豆大微光即大叫必室如漆黑而後少安

一日厥去四五次脈弦細數按之無力危急已極勉與定風珠湯陽育陰

以熄肝風

大生地八錢 麻仁四錢 生白芍四錢 生龜版六錢 麥冬不去心四錢 生阿

膠四錢 生鱉甲六錢 海參二條 生牡蠣六錢 雞子黃去渣後化入攪勻

吳氏醫案

肝厥

五

二枚 甘草炙五錢 煮成八杯去渣上火煎成四杯不時頻服

正月初 微見小效加 鮑魚片一兩 煮成十杯去渣煎至五杯服如前

日二 又見效方法如前

日三 厥止頭痛大減猶畏明方法如前

日四 腰以上發熱腰以下冰涼上下渾如兩截身左半有汗身右半無汗左右

渾如兩畔自古方書未見是症竊思古人云琴瑟不調必改絃而更張之

此症當令其復厥厥後再安則愈 照前方定風珠減半加 青蒿 八

分當夜即厥二三夜

日五 照前定風珠原方分量一帖服後厥止神安

日七 仍照前方

日八 方皆如前漸不畏明至正月二十日外微去帳幔湯藥服至二月春分後

與專翁大生膏一料全愈

甲申十一月初二日楊女九歲 初因肝鬱脇痛繼而肝厥犯胃醫者不識病名肝着與

絡病治法無非滋陰補虛或用涼藥以致十年之久不能吃飯飲粥湯止

一口食炒米粉止一酒杯稍聞聲即嘔厥終夜抽搐二三日方漸平六

脈弦繁而長經閉二年周身疼痛痰飲咳嗽終年無已時骨瘦如柴奄奄

一息此症內犯陽明故不食木克脾土故飲聚陽明空虛故無主聞聲而

驚外犯太陽故身痛而厥本臟自病故厥經謂治病必求其本仍從肝絡

論治

新絳紗 旋覆花包 降香末 廣鬱金 歸橫鬚 川椒炭 蘇子霜

桂枝 半夏 青皮

十四日 服前方七帖脇痛雖輕痰飲特甚咳嗽頻仍夜臥不安暫停絡藥專與

和胃蠲飲

半夏八錢 生薏仁 五錢 枳實 二錢 茯苓 六錢 淡乾姜 三錢 廣皮 四錢 桂枝

吳氏醫案

肝厥

六

三錢 煮三杯分三次服

廿七日 胃口稍開能食稀粥半碗脇仍痛仍服前活絡方內去川椒炭加廣皮

初四日 脇痛平咳嗽未除再服前蠲飲方

十一日 因余有由淮上赴紹興之行令其常服和胃方脇痛發時暫服新絳旋覆

花湯此時已能吃爛飯半碗矣

乙酉二月 脈稍和平雖弦而有胃氣乾飯能吃一碗有半經亦復通仍間服前

二方

九日 夜間偶感燥氣症欲起不得起欲坐不得坐欲臥不得臥煩躁無奈不

可當約二時服蠲散三兩許始安

次日仍與和胃

十八日 能食乾飯兩小碗矣六脈又和一等仍間服前二方

四月初 余復由淮至紹初八日至蘇州不放心此病作書一封令其調適性情

五月間又作書一封痛以大道理開導之十月間始得回書據云竟以余書作座右銘每日誦誦一過飲食又進精神大長聞家歡樂

肝痛

伊氏二十 肝鬱脇痛病名肝着亦婦科之常症無足怪者奈醫者不識見其有

寒熱也誤以為風寒而用風藥夫肝主風同氣相求以風從風致風鳴張

肝主筋致令一身筋脈肝開竅於目致令晝夜目不合不得臥者七八日

肝主疏泄肝病則有升無降失其疏泄之職故不大便小便澀僅通而短赤

特甚醫者又不識誤以為腸胃之病而以大黃通之麻仁潤之致令不食

不飲不便不寐六脈洪大無倫身熱且坐不得臥時時欲嘔煩躁欲怒是

兩犯逆也金匱謂一逆尚引日再逆促命期不待智者而知其難愈也議

宜通絡脈法肝藏血絡主血故也必加苦寒泄熱脈沉洪有力且膽居肝

內肝病膽即相隨故也

吳氏醫案

脇痛

七

新絳紗 四錢 蘇子 研四錢 歸橫鬚 四錢 桃仁 四錢 旋覆花 包五錢 降香末

四錢 川棟皮 五錢 雲連 炒二錢 廣鬱金 三錢 急流水八椀煮成三椀晝夜

六次服

又 服前方見小效即於前方內減川棟皮二錢加

丹皮 炒黑 三錢 生香附 二錢

又 脇痛減去大半但不得寐時時欲嘔議兩和陽明厥陰仍兼宣絡

半夏 醋炒五錢 降香末 三錢 黃芩 二錢 新絳紗 三錢 蘇子霜 二錢 青皮 一錢

五分 桃仁 三錢 川棟子 二錢 秫米 一撮 歸橫鬚 三錢 廣鬱金 一錢 煮三椀分

日二夜一三次服

又 昨方業已效今日再復苦藥即苦與辛合能降能通之義即於前方內加

古勇連 姜汁 二錢

又 昨用苦辛法脈減使通今日腹覺痛將近經期一以宣絡為主

新絳紗包五錢 丹皮炒三錢 元胡索一錢 旋覆花包三錢 歸鬚三錢 製香
附二錢 降香末三錢 鬱金一錢 兩頭尖一錢 桃仁泥三錢 條芩酒炒一錢
五分 蘇子霜二錢 水八杯煮取三杯分日二夜二三服

又 昨日一味通絡已得大便通利腹中痛止但不成寐今日用胃不和則臥
不安飲以半夏湯覆杯則寐法仍兼宣絡此仲景先師所謂衝脈累及陽
明先治衝脈後治陽明法也

又 新絳紗四錢 半夏一兩 降香末二錢 旋覆花包五錢 秫米二兩 水十杯煮
成四杯日三夜一分四次服

又 昨與半夏湯和胃業已得寐但脈沉數澁赤短議加苦藥泄肝熱而通小
腸火府

又 新絳紗四錢 黃柏二錢 鹽水炒 生香附三錢 旋覆花包五錢 半夏六錢 炒雲連
二錢 降香末三錢 秫米一兩 煎法如前

吳氏醫案

胸膈

八

又 昨日和胃宣絡兼用普通火府今日得寐澁色稍淡口亦知味是陽明已
有漸和之機矣惟胸中微痛背亦掣痛按肝脈絡胸背則太陽經也是由
厥陰而累及少陽肝膽為夫妻也由少陽而累及太陽少太為弟兄也今
日仍用前法加通太陽絡法

又 新絳紗三錢 黃柏五錢 桂枝嫩尖二錢 旋覆花包三錢 半夏五錢 川
棟子皮二錢 降香末三錢 秫米六錢 古勇黃連一錢 生香附二錢 煎法如
前

又 統膈痛痲也亦衝脈肝經之病

又 桂枝尖三錢 雲連炒黑一錢 淡吳萸炒黑三錢 新絳紗三錢 半夏五錢 生香
附三錢 全當歸炒三錢 秫米八錢 小茴香炒黑三錢 川棟子三錢 煎法如前

又 兩和肝胃兼治痲痛
淡吳萸炒黑二錢 半夏八錢 全當歸三錢 新絳紗二錢 烏藥三錢 生香附三

錢 旋覆花包三錢 青皮二錢 小茴香炒黑三錢 降香末三錢 雲連炒黑一錢 淡乾
姜二錢 桂枝尖三錢 秫米一兩 煮成四杯日三夜一分四次服

又 腹中拘急而痛小便短赤皆陰絡阻寒濁陰凝聚之象與宣通陰絡降濁
法

又 桂枝尖三錢 歸鬚三錢 小茴香炒三錢 降香末三錢 吳萸一錢 桃仁泥炒
二錢 川棟子三錢 琥珀研細沖 元胡索二錢 新絳紗三錢 麝香研細沖兩
頭尖二錢 水六杯煮成二杯每服半杯沖非白汁兩小茶匙日二夜一明
早一分四次服

又 仍用前法但昨日未用半夏今微夜不寐酉刻再服素問半夏湯一帖
因肝病不得疏泄兼有痺痛議兩疏氣血法

又 桂枝尖三錢 新絳紗三錢 歸鬚三錢 川棟子三錢 小茴香炒黑防已二錢
降香末三錢 晚蠶砂三錢 牛膝二錢 桃仁泥三錢 古勇連炒一錢

吳氏醫案

胸膈

九

不用用連即連即煮三杯分三次服
種連徒傳脾胃也

又 諸症悉滅而未盡除左脈已和右脈弦大是土中有木於疏氣血之中兼
泄木安土法

又 桂枝尖三錢 半夏五錢 新絳紗三錢 川棟子三錢 白芍酒炒三錢 小茴香炒
三錢 降香末三錢 防已二錢 歸鬚三錢 茯苓皮三錢 青皮二錢 廣鬱金
二錢 杏仁泥三錢 牛膝二錢 晚蠶砂三錢 煮三杯分三次服

又 右脈弦剛土中木盛

又 姜半夏六錢 白芍酒炒六錢 新絳紗三錢 桂枝尖四錢 歸鬚三錢 川棟子三錢
茯苓塊四錢 鬱金二錢 小茴香三錢 降香末三錢 廣皮二錢 煎法如前
脈沉數頭痛時微時盛向來時發時止已非一日此乃少陽絡病虛風內
動也今日且與清膽絡法勿犯中焦
苦桔梗一錢 白芍焦一錢 甘菊花炒一錢 羚羊角八分 丹皮一錢 刺蒺

藥一錢 鈎藤鈞一錢 桑葉一錢 生甘草八分 共為粗末分三次服

又 拾下焦結法

整當歸五錢 酒洗白芍六錢 生香附三錢 新絳紗二錢 澤蘭一錢 廣鬱金二錢 桂枝尖一錢 砂仁二錢 小茴香三錢 煮成三杯日二晚一分三次服

又

八脈麗於肝腎肝病久未有不累及八脈者用通補陰絡兼走八脈法 桂枝尖一錢 歸身三錢 小茴香一錢 杭白芍六錢 枳子炒二錢 桂圓肉二錢 新絳紗一錢五分 砂仁一錢五分 煮三杯分次服

又 法全前

桂枝尖一錢 炒白芍六錢 生香附三錢 降香末三錢 澤蘭一錢 廣木香一錢 新絳紗三錢 川芎八分 桂圓肉二錢 全當歸三錢 煮三杯分三次服

尹氏二十歲誤服大辛大溫致傷心陽使下焦濁陰來攻過提致少陽無忌有升

無降上愈盛而下愈虛且與鎮固法非治病也特醫藥耳

吳氏醫案

胸膈

十

新絳紗三錢 姜半夏六錢 焦白芍三錢 旋覆花包三錢 炙龜版五錢 黑梔

子三錢 代赭石煨一兩 降香末三錢 古勇連一錢 紫石英研細煮成三大

茶杯分三次服渣再煮一杯服

又 鎮衝脈泄膽陽業已得效仍宗其法其血絡之鬱痛未能純治蓋事有緩

急也

紫石英一兩 新絳紗三錢 焦白芍五錢 代赭石一兩 旋覆花包四錢 炒梔

子三錢 炙龜版八錢 姜半夏六錢 古勇連一錢 煮成三大茶杯分三次服

渣再煮一杯服

又 蘇氏二十歲脈弦數左尺獨大癩居右脇發則攻心痛躍不止病名肝

脾先宜宣絡後補八服

新絳紗三錢 桃仁炒三錢 炒丹皮三錢 旋覆花包三錢 鬱金二錢 元胡索

二錢 降香末三錢 歸鬚一錢 兩頭尖揀淨三錢 煮三杯分三次服

十二月肝着通絡法業已見效仍宗前法但必須用化癥回生丹間服為妙

取其治病不傷正耳

新絳紗三錢 半夏三錢 生香附三錢 旋覆花包三錢 桃仁三錢 蘇子霜三

錢 降香末三錢 烏藥二錢 元胡索二錢 廣鬱金二錢 歸鬚二錢 煮三杯分

三次服二帖

初六 於前方內加兩頭尖三錢 丹皮炒黑五錢 白芍炒三錢 韭白汁三小匙

藥力不及且用進法

新絳紗三錢 生香附三錢 桃仁泥三錢 旋覆花包三錢 歸鬚一錢五分 焦

初四 白芍六錢 川棟子三錢 丹皮五錢 藏紅花一錢 煮三杯分三次服三帖

新絳紗三錢 桃仁五錢 黑梔子五錢 旋覆花包三錢 香附生三錢 蘇子霜

三錢 降香末三錢 鬱金二錢 元胡索三錢 川棟子三錢 歸鬚一錢五分 藏

吳氏醫案

胸膈

十一

煮三杯分三次服

十六 業已見效照前方日服半帖九藥減三分之一

十九日 經來五日顏色已正不得過行傷正其氣留為丸藥緩化可也茲

議寧心止汗

白芍炒六錢 直蕪地五錢 牡蠣五錢 茯苓五錢 炙龜版八錢 丹皮三錢 麥

冬不去心五味子製一錢 小麥洗淨後入三錢 洋參二錢 整豆砂大紅紗包大

棗去核二錢 水八碗煮取八分三碗分三次服三帖

戊子二月 繼脈弦緊肝鬱癥血作燒兼之痰飲喘欬不得臥不能進食當臍疝

痛為日已久勢甚危急勉與逐痰開胃兼之化癥止熱

新絳紗三錢 良姜二錢 桃仁泥三錢 旋覆花包三錢 青皮二錢 小枳實三

錢 姜半夏六錢 歸鬚二錢 蘇子霜三錢 降香末三錢 廣皮二錢 川椒炭三

錢 煮三杯分三次服一帖 此方下有案未全

庚寅六月 恒婦十九 肝鬱兼受燥金脇痛 三年之久與血相搏發時痛不可
廿九日 忍嘔吐不食行經不能按月色黑且少漸至經止不行少腹痛脹湯藥先

宣肝絡兼之和胃再以九藥緩通陰絡

新絳紗 三錢 桃仁 三錢 川椒炭 三錢 旋覆花 包三錢 歸鬚 三錢 蘇子霜 三錢
姜半夏 五錢 青皮 二錢 廣橘皮 三錢 降香末 三錢 生薑 五錢 煮三杯分

三次服 十四帖 外以化椒回生丹每日清晨服一錢開水調服

七月十 諸症俱減照原方再服七帖分十四日服每日仍服化椒回生丹一錢
廿八 痛止脹除飲食大進惟經仍未行六脈弦細右更短緊與建中合二陳湯

以復其陽

姜半夏 四錢 桂枝 四錢 生薑 三錢 廣橘皮 三錢 白芍 炒二錢 大棗 去核
二枚 炙甘草 三錢 膠飴 一兩 去渣 煮二杯分二次服每日服化椒回生丹
一錢

吳氏醫案

脇痛

十一

八月十 服前方十數帖兼服化椒回生丹十數丸一切俱佳經亦大行

肝癰

辛巳三月 謝 病起肝鬱脇痛痰中帶血病名肝着醫者不識絡病因由

與絡病治法非見血投涼即見血補陰無怪乎愈治愈窮也大凡血症之

脈左脈堅搏治在下焦血分右脈堅搏治在上焦氣分茲左手脈淨取弦

沉取洪大而數重按即芤前曾痰有氣味現在痰夾瘀滯黑色唇舌眇白

其為肝經絡瘀夾痰飲咳血無疑勢已極勉與宣絡止血兼之兩利肝

胃以逐痰定咳

新絳紗 三錢 桃仁 三錢 廣鬱金 二錢 旋覆花 包三錢 半夏 三錢 蘇子霜 一錢
降香末 一錢 歸鬚 一錢 廣皮炭 二錢 煮兩茶杯分四次服 二帖

四月初 血家左手脈堅搏治在下焦血分此症先因肝絡瘀滯以致血不歸經

日久不治由陰經損及陽氣自汗潮熱痿弱陽虛也身熱左脈洪數而芤

漢傷也如是陰陽兩傷之極而瘀滯仍然未淨通絡則虛急補虛又絡滯

兩難措手不得已日用新絳一方緩通其絡其補藥則用陰陽兩攝法聊

盡人力而已
遠參 一錢 沙蒺藜 三錢 牡蠣 六錢 茯神 五錢 枸杞子 三錢 龜版 五錢 麥冬
不心四 五味子 一錢 海參 一條 煮三杯分三次服

初四 病起於脇痛瘀血誤補致塞久嗽成勞至骨痿不能起床仍有瘀滯不化

之形且痰有臭味即係肝着成癰前日脈雖孔大而滯昨日大見瘀血後
今日則純然芤矣豈非瘀血之明徵乎若一味貪補斷難再起兼之宣絡

萬二得聖安延之論高明酌之○又新絳覆花湯與前補劑問服

新絳紗 三錢 桃仁 泥 三錢 歸橫鬚 八分 旋覆花 包二錢 丹皮炭 五錢 廣皮
炭 一錢 製半夏 一錢 五分 煮二杯分二次服

吳氏醫案

肝癰

十一

前補方

初五 痰中臭味太甚黑痰未淨是活絡之方不能除脈芤自汗甚甚補攝之方

又不可緩痰稀唇白內有支飲於補方中去牡蠣海參益味之得飲者此

症極虛極實時人但知其虛而不知其實所以日誤一日以至於此治實

碍虛治虛碍實為望成功○一通一補俱每日照前服法未改

初七 脈較前飲戢於新絳方內半夏加一錢五分成三錢餘仍舊服法亦如之

初八 今日左尺脈獨大加封固腎氣法餘有原案二方每日酌服如前

灸龜版 八錢 人參 一錢 沙蒺藜 一錢 左牡蠣 六錢 麥冬 不去心 五味子 製
一錢 真雲苓 五錢 杞子 炒黑 三錢 炙甘草 三錢 焦白芍 三錢 蓮子 五錢 煮
二杯分二次服

初十 於前方內加人參五分成一錢五分又加海參一條淡菴絲 二錢 餘悉如

前四帖

十三 仍照前每日間服一通二補方

十七 左脈空大未飲精神較前雖好猶宜收攝下焦於前補方內去龜板五味

同日 痰色猶不能清白氣味亦不淨仍須宣絡

新絳紗 三錢 姜半夏 五錢 歸橫鬚 一錢 旋覆花 包 二錢 廣鬱金 一錢 廣皮 五分

炭 一錢 煮二杯分二次服上半日服此方 四帖

廿一 脈少欲通補二方間服如前 四帖

廿四 痰濁未變脈象少欲午後微熱不寐飲食中漸而加不可太過不及

人參 一錢 左牡蠣 二錢 蓮子 五錢 雲苓 五錢 枸杞子 三錢 炒黑三海參 洗 二錢 麥冬 五分 炒棗仁 三錢 炙甘草 五錢 海參 洗 二小條 煮三杯分三次服 利

冬 五分 炒棗仁 三錢 炙甘草 五錢 海參 洗 二小條 煮三杯分三次服 利

五月初 身熱不寐已愈脈象大為斂戢面色亦佳惟濁痰未淨耳仍用二方間

吳氏醫案 肝癰 五 志

服後方以逐末盡之癰膿而宜肝絡即所以開肝絡鬱也

人參 一錢 左牡蠣 五錢 痰藜 三錢 麥冬 三錢 不去心 枸杞子 錢 炒黑三海參 洗 二錢 雲苓 五錢 炒棗仁 三錢 淡菜 大 三錢 蓮子 五錢 不去心 五味子 熟 一錢 炙甘草 三錢 煮二杯分二次服午後服此

又方新絳紗 二錢 香附 二錢 桃仁泥 二錢 旋覆花 包 二錢 歸鬚 二錢 廣鬱金 二錢 姜半夏 三錢 廣皮 八分 煮兩小茶杯午前服

初九日覆診於補方內去牡蠣五味子餘仍舊 方間服如前

十三 痰已漸清肝亦漸平精神漸旺議去搜逐而補中與外宜茯苓飲意 方

人參 一錢 雲苓 六錢 香附 三錢 於朮 五錢 生薏仁 五錢 廣皮 三錢 半夏 五錢 小枳實 一錢 炙甘草 三錢 麥冬 三錢 不去心 煮三杯分三次服 四帖

十七 覆診於前方內去麥冬加白蒺藜仁 研 一錢 以腹微不和也

廿一 大便頻而不爽氣滯而有溼也

雲苓塊 六錢 遠參 一錢 姜半夏 三錢 生苡仁 五錢 於朮 三錢 廣皮 炭 二錢 白蔻 研 杏仁 三錢 白通草 一錢 煮三杯分三次服 四帖

孫氏 二十 歲 喘咳膿血氣臭午後身熱而赤宛若陰虛但左脇痛甚膿血之中兼

有稀痰乃肝癰夾痰飲所致先治肝癰與活肝絡

新絳紗 半夏 歸鬚 旋覆花 包 廣皮 鬱金 降香

末 桃仁 蘇子 元胡索 人參 後方 青皮 煮 杯分

次服 服六七帖膿血由漸而少熱退脇痛大減於前方加人參又服四五帖後

以補脾胃逐痰飲收功

癩狂

陀 五十 病由情志而傷中年下焦精氣不固上年露罪中之萌近因情志重傷

又屆相火主令君火司天君火客氣內與本身君相火相應以致肝風騰

吳氏醫案 癩狂 五 志

張初起如狂醫者仍然攻風劫痰大用辛溫剛燥復以苦寒直下足助賊

為虐也現在左脈實大堅牢大非佳兆勉以紫雪丹定癰癢肢厥而泄有

餘之客熱再以定風珠濟不足之真陰而熄內風之震動如果病有回機

神色稍清再議後法

紫雪丹 二兩 每服二錢 二時一服 以神清為度 牙關 大生地 一兩 左牡蠣 八錢 麥冬 八錢 不去心 生白芍 一兩 真阿膠 四錢 麻仁 四錢 生鱉甲 一兩 炙甘

草 六錢 蚌水 生開沖入 雞子黃 一 枚 藥煮成去渣後和 煮成二碗 渣再煮

兩碗共五碗 四刻服半碗 盡劑再作服

二十 左脈仍然牢固較昨日諸症俱減舌苔黃黑尺膚熱陽明絡現昨謂不止

本身虛熱且有客氣加臨非虛語也湯藥仍照前方再以清宮湯化牛黃

九紫雪丹 二時一次

連翹心 三錢 連心麥冬 五錢 元參心 五錢 竹葉捲心 三錢 蓮子心 一錢 煮

一大碗 服牛黃丸紫雪丹時即以此湯化服待湯已涼 必入丹丸

廿一 痰癢肢厥雖止其狂如故會厭不利脈仍牢固數大按陽並於上則狂的係陽火有餘非極苦之藥直折其上蓋之威其勢未必得減况小腸火肺非苦不通火降痰亦因之而降其會厭庶可得利矣

洋蘆薈 三錢 犀角 八錢 元參 五錢 龍膽草 三錢 麥冬 八錢 不去心 知母 六錢 真雅連 三錢 丹皮 八錢 白芍 六錢 細生地 六錢

頭煎三碗今日服二煎兩碗明早服二帖半

廿四 脈氣大減但陽升阻絡機發不靈議兼清會厭脈絡之熱

羚羊角 三錢 麥冬 三錢 洋蘆薈 一錢 直生地 三錢 知母 三錢 龍膽草 一錢 五鈎藤鈎 二錢 連翹 一錢 冬桑葉 一錢 五分 煮成三杯 外米醋盃半每藥一分 茶沖入半酒杯今晚一帖明早一帖

廿五 於前方內加 石膏 二兩

吳氏醫案

癲狂

夫

廿六 稍進糜粥覺勇力倍常舌紅黑脈較昨日實大猶為陽火有餘

犀角 六錢 細生地 四錢 雅連 四錢 麥冬 五錢 不去心 洋蘆薈 四錢 丹皮 五錢 知母 五錢 龍膽草 三錢 米醋 每藥一杯 濃煎三杯分三次服渣再煮一杯明早服

廿七 於前方內加鐵落煎湯代水鐵落即鐵舖中打鐵時所落鐵皮片

初二 諸證與脈皆減然未能淨苦藥猶不能減也煩腫係客氣議加辛涼

犀角 五錢 洋蘆薈 三錢 雅連 三錢 麥冬 六錢 不去心 龍膽草 三錢 知母 四錢 連翹 三錢 羚羊角 三錢 丹皮 五錢 銀花 三錢 鈎藤鈎 三錢 鐵落 煎三碗分三次服

初三 於前方內加 生地 八錢

初四 二月 脈弦數而勁初因肝鬱久升無降以致陽并於上則狂心體之虛以用勝而更虛心用之強因體虛而更強因日舉發氣伏最深已難

調治今歲又係風水司天有木火相攝之象勉與補心體瀉心用兩法

洋參 三錢 天生地 一兩 丹參 三錢 白芍 六錢 生龜版 一兩 黃柏 三錢 麥冬 六錢 蓮子心 一錢 山連 三錢 丹皮 四錢 煮三碗分三次服

外用紫雪丹六錢每次一錢與此方間服

初六 操持太過致傷心氣之狂疾前用補心體瀉心用攝心神已見大效脈勢亦減經謂脈小則病退是也

洋參 三錢 女貞子 四錢 丹皮 五錢 龜版 二兩 龍膽草 一錢 山連 三錢 白芍 六錢 黃柏炭 一錢 蓮子 五錢 麥冬 六錢 不去心 鐵落水煎煎三杯分三次服外以米醋一黃酒盃沖

廿七 某 左脈弦勁經謂單弦飲滯五日前因觀劇後做惡夢遂病狂肢厥經謂陽並於上則狂兩陰交盡則厥靈樞有滯邪發夢一卷大意以五臟偏勝非因夢而後病也前人有諸般怪症皆屬於痰之論雖不盡然然此症

吳氏醫案

癲狂

吳氏醫案

癲狂

七

現在咳嗽塊痰左脈單弦應作痰治

石菖蒲 二錢 半夏 五錢 茯神塊 五錢 天竺黃 二錢 丹皮 三錢 白附子 一錢 煮三杯分三次服先服陳李濟牛黃清心丸一二九溫開水調服

廿八 狂而厥左脈單弦咳嗽塊痰昨議應作痰治今日左脈漸有和平之象證現於外者亦效但形貌怯弱色白而嫩脈亦不壯此症之痰究因驚起凡神氣壯者不驚况驚後惡夢夢後大汗其為陽虛神怯顯然此症將來必歸大補而後收功現在不得以攻痰見效而忘其虛怯與化痰之中微加益氣

半夏 五錢 茯神塊 五錢 秋小麥 八錢 麥冬 五錢 不去心 石菖蒲 一錢 大棗 二枚 煮三杯分三次服

廿九 體虛有痰之症不能純治一邊今日脈微滑數於昨日方法中少加逐痰

茯神塊 五錢 半夏 五錢 陳膽星 一錢 白附子 一錢 麥冬 三錢 不去心 秋小麥 一錢

合石菖蒲一錢五分 煮三杯分三次服 先服牛黃清心丸半丸

初一日 昨日稍加逐痰痰出如許大勢安靜但多怒耳右脈仍滑痰未淨也
決神塊 三錢 半夏 六錢 石菖蒲 一錢 代赭石 煨飛 五錢 白附子 二錢 秋小麥 八錢 旋覆花 包三錢 炙甘草 一錢 煮三杯分三次服
其後痰去以大補心脾而安

十月初二日 鮑三十大狂七年先因功名不遂而病本京先醫市醫備醫已歷不少
既而徽州醫杭州醫蘇州醫湖北醫所閱之醫不下數十百矣大概補虛者多攻實者少間有已時不旋踵而即發余初診時見其蓬首垢面下體俱赤衣不遮身隨着隨毀門牌粉碎隨隨拆鏡靠手足外有鐵索錮鎖大石磨盤上言語之亂形體之羸更不待言細詢其情每日非見婦人不可婦人不願見彼竟開不可言叫號聲嘶哀鳴令人不忍聞只得令伊姬妾強侍之然後少安次日仍然無一日之空診其脈六部弦長而勁余曰
吳氏醫案 癲狂 六

此實症非虛症也於是用極苦以瀉心膽一經之火瀉心者必瀉小腸病在臟治其腑也膽無出路借小腸以為出路亦必瀉小腸也
龍膽草 二錢 天冬 三錢 細生地 三錢 胡黃連 三錢 麥冬 三錢 粉丹皮 三錢 煮三杯分三次服 服二帖大效妄語少而舉動安靜
初三日 見其效也以爲久病體虛恐過剛則折用病減者減其製例於原方減苦藥加補陰之甘潤
初五日 病家來告云昨服改方二帖病勢大重較前之叫哮妄語加數倍之多無一刻之靜此症想不能治諒其必死先生可不必再診矣余曰不然初用重劑而大效繼用輕劑加補陰而大重吾知進退矣復診其脈弦長而數於是重用苦藥
龍膽草 六錢 天冬 五錢 真雅連 五錢 洋蘆薈 六錢 麥冬 三錢 不去心烏梅肉 五錢 胡黃連 五錢 秋石 一錢 煮三碗分次服 服此方一氣六帖一日較一

日大效至十一日大爲明白於是將其得病之由因伊念頭之差因未識文章至高之境即能至高尙有命在非人力所能強爲何怒之有人生以體親心爲孝痛乎責之俯首無辭以後漸減苦藥加補陰半月以後去刑具着衣冠同跪拜神識與好人無異服專翁大生膏一料而大壯下科竟中矣

章氏 四十先是二月間病神識恍惚誤服肉桂熟地等補藥因而大狂余於三月間用極苦以折其上盛之威問服芳香開心包醫治三十日而愈但脈仍洪數余囑其戒酒肉服專翁大生膏補陰配陽彼不唯不服尤藥至午節大開酒肉於是狂不可當是臭遠聞至鄰不時脫淨衣褲上大街一二男子不能搏之使回五月十四日又延余診視余再用前法隨效二三日仍然如故蓋少陽相火旺極挾制君主行令藥雖暫開其閉暫折其威相火一動而仍然如故延至六月十六日午刻復自撕碎其褲人不及防而
吳氏醫案 癲狂 九

出大門矣余坐視不忍復自慚無術以已其病因謂其胞弟曰此症非打之使極痛令其自着褲也不可蓋羞惡之心亦統於仁能仁則不忍忍則不仁不仁之至羞惡全喪打之極痛則不能忍不忍而仁心復而羞惡之心亦復矣此先聖王撰作教刑之義也伊弟見其乃姊如是景况羞而成怒以保父母體面爲義於是以小竹板責其腿令着褲彼知痛後而自着衣着後稍明次日十七日立秋余與大劑苦藥一帖而全愈蓋打之功與天時秋金之氣藥之力相須而成功也後以專翁大生膏而收全功
丁亥二月 富 二十 陽并於上則狂先以極苦折其上盛之威左脈洪大膽無出路瀉膽者必瀉小腸心主言多言者必瀉心瀉心者亦必瀉小腸小腸火腑非苦不通
龍膽草 四錢 天冬 三錢 生牡蠣 打碎 五錢 洋蘆薈 三錢 麥冬 四錢 不去心胡黃連 三錢 細生地 五錢 丹皮 三錢 鐵落水煎煮三杯分三次服 二帖

十日 狂病與苦瀉小腸已效仍宗前法少加收攝陰氣餘有原案以前人誤下大便太稀故也

龍膽草 三錢 天冬 三錢 生薑 甲 打五錢 洋蘆薈 一錢 麥冬 不去心 三錢 生牡蠣 五錢 胡黃連 三錢 丹皮 五錢 五味子 一錢 次生地 五錢 鐵落水煮成去渣 加陳米醋半酒杯分三次服

廿一 狂病與育陰兼瀉小腸病退其半脈之洪大者亦漸小經謂脈小則病退宗其法而減其製

龍膽草 二錢 天冬 二錢 牡蠣 五錢 洋蘆薈 一錢 麥冬 不去心 三錢 白芍 三錢 胡黃連 二錢 丹皮 二錢 秋石 一錢 細生地 五錢 鐵落水煮三杯分三次服 四帖

廿六 狂病左關洪大有力得苦藥反大於前議進法餘有原案 龍膽草 五錢 知母 四錢 天門冬 四錢 洋蘆薈 五錢 丹皮 二錢 細生地 二錢 吳氏醫案 癲狂 辛

胡黃連 五錢 秋石 一錢 鐵落水煎成三杯加陳米醋一酒杯分三次服其碧雪丹仍服

丁亥二月 彥廿一 狂病有年六脈洪大有力左關更甚與極苦折其上盛之威 十八日 龍膽草 三錢 胡黃連 三錢 麥冬 不去心 洋蘆薈 三錢 細生地 三錢 丹皮 三錢 鐵 煮二杯分二次服 碧雪丹 二錢 溫開水沖

虛勞 伊氏 二十 歲 勞傷急怒吐血二者皆治肝絡醫者不識見血投涼以致胃口為苦寒傷殘脾陽陽亦為苦寒滑潤伐其生發健運之常此腹痛甚泄不食脈沉弦細之所由來也按三焦俱損先建中焦補土可以生金腎關之虛亦可仰賴於胃關矣 茯苓塊 三錢 人參 一錢 蓮子 去心 五錢 扁豆 一錢 芡實 三錢 水糖 三錢 廣皮 炭 一錢 煮一大碗緩緩服 多服為宜

甲子四月 陳氏 三十 歲 脈弦細失音謂之金碎不鳴吞熱不食食則嘔亦係三焦俱損為難治

茯苓塊 三錢 洋參 二錢 冬桑葉 二錢 甜杏仁 三錢 沙參 一錢 白扁豆 五錢 柏子霜 三錢 冰糖 三錢 胡桃肉 三錢

煮三杯分三次服 另含鮑魚片洋參片 甲子四月 陳氏 三十 歲 左脈搏大下焦肝腎吐血上焦咳嗽中焦不食謂之三焦俱損例在不治勉議三焦俱損先建中焦法

茯苓塊 二錢 沙參 三錢 蓮子 三錢 焦白芍 一錢 桂枝 二錢 芡實 三錢 白扁豆 三錢 桑葉 二錢 冰糖 三錢 胡桃肉 三錢

煮三杯分三次服 服此方四帖後能食 乙酉四月 施 二十 歲 形寒而六脈弦細時而身熱先天不足與諸虛不足之小建中法 吳氏醫案 虛勞 廿

白芍 六錢 炙甘草 三錢 生薑 四錢 桂枝 四錢 膠飴 一兩 去渣 後化入 大棗 去核 四枚 煮三杯分三次服

八月初 前方服過六十劑諸皆見效陽雖轉而虛未復於前方內減姜桂之半 加柔藥兼與護陰 大生地 五錢 麥冬 四錢 五味子 二錢

乙酉五月 姚 三十六 歲 六脈弦細而緊勞傷吐血諸虛不足小建中湯主之 初二日 白芍 六錢 炙甘草 三錢 生薑 五錢 桂枝 四錢 膠飴 化入 一兩 去渣 後化入 大棗 三枚 茯苓 四錢 煮三杯分三次服 共服二十一帖愈矣

乙酉五月 李 廿四 歲 每日五更胃痛欲食得食少安胃痛則背冷如冰六脈弦細陽微是太陽之陽虛累及陽明之陽虛陽明之陽虛現症則太陽之陽更覺其虛此等陽虛只宜通補不宜守補 桂枝 八錢 廣皮 四錢 川椒炭 五錢 半夏 六錢 乾姜 四錢 煮三杯分三次服

十四 背寒減腹痛下移減桂枝加茱萸良姜

乙酉五月 傳歲 六脈弦細而紫吐血遺精陽氣不攝胃口不開法當與建中

復其陽奈酒客中焦溼熱乘聚不可與甘改用辛淡微甘以和胃胃旺得

食而後諸虛可復也 半夏 五錢 雲苓塊 五錢 麥冬 不去心 白芍 五錢 生薏仁 五錢 神麩 炒五錢

桂枝 三錢 廣皮炭 三錢 姜汁 每杯點 三小匙 煮三杯分三次服

廿二 業已見效胃口得開進食脈尚弦緊多服為宜

乙酉五月 沈十五 幼孩脈雙弦而細緊癭結核胃腸不開色白食少且嘔形

體羸瘦與通補胃腸

雲苓塊 四錢 半夏 四錢 生薑 三錢 白扁豆 四錢 廣皮 炒二錢 煮三杯分三

次服

六月十 前藥已服十二帖嘔止胃開腹微脹脈有回陽之氣於前方加厚樸杉

吳氏醫案

虛勞

三

皮消脹脹消後接服後方化結於前方內去生薑廣皮加香附土貝母忍

冬藤青橘葉海藻以化癭癭結核

乙酉五月 錢廿七 六脈弦緊胃痛久病在絡當與和絡

降香末 三錢 桂枝尖 三錢 烏藥 二錢 小茴香 炒炭二 半夏 三錢 歸麩 二錢

公丁香 八分 良姜 一錢 生薑 三片 煮三杯分三次服 此方服七帖後痛

止以二十帖為末神麩丸服過一料

八月十 六脈弦細而紫臟氣之沉寒可知食難用飽稍飽則腹脹食何物則嘔

何氣間有胃痛時皆胸膈之衰也陽虛損症與通補臟腑之陽法大抵勞

病勞陽者十之八九勞陰者十之二三不然經何云勞者溫之世人愈以

六味八味治虛損人命其何堪哉 永戒生冷 暫戒猪肉介屬

雲苓塊 五錢 半夏 六錢 公丁香 二錢 白薏仁 三錢 良姜 二錢 小枳實 二錢

益智仁 三錢 生薑 五錢 廣皮炭 四錢 川椒炭 三錢 煮三杯分三次服

經謂必先歲氣毋伐天和今年陽明燥金太乙天符故用藥如左他年溫

熱宜減

廿四 前方已服五帖脈之紫無胃氣者已和痛楚已止頗能加餐神氣亦旺照

前方減川椒一錢公丁香一錢再服七帖可定九方

三十 前因脈中之陽氣已回頗有活潑之機恐剛燥太過減去川椒丁香各一

錢今日診脈雖不似初診之脈紫亦不似廿四日脈和肢涼陽微不及四

末之故與前方內加桂枝 五錢 再服七帖

九方 諸症向安惟六脈尚弦與通補脾胃兩陽

雲苓塊 八兩 人參 二兩 益智仁 四兩 生薏仁 八兩 半夏 八兩 小枳實 二兩

於白朮 四兩 廣皮 四兩 白薏仁 一兩 其為細末神麩丸兩煎湯法丸如梧

子大每服二三錢日再服日三服自行斟酌

備用方 陽虛之體質如冬日畏寒四肢冷有陽微不及四末之象服此方五

吳氏醫案

虛勞

三

七帖以充陽氣

桂枝 四錢 甘草炙 三錢 生薑 五錢 白芍 六錢 膠飴 去渣化 入一兩大匙 煮

二杯分二次服 此方亦可加綿黃耆人參雲苓白朮廣皮

乙酉八月 譚四十 病後六脈弦細而紫絕少陽和之氣形體羸瘦幸喜胃旺可

以守補與形不足者補之以味法

白芍 六錢 雲苓塊 四錢 甘草炙 三錢 桂枝 四錢 炙黃耆 四錢 生薑 三片 人

參 二錢 桂圓肉 三錢 大棗 去核 二 去渣後 膠飴 一兩 煮三杯分三次服

陳十九 脈虛數頭口眩胃尊有微熱飲食少減面似桃花身如柳葉與二甲復

脈法

熟地 六錢 生鱉甲 八錢 白芍 生六錢 麥冬 不去心 生牡蠣 五錢 麻仁 二錢

呵膠 二錢 炙甘草 六錢 煮三杯分三次服 服廿帖紅退量止食進後用

專翕大生腎四觔收功

李四十 面赤舌絳脈虛弦而數聞婦人聲則遺令其移居至大廟深處與三甲

復脈法

乾地黄 麥冬 生鱉甲 生白芍 生龜版 炙甘草
生牡蠣 阿膠 麻仁 煮 杯分 次服 服四十帖由漸而
效後以天根月窟膏一料計二十收功

羅四十 精關開泄太早兼之讀書謀慮遺滑多年耳鳴目至暮昏頭暈頭中覺
有物旋轉時忽響精神不振飲食短少與專愈大生愈每日一兩服至二
年始愈

常二十 久遺派弦細與桂枝龍骨牡蠣湯服六十帖而愈

吐血

王 脈弦如刃吐出血後左脇脹痛喉中如有物阻治在肝絡使血不瘀則吐
血可止後當與補陰

吳氏醫案

虛勞 吐血

甚

新絳紗 三錢 鬱金 一錢 降香末 三錢 旋覆花 包三錢 桃仁 炒三元 胡索 一錢

歸橫鬚 二錢 丹皮 三錢 蘇子霜 二錢 煮三杯分三次服

又 如刃之脈已見平減但虛細如故耳

降香末 三錢 丹皮 炒五錢 細生地 三錢 新絳紗 三錢 歸鬚 一錢 焦白芍 三錢

旋覆花 包三錢 香附 製一錢 廣鬱金 二錢 煮三杯分三次服

又 肝為剛臟勁氣初平未便服補取緩靈之能入肝絡者宜之

遼沙參 三錢 麥冬 不去心 白蒺藜 三錢 細生地 三錢 丹皮 炒五錢 廣鬱金 二錢

焦白芍 六錢 歸身 五分 生甘草 一錢 整石斛 三錢 桑葉 五分 煮三杯分

三次服

又 昨日仍瘀血吐出今尚未可呆補

細生地 三錢 沙參 三錢 焦白芍 三錢 羚羊角 二錢 麥冬 不去心 沙蒺藜 二錢
整石斛 五錢 當歸 一錢 茶菊 二錢 炒丹皮 五錢 桑葉 五分 生甘草 一錢

錢 煮三杯分三次服 外另服新絳紗三錢

普女 廿二 大凡吐血左脈堅搏治在下焦血分右脈堅搏治在上焦氣分又有
心肝血大腸血小腸血胃血衝脈血各種不同豈一概見血投涼所可
治哉無怪室女童男勞瘵乾血之多皆世無明眼醫士識病故也此症左
脈沉大有力類緊不其較體厚色白少腹痛小便短赤咳吐痰紫纒見鮮
色喉中鹹此衝脈受寒邪致經不得行倒逆而吐耳大忌柔潤寒涼諸
溫鍾衝脈行至陰之際濁使經得行而血症愈矣苦辛通法

川棟子 三錢 降香 三錢 兩頭尖 二錢 小茴香 二錢 桃仁 三錢 琥珀屑 沖三
紫石英 三錢 歸鬚 二錢 韭白汁 二匙 煮三杯分三次服

壬戌八月 羅三十 右脈浮洪咳痰吐血唇絳治上焦氣分

廿八日 茯苓 五錢 沙參 三錢 生扁豆 五錢 生薏仁 五錢 連翹 八分 炙桑葉 一錢

杏仁泥 三錢 煮三杯分三次服

吳氏醫案 吐血 甚

吳氏醫案

吐血

甚

九月初 血後咳不止進食不香右脈不浮而仍洪兼與養陽明之陰

沙參 三錢 生薏仁 三錢 扁豆 三錢 麥冬 三錢 茯苓塊 三錢 百合 一錢 玉竹

二錢 甜杏仁 一錢 桑葉 五分 煮三杯分三次服

初五 諸證俱退惟進食不旺右脈大垂尺澤先與甘寒養胃陰

大麥冬 六錢 沙參 三錢 生扁豆 三錢 細生地 三錢 五竹 炒香 秋梨汁 沖

一林 甜杏仁 三錢 桑葉 一錢 煮三杯分三次服

初九 甘潤養陰

大生地 三錢 沙參 三錢 火麻仁 二錢 甜杏仁 去皮尖 麥冬 不去心 柏子霜

二錢 生白芍 三錢 桑葉 一錢 生扁豆 三錢 炒玉竹 三錢 冰糖 二錢 煮三杯

分三次服

癸亥七月 伊二十六 脈弦數兩關獨浮左更甚右脇痛胸中痞塞肝鬱吐血先
理肝絡

新絳紗三錢 降香一錢 炒丹皮三錢 旋覆花錢包二錢 歸地一錢 蘇子霜三錢 廣鬱金一錢 煮三杯分三次服

三十日 血家脇痛與和肝絡脇痛已愈但咳嗽黃痰氣短懶食脈弦細數譙甘能

益氣補土生金清涼降熱而護胃陰合能食

沙參三錢 細生地三錢 桑葉二錢 麥冬三錢 甜杏仁三錢 藕汁沖一酒

玉竹二錢 香薷汁沖一酒 煮三杯分三次服 四帖

四月初 血家脇痛不食與和肝絡胃陰兩法俱效仍咳嗽兼胸中隱痛動則

喘氣虛金匱謂諸虛不足與小建中復其陽和營衛合能食從食中復其

虛診脈弦為減正合其論但脈數而痰濃陰亦大虧議復脈法兩補陰陽

方中亦包建中法在內仍然甘能益氣而補土生金也但肆中阿膠不佳

又兼滑膩且大便滯以牡蠣易之

沙參三錢 大生地三錢 麻仁一錢 麥冬三錢 不去心 左牡蠣三錢 大棗去核二

吳氏醫案 吐血 廿

白芍炒二錢 炙甘草三錢 姜汁沖二錢 桂枝一錢 煮三杯分三次服

初九日 血後咳嗽氣虛用復脈法甘緩理中補土生金之義飲食漸加是其大效

如果胃土旺無不生金之理如果飲食加無不可復之虛勞因前法而進

之

洋參炒二錢 大生地六錢 麻仁二錢 桂枝三錢 杭白芍六錢 芡實三錢 麥冬

不去心 炙甘草五錢 蓮子去心留殼五錢 生薑汁二小 大棗去核二錢

甲三錢 煮三碗分三次服

九月初 現因相火行令血復來右脈大暫清肺胃

麥冬六錢 北沙參三錢 白花百合二錢 石斛一兩 甜杏仁去皮尖研三錢 秋梨

五錢 桑葉三錢 生扁豆三錢 煮三杯分二次服

史四歲 酒客脈洪面赤吐血不止仍然飲食如常議金匱大黃黃連瀉心湯

急瀉三陽實火而血自止

又 前法已效不可再進議甘涼法服三日再議

又 前以瀉心法大效未敢再進血復來議再用瀉心法減其製

又 昨用瀉心法減其製雖見效而血未盡今仍照原方服二日大效以後永

不再發

癸亥九月 唐三十 凡咳血者右脈堅搏治在上焦氣分

白扁豆皮三錢 桃仁二錢 白茅根三錢 炒黑梔皮一錢 生薏仁三錢 桑葉

五分 側柏葉炭三錢 煮三杯分三次服 二帖而愈

乙丑三月 陳三十 吐血左手脈堅搏治在下焦血分

沙參三錢 細生地五錢 丹皮五錢 白芍四錢 黃芩炭一錢 麻仁三錢 阿膠

二錢 天門冬三錢 三七一錢 炒黑麥門冬四錢 甘草一錢 水八杯煮

取三杯分三次服

廿三日 左脈沉弦細數鋒銳如刃吐血左手脈堅搏治在下焦血分

吳氏醫案 吐血 廿

沙參三錢 細生地五錢 阿膠二錢 麥冬三錢 不去心 茯苓塊三錢 天冬三錢 元

參三錢 霍石解五錢 麻仁三錢 白芍四錢 黃芩炭一錢 甘草一錢 丹皮五

錢 煮四杯分四次服

廿六日 脈數減弦剛甚

洋參三錢 直大生地五錢 阿膠三錢 麥冬四錢 茯苓塊三錢 麻仁二錢

白芍炒四錢 生牡蠣三錢 炙甘草一錢 丹皮五錢 煮四杯分四次服

丙寅二月 趙 勞陽吐血脈雙弦金匱謂大則為虛弦則為減虛弦相搏其名

曰革男子失精亡血諸虛不足小建中湯主之

白芍六錢 炙甘草三錢 生薑五片 桂枝四錢 膠飴去渣後化入二兩 大

棗去核二枚

水五碗煮取兩碗渣再煮一碗分三次服輕者日一帖重則日再服

丙寅二月 章 右脈空大左脈弦細血後咳吐濁痰腥臭真液不守陰火上沖

克金非純補純清之症然而備矣

沙參三錢 甜杏仁一錢 去皮尖胡麻豆生三錢 麥冬三錢 不去心 枇杷葉五分
桑葉三錢 天冬三錢 五味子一錢 白花百合一錢 阿膠三錢 霍石斛五分
煎湯代水 濃煎兩杯分二次服

廿八 脈少欬痰咳亦減切戒用心
沙參三錢 生白扁豆三錢 阿膠三錢 洋參一錢 製五味子二錢 牡蠣生三錢
麥冬三錢 不去心 白花百合二錢 桑葉一錢 天冬三錢

三月初 脈大欬痰古所謂脈小則病退是也頗有起色若得舌苔化去則更妙矣
生薏仁五錢 沙參三錢 天冬三錢 生白扁豆三錢 洋參一錢 桑葉三錢 製
五味子三錢 麥冬三錢 不去心 梨汁沖一小杯 鮮蘆根汁沖五杯 煮三杯分三

吳氏醫案

次服 四帖

乙酉四月 胡二十 榮陽吐血汗多足麻六脈弦細不數小建中湯主之
白芍六錢 甘草炙三錢 生薑五錢 桂枝四錢 膠飴一兩 大棗三枚 煮三杯
去渣後將膠飴化入 上火二三分三次服

五月初 汗減足麻愈食少加原方再服
廿五日 前藥已服十四帖諸症皆愈惟咳嗽未止於前原方 加雲苓 半夏
乙酉正月 沈四歲 六脈弦數勞傷吐血建中湯主之
白芍炒六錢 丹皮三錢 人參三錢 桂枝三錢 甘草炙三錢 姜汁沖三錢 麥冬三錢 不去心
膠飴一兩 去渣後化入 煮三杯分三次服

十四 肝鬱脇痛病名肝着治在肝經之絡經藥弗愈也
新絳紗三錢 半夏三錢 蘇子霜三錢 旋覆花包三錢 青皮二錢 歸橫類一錢
降香末三錢 吳萸泡淡廣皮炭二錢 廣鬱金一錢 煮三杯分三次服

十五 六脈弦勁前用建中現在右脈已和左手仍勁胸中咳甚則痛間有一二
口紫色之血按肝脈絡胸是絡中尚有瘀滯且與建中宜絡
新絳紗三錢 降香三錢 丹皮炭三錢 旋覆花包三錢 鬱金一錢 蘇子霜二錢
桃仁泥三錢 歸橫類一錢 廣皮炭一錢 姜半夏五錢 煮三杯分三次服

廿一 六脈弦數以春氣在頭之故偶受微風右寸獨浮大而衄血暫與清清道
之風熱
白茅根五錢 甜杏仁三錢 紫菊花三錢 側柏炭三錢 桑葉三錢 鮮蘆根三錢
黑山梔一錢 煮三小杯分三次服

吳七十 周身痠不可當脈洪吐狂血與大黃黃連瀉心湯以後永不發
史五十 酒客大吐狂血成益六脈洪數面赤三陽實火為病與
大黃六錢 黃連五錢 黃芩五錢

瀉心湯一帖而止二帖脈平後七日又發脈如故又一帖
吳氏醫案 吐血 芫

吳氏醫案

吐血

吳二十 每日飽食就牀脾陽致困因失其統血之職此為傷食吐血脈弦與
中黃土每日一勛分二次煎服將盡半月而愈戒其夜食永遠不發
乙酉十一月 岳二十 勞傷吐血兩脇俱痛六脈弦緊誤補難愈凡勞傷肝鬱必有
瘀血故症現脇痛一以活絡為主俟瘀血去淨而後可以補虛
新絳紗二錢 桃仁三錢 蘇子霜二錢 旋覆花包三錢 歸橫類三錢 丹皮炭五錢
廣鬱金二錢 降香三錢 煮三杯分三次服 四帖

廿二 覆診脈之弦緊雖減而未和緩脇痛雖大減而未盡除與原方去桃仁加
細生地五錢
初五日 六脈弦細紫金隱謂脈變弦者寒也弦則為減男子失精亡血小建中
湯主之勞傷吐血愈後以建中復陽生陰
白芍六錢 麥冬三錢 大棗三枚 桂枝三錢 丹皮三錢 生薑三片 炙甘草
三錢 膠飴一兩 去渣後化入 煮三杯分三次服

湯主之勞傷吐血愈後以建中復陽生陰
白芍六錢 麥冬三錢 大棗三枚 桂枝三錢 丹皮三錢 生薑三片 炙甘草
三錢 膠飴一兩 去渣後化入 煮三杯分三次服

十八諸症全愈胃口大開虛未全復於原方加麥冬二錢使分佈胃中津液於

十二經臟之虛則從飲食中復矣

戊子七月 汝三十 本有肝鬱脇痛症又受秋涼燥金之氣不唯腹痛大發且有

表症午後身熱雖見血乃燥氣非溼溫也治在肝經與絡也

桂枝尖三錢 柴胡三錢 淡吳萸一錢 姜半夏四錢 歸鬚一錢 蘇子霜一錢

降香末二錢 廣皮三錢 川椒炭三錢 煮三杯分三次服 柴胡退去 服此方一

二日燥氣已退去柴胡再服二三帖

日 肝鬱脇痛乃肝絡中有瘀血方痛古人僉用新絳旋覆花湯橫走絡者也

後人多用逍遙散監走經者也故多不見效况久病必治絡乎

新絳紗三錢 桃仁二錢 廣鬱金一錢 旋覆花包三錢 歸鬚一錢 蘇子霜一錢

姜半夏三錢 香附三錢 廣皮炭一錢 降香末二錢 煮三杯分三次服

日 有汗鬱者必克脾脾受克者必停飲飲停射肺者必咳嗽清胃者必不眠

吳氏醫案 吐血 三

故靈樞謂胃不和則卧不安飲以半夏湯覆杯則寐法

姜半夏二兩 秫米二合

急流水八杯煮三杯分三次服切戒生冷猪肉

巳丑二月 王四十一 咳嗽胸滿短氣自汗夜甚大便燥六脈俱弦而微緊雖嗽甚

見血的係痰飲而非虛勞法宜溫通陽氣和胃逐飲忌生冷猪肉介屬鹹

味 雲苓塊六錢 桂枝四錢 焦白芍三錢 姜半夏六錢 杏仁五錢 五味子四錢

小枳實五錢 廣皮五錢 乾姜炭四錢 麻黃根去蘆甘草炙三錢

甘瀾水六大茶杯煮成兩茶杯渣再以六杯水煮兩杯日三夜一分四次

服○服此方四帖吐血喘滿全愈咳嗽亦愈六七

方論按痰飲十數日大便燥結乃肺氣不降肺與大腸相表裏肺運則大腸

亦運開肺痺即所以開大腸之痹也故此方重用杏仁又由於津液屯聚胃

中不得下行以致大腸乾燥故用枳實橘皮直通幽門俾津液下行又辛能

潤也再九竅不利皆屬胃病故重用半夏合橘皮和胃病由痰飲逐痰即所

以和胃也故其應如響今人僉用大黃苦寒堅陰甚至用元參麥冬生地作

增水行舟之計豈非背道而馳哉

初十 照前方再服一帖

日十一 少陽脈絡頭痛與清膽絡之熱不犯中下二焦今日頭痛全止六脈沈弦

不數咳嗽喘滿短氣自汗不食面黃肢微腫純然痰飲見症斷無補陰助

邪之理議病痰飲者當以溫藥和之

桂枝木三錢 杏仁三錢 焦白芍二錢 麻黃根去蘆乾薑三錢 五味子一錢

薑半夏五錢 廣皮三錢 炙甘草三錢 小枳實三錢 煮三杯分三次服

壬辰八月 王三十六 脈弦細而沈吐血久而不止久病當於絡中求之且先吐

紅血後吐黑紫絡中顯有瘀滯金匱謂凡病至其年月日時復發者當下

吳氏醫案 吐血衄血 三

之此下字須活看謂拔去病根則不再發矣金匱又謂脈弦者寒也此

證斷不可用陰柔呆賦之品致永無愈期議先與溫通絡脈拔去病根

以建中收功

新絳紗三錢 桂枝三錢 姜半夏三錢 旋覆花包三錢 歸鬚一錢 橘皮炭二錢

苓塊三錢 乾姜炒半黑一錢 煮三杯分三次服

巳丑正月 王四十一 衄血右脈洪大誤用大劑當歸以致大衄不止無論辛走

氣之藥不可用即涼血和血而不走清道者亦不見效議清清道之熱

側柏炭五錢 連翹連心銀花炭三錢 黑山樞四錢 桑葉三錢 白茅根兩錢

香花二錢 煮三杯分三次服

日廿一 衄雖止而氣血兩虛脈雙弦而細法當補陽以衄血初罷之候且與復脈

法

大生地 五錢 麥冬 不去心 炒白芍 三錢 生鱉甲 五錢 阿膠 二錢 炙甘草 四錢 生牡蠣 五錢 麻仁 二錢 煮三杯分三次服

廿五日 前日衄血初止六脈俱弦而細氣血暴虛也似當補陽而未敢驟補與三甲復脈湯四帖今日六脈俱大而滑氣血暴復也仍與翁攝真陰與三甲

復脈湯法
大生地 六錢 白芍 四錢 生牡蠣 五錢 生鱉甲 五錢 麥冬 不去心 四錢 生阿膠 三錢 生龜版 五錢 麻仁 三錢 炙甘草 五錢 煮三杯分三次服

便血
癸亥十二月初二日 毛 糞後便血責之小腸寒溼不與糞前為大腸熱溼同科舉世業醫者不知有此無怪乎數年不愈也用古法黃土湯

竈中黃土 二兩 生地 三錢 黃芩 炒 三錢 製蒼朮 三錢 阿膠 三錢 甘草 炙 三錢 附子 三錢 白芍 三錢 酒炒 全歸 五錢 水八碗煮成三碗分三次服

吳氏醫案 便血 五

初七日 小兒脈當數而反緩糞後便血前用黃土湯業已見效仍照前方加剛藥即於前方內去白芍全歸加

附子 一錢 蒼朮 二錢

戊寅七月初一日 孫三十八歲 其人素有便紅之症自十八起至今不絕現在面色萎黃失血太多急宜用古法有病則病受之雖暑月無碍也

方法分兩同前 服一帖即止次日停服後半月復發再服一帖全愈

福廿九 初因恣飲水振黃酒冰浸水果又受外風致成風水頭面與身腫大難狀腫起自頭先與越脾湯發其汗頭面腫消繼與利小便下截腫消脹消後與調理脾胃自上年十月間服藥起至次年三月方止共計湯藥一百四十三帖其病始安囑其戒酒肉生冷不意夏熱甚時仍恣吃冰浸水果自八月後糞後大下狂血每次有升許之多余用黃土湯去柔藥加剛藥每劑黃土用一筋附子用六錢或一兩他藥稱是服至九日餘帖始大愈

乙酉九月十七日 胡 本係酒客濕中生熱久而發黃顏色暗滯六脈俱弦其來也漸此非陽黃況糞後見血又謂小腸寒濕乎

竈中黃土 八兩 猪苓 三錢 附子 熟 三錢 雲茯苓皮 三錢 澤瀉 三錢 茵陳 五錢 炒蒼朮 三錢 黃柏 三錢 煮三杯分三次服 五帖全愈

乙酉四月 陳 糞後便血寒濕為病誤補誤涼胃口傷殘氣從溺管而出若女子陰吹之屬瘕氣皆然左脇肝部卧不着席得油膩則寒戰叢雜無倫幾於無處下手議治病必求其本仍從寒濕論治合能安食再商與黃芩湯中去柔藥加剛藥

竈中黃土 四兩 雲苓 五錢 川椒炭 三錢 茅山蒼朮 三錢 附子 熟 三錢 香附 三錢 生益智仁 三錢 廣皮 三錢 生薑 三錢 煮三杯分三次服

五月初 照原方再服二帖

初三日 心悸短氣加小枳實 四錢 乾姜 二錢 四帖

吳氏醫案 便血 五

十一 於原方去川椒炭 五帖

諸症皆效大勢未退左脈緊甚加熟附子 一錢 乾姜 一錢 降香末 三錢 三帖

廿七 諸症向安惟糞後便血又發與黃土湯法糞後便血乃小腸寒濕不與糞前為大腸濕熱同科

竈中黃土 八兩 附子 熟 四錢 黃芩 炭 四錢 雲茯苓塊 五錢 蒼朮 炒 四錢 廣皮 炭 三錢 生益智仁 二錢 煮三杯分三次服 以血不來為度

七月十日 面色青黃滯暗六脈弦細無陽胃陽不振暫與利胃其黃土湯後便紅發時再服

姜半夏 六錢 益智仁 三錢 川椒炭 一錢 雲苓塊 五錢 白蔻仁 一錢 廣皮 三錢 生薏仁 五錢 煮三杯分三次服

十七 於原方加桂枝 五錢

十一月肝鬱痰飲寒濕為病前與黃土湯治後便血之寒濕茲便紅已止

十五口 繼與通補胃腸現在飲食大進諸症漸安惟六脈弦細右手有胃氣左手

弦緊痰多畏寒脇下仍有伏飲與通補胃腸兼逐痰飲
姜半夏 八錢 桂枝 六錢 川椒炭 三錢 雲苓塊 五錢 白芍 三錢 乾姜 三錢 旋

覆花包三 香附 四錢 廣皮 五錢 小枳實 三錢 煮二杯分三次服
初十日 脈弦緊痰多畏寒衝氣上動與桂枝茯苓甘草湯合桂苓加桂湯法先

伐衝氣
桂枝 一兩 雲苓塊 連皮 全歸 三錢 獨桂 去粗皮 五錢 炙甘草 五錢 川芎 一錢 煮

三杯分三次服 服一帖衝氣已止當服藥後吐頑痰一口
日十一 衝氣已止六脈緊退而弦未除可將初十日方再服半帖以後接服廿九

日改定方以不畏寒為度
十一 服十一月十五日疏肝藥二帖
吳氏醫案 便血

十四 背畏寒脈仍弦緊再服十二月初十日桂枝加桂湯二帖以峻補衛陽服

藥後吐黑頑痰一口
十七 脈仍弦緊背猶畏寒陽未全復照原方再服二劑分四日服

廿九 前日之畏寒至今雖減而未全愈脈之弦緊亦未充和衝氣微有上動之

象可取十四日桂枝加桂湯再服二帖分四日立春以後故也
丙戌正月 六脈俱弦右脈更緊後便紅小腸寒濕黃土湯為主方議黃土湯

去柔藥加滲濕通陽雖自覺心中熱背心如水漬所謂白云熱者非熱也

况有惡寒乎
竈中黃土 八兩 桂枝 五錢 黃芩炭 四錢 雲茯苓塊 六錢 附子 熟四 廣皮 四

錢 生薑苡仁 五錢 蒼朮炭 四錢 煮四杯分四次服血多則多服血少則少

形萬一血來甚湧附子加至七八錢以血止為度再發再服切勿聽聽

音忘轉方也

先方 陽虛脈弦素有寒濕痰飲與錮鈔九法通陽滲濕而補脾胃

雲苓塊 八兩 桂枝 八兩 乾姜炭 四兩 姜半夏 八兩 蒼朮炭 四兩 益智仁 四

兩 生薑仁 八兩 廣皮 六兩 炙甘草 三兩 右為細末神麴糊丸小梧子大每

服三錢日三服忌生冷介屬
初十 糞後便紅雖止寒濕未盡脈之弦者雖減當退剛藥背惡寒未罷行濕之

中兼與調和營衛
竈中黃土 一兩 桂枝 四錢 廣皮 錢 雲茯苓塊 三錢 白芍 炒四 生薑 三錢

生薑苡仁 三錢 蒼朮炭 三錢 大棗 五枚 姜製半夏 三錢 黃芩炭 一錢 煮三

杯分三次服
腫脹
甲寅二月 陳三十 太陰所至發為腫脹者脾主散津脾病不能散津土曰敦阜

初四日 斯腫脹矣厥陰所至發為腫脹者肝主疏泄肝病不能疏泄木穿土位亦

吳氏醫案 便血

腫脹矣此症起於肝經鬱勃從頭面腫起腹固脹大的係腫脹而非水腫

何以知之滿腹青筋暴起如蟲絞並非本身筋骨之筋故知之治法以行

太陽之陽泄厥陰之陰為要醫者誤用八味丸反攝少陰之陰又重加牡

蠣清陰絕陽使陽不得行而陰凝日甚六脈沈弦而細耳無所聞目無所

見口中血塊累累續出經所謂血脈凝泣者是也勢太危急不敢驟然用

藥思至陽而極靈者莫如龍非龍不足以行水而開介屬之翁惟鯉魚三

十六鱗能化龍孫真人曾用之矣但孫真人千金原方去鱗甲用醋煮透加

改用活鯉魚大者一尾得六斤不去鱗甲不破肚加葱一斤水煮熟透加

醋一斤任服之 服鯉魚湯一晝夜耳聞如舊目視如舊口中血塊全無

神氣清爽但腫脹未除
初五 經謂病始於下而感於上者先治其下後治其上病始於上而感於下者

先治其上後治其下此症始於上腫當發其汗與金匱麻黃附子甘草湯

麻黃去節附子一兩炙甘草二錢煮成五飯碗先服半碗得汗止後服不汗再服以得汗爲度

此方甫立未書分量陳頌壽先生一見云斷然無效予問曰何以不效陳先生云吾曾用來曰此方在先生用誠然不效予用或可效耳王先生名謨忘其字云吾甚不解同一方也藥止三味竝無增減何以爲吳用則利陳用則否豈無知之草木獨聽吾兄使合哉余曰蓋有故也陳先生之性情忠厚其膠最小伊恐麻黃法陽必用八分附子護陽用至一錢以監麻黃又恐麻黃附子皆慄悍藥也甘草平緩遂用一錢二分又監制麻黃附子服一帖無汗改用八味丸矣八味陰柔藥多乃敢大用如何能效陳蔭山先生入內室取廿八日陳頌壽所用原方分量一毫不差在坐者六人皆譁然笑曰何吳先生之神也余曰余常與頌壽先生一同醫病故知之深矣於是麻黃去淨節用二兩附子大者一枚得一兩六錢少麻黃

吳氏醫案

腫脹

美

四錢讓麻黃出頭甘草用一兩二錢又少附子四錢讓麻黃附子出頭甘草但坐鎮中州而已衆見分量又大諱曰麻黃可如是用乎頌壽先生云不妨如有過差吾敢保衆云君用八分未敢足錢反敢保二兩之多乎頌壽云吾在菊溪先生處治產後鬱冒用當歸二錢吳兄痛責謂當歸血中氣藥最能竄陽產後陰虛陽越例在禁條豈可用乎夫麻黃之去當歸係營十百吾用當歸伊責之甚豈伊用麻黃又如是之多竟無定見乎余曰人之所以畏麻黃如虎者爲其能大汗亡陽也未有汗不出而陽亡於內者湯雖多但服一盃或半盃得汗即止不汗再服不可使汗淋漓何畏其亡陽哉但此症閉錮已久陰毒太重雖盡劑未必有汗余明日再來發汗病家始敢買藥而仙芝堂藥舖竟不賣謂錢字想是先生誤寫兩字主人親自去買方得藥服盡劑竟無汗

初六衆人見汗不出愈謂汗不出者死此症不可爲矣予曰不然若竟係死症

鯉魚湯不見效矣余化裁仲景先師桂枝湯用粥養胃家汗法竟用原方分量一劑再備用一帖又用活鯉魚一尾得四斤煮如前法服麻黃湯一飯碗即接服鯉魚湯一梳汗至眉上又一次汗至上眼皮又一次汗至眼下皮又一次汗至鼻又一次汗至上唇大約每一次汗出寸許二帖俱服完鯉魚湯一鍋合一晝夜亦服盡汗至伏兔而已未過膝也臍以上腫俱消腹仍大

初七經謂汗出不至足者死此症未全活雖腰以上腫消而腹仍大腰以下其腫如故因用腰以下腫當利小便例與五苓散服至二十一日共十五天不效病亦不增不減陳蔭山云先生前用麻黃其效如神茲小便涓滴不下奈何祈轉方余曰病之所以不效者藥不精良耳今日先生去求好肉桂若仍係前所用之桂明日予不能立方固無可轉也

廿二陳蔭山購得新鮮紫油安邊青花桂一枝重八錢乞余視之予曰得此桂

吳氏醫案

腫脹

美

必有小便但惡脫耳膀胱爲州都之官氣化則能出焉氣虛亦不能化於是用五苓散二兩加桂四錢頂遼參三錢服之盡劑病者所睡係棕牀予囑其備大盆二三枚置之牀下洩完被濕不可動俟明日予親視牀牀其溺自子正始通至卯正方完共得溺三大盆有半予辰正至其家視其周身如空布袋又如腐皮於是用調理脾胃百日全愈

洪氏六十一歲婦居三十餘年體厚憂鬱太多肝經鬱勃久矣又因暴怒重憂致成厥陰太陰兩經脹竝發水不得行腫從踵起先與腰以下腫當利小便例之五苓散法但陰氣太重六脈沈細如絲斷非輕劑所能了

桂枝五錢 茯苓皮六錢 肉桂四錢 豬苓五錢 生蒼朮五錢 廣皮五錢 澤瀉五錢 老厚樸四錢 煮三杯分三次服

前方服三五帖不效亦無壞處小便總不見長肉桂加至二三兩桂枝加至四五兩他藥劑是每劑近一劑之多作五六梳服五七帖後六脈絲毫不起腫不

消便亦不長所以然之故肉桂不佳陰氣太重憂鬱多年暴怒傷肝必有陳苑仍用原方加雞矢醃熟淨烟六錢又加附子八錢服之小便稍通一連七帖腫漸消飲食漸進形色漸喜於是漸減前方分量服至十四帖腫脹全消後以補脾陽疏肝鬱收功

郭氏^{六十}先是郭氏喪夫於二百里外其祖墓之側郭氏攜子奔喪饑不欲食寒不欲衣悲痛太過葬後慮墓百日席地而卧哭泣不休食少衣薄回家後致成單腹脹六脈弦無胃氣喘不能食唇口刮白面色淡黃身體羸瘦余思無情草木不能治有形之病必得開其愚蒙使情志暢遂方可其見效於萬一因問曰汝之痛心疾首十倍于常人者何故伊答曰夫死不可復生所遺二子恐難成立余曰汝何不明之甚也大凡婦人夫死曰未亡人言將待死也汝如思夫念切即死于墓側得遂同穴之情則亦已矣雖有病何必醫醫者求其更甦也其所以不死者以有子在也夫未死以

吳氏醫案 腫脹 三六

夫為重夫既死以教子為重者仍係相夫之事業也汝子之父已死汝子已失其陰汝再死汝子豈不更無所賴乎汝之死汝之病不惟無益於夫而反重害其子害其子不惟無益於子而且大失夫心汝此刻欲盡婦人之道必體亡夫之心盡教子之職汝必不可死也不可死且不可病不可病必得開懷暢遂而後可愈單腹脹死症也脈無胃氣死脈也以死症而見死脈必得心火旺相泄肝鬱之陰氣而後血脈通血脈通臟氣遂死症亦有可生之道詩云見睍曰消者是也伊問余言大笑余曰笑則生矣伊云自此以後吾不惟不哭泣不敢憂思一味以喜樂從事但求其得生以育吾兒而已余曰汝自欲生則生矣於是為之立開鬱方十數劑而收全功

- 旋覆花^{新絳紗包二錢} 香附^{三錢} 廣鬱金^{三錢} 姜半夏^{四錢} 青皮^{一錢} 蘇子霜^{三錢}
- 錢降香末^{二錢} 廣皮^{二錢} 歸橫鬚^{一錢} 川厚朴^{三錢} 煮三杯分三次服

吳氏^{二十}春夏間乘舟由南而北途間溫毒愈後感受風濕內脹外腫又因寢居肝鬱之故時常季夏左手心勞宮穴忽起勞宮毒如桃大此症有治熱得濕治濕得熱之弊選用幼科痘後毒歸肺喘促咳逆之寶脾利水法加極苦合為苦淡法俾熱毒由小腸下入膀胱隨濕氣一齊泄出也蓋勞宮毒屬心火瀉心者必瀉小腸小腸火腑非苦不通腰以下腫當利小便利小便者亦用苦淡也

飛滑石^{二兩} 茯苓皮^{一兩} 黃柏^{四錢} 猪苓^{一兩} 晚蠶砂^{四錢} 黃芩^{四錢} 澤瀉^{一兩} 白通草^{三錢} 雅連^{四錢} 煮成五杯分五次服以小便長為度此方服七帖分量不增不減腫脹與勞宮毒俱消以後補脾收功
乙酉五月^陳六歲^脈弦細而緊不知饑因脹外腫小便不利與腰以下腫當利小便法陽欲滅絕重加溫熱以通陽況今年燥金太乙天符經謂必先歲氣毋伐天和

吳氏醫案 腫脹 三六

桂枝^{六錢} 茯苓皮^{六錢} 川椒炭^{五錢} 猪苓^{五錢} 生茅朮^{三錢} 廣皮^{三錢} 澤瀉^{五錢} 公丁香^{二錢} 杉皮^{一兩} 厚樸^{四錢} 煮四杯分四次服
廿五 諸症皆效知饑腫脹消其大半惟少腹有疝竟若有一根筋吊痛於原方內減丁香一錢加小茴香三錢
乙酉十月^單氏^{四十}歲^腫脹六年之久時發時止由於肝鬱應照厥陰腹脹例治
雲蒼皮^{六錢} 厚樸^{三錢} 歸橫鬚^{三錢} 旋覆花^{包三錢} 香附^{三錢} 大腹皮^{三錢} 姜半夏^{四錢} 青皮^{一錢} 廣鬱金^{二錢} 降香末^{三錢} 木通^{一錢} 煮三杯分三次服不能寬懷消怒不必服藥
廿六 服前方八帖腫脹稍退惟陽微弱加川椒^{三錢} 大便不通加兩頭尖^{二錢} 去陳莖

壬辰四月^好五^十歲^先喘後腫六脈洪大有力左尺獨大肺腎之熱可知腰以下腫本當利小便但不宜溫利耳且置喘於不問其如治病必求其本者何

哉

生石膏四兩 雲苓皮 五錢 海金沙 五錢 先飛滑石 一兩 姜半夏 三錢 晚歸 砂 三錢 杏仁泥 六錢 小枳實 四錢 白通草 一錢 甘湖水 八杯 煮成三杯分三次服

十七 六脈仍洪數左尺仍獨大猶宜涼利小便

先煎飛滑石 一兩 海金沙 五錢 杏仁 六錢 生石膏 四錢 小枳實 四錢 厚樸 三錢 半夏 五錢 晚歸 三錢 橘皮 三錢 寧神皮 五錢 白通草 一錢 甘湖水 八杯 煮成三杯分三次服

癸巳四月 毛四十病起肝鬱木鬱則克土克陽土則不寐克陰土則腹脹白鬱 則脇痛肝主疏泄肝病則不能疏泄故二便亦不能宣通肝主血絡亦主

血故治肝者必治絡

吳氏醫案

腫脹

早

新絳紗 三錢 香附 三錢 蘇子霜 三錢 旋覆花 包三錢 歸鬚 三錢 小茴香 三錢

姜半夏 八錢 青皮 三錢 廣鬱金 三錢 降香末 三錢 頭煎二杯 二煎一杯分三次服

初七 服肝絡藥脹滿脇痛不寐少減惟覺胸膈按肝脈絡胸亦是肝鬱之故再 小便赤濁氣分濕也

旋覆花 新絳紗 三錢 小茴香 炒黑 三錢 川棟子 三錢 半夏 六錢 晚歸 三錢 降香末 三錢 歸鬚 二錢 兩頭尖 三錢 茯苓皮 三錢 橘皮 青二白通草 二錢 煮三杯分三次服

初十 驟濁陰而和陽明現在得寐小便少清但肝鬱必克土陰土鬱則脹陽土

鬱則食少而無以生陽故清陽虛而成胸膈暫與劑 半夏 一兩 茯苓皮 五錢 厚朴 三錢 桂枝尖 五錢 廣鬱金 三錢 淮白 三錢 生 苡仁 五錢 小枳實 二錢 括輿 連皮 三錢 煮三杯分三次服

十四 脈緩太陽已開而小便清通陽明已開而得寐能食但腹脹不除病起肝

鬱與行濕之中必兼開鬱 茯苓皮 五錢 半夏 五錢 廣木香 二錢 生苡仁 五錢 厚樸 三錢 煨肉果 五錢 降香末 三錢 廣皮 二錢 白通草 三錢 廣鬱金 二錢 煮三杯分三次服

徐三十 腹脹且痛脈弦細大便泄小便短身不熱此屬寒濕傷足太陰

桂枝 三錢 生苡仁 五錢 厚樸 三錢 豬苓 三錢 黃芩炭 一錢 乾姜 一錢 澤瀉 三錢 白通草 二錢 廣皮 二錢 煮三杯分三次服

丁氏 五十滯下白積欲便先痛便後痛減責之積重脈遲而弦痛甚蓋冷積也 非溫下不可

生大黃 五錢 厚朴 五錢 廣木香 三錢 南查炭 三錢 良姜炭 一錢 黃芩炭 二錢

吳氏醫案

單腹脹滯下

聖

廣皮 五錢 熟附子 錢 檳榔 錢 小枳實 錢 焦白芍 三錢 煮三杯三次服

黎廿八 滯下白積欲便先痛便後痛減責之有積用溫下法 生大黃 酒炒黑 厚朴 三錢 檳榔尖 一錢 熟附子 三錢 枳實 一錢 廣木香 一錢 炒白芍 二錢 廣皮 二錢 炒雲連 一錢 炒黃芩 二錢 水五杯煮兩杯分二

次服

甲子十一 張三十 先泄而後滯下脾虛傳腎症為難治

白芍 二錢 黃芩炭 二錢 雅連 吳英 一錢 炒猪苓 三錢 川椒目 三錢 厚朴 一錢 澤瀉 三錢 生茅朮 三錢 良姜 一錢 生苡仁 二錢 廣木香 一錢 廣皮 一錢 水 六杯煮成二杯渣再煮一杯分三次服

二十 先泄後滯下古云難治非一時可了且喜脈弱倘有生機

白芍 炒三錢 真山連 二錢 酒沙 紅麴 二錢 黃芩 酒炒 二錢 地榆炭 三錢 歸尾 一錢 厚朴 去白皮 三錢 小枳實 搗碎 廣皮 一錢 檳榔 五分 廣木香 五分 煎法如 姜汁炒

前

廿三 脈沈而有力滯下脹痛太甚便後少減片時其痛仍然議開一面用溫下法

生大黃 酒炒黑 白芍 酒炒半粘 廣木香 一錢 安邊桂 去粗皮 淨二錢 黃芩 酒炒半 小枳實 二錢 紅麴 二錢 廣皮炭 一錢 真山連 酒炒半 老厚朴 三錢 歸尾 一錢 水五杯煮成三杯分三次服

廿四 腎症復歸於脾用四苓合苓芍湯法

茯苓皮 五錢 猪苓 五錢 生苡仁 五錢 生茅朮 五錢 澤瀉 五錢 廣木香 一錢 焦白芍 二錢 厚朴 二錢 炒川連 五分 炒黃芩 一錢 廣皮 一錢 水八杯煮取三杯分三次服

廿五 於前方內加 白通草 二錢

吳氏醫案

滯下

聖

廿六 肝鬱則小便亦不能通此徒用四苓不效議開陰絡法

猪苓 三錢 小茴香 三錢 歸尾 一錢 澤瀉 三錢 川棟子 一錢 琥珀 研沖 三錢 兩頭尖 一錢 口糜 五厘 桃仁 三錢 煮三杯分三次服

廿七 開陰絡已效於前方內加安邊桂 三分 鬱金 三錢 生香附 三錢

廿八 九竅不和皆屬胃病用開太陽陽明兼瀉心法 半夏 六錢 茯苓皮 三錢 黃芩 一錢 猪苓 二錢 生苡仁 三錢 厚朴 姜汁炒 瀉 瀉 三錢 廣木香 一錢 青皮 一錢 廣皮 一錢 炒川連 五分 乾姜 二錢 水五杯 煮取兩杯渣再煮一杯分三次服

廿九 開太陽陽明兼法濕中之熱

姜半夏 六錢 猪苓 三錢 黃芩 二錢 茯苓皮 三錢 澤瀉 三錢 廣木香 一錢 生苡仁 三錢 白芍 一錢 真山連 五分 川草薢 一錢 廣皮 一錢 白通草 一錢 煮三杯分三次服

三十 糞後帶血加黃土湯法

半夏 五錢 廣木香 一錢 電中黃土 六錢 蘇解 三錢 全歸 一錢 雲茯苓皮 三錢 炒白芍 三錢 黃芩炭 一錢 炒茅蒼朮 三錢 厚朴 二錢 廣皮 一錢 水五杯 煮取二杯渣再煮一杯分三次服

初二 舌降甚胸中嘈雜無奈喉且痛糞中猶帶血跡議酸苦泄熱法

肉桂 去粗皮 黃芩 二錢 生大黃片 酒炒黑 桃仁 八分 厚朴 一錢 龍中黃土 八錢 枳殼 六分 神麴 五分 炒地榆炭 一錢 檳榔 八分 歸尾 一錢 淨烏梅肉 九枚 廣皮 七分 廣木香 八分 頭煎二杯二煎一杯分三次服服一帖去大黃肉桂再服一二帖

又 即於去大黃肉桂方內再去歸尾地榆桃仁加蒼朮 一錢

初二 四苓合苓芍法以小便短口糜猶有滯下也

吳氏醫案

滯下

聖

皮 三錢 猪苓 三錢 當歸 一錢 淨烏梅肉 三錢 澤瀉 三錢 山連 一錢 頭煎兩 杯分三次服

初三 少腹脹痛不小便仍係肝鬱不主疏泄之故

降香 三錢 小茴香 三錢 歸尾 二錢 桃仁 三錢 黃芩炭 一錢 琥珀 五分 生香 附 三錢 兩頭尖 三錢 口糜 五厘 雲連 炒 二 韭白汁 三滴 煮三杯分三次 服

初四 於前方內加 廣鬱金 二錢

初五 苦辛淡法開下焦濕熱兼瀉肝火

荊芥 五錢 川棟子 三錢 吳黃 炒黑 一 生香附 三錢 小茴香 炒黑 通草 一錢 雲連 炒黑 黃柏炭 二錢 水五杯煮取二杯分二次服 某小兒 滯下紅積欲便先痛便後痛減積滯太重非溫下不為功恐纏綿日久 幼孩力不能勝滯下為臟病也

生大黃一錢五分 黃芩一錢五分 眞山連一錢 安邊桂一錢 紅糖一錢 檳榔剪一錢
 焦白芍一錢五分 歸尾一錢 廣木香八分 煮兩杯先服一杯再便不痛即止不
 則再服一杯

丙戌六月 孫四 感受燥氣燥金克木木有肝鬱故邪氣乘之現在胸痞微痛
 十五日 餘歲 先與開痞化鬱

旋覆花包三錢 香附二錢 杏仁泥三錢 降香末三錢 廣皮一錢 廣鬱金三錢
 煮三杯分三次服外紫雪丹一錢分二次服

日十六 神昏煩躁邪入心包而又發黃熱甚重大勉與開心包一法與紫雪丹一
 三錢以神清爲度湯藥清濕熱之黃

飛滑石六錢 猪苓三錢 麥冬不去心四錢 雲苔塊連皮澤瀉三錢 茵陳三錢 煮
 三杯分三次服

日十七 伏暑成痢滯下紅積欲便先痛便後痛減責之積重非溫下不可
 吳氏醫案 滯下 聖

生大黃酒炒成川連二錢 廣木香一錢 安邊桂三錢 黃芩一錢 生白芍三
 錢 降香末三錢 紅麴三錢 烏梅肉三錢 廣皮炭一錢 歸鬚一錢 煮成三大
 茶林每服半杯以便前之痛止爲度

日十八 昨與溫下服藥一杯而痛更甚下皆紅積邪入肝絡之故於前方內加
 桃仁泥三錢 檳榔剪一錢 地榆炭二錢 煎小半杯投入前藥分二次服

日十九 滯下紅積用溫下法服藥竟劑而痛畧減仍用前法稍減其製
 生大黃酒炒半錢 歸鬚一錢 廣木香二錢 安邊桂去粗皮二錢 紅麴三錢 檳榔剪
 一錢 生白芍二錢 黃芩一錢 炒廣皮勿可太二錢 小茴香炒黑川連一錢 烏梅
 肉二錢 煮三杯分三次服以痛止爲度

日二十 滯下痛減六七脈漸小擬仍服前方不必竟劑如痛止接服此方
 生白芍一錢 厚朴三錢 小枳實二錢 炒黃芩二錢 檳榔一錢 炒廣皮一錢
 杏仁泥三錢 川連一錢 白通草三錢 廣木香三錢 紅麴三錢 烏梅肉一錢

煮三杯分三次服

日廿一 陳積已去餘邪未淨右脈未靜日白晴仍黃故知氣分不清讓進苦辛淡
 法宜導脈氣使餘邪由膀胱化氣而出兼與開胃台能納穀

雲苔皮五錢 猪苓三錢 廣木香三錢 姜半夏四錢 澤瀉三錢 杏仁泥二錢
 炒白芍三錢 厚朴三錢 炒廣皮二錢 炒黃芩二錢 川連一錢 姜汁炒半枳 煮三
 杯分三次服

日廿二 邪著裏不易外達雖經下氣機究未宣暢肛門墜滯蓋由受邪之際漸而
 深故其化也亦緩而滯非苦無能勝濕非辛無能通利邪氣仍用前法重
 與行氣

炒銀花二錢 澤瀉三錢 炒黃芩二錢 廣木香三錢 茵陳三錢 歸橫鬚二錢
 小枳實三錢 赤芍一錢 細甘草稍一錢 檳榔剪三錢 川連一錢 烏梅肉一
 錢 煮三杯分三次服

吳氏醫案 滯下 聖

日廿三 夜半肛門痛甚陰分邪氣久羈今日漸覺畏寒陽明久不納穀胃氣不沖
 之故未可純任苦寒今擬暫用白頭翁湯法加溫藥仍是苦辛複法此權
 宜之計也

白頭翁二錢 秦皮一錢 廣木香三錢 姜半夏五錢 歸鬚一錢 丹皮炭一錢
 川連五分 廣橋皮一錢 防風根一錢 上肉桂一錢 五分 煮三杯分三次服

日廿四 凡病日輕夜重者皆屬陰邪昨藥之偏於溫者以此今日肛門痛減者亦
 坐此茲邪去大半少寐不饑正須商進疏補脾胃勝濕仍不可少蓋胃和
 則神安矣脾治則痢減矣

焦白芍三錢 於朮土炒二錢 白頭翁一錢 黃芩炭一錢 肉桂一錢 廣木香三錢
 姜半夏五錢 山連炒五分 蒼朮炭一錢 雲苔塊四錢 廣皮炒二錢 烏梅肉一錢
 高麗參一錢 煮三杯分三次服

此方進而肛門愈發痛積滯反多穢濁特甚者扶正則餘邪積出也

廿五 昨得輕補肝之贅痛又甚正旺驅邪之故今日暫停扶正注意逐邪然久病亦不敢太過舌白苔

炒白芍一錢 安桂二錢 小茴香炒炭一錢 歸鬚二錢 檳榔剪一錢
姜半夏五分 秦皮二錢 南查炭一錢 白頭翁整三錢 紅麴二錢 炒山連一錢
煮三杯分三四次緩緩服

廿六 昨與逐邪濁膩續下痛減今議再加疏補以扶正氣

白頭翁整三錢 肉桂五分 炒於朮二錢 炒白芍二錢 黃芩炒一錢 小茴香
炒三錢 姜半夏五分 歸鬚一錢 南查炭一錢 雲苓塊五錢 秦皮二錢 檳榔剪
八分 高麗參一錢 紅麴二錢 炒山連一錢 煮三杯分三次服

廿七 積滯漸輕微有寒熱舌起白苔

雲苓塊連皮三錢 白芍炒一錢 廣木香一錢 姜半夏三錢 黃芩炭八分 焦神麴一錢
五焦於朮二錢 廣皮一錢 南查炭八分 高麗參一錢 煮三杯分三次服

吳氏醫案

滯下

罕六

廿八 寒熱止積滯尙未盡舌苔白濁而厚是其徵也少寐少食皆其故於前方

增其製加宣通中焦
雲苓塊四錢 白芍炒一錢 廣木香三錢 姜半夏五錢 黃芩炒一錢 焦神麴三錢
益智仁一錢 於朮焦二錢 白薤仁一錢 高麗參一錢 廣皮炒三錢 南查炭二錢
煮三杯分三次服

七月初 今夜間尙有宿積舌微黃則其伏邪未盡可知猶非純補純清之症

雲苓塊四錢 炒白芍二錢 焦於朮一錢 姜半夏三錢 炒黃芩一錢 焦神麴
三錢 益智仁一錢 生薤仁三錢 白薤仁一錢 高麗參一錢 炒廣皮二錢
煮三杯分三次服

初四 宿積猶然未淨舌白苔

雲苓塊五錢 生薤仁五錢 於朮炭三錢 姜半夏四錢 神麴三錢 白薤仁一錢
分 益智仁一錢 廣皮炒三錢 煮三杯分三次服

初八 今日仍下宿積許多舌根黑苔未淨肛門熱痛不寐暫與清積一二日後

再議補法
雲苓塊五錢 白頭翁二錢 焦神麴三錢 焦白芍三錢 姜半夏三錢 研益智
仁二錢 黃芩炭二錢 焦於朮三錢 炒廣皮三錢 煮三杯分三次服

十一 痢雖止而不寐不饑仍然固係胃不和之故但其人平素好用心機又屆

心事叢雜之際未免過慮議一而和胃一而兼補心氣
雲苓五錢 野山參二錢 棗仁炒熟三錢 麥冬三錢 焦於朮一錢 蓮子連皮心
遠志三錢 去淨丹 姜半夏三錢 冰糖三錢 煮三杯分三次服

初九日 史紅白滯下一月有餘痢疾之脈忌洪大喜腹脹此症腹不脹而脈

洪大所以難已日久便滑而頻數清滯之中兼與固下

黃芩炭三錢 白芍三錢 眞山連一錢 焦於朮二錢 歸鬚一錢 南查炭二錢
廣木香三錢 木瓜二錢 五味子一錢 肉果霜一錢 紅麴一錢 烏梅肉三錢

吳氏醫案

滯下

罕七

丹皮炭三錢 煮三杯分三次服

十五 滯下已久六脈洪大有陽無陰前與重收陰氣而去積滯即在收陰之中
以故脈見小而滯下少現在兩關獨浮有木陷入土之象切忌惱怒助肝
克脾傷胃又忌生冷猪肉滑大便而助濕邪今日用藥大意仍不能驟離
前法加入土中援木兼補宗氣

高麗參三錢 白芍黃酒炒一錢 廣木香三錢 雲苓塊三錢 黃芩黃酒炒三錢 南查炭
二錢 焦於朮二錢 歸鬚一錢 五味子一錢 肉果霜三錢 紅麴二錢 烏梅肉
三錢 濃煎三茶杯分三次服

初十日 德氏七十歲七旬以外之老人滯下紅白積業已一月有餘六脈洪大

滑數而且歇止乃痢疾之大忌舌苔老黃積滯未清腹痛當臍者一味
收補置積滯於不問邪無出路焉得收功勢已重大之極勉用化滯兼與
溫通下焦

姜半夏 五錢 白芍 三錢 焦神麩 三錢 杏仁泥 三錢 黃芩 炒二錢 眞山連 五錢
 廣木香 三錢 檳榔 二錢 廣皮炭 三錢 川椒炭 三錢 歸鬚 二錢 烏梅肉 三錢
 公丁香 一錢 紅麩 二錢 煮四小茶杯日三夜一分四次服
 初十 滯下本係積滯暑濕之實症前醫一味呆補希圖止瀉不知邪無出路如
 何能止腹痛已減議且減其製

姜半夏 二錢 白芍 炒一錢 檳榔 剪一錢 蒼朮炭 一錢 黃芩 炒一錢 廣皮炭
 一錢 廣木香 一錢 山連 炒一錢 烏梅肉 二錢 川椒炭 一錢 紅麩 一錢 煮三杯
 分早中晚三次服

戊子二月 陳 休息痢本係不治之症爲其久久累贅氣血虛盡矣此症且喜
 初七日 年輕形壯而又欲便先痛便後痛減陳積不行尙可借手於一下所謂網
 開一面也金匱謂凡病至其年月日時復發者當下之
 生大黃 酒炒半黑 歸鬚 三錢 降香末 三錢 上安桂 一錢 檳榔 一錢 廣木香
 吳醫醫案 滯下 罕六

一錢 炒白芍 三錢 眞山連 二錢 炒黃芩 三錢 廣皮 三錢 烏梅肉 五錢 紅麩
 五分 煮三杯分六次服
 初八 腹仍痛照前方再服一帖
 初九 再服一帖

初十 血分久痢三用溫下陳積尙多皆起於誤補留邪在絡之故未便再用大
 下恐致傷陰暫用通陰絡法細搜絡中閉錮之陳積三日後再服
 化痰回生丹 十九早中晚各服一丸溫開水

十七 餘邪留肝絡中一時難盡切戒厚味以固之藥宜搜剔法
 降香末 三錢 黃芩炭 一錢 川椒炭 三錢 南查炭 一錢 焦白芍 三錢 廣木香
 二錢 眞山連 八分 歸鬚 一錢 廣皮炭 三錢 丹皮炭 二錢 紅麩 三錢 烏梅肉
 二錢 煮兩大杯分三次服 一清晨空心服九藥一丸

十八 復診於前方內去廣皮加白芍 二錢 烏梅 二錢 九藥照常服

吳鞠通先生醫案 卷二

十九 久痢邪留肝絡綿綿不已合苦辛搜絡無他技巧仍宗前法
 白頭翁 三錢 大黃 酒炒黑 川椒炭 三錢 焦白芍 三錢 肉桂 頂好一廣木
 香 三錢 黃芩炭 二錢 歸鬚 三錢 南查炭 二錢 降香末 三錢 山連 炒一錢 烏
 梅肉 五錢 煮三杯分三次服 九藥仍照前服

壬辰九月 長四 腸滯身熱古所大忌茲幼孩滯下紅白而身又熱症非淺鮮
 十一日 炒白芍 二錢 桃仁 一錢 廣木香 八分 炒黃芩 一錢 歸鬚 一錢 炒山連 一錢
 降香末 一錢 紅麩 一錢 炒神麩 二錢 南查炭 一錢 煮三杯分三次服
 十三 又加斑疹

炒白芍 二錢 連翹 二錢 眞山連 炒一錢 炒黃芩 一錢 銀花 二錢 廣木香 八分
 檳榔 剪 二錢 殭蠶 二錢 炒神麩 二錢 桃仁 泥 一錢 蟬退 一錢 烏梅肉 二錢
 歸鬚 一錢 紅麩 一錢 煮三杯分三次服
 十五 腸滯身熱本所大忌又加溫疹難就一邊現在斑疹已過四日業有漸化
 吳氏醫案 滯下 罕

之機但身壯熱如火譫語煩躁起臥不安滯下紅積後重太甚欲便先痛
 便後痛減責之積重不得不借手於一下所以網開一面也
 黃芩 一錢 生大黃 酒炒半黑 紅麩 一錢 白芍 一錢 安邊桂 一錢 歸鬚 一錢
 檳榔 一錢 廣木香 一錢 廣皮 一錢 川連 八分 烏梅肉 一錢 煮三小茶杯分
 三次服 外紫雪丹 一錢五分每服五分溫開水調

十七 滯下紅積狂熱譫語後重欲便先痛前日與溫下法茲大熱與譫語均退
 惟後重未除滯下未清腰痠特甚雖仍腹痛且暫停下藥俟二日後細察
 病情再商

炒黃芩 二錢 桂枝 一錢 廣木香 一錢 炒白芍 二錢 神麩 炒一錢 廣皮炭 一錢
 檳榔 剪 一錢 川連 一錢 烏梅肉 三錢 川椒炭 一錢 紅麩 一錢 煮三杯分三
 次服

十九 熱雖退而未盡舌色尚絳口乾滯下白積腰痠甚

日廿一 諸症皆減滯下未清舌絳甚口渴仍後重脈仍數
炒黃芩二錢 檳榔一錢 小茴香二錢 炒白芍二錢 厚朴一錢 焦神麩三錢
茯苓塊二錢 銀花二錢 炒川連一錢 廣木香一錢 煮三杯分三次服

日廿二 滯下白積未清便前仍痛微有身熱再少與溫下法
雲苔一錢 銀花三錢 細生地三錢 炒黃芩二錢 歸麩二錢 檳榔一錢 丹
皮炭二錢 炒白芍二錢 川連一錢 烏梅肉三錢 煮三杯分三次服

日廿三 滯下白積未清便前仍痛微有身熱再少與溫下法
大黃酒炒半錢 熟附子一錢 神麩二錢 黃芩二錢 雲苔塊三錢 川連一錢 白
芍二錢 烏梅肉三錢 廣皮二錢 煮三杯先服一二杯痛除則止

日廿四 腹痛於原方內仍加附子大黃又加南查炭一錢 小枳實一錢 川椒炭一
分再服二帖

日廿五 去附子大黃又服一帖

日廿六 照原方再服二帖

日三十 滯下雖已大減仍有潮熱腹痛積滯仍未清也
炒白芍二錢 南查炭二錢 炒神麩三錢 黃芩炭二錢 廣木香一錢 橘皮炭
一錢 雲苔皮三錢 川椒炭一錢 烏梅肉三錢 生苡仁三錢 煮三杯分三次
服

積聚
甲子二月張二十膈右有積氣以故右脈沈伏弦細陽微之極濁陰太盛克之
也溯其初原從左脇注痛而起其為肝着之咳無疑此症不必治咳但宜
通肝之陰絡久病在絡故也倘濁陰得有出路病可自已所謂治病必求
其本者是也若不識綱領而妄冀速愈必致剝削陽氣殆盡而亡
旋覆花新絲紗烏藥三錢 川棟子二錢 桂枝尖三錢 青皮一錢 小茴香三
錢 降香末三錢 歸麩三錢 蘇子霜三錢 桃仁泥三錢 廣皮一錢 煮三杯分
三次服

日十九 服通絡藥已見小效脈氣大為回轉但右脇着席則咳甚腸下有支飲故
也議於前方內去桃仁川棟子小茴香加生香附三錢 半夏六錢 杏仁三
錢 肉桂八分 再服四帖

日廿三 先痛後便而見血議通陰絡法
降香末三錢 半夏五錢 歸麩二錢 小茴香三錢 香附二錢 蘇子霜三錢
藏紅花一錢 桃仁二錢 廣皮炭一錢 廣木香一錢 丹皮三錢 兩頭尖三錢
煮三杯分三次服

張二十 左癢腹面黃肢倦食少不能作文看書亦不能久宛如虛損與化癥
回生丹緩通陰絡法每日空心服一丸亦有早晚各服一丸之時服至二
年有餘計服化癥回生丹六七百丸之多癥始化淨氣體復原看書作文
始舉進士

吳氏醫案
吳二十膈右結癥運廣五寸羣丸如鵝卵太以受重涼又加暴怒而得痛不可
忍不能立不能坐並不能臥服辛香流氣飲三日服五帖重加附子肉桂
至五七錢之多絲毫無效因服天台烏藥散初服二錢滿腹熱如火燒明
知藥至膈右患處如搏物者然痛加十倍少時腹中起痞積無數丸一荷
蓄下濁氣一次如是者三三十次腹中痛楚鬆快少時痛又大作服藥如
前腹中熱痛起痞積下濁氣亦如前但少輕耳自已初服藥起至亥正共
服五次每次輕一等次早腹微痛再服烏藥散則腹中不知熱矣以後每
日服三三次七日後腫痛全消後以習射助陽而體壯

乙酉四月 葉四 無論癥瘕雖有氣血之分然皆係陰病結於陰部豈有用陰
藥之理維日已久沈寒痼冷之疾非巴豆不能除根 天台烏藥散
六月初 業已見效未能除根照常服前藥早晚各五分癥痛發時服二錢否若
白厚面色淡黃而暗左脈沈細陽微再與湯藥行濕通服
雲苔塊五錢 半夏五錢 益智仁一錢 生苡仁五錢 茯苓一錢 白朮仁一錢

川茸解 四錢 廣皮 三錢 白通草 一錢 煮三杯分三次服服至舌苔退爲度

乙酉五月廿九歲 十年癸氣六脈弦細而緊 烏藥 三錢 小茴香 五錢 吳茱萸 三錢 良姜 一錢 川椒炭 五錢 歸鬚 一錢 煮三

杯分三次服

初九 病減者減其製每日服半帖

乙酉五月廿一日 王氏 歲 六脈弦緊心下伏梁非易化之症一主憂泣肝之鬱也可 知又當燥金太乙天符之年金來克木痛愈甚矣與溫絡法其吐血亦絡

中寒也

降香末 三錢 半夏 三錢 小枳實 三錢 川椒炭 一錢 廣皮 一錢 歸鬚 三錢

公丁香 八分 煮三杯分三次服 四帖

廿五 諸症皆效自覺氣上阻咽加 旋覆花 包 五錢

廿九 效不更方再服

吳氏醫案

積聚

至

六月初 加淡吳茱萸三錢

乙酉五月廿四日 金氏 歲 癸結胸左經來必痛六脈沈細陽微

川棟子 三錢 全歸 三錢 淡吳茱萸 三錢 降香末 三錢 良姜 一錢 公丁香 一錢

小茴香 三錢 艾炭 三錢 煮三杯分三次服服七帖後接服化癥回生丹

六月初 業已見效每日服半帖再服十天

二十 每行經前三日腹微痛時空心服 化癥回生丹 一丸服至經盡後腹中

絲毫不痛爲止下月經行痛發時再如此服法癥瘕痛亦空心服一丸化

淨爲度

丙辰 月 車 五錢 醫髮已白大半臍左堅大如盤隱隱微痛不大便數十日先

延外科治之外科謂腸癰以大承氣下之三四次終不通延余診視按之

堅冷如石面色青黃脈短澀而遲先尚能食屢下之後糜粥不進不大便

已四十九日余曰此癥也金氣之所結也以肝木抑鬱又感秋金燥氣小

邪中裏久而結成愈久愈堅非下不可然寒下非其治也以天台烏藥散

二錢加巴豆霜一分姜湯和服設三服以待之如不通第二次加巴豆霜

一分五厘再不通第三次加巴豆霜二分服至三次後始下黑亮球四十

九枚堅莫能破繼以苦溫甘辛之法調理漸次能食又十五日不大便余

如前法下至第二次而通下黑球十五枚雖亦堅結然破之能碎但燥極

耳外以香油熬川椒製其堅處內服苦溫芳香透絡月餘化盡於此症方

知燥金之氣傷人如此而溫下寒下之法斷不容索也

乙丑 治通延劇久疝不愈時年六十八歲先是通延劇外任時每發疝醫者必

用人參故留邪在絡久不得愈至乙丑季夏受涼復發堅結肛門坐臥不

得脹痛不可忍汗如雨下七日不大便余曰疝本寒邪凡堅結牢固皆屬

金象況現在勢甚危急非溫下不可於是用天台烏藥散一錢加巴豆霜

分許下至三次始通後痛漸定調以倭硫黃丸兼用金匱蜘蛛散漸次

吳氏醫案

積聚淋濁

至

化淨

淋濁大小便閉

卽六歲便濁帶血既有膀胱之濕又有小腸之熱用導赤合四苓湯

滑石 飛五 茯苓皮 五錢 滑石 五錢 澤瀉 三錢 木通

三錢 甘草梢 一錢 竹葉 二錢 煮三杯分三次服

又 少腹痛於前方加川棟子 三錢 小茴香 三錢

王 濕土司天濕熱下注致成淋症墮腫

茯苓皮 五錢 萹蓄 五錢 車前子 二錢 生苡仁 五錢 澤瀉 三錢 甘草梢 二錢

飛滑石 二錢 蔚根 三錢 白通草 一錢 煮三杯分三次服

又 於前方內加 黃柏炭 二錢

又 八歲先是大小便俱閉自用大黃八錢大便雖通而小便涓滴全無續用五

若仍不通診其六脈弦緊病因肝鬱而成當開陰絡

降香末 三錢 歸類 三錢 琥珀 三錢 兩頭尖 三錢 丹皮 三錢 麝香 全研 沖 非
白汁 沖 三 煮三杯分三次服一帖而通一帖而暢

管三十小便淋濁莖骨痛不可忍白用五苓八正真蘇分清飲等淡滲愈利愈

痛細詢病情由房事不遂而成余曰溺管與精管異途此症當通精管為
是用虎杖散以杜牛膝代之

杜牛膝 五錢 丹皮 三錢 歸橫 三錢 降香末 三錢 琥珀 全研 木 兩頭尖 三錢
桃仁泥 三錢 麝香 全研 沖 煮三杯分三次服一帖而痛減五帖而痛止七

帖濁淨後以補奇經而愈

珍十八 血淋太多先與導赤不應繼以脈弦細詢由怒鬱而起轉方與活肝絡

新絳紗 三錢 歸類 三錢 片姜黃 二錢 旋覆花 包 三 香附 三錢 蘇子霜 一錢

降香末 三錢 鬱金 一錢 丹皮炭 三錢 桃仁泥 三錢 紅花 一錢 煮三杯分三

次服四帖而安

吳氏醫案 淋濁 五

王四十五 小便狂血脈弦數病因怒轉

細生地 五錢 香附 三錢 降香末 三錢 新絳紗 三錢 歸類 三錢 桃仁泥 三錢

青皮 二錢 旋覆花 包 三 丹皮炭 五錢 煮三杯分三次服四帖而血止

後兩月又因動怒而發仍與前方七帖而愈

范七十 因怒鬱而大小便閉與極苦以通小腸借通膈膈法

蘆薈 二錢 龍胆草 三錢 鬱金 三錢 胡連 三錢 桃仁泥 三錢 歸類 三錢 煮三

杯分三次服服二帖而大小便皆通

保女十 怒鬱少腹脹大如斗小便涓滴全無已三日矣急不可忍仰臥不能轉

側起立與開陰絡

降香末 三錢 香附 三錢 廣鬱金 二錢 龍胆草 三錢 琥珀 五分 兩頭尖 三錢

歸橫類 三錢 韭白汁 沖 三 麝香 全 沖 小青皮 五錢 煮三杯分三次服一

帖而通一帖而暢

保五 夏日痘後受暑小便不通脈洪數玉莖腫亮捲曲如鉤與涼利勝法

飛滑石 六錢 雲苔皮 五錢 杏仁 三錢 苡仁 五錢 白通草 一錢 蘇沙 三錢 煮

三杯分三次服一帖而通三帖而玉莖復元

乙酉七月 王八 全貨無聲六脈俱弦痰飲而兼濕痺小便白濁先與行濕

姜半夏 五錢 滑石 六錢 杏仁 四錢 雲苔皮 五錢 桂枝 三錢 晚蠶沙 三錢

川芎 五錢 防已 三錢 白通草 一錢 生苡仁 五錢 甘草 一錢 煮三杯分三

次服

十四 復診於原方加 猪苓 三錢 澤瀉 三錢

九月初 伏飲濕痺便濁前由淡滲通陽已服過三十三帖因停藥二十餘日現

在飲又上泛胸滿短氣腰痠淋濁未除且與行心下之飲脈弦細陽不復

雲苔皮 五錢 桂枝 四錢 晚蠶沙 三錢 姜半夏 五錢 杏仁 四錢 廣橘皮 五錢 川

芎 五錢 防已 四錢 白通草 一錢 小枳實 四錢 煮三杯分三次服

吳氏醫案 淋濁 五

十二 於前方去杏仁防已加姜半夏 五錢 生苡仁 五錢

五月初 痰飲痺症淋濁皆寒濕為病誤與補陰以致濕邪膠痼沈着急難清楚

前與開痺和胃現雖見效不少究係濕為陰柔之邪久為呆補所困難以

旦晚奏功也

飛滑石 六錢 桂枝 四錢 生苡仁 五錢 姜半夏 六錢 猪苓 三錢 小枳實 三錢

雲苔皮 五錢 澤瀉 三錢 晚蠶沙 三錢 川芎 五錢 廣皮 五錢 車前子 三錢

煮三杯分三次服

廿五 濁濕誤補久留與開太陽陽明法數十帖之多雖大見效究未清楚小

便仍間有濁時腿仍微有痠痛

姜半夏 一兩 桂枝 四錢 川椒炭 三錢 雲苔皮 五錢 猪苓 三錢 片姜黃 二錢

生苡仁 五錢 防已 三錢 晚蠶沙 三錢 川芎 五錢 廣皮 五錢 白通草 一錢

小枳實 三錢 煮三杯分三次服

十一月癩症火痰飲小便濁喉啞先開上焦後行中下之濕餘有原案

廿八日 癩症 五錢 卡夏 兩雲苓皮 五錢 生苡仁 五錢 杏仁 五錢 生甘草 三錢 煮三杯分三次服 喉啞服此

備用方 行中下兩焦濁濕法

煎滑石 一兩 杜枝 四錢 生苡仁 五錢 雲苓皮 六錢 黃柏 三錢 煎水炒 車前子 四錢 姜半夏 六錢 廣皮 三錢 晚蘇沙 三錢 川萆薢 五錢 煮三杯分三次服 便濁服此

戊子二月 癩 先淋後且血篋後癢而脹痛脈洪數應從精道論治與虎杖散

台導赤法

杜牛膝 三錢 白芍 三錢 木通 二錢 細生地 三錢 丹皮 五錢 琥珀 三錢 降香 末 二錢 歸鬚 二錢 兩頭尖 三錢 口腐 全研 沖 煮三杯分三次服

辛卯三月 滿七十血淋多年不愈起於驚閃現在痛甚有妨於溺溺則痛更甚

吳氏醫案

淋濁

吳

且有紫血條顯係於血之故法當宜絡再久病在絡又定痛亦須絡藥蓋疔痛之藥無不走絡走絡之藥無不定痛但有大絡別絡腑絡臟絡之分此症治在陰絡左脈沈弦而細所謂沈弦內痛是也

杜牛膝 三錢 桃仁 三錢 歸鬚 三錢 降香末 三錢 琥珀 全研 沖 兩頭尖 三錢 丹皮炭 五錢 口腐 全研 沖 五厘 煮成三小茶杯分三次食遠服

廿一 照前方服一帖

廿二 於前方內加小茴香炭 五錢 杜牛膝 加二錢 琥珀 加二分 口腐 加二厘 再服三帖

廿四 血淋之後音淋顯有穢濁之物下出不暢以故效而未愈再用前法而進之大抵以濁攻濁

杜牛膝 五錢 歸鬚 三錢 兩頭尖 三錢 小茴香 五錢 琥珀 八分 川椒炭 二錢 降香末 三錢 韭白汁 每杯點口腐 全研 沖 八厘 丹皮炭 三錢 煮三杯分三次服

廿六 病減者減其製照原方服半帖

廿七 脈數身熱風濕所致如今晚仍然大熱明日服此方溫病宜辛涼最忌發表且有下焦病以純走上焦勿犯中下二焦為要

連翹 三錢 苦桔梗 三錢 甘草 二錢 銀花 三錢 香豆豉 三錢 蘆根 三錢 薄荷 八分 荊芥穗 一錢 煮小茶杯分三次服

廿八 照原方再服一帖

廿九 風濕解後服溫藥治他病太急微有喉痛之意且與清上焦開提肺氣無任溫病餘邪滋長其下焦溫藥初一日晚再服未遲

桔梗 三錢 殭蠶 二錢 甘草 一錢 連翹 三錢 蟬退 去頭足 一錢 蘆根 三錢 銀花 一錢 煮二杯分二次服

三十 照前方服一帖

四月初 以病退八九故未服藥

吳氏醫案

淋濁

吳

初二 風濕已解無餘膏淋亦清至九分惟溺後微痛微有絲毫濁滯未清議用

前通絡泄濁法五分之一以清餘邪候十分清楚再商善後 茯苓 連皮 杜牛膝 一錢 丹皮 二錢 琥珀 二分 小茴香 二錢 歸鬚 八分 兩頭尖 一錢 口腐 全研 沖 二厘 煮一大茶杯分二次服以濁滯淨盡為度

初三 照前方服一帖

初四 大痛之後胃氣受傷食少而陽氣不振再九發不和皆屬胃病擬通補胃

陽莫開胃健食殺氣以生宗氣 雲苓塊 五錢 益智仁 二錢 麥冬 三錢 不去心 高麗參 二錢 橘皮炭 四錢 生薑 三錢 姜半夏 三錢 炙甘草 二錢 大棗 二枚 煮三杯分三次服

初五 仍服前方

初六 前方仍再服

泄瀉

乙酉四月陶四十久泄服茲自春而來古謂之木泄侮其所勝也

十五日 柴胡三錢 雲苓塊五錢 廣皮三錢 桂枝三錢 姜半夏五錢 生薑五錢 猪苓三錢 炙甘草二錢 大棗三枚 澤瀉二錢 煮三杯分三次服

十九 泄瀉已減於前方內加炒蒼朮三錢 前後共服十三帖全愈

五月初 前曾木泄與小柴胡湯十三帖而愈尚有糞後便血乃小腸寒濕之症

六日 現在脈雖弦而不動且兼緩象大便復清不必用柴胡法矣轉用黃土湯 法去柔藥避其滑瀉

竈心土 四兩 雲苓塊連皮五錢 熟附子二錢 炒蒼朮五錢 黃芩炭二錢 廣皮炭二錢 煮三碗分三次服

十一 濕多成五泄先與行濕止泄其糞後便血少停再議

雲苓連皮六錢 生苡仁五錢 桂枝五錢 猪苓五錢 茅蒼朮四錢 廣皮四錢 澤瀉五錢 廣木香二錢 煮三杯分三次服以泄止為度

吳氏醫案 泄瀉 五元

八月初 胃不開大便溏小便不暢脈弦

雲苓皮五錢 柴胡一錢 白朮仁一錢 生苡仁五錢 猪苓三錢 廣橘皮二錢 姜半夏三錢 澤瀉三錢 煮三杯分三次服

乙酉五月 陸氏二十六脈弦細面色淡黃泄則脾虛食少則胃虛中焦不能建

立安望行經議先與強土 雲苓塊三錢 半夏三錢 藿香梗二錢 益智仁一錢 苡仁二錢 白朮皮一錢

廣木香一錢 蘇梗一錢 廣皮炭一錢 焦三杯分三次服

廿八 右脈寬泛緩也胃口稍開泄則加添小便不通加實脾利水

雲苓塊五錢 猪苓三錢 澤瀉二錢 生苡仁五錢 加在前方內

六月十日 前方服十四帖泄止胃稍醒腕中舌苔滑周身痠痛六脈弦細而沈 先與和胃治痠在後 生苡仁五錢 桂枝三錢 益智仁五分 姜半夏五錢 杏仁二錢 藿香梗二錢

白朮仁一錢 防已三錢 廣橘皮二錢 煮三杯分三次服

吳氏醫案 泄瀉 五元

目錄

頭痛 胃痛 脾胃 噎食 嘔吐 反胃 咳嗽 肺癆 失音 水氣 寒溼 痺 痰飲

吳鞠通醫案

目錄

後學 高德爵汝 袁吉生慶元校刊

頭痛

乙丑三月 趙氏五十六脈弦而邊顛頂痛甚下連太陽陽虛內風眩動之故

桂枝 六錢 生黃耆 六錢 生薑 五錢 白芍 三錢 全當歸 一錢

大棗 三枚 炙甘草 三錢 川芎 一錢 膠飴 五錢

初十 陽虛頭痛愈後用善建中

桂枝 四錢 生絲蓍 五錢 生薑 三片 白芍 六錢

大棗 三枚 炙甘草 三錢 膠飴 五錢

季 少陽頭痛本有損一目之弊無奈盲醫不識混用辛溫反助少陽之火甚

至有用附子之雄烈者無怪乎醫者盲致令病者亦盲矣況此病由於伏

吳氏醫案

頭痛

暑發瘧瘧久不愈抑鬱不舒而起肝之鬱勃難伸肝愈鬱而膽愈熱矣現

在仍然少陽頭痛未罷議仍從少陽膽絡論治

刺蒺藜 五錢 麥冬 五錢 茶菊花 三錢 羚羊角 三錢 苦桔梗 三錢

鈎藤鈎 三錢 丹皮 三錢 青箱子 一錢 苦丁茶 一錢 麻仁 三錢

乙丑十月 陳 五歲少陽風動又襲外風為病頭偏左痛左脈浮弦而數大於

右脈一倍最有損一目之弊議急清膽絡之熱用辛甘化風方法

羚羊角 三錢 丹皮 五錢 青箱子 二錢 苦桔梗 三錢 茶菊花 三錢

鈎藤鈎 二錢 薄荷 二錢 刺蒺藜 二錢 生甘草 一錢 桑葉 三錢

水五盃煮取兩盃分二次服渣再煮一盃服

日廿五 於前方內減薄荷一錢四分加 木賊草 一錢 麩仁 三錢

頭痛眼蒙甚日三帖少輕日二帖

十一月初八日於前方內加 筵仁 白茅根 麥冬
 乙酉四月章 四十 血之因由於熱行清道法當以清輕之品清道之熱
 無奈所用皆重藥至頭偏左痛乃少陽膽絡之熱最有損一日之患豈熟
 地桂附鹿茸所可用悖謬極矣無怪乎深痼難拔也勉與清少陽膽絡法
 當用羚羊角散以無羚羊故不用

苦梗 一兩 桑葉 一兩 連翹 八錢 銀花 八錢 丹皮 八錢 薄荷 二錢
 茶菊花 一兩 鈎藤鈎 六錢 白蒺藜 四錢 苦丁茶 三錢 甘草 四錢
 其為極細末每服二錢日三次每服白扁豆花湯調外以豆漿一擔煎
 至碗許攤貼馬刀患處以化淨為度 必須鹽滷點之微豆腐漿

廿七 復診症見小效脈尚仍舊照前清少陽膽絡方再服二三帖俟大效後再
 議如此時無扁豆花為引改用鮮荷邊煎湯為引亦可

五月初 少陽絡熱誤用峻補陽氣以致頭目左畔麻木發癢耳後癢腫發為馬
 吳氏醫案 頭痛 二

刀現在六脈沈洪而數頭目中風火相煽前用羚羊角散法雖見小效而
 不能大愈議加一煎方暫清腦戶之風熱其散方仍用勿停

苦桔梗 三錢 生黃芩 三錢 茶菊花 三錢 側柏葉炭 三錢 炒蒼耳子 一錢
 連翹 三錢 桑葉 三錢 辛夷 一錢 鮮荷葉 一張 黑山梔 五枚 大便滯
 去山梔

六月初 細閱病狀由少陽移熱於陽明 生石膏 一兩 知母 三錢 葛根 三錢
 十二 偏頭痛係少陽膽絡病醫者誤認為虛而用鹿茸等峻補其陽以致將少
 陽之熱移於陽明部分項腫牙痛半邊頭臉腫痛目白睛赤且閉不得
 開如溫毒狀舌苔紅黃六脈沈數有力議與代賑普濟散急急兩清少陽
 陽明之熱毒

代賑普濟散 十包每包五錢用鮮蘆根煎湯水二盃煮成一盃去渣
 先服半盃其下半盃含化得稀涎即吐之一時許再煎一包服如上法
 十六 舌黃更甚脈猶數腫未全消目白睛赤縷白下而上其名曰倒垂廉治在

陽明不比自上而下者治在太陽也

代賑普濟散 每日服五包嚙下大半漱吐小半每包加生石膏三錢
 煎成一小碗服二日外以連心麥冬 一兩 分二次煎代茶

十八 今日偏頭痛甚且清少陽之絡其消腫之普濟散加石膏午前服一包餘
 時服此方

羚羊角 一錢 連翹 一錢 刺蒺藜 六分 凌霄花 一錢 鈎藤鈎 六分
 茶菊花 一錢 銀花 一錢 苦桔梗 八分 冬霜葉 一錢 生甘草 四分
 犀角 八分 丹皮 一錢 兩盃半水煎一盃頓服之日三帖

二十 大便結加 元參 二錢 糖則去之

廿三 經謂脈有獨大獨小獨浮獨沈斯病之所在也茲左關獨大獨浮膽陽太
 旺清膽絡之熱已服過數十帖之多而膽脈尚如是之旺絡藥輕清上浮
 服至何日得了議膽無出路借小腸以為出路小腸火腑非苦不通暫與
 吳氏醫案 頭痛 三

極苦下奪法然此等藥可暫而不可久恐化燥也

洋蘆薈 二錢 麥冬 五錢 川連 二錢 胡黃連 二錢
 龍膽草 三錢 丹皮 五錢 秋石 一錢

廿六 前方服二帖左關獨大獨浮之脈已平續服羚羊角散一天代賑普濟散
 一天目之赤縷大退其耳前後之馬刀堅硬未消仍服代賑普濟散
 七月初 脈沈數馬刀之堅結未化少陽陽明經脈受毒之處猶然纏扯板滯議
 外面改用水仙膏敷患處每日早服羚羊角散一帖已午後服代賑普濟
 散四包

初九 服前藥喉嚨較前甚為清亮舌苔之黃濁去其大半脈漸小仍數裏症日
 輕是大佳處外症以水仙膏拔出黃瘡若許毒氣尚未化透仍須急急再
 敷務期拔盡方妙至於見功遲緩乃前入誤用峻補之累速速解此重圍
 非旦晚可了只好寧耐性情寬限令其自化太緊恐致過剛則折之虞前

羚羊角散每日午前服一帖午後服代賑普濟散四包分四次再以一二三
包煎湯漱口以護牙齒

日七 數日大便不爽左脈關部復浮瘡口痛甚再用極苦以瀉小腸加芳香活
絡定痛

生大黃 酒炒黑 龍膽草 三錢 乳香 三錢 歸尾 三錢 沒藥 一錢
洋蘆薈 二錢 胡黃連 三錢 銀花 五錢 川連 一錢 秋石 三錢

日八 馬刀雖潰少陽陽明之熱毒未除兩手關脈獨浮膽氣太旺與清少陽陽
明絡熱之中兼疏肝鬱頓堅化核

苦桔梗 三錢 金銀花 三錢 夏枯草 三錢 生香附 三錢 連翹 三錢
冬霜葉 三錢 凌香花 三錢 茶菊花 三錢 粉丹皮 五錢 海藻 二錢

日廿五 馬刀以誤補太重而成爲日已久一時未能化淨以畏疼停止水仙膏之
吳氏醫案 頭痛 四

故舌上白苔浮而微黃其毒尙重現在胃口稍減水來克土之故於前方
加宜肝鬱

銀花 三錢 丹皮炭 三錢 香附 二錢 桑葉 三錢 連翹 三錢 茶菊花 三錢
苦梗 一錢 廣鬱金 二錢 仍以代賑普濟散漱口勿嘔

日廿八 肝鬱誤補結成馬刀日幾壞現在馬刀已平其半日亦漸愈服之數者已
平惟左關獨浮其性甚急肝鬱總未能降胃不甚開胸中飯後覺痞舌白
滑微黃皆木旺尅土之故其敗毒清熱之涼劑暫時停止且與兩和肝胃

新絳紗 三錢 姜半夏 三錢 粉丹皮 三錢 廣皮炭 二錢 歸橫楸 一錢
旋覆花 三錢 廣鬱金 二錢 降香末 一錢 蘇子霜 一錢

日廿九 少陽相火誤補成馬刀原應用涼絡柰連日白苔太重胃不和暫與和
胃現在舌苔雖化納食不旺而嘔未可用涼恐傷胃也於前方減其製
新絳紗 三錢 半夏 五錢 黃芩炭 一錢 廣鬱金 一錢 生薑汁 三匙

旋覆花 三錢 丹皮 三錢 仍用代賑普濟散漱口

日初六 於前方內去黃芩加 香附 三錢 廣皮炭 二錢
日初八 肝移熱於腦下爲鼻淵則鼻塞不通甚則衄血讓清腦戶之熱以開鼻塞
兼宜少陽絡氣外有馬刀故也

銀花 一錢 蒼耳子 四錢 辛夷 四錢 連翹 一錢 茶菊花 三錢 桑葉 三錢

又 於前方內加 旋覆花 三錢 廣鬱金 二錢 疏肝鬱加 姜半夏 一錢 止嘔
日十三 馬刀已出大膿左脈肝鬱作痛痛則大便日下六七次其色間黃間黑時
欲嘔有大腹泄之象與兩和肝胃

新絳紗 三錢 炒黃芩 二錢 降香末 三錢 香附 三錢 歸身 一錢 薑汁 三匙
旋覆花 三錢 廣鬱金 二錢 焦白芍 三錢 姜半夏 四錢 廣皮炭 三錢

日十九 外症未除內又受伏暑成痢舌白苔黃滑小便不暢大便五七次有黑有
白便又不多非積滯而何不惟此也時而嘔水與痰胃又不和內外夾攻
吳氏醫案 頭痛 五

何以克當勉與四苓合苓芍湯法

雲苓皮 五錢 猪苓 三錢 炒黃芩 二錢 澤瀉 三錢 姜半夏 五錢 紅糖 一錢
炒白芍 三錢 炒廣皮 三錢 姜炒川連 一錢 廣木香 二錢 降香末 一錢

日廿四 病由膽而入肝客邪已退所見皆肝膽病外而經絡內而臆膽無所不病
初診時即云深痼難拔皆誤用大熱純陽之累所謂雖有善者亦無如之
何矣再勉與瀉小腸以瀉膽火法

龍膽草 三錢 連翹 三錢 茶菊花 三錢 眞雅連 一錢 炒黃芩 三錢
姜半夏 三錢 竹茹 三錢 冬霜葉 三錢 烏梅 三錢

日廿六 脈少大而數即於前方內加 苦桔梗 三錢 金銀花 三錢 雲苓皮 三錢
日廿九 脈仍數肝膽俱病不能純治一邊

金銀花 三錢 姜半夏 三錢 川連 五分 黃芩 六分 連翹 三錢
茶菊花 三錢 冬霜葉 三錢 烏梅 三錢 雲苓 三錢 麥冬 三錢 連心 五錢

九月十 前方服十一帖胃口大開舌苔化盡肝氣亦漸和惟馬刀之核未消盡
鼻猶塞得強變為鼻脈弦數大便黑議於原方內去護土之剛藥加
入腦戶之絡藥蓋由風熱蟻聚於腦戶故鼻塞而鼻或鼻誤補而邪不得
出也

連翹心 三錢 銀花 三錢 烏梅 三錢 蒼耳子 三錢 麥冬 五錢
苦桔梗 三錢 辛夷 三錢 川連 二錢 茶菊花 三錢 桑葉 三錢
龍膽草 一錢 黃芩 二錢 人中黃 一錢 五分

廿八 開來札前方服七帖肺胃之火太甚議於原方內加 生石膏 一兩 杏仁
二錢 開天氣以通鼻竅清陽明以定牙痛加二三帖不知酌加石膏漸至
一二兩 再敷水仙膏以消核之未盡

廿九 右脈洪大而數渴欲飲水牙牀腫甚陽明熱也於前方內加 石膏 一兩
其二兩銀花 一錢 桑葉 二錢 各 共五錢如服三五帖後腫不消加石膏至四兩

吳氏醫案

頭痛

六

丁亥八月 長氏 五十 先牙痛陽明熱也繼因怒而偏頭痛少陽熱也痛甚而厥
初二日 口歪議清少陽陽明兩經之絡熱

金銀花 三錢 茶菊花 三錢 桑葉 三錢 連翹 不去心
鈎藤鈎 三錢 生石膏 六錢 苦梗 三錢 黃芩 炭 二錢
丹皮 五錢 兒茶 一錢 甘草 一錢

牙疼甚加此疼止去此

胃痛

甲子十月 伊氏 三十 脈弦急脇脹攻心痛痛極欲嘔甫十五日而經水暴至甚
廿七日 多幾不能起不欲飲少腹墜脹而痛此怒鬱傷肝暴注血海肝厥犯胃也
講胞宮陽明同治法蓋金匱謂胞宮累及陽明治在胞宮陽明累及胞宮
治在陽明茲因肝病下注胞宮橫穿土位兩傷者兩救之仍以厥陰為主
雖變金匱之法而實法平金匱之法者也

白烏藥 一錢 半夏 五錢 小茴香 二錢 製香附 三錢 血餘炭 本人之髮
廣澤金 一錢 青皮 八分 五靈脂 一錢 黃芩 炭 一錢 艾炭 三錢
水五盃煮取兩盃分二次服

廿九 金匱謂胞宮累及陽明則治在胞宮陽明累及胞宮則治注陽明茲肝厥
既克陽明又累胞宮必以厥陰為主而陽明胞宮兩護之

製香附 三錢 半夏 五錢 白烏藥 二錢 桂枝 三錢 草薢 一錢 艾炭 一錢
杜仲炭 二錢 淡吳萸 二錢 黑梔子 三錢 川棟子 三錢 小茴香 三錢
水五盃煮取兩盃分二次服

甲子十月 尹氏 二十 脈雙弦而細肝厥犯胃以開明心地為要緊無使久而成
患也

降香末 三錢 半夏 六錢 烏藥 二錢 廣皮 一錢 廣鬱金 二錢
淡吳萸 二錢 川椒 炒黑 一錢 青皮 一錢 生薑 三片 川棟皮 二錢

吳氏醫案

胃痛

七

水五盃煮取兩盃分二次服三帖

甲子十一月 玉氏 六十 肝厥犯胃濁陰上攻萬不能出通陽泄濁法外但牙輕重
月初四日 耳前三方之所以不大效者病重藥輕故也茲重用之

姜半夏 五錢 厚樸 三錢 降香末 三錢 川椒炭 五錢 白烏藥 三錢
淡吳萸 五錢 良姜 五錢 小枳實 三錢 雲連 一錢 兩頭尖 揀淨兩瓣
用甘瀾水八碗煮取三碗分六次服

初六 重剛劫濁陰業已見效當小其製

姜半夏 三錢 白烏藥 二錢 厚樸 二錢 良姜 三錢
川椒炭 三錢 小枳實 二錢 青皮 二錢 廣皮 一錢
用甘瀾水八碗煮取三碗分三次服二帖

車 脈沈弦而緊嘔而不渴肢逆且麻濁陰上攻厥陰克陽明所致宜急溫之
白烏藥 三錢 淡吳萸 五錢 半夏 五錢 厚樸 三錢 草薢 二錢

小枳實三錢 川椒炭三錢 乾姜三錢 青皮二錢
頭煎兩盃二煎一盃分三次服

脾胃

癸亥二月 許 四十脈弦而緊弦則木旺緊則為寒木旺則土衰中寒則陽不
運土衰而陽不運故吞酸噯氣不寐不食便九竅不和皆屬胃病濁陰

蟠踞中焦格拒心火不得下達則心熱如火譫苦辛通法
半夏二兩 小枳實三錢 廣皮二錢 薏仁五錢
厚樸三錢 淡吳萸三錢 生薑六片 炒雲連二錢

用甘瀾水八碗煮成三碗分三次服渣再煮一碗服

廿四 六脈陽微濁陰蟠踞不食不飢不用和陽明兼應濁陰法今腹大痛已
歸下焦十餘日不大便肝病不能疏泄用驅濁陰通陰絡法又苦辛通法

兼以濁攻濁法

吳氏醫案

脾胃

八

台烏藥二錢 厚樸三錢 淡吳萸三錢 川棟子三錢 小茴香三錢 炒黑
兩頭尖三錢 檳榔一錢 小枳實二錢 炒良姜一錢 廣皮一錢
以得通大便為度

廿七 服以濁攻濁法大便已通但欲便先痛便後痛減責之絡中宿積未能通
清膈上且有動氣又非湯藥所能速攻攻急恐有瘵散為蠱之虞釀化瘵
回生丹緩攻為妙

某 脈沈緊為裏寒木旺土衰濁陰上攻腹拘急時痛脇脹腰痛苦辛通法
兼醒脾胃

藿香梗三錢 厚樸二錢 生香附三錢 生薏仁三錢
廣鬱金二錢 官桂一錢 姜半夏三錢 廣木香八分
白蔻仁一錢 草撥一錢 台烏藥一錢 廣皮一錢
初五 脈弦細而緊濁陰上攻胸膈痛用辛香流氣法

川棟子三錢 良姜三錢 厚樸一錢 烏藥二錢 淡吳萸三錢 檳榔一錢
小枳實二錢 藜蘆二錢 廣皮一錢 廣木香一錢 三帖

初八 補火生土兼泄濁陰

茯苓塊三錢 台烏藥二錢 淡乾姜一錢 益智仁煨一錢
生薏仁三錢 半夏三錢 陳皮一錢 淡吳萸二錢 四帖

乙酉五月 李 十三 六脈俱弦不浮不沈不數舌苔白而滑不食不飢不便不
寐九竅不和皆屬胃病時自覺氣上阻咽致令臥不着席此肝氣之逆

也額角上有蟲斑神氣若昏目閉不欲開視不遠瞻云有蟲亦復有理議
先與兩和肝胃如再不應再議治蟲
半夏一兩 旋覆花五錢 秫米一合

二十 六腑不通九竅不和醫者不知六腑為陽以通為補每見其一便閉也則
以天黃蘗仁寒藥下之以後非下不通屢下屢傷遂致神氣若昏目閉不

吳氏醫案

脾胃

九

開脈弦緩而九竅愈不通矣已成壞症勉與通陽

姜半夏三錢 雲苓皮三錢 厚樸三錢 白蔻仁二錢
益智仁煨二錢 雞內金二錢 廣皮二錢 大腹皮三錢

廿三 六腑閉塞不通有若否卦之象按否之得名以坤陰長陽消之候將來必
致上下皆坤而後已坤為腹故腹大無外坤為純陰初爻變震為復然則
欲復其陽非性烈如震者不可豈大黃等陰寒藥所可用哉

天台烏藥散二錢 加巴霜一分 和勻分三份先服一分候五時不便
再服第二份得快便即止

廿四 服一次五時得快便宿物下者甚多目之閉者已開神氣亦清稍食粥飲
知頭笑矣

廿五 六腑不通溫下後大便雖通而小便仍然未解心下窒塞不飢不食六脈
弦遲急急通陽為要與開太陽開陽明法

半夏五錢 雲苓皮五錢 良姜一錢 猪苓三錢 川椒炭三錢
安桂一錢 公丁香一錢 澤瀉三錢 廣皮三錢

六月初一日 大便已能自解胃能進食是陽明已闢惟小便不通是太陽不開與專
開太陽

雲苓皮五錢 桂枝三錢 猪苓三錢 安邊桂一錢
晚蠶沙三錢 蒼朮一錢 澤瀉三錢 飛滑石三錢

煮三盃分三次服以小便通為度若小便已通而尚渾濁者再服一帖
以小便清為度

初六服前方二帖小便暫通連日大小便復閉大便不通已七日自覺胃中痞
塞脛上齒斑未退議用前配成之烏藥散再服四份如二便俱通即停藥
統俟初八日清晨再商如大便通一次而小便不通或大便竟不通明日
再服三份若大便二三而小便仍然不通者即勿服

吳氏醫案

脾胃

十

初八服烏藥散四分內巴霜四厘已得快便今朝且能自行小便六腑俱通矣
只與和胃令能進食可以收功蓋十二經皆取決於脾胃氣於胃也

雲苓地四錢 益智仁一錢 半夏三錢

生薏仁五錢 廣皮炭二錢 生姜五錢

慶室女十六歲 不食十餘日諸醫不效面赤脈洪與五汁飲降胃陰法兼服牛乳
三日而大食矣

甘蔗汁 梨汁 蘆根汁 荸薺汁 藕汁 各等分拌勻

邱 十八歲 溫熱愈後午後微熱不除脈弦數面赤與五汁飲三日熱退進食七
日全愈

噎食

王 左尺獨大腎液不充腎陽不安其位尺脈以大為虛經所謂陰衰於下者
是也右手三部俱弦食入則痛經所謂結腸於上者是也有陰衰而累及

陽結者有陽結而累及陰衰者此症形體長大五官俱露木火通明之象
凡木火太旺者其陰必素虛古所謂瘦人多火又所謂瘦人之病慮虛其
陰凡噎症治法必究陰衰陽結何者為先何者為後何者為輕何者為重
此症既係陰虛為本陽結為標何得妄用大黃十劑之多雖一時暫通陽
結其如陰虛而愈虛何業醫者豈不知數下亡陰乎且雲岐子九法大半
皆攻俞嘉言痛論其非醫者豈非之見邪愚謂因怒停食名之食隔或可
一時暫用大黃亦不得恃行數用今議五汁飲果實之甘寒牛乳血肉之
變化降胃陰以和陽結治其標大用專翁大生膏峻補肝腎之陰以救陰
衰治其本再能痛戒怒惱善保天和猶可望愈

專翁大生膏方

大熟地 四斤 海參 四斤 山萸肉 二斤 揀洋參 四斤 鱉甲 四斤
桂圓肉 二斤 鮑魚 四斤 提麥冬 四斤 杭白芍 四斤 牡蠣 四斤

吳氏醫案

噎食

十一

龜版膠 四斤 雲苓 四斤 猪脊髓 一斤 烏骨雞 一對 蓮子 四斤

沙蒺藜 四斤 芡實 二斤 羊腰子 三十對 真阿膠 四斤 白蜜 四斤

雞子黃 四兩

取盡汁文火煎煉成膏

癸亥十月 李 五十大凡噎症由於半百之年陰衰陽結古來紛紛議論各殊
十三日 李 五十大凡噎症由於半百之年陰衰陽結古來紛紛議論各殊

所長俱未定宗大抵偏於陽結而陰衰者宜通陽氣如旋覆代赭湯進退
黃連湯之類偏於陰衰而陽結者重在陰衰斷不可見一毫香燥如丹溪
之論是也又有食隔宜下痰隔宜導血隔宜通絡氣隔宜宣肝嘔吐太過
而傷胃液者宜牛轉草覆其液老僧寡婦強制太過精氣結而成骨橫處
幽門宜驚血以化之厨役受穢濁之氣傷肺酒肉勝食氣而傷胃宜化清
氣不可勝數按此症脈沈數有力而渴面色蒼而兼紅甫過五旬髮髮皆
白其為平日用心太過重傷其陰而又伏火無疑議且用玉女煎法

煨石膏 八錢 麥冬 六錢 牛膝 三錢 旋覆花 新絲炒 包三錢

大熟地 六錢 白粳米 一撮 知母 二錢 炙甘草 三錢

每早服牛乳一茶碗

甲子二月張 六十老年陽結又因久飲怒鬱肝旺尅土氣上阻咽致成噎食

按陽氣不虛不結斷非破氣可療議一而通補胃腸一而鎮守肝陰法

代赭石 煨一兩 半夏 一兩 姜炒洋參 二錢 桂枝 六錢

旋覆花 包煎 五錢 生薑 六錢 茯苓塊 四錢 七帖

二十 陽脈已起恐過潤其液議進陰藥退陽藥

代赭石 煨一兩 半夏 六錢 炒白芍 六錢 旋覆花 包煎 六錢 洋參 四錢

炙甘草 三錢 桂枝 三錢 茯苓塊 三錢 薑汁 每盃沖 三小匙

廿五 前日脈數因退陽進陰今日脈緩而痰多仍須進陽俾中焦得運以復其

健順有常之體

半夏 一兩 代赭石 一兩 生薑 五片 焦白芍 三錢

吳氏醫案

噎食

主

桂枝 六錢 茯苓塊 八錢 洋參 二錢 旋覆花 包煎 六錢 兩帖

五十 先因酒樓中飲酒食燒小豬鬃皮甫及下咽即有家人報知朋友凶

信隨即下樓尋車夫不知去向因步行四五里尋至其友救難未遇又

步行四里又未遇渴飲冰振烏梅湯一二碗然後僱車回家心下隱隱

微痛一月後痛有加延醫調治一年不效次年五月飲水一口胃中痛如

刀割乾飯不下咽已月餘矣閏五月初八日計一粒不下已十日得瘦如

柴而赤如精脈沈洪有力胃中痛處高起如桃大按之更痛不可忍余曰

此食隔也當下之因用大承湯加牽牛作三桶伊家見方重不敢服求錢

而後服一碗痛至臍腹二碗痛至小腹服三碗痛至肛門大痛不可忍又

不得下於是又作半劑服一碗外加蜜導法始下如雞蛋黑而有毛堅不

可破次日先吃爛麵半碗又次日飲粥湯三日食粥五日吃乾飯矣下後

所用者五汁飲也

楊 四十 先因微有痰飲咳嗽誤補於前誤下於後津液受傷又因肝鬱性急

致成噎食不食而大便燥六脈弦數治在陰衰

大生地 六錢 麥冬 五錢 麻仁 三錢 廣鬱金 八分

生阿膠 三錢 白芍 四錢 丹皮 三錢 炙甘草 三錢

服七帖而效又於前方加 鱉甲 四錢 杞子 三錢 服十七八帖而大效

進食如常惟餘痰飲後以外臺茯苓飲減廣皮枳實收全功

庚寅五月 陳 三十 酒客不戒於怒致成噎食其勢已成非急急離家玩遊山

水開懷暢遂斷不為功蓋無情草木不能治有情之病與進退黃連湯法

雲苓塊 四錢 人參 二錢 炙甘草 一錢 旋覆花 包煎 四錢

炒黃連 五分 半夏 四錢 生薑汁 沖 三 薤白 三錢

煮三盃分三次服

廿二 效不更方再服四帖

吳氏醫案

噎食

主

廿八 即於前方內加 廣橘皮 三錢 又服四帖

六月初 怒鬱兼酒毒與進退黃連湯法業已見效仍宗前法餘有原案

人參 三錢 雲苓塊 四錢 生薑汁 三匙 神麴 三錢 旋覆花 包煎 四錢

半夏 四錢 炙甘草 一錢 炒黃連 五分 薤白 三錢 廣橘皮 三錢

煮三盃分三次服

十二 諸症雖減六脈弦緊於前方減去黃連加溫藥調和營衛餘有原案

人參 三錢 雲苓塊 四錢 生白芍 三錢 麥冬 四錢 廣橘皮 三錢

桂枝 三錢 旋覆花 包煎 炒黃連 五分 炙甘草 一錢 大棗肉 二枚

薤白 三錢 神麴 三錢 生薑 三錢 煮三盃分三次服

廿二 諸症雖減六脈弦緊於前方內去黃連薤白加 代赭石 五錢

五月十 越 四十 噎食脈弦細脇痛前與宣肝絡其痛已止與代赭旋覆湯治

其噎

廿四 嘔吐不食即安胃丸法已效但小便猶短兼有口瘡議兼開太陽
 代赭石 八錢 人參 三錢 美半夏 五錢 炙甘草 三錢
 旋覆花 五錢 洋參 一錢 雲苓塊 五錢 大棗肉 三枚
 生薑 五錢 煮三盃分三次服

廿九 又服四帖
 癸亥三月 六十 舊有痰飲或發嘔吐仍係痰飲見症醫者不識乃用苦寒
 堅陰無怪乎無可存之物矣議食入則吐是無火例
 淡吳萸 五錢 半夏 八錢 淡乾姜 五錢 生薏仁 六錢 廣皮 三錢
 生薑汁 每次沖 水五盃煮二盃分二次服渣再煮一盃服

廿三 前方業已見效但脈遲緊與通養胃陽
 人參 一錢 淡吳萸 三錢 半夏 三錢 生薏仁 三錢
 吳氏醫案 嘔吐 齒

恆氏 七歲 初因大驚肝氣厥逆嘔吐頻仍後因誤補大嘔不止嘔即避人以剪
 刀自刎漸至粒米不下體瘦如柴奄奄一息仍不時干嘔四肢如冰後事
 俱備脈弦如絲而勁與烏梅丸法
 遼參 三錢 川椒炭 四錢 吳萸 泡淡 三錢 半夏 四錢 薑汁 三匙
 川連 姜炒 二錢 雲苓塊 五錢 烏梅 去核 五錢 黃芩炭 一錢
 服二帖而進米飲服四帖而食粥七帖後全愈後以兩和肝胃到底而
 大安

己丑正月 咳氏 五歲 嘔吐不食已久六脈弦細而弱與安胃丸法
 初十日 美半夏 八錢 川椒炭 六錢 廣皮 五錢
 雲苓塊 六錢 烏梅肉 四錢 生薑 五錢
 甘瀾水八茶盃煮成三盃分三次服

廿八 肝鬱停痰嘔吐百餘日治不如法肝未愈而胃大傷議與
 苦辛以伐肝甘淡以養胃陽
 美半夏 五錢 人參 三錢 淡吳萸 三錢 雲苓 五錢 川椒炭 四錢
 炒川連 五錢 生薑汁 三匙 煮三盃分三次服

六月初 於前方內減川椒炭一錢淡吳萸一錢加
 旋覆花 包煎 三錢 香附 三錢 美半夏 一錢
 初六 肝木橫穿土位嘔逆百餘日不止與苦辛伐肝用甘淡養胃陽已見大效
 俟膈下絲毫不用此方銀肝逆養肝陰補中陽性情之病胸中須海闊
 吳氏醫案 嘔吐 齒

甲子十一月 七十 老年陽微濁聚以致胸痺反胃三焦之陽齊閉難望有成
 月廿五日 議先通胸上清陽
 桂枝尖 五錢 半夏 五錢 括蕒 二錢 薤白 三錢 小枳實 八分
 白茯苓 一錢 白蜜 半酒 厚樸 一錢 薑汁 三小匙
 水八盃煮取三盃分三次服

三十 老年陽微濁聚反胃胸痺用開清陽法業已見效但嘔痰仍多議食入則
 吐為無火例用萊菔湯合大半夏法
 吳萸 泡淡 半錢 白蜜 一兩 白蜜 一兩 洋參 一兩 生薑 二兩

水八碗煮取三碗分三次服渣再煮半碗服

初三即於前方內加 茯苓塊 五錢

初十於前方內去吳萸加 薤白 三錢

嗽於決切與呃同

癸亥六月 王 三十六脈俱濡右寸獨大溼淫於中肺氣實鬱因而作嘔與傷

寒陽明足太陰之寒嘔有間以宣肺氣之痺為主

飛滑石 三錢 竹茹 三錢 白通草 二錢 生薑汁 每盃沖入 三小匙

杏仁泥 三錢 柿蒂 三錢 生薏仁 三錢 廣皮 二錢

十七 泄瀉胸悶於前方內加 茯苓 三錢 藿香梗 二錢

十九 脈之濡者已解寸之大者已平惟胃中有飲隔拒上焦之氣不得下通故

於其旺時而嗽甚今從陽明主治

茯苓塊 五錢 半夏 六錢 杏仁泥 二錢 飛滑石 三錢 小枳實 一錢 五分

吳氏醫案

反胃 嗽

夫

生薏仁 五錢 廣皮 三錢 藿香梗 三錢 白通草 三錢 柿蒂 三錢 三帖

廿二 嘔雖止而六脈俱數右手更大泄瀉色黑舌黃氣分溼熱可知

連翹 二錢 茯苓皮 五錢 黃芩炭 一錢 銀花 二錢 飛滑石 三錢

厚樸 一錢 扁豆皮 三錢 生薏仁 三錢 澤瀉 三錢 白通草 二錢

煮三盃分三次服三日六帖

咳嗽

甲子四月 吳 二十六脈弦勁有陰無陽但咳無痰且清上焦氣分

沙參 三錢 生扁豆 三錢 連翹 一錢 麥冬 三錢 冬霜葉 三錢 玉竹 三錢

冰糖 三錢 茶菊花 三錢 杏仁 三錢 煮三盃分三次服三帖

廿六 於前方內去連翹加 丹皮 二錢 地骨皮 三錢

肺癰

癸亥三月 王氏 五十八初起喉痺為快利藥所傷致成肺癰胸中痛口中燥痺仍

未達不食不寐痰氣腥臭已有成膿之象脈短而數寒熱且移於大腸而

泄瀉難愈之證勉與急開提肺氣議千金葶藶湯與甘桔合法

苦桔梗 二兩 桃仁 五錢 冬瓜仁 五錢 生薏仁 一兩 甘草 一兩

鮮薑根 四兩 水八碗煮成三碗渣再煮一碗分四次服

己巳年 堂伯兄 四十 飲火酒坐熱炕晝夜不寐喜出汗誤服枇杷葉麻黃等利

肺藥致傷津液遂成肺癰臭不可當日吐膿二升許用千金葶藶湯合甘

桔法

葶根 八兩 苦桔梗 三兩 桃仁 一兩 薏仁 二兩 冬瓜仁 一兩 生甘 一兩

煮成兩大茶碗晝夜服完碗半服去十之七以盡劑膿去八九又服半

劑毫無臭味後以調理脾胃收功

己卯年 朱詠齋世兄 五十 以二月初受風與桂枝湯一帖風解膿怯不敢去厚

衣因而汗多初四五等日又受風溫口渴思涼脈洪數先與辛涼輕劑不

吳氏醫案

肺癰

七

解脈又大汗更多口更渴身更熱因與辛涼重劑石膏等一帖身涼渴止

脈靜仍膿怯不去厚衣初十日當大內差使坐夜起五更衣更厚遂間不

敢去皮衣以致重亡津液而成肺癰與葶藶湯日二三帖服之五七日不

膿膿成臭極加苦葶藶子五錢膿始退未能十分淨盡後十日又發膿又

成吐如茶豆汁膿臭每吐一椀餘又與前方加葶藶三錢服三帖方平後

以補胃逐痰飲收功再其人色白體肥夙有痰飲未病之前秋冬兩季已

在 上書房行走早起恐寒誤服俗傳藥酒方本不嗜酒每早強飲數小

盃次年患此恙之由也

失音

乙丑二月 朱 右脈洪數有力金實無聲麻杏石甘湯證也奈已為前醫發汗

麻黃未便再用議清音湯加石杏

半夏 六錢 苦桔梗 六錢 石膏 六錢 杏仁粉 五錢 葶藶 五錢 生甘草 二錢

水五盃煮成二盃再煮一盃分三次服

初三 肺藏本熱為外風所搏實而無聲究係厥本石日之法為速

生石膏 一兩 麻黃 五錢 炙甘草 三錢 杏仁泥 六錢 半夏 五錢

初四 右脈之洪數有力者已減其半而音亦漸開仍用麻杏石甘加半夏一帖

生麻黃 三錢 生石膏 一兩 杏仁泥 七錢 姜半夏 七錢 炙甘草 三錢

甘瀾水八碗煮成三碗分三次服以後病減者減其製

乙酉正月 沈 二十 六脈弦細如絲陽微極矣咳嗽便溏納食不旺由上焦損

及中焦所以致損之由初因遺精繼因秋傷於溼冬必咳嗽外邪未清驟

然用補使邪無出路致咳嗽不已古謂病有三虛一實者先治其實後治

其虛現在喉啞治實先與開提肺氣治虛與諸虛不足之小建中湯

苦桔梗 四錢 雲苓塊 五錢 杏仁泥 二錢 姜半夏 四錢

生薏仁 五錢 生甘草 一錢 煮二盃分二次服

吳氏醫案

失音

夫

二月初 六脈弦細之極陰陽俱損急須用補以外感未淨喉音未清暫與理肺

一帖後再診

茯苓塊 四錢 苦桔梗 二錢 生甘草 三錢 甜杏仁 四錢 冰糖 四錢

鮮蘆根 四錢 姜半夏 三錢 煮二小盃分三次服

球 四十 酒客失音與麻杏石甘湯

生石膏 四兩 麻黃 五錢 杏仁 四錢 炙甘草 三錢

又 服一帖無汗音不出服二帖微汗音出不甚響仍用前法

蜜炙麻黃 三錢 生石膏 三錢 炙甘草 三錢 杏仁 四錢

又 服五帖音大出但脈滑耳與清音湯

苦桔梗 六錢 姜半夏 六錢 炙甘草 二錢

又 服五帖音清脈消痰飲不盡與外臺茯苓飲法減辛藥

茯苓 八錢 沙參 三錢 半夏 五錢 廣皮 二錢 甘草 一錢 五分

麥冬 不去心 小枳實 一錢 七帖而安

歌兒十五 失音歌唱勞傷肺火喉啞

洋參 切薄片 鮑魚 切薄片

早晚各取鮑魚二錢洋參五分煎湯頓服之歌時取鮑魚洋參各一片

貼牙後腮間噤其津液以後不復啞矣

歌兒十六 因飲酒過度食水果寒熱相搏溼熱內壅

蘇梗 苦桔梗 神麩 半夏 甘草

蘆根 茯苓塊 服數帖而愈

水氣

甲子三月 蘭女 十四 脈數水氣由面腫至足心經謂病始於上而盛於下者先

治其上後治其下讓腰以上腫當發汗例越婢加朮湯法

吳氏醫案

失音 水氣

夫

水五盃煮取二盃先服一盃得汗止後服不汗再服

生石膏 八錢 麻黃 去節 三錢 生薑 三片 炙甘草 二錢

杏仁泥 五錢 桂枝 二錢 大棗 去核 二枚

水八盃煮取三盃分三次服以汗出至足為度又不可使汗淋漓

甘四 水氣由頭面腫至足下與越婢法上身之腫已消其半茲脈沈而數以涼

淡復微苦利其小便

飛滑石 五錢 生薏仁 五錢 杏仁 三錢 茯苓皮 六錢

黃柏炭 一錢 海金沙 六錢 澤瀉 三錢 白通草 三錢

不能戒鹹不必服藥

甲子三月 通女 十九 右脈大於左浮而緊諸有水氣者腰以上腫當發汗但其

人自汗不得再發咳而熱仍以肺氣為主用小青龍湯去麻辛

杏仁泥 四錢 半夏 五錢 製五味 一錢 生薏仁 三錢

炙甘草一錢 桂枝三錢 炒白芍一錢五分 乾姜一錢

水五盃煮取二盃分二次服

廿二 於前方內加 茯苓塊五錢

廿四 風水愈後咳亦止多汗議苓桂朮甘湯加黃耆蜀椒而護表

茯苓五錢 生絲薯三錢 炙甘草三錢 桂枝四錢 於朮三錢

煮取二盃分二次服三帖

章 四十腰以下腫當利小便六脈沈細之極腸鳴色黑陽氣幾微溼沒矣

茯苓皮八錢 桂枝八錢 良姜三錢 生茅朮五錢 澤瀉六錢

老厚樸三錢 猪苓六錢 椒目三錢 安邊桂三錢 廣皮二錢

水八碗煮取三碗渣再煮一碗分四次服以小便利為度

又 腫脹胸痞用半夏瀉心湯法俟病愈再服前方

半夏 川連 生薑 黃芩 乾姜

吳氏醫案

水氣

三

甲子三月某 前因中焦停飲咳嗽轉用溫藥今雖飲咳見效小便究未暢行

脈之沉部洪較有力症本溼中生熱又有酒毒仍以涼利小便之苦辛淡

法

飛滑石六錢 晚蠶砂三錢 杏仁四錢 雲苓皮五錢 黃柏炭一錢

海金沙五錢 生薏仁四錢 半夏二錢 白蔻仁一錢五分 白通草一錢

冬霜葉三錢 煮成三盃分三次服

廿八 風水已愈其半復感風寒身熱頭痛身半以上復腫口渴脈浮數與越婢

加朮法

生石膏二兩 麻黃去節炒蒼朮二錢 杏仁泥五錢 桂枝三錢

炙甘草二錢 煮成三盃先服一盃得微汗即止

廿九 風水汗後脈洪數渴而停水腫未全消猶宜涼開膀胱

生石膏二兩 雲苓皮五錢 白蔻仁二錢 杏仁泥五錢 姜半夏三錢

飛滑石六錢 小枳實四錢 晚蠶砂三錢 生薏仁三錢 海金沙五錢

益智仁三錢 白通草一錢 猪苓三錢 廣皮一錢 煮成三盃分三次服

四月初 改用前方去石膏

初二 水腫未全消脾陽不醒食不能膾糞後見紅

甯中黃土一兩 飛滑石五錢 熟附子二錢 杏仁泥五錢

雲茯苓皮五錢 黃芩炭一錢 海金沙四錢 白通草一錢

鷲眼枳實二錢 生薏仁五錢 南蒼朮三錢 煮成三盃分三次服

初五 小便猶不甚長胃中得熱物微噎右脈滑數

飛滑石五錢 杏仁五錢 小枳實二錢 草薢三錢 益智仁一錢

雲苓皮五錢 厚樸一錢 海金沙五錢 木通一錢 廣皮炭一錢

生薏仁三錢 煮成三盃分三次服

初七 小便仍未通暢右脈數大未退仍宜涼肺以開膀胱

吳氏醫案

水氣

三

飛滑石六錢 杏仁五錢 晚蠶砂三錢 雲苓皮五錢 薏仁連皮一錢五分

大腹皮二錢 厚樸二錢 生薏仁四錢 海金沙六錢 桑皮三錢

白通草一錢 煮成三盃分三次服

初九 腫未全消又發痰飲咳嗽表通則小便長右脈洪數議照溢飲例與大青

龍法

生石膏一兩 麻黃蜜炙細辛一錢 桂枝四錢 雲苓塊連皮五錢

姜半夏五錢 杏仁五錢 生薑三錢 大棗去核炙甘草三錢

煮成三盃分三次服

十一 咳減小便數而欠渴思涼飲鼻衄肺熱之故

生石膏四兩 姜半夏五錢 桂枝五錢 杏仁泥六錢 小枳實三錢

雲苓皮三錢 炙黃耆三錢 生薑三片 炙甘草三錢 大棗去核

煮成三盃分三次服

十三 腰以下腫已消腰以上腫尚重與治上焦法

茯苓皮 五錢 生薏仁 五錢 麻黃 去節 三錢 姜半夏 五錢 白茅根 三錢

生石膏 四兩 白通草 一錢 杏仁 五錢 蘆根 五錢 煮成三盃分三次服

十五 腫減咳增脈洪數仍未止

杏仁泥 八錢 麻黃 蜜炙 三錢 生薏仁 三錢 旋覆花 三錢 包煎

生石膏 四錢 半夏 三錢 白茅根 三錢 白通草 一錢

飛滑石 六錢 蘆根 五錢 煮成三盃分三次服

十七 咳雖減脈仍滑數腫未全消

生石膏 四兩 杏仁 六錢 苦葶 三錢 飛滑石 六錢 海金沙 五錢

茯苓皮 三錢 半夏 五錢 蘇葉 連梗 三錢 煮成三盃分三次服

福 二十 初因愛飲冰振黃酒與冰振水果內溼不行又受外風從頭而腫起不能臥晝夜坐被上頭大如斗六脈洪大先以越婢湯發汗腫漸消繼以

吳氏醫案 水氣 三

調理脾胃藥服至一百四十三帖而愈噁其戒猪肉黃酒水果伊雖不飲而冰振水果不能戒也一年後糞後便血如注與金匱黃土湯每劑黃土用一筋附子用八錢服至三十餘劑而血始止後與溫補脾陽至九十帖而始壯

范 十八 風水腫脹

生石膏 四兩 麻黃 去節 三錢 桂枝 三錢 杏仁泥 五錢

炙甘草 三錢 大棗 二枚 煮成三盃分三次服

一帖而汗解頭面腫消次日與實脾利水五日全愈戒其避風伊不聽

後八日復腫如故仍與前法而愈後受戒規故不再發

周 十八 腫從頭而起

麻黃 去節 生石膏 一兩 杏仁 五錢 桂枝 三錢 炙甘草 三錢 蒼朮 三錢

煮成三盃分三次服如汗出不止以服一帖汗出不至足次日又服半

帖腫全消後以理脾收功

寒溼

乙丑六月 郭 三十 太陰中溼病勢沈悶最難速功非極剛以變脾胃兩陽不

可 姜半夏 六錢 桂枝 五錢 生茅朮 四錢 茯苓皮 五錢 椒目 三錢

小枳實 三錢 廣皮 三錢 生薏仁 五錢 生草果 三錢 生薑 一兩

老厚樸 四錢 煮成三碗分三次服

十九 寒溼為病誤用硝黃致瀾陰蟠踞堅凝如石苟非重剛何以直透重圍

川椒 炒黑 四錢 安邊桂 二錢 生薏仁 五錢 熟附子 五錢

猪苓 三錢 老厚樸 四錢 茯苓皮 五錢 澤瀉 三錢

乾姜 四錢 小茴香 三錢 生草果 二錢 白通草 二錢

廣皮 三錢 煮四碗分四次服 共服十三帖而後服轉

吳氏醫案 寒溼 三

辛卯十月 薛 二十 外痺寒溼太重內痰飲不食不寐咳嗽口渴大小便赤服

數先開肺痺

生石膏 先煎代 水一兩 桂枝 四錢 姜半夏 三錢 飛滑石 先煎 六錢

生薏仁 三錢 杏仁泥 五錢 小枳實 三錢 茯苓皮 五錢

防己 五錢 橘皮 三錢 煮四盃日三夜一分四次服

二十 外痺痛而內痰飲內外俱痺

生石膏 先煎代 水二兩 桂枝 三錢 海桐皮 三錢 飛滑石 六錢 杏仁 五錢

片姜黃 三錢 茯苓皮 五錢 穿山甲 三錢 姜半夏 五錢 地龍 三錢

生薏仁 三錢 白通草 一錢 橘皮 三錢 煮四盃分四次服二帖

廿二 痺痛腫重用藥以由經達絡為要

生石膏 二兩 桂枝 尖 三錢 防己 五錢 飛滑石 六錢 穿山甲 三錢

杏仁泥 五錢 片姜黃 三錢 地龍 三錢 茯苓皮 五錢 嫩桑枝 三錢

姜半夏三錢 乳香一錢 橘皮一錢 煮四孟分四次服二帖

廿四 痺症先腿重而後腕重昨與通經活絡茲上下皆輕痛減能動脈亦漸小脈小則病退也但加飲咳

生石膏八錢 飛滑石四錢 防己五錢 蘇子霜三錢 杏仁泥五錢
姜半夏六錢 穿山甲三錢 地龍三錢 晚蠶砂三錢 雲苓皮五錢
桂枝尖三錢 桑枝尖三錢 橘皮三錢 煮四孟分四次服二帖

廿六 右寸猶大腫痛未除

生石膏一兩 飛滑石六錢 杏仁六錢 海桐皮三錢 雲苓皮三錢
片姜黃三錢 穿山甲三錢 防己六錢 晚蠶砂三錢 姜半夏三錢
桂枝尖三錢 白通草一錢 地龍三錢 煮四孟分四次服二帖

廿八 右寸已小故右肢痛減左脈弦故左肢仍痛

杏仁泥五錢 雲苓皮五錢 獨活一錢 防己六錢 乳香三錢

吳氏醫案

寒溼

活

穿山甲三錢 桂枝尖五錢 沒藥三錢 地龍三錢 歸類三錢

片姜黃三錢 海桐皮三錢 煮四孟分四次服二帖

壬辰七月 毓氏二十 風寒溼三氣合而為痺脈弦又感燥金涼氣腹痛峻温猶

悉不及尚可吃生冷猪肉介屬等陰物乎

熟附子三錢 桂枝五錢 吳茱萸一錢 茯苓塊連皮六錢

生薏仁五錢 杏仁三錢 高良姜一錢 片姜黃二錢

川椒炭二錢 橘皮三錢 煮四孟分四次服二帖

廿九 表裏俱痺肢痛板痛前用暖温現在板痛少減仍遊走作痛兼有痰飲不

寐先與和裏

姜半夏八錢 桂枝五錢 吳茱萸二錢 小枳實二錢

茯苓塊連皮六錢 防己三錢 高良姜一錢 川椒炭二錢

橘皮三錢 煮三孟分三次服二帖

八月初 諸證已愈八九惟痺痛尚有斯須自覺胸中氣阻飽食反不阻矣宗氣

之虛可知議通補中焦

茯苓塊六錢 桂枝四錢 姜半夏三錢 焦於朮三錢

高麗參二錢 杏仁三錢 片姜黃一錢 炙甘草二錢

橘皮三錢 煮三孟分三次服四帖

痺

初十日 五月 崑氏二十 風溼相搏一身盡痛既以誤汗傷表又以誤下傷裏海屈

涼飲面赤舌絳得飲反停脇脹胸痛皆不知病因而妄治之累也議木防己湯兩開表裏之痺

生石膏一兩 桂枝六錢 木防己四錢 杏仁四錢 生香附三錢

炙甘草三錢 蒼朮五錢 煮三孟渣再煮一孟分四次服

十二 脇脹止而胸痛未愈於前方內加薤白廣皮以清胸上之陽

吳氏醫案

寒溼 痺

活

薤白三錢 廣皮三錢

十四 痺症愈後胃不利土惡溼也

姜半夏一兩 秫米二合 生薑三片 茯苓塊五錢

水五碗煮取二碗渣再煮二碗分三次服

十六 痺後清陽不伸右脇痠痛

半夏六錢 薤白三錢 吳茱萸一錢 桂枝二錢 烏藥一錢 青皮一錢

廣皮一錢 鬱金一錢 煮取二孟渣再煮一孟分三次服

吳氏醫案

生石膏五錢 桂枝三錢 海桐皮一錢 杏仁泥三錢

生薏仁三錢 防己二錢 茯苓皮二錢 片姜黃一錢

炙甘草一錢 牛膝一錢 煮三孟分三次服

癸亥十一張 二十風溼

羌活 三錢 苦桔梗 三錢 桂枝 二錢 半夏 一錢
 蘇葉 三錢 杏仁泥 三錢 陳皮 一錢 生薑 三片
 炙甘草 一錢 煮三盃分三次服

十六 風溼相搏一身盡痛汗之不汗用麻黃加朮法
 麻黃 五錢 去節 薏苡 五錢 杏仁 五錢 桂枝 三錢 炙甘草 三錢
 羌活 五錢 生薑 三片 煮三盃分三次服

晚 於前方內加 熟附子 三錢 半帖而愈

乙酉四月 十八 跗腫右脈洪數痰多咳嗽口渴莖中痛與涼利小便法
 廿九日 胡 歲 附腫右脈洪數痰多咳嗽口渴莖中痛與涼利小便法
 生石膏 八錢 滑石 六錢 海金沙 五錢 雲苓皮 五錢 生薏仁 五錢
 甘草稍 一錢 五分 半夏 三錢 煮三盃分三次服四帖

五月初 脈之洪數漸減去石膏二錢加 杏仁 三錢 廣皮 三錢
 六月 溼熱傷氣氣傷則短汗多必渴溼聚則跗腫與猪苓湯去阿膠加銀花以
 吳氏醫案 痺 美

化溼熱化則諸證皆愈

飛滑石 六錢 猪苓 四錢 銀花 三錢 雲苓皮 五錢
 澤瀉 三錢 煮三盃分三次服

二十 溼熱不擾下注腫小便利莖中痛
 滑石 六錢 茯苓皮 五錢 萹藤 五錢 猪苓 三錢
 薏仁 三錢 晚蠶砂 三錢 澤瀉 三錢 木通 二錢
 甘草稍 一錢 煮三盃分三次服服至小便暢為度

廿四 脈洪數小便反黃加 黃柏滑石莖痛止去甘草稍
 七月初 小便已長腫未全消脈弦滑咳嗽多痰
 半夏 六錢 生薏仁 五錢 萹藤 五錢 猪苓 三錢 澤瀉 三錢
 廣皮 四錢 茯苓皮 五錢 煮三盃分三次服

乙酉四月 張二十 身熱頭痛腰痛肢痛無汗六脈弦細兩目不明食少寒溼
 十九日 張二十 身熱頭痛腰痛肢痛無汗六脈弦細兩目不明食少寒溼

痺也

川烏頭 三錢 桂枝 五錢 防己 三錢 熟附子 三錢
 生薏仁 五錢 杏仁 五錢 羌活 二錢 澤瀉 三錢
 茯苓皮 五錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

五月初 服前方二帖頭痛止旋即誤服他人補陰藥便溼腹脹今日復診因頭
 三日 痛愈用原方去羌活治藥逆加厚樸 三錢
 初八 痺症已愈頗能舉步便溼泄瀉皆止目已復明胃口較前加餐因多服一
 帖脈稍數寒溼有化熱之象當與平藥逐其化熱之餘邪而已
 飛滑石 六錢 杏仁 二錢 蠶砂 三錢 桑枝 五錢 茯苓皮 五錢
 生薏仁 五錢 澤瀉 三錢 防己 一錢 煮三盃分三次服

六月初 又感受暑溼泄瀉腹脹與五苓法
 桂枝 五錢 雲苓皮 五錢 生薏仁 五錢 猪苓 四錢
 吳氏醫案 痺 毛

澤瀉 三錢 廣木香 二錢 炒薏苡 三錢 廣皮 三錢
 大腹皮 三錢 煮三盃分三次服

乙酉六月 趙氏 四十 太陽寒痺脈弦背心板着而痛
 廿日 茯苓皮 五錢 桂枝 五錢 川椒炭 三錢 生薏仁 五錢 川烏頭 三錢
 白通草 一錢 防己 三錢 煮三盃分三次服

廿五 服前藥已效而背痛難除加 附子 三錢
 七月初 脈已回陽痛未止每日服半帖六日三帖加 晚蠶砂 四錢 木通 三錢
 初九 脈仍小陽未回背仍痛再服三帖分六日
 乙酉五月 趙 三十 痺症夾伏溼腹脹痛且有肥氣溼已化熱故六脈俱滑此
 初六日 症本寒標熱先治其標本當在後

生石膏 四兩 桂枝 六錢 厚樸 五錢 防己 四錢 杏仁泥 六錢
 姜半夏 五錢 廣皮 四錢 煮三盃分三次服四帖

初十復診尺脈洪數更甚加 雲苓皮 六錢 黃柏 三錢 木通 三錢

十一尺脈仍洪腹痛欲便後肛門熱痛原方再服一帖

十六水停心下漉漉有聲暫與逐水無暇治痺

半夏 六錢 枳實 六錢 生薑 五錢 廣皮 五錢

甘瀾水八盃煮成三盃分三次服

十九水瀉退腹脹甚仍服前方去黃柏加大腹皮

廿三痺少減胃悶不開其人本有肥氣肥氣成於肝鬱暫與兩利肝胃

厚樸 三錢 降香末 三錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

六月 初右脈大而數去蘇子厚樸青皮加 黃芩 一錢

初五 諸症向安脈亦調適胃口亦開以調理脾胃立法

雲苓皮 五錢 半夏 五錢 白薏仁 一錢 生薏仁 五錢

吳氏醫案 痺 美

黃芩炭 二錢 廣皮 二錢 煮三盃分三次服

二十 誤食西瓜寒冷未有不發停飲者

雲苓塊 五錢 半夏 五錢 公丁香 八分 乾姜 三錢 小枳實 三錢

白薏仁 一錢 廣皮 三錢 益智仁 五分 煮三盃分三次服

乙酉五月 錢氏 四歲 寒痺脈弦短瀉而緊由腿上連少腹痛不可忍甚至欲厥

兼有痰飲胃痛

桂枝 六錢 雲苓皮 五錢 小茴香 三錢 川椒炭 三錢

防己 四錢 生薏仁 五錢 川烏頭 三錢 海桐皮 三錢

廣皮 三錢 片姜黃 三錢 煮三盃分三次服

六月初 左脈稍長仍然緊甚再服一帖 丸方寒溼為病

雲苓塊 八兩 炒蒼朮 六兩 熟附子 二兩 草薢 四兩 川椒炭 三兩

生薏仁 八兩 小茴香 四兩 川棟子 三兩 木通 四兩

其為細末神效為丸如小梧子大每服三錢姜湯下

乙酉正月 楊氏 六歲 前首崩帶後得痿痺病者自疑虛損詢病情寒時熱時

重正所謂經熱則痺絡熱則痿者也再行經有紫有黑經來時不維腰腿

大痛少腹亦痛經亦不調或多或少或算日數亦然此中不但溼熱且有瘀血

治溼熱用湯藥治瘀血用丸藥 左脈浮取弦而沈取寬 湯藥用諸痲獨取

太陰法丸藥用化癥回生丹

生石膏 二兩 桂枝 四錢 海桐皮 三錢 杏仁泥 五錢

生薏仁 五錢 防己 四錢 晚蠶砂 三錢 雲苓皮 五錢

白通草 一錢 煮三盃分三次服

乙酉 月 廿六歲 暑溼痺症誤以熱地等柔藥滑脾致令泄瀉臥牀不起兩足

蹇曲不伸飲食少進兼之疝痛先以五苓加川椒廣皮木香止其瀉繼以

半夏廣皮良姜益智白薏開其胃復以丁香川椒吳萸雲苓薏仁姜黃平

其疝又以防己杏仁桂枝烏頭薏仁雲苓皮川椒等伸其痺末惟引痛風

在筋也重用地龍桂枝引痛亦止後以補脾胃而全愈

王 四十歲 溼為痺背痛不能轉側晝夜不寐二十餘日兩腿拘攣手不能持

口眼歪斜煩躁不寧畏風自汗脈弦舌苔白滑面色昏暗且黃睛黃大便

閉先以桂枝杏仁薏仁羌活廣皮半夏茯苓防己川椒滑石令得寐繼以

前方去川椒羌活加白通草蠶砂草薢得大便一連七八日均如黑彈子

服至二十餘劑身半以上稍鬆背足痛甚於前方去半夏加附子片子姜

黃地龍海桐皮又服十數帖痛漸止又去附子地龍又服十數帖足漸伸

後用二妙丸加雲苓薏仁草薢白朮等藥收功

何 六十歲 手足拘攣誤服桂附人參熟地等補陽以致面赤脈洪數小便閉身

重不能轉側手不能上至鬢足蹇曲絲毫不能轉側移動細詢病情因大

飲食肉而然所謂溼熱不攘大筋短小筋弛長軟短為拘弛長為痿者

也與極普通小腸淡滲利膀胱

生石膏 八兩 防己 五錢 胡黃連 三錢 茯苓皮 六錢 晚蠶砂 四錢

飛滑石 一兩 杏仁 三錢 龍膽草 四錢 穿山甲 三錢 白通草 二錢

洋蘆薈 三錢 桑枝 五錢 地龍 三錢 煮三碗分三次服

前方服至七日後小便紅黑而濁臭不可當半月後手漸動足漸伸一

月後下牀扶椅桌能行四十日後走至簷前不能下階又半月始下階

三月後能行四十步後因痰飲用理脾肺收功此症始於三月廿三日

至八月廿三日停藥

周

四十兩腿紫絳而腫上起小細瘡如癩已三年矣兩腿膝痠痛不能立六

脈弦細而緊劉氏扁鵲心書謂之蘇木腿蓋寒溼着痺也

附子 八兩 雲苓皮 一兩 桂枝 一兩 生薏仁 一兩 烏頭 六錢

煮四盃分四次服服至三十餘帖而始策杖能行後去烏附用通經活

絡滲溼而愈

成

五十歲腰間痠軟兩腿無力不能跪拜間有腰痛六脈洪大而滑前醫無非

補陰故日重一日此溼熱痿也與諸痿獨取陽明法

生石膏 四兩 杏仁 四錢 晚蠶砂 三錢 防己 四錢 海桐皮 二錢

飛滑石 一兩 葶藶 五錢 生薏仁 八錢 桑枝 五錢 雲苓皮 五錢

白通草 二錢 煮三碗分三次服其服九十餘帖病重時自加石膏一

倍後用二妙散收功

乙酉正月

十五日 趙 四十歲肝鬱挾痰飲腎水上凌心心悸短氣腹脹胸痞六脈反沈

洪水極而似火也與蠲飲伐腎邪兼降肝逆法

雲苓皮 一兩 桂枝 五錢 蘇子霜 三錢 小枳實 五錢 川椒炭 三錢

姜半夏 八錢 降香 三錢 旋覆花 三錢 每盃沖 廣皮 四錢

甘瀾水煮四盃分早中晚夜四次服四帖戒生冷猪肉鹹菜

二十 痰飲兼痺腎水上凌心驚悸短氣腰脊背痛皆太陽所過之地小便短而

腹脹肚膈突出是內而臟腑外而肌肉無不痺者且與開太陽之痺脈洪

大與大青龍合木防己湯法

生石膏 四兩 杏仁 四錢 厚樸 三錢 雲苓皮 六錢 防己 四錢

飛滑石 六錢 桂枝 五錢 半夏 五錢 生薏仁 五錢 廣皮 三錢

小枳實 五錢 通草 一錢 煮四盃分四次服

廿一 於前方內加 飛滑石 四錢 晚蠶砂 三錢

廿二 外而經絡之痺內而臟腑之痺行痰開痺俱不甚應現在脈洪大少腹脹

小便短而臭濁先與開支河使溼熱得有出路再商後法

飛滑石 一兩 海金沙 五錢 猪苓 四錢 雲苓皮 五錢 白通草 一錢

小茴香 三錢 川萆薢 五錢 澤瀉 三錢 煮三盃分三次服二帖

廿五 加去陳莖法 兩頭尖 三錢 半夏 五錢 三帖

吳氏醫案 痺 至

廿九 痺症夾痰飲六脈洪數溼已化熱屢利小便不應非重用石膏宜肺熱不

可諸痺獨取太陰也

生石膏 四兩 桂枝 五錢 生薏仁 五錢 防己 五錢 晚蠶砂 三錢

飛滑石 一兩 杏仁 五錢 雲苓皮 五錢 黃柏 四錢 白通草 一錢

羌活 一錢 煮四盃分四次服四帖

二月初 痺症十年誤補三年以致層層固結開之非易石膏用至二筋有餘脈

象方小其半現在少腹脹甚而小便不暢腰痛胸膈邪無出路必得小便

暢行方有轉機

生石膏 四兩 桂枝 六錢 杏仁泥 六錢 老厚樸 五錢

飛滑石 四兩 防己 五錢 小茴香 炒炭 三錢 小枳實 五錢

雲苓皮 一兩 木通 六錢 煮四盃分四次服

以後脈大而小便不利用此小便利者去滑石

初五 大用石膏六脈已小經謂脈小則病退蓋脈為病之帥脈退不怕病不退

經又謂脈病人不病者死人病脈不病者生現在病歸下焦血分其人本有肝鬱兼通下焦血分

雲苓皮 一兩 桂枝 六錢 小枳實 五錢 防己 六錢 小茴香 炒炭 六錢
海桐皮 三錢 木通 四錢 炒黃柏 三錢 廣皮 三錢 川椒炭 二錢

全當歸 三錢 煮三盃分三次服

初六 加 石膏 三兩 滑石 一兩

初七 加 厚樸 三錢 姜半夏 五錢

螻螂丸方 痺症夾痰飲疝瘕六脈洪大用諸痺獨取太陰法脈洪大之極者已小難經所謂人病脈不病者生但脈雖平而痕脹痺痛未除議以烏藥散退痕痺之所以難退者以久病在絡故也再以緩通肝絡法脈若復大仍服前方數帖見效即止

吳氏醫案

痺

至

螻螂蟲 一兩 降香 三兩 小茴香 炒 三兩 穿山甲 炒 三兩

片姜黃 三兩 歸巖 四兩 川棟子 三兩 兩頭尖 二兩

海桐皮 三兩 口射 三兩 滴乳香 一兩 地龍 去泥 二兩

其為細末酒水各半為丸每服二錢日二三從此服螻螂丸起兩月而止

三月廿 痺症夾痰飲脈本洪數前用辛涼脈減兼用通絡散瘕丸散亦效現在六脈中部仍洪但不數耳議暫用宣肺

生石膏 四兩 桂枝 八錢 半夏 八錢 杏仁 八錢 雲苓塊 一兩

飛滑石 二兩 防己 六錢 全歸 三錢 廣皮 三錢 小枳實 四錢

海桐皮 三錢 煮四盃分四次服

廿六 復診右脈更大小便反短用苦辛淡法於前方內加 黃柏 三錢

四月十 痺痛夾痰飲

生石膏 八錢 桂枝 五錢 生薏仁 五錢 雲苓皮 五錢

晚蠶砂 三錢 防己 四錢 杏仁泥 五錢 姜半夏 五錢

白通草 五分 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

十七 內而脇痛外而腰背痺是氣血兼痺也

桂枝尖 五錢 雲苓皮 三錢 防己 三錢 杏仁泥 五錢 旋覆花 三錢

生薏仁 三錢 廣鬱金 二錢 半夏 四錢 小枳實 四錢 片姜黃 二錢

白薏仁 一錢 歸巖 二錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

廿五 痰飲踞於中焦痺痛結於太陽氣上沖胸二便不利

雲苓塊 二兩 桂枝 八錢 小枳實 六錢 飛滑石 六錢

姜半夏 五錢 防己 六錢 杏仁泥 八錢 白通草 一錢

廣皮 三錢 煮三盃分三次服

五月初 大凡腹脹之疾不責之太陰即責之厥陰此症自正月以來開太陽之

吳氏醫案

痺

至

藥末有不泄太陰者他症雖減其半而腹脹不除其故有三一者病起肝鬱二者肝主疏泄誤補致壅三者自正月以來以右脈洪大之故痺症雖重治在肺經經有諸痺獨取太陰之明訓茲右脈平而左脈大不得着於前議暫與泄厥陰之絡久病在絡故也

半夏 五錢 旋覆花 五錢 黃芩 三錢 蘇子霜 三錢 歸巖 三錢

厚樸 五錢 小枳實 五錢 降香 三錢 晚蠶砂 三錢 廣皮 三錢

杉皮 三錢 廣鬱金 三錢 煮三盃分三次服

廿三 左脇痛脹臥不着席胸亦悶脹氣短肝脈絡胸之故

旋覆花 三錢 歸巖 三錢 半夏 五錢 廣鬱金 三錢 廣皮 三錢

新絳紗 三錢 蘇子霜 三錢 香附 四錢 小枳實 四錢 青皮 三錢

川椒炭 四錢 降香末 三錢 煮三盃分三次服七帖

六月初 痰飲肝鬱脈弦細氣上沖胸

旋覆花^{四錢}包煎 蘇子霜^{三錢} 半夏^{六錢} 降香末^{三錢} 小枳實^{三錢}
 廣鬱金^{三錢} 桂枝尖^{三錢} 廣皮^{五錢} 公丁香^{二錢} 片姜黃^{三錢}
 小青皮^{三錢} 煮三五分三次服

初三痰飲上泛咳嗽稀痰兼發痺症
 桂枝^{六錢} 雲苓皮^{五錢} 川烏^{三錢} 小枳實^{四錢} 防己^{六錢}
 杏仁^{五錢} 飛滑石^{四錢} 薏仁^{三錢} 炒黃柏^{三錢} 桂心^{二錢}
 廣皮^{五錢} 白通草^{二錢} 煮三五分三次服

初六小便不暢下焦溼聚於原方複滋腎丸法
 十一痺症未盡除痰飲未全消當盛暑流行之際逐飲開痺即所以防暑

十三暑泄腹脹舌黃其人本有痰飲痺症議五苓去朮加 滑石厚樸杉皮木
 吳氏醫案 痺

香半夏藿香廣皮

桂枝^{三錢} 雲苓皮^{五錢} 木香^{一錢} 飛滑石^{六錢} 猪苓^{四錢}
 澤瀉^{四錢} 白薤仁^{三錢} 厚樸^{三錢} 藿香梗^{三錢} 山連^{一錢}

半夏^{三錢} 川椒炭^{一錢} 杉皮^{三錢} 煮三五分三次服

十五脈緩
 十六脈緩甚俱服前方

廿二久病在絡其本病統俟丸藥立方但逐痰飲宣氣化痺時令之暑溼而已

半夏^{六錢} 雲苓塊^{五錢} 厚樸^{二錢} 小枳實^{三錢} 香附^{三錢}
 杉皮^{三錢} 大腹皮^{三錢} 廣皮^{三錢} 煮三五分三次服

廿六服化癥回生丹起每日九
 廿七脈浮筋骨痠痛氣短五心煩熱新感暑溼之氣加以辛涼與宣三焦

銀花^{三錢} 小枳實^{三錢} 杏仁^{三錢} 藿香葉^{三錢} 連翹^{三錢}

廣皮^{三錢} 白薤仁^{二錢} 薏仁^{五錢} 煮三五分三次服

七月初背痛甚先與通太陽之痺

桂枝^{六錢} 雲苓皮^{八錢} 小枳實^{五錢} 打碎杏仁泥^{三錢} 防己^{五錢}
 半夏^{五錢} 川椒炭^{二錢} 煮三五分三次服亥初令完

初九近日陰雨連綿背痛腹脹不減兩便不爽非嘔則噦與宣痺開鬱兼去陳莖

杏仁泥^{六錢} 桂枝^{六錢} 雲苓皮^{半皮半} 防己^{六錢} 小枳實^{五錢}
 公丁香^{三錢} 厚樸^{五錢} 晚蠶砂^{三錢} 白薤仁^{三錢} 兩頭尖^{三錢}

小茴香^{三錢} 煮四五分四次服
 廿一寒溼發痺脈緩甚中有痰飲

茯苓^{八錢} 連皮生薏仁^{四錢} 枳實^{三錢} 熟附子^{一錢} 防己^{五錢}
 桂枝^{八錢} 片姜黃^{三錢} 薤白^{三錢} 川萆薢^{五錢} 杏仁^{四錢}

吳氏醫案 痺

川烏^{一錢} 白通^{一錢} 廣皮^{五錢} 煮四五分四次服

廿八脈弦緊痰飲痺症癢瘰因燥氣而發臟腑經絡俱痺故肢冷而畏寒也峻與通陽

桂枝^{一兩} 小枳實^{四錢} 杏仁^{五錢} 公丁香^{三錢} 澤瀉^{三錢}
 川椒^{五錢} 片姜黃^{三錢} 半夏^{五錢} 穿山甲^{一錢} 防己^{五錢}
 歸鬚^{二錢} 廣皮^{六錢} 煮四五分四次服

自六月廿六日起每日空心服化癥回生丹一九七月廿九日以後每日服天台烏藥散三分五分一錢二錢不等至十月十二日每兩烏藥散中加巴霜一分每晚服三分五分不等間有服至一錢十一月初一日以後每晚間服通補奇經丸

初十日痺痛飲咳脈弦細

雲苓皮^{六錢} 桂枝^{八錢} 生薏仁^{五錢} 川萆薢^{五錢}

飛滑石 四錢 防己 五錢 小枳實 三錢 川椒炭 三錢

川烏頭 三錢 杏仁 四錢 煮四孟分四次服

十一 衝氣上動畏寒脈沈細與桂枝加桂湯法直伐衝氣

桂枝尖 一兩 紫石英 六錢 小茴香 五錢 猪桂心 八錢

雲苓塊 三錢 煮四孟分四次服

十二 大寒節衝氣未止脈反弦緊於原方內加 當歸 五錢 川芎 三錢

服二帖脈中陽氣生動衝氣平畏寒止仍然早服化癥回生丹一九降

服通補奇經丸三錢

戊子十一月初十日 宋女十六歲 六脈弦緊而色青白寒痺攻胃嘔吐不能食足痠痛不能

行誤與陰虛門中之陰柔以助其陰又大用苦寒堅陰重傷胃陽無怪日

重一日也先與和胃令能食再商治痺

姜半夏 六錢 生薏仁 六錢 生薑 三大 雲苓塊 六錢

吳氏醫案 痺 五

川椒炭 三錢 甘瀾水八孟煮取三孟分三次服

六脈俱弦而緊經謂脈雙弦者寒也又謂緊則為寒面色青黃是色脈皆陰也症現兩腿足痠痛不能履步跪拜按陽明主前不能前者陽明傷也太陽主却不能却者太陽傷也足太陽陽明兩經為風寒溼三邪之干而成痺更可知矣痛甚則氣上沖心嘔不能食按諸上升之氣皆自肝而來姑娘年輕失母肝鬱多端肝木病則克胃土挾寒上升能不嘔乎金匱謂腳氣攻心發作欲死者是也再按腳氣即痺症之一端溼燥寒三者為陰陰邪此乃陰邪太實之症醫法自當以通經達絡和胃開鬱為要無奈不識陰陽不分寒熱不知虛實一以補陰寒涼純陰之品誤助病邪甚有以大黃芒硝混下者病家以得二便通利則病勢少減故屢用之以致胃氣傷殘日重一日矣其大便通而病少減之故蓋肝主泄泄肝病則不得疎泄又痺者閉也初病在絡經誤治成久病延及臟腑矣即用通大便法亦

當溫下不當用寒下既助寒溼之邪又重傷胃腸傷陰精神血氣無

一不傷從茲以往尚有生理乎經云勞者溫之未聞勞者寒之也又云得

穀者昌又云有胃氣者生無胃氣死治此症第一義急救胃氣為要胃氣

和而得食得寐再商治痺如居家者然萬事從緩先安爐竈也

十二 脈弦細而緊寒溼上攻嘔吐不食與和胃止嘔稍能進食仍宗前法小便

短兼開太陽

姜半夏 六錢 藜蘆 五錢 益智仁 二錢 生薑汁 三匙

雲苓皮 六錢 香附 三錢 煮三孟分三次服

十五 寒痺六脈弦緊不食而嘔便短純陰溼寒之疾與關陽明嘔止得進食與

開太陽便稍通前方單救陽明次方兼醒脾陽將來治痺且須峻補腎中

真陽而世人以予藥為熱不可服不知頭等陽藥如烏附之類尚未服也

姜半夏 六錢 雲苓皮 六錢 雞內金 三錢 生薏仁 六錢

吳氏醫案 痺 五

益智仁 二錢 香附 三錢 川藜蘆 四錢 白通草 一錢

白薏仁 三錢 廣皮 二錢 煮三孟分三次服

十七 誤傷胃陽不食而嘔自以復陽明之陽為主即以十七歲不月而論經謂

二陽之病發心脾女子不月此病亦當以通補陽明立法再陽明主約束

筋骨而利機關經謂諸痿獨取陽明痿痺更以通補陽明為要又謂虛則

補其母陽明陽土也其母火也補火焉能不用熱藥哉

姜半夏 五錢 藜蘆 三錢 川椒炭 一錢 生薏仁 三錢

雲苓塊 五錢 香附 三錢 益智仁 一錢 廣皮炭 三錢

生薑 三錢 煮三孟分三次服

己丑十一月初九日 魯氏三十歲 太陽痺腰痛甚脈弦遲與溫通經絡

雲苓皮 五錢 桂枝 五錢 片姜黃 三錢 生薏仁 五錢

海桐皮 三錢 羌活 一錢 木防己 三錢 公丁香 一錢

乳香 一錢 煮三盃分三次服服一帖去渣活再服一帖

十一 太陽痺腰痛甚因風寒而起脈弦遲與溫通經絡茲風已化熱右脈洪
大痛未止議用經熱則痺例

生石膏 二兩 桂枝 六錢 小茴香 三錢 雲苓皮 六錢 杏仁泥 五錢
生薏仁 六錢 防己 六錢 片姜黃 三錢 煮三盃分三次服

十七 太陽痺與經熱則痺例已效仍宗前法加利小便使邪有出路

生石膏 二兩 桂枝 六錢 生薏仁 六錢 飛滑石 四錢 晚蠶砂 三錢
雲苓皮 六錢 防己 六錢 杏仁泥 五錢 小茴香 三錢 川萆薢 三錢
煮四盃分日三夜一四次服

痰飲

壬戌八月 張氏 四十 內而伏飲外而新涼內外相搏痰飲斯發

姜半夏 五錢 杏仁粉 三錢 厚樸 三錢 飛滑石 三錢 小枳實 二錢

吳氏醫案

痺 痰飲

吳

生薏仁 五錢 桂枝木 三錢 廣皮 二錢 茯苓皮 三錢 白通草 三錢

生薑 三片 煮三盃分三次服

廿八 支飲射肺眩冒小青龍去麻辛

焦於朮 三錢 桂枝 四錢 生薏仁 五錢 半夏 六錢 小枳實 二錢
杏仁粉 五錢 乾姜 二錢 製五味 一錢 生薑 三片 炙甘草 二錢
炒白芍 三錢 煮三盃分三次服

九月初 渴為痰飲欲去不寐為胃仍未和故以枳實橘皮湯逐不盡之痰飲以

半夏湯和胃令得寐

半夏 一兩 生薏仁 五錢 秫米 一合 小枳實 二錢
桂枝 三錢 杏仁粉 三錢 廣皮 三錢 生薑 三片

煮三盃分三次服得寐再診

初六 服半夏湯既得寐矣而反更咳痰多議桂枝乾姜五味茯苓湯合葶藶八

藥瀉肺湯逐飲

半夏 五錢 茯苓塊 六錢 苦葶藶子 三錢 乾姜 五錢
桂枝 五錢 五味子 三錢 肥大棗肉 四錢

甘瀾水五碗煮取二碗分二次服渣再煮一碗服

初八 先以葶藶大棗瀉肺湯行藥已攻動之飲令其速去

苦葶藶 四錢 肥大棗 五枚 水五盃煮取八分 二盃分二次服

又 服葶藶大棗湯後即以半夏湯和胃

半夏 一兩 小枳實 四錢 生薑 五片 洋參 二錢 炒老黃色

水八盃煮取三盃分三次服

九月初 逐去水後用外臺茯苓飲消痰氣令能食

炒於朮 六錢 茯苓塊 六錢 廣皮 三錢 半夏 三錢 小枳實 四錢

生薑 八錢 洋參 二錢 姜汁 煮三盃分三次服

吳氏醫案

痰飲

吳

十五 飲喘腸下則肝病肝病則脾氣愈衰故得後與氣則快先與行腸下之飲

泄肝即所以舒脾換腸痛止再議補脾

生香附 三錢 半夏 四錢 蘇子霜 三錢 廣皮 二錢 旋覆花 三錢
小枳實 五錢 青皮 一錢 降香末 三錢 煮三盃分三次服

二十 行脇絡之飲業已見效倘有不盡仍用前法

生香附 三錢 半夏 二錢 廣鬱金 二錢 旋覆花 三錢
蘇子霜 一錢 歸壘 一錢 降香末 五錢 廣皮 一錢
小枳實 一錢 煮三盃分三次服

廿二 通補中陽兼行腸下不盡之飲

代赭石 五錢 半夏 五錢 焦白朮 三錢 桂枝 二錢 旋覆花 三錢
茯苓塊 五錢 生薑 三片 炙甘草 三錢 煮三盃分三次服

十月初 通降腸下之痰飲兼與兩和肝胃

二日

半夏 六錢 旋覆花 三錢 廣皮 一錢 桂枝尖 二錢 小枳實 二錢

乾姜 一錢 蘇子霜 三錢 生薑 三片 煮三盃分三次服

癸亥二月 廿二日 風寒夾痰飲為病自汗惡風喘滿短氣渴不多飲飲則嘔

夜咳甚倚息不得卧小青龍去麻辛加枳實廣皮行飲而降氣

桂枝 六錢 茯苓塊 六錢 廣皮 二錢 小枳實 二錢 炒白芍 三錢

半夏 六錢 炙甘草 三錢 乾姜 三錢 製五味 一錢 生薑 三片

甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

十一 昨用小青龍咳雖稍減仍不得寐今日用葶藶大聚合法

桂枝 八錢 半夏 六錢 小枳實 二錢 苦葶藶 三錢 炙甘草 三錢

炒白芍 四錢 乾姜 五錢 五味子 一錢 大棗肉 五錢 廣皮 三錢

水八盃煮取三盃分三次服渣再煮一盃服

十二 用小青龍逐飲兼利小便使水有出路

吳氏醫案

痰飲

單

杏仁泥 五錢 桂枝 五錢 小枳實 二錢 乾姜 二錢 炒白芍 一錢

生薑 仁 五錢 半夏 五錢 白通草 一錢 生薑 三片 製五味 一錢

炙甘草 一錢 煮成兩盃分二次服渣再煮一盃服

十三 脈稍平病起本渴大服薑桂湯反止者飲居心下格拒心火之渴也仍以

錫飲為主微惡寒兼和營衛

茯苓塊 三錢 桂枝 六錢 小枳實 一錢 炒白芍 三錢 大棗肉 二錢

杏仁泥 四錢 半夏 六錢 炙甘草 一錢 廣皮 一錢 製五味 一錢

乾姜 三錢 生薑 三錢 煮成兩盃分二次服渣再煮一盃服

十四 咳則脇痛不惟支飲射肺且有懸飲內痛之虞兼逐腸下懸飲

姜半夏 八錢 桂枝 六錢 蘇子霜 一錢 旋覆花 三錢

杏仁泥 四錢 乾姜 四錢 小枳實 一錢 廣皮 二錢

廣鬱金 三錢 青皮 二錢 生香附 三錢 製五味 一錢

生薑 五錢 煮三碗分三次服渣再煮一椀服

十五 咳止大半惟脇痛攻胸肝胃不和之故切戒惱怒用通肝絡法

姜半夏 六錢 桂枝尖 三錢 乾姜 三錢 廣鬱金 三錢 旋覆花 三錢

蘇子霜 三錢 降香末 三錢 歸鬚 一錢 生香附 二錢 青皮 二錢

頭煎兩盃二煎一盃分三次服

癸亥二月 廿二日 謝氏 二十歲 痰飲哮喘咳嗽重有汗六脈弦細有七月之孕與小青

龍去麻辛主之

桂枝 五錢 小枳實 二錢 乾姜 三錢 炙甘草 一錢

半夏 五錢 五味子 一錢 廣皮 一錢 白芍 三錢

甘瀾水五盃煮取二盃分二次服渣再煮一盃服

廿三 其人本渴服桂枝乾姜熱藥當更渴今渴反止者飲也惡寒未罷仍用小

青龍法胸痺痛加薤白按飲為陰邪以誤服苦寒堅陰不能速愈

吳氏醫案

痰飲

單

桂枝 八錢 小枳實 二錢 半夏 六錢 炒白芍 四錢 薤白 三錢

乾姜 五錢 製五味 一錢 厚樸 三錢 炙甘草 二錢 廣皮 一錢

甘瀾水五盃煮取二盃渣再煮二盃分四次服

廿四 胃不和則卧不安亥子屬水故更重脹也痛也皆陰病也無非受苦寒藥

之累

姜半夏 八錢 桂枝 八錢 杏仁泥 三錢 炒白芍 三錢

茯苓塊 五錢 乾姜 五錢 五味子 一錢 苦桔梗 三錢

生薑 仁 五錢 厚樸 三錢 炙甘草 一錢 薤白 三錢

廿五 寒飲誤服苦寒堅陰大用辛溫三帖今日甫能轉熱右脈始大左仍弦細

咳嗽反重者是溫藥啟其封閉也再以溫藥兼活痰痰出自然慄快

桂枝 五錢 杏仁泥 三錢 厚樸 三錢 小枳實 二錢 半夏 八錢

茯苓 五錢 炒白芍 三錢 薤白 三錢 製五味 一錢 乾姜 二錢 薏仁 五錢 括葉 一錢 煎法服法如前

廿六 右脈已退病勢稍減但寒熱汗多胸痺恐成渴汗則陽愈虛飲更難愈議桂枝加附子去甘草以助脹故也合括葉薤白湯意通中上之清陽護表陽為急

桂枝木 六錢 厚樸 二錢 小枳實 一錢 炒白芍 四錢 熟附子 一錢 薤白 三錢 大棗肉 二枚 生薑 三片

甘瀾水五盃煮取兩盃渣再煮一盃分三次服其第一盃服後即嘔稀熱帶半碗令微汗佳其二三次不必啜粥

廿七 昨日用桂枝湯加附子再加薤白法漏汗已止表之寒熱已和但咳甚議與逐飲

吳氏醫案 桂枝 六錢 姜半夏 五錢 葶藶 炒研細 茯苓 六錢 生薏仁 五錢 痰飲 聖

大棗肉 五枚 甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

偕 四十脈雙弦而緊寒也不欲飲水寒飲也喉中癢病從外感來也痰情不粘亦寒飲也咳而嘔胃陽衰而寒飲乘之謂之胃咳也背惡寒時欲厚衣

向火衛外之陽虛而寒欲乘太陽經也面色淡黃微青唇色淡白亦寒也法當溫中陽而護表陽未便以吐血之後而用柔潤寒涼小青龍去麻辛

加枳實廣皮杏仁生薑湯主之用此方十數帖而愈

癸亥二月 徐氏 二十 酒客脈弦細而沉喘滿短氣脇連腰痛有汗舌白滑而厚初十日 六歲 惡風寒倚息不得卧此係裏水招外風為病小青龍去麻辛證也

姜半夏 六錢 桂枝 六錢 炒白芍 四錢 旋覆花 三錢 杏仁泥 五錢 乾姜 三錢 製五味 一錢 炙甘草 一錢

癸亥七月 邵 二十 右關單弦飲癖少陰獨盛水臌盛而土氣衰已至吞酸飯

後吐痰不止治在胃腎兩關不能戒酒不必服藥用真武湯法

吳榮 三錢 生薏仁 六錢 水八盃煮三盃分三次服四帖

廿八 內飲用溫水臌法已見大效但藥太陽則不可再用所謂一弛一文之道且議理陽明以為過峻文字

姜半夏 六錢 小枳實 一錢 廣皮 一錢 茯苓塊 六錢 白豆蔻 一錢 生薏仁 六錢 生薑 六錢 煮三盃分三次服四帖

八月初 用理陽明亦復見效惟吐酸仍然未止按吞酸究屬肝病議肝胃同治法

半夏 六錢 茯苓 三錢 青皮 一錢 桂枝 三錢 吳萸 三錢 生薑 三片 薏仁 五錢 山連 姜炒 煮三盃分三次服四帖

吳氏醫案 內飲招外風為病既喘且咳議小青龍法 痰飲 聖

桂枝 三錢 茯苓塊 二錢 炒白芍 一錢 乾姜 三錢 麻黃 一錢 製五味 一錢 生薏仁 五錢 細辛 八分 半夏 三錢 炙甘草 一錢 煮三盃分三次服

又 痰飲喘咳前用小青龍藥已見效但非常服之品服遲緩議外飲治脾法

茯苓塊 六錢 桂枝 五錢 生於朮 三錢 益智仁 一錢 製茅朮 四錢 半夏 六錢 生薏仁 五錢 炙甘草 二錢 生薑 五片 煮三盃分三次服四帖

甲子十月 皮氏 四十 痰飲喘咳左脈浮弦沈緊自汗勢甚凶危議小青龍去麻

辛加厚樸杏仁 桂枝 六錢 杏仁霜 五錢 厚樸 三錢 製五味 一錢 半夏 六錢 炙甘草 三錢 乾姜 五錢 炒白芍 四錢

甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

廿九 於前方內加 雲苓塊 五錢 半夏 五錢

三十 服小青龍已效然其水尚洋溢未能一時平復

桂枝 八錢 杏仁霜 五錢 乾姜 五錢 五味子 三錢 雲苓 八錢

半夏 一兩 炙甘草 三錢 茯苓 一兩 廣皮 三錢 炙甘草 三錢 生薑 五片

甘瀾水煮成四碗分四次服

十一日 以眩冒甚於前方內加 於朮 六錢

初四 脈現單弦喘止咳減眩冒未盡再太陰屬土既重且緩萬不能一時速愈

且痰飲多年豈三五日可了

於朮 六錢 杏仁霜 五錢 桂枝 五錢 五味子 六錢

半夏 一兩 炙甘草 三錢 乾姜 三錢 雲苓 六錢

甘瀾水八碗煮取三碗分三次服三帖

乙丑二月 福 三十 痰飲胸痺兼有脇下懸飲

吳氏醫案

痰飲

醫

旋覆花 三錢 厚樸 一錢 薤白 二錢 小枳實 三錢

杏仁泥 三錢 半夏 五錢 括實 一錢 廣皮 一錢 生香附 三錢

水入碗煮取三碗分三次服三帖

初七 胸痺懸飲已愈惟腸痺食不甘味議和肝胃兼開腸痺

生薏仁 五錢 半夏 三錢 廣皮 二錢 白通草 一錢

小枳實 二錢 杏仁 八錢 姜汁 三匙

水五盃煮取二盃渣再煮一盃分三次服

乙丑十一月 李 三十 脈弦細而沉咳嗽倚息不得卧胸滿口渴用小青龍去麻

辛法

桂枝 六錢 小枳實 七錢 白芍 四錢 乾姜 五錢

半夏 一兩 五味子 二錢 茯苓 一兩 廣皮 三錢

炙甘草 三錢 煮四碗分四次服

十三 服小青龍已效但喉啞知渴脈見微數為痰飲欲去轉用辛涼開提肺氣

法

蜜麻黃 三錢 石膏 八錢 杏仁 五錢 半夏 三錢 苦桔梗 二錢

生甘草 三錢 廣皮 一錢 煮三盃分三次服

丙寅正月 煥氏 三十 痰飲法當惡水反喜水者飲在肺也喜水法當用甘瀾今

反溫燥以其為飲也既喜水曷以知其為飲以得水不行心悸短氣喘滿

眩冒咳嗽多痰嘔惡諸飲證畢具也既為飲證何以反喜水以水停心下

格拒心火不得下通於腎反來上燥華蓋反格拒腎中真水不得上潮於

喉故啞乾而喜水以救之也是之謂反燥反燥者用辛能潤法

半夏 一兩 小枳實 八錢 雲苓塊 一兩 杏仁泥 六錢 廣皮 五錢

生薑 一兩 甘瀾水八碗煮取三碗渣再煮一碗分四次服

丙寅正月 顏 四十 嗽不欲飲倚息不得卧脇痛自汗不寐脈弦緩議小青龍

吳氏醫案

痰飲

醫

去麻辛加 杏仁薏仁再重加半夏

杏仁泥 六錢 桂枝 六錢 五味子 一錢 焦白芍 三錢

生薏仁 一兩 半夏 一兩 炙甘草 五分 乾姜 三錢

甘瀾水八碗煮取三碗分三次服

廿七 嘔涼水於前方內加 乾姜 一錢 廣皮 三錢 以消痰氣

二月初 金匱謂桂枝乾姜為熱藥服之當遂渴今反不渴者飲也茲證不惟不

渴反嘔涼水不止其為寒飲無疑既真知其為飲雖重用姜桂何懼乎世

人之不能立方者皆未真知病情也畏而不敢服者亦未真知病情也

桂枝 八錢 小枳實 二錢 乾姜 七錢 焦白芍 四錢 茯苓 四錢

半夏 一兩 五味子 一錢 廣皮 三錢 炙甘草 一錢 生薑 五片

甘瀾水八盃煮取三盃渣再煮一盃分四次服

丙寅正月 崑 四十 飲家眩冒用白朮澤瀉湯法脈洪滑而沈

廿六日 二歲

廿七 於前方內加 竹茹 六錢 生薑汁 每盃沖
 廿八 年近八旬五欲俱備兼之下焦濁陰隨肝上逆極迫心火不得下降以致

廿九 五飲而兼濁陰上攻昨用苓桂重伐腎邪大辛以開中陽雖見小效大勢
 陰太盛而陽太衰恐即時難以復辟也勉與齊通三焦之陽法
 桂枝 六錢 姜半夏 六錢 厚樸 三錢 公丁香 三錢 茯苓 一兩
 乾姜 五錢 黑沈香 三錢 薤白 四錢 小枳實 六錢 生薑 一兩
 廣皮 四錢 肉桂 研細末 二錢 煮三碗分三次服

廿十 仍宗前法而小變之
 桂枝 六錢 姜半夏 八錢 乾姜 五錢 茯苓塊 一兩 薤白 三錢
 吳氏醫案 痰飲 吳

廿一 懸飲者水在肝也非下不可但初次診視且用輕法
 小枳實 五錢 廣皮 二錢 炙甘草 三錢 煮三盃分三次服

廿二 肺脹已開今日可無伐腎邪心下氣阻不能寐仍然議中焦降逆法令得
 寐
 廣皮 四錢 小枳實 五錢 肉桂 三錢 炒川椒 五錢 厚樸 三錢
 生薑 一兩 煮三盃分三次服

廿三 肺脹已開今日可無伐腎邪心下氣阻不能寐仍然議中焦降逆法令得
 寐
 代赭石 八錢 姜半夏 二兩 旋覆花 五錢 秫米 一合 廣皮 五錢
 小枳實 八錢 生薑自然汁 沖 煮三碗分三次服

胸滿而漉漉然無奈兩用通陽降逆絲毫不應蓋老年真陽太虛一刻難
 生難長故陰凝一時難返也議於前方內加香開一法
 半夏 一兩 桂枝 六錢 小枳實 一兩 括蕪 三錢 薤白 三錢
 乾姜 五錢 茯苓 連皮 一兩 沈香 研細末 二錢 廣皮 五錢 生薑 一兩
 降香 三錢 煮三碗分三次服

廿四 昨用降逆和胃業已見效但逆氣雖降仍然有時上阻陰凝太重肝氣厥
 逆也
 代赭石 八錢 姜半夏 一兩 旋覆花 四錢 包煎 茯苓 連皮 一兩 姜汁 沖 盃
 小枳實 六錢 廣皮 四錢 煮三碗分三次服

廿五 酉正月 陳 五歲 病由瘧邪傷胃正虛邪實六脈俱結且有痰塊塞滯經絡
 遂道病有三虛一實者先治其實後治其虛

吳氏醫案

痰飲

吳

吳氏醫案

痰飲

吳

廿六 己二月 佟氏 七十 五歲 脈沉細而不調喘滿短氣心悸氣上阻胸咳嗽倚息不得
 卧乃中焦痰飲下焦濁陰為患年老全賴陽氣生活茲陰氣陰邪上僭如
 此何以克當勉與通陽降濁法
 半夏 一兩 旋覆花 四錢 包煎 生香附 五錢 降香末 二錢 青皮 二錢
 廣皮 三錢 蘇子霜 三錢 煮三盃分三次服

廿七 懸飲內痛腸鳴非下不可以老年久虛且不敢下止有降逆而已
 姜半夏 二兩 桂枝 五錢 廣皮 五錢 薤白 五錢
 小枳實 一兩 秫米 四錢 通目 四錢 生薑 一兩
 旋覆花 三錢 包煎 煮三碗分三次服

薑半夏 六錢 茯苓塊 五錢 杏仁泥 一兩 驚眼枳實 四錢 廣皮 三錢

蘇子霜 二錢 甘瀾水八碗煮取三碗分早晚三次服一帖

廿八 脊痛痺也右腿偏癱瘓也咳嗽而喘支飲射肺也日久不愈皆假補用熟地等壅塞隱道之故服洪

生石膏 三兩 桂枝 五錢 茯苓皮 五錢 姜半夏 五錢

杏仁泥 五錢 防己 四錢 片姜黃 三錢 廣皮炭 三錢

薏仁 五錢 煮四碗分四次服

兩帖後退生石膏一兩加 赤茯苓塊 一兩

再兩帖後復加生石膏一兩 以左乳傍有結核作痛加青橘葉 五錢

二月初 痺夾痰飲與開痺錫飲法現在痺解而飲未除脈之洪者亦減病減者

減其製

姜半夏 五錢 桂枝 五錢 茯苓 連皮 六錢 防己 三錢 小枳實 三錢

吳氏醫案

痰飲

吳

青橘葉 三錢 薏仁 五錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

初八 加小枳實 二錢 廣皮 一錢 飛滑石 六錢

初九 加生石膏 一兩

十一 肝鬱夾痰飲咳嗽痰多吐痰血

旋覆花 三錢 薏仁 二錢 桃仁泥 一錢 廣皮炭 二錢

姜半夏 六錢 青皮 二錢 降香末 三錢 青橘葉 三錢

蘇子霜 三錢 歸鬚 一錢 煮三盃分三次服

又 痰飲夾肝鬱吐出血後以兩和肝胃為主

丸方 雲苓 連皮 八兩 香附 六兩 生薏仁 八兩 半夏 十兩

鬱金 二兩 澤瀉 八兩 益智仁 四兩 麝香 五兩

共為極細末神麴水法為丸如小梧子大每服三錢日三服開水送下

六月初 溼淫行令脈弦細胃不開渴而小便短澀者與猪苓湯法

飛滑石 六錢 猪苓 五錢 雲苓 四錢 澤瀉 五錢 姜半夏 四錢

益智仁 五錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服胃開即止

初六 痰飲之質冒暑欲嘔六脈俱弦雖渴甚難用寒涼與局方消暑丸法

姜半夏 八錢 茯苓 四錢 藿香梗 三錢 廣皮 三錢 生甘草 一錢

生薑汁 每盃沖 煮三盃分三次服

初八 病減者減其製減半夏四錢茯苓二錢

十二 腰以下腫當利小便渴而小便短澀渴者與猪苓湯例

飛滑石 一兩 猪苓 八錢 半夏 四錢 澤瀉 八錢 雲茯苓 六錢

煮三盃分三次服以渴減腫消為度

十四 脈沈細胃不開減猪苓三錢澤瀉三錢飛滑石三錢加

廣皮 三錢 藿香梗 三錢 益智仁 三錢

十六 暑溼病退小便已長陽氣不振與通補陽氣

吳氏醫案

痰飲

吳

雲茯苓 五錢 桂枝 三錢 茅蒼朮 二錢 半夏 三錢 生薏仁 五錢

白蔻仁 一錢 廣皮 二錢 炙甘草 一錢 煮三盃分三次服

十七 頭脹胸悶脈移氣鬱暑必夾溼也

藿香 半便半 雲苓皮 五錢 杏仁 三錢 半夏 三錢 薏仁 五錢

白蔻仁 二錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

十九 小便濁加 猪苓 四錢 澤瀉 四錢

廿四 暑月頭脹微痛與滯上焦

藿香葉 三錢 薄荷 一錢 荷葉邊 去蒂 一張

廿五 六脈陽微暑溼之餘小便白濁與分利法

單藜 五錢 生薏仁 五錢 桂枝 三錢 益智仁 三錢 猪苓 三錢

蒼朮 三錢 雲苓皮 五錢 澤瀉 三錢 煮三盃分三次服

七月十 溼熱為病與苦辛淡法

半夏 五錢 飛滑石 六錢 桂枝 三錢 猪苓 三錢 杏仁 三錢 澤瀉 三錢
木通 三錢 雲苓皮 五錢 生慧仁 五錢 煮三盃分三次服

廿二 溼熱為病與苦辛淡法小便已長胃不開與闔陽明

半夏 六錢 茯苓皮 五錢 廣皮 三錢 生薑 三錢

薏仁 五錢 益智仁 三錢 煮三盃分三次服

廿五 加 桂枝 三錢 枳實 三錢 白蔻 三錢

九月廿 痰飲喘咳脈弦與小青龍法

姜半夏 五錢 桂枝 三錢 炒白芍 二錢 杏仁泥 四錢

小枳實 三錢 乾姜 二錢 五味子 二錢 廣皮 三錢

炙甘草 一錢 煮三盃分三次服

廿四 痰飲脇痛而咳嗽是謂懸飲懸飲者水在肝也脈弦數水在內外風未淨也

吳氏醫案

痰飲

辛

薑半夏 六錢 杏仁 三錢 葶藶子 二錢 香附 三錢 桂枝尖 二錢

旋覆花 三錢 包煎 青蒿 三錢 黃芩炭 一錢 廣皮 一錢 小枳實 四錢

生薑汁 三匙 煮三盃分三次服

廿五 身熱退去青蒿黃芩炭葶藶子加 杏仁 二錢

廿七 痰飲脇痛而咳嗽是謂懸飲水在肝也脈弦數

半夏 六錢 桂枝尖 三錢 小枳實 三錢 旋覆花 三錢 包煎

杏仁 三錢 蘇子霜 三錢 降香末 三錢 生薑汁 三匙

香附 三錢 廣皮 二錢 煮三盃分三次服

廿九 病減者減其製減半夏三錢枳實一錢蘇子一錢降香一錢桂枝一錢連

前其服五帖收功

乙酉四月 痰 十七 春初前曾不寐與胃不和之靈樞半夏湯服至二十帖始

得寐茲胃仍不甚和猶有不寐之弊納食不旺再與和胃

半夏 六錢 生慧仁 五錢 白蔻仁 一錢 連皮益智仁 一錢 雲苓 四錢
姜汁 三匙 廣皮炭 五分 煮三盃分二次服

備用方 肝遺熱於腦則成鼻淵蒼耳子散主之

辛夷 一兩 蒼耳子 炒 一兩 連翹 八錢 苦桔梗 五錢 桑葉 六錢

銀花 八錢 茶菊花 六錢 甘草 三錢 黃芩炭 二錢 薄荷 一錢

其為極細末每服一錢兩前茶調日二次

五月初 胃不和數與和胃已得寐進食夜眠必流口水者經謂胃熱則蟲動蟲

動則廉泉開廉泉開則液自出與辛涼和胃法

半夏 六錢 生石膏 四錢 茯苓 六錢 白蔻皮 一錢 杏仁 三錢

薏仁 五錢 生薑汁 每盃三匙 煮三盃分三次服四帖

初六 口水減牙痛脈如故再服四帖

吳氏醫案

痰飲

辛

十六 風淫所勝治以辛涼佐以苦甘

金銀花 三錢 芥穗 八分 苦桔梗 二錢 連翹 一錢

香豆豉 三錢 杏仁 二錢 生甘草 一錢 桑葉 一錢

煮兩盃分二次服熱退為度 二帖熱退

十八 胃熱夜間口中液自出與和胃陰法

生石膏 六錢 半夏 五錢 茯苓 五錢 麥冬 不去心 三錢

白蔻仁 一錢 煮三盃分三次服

廿二 諸症皆減去石膏加 麥冬 二錢

廿八 胃中向有飲聚不寐服半夏湯已愈後因痰涎自出與涼陽明亦減餘飲

未除與服外臺茯苓飲意

茯苓 五錢 洋參 一錢 生薑 三片 半夏 三錢 麥冬 不去心 一錢

大棗 二枚 廣皮 五分 枳實 五分 煮兩盃分二次服

乙酉四月 吳 五十六脈洪數右寸獨大酒客痰多肺熱之至

廿九日 生石膏 四兩 半夏 五錢 薏仁 五錢 杏仁 五錢

茯苓皮 五錢 防己 三錢 煮三椀分三次服

五月初 廣皮 三錢 至五月二十日共服二十帖

廿六日 酒客形體壯盛而陽萎其為溼中生熱非精血之虛其象顯然與諸痿獨

取陽明法

生石膏 三兩 半夏 五錢 防己 四錢 薏仁 八錢 黃柏 五錢

茯苓皮 八錢 木通 三錢 煮三椀分三次服

六月十 去黃柏二錢木通三錢以喉嚨太久今可兼清肺氣加

苦桔梗 三錢 飛滑石 六錢 甘草 一錢

二十 脈洪數右大於左喉啞痰多 戒油膩

生石膏 四兩 半夏 六錢 蘇葉 半椀 炙甘草 一錢

吳氏醫案 痰飲

苦桔梗 三錢 杏仁 五錢 煮三椀分三次服

七月廿 生石膏 三兩 半夏 六錢 苦桔梗 四錢 生甘草 一錢

茯苓皮 六錢 杏仁 四錢 煮三益分三次服

八月初 右寸脈獨大金實無聲已效而未全愈照前方再服三劑前後共服八

十餘劑計石膏三百數十兩

乙酉五月 嚴 三十六脈弦細短瀉吐血三年不愈兼有痰飲咳嗽五更汗出

經謂陽絡傷則血上溢要知絡之所以傷者有寒有熱並非人之有絡只

許陽火傷之不準寒水傷之也今人見血投涼見血補陰為醫士一大痼

疾醫士之疾不愈安望病家之病愈哉此症陽欲亡矣已難救治勉照脈

症立方

姜半夏 六錢 焦白芍 三錢 乾姜炭 三錢 桂枝木 三錢 茯苓塊 五錢

五味子 二錢 廣皮炭 三錢 小枳實 一錢 煮三益分三次服

初六 覆診據云飲食已增午後之五心煩熱如故脈稍和緩諸病必究寢食得

穀者昌方無可轉至午後之熱方即甘溫除大熱法也因脈稍和緩去乾

姜炭

十三 前後共服過十劑汗斂食增血並不吐頭中發空得甜食則咳減中氣虛

也加 甘草 三錢 以補中氣再服四帖脈仍緊故也

十七 前後共服十四帖諸病向安惟脈之弦緊如故咳甚則欲嘔於原方去五

味于減甘草再服四帖

廿一 諸症皆漸減痰亦漸厚心悸甚加 枳實 一錢 再服四帖

廿五 脈弦細如故咳減夜甚陽微陰盛可知午後身熱已減惟食後反覺

嘈雜胸中有水狀少時即平於原方加 乾姜 一錢 枳實 二錢

三十 汗止嗽減五心煩熱亦減脈弦數夜間咳甚服熱藥反不渴飲尚重也病

吳氏醫案 痰飲

痰飲者冬夏難治

茯苓塊 五錢 桂枝 三錢 半夏 六錢 五味子 一錢

小枳實 五錢 薏仁 五錢 白芍 三錢 廣皮炭 五錢

炙甘草 一錢 乾姜 一錢 煮三益分三次服

六月初 前方已服四帖脈弦緊不數仍不知渴於前方內加

炙甘草 一錢 乾姜 二錢 再服三帖

初八 脈弦緊如故嗜咳如故舌白滑甚加 桂枝 二錢 再加乾姜 三錢

十二 脈之短瀉退而弦細如故痰飲仍重於前方內加 桂枝 二錢 再加乾姜

二錢 茯苓 三錢 以化飲

十七 夜咳已止是其佳處咳來日淺亦是最好左脈沈細右脈弦緊飲未盡除

至遍身骨痛久病之故古人云勞者溫之甘溫調營衛而復胃氣因旺進

食久久自愈病減者減其製

桂枝 三錢 五味子 一錢 乾姜 二錢 半夏 五錢 枳實 五錢
廣皮 三錢 炙甘草 一錢 煮三盃分三次服

調飲丸 痰飲久聚未能一時猝去業已見效與丸藥緩化可也戒生冷惱怒

桂枝 半觔 小枳實 四兩 乾姜 六兩 蒼朮炭 六兩 茯苓 觔半
半夏 一觔 益智仁 四兩 廣皮 兩 炙甘草 六兩

共為細末神麴為丸如梧子大每服三錢日三服飲甚時服小青龍湯
乙酉五月 陳 一歲 人尚未老陽痿多年眩冒昏迷胸中如傷油膩狀飲水多
初十日 則胃不快此伏飲眩冒症也先與白朮澤瀉湯逐其飲再議緩治溼熱之

陽痿豈有六脈俱弦細而恣用熱地久服六味之理哉

冬於朮 二兩 澤瀉 二兩 煮三盃分三次服

十三 已效而未盡除再服原方十數帖而愈

乙酉五月 李 八歲 其人向有痰飲至冬季水旺之時必發後因伏暑成痢痢
吳氏醫案 痰飲 焉

後便溏竟夜不寐者多日寒熱飢飽皆不自知大便不通按著必挾溼況
素有痰飲飲即溼水之所化醫者毫不識病以致如此卧牀褥而不得起
不亦冤哉議不食不飢不便不寐九竅不和皆屬胃病例與蠶樞半夏湯
令得寐再商

姜半夏 二兩 秫米 二合

急流水八盃煮取三盃分三次服得寐為度

十一 諸痰不和六脈純陰皆痰飲為呆臧補藥所閉昨日用半夏湯已得寐而
未熟再服前方三帖續用小青龍去表藥加廣皮枳實以和其飲蓋現在
面色光亮水主明也六脈有陰無陽飲為陰邪故也左脈弦甚經謂單弦
飲辭也有一症必有一症之色脈何醫者盲無所知吾不知伊一生所學
何事寧不愧死

姜半夏 六錢 桂枝 五錢 五味子 一錢 炒白芍 三錢

小枳實 五錢 乾姜 一錢 炙甘草 三錢 廣皮 三錢
甘瀾水八盃煮成三盃分三次服

十八 胃之所以不和者二惡溼而陽困也昨日純剛大燥以復胃陽今脈象較
前生動胃陽已有生動之機但小便白濁溼氣尚未暢行胃終不得和也
與開太陽開陽明法

姜半夏 二兩 秫米 一合 豬苓 六錢 桂枝 四錢 茯苓皮 六錢
飛滑石 三錢 廣皮 三錢 澤瀉 六錢 通草 一錢

流水十一碗煮成四碗分早中晚夜四次服
六月初 於原方內去滑石通草加 川椒 炒去汗 三錢

乙酉五月 高 二歲 脈弦痰飲喘咳與小青龍去麻辛加 廣皮枳實
十六日 姜半夏 六錢 桂枝 五錢 小枳實 五錢 廣皮 三錢 炙甘草 三錢

五味子 一錢 白芍 三錢 乾姜 一錢 煮三盃分三次服二帖

吳氏醫案 痰飲 蓋

十八 已見小效汗多加 淨麻黃根 三錢

二十 病減者減其製去桂枝枳實各二錢

廿日 服前藥汗少惟善噓周身痠痛於原方減乾姜一錢加
杏仁 三錢 防己 三錢

乙酉五月 董 四歲 脈沈細弦弱咳嗽夜甚久而不愈飲也最忌補陰補陰必
廿七日 死以飲為陰邪脈為陰脈也經曰無實實

桂枝 六錢 小枳實 一錢 乾姜 三錢 五味子 一錢 白芍 四錢
半夏 五錢 炙甘草 一錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

六月初 復診加 雲苓 三錢 枳實 二錢

十七 其人本有痰飲服小青龍胃口已開連日午後頗有寒熱正當暑溼流行
之際恐成瘧疾且與通宣三焦
茯苓皮 五錢 杏仁 三錢 姜半夏 四錢 生薏仁 五錢

小枳實二錢 青蒿二錢 藿香梗三錢 白蔻仁一錢
廣皮三錢 煮三盃分三次服

十九 寒熱已止脈微弱去蔻仁青蒿加 桂枝乾姜以治其咳

廿二 咳減寒熱止胃口開嗽未盡除脈尚細小效不更方服至不咳為度

乙酉五月 某 六脈弦緊右脈沈取洪大先從腹以上腫例舌白滑無汗從溢

飲例之大青龍法減甘藥為其重而辨也

生石膏 一兩 杏仁 去皮留桂枝 五錢 炙甘草 二錢 細辛 一錢

大棗肉 二枚 麻黃 去節生薑 二錢 煮成三盃先服一盃覆被令微

汗佳得汗止後服不汗再服第二盃如上法

十一 溢飲脈緊無汗咳嗽浮腫昨用大青龍汗出腫消喘咳減與開太陽陽

明法

半夏 五錢 飛滑石 五錢 茯苓 五錢 生薑 一錢 桂枝 一錢

吳氏醫案 痰飲

澤瀉二錢 蒼朮炭 一錢 猪苓 三錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

已服十數帖後加 蓮子 五錢 益智仁 一錢

乙酉正月 陳 七十 懸飲脈弦左脇不快為水在肝法當用十棗湯近又旬之

老人難任藥力與兩和肝胃可也

旋覆花 三錢 包煎 半夏 五錢 香附 五錢 廣皮 三錢 小枳實 三錢

淡吳萸 二錢 青皮 三錢 煮三盃分三次服

廿二 前方已服十餘帖復診脈結加 杏仁泥 六錢 再服三帖

壬戌正月 醫羅 六十 酒客痰飲哮喘脈弦數急與小青龍去麻辛加 枳實

橘皮湯不應右脇痛甚此懸飲也故與治支飲之小青龍不應應與十棗

湯以十棗大棗降用控涎丹

甘遂 五錢 大戟 五錢 白芥子 五錢

其為細末神麴糊丸如梧子大先服十三丸不知漸加至二十一丸以

得快便下黑綠水為度三服而水下喘止繼以和胃收功

在室女十七 伏暑夾痰飲與三仁湯重加半夏廣皮厚效而熱不退痰不除右
脈微結中有痰塊堵塞隨道因延刻正谷兒針中泉穴紫血出後繼咳者
痰二口以後用藥無不見效半月後伏暑痰飲皆愈矣

甲子八月 錢氏 三十 咳嗽胃中停水與小青龍去麻辛重加枳實廣皮五帖已

愈八九因回母家為父祝壽大開酒肉其父亦時醫也性喜用人參愛其

女遂用六君子湯服藥數十帖將近一年胸中積水脹而且痛又延

其父視之所用之藥大抵不出守神中焦之外愈治愈脹愈治愈痛以致

胸高不可以俯夜坐不可以臥已數月不食矣其父見勢已急力辭其父

延余治之余見其目欲努出面色青黃胸大脹痛不可忍六脈弦緊七八

至之多云曰勢急矣斷非緩藥所能救因服巴豆霜三分下黑水將近一

桶勢稍平以和脾胃調之三四月後漸平胃大開於是吃羊肉餃二十

吳氏醫案 痰飲

二枚胃中大痛一晝夜又用巴豆霜一分五厘下後痛止嚴禁血肉通補
脾胃一月而安

乙酉正月 趙 四十 太陽博則腰痛或左或右風勝則引也或喘或不喘者

中焦留飲上泛則喘不逆則不喘也切戒生冷猪肉與一切補藥周年可

取六脈洪大已極石膏用少萬不見效命且難保

生石膏 六兩 桂枝 五錢 小枳實 五錢 生薑 一錢

美半夏 五錢 杏仁 五錢 蜜芩皮 五錢 黃柏炭 一錢

白通草 一錢 防己 四錢 煮三盃分三次服四帖

二月 復診於前方內加 猪苓 三錢 飛滑石 一兩 小枳實 三錢 四帖

初七 於前方內去半夏猪苓加 海桐皮 三錢 片子姜黃 三錢 晚蘇砂 三錢

柏 一錢 服至廿五日止計十八帖於前方再加桑皮 三錢

廿六 於前方用石膏 四兩 去黃柏炭加 美半夏 五錢

廿七日兩日減石膏止留二兩

廿九日三石膏仍用四兩因拜掃停藥六天

初九日石膏每劑用二兩

初十日右手脈洪大已減石膏只用一兩

十一日每日用石膏二兩

十三日石膏每天用一兩

十五日因感燥氣停藥五天

廿一日石膏每帖用一兩

廿二日至 每劑石膏用二兩共服九帖

四月十日自淮安復至紹興又診得洪大之脈較前已減七八然較之平脈仍大而有力現在小便赤濁牙縫臭味復出痺痛雖止陽明太陽兩經淫熱未

吳氏醫案 痰飲

美

生石膏 四兩 杏仁 四錢 雲苓皮 五錢 飛滑石 六錢 海金砂 五錢

晚蠶砂 三錢 木通 三錢 慧仁 五錢 煮三盃分三次服四帖

十九日脈漸退減石膏至二兩加 姜半夏 五錢 廣皮 三錢

二十日至 每日用石膏一兩

廿二日至 每日用石膏二兩

廿六日 小便不利

生石膏 四兩 杏仁 四錢 姜半夏 五錢 飛滑石 六錢

生薏仁 五錢 木通 三錢 茯苓皮 五錢 海金砂 五錢

陳皮 三錢 煮三盃分三次服四帖

五月初 感受風寒服桂枝湯

初四 仍服前廿七日方三帖

初七 內飲招外風為病

姜半夏 五錢 桂枝 四錢 杏仁 三錢 白芍 二錢

小枳實 五錢 防己 三錢 乾姜 一錢 廣皮 三錢

炙甘草 五錢 煮三盃分三次服其第一盃服後即啜稀熱粥一椀覆

被令微汗即解得汗後餘藥不必啜粥服四帖

十一前因風寒夾飲之故用小青龍法現在風寒解而飲未除脈復洪大仍與

大青龍與木防己湯合法兼治飲與痺也

生石膏 六錢 桂枝 六錢 防己 四錢 茯苓皮 六錢

飛滑石 六錢 半夏 六錢 木通 三錢 小枳實 三錢

杏仁 四錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

十四其人本有痺症痰飲現屆盛暑發泄暑溼傷氣故四肢痿軟少氣口中膠

膩欲嘔與局方消暑丸意

茯苓 連皮 炙甘草 三錢 半夏 六錢 生姜汁 三匙

吳氏醫案 痰飲

荷葉 去蒂 煮三盃分三次服

十九日至 停藥

廿四日仍服十一日方至六月初七日止服十一帖

六月初 停藥

十八日氣急欲喘新感暑溼之故於原方內加 小枳實 二錢 廣皮 二錢 服五帖

生石膏 六錢 桂枝 四錢 半夏 六錢 飛滑石 六錢

茯苓皮 六錢 杏仁 四錢 防己 四錢 廣皮 三錢

小枳實 四錢 木通 三錢 煮三盃分三次服四帖

廿七日於原方內減石膏三錢加 飛滑石 六錢 共成一兩二錢木通 二錢 共成

五錢晚蠶砂 三錢

廿九渴欲飲水入則吐者名曰水逆五苓散主之

蒼朮三錢 桂枝三錢 茯苓皮六錢 半夏五錢 猪苓四錢
澤瀉四錢 藿香三錢 生姜汁三匙 煮三盃分三次服

七月初二日 飲食有難化之象於原方內去蒼朮加 廣皮炭四錢 神麩三錢 益智仁二錢 小枳實三錢 以通胃腑竝醒脾陽

初七日 右脈洪數六腑不和食後惡心二便不爽暑溼所干之故議宜三焦
生石膏三兩 茯苓皮六錢 黃芩炭三錢 飛滑石六錢
生薏仁五錢 姜半夏五錢 小枳實三錢 益智仁三錢

初九日 加 益智仁 小枳實
白薏仁一錢 廣皮三錢 生薑三片 煮三盃分三次服

初十日 中焦停飲晚食倒飽是脾陽不伸之故一以理脾陽為法
姜半夏五錢 茯苓五錢 益智仁一錢 川椒炭八分
生薏仁五錢 廣皮三錢 小枳實二錢 煨草果五分

吳氏醫案 痰飲 卒
白薏仁一錢 煮三盃分三次服

十七日 停飲兼痺脈洪向用石膏並不見效數日前因食後倒飽脈不大石膏已
用至三十劑之多轉用溫醒脾陽絲毫不應水之蓄聚如故跗腫不消胃
反不開右脈復洪大有力小便短思天下無肺者無瀉肺寒者瀉短肺熱
者無瀉仍用石膏涼肺胃

生石膏四兩 桂枝三錢 枳實五錢 防已四錢 姜半夏五錢
生薏仁五錢 廣皮五錢 煮三盃分三次服

廿一日 於前方內加 茯苓皮五錢 杉皮五錢 減石膏二兩

廿二日至 石膏只用四兩一帖

廿四日至 石膏每帖只用二兩

廿八日 飲聚不行小便已清少時即變臭濁六腑之不通可知大藥已用不少而
猶然如是病機之頑鈍又可知矣議暫用重劑餘有原案

生石膏四兩 杏仁八錢 雲苓皮八錢 飛滑石一兩
姜半夏八錢 防已三錢 海金沙八錢 小枳實五錢
廣皮四錢 煮三盃分三次服

八月初一日 加石膏二兩
初二日 又加石膏二兩

初七日 減去廣皮四錢小枳實一錢
初十日 脈之洪大不減加石膏二兩

十一日至 仍服前方
廿七日 仍服前方
九月初 服石膏至五十劑之多而脈猶浮洪千古來未有如是之頑病皆誤下
傷正於前誤補留邪於後之累今日去補陽明藥蓋陽明之脈大也

生石膏八兩 防已五錢 雲苓皮一兩 木通三錢 飛滑石二兩
杏仁泥一兩 小枳實五錢 煮四盃分四次服

吳氏醫案 痰飲 卒
專以苦淡行水服兩帖再商

初七日 復診加 生石膏四兩共成十二兩服四帖

十三日 脈洪滑痰飲未除晨起微喘足跗腫未消盡餘有原案
生石膏八兩 半夏六錢 生薏仁六錢 飛滑石一兩
雲苓皮六錢 杏仁四錢 葶藶子三錢 木通四錢

十五日 氣已不急去葶藶子右脈仍洪加 石膏一倍共成一劑

十六日 氣急者得葶藶而止右脈之洪大者得石膏一劑大減病減者減其製但
脈仍滑數加行痰飲

生石膏六兩 半夏一兩 枳實三錢 杏仁四錢 雲苓皮五錢
旋覆花四錢 煎廣皮四錢 香附五錢 煮四盃分四次服

十八日 脈漸小減石膏二兩服二帖
二十日 脈洪數加 石膏八兩共成十二兩服二帖

廿二 脈洪數減減石膏六兩加 葶藶子一錢五分
廿五 脈之洪大者得石膏一筋業經大減病減者減其製俟脈復洪大有力再酌加其製

生石膏 十二兩 半夏 一兩 香附 五錢 枳實 五錢 雲苓皮 五錢
旋覆花 四錢 廣皮 四錢 杏仁 四錢 煮四孟分四次服

廿九 小便短於原方加 飛滑石 一兩

妙應丸 全醫謂凡病至其年月日時復發者當下之此證痰飲兼痺自正月服藥至十月石膏將近百筋之多雖無不見效究未拔除病根左脇間漉漉有聲不時喘咳此水在肺也金匱水在肺十棗湯主之又謂偏弦飲漉又謂咳家之脈弦尙有水十棗湯主之又謂咳家一百日至一歲不死者十棗湯主之合而觀之此症當用十棗無疑但十棗太峻南人膽怯未敢驟用降用妙應丸續下之庶無差忒也

吳氏醫案

痰飲

壺

製甘遂 五錢 製大戟 五錢 白芥子 五錢

共為細末神麪糊為丸如小梧子大從三十丸服起得下痰水即止停數日水不盡再服以盡為度

十月初 服妙應丸二分六厘大棗三枚煎湯下清晨服約二刻先從左脇作響墜痛至少腹便下綠水膠痰梳許

初三 服妙應丸二分六厘大棗二枚煎湯下便下痰水如前湯藥未服

初四 氣喘於前方內加 石膏 四兩 共成一筋杏仁 四錢 其成八錢廣皮 一錢

共成六錢加桂枝 六錢 生薑 四錢 服四帖

初八 生石膏 一筋 半夏 一兩 茯苓皮 六錢 飛滑石 一兩

小枳實 五錢 杏仁 八錢 旋覆花 四錢 蘇子霜 一錢

廣皮 三錢 煮四孟分四次服三帖

十一 服妙應丸三分

十一 脈仍供大有力

生石膏 八兩 薏仁 六錢 半夏 六錢 香附 三錢 雲苓皮 六錢
旋覆花 四錢 杏仁 四錢 廣皮 三錢 煮三孟分三次服

十三 飛滑石 一兩 半夏 一兩 杏仁 八錢 桂枝 六錢 枳實 五錢 茯苓皮 五錢
旋覆花 四錢 廣皮 四錢 香附 三錢 蘇子霜 二錢 煮三孟分三次服

二十 去香附加 蘇子霜

廿二 妙應丸三分四厘服之即下痰水

廿九 妙應丸三分八厘服之下痰如前

初四 右脈洪數本有聚飲小便不長

生石膏 一筋 飛滑石 一兩 小枳實 四錢 半夏 六錢

茯苓皮 六錢 晚蠶砂 三錢 生薏仁 六錢 杏仁 六錢

白通草 二錢 煮三孟分三次服

吳氏醫案

痰飲

壺

初六 服妙應丸三分八厘下痰水如前

十一 於前方加 鬱金 三錢

十二 於前方加 廣皮 三錢 石膏 八兩

十三 於前方加 枳實 二錢 旋覆花 四錢

十四 於前方加 蘇子霜 四錢

十五 服妙應丸四分六厘下痰水如前

十六 服妙應丸六分下痰水如前

十七 痰飲喘咳右脈洪左關獨浮與建金制木法

生石膏 八兩 半夏 六錢 杏仁 六錢 香附 四錢 旋覆花 四錢

蘇子霜 三錢 青皮 三錢 煮三孟分三次服

廿二 服妙應丸六分自服丸藥每次皆下痰水惟此次未下以服藥後即食粥也

廿三 服妙應丸六分大便仍行痰水

廿七 洪大之脈已退惟兩關獨浮右大於左而兼實木陷入土與兩利肝胃兼

開膀胱小便短而水易停故也

飛滑石 一兩 半夏 六錢 雲苓皮 六錢 白芍 四錢

旋覆花 三錢 香附 三錢 蘇子霜 三錢 廣皮 三錢

青皮 二錢 煮三盃分三次服

初二月數目不服石膏右脈復然洪數左關之獨浮者亦未十分平靜與金木

同治法

生石膏 六兩 半夏 六錢 雲苓皮 六錢 杏仁 六錢 飛滑石 一兩

小枳實 六錢 香附 四錢 旋覆花 四錢 煮三盃分三次服

以後凡右脈大者服此小即停止

初二 服妙應丸六分下痰水如前

吳氏醫案 痰飲

初三 仍服初一日原方二帖

初五 於初一日方內加 桂枝 五錢 廣皮 四錢 以畏寒故也服五帖

初十 服妙應丸八分下痰水如前

十一 於前方內去桂枝廣皮脈不小故也再服五帖

十六 服妙應丸一錢仍下痰水如前

丁亥正月 曹 五歲咳嗽脈洪大數實面色黧黑已為難治况左脇版痛卧不

着席此水在肝也更為重極之症先與大青龍以平其脈再議逐腸下之

飲

生石膏 四兩 麻黃 去節 三錢 生薑 五片 炙甘草 三錢

杏仁泥 五錢 桂枝 三錢 大棗 三枚 細辛 一錢

煮三盃先服一盃得汗止後服不汗再服

二十 痰飲喘咳無汗六脈洪大數實與大青龍去劑脈小咳減惟口渴思涼未

除脈仍帶數仍與大青龍去麻辛可也

生石膏 三兩 先桂枝 三錢 小枳實 三錢 姜半夏 六錢 杏仁泥 六錢

雲苓 塊六錢 炙甘草 三錢 煮三盃分三次服

廿一 於原方內減石膏一兩加 枳實 二錢 廣皮 五錢

廿二 痰飲喘咳左邊卧不着席脈洪大數實與大青龍三次見效脈已平復惟

仍數耳

生石膏 二兩 雲苓 半塊 半桂枝 三錢 小枳實 三錢 姜半夏 六錢

炙甘草 三錢 杏仁泥 五錢 廣皮 五錢 煮三盃分三次服

丙戌四月 陳女 十五 六脈弦數午後身熱前曾腹脹泄瀉痰多喘咳氣上阻胸

內飲招外風為病兼有伏暑之象與通宣三焦

雲苓塊 六錢 生薑 仁 五錢 白薤仁 一錢 姜半夏 五錢 杏仁泥 三錢

旋覆花 三錢 包煎 黃芩 炭 一錢 五分 薑香梗 三錢 煮三盃分三次服

吳氏醫案 痰飲

十八 六脈弦數較前雖減而身熱未除喘咳亦減胃少開鬱少舒仍宗前法餘

有原案

雲苓皮 六錢 生薤仁 五錢 廣鬱金 一錢 姜半夏 五錢

旋覆花 三錢 包煎 黃芩 炭 三錢 白薤仁 一錢 薑香梗 三錢

杏仁 三錢 青皮 二錢 青蒿 一錢 煮三盃分三次服

二十 肝鬱痰飲咳嗽氣上阻胸寒熱與宣肝絡以開鬱和胃以逐飲降肝氣

鎮肝逆以去氣阻調營衛以止寒熱餘有原案

代赭石 五錢 煨 桂枝 三錢 炒白芍 三錢 旋覆花 三錢 包煎

姜半夏 五錢 香附 三錢 廣鬱金 二錢 歸橫嶺 二錢

降香末 三錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

廿三 肝鬱痰飲兼有伏暑寒熱前與通宣三焦繼以調和營衛宣肝鬱逐痰

飲兩法俱效仍宗第二法

代赭石^{三錢}煨飛桂枝^{三錢} 生薏仁^{五錢} 香附^{三錢} 旋覆花^{三錢}
炒白芍^{三錢} 歸巖^{二錢} 姜半夏^{五錢} 廣皮^{三錢} 白蔻仁^{一錢}
廣鬱金^{二錢} 降香末^{二錢} 煮三孟分三次服

廿六脈大則病進脈小則病退肝鬱夾痰飲三法俱效仍以兩和肝胃調和營衛立法

代赭石^{五錢} 煨飛桂枝^{三錢} 降香末^{二錢} 香附^{三錢} 新絳紗^{三錢}
炒白芍^{三錢} 歸巖^{二錢} 旋覆花^{三錢} 廣皮^{三錢} 益智仁^{五分}
姜半夏^{五錢} 煮三孟分三次服

廿九諸症向安惟餘痰飲經未行仍與兩和肝胃

茯苓塊^{五錢} 桂枝^{三錢} 姜半夏^{五錢} 香附^{三錢}
炒白芍^{三錢} 廣皮^{三錢} 降香末^{三錢} 生姜^{三大片}
全當歸^{二錢} 煮三孟分三次服

吳氏醫案

痰飲

突

五月初脈和昨日經行經前腹痛色紫黑今日不痛但少腹脹須服化癥回生

丹一二九
姜半夏^{三錢} 桂枝^{一錢} 香附^{三錢} 廣皮^{一錢} 焦白芍^{一錢}
降香末^{二錢} 歸巖^{一錢} 生姜^{三片} 煮二孟分二次服

己丑正月舒氏^{四十歲}痰飲喘咳夜甚脇痛少腹亦痛溺濁水在肝也經謂之懸飲懸飲者十賈湯主之恐其太峻宗其法而不用其方

姜半夏^{五錢} 生薏仁^{六錢} 旋覆花^{三錢} 香附^{三錢}
雲苓皮^{六錢} 小枳實^{三錢} 降香末^{二錢} 廣皮^{三錢}
蘇子霜^{三錢} 煮三孟分三次服

己丑正月魯氏^{七十歲}痰飲喘咳倚息不得卧左畔更不能着席脇下有飲水在肝也加逐肝中之飲與小青龍法

姜半夏^{六錢} 桂枝^{四錢} 廣橘皮^{三錢} 旋覆花^{三錢}

小枳實^{四錢} 香附^{三錢} 五味子^{一錢} 乾姜^{四錢}
炙甘草^{二錢} 煮三孟分三次服

十四痰飲喘咳倚息不得卧前與小青龍法痰少活右手今日脈結塊痰所致重與利肺氣為要

姜半夏^{六錢} 苦桔梗^{五錢} 杏仁^{五錢} 雲苓塊^{五錢}
小枳實^{四錢} 旋覆花^{三錢} 廣皮^{三錢} 蘇子霜^{三錢}
生姜汁^{三匙} 煮三孟分三次服

十八痰飲喘咳倚息不得卧脈結前與利肺氣治結脈法茲結脈已愈但自覺冷氣上冲當伐其衝氣

雲苓塊^{一兩} 桂枝^{六錢} 廣橘皮^{三錢} 姜汁^{三匙} 小枳實^{四錢}
姜半夏^{六錢} 乾姜^{四錢} 甘關水^{煮三孟分三次服}

庚寅十月潘^{二十歲}痰飲喘咳脈弦

吳氏醫案

痰飲

突

姜半夏^{六錢} 桂枝^{五錢} 廣橘皮^{三錢} 白芍^{三錢} 小枳實^{三錢}
炙甘草^{三錢} 乾姜^{二錢} 五味子^{一錢} 煮三孟分三次服

十八喘稍定而不寐與胃不和則卧不安飲以蠶糧半夏湯
姜半夏^{二兩} 秫米^{二合} 甘關水^{入孟煮取三孟分三次服}

廿四左脈弦甚所謂單弦飲澀也久飲受風因而大喘不寐與半夏湯喘止能寐伏飲未除

姜半夏^{六錢} 桂枝^{三錢} 小枳實^{三錢} 乾姜^{三錢} 雲苓塊^{五錢}
炙甘草^{三錢} 廣皮^{三錢} 炒於朮^{三錢} 煮三孟分三次服

己丑二月覺羅氏^{少陽}膽絡偏頭痛係上焦火病屬陽胸滿短氣不食不便咳嗽脈沈弦頭面肢腫欲小便則寒噤係中下焦水病屬陰陽水火兼病礙難措手勉與清上焦勿犯中下二焦俟上焦愈再治下焦

連翹^{三錢} 牛蒡子^{一錢} 鉤藤^{三錢} 刺蒺藜^{二錢}

銀花三錢 荆芥穗一錢 丹皮二錢 茶菊花三錢

桑葉三錢 煮三小盃分三次服一帖頭痛減

初九 痰飲誤用苦寒以致胸滿短氣便閉不食

姜半夏八錢 小枳實四錢 廣皮三錢 杏仁泥八錢 煮三盃分三次服

以大便通為度 服一帖便通思食胸滿除但頭復微脹

壬辰正月 珠氏歲六脈沈弦細弱陽氣虛極嘔吐停水食少再吃生冷猪肉

鹹味不可救矣

茯苓塊六錢 吳萸三錢 橘皮四錢 良姜三錢 川椒炭三錢

姜半夏六錢 生薑五錢 煮三茶盃分三次服

二月初 即於前方內去良姜加乾姜炭三錢

初五 陽虛受寒服溫藥已效仍有脇脹膈痛六脈弦細

吳氏醫案

痰飲

突

小茴香三錢 炒黑 良姜一錢 香附三錢 青皮一錢

廣橘皮三錢 煮三盃分三次服

初九 於前方內加 茯苓塊五錢

十一 陽微脈弦細脇脹減而腹痛未除

吳茱萸三錢 烏藥二錢 檳榔一錢 小茴香三錢 炒

廣橘皮三錢 良姜三錢 青皮一錢 生薑三片

川椒炭三錢 煮三小盃分三次服

廿一 本受燥金寒氣又加肝鬱腸痛治在肝絡

新絳紗三錢 香附三錢 蘇子霜三錢 旋覆花三錢 包煎

姜半夏五錢 青皮二錢 川椒炭三錢 歸橫鬚二錢

降香末三錢 橘皮三錢 煮三盃分三次服

壬辰二月 某 其人本有痰飲喘咳又感風溫不惡寒反惡熱口渴暮夜身熱

頭暈汗多暫與辛涼清上

連翹三錢 苦桔梗三錢 銀花三錢 香豆豉二錢

蘆根三錢 杏仁泥三錢 桑葉三錢 炙甘草五錢

竹葉三錢 煮三盃分三次服

初七 痰飲喘咳又加溫熱前與辛涼茲溫熱已退服猶微數尚不能純然大溫

以治飲且與平劑為穩

茯苓皮六錢 杏仁五錢 小枳實四錢 香附三錢 姜半夏六錢

旋覆花三錢 包煎 橘皮四錢 蘇子霜三錢 煮三茶盃分三次服

初九 胃不和則臥不安與靈樞半夏湯和胃

姜半夏二兩 秫米一合 急流水八盃煮取三盃分三次服

十一 痰飲喘咳脈弦細

吳氏醫案

痰飲

突

廣橘皮四錢 乾姜三錢 小枳實一錢 細辛一錢

炙甘草三錢 甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

十二 痰飲喘咳與溫中降氣已效仍宗前法而進之

桂枝三錢 小枳實五錢 細辛一錢 蘇子霜三錢

杏仁三錢 焦白芍二錢 乾姜三錢 廣橘皮五錢

炙甘草三錢 甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

十五 痰飲喘咳已愈五六惟口乾頭暈不寐與辛能潤法

姜半夏二兩 秫米一合 急流水八碗煮取三碗分三次服

十八 痰飲不寐與半夏湯已瘳惟短氣心悸未除汗多

姜半夏六錢 桂枝三錢 小枳實三錢 雲苓塊五錢

五味子三錢 乾姜三錢 炙甘草三錢 廣橘皮三錢

麻黃根三錢 去淨蘆 煮三盃分三次服

廿一 痰飲喘咳俱愈又感風溫頭暈脈數身熱與辛涼法

連翹 三錢 苦桔梗 三錢 桑葉 三錢 荆芥穗 一錢五分
 銀花 三錢 香豆豉 三錢 竹葉 一錢 炙甘草 一錢
 薄荷 一錢 煮三小盃分三次服

廿三 風溫已解痰飲不寐左脇痛與兩和肝胃

姜半夏 六錢 桂枝 三錢 降香末 三錢 歸鬚 一錢
 旋覆花 三錢 香附 四錢 廣橘皮 三錢 青皮 一錢
 蘇子霜 三錢 秫米 一撮 煮三盃分三次服

廿五 飲脹脇下痛而咳

姜半夏 六錢 桂枝尖 三錢 香附 四錢 降香末 三錢 小枳實 四錢
 旋覆花 三錢 杏仁泥 三錢 乾姜 三錢 蘇子霜 三錢 廣橘皮 四錢
 甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

吳氏醫案

痰飲

半

廿八 病減者減其製餘有原案

姜半夏 六錢 香附 三錢 小枳實 一錢 乾姜 三錢 旋覆花 二錢
 廣橘皮 三錢 青皮 二錢 蘇子霜 一錢 煮三盃分三次服

三月初八日 痰飲未盡除脇下有癥瘕鞭塊與溫通絡法

姜半夏 五錢 香附 三錢 小枳實 三錢 旋覆花 三錢
 川椒炭 三錢 乾姜 三錢 吳茱萸 一錢 蘇子霜 三錢
 小茴香 三錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

吳鞠通先生醫案卷四

婦科目錄

疝瘕

胎前

產後

陰吹

交腸

調經

帶下

麻燥

兒科目錄

吳氏醫案

目錄

痘

癰癧

食積

瀉泄

咳嗽

暑溫

伏暑

後學 高德信汝醫重錄 袁吉生慶元校刊

痼疾

廿三 庚八月 胡氏二十歲脈沈而細體厚而白陽虛可知奔豚從少腹上攻心胸發

作欲死氣回則已嘔酸瘕瘕大便結燥頭暈心悸皆肝經累及衝脈為病

桂枝尖二錢 降香三錢 川棟子五分 淡吳萸三錢 廣木香一錢

炒全歸三錢 靈運炭一錢 炒小茴香三錢 川芎一錢 廣鬱金二錢

青皮三錢 兩頭尖二錢 煮三杯分三次服

廿六 桂枝一錢 魏香附三錢 全歸三錢 降香三錢

炒小茴香三錢 川芎五分 半夏三錢 淡吳萸二錢

廣皮二錢 青皮二錢 靈運炭一錢 煮三杯分三次服

吳氏醫案 痼疾

廿九 紫石英五錢 生香附三錢 淡吳萸三錢 降香末三錢

廣皮二錢 桃仁泥二錢 川棟子三錢 炒全歸三錢

兩頭尖三錢 炒小茴香三錢 青皮一錢 錢五分

煮三杯分三次服

九月初 通補八脈

生鹿角四錢 肉桂八分 降香末三錢 紫石英五錢

杞子三錢 炒全歸三錢 桂枝尖二錢 生香附三錢

炒小茴香三錢 煮三杯分三次服

乙丑四月 廿七日 章氏七十歲老年癆泄小腹痛上連季脇小便短赤之極六脈洪數

法宜急調陰絡且令得小便庶可痛減進食

川棟子三錢 歸鬚三錢 藏紅花一錢 降香末三錢

良姜一錢 兩頭尖三錢 炒小茴香三錢 琥珀三分

廿八 六脈洪數較前更甚於前方內去兩頭尖加 川黃連一錢

廿九 脈小則病退較平人猶覺大也

川棟子三錢 檳榔五分 淡吳萸二錢 降香末三錢

青皮五分 真雅連一錢 炒小茴香三錢 琥珀四分

藏紅花八分 生香附三錢 歸鬚八分 口糜五錢

煮三杯分三次服

三十 病勢少減惟嘔惡不食兼與和胃

烏藥一錢 製半夏三錢 檳榔一錢 歸鬚二錢

降香末三錢 紅花五分 川連一錢 淡吳萸三錢

血珀三分 青皮二錢 炒小茴香三錢 口糜五錢 同研極細沖

頭煎八分兩茶杯二煎一茶杯分三次服

吳氏醫案 痼疾

五月初 帶下癆聚皆衝任脈為病數日來急通陰絡效已不少但六脈洪數有

力謹防下部生瘡凡瘡皆屬君火瀉心者必瀉小腸且膽無出路必借小

腸以為出路小腸火腑非苦不通

蘆薈一錢 龍膽草三錢 山連一錢 半夏三錢

川棟子三錢 青皮一錢 歸鬚三錢 生香附三錢

琥珀三分 烏藥二錢 淡吳萸三錢 檳榔二錢

口糜五錢 小茴香三錢 煮三杯分三次服

初三 今日脈雖小而泄較多

吳萸三錢 降香末三錢 草薢三錢 良姜三錢

生香附三錢 烏藥二錢 半夏二錢 川棟子三錢

歸鬚二錢 青皮一錢 小茴香三錢 廣皮二錢

煮三杯分三次服

初三 大瀉泄痛甚且有紫血積滯法宜通陽和絡

吳萸泡淡 降香末 三錢 紅花 五分 安桂 一錢 五分

川棟子 三錢 琥珀 三分 歸身 三錢 廣木香 二錢

生香附 三錢 口腐 五釐 川椒炭 三錢 青皮 一錢 五分

川連 一錢 煮三杯分三次服

初四 厥證俱減惟脇脹惡仍用前法而小變之

川棟子 三錢 安桂 一錢 川椒炭 三錢 降香末 三錢

青皮 二錢 生香附 三錢 淡吳萸 三錢 紅花 五分

廣鬱金 一錢 小茴香 三錢 廣皮 二錢 川黃連 一錢 五分

煮三杯分三次服

初五 於前方內去川椒炭再服一帖

初六 老年久病勢已緩且減其製間服烏藥散五分不痛不服

吳氏醫案

半夏 六錢 炒小茴香 五錢 全歸 七錢 炒老黃

川棟子 三錢 吳萸 泡淡 一錢 桂心 研細 沖 生香附 三錢

廣皮 一錢 紅花 五分 煎二杯分一次服

初七 老年久病諸症悉減未便純任攻伐議運補兼施能入奇經者宜之

炙龜板 三錢 全歸 黃酒 炒 小茴香 少服 黃酒 鹿角霜 二錢

艾炭 一錢 生香附 三錢 枸杞子 炒 二錢 砂仁 五分

煎二杯分二次服

廿六 王氏 濁陰上僭滴水不下痛脹不可忍而又加以大瀉泄六服幾

於無陽殆哉

炒川椒 八錢 華撥 四錢 小枳實 五錢 淡吳萸 六錢

良姜 三錢 魚白芍 三錢 安邊桂 去粗皮 紅麴 三錢

炒黃芩 一錢 老厚樸 五錢 歸身 一錢 炒川連 二錢

初八 九挽水煮成三碗加桂再煮得八分三碗分三次服

濁陰之上攻者少平積滯之下趨者未淨且有黑暗紫熾之形思有形有

質之邪非急趨不可誠溫下法欲便先痛便後痛減是其可下之據也再

以體虛而論急逐其實正所以護其虛也不然經綿日久終歸於憊反欲

下而不能矣古人所謂開一面也

桂心 三錢 生大黃 酒 炒 黃芩 一錢 川椒 炒 黑 五錢

炒白芍 三錢 紅桂 二錢 厚樸 三錢 淡吳萸 五錢

廣皮 三錢 歸尾 一錢 炒川連 一錢

水八盞煮成三杯先服二盞以知消息之即得快大便方已之意

化癥回生丹方

蕪甲膠 一兩 人參 六兩 桃仁 三兩 益母膏 八兩

熟地 四兩 紅花 一兩 公丁香 三兩 白芍 四兩

吳氏醫案

麝香 二兩 小茴香 三兩 歸尾 四兩 乾漆 二兩

五靈脂 二兩 杏仁 三兩 川芎 二兩 京三稜 二兩

蘇木 三兩 香附 二兩 蘇子霜 二兩 安桂 二兩

阿膠 二兩 元胡索 二兩 降香 二兩 艾炭 二兩

片姜黃 二兩 吳萸 二兩 良姜 二兩 兩頭尖 二兩

乳香 二兩 水蛭 香油 炒 川椒炭 二兩 沒藥 二兩

斑蝥 二兩 蒲黃炭 一兩 大黃 八兩

右藥其為細末以蕪甲大黃益母三膠和勻再加煉蜜為丸重一錢五

分蠟皮封謹用時溫開水利空心服瘕甚之症黃酒下

一治癥結不散不痛

一治癥發痛甚

一治血痺

一治癰母左脇痛而寒熱者

一治婦女乾血癆症之屬實者

一治婦女經前作痛古謂之痛經者

一治婦女將欲行經而寒熱者

一治婦女將欲行經誤食生冷腹痛者

一治婦女經閉

一治婦女經來紫黑甚至成塊者

一治產後瘀血少腹痛拒按者

一治腰痛之因於跌撲死血者

一治跌撲昏暈欲死者

一治金瘡棒瘡之有瘀滯者

馬氏二十歲腹痛十數年不愈三日一發或三日十日一發或半月一發發時痛

吳氏醫案 疝瘕 五

不能食無一月不發者與天台烏藥散發時服二錢痛輕服一錢不痛時服三五分一年以外其瘕化盡永不再發

史氏三十歲少腹痛不可忍六脈弦細而緊其夫曰妊孕業已足月想欲產耳余

曰胎脈流利弦緊乃賊克之脈此瘕也見病脈故不見胎脈與辛香流氣

飲二帖而痛止三日後大生如故

乙酉八月 王室女二十歲 肝鬱結成癥瘕左脈沈伏如無右脈浮弦下焦血分閉

塞極矣此乾血癆之先聲也急宜調情志切戒怒惱時刻能以想字待人

則病可愈矣治法以宣絡為要

新絳紗三錢 桃仁泥三錢 廣鬱金三錢 蘇子霜三錢

旋覆花包三錢 歸橫鬚三錢 降香末三錢 公丁香五分

煮三杯分三次服

九月初 服前藥四帖六脈沈伏如故絲毫不起病重則藥輕於前方內加

川椒炭三錢 良姜二錢

再用化癥回生丹早晚各服一丸服至癥瘕化盡為度三四百丸均未

可定斷不可改移易散也

十月十 癥瘕癯瘠服宣絡溫經藥二十二劑化癥回生丹四十餘丸業已見效

不淺脈亦生動經亦暢行藥當減其製化癥回生丹每早空心只服一丸

效則不必加切戒生冷猪肉介屬可收全功

新絳紗三錢 丹皮五錢 廣鬱金二錢 香附三錢

旋覆花包三錢 歸橫鬚二錢 降香末二錢 廣皮二錢

蘇子霜五分 煮三杯分三次服

此方常服可全愈

胎前

癸亥七月 汪氏三十歲痢疾古稱滯下沉久病脈實欲便先痛便後痛減其為積

吳氏醫案 疝瘕 胎前 六

滯未清無疑非網開一面不能補虛議溫下法所以敢用此者經謂有故無殞故無殞也

生大黃三錢 官桂一錢 焦神麩二錢 炒白芍二錢

黃芩一錢 南查炭一錢 老厚樸一錢 雲連一錢

廣木香一錢 桃仁泥一錢 歸橫鬚一錢

水四茶杯煮成六分三茶杯先服一杯候四個時辰問病人再便腹不

痛止後服若欲便之先痛減其半再服一分之半痛仍照前再服一分

其第三次亦如前候法

初七 服前藥全然不痛

焦白芍五分 茯苓一錢 廣木香八分 黃芩炭八分

雲連三分 老厚樸一錢 焦茅朮一錢 蓮子二錢

廣皮炭一錢 煮二杯分二次服

日九 帶下腹痛已去七八咳嗽冷痰脈近緩仍然雞鳴欲便穢滯之中兼醒

脾胃兩陽

茯苓塊 四錢 厚樸 二錢 製芽朮 三錢 焦白芍 一錢

半夏 二錢 煨肉果 一錢 五分 黃芩 炭 二錢 廣皮 一錢

廣木香 一錢 煮三杯分三次服

黃氏 三十 死胎不下已三日矣六脈其大心悸甚汗大出而喘按俗派愈以平

胃散加煨硝並陽虛欲脫前法下咽即死矣與救逆法護陽斂汗陰陽和而胎自下

遠參 三錢 牡蠣 五錢 蓮子 五錢 雲苓 四錢

龍骨 五錢 炙甘草 三錢 麥冬 三錢 林砂 梓

煮三盃服一盃而汗減喘定服二盃而死胎自下服三盃而神定以天

根月窟膏兩補下焦陰陽法兩月而安

吳氏 胎前

胎前

七

關氏 三十 難產三日不下脈大年長陰氣不足交骨不開

生龜板 八兩 煮兩碗盡剉而生生後補陰而安

滿氏 四十 難產五日不下呼吸定息脈再至陽氣不充裏寒且有癥瘕與溫經

肉桂 五錢 雲苓塊 五錢 川芎 二錢 人參 一錢

川椒炭 三錢 全歸 三錢

煮三杯分三次服盡剉而生大小無恙

又 產後惟腹中痠痛甚仍以前方內加

炮薑 四錢 淡吳萸 三錢 炒小茴香 三錢 桃仁 三錢

煮三盃分三次服服後下血塊長六七寸者一枚畧如狗形無腸腹中

尚有一枚不敢再攻以服逆補奇經丸化淨而身體大健

史氏 妊娠七月溫熱用承氣大下已散溫熱門中胎氣全然無傷其所生之

子已三十三歲矣

范氏 二十 每殞胎必三月斤虛而熱業已殞過三次考古法用養寄生湯按寄

生湯內用人參五錢又非二三帖所能保況業已見紅即人參甚便亦不

能定其必可以保況力不足者多能用參者少且寄生未定其桑也非寄

生亦復不少藥不真焉能見效內經謂上工治未病何若於未孕未殞之

前先用藥為妙故用專翁大生膏一料計二十四劑每日服一兩分早中

晚三次一料盡又受孕自二百四十天仍舊不保其夫來報余甚慚愧自

以為計之不善也其夫云不然前次之殞滑不可解若不知者然此次之

殞宛如大生難難萬狀是藥力已到而未足其補之量也皆久滑難補之

故望先生為加減急急再做一料乘月內服起必可大生也於是照前方

加重分量計生料八十斤外加嫩薑茸二劑作細末和膏內得乾丸藥

三十劑以後連生四五胎無一小產者

專翁大生膏 鹹法

胎前

八

無女月 人參 二劑

沙蒺藜 一劑 牡蠣 一劑 茯苓 二劑

海參 刺大者 麥冬 二劑 烏骨雞 雌雄 一劑

龜版 另熬膠 猪脊髓 一劑 蓮子 湖南 二劑

羊腰子 八對 芡實 三劑 阿膠 二劑

白蜜 一劑 熟地黃 三劑 杞子 炒黑 一劑

五味子 牛助 鮑魚 二劑

鱉甲 另熬膠 雞子黃 去白 二劑

右藥分四鍋鍋忌鐵器攪 以有情歸有情者一無情歸無情者一文火細

煉三晝夜去渣再熬六晝夜陸續合為一鍋煎煉成膏末下三膠合蜜和

勻以方中有粉無汁之茯苓白芍蓮子芡實為末合膏為丸每服二錢漸

加至三錢日三服一日一兩期年為度每殞胎必三月肝虛而熱者加天

冬一劑同熬膏再加鹿茸二十四兩為末 本方以陰生於八成於七故用

方用陽生於七成於八三八二十四之偶方以生胎 或加桑寄生一劑

之湯也古法通方多用偶守方多用奇陰陽互也

或加桑寄生一劑

或加桑寄生一劑

或加桑寄生一劑

方論夫乾其動也直其靜也專是以大生焉夫坤其動也闢其靜也翕是以廣生焉此方法乾坤之靜取靜以制動之義專治陽極而亢陰表而躁如產後血虛鬱冒自汗出大便難痙瘕驚風每項胎必三月溫熱誤下誤汗那退後陰之所存無幾一切陰虛而陽不損之症皆萃三陰柔藥半用血內有情竊動而不呆板之物養陰最速接其生氣而以收斂納縮之少陰為主蓋陽主開陰主閉故從來治腎以大封大固為主經云腎為封藏之本兼淫燥寒三項陰邪之病者禁用

干氏 每項胎必三月前人謂肝虛而熱用桑寄生湯余前保范氏胎以寄生湯藥品難得又鞭長莫及改用專翁大生膏純然補陰為乙癸同源之治送大生四五胎茲症面青黃脈弦細不惟不熱且虛寒之甚改用天根月窟膏兩補下焦陰陽兼補八脈始大生一胎孩體冰涼不赤未能存活又服藥一年又大生一胎嬰兒仍不甚溫又服藥一年又大生兩胎存活一

吳氏醫案 胎前 九

男一女矣

產後

癸亥二月 王氏二十歲熱雖重而陰脈有餘非虛證也乃伏暑為病陽陷入陰之故痰多咳嗽胸痞不愜忌柔藥

初四日 炙甘草 五錢 茯苓皮 三錢 乾薑 一錢 青蒿 三錢
 廣鬱金 三錢 青皮 一錢 半夏 三錢 青橘葉 三錢
 生薑 三片 黃皮 一錢 黃芩炭 一錢 煮三五分三次服
 初六 服剛藥而寒反多熱反少脈反緩而小不渴太陰溼重也
 茯苓 五錢 茅朮炭 三錢 青蒿 三錢 半夏 五錢
 廣鬱金 二錢 廣皮 二錢 乾薑 三錢 黃芩炭 一錢
 生薑 三錢 草果 一錢 煮三五分三次服
 初七 脈緩舌苔重便溲胸痞色淡黃白合而觀之為溼重脾寒之象

半夏 五錢 茯苓塊 五錢 薏仁 五錢 杏仁 二錢
 生茅朮 三錢 炒黃芩 二錢 檳榔 一錢 煨草果 五分
 廣皮 二錢 乾薑 三錢 白薤仁 六分 煮三五分三次服

初八 諸症俱減宜減其製
 茯苓 三錢 淡乾薑 一錢 生茅朮 二錢 半夏 三錢
 黃芩炭 一錢 檳榔 八分 杏仁 二錢 白薤仁 六分
 廣皮 一錢 煮二五分二次服

初十 病退八九以養中焦為法
 半夏 三錢 茯苓塊 五錢 薏仁 五錢 杏仁 三錢
 炒於朮 二錢 蓮子 連皮打碎 廣皮 一錢 白薤仁 八分
 煮三五分三次服

十三 產後陰傷因有寒溼外感症但見脈緩而陰脈有餘之寒溼溼症故忌柔

用剛滋溼症全愈而陰虛脈洪數陰脈不足之症現則不得不退剛用柔因時制宜醫貴乎活潑流動神明變化以求合乎道者此也豈有一毫私意存乎其間哉
 大生地 四錢 麥冬 不去心 熟五味 九粒 焦白芍 六錢
 生牡蠣 四錢 炙甘草 二錢 炙鱉甲 三錢 煮三五分三次服

癸亥五月 丁氏二十歲血與水搏產後惡露不行腹堅大拒按神思昏冒其為瘀血上攻無疑
 歸尾 五錢 蘇紅花 三錢 川芎 一錢 桃仁 三錢
 兩頭尖 三錢 煮三五分三次服間服化癥回生丹 五九
 廿七 血化為水瘀滯攻心昨已危急因用回生丹以直入厥陰陰絡之兩頭尖為導導續下瘀滯而神氣已清但瘀滯尚多誤以化癥回生丹緩攻為宜
 蘇紅花 二錢 澤蘭 二錢 兩頭尖 三錢 廣鬱金 三錢

煮兩盃渣再煮一盃分三次服化癥回生丹二九 每次和服一九

日八 腹中無處不痛服沈數有力瘀血尚多
歸尾五錢 元胡索四錢 澤蘭三錢 桃仁三錢
京三稜三錢 莪朮三錢 紅花二錢 兩頭尖五錢

川芎一錢 者四盃每盃和化癥回生丹一九服
日九 瘀滯已去不少腹痛減去八九經謂大毒治病十衰其六即無毒治病十
衰其九勿使過刻今日頭暈而目視歧見兩物不可狂浪再與攻痰議七
味九加車前子牛膝琥珀一面搗少生氣一面宜絡脈之血方為合拍
此時生死相關之際不可不精細也

吳氏醫案
茯苓四錢 熟地炭八錢 肉桂三錢 炒僵蠶六錢
黃肉炭三錢 丹皮四錢 山藥三錢 車前子四錢
牛膝四錢 其炒炭者成三椀又加琥珀細末九分分三次沖服

三十 同前
六月初 瘀血隨衝氣上攻神昏又用
化癥回生丹五九

日一 前用藥少陰開太陽法小便稍利腫脹微消但衝氣上動咳而不寐議伐
腎邪以止衝氣和胃以合寐

茯苓塊八錢 半夏六錢 紫石英生研細 桂枝木三錢
秫米一椀 製五味一錢 甘瀾水煮成三盃分三次服

日三 昨與伐衝氣藥和胃藥已見效仍宗前法腰冷少腹脹加小茴香
猪苓三錢 茯苓塊連皮 半夏八錢 澤瀉三錢
老厚樸一錢 秫米一合 桂枝三錢 小茴香炒炭一錢五分

日五 脈漸小為病退左關獨大為肝旺夜間氣上衝胸滿陰陽肝陽上升之故
甘瀾水煮成三盃分三次服

產後陰虛不敢峻攻食少宜開太陽藥與和胃

茯苓塊連皮 桂枝三錢 小枳實打碎 旋覆花包三錢
澤瀉三錢 五味子製一錢 焦白芍三錢 半夏六錢
廣皮炭一錢 廣鬱金一錢 澤蘭五分 煮三盃分三次服

日七 諸症悉除惟餘痰飲咳嗽喘滿短氣胸痺皆係應有之症無足怪者經謂
病痰飲者冬夏難治況十數年之痼疾又屬產後乎

王氏 鬱胃自汗出大便難產後三大症俱備因血虛極而身熱發厥六脈散
大俗云產後驚風不知皆內症也斷斷不可誤認外感症議翁謂真陰法
大生地六錢 麥冬不去心 白芍二錢 炒 生薑版 五錢

阿膠三錢 五味子製一錢 生牡蠣三錢 鮑魚三錢
炙甘草一錢 去渣後攪入雞子黃一枚 海參一條
煮三盃分三次服

又 夜間汗多加龍骨五錢
又 產後鬱冒自汗出六日不大便血少而淡一以增津補液為主
元參五錢 大生地六錢 洋參一錢 麻仁五錢
炒白芍三錢 鱈魚四錢 麥冬不去心 生龜版三錢

又 於前方內去洋參甘草
乙丑四月 文氏 太陰運土司天之年六脈沈細而緩舌苔滿佈白滑得飲則
胸滿大便泄泄面青黃唇白身萎不起顯係寒淫所傷致脾胃兩陽大敗

法以通補勝傷使寒淫得行方妙豈有橫補中焦守補臟真之理皆因其產後而誤也

生茅朮 三錢 半夏 五錢 小枳實 三錢 猪苓 三錢

茯苓地 五錢 煨草果 五錢 生薏仁 五錢 澤瀉 三錢

廣木香 五錢 老厚樸 三錢 廣皮 五錢 甘瀾水煮三盃分三次服

廿五 產後中溼昨用剛燥通陽業已見效今日細詢鼻出涼氣腸鳴腹痛青惡

寒香酸皆表裏傷虛見症詳前案

姜半夏 三錢 桂枝 三錢 小枳實 一錢 生薏仁 五錢

乾姜 三錢 煨草果 五錢 老厚樸 三錢 椒目 三錢

廣楸皮 三錢 生茅朮 三錢 煮三盃分三次服

廿六 六脈陽微之極稍緩則難救矣即於前方內加

桂枝 二錢 煨草果 五錢 吳茱萸 二錢 夏姜 一錢

吳氏醫案 產後 三

生茅朮 一錢 乾姜 一錢

廿七 產後中溼大用苦辛剛燥已見大效古法效者減其製但夜間不寐非重用半夏不可宗素問也

半夏 一兩 茯苓皮 五錢 乾姜 三錢 椒目 五錢

生茅朮 五錢 秫米 一合 草果 二錢 生薏仁 五錢

甘瀾水煮三盃分三次服

廿八 吞酸不得寐照前方內加

半夏 八錢 淡吳茱萸 五錢 秫米 一合

廿九 前因得效而減其製但與和胃令寐今雖得寐而舊症復來仍與廿六日方再服一帖

茯苓地 五錢 半夏 八錢 椒目 三錢 生茅朮 三錢

三十 產後中溼昨日復行大用剛燥又見大效今日仍減其製

桂枝 三錢 乾姜 三錢 老厚樸 三錢 薏仁 三錢

廣皮 二錢 小枳實 五錢 煎法服法如前

五月初一日 昨日波製病便不大效今日於前方內加

薏仁 二錢 生茅朮 二錢 乾姜 二錢 草果 一錢

初二 諸症悉減惟口不知味不能起坐脈微陽未復也用真武湯法

熟附子 三錢 桂枝 五錢 生白朮 三錢 生茅朮 五錢

椒目 五錢 煨草果 五錢 茯苓塊 五錢 生薑 五片

初三 於前方內加乾姜 三錢 附子 五錢 真姜 三錢 去白朮

初四 又於前方內加厚樸 三錢 枳實 三錢 廣皮 三錢

初六 微惡寒右脈未起陽不復也

桂枝 六錢 熟附子 四錢 乾姜 一錢 茅朮 三錢

吳氏醫案 後 古

茯苓塊 三錢 生薑 五片 薏仁 五錢 小枳實 二錢

煮三盃分三次服

初八 諸症悉減脈滑不寐胃不和也與素問半夏湯

茯苓 三錢 姜半夏 八錢 秫米 一合 薏仁 五錢

杏仁泥 三錢 煮三盃分三次服

初九 仍不寐加半夏至成兩半寐則不必加

初十 溫毒頰腫喉痛牙床木痛與普濟消毒飲但久病大虛初愈藥不宜過重

元參 一錢 苦桔梗 一錢 射干 一錢 銀花 一錢

牛蒡子 一錢 芥穗 八分 連翹 五錢 人中黃 八分

殭蠶 一錢 薄荷 五分 茶菊花 一錢 馬勃 八分

午刻一帖申刻一帖戌刻不見重明早服一帖若口渴身熱腫甚成刻加一帖

十一 照初十日方服三帖
十二 再服三帖 外洗日方 赤爛風弦牌經溼熱他症不可用此方也

桑葉 三錢 薄荷 一錢 明礬 六分 連翹 三錢
枳殼 二錢 膽礬 三分

先煎四味草藥去渣後入二礬上火化令相得先煎後洗洗後勿令見風

十三 病減者減其製

銀花 一錢 青箱子 一錢 茶菊花 一錢 連翹 一錢
苦桔梗 八分 冬桑葉 八分 薄荷 三分 牛蒡子 一錢

生甘草 五分 射干 八分 煮二盃分二次服

十四 諸症悉減餘熱未除大勢可無虞矣

苦桔梗 一錢 銀花 一錢 冬桑葉 一錢 草決明 一錢

吳氏醫案

產後

五

連翹 一錢 黃芩 五分 茶菊花 一錢 兒茶 八分

生甘草 一錢 煮二盃分二次服今晚一帖明早一帖

十五 於前方內加刺蒺藜 八分

十六 於前方內加草決明 黃芩

十七 諸症悉平惟餘肝鬱仍宜兩利肝胃兼宜絡脈

降香末 三錢 清皮 一錢 生薏仁 五錢 旋覆花 包三錢

香附 三錢 廣木香 一錢 製半夏 六錢 廣皮 二錢

益智仁 一錢 煮三盃分三次服

十八 進食不旺且與和胃

茯苓 三錢 半夏 五錢 白蔻仁 一錢 藿香 三錢

生薏仁 五錢 廣鬱金 二錢 益智仁 一錢 廣皮 三錢

大麥芽 一錢 煮三盃分三次服

廿一 下焦濁陰因寒淫蟄踞且來上攻心胸若痞若白滑濁議鋼飲法

川椒 三錢 淡吳萸 三錢 厚樸 二錢 良姜 三錢
小茴香 三錢 廣皮 二錢 青皮 二錢 小枳實 三錢
煮三盃分三次服

廿二 昨晚泄瀉一次今日痛減仍不知味

茯苓 三錢 澤瀉 二錢 熟附子 三錢 生茅朮 三錢
廣皮 二錢 老厚樸 二錢 淡吳萸 三錢 生薑 三片

廿三 腹中水氣仍熱未盡

茯苓 三錢 半夏 五錢 生茅朮 三錢 生薏仁 五錢
乾姜 三錢 小枳實 三錢 老厚樸 二錢 生薑 五片

吳氏醫案

產後

六

廿四 益智仁 二錢 甘瀾水頭煎兩盃二煎一盃分三次服

廿五 舌色漸正是其佳處大便溼滑溼正行而未盡也責在脾不和寐者胃不和也

半夏 一兩 茯苓 六錢 薏仁 五錢 猪苓 三錢
生茅朮 五錢 乾姜 三錢 澤瀉 三錢 益智仁 三錢
糯米 二台 桂枝 三錢

廿六 甘瀾水八碗煮取三碗分三次服一日一帖令盡

廿七 下焦濁陰上攻心悸即衝疝奔豚之類也議桂枝加桂法

茯苓 五錢 熟附子 三錢 全歸 三錢 桂枝 五錢
焦白芍 二錢 川芎 一錢 川椒 三錢 小茴香 三錢
生薑 三片 肉桂 三錢 煮三盃分三次服

廿九 脾陽幾無非再與重切脾陰不可

茯苓塊 五錢 桂枝 三錢 生薑仁 五錢 生茅朮 五錢

肉桂 去粗皮 五分 黑川椒 三錢 熟附子 三錢 廣皮 二錢

煨草果 五分 煮三盃分三次服

六月初一日 於前方內加附子 二錢 乾全蝎 二個 煨草果 五分 肉桂 五分

初二日 肝鬱脇痛久必成肝着速速開明情志要緊以痛止為度

新絳紗 三錢 半夏 三錢 生香附 三錢 鱗鬚 一錢

旋覆花 包三錢 廣鬱金 二錢 降香末 三錢 青皮 一錢

蘇子霜 三錢 高良姜 二錢 煮三盃分三次服

初八日 肝鬱則脇痛寒溼則腹痛

淡吳茱 三錢 良姜 二錢 生香附 三錢 旋覆花 包三錢

青皮 二錢 廣鬱金 二錢 降香末 三錢 蘇子霜 一錢

吳氏醫案 產後 煮三盃分三次服

初九日 久病脾胃兩虛切戒大飽大饑現在不寐

半夏 一兩 藿香梗 三錢 益智仁 煨一錢 秫米 一合

廣鬱金 三錢 甘湖水煮三盃分三次服以得寐為度

十一日 諸證悉減惟餘舌白滑腸下腹痛

半夏 五錢 降香末 三錢 生香附 三錢 青皮 二錢

生薑仁 三錢 廣鬱金 二錢 歸身 一錢 白扁豆 二錢

元胡索 二錢 夏薑 一錢 煮三盃分三次服

十四日 脾氣久虛未復調理飲食要緊防成痼疾在暑月雖常人之脾必虛況久病乎

半夏 五錢 茯苓塊 三錢 厚樸 三錢 良姜 二錢

廣木香 一錢 香附 三錢 烏藥 二錢 益智仁 一錢

椒目 二錢 青皮 二錢 煮三盃分三次服

十六日 寒溼未淨復受暑濕開太陽開陽明法

桂枝 五錢 茯苓塊 五錢 薤仁 五錢 半夏 六錢

生茅朮 三錢 椒目 五錢 安桂 二錢 肉果霜 去淨油

乾姜 二錢 豬苓 五錢 益智仁 一錢 廣皮 三錢

十八日 客氣加臨之溫病已退舌苔白滑寒溼傷陽之本病復舉先與利陽明之

陽以為坐鎮中州之計微泄厥陰之陰斯乃撥亂反正之規

茯苓塊 三錢 生薑仁 五錢 淡乾姜 二錢 製半夏 四錢

吳茱 泡洗 益智仁 一錢 生茅朮 三錢 川椒 炒黑

煮三盃分三次服

十九日 今日腹痛

茯苓塊 三錢 半夏 三錢 藿香梗 二錢 生薑仁 五錢

吳氏醫案 產後 煮三盃分三次服

夏薑 二錢 廣鬱金 二錢 淡吳茱 三錢 厚樸 三錢

炒乾姜 一錢 小茴香 三錢 廣皮 一錢 煮三盃分三次服

廿一日 面色猶然暗淡黃舌苔白時退時復大便或泄或不泄得油膩則滑

甚四末時或一冷則其脾陽未能一時全復可知仍以醒脾利溼立法

生茅朮 四錢 半夏 三錢 川桂枝 三錢 茯苓塊 連皮

肉桂 去粗皮 廣鬱金 二錢 生薑仁 三錢 椒目 三錢

生益智 二錢 大豆卷 三錢 神麩 一錢 廣皮炭 二錢

廿五日 暑溼傷氣腹中按之微痛善惡者肺氣虛也補之以辛

蒼朮炭 三錢 半夏 三錢 老厚樸 二錢 茯苓塊 三錢

夏薑 一錢 生益智 一錢 生薑仁 五錢 乾姜 一錢

廣皮炭 五分 川椒炭 二錢 煮三盃分三次服

初六日 鼻尖涼與胸中涼風上升者皆脾陽久困一時不能復辟之象口舌淡稍減思飲是其佳處

生茅朮八錢 桂枝五錢 熟附子三錢 茯苓塊五錢
神麴三錢 小枳實三錢 生薏仁五錢 廣皮三錢
張益智三錢 煮三盃分三次服

初四 諸症悉減惟餘便溏腹痛口已渴且減大熱純剛暫與分利

薏仁五錢 生茅朮八錢 椒目三錢 猪苓三錢
廣木香一錢 神麴二錢 澤瀉三錢 益智仁一錢
廣皮一錢 煮三盃分三次服

初六 泄瀉已止惟食後欠安

生茅朮三錢 半夏三錢 廣鬱金二錢 老厚樸姜炒
青皮一錢 焦神麴二錢 生薏仁三錢 廣皮一錢
吳氏醫案 產後 九

益智仁一錢 淡吳茱萸二錢 煮三盃分三次服

十一 諸証悉除惟餘泄由脾虛及腎寒諸理下焦

桂枝三錢 生茅朮三錢 蓮子三錢 茯苓三錢
肉果霜三錢 芡實三錢 半夏三錢 大豆卷二錢
生薑三片 椒目三錢 煮三盃分三次服

廿七 瀉泄雖止但終夜不寐胃尚未和也專與和胃

半夏二兩 生薏仁一兩 秫米一合
甘潤水八碗煮取三碗渣再煮一碗分四次服

周氏三十歲產後子腸不收突出戶外如小西瓜大一塊但軟扁耳脈弦數氣血皆虛着重在氣先以吳茱細末作袋墊身下湯藥以補中益氣湯少加川芎八分一帖而收二帖去川芎三帖去升柴加桂固經月而安

百氏二十歲產後發冒一日厥去四五次先與定風珠即復服湯去姜桂大劑加

鍾版龜甲牡蠣海參鮑魚鷄子黃一帖而效服至七日大安於是作專翁大生膏一料全壯

呂氏二十歲產後腰痛不可忍八脈虛而受寒
桂枝三錢 安邊桂二錢 杏仁三錢 鹿茸三錢
鹿角霜三錢 炒杜仲三錢 蒼朮三錢 枸杞子三錢
牛膝二錢 煮三盃分三次服服十餘帖而大安

秀氏三十歲產後不寐脈弦喘咳與蠶糧半夏湯先用半夏一兩不應次服一兩得熟寐又減至一兩仍不寐又加至二兩又得寐又減又不得寐於是竟用二兩服七八帖後以外藜藜苳飲收功

丁亥四月 某氏三十歲產後感受風溫自汗身熱七八日不解現在脈沈數邪陷下焦應瘧俗云產後驚風與復脈法但須先擊後重

細生地四錢 麥冬四錢 火麻仁二錢 生白芍二錢
吳氏醫案 產後 三

丹皮三錢 炙甘草一錢 生薑甲打碎 阿膠二錢
煮三盃分三次服

十四 產後陰虛又感風溫身熱與復脈法身熱已退但脈仍數虛未能復仍示前法而進之

丹參三錢 大生地五錢 生牡蠣五錢 炒白芍三錢
生薑甲五錢 麻仁三錢 麥冬三錢 炙甘草二錢
丹皮三錢 阿膠三錢 濃煎三茶盃分三次服

辛卯七月 普氏二十歲產前傷肺衛身大熱三日而生產後十五日熱不解並前三日已十八日矣逆傳心包神呆癡症全入心營大便結六脈并虛症已探危勉與邪少虛多之復脈湯法兼以清上

細生地五錢 元參四錢 紫菊花三錢 焦白芍三錢
麥冬四錢 冬桑葉三錢 火麻仁四錢 丹皮三錢

百氏二十歲產後發冒一日厥去四五次先與定風珠即復服湯去姜桂大劑加

炙甘草三錢 生薑甲五錢 阿膠三錢

煮三五分三次服 外服牛黃清心丸一九

八月初產後伏暑瘧疾與復脈法已愈惟大便結脛虛不可以下只有導法可

行湯藥潤津液為要

元參一兩 大生地五錢 阿膠五錢 麥冬不去心

生白芍三錢 麻仁五錢 煮三五分三次服此方大便通

十二產後陰虛

大生地六錢 沙參三錢 大麻仁三錢 生阿膠三錢

麥冬不去心 炙甘草三錢 炙阿膠三錢 歸身二錢

桂圓肉三錢 生白芍三錢 莢肉三錢 煮三五分三次服

陰吹

英氏三十陰吹按金匱婦人門之陰吹治以猪鬃髮煎純然補陰注謂腸胃俱與氏醫案

稿再按腸胃俱稿陰不足者陽必有餘脈當數面與唇舌皆赤口當渴

面青脈弦而遲不食不飲不便不寐蓋痰飲蟄踞胃中津液不行大腸腸

雖稿而胃不稿議通幽門法

半夏一兩 桂枝六錢 廣皮五錢 枳實八錢

煮三五分三次服一帖而減三帖而退惟餘痰飲調理脾胃數月而

痰飲亦愈

黃氏四十痰飲誤補喘而脈洪汗出先與大青龍去麻辛而安半月後又因感

受燥金之氣兼之怒鬱傷肝脈弦緊身熱腹痛先與柴胡桂枝各半湯熱

退而腹痛未愈且泄瀉陰吹焉得腸榜用川椒吳茱萸丁香香合五苓散

而陰吹愈後調理痰飲一月而安

李氏七十臍左有塊痛少腹亦痛大便自調陰吹亦非腸榜與化癥回生丹而愈

交腸

穆氏 前陰出糞病名交腸溼熱之故以其人喜飲黃酒大食猪肉之所致也

與五苓散法五苓散加黃柏黃連龍膽草數帖而愈告以切戒猪肉黃酒

伊遵戒半年飲食精神大好已復元矣八月節開肉後又開酒病復發不

可為矣

調理

楊室女二十經停一年腹有瘕瘕寒熱往來食少肝陽鬱勃下陷木來克土先

與提少陽生發之氣

姜半夏五錢 桂枝三錢 全當歸二錢 焦白芍三錢

青蒿一錢 白薤仁二錢 生薤仁五錢 廣皮二錢

黃芩炭二錢 煮三五分三次服三四帖而寒熱盡退

再與天台烏藥散每日早晚各服一錢驅臟中之濁陰即所以通下焦

吳氏醫案 交腸 調理

之陽氣不惟通下焦之陽亦且大通胃腸胃陽得開而健食健食而生

血所謂受氣取汁取胃汁變化而赤是為血此血也心主之脾統之

肝藏之由肝下注衝脈在男子上潮於唇生鬚髮在女子下泄為經故

此方服二十餘日而瘕散經通矣蓋巴豆多用則殺人少用則和胃此

方中用巴豆之氣而不用其質少之又少既能祛下焦之濁陰又能通

胃中之真陽以胃雖受濁而最惡濁陰正所以獲陽通陽正所以驅

濁一筆文字而兩面俱醒此其所以見效若神也伏暑門中醫王氏之

方亦同此義

乙酉八月 余氏三十無痛半產與暴崩六脈沈軟而細如伏陽虛體質產後漏

經半年經止後一年有餘忽來如崩又疑半產一以溫經為要

去後 阿膠四錢 小茴香炒炭三錢 艾炭四錢

全當歸二錢 炙甘草二錢 煮兩大茶盞分二次服

日三 經停年餘始行故多若暴崩脈沈細若伏少腹痛甚故用膠艾湯溫經甚
又感受燥金寒溼面腫胸滿而泄少腹痛拒按舌上白苔滿佈仍與溫法
去守補之阿膠甘草

艾葉炭 五錢 炮姜 五錢 小茴香 炒炭 三錢 姜半夏 五錢
雲苔 五錢 淡吳萸 三錢 生薏仁 五錢 全歸 一錢
川椒炭 三錢 降香末 三錢 煮三盃分三次服

日七 經色全然不赤面腫已消似當用補但六脈滑甚舌苔較前雖薄仍然純
白腹中按之則脹少腹仍痛溼邪之歸下焦者未消仍與溫經行溼

艾葉炭 五錢 薏仁 五錢 車前子 五錢 姜半夏 五錢 白通草 一錢
炮姜 三錢 大腹皮 三錢 雲苔皮 五錢 厚樸 一錢 小茴香 炒炭 三錢
廣皮 一錢 益母草 二錢 煮三盃分三次服

九月 停經一年有餘經通後舌白滑五日前面腫腹痛帶下特甚其為帶脈
吳氏醫案

之寒溼下注無疑

艾葉炭 五錢 薏仁 五錢 車前子 三錢 小茴香 炒炭 五錢
草薢 五錢 白通草 一錢 姜半夏 三錢 全歸 三錢

日六 怪多成五泄兼之口糜與五苓散法加薏仁木通

猪苓 五錢 雲苔皮 五錢 桂枝 一錢 澤瀉 五錢
蒼朮炭 一錢 不通 二錢 薏仁 五錢 煮三盃分三次服 全愈

十一月 帶症已久不時發經不調六脈陽微之極皆產後受傷虛不肯復之
故治在八脈非通補奇經丸不可且與湯劑行溼而溫經厚脈細易腫
者溼多此方不妨多服

雲苔皮 六錢 全歸 三錢 紫石英 三錢 川草薢 六錢 艾葉炭 三錢
蓮子 去心連皮 五錢 炒杞子 三錢 小茴香 三錢 芡實 五錢 煮三盃分三次服

通經奇經丸方 帶下本係八脈虛寒之病久帶則下焦愈虛古人所以有溼
厄之愈也一以通補八脈為要此證陽虛兼溼一用熟地黃肉桂柔之品
斷無生理

鹿角膠 四兩 鹿茸 八兩 沙蒺藜 四兩 肉蓯蓉 六兩 小茴香 炒炭 六兩
人參 四兩 補骨脂 四兩 川草薢 六兩 當歸 六兩 炙龜版 四兩

鹿賊骨 四兩 桑螵蛸 六兩 生牡蠣 六兩 杜仲炭 二兩 紫石英 二兩
狗杞子 四兩 右為細末益母膏和丸如小梧子大每服三錢早晚各
服一次不知午刻加一次暫戒豬肉永戒生冷若不能戒不必服藥間
服靈龜丸四五十九

丙戌正月 大凡胞宮累及陽明者治在胞宮陽明累及胞宮者治在陽明此症
變而有之病起產後漏經半年胞宮之損可知體厚溼重易腫總食不旺
陽明之虛又可知矣當兼治之 每日空心服奇經丸三錢以補胞宮

吳氏醫案

午間晚間各服湯藥一椀湯藥以理陽明為主

姜半夏 六錢 雲苔 六錢 益智仁 三錢 川草薢 六錢
廣皮 四錢 川椒炭 三錢 生薏仁 八錢 生薑 三錢

水八碗煮取兩椀午服一椀臨臥服一椀納食漸旺形體稍瘦則不必
服食減不瘦則再服

丁亥二月 阮氏三十六脈俱細左兼弦緊下焦虛寒八脈不固陽氣不攝之病
豈純陰所能靜守雖暫用固澁不旋踵而仍復崩潰古謂初崩宜溫現在
且用溫經將來非補八脈不可以兼有帶症故也

鹿角霜 五錢 艾炭 三錢 小茴香 炒炭 四錢
全歸 二錢 乾姜炭 三錢 煮三盃分二次服 二帖

日十四 金匱謂服雙弦者寒也又謂大則為虛弦則為瀉女子半產漏下主以小
建中其意蓋以中焦陽氣為要令營衛調和胃旺自能生血前以崩漏而

用溫下焦之陽現在雖止脈仍弦緊陽未復也况又自汗納食不旺今日仍宗前法兼與建中以衛陽虛故也

鹿角霜 三錢 桂枝 二錢 黑杞子 二錢 焦白芍 四錢

全歸 三錢 眞阿膠 二錢 艾炭 二錢 炙甘草 一錢

小茴香 三錢 川萆薢 三錢 煮三盃分三次服 服此方四肢畏

日六崩帶脈弦左手更緊四肢畏寒納食不旺皆誤用陰藥之故昨與溫補下

焦兼用建中詞中焦現在四肢畏寒解納食稍旺左脈之緊亦解崩止而

帶未除與通補八脈法

鹿角霜 五錢 萆薢 四錢 小茴香 三錢 雲苓塊 三錢

全歸 三錢 紫石英 生研細 炙龜版 四錢 杞子 炒黑 三錢

日九於前方內去生薑炭加桑螵蛸 三錢

吳氏醫案

調經

五

日二崩止而帶未除於前方內加 人參 海螵蛸 鮑魚

日三入脈虛寒脈弦緊與通補奇經丸

鹿角膠 四兩 黃芪 十二兩 小茴香 六兩 鹿角霜 四兩

雲苓 六兩 補骨脂 六兩 生牡蠣 六兩 杞子 炒黑 六兩

肉苁蓉 四兩 炙龜版 八兩 萆薢 六兩 菟絲子 四兩

高麗參 四兩 全歸 六兩 紫石英 生研細 飛西兩

右爲細末老雀九加小梧子大每服二錢日三服若服三錢早晚各一

次

丁亥閏五月初四日池氏前因中下焦有寒服震感散已效惟月事總不應期經云二陽之病發心脾女子不月二陽者陽明也陽明陽氣受傷肝來克土故常吐白沫胃虛而肝乘之故時發嘔逆現在受病確與經文相合議與利胃胃和則不嘔肝不來克納食旺自然生血經所謂中焦受氣取汁變化而

赤是爲血又謂營出中焦陽氣充滿則血無阻滯此等調經法世人絕不知之

姜半夏 五錢 薏仁 五錢 生香附 三錢 雲苓塊 三錢

廣皮 三錢 降香末 三錢 生薑 五大片

煮成三盃分三次服以至不嘔不吐沫納食旺爲度

帶下

李氏三十久帶甚至流入跗踵可爲狂帶矣脈弦數下焦陰陽八脈皆虛與天

根月窟膏每日一兩分早中晚三次服服至百日外而愈

戊子二月逢女癸十七初因內傷生冷又加伏暑中之溼熱去冬寒熱頻仍可知

以致經閉淋帶腹痛等症現在食太少大便溼瀉先與和肺經謂二陽之

病發心脾女子不月應從此處入手近世罕知之再補土者必先行瀉土

惡溼故也

吳氏醫案

帶下

五

日一腹痛已減胃亦漸開脈仍弦數肢倦與宣肝絡之中兼兩和用胃

日三照前方再服三帖

日七瘕氣繞臍痛少腹亦時痛

日十一腹痛已減胃亦漸開脈仍弦數肢倦與宣肝絡之中兼兩和用胃

新絳紗 三錢 歸頭 二錢 姜半夏 五錢 欒金 二錢

旋覆花 包三 降香末 三錢 雲苓塊 五錢 廣皮 三錢

益智仁 三錢 生薑仁 五錢 煮三盃分三次服 每日空心服天台

烏藥散五六分 此方服十二帖胃漸開腹痛止肢倦減面色稍紅

痔瘡

陳室女十五 脈核數時時欲哭每日哭四五次動住一時又哭無故而然每逢
經後更甚此行經太早虛氣燥也與金匱甘麥大棗湯以潤之服十數劑
漸愈後服專病大生膏四劑全安
痘症 庚申十月起

周女一週身熱耳冷隱隱有點防痘夏令感溫暑而發先宜辛涼解肌令其
易出切忌辛溫發表致虛發癩潰爛且助溫熱

連翹 三錢 苦桔梗 三錢 甘草 一錢 炒銀花 三錢

荆芥穗 八分 蘆根 三錢 薄荷 八分

二朝 點出未透仍宜解肌 照前
三朝 陰痘三天業已出齊但頂陷色暗與活血提頂法再包白皮薄兩太陰
氣虛之體此痘若用羌防必致癩塌一進苦降必致泄瀉

吳氏醫案 痘症

全歸土炒 二錢 苦桔梗 五分 木通 一錢 炒銀花 三錢

黃芥炭 五分 白芷 二錢 連翹 一錢 焦白芍 一錢 五分

紫草 八分 羅犀角 一錢 南查炭 一錢

四朝 氣虛則根鬆頂陷血薄則色淡無歡毒重則癩塌且與清毒活血提頂
扶過七日能用補托方可有成不然九朝癩塌可慮況現在泄瀉

全歸土炒 二錢 苦桔梗 二錢 白芷 一錢 羅犀角 三錢

羚羊角 三錢 紫草 一錢 連翹 三錢 炒銀花 三錢

紅花 一錢 皂針 一錢 生甘草 一錢 公雞冠血 每大半黃酒盃
點入三五匙

五朝 痘五天牛氣虛不能載毒外出牽延時日必致內陷癩塌今日仍然外
感用事未敢大補亦須用托法

棉薑生 三錢 白歸身 二錢 白芷 二錢 連翹 一錢 五分

苦桔梗 二錢 皂針 一錢 丹皮 一錢 燕窩根 五錢

紫草 一錢 甘草 五分 雞冠血 三五

濃煎一茶盃服完渣再濃煮半盃明早服

六朝 六天少用補托業已起脹顏色頗鮮但皮薄發亮今日須大補明日須
峻補

黨參 三錢 生黃耆 五錢 白歸身 三錢 白芷 一錢

苦桔梗 三錢 炙甘草 一錢 紫草 二錢 燕窩根 一兩

廣皮炭 一錢 川芎 一錢 雞冠血 每盃三匙 公雞湯煎藥

七朝 兩用補托色鮮而潤陷者復起但青紫十之二三發亮頗多今到七日
臟腑已週氣血用事正好施補氣載毒之方

人參 一錢 生黃耆 五錢 廣木香 八分 白芷 一錢

苦桔梗 三錢 炙甘草 一錢 川芎 四分 煨肉果 一錢 五分

燕窩根 一兩 廣皮 一錢 公雞湯煎

吳氏醫案 痘症

八朝 八天痘頂圓者不過一二頭面行漿胸背清淡三四四肢全然空殼
根盤色淡此氣血兩虛宜峻補用參歸鹿茸合陳氏異功散

生黃耆 一兩 黃鹿茸 鹿茸 煨肉果 一錢 茯苓塊 三錢

人參 一錢 廣木香 一錢 苦桔梗 三錢 歸身 六錢

炙甘草 三錢 廣皮炭 一錢 白芷 三錢 燕窩根 一兩

公雞湯 一劑 右藥煎成四茶盃加鹿茸汁半茶盃雞湯一中碗燕窩
湯一椀和勻上火煨濃小人服一半大人服一半

九朝 九天昨用峻補兩臂雖有黃漿四肢仍然空殼泄瀉之故用陳文仲大
異功散

生黃耆 一兩 人參 一錢 煨肉果 三錢 茯苓塊 六錢

肉桂 去粗皮為 廣木香 一錢 鹿茸 尖 酒煎 六錢 炒於朮 五錢

煨肉果 三錢 廣皮炭 二錢 歸身 五錢 炙甘草 三錢

十朝 即於前方內去肉桂鹿茸尖歸身加 生黃耆 四錢 澤瀉 五錢

十一朝 照前方

十二朝 即於前方內加薏仁 五錢

十三朝 漿未十分滿足四肢間有破損難保無痘毒咳嗽等事茲用利水以助

結痂驅逐餘毒即在所謂一舉而兩得者也

茯苓塊 五錢 洋參 三錢 廣木香 一錢 焦於朮 三錢

薏仁 八錢 煨訶子 一錢 櫻肉果 二錢 澤瀉 三錢

炙甘草 一錢 廣皮炭 一錢

十四朝 脚腫胸悶澀短水不利也

茯苓塊 五錢 冬朮 三錢 炒銀花 二錢 生薏仁 五錢

連翹 二錢 廣皮炭 一錢 飛滑石 二錢 澤瀉 二錢

五穀蟲 一錢

吳氏醫案 痘症 完

九月初四日 何男 三天氣虛毒重粘連成片兼之色滯頂陷攻毒則得虛溫托則

碍毒兩難措手和中表裏更不濟事勉與活血提毒不犯中下二焦

烏犀角 五錢 連翹 三錢 全當歸 三錢 羚羊角 三錢

紫草 三錢 南查炭 三錢 苦桔梗 三錢 白芷 一錢

直天麻 二錢 粉丹皮 三錢 薄荷 一錢 生甘草 一錢

每一酒杯和豬尾膏三小匙

初五日 四天昨用活血解毒大有起色但喉聲微啞面目浮腫太甚唇色絳紅時

病之火毒太重今日猶宜解毒

犀犀角 六錢 羚羊角 三錢 紫草 三錢 連翹 三錢

苦桔梗 六錢 白芷 一錢 丹皮 三錢 殼精草 三錢

炒查肉 二錢 全歸 二錢 永黃連 一錢 天蟲 三錢

桃仁 一錢 八中黃 三錢

用銀花 五錢 紫花地丁 五錢 煎湯代水

初六日 五天半漸有起色但險症變幻不一時刻小心為要今日仍宜活血提頂

微加托裏

犀角 三錢 生棉著 三錢 紫草 三錢 銀花 三錢

殼精草 三錢 白芷 二錢 連翹 三錢 土全歸 三錢

皂針 一錢 紅花 三錢 炙甘草 一錢

雞冠血 每酒盞藥 三小匙

初七日 六天半時癰已退氣血用毒頭面清燥三四週身亮殼非重用溫托不可

看守不誤不致破損可望成功

生棉著 八錢 紫草 三錢 炙甘草 三錢 白歸身 三錢

紫草 二錢 燕窩根 五錢 廣木香 一錢 白芷 二錢

雞冠血 每酒沖 十二時服二帖

吳氏醫案 痘症 完

初八日 七天半漿未及半咬牙寒戰灰白塌陷非陳文仲大異功散不可

綿薑 八錢 茯苓塊 二錢 白芷 三錢 人參 一錢

焦於朮 三錢 廣皮 一錢 桂心 一錢 廣木香 一錢

糯米 一撮 鱈身 四錢 炙甘草 三錢 公雞湯煎

初九日 八天半昨用大異功散咬牙寒戰已去大半但痘毒未足用異功合參歸

鹿茸法

綿黃耆 一兩 人參 三錢 訶子肉 二錢 黃鹿茸片 五錢

肉桂 去粗皮 煨肉果 一錢 茯苓塊 三錢 全歸 三錢

廣皮炭 二錢 焦於朮 三錢 白芷 二錢 炙甘草 一錢

廣木香 二錢 濃煎

初十日 九天半咬牙寒戰已去十分之九但身上清漿凝足未灌泄瀉頻仍翁仲

仁有泄瀉安寧土虛少毒之論今日猶宜峻補如泄瀉不止再加瀉腸

綿黃耆 一兩 八參 三錢 訶子肉 二錢 生鹿茸 五錢
 厚樸 二錢 廣木香 一錢 上肉桂 二錢 白芷 二錢
 炙甘草 二錢 煨肉果 三錢 廣皮 一錢 五分

十一 十天半月見功得效但泄瀉未止病癘染穢必有餘毒今日仍可補托一天議於明日用實脾利水收瀉法俾不盡之熱毒從小便而去

綿黃耆 一兩 人參 二錢 廣木香 一錢 上肉桂 一錢
 厚樸 二錢 煨肉果 三錢 訶子肉 三錢 炙甘草 二錢
 廣皮炭 二錢

十二 一天半癘雖結而漿薄泄瀉以實脾利水為法仍兼註腸

炙黃耆 五錢 人參 八分 廣木香 一錢 生薏仁 三錢
 肉桂 一錢 訶子肉 三錢 焦於朮 三錢 厚樸 二錢
 廣皮炭 二錢 茯苓塊 三錢 肉果 三錢 炙甘草 五分

吳氏醫案 痘症

十三 十二天癘薄微嗽癩癩便溏仍當補氣兼與實脾

生黃耆 五錢 人參 八分 訶子肉 二錢 茯苓塊 五錢
 肉果 五分 廣皮炭 一錢 焦於朮 三錢 薏仁 五錢
 炙甘草 三錢 廣木香 一錢 厚樸 一錢

十四 十三天喉啞咳嗽而渴肺中餘毒宜清便溏短痘後脾虛宜實

茯苓塊 三錢 銀花 三錢 訶子肉 二錢 炒冬朮 三錢
 連翹 五分 地骨皮 一錢 苦桔梗 三錢 厚樸 一錢
 五穀蟲 一錢 生薏仁 五錢

已酉九月 何女 痘中癩癩三天紫紅扁滿成片不起翁仲仁謂毒重過其形退縮且癩癩肢冷唇焦舌黃瘦短痘痂頂先出者已焦勉用雙解法

芥穗 三錢 生大黃 五錢 查肉 三錢 銀花 三錢
 苦桔梗 三錢 桃仁 二錢 連翹 一錢 牛蒡子 三錢

薄荷 一錢 全歸 三錢 豬尾膏 三匙 甘草 生一錢
 廿一 四天癘紅扁滿下後稍見起發究不肥旋何能起脹成漿咳嗽痰多且臭

清涼敗毒活血懸肌開提肺氣
 犀角 三錢 羚羊角 三錢 紫草 二錢 銀花 三錢
 苦桔梗 五錢 芥穗 三錢 連翹 三錢 牛蒡子 三錢
 歸尾 一錢 杏仁 三錢 南查肉 五錢 甘草 一錢

廿二 五天密佈不齊身熱未退扁滿陷形色滯暗不能起脹那得成漿勉與青毒之中兼活血提頂

犀角 三錢 羚羊角 三角 白芷 二錢 銀花 三錢
 苦桔梗 三錢 紫草 二錢 連翹 三錢 牛蒡子 三錢
 皂針 一錢 杏仁 三錢 南查肉 二錢 天蟲 一錢
 歸尾 一錢 雞冠血 每盞沖 甘草 一錢

吳氏醫案 痘症

廿三 六天頭面雖有行漿之勢究竟週身平陷較昨日顏色甚潤耳仍與清毒活血提頂少加托裏

黃耆 二錢 苦桔梗 五錢 全歸 三錢 犀角 三錢
 牛蒡子 三錢 天蟲 二錢 杏仁 三錢 穿山甲 一錢
 紫草 三錢 銀花 三錢 人中黃 一錢 白芷 二錢
 連翹 三錢 雞冠血 每盞沖 皂針 五分

廿四 七天頭面行漿周身半塌空殼用伍氏內托法

綿黃耆 八錢 洋參 炒老黃色 炙甘草 五分 苦桔梗 三錢
 川芎 五分 燕窩根 五錢 牛蒡子 炒研細 紫草 一錢
 公雞湯 一茶 全當歸 三錢 白芷 二錢 雞冠血 每盞沖

廿五 八天頭面癩足周身平塌者已起空殼者亦有行漿之勢翁仲仁謂喉啞聲嘶漿行飽滿亦何妨再咬牙在七日以後周氣虛況其食少手非陰虛

也

洋參一錢五分 苦桔梗五錢 白芷二錢 黃耆八錢
牛蒡子三錢 天蟲三錢 象貝一錢 公丁香四分

雞湯一茶 炙甘草一錢

廿六 九天漿已行及大半但氣虛作瀉者守勿懈毋令破損為要

綿黃耆一兩 洋參二錢 象貝母三錢 苦桔梗六錢
白芷三錢 廣木香一錢 牛蒡子三錢 天蟲三錢

炙甘草三錢 冬白朮二錢

廿七 十天漿行已及十之七八惟痰咳微癢眼中出膿為可慮

綿黃耆五錢 連翹一錢 穀精草一兩 焦冬朮三錢
桑葉一錢 生薏仁三錢 苦桔梗三錢 甘草一錢

土貝母三錢

吳氏醫案

痘症

三

廿八 十一天溼重小便不利畏寒咬牙

生黃耆五錢 洋參一錢 穀精草三錢 茯苓塊三錢
薏仁五錢 廣皮炭一錢 焦冬朮三錢 炙甘草三錢

廿九 十二天實脾利水以收痂止嘔加辛涼敗毒以護目疾

生黃耆二錢 銀花炒二錢 穀精草三錢 茯苓塊三錢
連翹二錢 地骨皮二錢 生薏仁五錢 冬朮炒三錢

炙甘草一錢 五分

十月初 十三天溼行痂結者過半氣化痂落者過半飲食甚好目開無恙已收

全功惟咳嗽減而未清仍宜實脾利水復以辛涼敗毒

茯苓塊三錢 銀花炒一錢 地骨皮一錢 生薏仁三錢
連翹一錢 五穀麩一錢 炒冬朮三錢 象貝一錢 五分

某七官 痘粒分顆原屬純正但熱毒頂平無漿間有二三陷者且有灰色明

日七朝氣血用事非峻補不可一切辛熱走裏者必不可不用為其溫中而托絡也其走表者斷不可用以其虛表而致癘場也再九日以後須防咳嗽泄瀉

初十 膏女疔 相火用事民病溫時發痘先宜辛涼達表切忌發汗

銀花二錢 苦桔梗二錢 薄荷五分 連翹二錢
牛蒡子二錢 甘草一錢 芥穗八分 杏仁粉二錢
蘆根三把

十一 險痘一天

銀花二錢 苦桔梗二錢 紫草一錢 連翹二錢
牛蒡子二錢 薄荷八分 芥穗一錢 歸橫鬚八分
甘草一錢 蘆根一兩 煎湯代水

十二 脾經險痘二天色重粘連船小載重夜間煩躁先以活血敗毒

南杏肉三錢 銀花五錢 地丁三錢 苦桔梗二錢
連翹二錢 丹皮二錢 桃仁泥八分 犀角一錢
當歸土炒 人參黃一錢 大黃一錢 紅花三分
豬尾痔三小 白茅根一兩 煎湯代水

十三 險痘三天色重粘連間有陷頂宜涼血提頂

犀角八分 羚羊角二錢 歸鬚八分 連翹二錢
細生地一錢 紅花五分 銀花一錢 苦桔梗一錢
甘草八分 丹皮二錢 白茅根三錢 蘆根三把

十四 險頭四天形色俱有起色但頂平便滯耳將就可望有成

生黃耆三錢 洋參一錢 白茅根三錢 茯苓塊三錢
銀花炒二錢 炙甘草一錢 白朮炭二錢 白芷一錢
雞冠血三小 穿山甲炒一皂針八分 公雞湯煎藥

吳氏醫案

痘症

四

日十五 五天即於前方內去銀花雞冠血加廣皮一錢

日十六 六天雖然行漿但不可色灰便溏

綿黃耆 三錢 浮參 二錢 廣木香 一錢 茯苓塊 三錢

肉果 一錢 訶子肉 一錢 焦於朮 五分 甘草 二錢

廣皮炭 一錢 濃煎

日十七 七天業已回漿十分全功但便溏溼重仍有意外之虞法宜實脾利水

茯苓塊 三錢 洋參 一錢 訶子肉 一錢 焦於朮 三錢

薏仁 三錢 廣皮炭 八分 廣木香 一錢 肉果 一錢

炙甘草 五分

癸亥十一日 壽女 三月初十日

芥穗 五分 苦桔梗 二錢 防風 一錢 杏仁 一錢

聖香葉 八分 桑葉 一錢 薄荷 八分 生甘草 一錢

吳氏醫案

痘症

痘

藍根 二把 連翹 二錢

日十一 重險痘一天熱一日而見點陽明絡現粘連成片汗多便溏氣虛毒重九

朝癰塌難防勉與毒髮肌

連翹 三錢 苦桔梗 三錢 歸尾 八分 桑葉 三錢

牛蒡子 研八 藍根 五錢 丹皮 二錢 猪尾膏 三匙

銀花 五錢 甘草 一錢

紫花地丁五錢與銀花先煎代水

日十二 出不爽快按末三歲之兒九日限期時刻有遠限之慮即於前方內加

白茅根 五錢 犀角 一錢

日十三 重險痘三天面貌紫紅殼薄頂陷根鬆粘連成片身上色淡不起小便清

大便多而稀頭溫足冷應作氣虛不能送毒外出看總之九朝塌癰之症勉與活血提頂而兼補氣

洋參 一錢 生綿葛 三錢 白芷 二錢 犀角 一錢

穿山甲 一錢 紅花 一錢 連翹 二錢 生甘草 一錢

皂針 一錢 歸尾 五分 猪尾膏 三匙入水

犀角 一錢 生薑 五錢 白芷 二錢 杏仁 一錢

苦桔梗 二錢 紅花 一錢 銀花 二錢 穿山甲 一錢

皂針 一錢 薄荷 八分 雞冠血 五匙 甘草 一錢

日十四 重險痘四天較昨日稍好然不能起脹馬得成漿塌陷之症勉與提頂

之極勉用辛溫而甘者助其元陽

生綿葛 五錢 洋參 二錢 穿山甲 一錢 焦白朮 一錢

半夏 一錢 蘇紅花 一錢 廣木香 一錢 白芷 二錢

公丁香 五分 煨肉果 八分 桑葉 一錢 炙甘草 一錢

吳氏醫案 痘症

濃煎如膏

日十六 六天虛寒亮設急用峻補以救萬一

生綿葛 一兩 洋參 六錢 蘇紅花 一錢 茯苓塊 三錢

犀角 五錢 穿山甲 三錢 焦於朮 四分 歸身 三錢

廣皮炭 二錢 廣木香 三錢 白芷 三錢 炙甘草 三錢

煨肉果 五分 老公雞湯煎如膏

日十七 七天殼薄無漿便溏氣血兩虛用陳文仲法

生綿葛 一兩 洋參 三錢 煨訶子 二錢 鹿茸尖 酒炒

猪桂 去皮淨 公丁香 八分 焦於朮 二錢 牛夏 一錢

廣皮炭 一錢 廣木香 一錢 白芷 一錢 炙甘草 三錢

煨肉果 二錢 公雞湯煎如膏

日十八 八天咬牙泄瀉目開殼薄無漿皆係虛寒塌陷之象急用陳文仲大異功

散法惜無刀用參耳

微參 五錢 熟附子 一錢 茯苓 三錢 洋參 五錢

廣木香 三錢 白芷 二錢 於朮 四錢 肉果霜 三錢

廣皮 二錢 鱉板 三錢 訶子肉 三錢 炙甘草 三錢

搖桂 五錢 公丁香 三錢 濃煎如膏分六七次服

日十九 九天昨用陳文仲大異功仍然塌陷咬牙水漿不得入口然根盤未散

不可棄而不治議於前方內加

肉果 二錢 公丁香 二錢 連服二帖

日二十 十天昨日此方連服二帖頭面業已行漿下身仍然灰白塌陷再用前方

二帖

日廿一 十一天痘灰白色漿不足必陷仍服前方二帖

日廿二 十二天頭面漿足四肢空殼尚多於前方內改肉桂為桂枝再服二帖

吳氏醫案 痘症 尾

日廿三 十三天仍須托裏溫中白日服完夜間再服半帖皆可

日廿四 十四天灰白咬牙泄瀉猶在險途

生綿葛 五錢 洋參 五錢 公丁香 六錢 肉果霜 六錢

黨參 五錢 生薏仁 五錢 茯苓塊 五錢 桂枝 五錢

廣木香 五錢 於朮 五錢 白芷 三錢 炙甘草 三錢

訶子肉 三錢 廣皮 三錢 水九梳濃煎如膏

癸亥十二日 徐六重險痘三天骨立無肉血枯而燥乾紅色暗粘連成片皆隱在

皮中乃泉毒把持之故勉與兩解毒法若照常理立方恐難長其及

紫花地丁 一兩 大黃 三錢 查肉 半生半 暹羅犀角 一兩

桃仁 半生半 銀花 二兩 紅花 三錢 青皮 二兩

痘起發為度 小豬尾血 每半 水八梳煮成三梳先服半梳約二時再進以舌苔退

日初五 重險痘四天天下後業已起發不必再用沈降涼血提頂

銀花 八錢 烏犀角 八錢 羚羊角 五錢 連翹 五錢

紫花丁 五錢 人中黃 三錢 白芷 二錢 苦桔梗 五錢

白茅根 一兩 皂針 二錢

日初六 重險痘五天大有起色仍宜涼血活血兼與敗毒

銀花 八錢 細生地 八錢 紫花丁 五錢 連翹 四錢

苦桔梗 五錢 人中黃 二錢 犀角 五錢 羚羊角 五錢

白茅根 一兩 白芷 三錢 分四次服

日初七 重險痘六天雖然行漿但火毒太重不必用補亦不可用補猶宜涼血解

毒以為結痂之地

細生地 一兩 銀花 八錢 苦桔梗 五錢 烏犀角 一兩

連翹 三錢 人中黃 二錢 粉丹皮 八錢 元參 五錢

吳氏醫案 痘症 尾

白茅根 一兩 紫花丁 六錢

日初八 七天於前方內減犀角一半加麥冬 五錢

日初九 八天漿已滿尼色已蒼胃已旺議辛涼以助結痂之用

銀花 三錢 白茅根 五錢 麥冬 五錢 連翹 三錢

五穀蘖 一錢 甘草 一錢五分

日初十 九天四肢太熱非重用辛涼其痂不結

銀花 五錢 細生地 三錢 元參 五錢 連翹 五錢

白茅根 六錢 丹皮 五錢 麥冬 不去心 生甘草 一錢

黃芩 錢五分 錢五分 粉丹皮 三錢 生薏仁 五錢

日十一 十天回漿甚緩微咳用辛涼小兼質脾

細生地 三錢 連翹 三錢 粉丹皮 三錢 生薏仁 五錢

麥冬 三錢 不去心 人中黃 五錢 地骨皮 一錢 黃芩 一錢

白茅根三錢 冬桑葉一錢

叶二十一 天仍服前方一帖

叶三十二 天再服前方一帖

叶五十四 天十分全功惟敗餘毒而已

仙人杖皮二錢 連翹三錢 五穀蟲二錢 人中黃一錢五分

丹皮三錢 白茅根三錢

癸亥十二日 因女重險痘二天色重粘連成片橫簇頗多第一方以達外感活血

髮肌爲法

薄荷一錢 牛蒡子三錢 當歸一錢五分 芥穗一錢

南紅花一錢 前胡一錢五分 半夏二錢 苦桔梗三錢

蘇葉一錢 杏仁三錢 生甘草一錢

叶十四 早第二方以提開毒爲主蓋損髮者必攻也況色重乎 吳氏醫案

生大黃一錢 桃仁半生半 南山楂半生半 苦桔梗四錢

青皮四錢 人中黃二錢 猪尾膏一小酒盃研入 上梅冰五錢

每次沖三小匙

申刻 重險痘三天早用必勝法現在顏色已退層重色絳抱髮頭腰中醫俞

太重弄舌嘔喘心火太重恐以涼重敗毒

次生地三錢 杏仁三錢 全歸三錢 羚羊角三錢

犀角六錢 川連一錢 苦桔梗三錢 銀花三錢

廣皮一錢五分 牛蒡子二錢 連翹三錢 甘草一錢五分

猪尾膏三匙 研入大冰片五釐

叶十五 險中逆痘四天氣既虛而毒又重色暗根鬆傷筋脫頭溫足冷抱髮頂

腰下不可補又不可此其所以難也勉與活血提頂

苦桔梗六錢 犀角五錢 銀花五錢 紫花丁五錢

全歸三錢 白芷三錢 穿山甲二錢 香肉六錢

皂針三錢 人中黃三錢 丹皮五錢 紅花一錢五分

研入冰猪尾膏每次沖奪命丹三粒

叶十六 險中逆痘五天較昨日雖有起色究竟色滯而重板着不行二日不大便

皆係藥毒把持恐不能行察若過此關則不能再行沉降矣諒必勝法

桃仁生炒各半兩 生大黃生薑紅花一錢五分 查肉炒一

苦桔梗六錢 甘草三錢 青皮六錢

叶十七 險中逆痘六天昨日復用必勝法雖有起色究竟頭面不如週身之牛鼻

毒把持陽尤可知

紫花丁五錢 大黃酒炒黑 白芷三錢 苦桔梗五錢

犀角五錢 紅花二錢 南查炭三錢 銀花五錢

皂針二錢 穿山甲條二全歸三錢 廣皮二錢

吳氏醫案 痘症

人中黃三錢

叶十八 險中逆痘七天頭面起發色鮮週身色淡逆者已順現有行漿之勢一以

上藥爲主

黨參五錢 生綿著一兩 歸身土炒 洋參三錢

茯苓塊三錢 防風三錢 桂枝五錢 炒廣皮二錢

白芷三錢 於朮三錢 炙甘草二錢

叶十九 八天照前方再服二帖

叶二十 九天身上色灰四肢尙空大便頻仍寒戰發瘧皆係虛象急急用陳文仲

法防其內陷

黨參三錢 茯苓塊五錢 半夏三錢 洋參黃汁炒

肉果霜五錢 白芷三錢 於朮五錢 訶子肉五錢

廣皮炒二錢 官桂去粗皮 廣木香三錢 甘草三錢

附子熟一 大棗肉二枚 生薑三片
 咬牙加公丁香三錢 第二帖做極細末
 廿一將昨日第二帖之末藥每服三錢約兩三時辰做一服
 甲子日 呂男狀元痘原不必服藥但現在半生半熟泄瀉唇色寒猶恐遺
 毒損目議溫托法

生鷄膏三錢 黨參二錢 訶子肉二錢 茯苓塊三錢
 白朮一錢 生薏仁二錢 製半夏一錢 廣皮一錢
 炙甘草三錢
 初六汪男三初報痘點形即繁重表虛脈滑心熱甚謹防八九朝癢塌且與
 辛涼解肌透毒

吳氏醫案 痘症
 銀花五錢 苦桔梗五錢 丹皮三錢 連翹二錢
 牛蒡子三錢 全歸一錢 薄荷三分 杏仁泥二錢

初七險痘一天頭面粘連點現癩關足涼非純然毒重亦非純然氣虛且與活
 血藥肌搥毒大涼大溫皆在難施之例
 犀角錢五 苦桔梗五錢 全歸一錢 銀花五錢
 牛蒡子一錢 青皮二錢 連翹三錢 南查炭三錢
 甘草二錢 薄荷八分 猪尾膏三匙
 外以胡荽酒洗足
 初八險痘二天半但唇腫右額腫心脾之火甚也足已溫痘苗稍大者即頂陷
 白茅根一兩 犀角五錢 查肉一錢 紫花丁五錢
 銀花五錢 紅花八分 苦桔梗三錢 連翹三錢
 廣皮八分 牛蒡子二錢 全歸二錢 甘草一錢
 猪尾膏三匙
 按白茅根秉燥金之體感風木而花藏胎內異於眾草生發最速其性

喜潔故能化毒開清其味甘涼故能走肺胃而不傷肺胃之陰本草稱
 其主衄症蓋言其所然而不言其所以然也但此物性平和不假以重
 權不為功也凡一切清竅病用之最良而痘症中護眼護喉走清道血
 分為尤良也

初九險痘三天半兩額兩眼肉腫瘡不腫心脾之火太甚也血無不活故今日
 不加血藥
 羚羊角五錢 元參五錢 細生地三錢 烏犀角五錢
 銀花五錢 紫花丁五錢 苦桔梗六錢 連翹三錢
 白茅根一兩 牛蒡子五錢 白芷二錢 生甘草一錢
 穀精草二錢

吳氏醫案 痘症
 初十重險痘四天半額滿於額額滯於身此陽火有餘之象雖不必大下仍以
 敗毒為主而提頂次之

初十一五天半已有行漿之勢不必提頂托漿但喉已聲啞趁此猶係外感用事
 之時仍用昨日方開提肺氣敗毒滅其蒸騰鍊毒之火使歸於和平即行
 此陽火痘之漿法所謂道無定體者此也高明以為何如
 仍用昨日方一帖限明日黎明服完
 初十二六天半面已有漿四肢腰背皆空五更大便兩次痛快而瀉今晚已入氣
 血用事之關須漸進補托兼與清毒
 炙綿菁三錢 黨參一錢 白茅根六錢 烏犀角三錢
 銀花三錢 苦桔梗一錢 冬白朮二錢 白芷二錢

日十三 廣皮炭一錢 茯苓塊三錢 日入後服
應必得扶其不及多得一分漿少得一分後患此身小痘多之定法也

生綿著五錢 白朮三錢 蘇紅花一錢 茯苓塊三錢

黨參三錢 廣皮炭一錢 廣木香一錢 白芷二錢

炙甘草五分

日十四 晚足九天於前方內去紅花

日十五 十天漿足色蒼形勢圓綻四肢陸續上漿皮膚潤之平和不冷亦不過熱
脈洪數有力合觀皆情理之正其不食與縮皆病象也痘多漿亦多鍊氣
血而成漿痛亦情理之正斷非陷症謹補氣以勝痛活絡以定痛法似不
岐於路矣

人參五分 生綿著三錢 紅花四分 冬朮三錢

吳氏醫案 痘症

熟綿著三錢 厚樸六分 乳香八分 茯苓塊三錢

廣皮一錢 沒藥八分 廣木香一錢 甘草三錢

白芷二錢

日十六 十一天大勢已有成功之象猶須防其泄瀉作癢

茯苓塊三錢 洋參炒黃一錢 廣木香八分 炒冬朮一錢

黨參二錢 炙甘草五分 焦白朮二錢 廣皮炒半黑一錢

日十七 十二天小便長大便滿暫與宣化腸胃

茯苓塊三錢 黨參一錢 五穀蟲三錢 殺精草三錢

厚樸一錢

日十八 十三天痘後肺液受傷渴而咳

沙參三錢 地骨皮三錢 象貝一錢 麥冬三錢

白茅根六錢 葦根三錢

日廿六 某男 風溫發熱三天耳冷尻冷已有微點謹防天花法宜辛涼解肌芳
香透絡最忌三陽表藥多汗致成癘場

銀花三錢 苦桔梗三錢 芥穗一錢 連翹三錢

牛蒡子炒研二錢 桑葉三錢 薄荷八分 白茅根三錢

甘草一錢 當日晚大瀉水蒸加 黃芩三錢 瀉止

日廿七 虛寒痘二朝甫二日熱退其半神氣安靜大便溏泄佈痘不多亦屬均稱
但痘形扁闊根鬆色亦過淡觀其皮色脾經素有飲食傷損議異功保元
合法

生綿著三錢 人參一錢 廣木香一錢 雲苓塊三錢

廣皮二錢 炙甘草一錢 生於朮二錢

日廿八 仍用前方

吳氏醫案 痘症

日初七 十二朝痘雖稀少發行薄弱膝下尚未結痂乘此機會再用保元以助餘
漿

雲苓塊三錢 人參一錢 炙甘草一錢 生薏仁三錢

綿著三錢

日初八 仍用前方

補案 辛年述 癸酉初夏余有痘水之游長女甫一齡於四月十一日見點至
廿五日已半月矣余適回家見其形勢鼓立者半頂陷者半根抱者半散
者半毫無汁漿本係謝寶靈兄調治因請同看伊立一方余視之曰此方
若上得起漿甘受重罰此方若上不起漿亦受重罰謝兄愕然曰足下左
右皆受罰何故余曰今日且不必明言明日來視漿色伊去後余仍用其方
照方製廿帖加燕窩十二兩大公雞一隻重九筋紫河車一具並藥其十
餘劑先分九鍋煎去渣後復并一鍋煎自早之暮不敢草率成藥膏待一

日初九 仍用前方

日初十 仍用前方

日十一 仍用前方

日十二 仍用前方

日十三 仍用前方

日十四 仍用前方

抱許令乃母飲半茶杯小人飲半酒杯二鼓時其母因乳脹謂余曰藥甚靈余無乳者已數日今忽蓬蓬豈非藥力乎余曰可急令小兒吮之彼曰小兒不得寐者已數日今方熟睡可驚之乎余曰限期已緊所以令汝服藥以乳汁上漿也今乳脹可與之吃矣因促之醒痛吮一飽少時又解湯下三鼓清漿如露矣未至四鼓又令母女服藥如前四鼓未解藥如前色五鼓以後又如茶色濃厚如及時之漿然天明已十七朝矣又延醫兄至彼一視曰奇哉何因得此余曰用君原方彼曰只添得燕窩一味何神止此余曰余昨云此方若上得起漿甘受重罰者先生於七八朝即以此方彼時氣血方壯毫無汁漿今以十五朝氣血消耗豈能上漿乎余又謂此方不能上漿亦受重罰者以先生之方若錯小女早不活矣因令伊教方之背面視之伊見照方甘帖之文又令親諸藥渣因謝曰余實不能

二十 某女 十九朝痘後便瀉而頻久則脾胃兩傷得瀉為穩
吳氏醫案

眞雪苓 五錢 白朮土炒 肉果霜 三錢 生薏仁 五錢
半夏一錢 訶子肉 三錢

廿日 質利水之中兼化清氣

雲苓 五錢 生薏仁 五錢 晚膳沙 三錢 於朮土炒 三錢
地骨皮 三錢 五穀蟲 三錢 蟬退去頭尾 炙甘草一錢五分

初一 三十天痘後餘毒腫潰補托之中加以敗毒

人參一錢 生薏仁 五錢 黃蘗 三錢 於朮 三錢
五穀蟲 三錢 銀花 三錢 雲苓 三錢

初四 痘後餘毒腫潰稍加銀花大便即瀉議於前方去銀花加內果訶子

於朮 三錢 人參一錢 廣木香 一錢 生薏仁 五錢
五穀蟲 二錢 肉果霜 五分 黃蘗 三錢
炙甘草一錢 訶子肉 炒三

初七 三十六天痘毒瀉爛應照瀉癆例即用痘科門中之保元合異功法

人參一錢 生薏仁 三錢 於朮 二錢 雲苓 五錢
炙甘草 二錢 廣皮 一錢 綿著 五錢

初八 傷食熱嘔吐痘後太飽之故與止渴消食其熱自止調理飲食要緊

茯苓 三錢 地骨皮 三錢 薏仁 三錢 半夏 二錢
炒廣皮 一錢 神糖 五分

二十 某男 風木司天之年又當風木司令之候風木內含相火時有痘疹無

論但受風溫身熱而不發痘或因風溫而竟發痘或發斑疹皆息辛溫表藥性與辛涼解肌透絡為穩此時醫所不知蓋風淫所勝治以辛涼佐以苦甘內運之正法也

銀花 三錢 苦桔梗 三錢 薄荷 八分 連翹 三錢
牛蒡子 一錢 桑葉 三錢 芥穗 一錢 鮮蘆根 五錢

吳氏醫案

甘草一錢

廿一日 險瀉逆痘二天痘色靛紅唇赤舌赤見點繁瑣三五成羣毒參陽位勉

與涼血擬毒
石礮生末一 生大黃 炒黑地丁 紫花 犀角 五錢
苦桔梗 三錢 桃仁 三錢 銀花 五錢 人中黃 三錢
地龍 三錢 連翹 三錢 白茅根 三錢 丹皮 三錢

此案為鈔錄者失去十四帖大意以犀角地黃湯加連翹銀花白茅根細生地等一味涼血收功至十五朝猶用犀角十六朝以辛涼清餘熱一方服至廿一朝

乙酉六月 十二姑九暑傷兩太陰身熱而嘔舌白滑
雲苓皮 四錢 連翹 三錢 藿香葉 二錢 生薏仁 三錢

銀花 三錢 白薤仁 一錢 梨半夏 三錢 杏仁 三錢
黃芩炭 二錢

廿三 痘三天頂平根鬆色暗夾虛夾毒之症與活血提頂敗毒扶到七天方好
補托

苦梗 三錢 牛蒡子 二錢 白芷 三錢 防風 三錢
紫花丁 二錢 紅花 二錢 連翹 二錢 人中黃 一錢
全歸 二錢 銀花 三錢 紫草茸 一錢 查炭 二錢

廿四 痘四天頂平根鬆色暗便閉不食昨用活血敗毒宜絡今夜已見大便熱
退能食頭面已有起脹之勢前後心續出盈干皆根泛頂平暗滯稍大者
頂即陷應照虛寒治與宣氣活絡提頂不得過用敗毒清裏致令使滯
內陷

吳氏醫案 痘症
當歸 土炒 二錢 藏紅花 二錢 查炭 二錢 防風 二錢

廣木香 一錢 薄荷 一錢 銀花 炒 三錢 穿山甲 炒 一錢
甘草 炙 五分 白芷 三錢 廣皮炭 一錢

廿五 痘五天頂平帶陷根鬆色暗昨日即照虛寒例治而用溫煦芳香今日口
並不渴而舌苔白厚盛暑之際倘兼足太陰之暑溼症七日以前外感用
事必視其在何臟腑而清之以為七日以後上漿之地

茯苓皮 三錢 當歸 土炒 六分 散 三錢 生薏仁 三錢
銀花 四錢 藏紅花 二錢 廣木香 一錢 防風 三錢
廣皮炭 二錢 白豆蔻 一錢 白芷 三錢 煮四小杯分四次服

廿六 痘六天頂平多陷根鬆色暗頭面色已華前後心尚多陷而暗身痛口不
渴與活血提頂令其易於上漿
當歸 土炒 三錢 生綿菁 五錢 紅花 二錢 銀花 五錢
穿山甲 三錢 白芷 三錢 乳香 一錢 廣木香 二錢

廣皮 三錢 沒藥 一錢 雞冠血 每杯點 甘草 三錢
公雞湯煎煮三杯分三次服

廿七 七朝已有行漿之勢平頂陷頂尚多加補托以助之
廿八 痘八天頭面行漿已有七成臂次于手足次于胸膈也胸以下陷頂多面
色灰仍須溫熱以助行漿之勢

綿菁 八錢 高麗參 三錢 白芷 三錢 防風 三錢
扶苓塊 三錢 紅花 二錢 當歸 土炒 三錢 廣木香 三錢
甘草 炙 五分 廣皮 三錢

廿九 痘九天正在行漿之際便頻眼開即是虛象粘連之處顏色即灰其虛而
何急急補托而兼溫煦為要
人參 三錢 炙綿菁 一兩 白芷 二錢 於朮 炒 三錢
肉果霜 三錢 廣皮 三錢 茯苓 三錢 廣木香 二錢

吳氏醫案 痘症
甘草 炙 三錢 防風 三錢

七月初十天雖已結痂漿未十分滿足尚有正行漿之處仍用前方再為補托
明日再與收痂未遲
初十一 天痘已結痂漿未十分滿足之故皆因連日便頻受暑積滯而成痂
疾先擬溫下其積今視四肢鼓立胸前全陷並非正結恐一進沉降並四
肢而亦陷矣前方係必不可不用之藥茲且暫停勉與實脾利水以結痂
少加化積俟十四朝之後痘勢收場如積滯未化再與下法

生薏仁 五錢 茯苓 連皮 五錢 黃芩炭 一錢 焦白芍 二錢
檳榔 二錢 真山連 薑炒 益智仁 一錢 神麴 炒 三錢
廣皮炭 三錢 南查炭 三錢

初三 痘十二天仍服前方
初四 痘十三天業已結痂原可妥當收功不意盛暑流行之際食物不化成致

欲便先痛便後痛減裏急後重之痢疾法當溫下假使畏縮不前拖延日久必無好音莫若乘此邪氣初聚之時急奪其邪冀邪去正存方收拾一切未完也

生大黃五錢 白芍三錢 炒黃芩三錢 熟附子二錢
檳榔三錢 小枳實三錢 赤芍桂一錢 神麩四錢
廣皮炭三錢 真山連二錢 查炭三錢
煮成三杯先服一杯候一二時俟其再便腹不痛即勿服腹仍痛再服第二杯三杯亦如之

初五 痘十四天四肢結痂十有其五昨日服藥後腹痛愈甚便中糞多積少日夜其七八次今用前方減附子一錢縮桂二分服後已刻至未刻便紅積一次腹中仍痛糞色如豬後二杯即加赤縮桂八分約服一杯半腹痛即便紅積仍有糞色黃夜半服第三杯丑寅時連便兩次糞色仍積微有紅

吳氏醫案

痘症

完

積腹仍微痛

初六 痘十五天膝下至足趾痂尚未結全已刻便一次燥糞黃色兼赭色滯糞微帶紅積腹不痛午刻服下第一杯至亥刻便一次糞色黃丑刻便一次無積糞黃

高麗參三錢 白芍炒三錢 黃芩炭一錢 雲苓皮五錢
檳榔二錢 赤桂心一錢 生薏仁五錢 山連一錢
廣皮炭三錢 南查炭二錢 神麩炒三錢 炙甘草一錢

初七 痘十六天痂已結痂痂已痊可不必服藥日帶微腫殺精草泡茶飲之

殺精草四錢 連翹三錢 青箱子三錢 茶菊花二錢
桑葉三錢

初九 痘漿未足毒流屬絡故青睛白翳又感時令燥氣化火故白睛起太陰睛

瘡考古治法以六味丸作湯改茯苓為君再加清續絡之熱毒以退翳

茯苓四錢 殺精草三錢 茵肉一錢 生地二錢
茶菊花二錢 丹皮二錢 山藥一錢 青箱子二錢
桑葉二錢 澤瀉五分

初十 仍照前方服內加 銀花五錢 連翹三錢 生甘草一錢 目內白翳稍退煩躁常哭因痘後血虛化燥故也與甘麥大棗湯主之
甘草五分 小麥七合 大棗五枚 煮粥服之

十一 因瘡痛而哭目內白翳仍有身上起大小瘡十數粒復生細痘在舊痂窩內痘漿未足流毒成瘡故也仍服初九日方

十二 目內白翳退太陰睛瘡仍在瘡未見消落原方再服

十三 目內太陰睛瘡仍在續出之瘡痘未退仍服原方瘡貼紫草膏如爛草炭十四 服原方一帖

吳氏醫案

痘症

幸

十五 未服藥

十六 目內太陰睛瘡稍退仍有翳身上瘡痂已落者復生小瘡未落之處復有倒漿欲潰總之流毒未清之故也原方再服目內翳以四退散治之

十七 至 痘已滿月目內太陰睛瘡未淨翳仍在仍服原方又服錢氏蟬退散一日二服 蟬退為末每服一錢羊肝湯下日二服

四退散 主治目睛老翳
人退即手 蛇退 雞退即厚
蟬退 每藥一兩加頂高梅冰片一分左眼右鼻聞右眼左鼻

初九 每聞少許兩月全愈

十五 六月 痘女十體堅痘少原可不必服藥但愈少漿更不可不足舌苔厚中黃邊白且與毒一帖明日再與托漿一帖

苦桔梗一錢 連翹三錢 人中黃八分 牛蒡子一錢五分

日六 於前方內加 鮮荷葉一角 全當歸一錢 煮二小杯分三次服
 生綿薯 四錢 白芷 五分 蘇參 三錢 炙甘草 一錢 五分

日七 辛涼結痂古之正法也實脾利水亦有溼者所宜施之茲當暑月舌苔厚而白溼也身熱未盡退熱也二法可合用

銀花 三錢 茯苓塊 三錢 蓮皮 三錢 蓮翹 三錢
 主慈仁 三錢

日一 三天佈痘稀疎苗頭純正但色白皮薄之兒頂平根鬆色淡有發薄無漿之慮雖在初起即用保元湯為當

黨參 三錢 連翹 二錢 紅花 三錢 綿薯 生 三錢
 銀花 三錢 甘草 二錢 胡荽 一錢 服三帖

五朝 氣血兩虛之症色淡根鬆頂平大便溏泄而頻痘不鼓立為得成漿漿既清薄痂必不厚雖係順症有痘後壞目牙疳之慮此等症舉世輕忽之

吳氏醫案

痘症

至

及至壞証已現必不可為余見之屢矣議陳氏木香散法必得漿足結痂為要

綿薯 五錢 高麗參 三錢 廣皮 一錢 於朮 二錢
 茯苓塊 二錢 甘草 二錢 白芷 二錢 肉果霜 三錢
 生薑 二片 木香 一錢 訶子肉 三錢 大蘇去核 一錢

七朝 痘已成漿兼有結痂究竟未滿足大便仍溏於前方內去高麗參訶子白芷再服三帖收功

日九 某 見點之初神氣昏冒先開心包透絡繼以辛涼達表使其易出下商後法切忌發汗傷無辜之表

紫雪丹 二錢 分四次服涼開水送以神清為度
 辛涼散 七包 二時服一包

日一 頭面色赤而頂平根寬鬆反不如腰以下鼓立甫三日小便濁須兼分利

形體本係溼胎應照毒博論治扶過六七朝以後能用蒲托方妙

茯苓皮 四錢 蒼朮 三錢 白通草 一錢 苦桔梗 三錢

澤瀉 三錢 芥穗 二錢 牛蒡子 炒研 一錢 連翹 三錢

甘草 一錢 紫地丁 二錢 銀花 五錢 蘆根 五錢

晚蓮沙 二錢 醫者補偏救弊之謂也三五日前見有何處偏勝及時去之以免七日以後糾纏時人不知以為此等方非治症也

日一 四天色陷頂平根鬆夜間煩燥毒氣未化氣分更虛與化毒提頂

連翹 三錢 紫地丁 三錢 白芷 二錢 銀花 二錢
 苦桔梗 三錢 甘草 二錢 丹皮 三錢 牛蒡子 二錢
 葦根 五錢 防風 二錢 白茅根 三錢 煮兩六杯分四次服

日三 五天根已抱住頂平皮薄議於此毒之中稍加安表

苦桔梗 三錢 綿薯 生 三錢 防風 二錢 牛蒡子 炒研 三錢

吳氏醫案

痘症

至

連翹 三錢 白芷 二錢 人中黃 二錢 銀花 三錢
 葦根 五錢 白茅根 三錢

日四 六天面色佳惟頂間有平者身上色淡時有癢意表虛皮薄之症重與實表提頂

洋參 半錢 生綿薯 六錢 白芷 二錢 銀花 三錢
 炙甘草 三錢 蘆根 五錢 防風 二錢

日五 七天面上翹有滲漿餘香清而皮薄急急內托為要體胖溼多加蒼朮頂為收痂之地又合小異功法

人參 三錢 生綿薯 一兩 廣皮 炒 三錢 於朮 三錢
 蒼朮 三錢 生薑 三片 防風 三錢 廣木香 煨 一錢
 大棗 去核 二枚 白芷 三錢

日六 仍用前方加 肉果霜 二錢

初七 照前方再服一帖

初八 淫體虛痘十天雖已回痂之期但破損太多仍恐發癩暫與護表實脾一帖明初再服

生棉著 五錢 防風 二錢 生慈仁 三錢 茯苓塊 五錢
白芷 二錢 廣皮炭 二錢 炒白朮 三錢

初九 險兼逆痘六天額額積聚本係毒重色白皮薄宜頂下陷而溫足冷

根最不紅氣血兩虛先與提頂將來能受陳文仲法方望成功
人參 一錢 煨肉果 三錢 紅花 三錢 綿蒼生 五錢
穿山甲 一錢 廣皮 二錢 防風 三錢 廣木香 一錢
甘草 二錢 白芷 二錢 廣木香 五分

初十 險兼逆痘七天昨用陳氏溫托法今日稍有起色但頂陷者尚多已口汗

破亦且汗多不能滿港局能鍊毒成漿今日再以陳氏木香散法溫中托
吳氏醫案 痘症

絡母使內陷癢場看守勿懈不致再有破損方可有望

人參 一錢 廣木香 二錢 白芷 三錢 綿蒼生 八錢
肉果霜 二錢 半夏 三錢 於朮 二錢 藏紅花 一錢
廣皮 二錢 防風 三錢 公丁香 一錢 甘草 三錢
歸身 二錢 再加公雞冠血以提頂

初十 便瀉而頻加詞子肉餘藥加分量以助漿

自初十日至十五日皆服此方惟分量加重
初六 白痘十四朝頭面雖然漿足兩足尚在行漿其勢未能十分充滿猶然大

便頻數又有咳嗽設大便不調尚在險關仍須補澁兼充養已喪之氣血
立方候裁
人參 七分 廣木香 二錢 訶子 二錢 於朮 炒 三錢
肉果霜 二錢 半夏 一錢 雲苓 二錢 赤石脂 二錢

廣皮炒 二錢 薏仁 五錢

廿二 處十一 痘後餘毒未清又加溫瀉陽明發斑口臭之極唇腫而黑目腫而

閉胃澀爛矣急救猶恐不及況再緩乎
元參 一兩 生石膏 八兩 知母 二兩 麥冬 不去心 一兩
烏犀角 一兩 丹皮 一兩 銀花 一兩 人中黃 五錢

廿四 得大效原方再服一帖

廿六 於原方內減元參為三錢加 射干 五錢 黃芩 五錢
丙戌九月 色紅秋燥氣化火現在君火客氣司令或有發痘之孩本有口汗

何可再以羌活發汗致令表虛身壯熱肢厥舌黃赤口渴脈洪大而數晚
間微有譫語大便結皆火証也皮色黃痘之頂平根鬆氣虛苗也先以辛
涼剋風擬毒清熱扶過七日能用補托方妙
吳氏醫案 痘症

生石膏 五錢 元參 三錢 炒黃芩 二錢 苦桔梗 三錢
連翹 三錢 全當歸 一錢 牛蒡子 二錢 銀花 三錢
人中黃 五分 紫地丁 二錢 外紫雪丹 六分 夜間服

廿五 險痘三天半尚未出齊稍大者業已頂陷其為氣虛可知雖不大便未可
沉降與活血提頂擬毒
次生地 五錢 苦桔梗 三錢 全歸 二錢 元參 三錢
牛蒡子 三錢 黃芩 二錢 連翹 三錢 紫草茸 三錢
白芷 二錢 銀花 三錢 人中黃 五分 煮三杯分三次服

初六 險痘四天頭面顏色雖重腫脚甚淡頂陷者不少大便已見舌尖有紅刺

而苦白柔潤宜甚謹防大便瀉滑夢語仍有口乃渴且與辛涼清上苦香
透絡使水毒及熱邪從內達外
苦桔梗 三錢 連翹 三錢 天虫 二錢 皂角刺 二錢

十七 五天陷者稍起色漸勻寐稍安舌苔白膩是中宮食滯未清口仍渴上焦之熱未退仍用前法兼與和中

銀花三錢 白芷三錢 白茅根三錢 杏仁二錢
 黃芩一錢 人中黃二錢 煮三杯分三次服
 另和服局方至寶丹一丸

十八 六天身半以上清燥七八惟腿過半顏色尙屬適中頂平便滑舌白氣虛有滯之徵今日宜與補托清上仍不可少中焦有滯必須急急清理能受補劑厚味方妙

生綿耆二錢 於朮二錢 炒神龜三錢 苦桔梗三錢
 白芷三錢 廣皮炭一錢五分 雲苓塊四錢 銀花一錢五分
 生甘草五分 蓮翹心三錢 查朮三錢 煮三杯分三次服
 另服局方至寶丹一丸

十九 七日有奇正氣血用事之期痰行尙不顯預頭面顏色亦佳身上與四肢微覺稍暗四末微涼大便溏微嘔皆脾陽不足之象今日疎補爲宜稍加香溫托裏

生綿耆五錢 白芷三錢 高麗參二錢 雲苓塊五錢
 查朮二錢 廣木香三錢 炒於朮四錢 廣皮三錢
 去淨油 肉果霜一錢 豈半夏三錢 煮三杯分三次服

二十 八天半瘰不十分濃足食少便溏尙覺安靜周身有疼痛之象氣虛而滯重難於峻補仍以補脾滲溼爲主稍加宣絡定痛仍須看守防護不致再有損傷要緊

廿一 九天瘰未滿足眼開太早大便稀溏有痘毒目疾之虞喜胃開進食仍宜補滋

生綿耆五錢 於朮三錢 肉果霜一錢 雲苓塊五錢
 半夏三錢 廣皮炭三錢 穀精草三錢 白芷二錢
 炙甘草二錢 訶子肉三錢 濃煎三小杯分三四次服

廿二 瘰未滿足即已火氣虛火軟大便已止且免收清與實脾爲主

生綿耆六錢 人參三錢 肉果霜三錢 訶子肉三錢
 於朮三錢 廣皮炭三錢 穀精草三錢 半夏三錢
 炙甘草二錢 廣木香二錢 白芷二錢 煮三杯分三次服
 雲苓塊五錢 人參一錢 穀精草三錢 炒於朮四錢
 半夏三錢 五穀蟲三錢 生薏仁五錢 白芷二錢
 廣木香三錢 煮三杯分三次服

廿三 實脾兼敗餘毒

雲苓塊三錢 於朮一錢 廣木香一錢 生薏仁三錢
 銀花炒三錢 黃芩炭一錢 穀精草三錢 歸鬚一錢
 五穀蟲一錢

廿四 氣虛溼重之痘甫經落即作滯下舌苔白滑唇淡而宜浮脾溼之象與實脾利水之中不用守藥加微苦兼入血分

雲苓塊五錢 猪苓二錢 穀精草三錢 蒼朮炭一錢
 白芍五分 南查炭三錢 廣木香三錢 黃芩炒二錢
 五穀蟲三錢 炒銀花二錢 歸鬚五分 橘皮炭二錢
 丹皮炭二錢

廿五 便後仍有積垢兼血脈與舌苔唇口較昨日皆佳并喜眠食均好神氣亦清爽痂落尙不艱難一以實脾爲主兼敗毒宜絡

吳氏醫案

吳氏醫案

猪苓三錢 茯苓塊五錢 歸鬚一錢 赤芍五錢
 廣木香三錢 桃仁五分 黃芩一錢 南查炭三錢
 蟬退去頭足 半夏一錢 五穀蟲三錢 青皮一錢
 銀花炒二錢 炒丹皮二錢

廿六便後垢膩兼血脾與小腸寒溼右脈仍大好在眠食俱佳與藥無忌

先煎中黃土二兩 猪苓一錢 廣木香三錢 雲苓塊五錢 歸鬚一錢
 代水煎中黃土二兩 猪苓一錢 廣木香三錢 雲苓塊五錢 歸鬚一錢

廿七痘後餘毒不安大便中夾有血積紅滯小便白濁與宜格清溼以清兼化

濁中清氣 雲苓皮五錢 猪苓一錢 黃芩五分 蒼朮炭一錢
 降瀉一錢 白芍一錢 晚蠶沙五分 桃仁二錢
 蟬退去頭足五分 五穀蟲五分 銀花炒二錢 山連炒八分

南查炭二錢 煮兩大茶杯分三四次服

廿八糞後瘀血未淨舌白滑苔脈滑甚 澤瀉一錢

猪苓三錢 中黃土五錢 地榆炒炭 雲苓皮三錢
 蒼朮炭二錢 歸鬚一錢 半夏一錢
 蟬退去頭足 丹皮二錢 黃芩炭五分 煮三杯分三次服

廿九痘後之血已無惟舌厚白苔脈洪滑小便白濁濕氣尚重

雲苓連皮 生薏仁三錢 黃芩炒二錢 猪苓三錢
 蒼朮炭五分 歸鬚一錢 澤瀉三錢 晚蠶沙一錢
 蟬退去頭足 半夏一錢 五穀蟲五分 煮三杯分三次服
 三十於前方內加 龜中黃土五錢

初一紅未見小便白濁仍然脈洪大

龜中黃土五錢 雲苓皮三錢 猪苓一錢 飛淨滑石三錢

晚蠶沙三錢 澤瀉一錢 生薏仁三錢 五穀蟲五分
 白通草一錢 南查炭五分 黃柏炭一錢 煮三小杯分三四次服

九月初六日 色女月六個 周身溼毒又加痘瘡舌苔黃厚脈洪數之至又赤爛風弦南

經六月之孩船小載重恐難勝任勉與辛涼解肌敗毒

廿九險痘三天溼毒已多痘亦不少舌苔黃厚滿佈船小載重恐難勝任

銀花三錢 紫地丁三錢 冬桑葉三錢 連翹五分
 苦桔梗五分 茶菊炭二錢 黃芩一錢 牛蒡子一錢
 人中黃一錢 丹皮二錢 煮兩茶杯每服半酒杯服至明
 三十於前方內加 細生地二錢

十月初險痘四天色太靛血熱也眼未封大者頂陷氣亦不旺外有溼瘡餘有

原案與犀角地黃湯法 犀角五分 細生地五錢 白芍炒一錢 銀花三錢
 茶菊花二錢 黃芩八分 連翹二錢 炙甘草一錢
 丹皮二錢 煮兩茶杯分四五次服

初二險痘五天未周歲之孩只有七天限期便要收功五天後半日即係三歲

以後之七日忽爾泄瀉七八次大非所宜急與補托透絡
 雲苓塊三錢 澤瀉五分 肉果霜五分 炒於朮二錢
 白芷一錢 廣皮炭一錢 廣木香一錢 木通八分
 煮兩茶杯頻服以瀉止為度

初三險痘六天業已上漿但因泄瀉之後頂平有發癰之象急宜實表內托

生棉膏五錢 半夏二錢 肉果霜五分 雲苓塊三錢

防風二錢 廣木香八分 炒於朮二錢 白芷三錢

煮兩茶杯分四五次服

初四險痘七天漿未足而世瀉發癩喉啞聲嘶必得瀉止漿足方妙

生綿耆五錢 於朮炒三錢 薑半夏三錢 茯苓塊三錢

防風二錢 肉果霜五分 苦桔梗三錢 白芷一錢

廣皮炭二錢 廣木香五分 煮三杯自服一半乳母服一半

初五八天於前方內肉果霜加至二錢仍服一帖

初六九天業已收痂溼瘡所生之痘尚有餘漿大便仍多猶有癩象

生綿耆三錢 半夏三錢 肉果霜一錢 炒於朮二錢

防風二錢 廣木香一錢 雲苓塊三錢 白芷二錢

五穀蟲二錢 苦桔梗二錢 煮兩大杯頻服

初七十天業已結痂大便猶溼而頻與實脾利水法

吳氏醫案 痘症

完

雲苓塊三錢 於朮一錢 肉果霜一錢 穀精草三錢

薏仁五錢 五穀蟲五分 廣木香一錢 煮兩大杯緩緩服日令完

初八於前方內去半夏真滋肉果霜四分

穀精草三錢 雲苓二錢 五穀蟲一錢 肉果霜一錢

於朮炒二錢 廣皮炭一錢 廣木香一錢 蟬退去頭足

煮兩杯分二三服

初十三天痘前本溼瘡赤爛風法溼瘡隨痘已落惟眼邊赤爛雖較前勢減

而未愈微有羞明之象

雲苓皮三錢 連翹不去心草決明二錢 生薏仁三錢

銀花一錢 冬桑葉一錢 穀精草二錢 澤瀉二錢

初十四天於前方內加 茶菊花一錢

初十五天眼皮之腫較昨已消其半眼亦能開仍用辛涼以清餘熱

雲苓皮三錢 連翹五分 草決明二錢 生薏仁三錢

銀花一錢 五穀蟲一錢 穀精草二錢 桑葉一錢

煮兩杯分數次服以腫消為度

九月初二日身熱癩癩數自汗耳冷脚冷唇冷有風溫欲痘之象大便頻仍

亦風邪也辛甘化風為宜

連翹五分 苦桔梗一錢 丹皮五分 銀花一錢

鈎藤鈎一錢 甘草五分 麥冬八分 茶菊花一錢

初三癩癩之後業已見點泄瀉嘔惡太重裏症重於表症脈滑甚

連翹三錢 苦桔梗二錢 黃芩二錢 銀花三錢

粉丹皮三錢 牡蠣五錢 煮兩杯頻服

初四二天根鬆色白泄瀉咳嗽乳食有不化之形初起之經表雖熱現在熱已

吳氏醫案 痘症

完

退裏虛可知雖不敢峻補亦不可再涼

雲苓塊三錢 廣木香一錢 藏紅花一錢 於朮炭三錢

當歸炭一錢 廣皮炭一錢 薑半夏二錢 煮三杯分三次服

初五三天色白根鬆皮薄之虛寒痘昨日兩天即用兩補氣血今日色稍紅泄

瀉咳嗽大減但皮薄太甚恐表虛癩癩與昨日方內再加實表

生綿耆三錢 防風二錢 藏紅花一錢 茯苓塊三錢

歸身一錢 廣木香五分 於朮炭三錢 廣皮二錢

桂圓肉二錢 薑半夏二錢

初六四天面色稍紅周身尚白仍宜溫托補血

生綿耆五錢 半夏三錢 藏紅花一錢 雲苓塊三錢

防風二錢 肉果霜一錢 焦於朮二錢 白芷一錢

炒廣皮五分 廣木香五分 歸身一錢 桂圓肉二錢

煮三杯分四次服

初七 五天下半已紅頭面行漿於前方內去紅花湯肉果糖七分

初八 六天漿已足但皮薄易破看守勿懈為要

生綿葛 三錢 半夏 二錢 廣木香 一錢 茯苓塊 三錢

防風 二錢 炙甘草 五分 焦於朮 二錢 煮兩小杯分四次服

初九 七天漿已收痂大便溏與實脾利水兼之補氣

焦於朮 二錢 雲苓 三錢 五穀蟲 一錢 廣皮炭 一錢

薏仁 三錢 煮一大杯分二次服

初十 八天大便仍溏與實脾利水兼之化氣

雲苓塊 三錢 薏仁 三錢 五穀蟲 二錢 焦於朮 三錢

彈退 去頭足 廣皮炭 一錢 切忌發物生冷

初九 九天於前方內加 晚薑沙 二錢

吳天醫案 痘症

日二十 天實脾利水

雲苓塊 二錢 彈退 去頭足 晚薑沙 一錢 焦於朮 二錢

通草 七分 五穀蟲 一錢 生薏仁 二錢

九月廿 奕以痘瘡見點一日面色青暗喙部白陰部紅額以輕而白額甚重而紅兼之三五成羣逆發瘡窠不少實係逆症勉與活血羅毒鬆肌透絡令其易出再商

紫地丁 二錢 連翹 五錢 藏紅花 三錢 苦桔梗 五錢

花地丁 二錢 荆芥穗 三錢 牛蒡子 三錢 薄荷 二錢

銀花 五錢 南查炭 三錢 桃仁泥 三錢 歸尾 三錢 人中黃 二錢

煮成三茶杯和入豬尾膏加入大梅冰片一分每次服一黃酒杯愈多

日廿七 逆痘二天陽部不發陰部稍有起色陽部之陽額也見點若有若無陽部之陰額也甚為顯透其為毒鬱不發可知周身根鬆皮薄扁潤色暗其為

氣虛又可知矣現當生發之際含攝毒活血鬆肌皆外道也扶過六天至七天能用補托方妙

紫地丁 三錢 銀花 五錢 荆芥穗 三錢 苦桔梗 三錢

白芷 二錢 南查炭 三錢 南紅花 三錢 防風 二錢

人中黃 二錢 桃仁泥 三錢 歸尾 三錢

煮三杯分四次服仍和豬尾膏加入大梅冰片五釐

日廿八 三天逆痘有漸順之機夜臥安靜飲食尚可是其佳處但瘡太多頂平根鬆漏瀾不起今日議減敗毒加以提頂令其起脹預護將來之毒

連翹 二錢 苦桔梗 三錢 紅花 三錢 芥穗 三錢

南查炭 三錢 川芎 一錢 全歸 三錢 人中黃 五分

煮三杯加入豬尾膏頻服

日廿九 四天漸有起色但根鬆頂平扁潤太多必得鼓立方妙

吳氏醫案 痘症

銀花 五錢 苦桔梗 三錢 紅花 三錢 連翹 三錢

穿山甲 三錢 全歸 二錢 防風 二錢 廣木香 八分

川芎 六分 白芷 三錢 人中黃 二錢 廣皮 一錢

煮三杯分三次服

日三十 五天雖已起脹究竟頂平根鬆顏色灰白水泡亦多大便頻而澇口渴且與提頂敗毒

銀花 五錢 苦桔梗 三錢 南紅花 二錢 連翹 三錢

穿山甲 二錢 白芷 三錢 防風 二錢 人中黃 二錢

廣皮 一錢 煮三茶杯頻服至明日午前令完

日廿七 六天正在行漿之際大便溏泄睡臥安靜痘勢雖未塌陷較昨見改觀顏色雖未灰白而暗淡根鬆頂陷兼有網紋正合大虛少毒之象急與水香散法令泄止方妙

生綿著 五錢 人參 一錢 肉果霜 三錢 去淨油 靈苓塊 五錢
 防風 三錢 訶子肉 二錢 炒於朮 三錢 白芷 三錢
 廣木香 三錢 薑半夏 三錢 廣皮 三錢 炙甘草 三錢

丁亥正月 汪巖痘二天損痰四五處雖不過多究竟毒過與攪毒鬆肌為安但
 初四日 痘形扁潤不齊氣虛之苗扶過七朝必須補托方好上漿

紫地丁 二錢 銀花 五錢 南紅花 二錢 苦桔梗 三錢
 連翹 三錢 生甘草 一錢 牛蒡子 三錢 芥穗 二錢
 豬尾膏 三錢 南查炭 二錢 全歸 二錢

初五 四天痘已佈毒神氣亦清無煩躁之象唇舌不淨是其佳處但額上色淡
 與面頰四肢亦過淡形勢間有扁潤氣虛之徵今日大便已行不乾火毒
 有限幸涼只須用七日後必須補托

吳氏醫案

痘症

三

連翹 三錢 苦桔梗 三錢 川芎 四錢 銀花 一錢
 南紅花 二錢 全歸 二錢 芥穗 一錢 生甘草 一錢
 天中 三錢 煮三小杯分三次服

初六 五天形扁潤而色鮮明已有起脹之勢惟足微冷氣虛之徵七朝必須
 補托方可保足

初七 六天於前方內銀花甘草俱減至一錢五分連翹減至二錢加
 廣木香 二錢

初八 七天頭面雖有行漿之勢但色稍暗而足冷古謂頭溫足冷便作虛看請
 溫托法以助其漿

人參 一錢 生綿著 六錢 白芷 二錢 桂枝 五分
 廣木香 二錢 廣皮 三錢 防風 二錢 炙甘草 五分
 煮三杯分三次服

初九 八天漿未足而大便溏加宜絡塞便即於前方內加
 茯苓 三錢 肉果霜 二錢 訶子肉 二錢 於朮 炒一
 初十 九天頭面業已回扁腮足漿尚未足雖溫而不熱猶宜輕輕托之

人參 八分 生綿著 三錢 白芷 一錢 於朮 炒二
 肉果霜 五分 廣皮 五分 雲苓 三錢 廣木香 一錢
 甘草 一錢 防風 一錢 煮三小杯分三次服

十一 十天業已收痂足溫大便乾而唇赤與辛涼助結痂兼解毒

連翹 三錢 五穀蟲 三錢 麥冬 三錢 銀花 二錢
 晚蠶沙 二錢 甘草 一錢 茯苓 三錢

吳氏醫案

痘症

三

十二 十一天唇赤較昨已退大便乾去茯苓
 初六日 汪巖見點即多損痰熱重可知且與辛涼攪毒解肌令其易出如明
 日漿錢太多再攻未遲

紫地丁 三錢 連翹 三錢 荆芥穗 一錢 苦桔梗 三錢
 銀花 三錢 冬桑葉 三錢 牛蒡子 三錢 薄荷 一錢
 人中黃 一錢 豬尾膏 三錢 冰片 三錢 煮三小杯分三次服 前日午

廿七 二天損痰太多必須攪毒鬆肌方妙
 紫地丁 五分 連翹 三錢 南查炭 炒三 苦桔梗 三錢
 銀花 三錢 歸橫額 二錢 牛蒡子 三錢 芥穗 二錢
 人中黃 一錢 豬尾膏 三錢 蘆根 四錢

廿八 三天色重大便乾燥小便短而白濁溼重可知不可用大黃
 細生地 三錢 紫地丁 二錢 草薢 三錢 連翹 三錢

苦桔梗三錢 丹皮三錢 銀花三錢 牛蒡子三錢

全歸五分 元參二錢 人中黃一錢 煮三小杯分三次服

廿九 四天色斃大便微溏小便已長頂未全起於前方內去濁下稍加提頂

細生地三錢 苦桔梗三錢 防風一錢 白芍炒一錢

花地丁一錢 白芷一錢 連翹三錢 人中黃三錢

丹皮三錢 銀花三錢 煮三小杯分三四次服

三十 五天大便溏小便白濁

連翹三錢 雲苓塊三錢 白芷二錢 銀花一錢

廣木香五分 廣皮炒二錢 防風二錢 白茅根三錢

二月初 六天大便稀溏小便白濁

雲苓塊三錢 澤瀉三錢 生薏仁三錢 於朮炭二錢

防風五分 廣皮炭一錢 廣木香二錢 白芷一錢

煮二杯分二次服

初七 天大便泄瀉於前方內去防風白芷澤瀉加 肉果霜 訶子

已丑十月多十個 周歲以內身熱三日時時惡寒上令餘火太甚現在冬寒司

令本係寒熱交加之際於茲發痘最為氣分阻遏身面隱隱有背腰尤

顯先宜辛涼透表使外感速消

連翹一錢 苦桔梗一錢 橘紅一錢 銀花一錢

荆芥穗五分 生薑三片 薄荷一錢 人中黃三分

廿三 二天神識安靜頭溫足冷大便稀溏形勢不振似乎虛寒一過但面上顏

色較身上甚淡未為無毒氣虛不能透之外出耳總須順此機括方為無

慮姑與開提肺氣使易充長

苦桔梗五分 銀花五分 歸尾一錢 荆芥穗一錢

天虫二錢 紅花一錢 人中黃五分 蟬退去頭足

白芷一錢 雞冠血沖三

廿四 重險痘三天兩腮潰爛面色淡於身即係毒熱陽位身太小形太弱既氣

虛而又毒重此其所以棘手也且與活血涼血敗毒提毒令其易出再商

花地丁二錢 連翹二錢 當歸尾一錢 苦桔梗二錢

銀花二錢 荆介穗一錢 牛蒡子一錢 犀角五分

南紅花一錢 豬尾膏一大丹皮一錢 人中黃一錢

廿五 重險痘四天按痘四日當齊茲頭面與身較昨日頗長但色太重足心尙

未見點為可慮耳舌苔老黃毒不為不重猶宜敗毒涼血

犀角五分 歸橫鬚一錢 苦桔梗二錢

連翹二錢 南紅花五分 荆芥穗五分 銀花二錢

人中黃一錢 豬尾膏一大丹皮五分 廣皮炭二錢

廿六 五天色漸淡神清大便溏

於朮炭一錢 雲苓塊一錢 白芷一錢 防風一錢

廣木香五分 廣皮二錢 川芎七分 高麗參八分

煮一大茶杯分三次服

廿七 六天色淡便頻與異功法

雲苓塊一錢 人參一錢 肉果霜一錢 炒於朮一錢

白芷一錢 廣橘皮一錢 薑半以一錢 防風八分

炙甘草五分 廣木香一錢 生薑二片 黑大棗去核

訶子肉八分 煮一大茶杯分三次服

廿八 七天正屆行漿之際不宜四肢俱冷急宜溫補

雲苓塊五分 人參一錢 訶子肉一錢 炒於朮一錢

白芷一錢 肉果霜五分 薑半以五分 防風一錢

公丁香 五分 廣木香 一錢 廣皮 一錢 炙甘草 八分

濃煎一大茶杯半分四次服

廿九 八天色白皮薄之孩兩太陰必虛易于泄瀉當與實脾

雲苓塊 五分 人參 一錢 廣木香 一錢 炒於朮 一錢

廣皮 一錢 炙甘草 八分 煮一大茶杯分三四次服

己丑十月 舒喜痘三天形小蜜碎此毒火過甚以歸宗法主之然余素不諳

此科仍須高明

大黃 一錢 生梔子 二錢 厚樸 一錢 生地 三錢

小枳實 一錢 知母 五分 麥冬 三錢 炙甘草 一錢

蘆根 三把 元參 二錢 煮一杯分兩次服此方文先

廿二 四天疔窠遊竄是毒重也足冷頂平扁潤無輪腹痛是氣虛也既毒重而

又氣虛兩難兼顧勉與敗毒鬆肌活血

吳氏醫案

痘症

宅

連翹 三錢 紫地丁 三錢 南查 炒炭 三錢 銀花 三錢

苦桔梗 三錢 全歸 三錢 白芷 二錢 大力子 二錢

廣皮 三錢 紅花 三錢 人中黃 一錢 蘆根 三錢

皂針 一錢 清尾膏 一酒杯加入磨 香五厘研細

廿三 五天氣虛毒重之痘昨與活血敗毒鬆肌今日大有起色兩足已溫血色

已活夢語似謔語包絡中之熱也以紫雪丹清之

苦桔梗 三錢 紫地丁 三錢 白芷 二錢 銀花 五錢

大力子 三錢 南查 一錢 連翹 三錢 人中黃 三錢

蘆根 五錢 防風 二錢 外紫雪丹一錢分二次溫開水送

廿四 六天毒已漸化夢語已除大涼大熱之品皆在所忌於和中安表之中稍

加托漿

銀花 三錢 生肌膏 三錢 廣皮 三錢 防風 三錢

蘇半夏 二錢 甘草 一錢 白芷 一錢 苦桔梗 一錢

蘆根 二錢 煮兩杯分三次服

廿五 七天痘已收肥漿清色淡須與漸次補托必得漿濃滿足方妙

半夏 三錢 生熟薏 四錢 白芷 三錢 全歸 三錢

粉葛仁 五分 紅花 一錢 防風 三錢 炙甘草 一錢

廣皮 三錢 煮三杯分三四次服

廿六 八天業已行漿但空殼居多根猶有不紅者稍用溫托

防風 二錢 生熟薏 五錢 神麩 炒三錢 白芷 一錢

蘆半夏 三錢 廣皮 三錢 青皮 二錢 炙甘草 三錢

蘆根 三錢

廿七 九天漿有漸足之勢仍宜助漿蓋未足九天猶有空處也

生熟薏 五錢 蘇半夏 三錢 白芷 二錢 防風 二錢

吳氏醫案

痘症

突

焦神麩 三錢 廣皮 二錢 青皮 二錢 炙甘草 三錢

糯米 二錢

廿八 十天此方缺

廿九 十一天業已收痂與辛涼化毒兼清溼熱

銀花 三錢 生薏仁 四錢 甘草 一錢 連翹 二錢

穀精草 三錢 蘆根 三錢 麥冬 三錢 五穀蟲 三錢

己丑十月 明女 痘重險痘二天攢簇細碎頂平謔語色淡既毒重而又氣虛且

與攞毒鬆肌

苦桔梗 三錢 連翹 三錢 紅花 三錢 南查 炭 五錢

銀花 三錢 杏仁 二錢 牛蒡子 三錢 薄荷 三錢

全歸 二錢 人中黃 一錢 芥穗 三錢 蘆根 三錢

豬尾膏 一酒杯加入磨 香六厘研細沖 煮三杯分四次服

外紫雪丹二錢分四包每包五分今日分服兩包明日再服兩包

廿八重險痘三天大便閉毒過不發與必勝湯法餘有原案

生大黃酒炒半錢 銀花五錢 南紅花三錢 紫花地丁五錢

元參三錢 苦桔梗三錢 南山查五錢 歸尾二錢

牛蒡子二錢 桃仁泥三錢 天虫二錢 人中黃一分

猪尾膏一酒杯加入膠

香六厘研細沖

廿九重險痘四天昨用大黃五錢大便未通並小便全無唇腫渴甚仍用必勝

法兩解氣血之毒餘有原案

生石膏四兩 元參五錢 桃仁泥三錢 生大黃一兩

銀花五錢 苦桔梗三錢 紫花地丁五錢 歸尾三錢

牛蒡子三錢 猪尾膏一酒杯 天虫三錢 人中黃二錢

吳氏醫案 痘症 完

煮四茶杯分四次服

初十一日重險痘五天昨日用大黃石膏大便已暢周一晝夜小便止一次喘咳

肺氣之熱可知形色較昨日頗覺起發頭面已有行漿之勢仍宜敗毒涼

肺護喉兼之提頂

元參五錢 生石膏二兩 黃芩三錢 銀花五錢

紫花地丁三錢 紅花二錢 苦梗三錢 牛蒡子三錢

白芍二錢 防風二錢 人中黃二錢 皂針一錢

天虫二錢 煮三大茶杯分三次服

初十二日六天業已行漿頭面背背甚可四肢平頂稍覺灰白似當補托但痘太多

毒太重身太熱且與清毒護喉明日七朝再托未違寒涼似不可重耳

細生地三錢 苦桔梗三錢 銀花三錢 元參三錢

藏紅花三錢 皂針三錢 防風三錢 牛蒡子三錢

白芷三錢 天虫三錢 人中黃二錢 黃芩二錢

初三天漿行五六腸鳴下氣恐有泄瀉之患急宜溫托

人參一錢 雲苓塊三錢 廣皮二錢 黃耆六錢

薑半夏三錢 甘草二錢 於朮三錢 肉果霜三錢

生薑三片 白芷三錢 訶子肉三錢 大棗二枚

防風二錢 廣木香三錢 煮四杯烤三杯分四五次服

初四日八天漿行至足顏色鮮明飽綻可以成功再照前方一帖分八九兩朝

煎緩緩服

初六日十天業已結痂惟胸腫與實脾利水法

雲苓塊三錢 銀花五錢 穀精草四錢 於朮一錢

連翹三錢 五殼蟲三錢 生薏仁五錢 煮三杯分三次服

初七日痘十一天仍用前方再服一帖

吳氏醫案 痘症 完

己丑十月富使女十

廿九日富二歲 痘因溫毒而發喉痛身熱鼻衄惡苗出扁潤根鬆多不

可解勉與先清溫毒

生大黃酒炒半錢 苦桔梗五錢 芥穗三錢 連翹三錢

牛蒡子五錢 丹皮三錢 銀花三錢 人中黃三錢

射干三錢 元參五錢 側柏炭三錢 天虫三錢

薄荷三錢 白茅根五錢 馬勃五分

煮六杯分六次服至明日午刻令完

初十一日重險痘二天苗暗紫而根扁潤昨用大黃六錢仍然大渴便閉先以敗

毒通肺涼血立法

生石膏四兩 銀花五錢 荆芥穗五錢 生大黃酒炒半

桃仁五錢 紫草茸三錢 苦桔梗五錢 歸尾三錢

人中黃二錢 紫地丁五錢 射干三錢 白茅根三錢

牛蒡子 五錢 煮五大茶杯分五次服

初二重險痘三天大便已見喉痛甚急清溫毒

紫花地丁 五錢 射干 三錢 苦桔梗 五錢

元參 五錢 天虫 三錢 牛蒡子 五錢 歸尾 五錢

蟬退 去頭足 二錢 人中黃 五錢 芥穗 三錢 馬勃 一錢

白茅根 三錢 煮五杯分五次服

初三重險痘四天頂平根鬆色重喉痛且與敗毒提頂

銀花 五錢 紫地丁 五錢 天虫 三錢 連翹 三錢

穿山甲 二錢 白芷 三錢 苦梗 三錢 牛蒡子 三錢

皂針 三錢 全歸 五分 人中黃 一錢 煮三杯分三次服

初四重險痘五天頂平根鬆色重喉痛且與敗毒提頂

肥丑十一某男 色暗扁潤形體太弱氣虛之症以渴而煩躁故且與髮肌搥毒

吳氏醫案

痘症

生

苦梗 三錢 生石膏 六錢 芥穗 八分 連翹 三錢

南查炭 一錢 紅花 八分 銀花 二錢 人中黃 一錢

蘆根 三錢 知母 炒一 煮二小杯分二次服

初二重險痘二天既氣虛而又毒重泄瀉舌絳煩躁汗多勉與涼血搥毒須避滑潤

生石膏 一兩 犀角 三錢 凌霄花 三錢 紫花地丁 五錢

丹皮 三錢 炒黃芩 二錢 金銀花 五錢 連翹 三錢

人中黃 一錢 苦桔梗 三錢 山連 酒炒 一錢 白茅根 三錢

初三重險痘三天毒過不發正看以小傍看甚多身半以下甚顯而赤頭面甚

暗而平即係毒乘陽位合之舌絳煩躁泄瀉勢非輕淺

紫花地丁 五錢 銀花 五錢 凌霄花 三錢 雲苓皮 三錢

犀角 三錢 炒山連 一錢 苦桔梗 三錢 丹皮 三錢

人中黃 一錢 炒黃芩 二錢 桑葉 三錢 白茅根 三錢

初四重險兼逆痘四天毒乘陽位昨日大用涼血解毒今日大有起色頭面頗

長但撥痰太多根鬆頂平毒重氣虛雖當補托然必清出地界七日氣血

用事再商舌絳不渴邪歸血分故不用石膏而加甘潤

紫花地丁 五錢 犀角 三錢 金銀花 五錢 細生地 五錢

丹皮 四錢 苦桔梗 三錢 凌霄花 三錢 麥冬 不去心 三錢

人中黃 二錢 豬尾膏 一酒 桑葉 三錢 白茅根 三錢

初五重險痘五天頂平根鬆色重喉痛且與敗毒提頂

大便頻瀉於涼血敗毒之中少加提頂理脾去甘潤扶過明日至七朝

能用補托可望有成

苦梗 三錢 紫地丁 三錢 丹皮 三錢 銀花 三錢

雲苓皮 三錢 白芷 二錢 犀角 三錢 廣木香 一錢

吳氏醫案

痘症

生

皂針 二錢 防風 二錢 人中黃 一錢 煮三杯分三四次服

初六痘六天已有行漿之勢大便仍頻可少與補托兼之實脾

人參 五分 雲苓皮 三錢 防風 二錢 蘇莖 五錢

廣木香 一錢 白芷 二錢 於朮 一錢 炙甘草 二錢

煮三杯分三次服

初七七天漿雖已行但色淡皮薄大便瀉氣虛之至重用補托漿雖不能十分

滿足必須八成方妙男子故也

炙甘草 八錢 連參 二錢 廣木香 一錢 雲苓皮 三錢

於朮 炒三 肉果霜 三錢 薑半夏 三錢 白芷 三錢

炙甘草 三錢 訶子肉 三錢 廣皮 三錢

濃煎四大茶杯一時服半杯

初八八天漿行五六形勢鼓粒而漿色不黃微帶灰色四肢空殼尚多仍須重

用溫托成功在此一舉

炙蘇耆一兩 人參三錢 肉果霜三錢 雲苓塊三錢

於朮三錢 訶子肉三錢 蘇半夏三錢 白芷五錢

廣木香三錢 公丁香五分 廣皮五錢 炙甘草三錢

濃煎四杯分四次服

初九 九天漿未足而色灰雖不咬牙而微有寒戰雖不泄瀉而大便頻澀與十

四味異功散法減其大者之分量可也

茯苓塊三錢 人參五錢 肉果霜三錢 薑半夏三錢

防風三錢 訶子肉三錢 白朮三錢 白芷三錢

廣木香三錢 熟附子一錢 肉桂一錢 炙甘草二錢

公丁香五分 廣皮三錢 煮三杯分四五次服

初十 十天漿雖不足而灰色頗變間有黃者大便頻澀仍舊虛寒之象可憐仍

吳氏醫案

症

書

須補托

雲苓塊三錢 人參三錢 肉果霜三錢 炒於朮三錢

白芷三錢 訶子肉三錢 廣木香三錢 防風二錢

炙甘草二錢 蘇半夏三錢 廣皮三錢 煮三杯分六次服

初十一 一天業已收斂漿未足大便太滑十四日猶係險關仍不得離補托收

滿法

生慧仁三錢 人參一錢 肉果霜五錢 雲苓塊一錢

於朮五分 煨訶子一錢 薑半夏二錢 廣皮五分

炙甘草一錢 廣木香一錢 煮兩茶杯分四次服

初十二 十二天仍照前方再服一帖

初十三 十三天再服一帖

初十四 十四天於前方內去人參肉果訶子雲苓再服一帖

己丑十一 張氏歲十七 重險痘二天雁行扁胸胸痞嘔惡頭痛口渴先解溫毒為

要

生石膏四兩 連翹五錢 黃芩三錢 苦桔梗五錢

銀花五錢 知母三錢 薄荷三錢 牛蒡子五錢

蘆根三錢 人中黃二錢 芥穗三錢

初四 重險痘三天昨因雁行扁胸胸痞嘔惡大用石膏今日症退形勢鼓粒牙

類原純正不合前醫誤與發表甫三日癢不可解喉痛溫毒未盡未可大

食 元參五錢 生石膏二兩 黃芩三錢 防風三錢

苦桔梗五錢 白芷三錢 知母二錢 牛蒡子三錢

桑葉三錢 天虫三錢 人中黃二錢 煮三杯分三次服

初五 重險痘四天痘之形色頗佳但溫毒之喉痛未止又加性急動肝則更痛

吳氏醫案

症

書

矣誤傷表氣之發癰恐破損致傷此其所以為險也

元參五錢 烏犀角三錢 射干三錢 知母五錢

苦桔梗五錢 桑葉三錢 防風三錢 牛蒡子五錢

蘆根五錢 白芷三錢 人中黃二錢 煮三杯分三次服

初六 五天喉痛減而未除已有行漿之勢但有二三成頂平者少用托法

元參三錢 生蘇耆五錢 皂針一錢 防風三錢

牛蒡子三錢 蘆根三錢 白芷三錢 金銀花三錢

初七 六天頭面漿已有七八肢尚未足大便未見口乾

元參五錢 生蘇耆五錢 白芷三錢 麥冬四錢

次生地四錢 蘆根三錢 防風三錢 金銀花三錢

糯米一撮

初八 七天頭面漿足口乾熱重大便結不必再為托漿與甘澆法以配陽之有

餘

元參 六錢 次生地 五錢 甘草 二錢 麥冬 不去心 四錢
黃芩 炭 二錢 薄荷 三錢 銀花 三錢

初九 八天漿已足眼未封多淚不爽防餘毒傷目兼之辛涼結痂

元參 五錢 殺精草 六錢 黃芩 二錢 銀花 三錢
五穀蟲 三錢 桑葉 三錢 丹皮 三錢 生甘草 五分
蘆根 三錢

初十 九天辛涼結痂目未封兼清心膽兩經之餘毒

薏仁 五錢 殺精草 五錢 黃芩 三錢 連翹 三錢
茶菊 花 二錢 丹皮 三錢 銀花 三錢 五穀蟲 三錢
桑葉 三錢

十一 十天日已愈有水泡未乾脈已不洪數與實脾利水

薏仁 五錢 雲苓塊 五錢 於朮 炒 二錢 連翹 三錢
五穀蟲 三錢 廬根 三錢 銀花 三錢 煮三杯分三次服

己丑十一日 明月二日 身熱三天見點有發痘之機微咳最忌發表恐慮表致癩
蓋痘由少陰而發至太陽之位而上漿結痂以成全功無辜誅伐太陽是
毀其成功之地且痘因溫熱之氣而發又最忌發汗與辛涼法

銀花 三錢 苦桔梗 三錢 芥穗 二錢 連翹 二錢
牛蒡子 三錢 天虫 二錢 杏仁 一錢 生甘草 一錢
蘆根 三錢 薄荷 六分 煮兩茶杯分四次服

初四 逆痘二天面色青白身體羸瘦見點似出不出毒出不發呻吟晝夜防閉
咳嗽有汗

苦梗 三錢 穿山甲 三錢 芥穗 二錢 銀花 五錢
南查炭 五錢 天虫 二錢 連翹 三錢 牛蒡子 三錢

地龍 二錢 薄荷 一錢 人中黃 一錢 煮三杯分五六次服
外兼雪丹二錢分四包先成一包晚開服一包明晨再服一包與湯藥
同服

初五 重險痘三天面色稍轉呻吟咳嗽俱減身腰點亦明亮惟頭面尚不顯彰
毒過不發之故

苦梗 三錢 穿山甲 一錢 川芎 一錢 銀花 五錢
全當歸 二錢 天虫 三錢 薄荷 一錢 牛蒡子 三錢
地龍 二錢 芥穗 二錢 人中黃 五分

初六 重險痘四天痘形起立惟色淡四肢與身不熱不住哭叫腹不和也

苦桔梗 三錢 白芷 二錢 南查炭 三錢 炒神麩 三錢
川芎 一錢 蘇紅花 二錢 全當歸 五分 廣皮 一錢
人中黃 一錢

初七 重險痘五天已放肥者皆破損可慮之至四肢不熱與溫托法

生絲蓍 五錢 防風 一錢 廣木香 一錢 薑半夏 三錢
白芷 二錢 炙甘草 二錢 藏紅花 三錢 廣皮 三錢
煮三小杯分四次服

初八 重險痘六天色暗頂平身不熱雖有行漿之勢但清而不暢須急與補托

人參 一錢 生絲蓍 六錢 紅花 三錢 半夏 二錢
廣木香 二錢 廣皮 三錢 防風 一錢 熟附子 八分
生薑 三錢 白芷 二錢 炙甘草 一錢 大棗 去核 二枚
煮三杯烤成一杯分三四次服三更令完

壬辰九月 初七 刻三朝三五成羣之痘且有查錢二三塊豈善證哉且與紫肌達
表活血搗毒
苦桔梗 一錢 連翹 三錢 南山查 二錢 全當歸 一錢

銀花三錢 炒黃芩一錢 荆芥穗八分 薄荷六分

紫草茸一錢 牛蒡子一錢 殭蠶一錢 人中黃五分

豬尾膏一錢 五厘半酒杯 煮三小杯分三次服

廿八 四天於原方內加石菖蒲一兩 生大黃酒炒五錢

廿九 五天色淡眼黑頭暈耳鳴毒活血提頂於前方內加

白芷二錢 防風二錢 皂針二錢 紅花三錢

初九 月七天已自行凝之勢但色淡間有根鬆一味托補使藥行飽滿諸毒隨

漿而泄

洋參二錢 生歸膏二錢 白芷二錢 銀花三錢

藏紅花一錢 全歸一錢 防風二錢 炙甘草三錢

煮三杯分三四次服

初三 九天漿已足而口渴甚火未退與辛涼助結痂之用

吳氏醫案

痘症

老

連翹三錢 生石膏一兩 黃芩二錢 銀花三錢

細生地五錢 桑葉三錢 麥冬三錢 生甘草一錢

煮三杯分三次服口渴止去石膏

初五 十一天痂已落而熱未退與辛涼清熱加納氣歸原法

次生地三錢 地骨皮三錢 黃芩二錢 銀花三錢

五穀散五分 桑葉三錢 連翹二錢 生甘草一錢

煮三杯分三次服

壬辰 十二天頭面腰間有粒身熱防痘宜辛涼最忌發汗

連翹三錢 苦桔梗二錢 元參二錢 銀花三錢

牛蒡子三錢 芥穗一錢 薄荷五分 南查炭二錢

甘草一錢 煮三杯分三次服

廿二 仍服原方一帖

廿三 險痘三天臉面獨重根鬆頂平地界不清

紫花地丁三錢 連翹三錢 東山查三錢 細生地三錢

銀花三錢 粉丹皮三錢 苦桔梗二錢 天虫二錢

荆芥穗五分 牛蒡子二錢 蘆根三錢 人中黃五分

豬尾膏半酒杯加入 煮三杯分三次服

廿四 險痘三天臉面之板滯已化活潤不合兩腮鼠跡不大便須微攻之

紫花地丁四錢 銀花五錢 苦桔梗三錢 生大黃三錢

連翹三錢 荆芥穗二錢 牛蒡子三錢 天虫二錢

人中黃二錢 豬尾膏一酒杯加入 煮三杯分三次服

廿五 重險痘四天頭面根鬆頂平背與兩腿蟻窠鼠跡太多有發薄漿清之虞

雖不大便不敢峻攻以有痂痕故也且與提頂拔毒

紫花地丁五錢 苦梗三錢 白芷一錢 牛蒡子三錢

吳氏醫案

痘症

美

銀花五錢 皂針一錢 白茅根二錢 連翹三錢

天虫三錢 人中黃一錢 防風二錢 蘆根三錢

豬尾膏一酒杯加入 煮三杯分三次服

廿六 險痘五天昨用提頂今日頂起者大半根亦漸緊業有行漿之勢大便昨

日已通蒸與領清氣以行漿

連翹三錢 苦桔梗三錢 丹皮二錢 銀花三錢

牛蒡子三錢 白芷二錢 防風一錢 人中黃五分

天虫二錢 橘皮二錢 白茅根三錢 蘆根三錢

煮三杯分三次服

廿七 痘六天業已氣血用事之際當與托漿

銀花三錢 生歸膏五錢 白芷二錢 防風二錢

白茅根三錢 蘆根三錢 丹皮二錢 炙甘草五分

煮三小杯分三次服

廿八痘七天仍須托漿

生絲蓍 五錢 銀花 三錢 白芷 三錢 細生地 五錢
防風 三錢 甘草 五分 白茅根 五錢 煮三小杯分三次服

廿九痘八天漿不甚足仍須托之於原方內去生地銀花白茅根加

人參 橋皮

三十痘九天與辛涼結痂於原方內加 五穀蟲 穀精草

壬辰十二月 福文 身熱色絳語癡狂先與紫雪丹二錢分二次服以開心包

廿七重險痘一天心經報痘語癡狂得香開少定其見點已有連珠之形恐將來橫痃必多唇舌色絳心火太急陽亢不寐又恐八九朝癩場急宜預防或可避也

吳氏醫案

痘症

志

暹羅犀角 五錢 銀花 五錢 桃仁泥 三錢 紫花地丁 五錢

連翹 三錢 荆芥穗 三錢 細生地 五錢 丹皮 三錢

苦桔梗 三錢 蔞花 三錢 薄荷 一錢 歸橫豎 一錢

川連 五分 人中黃 二錢 豬尾鬃 一酒杯加入 梅冰片 五厘

煮三大茶杯分五六次服一帖後

廿七神識不清仍服紫雪丹一錢

廿九照原方再服一帖

廿九重險逆痘三天連珠雁行太多急宜搗毒色重宜涼血便瀉宜堅陰

暹羅犀角 四錢 銀花 五錢 苦桔梗 三錢 紫花地丁 五錢

連翹 五錢 蔞花 三錢 細生地 三錢 川連 酒炒 二錢

牛蒡子 三錢 豬尾鬃 一酒杯 天虫 二錢 人中黃 二錢

煮三杯分三次服

三十照原方一帖分二日服

癸巳正月 痘六天將至氣血用事業已行漿變逆為順是其佳處但頭面雖起週身色白火反不足與溫托法

銀花 三錢 生黃耆 五錢 白芷 三錢 防風 三錢

炙甘草 三錢 橋皮 五錢 煮三杯分三次服

初四 九天頂下已有結痂之勢大便澀而頻與實脾利水以收痂少加敗毒

生薏仁 五錢 銀花 三錢 穀精草 三錢 雲苓塊 三錢

蘆根 三錢 五穀蟲 三錢 於朮炭 二錢 煮三杯分三次服三帖

痘 太傷所至為痘

癸亥閏二月 甫六十日之幼孩痘已廿餘日現在脈不數額上涼汗拉無外感可知乃難乘亂投致傷脾胃故乳食有不化之形恐成柔痃俗所謂慢脾風護中焦乃實土制風法又肝苦急食甘以緩之之義也

吳氏醫案

痘症

卒

生薏仁 五錢 肉果 煨一 明天麻 三錢 茯苓地 五錢

乾薑 二錢 廣木香 八分 焦於朮 三錢 甘草 三錢

橫生薑 一片 甘瀾水五茶杯煮成兩茶杯小兒服十之一二乳母服

十二八九渣再煮一茶林服如前法

三時 赤子不赤而刮日兼青脈遲涼汗舌苔白滑而厚食物不化洞泄者必中寒按虛必因於溼古所謂柔痃是也議從中治經謂有者求之無者求

之此症全無風火之象純然虛寒乳中之溼不化土愈虛則肝中內風愈動若不崇土而惟肝是求恐日見窮促矣

生於朮 一 人參 四分 明天麻 一錢 焦白芍 一錢

肉果 煨五 生薏仁 一錢 廣木香 五分 甘草 二錢

黃皮炭 三分

物 風溼相搏有汗為柔痃形若反弓者病在太陽俯視目珠向下者病在陽

明以陽明爲目下綱也今久病爲雜藥困傷脾胃大便泄乳食不化爲溼多風少症時俯視多爲病在陽明故此症以脾胃爲主議補中益氣法溼溼下行內用風藥領邪外出

日初三寒煙柔瘰昨用升陽益氣法從陽明提出太陽茲精神倍昔顏色生動舌上白苔化淨大便已實甚爲可喜但瘰家有灸瘰者難治

日初四瘰家自汗有灸瘰者難治刻下且保住脾胃從脾胃中土以條達四肢是久瘰一定之至理若鑲治其瘰是速之也

吳氏醫案

茯苓塊一錢 人參三分 訶子肉五分 焦於朮八分
桂枝二分 櫻肉果三分 生薑仁一錢 廣皮三分
炙甘草八分 芥朮炭六分
日初五 瘰家重爲苦寒所傷脾陽下陷又有灸瘰其瘰萬萬不能即愈議護中陽勿致虛脫爲要非滋陰緩仲陽陳文仲薛立齋葉天士之書者不知此義
茯苓塊一錢 人參四分 訶子肉五分 炒於朮一錢
桂枝三分 廣皮炭三分 櫻肉果六分 白芍二錢
炙甘草五分 廣木香四分 慧仁五分 濃煎
日初七 瘰仍不數大便猶滯但舌苔微黃神氣漸復不似前虛寒太甚之象宜退剛藥少進柔藥極輕請上守神粗守形兵法請見可而進知難而退此之謂也
人參三分 茯苓塊一錢 蓮子一錢 於朮一錢

日初九 諸症漸退神氣亦佳但舌上復起重濁之白苔乳溼之故暫停參藥且用疏補法

日初八 瘰症發來漸稀效不更方

日初六 瘰至沉至細至緩舌白滑甚溼氣太重故效而不愈於前方加劫溼而通補脾胃之草果調和營衛之桂枝白芍甘草

日廿一 瘰症脈沉細至緩舌白滑甚溼氣太重與溫淡法發來漸稀未得除根於前法內去剛燥加化痰

日廿五 服前方四帖已效舌苔仍然白滑六脈陽微照前方再服四帖
日廿九 前方已服四帖諸症皆安惟痰尚多再服四帖
日九月初 前方又服九帖瘰症止發一次甚輕已不嘔吐痰尚多脈甚小照前方再服
患瘰
日廿五日 瘰病久陰傷已極骨瘦如柴又加卒然中暑熱氣舌絳芒刺唇乾液涸無怪乎瘰厥神昏十指蠕動危險之至以脈尚浮弦而孔勉與一面香開心包一丙大隊陰兼鹹以止厥法先與紫雪丹一錢涼開水

和服六錢

犀角五錢 羚羊角三錢 白芍五錢 鱉甲五錢

細生地二錢 阿膠三錢 牡蠣五錢 炙甘草二錢

麻仁二錢 濃煎緩服

廿八神識未清間有譫語

犀角五錢 直生地八錢 麥冬不去心 鱉甲五錢

生白芍五錢 麻仁三錢 阿膠三錢 炙甘草六錢

一七月初 邪少虛多用復脈已當但活上黑苔未化宿糞未見兼加潤法

元參二兩 直生地八錢 麥冬不去心 枳實六錢

生白芍六錢 麻仁五錢 犀角五錢 炙甘草三錢

初五服前藥五帖見宿糞若許黑苔已化但神識尚未十分清楚用三甲復脈

吳氏醫案 癩瘋

湯加犀角即於三甲復脈湯內加犀角四錢

初八神識仍未清楚湯藥照前服 牛黃丸 三九

乙丑九月 陳三燥氣化火壯熱舌黃脈數而厥法宜辛涼解肌切忌發表

銀花八錢 羚羊角三錢 黃芩二錢 連翹六錢

苦桔梗六錢 丹皮三錢 杏仁四錢 牛蒡子三錢

甘草二錢 薄荷二錢 共為粗末分五包一時許服一包煎根湯

煎去渣服 燥氣化火身壯熱甚於前方內去薄荷羚羊角牛蒡子丹皮加

煨石膏 生地 麥冬 炒知母

乙丑閏六月八日 未及歲之兒溫毒頭腫既癒且厥壯熱氣促脈極數大恐真

陰不勝陽邪先以普濟消毒飲毒外必去升麻柴胡之直升少陽陽

明者加犀角羚羊角瀉心膽之熱

連翹六錢 苦桔梗三錢 薄荷二錢 銀花六錢

牛蒡子六錢 芥穗二錢 元參五錢 板藍根二錢

天虫三錢 馬勃三錢 人中黃二錢 共為粗末分八包一時許

服一包外以鮮薑棗一兩煎湯代水加犀角 鈔四錢 羚羊角 鈔四錢

另包不必為末於前藥每包加犀角五分羚羊角五分同煎

六月初 吳辰刻以跌撲驚後癩瘰至戌正始醒醒後身熱口渴脈數舌無

九日 昔用復脈湯六帖熱退脈靜又服二帖而安

尹十五 卒中暑風癩瘰口歪四肢抽掣頭微痛與清少陽腦絡法

羚羊角二錢 連翹二錢 枳丹皮一錢 苦桔梗一錢

銀花二錢 冬桑葉一錢 茶菊花二錢 薄荷八分

生甘草一錢 鈎藤鈎一錢 五帖全愈

百痘後餘邪入少陽陽明之絡但唇口與眼皮癩瘰致飲食不能合收每從

吳氏醫案 癩瘋

口張時隨即吐出四肢不掣與清二經之絡法

連翹二錢 細生地三錢 鈎藤一錢 銀花二錢

苦桔梗二錢 桑葉二錢 麥冬不去心 茶菊花二錢

生甘草一錢 丹皮二錢 刺蒺藜一錢

先服湯藥數帖後以三十帖作散每日早中晚三次各服二錢服至全

食積 乙酉七月 金男 幼孩手心熱舌苔厚而渴嘔吐食積也法當和胃而醒脾宜

降不宜升

苦香梗二錢 半夏二錢 廣皮炭一錢 焦神麩五分

厚樸五分 雞內金一錢 白豆蔻三分 薏仁研二錢

煨生薑片三小

十三 熱退脈平以調理脾胃為主

廿三 泄久脾虛成滯下
 茯苓塊 三錢 半夏 一錢 白扁豆 一錢 炒白朮 二錢
 山藥炒 一錢 廣皮炭 六分 炒神麩 一錢 厚樸 六分

乙酉七月 陶二幼孩 手心熱甚 舌微黃 身微熱 體瘦神不足 防成疳疾 與疏補
 中焦兼之消食
 厚樸 二錢 茯苓 二錢 煨益智 五分 廣木香 八分
 厚樸 二錢 雞內金 二錢 焦神麩 二錢 薏仁 三錢
 廣皮炭 一錢 黃芩炭 八分

廿五 孫九疳疾已久 若不急請調理 飲食則勢不可為矣 用藥以疏補中
 無立法
 雲苓塊 三錢 薏仁 三錢 廣皮炭 一錢 炒神麩 一錢
 厚樸 八分 雞內金 一錢 益智仁 七分 煮三小杯分三次服 而愈

吳氏醫案

食積

五

廿四 月經 脹大 浮取 數脈 虛食滯 疳疾 將成 大便頻仍 而腫腹大 虫濕
 宣中焦法
 雲苓皮 三錢 薏仁 四錢 益智仁 一錢 薑半夏 三錢
 神麩炒 三錢 黃芩炭 五分 白薏仁 一錢 廣皮 二錢
 煮三小杯分三次服 三帖

廿八 大便後見血 乃小腸寒 溼加黃土湯法於前方內加 附子 錢一
 蒼朮炭 三錢 薑中黃七 四兩 再服三帖

癩池

甲申六月 章男 十一 泄久 脾恐成柔瘰 俗所謂慢脾風 議疏補中焦
 十三日

廿四 今日仍用通補而進之
 茯苓塊 三錢 厚樸 一錢 煨肉果 一錢 炒薏仁 三錢
 蓮子 連皮去 炒扁豆 二錢 廣木香 五分 芡實 五分
 廣皮炭 八分

廿六 疏補中焦業已見效 仍不能外此法
 茯苓塊 三錢 人參 五分 煨肉果 一錢 炒薏仁 三錢
 於朮 一錢 炒扁豆 三錢 薑香梗 八分 半夏 二錢
 廣皮炭 八分 廣木香 八分 厚樸 八分

廿七 神氣聲音稍健 皮熱亦覺和平 大有起色 但積虛非旦晚可充
 吳氏醫案
 癩池
 五

廿八 舌有黃苔 小便色黃 微有積 皆脾虛不運之故 且暫停藥 加宣通法
 茯苓塊 三錢 於朮 一錢 白薏仁 五分 生薏仁 三錢
 半夏炒 二錢 雞內金 一錢 煨肉果 一錢 厚樸 一錢
 廣皮炭 八分 廣木香 七分 蓮子 去心 二錢

廿九 大便有不化之形 思乳食 為血肉有情 應於疏補之中 加消血肉積者
 茯苓塊 三錢 薏仁 三錢 白薏仁 三分 煨肉果 一錢
 厚樸 五分 雞內金 一錢 南查肉 一錢 神麩 八分
 廣皮炭 一錢 廣木香 七分

三十 脾虛大衰 則食物有不化之形 肝腎與衝脈伏寒 怒甚則疝痛

製茅朮一錢 茯苓一錢 煨肉果一錢 小茴香二錢
 薏仁三錢 白蔻仁五分 南查炭五分 烏藥八分
 廣皮炭八分 廣木香一錢 青皮六分

廿二 通補中下
 茯苓塊三錢 人參三分 小茴香炒黑一錢 煨肉果一錢
 薏仁五分 白蔻仁五分 廣木香六分 蒼朮八分
 南查炭八分

張男八個 泄瀉四五日 暑邪深入下焦 頭熱如火 手冷如冰 謂之暑厥 厥瘦難堪 脈遲緊 未必得愈 姑立方以救之 先與紫雪丹五分 作三次服

桂枝木一錢 豬苓二錢 製蒼朮一錢 茯苓塊二錢
 澤瀉一錢 廣皮炭七分 廣木香七分 扁豆一錢

吳氏醫案 治世 暑 又 暑有轉機 然終可畏也

薏仁三錢 茅朮炭一錢 半夏一錢 豬苓二錢
 廣木香八分 厚樸六分 澤瀉五分 炒扁豆一錢
 廣皮 五分

乙酉八月十五 伏暑泄瀉 加以停食 欲瀉腹痛 瀉後痛減 防成滯下 與五苓散 加消食 脈弦細而緩

雲苓皮五錢 桂枝三錢 南查炭二錢 蒼朮炭三錢
 豬苓三錢 小枳實二錢 炒神麩四錢 澤瀉三錢
 廣皮炭四錢 川椒炭二錢

一月後 覆診 病已大愈 善後方 與調理脾胃 咳嗽

癸亥七月 郭男八歲 咳而嘔 胃咳也 痰涎湧塞 喘滿氣短
 半夏三錢 茯苓塊三錢 薏仁三錢 杏仁二錢

小枳實一錢 陳皮一錢 蘇梗二錢 藿香梗一錢
 生薑二錢

廿八 卽於前方內去藿香梗 蘇梗 加 半夏二錢 苦葶藶五分 蘇子二錢 再服一帖

二十 小兒脾虛 溼重 胃咳 茯苓塊三錢 半夏六錢 焦神麩二錢 生薏仁五錢
 杏仁三錢 蘇子霜一錢 旋覆花包三 扁豆三錢
 生薑汁 每次沖 小枳實五分

卅二 卽於前方內去焦神麩 加 杏仁二錢 蘇子霜五分 廣皮三錢 服十帖

吳三歲 五歲 八歲 上三幼孩 連咳數十聲 不止 八歲者 且與千金葶藶湯 加苦葶藶子二錢 有二帖 愈者 有三四帖 愈者 第三四帖 減葶藶子

吳氏醫案 咳 乙半甚 喘者 加白茅根 五錢

文四幼孩 咳數十日 不止 百藥不效 用千金葶藶湯 加苦葶藶子二帖 而愈 周女 對春風 喻咳 醫用麻黃 向外發 又用訶子 白果 百合 向內收 以致喘不可 解 吐出者 皆血沫 用金沸草湯 三帖 而愈

乙酉五月 劉十七 三月間 春溫 喻咳 見血 現在六脈 弦細 五更丑寅卯時 單聲 咳嗽 甚謂之木扣金鳴 風本生於木也 議辛甘化風 甘涼柔木

連翹三錢 細生地三錢 薄荷一錢 銀花二錢
 苦桔梗三錢 桑葉三錢 天冬一錢 茶菊花三錢
 甘草二錢 麥冬三錢 鮮蘆根三錢

廿八 咳減 食加 脈猶洪 數左大於右 效不更方 再服四五帖

廿九 木扣金鳴 與柔肝清肺 已效 左脈洪數 已減 於前方去氣分 辛藥 加甘

潤

己丑二月 李女 風溫夾痰飲喘咳壯熱太甚勢甚危殆與宣肺清肺熱
 法
 沙參三錢 麥冬三錢 冰糖三錢 玉竹三錢

生石膏末二兩 杏仁五錢 蘆根五錢 苦葶藶子三錢
 黃芩三錢 煎三杯分三次服

十一 溫熱夾痰飲喘咳
 生石膏二錢 杏仁四錢 茯苓皮三錢 苦葶藶子五分
 蘆根五錢 冬瓜仁三錢
 煮三小杯分三次服服此方二帖而燒退

暑溫
 癸亥六月 史男 右脈洪大無倫暑傷手太陰有逆傳心包之勢喘渴太甚煩
 躁不寧時有譫語身熱且嘔議兩清心營肺衛之熱
 吳氏醫案 咳散 暑溫

連翹一錢 生石膏三錢 厚樸一錢 銀花二錢
 杏仁泥一錢 川連一錢 知母一錢 藿香梗一錢
 竹葉一錢 丹皮一錢 生甘草八分 日二帖

十三 諸症俱減熱已退但右脈仍洪舌黃而滑嘔未盡除
 飛滑石一錢 連翹一錢 川黃連一錢 杏仁泥五分
 銀花五分 生甘草八分 生薏仁一錢 葦根三錢
 荷葉邊一錢 炒知母八分 二帖

癸亥七月 興男 暑濕傷脾暮夜不安小兒脈當數而反不數且少腹以下常
 腫痛肝腎亦復虛寒況面色青黃舌苔白手心時熱調理乳食要緊防成
 疴疾謹辦以通為補食非溫不化例
 生薏仁二錢 半夏炒一錢 小枳實八分 杏仁泥五分
 厚樸一錢 白蔻仁四分 焦神麩五分 扁豆炒一錢

廣皮炭八分 小茴香炒一錢 生薑煨三錢 雞內金一錢
 四帖

初六前證已愈惟脾胃虛弱以疏補中焦為主
 田十四 暑濕誤下寒涼太多洞泄之後關開不寐隨食隨便完穀絲毫不化腫
 弦與桃花湯改湯法
 人參 赤石脂末 乾薑
 甘草炙 禹餘糧細末 粳米
 先以人參甘草乾薑三味煎去渣湯煮粥成然後和入赤石脂禹餘糧
 末愈後補脾胃而大健

伏暑
 周五本係伏暑誤以為風寒挾食發表消導致邪氣深入下焦血分夜熱早涼
 與煎厥瘧瘧相似食減脈大汗多便結先與救陽明之陰
 吳氏醫案 得溫 伏暑

元參五錢 梨汁一酒 葶藶汁一酒 麥冬不去心
 藕汁一酒 蘆根汁一酒 三帖

丁亥八月 台氏 伏暑內發新涼外加誤與三陽經表藥以致譫語神昏前
 用芳香開包絡神識已清惟舌苔白厚腹脹熱未盡除與通宣三焦法
 雲苓皮五錢 厚樸一錢 藿香梗三錢 飛滑石五錢
 香附二錢 炒黃芩二錢 杏仁泥三錢 廣皮二錢
 白蔻仁一錢 生薏仁五錢 煮三杯分三次服二帖

十四 伏暑新涼今日新涼之邪已退而伏暑之溼邪未除腹未全消故知之
 雲苓皮五錢 薏仁五錢 大腹皮三錢 薑半夏三錢
 猪苓三錢 黃芩炭二錢 杏仁泥一錢 厚樸三錢
 白蔻仁五分 藿香梗三錢 廣皮三錢 煮三杯分三次服二帖

吳鞠通先生醫案卷四終

吳鞠通醫案

卷五

肺癰

王氏 五十六歲 初起喉痺。為快利藥所傷。致成肺癰。胸中痛。口中燥。喉痺仍未痊。不食不寐。痰氣腥臭。已有成膿之象。脈短而數。寒熱且移。熱於大腸而泄瀉。難愈之證。勉與急急開提肺氣。議千金葦莖湯與甘桔合法。

桔 梗二兩 甘草一兩 桃 仁五錢 冬瓜仁五錢

苡 仁一兩 鮮葦根四兩

堂伯 兄 飲火酒。坐熱炕。晝夜不寐。喜出汗寐。誤服枇杷葉麻黃等利肺藥。致傷津液。遂成肺癰。真不可當。日吐膿二升許。用千金葦莖湯合甘桔湯。

蘆 根八兩 苡 仁二兩 桃 仁兩半 冬瓜仁兩半

吳鞠通醫案 卷五 肺癰


吳鞠通醫案 卷五 喉痺

桔 梗三兩 生甘草一兩

煎成兩大茶碗。晝夜服過碗半。膿去十之七八。盡劑膿去八九。又服半劑。毫無臭氣。調理脾胃收功。

朱詠 齋 五十餘歲 以己卯年二月初受風。與桂枝湯一帖。風解。膽怯不敢去厚衣。因而汗多。初四五日又受風。溫口渴思涼。脈洪數。先與辛涼輕劑不解。脈又大。汗更多。口更渴。身更熱。因與辛當重劑石膏等一帖。身涼渴止。脈靜。仍膽怯不敢去厚衣。初十日當大差。坐夜起五更。衣更厚。途間不敢去皮衣。以致重亡津液而成肺癰。與葦莖湯二三兩一帖。服至五七日不應。膿成臭極。加苦蘆葦子五錢。膿始退。未能十分淨盡。後十日又發。膿又成。吐如綠豆汁。濃臭。每吐一碗餘。又於前方加蘆葦三錢。服二帖方平復。以補胃逐痰飲收功。再其人色白體肥。夙有痰飲。未病之前。前秋冬兩季。以上書房行走。早起恐寒。誤服俗傳藥酒方。本不嗜酒。每早強飲數小杯。次年患此恙之由也。

喉痺



劉 三十二歲 服弦而長。木氣太旺。與君火結而成喉痺。

荆芥穗二錢 薄荷二錢 元 參八錢 銀 花六錢

牛蒡子五錢 連 翹五錢 馬 勃二錢 人中黃二錢

共為粗末。分八包。每一包蘆根湯煎。一時一服。

酒客服弦數。與苦藥清酒中之淫。即於前方內加

桔 梗四錢 射 干四錢 黃 芩四錢 兒 茶三錢

煎法如前。

乙丑六月二十日 舌苔邊白中濁。喉腫而痛。頭暈。身熱。脈數。痰氣所干。切戒穀食。急開關竅。

用時時輕揚法。

桔 梗八錢 人中黃三錢 薄 荷三錢 荆芥穗三錢

元 參一兩 牛蒡子八錢 黃 芩三錢 黃 連三錢

馬 勃二錢 板藍根三錢 僵 蠶三錢 連 翹八錢

銀 花八錢 鮮荷葉半張

共為粗末。分八包。一時許服一包。蘆根湯煎。

吳鞠通醫案 卷五 喉痺

吳鞠通醫案 卷五 喉痺

二十七日 舌濁甚。邪之傳化甚緩。於前方內加

黃 芩二錢 黃 連二錢 連 翹五錢

二十八年 淫熱厲氣。相搏以成喉痺。舌苔重濁色暗。必得淫氣宣化。而後熱可以解。

蓋無形之邪熱。每借有形之穢濁以為依附故也。因前法而小變之。

桔 梗八錢 人中黃二錢 黃 芩五錢 黃 連五錢

馬 勃五錢 牛蒡子五錢 僵 蠶三錢 連 翹八錢

銀 花八錢 通 草三錢 荆 芥二錢 杏 仁五錢

薄 荷三錢 滑 石一兩 犀 角三錢

共為粗末。分十包。一時許服一包。每服鮮荷葉邊二錢。蘆根三錢。同煎。

去渣服。

二十九年 喉痛雖止。舌濁未除。脈仍微數。則其中之淫可知。按。靈樞經五臟溫病。以

舌苔專屬之肺。故藥方一以宣通肺氣為主。蓋氣化則淫化。而火亦無依矣。

桔 梗三錢 人中黃八分 連 翹二錢 銀 花二錢

黃連錢半 黃芩二錢 馬勃八分 通草一錢
杏仁泥一錢 滑石三錢 蘆根一枝 荷葉半張
今晚一帖。明早一帖。

王壬午四月十一日
溫毒身熱喉痺。滴水不能下咽。已二日矣。與代服普濟散二十包。先煎一包。銜入口內。仰面浸漬喉瘡。一刻許有稀涎滿口。即控出吐之。再噴再浸。如上法。噴至半日。喉即開。得下咽。於是每一包藥煎一碗。咽一半。浸吐一半。三日得快便。喉全消。身熱亦退。育陰而愈。

六脈沉弦而細。純陰之象。喉痛足痺宜溫。

王氏三十人
川椒炭三錢 防己三錢 桂枝三錢 肉桂二錢
茯苓皮五錢 薑黃二錢 草薢五錢 苡仁五錢
四帖。

初八日 喉痛止去肉 桂痰不活加半 夏五錢

滿氏三十五歲
面色青黃。呼吸定息。脈再至而弦緊。食減。經不行。腹中有塊二三枚。長三四寸。肝厥無五日不發。喉痛十數年不休。向來所服之方。非寒涼。即婦科

吳鞠通醫案 卷五 喉痺

吳鞠通醫案 卷五 瘧

地芍藥等。以致歷年沉困不休。病勢日重。十二年不孕矣。與苦辛熱法。急回真陽。或者可救。

肉桂錢半 夏薑二錢 川椒二錢 廣皮二錢
吳黃錢半 半夏三錢
前方服二帖。喉痛減其大半。厥未發。食少進。腹痛減。與前方加人參錢半 茯苓三錢

前方服四帖。脈三至。喉痛止。食大進。腹痛亦減。仍服前方。去夏薑。並減劑藥分量。

前方服七帖。六脈將進至四至。服通補奇經丸一料。半年後受孕。

瘧

吳二十五月十六日
但寒不熱。似乎牝瘧。然渴甚脈數。皮膚捫之亦熱。乃伏暑內發。新涼外加。熱未透出之故。仍用苦辛寒法。加以升提。

杏仁泥三錢 天花粉二錢 薤仁 滑石

厚樸二錢 青蒿一錢 苡仁 藿香
鬱金二錢 黃芩一錢 知母

三杯。分三次服。三帖。

但寒不熱之瘧。昨用升提。已出陽分。渴甚。服洪數甚。熱反多。昨云熱邪深伏。未曾透出。不得作真牝瘧者。非虛語也。用苦辛寒重劑。

杏仁粉五錢 滑石三錢 生石膏八錢 知母一錢
薤仁三錢 糖梗三錢 厚樸三錢 黃芩二錢
鬱金三錢 甘草一錢

伊氏二十二歲 正月初七日
娠娠七月。每日午後。先寒後熱。熱至戌時。微汗而解。已近十日。此上年伏暑成瘧。由春初升發之氣而發。病在少陽。與小柴胡法。

柴胡五錢 黃芩三錢 炙甘草二錢 半夏四錢
人參二錢 生薑三錢 大棗二枚

朱 一帖。寒熱減。二帖。減大半。第三日用前方三分之一。全愈。
體厚本有小腸寒。後便血。舌苔灰白而厚。中黑。嘔惡不食。但寒不熱。

吳鞠通醫案 卷五 瘧

吳鞠通醫案 卷五 瘧

此脾瘧也。與劫法。
生蒼朮五錢 生草果三錢 檳榔三錢 生苡仁五錢
杏仁三錢 茯苓五錢 熟附子一錢 黃芩炭二錢
前方服三帖。而病勢漸減。舌苔化黃。減其製。又三帖。而寒來甚微。一以理脾為主。

於朮三錢 薤仁二錢 益智仁二錢 廣皮三錢
半夏三錢 黃芩炭二錢 苡仁五錢

佟氏四十歲
少陰三瘧。二年不愈。寒多熱少。脈弦細。陽微。損及八脈。通補奇經丸四兩。服完全愈。

少陰三瘧。久而不愈。六脈弦緊。形寒嗜臥。發時口不知味。不渴。腎氣上泛。面目黧黑。與扶陽湯法。

鹿茸三錢 桂枝三錢 人參一錢 熟附子二錢
蜀漆二錢 當歸三錢

四帖愈。後調脾胃。
鄭五十五 脈雙弦。伏暑成瘧。間二日一至。舌苔白滑。熱多寒少。十月之久不止。邪入已深。極難速出。且與通宣三焦。使邪有出路。勿得驟補。
杏仁泥四錢 茯苓皮五錢 薑 梗三錢 薤 仁二錢
知母三錢 半 夏三錢 苡 仁五錢 黃 芩二錢
青 蒿一錢

二十六日 加青 蒿一錢
服四帖。

初四日 脈緊汗多加
服四帖。

桂 枝三錢
服二帖。

初六日 脈已活動。色已華。寒大減。熱亦少減。共計已減其半。汗至足底。時已早至。八刻。議去青蒿。加黃芩一錢。舌苔雖減而仍白。餘藥如故。再服四帖。

吳鞠通醫案 卷五 瘧

九

吳鞠通醫案 卷五 瘧

一〇

十四日 三瘧與宣三焦。右脈稍大。熱多汗多。舌苔之白滑雖薄。而未盡化。瘧中生熱。不能驟補。與兩清溼熱。

杏仁泥三錢 知母二錢 通 草錢半 薤 仁二錢
黃 芩二錢 苡 仁四錢 黃 連一錢 茯苓皮三錢
半 夏三錢

十九日 加廣皮炭三錢 霍 梗三錢
服四帖。

二十二日 病減者減其製。每日服前方半帖。六日服三帖。

二十九日 病又減。去黃連。加益智仁三錢。以其脈大而尚緊也。仍係六日服三帖。餘邪未盡。仍六日服三帖。

六月初五日 三瘧與宣化三焦。十退其九。白苔尚未盡退。今日診脈。弦中兼緩。氣來至。是陽氣未充。議於前方退苦寒。進辛溫。

杏 仁三錢 益智仁三錢 桂 枝三錢 薤 仁三錢
黃 芩炭三錢 半 夏五錢 茯苓五錢 薑 梗三錢

二十二日 左脈弦緊。右大而緩。舌白未化。瘧雖止而餘溼未消。此方仍服。去
四帖。
薤 仁一錢 黃 芩一錢 益智仁一錢
服八帖。

七月初二日

四瘧已止。胃已開。脈已同。陽與平。補中焦。
半 夏三錢 薤 仁錢半 炙甘草二錢 廣皮炭三錢
生苡仁三錢 茯苓五錢 生 薑三片 於 朮三錢
大 棗二個

服七帖後。可加人參二錢。服至收功。
丸方 瘧後六服俱弦微數。與脾胃雙補法。

何首烏四兩 茯苓六兩 枸杞子四兩 五味子二兩
沙苑子三兩 山 藥四兩 於 朮四兩 薤 仁五錢
蓮 實六兩 人 參四錢

蜜丸如桐子大。每服三二錢。開水送下。逢節以人參五分煎湯送。

吳鞠通醫案 卷五 瘧

一一

吳鞠通醫案 卷五 瘧

一二

高 十六日 間三瘧。脈弦。暑邪深入矣。

杏 仁三錢 青 蒿三錢 茯苓皮三錢 薤 仁一錢
半 夏三錢 柴 胡一錢 藿香葉三錢 黃 芩三錢
知 母二錢 苡 仁三錢 炙甘草一錢 滑 石五錢
生 薑三片 大 棗二個

十八日 診脈數熱重加
知 母二錢

二十日 瘧止熱退。去知母。柴胡。青蒿。薑棗。改 薑 梗二錢 減
滑 石二錢

初五日 餘邪已輕。再服數帖。

朱 三十八日 但寒不熱。舌苔白滑而厚三四日。灰黑而滑五六日。黑滑可畏。脈沉弦而緊。太陰陰瘧。與牝瘧相參。但牝瘧表寒重。此則偏於在裏之寒。陰重也。初起三日。用桂枝。草果。蒼朮。黃芩。茯苓。苡仁。廣皮。豬苓。澤瀉。三四日加附子。五六日又加草果。蒼朮分量。再加生薑。舌苔始微化黃。惡寒漸減。服至十

二三日。舌苔惡寒始退。愈後峻補脾胃兩陽。然後收功。久瘧不愈。寒多。舌苔白滑。溼氣重也。宜宣通三焦。微偏於溫。

姚二十五歲
乙酉七月二十日
五日
扶苓皮五錢 生薑二片
前方服六帖。瘧已止。照原方去 草果 青蒿 加
滑石六錢 益智仁三錢
三瘧兼痺。舌苔白滑。終日一飲。熱時不渴。胸痞。此偏於伏暑中之溼多者也。惟日已久。又加誤補下行。邪已深入。為難治。勉與宣通經絡三焦。導邪外出。毋使久纏。

錢二十歲
乙酉十月初二日
桂枝三錢 防己四錢 杏仁五錢 青蒿三錢
半夏三錢 黃芩三錢 茯苓五錢 薤仁二錢
廣皮三錢 煨草果八分 片薑黃二錢

十五日
吳鞠通醫案 卷五 瘧
閱來札知汗多而寒熱減。舌白滑苔退。食後不飽悶。是伏邪已有活動之機。但陰瘧發於戌亥時。不見日光。雖屢用升提。使邪外出法。毫不見早。大可慮也。勉與原方內加草果分量。去茯苓。薤仁。再加急走之蜀漆。活血絡之當歸。

吳鞠通醫案 卷五 瘧
一三
一四

吳鞠通醫案 卷五 瘧
一四
桂枝三錢 柴胡三錢 半夏三錢 青蒿一錢
防己三錢 杏仁四錢 黃芩三錢 廣皮炭三錢
草果二錢 薑黃二錢 蜀漆三錢 當歸三錢
生苡仁五錢

十二月

閱來札知寒熱遞減而未盡除。停飲痺痛太甚。議減治瘧之品。加宣欬與痺之藥。然大有病退正衰之慮。飲與痺皆喜通不喜守。大忌呆補。奈何。

桂枝五錢 柴胡三錢 廣皮五錢 防己四錢
青蒿二錢 柴胡三錢 寒熱如再減 山甲片一錢
蜀漆二錢 則去之 生苡仁五錢 人參一錢
生薑三錢 半夏六錢 茯苓皮五錢 煨草果二錢
片薑黃三錢

初十日
煎四大茶杯。分四次服。七日必須來信。以後忽寒忽熱。已非呆於寒熱者可比。十五日寒大減。十八日寒熱又減。二十日申酉時似發非發。俱屬佳處。但手背之痛。左甚於右。伏邪甚深。腹左之塊。即係瘧母一類。不過脅腹之別耳。合觀寒多熱少。當與補陽。議於原方內減柴胡青蒿。加桂枝。其人參似非高麗參可比。蓋人生世上不可留後悔也。其瘧母每日空心服化癥回生丹一丸。開水送下。蓋化癥丹中。原有龍甲煎丸在內也。即久病在絡。亦須用之。又天士先生云。三時熱病。病久不解者。每借芳香以為搜逐之用。此證猶在畏途。不可隨便飲嗽也。於前方內減 青蒿 柴胡 加

楊二十四歲
丙戌十二月初一日
桂枝一錢 青蒿三錢 薤仁一錢 蜀漆一錢 桂枝三錢
杏仁二錢 黃芩三錢 茯苓半 苡仁三錢 柴胡錢半

初五日
吳鞠通醫案 卷五 傷寒
一五
服一帖而寒退。熱反多。此陰邪已化熱。去柴胡桂枝。重用通宣三焦。加廣皮半夏以和脾胃。

吳鞠通醫案 卷五 傷寒
一六

傷寒
服一帖而寒退。熱反多。此陰邪已化熱。去柴胡桂枝。重用通宣三焦。加廣皮半夏以和脾胃。

初二日
太陽中風。尚未十分清解。兼之溼痺骨痛。
桂枝四錢 厚樸二錢 薑砂三錢 杏仁三錢
防己三錢 茯苓皮五錢 薑黃二錢 炙甘草錢半
廣皮錢半

初五日
行經絡而和脾胃。則風痺自止。

桂枝八錢 白芍四錢 半夏五錢 防己六錢
炙甘草三錢 生白朮五錢 生薑五片 大棗二個
水八杯。煮三杯。分三次服。頭一次啜稀粥。令微汗佳。二三次不必食粥。左脈沈緊。即於前方加

初六日 脈洪大而數。經絡痛雖解而未盡除。痺也。小便白而濁。溼也。

熟附子五錢
桂枝三錢 澤瀉三錢 黃柏炭一錢 通草三錢
杏仁五錢 滑石五錢 苡仁五錢 茯苓皮五錢
猪苓三錢

初九日 昨服開肺與大腸痺法。溼滯已下。小便亦清。但大便與腹中微有血跡。證從寒溼化熱而來。未便即用柔藥以清血分。今日且與宣行腑陽。右脈仍見數大。可加苦藥。如明日血分未清。再清血分未遲。

杏仁泥三錢 黃柏炭一錢 黃芩炭二錢 陳皮錢半
苡仁五錢 半夏三錢 滑石五錢 厚樸二錢
細蘇梗一錢

初八日 舌苔仍有新白。衣被稍薄則畏寒。身熱已退。陽虛溼氣未盡無疑。

桂枝三錢 苡仁五錢 白芍二錢 陳皮錢半
吳鞠通醫案 卷五 傷寒 一七

半 夏五錢 生茅朮二錢 杏仁三錢 厚樸二錢
全當歸錢半 煎服均如前法。二帖。

初十日 諸證向安。惟營氣與衛不和。寐不實。寐後自覺身涼。以調和營衛為主。

桂枝三錢 苡仁五錢 大棗二個 白芍三錢
陳皮錢半 炙甘草二錢 半夏六錢 生薑三片
茯苓三錢 六帖。

十六日 營衛已和。即於前方內加
膠 蛤三錢 白芍二錢 五錢
七帖而安。

唐氏 太陽中風漏汗。桂枝加附子湯主之。
三十八 桂枝六錢 熟附子三錢 炙甘草三錢 焦白芍四錢
生薑三片 大棗三個

十七日 中風漏汗。兼之腎水上凌心。心悸腹痛。昨用桂枝加附子湯。諸症悉退。今左脈沈緩。右脈滑。表雖清而濁陰未退。議苓桂枝伐腎邪。歸苗溫衛脈。吳黃半夏生薑兩和肝胃。白芍以收陰氣。合桂枝而調營衛。加黃芩以清風化之熱。合諸藥為苦辛通法。此外感之餘。兼有下焦裏證之治法也。

黃三杯。分三次服。
桂枝四錢 全當歸三錢 小茴香三錢 半夏四錢
吳黃三錢 青皮錢半 焦白芍二錢 茯苓五錢
黃芩炭一錢 生薑三片

十九日 脈緩濁陰久居。兼有滯物續下。用藥仍不外苦辛通法。稍加推蕩之品。因其勢而利導之。大意通補陽明之陽。正所以驅濁陰之陰。若其人陽明本旺。胃陰自能下降。六腑通調。濁陰何以能聚。再胃旺自能坐鎮中州。濁陰何以能越胃而上攻心下。反覆推求。病情自見。

甘瀾水煎成三杯。分三次服。
淡吳萸三錢 小茴香三錢 桂枝尖四錢 厚樸三錢
吳鞠通醫案 卷五 傷寒 一九

二十二日 凡痛脹滯下。必用苦辛通法。兼護陽明。固不待言。前法業已見效。細詢病已十餘年。以半產後得之。誤用壅補成之。按久病在絡。再痛脹偏左。下至少腹板着。其中必有瘀滯。非純用湯藥所能成功。蓋湯者盪也。滯盪腸胃和通百脈。固其所長。至於細離密鑊。緩行橫絡。是其所短。非兼用化癥同生丹。緩通不可。且陽刺過重。有癥散為癥之虞。不得不思慮預防也。

川棟子二錢 黃芩炭一錢 小枳實錢半 烏藥二錢
青皮錢半 廣木香一錢 焦白芍二錢 陳皮一錢
茯苓三錢 吳鞠通醫案 卷五 傷寒 二〇

桂枝尖一錢 烏藥錢半 厚樸一錢 全當歸錢
半 夏五錢 地榆炭一錢 小茴香二錢 川棟子二錢
黃芩炭一錢 白芍二錢 黃連八分 廣皮炭八分
兩頭尖二錢 廣木香八分 桃仁錢半 紅花七分
鬱金一錢 降香末二錢

甘瀾水煎。前後四杯。日三夜一。分四次服。四帖。

甘瀾水煎。前後四杯。日三夜一。分四次服。四帖。

昔李東垣有方用藥至三十餘味者。張仲聖薑甲煎丸。亦有三十幾味。後人學問不到。妄生議論。不知治經治以急。急則用少而分量多。治絡治以緩。緩則用多而分量少。治新則用急。治舊則用緩。治急可用獨。治舊必用衆。獨則無推讓而一力成功。衆則分功而互相調劑。此又用藥多寡之權衡也。

兼服化癥回生丹一粒。

日二十七 宣絡法兼兩和肝胃。

全當歸三錢 製香附二錢 小茴香三錢 半 夏三錢
川芎五分 青皮八分 丹皮三錢 沙苑子三錢
白芍六錢

日二十八 寐仍不實。於前方內加

半 夏二錢 生苡仁六錢

初二日 案仍前。

吳鞠通醫案 卷五 傷寒

二二

吳鞠通醫案 卷五 傷寒

二二

全 歸三錢 製香附二錢 乾薑炭五分 小茴香三錢
降香末二錢 高良薑二分 青皮八分 廣皮炭八分
烏藥二錢 半 夏五錢 桃仁泥二錢 半

初五日

絡癥多年。腹痛脹攻胃。食後腹脹。今搜去絡中癥滯。飢甚則如刀刮竹。絡氣虛也。與通補絡法。

歸身三錢 龍眼肉三錢 白芍六錢 杞子三錢
丹皮三錢 小茴香一錢 丹參三錢
九帖全愈。

頭項強痛而惡寒。脈緩有汗。太陽中風。主以桂枝湯。

吳氏 十二月二十三日
桂枝三錢 白芍二錢 炙甘草二錢 生薑三錢
大棗二個
水五杯。煮二杯。第一杯服後。即食稀熱粥。令微汗佳。有汗二杯。不必食粥。無汗仍然。

日二十四 不解。於前方內加

羌活五錢

日二十五 服前方已。脈靜身涼。不肯避風。因而復中。脈緊無汗。用麻黃湯法。

麻黃三錢 羌活三錢 桂枝三錢 白芍三錢
炙甘草二錢 生薑三片 大棗二個

煮二杯。分二次服。

日二十六

服前藥不知身重疼痛。其人肥而陽氣本虛。平素面色淡黃。舌白溼氣又重。非加助陽勝溼之品不可。於前方內加

麻黃五錢 桂枝二錢 炙甘草三錢 杏仁三錢
白朮五錢 熟附子三錢

水五碗。先煮麻黃去上沫。入諸藥取兩碗。分二次服。服一碗而汗出愈。頭痛惡寒。脈緊。言寒。肢冷。舌色淡。太陽中風。雖係季春。天氣早間陰晦。雨氣甚寒。以桂枝二麻黃一法。

唐 五十九 三月十日 六日

麻黃三錢 桂枝六錢 炙甘草三錢 杏仁五錢

吳鞠通醫案 卷五 傷寒

二四

生薑六片 大棗二個

日十八日 原方倍麻黃。減桂枝。加附子三錢。二帖。

原方再服一帖。

日十九日 諸證悉減。藥當暫停以消息之。

日二十日 中風表解後。言寒。減食。則汗頭行痛。舌白滑。脈微緊。宜桂枝加附子湯。除風實表護陽。

桂枝六錢 白芍四錢 炙甘草二錢 附子三錢
生薑五片 大棗二個

水五杯。煮二碗。分二次服。渣再煮一碗服。

日二十一 表解後復中。惡寒胸結。舌苔厚而白。脈遲緊。裏急。

桂枝六錢 蒼朮三錢 附子四錢 乾薑三錢

苡仁五錢 茯苓五錢 厚樸三錢 枳實二錢
陳皮二錢 日二帖

二十二 於前方內加 炙甘草二錢 生薑二兩 去 茯苓減 苡仁 日二帖

二十三 諸證悉衰。當減其製。照前日方。日一帖。

二十四 中風表解後。餘邪入裏。舌黃身熱。胸痞。瀉心湯瀉其痞。

乾薑五錢 生薑五錢 黃芩五錢 黃連二錢
半 夏六錢 頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。

柴胡六錢 黃芩三錢 黨參三錢 桂枝四錢
半 夏三錢 炙甘草三錢 羌活三錢 生薑三片

吳鞠通醫案 卷五 傷寒 二五

吳鞠通醫案 卷五 傷寒 二六
寒熱後。寒退熱存。脅脹。

半 夏五錢 炙甘草三錢 陳皮炭三錢 生薑三錢
黃芩四錢 香附三錢 鬱金二錢 大棗二個

張 二十五 今年風木司天。現在寒水客氣。故時近初夏。猶有太陽中風之症。按太陽中風。係傷寒門中第一關。最忌誤下。時人不讀唐晉以上之書。故不識症之所由來。仲景謂太陽至五六日。太陽證不罷者。仍從太陽驅出。宜桂枝湯。現在頭與身仍微痛。既身熱而又仍惡風寒。的是太陽未罷。理宜用桂枝湯。但其人素有淫熱。不喜甘。又有微效。議於桂枝湯內去甘藥。加辛燥。服如桂枝湯法。

桂枝六錢 陳皮三錢 白芍四錢 半夏四錢
杏仁三錢

二十六 太陽中風。誤下胸痞。四五日。太陽症未罷。昨用太陽證仍在例之桂枝湯。今日惡寒已罷。頭目已清。惟胸痞特甚。不渴。舌白而壯熱。泄瀉稀水。頻仍。仲景法云。病發於陽而誤下。成胸痞者。瀉心湯主之。今用其法。再經謂脈

不動數者為不傳經也。昨日已動數太甚。斷無不傳之理。可畏在此。

乾薑五錢 茯苓五錢 半夏五錢 生薑三片
黃連三錢

二十七 太陽中風。誤下。前日先與解外。昨日太陽證罷。即瀉胸痞。今日胸痞解。惟自利不渴。舌灰白。脈沉數。經謂自利不渴者。屬太陰也。太陰宜溫。但理中之甘草人參。恐不合拍。議用其法而不用其方。

乾薑五錢 半夏六錢 蒼朮炭四錢 生薑四錢
陳皮炭二錢 茯苓一兩

二十八 太陽中風。先與解外。外解已。即與瀉誤下之胸痞。痞解而現自利不渴之太陰證。今日口不渴而利止。是由陰出陽也。服亦頓小其半。古云。脈小則病退。但仍沈數。身猶熱而氣粗不寐。陷下之餘邪不淨。仲景傷寒論謂真陰已陽邪尙盛之不寐。用阿膠雞子黃湯。按此湯重用芍藥。議用甘草瀉心法。

甘草三錢 黃芩四錢 半夏五錢 黃連三錢

吳鞠通醫案 卷五 傷寒 二七

吳鞠通醫案 卷五 傷寒 二八
脈沉數。陰經熱陽經不熱。是陷下之餘邪在裏也。氣不伸而嘔。嘔者傷寒門中之大忌也。皆誤下之故。議少用丁香柿蒂湯法。加芍藥以微裏熱。疏逆氣。

公丁香二錢 黃芩三錢 柿蒂九個 黃連一錢
陳皮二錢 薑汁三匙

初一日 誤下成胸痞。自利。兩用瀉心。胸痞自利俱止。但陷下之邪。與受傷之胃氣。搏而成嘔。昨用丁香柿蒂湯去人參。加芍藥。方雖易。仍不外仲聖苦辛通降之法。病者畏而不服。今日嘔不止而左脈加進。勉與仲聖瀉心中之橘皮竹茹湯。其力量降前方數等矣。所以如此用者。病多一日。則氣虛一日。仲聖於小柴胡湯中。即用人參。况誤下中虛者乎。

陳皮六錢 生薑五錢 炙甘草四錢 竹茹五錢
大棗四枚 半夏三錢 人參二錢 知母

十七日 誤下中虛。氣逆成嘔。昨與金匱橘皮竹茹湯。今日嘔減過半。古謂效不更

廿二 背仍痛。原方加
高良薑一錢 吳萸一錢 桂枝五錢
再服四帖。

廿七 已效。陰氣未退。再服三帖。分四日服完。
痛減。嘔與泄瀉俱止。減川椒黃薑之半。再服六帖。
陰未化。陽自不復。且心下堅大如盤。脈如故。前方再服。
燥金感後。所傷者陽氣。何得以大劑熱地補陰。久久補之。陽氣困頓。無怪
乎不能食而嘔矣。六脈弦緊。豈不知脈雙弦者寒乎。

姚 四十八 歲
乙酉 四月 二十 日
初二日 加桂枝三錢 乾薑一錢 減川椒之半

吳鞠通醫案 卷五 中燥 三三
吳鞠通醫案 卷五 中燥 三四

十一日 嘔痛皆止。飲食已加。惟肢軟無力。陽氣太虛。加甘草合前辛藥。為辛甘補
陽方法。
復感燥氣。嘔而欲瀉。於前方內去甘藥加分量自愈。六脈弦細如絲。陽微
之極。

廿一 日
川椒炭三錢 陳皮三錢 吳萸三錢 乾薑三錢
茯苓五錢 半夏五錢 桂枝五錢 公丁香錢半
生薑五錢

李 四十六 歲
乙酉 四月 十六 日
諸症皆效。脈稍有神。於原方內去吳萸丁香之剛燥。加苡仁之平淡。陽明
從中治也。

胃痛脅痛。或嘔酸水。多年不愈。現在六脈弦緊。皆起初感燥金之氣。金來
克木。木受病。未有不克土者。土受病之由來。則自金克木始也。此等由外
感而延及內傷者。自唐以後無聞焉。譏變胃而受胃變法。即用火以克金
也。又久病在絡法。

公丁香一錢 茯苓五錢 枳實四錢 川椒炭三錢

廿三 復診仍用原方四帖。
現在胃痛脅痛吐酸之證不發。其六脈弦緊不變。是胸中絕少太和之氣。
譏轉方用溫平。剛燥不可以久任也。

廿四 服之緊者稍和。腹痛已止。唯頭暈不寐。且與和胃令寐。再商後法。
再服一帖。
再服三帖。分三次服。以得寐為度。如服二帖後仍不寐。可加半夏至二兩。
感受金涼。胸痺頭痛。脈弦細而緊。

廿四 復診脈仍緊。原方加
益智仁二錢

十一日 診脈已回陽。去乾薑。減桂枝之半。
復診脈仍緊。原方加
益智仁二錢

廿二 川椒炭三錢 陳皮三錢 公丁香錢半 降香末三錢
香附三錢 查炭二錢 吳萸二錢 青皮二錢
青橘葉三錢 半夏五錢 苡仁五錢

十七日 復診病稍減。脈仍緊。去
枳實三錢 橘葉 及 川椒炭一錢 加

廿四 服之緊者稍和。腹痛已止。唯頭暈不寐。且與和胃令寐。再商後法。
再服一帖。
再服三帖。分三次服。以得寐為度。如服二帖後仍不寐。可加半夏至二兩。
感受金涼。胸痺頭痛。脈弦細而緊。

廿七 復診脈仍緊。原方加
益智仁二錢

廿八 復診脈仍緊。原方加
益智仁二錢

廿九 復診脈仍緊。原方加
益智仁二錢

三十日 復診脈仍緊。原方加
益智仁二錢

三十一日 復診脈仍緊。原方加
益智仁二錢

三十二日 復診脈仍緊。原方加
益智仁二錢

生薑五片 大棗二箇 二帖

十八日 燥氣雖化。六脈俱弦。舌苔白滑。用陽明從中治法。與苦辛淡法。最忌酸甘。

半 夏四錢 苡仁五錢 香附三錢 茯苓四錢 乾薑五錢 益智仁二錢 陳皮三錢 薤仁五錢 川椒炭二錢

二十一 脈仍弦緊。熱藥難退。欬嗽減。效不更方。右脅微痛。加香附三錢

二十三 右脅微痛。脈弦緊如故。加蘇子霜三錢 降香末三錢 旋覆花三錢

二十六 脅痛咳嗽皆止。痰尚多。脈弦未和。於前方內去香附 蘇子霜 降香 旋覆花 加 桂枝四錢 乾薑二錢半 以充其陽氣。行痰飲。和弦脈。

羅歷散方 吳鞠通醫案 卷五 中燥 三七

吳鞠通醫案 卷五 中燥 三八

主治中燥吐瀉腹痛。甚則四肢厥逆轉筋。腰膝肢麻。起臥不安。再甚則六脈全無。陰毒發斑。痲癩等症。並一切凝寒痼冷積聚。寒輕者不可多服。寒重者不可少服。以愈為度。非實在純受燥淫寒三氣陰邪者不可服。

桂枝六兩 公丁香二兩 草果二兩 川椒炭五兩 水菖蒲二兩 青木香四兩 吳茱萸四兩 防己三兩 檳榔二兩 降香末五兩 附子三兩 小茴香四兩 薤白四兩 苡仁五兩 五靈脂二兩 高良薑三兩 葶澄茄五兩 細辛二兩 烏藥三兩 乾薑三兩 雄黃五錢

右藥共為細末。開水和服。大人每服三錢。病重者五錢。小兒減半。病甚重者連服數次。以痛止厥回。或瀉止筋不轉為度。方論。按內經有五疫之稱。五行偏勝之極。皆可致疫。雖瘴氣之至。多見火證。而燥金寒溼之疫。亦復時有。著風火暑三者為陽邪。與穢濁異

趙

感受燥金之氣。腹痛甚。大嘔不止。中有蓄水。誤食水果。吳鞠通醫案 卷五 中燥 三九

吳鞠通醫案 卷五 中燥 四〇

三十一 公丁香三錢 半 夏一兩 茯苓皮五錢 生薑一兩 七月二 川椒炭六錢 烏梅肉三錢 吳茱萸四錢 陳皮五錢 十四日 高良薑四錢 枳實三錢

水五碗。煎二碗。渣再煎一碗。另以生薑一兩。煎湯一碗。候藥稍涼。先服薑湯一口。接服湯藥一口。少停半刻。俟不吐再服第二口。如上法。以嘔止痛定為度。

二十五 燥氣腹痛雖止。當臍仍堅。按之微痛。舌苔微黃而滑。周身筋骨痛。脈緩。陽明之上中見太陰。當與陽明從中治例。

桂枝六錢 川椒炭二錢 生薑三錢 白芍三錢 公丁香一錢 防己三錢 苡仁五錢 茯苓六錢 半 夏五錢 枳實三錢 薤仁五錢 茯苓五錢 生薑三錢 薤仁五錢 茯苓五錢

二十六 脈小於前。身痛已止。六脈未和。舌黃滑苔。半 夏五錢 生薑三錢 薤仁五錢 茯苓五錢

陳皮三錢 厚樸三錢 苡仁五錢 大腹皮三錢
川椒炭錢半

二十八日 腹脹如故不寐。加半夏一兩

初一日 太陽痺。

桂枝六錢 茯苓皮五錢 茅朮炭三錢 防己四錢
通草一錢 片薑黃三錢 杏仁五錢 苡仁五錢
滑石六錢 蠶砂三錢 杏仁五錢 苡仁五錢

初六日 腹脹停飲。前方內去朮之守。加苦辛之通。又去滑石。

大腹皮三錢 厚樸三錢 枳實三錢 陳皮三錢
六脈俱弦。胃口不開。腹脹肢倦。宜通六腑。即勞者溫之之法也。

桂枝六錢 大腹皮三錢 川椒炭三錢 陳皮五錢
益智仁三錢 半夏五錢 枳實二錢 茯苓五錢
厚樸二錢

吳鞠通醫案 卷五 中燥 四一

吳鞠通醫案 卷五 中燥 四二

張女 十五歲

服五帖而愈。
燥金之氣。直中入裏。六脈全無。僵臥如死。四肢逆冷。已過肘膝。醫痛轉筋。與通脈四逆湯。加川椒吳萸丁香一大劑。厥回脈出一晝夜。次日以食粥。太早。復中如前。脈復厥。體又死去矣。仍用前方。重加溫藥一劑。厥回其半。又二帖而無活。後以補陽收功。

顧 五十歲

直中燥氣。嘔少瀉多。四肢厥逆。無脈。目閉。無語。睛不轉。與通脈四逆湯。加人參 川椒 吳萸 丁香

楊 五十歲

一帖而效。三帖脈漸復。重與補陽而愈。
脊痛心煩懊惱。拘急肢冷。脈弦細而緊。欲坐不得坐。欲立不得立。欲臥不得臥。隨坐即欲立。剛立又欲坐。坐又不安。一刻較一刻脈漸小。立刻要脫。與霹靂散不住灌之。計二時。服散約計四兩而稍定。後與兩和脾胃而全安。

鄭 二十六歲

先是三月初九日。得太陽中風。與桂枝湯已愈。十二日晚已臥。下身有微汗。因廚房不戒於火。只穿小汗褂一件。未着襪。出外救火。火熄復臥。覺身

多 十六歲

微熱惡寒。腹中脹痛。脈弦數。與桂枝柴胡各半湯。汗出稍輕。究不能解。以後外雖化熱。面赤汗多。如溫病狀。以當胸之痛未休。舌白不燥。斷不敢用辛涼。而辛溫之藥。或進或退。十日不解。至二十四日。反重用溫熱。佐以黃連三錢。次日表證裏證。一齊俱解。如失。後與調理脾胃兩陽而安。
燥淫表裏俱病。面赤身熱。舌黃燥渴。六脈洪數而緊。大便閉。小便短。通盤全似火證。只有當胸痛拒按。此為陽中之陰。乃為真陰與苦熱芳香一劑而熱退。減輕分量。三帖而病全失矣。

痲 太陽所至

溫 九月二十

六十日之幼孩。痲已二十餘日。現在脈不數。額上涼汗。並無外感可知。乃雜藥亂投。致傷脾胃。故乳食有不化之形。恐成柔痲。俗所謂慢脾風。議護中焦。乃實土制風法。又肝苦急。急食甘以緩之。義也。

明天麻三錢 乾薑二錢 茯苓五錢 廣木香五分
炙甘草三錢 生苡仁五錢 焦於朮錢半 煨肉果一錢

吳鞠通醫案 卷五 痲 四三

吳鞠通醫案 卷五 痲 四四

三月初一日

甘瀾水五茶杯。煎成兩茶杯。小兒服十之一二。乳母服十之八九。渣再煎一茶杯。服如前。
赤子不赤而刮白兼青。脈遲涼汗。舌苔白滑而厚。食物不化。洞泄者必中寒。按症必因於溼。古所謂柔痲是也。議從中治。經謂有者求之。無者求之。此症全無風火之象。純然虛寒。乳中之溼不化。土愈虛則肝中內風愈動。若不崇土而惟肝是求。恐日見窮蹙矣。

人參四分 廣皮炭三分 廣木香五分 生於朮一錢
焦白芍一錢 煨肉果五分 炙甘草一錢 明天麻三錢
生苡仁一錢

初二日

風溼相搏。有汗為柔痲。形若反弓者。病在太陽。俯視目珠向下者。病在陽明。以陽明為目下綱也。今久病為雜藥困傷脾胃。大便泄。乳食不化。為溼多風少。痲時俯時多。為病在陽明。故此症以脾胃為主。議補中益氣法。溼下行。內用風藥。領邪外出。

初三日 寒溼柔症。昨用升陽益氣法。從陽明提出太陽。茲精神倍昔。顏色生動。舌上白濁化淨。大便已實。甚為可喜。但症家有痰者難治。

人參三分 桂枝二分 茯苓塊三錢 白朮一錢
 葛根二分 山藥一錢 炙甘草五分 生苡仁錢半
 焦白芍一錢

初四日 症家自汗。有痰者難治。刻下且住脾胃。從脾胃中立以條連四肢。是久症一定之至理。若鏤治其症。是速之也。

人參三分 廣皮三分 桂枝二分 茯苓塊一錢
 焦於朮八分 煨肉果三分 生苡仁一錢 炙甘草八分
 訶子肉五分 茅朮炭六分

初五日 症家為苦寒所傷。脾陽下陷。又有痰者。其症萬萬不能即愈。謹護中陽。勿

吳鞠通醫案 卷五 症 四六

初七日 脈仍不數。大便猶溏。但舌苔微黃。神氣漸復。不似前虛寒太甚之象。宜退剛藥。少進柔藥。醫經謂上守神。粗守形。兵法謂見可而進。知難而退。此之謂也。

人參三分 麥冬一錢 茯苓一錢 整蓮子一錢
 於朮一錢 白芍一錢 炙甘草七分 陳皮炒四分
 生苡仁錢半 整蓮子一錢 麥冬一錢 厚樸五分
 茯苓一錢 焦神曲八分 木香四分 廣皮炭五分

初九日 諸證漸退。神氣亦佳。但舌上復起重濁之白苔。乳溼之過。暫停參藥。且用疏補法。

致虛脫為要。非深讀錢仲陽、陳文仲、薛立齋、葉天士之書者。不知此恙。

人參四分 訶子肉六分 白芍二錢 於朮一錢
 桂枝三分 廣木香四分 茯苓一錢 煨肉果六分
 廣皮炭三錢 炙甘草八分 苡仁錢半

吳鞠通醫案 卷五 症 四六

吳鞠通醫案 卷五 症 四七

吳鞠通醫案 卷五 症 四八

吳鞠通醫案 卷五 症 四九

吳鞠通醫案 卷五 症 五〇

吳鞠通醫案 卷五 症 五一

吳鞠通醫案 卷五 症 五二

吳鞠通醫案 卷五 症 五三

吳鞠通醫案 卷五 症 五四

吳鞠通醫案 卷五 症 五五

張十三歲 脈沈細而弱。舌苔白滑。幼童體厚。純然溼邪。致症一年有餘。

蒼朮炭三錢 雲苓皮五錢 川椒炭三分 白朮一錢
 生苡仁六錢 廣皮三錢 桂枝三錢

初八日 症發來漸稀。效不更方。

十六日 脈至沈至細至緩。舌白滑甚。溼氣太重。故效而不愈。於前方中加劫溼而通補脾陽之草果。調和營衛之桂枝。白芍。甘草。

二十一日 症脈脈沈細。舌白滑。與溼淡法。發來漸稀。未得除根。於前方內去剛燥。加化痰。

桂枝四錢 苡仁五錢 半夏六錢 白芍三錢
 益智子二錢 炙甘草一錢 廣皮三錢 雲苓五錢
 薑汁三匙

吳鞠通醫案 卷五 症 四七

吳鞠通醫案 卷五 症 四八

吳鞠通醫案 卷五 症 四九

吳鞠通醫案 卷五 症 五〇

吳鞠通醫案 卷五 症 五一

吳鞠通醫案 卷五 症 五二

吳鞠通醫案 卷五 症 五三

吳鞠通醫案 卷五 症 五四

吳鞠通醫案 卷五 症 五五

吳鞠通醫案 卷五 症 五六

吳鞠通醫案 卷五 症 五七

吳鞠通醫案 卷五 症 五八

七月初一日

炙甘草六錢 麥冬八錢 直大生地八錢 生龍甲五錢
阿膠三錢 麻仁三錢 犀角五錢 生白芍五錢
邪少虛多用復脈已當但舌上黑苔未化宿糞未見兼加潤法
生白芍六錢 炙甘草四錢 麥冬六錢 直大生地八錢
阿膠三錢 麻仁五錢 犀角五錢 生龍甲六錢
元參二兩

初五日

交成三杯分三次服
服前藥五帖見宿糞碗許黑苔已化但神識尚未十分清楚用三加復脈
加犀角即於三甲復脈湯內加

初八日

神識仍未清楚湯藥照前間服牛黃丸三九
燥氣化火壯熱舌黃脈數瘧瘕而厥法宜清涼解肌切忌發表

陳三歲
九月初六日

薄荷二錢 羚羊角三錢 杏泥四錢 連翹六錢
銀花八錢 丹皮三錢 生甘草二錢 牛蒡子三錢

吳鞠通醫案 卷五 瘧疾

四九

吳鞠通醫案 卷五 瘧疾

五〇

十七日

共為粗末分五包一時許服一包蓋根湯煎去渣服
燥氣化火身壯熱渴甚於前方內加煨石膏炒知母麥冬去牛蒡薄荷丹
皮羚羊

岳八個月
六月初十八日

煨石膏五錢 炒知母錢半 麥冬二錢 細生地二錢
銀花二錢 連翹二錢 苦桔梗一錢 生甘草八分
杏仁一錢 黃芩一錢
未及歲之兒痘毒頭腫癰癢而厥壯熱氣促脈極數大恐真陰不勝陽邪
先以普濟消毒飲宣毒外出必去升麻柴胡之直升少陽陽明者加犀角
羚羊瀉心膽之熱
連翹六錢 大力子六錢 薄荷二錢 人中黃二錢
苦桔梗三錢 芥穗二錢 元參五錢 馬勃三錢
天蟲三錢 銀花六錢 鮮荷葉一張 鮮蘆根一兩煎
共為細末分八包一時許服一包

吳三歲
六月初九日
尹十五歲

犀角四錢 羚羊角四錢另包
於前藥每包加五分同煎
辰刻以跌撲驚後癰瘕至戌正始醒醒後身大熱口渴脈數舌無苔用復
脈湯六帖熱退脈靜又服二帖而安
卒中暑風癰瘕口歪四肢抽掣頭微痛與清少陽膽絡法
羚羊角 連翹 生甘草 桑葉
薄荷 苦桔梗 茶菊 銀花
勾藤 丹皮

五百

痘後餘邪入少陽陽明二絡但唇口與眼皮癢致飲食不能收合每從
口張時隨落出四肢不掣與清二經之絡法

苦桔梗 丹皮 連翹 生甘草
細生地 銀花 桑葉 麥冬
鉤藤 刺藜 茶菊

吳鞠通醫案 卷五 癰瘕

五一

吳鞠通醫案 卷五 食積

五二

先服湯藥數帖後以三十帖作散每日早晚中三次各服二錢服至半年
方愈

食積

金男 幼孩手心熱舌苔厚濁嘔吐食積也法當和胃而醒脾宜降不宜升
四歲 藜蘆 二錢 焦穀 錢半 白豆蔻 錢半 夏 二錢
雞內金 一錢 廣皮炭 一錢 苡仁 二錢 厚樸 錢半
煨薑 二錢

十三日

熱退脈平以調理脾胃為主
白朮 二錢 廣皮炭 六分 白扁豆 一錢 茯苓 三錢
神 二錢 半 夏 一錢 厚樸 六分 山藥 一錢

二十三日

泄久脾虛將成滯下
厚樸 二錢 生苡仁 三錢 廣皮炭 錢半 焦神 二錢
雲苓塊 二錢 益智仁 五分 廣木香 八分 雞內金 二錢

陶乙酉七月初二日

黃芩炭八分 焦白芍一錢
幼童手心熱甚。舌微黃。身微熱。體瘦。神不足。防成疳疾。與疏補中焦兼之消食。

生苡仁三錢 厚樸八分 焦神麩二錢 廣皮炭一錢
雞內金一錢 雲苓塊三錢 益智仁七分

煮二小杯。分三次服。三帖而愈。
疳疾已久。若不急講調理飲食。則不可為矣。用藥以疎補中焦立法。

孫九歲 丁亥七月二十日 五日

脈大浮取弦數。脾虛食滯。疳疾將成。大便頻仍。面腫腹大。與溫宣中焦法。
益智仁錢半 黃芩炭錢半 橘皮二錢 茯苓皮三錢
神麩三錢 半夏三錢 苡仁四錢 薤仁一錢

大便後見血。乃小腸寒溼。加黃土湯法。
於前方內。去薤仁。加蒼朮炭三錢 熟附子二錢 中黃土四錢

吳鞠通醫案 卷五 食積 五三 五四
再服三帖。

殞泄

泄久傷脾。恐成柔痙。俗所謂慢脾風。議疏補中焦。

章男 十一個月 六月十三日

扶苓塊三錢 厚樸一錢 煨肉果一錢 苡仁三錢
扁豆二錢 蓮子三錢 廣皮炭八分 芡實錢半
木香五分

十四日 仍用通補而進之。

人參五分 厚樸八分 煨肉果一錢 茯苓塊二錢
廣皮炭八分 木香七分 苡仁二錢 薑梗八分
焦神麩八分 白扁豆三錢 半夏二錢 小茴香一錢

十六日 疏補中焦。業已見效。仍不能外此法。

人參五分 厚樸八分 煨肉果錢半 苡仁三錢
茯苓三錢 煨肉果錢半 苡仁三錢 扁豆三錢

十七日 神氣聲音稍健。皮熱亦覺平和。大有起色。但積虛且晚可充。
葷梗八分 廣皮炭八分 焦於朮一錢
人參五錢 蓮子二錢 肉果霜錢半 茯苓三錢
半夏二錢 木香八分 白扁豆炒二錢 廣皮錢半

十八日 舌有黃苔。小便色黃。微有積。皆脾虛不運之故。且暫停參藥。加宣絡法。
山藥錢半 厚樸一錢 煨肉果一錢 半夏二錢
茯苓三錢 白朮二錢 蓮子去心 木香七分
雞內金一錢 生於朮一錢 廣皮炭八分

十九日 大便有不化形。思乳食。為血肉有情。應於疏補之中。加消血肉積者。
生苡仁三錢 查炭一錢 廣皮炭一錢 茯苓塊三錢
雞內金炒一錢 范蠡炭八分 木香七分 川樸錢半
煨肉果一錢 生苡仁三錢

二十日 脾虛火衰。則食物有不化之形。肝腎與衝脈伏寒。怒甚則疝痛。
白朮仁三分 生苡仁三錢

吳鞠通醫案 卷五 食積 五五 五六

小茴香二錢 生苡米三錢 木香一錢 黑查炭錢半
煨肉果錢半 製茅朮一錢 茯苓一錢 廣皮炭八分
白朮仁五分 青皮六分 烏藥八分

二十二日 補下通中。
小茴香炒錢半 生苡仁錢半 人參三分 查炭八分
煨肉果一錢 茯苓三錢 製茅朮八分 白朮仁五分
木香六分

張男 八個月
泄瀉四五日。暑邪深入下焦。頭熱如火。手冷如冰。謂之暑厥。羸瘦難堪。脈遲緊。未必得愈。姑立方以救之。先與紫雪丹五分。三次服。

豬苓二錢 製蒼朮一錢 澤瀉一錢 茯苓二錢
桂枝木一錢 廣皮炭七分 白扁豆一錢 木香七分
略有轉機。然終可畏也。

豬苓二錢 白扁豆炒錢半 澤瀉錢半 半夏錢半
生苡仁三錢 廣木香八分 茅朮炭一錢 厚樸六分

孟十五歲
八月初八日

廣皮炭五分
伏暑泄瀉。加以停食。欲瀉腹痛。瀉後痛減。防成滯下。與五苓散加消食。脈細弦而緩。

桂枝三錢 雲苓皮五錢 查炭二錢 蒼朮炭三錢
神麴四錢 小枳實二錢 猪苓三錢 廣皮炭四錢
川椒炭二錢 澤瀉三錢
一月後復診。病已大愈。善後方與調和脾胃。

咳嗽

郭男
八歲
癸亥七月十一日

咳而嘔。胃咳也。痰涎壅塞。喘滿氣短。
半夏三錢 小枳實一錢 陳皮一錢 杏仁二錢
蘇梗二錢 生苡仁三錢 生薑二錢 茯苓三錢
即於前方內加
苦葶子三錢 半夏二錢 蘇子二錢

吳鞠通醫案 卷五 咳嗽

五七

吳鞠通醫案 卷五 咳嗽

五八

二十日

去蘇梗再服二帖。
小兒脾虛。溼重胃咳。
葶半夏六錢 焦麴二錢 小枳實錢半 杏仁三錢
旋覆花三錢 蘇子霜錢半 茯苓三錢 生白扁豆三錢
生苡仁五錢 生薑汁三錢
即於前方內加
廣皮二錢 杏仁二錢 蘇子霜錢半 去神麴

十帖

吳三歲
八月初五日
文四歲
周女十歲
劉十歲

三幼孩連咳數十聲不止。八歲者且紐。與千金葶藶湯。加苦葶藶子三錢。有二帖愈者。有三四帖愈者。第三四帖減葶藶之半。紐者加白茅根五錢。幼孩嗜咳。數日不止。百藥不效。用千金葶藶湯。加苦葶藶二帖而愈。春風嗜咳。醫用麻黃向外發法。又用訶子白果百合向內收。以致嗜不可解。吐出者皆血沫。用金沸草湯。三帖而愈。
三月間春溫。嗜咳見吐。現在六脈弦細。五更丑寅卯時。單聲咳嗽甚。謂之

十七歲
乙酉五月四日

木扣合。鳴風本生於木也。譙辛甘化風。甘涼柔木。
苦桔梗三錢 連翹三錢 銀花二錢 甘草二錢
薄荷一錢 鮮蘆根三錢 桑葉三錢 麥冬三錢
細生地三錢 茶菊三錢 天冬一錢

二十日
六月初二日

咳嗽減。食加。脈猶洪數。左大於右。效不更方。再服四五帖。
木扣金鳴。與柔肝清肺已效。左脈洪數已減。與前方去氣分辛藥。加甘潤。
沙參三錢 玉竹三錢 麥冬三錢 冰糖三錢
風溫夾痰飲喘咳。肚熱太甚。勢甚危急。勉與宣肺絡。清肺熱法。
生石膏二錢 杏仁五錢 黃芩三錢 苦葶藶三錢
蘆根五錢

李女
四歲
己酉二月十日

風溫夾痰飲喘咳。肚熱太甚。勢甚危急。勉與宣肺絡。清肺熱法。
生石膏二錢 杏仁五錢 黃芩三錢 苦葶藶三錢
蘆根五錢

十二日

風溫夾痰飲喘咳。
生石膏二兩 杏仁四錢 冬瓜仁三錢 蘆根五錢
茯苓皮三錢 苦葶藶錢半
煮三小杯。分三次服。服二帖。燒熱退。

吳鞠通醫案 卷五 咳嗽

五九

吳鞠通醫案 卷五 咳嗽

六〇

吳二十歲
甲子四月二十四日

六脈弦勁。有陰無陽。但嗽無痰。且清上焦氣分。
桑葉三錢 生扁豆三錢 玉竹三錢 冰糖三錢
麥冬三錢 沙參三錢 杏仁三錢 連翹錢半
茶菊三錢
四帖。
於前方內。去連翹。加
丹皮二錢 地骨皮三錢

陳四十歲
丙戌四月十三日

咳嗽起於前年九月。夏傷於溼。伏暑遇新涼而發之咳。症本不大。後因誤補封固。邪已難出。又用桑皮末用地骨引邪入腎。按腎為封藏之臟。誤入者永難再出矣。身熱得補藥汗解。而足心之熱總不解。是其確證也。現在咳而嘔。六脈弦細而數。陰陽兩虛也。勉照胃咳方法。先能得穀。建立中焦。假如胃旺。或有生機。常吐血一二口。中有瘀滯。亦係久病絡傷。季脅作痛。肝經部分應加宣絡降氣。
葶半夏六錢 蘇子霜錢半 桃仁三錢 雲苓可入錢至兩許

降香末二錢

廣皮炭三錢

薑汁三小匙

痰三杯分三次服。此症揚湯止沸而已。斷難釜底抽薪。

陳十六歲

少年而體質本弱。六脈弦細而軟。五更咳嗽。時而吐血。應照陽虛夾飲吐血論治。又勞者溫之治法。與小建中湯加茯苓半夏。

白芍六錢

薑半夏三錢

生薑三片

桂枝四錢

雲苓五錢

膠飴化入

炙甘草三錢

大棗去核

多服為妙。

某十三歲

五更空咳。木叩金鳴。本用柔藥柔肝。茲兩脅痛。中有怒鬱滯。法當活絡。

新絳紗三錢

蘇子霜二錢

廣皮二錢

旋覆花三錢

降香末二錢

薑半夏五錢

歸脾三錢

鬱金二錢

青皮錢半

香附三錢

頭痛

趙氏

六脈弦而遲。沉部有浮部無。顛項痛甚。下連太陽。陽虛內風眩動之故。

吳鞠通醫案 卷五 頭痛

六一

吳鞠通醫案 卷五 頭痛

六一

桂枝六錢

白芍三錢

生薑六錢

炙甘草三錢

川芎一錢

全當歸二錢

生薑五錢

大棗三枚

膠飴化入

辛甘為陽一法也。辛甘化風。二法也。兼補肝經之正。三法也。服二帖。陽虛頭痛愈後用者建中。

初十日

白芍六錢

桂枝四錢

生薑三片

生薑五錢

炙甘草三錢

大棗三枚

膠飴化入

寺

少陽頭痛。本有損一目之弊。無奈盲醫不識。混用辛溫。反助少陽之火。甚至有用附子雄烈者。無奈乎醫者盲。致令病者亦盲矣。况此病由於伏暑發熱。瘧久不愈。抑鬱而起。肝之鬱勃難伸。肝愈鬱而膽愈熱矣。現在仍然少陽頭痛未罷。議仍從少陽膽絡論治。

桑葉三錢

茶菊三錢

羚羊角三錢

青箱子二錢

鉤藤二錢

丹皮三錢

麥冬五錢

麻仁三錢

桔梗三錢

生甘草錢半

刺蒺藜五錢

苦丁茶一錢

陳三十三歲

少陽風動。又襲外風為病。頭偏左痛。左脈浮弦而數。大於右脈一倍。最有損一目之弊。議急清膽絡之熱。用辛甘化風方法。

乙丑二月二十日

羚羊角三錢

茶菊三錢

桑葉三錢

苦桔梗三錢

生甘草一錢

丹皮五錢

青箱子二錢

薄荷二錢

刺蒺藜二錢

鉤藤二錢

水五杯。煮取兩杯。分二次服。渣再煎一杯服。日二帖。

二十五日

木賊錢半

蕤仁三錢

減薄荷錢四

頭痛眼蒙甚

初八日

於前方內加

蕤仁 麥冬 白茅根

章四十三歲

血之因。由於熱行清道。法當以清輕之品。清清道之熱。無奈所用皆重藥。至頭偏左痛。乃少陽膽絡之熱。最有損一目之患。豈熱地桂附鹿茸所可用。悖謬極矣。無怪乎深痼難拔也。勉與清少陽膽絡法。當用羚羊角散。

吳鞠通醫案 卷五 頭痛

六三

吳鞠通醫案 卷五 頭痛

六三

吳鞠通醫案 卷五 頭痛

六三

吳鞠通醫案 卷五 頭痛

六三

以無羚羊。故不用。

苦桔梗一兩

苦丁茶三錢

連翹八錢

甘草四錢

鉤藤六錢

銀花八錢

桑葉一兩

丹皮八錢

薄荷二錢

茶菊五兩

白蒺藜一錢

共為細末。每服二錢。日三次。每服白扁豆花湯調。外以豆腐漿一擔。熬至碗許。攤貼馬刀患處。以化淨為度。必須鹽瀉點之。做豆腐水。並非可吃之豆腐漿。

附有一人。素有肝鬱痰火。項間致成馬刀。外用蒲黃夏布貼患處。內服元參貝母牡蠣為丸。百日收功。

復診症小效。脈尚仍舊。照前清少陽膽絡方。再服二三帖。俟大效後再議。此時無扁豆花為引。改用鮮荷葉煎湯為引。亦可。少陽熱誤用峻補。

陽氣。以致頭目左半麻木發癢。耳後癰腫。發為馬刀。現在六脈沈洪而數。頭目中風火相扇。前用羚羊角散法。雖見小效。而不能大愈。議加一煎方。暫清腦戶之風熱。其散方仍用勿停。

二十七日

五月初二日

苦桔梗 側柏葉炭 荷葉邊餅一枚 辛 莖
 生 苓 黑山梔五錢 去之 蒼耳子炒 桑 葉
 連 翹蓮心 茶 菊
 六月 初 細閱病狀。由少陽移於陽明。加
 三日 生石膏一兩 知 母三錢 葛 根三分

十二日 偏頭痛係少陽膽絡病。醫者誤認為虛。而用鹿茸等峻補其陽。以致將少
 陽之熱。移於陽明部分。項腫牙痛。半邊頭臉腫痛。目白睛血赤。且閉不得
 開。如溫毒狀。舌苔紅黃。六脈沈數有力。議與代賑普濟散。急急兩清少陽
 陽明之熱毒。

十六日 代賑普濟散十包。每包五錢。用鮮蘆根煎湯。水二杯。煮成一。去渣先服
 半杯。其下半杯。噙化。得涎涎即吐之。一時許再煎一包。服如上法。
 舌黃更甚。脈猶數。腫未全消。目白睛赤。自下而上。其名曰倒垂。治在
 陽明。不比自上而下者。治在太陽也。
 代賑普濟散。每日服五包。嚥下大半。漱吐小半。每包生石膏三錢。煎成一

吳鞠通醫案 卷五 頭痛 六五
 吳鞠通醫案 卷五 頭痛 六六

十八日 小碗。服二日。外以不去心麥冬一兩。分二次煎。代茶。
 今日偏頭痛甚。且清少陽之絡。其消腫之普濟散加石膏。午前服一包。餘
 時服此方。三次三杯。

羚羊角一錢 丹 皮一錢 銀 花一錢 犀 角八分
 茶 菊一錢 刺 蒺藜六分 凌 霄花一錢 鈎 藤六分
 苦 桔梗八分 桑 葉一錢 連 翹一錢 生 甘 草四分
 兩杯半水。煎一杯。頓服之。日三帖。
 大便結。加元參二錢。糖則去之。

二十日 經謂脈有獨大獨小。獨浮獨沈。斯病之所在也。茲左關獨大。獨浮。膽陽太
 旺。清膽絡之藥。已服過數十帖之多。而膽脈尚如是之旺。絡藥清輕上浮。
 服至何日是了。議膽無出路。借小腸以為出路。小腸火腑。非苦不通。暫與
 極苦下奪法。然此等藥可暫而不可久。恐化燥也。

洋 蘆 薈 二 錢 龍 膽 草 三 錢 胡 黃 連 二 錢 真 雅 連 二 錢
 麥 冬 五 錢 丹 皮 五 錢 秋 石 一 錢

二十六 前方服二帖。左關獨大。獨浮之脈已平。續服羚羊角散一天。代賑普濟散
 一天。目之赤。大退。其耳後之馬刀。堅硬未消。仍服代賑普濟散。日四五
 次。

初九日 服前藥。喉嚨較前清亮。舌苔之黃濁。去其大半。脈漸小。仍數。裏症日輕。是
 大佳處。外症以水仙膏。拔出黃疔少許。毒氣仍未化透。仍須急急再敷。務
 期拔盡。方妙。至於見功。遲緩。乃前此誤用峻補之累。速速解此重圍。非且
 晚可了。只好寧耐性情。寬限令其自化。太緊恐致過剛則折之虞。前羚羊
 角散。每日午前服一帖。午後服代賑散四包。分四次。再以二三包煎湯。漱
 口。以護牙齒。

十七日 數日大便不爽。左脈關部復浮。瘡口痛甚。再用極苦以瀉小腸。加芳香活
 絡定痛。

吳鞠通醫案 卷五 頭痛 六七
 吳鞠通醫案 卷五 頭痛 六八

十八日 馬刀雖潰。少陽陽明之熱毒未除。兩手關脈獨浮。氣大旺。於清少陽陽明
 絡熱之中。兼疏肝鬱。軟堅化核。

苦 桔 梗 三 錢 桑 葉 三 錢 海 藻 二 錢 銀 花 三 錢
 丹 皮 五 錢 凌 霄 花 三 錢 連 翹 三 錢 生 香 附 三 錢
 夏 枯 草 三 錢 茶 菊 三 錢

二十五 馬刀以誤補太重而成。為日已久。一時未能化淨。以畏疼停止水仙膏之
 故。舌上白苔。浮面微黃。其毒尚重。現在胃口稍減。木來尅土之故。於前方
 加宣肝鬱。

苦 桔 梗 二 錢 桑 葉 三 錢 香 附 二 錢 銀 花 三 錢
 丹 皮 炭 三 錢 連 翹 三 錢 鬱 金 二 錢 茶 菊 三 錢

仍以代販普濟散。漱口勿嚙。
二十八日 肝鬱誤補。結成馬刀。目幾壞。現在馬刀已平其半。目亦漸愈。脈之數者已平。惟左關獨浮。其性甚急。肝鬱總未能降。胃不甚開。胸中飯後覺痞。舌白滑微黃。皆木旺尅土之故。敗毒清熱之涼劑。暫時停止。且與兩和肝胃。

新絳紗三錢 蘇半夏三錢 歸 鬚二錢 旋覆花三錢
廣皮炭二錢 降香末三錢 蘇子霜三錢 丹 皮三錢

八月初九日 少陽相火。誤補成馬刀。原應用涼絡。奈連日白苔太重。胃不和。暫與和胃。現在舌苔雖化。納食不旺。而嘔未可用涼。恐傷胃也。於前方減其治。

丹 皮三錢 生薑汁三匙 旋覆花三錢
新絳紗三錢 黃芩炭二錢 半 夏五錢

初六日 仍用普濟散漱口。於前方內去黃芩。加

香 附三錢 廣皮炭二錢

吳鞠通醫案 卷五 頭痛 六九

初八日 肝移熱於腦下。為鼻淵。則鼻塞不通。甚則衄血。議清腦戶之熱。以開鼻塞。兼宜少陽絡氣。外有馬刀故也。

蒼耳子烟三錢 連 翹二錢 桑 葉三錢 辛 夷烟去毛
銀 花二錢 茶 菊三錢 疏肝鬱。加 蘇半夏二錢

十二日

加旋覆花三錢 止嘔。馬刀已出大膿。左脅肝鬱作痛。痛則大便。日下六七次。其色間黃間黑。時欲嘔。有大痰泄之象。與兩和肝胃。

旋覆花三錢 蘇半夏四錢 薑 汁三匙 絳 紗三錢
真降香末三錢 香 附三錢 歸 鬚二錢 黃 芩二錢
鬱 金二錢 焦白芍三錢 廣皮炭三錢

十九日

外症未除。內又受伏暑成痢。舌白苔黃滑。小便不暢。大便五七次。有黑有白。便又不多。非積滯而何。不惟此也。時而嘔水與痰。胃又不和。內外夾攻。何以克當。勉與四苓合苓芍法。

二十四日 病由膽而入肝。客邪已退。所見皆肝膽病。外而經絡。內而臟腑。無所不病。初診時即云深痼難拔。皆誤用大熱純陽之累。所謂雖有善者。亦無如之何矣。再勉與瀉小腸以瀉膽火法。

真雅連三錢 連 翹三錢 烏 梅三錢 龍膽草三錢
黃 芩三錢 半 夏三錢 桑 葉三錢 竹 茹三錢

二十六日

脈少大而數。加 苦桔梗三錢 雲苓皮三錢 銀花三錢

二十九日

脈仍數。肝膽俱病。不能純治一邊。連 翹三錢 麥 冬三錢 雅 連五錢 銀 花三錢
黃 芩六分 烏 梅三錢 桑 葉三錢 半 夏三錢

吳鞠通醫案 卷五 頭痛 七一

九月十日

前方服十一帖。胃口大開。舌苔化盡。肝氣亦漸和。惟馬刀核未消盡。鼻猶塞。唇猶強。變經為軌。脈弦數。大便黑。又於原方內去護土之剛藥。加入腦戶之絡藥。蓋由風熱蟠聚於腦戶。故鼻塞而衄。或軌。誤補而邪不得出也。

苦桔梗三錢 蒼耳子三錢 烏 梅三錢 人中黃三錢
辛 夷三錢 茶 菊三錢 連 翹三錢 黃 芩二錢
麥 冬五錢 銀 花三錢 真雅連一錢 桑 葉三錢
龍膽草一錢

十九日

閱來札前方服七帖。脾胃之火太甚。議於原方加生石膏一兩。杏仁二錢。開天氣以通鼻竅。清陽明以定牙痛。如二三帖不效。酌加石膏。漸至二兩。再敷水仙膏以消核之未盡。

二十八日

右脈洪大而數。渴欲飲水。牙牀腫甚。陽明熱也。於前方內加石膏一兩。共二兩。銀花五錢。共八錢。桑葉二錢。共五錢。如服三五帖後。腫不消。加石膏至四兩。

富氏 顛頂一點痛。畏燈光日光如虎。脈弦細微數。此厥陰頭痛也。與定風珠三劑而愈。
何氏 陽虛頭痛。背惡寒。脈弦緊甚。與黃耆建中。加附子三帖而痛減。脈稍和。又每日服半帖。四日而愈。

胃痛

伊氏 脈弦急。脅脹攻心痛。痛極欲嘔。甫十五日而經水暴至甚多。幾不能起。不欲食。少腹墜脹而痛。此怒鬱傷肝。暴注血海。肝厥犯胃也。議胞宮陽明同治法。蓋金匱謂胞宮累及陽明。治在胞宮。陽明累及胞宮。治在陽明。茲因肝病下注胞宮。橫穿土位。兩傷者兩救之。仍以厥陰為主。雖變金匱之法。而實法金匱之法者也。

- 製香附三錢 烏藥二錢 半 夏五錢 艾炭三錢
- 鬱金二錢 黃芩炭一錢 小茴炭二錢 血餘炭三錢
- 青皮八分 五靈脂錢半

吳鞠通醫案 卷五 胃痛

七三

吳鞠通醫案 卷五 胃痛

七四

二十九日 五杯水。煎兩杯。分二次服。二帖大效。
金匱謂胞宮累及陽明。則治在胞宮。陽明累及胞宮。則治在陽明。茲肝厥既克陽明。又累胞宮。必以厥陰為主。而陽明胞宮兩護之。

- 製香附三錢 淡吳萸二錢 半 夏五錢 草薢二錢
- 川棟子三錢 艾炭錢半 小茴香三錢 烏藥二錢
- 黑梔子三錢 桂枝三錢 杜仲炭二錢

伊氏 脈雙弦而細。肝厥犯胃。以開朗心地要緊。無使久而成患也。
半 夏六錢 青皮錢半 生薑片大 廣皮錢半
淡吳萸二錢 烏藥二錢 川椒炒黑 鬱金二錢
川棟子皮二錢 降香末三錢

水五杯。煮取兩杯。二次服。三帖。

王氏 肝厥犯胃。濁陰上攻。萬不能出通陽泄濁法外。但分輕重耳。前三方之所以不大效者。病重藥輕故也。茲重用之。

初四日 川椒炭五錢 夏薑五錢 小枳實三錢 川樸三錢
半 夏五錢 烏藥三錢 淡吳萸五錢 雲連一錢

初六日 重剛劫濁陰。業已見效。當小其製。
川椒炭三錢 夏薑三錢 烏藥二錢 半 夏三錢
小枳實三錢 青皮二錢 廣皮錢半 厚樸二錢
甘瀾水八碗。煮取三碗。分六次。二帖。

車 脈沉弦而緊。嘔而不渴。肢逆且麻。濁陰上攻厥陰。尅陽明所致。急宜溫之。
烏藥三錢 半 夏五錢 淡吳萸五錢 川椒炭三錢
川樸三錢 乾薑三錢 草薢二錢 小枳實三錢
青皮二錢 頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。

脾胃

吳鞠通醫案 卷五 脾胃

七五

吳鞠通醫案 卷五 脾胃

七六

許 脈弦而緊。弦則木旺。緊則為寒。木旺則土衰。中寒則陽不運。土衰而陽不運。故吞酸噯氣。不寐不食。不飢不便。九竅不和。皆屬胃病。濁陰蟠踞中焦。格拒心火。不得下達。則心熱如火。議苦辛通法。
小枳實三錢 淡吳萸三錢 半 夏一兩 真雲連二錢
生苡仁五錢 廣皮二錢 厚樸三錢 生薑片大

二十四日 甘瀾水八碗。煎成三碗。分三次服。渣再煎一碗服。
六脈陽微。濁陰蟠踞。不食不飢。不便。用和陽明兼驅濁陰法。今腹大痛。已歸下焦。十餘日不大便。肝病不能疏泄。用驅濁陰通陰絡法。又苦辛通法。兼以濁攻濁法。

- 淡吳萸三錢 小枳實二錢 川棟子三錢 小茴香三錢
- 雄鼠糞三錢 廣皮錢半 烏藥一錢 夏薑二錢
- 川樸三錢 檳榔二錢

以得通大便為度。
服以濁攻濁法。大便已通。但欲便先痛。便後痛減。貫之絡中宿積未能通

二十七

清。臍上且有動氣。又非湯藥所能速攻。攻急恐有瘵散為蠱之餘。議化瘵
回生丹。緩攻為妙。

脈沈緊為裏寒。木旺土衰。濁陰上攻。腹拘急時痛。背脹。腰痛。宜苦辛通法。
兼醒脾陽。

某

白蔻仁一錢 官桂一錢 川樸二錢 半夏三錢
生苡仁三錢 葶藶一錢 蘇梗三錢 木香八分
生香附三錢 廣皮錢半 鬱金二錢 烏藥二錢
脈弦細而緊。濁陰上攻。胸痛。用辛香疏氣法。

淡吳萸三錢 小枳實二錢 木香一錢 川樸二錢
川棟子三錢 廣皮二錢 檳榔錢半 蘇梗二錢
烏藥二錢 夏薑三錢 蘇梗二錢

三帖。

初八日

補火生土。兼泄濁陰。

淡乾薑二錢 半夏三錢 淡吳萸二錢 烏藥二錢

吳鞠通醫案 卷五 脾胃 七七

吳鞠通醫案 卷五 脾胃 七八

茯苓塊三錢 生苡仁三錢 廣皮錢半 益智仁錢半
四帖。

李 十三歲
五月十四日

六脈俱弦。不浮。不沈。不數。舌苔白滑。不食。不飢。不便。不寐。九竅不和。皆屬
胃病。臥時自覺氣上阻咽。致令臥不着席。此肝氣之逆也。額角上有蟲斑。
神氣若昏。目閉不欲開。視不遠。醫云有蟲。亦復有理。與兩和肝胃。如再不
應。再議治蟲。

半 夏一兩

旋覆花五錢

稀米一合

二十日

六腑不通。九竅不和。醫者不知六腑為陽。以通為補。每見其二便閉也。則
以大黄萸仁寒藥下之。以後非下不通。屢下屢傷。遂致神氣若昏。目閉不
開。脈弦緩而九竅愈不通矣。已成壞症。勉與通陽。

廣皮三錢

川樸三錢

白蔻仁二錢

半夏三錢

大腹皮三錢

雞內金二錢

雲苓皮三錢

益智仁二錢

二十三日

六腑閉塞不通。有若否卦之象。按否之得名。以坤陰長陽消之候。將來必
致上下皆坤而後已。坤為腹。故腹大無外。坤為純陰。初爻變震為復。然則

欲復其陽。非性烈如震者不可。豈大黃等陰寒藥所可用哉。
天台烏藥散二錢。加巴豆霜二分。和勻分三分。先服一分。候五時不便。再
服第二分。得快便即止。

服一次於五時得快便。宿物下者甚多。目閉已開。神氣亦清。稍食粥飲。知
頑笑矣。

二十四日

六腑不通。溫下後大便雖通。而小便仍然未解。心下窒塞。不肌不食。六腑
弦遲。急急通陽為要。與開太陽陽明法。

二十五日

川椒炭三錢 澤瀉三錢 公丁香一錢 半夏五錢
廣皮三錢 猪苓三錢 雲苓皮五錢 夏薑二錢
安南桂一錢

安南桂一錢

猪苓三錢

雲苓皮五錢

夏薑二錢

公丁香一錢

六月初一日

大便已能自解。胃能進食。是陽關已闔。惟小便不通。是太陽不開。與專開
太陽。

桂枝三錢

雲苓皮五錢

猪苓三錢

安南桂錢半

澤瀉三錢

滑石三錢

蒼朮炭二錢

砂三錢

吳鞠通醫案 卷五 脾胃 七九

八〇

以小便清為度。復三杯。分三次服。以小便通為度。若小便已通。而尚渾濁者。再服一帖。

初六日

服前方二帖。小便暫通。連日大小便復閉。大便閉已七日。自覺胃中痞塞。
臉上蟲斑未退。議用前配成之烏藥散再服四分。如二便俱通。即停藥。統
俟初八日清晨再商。如大便通一次。而小便不通。或竟不通。明日再服三
分。若大便二三。而小便仍不通者。即勿服。

初八日

服烏藥散四分。內巴霜四厘。已得快便。今早且能自行小便。六腑俱通矣。
只與和胃。今能進食。可以收功。蓋十二經皆取決於膽。皆秉氣於胃也。

半 夏三錢

雲苓塊四錢

益智仁一錢

廣皮炭二錢

生苡仁五錢

生薑五錢

慶賀

不食十餘日。諸醫不效。面赤脈洪。與五汁飲。降胃清陰法。兼服牛乳。三日
而大食矣。

梨汁

藕汁

蔗汁

蔗根汁



ZW 21101000784689

S

2121.5

15b(1028)


十八歲

溫熱愈後。午後微熱不除。脈弦數。面赤。五汁飲三日。熱退。進食。七日全愈。

續修四庫全書 子部 醫家類

吳鞠通醫案終

吳鞠通醫案 卷五 脾胃



八