


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇〇二・子部・醫家類

太醫院經驗奇效良方大全六十九卷（卷五十七至卷六十九）〔明〕方賢輯……………一

胞與堂丸散譜不分卷〔明〕洪基輯……………二二九

名醫方論四卷〔清〕羅美輯并評……………二七一

醫方集解六卷〔清〕汪昂撰……………三八一

成方切用十二卷首一卷末一卷（卷一至卷五）〔清〕吳儀洛撰……………五一五

夫眼者乃五臟六腑之精華如日月麗天昭明而不可掩者也
 內胞屬肝而中間黑瞳一點如漆者腎寶主之是隨五臟各有
 強想無論其所主則瞳子之關繫重焉何以言之目者肝之外
 候也肝取木腎取水水能生木子肝母腎焉有子母而能相離
 者故故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙眩暈為
 輪赤暈刺痛浮翳此肝熱也磨生清淚枯黃遠睛此肝虛也瞳
 人開大淡白徧斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎熱也一
 虛一實以此驗之然人知肝腎之氣相依而行孰知心者神之
 舍又所以為肝腎之副焉所謂一而二二而一者也何則心主
 血肝藏血血能生熱凡熱衝發於心皆當清心涼肝又不可固
 執水生木之說特服者輕膜累水滋陰四旁燥源反本非夫一
 之水又果執為之主宰乎折而論之則拘急牽蹙瞳青胞白癢
 而清淚不亦不疾是之謂風眼烏輪突起胞硬腫紅膠淚濕漿
 粟熱刺痛是之謂熱眼眼障而淚胞腫而軟上壅朦朧酸澁微
 赤是之謂氣眼其或風與熱并則癢而浮赤風與氣搏則癢澁
 昏沉血熱交聚故生淫層粟肉紅縷偷鍼之類氣血不至故有
 眦視胞垂雀眼盲障之形淡紫而隱紅者為虛熱鮮紅而垢赤
 者為實熱兩皆呈露生翳肉者此心熱血旺白睛紅膜如紙金
 者此氣滯血凝熱證瞳人內湧白睛帶濕色滯而赤也冷證瞳
 人青綠白睛枯槁氣沉而濁也眼熱經久復為風冷所乘則赤
 爛眼中不赤但為痰飲所注則作疼肝氣不順而挾熱所以羞
 明熱氣蓄聚而傷胞所以胞合吁此外證之大槩然爾且臟不
 可關一脾與肺獨無預何耶曰白睛帶赤或紅筋者其熱在肺

上胞下胞或目昏間如疥點者其熱在脾脾主味也五味之毒
 養諸中則精華發於外肺主氣也水火升降榮衛流轉非氣熱
 能使之前所謂五臟各有證應者於此又可推矣雖然眼之為
 患多生於熱其間用藥大抵以清心涼肝調血順氣為先有如
 腎家惡燥設遇虛證亦不過以當歸地黃葷潤養之輕用溫藥
 不可也况夫肺能發燥肝亦好潤古方率用杏仁乾柿飴糖砂
 蜜為佐果非潤益之意乎至於退翳一節尤關利害凡翳起於
 胎家受熱輕則朦朧重則生翳真珠翳狀如碎米者易散梅花
 翳狀如梅花者難消雖翳自熱生然治法先退翳而後退熱者
 與之涼藥過多又且滌之以水不反掌而水凝眼特一團水耳
 水坐清澄尤不可規規於點洗喜怒失節嗜慾無度窮役眼力
 位涕過傷凌寒衝風當暑冒日不避烟火飲啖熱多此皆患生
 於肝臟者也專事點洗可乎哉有能靜坐養神愛護目力故懷
 真慮心逸日休調和飲食以養之斟酌藥餌以平之明察秋毫
 斷可必矣

眼目通用方
 還睛補肝丸 治肝虛兩目昏暗衝風淚下

- | | | | |
|----|-------|-------|--------|
| 白木 | 細辛去苗 | 苦藜 | 決明子 微炒 |
| 人參 | 羌活去蘆 | 當歸切焙 | 白茯苓 去皮 |
| 苦參 | 防風 去叉 | 官桂 去粗 | 地骨皮 |
| 玄參 | 黃芩 去黑 | 五味子 | 車前子 微炒 |
| 菊花 | 青葙子 | 葶藶 炒 | |
- 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九加至四十
 丸不拘時米飲送下
- 鎮肝丸 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗障隱眩暈

開多眩暈淚怕日羞明時發腫赤或生翳障並皆治之

遠志去心 地膚子 羌葶子 白茯苓 素皮

防風去蠶 決明子 蔓荊子 人參 路二

山藥 青葙子 甘菊花 栝子仁 炒

甘草 炙 兩 細辛 一分 甘菊 花 車前子 兩

右為細末蜜水煮糊如梧桐子大每服三十九食後用

米湯送下日三服

遠志九 清心明目益肝退翳

遠志 水浸去心 車前子 白蒺藜 炒去

細辛 各七 全蠍 五枚 蟬殼 洗焙 熟地黃 洗焙

扶神 去木 川芎 人參 羌葶子

蘆薈 研 琥珀 生地黃 蔓荊子 各半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心用米

湯送下臨睡當蒲湯下

羌活散 鎮肝明目暴赤眼一切內外障翳

羌活 川芎 防風 旋覆花 各

楮葉 楮實 蟬退 蒼朮 米泔浸去

木賊 甘菊 桑葉 八月 味 耳草 已 兩 各

右為細末每服二錢茶清調下早晚食後臨卧各一服合

時不得犯鐵器及不得見火忌濕麵及酒諸熱毒物

青葙子丸 治肝虛積熱外障

青葙子 二兩 車前子 兔絲子 熟地黃

羌葶子 五味子 細辛 防風

人參 澤瀉 茯苓 兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心用茶

清送下

羊肝丸 鎮肝明目

羌活 甘菊花 細辛 栝子仁

官桂 五味子 白朮 兩 各 黃連 三分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三四十九食前用

溫水送下一方有地黃無栝子仁

地黃丸 一名菊花丸 治用力勞心肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸

生翳膜兼肝腎風毒熱氣上衝目痛又視傷血上主肝故

勤書則傷肝而目昏肝傷則目生風而熱氣上凌目昏亦

感不宜專服補藥當益血鎮肝而目自明矣

熟地黃 半 兩 甘菊花 防風 光明硃砂

羌活 桂心 沒藥 已 兩 各 決明子

黃連 兩 各 一

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食後熱水

下日三晉范審嘗苦目痛就張湛求方湛戲之曰古方未

陽子少得其術以授魯東門伯次授左丘明遂世世相傳

以及漢杜子夏晉左大冲凡此諸賢並有目疾得此方云

省讀書一減思慮二專內視三簡外觀四旦起晚五夜早

眠六凡六物焚以神火下以氣飾蘊於胃中七日然後納

諸方寸脩之一時近能數其目睫遠視尺筮之餘長眼不

已非但明目及亦延年審如是而行非可謂之朝霞亦奇

方也

補肝湯 治肝虛兩脇痛筋脉拘急不得喘息眼目昏暗面

多青色

防風 去 兩 細辛 去 兩 栝子仁 白茯苓 去 兩

官桂 去 兩 山茱萸 蔓荊子 去 兩 桃仁 去 兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心用茶

清送下

<p>耳草<small>味甘性平</small> 右吹咀每服五錢水一盞半入大棗二枚擘破同煎至八分去滓不拘時溫服<small>日再服</small></p>	<p>石以明九 治肝虛血弱日久昏暗 石決明 五味子 兔絲子<small>酒浸一宿別搗</small> 山芋 知母<small>焙</small> 細辛<small>去苗</small> 熟地黃<small>酒洗各一</small></p>	<p>菊花散 治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜 甘菊 四兩 蟬蛻<small>去足</small> 白蒺藜<small>炒焦木賊童便內浸</small> 羌活<small>已上各</small> 刺芥穗 甘草<small>各二</small></p>	<p>湯泡散 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜 右為細末每服二錢食後茶清調下</p>	<p>杏仁 防風 黃連<small>去蘗</small> 赤芍藥 當歸尾<small>各半</small> 銅青二錢 薄荷葉三錢</p>	<p>雷巖丸 治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻眼睛淚出羞明怕日多見黑花翳膜遮睛臉生風粟或痒或痛隱泣 開薰久患偏正頭風牽引兩目漸覺細小視物不明皆腎水不能既濟肝木此藥久服大補腎臟添目力</p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空<small>心用米飲送下</small></p>	<p>心酒送下世人服藥多不知根源往往不効 春雪膏 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱泣難</p>
---	---	--	---	--	---	---	---

<p>開及多時赤腫怕日羞明不能遠視迎風有淚多見黑花 片腦<small>二錢</small> 麩仁<small>去殼微炒研</small> 右用生蜜二錢重將片腦麩仁同攪和用銅筋子或以金銀釵股時復點放背頭連眶赤爛以油紙塗膏貼之</p>	<p>又方 治肝虛或當風眼淚鎮肝明目 右用臘月牯牛膽盛黑豆不計多少浸候百日開取食後夜間吞三七粒神効</p>	<p>枸杞酒 治肝虛當風眼淚 右用枸杞子最肥者二升搗破內絹袋置罈中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每日飲之勿醉</p>	<p>二妙散 養肝氣治目昏視物不明泪下方 當歸 熟地黃<small>各等</small></p>	<p>右為細末每服二錢七不拘時無灰酒調下</p>	<p>養肝丸 治肝血不足眼目昏花或生翳膜久視不明 當歸<small>酒洗</small> 防風<small>去蘗</small> 麩仁<small>別研</small> 車前子<small>酒蒸</small> 白芍藥 熟地黃<small>各等</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五六十丸不拘時白湯送下</p>	<p>萬壽地芝丸 治目能近視不能遠視 天門冬<small>去心</small> 生薑<small>四兩</small> 甘菊花二兩 枳殼<small>去穢炒</small> 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸食後用茶清或溫酒送下此藥能治風熱</p>	<p>洗肝湯 治肝實眼 人參 黃芩<small>去黑</small> 赤茯苓<small>去黑</small> 山梔子仁 芍藥 柴胡<small>去苗</small> 地骨皮 丹菊花 桔梗<small>炒</small> 黃連<small>去蘗</small> 甘草<small>半兩</small></p>
---	---	---	--	--------------------------	--	-----------------------------------	---	--

右吹咀每服三錢水一盞入苦竹葉七片煎至七分去渣食後服

羚羊角散 治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚

羚羊角 銹 羌活 去蘆 玄參 車前子

黃芩 去黑 山梔仁 瓜蒌 胡黃連

菊花 各三 細辛 去苗

右為細末每服二錢食後竹葉煎湯調服

竹葉湯 治肝臟實熱眼赤疼痛

淡竹葉 黃芩 去黑 犀角屑 木通 炒各

車前子 黃連 去蘆 玄參 各一分 芒硝 二兩

梔子仁 大黃 一兩 炒各

右吹咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

龍膽飲 治肝臟實熱目赤腫痛

龍膽草 梔子仁 錢各二 防風 山茵陳

川芎 玄參 荆芥 甘菊花

猪實 甘草 各一錢

右為細末每服一錢半食後茶清調下

决明子湯 治肝臟實熱目背生赤肉溢痛

决明子 炒 茈胡 去苗 黃連 去蘆 苦竹葉

防風 去叉 升麻 各三 細辛 一分 菊花

甘草 半兩 各

右吹咀每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服

麥門冬湯 治肝實熱毒氣上熏於目赤腫痛痒

麥門冬 去心 秦皮 去粗 赤茯苓 去黑 萎蕤 各半

升麻 大黃 一兩 各

右劉如麻豆大每服五錢水一盞半入竹葉十片煎至八

分去滓入朴硝末一錢更煎令沸空心溫服

鴻肝散 治肝熱亦眼腫痛

梔子仁 荆芥 大黃 甘草

右等分劉碎每服二錢水煎食後服

羊肝丸 治肝經有熱目赤睛痛視物昏眩及治障翳青盲

羯羊肝 生用 黃連 去蘆 研為末

右先將羊肝去筋膜於砂盆內搗入黃連末杵和為丸如

梧桐子大每服五十丸不拘時熱水送下忌猪肉及冷水

或煖漿水下連作五劑差昔唐崔承元內障喪明夜坐即

有聲問誰答曰昔蒙出活今特來謝遂授此方依方脩合

服眼復明朗

田螺方 治肝熱目腫痛

右取田中螺大者七枚淨洗新汲水養去穢泥重換水浸

洗仍旋取於乾器中著少鹽花於口上承取自出汁用點

目逐箇如此用了却放之

助陽活血湯 治眼發之後上熱壅甚白睛紅多眩淚無疼痛

而視物難聞此因服苦寒藥過多真氣不能通九竅也故

眼昏花不明宜助陽活血補氣

茈胡 白芷 各五 升麻 當歸 各五

黃芪 三錢 防風 七分 蔓荊子 甘草 一錢

右吹咀作一服水一盞半煎至一盞去滓臨臥熱服避風

寒忌食冷物

并菊花散 治肝氣壅塞翳膜遮睛隱澁難開

并菊花 一兩 木賊 防風 去叉 白蒺藜

甘草 半兩 木香

右為細末每服一錢七不拘時沸湯點服

决明子方 治肝經熱 止决明目治風赤眼

右以决明子朝取一匙投令淨空心水吞下百日夜

光一方取决明作菜食之

羚羊角屑 治肝腎俱虛眼見黑花或作翳翅

人參

車前子

黃芪 二兩

右對碎每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

日再服

空青丸 治肝腎久虛目暗漸生翳膜

空青 研細

防風 去叉

人參

虎睛 一對

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五丸加至十丸用

麥門冬煎湯送下溫椒湯下亦可

益陰腎氣丸 此壯水之主以鎮陽光

熟地黃 二兩

五味子

澤瀉

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五七

十九空 心淡益湯送下

剪覆膏 治腎水枯乏肝氣不足上攻眼目昏眩眩暈明及

風毒眼臉赤生粟隱滋疼痛心經受熱暴赤腫痛婦人血

風注眼文 治翳膜遮睛拳毛倒睫

雄黃 研

麝香 研

黃連 研

右先用蜜四兩熬三四沸下燻并石再熬不住手攪令勻

候冷下黃丹再熬下黃連雄黃白丁香再攪下當歸海螵

蛸再熬三五沸下輕粉乳香麝香共攪令勻以笋皮收之

每用如皂角子大以湯化開熱洗一方用皮硝一兩安

便內却將燒紅燻并石放在皮硝童便內浸一方燻并石

加銅綠一兩土粉一兩三錢粘白礬乳香各三錢研砂二

錢同研為末煉蜜為膏每用皂角子大水化頻洗

此疾駐景丸 治肝腎氣虛視物眩暈血少氣多

車前子 二兩

川椒 一兩

右為細末蜜水煮糊丸如梧桐子大每服三十九空 心用

溫酒或益湯送下

補腎磁石丸 治腎肝氣虛上攻眼目昏暗遠視不明時見黑

花漸成內障

磁石 大塊 紅 甘菊花

免絲子 酒浸一宿慢火

右為細末用雄雀十五箇去毛嘴足留肚脇以青鹽二兩

水三升同煮令雄雀爛水欲盡為度取出先搗如膏和藥

末為丸如梧桐子大每服二十九空 心用溫酒送下

煎椒法 治元臟虛冷目黑睛不明

無灰酒 三升 沉香 一兩

附子 炮裂去皮

右先將椒用酒煮至二分入附子沉香末

匙攪勻成膏

白丁香 研

當歸 研

海螵蛸 研

輕粉 一合

黃丹 二錢

乳香 研

麝香 研

雄黃 研

燻并石 以湯化開熱洗一方用皮硝一兩安

便內却將燒紅燻并石放在皮硝童便內浸一方燻并石

加銅綠一兩土粉一兩三錢粘白礬乳香各三錢研砂二

錢同研為末煉蜜為膏每用皂角子大水化頻洗

此疾駐景丸 治肝腎氣虛視物眩暈血少氣多

車前子 二兩

川椒 一兩

右為細末蜜水煮糊丸如梧桐子大每服三十九空 心用

溫酒或益湯送下

補腎磁石丸 治腎肝氣虛上攻眼目昏暗遠視不明時見黑

花漸成內障

磁石 大塊 紅 甘菊花

免絲子 酒浸一宿慢火

右為細末用雄雀十五箇去毛嘴足留肚脇以青鹽二兩

水三升同煮令雄雀爛水欲盡為度取出先搗如膏和藥

末為丸如梧桐子大每服二十九空 心用溫酒送下

煎椒法 治元臟虛冷目黑睛不明

無灰酒 三升 沉香 一兩

附子 炮裂去皮

右先將椒用酒煮至二分入附子沉香末

匙攪勻成膏

五寶磁金子盛每服半匙空心溫酒化下
千金神效丸 治肝腎虛目暗升降水火明目益心腎

神麴 磁石大者如雞子者各二兩石砂研細

沉香各半兩 右為細末用生神麴水調煮糊九如梧桐子大每服三十

九空心鹽湯下礮石法水入腎硃砂法火入心齊以沉香
是以升降水火

杏仁方 治肝腎風虛腫人帶青眼多黑暗潤澤臟腑洗垢開
光能驅風明目

右用杏仁五枚去皮尖五更初就床端坐勿言勿呼吸
澄神嚼杏仁一粒勿嚥逐一細嚼五粒候津液滿口分為

三嚥直入肝腎惟在久而成功
三仁五子丸 治肝腎不足體弱眼昏內障生花不計遠近

栢子仁 蕙源仁 酸棗仁 兔絲子酒製

五味子 拘杞子 酒蒸覆盆子 酒浸車前子 酒浸
內從蓉 熟地黄 白茯苓 當歸

沉香各等分 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心用酒
酒送下

三仁丸 治內外障眼
三仁 三兩 車前子 黃連去心 麥門冬去心

青箱子湯洗 黃芩去心 秦艽去心 生地黃焙

羚羊角末 防風去心 人參 天門冬焙去心

丹砂 升麻 苦參 地膚子
菊花 玄參 羌活 夫明子
地骨皮 甘草

右為細末煉蜜和丸如梧桐子每服二十九加至三十六
食後百合煎湯送下但有瞳人不拘內外醫並治之
耳菊湯 治內外障翳一切眼疾

耳菊花 升麻 旋覆花 石決明

苦蕒 大黃半兩 羌活去心 地骨皮

石膏 木賊炒 青箱子 車前子

黃芩去心 防風去心 柘子仁 草決明

荆芥穗 甘草炙 黃連去心

右剉碎每服三錢水一盞蜜少許同煎至七分去滓食後
夜臥溫服

觀音丸 治內外障失明或欲結青光內障或赤脈疼痛

血竭 熊膽研各 人參 蛇蛻包煎

地骨皮 洗 木賊去心 蒼朮去心 鷹爪黃連去心

威靈仙 蔓荊子 羌活 車前子

川芎 當歸 羌活 蟬蛻洗

石決明生研各一兩 熟地黃去心 熟地黃去心

右為細末用羯羊肝一具去筋膜慢火煮半生半熟帶血
注和藥同搗以粟米粉用肝汁煮糊九如梧桐子大每服
七八十九食後溫米泔或石菖蒲湯送下

八子丸 治風毒氣眼翳膜遮睛不計久新及內外障眼

青箱子 決明子 葶藶子 車前子
五味子 拘杞子 地膚子 羌活子
麥門冬去心 細辛去心 官桂去心 生地黃焙
赤茯苓去心 澤瀉去心 防風去心 黃芩去心

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九加至三十
九茶清送下溫米泔飲亦得日三

治內外障眼

補乳

南蓬砂 二六

熟仁 十

燕麥

白沙蜜 一兩

右先將燕麥麩仁研去油入諸藥再研取沙蜜於湯瓶上蒸燂以紙濾過同諸藥攪勻用瓶口膠泥封少許在瓶內用沸湯泡洗

洗眼方 治內外障及翳膜赤脈昏泣

右以桑條於二三月間採嫩者暴乾淨器內燒過令大自威成白灰細研每用三錢入磁器或銀石器中以沸湯泡打轉候澄傾清者入於別器內更澄以新綿濾過極清者置重湯內令熱開眼淋洗逐日一度但是諸眼疾皆効

蓋圓丹 治男子婦人紫睛翳膜障蓋明赤筋碧障內外障

斑肉風赤眼

蒼木 四兩

羌活

白附子

遠志 去心

獨活

甘菊花

石膏

防風

青箱子

青皮

陳皮

仙靈脾 酥炙

木賊 去節

褚實

甘草 略

右為細末水浸蒸餅丸如彈子大每服一丸食後細嚼煎茶湯或茶清送下目二服忌酒麪

單服蒼木法 補下部明目治內外障九傳効方

金州蒼木

分童子小使浸三日一分用未曬三日一分用無

右浸日數足曬出更不淘洗切作片或曬或焙乾入黑芝

麻三四兩同入鐵上炒令乾香搗為細末以前湯藥餘酒

麥粉為丸如梧桐子大若酒少入醋此少丸每服四五

九白湯或酒送下

大陰玄精石散 治內外障眼

玄精石

石決明

鮮粉 飛過

殺精草 一兩

右為細末每服一錢食後麥門冬湯調下大有神効

防風 蜜炙

威靈仙

枸杞子

石決明 酥炙

熟仁 去殼

蒼木 略

鮮粉 飛過

殺精草 一兩

菊花 二兩

右為細末用推猪肝一具竹刀切去筋膜和藥搗千餘杵入麩少許共搗丸如梧桐子大每服三十丸食後鹽湯下

忌煎燥酢豆腐等毒物

五退還光丸 治內外障眼

蟬退 炒

蛇退 炒

猪前爪 存性

刺蝟皮 去刺

蒼木 炒水浸

枳實

防風

草決明 一兩

蠶退 半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九茶清送下一日一二服

立應散 治內外障翳皆淚多淚及暴赤眼一切目疾並皆治

之三 次搽鼻

香白芷 洗

當歸 去蘆

雄黃 別研

鴉不食草 半兩

川附子 炮各

躑躅花 研

右為細末入麩香少許和勻含水搽鼻內去盡濁淚眼淚

為度

養肝散 治內外障翳眼

右用猪肝二兩批開以夜月沙末二錢七搽在肝內麻繩

一研如兩日有疾即用兩餅
通光散 治紫睛翳膜昏眩風毒腫痛洗眼方

右用瓜萹一枚剖下頂蓋取穰并子同搗順子搗勻却入
在瓜萹內用元蓋蓋之坐淨土上取棗條子十兩約長四
五寸鍊瓜萹上用炭火燒扇之烟盡將成灰即住扇冷和
灰通研極細每用二錢沸湯浸澄清去脚洗之
云醫障生血止痛方

右用蟬蟪汁滴目中及給灸食之陳氏經驗方云晉書盛
考母氏失明躬自侍養母食必自哺之母既病久至於僕
伎數見搆捷婢忿恨伺考暫行取蟬蟪多給之母食以為
美然疑是異物密藏以示考考見之抱母慟哭絕而復蘇
母目豁然從此遂愈孟子曰陳仲子豈不誠廉士哉居於
陵三日不食耳無閉目無見也井上有李蟪食實者過半

夫匍匐將往食之三烟然後耳有聞目有見本草云蟬蟪
汁滴目中去醫障余在曲江有將官以醫離軍因閱晉書
見此參以孟子之言證以本草之說呼其子弟俾蓋事而
供勿令父知旬日後目明趨庭伸謝因錄以濟衆

指甲散 治眼翳及諸物入眼
右以左手中指甲洗淨候乾以刀刮其屑用燈草蘸點眼
中翳處一二次即去或用懷孕婦人瓜甲屑置目中去醫
撥雲散 能散風毒退翳障及赤爛弦者

羌活 防風 川芎 白蒺藜
荆芥 蟬退 甘菊花
右為細末每服二錢食後桑白皮煎湯調服
珊瑚散 治眼赤痛生翳障遠視不明障流
珊瑚三分 硃砂二分 龍腦半錢

右各研細令勻每以銅筋取一米許日三四度點之神效
神妙散 點睛障障眼

右為細末以銅筋點之研須極細
五退散 治眼中障翳
蟬退 蛇退 蠶退 豬退蹄
石決明 甘草
右為細末每服二錢食後薄荷煎湯調服
治赤障白膜風淚
右以青羊膽點之出本草

日精月華光明膏 能開一切內障善治醫障遮睛及焚睛等
肉不日掃除無間年久日深或一目兩目俱患但能見人
影者悉皆治之如雲開見日
黃連 當歸 訶子 石決明
石膏 大鵝梨 煨甘石
豬膜 馬牙硝 真瞻黎
黃丹 馬牙硝 乳香
鵬砂 文藥 乳香
天花粉 輕粉 犀角
右先將黃連等五味浸三日却用大砂鍋一口內藥水再
添滿七分熬重綿濾過至四五次却入鵝梨豬膜再熬至
三碗再濾過再下鍋入煨甘石黃丹再熬至二碗又濾過
却下馬牙硝等八味以柳枝不住手攪勻候成膏切瀝

淨入瓶內却入腦筋粉三味攪勻以油紙密封勿令水入
放冷水內浸三日取出每用以銅筋點眼良
退翳散 治目內翳障或瘡疹後餘毒不散

真蛤粉 另研較精草各一兩為末

右研勻每服二錢用術肝三指大一片批開摻藥在上捲
定再用麻線扎之濃米泔一梳煮肝熟為度取出放冷食
後臨睡細嚼却用元黃米泔送下忌一切毒物如芥素只
用白柿同煎煎藥令乾去藥食白柿孫盈仲云凡患瘡不
可食鷄鴨子必生翳膜錢李華之女年數歲瘡疹後兩眼
背生翳只服此藥各退白膜三重瞳子方瞭然也

磁石丸 治眼因患後起早元氣虛弱目無翳膜視物昏暗欲
成內障

磁石 二兩燒醋淬七次 肉從蓉 一兩酒浸一宿刮

兔絲子 酒浸五日 補骨脂 炒 巴戟 去心

石斛 去根 遠志 去心 木香 五味子

桂心 甘草 炙赤各 熟地黃 一兩

右為細末研勻煉蜜和搗三二百杵九如梧桐子大每服
二十九食前溫酒送下一方有茯神無遠志石斛

神仙碧霞丹 治內障

當歸 沒藥 各二 血竭 白丁香

蓬砂 片腦 麝香 已上各 馬牙硝

乳香 各半 黃連 三錢 銅綠 為末

右為細末熬黃連膏和丸如鷄頭實大每用新汲水半盞
於磁盒內浸常用每一丸可洗四十日大病不過一月小
病半月冷淡三日見効

七寶膏 治混睛外障

真珠 水晶 具齒已兩 石次明

琥珀 各三 空青 瑪瑙 龍腦 各半

右為細末研勻水五升石器內煎至一升去滓再煎至一
盞入蜜半兩煎和為膏每至夜臨時點之早晨不得點

墜腎丸 治偃目腎內障

青羊膽 青魚膽 鯉魚膽 各七 熊膽 一分

牛膽 半兩 石决明 一兩 麝香 少許

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服十九空心茶清下
羅漢應靈丸 治內障及因病赤眼食鹹物而得者

夜明沙 淨 當歸 蟬蛻 木賊 去節 各

右為細末用羯羊子肝四兩用水煮爛搗如泥入煎藥末
搗和丸如梧桐子大每服五十九食後熱水下百日照如

故昔日徐道亨奉母至孝患眼食鹽遂內障暗誦般若經
與市得錢米既得母忽一夕夢羅漢授此方服服復明

益氣聰明湯 治飲食不節勞役形體脾胃不足得內障耳鳴
或多年目暗視物不能此藥能令目廣火服無內外障

耳鳴耳聾之患又能令人精神過倍元氣自益身輕體健
耳目聰明

升麻 葛根 各三 黃蘗 酒製 芍藥 各一
蔓荊子 一錢 人參 黃芪 甘草 各半

右吹咀每服三錢水二盞煎至一盞去滓臨卧熱服近五
更再煎服之得腫更妙如煩悶或有熱漸加黃蘗春夏加

之盛暑夏月倍之若此一味多則不効如脾胃虛去之有
熱者少用之如舊有熱麻木或熱上墜頭目三兩服之後

其熱皆除治老人腰已下沉重疼痛如神此藥久服令人
上重乃有精神兩足輕浮不知高下若如此空心服之或

上重乃有精神兩足輕浮不知高下若如此空心服之或

少如黃葉輕浮自滅若治倒曉去黃葉芍藥忌烟火酸物
 羌活退腎丸 一名地黃丸 治內障右眼小背青白腎大背微顯
 白腎腫痛腫子散大上熱惡熱大便澀或時難小便便如常
 遇天熱腰痠頭痛睛膜能食日沒後天陰則昏惰此證亦
 可服滋陰地黃丸

熟地黃 生地黃 補製黃葉 酒製 當歸身 酒製

羌葶子 丹參 半斤 黑附子 炮 寒水石 生用 各

芍藥 三錢 防己 二錢 知母 兩 牡丹皮

羌活 川芎 三錢 羌胡 半兩 或

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服五七十九空心用白
 湯送下如消食未盡候飢時服之忌語言隨後以食壓之
 東垣蘭室秘藏方云腎在大背加葛根升麻腎在小背加
 羌胡羌活是也

補腎丸 治黑腎如珠外障

人參 茯苓 細辛 五味子

肉桂 桔梗 乾山藥 柏子仁 各二

乾地黃 半兩 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九空心茶下

退熱飲子 治膜入水輪外障

防風 黃芩 桔梗 羌葶子 各二

大黃 玄參 細辛 五味子 各一

搜風湯 治旋螺尖起外障

防風 大黃 天門冬 五味子

桔梗 一兩 細辛 芍藥 各半 羌葶子 二兩

右剉碎每服五錢水一盞煎五分去滓食後溫服

通肝湯 治眼黃膜上翳外障

防風 大黃 玄參 知母 各一

天門冬 黃芩 各半 麥門冬 羌葶子 各二

右剉碎每服五錢水一盞煎五分去滓食後溫服

炙肝散 治外障赤肉翳膜遮睛不明

石決明 洗 穀精草 各四兩 皂角子 一分 黃芩 去黑

木賊 各五 蒼朮 切片 焙半斤 甘草 炙 對

右為細末每用豬肝一葉去筋膜切數條搽藥末五錢
 於膜內仍搽鹽一錢合定用旋着濕柳枝三四條闊起慢
 火炙香熟早晨空心冷喫盡續喫冷飯一盞壓之仍於三
 聖穴灸二三七壯三日後有淚下為驗七日翳膜必退每
 旦用新水漱口

青金丸 治風毒攻眼成外障翳膜

銅青 真者 龍仁 仁 二宿 去水 研 石決明 淨水 磨

生犀角 飛過 各一錢 龍腦 研 白丁香 水 研 飛

海蝶蛸 水 飛過 各一錢 右將銅青與龍仁先研如糊次入白丁香研次入四味研

極細用好墨研濃汁於淨器中和熟為丸如菉豆大每用
 入乳汁化開點眼未用者常以龍腦養於磁器中

豬膽方 治外障眼

右以豬膽一枚用銀銚或瓦銚煎成膏入水腦如黍米大

點入眼中微覺翳輕又將豬膽白膜皮陰乾合作小繩如

釵股大小止用一頭燒灰待冷點翳數日後翳退雙日如

養羊角飲子 治黑翳如珠外障

羚羊角 五味子 細辛 大黃

知母	右劉碎每服五錢水一盞煎五分去滓食後溫服	芒硝	防風	天麻	烏蛇	右為細末每服一錢食後米飲調下	抽風湯	防風	黃芩	右劉碎每服五錢水一盞煎五分去滓食後溫服	摩風膏	黃芪	防風	小麻油	右為末煎成膏塗之	瀉膽散	玄參	知母	右劉碎每服五錢水一盞煎五分去滓食後溫服	天門冬	防風	補肝丸	决明子						
芒硝	防風	桔梗	防風	防風	細辛	芍藥	治鷄冠蜆肉外障	防風	玄參	芒硝	車前子	細辛	杏仁	白芷	黃芩	地骨皮	麥門冬	羌葶子	知母	五味子	茯苓	羌活	羌葶子	青葙子	枸杞子	五味子	茯苓	地骨皮	乾地黄
芒硝	防風	桔梗	防風	防風	細辛	芍藥	治鷄冠蜆肉外障	防風	玄參	芒硝	車前子	細辛	杏仁	白芷	黃芩	地骨皮	麥門冬	羌葶子	知母	五味子	茯苓	羌活	羌葶子	青葙子	枸杞子	五味子	茯苓	地骨皮	乾地黄

兔絲子	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九加至三十	人參	石决明	熟地黄	桂心	右為細末煉蜜和酒二三百杵丸如梧桐子大每服二十	補腎丸	羌葶子	石為細末研勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心	鹽湯送下	破石丸	破石	玄參	右為細末煉蜜和九如梧桐子大每服十九食前茶湯下	或鹽湯下	羚羊角	玄參	右劉碎每服三錢七水一盞煎七分去滓食後放溫服	瀉肝飲											
車前子	防風	防風	肉蓯蓉	肉蓯蓉	肉蓯蓉	肉蓯蓉	肉蓯蓉	熟地黄	熟地黄	熟地黄	熟地黄	乾薑	牡丹皮	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑
車前子	防風	防風	肉蓯蓉	肉蓯蓉	肉蓯蓉	肉蓯蓉	肉蓯蓉	熟地黄	熟地黄	熟地黄	熟地黄	乾薑	牡丹皮	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑	乾薑

頭昏五十年不瘥

具齒一枚 豆豉三十 三年苦酒三升一作

右先漬貝齒三宿消盡後內豆豉微火煎如膠取三合煮

治赤眼後生翳膜

右以麝香子洗淨曬乾每用一粒以筋頭點大眦頭閉目

即覺藥在目內圓旋轉藥力過即不轉須更自隨睛淚

出惹翳膜在上如魚眼再入一粒以病退為度一方為細

末每取如米大點眼背頭背靈州知錄彭大辨父在臨安

恭得此疾一僧以此藥治之坐間瞭然因得此方屢以治

人

拘杞煎 治眼中翳少輕者煮治眼滋痛

右取拘杞及車前子桑葉等分手中熱投使汁欲出又別取

桑葉兩三重裹之懸於陰地經宿乃摘破桑葉取汁點目

中不過三五度瘥

傳信方 所着法最奇云眼淚痒或生翳或赤痛並皆治之

右用宣州黃連搗篩末糝核仁去皮礪為膏等分扣合取

無蚱蛄乾棗三枚割頭少許留之去却核以二物滿填於

中却將割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄為佳大茶

梳量水半梳於銀器中文武火煎取一鷄子大以綿濾持

令點眼前後試數人皆應今醫家用亦多得效故附之萬

萬不失有驗

補陽湯 治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通今青白翳

見於太眦及足太陽少陰經中躡過足厥陰肝經氣不得

上通於目故青白翳內阻也當於太陽少陰經中九原之

下以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其陽後於足太陽

太陰標中標者頭也瀉足厥陰肝經火下伏於陽中乃次
治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法
是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨卧服益陰丸
若天色變大寒大風并勞役預日飲食不調精神不足或
氣弱俱不得服候時氣和平天氣如常服之乃先補其陽
使陽氣上升通於肝經之末利空竅於目矣

羌活 獨活 人參 熟地黃

黃芪 黃芩 白朮 甘草 白芍藥

澤瀉 陳皮 防風 當歸身 羌活

白茯苓 生地黃 知母 鹿角 鹿角

肉桂 去皮

右同為籠末每服半兩水三盞煎至一盞去滓空心宿食

消盡服之

連藥益陰丸 一名海陰丸

黃連 黃蘗 草決明 細黃芩

知母 羌活 獨活 當歸尾

防風 五味子 甘草 石決明

右為細末煉蜜和丸如棗豆大每服五十九丸漸加至百丸

止用茶清送下常多服補陽湯少服此藥為不可勝補陽

湯恐防飲食

升陽柴胡湯 升陽泄陰羌活柴胡補陽湯

柴胡 羌活 獨活 甘草根

當歸身 熟地黃 白芍藥 生地黃

積實 人參 白朮 黃芪

澤瀉 陳皮 白茯苓 防風

肉桂 半錢

知母 三錢 鹿角 鹿角

<p>右為咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓稍熱服食後另 合一料煉蜜為丸如梧桐子大食遠茶清送下五十九每 日與煎藥各一服加天氣熱甚加五味子三錢或半兩天 門冬去心半兩更加芍藥補實各半兩</p>	<p>青箱子九 治肝心毒熱丁醫入黑睛</p>	<p>青箱子 藍寶 枳殼 大黃 劉師</p>	<p>菊花 甘單 草决明 黃連 去</p>	<p>羌活子 細辛 麻黃 車前子 各半</p>	<p>鯉魚膽 雞膽 各一 羚羊角 三</p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九食後茶清 送下日三煎治內外障一切眼病</p>	<p>琥珀煎 治眼生丁醫火治不瘳</p>	<p>琥珀 龍腦 貝齒 珠砂 各半</p>	<p>馬牙硝 三</p>	<p>右同研如麪以水一大盞別入白蜜一兩攪和入通油礮 瓶中用重湯煮以柳木篋煎取一合已來即住以綿濾於 不津瓶子中盛之或銅器亦得每取少許點之一方為細 末點之</p>	<p>桑白皮湯 治目生花翳白點狀如棗花</p>	<p>桑白皮 木通 犀角 犀角屑</p>	<p>黃芩 茯苓 女參 旋覆花</p>	<p>川大黃 各一 甘菊花 半 甘草 一分</p>	<p>右為細末每服二錢七水一盞煎六分連滓溫服</p>	<p>藥仁散 治目生花翳多年不退</p>	<p>藥仁 赤茯苓 川大黃 車前子 青箱子</p>
---	------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	---	----------------------	-----------------------	--------------	---	-------------------------	----------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

<p>赤芍藥散 三</p>	<p>右為細末每服三升水一盞煎六分連滓熱服</p>	<p>知母 知母 羌活子 防風 細辛</p>	<p>桔梗 大黃 茯苓 芒硝 各</p>	<p>右對碎每服五錢水一盞煎至五分去滓食後溫服</p>	<p>琥珀散 治目積年生花翳</p>	<p>琥珀 珊瑚 珠砂 白者</p>	<p>馬牙硝 各半 烏賊魚骨 其用者一</p>	<p>真珠末 一及</p>	<p>右研極細令勻每日三五次點</p>	<p>雞距丸 治花翳淚出</p>	<p>雞距 雞舌香 胡粉 各半</p>	<p>黃連 石 石</p>	<p>右為細末裏肉為丸如雞距注眼大皆日再</p>	<p>法明子散 治眼卒生翳膜視物昏暗及翳覆裏瞳仁</p>	<p>决明子 黃連 川升麻 枳殼 各</p>	<p>玄參 各一 黃芩 三分 車前子 拖子仁</p>	<p>地膚子 人參 各</p>	<p>右對碎每服三升水一中盞煎至六分去滓食後溫服</p>	<p>真珠散 治眼忽生翳膜赤澁疼痛</p>	<p>真珠 青箱子 黃芩 石决明 各</p>	<p>人參 去 甘菊花 青翳 甘草 一</p>	<p>右為細末每服一錢食後溫漿水調下</p>	<p>聖乳散 治眼熱毒辛生翳及赤白膜</p>	<p>右以雄雀糞研用人乳汁和點之</p>
---------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

真珠膏 治眼腫熱目赤痛卒生翳膜昏暗

真珠 研一兩 麝香 硃砂 胡粉 各一分

貝齒 五枚 鯉魚膽 二枚 白蜜 兩兩

右除魚膽蜜外都研如粉以魚膽汁蜜於銅器中調令勻

用慢火煎成膏每以銅筋取少點之日三四上

鷄子殼散 治眼卒生翳膜

鷄子殼 白殼子者去膜取 貝齒 三枚

右研令細入磁盒中盛取少許日三五度點之

羌活退翳膏 治足太陽寒水膜子遮左右睛白

翳在上視物不明

羌活根 七分 椒樹 西北根一分 當歸稍 六分

黃連 二錢 防風根 柴胡根 麻黃 去節

升麻根 生地黃 各三 甘草稍 四分 麩仁 六箇

漢防已 薑本 各二

右用淨新水一大碗先將漢防已黃連甘草稍生地黃煎

至一半下餘藥外藥再煎至一盞去滓入銀石器中再煎

如膏點之有效為度

蠟附散 治鼻退翳膜

全蠍 附子尖 薑黃 青黛 各一分

薄荷 一兩 鵝不食草 半兩

右為細末口含永搗少許

開明丸 治年深日近翳障昏盲寂無所見一切目疾

熟地黃 酒浸 兩半 羌活 絲子 車前子

麥門冬 去心 薤仁 去皮 決明子 地膚子

羌活子 枸杞子 黃芩 五味子

防風 澤瀉 杏仁 炒去 細辛 見火

青箱子 北葶藶 炒各 官桂 半兩

羊肝 只用白羊者 用研薄切瓦上焙乾了作末或

右為細末九加梧桐子大每服三十九熱水下日三仍忌

生薑糟酒炙煨等熱物

補肝散 治三十年失明

右以葶藶子七月七日收陰乾搗末食後水服方寸匕

點眼金絲膏 治男子婦人目疾遠年日近翳膜遮睛攀睛

肉拳毛倒睫黑花爛弦迎風羞明冷淚及赤眼腫疼

硃砂 研 晉礬 研 青鹽 研 乳香 研

片腦 研 當歸 洗 黃丹 研 黃連 一兩

右用好蜜四兩除片腦外和七味內入青篋竹筒內油單

紙裹筒口五七重緊繫定入湯瓶中文武火煮一週時取

出劈破新綿濾去藥滓方下片腦和勻磁瓶收貯再用油

單紙五七重封繫瓶口埋露地內去火毒候半月取出每

用一粟米大點眼

龍腦膏 治遠年近日翳膜遮障攀睛瘀血連眶赤爛視物昏

暗不親光明隱淚多淚迎風難開神効

煨甘石 不以多少陳粉紅梅泥者為妙用甘

黃連 不以多少陳碎水浸一宿去滓將殼紅薑石

羅過用三升 龍膽草 不以多少洗淨日乾

桑柴皮 羅過 黃丹 半兩

右同白蜜四兩一處入在黑磁器內文武火慢煮以竹篋

子攪如漆色不粘手為度切勿犯生水仍不用鐵器裝藥

藥成依舊以磁器盛每用如皂子大新冷水半盞化開

先三日不用每日洗數次無妨藥盡須用紙蓋不可犯塵

灰截赤眼極効

治積年失明方

右以决明子拌為末食後以粥飲服方寸匕

撥雲退翳丸

治一切眼目不明

薄荷葉

川芎

當歸

楮實

甘菊花

蟬退

瓜蒌根

黃連

蔓荊子

蛇退

荊芥穗

香白芷

木賊草

防風

甘草

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每兩作十九每服一丸日進二服治眼引子于後

氣障水香煎湯送下

眼常昏暗茶清送下

眼睛肯當歸湯送下

婦人血暈當歸湯送下

補腎丸

治腎氣不足眼目昏暗瞳人不分明漸成内障

五味子

熟地黃

枸杞子

楮實子

覆盆子

肉蓯蓉

車前子

石斛

青蘘

沉香

磁石

兔絲子

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服七十丸空心用鹽湯送下

碧光散

治諸風攻眼翳膜除昏暗

防風

羌活

甘菊花

草决明

蟬退

川芎

蛇退

石决明

沙苑

熟地黃

石决明

兔絲子

甘草

熟地黃

石决明

兔絲子

右為細末每服一錢半食後麥門冬煎湯調服

四物五子丸

治心腎不足眼目昏暗

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥

枸杞子

覆盆子

地膚子

兔絲子

車前子

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九不拘時鹽湯送下

湯送下

杞苓丸

治男子腎藏虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成内障

成内障

枸杞子

白茯苓

當歸

兔絲子

青蘘

熟地黃

當歸

兔絲子

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服七十九食前用白湯送下

夜光丸

一名雙美丸治眼目昏暗及諸疾兼退翳膜

蜀椒

白胡椒

甘菊花

取末

右和勻取肥地黃十五斤切搗研絞取汁八九升許將前藥末拌浸令勻暴稍乾入盤中攤暴三四日內取乾候得

所即止勿令太燥煉蜜二斤同搗數千杵丸如梧桐子

大每服三十九空心日午熱水下久服目能夜視髮白并

黑通神強志延年益壽一方用熟地黃二兩酒浸九蒸九

曝食後細嚼新浙米十粒以湯送下或茶下亦得

真珠煎

治肝虛寒淫淫不見物

真珠

魚膽

白蜜

二兩

右合和銅器中微火煎取一半新綿濾過磁甌中盛每以

銅筋點如黍米者目背即淚出頻點取痊

又方

右以黃蘗一瓜甲許每朝含使津置掌中拭目訖以水洗

之至百日眼明此終身行之永除眼疾

治暑月或行路目昏遠多眼粘者

右以生龍腦薄荷五七葉淨洗手捧爛以生絹按汁滴入

眼中妙

治眼目昏暗

右取園桑老皮燒灰用水煎至七分去滓澄清洗一週年如童子眼光明并開洗眼日于後

正月初八日 二月初十日 三月初五日

四月初八日 五月初八日 六月初七日

七月初七日 八月初三日 九月初十日

十月初九日 十一月初十日 十二月二十二日

又方 用朴硝六錢重用水一盞煎至八分候冷定澄清下次分定每月一日洗至一年之間眼如童子光明

正月初一日 二月初八日 三月初四日

四月初五日 五月初五日 六月初四日

七月初五日 八月初一日 九月十三日

十月十三日 十一月十六日 十二月初五日

青魚膽方治目暗

右用青魚膽汁滴目中

又方 用鷹眼晴一對炙乾搗末研令極細以人乳汁再研每以銅筋取少許點於瞳仁上日夜三度可以夜見物或取臘月雖眼依上法用効三日見碧霄中物忌煙熏

密蒙花散 治冷淚昏暗

密蒙花 井菊花 杜蒺藜 石决明

木賊 去前 白芍藥 甘草 各半

右為細末每服一錢茶清調下服半月後加至二錢

金絲膏 治一切目疾昏暗如紗羅所遮或疼痛

宣黃連 半兩 白礬 一分 井鹽 一分 無以

白礬 一字 井鹽 一分 無以

山拖子 二錢 好者 燒研 黃連 半兩 煎 黃五七 十 煎 取

右用銀磁器內熬十餘沸用生絹上細紙數重濾過用時常點

點鹽法 明目去昏翳大利老眼得補益之良

右以海鹽隨多少淨揀以百沸湯泡去不淨瀝取清汁於銀石器內熬取雪白塩花用新瓦器盛每早用一大錢作牙藥揩擦以水漱動用左右手指背通互口內蘸鹽津洗

兩眼大小皆內閉目良久却用水洗面各洞視千里明目堅齒極有妙法東坡手錄目赤不可具湯浴并忌用湯泡

足湯驅體中熱併集於頭目喪明必矣

雞仁丸 治眼見黑花飛蠅流痛昏睛漸變青盲

雞仁 去皮 地膚子 細辛 去苗 石决明 煨 半兩

人參 地骨皮 去土 白茯苓 去皮 白朮 二兩 各

熟地黃 二兩 柴胡 八錢 人參 二錢 生地黃 酒洗 七

石膽 半兩 粉 鯉魚膽 五枚 青羊膽 一枚 防風 去 兩半

右為細末研勻以膽汁同煉蜜搜和丸如梧桐子大每服二十九食後米飲送下

熟地黃丸 治血弱陰虛不能養心致心火旺陽太甚偏頭腫悶瞳子散大視物則花法當養血涼血益血除風散火則愈矣

熟地黃 一兩 柴胡 八錢 人參 二錢 生地黃 酒洗 七

當歸身 酒洗 黃芩 各半 黃連 地骨皮

五味子 天門冬 去心 枳殼 炒 甘草 炙 各

右為細末煉蜜丸如菽豆大每服一百丸食遠茶清送下

日進三服忌食辛辣物而助火邪及食寒涼物損胃氣藥

不能上行也

摩頂膏 治肝腎虛風上攻眼生黑花或如水液

空青研 青蓮研粉 槐子 木香

附子研 牛酥二兩 搗脂四兩 早蓮草自然汁

龍腦半錢 丹砂研

右為細末先以早蓮草汁半酥搗脂銀器中熬三五沸下

諸藥末煎減一半止盛磁器中焙引用舊鐵一片重

二三四兩藥於頂上摩二三十徧令入髮竅中次服決明

丸忌鐵器

決明丸 治眼見黑花不散

決明子 井菊花研 防風去毒 車前子

苦菊 細辛 梔子仁 蔓荊子

玄參 白茯苓 薯蕷粉半 生地黃二分

右為細末煉蜜和搗二百杵九如梧桐子大每服二十

丸食後煎藥枝湯送下日三

摩頂膏 治眼前見花黃黑紅白不定

附子如棗去木香粉一 珠砂一分 龍腦半錢

青蘘半兩 牛酥二兩 搗脂四兩

右將前藥為末同酥脂以慢火熬成膏每用少許不拘時

頂上摩之

白龍粉 治腎水衰虛肝經邪熱視物不明或生障翳肉攀

睛或迎風淚出眼見黑花或如蠅龜或如油星或睛腫

痛或痒不可忍並皆治之

右用硝三錢於二九月造一大罐熱水浸開以綿濾過入

銀器或石器內煎至一半已上就鍋內放溫傾銀盆內於

露地放一宿次日結成塊子於別水內洗淨并用水罐熱

水化開裝入蘿蔔二箇切作片子同裝以蘿蔔熟為度傾

在磁器內撈蘿蔔不用於露地置一宿次日結成塊子去

水於日中曬一日去盡水光入好磁器盛放於透風日處

掛懸至風化開成用速旋於乳鉢內攪研極細點眼如常

法亦名文明粉

黃肝散 治眼生黑花漸成内障及開睛偏視風毒攻眼腫痛

涎痺短視倒睫雀目

羌活去毒 獨活去毒 青箱子 井菊花研

右為細末每服三錢七羊子肝一葉剉細淡竹葉數片同

搗如粽子別用雄黑豆四十九粒米泔一椀銀石器內同

煮黑豆爛泔乾為度取肝細嚼溫酒下又將豆食盡空心

日午夜臥服

服散方 治肝腎虛風上攻眼目生黑花頭目不利能通神延

年用川椒一斤揀淨去目及合口者於鍋內炒令透於地

上鋪淨紙二重用新盆合定週週用黃土培之半日去毒

出汗然後取之曝乾為度只取椒於磁合子內收每日空

心新汲水下十粒

苦菊散 治日暈昏濇視物不明

苦菊 地骨皮 荆芥穗 何首烏

菊花 旋覆花 車決明 石決明

井草去毒 青箱子 蟬蛻去土 木賊粉半

白芷一分

右為細末每服一錢食後米泔水調下

羊肝夫子 退服藥并翳膜遮睛小兒疳眼雀目並治之

蟬蛻 黃連粉半 蛇蛻粉半 菊花

井草粉

右為細末每用羊肝一具竹刀手批開搽藥持勻用白麩

累作夾子每日食後吞一服

光明散 治眼晴上生暈不問久新

右用鮮魚一頭長一尺二寸者取膽用刺破滴汁在銅筋

上陰乾用竹刀子刮下為細末每用少許點眼妙

决明子丸 治風熱上衝眼目或因外受風邪疼痛視物不明

决明子炒 細辛去苗 青葙子 蒺藜炒去

羌蔚子 芎藭 獨活 羚羊角鏡

升麻 防風半斤 玄參 枸杞子

黃連去骨 菊花一斤

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九加至三十

九淡竹葉煎湯送下

還睛丸 治風熱上攻眼目赤腫怕日羞明多淚隱澁肉侵

睛或痛漸生翳膜

白朮生用 防風去芦 羌蔚子炒 白蒺藜炒去

羌活去芦 蝉退足翅 青葙子去土 密蒙花

木賊各等

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九空心細嚼白湯

送下日三服

七寶散 治風眼除痰熱

當歸 芍藥 黃連 銅綠各一

杏仁七箇 白礬 甘草各一

右吹咀以水同放磁盞內於鍋中煎至八分去滓澄清

臨卧洗之

蟬花散 治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目翳膜遮睛赤

腫疼痛昏暗視物不明隱澁難開多生眵淚內外障眼

蟬蛻去土 菊花去根 穀精草洗去 白蒺藜炒

防風不見 羌活 密蒙花去枝 决明子炒

黃芩去土 川芎不見 蔓荊子去白 山梔子去皮

荆芥穗 木賊草 甘草各一

右為細末每服二錢用茶清調服或荆芥湯入茶少許調

服亦可食後臨卧皆可服

開明散 治風毒氣眼膜澁障膜

甘菊花去蒂 防風 羌活 蒺藜炒去

川芎 天麻 茯苓 蒼朮童便浸

蟬蛻半斤 荆芥 羌蔚子 華陰細辛

甘草一分

右為細末每服二錢食後鹽湯調服

金絲膏 治風熱上攻目赤腫痛

黃連去骨 大黃 黃蘗去粗 龍膽草

山梔仁 當歸一斤 青竹葉一斤 大棗二斤

燈心切 蓬砂明者 乳香研各

右用水五升不拘冬夏浸一時辰取出於銀石器內慢火

熬不令大沸候泣盡汁下火於令用絹絞取汁於无風土

處盛一時辰去滓於銀器內用慢火熬令減半入白蜜半

斤同攪候有蜜者以手挑起有絲即止放冷再以夾絹袋

子瀝過以磁盒盛之每取一茶脚許研龍腦一字極細入

膏同研一二寸過令勻取少許點之

琥珀煎 治風毒衝目腫赤痒痛

乳香別研 麝香別研 滑石別研 鉛丹別研

黃連別研 青皮各一 黃芩去土 白蜜各

木鼈子去殼 槐枝 柳枝各一 白蜜各

右將槐柳枝青皮黃芩滑石以水三椀同煎至兩椀去滓

下乳香麝仁鉛丹木鼈子與蜜同熬如琥珀色却下黃連末再煎至一椀半用熟絹濾去滓入磁器內密封懸掛在井底一宿出火毒每用銅筋點以目滋為度熬點皆不得犯鐵器

羌活散 治風氣攻眼昏澁多淚

羌活 川芎 天麻 旋覆花

藜蘆 防風 蟬蛻 甘草

細辛 杏仁 甘草

右為細末每服二錢新水一盞半煎食後服

草龍膽散 治上焦風熱氣毒攻衝眼目暴赤疼痛羞明多眵

迎風有淚翳膜攀睛肉隱痛並皆治之

龍膽草 香附子 菊花 草決明

甘草 川芎

右為細末每服二錢用麥門冬熱水入砂糖少許同煎食後調服或米泔調服亦可

地黃散 治混睛或白睛先赤而後疼痛迎風有淚隱澁難開

生地黃 芍藥 土當歸 甘草

右剉碎每服三錢水一盞半煎至七分食後溫服

撥雲散 治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮障羞明熱淚

決明子 羌活 羌活 羌活

右為細末每服二錢水一盞半煎至七分食後薄荷茶清調服菊花苗湯調下亦可忌醃菜魚鮮醬蟹炙燥發風等毒物

麻風散 治風毒攻眼赤腫疼痛

黃連 黃連 黃連 黃連

黃連 黃連 黃連 黃連

黃連 黃連 黃連 黃連

黃連 黃連 黃連 黃連

黃連 黃連 黃連 黃連

黃連 黃連 黃連 黃連

右剉細分三次新水煎濃清汁以手沃洗効

明礬 山梔子仁

右咬碎用無絨絹帛包定以井水小半盞浸之候水浸透

水黃洗眼二三十次一宿次早無事立効

攻毒散 治風毒上攻兩眼暴赤隱澁難開

右用乾薑不以多少洗淨吹咀每用二錢以薄綿緊裹沸湯泡乘熱洗如冷再溫更洗

春水散 治風眼除熱

白礬 青鹽 黃丹 雄黃

片腦 盆硝

右研極細點眼

通頂散 治風毒攻眼并夾腦風

細辛 香白芷 藜蘆 川芎

躑躅花 穀精草

右為細末每用先含新汲水一口然後挑少許搐在鼻內以手揉兩太陽穴

青箱子 治眼風赤昏暗淚出

青箱子 決明子 黃連 人參

苦參 地骨皮 白蘚皮 川大黃

升麻 車前子 梔子仁 枳殼

秦元 玄參 茯苓 黃芩

防風 龍膽草

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十丸食後溫漿水送下

香柳枝煎 治風赤眼

香柳枝煎 治風赤眼

香柳枝煎 治風赤眼

香柳枝煎 治風赤眼

香柳枝煎 治風赤眼

垂柳枝	桃枝	枸杞枝	桑枝 <small>各長二尺</small>
馬牙硝 <small>一分</small>	竹葉 <small>九片</small>	黃連 <small>去苗</small>	决明子 <small>兩</small>
龍腦 <small>半斤</small>			
右除硝龍腦外以漿水二大盞於銅器中煎至一半去滓			
重以綿濾令淨入硝及龍腦攪令勻更煎令稠每以銅筋			
頭取如小豆許點日三五度			
又方 治一切風赤眼眼皮上癢痒赤爛久治不効此藥之功			
不可盡述			
輕粉 <small>十字</small>	白蜜	白蠟 <small>各三</small>	臘月猪脂 <small>半兩</small>
右先踏猪脂成油漸入白蜜次下白蠟候三味總化成油			
入輕粉攪令勻非時捺眼赤皮上			
銅青湯 治風眩赤眼			
銅青 <small>黑豆大</small>	防風 <small>許</small>	杏仁 <small>二箇</small>	去尖
右各細切於盞中新汲水浸湯瓶上頓令極熱乘熱洗之			
如痛者加當歸數片			
治風赤溢痛			
右取訶梨勒袂入白蜜研注目中神良一方以鷹嘴者一			
枚滴蜜於石磨點			
枸杞六 治風熱生層赤白眼及去眼中風痒痛			
右搗枸杞子汁點眼立驗亦治暴赤眼風熱赤膜一方用			
葉搗汁含一滿口待稍温就嚥之			
拜堂散 治風赤眼			
右以五倍子研為細末貼破赤處			
熏洗方 治風眼爛弦臨洗加輕粉少許凡時氣赤眼自外而			
入非臟腑病者不必服藥重洗足矣			
黃連 <small>去毛</small>	川芎 <small>去毛</small>	荆芥穗 <small>各半</small>	蔓荊子 <small>各半</small>

五倍子 <small>三錢</small>	治目風熱腫赤難開	雄黃 <small>水香</small>	辰砂 <small>各二</small>	細辛 <small>半兩</small>	片腦
右到碎作三服每服用生絹一小方洗淨入藥絹內以口					
扎定水煎仍以紙糊瓶口勿令氣出却於無風處就瓶口					
紙上破以一小孔熏之候氣稍平揭去瓶紙於瓶口熏之					
氣温傾出用淨絹蘸洗如此三次為驗仍避風毒					
噀鼻藥					
右為細末口含水少許噀鼻中					
蟬殼散 治眼目風腫及生翳膜等疾					
蟬殼	地骨皮	黃連 <small>宣州者</small>	牡丹皮 <small>去心</small>		
白木	蒼木 <small>水淋</small>	菊花 <small>各一</small>	龍膽草 <small>半兩</small>		
甜瓜子 <small>半斤</small>					
右為細末每服一錢半荆芥煎湯調下食後臨卧各一服					
大治時疾後餘毒上攻眼目甚効忌熱炒豆醋醬等					
吹鼻散 治風眼腫					
枸杞白皮	鷄子白皮				
右等分研令極細每日三次吹鼻內					
涼膽丸 治眼狀青色大小皆頭眩痛頻頻下淚口苦少飲食					
黃連 <small>洗不</small>	黃芩	荆芥	龍膽草 <small>各半</small>		
蘆薈	防風 <small>各一</small>	黃蘗 <small>去粗</small>	地膚子 <small>各一</small>		
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後薄荷					
湯送下					
羌活散 治目風熱赤久不瘥					
羌活	木香	官桂 <small>去粗</small>	胡黃連		
山慈	升麻	艾葉 <small>各一</small>	牛膝 <small>切焙</small>		

山藥 白附子

右剉碎每服三錢水一盞煎至八分去滓食後服日三

菊花散 治目風淚出

蒼木 日去黃芩取用石器入河水同煮一盞一分

菊花 木賊 新者 草決明 洗 荆芥穗

旋覆花 甘草 炙 兩 蟬蛻 三分 蛇蛻 一分

右為細末用不津器盛每服一錢臘茶半錢同煎空心臨

卧時服

洗餅子 治目風冷淚去翳障

蟬蛻 洗 木賊 新者 井菊花 一 荆芥穗

芍藥 芍藥 蒼木 三 兩 甘草 兩

右為細末煉蜜和丸捏作餅如餅大每服一餅食後細嚼

臘茶送下日三

川芎丸 治頭風冷淚

川芎 細辛 白朮 井菊花

白芷 各一

右為細末蠟丸如黍米大夜卧內一九日中一時辰換一

丸看收伸臂謂予曰有人視一物作兩醫者作肝氣有餘

故見一為二故服補肝氣藥皆不驗此何疾也予曰孫真

人云目之系上屬於腦後出於項中邪中於頸因逢身之

虛其入沉則隨日系入於腦轉也則目系急也則目眩以

轉邪中其睛所中者不相比則睛散睛散則故故見一物

為兩物也後令服驅風人腦藥則愈

羌活散 治心肝風熱攻眼淚出

羌活 去 黃芪 各 芍藥 白朮 各 兩

甘草 各 兩

右為細末每服二錢荆芥湯調服

真珠散 治肝虛目風淚出

真珠 研 丹砂 研 乾薑 研 具 高 五 錢 以 灰

右研極細令勻以熱絹帛羅三遍每仰卧點少許俾眼中

合服少時

乳汁煎 治風淚澀障

人乳 一 升 黃連 去 黃 芩 研 乾 薑 研 乾 薑 研 乾 薑 研

右除乳 井同研極細以乳漬一宿明旦內銅器中微火

煎取三合綿濾去滓每以黍米大點背中勿當風點

洗眼方 治冷淚久而眼昏

開元銅鏡 一百文背 井 草 去 鐵 揀 青 益 一 兩 半

右於白磁器內用無根水一大碗浸七日每看一盞洗無

力換洗到十日約添井草青益每日洗三次忌食五辛驢

馬為魚暈酒

薑液膏 治眼風痺冷淚爛弦有蟲

右用生薑母一塊用銀筍揀入即按出點眼背頭効

食鹽方 治目中淚出不得開刺痛及治一切眼疾

右以食鹽如小豆大內目中晉晉去益以冷水數洗日曬

一方用鹽水洗眼亦良一方所為米以銅筍取如麻子大

內背頭日三五度

連翹飲子 治目中溜火惡日與火隱澀小角緊久視昏花迎

風有淚

連翹 當歸 紅荊花 蔓荊子

人參 井 草 三 分 柴 胡 二 分 升 麻 一 錢

黃芩 酒 製 黃芪 防風 羌活 各 兩

生地黃 三 分

右劉碎每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後稍熱服

吹眼膏 治視物睛困無力隱淚難開睛多淚目中淚下及迎風寒泣流明怕日常欲閉目喜在暗室寒其戶牖翳膜

遠晴此藥多點神效

黃連 三錢 麩仁

青皮 運翹

細辛 一分 柴胡 五分

右劉如麻豆大除連翹外用淨水二椀先熬除藥去半椀入連翹同熬至一大盞去滓入銀盞內以文武火熬至入

水滴成珠不散入熱蜜少許熬勻點之

滴金膏 治眼迎風冷淚不止

右用烏鷄膽汁點眼

治目中熱淚

右用烏賊魚骨為極細末點目中

摩風膏 治風牽眼目喎僻外障

木香

防風

烏頭

牛酥

右為細末以麻油半斤浸一日一夜以文武火煎如膏為

度塗摩之

槐子丸 治肝虛風邪所致致目偏視

槐子仁 二兩 酸棗仁 微炒 覆盆子

車前子 蔓荊子

痰蕪子 微炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心溫白

湯送下晚食前再服之

羚羊角湯 治風牽眼偏斜外障

羚羊角 防風 去又

人參 已上各 黃芪 剉

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食後臨卧服

抵聖散 治目偏風牽疼痛

荆芥穗 二兩 芍藥

右為細末每服二錢食後茶清調服

前胡 平角 蔓荊子 青箱子

防風 去又 梔子仁 麥門冬 去心 生地黃 剉

菊花 羌活 去羌 决明子 微炒 車前子 微炒

細辛 甘草 炙 黃芪 半兩

右劉碎每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

羌蔚子丸 治時氣後眼暗及有翳膜

羌蔚子 澤瀉 剉 枸杞子 青箱子

枳殼 去核 生地黃 剉 石決明 麥門冬 剉 心

細辛 剉 苗 車前子 剉 黃連 三兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後用漿

水送下

瀉肝散 治天行後赤眼外障

和母 黃芩 枳殼 剉 羌蔚子

大黃 玄參 羌活

右劉碎每服五錢水一盞煎至五分去滓食後溫服

大黃丸 治白睛腫脹痛不可忍

瀉肺湯 治暴風客熱外障白睛腫脹	水送下臨卧時再服	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後以溫	决明子 <small>微炒</small> 冬瓜子 青箱子 地膚子	車前子 <small>各一兩</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前用溫	酒送下日再服	桑白皮散 治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛腫脹日夜疼痛	心胃煩悶	桑白皮 玄參 川升麻 旋覆花 <small>去枝</small>	赤芍藥 杏仁 甘菊 <small>花去枝</small> 甜葶藶 <small>炒</small>	防風 <small>去芦</small> 黃芩 枳殼 <small>去穢</small> 甘草 <small>炙</small>	右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓食	後溫服	洗眼青皮湯 治眼白睛腫起赤瘳痛痒	青皮 <small>去粗</small> 桑根白皮 萎蕤 <small>略</small> 川大黃	玄參 梔子仁 青蘗 <small>湯下</small> 竹葉 <small>一握</small>	右咬咀以水二大盞煎至一盞半入鹽濾去滓微熱淋洗	冷即再煖洗之	玄參丸 治肺臟積熱白睛腫脹遮蓋瞳人開張不得赤澁疼	玄參 川升麻 漢防己 羚羊角屑	沙參 車前子 梔子仁 桑根白皮	杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small> 大麻仁 川大黃 <small>微炒</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後以溫
--------------------	----------	------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------	----------------------------------	---	--	------------------------	-----	------------------	---	--	------------------------	--------	--------------------------	-----------------	-----------------	---	------------------------

乳香 <small>各等</small> 沒藥 黃連 雄黃	益硝 <small>各等</small>	右為細末鼻內噴之	一捻金 治眼睛痛	服小便不利 茯苓澤瀉各半兩	右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎臨卧熱	生地黃 當歸 <small>略</small> 甘草 <small>炙</small>	柴胡 <small>一兩</small> 瓜蒌根 <small>二兩</small> 黃芩 <small>四兩</small>	作內障也得之於飽勞後	拈痛散 治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛脈弦欬	桑本 <small>略</small> 細辛 羌活 <small>子</small>	人參 茯苓 芍藥 五味子	補肝散 治眼痛如鐵刺外障	不拘時溫服	右為末每服三錢水一盞入砂糖二錢同煎至七分去滓	白芷 細辛 防風 赤芍藥 <small>各等</small>	治睛疼難忍者	右研勻綿裹以雪水三合浸一宿濾入磁盒中每用以銅	硃砂 <small>各一兩</small> 杏仁 <small>微炒</small> 青蘗 <small>略</small> 馬牙硝 <small>細研</small>	硃砂 <small>各一兩</small>	黃連 <small>研末</small>	右研碎每服五錢水一盞煎至五分去滓食後溫服	硃砂 <small>各一兩</small> 治眼白睛腫起赤澁疼痛	羌活 黃芩 玄參 <small>略</small> 地膚皮	桔梗 大黃 芒硝 <small>略</small>	活法 黃芩 玄參 <small>略</small> 地膚皮
-------------------------------	----------------------	----------	----------	---------------	------------------------	---	---	------------	--------------------------	--	--------------	--------------	-------	------------------------	--------------------------------	--------	------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------

效苦散 治眼睛痛不堪忍

川芎 當歸 防已 防風 各半

右為細末每服三錢熱酒調服

點眼金華水 治肝臟有熱血脈壅滯津液不流目中溢淚痛

黃連 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂

銅綠 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂

艾灰 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂

右已上九味研令勻與右老錢在綿子內以井華水浸三

七日後點目背頭

黃牛膽煎 治眼澁痛

黃牛膽汁 鯉魚膽汁 豬膽汁 羊膽汁 各半

熊膽一分 胡黃連一分 黃連一分 青皮一分

白蜜 三兩

右將諸藥末與蜜并膽汁和勻入磁瓶子內以油紙封固

牢繫坐飯甌中蒸符飯熟為度用新綿濾過每以銅筋取

如麻子大點目背日二三度

治眼澁痛方 治目澁痛不能視物及看日光并見燈火光不

得者

右用熟羊頭眼中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取

如小豆大安眼睛止仰卧日二夜二不過三四度瘥

黃連散 治目痒急赤痛及目中百病

右用黃連去鬚剉碎半兩以人乳浸點目背中

又方 治一切風眼皮上癢痒生瘡赤色上下皮膜鮮爛發作

無時經年累歲不効

右先用蜜少許以磁刺盛之於慢火上煖令熱下輕粉搗

令勻非特點癢痒處

點眼麩仁膏 治風熱眼飛血赤脈痒痛無定

麩仁 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂 硃砂

右將麩仁與酥相和研勻攤碗內後取艾一小團燒令煙

出即將碗覆煙上熏待艾煙盡即止重研令勻每以麻子

大點兩背頭日二度

魚膽傳眼膏 治飛血赤脈作痛及暴赤眼澁

鯉魚膽 五枚 黃連 末半兩

右取膽汁調黃連末於磁盒盛於飯上蒸一次取出如乾

入蜜少許調以膏塗傳目背日五七度

車前散 治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳仁羞明多

淚宜服之

車前子 密蒙花 草決明 白蒺藜 各等

龍膽草 菊花 粉草 各等

右為細末每服二錢食後米湯調服

治血灌瞳仁生障膜

右取生地黃汁溫服一小錢頻服以瘥為度

麥門冬湯 治血灌瞳仁昏澁疼痛及輕轉閉外障

麥門冬 去心 大黃 黃芩 去黑 桔梗 剉炒

玄參 細辛 去苗 芒硝 研各

右剉碎每服五錢七水一盞半煎至七分去滓下芒硝

少許食後溫服

真珠散 治眼血灌瞳仁生障膜

真珠 水晶 琥珀 馬牙硝 各半

硃砂 一兩 龍腦 一分

右同研如粉以銅筋取如半小豆大點之

本醫院經驗奇效良方卷之五十二終

太醫院經驗奇效良方卷之五十八

耳鳴耳聾門

附論

河間云耳者蓋非一也以竅言之是水也以經言之手足少陽
低會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入者經見有
若蟬鳴者有若鐘聲者有若火燭燭然者各隨經也之其間虛
實不可不察也夫耳鳴有聲非妄聞也耳為腎竅交會手太陽
少陽足厥陰少陰少陽之經若水虛火實而熱氣上甚客其經
絡衝於耳中則鼓其聽戶隨其脈氣微甚而作諸音聲也經言
使聽之玄府壅塞神氣不得通泄也其所驗者論曰屬足少陰
腎經寄竅於耳而通之所主者精氣調和腎氣充足則耳自
聰矣且耳聾所感不一有勞傷氣血風邪乘熱使精脫腎虛而
聾者有挾風而聾者有勞損而聾者蓋十二經脈上絡於耳其

諸經適有交併則氣逆而為厥厥氣搏入於耳為厥聾耳為
厥聾耳者宗脈之所附脈盛而風邪乘之風入於耳使經氣否
而不宣為風聾勞後傷於血氣滯然耗其精元瘦悴力疲昏昏
憤憤為勞聾或人善調養氣血和平不妄作勞其證漸愈或不
能謹避勞傷精氣神風邪停滯則為久聾之證又有耳觸風邪
與氣相搏其聲嘈嘈或見光為虛鳴有熱氣乘熱隨脈入耳
聚熱不散膿汁出焉為膿耳俗醫多用標悍燥烈之藥制之徒
往謂腎水虛冷故也夫心火本熱虛則寒矣腎水本寒則熱
矣腎水既少豈能反為病耶故一法用酒浸針砂一日至晚六
針砂將酒含口中用好磁石一塊綿裹塞耳在左塞左在右塞
右欲導其氣而通泄也或問曰聾既為熱或服乾燥生薑附子
醇酒之類性熱之物而或愈者何也答曰欲以開發玄府而令
耳之竅通泄也凡治聾者適其所宜若熱證已退而聾不已

以辛熱之劑發散疾止即已不可久服恐熱極而成他病
若聾甚困絕亦為難已慎不可攻之過極反傷正氣若非其病不
可服其藥飲食同法當所宜者過度則反傷正氣病已即止藥
欲求不病無損而已矣又言老人之氣也多病頭目昏眩耳鳴
戰慄上氣等證此皆陽實陰虛之證也俗言老弱為虛冷而無
熱也縱有熱證或云少水不勝多火而反言腎水虛則為寒此
乃世受誤之由也可不鑒哉

耳鳴耳聾通治方

犀角飲子 治風熱上壅耳內壅閉聾聵痛膿血流出

犀角 銹 木通 石菖蒲 甘菊花 根 枝

玄參 赤芍藥 赤小豆 炒 甘草 炙

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

並言散 治風入耳聾鳴

白芷 蒼朮 陳皮 石菖蒲 炒

細辛 厚朴 製 半夏 製 紫蘇 葉 葉

辣桂 木通 甘草 炙 川芎 二錢

右作一服水二鍾生薑五片葱白二根煎一鍾食後服

排風湯 治風虛耳聾

方見風門

芍藥散 治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血流出

赤芍藥 白芍藥 川芎 木鱉子

當歸 羌活 甘草 炙 半

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

益氣聰明湯 治飲食不節勞役形體脾胃不足得受內障耳
聾之患服此令人精神過倍元氣自益身輕體健耳目聰

明矣

黃蘗酒製 芍藥各半 蔓荊子一錢 升麻

葛根錢各半 人參 黃芪 甘草錢各二

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

治厥耳聾

右用和劑流氣飲加石菖蒲生薑三片葱白三根同煎食

後溫服

往星散 治風虛耳聾

辣桂 川芎 當歸 石菖蒲

細辛 木通 木香 白蒺藜炒去

麻黃去節 甘草炙 白芷稍 天南星煨裂各

右作一服水二鍾葱白二根紫蘇五葉生薑五片煎至一

鍾食後服一方加全蠍去毒一錢

益腎散 治腎虛耳聾

磁石火煨醋碎七 巴戟 川椒開口者

石菖蒲 沉香各半

右為細末每服二錢用猪腎一隻細切和以葱白少鹽并

藥溫紙十重裹煨令香熟空心細嚼溫酒送下

蔓荊子散 治內熱耳出膿汁

蔓荊子 赤芍藥 生地黃 桑白皮炒

井菊花 赤茯苓 川升麻 麥門冬去心

木通 前胡 甘草炙

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食後服

通神散 治耳聾

全蠍一枚 地龍二條 土狗二枚 明礬半生

雄黃兩半 麝香一字

右為細末每用少許葱白蘸藥引入耳中閉氣面壁坐一

時三日一次

補腎丸 治腎虛耳聾

巴戟去心 乾薑炮 芍藥 山茱萸

桂心 遠志去心 細辛 兔絲子酒浸

澤瀉 石斛 黃芪 乾地黃

當歸 蛇床子 牡丹皮 肉蓯蓉酒浸

人參 附子炮 甘草已二各 石菖蒲一兩

茯苓半兩 防風半兩 羊腎二枚

右為細末以羊腎研爛細酒煮麩糊丸如梧桐子大每服

五十九空心鹽酒送下

菴蓉丸 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉蓯蓉酒浸 石龍芮 石菖蒲 山茱萸去核

兔絲子酒浸 川羌活去步 鹿耳酒炙 磁石火煨醋碎

附子炮 石斛去核各 全蠍去毒 麝香研旋入

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心用鹽

酒或鹽湯送下

通耳法 治耳聾久不聞者

磁石用紫者如 穿山甲燒存性為

右二味用新綿子裹了塞所患耳內口中嚼少生鐵齋耳

內如風兩聲即愈

紅綿散 治聾耳出膿及黃水

白礬錢 明礬一字 麝香少許

右為細末先用綿杖子纏去耳中膿水盡方用綿杖子送

藥入耳中令到底摻之一方加黃丹龍骨

磁石丸 治風虛耳聾無聞

磁石 <small>火煨</small> 防風 <small>去毒</small> 羌活 <small>去毒</small> 黃芪 <small>去毒</small>	木通 <small>去毒</small> 白芍藥 <small>桂心</small> 入參 <small>去毒</small>	右為細末用羊腎一對切去脂膜搗爛打酒糊為丸如梧 桐子大每服五十九空心溫酒送湯任下	肉苁蓉 <small>酒浸</small> 兔絲子 <small>酒浸</small> 山芋 <small>白茯苓</small>	人參 <small>官桂</small> 防風 <small>去毒</small> 熟地黃	芍藥 <small>黃芪</small> 附子 <small>皮</small> 羌活 <small>去毒</small>	澤瀉 <small>各</small> 羊腎 <small>一對</small> 切去 <small>去毒</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫 酒送下	桑螺消湯 <small>治虛損耳聾</small>	桑螺 <small>十枚</small> 當歸 <small>五十八卷</small> 白木 <small>米泔</small> 白茯苓 <small>去皮</small>	官桂 <small>去毒</small> 附子 <small>白</small> 牡荊子 <small>磁石</small>	葛蒲 <small>米泔</small> 乾地黃 <small>各</small> 大黃 <small>剉炒</small> 細辛 <small>去毒</small>	川芎 <small>牡丹皮</small> 各半	右吹咀每服三錢七先以水三盞煮猪腎一隻取汁一盞 去腎入藥煎至七分去滓食前溫服	追風散 <small>治耳聾閉塞不通</small>	雄黃 <small>川芎</small> 石菖蒲	全蠍 <small>白芷</small> 藿香 <small>少許</small> 鵝不食草	薄荷 <small>苦丁香</small> 各等 <small>麝香</small> 少許	右為細末每用些少吹鼻中如無鵝不食草加片腦少許	清神散 <small>治氣壅頭目不清耳常重聽</small>	井菊花 <small>白殭蚕</small> 各 <small>羌活</small>	木通 <small>川芎</small> 防風 <small>各</small> 木香 <small>一錢</small>
---	---	--	---	---	---	---	-------------------------------	---------------------------	--	--	---	--------------------------	--	----------------------------	--------------------------	--	---	------------------------	--------------------------------	--	---

石菖蒲 <small>甘草</small> 各半	右為細末每服二錢食後茶清調服	磁石 <small>二兩</small> 火煨 <small>醋</small> 七次 <small>用</small> 葱子 <small>一合</small> 木通	川椒 <small>去毒</small> 石藥 <small>去毒</small> 防風 <small>遠志肉</small>	白朮 <small>茯苓</small> 細辛 <small>鹿茸</small> 酒浸	川芎 <small>山藥</small> 木香 <small>鹿茸</small> 酒浸	當歸 <small>黃芪</small> 川鳥 <small>一兩</small> 石菖蒲 <small>半</small>	肉桂 <small>半</small> 熟地黃 <small>二兩</small>	右為細末用羊腎兩對去膜以酒煮爛和諸藥末搗以煮 腎酒打糊和丸如梧桐子大每服百十九空心溫酒送湯 任下仍服清神散二藥相間服忌牛肉鷄鴨子	草麻子 <small>去毒</small> 松脂 <small>黃蠟</small> 杏仁 <small>去皮</small> 各半	乳香 <small>食鹽</small> 巴豆 <small>去皮</small> 各一分	右搗爛如膏捻如棗核樣如小拇指大以黃蠟薄捲之大 針刺兩三眼子兩頭透用塞耳經宿當聞鐘聲黃水出愈	雄黃散 <small>治耳聾</small>	雄黃 <small>防風</small> 礬石 <small>石菖蒲</small>	烏頭 <small>去毒</small> 川椒 <small>去毒</small> 各一分	大棗核 <small>十枚</small>	右為末以香燻中安艾一彈子大次着黃藥末半錢七於 艾上復以藥二錢七着艾上火燃向耳熏之	蒲九 <small>治腎虛耳聾重聽過於思慮則其病尤甚此藥主之</small>	石菖蒲 <small>蜀椒</small> 各 <small>葱子</small> 各半	皂莢 <small>一錢</small> 去 <small>羊腎</small> 一對 <small>切</small> 作 <small>片</small> 曬乾	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒
--------------------------	----------------	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	------------------------	--	---	-----------------------	---	--	--	--	------------------------

送下日三服凡欲服此藥臨睡時先將藥物於所患耳邊口中以牙齒咬定却以礪石一小塊塞耳內充氣微通略能聽聲然後服藥

透耳筒 治耳聾乃因腎虛耳中如風水聲或如鐘鼓聲

楸目 巴豆 薑蒲 松脂各一

右為末攤令薄捲作筒子塞耳內一日一易一方同川楸以蠟為丸如棗核大塞耳中一方無松脂

治耳聾方

一豆三指不出油

麝香少許用真脩

煉蜜為丸麥粒大

綿裹錠子耳中投

燒腎散 治耳聾

磁石沈細研碎七

附子炮去心 巴戟去心

川椒去目并合口者

右為細末每服用狗腎一隻去筋膜細切葱白薑白各一分切入藥一錢益花一字和棗令勻以十重溫紙裹於煆灰火內煨熟空心細嚼用酒解薄粥送下十日大効

桂心膏 治耳聾

桂心針八 野葛六錢 成煎雞肪五兩

右咬咀於銅器中微火煎三沸去滓密貯勿泄以葦筒盛如棗核大火炙冷少熱飲即側耳灌之如此十日即時自出大如指長一寸久聾不過三十日以髮裏膏深塞莫使泄氣五日乃出之千金翼云治二十年耳聾

鯽魚膽膏 治耳聾

鯽魚膽一枚烏雞脂少許 生油半兩

右和勻內撲葱管中七日滴於耳內瘥

蠟稍膏 治遠年近日耳聾

蠟稍七枚 淡豉二十一粒 巴豆七粒去心

右先研蠟稍淡豉令細別研巴豆成膏同研勻捏如小棗核狀用葱白小頭取孔以藥一粒在內用薄綿裹定時置在耳中來早取出未通再用以通為度

鼠膽丸 治遠年近日耳聾不聞入聲

曾青一錢 龍腦半錢 凌霄花三錢

右為細末每用一字吹入耳內後用鼠膽滴入耳內隨即用綿子塞內從晚塞到晨雞報曉取綿子耳鳴大驗

薑蒲散 治耳聾

石薑蒲十兩一寸 蒼朮五兩

右剉成塊子置於瓶內以米泔浸七日取出去蒼朮只將薑蒲於甌上蒸三兩時取出焙乾搗為細末每服二錢糯米飲調服日進三服或將蒸熟者作指頂大塊子食後置口中時時嚼動熱洋亦可

雞卵方 治耳聾

新雞卵一枚 巴豆一粒去心

右先以雞卵上開一竅將巴豆納雞卵中以紙兩重黏貼蓋却與雞抱以其餘卵雞子出為度取汁滴於耳內日二次五七日瘥

治耳聾方

右用蒼朮一塊長七分將一頭削尖一頭截平將尖頭揸耳內平頭上安筋頭艾炷灸之輕者灸七壯重者灸十四壯耆耳內有熱氣者効

又方

右用竹筒盛鯽魚膽吹飯煮熟之令煙注耳中一方生用鯽魚腦綿裹包入耳中一方用鯽魚膽滴耳中並瘥

量蠟散 治耳龍氣空腎虛等證

右用全蠟四十九箇去盡油濕以糯米半升於大瓦鋪平將蠟鋪於米上焙令米黃為度去米不用又切生薑四十片每片放蠟并焙盡焦為度去薑不用將蠟研為細末三五日前每日先服黑錫丹三五服臨服藥時令夜飯半飽服時看其入酒量勿令大醉酒調平令其人睡切勿令人叫醒令熱即却令人輕喚如不聽得濃煎葱白湯一梳令飲耳即鳴五更耳中聞百十擗笙響便自此聞聲一方無糯米製銀石器炒

治耳聾方

右用蠟紙一張剪作四片每一片於筋上緊捲抽却筋以蠟紙捲子安耳中燃之待火欲至耳急除去當有惡物出在紙紙上日一角凡子以蠟塞之

治耳聾法

右用耳邊半寸小葉神兩耳中却將甘草口中嚼目然聽

驢脂方 治積年耳聾

右用驢生脂和生薑熟搗綿塞耳數次能聽一方有川椒無生薑有人耳聾一日一作可畏直挑剔出血稍愈此乃腎臟虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服透水丹勿飲酒喫溫麩菜鷄猪之屬能盡一月為佳不能戒無効

治大病後耳聾方

右用生薑蒲梨汁滴耳中即効

醋附方 治耳龍塞耳疼痛

右用附子以醋醋煮一宿削如棗核以綿裹塞耳中一方

治風聲仍炎上星二七壯令氣通耳中即瘥

龜尿方 治耳聾滿耳

右用龜一枚安於合中荷葉上養之專看葉上有屎收取滴耳中一方用素龜推者以礪機中或盆內置之以鏡照龜既有鏡中影往七法發而失溺無以物收取用之又一法以紙炷火上燻熱以照其尻亦能失尿

乾地龍方 治耳聾耳鳴

右以乾地龍入鹽罈在葱尾內為水煎之一方為末用綿裹如棗核大塞耳中三五日即瘥一方用白頸者安葱葉中封頭蒸熟化為水以滴耳中

通氣散 治耳聾氣閉不通

茴香 木香 全蠟 玄胡索

陳皮 薑蒲絲 羌活 僵蠶

川芎 桑寄生 穿山甲 甘草 半錢

右為細末每服三錢不拘時溫酒調服

白龍散 耳者宗脈之所通小兒腎臟盛而有熱熱氣上衝於耳津液結滯則生膿汁有因沐浴水入耳內水濕停積搏於血氣凝積成熱亦令耳膿汁出謂之聾耳久而不瘥則變成聾

白礬 黃丹 龍骨 麝香 一錢

右研極細元以綿杖子裹盡耳中膿水用藥一字分搽兩

耳內日二次勿令風入

礬石浸酒方 治風邪之氣干於腦或入於耳久而不散經絡

瘡塞不能宜利使人耳中怪也然或作旋運

礬石 五所 防風 山茱萸 天雄 去皮 兩

木通 防風 薯蕷 菖蒲

遠志 去心 芍藥 細辛 蔓荊子

白茯苓 乾薑 肉桂 井菊 花 一

熟地黃 三兩

右細剉和勻以生絹袋盛以酒二斗浸七日後每日任性飲之以瘥為度

魚腦膏 治風聾耳鳴

生鯉魚腦 二兩

當歸 切焙

細辛 洗苗

附子 炮去

白芷

當歸 各半

右除魚腦外搗為細末以魚腦置銀器中入藥在內微火

上煎候香濃去滓傾入磁盆中候凝丸如棗核大綿裹塞耳中一方無膏蒲有羊腎脂同魚腦先熬次下諸藥

羊腎膏方 治風虛耳聾

杜仲 去粗皮

黃芪 剉各

磁石 五兩

綿裹煎水淘去赤汁

羊腎 脂一兩

去粗皮

右以水三大碗先煮磁石取汁二大碗下杜仲等又煎取

一盞半去滓入羊腎雙米一合葱白薑椒鹽醋一如作羹

法空心服

白鹽方 治卒得風疾費耳恍惚卒痛者

右用鹽五升甌上蒸熱以耳枕之冷即換亦治耳疼一方用軟布裹患耳或青布裹益亦可

肉菴菴丸 治勞瘵腎虛損腰脚無力面黑體瘦小便滑數

肉菴菴 酒浸一宿

石菴蒲

附子 炮去

鹿茸 去皮

磁石 燒令赤醋半七次

巴戟 去心

石斛 去根

杜仲 炒去

兔絲子 水淘淨酒浸三

補骨脂 炒

桑螵蛸 炒

熟地黃

牡蠣 煅

桂心 剉

右為細末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三五

十九空心溫酒送下晚再服

十九空心溫酒送下晚再服

十九空心溫酒送下晚再服

十九空心溫酒送下晚再服

羊腎附子丸 治勞瘵

附子 炮去

肉菴菴 酒浸遠志 去心

兔絲子 酒浸

牛膝 去苗

磁石 燒令赤醋半七次

右為細末用羊腎五對去脂膜細切爛研入酒三升於銀

鍋中微火煎如膏然後入藥末和搗三五杵丸如梧桐

子大每服五七十九空心溫酒送下鹽湯亦可

通耳丸 治卒聾及腎虛耳內作風水聲鐘聲

穿山甲 炒去

蝦蟇 七箇

麝香 少許

右為細末以蠟入麻油一滴為丸綿裹塞耳內

治暴耳聾

右用鷄心檳榔一箇以刀子從臍剉取一竅如錢眼大實

以麝香坐於所剉耳內從上以艾炷灸之不過二三次効

犀角散 治風毒壅熱心腎交滯兩耳聾頭重目眩

犀角 屑

前胡 去芦

井菊花

枳殼

生地黃

澤瀉

羌活 各半

麥門冬 去心

右以咀每服三錢水一中盞煎至五分去滓食後溫服

茯神散 治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急昏悶不利

茯神 去木

羌活

防風 去叉

黃芪 剉

石菴蒲

薏苡仁

麥門冬 去心

石菴蒲

五味子 剉半

右以咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓

食後溫服

羚羊角散 治耳聾不聞言語利腎氣退熱

羚羊角 剉

沙參

澤瀉

防風

木通 各二

旋覆花

石菴蒲 剉半

前胡 各三

三三一

奉牛半兩

右吹咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至五分去滓食後服

磁石散 治暴熱耳聾心膈壅悶

磁石水煆碎 木通 桑白皮 生地黃

防風 枳殼炒

石吹咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓空心溫服

單麻子丸 治久聾方

單麻子二十一箇 皂角半箇取肉 生地龍一箇

全蠍二箇 遠志去心 磁石火煆細水飛

乳香各一

右為細末以黃蠟密和為丸塞耳中

天椎鷄子方 治耳聾三十年不聞者

天椎一分 附子一分 鷄子一枚

右為細末將鷄子一孔取去黃用清和藥却內鷄子封合其頭還令鷄抱之待諸雞出其藥乃成取出以綿裹塞耳內取瘻為度

通氣散 治久聾諸藥不効

穿山甲炮 藜蘆各半 麝香一錢

右為細末以葱涎和劑塞耳中或為細末以少許葱管盛藥效耳中

水銀方 治久聾滿耳

水銀一分 磁石一分

右就樓煮鐵內以一盞去尖頭入水銀磁石刻在內即緊却頭勿令傾出候虹化為水取滴耳中愈

大蒜方 治耳聾久不効者

大蒜一箇 治耳聾久不効者

右用大蒜一瓣一頭刻一坑子以巴豆一粒去皮慢火炮令極熟入在蒜內以新綿裹定塞耳中不過三四次効

勝金透關散 治多年耳聾不可治者用此十日見効除兩根

川烏頭一箇炮去皮 細辛各一 膽礬半錢

右為細末用鼠膽調和勻再焙令乾研細却入麝香半字用鵝毛管吹入耳中吹時口含茶清待少時

龍齒散 治腎虛熱毒乘虛攻耳致耳內常鳴如蟬聲不可專服補藥宜用此方

龍齒 人參 白茯苓去皮 麥門冬去心 遠志去心 丹砂研 鐵粉研 龍腦研

右為細末研勻每用半錢是食後用沸湯調服日三服痛愈即已

地黃湯 治男二十歲因房毒後腎經熱右耳聽事不真每心中不寧則轉覺重聽盛鳴疼痛

生地黃半兩 桑白皮一兩 磁石煆碎水淘 羌活 羌活 木通 甘草各半 防風 黃芩

右吹咀每服四錢水一盞半煎七分去滓日二三服不拘時候一方無磁石

麝香散 治耳內盛鳴

麝香半錢 全蠍十四 薄荷十四 桑葉各半

右為細末滴水捏作挺子塞耳內極妙

療耳鳴湯 吳茱萸 巴豆去皮 乾薑 石菖蒲

礞石 細辛一分
 右為細末用錫膏和少許以綿裹塞耳中以磁五升布裹
 蒸乾耳門令燥氣進入耳內冷即易之如此數次瘥後常
 以亂髮捲塞耳中慎風一方無磁石

川芎 當歸 細辛半 石菖蒲

官桂 法粗 白芷 三

右吹咀每服三錢水二盞入柴蘇薑棗煎至一盞去滓不
 拘時服如虛冷甚者酌量加生附子益腎者宗脈所聚耳
 為之竅血氣不充宗脈乃虛風邪乘虛隨脈入耳氣與之
 搏故為耳鳴先用生料五苓散加製枳殼橘皮紫蘇生薑
 同煎吞青木香心淡下疎風下氣續以芎歸飲和養之
黃芪丸 治腎虛耳鳴 間腫者如打戰鼓耳內風吹更四

肢抽掣疼痛

黃芪 一兩 羌活 白蒺藜 无上炒去 刺各半

黑附子 大者 錫羊腎

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三四十九空心煨
 菴鹽湯送下一方有破故紙無白蒺藜

生犀丸 治耳中策策疼痛

犀角 炙 牛黃 南星 白附子 炮

乾薑 炮 升砂 沒藥 研 半夏 湯洗

龍腦 研 乳香 研 烏蛇 酒浸去 官桂 一分

防風 富 麝香 研

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心用溫
 酒送下

白龍散 治耳中卒然大痛治瘡生肌止痛

蓬砂 三錢 消石 研一兩 輕粉 研一錢 烏賊魚骨 研各
 右為細末每用少許搽耳中或油調如糊流耳中痛立止
治耳內疼

穿山甲 二片 狗子 二箇

右將土狗子夾在穿山甲內同炒焦黑色為度入麝香少
 許同研細末吹一字於耳內一方治耳聾

又方

用草烏削如棗核大蘸生薑自然汁塞耳內其疼立止一
 方不用薑汁

治耳內疼痛方

右用鬱金研細末字月一字以淨水調傾入耳却急傾出
杏仁膏 治耳中汁出或膿或膿

右用杏仁炒令赤去皮油成膏薄綿裹內耳中日三四度易
 之或亂髮裹塞之或如一方治耳卒痛或水出用杏仁炒
 焦為末葱涎搜和為丸以綿裹塞耳中熏耳亦可又治耳
 中腫兼有膿

礞石散 治耳卒腫出膿并底耳及治耳聾不聽有虫

右用礞石整令研細每以箒筒吹少許入耳中日三
 四度或以綿裹如棗核大塞耳中亦得一方先以乾薑搽
 之次入礞末尤妙一方先以紙纏去耳中汁次以礞末粉
 耳中次以食鹽末粉其上食久乃起不過再度亦瘥一方
 不用鹽

又方

用商陸生者洗淨以竹刀子削如棗核大塞耳中亦治耳
 內生瘡

葱涎膏 治耳聾耳鳴不可強挑

葱汁三合 細辛去苗 附子炮去皮

右將細辛附子為末以葱汁調令稀灌入耳中

柴胡聰耳湯 治耳中乾耳聾耳鳴致聾

柴胡三錢 連翹四錢 水蛭半斤炒 玄參三兩 歸身一兩

右除牙研外以水二盞入生薑三片煎至一盞去滓稍熱

下水蛭等末再煎一二沸食遠稍熱服

通氣散 治聾耳

郁李仁去皮 芍藥 人參各半 大黃

山芋 官桂去皮 檳榔三枚 牡丹皮

木香 細辛去苗 甘草炙

右為細末研勻每服一錢匕空心溫酒調下

治聾耳有膿

龍骨 杜梨 胭脂 海螵蛸各等

右為細末先繳耳淨將藥乾摻耳中

葛蒲散 治聾耳膿汁不止

葛蒲各 狼毒 磁石煅 附子炮去

右為細末以羊髓和少許綿裹塞耳中

竹蚌散 治聾耳

苦竹桂末 白礬各 乾胭脂半錢 麝香一錢

右研極細以綿杖子捲之却以鴨毛管輕吹一字入耳

蠟倍散 治聾耳膿汁不止

全蠍三錢 五倍子一兩 白礬一錢 麝香少

右為細末研勻每用少許吹耳中一方加乾胭脂

立效散 治聾耳底耳有膿

陳廬皮一錢 麝香少

右研勻每用少許先以綿拭耳內膿淨上藥

治聾耳方

麝香少 蟬殼半兩 蟬殼半兩

右研極細先用綿拭耳內膿令淨吹入藥柱耳門不得動

治聾耳膿水不止

狗膽一枚 枯礬一錢

右以臘猪脂調和納耳中以綿塞之不經三四上除根

麝香散 治聾耳底耳有膿

麝香少 桑椹一分 桑椹一分

右研極細每用半錢先以綿杖子拭去膿以藥摻之

香附散 治膿耳

右用香附子去毛研為末以綿杖送入耳內

附子丸 治耳聾出膿疼痛及耳聾耳

附子炮去 葛蒲各 白礬各 單麻仁研

右為細末研勻熔黃蠟和攪如棗核大針穿一孔令透塞

耳中日一換一方治耳聾不用黃蠟搗成膏以綿裹如棗

核大塞耳亦瘥

治耳膿

蜜陀僧一錢 輕粉半錢 麝香一錢

右為細末先以綿拭耳內膿却搽藥

三黃散 治耳內流膿

全蠍三錢 五倍子一兩 白礬一錢 麝香少

椎黃

硫黃

唯黃各等分

右為細末以少許吹入耳內立効

三聖散 治耳內出膿水

羌活

白附子炮各

右為細末用猪羊腎各一隻切開每隻入藥末半錢不符着盞濕紙裹煨熟五更初温酒嚼下續喫粥壓之

麝香佛手散 治五般耳出血水者

麝香少許

人牙煨過存性

右為細末每用少許吹入耳內即乾及治小兒痘瘡出現而醫者酒調一字服之即出

治凍耳成瘡

栢葉

三兩微杏二四十九枚湯浸炙為末

亂髮兩雞子大

食鹽

細研

乳香半兩

黃蠟半兩

清油一斤

右先煎油令沸即下乳髮以消盡為度吹下諸藥煎令焦黃瀝去滓更以綿裹過再以慢火煎之後下乳香黃蠟等梳令稠稀得所於磁器盛每用搗翎旋取塗之

治耳瘡方

土馬駿

井中苔各等分

右為細末以燈盞內油調塗之

黃馬散

治耳內外惡瘡及頭瘡口邊肥瘡癩瘡

黃栢

半兩

馬齒莧乾者

右為細末每用小豆許綿裹內耳中外傳之

治凍耳成瘡

栢白皮

榆白皮

桑白皮

杏仁湯浸去皮

甘草

一斤

羊髓半斤

右細剉以羊髓煎令黃瀝去滓於磁器盛每用搗翎

藤藥塗之

五驗散 治蚰蜒入耳

川芎

白芷

夜明沙炒

猪牙皂角炙

南星炮各

百部

白丁香

藥廬各四

草烏半兩

砒霜別研

草撥各二

海金沙一分

右為細末研勻臨時更用鉛丹調色勻磁器收如蚰蜒入耳取少許以醋一滴調化以細翎蘸藥入耳竅微吹令藥氣行立出藥不得多多即化蚰蜒成水不出如蠟螫先點少醋在螫處搽藥半字許擦令熱即効

治蚰蜒入耳方

雄黃

綠礬

礬石

半夏各一

及治蜈蚣諸虫入耳

右為細末以醋調一

治蚰蜒入耳

胡砂

膽礬

右研細以鷄翎管吹一字入耳中虫化為水

治百虫入耳

桃葉心二七

胡麻令香

右先以桃葉心塞耳中其虫必死未出將胡麻以葛袋盛枕耳邊虫自出

治蚰蜒入耳方

右用鷄一隻去毛足以油煎令黃筋穿作孔枕之

車脂膏 治百虫入耳

右取車轄脂傳耳孔虫自以肘後療聾耳膿血出綿裹塞

耳中

治百虫入耳方

右用鷄冠血滴入耳即出

治蛇入耳方

右用綠礬為末水調灌耳立出

治蛇入耳方

右用雄黃為末醋調灌耳立出

治蛇入耳方

右用銅牛一箇全搥碎置於耳邊即出一方去殼研爛滴水五七點研勻灌耳內自然出如無活者乾者研末亦可一方為末吹耳中以紙糊耳其虫自出

治百虫入耳方

右搗韭菜汁和醋灌耳中即出只以韭汁亦可

治諸虫及風等入耳方

右用白膠香燒因蒸耳令知耳孔內暖其虫自出

治飛虫入耳方

右用酸醋滴耳內虫必出不出必死

治蛇入耳方

右用牛乳一盞少少灌入耳內即出若入腹者飲一二升當化為黃水出未出更飲一方用牛酪

治蛇入耳方

右用驢乳灌耳中其虫從左耳入右耳出一方用黑驢乳汁灌之亦妙

治蛇及百虫入耳方

右以香油少少灌耳中若入腹者空腹服酢酪一升不出更服仍以麩和燒餅乘熱傳耳門須臾即出

又方

用水銀一大豆傾入耳中敲耳孔向下於

器物

又方

右用麻油作煎餅餅外以耳梳之須臾出
在河陽日蛇入耳無計可為半月後中門有聲腦悶不可徹至以頭自擊門柱疾狀危極因發御藥以療之無瘥者為受苦不願生存忽有人獻此方及愈

治百虫入耳方

右以火照之即向明出

治百虫入耳方

右以刀兩口於耳上相擊作聲虫即走出

治蜈蚣入耳方

右即閉氣氣滿即吐復閉取令出或死耳中徐徐以物鉤出之若積久不出者取新熟鷄肉安耳竅上虫即出

治惡虫入耳方

右用香油搗碎灰下置耳中即出

追毒膏

治百虫入耳不出

白礬

右為細末用香油調成膏每用皂角子大塞耳虫即出

諸虫入耳方

右用挑乘為挑虫自鼻出形如鷹嘴人莫知其名有人納蛇入耳過其極時以頭撞柱至血流不知其痒不可忍蛇入耳性性食髓至盡又能孳生凡虫麻油灌妙

治蛇及百虫入耳

右以鷄心血以生油調入耳內虫即出

治百虫入耳方

右以川椒為末一錢醋半盞浸一宿良

耳中其

治出入耳方

右以高良薑汁滴耳中虫出或以切熟猪心

治蚤虱入耳痛

右以薑蒲為末炒乘熱以綿裹着耳邊

蟬彈丸

治兩耳聾聾

白茯苓二兩山藥三兩杏仁一兩半

右為細末以黃蠟二兩熔和丸如彈子大每服一九食後

塞耳丹

石菖蒲一兩巴豆去殼全蠟一兩

右為細末葱涎和丸如蠟裹塞耳內

新編大醫院奇效良方大全卷之五十九

附論

鼻者肺之竅主清氣以入之道路若氣血和平陰陽升降則
又因飲食勞倦因時鼻氣不得宣通清道壅塞其為病也若積
熱客於陽明遂以迫血妄行自鼻孔中出謂之衄熱則津液中
乾冷則腦髓流注或風冷隨氣入於經上貫於腦下貫於鼻則
涕下不能自收謂之流涕或冷滯氣塞鼻則不聞香臭於是為
鼻翳血脈聚日又纏綿轉加壅結變生瘰癧或氣壅滯於上為
邪熱留伏不散則為鼻齋久則變為鼻痔鼻痔者鼻之為
不逆風熱而一河間云鼻窒塞也火主鼻以腫脹故熱者明
而鼻中膜脹則鼻窒塞也或謂寒主閉藏表以鼻窒為寒者誤
也蓋陽氣其入而下竅閉塞者為陽明

之脈左右相交而左

注於左竅故風熱等結

病偏於左則右竅反塞之類也所謂軌者鼻出清涕也夫五行
燥微則當其本化甚則兼其鬼賊故經曰亢則害承乃制也
易曰燥萬物者莫燥乎火以火煉金熱極而反化為水反其熱
極則反汗出也由是肝熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則
出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾經曰鼻熱甚出濁涕又云
膽移熱於腦則辛頰鼻淵者濁涕者不止也凡痰涎涕濁稠濁
者火熱極甚銷鑠致之然也或言熱為肺寒者誤也但見流涕
鼻窒胃寒則甚遂以為然豈知寒傷皮毛則腠理閉密熱氣怫
鬱而痛愈甚也及夫嚏者鼻中因痒而氣噴作於聲也鼻為肺
竅痒為火化心火邪熱干於陽明發於鼻而痒則嚏也或故以
物憂之痒而嚏者優痒為血故或說曰而嚏者由目為五臟精
華大陽真大光耀於目利心神躁亂而發熱於上則鼻中痒而

淺也或傷寒病衰而或淺者由大熱已退而虛熱為拜瘧後鼻
 則冷也或風熱上攻頭鼻壅滯涕洟而無他證者內寒鼻中得
 噴則壅滯開通而愈也或有痛感因噴而痛其不可忍者因噴
 之氣攻衝結痛而不得通利故也三者之證同為熱也故為病
 不同邪熱所乘之經有異故也鼻窒與噴嚏者熱客傷明胃之
 經也統涕者熱客大陰肺之經也蓋鼻者足陽明胃經所主陽
 明之脈左右相交注於鼻孔又鼻者肺之竅故肺氣通於鼻其
 邪熱干於二經發於鼻而為壅塞涕之證故經曰心肝有病
 而鼻為之不利也治法觀邪所中之何經所治則不失矣或因
 外胃風寒而痛痺甚送依寒治而用溫熱之藥散護者偶歷
 所中宜知寒覆於熱熱鬱氣濁清道不利故有是證可謂辛甘
 發散理開通結滯得效身熱外泄微者則已甚者解結不問
 其病轉如者雖用退熱以風辛涼之劑解之待使結散熱退暫
 愈而已全在手驗其內以言熱之微甚宜以辛溫辛涼之藥可
 也凡此諸證全在醫之能辨治之了然無不瘳矣

鼻通治方
 人參湯 治肺氣上攻鼻塞不通
 入參 白茯苓 黃苓 陳皮 去白
 羌活 麻黃 去根 蜀椒 去白并合口者以
 右作一服水二鍾煎至一鍾食後服
 辛蕞散 治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣急不
 通不聞香臭
 辛蕞 川芎 木通 去節 細辛 洗去
 防風 去劣 羌活 藁本
 白芷 甘草 炙 蘇
 白為細末每服二錢食後茶清調服

防風湯 治鼻淵熱滲下濁涕不止久而不已必成衄血
 防風 去節 黃芩 人參 麥門冬 去心
 川芎 甘草 炙
 右為細末每服二錢食後沸湯調服日三服
 香耳散 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵
 香耳子 炒 辛蕞 半兩 香白芷 一兩 薄荷 葉 半錢
 右為細末每服二錢食後用葱茶調服
 白芷散 治鼻痛
 白芷 杏仁 皮 炮 去 細辛 各一 全蠍 焙 二箇
 右為細末麻油調敷
 川椒散 治鼻流涕
 川椒 炒 出 汗 者 下 去 枝 棘 桂 川白薑 生用
 川芎 細辛 白木 各等

右為細末每服二錢食後溫酒調服
 梔子仁丸 治肺熱鼻發赤名曰酒渣鼻
 梔子仁 不拘
 右為細末以黃蠟為丸如梧桐子大每服二十九食後用
 茶酒任下
 白礬散 治肺風酒渣鼻等疾
 白礬 生用 硫黃 生用 乳香 各等
 右為細末每用手微搗動患處以藥擦之愈
 硫黃散 治酒渣鼻鼻上生黑粉刺
 硫黃 生用 輕粉 各一 杏仁 去皮 七箇
 右為細末噴津調服時時塗鼻上早晨洗去
 細辛散 治鼻熱有急而不聞香臭
 細辛 瓜蒂 各等

右為細末綿裹如豆大塞鼻中

交臂花散 治酒壅鼻

山梔子 各等

右為細末每服二錢食後茶湯調服

增損通聖散 治肺氣不和鼻塞不利

鼠粘子 桔梗 桑皮 紫苑 各半

荆芥穗 二錢 甘草 生用

右作一服水二鐘生薑五片煎至一鐘食後服

葛蒲散 治鼻內窒塞不通不得喘息

葛蒲 皂角 各等

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧少時

羊肺散 治肺虛上壅中主瘧不聞香臭

羊肺 洗 白木 木通 肉苁蓉

川芎 乾 各一

右除羊肺外為細末以水調稀調得所灌入肺中煮熟細

切焙乾為末每服二錢食後米飲調服

消鼻痔方

苦丁香 甘遂 各二 青黛 草烏尖

白礬 各半

右為細末麻油搜令硬不可爛旋丸如鼻孔大小用藥納

入鼻內令至痔肉上其痔化為水肉皆爛下每日一次

辛夷湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯唾稠粘

辛夷 去毛 川芎 白芷 甘菊 花

前胡 石膏 白朮 生地 黃

薄荷 赤茯苓 去皮 陳皮 去白 各 甘草 各二

右吹咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食遠溫服

疏風散 治傷風鼻塞聲重

細辛 半兩 川芎 一兩 薄荷 半兩 川烏 炮 去

撫芎 白芷 甘草 各二

右為細末每服一錢煎茶調下薄荷湯調亦可

通關散 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多嚏有項

拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶 織 焙 黃 白附子 炮 益智 去皮 蒺藜 炒 去

薄荷 苦參 各兩

右為細末每服三錢不拘時溫酒調下

又方 治鼻中窒塞氣息不通皆有肉柱若不得出終不能瘥

餘藥雖漸通利旋復生長宜服此藥

地膽 二十 白芷 七 膽 一 枚

右先搗地膽為細末納大膽中以繩繫定三日乃於日出

時令病人西首卧下以鼻孔向目傍人以故筆粘藥塗

入鼻孔中一日一夜至五六日當鼻孔裏近眼痛此是欲

落更候三四傳之漸漸嚏之即落取持指於四通道上柱

落後急以綿塞之慎風

治鼻塞不通及治衄血

右用小蘗一把水三升煮取一升去滓溫服曾有人陰冷

漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼痛不能眠煮大蘗根汁

服之立瘥一方為末酒調服

禦寒湯 治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻塞咳嗽上喘

黃芪 二錢 陳皮 人參 升麻 各五

蒼朮 七分 欬冬 花 黃連 各一 佛耳 草

白芷 防風 羌活 甘草 各三

黃蘗 二分

黃蘗 二分

黃蘗 二分

右作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服	防風湯 治鼻塞不聞香臭	防風 羊脂 梔子 七枚 升麻 一兩 石膏 研三	麻黃 三分 官桂 半兩 木通 一分	右吹咀每服三盞水一盞煎至七分去滓空心溫服日再	排風散 治鼻塞不通不聞香臭或生瘰癧肉	防風 秦艽 去苗 吳茱萸 湯浸 天桂 炮去	山芋 酪一 羌活 半兩	右為細末每服二盞空心溫酒調下	通頂散 治鼻塞不聞香臭	胡黃連 研 滑石 研各 瓜蒂 研七枚 麝香 研一錢	右研勻每用少許吹入鼻內即瘥	芎藭散 治鼻塞不聞香臭	芎藭 辛夷 兩 細辛 去苗 木通 半兩	右為細末每用少許綿裹塞鼻中濕則易之五七日瘥	瓜蒂散 治鼻塞不聞香臭	瓜蒂 藜蘆 各一	右為細末每用一錢綿裹塞鼻中日三易之一方以狗膽	汁和綿裹塞鼻中	葵蕪汁方 治鼻塞多年不聞香臭清水出不止	右取當道車 通葵蕪一把搗以水三升煎取熟先仰卧	使人滿口含飯取一合汁灌鼻中使人不過再度大瘥必	出一兩箇息肉以赤蠟虫一方有黃連等分同煎	溫肺湯 治鼻不聞香臭眼多淚淚	麻黃 四錢 升麻 黃芪 丁香 各二
-------------------	-------------	-------------------------	-------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	-------------	---------------------------	---------------	-------------	---------------------	-----------------------	-------------	----------	------------------------	---------	---------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------	-------------------

乾葛 防風 羌活 甘草 各	右吹咀作二服水二盞煎白二根煎至一盞去滓食後服	溫衛湯 治鼻不聞香臭目中溜火氣寒血熱冷淚多睛下冷	陰汗多痿弱	蒼朮 升麻 柴胡 黃芪	知母 羌活 各一 青皮 陳皮	黃連 木香 各三 當歸 身半 錢 澤瀉	黃蘗 白芷 防風 人參	甘草 各半	右吹咀作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服	芎藭散 治鼻塞為難	芎藭 肉桂 酥黃 去節	防已 木通 細辛 石菖蒲	白芷 各一 木香 川椒 甘草 各半	右吹咀每服三盞水二盞生薑三片紫蘇葉少許煎至八	分去滓食遠溫服	山茱萸丸 治難鼻	山茱萸 大黃 剉炒 菊花 各一兩 朴硝 分兩	附子 炮去 獨活 各三 秦艽 去苗 蔓荊子 皮 白	梔子 炮去 防風 甘草 各一兩	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫	酒送下老人亦宜服燥燥去附子加細辛半兩	赤龍散 治鼻翳太甚鼻者由肺氣注於鼻上榮頭而若上焦	壅滯風寒客於頭腦則氣不通冷氣停滯搏於津液膿涕	結聚則鼻不聞香遠成難也	龍腦 研 瓜蒂 研 黃連 三 赤小豆 三十
---------------	------------------------	--------------------------	-------	-------------	----------------	---------------------	-------------	-------	---------------------	-----------	-------------	--------------	-------------------	------------------------	---------	----------	------------------------	---------------------------	-----------------	------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------	-----------------------

右為細末研勻每用茶豆許唾吐吹入鼻中水出愈
通頂散 治鼻翳
瓜蒂 藜蘆 皂角肉 半斤 麝香 少許

右為細末每用少許吹入鼻中
雄黃散 治鼻翳
雄黃 半錢 瓜蒂 二枚 綠礬 一錢 麝香 少許

右為細末每用少許搽鼻中亦治息肉
黃白散 治鼻翳
雄黃 半錢 白礬 瓜蒂 細辛 各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻
治息肉方
雄黃 半錢 瓜蒂 細辛 各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻
治息肉方
雄黃 半錢 瓜蒂 細辛 各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻
治息肉方
雄黃 半錢 瓜蒂 細辛 各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻
治息肉方
雄黃 半錢 瓜蒂 細辛 各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻
治息肉方
雄黃 半錢 瓜蒂 細辛 各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻
治息肉方
雄黃 半錢 瓜蒂 細辛 各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻
治息肉方
雄黃 半錢 瓜蒂 細辛 各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻
治息肉方
雄黃 半錢 瓜蒂 細辛 各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻
治息肉方
雄黃 半錢 瓜蒂 細辛 各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搽鼻
治息肉方
雄黃 半錢 瓜蒂 細辛 各

右為細末綿裹塞鼻五許塞鼻中須臾即通
地龍散 治鼻中息肉
地龍 一分 豬牙皂莢 一錢

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在
內以清水盡其息肉自除
沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛
沒藥 研 蛇蛻 去土 南星 炮 白附子 炮

右為細末每用少許口噴冷水搗鼻中

川芎九 治腦流臭穢

川芎二生用 蒼朮一主用 草烏尖半兩

右為細末麩糊和九如梧桐子大每服十九食後茶清送下服藥後忌熱物一時

治鼻淵腦痛

右用生附子為末煨葱涎和如泥夜間塗涌泉穴

細辛散 治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胃腸不利

細辛一兩 附子半兩 白朮 訶黎勒

芫荽子 芫荽 桂心 枳殼

右以咀每服三錢水一盞主芫半煎至六分去滓食後

溫服

塞鼻桂膏 治鼻常有清涕

桂心 細辛 乾薑 皂莢

川椒 右為細末以羊脂和成膏每用如棗核大綿裹塞鼻中

白芷丸 治鼻流清涕不止

右將白芷研為細末以葱白搗爛和為丸如小豆大每服

二十九不拘時茶湯送下

烏犀丸 治鼻中生瘡

烏犀 羚羊角 牛黃 柴胡

丹砂 天門冬 胡黃連

人參 麥門冬 知母 黃芩

甘草一分

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心

用溫酒送下

地黃煎 治鼻生瘡疔痛不止

生地黃汁 生薑汁 苦參

右將地黃汁生薑汁浸苦參一宿以酥和於銅石器中煎

九上九下俱汁入酥盡去滓傾入盆中每用少許滴於瘡

上諸風熱瘡亦佳其鹽花至半却下

辛夷膏 治鼻內生瘡疼痛或壅塞不通及治鼻龍氣不宣通

辛夷一兩 細辛 木香

白芷 杏仁

右為細末以羊脂油各二兩同諸藥於石器中慢火熬

成膏待冷入龍腦麝香末各一錢為丸以綿裹塞鼻中取

日內即愈

椿根湯 治痔瘻口鼻

椿根 艾葉 葱白 豆豉 鹽

右合和以醋及清泔各三升煎十數沸去滓約又一升分

作三服有惡物下即効小兒量大小加減

烏香散 治鼻痔便膿鼻柱

草烏 麝香

右研極細以少許貼瘡上

治鼻口患痔數日欲死

右用鹽散傳之令通日十夜夜四度五度

平角散 治肺熱鼻乾無涕心神煩悶

平角香 木通 赤茯苓

枳實一兩 梔子仁二兩

右為細末每服二錢食後米飲調下

治肺風鼻赤

草馬尖七箇 明礬半錢

麝香一分

猪牙皂角一分

右為細末以大楓油和勻用磁器火上焙開先以薑擦次以指蘸藥擦之一日三次無不効

治酒鼓鼻

生硫黃五錢 黃連

白礬

乳香各半

輕粉半錢

右為細末用唾津蘸藥擦之一日二次須塗去赤為度

治酒鼓鼻

黃丹五文

硃砂五文 文巴豆十箇 去殼心

酒餅藥五文

右同入餅藥罐子中慢火熬兩三沸取下續入研細生磺

灰三錢雞子清調勻酒鼓鼻以鷓毛掃紅麩一日一次上

藥進出毒物病退即止次服消風散棹皮散之類五七貼

雀子斑用小竹棒兒挑藥點患處覺微腫即洗去不洗

去惡力太猛趙君飲撫軒所傳云二如趙再可知湖州時

與一詩僧相厚而僧患酒鼓鼻端生赤贅數枚大者如橘

小者如梅李下垂過口飲食言語皆所妨礙良自厭惡之

郡有一小兵事刀婦人但聞其善取蟹誠不知其能治酒

鼓也一旦自言於僧請醫此疾即以藥傳之凡半月餘每

日取惡物如膿血自皮膚中出者甚多其贅後悉成痂落

去鼻面瑩然遂以十千錢為謝耳語二卿俾直齋閣而求

得其方以傳秀卿治人良驗

治赤鼻及面上風瘡

大楓油五十 草馬為一個 輕粉

右先將草馬入油內熬令旬取出少時後下輕粉將末

攪勻每用少許塗擦患處令熱旬日得瘻一方無輕粉以

生薑擦處發傳藥

治酒鼓鼻及婦人鼻上生黑粉刺

生硫黃半兩 杏仁二錢 輕粉一錢

右為細末用酒餅藥調貼時塗上早則洗去數次絕根

治赤鼻肺風 詩曰

肺風鼻赤最難醫

我有良方付與伊

但用硫礬為細末

茄汁調塗始見奇

荆芥散 治肺風鼓疱

荆芥穗四兩 防風

杏仁去皮

白僵蠶炒 甘草各

白羨藥炒

右為細末每服二錢食後茶清調下

草麻子膏 治酒鼓鼻及治肺風面赤生瘡

草麻子研 輕粉研

溼青研

黃蠟各二 麻油一兩

硫黃研

右熬成膏以磁合盛每用少許擦於患處

草澄茄丸 治鼻塞不通

草澄茄半兩

薄荷葉三錢 荆芥穗二錢

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大不拘時嚼化一二丸

千金細辛膏 治鼻塞冷涕常出

細辛

川芎

黑附子炮去

乾薑 吳茱萸各半 桂心三錢 皂角屑一分

右用猪脂二兩煎油先一宿以米醋浸藥取入猪油內同

煎附子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

柳金散 治肺熱鼻塞涕濁

細辛白芷與防風 羌活當歸半夏等

桔梗陳皮茯苓 十般等分剉和同

三錢薄荷薑煎服 氣急調勻鼻貫通

通草膏 治鼻翳有息內不聞香臭

通草 附子炮 細辛各等

右為細末煉蜜和丸如棗核大綿裹塞鼻內

新刊大醫院奇效良方大全卷之五十九

新刊大醫院奇效良方大全卷之六十

口舌門

夫口者居太陰之經脾之所主五味之所入也舌乃心之竅舌

和則知五味矣蓋五竅入口藏於脾胃為之運化津液以養五

氣五氣者五臟之氣也節宣微爽五臟之氣偏勝由是諸疾生

焉且鹹則為寒酸則為滯並則因燥淡則由虛熱則從苦從甘

也口臭者乃肝臟燥熱之不同隨積於胃腸之間而生熱衝發

於口也口瘡者肝氣鬱滯風熱加之而然醫藥之法各隨其所

因以治之

口舌通治方

杏仁散 治心胃中客熱唇口乾燥或生瘡

杏仁 黃連 麥門冬 山梔子仁

赤茯苓 地骨皮 黃芩

黃散根 大黃 甘草

右以咀每服三錢水一中盞入淡竹葉十四片煎至六分

去滓食後溫服

牛黃丸 治心脾壅熱口舌乾燥及煩渴

牛黃 黃連 大黃 麥門冬 山梔子仁 馬牙硝

珠砂 麝香 薄荷 山梔子仁 馬牙硝

右為細末研勻煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後竹葉

煎送下

瓜蒌根散 治風熱口中乾燥舌裂生瘡

瓜蒌根 胡黃連 黃芩 白礬

白礬皮 天黃 牛黃 滑石

右為細末研勻每服二錢不拘時竹葉湯調服

丹露丸 辟瘴毒退風熱治口舌乾燥

寒水石 治口舌乾燥 龍腦 治口舌乾燥 甘草 治口舌乾燥

右為細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半丸食後用新汲水磨化服

含化丸 治上焦煩熱口舌乾燥心神不情頭目不利

石膏 治上焦煩熱口舌乾燥 寒水石 治上焦煩熱口舌乾燥 白蜜 治上焦煩熱口舌乾燥

右以水四大盞煎取一大盞半綿濾過入蜜同煎令稠丸如鷄頭實大常含一丸熱津

含香丸 治口臭去熱毒氣調和臟腑

鷄舌香 治口臭去熱毒氣調和臟腑 藿香 治口臭去熱毒氣調和臟腑 井松 治口臭去熱毒氣調和臟腑

當歸 治口臭去熱毒氣調和臟腑 桂心 治口臭去熱毒氣調和臟腑 白芷 治口臭去熱毒氣調和臟腑

乘陵香 治口臭去熱毒氣調和臟腑 木香 治口臭去熱毒氣調和臟腑 肉桂 治口臭去熱毒氣調和臟腑 白檀 治口臭去熱毒氣調和臟腑

丁香 治口臭去熱毒氣調和臟腑 麝香 治口臭去熱毒氣調和臟腑

右為細末研勻煉蜜和丸如芥實大常含化一丸熱津

五香丸 治口臭及身臭令香

丁香 治口臭及身臭令香 白芷 治口臭及身臭令香 紫陵香 治口臭及身臭令香 青木香 治口臭及身臭令香

藿香 治口臭及身臭令香 白芷 治口臭及身臭令香 桂心 治口臭及身臭令香 香附子 治口臭及身臭令香

檳榔 治口臭及身臭令香 甘草 治口臭及身臭令香 當歸 治口臭及身臭令香

右為細末煉蜜和丸如大豆許每服一丸常含熱津日三夜一亦可常含熱之

蓬蓬丸 治口臭

內廷菴 紅豆 治口臭 白芷 治口臭 草宣菴 治口臭

赤茯苓 治口臭 丁香 治口臭 人參 治口臭 甘草 治口臭

細辛 治口臭 官桂 治口臭

右為細末煉蜜和丸如鷄頭大每服一丸含化熱津

治口臭方

川芎 治口臭 陳皮 治口臭 桂心 治口臭

藥肉 治口臭

右為細末次納藥肉乾則加煉蜜和丸如大豆許且服十丸食前食後常含之或吞之七日大香

丁香丸 治口臭

丁香 治口臭 荳蔻 治口臭 白芷 治口臭 甘草 治口臭

右為細末煉蜜和丸如彈子大綿裹一丸熱化熱津

治心氣不足口臭

益母 治心氣不足口臭 甘草 治心氣不足口臭

右為細末特時乾紙熨之更以沸湯調服立効

生香膏 治口臭熱臭

右用乾餅瓜子去殼研細蜜少許調成膏食後含化或傳

齒上尤妙一方空心洗漱乾含一丸如棗核大

地骨皮丸 治肺熱口臭口中燥唇乾發渴小便多

地骨皮 治肺熱口臭口中燥唇乾發渴小便多 桑白皮 治肺熱口臭口中燥唇乾發渴小便多 山梔子 治肺熱口臭口中燥唇乾發渴小便多

馬兜零 治肺熱口臭口中燥唇乾發渴小便多

右為細末甘草膏和丸如芥實大每服一丸食後含化

升麻 治多食內口臭不欲聞其穢惡

升麻 治多食內口臭不欲聞其穢惡 青皮 治多食內口臭不欲聞其穢惡 黃連 治多食內口臭不欲聞其穢惡 黃芩 治多食內口臭不欲聞其穢惡

生薑 治多食內口臭不欲聞其穢惡

右為細末水浸蒸餅為丸如彈子大每服一二丸不拘時

細嚼白湯送下

治口臭方

右以鷄舌香含之日華子云鷄舌香治口臭所以三言故事

鷄舌香含之日華子云鷄舌香治口臭所以三言故事

即宜日合鷄舌香欲其寒事對答其無味也

生地黄煎 治脾熱香焦枯無潤澤

生地黄汁 生天門冬汁各半

萎蕤兩各二 黃芪 升麻兩各一 細辛

川芎 白朮 甘草生用各

右細到綿裹酒浸一宿以猪脂二斤煎至藥令色焦煎瀝

去滓內鍋中後下地黄天門冬汁熬令稠磁器盛每服半

匙不拘時含熱下

治冬月唇乾拆血出方

右用桃仁搗爛以猪脂稠塗唇上効

治緊唇而泡

右以馬齒莧水燙洗之

走馬散 治口內痔瘡

地子去仁留殼 明礬 柳葉火燒成灰

右為細末不拘多少吹入口中

治口瘡詩曰

口瘡有熱腫連喉 百法醫求病不家

搗取自然羅蔔汁 吐涎頻漱病難留

龍膽湯 治熱口苦名曰膽痺

龍膽草 黃連各四分 人參 天門冬

知母 黃芩各七分 柴胡一分 山梔子

麥門冬 五味子 甘草各五分

右剉細每服五錢水一盞半煎七分不拘時服

盧薈散 治口舌生瘡

盧薈 青蒿 蟾酥 羊蹄花各半

白礬 麝香 牛黃研各 乾地牛研各

瓜蒂散二十 丁香 細辛去苗 丹砂研各

馬牙硝研分三 熊膽研一

右為細末研勻先以頭髮裹指於溫水內蘸於之軟淨把

却膿水取少許藥末搽膏上或輕可即去蟬酥薑黃香粉

大小以意加減用之

玄參散 治口舌生瘡連齒斷爛痛

玄參 升麻 獨活 麥門冬去心

黃芩 大黃炒 梔子仁

前胡 犀角屑 甘草炙各

右為末每服五錢水一盞煎五分不拘時溫服

麝香丸 治口舌生瘡赤爛

麝香細研 升麻 黃芩 杏仁去皮尖

浮萍草 零陵香 寒水石 黃連

甘草生用各

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸綿裹含化熱津

蓬砂丸 治口臭口乾口舌瘡

蓬砂二兩 片腦 麝香各一分 馬牙硝四兩

寒水石兩一

右為細末用甘草膏和丸如麻子大不拘時含一丸熱津

綠雲散 治舌上生瘡

銅綠 鉛白霜各等

右同研極細每用少許搽舌上

升麻煎 治唇脫熱不巳口舌生瘡咽喉腫

升麻 玄參 射干各四 大辛

黃蘗各三 薔薇根白皮 四兩

右以水七升煎取一升五合去滓下蜜更煎一二時細

細合熱之

黃蘗丸 治口舌生瘡腫痛

黃蘗一研末 蜂蜜

黃丹各一分

右為細末端午日午時用蒸餅和丸如菘豆大綿裹一丸
夜後含有涎即吐之

治口舌生瘡爛痛方

右取蟾酥少 線惹日曝乾剪半寸含之有涎即吐出如
牙疼即咬之立瘥

治口舌生瘡方

右取銅牛去殼細研塗瘡上有涎即吐之三二次即可
定齋羅尼法 治下唇上瘡口舌生瘡

右以白礬末湯化洗足即愈

治飛熱入口令人舌開生泡此最可畏

右以紫蘇葉細青白湯熱下即愈

貼臍散 治元臟氣虛浮陽上攻口舌生瘡

吳茱萸醋 乾薑炮各半兩 木鼈子五枚

右為細末每用半錢用冷水調以紙膏貼臍

甘露飲 治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉

石斛

黃芩

麥門冬去心

生地黃

甘草炙各一分

右咬咀每服五錢水二盞煎八分去滓不拘時溫服

加味龍石散 治口舌生瘡時時血出咽噎腫塞疼痛妙劇

寒水石

硃砂各一分

馬牙硝一分

龍腦二分

白霜

蓬砂各半

甘草二錢

右研為細少許搽患處止津燥熱不妨

吹喉散 治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶

蒲黃一兩

金硝八兩

青黛半兩

薄荷汁一升

右入磁罐內以慢火熬令乾研細每用一字或半錢於
口內良久出涎吐之或喉中腫痛以葦筒吹入藥半錢無
不効一方無蒲黃

升麻飲 治口內生瘡齒齦肉爛

升麻

玄參

黃連

羚羊角磨

黃芩

葛根

大黃

麥門冬去心

羌活

防風

甘菊花各半 人參

知母

甘草炙各一分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服一方
無人參有牛旁子

蓬砂散 治口瘡

蓬砂

青黛

龍腦

石膏煨各

紫金霜 治大人小兒積熱口內生瘡

黃蘗

二指大一指小以蜜塗
慢火炙令紫色為度
黃蘗子一枚 火燒過

膩粉

麝香各少

右為細末研勻每用少許搽舌上

黃連散 治口瘡絕妙

黃連

朴硝

白礬各半

薄荷一兩

右為粗末用臘月黃牛膽將藥入膽內風頭掛兩月取下

如口瘡旋將藥研細入於口瘡上去其熱涎即愈

蟾酥綿 治口瘡

蟾酥五皂角

蓬砂

龍腦

麝香各一分

右研極細以溫湯半盞化令勻入絛綿秤半錢藥汁
乾候藥汁盡將綿寸截每用一片貼於患處有涎即吐

乾候藥汁盡將綿寸截每用一片貼於患處有涎即吐

日三五次易之取瘰

水藥丸 治口瘡

龍腦 少許

黃蘗 日乾

蓬砂 研

薄荷葉 各半

右為細末研勻其蜜和丸如龍眼大每服一丸津液化下

瘰者甚者加腦子研

治口瘡方

右以沙糖細細含化

無雲散

治口瘡臭氣疼爛久而不瘥

黃蘗 半兩

青黛

甘草 各二

右為細末研勻貼臥以一字安舌下熱津不妨天明瘥

治口瘡方

右以生半夏為細末醋調貼脚心中神効

紅芍藥方

心痛口瘡

紫椿紅蒼

三錢四兩

五服安瘥

右件紫椿紫梗紅芍藥蒼木各三錢為細末以羊肝四兩

批開搽藥末在肝內麻繩定火內燒令熱空心食之白湯

送下大効

養藥法

治口瘡久不愈者

黃蘗

不以多少用生藥

塗其上

黃蘗

右為極細末乾搽口瘡上貼臥時忌醬醋鹽

治舌上腫硬方

百草霜

鹽 等分

右研細以井花水調敷

治舌上腫硬出血

海蝶鋪

蒲黃 各等

右研細以井花水調敷

治口爛方

右用巴豆一二粒帶皮搗與麩糊為膏貼在頰門上一夜

便取之瘥瘡

黃蘗散

治口瘡

黃蘗 去毒炙乾

白蘗 蠶 直者置新瓦上下以

右研極細少許搽瘡上及舌上吐涎

玄參升麻湯

治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫或連頰兩頰

腫痛

玄參

升麻

平角

赤芍藥

桔梗

管仲

黃芩

甘草 各等

右以咀每服四錢水一盞半煎七分去滓不拘時服

亂髮灰散

治口吻生瘡及口傍惡瘡

亂髮灰

故絮灰

黃連 兩各一

乾薑 兩半

右為細末研勻少許傳瘡上日三五次以瘡為度

檳榔散

治口吻邊生瘡浸淫不愈

檳榔 燒存

輕粉 少許

右為細末少許傳口瘡上立愈一方飯前上汗調傳之

為金散

治口吻瘡

右取瑤珠三枚燒灰研細傳之

治口吻瘡

右用新炊飯子乾又熱以唇口向乾唇熨之二七下三兩

上瘥止

硫黃散

治唇瘡及緊唇瘡久不瘥

硫黃 研

白礬 研

丹砂 研

黃蘗 研末

麝香 研

水銀 研

右同研至水銀無星以臘猪脂和如泥先搽唇令干後以

膏塗之日三五上瘡	黃藥散 治瘻瘻	黃藥 一兩	五倍子 二兩	毒陀僧	甘草 許少
右除黃藥外餘藥同為細末水調勻敷於黃藥上火灸	五次將黃藥切或碎片貼貼之天明即愈	治口瘻常瘻爛黑腫疼痛不可忍	右以鯉魚血磨墨相和塗之一方用膽汁磨墨塗之	黃連散 治唇吻惡瘡	黃連 一分
乾薑 半分	右為細末每用少許傅瘻上不過三次愈一方有臙粉	五福化毒丹 治唇舌腫破生瘡煩渴	玄參 洗焙	桔梗 各二	人參 半兩
茯苓 一兩	馬牙硝 風化	青黛 各一	麝香 一字	甘草 七錢	半焙
右為細末研勻煉蜜為丸如皂角子大以金銀箔各四十片為衣每服一二九薄荷湯化下如口臭以生地黃汁化下食後服	白燈散 治緊唇	右纏白布作大燈在如指安斧刃燃熱令刀汗出拭取傅唇上日三二度	橄欖散 治緊唇燥裂生瘡	右用橄欖不拘多少燒灰為細末以猪脂和塗患處一方用核中仁細研傅之	治緊唇方
右以皂莢末少許以水調塗之	升麻散 治脾胃有熱風冷相乘唇腫生核疼痛	升麻	前胡	犀角 磨	薏苡仁

甘草 各兩	葛根	龍膽草	青竹 中
右吹咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後服	獨活散 治唇上生惡核腫由脾胃熱壅滯	獨活	升麻
升麻	桑寄生	犀角屑	大黃 三分
沉香	連翹	防己	大黃 三分
甘草 半兩	右劉碎每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服	治唇生腫核方	松脂 半兩
大黃	白欬	赤小豆	胡粉 一分
右為細末以鷄子清調塗唇上	薏苡仁湯 治風腫在唇唇口動或結核或浮腫	薏苡仁 炒	防己
赤小豆 炒	甘草 各	右吹咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓不拘時溫服	牛黃散 治重舌
牛黃 研	人參	大黃 炒	麝香 研
甘草 各	丹砂 研	當歸 切	白茯苓 三分
右為細末每服半錢食後沸湯調下甚者加至一錢	黃藥湯 治舌腫又重舌	黃藥	甘草 一分
右吹咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服	治重舌方	皂角刺 煎	朴硝 許
右研勻先以手蘸水擦口內并舌上下將藥擦舌上下涎出有消			

治重舌喉痺方

五靈脂石研末

右用米醋一大碗煎逐旋噴嗽口即愈

治重舌喉痺方

皂角不銹者四五錢

右研細末以米醋調塗腫處

又方 以蛇蛻燒灰研細少許傳之一方治小兒重舌燒蛇

統為末噴津和塗舌上瘡

薄荷蜜煎 治舌上生白胎乾澀語言不真

薄荷然汁 白蜜各等

右以生薑片先蘸水揩洗竟用珠砂雄黃荳砂膠麝為末

傳之良久末動更加玄明粉一方先以生薑蘸水揩洗用

薄荷自然汁白蜜作煎服之

馬牙疳丸 治木舌熱腫漸大滿口宜含

馬牙疳細研 鉛白霜

寒水石 太陰玄精石

麝香細研

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大含一丸燕津

治木舌方

右以半夏醋煎灌漱吐即瘥

牛黃散 治舌腫瘡

牛黃研

漢防己各三分 犀角屑一分 羚羊角屑

人參

桂心 牛蒡子炒 生地黄

甘草各半兩

右為細末研勻每服三錢水一中盞煎至六分不拘時連

玄參散 治心脾壅熱木舌腫瘡

玄參 升麻

甘草半兩

右吹咀每服五錢水一盞煎至五分去滓不拘時溫服

飛礬散 治木舌漸腫大滿口若不急治即塞殺人

白礬屑

右研細末搽搽若自然汁調若口燥乾澀之妙

瘡魚散 治舌腫滿口言語不得

瘡魚五枚 鹽半兩

右研細末以水二盞煎十沸去滓熱含吐去以瘡為度

治舌腫強方

蛇蛻燒有 全椒各等

右為細末每用少許搽傳之

有草霜散 治舌腫起如猪胞方忽然硬腫速巡塞悶殺人

右用益下墨末以醋調厚傳舌上下脫去更傳須臾即消

若先決去血汁更傳之尤佳凡此患人皆不識或錯治並

因殺人甚急但看其舌下有紫血形狀如蟻結或如即

蠶子細看之有頭尾其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自

消一方益下墨和益等分溼清水塗腫處令遍表裏良久

即愈一方用醋調尤妙一方用井花水調益下墨並成膏

傳舌上立愈

續舌膏 治舌腫熱下尺許及傷寒熱毒攻心舌出數寸

右用片膠成片頓於舌上三四次合就無事

又方

用草麻仁三四十粒乳鉢研細取油塗紙上一幅炭火上

燒紙一幅熏舌上未通又燒一幅取令病退未愈再合用

之令愈為度如治牛舌出亦可一法染黃紙捲成筒

子燒烟熏之其舌充入	巴豆方 治傷寒後不能轉攝舌出不收者	戎盤丸 治舌上黑有數孔大如菊出血如湧泉此心臟病	戎盤 黃芩 <small>一作</small> 艾葉 大黃 <small>各五</small>	人參 桂心 甘草 <small>各二</small>	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九以米飲送下	日三服亦燒鐵烙之	香參丸 治心臟熱盛舌上出血	人參 生蒲黃 麥門冬 <small>去心當歸</small> 勿焙 <small>各</small>	生地黃 <small>焙</small> 甘草 <small>一分</small>	右為細末煉蜜和丸如小彈子大每服一九溫水化下一日三四服	升麻湯 治心臟有熱舌上出血如湧泉	升麻 小蘗根 茜根 <small>各一</small> 艾葉 <small>去根</small>	寒水石 <small>三兩</small>	右以咀每服三錢七水一盞煎至七分去滓入生地黄汁一合更煎一二沸溫服	寸金散 治心經煩熱血妄行舌上血出不止	新蒲黃 <small>三錢</small> 新白麩 <small>三錢</small> 牛黃 <small>研</small> 龍腦 <small>研各半</small>	右研勻每服一錢食後生藕汁調服	熟艾湯 治心經熱舌上血出及諸失血	熟艾 <small>以糯米半</small> 松黃 栢葉 <small>炙各</small>	右以咀每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服	紫霜丸 治舌上出血竅如針孔	紫金沙 <small>即紫石英研一兩</small> 蘆薈 <small>研三</small> 貝母 <small>去心</small>
-----------	-------------------	-------------------------	---	----------------------------	------------------------	----------	---------------	--	---	----------------------------	------------------	--	-----------------------	---------------------------------	--------------------	---	----------------	------------------	--	-----------------------	---------------	--

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一九水一小盞	煎至五分溫服吐血衄血用溫酒化開服	治舌上出血如簪孔方	黃連 <small>半兩</small> 黃藥 <small>三兩</small> 梔子 <small>二十</small>	右到碎以酒二升漬一宿煮三沸去滓頓服	聖金散 治舌上出血不止	黃藥子 <small>一兩</small> 青黛 <small>一分</small>	右為細末每服一錢七食後新汲水調下日二服	黃藥 二兩 <small>坐實以慢</small> 火灰 <small>無研為末</small>	右每服二錢七溫水飲調下	槐花散 治舌出血不止名曰舌吻	槐花 <small>不以</small>	右濕乾研末傅舌上或火炒出火毒為末傅如舌腫以其	蒲黃末 乾擦之	新刊大醫院新功良方大全卷之六十
----------------------	------------------	-----------	--	-------------------	-------------	--	---------------------	--	-------------	----------------	----------------------	------------------------	---------	-----------------

咽喉門 附論

戴人云咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其因各異咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣通於地會厭管乎其上以司開闔掩其食下不掩之其喉鎖必舌抵上齶則會厭能閉其咽矣四者相交為用缺一則飲食廢而死矣此四者乃氣與食出入之門戶最急之要故為病也為咽痛喉痺之證是以難治輕者或治而愈甚者雖治必殆矣內經曰一陰一陽結為之喉痺王注曰一陰者手少陰君火心主之脉也一陽者手少陽相火三焦之脉也二火皆主脉並絡於喉氣熱則內液甚則腫脹腫脹則甚甚則痺上甚而不通則死矣非惟二脉繫此為病以十二經推之惟足太陽別下項其餘皆廢於喉龍惟君相二火獨勝則熱結正絡故痛且速也故十二經中言噎痛喉痺者相二

腫舌本強皆君火為之也惟喉閉急速用火之所為也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火焚木其勢緩龍火焚木其勢速經言喉痺則咽與舌在其中矣以其病同是火故不分也後之學者各詳其狀今畧咽喉一十八證一曰單蛾風其形圓如小筋頭生於咽喉關上或左或右可治生於關下者難治二曰雙蛾風生兩箇在喉關兩邊亦圓如小筋頭大或生關下者難治三曰蟬舌風又名子舌自舌下再生重舌者是也四曰牙疳風牙齦上腫盛飛毒成瘡者是五曰木舌風其舌漸長長大相似煮熟猪舌不能轉動六曰舌黃風自舌上腫痛黃色七曰咬牙噤風牙盡頭作舉口噤不開八曰魚口風如魚口水者不治九曰聚毒塞喉風喉關聚毒涎唾稠實發熱似分上下關上者依法治療關下者難治十曰懸壘壘毒風上腫危於而不

腥膻之惡物發泡者十二曰橫頰風腮頰結腫者是牙疔也破十三曰纏喉風風自頰邊過頰下赤色者是亦有寒熱者危殆十四曰松子風口內腫痛赤如猪肝張口吞物則氣逆閉飲食不能者用吹喉藥或蒜點腫處輕者退甚者喉關緊急不治十五曰崩砂井口風自舌下牙齦上下腫赤口內作界如湯熱牙齦漸甚爛者亦能脫齒十六曰連珠風自舌下起初起一箇又起一箇甚者三五七九箇連珠者是也十七曰蜂子毒或在腮臉洋爛或在喉關舌下作瘡其色黃如蜂者是十八曰走疔瘰癧風頸項結核五七箇皮骨赤腫作寒熱者惟木舌者本者強而不柔和也熱結於喉頭腫達於外且麻且痺腫而大者名曰纏喉風喉痺暴發暴死者名走馬喉痺於十八證外之別名難為治若不飾之於火則相去遠矣其微者可以鹹炙之其大者可以辛散之治此疾者世之有方如薄荷為頭環

白礬朴硝銅綠之類至如走馬喉痺何待此乎其死一如人之反掌之聞耳其故不誤人者無如砒金出血血出則病已但人畏針委曲傍求若執不從瞬息喪命凡用針時喉中搶者宜搗薑薑一塊入熱白湯時時呷之則搶而止治喉痺之疾如救火之法同豈可容易哉諸書治驗木舌脹者急以銹針小而銳者砒之五七度腫減出血而安纏喉風腫藥不能下者以涼藥灌鼻中吐之外以拔毒散之劑敷之熱退腫消而已喉痺者龍火也雖用涼劑常令煎極熱時時呷之此藥熱行寒不為熱病行格故也又常以銹針刺少商穴出血而愈後之業醫者須分人火龍火之病用藥無不取効矣

咽喉通治方

三黃丸 治咽喉疼痛作腫痰涎壅盛

方見積熱門

上清丸 治咽喉腫痛 喉壅盛

薄荷 一分 川芎 防風 桔梗 五片
砂仁 半兩 甘草 四兩

右為細末煉蜜和丸如皂角子大每服一丸不拘時噙化
龍齋聖丹 治心脾各熱毒氣攻心咽喉赤腫痰癢或成喉
痺或結硬不消愈而後發經久不瘥或舌本腫脹痛口生
瘡飲食難進並皆治之

南蓬砂 研 川芎 兩 生地黃 犀角屑

琥珀 研 玄參 羚羊角 鉛白霜
桔梗 升麻 連翹 赤茯苓 去皮
人參 馬牙硝 片腦 硃砂 飛

牛黃 研 麝香 研

方為細末研勻煉蜜和丸每兩作十九金箔五十片為方

每服一丸用薄荷湯或新汲水化下或細嚼或噙化津液
熱下食後臨睡皆可服

核毒牛黃丸 治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬口內生瘡

初起急胃爛不利不欲飲食

牛黃 三分 南蓬砂 桔梗 生地黃
犀角 取末 人參 琥珀 研 寒水石 去火
鉛白霜 片腦 梓黃 各一 蛤粉 四兩

玄參 升麻 各三 硃砂 研

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大金箔為衣磁器內

收貯每服一丸濃煎薄荷化下或新汲水化服亦可食
後日進三服或噙化亦得

碧玉散 治心脾積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉痺

重舌木舌腫脹皆可服

青黛 金硝 蒲黃 甘草 各等

右為細末研勻每用少許吹入咽喉內細細嚥下若作丸
用砂糖為丸每兩作五十九丸每服一丸噙化嚥下

玉粉丸 治冬月寒疾咽喉不利語言不出鍼經云寒氣客於
會厭卒然如噎宜服

官桂 草烏 各一 半夏 研 五

右為細末生薑自然汁浸蒸餅和丸如棗實大每服一丸
至夜噙化多平不愈者並皆治之

防風散 治咽喉疼痛者少用實者多用
防風 去蘆 羌活 僵蠶 炒 白蘞子 蜜炙
蓬砂 荊芥 黃藥子 大黃 溫酒蒸 罌

細辛 川芎 紅內消 山豆根 薄荷 半斤
鬱金 甘草 半兩 升麻 研 三

右為細末研勻薄荷汁同參少許調每服一匙不拘時服
玄參散 治懸壅腫痛不可忍

玄參 升麻 射干 大黃 各半

甘草 右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時緩急煎服

追風散 治咽喉腫痛
黃丹 朴硝 猪牙皂角 研 砂仁 研 各

右為細末每用少許以鵝翎蘸藥入口中敷舌上下又腫
脹然後以溫水灌漱如咽喉間毒已破瘡口痛者用猪膽
髓蒸熱淡薑醋煎與下立効

升麻散 治咽喉腫痛上膈壅熱口舌生瘡

升麻 人參 乾葛 赤芍藥
桔梗 去淨 各 甘草 一

七保散 右作一服用水二鍾生薑二片煎至一種食速服

明礬

雄黃

雄黃

全蠍

明礬

猪牙皂角

猪牙皂角

又方 治喉閉

青黛五分

猪牙皂角

猪牙皂角

右為細末醋煮麩糊和丸如櫻桃六每用一九以熱酒裹在筋頭上... 其涎如水出即解後服防風通聖散

防風通聖散

方見風門

蓬砂散 治喉風

蓬砂半兩

朴硝二兩

片腦三兩

硃砂二兩

雄黃半兩

雄黃半兩

右為細末以竹筒納藥吹入喉中即消

碧璽散 治咽喉閉塞一時不能言語痰涎壅盛

碧璽二兩

蓬砂一兩

右為細末每用少許吹入喉中有涎吐出

治風熱喉閉及纏喉風

煅硝半兩

蓬砂半兩

片腦一兩

白礬一兩

右為細末每用少許吹入喉中喻之有涎吐出

鐵法 治喉閉

右法鐵少商先出血立愈其先在兩手大指內側去爪甲

角如止業許三稜鐵之出血立効

五香散 治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香 沉香 藁陸香

右為細末研勻每服二錢水一鍾煎至五分不拘時服

利腸胃殺蟲一切風熱並皆治之

方見火門

甘露飲 治胃中寒熱牙宜齟腫咽喉乾燥伏熱在裏身黃如

金並皆治之

方見積熱門

麝香硃砂丸 治咽喉腫疼閉塞不通或止瘡癩舌根脹痛

麝香二兩

硃砂半兩

蓬砂三兩

寒水石

人為細末用甘草膏和丸如梧子大以硃砂為衣每服

馬牙硝

鉛白霜

片腦各三

甘草二十兩

二九不病時喻他藥下

清心利腸湯 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風

荆芥

薄荷

桔梗

黃芩

黃連

山柰

連翹

玄參

大黃

朴硝

牛蒡子

甘草

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

勝金散 治咽喉腫痛氣急諸項等症將香散入如婦人有孕

不可用麝香不問冷熱虛實咽喉腫痛皆通用若疾盛者

略加磨著少許立効或吐無妨

勝金

大硃砂

雄黃

白礬

地粉

乾胭脂

蘇合

麝香

右為細末每服一匙食後薄湯調服

白礬散 治纏喉風急喉閉

膽礬半錢 白礬半錢 去絲

右為細末每用少許吹入喉中

治咽喉牙關緊閉

右用巴豆去殼以紙包巴豆內用竹管壓出巴豆油在紙上將油紙作紙捲點燈火熾以烟薰左右鼻孔中口鼻涎流牙關開矣

碧雪 治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡胃中煩躁熱物妨礙或喉閉壅塞水漿不下天行時疫昏憤並皆治之

方見積熱門

絳雪 治咽喉腫痛嚙物妨礙及口舌生瘡

片腦半字 蓬砂一錢 辰砂三錢 馬牙硝

寒水石各二錢

石為細末研勻每用一字摻於舌上津液嚙之

吹喉散 治三焦熱盛口舌生瘡咽喉腫寒神思昏悶

方見口舌門

甘桔湯 治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有所得

苦桔梗一兩 甘草兩半

右作一服水一鍾煎至一鍾食遠服

利膈湯 治脾燥有熱虛煩上壅咽喉腫痛

方見積熱門

解毒雄黃丸 治纏喉風咽喉腫痛及上膈壅熱痰涎不利

雄黃 鬱金各半 巴豆去殼油

右為細末醋糊和丸如菉豆大每服七丸用茶清送下吐

出須痰即愈

王錦匙 治風熱喉閉及纏喉風

煇硝半兩 蓬砂半兩 片腦一字 白礬一分

右為細末每用少許吹入喉中

如聖散 治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急

雄黃細研 白礬飛 藜蘆去蘆 猪牙皂角炒去

右各等分為細末每用一字嚙入鼻內去痰為愈

升麻散 治上焦熱口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 人參 桔梗 赤芍藥

甘草各二錢

右作一服水一鍾煎至一鍾食遠服

終雪散 治熱結喉間連煩腫不消心膈煩滿

木通 桔梗炒 檳榔 赤茯苓皮

木香 官桂去皮 人參 升麻

訶梨勒五枚 訶梨勒五枚

蘇枋木 五兩 梨根白契 山梔子各四 朴硝研一

丹砂研一兩 麝香研一分

右除朴硝丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內慢火

熬至七升以生絹濾去滓再煎至五升下朴硝以柳木筴

動勿住手候稍凝即去大傾入盆中下丹砂麝香抹令勻

以磁器貯之勿令透氣每服一錢或二錢用冷蜜湯調下

食後臨臥服者老少加減

乾喉風

全蠍去毒 蓬砂三錢 片腦 麝香各半

朴硝 川烏 當歸 牛膝

荆芥 薄荷 葛粉 甘草各半

右為細末用清酒調者角菉菜汁調夏用黃麥汁調如不

能吞角豆腐切如菉子 藥入口內含化或新艾汁調

下亦可

開關潤喉蓬萊雪

片腦

沒藥

朴硝

右為細末每用少許以匙挑乾搽咽喉間及瘡上如在關下

摻舌下痰旋咳下仍用薄荷搗碎甘草煎水噙漱或以

荷研自然汁調成膏膏化亦妙

奪命無憂散 治纏喉風咽喉疼痛風涎壅盛

生瘡心腹脹滿脾積癥塊小兒疳積誤吞骨屑硬塞不下

熱盛喉閉涎涌氣急悶亂不省人事並皆治之

寒水石

滑石

荊芥

右為細末每服一錢乾搽舌上後以新水嚥下不拘時任

是百毒硬物可以除化如喫着巴豆杏仁辛辣薑桂胡椒

燥毒葱蒜芥物及諸藥毒火毒亦可用此藥每服

能潤三焦消五穀除三尸去八邪除九蟲趕瘟疫

疾其効如神曾直魏金臺玉簡方

龍腦散 治馬喉閉頰腫咽痛

龍腦

沉香

犀角

珠砂

馬牙

龍腦 治咽喉連頰頰腫日數深遠熱津液或發欲疼

龍腦

大黃

玄明粉

右除地黃汁外研為細末以地黃汁和如乾更入煉過蜜

少許為丸如小彈子大每用一丸以綿裹含化熱津日四

五次不拘時

橘皮湯 治馬喉痺勢如奔馬腫痛頰滿數數吐氣

陳橘皮

白木

右剉碎每服三錢七水一盞入生薑半分大紅棗二枚掌

破煎至五分去滓下芒硝末一錢七攪勻食後溫服日三

仙方奪命丹 治纏喉風木舌脹

骨刺竹木刺一切咽喉急證

烏賊骨

白蠟

甘草

右為細末研勻用熟餅包白麩蒸熟四兩和藥浸新井華

水丸如豌豆大給粉為衣放乾十年不壞每服一丸以瓦

器研碎新水半盞浸一茶時化開用匙挑藥徐滴入喉中

勿急用取藥盡為度

開關方

珠砂

川烏

右為細末每用半錢臘月內糝菜汁夏月黃麥投水炒為

水調如涕啞稠粘用芭蕉水調或蜜丸指頭大含化

龍腦破毒散 治喉痺咽喉腫塞不通

升麻

石骨

生地黄

黃芪

馬牙

甘草

青竹茹

生地黄

赤茯苓

白茯苓

乳鴉

白茯苓

紫河車

山豆根

犀角

山豆根

山豆根

山豆根

山豆根

山豆根

山豆根

山豆根

山豆根

山豆根

山豆根

山豆根

片鴉 麝香 蒲黃半兩 馬勃末三錢

金硝 青黛 白礬 甘草

右為細末研勻磁器收每用一錢以新汲水半盞調勻細

細呷嚥如是喉痺即破出血便愈如不是喉痺自然消散

若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上燕津如小

兒一錢作四五服亦如前法不拘時服

射干湯 治喉痺腫塞不通疼痛不下飲食并諸毒發動

射干 白芷 當歸 杏仁

升麻 平角 甘草 芍藥

右吹咀每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服

三忌海藻菘菜

如聖勝金錢 治急喉痺經喉風飛馳單鴉雙鴉結喉壅舌木

舌腮腫痛經用藥不能吞水者

確黃 川芎 川烏 薄荷

硝石 臘茶 生地黃 各等

右為細末以生薑汁搜和為錠每服先用新汲水灌漱吐

出次嚼生薄荷五七葉微爛用一錠同嚼極爛以井水嚥

下甚者連進三服即愈重舌腮腫先服一錠次以一錠安

患處便消胃者伏熱不省人事生薄荷水調研一錠灌下

即甦行路常膏一錠即無暑熱之患口舌生瘡不能合口

并食熱物如上法服訖用水灌漱嚼薄荷十葉如泥吐

再以水灌膏藥一錠增口內聚涎暴之如涎滿吐如吐

服三錠便能食酒醋過食酸酸酢補炙博喉中生泡須

破止血方著薄荷數葉以一錠同嚼并花水吞下沙

淋小便出血用車前草七葉生薑一小塊研爛水

香藥一錠以水送下分陰陽去風熱化血為涎化涎

常帶隨身備急一錠可治一人小兒只服半錠一

為加貫漿以嫩茶代煎茶

如神散 治咽喉一切急患不得開

雄黃 麝香 白礬

白礬 生用 乳香 一

右為細末研勻每用一字兩鼻內噴之合水 又舌下擦

燙出涎立効

金錢匙 凡人本中喉痺口禁咽喉腫痛木舌重舌

鬱金 大黃 草烏 猪牙皂角

南星 巴豆 五箇去心

右為細末用生薑自然汁調半錢許以綿物拂入喉中已

死者用竹管吹入須臾醒然後用藥半錢以

以吐瀉為驗

碧璽 治一切壅熱咽喉閉腫不能嚥物口舌生瘡舌根強言

語不正腮項腫痛

蒲黃 青黛 蓬砂 硝石

甘草 各等

右為細末每用手指捻於喉間燕津或冷水下頻服之

一字散 治喉閉氣塞不通飲食不下者或咽喉疼

雄黃 麝香 白礬 麝香

猪牙皂角 七錢

右為細末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎即愈一

無嗽稍亦治時氣經喉風果用效入萬無一失

拾金散 治喉閉欲死及治咽喉疼

地龍 麝香 全蠍 白礬

鬱金 猪牙皂角 七錢

右為細末每用一字吹入喉內古根不數次愈

牛膽膏 治鎖喉風

青黛 一兩 礬石 半兩 朴硝 一兩 甘草 二錢 生用

右為細末用臘月黃牛膽入藥在內當風掛百日取出再

入研麝香少許同研細每服半錢用井花水調服或吹入

喉中一方不用牛膽吹喉內一方無麝香一方各等分

治鎖喉風

明礬

輕粉

銅綠 鴨嘴膽礬 各一

江茶 半斤

右研細每以新汲水逐旋調和呷嚥之如吐即愈

奪命筋頭散

治急喉閉因喉澀滿堵塞氣不得通欲死者

膽礬

草烏 各四 綠礬 六錢 雄黃 二錢

右為細末每用筋頭蘸藥點喉內急吐涎沫吹以大黃

甘草等分俱為齏末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓

化乳香一粒溫服滌去熱毒恐為再發一方加白礬二錢

雄黃散 治纏喉風喉痺先兩日胃膈氣緊取氣短促忽然咽

喉腫痛手足厥氣痺不通頃刻不治

雄黃 透明者 如皂角 乾桑黃 各二片

巴豆 研七粒 生四粒 老去殼生 鬱金 一錢 研碎

右研勻每用半字茶清少許下如口噤咽塞用小竹管納

藥吹入喉中頃更吐利即愈一方無乾桑黃

如聖湯 治痰去熱利咽喉治咽中有瘡嚥物不下及咳嗽咯

血肺癆瘵喘氣促并小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

麥門冬 半兩 牛旁子 炒 桔梗 甘草 一兩 煎

右為細末沸湯調細細服入竹葉煎尤妙

地龍膏 治纏喉風

活地龍 五錢 須用 白梅肉 二箇 朴硝 二子

右同研成膏挑入喉中含化

山豆根湯 治鎖喉閉

山豆根 射干 芥麻 各等

右對碎每服三錢水二盞煎至七分去滓通口時時呷之

奪命散 治急喉風等證

白礬 粘 南蓬砂 指牙皂角 各等分

右為細末每用少許吹喉中痰出即愈

治痰中毒百發百中又咽喉內一切疾

皂角 略炮 高良薑 各等

右為細末噴鼻或已甚先須含香油一口不可吞就後當

之如已結成候少頃惡物膿血隨油面出輕者只含水亦

如前法一用竹管吹入喉中涎出愈

去涎方

草烏尖 鴨嘴青膽礬 各等

右為細末先用醋煎皂角調搗搗刷傳赤腫處開口流

出涎即將綿球一指頭大以布線繫定蘸藥末吞嚥至

腫處即抽出凡如此一二次其毒即破開口流出去盡涎

血却以後合瘡口藥點上俾久溫鹽水灌漱後進食

白礬 黃丹 麝香 各等

右研極細每用以銅筋點瘡口上

金鎖匙

治咽喉腫塞

雄黃 研末 巴豆 去殼

右作一服用生薑自然汁調灌下或吐或利皆愈一方細

研每遇急患不可減藥者用酒瓶裝灰坐瓶嘴下滾火一

炷焚之俟煙起將瓶嘴入一邊鼻中以紙覆瓶口熏之愈

立聖膏 治纏喉風

齊州半夏 巴豆

右將半夏輕搗每粒分作四片巴豆剝去心膜銀銅石器
內用米醋三大椀文武火熬乾為末以清醋微洗過研
為膏每患纏喉風或喉痺或喉蛾一斡耳以生薑自然
汁一茶脚化下甚者灌藥少時吐涎惡涎如魚凍相似極
有功効

立應丸 一名如聖散

治纏喉風及喉閉

南星 一箇剝去皮一火毒 白僵蠶 七箇

右將南星中心剝作孔入蠶在內以濕紙裹文武火煨熟
取出等分為末粥飲丸如梧桐子大如不丸只以綿裹藥
末吞之亦可如問口不得措牙齒上亦妙又為末每一字
以生薑汁調下如開喉不得以小竹管擊口灌之涎自出

小可只塗於唇上後用大薑一塊炙過含之一方用蜜

薑汁調藥以鷄翎蘸藥繳口內有涎吐出即可

治咽喉不得用鍼者

右以小口瓶內燒蛇床子烟張口受烟一熏即破

潤關住痛方

右以生薄荷研蜜調成膏送入咽喉下立効如涎多未退
再用如更下開可通頂又用葱頭兩箇搥碎安牙搥頭處
立開妙

紫苑方 治纏喉風喉閉飲食不通欲死者

右用返魂草根一莖即紫苑內入喉中待取惡涎出即可
如患乳鵝刺破後更以紫苑濃煎湯熱下更以馬牙硝末
挑一錢入咽間即愈一名紫苑又南中呼為夜葶是也
如聖丸 一名寬明散 治纏喉風一切喉痺危急及走

喉痺等證

右用白僵蠶不拘多少直者新瓦上炒為末以生薑自然
汁和丸如鷄頭實大含化急者生薑汁調一火盡以竹筒
灌入喉中即吐出頑涎半升許再服再將大黃一片如
指大一分厚口內含藥半食間再換大黃含至三片皆愈
若語不得神不清扶起坐灌藥從鼻入

右用釜底百草霜研細煉蜜和丸如龍眼大每服一丸以
新汲水化開灌下甚者不過三丸即愈

治一切咽喉腫毒

右用蟬殼為末以猪膽汁和蜜調傳腫處

新刊大醫院奇効良方大全六十一卷

牙齦門 附論

東垣曰夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其齒牙者是也手足陽明之所過上斷隸於坤上乃足陽明胃之脈貫絡也止而不動下斷嚼物動而不休手陽明大腸之脈所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢為病不同熱甚則齒動齦齦祖脫作痛不已故所治療不同也有惡寒冷之物作痛者有惡熱熱物而作痛者又有惡寒物又惡熱物而作痛者有惡寒飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齦動搖而作痛者有齒粗而為痛者有齒為疳所蝕少血出為痛者有齒斷腫起為痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙上多為蟲所蝕其齒缺少而色變為蟲牙痛者有胃中氣少不能衛寒袒露其齒作痛者有牙齦疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一藥而治之大抵齒之諸痛皆胃熱火旺之故且齒者骨之精華骨乃腎之所主外板則為牙內淋則為齒人腎氣強盛則齒自堅衰則齒必為病且手陽明之脈貫頰入於下齒經中澀注於牙儻風寒壅熱之氣或鬱滯胃中衝發於口則病之於齒輕者為宜露斷頰浮腫甚者則為疳齦齦脫之證齒牙之病在乎手足陽明二經動搖斷脫是以足少陰故此三經所主為多然齒祖虫疳濕熱斷腫血出作痛痛而穢臭者皆胃熱火盛所致亦有諸經錯雜之邪與夫外因得之者學者宜深究之陳無擇云齒為關門腎之榮骨之餘也腎衰則齒齦特固則齒堅又大腸支脈在牙斷主澀注於牙大腸壅則齒之為浮大腸壅則齒露扶風則攻月頭面或腫盛動作不許東垣又云消劉經歷乃內年三十餘病齒痛不可忍須騎馬外行口吸

涼風其痛立止至寒其痛復作家人以為崇神符於巫師而不能愈病乃濕熱為邪也足陽明多血多氣加以青梁之米助其濕熱故為此痛因立一方不須騎馬常令風寒之氣生於齒間以黃連胡桐決之苦寒新薄荷葉荆芥穗之辛涼四味相合而作風寒之氣治其濕熱為主以浙升麻行陽明經為使牙齒骨之餘以羊脛骨灰補之為佐麝香少許入肉為引共為細末擦之痛乃減半又以調胃承氣湯去硝加黃連以治其本服之下三兩行其痛良愈遂不復作是以前人立方用辛涼風劑風能散濕苦以洩熱也世俗多有用若花大戟小麥川椒細辛蒼耳等因煎炙燻或以寒水酸酸辛辣之味道口豈不漬搏且如以醋沃石則石蘇矣凡人之骨餘者乎然雖經絡之喜寒熱氣各不同受病之由自有盈實後之學者熟究此論治之獲功在

牙齦通治方

清胃散 治因服補胃熱藥致使牙斷上下疼痛不可忍牽引頭腦滿面熱發大痛足陽明之別絡於腦喜寒惡熱乃手足陽明經中熱盛而作痛也

牡丹皮 升麻 當歸 生地黃

黃連 各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

神功丸 治多食肉口臭不可近牙齒疳齦牙斷肉將脫齒落

血不止

黃連 三錢 升麻 二錢 木香 當歸身

蘭香葉 如無薑香

右為細末湯浸蒸餅和丸如菜豆大每服八十九食遠用

白湯送下	漱口王他散 治風蛀牙疼腫痒動搖牙斷潰爛宜露出血口氣等疾	當歸 川芎 防風 白芷	葉本 細辛 升麻 地骨皮	槐花 甘草 各等	右作一服用水二鐘黑豆三十粒生薑三片煎至一鐘去滓不拘時嗽口吐去	三牙散 治牙斷絞肉牙痒腫疼牙齒動搖欲落牙黃口臭	升麻 四錢 羊胆骨灰 羌活 各一 草龍膽 酒製 一兩半	右為細末每用少許貼牙斷疼處驗良又有涎吐去	麝香散 治熱多寒少牙露斷肉脫血出齒動欲落大作疼痛妨食	麝香 少許 升麻 各一 黃連 各一 草豆蔻 各一	熟地黃 麻黃 各一 益智 二分 羊胆骨灰 二錢	人參 生地黃 當歸 漢防已 酒製 各	右為細末每用小許擦牙疼處驗有涎吐去	蛀牙散	白礬 各 滴乳香 各等	右為細末燉膩和成膏子如粟米大每用一丸塞於蛀牙孔中寒即止	半牙地黃散 治腦寒痛及牙齒疼	生地黃 二分 蘇木 各二 人參 漢防已	熟地黃 羌活 各三 益智 各一 當歸 各一	白芷 黃芩 各五 麻黃 各一 羊胆骨灰 各一	黃連 各一 升麻 各一 吳茱萸 各一 草豆蔻 各一
------	-----------------------------	-------------	--------------	----------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	-----	-------------	-----------------------------	----------------	---------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------

右為細末每用少許擦牙疼處	荆槐散 治牙宜出血不止疼痛	荆芥穗 槐花	右各等分為細末乾貼牙患處	鬱金散 治牙齒出血疼痛	鬱金 白芷 細辛 各等	右為細末擦牙斷疼處驗少時有涎吐去	防風散 治牙齒疼痛	防風 鴉風 各三	右作一服用水二鐘煎至一鐘不拘時噙漱	香椒散 治冷證牙齒疼痛	香附子 紅川椒 破故紙 炒 各一 蘇木 一錢	右為細末入炒鹽二錢研勻每用敷擦患處	川芎散 治面腫牙疼不可忍	川芎 白芷 細辛 各等	右為細末每用少許擦牙疼處驗良又有涎吐去	秘方指牙散 治牙齒疼痛遇冷熱痛者	良薑 細辛 胡椒 草烏尖 各等	右為細末每用少許擦牙疼處驗良又有涎吐去	細辛散 治風寒邪頭腦牙齒疼痛	細辛 少許 桂枝 二分 羌活 羊胆骨灰 各半	麻黃 蒼朮 蘇木 各三 羌活 各一	升麻 防風 白芷 各二 當歸 四分	右為細末每用少許擦牙齒痛處驗有涎吐去	救苦散 治一切牙齒疼痛及蛀牙疼也	川烏 草烏 桂枝 良薑
--------------	---------------	--------	--------------	-------------	-------------	------------------	-----------	----------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------	--------------	-------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------	----------------	------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------

<p>右為細末每用少許貼于斷床處常有涎吐去</p> <p>麝香散 治牙齒疼痛</p> <p>麝香 一錢 銅綠 五錢 白欬 三錢 白礬</p>	<p>右為細末每用少許擦牙齒牙齦處常有涎吐去</p> <p>白芨散 治大寒化胎牙齒疼痛</p> <p>白芨 各二 細辛 各二</p>	<p>右為細末每用少許擦牙齒牙齦處常有涎吐去</p> <p>長春散 治牙齒動搖疼痛年久黑髮髮深有神効</p> <p>皂角 一斤 食鹽 二斤 香附 三斤 青鹽 另研 牛旁子 四兩 藿香 蓮花 並 旱蓮草 各一</p>	<p>右將皂角剉碎用瓦盆二箇上盆底鑽孔三箇下盆裝一重皂角一重食鹽將四兩都裝在下盆內將上盆相合泥固濟炭火煨煉煙青為度取出同將餘藥碾細入麝香片</p> <p>麝香 另研 片腦 另研 片腦 二兩</p>	<p>鵬再同研勻為細末每用少許擦牙患處喻良久有涎吐去校用淡鹽湯灌漱即愈</p> <p>草豆蔻散 治寒多熱少牙齒疼痛不可忍考</p> <p>草豆蔻 一分 當歸 六分 羊脛骨 灰 熟地黃 各五分</p>	<p>右為細末每用少許擦牙疼處</p> <p>麻黃散 治冬月時風寒濕頭疼項筋急牙齒動搖</p> <p>麻黃 一分 防風 一分 黃連 一分 羊脛骨 灰 各三分 羌活 半斤 升麻 一分 黃連 一分 草豆蔻 各一分 細辛 少許 熟地黃 一分 當歸 各六分 生地黃 一分 草龍膽 二錢</p>
--	--	---	--	---	--

太醫院經驗奇效良方大全 卷六二

<p>右為細末每用少許擦牙疼處</p> <p>白芨散 治大寒化胎牙齒疼痛及風寒作痛虫腫作疼</p> <p>羊脛骨 灰 麻黃 各半 黃芪 草豆蔻 升麻 各一分 黃連 當歸 益智 各四分 羌活 五分 白芷 藥本 各三分 吳茱萸 八分</p>	<p>右為細末每用少許擦牙斷床處</p> <p>皂莢散 治牙齒腫毒</p> <p>皂莢 一斤 熟地黃 二斤 桂枝 一分 熟地黃 二斤</p>	<p>右為細末入地黃汁一合和丸九丸陰乾每用特磨</p> <p>黃丹散 治牙齒腫毒色黑</p> <p>黃丹 半兩 白礬 一兩 川升麻 研末 細辛 研末 各一分</p>	<p>右先研白礬黃丹入細於生鐵銚子內炒如火色取出於地上用紙一層襯以物蓋之出火毒一宿後入升麻等三味末同研細每用少許擦於患處</p> <p>麝香散 治齒齦腫</p> <p>麝香 一錢 定粉 一錢</p>	<p>右研勻用黃蠟半兩熔開調攤紙上臨時剪作片子貼於患齒斷上</p> <p>所患齒斷上</p> <p>脂壞欲盡方 治牙齒腫毒</p> <p>右用白礬以新綿裹於患齒咬定有涎吐去一方治齒斷</p>
--	--	--	---	---

<p>神應散 治牙疼</p> <p>川芎 升麻 防風 茯苓</p> <p>白芷 細辛 香附 葶藶</p> <p>甘松<small>各等</small> 石膏<small>此餘藥加三倍</small></p> <p>右為細末每用少許臨卧刷牙以指蘸藥擦所患處竟熱麻以水漱去</p> <p>露蜂身散 治諸牙疼不可忍者</p> <p>川芎 白芷 當歸 赤芍藥</p> <p>細辛 防風 葶藶 升麻</p> <p>蜂房<small>炒各</small> 川椒<small>五粒</small></p> <p>右作一服用水煎乘熱含漱冷即吐去</p> <p>治牙疼方</p> <p>胡椒 青鹽 乳香 羌活</p> <p>草撥 良薑 細辛 雄黃</p> <p>烏頭 麝香<small>各等</small></p> <p>右為細末牙疼時噴水一口左邊牙疼以藥些少吹入右鼻孔內右邊牙疼吹入左鼻孔中即止</p> <p>治牙疼方</p> <p>石膏<small>四兩</small> 荊芥穗 川芎<small>各</small> 升麻</p> <p>細辛<small>各</small> 草撥 蠟<small>稍多</small> 胡椒<small>半兩</small></p>	<p>腫用白礬粘過為末傳齒根下以熱水漱去亦治牙疼</p> <p>治齒痛方</p> <p>草撥 白芷 生地黄 當歸鬚</p> <p>蜂房<small>炒</small> 薑黃 赤芍藥 桑白皮<small>炒</small></p> <p>細辛 藜蘆 荊芥穗 牛草<small>生用各</small></p> <p>右劉碎每服三錢用水煎出味頻漱</p>
--	--

<p>雄黃散 治諸牙疼</p> <p>雄黃 細辛 青鹽 乳香<small>另研</small></p> <p>良薑 草撥 胡椒<small>各等</small> 麝香<small>少許</small></p> <p>右為細末研勻以溫漿水刷牙以藥末於痛處擦運出涎休吐去就嗽數十次痛立止忌油膩一二日一方無青鹽有粘礬</p> <p>九寶散 治牙疼</p> <p>麝香 細辛<small>各一</small> 青鹽 草撥<small>無出不用</small></p> <p>川芎 砂仁 滑石 五倍子<small>各一</small></p> <p>右為細末與好茶對半研勻早晚擦牙</p> <p>草烏頭散 治牙痛</p> <p>草烏 水浸<small>去毒</small> 五靈脂 高良薑</p>	<p>膽礬<small>少許</small></p> <p>右為細末先以溫漿水漱過以藥一字擦痛處仍以漿水漱口再以藥擦之叩齒三遍以溫漿水漱去即愈</p> <p>麝香白牙散 治牙疼牙宣口臭</p> <p>麝香<small>少許</small> 石膏<small>半斤</small> 細辛 蒺藜<small>各</small></p> <p>三奈 青蘊<small>炒各</small> 丁香 檀香</p> <p>甘松 白芷<small>各三</small></p> <p>右為細末研勻以指蘸此少擦牙加川芎半兩尤妙</p> <p>升麻散 治牙齒疼痛</p> <p>升麻 地骨皮 槐白皮 防風<small>去蘆各</small></p> <p>莽草 桑寄生 葶藶<small>各一</small> 柳枝<small>一握</small></p> <p>右劉碎每服五錢以水二大盞入蘆末一錢荊芥穗同煎至一盞去滓熱含冷即吐日三</p>
---	---

白鹽盤 草撥 右為細末研勻每用一字擦牙合口少時去涎盡以鹽湯漱口吐去	全蠍 白芷 細辛 荆芥	防風 川芎 川椒各錢	右劉碎煎湯熱漱吐去	開笑散 治風冷齒疼 白芷 細辛 良薑 草撥	香附 川椒 蜂房炒	右等分為細末擦牙嚼鼻	一字散 治牙齒疼痛 細辛 良薑 草撥	胡椒 蜂房炒黃各	右為細末每用一字噙溫水隨痛左右鼻內啗更以半錢擦牙疼處有涎即吐候涎不粘不拘時候	透關散 治牙疼 蜈蚣頭 蠍稍去毒 草烏頭尖 各一錢	胡椒七粒 川烏頭底 十粒 雄黃七粒 大如麥	右為細末用紙擦于齶點藥少許於火上炙乾寒兩耳內門口少時即可神効	巴豆散 治牙疼 巴豆七粒 雄黃 大椒 密陀僧	草撥 上為細末以飯和捻作餅子 寒痛處	膏藥散 治牙高疼痛勤換作臭血出
---	----------------------	------------------	-----------	--------------------------------------	-----------------	------------	--------------------------------	-------------	--	--	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------

原缺

香附子散 治牙疼效速往來不歇

香附子 四兩 細辛 十兩

右劉碎每服二錢水一盞煎至八分去滓稍熱飲冷則吐之再易

治諸牙疼方

平胃散 少打梅花片腦 少研

右研勻擦牙疼處立止

川椒

細辛

華椒

猪牙皂角

荆芥

食鹽

右各等分研為末擦患處良久以水漱去

麝香一字散 治牙疼

麝香 十兩 三奈子 二錢 以麝香

右為細末每用三字口噴溫水隨疼一邊鼻內噴之漱動

水吐去便可神效

糖酥丸 治牙疼口瘡積年不瘥

糖酥 一斤 水 麝香 少許

右細研丸如粟米大以綿裹一丸於疼處咬之有涎吐去

胡椒丸 治牙疼

胡椒 一斤 糖酥 一斤 水

右細下丸如麻子大以綿裹一丸於疼處咬之有涎吐去

搗鐵湯 治牙疼久不瘥

右用大搗鐵不拘多少到如麻豆每用一合以水一盞煎

五七沙煎飲逐逐立效

治牙齦痛方

右以蕪荑仁安於齒上有縫就以室之立瘥

鯽魚砒方

右用鯽魚一箇破開入信於內放在地孔中候魚身上有熱霜掃盡心懸也 或吹自落

又方 新季蕪荑常牙疼月餘一試即愈屢効於人

右用蠟少許炙洋攤於紙上却以熱艾攤於蠟紙上以筋

捲之成筒去筋置艾筒於牙疼一邊鼻孔內以火燒艾筒

待其煙滿口疼止腫消

治牙疼方

右用蕪荑為末塞於牙孔中勿嚥汁神効

治牙疼方

右於春月採槐嫩枝火煨為末以指齒止蛀痛

治牙疼方

右以蘆薈子二七粒去赤皮細研以人乳和左邊牙疼點於右鼻中如右邊牙疼即點左鼻中立効

治齒寒立効方

右用川椒去目搗為細末以好白麩攪和丸如皂角子大

燒令熱於疼處咬之不過三五度瘥

固牙散 治牙疼

右用仙靈脾不拘多少為齋末煎湯漱牙齒大効

治牙疼殊方

右用青荷葉剪去四緣留中間連柄裹大如錢七枚以醋

米醋一盞煎取半盞去荷葉熬成膏抹痛處妙

麝香散 治齒齲

麝香 研 附子 炮 各 細辛 去苗 丁香

蒲黃 白礬 研 青黛 一箇

右為細末綿裹一錢於患處咬之嚥津下効日三五度

黃礬散 治疳瘻痔根宜

黃礬 <small>燒研</small> 乾蛤殼 <small>各一分</small> 防風 <small>去皮</small>	獨活 <small>去蘆</small> 藜香 <small>各一分</small>	右為細末研勻以溫漿水嗽口後以藥貼齒根上有涎即吐出日再貼即癒	細辛散 治齒齲	細辛 <small>去苗</small> 麝酥 <small>炙乾</small> 瓜蒂 黃連 <small>各一分</small>	右為細末每服一錢塗貼齒斷上日三五度	麝香散 治走馬牙疳疔惡候	麝香 <small>少許</small> 膽礬 <small>一分</small> 銅綠 <small>半兩</small> 白礬 <small>生用一分</small>	右為細末研勻上擦牙齦	青金膏 治走馬牙疳疔腐爛	青黛 <small>二錢</small> 砒霜 <small>一分</small> 粉霜 輕粉	麝香 <small>少許</small>	右為細末以小油旋研如稀糊塗之於夾紙上重疊研之每用薑大小剪貼之仍以白紙封護	三礬散 治牙根急疳	青礬 黃礬 <small>各半</small> 白礬 <small>一分</small> 麝香 <small>一分</small>	右為細末研勻每用些少傳瘡上有涎吐之	青金散 治走馬牙疳疔蝕損唇舌肉腐牙落臭澗其効如神	銅綠 <small>各等</small> 砒霜 <small>各等</small>	右研細每用些少傳患處	紅鉛散 治走馬牙疳	右用綠礬不以多少須用鮮明者入乾鍋以炭火燒令赤傾出以好酒拌勻再入鍋如此數遍色紅研為細末入麝香少許研勻先以溫漿水漱淨以指蘸些少傳患處有涎即吐去
--	--	-------------------------------	---------	--	-------------------	--------------	---	------------	--------------	---	----------------------	--------------------------------------	-----------	---	-------------------	--------------------------	---	------------	-----------	---

治走馬牙疳方	右用北棗去核每箇入信一米許包裹內燒存性研細每以此少傳患處	青黛散 治牙疳疔風疳齒又斷朽爛欲盡根出有虫疼痛	青黛 細辛 當歸 棘針 <small>微炒</small>	木杏 香附 青箱子 <small>各半</small> 梧桐淚	葛蒲 乾薑 <small>炮</small> 藜香 <small>各一分</small>	右為細末研勻每用半錢以綿裹含日四五度夜二度此藥無毒蒸以溫水調一錢服	八仙散 治牙疳	防風 白芷 細辛 地骨皮	川芎 荊芥 羌活 甘草 <small>各等</small>	右到碎每服三錢水一大盞煎數沸去滓澄清漱	鶴虱散 治牙齒風疳膿血出牙齒有虫	鶴虱 露蜂房 <small>燒灰</small> 細辛 <small>各半</small> 臙粉	麝香 <small>一分</small>	右為細末研勻每用臨時剪細如柳枝葉揀塗藥貼所患處一方以濕布子擦藥貼患處	麝香散 治齒漏疳疔蝕齒斷臭爛	麝香 黃礬 <small>燒赤</small> 白礬 <small>各一分</small>	荳蔻 <small>半分</small> 蝦蟆 <small>燒灰</small>	右為細末研勻先以綿拭斷上惡血出即用濕紙片蘸藥貼患處當次律有女年數齒上忽生一黑點後數日漸爛成走馬疳用此方即愈	鯽魚散 治齒漏疳疔蝕膿血出	大鯽魚 <small>十枚</small> 砒霜 <small>一分</small> 乾地黃 <small>研末</small>
--------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------	---------	--------------	-------------------------------	---------------------	------------------	--	----------------------	------------------------------------	----------------	---	---	---	---------------	--

右竹魚破腹去腸入下二味藥以紙裹魚入火燒烟絕取
去其幽灰更入白礬及麝香少許細研為末每用半錢搽
濕紙片上貼患處

細辛散 治風神牙疼牙斷宜爛牙齒動搖腮頰浮腫

細辛 去苗 荆芥 去梗 白芷 草烏 兩各一

紅椒 炒去目 鶴虱 縮砂 去殼 猪牙皂角

華撥 兩各半

右為細末每用少許於痛處擦之有涎吐去不得熱少時
以溫水漱口頻擦之立有神効

七香散 治風神牙疼及牙宣

荊芥穗 香附子 炒去毛 地骨皮

白芷 防風 各一 草烏 三枚 麝香 少許

右剉碎每服三錢水一盞煎數沸去滓澄清熱含冷吐

附子丸 治久患牙疼及齒疔

附子 兩去皮 胡椒 華撥

黃蠟 各一

右為細末燉蠟和丸如梧桐子大每用一九綿裹以患牙
咬之如蛀牙安在竅內

推黃膏 治虫牙疼

推黃 二錢 乳香 沒藥 各一 麝香 半錢

右為細末燉黃蠟和丸安在虫蛀牙孔中

白礬丸 治牙齒被虫蝕有蛀孔疼痛牙齒根朽爛

白礬 炒 黃丹 各一 編蝠糞 二十 巴豆 炒去殼

右同細研以軟粟米飯和丸如粟米大曬乾丸有蛀孔
疼痛不可忍者以一丸於痛處咬之立効

掃痛丸 治風蛀牙疼引太陽穴痛

川烏 兩 鴉片 一兩 良薑 兩 炒青
右為細末風牙痛刀上燒鹽同前藥搽蛀牙痛白梅肉同
前藥九塞之

治虫蛀牙疼

巴豆肉 三枚 明乳香 一錢

右同研燉黃蠟和丸如麻子大每用一九塞蛀孔中

般牙虫方 治牙齒被虫蝕有蛀孔疼痛

右用推黃研細以棗膏和丸塞孔中却燒鐵篋烙之或研
細隨左右疼處以刺耳送入耳中一方以推黃研末入齋
香少許研勻傅痛處

治虫牙方

右取韭菜子乾蓋火燒之却以竹箬捲一小角兒通蛀處
如下牙蛀則以韭菜子燒煎湯頻漱其虫自出

治虫牙疼方

右用糖酥搽生絲線陰乾剪二分長紐入痛牙根裏忌熱
物片時一方糖酥以熱湯化開新綿少許蘸藥如粟米大
塞痛處

取虫牙法

治風腫虫蛀動搖不安

右於三伏內用赤馬肉一塊或白者懸空於靜室候其生
蛆吊下者收拾起於熱瓦上焙乾研為末每用竹篋蘸一
小點放在疼牙上吹數一聲牙自落

柳枝湯 治齒斷腫連耳腮腫疼

垂柳枝 槐白皮 桑白皮 白楊皮 各一

右細到每用半兩以水一大盞煎至七分去滓入鹽一錢
攪勻熱含冷即吐去

柳枝湯 治齒斷腫連耳腮腫疼

柳枝湯 治齒斷腫連耳腮腫疼

柳枝湯 治齒斷腫連耳腮腫疼

柳枝湯 治齒斷腫連耳腮腫疼

柳枝湯 治齒斷腫連耳腮腫疼

<p>細辛 露蜂房 半 櫻枝 二兩 鹽花 一兩</p> <p>右到碎每服五錢以水一大盞煎至七分去滓熱含冷即吐去</p>	<p>消毒飲 治大人小兒唇口并齒斷有瘡腫痛臭氣又一切惡瘡並皆治之</p> <p>晚蠶蛾 五倍子 密陀僧 各等</p> <p>右為細末每用少許搽貼一方乾薄瘡上有津吐去</p>	<p>皂角散 昔有人食餅多齒間肉墜出昔汪丞相好食動風物性又嗜餅而患此有道人教服此藥而愈</p> <p>右用生地黄汁一匙用猪牙皂角數錠於火上炙令極熱蘸地黄汁再炙再蘸令汁盡為細末傅壅肉上即消縮又用朴硝為末傅壅肉上即消尤快</p>	<p>五倍膏 治牙腫連喉立効</p> <p>右用五倍子研細以冷水調傅頰外効</p>	<p>治齒熱痛斷腫方</p> <p>右用川升麻煎湯漱熱解毒</p>	<p>治風熱毒攻頭面齒斷腫痛不可忍</p> <p>右用牛旁根一斤熟搗絞取汁入鹽花一錢於銀器中熬成膏每用塗齒根下重者不過三五度</p>	<p>清上防風散 治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙關閉痛肉重腫鼻塞聲重頭昏目眩並皆治之</p> <p>防風 細辛 去苗 薄荷 各一 片腦 別一錢</p>	<p>川芎 七錢 白檀香 白芷 獨活</p> <p>天麻 附芥 甘草 各半</p>	<p>右為細末研勻每用二錢不拘時淡茶清調稍熱漱冷即吐出如頭昏目痛牙疳腫用熟茶清食後調服三錢</p>
---	--	--	---	-----------------------------------	--	--	---	---

<p>升麻湯 治一切風齒疼痛</p> <p>升麻 一兩 鷓鴣菜 四兩 地骨皮 八兩 薑 各五錢</p> <p>右以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓熱漱冷即吐出</p>	<p>雄黃散 治諸般風腫牙疼</p> <p>詩曰 雄辛青蠶等 膏良華齋胡</p> <p>雄黃 細辛 青蠶 石膏</p>	<p>良薑 雄黃 細辛 青蠶 石膏</p> <p>右為極細末早晚搽於牙上漱三五次吐去再添</p>	<p>草烏散 治風牙疼痛</p> <p>草烏 全蠍 白僵蠶 各七</p> <p>右為細末以指蘸藥擦於疼處唾津勿嚥然後漱之吐出</p>	<p>連翹散 治風牙疼腫不拘新久一服立効</p> <p>全蠍 一錢 高良薑 二錢 胡</p> <p>右為細末以手指蘸藥如齒藥用須擦令熱微須臾吐出少涎以鹽湯漱口大妙亦治腮頰腫痛</p>	<p>治風熱上攻齒痛 余頃任淮西幕府已酉冬被檄來和州至含山縣齒痛大作忽於一刀鏵人處得草藥一搯許以湯泡少時冷服隨意以手指蘸藥水泡痛處即定明日若人去歸余因得傳其方於後以治人多効</p> <p>右用嫩面地葱子即本草菘菜又名地松者霜後收之每用少許湯泡或云即是鷓鴣菜但本草別有鷓鴣菜為不同物也錢季誠方用鷓鴣菜一枝摺置齒中高監云以米醋煎鷓鴣散口其痛立定尤妙</p>
---	---	--	--	---	--

入方 治風腫氣腫牙疼及風蛀牙疼有苦牙痛者百藥不效 用此馬敏敏說一杆姐苦牙痛百藥不效用此即愈	右用天藤即生絲瓜一箇小者擦益火燒成灰存性為末 擦於痛處腫處延出蓋即愈右乃嚴月軒家傳屢効之方 自患此證一試而可勝後以水調藥灰捲上腮腫處尤妙 前有此方治蛀牙撥月軒此物大能去風若蛀牙則不妨	治風齒疼煩腫 右用獨活酒煮熱含之一方剉碎以水二大椀煎至一椀 去滓熱含冷即吐亦治齒風宜露	天雄散 治腎虛齒痛 天雄 <small>炮去</small> 當歸 <small>切焙</small> 細辛 <small>去苗</small> 附子 <small>炮去</small> 乾薑 <small>炮</small> 藜蘆 <small>去蘆</small> 苦參 生地黃 <small>切焙</small>	右為細末研勻早晚刷牙次以溫水漱口吐出	沉香散 堅固牙齒榮養髮 沉香 訶子皮 青藍 青黛 <small>研各二</small> 白檀香 母丁香 <small>各半</small> 當歸 香附子 <small>炒去</small> 細辛 <small>去苗</small> 荷葉灰 乳香 <small>研各</small> 苦練子 <small>炒四片</small> 龍腦 <small>另研</small> 麝香 <small>另研</small> 酸石榴皮 <small>二兩</small>	右為細末每用半錢如常刷牙溫水刷漱了早晚二次	珠砂散 揩牙令白淨 珠砂 <small>細研</small> 茅香 藿香 丁香 香附 甘松 白芷 升麻 黃丹 <small>各一</small> 石膏 <small>四兩</small> 寒水石 <small>八兩</small> 揩牙皂角 <small>二兩</small> 白檀香 零陵香 <small>各半</small>	右為細末研勻每用指齒甚佳	妙應散 牢牙疎風理氣烏龍髮
--	--	---	---	--------------------	--	-----------------------	--	--------------	---------------

人參 細辛 <small>去苗</small> 白茯苓 香附子 <small>炒去</small> 川芎 白蒺藜 <small>炒去</small> 砂仁 <small>各半</small> 百藥煎 白芷 石膏 <small>煨</small> 龍骨 <small>研各</small> 麝香 <small>少許</small>	右為細末早晨臨卧溫水刷漱之	白牙散 詩曰 細辛華撥與防風 白芷茯苓配貫芎 升麻升松香附子 石膏三倍有神功	右為細末研勻常用揩牙	沉香散 指齒瑩淨令白及治口臭 沉香 麝香 <small>各一</small> 升麻 藜蘆 石膏 <small>四兩</small> 寒水石 <small>二兩</small> 白芷 <small>各半</small> 細辛 <small>半兩</small>	右為細末每用早晚擦牙漱先	受拜齒藥 香附子 <small>用新大者半斤</small> 取出 <small>細剉以生薑一斤研</small> 細辛 <small>剉碎</small> 鹽 <small>各二</small>	右同以瓦器炒存性研細逐日揩牙	石膏散 治齒黑黃并口臭 石膏 <small>研</small> 白芷 沉香 <small>各一</small> 寒水石 <small>研二</small> 升麻 藜蘆 細辛 <small>去苗各</small> 丹砂 <small>一分</small>	右為細末研勻每用柳枝咬頭令軟蘸藥指齒	新刊大醫院許功良方大全卷之六十二
--	---------------	--	------------	---	--------------	--	----------------	--	--------------------	------------------

黃帝岐伯相為問答必推運氣之勝以月成疾之根源自非
得傳于師得悟于心貴天紀於人經道樞為日用孰能究其
所以然哉載稽古始自岐黃以來聖賢繼出使億兆之民皆得
有生之樂而無疾疢之苦所有婦人一科感疾異於男子者多
前人已註產寶方書大全及方載之胎前產後并雜病備矣今
略其切要并脈法開列于後

論形質受胎之始

太初者凡有之本也天得之以統氣太始者有形之本也地
得之以統形故輕清為天稟陽剛養而土乎上重濁為地積陰
柔順而養乎下感坤德而行花應乾道以經營是以天地相因
生生化化品物彰矣易曰大哉乾元萬物資始故陽施陰化血
氣和調感而為姓者亦資始資生之理也夫此形之初命門先
具天一主水主為陽水合丁之陰火而生丙為命門然後生心
心主血脈丙為陽火合辛之陰金而生庚有辛然後生肺肺主
皮毛庚為陽金合乙陰木而生甲有肺然後生肝肝主筋爪甲
為陽木合己之陰土而生戊有肝然後生脾脾三肌肉戊為陽
土合癸之陰水而生壬有脾然後生腎腎主骨髓髓合於五
行本其性情互相剋制及其配合互相生成且妊娠胎胎懷花
于此者乃在母腹中之事皆有經之可證也所以姓者食氣於
母所以養其形食味於母所以養其精滋育氣味為本故天之
五氣地之五味母既食之而胎又食之外則充乎形質內則滋
乎胎氣皆藉氣味之養育也今胎之所食始起厥陰也聖濟心

云京四時所化始於木也究十二經之所養始於肝也故一
血氣足厥陰肝經養之膽乃肝之腑二月肝氣足少陽膽經養
之三月陽明胃經養之脾乃胃之腑三月肝氣足少陽膽經養
之手少陽三焦經養之五月五行分五臟火生土足太陰脾經養
之六月六律定六腑足陽明胃經養之七月七清開七竅通光
明也土生金手太陰肺經養之八月八景神具濟真靈也手陽
明大腸經養之九月宮室羅布以定精也十月象足萬象成也
足太陽膀胱經養之自肝為胎臟腑相滋各養三十日此食於
母以養其精也且手太陽小腸經手少陰心經此二經不在十
月養經之數平居之日在下為月水有胎之時在上為乳汁故
不養於胎也夫胎胎之必始也受水精而成血成血成火精而成
氣受金精而成筋受木精而成骨受土精而成膚受皮毛五行
具而百骸皆備此所以集萬物之靈 有奇耦之充耗剛柔

之強弱榮衛之盈虛一時所感乃於氣形稟賦之始此皆不
之中稟於清者其子聰明智慧壽而且康稟於濁者愚癡不壽
妻在節慾以全其真陰陽配合得子必壽素問云陰陽所奉其
人壽也昔有人妻妾多而無子擇良家未笄之女相配亦無子
曰求男有道乎褚澄曰合男女必當其年男雖十六而精通必
三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁此皆陰陽之氣完
實然後交合則交而孕孕而育育而為子堅壯 壽今未笄之
女天癸始至已近男色陰氣早泄未完而傷未 動是以交
而不孕孕而不育育而子脆不壽此配合太早有傷陰陽以無
子也有婦人所產皆文者多然之過也所產皆男者此男子勤
慾惜精以婦人經行後一日三日五日於夜半時生氣瀉精受
壯必男經行後四日六日瀉精者受壯皆文若過六日瀉精者
受壯皆文若過六日已後包絡新血已滿雖交終難成孕今

黃節要善當益之

婦女月經何名天癸先期後期交生諸疾

夫天癸者天者天真之氣降與流之癸者北方壬癸之水故壬為陽水配丁而化木癸為陰水合戊而化火經曰水火者金湯之徵兆也且婦人秉陰之所集以陰類陰故得水之癸干也文至二七腎氣全盛衝任流通經血漸盈應府而**真氣**降與之從事故云天癸也常以三旬而一見不失其時又名月信也內經謂二七而天癸至然衝為血海任主胞胎脈靜海滿二者相資故令有子若或愆期或先期者或閉而不行皆成病也且閉而不行者內經陰陽別論云二陽之病發於心脾有不得隱由女子不月其傳為風消為怠黃者死不治夫經者血脈津液所化津液既絕為熱所燥肌肉消瘦特見渴躁血海枯竭病名血枯治法經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣或有經不行疑認為胎者有矣或心包厥洪數躁作時見大便澀注小便清而不利經水閉絕不行此乃血海乾枯宜調血脈除包絡中火邪而經自行矣內經所謂小腸移熱於大腸為虛癢為沉月澀不利則月事沉滯而不利故云虛癢為沉也或因勞心火上行月事不來者胞絡閉也胞脈者屬心而絡於胞中令氣上通肺心故不得下月事不來也大抵陰為陽所搏溫劑不可太過過則無益而反害以涼血和血則經自行又有經水不調或黑或紫丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其**經**稟火色也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣非則亦氣降則降氣疑則疑氣滯則滯氣清則清氣濁則濁上應於月其行有常名之曰經為氣之配因氣而行成塊者氣之凝也滯行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血皆虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者氣之甚也今人但已

紫者黑者作痛者成塊者指於風冷乘之而行溫熱之劑禍不輕矣凡論月水病源皆曰風冷乘之以其相胃而成俗也或曰黑者此乃水之色也紫者黑之漸也非冷而何經曰元則害承乃制熱甚者必煎水化所以熱則紫甚則黑也况婦人性執偏鄙嗜慾加倍臟腑厥陽之**無**日不起非熱而何且經漏不止者內經云陰虛陽搏謂之崩東垣曰婦人脾胃**致命**閉脈沉細而致疾或沉弦而洪大有寸關脈亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月膏肉之臭中有白帶者脈必弦細有赤帶者其脈洪數必腰痛脐下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮無脾胃病出見或四肢困熱心煩不得眠心下急宜大**脾胃**升舉血氣世俗以赤白之分白者為寒此其誤矣所謂**下者**任脈之病經曰任脈者起於中極之下以上毛際循腹上關元至咽喉上頤

指而入目注舌任脈自胞上過帶脈貫脐而上然其病所發正在過帶脈之分而淋瀝以下故曰帶下也赤白與下刺義同而無寒者蓋赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本也戴人云赤白痢者是邪熱傳於大腸下賁腸出赤白也帶下者傳為小腸入脬經下赤白也若濕熱結於任脈故津液湧溢是為赤白帶下其為證也頭目昏眩口苦舌乾咽嗌不利小便赤澀大便秘滯脈實而數者皆熱證也經曰元則害承乃制謂元過極則反**無**勝已之化制其甚也如以火鍊金熱極則反**為**水又如六月熱極則物反出液而濕潤林木流津故心熱甚則出汗肝熱甚則山吐脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾亦猶煎湯熱甚則沸溢及熱氣熏蒸於物而生津者也故下部任脈濕熱甚者津液湧溢而為帶下也內經曰少陰寃熱渡出白液寃者屈也結也寃熱寃帶而不散屈之猶寄也遺寃於帶脈之

間白物滿溢隨波而下綿綿不絕多不痛也或有痛者則盛氣
 因塞而成痛者又云思想無窮於額不得意淫於外入房太甚
 發為筋痿及為白淫謂白物淫積如精之狀男子溺溲而下衣
 子陰器中綿綿而下也俗醫將此為白帶治之而用辛熱之藥
 病之微者畏中有之蓋辛熱之性暫能開通鬱結散氣流濕而
 取效或病甚者鬱結不能開通舊病轉加熱證以致於死
 夫抵以辛劑煎在苦寒治之開結除濕去熱散氣無不中其病
 而免其害東垣治一婦人帶下久不止者諸藥不效診其脈心
 包尺脈極微白帶流而不止後用人參黃芩郁李仁乾薑白朮
 花芫胡荽甘草陳皮各捕經固真湯服此效矣又經水失常隨
 氣為病海藏備述四物湯加減其有立意順四時升降浮沉之
 理熱多寒少之證若春時四物湯加防風倍川芎夏時四物湯
 加黃芩倍芍藥秋時四物湯加天門冬倍地黃冬時四物湯加
 桂枝倍當歸若經率欲行腹痛絞痛臨經行者血溢也四物湯
 加玄胡索苦練木香檳榔主之若氣充經脈改月事頻併膈下
 多痛四物湯倍加芍藥主之若經水少而色和者四物湯倍加
 熟地黃當歸主之經水過多別無餘證四物湯加黃芩白朮主
 之若經水暴下四物湯加黃芩主之如膈下痛者四物湯加炒
 黃連主之若經水如黑豆汁者四物湯加黃連黃芩主之若血
 崩者四物湯加生地黃蒲黃黃芩主之若血臟虛冷崩中去
 過多四物湯加何厚艾葉主之若經水溢少四物湯加紅藥花
 紅花主之且如未嫁室女有病帶下者何也病曰有三一者經
 水初下陰中熱有當風弱者二者太衝脈氣盛則內熱以寒水
 洗之三者下元經行一時驚悸皆成此病當服木香琥珀當歸
 沒藥各四錢乳香一錢麝香珠砂二分半為末熱水為丸如龍
 眼大不拘時用溫酒化服前項諸證處方立論皆出乎前入

後之學者當德戒哉
 師尼之病其子主治
 寶鑑曰師尼之病自古未有言者昔太倉公與褚澄略而論及
 另立方藥難比要委之治寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是
 以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為勞孟子正謂無夫曰
 寡如師尼喪夫之婦欲男子而不可得慷慨成也易曰天地
 絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陰獨陽可乎若此偏者
 必以經閉為白淫痰逆頭風腦氣痞悶而點瘰癧之病診其脈
 極肝脈弦出寸口而上魚際究其脈源皆血盛而得經曰男子
 精盛則思室女子血盛則懷胎蓋男子以精為主婦人以血為
 主若陰陽和豈成病耶且婦人乃衆陰所集常與濕居貴子血
 盛氣衰者也血盛氣衰是謂從從則百疾不生血衰氣盛是謂
 逆逆則百害至矣且婦人嗜慾多於丈夫生兩倍於男子及其
 病也此之男子十倍難療尤不可不改若是四時節氣喜怒憂
 思飲食勞傷為患者悉與丈夫同也有如七疝八癩九痛十二
 帶下產毒乃男子所無之證此其生病倍於男子也又况慈惠
 愛憎嫉妬憂恚抑鬱不能自釋為病深固者所以治瘵十倍難
 於男子也由是婦人別立方焉倘能推其所自而調之可謂盡
 善盡美矣
 夜間夢與鬼交者何也
 人有五臟中有七神稟五行秀氣而生皆承神所以保養若
 陰陽調和則臟腑強盛鬼魅不能傷之若攝護失節而血氣衰
 鬼邪便傷故婦人夢中多與鬼魅交通由臟腑虛神不守舍故
 鬼氣得病也其狀不欲見人如有對忤或時獨笑或時悲泣
 者是也其狀伏逆或如鳥喙皆鬼邪為病也又脈來綿綿不知
 度數者顏色不變亦此候也昔戴人曾治一婦年三十四歲夜

夢與鬼神交驚怕異常及見神聖鬼府并構橋梁如此一十五
年不婚孕取折現構無所不致鑽肌皮肉孔穴萬千黃瘦發
熱引飲中滿脚腫診其兩寸脈皆沉而伏知胃中有痰實也
此其陽火盛于上陰水盛于下鬼神者陰之靈神堂者陰之所
舟構橋梁水之用病當三浦三泄三汗不旬日而無夢一月而
有娠人治効已載于書信不取矣且寡婦危信夜夢交通邪
氣交感久作瘵瘦或成鬼胎以按神散桃仁丸治之又有一秘
方真藥開列于後

松脂三兩 雄黃一兩
右二味為末熔化安息香和丸用瓦瓦和勻如彈子大冷
患人裸其身坐焙籠上四圍以衣遮蓋下用火爐燒藥一
丸熏之甚者不過五丸

○少陰脈滑而數者陰中生瘡○寸口脈浮而弱則為虛弱
則無血○脈來至狀如琴弦苦少腹痛主月水不利孔竅生瘡
肝脈沉主月水不利腰腹痛○尺脈來時斷絕者月水不利○
寸關調如故而尺脈不至者月水不利當患小腹引腰痛氣滯
上攻胃應也○經不通通胎寒而痛其脈沉緊此由寒氣客於
血室血凝不行結積血為氣所衝新血與故血相搏故痛○漏
血下赤白脈遲或虛小滑者主急疾大緊數者也○崩漏下血
寸口脈微遲尺脈微弦微遲為寒在上焦則吐尺脈微弦為
小腹引腰痛者必下血也○寸口弦而大弦則為減大則為
耗減則為寒耗則為虛寒虛相搏病則為華婦人則半產漏下
○尺脈急而弦大風邪入少陰之經女子漏自下赤○漏下赤
白日下血數升脈急疾者死遲者生○尺寸脈虛者必漏血若

脈弦者不可治○左手太陽浮大為男○右手太陰沉細為女
調經通治方
大溫經湯 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行
或崩中去血過多或經損壞瘀血停留小度急痛五心煩
熱並皆治之

吳茱萸湯 治心胃氣痛
白芍藥 治血虛
芎藭 治風濕
何應碎妙 甘草炙
右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

四物湯 治血虛
前或後或多或少或痛不一腰足腹中痛或崩中漏下或
半產惡露過多或停留不出或經閉腹痛下血胎不安產後
血塊不散或亡血過多惡露不止四物湯加茱萸煎服若
陽虛少使茱萸若陰虛多使茱萸一方加香附子治諸症
不足並皆治之

熱地黃 治血虛
川芎 治風濕
芍藥 治血虛
右為養末末煎服加減於後治婦人骨蒸加地骨皮牡丹
皮○若經期胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠一片
又加葱白黃芪若血虛冷崩中去血過多亦加膠艾○
若婦人常服者倍川芎倍芍藥倍黃芪倍芍藥倍黃芪○
秋倍地黃秋沉瀉血虛冬倍當歸秋沉寒而不食○若春
則防風四物加防風倍川芎○若夏則黃芩四物加黃芩
倍芍藥○若秋則門冬四物加天門冬倍地黃○若冬則
桂枝白朮加桂枝倍當歸○若血虛而腹痛微汗而惡風

四物加茂桂謂之腹痛六合○若風脈運如拳先羌活謂之風六合○若氣虛弱起則無力眩然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合○若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合○若虛寒脈微自汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒六合○若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合

○若產後虛勞日久而脈浮疾宜託胡四物湯

川芎 當歸 芍藥 熟地黃各半
芫胡八錢 人參 黃芩 半夏麴

甘草各三

同煎服

○若婦人筋骨肢節疼及頭痛脈弦增寒如瘧宜治風六合或傷損氣血乘虛而暈者宜

四物湯四兩 防風 羌活各一

○若血氣上衝心腹助下滿閉宜治氣六合

四物湯四兩 木香 檳榔各一

○若脐下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合小腹痛同用

四物湯四兩 玄胡 苦練各一兩

○若氣衝經脉故月事頻併脐下多痛宜芍藥六合

四物湯四兩 芍藥倍加 黃芩一兩

○若經事欲行脐腹絞痛眩暈者血泄也宜八物湯

四物湯四兩 玄胡 檳榔 苦練各一兩

木香各一

○若經水過多別無餘證宜黃芩六合

四物湯四兩 黃芩 白朮各一

○若經水過少宜四物湯內加葵花煎又加紅花血見愁

○若婦人虛勞氣弱咳嗽喘滿宜厚朴六合

四物湯四兩 厚朴一兩 枳實半兩

已上四味治法如前一證於四物湯中各加一味用之

○若經水暴下四物湯內加黃芩若腹痛加黃連如夏月不去黃芩

○若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩

○若經水少而色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩

○若經水適來適斷或有寒熱往來者先服小芫胡湯以去其寒熱後以四物湯和之如寒熱不退勿服四物是謂變證

表邪猶有不能効也依前論中交證隨證用藥調治之

○若婦人血積者四物湯內加

廣茂 芎三稜 桂 乾漆炒烟盡

○若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜八物湯

四物湯四兩 黃芩 白朮 茯苓

○若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱

大陽經病宜表虛六合湯

四物湯四兩 桂枝 地骨皮各七

○若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊太陽經病宜表實六合

四物湯四兩 麻黃 細辛各半

○若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛宜風濕

六合湯太陽標病也

四物湯四兩 防風 蒼朮各七錢

○若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦紋宜升麻六合

四物湯四兩 升麻 連翹各七

○若妊娠傷寒胃膈滿痛脈弦少湯頭昏項強宜託胡六合

四物湯四兩 升麻 連翹各七

○若經水過多別無餘證宜黃芩六合

四物湯四兩 黃芩 白朮各一

○若經水過少宜四物湯內加葵花煎又加紅花血見愁

○若燥結四物與調胃承氣湯合半名五燭散
 ○若流濕瀾燥宜四物理中各半湯
 ○若保胎氣令人有子四物與縮砂四物子湯各半名八珍湯
 ○若熱與血相搏口舌乾燥飲水加 瓜蒌 麥門冬
 ○若腹中刺痛惡物不止加 當歸 芍藥
 ○若血崩不止者加 蒲黃 生地黃 黃芩無一方
 ○若因熱生風者加 川芎 羌活 防風無一方
 ○若賊秘澀者加 大黃 枳實 枳殼
 ○若消瀉者加 宿桂 附子
 ○若嘔者加 白朮 人參 生薑無一方
 ○若發寒熱者加 乾生薑 牡丹皮 羌活 芍藥無一方
 ○若大渴者加 知母 石膏
 ○若水停心下微吐逆者加 猪苓 茯苓 防已
 ○若頭昏項強者加 羌活 黃芩
 ○若屋寒似傷寒者加 人參 羌活 防風
 ○若產後諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服之甚效
 ○若婦人或因傷酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者宜四物
 二連湯
 四物湯內用生 黃連 胡黃連
 用溫飲清服
 四物與桂枝麻黃白虎羌活胡理中四逆茶連承氣涼膈等
 皆可作各半湯易老用藥大略也
 ○若屋煩不得睡者加 竹葉 人參
 ○若婦人血虛心腹疝痛不可忍者去地黃加 乾薑名四神湯
 ○若諸育有溫者四物與白朮相半加
 天麻 茯苓 川山甲

○若燥結四物與調胃承氣湯合半名五燭散
 ○若流濕瀾燥宜四物理中各半湯
 ○若保胎氣令人有子四物與縮砂四物子湯各半名八珍湯
 ○若熱與血相搏口舌乾燥飲水加 瓜蒌 麥門冬
 ○若腹中刺痛惡物不止加 當歸 芍藥
 ○若血崩不止者加 蒲黃 生地黃 黃芩無一方
 ○若因熱生風者加 川芎 羌活 防風無一方
 ○若賊秘澀者加 大黃 枳實 枳殼
 ○若消瀉者加 宿桂 附子
 ○若嘔者加 白朮 人參 生薑無一方
 ○若發寒熱者加 乾生薑 牡丹皮 羌活 芍藥無一方
 ○若大渴者加 知母 石膏
 ○若水停心下微吐逆者加 猪苓 茯苓 防已
 ○若頭昏項強者加 羌活 黃芩
 ○若屋寒似傷寒者加 人參 羌活 防風
 ○若產後諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服之甚效
 ○若婦人或因傷酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者宜四物
 二連湯
 四物湯內用生 黃連 胡黃連
 用溫飲清服
 四物與桂枝麻黃白虎羌活胡理中四逆茶連承氣涼膈等
 皆可作各半湯易老用藥大略也
 ○若屋煩不得睡者加 竹葉 人參
 ○若婦人血虛心腹疝痛不可忍者去地黃加 乾薑名四神湯
 ○若諸育有溫者四物與白朮相半加
 天麻 茯苓 川山甲

用酒煎服

○若目暴赤發作雲翳疼痛不可忍者宜四物龍膽湯

四物湯各半卷法 防風各三 草龍膽

防已各一

用水煎服

一方等分為粗末每服四錢水一盞半煎至八分去滓取

六分清者帶熱服食前若平常血氣不調及常服只用木

方日二三服○若經血凝滯腹內血氣作疼加茂木官桂

等分用之王石膏云熱地黃滯血安能止痛不若以五味

子代之○若因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生薑

煎○若胎動不安下血每服加芫葉五七片更加葱白阿

膠末成四末之半當歸用小半如疾勢甚者以四味名半

兩細對以水四盞煎艾一塊如鷄子大阿膠五七片煎至

二盞半去滓分作四服一日全盡一方有粉草乾薑黃芪

日二三服至二臘以一二日為一臘以前產後每日可一

二服亦治血痢疾不止腹痛難忍宜加阿膠艾葉煎服名

六物湯如氣虛血海不調服一月不妨也○若產後被驚

氣滯種種積滯敗血一月內惡物微少敗血作病或脹或

寒胃膈脹或發寒熱四肢疼痛加玄胡索沒藥香白芷

與四物等分為細末淡醋湯或童子小便酒調下○如血

風於產後乘虛發作或產後傷風頭疼發熱百骨節痛加

荆芥穗天麻香附子石膏藿香各一分四物料共一兩中

加之每服三錢水一盞煎至七分服○如寒熱往來加炮

乾薑牡丹皮各一分若平常少虛肢體瘦倦月信不

調只用生薑薄荷如常服此是婦人常服之藥蓋朱家而

任緩効遲而功深○治老人風秘加青皮等分煎服○一

方治婦人腹痛作言身厥不快加熱地黃一倍

倍煎○治瘧疾加荆芥酒煎常服○一方添訖胡各五神

未煉蜜為丸如梧桐子大空心米飲下三四十丸以察年

高婦人白帶又良驗也請詳用之○一方四物湯加甘草

半斤為細末煉蜜為丸每兩作八九酒醋共半盞煎湯同

化調停下各當歸煎去敗血生好血如人行五里再進一

丸無時服○一方對散隨病證加減後藥煎服○血氣不

調加吳茱萸一兩甘草半兩○補下元加乾薑半兩甘草

七分○血崩淋瀝不斷加炮附子一箇赤石脂一兩○便

血及帶下加荆芥地椒○氣血滯腹內刺痛加桂○產後

傷風頭痛加石膏一兩甘草半兩○血風勞加荆芥訖胡

○潮熱加前胡乾葛黃芩入參○虛熱口乾加麥門冬黃

芩一兩○嘔吐不止加藿香白木半兩二人參一錢○產後

虛憊發熱煩悶加生地黃○產後腹脹加枳殼肉桂各三

錢○產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝○產後寒熱

往來加訖胡麥門冬各半兩○經血淋漓不斷加乾瑞蓮

房炒入藥○血滯不通加桃仁紅花各一分○產後間亂

加扶神遠志各半兩○虛而多汗加炮牡蠣麻黃根各半

兩○妊娠心煩加竹茹一塊○如有敗血則用當歸近上

節白芍藥以赤易熟地黃以生者○一方對散每服四錢

水一盞半煎至七分去滓食前熱服為末服亦可若常服

血氣不調平常服只用本方春加當歸夏加芍藥秋加川

芎冬加地黃各一兩半日二三服○妊娠作惡生寒面青

不思飲食憔悴加陳皮枳殼白朮茯苓甘草○產後敗血

築心地骨皮芍藥○潮熱黃芩地骨皮訖胡○咳嗽桑白

皮半其人參生薑北五味子甘草○損孕下血不止頭痛
 寒熱耳鳴氣血勞傷所致黃芩荆芥生地黃赤芍藥生薑
 ○產後潮熱死胡地骨皮白木茯苓甘草素允知母黃芩
 麥芽具母人參烏梅棗子○心腹脹滿枳殼青皮○產汗
 麻黃根○產後潮熱白木北地胡甘草牡丹皮地骨皮○
 有熱黃芩○汗多浮麥○腸風下血槐角槐花枳殼荆芥
 黃芩大腹皮紅內消地榆石楠葉白鷄冠花為散煎一半
 為末空心鹽湯舊酒調下○鼻衄吐血竹青蒲黃藕節半
 夏丁香訶子桂花紅棗飛羅麩白茅根蚌粉○如癰連翹
 茨子紅內消白芷蘇片荆芥牛膝山蜈蚣乳香沒藥漏
 蘆生地黃○血風兩脇筋疼或盤腸成塊大黃葶藶乳香
 ○胎動漏血不止黃芪側柏阿膠甘草續斷平常經血淋
 瀝不斷或多或少或赤或白非特漏下多服有劫○月水
 不通野芋根牛膝紅花蘇木舊酒水同煎○臨產小腹緊
 痛紅花滑石甘草燈心葵子○經閉枳殼大黃荆芥黃芩
 青皮滑石木通鹽麥海金沙山梔子車前子○安胎及漏
 胎下血阿膠大艾甘草蒲黃炒過○產後腹痛血塊攻腸
 大艾沒藥好酒○產後病眼北細辛羌活荆芥菊花甘草
 木賊石决明草决明○赤眼頭風疾薄荷清茶○赤眼生
 風防風黃芩○產後浮腫氣急腹大喉中水鷄聲牡丹皮
 荆芥白木桑白皮赤小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生薑
 葱白薄荷○月水不調血崩或多或少或前後逆心膨陳
 艾黃芪○血弱生風四肢痺行步艱難乳香人參沒藥
 麝香甘草五靈脂羌活獨活防風荆芥地龍南星白附子
 澤蘭為末蜜丸木瓜鹽湯下○血氣膨脹甘草大香枳殼
 馬兜鈴寧神蘇香地黃空心服○補血住崩百草霜

鐵天首綿灰蒲黃炒過龍骨白薑○血成片地黃藕節○
 黑血片人參白木○白淫濁龍骨○地黃當歸○五色研
 麝香好酒○鮮紅溫酒鹽湯○風疹赤腫荆芥牛旁子何
 首烏甘草防風羌活地黃益酒○帶下肉桂蒲黃百草霜
 甘草黑豆白木玄胡索白薑龍骨空心益酒○血寒并草
 烏梅范胡柳枝○感風勞嗽欬花知母阿膠半夏麻黃
 甘草馬兜鈴黃芩杏仁北地胡薑錢訶子為梅○月經久閉
 肉桂并草黃芪薑棗子木通紅花○大便下血四肢寒
 膨脹及腸胃有風槐花枳殼漏蘆荆芥木香白鷄冠花木
 通紅內消紫草石榴皮陳皮黃芩青皮甘草白茅根槐角
 ○產瀉人參川芎白芷蒲黃炒阿膠白木葶藶續斷乾薑
 黑附子肉桂黃芪赤石脂并草麥九益梅湯下○白帶用
 白龍骨酒○胎前產後痢後風乳香龍骨柴更木香肉桂
 蒼木牡丹皮白薇人參并草澤蘭大椒茴香煉蜜為丸不
 瓜酒下○治帶下赤白痢陳米飲○心腹脹炒薑酒○血
 氣艾醋湯○澤身勞倦為末炒薑酒陳青蒿益和調下○
 產後四肢黃甘草牡丹皮澤蘭白薇蒼木桂心茴香蜜丸
 鹽湯溫酒下○嘔逆飲食不入加白木丁香并草人參縮
 砂益智仁胡椒○經行腹痛腰痛背痛去薑牛膝紅花吳茱
 萸菴蘭并草銀器燈心熱服○產後人參乾葛烏梅瓜薑
 根○受胎小腸氣痛木香茴香○胎前嗽枳殼并草欬花
 知母馬兜鈴半夏通草蓬人參苦梗麥門冬○脚腫失
 履皮赤小豆茯苓皮生薑皮○產後不語失音訶子人參
 炒蜜百藥煎○陰陽交合經脈行赤石脂黃芪肉桂并草
 霜敗標灰肉豆蔻當歸木香龍骨白木茯苓地榆藕節○
 胎氣衝肝腰脚痺行步艱難枳殼木通并草連翹荆芥地

黃卷活獨活山梔子燈心空服○氣築小腹痛交胡索煎服○陳氏經方云吳興周端仁郎中頃赴省試照臨一隣吳某本醫家凡婦人百病只以四物湯加茱萸煎不効者產難及胎衣不下子死腹中入酒同煎凡用有効謹以此為報此藥不知起於何代或云自魏華陀之術權微方類單省傳稱陀破灸不過數處千金方云自三代以來醫方藥論未有如此詳備其間有漢晉名公諸方今產實方乃未梁時節度巡官曾齊所撰其中有四物散後條入聖惠方自後醫者易散為湯善用者若取良馬當隨意無不得所至為命名醫於四物中增損品味隨意虛實寒煥皆得其要者然亦非止婦人之疾可用而已
 逍遙散 治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱
 託胡去 白木 茯苓去 歸 去 薑
 芍藥 芍藥 薄荷半 甘草 一
 右作一服水二鍾煎薑五片煎至一鍾不拘時服
 加味吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期或前或後或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脈行時頭眩飲食減少氣滿心怯肌肉不澤悉皆治之
 吳茱萸 當歸 官桂 北細辛 半
 半夏 二錢 麥門冬 乾薑 白茯苓
 苦梗 南木香 防風 牡丹皮
 甘草 一
 右作一服水二鍾生薑三片紅棗一棰煎至一鍾食前服
 桃仁散 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水或經月不來多思酸物
 四體虛倦不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後

桃仁 半夏 當歸 川牛膝
 桂心 人參 蒲黃 牡丹皮
 川芎 澤蘭葉 赤芍藥 生地黃 一
 粉草 半錢
 右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服
 薑黃散 治血脈久冷月水不調臍腹刺痛
 薑黃 白芍藥 二 玄胡索 牡丹皮
 當歸 半 蓬朮 紅花 桂心
 川芎 一
 右作一服水二鍾酒半鍾煎至一鍾不拘時服
 紫石英丸 治婦人月經不調或多或少或前或後時發疼痛
 紫石英 煅 川烏 杜仲 炒 去 禹餘糧 煨 醋 泔
 遠志 去 心 桂心 澤瀉 桑寄生
 龍骨 別 研 當歸 人參 肉蓯蓉 酒 浸
 石斛 乾薑 炮 五味子 甘草 一 兩
 牡蠣 煨 川椒 去 目 并 合 口 者 不
 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用米飲湯送下
 吳茱萸湯 治婦人素虛又為風冷乘氣停滯腰脇刺痛
 吳茱萸 湯 洗 當歸 二 錢 桔梗 去 蘆 細辛 去 苗
 防風 去 蘆 乾薑 炮 熟地黃 半 甘草 半
 右作一服水二鍾煎至一鍾空心服
 椒紅丸 治婦人血氣不調臍積冷臍腹痛肌體日瘦
 椒紅 沉香 當歸 去 蘆 訶梨勒 煨 去
 蓬朮 附子 炮 白朮 各 一 藜香 煨 半
 肉豆蔻 良薑 丁香 各 半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫酒送下

暖宮丸 治衛任虛損下焦久冷月事不調不成孕育前漏下血赤白帶下並皆治之

生硫黃 六兩 赤石脂 火煨 海蝶蛸 附子 各三兩

禹餘糧 九兩 右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九空心用溫酒或醋湯送下

救急丸 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結硬時發刺痛漸成勞狀

龍甲 醋炙 桂心 三棱 醋炙 牡丹皮 牛膝 去苗 琥珀 訶子 取肉 桃仁 去皮尖雙

土瓜皮 失黃 各 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸食前用桃仁湯送下

當歸散 治血脈不通

當歸 川山甲 灰炒 蒲黃 炒各 辰砂 另研

麝香 少許 右為細末研勻每服二錢食前熱酒調下

當歸散 治婦人血脈虛竭或積 不定時作腹痛腰膝重疼攻刺小腹 通並皆治之

紅花 紫葳 牛膝 白芷

蘇木 碎各 桂心 三錢 當歸 赤芍藥 三錢 甘草 半錢 劉寄奴 各二

右作一服水一鐘酒一鐘同煎至一鐘服

入參荆芥散 治婦人血風發熱身體疼痛頭昏目眩煩渴盜汗或月水不調胸膈痞痛痲痺硬並皆治之

人參 去蘆 荆芥 穗 赤芍藥 龍甲 醋炙 去

芎藭 去苗 牡丹皮 羚羊角 酸棗仁 枳殼 麩炒 白木 肉桂 去粗 生地黃

防風 去蘆 當歸 芍藥 右作一服水二鐘生薑三片煎至一鐘不拘時服

伏龍肝散 治血氣勞傷衝任脈虛經血非時注下或如豆汁或成血片或五色相雜胸膈冷痛月經不止

伏龍肝 麥門冬 去心 赤石脂 各一 熟地黃 艾葉 炒各 當歸 炒 川芎 各半 肉桂 皮 粗

乾薑 炮 甘草 各半 右作一服水二鐘紅棗二枚煎至一鐘食前服

滋血湯 治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或為浮腫肌體發熱疑為勞瘵

馬鞭草 荆芥 穗 牡丹皮 肉桂 去粗 赤芍藥 川芎 當歸 去蘆 各 枳殼 炒 各

右作一服水二鐘為梅一箇煎至一鐘食前服

壯丹散 治婦人血熱氣虛內損月水不行外發潮熱肢體羸困漸成骨蒸並宜治之

牡丹皮 芍藥 女胡索 蓬莪朮 乾漆 當歸 烏藥 各 鬼箭草 陳皮 沒藥 研 蘇木 紅花

桂心 甘草 各半 右作一服水二鐘煎至一鐘不拘時服

六神湯 治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進飲食

川芎	當歸	白芍藥	熟地黃
黃芪	地骨皮	防已	木通
右作一服水二鐘煎至一鐘食前服	大腹皮飲 治婦人血瘦甲腹痛	瓜蒌	黃芪
厚朴	枳殼	大黃	陳皮
右作一服水二鐘煎至一鐘入酒半盞再煎一二沸去滓食前服	異功散 治婦人血氣虛冷時發刺痛頭目昏悶四肢無力寒熱往來狀似勞倦並宜服之	烏藥	川芎
當歸	陳皮	官桂	牡丹皮
芍藥	白芷	乾薑	玄胡索
右作一服用水二鐘生薑三片煎至一鐘入酒半盞再煎一二沸不拘時	玄胡索湯 治婦人室女七情所感血與氣併心腹疼痛或連腰脇甚作搐搦一切血氣經候不調並宜服之	女胡索	蒲黃
當歸	去蘆	乳香	木香
沒藥	甘草	半錢	官桂
右作一服水二鐘生薑三片煎至一鐘食前服	六合湯 治婦人經事一行腹中結塊腰腿重痛	川芎	當歸
官桂	蓬朮	白芍藥	熟地黃
右作一服水二鐘煎至一鐘食前服			

溫經湯 治婦人血海虛寒月水不調	川芎	當歸	芍藥	蓬朮
人參	牛膝	桂心	牡丹皮	
甘草 半錢				
右作一服水二鐘煎至一鐘不拘時服	人參白朮散 治偏身燥溫相搏玄府緻密心煩悵悸發渴飲食進少不為肌膚	人參	石膏	滑石
薄荷	黃芩	白朮	甘草	生地黃
茯苓	右作一服水二鐘煎至一鐘食前服	柏子仁湯 治婦人憂思過度勞傷心經不能藏血遂致崩中下血不止	茯苓	白朮
柏子仁	香附子	去苦	鹿茸	阿膠
茯神	去皮	當歸	小蓀	
川續斷	二錢	甘草		
右作一服水二鐘生薑五片煎至一鐘空心服	白朮散 治婦人脾胃氣虛小腹痛滿四肢無力不欲飲食	白朮	赤茯苓	厚朴
單菓	桂心	橫柳	人參	
陳皮	甘草	半錢		
右作一服水二鐘生薑三片棗一枚煎一鐘不拘時服	八珍散 調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食	人參	白茯苓	白朮
川芎	芍藥	當歸	熟地黃	
右作一服水二鐘生薑三片紅棗一枚煎一鐘食前服				

五燭散 治婦人傷寒發熱胃脹滿痛血氣不通	川芎 芍藥 當歸各二錢 熟地黃各一錢	枳實 補硝 厚朴各二錢 大黃三錢	右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服	滋血湯 治婦人心中虛損血脈虛弱月水過期	人參 山藥 黃芪各一錢 白茯苓去皮	川芎 當歸 白芍藥 熟地黃各半	右作一服水二鍾煎至一鍾食前服	增減四物湯 治婦人血積	川芎 當歸 熟地黃 乾漆炒烟	芍藥 京三稜 蓬水各半 官桂一錢	右作一服水二鍾煎至一鍾食前服	麥前散 治少男室女骨蒸婦人血風攻注四肢心胃煩滿	懸甲 醋炙 乾漆 常山 大黃 醋炙	白朮 芫胡 生地黃 赤茯苓	當歸 石膏各半 甘草半錢	右作一服水二鍾小麥一百粒煎至一鍾食前服有盜汗加麻黃根一錢同煎	桂枝桃仁湯 治婦人月事不通小腹脹疼	官桂 生地黃各二錢 芍藥二錢 桃仁半錢	甘草半錢	右作一服水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾食前服	增損四物湯 治月事不調心腹疼痛補血溫經注頭	川芎 當歸 芍藥 熟地黃	牡丹皮 白朮各半 地骨皮一錢	右作一服水二鍾煎至一鍾食前服
---------------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------	----------------	------------------	----------------	-------------------------	-------------------	---------------	--------------	--------------------------------	-------------------	---------------------	------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------	----------------

大玄胡索散 治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶或癥瘕	薺塊及一切心腹暴痛	女胡索 赤芍藥 川練子去核 蓬莪朮炭	京三稜 厚朴薑製 當歸 黃芩	川芎 桔梗 檳榔各一錢 木香	官桂去皮 甘草各半 大黃二錢	右作一服水二鍾煎至一鍾食前服	牡丹散 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食	牡丹皮 川大黃 赤茯苓 生地黃	赤芍藥 當歸 白朮各半 桃仁	官桂 石葦 木香各一錢	右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服	黃芪散 治婦人熱勞羸瘦四肢煩熱心燥口乾不欲飲食	黃芪 地骨皮 赤茯苓 麥門冬	生地黃 赤芍藥各半 人參 黃芩	當歸 芫胡半錢 甘草半錢	右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服	麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下	麥門冬 赤茯苓 赤芍藥 芫胡各半	桑白皮 生地黃 黃芪 羚羊角各一錢	甘草半錢	右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服	犀角散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下	犀角屑 赤芍藥 地骨皮 赤茯苓	紅花 人參 枳殼 麥門冬各一錢	芫胡二錢 黃芪半錢 甘草半錢
--------------------------	-----------	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	-----------------	----------------	-------------	--------------------	-------------------------	----------------	-----------------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-------------------	------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------	----------------

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服
地骨皮散 治婦人血風氣體羸弱寒熱發渴

地骨皮 桑白皮 枳殼 前胡
黃芪 白茯苓 五加皮 白芍藥

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服
滋養榮血補婦人諸虛冷血海久冷

當歸 川芎 麥門冬 牡丹皮
人參 芍藥 琥珀 酸棗仁 甘草

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服
大腹皮散 治婦人風毒脚氣肢節煩疼心脾壅悶

大腹皮 紫蘇 木通 桑白皮
羌活 荆芥 芍藥 青皮

右作一服水一鍾生薑五片葱白一莖煎一鍾不拘時服
桑白皮散 治婦人脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿

桑白皮 柳李仁 木通 檳榔
青皮 木香 防己 大腹皮

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服
神祕湯 治水氣乘肺而喘及治支飲喘滿

橘皮 桑白皮 紫蘇 人參
右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾食前服

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾食前服
治婦人寒熱體瘦皮節疼痛口乾心煩不欲飲食

羌活 荆芥 芍藥 青皮
木瓜 薄荷 枳殼 桑白皮

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服
赤茯苓 紫蘇 防己 大腹皮

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服
治婦人寒熱體瘦皮節疼痛口乾心煩不欲飲食

北羌活 赤茯苓 黃芪
麥門冬 枳殼 人參 地骨皮

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服
黃芪散 治婦人客熱心胃壅悶肢節煩疼不思飲食

黃芪 生地黃 瓜蒌仁 茯苓
犀角 黃芩 甘草 茯神

右作一服水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服
瑞金散 治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐疼痛

玄胡索 牡丹皮 紅花 片薑黃
赤芍藥 蓬莪木 川芎 當歸

右作一服水一鍾酒一鍾煎至一鍾食前服
牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛不思飲食

牡丹皮 玄胡索 官桂 京三稜
當歸 蓬莪木 赤芍藥 牛膝

右作一服水一鍾酒一鍾煎至一鍾食前服
石葦散 治婦人小便赤熱淋瀝

石葦 黃芩 瞿麥 榆白皮
木通 葵子 甘草

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服
神機湯 治上氣喘急不得卧

橘皮 紫蘇 人參
北五味 桔梗

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服
治婦人寒熱體瘦皮節疼痛口乾心煩不欲飲食

羌活 荆芥 芍藥 青皮
木瓜 薄荷 枳殼 桑白皮

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服
赤茯苓 紫蘇 防己 大腹皮

人物湯 治經事致行臍腹絞痛臨經痛者血澁也

川芎 當歸 芍藥 熟地黃各二錢

木香 檳榔 玄胡索 苦練各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

旋覆花湯 治婦人心胃嘈雜中脘痰飲冷氣心下汪洋口中

清水自出腹脇急脹滿痛不欲飲食

旋覆花 人參 桔梗 白芍藥各一錢

橘皮去白 赤茯苓 半夏各二錢 官桂去皮

細辛 甘草各半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

小芫胡湯 治婦人傷風續得寒熱發作有時經水適斷此為

熱入血室其血必結致如瘧狀

芫胡三錢 半夏 黃芩各二錢 生地黃

人參各半 甘草半錢

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾不拘時服

黃芩芍藥湯 治婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食

黃芩 芍藥 白芍藥 白朮 生地黃各半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

三黃瀉心湯 治婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩躁

譫語目赤毒氣閉塞不通

大黃五錢 黃芩三錢 黃連二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

竹茹湯 治婦人病未平復汗血吐血衄血下血

竹茹 人參 白芍藥 熟地黃各二錢

川芎 桔梗 當歸各一錢 桂心

甘草各半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

青竹茹湯 治婦人病未平復因有所動致熱氣上衝手足

拘急搐搦如中風狀

青竹茹二錢 瓜蒌根五根

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

當歸白朮湯 治婦人病未平復因有所動小腹急痛腰膝疼

四肢不任舉動無力發熱

當歸 白朮 桂枝 芍藥

人參 黃芩 甘草各半 附子壯用

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

乾薑芫胡湯 治婦人經脈初來方斷傷寒熱如瘧狂言見

兪並宜服之

乾薑 杜鵑 桂枝各一錢 瓜蒌根半錢

芫胡三錢 甘草半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

凌霄花散 治血瘦血塊及產後惡露不盡兒枕急痛應于積

聚瘀痛漸成癥瘕悉皆治之

凌霄花二錢 硃砂 桃仁另研 玄胡索

紅花 當歸 官桂去油 紅娘子酥

血竭 紫河車 赤芍藥 山梔子仁

沒藥 地骨皮 加皮 牡丹皮

甘草各二錢

右為細末每服二錢食前溫酒調服

內補當歸丸 治血氣虛損月水不調或崩中漏下去血過多

肌體羸困及月水將行腰腿重痛並皆治之

當歸味薑 阿膠化 白朮 續斷

乾薑炮	芍藥	甘草四兩	熟地黃	兩
附子炮	白芍藥	肉桂兩	吳茱萸	湯泡
白朮	蒲黃	錢		
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒送下				
熟地黃丸	治婦人風塵勞冷胃弱米穀不化或腸虛受冷大便時泄或月水不調淋瀝不止或閉澀不通結聚癥瘕久不成胎一切諸虛之證並皆治之			
熟地黃	五味子	各半	栝子仁	兩
芍藥	禹餘糧	醋炒	白茯苓	去皮
卷柏	去根	山藥	厚朴	去皮
白芷	細辛	去苗	防風	已上各
杜仲	去皮	蕪荑	心	人參
蛇床子	艾葉	炒	續斷	各半
石膏	煨	另研	當歸	去蘆
石斛	錢	兩	甘草	一兩
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒或米飲送下				
禹餘糧丸	治血虛煩熱月水不調赤白帶下漸成崩漏			
禹餘糧	醋炒	白石脂	兩	附子
桑寄生	白朮	厚朴	去皮	當歸
栝葉	炒	乾薑	炮	白芍藥
吳茱萸	湯泡			狗脊
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒或米飲送下				
神仙聚寶丹	治婦人血海虛冷外寒風寒搏結下散積聚成			

塊血氣攻注	胎前腹痛及經候不調崩中帶下並宜服之
沒藥	另研
辰砂	另研
右研勻滴水為丸每兩作十九每服一九空心溫酒送下	
洗洗丸	治婦人衝任虛寒胎孕不或或損隨
澤蘭葉	白朮
白芍藥	石斛
玄胡索	牡丹皮
右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒送下	
紫蘇散	治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不思飲食脚膝痠腫並皆治之
紫蘇	葉
枳殼	二兩
木瓜	青皮
右咬咀每服三錢水一盞生薑三片煎白一壺煎至七分去滓溫服佳	
濟陰丹	治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血冲心中風口噤子死腹中劈開口灌藥須臾生下便得無恙治墮胎腹中收刺疼痛橫生逆產胎衣不下血暈血癖血崩血滯血入四肢一應血病有患及諸種風氣或傷風吐逆咳嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脈不調赤白帶下乳生惡氣胎前虛冷數曾墮胎崩中不定因此成疾室女經脈不通並宜服之常服煖子宮和血氣悅顏色退風冷能消除萬病
三稜	二兩
蓬朮	片
枳殼	去穢

大艾去根	劉寄奴	香附子	敗血	各半
烏豆	三升	上九味	以穀	當歸身
摘皮	紅者	白芍	藥	兩半
官桂	皮	去粗	赤	藥
生地黃	酒	浸	熟地黃	酒
五靈脂	酒	浸	白木	膠
右為細末	以糯米粉	穀醋	打糊	為丸
十九空心	沉香湯	送下	蘇湯	益湯
南嶽魏夫人	濟陰丹	治婦人	血氣	久冷
因衝任之脈	虛損	胞內	宿挾	疾痛
內再行	或前	或後	或崩	中漏
冷痛	小便	白濁	已上	諸疾
治產後	百病	百碎	內常	服除
子充實	亦治	男子	亡血	諸疾
木香	鹿	京墨	煨	茯苓
桂梗	炒	人參	細辛	桂心
川芎	各半	蒼朮	米	濟
山藥	各三	澤蘭	葉	熟地黃
糯米	一	右為細末	煉蜜	和丸
每服	三兩	或以醋	糊為丸	如梧桐子
每服	五十九	依前		
服亦可				
治婦人	痰	無所	不治	

晚蠶沙	鱧魚鱗	燒	為當歸	去薑
澤蘭	去	搜	竹	子
防風	去	薑	蕪	美
川芎	人	參	黃	芪
白薇	檳	榔	不	見
紅花	炒	兩	藜	本
甘草	三	兩	白	薑
右為細末	煉蜜	搜和	并	數
血凝塊	病	綿	灰	酒
梗酒	下	血	崩	棕
風刺芥	酒	下	血	暈
黃汁	童子	小便	酒	一
化下	並	空	心	食
烏雞煎丸	治婦人	胎前	產後	諸疾
烏雄雞	一隻	烏藥	石	床
人參	白	木	黃	芪
海桐皮	肉	桂	去	粗
蓬莪朮	川	烏	紅	花
玄胡索	木	香	瑰	珀
肉苳蔻	草	菓	兩	半
右細剉	用烏	雄雞	一隻	湯
雞肚	中	用	新	磁
盛焙	乾	為	細	末
前產	後	傷	寒	蜜
白帶	下	生	薑	地
酒下	產	後	以	塊

逆薑湯下○惟益炒獨葵子酒下○安胎益酒下○室女
 經脈常通不道四肢疼痛煎紅花酒下○血氣攻刺心使
 寒痛煎當歸酒下○血暈棕櫚燒灰酒調吞下○血邪所
 殊砂麝香酒下○血悶煎烏梅湯研砂下○子宮久冷
 溫酒或薑湯下空心日一服○血風勞入參酒吞下○小
 腹疼痛炒苗香溫酒吞下○血散四肢遍身浮黃腫赤
 小豆酒下○常服溫酒醋湯任下並空心食前服
 小白薇丸 治婦人衝任虛損子藏受寒久無子息及斷續不
 產此由上熱下冷百病滋生或月水崩下帶漏五色腰腹
 疼重面黃肌瘦或因產乳不能將護路而太早或久坐濕
 地或冷風從下入血藏既虛風邪內乘或月水當行失於
 調攝傷動胞絡陰陽不和上焦虛陽墜燥下藏邪令結伏
 致使胎孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗

面熱熱齒無髮落胎膠寒重舉動少力並宜服之
 覆盆子 去穢 菖蒲 微炒 遠志 去心 桃仁 去尖
 白茯苓 去皮 藜蘆 去毒 卷柏 去根 肉桂 去粗
 人參 白芷 各三 白龍骨 川椒 去目并合
 白薇 去皮 乾薑 炮 細辛 去苗 蛇床子 炒
 當歸 去蘆 車前子 芍藥 兩半 熟地黃
 麥門冬 去心 一兩半
 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫
 酒或米飲送下此藥常服壯筋骨益血氣養子宮除風冷
 令人有子
 白聖丹 治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風快寒
 咳逆煩滿抑息短氣心脚腰背心腹與子疝相引痛滿下
 五色心常怠慢遺志怒憂勞即發皆是內傷所致

白聖 註獨根研 細辛 禹餘糧 醋炒
 龍骨 煨研 附子 炮去 石葦 去毛 烏賊魚骨 燉
 黃連 去毛 茯苓 去皮 肉桂 去粗 瞿麥 穗
 白欬 芍藥 白芷 白石脂 煨
 當歸 去苗 乾薑 炮 人參 甘草 炙
 川椒 去目并合口者
 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫
 酒送下一方無人參
 琥珀 澤蘭煎 治婦人三十六種血氣八風五痺七癢八痰心
 腹刺痛中風癱瘓手足痠疼乳中結聚妊娠胎動胎死亦
 出產衣不下或血淡心頭眩眼花血狂四肢浮身浮腫衝
 任久虛絕產無嗣早晚服食或因有子經脈不調赤白帶
 下惡心嘔逆身倦體倦入月一日一服消胎易產

琥珀 澤蘭 葉 去根 牡丹皮 去心 紫巴戟 去心
 茴香 五味子 去核 五加皮 劉寄奴 草 去枝
 白芷 川當歸 酒浸 赤芍藥 金釵石 斛 酒去根
 川芎 白芍藥 生地黃 洗焙 熟地黃 洗焙
 人參 附子 木 艾葉 醋炒 糯米 各一兩
 右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前用溫酒磨
 化服○漏胎刺痛煮糯米飲下○寒熱往來四肢煩躁煎
 青蒿酒下○婦人室女經閉煎紅花酒下○血暈不省人
 事童子小便和燉酒下○催生鷄子清和酒下○血氣血
 塊攻刺心腹燒研錢淨酒下○傷寒及中風尸紫煎麻黃
 湯下必被盡出汗即愈○心驚悸及頭疼清荷酒下○咳
 嗽煎桑白皮湯下○血風攻注淨身癢痒頭面麻痺炒異
 豆浸酒下○產前產後常服不生諸疾甚効

加味五積散

蒼朮六兩 白薑三兩 陳皮三兩 厚朴三兩

半夏洗 枳殼炒 楊芍藥 香附子炒

桔梗 人參去 茯苓去 川白芷

川芎 當歸去 薄荷炒 木香

肉桂 粉草各一

右劉碎生薑木瓜入鹽煎服○陰經傷寒生薑附子○血

脈不勻紫蘇○氣嗽烏梅薑錫○勾經麥子薑錢○補益

血海蘇益○產後生薑醋炒陳艾○胃冷不納食陳皮縮

砂○赤白帶陳米○冷氣疾木香萊菔○心燥背筋急頭

暈腰脚瘦生地黃當歸○脾虛蘇葉粉草月中被驚或因

爭觸心頭結塊五疇五噎箇青棗子○口苦舌乾吞酸噎

氣此為胃冷生薑鹽○腰痛批仁木瓜杜仲川續斷○身

疼素花○諸症脾胃不和羸瘦冷氣蘇益○冷瀉必過生

薑烏梅肉豆蔻陳皮各煎湯下

萬應紫苑丸 療脾腹久患痲痺如梳大及諸黃病每地氣起

時上氣衝心逆脘絞痛一切蟲咬十種水病十種蟲病反

胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行時病婦人多年月水不

通或腹如懷孕多血天陰助發又治十二種風頑痺不知

年歲晝夜不安與鬼交頭白多屑或哭或笑如鬼魅所

以著腹中積聚腹痛及治小兒驚瀉大人癲狂一切風及無

孕婦入身上頑麻狀如蟲行四肢快腫呻吟等疾並皆治

之功効不可具述

紫苑去 訶胡去 蒼朮 吳茱萸湯

厚朴去 枳殼去 茯苓去 皂角去

黃連去 桂枝 乾薑湯 川芎湯

羌活去 獨活去 防風去 巴豆去

人參去 蜀椒去 右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三九漸加至

五七丸食後臨臥生薑湯送下初有孕者不宜服○痔漏

腸風酒下○赤白痢疴子湯下○膿血痢米飲湯下○墮

傷血悶四肢不收酒下○蛔虫咬心積柳湯下○氣噎憂

噎荷葉湯下○打撲傷損酒下○中毒蕪灰甘草湯下○

一切風疥麻湯下○寸白虫積柳湯下○霍亂乾薑湯下

○咳嗽杏仁湯下○惡賢痛五淋酒下○陰毒傷寒溫酒

下○吐逆生薑湯下○食飲氣塊麪湯下○特氣井花水

下○脾風陳皮湯下○頭疼水下○心痛溫酒下○大小

便不通燈草湯下○周物所傷以本物湯下○吐水煎薑

湯下○氣病乾薑湯下○小兒天風吊搐防風湯下防已

亦可○小兒疳疔煎白湯下○小兒乳食傷白湯下○月

信不通煎紅花酒下○婦人腹痛川芎湯下○懷孕半年

後漏胎艾湯下○有子氣衝心酒下○產血暈溫酒下○

血氣痛當歸酒下○產後心腹脹滿且淋湯下○難產益

智湯下○產後血痢當歸湯下○赤白帶下酒煎艾湯下

○解內外傷寒病飲下○室女血氣不通酒下○子死焚

手湯下

沉香半 丁香一 麝香二 白木百

官桂 乾薑 縮砂仁 白芷菴

檳榔各 青皮 南木香 肉苳菴

胡椒 人參 生薑屑 阿子肉

陳皮 苧草各

右為細末煉蜜和如菓子大每服一丸細嚼生薑湯下
溫紅酒亦可空心食前日進三服

內交散 治婦人產後一切血症血崩虛癆腹痛氣逆
嘔吐冷血冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下五色腹中

聖鳴氣滿腹脹瀝血腰痛口吐清水顛產血衰顏色青黃
帶傷劣弱凡水不調下血墮胎血迷血暈血厥時發疼痛

頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不乾體虛多汗手足
逆冷並宜服之

茴香 藿香 丁皮 熟地黃 羌活

肉桂 去皮各 川芎 藜本 黃芪 去蘆

乾薑 炮各 木香 一兩 陳皮 四兩 白芍藥 十兩

當歸 去蘆 山藥 白芷 白朮

甘草 炙各 芍藥 白朮

右為末每服三錢水一大盞入生薑五片艾一團同煎至
七分空心食前熱服溫酒調亦得○如產後下血過多加

蒲黃煎○惡露不快加當歸紅花煎○水瀉加肉苳菴末
煎○嘔吐加藿香生薑煎○上熱下冷加荆芥煎○但是

腹中虛冷血氣不和並宜服之產後每日一服則百病不
生丈夫虛冷氣刺心腹疼痛尤宜服之

勝金丸 治婦人久無子及產前後一切病患兼治男子下
垂無力此藥能安胎催生妊胎臨月服五七丸產時或痛

婦人無子吳子官冷如服二十丸男女自至又治積年血
風脚手麻痺半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹

中結痛吐逆心痛子死腹中繞臍痛氣滿煩悶失蓋汗不
出月水不通四肢得腫無力血勞羸瘦小便不禁中風不

語口噤產後喘咳消渴服前是鬼迷暈敗血上衝寒熱頭

痛面色萎黃淋瀝諸疾血下無度血痢不止飲食無味產
後傷寒虛煩勞悶產後血癖產後虛癆凡婦人救疾不問
年深日近並宜服之一方名不換金丸治婦人諸虛不足
心腹疼痛

藥本 當歸 石脂 白芍藥

人參 白薇 川芎 牡丹皮

桂心 白芷 白朮 白茯苓

玄胡 沒藥 甘草 同沒藥 其半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸溫酒化下初產
了用熱醋湯下食前服此方係王承宜惠祖傳渠家凡婦

懷身便服此藥甚有神効常服尤妙係在京師於能家傳
一方有沉香無沒藥一方有附子無沉香

龍骨散 治腹下十二經絕產一日白帶二日赤帶三日經水
不利四日陰胎五日子藏堅六日藏癖七日陰陽患痛八

日內強九日腹寒十日藏閉十一日五藏酸痛十二日夢
與鬼交並宜服之

龍骨 三兩 半夏 黃蘗 竈中黃土

桂心 乾薑 石葦 滑石

烏賊魚骨 代赭 白礬 五枚

右治下節酒服方寸七日三白多者加烏賊骨礬各二
兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃隨二兩子藏堅加乾

薑官桂各二兩已上多病增之服藥三月有子即住藥
太過多生兩子當審方取好藥寡婦童女不可安服

鼓血丸 治婦人血海虛冷百病變生氣血不調時發寒熱或
下血過多或久閉不通崩中不止帶下赤白癥瘕癖塊攻
刺疼痛小便頻澀腸助脹痛腰重脚弱而黃體虛飲食減

少漸成勞狀及經脈不調胎氣多損產前產後一切病患無不治

菊花 去核 茴香 延胡索 炒 香附子 炒 酒洗

內桂 去粗 當歸 芍藥 熟地黃

牛膝 蒲黃 蓬朮 兩各三

右為細末用烏豆一升醋煮候乾為末再入醋二椀煮至

一碗自為糊丸如梧桐子大每服二十九溫酒或醋湯送

下血氣攻刺炒薑酒下噉噉絞痛當歸酒下忌鴨肉羊血

此藥緩子宮令人有子及治殺血損調街任後血海及胞

絡傷損宿痰乾血

烏喙 治腸覃病因寒氣客于腸外與胃氣相搏正氣不榮

繫腹內著惡氣乃起其生也始如鷄卵久久乃成狀如懷

胎按之堅推即移月事時下故曰腸覃亦治乳餘疾大小

便不利許食有伏虫腫脹癰疽毒腫久寒邪氣

烏喙 炮去皮 二錢 半夏 湯洗 石膏 煨 肉桂 酒洗

藜蘆 炒 牡蠣 各一 乾薑 炮 桂心 各一錢

巴豆 研膏

右為細末研勻煉蜜和丸如菽豆大每服三五丸食後溫

酒米飲任下亦治男子亦痛

卷栢丸 治婦人衝任本虛血海不足不能流通經絡月水不

調赤白帶下三十六疾並皆治之常服和經絡護五臟潤

肌膚長髮去黥除風令人有子

卷栢 去核 芎藭 洗焙 艾葉 炒各 熟地黃 洗焙

川芎 白芷 栢子仁 各一 肉桂 茶

壯丹皮 兩各一

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九用溫酒或

米飲送下空心食前服

溫白丸 治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失心憂愁思

慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切疾病有似

懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭者或如鬼所使但服

此藥無不愈者

桔梗 訖胡 葛蒲 吳茱萸 湯洗

紫花 去苗 黃連 去毛 肉桂 去粗 厚朴 去粗皮

人參 去蘆 茯苓 去皮 皂角 去灰 蜀椒 去目并合

巴豆 炮去心 各半兩 川烏 炮去皮 兩半

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三九漸加至

五七丸食後臨臥生薑湯送下

義木散 隨證斟量加入 義木 煨 川芎 當歸 去尾 熟地黃 酒洗

白芷 茴香 揚芍藥 甘草 各一

右為細末每服二錢鹽酒調下○月水不調銀器燈心○

安胎黃芪生地黃○補聖調氣生薑紅棗○遍身虛腫當

歸酒○小便不通滑石末○心虛硃砂研末調○敗血冲

心腹寒如刀刺斃籽錢紅淬酒知不退五靈脂酒○血閉

身疼炒薑酒○吐酸水丁香七粒煎湯○血風上攻眼目

浮腫荆芥○小腹痛木瓜○渾身浮腫薑湯或葱湯○胃

虛惡心藎香○頭面腫赤豆荆芥湯下○血不止木香湯

○冷嗽桑白皮乾柿○頭痛川芎細辛○血風潮熱生薑

紅棗○塵汗麻黃根○吐不止青陳皮○血風腰疼芸薹

子搗碎○女人血結不通手發痺急不知其數薺菜一撮

順流水柳叶○手足痺痺柳根浸酒○女人血氣成塊菘

心銀子燈心○血崩赤白帶其龍骨末好紅酒調○血風

中心狂言亂語身壯熱神抑枝七寸○血刺成塊不散
 菴蘭○文人癖氣膈氣妙茴香酒○婦人不問虛熱傷風
 血氣潮熱增寒一切百病先以三服隨證湯引投之服以
 他藥調理無不應驗○冷嗽猪血○心燥猪肝酒○催生
 順流水滑石禹餘糧榆白皮苧子乳香葵子酸車草汁煎
 湯或黃麻葉垂下者○胎衣不下再加茂木地黃竹青○
 行血菴蘭生地黃紅花蘇木陳艾煨楊芍藥加赤芍藥稍
 玉仙散 治婦人諸疾
 香附子九錢炒黑 白芍藥各一 甘草一錢
 右為細末每服三錢沸湯下○血崩不止竹葉煎湯下○
 月水不行手足熱加生薑麥歸煎木通湯下○月水不
 勻當歸酒下○頻頻下血不住米飲下○氣痛及老婦人
 忽下血加炒薑黃炒陳皮湯任下

補氣亦陽和中湯 治六脈俱中得弦洪緩相合按之無力弦
 在上是風熱濕下陷入陰中陽道不行其證開目則澤身
 麻木盡少而夜甚覺而閉目則麻木漸退則絕無常開其
 目此證不得懼其麻木不敢合眼致不得體皆重時有痰
 嗽覺中常有痰而不利時有燥作氣短促而喘肌骨充盛
 飲食不減大小便如常惟畏其麻木不敢合眼是其苦楚
 觀其色脈形病相應而不送內經曰陽盛瞋目而動輕陰
 病閉目而靜重又云諸脈皆屬於目靈樞經云開目則陽
 道行陽氣布通週身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分
 知其陽衰而陰旺也且麻木為風三尺之童皆以為然細
 按之有區別耳久坐而起亦有麻木為如繩繫縛之人釋
 之覺麻木而不敢動久則自己以此驗之非有風邪乃氣
 不行也治之當於肺中之氣麻自去矣知經脈中陰火乘

其功分火助於中為水也當其去陰火則愈矣時痰嗽
 者秋涼在外在上而作也則實其皮毛以溫劑身重厥後
 氣濕氣伏匿而作也時見燥作當非陽助氣逆血微瀉陰
 火與濕通行經脈調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有
 邪也補氣升陽和中湯主之
 黃芪五錢 白芍藥 人參各三 當歸身
 白朮 橘紅 澤瀉各二 草薢各一
 黃藥酒製 非麻 白茯苓 生甘草稍炒
 右以咀每服五錢煎法如常已時開服之
 滋陰萬病丸 治虛勞血弱肌肉枯燥手足多煩疲節酸疼髮
 髮脫落面少顏色腹中拘急痛引腰背去血過多崩傷內
 竭胃中氣短晝夜不得眠情思不樂怔忡多汗
 熟地黃 當歸各一
 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸不拘時米
 飲送下
 渾身碎痛飲子 治婦人勞倦
 虎骨五錢 防風 藥本 甘草
 白芷 茯苓各二 當歸 芍藥
 續斷 白朮 附子各三
 右為養末生薑薑煎服不拘時
 黃芪飲子 治婦人血氣不足夜間虛乏有汗倦怠少力
 黃芪 當歸 茯苓 五味子各半
 芍藥 遠志 人參 白朮
 浮麥各一 甘草三錢
 右剉碎每服三錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓不

補氣亦陽和中湯 治六脈俱中得弦洪緩相合按之無力弦
 在上是風熱濕下陷入陰中陽道不行其證開目則澤身
 麻木盡少而夜甚覺而閉目則麻木漸退則絕無常開其
 目此證不得懼其麻木不敢合眼致不得體皆重時有痰
 嗽覺中常有痰而不利時有燥作氣短促而喘肌骨充盛
 飲食不減大小便如常惟畏其麻木不敢合眼是其苦楚
 觀其色脈形病相應而不送內經曰陽盛瞋目而動輕陰
 病閉目而靜重又云諸脈皆屬於目靈樞經云開目則陽
 道行陽氣布通週身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分
 知其陽衰而陰旺也且麻木為風三尺之童皆以為然細
 按之有區別耳久坐而起亦有麻木為如繩繫縛之人釋
 之覺麻木而不敢動久則自己以此驗之非有風邪乃氣
 不行也治之當於肺中之氣麻自去矣知經脈中陰火乘

拘時服

理中茯苓湯 專治一婦人六十歲病振寒戰深

嘔噴足少陽口亡津液不足陽明心下急痛而痞

血脈為痞身熱近火亦有振寒在骨膈下惡寒

渾身黃而白睛黃之知其寒也子陰黃赤而黑頻數

自病來身重如山便著床枕勝也其脈診得左右關并

又命門中得弦而急極細雜之以淚而極緩之為寒加

者壯也六脈按之俱空虛也先以輕劑去其中焦

寒濕燕退其洪大脈理中湯

人參 白朮 乾薑 茯苓

右為細末每服二錢水一盞半煎至一盞水令寒服之謂

之熱因寒用其寒已對足太陽之假熱也以乾薑之辛熱

以瀉真寒也故曰真對真假對假若不愈當以木附湯水

之令寒以補下焦元氣也

黃芪白朮湯 治婦人四肢沉重自汗上至頭際頸而還惡風

頭燥熱

黃芪 一兩 白朮 人參 各半 五味子 三錢

細辛 三分 訖胡 升麻 各一 當歸身 半

吳茱萸 川芎 各半 黃蘗 酒製 羌活

甘草 二錢

右咬咀每服半兩水二大盞生薑五片煎至一盞去滓稍

熱食前服腹中不快加炙甘草一錢汗不止加黃蘗一錢

地榆散 治婦人崩中漏下不止

地榆 白芍 白朮 白茯苓

右為細末每服二錢水一盞半煎至一盞水令寒服之謂

之熱因寒用其寒已對足太陽之假熱也以乾薑之辛熱

以瀉真寒也故曰真對真假對假若不愈當以木附湯水

之令寒以補下焦元氣也

黃芪白朮湯 治婦人四肢沉重自汗上至頭際頸而還惡風

頭燥熱

黃芪 一兩 白朮 人參 各半 五味子 三錢

細辛 三分 訖胡 升麻 各一 當歸身 半

吳茱萸 川芎 各半 黃蘗 酒製 羌活

甘草 二錢

右咬咀每服半兩水二大盞生薑五片煎至一盞去滓稍

栢葉散

治婦人崩中漏下不問年月遠近漸至黃瘦四肢無

力腹內疼痛不思飲食

栢葉 續斷 川芎 生地黃

當歸 龜甲 鱉甲 各半 禹餘糧 二兩

何膠 牡蠣 地榆 赤石脂

艾葉 鹿茸 各一

右為細末每服二錢食前粥飲調下一方有丹參加鹿茸

安和丸如梧桐子大每服三四十丸空心用溫酒送下

或醋湯亦可

斷下湯 治衝任氣虛崩中漏下經脈不調每過月候將來

腰脚先痛漸減飲食四肢乏力及帶下三十六疾悉能

疎之

人參 去蘆 熟地黃 洗焙 艾葉 補砂 各 烏賊魚骨 洗灰

當歸 二兩 川芎 七錢 乾薑 兩半 何膠 絲粉 砂 成

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓食前溫服

補宮丸 治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形羸崩中帶下

白薇 牡蠣 白茯苓 鹿角霜

山藥 白朮 白芍藥 烏賊魚骨

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九丸空心用米

飲送下

白朮 白芍藥 烏賊魚骨

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九丸空心用米

飲送下

白朮 白芍藥 烏賊魚骨

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九丸空心用米

飲送下

白朮 白芍藥 烏賊魚骨

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九丸空心用米

飲送下

白朮 白芍藥 烏賊魚骨

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九丸空心用米

飲送下

白朮 白芍藥 烏賊魚骨

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九丸空心用米

<p>鹿茸散 治婦人崩中漏下不止 宜煎鹿茸 鹿茸二兩 去毛 白龍骨 鹿甲 各半 熟地黃 白芍藥 白石脂 烏賊魚骨 各半 續斷各 肉蓯蓉 各半 去毛 乾 右為細末 每服二錢 食前粥飲調下</p>	<p>治崩漏方 四物湯 一兩人參二錢 吳茱萸一錢 右劉碎每服半兩 薑棗煎服 食前五六服 寒熱腹痛皆退 崩漏末止 續服後熱附丸</p>	<p>熱附丸 熟附子 木賊去節 龍骨 赤石脂 各半 川芎 當歸 各半 右為細末 醋糊為丸 如梧桐子大 每服五六丸 食前用</p>	<p>米飲送下 ○ 婦人年五十已上 經斷七年 忽然經行 遂 成崩漏 發熱 腹痛 兩月不瘥 予診其脈 虛細 疾數 予曰 此 乃陰虛而致 宜服此藥</p>	<p>小蘗湯 治陽傷於陰 令人下血 前所謂天暑地熱 經水滲溢 當以此藥治之 小蘗葉 洗切 研取 生地黃 一斤 白木 兩</p>	<p>右入水一盞 煎至一半 去滓 溫服 或用小蘗葉 加減四物湯 治室女二七天 癸至亦有常時 未至而後至者 有卒然暴下 淋瀝不止 有若崩漏者 失血過多 變生諸證 悉宜服之</p>	<p>川芎 熟地黃 洗焙 川當歸 洗切 酒 白芍藥 各一兩 香附子 一兩 去毛 右以咀 每服四錢 以酒送下 至五片 煎至七分 去滓 食</p>
--	--	--	---	---	--	---

<p>前溫服如血色鮮而不止 宜煎鹿茸 熟地黃 煎服 涼血地黃湯 治婦人血崩不止 腎水陰虛 不能鎮守 包絡相 火故血走而崩也 生地黃 當歸尾 各半 黃連 黃蘗 知母 藥本 川芎 升麻 各二 紅花 少許 訶頭 防風 川羌活 黃芩 細辛 荆芥穗 蔓荊子 甘草 各分</p>	<p>右以咀作一服水三盞 煎至一盞 去滓 空心稍熱服 治室文血崩 不以冷熱皆可服</p>	<p>荆芥 右為細末 每服二錢 空心米飲調下 十灰丸 治崩中下血不止</p>	<p>錦灰 黃縮灰 馬尾灰 艾葉灰 藕節灰 連房灰 油髮灰 赤松皮灰 棕桐灰 蒲黃灰 右等分 研勻 用醋煮糯米糊和丸 如梧桐子大 每服七十 丸 加至一百丸 空心米飲送下</p>	<p>十灰散 治下血不止 錦片 木賊 棕桐 柏葉 艾葉 乾漆 柳鱗 鯉鱗 血餘 當歸 洗切 研末 蘇香 少許</p>	<p>右研勻 每服二錢 空心溫酒調服 鹿茸丸 治經後過多 其色紫黑 甚者崩下 或吸少氣 臍腹冷 極則汗出 或兩天 厥微小 由衝任虛衰 為風冷 寒乘胞中 氣不能固 可灸關元 百壯 不愈 下三寸</p>
---	--	--	--	--	---

有王御醫位夜熱不一室或山則其時暑月藥符中
只有大順散兩貼以冷水調服旋即奏效以此知醫者要
在權變也

治婦人血崩方

右用為梅燒灰研末以烏梅湯調下酒調亦可

縮砂散 治血崩

縮砂用新者夫皮不太多
少於新者上炒香

右為細末每服三錢食前溫酒調下米飲亦可

梅欬子 治婦人血崩

右以益白梅七箇燒灰為末空心米飲調下

一笑散 治婦人血崩

右用新綿一口燒灰研末空心酒調下立止

治婦人血崩方

烏梅一曰大者半斤以酒洗之 甘草二兩 艾葉三兩 白芍藥各四兩 當歸去蘆 熟地黃各二兩 阿膠湯洗切 芎藭各二兩 甘草二兩 艾葉三兩

右搗和丸如梧桐子大每服三四十九空心以淡醋湯送下日進二服

膠艾湯 治勞傷血氣月水過多淋瀝漏下連日不止

痛及難極將攝失宜胎動不安腹痛下墜或勞傷胞絡胞阻漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶心奔衝短氣及因產乳衝任氣壅不能約制延引日月漸成羸瘦

熱地黃 白芍藥 當歸 艾葉

右劉碎每服三錢水一盞酒六分煎至八分去滓食前熱服日三病甚者連夜併服一方有黃芪

鎮宮元 治婦人崩漏不止或下五色或赤白不定或如豆汁

或以若麻肝或下或立降胎生胎花久而不止

入黃瘦口乾胃煩不食

代赭石研末 紫石英研末 禹餘糧研末 香附子研末 陽起石研末 石硫黃研末 茯苓研末 扶神研末 阿膠研末 芎藭研末 當歸研末 黃芪研末 艾葉研末 血竭研末 右為細末用艾煎醋汁煮糯米糊和丸如梧桐子大每服七十九空心米飲送下

治漏下五色亦治嘔血令人黃瘦羸弱

右用地榆三兩劉碎以醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合○本草注云地榆主帶下十二病一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子閉七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定一方作葉水煎服代茶甚解熱

治白崩方

棕櫚燒灰 絲瓜研末 右等分為細末空心酒調下

豆蔻散 治婦人白崩

右用白扁豆花焙乾為末炒米煮飲入燒鹽空心服數次即效紫者勿用

馬蹄元 治白漏不絕

白馬蹄 禹餘糧 龍骨 烏賊骨

白礬 赤石脂

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九空心酒送下不止加三十九

牡蠣散 治帶下蒸經水過多或暴下片血不限年月遠近

龍骨 赤石脂 內茯苓

婦人因產後虛寒嘔惡不食腹痛如割時作寒戰發出汗變碎骨立厥度之左結成硬塊其大如掌米冷雜盛者此處獨無汗每塊微動則痛不可忍百藥治不効夢中忽有人殺以此方因服之惡心寒熱盜汗輒止盡一料遂平後獨血塊如故服至五六料其塊自融化而出如魚鱗	芎藭湯 一名芎藭湯中湯 治帶下漏血不止及風塵冷熱勞損衝任月水不調崩中暴下腰重裏急淋瀝不斷及產後失血過多虛羸腹痛或妊娠胎動不安下血連日小便頻數皮體頹倦頭暈目暗不欲飲食	芎藭 黃芪 芍藥 乾地黄 吳茱萸 甘草 當歸 乾薑 右咬咀以水一斗煮取三升分三服若月經後因有赤白不止者除地黃吳茱萸加杜仲人參各二兩	麒麟竭湯 治婦人血傷赤白帶下小腹疼痛	麒麟竭 黃蘗 地榆 禹餘糧 赤芍藥 熟地黄 右剉碎每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時服一方為細末食前粥飲調下二錢	茅花散 治血崩不止赤白帶下	茅花 棕樹皮 嫩荷葉 甘草 右為細末空心酒調半匙服	治婦人赤白帶下不問遠年近日皆治	龍骨 加上硫黃 右為細末每服半錢空心無灰舊酒調下	益母草散 治赤白惡露不止	益母草 益母草 益母草
--	--	---	--------------------	---	---------------	---------------------------	-----------------	--------------------------	--------------	-------------

右為細末每服二錢空心溫酒調下日三服	治帶下方	右用雲母粉溫水調下三錢立見神功	玳瑁丸 治赤白帶下不止	玳瑁 續斷 安息香 麒麟竭 乳香 沒藥 故錦灰 右為細末以蜜及安息香熬煉和藥末丸如菉豆大每服二十九食前溫酒送下	酒煮當歸丸 治癩疔白帶下症脚氣腫已下如在冰雪中如火焙乾重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也面白如枯魚之象肌肉如刀刮削瘦峻之速也小便不正與白帶常流而不禁固自不知覺面白目青藍如菜色目脈既無所見身重如山行步欹側不能安地履膝枯細大便難秘口不能言無力之極食不下心下痞煩心懊懷不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三陽空氣竭故噦嘔不止胃虛之極也其脈沉厥緊而滿按之空虛若脈洪大而滿按之無力猶為身寒之証况按之不實是為陰寒之極也若空虛則氣血俱虛之極也	當歸 茴香 良薑 黑附子 右剉碎每服五分以上等醇酒一升半同煎至酒盡為度木炭火上焙乾同為細末	炒黃蘗 丁香 全蠍 訶胡 升麻 木香 苦練 玄胡索 甘草 右與前四味同為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心宿食消盡飲醋湯下忌酒膩麪冷物
-------------------	------	-----------------	-------------	---	--	---	---

補經固真湯 白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不効診得心

胞尺脈極微其白帶流而不止叔和八葉狀後云崩中日

久為白帶漏下多時骨木枯言崩中者始病血崩不已久

下則血少復亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海

枯枯津液復亡枯乾不能滋養筋骨以本經行經藥為引

用為使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋滋津液以大

辛熱之氣味補其陽道生其血脈以香寒之藥泄其肺而

救其上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥佐而益元氣

名曰補經固真湯

人參二錢 補皮半錢 白乾薑末三 白葵花十六箇

柴胡 甘草 郁李仁 生黃芩 右除黃芩外以水三大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎

至一盞去滓空心帶熱服候少時以早膳壓之

丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所

得經隔少時其脈二尺俱弦緊時決救之無力其證自覺

臍下如冰水寒衣覆以禦其寒白帶白滑之物多聞有壅

滯水下時有鮮血右尺脈時洪微也壅滯水暴多下者是

急弦脈寒多如洪脈時見乃熱少合而明之急弦者北方

寒水多也洪脈時出者是命門包絡之火少也黑物多赤

物少合或壅滯水之狀也

丁香研四分 川芎 白芍藥 熟地黃

當歸身半 生艾葉一 阿膠六分

右作一服水二大盞煎至一盞半下膠燂再上火煎至

大盞帶熱空心候宿食消盡服之三兩服愈

治婦人赤白帶下不問年月深遠日漸羸瘦交起止不得

刺前根 不以少少能能并每一行以童子

刺前根 不以少少能能并每一行以童子

刺前根 不以少少能能并每一行以童子

右為細末每服二錢食前燂酒調下

菜羹浴湯 治下焦虛冷崩度疼痛帶下五色月水崩漏淋瀝

不斷

吳茱萸湯 炮杜仲 蛇床子 五味子

丁皮兩 木香 丁香兩

右對如麻豆大每用半兩以生絹袋盛水三大碗煎數沸

乘熱熏下部通手淋浴早晚二次熏洗

固真丸 治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目中溜火壅

其上視物眩暈然無所見牙齒惡熱飲痛須得黃連細末

擦之乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故

喜乾而惡濕肝經陰火上熾走於標故上壅而目中溜火

腎水侵肝而上溢致目眩暈而無所見齒惡熱飲者是少

陽陽明經伏火也

當歸身二錢 白芍藥 黃蘗半錢 乾薑四 白龍骨

前證乃寒濕為之也治法當大瀉寒濕以九子葉治之故

白藥在下焦治主病宜緩以製大忌湯散以白石脂白龍

骨以枯其濕以炮乾薑大辛熱瀉寒水以黃蘗之大寒為

因用又為細導故云古者雖有重罪不絕人之後亦為之

伏其坊主先其坊因之意又瀉齒中惡熱飲也以蛇床為

本經之使以芍藥半錢導之恐辛熱之藥太甚損其所經

故微瀉之當歸身辛溫大和其血脈此用藥之法完備矣

右為極細末研勻水煮稀麪糊和丸如雞頭大日乾空心

候宿食消盡煎百沸湯令文溫多用送下無令胃中停滯

待少時以早膳壓之是不令熱藥犯胃也忌食生冷硬物

酒及濕麪

酒及濕麪

酒及濕麪

二豆散 治耳鳴心燥腰脚疼重腹內嘔鳴臍下左冷頻下白水如泔泄瀉

白苴菹 肉苴菹 丁香 巴戟 丁皮 蒼木 黑附子 火煨

桂心 入參 白木 山藥 桔梗 茴香 粉草

右剉碎每服三錢水一盞半生薑三片紫蘇葉三片同煎至七分去滓空心溫服

薑黃散 治血臟久冷腹脹疼痛小便濃白如泔

片薑黃 二兩 大附子 兩 柳桂 木芍藥 紅藍子 三稜 各半 木香 牡丹皮

芫花 炒 郁李仁 去皮 沒藥 各一分 右為細末每服一錢酒煎服如腹痛用當歸沒藥為末以

水七分酒三分同煎七分熱服

內金鹿茸丸 治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白濁日夜無

變臍腹疼痛腰膝無力 鷄內金 鹿茸 黃芪 肉蓯蓉 五味子 遠志 牡蠣 桑螵蛸 龍骨 附子 各等

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用溫酒或米飲送下

治婦人久積虛寒小便白濁滑數不禁 右用鹿茸屑炒黃為細末每服二錢空心溫酒調下

又方 用鷄膽脛炙為末空心酒調二錢服

抑氣散 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭眩暈滿體寒怔忡皆可服

香附子 炒 陳皮 二 茯苓 甘草 各

右為細末每服二三錢不拘時白湯調下

土牛膝散 治婦人室女血閉不通五心煩熱

土牛膝 當歸尾 各一 桃仁 炒 去皮 紅花 各半

右為細末每服二錢空心用溫酒調下

溫經湯 治血海虛寒月水不利

當歸 川芎 芍藥 牡丹皮 蓬朮 桂枝 各半 人參 牛膝 各三

甘草 一錢 右分作二貼每貼水二鐘煎至七分不拘時溫服

通經丸 治婦人室女月水不通肚腹疼痛或成血瘕

桂心 青皮 大黃 川椒 乾薑 地 蓬朮 川芎 乾漆 各一分

當歸 桃仁 各一分 右等分為末用上藥十分為率四分同米醋熬成膏和末

六分搜成劑白中杵一二百下丸如梧桐子大每服二三

十九空心醋湯下一方不用川芎用紅花

三稜丸 治婦人經脈不通氣痛帶下兼治血瘕

三稜 醋炒 川芎 牛膝 玄胡宗 蓬朮 醋炒 蒲黃 菴朮 牡丹皮 羌活 醋炒 白芷 當歸 地龍 去土 乾薑 醋炒 大黃 醋炒 成膏和藥

右為細末以大黃膏和丸如梧桐子大每服三五十九空

心醋湯送下或紅花煎酒下

當歸散 治婦人天癸已過期經脈不勻或三四月不行或一

月再至以致腰腹疼痛蓋婦人七七數足而經脈不依時

若血有餘也不可止之宜服此藥

當歸 川芎 芍藥 山茱萸

黃芩 白朮 半兩

右為細末每服二三錢不拘時溫酒調服日三

芩心丸 治婦人七七已後天癸當住每月却行過多或不止

黃芩心 有枝條者二兩以米醋浸七

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服七十九空心溫

酒送下日二服

橘歸丸 治婦人肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝血失常

經故也

橘皮 二兩 當歸 一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒送下

三神丸 治室女血氣腹中刺痛痛引心端經行澁少或月水

不調以致疼痛

橘皮 二兩 當歸 酒浸 玄胡索 醋煮各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒送下

沒藥散 治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不下兒抱塊痛

沒藥 另研 血竭 桂心 玄胡索

當歸 蒲黃 紅花 乾漆 炒烟

木香 芍藥 各等

右為細末每服二錢食前溫酒調下

靈寶散 治婦人血氣攻刺痛引兩脇

丁香 木香 乳香 玄胡索

當歸 白芍藥 各等

右為細末每服二錢食前溫酒調下

加味烏沉湯 治婦人經水欲來臍腹疝痛

烏藥 縮砂 木香 玄胡索

香附 二兩 甘草 半兩

右細剉每服七錢水一盞半生薑三片煎至七分不拘時

溫服

琥珀丸 治婦人血痕腹中有塊攻刺小腹腰背相引而痛久

而不治黃瘦羸乏

琥珀 研 川烏 炮去 牛膝 酒浸 白芍藥

鱉甲 醋炙 蓬木 炮 當歸 酒浸 澤蘭葉

厚朴 製 木香 不見 官桂 各半 麝香 半錢

右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服七十九空心

用溫酒或米飲送下

當歸木香湯 治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩語聲沉重舌

根強硬言語蹇澁口苦不食白日因睡夜有汗神思恍

惚夢寢驚悸面色痿黃頭發喘嗽遍身疼痛脚氣走注四

肢沉重背脊拘急時發寒熱五心煩燥舌乾多渴胃膈不

利咽喉噎塞危羸瘦弱經日大脈為勞宜服

當歸 青皮 五加皮 海桐皮

陳皮 丁皮 桑白皮 地骨皮

牡丹皮 棕櫚皮 赤芍藥

木香 各半

右為末每服一錢水一盞入香油一二點古錢一文洗同

煎至七分不拘時溫服

○胎前通治方

養胎飲 治妊娠惡阻嘔吐不食胎動不安或時下血

川芎	白朮	茯苓	去皮	熟地黃	酒蒸
地榆	當歸	去蘆	半夏	湯泡	白芍藥
阿膠	成	黃芪	去蘆	甘草	炙
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服					
半夏	茯苓	湯泡	赤茯苓	去皮	熟地黃
陳皮	去白	人參	去蘆	桔梗	白芍藥
川芎	甘草	右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾空心服			
竹茹	湯	治妊娘嘔吐頭疼眩暈			
人參	去蘆	白朮	橘紅	去白	麥門冬
白茯苓	厚朴	薑製	甘草	半錢	竹茹
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服					
小地黃	丸	治妊娘惡心嘔吐清水腹疼不食			
人參	去蘆	乾薑	炮	各	
右為細末以生地黃汁和為丸如梧桐子大每服五十九					
食前米飲送下					
參橘散	治妊娘三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶				
人參	橘皮	去白	赤茯苓	去白	麥門冬
白朮	厚朴	薑製	甘草	炙	
右作一服水二鍾生薑七片竹茹少許煎一鍾不拘時服					
白朮散	治妊娘婦人宿有風冷胎發不長或失於將理動傷				
胎氣多致損胎常服此氣益血保護胎胎					
白朮	川芎	各一	牡蠣	煅	蜀椒
右為細末每服一錢空心酒調下					
榆白皮散	治妊孕胎漏去血一恐其難產常宜服之				

榆白皮	葵根	瞿麥	去心	火麻仁	去心
木通	去心	牛膝	湯洗	黃芩	去心
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服					
芎藭散	治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能拊腹疼痛				
右用川芎為末每服二錢不拘時溫酒調下					
心木散	治妊娘胎氣不和飲食少進				
白朮	炒	紫蘇	炒	人參	二錢
訶子	川芎	各八	甘草	炙	青皮
古作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服					
竹葉湯	治妊娘心驚膽怯終日煩悶者曰子煩				
白茯苓	三錢	防風	麥門冬	去心	黃芩
右作一服水二鍾竹葉五片煎至一鍾不拘時服					
知母散	治妊娘心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚				
知母	麥門冬	去心	赤茯苓	去白	黃芩
黃芪	各二	甘草	炙		
右作一服水二鍾入桑白皮半錢煎至一鍾再入竹瀝此					
少同煎不拘時服					
全生白朮散	治妊娘面目虛浮如水腫狀				
白朮	一兩	生薑	皮	大腹皮	茯苓
陳皮	各半				
右為細末每服二錢不拘時米飲湯調下					
全生茯苓散	治妊娘小便不通				
赤茯苓	各半	茯苓	各半		
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服					
瘦胎散	治妊娘七八月常服滑胎易生				
商州枳殼	五兩	枳殼	炒	粉草	半兩

當歸酒浸	白芍藥	白茯苓	去皮	澤瀉
川芎	白木	防風	去蘆	川芎
右為細末每服二錢空心用溫酒或米飲調下				
芍藥散	治妊娠外感風寒身壯熱脈暈頭眩心胃煩悶	川芎	紫蘇葉	白芍藥
白木	陳皮	去白	乾葛	各半
右作一服水二鍾生薑五片葱白三寸煎一鍾不拘時服				
百合散	治妊娠風壅咳嗽多喘滿	百合	紫苑	各半
前胡	去蘆	桔梗	去蘆	貝母
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服				
驅邪散	治妊娠停食感冷發為瘧疾	白木	竿葉	仁
白木	高良薑	炒	白茯苓	去皮
細砂仁	藿香葉	橘紅	各半	甘草
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服				
平安散	治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脇脹痛	川芎	木香	各半
乾薑	炮	生薑	厚朴	去皮
右作一服水二鍾入燒鹽一捻煎至一鍾不拘時服				
消風散	治妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴骨膈涎壅頭眩目暈	石膏	防風	去蘆
或腮項腫祝				
川芎	羚羊角	鎊	當歸	去
荆芥穗	白芷	鎊	甘草	炙
右作一服水二鍾好茶半錢煎至一鍾食遠服				
天門冬飲子	治妊娠肝經風熱上攻眼目帶下失明	天門冬	飲子	

天門冬	去心	知母	羌活	子
防風	去蘆	茯苓	去皮	川芎
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服				
枳實積柳丸	安養胎氣調和氣血	枳實	生用	橫柳
黃芩	當歸	木香	阿膠	各半
右為細末水和丸如小豆大每服三十九不拘時用溫米飲送下				
黃芩湯	治婦人孕胎不安	黃芩	白木	各半
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服				
枳殼湯	治胎漏下血及因事下血	枳殼	去殼	黃芩
右作一服水二鍾煎至一鍾食前服				
玄効散	治胎痛不安如重物所壓冷如冰	川芎	當歸	各半
右作一服水二鍾煎至一鍾食前服				
白木散	治妊娠傷寒發熱頭痛胎動不安或時吐逆不下食	白木	人參	橘紅
川芎	前胡	麥門冬	各半	夏
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服				
芍藥湯	治妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下腹沉者太陰也	芍藥	白木	各半
宜服此藥				

甘草 <small>各一錢</small>	右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服
安胎當歸湯	治妊娠五月舉動驚愕胎動不安下在小腹痛引腰脇小便疼下血
當歸	阿膠 <small>炒</small> 川芎 人參 <small>各二錢</small>
棗十枚	艾一握
右作一服酒一鍾水一鍾煎至一鍾不拘時服	
旋覆花湯	治妊娠六七月胎不安嘔吐
旋覆花	半錢 厚朴 白朮 枳殼
黃芩	茯苓 <small>各半</small> 半夏
生薑	<small>各一錢</small>
右作一服水二鍾煎至一鍾食前服	
人參橘皮湯	治惡阻病嘔吐痰水
人參	去蘆 橘皮 白朮 麥門冬 <small>去心各二錢</small>
白茯苓	厚朴 <small>製各一錢</small> 甘草 <small>半錢</small>
右作一服水二鍾生薑三片竹茹彈子大一塊煎至一鍾食前服	
人參丁香散	治妊娠惡阻胃寒吐逆反胃吐食及心腹刺痛
人參	四錢 丁香一錢 藿香 <small>半錢</small>
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服	
二香散	治妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水起坐覺重
香附子	一兩 藿香葉 甘草 <small>各三錢</small>
右為細末每服二錢不拘時沸湯調下	
桔梗湯	治妊娠肺壅咳嗽喘急
桔梗	紫蘇 人參 桑白皮

貝母	甘草 <small>各七錢</small> 天門冬 <small>去心</small> 桑白皮 <small>各一錢</small>
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服	
馬兜鈴散	治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急
馬兜鈴	桔梗 人參 甘草
貝母	<small>各一錢</small> 陳皮 <small>去白</small> 大腹子 桑白皮
紫蘇	<small>各一分</small> 五味子 <small>七分</small>
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服	
麻黃散	治妊娠咳嗽不止胎不安
麻黃	杏仁 桑白皮 甘草 <small>各八分</small>
紫苑	天門冬 <small>各二錢</small> 桔梗 <small>一錢</small> 竹茹 <small>彈子大</small>
右作一服水二鍾煎至一鍾去滓入蜜半匙再煎二沸不拘時服	
升麻散	治妊娠壅熱心神煩躁口乾渴逆
升麻	黃芩 人參 麥門冬
芫胡	梔子仁 犀角屑 瓜蒌根
芫胡	<small>各一錢</small> 知母 甘草 <small>各半</small>
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服	
芫胡散	治孕婦傷寒
芫胡	前胡 人參 生地黃
川芎	當歸 芍藥 粉草 <small>各一分</small>
右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾不拘時服	
服要出汗加葱白一根煎	
保安白朮散	治妊娠傷寒頭寒發熱此藥安胎
白朮	黃芩 <small>新瓦上炒</small> 桑白皮
右作一服水二鍾生薑五片紅棗三枚煎一鍾不拘時服	

安胎阿膠散 治妊娠傷寒

何膠炒 人參 桑寄生 白茯苓 去皮

白木 等分

右為細末每服二錢不拘時糯米飲調下

安胎白木散 治妊娠宿有冷胎瘦不長或失於將理傷胎多

重此藥補榮衛養胎氣

白木 川芎 兩各一 吳茱萸 湯兩 甘草 兩各一

右為細末每服二錢食前溫酒調下忌生冷菓實之物

前胡湯 治妊娠傷寒頭疼壯熱肢節煩疼

前胡 石膏 各半 黃芩 二錢 梔子仁

知母 大青 各二

右作一服水二鍾竹茹一塊葱白二寸煎一鍾不拘時服

黃龍湯 治妊娠傷寒壯熱頭疼黑吐不欲飲食腸下痛嘔逆

痰氣及產後傷風熱入胞絡寒熱如瘧并經水適來道斷

病後勞傷餘熱未除

此胡 人參 黃芩 甘草 各半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

赤茯苓散 治妊娠小便不利及水腫酒吐惡寒動轉前痛

赤茯苓 去支 葵子 各半

右為細末每服二錢不拘時新汲水調下

犀角散 治妊娠婦人諸風熱困倦時發昏眩

犀角 揀參 山梔仁 川羌活

黃連 青黛 川芎 吳白芷

茯苓 甘草 各一

右作一服水二鍾生薑三片竹葉七片煎一鍾食遠服

大寧散 治妊娠下痢赤白及泄瀉疼痛

黑豆 四七 甘草 生半 半 粟殼 七 去頭蒂

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

火龍散 治妊娠心氣疼

川練子 茴香 各三 艾葉末 益炒一

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

獨聖散 治妊娠小便不通

右用蔓荊子為末每服二錢食前濃煎葱白湯調下

萬應丸 治妊娠胎動不安及產後小戶痛不可忍

右用知母去皮炒為末煉蜜和丸如彈子大每服一九以

清酒一盞化開食前服

秦光散 治妊娠時氣五六日不得汗口乾多熱冷水狂言嘔

逆者宜服

秦光 此胡 各半 石膏 二錢 赤茯苓

前胡 升麻 葛根 犀角屑

黃芩 甘草 各人

右作一服水二鍾生薑五片竹茹一塊煎一鍾食前服

人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參 橘紅 厚朴 薑製 各當歸 炒

乾薑 甘草 各一

右作一服水二鍾生薑三片紅棗三枚煎一鍾不拘時服

厚朴散 治妊娠下痢黃水不絕

厚朴 薑製 黃連 半 肉苁蓉 二

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

黃連湯 治妊娠下痢赤白不止

黃連 八錢 厚朴 製 何膠 炒 當歸 各六

黃蘗 艾葉 各四 乾薑 五錢

艾葉 各四 乾薑 五錢

右為細末每服二錢空心米飲調下

葶藶散 治妊娠通身腫
葶藶 茯苓 桑白皮 郁李仁 各一錢

白木 四錢
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服小便利即愈

催生丹 治產婦生理不順臨難產
乳香 一分 母丁香 一分 臘月兔腦 隨處所

麝香 一分
右碾勻用兔髓和丸如鷄頭大陰乾以油紙密封裹每服一丸隨時溫酒送下

催生如聖散
右用黃蜀葵子不拘多少為細末每服二錢不拘時熱酒調下熱湯亦可

香桂散 下死胎
麝香 半錢 官桂 二錢

右研勻作一服溫酒調服須臾即下

來麩散 治臨產用力太過氣血暈悶不省人事
木香 不見 神麩 炒 陳皮 去白 白芍藥

阿膠 炒粉 麥蘖 炒 黃芪 去蘆 生薑 炒黑各一錢
糯米 一撮 苧根 洗淨 甘草 錢二

右作一服水二鍾煎至一鍾幹開灌連進為愈

無憂散 治胎肥氣逆臨難產
當歸 酒浸 川芎 木香 不見 白芍藥

枳殼 去白 甘草 炙各一 乳香 另研 血餘 燒灰 另研
右作一服水二鍾煎至八分入乳香血餘和勻不拘時服
澤瀉散 治妊娠氣壅身體脹脇浮腫喘急大便不通小便赤

滋宜散

澤瀉 木通 桑白皮 赤茯苓
枳殼 檳榔 各半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

防已湯 治妊娠脚腫通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利
防已 半錢 桑白皮 赤茯苓 紫蘇葉 各二

木香 五分
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

四製艾附丸 治婦人數墮胎由氣不升降所以胎氣不固尤宜服此
香附 一分 艾葉 一分 附子 一分 熟地 一分

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服七十丸空心溫酒送下肥人只依本方瘦人加澤瀉桑赤茯苓各二兩

一方用香附子一斤艾葉四兩當歸二兩用酒浸
琥珀丸 治婦人產前產後百病及瘵三十六種血冷七疝八

癆心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痺手足痠疼
乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯不安死胎不出并胎衣不

下並宜服之
琥珀 另研 辰砂 另研 阿膠 碎炒 五味子 揀淨

石斛 去根 附子 炮去 肉桂 去粗 沉香 不見
川芎 各半 牛膝 酒浸 當歸 炒去苗 肉蓯蓉 酒浸

人參 續斷 沒藥 各三分 熟地黃

木香 各一兩
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸空心煖酒化下

午後食前再服能生新血去惡血○若腹脇疼痛繞臍如刀刺及嘔逆上氣築心痰毒不思飲食用薑汁少許和酒

化服○諸痢及赤白帶下血冷崩中下血崩漏下血用生
薑與艾剉炒令赤色入酒同煎數沸去滓調服○世瀉不
止陳米服○能尿諸淋煎通草燈心湯服○血暈不知人
煎當歸酒調服○上熱下冷煎人參湯服○遍身虛腫水
氣煎赤小豆湯服○產內二毒傷寒及中風角弓反張如
板硬煎麻黃湯服以衣被蓋出汗○月經不通或閉難五
色煩併而下斷續不止飲食無味肌骨瘦劣面赤唇焦
寒乍熱四肢煩疼五心燥熱黑點遍身血斑赤腫走注及
血風勞傷無力用意于小便入薑汁少許調服常服以
便為妙若恐惡心以半酒○如懷胎婦於臨月一日一
服至產下不覺疼痛或服至五服十服日倍飲食是藥功
也其功不能具述

交感地黃煎丸 治婦人胎前產後服見黑花或即發狂如見

鬼狀胞衣不下矢者不語心腹脹滿水谷不化口乾煩渴
寒熱往來口內生瘡咽中腫痛心虛悸夜不得眠及產
後中風角弓反張面赤牙關緊急崩中下血如豚肝狀臍
腹疼痛血多血少結為癥瘕恍惚昏迷四肢腫滿產前胎
不安產後血刺痛並皆治之

生地黃 治胎前產後身疼保室論云身疼者肌體不實非受
風邪客於經絡州氣與正氣相搏交擊於骨肉之間故身
疼而不必月龍鼓湯主之若壯而患身腫疼者必因勞
傷化下

應贊湯 治胎前產後身疼保室論云身疼者肌體不實非受
風邪客於經絡州氣與正氣相搏交擊於骨肉之間故身
疼而不必月龍鼓湯主之若壯而患身腫疼者必因勞

後過多致使然也不爾經絡受風寒愈痛九疔風湯主之
產者必因勞傷身疼而不能動轉者良由產後百節開張
血脈流走氣弱則骨肉之間血多凝滯是故百節經脈緊
急腰背不注轉側手足不能動轉身熱若納炭頭如釘釘
醫者不識妄為傷寒發汗變生他證宜服

黃芪 治胎前產後身疼保室論云身疼者肌體不實非受
風邪客於經絡州氣與正氣相搏交擊於骨肉之間故身
疼而不必月龍鼓湯主之若壯而患身腫疼者必因勞
傷化下

佛手散 治產前產後腹痛體熱頭疼及穢產未進別物即先
服此藥逐敗血生新血能除諸疾

右為細末每服二錢水一盞酒二分同煎七分溫服○一

方為齋末每服四錢水七分酒三分同煎至七分熱服將
產前安蘇此藥將兩服藥煎之產了速進之三日內日
二服三日外一服○一方名苦歸湯只此二味等分以
水煎專治失血傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血
拔牙去血不止一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事
頭重目暗舉頭欲倒悉能治之若產後眩暈宜加芍藥服
之○一名桂香散治產後腹痛不可忍若加桂心等分酒
與童子小便合煎服之立効○一名當歸湯治妊婦子死
或未死胎動不安每服用酒水合煎連進數服胎若已死
服之便下若未死其胎即安此經累劫萬不失一○一名
現珀散臨月服之只縮胎易產兼治產後諸疾○一名羊

內湯治產後腹中疝痛往來寒熱吸吸少氣不能支
持頭眩汗腹內拘急每服用精羊肉一兩生薑十片水

二盞前至六分温服○一名君臣散治婦人室女心腹疝
 痛經脈不調用水煎服○若妊婦胎氣不安產後諸疾加
 酒煎服○一名芎藭散治婦人血氣上喘下腫二味等分
 為細末每服二錢空心煎艾湯調下又治產後損身血衝
 心及腹脹氣絕者神驗○難生倒橫子死腹中先用黑大
 豆一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥末四錢同煎
 至一盞以上分作二服未効再作○產後惡血注心迷悶
 喘急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁半合煎服○治臍
 毒每服一錢半入炒槐花末半錢水一盞煎至六分無時
 候服三日取下血塊即愈○如產後頭疼加荆芥煎如吐
 血亦宜服之○若產難多用百草霜香白芷等分為末
 為金散每服二錢童子小便好醋各一合沸湯浸服止一
 服見効甚者再服已分免矣○一法以五積散加醋煎服
 亦能催生○若崩中漏下失血過多久不能止用芎歸湯
 療之不止者以香附子炒去皮毛為細末每一兩入甘
 草末一錢清米飲煎服名順元湯○有白帶者於順元湯
 內加芍藥半兩或謂香附耗氣則不然許學士謂滋血養
 氣婦人德藥雖羸人亦宜服之○兼治男女血虧便利及
 諸證失血用此藥佐以米飲九百章霜末每服百餘丸或
 以其他燒灰藥皆能作効不可遽以燥澁之劑止之必致
 壅遏膏敗却生他證大抵血不能行氣使之然者氣得其
 平則血循故道必無妄行之患矣香附子善能導氣用之
 勿得其宜

返魂丹 治婦人胎前產後諸疾危證
 右用赤箭即野天麻葉似艾葉開紫花如紅蓼花形名羌
 藨子又名益母草又名大扎又名貞許又名負擔四五月

採取陰乾用葉及花子以磁器研為細末煉蜜和丸如彈
 子丸隨後治證嚼服其根燒存性為末酒調服功与黑神
 散不相上下○如胎前臍腹作痛或作声者温米飲下○
 胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止水煎秦苧糯米
 湯下或當歸湯亦可○如產時先用一九以童子小便化
 下安魂定魄氣血自然調順諸病不生又能破血止痛養
 脉息調經絡温酒下○產後胎衣不下血在胞中及橫生
 不順死胎經日不下者脹滿腹中心悶心痛炒鹽湯下○
 產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童子小便無灰
 酒各半下○產後咳嗽胃膈不利惡心口吐酸水面目浮
 腫兩脇痛卒動失力者温酒下○產後兩太陽痛呵欠心
 忪氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼
 痛温米飲湯下○產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如

見鬼神狂言不省人事薄荷自然汁如無生者濃煎薄荷
 湯下及童子小便酒各半亦可○產後面垢頰赤五心煩
 熱或結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童子小便
 酒各半下温薄荷自然汁亦可○產後餘血惡露不盡結
 滯臍腹刺痛惡物上衝心胃主悶者童子小便酒各半下
 ○產後大小便不通煩燥口苦者薄荷自然汁下如無生
 者濃煎薄荷湯下○產後瀉血者水煎棗湯下○產後白
 帶下者煎膠艾湯下○月水不調温酒下○血崩漏下温
 酒下○婦人久無子息温酒下服之十九至二十丸亦能
 注喜○一子死腹中蓋因卒病臍熱極蒸其胎是以子
 死也蓋子死不居子宮或墮胎於腹間冷痛小便沫出腹
 脹四肢逆冷瓜甲青者是也或臨產之時此藥安魂定魄
 血氣自然調順諸疾不生破血補虛止痛養血氣調經絡

用童子小便各七分化下○二產難者胎以食母之血十月滿足則餘血結成塊俗呼為兒枕欲產之時血塊先破敗血果其子是以難產或產後惡物不盡臍腹刺痛惡物上衝心胃主悶用童子便酒各七分化下○三胎面黃赤胎衣不下既產了臍腹腫贏五心煩燥血流入衣中則難出發寒熱有冷汗出但去其敗血其衣自出如帶斷了服此藥下或橫生不順心悶欲死者童便酒各七分化下薄荷自然汁益湯亦可○四產後三日起臥不得眼前黑睛生花蓋產後血氣未定運走五臟入肝則目昏俗為昏風醫家以風治之或血熱口乾煩渴心悶亂如見鬼神狂言妄語不省人事童便酒各七分薄荷自然汁亦可○五產後口乾心悶及煩渴者血氣未定即食熱麪積滯在內以致熱燥煩渴者俗為胃腸壅塞或兩太陽穴痛可欠怔忡氣短身體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛者溫米飲童便各七分化下○六產後四肢浮腫及寒熱者蓋因敗血流入五臟滲入四肢停留日久化為膿狀氣喘或小便澀或咳嗽胃膈不利惡心口吐酸水兩脇疼痛卒動乏力溫酒化下○七產後寒熱往來蓋因敗血入心則熱入脾則寒狀如癰臍腹作痛或作聲溫米飲化下桂枝湯亦可○八產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒各七分化下○九產後溺未經月滿或誤食物下與血相攻擊前所積受濕以此敗血相攻煎藥湯下○十產後大便秘結口苦煩渴非時不語以敗血衝心而蔽其孔童便酒各七分化下薄荷汁亦可○十一產後遍身疼痛百節開張血乘虛流入腸中停留不散臍腹疼痛米飲化下○十二產後崩中漏下不止蓋是傷酸物狀如鷄肝

者背倦悶煎糯米素充湯化下當歸桂枝湯亦可○十三產後未經月滿血氣不通蓋是月水未下或食熱麪壅結成塊喘嗽四肢無力多睡而汗出不止月水不調為骨蒸勞使服此藥童便酒各七分化下○十四產後吐逆不止蓋因敗血停於脾胃即發吐逆胃膈壅脹俗為及胃溫酒化下○十五產後鼻衄口乾舌黑蓋因心臟熱則舌黑鼻衄也童便酒各七分化下○十六產後赤白帶下煎素充湯下○十七產後氣急喉中猶聲者蓋因敗血衝心入喉中萬無一瘥矣○十八產後中風者蓋因未經七月勞動則百日之中傷房事申風初病之狀眼澀腰強筋急角弓反張牙關緊急若此者皆自傷犯耳○十九產後面色黑及遍身生黑瘡者乃敗血入皮膚萬無一瘥矣

旋覆湯 治產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅塞

旋覆花	麻黃	前胡	杏仁
五味子	荆芥	半夏	甘草
赤芍藥	茯苓	蘇子	桑白皮

古作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

芍藥湯 治產後去血過多血暈不省

芍藥	當歸
----	----

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服腹中刺痛加白芍藥

口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加白芍藥水停心下加

疾者生薑厚煩不得眠加人參竹葉

黑神散 治婦人產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心及腹痛

黑豆	當歸	肉桂	熟地黃
乾薑	蒲黃	芍藥	甘草

右為細末每服二錢不拘時用溫酒童子小便各半調服

四順經中丸 治新產血氣俱傷脾胃不調百日内宜常服

人參 去蘆 乾薑 炮 白朮 各一 甘草 兩各二

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲送下

人參當歸散 治產後去血過多血暈則陰虛陰虛則生內熱

其證心胃煩滿呼吸短氣頭痛悶亂胸膈轉甚與大病

虛煩相類

人參 去蘆 當歸 去蘆 肉桂 去粗 熟地黃

麥門冬 去心 白芍藥 二錢 血熱甚者加生地黃 二錢

右作一服水二鍾煎米一合淡竹葉十片煎一鍾食遠服

當歸養血丸 治產後惡血不盡發熱身痛經閉者宜服

當歸 去蘆 赤芍藥 牡丹皮 玄胡索 炒 各

肉桂 一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫酒或

米飲任下

四順散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

川芎 當歸 去蘆 乾薑 炮 赤芍藥 各等

右為細末每服二錢食遠用溫酒調服

當歸黃芪湯 治產後失血過多腰脚疼痛壯熱有汗

當歸 去蘆 黃芪 芍藥 各四

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

當歸散 治產後氣血俱虛慎勿大補恐增客熱別致他病常

令惡露快利

當歸 芍藥 川芎 黃芩 各一

白朮 半兩

右為細末每服二錢不拘時用童子小便或溫酒調服

七珍散 治產後不語論曰產後不語者何答曰人心有七孔

三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了

又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此者

但服此藥

人參 去蘆 石當歸 生地黃 川芎 各一

細辛 二錢 防風 辰砂 另研各

右為細末每服二錢不拘時薄荷煎湯調服

五露散 治產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏爽大便澀

川芎 桔梗 白芷 芍藥 甘草 各一

當歸 去蘆 人參 白茯苓 甘草 各一

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服如頭熱甚大便秘者

加大黃三錢

當歸血竭丸 治婦人產後惡露不下結聚成塊心胃痞悶及

臍下堅痛

當歸 血竭 芍藥 蓬朮 各

五靈脂 四兩

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服五十丸食前服溫

酒送下

川芎散 一名芍藥散 治產後頭疼不止

川芎 大者 芍藥 各

右為細末每服三錢不拘時用秤錢燒紅酒調服

三之一湯 治產後虛勞發熱日久不安

羌活 黃芩 人參 半夏

川芎 當歸 芍藥 熟地黃

甘草 各半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

增損鹿胡湯 治產後經水通斷感於異證手足搐牽咬牙昏

胃繫屬上焦	黃芩	人參	石膏
此胡二錢	半夏	黃芪	甘草
知母	右作一服水二鐘生薑三片紅棗一枚煎一鐘食遠服	人參	甘草
人參湯	治產後諸虛不足發熱盜汗	當歸	川芎
人參	去渣	當歸	川芎
右各等分	為末以猪腰子一隻去膜切作片以水二鐘搗	當歸	川芎
米半合	葱白二根煎米熟取清汁一鐘半入藥末一錢煎	當歸	川芎
至一鐘	不拘時服	當歸	川芎
失笑散	治產後心腹絞痛欲絕	當歸	川芎
蒲黃	炒	五靈脂	炒
右為細末	先用米醋調二錢變成膏入白湯半盞化開服	當歸	川芎
清魂散	治產後血暈昏不知人事更宜取乾漆燒煙鼻中熏	當歸	川芎
之考中	煩置醋炭火進此藥	當歸	川芎
澤蘭葉	人參	去渣	川芎
甘草	入	當歸	川芎
右為細末	每服二錢不拘時白湯溫酒各半盞和勻調下	當歸	川芎
增損四物湯	治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未盡停	當歸	川芎
滯胞絡	亦能令人寒熱但小腹急痛為異	當歸	川芎
川芎	白芍藥	當歸	川芎
人參	二錢	甘草	一錢
右作一服水	二鐘生薑三片煎至一鐘不拘時服	當歸	川芎
調經散	治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮腫不可作	當歸	川芎
水腫治之	但調經其腫自消又有去血過多心虛易驚加	當歸	川芎
龍腦骨	煨	當歸	川芎
當歸	酒洗	赤芍藥	酒洗
細辛	一錢	麝香	另研

琥珀	另研	肉桂	不見
沒藥	另研	甘草	二錢
右為細末	每服二錢不拘時生薑汁溫酒任意調下	當歸	酒洗
起痛散	治產後血滯經絡拘攣腰背強直遍身疼痛	官桂	不見
當歸	酒洗	獨活	去渣
白朮	黃芪	生薑	蘇白
甘草	一錢	桑寄生	半錢
右作一服水	二鐘煎至一鐘不拘時服	當歸	酒洗
抵聖湯	治產後血氣傷于脾胃腹滿悶嘔吐惡心	當歸	酒洗
赤芍藥	半夏	湯泡	陳皮
人參	錢半	生薑	三錢
右作一服水	二鐘煎至一鐘不拘時服	當歸	酒洗
濟危上	治產後下血過多虛極生風昏青肉冷汗不止	當歸	酒洗
五靈脂	卷柏	生用	乳香
桑寄生	陳皮	去白	阿膠
右將前四味	同研勻石器內微火炒勿令焦再研極細却	當歸	酒洗
入後四味	藥末以生地黄汁和丸如梧子大每服五十	當歸	酒洗
丸食	速當歸煎酒送下	當歸	酒洗
熱地黃湯	治產後惡露不止少氣胸弱服眩飲食無味	當歸	酒洗
熱地黃	酒洗	人參	去渣
瓜蒌根	三錢	甘草	一錢
右作一服水	二鐘煎至一鐘生薑三片紅棗三枚同煎至	當歸	酒洗
一鐘	不拘時服	當歸	酒洗
地黃散	治產後惡物不盡腹中疼痛	當歸	酒洗
生地黃	炒	當歸	酒洗
右為細末	每服二錢食前蓋酒調下	當歸	酒洗
卷荷散	治產後血上冲心血刺血暈血氣痛惡露不快	當歸	酒洗

卷荷 <small>初出</small> 紅花 當歸 <small>各一</small> 蒲黃 <small>性炒</small>	壯丹皮 <small>各半</small>	右為細末每服二錢空心酒調下一臘內童子小便調	四味湯 治產後一切諸疾神方分免一服尤妙	當歸心隔煩加 <small>半錢</small> 玄胡索氣悶喘加 <small>半錢</small>	血竭惡露不快加 <small>半錢</small> 沒藥心腹痛加 <small>半錢</small>	右等分為細末每服二錢食前以童子小便一鍾煎至六分溫服	獨行散 治產後血暈昏迷不省衝心悶絕	五靈脂 <small>二兩半</small> 生半 <small>半</small>	右為細末每服二錢溫酒調下口噤者拘開口灌之入喉即愈一方加荆芥為末童便調服如血崩不止加當歸酒童便煎不拘時服	胡氏蘇風散 治產後閉目不語	右以白礬研細熱水調二錢不拘時服	二母散 治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽	知母 貝母 人參	桃仁 杏仁 <small>並生用去皮</small>	右作一服水二鍾煎至一鍾食後服	參蘇飲 治婦人產後血入於肺面黑發喘欲死者	人參 <small>一兩</small> 蘇木 <small>二兩</small>	右先以水二碗煎取蘇木汁一鍾去滓調人參末二錢不拘時服	丁香散 治產後心煩咳嗽不止脾胃虛寒衝氣厥逆	丁香 白豆蔻 <small>各半</small> 伏龍肝 <small>一兩</small>	右為細末每服二錢食遠桃仁吳茱萸煎湯調下
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	--	---------------------------	-------------------	--	---	---------------	-----------------	--------------------	----------	----------------------------	----------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------	--	---------------------

瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如泉水	瑞蓮 <small>性微寒</small> 棕桐 <small>性微寒</small> 當歸 肉桂 <small>各一</small>	橫柳 <small>二枚</small> 鯉魚鱗 <small>燒</small> 川芎	右為細末每服二錢食前用煨生薑煎溫酒調下	漢防已散 治產後風濕氣壅上攻頭目浮腫	漢防已 猪苓 枳殼 桑白皮 <small>各二</small>	商陸 甘草 <small>各一</small>	右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服	三分散 治產後日久虛勞發熱	川芎 當歸 芍藥 熟地黃	白朮 白茯苓 黃芪 <small>各一</small> 芫胡	人參 <small>各半</small> 黃芩 半夏 甘草 <small>各半</small>	右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食前服	言翁散 治胎衣不下	當歸 <small>各半</small> 榆白皮 <small>一兩</small>	右為細末每服二錢食前用生地黃汁同溫酒調下	壯孺散 治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢乏弱頭目昏	童煩熱	壯孺 川芎 白茯苓 熟地黃	龍骨 <small>各一</small> 續斷 當歸 <small>各半</small> 五味子	艾葉 <small>酒炒</small> 人參 地榆 <small>各半</small> 甘草 <small>二錢</small>	右為細末每服二錢生薑三片紅棗一枚用水一鍾半同煎七分食前服	桂心丸 治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢麻痺煩疼	桂心 當歸 赤芍藥 壯丹皮
-----------------	---	--	---------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------	--------------	--------------------------------	---	------------------------	-----------	--	----------------------	--------------------------	-----	---------------	--	---	------------------------------	-------------------------------	---------------

從藥	橫柳 <small>各半</small>	青皮	乾漆 <small>炒烟盡各</small>
大黃	桃仁 <small>去皮</small>	三稜 <small>煨</small>	玄胡索
龍甲 <small>酥炙</small>	厚朴 <small>製各</small>		
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三四十九食前用			
溫酒送下			
草菓飲子	治婦人產後瘧疾寒熱相半或多熱者		
草菓 <small>炮去</small>	半夏 <small>湯泡</small>	川芎	赤茯苓
陳皮	白芷 <small>各一</small>	良薑	青皮 <small>去白</small>
紫蘇	甘草 <small>炙各</small>	乾葛 <small>二錢</small>	
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服			
牛熱飲子	治產後瘧疾多寒者		
內薑 <small>薑</small>	草菓 <small>仁</small>	厚朴 <small>生用</small>	半夏
陳皮	甘草	大棗 <small>去核</small>	生薑 <small>各等</small>
右和勻一半生用一半以濕皮紙裹煨			
不用將藥和勻每服以錢水二盞煎至七分去滓			
服食後一服			
皂給散	治婦人吹如腫痛頭疼發熱		
皂角 <small>燒一錢不乾者</small>	蛤粉 <small>用真者</small>		
右為細末每服二錢食後用熱酒調服取汗出為度			
連翹湯	治產後妬乳并癰		
連翹	升麻	芒硝	玄參
芍藥	白欬	防風	射干
大黃	杏仁	甘草 <small>炙</small>	
右作一服水二鍾煎至一鍾食後服			

新刊大醫院奇效良方大全卷之六十三

太醫院經驗奇效良方大全卷之六十四

書云陽升陰加四亨無差萬物稟天地之一氣男女從精血之

在百日名妳星至半載而為誇乳童週期而陰陽各半孩兒于

日乃真氣方著此際全在乳母能調則和不調則遠且和者其

母慈祥能調寒暑乳哺得宜是以百病頓釋形貌充悅筋骨

或酒醉乳兒令兒驚瀾或有孕乳兒令兒黃瘦

令兒多熱喘急或發寒未定

睡口鼻之氣侵火頗明令兒鼻

加秋熱氣鬱積令兒患熱病風

衣服過於月下眠眼過夜

痰或將惡相異物嬉戲下忍

無辜以為殃童子未成見稀物

精損血形體黧黑四肢枯瘠病之生

載其說乳下嬰孩之疾有病難治者以無所據中古巫妪氏着

顛顛經以占壽夭歷世相授於是小兒醫方興焉其次晉宋江

左推諸蘇家小兒方傳習有驗隋間有巢氏方撰集病源唐有

孫真人晉心此術造後賢後集名醫類聚然小兒治法散在

諸書傳考群書論說但有證而無治法張煥有方而關脈證惟

錢氏一書古今所重謂小兒方脈固難求證不可以言語取者

乳下之嬰襁褓之孩故專於一科古之有言醫之為難而慈幼

科比諸醫者又出人一頭地雖然人有長幼病感則一但幼小

不能言者耳人有四百四證能調則生失和則死幼者歸罪於

母注者或四氣七情或飢飽勞逸或嗜慾悞犯皆能成疾故上古神農氏之玉天下也觀人之遠和與草木之味以定酸酸甘苦以治疾病沉痾賦以軟之酸以收之甘以緩之苦以堅之奇哉辛味搃攝四傍然後播種百穀以養人之形骸古者巢居穴處不味其道故能全形返質以適自守氣血堅剛終保百年之壽於是乎明醫間出繼踵不絕岐和振袂於前李華馳聲於後悲哉後人巧偽日增故此天壽不滿雖有明醫續世診視無功澄祀妖邪以求餘福可謂息燈覓朗枯盤駕舟雖欲求生反遭艱險大抵養生之士要識遠和之理則天命無窮矣

○小兒初生總說

古人專陰陽二氣而生得志起自三焦冠壯易明童幼難治古云不能察其初小者是以別為一理耳小兒所稟形質壽命長短者全在乎精血 在母之胎中十月

而生一月如露珠二月似桃花三月男女分四月形像具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月受氣足又顯顯經云一月胎胞精血凝也二月胎形成胚也三月陽神為三魂四月陰靈為七魄五月五行分五臟六月六律足六腑七月精閉竅通光明也八月原神具降真靈也九月宮室羅布以定生人也十月受氣足萬象成而生也大抵壽夭窮通聰明愚癡皆以預定豈能逃乎小兒所稟全習父母之餘氣以長形質故肥不可生瘦瘦不可生肥大小與父母不等則難養也初生雖多患若形骸相稱則壽也小兒回舒轉首遲滯稍費人雕琢者壽之兆也若小兒預知人意身輕力懦者難養也古人有言譬如梅花早發不觀歲寒甘菊晚榮終於年事故知晚成者壽之兆也若小兒陰大而黑與身相等者可養之子若陰小而白者難養也若小兒形骸

弱頭面多青脉精神昏者難養也若小兒剛悍眼目俊朗神氣爽健髮絀而澤者壽之兆也若小兒精神實則少病故易養衰成也若形瘁而多病者難養也若小兒眼內黑珠少白睛大面色皸白者非壽之相也縱長不及天年若眼中黑珠大而白睛少面色黑形不淡者亦要觀其小兒眼中黑白分明表裏相稱曰壽曰康若黑珠動搖光明閃爍縱長亦憂目疾壽亦不及四旬矣凡嬰孩始生坐臥急以綿裹指拭兒口中惡物令淨方可浴拭若不急拭啼聲一出嚔下則生百病矣如或浴水未到且以綿絮包裹煖大人懷中浴湯極須調和若冷熱失所則令兒驚亦致五臟疾矣雖浴出亦當煖之若過暑月亦未可去其綿絮亦出母腹不可令冒寒氣也宜以預先煎下沸湯以瓶收之臨時漸煖不犯生水則兒不生蒼如此一月為佳自然長而少病矣初生小兒未乳之先用黃連與少浸汁調乾藤脂一規殼抹兒口中去其腹中舊糞方可與兒乳之一日內以少硃砂入蜜與少調灌半規殼一膈以牛黃少許徐徐抹兒口中若兒多睡煩勿強與乳之新生浴兒用猪膽一技取汁和入湯中浴兒則終身不生瘡疥又用五根湯浴兒亦可五根者挑柳棟梅槐加之苦參白芷煎湯浴之辟諸不祥大凡小兒冬不可久浴浴則傷令夏不可久浴浴則傷熱頻浴則背冷而發驚若遇熱時以軟絹蘸湯拭之小兒肌膚未成不可煖衣煖則令筋骨軟弱時常宜見風日若愛惜不見風日令兒肌膚脆軟便易傷損當將父母穿過旧絮著衣少假父母之餘氣幸勿以新綿著兒體其天氣和煖無風之時令人抱向日中嬉戲數見風日則血氣調肌膚堅密堪耐風寒不致疾病若歲惟帳之中重衣溫煖譬如草木生於陰地不見風日軟脆不耐風寒又當消息衣服無令衣多多則令兒汗出汗多則致虛損風邪易感小兒

當慎風池在頸項筋兩棘之間諸痰從此而發小兒臍帶... 不可頻浴頻浴則臍中入水撮口臍背從此起不可不慎此... 刀前人之成說實後人之龜鑑者欽

○看小兒三脉五脉法

水鑑先生曰小兒雖受陰陽二氣成其形氣尚未周何言有脉... 直至交蒸候盡陰陽氣足方可看脉其醫亂之年方生陰陽古... 云男子七歲曰醫生其氣陽之氣女子八歲曰亂其陰陽方成... 故未滿鬢亂之年呼為溥陽若鬢亂滿後呼為童兒始可看脉... 小兒初生至半歲之間有病速看額前眉上髮際下以無名指... 中指食指輕手滿按之若三指俱熱感寒寒氣氣三指俱冷... 上吐下瀉若食指熱胃堂不寬無名指熱乳食不和以致病也... 半歲已上方可看虎口週歲已上看虎口兼一指脉若五百六... 十四日變蒸滿足只看一指脉以食指按之上下旋轉分...

部凡言三部非寸關尺也小兒三部面看其色為一却虎口脉... 紋為二部二指脉為三部五脉者上按額前下按太衝并前三... 部共為五脉小兒有疾病無惡候不必常診太衝之脉此脉足... 生死之要會如七八歲脉一息六至為常人之脉一息八至為... 熱九至風五至虛四至損三至脫二至死十至必是病勞虛損... 形容瘦劣若或體肥面色青白一息十一二至謂之靈是風病... 死是為脉亂若一息一二至者為脉不來其人當厥冷而死遲... 若一息十一二至者必死速則不滿三月何謂一息一呼一吸... 為一息呼吸者即是一氣入一氣謂之一息其脉若指下來... 硬隱指急大者是有積若來微細即是冷若輕緊即是熱虛時... 復一大即是人驚若大小不勻即是惡候也所論浮數為熱伏... 結為寒沉細為令大小不勻為惡候數者緊也浮者輕也伏者... 貼也重乎方見結者亂也沉者重沒沉細者微也大小不勻即

是或大或小而不勻是謂氣不生其人必死也且如前入備述... 三脉立脉之法書之于左後李將此不可視以細事人命所繫... 務要誠心診察就上業上庶幾則可設有防誤禍之不輕醫為... 人之司命可不謹乎

○辨虎口紋訣

夫小兒三歲以前若有患須看虎口脉次指表節為命關次氣... 關次風關古人所謂初得風關病猶可傳入氣命定難陳是也... 男子以左手女以右手觀之... 有此通變三關脉候是極驚之候必死餘外並可醫治

風關青如魚刺主疳勞身熱易治

氣關青如魚刺主疳勞身熱易治

命關青如魚刺主虛風邪傳肺難治

風關青黑色如懸針主水驚

氣關赤如懸針主疳熱肺積熱

命關有此凡五色皆是死候三關通度如懸針者主慢

驚風難治

風關如水字主驚風入肺咳嗽面赤

氣關如水字主膈上有涎并虛積停滯

命關如水字驚風疳證夾驚候不拘五色三關通度者

乙

風關如乙字青黑色主慢脾風難治

氣關如乙字主驚風

命關如乙字青黑色主慢脾風難治

弓

風關如曲虫者疳積積聚前如排筭子肚皮如吹起... 氣關如曲虫主大腸積積... 命關如曲虫主心臟傳難治

<p>凡關如環主肝臟并有積聚 氣關如環主肝入胃吐逆不治 命關如環難治</p>	<p>此紋若在風氣二關易治若在命關通度難治 此紋若在手上或在面上或在左右臉邊皆是死候</p>	<p>脈曲向裏者是氣痺 脈曲向外者是風痺</p>	<p>脈斜向右是傷寒身熱不食無汗 脈斜向左是傷風身熱不食有汗</p>	<p>雙勾脈者是傷冷 脈三曲如長虫是傷硬物</p>	<p>脈兩曲如鈞是傷冷 脈一頭如環又有脚者是傷冷</p>	<p>頭面肚上有大脈并青筋並是食毒 面上有此點子並是再發之候</p>	<p>凡脈不足細者並是風氣但消痺然後取虫為効 一風易治 二氣 關病深 三命關死候</p>	<p>小兒驚風脈候 青色天雷四足驚焉 赤色飛禽因外入 黑色只因遭水撲 風關候脈應心經</p>		<p>辨三部脈證 上黑須知腎臟傳 中關黑候又纏綿 入驚此志兩相雜 目多直視定痰涎</p>
--	--	------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

<p>下黑須知是再驚 但宜風積便和平</p>	<p>上下是同因打撲 熱來悶閉沒心情</p>	<p>上青肝臟有風停 目直便青面更青</p>	<p>中是人驚并四足 渴來發燥不惺</p>	<p>下青原是再驚根 解熱宜賜是何論</p>	<p>上下俱青候是惡 十箇之中得一存</p>	<p>上赤風多入肺停 或來發熱嗽聲頻</p>	<p>中是風來入心臟 腸痛頻頻下瀉青</p>	<p>下赤重驚見本宗 但調心臟有神功</p>	<p>上下一同難治瘵 口開目下是知凶</p>	<p>上青肝臟本因留 目閉身疼四体柔</p>	<p>中是水瀉并再撲 熱來喘嗽不知休</p>	<p>下青因是再驚來 妙藥宜風定少災</p>	<p>上下若青俱發熱 四肢逆冷吞泉臺</p>	<p>上黑之時目上瞪 大便流糞又黃青</p>	<p>中見之時狀消渴 下熱尿黃便安寧</p>	<p>下黑若見赤相隨 氣多下瀉候如斯</p>	<p>上下俱同頂看手 虛煩燥渴速求醫</p>	<p>○再看三關脈色細訣</p>	<p>上關見此脈是心之候也 轉瀉恐虛而生風痰俱</p>	<p>中關若赤便多風熱 下關若赤發熱大腸閉結</p>	<p>上關見此黑脈是腎臟之脈為順若是大腸秘生風之候也</p>	<p>下關中關黑脈生風之候不為惡候 下關黑見無惡候</p>	<p>上關若自瀉足腸冷 下關若自瀉足腸熱</p>	<p>上關若見此脈四肢逆嘔吐加喘者惡候吐喘定生候</p>	<p>中關青脈風搏觸心急与治風即瘵</p>
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------

下關青脉若見無候即不宣轉上中俱同四肢熱為和四肢逆
為候也

上關黑并眼下发熱或無渴與解之瘥或先下大
流或身體壯熱全者須渴若下發熱或無渴與解之瘥

黑脉錯亂者腹脹是候或下痛即是積候下宜用九散
一日赤脉亂者是打撲及大驚九散脉透中關立變風候

忘神藥傷虛動脾臟生逆吐者為候用勻氣散補虛
如第一日便見此脉三關都見是五臟之應患若第二日

中關都隱也或下尺中關見者多氣候若三關都見或隱也
或面浮者是精氣候常隱也者不交出散數旬而死

如左手上部脉曲歸裏者是傷積室曲歸外者客風觸
之即發搐也中關若歸裏者是客風傳變散解之曲對

者凶候曲候過命關并外有惡候起者凶候
上關脉亂者傷令之患中下部脉亂凡者傷熱風

盛之疾下烏詳用雙下關若亂急須下温脾臟若下進食
此兩雙指關若見青与赤相雜如紫色無黑者上關脉

見傷寒必發咳嗽須解表微上浮入中關是風候下關若
見頻退為吉不退為凶候若孩童從氣關傳至命關方可調治

已上秘訣為神聖之醫也此前人消息後之孝者宜細推之
左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命

孫華二真人曰凡小兒左手見右手脉逆惡也右手見左手脉
為逆惡候也此陰陽定之而伏生死何况虎口脉平五歲已上

至十歲已下自斷乳而進食陰陽備矣故可善一指而定三關
分寸關尺象天地之九候也
○正定三十一脈死候不治

凡小兒病鳴聲放黑黃青膿手攣衣縫目多直視語帶喘息
人虛笑覆面向地啼哭無淚目無精光四肢就頸足外藥到口
不納四肢卧地交如汗出如珠擗眉交指甲引身長吁出氣變
寒冷水脚曲如鈎反張不已言語聲震魚口吐舌出唇黑欠慮
唇紅下氣無定久患愛與泥土服醜脾瀉變病成赤紅更有無
華之疾候是也

○辨孩兒生下三臍已前中病不治
風寒 絳珠噤 脐風 撮口 咳嗽 伏舌 木舌
重舌 鮮頰 項強 胃高

○變蒸
小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未具全自生之後即
長骨脉五臟六腑之神智也變者易也又生變蒸者自內而長
自下而上又身熱故以生之日後三十二日一變變每畢即情

性有異於前何者長生臟腑智意故也何故三十二日長骨漆
精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二
十數自生下骨一日十段而上之十日百段三十二日計三百
二十段為一變亦曰一蒸骨之餘氣自腦分入鬚上作三十二
齒而齒牙有不及三十二數者由變不足其常也或二十八日
即至長二十八齒已下做此但不過三十二之數也凡一周變
乃發熱諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃
金而未壯也故初三十二日一變生腎志六十四日再變生膀
胱其發耳與眇冷腎與膀胱俱主於水水數一故變生之九十
六日三變心喜一百二十八日四變生小腸其發汗出而微驚
心為火火數二百六十日五變生肝哭一百九十二日六變
生膽其發目不閉而赤肝主木木數三百二十四日七變生
肺聲二百五十六日八變生大腸其發鬚熱而汗或不汗肺者

肺聲二百五十六日八變生大腸其發鬚熱而汗或不汗肺者

金銀數四二百八十八日九變生脾智三百二十日十變生胃其後不食腸痛而吐乳此後乃齒生能言知喜怒故云始全也
 大倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日長其經脈手足
 手受血故能持物足受血能行立經云變且蒸謂蒸畢而足一
 歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微下不可別治是
 以小兒須變蒸然齒者如花之易苗所謂不及三十二齒由變
 之不及齒當變日相合年壯而視齒方周觀諸變蒸執作驚
 顛視日角左邊眉間脈紅是也八九初蒸見一條長一二分在
 眉上者輕自日角垂至眉上此重變蒸發熱見二條紅者兩三
 次蒸熱在內不解脈紅滯又因驚而蒸脈青變蒸多伏青在左
 大陽因傷風而蒸自信門青至眉之上因驚而蒸三變皆青三
 證俱見若及三十二齒者變蒸足也此篇載之於錢氏之書書
 之於右使後人易於便覽云

○小兒諸熱須分主治

驚熱	溫壯	壯熱	胎熱	脾熱	風熱	煩熱
潮熱	積熱	虛熱	實熱	疳熱	血熱	骨蒸

夫小兒驚熱者候因驚着熱以為常致令心氣不和身體微熱
 睡夢驚過身有汗甚者手足掣縮變成痲疾此由氣血不和
 實熱在內心神不定所以發搐又小兒變蒸亦微驚所以然者
 亦熱盛故也治之以七寶散天竺黃散并露散辰砂金箔散皆
 可治之小兒因驚則生熱則心不寧故睡卧不安身體微動
 心主驚實則發熱飲水虛則卧而悸動不安此其候也
 小兒溫壯者由胃氣不和氣行壅塞故蘊積體熱名曰溫壯若
 大便黃臭而黃者此腹內有伏熱以四順飲子治之若黃白而
 酸臭則挾宿食不消當服消積丸輕者少服重者節乳哺增加
 丸甚當取微利可也

小兒壯熱者因五臟生熱薰動於外故身體壯熱大抵與溫壯
 相類而有小異但溫壯然不其益是溫壯也其壯熱者一向熱
 而不止甚則發驚也以七寶散大黃朴硝湯皆能治之
 小兒胎熱者但有初生下肌膚紅白二臍已後遍身黃腫眼閉
 不開依冷聲此因胎內有熱或因母服熱藥所致亦謂之血
 渣治之以辰砂金箔散牛黃膏乳上吮之兼以黃蘗皮煎湯浴
 之此良法也

小兒脾熱夫弄舌者脾臟微熱令舌絡微緊時上舒古治之便
 不可用涼藥下之少與龍腦飲子地黃膏治之若大病未已弄
 舌者凶學者慎之

小兒風熱若身熱面青口中亦熱煩叫不特有風證者宜虎睛
 丸天竺黃散治之若熱甚大便秘澀者四順飲子亦可服之
 小兒煩熱者由臟腑實熱血氣盛表裏俱熱則苦煩燥不安反

膚壯熱也以八珍飲子七寶散皆可服之小兒手足多熱心煩
 燥哭唇深紅飲水不止以竹葉石膏湯加珠珀露散治之

小兒潮熱者時間發熱遇時即退來日依時而發此欲發驚也
 大抵血氣壅盛五臟驚熱薰發於外故與溫壯相類或來伏熱
 或帶宿寒夾伏熱者大便黃而臭帶寒者大便白而帶酸臭氣
 皆緣臟腑冷熱之氣俱盛腸胃蘊積故也治之以金連飲劑効
 湯加珠珀露散過期不解小柴胡湯或竹葉石膏湯也錢氏云
 假如潮熱是一臟實一臟虛而內發虛熱也法當補母而治本
 臟則愈且如日中發潮熱者是心虛也肝為心之母則宜先補
 肝上實而後瀉心也得母氣則內平以潮熱愈也醫見潮熱妄
 謂其實乃以大黃朴硝等諸冷藥利之利既多矣不能禁約而
 津液內竭縱取一時產鮮有不戒疳病而身瘦也
 小兒積熱者由表裏俱熱則遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便

○虎口脉色

脉色純紅者為初得病 為陽 為熱 為病在外

脉色紅而紫者 為病傳變 為內 外尚有熱或但熱為陽

脉色紅或紫而青 為病在毒 為病一寒一熱外為之變作

脉色純青者 為病久而過經 為冷 為熱在內 為病

胎則實力為虛寒 則為五臟之邪相干陰陽之證相反

脉色青而黑 為病極 或為久病再作形色黧黑

脉色黑而黃黃而露出者十無一生大凶

○面部

赤紅乃心氣絕蓋火屬心主炎上故知心絕則死

主交牙 弄舌 虛舌出 滿口生瘡 木舌 魚口

喉閉 舌上白胎 舌下重吊 咽喉腫爛 痰涎上壅

魚口 此為色急惡候

左太陽并日角

紅脉現變蒸候 主煩躁啼叫頭肚上温温壯熱一二日而退

太陰上紅脉現傷寒之候 主壯熱鼻塞

文臺上紅脉現傷寒三日餘 主內熱頭疼

太陽脉紅至太陰 内外有熱 又連文臺熱極不解至武臺

漸生變證

顯門紅脉胎受熱受驚之候 主不時驚跳時多啾唧夜啼睡

額上紅脉至眉心驚風發熱之候引入印堂驚痰搐搦有熱主

小便溢少

印堂紅脉現心經積熱眉心連印堂紅脉或紅影心肝上焦熱

蘊痰涎上壅貫上焦夜啼將生驚候近眉頭左下有西

伏驚時睡中驚跳

顯門紅脉腫凸此風熱痰生驚正緣熱氣上衝攻急心胃有熱

痰不止漸成驚風之候以涼刺去痰詳熱即安如顯門

上紅脉引入印堂此驚候搐動多日子

氣之劑

風池紅有風熱在上中焦瞬息將有搐動之候驚風化痰

氣池紅傷風久傳變在臟三焦有熱之候可煩解利

眉心印堂紅有熱驚發飲不吐則成驚搐

印堂至山根紅脉是心與小腸熱候 小便赤澀而少

山根下至鼻柱紅心胃氣候 小便連大便皆赤澀

印堂連至上準紅三焦有積熱可以清涼之劑過之

準上紅黃色此平穩無恙

顯門紅脉外腎因風温候 生熱為吊

顯門紅内有煩躁而熱

右太陽并日角紅脉因喫乳母傷風壅妨汁 成乳癰停滯生

○風熱痰等證

右太陽紅脉突乳母熱病痰妨 恐生痰候引入

武臺紅脉漸成吐瀉生驚之候

風池紅母不思拊養或狼羊骨汁毒生風

氣池紅母有熱痰乳兒雖至十歲病亦須發見此熱痰乳入兒

○五臟令兒眼目生昏傳變他病

顯門紅腎中氣病緣母能飲或好異物及食鷄鵝鴨子生魚菜

絲將來傳變異疾

七表 浮乳滑實弦緊洪

浮主中風乳失血 滑吐實下分明別

弦為拘急緊為寒 洪脉由來偏主熱

八裏 微沉緩濇遲伏濡弱

微沉緩濇遲伏濡弱

微沉緩濇遲伏濡弱

逢寒緩結微為痞 瀉脈敗血濡氣滯

伏患癰痛沈積冷 弱因患後虛浮是

九道 長短虛促結代牢動細

脈長陽毒在三焦 短脈胃中食不消

虛主多驚入恍惚 足時加峻命難逃

結為氣痞代羸瘦 牢者骨蒸似大燒

動則血崩精不固 細還瘦腫主枯槁

○視嬰孩大要

一視兩眼精神 二視聲音響大 三前後頂顛 四形貌

五毛髮

一兩目為五臟精華所聚 一身之神氣所鐘若精珠黑光滿

精神明快主兒有壽 一生少病雖有病亦易愈若眼白多

睛昏顛睛珠或黃或小此是稟受怯弱兒多患也

二聲音大而響亮五臟之氣壯令兒易得長浪如孩兒自生未

不曾大啼哭乃吉音不出此乃一臟或二臟之陰竅不通

神氣怯或叫聲如啾啾啞啞之狀此兒不壽而難養必矣

三顛門乃母氣血充實令兒顛門堅實而耐養如母多病氣血

怯弱令兒顛門虛軟而不實及後頂顛乃父之精元氣充

實令兒後頂上堅硬而耐養如父之原氣不足耽酒多慾

令兒後頂虛孔不堅亦不壽如父母俱怯生下兒女俱不

壽若如此其父母自亦不能保於天年前顛又曰信門道

家為泥丸後信名腦後頂門頭中心頂上又名百會穴華

陀者面部訣載甚詳頗多信同音凡前後信及百會開而

虛名解顛

四望口大鼻端眉目秀方福此嬰孩易長福氣堅厚如口

小鼻塌眉目既鄰令兒性異不貧則天亦是乖離此等難

剖訣

五髮乃血之餘母之血氣充實則髮黑而光潤如母因血虛帶

漏敗壞月事不調或耽酒多淫或母胎有患令兒髮黃焦

稿生疔熱瘡癩之患

九視小兒神氣色味無出於此五者不能全見但得兩目精神

聲音響亮此可保其六七此乃漢東王氏之心法口授之

秘訣也

○驚風搐不洽證

如驚風搐搐者定精神如常神思不政即是燥胃煩躁不安須

急急調理稍緩則不及事亦懼不療須要兩眼鮮明為吉

其餘難療之證須詳細察

驚風搐搐兩眼不開不洽 驚風定了兩眼亦開不得不得

叫不出說不得更不啞聲不洽 驚風連搐不止不洽

手按胸膈及咽喉間不洽 口中不時吐出鮮血不洽

吐不出者不一月死 信門腫起紅青赤交橫見不洽

大便瀉紫黑血不洽 信門如坑陷青赤現不洽

驚風搐動連日不下不洽 尋常無事時噤口噤眼連日

痰涎滿口咽喉間如解鋸不洽 痰涎如水鷄聲乃二氣爭不洽

聲音不出口不洽

○驚風治證

諸方書所載急驚風易治慢驚風難治此古今之通論也意之

度之出自至人傳授別是一濫機杼精思其訣錄方術真神仙

之妙方也有若小兒投病之原即驚風寒暑痰食各有由焉若

治療之法迥出一入頭地如寒屬膀胱驚熱屬心風屬肝痰食

屬脾胃究湯氏幼幼之說驚風痰常相繼於表裏大要察其部

位脈色燭見其病之底紐克時獲效矣

○驚

脈左顛門額上印堂三處一紅嫩則初驚方熱 紫麻則重驚

而熱 顛門屬腎 髮際屬膀胱 印堂屬心

顛門先紅及印堂青此心之微邪淫水 顛印皆紫紅此同前

上證皆輕 顛門青及印堂紅此腎之正邪冠心大必危

顛印皆青同上證病危 如加之左太陽上紅傷風內熱

日角紅至眉中變赤兩熱生驚 右太陽紅食了乳母傷風乳汁

右太陽紅青喫乳母傷寒乳汁

○風

脈看左太陽及風池 左太陽與風池紅風邪輕 青受風邪

重 左太陽屬膀胱 左太陽屬腎 左風池屬肝右風池屬胃

加之又看左太陽紅傷風初熱 左太陽紅感寒初熱

左文堂紅熱有五七日傳經了 左太陽紫傷風再受

左太陽紫傷寒再得 左文堂紫三四次熱了

右文堂紫久熱不退 左太陽青風變熱 左太陽青生微熱了

左文堂青再傳經熱不解 印堂紅主風熱生微熱

○痰

右太陽屬三焦 右太陽屬脾 右文堂屬肺 右武堂屬胃

右太陽紅突母感冒熱痧 右太陽青突母感冒熱痧

印堂青 右太陽青 右文堂青此三處主痰與食

印堂紅心熱生痰 印堂青黑主胎中驚痰飲

印堂紫主有熱痰 印堂青黃主有風痰

右太陽青紫傷寒夾風熱痧 右太陽青傷寒痧

○食

右太陽青 及文堂青 武堂青皆足食

如食傷因飽食不節或為冷硬之物或油膩之物致令頭

痰發熱嘔吐宿食肚疼如傷在膈上痞塞者煎蘆散吐之

停於肚中嘔吐肚疼宜用三物湯瀉之

有滯食緣胃弱化不送心胃滿閉肚疼與化鐵丸消食

二陳湯快膈有中食因其兒脾胃法常有停飲或食飽無

飲滯而不化痞塞三焦如驚風搐搦或迷悶而不省以夢

如醉神思昏亂發熱金星九主之

○五癩附症

風癩為病手足或一手一足或兩手兩足如癱不隨或噤眼

或健口或口喎牽引頰車

食癩為病傷肉食手足搐動角弓反張或拳攣或張狂大聲如

羊如犬大呌吐出血食方定其飲食盡被痰涎包裹在其中

驚癩為病厥頭目吊口目或一目雙目或昏或盲或邪視或頭

顛或推頭或戰腦

痰癩為病此患似張狂作之非常或半年一作或一年或一月

或一日一次或一日三次一身驚搐不廢手足不廢頭目

其人張狂如夢中如半醉燈下不知人皆從夢寐中作所

以無常也忽耳不能聞其目不能視如狂

飲癩為病此患與食不知飽忽然連三五日不甚思食手足搐

動多自夢寐中作食之大飽亦便發作

○症附症

若症病如寒邪中得患者十有九死

又熱瘟病及中暑發熱者十無一生

頭疼發熱頭項強硬不能回顧推頭口噤問之全不應人

漸漸角弓反張痰在咽喉響者死仲景云藥者根湯小續

命湯入麝香方大防風湯主之且小方脈者書立方者一

百餘家各有所長惟張氏此諸家優詠之切後之學者熟

讀玩味治嬰孩之疾則百發百中矣今畧各證通治方

列于後

○小兒證通治方

七寶散治小兒溫壯伏熱傷寒煩燥面赤氣喘夜熱既涼此藥

凉心曠消風熱

川大黃 赤芍藥

甘草 川當歸

麻黃

白朮 荆芥穗 各二錢

右為末一歲一錢水半盞葱白一寸薄荷一葉煎至三分

不拘時溫服

天竺黃散治小兒驚風熱

天竺黃 川葶金

山梔子

白僵蚕

煇散 去土 甘草 各等分

右為末一歲半錢熱水薄荷湯皆可服不拘時

甘露散治小兒驚熱通利小腸去驚涎清心腑止煩渴安神穩

特加硃砂名加硃甘露散

寒水石 石膏 生甘草末

右件為末和勻量兒大小或一錢或半錢熱月冷服寒月

熱服用薄荷湯調或燈心湯調被驚心熱不安外皆可服

小便不通快麥門冬燈心湯調若驚熱入硃砂少許不拘

時服一方有赤茯苓一兩蘇離方用滑石不是石膏錢氏

名玉露散每服一字或半錢或一錢熱後溫白湯調下

辰砂金箔散治小兒心膈邪熱神志不安驚惕煩渴恍惚怔忡

夜卧不安驚斷腫爛及痰實咳嗽咽膈不利

辰砂另研 結梗 人参 白茯苓

蛤粉 牙硝 甘草 片腦

各二錢 各二錢 各二錢 各二錢

金箔一井

右為末一歲半錢薄荷湯調不拘時百疳小兒臟腑多熱

睡卧不穩大便不利蜜湯調一字

四順飲子治小兒三焦積熱遍身丹腫唇口生瘡忽驚涎潮諸

熱等證

川當歸 赤芍藥

甘草 川大黃

右到碎三歲小兒用二錢水六分薄荷二葉煎八九沸去

粗不物時服大小以意加減與之小便不通加燈心木通

同煎服

紫霜丸治小兒變蒸發熱不解及夾食停冷溫壯汗後熱不歇

及腹中有痰癖乳哺不進乳則吐哕食積先寒後熱者

代赭石 赤石脂

巴豆 煇散

右件研入糊為丸如麻子大一粒少乳下食頃後與少乳

勿令多日服二九此藥無所不療雖行不虛人米飲下奇

牛黃膏治驚化痰祛邪熱止涎嗽

兼豆粉 甜硝

右為末和勻煉蜜丸如交實大金箔為衣或一丸或半丸

薄荷湯磨化服不拘

龍服飲子此瀉脾經熱可代瀉黃散用治小兒蘊熱咽喉腫痛

赤眼口瘡心煩鼻衄咽乾多渴睡卧不寧及除痰熱咳嗽

中暑煩躁一切風壅

甘草 人指子 藿香葉 石膏

各四錢 各三兩 各二兩 各一兩

片腦 瓜蒌 各七錢半

各二錢 各二錢 各二錢 各二錢

右為末每服一錢蜜水調服不拘時治傷寒餘毒潮熱汗加竹葉煎服

地黃煎丸治小兒風墜上膈熱煩鼻呞口瘡咽喉腫痛口舌生瘡或血熱五心常熱多渴飲水

生地黃 熱地黃 薄荷葉 鈔甘草 微炙

山梔十仁 玄參 片腦 半錢

右為末水密為丸如艾實大每服一九白湯磨化乳後服

煎湯治朝熱往來久而不解煩渴昏倦肌瘦減食

地骨皮 兩 柴胡 防風 黃芩

甘草 炙 葛根 各七錢半

右剉碎每服二錢用水六分煎至三分不拘時服

竹葉石膏湯治小兒垂瀉少氣逆欲吐四體煩熱

石膏 三兩 半夏 洗 人參 銹七 麥門冬 一兩

甘草 銹七 淡竹葉 一托

右剉碎每服二錢用水六分粳米二十四粒生薑二片煎至三分去粗不拘時服

金蓮飲子治小兒瀉積壯熱赤眼口瘡心煩躁悶咽乾多渴熱不止

防風 甘草 炙 連翹 柴胡 去蘆

山梔子 各半兩

右為末每服二錢用水六分煎至三分食後服

三解牛黃散治小兒潮熱實熱壯熱煩悶不思乳哺大小便不利及諸風癱瘓實

川大黃 煨 牛黃 黃芩 白附子

防風 兩半 白茯苓 桔梗 甘草 炙

人參 全蝎 微炙 白僵蚕 微炙 鬱金 各三錢

右為末薄荷湯和熟蜜調半錢不拘時服身熱渴吐瀉用防風湯調若壯熱不止甘草柳枝湯調服

大黃朴硝湯治小兒驚熱涎風前後不通

川大黃 蒸 甘草 生 朴硝 各一兩

右剉碎每服二錢水半盞入蜜少許煎至三分不拘時服

惺惺散治小兒傷風吐乳及疔疹毒氣時疫溫壯風熱等疾

桔梗 細辛 人參 白木 瓜蒌根 甘草 炙 白茯苓 川芎 各等分

右剉碎每服二錢水半盞生薑薄切各少許煎至三分不拘時如傷風無汗加葱豉薄荷煎服

紅綿丹治小兒急慢驚風手足抽掣目直涎壅壯熱氣癆及胎

疳中風 蝎梢 炙 反砂 各二 牛黃 一錢 赤足蜈蚣 一條 酒

天南星 薑汁 水片 麝香 各二分 蛇含石 各半兩

右為末米糊丸如鷄頭大金箔為衣量兒大小一歲半粒

薄荷湯磨化服不拘時

異功散治小兒吐瀉思食溫中和氣凡小兒虛冷病先與數服

以正其氣一名正氣散一方加薯蕷等分又名六神散

人參 白木 茯苓 甘草 炙

白僵豆 薯蕷 各等分

右為末每服二錢用水六分生薑二片紅棗一枚煎至三分

分量兒大小加減不拘時服如虛冷泄瀉加附子風證加

天麻喇加聖藥

錢氏白朮散治小兒脾胃虛弱昏困多睡乳食減少調中和氣

止吐逆除煩渴

人參 白朮 茯苓 甘草 炙

藿香

乾葛

木香

右為末一歲用二錢水五分煎至三分不拘時服

補肝腎地黃丸治小兒肝腎虛怯由胎氣不成面色皁白其顛

即解不語多啼位畏明體骨重白膜遮睛喜卧冷地

熟地黃各八分 山茱萸各四分 乾山藥各四分 澤瀉

牡丹皮各三分 白茯苓各三分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大三歲已下每用三五丸白

湯化下不拘時服

人參生犀散治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晡潮熱夜有盜汗

五心煩躁四肢困倦及大病差後餘毒不解或傷寒病後

食羊肉體熱不思食

羚羊角各一分 地骨皮各一分 秦艽去土 麥門冬去心

枳殼炒 川大黃各一分 柴胡去蘆 赤茯苓去皮

赤芍藥各一分 桑白皮各一分 黃芪各一分 人參

鱉甲去殼 黃芩各一分

右剉碎每服二錢水半盞烏梅半箇煎至三分不拘時服

地骨皮飲治小兒骨蒸潮熱往來心膈煩悸及傷寒後氣未解

柴胡去蘆 地骨皮各二分 知母各一分 甘草炙

鱉甲醋炙 黃芩各一分 人參各一分 赤茯苓半兩

右剉碎一歲二錢水六分薑梅各一片煎三分不拘時服

金瓜丸治小兒疳熱身多吐熱黃瘦久服令兒肥白

黃連各一分 黃柏各一分 甘草炙 青橘皮去穢

右為末入麝香少許攪猪膽汁和入石雷隔湯煮五已沸

掛風處一宿丸如菉豆大米飲下五七九至十五九不拘

時日三服

肥兒丸治小兒疳病者多因闕乳喫食太早所致或因久患疳

脾胃虛重動日漸羸瘦腹大不能行髮無精神

黃連各一分 神麴炒 大麥蘖炒 肉豆蔻炒

史均子去殼 木香一分 檳榔一分 不

右為末麵糊為丸如羅蔔子大白熟水下三五十九看大

小增城空心服

五疳丸治小兒五種疳疾

五靈脂研碎 黃連各等分

右為末湯浸蒸餅為丸如黍米大以五色為丸一分臘粉

為衣一分蜜陀僧為衣一分百草霜為衣一分硃砂為衣

一分青黛為衣晒乾和作一處每服三四十粒不拘時末

飲湯下目三服

龍膽丸治小兒食後多發熱或夜則涼此血熱證疳熱皆可治

宜黃連去毛 赤芍藥各一分 草龍膽去首 青皮去穢

檳榔大者 薄荷香少許

右為末猪膽汁少入麵糊為丸羅蔔子大每服三二十九

米飯湯空心服

硃砂膏治小兒鎮心驚驚化痰墜涎除風

硃砂另研 白礬炒 白附子炮 天南星炮

乾蝎一兩 熟地內炒 白礬炒

右件入麝香半錢共為細末麵糊為丸粟米大硃砂為衣

每服十九丸煎金銀薄荷湯下如盜汗煎麻黃根湯下不拘

時服

調中散治吐瀉

人參各一分 白茯苓各一分 丁香二十 白木半兩

甘草炙 紫蘇半兩

右為末每服一水用木瓜煎湯入鹽少調服不拘時

青金膏治小兒諸疾

青黛另研

胡黃連

熊膽化開

薄荷另研

白附子二枚

麝香少許

蟾酥

水銀各一皂

鉛霜

龍腦各少

右為末重入乳鉢內研細令勻用獾猪膽一箇取汁熬過浸蒸餅少許為丸如黃米大曝乾器內收密封或用時旋

取為丸每服二丸各依後項湯使送下

驚風白湯下二丸 搐搦將一丸溫水化開滴入鼻中待

噴嚏即可更用薄荷湯吞二三丸 久患五疳瘦瘠脚細

腹脹肚上青筋頭髮稀疎愛喫泥土時咬指甲瘦弱米飲

下 瀉痢頻併米飲下 疳蛔虫咬苦練子煎湯下

鼻下赤爛口齒疳虫所蝕口瘡並用乳汁化開塗在患處

疳眼雀目取白羊肝一葉用竹刀批開納藥二丸以麻線

縛定米泔水內煮熟令兒食肝恐小不能食乳母暫與兒

啖乳母用忌毒物薑蒜雞鴨猪肉此藥隔二三日服一次

能除孩子百病

紅綿散治小兒四時感冒寒風通身發熱變熱諸驚胎驚丹毒

等熱並皆治之及急慢驚風亦宜服之

人參二錢

天麻洗

礬蚕炒

麻黃去節

全蝎去毒名

甘草炙

辰砂一錢半

右件為末然後入硃砂和勻用乳極細每服半錢用水半

盞煎數沸入乾胭脂少許再煎一沸溫溫服不拘時

烏犀丸治小兒驚疳乳食不化內成積聚腹大體小潮熱往來

五心煩熱揉指咬甲蛔虫自利頸項結核肚痛無時遍身

瘡疥小便如瘧夜多盜汗嗜泥炭喜甘甜或瘧或渴或吐

或瀉或百日內外因吞惡血絞刺啼叫脾部虛弱易為傷

犯故百疾發生並宜服之常服消宿食破帶氣發散癩毒

不可疑藥味能散見已豆可畏不容服明味不知脾主

甲州萬物發生之原脾積閉飲血榮氣衛安免寒濕可疾

不因此發生累上用驗告勿他疑

巴豆一百粒

星一兩

橘皮一兩

香木六兩

右件為末和勻水浸蒸餅糊為丸如蘿蔔子大量兒大小

加減丸數臨臥生薑湯送下

五疳丸治小兒五疳驚悸狂發搐上盛延潮等疾如尋常延

盛看緊慢並宜服之不動臟腑養小之家宜預合以應倉

卒其驗如神

皂用四兩

半夏一兩

麝香一分

白附子炮

烏蛇焙

右件為末用皂角膏為丸如未能就加此生薑汁打糊同

為丸如葶豆大硃砂為衣六七歲三四粒薄可湯生薑

湯俱可送下不拘時服

神丹治諸癩癩倒便手足搐搦或吐或不吐或喉間一塊痰

下方懸有熱痰多日搗參多夜搗若氣血強盛漸上減

少或虛弱搗五瀉之虛實氣相干有食癩風癩癩胎

癩因傷感而得或因驚所得或喜怒而得病狀雖不同且

別其虛實冷熱為大要大抵形氣色吹於背中心二有
 眼腫陷或如鴨眼牛眼羊眼或眼白紅如血皆不治不能
 言聲音全不出口頭青如靛或青脉為頭信膜信陷頭頂
 十字開無辜手足俱廢羊眼無精光眼珠平小半眼努力
 看人全不動瘡痂不能言不能行皆不治或吐痰涎或清
 或以膠漆在咽喉溫溫有聲常上頭目沉重或癢痒絕發
 動一日不省人事

天南星光白大者七 礞砂一兩將細砂填
 赤脚蜈蚣七箇去 全蝎七箇去毒此二味焙乾
裝前切用刻下南星

已上同南星以紙數十重裹了以酒醋浸透於泥地上掘
 一穴坑方九一尺四圍排定磚用炭十斤燒坑并磚通紅
 掃淨以酒醋各二升澆在坑內却將南星包兒放在中間

更磚蓋定次用炭圍上護之經宿次日取出細切焙乾碾
 為細末入後藥

粉霜另研 辰砂各半兩 麝香一錢 凌霄花一兩研
 針砂半兩米醋

右件各為末和入前藥再乳極細分作四分一分猪心血
 九一分羊心血九一分羊蹄草根汁為九一分煮黃肉為
 丸如小紫豆大每三歲兒三十九十歲兒一百九燈心葉
 湯送下日三服

○諸熱驚

人參羌活散治小兒傷寒頭疼發熱渾身向急時行瘡疹

羌活 獨活 柴胡 前胡
 川芎各七 桔梗 人參 茯苓
 天麻 枳殼各五 地骨皮 薄荷

甘草各三分

右作一服水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

人參辛梗湯治小兒傷風發熱鼻寒咳嗽時行瘡疹

人參七分 細辛五分 桔梗 乾葛
 升麻 白朮 茯苓 柴胡各七分
 薄荷 甘草各五分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

人參清解散治小兒感風發熱頭疼鼻流清涕及溫壯悉治

人參 防風 天麻 前胡
 柴胡各七分 茯苓 枳殼各五分
 細辛三分 川芎七分 薄荷 甘草各三分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

人參前胡散治小兒感風發熱咳嗽

人參五分 前胡 半夏各七分 茯苓
 紫蘇 陳皮各五分 乾葛七分 枳殼

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

天竺黃薄荷散治小兒傷寒發熱頭疼發熱極生風咳嗽痰

延應帶鼻塞不通
 天竺黃七分 薄荷一錢 全蝎 白附子煨
 甘草各五分 羌活 僵蚕 麻黃去節

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分入竹瀝汁半盞

胡散不拘時服

白虎湯治小兒復寒熱渴不已

知母一分 石膏煨半 粳米一分 甘草五分

加人參一分

右作一服用水一鍾紅棗一枚煎至五分不拘時服

入參煎胡散治小兒傷寒退餘熱

前胡五分 柴胡一分

半夏湯泡七次

黃苓去心

人參去芦

枳椇六分 甘草五分

右作一服用水一鍾生薑三片棗子一枚煎至五分不拘時服

特服

藿香正氣散治小兒傷寒發嘔

藿香一分 厚朴姜製

半夏

陳皮

蒼朮未泔水浸一宿取出 甘草五分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

枳殼半夏湯治小兒傷寒嘔者

枳殼去穢炒 半夏湯泡七次

右作一服用水一鍾生薑五片煎至五分不拘時服

加減建中湯治小兒傷寒自汗當補虛和陰陽

黃芪一分

白芍藥一分

人參 熟地黃各七

甘草五分

右作一服用水一鍾煎至五分不拘時服

竹茹湯治小兒胃熱嘔苦汁

青竹茹如神乾葛一分

粳米九粒

半夏湯泡七次

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

小柴胡湯治小兒傷寒鼻乾

柴胡一分

半夏

黃苓

人參各七

甘草五分

加生地黃一分

右作一服用水一鍾生薑三片棗子一枚煎至五分不拘時服

抱龍丸治小兒傷寒溫病身熱昏睡氣麓風熱痰實咳嗽及中

暑沐浴後可服之

牛膽南星兩分 天竺黃半兩 雄黃

辰砂各二分

應射五分

右為細末并草膏為丸如法實大每服一九用薄荷生薑

湯臨服化下

○感寒吐瀉通治

藿香安胃散治小兒感寒逆吐瀉

藿香一分

半夏湯泡七次

陳皮

厚朴姜製

砂仁各七

蒼朮未泔水浸一宿

甘草五分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食前服吐逆加

煨生薑汁半蛤蜊殼

人參白朮散治小兒吐瀉微熱作渴

人參 白朮

茯苓 藿香各七

乾葛一分 木香

甘草各三分

加陳皮砂仁各七分 一名人參和中散

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食前服

益黃散治小兒不熱吐瀉四肢困腫脾胃虛弱

陳皮一分

青皮

訶子各五分

丁香

甘草各三分

右作一服用水一鍾煎至五分食前服

益脾散治小兒吐瀉虛弱調理脾胃

人參 白朮

茯苓各一分

陳皮

厚朴各七

木香

甘草各三分

右作一服用水一鍾生薑三片棗子一枚煎至五分食前服

寶脾散治小兒脾胃虛冷吐瀉不止不進乳食慢驚慢脾等語

及治下痢

人參	白朮	茯苓	肉豆蔻
薏苡仁	山藥	砂仁	神麩
麥蘖	扁豆	陳皮	冬瓜仁
甘草	木香	丁香	石蓮肉
陳米			

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服

寶腸散治小兒泄瀉腸滑脾虛此藥厚腸胃

茯苓	肉豆蔻	陳皮	砂仁
厚朴	姜製	訶子	蒼朮
木香		甘草	

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服

異攻散治小兒吐瀉不思乳食溫中和氣虛冷

人參	白朮	茯苓	陳皮
甘草	木香		

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服

人參和中散治小兒冷熱不調上盛下瀉

人參	白朮	茯苓	木香
陳皮	當歸	川芎	前胡
甘草			

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服

助胃膏治小兒胃寒吐瀉乳食不化不思乳食脾胃虛弱

人參	白朮	白茯苓	甘草
丁香	砂仁	木香	白豆蔻
乾山藥	肉豆蔻		

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸用米飲湯磨化食前服

人參	木香	訶子	肉豆蔻
丁香	藿香	砂仁	甘草

右為細末煉蜜丸如芡實大每服一丸白湯化下不拘時

安胃和脾散治小兒脾胃不和中脘氣痞心腹脹滿全不思食

嘔吐痰噎逆氣吞酸面色痿黃肌肉消瘦腹脇刺痛泄瀉

不止便利不調

蒼朮	厚朴	姜製	人參
陳皮	木香	藿香	澤瀉
砂仁	廣茂	檳榔	白朮
茯苓	青皮	甘草	小紅棗

右為細末每服一錢用淡生薑湯食前調下

○痢疾通治方

人參	白朮	茯苓	芍藥
官桂	川芎	當歸	粟米

右作一服用水一鍾煎至五分食前服

生熟飲子治小兒虛積腹肚疝痛下痢赤白裏急後重日夜無度並皆治之

粟殼	訶子	白朮	黃芪
陳皮	當歸	烏梅	木香
甘草	黑豆	淮棗	

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食前服

大効至聖千金飲子治小兒脾胃虛弱下五色先因嘔吐復作

泄瀉臍腹痛脇肋脹滿虛鳴下痢膿血相雜或如豆汁

黃芪	陳皮	粟殼	木香
----	----	----	----

白芍藥 <small>炒</small>	地榆	當歸	白朮
訶子 <small>地各</small>	枳殼	黃連	甘草 <small>各</small>
黑豆 <small>十粒</small>	烏梅 <small>一箇</small>	淮棗 <small>一箇</small>	
右作一服用水一鍾煎至五分食前服			
偏頂丹治下痢赤白裏急後重			
乳香	沒藥 <small>各五</small>	杏仁 <small>十四箇</small>	巴豆 <small>粒去油</small>
黃蠟	黃丹 <small>一兩</small>		
右為末用黃蠟溶化為丸如黍米大每服七丸赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下不拘時			
木香 <small>五錢</small>	九治小兒下痢膿血		
木香	肉豆蔻 <small>五錢</small>	黃連	地榆
當歸	白芍藥 <small>半兩</small>		
右為細末蒸烏梅肉丸如麻子大每服三十九用棗湯送下食前服			
沒石子九治小兒熱瀉久痢皆可服			
黃連 <small>半兩</small>	沒石子 <small>五錢</small>	訶子 <small>七</small>	木香 <small>二</small>
肉豆蔻 <small>七箇</small>			
右為末搗爛飯為丸如黍米大每服三十九白湯送下食前服			
二順散治伏熱中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澀			
猪苓	澤瀉	茯苓	白朮
甘草 <small>一分</small>	官桂 <small>一分</small>	乾葛 <small>半兩</small>	杏仁 <small>一分</small>
右為細末每服一錢用新汲水調下不拘時服			
益中膏治小兒吐瀉胃虛嘔逆			
陳皮 <small>一兩</small>	丁香 <small>二錢</small>	訶子 <small>七</small>	肉豆蔻 <small>七</small>
甘草 <small>半兩</small>			

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九食前米湯化下			
人參散治小兒臟寒泄瀉			
人參	木香	白朮	茯苓
附子 <small>尖</small>	山藥 <small>一錢</small>	肉豆蔻 <small>一分</small>	甘草 <small>半錢</small>
右為末每服一錢用水同薑棗煎量兒小以意加減不拘時服			
訶子湯治小兒泄瀉			
訶子 <small>七</small>	人參 <small>去蘆</small>	白朮	白芍藥
木香	陳皮 <small>去白</small>	肉豆蔻 <small>半兩</small>	甘草 <small>半兩</small>
右為末每服二錢用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服久瀉手足厥冷加附子大小增減服之			
○咳嗽通治方			
橘紅	半夏 <small>姜製</small>	貝母 <small>各七</small>	紫蘇
甘草 <small>各三</small>	加桔梗黃芩各五分		
右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食後服			
瀉白散治小兒肺臟氣實心胃壅悶咳嗽煩喘大便不			
升麻	地骨皮	桔梗	瓜蒌仁 <small>各五</small>
半夏	桑皮	杏仁 <small>各七</small>	甘草 <small>三分</small>
右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食後服			
潤肺散治小兒咳嗽氣喘有痰			
人參	陳皮	杏仁	貝母
麻黃	阿膠	桔梗 <small>各七</small>	甘草 <small>三分</small>
右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食後服			
知母湯治小兒胸膈氣喘痰壅發熱咳嗽			
知母	貝母	滑石	麻黃

訶子 甘草各五分 羌活 苦苣藤各三分

大黃二分 小麥五分 右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食遠服一方有

薄荷無麻黃 補肺散治小兒肺氣不足咳嗽喘急

阿膠 牛勞子 杏仁各一分 馬兜鈴七分

甘草五分 糯米九分 右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

定喘膏蘇散治小兒咳嗽氣喘

飽麻子去殼膜 川芎 紫蘇各七分 粟殼五分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

百部焙 麻黃去節各半 杏仁四十箇去皮

右為細末煉蜜為丸如芡實大食後白湯化下一丸仲陽方加松子肉五十粒

撮口 麝香散治小兒撮口胎熱

麝香 丹砂各半 蛇蛻皮一分

右為細末每用一字唾調塗唇上

丹砂 麝香 牛黃各二分 半夏

丁香 白附子 鐵粉 天麻 南星各五分

右為細末煮粳米飲為丸如麻子大每服五丸用荊芥湯不拘時下

定命散治小兒撮口吐白沫

川烏尖三箇 麝香少許 赤足蜈蚣半條 酒炙乾

右為細末每服半字用金銀薄膏湯調服不拘時

五聖散治小兒口禁不開不收乳食

乾錫精七箇 膩粉一錢 乾蜘蛛一錢 去口足用新竹

右為細末每服一字乳汁調與服待灌之

瓜蒂散治小兒口噤 瓜蒂七枚 全蝎一枚 赤小豆十四粒

右為細末每服一字米飲湯調服以吐為度

五福化毒丹治小兒上焦有熱胎熱胎毒口舌生瘡

玄參一兩 桔梗八分 赤茯苓 人參 馬牙硝各五分 青黛 甘草各一分 麝香

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸用厚荊湯不拘時化服

時化服 錦灰散治小兒七日臍風發腫

錦帛燒灰 雄黃七枚 大棗去核 麝香少許

右為末搗棗肉為膏封臍上

白龍散治初生小兒臍風 天漿子一枚 蠶蚕直一枚 膩粉少許

右同為末每服一字用薄荷湯調服不拘時

一字金治初生小兒七日之外忽成臍風撮口牙關緊閉

蠶蚕四枚 歲靈仙去骨 明礬生用 甘草生用各一錢 細辛一錢

右為末每用半字 煎荊芥湯調塗兩牙關內

封解散治小兒臍瘡濕腫爛

既帶灰 亂髮灰 白薑灰 紅帛灰同煎

南星 白欬 當歸 赤小豆

五倍子五味 血竭 龍骨 赤石脂煨

海螺蛸 百草霜 胭脂同研

右各等分同拌勻再研極細每用一字如濕乾搽乾用清

油調塗臍上

白礬散治小兒臍瘡不乾

白礬枯 龍骨各半

右為末搽敷臍中

神效散治小兒風臍水臍腫爛

黃連 黃柏各一錢 輕粉二分半

白礬五分

右同為末以葱煎湯先洗淨然後用藥搽臍上日三四次

五福化毒丹頰服方見前

○胎驚胎風

至聖保命丹治小兒胎驚胎風內吊腹肚堅硬目睛上視手足

搐掣角弓反張涎痰壅盛一切急慢驚風並皆治之

全蝎十四 僵蚕直者 白附子 天南星炮

珠砂研 麝香研各 防風去芦 天麻錄二

蟬蛻去殼 金箔十片

右為細末以粳米燻飯取中心軟者攪和為丸每一兩作

四十九丸每服一九用金銀薄荷湯不拘時化下

全蝎餅治胎驚寧神定志

全蝎十四箇 去毒用 白僵蚕五錢 茯神

天花粉 苦梗去芦 天麻炮 遠志肉

羌活 甘草各三

右為末麪糊為丸如芡實大捏作餅子每服半餅用金銀

薄荷湯化下不拘時

奪命丹治急慢驚風胎風風瀉客忤物忤目睛斜視痰壅搐掣

等證並治

人參去芦 南星姜製 半夏炮 獨活

荆芥穗 遠志肉 川芎 酸棗仁炒

白附子炒 川白芷 桔梗 甘草

石菖蒲各五 白茯苓 白木 天麻炮

全蝎去毒 防風去芦 羌活 茯神

川烏炮去 礞石炒 細辛去葉 蟬蛻十四箇

辰砂 雄黃 犀角各一 金箔二

銀箔三十片

右同為細末以至生薑汁打麪糊和丸如芡實大以硃砂

為衣每服半丸或一九用金銀薄荷湯化下不拘時

○客忤

麝香湯治小兒客忤卒痛及氣滿腹痛

半夏 黃芪各一 乾薑炮 甘草

肉桂錄五 麝香

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分不拘時服

犀角散治小兒客忤驚喘吐熱

犀角 麥門冬 鈎藤 丹砂各半

牛黃半分 麝香火許

右同為細末每服半錢用薄荷湯調服不拘時

椎鹿散治小兒客忤物忤

椎黃一錢 麝香一字 乳香半錢

右為未每服半錢用刺鷄冠血無時調服

○多啼

猪苓湯治小兒邪熱面赤多啼小便不利

猪苓去灰 澤瀉二兩 白朮半兩 赤茯苓二兩

一方 甘草五分

右同為 禾每服一錢用車前子生地黃麥門冬同煎湯

不拘時調服

金箔鎮心丸安神鎮心退熱

山藥半兩 珠砂一兩 馬牙硝一分 紫河車黑豆水煮

甘草 人參 茯苓各五 麝香

片腦一錢 金箔十片

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸或一丸用薄煎

湯化下不拘時

烏梅散治腹疼及臍下冷痛狀如盤腸內吊疝氣多啼等疾

烏梅和核 玄胡索 甘草各五 乳香

沒藥 鈎藤各二 茶黃一錢

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分不拘時服

白芍藥湯治小兒胃寒腹痛至夜多啼

白芍藥一兩 澤瀉七錢 白朮五錢 桂心二錢

當歸半錢 乾薑二錢 甘草三錢

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分空心服

寧心膏治小兒驚悸不寧心經有熱多啼安神定志

人參 白朮 茯苓 茯神

山藥 羌活 甘草各一 珠砂二兩

斤腦一錢 麝香少許 金箔二十片

石為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸用薄煎湯無鹽

化下

三鮮散治小兒心經有執面目赤狂躁氣急驚厥

人參 防風 天麻 茯神

大黃煨 礬石 白附子各二 赤芍藥

黃芩 僵蚕各三 枳殼二 全蝎尾十五箇

粉草六

右同為細末每服一錢用薄煎湯調服不拘時

○驚悸

金箔鎮心丸治小兒驚悸睡卧不寧心經恍惚皆治之方見前

辰砂一 牛膽南星一 琥珀 青礬石末各一

天竺黃二 甘草五分 麝香少許

石為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸用生薑湯不拘

時化服

木通散治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利散熱

羌活 山梔子各二 大黃煨 木通

赤茯苓 甘草各一

右剉碎每服二錢入紫蘇葉少用水一盞煎至五分不

拘時服

○急驚

人參羌活散治小兒九染驚搐多因感冒蓋失表散致熱極生

風先以解表退熱方見前

木通散治小兒急驚初發宜與此藥通其心氣祛除風邪

木通 石菖蒲 防風 枳殼

全蝎少 僵蚕少 木香 甘草

天南星各等分

右劉碎每服二錢用水一盞煎至五分生薑三片同煎
可不拘時服

太乙金丹治小兒急慢驚風胎驚天吊等證

全蝎四十分 防風 白附子炮 僵蚕炒

天麻 珠砂 牛膽南星 天竺黃各一

蟬蛻五分 麝香二分 牛黃一分 天授子一分

乾蟾一枚 炙赤脚蜈蚣一條 香上開一略入麝香一分

右為細末煉蜜為丸如芡實大用金箔為衣每服半丸用金

銀薄奇湯不拘時化服

全蝎散治小兒急驚風

全蝎 僵蚕炒 川芎 黃苓

南星炮 天麻 甘草 赤芍藥

桂皮 麻黃各等分

右劉碎每服二錢用水一盞生薑三片煎至五分不拘時

候服

○慢驚

觀音金翳散治小兒外感風寒內傷脾胃致吐瀉不止遂成慢

驚等證

全蝎二箇 天麻炮 防風去芦 羌活各半

川白芷 甘草炙 扁豆姜製 黃芪蜜炙

砂仁 赤茯苓各五

右同為末每服一錢用冬瓜仁煎湯不拘時調服

吉州醒脾散治小兒慢驚神昏目慢多困有痰

人參 白木 木香 白茯苓

白附子 天麻 全蝎炒 僵蚕去絲

右劉碎每服一錢水一盞生薑三片煎一技煎至五分

拘時服

○急慢驚風

抱龍丸治小兒痰熱咳喘驚風

方見驚熱類

太乙保生丹治小兒急慢驚風痰熱喘嗽

全蝎 白附子炮 僵蚕炒 牛膽南星

蟬蛻 琥珀 防風各二 珠砂一錢

麝香五分

右為細末粟米糊為丸如芡實大每服一丸用薄奇湯不

拘時磨化服

保安散治小兒急慢驚風及諸瀉痰涎壅盛

川烏尖 生附子五分 薑砂 花蛇肉各一錢

輕粉 麝香 片腦各一分 蝎梢一分 去毒

赤脚蜈蚣一條 炙

右為細末每服半錢用薄奇生薑湯不拘時調服

○慢脾

大醒脾散治慢脾風內虛昏悶不省

人參 茯苓 木香炮 全蝎炒

南星炮 白木 陳皮 石蓮肉

甘草炙 丁香 砂仁 白附子各一分

陳米一盞

右劉碎每服二錢用水一盞生薑三片煎一技煎至五分

不拘時服量兒大小加減與服

實脾散治脾胃虛冷吐瀉不止乳食不進慢脾等證

人參 白茯苓 白木 砂仁

麥芽 神麩 陳皮 石蓮肉

乾山藥	良姜 <small>炒</small>	青皮	冬瓜仁 <small>炒</small>
丁香	木香	薏苡仁 <small>炒</small>	扁豆 <small>炒</small>
香附子 <small>炒</small>	甘草 <small>炙</small>	陳米 <small>炒</small>	肉豆蔻 <small>炒</small>
右為細末每服半錢或一錢用米湯不拘時調服			
固真湯治小兒吐瀉後脾胃虛弱遂傳慢風不省人事			
人參	白茯苓	白朮	附子 <small>炮製去毒</small>
乾山藥	黃芪 <small>炙</small>	肉桂	甘草 <small>炙</small>
右剉碎每服二錢水一盞生薑三片紅棗一枚煎至五分不拘時服			
○驚風			
擄鼻開閉藥擄鼻而嚏者可醫不嚏者難治			
皂角 <small>炙</small>	北細辛	南星 <small>生用</small>	半夏 <small>生用</small>
加入麝香 <small>一分</small>			
右同為極細末每用少許以竹管盛吹入鼻孔牙關緊			
用烏梅煎濃汁調和藥末擦入兩牙關內			
天麻防風丸治一切驚風吐熱痰涎壅盛			
天麻 <small>煨</small>	防風	人參 <small>各一</small>	牛黃 <small>一分</small>
硃砂	雄黃	麝香 <small>各二分</small>	僵蚕 <small>炒去</small>
全蝎 <small>去毒</small>			
右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸用薄荷湯不拘時化服			
防風湯治驚風熱不退時復手足搐搦心神不寧			
防風	川芎	白芷	黃芩
細辛	薄荷	茯苓	甘草 <small>各一分</small>
右同為細末每服一末用白湯不拘時調服			
○口喎并失音			

硃砂丸治小兒口眼喎斜筋脈牽引	硃砂 <small>五分</small>	全蝎 <small>炒</small>	天麻	白附子 <small>炮</small>
右剉碎每服二錢水一盞生薑三片煎至五分不拘時服				
特化服				
全蝎散治小兒口眼喎斜語言不清	全蝎 <small>炒</small>	川芎	黃芩	僵蚕 <small>炒去</small>
赤芍藥	甘草	硃砂	南星 <small>湯泡去</small>	
天麻 <small>各三分</small>				
右為細末每服一錢用生薑湯不拘時調服				
寬氣飲治小兒風痰壅滯風傷於氣不能言語				
枳殼 <small>去</small>	人參 <small>去</small>	天麻	僵蚕 <small>炒去</small>	
羌活	甘草 <small>各一分</small>			
右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片煎至五分不拘時服				
木通湯治小兒血滯於心心緩不通語言不出				
木通	石菖蒲 <small>多用</small>	防風	枳殼	
全蝎 <small>焙</small>	僵蚕 <small>炒</small>	甘草	木香	
南星 <small>炮各等分</small>				
右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片煎至五分不拘時服				
○拘攣				
續命湯治小兒手足拘攣不能屈伸				
麻黃	人參	黃芩	川芎	
芍藥	甘草 <small>炙</small>	防風	杏仁 <small>去</small>	
官桂 <small>去</small>	防己	附子 <small>炮製去毒</small>		
右剉碎每服二錢水一盞生薑三片煎至五分不拘時服				

走風散治小兒感冒發熱手足拘攣宜服此藥

人參 茯苓 防風 川芎
柴胡 羌活 枳殼 桔梗

甘草 各等分

右剉碎每服二錢水一鍾生姜三片煎五分不拘時服

薏苡仁丸治小兒手足不能展用

薏苡仁 湯洗 常服 防風 牡丹皮

羌活 酸棗仁 去皮 各

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九用荆芥湯不拘時化下

時化下

海桐皮散治小兒脚攣不能伸

海桐皮 當歸 牡丹皮 熟地黃

牛膝 各一兩 山茱萸 補骨脂 各五兩

右剉碎每服二錢水一盞葱白二寸煎至五分不拘時服

○驚積

香砂保安丸治小兒乳食停滯胃膈不寬肚腹膨脹脾疳驚積

積聚並皆治之

香附子 砂仁 白朮 神曲

麥芽 糖棗 益智 陳皮 各半

甘草 木香 瀝榔 火均子 各五兩

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九米湯空心化下

三稜散治小兒飲食停滯肚腹脹滿驚積食積發熱等證

三稜 香附子 人參 青皮

陳皮 半夏 枳殼 益智仁

神曲 麥芽 蓬朮 大黃 各半

紫蘇 茯苓 甘草 各

右剉碎每服二錢用水一盞生姜三片煎至五分不拘時服

○解頤

補腎地黃丸治小兒稟賦不足腎氣虛弱骨髓不充頤縫不合

體瘦力弱

熟地黃 酒浸 川牛膝 酒浸 鹿茸 蜜塗 山茱萸 酒浸 蒸透

乾山藥 各五兩 牡丹皮 洗淨 白茯苓 各三兩 澤瀉 二兩

右為末煉蜜為丸如麻子大每服十五丸或二十九丸空心用鹽湯或溫酒任下

調元散治小兒稟受元氣不足頤頤間解

乾山藥 五兩 人參 去芦 白朮 白芍藥

白茯苓 茯苓 當歸 熟地黃

黃芪 各半 甘草 各 川芎 各二兩

右剉碎每服二錢用水一鍾生姜三片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

栢仁散治小兒頤頤不合

防風 栢子仁 白芨 二兩

右為細末每用一字用乳汁調塗頤上

桂心散治小兒頤頤不合

桂心 細辛 各五兩 乾姜 二兩

右為細末每用一字或半錢用乳汁調敷頤上

參芪當歸散治小兒臟腑虛弱氣血不榮以致頤頤

人參 黃芪 當歸 白朮

訶子 磁石 甘草 各

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分不拘時服

○寒熱

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分不拘時服

○寒熱

人參前胡散治小兒感冒寒熱往來

人參 前胡 紫胡各一 桔梗

半夏 甘草 地骨皮各五

右劉碎每服二錢水一盞生姜三片煎至五分不拘時服

秦元湯治小兒陰陽相勝寒熱往來

秦元 醫甲 醋炙 竹茹 二升 大黃 糞

麻黃 去節 甘草 柴胡 各五 檳榔 三升

右劉碎每服二錢水一盞煎至五分不拘時服

二姜丸治小兒寒熱與霍相似

乾姜 良姜 各等分

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三五丸用白湯空心

化下

○譟語

寧心膏見多啼類

寧眠膏治小兒驚熱心神恍惚譟語睡臥不穩

甜消 人參 殊砂 各一 茯苓

山藥 甘草 寒水石 各五

右為末煉蜜為丸如芡實大每服一丸薄苜湯下不拘時

小柴胡湯治小兒傷寒胃風身熱胸滿脇脹

柴胡 黃芩 半夏 人參

甘草 各一 升

右劉碎每服三錢水一盞生姜三片煎至五分不拘時服

大柴胡湯治小兒風熱腹脹及裏證未解譟言妄語疎利大便

柴胡 枳實 黃芩 去蘆 赤芍 藥 各一 大黃

半夏 洗 各七 枳實 七升 甘草 一兩

右劉碎每服三錢用水一盞生姜三片紅棗一枚煎至五

分不拘時服

○口瘡

一絲散治小兒口瘡

青黛 黃柏 訶子 各

加入枯白礬少許 蒲黃少許

右每用少許貼口瘡處

五福化毒丹 方見口瘡類

明砂散治小兒口舌生瘡咽喉不利重舌馬牙

明砂 蒲黃 淨消 孩兒茶

薄荷 甘草 各二 青黛 一升 片腦 少許

右為末每用少許付點口中瘡處

○齒斷

鎮驚丸治小兒驚風咬牙心神不安

辰砂 鐵粉 京墨 各一 片腦

麝香 各一

右為末麵糊丸如梧桐子大每服三四丸用荆芥湯不糊

時服

蟬花散治小兒驚風咬牙

蟬花 和散 僵蚕 法炒 甘草 玄胡索 各等

右為細末每服半錢用蟬殼湯不拘時調服

五疳通治方

散風丹治小兒風疳先用此藥

牛膽南星 紅羌活 獨活 防風

天麻 人參 川芎 荆芥 穗

細辛 各一 升

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二丸用薄荷紫蘇湯

不拘時送下

保安丸治小兒諸風癩久後亦驗

五靈脂半斤川烏生用去皮

右為末猪心血為丸如梧桐子大每服一九用生薑湯化

下不拘時服

獨活湯治小兒風癩解表通裏

獨活去節麻黃去節川芎各一大黃

甘草炒各

右劉碎每服二寸用水一鍾生薑二片煎至四分不拘時

溫服

細辛大黃湯治小兒風癩內熱

天麻各半防風各半細辛各半大黃各半

川芎各半甘草各半

右劉碎每服二寸入犀角少許用水一鍾煎至四分不拘

時服

牛黃丸治小兒風癩迷悶抽掣涎潮

牛黃各半全蝎去毒蟬殼各半防風各半

白附子生直僵蚕炒去絲天麻

麝香半寸

右為末以煮棗去皮核取肉和水及半寸研極細次入藥

末和丸如棗豆大每服三五丸用荆芥生薑煎湯送下不

拘時服

○驚癇

此金膏治小兒驚癇

人參各半琥珀各半白茯苓各半遠志肉各半

天麻各半川芎各半石菖蒲各半

南星煨青黛一

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五丸煎金及薄荷

湯磨化不拘時服

鎖驚丸治小兒一切驚癇

茯神去木鐵粉各半遠志去心紫石英煨研

人參各半琥珀各半滑石各半蛇黃煨研

南星炮各半龍齒各半熊膽各半輕粉三分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五丸

煎金及湯磨化不拘時服

虎睛丸治小兒驚癇邪氣入心

虎睛細研遠志去心犀角鎔大黃煨研

石菖蒲各半麥門冬去心

右為細末粟米粉打糊為丸如梧桐子大每服五七丸竹

葉煎湯磨化或金及煎湯亦可不拘時服

七寶鎮心丸治小兒驚癇心熱

遠志去心雄黃各半鐵粉各半琥珀各半

珠砂一金及箔四片麝香少許

右為細末煮棗取肉為丸如梧桐子大每服三五丸煎去

心麥門冬湯化下不拘時服

清神散治小兒驚癇

犀角各半白麝皮各半石菖蒲各半遠志去心

半夏各半茯神各半大黃各半人參各半

甘草各半

右為末每服半寸煎去心麥門冬湯化不拘時服

妙聖丹治小兒食積通利

雄黃各半噎稍各半珠砂各半代赭石煨研

輕粉	麝香各二	巴豆三箇 <small>去尖</small>	杏仁六 <small>尖</small>	右為末蒸棗肉為丸如梧桐子大每服三五丸木香煎湯磨化不拘時服
天麻丸治小兒食瀾有痰	南星炮二	白附子炮	天麻	牙硝
川靈脂	全蝎 <small>焙各</small>	輕粉半 <small>末</small>	巴豆霜 <small>去脚</small>	右為末稀麵糊為丸如麻子大每服十九用薄荷煎湯或薑湯送下亦可不拘時服
牛黃清心丸治小兒躁悶項背強直腰背反張時發時醒	牛黃 <small>一分</small>	麝香 <small>一分</small>	龍腦 <small>另研</small>	羚羊角末 <small>一錢</small>
當歸去蘆	防風去蘆	黃芩	麥門冬 <small>去心</small>	白芍藥
白芍藥	白朮 <small>各一</small>	柴胡 <small>去苗</small>	杏仁 <small>去皮尖</small>	桔梗
肉桂 <small>去粗</small>	大豆卷 <small>各一</small>	甘草 <small>炒</small>	雄黃 <small>八分</small>	白欬
人參 <small>去蘆</small>	神曲 <small>炒</small>	雄黃 <small>八分</small>	犀角末 <small>二</small>	乾山藥 <small>十</small>
右除棗杏仁及牛黃麝香雄黃龍腦四味另為細末入煎藥和勻煉蜜與棗膏為丸每兩作十九用金箔為衣每服一丸溫白湯化下食後服小兒驚癇即酌度多少以竹筆煎湯溫化服	蛇黃丸治小兒諸癩	蛇黃 <small>一</small>	雄黃 <small>各二</small>	青礬石
右為末稀麵糊為丸如梧桐子大每服三五丸人參煎湯磨化不拘時服	蛇黃丸治小兒諸癩	蛇黃 <small>一</small>	雄黃 <small>各二</small>	鐵粉 <small>各一</small>

斷癩丸治小兒諸癩瘰癧	皂角 <small>尺者三</small>	雄黃 <small>另研</small>	珠砂 <small>另研</small>	右為末每服一錢或二錢用水八分鐘煎至四分不拘時服
代赭石散治小兒陰陽疳通用	代赭石 <small>各一</small>	川芎 <small>各二</small>	赤芍藥 <small>各三</small>	右為末每服半錢以金銀器煎湯或和金箔銀箔在內同調不拘時服食小兒脚脛上自有赤斑即邪氣發出其病隨瘥若無赤斑則難治也
地龍散治小兒諸癩發歇無時	地龍 <small>兩</small>	虎睛 <small>一對</small>	人參 <small>半</small>	乾地龍 <small>兩</small>
天竺黃	珠砂	代赭石 <small>各一</small>	金銀箔 <small>三十</small>	雄黃 <small>半</small>
右為末每服半錢紫蘇湯調不拘時服	赤脚蜈蚣 <small>一</small>	烏蛇肉 <small>兩</small>	白附子 <small>生</small>	大南星 <small>末</small>
定癩丸治小兒五癩	白附子 <small>生</small>	烏蛇肉 <small>兩</small>	大南星 <small>末</small>	白礬 <small>新</small>
右為末稀麵糊為丸如梧桐子大每服二三九	白礬 <small>新</small>	烏蛇肉 <small>兩</small>	大南星 <small>末</small>	白礬 <small>新</small>

下不拘時服量大小加減

又方治與土

黃連

黃土各等

右為細末麵糊為丸如菜豆大三歲兒二十九煎黑豆湯

下米飲湯亦可不拘時服

○項軟

天柱丸治小兒風熱氣血不和頸軟頭不得正或前或後或左

或右

蛇含石用醋中七次

川爵金末少許

右並碾細末入乳鉢內再研極細入麝香少許和勻用煮

大米飯搗爛為丸如圓眼大每服一丸用荊芥湯化服又

入生姜汁一二滴或金銀薄荷湯亦可不拘時服

五加皮散治小兒頸軟

五加皮不拘多少

右為末酒調塗傳頸骨上

捷骨散治小兒久患疳疾體虛不食及諸病後天柱骨倒謂之

○五軟

白蠟不拘多少

右為細末三歲每服半錢薄荷酒調下

生筋散治小兒證如前

木鱉子去殼

單麻子去殼

右為細末先抱起頭顱摩頸上令熱先用生山藥搗汁和

藥二味調貼之

吐血

鵬砂散治小兒喉閉生瘡風痰熱毒鼻衄吐血

山藥去殼

鵬子去殼

甘草二兩

牙硝二兩

鵬砂二兩生麝香四兩另研

右為末每服三分或五分量兒大小加減用茶清湯食後

調服

三黃丸治小兒積熱吐血咽膈不利

黃連去頭

黃芩去腐

大黃煨各

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九熱水下如臟

腑壅實加服丸數小兒積熱亦宜服之量大小加減

茯苓補心湯治小兒心虛為邪氣所傷有熱吐血

陳皮去白

桔梗去毒

甘草炙

枳殼去穢

木香各五

紫蘇葉

茯苓去皮

半夏湯洗

乾葛

前胡去蘆

人參去蘆

當歸去蘆

川芎

芍藥

熟地黃各五

右作一服水一盞半生薑三片紅棗一枚煎至六分不拘

時服

天門冬丸治小兒吐血咯血大能潤肺止咳

天門冬一兩

甘草

阿膠

白茯苓

貝母

杏仁炒另研

右為細末入杏仁和勻煉蜜丸如梧桐子大每服一丸噙

化日夜可噙

是齊白木散治小兒積熱吐血咳血若因飲食過度負重傷胃

吐血者最宜服之

白木二兩

人參去蘆

白茯苓去皮

黃芩炙各

柴胡二兩

山藥

百合去心

甘草半兩

煎胡去蘆

右剉碎每服五錢水一鍾生薑三片紅棗一枚煎至五分

食後服

藕汁飲治小兒吐血不止

生藕汁 生地黃汁 大蘗汁各三 生蜜半匙

右件藥汁調和令勻每服一小匙不拘時服

四生丸治小兒吐血衄血腸乘於陰血熱妄行

生荷葉 生艾葉 生栢葉 生地黃各等

右爛研丸如圓眼大每服一九水一盞煎至四分不拘時服

千金龍膽湯治小兒出腹血脈盛實寒熱温壯四肢驚掣發熱

吐呢者若已曾進乳哺中實食不消壯熱及變蒸不解中

客忤鬼氣并諸驚癇悉主之

尤膽 鈞藤 柴胡 黃芩

桔梗 芍藥 茯苓 甘草 各二

燒蝦 二枚 大黃 一兩 煎

右劉碎每服三錢水一盞生姜二片煎至五分不拘時服

便血

槐角丸治小兒五種腸風下血脫肛

槐角 兩 地榆 黃芩 當歸 去芦 酒浸

防風 去芦 枳殼 半兩

右為細末酒糊為丸如菉豆大每服二十九米飲湯送下

食乳前服

槐花散治小兒腸風臟毒下血

槐花 芍 栢葉 荊芥穗 枳殼 各半

右為細末每服一錢空心米飲湯調服

槐角散治小兒腸胃不調脹滿下血

蒼朮 厚朴 陳皮 當歸

枳殼 兩 槐角 二兩 甘草 烏梅 各半

右劉碎每服五錢水一盞煎至五分不拘時服

烏梅丸治小兒大便下血不止

烏梅 三兩 連 枳殼 各半

右為末用醋打米粉糊為丸如菉豆大每服三十 空心

米湯送下

黃連散治小兒腸風下血疼痛不止

黃連 鷄冠花 貫衆 大黃

烏梅 兩 甘草 半

右為細末每服一錢用温米飲調不拘時服

黃連貫衆散治下血

黃連 貫衆 大黃 雞冠花

烏梅 兩 甘草 二 枳殼 荊芥 各五

右為細末每服一錢用温米飲湯調食前服

○秘結

牛黃散治小兒上焦熱臟腑秘結

大黃 一兩 白牽牛頭末 五錢

右為細末每服一錢有厥冷用温酒調下無厥冷而手足

煩者蜜湯調下不拘時服

郁李仁丸治小兒極極大小便不通并驚熱痰實

郁李仁 一兩 川大黃 一兩 去蘗皮 實者 碎

滑石 十兩

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲服

二三十丸更量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前服

犀角丸治小兒風熱痰實面赤大小便秘三焦邪熱臟腑蘊

毒疎導極穩

生犀角 一錢 人參 半兩 黃連 枳實 各一兩

大黃 二兩 酒浸 切 林大 片 用 巴 豆 內 一 粒 貼 在 大 黃 上

右各味同為細末煉蜜為丸如麻子大每服一二十丸
服熱水下末動再服

沒藥散治小兒風與滯血留蓄上焦胸膈高起大便不通

沒藥 大黃 枳殼 桔梗 各二

木香 甘草 各一

右剉碎每服三錢生薑二片水一盞煎至五分不拘時服

○諸淋

道赤散治小兒心虛熱小便赤澀或成淋痛

生乾地黃 木通 甘草 各一

右剉碎每服三錢水一盞竹葉十片煎至六分不拘時服

五淋散治小兒腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿

如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之

赤茯苓 赤芍藥 當歸 甘草 各二

右剉碎每服三錢水一盞煎至六分空心服

八正散治小兒心經熱臟腑秘結小便赤澀癃閉不通及熱

淋血淋並皆治之

車前子 瞿麥 菡萏 滑石

甘草 山梔子仁 木通 大黃 各一

右剉碎每服五錢水一盞燈心七根煎至七分食前服

清心蓮子飲治小兒上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱

小便赤澀或欲成淋並宜服之

黃芩 黃耆 白茯苓 石蓮肉 各二

人參 車前子 甘草 麥門冬 各一

地骨皮 各半

右剉碎每服五錢水一盞煎至六分食前服如發熱如柴

胡薄荷

五苓散治小兒伏熱小便赤痛如淋

澤瀉 白朮 茯苓 赤茯苓 白朮 各一

內桂 各半

右為細末每服一錢用燈心湯調不拘時服

○蟲動

靈藥散治小兒虫咬心痛欲絕

五靈脂末 白礬 各半

石同為末每服二錢水一盞煎至五分不拘時服當吐虫

出愈

史均子丸治小兒臟腑虛滑及疳瘦下痢腹脇脹滿不思乳食

若常服安虫補胃消疳肥肌

厚朴 史均子 訶子 各一

陳皮 甘草 各二

青黛 右為細末煉蜜和丸如小雞頭大每服一丸米飲化下或

乳汁化下亦可不拘時服

○癰癤瘡

湯蘆湯治小兒癰疽發背及一切熱毒成瘡赤腫

湯蘆 黃芩 白朮 麻黃 各一

大黃 白薇 粉草 枳殼 各一

芍藥 升麻 各二

右剉碎每服四錢水一盞煎至六分空心服

忍冬散治小兒渴疾既愈預防發癰疽之患

忍冬草 甘草 大黃 各一

右為末每服三錢水一盞煎至七分調乳香末些少不拘

時服

○瘡疥

加味羌活散治小兒四氣外痔肌膚發為癩疥增突發熱身痒

羌活

前胡

入參

桔梗

茯苓

甘草

川芎

枳殼

天麻

蟬蛻

薄荷

右劉碎每服三錢水一盞生薑三片煎至六分不拘時服

當歸飲子治小兒心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或

腫或痒或膿水浸淫

當歸

赤芍藥

川芎

生地黃

葵藜

荆芥穗

防風

何首烏

黃耆

甘草

右劉碎每服四錢水一盞生薑三片煎至六分不拘時服

丹毒

麻黃湯治小兒惡毒丹毒及風疹

麻黃

升麻

葛根

射干

雞舌香

甘草

石膏

右劉碎每服四錢用水一鐘煎至六分不拘時服

漏湯方治小兒數腫丹

當歸

大黃

甘草

芎藭

白芷

濁活

黃芩

赤芍藥

升麻

沉香

木香

木蘭皮

芒硝

右劉碎以水一斗二升煮取四升去滓內芒硝在內試其

冷熱以絹帛揭在患處

敗毒散治小兒瘡毒初發遊走遍體燥悶腹脹啼哭

桔梗

天花粉

乾葛

川升麻

川芎

赤芍藥

獨活

柴胡

甘草

右劉碎每服四錢水一盞生薑二片煎至六分不拘時服

○癰疹

地龍散治小兒風熱癰疹狀如傷寒耳尖及手足冷

地龍

穿山甲

硃砂

右前二味為細末後入硃砂一釐再研和勻每服一錢用

紫草煎湯調不拘時服量兒大小加減

消毒飲治小兒頭疼發熱癰疹如粟米狀

牛蒡子

荆芥

甘草

右為末每服三錢水一盞煎至六分不拘時服

清涼飲子治小兒癰疹大便結燥

大黃

當歸

赤芍藥

甘草

右劉碎每服三錢水一盞薄荷三五葉煎至七分食遠服

○湯火

治湯火所傷方

用黃蜀葵花浸油內以油敷患處或收黃蜀葵花晒乾碾

末香油調敷亦可

又方

右用定粉碾極細末臘月猪脂調敷患處

又方

右用單麻子內碾爛入蛤粉等分如乾再入香油以火調

搽患處

○鯁骨

治魚鯁骨鯁用貫衆為末并花水調令濃大呷一口慢上嚥下

又方

以野苧根淨洗搗爛每用如圓眼大如被雞骨所齧以雞黃化下魚骨則以魚汁化下

又方

以南鵬砂不拘多少噙化其骨脫然而下

又方

以懶瓜於咽喉下邊此患處効

獸骨

以象牙梳或牙笏或器皿磨水嚥下効

○中毒

食牛羊馬肉毒

又以蘆根煮汁頻服有効

治瘧毒

用生甘草為末白礬末各一兩不拘時用冷水調下一錢

即吐喉痺及嶺南啞瘡

○吐逆噦逆

香薷湯治小兒陰陽不順清濁相干中暑霍亂吐逆體熱煩燥

昏冒多渴

香薷 厚朴去皮 黃連用姜汁拌炒

右剉碎每服五錢用水一鍾酒少許煎至五分去粗水中

類合乳母同服一方入白扁豆炒等分

王氏半夏散治中暑伏熱生痰嘔吐

半夏 赤茯苓去皮 甘草炙 陳粳米五十粒

右剉碎作一服水一鍾倍加生姜煎至五分不拘時服

湯氏玉露散治小兒中暑昏迷煩渴不止心燥體熱頭疼

石膏煨用 寒水石煨 甘草炙 五錢

右為末每服一錢用白湯調入生姜汁七少不拘時服暑熱涼水調服亦可

竹茹湯治小兒胃熱嘔吐

青竹茹如許 半夏湯洗 陳皮七錢 瘦米九分 乾葛一錢

右剉碎作一服水一鍾生薑三片煎至五分量兒大小加

減與服亦治傷寒後嘔吐

附子理中湯治小兒寒證嘔吐不止防傳慢驚

人參去芦 白朮去皮 乾姜炮 附子炮去皮

甘草炙

右剉碎作一服水一鍾煎至五分不拘時服一方加木香

不換金正氣散治小兒感寒熱嘔吐

藿香去土 厚朴去皮 甘草炙 半夏湯洗

蒼朮去皮 陳皮各一錢

右剉碎作一服水一鍾生薑三片煎至五分食後

溫服

益胃散快膈益脾止嘔進食

木香 丁香 藿香 陳皮

縮石 白豆蔻各二錢 甘草炙

右為細末每服一錢用薑棗煎湯調服一方加茯苓

醃乳法治小兒冷氣入胃嘔吐及慢驚膽多驚啼及頭面黃脈

細者難治

人參 木香 藿香 沉香

神麩 麥蘖 陳皮各等 丁香減半

右剉碎每服五錢用水一鍾生薑五片紫蘇十葉紅棗三

枚砂糖內煮至半鍾令乳母服後檢去乳汁即仰臥雲時

令藥入乳絡令兒喫效口不過飽乃良法也嘔定令兒服

木方八仙散吉州醒脾散

○吐瀉泄瀉

五苓散治小兒霍亂吐瀉煩渴飲水小便不利

澤瀉二兩

猪苓去皮

白茯苓

白朮各半

官桂去皮

右為末每服一錢溫湯調不拘時服如渴燥煎水調下

調中丸又名理中丸

治小兒脾胃虛冷

人參去

白朮

甘草半兩

乾薑四錢

右為細末煉蜜丸如菉豆大每服二十九食前溫水送下

或作芡實大米湯化亦可

香橘餅子治傷食聚瀉

木香炮

青皮去白

陳皮去白各半厚朴製七

神麩炒

麥蘗炒

右為末煉蜜丸作餅用淡生薑湯化不拘時服

調中散治小兒傷食泄瀉

人參去

白茯苓

白朮

乾薑炮

藿香葉

香附子炒去毛

甘草三錢

縮砂仁二錢

木香炮

丁香炒半

右為細末每服一錢用姜棗煎湯調服不拘時服量兒大小加減或作煎劑亦可

小加減或作煎劑亦可

保安丸治小兒瀉瀉傷食瀉

香附子炒

砂仁各一

白姜

青皮

陳皮

三稜炮

蓬朮炮

甘草各五錢

右為細末麥蘗末打糊為丸如菉豆大每服二二十九

淡姜湯下食前服

沈香煎丸治積積疳積食積乳積中脘不和痞氣鬱結或

瀉痢嘔瀉肚腹疼痛傷食泄瀉等證並皆治之

乳香

沉香

杏仁炒

木香

丁香各一

百草霜二錢

肉豆蔻

巴豆

右為細末煨黃芩入酒些少和為丸如菉豆大每服三五

丸姜湯送下兼治肚痛不止以通為度

○滯痢

胃風湯治小兒風冷乘虛客于腸胃水穀不化泄瀉腹脹虛瀉

腸鳴疝痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血等證

方見痢疾頭類

黃連阿膠丸治冷熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口燥

煩渴小便不利

黃連三兩

阿膠半兩

茯苓去皮

右各為末水煎阿膠搜和丸如菉豆大每服二二十九

空心溫米飲送下

倉廩湯治小兒下痢赤白或因寒邪中臟肝致發熱者

紫胡去

前胡去

人參去

茯苓去

羌活去

獨活去

枳殼去

桔梗去

川芎

甘草

陳倉米

右剉碎每服五錢水一鍾生薑三片紅棗二枚煎至五分

不拘時服

真人養臟湯治小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急

後重臍腹疼痛脫肛墜下熱毒便血並皆治之

罌粟殼去

人參去

當歸去

白朮

肉桂去

訶子去

木香不見火

肉豆蔻

白朮

白芍藥

甘草

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食前服如臟寒者加

附子煎服

駐車九治小兒一切下痢無問冷熱

阿膠補心成味為末一黃連去腥當歸去苦乾薑去毒

乾薑兩

右為末以阿膠膏為丸如菽豆大每服二三十九食前用

米飲送下

導氣湯治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥一兩當歸五錢大黃黃芩各二

黃連木香檳榔各一

右到碎每服五錢水一鍾煎至五分食前服

神効參香散治小兒臟氣虛怯冷熱不調積而成痢或下鮮血

或如豆汁或如魚腦或下紫黑血或赤白相雜裏

急後重日夜頻併無問新舊並皆治之

白扁豆人參去苦木香各一白茯苓去皮

肉豆蔻煨各陳皮去白粟殼去殼

右為細末每服一二錢不拘時用米飲湯調服

聖効散治久痢

赤石脂煨白龍骨阿膠各一兩呵子肉炮去

木香炮黃連炮乾姜炮甘草半兩

右為細末每服一二錢煎粟米飲湯調空心服

厚腸丸治血痢脫肛

川練子去核黃連炒木香炮阿膠煨

當歸酒洗吳茱萸炒黃連炒

右為細末粟米飯為丸如黍米大每服二三十九食前米

湯送下

感應丸治小兒停積宿食冷物不能消化有傷脾胃或泄瀉臭

如抱藥維子或下痢膿血服此通利

百草霜用村家烟底上杏仁去皮尖要肥者

巴豆去心膜取肉肉豆蔻去皮川乾薑炮

南木香去毒丁香七

右除巴豆百草霜杏仁三味外餘四味并為細末與前三

味同并研令細用蠟質先將蠟三兩溶化作汁以重綿濾

去滓更以好酒半升於銀石器內溶蠟讓數沸傾出候酒

令其蠟自浮於上取蠟料用丸春夏脩合用清油半兩秋

冬用清油七錢半於銚內熬令香熟次下酒煮蠟工兩同

化作汁就鍋內裏熱拌和前項藥末成劑分作小錠子以

油車紙裹之旋丸如菽豆大每服三五九空心薑湯送下

消食丸又名消乳丸治積滯化乳食

砂仁橘皮京三稜炒蓬莪朮炒

神麩炒麥蘖炒甘草半兩香附子炒

右為細末湯浸蒸餅為丸如麻子大每服三十九食遠白

湯送下量兒大小加減

水香丸治乳積食積氣積

木香蓬朮砂仁青皮

珠珀細研代赭石煨研大丁香一錢

巴豆肉油去右為細末和勻飛白麵糊丸如麻子大風乾每服三五丸

至十丸乳傷乳汁下食傷米飲下不拘時

七聖丸治小兒宿食不消肚腹飽悶

京三稜蓬莪朮川練子煨取青皮去核

陳皮去白杏仁去皮芫花先用醋浸一宿炒乾

右為細末入醋入水調服

湯送下

右前件為細末另入杏仁細研一盞醋糊丸如黍米大每服三五十九臨睡熱水送下使日間所食之物一夜而消化求無痔疾之證一方用巴豆十粒同杏仁研有癖積者可用當服只用杏仁七聖丸也

石蓮肉一兩 蓬莪朮 益智仁 京三棱

甘草三 青皮去穢 陳皮去穢 厚朴姜汁炒

右劉碎每服五錢水一鍾生薑三片棗一枚鹽少許煎至五分不拘時服作未淡鹽湯調服亦可

縮砂香附湯治小兒噎宿腐氣心腹膨脹或時冷痛

香附子炒去毛 烏藥半斤 縮砂去皮

右為細末每服一錢紫蘇三葉鹽少許煎沸湯調下不拘

時服如大便秘搗麥湯調服又名寬氣散

穀神丸治小兒宿食留飲積聚中脘噎酸氣悶

人參 縮砂 香附子炒去毛 三棱炒

義木炒 青皮 陳皮 神曲炒

麥蘖炒 枳殼炒去穢

右為未煮粳米搗爛為丸如黍米大每服三五十九空心米湯下鹽湯服亦可

七香丸消食快膈和胃氣止嘔痛

木香 丁香 檀香 荳蔻

丁皮各一 陳皮去毛 縮砂仁去殼 三稜醋炒

蓬朮醋炒 白豆蔻二末 益智仁三末 香附子炒去毛

右為細末水糊丸如黍米大每服三五十九食遠淡薑湯送下米湯亦可

保和丸治小兒脾胃虛弱飲食不能消化日久羸瘦

糖棗四兩 陳皮 茯苓 半夏炒

蘿蔔子五分 白木 史均子肉 神曲

麥蘖炒 木香二兩 砂仁四兩 黃連五分

右為細末水發為丸如蘿蔔子大每服一錢不拘時米飲湯送下

楊九子治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不調心腹脹滿嘔逆

氣急或腸鳴泄瀉煩併腹中冷痛食噎乳癖痰氣痞結積

聚腸胃或秘或痢頭面浮腫不思乳食及療五種疳氣八

種痢疾肌肉消瘦氣急腹大神色昏憤清意不樂常服散

冷熱調和臟腑去疳積止瀉痢進飲食生肌肉悅顏色功

効非常不能盡述

蘿蔔子二兩 陳皮去白 青皮去白 京三棱炮

蓬朮炒 胡椒半兩 木香二兩

黑牽牛生用一兩 半炒

右為細末水發麩糊為丸如蘇子大每服二三十九空心用蘿蔔煎湯或姜湯送下量兒大小加減服之

長生丸治小兒清上實下補脾治痰及治傷食乳不消化大便

酸臭

木香半兩 檳榔三兩 全蝎二十箇 枳殼一兩

丁香 肉豆蔻 縮砂 半夏炒

右除肉豆蔻外七味為細末次入肉豆蔻再研極細末用

米飲和丸蘇子大每服三五十九空心乳汁或米湯送下

○丁奚噴露

十金丹治小兒手足極細項小骨高亮削體瘦腹大臍突號哭

智陷或成穀癩是名丁奚虛熱往來頭骨分開翻食吐虫

煩渴嘔噦是為嘔露一者皆因脾胃又虛不能消化水穀
不禁血氣致肌肉銷鑠腎氣不足復為風冷所傷榮衛在
露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種類之疾並
難治宜服此藥

青皮去白 陳皮去白 蓬朮煨 白豆蔻仁
川芎 五靈脂 蘆薈 雞心檳榔各半

木香 煨煨灰 史均子肉三錢
右為細末用猪膽汁浸糕糊丸如麻子大每服二三十丸
不拘時米飲送下有熱薄者湯下亦可

麝香另研 當歸酒洗 枳殼去穢
麝香另研 當歸酒洗 枳殼去穢

木香炮 代赭石煨 硃砂另研各 巴豆去穢
右為末麪糊丸如麻子大每服三五丸食後姜湯送下

揆癖丸治小兒穀癥等證
青皮去白 木香 蓬朮 代赭石煨

五靈脂去穢 大黃各三 巴豆去穢
右為末醋糊丸如麻子大每服三五丸食後姜湯送下

○鶴膝
錢氏地黃丸治小兒稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈
露如鶴之膝

熟地黃八錢 山茱萸 乾山藥各四 澤瀉
白茯苓去皮 牡丹皮各三 加旆茸各二 川牛膝各二

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服三歲已下一丸三歲
已上二丸空心溫水化下

○玃癖瘕氣

木香丸治小兒瘕癖疳積

木香 蓬朮 砂仁 青皮
代諸石煨研 硃砂細研 大丁香 川巴豆煨

右為細末和勻飛白麵糊為丸如麻子大每服三五丸乳
積乳汁下食傷米飲湯下不拘時服

代諸石煨研 川大黃各半 木香 五靈脂
硃砂 蟾甲黃 桃仁浸 辣桂各半

巴豆肉去油 一分半
右為細末湯浸糕糊為丸如麻子大每服五丸姜湯下
不拘時服

五玃丸治小兒一切食積
青皮炒 乾姜炮 五靈脂 蓬朮各

巴豆霜一錢
右為細末搗米飯為丸如麻子大每服三五丸米湯送下
不拘時服

瘕積瘕堅湯治小兒瘕積腹有積塊堅硬如石
厚朴 黃芩 當歸 草豆蔻仁
黃連 半夏 廣茂 益智仁

紅花 吳茱萸 升麻各二 生甘草
柴胡 澤瀉 神曲 青皮

橘皮各三 如渴加葛根四分
右作一服水一鐘先浸少時煎至六分食前服

木香煨 小兒瘕
木香煨 小兒瘕

木香煨 小兒瘕
木香煨 小兒瘕

木香煨 小兒瘕
木香煨 小兒瘕

木香煨 小兒瘕
木香煨 小兒瘕

右件同并為膏入醋少許攤於蠟紙上貼患處

肥氣丸治肝之積在左脇下如覆孟有頭足如盤收久不愈發疾嘔吐其脈弦而細

當歸頭 香木各半 青皮炒 又 蛇含石七張 鐵胤粉各三 又 三稜各半 鐵胤粉同入 醋黃一 鐵胤粉一

右為末醋煮米糊為丸如麻子大每服四五十九食遠用當歸浸酒送下

息背湯治肺之積在右脇下大如覆杯久不愈病洒洒寒熱氣逆喘咳發為肺癰其脈浮而毛

半夏湯洗 吳茱萸湯洗 桂心 人參 甘草炙 桑白皮炙 葶藶各半

右剉碎每服五錢水一鍾生姜五片棗二枚煎至五分食前溫服

散蒸湯治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛

攻刺腰脇小腹脹大小便不利 半夏湯洗 檳榔 當歸各七 陳皮去白 杏仁去皮尖 桂心各二 茯苓 甘草炙

附子湯洗 川芎 枳殼去白 厚朴姜製 吳茱萸湯洗

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分不拘時服如大便不利加大黃

伏梁丸治心積起於臍上至心大如臂久不愈病煩身軀脾股皆腫環臍而痛其脈沉而乳

茯苓 厚朴 人參 枳殼去白 白木 半夏湯洗 三稜各半

右為末水煮麵糊為丸如麻子大每服二三十丸米飲不拘時服作散酒調服亦可

痞氣丸治脾積在胃脘積大如盤久不愈病四肢不收黃痺飲食不為肌膚心痛徹背背痛徹心其脈浮大而長

大烏頭炮 附子炮 桂心各半 赤石服各半 川椒炒 乾姜炮

右為細末煉蜜為丸如麻子大每服一二十九不拘時用米湯送下

奔豚湯治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨疼少氣其脈沉而滑

白芍藥 甘草炙 黃芩各二 半夏湯洗 川芎 牛李根皮乾 葛各二 當歸

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片煎至六分不拘時服

大七氣湯治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛上氣壅塞小腹脹滿大小便不利

枳殼去白 陳皮去白 京三稜 蓬朮 青皮去白 桔梗去白 肉桂不見 藿香葉

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食前服

香稜丸治五積破痰癖消癥塊及冷熱積聚

木香不見 丁香各半 京三稜酒浸 枳殼去白 青皮去白 川椒炒 茴香炒

右為細末醋煮麵糊為丸如麻子大每服二十丸生薑鹽湯下溫酒亦可不拘時服

○腹痛

四順清涼飲治小兒熱證腹痛血熱結壅滯

大黃味紅赤芍藥 當歸 甘草微炙

加青皮抄散各半

右為粗末每服三錢水一鐘煎至五分不拘時服

指迷七氣湯治小兒冷證腹痛面青四肢冷

辣桂 青皮 陳皮 桔梗

三棱 蓬莪木 養香 益智仁略一

香附子一兩 甘草炙 加半夏微炒各七

右為粗末每服三錢水一鐘生薑三片紅棗一枚煎至五

分調和化蘇合香丸不拘時服

蘇合香丸治小兒卒暴心腹疼痛亦能順氣化痰驚搐瘧瘵疳積

方見氣門

當歸散治小兒胎寒腹痛面唇青身溫肢冷多啼

當歸炒 黃芪炙 北細辛去七 肉桂去皮

陳皮去白 白姜炮 縮砂仁 甘草炙

右劉涓子每服五錢水一鐘生薑三片糯米五十粒煎至五

分空心服

立積散治小兒中寒腹痛手足厥冷寒顛口噤暈閉口吐涎沫

不能啼哭

白芷 川芎 甘草炙 茯苓去皮

當歸去芦 肉桂去皮 芍藥各三 陳皮去白

枳殼去核 麻黃去根節厚朴剉去粗皮 桔梗去白

蒼朮米泔浸 乾姜炮 半夏洗二七 加附子炮

吳茱萸各

右為末每服五錢水一鐘半生薑三片紅棗二枚煎至

七分母子同服不拘時

一方用食鹽同茶炒裝絹袋內熨兒臍腹上下

○心痛 釣藤膏治小兒稟受虛怯邪干心痛及內疝疔疳面唇青

乳香制心 五靈脂 沒藥 當歸各

麝香一字

右為末煉蜜為丸如豌豆大百日內兒一丸煎釣藤湯化

下一歲二九三歲三九或乳香湯化不拘時服

乳附丸治小兒胃冷腸寒心腹疼痛便清泄瀉啼叫有汗

附子炮 乳香 當歸 訶子去核

桂心 乾姜炮 吳茱萸各等

右為末酒糊為丸如麻子大每服三十九吊藤湯或米湯

食前送下量兒大小加減與服

蓮仙丸治小兒心腹刺痛

桂心去皮 乳香 蓬莪木各

右為末酒糊為丸如麻子大一歲兒服二三十丸食前釣

藤湯下量兒大小加減

參香丸治小兒心腹疼痛及腸冷便青

乳香 木香 石菖蒲 人參

良薑炒

右為末酒糊丸如麻子大一歲兒十九食遠米飲湯下量

兒大小加減

化虫丸治小兒虫咬心痛來去不定不思乳食

鶴虱炒 檳榔 胡粉 苦練根各半

白礬研

右為末白糊為丸如麻子大三歲兒三五丸用溫漿水

入油三五滴食前下有小虫皆化為水大虫自下月初服

甚妙

安虫丸治小兒虫交心痛因上焦中焦虛冷胃寒所作

乾漆炒 附子生 黃仁生 巴豆生 各一錢

右為末白糊為丸如麻子大三歲兒三十九煎石榴根湯食前送下量見大小加減

遣虫丸治小兒虫動心腹痛啼呼口吐涎沫

檳榔 蕪荑去皮 雷丸 兎粉

鶴虱炒 各分

右為末煎苦練根湯調白麵打糊為丸如麻子大每服三十九食前史均子湯送下千金方云虫攻下部燒艾葉烟熏之

○浮腫

實脾散治陰水腫用此先實脾上

厚朴去皮 白朮 木瓜去穢 木香不見

乾姜炮 草果仁 大腹子 附子炮

甘草炙 白茯苓去破

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片紅棗一枚煎至五分不拘時服

大橘皮湯治小兒濕熱內攻心腹脹滿并水鍾小便不利大便

滑泄

橘皮去白 茯苓去皮 木香 甘草各二

檳榔三 滑石大 白朮 猪苓

澤瀉 肉桂各半

右剉碎每服三錢生姜三片煎至六分不分不拘時服

葶藶木香散治暑濕傷脾水鍾腹脹小便赤大便滑

葶藶 木香 茯苓 肉桂

滑石 猪苓 澤瀉 木通

牛草 白朮各

右為末每服一錢不拘時白湯調下

二物湯治小兒患氣急積久不瘥遂成水病攻面且身從腰以上腰腫此當發汗

麻黃去節 甘草五

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分不拘時服

牡礪散治大病差後腰以下有水氣者

牡礪煨 澤瀉 蜀漆洗炒 商陸

葶藶 海藻 括樓根各

右為末每服一錢用燈心煎湯調空心服量見大小加減

黑牽牛半生 白牽牛半生 青皮

陳皮各

右為末麵糊為丸如麻子大每服三十九不拘時米湯送下

五皮散治小兒諸般浮腫氣急可食

桑白皮 大腹皮 茯苓皮 陳橘皮

姜皮各

右剉碎每服五錢水一鍾紫蘇三五葉煎至五分不拘時服

服澤瀉方用五加皮地骨皮

內消丸治小兒頭面手脚腫

丁香十四 木香炮 青皮去 防風

巴豆去

右青皮并碎同巴豆炒黃去巴豆不用將青皮碾米入餘

藥末內和勻用麵糊為丸如麻子大每服二三十九不拘

時男孩兒橘皮湯送下女孩兒艾葉湯送下

時

塌氣散治小兒一切浮腫

木香二包

赤小豆

陳皮

蘿蔔子炒細

甘草五分

右剉碎每服五錢水一鍾生薑三片紅棗二枚煎至五分不拘時服量兒大小加減

○腹脹

中滿分消湯治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不能收四肢厥冷食入反出下虛中滿腹中寒心痞下焦沉厥

益智

半夏

木香

茯苓

升麻各七

川烏炮去

人參

青皮

當歸

生薑

柴胡

乾姜

華澄茄

黃連各半

黃芪

吳茱萸

草豆蔻酒浸

厚朴

黃蘗各一

一方有麻黃

澤瀉各二

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分不拘時服忌濕麵生冷硬物

中滿分消丸治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹

黃芩去腐

人參去芦

白朮

姜黃

黃連去積

半夏湯泡

枳實炒

黃猪苓去黑

甘草炙

白茯苓去皮

縮砂仁

乾生薑各二

厚朴姜製

知母剉炒

澤瀉

陳皮去穢

右各味為細末和勻水浸蒸餅為丸如麻子大每服五十

丸用白湯不拘時服

四炒丸治小兒氣血凝滯腹內鼓脹

枳殼炒

黃連去積

厚朴姜製

枳實炒

一分用乾漆一分用藤黃一分用黃連一分用黃芩一分用

同炒黃連一分用黃芩一分用黃連一分用黃芩一分用

同炒黃連一分用黃芩一分用黃連一分用黃芩一分用

同炒黃連一分用黃芩一分用黃連一分用黃芩一分用

右用同炒蒼朮等四味藥用水三碗煎至一碗去滓將蒼朮等藥汁煮麵糊為丸如麻子大每服五十九食遠用米飲湯送

塌氣丸治小兒疳腹脹喘急并面浮腫

丁香

胡椒炒

蘿蔔子炒

白牽牛生

右為細末白麵糊為丸如麻子大三歲兒三十九食前用

米湯送下量兒大小加減

消氣丸治小兒疳氣腹脹喘急

木香二

蘿蔔子炒

黃連去積

黃芩去積

右為末麵糊為丸如麻子大每服二十九不拘時米湯下

量兒大小加減

導氣丸治小兒腹脹氣急

京三棱

青皮

蘿蔔子炒

皂角酥炙

黑牽牛各半

右為末麵糊為丸如麻子大每服二三十丸不拘時用米湯送下

○口瘡

瀉心湯治小兒心臟積熱薰蒸上焦口舌生瘡

宣黃連去積

右為細末每服一字至半錢或一錢臨睡白湯調下

七寶洗心散治小兒壯熱煩燥風熱上壅心經積熱口舌唇燥

眼眩多淚大小便秘澀

大黃酒洗

甘草炒

當歸酒洗

麻黃不去

芍藥

荆芥穗

白朮三分

右為粗末每服三錢水一鍾生薑二片薄荷三葉煎至五分食後服

分食後服

分食後服

分食後服

分食後服

分食後服

分食後服

涼脯散治小兒臍積熱口舌生瘡

連翹 升麻 黃芩 川大黃

朴硝 梔子 薄荷葉各等

右剉碎每服五錢竹葉五葉蜜少許煎至五分食後服

大連翹飲子治小兒上焦壅熱口舌生瘡小便赤澀

連翹 瞿麥穗 滑石 牛蒡子炒研

車前子 赤芍藥各一木通 山梔子

川當歸 防風各半 黃芩 荆芥穗各一兩

柴胡去芦 甘草炙各 蟬蛻去足二

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後服

瀉黃飲子治小兒風熱總於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷 升麻 枳殼去白 黃芩

防風去芦 半夏湯洗 石斛各一 甘草半兩

右剉碎每服五錢水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

柳花散治小兒口舌生瘡

玄胡索 黃連 黃蘗 青黛另研

蜜陀僧另研各

右為細末每用少許貼口瘡上有津液吐出頻用不拘時

一方治小兒心有客熱滿口生瘡

用天南星末醋調貼兩脚心有吳茱萸末米醋調塗亦可

一方

用黃連細末以蜜水調抹口中患處

一方

用黃柏末青黛等分腦子少許另研入藥以水調抹乾疹亦可

○眼疾

小防風湯治小兒熱毒眼患

大黃蒸 山梔子 升麻 赤芍藥

川當歸 防風 羌活各等

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後用

小沉氣飲治小兒風毒眼患

蟬蛻去足 甘草 羌活 天麻

川當歸 防風 大黃 赤芍藥

薄荷 杏仁各等

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後服

生熟地黃湯治小兒疳蝕眼患閉合不開羞明怕日及至開眼

有如內障朦朧失所

生乾地黃 熟地黃 洗各 麥門冬 去心

川當歸 枳殼炒各二錢半 杏仁湯泡去皮

防風 甘草 赤芍藥各二

右剉碎每服五錢水一鍾黑豆七粒煎至五分食後服

小菊花膏治小兒積毒眼患

黃連 黃芩 大黃 菊花

羌活 桑木 荆芥穗 防風

右等分為末煉蜜為膏如小指大每服一餅細嚼白湯化

不拘時服

密蒙花散治小兒瘡痘并諸毒患眼

密蒙花 二錢 青箱子 決明子 車前子 各半

右為末羊肝一葉批開作三片搽藥令勻仍合作一片用

濕紙七重裹於灰中煨熟空心食之

牛黃丸治小兒失誤藥打觸着頭面額角煎倒撲令兒肝受驚

風遂使兩目睛開名曰通睛

牛黃 白附子炮 肉桂 全蝎

全蝎

芎藭

軟石膏煨過各半 白芷

藿香五錢

硃砂二錢

麝香二分半

右為末煉蜜為丸如芡實大每服一九薄荷湯化食後服

通頂散治眼疼風熱腫脹作楚

瓜蒂

藜蘆各一

皂角肉半錢 麝香少許

右為末每用少許吹入鼻中

○鼻

貼顛通關膏治小兒被乳母鼻息吹着兒顛令兒鼻塞不吃乳

荆芥一兩

香附子炒

白僵蚕各半 猪牙皂角二分

川芎一分半 細辛五分

右為細末用葱白研爛入煎藥末研勻捻作餅貼顛門上

消風散治鼻塞胃運頭目不清

人參

川芎 羌活

白茯苓

白僵蚕

藿香葉

防風

荆芥穗

甘草炒

蟬殼各

厚朴製

陳皮各二分

右為細末每服一錢或半錢食後用防風荆芥湯調服

辛夷散治肺虛為四氣相干鼻內壅塞涕出不已氣息不通

川芎

木通

防風去芦

甘草炙

辛夷仁

細辛去土

藜蘆去芦

升麻

白芷各等

右為細末每服一錢食後茶清湯調服

噙化鼻澄茄丸治小兒鼻塞不通

單澄茄半兩

薄荷三分

荆芥穗一分

右為末煉蜜丸如芡實大每服一九噙化津嚥如小噙不

得用薄荷湯磨化服不拘時

○時耳

犀角飲子治小兒風熱上壅兩耳龍耳閉內外腫痛膿水流出

犀角燒

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆炒

甘菊花各一枝 甘草半兩

右判碎每服五錢水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

龍骨散治小兒聾耳膿出不止久不瘥成龍耳也

龍骨一錢

黃丹炒七分

枯礬一分

麝香少許

胭脂四分

右同研令細先以綿拭子擦去耳中膿用竹筒納藥少許

吹入耳內勿令風入本方如海蝶蛸半錢亦妙

花胭脂膏治小兒聾耳常出膿水不止

花胭脂

白龍骨

枯礬

白石脂各一分

右研如粉用蒸棗和丸如棗核大以綿裹一九塞耳中日

三換之

紅綿散治小兒聾耳出膿及黃水

白礬細

胭脂一字

麝香少許

右為細末研勻用綿拭子擦去耳中膿水用竹筒納藥少

許吹入耳中

○脫肛

敗毒散治小兒風邪入大腸脫肛墜下

方見前

養臟湯治小兒久痢臟寒肛門出不收

五倍子

白礬

蛇床子各等

右為末水煎浸洗洗後用赤石脂為末以少許擦在芭蕉

葉上類用托入

爛皮散治小兒肛門或因洞泄或因用力過多脫出不收

爛皮一分

磁石煨碎

桂心各半

右為末每服一錢空心米飲調下

香荆散治小兒脫肛

香附子炒去毛

荆芥穗二兩

右為末每用五錢水一大碗煎熟淋洗

又方

用單麻子四十九粒研爛水調作餅子貼頂門上即收

○陰癩

藥篋內消丸治小兒陰癩偏大上攻臍腹疔痛膚囊腫脹或生

瘡瘍時出黃水

川練炒

大腹皮

五味子

海藻洗

玄胡索各半

茴香炒

桂心

川烏炮去

吳茱萸

桃仁研

食茱萸各五

木香半

桔梗

青皮

山茱萸各一

右為細末酒糊為丸如麻子大每服三十九空心溫酒送下

當歸散治小兒癩疔

牽牛微炒

辣桂各半

當歸

大黃各二

全蝎半錢

桃仁浸去皮

利為度

右剉碎每服三錢水一鍾入蜜半匙煎至五分食前服以

利為度

川練散治小兒癩疔小腹痛引腰脊攣曲身不能直

木香

檳榔

三棱

蓬朮炮

青皮去白

陳皮去白

川練肉

芫花各半

辣桂

牽牛各三

巴豆不

右為細末飛麵糊為丸如麻子大每服三九空心用生薑

湯送下

湯送下

牡蠣散治小兒外腎腫大莖物透明

牡蠣粉二錢 乾地龍一錢

右為細末用津唾調傳丸腎熱者雞子清調傳

○陰瘡

木通散治小兒小疳蘊熱濕毒邪于留熱於膀胱故生陰瘡

木通去尖

篇蓄去梗

大黃

赤茯苓去皮

甘草各三

瞿麥去塵

滑石末

山梔仁

車前子

黃芩各二

右剉碎每服五錢水一鍾燈心十根薄荷五葉煎至五分

食前服

臘茶散治小兒陰囊生瘡疼痛水出又不瘥

臘茶

五倍子各五

膩粉各半

右為末先用葱泔湯洗然後用香油調貼

一方治陰囊生瘡疼痛

右先用川椒荆芥槐枝柳枝蛇床子煎湯洗後用朴硝為

末雞子清調敷

一方治陰生瘡不乾

右用烏賊骨為細末乾貼瘡患處

一方

用紫蘇葉煎湯淋洗又作末貼之妙

一方治小兒陰瘡不乾

右用輕粉密陀僧為末貼之如痒加山梔子訶子燒存性

研同煎藥為末先將米泔水洗瘡淨然後敷貼此藥

○天鈞

鈞藤散治小兒天鈞風潮熱四肢抽掣

鈞藤

人參

犀角各半

甘草各半

全蝎

天麻各半

右為燕末每服一錢半水一鍾煎至四分不拘時服
釣藤飲治天吊風搐

釣藤 犀角 天麻 全蝎 五箇
木香 甘草 各五分

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服
釣藤飲子治驚風天吊卒然驚悸眼目翻騰

釣藤 加五 麻黃 去即 甘草 各三分 天麻 全蝎 各五分 防風 人參 各七分

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服
牛黃丸治小兒一切驚風五癇天吊客忤痰涎四肢抽掣

牛黃 白附子 天麻 薄荷 葉 各半 已上六味先為細末次入
白附子 全蝎 川烏 一隻 重半 去毒

雄黃 半兩 辰砂 三錢 牛黃 一錢 麝香
片腦 各半 另研

右件為細末一瓖和勻麻黃去節二兩酒一升煎麻黃至
一盞去麻黃用酒入蜜少許熬成膏劑前藥末為丸如芡

實大用金箔為衣每服一丸用薄荷湯化下大能發散
塗頂膏治天吊風備急

為頭 生用去 芸薹子 各二
右為末每用一錢新汲水調敷兒頂上

天漿子 散治小兒天吊驚風
天漿子 炙 蝎梢 犀角 屑 丹砂 另研

雄黃 另研 附子 法 炙 南星 炮 去 白附子
半夏 水銀 另研 乳香 另研 白蠟 蚕

賦粉 另研 牛黃 另研 各 麝香 另研 銀箔 另研

右為細末和勻每服一字用薄荷湯調下量兒大小加減
青黛丸治小兒天吊客忤五癇一劑十二種驚癇

青黛 天竺黃 乾蝦蟆 一箇 黃泥 包 裹 燒 赤
乾蝎 牛鼓 黃連 人參 地龍 各 一

釣藤 龍膽 草 各 半 蘆 薈 熊 膽 各 半
牛黃 麝香 雄黃 丹砂 各 一

夜明沙 法 士 胡黃連 各 三 錢
右為細末蒸餅糊為丸如麻子大一歲三九空心米飲湯
送下

再生散治小兒天釣驚風潮搐項筋緊強手足厥冷

烏蛇 酒 炙 天麻 南 星 炮 去 全蝎 各 半
麝香 五 大砂 另 研 牛黃 另 研

白附子 炮 炙
右為細末和勻 錢煎金銀 湯調下量兒大

三白散治小兒盤腸疝吊先服此藥後服
白牽牛 炒 兩 白木 炒 陳皮

木通 各 三 分
右為細末每服半錢用薄荷湯調不拘時服

釣藤膏方見心痛類

卷之六十四

新刻良方瘡疹論序

醫之為難古今通患凡大人之有疾能言致疾之因與目即所
由及目即所著醫之診治倍見其難兼小兒瘡疹欲
以未見之間或發壯熱或發驚悸不止一端擬似難明非深於
醫者不能辨也新學小生請歷未久多執偏見率以小兒為純
陽胃熱則發斑每投涼劑夫以瘡疹為熱因是一說然蓋以為
熱則又不可世徒知用熱藥太過往往損目胃不知服於藥太
隨比比傷生利害皆自不細况嬰孩腸胃嬌脆胎氣稟受虛實不
同運氣時令寒暑燥濕不齊隨證施藥以收十全之功
詎可執一偏之見乎比年書肆刊行方書充棟汗牛獨
證散漫難考檢開彌艱或收方之繁未該全備設遇
難症不過寸庸醫

予家藏是編以矣有方有證有治門類綱目靡不畢備明
幼大驗彰灼弗誣不敢松松結定庚寅春謹錄梓以廣其傳庶
好事者便於觀覽云

新刻良方瘡疹論卷之六十五

論瘡疹初出證第一

世嘗治瘡疹與傷寒時疫傷食風熱潮熱疝熱疑似之間便與
一乘均而治之殊不知邪正不同虛實各異輕者至重重者性
命危於風燭束手待斃誠為可哀今試論之且瘡疹與傷寒時
疫等證始者均為發熱又有他證不同可相為別證則列之次
篇小兒身熱耳冷脫乳咳喘因瘡疹也雖然五臟證各別究之
則歸一機也瘡疹為內實而生熱毒由兒生母腹中所受非若
內虛而感外寒之比蓋古方論云風熱傷胎生兒口禁風冷傷
胎生兒胎啼納汚則為血疳胎弱則為諸疳積驚而夜啼蘊熱
而斑毒以此觀之手之虛實由母之虛實所致也母若有疾亦
為子慮故知瘡疹在母腹中蘊熱毒也非若一歲中有異氣暴
寒時疫風熱傷食之比學者不可不察

○錢氏云瘡疹是母腹中所受積穢故五臟各有一證

夫人始生而蒙中和均稟五行陰陽形態變易益母導胎育有
盛衰虛實在其子也皆是母胎所受是知積穢故生下有瘡疹
則五臟各見一證其可欠煩悶者肝也時發驚悸者心也乍涼
乍熱手足冷者脾也面目顯赤咳嗽時喘者肺也腎在腑下不
納穢濁瘡黑者屬腎由胃風冷內虛之所致也且以嬰兒初生
下惡血未盡綿指拭之兒吞惡血在胃膈者吐以甘草如惡血
入腹中者利以黃連葉豆粉皆所以革惡穢也此乃世用保子
之常法觀已生既出腹外其母之虛實邪正在於子也况在腹
中同母氣血呼吸出入豈非受積穢而成者錢氏論之當矣
○瘡疹論日數
熱毒蒸三日則熱運於肌而紅斑生惟紅斑生至足為出齊不

可拘多少重者適身輕者數枚而已以紅斑生血疱血泡起如
 痘在肌皮之上故以痘名焉血泡結膿膿疱膿結而方為愈
 也紅點出者以紫草飲子欲出速用葫荑酒紅點出齊之後作
 血泡血泡七日則當結膿膿此皆大略之言爾病人歷貫不等
 不可拘以日數但正應病日形證以為活法古人云熱三日而
 成斑有熱五七日而生斑者有至十餘日而生斑者但足上有
 斑為出齊不可拘以日數也自斑至足有為出齊出齊之後長
 成血泡血泡七日當結膿膿若血泡中又尚有紅斑點相夾
 而生則不可拘以日數待其皆作血泡為齊為血泡當結膿血
 加亮至七日以上而不結膿血加亮當此恐毒氣內外貫注倒
 壓急與猪尾膏服則隨時結痂死故以血泡出七日為齊若七
 日為期膿血泡出齊而不結膿血加亮則失其平矣大抵小
 兒有病發熱日數稍久用藥者便當預防為瘡疹證蓋熱不解
 而熱毒運於肌中變為瘡疹故也所以不可不防也如紅斑出
 齊生血泡血泡七日結膿膿此乃榮衛調和內外無諸感冒方
 能如期且如血泡正作之際遇天令寒暑燥濕風不節氣候異
 宜遲速因而失叙亦不可拘日數但以紅斑皆為血泡日為齊
 若出血泡七日病人氣虛尚有紅斑未能皆生成血泡者毒氣
 為未盡當此合宜溫肌快榮衛藥以托之且以皆出血泡七日
 為期膿膿如期結痂死矣如當結膿膿而不結此是毒氣彌盛
 而不飲用猪尾膏以解之此為急務然猪尾膏是治毒氣盛血
 泡脹起不結膿血加亮血熱瘡毒能復入心故也非若外感風
 寒倒靨內虛吐瀉陷伏者更宜詳之

○瘡疹出於心則有先驚搐者
 夫熱吐熱瀉不可投燥藥傷寒而身熱不可便投涼藥瘡疹發
 搐不可投驚藥此皆外同而內異也素問云瘡瘍煩燥瘡疹

出於心今瘡疹出於心驚搐亦出於心也瘡疹毒氣始作心火
 大盛則生風生風則驚悸甚則搐搦熱氣蒸盛則煩燥為瘡疹
 則瘡疹矣所以為驚搐為煩燥為瘡疹為瘡疹數證心所主者
 必備無一闕焉如如者毒氣蘊於心臟則驚悸搐搦醫者不以
 內外証辨明之不為瘡疹防之便以銀粉膠麝青黛硃砂石
 等投之則心寒而肌致毒氣內伏是瘡疹而驚搐者無由而出
 也此證似驚風用藥當作瘡疹防備之蓋瘡疹之初似驚風者
 多醫者不審便作驚風治之為害不淺大抵瘡疹必有他証相
 雜必先有咳嗽痰涎心神驚悸煩燥嘔吐唇紅頰赤發渴耳冷
 足冷麻數古白如有此數證則銀粉涼心藥切不可用之心一
 涼而肌欬伏何由運出又有小兒平常安樂皆無疾病忽然發
 搐者必是瘡疹尤當審諦之蓋毒氣內盛但以發散毒氣如惺
 惺散消毒散升麻湯紅綿散兼以快氣利小便祛風等藥與服
 之此等藥雖未即効亦不至敗事其證次第待其熱氣得泄
 於肌膚心氣亦自定矣有風寒與內熱相搏而驚搐者則各見
 其證治之亦如前法但加勻氣藥為妙張氏云瘡疹氣勻即出
 快氣行即榮衛無滯有寒亦散瘡疹當自出矣

○紅斑點隱在肌中似出不出者
 紅斑點隱在肌中似出不出者此由榮衛有病也蓋蘊熱而
 生斑毒非熱毒則不能成斑斑矣小兒所稟有虛有實且實
 云受父精不足者犬抵瘡疹綠兒在母腹中食穢而成蘊熱却
 皆所稟不足者犬抵瘡疹綠兒在母腹中食穢而成蘊熱却
 隨天氣非節之暖而蒸出如冬月應寒而反熱謂之冬溫亦有
 隨春氣暄暖而出者有因他病發熱而蒸出者此皆發熱於外
 所蘊熱毒隨之出於肌中為瘡疹醫者不能防備見其熱而政
 其熱殊不知因他病蒸發而其中有瘡子證已存焉者若桑既

成斑疹而出使因虛而無熱以應之故疹雖見則外無壅盛之氣而不得泄內無由復入當此之際其人面青而惡寒肌肉慢而不食精神昏倦令疹隱隱在肌膚似出不得出者內虛寒也有身熱面赤者又大便利小便清有此證者但溫中進食然後發衛自復則毒氣隨多少出而不至太過與不及矣有人於此見疹疹出遲不能溫裏但用發散與之又豈知內無陽以相應更發陽氣外出令疹疹色白其人必脫當此反言既出得甚好忽然而斃如此者不可勝數此為虛脫也世常患之活人云疹疹出遲者以活血散用白芍藥末入酒數點湯調服之及入齒散切切新書云患疹疹而瀉甚者至於硫黃附子乾薑亦可蓋胃緩而榮衛復行疹疹必出矣夫治病用藥或冷或熱不同所以救一時之不及有人救此或見疹疹隱隱在肌膚欲出而不出不以為發衛虛則以為脾胃冷猶在發散或下之

疹之為斑爛為虛脫下之而愈危殆矣其不俱人者幾希如疹疹始作身熱似傷寒口耳尖并脚冷或腹痛者是疹疹必大便閉而頰頰赤若大便自利面青手足冷且溫之若臍臍如常或秘者可用蟬殼散搗皮湯髮灰飲免內驚兔毛煎湯浴之出後咳嗽肺痛吐食不下赤發疹湯亦疹子者犀角散未能勻者必勝散靈苑云未發令內消已發解利并出得太盛俱宜用玳瑁湯最良養生方疹疹與他證相似似之問宜升麻湯及已發結痂死亦宜服解利之藥正患疹疹并稟受怯弱者皆不宜用之可用獨勝散荆芥散安斑散紅子湯快斑散如聖散調中散犀角湯化毒湯紫草木通湯牛旁散紅綿散消毒散控心散奪命散黃芩散皆可選而用之恐出太密者牛旁甘草散預解風壅毒令不生疹子者慈活散

○疹疹出有逆順

疹既出而有逆順者三有時之逆順有虛實之逆順有出入之逆順且春夏陽氣發生疹疹出之為順秋冬陽氣伏藏疹疹出之為逆此時之逆順也何謂虛實之逆順大小便必而能食者此為實順也大小便利而不欲食者此為虛逆也此虛實之逆順也何謂出入之逆順大抵疹疹出者為順倒陷伏者為逆此出入之逆順也要之傷寒熱在表而不可下者恐裏虛不能作汗而解故也疹疹發熱在表結膿痂必先得其裏實則外方不陷伏此簡易平直之理人之通論也又有稟氣弱而內重者因出疹疹間大便自利懼其陷伏至於服薑附硫黃豆豉鍾乳桂木等藥以助之至於平安者固有之又有內實皮厚肉氣雖出毒氣不得宣泄至於服大黃硫石龍膽乾葛大青梔子木通石膏服之至於平安者亦有之此皆臨用則隨時變通豈可執泥於一曲哉

○疹疹出遲有數證

疹疹出遲有數證不可不辨一者出紅斑於肌膚之中紅點生為血斑血斑生膿胞膿胞結痂死而方愈若紅點見至數日而反不出者此為毒氣復隨其證危也蓋小兒熱毒在內又遇冬強或春夏暄暖內外皆熱發膿膿理速為疹疹始者疹疹出必先為紅點點當此之時或遇天氣大寒肌膚閉塞毒氣反伏而不出則身涼內躁面青而頰或謔言妄語當此之際宜用解肌表出之藥如紫草散猴黍酒蓋斑毒未甚出也發散如活血散之類又有紅斑點方出於外或內虛或食生冷或投涼劑宣瀉致令膿腐虛冷不食自利亦發陷而不出者宜用溫裏之藥蓋謂裏虛寒故也益黃散活血散參朮丸之類以溫之此紅斑既見不可復入者但宜溫出者一也二若疹疹已見斑點斑點盡生成血痘者期七日而結膿痂今一半尚為斑點未全皆為血

此毒氣半出故也緣疹過冬溫或春月陽氣乍值其熱毒
一時隨天氣運出於肌中當其未出則內外皆熱及其出也則
外感而裏虛大抵五行四時寒暑則從漸而久非節氣之冬溫
而夏冷來暴而去速小兒為最熱運行內熱出外天之暴熱一
退令兒外感而裏虛則無陽以應疹痘故出遲令半出半未
出也故半為斑點半為血痘當此必不能食乳大便如常小便
清白者宜用半溫裏半發表之藥如紫草蟬殼芍藥葡萄酒以
表之如活血散人齒散以溫之內溫甚者生寒寒則大便或溏
或不消則則不伏附矣蓋胃腑為裏既得溫煖與肌膚相應血氣
溫深方能蒸出也三者疹既出大盛而不出者尋之臟腑無
病榮衛自和無諸虛實寒熱為害但遲上 不結如死而反盛血
片甚者至於內陷其瘡黑腐爛臭痛如刀割中毒氣入心則亂
而危此由雜氣衝之房室觸犯故也故仲景云瘡疹未生之間
宜燒赤木猪甲以辟惡氣勿令外人入房恐其觸犯最宜防備
其中縱得安者亦必瘡痕經年黑色也及勞人力氣其人驚觸
坐卧切忌當風寒愈而成瘡疹宜燒黑牛糞之貴速愈而無
瘡痕矣左右上下安胡荽酒以禦汗氣惡氣愈帶荷以利小便
大凡患瘡疹常燒乳香最辟諸惡氣不可不知人之榮衛通
香則行過臭則止故惡氣不可不辟如物理相感木得桂而
枯雖黃過胡椒而黑亦如之意外人所戒在後人不得不
遵之

○論諸熱失治變為瘡疹候

病有初同而後異有初異而後同者此物極則反勢使之變
也若不通而變之則似是非而非若同而異迷而不反者有矣且
傷寒傷風傷食風熱是熱也須詳辨之且如手足指微冷而

青煩燥而惡寒左額有青紋者傷寒也面赤而鼻流清涕手足
煩燥自汗惡風者傷風也服胞腫而右額有青筋頭與肚俱熱
胃滿不食腹脹者傷食也面青紅額正中者青紋守掌心有汗
獨不安特發驚怖手絡壯微動似驚傷此散熱也身熱而倍
熱食唇紅面赤大小便秘脇下汗此風熱也上諸熱證則均究
其所以熱則異且諸證皆熱也故人身無非常之熱亦無非常
之冷但溫和而已今失於將理肌膚蒸熱於一身蓋善醫者
如此而汗如此而下隨證滲泄應手而愈若用藥遲速失序當
溫反吐瘰熱以溫則變證百出蒸為瘡疹者多矣且前諸證皆
熱也瘡疹亦熱也熱毒蘊於肌中失於治療皆可變為瘡疹故
傷寒則有胃爛發斑小兒則有胃熱發斑冬則有溫疹發斑
故初發熱則不同其蘊熱則同此乃後同而初異皆瘡疹證也
夫知其始異不致於變成瘡疹者明矣不知其始異故其變成

○瘡疹作搐

水流濕火就燥此勢之必至瘡疹本熱熱則動心此理之自然
夫心火熱而生肝風肝風旺而尅脾土脾土尅受於中則上下
氣不循環五行之氣無以相制則心火獨盛於上肺金受火尅
而無力不能制伏肝木熱則生風風火盛而脾土衰熱氣相擊
動於心神心喜為熱神氣不安故發驚也當此宜肝利小便風
定而斑疹隨出心臟斑疔疔則風去利小便則心熱退
矣風熱既定則驚搐亦自愈矣味者凡風火相勝而作搐不顧
瘡疹便用水銀朱砂黑錫蝎子硝石礞石燥燥瘡皆出於心火熱
者反陷伏則當出而不能出蓋瘡疹煩燥瘡皆出於心火熱
太過則搐古人治大熱則利小便熱甚不能搐搦為驚搐之
害今心受熱投以寒涼損心胃藥以冷之則其氣斂何由而出

况中焦既冷上焦熱愈不降其熱尤甚常見小兒患此誤投寒毒藥至死者臨終則遍身斑出以致不救蓋心一寒無緣發已在表者命終氣散黑靨陷伏已無及矣要知但是治驚當平肝去風利小便最為要妙况瘡疹在發驚之後何不謹防瘡疹之敗耶又况治驚者專用涼毒藥使脾滯心氣不降尤為驚病大害况後有瘡疹者乎

○瘡疹論疎利

龐安常云冬月溫煖小兒至春月必出瘡痘則冬月預服三豆飲子以解利之千金論云人之初生便伏生地黃汁數規穀而下黑糞則無瘡疹矣外臺方云時行痘暖便服油劑又云瘡疹盛行恐相傳染煎茵荷根汁與服以解利之此皆防微杜漸見其未兆間以疎利為良也何嘗拘於臨發熱時然後利之耶且如用升麻湯是治已發未發皆可服夫未發之意其為未見斑點

已前可服之已發之意其為已結而死已後服今人咸稱方狀云治已發未發皆可服之曾不知稟氣厚者則瘡幾若受氣薄者則為害不淺遂使速失度致於陷伏者多矣然則小兒稟氣厚者能食唇紅頰赤渴水睡中謔語或時啼哭又遇天氣暄熱易生瘡疹逐時以少藥疎利心肺從熱毒皆散縱有瘡疹亦腹矣雖曰小兒純陽亦有稟受怯弱內無蘊熱雖天氣暄熱若面青大小便如常無熱者則不可輕用解利藥恐反生他疾故用解利藥者宜審察虛實可也蓋瘡疹屬血熱轉下屬殺氣今言小兒發斑瘡此熱在裏而未發者斑毒未出則宜疎散熱毒導引快利使無壅遏何嘗以轉下為法况疎利與轉下相去之甚遠疎利者如三豆飲子油劑生地黃荷根紫草湯升麻之類又何嘗在已發斑之後用也瘡疹雖有轉下之法非謂瘡疹而轉下因生內熱使瘡疹毒氣內外蒸鬱恐生他疾方以疎導之

以平為期因瘡疹外熱臟腑受熱內外皆熱遂令正患瘡疹之中大便秘裏急後重小便赤澀腹滿而喘渴飲水漿手掌心并腋下汗出謔言妄語能食而瘡痘不結痂疔此是胃中殺氣瘡疹熱毒蒸蘊亦熱至甚方可令大便調過一二次使表無壅遏之患而已轉下雖有內熱亦不可過利常因有內熱味者偶然天利使內虛痘疹必陷及為深害不可不知故傷寒下之早為結宵瘡疹下之早為陷伏或有不問虛實寒熱見出不快便下之言瘡疹是熱毒壅殊不知瘡疹因熱而得出因虛寒不熱而陷如此為害者甚多大抵治小兒純陽多熱毒固為防瘡疹之患然身不熱斑未出已前內有熱證可下者則下之若已出班瘡疎利在結疔之後二者迥合毒氣在臟腑則宜利之毒氣在肌膚則疎散非若瘡疹在肌膚反空瀉腸胃之理又云總覺是瘡疹便宜利使出快此恐方宜不同用藥亦異若執之以為用則得失相半治疾用藥豈尊在於補瀉當隨證所宜斯為活法矣

○論表出與溫裏不同

瘡疹因熱而生斑此皆因熱氣藏於腸胃故因內熱與外熱相合隨榮衛運於肌膚則為瘡疹矣夫外熱者或感寒或感風風熱驚熱皆感外邪而生熱苟失於治療邪氣盛則實實則生熱故為外熱也既為瘡疹因熱而生斑因寒而陷伏蓋熱則出而散寒則收而斂當此溫肌表散而已又有熱毒正盛因煩熱而食生冷或服涼劑使胃寒則榮衛流注循行失度不能運化當此溫裏最為宜也此則內外之感當隨證治泄或感風寒閉密感理而瘡疹不出或出紅點或血疱其肌膚青白而惡寒鼻流清涕耳與陰皆熱宜與表散則可知慳正氣散活血散紅綿蘇葉草湯之類是表散之藥也其內傷生冷或服涼藥過劑或

吐或利此為裏寒急宜溫裏以救之其人必大小便利腹痛不食或嘔此宜用理中丸益黃散五積散倍中湯之類若醫者不明於此裏寒不能運出當溫之反發散外寒所伏不能出當表散而後下之是皆表裏不分寒溫失度當察其證

○諸瘡疔瘡

臟腑不同表裏有異是以瘡疔瘡疔分淺深也腑屬陽有熱則易出是以各層瘡疔瘡疔一出便如飛瘡細胞出於肌皮之上一出而便沒以言瘡疔瘡疔在肌肉血脈間必先出紅斑而後生成如熱則難出其為瘡疔瘡疔在肌肉血脈間必先出紅斑而後生成如疽故名瘡疔其所受氣深是以難出也暴熱而便出者必屬瘡疔父熱而難出者必瘡疔不可不知

○天氣壯熱即與疎轉後有瘡疔則輕既出不可疎利瘡疔所感而未成既成瘡疔而已出瘡疔出盡而結膿痂疔三

首和正輕重表裏先後不同用藥亦異方書云純氣是瘡疔便與疎轉即輕者大凡用藥之意是瘡疔便與疎轉蓋冬月究觀天氣壯暖至春夏陽氣發生兩熱相合則生病或嬰孩或童子內藏壯熱天氣壯暖即唇紅頰赤又渴飲水咳嗽痰喘中驚悸此皆熱氣所作以意推之臟腑熱者夏必發瘡疔以藥疎利臟腑熱氣既去縱有瘡疔亦輕此冬時便當即解之今人不然見紅斑已出熱毒在表後轉下之是表熱不除胃氣大厚無以運行榮衛毒氣最伏久裏則多危斃矣但既成瘡疔而已出是紅斑見時切不可疎轉其熱氣已在表故也既結膿痂者是毒氣已出而未結痂者毒氣再入臟腑餘毒為害却宜疎利之則不生他疾矣以此觀之疎利在未發瘡疔之前及已愈之後不在瘡疔正發時利

○瘡疔已出諸證不一

瘡疔瘡疔影形動則隨之病有盜汗有汗用則瘡之如瘡疔實

瘡疔未嘗不愈也瘡疔而補實未嘗不愈也瘡疔本熱毒於內及其發也體熱則血脈致榮於外要在血氣溫深胃氣盛壯水升火降然後熱不能伏歲隨血氣以流於肌絡結瘡疔而出豈一證可拘有胃虛不食而出或吐或瀉不食可見也則宜溫之有榮衛虛弱不能出者惡寒面青白肌骨軟慢似出不出者是瘡疔也當和其榮衛如活血故可也已有出彼風所感不能出者或發熱或狂言或風搐或遍身青紫紋是也當發散如淫淫散蠶毒散有已出而服冷藥或食生冷而內寒沉伏下出者則令瘡疔黑癩潮熱啼哭或白色服脹口氣自閉四肢微厥如人瘡疔中湯可也有出甚被微氣所蒸觸則成血片燒乳香如胡荽酒可也有畏服表藥過多遍身成一片謂之斑爛者宜安養之如六神七疔散內補散雙和湯可也有正出盛服涼心藥沉伏在裏發心寒戰慄伏者如丁香香玉冠薑桂當歸附子可也

○論瘡疔熱毒所起之由

有本虛少用藥大發之出得正盛忽然氣脫者此裏本虛也如丹砂養氣理中益黃等可也有出毒氣彌盛內外通達無陰氣所感但血毒滯滯結痂亦不成者七日已上指尾膏證是也其證各異宜細辨之

熱毒伏於臟腑則蒸於肌膚而成瘡疔非熱毒則不能出感感四時非節之氣或感外寒相搏於榮衛邪氣盛則實實則生熱因熱而成斑或傷食滯於中焦心氣不下隔熱而斑生或心熱甚則生風風盛搐搦如驚癇而生斑是皆熱有所起之由其熱至極動臟腑之熱而成瘡疔也則五臟各見一證且呵欠煩悶肝熱也時發驚悸心熱也乍涼乍熱手足冷脾熱也而目顯頰赤熱也時熱也胃若下焦不受穢無諸證但瘡疔者屬腎也良

由不謹風冷或因失肌內虛毒氣伏陽歸腎則變黑色癰疽世
 昔言瘡疹是熱此人之通病也因熱而內外相蒸兩熱相合陽
 毒歸外熱蒸而出味者不察見瘡疹發熱諸證已見便與利
 殊不知疎轉當時未覺為害後因瘡子出盛之時胃氣因疎而
 致虛不能運出使人不覺是先疎轉為害則因內虛為倒厥為
 不食為下利為昏倦變證百出不知所遇之初因疎轉為害而
 瘡疹出遲醫者不察當此又增發散更或下之愈增重因因此
 又救之不善也疾必生殊不知傷寒因身熱而下早為結背傷
 寒身熱固不可下瘡疹毒氣已發在表尤不可疎轉固言小兒
 因身熱耳冷尻冷咳嗽軟用利藥毒氣入裏則殺人因知傷寒
 身熱為汗解瘡疹身熱為瘡疹為血泡為膿窠為疔疔而方愈
 則瘡疹又不可下利甚於傷寒身熱不可下無以異也其瘡疹有
 宜利者在合下證詳論之矣大抵瘡疹是熱毒非熱則不能出
 瘡子有大熱者當利其小便有小熱者當解毒是亦利其熱也
 何必須轉利反虛其氣耶故知瘡疹是熱毒對其熱則瘡疹
 反不出為隨伏為害更深矣

○瘡疹已出不可服油劑
 冬嚴寒而反溫小兒陽盛而陰微無陰以制之則熱停於胃膈
 令兒頭髮直飲食以減此伏熱之兆便宜解之服油劑隨時
 便服預以防之也如千金方論人之初生服生地黃汁一蜺殼
 則不害瘡疹龐氏論冬月天氣溫暖小兒至春陽氣發生必發
 瘡疹宜預服三豆飲子常論瘡疹未發服非麻葛根湯此皆未
 見紅點時先服以防之豈是身熱斑生而用者且油劑三豆飲
 子非麻湯是皆預用之或是冬月應寒而反熱名曰冬溫前人
 推度之小兒純陽至春陽氣發三豆伏熱相搏必作瘡疹故隨
 冬溫時以服之又何嘗見斑點時服即千金論人之初生服生

此黃汁數塊終身不患瘡疹此為知錢尤防於未然者若斑
 點已出則不可服油劑矣
 ○瘡疹有欲出者有溫出者有解毒者
 病之在人所得有輕重善用藥者能使病重者即輕病輕者即
 安故仲景謂之隨證治世最為活法且瘡疹身熱而煩燥滿
 疎促有諸瘡疹證不見斑點其熱未退者以麻黃等湯以發之
 若已出斑點者即止後服不爾再服此表發出之也或稟受虛
 寒脾胃怯弱或服冷藥至多傷於脾胃令兒手足逆冷脈息遲
 細大便溏而小便清者炮乾薑炙甘草湯且乾丁香參木藥可
 選而用之此溫裏使令自出也或瘡疹出後有餘毒者下利黃
 赤膿血身熱而渴當以薤白湯與解之於斯三者或發或溫或
 解能審而之瘡疹可保無虞矣

○瘡疹雖有熱證大便如常過則不可再下
 事物以中為正臟腑以溫為平故過熱大涼皆非所宜臟腑有
 熱者則大便數日不通熱蓄血聚壅遏不行勢必增劇不得已
 則下之若或誤下為害不淺故大便如常是內無蓄熱切勿不可
 再下此前人言之詳後者蓋警策後人使無誤爾方書論五實
 證人能食而大便秘結大便熱無汗又有熱證相兼觀可下之
 又論五虛證令人不能食嘔吐皮寒脈細六小便利則宜補之
 以此而觀臟腑既已過如常則知裏無毒熱若下之者豈不為
 重虛者乎大便既如常有熱證者但利其小便則雖熱亦不
 能為害矣常觀病者大便不濡瀉有虛證用溫藥而愈者有矣
 大便濡瀉又用下藥而愈者未聞也雖或有之是食積或冷
 熱不和互相為害但半補半利去其食積分其冷熱此非正下
 者也
 ○不可妄發表下

一物具一性一性有一用藥之性或補或瀉或表或下或散或
 飲既各不同若然以所性施之所用用之當則遂時而病愈或錢
 氏論發散轉下皆稱不可妄者恐其用之不當爾且瘡疹諸證
 俱見及斑點既生若無內外寒熱虛實者但安養之待其所蘊
 多少任其自然則無大過不及之患如此非為當時不生他證
 亦病後易於將理今人則不然絕瘡疹斑點方出不顧所蘊輕
 重多寡心速而惟恐不出故用藥表里出之服以紫草蟬退副
 以人齒猴黎併與酒麩羌勞無所不試曾不知毒氣遇藥發之
 則一為十十為百百為千千為萬一之變合為一瘡方書稱名
 斑爛至於五內七竅皆有則重者為之下救輕者為聲啞為目
 疾為斑爛為閉耳塞鼻之患又有用表藥過多瘡表則發裏無
 陽氣以應之為虛脫者多矣一妄表者之過也夫瘡疹已出
 考賴熱氣連其毒氣以出則無眩冒腫悶之苦善攻其熱者
 熱甚則利其小便使熱輕則解其毒得氣矣脈理者不知但言瘡
 疹是熱無時進涼劑致於胃氣虛羸令兒胃滿腹脹又且下之
 致內屋毒氣入裏則殺人其象此不善下之過也錢氏稱不可
 妄發妄下誠不誣矣要之治熱以溫涼而行之未至於冷治寒
 以溫未至於熱當從其漸而已合下合發合有其證則論又詳
 具矣

○發熱有時則應臍臍知其斑瘡痘水疱膿疱
 谷空而響者形動而影隨舉此而得彼也故錢氏云熱應時而
 出是見熱而知臍臍明矣且以一日而觀之寅卯辰時熱者屬
 肝為水疱巳午未時熱者屬心為疹子丑寅熱者脾疹也耳腎不
 受穢無證但出瘡疹變黑為腎申酉戌時熱者屬肺為膿疱觀
 其熱發有時亦知瘡疹之所本是亦即前錄後之先見也
 ○瘡熱而毒

人之將理失之故殺積微成積積損成衰故厚三尺非一日之
 難熱而斑毒非一日之熱皆積微成著也大抵小兒自然陽盛
 而陰弱况朝夕飲熱乳兼重衣溫厚帳帳週密則傷皮膚害
 血脈瘡癩發黃是生多疾此熱熱而斑毒者表裏皆受熱也宜
 預服升麻湯消毒散紫草湯油劑為良又有傷寒發斑為感寒
 毒失於解利邪氣盛則實實則熱熱毒而斑生遍身如被蚊蚤
 所嚙不作瘡胞起但赤斑點者此五死一生之證作黑點者九
 死一生之證名曰發斑非瘡痘之比皆稱曰斑故因而及之瘡
 痘有數種疹起如癩瘡隨出隨愈此名癩疹其毒輕瘡痘如豆
 水疱如淚而青小膿疱有膿而大其形各異又有心斑脾疹五
 臟各有所主不可不知

○瘡痘已出未散勻
 人之平居樂逸則心神安靜氣體和平及其病則陰陽偏勝盛
 衰雖不同故今虛實不齊是以瘡疹已出不能遍勻前入治法
 透肌解毒而已使毒得出肌透消解氣既無壅遏則自然出勻
 也用必勝散快毒丹令少快其草飲胡荽酒紅粉丹自然勻順
 之

○瘡子未發者令內消
 前人於瘡疹防微杜漸無不盡其意為見小兒遇天氣溫熱或
 冬溫恐散瘡疹遂以犀角玳瑁二味磨汁與服之以茵草煎汁
 與消之則未發者令內消已發者亦能解利使毒氣不致大盛
 或有伏熱瘡疹未出四肢微熱飲食似減頭髮乾立或時額多
 微熱宜服生油方最佳

○瘡疹發熱而痛者
 瘡為虛痛為實又云諸寒為痛又云內快而外痛者為外實內
 虛外快而內痛者為內實外虛是以聖惠方云痛者言其通也

則病為實可知矣... 也故用麻黃湯水解散以解肌汗出寒熱自已瘡疹亦無阻矣

○瘡疹出不快

病之始末不同深淺各異瘡疹之出不快者非一端用之當隨... 渴而腹脹者宜勻氣解毒甚熱者宜利小便虛而自利者宜溫... 瘡不結痂者當此毒氣已出在表但解餘毒而已故出遲各... 同出遲先後之序不同醫者當辨毒氣在表在裏若虛若實補... 瀉調解隨證治之此是正瘡疹證無諸內外邪氣所感者也若... 患瘡疹中就有疥癩則治瘡不同且患瘡疹正出過時令寒... 暑燥濕風不節則疥癩與瘡疹用藥不同亦當消息且

正患瘡疹中暑氣大作則或煩燥而喘痛或喘滿而作渴此乃... 暑氣與瘡疹表裏熱氣併過壅滯而出不快宜與白虎湯荆芥... 散如出瘡疹中遇天氣暴寒令兒背展秘寒氣結聚出不快... 者宜用麻黃正氣散之類又有瘡疹正出煩燥飲冷過多或誤... 服涼藥使胃冷無以運行榮衛致中滿則上下氣不升降出不... 快者宜用理中湯薑黃散活血散至於下利者確附豆豉之類... 皆可選而用之文有瘡疹正盛內外熱氣壅遏血蓄結聚令兒... 能食腹脹不大便煩燥而渴手掌裏有汗端滿出不快者此由... 毒氣與心火貫注無陰氣以飲之宜用乳香栝石散紫金散... 尾膏以飲之或瘡疹正出被惡衝傷房室觸犯禁忌或孤臭人... 勞力人氣觸着令出不快者宜燒猪甲赤木乳香常燒令氣不... 絕仍止下安胡荽酒以禦之是以暑熱其數證方書但云出不... 快而已皆在人所得之由變通若大小便秘氣壅遏而出不快

素問云內藏心肝肺脾其證皆見於外所... 以瘡疹病而煩燥面赤者心也面黃體倦者脾也面青多怒者... 肝也喘噎面浮而白者肺也面黑善恐久耳聾手足厥者腎也... 此五臟有五色常與寸口尺內相應其不相應者病也又曰色... 之與脈當參相應其不相應者病今瘡疹屬心令人身熱煩燥... 驚悸面赤皆屬於心其赤者順今面色青是色不與病相應為... 不順也當更察外證防備之故素問云色以應日脈以應月分... 瘡疹臨時觀之豈不以色應日也瘡疹當唇紅頰赤而反青色... 其為病實者必生風大小便秘而燥渴者實也虛者必下利不... 食四肢厥者虛也各宜用藥預制之

○瘡疹面青者逆

○瘡疹身熱而脈反遲... 脈數為熱脈遲為寒此最驗也數熱屬肺遲寒屬脾今瘡疹在... 表屬肺而外發熱脈反遲而屬脾而為寒是脾不應其病陽病... 而得陰脈也宜當溫之以活血散人當散之類臟寒下利脈遲... 者以甘草乾薑湯且乳散之類蓋得胃氣既溫榮衛以和則或... 汗或疹而解矣其脈遲者是胃氣虛冷榮衛不足故也

○瘡疹非微痺則表不解

用若之法貴簡而當則病重者輕而危者安且瘡疹證雖極久... 熱然發斑之際必因天氣暄暖或感風寒而發熱或驚熱或傷

食而熱因熱而生疹斑末出者方其初發熱得微汗散之後
雖為斑疹亦輕已由非微汗則表不解也其證令人身熱頭暈
鼻中壅塞咽喉不利咳嗽目赤色焦皮膚緊而脈數此皆熱極
為疹症雖順而出毒氣亦不輕議者始以微汗解散其毒漸輕
矣如水羊痘散心散麻黃湯等主之如斑點已出則雖不可用
此發蓋自然出快則不可表表之成斑爛又有又發散隨汗為
白珠子或出小紅疹亦以汗而毒氣隨散不可不知也

○疹既出不盡透透而不長血疱此皆脾胃
虛榮衛怯弱使然也良由一時被天氣喧暖諸暴熱壅而成斑
點斑點既出無陽氣以應之故令在肌膚隱隱而不出也當此
則先和脾胃以行榮衛榮衛既暖毒無所容則出矣故前人用
人齒散活血散皆暖榮衛以發之班末出者用乳香指心

血丸出而不盡透者以猪血磨香金手足心唇上最為要妙或
以紫草散之類并脫殼散皆道寒熱虛實而救之又有當出被
外風寒所逼而不能出者其人必鼻流清涕頭痛宜以鮮利藥
隨證溫散也又有被風寒所迫而不能出其人必鼻流清涕頭
痛發熱宜以麻黃湯解利之

○未出可下已下出已定當利其大小便
毒氣在裏疹未出者可下毒氣在表疹見斑點已出者不
可下如已出定結膜案尚有熱證見者當利大小便此消恐裏
有餘毒不盡因而生疾其大小腸主出而不納有餘毒可利之
前人一動一靜必有至理存焉

○發疹疹有微盛
是疹疹雖而熱數日疹疹不出進退皆難成可慮也便欲大發
之懼其疹本稀而成斑爛成倒靨不發之人無以散毒然故方

毒論始以微發之微發之而不出即加藥加藥不出則大發之
大發之後或出不多或無斑疹脈息和平無地證者即疹疹本
稀不可更發也以此思之皆是用藥有漸發散不至太過靡不
至不及亦用藥之善也

○疹熱在表不可疎轉
毒氣在表宜散在裏宜下此為不易之法也今疹熱在表却
用疎轉其裏是表裏不分是故前人於一言一字無不審之其
在表宜散在裏宜下其疹疹是熱毒在表每每下其裏則
至於天傷久矣殊不知傷寒身熱在表者不可下故活人書論
疹疹身熱耳冷死咳救輒用利藥即毒氣入裏殺入尤甚刀
以疹疹固而下者自有可下證別具其詳矣

○疹出太盛
疹疹出太盛而面黃大便黑色煩喘燥渴或腹脹此為有於血
在裏故也宜以犀角地黃湯及治疹疹中鼻衄吐血毒氣未盡
有餘瘀血皆可服之然出得太盛燥渴者服甘草散其未出者
亦可服之煩喘甚者以麻黃湯咽痛而嗽者入麝香服之尤妙
出遲者與紫草飲子為良

○傷寒與疹疹同異
傷寒男體面黃女面赤增寒各口中氣熱呵欠煩悶項急也疹
疹則頭赤燥多噴嚏悸動皆倦四肢冷傷寒當散疹疹當溫平
勻氣面赤顯赤之不同又有諸熱證蒸為疹疹始終各宜當
隨證而治之不可死於一曲

○未能辨認問服升麻湯已發未發用胡荽酒
善治病者期於未然不善治者治已然昔人論升麻湯未能辨
認問可服之是疹疹未發未見斑點之前可以內消所以服之
若已發見斑點者不可服蓋升麻湯性大寒故也已發而服升

麻湯是以出齊結痂死之後方服解毒也往往人未知此則
 斑點既出而後服之令肌涼而反不得出為害極多胡葵酒
 則曰已發未發皆可服之胡葵碎一切惡氣衝觸外護之用胡
 葵者酒酒胡葵於末帳左右上下安之可辟惡氣瘡疹正宜用
 之非升麻湯之比故知升麻湯未辨認開服之能消諸熱而
 解毒於未然及其斑已見則當以和平藥安養之升麻葛根性
 大寒瘡疹既出而服之則反使寒弱為出遲為寒中為陷伏小
 兒稟受實者瘡發或所稟怯弱者最為大害不可不知故方書
 有直言瘡疹不可下者有直人之稟受不同方宜又異豈可執於
 一偏而不知變且北方冬月則風寒水烈南方除夜天氣溫和花
 卉亦發萬物亦應時豐四季皆無毒熱酷寒之害以此觀之所
 稟既異所治亦殊在臨時隨宜而用之不可下與可下自有證
 候故執泥者乃醫之病矣

○張氏論瘡疹氣句即出快

難經云氣行則血行氣止則血止故氣主响之血主濡之濡軟
 也氣行即血隨而行之氣滯則血壅之故張氏論瘡疹氣句即
 出快蓋臟腑既有毒毒方其壅於肌膚熱毒散而出為瘡疹熱
 亦不能復還榮衛週流血氣流注則出而無阻蓋氣句即出快
 此其義也或有結搏或裏有食滯於中焦不化或外寒所感皆
 今壅遏不通故氣既滯則血不流何田而出當此不能審察之
 則至危斃者有矣能使氣句行而不滯瘡疹無不出者

○瘡疹血疱作成膿疱令人心膈煩燥不安

瘡疹之發有漸當審次序可也若先後失序輕重失時飲散不
 得其宜則必凡差悞矣夫斑瘡疹始作而未出者當疎利令輕
 也既出而成血疱當令榮衛升降調脾胃令不冷不熱及其將
 作膿毒氣正感大腸不通者潤以通之大便自利者溫而固之

小便不通者導之及其亦結則解散其毒此治之大體也且瘡
 疹作膿是血疱結毒也心者主瘡瘍主煩燥當其作膿毒氣已
 出未得靜盡則毒氣應心而煩燥生矣若血疱作而煩燥此熱
 毒欲散未散之際但解熱毒而已宜用豆湯解之以黑豆煎汁
 放溫徐徐與飲之

○瘡疹身熱耳尖脚梢冷腹內痛或塊

病有似是而非若同而異者蓋肢體冷而腹痛者此毒氣在裏
 若不能審諦必作極冷治之反以熱藥為害愈深未冷極者不
 問身有無寒熱肢冷腹痛必大便自利倦卧惡寒今身熱肢冷
 腹痛大便不通蓋熱毒在裏則熱甚而發厥伏熱深而瘡疹不
 能出者宜以蟬脫末水煎服之而已出者亦可服之無害毒氣
 得泄則四肢溫暖腹痛自止矣前人論腹痛有虛有實腸鳴自
 利而腹痛者為虛痛是冷也腹滿而不大便者為實痛是熱
 也今腹中痛而不大便又身熱耳尖冷却冷為瘡疹證明矣又
 有瘡疹始發腹中有塊而痛醫者不能詳辨多作食積下之至
 於大損者多矣

○愛護將理

小兒稟賦摩頰以通之榮衛不和洗浴以通之膝理空疎粉未
 以密之此皆外可以通肌也及其瘡疹既作血肉作膿肌嫩
 未實諸氣可通恐惡氣有所觸犯而入故制方論使愛護而為
 防備計故云已出未出切忌見雜氣衝觸薰勞入又孤兒人羸
 之尤忌勞勞人相近未愈者不可當風生卧如當風即成疥癬
 也若瘡疹膿疱出可澆牛糞灰貼之則速愈而無癢也及左
 右上下不可飲胡葵酒能禦汗氣惡氣也若能食者時與蒲萄
 食之為其能利小便及取出快如德之義若紅爛膿有甚者以
 乾淨黃土細羅以傅之仍數敷食蜜若勢輕者則以芒消和猪

膽調金瘡上勿令動着其候瘡如落也有大段瘡發不通即瘡者以麥麩飯即將息不問已發未發皆可燒乳香於房室中令氣味不絕辟一切惡氣

○手足冷腹中硬為瘡疹

厥肝已有伏熱而感外風寒以擊之此陰陽相搏於榮衛輕者在腑為瘡重者在臟為瘡若手足稍冷况陰冷腹中硬痛者是瘡疹證或有驚證者由瘡熱動心切勿候投驚藥若驚藥候投則毒邪內攻其瘡不出便至危殆或出後為驚倒但服平和勻氣發散藥心愈

○聖惠方論瘡疹未見乃可疎利

凡嬰童患瘡疹候初覺似傷寒面色與四肢俱赤壯熱頭疼腰背痛足多厥冷眼精或黃或赤脉息但多洪數絕大不定小便赤而大便多秘總覺四肢色候雖是瘡疹未攻皮毛穴出者可

○石壁經論瘡疹歌備詳其證

小兒瘡疹候偏多咳嗽痰涎作久疔熱候心神如怕物驚時羊眼白翻波認目看燈睛有爛吐來氣逆又相磨十歲年中如發播唇紅臉赤疎交羅湯水心煩頭滿熱耳冷脚冷發無過古上有如粟米樣定知三日發交瘡此病未來宜早療莫將涼藥與伊摩細辨形證為妙用只將平藥以調和

○辨劉氏論轉下張氏論用藥

劉氏云初虞世所著必用方大有益於世惟瘡疹云當轉下誤入甚多緣方宜不同所稟虛實有異故也蓋小兒瘡疹轉瀉則助毒毒氣不能運出復攻於裏傷伏多致大傷張氏論用藥瘡

疹服惺惺散次服人參羌活散等如壯熱未退切不可通利大便及溫熱藥恐令瘡疹不出二人之論與初虞世之論皆未可熱煩在臨時可溫則溫可下則下皆有可溫可下證別具詳之矣學者宜通變用之可也

論痘疹已出證第二

○瘡疹熱與諸般熱不同

發熱證候多般瘡疹亦發熱也其體熱則同所得之由不同須引證而辨明之則各異發熱如瘡狀熱作有時者溫熱發熱飲食不減者名風熱發熱而頭熱肚熱右額有紋者名食熱發熱熱而多渴渴則瀉者名疳熱發熱唇上下汗出唇中間起一白疱子及耳陰皆冷者名變蒸發熱而額正中髮際有青紋下至眉心則發熱者名驚熱發熱而皮膚或赤色熱痛時時啼者名丹熱發熱目閉面赤色者名胎熱發熱而面赤汗出而鼻流

○瘡疹出視輕重

消涕左額有青筋文者名傷風熱發熱而面色青慘耳鼻冷惡寒無汗亦左額有青筋手足厥冷者此名傷寒熱也又有發熱之中偶有時行寒疫者則耳與陰反熱若瘡疹發熱則不同然呵欠頻悶時發驚悸乍涼乍熱手足時冷面目頰頰赤嗽嚏者此皆瘡疹之熱證也

○瘡疹出視輕重

病首輕重藥有淺深病深藥淺不能去病病淺藥深真氣受弊觀瘡疹分輕重而治之其瘡疹出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏白者輕瘡疹夾疹者半輕半重也一發而出盡者重也外黑而裏赤者微重外白而裏黑太重也青乾勞瘵昏睡汁出不止煩燥熱渴腹脹喘喘大小便不通者困也瘡中端大小如針孔者紫劇也論輕重為用藥之法輕者宜日氣令其自出也半輕半重宜解毒散則自輕也毒氣重者宜利小便太重而勞劇者

醫隨正滲泄熱氣衝於心則謔言妄語則珠砂參苓之類可用
 心蒸於肝則搖擗狀若驚癲則防風羌活天麻全蝎兩星之類
 可用也蒸於脾則腹脹渴水大便秘目腫則枳殼散橘麩山朮
 地黃之類可用也蒸於肺則喘急渴水咳嗽鼻乾則桑白皮馬
 兜今半夏之類皆可用毒氣歸腎而黑麝入者宜借皂膏活
 血散皆可急而用之也又有風邪客搏於皮膚熱不得泄瘡變
 為癰瘡之狀皮膚癢者則輕又有內先熱外被風邪相連
 搏於血則赤斑其毒亦深傷寒變瘡痘者其傷寒熱毒甚而發
 炮瘡其瘡色白或赤發於皮膚頭作癩漿戴白膿者輕有紫黑
 作根隱隱在肌肉裏者其毒必甚重者五內七竅皆有瘡其形
 發如豆故以名馬大抵正瘡痘是母腹中時受積穢良田內實
 而斑毒生其感風感寒為癰瘡為痘毒為痘瘡皆外邪乘內實
 而伏於臟腑內外皆熱蓄血聚壅過不行結而成也所遇
 之初不同可不辨之正瘡子內實而生者五臟各有一證前篇
 備論之矣且傷寒傷風何以別之面青四肢微厥無汗而惡寒
 耳與陰皆熱者傷寒也傷風者面赤四肢煩熱涕有汗惡風
 此二者宜審而早治之不爾為瘡也若在母腹中蘊毒氣者
 千金方云兒初生以生地黃汁一錢與服便黑糞為解又瘡
 疹臨發未出之間以升麻湯解之冬溫以三豆飲子解之時氣
 發瘡疹恐相傳染以茵草根煎汁解之此皆瘡痘當用者惟傷
 寒傷風變為瘡痘是汗下失時之過

○瘡疹疎利與取轉不同

瘡疹已出熱毒居表而不可疎利疎利是未出時即疎利之疎
 則散其熱氣利則滑其肌竅使熱毒則發泄而不壅遏其瘡疹
 輕而易出也及其瘡疹已出即不可疎利宜以和平勻氣藥調
 理為宜又局常令人取轉即且疎利與取轉相去遠矣疎利者

是以輕涼之藥疎散易出也如黃連散青黛散當歸散煩燥
 疔不安煩煎豆湯徐徐服之取轉者是以峻快之藥轉下也
 如巴豆苦硝輕粉水銀之類是也疎利與取轉輕重殊等不可
 同日而語古言疎利今乃為取轉得不為誤耶

○辨瘡痘指迷方論與錢氏活人書不同

小兒所稟有盛有實病証有寒有溫故良工隨宜而治各得其
 所今觀董汝與指迷方論其稟氣厚者或病熱而又失於解利
 有蘊積熱毒者治法則當利利之無不愈此由小兒稟氣已厚
 又有病熱而失於解利蘊熱在裏則宜利之利之無不愈矣此
 董汝指迷用藥之意皆熱毒未出於表蘊毒在裏時用之也若
 無錢氏方活人書用藥之意錢氏論倒靨欲脾強而勝腎得身
 溫而渴陽氣復者可生也活人書云身熱耳冷尻冷輒用利藥
 則殺人二人之論身熱為瘡疹毒以在表氣虛在裏故不可利

但以溫平解毒而已故知傷寒身熱而下之早毒氣入裏為結
 瘡瘡毒為熱在表下之早為黑靨為陷伏四人之論皆不可廢
 用之要得其宜後之醫者當以董汝指迷方治瘡疹未出預截
 熱毒若已出了者解利餘毒則無不愈矣以錢氏朱氏之意治
 瘡疹正作使外不至太過裏不至陷伏亦無不愈者大抵治瘡
 皆當隨宜用之最為要法譬如小兒患有傷於冷者有伏熱者
 有被驚者有感風寒者有傷食者臨期分別豈可泥於一曲况
 習醫者又隨方而用之以愚觀之昧者徒五見其偏審之四說
 皆為可用

○治瘡疹方宜不同用藥亦異

素問云一病異用藥各不同皆愈者何也此地勢使然爾且東
 方食魚而膏膩令人黑色而疎理為病癰瘍以砥石治之西方
 風土剛強外邪不能傷其病生於裏治之宜於毒藥此方風寒

水烈截生寒滿病其治宜於... 南方天地所長陽盛其地... 水土弱而霧露之所聚其民... 酸而食附病而學詳治以微... 中央地平以溫其生萬物也... 衆雜食而不勞病為痿厥寒... 其治宜於導引按摩是以五... 方地勢高下不同治法亦異... 故仲景治傷寒用桂枝麻黃大... 青龍湯皆是熱性藥云西北... 二分行之無不應驗惟江淮... 地處卑用加減法如升麻石... 膏知母之類是隨此五方地... 氣而用藥也又云病素有虛... 實者並用古方不在加減法... 當此隨時變通不泥可於一... 曲且西方風土剛強外邪不... 能護病生於裏其治宜毒藥... 利之設有陰證者亦須用理... 中湯四逆湯之類以復陽氣... 南方雖為陽精拱上其地下水... 土弱霧露之所聚病為擊痺... 設有陽證者即加大黃大青... 黃連葶藶苦酒之類以復陰... 氣也此皆前人得隨時增減... 之理則知瘡疹豈在專補專... 瀉但應當日脈正法逐可也... 方宜各自不同故用藥豈可... 執泥哉

○瘡疹戒失不可當... 人之飲食起居者消息虛實... 存焉且晝日起居行坐其氣... 血漸降也夜則倒臥血氣漸... 升則心安而逸也此上下亦... 降虛實運動也且人之胃腹... 方其飢也則腸實而胃虛及... 其飽也則胃實而腸虛此平... 居飲食進而無病尚且一起... 居一飲食而一虛一實存焉... 况小兒在母腹中所蘊毒在... 臟腑欲出為裏熱熱甚而發... 於外其熱暴出其裏蘊毒正... 賴飲食湯藥以助之苟或失... 飢內無食以助胃何以運出... 其毒痘則為黑靨陷伏者多... 矣此內虛所致也故不可失... 飢者此也又瘡疹正出乃表... 實裏虛心煩惡熱而欲冷或... 起居當風或失蓋覆則裏熱... 被外風寒所搏而為陷伏者... 亦多此外邪所致核瘡疹者... 可不謹歟

論人論瘡疹有大熱則當利其小便... 蓋大熱則裏熱肺實大小便皆不利... 心熱而渴氣滯而喘飲食不結... 膿血疔疔當此裏熱既盛俱其... 生他疾故利小便心火有所導... 引雖不用冷藥熱亦自減去矣... 可待其瘡疹至熱過不為冷... 誤尤為良法其小熱則解毒... 蓋小熱不解大熱必生小熱... 而利小便則損氣當此有小... 熱不可利小便但解熱而已... 如玳瑁湯獨勝散安斑散如... 聖散紫草湯犀角飲此雖不利... 其小便其熱亦不能為害當... 思前人云大熱者方利其小便... 有小熱者尚不敢利其小便... 恐致損氣彼其委下者可不... 愧乎

○小便赤澀心腹脹滿... 因瘡疹伏熱在胃則中有所... 隔上則心火不降故小便赤... 下則陰氣不融亦故為心腹... 脹滿蓋紫草散發出其毒胃... 中熱散自然冰釋詳其藥味... 以紫草發散以黃耆定痛... 解毒生肌以枳殼治腹脹... 令大腸不秘氣逆消脹以... 木通導心熱而利小便以... 甘草和之古人用藥必有... 至理焉可不以意推之

○先曾利而後瘡疹出不可再利... 但解毒而已... 飲食芳味雖能益人用之... 過亦能害人况烈毒標悍... 之藥又在已下之後豈可... 再利之此五臟不可再傷... 故也蓋瘡疹未出已曾先... 利之今瘡疹始出則內無... 壅滯熱毒縱有亦已輕矣... 故云曾經下後惟有熱者... 瘡幾矣其熱亦衰幾矣大... 抵瘡疹不經下亦有內虛... 者宜勻氣安養之又况... 曾下而後瘡疹出若又下... 之是重虛也

○煩燥而渴... 心經有熱則煩燥脾臟津... 液少必口渴咽乾而渴也... 瘡疹已出未出皆宜用甘... 草散若心煩發渴大便不... 通小便赤澀者宜服通... 關散煩而帶悶灯心湯... 主之夏月天氣大熱... 炎暑煩燥熱渴

大便澀而小便赤者白虎湯加入參煎服之虛煩發燥而渴小便不利者五苓散酒蒸黃連九皆要藥也宜擇而用之

○瘡疹煩燥腫則不安者

陽氣勝而陰氣少則煩而燥甚則其心悸動不能安矣故身熱煩燥腫則不安但清心利小便則自然安適若表不解身熱而煩燥腫則不安者服水解散或結糞大便澀而煩燥不得眠者必腹脹半掌心腋下汗宜服麻仁丸或煎黑豆徐飲之甚者青黛散以水調服惟津液枯少虛煩之氣晝夜不得眠者酸棗仁湯為良也

○瘡疹毒狀如蚊蚤所咬毒盛而黑色者

瘡疹陷伏虛實不同宜詳辨之有胃寒榮衛氣虛而陷伏者則肌膚慢瘡觀皆白不欲食或嘔大便不秘小便清白者此皆宜溫之活血散人茲散胃愛散虛寒甚而至於自利間亦可用雞

附子理中

五苓散

白虎湯

五苓散

附子理中五苓散亦可用瘡出為期又有毒氣內外壅遏熱蓄結聚而不散毒氣壅聚於肌膚急出不得墮於毒氣倒瀝黑色蓋血活如朱砂如鷄冠色若毒聚血聚則黑色又如蚊蚤所咬而黑色者由毒氣暴出熱搏之故血凝而不得出為黑瘡其證最惡其大小便秘腹脹滿喘急煩燥者宜用山梔子湯宜毒膏治黑瘡子志候無比散毒氣內攻紫黑色出不快者莊氏云斑瘡倒瀝帶黑色者謂之兕瘡子宜積猪尾血調腦子佳

○誤服涼藥水伏瘡疹者服胃愛散

小兒胃熱出斑瘡蓋胃者主一身肌肉其胃中熱則身熱身熱大甚斑毒得出胃熱既出其裏已虛合以和平藥調助之又有及病家未明乎此見其熱便用涼藥是裏無熱又加冷藥則寒積寒使瘡子不能出也蓋有熱則氣散有寒則氣收使肌

以溫之胃氣既復得溫榮衛復行則出矣故胃愛散以脾胃虛生寒而用之

○瘡子便血毒黑腫不醒者

瘡子當出而不出者此由毒氣當散而不散也蓋心主血而營於血瘡疹不出毒氣壅聚於裏則為便血黑色故神昏腫而不醒其證甚惡脫殼散犀角地黃湯主之

○瘡疹已出而腹脹

瘡疹已出而腹脹者何此陰陽不和也此毒氣陷伏入裏也二者緣毒氣已出而毒盡又正熱或外傷寒而內傷於冷也大抵瘡毒正作熱毒極積則多渴煩燥而引飲又或投涼藥或飲冷水故熱被冷激而不能蒸出冷氣內拒而不能消化其於熱毒氣相搏於裏則不消令人腹脹氣喘甚者發寒肢厥瘡白而無血色或至不救急宜以溫中藥逐冷氣散則腹脹亦消

附子理中

五苓散

白虎湯

五苓散

味者一見腹脹莫不更增宜瀉是謂重困蓋傷於冷者必不能食大小便利時時下氣此傷於陰陽氣不和也又有毒氣陷伏入裏者瘡疹出遲毒氣倒瀝亦令兒腹脹亦宜用溫平解毒快氣藥如人蓋散活血散之類服之大概毒氣伏入者必有熱證相雜或渴或煩燥或大小便秘澀或啼哭不止者則陷伏黑瘡證中具詳矣若腹脹自閉口中如爛肉臭者其證惡此為難治

○當下當救裏

瘡子半出半不出此毒氣半在裏而不出蓋故也或盛出大便不通小便赤澀喘急腹脹而蓋唇乾口燥引飲語者當急下之此由毒氣彌盛而內外皆熱若大便裏急後重者當令大便潤過內不燥不裏急後重腹不脹者且利其小便又有瘡子半出半不出下利四肢厥逆腹脹吃噎此由裏寒毒氣不能出故宜以瀉附理中等藥急下之一則言當下者恐毒氣復入故也

一則言宜溫者恐無胃陽以行榮衛虛實之勢劇也故二者不可廢

○瘡疹既下懼太早

天病有遲速藥當隨應而用可以速則速可以緩則緩如響應梓間不容櫛且瘡疹始出未有可下證但以和平藥調理之乳食飽哺之避風寒以溫之三者皆為保子之常法如瘡疹見而三五日尚未出者可微發之微發不出則大發之大發之出不多厥息平和無他證者即瘡本稀不可更表散也今人總見表不出熱又不退必便下之其內盡瘡子將發者則因利而不出瘡子已出者必復陷陷必黑驚瘡子歸腎此為脾土弱而腎水天勝錢氏以百祥丸下膀胱毒則脾土自實瘡毒可以復出與其下膀胱毒於黑驚之後莫若正脾土於未出之先則不下為愈是風與熱證皆可下今見熱而便下故不可也况下之縱愈亦有三證一為赤痢二為痘痲三為目赤有此證者皆下之失於早不可不戒故前人論曰瘡疹未見乃可疎利是熱毒未形容閉毒在臟腑則預下之也又黃牛升證云瘡疹出定大便不通今膿汁不乾者可下之以此觀之當下證是未出之前及已出定之後非正出而可下也且利毒丸雖治胃熱瘡疹欲出阻狂腹脹氣急大小便赤澀煩渴舌乾腫中驚而厥脈沉太滑數雖名利毒丸利其邪熱燒用大黃大黃性利毒鮮表故傷寒當利亦用之又通關散證云治患瘡疹心燥發渴便赤口舌生瘡用木通瞿麥滑石皆利小便藥也二方皆謂大小便熱為害甚則去其熱毒氣苟不用之又為失下之害故用之豈是瘡疹正出而下之也故下之者不可太早

○誤下證

腸寒身熱固不可下瘡疹熱不在表亦不可轉下者蓋熱毒已

在表故也活人書云小兒身熱耳冷尻冷咳嗽用利藥必毒氣入裏則殺人蓋熱在表則表實而裏虛故身雖熱裏無可下證而便下之則裏無陽以應表至於陷伏而死者多矣力持瘡疹血氣順脾胃溫則易發若裏無熱而誤於疎轉則令氣弱血虛脾冷榮衛無以運化而毒氣難泄立見危殆尤當審諦又况小兒卑寒唇焦內伏熱也脈細面色痿黃或青色皮膚又慢口吐青涎者此候下證也或服涼藥太過或裏無熱壅滯則不可下也

論瘡疹已出後復生他疾第三

○論瘡疹當令大便過者有當溫者有當令下者

夫瘡疹傷寒風熱傷食諸證身有熱者如大便四五日或六七日不通者須用少藥令潤過非取峻快之意亦有外證參之須手細辨認為宜如仲景云腸結陰結大便秘者至十四日十七日方劇苟若至十四日十七日因有他病損耗津液而無結糞腹不脹不裏急後重則不可攻之蓋腸無結糞故也今言六七日本今潤過氣升降則身熱者不生他疾緣小兒純陽身熱而大便不通者易實大便自利者易虛易生他疾當調令大便如常最為候臟腑虛實之要法也雖然大便秘非一證有風秘有氣秘有熱秘虛秘冷秘用藥當細辨也且人能食大便不通結滯如下乘塊者風秘也煩燥飲引小便赤而大便秘腹下至掌心有汗者熱秘也腹脹腸中虛鳴胃腸不利腰腹引痛者氣秘也嘔吐清水不能食面青而瘦冷秘也或久病不能乳食腹不脹不裏急後重雖久不大便者虛秘也凡此五秘者當隨證治之若大便如常且不可以冷藥與服恐水往胃脾榮衛不行則瘡疹亦不出矣又有患至五七日自然瀉者須用與理中丸等溫腸胃藥若瀉住即止後服亦不下過熱此是當下當溫之證又

有瘡疹出正盛喘急腹脹小便赤赤手掌心并腋下汗
或睡中譫語大便不通者用四順散子得氣通喘定腹不脹則
已之下之瘡紅快者更不須通也

○瘡疹或吐或瀉或不食

瘡疹之證或吐或瀉或不食者此由脾胃虛弱也小兒胃熱出
斑疹大抵瘡疹多出於胃緣熱毒方作之際必多煩渴燥熱引
飲或於風寒家坐臥不安熱相傳冷氣入胃故令胃冷則吐
脾冷則瀉脾胃皆虛則不食也當以治中益黃等隨證與之其
者隨宜增減以吐利止為度又有熱吐熱瀉則不同何以別之
蓋熱吐者手掌心并腋下熱而澀澀有汗發渴而臉赤而飲冷
未能言而渴者則一向飲乳聚其飲乳滿於胃臆不能消化吐
出射是熱吐也總吐了又急欲食乳是內熱而渴但能言其
渴醫者不審見吐利便用燥藥熱極生風者害人甚眾非特瘡

疹有此他證亦不用此分熱吐熱瀉尤審熱瀉者小便赤赤而
渴口燥咽乾皆當用五苓散竹葉半夏湯主之小兒不食亦有
虛實二證或吐或利面青而目睛青黑色而不食乳者為虛寒
而不食也宜溫之大小便如常面赤而壅或渴或腫中驚或咬
齒目白睛黃赤無喘或身熱而不食乳者此為實熱中滿而不
食乳也由如伏熱者亦不思食胃滿滿悶食故尤宜詳審

○瘡疹皆多在表不可妄下

傷風與寒以汗解汗者穀之精氣也瘡疹依膿血而化膿血而
疔血也古人以解利藥如芥蘇湯之類皆懼其血熱毒甚則瘡
疹尤甚故少涼血以解其毒瘡疹亦易於將理何貴以轉瀉傷
其臟腑脾胃也蓋臟腑脾胃既寒何以運行榮衛榮衛既遲瘡
疹膿血亦何以蒸成故知傷寒則氣行汗出而已尚不可下
况瘡疹在血氣溫厚內不虛而外不寒則出而不伏隨失則不

觀內補散治瘡疹至驗皆是煖血行榮衛藥今瘡疹與癰疽皆
瘡也何嘗以轉瀉而治瘡疹也

○瘡疹隨伏倒靨

瘡疹隨伏倒靨方書稱倒靨而己殊不知內虛不能盡出者為
隨伏外被風寒所迫或被惡氣衝觸而不得出者名倒靨然得
之有始末輕重不同若一藥用藥因緣夫橫者多矣蓋瘡疹已
出斑點為始以血疱為中以結膿為末三者淺深不同
為得不論夫既出斑點為始者膿未成而毒氣內外皆熱數日
既熱其毒斑毒於肌竅出於皮膚亦有隨伏亦有倒靨斑點始
出外被風寒所感使肌竅後閉血凝滯而不行必身疹四肢微
厥氣血凝實與風寒相搏於肌膚必大小便秘斑點不長或黑
色或身生青紫癢疹此為倒靨也當此可溫肌發散風寒如紫
草陳皮薄荷入煎極極荷葉之類溫散寒邪然後熱氣復

行則斑出矣有胃虛而不能副榮衛者雖出而後沒故斑運白
色或黑色此內虛所致故出而無血氣以應之其人必不能食
乳或大便自利小便不赤而清或倦或嘔四肢微厥其由內胃
既虛自不能出此為隨伏也當此宜用溫辛之藥令其胃煖榮
衛復溫必自然出矣如理中湯活絡散入齒散之類以溫之吐
利甚者須薑附疏桂亦可用此治內自虛而隨伏者也若以血
疔為中者是紅斑出之後至是有斑為出瘡疹毒方出盡也
自斑點生如豆起於肌皮之上所以血疱為中者未結膿血疔
疔之前證也血疔七日當結膿血疔當此或外被風寒所感
為倒靨或胃氣虛而吐瀉為隨伏者亦如前法治之可也血疔
是毒氣正盛湯熱內外稱滿無陰以收之血疔出至七日而當
結膿粟疔而愈今七日而尚如豆大血貫之不結膿粟此尚
毒氣內外貫注血熱相搏必復入於心矣二至危斃急以豬尾

膏原心血使陰氣感之必隨時結茹花而愈古人以味心腦
精血等原心藥治瘡疹是治其毒氣已出後心熱毒氣倍常則
用之也非治裏自弱而附伏者非肌竅感寒而倒靨者可用也
附伏倒靨皆虛寒證附伏胃弱自不能出當溫之倒靨是風寒
外感於肌竅當發散故非猪尾膏證猪尾膏是治心熱太過而
不能自收軟結如死者非為涼脾之藥也蓋素問云瘡瘍燥痛
痺皆出於心當血死後紫黑而不結膿案內外貫注毒氣
必復於心則危矣以血死結膿案膿案結如死如結膿案如死
內外有感胃而生病者此觸胃之過治之無異於前斑點時用
藥也觀小兒數日食則胃熱甚氣耗作斑點膿案則血弱
結毒死之際少增滋養藥術調劑寒溫藥以助之為佳病後服
解利藥亦不可緩也瘡疹未透心煩狂燥氣喘妄語或見鬼者
龍腦膏觸犯黑色者奪命膏黑陷者百祥丸藍振散四聖散入

藍散毒感而黑色者山拖湯宜毒膏良方治毒氣入臟而不出
者鴉子指血酒活人書黑瘡子惡候無比散借金散朱砂散瘡
子反入抵聖丸救生散玃玃散化斑散瘡子靈花蛇散蘇黃湯
濕生蟲散撒攪被磬水牛旁散治黑色名鬼瘡子入齒猪血散
皆是熱感毒氣倒靨者非治裏虛吐瀉不食而倒靨者如脾胃
虛吐瀉或斑未出醫人不識誤用涼藥水却致令內伏不出胃
受散主之服之汗出者不用控心散如無汗即服控心散後下
羌活散為良

○瘡疽黑陷耳脫反熱
五行以土旺制水五臟以脾制腎蓋土旺水升上而不下走泄
此五行相生相制使之既濟此五臟平和陰陽非降也且人平
居飲食以滋脾土脾土運化滋榮衛觀脾土於中上流肝榮脾
衛下以腎水不走泄為失其平則有太過不及之患何以知之

瘡疽出而耳脫此脾土勝腎水瘡疽陷而耳脫熱此腎水反
勝脾土矣蓋耳脫者腎也體熱則血脈凝滯則殺氣盛也或氏
百祥丸瀉勝脫腎水令脾土復旺當此致於不救者亦十有八
九亦豈得已而用之哉當此之際不用百祥丸則無治法毒氣
去而真氣不絕者猶活不去其毒則束手矣如活人書厥陰證
土敗木賊用承氣湯瀉其毒氣亦豈得已而用之當此而不下
亦不可也愚思之與其瘡疽用百祥丸傷承氣湯下其毒與
若救脾土於未侵之先治其未然者為良瘡幾不致狼狽之地
成功於不見危者為妙

○瘡黑亦有逆順者
瘡疹出者為順黑陷伏者為逆然其中黑陷亦有順者此為
瘡逆脾氣乃強則脾土盛制水也是脾強而腎退雖黑陷而忽
瀉膿血并死死者順此必舊服補脾藥脾氣得盛而不衰其外

脈絡瘡黑陷而不死者得脾臟不衰則心肺肝腎有以救之素
問云脾病則五臟危今脾土既盛餘四臟則無慮矣臟腑既無
虧盈則不能為害又有黑陷而逆者乃水殺不消瀉乳不化者
逆是脾虛不能制腎故水殺乳食不化而自泄此脾土既衰於
衰外有瘡疹黑陷者是毒氣陷伏必先入脾脾虛而受毒四臟
皆因而危殆矣是以為逆為難治掌觀古書云病在臟者半死
半生病在表者輕以此瘡疹瀉膿血瘡疹者雖順非可為常治
法此亦九死一生之證爾

○瘡疹出遲朝夜啼哭
神魄聰慧智 五臟之正神也喜怒悲憂恐五臟之情為也人
之五臟調暢則安適抑鬱則煩悶故小兒瘡疹者雖非常之熱
毒為瘡疹而外未得在臟腑而不能散故毒怒不常悲恐而
仍則神不能安而朝夜啼哭也當此醫者察其毒毒在表在裏

當隨證治世若發熱湯水面赤小便赤五微表令出可也若於無熱大便秘腹脹滿者當令大便通大抵內無壅滯之氣則榮衛通行神視泰然瘡亦出快矣若者不知察惟見朝文啼哭或以為心熱或以為聚痰或涼或下不能去其表裏熱毒復使其冷熱相併天生多疾不可不知

○瘡疹凸凹生瘡

瘡疹結膿痂可扒碎之則不成痂痂今瘡疹雖結痂猶無肌肉致令凸凹也故在結膿未成乾死扒去之則不成痂痂矣有瘡疹愈而再生者此因瘡疹安後失解利毒氣留滯敗熱於肌肉之間也宜用明膠散次服密陀僧散散腐白散牡蠣散馬齒莧散秦皮散等以傳之為良與其用藥於已再生瘡疹之後莫若解毒於未再成瘡疹之先

○瘡疹大便如常

脾胃納穀氣大小腸出津液此平居察虛實冷熱之象蓋飲食進退則知人穀氣之虛實大小便滑澀則知人之冷熱也熱則秘澀而不利冷則滑泄而無度今大便如常則知臟腑平和無天熱大冷之患故不在補瀉亦不可妄攻擊也且活人書云清便自調則是大便如常又云大便堅小便數不可用承氣湯攻之是津液已行於小便故但以麻仁脾約丸用之可也小便清者不可下此無裏熱也大便硬而小便少者未可攻此津液當還入胃中大便自過也陽明病自汗出苦澀汗小便自利者不可下此表裏皆亡津液也又云小便赤却當下此是表裏證俱見以五苓散主之又云不大便六七日頭疼有熱者是裏證當下小便清者知不在裏仍在表又云大便硬而脈沉細是裏證當下以此觀之古人治病未有不審飲食進退大小便滑澀自外而知裏此非再治瘡疹之法若害瘡疹或醫地病川之亦

良况嬰童未能言者尤用此

○瘡疹服藥則損目服冷藥則無不夭傷

火制金木制土水生木木生火皆自然之理也順之則安逆之則否故瘡疹是熱而生又益以熱藥則損目抑之以冷藥則為陷伏蓋人身無非常之熱亦無非常之冷但溫和而已今瘡疹身暴瀰非常之熱而鬱發肌腠蒸之為瘡疹順其熱則出而毒散及其熱過則損目為咽痛為癰瘍為狂眩抑之以冷為陷伏為黑癩為天傷故善醫者使陽不至虧盈陰不至鬱伏調適中和而已苟為不然陽勝則熱盛而生風肝應於目無不害目者陰盛則脾土無燥氣腎水反勝為黑癩陷伏則天傷者多矣不可不察

○斑爛

病當發散而不發散則毒氣閉塞胃而喘促悶亂而不知人不可當發散而強發散則熱毒隨陽出於肌竅皆為斑疹遍身無數肌肉如爛故名曰斑爛此失於不善表者之過也治斑爛之法調脾進食大便令不秘不利養榮衛以生肌解毒則無目赤無咽痛無口瘡無吐衄等證解之不至於冷調養不至於熱最為良法也但斑爛發膿痛甚者用乾黃土羅為細末傅之輕者用芒硝猪膽汁調塗瘡上勿令動著直俟瘡疹脫自落大段瘡發多不通卧席者即用麥麩簞卧將息最為佳又有因於表過多外則斑爛為陽氣在外內虛生寒臟腑自利急當救裏如理中豆蔻之類臟腑自溫平其瘡必愈

○感寒與瘡疹伏熱相雜而發者

瘡疹是五臟伏熱於裏因熱蒸而以外其感冒是外感寒邪漸伏入裏且感寒始發則頭疼發熱惡寒流涕左頰不青以者感寒也夫感寒者寒極則生熱邪熱盛則實實則動加伏瘡

疹之寒熱交作陰陽混雜證候非一故醫者若汗若下則疹疹
隨出蓋感寒在表熱在裏寒極而生熱熱則隨出若不其
寒則疹疹不能出但表證身熱而喘則微汗和解之裏證腹脹
大便秘小便赤澀者則微利之煩燥渴甚者但利小便胃腑食
不下者宜吐之此發汗吐下利小便皆是去感寒伏熱邪氣也
治之則當發汗吐下利小便隨手而愈但用藥者不可令藥太
過最為良法如過於表者疹疹出則為斑爛為口傷爛去下之
過者為否悶為內陷為下膿血當此細推之疹疹非感寒之此
緣有疹疹隨出故用藥者不可不謹

○瘡毒不散

治病當隨時變通不可泥於一曲也且瘡疹之證如熱毒在表
者不可下下之則裏虛為害非虛亦不可助之助之裏有壅熱
為害亦不可令有大熱故前人云斑疹未見者以葛根湯見粘
子湯惺惺散紫草飲子解利之但裏不至冷大便不至利氣實
者可服之也或有不問虛實以胡荽酒酒之或以葡萄酒飲之又
火燉人齒 酒調服之若盛實者服之則為害蓋胡荽酒葡萄酒
酒火燉人齒此皆內虛自利陷伏者可服之苟為不然則助之
以熱毒氣貫注耳目口鼻悉平胸中閉塞大便堅秘小便如血
是毒毒不散則熱毒無從出也毒氣攻臟腑故使口而不起
謂之倒靨蓋毒不散又不能解之至於斃者不可勝數矣蓋
陽熱無陰氣以守之當此之際豈不觀六便堅秘小便皆如血
若有此證者猪尾骨化斑湯犀角地黃湯犀角玳瑁湯可選而
用之也用之則毒散毒無滯疹疹自出矣皆常用已驗之法
姑條次于下其疾始覺頭疼發熱或微熱而後作寒煩燥嘔痛
者則以四味茶麻湯癩癩或癩疹者則以荆芥湯面赤大便秘
小便赤而嘔者以小柴胡湯不惡寒但煩燥而小便濇又多湯

而成赤斑點者以竹葉湯犀角飲子大便不通者與四順飲子
唇甚謬語大便不通與承氣湯若大便日利黑黃色毒氣亦用
折出大便已利又得調氣藥以助之其疹亦稀乳生斑者以自
然出者不可表也斑生而至足

○飲乳嬰兒與能食童子用藥不同

夫飲乳嬰兒者由人之生胃氣未固胃氣未成飲乳易傷風邪
易入臟腑嬌嫩血氣懦弱肌體不容精神易弊故用藥當審其
大小輕重而用之可也蓋差之毫釐立見危殆安可與能食童
子同用藥也且能食童子自絕乳後食火灼炮炙之物酒麵并
肥魚肉滋味安可與飲乳嬰兒同用藥也夫嬰兒有疾服藥但
與乳母服之為要法譬如童子與食與嬰兒飲乳同乳母既服
其藥必流入乳兒亦飲之是以童子能食服藥也免其慄悍毒
烈之藥蒸薰臟腑亦為良法且能食童子穀氣既實臟腑充盈
如生疾病能食不大便裏急後重手掌心赤腋下汗當令大
便如常過心熱啼哭小便不通心神不安當利其小便飲乳嬰
兒有斯疾但將斯藥與乳母服是亦嬰兒服之也

○瘡疹本稀不可發表

夫傷寒表證須看榮衛淺深故仲景有發汗者有調榮衛者有
和解者三者分輕重虛實淺深也瘡疹固熱毒而斑生亦皆
熱氣深淺故瘡疹本稀者為不可表小兒數日熱運於少自快
但以升麻湯荆芥散主之出雖少足心者此出疹不可表也
出齊皆成血疱或已出膿疱或水疱或至於痂疔者皆不可表
此臟氣既平榮衛既和自然而愈妄加治療補之則熱瀰之則
寒表之為斑爛愈生多疾矣何謂瘡疹本稀蓋瘡疹無定數如汗
之無多寡但看所蘊熱毒之微盛爾且瘡疹出而不甚熱既出
而喜笑如常無寒熱無煩燥諸證蓋有少便膿血痂疔此皆瘡

本稀不可表也但解毒而已若本稀而強欲發之則為斑爛為

○瘡疹無凝滯則勿表勿下

病有遲速蓋日數待禁衛以祛運其蘊毒而出也且瘡疹熱數
日運熱毒為赤斑點出於肌膚中至足有方為出齊蓋斑點長
成血毒血毒成膿膿成膿疔結痂此雖大畧之言瘡疹必先斑
次血疔又次膿疔又次結痂此自然之序善治病者不可先
時而後亦不可後時而先也蓋傷寒表證出汗而愈其有一二
日便汗出者則名為狂汗雖出之必復重又期六七日正汗出
則愈矣傷寒裏證當下則下之若下早為結胃為痞氣蓋病深
在裏者則可下以此言之比之治瘡疹或表或下若太早則病
毒不去真氣受弊有如瘡疹自然出快不勝其幸若反加安表
妄下適以為害然發表則熱氣承表而出不知有熱微盛為斑
爛為倒靨為虛脫者多矣妄下則為內虛為陷伏為大傷宜審
究之可也合表合下證各別具詳之矣

○瘡疹起而能食

病生於裏而達於表觀其表而知其裏亦在乎熱之而已矣且
瘡疹起而能食者蓋瘡疹出於表而裏虛當食少今陽氣出表
能食為裏不虛而有熱本方用大黃九下之亦更看津與必證
然後用之若瘡疹起而能食大小便秘而喘滿面赤胃閉者則
宜下之若無此證知其熱便下之則誤矣豈不謂瘡疹起而能
食便下之但知其中不虛爾雖瘡起而能食無別熱毒證則不
必下也

○黑靨帶未發寒

夫黑靨世俗之稱有二一曰倒靨二曰暗伏且倒靨有四證一
則感風寒二則毒氣盛心熱與外熱壅鬱蒸不消毒入

三則飲食少而內虛臟腑或泄利無陽以應之遂倒靨四則不
禁房室穢氣衝觸名同倒靨所得之由既不同用藥救之豈得
不異若不究其源一槩論之則無不天傷不待此爾一若瘡疹
正出坐卧當風或失於蓋覆感外風寒搏於肌膚之中榮衛受
寒必發熱而惡寒頭痛鼻流涕當此之際宜以溫辛藥表散
寒氣若失於治療榮衛受寒不解加寒戰而喘悶則為倒靨著
一也二者五臟蘊積其熱出於肌膚小兒陽盛而陰微熱毒滯
漫心熱壅滯而不收使外不特作膿結痂疔內不得毒氣消散
當此之際用涼藥解毒利小便藥以治之令其毒氣漸消則愈
苟失其治療則為倒靨者二也三者其人稟受氣怯或因患而
飲食少遂致脾胃虛弱因虛而生寒因寒而下利因利而內虛
冷當此宜急用進食因臟腑寒以溫之臟腑既平因飲食進乎
足溫煖則瘡疹復出矣世有醫者瘡子是熱不敢用溫藥遂致

○倒靨者三也四者瘡疹正盛內外無寒熱無虛實證候而不出

者此由不能禁忌穢氣衝觸胃房勞觸犯若有此犯則瘡疹不出
毒氣入心悶亂而斃若已出之後觸之則令其瘡黑爛痛極如
刀割其癩痕經年黑色此仲景所謂瘡疹未發之間宜於房室
燒赤木猪甲二物辟惡氣謹戒淫慾常令人守房室門戶忌生
人入房恐有觸犯令見瘡疹難出也其他或得上常面青黃者
輕甚而至斃者不可救藥此謂倒靨者四也夫一日感寒宜溫
表二日內盛毒復入裏宜利小便解毒三日內虛宜溫表四日
觸犯宜禁忌九此四者治療失度用藥差殊則難救矣夫所謂
倒靨其不發寒者為輕倒靨發寒者為重蓋脾之土弱反被腎
水所勝故錢氏用兩祥丸瀉膀胱之毒去之黑靨而發寒此是
誤認瘡疹證候為他疾而妄下之脾暴虛極至於發寒以致危
殆錢氏下祥丸以瀉膀胱之毒是陽氣復還以助脾土者則可

矣若言瀉勝此經水必令脾土自勝此好奇者之言蓋黑驚為腎但瀉勝此經毒爾殊不知先慢下之則脾土益又言瀉勝此經水豈不知臟腑根本皆虛是謂虛虛前人之意但瀉勝此經毒氣也故曰黑驚而未發寒者稍輕况黑驚是逆而發寒者為重愚因而詳論之正如活人書云厥陰證士脫木賊乃胃土受肝木所剋則心火腎水不能既濟令人胃味以大承氣湯下之胃毒既去水升火降則寒熱作而大汗解矣承氣湯去百祥九皆去毒之意

○可下證

瘡疽出大盛為血癍在肌膚之上至三日或五六日當結膿血癍而愈今瘡疽六七日不結膿血癍死若此由毒氣盛而裏外貫注若不速解之毒氣復入為倒靨宜猪尾膏者脈與外證審諦方可下之其血癍至五七日不結癍能食而喘發渴腹脹

昏睡諸語不大便者用承氣湯川黃散下之如作渴發熱面赤

悶亂大小便澀或大吐者當利其小便宜通關散主之又瘡疹已出定大便不通瘡出膿汁不乾者牛黃丹又有瘡疹證而未出胃熱發溫狀氣癍腹脹滿大小便赤澀睡中驚悸煩渴口乾脉沉大滑數此是毒盛而不能泄常用利毒丸下之裏無滯氣藥前外降瘡疹自出矣此皆合下證也又有瘡黑陷大便自利腹脹者乃虛寒證也當溫之不下

論雜病第四

○諸惡證

夫痘子出而後不出或大瀉而或有不此候皆因瘡疽出而服冷藥過熱毒在肺中也故煩燥迷悶不食或大小便難皆惡候也瘡毒帶白膿者其毒輕或紫黑色隱隱在於肌肉者其毒重甚者五臟咽喉內必有瘡其不大小便難便澀出血而瘡黑

驚生膿者死鼻有黑氣者死或痘疹未出毒氣內逼目睛上實驚叫有如驚風者此乃瘡欲出之候也若誤認為驚謂治必使毒氣內蓄邪熱不泄亦乃死候或有瘡痘既出證語不以此亦惡候或見是瘡以藥解利見瘡疹反沒者乃死宜急溫之復出乃愈或瘡作白胞忽然伏入臟腑漸作紫黑無膿日夜煩悶啼哭其證尤惡服此毒散其毒必手足心出乃差此是五死一生之候若便血瘡陷無膿者死其有猛毒痘瘡不出者一生以地黃雄黃令飲不可太多多則反有所損前證皆惡候

○先知節候陰陽虛實

夫稟氣盛者夏酷暑而不熱冬嚴寒而不冷此裏實而寒暑不能侵之也稟氣弱者未寒先寒未熱先熱故未有十日天寒日陰則感寒濕而濡瀉未有十日天溫日明則伏熱而中暈此虛弱之人常態也蓋先知節氣者能辨陰陽寒暑出入之盛衰素

問云陽盛人能冬不能夏陰盛人能夏不能冬此亦人之虛實

與寒暑相為否泰者矣且立夏氣變純陽萬物茂盛用藥者用熱遠熱如桂枝麻黃大青龍湯并諸熱藥必加知母非麻石膏輩是不盡其熱藥也且立冬兩陰俱盡氣合純陰用藥者用寒寒如服諸涼劑服湯利過者止後服不必盡劑是不盡用涼藥也是寒月不盡用涼藥若盡用涼藥表裏皆寒人不能當校也治瘡疹亦當依此隨虛實寒溫陰陽出入而用藥也皆可拘一證一藥為盡而已矣病人素有盛實或素有虛寒者並用古方不在加減也且春分陽漸在外而陰漸在內秋分陽漸在內而陰漸在外用藥者豈得而同諸此按四時陰陽通合臟腑內外虛實而用之故時當陽出而陰入則宜其愈陰出而陽入則宜其愈故陽出而陰入者虛者病陰出而陽入者實者病此其常理不交者也如冬溫虛者安而實者病夏熱則實者安而虛

者病此皆節氣陰陽虛實使之也冬溫暖夏寒涼非節之為病
者在入將攝而何尔所以錢氏治瘡症言春夏順而秋冬
是論陰陽出入迎合表裏之意也

○行房觸犯燒赤木猪甲

伏積熱毒甚者為瘡疹方其榮衛被熱毒所蒸毒出為斑痘方
其出肌膚受毒靜以守之則順出而愈若加觸以不潔之氣蒸
以行房觸犯陰陽相感毒氣著於人則使瘡疹入裏毒氣入心
悶亂而死若已出之後觸則令瘡黑爛極如刀割縱或瘡疹得
安癩痕經年黑色仲景論瘡疹未出之間宜於房室內燒赤木
猪甲二物辟惡氣謹戒飲酒嗜慾令人守房室門戶恐生人入
有觸犯令小兒瘡疹難出也如有觸犯或有面青黃色者猶輕
要之安胡夢於左右上下安頓之能解狐臭雜惡穢污之氣更
燒乳香令室中香不絕辟除一切惡氣熱令易出易結痂疔瘡
疹畏難惡氣不可不謹者譬如掛脯同處一壞皆壞古語云樹
得柱而枯雌黃遇胡粉而黑柳亦物類相感云爾

○初生服生地黄汁令不生瘡

錢氏論瘡疹是母腹中所受穢毒故小兒患瘡疹五臟皆見證
故前人亦先有以制之也千金論云方嬰兒初生宜進生地黄
汁點孩兒口中令便下黑穢則至老亦不害瘡疹蓋便下黑者
此是腹中所受穢毒令人但見簡易平直而不用抑亦願目前
不思後慮者歟

○瘡疹毒氣令胃爛便血

小兒胃熱發斑其斑既出於肌膚今瘡疹正出或外披風寒所
伏或毒氣太盛熱毒壅遏則出不快蓋毒氣復極還於裏未
服涼藥使毒理於外不得出於肌膚毒氣倒於裏者有核惡氣
衝觸不離房事復觸入裏者皆可為胃爛便血各隨證救之

如風寒所伏者當解表而散之治瘡疹麻黃湯是也內外毒氣
壅遏復入裏當解毒如犀角湯之類是也冷氣入胃水伏於胃
溫之胃藥散之類是也惡氣薰觸不謹房事觸伏者當燒赤香
赤木猪甲之類服以蘇合香丸等以禦之又有毒氣內外有所
感冒陷伏者急以麻黃湯主之王氏手集白花蛇散撮攪投水
煮服之無不立効如有內外觸冒失於救療遂至胃爛便血此
證最危急宜用犀角地黃湯并草散以解之解之漸甦瘡出
者活神昏胃悶者死

○餘毒失詳則嘔吐并諸雜證

脾胃主納而不出大小腸主出而不納是平居飲食水穀糟粕
出納也常論胃主納食而瘡疹後嘔逆是有邪氣相干使胃逆
而不順故使氣逆而吐也其吐有冷吐有熱吐瘡疹病後吐者
此餘毒在胃不解當仔細辨驗終是不同其熱毒在胃而吐者
令人心煩作渴小兒不佳食乳者是渴也小便赤澀手掌心有
汗或熱面赤引飲停於胃中成痰膈中不利縱能食乳聚滿吐
出如射則一時胃中稍寬又復飲乳者渴也飲乳又吐脈洪數
此熱吐也冷吐者不渴飲食與水隨喫隨吐面青手白足冷大
小便利宜細辨之有熱有餘毒在胃脘嘔吐者宜服黃芩散
苓散入參竹葉湯若餘毒在中口舌生瘡下部亦有瘡或下膿
血服黃連散三黃熟艾湯發喘而煩燥小便不利者燈心湯若
胃熱甚腫痛妨其嚙食飢不欲食煩熱面黃者宜服甘露飲
槐花散如毒入目者服淨心散最良咽喉痛并嗽不已者麻黃
湯加麝香服之或大便不通傳熱毒攻於臟腑及眼并咽喉腫
塞口舌壞爛者以如聖湯紫河車散紫雪之類可選而用之比
解餘毒之要藥也

預服油劑以解瘡毒

防慮於未然者則思熱毒未成瘡者時預服油劑以解之蓋小兒四肢微熱食物以成頭熱或時額微熱則與生油劑飲之每夜如方法與飲似竟四肢熱服之良久就臥多至三五服大小便利四肢熱散邪毒漸退疹症雖出亦輕尤良法也

○斑疹熱則出愈難大便不通小便便如血或為癰身熱似是非而非若同而異醫者當詳審於疑似之間言斑疹得熱則愈愈難此非得熱而愈出難為氣不通滯與毒氣混雜不行故出難非獨熱而難出也胡不觀大便不通是氣不通行或便血或為癰疽或肌肉破裂以此觀之氣不通又熱毒之氣壅盛毒在腸中則血滲入腸為便血毒壅肢絡不行為癰疽為身軀破裂使其大便通小便利則無斯患矣有此證者宜服犀角此黃湯白虎湯并麻湯等雪之類便血以牛黃散可選而用之

○誤以巴豆丸下之則內虛而熱不除表熱而蕩滌故宜湯液以散之取食積宜下之用九子藥蓋用九子藥者取收攝之義也今病瘡疹是表熱若用九子藥反攻其裏則表熱陷伏於裏其熱愈不除復為倒靨為便膿血肌膚毒壅道不通為痘腫為腫毒瘡疹不可用巴豆丸九子藥者但能取腸中積故也非瘡疹表熱者可用

○瘡疹不可用巴豆水銀粉
小兒頭痛身有大熱口鼻有熱咽乾痛口煩生瘡兩目如火耳尖手足指冷厥大而作渴面赤增寒心逆熱口臭此是伏瘡子候先當去熱毒邪氣用大黃湯煮湯液蕩滌其表熱表熱散則諸疾皆愈矣昧者以巴豆水銀粉此藥無去表熱之理反傷腸也蓋巴豆水銀粉但能去積中熱積熱而已豈可以為瘡疹表熱者用則用之者大傷不可不成
熱毒攻肝衝於目

肺金燥心火熱肝木風脾土濕各有所統夫肝木勝脾土表且風入肺肺熱則為陽風為結為下鮮血冷則為不食為癯地為肢厥此五行相生相剋之意也熱則生風由大盛而風伏肺金既受火剋金表不能制木則無金以制之木勝肝旺心火炎上肝竅於目心熱壅則衝於目故瘡疹之始最宜防備之使之視井則欲觀深視遠則有運於目得陰氣感之蒸騰脂則欲涼血散毒氣眼以赤枯刺芥防風已去其風傳以白芥子末於兩脚心瘡疹則不入於眼是皆防微杜漸使神水不被風毒熱壅之害得無睛脹凹凸昏暗之憂方書多稱於此卷首者欲消目疾於未然不可不察

○瘡疹後餘毒咳嗽喘痛
夫血氣者陰陽之男女水火者陰陽之徵兆左右者陰陽之道路今瘡疹病後咳嗽左右脇痛飲食不下此餘毒所傷氣不能升降也且咳嗽者由陽不降心火熾於肺金也脇痛者脇居人之左右左右者陰陽之道路氣之所行處今脇痛是氣不能升降也飲食不下者由呼吸升降之間脾受穀味今氣不能升降脾氣不能運磨水穀也數者但解毒毒去然後真氣自當以赤茯苓湯導心火利小腸小柴胡湯治咳嗽脇痛二和散調頂陰陽則自愈矣

○傷寒熱毒甚則不可不發表
傷寒熱毒在表未能作汗或當汗而不得汗暴熱灼於肌膚故發斑瘡疹痘也其痘色白或赤如火丹瘡頭瘡白膿者輕若紫色者根隱也其在肌肉者甚重五內七竅皆有瘡其形如豆故以名焉此乃傷寒熱毒小兒肌肉嬌嫩多有此故因而及之
○瘡疹餘毒不盡煩渴胃痛
熱在表而生瘡疹瘡毒已出將愈則表雖退有餘毒在裏則令

小兒膏滿煩燥而渴此皆失於解利熱毒不散發使也宜黃連散燈心散黃茶散并露散皆可選而用之

○瘡疹不結痂死

瘡疹因熱而出又因大熱甚而不結結痂死是以內外蒸鬱無陰氣以欽之故也前人以宣風散導之以生毒散解之使熱不壅脹必結痂死矣又有發如膿粟不肯作痂者謂砂糖水與喫即結死此法須顧瘡子未出盡切不可用蓋瘡子初發而食甜物如糖蜜棗粘必使瘡子入目尤宜忌之此云用砂糖者定瘡子作膿粟毒氣已定而用之庶不為目害矣又有血疱出已七日不結痂死者宜用猪尾膏則愈矣

○辨瘡疹并水瘡子入大腸

疹與痘輕重不同疹自衣而出於腑則輕痘自裏而出於臟則重世俗但見疹見痘方知輕重未能預知而防備然疹與痘其

初何以辨之茅先生論有見於未然且早晨渾身微熱至日午

後大熱眼睛黃色兩脇下汲上然動甚至發如驚風狀亦身有大熱手足逆冷此病屬厥治以獨勝散投之以和平生津藥潤

之此必是瘡疹謹不可投涼藥恐冰入大腸而痘子不出則瀉下如赤豆汁及朝出而暮愈或頰頰赤色如掌大口內有臭氣

唇焦目閉腹脹者此必死候此是瘡疹入裏由用利藥裏血毒陷入腸中或便膿或便赤汁皆惡候也且疹候早晨微熱午後

亦大熱眼白赤色而不黃手足冷而吐逆此屬腑為疹治法如治瘡疹皆同報用利藥變為惡候

○結核腫毒

瘡疹熱毒藏於肌膚使榮衛流注天度則榮衛合行而不牛為之壅滯壅滯則結核腫毒或為疔瘡或為瘡瘍發於頭頂手是肢節間甚老則為癰毒此熱毒壅滯之過也亦令人咽膈不

利痰涎壅塞咳嗽咽乾眼赤臉頰煩燥腫宜以消毒散小兒胡湯最險腫毒出膿數日不止體虛煩熱頭痛昏悶者黃連散大便不通者大黃散主之腫毒赤腫初生者燒鷄毛水燻之醋調伏龍肝傳之地松胡葉以傳之鷄子清調亦小豆末以傳之地龍糞新水以傳之并馬齒莧龍葵葉鷄腸草苦荬葉景天藥皆可搗傳之赤腫不散成瘡而未得頭出者馬鞭草以傳之

○冬溫發斑癩疹如錦紋

活人書云冬月暄暖而溫毒發斑癩疹如錦紋者以冬月觸冒寒毒至春始發病初在表在已發汗或未發汗表證未罷毒不散故發斑以黑膏主之又有冬月溫暖非節非疾之氣冬未即病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄暖溫毒始發則肌膚斑爛癩疹如錦紋咳而心悶但嘔清汁者葛根搗皮湯主之小兒常有此證令兒心悶咳嗽嘔吐清水醫者不辨作胃寒

治之轉如悶亂狀若驚瀧遂生他疾但咳嗽而吐汁者知其心

悶矣預宜服葛根搗皮湯則立愈

○瘡疹用百祥丸證

黑紫乾陷者下以百祥丸不黑者謹勿下要之紫黑乾陷則下之無疑矣然當下有數證宜仔細以外證與脈別之有感風寒而黑陷者則宜溫散之有內虛自利而陷者則宜溫之有下之早毒氣入裏而陷者則宜溫而表出之有被外物衝觸而陷者則宜薰解之其用藥皆不同又有蘊積毒氣深而內外蒸鬱瘡起能食不結痂疔毒氣不得散大小便秘脹脹而陷者為其毒氣入裏宜用百祥丸瀉滯之毒服之身溫飲水者可治以脾胃而勝腎水寒去而後溫則瘡疹復出矣若寒戰不已身冷汗出耳脫反熱者死要之錢氏詳腎氣太旺脾虛不能制之此寒氣太旺腎氣不溫瘡疹復陷而不出矣下後身熱氣溫欲飲水

者此寒去而後復為可治以此而苦瘡疹不可妄下故不過溫脾胃暖血氣也錢氏言渴勝脫水於已陷之後不若取脾土於未陷之先尤為盡善盡美矣

○瘡疹後患目翳忌煎藥

湯散膏丹之殊異多刺點洗之不同且瘡疹之為目翳者毒氣自臟裏而達外治之要法但活血解毒而已活血不至於熱解毒不至於冷得其血活毒散則睛不變血不怯不致凹凸損陷是為良法也方其病極自裏而外始者毒氣在於臟腑外延於筋絡筋絡而至目其病深以非煎藥可取効蓋煎藥非毒則冷必相攻擊反以為害前人所不取也瘡疹後患目不在煎藥故辨及之

○冬月預服三豆飲子

麗氏云冬令溫燥當時便服三豆飲子以解其毒則春夏不生

瘡疹矣蓋冬令風寒水烈是謂閉藏之時此天地之正氣也冬月天氣惟燥是冬應寒而反熱初之而非其時有其氣小兒抱胎陽以生至春必發瘡疹預服三豆飲子以菉豆赤小豆黑豆副以甘草淺竹葉木通砂糖煎之隨腫以飲之則解一切熱毒冬月隨受熱而隨解之也至春夏間則無瘡疹之患縱有亦輕此乃冬月燠時預服之也

○瘡疹入目防備法

瘡疹方出間欲使不入耳目可噴胡荽酒於耳目邊或以黃葉末水調傳兩目兼以白芥子末水調傳兩脚心乃抱兒令目投菉豆七枚於井水中使寒瘡不入目中此皆愛護目之法也又有忌食之法如醬醋五味牛鷄鴨皆不可食蓋小兒患瘡子食鷄鴨卵未有不患目者雖瘡疹已愈數月向未可與食之亦為目患此皆為瘡疹之所忌但令小兒食淡物為淡精

肉淡餅之類不能食淡物者入少益無害患瘡疹之兒可預而令知之最為要法患瘡疹之家亦不可養鷄鴨卵之氣相煎亦能預目不可不知

○瘡疹攻咽毒

瘡疹咽痛者由心胃有熱衝於咽故咽乾而痛口舌生瘡上衝齦腫而牙齒搖動者宜服甘露飲子欲涼膈去痰則服消毒散咽喉腫痛者宜如聖散消毒散心煩者宜鼠粘子湯冬月老幼皆可服之則春夏不生瘡疹也有聲瘡不出舌頰生瘡煩悶熱面赤者以紫河車散主之咽痺水漿不下者以紫雲主之已上諸證屬熱須是臟腑亦熱者方可用之如上焦有熱其人若小便清或大便稀澀是臟腑無熱則別以清上溫下藥兼服不可一槩而用藥也已上並可以小柴胡湯充宜

○瘡疹大小便不通

瘡疹熱毒在裏令兒大小便不通熱毒蘊而不散則不結如死及其熱氣少而下之早則為陷伏如大小便不通欲以藥下之者須是微覺腹脹滿而喘按之腹微實手掌心并腕下汗出者此有熱毒燥糞在裏宜下之瘡疹大便不通者川芎散瘡疹既出定大便不通瘡出膿汁不乾敗毒牛黃丹大承氣湯又有瘡疹欲出胃熱發溫壯氣壅脹滿大小便赤澀睡中驚煩渴口舌乾手足微冷多睡時軟涎沫實沉大滑數宜服利毒丸心煩燥渴小便赤澀者通關散前四藥皆有熱證方可用之性寒通利故也不可妄投為害不輕

○乳下見兒服湯藥多則反為累

小兒如水中之泡草頭之露以表用藥無令造次為小兒臟腑嬌嫩血氣懦弱肌膚不密精神易倦故言不易醫然乳下嬰兒周歲二三歲有病宜少服湯藥量其大小但將藥與乳

母服之為妙忌一切藥與兒喫恐反生多疾蓋藥性燥悍毒烈非寒即熱不表即下或飲或散服多則反為累蓋其攻擊太甚不可不察大抵在簡而當則病除不損氣若泛然而用非止不効藥性之必反為害故瘡疹出而無他証者宜少與湯藥

○瘡疹各溫當先下其毒

夏月陽氣在外陰氣在內冬月陰氣在外陽氣在內其陽氣在外人喜冷陰氣在外則人喜熱蓋夏月扶陰以助陽冬月扶陽以助陰以平為期人有盛衰與四時不相稱則反為病且夏月天氣大熱則人食冷以助陰素問云用熱遠熱者是也亦不可過冷過冷則逆正氣為害且若人氣衰而火少夏月豈可過冷也嬰童有然陽盛而火壯雖冬月宜可多食熱物其能食童子蒸能吸熱乳嬰兒如冬月食火炮炙之物乳母恣食酒麪甘

肥便與兒乳其熱毒因積微成者又遇冬月天氣暄暖則內外蘊熱於臟腑至春陽發生其毒熱隨榮衛而出遂成瘡疹無後疑慮如冬月應寒而反熱此是冬溫毒氣在臟未出於肌膚也當冬月便疎利解去其毒可也如篇根湯三五三黃丸當歸飲油劑填赤散化毒丹之類皆可隨輕重冬月溫煖時皆可選用之也

○瘡疹便膿血

瘡疹病後餘毒不解毒熱入胃令兒便血日夜無度腹痛啼哭者宜用牛黃散又有渾身熱下痢黃赤膿血者雞白散解之或胃風湯尤佳小便赤而煩宜以導赤散導角地黃湯主之

○瘡疹膿汁不乾

小兒瘡疹太盛膿汁水粘不可看帶不可轉側疼痛日黃土未傳之便乾欲不成癩瘡者以牛糞曬乾火煉成粉研如粉

相以用綿撲有瘡痛癢膿甚者以黃土細羅為末傳之六段不通即布者以麥麩不計多少鋪即消息最為要法

○瘡疹入目用藥

心熱毒生肝風肝主目熱毒衝之故初目患以涼肝丸服之素皮散洗之紫雲花散服之或因食毒物毒出於目者山靈脾散暴赤腫痛者蘇麻子散患半年一年餘者蟬蛻散出正盛而不令入目者調肝散入眼成翳者小毒散生翳者散風熱攻眼者并泉石散目中且瘡成翳者大黃散貼之赤脉侵睛者羚羊角九豆瘡入目昏暗者金花散瘡入目裏侵睛者蟬皮散翳障不見光明者蟬花散為良

○瘡疹後餘毒諸方

瘡疹熱毒內外皆作今瘡疹已出而結痂死餘毒在臟者宜解利之若解之精至於生病多端瘡疹出盡後大便秘者宜服大青散小便秘者宜服黃芩散胃中有熱胃中有邪氣而嘔面赤而渴大便秘或如常或瘡疹後下利色黃者黃連散煩喘小便不利者燈心湯花散發渴飲水下血不止者消赤散薄苛湯調下黃芩散服之

○消癩痕

瘡疹生於肌中瘡痂不可早去之而出風早則為之癩疹肌膚為凹凸宜用鵬散酒調服之蜜他僧水研塗之藥散散胡粉散鷹屎白散馬齒散指散羊脂散雞散升麻水豆散黃藥散白蜜羊脂散金散皆可透而用之欲無癩痕者在結膿結死勿令癩痕矣

○痘癩

痘癩者瘡疹毒氣當而不得出毒氣壅遏於肌膚故使肌膚

偏盛而成症 又 疹 疹利是致毒氣不散外不

得世於肌膚內無由入 疹則為痘 或為腫毒

令頭項背脇肢內赤 化之後便以消毒散升

麻湯五香散連翹散 選而解之失於解利腫

毒所發未成膿者小柴 煎服之立愈又有重受

怯弱病瘡疹後面青不能飲食 寐倦息無熱證者且與

調平養安養之令其裏突如面赤 秘或發傷咳嗽睡中驚

叫小便赤澀則可用前諸藥解利之今人見解利可治餘毒不

問虛突便解利之逐為虛弱者害亦不可不知也

○瘡疹後發瘡

素問云瘡瘍煩燥瘡瘳瘳瘳言其出於心五臟蘊熱毒成瘡

疹熱則生風當其未出心火生肝風今見發瘡今瘡疹既出之

後又發瘡者是餘毒未解熱積停滯不能消散故動肝風而發

瘡也宜以道赤散化毒丹消毒飲柴胡湯三白散之類散熱退

風而已或瘡疹復發食果後未能損熱食蒸發瘡者宜以紫霜

尤服之其證必頭熱肚熱是傷食證也又有瘡疹後再作瘡疹

者亦輕此亦餘毒未盡皆失解利之故瘡疹之出後宜可不解

利解利者當隨虛實而用藥也後人見瘡疹後解利餘毒一列

妄投以藥或虛者反為大害不可不知氣虛者不渴面青飲食

少大便不秘肌瘦無力皆虛證也有此證者未可解利也又

詳有瘡疹證而瘡疹未出而發瘡者用藥不可太冷恐為瘡疹

之後害瘡疹已出後發瘡者此熱甚也故宜用化毒丹大青膏

諸瘡藥無害蓋無瘡疹之悔矣若能詳審而調理皆獲安愈因

而具述以廣其傳

○瘡疹愈後忽遍身青色或黑色手足厥冷口噤如瘡

此名中地風也小兒瘡疹方愈榮衛尚弱餘毒水解 或青

或黑色手足厥冷口噤延纏甚者手足微搐此由四時五行節

令氣交有風兩寒暑地氣暴至小兒瘡疹方愈榮衛尚弱被地

風所吹毒氣乘虛而入故生是疾也宜用和濟方消風散二錢

入蟬蛻末二錢分作三服生薑薄荷汁酒各數點溫湯侵服二

三服即立醒夫隨時少汗而解或出瘡疹或再出瘡疹而愈此

乃京師醫官宋鑑用此無不愈者後傳於此方用之

○瘡疹已出狂叫喘呼

瘡疹已出者熱毒自裏而達外狂叫喘呼者臟腑熱燥而無津

液也夫腎水常欲升心火飲而降今五臟皆熱瘡疹既出津液

外泄臟腑乾涸無陰氣以守之則陽毒燥於上故狂叫喘呼宜

服犀角地黃湯玳瑁散甘草散麻黃散主之更看大小便何部

不利利之必愈

○猪尾膏證

瘡汗突汗皆汗也虛熱突熱皆熱也是以瘡疹倒靨者逆有突

方論皆稱倒靨而已不可分而辨正之是以瘡疹始發或斑或

血疱未結痂之際或因久不食或因自利或感寒邪或感寒

不能運行榮衛至不能出者瘡疹雖名重厥則出矣猪尾膏使

心既通榮衛將復則氣和神甦瘡疹自結痂 疔矣夫蘊毒作疔

點斑點作血疱血疱如豆起於肌皮之上名曰痘疹既作血疱

血疱作膿膿疱結痂而愈今作血疱而日數當結膿窠而

不結膿窠者是毒氣尚可復入於裏古人處方心涼熱毒氣不

能復侵於心也毒在肌膚則無慮矣以此觀之瘡疹至血疱是

毒已盡在外也後用猪尾膏則毒氣不能復入也今有醫者及

病家見斑點或見血疱出遲便用猪尾膏殊不知毒氣未出盡

而心胃寒涼毒氣不能出候人者多矣猪尾膏是毒氣未出盡

未結膿窠者熱氣與血相搏尚同榮衛出入週流恐其毒氣

八裏而用之也又論小兒方書亦用腦子猪血痔瘡之逐斑點出而愈者此言為害尤甚非瘡疽之藥也乃是治傷寒熱證危急用之熱散然後斑出而愈是治發斑者非治瘡疹之斑後人不為祖述以候傳候而用之者可怪矣

○貴賤不同用藥亦異

貴賤不同形志有異士貴之人形雖潔而志苦動慮關心所稟多虛末三日天晴而中暑心間未除雨則寒嗅荆芥薄荷而腹瀉服桂附乳而宜溫之蓋皆稟寒不能運行榮衛故也又有瘡疹始發或斑或血斑未結而心煩狂燥氣喘妄語或見神鬼大小便秘腹脹渴而能食若毒氣發而黑色者此為實宜用猪尾膏奪命膏宣毒膏良方猪血在腦膏皆可從漸而止以知效為度常人不辨別虛實既用藥又不能擲節小熱遂以大涼藥治之熱疾未去冷病為害者多矣又有瘡疹自斑點結

血痲疹六七日當結痲或六七日不結痲死者此是毒氣

盛實心火既燥熱毒內外貫注故令不結痲而當此宜用猪尾膏常用之進一服隨時結痲而神速特異以慈惠之人常遇天氣節令寒暄不時脫着衣服以避寒溫必先呷冷水一二呷而不感冒是心涼膜理秘而飲則風寒不能侵之也今瘡疹用猪尾膏是心為大而燥居於上焦又加之被蘊熱毒氣併於心臟熱氣既盛則毒氣內外貫注古人用猪尾血乃以心血歸心用左腦香以涼其心榮衛得香而行遇一則上心得血引左腦香已行榮衛血痲始結膿膿血結痲餘證自退矣大抵用猪尾膏之意豈不觀傷寒厥陰證土敗用承氣湯下之脾間毒去脾土既和則水升火降寒熱作而大汗解不知其熱此寫貴之人常態也田野之人其形雖苦其志甚樂其神安所身多矣明靈桂而熱發服橘而便秘其亡而不知其憂由

野之人常態也雖幼穉霜露中向日不知霜露之寒此皆素習以為常態也是以醫者當察富貴貧賤之不同用藥亦異不可一槩而治也

○防用藥之失

前輩言治老人之病當先助火蓋老人者自然陰盛而陽微謂不欲見其虛而治其虛預以溫之治小兒則曰當先瀉大為小兒自然陽盛而陰微預以瀉導引以平為期不至生熱也此治之大畧也若老而實幼而虛此為當隨時變通不可執於一曲也又曰五實當瀉五虛當補何謂五實身熱脈大大小便不利無汗為實有此證者下之愈何謂五虛身冷皮冷大便不利汗出為五虛溫之愈又曰用利藥候大小便秘而利利之愈用溫藥者候大小便利而溫之愈二者合利而利合溫而溫也又有外證合利大小便已自利何必利外證合溫大小便已秘何必

溫大抵治病最難陰陽偏絕則無抵救藥善用藥者但令陰陽

不偏則人不死也故因而知又有熱瀉冷秘之辨此好事者必言之則終是不同熱瀉者渴水心煩小便赤手掌心出汗宜利小便冷秘者不能食膏滿吐清涎面青瘦而不能食者必秘也其證少又非暴病不可不知

○病證未分所用藥

病有外同而內異又有病中遇天氣寒暑燥溫不同感異氣者又有病中喜怒哀樂不和病變異不常書中無名者仲景之曰不了了不和是也目睛不了了醫未識其證也了睛不和用藥不中其病此外同而內異也大抵治病多調適寒溫治熱熱去而不冷治冷去而不熱陰不虧而陽不損無不效者治風以治風藥治冷寒治勞治氣無非同治勞治氣藥後人不能究其病之源流緊要一槩用四功子湯參苓之類藥性

溫平為不能知病之由欲遂其差候殊不知縱令病勢弥漫卒不能救快入者多不可不知要之用和緩之藥各從其類而口緩但不致剛烈爾且防風白朮治漏風川芎當歸治血風川芎荆芥治頭風獨活羌活治高風天雄附子治風乾薑細辛治寒風大黃荆芥治熱風木瓜天麻治筋風各隨虛實寒熱而治之何嘗治風而不用風藥治冷而不用冷藥但令病去而不生他證為妙也

○瘡疹後觀虛實而解利

稟受有虛實病後亦有虛實發得一藥而論且瘡疹病後洩解利之解利須觀虛實而用藥也且小兒稟受既實平時熱熱而壯瘡疹後須觀熱氣淺深熱者必大便難咽乾作渴而赤而小便便或赤有熱證者方可解利大段熱甚者以大黃散胃有餘毒嘔吐口亦有瘡或下利黃赤黃連散主之煩喘而小便不利

痘心湯餘熱溫壯齒齦宣腫牙疹不能嚼物面赤而黃或煩疳露飲子槐花散肝臟餘毒不解叫怒不能睡卧者調肝散瘡疹出而恐入目爭心散出後餘毒未退渴水仍下血疹疔疔子散黃者散痘癰絲發者小柴胡湯犀角地黃湯為良今絕見病瘡疹當解利不問虛實便乃解利候投涼劑者多蓋解利是治其有餘毒者用之瘡疹後無熱毒者但當隨宜安養之又有稟受怯者因天氣不常冬溫邪熱遂成瘡疹瘡疹既出榮衛為斑為血疱為膿血為痧疔其榮衛大虛坐立戰搖大便不秘小便不赤身無諸熱證宜用胃安散七寶散雙和散之類安養之候其乳食如故不畏風寒肌膚稍實而少少以解利藥無害常見瘡疹不問虛實便解利之或為寒中或為下利生內多端故因而及之

本痘疹論終

瘡疹論藥方

○預截熱毒第一

初生服生地黃汁仲景云我兒初生下時宜進生地黃汁點在我兒口中即下黑屎至壯年亦不害瘡疹

一冬溫服生油劑葡萄云小兒臟腑伏於熱毒未成瘡疹疾候四肢微覺有熱食物似減頭髮乾立或時額多微熱宜服生油劑方

右用生油一小盞似入熱溫熱水一小盞旋旋傾熱水一小盞入油盞內不住手以杖子打攪直俟入盞熱水更打令均如蜜即止夜即時三歲前至百日及一晝內每服二

三蠅殼五歲至七歲每服三蠅殼十五歲以前至十五歲服三蠅殼至半合直至大人每服一合至二合量大小增減與服之服後良久令臥少時服三五服大小便利四肢熱

退瘡痘不生也萬全方云補論可先服以油劑服之行解四肢熱極或瘡痘已出不可以油劑服但服和平藥療於肝臟解其大熱慮熱毒太盛

三冬溫服三豆飲子大凡有時行瘟毒天行瘡痘者宜預服之赤小豆 黑豆 菽豆 各半 升早一兩

右用水九升煮候豆熟為度逐日空心任意飲之七日後瘡必發快龐氏云冬月溫暖小兒輩必發瘡痘宜預服三

豆飲子以解之四欲不患瘡疹服黃根汁治時行瘟毒瘡痘正發欲不患瘡疹者預煎汁入酒以飲之則解之果用甚應本草云黃根苦

寒治一切毒毒又治一切血病月經不止腸風痔瘡淋瀝治瘡癩疥血撲服瘡血皆宜服之

五覺溫壯熱服黃根散夫行熱氣欲發瘡疹作熱瘡者宜服解

肌出汗

葛根

芍藥

右為發末每服四錢水一盞煎至半盞溫服取少汗出若先自汗者即去麻黃

六禱皮湯治傷寒時氣腕巨瘡毒

右用樺皮木剉煎服取安樺皮味苦平無毒治肌熱黃疸治時瘧熱毒瘡今腕巨是也及治乳癰初作腫硬欲

治癰腫其治瘡疽可知

也必勝散治瘡疱出未能勻逼此藥透肌解毒或不利其瘡毒已先發者宜解毒服之

右以牛旁子不限多少炒令熟杵為細末每服一錢入荆芥二穗水一盞同煎至四分於溫與服如瘡疹已出更與

服充妙牛旁子本草云癰未破者服一枚能出癰疽頭故出而未透勻者宜用之又云通十二經脈十二經脈既通毒氣出齊無阻矣

八涼驚丸治瘡疹五勝皆見木勝土木歸心故預防發癰者

龍膽草 防風 各末 青黛 各末 鈞藤 各末

牛黃 麝香 各末 黃連 各末 龍腦 各末

右同研細末麪糊為丸如粟米大每服三五丸至一二十丸煎金銀湯送下溫服

九括蕞散治斑生於心心生熱熱則生風風屬肝二臟相搏風火相爭故發搐也治之當瀉心肝補其母宜用之

括蕞根 末 白甘遂 末 各

右同慢火上炒焦黃研勻每服一字煎麝香薄荷湯調下無時服

○無疑似解利第二

十升麻湯治大人小兒時氣癰疽頭痛凡令脈數發熱皮赤

瘰及瘡疹疑貳之間並宜服之或未經解利而瘡毒已發

又云證候未全或未明者但可與解散之也又去惡瘡疹

大便自如常者亦可服升麻湯蓋用升麻其性苦寒無毒

主解百毒殺鬼邪辟瘟瘴惡毒中惡腹痛咽喉口瘡皆毒

也瘡疽亦毒故也其次用葛根性平治消渴大熱解肌發

表出汗開腠理治頭痛升麻葛根二藥皆治伏熱毒動心

恍惚驚悸煩燥天抵瘡疹是溫熱毒葛根解熱升麻去毒

也病熱而藥性微寒冷熱相攻則為藥治時行寒熱又法

血痺使瘡疽易出也又利小便瘡疹有文熱者則利小便

也次有甘草調和之况新書言瘡疹渴燥甚者亦用炙草

散主之四者解毒治熱調榮衛為治瘡疹之要藥也為與

疑貳之間非瘡疹伏熱而發熱者有傷寒傷風傷食驚證

蕪患瘡疹而蕪氣法者皆發虛熱而非實熱若服之是瘡

疹者則毒滅而愈他證者及以為害不能盡述其由但有

壯熱而面青目白睛不黃赤大便不秘小便清者皆不可

服裏無蘊熱故也此藥治未發瘡疹之前瘡疹已愈之後

服之消毒故也非正出時服

升麻 葛根 芍藥 甘草 等分

右為發末每服二錢水一盞同煎至半盞去滓溫服不拘

時候亦可為細末湯調服身心煩熱即溫服寒多即熱服

十一惺惺散治數證皆為純陽人所用古人處為小兒藥非乃

裏寒者可服且以藥對其證用之意大抵渾身止熱必由

風熱瘡疹傷寒時氣且先與之也其頭痛目澀并流清涕

者用細辛喘菴者用桔梗入參多睡者用茯苓恐傷寒時

者用細辛喘菴者用桔梗入參多睡者用茯苓恐傷寒時

者用細辛喘菴者用桔梗入參多睡者用茯苓恐傷寒時

氣乘裏弱者用白朮也治風熱瘡疥括萎根也括萎味苦
寒治身熱煩滿大熱除腸胃中積熱八疽而黃瘡消而
水止小便便利熱而膏痺不下乳陽證傷寒治癰下
其熱也故非裏寒者可用其裏寒者由身有大壯熱不渴
而大便反利小便不赤面青目白睛不黃赤皆裏寒證也
其中雖有白朮以溫終非為虛熱者用之臟腑寒則寒
藥先効熱藥未必能制之臟腑熱則熱藥先効寒藥不能制
之此勢之自然也豈得不辨表裏冷熱而用藥也和劑方
小兒傷寒壯熱當先服此大効以服羌活散如壯熱未退
切不可與通利大便及涼藥恐是瘡疹服藥則誤也

苦桔梗

細辛去葉

人參

甘草炒

白茯苓

括萎根

白朮各半

右為細末每服一錢水一盞薄荷二葉同煎至三分去

相溫服要知氣入薑煎不拘時候身雖壯熱大便自利者
不可服

十二荆芥散治麻痘子無瘰癧或癩疹大便自過

右用荆芥少許爛研以新井水將布帛裂過入一滿許麻
油打勻令飲之便不亂悶麻豆已出用黃蠟煎青膠水飲

即安青膠水乃荆芥治血風麻子是疹子常言風癩癩疹
則皆出皮膚其毒輕而浮又以麻油打勻此滑竅之理又
以黃蠟煎青膠水服則安此滋血行榮衛榮衛既順麻疹
出矣指迷方荆芥湯乃消毒飲加薄荷煎服之

十三羌活散解毒治風壅欲作瘡痘者

羌活

獨活

川芎

羌活

蟬退

前胡

柴胡

地骨皮

甘草炙

括萎

天麻炙

荆芥

防風各半

右為細末每服一錢水三分薑薄荷三葉盡內心至二十

通口服量火小加減藥水此藥詳其藥味治風治身治瘡

下痰涼脾治血熱透肌但實熱發無汗不治如稟受怯弱

或脾胃弱或外熱自白睛青色皆裏無熱不可輕用

十四奪命散治瘡疹已發未發並宜服之

升麻

糯米

紫草

甘草半兩

木通二錢

右劉為散每服一大錢水七分煎四分去滓溫服出瘡疹

熱毒勢甚者服解熱利小便瘡痘初發氣盛亦宜服

十五牛旁散涼風解毒

右用牛旁子炒為末水煎一盞服之小兒冬月有非節之

暖及春月天氣暄暖或甘肥之過或重衣溫厚帳帳周密

傷皮膚害血脈瘡癩發黃是生多疾宜預常服之也

十六寫根補皮湯治冬溫未即病春被積寒所折不得發至夏

熱得其寒解冬溫始發肌肉斑爛癩疹如錦紋而咳心悶

但嘔吐清汁服此

葛根

橘皮去白

杏仁去皮

知母

黃芩

麻黃去節

甘草炙

右件劉散等分每服抄三錢用水一盞同煎半盞去粗溫

服不拘時候

十七薄荷散方小兒總覺是瘡疹宜服之

薄荷葉一兩

麻黃去節

甘草炙

右為細末每服二錢水一中盞薑二枚生薑三片同煎至

六分去粗攸溫日三兩次服此是小兒稟受毒氣甚

者宜服之蓋此方云小兒總覺是疹痘便服之服之而汗

出者服調中散服薄荷散若作寒熱厥反遲者選脫齒散以溫之詳其理非下藥之法也實者服之未必受虛者以之必危殆

〇熱甚生風者第三

十八獨勝散治小兒發瘡痘早微熱晚大熱目黃脇動身熱手冷發甚如驚者又名牛旁傳蚤散

牛旁子半兩 白僵蚕一分

右為末每服一大錢水六分蓋紫草二七寸同煎至四分益連進三服其痘便出此藥用牛旁子出癰透肌白僵蚕治遍身癰疹疼痛成瘡為末酒調服之立瘥又以紫草煎之令利竅是瘡疹證無虛寒證者服之立出也

十九抱龍丸治小兒一切風熱中著驚悸瘡疹欲出多睡咳嗽痰盛面赤手足冷發溫壯脾胃驚搐不寧脈洪數頭痛

南星 利開製白者為用原月黃牛膝竹天竺黃二兩

朱砂二錢 雄黃半兩 麝香一錢 牛黃一字

右同研極細滴水如丸如雞頭實大每服二歲兒竹葉薄荷湯化下一丸不拘時候錢氏云因驚而生熱用藥發散熱入於表故表熱不退而生斑宜服之有大熱者利小便有小熱者宜解毒其出快勿表勿下宜服抱龍丸

紫草膏治麻痘不快

紫草 白附子 蘇黃 甘草

全蝎 僵蚕

右件為末用蜜一兩酒半盞入紫草煎數沸後令旋旋同和煎藥丸如皂角子大每服一粒用紫草煎湯化下前用黃芪散調治詳之本草云無毒治病十去其七止等藥也猶如紫草膏治瘡痘兼此藥治驚風疾又治瘡疔出

不快如瘡疹所作之初似傷寒傷風驚風瘡疹疑其之間與服之皆有主治不至敗事可與上等藥同矣

〇感月風寒與瘡疹相雜者第四

二十紅綿散一名天麻散治傷寒及痘疹

天麻 荆芥 甘草 蘇黃

右為末令勻每服一錢水半盞薄荷二三葉酒四五滴煎二三沸帶熱服之如疹子未出再進一服相次又進一服若是傷風服亦不妨此藥大抵為解表之藥也治身有六熱面赤氣籠無汗者為表未解也可服之蓋此藥以天麻麻黃為主治也有汗不得服麻黃者其膝理已疎開不宜更發汗也如有熱更有汗者則惺惺散為和解之藥也故

仲景論表證有發汗者有和解者有調和榮衛者今有汗者不可服麻黃則和解毒為可用如更有虛寒證者又止

宜調榮衛也如行散之類是也論此藥能治瘡疹者紫芥主寒熱鼠瘻癰疽生瘡下痰血天麻治諸毒惡氣皮膚壅滯熱毒癰腫蝎治諸風癰疹筋脈諸風小兒驚風其劑芥天麻蝎三味皆性平治瘡理血故宜瘡疹所服也

二十一五積散治傷寒寒疫內傷生冷者所服也瘡痘本熱毒小兒熱盛洵則飲冷熱則當風反被風寒所伏寒熱相搏面青發熱心煩自利者宜以此藥散其內外寒毒然後熱氣上行或汗或瘡痘或癰疹服之而愈矣

方見寒門

二十二麻黃湯治瘡疹煩喘甚者主之 麻黃 杏仁 甘草 桑白皮

右劉為散每藥一錢用水七分盞同煎至四分盞去粗
服之若脉數有熱未服者入竹瀝少許咽喉病或嗽者
熱入齋香少許服之

○調平瘡疹用之第五

二十三紫草飲子治小兒初覺不安辨證候有瘡疹證三四日
隱又在肌膚而未出者及瘡出而遲亦宜當與服蓋紫草
者能利竅則瘡痘易出也通水道去心腹邪氣則心除積
蓄之熱臟腑自安也

右用紫草二兩細剉以百沸湯一大盞沃以物合定勿令
紫草氣出量見大小溫溫服之雖瘡子出亦當輕爾

二十四髮灰飲治斑瘡疏豆

右用頭髮燒灰令存性飲調服之古方以亂髮治丁腫骨
疽治孩兒熱瘡癩熱諸般血疔種驗髮本血之餘今治諸

血瘡證從其類也

二十五牛蒡子散治疥豆初作服此即稀

牛蒡子各半兩 甘草一錢

右為細末每服一字或二字簡麥煎湯調服之不拘時作

二十六兔肉醬去小兒疏豆瘡

右用兔肉臘月者作醬食去疏豆瘡無臘兔毛煎湯洗脫
豆瘡及兔毛傳良其兔腦主凍瘡骨節磨傳文疥兔毛灰
主灸瘡兔頭皮主冠毒氣在皮膚如針刺者又云主鼠
瘻以兔腦兔骨兔頭皮兔毛已上主治此之皆治皮膚瘡
瘻故藥性論云兔肉平寒作醬去疏豆瘡涼血故也蓋兔肉
多食則令人色痿損陽事絕血脉此亦涼血散熱故也

二十七安斑散調理瘡

升麻 赤茯苓 羌活 黃芪

入參

右為細末每服一錢水七分盞紫草薄荷少許同煎至四
分盞去粗放溫服之量見大小增減此藥為解毒涼血主
肌寬腸導熱利小便快膈之藥也患瘡疹有熱無寒者可
服之

二十八蘿蔔湯治斑疹瘡出不快者

右用開花蘿蔔前汁時時與飲之張氏云瘡疹氣勻即出
快尋諸本草蘿蔔主治嗽定喘下氣消脹解毒解渴解毒
毒詳之皆勻氣解毒消壅則瘡疹然勻快矣此氣勻即出
快之意開花蘿蔔取欲出之義爾

二十九紅子湯平調瘡疹

紅花子 紫草 芍藥 茯苓 升麻 各半
右為細末每服半錢煎薄荷湯入酒一滴同調下此藥用

麻黃表毒氣令出升麻解毒毒草滑竅也內紅花子本
草云治天行瘡子不出者吞數顆即出故用之

三十快斑散調瘡疹

貫眾 赤芍藥 甘草 升麻

右為細末每服一錢水一盞竹葉七片同煎至五分盞去
粗溫服量大小與之此藥內貫眾主腹中諸熱邪毒其味
微寒故也患瘡痘煩渴咽燥喘急大便秘小便赤燥口乾
目赤皆裏熱也宜服之如無裏熱證則與藥不相當反為
之害若當服而不服斯害也已可不審之

三十一甘草散治瘡子未出及雖出燥渴者宜服

右用大甘草不以多少炙過為末每服一錢或二錢水
煎至六分盞去滓溫服不拘時候呷之以少解利熱毒

即住若瘡出遲當常服紫草散于方見瘡疹初出門大人當針兩腕視于骨間男左女右取之或灸一壯亦助發毒瘡毒氣已發不必用

三十二紫草如聖散瘡疹初出急服方與乳嬰兒與乳母兼服之四五歲已外只令乳服之

紫草二兩 陳皮去白一兩

右為細末每服一錢水一小盞入葱白三寸煎至五分盡去粗溫服量兒大小與服妙選方云瘡疹熱勻即出快紫草滑竅去心腹邪氣陳橘皮快氣葱白發散而開泄膿理也

三十三化毒湯治瘡疹已出未出並可服之

紫草 升麻 甘草各半兩

右件如麻豆大水二盞糯米五十粒煎至一盞去滓放溫

分作數服劉氏傳云豉豆漆飲出渾身壯熱不思飲食若服此一服即內消已有一兩顆出即解其半若令出即當目頭焦只三服瘡詳其前人處方藥與化毒之名至於主治之證無不切要但者人臨時用之何如爾且瘡疹病無他病相兼無不愈也又在人稟受虛實不同冬夏各異又乘其氣所得之 由風寒食驚不一當隨時而酌安養之

又如仲景治傷風云正患傷寒如其人有被疾者發動則無以故疾藥攻之法入書云治傷寒云病中又感異氣者乃時令寒暑燥濕風不和脈息與少陽相異證候與傷寒不同者當隨宜以法治之不可泥於一曲也此藥化毒但能化實熱之毒若虛而游熱而伏冷者皆當調適以平為期

三十四調中散

白茯苓 人參 紫河車 甘草

右件各等分為細末每服二錢水一盞生薑二片棗二枚同煎至六分去滓溫服作兩三次服

三十五紫草木通湯治小兒瘡疹

木通 紫草 人參 茯苓

糯米各一 甘草半

右為細末每抄四錢水一盞半煎至一盞去粗放溫分二三服小兒瘡疹熱甚則出熱心主之熱甚則小便赤澀其熱蘊蓄而生病此藥利心火以燥脾土心清則不生他疾脾平五臟自安也木通導心火糯米歸脾土也

三十六如聖湯治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗 甘草 牛蒡子 麥門冬

右為細末每服二錢沸湯點細呷服入竹葉煎尤妙量

汲方同以牛蒡子為惡實蓋異名也

三十七蟬退甘草湯發小兒斑疹

大蟬退 甘草

右用水半碗煎至一小盞旋旋與服効已用驗

三十八紫草枳殼湯治瘡子出不快倒靨

紫草 木通 甘草 枳殼

右等分為細末每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫服大抵壅滯則榮衛不行令出不快則倒靨用枳殼寬大腸亦通利小腸紫草滑竅治心腹蘊蓄邪氣皆易出也大小便秘澀者無不可用

三十九當歸散治小兒初得病風以驚狂身熱汗出問之不增寒

不惡風脈洪數者當下之如竟得有此證瘡痘未發之前宜服當歸散

當歸一兩 甘草一錢

右為細末每服二錢水一中盞五散十粒同煎至半盞去滓量兒大小服以利為度逐日冷與甘草汁三歲已下歲已上加減服之

四十快毒丹治小兒瘡疹氣勻即出快蓋血與氣相隨若內有邪熱即血妄行使氣不勻大抵瘡疹氣快自勻宜快毒丹瘡疹出皆宜服之

牽牛黑者木香已上各肉苳菴半兩青皮生一兩熟半兩右件搗羅為細末滴水和丸如黍米大每服七粒至十粒濃煎紫草葱白湯下乳前服之量太

○防備薰沐用之第六
四十一胡荽酒治小兒初覺不安辨證是瘡疹或已發未發以出而快者用之蓋瘡疹煩燥皆出於心胡荽味辛能

通心竅胡以胡荽酒煎噴之立出心主瘡瘍主煩燥主痛痒主驚悸凡為瘡疹數證必備是胡荽能通心竅而通之則瘡疹易出也若辨證是瘡疹而大便秘者紫草胡荽二藥皆未可用恐紫草性寒胡荽利大腸故也則宜先溫之臟腑如常瘡疹證未退者宜用之

右用胡荽三兩細切以酒二大盞煎令沸沃胡荽便以物合定不令氣出候冷去滓微撒從頂以下塗兒面候眼目之間噴背脊及兩脚胸腹令遍勿噴於面錢氏用好酒二盞煎一兩沸入胡荽四兩再煎又云病人左右上下常令有胡荽氣即令辟去汗氣惡氣瘡疹出快忌外人及穢觸之物雖不可受風冷然亦不可壅遏常令衣服得中并盪涼處坐卧

四十二葡萄酒治時氣發瘡疹不出者

右以葡萄酒飲之葡萄酒味甘平利小便取穗出快之義也

四十三燒赤木猪甲

景仲謂瘡疹未出之間宜於房室燒赤木猪甲二物辟惡氣父母常戒其色慾亦令人守房室門戶勿令外人入房恐觸犯令小兒瘡疹難出或有觸犯得上喘面青黃色者猶輕因此犯而死者不可勝數宜謹之

四十四燒乳香薰瘡疹法

如瘡疹正發則忌諸臭穢惡氣以逆榮衛恐陷伏倒靨也於房室中常令燒乳香不絕可去惡氣瘡疹無不効者

四十五黃土末傳瘡疹已出者不可發表如又表之者更增滋爛若發膿痛甚者即用乾淨黃土羅為細末傳之仍數已食蜜為妙

四十六羊硝猪膽汁如瘡斑爛為不合表之太過一手一足面腦腹背皆各為一片瘡相似令人不忍觀之者用羊硝猪膽汁調塗瘡上勿令動看直候瘡落有大段瘡發不通卧席者用麥麩簾卧將息為妙

四十七黑牛糞燒灰貼瘡疹治已出而未平切忌見雜人恐勞力之人及狐臭薰觸故也未愈不可當風當風則成瘡斑也如膿疱出可煨墨牛糞貼之令速愈而無癩痕也

四十八黃葉膏小兒瘡疽出後即須愛護面目勿令沾染欲用胡荽酒噴時先用此方塗面上然後噴四肢大人嬰孩有此悉宜用之

黃葉一兩 葦豆一兩 甘草四兩
右件搗羅為末再研令細後以生麻油調如薄膏從耳前眼唇並手塗三五遍上塗面後可用胡荽酒噴也早用此

六塗面上令不生疹痘也如用此方塗遲縱有疹痘亦少
諸家亦愛護面目者皆以此方治療分兩用法皆同惟疹
痘論一料用菴豆粉三兩伍錢

四十九白芥子散治小兒患瘡疹令不入眼

右用白芥子為末水調傳脚心則瘡不入目矣

五十爛肉汁治豌豆瘡

右用爛肉汁洗之乾肺亦得

○微表而微散第七

五十一蟬蛸散治瘡疹漸作身熱似傷寒只耳尖脚稍冷或腹
痛大便秘者是瘡疹

右用蟬蛸二十一箇洗去泥為末水一盞慢火煎至半盞

去滓量兒大小溫服之如覺瘡疹已出便依前服三五次

不是瘡疹亦無害小兒瘡疹欲發出加甘草一錢半煎一

盞旋旋與服累劫小兒伏疔積熱毒蟬蛸味鹹寒可以

制况有暴感風作熱客於表者蟬蛸亦治風毒充於皮膚

癢痒不止驚癩夜啼癩疾寒熱驚悸皆宜服之

五十二猴梨酒治瘡痘出不快

猴梨子五箇又名 右用酒煎入水便服之瘡痘即出

五十三麻黃紫草湯治瘡子不出

麻黃去節 人參各一 杏仁七枚去 右為籠末每服二錢水二盞用紫草五寸同煎至一盞去

滓分為三四服分作二日服未可服諸藥

五十四水鮮散治瘡疹出不快煩燥不得眠者或出而身體尚

有熱者

大黃 黃芩 桂心 甘草炙

右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服

若時行瘡疹出不快煩燥不眠者加木香一錢半

五十八葛根散治天行熱氣欲發瘡痘作熱甚疼者宜服鮮肌

出汗

芍藥 麻黃各一 石膏二兩 黃芩

右到如麻豆大每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服

若時行瘡疹出不快煩燥不眠者加木香一錢半

五十九葛根散治天行熱氣欲發瘡痘作熱甚疼者宜服鮮肌

芍藥各二 麻黃去節 右為末患者以生熟湯浴訖燉水調下二錢相次二服得

汗利便差強實人服二方寸七調風實之人 三伏中亦

宜用之若去大黃則春夏通用之凡人飲酒食瓜果多以

生熟湯浸身皆為酒及瓜氣味以此觀之先用此浴身亦

出其毒矣

五十五玄參升麻湯治傷風傷寒風熱驚食等熱運於肌或汗

或下後毒氣不散表虛裏實熱發於外故身斑如錦紋甚

則煩燥譫語兼治喉閉腫痛

玄參 升麻 甘草炙等 右到如麻豆大每枚三錢水一小盞同煎至半盞去粗溫

服不拘時候

五十六麻黃黃芩湯治瘡疹出不快煩燥不得眠

麻黃去節 黃芩 赤芍藥各半 甘草炙 右為細末每服二錢燉水調服日三服兼治天行熱氣出

跳豆瘡不快蓋煩燥皆憤或出尚身熱疼者

五十七升麻黃芩湯治瘡疹出不快煩燥不得眠

升麻 黃芩 乾葛 芍藥各三 右到如麻豆大每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服

若時行瘡疹出不快煩燥不眠者加木香一錢半

五十八葛根散治天行熱氣欲發瘡痘作熱甚疼者宜服鮮肌

出汗

芍藥 麻黃各一 石膏二兩 黃芩

右到如麻豆大每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服

若時行瘡疹出不快煩燥不眠者加木香一錢半

五十九葛根散治天行熱氣欲發瘡痘作熱甚疼者宜服鮮肌

出汗

芍藥 麻黃各一 石膏二兩 黃芩

右到如麻豆大每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服

若時行瘡疹出不快煩燥不眠者加木香一錢半

六十一葛根散治天行熱氣欲發瘡痘作熱甚疼者宜服鮮肌

出汗

芍藥 麻黃各一 石膏二兩 黃芩

右為龍末每服四錢水一盞煎至半盞去滓用之

候自出汗者去麻黃

○微下而日消第八

五十九四順散患瘡疹至四五日不大便者子又盛出却喘氣急腹脹小便赤澀須用此方

大黃 甘草 芍藥 當歸各等

右為龍末每服抄三錢水一盞煎至六分去粗溫服不拘

時候若得氣通不喘腹不脹便休與此藥若初覺有赤點

子大便如常小便赤澀須用藥通大便要出快也若出得

色紅而快更不須通也

六十利毒丸治小兒瘡疹欲出胃熱發溫壯氣龍滿大小便赤澀服中驚瀕瀕口舌乾手足微冷多睡時嗽涎實脈沉大

滑數便宜服之

大黃 半兩 臘粉 六青 龍腦

朱砂 各半 檳榔 生牽牛 芍藥

青黛 各半

右為細末麩糊為丸如黃米大二歲小兒服八九生薑實

水下不動再服量兒大小虛實加減

六十一夾食者紫霜丸治頭疼壯熱脹為夾食

方見和劑方

○瘡疹出太盛解毒第九

六十二消毒散治瘡疹已出未能勻透毒氣壅遏出不化壯熱

狂燥咽膈壅塞肺不安大便秘澀及治大人小兒上膈

壅熱咽膈痛胸膈不利

牛蒡子 甘草 荆芥

右為龍末每服一錢水七分盞煎至四分去滓食後服

服之此藥治大便秘澀是治裏熱故也况本草云惡實味辛平其中治瘡治風腫治暴發熱肉生風解丹石毒治咽

六十三化斑散

石膏 用紙裹煨於炭火未或用

右件等分用熱水調下一字服之或調塗唇上去頭瘡除

昏發泄瘡子此各石膏知母化毒散治小兒瘡疹此二方

極妙後方恐大涼

六十四地黃推黃散治溫毒發斑瘡痘出不快者乃冬應寒天

熱或被積寒暴發熱毒不得宣泄令身斑如錦紋心悶而

咳但啞清汁者葛根橘皮湯地黃推黃散子

地黃 淡豆豉

右以猪脂一斤和勻露一宿煎三分減去一分去滓下推

黃末一錢麩香半錢攪勻量兒大小飲若太多反有所按

六十五犀角散治小兒瘡疹不惡寒但煩燥小便赤澀多渴或

赤斑點者

犀角 甘草 防風 黃芩

右為龍末每服抄三錢水一盞煎至七分去粗溫服不拘

時候

六十六紫河車散治小兒斑瘡毒氣不解攻咽喉者聲音不出

舌頰生瘡過頰頰潮熱面赤

紫河車 茜根 貫衆 芍藥

甘草

右為龍末每服一錢水七分盞煎至四分去

滓溫服一方用牛蒡子

六十七玳瑁湯治時行晚 瘡及赤瘡疹子未發者令內消已發者解利毒氣令不不盛

生玳瑁 生犀 治時行晚

右同攪令勻每服半小微溫服一日四五服為佳又治出而未快者宜服之又云毒氣內攻紫黑色出不快用玳瑁水磨濃汁一合入獾猪心血一皂子大以紫草濃煎湯都作一服服之玳瑁犀角其性微寒以治熱毒則知其無失也二藥皆治瘰癧瘰癧解百毒通血脉消癰腫故用之以解蠱毒可宜服也

六十八白虎湯治小兒痘瘡斑疹赤黑出不快及瘡毒餘熱并溫熱病暑中氣煩燥熱渴大便秘小便赤四時天氣大熱即可與服如冬無大寒天氣大溫即可服之

石膏 知母 甘草 人參

右為養末每服抄三錢水一八益糧米二十粒同煎至半蓋去粗溫服不拘時候此藥治中暑又患瘡痘天氣大熱與肌熱心熱相應煩燥狂亂渴水發黃鼻衄吐血便血淋

秘皆可服之指迷方治瘡疹夏月煩燥加麥門冬用竹葉煎一名竹葉湯

六十九入參竹葉湯治夏月壯熱煩燥心悶口乾渴心神不寧痰壅嘔逆蕪治瘡疹後餘毒熱不退小便赤澀成赤斑者

入參 半夏 淡竹葉

右五味等分為養末每服抄二錢用水一小盞生薑三片同煎至半盞去滓溫服不拘時候瘡疹如覺不惡寒但煩燥小便赤澀多渴成赤斑點者宜服之此藥治中暑虛煩傷寒疹後餘熱不退皆宜服也

七十八初散治瘡疹毒氣少大小便利倒伏不出者

生地黃 地黃 珠砂

右為細末每服一牛煎胡荽酒少許同溫湯送下

七十一青黛散治瘡疹未作膿痛甚心隔煩燥睡不安者並宜服之

右用波斯青黛如棗核大以水調服之一方用溫磨刀水調服之

七十二野通散治瘡疹出不快并傷寒不語

乾野人糞 片腦 麝香

右為細末每服一錢新汲水八錢調下本草云乾野人糞治蜘蛛咬瘡此治瘡疹出快明矣蓋蜘蛛咬瘡久而不愈其絲生皮膚起蔓延身不愈用雄黃青黛麝香水調以蜘蛛試之蜘蛛化為水後果驗其雄黃青黛麝香是治瘡疹常用之藥乾野人糞亦治瘡疹之藥野人乃彌猴也黃色尾長面赤者若人家養者肉及屎皆不生或入其食忌雜連其本真也

七十三無比散治瘡疹惡候不快及黑瘡子應一切惡候

珠砂 片腦 麝香

右同研細如有患者小兒一字大人半錢水銀少許同小

後取轉下如爛魚腸菊菊穗之類臭惡物便安小兒用

乳汁滴充如觀之此藥方思右人論證處方無有不効者

須是病染相主則一下咽而病云若不相主而用之下咽即死也且傷寒有用硝石大黃而愈者有用附子乾薑硫黃丹硫著艾而愈者此合用而用之也設若必用硝石大

黃却用硫黃附子薑桂合用硫附薑桂却用硝石大黃下咽即死矣此用無比散之意也無比散治瘡瘰熱毒太盛瘰癧榮律不行外不得泄而內不得通毒氣在裏外則瘡疹黑色裏則腹一喘急語語大小便不通昏因者宜服之此有其毒則用其藥無不効者設或瘡黑瘰癧裏無腹脹無喘急無語語下大小便不通無昏因大便反如常或反利者則無此散不可用也常言對證用藥是也有一士大夫之家一子第八歲患瘡疹黑瘰癧診胃脈大弱前醫用升麻湯羌活散問其胃弱之故言平時胃弱不能進食今瘡疹黑瘰癧非麻羌活散臟腑日夜數次後用溫臟腑藥更不止而卒服升麻羌活散愈臟腑不因而米穀不化當此見瘡黑不見其臟寒則無比散亦無如之何故下藥先審病之虛實寒熱豈可一藥見黑瘰癧投良劑豈不誤人生死之計也

七十四豆湯治瘡瘰未作膿心煩燥睡不安者

右用黑豆豉汁徐徐溫服之亦解

七十五透肌散治瘡瘰升方與三十三化毒湯同

七十六黃蓮散治瘡瘰毒氣上衝口舌有瘡下部亦有瘡有熱者亦服之

右用黃蓮一兩去蘂為末每服一錢水一盞煎至五分去粗不拘時服量大小虛實與服瘡瘰初發亦宜服之

七十七通關散治小兒斑痧水痘心悶煩燥發渴及小便赤澀口舌生瘡通心經利小便

山梔子 大黃 木通 甘草炙
車前子炒 瞿麥 茯苓 人參
滑石 地黃 芍藥

石為細末每服一字二三能者半錢水半盞八分心同煎至三分服藥受弱弱者五分散人參白朮散亦得

七十八紫雲散治大人小兒一切熱毒胃熱發斑消斑瘡疹及傷寒熱人胃發斑并驚簡延厥走馬急疳熱疳黃瘦腹瀉痛及瘡疹發毒攻咽喉水食不下者

黃金 寒水石 石膏 犀角 羚羊角 三玄參 沉香 木香 丁香 升麻 升麻 升麻

右用水五升煎黃金至三升去全不用人諸藥再煎至一升濾去粗投上好芒硝二斤半微火煎以柳不惹攪勿停手候欲凝入盆中更下研硃砂麝香各三兩急攪候冷貯於罈器中勿令見風每服一錢溫水化下小兒半錢一字咽喉危急檢少許乾燕之

七十九竹葉湯治小兒瘡疹不惡寒但煩燥小便赤澀多渴成赤斑點者宜服竹葉湯犀角散

右為末每服抄二錢水一盞竹葉一握同煎至半盞去滓溫服不拘時候

八十導赤散治瘡疹心經蘊熱睡臥不寧煩燥而小便不利面赤多渴小兒貪食乳者湯也

人參 木通 麥門冬 生地黃 甘草炙

右等分為末每服抄二錢水一小盞煎至半盞去粗溫服不拘時候

八十一救生散治小兒瘡疹膿疱惡寒危困陷下黑色方共藥治大段熱毒頓回八歲前皆不得已而用之

太醫院經驗奇效良方大全 卷六五 一九七

積毒血 風月內以新毛龍子切

珠砂 牛黃 片膠 馬牙硝 一研

右同研極細每服一字新汲水調下六便下惡物瘡現紅

色為瘦不過再服神驗無比

八十二犀角湯治小兒痘疹及赤瘡子

犀角 粉 大黃 炒 桑白皮 蜜炙 鈎藤 牛黃 去毒 龍磨 半錢 石膏

右為膏末每服一錢水一小盞煎至四分去滓溫服量兒

大小加減服瘡子退後濃磨犀角水塗之更良錢氏亦代

方同以此藥治瘰癧太盛令不入眼則名調肝散此藥

治風盛氣實心肝血熱津液內燥大便不通毒氣上盛表

熱未散之藥也且大黃於裏治燥鈎藤能治風血熱

桑白皮石膏治上焦熱麻黃黃芩散肌熱犀角甘草解毒

熱大抵用藥貴於與病相主則病去而正氣自復苟為不

然則反為大害如犀角散自非大便數日不通喘急悶亂

煩燥諸語者豈可服之恐病藥不相主治也

八十三牛黃散治便血由瘡疹陽毒入胃便血致日夜無度腹

痛啼哭 牛黃一分 鬱金一兩 右為細末每服半錢以漿水半盞煎至三分和滓溫服量

兒大小以此增減日二服 八十四玉露散治暑月山瘡疔煩燥熱湯

寒水石 煅而微青黑中有甘草一兩 方解石 煅而微白有甘草一兩 右同為細末每服一字或半錢一盞食後用溫湯調下

八十五犀角飲子解熱毒去風疹

犀角 甘草 炒 粉 防風 二兩 黃芩 一兩

右為膏末每服五錢用水一小盞煎至半盞去粗溫服不

拘時候 八十六犀角地黃湯治瘡疹出大盛者宜服之活人書云傷寒

及瘟疫病應發汗而不發汗內有瘀血者及鼻衄吐血不盡

內有餘瘀血而黃大便秘者此方主消化瘀血蒸治瘡疹

大盛者此方解之 犀角 一兩 生地黃 半斤 芍藥 三分 牡丹皮 一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煮取一盞有熱如狂

者加黃芩二兩其人脈大來遲腹又滿自言滿者為無熱

不用黃芩 ○毒氣壅於倒厥黑色第十

八十七猪尾膏治瘡疹初作未能出透及已出盡內外熱毒貫

注血泡如豆在於肌皮之上不結痂死二者皆用之且瘡

疹蘊伏毒熱欲出而未透透則熱甚動心煩狂躁妄語

或見鬼神此皆心熱也蓋心榮於血血熱則瘡疹則色敗

未出者則為鬼瘡子一出而便黑也已出者為黑瘡大能

瘡痘自紅斑生成血泡至五七日結膿窠至六七日不

結膿窠者此是毒氣彌滿恐復入裏古人用龍腦香涼心

血行榮衛用猪心血者以心歸心用猪尾血者取其常動

欲散外也况有前狂燥證而未省者以溫酒化下此意欲

散而行榮衛故也皆治熱毒太盛者後人見用猪尾膏亦

名龍腦膏得効間有虛而倍伏者亦用之誤人甚多深可

怪也又有當用一字却用一兩熱少而不能當之及以為

害者亦多如合用一字者且與半字如傷寒作湯甚能飲

一第 1000 升 貴子 日 年 3 月 第 4 頁 之內

一斗者且與五升正此之意况有心經熱痰有他虛寒證
見者又不可輕服如吐瀉人發熱煩渴小便赤則不全為
寒證治也煩燥人大便自利而小便清則不全為熱證治
也如有此證在醫者兩全之去其所苦扶和陰陽不至偏
絕無不安者

右用丸腦半字許研細旋滴猪心血和丸以紫草湯化下
煩燥狂悶未省者以溫酒浸服之錢氏用猪尾膏用猪尾
血其意皆通又名丸腦膏

八控心散小兒斑疹一服而出

全蝎二十四雄黃一分麻黃去節各一分

右為細末每服一錢用胡荽煎酒調下蝎治諸風癱瘓中
風半身不遂口眼喎斜語澁抽掣者為能透諸筋脈雄黃
主惡瘡疔毒透百節治疥癩亦治瘡疹毒氣不能出也麻

黃鮮肌泄邪氣惡氣消赤黑斑疹三藥治瘡疹當出而不
出者如自然出快者不須服也

八十九獨味麻黃湯治斑疹倒靨

右用麻黃三十寸去節蜜拌炒令香紫色為度水一盞煎
至六分服昔有人得此方后知兗州仙源縣值工筆李用
之子斑疹倒靨已至危困投此藥一服瘡子便出其應如
神未至胃爛便血者皆可治服

九十甫金散治小兒瘡疹已出而復搨其勢甚危諸藥不効者
乃無一失

紫背荷葉糯米水白蠟去毒水
右為細末各一錢七小兒半錢研胡荽汁和酒下米飲亦
得本家在瘡貼印施人其全活者甚眾蓋藥有用就腦入
牙齒者卒難得之惟此藥無毒而効速荷葉卒難得可於

益鋪內尋之

九十一滑石散治瘡毒出既恐壅聚黑色此藥滑竅令出快治
疔上煩熱多渴小便赤澀面青氣急大便不利者

滑石井草

石等分為細末每服一錢雞子清酒各少許調服

九十二橄欖核水治瘡子倒靨

右用橄欖子核中截斷水磨少許服立發

九十三快毒丹治小兒瘡疹氣勻即出快蓋血與氣相隨若內
有邪熱即血妄行使氣不勻大抵瘡疹氣快自宜快毒
丹瘡疹出皆服之

牽牛黑者木香各一分肉苳蔻半兩青皮生半兩

右為細末滴水和丸如黍米大每服七丸至十九歲煎紫
草葱白湯下乳前服之量其大小加減

九十四紅粉丹治疔熱瘡疹不勻

龍腦細研壞子臘脂天竺黃硃砂細研

南星內產乾取末一兩

右五味煉蜜和搜為丸如鷄頭子大每服一丸煎人參湯
化下

九十五乳香猪血膏治斑疹不發

右以乳香研細用猪心血為丸如櫻桃大每服一丸用水
磨化下

九十六紫金散治小兒瘡疹倒靨及出不快者

紫草蛇退雄黃牛蒡子炒各

石為龜末每服一錢水七分煎至四分去滓溫服不拘
時候蛇退治一切惡瘡十年不愈者亦用之良故也

九十七鈞藤紫草散發斑疹令出快

鈞藤鈎子 紫草非

右等分為細末每服一字或半錢用溫酒調下熱時服紫草滑緩利小便散諸十二經毒氣鈞藤治小兒寒熱十二驚癇今治瘡疹而用之素問云瘡瘍煩燥痛痺皆出於心驚癇心病也瘡瘍亦心所主者故用也

九十八齋香猪血丸治小兒瘡疹不透

右旋取猪心血調齋香少許兩手心塗之并塗嬰小口唇上即無極驗

九十九木星飲子治小兒瘡疹不出及出不快者

朱砂一分 鬱金半兩

右為細末每服一字或二字量大小入龍腦少許以新汲水茶脚少許同調勻然後刺猪牙血滴三點于入藥汁令

服不過一二時辰瘡子出便紅小兒無他瘡神効本草

云鬱金辛寒主血積下氣生肌上血破惡血氣聚血金瘡以意詳瘡疹出於心也由熱而出也朱砂安心性微寒以治熱也熱有所蘊蓄則壅礙而不出用鬱金者下氣消惡血無壅礙則出而不遲也

一百四聖散治瘡疹出不快及倒靨

紫草 木通 甘草 枳殼 炙炒

黃芪 切焙

右件等分為麤末每服一錢水一中盞煎六分去粗溫服

一百一脫殼散

右以鷄子抱出殼子於新瓦上焙乾去膜取殼搗研如粉細過小兒痘瘡倒靨不出或臟腑養血糞黑頭瘡骨腫不能用酒調一字塗患處上令兒拭或以酒調塗風池背

上心前此名脫殼散或以熱湯調一字服之

一百二山梔子湯治瘡疹及斑毒狀如蚊蚤所醫毒盛黑色者

山梔子仁 白鮮皮 赤芍藥 升麻 各一

右件為細末每服一錢水八分盞入紫草薄荷各少許同煎至五分去滓放溫服

一百三化毒散

鬱金 一枚 甘草 一分 右用水半碗同煎令水乳去甘草將鬱金切作片令乳為末入生腦子半錢研令勻用猪血研成稀膏子煎薄奇湯

化下一錢不過一服其毒氣從手足心出乃差此五疔一生之候若便血蒼懷無膿者十死不治一法可用蠅蛻末一錢好腦子一皂角子大大指心三皂子大和作膏子

用熱酒浸紫草令溫化下服後少上發大疔瘡毒顯出然後依證調治

一百四宣毒膏治毒氣盛瘡疹已出不快倒靨急服此藥曾經大効

積猪血 先臘八日取後尾血 好硃砂 細研 揀乳香 細研 甘草 末為 馬牙硝 各半 片腦 麝香

右件一處同猪血拌勻用一寬新竹筒底節一箇盡入諸藥在筒內用密紙敷重繫定於大糞坑至梁上至清明日取出膠乳更入腦麝各一錢細研勻滴水九如皂角子大煎人參湯化下一丸若毒盛瘡黑靨脹之者瘡疹紅活再

長神驗

一百五百祥丸治瘡疹黑陷而耳脫反熱者為逆也用百祥地牛李膏各三服而不愈又云紫黑乳陷者百祥丸下之

黑者謹勿下又云黑者無問何時十難救一其候或寒戰
噤牙或耳黃腫紫宜急以百祥丸下之之下之復惡寒不已
身冷汗耳熱及熱者死病也得身溫欲飲水可治又云瘡
黑陷而不發寒病未困也遂用百祥丸為藥以牛李膏為
助各一大服五日而復紅活七日而愈

右紅芽大戟不以多少陰乾漿水煮軟去骨日中曝乾復
入汁中煮汁盡焙乾為末水丸如粟大每服一二十九研
赤芝麻湯下吐利同無時

一百六牛李膏治瘡瘻倒靨又云已出未出快者宜服草散
玳瑁散之類重者以牛李膏又云治小兒瘡疹毒氣不
出不快及觸犯黑色者宜用之又云奪命膏

右用黑熟牛李子七八月內採於盆內研汁生絹烈去滓
用銀器盛慢火熬成膏磁器內以常令透風每服一皂角

子大煎杏膠化如入行二十里一服其瘡疹自然紅
色毒氣慢此藥神妙一切瘡疹出不快並可服錢刀同名

牛李膏又云必勝膏云至秋結實黑圓成穗無生者市肆
中乾者為末水熬代用董汲治小兒瘡疹痘惡候見其

瘡下不面或出不快長及紫黑乾陷亦用此藥仍云沒小
年者此惡候極危殆父母不忍見之遇錢乙下此藥得安

因懇求得真方遂傳於世然於收時不知早晚故無全效
今并收時載之九月後收取研瀝成膏每膏二兩研入好

膏者半錢收貯不滓器中九齋衛生方同但用挑膠半兩
牛李子一兩炒為翁末每服一錢水七分盪煎至四分去

滓溫服治瘡亦同
一百七倍金散治小兒瘡痘倒靨黑色
鼠粘子神效神效神效減杖筆 山果子連核

右為龜末每服一錢水八分盪入荊芥 穗紫草十根同
煎至四分去粗溫服

一百八指聖丸治小兒疳瘡不出入方
右取用十二月老鴉左翅不計多少風中令乾夜日燒為

灰用中等獺猪背上刺血為丸如鷄頭實大每服一丸取
獺猪尾上血少許溫水同化下未效二三時再服

一百九濕生蟲散治瘡子倒靨
右用濕生蟲不計多少焙乾為末酒調下一字

一百一十白花蛇散治大人小兒瘡子倒靨
白花蛇燒骨一兩火大丁香二枚
右為細末每服一錢小兒半錢以水解淡酒調下如見瘡

者服之移時重紅生如聖
○毒氣滿盛而下第十一

一百一十一敗毒牛黃丹瘡子出定大便不通瘡中膿汁不乾
真牛黃 大黃未粉霜 珍珠未

右件同研勿煉蜜和丸如黍米大每服十粒煎人參湯下
量兒大小加減

一百十二大黃丸治瘡痂起而能食以此藥下之錢氏維六
未可以能食為有熱而便下須有他證相表裏方可下且

瘡痂起而能食也而腹滿腹滿而不大便不大便而喘急
喘急甚而語者方可下下之藥但能去熱毒不為瘡

痘之害若瘡痂起而能食一證便下之下之則不穩蓋熱
氣未深故也如傷寒發厥須在六七日已後蓋氣深方能

發破破而下之表裏皆解傷寒則汗解熱則瘡疹出矣
大黃一兩黑牽牛半生半熟

川芎半兩甘草一

右為細末米糊為丸如麻子大每服量大小加蜜湯吞下以溼利為度

一百十三川黃散治癩瘡及斑瘡大便不通

大黃 川芎 甘草 黃芩

枳殼 半兩

右為散末每服一錢水一小盞煎草少許煎至半小盞去滓溫服不拘時候瘡癩而大便不通不為害者則不下其為害可下者雖大便不通欲大便而不得通不得通而腹脹滿心胃悶喘急而赤腫中謔語有諸證即可下又看熱氣淺深藥有少輕重也又有諸熱證大便如滑者又不可下熱在表故也當與小柴胡湯五苓散治之

一百十四大承氣湯治昏甚謔語妄言大便不通腹脹之心脈下有汗日晴黃赤喘急者當用之

厚朴 八兩 大黃 四兩 枳實 一兩

右為散末每服五錢水半盞煎至二分入芒硝一兩去滓溫服不拘時候

○瘡疹病中表裏感寒或吐或利者第十二

一百十五益黃散治小兒胃冷嘔吐脾虛泄瀉又治患寒因煩燥渴水飲過多蒸傷脾胃或吐或瀉並宜服之

丁香 訶子 青皮 陳皮 白

木香

右為細末水半盞煎末一錢同煎至三分盞去滓溫服不拘時候

一百十六參不九治小兒脾胃傷冷外熱裏寒不思飲食身常壯熱大便或溼色白或患瘡疹身有大熱因食冷物或冷藥過變或瀉或腹脹或已出瘡疹麻白無血色此由裏寒

脾胃伏冷榮衛不行致令毒氣內伏不出宜服之其瘡癩白死血色者皆從癩白四圍紅暈再起作膿結而愈

人參 白木 乾薑 甘草

右為細末米糕泡糊為丸如麻子大每服百餘丸溫水吞下或米飲亦得乳食前服前世之書如仲景諸論治傷寒云輕者用理中湯重者用四逆湯此乃胃足陽明經而感寒邪脾胃乃為中州之府故用理中湯日辛甘發散為陽以退寒邪也理中湯煉蜜丸而嚼下日理中丸蓋添蜜其以入脾胃而便化於中焦今參朮丸以粳米糕為丸取其難化服在脾胃浸漉漸得消化則中焦得煖脾上喜其熱自歸此所以能治熱也

一百十七二和散治瘡疹并傷寒冷熱不和陰陽痞隔不升降服之調榮衛升降氣和冷熱自食快氣

藿香葉 香附子

右等分為細末每服抄一字溫水調服不拘時候

一百十八六神散治脾胃虛弱津液燥少內虛不食身發熱

人參 白朮 茯苓 甘草

右等分為細末每服抄二錢用水半盞生薑一片棗一枚同煎至三分去滓溫服之不拘時候身熱甚者加烏梅少許同煎服

白扁豆 黃耆 麥冬

一百十九治中湯治瘡疹方作熱渴欲飲或飲冷水或食冷物雖身熱其中寒不食嘔吐下利宜服之

人參 白朮 乾薑 甘草

右等分為細末每服一錢用水半盞煎至三分去滓溫服

青皮 陳皮 白

不拘時候量大小服之

一百二十胃風湯證候并方見集驗方

一百二十一乾薑甘草湯治瘡疹壯冷藥太過咳厥手足冷脉遲者自利嘔吐不食

乾薑炮 甘草各四分

右剉為散水一升二合煎至四合去滓溫服

一百二十二胃愛散調理小兒脾胃吐瀉如斑疹未出醫者不識形候便將冷藥水却瘡子致令內伏不出將此胃愛散調如身汗即不用控心散發也如无汗即控心散發之後下羌活散胃愛散

糯米一兩 乾淡木瓜三分 甘草一分 丁香附子各六分

藿香葉 紫蘇葉各一分

右件藥同一處令碎碾為細末分一錢或半錢煎粟米

藥子湯下

一百二十三勾氣湯取餘毒後調理

栝梗五兩 甘草二兩 白乾薑一分 縮砂

陳皮去白 茴香各一分

右為細末每服半錢或一錢用霜木瓜煎湯調下或用紫

蘇煎湯送下

一百二十四豆乳散治小兒瘡疹間偶滑泄不止甚者宜服之

肉豆蔻一枚 乳香一豆大

右為細末米飲調下

一百二十五薑附湯治瘡疹半出而半不出或出盛時却下利支厥嘔逆泄瀉吃噎須急與理中丸四逆薑附湯之類不須疑已試之驗也大便自利腹脹者是熱毒被冷所播不能出冷甚則為下利其毒小得則為腹脹當此以理中

九四逆薑附湯等服之重復溫則利止熱毒得從法則腹

脹自消瘡疹亦自出矣又有瘡疹半出半未出或出盛時

却大便不通小便赤澀喘急腹脹而唇齒乾口燥渴引飲

譫語者當急下之此證是毒氣壅滯欲出而出不辨故腹

脹下之熱毒散榮衛伸則裏脹消外瘡出合溫合下皆得

其宜不可不述之若下膿血而腹脹者又非此證宜服南

金散乳香猪血膏理中丸薑附湯

方見寒門

四逆湯方見傷寒門

一百二十六七珍散調胃進食滋養榮衛

人參 茯苓 白朮 山藥 黃耆 炙甘草 白扁豆炒

右等分為細末每服抄二錢水一盞生薑三片煎一

同煎至六分蓋連滓溫服不拘時候加粟米半升

此藥大能進食昔人患不食用諸藥皆不効後用此數

飲食大進脾土居中燥濕皆非所宜但得其中則水升火

降脾愛穀味也

一百二十七薤白湯治瘡疹下利黃赤膿血及身熱

薤白切半 豆豉一盞 山梔子十枚

右用水五盞同煎薤白爛為度去滓量大小服之解去惡

積也

○瘡子因吐利內虛自陷者第十三

者皆宜服之

右用白芍藥必為細末用溫酒調服或入酒一匙則出快

如欲止痛者只用溫熱水調服之以意尋之此乃調榮衛

蔡也蓋張氏妙選方云瘡疹氣勻即出快氣行由榮衛無阻矣又考蔡主時行寒熱消腫則治瘡疹矣素問論脚受血而能行目受血而能視手受血而能握物活人書一證感寒寸大尺弱兩足拘攣為下焦血少不能伸用芍藥甘草湯三服遂脚伸不拘攣能行常用有效又有老貴人不能拜跪宜醫用六辛湯乃是白芍藥六兩甘草半兩服十日而能行此亦活血散行榮衛也

一百二十九人齒散治瘡疹已出而不快既出而倒靨患瘡疹作寒熱而脈反遲者或攻皮膚而出遲或面額赤肺不洪大者或服涼藥過多血澁氣弱或出其未快既出而倒靨患瘡疹間以酒調服之錢一附方治瘡疹倒靨入麝香酒調服之尤佳又云瘡疹倒靨不出加赤小豆七粒薄荷酒細服之若黑色者名曰鬼瘡子用獾猪心下二錢煮酒再服之

右用人齒脫落者以麝香固濟八人假令通夫似令取出為末用薄荷酒調服之半錢及久脈平毒氣散瘡如粟米而出詳之此為發出瘡疹之藥也如傷寒表汗之藥如傷寒發汗須看榮衛之淺深瘡疹表出須看蘊熱之多少也恐蘊熱少而用藥過為斑爛故也其已出而未快者古血散猴藜酒葡萄酒之類可也既出而倒靨者須入齒散則病藥與稟受弱人三者皆相當也不爾則病輕藥重反以為累也後人不能究其毒氣輕重一藥用藥因茲夫橫者多昔有士貴之家患瘡疹已出而稍遲遂用正氣散加白芍藥又用胡荽酒猴藜酒亦出遲渠家云大抵醫家用藥大緩自夜來燒人齒五个酒調服之一身瘡疹俱出駭聞渠用遂再診視脈已微觀腦後并兩脚盡白色是榮衛弱熱毒少而藥力過則陽氣少而元以應接故死血色也告

云陽氣盡出表外今裏寒七氣成燥七必瀉瀉急以二氣丹為小丸服至半兩水瀉二日方止又服內補散治瘡疹其瘡疹服人齒散表過為斑爛通體為一將息月餘方愈其人精神稍緩蓋耗竭心液故也詳人齒治妳乳癰破腫出箭鏃則表瘡疹甚驗若慢用早則一變十不可勝數為斑爛為虛脫為裏寒不可不知又有田舍及市井間小兒患瘡疹中行走當風任服朴硝大黃之類無害者恐富貴之稟非負荷者比各隨宜而治前云服人齒散嗽微而瘡色白為外陽微瀉瀉為內陰盛自非先用二氣丹後尚瀉瀉若用之違豈不為虛脫也

一百三十內補散治小兒正患瘡疹中或感外寒或以湯上或服冷藥過多因生吐瀉脾虛血澁瘡疹遲遲不出肌膚瘦而無血色裏服諸調脾胃藥此可以治血氣瘡

毒得出

- 人參 黃芪 白芷 當歸
- 肉桂 桔梗 川芎 木香
- 甘草炙 防風 厚朴薑製 阿膠炒
- 搗皮去白

右等分為細末每服一錢入酒二匙溫湯浸調服之不拘時候王子建云仲景論證多而用藥少男子詳而婦人畧云此乃穿鑿之過若使仲景存日其方有餘用蓋無壞病矣今則醫者治病似紛擾之為利是圖動輒差悞後賢處方救其不及是乃方愈多皆是救差悞爾治瘡疹用內補散亦救其差悞爾但俗人常云瘡疹是熱毒見其藥稍溫便以為悞此不審之過也殊不知傷寒是傷其寒却中間或用大黃朴硝升麻知母之類此皆救一時不及若不

述此恐人執而不秘一向偏見使緩急療病意議不能完備

○解利極毒第十四

百三十一赤茯苓湯治小兒疹瘡出後咳逆脇痛不下食

赤茯苓 甘草炙 大青 升麻

枳殼 煨炒各 枳子一分

右為糞末每服一錢水一小盞入若竹葉一七片豆豉三十粒同煎至五分蓋去滓分為三服日三四服青兒大小以意加減本方稱疹瘡出後脇痛者由病後毒氣滯亂阻於升降左右為陰陽之道路氣之所行處令氣滯為脇痛以枳殼寬腸下氣令氣順脇不痛也大青枳子二盞與升麻解毒赤茯苓導心火利小腸無熱以克肺氣而逆自平爾

百三十二小柴胡湯治發熱甚而嘔宜服之

柴胡 人參 黃芩 芍藥 甘草炙

半夏 煨七次

右為糞末每服三錢水一盞生薑二片棗子一丸煎至半盞去滓溫服咳嗽者加五味子煎服頭痛發熱嘔吐寒痛者四味升麻湯大便不通者四順飲若大便自利黃黑色者此毒亦有所出不必廣與湯劑恐重增他病大便自然通不得以溫藥助之瘡疹亦稀少自快利只與四味升麻湯荆芥散維大便利不可以溫藥助之其下利甚者却與少溫之

百三十三六青四物湯治熱病十日已上發汗及吐利後熱不除身上斑出

大青 四兩 豆豉 八合 阿膠 甘草 炙

右劉如麻豆每服抄五錢水一盞煎至六分去滓入膠煎令化服

百三十四沙糖水治瘡子作膿窠了是毒氣已盡出在肌但末結膿者

右宜調沙糖水與喫瘡子將欲乾時須與兒搗去茄令血出則定無瘡子若從他至乾定隱一瘡子也後人見喫沙糖水瘡乾不問毒氣出與不出盡便與沙糖水喫損目者多矣蓋當瘡結成膿疱是毒氣出盡在肌膚可服之也設或尚爾血瘡未成膿疱乃毒未出盡便喫沙糖水則損目蓋患瘡瘡兒食糖蜜棗柿即瘡入目及患瘡瘡兒食糖鴨卵食其兒開卵氣目中即生翳膜更不可食

百三十五藍根散 板藍根 一兩 甘草 炙 三

右同劉為細末每服半錢或一錢用雄雞冠上一兩煎同溫酒少許食後同調下

百三十六甘露飲解胃熱及小兒瘡疹已發後餘毒後熱溫壯齒斷宣腫牙痛不能嚼物飢而不欲食頃頃西黃及病後瘡疱乳母俱可服

甘草 山茵陳 石斛 批把 藥 生地黃 麥門冬 去心

右等分為糞末每服抄二錢水一盞同煎至八分食後溫服牙齦動搖牙斷腫熱含漱并服

百三十七槐花散治斑瘡餘熱不退 槐花 赤小豆 各 少許

右為細末每服半錢蜜湯調服不拘時候 百三十八碎心散治瘡瘡出欲盡便服之如入眼即自退

蛇蛻燒一錢 不蛀皂角燒十錢 甘草生用

右為細末每服一錢熱水調下小兒半錢

一百三十九青金丹治小兒瘡疹病後取下餘毒

滑石末 白丁香研過 天南星 青黛 細羅

輕粉 水銀各二錢 煨以水銀煨以水銀 煨以水銀煨以水銀

川巴豆去皮心 煨以水銀煨以水銀 煨以水銀煨以水銀

右件藥用拌和勻用軟飯為丸如梧桐子大巴豆不出油

依形證用湯使傷寒後取積痰煎葱白湯送下取甘蟲用

牛肉汁下驚風肚中緊硬面青黑用金銀薄荷葱白湯下

因傷着肚中及腹皮上微熱腹脹夜間作熱少下下是

疥面青黃色眼微黃肚腹中有積用皂角子一二五五下

煨過水一盞煎至半盞送下此藥有積作馮魚鮓以下氣

積炒茴香湯下凡下此藥周歲一曰九二歲一曰九七歲

二十四九看大小加減下瀉是曰天疳疳疳疳疳疳疳

時可依形證候下藥補之臨服此藥恐先吐下此小疳疳

亦不妨

一百四十黃芩散治瘡毒出盡後服之恐瘡毒入月不

黃芩 山梔子 黃丹

右等分為細末用牛蒡子葉取汁調塗於頂門

一百四十一燈心湯治瘡痘出後煩喘小便不利者宜進之

燈心 一把 鱉甲醋炙

右到為散每服一兩用水八合煎取四分服之各量大小

加減服之

一百四十二黃耆散治壯熱不退可涼肌膚散熱

黃芪 柴胡 乾葛 甘草炙

右為末每服一錢薄荷三葉水半盞煎至三分約三甲空

心服此藥治發熱數日未退者其熱是瘡疹者量其虛實

用之也

一百四十三朱砂膏治小兒驚積驚熱病後可常服

朱砂半兩 鵬砂 馬牙硝各三錢 真珠末一錢

玄明粉二錢 片腦 麝香各一錢

右件各為末於一處拌合和用好蜜煉成膏如小兒諸般

驚熱用甘草煎湯化下一臘及一月內小兒不通下藥可

以藥用乳調塗於上令小兒喫乳下

一百四十四宣風散治身熱煩渴腹滿而喘大小便去虛面下

問亂大吐當利其小便不瘥者宜服之

檳榔二箇 陳皮去白 甘草炙 牽牛用半

右為細末三兩歲用蜜湯調下半錢已上者半一

前服

一百四十五甘桔湯治瘡疹咽喉疼痛生瘡者服之

甘草二錢 桔梗一兩

右為細末每服二大錢水一盞煎至五分食後服

熱手搏眉目鼻面加阿膠半片炒過同煎至五分服

一百四十六定命朱砂散治小兒瘡疹毒氣不出或出後乾黑

色服此藥發出毒氣其瘡子細紅而出也此方係出瘡子

倒壓門中

朱砂半兩 生龍腦 滴乳香 馬牙硝各四錢

甘草二錢

右五味研勻用臘月新獺猪血半升同研勻取青竹筒長

二尺留兩節開一頭作篋子注藥在內黃蠟塞定以油絹

緊裹封勿令透氣埋地坑中至一百五日取出水洗瘡風

田螺大者 巴豆去殼 膽礬許豆 麝香火許
 右將田螺以水養三日出泥土揭起入膽豆麝香在螺內
 以線拴住放磁器內次日化成水凡用酒五更時將藥水
 以手自抹在兩腋內不住手抹藥直待腹內欲行臟腑即
 住手先要揀深遠無人到處生地內去大便黑糞極臭是
 其證以土厚蓋之不可令人知之如不盡再以藥水抹之
 又去大便後次日以枯礬擦之可去病根

治腋氣方

右以膽礬如琉璃者半生半熟煨為細末入臙粉少許同
 研每用半錢以生薑自然汁調藥指擦腋下亦入下
 痛則止礬以無灰已石頭妙

治腋氣方

右用蒸餅一枚作兩片搽除細末一
 在腋略腫少時候令棄之如一夜有病只只
 藥元方平生苦此疾來紹興偶得此方用一次遂痊

治腋氣方

右法搽去腋下毛以甘遂半兩為末用猪肉兩煮拍
 將甘遂摻肉上午後貼放兩腋下候明旦五更膿出草
 半兩為湯一椀服之須臾下臭氣

治腋氣方

右用活田螺一箇以好麝香少許安於田螺內却埋於露
 天地上不可兩打待七七四十九日取出看患處淨洗拭
 乾用墨搽之却再洗有黑處是穀子用田螺汁點之內
 度立愈

治腋氣神妙方不可盡述

右用白礬飛過不以多少臨睡時以紙糊上伸手托

柱上以藥乾指令腋下十分熱痛兩腋指徧先於日中淨
 所著上截衣服用灰汁淨洗又泡去衣袖中臭氣皆無氣
 息如新衣方可著若洗氣息不斷狂用其藥大槩藥無不
 驗多是衣服再作氣故不能斷指一方用燒好礬石土絹
 袋盛常以粉腋下不過十度一方唾調塗之

治陰汗鴨臭兩腋下臭不可與人同行

白礬 蜜陀僧 黃丹各一 麝香一

石於乳鉢內研如飛塵以醋於手心內調藥未搽腋下經
 兩時辰許却以香白芷煎湯洗之一日用一次

治腋臭神效

蜜陀僧四 白礬二 輕粉三

右為細末頻擦兩腋下擦至半月見效半年全愈

奇効良方之六十六

蜜陀僧四 白礬二 輕粉三

凡人腹中有死蟲此物與人俱生而為人大害死蟲之形狀似
 米而毛或如薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三寸又有九蟲一
 曰伏蟲長四分二曰蛇蟲長一尺三曰白蟲長一寸四曰肉蟲
 狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶六曰胃蟲狀如蝦蟆七曰弱蟲狀
 如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蟻蟲至細微形如菜蟲狀伏
 蟲則群蟲之主也就蟲貫心殺人白蟲相生子孫轉多其母轉
 大長至四五丈亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人咳嗽胃蟲
 令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多嗜亦令人易噯
 蟻蟲居胸膈之間多則為痔劇則為癩因人瘡瘻即上者難
 癩癩病疥癬無所不為人亦不必盡有有亦不必盡多或備
 有或備無病常人多其蟲凶惡人之相也常以白草草沐

浴佳根葉均可用既是香草且是死蟲之畏也○凡治諸病皆須去諸蟲并疥飲宿醉醒除盡方可服補藥不
 爾必不得藥力○凡得傷寒及天行熱病腹中有熱久人食以
 腸胃空虛三虫行作求食蝕人五臟及下部若齒漸黃色舌上
 盡白甚者唇裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠當數看其上唇口有
 瘡齒血唇內如粟瘡者心內懊懣痛悶此蟲在上蝕也○九虫
 皆由臟腑不實脾胃俱虛雜食生冷甘肥油膩鹹膩等物節宣
 不時腐敗停滯所以發動又有神志不舒精魄失守及五臟勞
 熱又病餘毒氣血積滯而生或食瓜果與畜獸內藏遺留諸虫
 子類而生虫之為候嘔惡吐涎口出清沫痛有去來乍作乍止
 寸白虫色白形補換人精氣力之腰疼蟻虫細如菜虫能為痔
 漏瘡癩疥癬癰疽等患寸白蟻虫是三者皆九虫數中之一物
 也外此又有兒童疳積昏瞶煩燥鼻爛汁臭齒斷生瘡下利黑

太醫院經驗奇效良方大全 卷六七

血虫食下部為狐不唇有瘡虫食其臟為感上唇有瘡○三虫
 者為長虫赤虫蟻虫也乃有九種而蟻虫及寸白人多病寸
 白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裏
 潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速除之蟻虫多是小兒
 患之大人亦有其病令人心痛清朝口吐汁煩燥則是也其餘
 各種種不利人人胃無不有者宜服九虫丸以除之○蛔虫者
 是九虫之一也長一尺亦有長五六寸或因臟腑虛弱而動或
 因食甘肥動而其發動則腹中痛發作種聚行來上下痛有休
 息亦攻心痛腹中熱口中喜涎及吐清水貫傷心者則死該其
 脈腹中痛其脉法當沉弱弦今反洪而大則銅蟲也

諸蟲通治方
 鶴虱丸 治積年常患諸虫心痛吐水不能食

狼牙 附子 乾木 附子 乾木

檳榔 白木 橘皮 甘草 各

吳茱萸 煨乾薑 各 狼毒 醋炒 黃

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服十五

丸不拘時粥飲送下

取虫積方

檳榔 牽牛 各半 雷丸 半兩 苦陳皮 一兩

大黃 四兩 皂角 半斤 三稜 蓬朮 各二兩 另

木香 隨意 右為細末煎皂角膏子煮糊為丸如黍米大每服二錢四

更時分冷茶清下小兒一錢一虫以白粥補之

萬靈丸 取積追虫

黑牽牛 一斤取頭末 六腹子 一斤帶若取末七兩

蓬朮 二兩 京三稜 也 雷丸 也 廣木香 五兩

十五

右為細末研勻用好紫色皂角半斤去皮切碎用水兩大盞浸一宿冬月浸兩宿撈去粗滓銅磁器內熬數沸取出沫出為膏放冷和藥必須揀搗為末如梧桐子大每服四錢重五更時以糖水送下溫冷不效至天明利三五行有取下是何虫積以溫白粥補之忌食生冷魚腥硬之物至婦勿服

石榴枝湯 治九虫動作腹中刺痛口吐清水面色黑黃及虫攻心痛者

東引石榴枝 三兩 陳皮 湯浸去白 吳茱萸 湯浸去 木香 兩各一 芍藥 大黃 二兩 葱豉 和 二兩

右吟咀如麻豆大每服半兩水一盞半煎至八分以滓至心溫服

根牙散 治九虫在腸胃令人心煩吐逆下虫

狼 貫衆 鶴虱 無名 二各

右為細末每服一錢粥飲調下良久再服虫出為度

竹節丸 治三虫

燒竹節 雷丸 各三 灰 一分 橘 半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子 八每服八九用白湯送下一日三服

攢柳湯 治三虫并寸白虫

右用攢柳三枝以灰火煨過倉換篩用水三盞煎至一盞半去滓分三服空心日午夜各一服其虫盡下或和葱白鹽豉同煮飲之亦佳一方治寸白虫用攢柳二七枚坐碎以水二升半煮成收一升半去滓內末頓服煖卧虫出或不盡更服取瘥止宿勿食且服之

麥門冬丸 治肺勞熱生虫其虫如蠶令人欬逆氣喘或癆瘵

肺氣膈毒膈寒膈熱膈此皆從勞氣所生名曰骨育病鍼灸不至

麥門冬 去心 乾薑 獨椒 夫目并各一兩

黃芪 剉 百部 治 白木 人參

桂 去粗皮各一分 遠志 去心 附子 炮去 細辛 夫兩

甘草 兩各一 杏仁 炮去尖 黃芩 兩

右為細末煉蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻熟丸如酸棗大含化稍嚼嚥津一方有攢柳一方無白木

前胡湯 治脾勞有白虫長一寸在脾為病令人好嘔胃中欬效即嘔而不出

前胡 去蘆 白朮 剉 細辛 夫兩 赤茯苓 去皮

枳殼 夫兩 常山 剉 松蘿 旋覆花 兩各一

龍 杏仁 夫兩 各一兩

右對碎每服半兩水二盞入竹葉一片洗淨切如豆煎至一盞去滓空心服吐之即瘥若腹中熱滿加芒硝半錢施

子仁 一兩 黃芩 一兩 半 苦參 一兩 一方用枳實 剉 散

雷丸丸 治心膈勞熱傷心有長虫名曰蠱長一尺貫心為功

雷丸 炮火 橘皮 湯浸去 桃仁 夫兩 各一兩 皮尖 剉

貫衆 夫兩 白蘘蕪 夫兩 青葙子 炒 乾漆 夫兩 各一兩 出

根牙 夫兩 白蘘蕪 夫兩 亂髮 夫兩 各一兩 研

右為細末研勻煉蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻熟丸如梧桐子大每服十五丸空心用溫酒送下至晚專服米飲亦得一方不用塗酥一方有蠶絲長菜葉根皮

煎散 治腎勞熱四肢種急有蟻虫如菜中虫生於腎中

貫衆 夫兩 白蘘蕪 夫兩 胡粉 夫兩 杏仁 夫兩 各一兩 研

右為細末研勻每服二錢空心并花水調下日晚再服

桑根白皮酒 治肺勞熱生虫在肺為病

桑根白皮取東引者 吳茱萸根皮取東引者

狼牙法連黃連

右細剉用酒七升煮至三升去滓分作三服每日空心一服一方無狼牙

茱萸根浸酒方 治脾勞熱有白虫在脾中為病令人好嘔

吳茱萸根取東引者 麻子淨洗 陳橘皮去白炒

右先搗碎橘皮麻子如泥然後拌茱萸根用酒一斗浸一宿慢火上微煎絞去滓分作五服每服空心溫服虫即下

水銀膏 治蟻虫咬入下部痒

右水銀一兩用蒸棗膏和九如人指大綿裹臨卧內下部

中一宿內藥時常留綿帶子在方水銀須慎之

聖効丸 治臟腑虛弱或多食甘肥致納虫動作心腹交痛

發則種聚往來上下痛有休止腹中煩熱口吐涎沫是虫咬宜服此藥若積年不瘥服之亦愈又治下部有虫坐痔

痒痛

木香 鶴虱炒 檳榔 訶子微去

蕪荑炒研 附子炮去 乾薑炒各七 大黃兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前用橘皮湯送下婦人醋湯下

蠶蛹汁方 治蛇虫

右取綠絲蠶蛹兩合爛研生布絞取汁空心頓飲之非綠

絲即須依時收取蠶蛹曝乾搗為細末用時以意斟酌多

少和粥飲服之

錫灰丸 取寸白諸虫

錫灰研末 鷄心檳榔 貫衆格五 木香半斤

輕粉 黃丹二斤

右為細末酒醋煮麩糊為丸如荔枝大每服一九米泔浸軟日午先喫飯了至黃昏不飢飽時喫肉脯一片引虫火刻溫酒醬下至天明虫出又喫韭菜亦治寸白虫

治寸白虫令化為水

狗脊 貫衆 白蕪荑 酸石榴根剉

右剉碎每服半兩以漿水一大盞煎至五分去滓四更初溫服先於晚間不得喫夜飯

治寸白虫為水瀉出亦除方

梔子 檳榔 蕪荑各等

右為細末每服二錢溫酒調服先燒牛肉脯喫後服藥

聖効散 治寸白虫不拘遠年神効

南木香 檳榔各等

右為細末每服三錢濃米飲調下黎明空心先熱嚼炙猪肉之屬只嚼汁吐去滓便服藥辰已間虫下其疾亦除此方簡易如是取効速用之累驗

治寸白虫方

右用梔子四十九枚去皮以月上旬平旦空心服七枚七日服盡虫消成水亦瘥又云食實七顆七日滿虫化為水

一方以百枚只燃燄之食盡佳不餓者但啖五十枚亦得

經宿虫消自下一方并治三尸虫

治寸白虫方

右用黑鉛灰炒四錢一服先喫猪肉脯少許一時亦却用

砂礬濃水并盡調灰五更服虫盡下白粥將息一日良方

宜和中每竟心中多帶雜意謂飲作又疑是虫慢依良方

所說服豎白下虫二條一長二天五寸頭闊尾尖每寸作一節斑斑如錦文一條背寸斷矣千金謂勞則生熱熱則生虫心虫曰蛇脾虫寸白腎虫如寸截絲縷肝虫如爛杏肺虫如蠟五虫皆能殺人惟肺虫為心肺虫居肺之內蝕入肺系故成瘵疾咯血聲嘶藥所不到治之為難有人說道藏中載諸般虫皆頭向下行唯自初一至初五以前頭上行故用藥者多取月朏以前蓋謂是也

治濕墮方
青黛二兩 黃連 丁香各一分

右為細末以車脂和如棗大內下部日一二度

治虫蝕下部肛盡腸穿者
右取長股蝦蟆青背者一枚鷄骨一分燒為灰入和吹下部令深入累用効

奇効良方卷之六十七

奇効良方卷之六十八

中惡門 附論

夫病者卒心腹脹滿吐利不行如乾霍亂狀世所謂衝惡是也由人精神不全心志多恐遂為邪鬼所擊或復附着沉沉然默暖言謔語誹謗罵詈訐露人事不避談嫌口中好言未然禍福及至其時毫毛無失人有起心已知其肇登高涉險如履平地或悲泣呻吟不欲見人其狀萬端如醉如狂不可舉舉此皆鬼神及諸精魅附着感人或復觸犯忌諱土地神靈為其所作非有真實但隨方俗攷驗治之中惡者是人精神衰弱為鬼邪之氣卒中之也夫人陰陽順理榮衛調平神守則強邪不干若將攝失宜精神衰弱便中鬼毒之氣其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死又凡卒中惡腹大而滿者診其脈緊大而浮者死緊細而微者生又中惡吐血數升脈數細者死浮緩而疾者生口惡者差後餘勢尚滯發作則變成症也

中惡通治方

辟穢丹 辟穢氣
細辛半兩 甘松一兩 川芎二兩 麝香一分

右為細末水和丸如彈子大久嘗好每燒一丸

桃皮湯 治中惡喘急心腹痛胃腸脹滿短氣

桃枝二握東 白楊皮一握 梔子仁十四 當歸切焙
桂心各三兩 附子炮去 吳茱萸炮洗 香豉各半

右剉碎每服半兩水一盞半入生薑一棗大煎至一盞去滓入真珠末半錢攪勻溫服一方無白楊皮

珠砂丸 治中惡客忤毒死

珠砂水飛 附子炮去 雄黃水飛 麝香一分
巴豆研碎 桑葉去心

右細研勻煉蜜和搗三五百杵九如麻子大每服三九不
拘時粥飲下如不利更加三九至七九以利為度

珠犀散 治口惡中忤鬼氣其證暮夜或登廁或以郊野或遊
空屋或人所不至之地忽然眼見鬼物鼻口吸着惡氣
然倒地四肢厥冷兩手握拳鼻口出清血性命遠巡須臾
不救此證與尸厥同但腹不鳴心脇俱暖切勿移動即令
人圍繞打鼓燒火或燒麝香安息香蘇木樟木之類候醒
方可移歸

大珠砂 麝香生研各一分犀角半兩

右為細末研勻每服二錢用井花水調灌服如無前件藥

只用單方

治卒中惡方

右用葱心黃刺鼻孔中血出愈耐後方云入七八寸無舌

使目中血出佳崔氏云男左女右

治卒中惡方

右令仰臥以物塞兩耳以兩竹筒內病人鼻中使兩人痛
吹之塞口傍無令得氣出半日病人則噫噫則勿後吹

治卒中惡氣絕

右以珠砂書古作鬼字額上亦書之大良

治中惡與卒死鬼擊亦相類

右搗菖蒲生根絞汁灌之立瘥尸厥之病卒死脉尤動听
其耳中如微語聲股間暖是也以此方治之

殺鬼五邪丸

治邪氣鬼魅所持妄言狂走恍惚不識人

丹砂研 雄黃研 龍骨 鬼臼去毛

赤小豆各一兩 桃仁湯浸去皮尖 鬼箭羽去毒

芫青去翅足

右為細末研勻煉蜜和九如彈子大囊盛之男左女右繫
於臂上小兒繫於頭上合藥時勿令婦人雞犬見或煉蜜
和丸如梧桐子大每服一九米飲下亦可日三服一方有
犀角屑

碎諸邪崇附着及小兒驚哭恐悸

右用安息香一皂子大燒令烟服邪自去

治人卧忽不寤

切勿以火照照之殺人但痛齧其踵及足拇指甲際多唾
其面即活仍以舊蒲末吹兩鼻中及桂末吹舌下

鎮心丸 治心氣怯弱常多驚悸恍惚謬忘

丹砂研 防風去蘆 官桂去粗 細辛去苗

當歸切焙 鐵精 防已各一兩 白茯苓去皮

茯神去木 桂黃研 桔梗去芦 石膏各一兩

遠志去心 乾薑炮 銀屑 紫石英研

人參 甘草炙各二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九食後用白湯
送下日三增之

扶神散 治虛羸心氣乏弱多驚

扶神 黃芪 乾薑炮 白芍藥

人參 桂心 甘草炙各一兩 遠志去心

右剉碎每服半兩水一大盞煎五分去滓不拘時温服

八毒赤丸 治男子婦人染着神鬼謂之鬼瘡病服之甚効

雄黃研 礬石一方 牡丹皮

附子切 藜蘆 巴豆各一兩 蜈蚣一條

右為細末煉蜜和丸如小豆大每服五七丸至十九冷水
送下無時昔有副使許可道到桂州請醫看脉乍大乍小

乍短乍長氣血不勻邪氣傷正本官說去路到邯鄲驛中
夜夢一婦人着青木不見面用手於脇下打了一拳遂一
點痛往來不止寒熱不食乃鬼擊也可服八毒赤元本官
言常讀名醫錄中看李子愈八毒赤元為殺鬼杖子遂與
藥三粒臨卧服明旦下清水二斗立効合時宜齋戒誠心
破棺丸一名復生散 治癘卒死及為墻壁竹木所壓水溺金

橫死心頭溫者並治之
右用半夏不以多少湯洗去滑研為細末每用大豆許吹
入鼻中即活但心頭溫者可治

治卒鬼擊如中箭忽然一點痛如注不可忍
右以桃皮一片將裏面濕處貼痛上取一匙頭安桃皮上
緊槎艾一團如胡桃大安是頭上灸之須臾痛散

治夢中被刺殺或杖打諸般不祥卒然吐血衄血下血者九
竅皆有病名鬼擊

升麻 獨活 續斷 地黃各半

宮桂去粗皮

右為細末每服二錢食前白湯調下日三服

治自縊死方 凡自縊死從早至晚雖已冷必可活從夜至早
稍難若心下溫一日已上猶可救欵抱其身緩緩解繩切
不可截斷繩故即令人踏其肩以手接其髮常令一人緊
以手擦胸脇散動之一人摩捋臂足屈伸之若已僵但漸
漸足屈之及按其腹如此一飯時即氣口中出得呼以眼
開勿苦勞動可用官桂湯少與飲及粥清令潤喉更以兩
人以筆管吹其耳中依法救無不活者又緊用手掩其
口勿令透氣兩時氣急即活

治自縊死方 凡救自縊死者急須按定其心勿截繩手抱起
徐徐解之心下尚暖以氈覆口鼻兩人吹其兩耳一方以
衣物塞耳竹筒口中重吹氣入仍塞口邊莫令氣出則
可活矣

治自縊死及中惡氣被絕者
右用皂角細辛搗為細末吹兩鼻中

治自縊死方

右刺鷄冠血出滴著口中即活男用雌文用雄者塗喉下

治自縊死方
右用鷄屎白如棗大酒半盞和灌口鼻中佳

治自縊死方
右用梁上塵如大豆許以小竹筒時吹兩耳兩鼻即活

治自縊死方
右用尿鼻只眼耳中并髮頭髮一撮如鼻管大制之立活

治自縊死方
右以藍青汁灌之立活

治自縊死方
右以松子油內口中令得入咽中便活及治溺死

治自縊死救之未活以車載之法
右以絹緊絞身體令堅以車牛載行三十里許使人於車
上行踏肩引髮如前

治溺死已經半日
右取大甕覆地以溺死人腹伏甕上以微火于甕下燃之
正對死人心下須臾死人心下甕暖口中水出盡即甕勿
令過熱

治溺水葱汁導水法

治溺水葱汁導水法

右取不雖皂角為細末以葱白汁或棗核和丸如棗核大
內下部中其水自出効

治溺水死以酒灌法

右法倒垂死人以好酒灌鼻中及灌鼻部或醋灌鼻中

治忽溺水死者

右倒卧灑却水便於肚上多著灰掩之仍以皂角末吹兩

鼻中即活

治溺水石灰壅之得活

右以石灰壅之候下部中水出盡即活一方以綿裹石灰

納下部中

救溺水法

凡人溺水者救上岸即將牛一頭却令溺水之人

將腹橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐牽牛而行以出

腹內之水如醒即以蘇合香丸之類或老薑擦牙若無牛

以活人於長板凳上仰卧却令溺水人如前法將此法活

人身上水出即活仍灸臍中百壯

治溺水心頭尚溫

右先用人抱定令頭微仰用口於鼻中吸出黃水却先用

綿絮熅其下體及陰囊處即活如無綿絮可用灰數十籬

通體埋蓋只留面在外令頭仰亦可活

凡溺水一宿尚可救

右先屈死人兩脚着生人看上以死人背貼生人背擔走

吐出水即活亦治凍死

又方

先解死人衣灸臍中即活

又方

右以酒罍一箇以紙錢一把燒放罍中急以罍口覆溺水

人臍上冷則再燒紙錢放於臍內覆臍去水即活

治凍死 凡冬月落水凍四肢直口嚙尚有微氣者方或因風

雨霜雪冷氣入臍陽氣暴絕

右以大罍中多焚灰使燻臍或以搏其心冷則更易小罍

氣通自則得轉口亦乃開可與溫酒服粥清稍熾之即

活若不先溫其心便將火灸其身冷氣與火相搏即不活

治凍死人已救活宜服此藥一二服

生薑附子 陳皮 各一兩

右用水三盞煎至一盞半放溫與服不可熱不可冷

治凍死方

右用葱或蘆薈果之以索繫定放在平穩處令兩人對面

輕上袂轉往來如趕趕毬四肢溫和即活仍灸臍中三五

壯凡冬月凍倒人急與冷水一二口扶在溫燠處不得與

熱湯如便與熱物及向灸必死雪泥中行便近火如臍指

隨落

療入井塚悶胃

凡五六月井中及深塚中皆有伏氣入則令人鬱悶殺人

如欲入必須先以鷄鴨雜鳥毛投之直下至底則無伏氣

毛若徘徊不下則有毒氣也亦可内生六畜等置中若有

毒其物必死若或不得已而入當先以酒毒若酒數升先

洒井塚中四邊畔停以時然後可入若竟有冷氣鬱悶奄

奄欲死者選取其中水灑人面令飲之又以灌其頭及身

體即活若無水取他水用之

夏月不可陶井多致殺人

宜先以鷄毛放井中試之如挫動不肯便下是有毒氣不

可入古塚亦然五月七月尤甚如已中毒以水灌其兩耳

令水調雄黃末一二錢轉筋入腹痛欲死者使四人捉手足灸臍在邊二寸十四壯又生薑一兩擘破酒五盞煮濃頻服又醋浸衣絮令微濕裹轉筋處又濃煮湯通手浸

怪疾手足洗胃脇間即甦
治遍身忽皮底濕濕如波浪痒不可忍抓之血出亦不能解謂之氣奔

人參 苦枳 青鹽 白朮

細辛一兩

右劉碎作一服水二椀煎下滌去滓飲盡愈

治手十指節斷壞唯有筋連無節肉間虫出如灯心長尺餘遍身綠毛名曰血餘

茯苓 胡黃連一錢

右劉碎水一盞半煎至七分不拘時服

治眼赤鼻張大喘渾身出班毛髮盡起乃熱毒氣結於下焦

白礬 滑石一兩

右作一服水三椀煎至半椀令不往飲候盡乃安

治手足甲忽然長倒生肉刺如錐痛不可忍

右食葵菜自愈

治眼晴垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血出其名曰肝脹

右用羌活煎汁服數盞自愈

治腹中有物作聲隨人言語

右用板藍汁一盞分五服服又名應生虫當服雷丸自愈

治人自竟自形作死人並卧不別真假不語問亦無對是離魂

右用長以人參茯苓濃煎湯服之真者氣爽假者化矣

治頭面發熱有光色化人手近之如火燒人

右用蒜汁半兩酒調下吐出蛇狀遂安

治鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸愈固如繩痛不可忍雖忍痛摘去一逆即復更生此由食猪羊血過多遂生

鍾乳石 礪砂各一

右為細末飯和丸如梧桐子大每服十丸空心臨卧各一服水送下自然退落一方有乳香不用乳石

治脇破腸出臭穢

急以油摸腸用手送入煎人參枸杞湯淋之皮自合矣契

羊腎粥一十日即愈

治忽然氣上喘不能言語口中汁流吐逆齒皆搖動氣出轉大則悶絕蘇復如是名曰傷寒併熱霍亂

大黃 人參 附子 各一兩

右用水三盞煎至一盞去滓熱服

治渾身生燎泡如甘棠梨每筒破出水內有石一片如指甲大泡破復生抽盡肌膚肉則不可治

荆三棱 蓬莪朮 各半

右為細末每服二錢食前溫酒調服

治大腸頭出寸餘治之

右用芝麻清油器盛之以馨坐之飲大麻子汁服數升愈

治口鼻中腥臭水流以梳盛之有鐵色鯪魚如稗米大走躍不住以手捉之即化為水此肉壞矣

右任意饑食鷄肉月餘愈

治兩足心凸如腫上面生黑色豆瘡硬似釘子釘了履地不得

脛骨生碎肌體流出身發寒顛唯思飲酒此是肝腎氣冷

熱相吞

右炮川烏末傳之煎韭子湯服之愈

治四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解

黃蘗三兩酒浸

右為細末每服二錢用酒調下服盡即安

治腹脹如鐵石臍中水出旋變作虫行之狀繞身匝喙痒痛難忍撥掃不能盡

右濃煎蒼朮湯浴之及以蒼朮末入麝香少許研勻以水

調服痊

治眼白瞳仁渾黑見物依舊毛髮直如鐵線雖能飲食不語如醉名曰血漬

右用五靈脂為細末每服二錢食前用溫酒調服

治通身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血注若不速治潰而膿出

右以赤皮葱數莖燒灰淋洗熨鼓湯三盞自安

治眉毛推動目不能視交睫噴之不應但能飲食有經日不効

右用蒜三兩搗取汁酒調下即愈

治毛髮節次血出若血不出皮脹膨如鼓須臾眼鼻口被氣脹

合矣此名脈溢夏子益治奇病方二十八道唐與義刊印于上饒其間一二證昔常見有病之者皆莫知所以治療之法今得子益之方敢以附此書之末用廣其傳

右用生薑汁水合半盞服之而安

治血自皮膚熾出

右以煮酒瓶上紙碎揉如楊花以手捏在出血處立止

治怪疾奇方 昔廬陵朋田李教諭梅心傳

袁州分宜縣有一男子自十歲喜飲酒至十九歲日間飲一二斗不醉片時無酒叫呼不絕全不進食日就羸斃其父驚惶叩神忽遇一道人令其父用手巾縛住其手足不

令動推但扶住少立却取生辣酒一罇就於其子口邊打

開其酒氣衝入口中病人必欲取飲而道人堅不肯與之

頃臾口中吐出物一塊直下蟻底道人却用紙封塞蟹口

用猛火燒滾約酒乾一半却開視之其一塊如猪肝樣三

兩重週迴有小孔如針眼不可數計棄之江中自後飲食

後舊雖備酒不能飲矣

治居民逃避石室中賊以烟火熏之

昔李師者被烟熏欲死迷悶中摸索得一束蘆服俗名蘆

菊嚼汁下咽而甦或臨臥食蘆菊一塊或預曝為末新水

調灌或以新水搗爛飲之皆可

治因癩穿舌心血出不止諸藥不能效者

右以米醋用鷄翎掃所斷舌處其血即止仍用真蒲黃杏

仁湯泡去皮尖蓬砂少許研為細末以煉熟蜜調藥湯調

得所舍化而安

治入身上及頭面上浮腫如蛇狀者

右以兩清磚街上參滾一錢水化開塗患處立消

昔江左常有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲滴酒

口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺臍內肉脹

起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試諸藥不効以

草木之類悉試之無苦至具母其瘡乃聚眉問口商人喜

曰此藥可治也因以小葉筒毀其口灌之數日成痂遂愈

然不知何疾也

昔華化行道見車載一人病咽塞食不下呻吟啞入餅店家取

餅餅弄大餅三升飲之當齋果吐大蛇一枚而愈

治有虫如蟹走於皮下作聲如小兒啼為蝨肉之化

右用雷丸雄黃各一兩為細末用猪肉一片搽藥在上灸

熱熨盡其病自安

治腹上麻痺不仁

右多煮葱白喫之自愈

凡腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不効乃為氣脫

右用益智子煎湯服立愈

治眼前常見禽虫飛走以手捉之則無乃肝膽經為疾

羌活

玄明粉

酸棗仁

青箱子花

右為細末每服二錢水一大盞煎至七分和滓飲之一日

服三次

治面上及遍身生瘡似猓鬼眼有光彩無膿血但痛痒不常飲

食減少久則透脛名曰寒瘡

右多與鷄魚葱韭自愈

治口内生肉越其惡自已惡見有根線長五寸餘如鼠股吐逆

出以飲食了却吞其線以手輕捏痛徹於心因不可言

右用麝香一錢研細食後水調服三日驗

治婦人產後忽兩乳伸長細小如腸垂下直下小肚痛不可忍

危亡須臾名曰乳懸

右將川芎當歸各二片半剉碎於瓦石器內用水濃煎不

拘時候多少溫服餘一片半剉作大塊用香爐慢火逐旋

燒烟安在病人面前卓子下要烟氣直上不絕令病人低

頭伏卓子上將口鼻及病乳管吸咽氣直候用此一料藥

盡看病證如何或未痊安略縮減再用一料如前法煎服

及燒烟薰吸必安如此用二料已盡雖兩乳略縮上而不

復舊用冷水磨草麻子一粒於頭頂心上塗片時即洗去

則痊安矣

治婦人臨產服催生藥驚動太早未嘗離經而用力太過以致

育膜有傷產後水道中垂出肉線一條約三四尺長牽引

心腹痛不可忍以手微動之則痛若欲絕

右先服失笑散數服仍用生薑三斤淨洗不去皮於石鉢

內研爛以清油三斤拌勻入鍋內炒熟以油乾焦為度先

用熟絹一段約五尺長摺作結方令穩重婦人輕輕盛起

使之屈曲作一團納在水道中却用綉袋兜裹油薑以溫

傳柱肉線上熏覺薑漸冷又用熨斗火熨熨使之常有薑

氣已過除去又用新者如此熏熨一日一夜其肉線已縮

大半再用前法越兩日其肉線盡入腹中其病痊安却再

服失笑散尋歸湯補之切不可使肉線斷則不可治

奇効良方卷之六十八

奇效良方卷之六十九

諸毒門 附論

凡人談談山川不請水土人畜飲啖誤中於毒素不知方多遭其變豈非枉橫耶然而大聖久設其法以救活之正為貪生者樂忽而不學一朝逢過便自甘心竟不識其所以今述得農黃帝解毒方法好事者必留意焉

諸毒通治方

神仙解毒萬病丹 治一切藥毒鼠子毒鼠莽毒惡菌草金石毒突疫死牛馬肉毒河豚毒時行瘟疫山嵐瘴毒急喉閉纏喉風脾病黃腫赤眼瘡癩衝胃寒暑熱毒上攻或自縊溺水打撲傷損癰疽發背未破魚癩瘡腫湯火所傷百虫犬鼠蛇傷男子婦人或中顛邪狂走鬼胎鬼氣並宜服之凡人若家或出入不可無此藥其濟世衛家之書如毒藥

嶺南最多若通官嶺表繞繞意思不快便服之即安二廣山谷間有草曰胡蔓草又名斷腸草若以人急水吞之急死緩水吞之緩死又取毒蛇殺之以草覆上以水洒之數日雨生其上取為末酒調以毒人始亦無患再飲酒即毒發立死其俗淫婦人多自配合此人與人情分相好多不肯逐北人四陰以藥置食中此人還即戒之曰子某年來若從其言即復以藥解之若過期不往必死矣名曰定年藥北人番被亦宜誌之若覺中毒四大不調即便服之或於鷄豚鴛鴨魚羊等肉下藥獲食此物即觸發其毒急服此藥一粒或吐或利隨手便痊昔有一女子久患勞瘵病為死虫所噬磨一粒服之二時以吐下小虫千餘條一大者正為段段後托服蘇合香丸半月遂無如常至牛馬六畜中毒亦以此救之無不効

文蛤三兩淡紅黃色者地碎洗淨 山茨菇二兩

續隨子去殼研細以鹽水一兩 蘇合香三錢

右各研為細末和勻以糯漿為劑每料分作四十粒

於端午重陽七夕合如欲急用辰日亦得於木臼中拌數百下不得令婦人孝子不其足人鷄犬之類見之切宜秘

惜木可廣傳輕之無効如癰疽發背木破之時用冷水磨塗痛處并磨服良久覺痒立消○陰陽二毒傷寒心悶

狂言亂語胃膈壅滯邪毒未發及瘟疫山嵐瘴氣纏喉風

冷水入薄荷一葉同研下○急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼

氣並用燉無灰酒下○自縊落水死心頭煖者及驚死鬼

迷死未隔宿者並冷水磨灌下○蛇犬蜈蚣傷並用冷水

磨塗傷處○諸般瘡疾不問新久臨發時煎桃柳枝湯磨

下○小兒急慢驚風五疳八痢蜜水薄荷一葉同磨下○

牙關緊急磨塗一九分作三服量大小與之○牙痛酒磨

塗及含藥火許吞下○湯火傷束流水磨塗傷處○打撲

錫損炒粉篩無灰酒下○年深日近頭疼太陽疼用酒入

薄荷葉磨紙花貼太陽穴上○諸般痲疾口眼喎斜眼目

掣收夜多睡涎言語蹇澁卒中風口禁牙閉緊急筋脈攣

縮骨節風腫手脚疼痛行步艱辛一應風氣疼痛並用酒

磨下有厚婦人不可服

毒藥雜黃散 凡始覺中毒及蛇虫咬癩疽繞作即服此令毒

氣不聚

好青黛 雄黃各等

右研細令勻每服二錢新汲水調下

解毒毒方 乾道五年襄陽有劫盜將死而持首貨命黥配者

解毒毒方 乾道五年襄陽有劫盜將死而持首貨命黥配者

州牧慮其後為人害既受以刑以生漆塗其兩眼因行到
荆門已育不見物守禁長林縣獄以待傳送適有村叟以
事在獄中憐而語之曰汝明日去時倩送者往蒙石急尋
蟹搗碎灑汁滿眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如其言訪
得一小蠅用之留三日而行目睛好略無損予妹婿朱晞
頽時以常陽尉掛色令親見之

誤飲蛇交水毒方 陳齋郎湖州安吉人因滋春渴掬澗水兩
口燕數日覺心腹微痛日久疼甚服藥醫診之云心脾受
毒今心脉損甚齋合云去年滋春渴飲澗水得此病醫云
笑却蛇在澗邊遺下不淨在澗水內蛇已成形在腹中食
其心而痛也遂以水調雄黃服之果下赤蛇數條皆能走
解毒丸 解世間不測一切毒

山豆根 山茨菇 兼豆粉 枝護根

土馬糝 黃藥子 紫河車 續隨子仁

木通 盆硝 藿香 五味子

薄荷 貫衆 寒水石 白礬蠶

乾葛 雄黃 百藥煎 茜草根

大黃 硃砂 麝香 甘草

右為細末蒸餅和丸如彈子大以蠶青三兩和勻留一半
為衣每服半丸用生薑蜜水化下

治淡毒中

右以知母連根葉搗作末服之亦可服水搗取汁飲二升
夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便
無畏熱射工亦可和水作湯浴之甚佳

治中蠱毒

右用生蒼耳七箇白礬兩皂子許嚼碎交慶瀨男子壽之

餘藥敷腫處

白布豆飲 一名巴豆青 解砒毒

右用白布豆不以多少為細末入青黛等分細研再入甘
草末少許已豆一枚去殼不去油別研為細末取一半入
藥內以砂糖一大塊水化開漆成一大匙飲之毒隨利去
後却服五苓散之類

藍根散 解藥毒

藍根 蘆根 兼豆 澱脚
右先將二根以水一椀煎至七分去滓次入後二味和勻
分三服或一二服利下惡物不用再服

解毒飲 凡中藥毒即令食生黑豆數粒食之聞腥者即非中
毒也若是吐逆躁煩服藥須極冷即解也

甘草 白礬 延胡索

右對細每服半錢水一盞煎至六分去滓放冷細細呷之

解半夏毒方

右以生薑汁或乾薑汁服之良。唐崔魏公云鉉夜暴亡
有梁新聞之乃診之云中食毒僕曰常好食竹雞竹雞多
食半夏苗必是半夏毒命生薑挾汁而灌之活。浙人王
夫人忽日面上生黑斑數點日久滿面俱黑遍求醫治不
效忽遇一草澤醫人云夫人中食毒治之一月平復後校
其方止用生薑汁服之問其故云食斑鳩蓋此物常食半
夏苗中毒以薑解之

解斑疔青毒方

右用猪膏大豆汁或藍蘆汁服之一方用鹽湯煮猪膏已
豆飲之一方用大小黑豆汁服之並瘥

解毒若毒方 治食棗棗悶亂如卒中風或似熱盛狂病服藥

即愈

右以甘草汁或藍青汁飲之即愈

治中砒毒方

右用甘草汁同藍汁飲之即愈

解鈎吻毒方

治鈎吻毒困欲死面青口噤逆冷身痺肘後方

云鈎吻菜萸食芥相似而所生之傍無他草又莖有毛誤食之殺人

右用薺菜八兩咬咀以水六升煮取三升如人躰冷服五合日二夜三濃服為妙一方煮桂汁飲之一方取葱涕佳

解砒毒方

右以豆豉濃煎湯飲之亦治服藥過劑心中煩悶

解巴豆毒方

其證口乾兩臉赤五心熱利不止諸藥不効

右用芭蕉根葉研取自然汁服利止而安

解鼠莽草毒方

右用栝蓮房殼帶梗陰乾咬咀煎水三二椀灌之如無用

荷葉中心蒂或用藕節煎湯一椀溫令灌之毒即散

解砒毒方

其證煩燥如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐面色青

黑四肢逆冷命在頃臆不救

右用菜豆半升搗去滓以汲水調通口服或用真蘇花二

錢分二服以井花水濃調服之又方治悶絕心頭溫者新

汲水調水粉服之如神

解附子毒方

右用防風濃煎湯飲之立瘥

解一切藥毒毒六畜肉中毒方

右用白扁豆生曬乾為細末新汲水調下二三錢七全椒

醫者高照一子無賴父笞之遂服砒霜自毒大洩利腹脹

欲裂手教以水調服隨服之與之不數旋利安

解藥毒方 王仲禮嘗酒吐歲時瘡痞發於鼻逆於顙心甚惡

之服藥勿効僧法滿使服何首烏丸當用二斤適墮僕識

草藥乃掘得之其法忌錫器但於砂鉢中藉黑豆蒸熟既

成香味可人念所蒸水必能去風證以頰面初覺極熱漸

加不仁至晚大腫眉目耳鼻渾然無別望之者莫不驚畏

主之母高氏曰凡人感風癩非一日積吾兒遇毒何至於

是吾聞

山豆根

赤小豆

黑蛤粉

生薑汁

右急命撲搥換薑汁以上三味為末調付之中夜腫消利

曉如初益先採何首烏擇焉不精為狼毒雜其中以致此

捷也

解藥過劑毒

服附子酒多而覺頭重如斗唇裂血流急求黑

豆菜豆各數合爵之及濃煎黑豆菜豆湯併飲○服風藥

多則亂不省醋濯濃煎甘草同生薑自然汁頓飲之又方

以螺青細研新汲水調下

治藥中有巴豆下利不止

乾薑

黃連

一散

一兩

右為細末每服二錢水調下如人行五里再服

又方治同前

右煮菜豆湯冷服之瘥

解老湯

瘥石毒卒發者慄慄如寒或欲食或不欲食若服紫

石英發毒者亦熱悶昏昏喜用起止無氣力或寒皆是臟

腑氣不和以此治之

齊菴 芩苓

黃苓

芍藥

右吹咀以水一斗先煮蔓菁子取八升去滓內餘藥煎取
三升去滓分三服日三若虛弱人加入參一兩若上氣加
茯苓齊芩各一兩甚良

治銀毒方

黃連去毛 甘草生剉各一兩

右剉碎以水三盞煎取二盞去滓時時飲之

治丹砂毒方

右用鹽半兩以冷水攪勻令澄旋旋服之

治石鍾乳毒方

右用紫石英為細末每服一錢七溫水調下連三服

黑鉛酒 治中金石藥毒

右用黑鉛一斤以井鍋內作汁投酒一升如此十數迴候
酒至半升去鉛頓服之劫一方以井水磨下碎砒毒

解丹毒方

右以地漿服之甚効

治一切藥毒毒金石毒

右並用石蟹以熱水磨服

治五石毒

右用齊危汁生服良

治丹石毒

右以鮮肉食之良

解麩毒方

右以羅麻啖之昔有婆羅門僧來求見食麥麩者云此大
熱何以食之又見食中有羅麻云賴有此以解性自此相
傳食麩必啖羅麻

解 切食毒及飲酒不知中何毒卒急無藥可解

齊芩 甘草生用各一兩

右細剉以水五盞同煎取二盞停冷去滓分三服一方解
一切藥毒加蜜少許同煎服之

治食索粉片積方

右用紫蘇濃煎汁加杏仁泥服之即散

治中豆腐毒方

右用生蘿蔔煎湯如非時無蘿蔔用子煎湯亦可有人好
食豆腐因中其毒醫治不効偶更醫上至中途適見做豆
腐之家夫婦相爭因問云今早做豆腐妻誤將蘿蔔湯置
腐鍋中今豆腐不成蓋豆腐畏蘿蔔也醫得其說至病家
凡用湯使俱以蘿蔔煎湯或調或噉病者遂愈

治粽糝為積方

右用麩末加少木香末鹽湯調服口有酒香食積去矣火

治酒積甚妙

黃龍湯 治因食中毒

右將龍底當金直下掘取赤土為細末以冷水調隨多少
服之或以犀角水磨取汁飲亦治食六畜肉中毒火効

治誤吞水蛭方

昔有人夜間飲水誤吞水蛭入腹經停日久必生下小蛭
能食人肝血腹痛不可忍而目黃瘦全不進食若不早治
能令人死

右用田中乾泥一塊以小死魚三四箇同猪膏熔油攪勻

用巴豆十粒去皮膜拌入泥內研爛如丸如菽豆大用田
中冷水吞下十九小兒服三九至五九須臾大小小蛭一
時皆瀉出却以局方四物湯加黃芪煎服生血補理

額肝丸 治食魚膾不消生瘕常欲食膾者

<p>獺骨肝肺 大黃 蘆根 鶴骨</p> <p>桔梗五分 乾薑 桂心 斑蝥</p> <p>右為細末煉蜜和丸酒服十九至十五九日再瘥</p>	<p>治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱狂言妄語或洞下方</p> <p>右用杏仁一升去皮研以沸湯三升和絞汁三服狗肉原片皆出淨良驗</p>	<p>治食六畜肝中毒方 凡物肝臟不可輕取自死者彌勿食之</p> <p>右用豆豉以水浸絞取汁旋服之</p>	<p>治河豚毒方</p> <p>五倍子 白礬</p> <p>右等分為細末水調服之</p>	<p>治食自死為獸肝中毒方</p> <p>右取故頭巾拈一錢七熱湯中焯服之亦治卒心痛以沸湯取汁飲之頭巾即縛繫帛也又方飲豉汁數升良</p>	<p>治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾或發熱不語</p> <p>右以蘆根煮汁飲之</p>	<p>治食馬肝牛肉毒方</p> <p>右以人乳汁合豉濃汁服之神効</p>	<p>治誤吞蜈蚣方 昔有村店婦人因用火筒吹火不知筒內有蜈蚣藏焉因以吹火其蜈蚣驚避竄入喉中不覺下胃求救人無措手適有人云取討小猪塊一筒斷喉取血食之灌以清泔取吐即愈</p>	<p>療食葷并菌中毒致殺人者及療瘋狗食之令人笑不止者並皆治之蓋菌種類不一往往蛇蝎毒氣所熏蕪而成耳</p>
--	---	--	--	---	--	--------------------------------------	---	--

<p>右掘地作坑以新汲水投坑中攪之乘渾濁取出以新汲水過用磁器盛每服時調轉飲一盞至三盞當効</p> <p>解狐子毒及一切菌毒</p> <p>右用芫花生者為末每服一錢新汲水下利為好</p>	<p>中草毒方 崇寧間蘇州太平山白雲寺五僧行山間得草一叢甚大摘而煮食之至夜發吐三人急採驚為草生啖遂愈二人不甚肯啖吐至死此草藤蔓而生對開黃白花傍水依山處皆有之治癰疽腫毒尤妙或服或傳今人謂之金銀花又曰老翁鬚本草名忍冬草</p>	<p>石刻方 治蠱毒宋嘉祐中范吏部道為福州守日揭一方于石云凡中蠱毒無諭年代近遠但煮一鴨卵搗銀釵於內并禽之約一食頃取視釵卵俱黑即中毒也其方用</p> <p>五倍子 二兩 硫黃末 一錢 丁香 木香</p>	<p>麝香 輕粉 糯米 甘草</p> <p>石用水十分於瓶內煎七分候藥面生皺皮為熟給瀝去滓通口服病人平正仰卧令頭高覺腹中有物衝心者三次後得大吐出一盆桶盛之如鱗魚之類乃是惡物吐罷飲茶一盞瀉亦無妨旋煮白粥補忌生冷油膩鮮醬十日後服解毒丸三五九經旬平復</p>	<p>七寶丸 治蠱毒</p> <p>敗鼓皮 蠶退紙 刺蝟皮 五倍子</p> <p>續隨子 珠砂 雄黃</p>	<p>右為細末糯米搗糊和丸加梧桐子大每服七丸空心用熱水送下</p> <p>東坡雄黃丸 治蠱毒及虫蛇畜獸毒</p> <p>雄黃 明白礬 鞋用各</p>
--	---	--	--	--	--

右林端午日合研細溶黃蠟和丸如梧桐子大每服七丸

念藥王菩薩藥王菩薩七流白湯送下

蜜髓煎 治中蠱毒令人腹內堅痛面目青黃病變無常

蜜一搗 猪骨髓五兩

右同煎令熟分作十服日三服即瘥

治蠱毒及金蠶蠱毒方 凡中毒者先以白礬末令嘗不覺澀

而味甘次食黑豆不腥乃中毒也即濃煎石榴根皮汁飲

之不下即吐出虫皆活無不愈者李晦之云凡中毒以白

礬末搖為細末冷水飲之

馬兜零根湯 治五種蠱毒及草蠱行在曲涼處及嶺南人苦

行此毒入人咽喉痛欲死者

右用馬兜零根一兩細剉以水一盞煎至之分去滓空心

頓服當時吐出蠱味吐再服以快為度一方以苗為末溫

水調服一方用根搗末水服方寸匕

治諸蠱毒方

右用鰻魚乾末空心服之三二度差一方燒炙令香食

之尤佳其魚有五色紋者良

鐵精丸 治食中有蠱毒腹內堅痛面目青黃瘦瘠露骨立

病變無常

鐵精乃吸鐵罐中如墨紫色

右為細末以生雞肝搗和丸如梧桐子大曝乾每服五丸

至七丸溫酒下

治中蠱毒

右用山豆根不以多少蜜遣人和水研已禁聲服少許不

止再服

搗皮散 治蠱毒下血如爛肉片心腹痠痛如有物齧若不即

治蝕人五臟乃死

樹木北陰 桃根白皮各四兩 蝟皮灰

亂髮灰各五升 大麻子汁五升

右先以水五盞煮樹皮桃根皮取濃汁二盞和麻子汁每

服煖汁一盞調蝟皮灰髮灰二錢匕令患人少食旦服須

史用水一盞以鷄翎引吐於水中如牛涎諸蠱並出

右中蠱毒下血如肝

草麻去根 朴硝一錢

右細研作一服新汲水調下連作二三服効

地榆散 治蠱毒下血或腹痛或不痛百治不効煩渴不止

臭椿根東引根白皮 地榆

右為細末每服一錢熱米飲調下

苦瓠湯 治蠱毒吐血或下血如爛肝

右用苦瓠一枚切以水二大盞煎取一盞去滓空心分溫

二服吐下蠱即愈范汪方云苦瓠毒當臨時量用之肘後

方云用苦酒一升煮令消飲之神驗一名苦葫蘆

瘵卒中蠱下血如鷄肝者 晝夜出血石檢四歲皆損惟心未

毀或鼻破待死者

古以桔梗搗屑以酒服方寸匕日三服不能下藥者以物

拗口開灌之心中當煩須臾自定服七日止當猪肝腫以

補之神良

雄黃散 治中蠱毒吐血

雄黃一分 伏龍肝研半 斑蝥去足翅糯米炒

右為細末每服二錢七空心以酪漿調下或吐蝦蟇及蛇

虱等出是

麥麩散 治中蠱吐血

右用小麥麩二合分為三服以冷水調下半日服盡當下

蠱即瘥 試蠱法 南方有蠱毒之鄉於他家飲食即以犀角撓之白沫

竦起即為有毒無沫者即無毒也

廣南衛生方桃生 胡蔓草并葉如茶其花黃而小凡一葉入

口百竅潰血人無復生廣西愚民私怨茹以自斃家人竟

之急取 抱卵不生鷄兒細研和以麻油扶口灌之乃吞吐

出惡物而甦少遲不可救矣如人誤服此藥者止以前法

解之

治桃生 雷州民康村妻為蠻巫林公榮用鷄肉桃生值商以

揚一者善醫瘰癧服之繞食頃吐積肉一塊剖開筋膜

中有生肉存已成鷄形頭尾嘴翅悉稍以康訴于州州捕

林至獄而呼揚生今其疾證用藥其略云凡突魚肉瓜菓

湯茶皆可桃生初中竟胃腹稍痛明日漸加查刺滿十日

則物生能動騰上則胃痛沉下則腹痛積以瘦瘁此是瘰

也昔陳可大知肇慶府助下忽腫起如生癰瘡狀頃刻間

其大如椀識者云此中挑生毒也候五更以葶豆細嚼試

若者甜則是已而果然乃用此方

右用升麻為末用冷熱水調二大錢服之遂洞下瀉出腫

即消續煎平胃散調補若在上膈則取之其法用執茶一

既投膽礬半錢於中候礬化盡通呷服良久以鷄翎探喉

中即吐出毒物在下膈則瀉之以米飲調礬金末三錢毒

則瀉下乃礬人參白朮末各半兩同無灰酒半升入瓶內

慢火熬半日待酒熱取出溫服之日一杯五日乃止然後

飲食如故

葱白湯 治中水毒瘰癧如傷寒狀

葱白如一握 豉半升 葛根二兩 升麻三分

右對如巨大每服四錢七水二盞煎至一盞去滓不拘時

溫服移時再服

五加皮散 治中水毒瘰癧如傷寒狀

右用五加皮研為細末每服一錢七酒一盞調下日二夜

一粥飲調亦得一方以五加根燒研為末水調服

牡丹散 治中水毒瘰癧下部虫蝕生瘡

右用牡丹皮為細末每服一錢七酒一盞調下日三

奇效良方後序

天地之大德曰生

皇朝蒞天下體天地之撰以生為德教養之餘思有以濟所不及尚御之外輒命郡縣比儒學立醫學所謂癢痾疾痛舉切吾身生意藹然充滿天下蓋有以盡

天地宇乎之職分者心自是職

醫者率能精白一心期體

上意如古巫彭桐君之處方餌俞跗岐伯雷公之察明堂究息脉佐神農黃帝於古盛時焉荷歟休哉故太醫院使董宿嘗以古醫家者流有論無方自漢以還

方始疊出如十全千金靈苑秘錄廣濟博驗奚啻百家制非無見用或少功蓋以病者外感內傷因變萬殊徒知執方以求病不能因病以處方故耳於是搜奇選效得古今良方若干類而萃之證別以明門先以論期於

成書未竟而歿今

上皇帝丕承

先烈休隆國本生生大德已與天地同撰亦篤於醫而院使方賢復仰副

聖情圖稱委任乃與御醫楊文翰輩取前所輯芻求秘妙附而益

之凡六十九卷豈亦巫彭桐雷
俞波之用心者歟於乎智者創
物巧者述焉齊人褚澄所謂論
不乖理方無違義雖復後學亦
曰良師此書既行則智者因論
以得病而巧者臨病以求方生
意愈而國家教養所不

成分

（辰秋）

日

賜進士及第前翰修撰知

制誥

經筵侍講中順大夫致仕知府古

燕岳正誨



序畢

胞與堂丸散譜

〔明〕洪基輯

據上海圖書館藏明崇禎十
一年刻本影印原書版框高
一九六毫米寬二四八毫米

興堂丸散譜引

道理與法而已非理無以立
以立方多方無論何以補病
乃何以模倣余友九有氏之丸
述內經羽翼本草其理其法真
日月矣使人不知方在、解劑

公益蘇粟以行於世而與天地相終始
考我余甚珍之詳為披閱請付剞劂為
惜目題其譜曰攝生秘剖復贅語於
簡端惟愧揚摧之未既

雲陽張夫書於儀曹清署

胞與堂丸散譜引

家大人及余皆好軒岐家言因與九有氏善九有
氏美秀而文苑精於醫而一片婆心自謂天地萬
物本吾一體嘗名其堂曰胞與戊寅冬以所秘授
方及已秘創者拈出而詳說之其於攝生之道可
謂一剖無餘矣且鐫之成譜以公諸人其利濟之
心抑何溥哉使人人操是心以行則畛域化鄙吝
消疹戾不作舉天下後世皆蒙其澤寧直一方一
時已耶胞與之名良不虛矣凡見之者亡不傾嚮
之微獨張撤老儀部迫余兩人也

吳興友弟陳肇英書於揮羽堂

胞與堂丸散譜引

夫醫世所傳陰功養生居半者也龍門
太史叙秦越人淳于意之奇至已而惜
其身之不免何也豈其擅一技暖、姝、
因之吾利肆欲所謂以藥石鍼齊和天
地之乖沴輔人事之不及者未講也余
友洪九有以碩儒攻醫探諸經驗奇方
悉譜而詳說之付梓行博濟域中疾苦
真所謂民為胞物為與之盛心也近隲
其身為羨門廣成遠隲其昆裔翼明時
膺茂祉者不蔡可知已余見而欽之特
書數語簡端以為異日左券

東瀛林冲霄題于環碧清署

醫國剩長才方外經綸

書是藥

調元藉妙手人間游戲

佛為心

贈

九有詞丈

楚人友弟關士登

胞與堂治目丸散譜引

竊聞目者太乙之精也左字英明右
字壽光司之者左則有王子喬右則
有志松子籍或昏眊至極療豈易言
哉余友洪九有氏探奇方於東王父
啟矇開腹不下千百十人而猶憾其
軫之之法隘也乃以肘後神授者付
劑劑以廣其傳蓋欲遐邇俯壤之俵
俵莫之者再鑄之以良眊也此其功
直侔西竺金篦區區杼蓬瀛之秘與
喬松爭治者又不足言矣

豫章江泰拜手題

訂丸散譜緣起

余性嗜醫每於業儒之暇旁搜醫典究心於茲蓋亦有年
因走四方就正有道原夫醫理惟方與法而已歸來日讀
三世四家之書以窮其法覓方心切更榜其門曰兌換奇
方海內高人異士懷奇方者咸折節而辱教焉錄是廿載
辛勤倒屣負笈總其所得之方彙以萬計特拈其九散方
之最神奇最切用者若干種製以療人輒施輒効信乎古
昔神良之醫洞窺造化熟曉陰陽按證處方自有精理胡
世之執流忘源泥方道理也此丸散之不能已於說矣乃
於其升降浮沉寒熱溫平良毒之性宣通補瀉輕重滑澀
燥濕反正逆從之理揆之於經酌以心見參之於證演以

廣言要綜詳悉各鵬成篇今千世而下猶見先哲立方深
意以免妄投說中有所援引仍繫書目更為之刪繁補畧
務開方旨透徹而止凡發一丸散必附一說以告故每篇
贅以堂名姓氏以誌余藥耳不意格理尋源之士遐邇來
索因合為譜然而堂名姓氏殊覺贅煩寧不貽笑大方乎
切欲削去奈分用處多今姑存之得是譜者幸為諒焉是
譜也乃余一片婆心願天下為有本之學苟有志乎醫者
於此譜而推廣之醫理雖深其於處方用藥思過半矣又
如嘉遊山林遨遊湖海求良醫而不速得按譜而斟酌自
樂焉則亦尊生之一助云此譜之所繫訂也

新安洪基謹識

畫一丸散總目

- | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| 天王補心丹 | 八味地黃丸 | 虎潛丸 | 孔聖枕中丹 | 健腦養胃丸 | 枳朮丸 | 越鞠丸 | 愈風丹 | 滋痰丸 | 五神丸 | 戊己丸 | 滋陰潤腸丸 | 喉閉散 | |
| 人參固本丸 | 六味地黃丸 | 金匱腎氣丸 | 魚鱗丸 | 秘傳丹 | 詞中平胃丸 | 香砂枳朮丸 | 牛黃丸 | 珠珀益元散 | 三黃丸 | 木香檳榔丸 | 四神丸 | 脾約丸 | 白糜散 |
| 補天大造丸 | 七味地黃丸 | 滋陰大補丸 | 扶桑至寶丹 | 參苓白朮散 | 保和丸 | 橘半枳朮丸 | 九製稀涎丸 | 清氣化痰丸 | 左金丸 | 香連丸 | 養樂丸 | 九龍丹 | 明目地黃丸 |

- | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 黃連羊肝丸 | 千金補腎丸 | 痔漏丸 | 衛生寶 | 保胎丸 | 帶下丸 | 肥兒丸 | 十珍膏 | 參朮膏 | 養生主 | 五五酒 | 靈飛散 | 風寒痰濕膏 |
| 千金磁珠丸 | 青娥丸 | 珠珀蠟蟻丸 | 八珍益母丸 | 達生散 | 小兒至寶丹 | 龜鹿膏 | 二冬膏 | 山薊膏 | 鮮春醞 | 芙蓉醞 | 五勝膏 | 固精益腎煥騰膏 |
| 石斛夜光丸 | 化毒丸 | 小半黃丸 | 調經種子丸 | 崩漏丸 | 抱龍丸 | 瓊玉膏 | 杞園膏 | 玄及膏 | 百藥長 | 斷地醞 | 御驗膏 | |
- 謹訂丸散膏酒八十種於胞與堂中時
新安洪九有

天王補心丹

治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等證

人參去 丹參微 玄參微 白茯苓去
 五味子烘 遠志去木 桔梗各五錢 當歸身洗
 天門冬去心 麥門冬去心 栝子仁炒 酸棗仁炒
 生地黃酒洗 辰砂五錢 為衣
 右為末煉蜜丸如梧桐子大空心白滾湯下三錢或圓眼湯俱佳 忌胡荽大蒜蘿蔔魚腥燒酒

心者神明之官也受熱思慮則傷心神明受傷則主不明而十二官危故健忘怔忡心主血血燥則津枯故大便不利舌為心之外候心火炎上故口舌生瘡是凡以生地為君者取其下入足少陰以滋水主水盛可以伏火況地黃為血分要藥又能入手少陰也棗仁遠志栝仁養心神者也當歸丹參玄參生心血者也二冬助其津液五味收其耗散參苓補其氣虛以桔梗為使者欲載諸藥入心不使之速下也微論

胞與堂主人洪九有

人參固本丸

治腎虛肺熱喘嗽發渴等證

人參 去蘆二兩

天門冬

去心 肥薄 曝

乾或焙乾

麥門冬

熟地黃

乾或焙乾

生地黃

酒洗 肥薄 曝

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心白滾湯下

三錢 忌蘿蔔魚腥

天一生水故腎為萬物之原人身之本也自戕

其原則本不固而勞熱作矣熱則火來乘金而

喘嗽生焉故取生熟地黃味之厚者以補腎涼

腎為君精不足者補之以味也取天門冬氣

之清者以平肺保肺為臣虛則補其母也以人

參補氣為佐內經所謂無陽則陰無以生亦取

化源之法也倘肺熱傷肺之說橫於胸中畏參

不用則獨陰不長將坐而待斃耶願生微論

胞與堂主人洪九有

六味地黃丸

治腎經不足發熱作渴小便淋秘氣壅痰嗽頭目暈眩眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不固腰膝痠軟自汗盜汗諸血失音水泛為痰血虛煩燥下部癆瘵足跟作痛等證補益之功不能盡述

熟地黃 八兩 酒洗 去心

山茱萸 酒洗 去核

乾山藥 炒 四兩

牡丹皮 酒洗 去心

白茯苓 去皮 製

澤瀉 去毛 酒洗 各三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心淡鹽湯下三錢 忌蘿蔔

腎者水臟也水衰則龍雷之火無畏而亢上故王啟玄曰壯水之主以制陽光即經所謂求其屬而衰之也地黃味厚為陰中

之陰專主補腎填精故以為君山茱萸味酸歸肝已癸同治之

義且腎主閉藏而酸飲之性正與之宜也山藥味甘歸脾安水

之仇故用二味為臣丹皮亦入肝其用主宣通所以佐山藥之滯也茯苓亦入脾其用主通利所以佐山藥之滯也且色白屬

金能培肺部又有虛則補母之義至於澤瀉有三功焉一曰利

小便以清相火二曰行地黃之滯引諸藥速達腎經三曰有補

有瀉諸藥無善攻增氣之虞故用以為使此丸為益腎之聖藥

而味者薄其功緩蓋用藥者有四失也一則地黃非懷慶則力

淺一則地黃非自製則不熟且有犯鐵之弊一則疑地黃之滯

胞與堂主人洪九有

七味地黄丸 舊名加減八味丸以其混故改正之

治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛或形體憔悴汗發熱五臟齊損大拒上焦等證

- 熟地黄 八兩 忌鐵料膏 山茱萸 酒潤去核
- 乾山藥 炒各四兩 牡丹皮 酒洗微炒
- 白茯苓 去皮乳製 澤瀉 去毛酒浸焙各三兩
- 肉桂 去皮忌火一兩

右為末煉蜜丸如梧子大空心淡藍湯下三錢忌蘿蔔腎水不足虛陽僭上必用此丸引火歸原夫在君火可以濕伏可以直折在相火性當從其性而伏之肉桂性熱與

火同性雖在下焦壯水藥中能引無根虛火降而歸經此方以類聚之義也且肉桂之質在中半以下故其性專走腎經下部此本乎地者親下之義也又况相火寄於甲乙之間肝膽木旺則巽風動而烈火熾明古人謂北方不可瀉瀉肝即所以瀉腎本草曰木得桂而枯乃伐肝之要藥也經曰熱因熱用逆治之妙法正與逆其性而伏之義相合或者畏其熱而遺之豈達造化升降之微乎黃柏知母治相火僅可施於壯寔者暫用之若虛火而誤用之則腎因瀉而愈虛愈虛而虛火愈熾矣素問氣增而勝及久用寒涼反從火化之說獨不聞乎願生微論

胞與堂主人洪九有

八味地黄丸

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實臍腹疼痛夜多漩溺或陰格陽內真寒而外假熱等證

- 熟地黄 八兩 忌鐵料膏 山茱萸 酒潤去核
- 乾山藥 炒各四兩 牡丹皮 酒洗微炒
- 白茯苓 去皮乳製 澤瀉 去毛酒浸焙各三兩
- 肉桂 去皮忌火一兩 熟附子 如法詳製各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大空心淡藍湯下三錢忌蘿蔔腎有兩枚皆屬於水雖有左右之分初無水火之別考之內經昭然可曉仙經曰兩箇一般無二樣中間一點是真

精又曰兩腎中間一點明夫真精也明也即命門相火也命門乃穴名而其穴在兩腎中間蓋一陽生於二陰之間所以成乎坎而象天之北也經曰少火生氣人無此火生化之原或幾乎息矣是丸也肉桂附子味厚而辛熱味厚則能入陰辛熱則能益火故能入少陰而益命門之火地黃山茱萸味厚而質潤味厚則能養陰質潤則能壯水故能滋少陰而壯坎中之水火欲實則澤瀉丹皮之酸可以引而瀉之水欲實則山藥茯苓之辛淡可以滲而制之水得其養則腎復其天矣王太僕曰益火之原以消陰翳八味丸是也

胞與堂主人洪九有

金匱腎氣丸

治脾胃大虛腰重脚重小便不利肚腹腫脹四肢浮腫喘急痰盛已成蠱症其効如神

熟地黃四兩忌鐵杆青白茯苓去皮乳製三兩山茱萸去核酒潤
乾山藥微炒牡丹皮酒洗微炒澤瀉去毛酒浸焙乾
車前子微炒川牛膝酒洗培乾肉桂去皮忌火
附子如法製熱五錢
右為末煉蜜丸如梧桐子大空心白滾湯下三錢

忌蘿蔔

先哲謂土為萬物之母火為萬物之源身中所最重者脾虛則土不能制水腎虛則水不能安位故運行而泛濫於皮膚之間因而攻逐虛虛之禍殆不可言八味丸脾腎要藥佐以車前泄太陰之水佐以牛膝開少陰之竅故服之則小便如泉而脹可通已又無損於真元之氣也順生微論

胞與堂主人洪九有

滋陰大補丸

治陰陽兩虛平補之劑

熟地黃二兩川牛膝
山藥各一兩五錢山茱萸去核
杜仲薑汁炒去絲白茯苓
巴戟天去心五味子炒
小茴香炒肉苁蓉
遠志去心各一兩石菖蒲
枸杞子各五錢俱製為末

紅棗肉為丸如梧桐子大空心白湯下錢
地黃牛膝杜仲山萸五味枸杞滋陰藥也
巴戟苁蓉茴香遠志菖蒲山藥茯苓紅棗
養陽藥也滋陰者潤而不寒養陽者溫而不熱丹溪翁立方之穩大都如此中年之人服之殊當醫方考

胞與堂主人洪九有

虎潛丸

治腎陰不足筋骨痿軟不能步履

黃柏炒 知母炒 熟地拌 鎖陽各

當歸兩 陳皮去白 白芍酒炒 牛膝各

虎脛骨一兩 酥炙透 敗龜板四兩 酥炙透

右為末煮羯羊肉搗為丸如梧桐子大淡鹽

湯送下三錢 或溫酒亦可

人之一身陰氣在下陰不足則腎虛腎主骨故

艱於步履龜屬北方得天地之陰氣最厚故用

以為君虎屬西方得天地之陰氣最強故用以

為臣獨取脛骨從類之義也用此二物者古人

所謂草木之藥性偏難効氣血之屬異類有情

也黃柏知母所以去骨中之熱地黃歸芍所以

滋下部之陰陰虛則陽氣泄越而上故加鎖陽

以禁其上行加陳皮以導其下降精不足者補

之以味故用羊肉為丸命曰虎潛者虎陰也潛

藏也欲其封閉氣血而退藏於也 願生微論

胞與堂主人洪九有

孔聖枕中丹

治學問易忘此丸服之令人聰明

敗龜板醋炙 龍骨研為末入錫

遠志去心苗 菖蒲九節者去毛

右為末蜜丸一錢一九每服一九溫酒化下

日三 一方為散亦可

方考曰凡人多識不忘者心血足而無所蔽也

若心血不足和氣蔽之則傷其虛靈之體而學

問易忘矣龜介蟲之靈物也龍鱗蟲之靈物也

用龜甲龍骨者假二物之靈養此心之靈欲其

同氣相求云爾遠志辛溫味厚辛溫可使入心


味厚可使養陰菖蒲味辛氣清味辛則利竅氣

清則通神學問寧復易忘耶是方也出於孫真

人千金方其來必有所自但曰孔聖枕中方則

未敢是非也

胞與堂主人洪九有



新苗丹三品一日上升二日中升三日小丹以應天地人

上丹不允金石桂附

五味子半斤百部酒浸、玉女酒浸、肉蓯蓉酒浸、思仙木杜仲、不凋草去心細草去心、仙人杖狗脊防風枝者、白茯苓、思益然床子栝子仁另研、乾薯蕷炮裂十二兩

右末之蜜煮麴糊為丸如栝桐子大空心溫酒下二十粒至三十粒不飲者、鹽湯下春乾薑湯下夏五味子加四兩通稱十二兩四季從蓉加六兩通稱、半斤各十八日四立之前也秋仙人杖加六兩冬細草加六兩戊寅庚申相、火司天中見火運食後蒸餅養肺平熱藥、中丹用桂附而無金石

黃耆白朮者半兩陰也、黃芩各一兩與黑附子、蜀椒去子一兩茯苓二兩、人參二兩桂枝二兩、右末之粟米粥和劑為丸如栝桐子大食前酒下二三十粒、小丹有氣石以扶氣、生地黃、肉蓯蓉、兔絲子酒浸五味子各五栝子仁另研

石斛 巴戟去心 天門冬去心 蛇床子炒 覆盆子各三兩
續斷 澤瀉 人參 乾薯蕷 遠志去心
菖蒲 桂枝去皮 白茯苓 山茱萸去核 杜仲剉炒各二兩
天雄炮一兩或煉鍾乳粉服一兩氣定者去
右末之蜜和劑丸如栝桐子大空心酒服十粒或八粒去乳粉者十五二十粒
右末五年生薑蕪蕪錫經虛人多記去乳粉倍地黃虛人多忘倍遠志茯苓
神虛人吸吸倍覆盆子欲光澤倍栝子仁風虛倍天雄虛寒倍桂小使赤濁
三倍茯苓一倍澤瀉倍遠倍人參
啟玄子曰南陽真人張仲景戒人妄服燥烈之藥謂藥勢偏有所助勝起流變、則百病生焉余師玄珠先生秘授保神守中和暢榮衛樂三分命曰耘苗丹者、欲以彰微妙之旨謂人若妄服燥烈藥乃問苗之不长而根之者也人年高或、少而稟氣受血不強舍此三藥而弗嘗者是不耘苗者也余按玄珠君耘苗丹、品具五味妙應三才真祖隱祖珍錄其庶者也其功詳出南陽真人下哉、但恐傳之不廣乃命剉劑與世共之

胞與堂主人洪九有

參苓白朮散

治脾胃虛弱不思飲食

人參 白茯苓 去皮 白朮 土炒
砂仁 微炒 甘草 炙 山藥 炒
桔梗 焙 薏苡仁 炒 菟豆 炒
蓮肉 去心

石等分為末不拘時白滾湯調下二三錢

忌生冷麪食魚腥
脾胃者土也土為萬物之母諸臟腑百骸受氣

於脾胃而後能強若脾胃一虧則眾體皆無以、受氣日見羸弱矣故治雜證者宜以脾胃為主、然脾胃喜甘而惡苦喜香而惡穢喜燥而惡濕、喜利而惡滯是散也人參菟豆甘草味之甘者、也白朮茯苓山藥蓮肉薏仁甘而微燥者也砂、仁辛香而燥可以開胃醒脾桔梗甘而微苦甘、則性緩故為諸藥之舟楫苦則喜降則能通天、氣於地道矣 醫方考

胞與堂主人洪九有

健脾胃丸

治脾胃虛弱男女老少皆宜常服

人參	五錢	白朮	土炒二兩	白茯苓	
廣陳皮		當歸	酒洗	白芍藥	炒
麥芽	炒各一兩	木香	五錢	半夏	麩一兩
山藥	二兩	枳實	五錢		

右為末陳米糊為丸如椒目大每服三錢食後白滾湯送下

脾胃屬土故土為萬物之母母旺則眾體皆強母傷則眾體皆病此東垣諄諄以脾胃為言也是丸也人參白朮以益其氣當歸白芍以滋其血木香陳皮以利其滯麥芽枳實以消其積半苓山藥以燥其濕濕者燥之積者消之滯者利之血主濡之氣主响之則不剛不柔而無過不及之患脾胃既得其養又安有不強健者哉

胞與堂主人洪九有

調中平胃丸

治脾胃虛弱中氣不調

人參	五錢	黃耆	蜜炙	陳皮	各二兩
甘草	蜜炙	蒼朮	炒	厚朴	薑汁炒
木香	各一兩				

右為末陳米糊為丸如椒目大食後白湯下三錢或二錢

人參黃耆甘草甘溫之品也甘者中之味溫者中之氣氣味皆中故能調補中氣而蒼朮厚朴之苦辛能平胃中敦阜之氣陳皮木香之辛香能去胃中陳腐之氣夫敦阜之氣平陳腐之氣去寧有不調之中乎

胞與堂主人洪九有

保和丸

治飲食內傷令人惡食者此丸主之

山查肉 二兩 神麴 炒 半夏 薑汁製炒

茯苓 各一兩 蘿蔔子 微炒 陳皮

連翹 各五錢

右為末水跌凡如椒目大食後白湯下三錢。傷於飲食故令惡食諸方以屬藥攻之是傷而復傷也此丸藥味平良補劑之例也故曰保和。山查甘而酸酸勝甘故能去肥甘之積神麴甘而腐腐勝焦故能化炮炙之膩蘿蔔子辛而苦苦下氣故能化麴物之滯陳皮辛而香香勝腐故能消陳腐之氣連翹辛而苦苦瀉火故能去積滯之熱半夏辛而燥燥勝濕故能消水穀之氣茯苓甘而淡淡能滲故能利濕傷之滯如此則脾胃之氣復其和矣醫方考

胞與堂主人洪九有

枳朮丸

治痞消食強胃健脾

白朮 土炒一斤 枳實 去穢麩炒八兩

右為細末荷葉煨陳米飯為丸如椒目大白滾湯送下

東垣曰白朮苦甘溫其苦味除胃中之濕熱其甘溫補脾家之元氣多於枳實一倍枳實味苦溫泄心下痞悶消胃中所傷此藥下胃所傷不能即去須一兩時許食乃消化先補虛而後化所傷則不峻厲矣荷葉狀如仰盂於卦為震入感之生足少陽甲膽也飲食入胃營氣上行即甲膽之氣也荷葉空清而象風木此氣所感而胃氣有不上升者乎更以煨飯和藥與白朮協力滋養穀氣而補脾胃其利大矣若用屬藥下之傳變諸證不可勝數願生微論

胞與堂主人洪九有

香砂枳朮丸

破滯氣消飲食開胃強脾

白朮一斤 枳實八兩 去

木香一兩 砂仁一兩

右為末荷葉煨陳米飯為丸

如椒目大白滾湯送下三錢

枳朮丸止主飲食自傷如鬱則

氣阻不能下行怒則氣鼓因而

逆上必賴木香砂仁苦以下氣


溫以和氣所以佐枳朮二味之

不及平肺肝兩臟之有餘也况

芳香之氣又脾所喜。經曰塞者

通之此丸是已。願生微論

胞與堂主人洪九有



橘半枳朮丸

健脾消痞利膈

白朮一斤 枳實八兩 去

橘皮四兩 半夏二兩 薑

右為末荷葉包陳米飯煨乾為末

打糊丸如椒目大白湯下三錢或

此丸用白朮以補脾枳實以消痞燒

飯取其香以益胃荷葉取其仰以象

震象震者欲其升生甲膽之少陽也


此易老一時之方來東垣末年之悟

孰謂立方之旨易聞哉加橘皮半夏

利其膈也如此則清者升濁者降塞

者通滯者利而脾胃復其常矣。醫方

胞與堂主人洪九有



越鞠丸

總治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不化

香附炒 梔子薑汁炒 蒼木米泔浸炒

神麴炒 川芎等分

右為末神麴打糊為丸如椒目大空心白湯

送下二錢或三錢

血鬱 紅花湯下 濕鬱 白芷湯下

熱鬱 燈心湯下 食鬱 山楂湯下

痰鬱 生薑湯下 氣鬱 木香湯下

夫人之有鬱氣猶天地之閉塞成冬也不有以開之則發育之令息矣人身中豈可一日見此象乎丹溪以香附主氣山梔主熱蒼木主濕與痰神麴主食川芎主血誠諸鬱之總司也經曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之治各異法詎可執一途而取哉願生微論胞與堂主人洪九有

牛黃丸

治男婦諸風緩縱不隨語言蹇澀痰涎壅盛卒然暈倒口眼相引手足攣搐脊背強直口吐涎沫或心忡健忘顛狂癩病言語錯亂神不守舍或歌或哭或痴或呆如見神鬼或驚悸恐怖心神恍惚夢寐不安或積熱吐血骨蒸癆病及小兒五疳天吊急慢驚風潮熱發搐頭目仰視或痘疹鬱結不出發而為驚等證

當歸一兩 川芎一兩 白芍二兩 人參二兩 白木一兩

茯苓一兩 甘草五兩 山藥七兩 神麴二兩 桔梗一兩

乾薑一兩 肉桂一兩 麥冬五兩 黃芩五兩 防風五兩

柴胡一兩 杏仁一兩 去尖炒 大豆黃卷五兩

白蘇一兩 蒲黃一兩 阿膠一兩 犀角一兩 羚羊一兩

牛黃一兩 麝香一兩 冰片一兩 雄黃一兩 大棗百枚

右除大棗杏仁犀角羚羊及雄黃牛黃麝香冰片四味為末入餘藥和勻凍蜜與棗膏為丸每兩作十九丸共用金箔四十片為衣用蠟包封收貯每用一九或半九白湯化下或薑湯薄荷湯俱可嬰兒一九分作四服斯丸乃祛風化痰理氣調血之藥富有是證而用之其功效如影響也若脾肺氣虛而痰涎壅盛肝脾血虛而發癩抽搐必當以固本為主不可泛用恐虛其虛而益其患也治者慎之

胞與堂主人洪九有

九製稀查丸

治諸般風證骨節疼痛緩弱無力

稀查草不拘多少此草處處有之其葉似蒼耳對節

而生用五月五日七月七日九月九日採來曬乾鋪

入甌中用好酒層層勻灑蒸之復曬如此九次為度

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三錢空心無灰酒下

骨節疼痛壅疾也壅者喜通此物味辛苦而氣寒用九蒸

九曬則苦寒之濁味皆去而氣輕清矣經云輕可以去實

蓋輕清無竅不入故能透骨驅風勁健筋骨若未之九蒸

九曬或蒸曬之數不滿于九濁味猶存陰體尚在則不能

透骨驅風而却病也此陰陽清濁之義惟明者求之醫考

唐江陵節度使成訥進稀查丸方云臣有弟訥年三十一

中風就枕五年百醫不瘥有道人鍾鍼者命服稀查丸必

愈臣依法修合與訥服果如其言今特奏進奉宣付醫院

詳錄 又知益州張詠進稀查丸表云金陵銀線素根紫

芩對節而生蜀號火炊莖葉類蒼耳誰知至賤之中乃

有殊常之効臣服至百服眼目清明至十服積髮烏黑筋

力較健効驗多端有却押衙羅守一中風墮馬失音不語

臣與十服其病立痊又和尚智嚴年七十忽患偏風口服

喝斜時時吐涎臣與十服亦便得瘥今合百劑差職員史

元奏進醫考

胞與堂主人洪九有

愈風丹

治痛風手足麻木毛落眉脫遍身癩疥搔癢成瘡

白花蛇 烏梢蛇 土鱧蛇 頭尾全者各一條酒浸

苦參四兩 皂角一斤 去皮法以無灰酒

右以三蛇并苦參末將皂角膏和為丸如梧桐子大每

服三錢以玉屏風散煎湯送下輕者三錢得一

痛風者天地殺物之風燥金之氣也故令瘡而不膿燥而

不濕燥金之體遊故一客於人則營衛之行滯令人不仁

而麻木也毛落眉脫者燥風伐其營衛而表氣不固也遍

身癩疥者上氣下血俱病也諸痛屬實諸癢屬虛痛風之

瘡固多有蟲而衛氣之虛不可誣也是證也主燥劑以疏

風則反以助邪往往血枯而死故求古方潤劑以主之白

花烏梢土鱧三蛇者血氣之屬也用血氣之屬以驅風豈

不油然而潤乎然其性中有毒同氣相求直達癩風毒舍

之虞豈不居然而効乎皂角之性善於潔身則亦可以潔

病苦參之性善於去熱則亦可以去風昔人吞以防風通

聖散此乃汗下之劑也非營衛虛者所宜今以玉屏風散

更之則黃耆可以排膿補表防風可以利氣疏邪白木可

以實脾而補肌如此治癩可謂深得癩之奧者矣

胞與堂主人洪九有

珠珀益元散

治男婦小兒六腑實熱上焦燥渴心胸悶亂精神恍惚口舌乾燥便秘赤色及中暑等證

滑石研上白者六兩 甘草研大粉草一兩

珠砂研透明者二錢 琥珀研真正者三錢

右各製淨稱準分兩配合和勻收貯每服三

錢涼水調服或蜜水或燈心湯俱佳

益元散滑石六數甘草一數者乃守真先生取

易數天一生水地六成之之義也故名曰六一

散又名曰天水散按滑石性寒而淡寒則能清

六腑淡則能利膀胱甘草性平而甘平則能緩

火勢甘則能調中氣珠砂之重可以鎮心亦可

以墜火琥珀之明可以安神亦可以利水故並

加之經曰治溫以清涼而行之故用涼水蜜水

燈心湯是散簡易而效捷火證者證用之神良

但於老弱陰虛之人宜少與也此虛實之辨明

者詳之否則蹈虛虛之戒惡乎不慎

胞與堂主人洪九有

礞石滾痰丸

治頭風目眩耳鳴口眼蠕動眉稜耳聾痛癢四肢遊風腫硬噎氣吞酸心下嘈雜心氣冷痛癱瘓奇怪手麻臂疼口糜舌爛喉閉或遠項結核胸腹間如二氣交釁噎塞煩悶失志顛狂心下怔忡喘嗽嘔吐一切難名等證

大黃酒蒸 黃芩去朽者礞石色一兩沉香五錢

右為末水跌丸如椒目大每服量人大小強弱用之

微論曰痰不自動也因氣而動氣不自升也因火而升積

之既久依附腸胃迴薄曲折處以為棲泊之窠曰謂之老

痰其變現之證種種怪異難以測識莫可名狀非尋常藥

可能療也愚君見及此故用大黃為君以開下行之路黃

芩為臣以抑上僭之火礞石慄悍之性遊行腸胃踵其迴

薄曲折之處蕩而滌之幾於刮腸剖骨之神故以為佐奔

馳於上中下三焦開飛門魄門之竅者沉香之力也故以

為使必須服之得法則效如響應用水一口送過咽即便

仰卧令藥在咽喉間徐徐而下半日不可飲水不可起身

坐行言語直待藥氣除逐上焦痰滯然後動作大抵服藥

唯間稠粘壅塞不利者乃痰氣泛上藥力相攻耳少頃藥

力既勝自然寧貼吳氏曰是丸也乃攻擊之劑也必有實

熱者始可用之若與虛寒之人則非宜矣又礞石絲焰硝

三黃丸

治三焦積熱上攻眼目赤腫小便赤澀大便結燥五臟俱熱腸風痔漏等證

黃芩

黃連

黃柏

俱酒潤各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心白湯

下三錢或二錢煎炒椒姜辛辣等熱物

少火之火無物不生壯火之火無物不耗

經曰壯火食氣是也故少火宜升壯火宜

降今以三物降其三焦之壯火則氣得其

生血得其養而三焦皆受益矣黃芩苦而

枯故清熱於上黃連苦而實故瀉火於中


黃柏苦而潤故瀉火於下雖然火有虛實

是丸但可以治實火若虛者用之則火反

盛謂降多亡陰也丹溪曰虛火宜補則虛

實之辨若天淵矣明者幸求之證焉醫方

胞與堂主人洪九有



左金丸

治肝經火實左脇滿痛

川黃連

六兩炒

吳茱萸

一兩虛湯泡

右為末水跌丸如椒目大白湯下二錢

吳氏曰肝木居於左肺金處於右左金者

謂金令行於左而平肝木也黃連善瀉心

火不使乘金則肺家清肅之令左行而肝

木有利矣愚謂心者肝之子也實則瀉其

子故以黃連為君然肝喜竦泄必佐以茱

萸之辛使其條達宣通無拂鬱之患辛者


金之味也辛以暢氣則治節收氣化之權

而將軍無謀慮之失矣經曰佐以所利和

以所宜左金丸之謂乎願生微齋

胞與堂主人洪九有

胞與堂主人洪九有



塞美五神丸

治疫瘧一歲之中長幼相似者足也

東方	青黛 <small>錢五</small>	麝香 <small>分二</small>	西方	白礬 <small>錢五</small>	白芷 <small>錢二</small>
南方	官桂 <small>錢五</small>	硃砂 <small>錢一</small>	北方	巴豆 <small>四十九粒</small>	黑豆 <small>三升</small>
中央	硫黃 <small>錢五</small>	雄黃 <small>錢一</small>			

上件各依方位以磁盤盛之於五月初一日履誠安於本家侍奉神前至初五日午時共研為末用五家粽角為丸如梧桐子大陰乾收貯聽用凡遇患瘧之人於瘧發之日清晨綿包裏塞美中男左女右用之

夫名疫者天地不正之氣也去位勝後之氣也會毒吐毒之氣也。大氣之來無人不受壯者逸者居者則不病怯者勞者出者遇之則無形之氣懸鼻而入藏於分肉之間與正氣分爭則成瘧矣是丸也位按五方藥按五色氣按五氣味按五味月按五

月日按五日粽按五家此醫流而兼陰陽家之識也故瘧邪入於肝則青黛之涼可以清肝瘧者之燥可以直達瘧邪入於肺則白芷之辛可以瀉肺礬石之腥可以清燥瘧邪入於心則丹砂之重可以鎮心官桂之焦可以益火瘧邪入於腎黑豆其鹹可以益腎巴豆之腐可以瀉邪瘧邪入於脾則硫黃之溫可以建中雄黃之悍可以辟穢以疫氣無形絲莫而入故亦就臭而塞之塞其一竅露其一竅固師必缺之道也修劑之期必於五者病原於陰陽不正之氣故亦以陰陽之理勝之蓋曰五者中宮甲乙之數南面之政也諸氣之變雖有勝復亢制之殊要皆北面而臣守位秉命之道也故率以五數修劑焉

胞與堂主人洪九有

木香檳榔丸

治赤白痢疾裏急後重及腸胃積滯等證

木香	檳榔	青皮 <small>去穢</small>	陳皮 <small>去白</small>
枳殼 <small>去穢</small>	牽牛	三稜 <small>醋煮</small>	莪朮 <small>醋煮</small>
當歸 <small>酒洗</small>	香附	大黃 <small>酒浸</small>	黃柏 <small>炒</small>
黃芩 <small>酒炒</small>	黃連 <small>吳茱萸湯潤</small>		

右為末水跌丸如梧桐子大空心白湯送下

二錢小兒減半 忌生冷麪食大葷

內經曰濕淫所勝平以苦熱故用木香熱者寒之故用黃連黃芩黃柏抑者散之故用青陳香附強者瀉之故用大黃牽牛逸者行之故用檳榔枳殼留者攻之故用三稜莪朮燥者濡之故用當歸是丸惟實者堪與虛者非所宜也

胞與堂主人洪九有

香連丸

治下痢赤白腹痛不快裏急後重等證

黃連二十兩吳茱萸十兩木香四兩 右為末醋糊丸如梧桐子大每服三錢減小兒

白痢泡淡薑湯送下 赤痢煎甘草湯送下

赤白甘草薑湯送下 噤口痢人參湯送下

忌麪食生冷大葷辛辣

時至於夏天道南行屬火而熱在人身則以應

之斯時也不能致謹多食生冷則腸胃之間寒

熱相搏佛鬱成積不能宣通發而為痢火性急

速故腹痛而後重裏急錢氏以黃連為君者取

其苦寒直折心家之火恐其大寒之性凝而不

行故以茱萸之辛溫制之以木香為佐者蓋以

痢之為病只是火火之有餘只是氣得以通利

三焦之氣而火降矣且能監制黃連無喜攻增

氣之變夫是二物皆主直行而折經曰有餘者

折之此之謂也順生微論

胞與堂主人洪九有

戊己丸

治脾胃熱瀉不止

黃連十兩 吳茱萸泡

白芍藥炒各二兩

右為末水跌丸如椒目大白

湯下三錢或二錢

方考云熱瀉者糞色黃褐肛門

斂澁也苦從火化火能生土故

用黃連厚腸胃而益土臊酸從

木化木能疎土故茱萸辛臊能

疎亢盛之肝芍藥味酸能瀉土

中之木戊己為胃土己為脾土用

是藥以調脾胃故曰戊己丸

胞與堂主人洪九有

四神丸

治脾腎俱虛子後作瀉不思食不化食

肉豆蔻 二兩生用 破故紙 四兩炒

五味子 三兩微炒 吳茱萸 五錢鹽湯泡過

右為末紅棗四十九枚生薑四兩切片用水煮棗熟去薑取棗肉和藥為丸如梧桐子大空心淡鹽湯送下

脾主水穀又主上升虛則不能消磨水穀而反行下降腎主二便又主閉藏虛則不能禁固二便而反為滲泄夫腎水受時於子弱土不能禁制故子後每瀉也肉豆蔻之澁溫可固滑而益脾吳茱萸之辛溫可散邪而補土五味子酸鹹可入腎而收斂破故紙辛溫可固本而益元土受溫補則燥能制水水受溫補則力能閉藏子後之瀉從可瘳矣 願生微論

胞與堂主人洪九有



棗礬丸


治穀疸身目俱黃及黃胖等證

綠礬 半斤火煨通紅 棗肉 二斤煮去皮核搗爛

平胃散 四兩為末

右用棗肉和綠礬末為丸平胃散為衣如椒目大空心薑湯下三錢水穀癖積於中抑遏肝腎之火久久鬱熱故身目俱黃是丸也綠礬鹹寒能爽痰癖而勝濕熱棗肉甘溫能益脾胃而補中宮平胃散者蒼朮厚朴陳皮甘草也蒼朮厚朴所以平胃家敦阜之氣而除積飲陳皮甘草一以利氣一以和中乃調胃之意也

胞與堂主人洪九有



脾約丸

治腸胃燥熱大便秘結

麻仁十兩入滾湯內泡浸一宿 杏仁五兩半 芍藥酒炒 枳實炒 厚朴薑汁炒 右為末煉蜜丸如梧桐子大白湯送下三錢

成氏曰約者約結之約又約束也經曰飲入於

胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通

調水道下輸膀胱水精四布五經並行於胃強

脾弱約束津液不得四布但輸膀胱小便數而

大便鞭故曰脾約麻仁甘平而潤杏仁甘溫而

潤經曰脾欲緩急食甘以緩之本草曰潤可以

去枯是以麻仁為君杏仁為臣枳實苦寒厚朴

苦溫破結者必以苦故以為佐芍藥酸寒大黃

苦寒酸苦湧泄為除故以為使丹溪曰既示脾

約血枯火燔全受邪而津竭必竊脾之母氣以

自救全衰則土受木和脾失轉輸肺失傳化

宜滋陰降火金行清化脾土健旺津液既潤何

秘之有此九惟熱甚而稟實者相宜熱雖甚而

虛者少服恐反致其燥涸之苦矣順生做論

胞與堂主人洪九有

九龍丹

治腎水不足邪火搖動精濁遺失之證

枸杞子酒蒸 金櫻子焙 山查肉炒 石蓮肉炒 蓮花鹽焙 熟地黃黃芪 芡實粉炒 白茯苓 川當歸等分 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三錢空心白滾

湯送下

精濁腎液之病也所以精濁者心為之也一動其心

而天君搖搖則精濁走失矣所謂主不明則十二官

危也其精濁與便濁不同便濁是便濁濁即青淋

證也乃是胃中濕熱滲入膀胱與腎經絕無相干精

濁則牽絲粘膩雖不便濁亦漸漬而出耳治此者宜

滋腎清心使脾固脫是丸也枸杞熟地當歸味厚者

也可以滋陰滋陰則足以制陽光金櫻蓮鹽芡實味

澀者也可以固脫固脫則無遺失石蓮肉苦寒可以

清心清心則淫火不熾白茯苓甘平可以益土益土

則制腎邪而山查肉者所以消陰分之障礙也

胞與堂主人洪九有

胞與堂主人洪九有

喉閉丸

治纏喉風喉閉先胸膈氣緊焉然咽喉腫痛手足厥冷氣不能通頃刻不治

雄黃一錢

鬱金五分

巴豆七粒去壳皮

冰片少許

麝香少許

右為末醋糊丸如麻子大茶清下五分如口噤喉塞用竹管納藥入喉中須臾吐痰立解未吐再服咽喉司呼吸主升降乃一身之緊關索繫患則無問其標本而當急治焉者也經曰足少陰所生病者口

渴舌乾咽腫上氣溢乾及痛素問曰邪客於足少陰之絡令人咽痛不可納食又曰足少陰之絡循喉嚨通舌本凡喉病皆少陰之證少陰之火達如奔馬逆衝于上到此咽喉緊鎖慶氣鬱結而不得舒故成乳蛾纏喉雙蛾單蛾等危證急治則生緩治則死是丸也雄黃能破結氣巴豆能下稠痰鬱金能散惡血冰片能透開竅盡此四者閉其通矣丹溪翁生平不用厲藥然此丸者實不得已而用之其亦行權之妙乎

胞與堂主人洪九有



口糜散

治口瘡糜爛

薄荷葉六分川黃柏五分

青黛飛水四分白硼砂三分

朱砂飛水二分冰片研另一分

右為細末用小磁罐密封收貯每取少許着於瘡上良

口瘡本於濕熱濕熱不去必至疴蝕寒可以勝熱苦可以堅膚故用薄荷黃柏青黛白硼砂苦寒之品乃朱砂者令其解熱毒也冰片者令其散熱結也濕熱既蠲而口糜自愈矣

胞與堂主人洪九有



明目地黄丸 即東垣益陰腎氣丸

治腎虛目暗不明

熟地黄 四兩 生地黃 乾山藥

山茱萸 當歸 五味子

牡丹皮 澤瀉 茯苓

柴胡 各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心淡鹽湯送

下三錢 忌蘿蔔

精生氣氣生神故腎精一虛則陽光獨治陽光

獨治則壯火食氣無以生神令人目暗不明王

冰白壯水之主以制陽光故用生熟地黃山萸

五味當歸丹皮澤瀉味厚之屬以滋陰養腎滋

陰則火自降養腎則精自生乃山藥者所以益

脾而培萬物之母茯苓者所以養神而生明照

之精柴胡者所以升陽而致神明之氣於睛明

之窠也孫思邈曰中年之後有目疾者宜補不

宜瀉可謂開斯世之矇矣東垣此丸其近之

胞與堂主人洪九有

黃連羊肝丸

治目紅腫羞明眵淚眊眩暈腦巔沉重睛

珠疼痛眼睫無力常欲垂閉不敢久視

久視則酸疼及生翳淫熱等證

黃連 白羯羊肝 一具

先以黃連研為細末將羊肝以竹刀刮

下如糊除去筋膜入搗盆中研細入黃

連末為丸如梧桐子大每服三錢茶清

白湯任下

忌猪肉及生冷

斯丸以黃連除熱毒明目為君以羊肝肝

與肝合引入肝經為使不用鐵器者金剋

木肝乃木也一有金氣肝則畏而不受蓋

專治肝經之藥非與群隊者比也肝受邪

者並皆治之 原機啟微

胞與堂主人洪九有

千金磁珠丸

治神水寬大漸散昏如霧露中行漸觀空中有黑花漸
觀物成二體久則光不收及內障神水淡綠色淡白色
磁石吸針者辰砂透明者神翅真正者

先以磁石置巨火中煨醋淬十餘次晒乾另研極細二
兩辰砂另研極細一兩生神翅末三兩與前藥和勻更
以神翅末一兩水和作餅煮浮為度撲入前藥煉蜜為

丸如梧桐子大空心白湯下一錢一云食後每
服五分日三

以磁石辛鹹寒鎮墜腎經為君令神水不外移也辰砂微
甘寒鎮墜心經為臣肝其母此子能令母實也肝實則目
明神翅辛溫甘化脾胃中宿食為佐生用者發其生氣熱

用者飲其蒸氣也服藥後俯視不見仰視漸觀星月者此
其効也亦治心火乘金水衰反制之病久病累發者服之

則永不更作空心服此午前更以石斛夜光丸主之辰砂
磁石法水入腎珠砂法火入心而神翅專入脾胃乃道家

黃婆媒合嬰兒姪女之理加沉香升降水火尤佳辰砂
磁珠丸主明目百歲可讀細字書常服大益眼目龍木論

古人於腎虛及種子方中每用磁石近代況於金石之說
多不知用然磁石性能引鐵則用之者亦是假其引肺金

之氣入腎使其子母相生爾水得金而清則相火不攻自
去矣嗚呼醫之神妙在於幽微此言可與知者道也考醫方

胞與堂主人洪九有

石斛夜光丸

治內障初起視覺微昏空中有黑花神水變淡綠色次
則視物成二神水變淡白色久則不觀神水變純白色
及有眵淚眊眊等證

天門冬去心人參各二兩麥門冬去心

熟地黃各一兩兔絲子酒浸甘菊花去蒂

草決明炒杏仁去皮尖乾山藥炒枸杞子

牛膝酒浸各五兩子白蒺藜炒去石斛七粒

肉蓯蓉川芎甘草炙枳殼炒

青箱子防風黃連烏犀角鎊

羚羊角鎊各五錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三錢溫酒淡盞湯或
白滾湯任下

此丸養補藥也補上治下利以緩利以久不利以遠也故
君以天門冬人參兔絲子之通腎安神強陰填精也臣以

五味子麥門冬杏仁茯苓枸杞子牛膝生熟地黃之飲氣
除濕涼血補血也佐以甘菊花蒺藜石斛肉蓯蓉川芎甘

草枳殼山藥青箱子之治風療虛益氣祛毒也使以防風
黃連草決明烏犀角羚羊角之散滯泄熱解結明目也除

弱不能配陽之病亦最宜服此從則順之治法也然必
千金磁珠丸服之庶易功原机啟後

胞與堂主人洪九有

千金補腎丸

治一切耳聾證

人參 黃耆 當歸 山茱萸 肉桂 牡丹皮
 白芍藥 桂心 遠志 巴戟天 克絲子 麩
 細辛 肉蓯蓉 附子 熟地黃 蛇床子 煨
 白茯苓 甘草 乾薑 澤瀉 石斛 各二
 石菖蒲 防風 羊腎 極細 極細 極細
 右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒送下三錢

耳以司聽匪聽勿聰也君子有思聰之責者胡然而使衰

如手故取千金腎氣丸以開斯世之聾聵按千金云勞聾

氣聾風聾虛聾毒聾六聾耳鳴者此方主之勞聾者勞火

鼓其聽戶也氣聾者經氣滯塞於聽戶也風聾者風熱閉

其聽戶也虛聾者氣血虛耗而神不用也毒聾者膿血障

礙妨於聽戶也久聾者病非一日邪氣痺聚也凡是聾者

勢必耳鳴故總繫其耳鳴也味之甘者可以補虛亦可以

卻勞人參黃耆羊腎山茱萸地黃鬼絲巴戟蓯蓉澤瀉芍藥

當歸茯苓甘草均之味甘之品也味之辛者可以開結毒亦可

者可以驅風亦可以順氣細辛菖蒲遠志丹皮石斛均之

味辛之品也味之熱者可以開結毒亦可味之微毒之品也

以療久痺蛇床桂心附子乾薑均之辛溫微毒之品也味

胞與堂主人洪九有

青娥丸

治腎虛腰痛

破故紙 酒浸少 炒
 杜仲 薑汁炒
 黃柏 鹽水炒
 胡桃肉 去皮炮
 川葶藶 重便浸
 牛膝 去蘆
 知母 酒拌炒
 各四兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒送下三錢

腎坎象也水火並焉水衰則陽光獨治而令腎

熱火衰則陰翳襲之而令腎寒水火俱衰則土

氣乘之而邪實於腎均之令人腰痛也是丸也

故紙杜仲胡桃味厚而溫黃柏知母牛膝味厚

而寒溫者可使養陽寒者可使養陰均之味厚

則均之能走下部矣若葶藶者苦燥之品足以

利水土之邪而平其氣也曰青娥者涵陽之坎

也假之以名斯丸明其全夫水火之真爾

胞與堂主人洪九有

化蟲丸

治一切蟲病大者即下小者盡化為水

鶴虱去土 胡粉炒 苦練根東引不出土者

檳榔兩各一 使君子 蕪荑錢各五 枯礬錢二分

右為末米糊丸如椒目大量人強弱用之

為國者必欲去夫蠹國之小人為醫者必欲去

夫蠹身之蠱蝕此化蟲丸所製也經曰腸胃

為市故無物不包無物不容而所以化生諸蟲

者猶腐草為螢之意乃濕熱之所生也是蟲以

濕熱為巢穴鶴虱等七味皆有殺蟲之能且去

濕熱能直搗其巢穴矣古人率單用之今乃類

聚為丸其亦保安之策也蟲類多種治各不同

此方無所不宜蟲劑之總司也但服之得法無

不神驗須初一至初十蟲頭向上宜先餓半日

而使蟲饑次早五更用油煎肉一片嚼之蟲聞

肉香頭皆向上隨以藥服之須臾或葱湯或白

湯助藥力下行則蟲盡下矣

胞與堂主人洪九有



痔漏丸

治一切內外痔漏及諸般頑漏

魚鱉四兩極淨者 黃蠟四兩 明礬研二兩末

朱砂研一兩末 珍珠研五錢末 象牙研五錢末

先將魚鱉酒煮極爛杵如膏入蠟化盡離火入礬

并砂珠牙末和勻丸如梧桐子大每服三十九空

心酒送下

察痔漏者病醫之事也君子鄙談之然擇疾而療非

仁人之用心也故訂痔漏丸以拯夫世之苦痔漏者

按痔之為病緣於七情內傷五賊外乘饑飽不節勞

役異常煎之酒色厚味所致也生於肛門之外者名

外痔生於肛門之內者名內痔初起即當醫治庶免

後患人反以小恙不足懼延捱日久變為痔漏始乃

惶忙求治或治反不如法往往糞從孔出血數竅流

釀成莫救之禍惜哉我守每日禁兩心憐憫因適

訪名流得傳是方製以療人輒皆奇効是丸黃蠟明

礬為解毒生肌之聖藥加以砂珠牙末其功更倍之

矣用魚鱉為君者取其味厚滋補而有膠固不漏之

義焉且無刀針掛線爛藥之險重軀命者亟宜服之

胞與堂主人洪九有

滋陰潤腸丸

治大腸秘結血少腸枯久不大便

熟地黃 當歸 熟地黃

生甘草 麻仁 生地黃

桃仁去皮 紅花各一兩 升麻三錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三

錢白滾湯送下 虛弱者每服減一錢

秘結燥證也有火燥有風燥有水竭之燥

才血虛之燥從容養血清燥為上手急遽

攻下通腸為下手然大腸得血則潤亡血

則燥故用熟地當歸以養血初燥動血久

燥血瘀故用桃仁紅花以去瘀麻仁所以

潤腸大黃所以通燥血熱則涼以生地黃

氣熱則涼以生甘草微入升麻消其風熱

爾經曰燥者濡之此之謂也 醫方考

胞與堂主人洪九有

硃珀蠟礬丸

治癰疽發背惡瘡惡漏

黃蠟 二兩 明礬 三兩

硃砂 三錢要 琥珀 三錢要

先將蠟熔化離火少溫入極

細礬末及硃珀末和勻丸如

梧子大食前溫酒下三十丸

此丸不惟定痛生肌而且消毒

化膿及內癰排膿托裏之功甚

大并一切惡瘡頑漏服之其毒

即解薛立齋先生云此為外科

之聖藥也服至四五兩之上愈

見其功矣 薛氏醫案

胞與堂主人洪九有

八珍益母丸

治胎前產後諸虛百損月事不調子宮虛寒久不
受孕此藥行氣養血調經種子婦人百病俱宜服

當歸 酒洗川芎 微炒 白芍藥 炒 懷熟地

人參 白朮 土炒 白茯苓 炙甘草

香附 分四分益醋酒阿膠 切碎給益母膏

右十味分兩隨證加減各製為末入益母膏加煉

蜜為丸如梧桐子大空心白滾湯送下三錢

易曰坤道成女又曰至哉坤元萬物資生然則女道

貴生育也欲其生育必使陰陽和氣血調乃能有濟

何也蓋氣為衛屬陽血為營屬陰此人身之兩儀生

化之原也純用四物則獨陰不長純用四君子則孤

陽不生二方合用則氣血有調和之益而陰陽無偏

勝之虞矣香附引氣生血解鬱散結阿膠調經理血

治帶止崩益母膏者活血行氣有補陰之功凡胎前

產後有所恃者氣血也胎前無滯產後無虛是其行

中有補矣命名益母者所以利有子也

胞與堂主人洪九有

調經種子丸

治婦人月事不調久不受胎

當歸 酒洗川芎 微炒 白芍 炒 三熟地 黃 兩 白朮 三 兩

白茯苓 兩 人參 一 兩 甘草 一 兩 炙 香附 兩 阿膠 三 兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心白滾湯下三錢

無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女女以

坤道用故治婦人者以陰為正方其二七而天癸至月事

以時下者女子得坤之陰陰中必有陽故以七為紀一七

而意更二七而天癸至也人受天地之氣以生故能克肖

天地月天之陰也以月而盈以月而虧故女子之血亦以

三十日而一下也血氣下也同於月故名之曰月事經曰

月事以時下故能有子是以月事不調者宜服此丸使月

事調勻則陰陽和而萬物生有子之道也是九也當歸芍

藥性黃香味厚之品也味厚為陰中之陰故能益血析而

論之當歸辛溫能活血芍藥酸寒能斂血熱也甘濡能補

血又曰當歸入心脾芍藥入肝熱地入腎乃川芎者微上

微下而行血之氣者也此四物所以為婦人之要藥而調

月者必以之為程規又用人參白朮茯苓甘草以養陽也

所以必煎養氣者太極之妙陰生於陽故也至於香附開

其鬱結阿膠益其陰血而調經種子之術可謂盡美而盡

善也

胞與堂主人洪九有

保胎丸

治婦人懷孕氣血虛弱不能容養面黃嘔吐精神
倦怠四肢無力或寒熱往來頭暈眼花胸膈不寬
不思飲食恐動其胎最宜服之萬無一失

人參 五錢 白木 土炒 白茯苓 各一兩
甘草 五錢 當歸身 酒洗 川芎 微炒
白芍藥 炒一兩 懷地黃 二兩酒 艾葉 一兩
香附 四製 陳皮 各一兩 砂仁 五錢
條黃芩 酒炒 炒阿膠 各一兩 益母膏 四兩

紅棗肉 四兩 川蜜 八兩

右為末紅棗肉益母膏煉蜜為丸如梧桐子大空
心白滾湯送下三錢

氣血虛則胎不安氣血熱則胎不安氣血滯則胎不
安不安則難乎保矣是丸以四君四物補其氣血之
虛條芩阿膠清其氣血之熱艾附砂陳行其氣血之
滯紅棗肉益母膏則補其母益母膏益母所以利其
子也保胎之道畢矣

胞與堂主人洪九有



達生散

治產難如神臨月服之令人易生

人參 五錢 白木 土炒 甘草 炙

當歸 白芍藥 紫蘇

陳皮 各一兩 大腹皮 三兩黑豆汁
洗淨晒乾用

右散每服一兩水煎服

生不必催也催之則宋人之樞苗耳非徒

無益而又害之也然產難之故多是氣血

虛弱營衛澁滯使然凡臨月之際預服達

生散為良蓋是散用參朮甘草益其氣用

當歸芍藥益其血用蘇陳腹皮流其滯氣


血不虛不滯則其產也猶之達矣矣用催

乎詩云誕彌厥月先生如達朱子曰先生

首生也達小羊也羊子易生而無留難故

昔醫以達生名其散也

胞與堂主人洪九有



崩漏丸

治婦人經血崩漏

羌活 藁本 防風 肉桂 夏冬勿用

白木 土炒 當歸 黃耆 柴胡 各三兩

人參 熟地黃 川芎 細辛 六錢

白芍藥 炒 紅花 獨活 甘草 炙

附子 炮去皮 桃仁 去皮尖

右為末酒糊為丸如梧桐子大空心溫酒送下三錢 或淡醪湯亦可

氣血人身之陰陽也陽主升陰主降陽根乎陰陰根乎陽一動一靜互為其根則一升一降循經而行無崩漏也若陽有餘則升者勝血從上竅而出陽不足則降者勝血從下竅而出是丸也附子肉桂人參黃耆白木甘草壯陽益氣之品也羌活獨活柴胡藁本防風細辛川芎升陽舉經之品也當歸芍藥地黃紅花桃仁滋陰入血之品也壯陽則氣不虛舉經則血不陷滋陰則血不燥夫如是則血為氣之守氣為血之衛血營於中氣衛於外升降上下一循其經矣胡然而崩也 醫方考

胞與堂主人洪九有

帶下丸

治婦人赤白帶下此丸神良

馬毛 二兩 椒和伏火一宿白馬

龜甲 醋炙 鼈甲 醋炙 牡蠣 火炙

右為末醋水跌丸如梧桐子大每服三錢溫酒送下日三 一方為散每服方寸匕丸佳

氣陷於下焦則白帶血陷於下焦則赤帶以滋藥止之則未盡之帶留而不出以利藥下之則既損之中又傷其下皆非治也馬得乾之剛毛得血之餘血餘可以固血乾剛可以利氣固血則赤止利氣則白愈此用馬毛之意也龜鼈牡蠣外剛而內柔離之象也去其柔而用其剛故可以化癥可以固氣化癥則赤白之成帶者無復中留固氣則營衛之行不復陷下營不陷則無赤衛不陷則無白矣

胞與堂主人洪九有

小兒至寶丹

治小兒驚癇吐瀉及一切諸疾皆良

七氣湯 五兩 妙香散 五兩 六一散 四兩 膽南星 一兩

右為一處煉蜜為丸如龍眼核大硃砂為衣每用量兒

大小加減丸數隨證用引研服

感寒夾驚發熱慈蓋湯下 傷食嘔吐泄瀉薑湯下

赤白痢陳米湯下 大便秘結火麻仁湯下

小便赤澀車前子湯下 發熱薄荷湯下

煩渴燈心湯下 霍亂紫蘇湯下

喘咳麻黃杏仁湯下 積聚腹痛薑湯下

急驚搐搦薄荷湯下 慢驚人參白朮湯下

疳積身瘦肚大手足細大便泄瀉小便如淋障未湯下

諸病後無精神少氣力不思飲食薑棗湯下

此丹乃先賢取三方配合而成以拯萬世之嬰兒真微妙

秘訣也七氣湯者菘菜一兩 益智錢五錢 陳皮一兩 三稜錢五錢 枳椇錢

五錢 甘草錢三錢 茯苓錢二錢 黃芩錢五錢 青皮錢一錢 藿香錢五錢 消補魚行

之劑也妙香散者木香錢六錢 遠志二兩 麝香五分 硃砂錢二錢 山藥兩


粉草一兩 白朮一兩 人參錢一錢 安神正氣之法也六一散者滑石

六兩 研末甘草一兩 一天一生水地六成之之義也加膽南

星者治風痰爾如此妙合成丹隨證調引諸病如遺寶嬰

之術至矣故曰至寶丹

胞與堂主人洪九有



抱龍丸

治小兒驚風潮搐四時痘疫身熱昏睡痰涎壅盛

風熱喘嗽煩燥不寧并痘疹欲出先發驚搐及蠱

毒中暑等證並宜投服

天竺黃 研一兩 膽南星 研一兩 人參 研去鬚蘆

辰砂 研極細 雄黃 研極明者 珍珠 研極細

琥珀 研極好 沉香 研極細 檀香 研極細

木香 研極好 真麝香 研極細 金箔 研極細

右末煎甘草膏為丸如芡實大外用蠟皮封之每

服一丸白滾湯 嬰兒半丸

抱者保也龍者肝 東方青龍木木生火謂生

我者父母也肝為母心為子母安則子安况心藏神

肝藏魂神魂既定驚從何生此抱龍丸命名之義也

經曰明可以安神故用琥珀珍珠重可以去怯故用

辰砂金箔氣竄可以利竅故用雄黃沉檀木麝甘温

可以同元故用人參辛燥可使開痰故用南星寒涼

可使清熱故用竺黃是丸化痰祛邪清熱之功居多

屬肝心實熱而致者服之殊効若脾肺虛熱而見昏

睡痰嗽者當用調補元氣之藥為良也

胞與堂主人洪九有

胞與堂主人洪九有

肥兒丸

治小兒疳積神良

黃連 製

蘆薈

青皮 炒

陳皮

神麩 炒

麥芽 炒

三稜 炒

莪朮 塊

肉果

檳榔

白豆蔻

史君子

沉香 錢五

木香

蝦蟆 錢一

錢各

右為末神麩糊丸如麻子大每二三十丸米飲下
微論曰衛氣少而寒者乘之也元氣微而飲食傷
之也外乘內傷積而成之也父母以其統陽耶故深
冬不為裳父母以其惡風耶故盛夏不解衣父母以

其數饑耶故飼以厚食之父母以其或渴耶故乳後
更飲之有愚慈而為父母者又不審其寒暑飲食也
故寒而不為煖暑而不生涼飲而不至渴食而不及
饑而小兒幽玄御默抱疳而不能自言故外乘內傷
因循積漸釀而成疳也溫而易饑能食而腹脹下
利作嘔聲已上之證治勿後後則危也今以肥兒
丸主之發熱作渴面黃肌瘦倦怠短氣髮墜作瀉豈
不為稿乎是丸皆去積健脾之品服之當益然渙然
潤澤而肥腴矣

胞與堂主人洪九有

龜鹿二仙膏

治虛損精極者夢泄遺精瘦削少氣目視不明等證久
服大補精髓益氣養神

鹿角 二斤

龜板 一斤

枸杞子 六兩

人參 三兩

右將鹿角截碎龜板打碎長流水浸三日刮去垢用砂
鍋河水慢火魚眼湯桑柴煮三晝夜不可斷火當添熱
水不可添冷水三日取出晒乾碾為末另用河水將末
并枸杞人參又煮一晝夜濾去渣再慢火熬成膏初服
一錢五分漸加至三錢空心無灰酒化下
精氣神人身之三寶也經曰精生氣氣生神是以精極則
無以生氣以致瘦削少氣氣少則無以生神以致目昏不
明鹿得天地之陽氣足全善通督脉足於精者故能多淫
而壽龜得天地之陰氣最厚善通任脉足於氣者故能伏
息而壽其角與板又其身聚精氣神之最勝者取而為膏
以補之所謂補以類也且二物氣血之屬又得造化之玄
微異類有情竹破竹補之法也人參為陽補氣中之怯枸
杞為陰清神中之火是膏也一陰一陽無偏攻之憂入氣
入血有和平之美錄是精日生而氣日旺氣日旺而神日
昌庶幾享龜鹿之年矣故曰二仙

胞與堂主人洪九有


瓊玉膏

治乾咳神良

生地一斤 白茯苓三兩 細末 人參一兩 細末
白蜜八兩

右以地黃將河水熬汁去渣入白蜜再熬稠
方下參苓末和勻入磁瓶用綿紙十數層加
箬封紫瓶口入砂鍋內以長流水淹沒瓶頸
用桑柴火煮三晝夜取出換油紙紫口以蠟
封固懸井中一日取起仍煮半日白湯點服
乾咳者有聲無之名也火乘於肺喉罷淫淫
而癢故令有聲之原於肺者有痰病不歸於脾
故無痰也易曰燥為物者莫燥乎火相火一燥
則五液皆涸此乾咳之繇也故丹溪以地黃為
君令水盛而火自息也損其肺者益其氣故用
人參以鼓生發之元虛則補其母故用茯苓以
培萬物之本白蜜為百花之精味甘歸脾性潤
悅肺且緩燥急之火四者皆溫良和厚之品誠
堪寶重郭機曰起吾沉痾珍寶瓊瑤故有瓊玉
之名示人知所珍也

胞與堂主人洪九有



十珍膏

主滋陰降火養血清肝

懷生地酒一斤 當歸身酒三兩 白芍藥炒
知母并益炒酒 牡丹皮浸炒使地骨皮炒
天門冬去心 麥門冬去心 各人參蒸去
生甘草錢各五

右十味用水二斗煎一斗去渣熬煉成膏隨
意服

夫陰虛者未有一大動脈直世之藥惟病端
初起元氣未虛勢方盛陰脈鼓而者暫取治
標稍久涉虛便不可服王上僕曰治熱未已而
中寒更起且足太陰傷而紀肺金孕育之原矣
斯以地黃為君知母為佐壯天一之水以劑而
了不與之直爭也當歸芍藥以沃厥陰腎肝同
治之法也水衰則火旺是以二皮為鈐制火盛
則金衰是以二冬為屏障人參補金位之母甘
草生用所以奉令承使奔走贊成者也

胞與堂主人洪九有

二冬膏

清心潤肺降火消痰

天門冬 去心 一斤

麥門冬 去心 一斤

右二冬入砂鍋水煎取汁再將渣水煎以無味為度入蜜熬成膏空心白湯下二三匙

人之一身陰常不足陽常有餘况保養者少作喪者多真陰既虧邪火必旺火旺則陰愈消而虛損痰咳煩渴燥等證作矣故正當滋其陰

使陰與陽齊則火能制火而火升入降斯無病矣是膏用天冬清金降火益水之源故能下通

腎氣以滋陰且仙書極贊其禦寒辟穀御女延齡其於養生誠為珍品蓋腎主津液燥則凝而

為痰得潤劑則肺不燥而痰自化亦治本之法也更以麥冬氣薄主升味厚為陰有清心潤肺

之功堪與天冬相並而施膏澤以濡其枯槁焉

胞與堂主人洪九有

杞圓膏

此膏安神養血滋陰心陽益智強筋骨澤

肌膚駐顏色

枸杞子 去蒂五斤

圓眼肉 五斤

右二味為一處用新汲長流水五十斤以砂鍋桑柴火慢慢熬之漸漸加小煮至杞圓無味方去渣不用再慢火熬成膏取起磁罐收貯不拘時頻服二三匙

心主血脾統血肝藏血思慮動勞則血受傷因

而不足血不足則虛火熾而煎燥腎水日見衰

竭矣茲取圓眼肉甘溫濡潤之品甘溫可以補

脾濡潤可以養心枸杞子味厚氣平之品味厚

可以滋陰氣平可以益陽血不足而益陽此太

極之妙陰生於陽也陰陽和水火濟心腎時交

則陰血自生而常足矣

胞與堂主人洪九有

參朮膏

治虛弱之人脾胃虧損或脹或瀉

白朮土炒八兩 人參去蘆 薏苡仁炒各四兩

蓮肉去心皮 黃耆蜜炙各三兩 白茯苓去皮二兩

神麴炒一兩 澤瀉炒 甘草炙三錢

右用水二斗煎一斗去渣再熬七膏白湯下日三
經曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生膈脹此皆
土虛并金亦薄遂失其升降之常下運曰脾欲緩急

食甘以緩之苦以泄之白朮 五九 為君東垣曰
脾胃虛則氣不足人參甘溫補氣是以為臣氣不足
者肉分不充故佐以黃耆土虛則不能生金故佐以
苡仁虛則補其母故佐以蓮肉土惡濕虛則不舉於
畏故佐以茯苓澤瀉土虛不能散精輸肺故佐以神
麴通五方之氣於太陰和諸藥之性而無忤者甘草
為使之力也

胞與堂主人洪九有

山薊膏 山薊白朮

補胃健脾和中進食

白朮 十斤 白蜜 二斤

右將白朮先煮粥湯待冷浸一宿用陳
壁土拌蒸透再以米粉又拌蒸刮去皮
淨切片曬乾聽用將水百碗桑柴火煎
取三十碗加白蜜熬成膏每服一酒盃
淡薑湯點服

太陰主生化之元其性 味甘其
氣喜溫白朮備此三者為中宮要藥配
以白蜜和其燥也且其味重則歸脾透陶
氏頌云綠葉抽條紫花標色百和六
腑內充木榮火謝盡採擷之難啟旦移申
窮淋瀝之劑味重金漿芳踰玉液夫豈無
故而得此隆譽哉

胞與堂主人洪九有

玄及膏 玄及五味子也

治火嗽夢遺精滑更能強陰壯陽

北五味子 一斤水浸 白蜜 三斤

右五味子入砂鍋加河水煎之取

汁又將渣再煎以無味為度入蜜

微火熬成膏空心湯下二三匙

北方之令主閉藏神 則不能

收固五味子味酸 收飲能

固耗散之精有金水 生之妙况酸

味正入厥陰厥陰偏喜泄乃圍魏

救趙之法也一物單行功專力銳更

無監制故為効神速元和紀用經之

玄及散厥有旨哉

胞與堂主人洪九有

養生主 一名歸園杞菊酒

此酒補心腎和氣血益精髓壯筋骨安五臟

旺精神潤肌膚駐顏色

當歸身 一酒洗 圓眼肉 八兩 枸杞子 四兩

并菊花 一兩 白酒漿 七斤 好燒酒 三斤

右四味用一絹袋盛之懸於雲中再入一酒

封固寄月餘不拘時隨意飲之甚有利益

唐子西名酒之和者曰養 酒之勁者曰齊

物論然則補益之酒貴味 也當歸補

血奇珍園眼養心佳果 請之仙人

杖并菊花益壽名之傳延 策一其厚腸胃

而潤肌膚燒酒之平行無勢而通血脉且其配

合性純和味其美誠養生主也 不夫沉湎無度

醉以為常亦反致疾耳此大禹所以疏儀狄周

公所以著酒誥雖為敗德之防亦寓墮軀之戒

即堯夫云美酒飲教微醉後此得飲法之妙所

謂醉中趣壺中天者也斯盡養生主之旨矣

胞與堂主人洪九有

百花如意醉春醞

此醞益腎固精堅陽久戰且其品味不燥不熱真房術中之絕技也

角沉香 一兩 玫瑰花 一兩 薔薇露 一兩
梅花蕊 一兩 桃花瓣 一兩 韭菜子 一兩
核桃肉 八兩 白酒漿 五斤 子燒酒 五斤

右七味用一絹袋盛之 入 燻中再入

二酒封固窸月餘 取

美景良辰花朝月夕絲竹合奏童姑廢歌藉此醞以發興暢懷融融然何樂如之且飲醇襲芬恍若沉醉於百花春谷也更有 一種妙處或行或止或久或速一任自如謂曰如意不亦宜乎

胞與堂主人洪九有

百藥長

此酒治男婦諸虛百損五勞七傷身體羸瘦胸膈脹滿脾胃不調四肢無力筋骨疼痛并風痰寒濕一切等症

當歸 一兩 川芎 五錢 白芍藥 一兩 懷地黃 一兩 白朮 一兩 白茯苓 一兩 天冬 二兩 麥冬 二兩 牛膝 一兩 杜仲 一兩 破故紙 一兩 茴香 一兩 五味子 一兩 枸杞子 一兩 陳皮 一兩 半夏 一兩 蒼朮 一兩 厚朴 一兩 枳殼 一兩 香附 一兩 砂仁 五錢 官桂 一兩 羌活 一兩 獨活 一兩 白芷 一兩 防風 一兩 蔓烏藥 一兩 秦艽 一兩 何首烏 一兩 川草薢 一兩 乾茄根 一兩 晚香沙 一兩 乾薑 一兩 小茴香 一兩 燒酒 六斤
右各藥共用一絹袋盛之懸掛 入 燻中再入 燻乾研細末 不拘時隨其量之大小多寡服之

為丸服亦妙

余嘗讀漢史至王莽詔書云酒為 長則神百藥而治百病者莫酒若也虛損勞傷身體羸瘦此酒以神藥為之養其血白朮茯苓益其氣天冬麥冬潤心而牛杜益而腰腎五味助其陰枸杞壯其陽腸脹滿脾胃不調皆此酒之功陳皮半夏蒼朮厚朴平其胃枳殼香附砂仁官桂調其中風寒痰濕力之痛楚藉此酒以神藥為之獨活白朮防風烏藥首烏秦艽單蘇茄根秦沙薑藜之屬去其風散其寒燥其濕行其痰如此則疾自弱力自強而氣血自旺矣百藥之長名稱實也或疑味多不專殊不知七情五賊紛擾其中正宜此大長之長以安內攘外也譬之韓侯之兵多多益善云爾

胞與堂主人洪九有

五五酒

治五勞補五臟長肌膚澤容色壯筋實髓保神守中久服可延年

五穀 粳米 黍米 粟 芝麻 大麥米 黑豆

五果 圓眼肉 紅棗肉 白果肉 胡桃肉 蓮肉

五仁 松子仁 柏子仁 杏仁 桃仁 薏苡仁

五子 枸杞子 冬青子 兔絲子 桑椹子 烏犀角

五精 巴戟 甘菊 首烏 桑椹

二酒 白酒漿 好燒酒

先將五穀共蒸熟攤冷五果五仁取 五子二精共用磁罐盛

之封固其口重湯煮三炷香取起 各味同一處用

燒酒浸三七再入白酒漿寄七七 三次一寒隨意

余製斯方用稻梁草木果味以養人 引之其取教

之玄微又豈任臆耶易傳河圖象數二天 五五五位相得而

各有合天數二十有五地數 十凡天地之數 十有五此所以成

變化而行鬼神也且五者土之生數也蓋土以上為本萬物皆致養

焉此酒配合品味用五五五二十五以合天之數分兩用六五六三

十以合地之數酒用二象兩儀也斤用六十四象六十四卦也體天

地法陰陽其寓旨也深矣其有裨於人也弘矣余既製之又從而詳

說之以為尊生者指南

胞真堂主人洪九有

美髯酒

此酒烏鬚神良

桑椹子 火烘乾二兩 何首烏 煮黑芝兩

冬青子 鹽水炒三兩 旱蓮草 煨熟三兩

熟地黃 七兩 懷慶者 烏反葉 切碎三兩

黑豆皮 三兩 不仁豆 乾於 切碎三兩

烏犀角 三兩 銅罐 河水 煎滿水成珠

右用無灰酒六十斤將藥用紙袋盛之投入

酒內封固壘口煮三炷 以土地上口火氣

不拘時多少隨意飲 鹽少許引

入腎經為佳

夫人生世間頂天立地極 入者惟藉髮鬚眉

爾豈可任其枯槁皓白而得 不為理乎此烏鬚

之術宜亟講也斯 桑椹首烏冬青旱蓮地

茄花犀角青藍烏飯 黑豆皮首烏鬚之聖藥

清之以酒者使循經絡達毛 氣也向之枯者潤

白者黑復為一美髯丈夫 矣且考桑椹等品仙

經聖典極稱其妙用故能 補腎填精壯顏益壽

豈區區烏鬚而已哉

胞真堂主人洪九有

斷蛇藥

治大麻風年深不愈眉毛脫落鼻梁崩壞額顛腫破身
癩瘡裂足指潰爛并上中下諸般風濕等症

真新蛇酒洗地龍去土各當歸酒洗川子微炒去

赤芍藥天門冬蒼朮未泚沒木鱉子去殼

細辛白芷荊芥穗蔓荊子

井菊花石菖蒲威靈何首烏

明天麻胡麻烏白蒺藜去刺

炙甘草紫苦參去殼

木賊草去蒂定風草即天小各一燒兩五十斤

石咀片用絹袋盛之懸於墻同醞釀月以食後避

風飲之以醉為妙

身半以上天之陽也病即氣虛

無壞而顛破也身半以下地之

則下病故瘡癩足裂而指墮也

荆靈仙荆芥甘菊木川芎荊

上可以驅風可以勝濕可以散

木苦參紫參沙參首烏當歸甘草天芍胡麻可以親

下可以療濕可以解毒可以活血乃地龍者泥盤之物濕

土所化也故能引諸藥以就濕斬蛇者奔騰之類風動之

象也故能引諸藥以驅風此易所謂雲從龍風從虎也用

燒酒者為諸藥之向導令其微上微下行十二經而通治

也斯釀誠為深達痛風之奧旨矣

胞與堂主人洪九有

胞與堂主人洪九有

胞與堂丸散譜

不靈飛散

清腫解毒止淚明目去翳退赤收濕除爛治一切目疾

爐甘石水大假通紅用重便淨如此七次靈藥二錢

珠砂一錢琥珀一錢珠末一錢牛黃一錢熊膽一錢

右和極勻每次用牙簪挑少許點眼閉目片時再點又

閉片時待藥力過然後以簪擦去並熱水洗淨日二

附靈藥方水銀五錢鉛五錢火硝八錢研先將鉛化

開入水銀作一家再以硝研一城確內五水封

固打火三炷香先文後武待

夫目證有內外治各不同藥

而畏熱者有喜點而畏點者不

疾既成非點不退服藥如釜底

汚須濯鏡垢須磨脂膏之釜不

之方也若內障不服而外障者徒

益服而點者亦然外障服以不

退既已結成者服雖不發不長

盡其妙此靈飛散所宜製也是散

磨礬撥雲若砂珀珠末牛黃熊

赤明目之品也凡目有外障者

胞與堂主人洪九有

胞與堂主人洪九有

胞與堂主人洪九有

胞與堂主人洪九有

胞與堂主人洪九有

胞與堂主人洪九有

胞與堂主人洪九有

五膽膏

治一切火熱赤眼流淚爛弦怕熱羞明或痛或癢等證

熊膽 精膽 雞膽 猪膽 羊膽

川蜜分等

右將膽蜜入銀碗或銅匙口微火熬成膏取起用磁盒藏之 毒點眼不効

夫目證內熱則驗赤障 微熱則

癢熱盛則痛或痛或赤 以也火熱

則神濁昏冒故令晝不 傷勝者則

惡火故令不可以近燈 所謂天明

則日月不明邪害空竅也 五膽之苦已以

勝熱川蜜之潤足以濟火 膽者甲木之

精也蜜者百花之精也 皆有瑩潤之竅之

妙焉

胞與堂主人洪九有

御心膏

治一切風氣寒濕手足拘攣骨節痠痛男子宿積女人血瘕及腰疼脇疼諸

症疼痛結核轉筋頑癩頑癬積年不愈腫毒初發楊梅疔破者俱良

血餘 當歸尾 川芎 赤芍藥 生地黃 桃仁 紅花

蘇木 木香 茅香 丁香 丁皮 藿香 烏藥

南星 半夏 貝母 蒼朮 玄參 苦參 黃芩

黃柏 大黃 山柅 八花粉 枳殼 川烏 草烏

肉桂 良薑 艾葉 防風 荆芥 白芷 蘇干

羌活 獨活 連翹 藥本 秦艽 麻黃 續斷

牛膝 骨碎補 牙痛 五加皮 白鮮皮 白芨 白薇

大楓子 草麻子 蒼耳子 五倍子 風藤 公靈山 烏節

降真節 僵蚕 全蝎 蟬退 蜈蚣 鱉甲 桑枝

山甲略一蝦蟆一個桃枝 中支 蜈蚣 鱉甲 桑枝

阿魏錢五 梅丹水麻油斤二 不用丹

右各味用油浸十餘日方下鍋文武火熬 不用丹

却將丹旋旋投入慢火熬至滴水成珠 不用丹

氣血人身之陰陽也陰陽調和則病不生苟失其調 不用丹

諸痛痞腫之證作矣然內治固有所九而外治亦 不用丹

以澤夫世之有外患者紅餘歸尾等八味活血行血 不用丹

調氣之品也南星等四味消痰燥濕之品也玄參等八味清熱涼血之品也川 不用丹

烏等五味祛風散寒之品也荆防蛇蝎等三十五味散風攻毒群隊之品也桃 不用丹

柳等七枝乃秉天地陰陽和氣而生每枝各用三七二十一寸正所以調和 不用丹

人身之陰陽也乳香等五味則有消凝導滯通關通痛之妙焉丹油調劑成 不用丹

膏此外合大隊之兵也効之神良余屢驗其名曰御驗則其朝代亦未之詳耳 不用丹

胞與堂主人洪九有

祛風膏

祛風散寒行痰治濕通治痛風之證神效

薑汁一碗 蔥汁一碗 廣膠八兩

牙皂一兩 川椒一兩 米醋一碗

乳香五錢 沒藥五錢 蘇香一錢

右將薑蔥汁同和皂... 入醋并熬

再加廣膠慢火... 送入乳沒麝

香在內和勻每用... 貼處

經曰風為百病之

風有寒有濕有

以其善行數變長於諸... 丁斯因濕痰

流血復被風寒... 則善寒則

善痛所以痛者... 不通也所

以走痛者風氣... 也薑蔥疏

通腠理廣膠發... 寒開竅

乳香沒藥消痰... 藥耳如

此透關疏表內... 兵也

胞與堂主人洪九有

玉蜀黍... 祛風膏... 治風濕... 功效神速...

固精丸

治男子精寒陽事痿弱舉而不堅... 崩漏等證貼之俱有奇效

韭菜子一兩 蛇床子一兩 附子一兩 肉桂一兩 川椒一兩 真麻油斤二

換丹... 倭硫黃... 丁香... 各研獨

右將前五味用香油... 入鍋內... 至枯... 濾去... 入丹

再熬滴水成珠... 得中... 即成膏... 用大紅緞... 如酒

盃口大將倭硫... 丁麝... 以獨... 搗爛... 為丸... 如豌豆... 安於膏

藥內貼之

夫精乃腎中之真水也... 全賴真...

名醫方論

〔清〕羅 美 輯并評

據中國科學院圖書館藏清康熙
十四年羅氏古懷堂刻本影印原書
版框高一九二毫米寬二四六毫米

新安羅東逸先生評定
慈水柯韻伯先生恭閱

古今名醫方論

古懷堂藏板

刻方論小序

自昔彼美云遐良邁難再士生
其間動成慨往無扣角短箭
之遙有帶月歸鋤之興是以
陸沉之志思侶長沮糜鹿之情
序一

實甘豐州微吟午夜耿懷人
至曙星勦夢北牕享義白皇
於肱半錐或果哉終斯已矣
無如大壑滄漂蓬其次淵浸三
時或餒九稔恒饑則又去而逃

死縣壺給食於是始為醫學搜
時傳之秘簡閱指掌之授書見
其類證為編括方以口塵軒岐於
度坵靈長沙以雲霧轉益膏
旨徒增橫天仲景不云乎人稟

序三

五常以有五藏經絡府俞陰
陽會通玄冥幽微變化難極
自非才高識妙豈能撰其理教
今之學醫不思識字討論經旨以
演其所知而迺面墻窺管費人試

方老者不愧少而無知痛心或不揣
不敏每循斯事思欲究其闕之書
樞挾參同於符易日與同志數公
旁搜遠紹始自漢代下迄元明無
下石家要歸一轍作用底益頗

序三

能燦然因集為古今明醫經論
治彙粹八卷方論在其末編今令
先出傳心同學以堵醫方所集要
約簡明皆日用常行昭耳目用
之恒常而易忽體以證治而或非

雖人三枯未事三當用將以為耳
前之嚆矢昨畔之雷光野人
蒐集聊潤芹之一獻云耳其
於漏卮無當固稿項黃馘之所
固然而無是道也因序首

序由

康熙乙卯巧月既望新安

羅美書於虞山麓之

古懷堂



凡例

一古之方書得人乃傳非人勿言誠重之也故扁鵲魯公
輩皆稱禁方不輕授人後漢張仲景夫子傷橫天之莫救
博採眾方平脉辨證著傷寒雜病論公之天下欲人見病
知源是世醫方之祖也其方發表攻裏固本禦邪內外證
治無乎不備後人惑傷寒為一家書束之高閣即專治傷
寒者又為活人全生諸書所掩未嘗好學深思心知其故
則見為古方難用競管膚淺以矜捷得所以左釜雷鳴也
茲編本欲以仲景方為首簡恐人猶重視而畏遠之姑以
魯醫方論

凡例

日用諸方表表耳目者為先導諸方義明而後入仲景之
門亦行遠登高之自爾
一漢建安以前苦於無方宋元豐以後局方猥顧蔓延今
時何有根抵漫無指歸惟薛立齋先生所用諸方簡嚴純
正可為後法是編多所採錄而金匱千金外臺諸書及潔
古東垣太無丹溪方之作者咸擇而錄焉仲景有云學者
能尋余所集思過半矣
一有方即有柄自仲景始也有方更有論自成無已始也
明代趙以德有金匱衍義於方頗有論吳氏鶴皋著醫方

考近時醫林復有張景岳趙養葵喻嘉言李士材程郊倩張路玉程扶生諸公各有發明余喜得而集之矣然其間或擇焉而未精語焉而未詳亦間有不恆於心者因與素交諸同人往來探索古作者之意時時析疑欣賞得見一斑即各與分方補論因而附列增入少爾後學本非噉名實未辭續紹之媿云

一病名多端不可以數紀故仲景分六經而司治之使百病咸歸六經是扼要法也後人不知六經為雜病辨證設竟認為傷寒設由是仲景辨證之權衡廢天不知證便不

名醫方論 凡例 二

方矣巢元方作病源陳無擇作三因為近來醫書之祖華陀之肘後孫思邈之千金是後來局方之祖然論雖多方雖廣而不得治之要實千載迷塗矣後此繼起者莫不貴叙證之繁治法之備策方之盛求勝前人不知病名愈多後學愈昏方治愈繁用者愈無把握一遇盤根錯節通試諸方渺無所措豈如得仲景法不於諸病搜索但於六經講求一劑而唾手可愈耶友人韻伯於仲景書探討有年所著傷寒論翼多所發明故是編於傷寒方中錄其論最夥亦欲學者因之略一見仲景一斑耳

一吳氏作醫方攷其意未嘗不欲以立方本源開後學之蒙也究乃拘證論方壁多疏註以遷就之仍與諸家類書無別夫所謂考者考其製方之人命名之義立方之因與方之用因詳其藥之品味分兩製度何病是主治何病可兼治何病當增減何病不可用使人得見之明守之固也乃爾分門分方第知有證之可尋徒刻方以備員亦何知有方之神奇變化攷其所用之精妙乎是編非但論其方之因方之用詳其藥性君臣法製命名之義而已必論其內外新久之殊寒熱虛實之機更引諸方而比類之又推

名醫方論 凡例 三

本方而互通之論一病而不為一病所拘明一方而得衆病之用遊於方之中超乎方之外全以活法示人比之方攷稍有得一得耳
一借評方論非取文章故所批閱必於眼目肯綮指出所以然以質證同志人有共目則人有同心非敢僭為臆說也
一茲選不佞本以數年心目遍搜古今名醫經論刪纂其要定為古今名醫彙粹八卷實為經論無方之書茲選方論附在末部今因刪削費繁茲編先出用質四方同志以

爲月教所珠玉見投以慰飢渴卽嘗補入正集川慶大觀

名醫方論

凡例

四

名醫方論 目次

名醫方論目次

卷一

補中益氣湯論三條

柯韻伯 趙養葵 陸麗京

黃芪建中湯論二條

喻嘉言 本論一則 附建中論一則

人參養榮湯

柯韻伯

歸脾湯

羅東逸

保元湯

柯韻伯

四君子湯

張路玉

六君子加香砂湯

柯韻伯

名醫方論

目次

一

四物湯

張路玉 柯韻伯

聖愈湯

柯韻伯

當歸補血湯

吳鶴臯

酸棗仁湯

羅東逸

養心湯

吳于宣

獨參湯

柯韻伯

炙甘草湯

喻嘉言

逍遙散

趙羽皇

二陳湯

李士材

生脈散	柯韻伯
理中湯	程郊倩
芪附木附參附三湯	合論 喻嘉言
清暑益氣湯	論二條 吳鶴臯 程郊倩
附暑門諸方論	一條 喻嘉言
竹葉黃芪湯	柯韻伯
清燥救肺湯	論二條 喻嘉言 柯韻伯
當歸六黃湯	季楚重
桂苓木甘湯	趙以德
名醫方論	目次
卷二	二
小半夏湯三方	合論一條 趙以德
瀉白散	季楚重
地骨皮飲	柯韻伯
升陽益胃湯	吳鶴臯
清脾飲	柯韻伯
溫膽湯	羅東逸
導赤散	季楚重
芍藥湯	羅東逸

犀角地黃湯	柯韻伯
人參清肺湯	三方合論 王又原
溫脾湯	喻嘉言
秦芩升麻湯	李士材
二黃湯	柯韻伯
四磨湯	王又原
升麻葛根湯	柯韻伯
防風通聖散	吳鶴臯
藿香正氣散	吳鶴臯
名醫方論	目次
三	
防風黃芪湯	柯韻伯
稀涎下縉湯	柯韻伯
麥門冬湯	喻嘉言
菴活冲和湯敗毒散	合論 趙以德
神木湯	柯韻伯
三生飲	柯韻伯
仙方活命飲	附止齋治 羅東逸
麻黃加木桂枝加附	論合 程扶生
木防已湯四方合論	喻嘉言

大黃附子湯	喻嘉言
經驗續命湯	趙以德
括萎桂枝湯	喻嘉言
越婢加半夏小青龍加石膏合論	喻嘉言
桂枝湯	柯韻伯
麻黃湯	柯韻伯
葛根湯 <small>論二條</small>	柯韻伯 喻嘉言
大青龍湯	柯韻伯
小青龍湯 <small>論二條</small>	柯韻伯 趙以德
名醫方論 目次	
四	
桂枝人參葛根芍藥連合	柯韻伯
卷三	
葛根黃芩黃連湯	喻嘉言
桂枝去桂加茯苓白朮湯	柯韻伯
黃芩湯 <small>論二條</small>	程郊倩 柯韻伯
黃連湯 <small>論二條</small>	程郊倩 成無已
十棗湯	柯韻伯
小陷胸湯	程扶生
大陷胸湯	柯韻伯

五瀉心湯合論	王又原
桂枝加附子湯	柯韻伯
桂枝甘草湯	柯韻伯
芍藥甘草附子湯	柯韻伯
桂枝去芍藥加麻辛附湯	柯韻伯
小建中湯	柯韻伯
五苓散 <small>論二條</small>	程郊倩 趙羽皇
越婢湯 <small>論二條</small>	喻嘉言 趙以德
茵陳蒿湯	柯韻伯
名醫方論 目次	
五	
梔子豉湯 <small>并加減諸湯合論</small>	柯韻伯
豬苓湯	趙羽皇
白虎湯	柯韻伯
人參白虎湯	趙以德
大小二承氣湯合論	柯韻伯
桃仁承氣湯	柯韻伯
小柴胡湯	程郊倩
大柴胡湯	柯韻伯
柴胡桂枝湯	柯韻伯

桂枝加芍藥加大黃二湯合論	柯韻伯
麻黃附子細辛湯	柯韻伯
乾薑附子茯苓四逆二湯合論	柯韻伯
旋覆代赭湯	羅東逸
赤石脂禹餘糧湯	柯韻伯
真武湯 <small>附加減論</small>	趙羽皇 柯韻伯
黃連阿膠湯	柯韻伯
當歸四逆湯	柯韻伯
吳茱萸湯	羅東逸
名醫方論	目次
白頭翁湯	柯韻伯
四逆通脈四逆合論	王又原
麻黃杏仁甘草石膏湯二論	柯韻伯 程扶生
附子湯	柯韻伯
參胡三白湯	柯韻伯
卷四	
腎氣丸	張景岳
八味丸 <small>論四條</small>	趙養葵 喻嘉言 柯韻伯
六味丸	柯韻伯

天王補心丹	柯韻伯
朱砂安神丸	葉仲堅
枳朮丸 <small>附加減論</small>	李東垣 趙以德
磁硃丸	王又原
四神二神五味子散 <small>合論三條</small>	程郊倩 李士材 柯韻伯
滋腎丸	羅東逸
虎潛丸	王又原 葉仲堅
越鞠丸	季楚重
封髓丹	趙羽皇
名醫方論	目次
左金丸	胡天錫
資生丸	羅東逸
脾約丸	成無已
更衣丸	柯韻伯
備急丸	柯韻伯
當歸龍薈丸	柯韻伯
四生丸	柯韻伯
石斛夜光丸	羅東逸
礞石滾痰丸	柯韻伯

指迷茯苓丸	柯韻伯
大黃廣蟲丸	李士材
烏梅丸	柯韻伯
平胃散	柯韻伯
瓜蒂散	柯韻伯
天水散	柯韻伯
阿膠散	程郊倩
玉屏風散	柯韻伯
五淋散	柯韻伯
失笑散	吳于宣
清胃散	羅東逸
龜鹿二仙膏	李士材
瓊玉膏	李士材
附補方藥雜論十七條	張景岳曰喻嘉言三虞天民 趙羽皇一柯韻伯七
補遺	
參蘇飲	葉仲堅
香薷飲	葉仲堅
名醫方論目次全	

名醫方論 卷一

名醫方論卷一

新安羅東逸先生評定

慈水柯韻伯先生參閱

補中益氣湯附三條

治陰虛內熱頭暈口渴表熱自汗不任風寒冰洪大心
煩不安四肢困倦漸於言語無氣以動動則氣高而喘

黃芪 人參 雲木 炙甘草 陳皮

當歸 升麻 柴胡

右八味加生薑三片大棗二枚水煎溫服

名醫方論 卷一

柯韻伯曰仲景有建中理中二法風水內干中氣用甘草
飴棗培土以禦風姜桂芍藥驅風而瀉水故名曰建中寒
水內凌於中氣用參朮甘草補土以制水佐乾薑而生土
以禦寒故名曰理中至若勞倦形氣衰少陰虛而生內熱
者表症頗同外感惟東垣知其為勞倦傷脾穀氣不盛腸
氣下陷陰中而發熱製補中益氣之法謂風寒外傷其形
為有餘脾胃內傷其氣為不足遵內經勞者溫之損者益
之之義大忌苦寒之藥選用甘溫之品升其陽以行春生
之令凡脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪護皮毛而開腠理



黃芪建中湯

治虛勞裏急悸衄、腹中痛、夢失精、四肢酸疼、手足煩熱、咽乾口燥、諸不足。

黃芪 膠飴 白芍 甘草 桂枝 生薑

大棗

右七味水煎服

喻氏曰：虛勞而至於亡血失精，津液枯槁，難為力矣。內經於鍼藥所莫制者，調以甘藥。金匱遵之，而用黃芪建中湯。急建其中氣，俾飲食增而津液旺，以至充血生精而復其

名醫方論

卷一

四

真陰之不足，但用稼穡作甘之本味，而酸辛鹹苦在所不用。蓋舍此別無良法也。然用法貴立於無過之地，寧但嘔家不可用建中之甘，即服甘藥微覺氣阻，氣滯更當慮甘藥太過令人中滿，早用陳皮砂仁以行之，可也不然。甘藥又不可恃，更將何所持哉？後人多用樂令建中湯十四味，建中湯雖無過甘之弊，然樂令方中前胡細辛為君，意在退熱而陰虛之熱則不可退。十四味方中用附桂從容，意在復陽而陰虛之陽未必可復。又在用方之善為裁酌矣。又曰：傷寒有小建中一法，治二三日心悸而煩，以其人中

名醫方論

卷一

五

氣餒弱不能送邪外出，故用飴糖之甘，小小建立中氣以祛邪也。金匱有黃芪建中一法，加黃芪治虛勞裏急自汗，表虛肺虛諸不足症，而建其中之衛氣也。金匱復有大建中一法，以其人陰氣上逆，胸中大寒，嘔不能食，而腹痛至極，用蜀椒乾薑人參飴糖大建其中之陽，以驅逐濁陰也。後人復廣其義曰：樂令建中湯治虛勞發熱以下，並建其中之榮血。曰：十四味建中湯治藏氣裏虛，以之兩建其脾中腎中之陽，陰仲景為祖，後人為孫，使虛羸之體服建中之後，可汗可下，誠足恃也。至理中則燮理之義，治中則分

治之義，補中溫中，莫非惠先京國之義，緣傷寒外邪逼域中，法難盡用，仲景但於方首以小之一字，示其微義，至金匱始盡建中之義。後人引伸觸類，曲暢建中之旨，學者心手之間，所當會其大義也。

人參養榮湯

治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉等症若氣血虛而變見諸症勿論其病其脉但用此湯諸症悉退

人參 白朮 茯苓 甘草 黃芪 陳皮
當歸 熟地 白芍 五味子 桂心 遠志

右十二味加薑三片棗二枚水煎服

柯韻伯曰古人治氣虛以四君治血虛以四物氣血俱虛首以八珍更加黃芪肉桂名十全大補宜乎萬舉萬當也而用之有不獲効者蓋補氣而不用行氣之品則氣虛之

名醫方論

卷一

六

甚者無氣以受其補補血而仍用行血之物於其間則血虛之甚者更無血以流行故加陳皮以行氣而補氣者悉得効其用去川芎行血之味而補血者因以養其功此善治者只一加減便能轉造化之機也然氣可召而至血易虧難成苟不有以求其血脉之主而養之則營氣終歸不足故倍人參為君而佐以遠志之苦先入心以安神定志使甘溫之品始得化而為血以奉生身又心皆緩必得五味子之酸以收斂神明使營行脉中而流於四藏若之曰養榮不必仍十全之名而收効有如此者

歸脾湯

治思慮傷脾或健忘怔忡驚悸盜汗寤而不寐或心脾作痛嗜卧少食月經不調

人參 黃芪 甘草 白朮 茯苓 木香
龍眼肉 酸棗仁 當歸 遠志

薑三片水煎服

羅東逸曰方中龍眼棗仁當歸所以補心也參芪朮苓草所以補脾也立齋加入遠志又以腎藥之通乎心者補之是兩經兼腎合治矣而特名歸脾何也夫心藏神其用為

名醫方論

卷一

七

思脾藏智其出為意是神智思意火土合德者也心以經營之久而傷脾以意慮之鬱而傷則母病必傳諸子子又能令母虛所必然也其症則怔忡怵惕煩躁之徵見於心飲食倦怠不能運思手足無力耳目昏眊之症見於脾故脾陽苟不運心腎必不交彼黃芪者若不為之媒合則已不能攝腎歸心而心陰何所賴以養此取坎填離者所以必歸之脾也其藥一滋心陰一養脾陽取乎健者以壯子益毋然恐脾鬱之久傷之特甚故有取木香之辛且散者以闡氣醒脾使能急通脾氣以上行心陰脾之所歸正在

一書... 9 ...

斯耳

張路玉曰補中益氣與歸脾同出保元並加歸朮而有升
舉胃氣滋補脾陰之不同此方滋養心脾鼓動少火妙以
木香調暢諸氣世以木香性燥不用服之多致痞悶或泄
瀉減食者以其純陰無陽不能輸化藥力故耳

名醫方論

卷一

八

保元湯

治氣虛血弱之總方也小兒驚痘家虛者最宜

黃芪三錢

人參二錢

甘草一錢

肉桂者夏二三分

秋冬六七分

右四味水煎服

柯韻伯曰保元者保守其元氣之謂也氣一而已主腎為
先天真元之氣主胃為後天水穀之氣者此指發生而言
也又水穀之精氣行於經隧為營氣水穀之悍氣行於脉
外為衛氣大氣之積於胸中而司呼吸者為宗氣是分後
天運用之元氣而為三也又外應皮毛協營衛而主一身

名醫方論

卷一

九

條分諸
氣足開
後學之
宗

之表者為太陽膀胱之氣內通五藏司治節而主一身之
裏者為太陰肺經之氣通行內外應腠理而主一身之半
表半裏者為少陽三焦之氣是分先天運行之元氣而為
三也此方用黃芪護表人參固裏甘草和中三氣治而元
氣足矣昔李東垣以此三味能為大補金培土為除煩熱
之聖藥鎮小兒驚劬如桴鼓魏桂巖得之以治痘家陽虛
頂陷血虛漿清皮薄發痒難灌難斂者始終用之以為血
脈須補氣陽生則陰長有起死回生之功故名之為保元
也又少佐肉桂分四時之氣而增損之謂桂能治血以推

權新加
減其法
燥然

動其幸扶陽益氣以充達周身血在內引之出表則氣從
內託血外散引之歸根則氣從外護參芪非桂引道不能
獨對其功桂不得甘草和平氣血亦不能緒其條理要非
象聞淺見者能窺其萬一也四君中不用白木避其燥不
用茯苓恐其滲也用桂而不用四物者芎之辛散歸之溼
潤芍之酸寒地黃之泥滯故耳如宜燥則加苓木宜潤加
歸宜收加芍當散加芎又表實去芪裏實去參中滿忌甘
內熱除桂斯又當理會矣

又云人知火能剋金而不知氣能勝火人知全能生水而

名醫方論

卷一

十

不知氣即是水此義唯東垣知之故曰參芪甘草除煩熱
之聖藥要知氣旺則火邪自退丹溪云氣有餘便是火不
知氣上騰便是水

妙理備
廢

四君子湯

治面色痿白言語輕微四肢無力脈來虛弱者若內熱
或飲食難化作酸乃屬虛火須加炮薑

人參 白朮 茯苓 甘草各二錢 水煎加薑棗

加陳皮為五味異功散 加陳皮半夏為六君子湯

張遂玉曰氣虛者補之以甘參朮苓草甘溫益胃有健運

之功具沖和之德故為君子若合之二陳則補中微有消

導之意益人之一身以胃氣為本胃氣旺則五臟受蔭胃

氣傷則百病叢生故凡病久不愈諸藥不效者惟有益胃

名醫方論

卷一

十

補腎兩途故用四君子隨症加減無論寒熱補瀉先培中
土使藥氣四達則週身之機運流通水穀之精微敷布何
患其藥之不效哉是知四君六君為司命之本也 更加
砂仁木香名香砂六君子

香砂六君子湯

治氣虛腫滿痰飲結聚脾胃不和變生諸症者

人參一錢 白朮二錢 茯苓二錢 甘草五分 陳皮五分

半夏一錢 砂仁八分 木香七分

右生薑二錢水煎服

柯韻伯曰經曰壯者氣行則愈怯者著而為病蓋人在氣交之中因氣而生而生氣總以胃氣為本食入於陰長氣於陽晝夜循環周於內外一息不運便有積聚或脹滿不食或生痰雷飲因而肌肉消瘦喘咳嘔噦諸症蜂起而神

名醫方論

卷一

三

機化絕矣四君子氣分之總方也人參致沖和之氣白朮培中宮茯苓清治節甘草調五臟諸氣既治病安從來然撥亂反正又不能無為而治必舉夫行氣之品以輔之則補品不至泥而不行故加陳皮以利肺金之逆氣半夏以疎脾上之滯氣而痰飲可除也加木香以行三焦之滯氣縮砂以通脾胃之元氣積鬱可開也四君得四輔而補力倍宜四輔有四君而元氣大振相須而益彰者乎

四物湯

治一切血虛血熱血燥諸症

當歸 熟地 各三錢 川芎一錢 白芍二錢

右四味水煎服

張路玉曰四物為陰血受病之專劑非調補真陰之的方書咸謂四物補陰遂以治陰虛發熱火炎失血等證蒙害至今又專事女科者咸以此湯隨症漫加風食痰氣等藥紛然雜出其甚可恨者莫如坎離丸之迅掃虛陽四物二連之斬削真氣而庸工利其有劫病之能咸樂用之何

名醫方論

卷一

三

異於操刃行劫耶先輩治上下失血過多一切血藥置而不用獨推獨參湯重便以固其脫者以有形之血不能速生無形之氣所當急固也昔人有言見血無治血必先調其氣又云四物湯不得補氣藥不能成陽生陰長之功誠哉言也然余嘗謂此湯傷寒火邪解後餘熱暫於血分至夜微熱不除或合柴胡或加桂枝靡不應手輒効不可沒其功也

聖愈湯

治一切失血或血虛煩渴燥熱睡
渴等證



四物湯加 人參 黃芪 一方去芍藥

右水煎服

柯韻伯曰。經曰。陰在內。陽之守也。陽在外。陰之使也。故陽中無陰。謂之孤陽。陰中無陽。謂之死陰。丹溪曰。四物皆陰。行天地閉塞之令。非長養萬物者也。故四物加知柏。久服便能絕孕。謂其嫌於無陽耳。此方取參芪配四物。以治陰

名醫方論

卷一

去

虛血脫等證。蓋陰陽互為其根。陰虛則陽無所附。所以煩熱燥渴而陽亦亡。氣血相為表裏。血脫則氣無所歸。所以睡臥不寧而氣亦脫。然陰虛無驟補之法。計在存陽。血脫有生血之機。必先補氣。此陽生陰長。血隨氣行之理也。故曰。陰虛則無氣。無氣則死矣。此方得仲景白虎加人參之義。而擴充者乎。前輩治陰虛用八珍十全。卒不獲效者。因甘草之甘不達下。焦白朮之燥不利脾胃。茯苓滲泄碍于生升。肉桂辛熱動其虛火。此六味皆醇厚和平而滋潤服之。則氣血疏通。內外調和。合於聖度矣。

當歸補血湯

治男婦凡熱面赤煩渴引飲。脈來洪大而虛。重按全無。當歸二錢 黃芪二兩

水煎服

吳鶴臯曰。血實則身涼。血虛則身熱。或以饑困勞役。虛其陰。血則陽獨治。故諸症生焉。此證純象白虎。但脈大而虛。非大而長為辨耳。內經所謂脈虛。血虛是也。當歸味厚。為陰中之陰。故能養血。黃芪則味甘補氣者也。今黃芪多數。倍而云補血者。以有形之血不能自生。生於無形之氣。故

名醫方論

卷一

去

也。內經云。陽生陰長。是之謂耳。

酸棗仁湯

治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁 二升 甘草 二兩 知母 二兩 茯苓 二兩 川芎 二兩

右五味以水八升煮棗仁得六升內藥煮取三升分
溫三服

羅東逸曰經曰肝藏魂人卧則血歸於肝又曰肝者罷極
之本又曰陽氣者煩勞則張精絕故罷極必傷肝煩勞則
精絕肝傷精絕則虛勞虛煩不得卧明矣棗仁酸平應少
陽木化而治肝極者宜收宜補用棗仁至二升以生心血

名醫方論

卷一

十六

養肝血所謂以酸收之以酸補之是也願肝鬱欲散散以
川芎之辛散使輔棗仁通肝調營所謂以辛補之肝急欲
緩緩以甘草之甘緩防川芎之疏肝泄氣所謂以土葆之
然終恐勞極則火發於腎上行至肺則衛不固而仍不得
眠故以知母崇水茯苓通陰將水壯金清而滋目寧神
凝魂藏而魄且靜矣此治虛勞肝極之神方也

養心湯

治心神不足、夢寐不寧、驚悸健忘等症

白芍 當歸 人參 遠志 麥門冬

黃芩 山藥 芡實 蓮鬚 酸棗仁

茯神 石蓮子

右十二味水煎服

吳于宣曰難經云心不足者調其榮衛榮衛者血脉之所
出而心主之故養心者莫善於調榮衛也然榮衛並出中
州榮淫精於肝而濁氣歸心衛氣通於肺而為心相腎受

名醫方論

卷一

十七

心營肺衛之歸而又升精於離以成水火既濟是三藏者
皆心之助而調榮衛者所必出於是也故調榮衛調其四
藏而心養矣是方人參扶神以神養心棗仁歸芍以毋養
肝山藥門冬黃芩以清養肺蓮鬚芡實石蓮遠志以滋養
精而升之於是神明之君主泰然於天鈞之上矣此養心
之旨也

獨參湯

治元氣虛而不支脉微欲絕及婦人血崩產後血暈

人參分兩隨人隨症

須上揀者濃煎頓服待元氣漸回隨症加減

柯韻伯曰一人而係一世之安危者必重其權而專任之則一物而係一人之死生者當重其分兩而獨用之春秋運斗樞云搖九星散而為人參所以有人參上有紫氣物華天寶洵神物也故先哲於氣虛血脫之證獨用人參三兩濃煎頓服之能挽回性命於瞬息之間非他物所可

名醫方論

卷一

十八

代世之用者恐或補任邪氣此少以姑試之或加消耗之不察可歎未以監制之其權不重力不專人何賴以得生如古方靈靈散獨聖散大補丸舉卿古拜等方皆用一物之長而取效量捷於獨參湯何疑耶然又當隨機應變視病機為轉旋故獨參湯中或加童便或加薑汁或加附子或加黃連相得相須而相與有成亦不礙其為獨如薛新甫治中風加人參兩許於三生飲中以駕馭其抑此真善用獨參湯者

炙甘草湯論二條

治傷寒脉結代心動悸者外臺又治肺痿咳吐多心中温温液液者

甘草四兩 生地黃一兩 麥冬半兩 人參二兩 桂枝三兩

生薑三兩 大棗十二枚 阿膠二兩 麻仁半兩

右九味以酒七升水八升煮取三升去滓入膠溶盡温服一升日三服一名復脉湯

喻嘉言曰按此湯仲景傷寒門治邪少虛多脉結代心動悸之聖方也一名復脉湯千金翼用之以治虛勞外臺用

名醫方論

卷一

十九

之以治肺痿然本方所治亦何止於二病仲景諸方為生心之化裁亦若是而已矣外臺所取在於益肺氣之虛潤肺金之燥至於桂枝辛熱似有不宜而不知桂枝能通營衛致津液營衛通津液致則肺氣轉輸濁沫以漸而下尤為要藥所以云治心中温温液液者柯韻伯曰仲景於脉弱者用芍藥以滋陰桂枝以通血其則加人參以生脉未有用地黃麥冬者豈以傷寒之法義重扶陽乎抑陰無驟補之法與此以心虚脉代結用生地為君麥冬為臣峻補真陰開後學滋陰之路地黃麥冬味

雖甘而氣大寒、非發陳、蕃秀之品、必得人參、桂枝、以通、
生薑、大棗、以和、管阿膠、補血、酸棗、安神、甘草之緩、不使速、
下、清酒之猛、捷於上行、內外調和、替可寧而脉可復矣、酒
七升、水八升、只取三升者、久煎之、則氣不峻、此虛家用酒
之法、且知地黃、麥冬、得酒良。

名醫方論

卷一

手

活所之法
養藥白
人知木
如土
木知言

造遙散

治肝家血虛火旺、頭痛目眩、煩赤口苦、倦怠煩渴、抑鬱
不樂、兩脇作痛、寒熱、小腹重墜、婦人經水不調、脉弦大
而虛。

當歸 芍藥 白木 茯苓 甘草 柴胡 各錢

加味造遙散即此方加丹皮山梔 炒各五分

趙羽皇曰五臟皆欲補瀉云肝若急急食甘以緩之蓋肝
性急善怒其氣上行則順下行則鬱鬱則火動而諸病生
矣故發於上則頭眩耳鳴而或為目赤發於中則胸滿脇

名醫方論

卷一

三

痛而或作吞酸發於下則少腹疼疝而或溲溺不利發于
外則寒熱往來似瘧非瘧凡此諸症何莫非肝鬱之象乎
而肝木之所以鬱者其說有二一為土虛不能升木也一
為血少不能養肝也蓋肝為木氣全賴土以滋培水以灌
既若中氣虛則九地不升而木因之鬱陰血少則木無水
潤而肝遂以枯方用白木茯苓者助土德以升木也當歸
芍藥者益榮血以養肝也丹皮解熱於中草梔清火於下
獨柴胡一味一以厥陰報使一以升發諸陽經云木鬱則
達之柴胡其要矣

二陳湯
治肥盛之人溼痰為患喘嗽脹滿

半夏三錢 茯苓三錢 陳皮去白三錢 甘草一錢

右四味加薑三片水煎服

李士材曰肥人多溼溼挾熱而生痰火載氣而逆上少夏之辛利二便而去溼陳皮之辛通三焦而理氣茯苓佐半夏共成燥溼之功甘草佐陳皮同致調和之力成無已曰半夏行水氣而潤腎燥經曰辛以潤之是也行水則土自燥非半夏之性燥也或口有痰而渴宜去半夏代以貝母

名醫方論

卷一

注

吳萑阜曰渴而喜飲者易之不能飲水雖渴宜半夏也此溼為本熱為標所謂溼極而兼勝已之化非直象也又東南之人溼熱生痰故丹溪恒主之加枳實砂仁即名枳砂二陳湯其性較急也先哲曰二陳為治痰之妙劑其於上下左右無所不宜然止能治痰之標不能治痰之本痰不在脾在腎治者詳之

生脉散
治熱傷元氣氣短倦怠口乾出汗

人參 麥門冬 五味子 水煎服

柯韻伯曰肺為嬌藏而朝百脉主一身元氣者也形寒飲冷則傷肺故傷寒有脉結代與脉微欲絕之危暑熱刑金則傷肺故傷熱有脉來虛散之足慮然傷寒是從前來者為實邪故雖脉不至而可復可通傷熱是從所不勝來者為賊邪非先從滋化其源挽回於未絕之前則一絕而不可復此孫真人為之急培元氣而以生脉名方也麥冬甘

名醫方論

卷一

注

寒清權衡治節之司人參甘溫補後天營衛之本五味酸溫收先天天癸之原三氣通而三才立水升火降而合既濟之理矣仲景治傷寒有通脉復脉二法少陰病裏寒外熱下利清穀脉微欲絕者製通脉四逆湯溫補以扶陽厥陰病外寒內熱心動悸脉結代者製復脉湯涼補以滋陰同是傷寒同是脉病而寒熱異治者一挽坎陽之外亡一清相火之內熾也生脉散本復脉立法外無寒故不用黃桂之辛散熱傷無形之氣未傷有形之血故不用地黃阿膠麻仁大棗且不令其泥膈而滯脉道也心主脉而苦

緩○急○食○酸○以○收○之○故○去○甘○草○而○加○五○味○矣○脉○資○始○於○腎○資○
 生○於○胃○而○會○於○肺○仲○景○二○方○重○任○甘○草○者○全○賴○中○焦○穀○氣○
 以○通○之○復○之○非○有○待○於○生○也○此○欲○得○下○焦○天○癸○之○元○氣○以○
 生○之○故○不○藉○甘○草○之○緩○必○取○資○於○五○味○之○酸○矣○

名醫方論

卷一

五

理中湯

治中氣不運、腹中不實、口失滋味、病久不食、臟腑不調、
 真傷寒直中太陰、自利不渴、寒多而嘔等證。

人參 白朮 乾薑炮 甘草炙各一錢五分 水煎服、加附

子即名附子理中湯

程郊倩曰：陽之動始於溫，溫氣得而穀精運，穀氣升而中
 氣澹，故名曰理中。實以燮理之功，予中焦之陽也。若胃陽
 虛，即中氣失宰，膈中無發宣之用，六府無滌陳之功，猶如
 釜薪失煖，故下至清穀，上失滋味，五臟凌奪，諸症所由來。

名醫方論

卷一

五

也。參、朮、草，所以同乎州。乾薑辛，以守中，必假之以煖釜，
 薪而騰陽氣，是以穀入於陰，長氣於陽，上輸華蓋，下攝州
 都，五臟六腑皆以受氣矣。此理中之旨也。若水寒互勝，即
 當脾腎雙溫，附子之加，而命門益壯，毋溫矣。

三因芪附木附參附三湯

治陽虛自汗寒溼沉痼陽虛陰盛

黃芪 兩 附子 錢 名芪附湯

白朮 兩 附子 錢 名木附湯

人參 兩 附子 錢 名參附湯 水煎分三服

喻嘉言曰衛外之陽不固而自汗則用芪附脾中之陽退鬱而自汗則用木附腎中之陽浮遊而自汗則用參附凡屬陽虛自汗不能舍三方為治然三方之用大矣芪附可以治虛風木附可以治寒溼參附可以壯元神三者亦交

醫方論

卷一

三六

相為用若用其所當用功效若神誠足貴也以黃芪人參為君其長駕遠馭附子固不足以自恣木雖不足以制附然遇陽虛陰盛寒溼沉痼即生附在所必用何取制伏為耶金匱白朮附子湯中加甘草一味以治痺症豈非節制之師乎急症用其全方即不可制緩症用其半力即不可不制至如急中之緩緩中之急不制而制制而不制妙不能言

清暑益氣湯

長夏溼熱蒸炎四肢困倦精神減少身熱氣高煩心便黃渴而自汗脈虛者此方主之

人參 黃芪 甘草 白朮 蒼朮 神麩

青皮 升麻 乾葛 麥冬 五味 當歸

黃柏 澤瀉 廣皮

水煎溫服

吳鶴臯曰暑令行於夏至長夏則兼溼令矣此方兼而治之炎暑則表氣易泄兼溼則中氣不固黃芪所以實表白

醫方論

卷一

三七

木神麩甘草所以調中酷暑橫流肺金受病人參五味冬所以補肺飲肺清肺經所謂扶其所不勝也火盛則水衰故以黃柏澤瀉滋其化源津液亡則口渴故以當歸乾葛生其胃液清氣不升升麻可升濁氣不降二皮可理蒼木之用為兼長夏溼也程郊倩曰人知清暑我兼益氣以暑傷氣也益氣不獨金能敵火凡氣之上騰而為津為液者回下即腎中之水水氣足火淫自却也

附暑門諸方論

喻嘉言曰元豐朝立和劑局萃集醫家經驗之方於中者
一門獨詳以夏月暑證五方歷試見聞廣耳其取用小半
夏茯苓湯不治其暑顛治其溼又以半夏茯苓少加甘草
名消暑丸見消暑在消其溼矣其香薷飲用香薷扁豆厚
朴爲主方熱盛則去扁豆加黃連爲君治其心火溼甚則
去黃連加茯苓甘草治其脾溼其縮脾飲則以脾爲溼所
浸淫而重滯於菹葛根甘草中佐以烏梅砂仁草藥以
快脾而去脾所惡之溼甚則用大順散來復丹以治暑證
之多瀉利者又卽縮脾之意而推之也其枇杷葉散則以

名醫方論

卷一

三六

胃爲溼所積據而濁穢故用香薷枇杷葉丁香白茅香之
辛香以安胃而去胃所惡之臭甚則用冷香引子以治暑
證之多嘔吐者又卽枇杷葉散而推之也醫者於溼熱虛
寒淡深緩急間酌而用之其利溥矣而後來諸賢以益虛
繼之河間之桂苓甘露飲五苓三石意在生津液以益胃
之虛子和之桂苓甘露飲用人參甘草葛根藿香木香益
虛之中又兼去濁或用十味香薷飲於局方五味中增人
參黃芪白朮陳皮木瓜益虛以去溼熱乃至東垣之消暑
益氣湯人參黃芪湯又補中實衛以去其溼熱肥白內虛

之人勿論中暑與否所宜頻服者也中暑必顯燥煩熱悶
東垣做仲景竹葉石膏湯之制方名清燥湯仍以去溼爲
首務夫燥與溼相反者也而清燥亦務除溼非東垣具過
人之識不及此矣又如益元散之去溼而加辰砂則并去
其熱五苓散之去溼而加人參則益虛加辰砂減桂則去
熱白虎湯加人參則益虛加蒼朮則勝溼合之局方則大
備矣然尚有未備者暑風一症卒倒類乎中風而未可從
風門索治百一選方大黃龍丸初不爲暑風立法而愚見
從而贊之曰有中暈昏死灌之立甦此可得治暑風一斑

名醫方論

卷一

三九

矣儻其人陰血素虧暑毒深入血分者良方復有地榆散
治中暑昏迷不省人事而欲死者但用平常涼血之藥清
解深入血分之暑風此以心火暴甚煎熬真陰捨清心涼
血之外無可潑滅者美其名曰潑火散知言哉

竹葉黃芪湯

治消渴氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉 生地黃 各二錢 黃芪 麥冬 當歸
川芎 黃芩 甘草 芍藥 人參 半夏
石膏 各一錢

右水煎服

柯韻伯曰氣血皆虛胃火獨盛善治者補瀉兼施寒之而不至亡陽溫之而不至於助火扶正而邪却矣四君子氣藥也加黃芪而去苓木恐火就燥也四物湯血藥也地黃

名醫方論

卷一

三十一

止用生者正取其寒也人參黃芪甘草治煩熱之聖藥是補中有瀉矣且地黃之甘寒瀉心腎之火竹葉助芍藥清肝膽之火石膏佐芍藥清脾胃之火麥冬同黃芩清肺腸之火則胃火不得獨盛而氣血之得補可知惟半夏一味溫中辛散用之大寒劑中欲其通陰陽之路也岐伯治陰虛而目不瞑者飲以半夏湯覆杯則卧今人以爲燥而湯者禁用是不明陰陽之理也

清燥救肺湯

喻氏製 論一條

主治諸氣腫鬱諸痿喘咳

桑葉 經霜者 三錢 石膏 二錢五分
真阿膠 八分 麥冬 一錢 杏仁 去尖炒 七分
右九味以水一碗煎六分頻頻二三次滾熱服痰多者貝母瓜蒌血枯加生地熱甚加犀角羚羊角或加牛黃

喻嘉言曰按諸氣腫鬱之屬於肺者屬於肺之燥也而古今治氣鬱之方用辛香行氣絕無一方治肺之燥者諸痿喘咳之屬於上者亦屬於肺之燥也而古今治法以痿喘屬陽明以喘屬肺是則喘與痿屬之中下而惟喘屬上矣所以亦無一方及於肺之燥也即喘之屬於肺者非表即下非行氣即瀉氣間有一二用潤劑者又不得其肯綮今擬此方名清燥救肺大約以胃爲主胃土爲肺金之母也其天冬知母能清金滋水以苦寒而不用至如苦寒降火之藥尤在所忌蓋肺金自至於燥所存陰氣不過一綫耳倘更以苦寒下其氣傷其胃其人尚有生理乎誠做此增損以救肺燥變生諸症庶克有濟耳

名醫方論

卷一

三十一

喘咳之屬於上者亦屬於肺之燥也而古今治法以痿喘屬陽明以喘屬肺是則喘與痿屬之中下而惟喘屬上矣所以亦無一方及於肺之燥也即喘之屬於肺者非表即下非行氣即瀉氣間有一二用潤劑者又不得其肯綮今擬此方名清燥救肺大約以胃爲主胃土爲肺金之母也其天冬知母能清金滋水以苦寒而不用至如苦寒降火之藥尤在所忌蓋肺金自至於燥所存陰氣不過一綫耳倘更以苦寒下其氣傷其胃其人尚有生理乎誠做此增損以救肺燥變生諸症庶克有濟耳

柯韻伯曰。古方用香燥之品以治氣鬱不獲奏效者。以火就燥也。惟繆仲醇知之。故用甘涼滋潤之品以清金保肺。立法喻氏宗其旨。集諸潤劑而製清燥救肺湯。用意深取。藥當無遺蘊矣。石膏麥冬。稟西方之色。多液而甘寒。培肺金主氣之源。而氣可不鬱。土為金母。子病則母虛。用甘草調補中宮生氣之源。而金有所恃。金燥則水無以食氣。而相生毋令子虛矣。取阿膠胡麻黑色。通腎者滋其陰。以上通生水之源。而金始不孤。西方虛則東實矣。木實金平之。二葉稟東方之色。入通於肝。枇杷葉外應毫毛。固肝家之

名醫方論

卷一

三十一

肺藥而經霜之桑葉非肺家之肝藥乎。損其肺者益其氣。人參之甘以補氣。氣有餘便是火。故佐杏仁之苦以降氣。氣降火亦降。而治節有權。氣行則不鬱。諸痿喘嘔自除矣。要知諸氣鬱則肺氣必大虛。若泥於肺熱傷肺之說。而不用人參。必鬱不開。而火愈熾。皮栗毛落。喘而不休。此名之救肺涼。而能補之謂也。若謂實火可瀉。而久服芩連。反從火化。亡可立待耳。愚所以服膺此方而深贊之。

當歸六黃湯

治陰虛有火令人盜汗者

當歸 生地 熟地 黃芪 黃芩 黃連

黃栢 水煎服

季楚重曰。汗本心之液。其出入關乎肝肺。榮分開闔。肝司之衛。分開闔。肺司之額。營衛各有所虛。則各有所汗。陽虛汗責在衛。陰虛汗責在營。然必相須為用。衛氣不固於外。由陰氣之不藏。營氣失守於中。由陽氣之不密。故治盜汗之法有二。一由肝血不足。木不生火。而心亦虛。酸棗仁湯

名醫方論

卷一

三十一

補肝即以補心也。一以肝氣有餘。木反侮金。而肺亦虛。當歸六黃湯治肝以治肺也。是方當歸之辛養肝血。黃連之苦清肝火。一補一泄。斯為主治肝火之動。由水虛無以養生。地涼管分之熱。熟地補髓中之陰。黃栢苦能堅腎。是瀉南補北之義也。肝木之實。由金虛不能制。黃芪益肺中之氣。黃芩清肺中之熱。是東實西虛之治也。惟陰虛有火。關尺脈旺者。始宜若陰虛無氣。津脫液泄。又當以生脈六味固陰。陽之根若用芩連栢苦。寒傷胃。使金水益虛。木火益旺。有措手不及之虞矣。

桂苓甘水湯 金匱

治心下有痰飲胸脇支滿目眩又曰短氣有微飲當從小便去之桂苓甘水湯主之腎氣丸亦主之腎氣丸已見

茯苓二兩 桂枝二兩 白朮二兩 甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

趙以德曰靈樞謂心胞絡之脈動則病胸脇支滿者謂痰飲積於心胞其病則必若是目眩者痰飲阻其胸中之陽不能布水精於上也茯苓治痰飲伐腎邪參水道故用以為君桂枝通陽氣和營衛開經絡痰水得溫則行故以為

名醫方論

卷二

三四

臣白朮治風眩燥痰水除脹滿故以佐茯苓然中滿者勿食甘此用甘草何也蓋桂枝之辛得甘則佐其發散復益土以制水且得茯苓則不資滿而反泄滿本草曰甘草能下氣除煩滿故用之也夫短氣有微飲此水飲停畜呼吸不利而然也金匱並出二方妙義益彰呼氣之短用苓桂末甘湯之輕清以通其陽陽化氣則小便能出矣吸氣之短用腎氣丸之重降以通其陰腎氣通則關門自利矣

卷一終

呼吸二
義發明
極精

名醫方論卷二

新安羅東逸先生評定

慈水柯韻伯先生參閱

小半夏湯三方合論一條

嘔家本渴渴為欲解今反不渴心下有支飲故也

半夏一升 生薑半斤 以水七升煮取一升半分溫再服

小半夏加茯苓湯

治卒嘔吐心下痞悶間有水眩悸者

半夏一升 生薑半斤 茯苓三兩 煎服如前

名醫方論

卷二

外臺茯苓飲

治心胸中有痰飲宿水自吐出水復心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓四兩 人參二兩 白朮二兩 枳實二兩 橘皮二兩 生薑四兩

里再進之

右六味水六升煮取一升分三服如人行八九里再進之趙以德曰嘔為痰飲動中湧而出之嘔盡本當渴渴則可微支飲之全去今反不渴是其飲尚留去之未盡也用半



夏之辛溫生薑之辛散其欲出之飲則所閉之邪自盡矣。半夏生薑皆味辛可治膈上痰。心下堅。嘔逆日眩。然悸必心受水凌必加茯苓以去水。伐腎邪安心神也。後方加人參枳實橘皮此由上中二焦氣弱水飲入胃脾不能輸歸於肺。肺不能通調水道以致停積為痰。為宿水吐之則下氣因而上逆。是為虛氣滿不能食。當補益中氣以人參白朮為君。茯苓逐宿水。枳實調諸氣為臣。開脾胃宣揚上焦發散凝滯則陳皮生薑為使也。其積飲既去而虛氣塞滿其中不能進食此症最多。

名醫方論

卷二

瀉白散

治肺氣熱盛咳嗽而喘而腫身熱

桑白皮 地骨皮 甘草 水煎服

季楚重曰。經云。肺苦氣上逆。上逆則上焦鬱熱。氣鬱生涎。火鬱生熱。因而治節不行。壅甚為喘。滿腫嗽。瀉白者。正金之令。驅氣之逆。非劫金而瀉之也。法使金清。則氣肅。桑根白皮。稟西方燥金之氣。甘辛能入肺而瀉氣。之有餘。地骨皮。涼平調不足之陰。能清陰中之火。滋腎子以清母。甘草益土和中。且生能瀉火。補土母以食子。瀉補交致。金元自

名醫方論

卷二

三

正於以佐桑皮而行諸氣之憤鬱。鮮不達矣。較之黃芩知毋。苦寒傷胃者遠也。夫火熱傷氣。收肺之治有三。傷寒邪熱侮肺。用白虎湯除煩。此治其標。內症虛火燥陰。用生脉散。益陰此治其本。若夫正氣不傷。鬱火又甚。則瀉白散之清肺調中。標本兼治。又補二方之不及也。

地骨皮飲

治陰虛火旺骨蒸發熱日靜夜劇者婦人熱入血室胎前發熱者

四物湯加

地骨皮

牡丹皮

水煎服

柯韻伯曰陰虛者陽必熾之故熱仲景曰陰弱則發熱陽氣下陷入陰中必發熱然當分三陰而治之陽邪陷入太陰脾部當補中益氣以升舉之清陽復位而火自熄也若陷入少陰腎部當六味地黃丸以對待之壯水之主而火自平也陷入厥陰肝部當地骨皮飲以涼補之血有所藏

名醫方論

卷二

四

而火自安也。四物湯為肝家滋陰調血之劑加地骨皮清志中之火以安腎補其母也。加牡丹皮清神中之火以涼心瀉其子也。二皮涼而不潤但清肝火不傷脾胃與四物加知栢之濕潤而苦寒者不同矣。故逍遙散治肝火之鬱於本藏者也。木鬱達之順其性也。骨皮飲治陽邪之陷於肝臟也。客者除之勿縱寇以遺患也。二方皆肝家得力之劑。

升陽益胃湯

治脾胃虛怠情嗜卧四肢不收時值溼熱體重節痛口乾舌燥飲食無味大便不調小便頻數食不消兼見脾病瀝浙惡寒慘慘不樂面色不和

羌活

獨活

防風

柴胡

人參

白朮

茯苓

甘草

黃芪

白芍

半夏

黃連

澤瀉

陳皮

水煎服

吳鶴臯曰脾土虛弱不能制溼故體重節痛不能運化精微故口乾無味中氣既弱傳化失宜故大便不調小便頻

名醫方論

卷二

五

數也。瀉浙惡寒肺弱表虛也。面色不樂腸氣不伸也是方半夏白朮能燥溼茯苓澤瀉滲之二活防風柴胡能升舉清陽之氣黃連療溼熱陳皮平胃氣參芪甘草以益胃白芍酸收用以和燥而協羌防柴胡辛散之性蓋古人用辛散必用酸收所以防其變厲猶兵家之節制也。

清脾飲

治痰積成瘧

青皮 厚朴 草果 半夏 柴胡 白朮

甘草 茯苓 黃芩 水煎服

柯韻伯曰瘧為少陽病治分六經邪留於募原有遠近之殊其發有虛實先後之異而此湯之治瘧實以痰積名之清脾者究其因而治其本也先語云無痰不成瘧無積不成瘧是脾為生痰之源而積之不磨者亦因脾之不運也胃主內脾主消而胃為脾之表凡欲清脾必先平胃青皮

名醫方論

卷二

六

厚朴草菓皆氣味兼厚之品取以倒陽明之倉正以利太陰之輸也然宿痰留結更有藉於茯苓半夏之淡滲辛散是恐奇之不去則劑之所以攻脾之實者平胃除痰每相須耳積因於寒痰因於熱是寒熱往來為瘧之標而實為痰積之本矣必用苓朮以清之更合於少陽之治然此為土中瀉火不是直攻少陽乃清脾之義也火土平而無以善其後則瘧之因實而成者未免因虛而劇甘朮之必須又防微杜漸法耳

溫膽湯

治熱嘔吐苦虛煩驚悸不眠痰氣上逆

竹茹 枳實 半夏 甘草 陳皮 生薑

右六味水煎服

羅東逸曰膽為中正之官清靜之府喜寧謐惡煩擾喜柔和不喜壅鬱蓋東方木德少陽溫和之氣也若大病後或久病或寒熱甫退胸膈之餘熱未盡必致傷少陽之和氣以故虛煩驚悸者中正之官以燭蒸而不寧也熱嘔吐苦者清靜之府以鬱炙而不謐也痰氣上逆者土家溼熱友

名醫方論

卷二

七

乘而木不得升也如是者首當清熱及解利三焦方中以竹茹清胃腕之陽而臣以甘草生薑調胃以安其正佐以二陳下以枳實除三焦之痰壅以茯苓平滲致中焦之清氣且以驅邪且以養正三焦平而少陽平三焦正而少陽正膽家有不清寧而和者乎和即溫也溫之名實涼之也若膽家真畏寒而怯屬命門之火衰當與乙癸同源而治矣

導赤散

治心熱小便黃赤莖中痛熱惡不通

生地黃 木通 甘草梢

右三味水煎服

季楚重曰經云兩精相搏謂之神是神也者待心中之真液腎中之真氣以養者也故心液下交而火自降腎氣上承而水自生前賢以生脈救真液是治本不治標也導赤散清邪火是治標以固本也錢氏制此方意在制內丁之火必先合乙癸之治生地黃涼而能補直入下焦培腎水

名醫方論

卷二

之不足腎水足則心火自降尤慮肝木妄行能生火以助邪能制土以盜正佐以甘草稍下行緩木之急即以瀉心火之實且治莖中痛更用水通導小腸之滯即以通心火之鬱是一治兩得者也瀉心湯用黃連所以治實邪實邪責木之有餘瀉子以清房也導赤散用地黃所以治虛邪虛邪責水之不足壯水以制火也此方涼而能補導赤之用苦寒伐腎傷其生氣者遠矣

芍藥湯

治滯下赤白便膿血後重諸證

芍藥 當歸 黃連 檳榔 木香

甘草 桂 黃芩

每服半兩水煎服病不減加土黃

羅東逸曰本方註云澁而便膿血知氣行而血止也行血則便膿自愈調氣則後重自除至今推為要言然非知本之論也夫滯下本太陰病長夏令行土潤溽暑太陰本虛暑溼不攘土溼則木鬱木鬱則傷土太陰失健運少陽失

名醫方論

卷二

九

疏達及飲食失節不化至秋金收令行火用不宣鬱蒸之久而滯下之症作矣是始為暑傷氣繼為氣傷血因而為白為赤為兼赤白下迫窘急腐穢不去以成後重方以芍草為君用甲已化土法先調脾即於土中升木顧溼熱必傷大腸黃連燥溼清熱厚腸胃黃芩清大腸火為臣久積必中氣逆滯疏滯以木香下逆以檳榔當歸和氣血為佐桂補命門實土毋反佐溫而行之忍芩連之勝令也斯少陽達太陰運矣若大實痛者加大黃用仲景芍藥湯加大黃法以蕩腐穢無留行矣是方尤為滯下本方也

平肝地黃湯

主治吐衄便血婦人血崩赤淋

生犀角 生地黃 白芍藥 牡丹皮

右四味先用三物水煎去滓入生犀汁熱服

柯韻伯曰氣為陽血為陰陽密乃固陽盛則傷陰矣陰平陽秘陰虛者陽必湊之矣故氣有餘即是火火入血室血不營經即隨逆氣而妄行上升有出於口鼻下陷者出於二便雖有在經在府之分要皆心肝受熱所致也心為營血之主心火旺則血不寧故用生犀生地酸鹹甘寒之味

名醫方論

卷二

十

清君火肝為藏血之室肝火壯則血不守故用丹皮芍藥辛酸微寒之品以平相火此方雖曰清火而實滋陰之劑蓋血失則陰虛陰虛則無氣改陰不足者當補之以味勿得反傷其氣也若用芩連磨早梔栝以瀉其氣則陽之劇者苦從火化陽已衰者氣從舌發燎原而飛越矣

人參清肺湯

準繩 三方合論

治肺胃虛寒欬嗽喘急坐卧不安並治久年勞嗽吐血

人參 阿膠 骨皮 知母 烏梅 粟壳

炙甘草 杏仁 桑皮 等分 棗子 水煎服

人參定喘湯

準繩

治肺氣上逆喘嗽痰中有聲胸膈緊扁及感寒邪咳喘

人參 麻黃 阿膠 五味 栗壳 甘草

名醫方論

卷二

二

半夏麩各一錢 桑皮二錢 生薑三片 水煎服

人參瀉肺湯 金匱

治肺經積熱上喘胸膈脹滿痰多大便澀

人參 黃芩 梔子 枳壳 薄荷 甘草

連翹 杏仁 桑皮 大黃 桔梗 水煎服

王又原曰經云邪之所湊其氣必虛又肺為嬌藏其不堪破耗也明矣自肺熱傷肺之說行曰保肺補肺眾共諱之曰清肺瀉肺樂與和之豈知古人清肺瀉肺等湯而必皆以人參立名夫亦可曉然於肺氣之不可耗而人參之在

所必用也。肺體清而法天下濟而司降令。一切渾濁不得
 上千者。皆氣之徒能運行而不息也。若肺氣少。則降下
 失令。渾濁之氣遂逆上行。此為欬嗽。為喘急。肺葉脹舉。胸
 膈蒸痛。移熱大腸。大便艱澀。種種顯有餘之象。實種種為
 不足之徵。故不問內傷外感。為熱為寒。要以人參。保定肺
 氣為主。或骨皮。知母。阿膠。滋之。或烏梅。五味。薑。棗。斂之。
 或半夏。越生。薑。降之。或杏仁。桑皮。枳殼。桔。梗。利之。或梔子
 黃。芩。連。翹。涼之。或麻。黃。薄。荷。發之。大黃。下之。總恃人參之
 大力。握樞而運。已入之邪。易出。而將來之邪。無從入也。肺

名醫方論

卷一

十二

邪得諸藥以俱出。而肺氣不隨。諸藥以俱出也。然則人參
 亦何常傷肺。乃長而不敢用耶。

温脾湯 本事方
 主治錮冷在腸胃間。泄瀉腹痛。宜先取去。然後調治。不
 可畏虛以養病也。

厚朴 乾薑 甘草 桂心 附子 各二兩
 大黃 四錢

右咀。取一兩水。二鍾。煎六分。頓服。

喻嘉言曰。許叔微製此方。深合仲景以温藥下之之法。其
 大黃止用四錢。更為有見。夫錮冷在腸胃。而泄瀉矣。即温
 藥中寧敢用上黃之猛。重困之乎。減而五之一。乃知叔微

名醫方論

卷二

十三

之得於仲景深也。仲景云。病人舊微瀉者。梔子湯不可與
 服。又云。太陰病。脈弱。便利。設當行大黃。芍藥者。宜減之。以
 其人胃氣弱。易動故也。即是觀之。腸胃錮冷之泄瀉。而可
 恣用大黃耶。不用則温藥必不能下。而久留之邪。非攻不
 去。多用則温藥恐不能制。而阿下之勢。或至轉增。裁酌用
 之。真足法矣。

秦艽升麻湯

治風寒客胃、口眼喎斜、惡見風寒、四肢拘急、脈浮而緊

升麻 葛根 秦艽^上 白芷^上 防風^上 甘草

芍藥 人參 桂枝 葱白

右十味水煎服

李士材曰：至哉坤元，為五藏之主，木勝風淫，則倉廩之官，承制脾主四肢，故痿痺也。口為土之外候，眼為木之外候，故俱病也。升麻、白芷皆陽明本藥，故用為直入之兵。人參、桂枝固其衛氣，芍藥、秦艽和其營血，防風、卑賤之卒，隨令

名醫方論

卷二

十四

而行，葱根發汗之需，無微不至。又藉甘草以和之，而邪有不散者乎。

二黃湯

治上焦火盛、頭面大腫、目赤腫痛、心胸咽疾、口舌耳鼻

熱盛及生瘡毒者

黃芩 黃連 甘草^{各等分}

水煎食後服

柯韻伯曰：諸腫痞痛，皆屬心火，必用芩連以瀉心，然傷寒熱結於內，而心下痞者，是為客邪治客，當急故君大黃，率芩連用麻沸湯漬絞其汁，而速驅之，不使暫留也。此熱淫於內，而上炎頭目者，是為正邪治之，當緩，故用甘草與芩

名醫方論

卷二

十五

連等分同煎，漫飲以漸漬之，不使下行也。蓋心下木虛而火實之法，當并瀉其子，土鬱奪之而火速降矣。上焦本清而火擾之法，當先培其子，土得其令而火邪自退矣。芩連得大黃，不使其子令母實，芩連得甘草，又不使其母令子虛，同一瀉心而其中又有攻補之不同如此。

四磨湯 濟生

治七情感傷上氣喘急妨悶不食

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎三五沸放溫空心服或

下養正丹尤妙

王又原曰經云聖人膏氣如持至寶庸人役物而反傷太和此七情適所感皆能為病然愈於壯者之行而成於弱者之着患者不察一遇上氣喘急滿悶不食謂是實者宜瀉輒投破耗等藥得藥非不暫快初投之而應投之久而

名醫方論

卷二

十六

不應矣夫呼出為陽吸入為陰肺陽氣旺則清肅下行歸於腎陰是氣有所收攝不復散而上逆若正氣既衰邪氣必盛縱欲制堅破滯邪氣必不伏方用人參補其正氣沉香納之於腎而後以檳榔烏藥從而導之所謂實必顧虛瀉必先補也四品氣味俱厚磨則取其味之全煎則取其氣之達氣味齊到效如桴鼓矣其下養正丹者煖腎藥也本方補肺氣養正溫腎氣鎮攝歸根喘急逆已矣

升麻葛根湯

治陽明表熱下利兼治痘疹初發

升麻 葛根 芍藥 甘草

右四味水煎服

柯韻伯曰此為陽明初病解表利裏之劑可用以散表熱亦可用以治裏虛一方而兩擅其長也夫身熱汗自出不惡寒反惡熱是陽明之本證仲景未嘗立治表之方見陽明初起汗出多而惡寒者便用桂枝湯反無汗而喘者仍用麻黃湯症同太陽而稱陽明者是陽明之自病而非太陽

名醫方論

卷二

十七

陽轉屬也此方不用麻桂者恐傷肌肉之表汗太過而亡津升麻葛根提胃腕之陽散肌肉之浮熱芍藥甘草瀉肝膽之火以解胃府之實熱有汗則發無汗則止功同桂枝而已遠於薑桂且不須啜稀粥以助陽也胃實為陽明之裏症仲景製承氣三方然陽明初病往往有移熱於脾而下利者內經所謂暴注下迫皆屬於熱也下利正是胃實之兆故太陽陽明合病必自下利仲景製葛根湯以表散之是從陰引陽法此方即放其義去薑桂之辛熱以升麻代麻黃便是陽明表劑而非太陽表劑矣葛根稟性甘涼

可以散表實協升麻以上升則使清陽達上而濁陰降下可知芍藥收欬陰精甘草緩急和裏則下利自止可知治裏仍用表藥者以表實下利而非裏實故也痘疹自裏達表出於少陰而發於太陽初起則內外皆熱故亦宜於涼散耳

防風還聖散

風熱壅盛表裏三焦皆實者此方主之

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃

薄荷 麻黃 連翹 芒硝 石膏

黃芩 桔梗 滑石 甘草 荆芥

白木 梔子 生薑 每服三錢

吳鶴皇曰防風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之由汗而泄荆芥薄荷清上藥也風熱之在巔頂者得之由鼻而泄大黃芒硝通利藥也風熱之在腸胃者得之由後而

泄滑石梔子水道藥也風熱之在決瀆者得之由溺而泄風淫於高肺胃受邪石膏桔梗清肺胃也而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火風之為患肝木主之川芎歸芍和肝血也而甘草白木所以和胃氣而健脾劉守真氏長於治火此方之旨詳且悉哉亦治失下發斑三焦火實全方除確黃名曰雙解散解表有防風麻黃薄荷荆芥川芎解裏有石膏滑石黃芩梔子連翹復有當歸芍藥以和血倍槩白木甘草以調氣營衛皆和表裏俱暢故曰雙解本方名曰通聖極言其用之妙耳

藿香正氣散

治外受四時不正之氣內停飲食頭痛寒熱或霍亂吐泄或作瘧疾

藿香 桔梗 紫蘇 白芷 厚朴 大腹皮 半夏 茯苓 陳皮 甘草

右十味加薑棗水煎熱服

吳鶴臯曰四時不正之氣由鼻而入不在表而在裏故不用大汗以解表但用芬香利氣之品主之蘇芷陳腹朴梗皆氣勝者也故足正不正之氣茯苓甘草則甘平之品所

名醫方論

卷二

十一

以培養中氣者矣若病在太陽與此湯全無相干傷寒脈沉發熱與元氣本虛之人并夾陰發熱者宜戒又全不換正氣散即平胃散加半夏藿香凡受山嵐瘴氣及出遠方不服水土吐瀉下利者主之蓋平胃散可以平溼土而消瘴半夏之燥以醒脾養香之芬以開胃名曰正氣謂能正不正之氣耳

防風黃芪湯

治中風不能言尿沉而弱者

防風 黃芪 水煎服

柯韻伯曰夫風者百病之長也邪風之至急如風雨善治者治皮毛故用防風以驅逐表邪邪之所湊其氣必虛故用黃芪以鼓舞正氣黃芪得防風其功愈大者一攻一補相須相得之義也唐柳太后中風不言許胤宗造防風黃芪湯數十斛置床下蒸之身在氣中居次日便能語是以外氣通內氣令氣行而愈也經曰五氣入鼻藏於心肺上

名醫方論

卷二

十一

使耳目修明聲音能彰製此方者其知此義矣夫薰蒸之力尚能去病况服之乎今人治風惟以發散為定法而禁用參芪豈知目盲不能視口噤不能言皆元氣不足使然耳誰知補氣可以禦風正勝而邪却之理耶神而明之存乎其人信哉

稀涎干縉湯

治風痰不下喉中聲如牽鋸咸中溼腫滿

半夏大者十 猪牙皂角一握 甘草一錢 白礬二錢

右四味研末用生薑自然汁少許冲温水一盞調末

一錢灌之得吐痰涎即醒

柯韻伯曰攻邪有汗吐下三法仲景於吐劑立梔豉瓜蒂二方所以導熱邪之外出逐寒邪而外散也其有不因外感因醇酒厚味漸漬凝結變為頑痰一旦乘虛上塞咽喉氣不得通忽然昏仆目反直視喉中聲如牽鋸此為痰厥

名醫方論

卷二

廿二

先輩所云怪證多屬於痰者此也非用峻劑以攻之頑痰不能遽退故用生薑半夏之辛以散之甘草之甘以湧之白礬之澀以墜之牙皂之勇以開之此斬關奪門之勢惟稟氣素實而暫虛者可用壅塞稍疏續進他藥不可多用以傷元氣如平素虛弱者又當攻補兼施六君湯中加牙皂白礬末以吐之則庶幾矣若誤作中風治之去生便遠

麥門冬湯 金匱

火逆上氣咽喉不利止逆下氣者主之

麥門冬半升 半夏二升 人參三兩 甘草二兩 杭米三合

大棗十五

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜

一服

喻嘉言曰此方治胃中津液乾枯虛火上炎治本之良法也夫用降火之藥而火反升用寒涼之藥而熱轉熾者徒知與火熱相爭而正氣不致津液不生不雜無益而反害

名醫方論

卷二

廿三

之矣凡肺病有胃氣則生無胃氣則死胃氣者肺之母氣也本草有知母之名者謂肺藉其清涼知清涼為肺之母也有貝母之名者謂肺藉其豁痰豁痰為肺之母也然屢施於火逆上氣咽喉不利之證而屢不應名不稱矣孰知仲景妙法於麥冬人參甘草大棗杭米大補中氣以生津液津液隊中又增入半夏辛溫之味以開胃行津而助潤肺豈特用其利咽下氣哉蓋其利咽下氣非半夏之功實善用半夏之功矣

九味羌活湯一名沖和湯四時發散之通劑合論一條

羌活 防風 川芎 白芷 細辛 蒼朮

黃芩 甘草 生地

加生薑三片葱白三莖水煎服

活人敗毒散

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼

白芍 枳椇 人參 甘草 薑

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎七分溫

服或沸湯煎服

名醫方論 卷二 二七四

治傷寒溫疫風溼風眩拘攣風痰頭疼目眩四肢痛憎
寒壯熱項強睛疼老人小兒皆可服煩熱口乾加黃芩
趙羽皇曰東南地土卑溼凡患感冒輒以傷寒二字混稱
不知傷者正氣傷於中寒者寒邪客於外未有不感而內
不傷者也仲景醫門之聖立法高出千古其言冬時嚴寒
萬類深藏君子固密不傷於寒觸胃之者乃名傷寒以失
於固密而然可見人之傷寒悉由元氣不固而膚腠之不
密也昔人常言傷寒為汗病則汗法其首重矣然汗之發
也其出自陽其源自陰故陽氣虛則營衛不和而汗不能

名醫方論 卷二 二七五

散所由立也九味湯主寒邪傷營故於發表之中加芎地
引而入血卽借以調營用蒼朮為引使通體汗出庶三陽
血分之邪直達而無所滯矣敗毒散主風邪傷衛故於發
表中加參苓枳椇引而達衛以宣通固託生薑為使使流
連肺部則上焦氣分之邪不能干矣是方亦可用黃芩以
諸藥氣味辛溫恐其僭亢一以潤之一以清之也

作陰氣弱則津液枯涸而汗六能滋但攻其外不顧其內
可乎表汗無如敗毒散羌活湯其藥如二活二芎蒼辛
芷羣隊辛溫非不發散若無人參生地之大力者居乎其
中則形氣素虛者必至亡陽血虛挾熱者必至亡陰而成
痼疾矣是敗毒散之人參與沖和湯之生地人謂其補益
之法我知其託裏之法蓋補中兼發邪氣不致於流離
中帶補真元不至於耗散此古人制方之妙也
胡天錫曰非其時而有其氣惟氣血兩虛之人受之寒者
營而風客衛不可用峻劑故稍從其輕者此羌活湯敗毒

神水湯

王治三時外感寒邪內傷生冷而發熱及脾泄腸風

白朮三錢 防風三錢 甘草一錢

右三味無汗用蒼朮加葱白生薑有汗用白朮生薑

柯韻伯曰此王海藏得意之方倣仲景麻桂二方之義而製為輕劑也然此是太陰之劑可以理脾胃之風溼而不可治太陽之風寒亦不可以治陽明之表症與少陽之半表裏也內經所謂春傷於風邪氣雷連而洞泄至夏而發泄腸癖者宜之若冬傷於寒至春溫病者又非所宜也今

名醫方論

卷二

廿六

人不知仲景立方之旨只恐麻黃桂枝之傷人也得此平和之劑特為穩當不知榮衛不和非調和脾胃者所可代胃家之實者非補虛之品所能投肝膽之相火往來少陰之水相射者不得以燥劑該攝也先明藥之理始得方之用能知方始可用方而不執方若病在太陽先發陽明之迂是引賊破家易老豈獨為葛根道哉

三五飲

治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂痰厥氣厥

南星二兩生 川烏去皮生 附子去毒生 木香一錢

右每味五錢薑水煎加入人參一兩

柯韻伯曰風為陽邪風中無寒不甚傷人惟風中挾寒害始劇矣寒輕而在表者宜發汗以逐邪寒重而入裏者非溫中補虛終不可救此取三物之大辛大熱者且不炮不製更佐以木香取其至剛至銳之氣而用之非以治風寒以治寒也然邪之所湊其氣必虛但知勇於攻邪若正氣

名醫方論

卷二

廿七

虛而不支能無倒戈之患乎必用人參兩許以駕馭其邪此立齋先生真知確見立於不敗之地而收萬全之效者也若在庸手必謂補任邪氣而不敢用此謹熟陰陽毋與眾謀岐伯所以叮嚀致告耳觀其每服五錢必四服而邪始出今之畏事者用烏附分數必製熟而後敢用更以苓連監制之焉能挽回如此危症哉古今人不相及如此本方去烏附即星香散治痰厥氣厥足矣

仙方活命飲 附薛立齋治癰毒方

治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即消又止痛消毒之聖藥也

川山甲 白芷 防風 皂角刺 乳香 沒藥

當歸尾 赤芍 花粉 貝母 陳皮 甘草

金銀花 右十三味川酒一碗煎數沸服

羅東逸曰此癰門開手攻毒之第一方也經云營氣不從逆於肉理故癰疽之發未有不從營氣之鬱滯因而血結痰滯蘊崇熱毒為患治之之法妙在通經之結行血之滯

名醫方論 卷二 廿九

佐之以豁痰理氣解毒是方川山甲以攻堅皂刺必達毒所白芷防風陳皮通經理氣而疏其滯乳香定痛和血沒藥破血散結赤芍歸尾以驅血熱而行之以破其結佐以貝母花粉金銀花甘草一以豁痰解毒一以散毒和血其為潰堅止痛宜矣然是方為營衛尚強中氣不虧者設若脾胃素弱營衛不調則有托裏消毒散之法必須斟酌而用見之立齋先生所論此千古不易之治也因謹附先生治癰用方之法於後使後學服膺云
薛立齋曰治癰之法若腫高焮痛者先用仙方活命飲解

之後用托裏消毒散沒腫微痛者用托裏散如不應加薑桂若膿出而反痛氣血虛也八珍散不作膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪肉桂不空肌不收斂脾氣虛也四君加芍藥木香惡寒增寒陽氣虛也十全大補加薑桂補熱內熱陰血虛也四物加參朮欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑白汗盜汗五臟虛也六味丸料加五味子食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏喘促咳嗽脾肺虛也前湯加麥冬五味欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理中湯熱渴淋秘腎虛陰火也加減八

名醫方論 卷二 廿九

味凡大凡怯弱之人不必分其虛實惟當先補胃氣蓋瘡瘍之作緣陰陽虧損其膿既泄氣血愈虛豈有不宜補者哉或疑參芪滿中間有用者又加發散敗毒所補不償所損又或以有疾不服補劑因而致誤傷哉

附托裏消毒散 人參 黃芪 白朮 茯苓

當歸 川芎 芍藥 金銀花 白芷 甘草

連翹 水煎服 參芪水甘草以益氣分歸芍芍

以滋血分銀花白芷連翹以解毒 托裏散即前方加

熟地去芍甘銀花白芷連翹

麻黃加水湯

治濕家白煩疼

麻黃_{三兩}

桂枝_{三兩}

甘草_{二兩}

杏仁_{半升}

白朮_{四兩}

右五味以水九升煮麻黃減二升去沫內諸藥煮取

二升半去滓溫服八合覆取微似汗

程扶生曰此湯為溼家表散法也身疼為溼身煩為熱加白朮於麻黃湯中以助其去溼一以恐其過散此治溼之正法也發散方中加白朮又為潔古海藏開鬼門

桂枝加附湯

名醫方論

卷二

三十一

主治傷寒八九日風溼相搏身體煩疼不能轉側不嘔

不渴脈浮虛而澁者

桂枝_{四兩}

附子_{三枚}

甘草_{二兩}

生薑_{三兩}

大棗_{三枚}

右五味以六升水煮取二升去渣分溫三服

程扶生曰溼與風相搏流入關節身疼極重而無頭痛嘔渴等症脈浮虛者風也澁者寒溼也風在表者散以桂枝甘草之辛甘溼在經者逐以附子之辛熱薑棗辛甘行營衛通津液以和表蓋陽虛則溼不行溫經助陽散溼多藉附子之大力也

木防已湯

四十一 論一修

木防已_{三兩}

石膏_{用雞子大十二枚}

桂枝_{二兩}

人參_{四兩}

右四味以水六升煮取二升分溫再服

木防去石膏加茯苓芒硝湯

木防已

桂枝_{各兩}

人參_{四兩}

茯苓_{三兩}

茯苓_{四兩}

右五味以水六升煮取三升去滓後內芒硝再微煎分溫再服微利則愈

葶藶大棗瀉肺湯

本方治肺癆喘不得卧并治支飲不得息

名醫方論

卷二

三十一

葶藶_{熟令黃色如彈子大}

大棗_{十二枚}

右二味以水三升煮棗取二升去滓內葶藶煮取一

防已椒目葶藶大黃丸

治腹滿口舌乾燥此腸門有水氣

防已

椒目

葶藶_熟

大黃_{各二兩}

右為末蜜丸如桐子大先食飲服下丸日三服稍增

口中有津液渴者加芒硝半兩

喻嘉言曰四方皆治支飲上入膈中而有淺深次第之分首一方先治其肺中一方顯治其肺後一方端治肺氣所

傳之府。益支飲上入於膈。逼近心肺。與痰腎邪。本文云。其人喘滿。心下痞堅。面色蒼黑。其脈沉緊。何之數十日。醫吐下之不愈。未防已湯主之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。去石膏。加芒硝。茯苓。蓋以支飲上入。阻其氣。則逆於肺間。而為喘滿。阻其血。則雜揉心下。而為痞堅。腎氣上應。其色黑。血凝之色亦黑。故強黑見於面部。然且姑緩心腎之治。先治其肺。肺之氣行。則飲不能逆。而俱解矣。未防已。味辛溫。能散而飲結氣。又主肺喘滿。石膏辛甘微寒。主心下逆氣。清肺定喘。人參甘溫。治喘消膈。飲補心肺不足。

各醫方論 卷二 三

桂枝辛熱。通血脈。開結氣。宣導諸藥。在氣分服之。即愈。若飲在血分。深連下焦。必愈而復發。故去石膏。氣分之藥。加芒硝。入陰。分開痰結。消血癖。合之茯苓。去心下堅。且伐腎邪也。葶藶大棗湯。大瀉其肺氣。亦以氣停故液聚耳。防已椒目葶藶大黃丸。治腹滿。口舌乾燥。腸間有水。氣之症。乃肺氣膈鬱於上。以致水飲不行於下。而燥熱之甚。用此丸。急通水道。以救金氣之膈鬱。不治上而治其下。故用丸劑也。羅東逸曰。此三方金匱衍義。趙以德註之。已詳。而論嘉言合而註之。青出於藍。故棄趙而取喻耳。

大黃附子湯 論二條
主治脇下偏痛發熱。其脈緊弦。此寒也。以溫藥下之。
大黃 兩 附子 二枚 細辛 兩

右三味以水五升。煮取二升。分溫三服。若強人。取一升半。分三服。服後如人行四五里。再進。

喻嘉言曰。仲景治傷寒熱邪。痞聚心下。而挾陽虛陰盛之症。用附子瀉心湯之治矣。其雜症。脇下偏痛發熱。為陽其脈弦緊。為陰寒上逆者。復立此溫藥下之一法。然仲景諄諄傳心後世。領略者鮮。全賈又別出一條云。其脈數而緊。

各醫方論 卷二 三

乃弦狀如弓。弦按之不移。數脈弦者。當下其寒。脈緊而遲者。必心下堅。脈大而緊者。陽中有陰。可下之。讀者罔識其指。詎知皆以溫藥下之之法耶。其口當下其寒。曰陽中有陰。試一提出。其金鍼不躍然乎。張路玉曰。三承氣湯為寒下之彖劑。白散備急丸為熱下之剛劑。附子瀉心湯。大黃附子湯。為寒熱互結。剛柔並濟之和劑。近世但知寒下一途。絕不知有溫下一法。蓋暴感之熱結。可以寒下。久積之寒結。亦可寒下。乎是以備急無法。所由設也。然此僅可治寒實之結。設其人稟質素虛。雖

發明得妙

有實邪固結敢用剛猛峻劑攻擊之乎故仲景又立附子瀉心湯用芩連佐大黃以祛鬲上之熱痞即兼附子之溫以散之大黃附子湯用細辛佐附子以攻脇下寒結即兼大黃之寒導而下之此聖法昭然不可思議者也

名醫方論

卷二

三十四

續命湯 金匱

治 風非身體不能自收口不能言胃味不知痛處或拘不得轉側

麻黃 桂枝 石膏 乾薑 杏仁 川芎 當歸 人參 甘草各三兩

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治脉伏不得卧欬逆上氣面目浮腫

趙以德曰痺病者榮衛氣血不養於內外故身體不用機

名醫方論

卷二

三十五

關不利精神不治然是症有虛有實虛者自飲食房勞七情得之如內經所謂內奪而厥則為瘖痺之類是也實者自風寒暑溼感之虛者不可以實治治之則愈散其氣血今此方明言其中風痺其榮衛之屬實邪者也故用續命續命乃麻黃湯之變者加乾薑開血受寒痺石膏解肌受風痺當歸和血人參益氣川芎行血散風也其并治欬逆上氣面浮亦為風寒而致之地

誤用方者無誤

括蕒桂枝湯

治太陽症備身體強凡凡然脉反沉遲此為瘧此湯主之

括蕒根_{二兩} 桂枝_{二兩} 芍藥_{二兩} 甘草_{二兩} 生薑_{三兩} 大棗_{三枚}

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃須啜熱粥發之

喻嘉言曰傷寒方中治項背凡凡用桂枝加葛根湯矣彼之汗出惡風其邪在表而此之太陽症罔不具備其邪之

名醫方論 卷二 三六

亦在於表可知也但以脉之沉遲知其表之邪為內溼所持而不解即係溼熱二邪交合不當從風寒之表法起見故不用葛根之發汗解肌改用括蕒之味苦入陰擅生津徹熱之長者為君合之桂枝和營衛養筋脉而治其瘧乃變表法為和法也然既以括蕒根當增之桂枝為臣當減

越婢加半夏湯 合論二條

治欬而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮大者

麻黃_{半斤} 石膏_{半斤} 生薑_{半斤} 大棗_{二十枚} 甘草_{二兩} 半夏_{半升} 右六味以水六升先煮麻黃去沫內藥取三升分溫三服

小青龙加石膏湯 治肺脹咳而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水

麻黃_{二兩} 桂枝_{二兩} 細辛_{二兩} 芍藥_{二兩} 甘草_{各三兩} 五味子_{半升} 乾薑_{二兩} 半夏_{半升} 石膏_{二兩} 右九味以水一斗煮麻黃去沫內諸藥取三升強火

名醫方論 卷二 三七

服一升麻者減之日三服小兒服四合 喻嘉言曰前一麻黃湯中以杏仁易石膏而加薑棗則發散之力微而且緩後一方中以證兼煩躁宜發其汗麻桂藥中加入石膏芍藥五味子其勢下趨亦不至過汗也越婢方中有石膏無半夏小青龙方中有半夏無石膏觀二方所加之意全重石膏半夏二物協力建功石膏清熱蓄辛熱亦能豁痰半夏豁痰藉辛涼亦能清熱前麥冬湯方中下氣止逆全藉半夏入生津藥中此二方文藉半夏入清熱藥中仲景加減成方無非化裁後學矣

桂枝湯

治風寒在表脉浮弱自汗出頭痛發熱惡風惡寒鼻鳴乾嘔等證雜證自汗盜汗虛癰虛痢最宜若脉浮鬱汗不出者禁用酒客病風寒而汗出者亦不可與之

桂枝 芍藥 生薑 甘草 大棗

右五味以水七升煮取三升服一升覆令微汗不可令如水流滴病必不除若服一升汗出病痊不必盡劑服已更啜稀粥一盞以助藥力

柯韻伯曰此方為仲景羣方之冠乃滋陰和陽解肌發汗

名醫方論

卷二

三十八

調和榮衛之第一方也凡中風傷寒雜症脉浮弱汗自出而表不解者咸得而主之其他但見一二證即是不必悉具矣桂枝赤色通心溫能散寒甘能益氣生血辛能發散外邪內輔君主發陽氣而為汗故麻葛青龍凡發汗劑咸用之惟桂枝湯可不用麻黃而麻黃湯不可無桂枝也本方皆辛甘發散惟芍藥之酸寒益陰斂血內和營氣故能止汗先輩言無汗不得用桂枝者正以中有芍藥能止汗也芍藥之功在於止煩煩止汗亦止故反煩更煩與心悸而煩者咸賴之若倍加芍藥即建中之劑而非復發汗之

此明不用桂枝之故

此明不用桂枝之故

劑矣是劑也用桂枝發汗芍藥止汗生薑之辛佐桂枝以解肌大棗之甘佐芍藥以和裏桂芍之相須薑棗之相得陽表陰裏並行而不悖是剛柔相劑以為和也甘草甘平有安內攘外之能用以調和氣血者即以調和表裏且以調和諸藥矣而精義又在啜稀熱粥以助藥力蓋穀氣內充則邪不復入而啜粥以繼藥之後則餘邪不復留複方之妙用又如此要知此方專治表虛能解肌以發營中之汗而不開皮毛之竅以出衛分之邪故汗不出者是麻黃證脉浮緊者是麻黃脈即不得與桂枝湯矣然初起無

汗當用麻黃發汗如汗解後復煩即脉浮數者不得更與麻黃而用桂枝如下後脉仍浮氣上冲與下利止而身痛不休者皆用此解外何故蓋此時表雖不解腠理已疎邪不在皮毛而在肌肉故詠證雖同麻黃而主治當屬桂枝也粗工妄謂桂枝湯專治中風不治傷寒使人疑而不用不知此湯以治自汗盜汗虛癰虛痢隨手而愈因知仲景方可通治百病後人遇一症便集百方以眩人使人無下手處豈不陋哉

名醫方論

卷二

三十九

汗當用麻黃發汗如汗解後復煩即脉浮數者不得更與麻黃而用桂枝如下後脉仍浮氣上冲與下利止而身痛不休者皆用此解外何故蓋此時表雖不解腠理已疎邪不在皮毛而在肌肉故詠證雖同麻黃而主治當屬桂枝也粗工妄謂桂枝湯專治中風不治傷寒使人疑而不用不知此湯以治自汗盜汗虛癰虛痢隨手而愈因知仲景方可通治百病後人遇一症便集百方以眩人使人無下手處豈不陋哉

麻黃湯

太陽風寒在表頭項強痛發熱身疼腰痛骨節痛惡風寒無汗胸滿而喘其脈浮緊或浮數者用此發汗如若脈浮而弱汗自出或尺中脈微與遲者俱不可用風寒溼成痺冷風痺是宜

麻黃^{三兩} 桂枝^{三兩} 甘草^{二兩} 杏仁^{七十枚}

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合取微似汗不須臾服一服汗出後服汗出多者溫粉撲之恐汗多亡陽也

名醫方論

卷二

柯韻伯曰此別表逐邪發汗之峻劑也麻黃中空外直定如毛竅骨節能驅骨節之風寒悉從毛竅而出為衛分發散風寒之第一品桂枝支條縱橫宛如經別孫絡能入心化液通經絡而出汗為營分解散風寒之第一品杏仁為心果溫能助心散寒苦能入心下氣為逐邪定喘之第一品甘草味甘平外拒風寒內和氣血為安內攘外之第一品飲入於胃行氣於玄府輸精於皮毛斯毛脈合精而漆汗出在表之邪得盡去而不再痛止喘平寒熱煩解不須啜粥而藉汗於穀也其不用薑棗者以生薑之性橫散

於肌礙麻黃之汎升大棗之風泥滯于膠衛杏仁之速降此欲急於直達稍緩則不汎橫散則不峻矣然此為純陽之劑過於發散如單刀直入之物用此却當一戰成功不去則不戢而名禍故可一不可再如汗後不解便當以桂枝湯代之若猶流連于皮毛又有桂麻各半麻黃一桂枝二之妙用若陽盛于內而無汗者又有麻黃杏仁甘草石膏湯此仲景用之心法也

名醫方論

卷三

汗

葛根湯 合論二條

主治頭項強痛背亦強牽引几几然脉浮無汗惡風并治風寒在表而自下利

葛根二兩 麻黃二兩 桂枝二兩 生薑二兩 芍藥二兩 甘草二兩 大棗十五枚

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥同煎分溫三服

柯韻伯曰此證身不疼腰不痛骨節不疼不惡寒是骨不受寒矣頭項強痛下連於背牽動不寧是筋傷於風矣不

名醫方論

卷二

四十一

喘不煩躁不乾嘔是無內症無汗而惡風病只在表若表病而兼下利是表實裏虛矣此麻黃青龍二症較輕然几几更甚於項強而無汗不失為表實但脉浮不緊是中於鼓動之陽風故於桂枝方加麻黃倍葛根以去實小變麻桂之法也葛根味甘氣涼能起陰氣而作汗開腠理而解表故以為君寒熱俱輕桂芍俱減麻黃助桂薑以開表大棗助芍以調內故用以治表實而表邪自解不必治裏虛而下利自瘳與大青龍治表裏俱實者徑庭矣蓋葛根稟氣輕清而賦體厚重輕以去實重以鎮動厚以固裏惟

表實裏虛者宜之胃家實者非所宜也故仲景於陽明經中不用葛根東垣定為陽明經藥易老云未入陽明者不可便服豈二老未讀仲景書乎要知葛根桂枝俱是解肌和裏之劑故有汗無汗下利不利俱可用與麻黃之專於發表者不同耳

金匱治太陽病無汗小便反少氣上冲胸口噤不得語欲作剛瘕

喻嘉言曰傷寒項背几几無汗惡風者用葛根湯此症亦用之者以其邪在太陽陽明兩經之界兩經之熱并於胸

名醫方論

卷二

四十一

中必傷肺金清肅之氣故水道不行而小便少津液不布而無汗陽明之筋內結胃口外行胸中過人迎環口熱并陽明筋脉牽引口禁不得語然剛瘕無汗必從汗解况溼邪內鬱必以汗出如故而止故用此湯合解兩經之溼熱與風寒之表法無害其同也

大青龍湯

治痛項強痛脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁無少陰症者用此發汗清火若脉浮弱自汗出者不可服服之必厥逆筋惕肉振也

麻黃 六兩 桂枝 三兩 甘草 二兩 杏仁 四十枚 石膏 二兩

大棗 十枚 石膏 如雞子大一枚

右七味水煎服如麻黃湯法

柯韻伯曰此麻黃症之劇者故於麻黃湯加味以治之也諸症全是麻黃而喘與煩躁有別喘者是寒鬱其氣升降

名醫方論

卷二

四十一

不得自如故多用杏仁之苦以泄氣煩躁者是熱傷其氣無津不能作汗故特加石膏之甘以生津然其性沉而大寒恐內熱頓除而表邪不解變為寒中而協熱下利故必倍麻黃以發表又倍甘草以和中更用薑棗以調營衛一汗而表裏雙解風熱兩除此清內攘外之功所以佐麻桂二方之不及也少陰亦有發熱惡寒無汗煩躁之症與大青龍同但脉不浮頭不痛為辨法當溫補及脉浮弱自汗者是桂枝症反與麻黃石膏則真陽立亡矣胃氣不至於四肢故手足厥冷太陽不周於一身故筋惕肉瞤仲景

名醫方論

卷二

四十四

所深戒也必細審其所不可用然後不失其所當用不要知麻黃症熱全在表桂枝症之自汗大青龍之煩躁皆兼裏熱仲景於表劑中便加寒藥以清裏自汗是煩之兆躁是煩之微汗出則煩得泄故不躁宜微寒酸苦之味以和之好不出則煩不得泄故躁宜大寒堅重之品以清之苟與膏本是裏藥今人見仲景入表劑中因疑而畏之當用不用以至熱結陽明而斑黃狂亂紛出矣仲景於太陽經中即用石膏以清胃火是預保陽明之先著加薑棗以培中氣又慮夫轉屬太陰苦心良法有如此者

小青龍湯

治傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。及雜病。膚脹。水腫。證。用此發汗而利水。

桂枝

芍藥

甘草

麻黃

細辛

乾薑

各三兩

半夏

五味子

各半升

右八味。先煮麻黃。去沫。內諸藥。煮取三升。溫服一升。○若渴。去半夏。加栝蒌根三兩。○若微利。去麻黃。加芫花。○若噎者。去麻黃。加附子。○若小便不利。少腹

名醫方論

卷二

四五

滿者。去麻黃。加茯苓四兩。○若喘者。去麻黃。加杏仁半升。

柯韻伯曰。寒熱不解而咳。知內有水氣。射肺。乾嘔。知水氣未入於胃。而在心下也。心下為火位。水火相射。則水氣之變幻不可拘。如下而不上。則或渴。或利。上而不下。則或噎。或喘。閉於腸胃。則小便不利。而少腹因滿矣。惟發熱而欬。為定證。故於桂枝方。去大棗之泥。加麻黃以開腠理。細辛逐水氣。半夏除嘔。五味乾薑以除咳。若渴者是心火盛。故去半夏之燥熱。加栝蒌根以生津。若微利與噎。小便不利

與喘者。病機偏於向裏。故去麻黃之發表。加附子以除噎。

芫花。茯苓。以利水。杏仁。以定喘。耳。兩青龍俱治。有表裏證。

者。用兩解法。大青龍是裏熱。小青龍是裏寒。故發表之藥。

相同。而治裏之藥。則殊也。此與五苓同為治表不解。而心

下有水氣。在五苓治水。畜而不行。故大利其水。而微發其

汗。是水鬱折之也。本方治水之動而不居。故備舉辛溫以

散水。並用酸苦。以安肺。培其化源也。細詳仲景發表利水

諸法。精義入神矣。

趙以德曰。溢飲之證。金匱云。當發其汗。小青龍湯治之。蓋

名醫方論

卷二

四五

水飲溢出於表。營衛盡為之不利。必做傷寒營衛兩傷之。法發汗以散其水。而後營衛行。經脈通。則四肢之冰亦消。必以小青龍為第一義也。

桂枝人參葛根黃芩黃連二湯

太陽外證未解而數下之遂協熱而利利下不止表裏不解脈微弱心下痞鞭者桂枝人參湯主之桂枝證醫反下之利遂不止其脈促喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之

桂枝 甘草各四兩 人參 白朮 乾薑各三兩

水九升先煮四味取五升內桂更煮三升日再服夜一服


黃連 黃芩各三兩 甘草炙二兩

水八升先煮葛根減二升內諸藥煮二升分溫再服

柯韻伯曰外熱不除是表不解下利不止是裏不解病因則同一以微弱之脈而心下痞鞭是脈不足而證有餘一以脈促而喘反汗自出是脈有餘而證不足表裏虛實當從脈而辨證矣弱脈見於數下後則痞鞭為虛文用理中之辛甘溫補止利消痞鞭又加桂枝以解表先煎四味後內桂枝和中之力饒而解肌之氣銳是於兩解中寓權宜法桂枝枝證脈本緩誤下後而反促陽氣重可知邪束於表陽擾於內故喘而汗出利遂不止者是暴注下迫屬於

熱也故君氣輕質重之葛根以解肌而止利佐苦寒清肅之芩連以止汗而除喘又加甘草以和中先煮葛根後內諸藥解肌之力緩而清中之氣銳又與補中逐邪者殊法矣上條脈證是陽虛雖協熱於外而裏則虛寒下條脈證是陽盛雖下利不止而表裏俱實同一協熱利同是表裏不解而寒熱虛實攻補不同前方理中加桂枝而冠桂枝於人參之上後方瀉心加葛根而冠葛根於芩連之首不名理中瀉心者總為表未解故耳補中亦能解表涼中亦能散表補中亦能散痞涼中亦能止利仲景製兩解方

神化如此



名醫方論卷三

新安羅東逸先生評定

慈水柯韻伯先生參閱

葛根黃芩黃連湯

治太陽誤下邪熱入裏脈促喘而下利

葛根

甘草

黃芩

黃連

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二


升去滓分溫再服

喻嘉言曰太陽病原無裏症但當用桂枝解外若反下之

名醫方論

卷三

則邪熱之在太陽者未入陽明之經已入陽明之府所以其脈促急其汗外越其氣上奔則喘下奔則泄故舍桂枝而用葛根以專主陽明之表加芩連以清裏熱則不治喘而喘自止不治利而利自止此又太陽兩解表裏變法也



桂枝湯去桂加茯苓白朮湯

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之利則愈

桂枝湯去桂加白朮茯苓各三兩減芍藥一兩

柯韻伯曰汗出不徹而遽下之表證仍在而反無汗更見心下滿痛此謂有表裏證矣病機向裏即當究其裏滿而不鞭痛而微此非結熱必水氣凝滯而然當問其小便若小便利者邪未犯本病仍在表仍須汗散如小便不利者由膀胱之水氣不行故營衛之津液不出而非桂枝證未

名醫方論

卷三

罷也欲利小便者不得更發汗故去桂枝而君以苓朮則甚芍即散邪利水之佐甘棗效培上制水之功非復辛甘發散之劑矣此水結中焦可利而不可散所以與小青龍五苓不同法但得膀胱水去而太陽表裏之證悉除此為治病必求於本耳經曰血之與汗異名而類又口膀胱津液氣化而後能出是汗由血化小便由氣化也桂枝是血分藥但能發汗不能利水按五苓散云多服煖水汗出愈此云小便利則愈可明用桂枝去桂之理今人不審仲景法妄謂仲景製五苓以利水豈不悖哉

黃芩湯 論二條

治太陽少陽合病自下利者若嘔者加半夏生薑

黃芩 甘草 芍藥 各三兩 大棗 十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服

夜一服嘔者加 半夏半升 生薑三兩

程郊倩曰此之合病者頭痛胸滿口苦咽乾目眩或往來寒熱脈或大而弦斗表之邪不待太陽傳過而即合太陽並見經氣不無失守所以下利陽熱漸勝表實裏虛則邪熱得乘虛而攻及裏氣故用黃芩湯清熱益陰半裏清而

名醫方論 卷三 三

半表自解矣

柯韻伯曰太陽少陽合病是熱邪已入少陽之裏膽火上逆移熱於脾故自下利與黃芩湯酸苦相濟以存陰也熱不在半表故不用柴胡今熱已入半裏故黃芩主之雖非胃實亦非胃虛故不須人參以補中也兼痰飲則嘔故仍加半夏生薑

黃連湯

治傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者

黃連 甘草 乾薑 各三兩 人參 二兩 桂枝 三兩

半夏 半升 大棗 十二枚 右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服

夜二服

程郊倩曰熱在胸中有煩躁鬱悶之證可知胃中又有邪氣以寒邪被格在下故也此證寒熱俱有較之大青龍之寒熱已向近裏一層故其症不見之表裏際而只見之上

名醫方論 卷三 四

傳量方 中往往 寒熱並 用黃連 湯之用 乾薑此 其門頭

下際腹中痛者陰不得上而寒乃獨治於下也欲嘔吐者陽不得下而熱乃獨治於上也此為上下相格則治法亦寒熱並施而辛寒易以苦寒辛熱加以苦熱更用人參半夏以補宣中氣升降陰陽自此條而互及瀉心諸湯皆其法也 成氏曰淫家下後舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒是邪氣入裏而為下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而為下寒上熱也喻氏曰陰陽悖逆皆當和解法

十棗湯

治太陽中風表解後裏氣不和下利嘔逆心下至脇痞滿鞭痛汗出短氣頭痛不惡寒者此治水之急方也

大棗十枚

甘遂

大戟

芫花熬各等分

右三味各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內末藥強人一錢羸人服半錢平旦溫服若下少病不除者明日再服加半錢得快下後糜粥自養

柯韻伯曰仲景利水之方種種不同此其最峻者也凡水

名醫方論

卷三

五

氣為患或喘或咳或悸或噎或吐或利或無汗病在一處而止此則外走皮毛而汗出上走咽喉而嘔逆下走腸胃而下利水邪之泛溢於外者浩浩莫禦矣且頭痛短氣心腹脇下皆痞滿而鞭痛是水邪尚留結於中三焦升降之氣阻隔而難通矣表邪已罷非汗散之法所宜裏邪充斥又非淡滲之品所能勝非選利水之所至峻者以直折之中氣不支束手待斃耳甘遂芫花大戟三味皆辛苦氣寒而稟性最毒並舉而用之氣味合相濟相須故可交相去邪之巢穴決其瀆而大下之一舉而水患可平也然水利

所奏其元氣已虛而毒藥攻邪必脾胃反弱使無健脾胃之品為主宰邪氣盡而大命亦隨之矣故選十棗之大而肥者以君之一以培脾土之虛一以制水氣之橫一以解諸藥之毒得一物而三善備既不使邪氣之盛而不制又不使元氣之虛而不支此仲景立法之盡善也味者惑於甘能中滿之說而不敢用豈知承制之理乎張子和竊此意而製瀉川禹功神祐等方以治水腫痰飲之病而不

名醫方論

卷三

六

小陷胸湯

治心下痞按之則痛脈浮滑者

黃連二兩 半夏半升 栝蒌實大者一枚

右三味以水六升先煮栝蒌實取三升去滓內諸藥煮取二升分溫三服

程扶生曰此熱結未深者在心下不若大結胸之高在心
上按之痛比手不可近為輕脈之浮滑又緩於沉緊但痰
飲素盛挾熱邪而內結所以脈見浮滑也以半夏之辛散
之黃連之苦瀉之栝蒌之苦潤滌之熱所以除熱散結於

名醫方論 卷三 七

胸中也先煮栝蒌分溫三服皆以緩治上之法

程郊倩曰黃連滌熱半夏導飲栝蒌潤燥合之以開結氣
亦名曰陷胸者攻雖不峻而一皆直瀉其胸裏之實邪亦
從此奪矣

大陷胸湯

主治傷寒發熱不發汗而反下之表熱乘虛入於胸中
與不得為汗之水氣結而不散令心下至小腹鞭滿而
痛不可近其人身無大熱但頭汗出或潮熱燥渴脈沉
緊者如水腫腸澀初起形氣俱實者亦可用

大黃六兩 芒硝二升 葶藶子半升 杏仁去皮各半升 甘遂一枚

右五味以水先煮大黃杏仁葶藶子去滓內芒硝煮一二沸
內甘遂末溫服得快利止後服如未劇者加白蜜二
合作丸如彈子大水煮一丸服過宿乃下如不下更

名醫方論 卷三 八

服

柯韻伯曰胸中者宗氣之所出故名氣海氣為陽故屬太
陽之部氣為水母氣清則水精四布氣熱則水濁而壅結
矣水結於胸則津液不下無以潤腸胃故大便必燥不下
輪膀胱其水道不通大黃芒硝善滌腸胃之熱實此病在
胸中而亦用以為君者熱淫於內當治以苦寒且以潤腸
明之燥是實則瀉子之法補膀胱之寒亦制之以其所畏
也任甘遂之苦辛所以直攻其水結然水結因於氣結必
任杏仁之苦溫以開其水中之氣氣行而水自利矣水結

又因下氣熱必佐葶藶之大寒以清其清分之熱源清而流自潔矣若胸中水結而未及中焦者當小其劑而復以白蜜之甘以緩之使留連于胸中過而乃下但解胸中之結滯而保腸胃之無傷是又以攻劑而為和劑矣是方為利水攻積之劑故治水腫痢疾之初起者甚捷然必視其人壯實可以一戰成功如平素虛弱者病久而任攻伐者當念虛虛之戒矣

此小柴胡去柴胡而加黃連

五瀉心湯

傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之但滿而不痛此為痞宜半夏瀉心湯

半夏半升 黃芩 乾薑 人參各三兩 黃連二兩
大棗上枚 甘草三兩

右七味以水一斗煮取六升分溫三服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯○心下痞按之濡其脈關上浮者大黃

名醫方論

卷三

汁

黃連瀉心湯

大黃二兩 黃連二兩

以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓服之

心下痞而後惡寒汗出者附子瀉心湯

大黃二兩 黃連二兩 黃芩二兩 附子一枚
別煮取汁

以麻沸湯二升漬二味須臾去滓內附子汁

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噎食臭腸下有冰氣腹中雷鳴下利生薑瀉心湯

生薑四兩 甘草 人參各三兩 乾薑二兩 黃連二兩

黃芩 三兩 半夏 半升 大棗 十二枚

右八味以水一斗煮取六升分溫三服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯

甘草 四兩 黃芩 三兩 半夏 半升 黃連 二兩 大棗 十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓分溫三服

名醫方論

卷三

七

王又原曰病發於陰而反下之因作痞然亦有汗出解之後而痞者亦有下後復汗而痞者亦有不經汗下而痞者大要結胸屬實痞屬虛結胸熱入痞無熱入藥用苦以瀉之辛以散之是也然仲景立五瀉心湯藥有同異其同者黃連乾薑若黃芩大棗則異而同也其異者人參附子大黃若半夏甘草生薑則同而異者也試論之傷寒五六日柴胡症具而以他藥下之成痞即用小柴胡湯以乾薑易生薑以黃連易柴胡彼以和表裏此以徹上下而必推半夏為君者痞從嘔得來半夏之辛以破結主病之藥故也

名醫方論

卷三

七

汗出解之後已無傷寒矣胃藏津液發汗則津液亡故胃中不和薑棗以和榮衛以生發胃家升騰之氣乃治雜症之標的也一屬少陽一屬汗解人參在所必用耳若傷寒中風正在太陽無用人參之例雖下而復下為胃中虛不可用也但以甘草緩其下利之急速和其客氣之上逆溫其中氣之不調補其心煩之不安焉耳心下鞭滿痞之作也紫反入裏痞之診也按之濡關上浮為痞尚未成故無用虜劑之六十萬但假將軍之先聲以奪之此瀉以麻沸湯須臾去滓僅得其無形之氣不用其有形之味也心下痞惡寒者為兼有之證明係表邪未解心下痞而復惡寒者為續見之證明係陽氣外亡況加以汗出乎兼見者以兩湯治之續見者以一湯救之其附子則煮汁者是取三黃之氣輕取附子之力重也然胃居心下心下痞者胃痞也不曰瀉胃而曰瀉心恐混以苦寒傷其胃陽又誤為傳入陽明以治陽明之法治之也此仲景之微旨也

桂枝加附子湯

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者此方主之

桂枝湯加附子一枚炮去皮破八片煎服同不須啜粥

柯韻伯曰發汗太過陽無所止必而汗出不止矣汗多亡陽之府不閉風乘虛入故復惡風津液外泄不能潤下故小便難四肢者諸陽之本陽氣者柔則養筋開關不得寒氣從之故筋急而屈伸不利此離中陽虛不能斂液當用桂枝湯補心之陽陽密則漏汗自止惡風自罷矣坎中陽

名醫方論

卷三

十三

虛不能行水必加附子以回腎之陽陽回則小便自利四肢自柔矣汗漏不止與大汗出同而來由則異服桂枝後大汗出而大煩渴是陽陷於裏急當滋陰故用白虎加參以和之用麻黃湯遂漏不止是陽亡於外急當扶陽故用桂枝加同以固之要知發汗之劑用桂枝不當則陽陷於裏用麻黃不當則陽亡於外因桂枝湯有芍藥而無麻黃故雖汗大出而玄府仍能自閉斷不致亡陽於外耳

桂枝甘草湯

治發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者

桂枝 四兩 甘草 二兩

右二味水三升煮取一升頓服

柯韻伯曰汗出多則心液虛氣餒故悸叉手自冒則外有所衛得按則內有所依如此不堪之狀望之而知其虛矣桂枝本營分藥得麻黃生薑則令營氣外發而為汗從辛也得芍藥則收斂榮氣而止汗從酸也得甘草則補營氣而養血從甘也故此方以桂枝為君獨任甘草為佐以補

名醫方論

卷三

十四

心之陽汗雖多而不至於亡陽甘溫相得斯血氣和而悸自平與治心中煩心下有水氣而悸者迥別乃補心之壞劑也

芍藥甘草附子湯

發汗病解反惡寒者虛故也此方主之

芍藥三兩 甘草二兩 附子一枚炮去

右三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服

柯韻伯曰發汗病解而反惡寒比未汗時更甚其陽虛可知矣夫太陽少陰為表裏太陽之病本由少陰之虛不能藏精而為陽之守也今惡寒反見於發汗病解後是寒邪已從汗解太陽之虛不能衛外而為陰之使也則陽亡之兆已見於此若仍以桂枝湯攻表非以扶陽反以亡陽也

各醫方論

卷三

十五

故以芍藥收少陰之精氣甘草緩陰邪之上行附子補坎宮之少火但使腎中元陽得位在表之虛陽惡寒自解耳

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

治水飲在氣分心下堅大如盤邊如旋盃者

桂枝三兩 生薑三兩 甘草二兩 大棗十二枚 麻黃二兩

細辛二兩 附子一枚炮

右七味以水七升先煮麻黃去沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈

柯韻伯曰水飲者少陰所主心下者太陽之部心下有水氣至於堅大如盤是五藏之陽已竭也唯邊如旋杯狀尚有一線之微陽斯時欲利水則水堅而不可破欲行氣則

各醫方論

卷三

十六

氣泄而微陽亦亡非大劑以扶陽則束手待斃矣內經曰陽之氣以天地之疾風名之陽之汗以天地之雨名之故用附子薑桂辛生陽之氣麻黃細辛以發陽之汗甘草大棗以培胃腕之陽使心下之水飲外達於皮毛必如蟲行皮中而堅大如盤者始散此一汗而營衛之氣通腹中之輪轉猶如疾風暴雨不終朝而天朗氣清如故也蓋氣為陽水為陰又氣為水母陽王則水精四布而氣化為汗陽虛則陰氣凝結水不化而為積矣今人凡遇此證非用峻劑以利水即香燥以行氣於先聖大法畏而遠之寧死而

不敢服可勝道哉。此與傷寒結胸證同而病則異傷寒誤下因邪氣內陷是陽爲陰鬱而水不行故用硝黃甘遂苦寒之品以下之此因寒邪內結陽衰而氣不化所謂自傷氣之劑也故於桂枝湯去芍藥之微寒合麻辛附之辛熱以汗之難經曰陽盛陰虛汗之則死下之而愈陰盛陽虛下之則死汗出而愈毫釐千里可勿慎與。

小建中湯
治傷寒表未解或心悸而煩或腹中急痛而脈陽瀋陰弦者。

桂枝三兩 芍藥六兩 甘草三兩 生薑三兩 大棗十二枚 膠飴一升

右六味水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解分三服

柯韻伯曰桂枝湯爲治表而設佐以芍藥者以自汗故耳自汗本表證而所以自汗者因於煩煩則由裏熱也此湯倍芍藥加膠飴名曰建中則固爲裏劑矣然由傷寒內熱

雖發而外寒未除勢不得去桂薑以未離於表而急於建中故以小名之其劑不寒不熱不瀉惟甘以緩之微酸以收之故名曰建耳所謂中者有二一心中悸而煩煩則爲熱悸則爲虛是方辛甘以散太陽之熱酸苦以滋少陰之虛是建臆中之宮城也一腹中急痛急則爲熱痛則爲虛是方辛以散厥陰之邪甘以緩肝家之急苦以瀉少陽之火酸以致太陰之液是建中州之都會也若夫中氣不足勞倦所傷非風寒外襲者金匱加黃芪以固腠理而護皮毛則亡血失精之症自寧此陽密乃固之理也。

五苓散 附茵陳五苓散

治脉浮小便不利熱微消渴者發汗已脉浮數煩渴者
中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入
茯苓 猪苓 白朮 澤瀉 桂枝

右五味為末以白飲和服方寸七日三服

程郊倩曰標邪傳入膀胱是謂犯本其人必渴必小便不
利宜可消水矣乃一症以水入則拒而吐一症以水入則
消何居膀胱為津液之府熱入而畜邪水致小便不利也
是則水氣挾熱而上升必至格水此渴欲飲水水入則吐

名醫方論 卷三 九

也用五苓者取其開結利水也水泉不致留結邪熱從小
便出矣若熱微消渴是則熱入膀胱而燥其津液乃成消
渴此膀胱無邪水之畜亦用五苓者以化氣回津也使膀
胱之氣騰化故渴亦止而病愈然症必以脉浮數煩渴為
脉表症裏知非陽明之裏而仍為太陽之裏故以五苓主
之也
趙羽皇曰人身之水有二一為真水一為客水真水者即
天乙之所生客水者即飲食之所溢故真水惟欲其升客
水惟欲其降若真水不升則水火不交而為消渴客水不

此雜症
五苓論

一取開
一取利水
一取化
一取津
一取太陽
一取本之
治矣

五苓與
真水
對客
水之
有
餘
真
水
之
不
足
皆
所
以
不
行
水
也
知
不
可
不

降則水土相混而為腫滿五苓散一方為行膀胱之水而
說亦為逐內外水飲之首劑也蓋水液雖注於下焦而三
焦俱有所統故肺金之治節有權脾土之轉輸不怠腎關
之開闔得宜則溲瀉方能按時而出若肺氣不行則高源
化絕中州不運則陰水泛流坎藏無陽則唇冰內結水終
不能自行不明其本而但理其標可乎方用白朮以培土
土旺而陰水有制也茯苓以益金金清而通調水道也桂
味辛熱且達下焦味辛則能化氣性熱專主流通州都混
凝寒水自行再以澤瀉猪苓之淡滲者佐之禹功可奏矣

名醫方論 卷三 二十

先詰有曰水之得以安流者土為之隄防也得以長流者
火為之蒸動也無水則火不附無火則水不行旨哉言乎
羅東逸曰傷寒之用五苓允為太陽寒邪犯本熱在膀胱
故以五苓利水瀉熱然用桂枝者所以宣邪而仍治太陽
也雜症之用五苓者特以膀胱之虛寒水為壅茲必肉桂
之厚以符之而虛寒之氣始得運行宣泄二症之用稍異
不可不辨 加茵陳為茵陳五苓散治酒積黃瘧益土虛
則受溼溼熱乘脾黃色乃見茵陳專理溼熱發黃者所必
用也佐以五苓旺中州利膀胱桂為向導直達熱所克矣

越婢湯 金匱

治風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱者
又治裏水一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水
假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加水湯主之
麻黃 石膏 生薑 大棗 甘草

右五味以水六升煮麻黃去沫內諸藥煮取三升分
三服 惡風加附子一枚炮

喻嘉言曰越婢湯者示微發表於不發之方也大率取其
通調營衛麻黃石膏二物一甘熱一甘寒合而用之脾偏

名醫方論 卷三 十一

於陰則和以甘熱胃偏於陽則和以甘寒乃至風熱之陽
水寒之陰凡不和於中上者悉得用之何者中土不和則
水穀不化其精悍之氣以實營衛營衛虛則或寒或熱之
氣皆得壅塞其墜道而不通於表裏所以在表之風水用
之而在裏之水兼渴而小便自利者咸必用之無非欲其
不害中土耳不害中土自足消患於方萌矣
趙以德曰五藏各一其陰陽獨脾胃居中而兩屬之故土
不獨成四氣土亦從四維而後成不惟火生而已於是四
方有水寒之陰即應於脾風熱之陽即應於胃飲食五味

之寒熱凡入於脾胃者亦然一有相干則脾氣不和胃氣
不清而水穀不化其精微以行營衛以實陰陽也甘者是

土之本味所以脾氣不和和以甘熱胃氣不清清以甘寒
麻黃之甘熱走手足太陰經連於皮膚行氣於三陰以祛
陰寒之邪石膏之甘寒走手足陽明經達於肌肉行氣於
三陽以祛風熱之邪既用其味甘以入土用其寒熱以和
陰陽用其性善走以發越脾氣更以甘草和中緩急調二
藥相協而成功大棗之甘補脾中之血生薑之辛益胃中
之氣惡風者陽虛故加附子以益陽風水者則加木以散

名醫方論 卷三 廿一

皮膚間風水氣發變精以宣榮衛與麻黃石膏為使引其
入土也越婢之名不亦宜乎
喻論明析趙說能細剖其理開便後學故兩錄之

茵陳蒿湯

陽明病發熱但頭汗出身無汗小便不利渴飲水漿此為瘀熱在裏身必發黃腹微滿者本方主之

茵陳蒿 兩

梔子 十四枚

大黃 兩

水一斗先煮茵陳減六升內二味煮三升去渣分溫三服小便當利尿如皂角汁狀一宿腹減黃從小便去也

柯韻伯曰太陽陽明俱有發黃證但頭汗而身無汗則熱不外越小便不利則熱不下泄故瘀熱在裏然裏有不同

名醫方論

卷三

廿三

肌肉是太陽之裏當汗而發之故用麻黃連翹赤豆湯為涼散法心胸是太陽陽明之裏當寒以勝之用梔子栝皮湯乃清火法腸胃是陽明之裏當瀉之於內故立木方是逐穢法茵陳禀北方之色經冬不凋傲霜凌雪偏受大寒之氣故能除熱邪留結率梔子以通水源大黃以調胃實令一身內外瘀熱悉從小便而出腹滿自減腸胃無傷仍合引而竭之之法此陽明利水之聖劑也仲景治陽明渴飲有四法本太陽轉屬者五苓散微發汗以散水氣大煩燥渴小便自利者白虎加參清火而生津脉浮發熱小

便不利者猪苓湯滋陰而利水小便不利腹滿者茵陳湯以泄滿令黃從小便出病情治法胸有成竹矣竊思仲景利小便必用氣化之品通大便必用導氣之味故小便不利者必加茯苓甚者兼用猪苓因二苓為氣化之品而小便由於氣化也茲小便不利不用二苓者何本論云陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利小便故也斯知陽明病汗出多而渴者不可用則汗不出而渴者津液先虛更不可用明矣此以推陳致新之茵陳佐以屈曲下行之梔子不用枳朴以承氣與芒硝之名醫方論

名醫方論

卷三

廿四

利則大黃但可潤胃燥而大便之不遠行可知故必一宿而腹始減黃從小便去而不由大腸仲景立法神奇非夷所思耳

梔子豉湯 附加減諸湯

治陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重煩躁心中憤憤怵惕懷懷目疼鼻乾不得卧

梔子十四枚

香豉四合

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去渣分二服温進一服得吐止後服。若少氣者加甘草二兩。若嘔者加生薑三兩。若下後心煩腹滿起卧不安者去香豉加厚朴四兩枳實四枚

名醫方論

卷三

廿五

○若醫以丸藥下之身熱不去微煩者去香豉加乾薑二兩。○若身熱發黃者去香豉加甘草一兩黃柏二兩

柯韻伯曰太陽以心腹為裏陽明以心腹為表蓋陽明之裏是胃實不特發熱惡熱目疼鼻乾汗出身重謂之表一切虛煩虛熱咽燥口苦舌胎腹滿煩躁不得卧消渴而小便不利凡在胃之外者悉是陽明之表也仲景製汗劑是開太陽表邪之出路製吐劑是引陽明表邪之出路所以太陽之表宜汗不宜吐陽明之表當吐不當汗太陽當汗

陽明之表當吐此義前人未發所謂汗法當如此

而反吐之便見自汗出不惡寒饑不能食朝食莫吐欲飲冷食不欲近衣等證此太陽轉屬陽明之表法當梔子豉湯吐之陽明當吐而不吐反行汗下温鍼等法以致心中憤憤怵惕懷懷煩躁舌胎等證然仍在陽明之表仍當梔子豉湯主之梔子苦能湧泄寒能勝熱其形象心又赤色通心故主治心中上下一切證豆形象腎又黑色入腎製而為豉輕浮上行能使心腹之濁邪上出於口一吐而心腹得舒表裏之煩熱悉解矣所以然者二陽之病發心脾此是心脾熱不是胃家實即所云有熱屬藏者攻之不冷

名醫方論 卷三 廿六

發汗之義也急除胃外之熱不致胃家之實即此梔豉湯為陽明解表裏之聖劑矣熱傷氣者少氣加甘草以益氣虛熱相搏者多嘔加生薑以散邪若下後而心腹滿起卧不安是熱已入胃便不當吐故去香豉屎未燥不宜復下故抵用梔子以除煩佐枳朴以泄滿此兩解心腹之妙又小承氣之輕劑也若以丸藥下之心微煩而不懷懷是知寒氣留中而上焦蓄熱故任梔子以除煩倍乾薑以逐內寒而表熱自解此又寒熱並用為和中解表之劑矣丙外熱熾肌肉發黃必須苦甘之劑以調之栝皮甘草色黃

此義後
人深遠
切此發

而潤助梔子以除內煩一而解外熱形色之病仍假形色以
通之此皆用梔子於滅以禦陽明表證之變幻也夫梔子
之性能屈曲下行不是上湧之劑惟致之腐氣上蒸心肝
能令人吐耳觀瓜蒂散必用致汁和服是吐在致而不在
也梔子乾薑湯去致用薑是取其橫散梔子厚朴湯以
積朴易致是取其下泄皆不欲上越之義二方後樂云得
吐止後服大背仲景之旨矣看梔子與茵陳栝皮湯俱不
言吐病人舊微瀉者不可與則梔子之性自明矣

名醫方論

卷三

廿七

猪苓湯

傷寒

治陽明病脈浮發熱渴欲飲水少陰病下利六七日欲
而嘔渴心煩不得眠者

猪苓

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠各二兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠溶
溫服七合日三服

趙羽皇曰仲景製猪苓一湯以行陽明少陰二經水熱然
其旨全在益陰不專利水蓋傷寒在表最忌亡陽而裏虛
又患亡陰亡陰者亡腎中之陰與胃家之津液也故陰虛

名醫方論

卷三

廿八

之人不但大便不可輕動即小便亦忌下通倘陰虛過於
滲利津液不致耗竭乎方中阿膠養陰生新去瘀於腎中
利水即於腎中養陰滑石甘滑而寒於胃中去熱亦於胃
家養陰佐以二苓之淡滲者行之既疏濁熱而不留其瘀
壅亦潤真陰而不苦其枯燥源清而流有不清者乎顧太
陽利水用五苓者以太陽職司寒水故急加桂以溫之是
煖腎以行水也陽明少陰之用猪苓以二經兩關津液特
用阿膠滑石以潤之是滋養無形以行有形也利水雖同
寒溫迥別惟明者知之

白虎湯

治陽明症汗出渴欲飲水脉洪大

石膏一斤碎 知母 甘草 梗米

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三

柯韻伯曰邪入陽明故反惡熱熱越故汗出因邪熱鏖其精液故渴欲飲水邪盛而實故脉洪大半猶在經故兼浮滑然火炎土燥終非苦寒之味所能治經曰甘先入脾又曰以甘瀉之以是知甘寒之品乃瀉胃火生津液之上劑也石膏甘寒寒勝熱甘入脾又質剛而主降備中土生金

名醫方論 卷三 十九

之體色白通肺質重而含脂具金能生水之用故以為君知母氣寒主降苦以泄肺火辛以潤腎燥故為臣甘草為中宮舟楫能土中瀉火寒藥得之緩其寒使沉降之性皆得雷連於胃梗米氣味溫和稟谷平之德作甘稼穡得二味為佐陰寒之物庶無傷損脾胃之慮也煮湯入胃輸脾歸肺水精四布大煩大渴可除矣白虎為西方金神取以名湯秋金得令而炎暑自解矣更加人參以補中益氣而生津協和甘草梗米之補承制石膏知母之寒瀉火而土不傷乃操萬全之術者

白虎加人參湯

治太陽中熱汗出惡寒身熱而渴者喝是也

知母 石膏 甘草 梗米 人參

右五味以水如前煮服法

趙以德曰汗出惡寒身熱而不渴者中風也汗出惡寒而渴者中暈也其症相似獨以渴不渴為辨然傷寒中風則皆有背微惡寒與時時惡風而渴者亦以白虎人參湯治之蓋為火酷肺金肺主氣者也肺傷則衛氣虛衛虛則表不足由是汗出身熱惡寒內經曰心移熱於肺傳為腸消

名醫方論 卷三 三十

消腸則渴皆相火傷肺所致可知其要在救肺也石膏能治三焦火熱功多於清肺退肺中之火是用為君知母亦就肺中瀉心火滋水之源人參生津益所傷之氣而為臣梗米甘草補土以資金為佐也

大承氣湯 論二條

治陽明病潮熱手足濇然汗出譫語汗出多胃燥獨語如見鬼狀喘冒不能臥腹滿痛脈滑實又目中不了了睛不和又少陰病初得之口燥咽乾者自利清水色純青心下痛口燥舌乾者六七日腹脹不大便者

大黃^{四兩} 厚朴^{半斤} 枳實^{五枚} 芒硝^{三錢}

右四味以水一斗先煮二物取五升內大黃煮取二升去滓內芒硝再上火微煮二沸分溫再服得下即停後服

名醫方論

卷三

三

小承氣湯

大黃^{四兩} 厚朴^{二兩} 枳實^{三枚}

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫三服初

服時當大便不爾再服以利為度得便即止服

柯韻伯曰諸病皆因於氣穢物之不去由於氣之不順也故攻積之劑必用氣分之藥因以承氣名湯方分大小有二義焉厚朴倍大黃是氣藥為君名大承氣大黃倍厚朴是氣藥為臣名小承氣味多性猛制大其服欲令大泄下也因名曰大味寡性緩制小其服欲微和胃氣也因名曰

小且煎法更有妙義大承氣用水一斗煮朴枳取五升去滓內大黃再煮取二升內芒硝何哉蓋生者氣銳而先行熟者氣純而和緩仲景欲使芒硝先化燥屎大黃繼通地道而後枳朴除其痞滿若小承氣以三味同煎不分次第同一大黃而煎法不同此可見仲景微和之意也喻嘉言曰金匱治瘧為病胸滿口噤卧不着席脚舉身必斷齒可與大承氣湯乃死裏求生之法也靈樞謂熱而瘧者死腰折瘧縱齒斷也茲所云卧不着席即腰折之變文脚舉身即瘧瘵之變文且齒斷加以胸滿口噤上中下三

名醫方論

卷三

三

存此條為下能存陰之一證

焦熱邪充斥死不旋踵矣在傷寒症腹滿可下胸滿則不可下然投是湯者須知所謂胸滿謂其邪尚在表故不可下此證入裏之熱極深極重匪可比倫况陽熱至極陰血立至消亡即小小下之尚不足以勝其陽救其陰故取此湯以承領其一陰之陰氣陰氣不盡為陽熱所劫因而得生者多矣可與一守其活臨症酌而用之初非定法也既有下之重傷其陰之大戒復有下之急救其陰之活法學者欲為深造端在此矣

桃仁承氣湯

治血結胸中手不可近或中焦蓄血寒熱胸滿漱水不欲咽善忘昏迷如狂者此方治敗血留經通月事

桃仁半兩 大黃二兩 硝三錢 桂三錢 甘草二錢

右每服一兩薑水煎服

抵當湯并丸

治傷寒蓄血并治癥瘕追蟲攻毒甚佳

水蛭熬 蠭蟲去翅足各二十枚 桃仁二十枚 大黃三兩酒洗

右四味水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

名醫方論

卷三

三

即以四味搗粉為丸分四九以水一升煮一丸取七合服之晡時當下血若不下者更服

柯韻伯曰膀胱為水府血本無所容蓄者也然太陽為諸陽主氣是氣之最多者而其經則又多血少氣則知太陽在表陽分之氣多而在經血分之氣反少也少氣者膀胱之室熱結澀滯法當小便不利而反利者是太陽上焦之氣化行而下焦血海之氣化不行可知必其隨經之榮血因熱而結於裏矣此為小腹之裏而非膀胱之裏故小便雖利而鞭滿急結畜血仍於於小腹也熱淫於內神魂

不安故發狂血瘀不行則營不運故脈微而沉榮不運則氣不宣故沉而結也營氣不周於身則身黃消穀善饑者胃火熾盛也大便反易者血之濡也色黑者畜血滲入也善忘者血不榮智不明也此皆瘀血之徵兆非至峻之劑不足以抵其巢穴而當此重任故立抵當湯蛭蠭之善飲血者而利於水蠭蟲之善吮血者而猛於陸並舉水陸之善取血者以攻之同氣相求更佐桃仁之苦甘推陳致新

大黃苦寒蕩滌邪熱此名抵當也若熱雖盛而未狂小腹滿而未鞭宜小其制為丸以緩治之若外症已解小腹急

名醫方論

卷三

三

結其人如狂是轉屬陽明用調胃承氣加桃仁桂枝之行血者於其中以微利之胃和則愈矣此桃仁承氣又為治之緩也

小柴胡湯

治傷寒五六日寒熱往來胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔耳聾脈數此是少陽經半表半裏之症宜此湯和解之

柴胡

黃芩

人參

甘草

半夏

生薑

大棗

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服若胸中煩而不嘔去半夏人參加括蕒實一枚若渴者去半夏加人參合前成四兩半加括蕒

名醫方論

卷三

三

根四兩若腹中痛去黃芩加芍藥三兩若脅下痞鞭去大棗加牡蠣四兩心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩溫覆取微汗欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩程郊倩曰方以小柴胡名者配乎少陽而取義至於制方之旨及加減法則所云上焦得通津液得下胃氣因和盡之矣何則少陽脈循脇肋在腹陽背陰兩岐間在表之邪欲入裏為裏氣所拒故寒往而熱來表裏相拒而留於岐分故胸脇苦滿神識以拒而昏困故嘿嘿木受邪則妨土

名醫方論

卷三

三

故不欲食膽為陽木而居清道為邪所鬱火無從泄逼炎心分故心煩清氣鬱而為濁則成痰滯故喜嘔嘔則木火兩舒故喜之也此則少陽定有之症其餘或之云者以少陽在人身為遊部凡表裏經絡之罅皆能隨其虛而見之不定之邪也據症皆是太陽經中所有者特以五六日上見故蜀之少陽半表半裏兼而有之方是小柴胡症方中柴胡以疏木使半表之邪得從外宣黃芩清火使半裏之邪得從內微半夏能開結痰諸濁氣以還清人參能補久虛滋肺金以融木甘草和之而更加薑棗助少陽生發之氣使邪無內向也至若煩而不嘔者火成燥實而逼胸故去人參半夏加括蕒實渴者燥已耗液而逼肺故去半夏加括蕒根腹中痛木氣散入土中胃陽受困故去黃芩以安土加芍藥以戰木脅下痞鞭者邪既留則木氣實故去大棗之甘而緩加牡蠣之鹹而爽也心下悸小便不利者土被侵則木氣逆故去黃芩之苦而伐加茯苓之淡而滲也不渴身有微熱者半表之寒尚滯于肌故去人參加桂枝以解之欬者半表之寒湊入於肺故去參棗加五味子易生薑為乾薑以溫之雖肺寒不減黃芩恐木寡於畏也

總之邪在少陽。是表寒裏熱。兩鬱不得升之故。小柴胡之治。所謂升降浮沉則順之也。

名醫方論

卷三

三

大柴胡湯

治熱結在內。往來寒熱者。

柴胡^{半斤} 半夏^{半斤} 黃芩^{三兩} 芍藥^{三兩} 枳實^{六枚}

生薑^{五兩} 大棗^{十二枚}

右七味以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。溫服一

升。日三服。

柯韻伯曰。此熱結在氣分。不屬有形。故十餘日。復能往來寒熱也。若熱結在胃。則蒸蒸發熱。不復知有寒矣。往來寒熱。故倍生薑。佐柴胡以解表。結熱在裏。故去參甘之溫補。

名醫方論

卷三

三

加枳芍以破結。按大柴胡是半表半裏氣分之下藥。並非言及大便鞭與不大便。其心下惡。心下痞。鞭是病在胃口。而不在胃中。結熱在裏。不是結熱在胃。且下利則地道已通。仲景不用大黃之意。曉然若以下之二字。妄加大黃。亦謬乎。大小柴胡俱是兩解表裏之劑。大柴胡主下。小柴胡主和。和無定體。故小柴胡除柴胡甘草外。皆可進退。下有定局。故大柴胡無加減法也。

柴胡桂枝湯

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結此太陽少陽併病也柴胡桂枝合半湯主之

柴胡 四兩 黃芩 人參 生薑 芍藥

桂枝 各二兩半 甘草 二兩 半夏 二合 大棗 六枚

右九味水煎服

柯韻伯曰柴桂二湯皆是調和之劑桂枝湯重解表而微兼清裏柴胡湯重調裏而微兼散表桂枝本為太陽表邪設又可用以調諸經之表小柴胡為少陽半表立法亦可

名醫方論 卷三 三十九

其後自別

用以調三陽之半表仲景書中最重此二方故於六經病外獨桂枝證柴胡證之稱見二方之任重不拘於經也如陽浮陰弱條是仲景自為桂枝證之註釋血弱氣虛條亦仲景自為柴胡證之註釋桂枝有壞病柴胡亦有壞病桂枝有疑似證柴胡亦有疑似證病如桂枝證而實非若脚攣悉與胸中痞硬者是已病如柴胡證而實非如本渴而飲水嘔食穀噦與但欲嘔胸中痛微溇者是已此條為傷寒六七日正寒熱當退之時反見發熱惡寒諸表證更兼心下支結諸裏證表裏不解法當表裏雙解之然惡寒微

則發熱亦微可知支節煩疼則一身骨節不疼可知微嘔心下亦微結故謂之支結表證雖不去而已輕裏證雖已見而未甚故取桂枝之半以散太陽未盡之邪取柴胡之半以解少陽微結之證口不滿身有微熱者當去人參以六七日來邪雖不解而正氣已虛故仍日人參以和之也外證雖在而病機已見於裏故方以柴胡冠桂枝之前為雙解兩陽之輕劑

名醫方論 卷三 四

桂枝加芍藥加大黃二湯

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝 芍藥 甘草 生薑 大棗

即桂枝湯倍芍藥三兩大實痛者即原方加大黃二兩煎法如前

柯韻伯曰腹滿為太陰陽明俱有之證然位同而職異太陰主出太陰病則腐穢之出不利故滿而時痛陽明主內陽明病則腐穢燥而不行故大實而痛大寔痛是陽明病

名醫方論

卷三

四三

得讀伯此論如日麗空矣不是太陰病仲景因表症未解陽邪已陷入於太陰故倍芍藥以益脾而除滿痛此用陰和陽法也若表邪未解而陽邪陷入於陽明則加大黃以潤胃而除其大實痛此雙肝表裏法也凡妄下必傷胃氣胃氣虛則陽邪襲陰故轉屬太陰胃液涸則兩陽相搏故轉屬陽明屬太陰則腹滿時痛而不實陰道虛也屬陽明則腹大實而痛陽道實也滿而時痛是下利之兆大實而痛是燥屎之徵故加芍藥小變建中之劑加大黃微示調胃之方

麻黃附子細辛湯

治少陰病始得之發熱脈沉無裏證者

麻黃二兩 附子一枚 細辛二兩

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去沫內藥取三升去滓溫服一升日三服熱微者以甘草易細辛微發汗

柯韻伯曰少陰主裏應無表證病發於陰應有內熱今始受寒邪即便發熱而裏無熱似乎太陽而屬之少陰者以頭不痛而但欲寐也蓋少陰為太陽之雌大言陰與陽小

名醫方論

卷三

四三

言天與地兩相須也太陽陽虛則不能主外內傷真陰之氣便露出少陰之底板少陰陰虛則不能主內外傷太陽之氣便假借太陽之面目此陰陽表裏雌雄相輸應之機耳陰陽疑似之際症難辨而脈可憑內經曰逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沉故身雖熱而脈則沉也所以太陽病而脈反沉便用四逆以急救其裏此少陰病而表反熱便於表劑中加附子以豫固其裏何以故腎為坎象二陰不藏則一陽無藏陰邪始得以內侵孤陽因之以外越耳夫發熱無汗太陽之表不得不開沉為在裏少陰之樞又不得

此

不固。設用麻黃開腠理。細辛散浮熱。而無附子以回元陽。則少陰之津液。越出太陽之微陽外。亡去生便遠。惟附子與麻黃並用。則寒邪散而陽不亡。精自藏而陰不傷。此裏病及表。脉沉而當發汗者。與病在表。脉浮而發汗者。選處也。若表微熱。則受寒亦輕。故以甘草易細辛。而微發其汗。甘以緩之。與辛以散之者。又少間矣。

名醫方論

卷三

望

直扶所
以然誰
能道一
字

乾薑附子茯苓四逆二方

下後復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔。不渴。無表證。脉沉微。身無大熱者。乾薑附子湯主之。

乾薑

附子

右二味以水三升頓服

發汗若下之病仍不解。煩躁者。茯苓四逆湯主之。

茯苓

人參

甘草

乾薑

附子

右五味以水五升。煮三升。溫服七合。日三服。

柯韻伯曰。二條皆太陽壞病轉屬少陰者也。凡太陽病而

名醫方論

卷三

望

妄汗妄下者。其變證或仍在太陽。或轉屬陽明。或轉繫少陽。或繫在太陰。若汗後復下。或下後復汗。誤而又誤。則轉屬少陰矣。少陰為太陽之裏。是太陽之根蒂也。太陽以陽為主。若治不如法。陽盛則屬陽明。陽衰則屬少陽。虛則屬太陰。此陽亡故轉屬少陰耳。脉在少陰則沉微。邪入少陰則煩躁。煩躁雖六經俱有。而多見於太陽。少陰者。太陽為真陰之標。少陰為真陽之本也。未經汗下而煩躁。屬太陽。是煩為陽盛。躁為陰虛矣。汗下後而煩躁。屬少陰。是煩為陽虛。躁為陰極矣。陰陽不相附。故煩躁而煩躁之中。又

方議妙

當以汗下之先後。表證之解不解。為之詳辨。則陰陽之差。多。差。少。不。致。混。淆。而。用。方。命。劑。無。纖。毫。之。失。也。夫。先。汗。後。下。於。法。為。順。而。表。仍。不。解。是。妄。下。亡。陰。陰。陽。俱。虛。而。煩。躁。也。製。茯苓。四。逆。固。陰。以。收。陽。先。下。後。汗。於。治。為。逆。而。表。證。反。解。內。不。嘔。渴。似。乎。陰。陽。自。和。而。實。妄。汗。亡。陽。所以。虛。陽。擾。於。陽。分。晝。則。煩。躁。不。得。安。陽。虛。不。得。入。於。陰。故。脉。沉。微。而。皮。靜。是。真。陽。將。脫。而。煩。躁。也。用。乾。薑。附。子。固。陽。以。配。陰。同一。煩。躁。而。用。方。不。同。如此。薑。附。者。陽。中。陽。也。生。用。則。力。更。銳。不。加。甘。草。則。勢。更。猛。矣。是。方。比。四。逆。為。峻。回。陽。當。

名醫方論

卷三

四十五

急緩二
議別後
學心胸

急也。茯苓。感。大。和。之。氣。化。不。假。根。苗。而。成。能。補。先。天。無。形。之。氣。安。虛。陽。外。脫。之。煩。故。以。為。君。人。參。能。回。元。氣。於。無。何。有。之。鄉。通。血。脉。於。細。微。欲。絕。之。際。故。以。為。佐。是。方。以。人。參。佐。茯苓。補。下。焦。之。元。氣。以。乾。薑。配。生。附。回。下。焦。之。元。陽。調。以。炙。草。之。甘。比。四。逆。為。緩。固。裏。宜。緩。也。一。去。甘。草。一。加。參。苓。而。緩。急。自。別。用。方。之。神。乎。

名醫方論 卷三

旋覆代赭石湯

治汗吐下解表後心下痞鞭噫氣不除

旋覆花 三兩 代赭石 二兩 人參 三兩 甘草 炙 三兩 生薑 瀉

大棗 十二枚 半夏 半升

右七味以水煎減半去滓再煎取三升溫服日三服。羅東逸曰。仲景此方治正虛不歸元而承領上下之聖方也。蓋發汗吐下解表後邪雖去而胃氣之虧損亦多。胃氣既虧三焦因之失職。陽無所歸而不升。陰無所納而不降。是以濁邪留滯伏飲為逆。故心下痞鞭噫氣不除。方中以

名醫方論

卷三

四十六

人參。甘。草。養。正。補。虛。薑。棗。和。脾。養。胃。所以。安。定。中。州。者。至。矣。更。以。代。赭。石。得。土。氣。之。甘。而。沉。者。使。之。斂。浮。鎮。逆。領。人。參。以。歸。氣。於。下。旋。覆。之。辛。而。潤。者。用。之。開。肺。滌。飲。佐。半。夏。以。瀉。痰。飲。於。上。苟。非。二。物。承。領。上。下。則。何。能。使。氣。噫。不。除。者。消。心。下。鞭。自。除。乎。觀。仲。景。治。下。焦。水。氣。上。凌。振。振。欲。擗。地。者。用。真。武。湯。鎮。之。利。在。下。焦。者。下。元。不。守。用。赤。石。脂。禹。餘。糧。固。之。此。胃。虛。在。中。氣。不。及。下。復。用。此。法。領。之。而。胸。中。轉。否。為。泰。其。為。歸。元。固。下。之。法。各。極。其。妙。如。此。

三四三

赤石脂禹餘糧湯

主治久利不止大腸虛脫服理中丸而利益甚者

赤石脂

禹餘糧

各一筋

右二味以水六升煮取二升去渣分溫三服

柯韻伯曰甘薑參朮可以補中宮元氣之虛而不足以固下焦脂膏之脫此利在下焦者藥不得以理中之劑收功矣然大腸之固仍責在胃關門之不閉仍責在脾土虛不能制水仍當補土今補土而土不受補者非治法之謬也當知稟甲乙之氣者終不若稟戊己之化者能培土制

名醫方論

卷三

四七

水之為得當也石者土之剛也二石皆土之精氣所結石脂色赤入丙助火以生土餘糧色黃入戊實胃而瀉腸急以治下焦之標者實以培中宮之本也要知此證土虛而火不虛故不宜於薑附仲景曰復利不止者當利其小便可知與桃花湯別成一局矣

真武湯

論三條

治少陰水氣為患腹痛下利四肢沉重疼痛小便不利其人或咳或嘔或小便便利而下利者用此加減

白朮

茯苓

白芍

大附子

生薑

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

趙羽皇曰人之一身陰陽是也上焦屬陽而主心肺下焦屬陰而主肝腎肝藏陰血腎兼水火真武一方為北方行水而設用三白者以其燥能制水淡能伐腎邪而利水酸能泄肝木以疏水故也附子辛溫大熱必用為佐者何居

名醫方論

卷三

四八

蓋水之所制者脾水之所行者腎也腎為胃關聚水而從其類儻腎中無陽則脾之樞機雖運而腎之關門不開水雖欲行孰為之主故脾家得附子則火能生土而水有所歸矣腎中得附子則坎陽鼓動而水有所攝矣更得芍藥之酸以收肝而斂陰氣陰平陽秘矣若生薑者并用以散四肢之水氣而和胃也蓋五苓散行有餘之水真武行不足之水兩者天淵總之脾腎雙虛陰水無制而泛溢妄行者非大補坎中之陽大健中宮之氣即日用車前木通以利之豈能効也

柯韻伯曰坎宮火用不宣故腎家水體失職是下焦虛有
寒不能制水故也法當壯元陽以消陰翳逐雷垢以清水
源因立此湯方後立加減法是真武加減症不是主症雖
皆水氣為患而不屬少陰其云若效者是水氣射肺所致
加五味子之酸溫佐芍藥以收腎中水氣細辛之辛溫佐
生薑以散肺中水氣小便自利而下利是胃中無陽則
腹痛不屬相火四肢困於脾溼故去芍藥之酸寒加乾薑
之辛熱即茯苓之甘平者亦去之此為溫中之劑而非利
水之劑矣若嘔者是水氣在中故中焦不治四肢不利

名醫方論

卷三

四九

病不涉少陰由於太陰溼化不宣也不須附子之溫腎倍
加生薑以散邪此為和中之劑而非下焦之劑矣附子
芍藥茯苓白朮四味皆真武所重若去一味便不是真武
仲景論證治多觸類旁通並不畫地為界
喻嘉言曰亡陽而用真武以救之者蓋真武北方司水之
神方中四味是行水收陰崇土回陽之劑故能收持分馳
離絕之陰陽互鎮於北方少陰之位也蓋人身陽根於陰
真陽飛越亟須鎮攝歸根耳

黃連阿膠湯

治少陰病得之二三日心中煩不得臥

黃連四兩 黃芩二兩 芍藥二兩 雞子黃二枚 阿膠三兩

右五味以水五升先煮三藥取二升去滓內膠溶小
冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

柯韻伯曰此少陰之瀉心湯也凡瀉心必藉連芩而導引
有陰陽之別病在三陽胃中不和而心下痞鞭者虛則如
參甘補之實則加大黃下之病在少陰而心中煩不得臥
者既不得用參甘以助陽亦不得用大黃以傷胃矣用連

名醫方論

卷三

五九

芩以直折心火佐芍藥以收斂神明所以扶陰而抑陽也
然以但欲寐之病情而至不得臥以微細之病脈而反見
心煩非得氣血之屬以交合心腎甘平之品以滋陰和陽
不能使水升而火降若苦從火化而陰火不歸其部乎少
陰之熱不除雞子黃稟離宮之火色入通於心可以補心
中之血用生者攪和取潤下之義也驢皮稟北方之水色
入通於腎可以補坎宮之精濟水內合於心而性急下
與之相溶而成膠是降火歸原之妙劑也經曰火位之下
陰精承之陰平陽秘精神乃治斯方之謂歟

當歸四逆湯

手足厥冷，脈細欲絕者，主之。若其人內有久寒，加吳茱萸生薑。

當歸 桂枝 芍藥 細辛 甘草

通草 大棗

右七味以水八升，溫服一升，日三服。

柯韻伯曰：此厥陰初傷於寒，發散表寒之劑。凡厥陰傷寒，則脈微而厥，以厥陰為兩陰之交盡，又名陰之絕陽傷於寒，則陰陽之氣不相順接，便為厥。厥者，手足逆冷是也。然

名醫方論

卷三

五十一

相火寄於厥陰之藏，經雖寒而藏不寒，故先厥者後必發。熱所以傷寒初起，見其手足厥冷，脈細欲絕者，不得遂認為虛寒而用薑附耳。此方取桂枝湯，君以當歸者，厥陰主肝為血室也，倍加大棗者，肝苦急甘以緩之，即小建中加饴法，肝欲散急食辛以散之，細辛甚辛通三陰，氣血外達於毫端，方比麻黃用以代生薑，不欲其橫散也。與麻黃湯不用同義，通草能通關節用以開厥陰之闔，當歸得芍藥生血於中，大棗同甘草益氣於裏，桂枝得細辛而氣血流通，經緩中以調肝，則營氣得至太陰而脈自不絕，溫表以逐

名醫方論

卷三

五十二

邪則衛氣得行，四末而手足自溫，不須參苓之類，不用薑附之峻。此厥陰四逆與太少不同治，仍不失辛甘發散之理。斯為厥陰傷寒表劑歟。若其人內有久寒，非發散之品所能兼治，茱萸辛熱，猛於細辛，能直通厥陰之藏，仍加生薑之橫散，淫氣於筋，筋脈不沮弛，則氣血如故，是又救厥陰內外兩傷於寒之法也。程郊倩曰：少陰所主者氣，厥則為寒，當納氣歸腎，厥陰所主者血，厥則為虛，當溫經復營，此大法也。

吳茱萸湯

治厥陰病乾嘔吐涎沫頭痛者少陰症吐利手足厥冷煩燥欲死者湯明食穀欲嘔者

吳茱萸二升 人參二兩 生薑六兩 大棗十二枚

右四味以水七升煮取二升溫服七合日三服

羅東逸曰仲景救陽諸法於少陰四逆湯必用薑附通脈四逆湯加乾薑分兩其附子生用附子湯又加生附至二枚所以然者或壯微陽使外達或招飛陽使內返或如斷鰲立極以鎮元陽之根抵此在少陰真陽命蒂故以回陽

名醫方論

卷三

五十三

為亟也至其治厥陰則易以吳茱萸而并去前湯諸藥獨用人參薑棗有故蓋人身厥陰肝木雖為兩陰交盡而九地一陽之真氣實起其中此謂生陽此之真氣大虛則三陰濁氣直逼中上不惟本經諸症悉具將陽明之德運失職以至少陰之真陽浮露且吐利厥逆煩燥欲死食穀欲嘔種種叢生矣吳茱萸得東方震氣辛苦大熱能達木鬱又燥氣入肝為能直入厥陰招其垂絕不升之生陽以達上焦故必用以為君而又慮無真元氣以為之合則一陽不徒升也於是去藥之燥滲酸瀉與偏陽亢氣者擇人參

參用八
吳當君

兩處煩
躁入并
為一從
未枯出

之清和而大任之以固元和陽為之輔取薑棗和胃而行四末斯則震坤合德木火土同氣以成一陽之妙用而足三陰之間皆成生生之氣矣諸症有不退者乎蓋仲景之法于少陰重固元陽於厥陰則重護生氣學者當深思而得之矣

王又原曰少陰厥陰俱有躁煩少陰之躁在水由龍火不歸故薑附得而陽回厥陰之躁在木惟雷火上逆若用薑附是益其震烈耳故厥陰躁煩多死證非少陰比也

名醫方論

卷三

五十四

白頭翁湯

治厥陰熱利下重脉沉弦渴欲飲水者

白頭翁 二兩

黃連 二兩

黃柏 二兩

秦皮 各二兩

右四味水煎服

柯韻伯曰三陰俱有下利證自利不渴者屬太陰是藏有寒也自利渴者屬少陰以下焦虛寒津液不升故引水自救也惟厥陰下利屬於熱以厥陰主肝而司相火肝主則氣上撞心火鬱則熱利下重溼熱穢氣奔逼廣腸魄門重滯而難出內經云暴注下迫者是矣脉沉為在裏弦為肝

名醫方論

卷三

五十五

脉是木鬱之徵也渴欲飲水厥陰病則消渴也白頭翁湯風偏靜長於驅風用為君者以厥陰風木風動則木搖而火王欲平走竅之火必寧搖動之風秦皮木小岑高得清陽上升之象為臣是木鬱達之所以遂其發陳之性也黃連瀉君火可除上焦之渴是苦以發之黃柏瀉相火可止下焦之利是苦以堅之也治厥陰熱利有二初利用此方以升陽散火是謂下者舉之寒因熱用法久利則用烏梅丸之酸以收火佐以苦寒雜以溫補是謂逆之從之隨所利而行之謂其氣使之平也

四逆湯

二方合論一條

治脉沉厥逆等證

甘草 二兩

乾薑 二兩

附子 一枚

右三味以水三升煮取一升二合溫服

通脉逆湯

治少陰下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者厥陰下利清穀裏寒外熱汗出而厥者亦主之

乾薑 三兩強人可四兩

甘草 三兩

附子 一枚

名醫方論

卷三

五十六

右三味以水三升煮取一升二合溫服。加減法。面赤色者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加生薑二兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參一兩。王又原曰仲景真武湯一方於水中補火四逆與通脉四逆二方是於水中溫土二方用藥無異分兩不同主治又別所以然者前方脉沉為陽氣不鼓四逆為陽微不周然真陽未盡亡也君以炙草之甘溫溫養微陽臣以乾薑附子之辛溫通關節走四肢此因內陽微而外寒甚故制為

陽氣外達之劑。後方裏寒外熱。是腎中陰寒逼陽於外。故君以乾薑樹蟻中宮。臣以國老主持中外。更以附子大壯元陽。共招外熱返之於內。蓋此時生氣已離。存亡俄頃。若以柔緩之甘草為君。何能疾呼外陽。故易以乾薑。然必加甘草與乾薑等分者。恐喪亡之餘。薑附之猛。不能安養。夫元氣所謂有制之師也。陽微於裏。主以四逆。陽格於外。主以通脈。若內外俱寒。則又為附子湯證。而非二方所主矣。其加減法內。面色赤者加蔥。後人遂以蔥白為通脈。四逆不知陽亡於外。更用蔥以助其散。則氣從汗出而陽。無由內返也。豈不誤耶。蓋白通立名。因下利脈微。用蔥白以通上下之陽。此裏寒外熱。用通脈以通內外之陽。故主方不用蔥也。宜詳辨之。

名醫方論

卷三

五十七

麻黃杏仁甘草石膏湯

溫熱內發表裏俱熱。頭痛身疼。不惡寒。反惡熱。無汗而喘。大煩大渴。脈陰陽俱浮者。用此發汗而清火。若脈浮弱。沉緊。沉細。惡寒。惡風。汗出而不渴者。禁用。

麻黃 四兩 杏仁 五十枚 甘草 炙 二兩 石膏 半斤

右四味煎服同麻黃湯法

柯韻伯曰。石膏為清火之重劑。青龍白虎皆賴以建功。然用之不當。適足以召禍。故青龍以惡寒。脈緊。用薑桂以扶衛外之陽。白虎以汗後煩渴。用粳米以存胃腕之陽也。此

名醫方論

卷三

五十八

但熱無寒。佐以薑桂。則脈流急疾。斑黃狂亂。作矣。加以粳米。則食入於陰。長氣於陽。譏語腹脹。蒸蒸發熱。矣。亢則害。者承乃制。重在存陰者。不必慮其亡陽也。故於麻黃湯去桂枝之辛熱。取麻黃之開。杏仁之降。甘草之和。倍石膏之大寒。除內畜之實熱。斯溱溱汗出。而內外之煩熱悉除矣。程扶生曰。此治寒深入肺。發為喘熱也。汗既出矣。而喘是寒邪未盡。若身無大熱。則是熱壅於肺。故以麻黃散邪。不膏除熱。杏仁利肺於青龍湯內。減麻黃去薑桂。穩為發散。除熱清肺之劑也。石膏去熱清肺。故肺熱亦可用。

附子湯

治少陰病身痛手足寒骨節痛口中惡寒脉沉者

附子二枚 人參二兩 白朮四兩 茯苓三兩 芍藥三兩

右五味以水八升煮取三升去滓分温服一升日三服

柯韻伯曰此仲景温補之第一方乃正治傷寒之法為少陰固本禦邪之劑也夫傷則宜補寒則宜温而近世治傷者皆以寒凉剋伐相授受竟亡傷寒二字之名實矣少陰為陰中之陰又為寒水之藏故傷寒之重者多入少陰所

名醫方論

卷三

六十

以少陰一經最死證方中用生附二枚者取其力之銳且以重其任也益少火之陽鼓腎間之動氣以禦外侵之陰翳則守邪之神有權而呼吸之門有鎖矣身痛自除手足自温以人參為佐者所以固生氣之原令五臟六腑之有本十二經脉之有根脉自不沉矣三陰以少陰為樞設扶陽而不益陰陰虛而陽無所附非治法之盡善也故用白朮以培太陰之土芍藥以滋厥陰之木茯苓以利少陰之水水利則精自藏而骨節自和矣土安則水有所制木調則水有所生制生則化矣扶陽以散寒益陰以固本此

江經二義
從前未
發緣未
讀內經
耳
真武湯
附子湯
異而論

萬全之術其畏而不敢用束手待斃者曷可勝計耶此與麻黃附子湯皆是治少陰表證而有出入之不同內經曰心陰之陰其入於經也從陽部注於經其出者從陰內注於骨發熱脉沉無裏證者從陽部注經也身體骨節痛手足寒脉沉者從陰內注於骨也從陽注經是表熱裏寒病從外來故温而兼散從陰注骨是表寒裏虛病從內出故温而兼補又與真武湯似同而實異倍朮附去薑而用參全是温補以壯元陽真武湯用生薑而無人參尚是温散以逐水氣補散之分岐只在一味之轉旋也學者安

名醫方論

卷三

李

得將仲景方草草看過

參胡三白湯

治汗下後虛微少氣發熱口燥去柴胡名人參三白湯

人參 柴胡 白朮 白芍 白苓 薑棗

柯韻伯曰汗下後裏氣既虛當求之於三陰而表熱復發又當責之三陽三陽以少陽為樞其方以小柴胡三陰以少陰為樞其方以真武法當參合為治然此熱是少陽之虛不得仍作火治故於柴胡方中去黃芩口燥而不嘔故去半夏少氣而反去甘草者欲其下達少陰也於真武湯中不取附子欲其上通少陽也所藉惟人參故用為君佐

名醫方論

卷三

全

白朮以培太陰之母白芍滋厥陰之血茯苓清少陰之水生薑助柴胡散表邪大棗助人參補元氣信為大病後調理之聖劑至當而可法者也若營衛不和則去柴胡用桂枝口渴心煩加麥冬五味輔人參生津止渴心下痞用黃連枳實瀉心不得卧加竹茹泄木陰熱如無表熱并去柴胡名人參三白湯純乎調內矣

卷之三

名醫方論卷四

新安羅東逸先生評定

慈水柯韻伯先生參閱

濟生腎氣丸

治腎虛脾弱腰重脚腫小便不利腹脹喘急痰盛已成鼓症其効如神

熟地黃 白茯苓 牡丹皮 乾山藥 澤瀉

車前子 山茱萸 牛膝 肉桂 附子

右十味蜜和丸每服八十九空心米飲下

名醫方論

卷四

張景嶽曰水腫乃脾肺腎三藏之病蓋水為至陰故其本在腎水化於氣故其標在肺水惟畏土故其制在脾肺虛則氣不化精而化水脾虛則土不制水而水泛腎虛則水無所主而妄行以致肌肉浮腫氣息喘急病標上及脾肺病本皆歸于腎蓋腎為胃之關關不利故聚水而不能出也膀胱之津由氣化而出氣者陽也陽旺則氣化而水即為精陽衰則氣不化而精即為水水不能化因氣之虛豈非陰中無陽乎故治腫者必先治水治水者必先治氣若氣不能化水道所以不通先天元氣虧于下則後吞胃氣失



其本由脾及肺治節不行此下為附腫腹大上為喘呼不得卧而標本俱病也惟下焦之真氣得行始能傳化真水得位始能分清必峻補命門使氣復其元則五臟皆安矣故用地黃山藥丹皮以養陰中之真水山茱萸附以化陰中之陽茯苓澤瀉車前牛膝以利陰中之滯能使氣化於精即所以治肺也補火生土即所以治脾也壯水利竅即所以治腎也補而不滯利而不伐治水諸方更無有出其右者然當因此擴充隨症加減若其人因大病之後脾氣大虛而病水脹者服此雖無所碍終不見效余熟計

石醫方論

卷四

二

之元氣大傷而藥兼滲利未免減去補力元氣不復病必不除遂悉去利水之劑專用參朮桂附三大劑而足脛漸消十餘劑而腹脹退此後凡治中年之後脾腎皆虛者悉用此法蓋氣虛者不可復行氣腎虛者不可復利水溫補即所以化氣塞因塞用之妙顧在用之者何如耳古法治腫不用補劑而用去水等藥微則分利甚則推逐如五苓散五淋散五皮散導水茯苓湯之類皆所以利水也如舟車神祐丸瀉川散禹功散十棗湯之類皆所以逐水也但察其果係定邪則此等治法仍不可廢然溫補即所以化

氣氣化而愈者出白天然消伐所以逐邪逐邪而頓愈者由於勉強今工所用悉皆此類早服晚通去水斗許頓脹頓消索謝而去不顧人之虛實不慮人之生死不數日而復脹百無一生可勝道哉

石醫方論

卷四

三

八味地黃丸 論四條

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元衰憊臍腹疼痛夜多漩溺等症

熟地黃八兩用真生懷慶熟浸宿柳木斷砂鍋上蒸半日晒乾如式九次為度能用搗膏 乾山藥四兩 山茱萸四兩

牡丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩 肉桂 附子各二兩

右八味為末煉蜜丸如桐子大酒下十五丸日再服

趙養葵曰君子觀象於坎而知腎中具水火之用今人入房而陽氣易舉者陰虛火動也陽事先痿者命門火衰也真水竭則隆冬不寒真火熄則盛夏不熱是方也熟地山

名醫方論 卷四 四

藥澤瀉丹皮茯苓山萸皆濡潤之品所以能壯水之主肉桂附子辛潤之物能於水中補火所以能益火之原水火得其養則腎氣復矣

喻嘉言曰金匱用八味丸治脚氣上入少腹不仁者脚氣即陰氣少腹不仁即攻心之漸故用之以驅逐陰邪也其虛勞腰痛少腹拘急小便不利則因過勞其腎陰氣逆於少腹阻遏膀胱之氣化小便不能通利故用之以收腎氣也其短氣有微飲者飲亦陰類阻其胸中之陽自致短氣故用之引飲下出以安胸中也消渴病飲水一斗小便亦

一斗此腎氣不能攝水小便恣出源泉有立竭之勢故急用以逆折其水也夫腎水下趨之消腎氣不上升之渴非用此以蟄護封藏蒸動水氣合此易從治哉後人謂八味丸為治消渴之聖藥得其旨矣

柯韻伯曰命門之火乃水中之陽夫水體本靜而川流不息者氣之動火之用也非指有形者言也然火少則生氣火壯則食氣故火不可亢亦不可衰所云火生土者即腎家之少火遊行其間以息相吹耳若命門火衰少火幾於熄矣欲煖脾胃之陽必先溫命門之火此腎氣丸納桂附

名醫方論 卷四 五

於滋陰劑中是藏心於淵美厥靈根也命門有火則腎有生氣矣故不日溫腎而名腎氣斯知腎以氣為主腎得氣而土自生也且形不足者溫之以氣則脾胃因虛寒而致病者固痊即虛火不歸其部而失血亡陽者亦納氣而歸封蟄之本矣 崔氏加減八味丸以五味之酸收易附子之辛熱腎虛而不甚寒者宜之也千金方於八味外更加玄參之鹹寒以助熟地而滋腎加芍藥之酸寒助丹皮以滋肝總之為桂附加瑣耳以之壯水則有餘以之益陽恐不足也濟生方加牛膝車前以治水腫倍茯苓以輔地黃

山藥莖。與澤丹車牛等列。隨證加減。允為得法。益陰腎氣。九於六味外。加當歸五味柴胡。以治目暗不見化裁之妙矣。

名醫方論

卷四

六

六味地黃丸

主治腎精不足。虛火炎上。腰膝痠軟。骨蒸痰疼。足跟痛。小便淋秘。或不禁。遺精夢洩。水泛為痰。自汗盜汗。亡血消渴。頭目眩暈。耳鳴齒搖。尺脈虛大者。

熟地黃八兩 山藥莖四兩 白茯苓 乾山藥各四兩

牡丹皮三兩 澤瀉三兩

右為末。煉蜜丸。如桐子大。空心淡鹽湯下。

柯韻伯曰。腎虛不能藏精。坎宮之火無所附而妄行。下無以奉春生之令。上絕肺金之化源。地黃稟甘寒之性。製熟

名醫方論

卷四

七

味更厚。是精不足者。補之以味也。用以大滋腎陰。填精補髓。壯水之主。以澤瀉為使。世或惡其瀉腎而去之。不知一陰一陽者。天地之道。一開一闔者。動靜之機。精者屬陰。水也。靜而不走為腎之體。溺者屬壬陽水也。動而不居為腎之用。是以腎主五液。若陰水不守。則真水不足。陽水不流。則邪水逆行。故君地黃以護封蟄之本。即佐澤瀉以疏水道之滯也。然腎虛不補。其毋不導其上源。亦無以固封蟄之用。山藥涼補。以培坎水之上源。茯苓淡滲。以導壬水之上源。加以萊菔之酸。溫藉以收少陽之火。以滋厥陰之

續議精

液○丹○皮○辛○寒○以○清○少○陰○之○火○還○以○奉○少○陽○之○氣○也○滋○化○源○
奉○生○氣○天○癸○居○其○所○矣○壯○水○制○火○特○其○一○端○耳○

名醫方論

卷四

八

天王補心丹

主治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等症

人參 酸棗仁 當歸 生地黃 栝子仁

麥冬 天冬 遠志 五味子 白茯苓

丹參 玄參 桔梗

右為末煉蜜丸如椒目大白湯下

柯韻伯曰心者主火而所以主者神也神衰則火為患故補心者必清其火而神始安補心丹用生地黃為君者取

名醫方論

卷四

九

其下足少陰以滋水主水盛可以伏火此非補心之陽補心之神耳凡果核之有仁猶心之有神也清氣無如栝子仁補血無如酸棗仁其神存耳參苓之甘以補心氣五味之酸以收心氣二冬之寒以清氣分之火心氣和而神自歸矣當歸之甘以生心血玄參之鹹以補心血丹參之寒以清血中之火心血足而神自藏矣更假桔梗為舟揖遠志為向導和諸藥入心而安神明以此養生則壽何有健忘怔忡津液乾涸舌上生瘡大便不利之虞哉

朱砂安神丸 東垣方

治心神昏亂驚悸怔忡寤寐不安

朱砂 另研 黃連 各半兩 生地黃 三錢

當歸 甘草 各二錢

右為細末酒泡蒸餅丸如麻子大朱砂為衣每服三十丸外時津液下

葉仲堅曰經曰神氣舍心精神畢具又曰心者生之本神之舍也且心為君主之官主不明則精氣亂神太勞則魂魄散所以寤寐不安淫邪發夢輕則驚悸怔忡重則癡妄

名醫方論 卷四

癡狂耳朱砂具光明之體赤色通心重能鎮怯寒能勝熱甘以生津抑陰火之浮遊以養上焦之元氣為安神之第一品心苦熱配黃連之苦寒瀉心熱也更佐甘草之甘以瀉之心主血用當歸之甘溫歸心血也更佐地黃之寒以補之心血足則肝得所藏而魂自安心熱解則肺得其職而形自正也

枳木丸 東垣 治胃虛溼熱飲食壅滯心下痞悶

白朮 二兩 枳實 二兩 炒

右為細末荷葉煨陳米飯為丸如椒目大白湯下

東垣曰白朮苦甘溫其苦味除胃中之溼熱其甘溫補脾家之元氣多於枳實一倍枳實味苦溫泄心下痞悶消胃中所傷此藥下胃所傷不能即去須一二時許食乃消化先補虛而後化所傷則不峻利矣荷葉狀如仰盂於卦為震正少陽肝膽之氣飲食入胃營氣上行即此氣也取之以生胃氣更以米飯和藥與木協力滋養穀氣而補脾胃

名醫方論 卷四

其利大矣若用食藥下之傳變諸症不可勝數 按東垣此方源出金匱然一急一緩一行一補其用有不同者

附錄金匱枳木湯

治心下鞭大如盤邊如旋杯水飲所作

枳實 七枚 白朮 三兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中脹即散趙以德曰心下胃上脘也胃氣弱則所飲之水不消痞結而堅必強其胃消其痞白朮健脾強胃枳實善消心下痞逐停水散滯血

磁珠丸 千金方

治神水寬大漸散昏如霧露中行漸視空中有黑花視物成二體及內障神水淡綠色澹白色又治耳鳴及聾

磁石三兩

辰砂二兩

神麴

生三兩更以二兩水和作餅煮浮棗入煎藥湯中煮乾

每服十九加至三十九空心米湯下

王又原曰經曰五藏六府之精皆上注於目則目之能視者氣也目之所以能視者精也腎能藏精故神水發於腎心為離照故神光發於心光發陽而外映有陰精以為守則不散而常明水發陰而凝結有陽氣以為布則洞悉而

名醫方論

卷四

三

不窮惟心腎有虧致神水乾涸神光短少昏眊內障諸證所由作也磁石直入腎經收散失之神性能引鐵吸肺金之氣歸藏腎水朱砂體陽而性陰能納浮游之火而安神明水能鑒火能燭水火相濟而光華不四射與然目受藏府之精精神於穀神麴能消化五穀則精易成矣蓋神水散大緩則不疾賴鎮墜之品疾收而吸引之故為急收之劑也其治耳鳴耳聾等症亦以鎮墜之功能制虛陽之上奔耳

柯韻伯曰此丸治癩癩之聖劑蓋狂癡是心腎脾三藏之

病心藏神脾藏意與智腎藏精與志心者神明之主也主

不明則十二官危使道閉塞而不通乃大傷即此謂也

然主何以不明也心法離而屬火真水藏其中若天一之

真水不足地二之虛火妄行所謂天氣者藏寒地氣者胃

明日月不明邪害空竅故目多妄見而作此奇疾也非金

石之重劑以鎮之狂必不止朱砂稟南方之赤色入通於

心能降無根之火而安神明磁石稟北方之黑色入通於

腎吸肺金之氣以生精墜炎上之火以定志二石體重而

主降性寒而滋陰志同道合奏功可立俟矣神麴推陳致

名醫方論

卷四

三

新上交心神下達腎志以生意智且食入於陰長氣於陽奪其食則已此內經治狂法也食消則意智明而精神治是用神麴之旨乎煉棗和丸又甘以緩之矣

四神丸

治脾腎雙虛。子後作瀉。不思食。不化食。

肉录 破故紙三兩 五味子三兩 吳茱萸五錢 湯泡

右為末。紅棗四十九枚。生薑四兩。切水。煮棗熟。去棗。取棗肉。搗和藥。丸。桐子大。空心鹽湯下。

二神丸 去茱萸五味

五味子散 去肉豆蔻破故紙

程郊倩曰。命門無火。不能為中宮腐熟。水穀藏寒在腎。誰復司其閉藏。故木氣纒筋。不疏泄而亦疏泄。雖是木邪。不

名醫方論 卷四 十四

土實腎之脾。胃虛也。此際補脾。不如補腎。補腎脂有溫中。煖下之能。五味子有酸收固澁之性。吳茱萸散邪補土。肉豆蔻滋滑益脾。煖腎而使氣蒸。破滯而使氣壯。補腎仍是補脾矣。

李士材曰。腎水受時於子。弱土不能禁制。故子後每瀉也。柯韻伯曰。瀉利為腹疾。而腹為三陰之都會。一藏不調。便能瀉利。故三陰下利。仲景各為立方。以主之。太陰有理中。四逆厥陰有烏梅白頭翁。少陰有桃花真武。皆冬猪膚。四逆湯散。白通通脉等劑。可謂曲盡病情。諸法備美。然祇為

逆湯散。白通通脉等劑。可謂曲盡病情。諸法備美。然祇為

一藏立法。若三藏相關。久暫不痊。如子後作瀉。一症猶未之及也。夫雞鳴至平旦。天之陰。陰中之陽也。因陽氣當至。而不至。虛邪得以留而不去。故作瀉於黎明。其山有四。一為脾虛不能制水。一為腎虛不能行水。故二神丸君補骨

脂之辛燥者。入腎以制水。佐肉豆蔻之辛溫者。入脾以煖土。丸以棗肉。又辛甘發散為陽也。一為命門火衰不能生土。一為少陽氣虛無以發陳。故五味子散。君五味子之酸

溫。以收坎宮耗散之火。少火生氣。以培土也。佐吳茱萸之辛溫。以順肝木欲散之勢。為水氣開滋生之路。以奉春生

名醫方論 卷四 十五

也。此四者。病因雖異。而見症則同。皆水亢為害。二神丸是承制之劑。五味子散是化生之劑也。二方理不同。而用則同。故可互用。以助效。亦可合用以建功。合為四神丸。是制生之劑也。制生則化。久泄自瘳矣。稱曰四神。比理中八味。二丸較速與。

滋腎丸

治肺痿聲嘶咳血煩躁

黃栢三兩

知母三兩

肉桂一錢

右為細末熟水九桐子大每服五十九空心下

羅東逸曰此丸為腎家水竭火炎而設夫水竭則腎涸腎涸則下泉不鍾而陽盛於上斯喉痺痰結煩躁之證作火炎則金傷金傷則澤燥高源無以蒸煦布漚斯聲嘶咳血焦痿之證生此時以六味補水水不能遽生也以生脉保金金不免猶燥也惟急用黃栢之苦以堅腎則能殺龍泉

名醫方論

卷四

十六

之沸火是謂濇其源而安其流繼用知母之清以涼肺則能全破傷之燥金是謂沛之雨而騰之露然恐水火之不相入而相射也故益以肉桂之反佐為用兼以導龍歸海於是坎盈窟而流漸長矣此滋腎之旨也
柯韻伯曰水為腎之體火為腎之用人知腎中有水始能制火不知腎中有火始能致水耳蓋天乙生水一者陽氣也即火也氣為水母陽為陰根必火有所歸斯水有所主故反佐以桂之甘溫引知栢入腎而奏其效此相須之度亦承制之理也

虎潛丸

治腎陰不足筋骨痿軟不能步履

龜板

黃栢各四兩

知母

熟地各二兩

牛膝三兩

芍藥一兩

瑣陽

虎骨

當歸各一兩

陳皮七錢

五錢

右為末煮羯羊肉搗為丸桐子大澹鹽湯下

王又原曰腎為作強之官有精血以為之強也若腎虛精枯而血必隨之精血交敗溼熱風毒遂乘而聚焉此不能步履腰痠筋縮之症作矣且腎兼水火火勝陰溼熱相搏筋骨不用宜也方用黃栢清陰中之火燥骨間之溼且

名醫方論

卷四

十七

若能堅腎為治痿要藥故以為君虎骨去風毒健筋骨為臣然高原之水不下毋虛而子亦虛肝臟之血不歸子病而毋愈病知毋清肺原歸於養肝血使歸於腎龜稟天地之陰獨厚茹而不吐使之坐鎮北方更以熟地牛膝鎖陽羊肉羣隊補水之品使精血交補若陳皮者疏血行氣茲又有氣化血行之妙其為筋骨壯盛有力如虎也必矣道經云虎向水中生以斯為潛之義焉夫是以命之曰虎潛丸

虎潛丸 方見上篇

葉仲堅曰痿原雖分五臟然其本在腎其標在肺內經云五臟因肺熱葉焦發為痿躄又曰陽氣內伐水不勝火則骨痿髓虛故足不任身骨痿者生於大熱也若視為虛寒而投以桂附多致不救是方以虎名者虎於獸中稟金氣之至剛風生一嘯特為肺金取象焉其潛之云者金從水養母隱子胎故生金者必麗水意在納氣歸腎也龜應北方之象稟陰最厚首常向腹善通任脈能大補真陰深得夫潛之義者黃柏味厚為陰中之陰專補腎勝之陰不足

虎潛之
義發明
妙極

名醫方論

卷四

十九

能使足膝中氣力涌出故痿家必用二者為君一以固本一以治標恐奇之不去則偶之也熟地填少陰之精用以佐龜板知母清太陰之氣用以佐黃柏牛膝入肝舒筋歸芍佐之肝血有歸陳皮疏之氣血以流骨正筋柔矣又慮熱則生風逗留骨節用虎骨所以驅之純陰無陽不能發生佐瑣陽所以溫之羊肉為丸補之以味淡鹽湯下懸行入腎斯皆潛之為義

越鞠丸

治臧府一切痰食氣血諸鬱為痛為嘔為脹為利者

香附 蒼朮 撫芎 山梔仁 神麩

水發丸每服百丸

李楚重曰內經論木鬱達之五句前聖治鬱之法最詳所謂鬱者清氣不升濁氣不降也然清濁升降皆出肺氣使太陰失治節之令不惟生氣不升收氣亦不降上下不交而鬱成矣故經云太陰不收肺氣焦滿又云諸氣臍鬱皆屬於肺然肺氣之布必由胃氣之輸胃氣之運必本三焦

名醫方論

卷四

十九

之化甚至為痛為嘔為脹為利莫非胃氣不宣三焦失職所致方中君以香附快氣調肺之佛鬱臣以蒼朮開發強胃而資生神麩佐化水穀梔子清鬱導火於以達肺騰胃而清三焦尤妙撫芎之辛直入肝膽以助妙用則少陽之生氣上朝而營衛和太陰之收氣下肅而精氣化此丹溪因五鬱之法而變通者也然五鬱之中金木尤其前人用逍遙散調肝之鬱兼清火滋陰瀉白散清肺之鬱兼潤燥降逆要以木鬱上衝即為火金鬱斂溢即為燥也如陰虛不知滋木氣虛不知化液是又不善用越鞠矣

封髓丹

治夢遺失精及與鬼交

黃柏 砂仁 甘草

右蜜糊為丸每服三錢

趙羽皇曰經云腎者主水受五藏六府之精而藏之又曰腎者主蛰封藏之本精之處也蓋腎為怪藏多虛少實因肝木為子偏喜疏泄母氣厥陰之火一動精即隨之外溢况肝又藏魂神魂不攝宜其夜卧鬼交精泄之症作矣封髓丹為固精之要藥方用黃柏為君以其味性苦寒又能

名醫方論

卷四

三十

堅腎腎職得堅則陰水不虞其泛溢寒能清肅則龍火不至於奮揚水火交攝精有不安其位者乎佐以甘草以甘能緩急瀉諸火與肝火之內煩且能使水土合為一家以妙封藏之固若縮砂者以其味辛性溫善能入腎腎之所惡在燥而潤之者唯辛縮砂通三焦達津液能內五藏六府之精而歸於腎腎家之氣內腎中之髓自藏矣此有取於封髓之意也

左金丸

治肝藏火實左脇作痛

黃連 吳茱萸

右為未作丸

胡天錫曰此為肝火之正劑肝之治有數種水衰而木無以生地黄黃九癸乙同源是也土衰而木無以植參苓甘草散緩肝培土是也木經血虛有火用逍遙散清火血虛無水用歸脾湯養陰至於補火之法亦下同乎腎而瀉火之法治則上類乎心左金丸獨用黃連為君從實則瀉子之法

名醫方論

卷四

三十

以直折其上炎之勢吳茱萸從類相求引熱下行并以辛溫開其鬱結懲其扞格設以為佐然必木氣實而土不虛者庶可相宜左金者木從左而剛從金也

資生丸

治婦人妊娠三月脾虛嘔吐或胎滑不固兼丈夫調中養胃饑能使飽飽能使饑神妙難述

- 人參 三兩
- 雲木 三兩
- 茯苓 二兩
- 山藥 三兩
- 苡薏仁 二兩
- 蓮肉 三兩
- 芡實 二兩
- 甘草 二兩
- 陳皮 二兩
- 麥蘖 二兩
- 神麴 二兩
- 白苳蔻 錢
- 桔梗 二兩
- 藿香 二兩
- 川黃連 四錢
- 砂仁 二兩
- 扁豆 二兩
- 山查 二兩

右十七味為細末煉蜜丸彈子大每服二九米飲下

羅東逸曰此方始於繆仲醇以治妊娠脾虛及滑胎蓋胎

名醫方論

卷四

三

資始於足少陰資生於足陽明故陽明為胎生之本一有不
 足則元氣不足以養胎又不足以自養故當三月正陽明
 養胎之候而見嘔逆又其甚者或三月或五月而墮此皆
 陽明氣虛不能固耳古方安胎類用芎歸不知此正不免
 於滑是方以參朮茯苓蓮芡山藥扁豆苡薏之甘平以補
 脾元陳皮麴砂蔻藿桔之香辛以調胃氣其有淫熱以
 黃連清之燥之既無參苓白朮散之滯又無香砂枳朮丸
 之燥能補能運臻於至和於以固胎永無滑墮丈夫服之
 調中養胃名之資生信不虛矣

脾約丸

治腸胃燥熱大便秘結

- 麻仁 二升
- 杏仁 二兩
- 枳實 厚朴 芍藥 各八兩

右為末蜜丸白湯下

成無已曰約者約結之約又約束也經曰飲入於胃遊溢
 精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱
 水精四布五經並行今胃強脾弱約束津液不得四布但
 輸膀胱小便數而大便鞭故曰脾約麻仁甘平而潤杏仁
 甘溫而潤經曰脾欲緩急食甘以緩之本草曰潤可去結

名醫方論

卷四

三

是以麻仁為君杏仁為臣枳實苦寒厚朴苦溫破結者必
 以苦故以為佐芍藥酸寒大黃苦寒酸苦湧泄為陰故以
 為使丹溪曰既云脾約血枯火熾金受邪而津竭必竊脾
 之母氣以自救金衰則土受邪脾失轉輸肺失傳化理宜
 滋陰降火金行精化脾土健旺津液既潤何秘之有此方
 惟熱甚而稟質者可用熱雖甚而虛者愈致燥涸之苦矣

更衣丸

治津液不足大便不通

硃砂五錢研如飛麩

蘆薈七錢研細

滴好酒少許和丸每服一錢二分好酒下

柯韻伯曰胃為後天之本不及固病太過亦病然大過後有陽盛陰虛之別焉兩陽合明而胃家實仲景製三承氣下之水火不交而津液亡前賢又製更衣丸以潤之古人入廁必更衣故為此丸立名用藥之義以重墜下達而奏功硃砂色赤屬火體重象金味甘歸土性寒類水為丹祖承

名醫方論

卷四

注

母能輪坎以填離生水以濟火是腎家之心藥也配以蘆薈黑色通腎苦味入心滋潤之質可轉濡胃燥大寒之性能下開胃關此陰中之陰詢為腎家主劑矣合以為丸有水土既濟之理水土合和之義兩者相須得效甚宏奏功甚捷真匪夷所思者

備急丸

治寒氣冷食積留胃中心腹痛大便不通者

大黃

乾薑各一兩

巴豆二兩去皮心

先搗大黃乾薑為末內巴豆合搗千杵和蜜丸如豆大藏密器中勿泄氣候用每服三四丸煖水或酒下金匱主中惡心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口禁如卒死者捧頭起灌令下咽須臾當差不差更與三丸當腹中鳴即吐利便差若口禁者亦須折齒灌之

柯韻伯曰大便不通當分陽結陰結陽結有承氣更衣之

名醫方論

卷四

注

劑陰結又製備急之方金匱用此治中惡當知寒邪卒中者宜之若用於溫暑熱邪速其死矣是方尤為陰結者立乾薑散中焦寒邪巴豆逐腸胃冷積大黃通地道又能解巴豆毒是有制之師也乃依仲景白散而加峻者歟白散治寒結在胸故用桔梗佐巴豆為吐下兩解法此寒結腸胃故用大黃佐薑巴以直攻其寒世徒知有溫補法而不知有溫下之治所以但講虛寒不議攻寒實也

當歸龍薈丸

治肝經實火大便秘結小便澀滯或胸膈作痛陰囊腫脹凡屬肝經實火皆宜服之

當歸 龍膽草 黃連 黃芩 梔子仁 各二兩

大黃 蘆薈 青黛 各五錢 木香 五分 麝香 五分

右為末炒神麩糊丸每服二十九煎湯下

柯韻伯曰肝為相火有瀉無補青黛稟東方之色入通於肝大寒之性所以瀉其實火也夫東實西虛必瀉南補北而全氣始行故用梔子之赤色通心者率膽草荊連以瀉

名醫方論 卷四 三

火而除胸膈之痛佐以蘆薈之黑色通腎者以補水而利小便以除陰囊之腫凡木氣鬱者必尅土此肝火亢則反能燥脾而實胃故用神麩疎脾大黃調胃以通大便之秘結也肝火旺則血虛故君當歸氣有餘便是火故佐二香丹溪云宜降氣不宜降火蓋為虛火言此火實尅金熱傷元氣治節不行允宜瀉火從荊連之例矣夫氣藥燥熱若不於大寒劑中用之皆倒戈之輩故必火降而氣始降亦必氣降而火不復升是知降氣降火又兩相須也

四生丸

治陽盛陰虛血熱妄行或吐或衄者

生地黃 生栢葉 生荷葉 生艾葉 等分

右四味搗爛為丸如雞子大每服一九滾湯化服

柯韻伯曰心腎不交則五臟齊損陰虛而陽無所附則大炎上焦陽盛則陽絡傷故血上溢於口鼻也凡草木之性生者涼而熟之則溫熟者補而生者瀉四味皆清寒之品盡取其生者而搗爛為丸所以全其水氣不經火煮更以遠於火令矣生地多膏清心腎而通血脈之原栢葉西指

名醫方論 卷四 三

清肺金而調管衛之氣艾葉芳香入脾胃而和生血之司荷葉法震入肝家而和藏血之室五藏安堵則水火不相射陰平陽秘而血歸經矣是方也可暫用以遏妄行之熱血如多用則傷營蓋血得寒則瘀血不散而新血不生也設但知清火涼血而不用歸脾養榮等劑以善其後鮮有不綿連歲月而斃者非立法之不善妄用者之過耳

石斛夜光丸

治神水寬大漸散昏如霧露空中有黑花及覩物成二神水淡綠淡白色者

天門冬 焙

人參

茯苓 各二兩

麥冬

熟地

生地 各一兩

枸杞子

兔絲子

甘菊花

石斛

乾山藥

杏仁 各七錢

肉苁蓉

蒺藜

川芎

甘草 炙

黃連

防風

青葙子

枳殼

羚羊角 鎊

烏犀 鎊各五錢

牛膝 七錢五分

草決明 八錢

為細末煉蜜丸桐子大每服三五十九溫酒鹽湯下

名醫方論

卷四

三

羅東逸曰此方為陽衰陰弱不能升精於目而設故自科與千金磁珠丸並重治證亦同然磁珠為鎮墜藥此為美補藥鉞經曰五藏六府精氣皆上於目而為之精故夫目之精明者陰陽合傳而為精明者也若腎肝虛則陰弱不能斂精以升養神水於內脾肺虛則陽衰不能攝陰而浮散神光於外以致神水寬大覩物成二此其治法其管在肝其主在腎其合在脾能合腎脾之陰而使肝達之則必能歸精於兩眸而繼明如晝夜矣是方先補腎肝以二冬二地兔絲枸杞五味牛膝從容羣隊滋陰之品以之強陰

填精斂氣安神養血此水之主亦所以生木也復以人

參炙草茯苓山藥培補中宮使調合陰陽也佐之以蒺藜

甘菊川芎枳殼防風行用達氣青葙決明子解結散滯黃

連烏犀羚羊清火泄熱然必取石斛之妙合脾腎者清而

行之要使升精歸明之用藏府合德專精致一耳其以為

丸者補上治下利以緩利以久不利以速也

名醫方論

卷四

三



礞石滾痰丸

治實熱老痰之峻劑

虛寒者不宜



黃芩

大黃

酒蒸各八兩

沉香

五錢

礞石

煅過陳久者佳

右四味為細末水九川椒大量人大小用之用溫水一口送過咽即便仰卧令藥徐徐而下半日不可飲食勿起身行動言語待藥氣自胃口潮下二腸然後動作飲食服後喉間稠粘壅塞不行者乃藥力相攻故痰氣上上也少頃藥力到自然寧貼服之得法効如響應

名醫方論

卷四

三

柯韻伯曰脾為生痰之原肺為貯痰之器此無稽之談也夫脾為胃行其津液以灌四旁而水精又上輸於肺焉得凝結而為痰惟腎為胃關關門不利故水聚而泛為痰也則當曰腎為生痰之原經云受穀者濁受氣者清清陽走五藏濁陰歸六府肺為手太陰獨受諸氣之清而不受有形之濁則何可貯痰惟胃為水穀之海萬物所歸稍失轉味之職則溼熱凝結為痰依附胃中而不降當日胃為貯痰之器斯義也惟于隱君知之故製老痰之方不涉脾肺而責之胃腎二黃礞石稟中央之黃色入通中宮者也黃

疑得是此前人後學不知而信之不加之者也

礞石能清理胃中無形之氣大黃能滌蕩胃中有形之質然痰之為質雖滑而粘善棲泊於腸胃曲折之處而為巢穴不肯順流而下仍得緣涯而升故稱老痰二黃以滋潤之品祇能直行而泄欲使委曲而導之非其所長也故選金石以佐之礞石之燥可以除其溼之本而其性之悍可以迅掃其曲折依伏之處使穢濁不得臟滯而少留此滾痰之所由名乎又慮夫關門不開仍得為老痰之窠曰沉香稟北方之色能內氣歸腎又能疏通腸胃之滯腎氣流通則水垢不留而痰不再作且使礞石不粘著於腸二黃不

名醫方論

卷四

三

傷及於胃一舉而三善備所以功效若神也

指迷茯苓丸

治中焦停痰伏飲

半夏 製兩

茯苓 兩

風化硝 二錢

枳殼 五錢

右四味薑汁糊為丸

柯韻伯曰痰飲之本皆水也水入於胃游溢精氣上輸於脾此自陽入陰也脾氣散精上歸於肺此地氣上升也通調水道下輸膀胱是天氣下降也水精四布五經並行是水入於經而血乃成也若陰陽不和清濁相干胃氣亂於中脾氣艱於升肺氣滯於降而痰飲隨作矣痰與飲同源

名醫方論

卷四

三

而有陰陽之別陽盛陰虛則水氣凝而為痰陰盛陽虛則水氣溢而為飲除痰者降氣清火是治其標補陰利水是治其本也此方欲兼兩者而合治之半夏燥濕茯苓滲濕風硝軟堅枳殼利氣別於二陳之甘緩遠於礞石之峻悍亦平胃之劑耳

大黃蠶蟲丸

治五勞七傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑

大黃 兩

黃芩 兩

甘草 兩

桃仁 去皮

杏仁 去皮

芍藥 兩

地黃 兩

乾漆 兩

蠶蟲 去足

水蛭 去足

蟅蟲 兩

麩蟲 兩

右十二味為末蜜丸如小豆大酒服五丸日三服

李士材曰勞傷之症未有無瘀血者也閱之日久則發為熱熱涸其液則乾枯於經絡之間愈乾愈熱愈熱愈乾而新血皆損人之克養百骸光華潤澤者止藉此血血傷則

名醫方論

卷四

三

無以沃其膚故甲錯也且得血而能視榮氣不貫於空竅故黑黯也仲景洞見此症補之不可涼之無益而立北方經曰血主濡之故以地黃為君堅者削之故以大黃為臣統血者脾也脾欲緩急食甘以緩之又酸苦滂泄為陰故以甘芍桃杏為佐鹹走血苦勝血故以乾漆之苦四蟲之鹹為使吳氏曰濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生今人遇一勞症便用滋陰服而不效坐以待斃術豈止此耶

烏梅丸

治厥陰病消渴氣上撞心中疼熱饑而不欲食食即吐蚘又主久利

烏梅三百枚 黃連一兩 細辛 附子炮 人參 桂枝

黃栢各六兩 乾薑十兩 當歸 蜀椒各四兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下丸如桐子大先食飲服十九日三服稍加至一二十九禁生冷滑物臭食

名醫方論

卷四

三十四

治厥陰大法

厥陰九明論

柯韻伯曰六經惟厥陰為難治其本陰其標熱其體木其用火必伏其所主而先其所因或收或散或逆或從隨所利而行之調其中氣使之和平是治厥陰法也厥陰當兩陰交盡又名陰之絕陽宜無熱矣第其具合晦朔之理陰之初盡即陽之初生所以一陽為紀一陰為獨使則厥陰病熱是少陽使然也火王則水虧故消渴氣上撞心中疼熱氣有餘便是火也木盛則土故饑不欲食蟲為風化饑則胃中空虛虵聞食臭出故吐蚘仲景立方皆以辛甘苦味為君不用酸收之品而此用之者以厥陰主肝木

名醫方論

卷四

三十五

耳洪範曰木曰曲直作酸內經曰木生酸酸入肝君烏梅之大酸是伏其所主也配黃連瀉心而除疼佐黃栢滋腎以除渴先其所因也腎者肝之母椒附以溫腎則火有所歸而肝得所養是固其本肝欲散細辛乾薑辛以散之肝藏血桂枝當歸引血歸經也寒熱雜用則氣味不和佐以人參調其中氣以苦酒漬烏梅同氣相求蒸之米下資其穀氣加蜜為丸少與而漸加之緩則治其本也吐昆蟲也生冷之物與濕熱之氣相成故藥亦寒熱互用且胸中煩而吐蚘則連柏是寒因熱用也蚘得酸則靜得辛則伏得利自止

平胃散

治溼淫於內脾胃不能剋制有積飲痞膈中滿者

蒼朮

五觔 浸七日

陳皮

去白

厚朴

各三觔 薑汁炙

甘草

三十兩 炙

右為末每服三錢薑湯下日三服又水煎每服七錢

柯韻伯曰內經以土運太過曰敦阜其病腹滿不及曰卑監其病留滿痞塞張仲景製三承氣湯調胃土之敦阜李東垣製平胃散平胃土之卑監也培其卑者而使之平非削平之謂猶溫膽湯用涼劑而使之溫非用溫之謂後之註本草者曰敦阜之土宜蒼朮以平之卑監之土宜白朮

名醫方論

卷四

三六

以培之若以溼土為敦阜將以燥土為卑監耶不審敦阜卑監之義因不知平胃之理矣二朮皆燥溼健脾之用脾燥則不滯所以能健運而得其平第二朮白者柔而緩蒼者猛而悍此取其長於發汗迅於除溼故以蒼朮為君耳不得以白補赤瀉之說為二朮拘也厚朴色赤苦溫能助少火以生氣故以為佐溼因於氣之不行氣行則愈故更以陳皮佐之甘先入脾胃得補而健運故以炙甘草為使名曰平胃實調脾承氣之劑與夫潔古取金匱之枳朮湯以為九枳實之峻重於厚朴且無甘草以和之雖倍

白朮而消伐過於此方味者以朮為補為當久服不思枳實為峻而不宜多特未之思耳

名醫方論

卷四

三六

瓜蒂散

邪結胸中胸中痞軟寸脈微浮氣上冲咽喉不得息或心下滿而煩饑不能食手足厥冷脈乍緊者或飲食入口即吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者皆宜用此吐之亡血虛家不可與也

瓜蒂

赤小豆熬黃各一分

右二味別搗為散取一錢匕香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止

名醫方論

卷四

三八

柯韻伯曰胸中者清虛之府寒邪凝結內熱不得外達以至痞軟其氣上冲心下煩心中溫者熱鬱也脈微浮或弦遲或乍緊手足寒飲食入口即吐者寒束也咽喉不得息心下滿饑不能食欲吐不能吐者寒格而熱不得越也肺氣不得降胃陽不得升諒非汗下之法所能治必得酸苦湯泄之亦因而越之上焦得通中氣得達肺家之治節行胸中之陽氣復痞軟可得而消瓜蒂色青象東方甲木之化得春升生發之機能提胃中陽氣除胸中實邪為吐劑中第一品然必得穀氣以和之赤豆形色象心甘酸以

辨症精

保心氣香豉形色象腎性本沉重微熱而使輕浮能使腎家之清氣交於心胸中之濁氣出於口作為稀糜調服二散雖快吐而不傷神奏功之捷勝於汗下此所以三法鼎立耳今人不知岐伯仲景之精義置之不用汗之下之變證蜂起可勝悼哉

名醫方論

卷四

三九

天水散 一名益元散 一名六一散

治夏時中暑熱傷元氣內外俱熱無氣以動煩渴欲飲
嘔胃枯涸者又能催生下乳積聚水盲裏急後重暴注
下迫者宜之

桂府滑石 六兩才飛 甘草 兩 辰砂 錢

右為細末新汲水一碗調服三錢

柯韻伯曰元氣虛而不支者死邪氣盛而無制者亦死今
熱傷元氣無氣以動斯時用參以補氣則邪愈甚用苓
連以清熱則氣更傷惟善攻熱者不使喪人元氣善補虛

者不使助入邪氣必得氣味純粹之品以主之滑石稟土

中冲和之氣行四方清肅之令秉秋金堅重之形寒能勝
熱甘不傷脾含天乙之精而具流走之性異於石膏之凝
滯能上清水原下通水道滂滂八府之邪熱從小便而泄
矣甘草稟草中冲和之性調和以外止渴生津用以為佐
保元氣而瀉虛火則五臟自和矣然心為五臟土暑熱擾
中神明不安必得朱砂以鎮之出神氣可以遠復凉水以
滋之則邪熱可以悉除此補心陽寒亦通行也至於熱
利初起裏急後重者宜之以滑去著也催生下乳積聚

畜水等症同乎此義故兼治之是方也益氣而不助邪透
邪而不傷氣不負益元之名矣宜與白虎生脉三方鼎足
可也

名醫方論 卷四 四十一

阿膠散

治肺虛有火嗽無津液咳而喘氣者

真阿膠兩 牛勞子二錢 馬兜鈴五錢 炙甘草五錢

杏仁七錢 糯米一合

每服兩許水煎服

程郊倩曰痰帶紅線嗽有血點日漸成癆緣肺虛腫之最高葉間布有細竅氣從此出入呼吸成液灌溉周身所謂水出高源也一受火炎吸時徒引火升呼時并無液出久則肺竅俱閉喉間或癢或瘡六葉遂日焦枯矣今用阿膠

名醫方論

卷四

四

為君者消竅癢也用杏仁大力子者宣竅道也用馬兜鈴者清竅熱也糯米以補脾母氣到則肺自輕清無礙矣

玉屏風散

治風邪久留而不散者自汗不止者亦宜

防風 黃芪 白木等分 右為細末酒調服

柯韻伯曰邪之所湊其氣必虛故治風者不患無以驅之而患無以禦之不畏風之不去而畏風之復來何則發散太過玄府不閉故也昧者不知扎裏固表之法徧試風藥以驅之去者自去來者自來邪氣留連終無解期矣防風徧行周身稱治風之仙藥上清頭面七竅內除骨節疼痛外解四肢學急為風藥中之潤劑治風獨取此味任重功專矣然衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔

名醫方論

卷四

四

惟黃芪能補三焦而實衛為玄府禦風之關鍵且有汗能發無汗能止功同桂枝故又能除頭目風熱大風癩疾腸風下血婦人子臟風是補劑中之風藥也所以防風得防芪其功愈大耳白木健脾胃溫分肉培土即以寧風也夫以防風之善驅風得黃芪以固表則外有所衛得白木以固裏則內有所據風邪去而不復來此欲散風邪者當倚如屏珍如玉也其自汗不止者亦以微邪在表皮毛肌肉之不固耳其與防風通理等方懸殊矣

五淋散

治膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或成砂石或如膏汁或熱拂便血

赤茯苓一錢五分 赤芍藥 山梔仁各一錢 當歸

細甘草各一錢二分

右五味加燈心水煎服

柯韻伯曰經曰腎合膀胱故腎為水藏而膀胱為水府腎主癸水受五藏六府之精而藏之膀胱主壬水受五藏六府之津而藏之故膀胱者州都之官津液藏焉然又曰氣

名醫方論

卷四

四

化則能出者何也膀胱有上口而無下口能納而不能出唯氣為水母必太陽之氣化而膀胱之溺始出是水道固藉無形之氣化不專責有形之州都矣然水者陰也氣者陽也氣為陽之根源而火為陽之徵兆所以氣有餘便成壯火而為邪熱壯火上行三焦則傷太陽之氣邪熱下入膀胱則潤州都之津火勝則水虧理固然也夫五藏之水皆生於氣故少火生氣而氣即為水水精四布下輸膀胱源清則流潔矣如壯火食氣則化源無藉乃癯閉淋瀝膏淋豆汁砂石膿血而水道為之不利矣總由化源之不

清非剛決瀆之失職若以八正舟車禹功濬川等劑泄之五藏之陰虛太陽之氣化絕矣故急用梔苓治心肺以通上焦之氣而五志火清歸芍滋腎肝以安下焦之氣而五藏陰復甘草調中焦之氣而陰陽分清則太陽之氣自化而膀胱水潔矣此治本之計法之盡善者也

名醫方論

卷四

五

失笑散

治產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不省人事

五靈脂 蒲黃等分 每服三錢酒煎服

獨聖散附

山查肉二兩 水煎用童便沙糖和服

吳于宣曰經云心主血脾統血肝藏血故產後瘀血停滯三經皆受其病以致心腹疼痛惡寒發熱神迷眩暈胸膈滿悶凡茲者由寒凝不消散氣滯不流行惡露停蓄小腹結痛迷悶欲絕非純用甘溫破血行血之劑不能攻逐

名醫方論

卷四

四六

平也是方用靈脂之甘溫走肝生用則行血蒲黃甘平入肝生用則破血佐酒煎以行其力庶可直抉厥陰之滯而有其推陳致新之功甘不傷脾辛能逐瘀不覺諸證悉除直可以一笑而置之矣至獨聖散用山查一味濃煎與沙糖童便同服者何也山查不惟消食健脾性破瘀積痰癖可立止見枕作疼更益以沙糖味甘入脾能逐惡爰中而不傷脾童便涼下而不傷氣以佐山查則脾氣得宣山查之功用益力其効益偉名之曰獨聖不虛也

清胃散

治胃經溼熱牙齒牙根腫痛或牽引頭腦或面發熱

生地黄 茵陳 川黃連 升麻 牡丹皮

水煎服

羅東逸曰陽明胃多氣多血又兩陽合明為熱盛是以邪入而為病常實若大渴舌胎煩躁此傷氣分熱多火腑燥其津液白虎湯主之若醇飲肥厚炙烤過用以致熱壅大府逆於經絡溼熱不宜此傷血分治宜清胃方中以生地涼血為君行之牡丹皮去蒸而疏其滯以黃連微熱燥溼

名醫方論

卷四

四七

為臣和之以當歸辛散而循其經仍用升麻之辛涼升舉以騰本經之清氣即所謂升清降濁火鬱發之者也如是而喉咽不清齒齦腫痛等症廓然俱清矣

龜鹿二儂膠

大補精髓益氣養神

鹿角血老 龜板白整者 枸杞子廿州者 人參十五兩

右用鉛錘如法熬膠初服酒化一錢五分漸加至三錢空心下

李士材曰人有三奇精氣神生生之本也精傷無以生氣氣傷無以生神精不足者補之以味鹿得天地之陽氣最全善通督脉足於精者故能多淫而壽龜得天地之陰氣最厚善通任脉足於氣者故能伏息而壽一物氣血之屬

行醫方論 卷四 四九

又得造化之玄微異類有情竹破竹補之法也人參為陽補氣中之怯枸杞為陰清神中之火是方也一陰一陽無偏勝之憂入氣入血有和平之美由是精生而氣旺氣旺而神昌庶幾龜鹿之年矣故曰二仙

瓊玉膏

治虛勞乾咳

生地黄四兩 白茯苓三兩 白蜜二兩 人參六兩

右以地黄汁同蜜煮沸用絹濾過將參茯苓細末入前汁和勻以磁瓶用綿紙十數層加箬封瓶口入砂鍋內以長流水煮沒瓶頸桑柴火煮三晝夜取出換紙札口以蠟封固懸井中一日取起仍煮半日白湯點服

李士材曰乾咳者有聲無痰火來乘金金極而鳴也此木

行醫方論 卷四 四九

元之病非悠遊漸漬難責成功若誤用苦寒祇傷脾土金反無母故丹溪以地黃為君冷水盛則火自息又損其肺者益其氣故用人參以鼓生發之元虛則補其母故用茯苓以培萬物之本白蜜為百花之精味甘歸脾性潤悅肺且緩燥急之火四者皆溫良和厚之品誠堪寶重郭棖曰起吾沉痾珍寶瓊瑤故有瓊玉之名

附補方藥雜論十七條

張景岳曰。豫古枳木。以白木為君。得燥而能健。佐以枳實。其味苦峻。有推墻倒壁之功。此高攻於守之劑。唯脾氣不清而滯勝者宜之。若脾氣已虛。非所宜也。今以為補脾之藥。及小兒瘦弱。製令常服。適足傷其氣。助其瘦耳。東垣平胃散。欲治其不平也。本為胃強和實者設。故性味從辛燥從苦。而能消散。唯有滯有積者宜之。若以為健脾而常服。其悞甚矣。

補中益氣一湯。允為東垣獨得之心法。本方以升柴助升。

醫方論

卷四

五

氣以參朮歸芪助陽氣。此意誠盡善矣。然補陽之義。亦有宜否。如治勞倦內傷發熱。為助陽也。非發汗也。然有不散而散之意。故於勞倦感寒。或陽虛痰癰。及脾氣下陷等症。並宜若全無表邪寒熱。而中氣虧甚者。則升柴大非所宜。蓋升柴之味兼苦寒。升柴之性兼疎散。唯有邪者可因升而散之。若無邪大虛者。即純用培補。猶恐不及。再兼疎散。安望成功。凡補陽之劑。無不能升。正以陽主升也。寇宗奭極言五勞七傷。大忌柴胡。而李時珍以為不然。要之能散者。斷不能聚。能泄者。斷不能補。性味苦寒者。斷非扶陽之

物。故表不同而汗不欬者。不可用。外無表邪而陰虛發熱者。不可用。陽氣無根而格陽戴陽者。不可用。脾肺虛甚而氣促以喘者。不可用。命門火衰而虛寒泄瀉者。不可用水。虧火元而衄血吐血者。不可用。四肢厥而陽虛欲脫者。不可用。總之。元氣虛極者。不可泄。陰陽下竭者。不可升。人但知補中益氣可以補虛。不知幾微關係。判於舉指之間。纖微不可。奈悞者。正此類也。

神麩麥芽。雖助戊土。以腐熟水穀。然麥芽一味。治婦人喪子。乳房脹痛。欲成癰者。用十二兩炒熟。煎服。即消其破血。

醫方論

卷四

五

散氣可知矣。又婦人良方云。神麩善下胎。皆剋伐之功。多而補益少。不宜輕用。喻嘉言曰。連芩柴芍。知母。皆苦寒之劑。能瀉有餘之火耳。若飲食勞倦內傷。元氣為陽虛之病。以甘溫之劑。除之。如黃芪。人參。甘草之屬。若陰微陽強。相火熾盛。以乘陰位。日漸煎熬。為血虛之病。以甘平之劑。降之。如當歸。地黃之屬。若心火亢極。鬱熱內實。為陽強之病。以鹹冷之劑。折之。如大黃。朴硝之屬。若腎水受傷。真陰失守。無根之火。為陰虛之病。以壯水之劑。濟之。如生地。玄參之屬。若命門火衰。為

3 三

陽脫之病以溫熱之劑固之如附子乾薑之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土為火鬱之病以升陽之劑發之如升麻葛根之屬不明治法以求施治何所據依耶今人見煩熱枯燥等症不敢用附子者惡其以熱助熱也孰知不藏精之人腎中陽氣不鼓精液不得上升故枯燥外見必於補陰劑中用附子助陽則陰氣上交於陽位如釜底加薪則釜中氣水上騰而潤澤有立至者黑鉛一味乃水之精入北方壬癸凡遇陰火逆冲真陽暴脫氣喘痰鳴之急症同桂附回陽等藥用之立見奇功即

經云重劑是也

虞天民曰血不歸原責之胃寒涼屢用不効唯炙甘草炮薑草引血歸元妙失血後大熱大渴症似白虎惟脈虛大不長實為異誤服寒涼必死當歸補血湯主之趙羽皇曰參者參也與元氣為參贊者也不特氣虛宜用即血虛亦宜用內傷宜用外感亦宜用蓋煩渴由于火邪得人參而陰津自長腫脹本乎氣壅得人參而痞悶全消以至食不欲入食入反脹或胃不噎膈泄利亡陰瀝漸惡

寒多汗漏風等症無不賴人參之大力作元氣之藩籬而妄謂肺熱傷肺參能作飽不知肺金之克熱非參莫救肺虛之中滿非參與木何由健運此所以功魁羣草也附子一味有斬關奪門之勇引補氣藥行十二經以起散失之元陽引補血藥入血分蒸動不足之真陰引發散藥開腠理以驅在表之風寒引溫藥達下焦以逐在裏之冷滯其用亦弘矣正治人所易曉其最妙能以熱攻熱如胃陽發露口爛舌糜腎陽發露面赤吐紅用之頃刻神清熱退唯其能返本回陽也世人豈識之哉

柯韻伯曰仲景備十劑之法輕可散黃麻黃葛根諸湯是也宜可決壅枳實瓜蒂之方是也通可去滯五苓十棗之屬是也泄可去閉陷胸承氣抵當是也滑可去著膽導蜜煎是也澀可固脫赤石脂桃花湯是也補可扶弱附子湯理中丸是也重可鎮怯禹餘糧代赭石湯是也溼可潤燥黃連阿膠湯是也燥可去淫麻黃連翹赤小豆湯是也寒能勝熱白虎湯黃連瀉心湯是也熱可制寒白通四逆諸方是也

看仲景加減法當細審其深意如腹中痛者少陽加芍藥

少陰加附子太陰加人參若心下悸者少陰加桂枝少陽加茯苓若渴者少陽加括蕪根人參太陰加白朮仲景於加減中分陰陽表裏如此故執仲景方始知仲景立方之妙理會仲景法纔知仲景用藥取舍之精
仲景立方精而不雜其中以六方為主諸方皆從而加減焉凡汗劑皆本桂枝吐劑皆本旋覆攻劑皆本承氣和劑皆本柴胡寒劑皆本瀉心溫劑皆本四逆渾而數之為一百一十三方者未之審耳

小柴胡方為半表而設而其證皆屬於裏蓋表證既去其

醫方論

卷四

五

半則病機偏於向裏矣惟往來寒熱一證尚為表邪未去故獨以柴胡一物主之其他悉用裏藥凡裏證多陰多寒多虛而少陽之裏偏於陽偏於熱有虛有實而不盡屬於虛也然仲景又深以裏虛為患故於半表未解時便用人參以固裏

桂枝本為太陽風寒設可以散六經初感之邪柴胡本為少陽半表設更可以調三陽半表之證蓋桂枝湯是調和營衛之劑柴胡湯是調和腠理之劑凡風寒襲人不在營衛即入腠理所以仲景一書最重二方

脾為至陰居中宮而撫四肢最畏寒邪為患故仲景製理中四逆二方理中者理中焦為腹痛吐利而設若手足逆冷下利清穀是太陰本病觀四逆證上不稱厥陰少陰有此證者必見面赤故以通脈加之則四逆本為太陰立可知也然他經有此陰寒者可通用之用於太陰本經是固本以逐邪也用於少陰溫土以制水也用於厥陰和水土以生木也用於太陽益火以扶元陽也惟陽明胃貴少陽相火非所宜耳

腎主五液入心為汗少陰受病液不上升所以陰不得有

醫方論

卷四

五

汗仲景治少陰之表於麻黃細辛中加附子是升腎液也若少陰無主水火不和真陰為邪所逼則水隨火越故反汗出仲景治少陰之裏附子湯中任人參是補腎液也

參蘇飲 局方

治感冒風寒咳嗽吐痰涕唾稠粘胸膈滿悶寒熱往來或頭痛惡寒脈弱無汗

人參 蘇葉 乾葛 前胡 陳皮 枳殼 茯苓
半夏 桔梗 木香 甘草 生薑 大棗

右水煎熱服取汗

葉仲堅曰此少陽中風而寒溼內着之證也仲景於表劑不用人參惟少陽寒熱往來雖有口苦咽乾目眩之相火亦用人參以固中氣此咳嗽聲重痰涎稠粘涕唾交流五

卷四

補五

液無主寒溼稽留於胸膈中氣不固可知矣故以人參為君然非風寒之外邪來傷則寒熱不發而痰涎不遽生故輔以紫蘇乾葛凡正氣虛者邪氣必盛故胸膈滿悶輔以陳皮枳殼少佐木香以降之痰涎壅盛於心下非辛燥不除故用茯苓半夏少佐桔梗以開之病高者宜下故不取柴胡之升而任前胡之降欲解表者必調和榮衛欲清內者必顧及中宮此葶藶甘草之所必須也名之曰飲見少與緩服之義本方去人參前胡加川芎柴胡即葶藶散則治頭痛發熱惡寒無汗之表劑矣

香薷飲 局方

治暑月乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛發熱惡寒煩躁口渴腹痛吐瀉者

香薷 厚朴 白扁豆 炒
水煎浸冷服

葉仲堅曰飲與湯稍有別服有定數者名湯時時不拘者名飲飲因渴而設用之於溫暑則最宜者也然胃惡燥脾惡溼多飲傷脾反致下利治之之法心下水氣者發汗腹中有水氣者利小便然與其有水患而治之曷若先選

卷四

補三

其能汗能利者用之乎香薷芳辛溫能發越陽氣有微上徹下之功故治暑者君之以解表利小便佐厚朴以除溼扁豆和中合而為飲飲入於胃熱去而溼不留內外之暑證悉除矣若心煩口渴者去扁豆加黃連名黃連香薷飲加茯苓甘草名五物加木加參芪橘木名十味隨證加減盡香薷之用也然勞倦內傷必用清暑益氣內熱大渴必用人參白虎若用香薷是重虛其表而反濟以內熱矣香薷乃夏月解表之藥如冬月之麻黃氣虛者尤不可服今人不知暑傷元氣藥用以代茶是開門揖盜也

醫方集解

〔清〕汪昂撰

據中國科學院圖書館藏清康熙刻本影印原書版框高二〇〇毫米寬二九四毫米

敘

孔子曰能近取譬可謂仁之方也已夫仁為心性之學尚不可以無方况于百家眾藝可謂無方而能善此乎諸書之中醫為尤重以其為生民司命而聖人述所必慎者也醫者治病必有症症者證也

醫方集解

自序

彼此用之為嘗試者也方之祖始于仲景後人觸類擴而充之不可計殫然皆不能越仲景之範圍蓋前人作法後人因焉創始者難為力後起者易為功取古人已驗之成規可斟酌用之為効不既易乎然而執方醫病而病不能瘳甚或皮以殺人者又何以說焉則以脉候未辨藥性未明惑于似而反失其真知有方而不知方中解故也方中有解始于陳無擇無擇慨仲景之書後人罕識爰取傷寒論而訓詁之詮症釋方使觀者有所循入誠哉仲景之功臣而後覺

之先導矣厥後名賢輩出謂當通事增華析微附與使古方時方大明于世寧不愉快夫何著方者日多註方者不再見豈金針不度歟抑工于醫者未必工于文詞不能達意遂置而不講歟迄明始有吳鶴臯集醫方考文義清疎同人膾炙是以梨棗再易豈為空谷足音故見之而易喜歟然吳氏但一家之言其于致遠鉤深或未徹盡茲特博採廣搜網羅羣書精窮奧蘊或同或異各存所見以備參稽使探寶者不止一藏嘗維者不僅一齋庶幾病者觀之得以印

醫方集解

自序

證用者據之不致徑庭寧非衛生之一助歟或曰善師者不陳得魚者忘筌運用之妙在于一心何以方為余曰般匪不乘規矩師曠不廢六律夫易之為書變動不居然亦有變易不易二義故曰著之德圓而神卦之德方以智夫卦誠方矣豈方智之中迷無圓神之妙也哉吾願讀吾書者取是方而圓用之斯真為得方之解也已

康熙壬戌歲陽月休寧初菴汪昂題于延禧堂

凡例

一古今方書至為繁夥然于方前第註治某病其病而未嘗發明受病之因及病在某經某絡也一方之中第註用某藥某藥亦未嘗發明藥之氣味功能入某經某絡所以能治某病之故也方書徒設庸醫淺術視之情如乃拘執死方以治活病其不至于快世殃人者幾希矣及宋陳無擇始將仲景之書先釋病情次明藥性使觀者知其緒端漸得解會其嘉惠後人之心可謂切至而世猶以循文訓釋譏之不知仲景之書文淺義深至為難讀其良法良旨雖非陳氏所能徹盡然不讀陳氏之訓解人安能入仲景之門庭乎自陳氏而後歷年數百竟未有繼踵而釋方書者即如金匱玉函猶然晦昧又况于金外臺以及後賢之製劑也哉及明興始有吳鶴皋之醫方考分病列方詞旨明爽海內盛行茲

方集解 凡例

一 倣陳氏吳氏遺意而擴充之採輯古方先詳受病之由次解用藥之意而又博採碩論各言分別宜用忌用惟求義理不厭詞繁頗竭苦心不知有世好否也

一 醫方考因病分門病分七十門方凡七百首然每症不過數方嫌于方少一方面二三見又覺解多如五積散道遙散皆未入選不無闕略茲集門分二十有一正方三百有奇附方之數逾之雖未足以盡醫療之目苟能觸類引伸而醫察之大法用之亦已不窮矣

一 本集所載皆中正和平諸書所共取入世所常用之方即間有一二厲劑亦攻堅瀉熱所必需者猶然布帛菽粟之味也至于藥味幽僻採治艱難及治奇證怪病者藥不選錄又方雖出自古人而非今人所常用者亦不選錄

一 古人立方分兩多而藥味寒暑如勁兵專走一路則足以破品擒王矣後世無前人之明識分兩減而藥味漸多譬猶廣設攻圍以庶幾于一過也然品類太繁攻治必雜能無宜于此而不宜于彼者乎茲集藥過二十味以上者藥不選錄

一 仲景傷寒論前人印定眼目自陳無擇而外鮮所發明陶節菴雖著傷寒六書參合後賢之治法盡更仲景之方名究未嘗有片言隻字發揮仲景一症一方者又變前法不復分經論治仲景之書與渺難窮節菴之書顯淺易讀世人奉為若祭故識見愈卑猥也近世如方中行喻嘉言程郊倩諸名者傷寒論辨雖有偏駁未能盡合經意然間有一二新義為從前所未發者故多錄之不敢重古而非今也

方集解 凡例

而歷之

一 正方之後系以附方一則篇章省約一則便于披尋且以示前人用藥加減之注也

一 時丁亥晚洞垣窺藏之技世不再親而村間市井稍能誦藥性讀回春者輒爾懸壺草菅人命恬不為怪古云學醫人費豈不信然余竊憫之故著本草備要一書字數句釋便知藥品有性情施用有宜忌復者是集辨症論方便知受病有源因治療有軌則庶幾平居讀之可使心理開明臨病考之不致攻補誤用脫過庸人之手既可據症以校方設處窮僻之鄉不難檢方以用藥豈非衛生之善道奇篋之要編也乎高明之家以為然否

一 醫書浩瀚泛覽為難岐黃之家尚艱博涉文墨之士奚暇旁通若非篇

章簡要詞理通明則智士不樂披尋淺人復難解了讀方不得其解治
療安所取裁是用衷合諸家會集眾說由博返約用便搜求實從前未
有之書亦醫林不可不有之書也弟昂藏書既寡見聞不多集中採用
不滿數十家又恐註釋太繁觀者易倦其中篇至漫衍不能盡錄者不
得不稍為刪節非敢輕肆以限于太幅也然出自某人某書必仍存其
名集至于古今相沿之語相襲之方不知始自何人而不可廢者皆採
錄之或文法未暢者亦僭為刪潤間有竊附鄙見者必加昂按二字至
每方之全解有全用昔人者有出自心裁者然作述相半未敢師心自
用也

古人治療識見高明而用意深遠其處方用藥多有非後人所易測識
者有上病下取下病上取者有陰病治陽陽病治陰者又有三三之治者况余不業岐黃久無師授
方集解 凡例

寡見勘閱尤稱固陋安能鑿洞古人立方之本意哉今姑就方書所載
及愚心所通曉者採輯成書至于古方不得其解者尚多不敢忘加逆
億以取罪先賢貽悞後世也

綱目準繩二書多有採用前人而不著其名氏者不能推原所自則以
綱目目準繩曰三字彙之

一集中所分門類蓋以治病之道當治于未病故先補養及既受病則有
汗吐下三法故次發表涌吐攻裏若表症未除裏症復急者當表裏交
治故次發表攻裏又有病在半表半裏及在表而不可汗在裏而不可
下者法當和解故次和解然人之一身以氣血為主故次理氣理血若
受病之因多本于六淫故次風寒暑濕燥火古云百病皆由痰起故次
除痰若飲食不節能致積滯故次消導又滑則氣脫故次收瀉退能作

病故次殺虫至于眼目癰瘍婦人各有科然茲集所以便用故每科
畧取數方以備採擇未附救急良方以應倉卒再附勿藥之詮于卷終
使知謹疾攝生之要無非欲躋斯世于仁壽而已

一本集雖名方解然而病源脈候藏府經絡藥性治法罔不畢備誠醫學
之全書也黃之捷徑也讀者倘能細心玩索自有深造達源之妙若厭
其繁多而倦于披閱則作者之苦心無以表見于世矣

一服藥節度有食前食後之分古今相傳罔敢或異愚意竊謂不然凡人
飲食入腹皆受納于胃中胃氣散精于脾脾復傳精于肺肺主治節然
後分布于五臟六腑是胃乃人身分金之體也未有藥不入胃而能即
至于六經者也况肺為華蓋葉皆下垂以受飲食之蒸蒸藥入胃脫疾
趨而下安能停止若有停留則為噎為噎矣未聞心藥飲至心間而即

可入心肺藥飲至肺間而即能入肺者也若上膈之藥食後服之胃中
先為別食所填塞須待前食化完方能及後藥是欲速而反緩矣且經
脈在內理之中藥之糟粕如何能到其到者不過氣味耳若云上膈之
藥須令在上下膈之藥須令在下則治頭之藥必須入頭治足之藥必
須入足乎此理之顯明易見者俱此法相傳已久集中一仍其舊不敢
擅改然不能無疑附記于此以質明者

一集中方名用一病症用一精義用○

一十二經絡手太陰肺手少陰心手厥陰心胞手太陽小腸手少陽三焦
手陽明大腸足太陰脾足少陰腎足厥陰肝足太陽膀胱足少陽胆足
陽明胃附此以備查考

參蘇散

梔子乾薑湯 梔子厚朴湯 梔子大黃湯 梔子乾薑湯 梔子乾薑湯

稀涎散

乾薑亂吐方 此法

攻裏之劑

附方十五 內表一方

大承氣湯

三一承氣湯 六一順氣 小承氣湯 厚朴大黃湯 三化湯

調胃承氣湯

甘草湯 大黃 桃仁承氣湯 見血

大陷胸湯

小陷胸湯 十棗湯 小陷胸丸

三物備急丸

礞石丸 枳實瀉滯丸 參煎湯法

木香檳榔丸

倒倉法 天

豬胆導法

表裏之劑 附方十一

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯 水解散

桂枝加大黃湯

防風通聖散 祛風至寶丹 三黃石膏湯 麻黃白木湯 香蘇飲

五積散

參蘇飲 茯苓補心湯 香蘇飲

和解之劑

附方三十七 內表方三

黃連湯

黃芩湯 黃芩加半夏生薑湯 外 芍藥甘草湯 甘草乾姜湯 芍藥湯 枳實白濁湯 枳實白濁湯

溫胆湯

道遙散 八味道

六和湯

養正氣散 養正氣散

三解湯

清脾飲 黃連阿膠丸 仲景黃連丸 海藻黃連丸 海藻黃連丸

痛瀉要方

薑茶飲 梅蜜 荊根湯 甘草黑豆湯

陰陽水

卷三 理氣之劑 附方十二 一方

補中益氣湯

補中益氣湯 參木益胃湯 下膠頭氣

蘇子降氣湯

烏藥順氣散 八味順

四磨湯

木香順氣湯 越鞠丸 四七湯

七氣湯

丁香柿蒂湯 丁香柿蒂湯 丁香柿蒂湯

代瀉旋覆湯

橘皮竹茹湯 金匱竹茹湯 橘皮竹茹湯

定喘湯

理血之劑 附方二十二 內表方二

四物湯

氣六合湯 神應散 神應散 神應散 神應散 神應散 神應散 神應散 神應散 神應散

滋陰地黃丸	加減駐景丸	地芝丸	消風養血湯	補肝散	石膏羌活散	羊肝丸	二百味草花膏	百點膏	飛絲芒塵入目方	羅夢之劑	真人活命飲	蠟蟾丸	救苦勝靈丹方	飛龍奪命丹	皂莢丸	托裏黃耆湯	止痛白蹄湯	灸法	經產之劑	表裏六合湯	四物湯	膠艾湯
子和定	九	九	湯	散	散	丸	膏	膏	方	方	飲	丸	方	丹	丸	湯	湯	法	劑	湯	湯	湯

羚羊角散	紫蘇飲	白朮散	紫菀湯	參朮飲	失笑散	返魂丹	當歸散	當歸羊內湯	啟宮丸	豬蹄湯	相子仁丸	連附四物湯	回經丸	如聖散	正氣天香散	固下丸	白芷散	救急其方	暴死	癆死	中痧	蛇虫咬傷	刀斧傷
散	飲	散	湯	飲	散	丹	散	湯	丸	湯	丸	湯	丸	散	散	丸	散	方	死	死	痧	傷	傷

誤吞銅鐵金銀

吞異繞喉

頰車不合

呃逆不止

舌脹滿口

乳蛾喉疔

霍亂攪腸沙

鼻衄不止

耳八耳中

跌打損傷

產婦血暈

子腸不收

勿藥之詮

上古天真論

調息

調息之法

養生頌

小週天

六字訣

一秤金訣

金丹秘訣

李東垣論

精氣神

十六事宜

諸傷

醫方集解

目錄

風寒傷

濕傷

飲食傷

色慾傷

醫方集解卷之二

休寧初菴汪昂著

弟殿武

補養之

不足者

舒假之

成而後

非旦夕

劑居前

六味地

黃陰虧

津液生

按之至

骨困不

醫方集

痛足跟

地黃

心鹽湯

君小便

及有癢

八兩地

此足少

氣壯丹

屬陽故

腎精

不調
何首烏 大者赤白各一斤去皮白灰芥乳牛膝酒浸同煎首烏第七嘗歸
洗枸杞 酒浸蒸九熟白灰芥乳牛膝酒浸同煎首烏第七嘗歸
洗枸杞 酒浸蒸九熟白灰芥乳牛膝酒浸同煎首烏第七嘗歸
洗枸杞 酒浸蒸九熟白灰芥乳牛膝酒浸同煎首烏第七嘗歸
洗枸杞 酒浸蒸九熟白灰芥乳牛膝酒浸同煎首烏第七嘗歸

此足少陰厥陰藥也何首烏滋精固氣補肝腎為君茯苓交心腎而
參脾濕牛膝強筋骨而益下焦當歸辛溫以養血枸杞甘寒而補水克
絲子益三陰而強衛氣補骨脂助命火而煖丹田此皆固本之藥使榮
衛調適水火相交則氣血太和而諸疾自已也何首烏流傳雖久服者
應節運此方世宗服之連生皇子遂盛行于世其地黃黃行自烏皆君
藥也故六味丸以地黃為君七寶丹以何首烏為君各有配合未可同
類而共施也即有加減當各依本方隨病而施損益今人多以何首烏
加入地黃丸中合兩方為一方是一藥二君安所適從乎夫製方之本
旨矣

還少丹 治脾胃虛寒血氣虧之不思飲食發熱盜汗遺精白濁肌體
瘦弱牙齒浮痛等症 腎為先天之根本脾為後天之根本二本有傷則
見上頂諸症故未老而先衰一本既固則老可還

熟地黃 山藥 牛膝 酒浸 枸杞 酒浸 山藥 茯苓 杜仲 薑汁炒
遠志 五味子 炒 楮實 酒蒸 小茴香 炒 巴戟天 酒浸 肉蓯蓉 酒浸 石菖蒲 五
加惠肉蜜丸鹽湯或酒下一方茯苓換茯神加川續斷名打老兒丸人
年過百歲打其老
兒子不肯服此丸

此手足少陰足太陰藥也兩腎中間有命火乃先天之真陽人之日用
云為皆此火也此火衰微則無以蒸蒸脾胃飲食減少而精氣日衰矣
茯苓巴戟能入腎經血分茴香能入腎經氣分同補命門相火之不足
火旺則土強而脾能健運矣熟地枸杞補水之藥水足則有以濟火而

不亢不害矣杜仲牛膝補腰膝以助腎茯苓山藥參濕熱以助脾山藥
五味生脾液而固精遠志薑蒲通心氣以交腎 遺精白濁由大惠補氣
益血潤肺強脾楮實助陽補虛充肌壯骨此水火平調脾胃交補之劑
也

丹溪去積實更名滋陰大補丸 此陰虛平補之劑而曰
滋陰者腎為陰藏也

地黃丸 治脾胃不足房室虛損形瘦無力面色青黃 此脾胃兩亦治
血虛久痔 痔氣不攝血則妄行濕熱下流則成
蒼朮 熟地黃 斤 五味子 斤 乾薑 七錢 冬一兩 秋
聚肉丸米飲或酒下

此足太陰少陰藥也喻嘉言曰此方以蒼朮為君地黃為臣五味為佐
乾薑為使治脾胃兩藏之虛而去脾濕除腎燥兩擅其長超超玄著視
後人之脾胃補藥味麗雜者相去不已遠耶

虎潛丸 治精血不足筋骨痿弱足不任地及骨蒸勞熱 肝主筋血不足
精不足則骨痿故步履為艱也人之一身
腸胃有餘陰常不足骨蒸勞熱本乎陰虛

相宜酒 知母 炒 熟地黃 三兩 虎骨 二兩 龜板 四兩 酒當歸 洗
牛膝 酒 白芍 炒 陳皮 二兩 羯羊肉 酒煮爛 九鹽湯下冬加乾
薑一兩丹溪加滋陰白朮茯苓甘草五味羌活黃芩河車名補益丸治痿
一方加龍骨活絡虎潛丸治遺洩

此足少陰藥也黃柏知母熟地所以壯腎水而滋陰當歸芍藥牛膝所
以補肝虛而養血牛膝又能引諸藥下行以壯筋骨蓋肝腎同一治也
龜板陰氣最厚故以補陰而為君虎骨陰氣最強故以健骨而為佐用
鹿骨者虎雖死猶立不仆其氣力皆在前脰故用以入足從其類也瑣
步益精壯陽養筋潤燥然數者皆血藥故又加陳皮以利氣加乾薑以

此足少陰藥也黃柏知母熟地所以壯腎水而滋陰當歸芍藥牛膝所
以補肝虛而養血牛膝又能引諸藥下行以壯筋骨蓋肝腎同一治也
龜板陰氣最厚故以補陰而為君虎骨陰氣最強故以健骨而為佐用
鹿骨者虎雖死猶立不仆其氣力皆在前脰故用以入足從其類也瑣
步益精壯陽養筋潤燥然數者皆血藥故又加陳皮以利氣加乾薑以

此手太陰足少陰藥也肺主氣而氣根于丹田故肺腎為子母之藏必水能制火而後火不刑金也二冬清肺熱二地益腎水人參大補元氣氣者水之母也且人參之用無所不宜以氣藥引之則補陽以血藥引之亦補陰也

氣補 參乳丸 大補氣血

人參末 人乳粉 等分蜜丸頓乳取粉法取無病少年婦人乳用銀瓢或錫瓢傾乳少許浮淡水上頓再浮冷水上立乾刮取粉用如攤粉皮法按人乳乃陰血所化服之潤燥降火益血補虛所謂以人補人也須用一婦人之乳為佳乳雜則其氣雜又須旋川經久則油澀

此手足太陰足厥陰藥也人參大補元氣人乳本血液化成用之以交補氣血實平淡之神奇也

醫方集解 卷一 人參周本丸 參乳丸

天王補心丹 終南宣律師講勞心 治思慮過度心不足怔忡健忘

心口多汗大便或秘或澹口舌生瘡等症心也者君主之官也神明出明傷而成心勞故怔忡健忘也汗者心之液心煩熱故多汗心主血血不足故大便燥或秘或澹者心火不能生脾土也舌者心之苗虛火上炎故口舌生瘡怔忡者心惕惕然動不安也丹溪曰怔忡大驚屬血虛與痰經曰血并于下氣并于上亂而善忘又曰盛怒傷志志傷善忘又曰靜則神藏躁則消亡人不耐于事物之擾擾其血氣之陰者將竭故失其清明之體而善忘也夫藥固有安心養血之功不若寧神靜慮返觀內守為尤勝也

生地四兩 人參 玄參 炒 丹參 炒 茯苓 一用 桔梗 遠志 炒 五 酸棗仁 炒 柏子仁 炒 天冬 炒 麥冬 炒 當歸 洗 五味子 炒 蜜丸 彈子大 砂為衣 臨臥燈心湯下 一九或嚼含化 一方有石菖蒲四錢 開心除痰 無五味子一方有甘草 此手少陰藥也生地玄參北方之藥補水所以制火取既濟之義也丹

腎補

去腎所以生心血血生于氣人參茯苓所以益心氣人參合麥冬五味又為生脈散益心主脈肺為心之華蓋而朝百脈百脈皆肺生脈血也所以使天氣下降也天氣下降地氣上升地氣上升則天氣下降冬同為滋水潤燥之劑遠志杏仁栝仁所以養心神而杏仁五味酸以收之又以欬心氣之耗散也桔梗清肺利膈取其載藥上浮而歸于心故以為使砂色赤入心寒瀉熱而重靈神靈書之人所當常服 孔聖枕中丹 治讀書善忘久服令人聰明讀書易忘者心血不足 敗龜板 炙 龍骨 研末入雞 九節菖蒲各等分為末每服酒調一錢日三服

此手足少陰藥也龜者介虫之長陰物之至靈者也龍者鱗虫之長陽物之至靈者也借二物之陰陽以補吾身之陰陽假二物之靈氣以助

醫方集解 卷一 孔聖枕中丹 大補陰丸

吾心之靈氣也又人之精與志皆藏于腎腎精不足則志氣衰不能上通于心故迷或善忘也遠志苦洩熱而辛散鬱能通腎氣上達于心強志益智菖蒲辛散肝而香舒脾能開心孔而利九竅去濕除痰 首補為精英神仙 又龜能補腎 腎腎藏志 龍能鎮肝 青龍攝肝 使痰火散而心肝寧則聰明開而記憶強矣

大補陰丸 治水虧火炎耳鳴耳聾欬逆虛熱 耳為腎竅耳鳴耳聾皆火勢衝逆而上則為 腎脈洪大不能受吸補者 咳逆即今之呃逆也 腎水少 熟地黃酒 敗龜板 醋炙 猶有髓和蜜丸 鹽湯 黃柏 炒 知母 四兩 熟地黃 酒 敗龜板 醋炙 猶有髓和蜜丸 鹽湯 下 此足少陰藥也四者皆滋陰補腎之藥補水即所以降火所謂壯水之主以制陽光是也加骨脂者取其能通腎命以骨入骨以髓補髓也

于存腎

滋腎丸又名通閉

治腎虛熱脚膝無力陰痿汗衝脈上衝而喘及

下焦邪熱口不渴而小便秘腎中有水有水不足則火獨治其虛熱

痰除汗衝脈起于三陰之交直衝而上至膈

水不制火故氣逆上而喘便秘不渴解見後

黃栢二兩知母一兩桂一蜜丸

此足少陰藥也水不勝火法當壯水以制陽光黃栢苦寒微辛瀉膀胱

相火補腎水不足入腎經血分知母辛苦寒滑上清肺金而降火下潤

腎燥而滋陰入腎經氣分故二藥每相須而行為補水之良劑肉桂辛

熱假之反佐為少陰引經藥因熱用也李東垣曰經曰氣口大于人迎

迎大于氣口四倍各曰格格則吐逆閉者甚熱之氣格者甚寒之氣是

閉無出之由格無入之理也小便者足太陽膀胱所主生于肺金肺中

伏熱水不能生是絕小便之原也渴而小便不通者肺氣不得降是也

故用清燥金之正化氣薄淡滲之藥瀉火而清肺滋水之化原也若熱

在下焦而不渴是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰之藥

治之王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石腿裂出水夜不得眠不

能飲食請余診治歸而不至且因記素問云無陽則陰無以生無陰

則陽無以化又云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣此病難

秘是無陰則陽無以化也此因膏梁積熱傷腎水又逆而上而為嘔

咳內關外格之症悉具死在旦夕矣遂處北方大苦寒之劑黃栢知母

各一兩桂一錢為引須火前陰如刀刺火燒潮如源泉腫脹遂消此症

一在上焦氣分而渴一在下焦血分而渴二者之殊至易辨耳又云

凡病在下焦皆不渴血中有濕故不渴也若膀胱陽虛陰無以化又

當用八味腎氣丸按消渴症以渴為主而分氣血故血分亦有渴者淋

症以淋為主而分氣血故血分亦有渴者淋

本方去桂名療腎滋本丸治腎虛目昏本方去桂加黃連名黃栢滋腎

丸治上熱下冷水衰心煩上熱下冷陽單黃栢一味名大補丸治腎勝

脫虛熱下血虛者四物湯下腰腹痛而足心熱為末薑汁酒調服名酒

行散治痛風腰以下濕熱流注

庭龍丸 治虛損理百病駐顏益壽

鹿角膠 鹿角霜 菟絲子 栢子仁 熟地黃 等分為末酒化膠

為丸一方加補骨脂一方加鹿茸肉從蓉陽起石附子黃耆當歸惠仁

炒辰砂亦名斑龍丸此峻補氣血之劑陽虛者宜之若其陰虧

此手足少陰藥也鹿角膠菟絲子地皆腎經血分藥也大補栢子仁

子仁入心而養心氣又能入腎而潤腎燥使心腎相交心志旺而神

安精髓元而筋骨壯去病益壽不亦宜乎鹿一名斑龍睡時以首向尾

陽之會其角鐙于鹿首豈尋常舍血之屬所可擬哉成都道士常贊

龍丸歌曰尾闕不崇滄海竭九轉靈丹都說說准有斑龍頂上珠能補

下穴 玉堂調

龜鹿二仙膏 治瘦弱少氣遺洩精目視不明精極之症

極血極精極筋極骨極肌極也精生氣生神精極則無以生氣故瘦

弱少氣氣弱則不能生神故目視不明精氣不固木不能制火故遺洩

而精愈耗也

鹿角十斤龜板五斤栢子仁一斤 先將鹿角龜板鋸截刮淨水浸桑火

熬鍊成膠再將人參栢子仁熬膏和入每晨酒服三錢

此足少陰藥也龜為介虫之長得陰氣最全介虫鹿角遇夏至即解

純陽之性即解且不兩月長至一二十斤骨之速生無過於此者人身

長故能峻補氣血兩者皆用氣血以補氣血所謂補之以其類也人參

大補元氣栢子仁滋陰助陽此血氣陰陽交補之劑氣足則精固不遺血

足則視聽明了久服可以益壽豈弟已疾而已哉

能通任脈故取其甲以補心補腎補血以養陰也鹿首常

返同尾能通督脈故取其角以補命補精補氣以養陽也

補火丸 治冷勞氣血枯竭肉瘠齒落皮倦言微

也為萬物之父故曰天非此火不能生物人非此火不能生此火一

息則萬物無父故其肉衰而精血衰而言微矣

石硫黃一猪大腸尺 將硫黃為末實猪腸中爛煮三時取出去皮蒸餅為丸如梧子大每服十九日漸加之

此足少陰命門藥也硫黃火之精也亦號將軍亦號將軍故用之以補火以其大熱有毒故用猪藏爛煮以解之庸俗之人忌而罕用蓋不知

其有破邪歸正返滯還清消陰回陽化魄生魂之力也吳鶴皋曰硫黃藥皆滯性黃連寒而不滯諸藥皆燥惟硫黃熱而不燥昔仁和東早復丹半硫九靈砂丹百透之二氣丹活人之返陰丹陽氏之紫霞丹皆明之但所主各有攸當耳昂按人有真陽虛者附所不能補者非硫黃不能補之今人以為燥毒棄而不用不知硫黃性雖燥而疎利與燥者不同本草稱為救危妙藥道家以之服食尊之為金液丹西人所可常服者且補與硫一陰一陽然皆同類之物今人惟知用芒硝而不敢用硫黃可見今人之不達古人矣

附金液丹硫黃十兩研末益盆盛水和赤石脂封口鹽泥固濟日乾地內埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟慢火養七日七夜加頂火

一斤煨取出研末蒸餅丸米飲下治久寒錮冷勞傷虛損傷寒陰症小兒慢驚

玉真丸生硫黃二兩生硝石石膏半夏各一兩薑汁糊丸薑湯或米飲下每四十九治腎厥頭痛

來復丹大陰玄精石舶上硫黃硝石各一兩兩藥同微抄不可火五靈脂去砂青皮陳皮各一兩醋糊丸米飲下治伏暑泄瀉身熱脈弱玉機曰硝石性寒佐以陳皮其性疎快硫黃能利人若作煨藥止瀉誤矣此由喉食生冷或胃暑熱中脫閉結滯變亂此藥通利三焦分理陰陽服之甚驗若劇暑火濕熱者勿用

半硫丸半夏硫黃等分生薑糊丸治老人虛秘冷秘

靈砂丹水銀三兩硫黃一兩鍊成研末糯米糊丸治諸虛錮冷

二氣丹硝石硫黃等分為末石器炒成砂再研糯米糊丸梧子大每服

四十九并水下治伏暑傷冷二氣交錯中脫痞結或嘔或泄霍亂厥逆返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁四肢逆冷硫黃五兩硝石大陰玄精石各一兩附子地黃桂心各五錢用鐵銚先鋪玄精末一半次鋪硝石末一半中間下硫黃末又着硝石一半蓋硫黃再以玄精末蓋上用

小壺合着於三斤燒令得所勿令爛出研末和前藥末做丸梧子大每服十五至二十九艾湯下汗出為度

本事方破陰丹治陰中伏陽煩躁六脈沉伏硫黃水銀各一兩陳皮青皮各五錢先將硫黃入銚銚開次下水銀鐵杖攪勻令無星細研糊丸每服三十九如煩躁冷鹽湯下陰症艾湯下

傷寒百問方硫黃五錢艾湯調下治身冷麻微厥而煩躁令臥汗出而愈

醫方集解補 卷一 補火丸 唐鄭相國方 黑錫丹黑鉛硫黃各二兩將錫鎔化漸入硫黃候結成片傾地上出火毒研至無聲為度治陰陽不升降上盛下虛頭目眩暈

唐鄭相國方 治虛寒喘嗽腰脚酸痛肺虛氣乏而痰多則喘破故紙十兩酒洗胡桃肉二十兩去皮蜜調如飴每晨酒服一大匙不能飲者熱水調忌食薑羊肉菜也

此手太陰足少陰藥也破故紙屬火人心包命門能補相火以通君火煖丹田壯元陽胡桃屬水能通命門利三焦溫肺潤腸補養氣血有水

火相生之妙氣足則肺不虛寒血足則腎不枯燥久服利益甚多不獨

上療喘嗽下強腰脚而已也古云黃柏無知母破故紙無胡桃水母生合之原相火之主腎命相通滋養而居燥胡桃狀頗相類皮汁青黑故入北方佐破故紙潤燥而調血使精氣內充血脈通調諸疾自然愈矣

故入北方佐破故紙潤燥而調血使精氣內充血脈通調諸疾自然愈矣

故入北方佐破故紙潤燥而調血使精氣內充血脈通調諸疾自然愈矣

腎補

本方加杜仲一斤生薑炒熟四兩名青娥丸治腎虛腰痛... 能腎將再加牛膝酒浸黃柏鹽水川草解... 盧巴小茴香草解名喝起丸治小腸氣痛引服

二至丸 補腰膝壯筋骨強陰腎烏髮髮價廉而功大... 冬青子 即女貞實冬至日採不拘多少陰乾酒拌蒸過一夜粗... 草 夏至日採不拘多少搗 臨臥酒服一方加桑椹乾為丸或桑椹蒸... 膏和入

此足少陰藥也女貞甘平少陰之精隆冬不凋其色青黑益肝補腎早... 蓮甘寒汁黑入腎補精故能益下而榮上強陰而黑髮也 李時珍曰女... 古方罕 用何故

扶桑丸 除風濕起麻疔駐容顏烏髮髮却病延年... 嫩桑葉 去蒂洗淨暴 巨勝子 即黑脂麻 將脂麻搗碎熬濃汁... 和蜜煉至滴水成珠入桑葉末為丸一方桑葉為末脂麻蒸搗等分蜜... 丸早鹽湯晚酒下

五藏

此足少陰手足陽明藥也桑乃箕星之精其木利關節養津液故凡蒸... 桑其葉甘寒入手足陽明涼血燥濕而除風巨勝子平色黑益腎補肝... 潤府藏精髓之中惟此為良 夫風濕去則筋骨強精髓充則容顏華... 却病烏髮不亦宜乎 歌曰扶桑扶桑高入雲海東日出氣氣盈溢每變... 葉英英翠可捫真人采窮大地氣相與紅霞共吐吞瀧磨入鼎即靈藥... 芝木區區未可尋餐松已有人仙去我今朝夕從此若葉分葉分願王... 汝發陰裏 面有桃津

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉 傷則失其健運之職故... 飲食不消 兼寒則嘔吐兼濕則瀉泄也飲食既... 少果實無以稟氣則虛羸日甚精神衰生矣

醫方集解 卷一

人參 白朮 茯苓 甘草 山藥 扁豆 薏仁 蓮肉 煨肉 陳皮... 砂仁 桔梗 為末每三錢煎湯或米飲調服... 此足太陰陽明藥也治脾胃者補其虛除其滯行其滯調其氣而已人... 參白朮茯苓甘草山藥薏仁扁豆蓮肉皆補脾之藥也然茯苓山藥薏... 仁理脾而兼能滲濕砂仁陳皮調氣行滯之品也然合參朮苓草煨胃... 而又能補中 補藥則補 桔梗苦甘入肺能載諸藥上浮又能通天氣... 于地道而和則天 使氣得升降而益和且以保肺防燥藥之上僭也

妙香散 治遺失精驚悸鬱結 腎主藏精心主藏神邪火肝行心... 思氣滯則成鬱結... 山藥 二兩 人參 黃耆 遠志 茯苓 茯神 桔梗 甘草 二錢... 香 二錢 麝香 錢 辰砂 另研 為末每服二錢酒下

此手足少陰藥也心君火也君火一動相火隨之相火寄于肝膽腎之... 陰虛則精不藏所之陽強則氣不固 故精脫而成夢矣 夢之初... 起亦有不在肝腎而在心肺脾胃之不足者然必傳于肝腎而精乃走... 也又曰心腎是水火之藏法天地施生化成之道故精神為五藏之... 宗主若由他藏而致腎之泄者必察則屬以法其治天賦精自心而泄... 者則血脈空虛本經不收自肺而泄者則皮疏毛焦端急不利自脾而... 泄者色黃肉消四肢懈怠自肝而泄者筋痿色青自腎而泄者色黑... 空而竹葉即亦可治也朱丹溪曰主閉藏者腎也司津液者肝也二... 藏皆有相火而其系上屬于心心君火也為物所感則動心動則... 相火為然隨之難不交會精亦暗流而泄矣所以聖賢只是教人收... 心養性其 山藥益陰清熱兼能補精故以為君人參黃耆所以固其氣... 有深矣

遠志 二枚 所以寧其神寧氣固則精自守其位矣且二枚下行利水... 又以世胃中之邪火也桔梗清肺散滯水香疎肝和脾 行氣散積肝... 丹砂鎮心安神寧香通竅解鬱 二藥又能辟邪亦所以治其邪威... 也如甘草者用以交和乎中猶黃耆之疑其疑也 黃耆厚也 疑其疑也 疑其疑也

也如甘草者用以交和乎中猶黃耆之疑其疑也 疑其疑也 疑其疑也

表補

不用固濟之劑但安神正氣使精與神氣相依而自固矣以其安神和氣故亦治驚悸鬱結不知其鬱但用清劑則脫愈清愈鬱其病反甚矣

玉屏風散 治自汗不止氣虛表弱易感風寒

此足太陽手足太陰藥也黃耆補氣尚固肌表故以為君白朮益脾脾

主肌肉故以為臣防風去風為風藥卒徒而黃耆畏之故以為使以其

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

痰脾虛鼓脹以補劑治服滿內經再加香附砂仁名香砂六君子湯治

虛寒胃痛或腹痛泄瀉六君子加麥冬竹瀝治四肢不舉四君子

加柴胡葛根黃芩白芍名十味人參散治虛熱潮熱身倦息六君子

加烏梅草菓等分薑棗煎名四獸飲以補脾故名治五藏氣虛七情兼

併結聚痰飲與衝氣相搏發為瘧疾亦治瘧瘧本方加黃耆山藥亦名

六君子湯為病後調理助脾進食之劑本方加生薑酸棗仁炒治振悸

不得眠居上本方加竹瀝薑汁治半身不遂在右者屬氣虛亦治痰厥

暴死本方加木香藿香乾葛名七味白朮散治脾虛肌熱泄瀉虛熱

作渴人參白朮乾葛再加五味子柴胡治消渴不能食本方除人

參加白芍名三白湯治虛煩或泄或渴為調理內傷外感之奇方本方

除茯苓加乾薑名四順湯亦可蜜丸治陰症脈沉無熱不欲見光腹痛

醫方集解補 卷一 四君子湯 七

下和如陰陽未辨姑與服之若陽本方加山藥烏薑棗煎名六神散

陳無治小兒表熱去後又發熱者世醫到此不能曉或再用涼藥或

歸元而陽浮于外所以再熱非熱也宜用此湯加梗米煎和四君合

其胃氣則收陽歸內而身涼矣熱者加升麻知母名銀白湯四君合

四物名八珍湯治心脾虛損氣血兩虛心主血脾主氣四物補血反胃損飲食

不為肌膚血氣充然若傷之重者其陰內竭虛陽外鼓諸症蜂起則于

四君四物之中又加黃耆以助陽固表加肉桂以引火歸元名大全大

補湯金匱曰虛者十補勿十全大補去川芎加陳皮名溫經益元散

治汗後頭眩心悸筋惕肉瞤或汗出不止及下後下利不止身軀疼痛

太陽宜汗汗多則亡陽故有脈浮而汗之症十全大補加防風為君再

陽明宜汗下多則亡陰故有下利身痛之症十全大補加防風為君再

加羌活附子杜仲牛膝名大防風湯治鶴膝風

四物湯見血

補陰 益血

不用固濟之劑但安神正氣使精與神氣相依而自固矣以其安神和

氣故亦治驚悸鬱結不知其鬱但用清劑則脫愈清愈鬱其病反甚矣

玉屏風散 治自汗不止氣虛表弱易感風寒

而易泄且畏風也此與傷風自汗不同

改實之邪實此實之表虛故補散各異

黃耆 防風 白朮 為末每服三錢

此足太陽手足太陰藥也黃耆補氣尚固肌表故以為君白朮益脾脾

主肌肉故以為臣防風去風為風藥卒徒而黃耆畏之故以為使以其

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

益衛固表故曰玉屏風

補中益氣湯

治脾胃虛弱怠惰時值秋燥令行濕熱方退體重

節痛苦口舌乾心不思飲食不知味大便不調小便頻數兼見肺病瀝

浙惡寒慘慘不樂乃陽氣不升也日清陽失位則濁陰上于脾虛不運

黃耆 補中益氣湯 治脾胃虛弱怠惰時值秋燥令行濕熱方退體重

婦人經候凝結血塊暴下脾虛水瀉

此足太陰陽明藥也六君子助陽益胃補脾胃之上藥也

黃耆以補肺而固衛芍藥以飲陰而調榮羌活獨活防風柴胡以除濕

痛羌活除百而升清陽茯苓澤瀉以瀉濕熱而降濁陰少佐黃連以退

陰火補中有散發中有收使氣足陽升則正旺而邪服矣

也何故秋旺用參木芍藥之類反補脾為脾胃虛則脾受病故因時

而補易為力也又曰今病脾胃久衰一日體重肢節痠痛大便泄下小

補脾胃瀉陰火升陽湯

治飲食傷胃勞傷脾火邪乘之而生大熱

右開脈緩弱或弦或浮數右關脈弱脾虛也木克土也浮數熱也東

參七石膏 用過時去之 每服三錢或五錢

此足太陰陽明少陽藥也柴胡升麻羌活助陽益胃以升清氣人參蒼

木黃耆甘草益氣除濕以補脾胃黃連石膏涼心清胃以瀉陰火

李東垣曰胃乃脾之剛脾乃胃之柔飲食不節則胃先病脾無所稟而

後病勞倦則脾先病不能為胃行氣而後病胃為十二經之海脾胃既

而弱本脈也或本脈中兼見弦脈或見四脈滿閉淋瀝便難轉筋

一二症此肝之脾胃病也當加風藥以瀉之脈中兼見洪火症中或見

肌熱煩熱面赤肉痛一二症此心之脾胃病也當加瀉心火之藥脈中

兼見浮瀉症中或見氣短上喘咳嗽痰涎壅盛一二症此肺之脾胃病

也當加瀉肺及補氣之藥脈中兼見沉細症中或見善欠善恐一二症

此手太陰足少陰藥也肺虛而用參耆者脾為肺母氣為水母也

本方除麻黃名桂枝加葛根湯治前症汗出惡風者本方加半夏名葛根加半夏湯治太陽陽明合病不利但嘔此又以利不利辨傷為陰陰性下行氣不和故利而不嘔風為陽陽性上行氣逆而不下故嘔而不利而半夏內下逆氣本方加黃芩名葛根解肌湯治發熱惡寒頭痛項強傷寒濕病

麻黃附子細辛湯治傷寒少陰症始得之反發熱脈沉者少陰症脈沉是也太陽弱與少陰弱相為表裏皆虛故太陽之邪直入而脈沉餘邪未盡入裏而表熱此症謂之表裏相傳非兩感也

此足少陰藥也太陽症發熱脈當浮今反沉少陰症脈沉當無熱今發熱故曰反也熱為邪在表當汗汗沉屬陰又當溫故以附子溫少陰之經以麻黃散太陽之寒而發汗以細辛腎經表藥屬其間是汗劑之重者助陽真曰仲景太陽篇云病發熱頭痛脈沉身重者麻黃附子湯宜之逆湯少陰篇云少陰病始得之反發熱者麻黃附子湯方集解

細辛湯均是發熱脈沉以其頭痛故屬太陽症者以裏入虛寒正氣衰微又身重痛故宜麻黃使正氣內強通邪外出而乾重附子亦能出汗而散寒不虛寒而脈浮則正氣屬太陽麻黃症矣均是脈沉發熱以無頭痛故名少陰症陰病當無熱今反熱者邪在表未全傳裏但皮膚閉而熱故用麻黃細辛以發表熱今反熱者少陰之經假使寒邪入裏外必無熱當見吐利等症而正氣少陰四逆湯症矣由此觀之表邪浮淺發熱之反熱輕正氣衰微脈沉之反為重此四逆湯不為不重于麻黃附子細辛湯矣又可見熱附配麻黃發中有補生附配乾薑補中有發仲景之旨微矣按傷寒傳入三陰尚有在經表症如太陽有桂枝加芍藥湯少陰有麻黃附子細辛湯厥陰有當歸四逆湯之類皆陰經表藥也又按少陰雖有反熱而無頭痛脈沉雖有頭痛而無身熱且痛不知陽經之甚若身熱頭痛全者則屬陽症雖有頭痛而無身熱且痛不知陽經之甚若身熱頭痛全者則屬陽症雖有頭痛而無身熱且痛不知陽經之甚若身熱頭痛全者則屬陽症

證者當微發汗得之二三日微利得之為發無症無此利屬過與症也其法汗之必至亡陽惟此二症用之全屬用本方治少陰水症少氣脈沉虛

升麻葛根湯治陽明傷寒中風頭疼身痛發熱惡寒無汗口渴目痛鼻乾不得臥及陽明發狂欲出不出寒暄不時人多痰皮三陽皆有痛屬表六經皆有身痛在陽經則頭痛約急風寒在表故發熱惡寒邪外束故無汗熱入裏故口渴陽明脈絡鼻決目故目痛鼻乾陽明屬胃胃不和故臥不安陽邪入胃裏實表虛

升麻三葛根芍藥甘草一錢加葛煎如頭痛加川芎白芷川芎監陽血氣之使白芍身痛背強加羌活防風此兼太陽熱不退春加柴胡黃芩防風少陽司合柴夏加黃芩石膏清降熱面腫加防風荆芥連翹白芷川芎芍藥升散喉加桔梗清肺利咽

此足陽明藥也陽明多氣多血寒邪傷人則血氣為之壅滯辛能達表輕可去實故以升葛辛輕之品發散陽明表邪陽邪盛則陰氣虛故用芍藥斂陰和血又用甘草調其衝氣也雲岐子曰葛根為君升麻升麻甘草升陽解發又治時疫時疫成之必先入胃發已出者勿服恐重虛其表也麻症已見紅點則不可服陽明為表之裏升麻助陽正氣凡攻其熱又不可發汗攻下虛其表裏之氣如內熱甚加黃連犀角清心大青知母石膏黃芩黃柏玄參之類若斑熱稍退潮熱漸平大便可用大柴胡加芒硝傷寒未入陽明者勿服恐反引表邪入陽明也

不勝屬明辨誤將為熱也簡卷曰此

陽明在經之邪若止府病另有治法

柴胡 葛根 羌活 白芷 黃芩 芍藥 桔梗 甘草 加薑棗

石膏一錢煎服無汗惡寒甚者黃芩冬月加麻黃春月少加夏月加

蘇葉

此足太陽陽明藥也寒邪在經羌活散太陽之邪用此以正為散陽明

之邪柴胡散少陽之邪而節卷加入少陽與將為熱故以黃芩石膏桔梗

清之三藥並以芍藥甘草和之也

柴胡升麻湯方 治少陽陽明合病傷風壯熱惡風頭痛體痛鼻塞咽乾

痰盛咳嗽唾涕稠粘及陽氣鬱遏元氣下陷時行瘟疫 劉宗厚曰傷風

寒同論雖有麻黃桂枝之分至于傳變之後亦未嘗悉分之也諸家皆

與感冒四氣併中風條混治惟陳無擇別立傷風一方在四淫之首且

依傷寒以太陽為始分註六經可謂詳密但風本外邪兩方例用解表

發表然受病之源亦自不同若表虛受風專用發表 必至汗多亡

陽方集解表 汗肌 必至汗多亡

陽之症若內快於熱而受風亦宜內外交治不可 表也或曰此

云表虛與傷寒中風表虛同欒子曰不同也彼以太陽中風而于有汗

無汗分虛實實者加麻黃虛者加葛根俱解

表也此示表虛者當固守衛氣而散風者也

柴胡 前胡 黃芩 升麻 錢葛根 桑白皮 錢荆芥 錢赤芍 石膏

兩 加薑三片或二十粒煎

此足少陽陽明藥也陽明而兼少陽則表裏俱不可攻祇宜和解在經

柴胡平少陽之熱升葛散陽明之邪升提清陽而胡消痰下氣而解風

寒桑皮瀉肺利濕而止痰嗽荆芥疏風熱而清頭自赤芍調營血而散

肝邪黃芩清火于上中二焦石膏瀉熱于脾胃之部石膏辛寒為君加

薑棗者取其辛散而升發也

九味羌活湯 治傷寒傷風憎寒壯熱頭痛身痛項痛脊強

嘔吐口渴太陽無汗及感冒四時不正之氣溫病熱病 有物有聲日嘔

無聲日嘔則寒則吐則熱水吐邪熱在表則不渴寒則渴四時不正

之氣用時常熱而反大涼時當寒而反大溫非時而有其氣也冬則傷

寒不即病者至春而發為溫病

至夏而發為熱病餘症所見尚

羌活 防風 蒼朮 細辛 川芎 白芷 生地黃 黃芩 甘草

一 加生薑葱白煎如風證自汗者去蒼朮白朮黃芩發表而即

開門也胸滿去地黃加枳殼桔梗喘加杏仁夏加石膏知母汗下兼行

加大黃

此足太陽例藥以代桂枝麻黃青龍各半等湯也藥之辛者屬金于入

為藥故能匡正黜邪羌活蒼朮細辛皆辛藥也羌活入足太陽為撥亂

反正之主藥 無汗者倍之 蒼朮入足太陽辟惡而去濕能除濕下氣

邪氣不致傳 白芷入足陽明治頭痛在額川芎入足厥陰治頭痛在腦

細辛入足少陰治本經頭痛皆能驅風散寒行氣舌上而又加黃芩入

手太陰以泄氣中之熱生地入手太陰以泄血中之熱 其苦寒生地

于發熱之後則當者 防風為風藥卒徒隨所引而無不至治一身盡痛

為使無汗宜 甘草甘平用以協和諸藥也藥備六經治通四時用者當

隨症加減不可執一未盡則其變不可言故立此方使不犯二節禁忌

為解表神方冬可治寒夏可治熱春可治溫秋可治濕是清

路之應兵代麻黃等藥為穩當但虛虛氣弱之人在所禁耳

神湯方 治時氣瘟疫風寒兩感頭痛發熱惡寒無汗咳嗽聲重

或時四時不正之氣謂之時氣天災流行沿門闔戶傳染相似謂之疫

疫頭痛發熱惡寒無汗邪在表也咳嗽鼻聲重風寒兩感故表實而

麻黃 葛根 升麻 川芎 白芷 紫蘇 甘草 陳皮 香附

赤芍藥 等分加薑葱白煎

此陽經外感之通劑也吳鶴皋曰古人治風寒必分六經是皆用藥然

此足太陽少陽手太陽藥也羌活人太陽而理遊風獨活人少陰而理
伏風兼能去濕除痛柴胡散熱升清協川芎和血平肝以治頭痛目昏
前胡枳殼降氣行痰協桔梗茯苓以泄肺熱而除濕消腫甘草和裏而
發表人參輔正以匡邪疏導經絡散邪滯故曰散毒

此方為第一三氣合邪最易成其氣五傳則為疫矣方中所用皆辛
平更有入參大力者皆正以祛邪病者目服二三劑使邪不復留詎
不快哉奈何俗醫減去人參者與他方有別耶又曰散毒宜用人參其
辨不可不明蓋人受外感之邪必先汗以驅之惟元氣旺者外邪始乘
乘勢以出若素弱之人藥邪外行氣從中較輕者半出不出重者反隨
元氣而入發熱無休矣所以虛弱之體必用人參三五七分入表藥中
少助元氣以為驅邪之主使邪氣得藥一湧而出全非補益發邪之意
也即如解藥中有人參之人力者居間外邪遇正自平而退舍否則
邪氣之蟄伏安肯聽命和解耶不知者謂虛寒無補法邪不得出而滿
印痘疹疹病以及中風中痰中寒中暑等症初起時藥不效而滿
人之遇重病可生之機應置不理矣古方表汗用五積散參蘇飲散毒
散和解用小柴胡白虎湯竹葉石膏湯等方皆用人參領內邪外出乃
得速愈奈何不察耶外感散毒之人汗之熱不退下之利之熱亦不退
大熱呻吟津液乾枯如枯柴醫者技窮正為元

耳筒元氣未滿先用參三五七分煎藥深入藥力至汗和不應耶
東垣治內傷外感用補中益氣加表藥一味推服而散外邪行功于
古傷寒尚科從仲景至今明賢方書無不用參何為今日醫家棄除不
用全失相傳宗旨使虛虛之人百無一活皆不悟其害之也蓋不當用
參而殺人者是與毒未歸佳實附等藥同行溫補之誤不謂與羌獨柴
前芎半枳桔等藥同行汗和之法所致也安得視等此處耶且羌柴
已未江准大疫用散毒散倍人參去前胡獨活服者盡動高壓已邪大
疫用本方復効染種辛巳壬午大疫道備相學并和藥中惟加入
參者多活更有發斑一症最毒惟加參于消與藥中全活其
案凡訊健其荒之年飲食起居不節致患時氣者宜用此法

本方除人參名散毒散治同有風熱加荆芥防風名荆防散毒散亦治
腸風下血清鮮血鮮者為腸風隨感而見也本方去人參加連翹金銀
花名連翹散治瘡毒除人參加黃芩名敗毒加黃芩湯治癰病不
惡風寒而渴除人參加大黃苦硝名消黃散散消熱毒積敗毒散
合消風散名消風散散毒散門 治風毒癩疹及風水皮水在表宜從汗
解者本方加陳原米名倉廩散治噤口痢乃熱毒中心食入則吐單陳

升散 川芎茶調散 治諸風上攻正偏頭痛惡風有汗憎寒壯熱風寒盛
頭暈目眩 偏正頭痛者風中于腦作止無時也中風故有汗惡風邪
于鼻故塞火升故痰盛
痰熱上攻故頭暈目眩

薄荷 荊芥 羌活 白芷 甘草 防風 細辛 每
三錢食後茶調服一方加菊花 麝香 名菊花茶調散治頭目風熱
菊性清快明目
麝香消風化痰

此足三陽藥也羌活治太陽頭痛白芷治陽明頭痛川芎治少陽頭痛
細辛治少陰頭痛防風為風藥卒徒皆能解表散寒以風熱在上宜于
升散也頭痛必用風藥者以顛頂之上惟風可到也薄荷荊芥並能消
散風熱清利頭目故以為君 辛香清輕能入肝經氣分而
散風熱清利頭目故以為君 辛香清輕能入肝經氣分而
散風熱清利頭目故以為君 辛香清輕能入肝經氣分而

以升清陽而散鬱火 陽不升則痛加甘草者以緩中也用茶調者茶
能上清頭目也 湯散云茶苦寒下行如何是清頭目陳嘉謨曰火下降
上氣于其寒寒而成痛故用此助助以升散之也
若服辛散藥反甚者則宜用酸澀收而降之乃愈
再造散 治陽虛不能作汗 胸膈痞滿日治頭痛項強發熱惡寒無汗服
汗名曰無陽症虛而不識不論時令逢
以麻黃重劑取其汗誤入死者多矣

人參 黃耆 桂枝 甘草 附子 細辛 羌活 防風 川芎
畏薑 棗三枚加炒芍藥一撮煎夏加黃芩石膏
此足太陽藥也經曰陽之汗以天之雨名之太陽病表藥無汗是邪盛
而真陽虛也故以參耆甘草薑桂附子大補其陽而以羌防芎細發其
表邪加芍藥者于陽中斂陰散中有收也 汗按汗即血也血和而後能
日入第知參耆能止汗而不知其能發汗以在表藥中則助表藥發
而能散也東垣丹溪治虛人感風多用補中益氣加表藥即此意也

傷寒

大羌活湯 治兩感傷寒內傳曰傷寒一日即受之大陽經脈循腰

陽明主肉其脈扶身於口故身熱日甚而鼻乾不得三日少陽受

之少陽主胆其脈循脇於耳故胸脇痛而耳鳴四日太陽受之大陰

經古木故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器於肝故煩

滿而囊縮兩感者一日則太陽與少陰俱病有頭痛項強者而又口乾

煩渴也二日則陽明與太陰俱病有身熱濇濇而腹滿不飲食也三

日則少陽與厥陰俱病有胸脇痛耳鳴而身熱微濇也此陰陽表裏俱

病欲汗之則有裏症欲下之則有表症故內經仲景皆云必死與鸕臯

曰易老製此方意謂傳經者皆為陽邪一千升

陽散熱滋陰養臟則感之淺者尚或可平也

吐

母石膏各一劑如寒熱轉大者桂枝黃芩湯和之小柴胡湯

桂枝知母石膏外邪已罷內邪未已用柴胡人承氣等下之

涌吐之劑邪在表宜汗在上焦宜吐在中下宜下此汗吐下三法也

之又曰在上者涌之是也先賢用此法者最多今人惟知汗下而吐

法絕不用者當吐者而不行涌吐使邪氣壅結而不散輕病致重

重病致死者多矣○朱丹溪曰吐中就有發散之義張子和曰諸汗

法古方多有之惟以吐發汗者世罕知之故子嘗曰吐法兼汗以此

夫

瓜蒂散 治卒中痰迷涎壅盛顛狂煩亂人事昏沉五癎痰壅及火

吐

氣上衝喉不得息食填太陰欲吐不出痰壅上膈火氣上衝食傷寒如

桂枝症頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞鞅氣上衝喉不得息者胸有

寒也當吐之 汗出惡風頭痛項強為桂枝症其為邪在表今無頭痛項

中與表相 強而脈微浮胸痞鞅則不在表而入裏為邪在胸中胸

應故宜吐 亦治諸黃急黃 卒然發黃心滿氣喘命在須臾曰

甜瓜蒂炒 赤小豆共為末熟水或酸漿水調下量入虛實服之吐時須

令閉目跪束肚皮吐不止者葱白湯解之良久不出者含砂糖一塊即

吐諸亡血虛家老人產婦血虛脈微者俱不可服 服此恐損胃氣若止

胸中窒塞問以物探之得吐 如頭額兩太陽痛者令病人噉水一口

吐

此足太陽陽明藥也胸中痰食與虛煩者不同越以於蒂之苦涌以赤

小豆之酸吐去上焦有形之物則水得舒暢天地交而萬物通矣吐後

而胃弱者改用參朮 瓜蒂能行水濕痰涎頭痛滿寒熱脈緊不大

者並宜此散吐之或問何謂木鬱曰脈除少陽屬木于今為春乃人身

生發之氣也食者陰物也脾胃者坤土也飲食填塞太陰則土盛而反

侮木生氣不得上升而木鬱矣吐去上焦有

形之物則木得條達而遂其生之性矣

本方除赤豆名獨聖散治太陽中膈 身重痛而脈微弱更用傷冷

房中鬱過其外出之陽反中入內故耳熱重 本方除赤豆加防風藜蘆

吐

醫方集解

卷二

四

一

一

一

一

一

一

吐

醫方集解

卷二

四

一

一

一

一

一

一

名三聖散和本方除亦豆加鬱金韭汁鴉膽探吐亦名三聖散治中風

風癩痰厥頭痛本方除赤豆加全蝎五分吐風痰本方加淡豉治傷寒

煩悶瓜蒂吐下邪鬱胸膈而痰滿者謂之實瓜蒂散此重劑也○丹溪用

瓜蒂散子苦參藜蘆等劑服吐許白雲先生不遵後以附子尖和藥水

與之始得
六吐也

參茸散 治虛弱人痰涎壅盛
人參研為末水調下一二錢或加竹瀝和服竹瀝

此手太陰足太陽藥也經曰在上者因而越之痰涎上壅法當涌之病

人虛厥故以參茸代藜蘆瓜蒂宜猶帶補不致耗傷元氣也朱丹溪曰

中之陰虛反瀉太陰之
陽亦猶麻黃根補不同

梔子豉湯仲景 治傷寒汗出下後虛煩不眠刺者反覆刺心下懊憹及

大下後身熱不退心下結痛或痰在膈中汗出下後氣不足邪氣乘

熱者熱而煩擾懊憹者懊憹懊憹也苦動為陽夜臥主陰陽熱未散陰

氣未復故不得眠身熱去而心結痛者熱盡入裏則為結胸熱不去而

結痛者客熱散漫為虛
煩熱仍在表故當越之

梔子十四 淡豉四 服令微吐仲景曰病人舊微

此足太陽陽明藥也煩為熱勝梔子苦寒色赤入心故以為君淡豉苦

能發熱腐能勝焦腎氣為腐心氣為焦助梔子以吐虛煩故以為臣酸

苦泄泄為陰也此吐無形之虛煩若膈有實邪當用瓜蒂散玉海藏曰

血也煩出于肺躁出于腎故用梔子治肺煩香豉治腎躁亦用吐藥

而邪在土焦吐之則邪散經所謂在上者因而越之也或問煩躁皆心

為之何謂煩躁肺燥出于腎目熱則煩熱甚則躁煩為陽躁為陰大

抵皆心火為病火旺則金燥而木動惟火獨在故肺腎合而為煩躁按

大便遲者為吐症大便秘者為瀉症大便數者不可服而更

虛寒在下難煩非蘊熱也若宿食而煩躁者梔子大黃湯主之

本方加甘草名梔子甘草豉湯仲景治前症兼少氣者甘以本方加生薑

名梔子生薑豉湯仲景治前症兼嘔者甘以本方除淡豉加乾姜名梔子

乾姜湯仲景治傷寒誤下身熱不去微煩者乾姜以本方除淡豉

加厚朴枳實名梔子厚朴湯仲景治傷寒下後心煩腹滿厚朴亦表

裏兩解 本方加大黃枳實名梔子大黃湯仲景治酒疸發黃心中懊憹或

熱痛亦治傷寒食復則消導本方加枳實名枳實梔子豉湯仲景治傷

寒勞復傷寒新疫血氣未平餘熱未盡本方加薤白名薤白豉湯仲景

治傷寒下利如爛肉汁赤滯下伏氣腹痛諸熱症臣若寒能升能散

及大腸 本方加犀角大青名犀角大青湯治斑毒熱甚頭痛

稀涎散 治中風暴仆痰涎壅盛氣閉不通先開其閉令微吐稀涎續進

他藥不可令大吐後不可大投 亦治喉痺不能進食

皂角四挺去白礬二為末溫水調下五分或加藜蘆藜蘆能吐風痰

此足太陰厥陰藥也其鶴舉曰清陽在上濁陰在下天冠地履無暴仆

也若濁邪逆上則清陽失位而倒置矣故今人暴仆所患痰涎壅塞者

風盛氣湧使然也經曰病發于不足標而本之先治其標後治其本故

不與疎風補虛而先吐其痰涎白礬酸苦能湧泄鹹能軟頑痰故以為

君皂角辛能通竅鹹能去垢專制風木故以為使固奪門之兵也師曰

凡吐中風之痰使咽喉疎通能進湯藥便止若盡攻其痰則無液以養

筋令人變急偏枯此其禁也按痰不可盡攻不獨中風也朱丹溪曰胃

張子和加藜蘆常山甘草名常山散吐痰痰甘草合常本方加雄黃藜

蘆名如聖散為末搗丸治癲疾急痺牙關緊閉

乾霍亂吐方三 治乾霍亂欲吐不得吐欲瀉不得瀉腹中大痛者霍亂

燒鹽 熱童便 三飲而三吐之
此足太陽陽明也吐瀉不得邪結中焦能軟堅可破頑痰宿食炒

之則善故能涌吐童便本人身下降之氣引火下行乃歸舊路味又鹹

寒故降火甚速此由脾土燥極而不得降以鹽涌于上瀉泄于下則中

通矣方極簡易而有回生之功不可忽視

本方單用燒鹽熱水調飲以指探吐名燒探探吐法治傷食痛連胸膈

痞悶不通手足逆冷尺脈全無食填太陰抑遏肝胆之氣不得上升兩

忽然厥逆口不能言或不能舉者名曰食厥若作中風中氣治之不可

立傷宜先以指探吐之不行消食導氣之藥經曰上脘有積下脘無積其

攻集之劑邪在表宜汗邪在裏宜下人之身元氣過流不能容納

大承氣湯 治傷寒陽明府症陽邪入裏胃實不大便發熱語自汗

出不惡寒痞滿燥實堅全見雜病三焦大熱脈沉實者陽明外症身熱

惡熱是也此為在經仍當汗散若熱邪已入胃府病滿燥實堅全見者

法多自汗過汗亡津液水以制火則有燥熱結而不散故見身熱

大黃四兩酒洗土海藏曰邪氣居高非酒不到大黃若用生者則

服得利則止陶節菴曰大黃無積實不通瀉經用附子無乾

此正陽明藥也東垣曰大熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱

盛者以寒消之故用芒硝之鹹寒以潤燥軟堅大黃之苦寒以瀉熱去

瘀下燥結泄胃強積實厚朴之苦降瀉痞滿實瀉所謂土鬱奪之也

形重藥厚并治大瀉實瀉痞二味治無形氣藥然非大實大瀉不

可輕投恐有寒中結胸痞氣之變也大小附瀉之所由作也承順

此少陽陽明藥也邪在上焦則滿在中焦則脹胃實則潮熱潮水之...

故除芒硝欲其無傷下焦其陰也... 陽明利太陰陽明利少陽...

金匱用本方治支飲胸滿更名厚朴大黃湯本方加羌活名三化湯...

治中風邪氣作實二便不通... 無用承氣之理非堅...

焦燥實及傷寒吐後腹脹滿者... 熱也江多亡津熱又入裏...

大黃酒芒硝甘草... 此是太陽陽明藥也...

堅二物下行甚速故用甘草甘平以緩之... 枳朴者不欲其犯上焦氣分也...

醫方集解 卷二一

下心煩者及發汗不解蒸熱者... 本方加當歸芍藥煎名當歸承氣湯...

燥鼻乾或便溺秘結或痰血發狂... 方除芒硝名大黃甘草湯...

芒硝甘草各二兩又名破棺丹治多汗大渴便閉諸語陽結之症及諸...

大陷胸湯... 治傷寒下之早表邪入裏心下滿而鞭痛或重汗而俱下...

無大熱但頭微汗出脈沉為水結胸... 飲熱而發者虛火之支結又次之...

表邪下之重虛沉而結故死... 反下之熱入因作結胸病發于陰...

加原註無熱惡寒則小寒矣... 為陰則仲景病論中風傷寒每有五言...

春山三陽傳于胃已入府者為可下若在胃而不下則為下與三陽在
經無異故曰陽邪結于腸則結在胸陰邪結于陰位則在心結或遊
勞也陰經既下何以止成痼以所結只在陰位不若陽邪結甚也
書云胸膈滿者胸膈氣滯也非心下滿膈滿者膈膈脹滿也非膈
中滿蓋表邪傳裏必先胸膈以心膈入胃是以胸膈多帶表症宜微汗
胸膈多帶半表半裏宜和胸中宗室宜瀉之如結胸燥渴便秘之以
此湯下之附白散也一分去心皮炒黑研且以結胸各三分治寒之
結胸巴豆辛熱以散寒結其母苦辛以散痰實結在胸故以桔梗原而
上之利膈清表故病在膈
上必吐膈在膈下必利也

大黃兩升 芒硝一升 甘遂一錢 先煮大黃去滓內芒硝煮一二沸內甘遂
末溫服

此足太陽藥也表邪入裏結于肩位以致三焦俱實手不可近證為危
急非常藥所能平故以甘遂苦寒行水直達為君芒硝鹹寒軟堅為臣

大黃苦寒蕩滌為使三藥至峻能有起死之功 華繩曰邪結胸中處至
氣與胸中陽氣相結不能分解壅于心下為難為痛非虛煩屬實者所
可同故須攻下也低者水之為陷之以平為正故曰陷胸也經又曰

醫方集

大陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發
熱微盜汗出而反惡寒者表未解也陽反下之動數變遲屬內拒痛胃
中空虛客氣動胸膈為氣燥煩心中懊憹陽氣內陷心下因邪則為結胸
大陷胸湯主之朱丹溪曰太陽病在表而攻裏可謂虛矣原文曰太陽
病脈浮而動數今得誤下動數變遲矣又曰胃中空虛又曰短氣躁煩
虛之甚矣借曰陽氣內陷心下因邪而可迅攻之乎豈陷胸之力反復
于承氣一下再下寧不具其虛乎前文曰結胸脈浮大者下之死又曰
結胸症悉具類脈者死今日脈浮又曰煩燥大陷胸果可用乎若胃中
空虛客氣動胸膈心下懊憹者當以梔子散湯吐去胸中之邪胸膈滯
結胸乃下早而成未嘗經下者非結胸也乃表邪傳入胸中之症雖滿悶
尚為在表宜少陽湯分半表半裏之間只宜小柴胡加枳實以治未
動則以少柴胡對小陷胸一服給然若因下早而成者方用陷胸湯以
分後洋從從治之不宜太峻上焦乃清道至高之分過不則傷元氣也
用之功曰陽氣結胸微喘心膈高起不可近用大陷胸湯不逆者此
下後虛逆氣已不理微喘上攻高起不可近用大陷胸湯不逆者此
用之如神活人云下後微喘上攻高起不可近用大陷胸湯不逆者此
前中益放也甘遂中雖有微喘上攻高起不可近用大陷胸湯不逆者此
前末之下末是也其水結胸者不可近用大陷胸湯不逆者此
加用甘遂半夏栝蒌心下結胸滿多山按飲結心胸故陷胸湯
重之類皆為飲飲而後也

小陷胸湯 治傷寒誤下小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者及痰
熱塞胸 前症上下俱難此則正在心下前症痛不可近此則按之則痛
上結 結胸脈沉緊或寸浮開沉或脈浮滑知熱未深與此湯以除腐
熱

黃連一兩 半夏半升 栝蒌一枚 此足少陽藥也黃連性苦寒以泄熱栝蒌性寒潤以滌垢半夏性辛溫
以散結結胸多由痰熱結聚故用三物以除痰去熱也 王海藏曰太陽
也大陷胸丸陽明藥也小陷胸湯少陽藥也大
陷胸丸治熱實大陷胸丸兼喘小陷胸湯治痞

大陷胸丸 治傷寒結胸項強如柔痙狀 有汗為柔痙胸膈實滿故項
大黃兩升 芒硝 葶藶炒 杏仁各半升 合研取如彈丸一枚別搗甘遂
末一錢白蜜三合煮服

此足太陽陽明藥也黃性苦寒以泄熱芒硝性鹹寒以軟堅杏仁性
苦甘以降氣葶藶甘取其行水而直達白蜜取其潤滑而甘緩

十棗湯 治太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出頭
痛心下痞鞭引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒表解而裏未和邪熱內
蓄有伏飲者下利嘔逆裏受邪也汗出不惡寒表已解也頭痛痞鞭引
嘔逆頭痛與表症頭痛別用枳實芍藥散後日此症與結胸頗
同故湯亦與陷胸相類表解後攻與結胸之戒不殊也

芫花 甘遂 大戟 先煮棗去滓內前藥末強人服一錢
虛人五分或棗肉為丸病不除者再服得快下後糜粥自養

此足太陽藥也芫花大戟性辛苦以逐水飲甘遂苦寒能直達水氣所
結之處以攻決為用三藥過峻故用大棗性甘以緩之益土所以勝水

使邪從二便而出也 十棗湯小陷胸湯主水氣乾乾桂枝湯生大陽汗
出吐涎沫乾嘔王海藏曰表有水川小陷胸裏有水川十棗或問十棗
湯桂枝去桂加茯苓白朮湯皆瀉飲家俱有頭痛而脈之疏何也蓋

醫方集 卷之九 十棗湯

瀉

大黃一枳實炒黃芩炒黃連炒神麩炒五白木炒茯苓錢澤瀉錢蒸餅為丸多服

此足太陽陽明藥也飲食傷滯作痛成積非有以推下之則不行積滯不盡病終不除故以大黃枳實攻而下之而痛瀉反止經所謂通因通用也傷由濕熱黃芩黃連佐之以清熱茯苓澤瀉佐之以利濕積由酒食神麩蒸餅並合之物化食解酒因其同類溫而消之芒連大黃苦寒太甚恐其傷胃故又以白木之甘溫補土而固中也

倒倉法丹

黃牡牛肉肥嫩者二斤切碎洗淨用長流水桑柴火煮之爛濾去滓取淨汁再入鍋中文武火熬至琥珀色則成矣擇一靜室明快不通風者

醫方集解

令病人先一夜不食其中每飲一鍾少時又飲積數十鍾病在上者

必吐病在下者必利病在中者止而且利視所出物可盡病根乃止連

之急則逆上而吐多緩則順下而利多視病之上下而為緩急吐利後必渴不得與湯其小便必長取以飲之名輪迴酒非惟止渴兼滌餘垢行後倦臥覺飢先與米飲次與稀粥三日後方與厚粥軟飯羹調養半月一月精神煥發沉疴悉痊矣須戒色慾半年一年戒牛肉數年

霞天膏即照前法每肉十二斤可熬膏一斤磁罐盛之夏月水浸可留三日寒天久留生微菌用重湯煮八煎劑調服八九劑每三分加麩一分煮糊或同蜜煉

此足太陽手足陽明藥也朱丹溪曰牛坤土也黃土之色也以順為德而法健為功者壯之用也肉胃之藥也液無形之物也積聚久則形質

通大

成依附腸胃迴薄曲折之處以為巢曰豈錄兩之九散所能規其藩臚乎肉液充滿流行無處不到如洪水泛漲浮莖陳朽皆順流而下不得停留凡屬滯得一先而空澤枯潤補虛益損寧無精神煥發之樂乎其方傳于西域異人中年後行一二次亦却癯養壽之一助也王翰曰中非吐下藥備補為瀉以瀉為補亦奇方也

蜜煎導法

治陽明症自汗小便利大便秘者胃實自汗小便利此若與下藥則液愈耗矣雖大便難不可攻之宜用外導之法

蜂窩用銅器微火熬爛攪勿令焦候凝如鉛捻作挺子頭銳如指摻皂角末少許乘熱納穀道中用手抱住欲大便時去之加鹽少許亦可

此手陽明藥也蜜能潤腸熱能行氣皂能通竅經曰表解無汗者胃雖實忌攻故外導而通之不欲以苦寒傷胃也徐忠可曰此為大便不行而別無所苦者設也結胸

醫方集解

猪胆治症同煎取汁八醋少許用竹筒長三四寸以一半納穀道中將胆汁

灌入肛中項當大便

此手陽明藥也便秘者屬燥屬熱自汗者為亡津液當小便利今反利是熱猶未實故不可攻猪胆汁寒勝熱滑潤燥苦能降醋酸善入故能引入大腸而通之也津液枯者宜蜜導熱邪盛者宜煎導如冷秘者烏末相合亦可蓋煎能收膠潤燥草烏能化寒消結可隨症陰陽所宜而用之

表裏之劑病在表者宜汗宜散病在裏者宜攻宜清至于表症未除兼治之後人師其意則有防風通聖參蘇五積諸劑

大柴胡湯治傷寒發熱汗出不解陽邪入裏熱結在裏

治傷寒發熱汗出不解陽邪入裏熱結在裏裏非三陰之

表裏

此為少陽陽明三陽亦有轉入陽明者如大陰有桂枝加
大黃湯少陰有二大承氣脈除二小承氣皆屬陽明症也 心下痞鞭嘔
而下利或往來寒熱渴瀉腹滿便秘表症未除裏症又急脈洪或
沉實數者表症未除者發熱頭痛身熱仍在也裏症又急者病
洪者邪在陽明也其脈而白者何亦用之裏者皆口裏虛者便難
而勿攻裏者雖利而不可下心煩喜嘔裏已甚結于胃中故下之
愈則

柴胡八兩 半夏升黃芩 芍藥三兩 生薑五兩 大棗十二枚 枳實四兩 大黃二兩
無大黃下注云若不加大黃惡下為大柴胡湯也 崔氏
夫柴胡加前胡名大柴胡湯胡洽云亦山仲景方治何

此足少陽陽明藥也表症未除故用柴胡以解表裏症燥實故用大黃
枳實以攻裏芍藥安脾散陰 木不吐土 黃芩退熱解渴半夏和胃止
嘔姜辛散而聚甘緩以調管衛而行津液此表裏交治下劑之緩者也
周揚俊曰仲景于陽入於陰則用柴胡加芍藥湯也 柴胡加芍藥湯則
有大柴胡湯皆表裏之解之法也 柴胡加芍藥湯則

小承氣而為一方少陽不可下然兼陽明病則當下宜小承氣湯
經則大柴胡湯或曰大柴胡湯瀉也桂枝人參湯補也何為皆治下利
心下痞鞭嘔者下之早以作痞者裏虛而利也表裏不解
故用桂枝人參湯表裏和裏若傷寒發汗出不解心下痞鞭嘔吐而
利者此為實故當以大柴胡下之 胸膈痞滿心下痞鞭嘔吐而
氣澀深用藥三焦俱傷則痞滿燥實全見宜大承氣湯邪在中焦則
有燥實堅三焦宜調胃承氣湯加甘草和中去積者恐傷上焦氣也
之氣也邪在上焦則痞而宜小承氣湯去積者恐傷上焦氣也
若表症未除裏症又急不得下者則用大柴胡湯通表裏而治之
大小承氣散小承氣火之制胃承氣又次之大柴胡又次之蓋恐邪性
燥急故

柴胡加芒硝湯 治傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日脯潮熱已而微
利此本柴胡症知醫以圍藥下之非其治也潮熱者實也先以小柴胡
湯以解外後以加芒硝湯主之 傷寒十三日為再傳經也當解之時
也邪氣猶在 表裏之間也

小柴胡湯 加芒硝六兩

表裏

此少陽陽明藥也表症未除故用柴胡以解表裏症燥實故用大黃
枳實以攻裏芍藥安脾散陰 木不吐土 黃芩退熱解渴半夏和胃止
嘔姜辛散而聚甘緩以調管衛而行津液此表裏交治下劑之緩者也
周揚俊曰仲景于陽入於陰則用柴胡加芍藥湯也 柴胡加芍藥湯則
有大柴胡湯皆表裏之解之法也 柴胡加芍藥湯則

表裏

此少陽陽明藥也表症未除故用柴胡以解表裏症燥實故用大黃
枳實以攻裏芍藥安脾散陰 木不吐土 黃芩退熱解渴半夏和胃止
嘔姜辛散而聚甘緩以調管衛而行津液此表裏交治下劑之緩者也
周揚俊曰仲景于陽入於陰則用柴胡加芍藥湯也 柴胡加芍藥湯則
有大柴胡湯皆表裏之解之法也 柴胡加芍藥湯則

桂枝加大黃湯 治太陽誤下轉屬太陰腹滿大實者 腹脹雖屬太
陰腹滿時痛猶宜和之以桂枝加大黃湯也
滿痛便秘口燥咽乾者方可以此湯下之

實痛則邪已入太陰經曰諸痛為實痛隨利減故用桂枝以解未盡之
表邪加大黃以下內陷之邪熱 經又曰太陰病脈弱其人續自便利及
動故也仲景之慎于用下也如是故海藏曰腹滿桂枝加大黃湯治
桂枝加大黃湯為不用芍藥加大黃而于桂枝內加之也 太陽經治
以太陽為本也 經曰太陰腹滿痛有三有大柴胡湯經之邪有直入本
經之邪有下後內陷之邪此腹滿時痛為下後內陷之邪宜桂枝加芍
藥湯大實痛者桂枝加大黃湯誤過本經直入陰邪腹滿痛脈實非
者用此下之 經曰太陰腹滿痛者有宿食也非大
黃不能除亦通
因通用之意也

水解散 治天行一二日頭痛壯熱
麻黃兩 桂心 甘草 白芍二兩 大黃 黃芩三兩
此足太陽陽明藥也麻黃能開腠發汗桂心能引血化汗黃芩以清上
中之熱大黃以瀉中下之熱甘草白芍能調劑而和中蓋天行瘟疫
熱自內達外與傷寒由表傳裏者不同故雖一二日之淺可以汗下兼
行不必同于傷寒之治法也

防風通聖散 治一切風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷氣血佛鬱
表裏三焦俱實憎寒非熱頭目昏運目赤睛痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽
痰不利唾涕稠粘咳嗽上氣大便秘結小便赤澀瘡癤疔瘡疔跌損

醫方集解 卷二

四一九

傷痰血使血脈風燥渴手足燥癢驚狂發冷身熱也項脈自赤
風熱上攻也耳鳴口苦邪在少陽也便溏身熱結人附也小便赤澀
熱而勝也也遠瀉邪氣血脈暢也丹毒癰疽風熱在胃也手足瘧瘧
驚狂發冷也

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷 川芎 當歸 白芍 白朮

山梔 炒大黃 芒硝 黃芩 石膏 枳椇 甘草 滑石 加生

姜葱白煎自利去硝黃自汗去麻黃加桂枝湯加姜製半夏

此足太陽陽明表裏血氣藥也防風荆芥薄荷麻黃輕淨升散解表散

寒使風熱從汗出而散之于外大黃芒硝破結通幽梔子滑石降火利

水使風熱從便出而泄之于下風淫于內肺胃受邪枳椇石膏清肺瀉

胃風之為患肝木受之川芎歸芍和血補肝黃芩清中上之火連翹散

氣聚血凝甘草味溫和中重用甘草滑石亦善白朮健脾而燥濕上

下分消表裏交治而能散瀉之中猶溫養之意所以汗不傷表下不

傷裏也

本方再加人參補氣熱地益血黃柏黃連除熱羌活獨活天麻細辛全

蝎祛風蜜九椰子大每服一丸茶酒任下名祛風至寶丹中風門中不

易之湯 本方除大黃苦硝名雙解散麻黃防風薄荷川芎以解表

復有當歸芍藥以和血枳椇 甘草白朮以調氣故曰雙解

葛根黃連黃芩湯 治太陽病桂枝症醫反下之利遂不止麻促者表

未解也喘而汗出者此湯主之 發熱頭痛惡風自汗所謂桂枝症也此

入裏透陽然利不止也促為陽盛下利而脈促知表未解前症仍

在也汗出而喘為邪氣外泄所致喘而汗出為裏氣逆所致與此湯

散表邪清裏熱 散表而利日促 葛根半甘草 黃芩二黃連二 先煎葛根內諸藥煎或加

此足太陽陽明表也表症而在醫反誤下邪入陽明之府其汗外越氣
上奔則喘下陷則利故舍桂枝而用葛根高治陽明之表 葛根能升陽
能藥加茶也以清裏熱甘草以調胃氣不治利自止自止不治喘而喘
自止矣又太陽表裏兩解之變法也

三黃石膏湯 治傷寒溫毒表裏俱熱狂叫欲走煩躁大渴而赤身乾兩

自如火身形拘急而不得汗或已經汗下過經不解三焦大熱譫狂鼻

衄身目俱黃六脈洪數及陽毒發斑 胸節痛曰此因熱在三焦間裏

石膏 黃芩 黃連 黃柏 梔子 枳椇 淡豉 每服一兩

姜三片棗二枚細茶一撮煎熱服

此足太陽手少陽藥也表裏之邪俱盛欲治內則表未除欲發表則裏

又急故以黃芩瀉上焦之火黃連瀉中焦之火黃柏瀉下焦之火梔子

通瀉三焦之火而以麻黃淡豉散表邪石膏重瀉胃火能解肌亦

表裏分消之藥也

五積散 治少陰傷寒及外感風寒內傷生冷身熱無汗頭痛身痛項

背拘急胸滿惡食嘔吐腹痛寒熱往來胸氣腫痛冷秘寒疝寒瘧惡寒

無汗婦人經水不調

白芷 陳皮 厚朴 當歸 川芎 芍藥 茯苓 枳椇 蒼朮

枳殼 半夏 麻黃 乾姜 肉桂 甘草 加姜葱煎又法

除桂芷枳殼陳皮餘藥慢火炒攤冷入桂芷同煎名五積散用炒

其溫有汗去蒼朮麻黃氣虛去枳椇加人參白朮腹痛挾氣加吳茱萸

胃寒加煨姜陰虛傷寒皮冷虛汗加附子婦人調經加醋艾

此陰陽表裏通用之劑也麻黃桂枝所以解表散寒甘草芍藥所以和

中止痛蒼木厚朴平胃土而祛濕陳皮半夏行逆氣而除痰芎歸姜正
 入血分而祛寒濕枳殼桔梗利胸膈而清寒熱茯苓瀉熱利水寧心益
 脾所以為解表溫中除濕之劑去痰消痞潤經之方也一方統治多病
 惟活法者變而通之本方能散寒積食積氣積血積痰積積各五積王
 草即平胃也枳殼陳皮半夏即枳桔半夏等湯也加芎歸治血又加乾姜
 為厚朴散此散藥相合為解表溫中之劑消痞潤經之方也惟在活法
 感表裏之分所製實非仲景表裏之方也惟在活法
 變而通之胸膈滯日夫病不身熱頭痛初起怕寒腹痛嘔吐泄瀉勝因
 沉寒不渴脈沉遲無力人皆知為陰症矣至于發熱而赤黃燥渴去衣
 被脈大人皆不識認作陽症誤投寒藥死者多矣不知陰症不分熱與
 不熱不論脈之浮沉大小但指下無力重按全無便是沉陰急與五積
 散一服通解表裏之寒若內有沉寒必須姜附溫之若作熱治而用涼
 藥則渴愈甚而躁愈急豈得生乎此取脈不取
 症也按傷寒有含症取脈者又有含脈取症也

本方合人參取名五積交加散治寒溫身重痛腰脚酸疼

麻黃白朮湯東垣 治大便不通小便赤澀身面俱腫色黃麻木身重如山

喘促無力吐痰唾沫發熱時躁躁已振寒項鶴如水目中溜火鼻不聞

香膈有動氣小腹痛東垣曰此宿有濕熱伏于榮血之中水火乘于
 為腎水不足冬時寒水得令乘其肝木
 尅火麥木大勝必有火復故見諸症

青皮 陳皮 黃連 甘草 升麻 柴胡 桂枝 人參 黃柏

黃耆 蒼朮 白朮 厚朴 枳殼 茯苓 澤瀉 吳茱萸 白薑

蔻 炒麩 麻黃 杏仁 分二服

此是三陽三陰通治之劑也前症蓋因表裏俱傷陽氣抑不得升故風

火濕熱鬱而為病也桂枝麻黃解表祛風升麻柴胡升陽散火黃連黃

栢燥溫清熱而黃栢又能補腎滋陰冠栢青陳利氣散滿而青栢又能

平肝斂肝又能溫胃杏仁利肺下氣神麩化滯調中吳茱萸溫肝二

者甘草蒼白二朮補脾益氣二苓澤瀉通利小便使濕去而熱亦行方

內未嘗有通大便之藥蓋清陽升則濁陰自降矣五苓補中平胃麻黃
 但皆氣藥而無血藥與五積不同然乃東垣之方錄之以見活法之中
 又有此

參蘇飲元 治外感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽痰中焦眩暈嘔煩傷風

泄瀉及傷寒已汗發熱不止發熱頭痛外感也咳嗽痰壅嘔逆泄
 瀉內傷也汗而熱不止陰虛也

人參 紫蘇 乾葛 前胡 半夏 茯苓 枳殼 陳皮 白甘草 枳

殼 桔梗 木香 每五錢加姜棗煎外感多者去棗加葱白肺中

有火去人參加杏仁桑白皮瀉肺 泄瀉加白朮扁豆蓮肉健脾

此手足太陰藥也風寒宜解表故用蘇葛前胡勢傷宜補中故用參苓

甘草栢半除痰止咳枳桔利膈寬腸木香行氣破滯使內外俱和則邪

散矣蓋伏身重注痛者亦宜此方和之別宗厚曰此出少陽柴胡
 散治外感胃氣積聚之病本方云前胡葛根自能解肌枳殼栢

醫方集解卷二 參蘇飲 不重飲

紅參白朮寬中快膈枳殼枳實為燥烈藥枳實亦非辛平之劑元

氣謂參蘇飲治一切發熱皆功謂有風寒解表有氣藥和中則外感風

寒內積痰飲皆可治也今則物名伏苓術心湯尤能治

虛熱及吐衄便血乃虛實表裏兼治之劑然不可過

本方去人參前胡加川芎柴胡姜棗煎名蘇飲治傷風寒外有發

熱頭痛惡寒內有咳嗽吐痰氣湧此或時有前熱收去人參加
 川芎為通陰散血氣之使

香蘇飲方 治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈悶噯氣惡食

下之地春氣常在故東南甲溫之區風氣柔弱易傷風寒前感日受

邪府淺之名也山嵐瘴氣入在手上海客下皮膚故無六淫形症能發熱

頭痛而已則滿氣惡食則兼內傷也

香附 紫蘇 陳皮 枳殼 甘草 加姜葱煎傷食加消滯藥咳嗽加

杏仁桑皮有痰加半夏頭痛加川芎白芷傷風自汗加桂枝傷寒無汗

加麻黃乾姜傷風鼻塞頭昏加羌活荆芥心中卒痛加延胡索酒一杯

此手太陰藥也紫蘇疏表氣而散外寒香附行裏氣而消內壅栢紅能

羽入本經乃由表而將至裏當微執表迎而奪之勿令傳太陽藥胡
味苦微寒少陽主藥以升陽達表為君黃芩苦寒以養陰退熱為臣
足則陽泰之故發寒用黃芩降陰氣使不陷入陽中則不寒陰不足則
陽泰之故發熱用柴胡升陽氣使不陷入陰中則不熱又曰柴胡黃芩
之苦寒以退熱午夏生薑味辛溫以退寒入參大棗甘草味甘溫以助正氣
半夏辛溫能健脾和胃以散逆
氣而止嘔人參甘草以補正氣而中使邪不得復傳入裏為佐
陰使水邪不致結土李時珍曰少陽症雖在半表半裏而胸膈痞滿
然必虛人方可用參邪在半表半裏則營衛爭表屬衛故用姜棗之辛
甘以和營衛為使也
胃中焦之痛故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽藥也其按牛
夏止嘔和胃健脾亦通治煩嘔不欲食寒熱間作肝亦有之不獨少陽
也小柴胡之用牛夏以邪在半表半裏則陰陽爭用牛夏和胃而通陰
陽也蓋經用治不眠亦同此意而仲景治厥陰痛及大便秘結而小使長
用牛夏取其辛能散寒又能散也丹溪謂牛夏能使大便移而小使長
今人亦以牛夏為除痰之藥稍涉燥症轉不敢用而牛夏之功不用不復
見知于世矣徐忠司曰小柴胡能用清氣而行陽道能引氣土行而
行春令能散諸經血凝氣聚凡邪在表夏濕雜者俱藉此以提出少

陽胆經而散以柴甘生薑為定藥餘則加減隨症耳陶菴曰本經
症心下飽悶未結下者非結助也乃表邪傳至胸中未入于胃尚為在
表只須小柴胡加枳實不效就以木方對小陷胸加枳實一服即愈然其
効如神喻嘉言曰傷寒分表裏中三治表裏之邪俱盛則從中而和之
故有小柴胡之和法乃人參甘草半夏生薑大棗助脾和中但帶柴胡
一味透表黃芩一味透裏欲入胃中驅胃氣之升者帶柴胡出表胃氣
之降者帶黃芩入裏一和而表裏之邪盡服未効者加枳實治之不和
格矣又口虛勞發熱者乃兩虛則惡寒發熱則發熱耳經謂營衛傳
不亢職寒熱自止若誤用小柴胡則汗多而傷于外便溏而營傷于
內虛熱轉加病益甚矣吳若曰小柴胡為半表半裏之劑太陽經之表
熱陽明經之標熱皆不能自也若夫陽氣虛寒而亦發熱脈沉足冷者
服之立見危殆及內有虛寒大便不實婦人產後發熱皆不可用也李
上材曰今人治傷寒不分陰陽表裏而用此方去參投之以為不穩投
人多矣曰獨喉利也○李東垣曰若血受病亦先調氣氣不調則血
不行氣夫血婦也如婦人經病先柴胡以行經
之表大四物以行經之裏亦先氣而後血也
本方以前胡代柴胡名小前胡湯世治同胡治云亦本方加陳皮芍藥
名柴胡雙解散治同水方加芒硝名柴胡加芒硝湯仲景見
桂枝名柴胡加桂枝湯仲治傷寒六七日發熱微惡寒支節煩痛微嘔

心下支結外症未去者傷寒六七日邪傳胸中支結者胸中支撐而結
將傳裏發熱惡寒者仲煩痛為外症未除宜和解此藥大陽散力
桂枝麻黃湯日發汗多亡陽難禁不可下宜此湯和其營衛以通津液自
愈
本方除黃芩甘草加桂枝茯苓龍骨牡蠣鉛丹大黃名柴胡加龍骨
牡蠣湯仲治傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語身重不可轉
側傷寒八九日通經然後下之可謂煩矣孰知外邪不盡而人裏煩
虛為將下之官失也而多思也小便不利與黃芩胡湯以除煩滿加茯苓龍
骨牡蠣鉛丹收斂神氣而鎮驚而茯苓龍骨牡蠣又能行津液利小便加大
黃以通胃氣止腹脹加桂枝以行陽氣合柴胡以散表邪而解身重因
內亂故致煩驚譫語仲景加人心藥散種不專以足行也桂枝之也
本方去半夏人參姜棗加桂枝乾姜花粉牡蠣名柴胡桂枝乾姜湯仲
治傷寒汗下後胸膈滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出桂枝來寒熱
心煩者頭汗寒熱而兼黃芩表裏皆有邪故除人參半夏加桂枝以
解太陽乾姜以散滿花粉以生津牡蠣以瑛堅以此和解復津

夜而亦治瘧發寒多熱少但寒不熱喻嘉言曰小柴胡陰陽兩時
助陽壯則進而從陽其加參連以退而從陰可以類推至推曰傷寒餘
熱未盡重感六淫之氣變而為瘧治法與雜病不同寒多熱少或寒餘
者太陽邪變也柴胡桂枝湯熱多寒少或寒多熱少者陽明邪變
也白虎湯加桂枝寒熱相爭或先熱者少陽邪變也小柴胡湯者去牛
夏加花粉知母寒熱大作喉燥汗出不散者太陽陽明合病也桂枝石
膏湯服此後瘧愈甚者三陽合病也惡傳入陰經急用桂枝黃芩湯如
傳入陰經從卵至午發而晝止大便閉者大柴胡湯下之從午至酉發
而腹滿微利之不放下者厄子升麻湯苦扶痰食積氣治法與雜病路
承氣湯微利之不放下者厄子升麻湯苦扶痰食積氣治法與雜病路
同附桂枝石膏湯桂枝一錢黃芩二錢石膏三錢知母三錢桂枝湯
即小柴胡加石膏三錢知母二錢桂枝五錢分三服日三次桂枝湯
陽白虎湯陽明柴胡治少陽瘧甚則瘧瘧合二陳食積合不閉滿瀉
合五苓散開合大柴胡無汗瘧甚則瘧瘧合二陳食積合不閉滿瀉
夜發如白芍桃仁日久加常山無瘧止之治瘧之法也
本方去牛
夏加花粉名柴胡去半夏加栝實湯治瘧瘧而渴及勞瘧花
瀉瘧生津太陽小便不利而渴宜五苓散陽明大便不利而渴宜承
氣大柴胡已利而渴宜白朮少陽寒熱往來而渴宜此湯過勞即發名
本方去柴胡黃芩加厚朴名厚朴生薑湯治瘧瘧而渴及勞瘧花

能治... 和氣... 治乃所以深治之也

本方去芍藥加乾姜... 名甘草乾姜湯... 金匱用此治肺痿肺

冷吐涎沫小便數... 本方加附子名芍藥甘草附子湯... 仲景別本方

加黃芩名黃芩芍藥湯... 治熱痢腹痛後重身熱... 稠粘及鼻衄不

止脈洪數... 此即仲景之黃芩湯... 本方加白米名白芍藥湯... 治脾濕水瀉

身重困弱... 保命集曰... 本方加白米名白芍藥湯... 治脾濕水瀉

防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附更詳外症治之... 加身困倦加白木

自汗逆冷氣急微加桂附以溫之... 如事急後重腹脹血閉枯澀在盛冬于

加大黃... 醫方集解... 治胸痺喘息咳逆胸背痛短氣... 胸中者心肺之分

枯蕪薤白白酒湯... 治胸痺喘息咳逆胸背痛短氣... 胸中者心肺之分

枳實薤白白酒湯... 治胸痺喘息咳逆胸背痛短氣... 胸中者心肺之分

此上焦膈中藥也... 喻嘉言曰胸中陽氣如離

火當空曠然無外設地氣一上則窒塞有加... 知胸痺者陰氣上逆之

候也仲景微則用薤白白酒以益其陽... 甚則用附子乾姜以消其陰世

醫不知胸痺為何病習用豆蔻木香詞子三稜神麩麥芽等藥... 坐耗其

胸中之陽亦相懸矣... 難藥光滯露亦難辨故曰難露其性

本方加半夏名枳實薤白半夏湯... 治胸痺不得臥心痛徹背... 不得

夏本方除白酒加枳實厚朴桂枝名枳實薤白桂枝湯... 治胸痺氣結

在胸膈滿膈下逆搶心

溫胆湯... 治胆虛痰熱不眠虛煩驚悸口苦嘔涎... 以溫為候虛則寒

于胆虛虛火上溢故口苦嘔涎... 寒則不眠驚悸亦由

之邪胆虛氣鬱致脾生痰涎而嘔涎傷脾... 痰多者宜此症

陳皮白半夏... 枳實竹茹... 加麥煎或加棗局方

無茯苓如心虛加人參... 仁心內煩熱加黃連麥冬口燥舌乾去半夏

牛夏行加麥冬五味花粉... 麥末清加柴胡內虛大便自利去枳實加

白木內實心煩加黑梔子

此足少陽陽明藥也... 橘半生薑性辛溫以之導痰止咳即以之溫胆

云痰在胆則神不... 枳實破滯茯苓滲濕甘草和中竹茹開胃土之膠清

肺金之燥涼肺金即所以平甲木也... 金能平木如是則不寒不燥而胆

常溫矣經又曰胃不和則臥不安又曰陽氣滿不得入于陰陰氣虛故

目不得眠半夏能和胃而通陰陽故內經用治不眠二陳非特溫胆亦

以和胃也... 溫胆湯即二陳加枳實竹茹三四云心虛則神氣鬱生痰涎

汗並溫胆湯主之... 唯則以人參代竹茹內經半夏湯治痰涎不眠半夏

五合糯米一升用清湯... 湯為湯者服汗出即已半夏除痰利小便便稀

醫方集解... 治胸痺喘息咳逆胸背痛短氣... 胸中者心肺之分

本方加人參遠志... 仁就地名十味溫胆湯治夢遺驚惕

遺遺散... 治血虛肝燥骨蒸勞熱咳嗽潮熱往來寒熱口乾便澀月經

不調... 竹葉瀉心湯... 治血虛肝燥骨蒸勞熱咳嗽潮熱往來寒熱口乾便澀月經

柴胡... 當歸... 白芍... 木... 加煨薑薄荷煎

此足少陽厥陰藥也... 肝虛則血病當歸芍藥養血而斂陰木盛則土衰

甘草白木和中而補土... 亦以平木柴胡升陽散熱合芍藥以平肝而使

木得條達... 木喜條達故以芍藥... 芍藥利濕助甘木以益土而令心氣

安寧 通心腎 生髮煖胃 祛痰調中 解鬱消積 潤肺瀉火 消風疏逆
和中諸症 自已所以有逍遙之名 有乾咳者 丹溪曰 極為難治 此係
遠散以開之 下用補陰之劑 可愈
昂按此即後傳醫賈所言之旨也

本方加丹皮 厄子名八味逍遙散 已治怒氣傷肝 血少目暗 經日為
血而能瀉肝 傷血少則目昏 丹皮能瀉血中伏火 厄子能瀉三焦火
故薛氏加之以抑肝氣 兼以調經也 醫賈曰 右方逍遙散 柴胡薄荷
歸芍藥陳皮甘草白朮茯苓其加味者 則丹皮厄子余以山厄屈曲下
行泄水 改用吳茱炒連其論五瀉曰 東方先生本木者 生生之氣 即火
氣也 火附木中 木鬱則火亦鬱矣 火鬱則土自鬱 土鬱則金鬱 金鬱則
水鬱 五行相附 自然之理也 余以一方治木鬱 而諸鬱皆愈 逍遙散是
也 方中柴胡薄荷二味 最妙 蓋肝乃甲木 少陽之氣 其氣柔嫩 象草穿
地而未伸 此時若被寒風一鬱 即軟萎 迨抑不能上伸 下上伸則下
脾土而金水併病 矣 惟得溫風一吹 鬱氣始得暢達也 蓋木喜風 播寒
即推委 溫即發生 柴胡薄荷 辛能發散 溫能入少陽 右入左方之妙 如
此 其甚者 方中加吳茱炒連 即左金丸 黃連清心火 吳茱炒連 肝氣三
躁 同氣相求 以平肝木 木平則不生心火 火不刑金 而金能制木 不直
伐木而佐金 以制木 此左金所以得名也 此法之巧 若然 增不也 惟用
六味地黃加柴胡芍藥 以滋腎水 俾能生木 逍遙散風以散之也 地黃

醫方集解和 卷之二十二 逍遙散
飲雨以潤之也 亦有不得其天者 乎此法一立 木火之鬱 上而木不下
如土土亦得滋潤 無燥燥之患 金水自能相生 余謂一法可通五法者
如此 推而廣之 凡寒熱往來 惡寒惡熱 嘔吐吞酸 噎膈胸膈 痛小腹痛
膨脹 頭暈盜汗 黃疸 瘧疾 疝氣 癰疽 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒
傷濕 除直中外 凡外感者 皆作鬱看 以逍遙散加減 出入 無不應手 如
小柴胡湯 四逆散 羌活湯 羌活湯 羌活湯 羌活湯 羌活湯 羌活湯 羌活湯 羌活湯
愈少 項復發 或頭暈 愈其此必下寒上熱之假症 此不可復投 當
故用溫補之劑 如陽虛以四君子湯 加溫熱藥 陰虛以六味湯 加溫熱
藥 元氣之士 下須余黃矣 又曰 余于冬月 正傷寒 麻黃桂枝 症作寒鬱
治 不惡寒者 作火鬱 治此 余創論也 既曰 寒邪何故入內 而反為熱 不
知 即見本身之火 為寒所鬱 一步 運歸一步 久則純熱 矣 三黃解毒 解
其火也 葛根 升麻 火鬱發之也 三承氣 土鬱奪之也 小柴胡 木鬱達之
也 此理甚簡 易到 守真謂用麻黃 桂枝 必加涼藥 子和 六神 通經 解
膏 于麻黃 蒼朮 中胸氏 謂九味 羌活 可代三方 皆非也 不若逍遙散 真
可一方 代三方 也 火為鬱 煎腎水 至木旺 時無生 發滋潤 之本 故
發熱而渴 非外感也 余以六味湯 滋其水 以柴胡 舒其木 活人多矣

六和湯方 治夏月飲食不調 內傷生冷 外傷暑氣 寒熱交作 霍亂吐瀉
及伏暑 煩悶 倦嗜 口渴 便赤 中酒 等症 風寒暑濕 之邪 傷脾 則瀉
瀉 瀉則瀉 赤陰陽 相爭 則寒熱 交作 或霍亂 轉
筋 脾主四肢 傷則倦 倦傷 酒亦有 濕散 為治

砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏 扁豆 木瓜 人參 白朮
赤茯苓 甘草 加姜棗煎傷暑 加香薷傷冷 加紫蘇 一方無白朮一
方有蒼朮

此足太陰陽明藥也 藿香砂仁杏仁厚朴香能舒脾 辛能行氣 而砂仁
厚朴兼能化食 木瓜酸能平肝 舒筋 筋木乘脾 故轉筋 木瓜酸能舒筋
扁豆赤茯苓能滲濕 清熱 而扁豆又能散暑 和脾 半夏辛溫 散逆 而止
嘔 參朮甘溫 補正 以匡邪 甘草補中 協和 諸藥 藿香散而調榮 衛皆
所以和之也 或加香薷者 用以祛暑 加紫蘇者 用以發表 散寒也 吳錫
六和者 和六府也 脾胃為六府之總司 光調脾胃 則水穀四布 五臟並
行 百骸九竅 皆太和矣 吳錫按 六和者 和六氣也 若云 和六府 則五臟又
不當 和乎 蓋風寒暑濕 燥火之氣 夏月感之 為
多 故用諸藥 匡正脾胃 以拒諸邪 而平調之也

醫方集解和 卷之二十二 藿香正氣散 治外感風寒 內傷飲食 憎寒壯熱 頭痛嘔吐 腹脹滿悶
咳嗽氣喘 及傷冷傷濕 瘧疾 中暑 霍亂 吐瀉 凡感風瘴 不化之氣 者並
宜增減 用之 元氣虛弱者
藿香 紫蘇 白芷 大腹皮 茯苓 白朮 陳皮 半夏 厚
朴 枳椇 兩甘草 兩 每服五錢 加姜棗煎 一方加木瓜 氣鬱能傷
食重者 加消食藥
此手太陰足陽明藥也 藿香辛溫 理氣 和中 辟惡 止嘔 兼治表裏 為君
蘇正桔梗 散寒 利膈 佐之以發表 邪厚朴 大腹行水 消腫 橘皮 半夏 散
逆 除痰 佐之以疏裏 滲苓 木瓜 益脾 去濕 以補正氣 為臣 使也 正氣
通暢 則邪逆 自除 矣 吳錫曰 若太陽傷寒 頭痛 發熱 骨節 痛者 此方全
矣 凡傷寒 發熱 脈沉 元氣 虛人 併表 陰傷 寒發 熱者 皆不可 用 藿香
曰 肥人多中 以氣 盛于外 而兼于內 也 肺為 氣出入 之道 人肥者 必氣
急 氣急 必肺 邪盛 肺金 尅肝 木思 為肝 之府 故痰 涎壅 盛 治之 必先 理
氣 中後 氣未 盡 順 痰未 盡 降 調理 之劑 當以 藿香 正氣 散和 是香 散服

陽痿

此藥非特治中風之症
中氣中惡毒凡尤宜

本方合三味香薷飲香薷一名藿香湯治伏暑吐瀉轉筋

三解湯 治時行瘧之通劑此三陽經也凡要曰瘧有中三陽者有中

瘧治多并之在陽明謂之熱瘧治冬下之在少陽謂之風瘧宜和之此
三陽受病謂之惡瘧發在夏至後處暑前此傷之淺者也三陰經總
謂之濕瘧當從太陰經論之發在處暑後冬至前此傷之重者逆而為
痰痰者老也居西方宜毒藥燥之李挺曰凡瘧須分陰陽氣虛者屬血
虛屬陰發于春夏屬陽發于秋冬屬陰自子至巳屬陽自午至亥屬陰
邪淺在府為陽與營衛並行故一日發邪深在經為陰橫連膜原不能
與衛氣並行故間日發或三四日一發衛虛則先寒營虛則先熱喻嘉
言曰非發必有寒自熱蓋外邪伏于半表半裏適在少陽所主之界出
與陽爭陰勝則寒入與陰爭陽勝則熱即純熱無寒為瘧瘧溫瘧寒
無熱為北瘧要皆自少陽而逆其極偏補偏救辨亦必還返少陽之界
使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽
則不成其為瘧矣脈緩脈遲而弦之一字實貫微之也即按瘧之不惟
少陽滿咳之不離于肺故經曰五藏
六府皆令人咳然必傳以與肺也

柴胡 麻黃去澤瀉各三

醫方集解 卷二 解湯

此足少陽藥也吳鶴臯曰病有三在在表在裏及在半表裏也瘧邪

藏于分肉之間邪正分爭併于表則在表併于裏則在裏亦有所併則
在半表半裏麻黃之辛能散表邪用汗而泄澤瀉味鹹能引裏邪由溺
而泄柴胡升陽發熱居表裏之間而和解之此但可以治實瘧虛者當
辨其氣血而加補劑晝發屬氣 夜發屬血

清脾飲治瘧疾熱多寒少口苦噤乾小便赤澀脈來弦數

苦楝乾肝胆火也熱盛故便赤瘧邪居于半
表半裏屬小腸中腸之分肝脾屬木故麻弦

青皮 厚朴 柴胡 黃芩 半夏 茯苓 白朮 甘草 草菓

加姜煎一方加檳榔大渴加麥冬知母痰不止加酒炒常山 烏梅二

常山劫痰截瘧
烏梅飲陰清熱

此足少陽太陰藥也瘧為肝脾之邪然多因脾胃受傷而起脾屬濕二

重感于濕濕生熱熱生痰故見前症也脾既受病木又對之故用青皮

柴胡以破滯而伐肝柴胡疏上焦肝氣半夏厚朴以行痰而平胃厚朴

積寒除痰而截瘧能清膏蓋先去其害脾者而以白朮甘草調而補之

也此即小柴胡湯加減從溫脾清方而一變也虛瘧之用吳鶴臯曰清
脾非清涼之謂乃攻去其邪而脾部為之一清也劉宗厚因黃芩之
辛熱而訛焉是未達厥用和氏之清矣張子和曰世醫以和為藥之
者歸之崇怪良可笑也劉宗厚曰暑濕陽極伏陰在內人或納涼潔滯
寒客肌肉之間或飢飽勞役內傷而病作肌肉屬脾發則惡寒戰慄乃
謂之脾寒耳實由風寒濕熱邪鬱於脾夏時毛竅疎通而不為病至秋
氣收斂之際表邪不能發越故進退不已往來寒熱勢如委人之狀
由脾胃和精氣通陰陽和解諸邪悉散實非脾病也世用發表兩劑溫
經散寒等法亦未嘗執于燥脾劫劑也昂按脾虛惡寒胃虛惡熱寒熱
間作脾亦有之不獨少陽也雖十二經皆能為瘧而脾胃受傷者實
多故仲景小柴胡湯入參甘草半夏黃芩皆脾胃藥其治瘧受傷者實
一而而巳嚴氏宗之故以小柴胡加減而立清脾飲是明也脾胃論治
矣劉氏之論亦主脾胃內傷乃不取胡子和之案以為非病恐不然

醫方集解 卷二 清脾飲

也又古方用神丹雄珠丸治鬼瘧蓋每
病多有熱毒者何獨干瘧必云無此也

痛瀉要方 治痛瀉不止脾虛故瀉肝實故痛吳鶴臯曰此身傷食

故責之上取木賊也。就氏曰水瀉腹不痛者瀉也痛甚而瀉瀉血痛
減者食積也瀉水腹痛腸鳴痛一陣瀉一陣火也或瀉或不瀉或多或
少者痰也完穀不化者氣虛也

白朮 芍藥 防風 或煎或丸久瀉加升麻

此足太陰厥陰藥也白朮苦燥濕甘補脾溫和中芍藥瀉肝火酸斂

逆氣緩中止痛防風辛能散肝香能舒脾風能勝濕為理脾引經要藥

東垣曰若補脾胃陳皮辛能利氣炒香尤能燥濕醒脾使氣行則痛止

數者皆以瀉木而益土也

黃連阿膠丸 治冷熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴
小便不利 濕熱鬱于腸胃故

黃連一兩 茯苓二兩 阿膠一兩 為末水熬阿膠為六空心米湯下延年加

茯苓加乾薑當歸名駐車丸治同

此手足陽明藥也黃連瀉火燥濕開鬱消痰以平其痛熱阿膠補陰益

血潤燥利腸以和其裏急茯苓能令肺氣下降通于膀胱清熱利水止

渴除煩為清解之平劑

仲景黃連阿膠湯黃連四兩 芍藥二兩 阿膠三兩 雞子黃二枚 治傷寒

少陰病得之二三日以上心煩不得臥

陽熱所灼故心煩不得臥本連之苦以除熱雞子阿膠之甘以益血芍

藥之酸以收陰氣用苦寒甘潤酸斂之劑收攝其欲亡之液陰較之四

逆一水一火為不同矣

海藏黃連阿膠湯黃連四兩 黃柏阿膠各五兩 山梔五兩 每服四錢治傷寒

熱毒入胃下利膿血虛和苦嘔腹痛加芍藥血不止加枳

生薑 陳細茶 每味約三錢濃煎服或微炒煎

此足太陰陽明藥也茶助陰姜助陽使寒熱平調並能消暑解酒食

此方用之厚勿勿以藥之平淺而忽之也

本方除生薑加陳曰梅蜜木煎名梅蜜飲治熱痢除茶加木香肉蔻治

冷痢

治傷寒病後嘔噦不下食

此日初病時熱虛多服冷藥便發故脾胃虛

荊根湯 治傷寒病後嘔噦不下食

此足太陰陽明藥也荊根甘寒降伏火利小水竹茹甘寒除胃熱清燥

金生薑辛溫祛寒飲散逆氣三者皆能和胃胃和則嘔止加梗米者亦

藉以調中州也

陰陽水 治霍亂吐瀉有神功

本藥中治霍亂之最多然有寒熱三症而

不救者卒患此厥候未審切勿輕投偏熱偏寒之劑惟飲陰陽水為最

則生熱心火上炎故吐瀉者胸也脾濕下注故瀉瀉者濕也風水所射則

轉筋轉筋者風也又邪在上焦則吐在下焦則瀉在中焦則吐瀉交作

沸湯 井水 各半鍾和服

此中焦分理陰陽之藥也陰陽不和而交爭故上吐下瀉霍亂飲此

輒定者分其陰陽使和平也

甘草黑豆湯 解百藥毒兼治筋疝

筋疝者莖中孽痛挺膜不堪此由用

此足陽明藥也甘草和中以解毒黑豆散熱以解毒

然又加甘草 若治筋疝當用甘草稍以稍能徑達中也

本方加大黃名大黃甘草湯治上中下三焦消渴

醫方集解卷之三

休寧訥菴汪 昂暑輯

弟殿武汪 桓泰閣

男其兩汪 端

理氣之劑 經曰諸氣鬱結皆屬于肺又曰怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下悲則氣收怒則氣泄喜則氣亂悲則氣耗

諸症之類 凡有氣鬱結者皆屬于肺又曰怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下悲則氣收怒則氣泄喜則氣亂悲則氣耗

升中 補中益氣湯

虛或喘或嘔 陽虛自汗 宜本湯加麻黃根浮小麥升安宜宜或氣

醫方集解

虛不能攝血 以瘡痢脾虛久不愈一切清陽下陷中氣不足之症

脾胃也 藏府肢體皆稟氣于脾胃 飢飽勞傷其脾胃則氣血虧損 而皆病矣 陽氣不固則陰火大乘 故熱而煩 非實熱也 頭暈目眩 氣清陽不升 則濁氣上逆 故頭痛或作或止 非如外感頭痛不也 陽虛不能衛外 故惡寒自汗 氣虛故懶言 食則胃虛則火也 于肺故喘金受火劫不能生水 故渴脾虛不能運血 故血妄行而吐下清陽下陷 則為瀉痢 氣血兩虛 則痛不止 名瘡瘻也 李東垣內傷外感辨傷于飲食勞役七情六慾 為內傷 傷于風寒暑濕為外感 內傷發熱時時止 飲食勞傷七情六慾 為內傷 傷于風寒暑濕為外感 寒雖厚衣烈火不除 內傷惡風不長 甚風反畏 惡寒得便解 外感惡惡內傷頭痛乍痛乍止 外感頭痛連綿不休 宜表邪方宜內傷有濕或不作渴或心大乘 脾亦作渴 渴外感須二三日外表熱甚 方作渴 內傷則熱傷氣四肢困無力 怠倦嗜睡 外感則傷風傷寒 則一身筋骨疼痛 內傷則短氣不則以無外感則喘急感有作內傷則手熱外感則手背熱 天氣通于脾胃 脾胃之氣通于脾胃 則鼻寒傷風則流涕 然能飲食 口知味 腹中大便如常 地氣通于脾胃 則迎脈主表 外感則人迎大子氣口右氣口脈主裏 內傷則氣口大于人迎 內傷證屬不足 宜溫補宜和 外感證屬有餘 宜汗宜吐宜下 內傷之症 候作外感 妄發其表 重虛元氣 補如反 宜汗宜吐宜下 內傷之又有內傷外感 兼病者 若內傷重者 宜補養為先 外感重者 宜疏散

醫方集解 卷三

為急此湯惟上焦痰喘中焦

黃耆 錢多 人參 甘草 白朮 炒陳皮 白當歸 升麻 三

柴胡 三 薑三片 棗二枚 煎如血不足加當歸 精神短少加人參 五味

肺熱咳嗽去人參 藍乾加葛根 能升胃中清氣入肺而生水耳 頭痛

加蔓荊子 痛甚加川芎 腦痛加藜蘆 本細辛 風濕相搏 一身盡痛 加羌活

防風 有痰加半夏 生薑 胃寒氣滯加青皮 慈仁木香 益智腹脹加枳實

厚朴 木香 砂仁 腹痛加白芍 甘草 熱痛加黃連 能食而心下痞加黃連

咽痛加桔梗 有寒加肉桂 濕勝加蒼朮 陰火加黃柏 知母 陰虛去升麻

加熟地 山茱山藥 大便秘加酒煨大黃 咳嗽者加旋覆 疑冬夏加麥冬

五味 秋加麻黃 黃芩冬加不去根 節麻黃 天寒加乾薑 泄瀉去當歸 加

茯苓 蒼朮 益

醫方集解

此足太陰陽明藥也 肺者氣之 黃耆補肺固表為君 脾之本 上

生金 脾胃一 人參 甘草 補脾益氣 和中瀉火 為臣 東垣曰 參者 草

虛而熱 得甘溫以補元氣 白朮 燥濕強脾 歸和血 養陰為佐 補

和陰 不然 升麻 以升陽明清氣 右升而後 柴胡 以升少陽清氣 左

陽升則萬物生 清升則陰濁降 加陳皮者 以通利其氣 陳皮同補藥 則

生薑 辛溫 大棗 甘溫 用以和營衛 開腠理 致津液 諸虛不足 先建其中

中者何 脾胃是也 李東垣曰 脾胃虛者 因飲食勞倦 心火亢甚 承其

脾胃一虛 肺氣先絕 故同黃耆 以益皮毛 而固腠理 不令自汗 上喘氣

短故以人參 補之心 大參 脾胃用多 草甘溫 以海大熱 而補脾元 若脾胃

急痛 併大虛 腹中急 宜多用之 中滿者 減之 白朮 苦甘 溫除胃中之

熱利 脾胃間血 胃中清氣 在下必加升麻 柴胡 以升之 引參者 甘草

清濁相干 用去白朮 皮以理之 又助陽氣 上升以散滯氣 脾胃氣虛 為

陰火傷 其生火之氣 營血大虧 血滅則心無所養 致令心滿 而煩病名

曰恍惚 故加甘辛微溫之劑 生陽氣 仲景之法 血虛以人參 補之 陽旺則

氣而兼順氣者氣順則風散風邪卒中常先治標若氣虛病久者非

所宜也... 氣逆... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

或大便不通... 蘇子半夏... 蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

蘇子降氣湯... 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘咳吐血

木香 草薹仁 益智 蒼木 厚朴 青皮 陳皮 半夏 吳茱

此足太陰陽明藥也木香厚朴青皮陳皮辛能行氣兼能平肝草薹

智香能舒脾蒼木半夏燥能勝濕乾薑吳茱能散寒升柴之輕以升

其陽春瀉之淡以泄其陰蓋脾為中樞使中樞運轉則清升濁降上下

宜通而陰陽得位矣然皆氣藥恐其過燥故重用當歸以濡其血共成

益脾消脹之功也

四磨湯 治七情氣逆上氣喘急妨悶不食

枳殼 沉香 烏藥 人參 等分濃煎三四沸溫服一方人參易

枳殼一方去人參加枳實木香白酒磨服名五磨飲子治暴怒死名

曰氣厥

此手太陰藥也氣上宜降之故用枳殼沉香

逆有順之故用烏藥加人參者降中有升瀉中帶補恐傷其氣也大實

者仍宜枳殼

越鞠丸 統治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不消

也六者之中以氣鬱為主氣行則鬱散矣吞酸嘔吐由火鬱食滯不消

由濕鬱不化行則滯滯則食自降六鬱不消風寒者氣鬱不化

由熱鬱不化行則滯滯則食自降六鬱不消風寒者氣鬱不化

由食鬱不化行則滯滯則食自降六鬱不消風寒者氣鬱不化

由痰鬱不化行則滯滯則食自降六鬱不消風寒者氣鬱不化

氣鬱加木香檳榔食鬱加麥芽山查砂仁挾寒加吳茱萸又或春加防
風夏加苦參冬加吳茱萸經所謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之
也

此手足太陰手少陽藥也吳鶴皋白越鞠者發越鞠鬱之謂也香附開
氣鬱蒼木燥濕鬱無芎藭血鬱梔子解火鬱神麴消食鬱陳來草曰皆
理氣也氣暢而鬱舒矣

曰諸氣鬱皆屬于肺又鬱病多在中焦中焦脾胃也水穀之海五藏
六府之主四散一有不平則中氣不得其和而先鬱矣此方藥兼并降
者將欲升之必先降之將欲降之必先升之蓋本辛熱壯胃胃強脾
能運入諸經運流陽明之濕通於飲食消於中快於下氣不最速
一升一降故鬱散而平無芎藭足厥陰直達三焦上行頭目下行血海
為通陰陽血氣之使不但開中焦而已胃主行氣于三焦脾主行氣于
三陰脾胃既布水穀之氣得行則陰陽氣不受礙金之鬱皆由胃氣
而得通利矣○或問丹溪曰脈訣云無則生氣冷則生氣皆于胃氣
之言而丹非然則諸氣諸飲皆吐否酸反胃諸病將無寒症耶曰五
藏各有火五志散之其火隨起若諸寒為病必須身犯寒氣口食寒物
非若諸火病自內作所
以氣鬱火病十無一二

七氣

七氣湯三四方亦治七情氣鬱痰涎結聚咯不出嘔不下胸滿喘急或
咳或嘔或攻衝作痛七氣者寒熱喜怒憂愁也七情之病令人氣滯
半夏五錢 厚朴三錢 茯苓四錢 紫蘇二錢 加薑煎

此手足太陰藥也氣鬱則痰聚故散鬱必以行氣化痰為先半夏辛溫
除痰開鬱厚朴苦溫降氣散滿紫蘇辛溫寬中暢肺定喘消痰茯苓甘
淡滲濕益脾通心交腎痰去氣行則結散鬱解而諸症平矣

本方加白芍陳皮人參桂心亦名七氣湯 治七情鬱結陰陽反戾吐
利交作寒熱眩暈痞滿噎塞

四七湯局方亦名 治七情氣鬱痰涎結聚虛冷上氣或心腹絞痛或膨
脹帶急針經云胃絡不和喘出于陽明之上

溫中解鬱

此足陽明藥也成氏曰鞭則氣堅旋覆之鹹以吳茱萸性則氣浮代類
之重以鎮虛逆能養陰血止反胃又辛者散也生薑之辛以散虛痞甘者
緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱用此湯下利者生薑瀉心湯活
人云有旋覆代類症或咳逆氣虛者先服四逆湯胃氣逆不降者神効
後服此湯為良周揚俊曰子母倍之以治反胃食氣逆不降者神効
丁香柿蒂湯氏 治久病呃逆因下寒者按方書無字或作噦說又曰
噦氣也海藏東垣皆以噦為乾嘔人多非之今從俗作噦說此病有
因痰且氣滯者有因血瘀者有因火鬱者有因胃熱失下者此皆屬實
有因中氣大虛者有因大下胃虛陰火上衝者此皆屬虛寒熱虛實治
法不一古方以此湯治寒呃難病本于寒然亦有火也○呃在肝焦散
氣不運其聲短小得食即發呃在下
煎真氣不足其聲長大不食亦然

丁香 柿蒂 人參 生薑 一方加陳皮半夏茯苓甘草厚薑
此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

人參 官桂 半夏 甘草 加薑煎心腹痛加延胡索能行血中
而此獨異者蓋鬱久則濁氣閉塞而清氣日薄矣故雖痛難脹而不用
木香枳殼用人參以壯主氣之藏 官桂以制謀慮之鬱 肝者將軍之
官桂能平肝鬱久生痰半夏為之驅逐鬱故不和國老為之調停 甘
桂性辛溫疎氣甚捷鬱結者還為和暢矣湯名四七者以四味治七情
也 玉機微義曰經云寒則氣收宜辛
散之甘緩之此治氣虛寒鬱藥也

代類旋覆湯 治傷寒發汗若吐若下解後心不痞鞭噫氣不除汗出
大邪難解胃氣弱而不和虛血上
逆故痞鞭噫氣即俗所謂受氣也
旋覆花 代類 人參 甘草 半夏 生薑 大棗 十二
名 氣 湯 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩

此足陽明藥也成氏曰鞭則氣堅旋覆之鹹以吳茱萸性則氣浮代類
之重以鎮虛逆能養陰血止反胃又辛者散也生薑之辛以散虛痞甘者
緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱用此湯下利者生薑瀉心湯活
人云有旋覆代類症或咳逆氣虛者先服四逆湯胃氣逆不降者神効
後服此湯為良周揚俊曰子母倍之以治反胃食氣逆不降者神効
丁香柿蒂湯氏 治久病呃逆因下寒者按方書無字或作噦說又曰
噦氣也海藏東垣皆以噦為乾嘔人多非之今從俗作噦說此病有
因痰且氣滯者有因血瘀者有因火鬱者有因胃熱失下者此皆屬實
有因中氣大虛者有因大下胃虛陰火上衝者此皆屬虛寒熱虛實治
法不一古方以此湯治寒呃難病本于寒然亦有火也○呃在肝焦散
氣不運其聲短小得食即發呃在下
煎真氣不足其聲長大不食亦然

丁香 柿蒂 人參 生薑 一方加陳皮半夏茯苓甘草厚薑
此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而後賢生薑去痰開鬱而散寒柿
蒂苦澁而降氣人參所以補真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

歸脾湯

不眠或脾虛不能攝血致血妄行及婦人經帶不能生血而血少故怔

形之氣又有當歸為引則從之而生血矣經曰陽生則陰長此其義耳

此足太陰厥陰藥也當歸氣味俱厚為陰中之陰故能滋陰養血黃耆

乃補氣之藥何以五倍于當歸而又云補血湯乎蓋有形之血生于無

得以此此血中之伏火耳○綱目曰四物與桂枝麻黃白虎柴胡

加大大黃名生地黃耆湯治婦人血風症去血過多因而燥個循衣摸

床撮空閉目揚手擲足錯語失神脈弦浮而虛男子去血過多亦有此

藥也自外而之內者用之生地黃連湯血藥也日內而之外者用之氣

血合兩循衣撮空症同日氣之血而復之氣者大承氣湯下之自血

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾怔忡忘驚悸盜汗發熱體倦食少

人參養榮湯 治脾肺氣虛榮血不足驚悸健忘發熱食少無味身

倦肌瘦色枯氣短毛髮脫落小便赤澀

此手少陰藥也人參黃耆以補心氣川芎當歸以養心血二伏遠志柏

仁酸棗以泄心熱而寧心神五味收神氣之徐越半夏去擾心之痰涎

甘草補土以培心子赤桂引藥以入心經潤以滋之溫以補之酸以飲

之香以舒之則心得其養矣

助參耆而補氣 助參耆而補氣 助參耆而補氣

諸病悉除矣 諸病悉除矣 諸病悉除矣

薄荷 兩 川芎 防風 犀角 柿霜 甘草 兩 桔梗 兩 蜜丸

此手太陰藥也薄荷辛香升浮消風散熱清肺是以能治血病防風血

藥之使瀉肺搜肝為上部血藥之使川芎血中氣藥升清散瘀則清

降為通除陽柿霜生津潤肺犀角涼心清肝甘草煖炎上之火勢桔梗

血氣之使載諸藥而上浮又甘桔相合為清咽利膈之上劑也

遺元水 飲自已瀉 治咳血吐血及產後血運陰虛久嗽火蒸如燎血生

統于脾藏于肝宜布于肺靜則歸經熱則妄行火傷肺絡血隨咳出或

帶痰中為咳血吐血多者為吐血產後去血過多則發運肺主皮毛故

熱如 火燎 童便 取十一二歲無病童子不茹葷辛清微如水者去頭尾熱飲冬

則用湯溫之或加藕汁阿膠和服有痰加薑汁

此手太陰足少陰藥也童便鹹寒降火滋陰潤肺散瘀故治血症火嗽

血運如神北齊褚澄曰喉不容物壅塞必咳血既滲入愈滲愈咳愈咳

性溫不寒飲之入胃隨脾之氣上歸于肺下通水道而入膀胱乃其舊

路故能治肺病引火下行其味鹹而走血故治血病當熱飲熱則真氣

尚存其行自速於則惟性鹹寒之性而已李士

材曰煉成秋石與元之氣漸失不及童便遠矣

麻黃人參芍藥湯 治吐血外感寒邪內虛濕熱 東垣常治一貧上病

網居噴室臥熱炕或而吐血東垣謂此久虛弱冬居噴室衣單薄是

重虛其陽表有大寒過裏熱火邪不得舒伸故血出於日當補表之

陽瀉裏之虛熱因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不

與之遂成動血却與麻黃湯立愈與此甚同因作此湯一服而愈

桂枝 五分 補 麻黃 五分 黃耆 五分 甘草 五分 芍藥 五分 白芍 五分 人參 五分 麥冬 五分 五味子 五分 當歸 五分 熟地 五分

此足太陽手足太陰藥也綱目曰觀此一方足以為萬世模範矣蓋取

仲景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人當服仲景方者當以此為則

犀角地黃湯 治傷寒胃火熱盛吐血衄血便血畜血如狂嗽水

不飲漿及陽毒發斑 口血吐血衄血便血畜血如狂嗽水

火氣急延故隨經直犯清道而鼻衄其血走而不守隨氣而行

者則為咳血咯血其存胃中者為吐血之熱在肺則咳血之熱在

或為火過故嘔血從喉而出也心後熱於肺則咳血之熱在

血為熱傷寒熱動血為熱動血熱動血熱動血熱動血熱動血

熱二症傷寒便血為傳熱邪熱邪熱邪熱邪熱邪熱邪熱邪熱邪

水不欲飲熱在經未入裏也血發熱而內不渴故雖嗽水而不

海藏曰大凡血症皆不飲水惟氣發熱而內不渴故雖嗽水而不

欲飲者其熱在表發熱而內不渴故雖嗽水而不欲飲者其熱在

疹者其熱在裏發熱而內不渴故雖嗽水而不欲飲者其熱在

胃則發熱下泄熱而內不渴故雖嗽水而不欲飲者其熱在

如綿紋者為斑疹輕而斑重色紫黑者熱極而胃爛也

真不可汗汗之重合開泄更增斑瀾亦不可下恐毒內陷也

生地黄 兩 白芍 兩 丹皮 犀角 二錢 牛黃 一分 犀角 二錢 牛黃 一分

每服五錢熱甚如狂者加黃芩一兩因怒致血者加梔子柴胡

之入藥 二焦之火梔子瀉三焦 節菴加當歸紅花桔梗陳皮甘草藕汁

名加味犀角地黃湯以治同 利上焦陳皮以導中焦紅花以行下焦

此足陽明太陰藥也血屬陰本靜因諸經火逼遂不安其位而妄行犀

角太寒解胃熱而清心火芍藥酸寒和陰血而瀉肝火丹皮苦

寒瀉血中之伏火主地大寒涼血而滋水以其平諸經之僭逆也

分三部藥有重輕犀角地黃湯治上血如吐衄之類桃仁水氣湯治中

血如血育中焦下痢膿血之類抵當湯治下血如便血之類黃芩

芍藥湯凡病陰所主脾不運血而上行實者犀角地黃湯治上

黃芩芍藥湯凡病陰所主脾不運血而上行實者犀角地黃湯治上

胃而為對症若陰虛火動血能下人醫水引地黃湯治上

上故為對症若陰虛火動血能下人醫水引地黃湯治上

胃者皆所不宜○傷寒汗出不微能通動經血其功甚速

二清者不問上宜○傷寒汗出不微能通動經血其功甚速

血痔
二陰
之支
各錢
燥金
馳大

之問五府之血出于肝
門餘孔處治各不同

槐花 側柏葉 荆芥 枳殼 炒 等分為末每服三錢米飲下

此手足陽明藥也側柏養陰燥濕最清血分槐花疎肝瀉熱能涼大腸

荆芥散 搜風 枳殼寬腸利氣 此病多由濕熱風燥之邪如

者溫補及升舉藥大法涼血用槐花地榆漏卮條芩炒連梔子生地

血用阿膠當歸川芎白芍風濕用秦九防風荆芥木茨黃者少

桃仁紅花蘇木寬腸用枳殼升舉用升麻生血補氣加人參黃耆白

甘草○柏葉生而向西稟金兌之正氣能制肝木不生升金主降

荆配夫婦之道和則血得以歸肝故仲景治吐血不止氣血虛寒用柏

葉湯前葉乾薑各三兩艾三把馬糞汁一升合煮服馬糞午為難復之

心火

本方除柏葉荆芥加當歸黃芩防風地榆酒糊丸名槐角丸治同

本方加當歸生地川芎入烏梅生薑煎名加減四物湯治同

非風痞于腸胃故也本方除柏葉枳殼加當歸川芎熟地白木青皮升

麻亦名槐花散又名當歸和血散治腸癖下血濕毒下血本方除柏

葉枳殼加青皮等分亦名槐花散治血痢腹痛不痛不裏急後重單用

槐花荆芥炒黑為末酒服亦治下血

秦艽白朮丸 治痔瘡痔漏有膿血大便燥結痛不可忍

主收司行津液以從足陽明胃土之化則生血化萬物人或醉飽入房

酒熱留者忍精不泄流注陰間前陰之氣歸于大腸木乘火勢而燥

金大就燥則大便閉而痔作矣受病者燥氣也為病者胃

濕也濕熱風燥四氣合邪法當瀉火潤燥疏風和血止痛

秦艽 白朮 歸尾 洗桃仁 枳實 皂角子 澤瀉 地榆 三

麩糊丸 此手足陽明藥也李東垣曰秦艽桃仁歸尾潤燥和血

仁以除風燥地榆以破血止血枳實苦寒以補腎而泄胃實澤瀉淡滲

使氣歸于前陰以補清燥受胃之濕邪也白木之苦以補燥氣

之不足其味甘以瀉火而益元氣故曰甘寒瀉火乃假枳實之寒也大

便秘瀉以大黄推之其津液益不足用歸和血加油潤之劑自然冥

利矣

本方除白木枳實地榆加蒼朮黃柏大黃檳榔防風名秦艽蒼朮湯治

同李東垣曰腸頭成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者兼受火

防除是角枳實地榆加防風升麻柴胡陳皮大黃黃柏紅花炙草名秦

丸防風湯治痔漏大便時疼痛者非痔漏也本方用秦艽一味加羌

活防風麻黃升麻柴胡藥本細辛黃耆炙草紅花名秦艽羌活湯治痔

漏成地下垂不任其癢本方除地榆加大黃紅花名秦艽當歸湯治痔

漏大便燥結疼痛以上皆

芍藥湯 治下痢膿血稠粘腹痛後重

非後重氣血皆滯也劉河間曰行

血則膿血自愈調氣則後重自除

芍藥 歸尾 黃芩 黃連 大黃 木香 檳榔 甘草 桂

每服五錢利不減加大黃

此足太陰手足陽明藥也芍藥酸寒瀉肝火飲陰氣和營衛故以為君

大黃歸尾破積而行血木香檳榔通滯而行氣黃芩黃連燥濕而清熱

蓋下痢由濕熱鬱積于腸胃不得宣通故大便重急小便赤澀也辛以

散之苦以燥之寒以清之甘以調之加肉桂者假其辛熱以為反佐也

湯而加行血調氣之藥

本方除桂甘草加枳殼名道滯湯

治前症兼渴者

以甘芍和中止腹痛熱痛加芩連寒痛加姜桂以木香檳榔行氣除後

重氣分加枳殼滑石寬腸血分加當歸枳實和血以秦艽皂角子祛腸風

重不解去換柳換
條岑加升麻提之

蒼木地榆湯 治脾經受濕痢疾下血

蒼木 地榆 每一兩煎

此足太陰陽明藥也蒼木燥濕強脾升陽而開鬱地榆清熱涼血酸收
能斷下為治血痢腸風之平劑初起者勿用

本方加芍藥阿膠卷柏名芍藥地榆湯 治泄痢膿血乃至脫肛

補血與液為肺大
腸要藥能治熱痢

小菊飲子 治下焦結熱而成血 水心主血小腸其府也熱毒搏血流入
小腸滲入膀胱心熱者小腸必熱經所謂胞移熱于膀胱則癃溺血是
也然熱必兼濕戴氏曰血鮮者心小腸實熱血瘀者腎膀胱虛冷準繩
曰多有熱極而凝凝者不可更以爲
小菊 蒲黃 滑石 木通 生地黃 梔子 淡竹葉 當

血淋 小便不利 日痰

此手足太陽藥也小菊藜蘆節退熱散瘀生地涼血蒲黃止血生行血木
通降心肺之火下達小腸梔子散三焦鬱火由小便出竹葉涼心而清
肺肺為清之源凡
通淋者必先清肺 滑石瀉熱而清竅當歸養陰能引血歸經甘草益
陽能調中和氣也

歸 甘草 各五分

傷元氣活湯 治從高墜下惡血留于脇下疼痛不可忍

積血 傷元氣

積血 傷元氣

柴胡 當歸 枳實 川山甲 甘草 紅花 桃仁 大

黃酒 每服一兩加酒煎以利爲度 藥內無羌活酒

此足厥陰藥也原文曰肝胆之經行于脇下屬厥陰少陽故以柴胡引

用爲君以當歸活血脈以甘草緩其急爲臣亦能生新血陽生則陰長

也以穿山甲花粉桃仁紅花破血潤血爲佐以大黃湯滌敗血爲使氣

味相合各有攸歸痛自去矣

祛風之劑 六淫風寒暑濕燥火也六者之中風流爲首故經曰風者

又曰風者善行而數變至其變化乃爲地病無常方然其風也則

伏食其熱也則筋肉益天地間惟風無所不入人之受之者性爲

自重則爲傷又取則爲中然必其人與氣虛也故中風之症河間以

乘虛而入心火暴發其所以爲熱生痰生熱生風東垣以爲本

氣自病若以風爲虛者所以治之有清熱化痰生風順氣之不

而治法亦異丹溪之藥也○按內經論論論論論論論論論論論

也故治亦異丹溪之藥也○按內經論論論論論論論論論論論

方亦次木門

小續命湯 治中風不省人事神氣潰亂半身不遂筋急拘攣口眼喎

邪語言蹇流風濕腰痛痰火併多六經中風及剛柔二瘕 陰虛火旺痰

則拘急風中口而則爲左不遂氣虛風中右體爲右不遂風中筋

直以寒能流風濕腰痛痰火併多六經中風及剛柔二瘕 陰虛火旺痰

心經手少陰爲脾絕脈合爲肝絕脈絕脈者皆不治或只見一二症向有得生者

直以寒能流風濕腰痛痰火併多六經中風及剛柔二瘕 陰虛火旺痰

引邪入中府不入于經則入于腑入于腑則入于胃入于胃則入于脾入于脾則入于

絡之外府也但中府不入于經則入于腑入于腑則入于胃入于胃則入于脾入于脾則入于

總之也中府不入于經則入于腑入于腑則入于胃入于胃則入于脾入于脾則入于

津液也中府不入于經則入于腑入于腑則入于胃入于胃則入于脾入于脾則入于

津液也中府不入于經則入于腑入于腑則入于胃入于胃則入于脾入于脾則入于

日久不大便胸中不快加大黃枳殼散寒下利去防已黃芩倍附子加

白木嘔逆加半夏黃連手足戰掉加石黃蒲竹瀝身痛發搐加羌活口渴加麥冬花粉煩渴多驚加犀角羚羊角汗多去麻黃杏仁加白木香燥去桂附加石膏

此六經中風之通劑也吳鶴皋曰麻黃杏仁麻黃湯也治太陽傷寒桂枝芍藥桂枝湯也治太陽中風此中風寒有表症者所必用也人參甘

草補氣川芎芍藥補血此中風寒氣血虛者所必用也風溼故主以防風濕溼佐以防已寒溼佐以附子熱溼佐以黃芩病來難擾故藥亦兼

該也按中風有解表攻裏行中道三法內外症俱有者先解表而後攻裏其表症者曰此治冬月直中風寒之方亦麻黃桂枝之變法六經

有條之表症者曰此治冬月直中風寒之方亦麻黃桂枝之變法六經之而表其氣必虛世間如有便溺阻滯宜化湯麻仁九通利之然邪

風至則令人罕用然古今風方多從此方損益為治喻嘉言曰中風之脈必有所兼兼寒則浮兼熱則沉兼濕則濡兼燥則數兼痰則滑兼氣

則浮滑兼火則盛大兼陽虛則脈微兼陰虛則脈弦或細或澀或滑或

頂痛緩遲為管衛衰然或浮或沉或數或遲或弦或澀或滑或澀或

受制必死無疑若數大未至身死尚有不死者○保命集曰厥陰瀉刺不止脈沉遲手足厥逆脈細弱此為難治宜麻黃湯小續命汁之謂

有表邪宿于內當散表邪則臟腑自安矣又曰厥陰瀉刺不止脈沉遲手足厥逆脈細弱此為難治宜麻黃湯小續命汁之謂

日厥陰瀉刺以風治風小續命消風散主之

易老六經加減法本方倍麻黃杏仁防風名麻黃續命湯治太陽中風無汗惡寒本方倍桂枝芍藥杏仁名桂枝續命湯治太陽中風有汗惡

風本方去附子加石膏知母名白虎續命湯治陽明中風無汗身熱不

惡寒本方加葛根倍桂枝黃芩名葛根續命湯治陽明中風身熱有汗

惡風本方倍附子加乾薑甘草名附子續命湯治太陰中風無汗身

涼本方倍桂附甘草名桂附續命湯治少陰中風有汗無熱本方加羌活連翹名羌活連翹續命湯治中風六經混滯紫之于少陽厥陰或肢

麻身不自收口不能言局味不知痛處或抱急不能轉側錄驗方去人參加乾薑黃芩非瀝即于金大續命湯通治五瀉福枯成風

侯氏黑散治中風四肢煩重心中惡寒不足者熱而快也心中惡寒也外臺用治風癩

菊花四分防風白木十分桔梗八人參茯苓當歸川芎乾薑桂枝細辛牡蠣礬石三分右末用溫酒調方寸七服二十日

日三再冷食服四十日共六十日止則藥積腹中不下熱食即下矣此手太陰少陰足厥陰藥也菊花秋生得金水之精能制火而平木木

平則風息火降則熱除故以為君防風細辛以祛風當歸川芎以養血人參白朮以補氣黃芩以清肺熱桔梗以和膈氣茯苓通心氣而行脾

濕薑桂助陽分而達四肢牡蠣白礬酸飲清收又能化痰痰加酒服者

以行藥勢也喻嘉言曰此方治風而補虛補虛不能之至驅補之甲而行

附金匱風引湯大黃乾薑龍骨各四兩桂枝三兩甘草牡蠣各二兩滑石

膏寒水石赤石脂白石膏紫石英各六兩梓篩取三指撮煮三沸溫服治

大人風引癱瘓小兒驚癇瘧疾日數十發氏用治脚氣按黑散風引

為仲景聖方而桂枝來全續命湯又云侯氏黑散風引湯防已地黃湯

頭風麻痺之方又云仲景方書之祖復取氏方為法耶思謂仲景多方

方連連而必創自一人之手乎方若宋出此藥其大半不可不

瘋疾必氣血不足之人風引湯用大黃為君又石藥其大半不可不

活風 活血 活火

風引諸劑要存 其源流焉耳

天秦丸湯 治中風手足不能運掉舌強不能言語風邪散見不拘一

經者經曰受血而能運是受血而能少又脾主四肢脾虛血弱不能

石膏 石膏三當歸酒洗白芍 炒酒芍 生地 酒熱地 白木 炒茯苓

甘草 炙 黃芩 炒防風 羌活 獨活 白芷 兩細辛 錢 每服一兩兩

濕加生薑春夏加知母心下痞加枳殼此六經中風輕者之通劑也以

秦瓦為社者祛一身之風也以石膏為臣者散胸中之火也羌活散木

陽之風脫白芷散陽明之風 川芎散厥陰之風 細辛獨活散少陰

之風 防風為風藥卒徒隨所引而無所不至者也大抵內傷必因外

感而發諸藥雖云搜風亦兼發表風藥多燥表藥多散故疎風必先養

血而解表亦必固裏當歸養血生地滋血芍藥活血芍藥欲陰和血血

活則風散而舌本柔矣又氣能生血故用白朮茯苓甘草補氣以壯中

樞脾運濕除則手足健矣 脾主四肢 又風能生熱故用黃芩清上石膏

瀉中生地涼下以其平逆上之火也 劉宗厚曰秦瓦湯愈風湯雖皆有

大半精何以養血而益筋骨也天麻凡養血壯筋骨諸藥近理喻嘉言

曰此方既云養血而筋自柔何得多用燥藥既云壯筋骨而筋自健

風藥以動之是言與方竹葉何論三化湯愈風湯及大秦瓦湯皆似此

而非若此按此方用之類聚效亦多未可與愈風三化湯同日語也此

益初中之時外扶表邪故用麻黃以解表可用血藥氣藥以調表非能

下燥散者也治風有解表攻裏行中道三法內外症俱有者先解表而

後攻裏是也若愈風解表而麻黃大二三

化攻裏而金用承氣則非中道宜矣

附易老天麻丸天麻 風 牛膝 筋 草 筋 立 參 壯 水 制 大 杜 仲 使 筋

骨相 當歸 和 血 生 地 真 除 羌 活 竹 節 風 附 子 行 經 蜜 丸 一 方 有 獨

活五

三生飲 治中風卒然昏愈不省人事痰涎壅盛語言蹇澀等症 李東垣

非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰四旬氣衰之極或憂喜忿怒傷

其氣者多有此症壯歲之時無有也若虛者則開有之亦是形虛氣

衰而如此耳其按此

即東垣主乎氣之說

生南星 生川烏 皮生附子 去皮木香 錢 每服一兩加入參一兩煎

此足太陰陽明厥陰手少陽藥也南星辛烈散風除痰附子重酸溫脾

逐寒烏頭極溫脾逐風二藥通行經絡無所不至皆用生者取其力

峻而行速也重加入參所以扶其正氣少佐木香所以行其逆氣也

引親東垣之論當以氣虛為主雖有風邪亦是乘虛而發經曰邪之所

聚其氣必虛是也當此之時當急發散以驅之於上下或急以三

生飲一兩加入參一兩煎服此方行經治痰之劑新開王之王將

必用人參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

其用者附參兩許其藥其功而補助其氣不則不惟無益適以取敗也先

此子足少陰太陰足厥陰藥也熟地以滋根本之陰巴戟從蓉官桂附

子以返真元之火石斛安脾而秘氣山茱溫肝而固精菖蒲遠志茯苓

補心而通腎藏麥冬五味保肺以滋水源使水火相交精氣漸旺而風

熱地黃 巴戟心 山茱萸 肉從蓉 附子 地 官桂 石斛 茯苓

石菖蒲 遠志 麥冬 五味子 等分每服五錢入薄荷少許煎漿

煎服

快濕則流出有汗為柔經筋急而痛為濕筋弛而緩為痲仲縮不已為痲痲俗謂之摘是也

羌活 防風 白芷 柴胡 甘草 黃芩 半夏 川芎 芍藥

當歸 烏藥 加薑煎人薑汁竹瀝服柔痲加白木桂枝剛痲加蒼木

麻黃口噤咬牙大便實加大黃

此足太陽厥陰藥也羌防芎芷柴胡甘草辛甘以發散風邪用烏藥者

治風須順氣也用歸芍者治風先活血也用半夏竹瀝薑汁者風必挾

痰也用黃芩者風必生熱也柔痲加白木桂枝有汗欲其無汗剛痲加

蒼木麻黃無汗欲其有汗口齒屬陽明實則口噤咬牙而便秘故

加大黃以泄胃熱也

獨活湯

治風虛癱瘓昏憤不覺或為寒熱筋急而痛為痲痲而痲為

醫方集解 卷三

獨活 羌活 防風 細辛 桂心 白微 當歸 芍藥 半夏

人參 茯神 遠志 葛蒲 錢五 甘草 錢二 每服一兩加薑棗煎

此手少陰足厥陰藥也肝屬風木而主筋故癱瘓為肝邪肝欲散急食

辛以散之二活防風祛風細辛桂心溫經半夏除痰芎歸辛散風而溫

和血活血則風散辛以散之即辛以補之也

移熱于心則昏憤故以人參補心氣當歸開心竅茯神遠志安心神白

微鹹寒退熱而治厥使風靜火息血活神寧而癱瘓自已矣

活絡丹 治中風手足不仁日久不愈經絡中有濕痰死血腿臂間忽有

一二點痛

川芎 地黃 草烏 地龍 乳香 沒藥 酒下

此足太陽厥陰藥也吳鶴卑白胆星辛烈所以燥濕痰二烏辛熱所以

散寒濕蚯蚓濕土所生欲其引鳥星直達濕痰所結之處大易所謂同

氣相求也

藥以消痰血

消風散 治風熱上項頭目昏痛項背拘急鼻嚏聲重及皮膚頑麻癩疹

瘰癧婦人血風

荆芥 陳皮 白厚朴 薑汁 甘草 防風 羌活 蘆香 殭蚕 炒

蛇川芎 茯苓 人參 為末每服三錢茶湯下瘡癬酒下

此足太陽手太陰藥也羌防荆芎之辛浮以治頭目項背之風殭蚕蠶

蛻之清揚以去皮膚之風蘆香厚朴以去惡散滿參苓甘樹以輔正助

中使風邪無留連也

醫方集解 卷三

清空膏 治正偏頭痛年深不愈及風濕熱上壅頭目及腦苦痛不止

黃芩 黃連 羌活 防風 柴胡 川芎 錢五 甘草 錢二 為末每服

三錢茶調如膏日湯送下如少陰頭痛如細辛太陰頭痛脈緩有痰去

羌活防風川芎甘草加半夏如偏頭痛服之不愈減羌活防風川芎一

半加柴胡一倍相火如自汗發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎

湯加白芷

此足太陽少陽藥也頭為六陽之會其象為天清空之位也風寒濕熱

午之則渴陰上壅而作實矣羌防入太陽柴胡入少陽皆辛輕土升祛

風勝濕之藥川芎入厥陰為通陰陽血氣之使甘草入太陰散寒而緩

痛辛甘發散為陽也芩連苦寒以羌防之風升之則能去濕熱于高顛

之上矣按此即內經所謂行痛痛也經曰風寒濕三者雜合而為痺也

又云治少陽頭痛如痛在太陽陰少勿川芎獨勝也○頭痛用

羌活防風柴胡川芎升麻細辛藜蘆之具者分各散也川芎黃連黃

柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

黃連黃柏知母石膏生地之與者分各散也川芎黃連黃柏知母石膏生地

上中下通用痛風丸丹 痛風有寒有濕有熱有痰有血之不同此為通

治此即內經所謂行痛痛也經曰風寒濕三者雜合而為痺也

黃柏酒洗南星三兩神麩炒川芎桃仁去皮龍胆草行防已行

白芷兩羌活威靈仙酒洗桂枝三錢紅花二錢麩炒

此治痛風之通劑也黃柏酒洗南星三兩神麩炒川芎桃仁去皮龍胆草行防已行

行水四者所以治濕與熱也南星燥痰散風桃仁紅花活血去瘀川芎

為血中氣藥四者所以治痰與血也羌活祛百節之風白芷祛頭面之

風桂枝威靈仙祛臂脛之風四者所以治風也加神麩者所以消中州

陳積之氣也踈風以宣于上瀉熱利濕以泄手下活血燥痰消滯以調

其中所以能兼治而通用也若不兼者以意消息可矣

此足厥陰藥也防風羌活蒼耳秦朮松節菖蒲砂草薤白以祛風兼

以燥濕血消痞能除骨節間之風菖蒲松節菖蒲砂草薤白以祛風兼

養血營筋白朮補氣而健脾四皮虎脛驅風而壯骨風從虎故虎骨治

史國公藥酒方 治中風語言蹇澀手足拘攣半身不遂痿痺不仁

羌活防風白朮土當歸酒洗川牛膝酒洗川芎杜仲姜汁炒松節

虎脛骨酥炙甲晚奎砂炒秦朮蒼耳子四兩而枳實五兩

八兩為粗末絹袋盛浸無灰酒三十觔煮熟退火湯服每日數次常

令醞醞不斷

此足厥陰藥也防風羌活蒼耳秦朮松節菖蒲砂草薤白以祛風兼

以燥濕血消痞能除骨節間之風菖蒲松節菖蒲砂草薤白以祛風兼

養血營筋白朮補氣而健脾四皮虎脛驅風而壯骨風從虎故虎骨治

史國公藥酒方 治中風語言蹇澀手足拘攣半身不遂痿痺不仁

羌活防風白朮土當歸酒洗川牛膝酒洗川芎杜仲姜汁炒松節

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

胃風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

痛風

其氣力皆在前... 驚甲亦厥陰血分之藥能益陰血而去... 肝風風濕去氣血旺則病除矣

獨活湯... 治中風身體煩痛項背拘急手足冷痺腰膝沉重舉動艱難

黃耆... 當歸... 防風... 芍藥... 甘草... 加薑棗

煎

此足太陽厥陰藥也... 辛能散寒風能勝濕防風羌活除濕而疎風氣通... 則血活血活則風散黃耆炙草補氣而實衛

活血而和營... 黃耆... 當歸... 防風... 芍藥... 甘草... 加薑棗

風濕

三痺湯... 治氣血凝滯手足拘攣風寒濕三痺... 黃耆... 當歸... 防風... 芍藥... 甘草... 加薑棗

風濕

者宜準諸此... 獨活寄生湯... 治肝腎虛熱風濕內攻腰膝作痛冷痺無力屈伸不使

獨活... 桑寄生... 秦艽... 防風... 細辛... 當歸... 芍藥... 川芎... 杜仲... 牛膝... 人參... 茯苓... 甘草... 桂心... 等

分

此足少陰厥陰藥也... 獨活細辛入少陰通血脉... 以祛風桑寄生益氣血祛風濕... 地所以活血而補陰參桂苓所以益氣而補陽辛溫以散之甘溫以

補之使血氣足而風濕除則肝腎強而痺痛愈矣... 本方除獨活寄生加羌活續斷名羌活續斷湯治同

驚風

沉香天麻丸... 治小兒因驚發搐痰多眼白癩筋... 羌活... 獨活... 沉香... 益智仁... 川烏... 附子... 天麻... 防風... 半夏... 甘草... 薑棗... 每服五錢薑三片煎

日疾因食冰臣請以冰煎此藥是治受病之源也果愈

本方三兩加附子一枚名附子理中湯亦可作九即四治中寒腹痛身

痛四肢拘急治之當分微甚微則不換金正氣散加附子附子五種散

甚者膈腹痛四肢厥附子理中湯加木人加茯苓本方加枳實茯苓蜜丸

加木瓜入肺加桑白皮入脾加木人加茯苓本方加枳實茯苓蜜丸

名枳實理中湯功治寒實結胸欲絕胸膈高起手不可運用大陷胸

不瘳者用此丸先理其氣次療諸疾用之如神渴者加花粉自汗者

加牡蠣本方去甘草加茯苓川椒烏梅名理中安臥丸治胃寒吐酸

就甘則動故去甘草得酸本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯治

則止得辛則伏故加椒梅本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯治

太陽表症不除而數下之協熱而利心下痞鞭表裏不解者之邪全藉

中氣為敷有故用理中以和裏而加桂枝以解表不名理中而名桂枝

者到底先表之意也大底陽熱為邪則腹滿而嘔除寒為邪則腹滿

而吐本方加黃連茯苓名連理湯治傷暑瀉而作濕若外感盛暑內傷

利而吐本方加黃連茯苓名連理湯治傷暑瀉而作濕若外感盛暑內傷

砂仁本方加當歸白朮陳皮厚朴川芎入薑煎名溫胃湯治憂思鬱結

脾肺氣凝脹滿上衝飲食不下本方加黃耆白芍陳皮薑香名黃耆湯

海藏亦出本方加青皮陳皮治中湯治前症腹滿痞悶兼食積者

理中例法本方加青皮陳皮治中湯治前症腹滿痞悶兼食積者

四逆湯仲景四逆者四肢厥逆也再治三陰傷寒然三陰通用之太陽

症脈沉亦身痛腹痛下利清穀惡寒不汗四肢厥冷或反不惡寒而赤

有用此者煩燥裏寒外熱或乾嘔或咽痛脈沉微細欲絕腹痛自利裏寒也三陰

順身熱脈大者逆內寒故惡寒不渴四肢厥冷反不惡寒而赤

陽氣不能敷布故一身皆痛而手足厥冷也反不惡寒而赤

微故明痛脈沉者寒即伏也按少陰脈有沉而微者數而脈大則

微也詳前論曰人知數為熱不知沉細中見數為寒其真陰寒脈常

有七八至者但按之無

力而數耳宜深察之

附子生用乾薑兩甘草各二冷服而赤者格陽于上也加葱九葶以

通陽表藥立至亡陽不用表藥外邪不服故用前湯如葱為治腹痛

者真陰不足也加芍藥二兩以斂陰咽痛陰氣上結也加桔梗一兩以

利咽利止脈不出加人參二兩以助陽補氣血嘔吐加生薑二兩以散

逆氣逆湯加減法也

此足少陰藥也寒滯于內治以甘熱故以薑附大熱之劑仲發陽氣表

散寒邪亦能發表甘草亦補中散寒之品又以緩薑附之上僭也甘草

附子為使必冷服者寒盛于中熱飲則格拒不納經所謂熱因寒用

日治寒以熱涼而行之是也此奇制之大劑也肝腎位遠非大劑不能

滿身痛者急當救裏宜四逆湯清便自調身痛者急當救表宜桂枝湯

內拘急門肢痛又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之按厥陰症四肢沉

冷指脈沉疾按之有力者為陽厥當下之宜大承氣湯如脈沉遲

按之無力者則為陰厥宜四逆湯更須速灸之凡傳經邪則為陽厥

經為熱厥直中為寒厥斯言甚謬三陰之厥多傳于手足此為熱厥少

陰之厥必發熱于一條果如神邪之說則在四五日固得矣論中何云一

日不如何無之邪而神速若此其日厥應下之者下其熱非下其寒也

遇發熱則可下遇厥則不可下矣推原其故厥陰與少陰三陰之厥

少陽在三陽為熱陽則熱則不可下矣推原其故厥陰與少陰三陰之厥

只論熱與厥之多少熱之勝復少知此症不必論其來自三陽也

陰陽過而陽不能復遂有陰中亡陽等症仲景所以調停二治法須合

陰陽過而陽不能復遂有陰中亡陽等症仲景所以調停二治法須合

在厥陰中破陽以行陰陰陽宜溫中已去若病以行陽則便宜厚朴之

辛熱之而加肝藥中微如苦寒納逆土之扶陽折陰之微矣又曰烏梅

丸於辛酸入肝藥中微如苦寒納逆土之扶陽折陰之微矣又曰烏梅

拈之也經曰凡陰陽不和則手足厥逆而利之症皆可以此方

三陽之脈俱相接于手足陰陽不和則手足厥逆而利之症皆可以此方

則手足厥冷也○附論其辨熱經絡之淺又當加和營衛併宣導之藥

陽必加陰藥一二味制其併熱經絡之淺又當加和營衛併宣導之藥

身汗或兼風也

本方加白朮大棗名木附湯治風濕相搏身腫煩疼及中寒發厥心痛本方除甘草名乾薑附子湯治下後復汗晝夜靜不嘔不渴無表症脈沉微無大熱者蓋日煩躁虛陽擾亂外見假熱也夜安靜不嘔虛之極陽必厥陽虛之極陰必凝凝而後又治中寒厥逆吐衄汗或從陰中回陽不當以晝日煩躁而疑之矣

自汗淋漓中寒之症身熱口紫眩暈無自汗者厥逆而汗者則詳之而中寒未之及何也日陽動陰靜陰寒既鬱而成熱遂從平陽傳變不一麻有定方不極推其病不詳也

及外熱煩燥陰盛格陽陰盛附湯加當歸肉桂入蜜和服名黃附歸桂湯喻嘉言曰服藥附湯後桂枝逐逐當分之邪始得藥分相當也

再入人參甘草名蓋附歸桂湯加薑煎喻氏曰服前湯後本方除甘草加葱四逆名白通湯復陽再加人尿猪胆汁名白通加人尿猪胆汁湯仲景本方加人參二兩名四逆加人參湯治惡寒脈微復利利上亡血惡寒脈微復利陽虛陰勝也利止則津液內竭再加茯苓六兩名茯苓四逆湯治汗下後病不解而煩躁汗則亡陽而表虛陰陽表裏俱虛乃生煩躁故用茯苓人參入心以除煩附子乾薑入腎以解寒本方除乾薑加芍藥三兩名芍藥甘草附子湯治傷寒發汗不解反惡寒者虛故也

惡寒脚掣急用桂枝湯誤攻其表得之便厥咽中乾煩躁吐逆與此湯以復其陽

故症雖斷于少陰而不取用四逆也

若厥愈足溫者更作芍藥湯以

和其陰其脚即伸芍藥甘草各四兩仲景別本方加吳茱萸名茱萸四逆湯治厥陰少陰腹痛本方加當歸木通名當歸四逆湯治厥寒手足厥冷脈細欲絕及男婦寒疝臍下冷引腰膝而痛寒傷營血故加當歸當歸四逆湯本方加茵陳名茵陳四逆湯治陰黃本方加生豚散陳皮名同陽返本湯治陰盛格陽本方加官桂及通草名漿水散治虛寒水瀉冷汗脈微甚者嘔吐此為急病漿水者利漿水澄微清

當歸四逆湯治厥陰傷寒手足厥寒脈細欲絕成氏曰手足厥寒者脈細欲絕者陰血內弱脈行不利與此湯復陽生陰

當歸 桂枝 芍藥 細辛 甘草 木通 大棗 仲景

又曰其人素有久寒者加吳茱萸一斤生薑六升和煮名四逆加吳茱萸湯

此足厥陰藥也成無己曰脈者血之府也諸血皆屬于心通脈者必先補心益血若先入心當歸之苦以助心血心苦緩急食酸以收之芍藥之酸以收心氣用苦急食甘以緩之大棗甘草通草以緩陰血

多矣而有因寒因熱之不同此則因風寒中血脈而通故以當歸細辛中之氣藥為君通脈散逆必先去血中之邪故以桂枝散太陽血分之風細辛散少陰血分之寒為輔未有營衛不和而脈能通者故以芍藥甘草大棗調和營衛通草利九竅通血脈關節諸藥能通之破阻滯而厥寒散矣周揚俊曰四逆湯全從同陽起是四逆散全從和陽起也起見當歸四逆全從營血通脈起見不欲入辛熱之味恐和其陰也少陰散中重在真陽陽不通則邪不去則陰寒中藏可藏血不養血則脈不起即遇久寒之人亦不用乾薑附子止用吳茱萸之走肝者自上至下生薑之辛散者

自內連外足矣

四逆散因名四逆散治傷寒少陰症陽邪入裏四逆不溫或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重陽邪傳裏熱結于裏故四逆成虛熱飲故悸裏有結熱故小便不利腹中痛下利陽邪在裏則手足必熱至太陰則手足溫至少陰則熱邪漸深四肢逆而不溫至厥陰

寒邪客之則不能固以下利也與白通湯復陽散寒服後利不止厥
逆無脈乾嘔者氣入其內為格拒陽氣逆也服此湯後脈暴出
者正氣因發泄而動也死
脈微者陽氣動也生

葱白四兩乾薑兩附子一枚人尿五合猪胆汁一合腹痛者黃陰不死也去

葱加芍藥二兩以飲陰嘔者加生薑二兩以散逆咽痛者加桔梗二兩

以利咽利止脈不出者加人參二兩以助陽

此足少陰藥也葱白之辛以通陽氣薑附之熱以散陰寒此白通湯也

服而不應者乃陰盛格拒乎陽藥不能達于少陰故加人尿猪胆汁為

引取其與陰同類苦入心而通脈寒補肝而和陰下咽之後冷體既消

熱性便發情且不違而致大益經曰逆而從之從而逆之正者正治反

者反治此之謂也以熱治寒以寒治熱為正治以熱治熱以寒治寒為

反治亦曰從治謂從其性而伏之也按厥有陰陽二

症陰厥者身涼不渴脈遲細而微陽厥者身熱極而反厥雖厥而煩躁

瀉妄身夜時溫而脈數也若陽厥極深至于身冷脈微欲絕為熱極而

醫方集解卷四白通湯

將死矣急以大承氣下之則厥愈所謂寒藥反能生脈而令身煖也若

以熱藥助其陽則陰氣暴絕陽亦絕而死矣若陰已先絕而陽亦將絕

于此時而後下之則陰陽俱竭而亦死矣

陰厥用白通湯亦當急投後則無及

附葱熨艾炙法掃治陰毒手足逆冷腹痛暴絕服白通湯或四逆湯後

用葱一大握以繩纏束切去兩頭留白寸許以火炙熱安臍上先將麝

香半分填臍中次放葱餅用熨斗盛火熨令熱氣從臍入腹痛甚者連

熨二三餅身溫有汗即瘥否則不治或用艾炙關元氣海臍下一寸五

寸為丹田三各二三壯內外協攻務令一時之內陰散陽回得汗而

解葱能通中艾性溫熱廣能開角厥助之以火故有回陽之功或用醋醋拌麝皮炒熟袋盛熨比

前法尤捷

吳茱萸湯仲景治陽明症食穀欲嘔若得湯反劇者則屬上焦食穀欲嘔

湯反劇則為少陰症吐利手足厥冷煩躁欲死吐利耗陽利損陰厥

醫方集解 卷四

陽氣厥陰症乾嘔吐涎頭痛厥陰之脈挾胃乾嘔吐沫裏寒內格也厥

內爭厥陰症乾嘔吐涎頭痛厥陰之脈上頭而痛氣上逆也按三陽

皆有頭痛太陰少陰之脈不上循頭故無頭痛惟厥陰與腎脈會

于巔亦有頭痛然風溫在少陰濕溫在太陰而頭痛是又不可拘拘

者李東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭痛足寒而氣逆也蓋太陰少

陰二經雖不上頭然痰與氣逆于膈中頭上氣不得暢而為痛也

吳茱萸一升人參三兩大棗十二枚生薑六兩

此足厥陰少陰陽明藥也治陽明食穀欲嘔者吳茱萸生薑之辛以溫胃

散寒下氣人參大棗之甘以緩脾益氣和中喻嘉言曰此明嘔有太陽

亦有陽明若食穀而嘔者屬胃寒與太陽之惡寒嘔逆原為熱症者不

同火熱上恐誤以寒藥治寒嘔也若服吳茱萸湯反劇者則仍屬太陽

熱邪而非胃寒明矣宜葛根加半夏湯小柴

煩躁欲死腎中之陰氣上逆將成危候腎中陰盛上格故用吳茱萸散

下逆人參薑助陽補土使陰寒不得上干溫經而兼溫中也吳茱萸

為厥陰本藥故又治肝氣上逆嘔涎頭痛

本方加附子名吳茱萸加附子湯治寒疝腰痛引膝丸尺脈沉遲

大建中湯金治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝皮起出見

有頭足上下痛而不可觸近者陽受氣于胸中陽虛則陰邪得以中之

高起痛不可解近之邪心為陽氣為陰寒乘于中焦故見

寒乘于中焦冷熱不消木敷心脾為子母之聲為邪所乘故痛而嘔復

食也

蜀椒二合乾薑兩人參二兩煎去滓內飴糖一升微煎溫服

此足太陽陽明藥也蜀椒辛熱入肺散寒入脾煖胃入腎命補火乾薑

辛熱通心助陽逐冷散逆人參甘溫大補脾肺之氣飴糖甘能補土緩

可和中益人之一身以中氣為主用辛辣甘熱之藥溫健其中藏以大

絀下焦之陰而復其上焦之陽也即按俗云諸病無補法此証至于不

虛損

補大補之藥將以仲仲為信欺抑以後人為然歟

十四味建中湯 治氣血不足虛損勞瘵短氣嗜臥欲成勞瘵及陰症發

斑寒甚厥微陰症發者或因汗吐下後中氣虛乏或因感寒損傷腎

火上衝薰肺而發喘其色赤紅隱隱見于肌表與陽症發斑色赤未

者不同此胃氣極虛若服寒藥立見危殆少壯年日以參耆桂附而治

功法之變者也醫不達推安足語此

黃耆 人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 粳米 芍藥 桂枝 炙甘草

川芎 麥冬 肉蓯蓉 附子 肉桂 加薑蔥煎

此是三陰陽明氣血藥也黃耆益衛壯氣補中首藥四君補陽所以益

氣參朮四物補陰所以養血芍藥地陰陽調和則血氣名安其位矣半夏

和胃健脾麥冬清心潤肺從容補命門相火之不足桂附引失守之火

而歸元于十全大補之中而有加味要以強中而威外也

醫方類聚 卷四十四 小建中湯

本方除茯苓白朮麥冬川芎熟地從容各八味大建中湯治同本方除

川芎熟地白朮附子從容加柴胡細辛陳皮名樂令建中湯治藏府虛

損身體羸瘦潮熱自汗將成勞瘵大能退虛熱生氣血喻嘉言曰樂令

辛為君意在退熱而陰虛之熱則不可退十四味建中湯用桂附從容

意在復陽而陰虛之陽未必可復又在用方者之善為裁酌耳又曰二

方治藏氣虛虛以之兩建其脾胃之陽益虛勞之病

多本脾胃故引仲建中之法乃後人起出之方也

小建中湯 治傷寒陽脈浮陰脈弦腹中急痛

者木剋土也太陽在表無腹痛少陽在中氣虛而痛

陽明腹滿急痛者裏實也宜下之太陽初起小承氣湯三陰小利而腹

痛者裏寒也宜溫之四逆湯附子理中湯中氣虛而痛

桂枝 生薑 芍藥 甘草 大枣 人參 桂枝 升糖一升微火解服

此是太陰陽明藥也準繩曰脾居四藏之中生膏榮衛通行津液一有

不調則失所育所行矣必以此湯溫健中藏故名建中脾欲緩急食甘

以緩之故以飴糖為君甘草為臣桂枝芍藥散也潤也榮衛不足潤

而散之芍藥酸寒收也泄也津液不通收而行之故以桂芍為佐生

薑辛溫大專甘溫胃者衛之源脾者榮之本鍼經曰榮出中焦衛出上

焦是以衛為陽益之必以辛榮為陰補之必以甘辛甘相合脾胃健而

榮衛通故以薑棗為使李東垣曰傷寒論云陽脈清陰脈法當建中

溫補脾胃為臣水挾木勢亦來侮土肉桂大半煎芍藥以退寒水

白朮附子湯 治風虛頭重眩若極食不知味用此暖肌補中益精

加甘草大能生血此仲景之妙法益極補作甘能補胃胃為氣血

之源氣血所從生也經曰無陽則陰無以生以甘益胃而生血自今

人但知參者為氣藥故特表而出之昂按補亦治傷寒汗後身痛表虛

血湯黃耆五倍于當歸而云補血即此義

惡寒脈遲弱者身痛乃六經俱有之症有表有裏有熱有風有濕

如被杖以此別之此症因過汗耗陰氣血少不能榮養筋骨故痛

虛故汗後汗後故脈弱用黃耆甘草之甘以補中氣芍藥之酸以收陰

氣桂枝辛熱外以益衛而實天內以和榮而補陰使中氣建立則能

生有榮衛通行津液未虛而身自汗背止虛勞不足可愈矣

氣

白木 兩甘草 兩附子 一枚 每服五錢 薑五片 葱一 枚煎

此足太陰少陰藥也喻嘉言曰腎氣虛外風人之風挾腎中陰濁之

氣厥逆上攻頭暈眩極苦難耐兼以厚虛不知食味此脾腎兩虛風

已八藏方中全不用風藥但用附子煖其水藏白木煖其土藏水上一

煖則濁陰之氣盡趨于下而二症自止製方之義精矣

木方加桂枝不用薑名甘草附子湯治風濕相搏一身煩痛汗出

惡風小便不利或身微腫風則上先受之濕則下先受之殆至兩相搏

不痛也風勝則衛氣不固故汗出而惡風濕勝則水道不行故小便不

利而後腫用白木以益土燥濕桂枝以散風固表附子以驅陰助陽甘

草以和中 本方加官桂川芎名芎木除濕湯治寒濕頭眩運

益元湯 治面赤身熱不煩而躁飲水不入口名載陽症成氏曰煩躁

更作燥煩者先燥而通復煩也從煩至躁為熱先躁後煩謂燥勝然

是也此氣欲脫而爭譬如燈將滅而後明矣按內熱曰煩謂心中鬱煩

為有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱曰躁謂身體手

足動擾欲裸衣人并為無根之火故

但躁不煩及先躁後煩者皆不治

附子 炮薑 艾葉 黃連 知母 人參 麥冬 五味子 甘草

加薑葱白煎入童便一匙冷服

此足少陰藥也附子乾薑艾葉回陽之藥協以人參甘草補其陽虛退

其陰火所謂甘溫能除大熱也黃連以折泛上之火知母以滋在下之

二陰

回陽救急湯 治三陰中寒初病身不熱頭不痛惡寒戰慄

四肢厥冷引衣自蓋臥沉重腹痛吐瀉口中不渴或指中唇青口吐

涎沫或無脈或脈沉遲無力初病無身熱頭痛是無表邪不在陽也

也引衣自蓋臥沉重是寒中少陰也腹痛吐瀉不渴是寒中太陰也

指中唇青口吐涎沫是寒中厥陰也至于沉遲無脈陰寒為已甚矣

而一身戰慄者有陽微陰勝邪氣內爭而正氣欲勝外爭而勝故身為振搖

以解也

附子 乾薑 肉桂 人參 白朮 茯苓 半夏 陳皮 甘草

五味子 加薑煎入麝三厘調服無脈加猪胆汁而通吐瀉加升

麻黃者嘔吐加薑汁吐涎沫加鹽炒吳茱萸

此是三陰藥也寒中三陰陰盛則陽微故以附子薑桂辛熱之藥祛其

陰寒而以六君溫補之藥助其陽氣五味合人參可以生脈加麝香者

通其竅也

四神丸 治腎瀉脾瀉 腎瀉者五更時瀉也經曰腎者胃之關也前陰利

閉故將交陽分則瀉也脾瀉者脾之清陽下陷不能運化則泄元氣

不足不能分別水穀不痛而瀉也兩症皆由腎命火衰不能上生脾土

故也楊仁齋曰腎命之氣

交通水穀自能化矣

被故紙 四兩酒浸 五味子 三兩 肉豆蔻 二兩 吳茱萸 一兩 鹽 月大

湯下 若平且服之至夜藥力已盡

故以為君肉滋辛溫能行氣消食煖胃固腸五味鹹能補腎酸能濟精
吳萊更辛熱除濕燥能入少陰厥陰氣分而補火生薑煖胃大薑補土
所以防水蓋久瀉皆由腎命火衰不能專責脾胃故大補下焦元陽使
火旺土強而不復妄行矣

本方單用破故紙肉苁蓉名二神丸治同
戊癸化火同為補土母之藥許學士曰有不進食者服此藥皆不
効子授二神丸頗能進食此病不可全作脾胃治蓋胃氣怯弱與元氣清
是以不能化食如服此本方單用五味子吳萊更名五味子散治同本
之下無火物終不熱也
方除五味子吳萊更加茴香一木香五錢薑黃丸亦名四神丸治同
尚香亦煖胃之藥木香行氣而實大腸用以脾和脾不使木盛尅土
也○薛氏醫案云脾胃虛寒下陷者補中益氣湯加木香肉苁蓉得順
脾氣虛寒不禁者六君子湯加炮姜肉桂命門火衰脾土虛寒者宜八
味丸脾腎氣血俱虛者十全大補湯送四神丸大便滑利小便秘澀或
肢體盡腫喘咳吐痰為脾腎
虧損宜金匱加減腎氣丸

寒積

感應丸 治新舊冷積瀉痢等症

木香 肉苁蓉 丁香 半乾薑 炮 百草霜 杏仁 一百四十粒 去皮尖 巴豆 七十粒 去心皮膜 巴豆杏仁另研同前藥末和勻用好黃蠟六兩溶化重絹濾
去渣好酒一升干砂鍋內煮數沸候酒冷蠟浮用清油一兩銚入熬熱
取蠟四兩同化成汁就銚內和前藥末乘熱拌勻丸如豆大每服三十
丸空心薑湯下

此手足陽明藥也肉苁蓉逐冷消食下氣和中丁香煖胃助陽宣壅除痺
木香升降諸氣和脾疏肝杏仁降氣散寒潤燥消積炮薑能逐細冷而
散痞通關巴豆善破沉寒而奪門宣滯寒積深痼非此莫攻百草霜和
中溫散亦能消積治痢為佐也
年六十餘游五戰犯生冷油膩肉食即作痛服升流藥海反其脈
而骨此乃脾腎久陽積冷積毒以熱下之川椒薑巴豆丸五十粒

服一日速愈自是每用
治瀉痢愈者近百人

導氣湯 治寒疝疼痛陰氣積于內復為寒邪所襲榮衛不調則成疝
寒疝水疝筋疝血疝氣疝疝如石或引腰丸而痛名寒疝疝有七種
陰疝疝結于陰器故也此方乃治疝之通劑以疝病多因寒濕所聚也
女子陰疝亦同此類○張子和曰凡遺尿秘結陰囊腫痛精滑白濁皆
男子之疝也血疝不月足愛咽乾難秘小便有塊前陰突出後陰痔核
皆女子之疝也但女
子不名疝而名瘕

川練子 錢 木香 錢 茴香 錢 吳萊更 錢 長流水煎
此足厥陰少陰藥也川練苦寒能入肝舒筋使無鬱急之苦又能導小
腸膀胱之熱從小水下行為治疝之主藥木香升降諸氣通利三焦疎
肝而和脾胃茴香能入腎與膀胱煖丹田而祛冷氣吳萊更入肝腎氣分
燥濕而除寒三者皆辛溫之品用以宣通其氣使小便下利則寒去而
濕除也

天台烏藥散 治小腸疝氣牽引臍腹痛厥陰肝脈絡于陰器上入少
牽引疝痛小腸經絡並于厥陰寒邪客于小腸小腸痛引辜丸上而不
下痛入臍腹甚則上衝心胸故俗一名小腸氣古人治法往往相類
烏藥 木香 茴香 炒 良薑 炒 青皮 錢 檳榔 錢 川練子 錢 巴豆 七粒
先以巴豆微打破同川練炒黑去毒及巴豆同餘藥為末酒下一錢
此足厥陰手太陰藥也烏藥散膀胱冷氣能消腫止痛川練導小腸邪
熱因小便下行木香青皮行氣而平肝良薑茴香散寒而煖腎檳榔性
如鐵石能下水潰堅巴豆斬關奪門破血瘕寒積皆行氣祛濕散寒之
品也

疝氣方丹 治疝氣疼痛
吳萊更 枳殼 梔子 唐菖子 俱山查 荔枝核 等分為末空心
長流水下二錢

原缺

明辨

四味香薷飲 治一切感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛重自汗肢倦或煩渴
 或吐瀉者 則傷于脾胃則利上蒸于頭則重而痛者 能傷氣故也
 香薷一厚朴姜汁扁豆黃連三錢 冷服 所謂治溫以清涼而汗
 之也 嚴作

此手少陰手足太陰足陽明藥也香薷辛溫香散能入脾肺氣分發越
 陽氣以散皮膚之蒸熱厚朴苦溫除濕散滿以解心腹之凝滯扁豆甘

淡能消脾胃之暑濕降濁而升清黃連苦寒能入心脾清熱而除煩也
 李時珍曰有處高堂大屋而中暑者因納涼太過飲冷太多腸氣為

邪所遏反中入內故見頭痛惡寒之症用香薷以發越陽氣散水和脾
 時愈王履曰此非中暑亦傷寒之類耳玉機微義曰東垣論暑病曰

冬月傷寒傳變為暑不一破為寒邪傷形此則暑熱傷元氣虛其
 有一時不收者與傷寒陰暑填到害人實同故是病何大問後人

活人書云脈虛身熱謂之中暑乃不足之症頭痛惡寒形同物用
 溫散之劑脈盛身熱謂之中熱乃六餘之症頭痛惡寒形同物用

清涼之劑薛氏曰中暑乃陰寒之症當補陽氣為主少佐以解暑先哲
 醫方集解 卷四 四味香薷飲

用乾薑附子此推內經合時從病之法也香薷飲乃散陽之藥真陰之
 劑若元氣虛犯房勞而用之者適所以招暑也李士材曰香薷乃夏

發汗之藥其性溫熱只宜于中暑之人若中寒之人誤服之反成大害
 李時珍曰香薷乃夏月解表之藥猶冬月之用麻黃氣虛者尤不可多

服今人謂能解暑乃天之氣係清邪所以中暑者少陰心經其症多與傷
 寒相似但傷寒初病未至煩渴暑初病即渴傷寒必浮脈暑脈必濡

為不同耳按張氏之辨症是也如風亦陽邪傷天氣當于頭未可
 言詞又傷寒中足六經雖係內經原文然麻黃桂枝皆肺藥清心散湯
 皆心藥水可執言傷足不傷手也○暑有胃有傷有伏有中四者輕重
 之分

本方除扁豆名黃連香薷飲治中暑熱盛口渴心煩或下鮮血本方除
 黃連名三物香薷飲治傷暑嘔逆泄瀉再加茯苓甘草名五物香薷飲

驅暑和中再加木瓜名六味香薷飲治中暑濕盛心火溫盛則加茯苓
 木瓜以再加人參黃耆白木陳皮名十味香薷飲治暑濕內傷頭重吐
 去脾濕再加人參黃耆白木陳皮名十味香薷飲治暑濕內傷頭重吐
 利身倦神昏加參耆者所以補脾益氣加苓木陳草者所以助脾調中

此足太陽手太陰藥也滑石氣輕能解肌質重能清降寒能瀉熱滑能
通竅淡能行水使肺氣降而下通膀胱火退則肺氣下降故
佳瀉止煩渴而行小便也小便利則大便加甘草者和其中氣又以緩
滑石之寒滑也加辰砂者以鎮心神而瀉丙丁之邪熱心為丁火
其數六一者取天一生水地六成之之義也故又名天水散取河間曰
其能通除上下三焦濕熱也然惟體盛濕多之人宜服之以表裏諸病蓋取
便濕熱從小便出若無濕之人而多服此則反耗其津液而渴轉甚矣
又當服
生麻散

本方加辰砂少許清心名益元散加薄荷少許清肺名雞蘇散加青黛少許
清肝名碧玉散治同本方加紅麴五錢名清六散治赤痢亦屬熱傷血分
血加乾薑五錢名溫六丸治白痢白屬熱傷氣分乾本方加生栢葉生
車前生藕節名三生益元散治血淋本方加牛黃治虛煩不得眠本方
醫方集解
卷四 雜藥 治暑九

除甘草加吳茱萸一兩名茱萸六一散治濕熱吞酸本方除滑石加黃
耆六兩大寒煎熱服名黃耆六一散治諸虛不足盜汗消渴凡渴症仿
黃耆六一散
吞忍冬九
清暑氣除煩渴止吐瀉霍亂及暑月酒飲所傷

砂仁 草菓去烏梅 甘草炙扁豆炒薑薑
此足太陰陽明藥也暑心兼濕而濕屬脾土暑濕合邪脾胃病矣故治
暑必先去濕砂仁草菓辛香溫散利氣快脾消酒食而散濕扁豆專解
中宮之暑而滲濕濕盛則津葛根能升胃中清陽而生津風藥多燥惟
烏藥清熱解渴甘草補土和中
消暑丸治伏暑煩渴發熱頭痛胃不利
半夏一斤橘五茯苓 甘草半斤薑半斤胡椒丸勿見生水熱湯下有痰

生薑湯下

此足太陰太陽藥也長夏炎熱濕土司令故暑必兼濕症見便秘煩渴
或吐或利者以濕勝則氣不得施化也此方不治其暑而治其濕用半
夏茯苓行水之藥少佐甘草以和其中半夏用醋煮者醋能開胃散水
飲熱解毒也使暑氣濕氣俱從小便下降則脾胃和而煩渴自止矣局
方取此名消暑丸意甚深遠傷暑而發熱頭痛者服此尤良
本方一兩加黃連二錢名黃連消暑丸治伏暑煩渴而多熱痰

大順散 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干陰陽氣
逆霍亂吐瀉藏府不調
乾薑 桂 杏仁 甘草 等分先將甘草用白砂炒次入薑杏炒
過去砂合桂為末每服二錢
醫方集解
卷四 大順散 五苓散 人參白虎湯

此足太陽藥也例重暑太陽 夏月過于飲冷陰寒陽氣不得伸越故氣
逆而霍亂吐瀉也脾胃者喜燥而惡濕喜溫而惡寒乾薑肉桂散寒燥
濕杏仁甘草利氣調脾胃辛甘發散之藥升伏陽于陰中亦能治之發
也如傷暑無寒症者不可執泥中傷暑毒陽外陰內故治之多用峻劑
故亦治之然有陰陽二症寒熱不同治當審慎共為
車曰此方非治暑乃治暑月飲冷受傷之脾胃耳

五苓散 治暑熱入心發熱大渴小便不利及暑濕相搏自汗身重方見
門渴者去桂加黃連藥丹淡滑伯仁每疑暑病不當發汗蓋暑傷心熱
散利水之藥使暑氣從小腸膀胱
下降則病易愈而元氣無損矣
人參白虎湯 治太陽中暈身熱汗出足冷惡寒脈微而渴方見
竹葉石膏湯 治傷暑發熱脈虛方見
利濕之劑 濕為陰邪經曰地之濕氣感則青皮肉筋脈又曰諸濕腫

渴熱

五苓散

治太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者少

少與之令胃氣和不愈若脈浮小便不利微熱消渴者此湯主之

飲水入節吐名曰水逆邪熱挾飲飲上逆故外水格而不入及傷寒

痞滿服瀉心湯不解渴而煩躁小便不利功擅瀉熱滋陰導飲生津故

在上焦而治在下焦者使濁陰出下竅而清陽之在上焦者自能宣化

乃微實而通治諸濕腹滿水飲水腫嘔逆泄瀉水寒射肺或喘或咳中

暑煩渴身熱頭痛膀胱積熱便秘而渴霍亂吐瀉痰飲濕滯身痛身重

醫方集腋 卷四 竹葉石膏散 五苓散

此皆傷濕之見症也濕勝則脾不運土不能制水溢于皮膚則腫脹併

于大腸則泄瀉水停心下則嘔吐水寒射肺則喘咳暑先入心故煩渴

五苓利小便降心火故兼治中暑煩渴肺病則全不能生水膀胱熱則

能升清而變痰多矣

猪苓 茯苓 白朮 桂枝 澤瀉 白朮 桂枝 澤瀉 白朮 桂枝 澤瀉

此足太陽藥也太陽之熱傳入膀胱之府故口渴而便不通經曰淡味

滲泄為陽二苓甘淡入肺而通膀胱為君水無當于五味故淡能利水

必上行入肺而後鹹味涌泄為陰澤瀉甘鹹入腎膀胱同利水道為臣

益土所以制水故以白朮苦溫健脾去濕為佐膀胱者津液藏焉氣化

則能出矣故以肉桂辛熱為使熱因熱用引入膀胱以化其氣使濕熱

之邪皆從小水而出也若汗下之後內亡津液而渴不便不利者不可用五

膀胱也

也

愈亦有大熱如狂小便不利而渴者此湯者使太陽隨經之邪直達膀胱

三一日肺燥不能化氣故用二苓澤瀉之甘淡以泄肺而解氣

濕不能升精故用白朮之苦溫以燥脾而升精一日膀胱無陽不能

氣故用肉桂之辛熱以溫膀胱而化陰使水道通利則上可以止渴中

可以去濕下可以泄邪熱也李東垣曰五苓散太陽之使從膀胱

出也小便不利者不宜用然太陽病而渴者利小便也五苓散下之

也與中湯治吐瀉上之半表半裏五苓散分陰陽膀胱經之半表半裏

人發熱煩渴小便赤澀下此是表裏俱見五苓散上之五苓利水

何以能止渴生津蓋濕熱當下此是表裏俱見五苓散上之五苓利水

通也周玉苓利其小便則濕熱不消津潤而渴止矣亦內經通因通用

之意李東垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以導其濕傷食者

有形之物也輕則清化或損重則方可止下

本方去桂名四苓散李東垣曰無惡寒症不可用桂枝湯使曰五苓為

若但渴則本方加辰砂名辰砂五苓散並治小便不利本方加蒼朮名

蒼朮五苓散治寒濕本方加茵陳名茵陳五苓散治濕熱黃便秘煩

醫方集腋 卷四 五苓散

渴本方加羌活名元戎五苓散治中焦積熱本方加石膏滑石寒水石

以清六府之熱名甘霖飲宜明別本方去桂澤瀉名猪苓散治

嘔吐病在膈上思飲水者本方單用肉桂茯苓等分名桂苓丸治

少陰之病也

利濕

方合益元散治諸濕淋瀝再加琥珀名茯苓琥珀湯治小便數而欠

小便頻也本方合平胃散名胃苓湯一名對金飲子治中暑傷濕停飲夾

食腹痛泄瀉及口渴便秘此上下分清其濕也按機要論泄瀉有腐屎

腐屎動蕩氣不平亦便溏瀉此因于內傷者也外感者因于六氣內傷

調五臟又有因飲食所傷而泄者皆當消導因風食泄者當解散因痰

滯上焦致大腸不固而泄者當除痰有脾胃氣本方合黃連香薷飲名

藜苓湯治傷暑泄瀉本方合小柴胡湯名柴苓湯治發熱泄瀉口渴瘧

疾熱多寒少口燥心煩以上三方並加薑棗煎師用本方治髮自及

禿落木一斤桂半斤二苓澤瀉各四兩更名茯苓木散

猪苓湯治陽明病脈浮發熱渴飲水小便不通成氏曰脈浮發熱

水中焦熱也小便不利熱結下焦津液不通也準繩曰此浮字誤也足

豚字下脫一不字也活人云豚浮者五苓散脈沉者猪苓湯按太陽篇

五苓散乃猪苓茯苓澤瀉加桂木陽明篇猪苓湯亦前二味加滑石阿

膠桂水半斤甘為陽生外阿膠滑石甘寒為陰生內陽明表之裏不

當言肝沉又詳少陰篇下利六七日咳而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯

主之難不言脈沉然少陰之脈必沉也以此推之成氏隨友誤釋明矣

昂按猪苓湯味淡氣輕雖三焦通用之藥其實太陽藥也成氏詳釋深

為當理仲景列之陽明篇亦用治少陰利取其降火行水則利自止

少陰利便為少陰藥太陽亦有四逆者豈四逆便為太陽藥乎且收

脈浮為不浮方少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者裏寒也

書中無此文法少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者裏寒也

利者陽邪入裏心煩不眠知熱也欬而嘔渴有停飲必渴而下通治

濕熱黃疸口渴渴猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠各

此足太陽陽明藥也熱上壅則下不通下不通熱益上壅又濕鬱則為

渴不眠要使水道通利則熱邪皆從小便下降而三焦俱清矣吳鶴舉

曰以諸藥過燥故又加阿膠以存津液按徐之才曰燥可去濕桑白皮

瀉為至燥之劑蓋當以行水之藥為燥而不以燥熱之藥為燥也故曰

瀉者欲于十劑之外加寒熱三劑愚所著本草衍要則以熱藥為燥劑

故用桂木猪苓湯治傷寒水氣乘心厥而心不悸者先治其水切治其厥

不爾瀉水入胃必作利也大陽症飲水過多小便必停亦治傷寒

汗出不渴者汗而不渴為邪熱未入裏故但解表利水而兼和中亦

治膀胱府欬而遺溺

茯苓桂枝甘草生薑

此足太陽藥也淡能滲水甘能寧心助陽故用茯苓辛能散飲溫能發

汗解肌故用薑桂益土可以制水甘平能補氣和中故用甘草有過汗

而悸者有此下而悸者有氣虛而悸者惟飲之為甚于邪以水停

心下無所不入侵于肺則咳傳于胃為嘔溢于皮膚為腫汗邪間為

利故經曰先治其水後治其厥厥為邪之深者猶先治水況病之淺者乎

本方去生薑加白木名茯苓桂枝白木甘草湯治傷寒吐下後心下

逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振搖者逆滿氣衝

上痛于脈也故令頭眩沉為在裏且既經吐下復發其汗則金匱用治

陽益虛而津液耗故津液竭也與此湯導飲和中益陽固衛

心下有痰飲胸下支滿目眩

小半夏加茯苓湯金匱三因名

則嘔水停胸則痞上于

之所以風為虛象氣虛其本也

防已 黃耆 兩白朮 七錢 甘草 五錢 妨服五錢加薑煎腹痛加芍

藥喘加麻黃有寒加細辛氣上衝加桂枝熱痛加黃芩寒冬掣痛加薑

桂濕盛加茯苓蒼朮氣滿堅痛加陳皮枳殼蘇葉

此足太陽太陰藥也防已大辛苦寒通行十二經開竅為治風腫

水腫之王藥黃耆生用達表治風注膚痛溫分肉實腠理白朮健脾燥

濕與黃耆並能止汗為臣防已性險而捷故用甘草甘平以緩之又能

補土制水為佐執寒辛甘發散調和榮衛為使也

本方去白朮薑蔥加茯苓為桂枝名防已茯苓湯治水在皮膚四肢

垂澁而動名皮水防已行經絡茯苓善滲濕黃耆達皮膚桂枝走肢節

沒指其履如皮不惡風不渴名皮水當發其汗又云惡寒不渴名風水

不惡寒而渴名皮水假令皮水不渴亦當發汗脈沉遲曰渴名正水脈

沉腹滿不渴名積飲水堅滿如石名石水木方加人參一兩生薑二兩防已

白朮各增三倍名防已湯治風濕脈浮多汗身重中風之脈陽浮而

脈沉遲發熱胸滿身腫汗如柏汁名黃汗木方加人參一兩生薑二兩防已

治傷濕身重腹痛腰冷不渴小便自利飲食如故

病肩下焦 腎主水濕性下流必舍于其所合而歸于坎勢也腰為腎之

出衣裏冷濕 宣明用治胞腫膀胱熱痛溺于小便上為清涕風寒濕邪

氣不能化故水道不通是太陽經上絡額而大

乾薑 茯苓 四甘草 白朮 有寒者加附子經心錄加肉桂澤

瀉杜仲牛膝治同

此足少陰太陽藥也乾薑辛熱以燥濕白朮苦溫以勝濕茯苓甘淡以

參濕甘草甘平和中而補土此腎病而皆用脾藥益土正所以制水也

陽水

舟車丸 河間微仲景十劑例 治水腫水脹形氣俱實腫脹者水道壅

而先腫下體腰腹脹大便秘也○陽水先腫上體有背手肘手三陽經陰

急為氣虛朝暮俱急為氣血兩虛腫脹由心腹而散四肢者吉由四肢

而心腹者危男自下而女自上而下皆難治腫脹昏黑則傷肝

是逆也多死 黑牽牛 四兩 大黃 酒浸 甘遂 麩裏 大戟 麩裏 芫花 醋炒 青皮 炒 橘紅 一木

香錢 輕粉 水丸 此足太陽藥也牽牛大戟芫花甘遂皆行水之厲劑也能通行十

二經之水然腫屬于脾脹屬于肝水之不行由于脾之不運脾之不運

由于水盛而來侮之是以不能防水而洋溢也青皮木香疎肝泄肺而

健脾與陳皮均為導氣燥濕之品使氣行則水行脾運則腫消也輕粉

無礙不入能去積痰故少加之然非實症不可輕投

本方減芫花大戟青皮陳皮木香加苦楝杏仁名瀉川散薑湯下五

分治同

疎鑿飲子 治遍身水腫喘呼口渴大小便秘上症為濕熱甚而氣尚實

症脈必沉數除水○羌活 秦艽 麻黃 大腹皮 茯苓皮 椒目

見陰症脈必沉遲○木通 澤瀉 商陸 赤小豆 等分加姜皮煎

此足太陽手足太陰藥也外而一身盡腫內而口渴便秘是上下表裏

俱病也羌活秦艽丸解表疎風使濕以風勝邪因汗出而升之于上腹皮

芫皮蠶皮辛散淡滲所以行水于皮膚行皮商陸檉榔椒目赤豈去脹

攻堅所以行水于腹裏木通瀉心肺之水蓮子少腸澤瀉瀉脾腎之水

利後利前
日救陰木陰

醫水

大腹
與核
神同

通于膀胱 二藥瀉水上下內外分消其勢亦猶神禹疏江繫河之意也
 經曰腎何以主水腎者至陰也至陰者腎水也腎何以聚水而生病腎者少陰也少陰者冬
 脈也故其本在腎其本在肺皆積水也腎何以聚水而生病腎者少陰也少陰者冬
 不得臥者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得臥論語曰
 胃為水穀之海五藏六府之原脾為水腫肺為逆不得臥論語曰
 不能通胃之水道于膀胱而病于上腎不能通胃之水道于膀胱而病于中
 于下以致積水漫溢無所底止王好古曰水者脾肺腎三經所主有五
 藏六府十二經之部分上頭中四肢下腰脚外皮膚中肌肉內筋骨
 脈有尺寸之殊浮沉之別不可不察也
 水腫有痰涎食積血瘀致結不通而成者有熱相火生痰道阻
 塞而成者有燥熱鬱結不通而成者有虛寒相火生痰道阻
 中氣虛衰而成者有大病後正氣衰微而成者有小便不利水液不行
 脾真能利而成者有症候不足宜以別治之然其源多因中氣不足而起
 諸賢曰治脾滿先以脾土為主宜以別治之然其源多因中氣不足而起
 滿而用純補之劑不益脹滿平曰脾氣既虛不可復行其氣腎水既衰
 不可復利其水純補之劑初覺不快過時藥力得行漸有條理矣
 此即內經寒因寒用之義

實脾飲 治肢體浮腫色悴聲短口中不渴二便通利脾胃虛寒上不
 醫方集 卷四 實脾飲
 行而浮腫以無熱故口不渴而便不燥此
 為陰水嚴氏曰治陰水發腫用此先實脾土

白木 炒茯苓 甘草 厚朴 姜大腹皮 草薹 木香 木瓜 附
 子 黑薑 加薑煎
 此足太陰藥也脾虛故以白木苓草補之脾寒故以薑附草薹溫之脾
 濕故以大腹茯苓利之脾滿故以木香厚朴導之 木香行氣平肝實腸
 然土之不足由于木之有餘木瓜酸溫能于土中瀉木兼能行水與木
 香同為平肝之品使木不尅土而肝和則土能制水而脾實矣經曰濕
 勝則地泥瀉水正所以實土也 朱丹溪曰治水腫宜清心火補脾土火
 行而清濁分其清者復回為氣為血為津液而水腫消汗為瀉而分消
 矣又利水病當以健脾胃為主使脾胃實而氣運則水自行宜參苓為君
 所挾症加減利水者少陰腎中之真陽衰微不能封閉而泄瀉無制
 但陰水為然然陰水者少陰腎中之真陽衰微不能封閉而泄瀉無制
 耳方中不用桂而用厚朴枳實向有可議也○按治水有三法實土
 首守也治水者攻也兼之於汗為三治三治併舉者實土

五皮飲 治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫脾虛不能制水故傳化
 上宜汗半身以下宜利小便

五加皮 地骨皮 茯苓皮 大腹皮 生薑皮 一方五加皮陳皮

羅氏五加皮 治病後脾肺氣虛而致腫滿

此足太陽太陰藥也 五加祛風勝濕地骨退熱補虛生薑散助陽水
 邪大腹下氣行水茯苓滲濕健脾子散瀉之中猶寓調補之意皆用皮
 者水溢皮膚以及行皮也

麥門冬湯 治水溢高原肢體皆腫 經曰三焦者決瀆之官水道出焉土
 脫下焦不治水而勝於脾○經曰三焦者決瀆之官水道出焉土
 府藏游行于五者之間故曰少陽為游部其經上而布於中絡心包下
 出委陽絡於腋非上焦之天樞下焦之氣街與中焦之液門表裏以行諸經
 者手少陰經受邪則下焦之天樞下焦之氣街與中焦之液門表裏以行諸經
 大鬱之久必發則與衝脈之氣大者同逆而上衝為十二經脈之海其

醫方集 卷四 五皮飲 麥門冬湯
 上者出項諸陽諸精其下者並少陽不足滲三陰諸絡由是
 水從大溢上積于肺而為喘呼不得臥散于陰絡而為腫隨五藏之
 虛者入而聚之為五藏之脹皆相火汎溢其水而生病者也非相火別
 水不溢而止為積水地按經曰諸腹脹大皆積于熱諸病腫皆屬于
 其是之謂歟

麥門冬 五十枚 梗米 五十
 此手太陰藥也吳鶴皋曰肺非無為也飲食入胃游溢精氣上輸于脾
 脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱肺熱則失其下降之令以致
 水溢高原滯于皮膚而為水腫醫明于此實脾藥水皆不能愈故用
 麥冬清肺開其下降之源梗米益脾培乎生金之母此治病必求其本
 也或問此症何以辨之 肢體皆腫小腹不急初起便有喘滿此其候

活勝濕湯 治濕氣在表頭痛頭重或腰脊重痛或一身盡痛微熱

在濕氣
在表

手足太陰

昏倦 氣在表外傷于濕也濕之為害不著于太陽則頭項痛且重也濕鬱則為熱然乃陰邪故但微熱而昏倦也李東垣曰頭痛有強乃太陽之經氣不行也此湯主之昂按此湯雖名勝濕實傷風頭痛

羌活 獨活 川芎 藁本 防風 甘草 蔓荊子 加身重

腰中沉沉然中有寒濕也加酒洗防已附子

此足太陽藥也經曰風能勝濕風吹則乾羌獨防藁芎蔓皆風藥也濕

氣在表者辛溫升散又皆解表之藥使濕從汗出則諸邪散矣

太陽寒濕則防善散太陽風濕二法祛風勝濕兼通關節川芎能升厥

陰清氣上治頭痛甘助諸藥辛甘發散為陽氣味甘平發中有補也

若水濕在裏則當用行水滲洩之劑喻嘉言曰經曰濕上甚為熱表之

表散吳鶴皋曰脾弱濕傷者二陳平胃之類主之濕感濡泄者五苓六

一之類主之水腫發黃者五皮茵陳之類主之今濕流關節非前藥所

宜矣無兼不入惟風為能散凡關節之病非風藥不能到也三四用此

易知柴胡五分治臥而多驚涕多應波者亦在少陽厥陰也如淋如津

醫方集解 卷四

本方除濕活荊川芎甘草加升麻蒼朮名羌活除濕湯治風濕相搏

一身盡痛本方除川芎加黃耆當歸蒼朮升麻名升陽除濕湯治水疝

腫太陰汗不絕再加麥芽神麩猪苓澤瀉加當歸黃耆亦名升陽除濕

湯東垣治脾虛瀉痢

中滿分消丸 治中滿鼓脹氣脹水脹熱脹諸病有聲鼓之如鼓為鼓

通利為血脹但氣分心下堅大兩病發于上血分血結胞門而病發于

下氣血不通則水亦不通而尿少尿少則水積而為水脹熱熱相生則

為熱脹也金匱曰病有血分何也師曰經水前腹後病水名曰血

分此為難治先病水後經水斷名曰水分此病易治水去其經當自下

氣分即 厚朴炒一枳實炒黃連炒黃芩炒半夏炒陳皮知母炒澤瀉三

茯苓砂仁訖薑二黃黃人參白朮炒甘草猪苓一蒸餅

中滿

丸焙熱服 寒因熱用東垣立中滿分消丸治熱

此足太陽陽明藥也厚朴枳實行氣而散滿二藥兼能黃連黃芩澤瀉

而消痞毒黃砂仁煨胃而快脾乾薑益陽而燥濕陳皮理氣而和中半

夏行水而消痰知母治陽明獨勝之火潤腎滋陰麥瀉瀉脾腎安行之

水升清降濁少加參朮芍草以補脾胃使氣運則脹消也按此方乃合

心二陳脾胃而為一方者但分兩有多寡則所治有主客之異矣宋丹

溪曰脾胃之德是為平人今也七情內傷六淫外感飲食失節房勞致

虛脾土之陰受傷轉輸之官失職故陽升陰降而成天地不交之否清

濁相混遂道滯塞而為熱熱留為濕濕熱相和生遂成脹滿經曰鼓脹

是也以其外雖堅滿中空無物有似于鼓以其膠固難治又名曰蠱脹

之患滋腎陰以制火使肺得清化之令却鹹水斷妄忍無有不妥醫者

急于取効病者若于脹滿甚而行利藥以水通快不知

寬得一日半日其脹愈甚而病邪其矣元氣傷矣

中滿分消湯 治中滿寒脹寒疝二便不通四肢厥逆食入反出腹中

寒心下痞下虛陰躁奔豚不收 原文曰或多食寒涼及脾胃久虛之人

川烏 乾薑 畢澄茄 生薑 黃連 人參 當歸 澤瀉 青皮

麻黃 柴胡 吳茱萸 草薢仁 厚朴 黃耆 黃柏 益智仁

木香 半夏 茯苓 升麻 煎服

此足陽明太陰藥也川烏二薑吳茱萸益智草薢除濕開鬱煖胃溫

腎以祛其寒青皮厚朴以散其滿升麻柴胡以升其清茯苓澤瀉以瀉

其濁人參黃耆以補其中陳皮以調其氣當歸以和其血麻黃以泄其

汗半夏以燥其痰黃連黃柏以去濕中之熱又熟因寒用也李東垣曰

常問鬼門潔淨府開鬼門者發汗也潔淨府者利小便也中滿治法

于內謂脾胃有病令上下分消其濕下焦如瀉氣而自然分化如或大

實大滿大小便不利者 從權以寒熱藥下之

天橋皮湯 治濕熱內攻心腹脹滿小便不利大便滑瀉及水腫等症小

并入大腸故小便不利而大便滑瀉

滑石六分甘草一分赤茯苓一分白朮一分桂枝五分陳皮一分木香

枳榔三分加薑煎每服五錢

此足太陽藥也赤芍猪苓澤瀉火行水自木補脾肉桂化氣此五苓

散也滑石清熱利濕甘草瀉火調中此六一散也濕熱內甚故加枳榔

峻下之藥陳皮木香行氣之品使氣行則水行以通小便而實大便也

南陳高湯 治傷寒陽明病但頭汗出腹滿口渴二便不利濕熱發黃

脈沉實者汗小便利則病愈此為熱在裏必發黃者但頭汗身無

色也熱在裏者身如橘色汗如油此為熱在裏必發黃者但頭汗身無

而身無汗夫熱外越則不與下參則不內存今便既不利身又無汗

故熱入血室久水結胸皆有頭汗之症乃傷寒傳變故與利凡熱在

裏熱入血室久水結胸皆有頭汗之症乃傷寒傳變故與利凡熱在

醫方集解 卷四 大黃 兩 枳實 兩 枳實 兩 枳實 兩 枳實 兩 枳實 兩

濕在經則曰肺發熱身寒在則節則身痛在藏府則備汗小便反清腹

或服清濕熱相搏則發黃乾黃熱勝色明而便溲濕瀉勝色晦而便

澀又黃病與濕病相似但濕病在表一身不痛

表一身不痛

茵陳 兩 大黃 兩 枳實 兩 枳實 兩 枳實 兩 枳實 兩 枳實 兩

此足陽明藥也成無己曰小熱涼以和之大熱寒以散之發黃者濕熱

甚也非大寒不能散其熱故以茵陳為君茵陳發汗利水以泄太陰陽

梔子為臣大黃為佐分泄前後則腹得利而解矣由小便出大黃能導

大便出

本方大黃易黃連名茵陳三物湯治同本方加厚朴枳實黃芩甘草入

生薑灯草煎名茵陳將軍湯治同本方去梔子大黃加附子乾薑治

寒濕陰黃 前病為陽黃如身黃而色暗者為陰黃宜此湯大抵酒以茵

小便或下之無汗為表實宜汗之或吐之若小便清是無熱也仲景云

發黃小便自利常與虛勞宜小建中湯自利腹滿而喘不可除熱而除

之必虛宜少牛乳湯主之玉梅癰口內腫痛勞後形體瘦弱食失節中

州變寒病生黃非外感而得只宜理中大小建中是矣不必用茵陳

八正散 治濕熱下注咽乾口渴少腹急滿小便不通或淋痛尿血或

因熱為腫濕熱下注少腹急滿則小便不通

車前子 木通 瞿麥 扁蓄 滑石 甘草梢 梔子 大黃 加

燈草煎一方加木香取其辛能利氣

此手足太陽手少陰藥也木通燈草清肺熱而降心火肺為氣化之源

心為小腸之合也車前清肝熱而通膀胱肝脈絡于陰器膀胱津液之

府也瞿麥扁蓄降火通淋此皆利濕而兼瀉熱者也滑石利竅散結梔

子大黃苦寒下行此皆瀉熱而兼利熱者也甘草合滑石為六一散用

稍者取其輕達壅中甘能緩痛也雖治下焦而不專于治下必三焦通

利水乃下行也膀胱藏水三焦出水故治小便不利利法也取三焦

醫方集解 卷四 八正散 車前子 木通 瞿麥 扁蓄 滑石 甘草梢 梔子 大黃 加

下宜清宜燥宜升有屬二腑三之治如不因脾燥恒勝成有熱利清

膀胱此正治也如因脾燥不能生小便清全此隔二如因脾燥不運而

情不升故脾不能生小便常燥脾健胃也此隔三車前子茯苓瀉肺也黃

柏黃考為膀胱也蒼朮白朮燥脾健胃也又曰小便不通為氣虛血虛

實熱痰閉皆宜吐之以升其氣氣升則小便自降氣虛用參朮升麻等先

服後吐或就參者藥中調理吐之血虛用四物湯先服後吐或就芍歸

湯探吐之痰多二陳湯先服後吐或加香附木通實熱當利或入正散

而巳經謂三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣

化則能出矣三焦之氣一有不化則不得如決瀆而出矣豈獨下焦勝

則下焦無以自通必上瀆而下瀆始出也

車前分清飲 治陽虛白濁小便頻數澀白如油名曰膏淋 腎氣虛則不

便數膀胱有熱則小便清而澀不分或收枯

川車前 石菖蒲 烏藥 益智仁 等甘草梢 入鹽食前服一方

加茯苓

此手足少陰足厥陰陽明藥也車前能泄陽明厥陰濕熱去濁而分清

濕熱

石菖蒲開九竅而通心甘草稍達莖中而止痛使濕熱去而心腎通則氣化行而淋濁止矣此以疎泄而為禁止者也心脾俱熱便小便赤而

濕熱

琥珀散 治氣淋血淋膏淋砂淋心腎氣鬱清濁出于熱苦膀胱溺澀而

濕熱

滑石 琥珀 木通 扁蓄 木香 當歸 鬱金 炒二 為末服

濕熱

此手足少陰太陽藥也滑石滑可去實利竅行水扁蓄苦能下降利便

濕熱

通淋琥珀能降肺氣通于膀胱木通能瀉心火入于小腸

濕熱

歸經氣淋由于氣滯木香能升降諸氣諸淋由心肝火盛鬱金能涼心

濕熱

散肝下氣而破血也 大法鬱金琥珀開鬱青皮木香行氣蒲黃干漆破

濕熱

防已 治脚氣足腫痛憎寒壯熱脚氣自外感得者山嵐雨水或履

濕熱

犀角 食前服熱加黃芩時令熱加石膏肥人有痰加竹瀝薑汁或

濕熱

木通 板榔 生地 炒川芎 白朮 蒼朮 炒黃柏 甘草稍

濕熱

醫方集解 卷四

濕熱

南星大便秘加桃仁紅花小便赤澀加半膝或木瓜苡苳

濕熱

此足太陽藥也防已行水療風瀉下焦之濕熱檉柳攻堅利水墜諸藥

濕熱

使下行水通降心火由小便出草稍泄脾火徑達腎莖黃柏生地滋腎

濕熱

陰而涼血解熱蒼白朮燥脾濕而運動中樞腫由血鬱川芎行血中

濕熱

之氣痛由肝實犀角涼心而清肝合之以清熱利濕消腫止痛也

濕熱

當歸拈痛方 治濕熱相搏肢節煩痛肩背沉重或偏身疼痛或脚氣

濕熱

腫痛脚膝生瘡膿水不絕及濕熱發黃脈沉實數動消者則腫熱

濕熱

茵陳 羌活 防風 升麻 葛根 蒼朮 白朮 甘草 黃芩 炒

濕熱

苦參 炒知母 炒當歸 猪苓 澤瀉 空心服 一方加人參

濕熱

此足太陽陽明藥也原文曰羌活透關節防風散風濕為君升葛味薄

濕熱

引而上行苦以發之白朮甘溫和平蒼朮辛溫雄壯健脾燥濕為臣濕

濕熱

熱和合肢節煩痛苦參黃芩知母茵陳苦寒以泄之酒炒以為因用血

濕熱

塞不流則為痛當歸辛溫以散之入參甘草甘溫補養正氣使苦寒不

濕熱

傷脾胃治濕不利小便非其治也猪苓澤瀉甘淡鹹平導其留飲為佐

濕熱

上下分消其濕使壅滯得宣通也 氣濕熱之劑後人用治諸症其驗

濕熱

禹功散子 治寒濕水疝陰囊腫脹大小便不利之病蓋得之醉後而

濕熱

黑牽牛 兩 茴香 炒 為末每服一錢姜汁調下或加木香一兩

濕熱

醫方集解 卷四

濕熱

四六五

此足少陰太陽藥也... 大腸風秘氣秘... 陰邪也

升陽除濕防風湯... 治大便閉塞或裏急後重... 白膿或血慎勿利之利之則必至重病反鬱結而不通矣以此湯升舉

其陽則陰自降矣... 蒼木... 仁半夏各五分... 此足太陰陽明藥也... 甘溫茯苓甘淡佐之以健脾利濕防風辛溫勝濕而升陽白芍酸寒斂

陰而和脾也... 潤燥之劑... 氣升之舉之不可求下此東垣發前人所未

身榮養百骸故枯槁而無潤澤也... 潤燥之劑... 氣升之舉之不可求下此東垣發前人所未

日水之氣... 潤燥之劑... 氣升之舉之不可求下此東垣發前人所未

地黃... 人參... 白蜜... 先將地黃熬汁去渣入蜜煉稠再

將參苓為末和入磁罐封水煮半日白湯化服... 加琥珀沉香各五

錢自云奇妙... 此手太陰藥也... 為水母土為金母... 肺熱而生津也

甘草... 治傷寒... 此手太陰藥也... 血而寧心... 此手是太陰藥也

此手是太陰藥也... 血而寧心... 此手是太陰藥也... 血而寧心

冬阿膠地黃之甘潤經益血復脈通心也... 外聖用治肺痿... 液則神氣能轉輸

此手大陰足陽明藥也... 寒涼藥而火反升... 母氣也仲景于參冬人參梗米甘草大棗大補中氣大生津液隊中增

此手大陰足陽明藥也... 寒涼藥而火反升... 母氣也仲景于參冬人參梗米甘草大棗大補中氣大生津液隊中增

此手大陰足陽明藥也... 寒涼藥而火反升... 母氣也仲景于參冬人參梗米甘草大棗大補中氣大生津液隊中增

此手大陰足陽明藥也... 寒涼藥而火反升... 母氣也仲景于參冬人參梗米甘草大棗大補中氣大生津液隊中增

風秘

順氣數藥未攻散故又用山藥益氣固脾山藥溫肝補腎莖絲益陽
強陰以補助之也本方云久服百病皆除日乘有偏
潤腸丸治腸胃有伏火大便便秘全不思食風結血結風秘印風秘
津液不足熱秘由大腸熱結冷秘由冷氣秘由腸胃積滯津液不
道非燥莫也仲景曰麻浮而數能食不大便者此為實名曰陽結脈沉
而遲不能食身熱重大便反鞭名曰陰結李東垣曰實秘熱秘印陽結
也宜散之虛秘冷秘
即陰結也宜溫之

加秦艽皂角子性用
此手足陽明藥也歸尾桃仁潤燥活血羌活搜風散邪大黃破結通幽
麻仁滑腸利竅血和風疎腸胃得潤則自然通利矣宋丹溪曰古方通
劉益肺氣不降則難傳送用枳殼沉香訶子杏仁等是也又老人虛人
風人津液少而秘者宜滑之用如麻仁何膠等是也如妄以峻藥至
之則津液走氣血耗難痊
通而印秘矣必變生他症

本方加防風皂角仁蜜丸名活血潤燥丸治同是角得濕則滑
清則燥結自除本方
去羌活加升麻紅花生熟二地名潤燥湯俱東治同升麻者能
大黃煨熟當歸酒浸枳實炒等分蜜丸亦名潤腸丸治痔病肛門燥澀

通幽湯治幽門不通上攻吸門噎塞不閉氣不得下大便艱難名曰
下脫不通治在幽門下脫印幽門胃之下口也大身上下有七門皆下
食者也其吸入之氣不得下歸胃為陰火相拒故膈噎不通濁陰
不得下降而大便燥結不能下歸胃為陰火相拒故膈噎不通濁陰
在幽門使幽門通利其陰火相拒則幽門通
及門亦不受邪胸膈得開脹滿去矣是謂陰得下歸地也

當歸身 升麻 桃仁 紅花 甘草 生地黃 熟地黃 五 或
加枳榔末五分本方加大黃麻仁名當歸潤腸湯治同
此手足陽明藥也當歸二地滋陰以養血桃仁紅花潤燥而行血枳榔

下墜而破氣滯加升麻者天地之道能升而後能降清陽不升則濁陰
不降經所謂地氣上為雲天氣下為雨也李東垣曰噎膈痰十二陰經
主五沙津液足則大便如常若飢飽勞傷損傷胃氣反食辛辣味厚之
物而助火邪大傷血中耗損真陰津液虧少故大便燥結少陰不得
便以辛潤之大陰不得大便以苦潤之陽結者散之陰結者溫之傷食
之血燥者以桃仁酒製大黃通之氣燥者以麻仁加大黃利之氣滯者
郁李仁枳實皂角仁潤之不可概用牽牛也

風秘

下墜而破氣滯加升麻者天地之道能升而後能降清陽不升則濁陰
不降經所謂地氣上為雲天氣下為雨也李東垣曰噎膈痰十二陰經
主五沙津液足則大便如常若飢飽勞傷損傷胃氣反食辛辣味厚之
物而助火邪大傷血中耗損真陰津液虧少故大便燥結少陰不得
便以辛潤之大陰不得大便以苦潤之陽結者散之陰結者溫之傷食
之血燥者以桃仁酒製大黃通之氣燥者以麻仁加大黃利之氣滯者
郁李仁枳實皂角仁潤之不可概用牽牛也

非 汁牛乳飲治胃脫有死血乾枯積食下作痛翻胃便秘胃脫有
積而便秘口唇乾細胃多因氣血兩虛胃弱而吐也新血不生故腸
可下積在吸門即吸門之會處也食下胃弱須臾吐出積在胃門
之上口也此上焦名吸門下焦名反胃又自寒痰瘀血
食積聚來胃日 論治
或消或潤宜隨 論治

此足陽明藥也非汁辛溫益胃消痰牛乳甘溫潤燥養血瘀去則胃無
阻血潤則大腸通而食得下矣朱丹溪曰細胃腸虛大便燥結宜牛乳
服人乳人乳有五味之奇七情之火也却按腸虛不運服香燥藥取快
一時破氣而燥血是速其死也不如少服藥飲牛乳加非汁或麥汁或
陳酒為佳丹液亦用香燥藥所宜補血益陰潤燥和胃調中却無其力
可以意會○治腸胃諸藥非汁散於竹瀝麥汁清痰並便降火人乳生
乳酒燥補血香根汁止咳李根汁涼血甘瀝汁和胃學費
消食隨尿投重或加燒酒未醋白蜜和諸汁煎服亦佳

黃耆湯治心中煩燥不生津液不思飲食
黃耆 熟地黃 芍藥 五味子 麥冬 天冬 人參 甘草 茯苓
每服三錢加烏梅煎

此手足太陰藥也黃耆人參補氣熟地芍藥補血烏梅五味飲耗生津
天冬麥冬瀉火補水茯苓淡以利濕甘草甘以和中瀉去氣運則脾和

去原 生津 黃耆湯 治心中煩燥不生津液不思飲食

而思食津生而燥退矣

消渴方丹 治渴症則熱善清小數 渴石多飲為上消肺熱也多食善飢

下消腎熱也皆火盛而水衰也經曰二陽結謂之消二陽者陽明也

陽明大腸上津病消則口乾是津不足也足陽明胃主血榮潤清

致善飢是血中扶火血不足也木傳能食者必強壯也

必得中滿鼓脹皆不治之症也氣分渴者飲涼水直寒涼溼利以清

其熱血分渴者喜飲熱水宜甘溫藥劑以滋其燥上焦中重下危如

反甘是生氣泄脾氣下 凡人腎中為土冠木也

黃連 天花粉 生地汁 藕汁 牛乳 將黃連花粉為末調服或

加薑汁蜂蜜為膏喻化

此手足太陰陽明藥也經曰心移熱于肺傳為消火盛灼金不能生

水故今燥渴黃連苦寒以瀉心火生地大寒以生腎水花粉藕汁降火

生津牛乳補血潤以去燥火退燥除津生血旺則渴自止矣黃連花粉

生津牛乳補血潤以去燥火退燥除津生血旺則渴自止矣黃連花粉

地黃飲子 治消渴煩燥咽乾而赤 咽乾腎火上炎也面赤陽明

人參 黃耆 甘草 生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 枇杷葉

石斛 澤瀉 枳殼 等分每服三錢

此手足太陰陽明藥也喻嘉言曰此方生精補血潤燥止渴佐以澤瀉

枳殼疎導二府 澤瀉瀉膀胱之火 使小腑清利則心火下降心與小

大腑流暢則肺經潤燥相表裏 宿熱既除其渴自止矣 嘉言又曰人

治渴症氣分燥熱此湯治血分燥熱竹葉黃耆湯治氣血燥熱

辨症而用之附竹葉黃耆湯治淡竹葉生地黃各二錢 葛根川芎芍藥

冬黃本炒人參黃耆甘草半夏石膏各一錢 治消渴血氣兩虛胃火盛而作渴

白茯苓丸 治腎消兩腿細腰脚無力 此因中消之後胃熱入腎消

消即下消乃土消中消之傳變飲一決二便如膏脂王註曰脾主氣脾

無病則氣能束津液其精微者聚於腸胃血脈餘者為痰脾病則津

液無氣攝而精微者

亦隨淚下如膏脂也 茯苓 黃連 花粉 車前 熟地黃 覆盆子 人參 玄參 兩石

斛 蛇床子 五分 雞陸 鹿膠 鹿角 鹿尾 鹿筋 鹿骨 鹿髓 鹿胎 鹿子

此足少陰藥也茯苓降心火而交腎黃連清脾火而瀉心石斛平胃熟

而瀉腎鹿筋鹿尾鹿骨鹿髓鹿胎鹿子鹿胎鹿子鹿胎鹿子

粉生津車前清熱利濕鹿膠鹿尾鹿骨鹿髓鹿胎鹿子鹿胎鹿子

數善治腸消磁石色黑入腎補腎益精故假之為使也

止反加燥急是脾痿弱子生是九加厚角有腎病而黃連降火

治心母乃倒手子日皆者胃之閉也胃熱下移于腎則閉大開心之

陽火得以直降于腎心火灼腎燥不能濡予用厚角黃連對其下

之陽火得以直降于腎心火灼腎燥不能濡予用厚角黃連對其下

桑白皮等汁十味煎 治氣嗽經久將成肺痿乍寒乍熱唾涕稠粘

喘息氣上唇口焦乾亦有唾血者漸覺癯瘦小便赤少色敗毛落此亦

成蒸及久嗽成肺癰腫悉成膿出無多少

桑白皮升地骨皮煎取汁三升生地汁升生麥冬汁升生葛根汁

瀝生薑汁 白蜜 麥冬升牛酥合 以麥冬生地葛根竹瀝薑汁

和煎減半再內桑皮地骨汁和煎三分減一可入酥蜜麥冬攪勿停手

煎如飴糖夜臥時取一胡桃大含之稍加至雞子大或薑日丸服亦得

此手足太陰藥也桑皮瀉肺行水麥冬補肺生津地骨退熱除蒸竹瀝清

痰養血能除陰虛之 生薑祛寒而溫胃麥冬補土以生金地汁葛汁甘

寒以除大熱白蜜牛酥甘潤以止久嗽也

治久嗽方金

白蜜二生薑取汁 先秤銅銚斤兩訖納蜜薑汁微火熬令薑汁盡

惟有蜜斤兩在則止每合如煎大一丸日三服

曰立效後不可服為大寒之劑易老日有是病則投是藥苟拘于精而
以指手若以白虎為大寒承氣又有以行于冬合乎大陽發熱無汗而
渴忌白虎表未解也陽明汗多
而渴忌五苓散津液大耗也

本方加人參三兩名人參白虎湯治傷寒渴飲水無表症者白虎
人參生和凡身發熱為熱在表渴飲水為熱在裏身熱飲水表裏俱
有熱身不渴表裏俱熱飲水不可不與不可遇以表飲則有
水結胸心下悸喘咳喘咳

亦治傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者
此病多因血虛得之及胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土宜服此
升陽散火湯治肌熱表熱四肢發熱骨體中熱熱如火燎之燔手

柴胡八錢防風五分葛根升麻羌活獨活人參白芍錢各廿
草三錢甘草三錢每服五錢加薑棗煎

此手足少陽藥也柴胡以發少陽之火為君升葛以發陽明之火羌防
以發太陽之火獨活以發少陰之火為臣此皆味薄氣輕上行之藥所
以升舉其陽使三焦暢通而火邪散矣人參甘草益脾土而瀉熱為
藥瀉脾火而斂陰且酸甘緩散中有收不致有損陰氣為佐使也
身日經曰少火生氣天非此火不能生物人非此火不能有生得之則
光透之則滅今為飲食抑遏則生道幾乎息矣使陽出於上竅則濁
除目睛下視而飲食得化無抑遏之患矣東垣聖子脾胃論出於上竅則濁
散者必用酸收故桂枝湯中
亦用芍藥猶兵家之節制也

本方除人參獨活加葱白名火鬱湯治同火鬱者內熱外寒脈沉而數
沉而數知
為內熱也

陶節庵升陽散火湯人參白朮茯苓甘草陳皮麥冬當歸芍藥柴胡黃
芩加薑棗煎治傷寒又手足心熱衣被床席皆覺沉不省人事
日倍醫不識誤認風症不知此乃肝熱乘脾元氣虛衰不能主持者最
宜症小便利者可治有痰加薑棗半煎大煎

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐津液不足故虛羸少
逆故欲吐亦治傷寒後虛脈虛

連翹四散 治心火上升中焦燥實煩躁口渴頭眩口瘡唇裂吐血

涼膈散方 治心火上升中焦燥實煩躁口渴頭眩口瘡唇裂吐血

此上中二焦瀉火藥也熱淫于內治以鹹寒佐以苦甘故以連翹黃芩

竹葉薄荷升散于上而以大黃芒硝之猛利推導其中使上升下行而

膈目清矣用甘草生蜜者病在膈甘以緩之也李東垣曰易老法減大

膈與六經之熱以手足少陽與下胸膈同相火游行一身之表乃至

高之分故用升散之劑浮而上之以去胸膈大經之熱也重病用煎方

醫方集解 卷五 瀉火 九

輕者用此方論謂言口按中風症大勢風木令君相二火主病古方用

赤芍散居多如轉舌背用涼膈散加茵陳遠志治命金丹用涼膈散加

清熱瀉火散風火上炎胸膈正源之地所以清心寧神轉舌治命涼

膈之功居多不可不備也瀉火散也按轉舌背散心經之熱也治

命丹散肝經之熱也瀉火散也按轉舌背散心經之熱也治

子肺而咳喘用風水主筋主怒主筋故筋脈不舒則肝火上升

治瀉汗歸大黃湯同煎

當歸龍胆草酒洗梔子炒黃連炒黃芩炒一人大黃酒青黛水煎

香木香二麝香五分 蜜丸薑湯下

此足厥陰手足少陽藥也肝水為生火之本肝火盛則諸經之火相起

而起為病不止一端矣故以龍胆黃芩入木經而折之而以大黃

連翹柏通平上下三焦之火也黃芩瀉肺火黃連瀉心火黃柏瀉腎

君少加木香麝香取其行氣通竅也然非實火不可輕投

龍胆瀉肝湯方 治肝經實火瀉熱瀉肝耳聾目眩口苦筋疼陰汗陰

腫陰痛目濁淚血者將肝之官也謀慮出焉肝中正之官也火出

故筋脈肝脈絡于目或或或或或或或或或或或或或或或或或或或

龍胆草酒洗黃芩酒洗梔子酒洗澤瀉木通車前子當歸酒洗生地黃

此足厥陰少陽藥也龍胆瀉厥陰之熱柴胡少陽之熱黃芩梔

子清肺與三焦之熱以佐之澤瀉瀉腎經之濕木通車前瀉小腸膀胱

之濕以佐之然皆苦寒下瀉之藥故用歸地以養血而補肝用甘草以

緩中而不使傷胃為臣使也東垣無黃芩梔子甘草亦名龍胆瀉肝湯

治前陰熱癢燥與此因飲酒風濕熱合于下焦為邪厥陰肝脈絡于陰

所請在下者因而瀉之柴胡入肝為引澤瀉車前木通利小便亦除濕

車前加人參五味天冬麥冬黃連知母亦名龍胆瀉肝湯治筋脈燥

口苦爪枯亦治前症以平木酒煉所以養筋用黃連知母者上以清心

肝下以瀉肝火一為

左金丸 治肝火燥盛左脇作痛吞酸吐酸筋散病結肝火盛則

吐酸亦由肝火上于肺胃從木之性故酸厥陰之脈絡陰

寒濕子之則成筋痛肝木過盛則筋上則成痞結亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

亦治噤口痢

湯藥入口即吐本方加糯米一撮煎服

黃連六兩煎水一兩服 水丸

此足厥陰藥也肝實則作痛心者肝之子實則瀉其子故用黃連瀉心
清火為君使火不劫金金能制木則肝平矣吳茱萸辛熱能入厥陰行
氣解鬱又能引熱下行故以為反佐一寒一熱藥者正治熱者從治以

治熱從其性而治之亦曰反治故能相濟以立功也肝居于左肺處于右左金者謂使
金令得行于左而平肝也李東垣曰病機曰諸症吐酸皆屬于熱此上

甚則酸水其心次令牙酸不能相對以多辛熱劑療之必酸若以病
機作酸攻之誤矣或問吞酸者問以為熱東垣以為寒何也丹溪曰吐

酸與吞酸不同吐酸吐酸水如醋平時津液隨上升之氣帶而成積
滯中生熱故酸水化逆作酸味非熱而何其有鬱之久伏于腸胃之間

治不得上感不得下風表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心服表溫痰
痰理開發或得香熱湯九津液得行亦可暫解非寒而何素問言熱言

其本也東垣言寒言其未也子言治吞酸用黃連吳茱萸炒研令送
為作使老木亦老為補湯浸蒸餅為丸吞之仍教癩食蔬菜自養則病

醫方集解 卷五 九
多安口藏氏曰房勞腎虛之人胸膈多有脹痛此皆虛不能納氣氣虛
不能生血之故氣與血猶水也盛則流暢虛則澀有不滑者所以作痛

本方加炒茶葉陳皮亦名黃連丸治同本方加芍藥等分為丸名戊
己丸治熱痢瀉熱瀉者黃連也戊為胃土己為脾土本方除吳茱萸

加附子一兩名運附六一湯治胃脘痛寒因熱用也本方用黃連一味
吳茱萸湯浸一宿為丸名抑清丸入瀉肝火治左脇作痛單黃連煎服

名瀉心湯治心熱
瀉心丸 治肝火鬱熱不能安臥多驚多怒筋痿不起自赤腫痛肝木
木盛生火故發熱多其子寅卯木肝之府按之在肉之下竹之上為肝

熱肝則之經行于兩脇風火子之故附不安川在志為怒故多怒肝虛
則其故多怒肝主筋遂熱則筋故
按曰為肝家風熱發于目故腫痛
龍胆草 山厄 大黃 酒川芎 黃芩 酒羌活 防風 等分蜜丸竹

藥湯下

此足厥陰少陽藥也肝者將軍之官風淫火熾不易平也龍胆大黃苦
寒味厚沉陰下行直入厥陰而散瀉之所以抑其怒而折之使下也若

酒氣雄防風善散故能搜肝風而散肝火所以從其性而升之子上也
少陽火鬱多煩躁危子能散三焦鬱火而使和熱從小便下行少陽火

實多煩目赤川芎能上行頭目而逐風邪且川芎當歸乃血分之藥
能養肝血而潤肝燥燥多怒多驚又皆血中氣藥辛能散而溫能和

兼以培之也一瀉一散一補同為平肝之劑故曰瀉胃五藏之中惟肝
營有餘散之即所以補之以木喜條達故也然必壯實之人方可施用

余子容曰時多執肝常有餘之說舉手便云平肝按聖濟經云原四
時之所化始於木完十二經之所養始於春女子受胎一月是厥陰肝

經養之肝者乃春陽發動之始萬物生之之源故成怒養陽使先天之
氣引生手無筋是攝生之切要也不可先于前說昂按此說本之內經

醫方集解 卷五 九
六所藏象論曰所謂得五行時之勝各以氣命其藏求其勝也皆歸始
春蓋春屬肝木乃身身升生之氣此氣若有不充則四藏何所稟承如

春無所生則夏長秋收冬藏者何物乎五行之中惟木有發榮暢茂之
象水火土皆無是也花葉萌生榮華而可愛結實成實食之以全生

皆此木也使天地而無木則世界物無色矣由是言之培之養之
尤急不暇而尚欲剪之伐之乎故養血和肝使火不上炎則心氣和平

而有滋無補不知六味地黃丸七寶美髯丹等劑皆補肝之藥也人特習
而不察耳外老秘要曰五行五藏皆互相生肝雖處中而為諸首位伯

甲乙續卷四仁故應春而生也為心之母餘藏諸次而生焉心為主主
神四藏為四鄰四鄰有憂王必懷憂四鄰和平則王有悅悅則醫術不

錯變則經絡生心不受邪所病者惟憂樂能制也肺為風府呼吸之
門諸臟氣息皆形誰能不出戶肝若風熱盛心憂則頭痛道憂

則心煩寒盛必熱熱盛必寒倚伏之道也但平風熱抑狂和而營衛自
然通

屏火

瀉黃散 治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴易飢熱在肌肉口為燥
脾之外候口燥唇乾口臭口臭皆屬脾火脾熱故煩渴易飢病者名中

消脾主肌肉故在肉分輕按重按皆不熱不熱不重乃得之遇夜尤
甚者為脾熱宜此湯及調胃承氣湯宜補中益氣湯。按而上
送身而後身熱任而妄言妄見皆足陽明有熱也及足外廉腫後

此足陽明藥也黃連瀉心火亦瀉脾火脾為心子而與胃相表裏者也
當歸和血生地丹皮涼血以養陰而退陽也右膏瀉陽明之大熱升麻
升陽明之清陽消升熱降則腫消而痛止矣海狗白膠補腎而牙痛
痛者補中益氣湯思慮傷脾而痛者歸脾湯勞傷虛熱而痛者六味丸
腎經虛寒而痛者還少丹重則方味尤其屬風熱者獨活散散風
寒入腦者羌活附子湯當歸時制宜附獨活散獨活羌活川芎防風各
五錢細辛附子各三錢

防風兩錢香七錢山色一兩石膏五錢甘草二錢右末微炒香酒調服
此足太陰陽明藥也山色清心肺之火使屈曲下行從小便出養腎理
脾肺之氣去上焦壅熱碎惡調中石膏大寒瀉熱兼能解那甘草甘
和中又能瀉火重用防風取其升陽能解脾中伏火又能于土中瀉
木也木盛壯土助風能散肝火英鶴草白或開脾中伏火何以不用黃
連中潤劑也李東垣曰瀉黃散非瀉脾也脾中為肺也
實則瀉其子以脾為生肺之上親故用石膏也子之類
錢乙瀉黃散白芷防風升麻枳殼黃芩各錢石斛一分半夏一分甘草七
分

治同前症或唇口皸爛燥烈脾之華在唇動也風也燥烈火也白芷
升麻皆屬陽明藥防風祛風而散脾火燥在
醫方集解火卷五瀉黃散
脾口故從其性而升發之也黃芩瀉中土之熱以殺利中土之氣牛夏
能燥能瀉發表開鬱古語清脾平胃瀉熱補虛甘草和脾兼能瀉火亦
火德發之之義也治口病諸藥脾燥則口甘生地芍藥黃連瀉火神
藥黃連瀉火神藥則口辛黃芩芩芩子瀉脾芍藥瀉脾冬清心腎熱則
口鹹知母烏梅骨蒸骨蒸則口淡茯苓白朮生薑煨脾勝濕口
瀉黃芩瀉火葛根生津防風
薄荷疎風瓜蒌化痰行痰

牙痛火
清胃散東 治胃有積熱上下牙痛牽引頭腦痛而發熱其牙喜寒惡熱
或牙齦潰爛或牙宣出血或唇口類腫脹痛是陽明胃脈循鼻外入上
耳前主上牙齦喜寒飲而惡熱手陽明太陽脈上頰貫頰入下齒依口
主下牙齦喜熱飲而惡寒足陽明別絡絡於頰故頰痛陽明之脈貫手而依口
而熱二經熱盛故唇口齒痛而腫痛也齒為骨屬腎牙宣牙齦出血
或齒縫出血也亦各齒痛乃腎痛若血多而湧出不止為陽明熱盛以
陽明多氣多血也唇屬脾火屬熱燥則乾熱則裂風則刺刺則刺刺若
脈破裂如癢癢名曰齒齦唇舌者肌肉之木也人中不滿者為唇反唇
反者肉
先死

生地黃 牡丹皮 黃連 當歸 升麻 一方加石膏

此足陽明藥也黃連瀉心火亦瀉脾火脾為心子而與胃相表裏者也
當歸和血生地丹皮涼血以養陰而退陽也右膏瀉陽明之大熱升麻
升陽明之清陽消升熱降則腫消而痛止矣海狗白膠補腎而牙痛
痛者補中益氣湯思慮傷脾而痛者歸脾湯勞傷虛熱而痛者六味丸
腎經虛寒而痛者還少丹重則方味尤其屬風熱者獨活散散風
寒入腦者羌活附子湯當歸時制宜附獨活散獨活羌活川芎防風各
五錢細辛附子各三錢

生地黄 熟地黃 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩 枳殼 枳
批葉 甘草 等分每服五錢一方加桂苓名桂苓甘露飲本藥方加
犀角云如此甚有道理犀角清心瀉肝
此足陽明少陰藥也煩熱多屬于虛地冬甘草石斛之甘治腎胃
之虛熱瀉而兼補也茵陳黃芩之清寒折熱而去濕火熱上行為患故
又以枳殼枳實抑而降之也

河間桂苓甘露飲滑石四兩石膏寒水石甘草各二兩白朮茯苓澤瀉各一
兩猪苓肉桂各五錢每服五錢治中暑受濕引飲過多頭痛煩渴濕熱便秘
此本五苓六一之合張子和去猪苓減三石一平加入參乾葛各一
劑也以清六府之熱張子和去猪苓減三石一平加入參乾葛各一
香五木香分每服三錢亦名桂苓甘露飲治伏暑煩渴脈虛水逆飲水
水入即吐

白散 治肺火皮膚熱酒漸寒熱自肺元蒸喘氣急肺王皮毛
也酒漸寒熱邪在皮膚也日痛尤甚金狂于西也肺苦氣上逆故
咳嗽喘急經按即得重按全無是熱在皮毛日西尤甚為肺熱

桑白皮 地骨皮 錢五分 粳米 易老加黃連

此手太陰藥也桑白皮甘益元氣之不足幸瀉肺氣之有餘除痰止咳

性善行水瀉火故能 地骨皮寒瀉肺中之伏火淡泄肝腎之虛熱涼血

除痰痰除則嗽止 退蒸 肝木盛能生火火盛則劫其子甘草瀉火而益脾粳米清肺而補胃

全母虛則 並能瀉熱從小便出肺主西方故曰瀉白 李時珍曰此瀉肺

瀉其母 瀉曰散瀉肺熱氣分之火黃芩一物湯丹煖清金

九瀉肺經血分之火清金非即黃芩妙為末水丸

本方加人參五味茯苓皮陳皮亦名加減瀉白散 東垣治咳嗽喘急嘔

吐本方加知母黃芩桔梗青皮陳皮亦名加減瀉白散 治咳而氣喘

煩熱口渴胸膈不利本方除甘草粳米加黃芩知母麥冬五味桔梗亦

名加減瀉白散 治過飲傷肺氣出腥臭唾涕稠粘嗝喉不利口苦

乾燥 原文云桑皮地骨皮味苦散寒降肺中伏火而補氣為君黃芩知母

乾燥 治寒治氣出腥臭清而利氣為臣五味酸溫以收肺氣麥冬苦寒

醫方集解 卷五 瀉白散 導赤散

治唾溫稠枯口苦乾燥為在枯梗 幸涕釋浮治痰逆利咽膈為使也

相表裏心熱則小腸亦熱故便赤淋痛而赤狂躁口糜舌瘡咬牙口渴心與

故諸經之熱皆應于小腸而赤瀉散 交牙口渴皆為心熱也舌為心苗若

心火上炎煎蒸于口則口糜舌瘡 經手按至皮膚之下肌肉之上則熱

日中尤甚身熱在血脈為心熱 宋丹溪曰五瀉各有火五志激之其

火隨起若諸寒病必身犯寒氣 食寒物非若諸大病自內作者

生地黄 木通 甘草稍 淡竹葉 等分煎

此手少陰太陽藥也生地涼心血竹葉清心氣 故清上焦木通降心火

入小腸君火宜木通相火宜澤瀉竹木維 草稍建中而止痛 便赤以

共導丙丁之火由小水而出也 下焦為白火也心為丁火心熱泄小腸金

散治口糜神動目眩眩移熱于小腸 肺腸不健上為口糜亦有五瀉

中湯加附子者因脾胃虛衰之火 被遏上炎故用參朮甘草補其上再

附散其寒則火得所助接引退舍矣 補日曰心氣

蓮子清心飲 治憂思抑鬱發熱煩躁或酒食過度火盛冠金口苦咽

乾漸成消渴遺精淋濁遇老即發四肢倦怠五心煩熱夜靜甚及女

人崩帶 煩躁遺精淋濁者心虛而有熱也心火妄動則不能下交于腎

陽虛也崩中由損傷衝任氣血俱虛經日陰虛陽搏調之崩由陰虛而

陰虛陽竭榮氣不升衛氣下陷 或濕痰濕熱蘊積而下流也

石蓮肉 人參 黃耆 茯苓 柴胡 黃芩 地骨皮 麥冬 車

前子 甘草 錢 空心服

此手足少陰足少陽太陽藥也參耆甘草所以補陽虛而瀉火 東垣曰

之聖藥助氣化而達州都 此則能出地骨退肝腎之虛熱柴胡散肝胆

之火和黃芩麥冬清熱于心肺上焦茯苓車前利濕于膀胱下部中以

石蓮清心火而交心腎則諸症悉退也

醫方集解 卷五 蓮子清心飲 五

變神昏不語或睡中獨語目赤口乾不飲水與粥則嘔不與勿思形如

醉人名越經症 傷寒不硬不瀉二便如常病不在府也神昏語不思

熱入裏故目赤舌乾和熱在陰故不 渴此症自定而傳手經故曰越經

黃連 黃芩 犀角 知母 山梔 滑石 麥冬 人參 甘草

茯神 加燈心 薑棗煎

此手少陰太陽藥也陳來章曰熱入心經涼之以黃連犀角梔子

心移熱于小腸泄之以滑石甘草燈心熱上逼于肺清之以黃芩梔

子麥冬然邪之越經而傳于心者以心神不足也故又加人參茯神

以補之 按按傷寒傳邪手足原無界限故仲景亦有熱心數動而麻黃

故亦曰導赤其與瀉心 異者以無痞澀之症也

午後

絡未入藏府雖用柴葛之類全藉參木之力以達其邪又恐邪入厥
隨用茯苓半夏兼助其痰合之當歸赤芍黃芩並治其血中之熱止用
三錢為劑蓋方咸知約庶取用柴胡
乾葛以此叔微一種苦心持為發之

白木除濕湯 治午後發熱背惡風四肢沉困小便色黃又治汗後發
熱午後發熱熱在陰分陽陷陰中也背為陽腹為陰皆惡風者陽不足
幸也脾主四肢四肢沉困濕熱而脾不運也小便黃濕熱也汗後而
熱不退
陽虛也

人參 赤茯苓 甘草 柴胡 白木 生地黃 地骨皮 知母
澤瀉 每服五錢如有刺痛加當歸七錢小便利減苓瀉一半

此足太陰少陰少陽藥也陽陷陰中熱在血分故以生地滋其少陰而
以知母地骨瀉血中之伏火也柴胡升陽以解其肌柴胡陷陰中故以苓
瀉利濕兼清其熱參木甘草益氣助脾氣足陽升虛熱自退脾運而濕
亦除矣 方名除濕而治在退熱
欲熱從濕中而下降也

清骨散 治骨蒸勞熱 火炎水竭真陰銷燬故肌骨之間蒸蒸而熱也
夜熱者是陽氣下陷入陰中也名曰熱入而寒晝熱夜熱是重
陽無陰也當用瀉其陽填補其陰晝熱則在氣夜熱則在血

銀柴胡 錢胡黃連 秦艽 鱉甲 地骨皮 青蒿 知母 甘草
分五

此足少陽厥陰藥也地骨皮黃連知母之苦寒能除陰分之熱而平之
于內柴胡青蒿秦艽之辛寒能除肝胆之熱而散于表鱉陰類而甲屬
骨能引諸藥入骨而補陰甘草甘平能和諸藥而退虛熱也

石膏散 治勞熱骨蒸四肢微瘦有汗脈長者 勞熱之症不盡屬陰虛
蒸令人先寒後熱漸成羸瘦者
有汗胃實也脈長陽明症也

石膏 研細每夕新汲水服方寸七取熱退為度

此足陽明藥也石膏大寒質重能入裏降火味辛氣輕能透表解肌雖

醫方集解 卷五

寒而甘能緩脾益氣火勞有實熱者非此不為功故外秘要明醫然
皆載之 玄味曰五行六氣水持其一再一水既虧豈能勝五火哉醫不
能清火養陰熱則能補火燥水理則易明也勢為熱症明矣尚可補乎惟
無熱無積之人脈微無力方可補之必察其胸中及右腎二火果虧後
用補劑可也 治勞熱骨蒸四肢微瘦有汗脈長者 勞熱之症不盡屬陰虛
火也過用冷藥者則益下無火而水也非徒無益而反害之

二母散 治肺勞有熱不能服補氣之劑者 肺虛火或咳嗽熱陰虛
元而陰愈虧故有痰病
虛勞不能服溫補藥者

知母 貝母 等分為末服 古方二母各一兩加巴霜十粒真三
片臨臥白湯嚼服治咳嗽喘必利下寒痰

此手太陰藥也火旺鑠金肺虛勞熱能受溫補者易治不能受溫補者
難治故又設此法以滋陰用貝母化痰瀉肺火知母滋腎清肺金取其
若能泄熱寒能勝熱潤能去燥也 二母皆潤
燥之藥

利膈湯 治肺熱虛煩上壅咽痛生瘡 十二經脈惟足太陽在表
循喉嚨歷膈或實熱上攻或虛火妄行痰涎結聚則成咽痛咽瘡皆
宜升之散之若虛火宜用人參黃芩辛熱之藥多有過服寒涼而病反
甚者張子和曰經何以言一陰一陽結為喉痺蓋若相二火獨勝則熱
結正絡故前且速也 監乾益痛咽頰腫活水強若君火也 惟喉痺急
速相火也君火也
火也相火龍火也

薄荷 荆芥 防風 桔梗 甘草 牛蒡子 人參 等分或為末
每服二錢或加薑豨其氣清化能散
相火逆結之痰

此手太陰少陰藥也咽痛咽瘡由于火鬱桔梗甘草甘桔湯也辛苦散
寒甘平除熱為清肺利咽之要藥加薄荷荆芥防風以散火除風加牛
蒡子以潤腸解毒火者元氣之賊正氣虛則和火熾故又加人參以補
虛退熱 治少陰咽痛喉痺肺腫上膿乾咳無痰火鬱在肺手少
陰經也

甘桔湯 治少陰咽痛喉痺肺腫上膿乾咳無痰火鬱在肺手少
陰經也

醫方集解 卷五 四七九

麻快喘足少陰腎脈喘咳火喘則喘曰一陰一陽結為之喉痺一
陰少陰君火二陽少陽相火也肺虛者金虛云熱之所迫血為之凝滯
畜結難散吐如米粥始前可救服亦治心厥發咳心前喉中介介
成難治火鬱在肺則乾咳無痰

甘草二桔梗一 或等分至好古加法首加訶子聲不出加半夏上

氣加陳皮涎嗽加知母貝母欬湯加五味酒湯加葛根少氣加人參嘔

加半夏生薑吐膿血加紫苑肺病加阿膠胸膈不利加枳殼痞滿加枳

實白赤加梔子大黃面腫加茯苓膚痛加黃芩發斑加荊芥防風痰火

加牛蒡子大黃不得眠加梔子 昂按觀海蘇之所謂面

此手太陰少陰藥也甘草甘平解毒消火結梗苦辛清肺而利膈又

能開提血氣表散寒邪排膿血而補內漏故治咽喉痛喉痺腫咳取

其辛苦散寒甘平除熱也 金匱曰咳而胸滿振寒喘乾不渴時出濁唾

法求其新起提其散血或從唾出或從咽出足以殺其毒此因胸滿振

寒不渴病尚在表用此開提肺氣若勢已入裏又當引之從胃入腸此

法不中用矣綱目曰喉痺惡寒為寒邪于外熱于內忌用此藥

等劑熱喉使陽鬱不得伸又忌清涼藥下之使陽氣鬱更宜用表

藥提其氣升以助陽也如不惡寒脈滑實者又當用寒劑下之散邪收

之也○外蓋秘要曰五藏之病心為主而肺居其上肺為華蓋下覆

四藏合天之德通達風氣性燥溫而惡寒心火重炎上蒸其肺金被火

傷則葉葉倚着于肝肝發熱則嗽因心肝虛弱不能傳陽于下焦遂至

正陽俱弱變成嗽矣肺主皮毛遇寒則燥而葉葉起肺嗽因葉葉着于

肝而成病由木能扣金與鳴也先養肺抑心肝虛熱和其腎則愈矣

本方除桔梗名甘草湯 治同本方加防風名甘桔防風湯治同本方

加防風荆芥連翹名如聖湯 治上焦風熱本方加連翹薄荷竹葉

梔子黃芩名桔梗湯治上焦熱喉痺熱腫又方桔梗桑皮貝母瓜蒌

當歸根設散仁防己 各五分 黃耆杏仁百合甘草 各三 加薑煎亦

名桔梗湯治肺癰吐膿乾多瀉如大便閉加大黃小便赤加木通

則不能言訶子飲肺清痰散逆破結利肺氣甘草和元氣宜便降
火潤肺或加水通以利機散也○足少陰腎脈係舌本足太陰脾脈連
舌本手少陰心別脈繫舌本三經虛則痰涎壅塞其脈道舌不轉運而
能言或三脈亡血舌無血色榮養而舌者中風不能轉運之類而喉
喉音聲如故喉者勞嗽失音 本方除甘草加枳殼名枳殼湯治胸中
痞塞噎氣吐酸或欬 枳殼枳椇苦下氣而散寒消熱而除欬活人云
知是痞先用枳椇湯尤妙

之參升麻湯 治發斑咽痛 發斑者陽明胃熱也

散斑 升麻 甘草 等分

此足陽明少陰藥也升麻能入陽明升陽而解毒之參能入少陰壯水

以制火甘草甘平能散能和故上可以利咽而內可以散斑也

本方除之參加犀角射干黃芩人參各陽毒升麻湯治陽毒發斑頭項

背痛狂燥罵詈咽腫吐血温服取汗

醫方集解 卷五 之參升麻湯

清斑青黛飲 治傷寒熱邪傳裏實表虛陽毒發斑 血熱不散蒸于

如疹子重者綿綿紫黑者熱極而胃爛也多死或因陽症誤投寒藥

或因下早表熱未虛入胃或因下遲熱留胃中皆發斑○斑在背六日

傷寒發斑或下早或下遲也因溫毒發斑冬令感寒至春始發也日熱

病發斑冬令感寒至夏乃發也因時氣發斑天疫時行之氣也治皆相

同曰內傷發斑先因傷暑次食涼物通其暑火浮游于表也宜加香薷

扁豆曰陰虛發斑元氣大虛寒伏于下通其無根夫守之火上獨蒸肺

傳于皮膚淡紅而稀少也宜

大寒中湯誤投寒劑則始矣

青黛 黃連 犀角 石膏 知母 之參 梔子 生地黃 柴胡

人參 甘草 加薑棗煎人苦酒醋也一匙和服大便實者去人參加

大黃

此是陽明藥也發斑雖出胃熱亦諸經之火有以助之青黛黃連以清

肝火梔子以清心肺之火之參知母生地以清腎火犀角石膏以清胃

火此皆大寒而能解鬱熱之毒者引以柴胡使達肌表柴胡清少使以

...

葛葉以和營衛其用人參甘草以和胃也胃虛故熱毒乘風入裏而發于肌肉也如苦酒者其酸收之義乎

玉屑無憂散 治喉喉風痺咽喉腫痛咽物有碍或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癪小兒疳疔及骨屑腫毒

玄麥 黃連 荆芥 貫眾 山豆根 茯苓 甘草 砂仁 滑石 錢硼砂 寒水石 爲末每一錢先挑入口徐以清水咽下能除三尸去八邪辟瘟療渴

此足陽明少陰藥也玄麥黃連寒水石清火貫眾山豆根解毒滑石茯苓利水砂仁硼砂軟堅並能清

朱丹溪曰咽痛必用荆芥麻火上炎必用玄麥又有陰氣大虛虛火游行無制客於咽喉遂成咽病脈必浮大重取必滿宜滋陰人參湯細降之藥立斃

香連丸 治下痢赤白膿血相雜裏急後重 濕熱之積于血分則赤者氣血俱病也後重裏急者氣滯不通也按裏急後重有因火熱者有因氣滯者有因積滯者有因氣虛者有因血虛者有因火熱者有因氣滯者有因積滯者有因氣虛者有因血虛者

黃連 二十兩 黃連 二十兩 醋糊丸米飲下一方等分蜜丸 一方加甘草八兩黃連用滾水拌蒸晒九次入木香爲丸

此手足陽明藥也病爲飲食不節與暑所傷濕熱蒸鬱而成黃連苦燥濕寒勝熱直折心脾之火故以爲君用吳茱萸同炒者取其能利大腸壅氣

能通利三焦泄肺以平肝使木邪不剋脾土氣行而滯亦去也一寒一熱一陰一陽有相濟之妙經所謂熱因寒用也

或言下痢白爲寒者誤也寒則不能消熱何由化也化爲膿也燥熱爲白屬肺金也泄痢皆兼於濕熱熱甚于腸胃之內致氣液不得宜通使積滯不止也下痢赤白俗言寒熱相兼其說尤誤寒熱氣液俱甚于腸胃而利爲利平各隨五臟之部而見其色其本則一出于陰且分

然病是 病按

一出于熱但分淺深而已或曰何故服辛熱之藥未有愈者曰爲能開發鬱結使氣液宜道流濕潤燥氣和而已其若用辛苦寒之藥微如辛熱佐之如錢氏

本方加石運肉治噤口痢本方倍大黃治痢積滯本方加吳茱萸肉豆蔻烏梅湯丸本方加訶子龍骨名黃連丸並治痢疾斷下

白頭翁湯 治傷寒熱痢下重欲飲水者 此湯專轉痢之症也仲景見

此足陽明少陰厥陰藥也白頭翁苦寒能入陽明血分而涼血止滯秦皮苦寒性瀉能涼肝益腎而固下焦黃連苦寒能入肝除熱黃連涼心清肝黃柏

瀉火補水並能燥濕止利而厚腸取其寒能勝熱苦能堅腎瀉能斷下也成無己曰腎欲堅食苦以堅之利則下焦虛故以純苦之劑堅之

也徐忠可曰此主熱利下重乃熱陽氣下陷而重也陷下則傷陰陰傷則血熱難後重而不用調氣之藥病不在氣可周揚後曰和傳厥陰少陽其未也

治腎熱耳流膿血不聞人聲 腎爲心之子心火旺則腎熱腎熱則耳鳴耳聾或流膿血或風邪搏結成核案耳皆令醫宜通耳

磁石 煅牡蠣 牡蠣 白木 炒 麥 芍藥 甘草 生地黄 汁

葱白 大棗 分三服 此足少陰藥也磁石體重鹹色黑補腎熱通耳明目故以爲君牡蠣鹹寒軟痰破結生地大寒瀉火滋腎麥甘草補肺清金

此足少陰藥也磁石體重鹹色黑補腎熱通耳明目故以爲君牡蠣鹹寒軟痰破結生地大寒瀉火滋腎麥甘草補肺清金

此足少陰藥也磁石體重鹹色黑補腎熱通耳明目故以爲君牡蠣鹹寒軟痰破結生地大寒瀉火滋腎麥甘草補肺清金

天大候曰肺虛則少... 能生水而制火退熱而飲陰自木甘草大寒補脾之品益土氣正以制

辛夷散 治鼻生瘰肉氣患不通不聞香臭... 辛夷 白芷 升麻 藜蘆 防風 川芎 細辛 木通 甘草

此手太陰足陽明藥也經曰天氣通于肺若腸胃無痰火積熱則平常

辛溫雄壯亦能上入竅頂勝濕祛風細辛散熱破結通精氣而利九竅

通中茶清寒苦以下行瀉火甘草和中又以緩其辛散也... 明腎脈使界上行腦為元神之府鼻為命門之竅人

白芷 薄荷 辛夷 蒼耳子... 此手太陰足陽明藥也凡頭面之疾皆由清陽不升濁陰逆上所致白

助胃中清陽上行頭腦若耳疎風散濕上通腦項外達皮膚竭荷泄肺

疎肝清利頭目... 腦液自回矣

除痰之劑... 治一切痰飲為病咳嗽喘滿嘔吐惡心頭眩心悸脾虛不能

半夏 陳皮 白茯苓 甘草... 加薑煎服能製半夏之毒

火痰加石青... 芽神麩老痰加枳實海石苦硝氣痰加香附枳殼助痰在皮裏膜外加

白芥子四股痰加竹瀝... 此足太陰陽明藥也半夏辛溫體滑性燥行水利痰為君痰因氣滯氣

順則痰降故以橘紅利氣痰由濕生濕去則痰消故以茯苓滲濕為臣

手足罷軟誤以爲風則非其治且通痰湯加木香黃芩大凡痰飲發生諸症當以治飲爲先飲消則諸症自愈如頭暈目眩骨痛投以風藥不効投以痰藥見功又如眼赤羞明由之涼藥不效以痰劑投之凡此之類不一而足有人生感吐痰滿地不甚明辨只是以多此氣虛不能攝涎不可用利藥宜六君子加益智仁一錢以攝之

本方加人參白朮名六君子湯治氣虛有痰本方去茯苓甘草名陳皮半夏湯再加桔梗名桔梗半夏湯本方去陳皮甘草名半夏湯再加生薑名小半夏加茯苓湯並治水氣嘔惡本方加黃芩名茯苓半夏湯治熱痰本方加黃連梔子生薑名三陳加梔連生薑湯治胸上熱痰令人嘔吐去生薑治嘔雜本方加砂仁枳殼名砂枳二陳湯行痰利氣本方加胆星枳實名道痰湯治頑痰膠固非二陳所能除者加助半夏加枳實以再加首蒲治驚悸健忘怔忡不寐導痰湯加木香香成術治胸膈之功再加首蒲治驚悸健忘怔忡不寐導痰湯加木香香附名順氣導痰湯治痰結胸滿喘咳上氣本方加枳實栝樓服于山查

神麴治食積痰嗽發熱本方加蒼朮枳殼片子薑黃名加味二陳湯治痰攻眼腫併酒家手臂重痛麻木本方除甘草加乾薑薑汁糊丸名溫中化痰湯治胸膈痰不快本方除茯苓甘草加黃連麵糊丸湯下名三聖丸治痰火嘔雜心懸如飢用陳皮生薑名橘皮湯治乾嘔噦及手足厥者用生薑汁名生薑半夏湯治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中憤憤然無奈者本方半夏醋煎除陳皮薑汁九名消痞丸

潤下丸 治胸中痰飲
廣陳皮 去白八兩 甘草二兩 蒸餅糊丸或將陳皮鹽水煮爛晒乾同甘草爲末名三寶散湯下濕勝加厚夏火盛加木連
此足大陰陽明藥也陳皮燥濕而利氣濕去則痰潤氣順則痰行食鹽

潤下而軟堅潤下則痰降軟堅則痰消痰在胸中故用甘草引之入胃且草經蜜炙能健脾胃脾胃健則痰自行矣虛弱人慎用引氣亦類痰以養痰也

桂苓甘朮湯 治心下有痰飲胸脇支滿目眩 肺支滿痰飲其色中之 腸水精不能上布故目眩
茯苓 白朮 甘草 二 此足大陰藥也喻嘉言曰茯苓治痰飲伐腎利滲水道桂枝通陽氣開經絡和營衛白朮燥痰水除脹滿治風眩甘草得茯苓則不資滿而反泄滿故本草曰甘草能下氣除煩滿此症爲痰飲阻抑其陽故用陽藥以升陽而化氣也 金匱曰短氣有微飲者當從下便去之桂苓甘朮湯主之腎氣丸亦主之按腎氣丸亦通陽行水之藥也
清氣化痰丸 治熱痰 痰者痰因火盛也痰即有形之火火即無形之痰痰隨火而升降火引痰而橫行發生諸症不可醫方集解 卷五 潤下丸 桂苓甘朮湯 化痰丸 痰者痰因火盛也痰即有形之火火即無形之痰痰隨火而升降火引痰而橫行發生諸症不可

此手足大陰之藥治痰火之通劑也氣能發火火能發痰半夏南星以燥濕氣黃芩枳實以平熱氣陳皮以順氣杏仁以降逆氣枳實以破積氣茯苓以行水氣水濕火熱皆生痰之本也蒸氣之亢而爲火猶民之反而爲賊賊平則還爲良民而復其業矣火迫則還爲正氣而安其位矣故化痰必以清氣爲先也

順氣消食化痰丸 治酒食生痰胸膈悶五更咳嗽 痰之物皆能生痰痰生于胸膈故滿悶五更咳嗽 嗽由胃有食積至此時大氣流八肺中故咳
半夏 枳實 茯苓 陳皮 白朮 杏仁 蘇子 山查 麥冬 神

頭厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

厥

此足陽明手足太陰藥也星夏以燥脾胃之痰香附以快三焦之氣使
 氣行則痰行也于機微義曰此方與局方四七湯指連茯苓九皆行痰
 而兼用氣藥即嚴氏其順則痰自下之意然紫蘇枳殼
 味氣藥也厚朴脾胃氣藥也香附肝氣藥也隨氣而下不可不分又
 云嚴氏以人之七情鬱結氣滯生痰氣道通利痰自降下又有原有積
 痰其氣因痰而結滯者必先逐去痰結則氣自行豈可當主一說。有
 一咳痰即出者脾濕勝而痰滑也宜半夏南星皂角之屬燥其脾若利
 氣之劑所當忌也有連珠痰不出者脾燥勝而痰滑也
 宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺若燥脾之劑所當忌也

半夏天麻白朮湯治脾胃內傷眼昏頭眩頭痛如裂身重如山惡心
 煩悶四肢厥冷謂之足太陰痰厥頭痛痰厥者濕痰厥逆而上也痰逆
 黑色也。東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭痛足寒而氣逆也太陰
 少陰三經雖不上頭然痰與氣逆壅于腦中頭上氣不得陽而為痛也
 半夏製麥芽神麩炒白朮炒一蒼朮酒浸人參黃耆製陳皮茯苓
 澤瀉天麻五分乾薑三分黃柏二分每服五錢

此足太陰藥也痰厥頭痛非半夏不能除而能和中胃頭眩眼黑虛風內
 作非天麻不能定天麻有風不黃耆人參甘溫可以瀉火亦可以補中
 動名定風黃耆人參甘溫可以瀉火亦可以補中

二木甘苦而溫可以除痰亦可以益氣去濕故除痰苓瀉瀉熱導水陣
 健脾胃益氣

皮調氣升陽神麩消食湯胃中滯氣麥芽化結助成已運行胃為已上
 脾為已上

乾薑辛熱以滌中寒黃柏苦寒酒洗以療少火在泉發躁也李東垣曰
 受之風寒傷上邪從外入令人頭痛身重惡寒此傷寒頭痛也頭痛上
 鳴九厥不利腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者過在手太陽少
 陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛者下虛上實也過在足太陽
 少陰其則入腎風濕頭痛也如頭半寒痛者先取手太陽陽明次取足
 少陽陽明此偏頭痛也如頭痛者所犯大寒內至骨節痛者以
 為主腦逆故令頭痛者亦有風濕之痛者其者應盡痛子足寒至節死
 不治頭痛每以風藥治之者高麗之上唯風可到味之薄者陰中之陽
 乃自地升天者也太陽頭痛者風寒濕脈常川芎黃芩芍藥白芷發熱
 為主少陽頭痛者風寒濕脈常川芎黃芩芍藥白芷發熱
 或腹痛者其脈沉者其脈沉者其脈沉者其脈沉者其脈沉者其脈沉者
 不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉者其脈沉者其脈沉者其脈沉者其脈沉者
 頭痛或吐涎沫放冷脈浮緩者黃芩湯主之而虛頭痛者歸脾湯主之
 氣虛頭痛人參黃耆湯主之氣虛頭痛者歸脾湯主之氣虛頭痛者歸脾湯主之

子細辛清苦而溫頭痛藥也白朮半夏天麻湯燥脾頭痛藥也紫蘇枳殼
 以苦吐之瓜蒂散
 痰丸指迷 治痰停中脘兩臂疼痛痰伏于內停滯中脘脾主四肢脾
 濕者

半夏天麻一茯苓一兩枳殼五錢風化硝二錢半如一時米易成但以押
 劑取亦可加芒硝 薑汁糊丸薑湯下

此足太陰陽明藥也半夏天麻茯苓澤瀉水枳殼行氣化硝軟堅去堅
 生

薑製半夏之毒而除痰使痰行氣通骨痛自止矣論語言曰痰藥雖多
 入四膠令人肩背酸痛兩手攣攣以為風則非其治宜導痰湯加木
 香薑黃各五分輕者指迷茯苓丸重者控涎丹外有血虛不能榮筋而
 致臂痛宜薑黃湯

控涎丹一名妙應
 治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引釣痛走易不定

或手足冷痺氣脈不通此乃痰涎在胸膈上下誤認癱瘓非也
 甘遂去心大戟去皮白芥子 等分為末糊丸臨臥薑湯服五七丸至十九
 痰涎加丸數腳氣加枳榔木瓜松脂卷柏驚風加硃砂全蝎驚氣成塊
 加穿山甲鱉甲延胡索蓬木熟痰加益硝寒痰加胡椒木香薑桂
 此手足太陽太陰藥也水瀉藥加減行李時珍曰痰涎為物隨氣升降
 無處不到入心則迷成癲癩入肺則寒痰為喘咳背冷入肝則膈痛乾
 嘔寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引釣痛入皮肉則癩癧
 癰腫無擇三方並以控涎丹主之殊有奇効此乃治痰之本痰之
 本水也濕也得氣與火則結為痰大戟能泄藏府水濕甘遂能行經隧
 水瀉直達水氣所結之 白芥子能散皮裏膜外痰氣唯善用者能收奇
 功也

三子養親湯 治老人氣衰痰盛喘滿食不化因火而動氣有痰火塞胸

痰火塞胸

紫蘇子 沉香 白芥子 萊菔子 各微炒研煎服或等分或看病所主

為君

此手足太陰藥也白芥子除痰紫蘇子行氣萊菔子消食然皆行氣豁

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

痰之藥氣行則火降而痰消矣

服之善湯送下服後仰臥令藥在胸膈之間除逐上焦痰滯不宜飲水

行動昂按凡藥必先入胃然後能分布於藥經其絡胃乃人身分金之

頭痛之藥亦必令之上咽于頭而可以見功者乎若曰胸中必須在膈將

下故為利痰聖藥石礞過無金星者不堪用陳久者佳新製者火毒

未除

此手足太陰陽明藥也礞石剝悍之性能攻陳積伏歷之痰大黃湯熱

去濕以開下行之路黃芩瀉肺涼心以行上僭之火沉香能升降諸氣

上至天而下至泉以導諸藥為使也然皆峻劑非體實者不可輕投

或曰痰症古今未詳方書雖有五飲諸飲之異而究莫知其為病之源

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

或曰痰非作眩目運耳鳴或口眼歪斜或喉痛或牙痛或喉痛或牙痛

牛黃丸 治風癩迷悶延潮抽掣

胆星 全蝎 蜈蚣 蟬蛻 五分 牛黃 白附子 蠶絲 防風 天麻

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

麝香五分 煮肉和水銀五分細研入藥末為丸荆芥薑湯下

此手少陰足太陰厥陰藥也牛黃清心解熱開厥利痰天麻防風南星

全蝎辛散之味蠶絲蟬蛻清化之品白附頭面之藥去頭面皆能搜肝

風而散痰結腐香通水銀劫痰引以醫芥者亦以逐風而行痰也

黃丸之方頗多互有異同然大要在乎搜風化痰寧心通竅多用水磨

牛雄金珠犀珀若中藏者宜之如中府中脈脈者反能引風入骨此方

藥味頗簡故姑錄之以概其餘也喻嘉言曰牛黃丸與蘇合丸與治熱

阻關竅宜牛黃丸寒阻關竅宜蘇合丸若手撒口開遺尿等死症急用

參附峻補間有生者若

牛黃蘇合入口即斃

辰砂散 治風痰諸癩狂心疾 諸癩因驚恐憂怒火盛于心痰塞心

不身熱脈浮在表者陽癩屬六腑易治身冷脈沉在裏者

陰癩屬五臟難治其實痰火與驚而已癩狂亦出于此

辰砂一兩 乳香者 棗仁 五錢 溫酒調下恣飲沉醉睡一二日

勿動萬一驚痛不可復治

醫方集解 卷五 十黃丸 辰砂散

此手少陰藥也辰砂鎮心瀉心火乳香入心散痰血棗仁補肝胆而寧

心

本方加人參一兩蜜丸彈丸大名寧志膏 每服一丸薄荷湯下治同

白金丸 治癩狂失心 癩多喜笑尚知畏懼癩不足狂多忿怒人不能

難經曰諸陽為狂諸陰為癩。喜屬

心怒屬肝二經皆火有餘之地也

白礬三錢 薄荷糊丸

此手少陰藥也白礬酸鹹能軟頑痰變金苦辛能去惡血痰血去則心

竅開而疾已矣

風痰 青州白丸子 治風痰湧盛嘔吐涎沫口眼喎邪手足癱瘓小兒驚風

痰壅塞及痰盛泄瀉 肥人滑泄多屬之痰脈滑

經絡 白附子 生南星 生用半夏 水浸生衣川烏 去皮臍生 為末稍袋盛之

水攤出粉末盡再搗再攤以盡為度貯磁盒日暴夜露春五日夏三秋

七冬十日晒乾糯米糊丸如棗豆大每服二十丸薑湯下癱瘓酒下驚

風薄荷湯下三五丸

此足厥陰太陰藥也痰之生也由風由寒由濕故用半夏南星之辛溫

以燥濕散寒川烏白附之辛熱以溫經逐風浸而暴之者殺其毒也

言曰此治風痰之上藥也

然熱痰迷塞者非所宜施

星香散 治中風痰盛體肥不渴者

胆星八木香二 為末服或加全蝎

此足厥陰藥也南星燥痰之品製以牛胆以殺其毒且胆有益肝胆之

功屬風木 佐以木香取其行氣以利痰也木香能疎肝

燥可知加全蝎者以散肝風也 中風體虛有痰者宜調下此散

醫方集解 卷五 星香散

常山飲 瘧久不已者用此截之 瘧初起不宜藥則邪氣未

常山 五錢 草果 檳榔 知母 貝母 烏梅 薑三片 棗一枚

半酒半水煎露一宿日未出時而東空心溫服渣用酒浸煎待瘧將發

時先服一方有良薑甘草無檳榔一方加穿山甲甘草

此足少陰太陰藥也古云無痰不作瘧常山引吐行水祛老痰積飲檳

榔下氣破積能消食行痰陰陽不和則瘧作陰勝則寒知母滋陰能治

陽明獨勝之火草果辛熱能治太陰獨勝之寒貝母清火散結濕熱除

痰烏梅酸飲滯收生津退熱散陰故 合為截瘧之劑也 趙以德曰常山

常山甘草烏梅檳榔穿山甲皆治瘧藥以成方者為知母性寒入足

陽明治獨勝之熱使退就太陰草果溫燥治足太陰獨勝之寒使退就

陽明二經和則無陰陽交錯之變是為君藥常山主寒熱瘧吐胸中痰

結是為臣藥甘草和諸藥烏梅去痰檳榔除痰破滯氣是為佐藥穿

山甲六山而居過水而入則是出入陰陽貫穿經絡于榮分以破暑結

之邪為使藥也若脾胃有痰瘧者用之收効李士材曰常山生用後用

之氣也胃氣元氣穀氣甲胆上升之氣一也食藥感此氣化胃氣何由
不上升乎燒飯與曰木協力滋養穀氣補令胃厚不至再傷其利廣矣
王安道曰勞倦飲食難化為內傷然勞傷傷氣不足矣飲食傷又當于
不足之中分其有餘天即能不飲食者胃中虛也此為不后而傷也飲
食自倍腸胃乃傷者此不足之中兼有餘而傷也惟其不后而傷也飲
共有餘故消導亦有物滯氣傷消兼行者亦有物滯氣不勝也須消
導者亦有不須消導但須補益者枳木丸之類雖曰消導固者補益之
意焉若所滯之物非枳木丸之方所能去者消導急者黃丸瓜蒂散等
藥自東垣亦未嘗
委之而勿用也

木方作湯名枳木湯治心下堅大如盤邊如旋盤心下上焦屬
之本方加半夏一兩名半夏枳木丸治脾濕停痰及傷冷食淋者加澤
瀉一兩木方加橘皮一兩名橘皮枳木丸治飲食不消氣滯痞悶木方
加陳皮半夏名橘半枳木丸健脾消痞化痰本方加木香一兩名木香
枳木丸治氣滯痞滿木香于肝行氣使木不地金再加砂仁名香砂枳木丸破滯氣

消飲食強脾胃如加乾薑五錢名木香乾薑枳木丸兼治氣寒再加人
參陳皮名木香人參乾薑枳木丸開胃進食本方加神麩麥芽各一兩
名麩麥芽枳木丸治內傷飲食或泄瀉本方加酒炒黃連黃芩大黃炒神
麩橘紅各一兩名三黃枳木丸治傷肉食濕麵辛熱味厚之物填塞悶
亂不快本方加茯苓五錢乾薑七錢名消飲丸治停飲胸滿嘔逆

保和丸 治食積飲停腹痛泄瀉痞滿吐酸積滯惡食食滯下利傷于食
運化滯于腸胃故有泄瀉食滯等症傷而未甚不欲飲以腐劑惟以手
和之品清而化之故曰保和丸東垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利
小便以導其濕傷食者有形之物也輕則消化或損其積重者方可吐
下麻澤云大腸有宿食寒冷發熱有時如瘧輕則消導重則下之當求
食門
山查三兩去核或
云核亦有神麩 茯苓 半夏 陳皮 萊菔子微炒 連翹五錢
麩糊丸 麥芽湯下或加麥芽人藥亦可

此足太陰陽明藥也山查酸溫收縮之性能消油膩腥膻之食收縮故
食消
神麩辛溫蒸膏之物皆溫能消酒食陳腐之積服于辛甘下氣而制麩
麥芽鹹溫消穀而軟堅堅積傷食必兼乎濕茯苓補脾而滲濕積久必
變為熱連翹散結而清熱半夏能溫燥和胃而健脾陳皮能降能升
調中而理氣此內傷而氣未病者但當消導不須補益大安丸加白木
則消補兼施也

本方加白木白芍去半夏腹子連翹蒸餅糊丸名小保和丸助脾進食
本方加白木二兩名大安丸或加人參治飲食不消氣虛微邪本方加
白木香附黃芩黃連厚朴枳實治積聚痞塊本方合越鞠丸扶脾開鬱
健脾丸 治脾虛血弱飲食不消
人參 白木土炒 陳皮 麥芽炒 山查去核 枳實三兩 神麩糊丸米
飲下

此足太陰陽明藥也脾胃者倉廩之官胃虛則不能容受故不嗜食脾
虛則不能運化故有積滯所以然者由氣虛也參木補氣陳皮利氣氣
運則脾健而胃強矣山查消肉食麥芽消穀食戊己不足脾胃為戊土故
以二藥助之使化枳實力猛能消積化痞佐以參木則為功更捷而又
不致傷氣也夫脾胃受傷則須補益飲食難化則宜消導各斯二者所
以健脾也
本方去山查麥芽加茯苓炙甘草名益氣健脾丸治脾虛食少本方去
山查麥芽陳皮加當歸芍藥黃芩麥芽杏仁名養榮健脾丸治脾陰
不足飲食不為肌膚血充然本方去人參枳實麥芽加香附木香半夏
茯苓神麩黃連當歸芍藥一方無 荷葉燒飯丸名理氣健脾丸治脾胃

虛弱久痢本方去人參山查麥芽加神曲川芎香附麩粉九名舒
 鬱健脾丸治脾氣鬱滯飲食不消本方去山查麥芽加半夏星蛤粉
 茯苓神麩糊丸名化痰健脾丸治內傷痰厥本方去人參山查麥芽加
 半夏山查黃連水丸名清火健脾丸治脾虛有火本方去人參山查麥
 芽加木香檳榔厚朴半夏甘草名和中健脾丸治胃虛飢不欲食再加
 人參名妙應丸治胃虛不能食藏府或結或瀉本方去山查加半夏青
 皮木香砂仁草蔻乾薑炙甘草茯苓澤瀉蒸餅丸名寬中進食丸

東補脾胃進飲食

枳實消痞丸

治心下痞痞食懶倦右關脈弦

倦右關脈脾脈也者脾虛而木來侮之也。脾曰太陰所至為積飲痞
 腐皆陰勝陽也受病之藏心與脾也因而鬱滯為痞者火與濕也蓋心
 陽火也至血脾陰上也主治凡傷其陽則火拂鬱而血凝
 傷其陰則上壅然而濕聚陰陽之分施治之法不可同也
 醫方集解 卷五 枳實消痞丸

枳實 炒黃連 厚朴 薑炒 半夏 麩 麥芽 炒 人參 白朮 茯苓 乾薑 炙甘草 蒸餅 糊丸

此足太陰陽明藥也枳實苦酸行氣破血脾無積血

鬱並消痞之君藥厚朴苦降散濕滿而化食厚腸麥芽鹹溫助胃氣而

軟堅破結半夏燥痰濕而和胃乾薑由惡血而通肝脾開五臟六腑皆所

以散而瀉之也麥朮甘草溫補脾使氣足脾運而痞自化既以助散

瀉之力又以固本使不傷真氣也

枳實消痞丸 治脾積在胃脘大如盤久不愈令人四肢不收或發黃疸

飲食不為肌膚

中央填塞痞滿皆上病也與服滿有輕重之分痞推內覺滿則腹滿則外
 有脹急之形也前人所指誤下所致蓋傷寒之病由下誤下則裏氣虛

有飲食積滯不能消化而成痞者有熱熱太甚上來心下而成痞者古
 方用黃連黃芩枳實之苦以瀉之厚朴半夏生薑之辛以散之入參
 上之甘苦溫以補之茯苓澤瀉之淡以滲之推宜上下分消其果有
 自實之症亦可解也陳世榮云若下痞痞者用利藥
 黃連厚朴 吳茱萸 白朮 炒黃芩 茵陳 乾薑 砂仁 人參
 茯苓 澤瀉 川芎 桂 巴豆 煎湯下

此足太陰陽明藥也黃連瀉熱燥濕治痞君藥

仁行氣而散滿茵陳芩瀉利水以實脾黃芩清肺而養陰

逐冷蠶桂川烏補命火以生脾土而蠶桂又能去痰生新

藥巴豆能消有形積滯為斬關奪門之將隨之以為先驅

補脾元正氣正旺然後可以祛邪也

血藥常之若全用氣藥則痞益甚而復下之氣愈下降必變為中滿鼓

醫方集解 卷五 枳實消痞丸

本方除吳茱萸白朮茯苓澤瀉茵陳川芎砂仁加黃芩神丹參紅豆

名伏梁丸治心積起膈上至心下大如臂令人煩心本方除吳茱萸砂仁

桂朮黃芩澤瀉加柴胡蘼蘼魚尾布甘草名肥氣丸治肝積在左脇

下有頭足令人發咳痰不已本方除吳茱萸白朮砂仁黃芩茵陳澤瀉

加紫苑桔梗天冬白蘞陳皮青皮三稜名息黃丸淡滲瀉下治肺積在

左脇下令人酒漸寒熱喘發肺癰秋冬黃連減半本方除吳茱萸白朮

砂仁人參乾薑川椒黃芩茵陳加黃芩丁香附子苦棟延胡索獨活全

蝎名黃脈丸淡鹽湯下治胃積發于小腹上至心下若豚狀上下無時

令人喘咳骨疼及男子疝女子瘕聚帶下此東垣五積方也雖有改
 力贊助成功口大積大聚其可犯也其大半而止過者
 死矣此丸五積丸非東垣之方也按醫方中皆不詳

專治酒積或嘔吐或泄瀉痞滿痛小便不利

所釀成故其味而重

神麴 乾薑 猪苓 澤瀉 砂仁 木香 青皮 陳皮 人參 白朮 茯苓

此手足陽明藥也過飲無度濕熱之毒積于腸胃

熱從肌肉而解豆蔻砂仁皆辛散解酒故以為君

香乾薑調氣而溫中青皮陳皮除痰而疏滯

便出乃內外分消之劑飲多則中氣傷故又加參朮

最能解酒李東垣曰酒大熱有礙無形之物也

下之是無形元氣受傷反損有形血陰血愈虛

名木蜜蠟霜黃赤而味甘其藥入酒酒化

醫方集解 卷五 葛花解酲湯 醫方

醫方集解 治癰久不愈腹中結塊名曰痞母

甘草 等分薑三片棗一枚烏梅少許煎

此足少陽厥陰大陰藥也久癰必由脾虛白朮補脾

氣足脾運方能磨積也川芎補肝而血中氣帶芍藥助脾

火邪二藥並和厥陰榮氣榮血則陰陽和矣

攻積草藥煖胃而祛寒厚朴破血而散滿陳皮理氣

而補土蓋脾屬陰色青入肝能益陰補虛消熱散結

之君藥也

醫方集解卷之六

休寧初卷汪昂著

弟殿武汪恒齋

收海汪

大士汪

赤石脂禹餘糧湯

復以他藥下之利不止

下焦赤石脂禹餘糧湯

赤石脂禹餘糧湯

醫方集解 卷六 赤石脂禹餘糧湯

此手陽明藥也瀉可去脫重可達下

甘以益氣 難會須用餘糧赤石脂

桃花湯 治少陰病二三日至四五日腹痛

血者 焦不約而裏寒也凡下利便膿血身冷

赤石脂禹餘糧湯

此足少陰藥也李時珍曰赤石脂之重滲入下焦

辛溫煖下焦氣分而補虛硬米之甘溫

之花湯主下焦血虛且寒非乾薑之溫

之曰以引入腸胃準繩曰便膿血熱下

養用辛以散之義諸使膿血皆傳經之熱

可收瀉利乾薑者假其辛熱以從故用

男其兩汪端

婁子錫汪惟龍

收海汪

大士汪

赤石脂禹餘糧湯

復以他藥下之利不止

下焦赤石脂禹餘糧湯

赤石脂禹餘糧湯

醫方集解 卷六 赤石脂禹餘糧湯

此手陽明藥也瀉可去脫重可達下

甘以益氣 難會須用餘糧赤石脂

桃花湯 治少陰病二三日至四五日腹痛

血者 焦不約而裏寒也凡下利便膿血身冷

赤石脂禹餘糧湯

此足少陰藥也李時珍曰赤石脂之重滲入下焦

辛溫煖下焦氣分而補虛硬米之甘溫

之花湯主下焦血虛且寒非乾薑之溫

之曰以引入腸胃準繩曰便膿血熱下

養用辛以散之義諸使膿血皆傳經之熱

可收瀉利乾薑者假其辛熱以從故用

也汗孔

目汗

陰虛

附撲汗法白米... 不止又方龍骨牡蠣糯米等分爲末撲之

牡蠣黃耆 麻黃根 浮小麥 煎服

此手太陰少陰藥也... 小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽爲陰之汗陽氣虛則衛不固黃耆麻黃根之甘溫走肌表而固衛

相子仁丸 治陰虛盜汗

相子仁 油二兩 人參 白朮 半夏 五味子 牡蠣 麻黃根 煎服

此手足太陰少陰藥也... 牛養心經神爲君牡蠣麥麩之鹹涼靜躁收脫爲臣五味酸飲清收半

茯苓丹 治遺精白濁及強中消渴... 小受傳腎至微精所受五臟六腑輸至之精皆不得蒸而時下矣故爲

菟絲子 五味子 石蓮肉 白茯苓 山藥 將菟絲子用酒浸

過餘酒煮山藥糊爲丸... 渴米飲下

此手足少陰藥也... 醫方集解 卷六

赤白

生津石蓮清心止渴... 氣于腎利小便而不走氣取其淡滲于補正中能泄腎邪也

此足少陰太陽太陰藥也... 火所以清熱二苓所以利濕半夏所以除痰濕熱多由于鬱滯砂仁菴

和中而補土惟蓮藕之清則所以固其脫也... 醫方集解 卷六 治濁固本丸

水陸二仙丹 治遺精白濁... 不足火蒸蒸

金櫻子 取半斤者蒸膏一斤... 此足少陰藥也金櫻子實其能益精潤能滋陰清能止脫

生于山故名水陸二仙丹... 醫方集解 卷六

金鎖固精丸

治精滑不禁 遺精者火炎上而水

沙苑疾藥

及寶 運鬚 龍骨 酥土 鹽水 煎一日 蓮子粉為糊

九菟湯下

此足少陰藥也 痰熱補腎益精通子 交通心腎壯陽清熱補水 交實固

腎補脾合之運鬚龍骨皆精氣之品 以正滑脫也 治遺精大注有

辰砂磁石龍骨之類 鎮之痰飲迷心者 猪苓丸之類 導之思慮傷陰者

潔古珍珠粉九黃柏蛤粉等分 滋陰降火 思慮傷陽者 謙而鹿茸養容

本事猪苓丸猪苓末二兩 先將一半炒半夏令黃 取半夏為末 糊丸更

用猪苓末一半 同炒微裂 砂紙養之 申未開空 心酒鹽湯任下 釋曰

牛夏有利性 猪苓導水 益腎閉導氣 使通之意也 定志丸見目門

人參 楊根白皮 等分為末 米飲或酒調下

此手足陽明藥也 人參之甘以補其氣 楊根之苦以燥其濕 冀以解其

熱 瀦以收其脫 使虛者補而陷者升 亦劫劑也 初起

桑螵蛸散 治小便數而欠 數便頻也 欠便短也 溺雖出于膀胱 然秘

能安神補心氣 癆瘵忘

人參 茯苓 蓮心 右菖蒲 桑螵蛸 龍骨 龜板 等分

此足少陰手足太陰藥也 虛則便數 故以螺蚌龍骨固之 螺蚌補腎熱

則便欠 故以菖蒲龜板滋之 人參補心氣 菖蒲開心 龜板能通心氣

于腎 遠志能通腎氣 心並能清心解熱 心者小腸之合也 心補則小

腸不虛 心清則小腸不熱矣

殺蠱之劑 以爲生者是 吾身一小天地也 燒燔煎人所當有之 至

寒受火迫則不安 其也亦能爲別 若飲食不與 氣虛虛衰 又能變生

諸病 不可名狀 如聚散 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

烏梅丸 治傷寒厥陰虛寒厥 吐衄 嘔吐 腹痛 泄瀉 痢疾 疝氣 瘰癧

食臭 復出也 此爲蕪寒 自生 此與烏梅丸 治瘰癧 安坑 亦治胃府發

咳 咳而嘔 嘔甚則長 蟲出 亦至久劇

烏梅 細辛 桂枝 人參 附子 黃柏 黃連 干薑 川椒

此足陽明厥陰藥也 虺得酸則伏 故以烏梅之酸 伏之 虺得苦則安 故

以連相之苦 安之 虺因寒而動 故以桂附薑椒溫其中 藏而以細辛當

歸潤其腎 肝人參用以助脾 烏梅兼以斂肺 吐衄爲胃寒之故 則成坑

下手足者 也陽氣內附 不與陰氣相順 故手足逆冷也 三陽三陰 俱相

集芩丸 治瘰癧腹痛 作止有時 或耕起來 往瘰癧 痛有作止者 重噴則

大黃 芩 葛風 枳榔 訶子 皮 蘇莢 木香 乾薑 附子 五分

此手足陽明藥也 重葛風酸而畏苦 故用葛附之熱 以溫之 烏梅調

皮之酸 以伏之 大黃枳榔 蘇莢 葛風之苦 以殺之 木香辛溫 以順其氣

雄黃 枳榔 白礬 等分 飯丸 每五分 食遠服

治腹痛 痛甚 痛有時 乾痛者 不吐不瀉 而痛也 有時者 濕

痛也 雄黃 枳榔 白礬 等分 飯丸 每五分 食遠服

治腹痛 痛甚 痛有時 乾痛者 不吐不瀉 而痛也 有時者 濕

痛也 雄黃 枳榔 白礬 等分 飯丸 每五分 食遠服

治腹痛 痛甚 痛有時 乾痛者 不吐不瀉 而痛也 有時者 濕

痛也 雄黃 枳榔 白礬 等分 飯丸 每五分 食遠服

治腹痛 痛甚 痛有時 乾痛者 不吐不瀉 而痛也 有時者 濕

此手足陽明藥也雄黃之辛毒板榔之苦降胃之酸瀉胃殺虫之品也故合用以治之

化虫丸 治腸胃諸虫為患 腸胃之中無物不容所以發生諸虫者欲正氣則衰或食生虫之物或濕熱蒸鬱而成

後重生之義也 胡粉 枳椇根 使君子 錢枯 蘇合 蘇合

為米酒黃麴糊作丸量人大小服之一錢五分 此手足陽明藥也敷藥皆殺虫之品也單用尚可治之類華為丸而虫

焉有不死者乎 其類皆其所常用者也有加附子乾薑者壯正氣也加苦參黃連者得苦而伏也加烏梅者得酸而收也加蘇合大瓜

者治九發天飽之虫也川椒皮者治風癢之虫也川椒子者治盆菜

使君子丸 治癰脹腹痛及食積黃食米炭土等物 飲食停滯濕

使君子 去殼 南星 薑 枳椇 右藥合炒如食生米用麥弄一斤炒

此手足陽明藥也使君子之甘南星之毒板榔之苦皆能殺虫以諸物因其所嗜引以砂糖誘之以甘也

獼猴肝丸 治鬼疰傳尸勞瘵 此五疰之一也疰使人寒熱沉沈不

此三陰藥也其鶴鼻白獼猴肝治鬼疰此何以故凡物聚人而僻處

藏也 肝皆在案數惟期肝一月一變其間又有退葉獨其于他賦此其所以能治

消渴殺虫方 治消渴有虫 昔棟根 取新白皮一握切焙入麝香少許煎空心服雖困頭不勿取

下重三四條類蛇而色紅其渴乃止 此陽明藥也消渴一症有虫耗其精液而成者益飲醇食炙積成胃熱

漏熱生虫理固有之臨病宜辨審也 明目之劑 目之在人特五官之三年而古人立有專劑蓋以除翳各

角大小皆為血輪大皆屬心若火大皆赤者為實火小皆屬心包相

滋陰地黃丸 治血弱氣虛不能養心心火旺盛肝木自實

子散大視物不清 肝為心母子能令母實故心火旺則肝木作實肝主

骨皮 五味子 黃連 人參 甘草 枳殼 柴胡 黃芩 當歸 天門冬 地

目二服息不辛熱之物助火寒冷之物損胃便藥不上行
此手足少陰足厥陰少陽藥也熟地當歸益生地地骨涼血黃芩瀉
肺火黃連瀉肝火天冬清肺而滋腎葉胡散肝而升陽五味收耗而斂
散人參甘草以益氣補中枳殼以利氣行滯也

補肝

加減駐身丸治肝腎氣虛兩目昏暗肝為肝臟子神光清腎

枸杞子 五味子 車前子 楮實 川椒 熟地 當歸 五
芎 絲子 酒浸 薑丸酒下本方除當歸五味楮實川椒名駐身丸治同

此足少陰厥陰藥也熟地枸杞補肝滋腎芎絲楮實益精強陰五味斂
耗散而助金水五味子酸鹹居多能斂肺 當歸和氣血而益肝脾肝藏

統血目得 川椒補火以逐下焦虛寒車前利水而瀉肝腎邪熱也車前
血而能視 肝明目利小便而不走氣得此瀉邪則補藥便為得力張
子和曰日赤腫是厥陰肝經風熱利小便能去肝經風熱

定志丸治目不能遠視能近視者王海藏曰目能近視者其有水
服蓋心強志能察健忘

不能遠視

遠志 菖蒲 人參 茯苓 蜜丸珠砂為衣張子和方無菖蒲
加茯神相子仁酸更仁亦名定志丸酒糊丸薑湯下安魂定驚

此手少陰藥也人參補心氣當歸開心散茯苓能交心氣于腎遠志能
通腎氣于心珠砂色赤清肝鎮心屬離火火旺則光能及遠也

不能近視

地芝丸治目能遠視不能近視王海藏曰目能遠視者其有火
生地黄 天冬 雨枳殼 甘菊花 蜜丸茶清或酒下用茶者飲

此足少陰藥也生地涼血生血天冬潤肺滋腎枳殼寬腸去滯甘菊降
火除風

人參益胃湯 治勞役飲食不節內障自病內障者睛裏昏翳不病之
白者李東垣曰五臟六腑之精氣皆乘受于脾胃而上貫于目脾者諸
陰之首也目者血氣之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸
明于目矣心者君火也主神宜靜而安相火代行其令相火者能歸也
上百脈皆勞于目既勞役過勞力妄行及因邪氣厥逆而損其血脈
故諸病生焉醫者不理胃及養
血安神治標不治本不理理也

黃耆 人參 甘草 白芍藥 黃柏 蔓荊子 每四錢
日二服本方加升麻葛根各益氣聰明湯補門

此足太陰陽明藥也參耆甘草大補中氣以強脾胃蔓荊升清陽而通
九竅白芍入厥陰而和榮血而能視黃柏除濕熱而滋腎水則日明使
精氣足而清陽升則藏府和而障翳退矣損金善日治目不明氣虛而

精氣已脫連相帶
赤腫 治風熱血湯 治目赤腫痛風熱傷血則赤腫痛 內外向者為外障在內近界者為內
障方集解 卷六 治風熱血湯 治目赤腫痛

荆芥 蔓荊子 菊花 白芷 麻黃 防風 桃仁 紅花 川
芎 當歸 白芍 草決明 石決明 甘草

此足太陽厥陰藥也荆芥防風麻黃白芷甘芎蔓荊輕浮上升並能瀉
風散熱桃仁紅花川芎歸芍辛散酸收並能養血去瘀兩決明皆除肝
經風熱專治目疾痰去血活則腫消風散熱除則痛止又目為肝竅搜
風養血皆以和肝加甘草者亦以緩肝而止痛也保命集云肝病在府

在臟則為乘當養血安神暴發
者為表易舉久病者在裏難治
洗肝散 治風熱上攻暴作赤腫目痛難開隱瀼淚凡目赤者或大

洗肝散之類是也散音或眼脂

薄荷 羌活 防風 當歸 川芎 梔子 大黃 炙甘草 等分

薄荷 羌活 防風 當歸 川芎 梔子 大黃 炙甘草 等分

薄荷 羌活 防風 當歸 川芎 梔子 大黃 炙甘草 等分

薄荷 羌活 防風 當歸 川芎 梔子 大黃 炙甘草 等分

為末每服二錢

此足厥陰陽明藥也肝屬木而主目木喜條風熱鬱于內故用薄荷

羌防以升之散之肝藏血故用當歸川芎以和之養之大黃瀉胃火而

通燥結梔子降心火而利小便

補用散方治肝虛目痛筋脈疼痛冷淚不止羞明怕日及夜則刺甚顯

苦寒之藥反劇者

夏枯草香附

甘草五錢

此足厥陰藥也夏枯草過夏至陰生則枯蒸稟純陽之氣有補養厥陰

血脈之功夜痛及用苦寒藥反甚者夜與寒皆陰也夏枯草能治之者

陽勝陰也香附行氣散肝和中解鬱推陳致新故用以為佐

當歸川芎 地骨皮 白蒺藜 養蒙花 甘菊花 羌活 荆芥

木賊 天花粉 蔓荊子 薄荷 枳實 甘草 川椒

連 蛇蛻 蠅蛻 蜜丸每兩作十九每服一九日三弱者米泔下

睛暗當歸湯下內障水香湯下

此足太陽厥陰藥也羌活荆芥蔓荊薄荷以升陽散風當歸川芎以和

肝養血黃連地骨粉清火熱枳實破滯氣川椒溫下焦木賊蛇蛻蠅

蛻以退翳養蒙養荊甘菊目蒙蒙藥以潤肝補腎瀉火清金炙草補中

以和諸藥也

石膏羌活散

治久患雙目不明遠年近日內外氣障風昏拳毛倒睫

羌活 荆芥 白芷 藥末 細辛 川芎 薄荷 甘菊 養蒙花

菜子 麻子 木賊 黃芩 石膏 甘草 等分為末每服一二

錢食後臨臥蜜水調下或茶清米泔亦得

此足太陽陽明厥陰藥也原文曰羌活治腦熱頭風藥本治正偏頭痛

白芷清頭目川芎療頭風荆芥治目中生瘡養蒙治羞明怕日蒼木明

目煖水藏木賊退障翳麻子起拳毛細辛菜子起倒睫黃芩石膏洗心

退熱甘菊降火除風甘草調和諸藥

防風飲子 治倒睫拳毛

黃連 甘草 人參 當歸 牛黃 葛根 防風 細辛 蔓荊子 食

後服避風寒濕熱

此足太陽陽明藥也參甘以補其氣歸身以濡其血黃連以清其火防

葛以散風熱細辛入少陰而潤腎蔓荊走頭面升陽

本方除人參當歸黃連加黃耆各神効明目湯治前症兼赤爛昏痛

冷淚多眠

又法摘去拳毛以鼠血點數次即愈

羊肝丸 治目疾內障

內障心火為勢妄行火炎不制神水受傷上為內障此五藏病也諸

皆屬于目相火者心包絡也至有脈上榮于目大盛則百脈沸騰上為

內障此虛弱病也勝脫小腸三焦脈俱併于目其精氣亦上注于目

之精四府一衰則精氣盡散非火乘之上為內障此六府病也神水黑

眼背時于陰白膜赤脈皆發于陽除翳障作放能為視物不立陽虛

不能視也

夜明砂 水賊 羊肝 以羊肝去筋膜水

煮搗爛丸

此足厥陰藥也收食血之重夜明砂收眼也故能散目中惡血而明
目化其天或夜明砂木賊輝揚而善歸木液能平肝散熱而去障障性
善斂故能退睛管歸能入厥陰養血而和肝用羊肝者羊性偏火取其
氣血之厲能補氣血引諸藥入肝以成功也

濟生羊肝丸黃連一兩搗羊肝一具去筋膜生甲搗爛和丸本車方煮
爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青翳

爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青翳

爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青翳

爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青翳

爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青翳

爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青翳

爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青翳

爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青翳

爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青翳

爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青翳

此足厥陰藥也收食血之重夜明砂收眼也故能散目中惡血而明
目化其天或夜明砂木賊輝揚而善歸木液能平肝散熱而去障障性
善斂故能退睛管歸能入厥陰養血而和肝用羊肝者羊性偏火取其
氣血之厲能補氣血引諸藥入肝以成功也

黃連 人乳 浸煎或煎點或加朴硝
此足厥陰藥也衍義曰人心主血肝藏血目受血而能視熱水入于經
其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁即血也用以點目
豈有不相宜者哉昂按加黃連者以清心肝之火也

百照膏 治翳遮瞳人如雲氣障隔
黃連二錢以水一碗煎膏 甘草六分防風八分 去皮尖 同煎滴
水不散去渣入蜜少許再煎少時要病人淨心點之至目微痛為度一
日五七點使藥力相續故曰百照臨點尤妙

此足厥陰藥也黃連瀉火防風散風甘草和中黃歸養血薤仁消風散
熱益水生光

柴胡 麻黃 黃連 生地 歸身 甘草 訶子皮 以水
二碗先煮麻黃至一碗去沫入後藥同煎至水不散去渣入蜜少許
再煎之

此足少陽厥陰藥也柴胡麻黃發表散邪歸身生地和肝養血黃連清
肝火甘草和中州瞳子散大故加訶子以收之也

飛絲芒塵入目方
陳壁 濃磨點之

飛絲芒塵入目方

飛絲芒塵入目方

飛絲芒塵入目方

飛絲芒塵入目方

癰疽之利... 毒在上飽服在下... 凡人活命飲... 治一切癰疽腫毒初起求消者

治癰

凡人活命飲

治一切癰疽腫毒初起求消者

金銀花 陳皮 白芍 防風 甘草 貝母 天花粉

乳香 沒藥 皂角刺 穿山甲 用酒煎

毒在上飽服在下... 凡人活命飲

此足陽明厥陰藥也... 金銀花散熱解毒癰疽聖藥

醫方集解

卷六

未

降火自正除濕祛風... 氣防風瀉肺疏肝... 托裏護心... 散皂角刺... 破堅故以為便加酒者

金銀花酒

初起

治一切癰疽

癰疽之生... 治一切癰疽惡瘡不問發在何處或肺癰腸癰初起便服可

金銀花 五兩... 甘草 水二碗煎一服再入酒一服

三服一日一夜服盡... 者搗爛酒調敷毒四

此足太陰陽明藥也... 藥甘草亦扶胃解毒之上劑也

本方用金銀花... 湯治痛癢色變紫黑者

附忍冬膏... 虛癩風尤宜于火熱熾盛之人

花香尤勝... 花毒尤勝

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

托裏

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

黃蠟... 治一切瘡癰惡毒先服此丸

于咽喉腫達于外麻痺且痛
為喉風腫于兩旁為喉痺

雄黃一錢 金三巴豆十四粒
醋糊為丸每服五分津嚥下

上熱火吹息帶刺入喉中由紫血惡
涎即寬此以熱攻熱七則流通之義也

此手足少陰少陽藥也吳鶴皋曰癰喉急症緩治則死維黃能破積氣

鬱金能散惡血巴豆能下稠涎丹溪生平不用劇劑此蓋不得已而惟

者乎單蟻蟻蟻木舌子舌腫喉風走馬喉風病同于火候不分也惟

火鬱發之發謂發汗也
血者乃發汗之一端也

皂莢丸金治肺癰欬逆上氣時時唾濁但坐不眠肺者五藏之華蓋也

皮毛芳傷血氣脈虛而風邪乘之內感于肺汗出惡風咳嗽短氣鼻

塞項強胸膈脹滿久久不瘳則成肺痿傷皮毛熱傷血脈風熱相搏

氣血積滯結于肺則成肺癰多唾涎沫而無膿者肺痿也口乾喘滿

咽喉而渴其則四肢微腫咳吐膿血胸中隱痛者肺癰也痰為正氣虛

氣實

皂莢同去皮為末蜜丸以皂莢和湯服三丸

此手太陰藥也喻嘉言曰火熱之毒結聚于肺表之裏之溫之清之曾

不少應堅而不可攻者今服此丸庶幾無堅不八聿成洗滌之功不可

以藥之微賤而少之也

千金方用桂枝湯去芍藥加皂角名桂枝去芍藥加皂角湯治肺痿吐

沫本方加蛤粉等分為末名皂蛤丸治婦人風邪客于乳房而成癰

每服二錢酒下此藥能導其汗散其風

托裏十補散局方外科治癰瘡初發或已發邪高痛下瘡盛形脈

無力者宜補形氣調經脈自當清散不待汗之下也

黃耆 人參 當歸 川芎 桂心 白芷 防風 厚朴 桔梗

沒藥亦名托裏散治癰瘡疔瘡

此手足太陽足厥 陽明藥也參耆補氣歸酒血甘草解毒桂枝白

芷桔梗非膿厚朴瀉實蒲防風散風邪為表裏氣血之藥共成助陽內

托之功也宋升溪曰若冬月肺癰用之可轉重就輕若清夏月用之

人不分冬夏無論經絡不能無誤也惟要曰治癰須明托裏理通藏府

謂和榮衛三法內之外者其脈沉實發熱煩躁外無歇赤痛深于內其

邪深矣當疎通藏府以絕其源外之內者其脈浮數痲腫在外形瘡外

宜通知其內在經府和榮衛用

此三者雖未即愈必無變症

托裏黃耆湯治諸瘡潰後膿多內虛兩湖宜大補氣血

黃耆 人參 當歸 桂心 茯苓 遠志 麥冬 五味子 炒 等

分每服五錢食遠服

此手足太陰足陽明藥也人參黃耆補氣固衛當歸桂心活血生肌扶

芩瀝濕健脾麥冬清熱補肺遠志辛散消理癰疽散鬱補精長

溫善收腫大丹溪曰癰疽潰後補氣血理脾胃為切要否則數月半

年之後虛症仍見轉成他病也

托裏溫中散治瘡瘍為寒變而內陷膿出清解皮膚涼心下痞滿

腸鳴切痛大便微澀食則嘔逆氣短喘逆不得安臥時發昏憤此孫王

伯喉痛方也六脈沉微色紫膚涼加以呃逆胃中虛寒

每矣迷于盛夏用此大辛熱之劑益檢時從症之變法也

附子 乾薑 羌活 木香 茴香 丁香 沉香 益智仁 陳

皮 甘草 加生薑五片煎

此足陽明三陽藥也衛生寶鑑曰經因寒淫于內治以辛熱佐以苦溫

附子乾薑大辛熱溫中外發陽氣白晝之表為君羌活味苦辛溫透關

節炙甘草溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐呃逆不下食補甜沉

香丁香大辛熱以散寒邪為佐瘡氣內攻聚而為潰木香茴香陳皮辛
苦溫治疔毒散毒為佳

止痛膏歸湯 治瘡疽背疽疔瘡

當歸 生地黃 芍藥 黃耆 人參 甘草 官桂 各一

此足陽明厥陰藥也當歸生地活血涼血人參黃耆益氣補中官桂解
毒化膜則痛漸止芍藥和脾酸以飲之甘草扶胃甘以緩之則痛自滅

矣齊德之日世人皆謂乳沒珍貴之藥不任疼痛不知乳沒利宜殊非
通之虛痛補之實痛溫之風痛除其風濕痛導其濕燥痛潤之寒痛
之陰陽不和者調之經絡閉者利之不可執一而無權也

長肉

生肌散 敷瘡長肉

寒水石 滑石 龍骨 海螵蛸 兩 蜜陀僧 枯礬 定粉 乾胆

脂五 共為細末搽瘡口上

此陽明藥也 瘡口不斂蓋因膿水散溢而潰爛也石膏亦名藥
時珍曰唐宋諸方 滑石解肌熱龍骨枯礬善收瀉脂活血解毒螵蛸
寒水石即石膏 陀僧定粉收濕燥膿故能斂瘡而生肉也

又方檳榔枯凡 陀僧黃丹血竭 輕粉 亦各生肌散張子和
方黃連 蜜陀僧 胭脂 雄黃 輕粉 亦各生肌散治同

灸法 治一切癰疽惡瘡

凡人初覺發背欲結未結赤腫焮痛以濕紙覆其上先乾處即癰頭也
取獨頭大蒜切片安于頭上用艾灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛
不痛者灸至痛時方住最要早覺早灸為上若有十數頭者即用蒜研
作餅鋪頭上聚艾于頭上燒之若初發赤腫一片中間有黃粟米頭子
便用獨蒜片安于頭上着艾灸十四壯或四十九壯使毒氣外出則易

愈 可用引氣上更生大福也 更源曰有灸至八百壯者約艾一箇初
瘡肉不痛而灸至好肉方痛至夜火熾瘡肉高者不得火此言過矣
否則內通五臟而危矣劉日曰精要謂頭上瘡毒不得火此言過矣
為瘡陽所聚艾宜小壯數宜少小者如椒粒少者三五壯而已按東
項灸元好問謂瘡以火艾炷如兩核許者灸至百壯始覺痛而痊由是
知少若不痛者艾炷大壯數多亦無妨也

芙蓉外敷法

一切癰疽腫毒用芙蓉花或葉或根皮爛搗或乾研末蜜調塗四圍中
間留頭乾則癰換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿出已潰者
則易收斂醫秘之名為清涼膏清散鐵線散皆此物也或加赤小豆
末或種耳燒存性為末加入亦妙 芙蓉辛平性滑潤粘滑膿

經產之劑 婦人之病與男子同惟行經時痛則不可以例治故取胎
表實六合湯 治妊娠傷寒頭痛身熱汗脈太盛經病

四物湯 治兩麻黃 細辛 此足太陽藥也凡婦人傷寒六經治例皆同有懷妊者則以安胎為主
藥中有犯胎者則不可用也海藏皆以四物為君養血安胎餘同傷寒
例分症而治麻黃細辛發汗解表故加用之治表實無汗者

四物四兩加桂枝地骨皮各七錢名表虛六合湯治妊娠傷寒表虛自
汗身熱惡寒頭痛項強脈浮而弱 地骨皮涼血散 四物四兩加防風蒼
朮各七錢名風濕六合湯治妊娠傷寒中風濕氣肢節煩痛頭痛身熱
脈浮四物四兩加升麻連翹各七錢各升麻六合湯治妊娠傷寒下後
過經不愈濕毒發斑如錦紋者四物四兩加柴胡黃芩各七錢名柴胡
六合湯治妊娠傷寒胸膈滿病而脈弦少陽經症四物四兩加大黃五
錢桃仁十枚炒炒名大黃六合湯治妊娠傷寒大便秘小便赤氣滿而

脉沉數太陽陽明本病也急下之

毒之如何此伯日有故無

四物四兩加人參五味各五錢

湯治妊娠傷寒汗下後咳嗽不止

名補實六合湯治妊娠傷寒後虛

加槐子黃芩各五錢名槐子六合湯

四兩加石膏知母各五錢名石膏六合湯

而六四物四兩如茯苓澤瀉各五錢

不利太陽本病本勝也四物四兩

一加甘草一兩一方治妊娠傷寒汗下後血漏不止

兩加附子肉桂各五錢名附子六合湯

汗腹中痛脉沉遲者少陰病也

地大黃酒各五錢名酒大黃湯

仁莫妄施要效母于無損大黃四物

三日乳蒸熱或早起勞動飲食停滯

或大便閉塞其苦非輕凡有發熱且

妙過酒熱地黃佐之加軟苗柴胡乾

能引血入內分氣藥人氣分且能去

治熱深合內經之旨如惡露不盡者

少者加百木茯苓有痰阻逆者加陳

四物為至乃養血務木之要也

詳察脈症而用之

膠艾湯治婦人漏下或半產後下血

五月而產胎必傷其血海血因續下

水過多淋瀝不斷此即

阿膠 甘草 艾葉 當歸 芍藥 地黃

醫方集解 卷六

升酒三升煮取三升內阿膠烺化服

治胎動經滿腰痛腹痛短氣加黃芩

藏吐血及金瘡經肉絕者加乾薑

此足太陰厥陰藥也四物以養其血

以甘草行以酒熟使血能循經養胎

又方阿膠一斤蛤粉炒艾葉散莖亦

痛或胎上搶心去血腹痛指迷方

不胎足厥陰脈之經水即閉飲食稍

生險地二生火謂之腫足少陽脈所

矣或編者一物乃大藏之虛如愛酸

四月始受小精以成血脈形像具手

火精筋骨四肢已成毛髮始生足太

口目皆成足陽明脈所主七月始受

太陰脈所主八月始受土精以成皮

陽明脈所主九月始受石精百節單

神氣備足乃生足太陽脈所主准手

為而巳胎胎須妨三五七月

宜服清熱涼血安胎之藥

鈎藤湯治惡瘧胎動不安

鈎藤鈎 當歸 茯神 人參 桔梗

子柴胡白朮風痰加半夏南星竹瀝

此足厥陰藥也鈎藤之甘寒以除心

琴梔子之苦寒以平少陽厥陰之風

以益氣而寧神當歸寄生以養血而

羚羊角散治胎前中風

羚羊角 獨活 防風 芎藭 當歸

五〇三

仁五分木香二分 甘草二分 加蘇煎一方有五加皮

此足厥陰藥也羚羊之辛涼以平肝火防風獨活之辛溫以散肝邪茯
神酸豏以寧神當歸川芎以活血杏仁木香以利氣薏仁甘草以調脾
也扶土所以心水夜驚仁亦治筋急拘攣之症

紫蘇飲子懸 治胎氣不和湊上胸腹滿頭痛心腹脇痛子懸由下

蘇葉一分當歸一分芍藥一分人參一分陳皮一分大腹皮一分甘草一分加

蘇煎空心服心腹痛者加木香玄胡索

此手足太陰厥陰藥也陳來章曰芍藥以和其血蘇橘大腹以順
其氣氣順血和則胎安矣既利其氣復以人參甘草養其氣者順則順
其邪逆之氣養則養其冲和之氣也

天仙藤散子氣 治子氣婦人衝任受血風因妊娠而足腫喘悶

天仙藤生木香香附炒烏藥炒陳皮炒甘草炒等分加紫蘇三葉

木瓜生薑各三片空心煎服或為末湯調下目三服

此手足太陰藥也天仙藤之苦溫疏氣活血能解血中之風氣香附烏
藥陳皮之辛溫以行鬱氣紫蘇生薑之辛溫以疏表氣甘草之甘緩以
和正氣少加木瓜以除濕熱利筋骨調榮衛也

白朮散子腫 治子腫面目肢體虛附如水狀胎中挾濕水與血搏濕氣流

白朮一分蒼朮一分陳皮一分茯苓皮一分大腹皮一分為末米飲下指迷有方

桑皮白皮無白朮皮飲丹溪除薑皮腹皮加川芎木通補中導水行

氣此症有黃魚

此足太陰太陰藥也小病當令上下分消薑皮橘皮辛而能散使水從
手發汗皮厚皮厚皮厚而能泄使水從溺發出水盛由于土衰故用白朮
之甘溫以扶脾土而堤防之不致泛溢也

竹葉湯子煩 治妊娠心煩胆怯終日煩悶名子煩受胎四五箇月相火用事

防風一分人參一分有防風知母如有痰者加竹瀝

此手足太陰少陰藥也竹葉清煩黃芩消熱麥冬涼肺心火乘肺故茯苓

寧心人參補虛妊娠心煩固多虛也如相火盛者單知母九君火盛者

紫蘇湯子嗽 治子嗽凡切不可作虛煩

紫蘇一分冬一分桔梗一分甘草一分桑白皮一分杏仁一分竹茹一分入蜜溫服

此手足太陰藥也子嗽由于火邪當以清火潤肺為務桔梗桑皮之涼以
瀉之天冬竹茹之寒以清之紫蘇芩草之溫杏仁白蜜之潤以潤之也

安胎散子淋 治子淋心煩悶亂子淋膀胱小腸虛熱也虛則不能制水熱

此手足太陰足太陽少陰藥也陳來章曰虛熱宜補故用人參甘草之甘

林問宜滋潤用木通燈草之滲滑石之滑肺燥則天氣不降而麥冬能

清之則地氣不升而細辛能潤之經曰地氣上為雲天氣下為雨

當歸一分熟地黃一分芍藥一分人參一分白朮一分陳皮一分半夏一分甘草一分

加... 此足太陰厥陰藥也

此足太陰厥陰藥也脾虛補以四君血虛補以四物痰飲消以二陳使氣得升舉而肥曰通也

又法將孕婦倒懸胎動而小便自通矣

附丹溪麥冬膏人參五分白朮錢黃耆半茯苓陳皮桃仁各一炙甘草

分用猪羊胞煮湯入藥煎服治產後胞損成淋瀝症

黑神散方 治產後惡露不盡攻衝作痛及胞衣不下胎死腹中

熟地黃 歸尾 赤芍 蒲黃 桂心 乾薑 甘草 黑豆

每服二錢酒童便各半煎便產須知有生地黃

此足太陰厥陰藥也前症皆因血瘀不行熱地歸芍之潤以瀉血蒲黃

黑豆之滑以行血蒲黃當生用桂心乾薑之熱以破血

古黑神散有草霜白芷等分每二錢煎入童便 少許和服治橫生逆

失笑散方 治惡露不行心包絡痛或死血腹痛

痛 滿黃 五靈脂 等分為末煎醋調服

此手足厥陰藥也生蒲黃性滑而行血五靈脂氣燥而散血

入厥陰而活血止痛故治血痛如神

淨蘭葉 人參 三川芎 荆芥 甘草 為末溫酒調下更宜燒

此足厥陰藥也氣血虛弱故以芎藭淨蘭養其血人參甘草補其氣外

感風邪故以荆芥疏其風風邪去氣血生則神清矣肝藏魂故曰清魂

五月五日六月六日或小雪日益母草花正開時連根採收陰乾用花

葉及子石臼搗末蜜丸或搗汁干砂鍋內文武火熬成膏服忌鐵如胎

動腹痛下血不止當歸湯下橫生逆產胎衣不下炒鹽湯下產後血暈

口渴狂言產後中風失音口噤及血結奔痛時發寒熱面赤心煩或鼻

衄舌黑口乾並童便和酒下產後喘嗽惡心吐酸脇痛無力酒下產後

瀉血裏湯下產後痢疾米湯下產後崩漏糯米湯下產後帶下膠艾湯

下產後二便不通煩躁口苦薄荷湯下凡產後以童便化下一丸能安

產良藥而又能消疔腫散乳癰也
明日秘經用子為良若胎產瘕瘕消水行血則
可並用益根蓮花葉子行子則行中自補也

當歸羊肉湯 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰發勞

黃耆 兩 人參 當歸 七 生薑 五 用羊肉一斤煮汁去肉入前藥煎服

如惡露不盡加桂行血惡露下多加川芎有寒加吳茱萸有熱加生薑

汁有氣加細辛 此手是太陰厥陰藥也參耆補氣而固衛當歸養血而調榮生薑辛溫

引氣入氣分而生新血羊肉甘熱用氣血之屬以補虛勞熱退而汗

收矣 小方除人參黃耆用羊肉一葷五歸三各當歸生薑羊肉湯治產後

腹中疝痛及寒疝腹痛勞不足 疝者鳩又言 疝者鳩又言

當歸散 婦人妊娠宜當服之 產者宜服之胎無疾苦臨盆易產產

後百病悉 當歸 芍藥 芍藥 黃芩 白朮 為末酒調服日二

此足太陰厥陰衝任藥也衝任血盛則能養血而胎安芍藥芍藥能養

血而益衝任又懷妊宜清熱涼血血不妄行則胎安黃芩養陰退陽能

除胃熱白朮補脾燥濕亦除胃熱胎氣係于脾脾虛則 脾胃健則能運

化精微取汁為血以養胎自無惡阻嘔逆之患矣故丹溪以黃芩白朮

為安胎聖藥也 易簡方加山藥治經三四月不行或一月再至 數月不行者自少也

之以白朮山藥一月再至者脾虛有熱也 白朮能補脾黃芩能涼血山藥能固經

啟宮丸 治子宮脂滿不能孕育 婦人肥盛不孕者以子宮

脂滿不能受孕 脂滿不能受孕 脂滿不能受孕

脂滿不能受孕 脂滿不能受孕 脂滿不能受孕

脂滿不能受孕 脂滿不能受孕 脂滿不能受孕

脂滿不能受孕 脂滿不能受孕 脂滿不能受孕

脂滿不能受孕 脂滿不能受孕 脂滿不能受孕

脂滿不能受孕 脂滿不能受孕 脂滿不能受孕

青蘗 白朮 牛夏 麩 香附 附子 茯苓 神麩 錢 檳榔 紅 甘草 蘇

此足太陰厥陰藥也補半白朮燥濕以除其痰香附神麩理氣以消其

滯川芎散鬱以活其血則藥者通塞者散矣茯苓甘草亦以去濕和中

助其生氣也 脾而不木多由痰濕改以 助其生氣也 脾而不木多由痰濕改以

達生散 亦各東膠 婦人妊娠八九月服數十劑易生有力 詩云誕彌厥

當歸 芍藥 洗酒 人參 白朮 陳皮 紫蘇 甘草 大腹皮 三

入青葱五葉黃楊腦子七個煎黃楊木 或加枳殼砂仁或春加川芎夏

加黃芩冬加木芍或有別症以意消息 此足太陰厥陰藥也當歸芍藥以益其血人參白朮以益其氣陳

皮紫蘇蔥葉以疏其壅氣血不虛不滯則胎產自無留難之患矣 朱丹

有瘦胎飲為湯湯公至而作恐非至到之言予換味苦于難產遇胎前

母氣虛亦不能自運耳當補母氣則胎兒健易產令其有孕五六月以

東與時令加減服無不應因各日達生散云昔海陽公主難產方士

進使胎飲用枳殼四兩炒甘草二兩炙五月後日服一錢漸古改以枳

本名來胎飲至奉養大過氣實有餘故可服之若一榮滋施氣之甚矣

按漢時許學士云大率如娠惟在抑陽助陰其方甚多亦恐羣隊枳殼

散所以抑陽助陰物湯所以養陰然枳殼散差其宜以內補九佐之印當

二兩為丸也 豬蹄湯 治乳少 通草 一兩 煮食

此足陽明藥也猪蹄能潤下通草淡能通散

猪蹄 通草 煮食

猪蹄 通草 煮食

猪蹄 通草 煮食

猪蹄 通草 煮食

猪蹄 通草 煮食

風

少

廣濟方用猪蹄四隻者汁加土瓜根漏蘆木通各三兩
少米意 煮稀粥食治同或以猪蹄湯調益元散服以木梳梳乳房乳
汁自下 又等山甲王不留行皆通乳之藥俗
人參荆芥散 治血風勞 寒熱汗流轉不已乃成王也

荆芥五分 防風 甘草 芎藭 當歸 桂心 加薑煎
此足太陰厥陰手少陰藥也陳來章曰血中之風荆芥防風散之大益
生風矜角柴胡平之陰虛發熱地黃驚雷滋之血氣痛澤月水不調等
驚雷歸桂心枳殼調之煩忘食少盜汗心忡人參白朮炙草杏仁補而
收之

柏子仁丸 治經行復止血少神衰 女子善懷每多憂思憂多則傷心
肝無所大而衝任之脈枯故經閉不行也。經日月事不來者胞脈門
也胞脈者屬心而絡于胞中令氣上通肺心氣不不得可降營事不來月
相子仁 去油牛膝 酒卷柏 錢五 澤蘭 續斷 熟地黃 蜜丸米飲下

益衝任卷柏澤蘭活血脈而通經閉 卷柏人血用破血天灸用止血李班曰
行一月一見其來有常故曰月經或外感風寒燥濕熱或內傷生
或比情鬱結滯礙為痰凝滯于內日血滯或用力太過入房太甚或
食燥熱以致火動邪氣盛而津液衰日血枯若經後發熱血氣暗而
妄行逆上則出于口鼻小血相閉則為崩帶結于內則為癥瘕疝疝血
瘕瘕瘕等症並治熱相傳則為崩帶結于內則為癥瘕疝疝血
山血帶與血枯而日血滯經閉宜破者原因飲食熱毒或累怒發熱
炭真須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生矣皆氣旺血
起于勞役憂思過宜溫補或兼火濕熱尤宜清之涼之每以內佳
左背熱則血行也但不可純用峻藥以解陰道至于耗氣益血之
女科要法但氣血配氣熱則熱氣寒則寒氣甘則升氣降則降氣
則行氣滯則滯如氣鬱火氣盛于血育方可用厚香附散如氣散加木
香滋潤行氣開鬱若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女一般腸
主則陰自長氣耗則盛
亦稱豈可專耗其氣哉

醫方集解 卷六

經

歸六君子湯 治經水後期其來滴少形體虛弱
當歸 芍藥 人參 白朮 茯苓 甘草 橘紅 半夏 加薑煎
此足太陰厥陰藥也二陳治其痰滯參朮補其氣虛氣行則芍歸活其
經血

連附四物湯 治經水後期其來滴少形體虛弱
白者虛也若扶扶停水以混之也如痢
連附四物湯 加香附黃連
此手少陰手足厥陰藥也四物以益陰養血加黃連以清血熱香附以
行氣

四物加艾木湯 治經水過多 黃芩 枳殼 白朮 四物加艾通湯治
經水適斷五心煩熱經水色黑或如豆汁 或如豆汁熱兼濕也 芩
加梔運為熱六合湯加薑附為寒六合湯加陳朴為氣六合湯加羌
為風六合湯皆婦科經產通用之藥也

固經丸 治經行不止及崩中漏下紫黑成塊 衝任為經脈之海若無
調適其功過度則傷衝任之氣虛不能約制則血氣和平血氣
下或由陰虛陽弱為熱所乘致傷衝任血得熱則妄行也脈數疾小為
順大者為逆紫黑成塊者熱甚而反兼水化非寒也
玉機微義曰血得寒則凝既行而紫黑故知非寒也

龜板 天門 芍藥 黃柏 三兩 黃芩 炒 香附 酒炒 枳殼 炒 酒丸
此足少陰厥陰藥也經多不止者陰虛不足以制胞絡之火故越其常
度也助中漏下者虛而挾熱也紫黑成塊者火極似水也黃芩清上焦
之火黃柏瀉下焦之火龜板滋陰而養血皆壯水以制陽火也香
附辛以散鬱積皮黃以止脫

醫方集解 卷六

男婦 升陽舉經湯 治崩漏身熱自汗短氣倦怠懶食 此由

補中益氣湯 見氣加白芍照梔子 補中益氣湯 補中益氣湯 補中益氣湯

此足太陰陽明藥也 補中湯以益氣升陽 補中湯以益氣升陽 補中湯以益氣升陽

陰黑梔以清熱止血 又東垣前草秘藏升陽舉經湯 黃耆白朮 各三錢 羌活防風藥本二

獨活附子 甘草 各一錢 人參熟地川芎 各一錢 細辛 六分 桃仁 十箇 去紅

花肉桂 勿用芍藥 各五分 每服三錢 漸加至五錢 治經水不止 原文曰如

之空虛是氣血俱脫大寒之症 經手其脈數疾 舉脈弦緊或澀皆陽脫

之症 陰火亦亡見熱症于口鼻 脈或渴此皆陰陽欲先亡也 當溫之

如聖散 治崩漏不止 凡非時血行淋漓不已 謂之漏下 忽然暴

櫻欄 烏梅 兩錢 烏梅 兩錢 烏梅 兩錢 烏梅 兩錢 烏梅 兩錢

此足厥陰藥也 瀉能止血 故用櫻欄 酸能收斂 故用烏梅 溫能守中 故

用乾薑 能止血 火也 故並用

牡丹皮散 治血衰 瘦者血凝聚而成也 伏于隱辟之

丹皮 桂心 歸尾 延胡索 分三牛膝 赤芍藥 莪朮 分三稜 分四

水酒各半煎 此足厥陰藥也 桂心丹皮赤芍牛膝以行其血 三稜莪朮歸尾延胡以

行其血中 氣滯氣中血滯 氣血過流則結者散矣

正氣香散 治一切諸氣氣上 凌心心胸 欬喘肺痛 痛 痛 痛 痛 痛 痛

婦人多憂鬱 故氣病為多 氣為血配 氣滯則血亦不能行 故月候不調也

香附 烏藥 陳皮 蘇葉 乾薑 蘇子 每五六錢煎

此手太陰厥陰藥也 烏藥陳皮而入氣分 而理氣香附蘇葉入血

分而行氣 以散鬱 使入氣分 兼入血分 用辛溫以解鬱 散肝令氣

調而血和 則經行有自 常無痛壅之患

抑氣散 治婦人氣盛于血 變生諸症 煩躁 膈痛 凡入血氣和平 則無

于胸膈則滿上 女子頭則暈矣

香附 兩錢 陳皮 兩錢 茯苓 兩錢 甘草 兩錢 為末 每服二錢

此手太陰少陽藥也 經曰高者抑之 香附能散鬱 陳皮能調諸氣 伏

神能安心 氣甘草能緩逆 氣氣得其平 則無亢害之患 矣若鬱甚者 當

于理氣門中 諸方選用 不必泥此 氣之藥 則真氣耗散 陰火愈盛 而成

氣血而虛矣 是方平和 為可常用 或用滋血之藥 使陰而充足

而下九子 治赤白帶下 帶下起于風寒濕熱 所傷入于胞中 或中經脈

下焦奇經之分 因帶脈而得 各故曰帶 赤者屬血 白者屬氣 其狀如涕

相連而下 言帶者 亦病形也 有濕 流滯下焦 者有肝腎陰淫 濕勝者

醫方集解 卷六 正氣香散 下九

有驚恐而木乘土位 濁液下流者 思慮無窮 而為白淫者 或餘濕

熱滯于小腹之下 者 辨本雖殊 皆為氣血虛損 榮衛滯滯 而成其標

也 則 樗皮 兩錢 白芍 五錢 黃柏 三錢 粳米 飲下

此足少陰厥陰藥也 陳來章曰 樗皮苦燥 寒勝熱 固下 故赤白帶

因于濕熱者 用之為君 古方有蒼柏 樗皮 側柏 樗皮 芩柏 樗皮 芩木 樗

芍藥之酸 斂陰氣 收下瀉為臣 黃柏之熱 以散寒濕 黃柏之寒 以祛熱

濕 並炒黑 以止血 收脫為佐使也

當歸煎丸 治赤白帶下 腹中痛 不飲食 羸瘦 此血虛有熱之症 法當

少復亡其 弱故白滑之物 下漏不止

此足少陰厥陰藥也 歸身熟地 續斷 阿膠 補肝滋腎 以治血虛 牡蠣地

榆清熱 收脫 以止帶下 赤芍酸寒 能散惡血 去瘀 所以生新散之 所以

收之也 以上八味醋

白芷散 治赤白帶下脫不禁 長方曰帶下由于風寒濕熱所傷傷肝

白芷 兩海螵蛸二個 胎髮一錢 為末酒調下二錢

此足陽明少陰厥陰藥也白芷辛溫燥濕而祛風烏鯛即海鹹溫收濕而和血髮者血之餘補陰消痰蝦黑又能止血也

救急良方 人之以疾病死而得終其天年者雖不幸猶幸也乃有暴 害坐視其轉死莫之能救者多矣故救簡便良方 以備緩急倘用此而救活一命于人心獨無愧乎

暴死 凡人延湖于心中卒然倒仆急扶入煖室扶策正坐用火炭沃醋使醋氣衝入病人鼻中良久自甦或搗韭菜汁灌鼻中或用皂角末吹入鼻中得甦則醒倉卒無藥急于人中穴及兩足大指離甲一葉葉許

各灸三五壯即活 凡人卒然昏倒身冷無痰此名氣厥 亦名中氣若 身風有痰者 則名但扶正坐氣順即安或用皂角末吹鼻令甦亦佳 凡冬月中寒卒倒身強口禁手足厥冷如無醫藥當燙前鼻湯灌之 凍死有氣者

以灰炒熱盛囊中熨其心頭冷即易之若遠以火烘冷與火爭必死浴以熱湯亦死或用薑汁熱酒各半溫服 凡暑月道中中熱卒死以路上熱土團臍令人尿其中即活薑湯重便乘熱皆可灌之或用熱土大赫等分搗水灌之或置日中或令近火以熱湯灌之即活切勿飲以冷水反臥冷地正如凍死人若遠近火即死

益死 急令手裏衣物緊繫道起解繩安放正平枕髮向上揉其項痕愈則喉管脚踰兩肩以兩管吹氣入耳內或刺雞冠熱血滴口中男用雌女用雄鳥節氣轉或再屈伸其手足將手摩之或氣不接將腰打

三四等或以皂角末搗切不可割斷繩索雖自至身冷猶可活 溺死 急倒提出水用牛一頭令橫臥以腹合牛背上牽牛徐行令吐出腹中之水以老薑擦牙即活口紫者搗開橫一筋于牙間使水得出如無牛以銅覆地將病人臍對銅臍俯臥以手托其頭水出即活或俯臥

巖上脚後稍高離地臍中待其水自流出或用皂角末綿裹納下部出水即活切勿火烘寒入內不救

魔死 如原有燈即得切忌火照但痛咬其脚跟或咬大指搗而壓其項或以皂角末吹入鼻中得甦即醒

中奇 凡中蠱毒令醬白醬不瀆食黑豆不醒即是中毒可濃煎石榴皮汁飲之或熱茶化胆礬半錢探吐吐惡毒或米飲調鬱金末三錢令下

凡中飢補毒急飲以人溺及人唾汁或搗烏柏樹根葉汁或藍汁令

服或刺羊血熱服或取生蠟研冷水服 中蠱毒緣飲生豆腐漿解之 中諸菌菌毒及重蟻入腹黃土和水飲下之 綠豆湯甘草湯能解百毒

服鉛粉 以麻油調蜂蜜加飴糖與服 蛇虫犬咬傷 凡惡蛇傷急于傷處上下緊縛使毒不散走隨浸毒缸內食蒜飲酒令飽使毒不攻心或礬石甘草等分冷承服二三錢更搗蒜

救患處加艾圍灸之此法兼治百虫毒蠱又方五靈脂一兩雄黃五錢酒調服淨收患處又方貝母為末酒調盡醉飲之頃久酒自傷處為水

流出候水盡以藥渣敷瘡上垂死可活 凡蜈蚣傷取大蜘蛛放傷處吸去其毒即投蜘蛛于水中令吐毒以全其命又方生雞血傳之又法

鹽水洗淨鷄涎或搗塗之壁壁虎咬用桑葉灰水煎敷沸瀉濃汁調白

藥未塗之 蝎子慈用白蠟半夏等分醋調塗之

向之亦不得殺之若蝨 凡瘋狗咬傷急用香末將半個碎切斑蝥七

個去頭翅足若過一日加一個糯米一撮慢火炒脆去斑蝥取米研末

好酒調服取下惡物多自凶者頭上有紅髮三根拔去之若仍凶腹內

有狗聲者再加木煎一個用斑蝥甘一枚如前製法與服後以黃連甘

三解之三月不可聽鐘鼓聲再發則難治終身不得食羊犬肉稍輕者

急于無風處捏去惡血孔乾者針刺出血用小便或搗湯洗淨搗葱貼

上若常大咬者洗淨血水用虎骨煨研敷患處或爛嚼杏仁傅之

湯炮傷 雞子清調大黃末塗之炒黃柏末亦可一法以冷燒酒燒淋甚

妙 刀斧傷 剉海螵蛸末傅之血立止古墻石灰藥傅之亦佳金鎗血出

醫方集解 救急 卷六 蛇虫大咬傷湯 骨哽 凡魚骨哽食橄欖即下如無鮮者用橄欖核糜水飲之

骨哽 凡魚骨哽食橄欖即下如無鮮者用橄欖核糜水飲之

是有如此者 又貓涎亦能下魚骨哽 凡雞骨哽用野芋根搗爛如

龍眼太鷄湯化下如魚骨哽魚湯化下 猪骨哽用大弟一足取其涎

徐徐嚥下或用研碎花水洗化下或醋煎成餅仙嚥下

子煎湯服下 凡治哽之法可以類推如屬雞骨哽用魚骨哽或雞

誤吞銅鐵金銀 但多食肥肉自隨大便而出吞針者若蠶豆同菲菜其

針與菜自從大便出後吞銅者食葶藶散即化

吞髮蟻不出 取白髮燒灰白湯調下一錢

煩車閉不能台醉 之腫中用皂角末吹其鼻嚏透自台

呢逆不止 用紙捻刺鼻中得嚏即止

舌脹滿口 刺雞冠血浸紙捲筒塞鼻內注燈油吹入以生清涼之或煎

乾薑末 乳蛾喉疔 凡乳蛾水漿不人者先用皂角末點破再取杜牛膝汁和醋

含嚥又法艾葉搗汁口含良久腫自消冬月無葉搗根用之又喉閉者

取山豆根汁含嚥即開有藥不能進者急取病人兩臂搗數十次使血

聚大指上以髮繩扎住指拇針刺指甲縫邊出血如放沙一般左右手

皆然其喉即寬

霍亂絞腸痧 以針刺其手指近中處一分半許出血即安仍先自兩側

捋下令惡血聚于指頭後刺之

鼻衄不止 亂髮燒灰存性細研水服併吹入鼻中又白芨末新汲水調

下文紙數十層水浸濕安頂中以火炙之紙乾立止又用線扎中指中

醫方集解 救急 卷六 霍亂絞腸痧 跌打損傷 節左孔出血扎左指右孔出血扎右指兩孔出血則俱扎之又以大蒜

搗餅貼定心

重入耳中 用猫尿滴耳中重即出

跌打損傷 韭汁和童便飲散其瘀血骨折者蜜和葱白搗勻厚封酒調

白芨末二錢服

產婦血暈 扶坐燒炭沃醋或燒舊漆器令烟入其口鼻即醒

產後子腸不收 醋三分冷水七分和暖產婦面一嚥二縮三嚥即收又

法以草麻子十四粒去殼搗膏塗頂心即收收即去之又法皂角末吹

鼻中嚏作立止

勿藥玄詮 人之有生備五官百骸之軀其聖知中抑之德所係非輕

父母之生成不鮮孰大焉故內經曰聖人不治已疾之未病天病已

成而後藥之慮猶滿而穿并關而病兵不亦晚乎故取養生家言淺

近易行者聊錄數則以應信士之修持又將飲食起居之禁忌撮其
大要以為觀法者之防範使人知謹疾而却病不猶勝于藥劑而求
醫也

妄

內經上古天真論曰上古之人法于陰陽和于術數之法飲食有節起居
有時不妄作勞故能形與神俱而終盡其天年度自感其去今時之人
不然也以酒為漿以妄為常醉以入房以欲竭其精以耗損其真不知
持滿之慮不時御神務快于心逆于坐樂起居無節故半百而衰也夫
上古聖人之教下也虛邪賊風避之有時恬淡虛無真氣從之精神內
守病安從來

調息 調息一法貴徹三教大之可以入道小用可以養生故迎文垂教
以視鼻端目數出入息為止觀初門莊子南華經曰至人之息以踵大
易隨卦曰君子以嚮晦入冥息之虛溪曰古之至人有息無睡故曰嚮
醫方集解 卷六

晦入冥息變源之法當向晦時耳無聞目無見四體無動心無思慮如
種火相似先天元神元氣停育相抱真意綿綿老子曰綿綿自然與
虛空同體故能與虛空同壽也世人終日營營精神困憊夜間靠此一
睡始發一日之用一靈靈光盡為後天濁氣所掩是謂陽陷于陰也

調息之法不拘時候隨便而坐平直其身其體不倚不曲解衣衣緩帶
腰帶不寬則上務令調適口中舌攪數遍微嚙出濁氣不得鼻中微
下氣不流通微納之或三五遍或一二遍有津嚥下叩齒數通舌抵上腭唇齒相着
兩目垂簾令瞳然漸次調息不喘不粗或數息出或數息入從一至
十從十至自攝心在數勿令散亂如心息相依雜念不生則止勿數任
其自然坐久愈妙若欲起身須徐徐舒手足勿得遽起能動行之靜
中光景種種奇特直可明心悟道不但養身全生而已也調息有四相

呼吸有聲者風也守風則散雖無聲而鼻中漚漚者喘也守喘則結不
聲不漚而往來有形者氣也守氣則勞不聲不漚出入綿綿若存若亡
神氣相依是息相也息調則心定真氣往來自能奪天地之造化息息
歸根命之帶也

蘇子瞻養生頌曰已飢方食未飽先止散步道邊務令腹空當腹空時則
便入室不拘晝夜坐臥自便惟在攝身使如木偶常自念言我今此身
若少動搖如毫髮許便墮地獄如商君法如孫武令事在必行有死無
犯又用佛語及老聃語視鼻端自數出入息綿綿若存之用不勤數至
數百此心寂然此身元然與虛空等不煩禁制自然不動數至數千或
不能數則有一法強名曰隨息息俱出復與俱入隨之不已一旦自任
不出不入忽覺此息從毛竅中入萬四千雲蒸雨散無始以來諸病自
除諸障自滅自然明悟恍然如盲人忽然有眼此時何用求人指路
是故老人言盡于此

小週天 先要正念身心澄定面東跏坐平坐亦可但前膝不
用三昧耶指無名指右按于臍下叩齒三十六通以集身神赤龍擲海
內外三十六遍赤龍古也內雙自隨舌轉運舌抵上腭靜心數息三百
六十週天畢待神水滿漱津數通用四字訣撮抵閉吸也撮提提道舌
從任脈撮過穀道到尾閭以意運送徐徐上夾脊中關漸漸速些閉
目上視鼻吸真呼撞過玉枕後將目往前一忍直轉鼻翳頭倒下觀
橋分津送下重樓入離宮心而至氣海坎宮畧定一定復用前法連
行三次口中之津分三次嚥下所謂天河水逆流也靜坐片時將手左
右擦丹田一百八下連擦抱任放手時將衣被圍住臍輪勿令風入

長得丹田後發熱次將大指內擦熱拭目十四遍去心火擦鼻三十六遍潤肺擦耳十四遍補腎擦面十四遍健脾胃手掩耳鳴天鼓後將手往上一即朝天揖如此者三徐徐呵出濁氣四五口收清氣雙手抱肩移筋換骨數遍擦玉枕關二十四下擦腰眼一百八下擦足心各一百八下

道經六字訣呵呼咽噓吹嘻 每日自子至巳為六陽時而東靜坐必閉意亦不令風入叩齒三十六通舌攪口中候水滿時漱數遍分三口嚥嚥下以意送至丹田微撮口念呵字呵出心中濁氣念時不得有聲反損心氣即閉口鼻吸清氣以補心吸時亦不得聞吸聲但呵出令短吸入令長如此六次再念呵字六遍以治脾再念咽字六遍以治肺再念噓字六遍以治肝再念喜字六遍以治三焦客熱再念吹字

六通以治腎並如前法謂之六通天也詩曰天也夏至呵心火自開秋咽定收金氣潤肺房中少三焦勝邪除煩熱四季長呼咽其功尤勝保神丹

一稱金訣曰一吸便提氣氣躡臍一提便噓水火相見不拘行住坐臥舌攪華池抵上腭候津生時漱而嚥下咽嚥有聲入一身之水皆鹹能滋百脈自調勻隨以鼻中吸清氣一口以意自力向津送至臍下丹田存一存謂之一吸隨將下部輕輕如忍便狀以意自力從尾間提起上夾脊雙關透玉枕入泥丸謂之一呼周而復始久行精神強旺百病不生

金丹秘訣曰一擦一拋左右換手九九之功真陽不走戊亥二時陰盛陽衰之候一手兜外腎一手擦臍下左右換手各八十一半月精固久而兩佳

李東垣曰夜半收心靜坐片時此生發週身元氣之大要也精神生氣積氣生精此自無而之有也鍊精化氣鍊氣化神鍊神還虛此自有而之無也

髮宜多梳面宜多擦目宜常迎耳宜常鳴耳宜常鳴則耳聾舌宜抵腭齒宜數叩津宜數漱濁宜常叩背宜常煖胸宜常腹宜常摩腹宜常撮腋宜常搖足心宜常擦皮膚宜常乾沐浴宜常大小便宜閉口勿言

諸傷 久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋暴怒傷肝思慮傷脾極憂傷心過悲傷肺多恐傷腎善驚傷胆多食傷胃醉飽入房傷力勞作傷心 春傷于風夏傷于暑秋傷于濕冬傷于燥必病溫 夜寢語言大損元氣故聖人戒之

風寒傷 沐浴臨風則病腦風 當風則病中風暑風夜露乘風則病寒熱則起受風則病痺厥 衣京

富冷則寒外侵飲冷食寒則寒內傷人推知有外傷而不知有內傷不可不察也若以暑熱日房勞未嘗不病也而不知其病由暑熱也此有發明及此者世醫若知之 早起露首則病身熱頭痛納涼陰室則病身熱惡寒多食涼瓜菓則病泄瀉腹痛夏走炎途食菓食冷則病瘧疴

濕傷 坐臥濕地則病痺厥風邪風雨則病身重身痛長着汗衣則病麻木發黃勉強涉水則病脚氣蠶痺飢餓浴則病骨節痛汗出見濕則病瘧邪 飲食傷 經曰飲食自倍腸胃乃傷膏粱之變定能生大疔膏粱之疾消

癯瘦厥飽食太甚筋脈橫解腸胃為痔飲食失節損傷腸胃始病熱中
未便寒中 怒後勿食食後勿怒醉後勿飲冷謂人醉後則有飽食勿
便臥 飲酒過度則藏府受傷肺因之而痰嗽脾因之而痞悶胃因之
而嘔吐心因之而昏狂肝因之而善怒胆因之而忘問腎因之而燥精
膀胱因之而渴赤二腸因之而泄瀉甚則勞嗽失血消渴黃疸疔癰
疝為害無窮 鹹味能瀉腎水損真陰辛辣大熱之味皆損元氣不可
多食

色慾傷 男子二八而天癸至女人二七而天癸至交合太早新喪天
乃天之所男子八八而天癸絕女人七七而天癸絕精血不生入房不
禁是自促其壽算 人身之血百骸貫通及欲事作撮一身之血至于
命門化精以泄人之受胎此命門火以有生也夫精者神倚之如魚得

心之神必倚物方有所能也
之如魚得
血則百脉枯槁接無度必損腎元外雖不泄精已離宮定有直精
數照隨陽之疾而溢出如火之有烟燄豈能復返于游哉

據上海圖書館藏清乾隆二十六年
硤川利濟堂刻本影印原書版
框高一八九毫米寬二八二毫米

成方切用

〔清〕吳儀洛撰

乾隆辛巳季新鐫

澉水吳遵程輯

成方切用

硤川利濟堂藏板

成方切用 自序

序

內經醫之奧旨也。諸方醫之粗迹也。近代時醫相率以方授受而求經論者無之。舍奧旨而務粗迹。安望其術之神良乎。雖然方亦何可廢也。方以立法法以制宜。譬之工倕。匠心獨創。斷未有個規矩而為之者。特神而明之存乎其人焉耳。昔方書得人乃傳。扁鵲倉公皆稱禁方。秘不輕授。所以漢時以前成方絕少。而仲景為方之祖也。仲景以後方書充棟。無如製方者日益多。而註方者不少。槩

見宋成無已始將仲景一百三方論而註之。使觀者知其端緒。漸得解會。但循文訓釋。仲景之良法精義不能盡徹。迄明興始有吳鶴臯之醫方考。因病分門。詞旨明爽。海內盛行。但搜採不無闕略。近日汪訥菴倣成氏吳氏之意而擴充之。採輯古方名曰集解。先詳受病之由。次解用藥之意。碩論名言。採搜甚富。然不能無承訛襲愆之說。且于新方。摭未採錄。均未可以語全書也。不揣愚陋。取吳氏汪氏所輯而增改之。得古今良方凡一千三

上海圖書館藏

百餘首稟諸經以觀其合訂之證以發其微編為十四卷題其端曰成方切用以所錄皆取切于時用之方而尤期用方者之切于病情也何則邇來風氣寢薄人之稟受遠不及古故方有宜古不宜今者設起仲景于今日將必有審機察變損益無已者而謂錄方可不切于時用乎且病有標本先後治有緩急逆從醫貴通變藥在合宜苟執一定之方以應無窮之證未免實實虛虛損不足而益有餘反致殺人者多矣用方之切于病豈易易哉

然則如之何而後可曰研窮乎靈樞素問而經義無不通也詳求夫望聞問切而證因莫能遁也深悉于氣味陰陽而藥性剖其微也夫然後經之以法緯之以方從斯集而合離變化焉自迎刃而中其肯綮矣

乾隆辛巳中冬月長至日漱水吳儀洛遵程書於硤川之利濟堂



凡例

一古人因病立方加減出入俱有深意若不明其受病之由與用方之所以能治其病之故而槩執方以治之其不至于悞世殃人者幾希茲集病情方意互相闡發庶便資用若每方皆釋則重複煩瑣反生厭瀆故前後間見詳略不一或釋制方之意或擬加減之法讀者彙觀而統會之可也

一 人身一小天地也當天地初開氣化濃密則受

成方切用 凡例
氣常強及其久也氣化漸薄則受氣常弱嘗者五帝之壽咸踰百歲三王之後及百者鮮矣故東漢之世仲景處方輒以兩計宋元而後東垣丹溪不過錢計而已豈非深明造化與時偕行者與今去宋元又遠元氣轉薄所以臨證施治多事調養專防剋伐多事溫補痛戒寒涼此今時治法之變通也若執成方或矜家秘惟知盡劑不顧本元惟知古法不審時宜則輕病即重重病即死矣有利濟之心者宜加戰兢焉

一成無已所註仲景之方。不過循文訓釋而已。近世如方中行喻嘉言周揚俊輩。于仲景傷寒論。俱有發明。而喻氏尤能闡發其精義。故本集採錄獨多。

一吳鶴臯之醫方考。門分七十。則嫌其多方。凡七百首。每證不過數方。則嫌其少。如五積散逍遙散。皆不入選。不無闕略。近日汪訥菴醫方集。解門分二十有一。正方三百有奇。附方之數過之。但專錄古方。未及新方。茲集門分二十有六。古

成方切用 凡例

方新方共一千三百餘首。似已足盡醫療之法。其有未備者。其神明而推廣之。比例而善用之。則得矣。

一集中所分門類。醫學始于靈素。故首列內經之方。而人之由生。全賴夫氣。故先治氣。血者所以配氣。故次理血。今人血氣虧者甚多。故次補養。而大虛者防滑脫。故次瀉固。及受病則有汗吐下三法。故次發表。涌吐攻裏。又有宜緩攻者。故次消導。若病在半表半裏。法當和解。故次和解。

又有表證未除。裏證又急者。當表裏交治。故次表裏。而受病之因。多起於六淫。故次風寒暑溼燥火。而病有因痰者。故次除痰。有因蟲者。故次殺蟲。至于婦人小兒癰瘍眼目。各有顛科。茲集欲便于用。故每科略取數方。以備採擇。又錄救急之方。以應倉卒。末附勿藥元詮。以為衛生之方。使人知病有勿藥之治。真有方而具無方之妙已。

一本集方名用。病證用。精義要義用。

成方切用 凡例

一拙刻第三種本草從新。刊布已數年矣。今復出此集相輔而行。其間多有互相發明者。
一拙著醫學第五種傷寒分經。第六種雜證條律等書。俱嗣刻問世。

吳氏醫學述第四種成方切用總目

卷首

內經一十二方 附一十一方

卷一上

治氣門共四十方

卷一下

理血門共五十五方

卷二上

補養門共八十七方

成方切用 總目

卷二下

瀉固門共二十八方

卷三上

表散門共六十三方

卷三下

涌吐門共二十四方

卷四上

攻下門共三十八方

卷四下

消導門共五十二方

卷五上

和解門共四十八方

卷五下

表裏門共二十方

卷六上

祛風門共八十三方

卷六下

祛寒門共九十三方

成方切用 總目

卷七上

消暑門共四十四方

卷七下

燥溼門共五十五方

卷八上

潤燥門共三十五方

卷八下

瀉火門共一百零一方

卷九上

除痰門共五十方

卷九下

殺蟲門共二十方

卷十上

經帶門共二十九方

卷十下

胎產門共五十七方

卷十一上

嬰孩門共五十四方

成方切用

卷十一下

癰瘍門共三十三方

卷十二上

眼目門共二十五方

卷十二下

救急門共五十三方

卷末

勿藥元詮共七十四條

成方切用 總目 方制總義

方制總義

靈樞刺節真邪篇曰真氣者所受於天與穀氣并而充身也... 素問疏五過論曰治病之道氣內為寶循求其理

成方切用 總義

求之不得過在表裏... 素問陰陽應象大論曰陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也治

小當因病之輕重而為之制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二

制之小也。君一臣三，佐五，制之中也。君一臣三，佐

九，制之大也。此言用方。寒者熱之，熱者寒之。以治

正治法也。微者逆之，甚者從之。病則熱，陰病則

寒，真形易見。其病則微，故可逆之。逆即下文之正

治也。病則甚，故當從之。從即下文之假證難辨

其病則甚，故當從之。從即下文之假證難辨

僕曰：夫病之微，猶火也。遇草而熾，得木而

燔。可以大甚，猶龍火也。得溼而熾，遇水而折。攻之

其性以水折之，猶龍火也。得溼而熾，遇水而折。攻之

滅，然逆之謂以寒攻熱，以熱攻寒。從之謂攻以寒

熱，須從其性。用不必皆同。是以下文曰：逆者正治

成方切用。總義。從者反治，從少從多。堅者削之，客者除之。勞者溫

之，結者散之。留者攻之，燥者濡之。急者緩之，散者

收之。損者益之，逸者行之。驚者平之。上之下之，摩

之浴之，薄之劫之，開之發之，適事為故。溫之，溫養

奔逸潰亂也。行之，行其逆滯也。平之，安之也。上之，

吐之也。摩之，按摩之也。薄之，追其隱藏也。劫之，奪

其強盛也。適事為故，帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者

正治，從者反治。從少從多，觀其事也。熱以寒治，寒以

病者謂之正治，以寒治寒，以熱治熱。從其病者謂

之反治。從少謂一而二，從多謂二而一。一異

成方切用 方制總義

病有微甚者，以證有真假也。寒熱有真假，虛實有

真假。真者正治，知無難。假者反治，乃為難。兩如

逆熱，為嘔吐，為腹脹，為泄利，為沉而細，或弱而遲，為厥

發熱，必欲得衣，此浮熱在外，而沉寒在內也。真熱

或大便祕結，或小便赤澀，或發熱振衣，或脈音壯厲

渴，此皆真病。真寒者，宜溫其寒。真熱者，宜解其熱

是當正治者也。至若假寒者，易證似陰，火極似水

也。外雖寒而內則熱，脈數而有力，或沉而鼓擊，或

身寒惡衣，或便熱祕結，或煩渴引飲，或沉而鼓擊，或

此則惡寒非寒也。明是熱證，所謂陽極似陰，火極似水

曰：陽盛則陰也。假熱者，陰證似陽，水極似火也。外

雖熱而內則寒，脈微而弱，或數而虛，或浮大無根

或弦芤，或虛狂起倒，而禁之即止，或蚊跡假斑，而淺

紅細碎，或喜冷水，而所即止，或蚊跡假斑，而淺

被不撤，或小水多利，而大便不結，此則惡熱非熱

成方切用。總義。明是寒證，所謂寒極反兼熱化，亦曰陰盛格陽也

此皆假病。假寒者，清其內熱，內清則浮陰退舍矣

假熱者，溫其真陽，中溫則瀉之，虛則補之。是當從治

者也。又如虛實之治，實則瀉之，虛則補之。此不易

之法也。然至虛有盛候，則有假實矣。大實有羸狀

則有假虛矣。總之虛者，正氣虛也。為色慘形疲，為

神衰氣怯，或自汗不收，或二便失禁，或夢遺精滑

五二二

則措手無及故治虛邪者當先顧正氣正氣存則不致於害且補中自有攻意蓋補陰即所以攻熱補陽即所以攻寒世未有正氣復而邪不退者亦未有正氣竭而命不傾者如必不得已亦當酌量緩急暫從權宜從少從多寓戰於守斯可矣此治虛之道也若正氣無損者邪氣雖微自不宜補蓋補之則正無與而邪反盛適足以藉寇兵而資盜糧故治實證者當直去其邪邪去則身安但法貴精專使藥速效此治實之法也要之能勝攻者便是實證實者不可攻何慮之有不能勝攻者便是虛證虛者不可攻不攻之證不多見而假實之證最多也知也惟是假虛之證不難治而假實之證難治也假寒之證不難治而假熱之證難治也假虛者多寒如丹溪曰氣有餘便是火故實能受寒而不知氣不足便是寒故虛能受火故實能受熱醫者不知真假本末者害無窮矣帝曰反治謂何岐伯曰熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通

成方切用

總義

十

用必伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已用者如寒大寒內結當治以熱然寒甚格熱熱不得前則以熱藥冷服下益之後冷體既消熱性便發情且不違而致大益此熱因寒用之法也寒因熱用者如大熱在中以寒攻治則不入以熱攻治則病增乃以寒藥熱服入腹之後熱氣既消寒性遂行且以和而病以減此寒因熱用之法也如五常政大論云治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之亦寒因熱用熱因寒用之義塞因塞用者如下氣虛乏中焦氣壅欲散滿則更虛其下欲補下則滿甚於中治不知本而先攻其滿藥入或減藥過則然氣必更虛病必漸甚乃不知少服則資壅多服則宣通峻補其下以疎啓其中則下虛自實中滿自除此塞因塞用之法也如大熱內蓄或大寒內凝積聚留滯瀉利不止寒滯者以熱下之熱滯者以

寒下之此通用之法也以上四治必伏其所主者制病之本也先其所因者求病之由也既得其本而以真治真以假對假其始也治類似同其終也病變則異矣是為反治之法故可使破積潰已也○塞入聲帝曰善氣調而得者何如岐伯曰逆之從之逆而從之從而逆之疏氣令調則其道也氣調而得者言氣本調和而偶感於外也岐伯言其治法亦無過逆之從之而已其間有宜主以疏泄其邪氣而令其調和此治氣調而病於外者道也

素問至真要大論帝曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上下三

成方切用

總義

十一

品之謂也主病者對證之要藥也故謂之君君者者謂之臣味數稍多而分兩重賴之以為主也佐君者迨也應臣者謂之使數可出人而分兩更輕所以備通行向導之使也此則君臣佐使之義非上三品如下文善惡殊貫之謂也○使去聲帝曰三品何謂岐伯曰所以明善惡之殊貫也言處方之制故有君臣佐使此言藥性善惡故有上中下之殊神農云上藥為君主養命以應天中藥為臣主養性以應人下藥為佐使主治病以應地故在本草經有上中下三品之分此所謂善惡貫也

素問至真要大論帝曰病之中外何如岐伯曰從內之外者調其內從外之內者治其外從內之外

從外之內者外為本。從內之外而盛於外者先調其內而後治其外。從外之內而盛於內者先治其外而後調其內。愈此治病之大法也。故曰治病必先求其本。中外不相及則治主病。中外不相及自各一猶律家二罪俱發科其重也。按此篇即三因之義也。如金匱要略曰：于形氣難不越三條。一者經絡受邪入臟腑為內所因也。二者四肢九竅血脈相傳壅塞不通為外皮膚所中也。三者房室金刃蟲獸所傷也。故無擇著三因方曰：有內因有外因有不內外因。蓋本於仲景之三條而仲景之論實本諸此爾。疾。帝曰：善病之中外何如。前問病之標本之義。故此復問。蓋岐伯曰：調氣之方必別陰欲明陰陽治法之詳也。

成方切用 總義 主

陽定其中外各守其鄉。內者內治外者外治。微者調之其次平之盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利。方法也。陰陽三陰三陽也。中外其所也。微者調之謂小寒之氣和之以溫小熱之氣和之以涼也。其次平之謂大寒之氣平之以熱大熱之氣平之以寒也。盛者奪之謂邪之甚者當直攻而取之如甚於外者汗之甚於內者下之。凡宜寒宜熱宜溫宜涼各求其同氣者以別必列切。衰去之是謂隨其所利也。別必列切。

素問五常政大論帝曰：有毒無毒服有約乎。約度服篇曰：夫約方者猶約囊也。囊滿而岐伯曰：病有新久方有大小有毒無毒固宜常制矣。病重者宜弗約則輪泄方成弗約則神與弗俱。

成方切用 方制總義

宜小無毒者宜多。有毒大毒治病十去其六。常毒治病十去其七。小毒治病十去其八。無毒治病十去其九。六分七分八分九分之約者蓋以治病之法藥不及病則無濟於事。藥過於病則反傷其正。而生他患矣。故當知約制而進止有度也。王氏曰：大毒之性烈其為傷也多。小毒之性利其為傷也少。常毒之性烈其為傷也少。小毒之性利其為傷也。所傷可知也。故至約必止之。以待來證。爾然無毒之藥性雖平和久而多之則氣有偏勝必有偏絕。久攻之則臟氣偏弱。既弱且穀肉果菜食養盡。因不可長也。故十去其九而止。穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也。餘未盡者則當以穀肉果菜食養盡之。時論曰：毒藥攻邪勿以毒藥盡病邪也。如藏氣法亦貴得宜。不可使之太過。過則反傷其正也。不盡行復如法。如此而猶有未盡過則再行。前必先歲氣無伐天和。五運有紀六氣有序。四時有令陰陽有和。天和也。設不知歲氣變遷而妄呼寒熱則邪正盛衰無所辨。未免犯歲氣。伐天和矣。天柱之由。此其甚。無盛盛無虛虛而遺人天殃。邪氣實者復助之者復攻之。虛其虛矣。不知虛實妄施其補以致盛者愈盛。虛者愈虛。真氣日消。則病氣日甚。遺人天殃。醫之無致邪。無失正。絕人長命也。虛其虛是致邪。正也。重言之所以深戒夫伐天和而絕人長命以見歲氣不可不慎也。

成方切用 總義 主

厥陰風木司天。年已亥。風淫所勝。平以辛涼。王註云：厥陰氣未為

五二五

盛熱故以佐以甘苦以甘緩之以酸瀉之風為木
涼藥平之故以辛涼過於辛恐反傷其氣故佐以甘
甘者勝辛甘益氣也木性急故以甘緩之以酸瀉
之者木之正味 ○清反勝之治以酸溫佐以甘苦
其瀉以酸也則金之清氣反能勝之故當治以酸
或氣有不及則金之清氣反能勝之故當治以酸
溫酸求木之同氣溫以制清也佐以甘苦甘以緩
肝之急苦以溫金也

少陰君火司天年子午熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘

以酸收之熱為火氣水能勝之故平以鹹寒佐以

所以去熱之實也甘勝鹹所以防鹹之過也苦能泄

經而不斂者以酸收之 ○寒反勝之治以甘溫

佐以苦酸辛故當治以甘溫甘能勝水溫能制寒

成方切用 總義 也佐以苦酸辛寒得苦而溫得辛而散且

火為水勝則心苦緩故宜食酸以收之

太陰土司天年丑未溼淫所勝平以苦熱佐以酸辛

以苦燥之以淡泄之溼為土氣燥能除之故平以

辛勝酸所以防酸之過也故佐以酸辛以苦燥之

者苦從火化也以淡泄之者淡能利竅也藏氣法

時論曰脾苦溼急溼上甚而熱治以苦溫佐以甘

辛以汗為故而止溼鬱於上而成熱者治以苦溫

辛甘以和中辛以散鬱也則溼以行溼也佐以甘

熱之在上以微汗如故而止矣 ○熱反勝之治以

苦寒佐以苦酸苦寒所以祛熱熱勝則

少陽相火司天年寅申火淫所勝平以鹹冷佐以苦甘

以酸收之以苦發之以酸復之熱淫同故平以鹹
冷苦能瀉火之實甘能緩火之急故佐以苦甘火
盛而散越者以酸收之火鬱而留伏者以苦發之
然以酸復之而火未免傷氣故又當 ○寒反勝之治以
以酸復之而火熱二氣同治也 ○寒反勝之治以
甘熱佐以苦辛或氣有不及與上

陽明金燥司天年卯酉燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛

以苦下之燥為金氣火能勝之平以苦溫苦從火

燥結不通則邪實佐以酸辛酸能生津辛能潤燥也

於內故以苦下之 ○熱反勝之治以辛寒佐以苦

甘辛寒所以潤燥散熱

太陽水寒司天年辰戌寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦

成方切用 總義 火邪也佐以苦辛苦

能泄熱辛能散熱也

厥陰風在泉年寅申風淫於內治以辛涼佐以甘苦

以甘緩之以辛散之治以辛涼佐以甘苦以甘緩

散之者所謂肝欲散也 ○清反勝之治以酸溫佐以

甘苦以辛平之治以酸溫佐以苦甘俱與司天反

補以辛金之正味其瀉以辛也

少陰火在泉年卯酉熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦

味其瀉以辛也

少陰火在泉年卯酉熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦

味其瀉以辛也

宜加苦寒之藥以順冬沉之氣所謂順時氣而養
天和也經又云春省酸增甘以養脾氣夏省苦增
辛以養肺氣長夏省甘增鹹以養腎氣秋省辛增
酸以養肝氣冬省鹹增苦以養心氣此則不伐天
和而又防其太過所以體天地之大德也味者捨
本從標春用辛涼以伐木夏用鹹寒以抑火秋用
苦溫以泄金冬用辛熱以潤水謂之時藥殊背素
問逆順之理以夏月伏陰冬月伏陽推之可知矣
雖然月有四時日有四時或春得秋病夏得冬病
神而明之機而行之變通權宜又不可執一也

成方切用 總義

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷首

內經方 靈樞方五 附方六
素問方七 附方五

寒痺方 季春痺方 目不瞑方 猛疽方 萬氏

肘後方 千金二方 敗疵方 鼓脹方 范汪方
陳文中方 心鏡方 血枯方 陽厥方 普濟方
何大英方 正脾痺方

風方 尸厥方 五疫方 酒

成方切用 內經 卷首 目錄

吳氏醫學述第四種

上海圖書館藏

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭同較
殷豫龍浩如

成方切用

內經方

內者性命之道。經者載道之書。其書乃黃帝與岐伯鬼與區伯高少師少俞雷公六臣講求而成。其方高簡奧妙。不易測識。今人罕能用之者。然既為古聖之神方。自不得不錄之。以冠於卷首。

用醇酒二十觔。蜀椒一升。乾薑一觔。桂心一觔。漬酒中。浸以綿絮布巾。用生桑炭炙巾。以熨寒痺所

成方切用

卷首

刺之處

靈樞壽天剛柔篇

神靈之樞要。是謂靈樞。按漢藝文志曰。黃

帝內經十八卷。蓋靈樞九卷。素問九卷。即內經也。二經各載八十一篇。皆合黃鍾九九之數。而天人之道盡矣。黃帝曰。余聞刺有三變。何謂三變。按史記。公孫名軒轅。有熊國君少典之子。繼神農而伯高。有天下。都軒轅之印。以土德王。故號黃帝。刺者。刺其陰。刺衛者。刺其陽。刺寒痺。黃帝曰。刺三變者。奈何。伯高答曰。刺營者。出血。刺衛者。出氣。刺寒痺者。內熱。調經論亦曰。取血於營。取黃帝曰。營衛寒痺之為病。奈何。伯高答曰。營之生病也。寒熱少

成方切用 卷首

氣血上下行。故為寒熱。在陰。陰虛則陽勝。則

無氣。故為少氣。邪在血。故為上下。衛之生病也。氣

安行。所以刺營者。當刺其血。分。衛之生病也。氣

痛時來時去。佛。佛。音。戲。音。貴。響。風寒客於腸胃之中

衛屬陽。為水穀之悍氣。病在陽分。故為氣痛。氣無

定形。故時來時去。佛。音。戲。音。貴。響。風寒客於腸胃之中

間。以六腑屬表。而陽邪歸之。故病亦生於衛。氣寒

痺之為病也。留而不去。時痛而痺。不仁。寒痺久留

脈不行。或凝滯而為痛。或黃帝曰。刺寒痺。內熱。奈

皮膚不知痛癢。而為不仁。黃帝曰。刺寒痺。內熱。奈

何。伯高答曰。刺布衣者。以火焯之。刺大人者。以藥

熨之。內熱。謂其經也。布衣。血氣瀟灑。故當以火

焯之。即近世所用雷火鍼。及艾蒜蒸炙之類。

成方切用 卷首

焯音。黃帝曰。藥熨。奈何。伯高答曰。用淳酒二十

觔。蜀椒一升。乾薑一觔。桂心一觔。凡四種。皆咬咀

漬酒中。用綿絮一觔。細白布四丈。并納酒中。置酒

馬矢。焯音。中。蓋封塗。勿使泄。五日。五夜。出布綿絮

曝乾之。乾復漬。以盡其汁。每漬必碎。其日乃出

乾。乾并用滓。與綿絮。復布為複巾。長六七尺

為六七巾。則用之。生桑炭炙巾。以熨寒痺所刺之

處。令熱入。至於病所。寒復炙巾。以熨之。三十遍而

五二九

可以阻之。又吹去細末。然後煎之。取其清汁也。廣浸也。馬矢中者。乾馬屎而熨之也。此西北方所常用者。塗鹽泥封固也。辟風也。復布為襪也。深粗也。布以生桑炭者。桑能利關節。除風寒也。溼痺諸痛也。大人血氣清滑。故當於未刺之先。及既刺之後。但以藥熨則經通。汗出而寒痺可除矣。起步內中。無見風。每刺必熨。如此病已矣。此所謂內熱也。刺後起步於密血行。而慎避風寒也。凡此者。皆所謂內熱之法。

治之以馬膏。膏其急者。以白酒和桂。以塗其緩者。以桑鉤鉤之。治季春痺。靈樞經筋篇曰。足陽明之筋病。足中指支脛轉筋。腳跳堅。本經之筋起於中指。結於附上。

成方切用 卷首 靈樞經筋篇

邪外上行。加於輔骨。上結於膝外廉。其直者。伏兔。上循脛。結於膝也。跳者。跳動。堅者。堅強也。伏兔。轉筋。脾前腫。瘡疔。腹筋急。其直者。上循伏兔。結於脾。聚於陰器。上腹而布。引缺盆及頰。卒口僻。急者。目不合。熱則筋縱。目不開。頰筋有寒。則急。引之。移口有熱。則筋弛。縱緩。不勝收。故備。備。歪斜也。其筋自缺盆。上頸頰。挾明。為目下網。故凡日之不合。太陽為目上綱。陽備者。皆足陽明之筋病。寒則急。而熱則緩也。治之以馬膏。膏其急者。以白酒和桂。以塗其緩者。以桑鉤鉤之。即以生桑炭置之坎中。高下以坐等。以膏熨急頰。且飲美酒。噉美炙肉。不飲酒者。自強。

也為之三拊。而巳。馬膏。馬脂也。口頰。尚僻。乃風於口。會太陽之筋。絡於目。寒則筋急。而熱則筋緩。而縱。故左中寒。則筋急。於右中寒。則筋緩。於左寒者。急而熱者。緩也。急者。皮膚頑癢。營衛凝滯。治法。急者。緩之。緩者。急之。故用馬膏。之甘平。柔緩以摩其急。以潤其緩。以通其血脈。用桂酒之辛熱。急束。以塗其緩。以和其營衛。以通其經絡。桑能治風痺。通節竅。以桑鉤鉤之者。鉤正其口也。復以生桑火。煖之。坐而地。坎之中。高下以坐等者。欲其深淺適中。便於坐而得其煖也。然後以前膏熨其急頰。且飲之。美酒。噉之。美肉。皆助血舒筋之法。病在上者。酒以行之。甘以助之也。雖不善飲。亦自強之。治三拊而已。言再三拊。摩其患處。則病自巳矣。治在燔鍼劫刺。以知為數。以痛為輸。名曰季春痺也。足陽明正盛之經。應三月之氣也。

成方切用 卷首 靈樞經筋篇

以千里水。煮秫米。半夏湯。治目不瞑。靈樞經邪客篇。黃帝問於伯高曰。夫邪氣之客人也。或令人目不瞑。不臥。出者。何氣使然。邪氣感入。令人寐無。伯高曰。五穀入於胃也。其糟粕。津液。宗氣。分為三隧。隨音。故宗氣積於胸中。出於喉嚨。以貫心脈而行。呼吸焉。隨音。隨道也。糟粕之道。出於下焦。津液之道。出於中焦。宗氣之道。出於上焦。故分為三隧。喉嚨。為肺之系。而下貫於營氣者。泌其津液。注之心。故通宗氣而行呼吸。營氣者。泌其津液。注之於脈。化以為血。以榮四末。內注五臟六腑。以應刻數焉。營氣。出於中焦。中焦。水穀之氣。泌其津液。數焉。變化以為血。脈外而四肢內。而臟腑無所不。

至。故其通行之數與刻數皆相應焉。衛氣者出其悍氣之

慄疾而先行於四末分肉皮膚之間而不休者也

晝行於陽夜行於陰常從足少陰之分間行於五

臟六腑衛氣慄疾滑利不能入於脈中故先行於

陽常從足太陽始夜行於陰常從足少陰始

今厥氣客於五臟六腑則

衛氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽

氣盛陽氣盛則陽躄陷不得入於陰陰虛故目不

瞑邪氣逆於臟腑則衛氣不得入於陰分故偏盛

於陽陽偏盛則陽躄陷者受傷之謂陽盛陰

虛故目不瞑。躄有五音躄。高。脚。又極。虐。切。黃帝曰善治之奈何伯高

成方切用 卷首

曰補其不足寫其有餘此刺治之補寫也。補其不

足也。若陰盛陽虛而多臥者自當補陽寫陰矣。調

其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一齊陰

陽已通其臥立至凡不臥之證有邪實者多屬外

因有營虛者多屬內因此半夏黃帝曰善此所謂

湯一法蓋專為邪實者設爾。黃帝曰善此所謂

決瀆壅塞經絡大通陰陽和得者也願聞其方伯

高曰其湯方以流水千里以外者八升揚之萬遍

取其清五升煮之炊以葦薪古今量數不同大約

之鐵斛數三升二合然則云八升者即今之二

成方切用 卷首

沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭為一升

半火沸者先以火沸其水而後置藥於中也秫即

散邪除勝陰虛夜不寐者味甘微寒能利大

之三合二勺半夏五合約今之一合六

勺炊至一升半約今之四合八勺也去其滓飲

汁一小杯日三稍益以知為度故其病新發者覆

杯則臥汗出則已矣久者三飲而已也

合豕膏冷食治猛疽 靈樞癰疽篇黃帝曰願盡

聞癰疽之形與忌曰名岐伯曰癰發於嗑中名曰

猛疽猛疽不治化為膿膿不寫塞咽半日死其化

成方切用 卷首

為膿者寫則合豕膏冷食三日已猛疽言為害之

急也若膿已寫

方治肺熱暴疔用豬脂一劬煉過入白蜜一劬再

煉少頃濾淨冷定不時挑服一匙即愈又肘後方

治五種瘡疔用豬脂一劬溫熱服日三當利乃愈

之立通治小便利不通豬脂一劬水二升煎三沸飲

二升下酒五合和煎分服陳文中方治瘡瘡便閉

用肥豬臙一塊水煮熱切如豆大與食自然臙臙

滋潤兩兩煮百沸切和醋醬食之若無疾服此最

嗽不利及大腸秘結者尤宜用之 靈樞癰疽篇 岐伯曰癰發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也

五三一

灸之其病大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小
 豆劉蔭蔭同草根各一升以水一斗六升煮之
 竭為取三升則強飲厚衣坐於釜上令汗出至足
 已蔭蔭也連翹也二草之根俱能解毒故各用
 斗六升煮取三升其折數類此馬玄臺曰蔭蔭
 即今之連翹也以其連翹及草根煮汁以強飲之
 雞矢醴治鼓脹素問腹中論是謂素問黃帝
 問曰有病心腹滿且食不能暮食此為何病岐伯
 對曰名為鼓脹食其脹如鼓故名鼓脹帝曰治之
 奈何岐伯曰治之以雞矢醴一劑知二劑已一劑

成方切用內經卷首鼓脹方七

其效二劑可已其病王水云本草雞屎利小便並
 不治蠱脹今方治當用湯漬服之爾李時珍曰鼓
 脹生於溼熱亦有積滯成者雞屎能下氣消積通
 利大小便故治鼓脹有殊功此岐伯神方也醴者
 一宿初來之酒醴也又按范汪方云宋青龍中司
 徒吏顏奮女苦風疾一臂偏痛一人令穿地作坑
 取雞屎煎葉然之安脛入坑中熏之有長蟲出遂
 愈也普濟方云治鼓脹入食不能暮食由脾虛不
 能制水水反勝土水穀不運氣不宣流故令中滿
 其脈沉實而消宜雞矢醴主之何大英云諸腹脹
 大皆屬於熱精氣不得滲入膀胱別走於臍溢於
 皮裏膜外故成脹滿小便短澀雞矢性寒利小便
 誠萬全不傳之寶也用臘月乾雞矢半斤為末盛
 以酒醴一斗漬之七日溫服三升或為半斤服二
 錢亦可正傳云用雞矢一升研細炒焦色未服上
 出火毒以百沸湯淋汁每服一大盞調木香檳榔
 末各一錢以日三服以平為度又按醫鑑等書云用
 乾雞矢八合炒微焦入無灰好酒三碗其煎乾

至一半許用布濾取汁五更熱飲則腹鳴辰巳時
 行二三皆黑水也次日覺足面漸有縞紋又飲
 積及溼熱有餘者宜用之挾虛者禁之○吳鶴皋
 曰朝寬暮急病在營血鶻帝曰其時有復發者何
 矢穢物從陰化可入營血鶻帝曰其時有復發者何
 也復也岐伯曰此飲食不節故時有病也鼓脹
 本因停滯故不雖然其病且已時故當病氣聚於
 可復縱飲食也雖然其病且已時故當病氣聚於
 腹也後言雖是飲食不節時有病者又有病且已之
 治之以蘭除陳氣也治脾痺素問奇病論帝曰
 有病口甘者病名謂何何以得之岐伯曰此五氣
 之溢也名曰脾痺五氣五味之所夫五味入口藏

成方切用內經卷首脾痺方八

於胃脾為之行其精氣津液在脾故令人口甘也
 脾主為胃行其津液者也故五味入胃則此肥美
 津液在脾脾屬土其味甘脾熱則口甘爾此肥美
 之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人
 內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉為消渴味厚
 助陽故能生熱甘者性緩不散故能留中熱留
 不去久必傷陰其氣上溢故轉為消渴之病治
 之以蘭除陳氣也蘭草性味甘寒能利水道辟不
 津止渴潤肌膚故可除陳積畜熱之氣按蘭草
 俗名省頭草即澤蘭之一類二種有以為即山蘭
 葉李時珍詳正之詳載本草從新澤蘭下
 以四烏鯁骨一薏茹二物合并丸以雀卵飲以鮑

魚汁治血枯。素問腹中論帝曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩時時前後血病名謂何何以得之支者滿如支脈也肺主氣其臭腥肝主血其臭臊肺氣不能平肝則肝肺俱逆於上濁氣不降清氣不升故聞腥臊而吐清液也口中唾血血不歸經也四支清冷氣不能周也頭目眩暈失血多而氣隨血去也血氣既亂故於前陰後陰岐伯曰病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也血枯者月水斷絕也致此時有所大脫血如胎產既多及崩淋吐衄之類則以醉後行房血盛而熱因而縱肆則陰精盡泄

成方切用 **卷首** **血枯方** **九**

精去則氣去故中氣竭也夫腎主閉藏肝主疏泄不惟傷腎而且傷肝及至其久則三陰俱虧所以有先見諸證如上文所云而終必至於血枯則月事衰少不來也此雖以女子為言若丈夫有犯前證亦不免為精枯之病帝曰治之奈何復以何術則勞損之屬皆是也岐伯曰以四烏鯁骨一蘆茹二物并復者復其血也

合之丸以雀卵大如豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也烏鯁即烏賊也骨名海螵蛸氣味鹹溫而滑主女子赤白帶下及血閉血枯亦能令人有子蘆茹即藎茹王冰言取其能散惡血以通經脈雀即麻雀也雀卵氣味甘溫能補益精血主男子陰痿不起故可使多精有子及女子帶下便溺不利後飯者先藥後飯也鮑魚即今之淡乾魚也諸魚皆可為之惟石首鮑魚者為勝其氣味辛溫無毒魚本水中之物

成方切用 卷首

故其性能入水臟通血脈益陰氣煮汁服之能同諸藥通女子血閉也以上四藥皆通血脈血主於肝故凡病傷肝者亦皆可用之蘇頌曰本草諸藥並不治血枯而經法用之是攻其所生所起爾時珍曰今人知雀卵能益男子陽虛不知能治女子血枯蓋雀卵益精血爾按蘆茹甲乙經及太素新校正李氏綱目俱作藎茹獨張景岳以為即茜草也以茜草一名茹蘆能止血治崩又能活血通經脈也存之以備參考

以生鐵洛為飲治陽厥 素問病能論帝曰有病怒狂者此病安生怒狂者多怒而在也即岐伯曰生於陽也之逆也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者暴折而難決故善怒也病名曰陽厥宜於

成方切用 **卷首** **陽厥方** **十**

暢達若暴有折挫不得剖決故令善怒帝曰何以知之岐伯曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也陽明常動者謂如下關地倉大常動者也巨陽少陽不動者謂巨陽惟委中崑崙少陽惟聽會懸鐘其脈雖微動而動不甚也於其不甚動者而動且大疾則其常動者更甚矣此即陽厥怒狂之候帝曰治之奈何岐伯曰奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已五味入口而化於脾食入於陰也藏於胃以養五臟氣長氣於陽也食少則氣衰故節奪其食不使胃火復使之服以生鐵洛為飲夫生鐵洛者下氣疾也落之鐵屑用水研浸可

五三三

以為飲其屬金其氣寒而重最能墜熱開結平木火之邪故可以下氣疾除怒狂也凡藥中用鐵精鐵華粉銀砂鐵鐵水之類皆同此意

以澤瀉木各十分麩街五分合以三指撮為後飯

治酒風 素問病能論帝曰有病身熱解墮汗出

如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名曰酒風此

風論中所謂漏風也酒乃麴藥熱藥所成故令身熱汗多汗則氣屢世而不收持故懈惰淫得熱而蒸故而少氣因酒得風而病故曰酒風 帝曰治之奈

何岐伯曰以澤瀉木各十分麩街五分合以三指

撮為後飯 澤瀉味甘鹹性微寒能滲利溼熱木甘苦氣溫能補中燥溼止汗麩街即薇街

成方切用 卷首 酒風方 十一

一名無心草南人呼為吳風草即鹿街草蓋麩鹿一類也味苦微寒主治風溼十分者倍之也五分者減半也合以三指用三指撮合以約其數而為煎劑也飯後藥先故曰後飯

鬻其左角之髮方一寸燔治飲以美酒治尸厥

素問繆刺論曰邪客於手足少陰太陰足陽明之

絡此五絡皆會於耳中上絡左角邪客於手少陰

經手太陰肺經足太陰脾經足陽明胃經五絡俱

竭令人身脈皆動而形無知也其狀若尸故曰尸

厥也五絡俱竭陰陽離散也身脈皆動筋傷肉爛刺

其足大指內側爪甲上去端如韭葉隱白穴也

後刺足心 湧泉穴也 後刺足中指爪甲上各一

疔 疔疔明之井厲先穴也 後刺手大指內側去端

如韭葉 手太陰之井 後刺手心主衝穴也 上文五

結未及手心中也 少陰銳骨之端各一疔立已 神

此刺之少和胸中也 少陰管吹其兩耳 以竹管納對

門穴之少和胸中也 少陰管吹其兩耳 以竹管納對

勿令氣泄也 所以溫助五絡氣可復通也 新校正

云按附隱居謂吹其左耳極三度復吹其右耳三

也 鬻其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不

能飲者灌之立已 鬻治燒製為末也 飲以美酒

助藥力行血氣也 補以 其類故可使尸厥立已

成方切用 卷首 尸厥方 十一

小金丹治五疫 素問遺篇刺法論黃帝曰余聞

五疫之至皆相傳易無問大小病狀相似不施救

療如何可得不相移易者 五疫即五運疫癘之氣

謂欲禁止也 岐伯曰不相染者正氣內存邪不可干

避其毒氣 天牝從來復得其往氣出於腦即不邪

干 疫癘乃天之邪氣若吾身正氣內固則邪不可

往也 蓋以氣通於腦為鼻連於腦中流布諸經令人

相染矣 氣出於腦為鼻連於腦中流布諸經令人

毒氣可氣出於腦即先想心如日 應人之心想心

如口即所以存吾之氣也。欲將入於疫室先想青

氣自肝而出左行於東化作林木心之所至氣必至焉故存想之

東則神有所注而氣可王矣左行於次想白氣自肺

而出右行於西化作戈甲肺氣也壯次想赤氣自心

而出南行於上化作焰明心氣也壯次想黑氣自腎

而出北行於下化作水腎氣也壯次想黃氣自脾而

出存於中央化作土脾氣也壯五氣護身之畢以想

頭上如北斗之煌煌然後可入於疫室煌煌輝耀

當謹避之如此又一法於立春之日日未出而吐

成方切用 卷首 五三五

之舊註日用遠志去心以水煎之飲二盞吐之不疫又一法於雨水日後

三浴以藥泄汗謂以祗邪散毒之藥煎湯三浴以泄其汗也又一法小

金丹方辰砂二兩水磨雄黃一兩葉子雌黃一兩

紫金半兩以金箔同研之可為細末同入合中外固了地一尺

築地實不用爐不須藥制用火二十筋煨之也七

日終常令火不斷候冷七日取次日出合子埋藥地中

七日取出順日研之三日煉白沙蜜為丸如梧桐

子大每日望東吸日華氣一口冰水下一丸和氣

嚥之服十粒無疫干也合子即磁確之屬順日研之謂左旋也按此遺篇

之言乃出後人增附法非由古未足深信。避疫之法必節慾節勞仍勿忍饑以近其氣自可無慮

成方切用 卷首 五三五

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷一上

治氣門 正方二十三 附方二十七

栝萸薤白酒湯 栝萸薤白半夏湯 四君子湯 功異

散人參散 又六君子湯 七味白朮散 三白

湯六神散 八珍湯 十全大補中益氣湯 益

補陽湯 大防風湯 溫經 參朮益胃湯 補中益氣

氣湯 調營養衛湯 順氣和中湯 補中益氣

生黃漿代赭旋覆湯 升陽益胃湯 補脾胃瀉

陰火升陽湯 橘皮竹茹湯 丁香柿蒂湯

成方切用 卷一上 目錄

丁香柿蒂湯 又四磨湯 舉元煎 獨

參湯 見救門 保元湯 見孩門 參朮膏 養門

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

有杜雋望

成方切用

治氣門 天積氣兩地積形爾人氣以成形

惟氣以成形也 豈不鉅哉 然形存氣散則形

有積氣有衛氣有宗氣有臟腑之氣有經絡

之氣各為區分 其所以統攝營衛脈腑經絡

而令克周無間 氣流不息 通體節節皆靈者

全賴胸中神機化滅 氣立孤危矣 金匱曰營

衛相得 其氣乃行 大氣一轉 其氣乃散 見營

衛兩不和 氣即痺而難通 必先令營衛相

得其氣 並行不悖 然必俟胸中大氣一轉 其

久病駁劣之氣 始散然則大氣之關於病機

若此 金匱獨鏡 其法 舉胸中氣 獨發

其義 於一門 而治 法 舉胸中氣 獨發

陽主開陽 盛則有開 無塞 爾若胸中之陽不

庭可損其有餘 則用枳木湯足矣 用枳必與

木各半 可過損乎 識此以治胸中之病 寧不

思過半乎 今人之暴其氣而不顧 迨病成復

栝萸薤白酒湯 治胸痺喘息欬唾胸背痛

短氣寸口脈沉而遲 關上小緊數 徐忠可曰天

發逆倚息 欬短不得 氣短不得 欬其形如 腫此胸痺 云喘息欬 噴胸背痛 短氣彼邪 重故不得 臥此虛故 前後胸背 應痛是六 別異

陽氣用事。故清肅時行。呼吸往還。不愆常度。津液上下。潤養無滯。痺則虛而不充。其息乃不勻。而喘噓乃隨欬而生。胸為前背。後則下。其中氣不能。則前後俱痛。寸口主陽。因虛伏而不鼓。則沉而遲。關主陰。陰寒相搏。則小緊而數。數者陰中挾燥火也。故以栝蘆開胸中之燥。葶藶為君。薤白之辛溫。以行痺著之氣。白酒以通行營衛。為佐。其意謂胸中之陽氣。布則燥。自潤。痰自開。而諸證悉愈。此正見仲景對酌論證之妙。蓋胸痺。孰為是乎。痺虛則不運。不運則津液必凝滯。而為痰。故胸痺。本與支飲。痰飲相類。但支飲。痰飲。乃飲重。而滯氣胸痺。則由支飲。虛而氣。飲。因之。故仲景既不一脈為言。而曰夫脈當取太過不及。陽微陰弦。即胸痺而痛。又註云。責其極虛。見胸痺。當陰

成方切用 卷上 栝蘆薤白白酒湯

全責陽虛。既非表證。外入之疾。亦非痰飲內積之比。故以栝蘆薤白潤燥通陽為主。未嘗不取消痰下氣。而意實不同於治飲也。故細分寸口沉遲者。約略言其脈之在陽者為微。細分寸口小緊數者。約略言其脈之在陰者為弦。當取太過不及者。約略之辭也。今以陰陽緊審關前關後。使人認定上焦。陽虛而胸痺一證。與支飲痰飲等病。因治法判然矣。
栝蘆一枚 薤白兩 白酒四升
此上焦膈中藥也。膈中。兩乳中間。經曰。膈中。喻嘉言曰。胸中。陽氣如離照。當空曠。然無外設地。氣一上。則窒塞有加。故知胸痺者。陰氣上逆之候也。仲景微則用薤白白酒。以益其陽。薤葉光

成方切用 卷一上

難於故曰。薤露。其性滑泄。能通氣滯。故胸痺下重。並用之。甚則用附子乾薑。以消其陰。世醫不知胸痺為何病。習用荳蔻木香訶子三稜神麩麥芽等藥。坐耗其胸中之陽。亦相懸矣。

加半夏名栝蘆薤白半夏湯。治胸痺不得臥。心痛徹背。飲之兼證。又心痛徹背。支飲原不痛。飲由胸痺而痛。應背。故即除白酒加枳實厚朴。前方加半夏。以去飲下逆。
桂枝名枳實薤白桂枝湯。治胸痺心中痞。留氣結在胸。胸滿脇下逆。搶心。徐忠可曰。胸痺而

成方切用 卷上 栝蘆薤白白酒湯

似痞與結胸之象。乃上焦陽微。而客氣動。膈也。註云。留氣結在胸。即客氣也。更脇下逆。搶心。是不獨上焦虛。而中焦亦虛。陰邪得以據之。為逆。為搶。故於薤白栝蘆。又加枳實。以開其結。桂枝行陽以疏其肝。又曰。人參湯亦主之者。病由中虛。去其太甚。即可補正。以化邪也。胸痺之虛。本陽氣微。非營氣虛也。陽無取乎補。宜而通之。即陽氣暢。暢則陽盛矣。故薤白方。以行陽為主。不取補也。此曰人參湯亦主之。因脇下逆。由中氣虛。故兼補中。爾人參湯。即理中湯等分。而用乾薑者。爾。
四君子湯 治一切陽虛氣弱。脈來虛軟。脾衰肺損。飲食少思。體瘦而黃。或痿白。皮聚毛落。言語輕微。四肢無力。及脾胃不和。洩痢虛飽。

五三七

人參 白朮土茯苓二甘草一 加薑棗

人參甘溫大補元氣為君。白朮苦溫燥脾補氣為臣。茯苓甘淡滲溼瀉熱為佐。甘草甘平和中益土為使。氣足脾運飲食倍進則餘臟受蔭而色澤身強矣。

加陳皮以理氣散逆。名異功散錢氏調理脾胃。再加半夏以燥溼除痰。名六君子湯治脾胃氣虛飲食不進致成痰癥。不時咳唾或胃氣虛寒動成嘔惡。凡虛癆及諸病後惟真陰虧損者大忌用此培土之劑以伐

成方切用氣卷上四君子湯四

或腹痛泄瀉六君子加竹瀝麥冬治四肢不舉。脾主四肢。六君子加烏梅草菓等分薑棗煎名四獸飲。以輔脾故名。治五臟氣虛七情兼併結聚痰飲與衛氣相搏發為瘧疾亦治瘡癤。六君子加柴胡葛根黃芩白芍名十味人參散治虛熱潮熱身體倦怠。加黃耆山藥亦名六君子湯為病後調理助脾進食之劑。加棗仁妙治振悸不得眠。居胡治加薑汁竹瀝治半身不遂在右者屬氣

虛亦治痰厥暴死加木香霍香乾葛名七味白朮散錢氏治脾虛肌熱泄瀉虛熱作渴皆能生津楊仁齋再加五味柴胡治消渴不能食除人參加白芍名三白湯調理內傷外感治虛煩或渴或泄加山藥藕豆薑棗煎名六神散陳無治小兒表熱去後又發熱者世醫到此蓋不能曉或謂不治此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再熱非熱證也宜此湯加梗米和其胃氣則收陽歸內而身涼矣寒四君合四物名八珍湯治氣血兩虛及胃損飲食不為肌膚若傷之

成方切用氣卷上四君子湯五

重者真陰內竭虛陽外鼓諸證蜂起則於四物四君之中又加黃耆以助陽固表加肉桂以引火歸元名十全大補湯金匱曰虛者十補勿十全大補加防風為君再加羌活附子杜仲牛膝名大防風湯治鶴膝風十全大補去川芎加陳皮名溫經益元散卷治汗後頭眩心悸筋惕肉瞤或汗出不止或下後下利不止身體疼痛陽太宜汗汗多則人陽故有眩悸瞤惕之證陽明宜下下多則人陰故有下利身痛之證

補中益氣湯東垣治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡

旋覆欬冬夏加麥冬五味秋加麻黃黃芩冬加
 麻黃不去根節天寒加乾薑泄瀉去當歸加茯
 苓蒼朮益智如冬月惡寒發熱無汗脈浮而緊
 加麻黃若脈浮而緩有汗加桂枝芍藥東垣此
 感證中有內傷一種故立此方以補傷寒書之
 所未及非補虛方也今感證家多不敢用而以
 為調理補虛服食之藥則謬矣調
 理補虛乃通其意而轉用之者爾
 肺者氣之本黃耆補肺固表為君脾者肺之母
 土能生金脾胃人參甘草補脾益氣和中瀉火
 一虛東垣曰參者甘草瀉火之聖藥蓋煩勞則
 為臣虛而生熱得甘溫以益元氣而虛熱自退

成方切用 卷上 補中益氣湯

故亦謂白木燥溼強脾當歸和血養陰為佐補
 之瀉宜兼和陰不升麻以升陽明清氣右升而復柴
 然則已亢胡以升少陽清氣上行陽升則萬物生清升
 則濁陰降加陳皮者以通利其氣陳皮同補藥
 瀉生薑辛溫大棗甘溫用以和營衛開腠理致
 津液諸虛不足先建其中中者何脾胃是也東垣
曰脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其上
 位其次肺氣受邪須多用黃耆而人參甘草次
 之脾胃一虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而
 固腠理不令自汗上喘氣短故以人參補之心
 火乘脾用炙草甘溫以瀉火熱而補脾元若脾
 胃急痛并大虛腹中急縮宜多用之中滿者減

之白木苦甘溫除胃中之熱利腰膈間血胃中
 清氣在上必加升麻柴胡以升之引參耆甘草
 甘溫之氣味上升以補胃氣之散而實其表又
 緩帶脈之縮急氣亂於中清濁相干用去白陳
 皮以理之又助陽氣上升以散滯氣脾胃氣虛
 為陰火傷其生發之氣營血亦虧血減則心無
 所養致令心滿而煩病名曰恍惚故用甘辛微溫
 之劑生陽氣若虛煩不寧者增人參補之陽旺
 則能生陰血或增當歸和之少加黃芩以救腎
 水瀉陰中伏火如煩猶不止少加生地補腎水
 水旺則心火自降李士材曰虛人感冒不任發
 散者此方可以代之東垣曰肌熱者表熱也服
 此湯一二劑得微汗則已非正發汗乃陰陽氣
 和自然汗出也凡四時按虛傷寒通宜補散
 故丹溪治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四君
 子加發散藥血虛者四物湯加發散藥東垣治
 風溼用補中益氣湯加羌活防風升麻藜蘆本蒼
 朮海藏治風溼無汗者用神木湯有汗者用白

成方切用 卷上 補中益氣湯

木湯治剛瘧神木湯加羌活麻黃治柔瘧白木
 湯加苦木桂心治中風脈弦細孔遲者用黃耆
 湯此皆非仲景成法然對證則可用亦不可廢
 也明醫雜著云發熱有數種治各不同仲景論
 傷寒傷風此外感也故宜發表以解散之此麻
 黃桂枝之義也感於寒冷之月即時病發故用
 辛熱以勝寒如春溫之月則當變以辛涼之藥
 夏暑之月即當變以甘苦寒之藥又有冬溫此
 天時不正陽氣反泄用藥不可溫熱又有寒瘧
 御在溫熱之時此陰氣反逆用藥不可寒涼又
 有瘧疫沿門闔境相似者此天地之厲氣當隨
 時令參氣運而治宜辛涼其苦寒之藥以清熱
 解毒若夫飲食勞倦為內傷元氣則真陽下陷
 內生虛熱故東垣發補中益氣之論用甘溫之
 藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之
 不足也又有勞心好色內傷真陰陰血既傷則
 陽氣偏勝而為虛熱是謂陰虛火旺勞瘵之證
 故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物加知朮

成方切用氣 卷上 補中益氣湯

補其陰而火自降此用血藥以補血之不足也... 又有夏月傷暑之病雖屬外感卻類內傷東垣所謂清暑益氣是也... 又有因暑熱而過食冷物以傷其內或過取風涼以傷其外此則非暑傷人因貪涼而致之病治宜辛熱解表辛溫理中之藥卻與傷寒治法相類者也... 外感之與內傷寒病之與熱病氣虛之與血虛如水炭相反治之若差則輕病必重重病必死矣醫貫曰讀傷寒書而不讀東垣書則內傷不明而殺人多矣讀東垣書而不讀丹溪書則陰虛不明而殺人多矣... 是內傷悉類傷寒切戒汗下以為內傷多而外感少只須溫補不必發散如外感多內傷少溫補中少加發散以補中益氣為主如內傷兼寒者加麻黃兼風者加桂枝兼暑者加黃連兼溼者加羌活實乃萬世無疆之利此東垣特發陽虛發熱之一門也然陰虛發熱者十之六七亦類傷寒今人一見發熱無不通用發散發散而

成方切用 卷一上

成方切用氣 卷上 補中益氣湯

賴乎故於諸證之中凡其不宜用此者則有不... 可不察如表不固而汗不斂者不可用外無表邪而陰虛發熱者不可用陽氣無根而格陽戴陽者不可用脾虛泄瀉者不可用水虧火元而命門火衰而虛寒泄瀉者不可用... 吐血衄血者不可用四肢厥逆而陽虛欲脫者不可用... 總之元氣虛極者不可用... 但知補中益氣湯可以補虛一槩尚之而不知病當緊惡則此時幾微關係判於一舉指之間而纖微不可察... 誤者止此類也... 加炒芩神麩名益胃升陽湯治婦人經水不調或脫血後食少水瀉... 東垣曰脫血益氣古聖之氣去白朮加草蔻神麩半夏黃蘗名升陽順氣... 湯治飲食勞倦所傷滿悶短氣不思食不知味... 時惡寒... 東垣曰升麻柴胡味薄性陽引脾胃清甘草上行克實勝理使衛外為固凡補脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也... 助春夏之升浮者也此便是瀉秋收冬藏之藥也... 在人一身之乃肝心也但言瀉之以酸味寒涼之劑并淡味滲泄之藥此助秋冬之沉降者也... 此便是瀉春生夏長之藥也... 在人一身之肺腎是也... 吳鶴皋曰升柴半升其清清升則陽氣順矣... 歸甘草補其虛虛補則正氣順矣... 其膈膈利則痰氣順矣... 加蒼朮倍分半... 夏黃芩益智各三分名參朮益胃湯治內傷

倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃除當歸白朮
 加木香蒼朮名調中益氣湯治脾胃不調胸滿
 肢倦食少短氣口不知味及食入反出加白芍
 五味亦名調中益氣湯以上俱東垣方治氣虛多汗餘
 治同前本方純用甘溫所謂勞者溫之損者溫
 之此加白芍五味之酸以收耗散之氣
 有發有收此東垣別開一
 路以廣補中之妙者乎加羌活防風細辛川
 芎名調營養衛湯治勞力傷寒頭痛身熱惡
 寒微渴汗出身痛脈浮無力加白芍細辛川芎
 蔓荊名順氣和中湯治清陽不升頭痛惡風

成方切用 卷一上 補中益氣湯 主

脈弦微細加黃蘗生地名補中益氣加黃蘗生
 地湯治陰火乘陽發熱晝甚自汗短氣口渴無
 味

代赭旋覆湯治傷寒發汗若吐若下解後心
 下痞更噫氣未除汗吐下後大邪雖解胃氣弱
 氣即俗所謂噯氣也并善治反胃噎食氣逆不降
 旋覆花 甘草兩半夏升人參兩代赭石兩生
 薑兩大棗十二
 喻嘉言曰此亦伏飲為逆但因胃氣虧損故用

法以養正而兼散餘邪大意在噫氣不除上既
 心下痞硬更加噫氣不除則胃氣上逆全不下
 行有升無降所謂弦絕者其聲嘶土敗者其聲
 噦也故用代赭領人參納氣歸元海以鎮安其
 逆微加散邪滌飲而痞自開成氏曰韋則氣
 軟痞韋法則氣浮代赭之重以鎮虛逆辛者散
 也生薑半夏之辛以散虛痞甘者緩也人參大
 棗甘草之甘以補胃弱綱目曰病解後痞韋噫
 氣不下利者用此湯下利者生薑瀉心湯活人
 云有旋覆代赭證或咳逆氣虛者先服四
 逆湯胃寒者先服理中湯後服此湯為良

成方切用 卷一上 升陽益胃湯 治脾胃虛弱怠惰嗜臥時值秋

燥令行溼熱方退體重節痛口苦舌乾心不思
 食食不知味大便不調小便頻數兼見肺病灑
 淅惡寒慘慘不樂乃陽氣不升也

黃耆兩半夏 甘草炙 人參兩 白芍炒 羌活
 獨活 防風五錢以其秋旺 陳皮四錢 白朮土
 茯苓小便利不用 澤瀉無淋勿用 柴胡三錢 黃連二錢 每
 三錢薑棗煎此方殊為不介
 六君子助陽益胃補脾胃之上藥也加黃耆以
 補肺而固衛芍藥以斂陰而調營羌活獨活防

風柴胡以除溼痛節之痛而升清陽茯苓澤

瀉以瀉溼熱而降濁陰少佐黃連以退陰火補

中有散發中有收使氣足陽生自正旺而邪服

矣東垣曰此治脾胃兼肺病也何故秋旺用參

故因時而補易為力也又曰子病脾胃久衰一

日體重肢節疼痛大便泄下小便閉塞默思內

經云在下者因而竭之是利小便也又治諸

瀉小便不利者先分利之治溼不利小便非其

治也常用淡滲之劑又思聖人之法雖布在方

策其未盡者以意求之今寒溼客邪自外入裏

而甚暴若用淡滲以和之病雖即已降之又

降復益其陰而重竭其陽也治以升陽風藥是

為宜爾羌活獨活升麻柴胡各一錢防風炙甘

草各五分一劑而愈大法寒溼之勝風以平之

又曰下者舉之聖人之法舉一可知百矣東垣

又曰藥中但犯澤瀉豬苓茯苓木通燈草淡味

滲洩之類皆從時令之旺氣以泄脾胃之外邪

而補金水之不足也或小便已數肝腎不受邪

者而誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先損其兩

目也又云靈樞云頭有疾取之足謂陽病取陰

也足有疾取之上是陰病取陽也中有疾旁取

之中者脾胃也旁者少陽甲膽也甲膽風木也

東方春也胃中穀氣者便是風化也胃中溼勝

而成泄瀉宜助甲膽風勝以克之又是升陽助

清氣上行之法也

成方切用氣卷十一

補脾胃瀉陰火升陽湯

脾火邪乘之而生大熱右關脈緩弱或弦木

土或浮數升脾胃之氣下流肝腎是有秋冬而

成方切用 卷一上

無春夏也惟瀉陰火升陽氣用味薄

風藥升發則陰不病而陽氣生矣

黃耆 蒼木 甘草 羌活 升麻 柴胡

服三錢或五錢

柴胡升麻羌活助陽益胃以升清氣人參蒼朮

黃耆甘草益氣除溼以補脾胃黃耆黃連石膏

涼心清熱以瀉陰火東垣曰胃乃脾之剛脾乃

病脾無所稟而後病勞倦則脾先病不能為胃

行氣而後病胃為十二經之海脾胃既虛十二

經之邪不一而出假令不能食而肌肉削此本

病也右關脈緩而弱本脈也或本脈中兼見弦

脈證中或見四肢滿悶淋瀝便難轉筋一二證

此脾胃兼肝病也當加風藥以瀉之脈中兼見

洪大證中或見肌熱煩熱面赤肉消一二證此

脾胃兼心病也當加瀉心火之藥脈中兼見浮

濇證中或見短氣氣上喘咳痰盛皮逆一二證

此脾胃兼肺病也當加泄肺及補氣之藥脈中

兼見沉細證中或見善欠善恐一二證此脾胃

兼腎病也當加瀉腎水之浮及瀉陰火之藥蓋

百病皆從脾胃生也處方

成方切用氣卷十一

橘皮竹筍湯

治久病虛羸嘔逆不已

橘皮 竹筍 甘草 人參 生薑 大棗

五四三

故

徐忠可曰此胃虛而冲逆為噦然非真元衰弱之比故以參甘培胃中元氣而以橘皮竹筴一寒一溫下其上逆之氣以薑棗宣其上焦使胸中之陽漸暢而下達謂上焦固受氣於中焦而中焦亦稟承於上焦上焦既宣則中氣自調也加半夏麥冬赤茯苓枳實亦名橘皮竹筴湯

丁香柿蒂湯

治久病呃逆因於寒者呃在中焦氣不運 聲短小 得食即發 為胃呃 呃在下焦氣氣不足 其聲長大 不食亦然 為腎呃 久呃則胃

成方切用 氣 卷上 丁香柿蒂湯 去 腎俱寒者為多此病有因痰阻氣滯者有因瘀血者有因火鬱者有因胃實失下者此皆屬實有因中氣大虛者有因大下胃虛陰火上逆者此皆屬虛寒熱虛實治法不一古方以此湯治

丁香 柿蒂 錢二 人參 錢一 生薑 片五 一方加陳皮

半夏 茯苓 甘草 良薑

丁香泄肺溫胃而煖腎生薑去痰開鬱而散寒柿蒂苦澇而降氣人參所以輔真氣使得展布也朱丹溪曰人之陰氣因胃為養土傷則木挾相火直冲清道而上作呃逆古人以為胃寒用丁香柿蒂不能清痰利氣惟助火而已李時珍曰宋氏但執以寒治熱矯枉之過矣按古人

治陰呃每用桂附乾薑吳萸丁香茴香諸辛熱藥多有收效者治陽呃用橘紅竹筴湯土機微義曰呃逆本由陰氣已虛陽火暴甚直衝而上出於胃入於肺而作聲東垣用涼藥者所以瀉熱降火也若陰證呃逆以陰氣先消陽火亦竭浮於胸中亦欲散也故不用寒藥而反以溫藥養胃留其陽氣胃氣和則愈陽生則陰長之說也

除人參生薑加竹筴橘紅名丁香柿蒂竹筴湯

又名橘紅竹筴湯治陽呃或問治陽呃者何以不用知藥吳鶴皋曰此少陽虛邪非實邪也故用柿蒂竹筴之味薄者主之若知藥味厚則益戕其中氣否塞不益甚乎古人蓋除人參生薑亦名丁香柿蒂湯嚴氏

寶鑑去人參加青皮陳皮三因去人參加良薑

成方切用 氣 卷上 四磨湯

七

甘草名丁香散

四磨湯嚴氏 治七情氣逆上氣喘急妨悶不食怒氣上思則氣結憂愁不已氣多厥逆重則眩仆輕則上氣喘急滿悶妨食

檳榔 沉香 烏藥 人參 等分濃磨煎三

四沸溫服 一方人參易枳殼一方去參加枳

實木香白酒磨名五磨飲治暴怒卒死名曰氣厥

氣上宜降之故用檳榔沉香檳榔性如鐵石沉能下氣逆宜順之故用烏藥加入人參者降中有升瀉中帶補恐傷其氣也

舉元煎景 治氣虛下陷血崩血脫凶陽垂危等

證有不利於歸熟等劑而但宜補氣者以此主之

黃耆炙 人參三五錢 白朮炒 甘草炙 升麻炒 五

如兼陽氣虛寒者桂附乾薑隨宜佐用如兼

滑脫者可加烏梅二箇或文蛤七八分

獨參湯 諸虛氣弱脈微危急及大失血者此方

主之血脫者須益其氣蓋有形之血不能速生無形之氣所當急固陽生則陰長也有

痰者加薑汁煩躁者加童便身寒者加附

成方切用氣 卷上 舉元煎 獨參湯 六

子

人參得天地冲和之氣以成形故用之以補冲

和之氣使其一息尚存則可以次第而療諸疾

是以病之危急而虛者良醫以氣為首務也

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷一下

理血門附方三十一

四物湯知榮四物湯 滋陰降火湯 坎離丸

湯元戎四物湯 治風六合湯 補肝丸

湯艾附煖宮丸 婦寶丹 防風當歸散 四神

丸桃仁承氣湯 氣對子承蒼木地榆湯 芍藥

湯導滯 秦艽白朮丸 秦艽防風湯 秦艽羌活湯

麻黃人參芍藥湯 當歸補血湯 槐花散加減

成方切用血 卷下 目錄

花散槐角丸 又槐 咳血方 龍腦雞蘇丸 犀

角地黃湯加味犀角 歸脾湯酸棗 人參養營湯

養心湯 還元水迴輪 獨聖散 清咽太平丸

小蘆飲子 復元羌活湯 補陰益氣煎 四生

丸 當歸六黃湯

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭

男

有榆蒼培同較 有杜雋望

成方切用

理血門 人有陰陽。即為血氣。陽主氣。故氣全所賴。惟斯而已。蓋其源而血氣。則形強。人生一統於脾。藏受於肝。宜布於肺。施泄於腎。灌漑和柔。凡為七竅之靈。為四肢之用。為筋骨之顏色。充營衛。津液得以通行。二陰得以條暢。凡形質所在。無非血之用也。人有此形。惟賴

成方切用 卷下

此血。故血衰則形萎。血敗則形壞矣。然血化於氣。而成於陰。陽虛則不能生血。所以血宜靜而溫。不宜動。此盈虛性用之機。苟能察其精義。而治得其宜。又何血病之足慮。如熟地當歸。枸杞鹿膠。山茱萸。血虛所宜。生地芍藥。阿膠。血熱所宜。梔子犀角。血之太熱所宜。桃仁紅花。蘇木丹皮。血瘀所宜。乳香沒藥。五靈脂。凌霄花。花血。麻川。痛所宜。丹參益母草。醇酒。滯所宜。升麻。川芎。白芷。血閉所宜。棕灰。髮灰。白芨。烏梅。倍子。血滑所宜。乳酪。酥油。柏子。仁。菴菴。血燥所宜。薑桂。血寒所宜。人參。白朮。黃耆。甘草。能觸類而長之。可以應無窮之變矣。

四物湯

治一切血虛及婦人經病。月經先期為陽。故其色紅。上應於月。其行有常。故名曰經。必從

氣之配。因氣而行。成塊者。氣之凝。將行而痛。在錯經。妄行者。氣之亂。紫者。氣之熱。黑者。氣之甚也。今人見紫黑。作痛成塊。幸指為風。冷乘之。而用溫熱之劑。禍不旋踵矣。經曰。九則害。乘乃制。熱極則兼水化。所以熱則紫。甚則黑也。若日風冷。必須外得。或有不化。所以熱則紫。甚則黑也。日寒則凝。而不行。既行而紫黑。故知非寒也。

當歸酒洗。生地錢三。芍藥錢二。芩薺半錢。如涼血心加黃連。肝條。芥。肺枯。芥。大腸實。芥。膽黃。連。腎膀胱黃。葉。脾。生地。胃。大黃。三焦。地骨。心。包。絡。丹。皮。小腸。梔。子。木。通。如。清。氣。心。與。包。絡。加。麥。冬。肺。枳。殼。肝。柴。胡。青。皮。脾。白。芍。胃。乾。葛。石。膏。大。腸。三。焦。連

成方切用 卷下 四物湯

翹。小。腸。赤。茯苓。膀胱。滑。石。琥珀。血。虛。加。龜。板。血。燥。加。人。乳。血。瘀。加。桃。仁。紅。花。韭。汁。童。便。行。之。暴。血。加。薄。荷。元。參。散。之。血。不。止。加。炒。蒲。黃。京。墨。久。不。止。加。升。麻。引。血。歸。經。婦。人。經。血。紫。黑。脈。數。為。熱。加。芩。連。血。淡。脈。遲。為。寒。加。桂。附。人。肥。有。痰。加。半。夏。南。星。橘。紅。人。瘦。有。火。加。黑。梔。知。母。黃。蘗。鬱。者。加。木。香。砂。仁。蒼。朮。神。麴。瘀。滯。加。桃。仁。紅。花。延。胡。肉。桂。氣。虛。加。參。耆。氣。實。加。枳。朴。以上乃舊時加當歸。辛。苦。甘。溫。入。心。脾。生。血。為。君。生。地。甘。寒。入

心腎滋血為臣芍藥酸寒入肝脾斂陰為佐芍
芩辛溫通上下而行血中之氣為使也

包肝經上行頭目下行血海玉機微義曰川芎入
血中之氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於
氣也而黃血中血藥也通腎經性味甘寒能補
真陰之虛也當歸血中主藥也通肝經性味辛
溫分三治全用活血各歸其經也芍藥陰分藥
也通脾經性味酸寒能和血治血虛腹痛也此
特血病而求血藥之屬者也若氣虛血弱又當
從長沙血虛以人參補之陽旺即能生陰血也
男漢治陰虛發熱於血藥四物湯亦分陰陽血
之動者為陽歸芍主之血之靜者為陰地芍主
之血之陰不足雖芍歸辛溫亦不用血之陽不
足雖薑桂辛熱亦用之與瀉火之法正治從治
相同吳鶴皋曰地芍養五臟之陰芍歸調營中
之氣陰陽調和而血自生若失血太多氣息幾

成方切用 卷下 四物湯

微之際慎勿與之蓋四物陰類非所以生血者
也當重用參者以固欲絕之氣故曰脫血者先
益其氣否則川芎香薷反能耗氣氣血雙亡而
死矣故凡胃虛氣弱之人皆不宜服丹溪謂產
後忌用芍藥恐酸寒伐生生之氣然芍藥微瀉
血虛氣痛新產正血虛氣痛之時醇酒微炒用
之則害又血塊凝滯作禍不可泥於產後大補
氣血放膽用之玉燭散無妨推陳致新亦是
補法只因產後大補氣血一語致積血而殞者
多矣張景岳曰治血之劑古人多以四物湯為
主然亦有宜有不宜蓋補血行血無如當歸但
當歸之性動而滑凡因火動血者忌之因火而
嗽因淫而滑者皆忌之凡火載血上者忌之因
川芎之性升而散凡火載血上者忌之因火而
汗火不歸原者皆忌之凡火載血上者忌之因
血清血無如芍藥然二物皆涼陽虛者非宜也
脈弱身涼多嘔便澀者皆非宜也故凡用
四物以治血者不可不察其宜否之性

加黃檗知母名知檗四物湯再加參名滋陰
降火湯治陰虛有火知檗四物蜜丸名坎離丸

治陰虛嗽血丹溪論癆瘵主乎陰虛蓋自子至
在午後子前屬陽陰虛則陰虛則盜汗從寐
時出升屬陽降屬陰陰虛則氣不降痰涎上逆
吐出不絕脈浮屬陽沉屬陰陰虛則浮之洪大
沉之空虛宜用四物竹瀝加炒藥龜板補陰降
火之劑又須遠嗜欲薄滋味靜心調養以助之
準繩云丹溪治癆瘵主乎陰虛用四物加知檗
主之世醫遵用百無一效何哉蓋陰虛火必上
炎當歸辛溫非滋陰降火之藥川芎上竄非虛
炎短乏者所宜地黃泥膈非胃弱多食少者
所宜知檗辛苦大寒雖日滋陰其實燥血雖曰
降火久而增氣反能助火至於敗胃所不待言
不若用薏仁百合天冬麥冬桑皮地骨棗仁北

成方切用 卷下 四物湯

味甘名三黃四物湯治陰虛潮熱用生熟二地
發熱夜劇陽陷陰中名熱入血室加黃檗黃芩
物湯元治氣旺血虛五心煩熱入血室夜分
非知藥四物之謂也加黃連胡黃連名二連四
陰補肺腎即是補陰治腎虛蓋心肝屬陽肺腎屬
參耆地黃膏之類治腎虛蓋心肝屬陽肺腎屬
角膠霞天膏化服大抵薏仁百合之屬治肺虛
參耆地黃膏之類治腎虛蓋心肝屬陽肺腎屬
非知藥四物之謂也加黃連胡黃連名二連四
物湯元治氣旺血虛五心煩熱入血室夜分
發熱夜劇陽陷陰中名熱入血室加黃檗黃芩
甘草名三黃四物湯治陰虛潮熱用生熟二地

加黃耆丹皮升麻柴胡名三黃補血湯治血虛六脈俱大按之空虛黃耆補氣升柴升陽生血也加桃仁紅花名元戎四物湯治血結

便秘撲損瘀血加羌活防風秦艽名治風六合湯治風虛眩暈風秘便難蜜丸名補肝丸散以

補加木香檳榔名治氣六合湯治血虛氣滯或血氣上衝加羌活天麻蜜丸名神應養真丹治

足厥陰經受風寒暑溼癱瘓不遂語言蹇澀及血虛腳氣加桃仁紅花竹瀝薑汁治半身不遂

成方切用血卷下四物湯

在左者屬瘀血瘀血不去則新血不生故用桃仁紅花活血去瘀加薑汁竹瀝

者以痰無去白芍加防風名防風當歸散治發汗過多而成瘕證宜去風養血去地黃加乾薑

名四神湯治婦人血虛心腹疴痛疴音鳩又音絞急痛也

加艾葉四製香附童便鹽水酒醋各浸三日醋丸名艾附煖

宮丸治子宮虛冷再加阿膠名婦寶丹治虛寒

月水不調加丹皮地骨治婦人骨蒸除芍藥地

黃名歸芎湯為末名佛手散又名一奇散又名

君臣散治產後血虛頭痛胎動下血服此即安

男子去血

此誤

多亦有

此誤

子死腹中服此即下催生神效四物各七錢加防風一兩梔子黃芩黃連各三錢每服五錢如脈實加大黃名生地黄連湯海治婦人血風證

去血過多因而燥澀循衣摸牀撮空閉目揚手

擲足錯語失神脈弦浮而虛陶節菴曰大承氣之內者用之生地黃連湯血藥也自內而外

者用之氣血合病循衣摸牀證同自氣之血而復之氣者大承氣湯下之自血之氣而復

之血者生地黃連湯主之二者俱不大便此是承氣湯對子又與三黃石膏湯相表裏是皆三

焦包絡諸火之病也病既危急只得以此降血柴胡理中四逆茶黃承氣涼膈等皆可作各半

成方切用血卷下四物湯

湯此易老用藥大略也加大黃芒硝甘草當歸用尾芍藥

用赤名玉燭散和治經閉腹痛體瘦善饑取四時和氣謂之玉燭之義也

抵當湯仲治太陽病六七日表證仍在發熱惡

項脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下

焦少腹當鞭滿小便自利者必有畜血令人善

念所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也太陽

膀胱為腑此太陽熱邪隨經入腑熱與血搏故

為畜血脈沉為在裏表證仍在則邪氣猶淺不

結於胸中而發狂經日熱結膀胱其人如狂又

曰血併於下亂而善忘小腹鞭滿而小便不利

者為湯澀。鞭滿而小便不利者。為畜血。準繩曰。玩仍在二字。則邪氣為不傳裏。非猶淺也。膀胱為太陽本經。曰熱結下焦。曰少腹鞭滿。曰小便自利。皆膀胱之證。故總結曰。隨經熱也。在裏二字。乃隨經膀胱之裏。非三陰之裏也。按太陽在陽在表。縱有沉緊沉滑之脈。皆不得以裏陰名之。

水蛭三十箇。豬脂熬黑。蠱蟲三十箇。去頭足翅。桃仁二十枚。去皮尖。研。

大黃酒浸。

苦走血。鹹滲血。蠱蟲水蛭之苦。鹹以除畜血。甘

緩急。苦泄熱。桃仁大黃之甘。苦以下結熱。程郊

表證仍在。脈微而沉。是有表證。而無表脈。熱在下焦。可知。非桂枝所能散。桃仁所能攻。緣熱結

成方切用 卷下 抵當湯 七

膀胱與熱在裏。邪有淺深。故桃仁承氣與抵當湯。攻有緩急。

減水蛭十箇。蠱蟲桃仁各減五箇。分爲四丸。每

水煮一丸。名抵當丸。治本病無喜冷如狂之證

者。附代抵當丸。大黃兩。生地歸尾桃仁穿山

甲元明粉各一。桂心錢蜜丸。以通之。桂心熱以

動之。大黃元明粉苦寒。鹹寒以推蕩之。如穿山甲引之以達於瘀所也。

桃仁承氣湯。治傷寒外證不解。熱結膀胱。小

腹脹滿。大便黑。小便利。燥渴。譫語。畜血發熱。如

狂及血瘀。胃痛。腹痛。癰疾。實熱。夜發。瀉疾。

滑仁號

聚滿亦有在上焦者

畜血急痛。熱邪自太陽不解。傳入膀胱之府。與

不下者。血畜下焦。故小腹急脹。皮見青紫。筋大

便利。而少腹仍急。故知為畜血。心主血。邪熱上

干。心君不寧。故躁煩譫語。而如狂。瘀血聚於陽

明。則胃痛。在太陰。則腹痛。在厥陰。則脇痛。瘧夜

發者。熱入血分也。活人云。不當汗而汗之。其

津液。陽擾之極。則侵陰也。故燥血畜於胸中。也

李梴曰。太陽證。則如狂。陽明證。則善忘。少陽證

則寒熱。如瘧。傷寒有用大承氣不解。反便堅善

食者。瘀血也。凡胸中滿。心下滿者。皆氣也。腹中

滿者。或燥矢。或宿食。少腹滿者。或濁。或血。停畜

而脹滿也。清陽出上竅。故上滿者。為氣多。濁陰

出下竅。故下滿者。為血多。俱是熱病。惟冷結

膀胱。少腹滿。一證為寒。有手足厥冷。為可辨。

桃仁五十枚。去皮尖。研。大黃兩。芒硝。甘草。桂枝。兩

成方切用 卷下 桃仁承氣湯 八

大黃芒硝蕩熱去實。甘草和胃緩中。此調胃承

氣湯也。熱甚則搏血。血聚則肝燥。故加桃仁之

甘苦。以潤燥而緩肝。加桂枝之辛熱。直達瘀所

而行之也。櫻寧生曰。血溢血泄。諸畜安者。其始

其鏡氣。然後區別治之。或問失血復下。虛何以

當。伊舉曰。血既妄行。迷失故道。不去畜利。瘀則

以安為常。何以禦之。且去者。自去。生者。自生。何

仁承氣對子加青皮枳實破血必行氣也加當歸芍藥去瘀而生新也柴胡平肝

升清而散表熱蘇木助

蒼朮地榆湯治脾經受溼痢疾下血

蒼朮三兩地榆炒黑每一兩煎

蒼朮燥溼強脾升陽而開鬱地榆清熱涼血酸

收而斷下為治血痢腸風之平劑初起者勿用

加芍藥阿膠卷柏名芍藥地榆湯治泄痢膿

血乃至脫肛阿膠補血與液為肺

芍藥湯治下痢膿血稠黏腹痛後重

成方切用赤為傷血白為傷氣膿血稠黏氣血兩傷也腹痛後重氣血皆滯也劉河間曰行血則膿血自愈調氣則後重自除

芍藥兩歸尾錢二黃芩錢三黃連錢三大黃錢三木香錢三

甘草錢二檳榔錢二桂錢半每服五錢痢不減加大

黃此為實熱者言也然今之實熱者鮮矣

芍藥酸寒瀉肝火斂陰氣和營衛故以為君大

黃歸尾破積而行血木香檳榔通滯而行氣黃

芩黃連燥溼而清熱痢由溼熱積於腸胃不得

宣通故大便重急小便赤澀也辛以散之苦以

燥之寒以清之甘以調之加肉桂者假其辛熱以為反佐也

除桂甘草加枳殼名導滯湯治前證兼

渴者此方今人多用僅遇虛寒者而誤用之禍不旋踵矣

秦艽白朮丸治痔瘡痔漏有膿血大便燥結

痛不可忍津液以從足陽明胃土之化旺則生

化萬物人或醉飽入房酒熱留著忍精不泄流注纂問前陰之氣歸於大腸木乘火勢而侮燥

金火就燥則大便閉而痔作矣受病者燥氣也為病者胃溼也溼熱風燥四氣合邪法當瀉火

和血止痛

成方切用秦艽白朮丸

桃仁研歸尾洗秦艽五錢白朮兩枳實炒皂角子兩

性燒存澤瀉錢五地榆錢三麩糊丸

秦艽歸尾桃仁潤燥和血秦艽為風藥中潤劑皂角仁以

除風燥地榆以破血止血枳實苦寒以泄胃實

澤瀉鹹泄使氣歸於前陰以清溼邪也白朮之

苦甘以瀉火而益元氣故曰甘寒瀉火乃假枳

實之寒也大便祕澀以大黃推蕩之其津液益

不足用當歸和血加油潤之劑自然與利矣

除地榆加大黃紅花名秦艽當歸湯治痔漏大

便燥結疼痛用秦艽一味加羌活防風麻黃升
麻柴胡蔓本細辛黃耆炙草紅花名秦艽羌活
湯治痔漏成塊下垂不任其癢除皂角枳實地
榆加防風升麻柴胡陳皮大黃黃檗紅花炙草
名秦艽防風湯治痔漏大便時疼痛無痛者非
痔漏也除白朮枳實地榆加蒼朮黃檗大黃檳榔
防風名秦艽蒼朮湯以上俱治同成塊者溼也
作大痛者風也大便燥結者兼受火熱也是溼
熱風燥四氣合邪當去四者以破氣藥兼之治
法全矣

成方切用 卷一下 麻黃人參芍藥湯

麻黃人參芍藥湯 治吐血外感寒邪內虛蘊

麻黃去外寒黃耆益實表甘草炙補脾白芍藥安太陰
人參益元氣麥冬保肺氣五味子五粒安肺氣當歸
養血桂枝和營衛熱服
綱目曰觀此一方足以為萬世模範矣蓋取仲
景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人當服仲
景方者宜以此為則與補藥愈後繼居曠室臥
熱炕咳而吐血東垣謂此久虛弱冬居曠室衣
服單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪

成方切用 卷一下

不得舒伸故血出於口當補表之陽瀉裏之虛
熱因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗
而不與之遂成衄血卻與麻黃湯立愈
愈與此甚同因作此湯一服而愈

當歸補血湯 治傷於勞役肌熱面赤煩渴引

飲脈大而虛飽勞傷其陰血虛則身熱此以饑
熱煩渴與陽明白虎證無異但白虎證得之外
感實熱內盛故脈大而長按之有力此證得之
內傷血虛發熱脈大而無力內經所謂脈虛血
虛是也誤服白虎湯必斃

黃耆炙一兩當歸酒洗二錢空心服

當歸滋陰養血黃耆乃補氣之藥何以五倍於
當歸而云補血湯乎蓋有形之血生於無形之

成方切用 卷一下 當歸補血湯

氣又有當歸為引則從之而生血矣經曰陽生

則陰長此其義爾

槐花散 治腸風臟毒下血血之在身有陰有
陽陽者順氣而行
循流脈中調和五臟瀝陳六腑謂之營血陰者
居於絡脈守臟腑滋養神氣濡潤筋骨若感
內外之邪而受傷則或循經之陽血至其傷處
為邪氣所阻滯泄經外或居絡之陰血因雷
之邪瀉裂而出則皆滲入腸胃而泄矣世俗
以腸風名之不知風乃六淫之一爾若腸胃受
火熱二淫與寒燥淫佛鬱其氣及飲食勞力傷
其陰絡之血者亦可謂之腸風乎針經曰陽絡
傷則血外溢而吐衄陰絡傷則血內溢而便溺
戴氏以隨感而見色鮮者為腸風積久而發色
瘀者為藏毒又云色鮮為熱白大腸氣分來色
瘀為寒白小腸血分來或曰腸風者風邪淫胃

五五一

臟毒者溼邪淫胃。臟毒腸風之血。出於臍腸之間。五痔之血。出於肛門。蝕孔處。治各不同。

槐花 炒 側柏葉 荆芥 黑枳殼 炒 等分爲末

每服三錢米飲下

側柏養陰燥溼最清血分。槐花疏肝瀉熱能涼

大腸。荆芥散瘀搜風。病爲風病。血枳殼寬腸利氣。

此病多由溼熱風燥之邪。如久不愈者。不宜純用寒涼。須兼溫補。及升舉藥。大法涼血。用槐角地榆。側柏。條芩。炒連。梔子。生地。和血。用阿膠。當歸。川芎。白芍。風溼。用秦艽。防風。荆芥。蒼朮。茯苓。血。少加桃仁。紅花。蘇木。寬腸。用枳殼。升。舉。用升麻。補氣。生血。加人參。黃耆。白朮。甘草。

加當歸生地川芎入烏梅生薑煎名加減四物

成方切用 卷下 槐花散 主

湯生治同 補血 除柏葉荆芥加當歸黃芩防風

地榆酒糊丸名槐角丸 方局治同 疏風 除柏葉枳

殼加青皮等分亦名槐花散 古治血痢腹不痛

不裏急後重除柏葉枳殼加當歸川芎熟地白

朮青皮升麻亦名槐花散又名當歸和血散 垣東

治腸澀下血溼毒下血經驗方單用槐花荆芥

炒黑爲末酒服亦治下血

咳血方 丹 治咳嗽痰血 咳者有聲無物。嗽者有物無聲。咳者有聲無物。嗽者有聲有物。肺主氣。氣逆爲咳。腎主水。水泛爲痰。腎上入

肺也。肺爲華蓋。至清之臟。有火則咳。有痰則嗽。

肺循喉嚨。其支者從肺絡心。屬胸中。故病則俱病也。涎唾中有少血散漫者。此腎從相火炎上

之血也。若血如紅縷。從痰中咳出者。此肺絡受熱傷之血也。若咳出白血。淺紅色。似肉似肺者

必死。凡唾中帶血。咯出有血。或血絲。屬腎經

鼻衄。經出。咳。嗽。有血。屬肺經。嘔吐成盆。成碗者

屬胃經。陽明多血。多氣。故也。自兩脇逆上。吐出

者。屬肝經。瀉血。屬小腸膀胱經。下血。屬大腸經

牙宣。出血。屬胃腎虛火。舌血。謂之舌衄。汗孔出

血。謂之肌衄。心與肝也。又驚而動血者。屬心。怒

而動血者。屬脾。勞而動血者。屬腎。

而動血者。屬肝。憂而動血者。屬肺。思

青黛 飛水 栝藹仁 油 海石 砂 山梔 黑訶子 肉 等

分爲末蜜丸化嗽甚加杏仁

肝火上逆能燥肺金故咳嗽痰血青黛瀉肝而

理血散五臟鬱火 梔子涼心 蒲青肺使邪熱下

行二者所以治火 栝藹潤燥滑痰爲治嗽要藥

能清上焦痰火 海石軟堅止嗽 清水之上源能

蕩除鬱熱垢膩 二者降火而兼行痰加訶子

肺爲水之上源 者以能斂肺而定痰喘也不用治血之藥者火

退則血自止也

龍腦雞蘇丸 方局 治肺有鬱熱咳嗽吐血衄血下

血 肺有鬱熱故咳嗽甚則逼血上行 熱淋消渴

肺熱則肺移熱於大腸則下血 熱淋消渴

肺熱則渴而多飲爲上消 口臭 脾胃 口苦 肝

在經也
也表熱太
也表熱太
也表熱太

有熱清心明目。

雞蘇葉一名龍腦薄生地六錢麥冬四錢蒲黃阿

膠木通銀柴胡二錢甘草半錢黃耆人參一

先將木通柴胡浸二日熬汁地黃浸汁熬膏

再用蜜三兩煉過和丸梧子大每服二十九細

嚼湯下一方有黃連

肺本清肅或受心之邪燄或受肝之亢害故見

諸證雞蘇輕揚升發瀉肺搜肝散熱理血故以

為君生地涼血炒蒲黃止血以療諸血柴胡平

成方切用血卷下龍腦雞蘇丸

肝解肌熱木通利水降心火麥冬阿膠潤燥清

肺參者甘草瀉火和脾此亦為熱而涉虛者設

故少佐參者也喻嘉言曰此九兩

犀角地黃湯治傷寒胃火熱盛吐血衄血

日吐鼻血曰衄吐行濁道衄行清道喉與咽二

管不同也經者循經之血走而不守隨氣而行

火氣急迫故隨經直犯清道上膈而出於鼻為

衄其從肺竅而出於咽者則為咳血咯血其存

胃中者為守管之血守而不走胃虛不能攝血

或為火逼故嘔吐從咽而出也吐血之熱在府

衄血之熱在經雞病衄血熱嗽血便血熱於肺則

為裏熱傷寒衄血為表熱二畜血如狂漱水下飲

成方切用 卷一下

燕燕血在上焦則善念在下焦則如狂漱水不

故雖漱水而不欲飲海藏曰大凡血證皆不飲

水惟氣逆則飲水經曰陽明病口燥漱水不欲

飲者必衄傷寒當發汗而不發汗及陽毒發斑

邪熱入裏逼血妄行故見諸證

熱甚傷血裏實表虛發於皮膚而為斑疹傷寒

下早熱毒乘虛入胃則發斑見紅點者為疹如錦

紋者為斑疹輕而斑重色紫黑者熱極而胃爛

也者多死凡斑疹慎不可汗汗之重令開泄

更增斑爛亦不可遠下恐斑毒內陷也

生地兩白芍兩犀角其精氣盡在是也作器物

者多被蒸者丹皮二錢每服五錢熱甚如狂

者加黃芩一兩因怒致血者加梔子柴胡黃芩

成方切用血卷下犀角地黃湯

中二焦之火梔子瀉三焦之

火柴胡平少陽厥陰之火

血屬陰本靜因諸經火逼遂不安其位而妄行

犀角大寒解胃熱而清心火芍藥酸寒和陰血

而瀉肝火之丹皮苦寒瀉血中伏火生地

大寒涼血而滋水以其平諸經之僭逆也

分三部藥有重輕犀角地黃湯治上血如吐衄

之類桃仁承氣湯治中血如畜血中焦下痢膿

血之類抵當湯治下血如畜血如狂之類又

日此證足太陰所主脾不裹血越而上行實者

犀角地黃湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐血者

咸用芍藥主之故知太陰藥也醫貫曰犀角地

黃湯乃衄血之方蓋犀水獸也醫貫曰犀角地

以通天鼻衄之血從任督而至顛頂入鼻中惟

五五三

犀能通頂而又不

犀角能下入腎水引地黃滋陰之品由腎脈而上故為對證若陰虛火動吐血與咳者皆不可借用成功若陽虛勞嗽及脾胃虛者皆不宜活人聖藥如無犀角代以升麻二藥性味相遠何以為代蓋以升麻能引諸藥入陽明也朱二允曰升麻性升犀角性降用犀角止行歸經爾僅誤下降之氣清心肝之火使血下行歸經爾僅誤用升麻血隨氣升不愈湧出不止乎傷寒汗出不微能通動經血誤發其汗亦動經血二者不同附向文治一人傷寒四五日吐血不止醫以犀角地黃湯茅花湯治之反劇陶切其脈浮數而緊遂用麻黃湯汗出而愈此取脈不取證也可謂得仲景心法矣故脈不浮緊而數其可湯主之又曰傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃者愈風寒在經鬱而為熱不得汗解則熱自衄血散俗名紅汗故愈若至未發汗致衄者仍須

成方切用

犀角地黃湯

用麻黃發之成無已日傷寒衄者為邪氣不得發散難甚於經通迫於血也桂枝麻黃湯治衄者非治衄也即是發散經中邪氣衄血鬱於上而吐血者謂之薄厥陷於下而衄者謂之畜血此由太陽陽隨經熱在裏血為熱所搏結於下焦少腹當鞭小便自利

節菴加當歸紅花桔梗陳皮甘草藕汁名加味
犀角地黃湯常歸引血歸經藕汁涼血散瘀桔梗以利上焦陳皮以導中焦紅花

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾怔忡健忘

不足下氣有餘腸胃驚悸有觸而心動日驚無實而心氣虛故善忘驚悸有觸而心動日驚無也盜汗則不能生血而血少故見前諸證發熱

脾主體倦四肢食少健運不眠血不歸經。脾肌內體倦四肢食少健運不眠血不歸經。脾前諸證或脾虛不能攝血致血妄行及婦人經帶或心脾傷痛嗜臥肢體作痛大便不調或瘰癧流注不能消散潰斂

黃耆 蜜當歸 洗龍眼肉 二錢 棗仁 炒白朮 土炒 八錢 茯神 錢 遠志 八分 木香 磨 甘草 炙 五錢 薑

醫貫曰 心生血脾統血肝藏血凡治血證須按三經用藥遠志棗仁補肝以生心火茯神補心

成方切用

以生脾土參耆甘草補脾以固肺氣木香香先

入脾總欲使血歸脾爾氣行則血自歸經治虛

火之血養正為先氣壯則自能攝血。高鼓峯曰心火衰甚不能生土以致土困金敗外兼咳嗽吐痰寒熱往來盜汗急以此方去木香加白芍以治之凡見脾胃衰弱飲食不思大便泄瀉總屬君火不旺所致此補本方也凡各種虛證補中益氣所不效者投以此方如肺腎受傷再加麥冬五味如肝腎受傷則芍藥更為有益如從佛鬱而起則加柴胡丹皮山梔如非二陽之病至性忡則去木香加枸杞麥冬五味之屬如實挾包絡一類有餘之火兼痰者則加黃連生地貝母冬之類以清之夢遺而挾相火者加黃藥不起惺惺不寐此方亦是對證要藥亦可變為

養營加減。○按歸脾湯乃有宋嚴用和所創以治二陽之病發心脾內遠志當歸乃薛新甫所加。以治血虛。又加丹皮山梔為加味。以治血熱。而陽生陰長之理。乃備隨手變化。通於各證。無不神應。曰歸脾者。從肝補心。從心補脾。幸所生所藏。而從所統。所謂隔二之治。蓋是血藥。非氣藥也。後人見薛氏得力。亦漫浪效之。而不解其說。妄為加減。盡失其義。即有稍知者。亦止謂治血從脾。雜入溫中劫陰之藥。而嚴薛二家之旨益晦。西明高欽峯。於趙氏之論。而獨悟其微。謂木香一味。本以噓血。歸經然以其香燥。反動肝火。而乾津液。故其用。每去木香。而加芍藥。以追已散之真陰。且肺受火刑。白木燥烈。恐助咳。嗽得芍藥。以為佐。則太陰為養榮之用。又配合黃耆。建中。龍性乃馴。唯脾虛泄瀉者。方留木香。以醒脾。脾虛挾寒者。方加桂附。以通真陰之陽。而外此。皆出入於心肝脾三經。甘平清潤之藥。濟生之法。始無墮義矣。

成方切用 卷下 歸脾湯

去白木木香龍眼加茯苓陳皮入蓮肉薑棗煎

名酸棗仁湯治虛煩不眠金匱酸棗仁湯亦治不眠見和解門

人參養營湯 治脾虛食少無味身倦肌瘦肺虛

色枯氣短毛髮脫落小便赤澀營血不足驚悸

健忘寢汗發熱經曰脾氣散精上輸於肺此地下輸膀胱此天氣下降也脾主治節通調水道上下不交而為否營血無所藉以生諸種虛證

亦治發汗過多身振脈搖筋惕肉瞤汗為心液汗過多則血液枯涸

人參 白木 白芍 黃耆 當歸 茯苓 錢一

成方切用 卷一下

熟地 錢三 甘草 炙 陳皮 桂心 遠志 分五 五味 粒七

加薑棗煎

熟地歸芍養血之品參耆苓朮甘草陳皮補氣之品血不足而補其氣此陽生則陰長之義也且參耆五味所以補肺能生血氣甘陳苓朮所以健脾脾統血熱地所以滋腎腎藏精精遠志能通腎氣上達於心桂心能導諸藥入營生血五臟交養互益故能統治諸病而其要則歸於養營也薛立齋曰氣血兩虛而變現諸證莫能名狀勿論其病勿論其脈但用此湯諸證悉

成方切用 卷下 人參養營湯

養心湯 治心虛血少神氣不寧怔忡驚悸心主藏神經日靜則神藏躁則消忘心虛則易動故怔忡驚悸不得安寧也

黃耆 炙 茯苓 茯神 當歸 川芎 半夏 麩

一兩 甘草 錢一 柏子仁 油 棗仁 遠志 心 五味

人參 肉桂 半 每服五錢

參耆以補心肺之氣肺為心華蓋芎歸以養心肝之

血肝木能生心火二茯遠志以泄心熱柏仁酸棗以寧

五五五

心神五味收神氣之散越半夏去擾心之痰涎
甘草補土以培心子赤桂引藥以入心經潤以
滋之溫以補之酸以收之香以舒之則心得其
養矣

養矣

還元水

治咳血吐血及產後血運陰虛久嗽火

蒸如燎

血生於心統於脾藏於肝宣布於肺靜
則歸經熱則妄行火傷肺絡血隨咳出
或帶痰中

童便

取十一二歲無病童子不茹葷辛清徹
如水者去頭尾熱飲冬則用湯溫之或加藕汁

成方切用 卷下 湯 藥 九 水 一 主

阿膠和服有痰稍加薑汁

童便鹹寒降火滋陰潤肺散瘀故治血證火嗽

血運如神

北齊褚澄曰痰不容物毫髮必咳血
既滲入愈滲愈咳愈咳愈滲飲漉漉
百不一死服寒涼藥百不一生李時珍曰小便
飲之入胃隨脾之氣上歸於肺下通水道而入
膀胱乃其舊路故能治肺病引火下行其味鹹
而走血故治血病當熱飲熱則真氣尚存其行
自速冷則唯有鹹寒之性而已李士材曰煉成
秋石真元之氣漸失不及童便遠矣飲自己
輪酒

獨聖散

治多年咳嗽肺痿咯血紅痰

白芨

為末每服二錢臨臥糯米湯下

人之五臟唯肺葉壞爛者可以復生白芨苦辛
收澀得秋金之令能補肺止血故治肺損紅痰
又能蝕敗疽死肌為去腐生新之聖藥

清咽太平丸

治膈上有火早間咯血肺屬金肅
清之屬也

木火焚灼肺金受刑故咯血兩頰常赤肺肝
早間寅卯木旺生火之時

喉不清皆十二經脈唯足太陽在表不歷膈咽餘
尤甚諸火上逆
故咽喉不清

薄荷兩川芎 防風 犀角 柿霜 甘草二

桔梗三 蜜丸

成方切用 卷下 獨聖散 清咽太平丸 主

薄荷辛香升浮消風散熱消風故疏肝散熱故
防風血藥之使瀉肺搜肝為上部血藥之使

川芎血中氣藥升清散瘀柿霜生津潤肺犀角
涼心清肝甘草緩炎上之火勢桔梗載諸藥而

上浮又甘桔相合為清咽利膈之上劑也

小蘗飲子 治下焦結熱而成血淋其主血小腸

搏血流入胞中與便俱出痛者為血淋不痛者
為溺血蓋心熱者小腸必熱經所謂胞移熱於
膀胱則癰溺血是也然熱必兼溼戴氏曰血鮮
者心小腸實熱血瘀者腎膀胱虛冷準繩曰多
有熱極而血凝黑者未可便以為冷也

搏血流入胞中與便俱出痛者為血淋不痛者
為溺血蓋心熱者小腸必熱經所謂胞移熱於
膀胱則癰溺血是也然熱必兼溼戴氏曰血鮮
者心小腸實熱血瘀者腎膀胱虛冷準繩曰多
有熱極而血凝黑者未可便以為冷也

小薊 蒲黃 黑藕節 滑石 木通 生地

梔子 炒 淡竹葉 當歸 甘草梢 各五分

小薊藕節 濕熱散瘀 生地涼血 蒲黃止血 木通降心肺之火 下達小腸 梔子散三焦鬱火 由小便出 淡竹葉 清心而利小便 相為表裡 滑石瀉熱而滑竅 當歸能引血歸經 草梢能徑達莖中也

復元羌活湯 湯名羌活而方內無之 疑缺誤 治從高墜下惡血

留於脇下 疼痛不可忍者 必問傷在何經 惡血

成方切用 血 卷下 小薊飲子 復元羌活湯

血故也

柴胡 錢五 當歸 栝蔞根 穿山甲 炮 甘草 紅

花 錢二 桃仁 皮五十 去 大黃 酒一兩 每服一兩加酒

煎以利為度

原文曰 肝膽之經行於脇下 屬厥陰少陽 故以柴胡引用為君 以當歸活血脈 以甘草緩其急 為臣 以穿山甲 花粉 桃仁 紅花 破血潤血 為佐 以大黃 蕩滌敗血 為使 惡血去而痛自除矣 補陰益氣煎 治勞倦傷陰 精不化氣 或陰精

成方切用 卷一下

內乏 以致外感 不解寒熱 痰癆陰虛 便結不通

等證 人參 錢一 熟地 三五錢 或 當歸 二三錢 山藥 酒炒 廿

草 灸 陳皮 錢一 柴胡 外邪不用 升麻 浮於上 不用 葛棗煎

此補中益氣湯之變方也 凡氣虛感邪者 宜補中益氣湯 精虛感邪者 宜此 張景岳曰 補中益

之心法 蓋以脾胃屬土 為水穀之海 凡五臟生 成 唯此是賴 者 在賴其發生之氣 運而上行 故 由胃達脾 由脾達肺 滋溉一身 即如天地之土 其氣皆然 凡春夏之土 能生 能長 者 以得陽氣

成方切用 血 卷下 補中益氣煎

而上升 升則向生也 秋冬之土 不生不長者 以得陰氣 而下降 降則向死也 今本方以升柴助 升氣 以參耆歸木助陽氣 此東垣立方之意 誠 盡善矣 第脾本象天 脾木象地 地天既交 所以 成泰 然不知泰之前 猶有臨 臨之前 猶有復 此 實三陽之元始 故予再製補陰益氣煎 正所以 助臨復之氣 庶乎得復本之道 而足補氣血之

四生丸 治吐血 衄血 血 甚良 陰血熱妄行 此方 生荷葉 生艾葉 生地 生側柏葉 四

件爛搗丸 如鷄子大 每服一丸 滾湯化 統而論之 生之則寒 則四生皆能去火 析而論 之 則荷艾輕香 去火於氣 柏質實瀉火於陰

五五七

火去則血歸經而吐衄愈矣

當歸六黃湯

治陰虛有火盜汗發熱

血發於外為汗汗乃心之液藏府表裏之陽皆心主之以行其變化隨其陽氣所在之處而生津亦隨其火擾之處泄而為汗汗者心之陽寢者腎之陰陰虛睡熱必奏之故汗出也

當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃蘗 黃連

連等黃者倍加麻黃根本湯加麻黃根治盜汗甚捷蓋其性能行

周身肌表引諸藥至衛分而固腠理也

陰虛有火睡去則衛外之陽乘虛陷入陰中表

成方切用 卷十下 四生丸 當歸六黃湯

液失其固衛故濺濺然而汗出及覺則陽用事

衛氣復出於表表實而汗即止歸地所以養陰

芩連所以去火生地黃藥可以養陰亦可以去

火而倍用黃者所以補衛固表也

熱盜汗宜當歸六黃湯加地骨皮陽虛陰必乘故發厥自汗宜黃耆建中湯甚者加附子或甘附湯有淫熱合邪汗出不休以風藥勝其淫甘藥泄其熱羌活勝濕湯有痰證冷汗自出宜理氣降痰痰去則汗自止有汗證用固瀉藥汗愈不收此可理心宜大補黃耆湯加棗仁有微攝血滋溢而為汗宜大補黃耆湯加棗仁有微熱者加石斛。士材曰六黃湯唯火實氣強者損胃弱深爾

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷二上

補養門 正六十七

八味地黃丸 右歸丸 右歸飲 六味地黃丸

九知藥八味丸 七味地黃丸 都氣丸 加減

生肝飲 滋陰腎氣丸 益陰腎氣丸 滋腎

湯肝飲 滋水 左歸丸 左歸飲 一陰煎 二

陰煎 三陰煎 四陰煎 五陰煎 七寶美髯

丹 大補元煎 滋陰大補丸 兒老五福飲 七

成方切用 卷十上目錄

黑地黃丸 大營煎 小營煎 虎潛丸 補益丸

丹濟陰 參朮膏 兩儀膏 天真丸 貞元飲 三

才封髓丹 鳳髓丹 當歸地黃飲 人參固本丸

地黃醴 參乳丸 頓乳取 歸腎丸 天王補心丹

贊化血餘丹 孔聖枕中丹 養元粉 大補

陰丸 斑龍丸 又斑 元武豆 龜鹿二仙丹 二

至丸 蟠桃菓 扶桑丸 羊肉湯 益氣聰明

湯 秦芫髓甲散 黃耆髓甲散 秦芫扶

羸散 百合固金湯 補肺湯 補肺阿膠散

紫苑湯 王母桃 玉屏風散 黃耆湯 川芎湯 妙香散
 參苓白朮散 休瘧飲 何人 四君子湯 見治 歸脾
 湯 見理 人參養營湯 見理 十全大補湯 見治 八珍
 湯 見治 生脈散 暑門 當歸補血湯 見理

成方切用 卷二十一

仲景云氣
 虛有參宜
 醫氣丸補
 而逐之
 吳山云
 八味丸治

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭

男

有榆蒼培同較

有杜雋望

成方切用

補養門

凡氣虛者宜補其。上。人參黃耆之屬
 精虛者宜補其。下。熟地枸杞之屬
 虛無火者宜補而兼。桂附乾薑之屬
 有火者宜補而兼。清門冬芍藥生地之屬
 固陰陽之治法也。其有氣因精而虛者自當
 補精以化氣。精因氣而虛者自當補氣以生
 精。又有陽失陰而離者不補陰何以收散
 之氣。水火相敗者不補火何以甦垂寂之

成方切用

卷二十一

陰此又陰陽相濟之妙用也。故善補陽者必
 於陰中求陽。則陽得陰助而生化無窮。善補
 陰者必於陽中求陰。則陰得陽升而泉源不
 竭。是故以精氣分陰陽則陰陽不可離。以寒
 熱分陰陽則陰陽不可混。此又陰陽邪正之
 離合也。大凡陽虛多寒者宜補而兼溫。而清
 潤之品非所宜。陰虛多熱者宜補以甘涼而
 辛燥之類不可用。知宜知避則不惟用補而
 方制皆可。得而貫通矣。

崔氏八味丸

治命門火衰不能生土以致脾

胃虛寒飲食少思泄瀉腹脹或元陽虛憊陽痿
 精寒臍腹痛夜多漩溺膝痠腰軟目昏等證
 王冰所謂益火之原以消陰翳也尺脈弱者宜

藥之本也

之者亦有假有力

熟地黃用懷生地水洗去砂土柳木既砂鍋上

搗膏山萸肉酒潤懷山藥四茯苓丹皮澤

瀉三肉桂皮熟附子兩蜜丸洛謂蜜性甘緩

更得空心理湯下

吳鶴臯曰腎中水火俱虧者此方主之李士材

兩枚皆屬於水初無水火之別仙經曰兩腎一

坎而位乎北也趙養葵曰君子觀象於坎而知

此人生與天地相似也今人入房甚而陽事易

成方切用

李士材

三

亦有火盛

而宗筋弛

緩者不可

不知

又用以治

婦人轉胞

亦同此義

舉者陰虛火動也陽事先痿者命門火衰也真

水竭則陰冬不寒真火息則盛夏不熱是方也

六味皆濡潤之品所以能壯水之主桂附辛潤

其養則腎氣復其天矣喻嘉言曰金匱用八味

丸治脚氣上入少腹不仁者脚氣即陰氣少腹

而辛熱純陽通行諸經走而不守桂為少陰之

藥宣通血脈性亦竄發二者皆難控制必得六

者純陰厚味潤下之品以為之濬導而後能納

附為腎陰之定藥離法任意而雜用之酷烈中

上燥潤三陰為福非非也或曰仲景治少陰傷

寒用附者十之五非專為保益腎陽耶曰仲景

為陰邪盛在諸經非溫經不能驅之使出附子

意在三焦命門辛熱之味故用以攻諸經之寒邪

梅以至太陽之乾薑附子芍藥桂枝甘草陽明

論中正唯八味之附乃補腎也桂逢陽藥則為

汗散逢血藥即為瀉行逢泄藥即為滲利與腎

更疎亦必八味丸之桂乃補腎也故曰當論方

不當論藥當就方以論藥不當執藥以論方

此方主治在化元取潤下之性補下治下制以

急茯苓澤瀉之滲瀉正所以急之使直達於下

也腎陰失守湯燉於上欲納之復歸於宅非借

降泄之勢不能收攝寧靜故用茯苓之淡泄以

降陰中之陽用澤瀉之鹹瀉以降陰中之陰也

體之方悟其變化處一錢不走之妙有腎虛

火不歸經大熱煩渴目赤唇裂舌上生刺喉如

煙火足心如烙脈洪大無倫按之微弱者宜十

全大補湯吞八味丸或問燥熱如此復投桂附

不以火濟火乎曰心胞相火附於命門男以藏

精女以繫胞因嗜慾竭之火無所附故厥而上

炎且火從腎出是水中之火也火可以水折水

中之火不可以水折桂附與火同氣而味辛能

開腠理致津液通氣道據其窟宅而招之誘之

同氣相求火必下降矣然則桂附者固治相火

之正藥歟八味丸用澤瀉冠宗黃謂其法引

桂附歸就腎經李時珍曰非接引也茯苓澤瀉

皆取其瀉膀胱之邪氣也古人用補必兼瀉

成方切用

李士材

三

邪去則補藥得力。一聞此乃元妙。後世不知此理。專一於補。必致偏勝之害矣。洛按此亦為虛中挾邪。滯者設爾若純虛之證。而兼以滲利未免。免滅去藥力。常用右歸丸。或右歸飲。

加五味鹿茸名十補丸。治兩尺微弱。陰陽俱虛。

右歸丸景 治元陽不足。或先天稟衰。或勞傷過度。以致命門火衰。不能生土。而為脾胃虛寒。飲食少進。或嘔惡膨脹。或反胃噎膈。或卻寒畏冷。或臍腹疼痛。或大便不實。瀉痢頻作。或小水自遺。虛淋寒疝。或寒侵谿谷。而肢節痛痺。或寒在下焦。而水邪浮腫。總之真陽不足者。必神疲氣

怯。或心跳不寧。或四肢不收。或眼見邪祟。或陽衰無子。等證。速宜益火之原。以培右腎之元陽。而神氣自強矣。八味丸治之不愈者。宜服此。或用右歸飲。凡八味右歸用桂附等方。唯肺陰有病者。宜之。否則助火燥金。反生肺病。

成方切用 補 卷上 右歸丸 四

大懷熟八山藥 山萸肉 枸杞 菟絲製杜仲薑湯鹿角膠炒珠當歸三兩便附子製肉桂

右九法如前。或丸如彈子大。每嚼服二三丸。白湯下。其効尤速。如陽衰氣虛。必加人參。以為之主。或二三兩。或五六兩。隨人虛實。以為

增減。蓋人參之功。隨陽藥則入陽分。隨陰藥則入陰分。欲補命門之陽。非加人參不能捷効。

如陽虛精滑。或帶濁便溏。加補骨脂酒炒三兩。

如殮泄腎泄不止。加五味子三兩。肉苳蔻三兩。麩炒去油用。如飲食減少。或不易化。或嘔

惡吞酸。皆脾胃虛寒之證。加乾薑三四兩。炒黃用。如腹痛不止。加吳茱萸二兩。湯泡半日。炒

用。如腰膝痠痛。加胡桃肉連皮四兩。如陰虛陽痿。加巴戟肉四兩。肉蓯蓉三兩。或加黃狗

外腎一二副。以酒煮爛。搗入之。右歸飲景 此益火之劑也。凡命門之陽衰。陰勝者。宜此方。加減生之。如治陰盛格陽。真寒假熱等證。宜加澤瀉二錢。煎成。用涼水浸冷服之。尤

成方切用 補 卷上 右歸飲 五

熟地三四錢或加山藥炒杜仲薑湯枸杞二錢炙甘草一錢肉桂一錢製附子一二錢萸肉一錢水二

蓋煎七分。食遠服。如氣虛血脫。或厥或昏。或汗或暈。或虛狂。或短氣者。必大加人參。白朮。隨

宜用之 如小腹多痛加吳茱萸六七分 如火衰不能生土為嘔噦吞酸者加炮薑二三錢

如陽衰中寒泄瀉腹痛加人參肉苳蓉隨宜用之 如淋帶不止加破故紙一錢 如血少

血滯腰膝軟痛者加當歸二三錢

六味地黃丸 治肝腎不足真陰虧損精血枯

竭憔悴羸弱腰痛足痿自汗盜汗水泛為痰

日久病陰火上升津液生痰不生發熱咳嗽

血宜補血以制相火其痰自除 頭暈目眩

其熱烙手骨困不任為腎熱 方直指

成方切用 卷三 六味地黃丸 六

淫慾過度腎氣不能歸元此氣虛頭暈也吐耳

鳴耳聾遺精便血消渴淋瀝失血失音舌燥喉

痛虛火牙痛足跟作痛下部瘡瘍等證 諸證皆

不足虛火上炎所致 熟地八兩 山茱萸四兩 茯苓丹皮 澤瀉

三兩 右丸法如前空心鹽湯下

腎中水虛不能制火者此方主之今人足心熱

陰股熱腰脊痛率是此證乃咳血之漸也熟地

滋陰補腎生血生精山萸溫肝逐風潛精秘氣

牡丹瀉君相之伏火涼血退蒸 時珍曰伏火即

相火也世人專以黃藥治相火不知丹皮之功

更勝丹皮能入腎瀉陰火退無汗之骨蒸

山藥清虛熱於肺脾補脾固腎 茯苓滲脾

中濕熱而通腎交心澤瀉瀉膀胱水邪而聰耳

明目壯水之主以制陽光即此方也 六味地黃

味潤下之方也純陰腎之氣重味腎之質潤下

腎之性非此不能使水歸其壑其中只熟地一

味為本藏之主然遇氣藥則運用於上遇血藥

則流走於經不能制其一綫入腎也故以五者

佐之山藥陰金也坎中之良堅凝生金故入手

太陰能潤皮膚水發高原導水必自山山藥堅

少腹之土真水之原也水土一氣鎮達臍下山

茱萸陰木也肝腎同位乎下借其酸澀以收泛

成方切用 卷三 六味地黃丸 七

溢水火升降必由金木為道路故與山藥為左

右降下之主以制其旁軼二者不相離觀李朱

拆用二味於他方可悟也丹皮本手足少陰之

藥能降心火達於膀胱水火封居瀉南即益北

而又有茯苓之淡泄以降陽瀉瀉之水此制以

陰疏瀉決排使無不就下入海之水此制以

微旨也仲景原方以此六者駕馭桂附以收固

腎中之陽至宋錢仲陽治小兒行遲齒遲脚軟

顛開陰虛發熱諸病皆屬腎虛而小兒稚陽純

氣無補陽之法乃用此方去桂附用之應手神

效明薛新甫因悟大方陰虛火動用丹溪補陰

法不驗者以此代之立應自此以來為補陰之

神方矣趙養葵得力於薛氏醫案而益闡其義

觸處旁通外邪雜病無不貫攝而六味之用始

盡矣趙氏作醫貫專用此湯大劑療病且云

即湯以傷胃汁乾急下之邪熱入於胃腑消耗津液

故飲水者不可不與不可多與別無治法縱有

治者徒知以芥連梔藥麥冬五味花粉甚則石膏知母此皆有形之水以沃無形之火安能滋腎中之真陰乎若以六味地黃大劑服之其渴立愈何至傳至少陰而成燥實堅之證乎

加黃檗知母各二兩名知藥八味丸治陰虛火

動骨痿髓枯因下焦**尺脈旺者宜之**朱丹溪曰

火也人火也可以水滅可以直折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也屬可以水溼折之當從其類而伏之唯黃檗之屬可以降之醫貫曰左尺脈虛細數者是腎之真陰不足宜六味丸以補陰右尺脈沉細數者是命之相火不足宜八味丸以補陽至於兩尺微弱是陰陽俱虛宜十補丸此皆滋先天化源自世之補陰者率用知藥反戕脾胃多致不起不能無憾故特表而出之又曰王節齋云凡酒色過度損傷肺腎真陰者不可過服參耆服多者

成方切用補**卷三**六味地黃丸

死蓋恐陽旺而陰消也自此說行而世之治陰虛咳嗽者視參耆如砒鴆以知藥為靈丹使患此證者百無一生良可悲也蓋病起房勞真陰虧損陰虛火上故咳當先以六味丸之類補其真陰使水升火降隨用參耆救肺之品補腎之母使金水相生則病易愈矣世之用寒涼者固不足齒間有知用參耆者不知先壯水以制火而遽投參耆以補陽反使陽火旺而金益受傷此不知後先也**加桂一兩名七味地黃丸引無根之火降而歸元治肝經氣虛筋無所養變為寒證以致筋骨疼痛腳軟懶行及傷寒服涼藥過多木中無火手足牽引肝經血虛以致火燥筋****變為結核癰癤等證經曰辛以潤之此方是**

成方切用 卷二上

也加五味名都氣丸治勞嗽益肺之源以生腎水也加肉

桂一兩五味二兩名加減八味丸治腎水不足

虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽

喉作痛或形體憔悴寢汗發熱五臟齊損加五

味二兩麥冬三兩名八仙長壽丸治虛損勞熱

加杜仲薑牛膝酒各二兩治腎虛腰膝痠痛去

澤瀉加益智仁三兩鹽酒治小便頻數益智辛

固用熟地二兩山藥山萸丹皮歸尾五味柴胡

各五錢茯苓神澤瀉各二錢半蜜丸硃砂為衣名

成方切用補**卷三**六味地黃丸

益陰腎氣丸即明目地黃丸東垣治腎虛目昏加柴胡者

於上加柴胡五味白朮當歸甘草名滋腎生肝

飲治血虛氣滯或肩背絆痛或胃脘當心而痛

或肝火鬱於胃中以致倦怠嗜臥飲食不思口

渴咽燥及婦人小便自遺頻數無度凡傷寒後

熱已退而見口渴者用之薛氏用治婦女鬱怒

傷肝脾以致小便淋瀝不利月經不調兩脇脹

悶小腹作痛寒熱往來胸乳作痛左關弦洪右

關弦數此鬱怒傷肝脾血虛氣滯為患高鼓峯曰六味

五六三

九薛氏一變而為滋腎生肝飲用六味減半分
兩而加柴胡五味白木當歸甘草合逍遙而去
白芍加五味合都氣意也以生肝故去芍藥而
留白木甘草以補脾補脾者生金以制木也以
制為生天地也去山萸而加柴胡歸尾生地五味
自然之序也辰砂為衣名滋陰腎氣丸治目神水寬大漸散
或如霧露中行漸觀空中有黑花視物二體久
則光不收及內障神水淡白色高鼓峯曰又一
氣丸獨去山萸黃而加柴胡歸尾生地五味仍
合逍遙都氣腎肝同治用歸尾生地者行瘀滯
也柴胡疎木氣也去芍藥恐妨於行之疎之也
名滋陰者厥陰也皆用五味者雖合都氣然實
防木之反尅馮丁之義也去澤瀉而用參耆歸
去山萸莫不欲強木也

成方切用補卷主六味地黃丸

木陳皮甘草五味麥冬名人參補氣湯治腎水
不足虛火上炎咳嗽膿血發熱作渴小便不調
等證高鼓峯曰又一變而為人參補氣湯其義
之與六味其功相反焉得合之曰從合生脈來
則有自然相通之義借茯苓以合五味異功之
妙用歸者以合養血之奇其不用澤瀉者蓋為
發熱作渴小便不調則無再竭之理無再竭
便當急生脈之所由來既當生脈異功之可
以轉入也且水生高原氣化能出肺氣將敗故
作渴不調此所以急去澤瀉而生金滋
水復崇土以生金其苦心可不知哉
加生地
柴胡五味復等其分名加味地黃丸又名抑陰
地黃丸治肝腎陰虛耳內痒痛出水或眼昏痰

喘或熱渴便溼等證高鼓峯曰又一變而為加
矣柴胡從逍遙遙來生地從固本來五味仍合都
氣其日耳內痒痛出水或眼昏痰喘或熱渴便
溼而總為肝腎陰虛則知陰虛半由火鬱而致
也故用柴胡以疎之鬱火非生地不能涼故用
生地用五味仍馮丁以補金補金以生水也日
抑陰為鬱火太盛非疎之不可疎之所以抑之
生地涼血使有馮義
瀉之所以抑之也
加五味生地當歸名抑陰
腎氣丸治諸臟虧損胸膈痞悶發熱潮熱肺熱
或寒熱往來五心煩熱或口乾作渴月經不調
或筋骨痠倦飲食少思或頭目不清痰氣上壅
咳嗽喘甚或小便赤數兩足熱痛或腰膝痠軟

成方切用補卷主六味地黃丸

肢體作痛等證高鼓峯曰又一變而為抑陰腎
歸二味則從四物湯來何也其列證有發熱潮
熱肺熱肝血虧矣焉可再以柴胡疎之哉最妙
在胸膈痞悶一句緣此證之悶是肝膽燥火閉
伏胃中非當歸生地合用何以消胸中之火而
生胃陰若用柴胡便為逍遙入肝膽不能走胃
陰矣一用柴胡一不用柴胡流淫潤燥之義判
乎微乎
去澤瀉加川棟子當歸使君子川芎
以赤茯苓換白茯苓名九味地黃丸治腎疝高
峯曰又一變而為九味地黃丸川棟子使君子
川芎盡是直瀉厥陰風木之藥仍是肝腎同治
之法緣此疝必有蟲皆風木之所化是肝有可
攻之理但伐其子則傷其母故用六味以補其
母去澤瀉者腎
加柴胡芍藥名疎肝益腎湯治

胃脘痛而大便燥結者此肝血虛也逍遙散所
 不愈者此方妙高鼓峯曰趙氏以為六味加減其悟端而以上變化藥未透其根底故盡廢而不能用見其能合常歸柴胡而去芍藥則反用芍藥為疎肝益腎此則其聰明也乃謂白朮與六味水土相反人參脾藥不入腎其論亦高簡嚴密然細參薛氏畢竟趙氏拘淺薛氏諸變法似乎寬活然其實嚴密學者當善悟其妙而以意通之大旨以肝腎為主而旁救脾肺脾肺以安頓則君相二火不必提起而自然帖伏矣加

當歸芍藥柴胡棗仁山梔名滋水清肝飲治胃
 腕燥痛氣逆左脇上嘔吐酸水忽熱忽止等證
 鼓峯造滋水清肝飲取地黃丸之探原而不隔於中取生黃湯之降火而不犯於下真從來所
 成方切用補卷上左歸丸

無火者不用九法如前每食前滾清湯或淡鹽湯
 送下百餘丸如純陰失守虛火上炎者宜用
 純陰至靜之劑於本方去鹿膠枸杞加女貞子
 麥冬三兩如火燥肺金乾枯多嗽者加百合
 三兩如氣虛者加人參三四兩如大便燥
 結去菟絲子加肉苁蓉三兩如血虛微滯加當
 歸四兩如腰膝痠痛加杜仲三兩鹽水炒用
 如臟平無火而腎氣不充者加破故紙三兩
 蓮肉去心胡桃肉各四兩龜膠不必用右凡五
 成方切用補卷上左歸丸

未及也按六味乃純陰藥唯陽氣有餘胃強
 脾健者宜之氣虛脾弱胃弱者服之必食減增病
 左歸丸景治真陰腎水不足不能滋養營衛漸
 至衰弱或虛熱往來自汗盜汗或神不守舍血
 不歸原或遺淋不禁或口燥舌乾或腰痠腿軟
 或昏運眼花耳聾凡精髓內虧津液枯竭等證
 俱宜速壯水之主以培左腎之元陰而精血自
 充矣此方主之

成方切用 卷二上

大懷熟八山藥 萸肉 枸杞 菟絲子 製鹿
 角膠敲碎炒牛膝酒洗蒸熟三兩龜膠切碎炒

熟地三四錢或加山藥 甘枸杞二錢茯苓半錢

甘草一錢錢一錢畏酸者少用之 如肺熱而煩者加
 麥冬二錢 血滯者加丹皮二錢 心熱而躁
 者加元參二錢 血熱妄動者加生地三四錢
 陰虛不寧者加女貞子二錢 上實下虛者
 加牛膝二錢以導之 血虛而燥滯者加當歸
 二錢 脾熱易饑者加芍藥二錢 腎虛骨蒸
 多汗者加地骨皮二錢 此壯水之劑乃一陰
 煎四陰煎之主方也按六味乃虛中挾溼熱而
 津。瀉之。泄。丹。皮。之。涼。也。宜
 以此。其。純。之。劑。平。補。之。

成方切用 卷三十一 陰煎

一陰煎景岳 此治水虧火勝之劑故曰一陰凡腎
 水真陰虛損而脈證多陽虛火發熱及陰虛動
 血等證或瘧疾傷寒屢散之後取汗既多脈虛
 氣弱而煩渴不止潮熱不退者此以汗多傷陰
 水虧而然也皆宜用此加減主之
 熟地錢三五 生地 白芍藥 麥冬 丹參錢二杜
 仲錢半 甘草錢一 如火盛躁煩者入真龜膠二三
 錢化服 如氣虛者間用人參一二錢 如心
 虛不眠多汗者加棗仁當歸各一二錢 如汗

多煩躁者加北五味十粒或加山藥山茱萸
 如見微火者加女貞子一二錢 如虛火上浮
 或吐血或衄血不止者加澤瀉一二錢茜根二
 錢或加川續斷一二錢以瀦之亦妙 去杜仲
 丹參加知母地骨皮各一錢名加減一陰煎治
 證如前而火之甚者
 二陰煎景岳 此治心經有熱水不制火之病故曰
 二陰凡驚狂失志多言多笑或瘍疹煩熱失血
 等證此方主之

成方切用 卷三十一 陰煎

生地錢三四 麥冬錢二三 棗仁錢二 元參 茯神 木
 通錢半 黃連錢一 生甘草錢一 加燈心二十根或
 竹葉亦可 如痰勝熱甚加九製膽星一錢或
 天花粉一錢五分
 三陰煎 此治肝脾虛損精血不足及營虛失血
 等證故曰三陰凡中風血不養筋及瘧疾汗多
 邪散而寒熱猶不能止是皆少陽厥陰陰虛血
 少之病微有火者宜一陰煎無火者宜此方主
 之

當歸_{錢二三} 熟地_{錢三五} 芍藥_{酒炒} 棗仁_{錢二} 人參_隨 炙甘草_{錢一} 如嘔惡者加煨薑三五片 汗多煩躁加五味子十四粒 汗多氣虛者加黃耆一二錢 小腹隱痛加枸杞一二錢 如有脹悶加陳皮一二錢 如腰膝筋骨無力加杜仲牛膝

四陰煎 此保肺清金之劑故曰四陰治陰虛勞損相火熾盛津枯煩渴咳嗽吐血多熱等證 生地_{錢三四} 麥冬 芍藥 百合_{錢二} 生甘草_{錢一} 沙

成方切用 補 卷上 四陰煎

參_{錢二} 茯苓_{錢半} 如夜熱盜汗加地骨皮一二錢 如痰多氣盛加貝母二三錢 阿膠一二錢或天花粉亦可 如金水不能相滋而乾燥者加熟地三五錢 如多汗不眠神魂不寧加棗仁二錢 如多汗兼渴加五味十四粒 如熱甚者加黃蘗一二錢 鹽水炒用或元參亦可但分上下用之 如血少經遲枯澀不至者加牛膝二錢 如血熱吐衄加茜根二錢 如多火便燥或肺乾咳咯者加天冬二錢或加童便亦可

如火載血上行者去甘草加炒山梔一二錢 五陰煎_景 凡真陰虧損脾虛失血等證或見瀉泄未甚者所重在脾故曰五陰忌用潤滑宜此主之

熟地_{錢五七} 芍藥_炒 山藥_{錢炒} 菟豆_{錢二三} 茯苓_錢 甘草_{錢一} 五味_{錢二} 人參_隨 白朮_{錢一} 加蓮肉去心二十粒

七寶美髯丹_{節節} 治精血不足羸弱周痺腎虛無子消渴淋瀝遺精崩帶癰瘡痔腫等證 周身

成方切用 補 卷上 五陰煎 七寶美髯丹

痿痺也。由氣血不足。無子。由腎冷精衰。消渴淋瀝。由水不制火。遺精。由心腎不交。崩帶。瘡痔。由營血不調。
何首烏_{片大者赤白各一觔去皮切} 白茯苓_{乳牛} 膝_{酒浸同首烏第七次蒸九曬} 當歸_{酒洗} 枸杞_{酒浸} 菟絲子_{酒浸} 蒸各破故紙_{黑芝藤拌炒四兩淨} 蜜丸鹽湯或酒下 忌鐵器
何首烏_{精固氣補肝堅腎為君茯苓交心腎而滲脾溼牛膝強筋骨而益下焦當歸辛溫以養血枸杞甘潤而補水菟絲子益三陰而強衛}

氣補骨脂助命火而爰丹田此皆固本之藥使營衛調適水火相交則氣血太和而諸疾自已也何首烏流傳雖久服者尚寡明嘉靖間方士世宗服之連生皇子遂盛行

於世

大補元煎景岳 治男婦氣血大壞精神失守急劇

等證此回天贊化救本培原第一要方 本方

與前右歸飲出入互用

人參補氣補陽以此為主少則熟地補精補陰少則用三四錢多則用一二兩 熟地以此為主若多則用一二兩 山藥炒 杜仲二錢 當歸二錢 泄瀉者去

成方切用補 卷上 大補元煎 滋陰大補丸

之 黃肉一錢如畏酸者去之 枸杞二錢 甘草二錢 如

元陽不足多寒者加附子肉桂炮薑之屬隨宜

用之 如氣分偏虛者加黃耆白朮胸口多滯

者不必用 如血滯者加川芎去黃肉 如滑

泄者加五味故紙之類

滋陰大補丸丹溪 溫補心腎脾胃一切虛損神志

俱耗筋力頓衰腰腳沉重肢體倦怠血氣羸乏

瘦弱食減發熱盜汗遺精白濁牙齦浮痛等證

熟地二兩 牛膝酒浸 枸杞酒浸 山藥兩 茯苓乳 小茴香

杜仲薑汁炒 遠志去心 五味 巴戟天酒浸 肉蓯蓉酒浸 黃肉兩 石菖蒲五錢 加棗肉蜜丸鹽湯或酒下

兩腎中間有命火乃先天之真陽人之日用云

為皆此火也此火衰微則無以薰蒸脾胃飲食

減少而精氣日衰矣菴菴巴戟能入腎經血分

茴香能入腎經氣分同補命門相火之不足火

旺則土強而脾能健運矣熟地枸杞補水之藥

水足則有以濟火而不亢不害矣杜仲牛膝補

成方切用補 卷上 五福飲

腰膝以助腎茯苓山藥滲溼熱以助脾山萸五

味生肺液而固精遠志菖蒲通心氣以交腎精

白濁由於心腎不交 大棗補氣益血潤肺強脾此陰陽平

補之劑而曰滋陰者腎為陰臟也此即楊氏還

也楮實軟骨敗陽楊氏用之甚謬丹溪滅之殊

得還少丹加續斷茯苓換茯苓神名打老兒丸

五福飲景岳 凡五臟氣血虧損者此能兼治之足

稱王道之最 人參 熟地宜 當歸二錢 白朮炒 甘草一

加薑棗 凡氣血俱虛等證以此為主或宜

溫者加薑附宜散者加柴麻升葛左右逢源無不可也宜涼者亦當隨宜加之 加棗仁二錢遠志三五分製用名七福飲治氣血俱虛而心脾為甚者

黑地黃丸 治脾腎不足房室虛損形瘦無力面

色青黃此脾腎兩傷之證亦治血虛久痔氣不攝血則流則成痔瘻古曰此治血虛久痔之聖藥

蒼朮油浸熟地一兩乾薑春冬一兩秋七錢夏五錢棗

肉丸米飲或酒下

成方切用 卷三十一 黑地黃丸 大營煎 三

喻嘉言曰此方以蒼朮為君地黃為臣五味為佐薑薑為使治脾腎兩臟之虛而去脾溼除腎燥兩擅其長超超元箸視後人之脾腎雙補藥味龐雜者相去不已遠耶

大營煎治真陰精血虧損及婦人經遲血少

腰膝筋骨疼痛或血氣虛寒心腹疼痛等證

當歸二三錢或五錢熟地三五錢枸杞二錢杜仲二錢牛膝二錢

肉桂一錢炙甘草一錢如帶濁腹痛者加故紙

一錢炒用 如氣虛者加白朮人參 中氣虛

寒嘔惡者加炒焦乾薑一二錢

小營煎治血少陰虛此性味和平之方也

當歸錢二熟地錢三芍藥錢四山藥 枸杞錢二炙草

錢一 如營虛於上而為驚恐怔忡不眠多汗者

加棗仁茯神各二錢 如營虛兼寒者去芍藥

加煨薑 如氣滯有痛者加香附一二錢引而

行之

虎潛丸 治精血不足筋骨痿弱足不任地及骨

蒸勞熱肝主筋血不足則筋痿腎主骨精不足則骨蒸故步履為艱也骨蒸勞熱本乎

成方切用 補 卷三十一 小營煎 虎潛丸 三

黃檗鹽酒炒知母鹽酒炒熟地三兩虎脛骨酥炙兩龜板

酥炙兩瑣陽酒洗兩當歸酒洗兩牛膝酒洗兩白芍酒洗兩陳皮

鹽水潤二兩羯羊肉酒煮爛搗丸鹽湯下冬加乾

薑一兩丹溪加乾薑白朮茯苓甘草五味菟絲

紫河車名補益丸治痰一方加龍骨名龍虎濟

陰丹治遺洩

知葉熟地所以壯腎水而滋陰歸芍牛膝所以

補肝陰而養血牛膝又能引諸藥下行以壯筋

骨蓋肝腎同一治也龜得陰氣最厚故以補陰而為君虎得陰氣最強故以健骨而為佐用脛骨者虎雖死猶立不仆其氣力皆在前脛故用以入足從其類也瑣陽益精壯陽養筋潤燥然數者皆血藥故又加陳皮以利氣加乾薑以通陽羊肉甘熱屬火而大補亦以味補精以形補形之義使氣血交通陰陽相濟也名虎潛者虎陰類潛藏也一名補陰丸蓋補陰所以稱陽也凡陽勝者不必瀉陽只補其陰以配陽使水火均平自無偏勝之患矣

成方切用 補 參朮膏 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

參朮膏 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參 白朮 等分水煎糊湯化服之
兩儀膏 治精氣內虧諸藥不應或以剋伐太過耗損真陰者凡虛在陽分而氣不化精者宜參朮膏若虛在陰分而精不化氣者莫妙於此其有未至大病而素覺陰虛者用此調元尤稱神妙

人參 八兩或四兩 大熟地 一 二味用好甜水或長

流水十五碗浸一宿以桑柴文武火煎取濃汁若味有未盡再用水數碗煎渣取汁并熬稍濃乃入磁罐重湯熬成膏入上白蜜四兩或半觔收之每以白湯點服若勞損咳嗽多痰加貝母四兩亦可

天真丸 治一切凶血過多形槁肢羸飲食不進腸胃滑泄津液枯竭久服益氣生血煖胃駐顏精羊肉 七觔去筋膜脂皮 肉苁蓉 山藥 十兩

成方切用 補 參朮膏 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

當歸 十二兩 天冬 去心 為末安羊肉內縛定用無灰酒四瓶煮令酒乾入水二斗煮爛再入後藥 黃耆 五兩 人參 三兩 白朮 二兩 為末糯米飯作餅焙乾和丸溫酒下如難丸用蒸餅杵丸

喻嘉言曰此方可謂長於補矣人參羊肉同功十劑日補可去弱人參羊肉之屬是也人參補氣羊肉補形 而苁蓉山藥為男子之佳珍合之當歸養營黃耆益衛天冬保肺白朮健脾而其製法尤精允為補方之首貞元飲 治氣短似喘呼吸促急提不能升嘔不

能降氣道噎塞熱則垂危者常人但知為氣急其病在上而不知三海無根肝腎虧損此子午不交氣脫證也常見婦人血海常虧者最多此證宜以此飲濟之經之敢云神劑凡診此脈必微細無神若微而兼緊尤為可畏儻庸眾不知妄云痰逆氣滯用牛黃蘇合及青陳枳殼破氣等劑則速其危。

熟地七八錢 當歸二三錢 炙甘草一二錢 如兼嘔惡或惡寒者加煨薑三五片 如氣虛脈微至

成方切用 補 卷三十一 三才封髓丹

極者急加人參隨宜 如肝腎陰虛手足厥逆加肉桂一錢 三才封髓丹板 降心火益腎水滋陰養血潤而不燥

天冬炙七錢半 熟地 人參五兩 黃蘗酒炒三兩 砂仁兩半 甘草

麩糊丸用茯苓五錢切片酒一大盞浸一宿次日煎湯送下 天冬以補肺生水人參以補脾益氣熟地以補腎滋陰以藥有天地人之名而補亦在上中下

之分使天地位育參贊居中故曰三才也喻嘉言曰加黃蘗以入腎滋陰砂仁以入脾行滯甘草以小變天冬黃蘗之苦俾合人參建立中氣以伸參兩之權殊非好為增益成方之比也除後三味等分煎名三才湯治脾肺虛勞咳嗽除前三味名鳳髓丹治 治心火旺盛腎精不固易於施泄

當歸地黃飲 治腎虛腰脚疼痛等證 當歸二三錢 熟地三五錢 山藥 杜仲二錢 牛膝錢半 山

成方切用 補 卷三十一 三才封髓丹

黃錢一分 炙甘草八分 如下部虛寒加肉桂一二錢 甚者加附子 如多帶濁去牛膝加金櫻子二錢或補骨脂一錢 如氣虛者加人參一二錢 枸杞子二三錢

人參固本丸 治肺勞虛極肺主氣者人身之根也肺氣既虛火 又剋之則成肺癆有咳 嗽咯血肺痿諸證也 人參二兩 天冬 麥冬 生地 熟地四兩 蜜丸

肺主氣而氣根於丹田故肺腎為子母之臟必水能制火而後火不刑金也二冬清肺熱二地

益腎水人參大補元氣氣者水之母也且人參之用無所不宜以氣藥引之則補陽以血藥引之亦補陰也

地黃醴 治男婦精血不足營衛不充等證宜製

此常用之

大熟地八兩曬乾 枸杞四兩用肥極者 沉香一錢 或白檀三錢 右約每藥一觔可用高燒酒十觔

浸之不必煮但浸十日之外即可用矣凡服此

者不可過飲服完又加酒六七觔浸半月再用

成方切用 補 參乳丸 參乳丸 參乳丸

參乳丸 大補氣血

人參末 人乳粉 等分蜜丸頓乳取粉法取

無病年少婦人乳用銀瓢或錫瓢傾乳少許浮

滾水上頓再浮冷水上立乾刮取粉用如攤粉

皮法按人乳乃陰血所化服之潤燥降火益血

須用一婦人之乳為佳乳雜則其氣雜又須旋

用經久則油類

人參大補元氣人乳本血液化成用之以交補

氣血實平淡之神奇也

歸腎丸 治腎肝真陰不足精衰血少腰痠脚軟

形容憔悴遺泄痿弱等證 此左歸右歸二方

之次者也

熟地八兩 菟絲子製 杜仲 枸杞子 茯苓 黃

肉 山藥四兩 當歸三兩 煉蜜同熟地搗為丸桐

子大每服百餘丸饑時淡鹽湯送下

天王補心丹終南宣律師課誦勞心 治思慮過

度心血不足怔忡健忘心口多汗大便或秘或

溇口舌生瘡等證慮過度耗其心血則神明傷

成方切用 補 卷上 歸腎丸 天王補心丹

而多成心勞故怔忡健忘也汗者心之液心煩熱

者心火熾肺金肺熱而小水不利也舌者心之

苗虛火上炎故口舌生瘡怔忡者心惕惕然動

不自安也丹溪曰怔忡大槩屬血虛與痰經日

血并於下氣并於上亂而善忘又曰盛怒傷志

志傷善忘又曰靜則神藏躁則消忘人不耐於

事物之擾擾其血氣之陰者將竭故失其清明

之體而善忘也夫藥固有安心養血之功不若

寧心靜慮返觀內守為尤得也 生地四兩 柏子仁炒研 當歸酒洗 棗仁 天冬去心 麥

錢開心除痰無五味子一方有甘草

生地入心腎滋陰而瀉火故以為君養陰所以配陽取

義也丹參當歸所以生心血血生於氣人參扶

苓所以益心氣人參合麥冬五味又為生脈散

蓋心主脈肺為心之華蓋而朝百脈百脈皆補

肺生脈脈即血也所以使天氣下降也天氣下降地

乃天冬元參苦寒而瀉火與麥冬同為滋水潤

燥之劑遠志棗仁柏仁所以養心神而棗仁五

味酸以收之又以斂心氣之耗散也桔梗清肺

成方切用補血餘丹卷二上贊化血餘丹 夫

利膈取其載藥上浮而歸於心故以為使硃砂

色赤入心寒瀉熱而重寧神讀書之人有宜常

服者今醫有謂此方可廢不如以都氣錠之亦

屬臆見爾

贊化血餘丹 此藥大補氣血故能烏髮髮壯形

體其於培元贊化之功有不能盡述者

血餘 熟地八兩何首烏小黑豆汁拌蒸七次如

胡桃肉 肉苁蓉酒洗去茯苓乳拌小茴香炒

巴戟肉酒浸剝杜仲鹽水洗菟絲製鹿角膠炒當

成方切用 卷二上

歸 枸杞兩人參隨宜用 煨蜜丸每服三五

錢食前白湯下 精滑者加白朮山藥各三兩

便溏者去菴蓉加補骨脂酒炒四兩 陽虛

者加附子肉桂

孔聖枕中丹金 治讀書善忘久服令人聰明讀

易忘者心血不足而 痰與火亂其神明也

敗龜板酥龍骨研末入遠志 九節菖蒲

等分為末每服酒調一錢日三

龜者介蟲之長陰物之至靈者也龍者鱗蟲之

成方切用補卷二上孔聖枕中丹 養元粉 夫

長陽物之至靈者也假二物之陰陽以補吾身

之陰陽假二物之靈氣以助吾心之靈氣也又

人之精與志皆藏於腎腎精不足則志氣衰不

能上通於心故迷惑善忘也遠志苦泄熱而辛

散鬱能通腎氣上達於心強志益智菖蒲辛散

肝而香舒脾能開心孔而利九竅去溼除痰菖蒲

為水草之精英 又龜能補腎元武龜蛇屬龍

鎮肝青龍屬肝使痰火散而心肝寧則聰明開

而記憶強矣

養元粉 景 大能實脾養胃氣

糯米一升水浸一宿山藥 芡實 蓮肉三川

椒去目及閉口者炒 共為末每日饑時以滾

水一碗入白糖三匙化開入藥一二兩調服之

或加使君子查肉各一兩亦可

大補陰丸 丹 治水虧火炎耳鳴耳聾欬逆虛熱

耳為腎竅耳鳴耳聾皆屬腎虛水不制火則為欬逆虛熱腎脈洪大不能受

峻補者

黃檗 鹽酒炒 知母 鹽水炒 熟地 敗龜板 酥炙

成方切用 補 卷上 大補陰丸 斑龍丸 羊

豬脊髓和蜜丸鹽湯下

四者皆滋陰補腎之藥補水所以降火所謂壯

水之主以制陽光也加脊髓者取其能通腎命

以骨入骨以髓補髓也 人身腎命系於脊骨

斑龍丸 治虛損理百病駐顏益壽

鹿角膠 鹿角霜 菟絲子 柏子仁 熟地

黃 等分為末酒化膠為丸一方加補骨脂一

方加鹿茸肉蓯蓉陽起石附子黃耆當歸棗仁

辰砂亦名斑龍丸

鹿角膠霜菟絲熟地皆腎經血分藥也大補精

髓柏子仁入心而養心氣又能入腎而潤腎燥

使心腎相交心志旺而神魂安精髓充而筋骨

壯去病益壽不亦宜乎 鹿一名斑龍睡時以首

壽頭為六陽之會茸角鍾於鹿首豈尋常含血

之屬所可擬哉成都道士常貨斑龍丸歌曰尾

間不禁滄海竭九轉靈丹都謾說唯

有斑龍頂上珠能補玉堂關下穴

元武豆 補腎之功甚大

羊腰子 五十箇 甘枸杞 二兩 補骨脂 一兩 茴香 小

茴香 六兩 肉蓯蓉 十二兩 大便 青鹽 八兩 如無蓯

蓉者去之 成方切用 補 卷上 元武豆 龜鹿二仙膏 羊

兩 大黑豆 圓淨者一斗 淘洗 右用甜水二斗以砂鍋

煮前藥七味至半乾去藥渣入黑豆勻火煮乾

為度如有餘汁俱宜拌滲於內取出用新布攤

涼曬乾磁瓶收貯日服之若陽虛者加附子一

二兩更妙

龜鹿二仙膏 治瘦弱少氣夢遺泄精目視不明

精極之證 五勞之外又有六極謂氣極血極精

精極則無以生氣故瘦弱少氣氣弱則不能生

神故目既不明精氣不固水不能制火故遺洩

而精愈耗也

鹿角十觔龜板五觔枸杞一觔人參一觔先將鹿角龜板鋸截刮淨水浸桑火熬成膠再將人參枸杞熬膏和入每晨酒服三錢

龜為介蟲之長得陰氣最全介蟲類鹿角遇夏至即解稟純陽之性即陰生且不兩月長至一二十觔骨之速生無過於此者人身唯骨難長故能峻補氣血兩者皆用氣血以補氣血所謂補之以其類也人參大補元氣枸杞滋陰助陽此氣血陰陽交補之劑氣足則精固不遺血足則視聽明了

成方切用補卷上二至丸

久服可以益壽豈特已疾而已哉李時珍曰龜龜首常藏向腹能通任脈故取其甲以補心補腎補血以養陰也鹿首常返向尾能通督脈故取其角以補命補精補氣以養陽也

二至丸 補腰膝壯筋骨強腎陰烏鬚髮價廉而功大

冬青子即女貞實冬至日採不拘多少陰乾蜜酒拌蒸過一夜粗袋擦去皮曬乾為末五瓊收貯或先熬早蓮草夏至日採不拘多少早蓮膏搗汁熬膏和前藥為丸臨臥酒服一方加桑甚乾為丸或桑甚熬膏和入

成方切用 卷二上

女貞甘平少陰之精隆冬不凋其色青黑益肝補腎時珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉早蓮甘寒汁黑入腎補精故能益下而榮上強陰而黑髮也

蟠桃菓 治遺精虛弱補脾滋腎最佳
芡實 蓮肉去心膠棗肉 胡桃肉去衣熟地 等分以豬腎六個摻大茴香蒸極熟同前藥末搗成餅每日服一個空心食前用滾白湯或好酒一二鍾送下此方凡人參附子俱可隨意加用
扶桑丸胡僧 除風溼起羸疴駐容顏烏鬚髮卻病

成方切用補卷上二至丸

延年 嫩桑葉去蒂洗淨暴乾一觔為末巨勝子即黑芝麻淘淨四兩白蜜一觔將脂麻搗碎熬濃汁和蜜煉至滴水成珠入桑葉末為丸一方桑葉為末脂麻蒸搗等分蜜丸早鹽湯晚酒下

桑乃箕星之精其木利關節養津液其葉甘寒入手足陽明涼血燥溼而除風巨勝甘平色黑益腎補肝潤臟腑填精髓陶隱居曰八穀之中唯此為長去風溼去則筋骨強精髓充則容顏澤卻病烏鬚不

五七五

亦宜乎歌曰扶桑扶桑高入雲海東日出氣氣

結子如丹忽如黍綠葉英翠可捫真人採竊

羊肉湯和韓祇治傷寒汗下太多陽失血惡人

蹶臥時戰如瘧及產脫血虛逆韓祇和曰若止救

肉湯為效甚速病人色雖見陽是熱客上焦中

當歸 白芍 牡蠣煨一 龍骨煨五 附子炮生

薑二兩 桂枝七錢 每服一兩羊肉四兩加葱白

成方切用補 卷上 羊肉湯 益氣聰明湯 毒

煮服 當歸芍藥以補其陰附子薑桂以復其陽龍骨

牡蠣以收其脫羊肉大補以生其氣血

益氣聰明湯東垣 治內障目昏耳鳴耳聾五臟皆

脾胃以達於九竅煩勞傷中使沖和之氣不能

及養血安神治標不治本是不明理也

黃耆 人參錢五 葛根 蔓荊子錢三 白芍藥 黃

芩二錢 如脾虛去之熱減少用 升麻半錢 炙甘

草錢一 每四錢臨臥服五更再服

十二經脈清陽之氣皆上於頭面而走空竅因

飲食勞役脾胃受傷心火太盛則百脈沸騰邪

害空竅矣參耆甘溫以補脾胃甘草甘緩以和

脾胃乾葛升麻蔓荊輕揚升發能入陽明鼓舞

胃氣上行頭目中氣既足清陽上升則九竅通

利耳聰而目明矣白芍斂陰和血黃芩補腎生

水蓋目為肝竅耳為腎竅故又用二者平肝補

腎也

秦艽龍甲散謙 治風勞骨蒸午後壯熱咳嗽肌

成方切用補 卷上 秦艽龍甲散 毒

瘦頰赤盜汗脈來細數風陽邪也在表則表熱

蒸午後後甚者陰虛也風火相搏則咳嗽蒸久血

枯則肌瘦虛火上炎則頰赤睡而汗出口盜汗

陰虛也脈細為

龍甲炙 柴胡 地骨皮兩 秦艽 知母 當歸

錢五 烏梅箇一 青蒿五 汗多重加黃耆

風生熱而熱生風非柴胡秦艽不能驅之使出

龍陰類用甲者骨以及骨之義烏梅酸澀能引

諸藥入骨而斂熱青蒿苦寒能從諸藥入肌而

解蒸柴胡青蒿皆感少陽生發之氣凡苦寒之

藥多傷脾胃惟青蒿芬芳入脾獨宜於血

虛有熱之人。知母滋陰當歸和血地骨散表邪兼清

裏熱又去汗除蒸之上品也。地骨退有汗之骨蒸。

黃耆鼈甲散治男女虛勞客熱五心煩熱四肢怠惰咳嗽咽乾自汗食少或日晡發熱

五心手心足心也脾主四肢五心煩熱是心火陷於脾土之中宜升發火鬱四肢怠惰脾虛也咳嗽肺火也咽乾腎水不足相火上炎也自汗陽虛也食少脾胃弱也日西潮熱肺虛也。

黃耆錢鼈甲錢天冬錢柴胡錢秦艽錢地骨皮錢

茯苓錢桑白皮錢紫苑錢半夏錢芍藥錢生

地黃錢甘草錢知母錢人參錢桔梗錢肉桂錢

成方切用補卷三上黃耆鼈甲散

每兩加薑煎衛生減桂芍地骨名人參

黃耆散治同

鼈甲天冬芍地知母滋腎水而瀉肺肝之火以

養陰地黃知母滋腎水天冬瀉肺火鼈甲芍藥瀉肝火黃耆人參桂芍

甘草固衛氣而補脾肺之虛以助陽桑皮桔梗

以瀉肺熱半夏紫苑以理痰嗽紫苑潤肺止咳

故金匱治喉痺咽痛皆用半夏蓋辛能散亦能潤也秦艽地骨以散內熱

而除蒸柴胡以解肌熱而升陽此表裏氣血交

治之劑也

成方切用 卷二上

秦艽扶羸湯指血治肺痿骨蒸或寒或熱成勞咳

嗽聲不出體虛自汗四肢倦怠肺痿有火熱者有肺氣虛寒而得之者皆蒸骨裏蒸然熱陰虛也咳嗽陰火乘肺也或寒或熱陰陽不和也聲啞火鬱在肺也自汗倦

急心脾虛而衛氣不充也

柴胡錢秦艽錢人參錢當歸錢鼈甲錢地骨皮錢

甘草錢紫苑錢半夏錢加薑煎此即前

歸去黃耆茯苓生地芍藥天冬知母桑皮桔梗肉桂

柴胡秦艽散表邪兼清裏熱柴胡解肌熱秦艽退骨蒸鼈甲

地骨滋血而退骨蒸地骨皮涼血退骨蒸參草補氣當

成方切用補卷三上秦艽扶羸湯

歸和血紫苑理痰嗽潤肺除痰半夏發聲音肺屬金

從出也。有物實之則金不鳴燥淫除痰則金清而聲自開矣。有聲嘶而啞者是肺已損也。難治

表裏交治氣血兼調為扶羸良劑透肌解熱

為要藥故骨蒸方中多用之。冠宗爽曰柴胡本經本無一字治勞熱權大明並言補虛勞醫家

執而用之。貽害無窮。時珍曰勞有五若勞在肝膽心包有熱或少陽經寒熱則柴胡乃手足

厥陰必用之。藥勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡為退熱升清必用之。唯勞在肺腎者不

可用爾。冠氏一舉橫斥殊非通論。大抵柴胡能退熱升清宜暢氣血。昔孫琳治勞瘵而日熱

有在皮膚在臟腑在骨髓在骨節者非柴胡不除。則柴胡亦有退骨蒸之力矣。况有滋補之藥

以輔之乎。直指方又云柴胡退熱不及黃芩。不

知黃芩乃寒能勝熱折火之本也。柴胡乃苦以

發之散火之標也

百合固金湯

治肺傷咽痛喘咳痰血

則腎水之源絕腎脈挾咽虛火上炎故咽痛火上薰肺故喘咳痰因火生血因火通

熟地錢三生地錢二麥冬半百合芍藥炒生甘草

當歸 貝母 元參 桔梗

金不生水火炎水乾故以二地助腎滋水退熱

為君補肺者多兼補腎 百合保肺安神麥冬

清熱潤燥元參利咽喉而降火貝母散肺鬱而

除痰歸芍養血兼以平肝則尅金桔梗清金功

成方切用 卷上 補肺湯

成上部而上浮皆以甘寒培元清本不欲以苦

寒傷生發之氣也 李士材曰載菴此方殊有卓

宜顧母否則金終不能足也醫貫曰咳嗽吐血

未必成瘵也服四物知榮之類不已則瘵成矣

胸滿膨脹悒悒不快未必成脹也服山查神麩

之類不止則脹成矣面目浮腫小便秘澀未必

成水也服滲利之藥不止則水成矣氣滯膈塞

未必成噎也服青皮枳殼寬快之藥不止則噎

矣 補肺湯 治肺虛咳嗽有聲無痰日咳蓋傷於肺

嗽曾解外以致脾胃俱虛飲食不進宜溫中助胃兼治嗽藥

桑皮炙熟地錢二 人參 黃耆炙 五味 紫苑錢一

大蜜少許和服

肺虛而用參者脾為肺母氣為水母也虛則

母用熟地者腎為肺子子虛必盜母氣以自養

故用腎藥先滋其水且熟地亦化痰之妙品也

丹溪曰補水以制 咳則氣傷五味酸溫能斂肺

氣咳由火盛桑皮甘寒能瀉肺火紫苑辛能潤

肺溫能補虛合之而名曰補肺蓋金旺水生咳

成方切用 卷上 補肺阿膠散

嗽自止矣 此治肺虛咳嗽若實火嗽者禁用劉

此湯與金匱腎氣丸為少陰例藥仁齋直指曰

嗽暴重自覺氣從臍下逆上者此腎虛不能收

氣歸元當用地黃丸安腎丸母徒從事於肺此

虛則補子之義也醫貫曰五行惟肺腎二臟母

病而子受邪何則肺主氣肺有熱氣得熱而上

蒸不能下生於腎而腎受傷矣腎傷則肺益病

蓋母藏於腎水之中因肺受心火之邪欲下遁水

中而腎水乾枯有火無可容之地由是復上而

為病 補肺阿膠散 治肺虛有火嗽無津液而氣哽

阿膠蛤粉炒 馬兜鈴焙 甘草炙 牛蒡子炒香 杏仁七錢 糯米一兩

仁去皮尖 糯米一兩

馬兜鈴清熱降火 故入肺 牛蒡子利膈滑痰

潤肺解熱 杏仁潤燥散風 阿膠清肺滋腎益血

故治火嗽 補陰氣順則不噎液補則津生阿膠補血 火退而

嗽寧矣土為金母 故加甘草糯米以益脾胃

日補肺阿膠散用馬兜鈴非取其補肺 取其清熱降氣而肺自安也其中阿膠糯米乃補肺之

藥正

紫苑湯海 治肺傷氣極勞熱久嗽吐痰吐血極氣

成方切用補 卷上紫苑湯 單

六極成一也肺主氣元氣虛則陰火盛壯火食 上行及肺痿變癰也

紫苑洗淨 阿膠蛤粉炒 知母 貝母一錢 桔梗

人參 茯苓 甘草五分 五味十二粒

勞而久嗽肺虛可知即有熱證皆虛火也海藏

以保肺為君故用紫苑阿膠二藥潤肺補虛消痰止咳 以清

火為臣故用知母貝母二藥辛寒 以參苓為佐

者扶土所以生金以甘桔為使者載藥上行脾

市桔梗載諸藥上行而能 清肺甘草補人參補脾 五味滋腎家不足之

水收肺家耗散之金久嗽者所必收也

王母桃景 培補脾腎功力最勝

白朮味甘者佳苦者勿用 大懷熟蒸搗二分 何首

烏九蒸 巴戟甘草湯 枸杞減半 右為末煉蜜丸

龍眼大每服三四丸饑時嚼服滾湯送下或加

人參其功尤大

玉屏風散 治自汗不止氣虛表弱易感風寒也陽

者衛外而為固也陽虛則不能衛外故津液不固而易洩且畏風也此與傷風自汗不同彼責

虛故補瀉各異

成方切用補 卷上王母桃 玉屏風散 單

黃耆防風兩 白朮炒二兩 為末每服三錢

黃耆補氣韻固肌表故以為君白朮益脾脾主

肌肉故以為臣防風去風為風藥卒徒而黃耆

畏之故以為使以其益衛固表故曰玉屏風東

垣曰黃耆得防風而功益大取其相畏而相使

也連繩以卒中偏枯之證未有不因真氣不遇

而病者故黃耆為必用之君藥防風為必用之

臣藥黃耆助真氣者也防風載黃耆助真氣以

遇於身者也亦有治風之功焉許胤宗治王

太后中風口噤煎二藥薰之而愈况服之乎

前藥等分煎名黃耆湯潔古用代桂枝湯治春

夏發熱有汗脈微弱惡風寒者惡風甚加桂枝

又用川芎蒼朮羌活等分名川芎湯以代麻黃湯治秋冬發熱無汗惡風寒者惡寒甚加麻黃

芎香散

治夢遺失精驚悸鬱結

邪火妄行。心腎不交。上實下虛。則夢中遺失。心虛神擾。故多驚悸。憂思氣滯。則成鬱結。

山藥 薑汁炒 人參 黃耆 遠志 炒 茯苓 茯

神 一 桔梗 三 木香 二 錢 辰砂 另 甘草 錢 麝香 錢

為末每服二錢酒下

心君火也君火一動相火隨之相火寄於肝膽

腎之陰虛則精不固肝之陽強則氣不固

成方切用

補

卷上

芎香散

望

也故精脫而成夢矣

不足者然必傳於肝腎而精乃走也又曰心腎

是水火之臟法天地施生化成之道故藏精神

為五臟之宗主若由他臟而致腎之泄者必察

四屬以求其治大抵精自心而泄者血脈空虛

本縱不收自肺而泄者皮槁毛焦喘急不利自

脾而泄者色黃肉消四肢懈怠自肝而泄者筋

痿色青自腎而泄者色黑髓空而骨節即脈亦

可辨也丹溪曰上閉藏者腎也司疏泄者肝也

二臟皆有相火而其系上屬於心心君火也為

物所感則易於動心動則相火翁然隨之雖不

-6 144 33 485" data-label="Text">

交會而精亦暗流而滲漏矣所以聖山藥益陰

其位矣且二茯下行利水又以泄腎中之邪火也桔梗清肺散滯木香疎肝和脾行氣故疎肝

能辟邪亦所以治其邪感也加甘草者用以交

和乎中猶黃婆之媒嬰姪也

方不用固瀉之劑但安神正氣使精與神氣相

依而自固矣以其安神利氣故亦治驚悸鬱結

妻全善曰詳古治夢遺方屬鬱滯者居大半庸

醫不知其鬱但用瀉劑固脫愈瀉愈鬱其病反

甚矣

成方切用

補

卷上

參苓白朮散

望

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉

土為萬物之母脾土受傷則失其健運之職故

飲食不消兼寒則嘔吐兼溼則濡泄也飲食既

少衆藏無以稟氣則虛

壽日甚諸病叢生矣

人參 白朮 炒 茯苓 甘草 炙 山藥 扁豆

薏仁 蓮肉 去心 陳皮 砂仁 桔梗 為末每

三錢棗湯或米飲調服

治脾胃者補其虛除其溼行其滯調其氣而已

參朮苓草山藥薏仁扁豆蓮肉皆補脾之藥也

-6 525 33 885" data-label="Text">

然茯苓山藥薏仁理脾而兼能滲溼砂仁陳皮

調氣行滯之品也。合參朮芍草，煖胃而又能補

中。陳皮砂仁入桔梗苦甘入肺，能載諸藥上浮。

又能通天氣于地道。肺和則天使氣得升降而

益和，且以保肺防燥藥之僭上也。

休瘡飲 此止瘡最妙之方也。若汗散既多，元氣

不復，或以衰老或以弱質而瘡有不能止者，俱

宜用此化暴善後之第一方也。

人參 白朮炒當歸各三錢何首烏製炙甘草

八分用陰陽水各一盞煎七分，露一宿，次早溫

服。如陽虛多寒，宜溫中散寒者，加乾薑肉桂

之類，甚者或加製附子。如陰虛多熱，煩渴喜

冷，宜滋陰清火者，加麥冬生地芍藥，甚者加知

母，或加黃芩。如腎陰不足，水不制火，虛煩虛

餒，腰痠腳軟者，加熟地山藥杜仲之類。如邪

有未盡，而留連難愈者，于此方加柴胡麻黃細

辛紫蘇之屬，自無不可。如氣血多滯者，或加

酒水各一盞煎服，藥後飲酒數杯亦可。

去白木甘草，加生薑陳皮，名何人飲，治同。

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷二下

瀉固門正方二十四

赤石脂禹餘糧湯 桃花湯 訶子散河間訶

隄丸 真人養臟湯脫肛 牡蠣散 柏子仁丸

固真丸 金鎖固精丸珍珠粉丸 芥朮菟絲丸

治濁固本丸 祕元煎 固陰煎 茯苓丹 菟

絲煎 水陸二仙丹 黏米固腸糕 惜紅煎

桑螵蛸散 人參榜皮散 玉關丸 四神丸見

成方切用瀉 卷二下目錄

門寒二神丸見 如聖散見經 撲汗法

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆蒼培同較 有杜雋望

成方切用

澹固門

十劑曰澹可去脫壯蠟龍骨之屬是其肺尤宜急固其腎所謂上病下取也久遺成淋而精脫於下者宜固其腎尤宜兼固其氣所謂下病上取也小便不禁者宜固其膀胱大便不禁者宜固其腸厥汗泄不止者宜固其皮毛血泄不止者宜固其營衛凡因寒而脫者當重溫補有火而滑者當佐以清

成方切用

涼總之在上在表者皆宜固氣氣主在肺也。在下在裏者皆宜固精精主在腎也。

赤石脂禹餘糧湯

治傷寒服湯藥下利不止

心下痞更服瀉心湯已復以他藥下之利不止

已上言再醫以理中與之利益甚誤也理中者

理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復

利不止者當利其小便難經曰中焦中脘主腐

上日主分別清濁主出而不內以傳道也靈樞

日水穀者常并居於胃中成精粕而俱下於大

小腸而成下焦利在俱下濟泌別汁循下焦而

滲入膀胱焉然則利在下焦者膀胱不滲而下

焦滑脫也餘糧甘平消痞硬而鑿臟腑石脂甘

溫固腸虛而收滑脫乃利仍不止者膀胱不滲

而水穀不分也利小便者導其水而分消之使膀胱各行其事也。

赤石脂一觔 禹餘糧一觔 水六升煮二升去渣分三服

澹固門

澹可去脫重可澀下二物澹以止脫重以固下

甘以益氣難食須用餘糧赤石脂

桃花湯

治少陰病二三日腹瀉小

便不利下利不止便膿血者

也而下利不止便膿血則下焦滑脫矣滑脫即不可用寒藥故取乾薑石脂之辛溫以溫經固

脫而加粳米之甘以益中州蓋治下利必先中氣不下降則滑脫無源而自止也

成方切用

赤石脂一觔 粳米一升 水七升

煮米熟去渣內石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿服

此少陰傳經熱邪也陰經循行於裏故腹痛下

利仲景反用石脂乾薑之溫澀何意蓋下利至

於不止熱勢已大衰而虛寒滋起矣故非固脫

如石脂不可且石性最沉味澀易滯故稍用乾

薑之辛散佐之用粳米獨多者取其和中而養

胃也石脂用半全半未以全用則氣味不出純

手注

未難於下咽所以斟酌其當而為之者也
所以每服
一服其是
成程而非
王吳無足
怪也

末又難於下咽所以斟酌其當而為之者也

訶子散東垣治虛寒泄瀉水穀不化腸鳴腹痛脫

肛及便膿血日夜無度

御米殼去帶蜜炒五分訶子煨去核七分乾薑炮六分橘紅五分

右末空心服

御米殼酸澁微寒固腎瀉腸訶子酸澀苦濕收

脫住瀉炮薑辛熱能逐冷補陽陳皮辛溫能升

陽調氣共以固氣脫亦可收形脫也泄瀉為氣脫脫肛為形脫

成方切用

卷下

訶子散

三

河間訶子散訶子一兩半生半煨木香錢五甘草錢二黃連

三為末每服三錢用白朮芍藥湯調下治瀉久

腹痛漸已瀉下漸少以此止之如不止加厚朴

一兩竭其餘邪唯積滯未清者宜之

鞏隄丸治膀胱不藏水泉不止命門火衰小水

不禁等證

熟地酒製菟絲酒製白朮炒二兩韭子炒破故紙酒炒益

智仁炒北五味炒熟附子一兩茯苓一兩為末山

藥糊丸桐子大每服百餘丸空心滾湯或酒下

成方切用 卷二下

如氣虛加人參一二兩更妙

真人養臟湯南治瀉痢日久赤白已盡虛寒脫

肛大腸者傳導之官腎者作強之官酒色過度則腎虛而泄母氣肺因以虛大腸氣無所主故脫肛小兒血氣未壯老人血氣已衰皆易脫

亦治下痢赤白臍腹痛日夜無度

罌粟殼去帶蜜炙三兩六錢訶子煨去核二錢肉豆蔻炒五錢

木香二兩肉桂八錢人參一兩白朮炒當歸錢六白

芍炒一兩生甘草八錢每服四錢臟寒加附

子一方無當歸

成方切用

卷下

真人養臟湯

四

脫肛由於虛寒故用參朮甘草以補其虛肉桂

肉蔻以祛其寒木香溫以調氣當歸潤以和血

芍藥酸以收斂訶子罌粟殼則瀉以止脫也此虛

升故宜大補氣血或加川芎以調血及升柴以升提之又有氣熱血熱而肛反挺出者宜用茶

連棗或四物加升柴芫防之類

丹溪脫肛方人參黃耆當歸川芎升麻此治氣

而脫

牡蠣散治陽虛自汗離而汗出日自汗

牡蠣研黃耆一兩麻黃根錢一浮小麥百粒煎服

五八三

陳來章曰汗為心之液心煩熱則汗不止牡蠣浮小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽為陰之衛陽氣虛則衛不固黃耆麻黃根之甘溫走肌表而固衛

柏子仁丸 治陰虛盜汗睡而汗出曰盜汗

柏子仁炒研去油三兩 人參 白朮 半夏 五味子

牡蠣 麻黃根兩 麥麩錢五 棗肉丸米飲下

五十九日三服

陳來章曰心血虛則睡而汗出柏子仁之甘辛

成方切用 卷下 柏子仁丸 固真丸 五

平養心寧神為君牡蠣麥麩之鹹涼靜躁收脫為臣五味酸斂收瀋半夏和胃燥溼為佐溼能作汗麻黃根專走肌表引人參白朮以固衛氣為使

固真丸 治夢遺精滑

菟絲子一觔淘洗淨用好酒浸三日煮極熟 牡

蠣煨 金櫻子蒸熟 茯苓酒拌蒸 蜜丸空心好酒

送下三錢或鹽湯亦可

金鎖固精丸 治精滑不禁精滑者火炎上而水

沙苑蒺藜 芡實蒸 蓮鬚二兩 龍骨炙 牡蠣鹽水

日夜熾 蓮肉粉為糊丸鹽湯下

蒺藜補腎益精蓮子交通心腎牡蠣清熱補水

芡實固腎補脾合之蓮鬚龍骨皆瀋精祕氣之

品以止滑脫也治遺精大法有五心神浮越者

擾心者豬苓丸之類導之思想傷陰者潔古到

珠粉丸黃蘗蛤粉等分滋陰降火思想傷陽者

識甫鹿茸菴蓉絲絲等補陽陰陽俱虛者丹溪

作心虛治用珍珠粉丸定志丸補之附本事

養丸豬苓末二兩先將一半炒半夏令黃取半

夏為末糊丸更用豬苓末一半同炒微裂砂瓶

養之申末間空心酒鹽湯任下釋曰半夏有利

性豬苓導水蓋腎閉導氣使通之意也定志丸

見眼

成方切用 卷下 金鎖固精丸 芡實丸 六

芡實丸 治脾腎虛損不能收攝以致夢遺

精滑困倦等證

菟絲子酒蒸或五六兩 蓮肉去心 白朮 茯苓四兩

仲酒炒 山藥二兩 五味酒蒸 炙草錢五 右用山藥

末以陳酒煮糊為丸桐子大空心白滾湯或酒

下百餘丸 如氣虛不能收攝者加人參三四

兩尤效

治濁固本丸 治胃中溼熱滲入膀胱下濁不止

淋病在濁家屬肝膽部濁病在精家屬腎膀胱

部或由溼熱或由虛寒大抵熱者多而寒者少

赤屬血。白屬氣。或由敗精瘀血。壅塞竅道。痛澀異常。非是熱淋。不宜用淋藥治。

甘草 三 豬苓 黃連 蓮鬚 二 黃蘗 益智

仁 砂仁 半夏 製 扶苓 兩

精濁多由溼熱與痰黃連瀉心火黃蘗瀉腎火

所以清熱二苓所以利溼半夏所以除痰溼熱

多由於鬱滯砂仁益智辛溫利氣又能固腎強

脾既以散留滯之氣且稍濟連藥之寒甘草和

中而補土唯蓮鬚之瀉則所以固其脫也

巢氏原病候論曰白濁者由勞傷腎氣虛冷

成方切用 卷下 治濁固本丸

法亦悞。不思內經本無白濁之名。惟言少陰在泉客勝。溼便變少。陽在泉客勝。則溼白。又言思泉無窮。入房太甚。發為白淫。與脾移熱於腎。出白二者皆隨溼而下。夫非白濁之源乎。原病式因舉內經。謂諸病水液渾濁皆屬於熱。言天氣熱則水渾濁。寒則清。謂發聖人之旨。以正千載之誤矣。予嘗聞先生論赤白濁。多由溼熱下流膀胱而成。即靈樞所謂中氣不足。溼便為之變是也。必先補中氣。使升舉之。而後分其臟腑氣血。赤白虛實。以治其他邪熱所傷。固在溼熱補虛。設腎氣虛甚。或火熱亢極者。則不宜過用寒涼。必以反佐治之。要在權衡輕重而已。葉氏曰。遺精多作腎虛。補瀝之而困。効不知此。因脾胃溼熱。所乘飲酒厚味。食火之人。多有此疾。腎雖藏精。其精本於脾胃。飲食生化而輸於腎。若脾胃受傷。溼熱內鬱。使中氣滯而不精。則所輸皆濁氣。邪火擾動。水不得而安。故令遺精也。

祕元煎 治遺精帶濁等證此方專主心脾

金櫻子 去核 棗仁 研 芡實 炒 山藥 炒 白朮 炒 扶

神 人參 錢 炙甘草 錢 遠志 炒 八分 五味子 十

水煎食遠服

此治久遺無火不痛而滑者可用之 如尙覺

有火熱者加苦參一二錢 如氣大虛者加黃

耆一二錢

固陰煎 治陰虛滑泄帶濁淋遺及經水因虛不

固等證此方專主肝腎

成方切用 卷下 祕元煎

熟地 錢三五 菟絲子 炒 二錢 山藥 炒 二錢 黃肉 錢一 甘草

炙一錢 遠志 炒 七 五味子 十四 人參 隨 水煎食

遠服 如虛滑遺甚者加金櫻二三錢或醋炒

文蛤一錢或烏梅二個 如陰虛微熱而經血

不止者加川續斷二錢 如下焦陽氣不足而

兼腹痛泄瀉者加補骨脂吳茱萸之類隨宜用

之 如肝腎血虛而小腹痛血不歸經者加醋

炒當歸二三錢 如脾虛多溼或兼嘔惡者加

白朮一二錢 如氣陷不固者加炒升麻一錢

如兼心虛不眠或多汗者加棗仁二錢炒用

茯苓丹 治遺精白濁及強中消渴

天施地生之道心神傷則火動火動不已則腎水受傷腎主藏精所愛五臟六腑輸至之精皆不得藏而時下矣故為遺精夢泄戴氏曰遺精有因用心過度心不攝腎以致失精者有思色慾不遂致精失位輸泄而出者有色慾太過滑泄不禁者亦有年壯氣盛久無色慾精滿而泄者赤濁屬血由心小腸屬火也白濁屬氣由肺大腸屬金也渴證下消者莖長典盛不交精出名強中腎水虧心火亢也

菟絲子 兩 五味子 兩 山藥 六兩 白茯苓 石蓮肉

三 將菟絲用酒浸過餘酒煮山藥糊丸漏

成方切用 卷下 九

精鹽湯下赤濁燈心湯下白濁茯苓湯下消渴

米飲下

菟絲辛甘和平強陰益陽能治精寒淋渴五味滋腎生津石蓮清心止濁山藥健脾利溼皆澀精固氣之品也茯苓能通心氣於腎利小便而不走氣取其淡滲於補正中能泄腎邪也

菟絲煎 治心脾氣弱凡遇思慮勞倦即苦遺精者宜此主之

山藥 錢二 棗仁 炒 茯苓 一錢 當歸 錢二 人參 錢三

製菟絲子 五錢 炙甘草 一錢 或 遠志肉 製四分 鹿

角霜 為末每用加 水煎加鹿角霜末食前調

服或加白朮二三錢

水陸二仙丹 治遺精白濁 精與濁所出之竅不

膽之火也精濁乃精氣滑出不便亦然 此腎水不足浮火薰蒸故精離其位也

金櫻膏 取半黃者熬膏一觔 茨實 一觔 熟為粉 和

丸鹽酒下

金櫻茨實甘能益精潤能滋陰瀉能止脫一生

於水一生於山故名水陸二仙丹

成方切用 卷下 十

黏米固腸糕 治脾胃虛寒或因食滯氣滯腹痛

泄瀉久不止者多服自效

白糯米滾湯淘洗炒香熟為粉每粉一兩加乾

薑炒熟者二分半白糖二錢拌勻於饑時用滾

水調服一二兩如帶微滯者加陳皮末二分或

砂仁一分 一法用陳老米粉亦妙

桑螵蛸散 治小便數而欠 數便頻也欠便短

然泌別者小腸也小腸虛也 能安神魂補心氣療

健忘

人參 茯苓一用 遠志 石菖蒲鹽炒 桑螵蛸鹽水
炒龍骨 龜板酥炙一用 當歸 等分爲末 臨
臥服二錢 人參湯下

虛則便數故以螵蛸龍骨固之並能補腎 熱則便
欠故以當歸龜板滋之人參補心氣菖蒲開心
竅茯苓能通心氣於腎遠志能通腎氣於心並
能清心解熱心者小腸之合也心補則小腸不
虛心清則小腸不熱矣

惜紅煎 治婦人經血不固崩漏不止及腸風下
成方切用 卷二下 桑螵蛸散 惜紅煎 主

血等證

白朮 山藥二錢 白芍藥酒炒五分 荆芥穗炒 地榆
川續斷錢一 炙甘草錢一 北五味粒十四 烏梅二箇
水煎食遠服 如火盛者加黃芩黃連 如

脾虛兼脾泄者加破故紙人參

人參 檮皮散 治臟毒挾熱下血久痢膿血不止

挾熱者謂挾客熱及飲酒煎炒薰灸之熱也久痢不止氣虛滑脫也

人參 檮根白皮東引者去粗皮醋炙 等分爲末米飲
或酒調下

成方切用 卷二下

人參之甘以補其氣檮皮之苦以燥其溼寒以
解其熱瀝以收其脫使虛者補而陷者升亦劫
劑也初起勿用

玉關丸 治腸風血脫崩漏不止帶濁不固諸藥
難効者宜用此方兼煎藥治之及瀉痢滑泄不
能止者

白麩炒熟四兩 枯礬二兩 文蛤醋炒黑二兩 北五味一兩 訶子
生牛熟二兩半 共爲末熟湯和丸桐子大以溫補脾
腎等藥隨證加減煎湯送下或人參湯亦可如

成方切用 卷二下 人參檮皮散 玉關丸 主

血熱

人參藥送下

撲汗 凡自汗不止者用龍骨些蠟糯米等分
爲 絹袋盛週身撲之即止

成方切用表

卷三上 桂枝湯

二

亦陰。陰以候營。陽脈浮者。衛中風也。陰脈弱者。營氣弱也。傷於風者。頭先受之。故頭痛。經曰。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。風併於衛。營弱。衛強。故發熱。自汗也。衛虛則惡風。營虛則惡寒。自汗則皮腠疎。故惡風復惡寒也。惡寒雖屬表。亦有虛實之分。無汗惡寒為表實。宜發汗。汗出惡寒為表虛。宜解肌。鼻鳴乾嘔者。風寒並舉。義重惡風。有音而作嘔也。喻嘉言曰。風寒並舉。義重惡風。惡風未有不惡寒者。所以傷寒亦互云。及陽明病。脈遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可發汗。脈遲。仍當從外解肌。斷其入胃腑之路。

桂枝 芍藥 生薑 甘草 大棗
 兩 兩 兩 兩 兩
 炙 二 兩 十二枚

熱服須臾啜稀熱粥以助藥力溫覆取微似汗

不可令如水淋漓汗出病差停後服服一劑盡病證猶在者更作服

則邪不能入而熱啜以助藥力。藥力發氣內充。法中之法。若此。世傳方書無此四字。駁失初意。更有已透微似之汗。蓋覆強逼致令大汗淋漓。者。總不知解肌為何義。爾所以服桂枝時。要使周身。藥然。似乎。有汗者。無非欲其皮毛。間竅暫開。而邪散也。然。恐藥力。易過。又藉熱。病以助其。燥。如。此。一。時。之。久。肌。竅。不。致。速。閉。則。外。受。之。邪。盡。從。外。解。允。為。合。法。矣。不。識。此。意。汗。時。不。失。之。太。過。即。失。之。不。及。太。過。則。邪。未。入。而。先。擾。其。營。其。門。必。至。病。不。除。而。生。變。矣。

周揚俊曰。風既傷衛。則衛氣疎。不能內護於營。

成方切用 卷三上

成方切用表

卷三上 桂枝湯

三

而汗自出矣。汗者血之液也。桂枝血分藥也。苟非以血藥入透營分。和營散邪。芍藥護營固裏。則不但外邪不出。且必內入。而為腑患。然後知和營則外邪出。邪出則衛自密。更不必用固表之藥。而汗自止矣。

仲景曰。病嘗自汗出者。營氣復發。其汗營衛和。則愈。此明衛受風邪。營反出汗之理。所以中風病。治法宜桂枝湯也。好古曰。或問桂枝湯。所以中風病。治法宜桂枝湯也。好古曰。用桂枝湯。又曰。無汗不得用桂枝。汗多者。桂枝甘草湯。此又能閉汗也。二義相通。否乎。日。仲景云。太陽病發熱。汗出者。此為營弱。衛強。陰虛。陽必奏之。故用桂枝發其汗。此乃調其營氣。則衛氣自和。風邪無所容。遂自汗而解。非若麻黃能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則邪從汗出。而汗自止。非桂枝能閉汗孔也。亦惟有汗者宜之。若傷寒無汗。則當以發汗為主。而不獨調其營衛矣。故曰。無汗不得服桂枝。有汗不得服麻黃。以桂枝湯中。有芍藥。故也。蓋發汗。在芍藥。不在桂枝也。李東垣曰。仲景治表虛。製此湯。用桂枝為君。桂枝辛熱。發散。體輕助陽。芍藥甘寒。佐之。若腹中急痛。乃製小建中湯。以芍藥為君。芍藥酸寒。主收補中。桂枝甘草佐之。一治表虛。一治裏虛。又曰。以桂枝易肉桂。治感寒腹痛之神藥。如

加白朮川芎羌活防風飴糖名疎邪實表湯

治同。陶氏製此。以白朮為君。以代桂枝湯。喻嘉言曰。坐令外感內傷。混同論治矣。節菴所著傷寒六書。盡易仲景原方。參合後賢治法。以代桂枝。麻黃。芍藥。青龍等劑。後人以爲便用。

五八九

故世之嗜節菴者勝於仲景以節菴為捷徑以仲景為畏途節菴之書行而仲景之書晦如節菴者可謂潔古海藏輩之功也

枝甘草湯 景仲治發汗過多叉手冒心心中悸欲

得按者 方中行曰汗多血傷而心虛動悸故叉手自冒欲得按也桂枝走陰斂液宅心

能固疎慢之表甘草緩脾和中益氣能調不足之陽則此方實收陰補陽之為用也

不用附子者未見惡寒也不加人參者不見沉瀝脈也去芍藥屬陰也去薑棗無取辛散也故止用桂枝二甘草一則固表和中兩相

加附子湯 景仲治太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢微急難以屈伸

方中行曰此亦太陽中風誤汗之變證夫固表斂汗無出桂枝右矣而欲復陽益氣所以

有附子之加焉惡風為陽虛小便難為勝肌

成方切用 卷三 桂枝湯

筋傷拘急難以屈伸因無津液以養此本桂枝

湯也誤用麻黃勢必至大汗而亡陽人身津液

有幾堪漏而無已耶故以附子去芍藥加附子

入桂枝湯中為固表回陽上劑

名桂枝附子湯 景仲治傷寒八九日風溼相搏身

體煩疼不能轉側不嘔不渴脈浮虛而濇

八九日再經之時既不傳經復不入裏者固風溼持之也

煩疼者風也浮風也虛則汗後之不足濇溼也

渴無裏證也浮風也虛則汗後之不足濇溼也

其脈正與相應然後知風溼之邪在肌內而不

在筋節故以桂枝表之不能發熱為陽氣素虛故

以附子逐溼兩相結合自不能留矣此得之

寒因此方即後條之甘草附子湯以薑棗易木

之變制也去木者以寒本無汗不似風之自汗

而溼多也則均爾然去彼取此雖少殊而其所以散風除溼

食也然去彼取此雖少殊而其所以散風除溼

則均爾然去彼取此雖少殊而其所以散風除溼

附子獨於傷寒兼風溼者三方均用附子其理

安在蓋傷寒熱證也加以風溼寒裏勢必易熱

乃至八九日之久而不言身熱知其入陽氣素

虛矣陽虛者邪湊於裏為內入則易而外解極

難何者無元氣以復之也故仲景用桂枝解外

復重附子以溫經使絡脈再加之芍藥生薑

肉同無處不到則無邪不驅矣

各一兩人參三兩名桂枝新加湯 景仲治傷寒汗

後身痛脈來沉遲 反身痛者乃陽氣暴虛邪不

能盡出所致况脈見沉遲更無疑矣若尺遲乃

素虛此則六部皆然為發汗新虛故於桂枝方

中加芍藥以去邪人參以輔正仲景意中明明

桂枝湯不欲與參並用以桂枝能解肌表之邪

人參反固肌表之邪然在誤汗後正氣虛微餘

邪不解有不得已並用之勢人參向主半表故

曰新加加芍藥者以誤汗而陽虛邪湊也

加芍藥一倍名桂枝加芍藥湯 景仲治太陽誤下腹滿時

痛屬太陰也 喻嘉言曰太陽病之誤下其變皆

邪已入陰位所以屬太陰也此而腹滿時痛則其

法以升舉陽邪但倍芍藥以收太陰之逆氣本

方不增一味

去桂加茯苓白朮名桂枝去桂加

茯苓白朮湯 景仲治服桂枝湯或下之仍頭項強

痛翁翁發熱無汗心下滿微痛小便不利

張桂枝湯治風而遺其寒所以不解而證變設

更下之則邪勢乘虛入裏益誤矣在表之風寒

成方切用表卷三上

桂枝湯

木

未除而在裏之水飲上逆故變五苓兩解表裏之法而用茯苓白朮為主治去桂枝者以已誤不可復用也然桂枝雖不可用其部下諸屬皆所必需儻併不用芍藥以收陰其草薑棗以益虛而和脾胃何以定誤汗誤下之變耶故更以一主將而一軍用命甚矣仲景立方之神也

厚朴杏仁名桂枝加厚朴杏仁湯治太陽病下之微喘表未解也微喘邪猶在中上略為上入桂枝湯者以表均未解也厚朴杏仁為下氣散結之聖藥蓋誤下則引邪入裏既入不復外出利其下行散其熱結而喘自止矣然即非誤下而喘亦宜用此湯故仲景原文復申言此也

去芍藥生薑加茯苓名茯苓桂枝甘草大棗湯甘爛水煎治汗後臍下悸欲作奔豚言曰

汗本心之液發汗後臍下悸者心氣虛而腎氣發動腎邪欲上凌心故臍下先悸取用茯苓桂枝直趨腎界預伐其邪所謂上兵伐謀也

合麻黃湯名桂麻各半湯仲景曰太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少不嘔渴清便一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更吐下也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必癢宜桂枝麻黃各半湯準繩云首節頗似小柴胡證故以不嘔清中加黃耆以溫分肉司開闔原非溫經之謂後節面色反有熱色言表邪未盡故宜各半湯不見病如

成方切用 卷三上

成方切用表卷三上

桂枝湯

七

可與面合赤色比類而觀也方中行曰如瘧狀謂有往來寒熱也發熱惡寒熱多寒少者風寒俱有而寒少風多也不嘔渴清便邪之往來未徹表亦未及裏也二三度發乃邪居淺近易及而頻數故脈亦微緩而為欲愈也脈微而惡寒已下重以不得解者言而出其治也陰言後陽言前俱虛故禁攻也不可汗已過表也不可吐下未見有裏也熱色陽浮外薄風寒持之不散所以小汗亦不能得出鬱而癢也桂枝麻黃各半者總風寒而兩解之也

二分合麻黃湯一分名桂枝二麻黃一湯治服桂枝湯大出汗脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解論嘉言曰此亦風多寒少其寒汗反大出脈反洪大似乎風邪再襲故重以桂枝湯探之若果風邪之故立解矣若形如瘧日再發則邪本欲散又且淺而易散其所以不散者終為微寒所持故略兼治寒而汗出必解也

二分合越婢一分名桂枝二越婢一湯治太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可復發其汗論嘉言曰此亦風多寒少之乃內津液之通稱也故以不可更汗為戒然非汗則風寒終不解惟取桂枝之二以治風越婢之一以治寒乃為合法越婢者石膏之辛涼也胃得之乃熱化津生以此兼解其寒也

芍藥加黃耆名桂枝加黃耆湯仲景云黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常羸盜汗出者此營氣也若汗出已反發

五九一

氣久久而
大氣阻塞
為病皆有
此一段光
身後後段
復就大氣
之為病者
而推言之
不復黏着
黃汗矣。

熱者久久身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若
身重汗出已輒輕者久久必身潤潤即胸中痛
又從腰以上汗出下無汗腰臍弛痛如有物在
皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此
為黃汗。桂枝加黃耆湯主之。徐忠可曰此段論
黃汗中變態零雜
同歸於黃汗其治大同而小異也謂黃汗病由
水氣傷心故熱聚心胸若火不能下交於腎每
兩脈自冷自者真氣不下非足下受邪也假
令發熱而足脛亦熱是風寒歷於肢節而痛故
曰此屬歷節其汗出之期乃心火為水淫所傷
不能生土中氣虛餒心主血營分虛熱於是食
已胃勞火動則汗常暮陰躁則汗故曰此營氣
也乃又設言汗與發熱及身重相并之際以盡

成方切用表 卷上 桂枝湯

病能日假若汗出已宜身涼今因內邪盛而反
熱則皮膚之陰氣為汗所燥久久必甲錯更發
熱不止營氣熱則生惡瘡假若身本重溼也
汗出已輒輕是表溼為汗所衰但暫輕而不能
終止其重則內氣愈虛內虛則肌肉羸動也
胸中痛氣不運也又或元氣上下不能貫串則
腰已上汗下無汗於是元氣不能及下則腰臍
弛痛弛如脫也如有物在皮中狀不便捷也其
劇而危者胸中之元氣傷則不能食周身之陰
氣窒則身疼氣壅則煩躁心火鬱胃而熱氣下
流則溺澀然皆積漸所致其原總由水氣傷心
而病日深故曰此為黃汗藥用桂枝加黃耆者
調和營衛而暢其氣則除甘草加黃耆三兩名
補正印所以驅邪爾。**桂枝五物湯** 金匱
桂枝五物湯 治傷寒太陽證邪氣在表發熱頭痛
上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀黃耆

桂枝五物湯主之。徐忠可曰陰陽寸口人迎也
字以微脈為主兩尺中小緊謂細尋之有小緊
者此病邪直入之形正如明堂篇測病法所謂
下銳下向也然此由全體風溼血相搏痺其陽
氣使之不仁故以桂枝壯氣行陽芍藥和陰薑
棗以和上焦營衛協力驅風則病原拔而所入
微邪亦為強弩之末矣立法之意重在引陽故
嫌甘草之緩不若加栝蒌根名栝蒌桂枝湯金
黃耆之強有力爾。**仲景曰太陽病其證備身體強凡然脈反沉
遲此為瘧栝蒌桂枝湯主之**徐忠可曰此為瘧
主方太陽病其證備者身熱頭痛汗出也身體
強即背反張之互辭凡凡然即頸項強之形狀
脈反沉遲謂陽證得陰脈此瘧脈之異於正傷
寒也其源由筋素失養而溼復扶風以燥之故

成方切用表 卷上 桂枝湯

以桂枝湯為風傷衛主治加栝蒌根以清氣分
之熱而大潤其太陽經既耗之液則經氣流通
風邪自解溼氣自行筋不燥而瘧愈矣龐安時
曰栝蒌根不主項強凡凡然之意以肺熱不令移
於腎也加於桂枝湯中則可以徹熱榮筋調
和營衛矣凡字無鈞音殊頸項難舒之狀加
龍骨牡蠣名桂枝加龍骨牡蠣湯 金匱
**治男子失
精女子夢交** 徐忠可曰陰虛之人火藥當助腎
養和中上焦之營衛使陽能生陰而以
安腎寧心之龍骨牡蠣為補陰之主。
麻黃湯 治傷寒太陽證邪氣在表發熱頭痛
身痛腰痛骨節痛項背強惡寒惡風但有一毫
尚為無汗而喘脈浮而緊寒邪外束陽不得越
在表

之傷寒則為病熱寒初中人必先表即足太陽寒水之經太陽為諸陽上氣方一身之綱維本經之脈起目眚上腦下項循脊扶脊抵腰行於身後故所過之處無不痛也惡寒者雖無風而惡寒惡風者當風而始強之然惡寒者見風必惡惡風者見寒亦惡此為邪在表也若邪入於裡則無頭痛惡風寒之表證也原病式曰身熱惡寒熱在表也熱在表而後邪畏正故病熱而反惡寒或言為寒在表及熱在皮膚寒在骨髓者誤也凡人之傷風暑溼皆有汗唯傷寒獨不汗出寒能瀉血又表實也氣上逆故喘邪在表故脈浮傷寒脈緊而傷風脈緩者寒勁急而風緩散也喻嘉言曰冬傷寒春傷溫夏傷暑溼此四時正病也然夏秋亦有傷寒冬春亦有傷暑傷溼乃四時之客病所謂異氣也冬春正病有汗為傷風無汗為傷寒即夏秋正病有汗為傷暑溼無汗為傷寒亦治太陽陽明合病喘而胸滿壅盛仍為傷寒

成方切用

卷三上

麻黃湯

十一

湯氣不得宣發故逆而作喘若心下滿腹痛為實宜下之此胸中滿胸中去表猶近非裏實雖有陽明然與太陽合病尚為在表宜汗不宜下經曰陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯又曰陽明病發汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯問兩經合病當用兩經之藥何以偏用麻黃湯耶蓋邪自太陽而來仍當提出太陽亦治哮喘不欲其陷入陽明故不用葛根也亦治哮喘哮喘由風寒客於背俞且肺內有膠固之痰復感寒而作此湯散寒利肺然唯氣實者可曾用麻黃三兩桂枝兩杏仁七十枚甘草兩先煮麻黃數沸去沫內諸藥煎熱服覆蓋取微汗中病即止不必盡劑無汗再服凡用麻黃去節備用度免大發冬月生用傷寒初感始於太陽故以發汗為先汗出則愈活人云凡發汗病

證仍在者三日內可二三汗之令腰以下周遍為度王海藏曰表證當汗脈浮急汗之脈沉緩汗之裏證當下脈浮緩下之脈沉急下之三陽汗當急而下當緩三陰汗當緩而下當急按汗有大汗解表微汗解肌之殊下有急下少與微和滲利之別

麻黃中空辛溫氣薄肺家藥而走太陽能開腠散寒從此人仍從此出桂枝辛溫能引營分之邪達之肌表桂入營血能解肌杏仁苦其散寒而降氣甘草甘平發散而和中經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛是已喻嘉言曰麻黃發汗用麻黃有汗用桂枝未有究其精微者津液為汗汗即血也在營則為血在衛則為汗寒傷營營血內瀉不能外通於衛衛氣固閉津液不行故無汗發熱而惡寒風傷衛衛氣外泄不能內護於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒皆由皮毛而入皮毛肺之合也證雖屬太陽然亦拂鬱咳嗽有痰喘而胸滿非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌表在杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加石膏黃書夏至後加石膏知母是皆泄肺火之藥是麻黃湯雖太陽發汗重劑實散肺金火鬱之藥腠理不密則津液外泄而肺氣虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防津液而和營衛下後微喘者加厚朴杏仁以津液也活人書加黃芩為陽且湯以泄肺熱也

成方切用

卷三上

麻黃湯

十一

是桂枝湯雖太陽解肌輕劑實為理解救肺之

藥也。李士材曰：古云冬不用麻黃，夏不用桂枝。蓋以冬主閉藏，不應疎泄；夏令炎熱，不宜辛溫。經所謂必先歲氣，毋伐天和是也。又云：夏月不用麻黃，兩說相反。何耶？或舍時從證，或舍證從時。臨時變通，存乎其人。爾王履曰：傷寒即病者，謂之傷寒，不即病者謂之溫病。其原不殊，故一稱爲傷寒，其類則殊。施治不得相混。仲景之書，專爲即病之傷寒設，下兼爲不即病之溫病設也。今人或以傷寒法治溫病，則熱證居多，三陰傷寒證十居七八。若溫病但一於熱，爾後人誤爲通治，遂疑諸熱劑不敢用。是未悟仲景立麻黃湯、桂枝湯之有所主，有其時矣。苟知非治溫病之劑，則羣疑冰釋矣。又曰：傷寒即發於冬，寒之時，寒邪在表，閉其腠理，非辛溫不能散之。此麻黃、桂枝等劑所以必用也。溫病熱病發於暄熱之時，鬱熱自內達外，無寒在表，故非辛涼苦寒、苦酸之劑不能解之。此桂枝、麻黃等所以不可用也。而後人所處水解散，大黃湯、千金湯

成方切用 卷上 麻黃湯

防風通聖之類。兼治內外者之所以可用也。夫即病之傷寒，有惡風惡寒之證者，風寒在表，表氣受傷也。後發之溫熱病，有惡風惡寒之證者，必重感風寒，而表氣亦受傷也。若無新中之風寒，則無惡風惡寒之證。故仲景曰：太陽病發熱而渴，不惡寒者爲溫病。溫病如此，則知熱病亦如此。而不渴惡寒者，非溫熱病矣。或有不因新中風寒，亦見惡風惡寒之證者，蓋因表虛熱達於表，而傷表氣，所謂衛虛則惡風。營虛則惡寒。爾非傷風惡寒，傷寒惡寒也。溫病熱病，亦有先見表證，而後傳裏者。蓋鬱熱自內達外，不得泄，還復入裏，而成可攻之證。非如傷寒從表而始也。每見世人治溫熱病，誤攻其裏，亦無大害。誤發其表，變不可言。此足明其熱之自內達外矣。問有誤攻致害者，乃春夏暴寒所中之疫證。邪純在表，未入於裏，不可與溫病熱病同論。夫秋冬傷寒，真傷寒也。春夏傷寒，寒疫也。與溫病熱病自是兩途，豈可同治。况傷寒直中陰經，與

太陽雖傷，不及鬱熱，即傳陰經。爲寒證，而當溫者，又與溫病熱病大不同。其可混治乎。一陽子曰：傷寒傳足不傳手，非窮理之言也。草憲劉子指足經所屬水土木，水遇寒而涸，冰土遇寒而坼，裂木遇寒而凋枯。故寒喜傷之，手經所屬金與火，金遇寒而愈堅，火體極熱，寒不能製，故寒不能傷味者，奇之。將人身營衛經絡，上下截斷，不相聯絡，失血氣周流，瞬息悶絕之旨矣。夫寒邪襲人，必先皮毛，灼熱鼻塞，息粗，肺主皮毛，是手太陰肺辛金先受病矣。海藏有傷寒自皮毛入之語，先師有桂枝湯之說。雖太陽表之表之劑然，汗法舍皮毛，何自而解。更衣倍常，閉結溘泄，手陽明大陽庚金受病矣。先師有確黃朴實之用，雖兼正陽三陰裏之裏之劑然，下法舍太陽何自而通。劉子謂金遇寒而愈堅，信乎。陽氣拂鬱，舌胎言妄，手少陰心丁火病矣。先師有瀉心數法，亢極動血，上下煩蒸，手厥陰心胞火，手少陽三焦火病矣。治有三黃、柴、芩數條，小便

成方切用 卷上 麻黃湯

癰祕，手太陽小腸丙火病矣。治有五苓、導赤之劑。劉子謂火熱寒不能傷，信乎。經又云：人之傷寒，則爲病熱。既云病熱，則無水冰土，坼木枯之說。而有金燥、火亢之徵矣。劉子何人敢持管見，或世誣人，或機要云：有厥陰經下痢不止，脈沉而遲，手足厥逆，唾涕膿血，此難治。宜麻黃湯小續命湯汗之。此有表邪，縮於內，當瀉表而愈。張子和曰：瀉泄以風爲根，非汗不出。有病此者，腹中雷鳴，水穀不分，小便滯澀，服瀉藥溫藥不效。灸中腕臍下數十，燥熱轉甚。津液枯竭，延余視之，脈浮大而長，身表微熱，用桂枝麻黃湯加葛棗，連進三大劑，汗出終日，至旦而愈。次以胃風湯和其臟腑，食進而安。經曰：春傷於風，夏必泄泄。故可汗而愈。按風屬木，脾屬土，木尅土，故也。

除桂枝加石膏名麻黃杏仁甘草石膏湯 景仲

小字宜玩
觀沉小屬
少陰句可
知正水而
不喘脈沉
而加小即
從少陰論
治亦即石

景曰發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大

熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

湯則逆是已經用過也桂枝固衛寒不得泄而氣
轉上逆所以喘益甚也無大熱者鬱伏而不顯
見也以傷寒之表猶在故用麻黃以發之杏仁
下氣定喘甘草退熱和中本麻黃正治之佐使
也石膏有微熱之功尤能助下喘之用故易桂
枝以石膏誠為太陽傷寒誤汗轉喘之主治也
或問發汗後不可更行桂枝湯桂枝既不可
行麻黃可行耶無大熱石膏可行耶喻嘉言曰
治傷寒先分營衛麻黃二湯斷無混用之理此
證太陽之邪雖從汗解然肺中熱邪未盡所以
熱雖少止喘仍不止故用麻黃發肺邪杏仁下
肺氣甘草緩肺急石膏清肺熱即以治足太陽
之藥通治手太陰經也儻誤行桂枝亦治溫瘧先
枝寧不塞寒肺氣血吐癰膿乎

成方切用表卷三上麻黃湯

熱後寒加白朮名麻黃加朮湯

身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可

以火攻之

湯為發汗之主而加朮一味以為固本清溼之
地則內外兩得矣然發汗雖亦有火攻之法而
非治溼也去桂枝杏仁加附子名麻黃附子湯
故又戒之仲景曰水之為病其脈沉小屬少陰浮者為
風無水虛腫者為氣水發其汗即已脈沉者宜
麻黃附子湯浮者宜杏子湯徐忠可曰仲景於
出方獨所云石水不出方觀所出之方似手責
之手足太陽手足太陰裏水與急風兼責陽明

水治法所
以石水不
出考也

正水之下
寒多者似
亦可不用
經不顯言
石水可知
正水亦有
屬少陰者
故不若以
脈沉為別
附子湯為
少陰水主
方若脈浮
則浮者為

風故仍責
肺而用杏
子方爾
水已成則
氣難而肺
熱故裏水
與風水俱
有用石膏
者不用桂
枝可知麻
黃無桂枝
不全發表
大能通微
營中之氣
故用以治
水爾

而用石膏此獨另揭言水之為病脈沉小者屬

少陰後即承之曰脈沉者宜麻黃附子湯然則

此方或謂所謂石水之主方耶又即承麻黃附
子甘草方而曰脈浮者宜杏子湯既脈浮不與
前風水皮水方相同豈非杏子方乃正水而問
有脈浮者即為風水宜用此方耶蓋麻黃附子
甘草方即麻黃甘草二味爾以少陰而加附子
發其龍火之真陽協力麻黃甘草以開久蝕之
陰杏子湯因金囚不能運水故以脈浮者責肺
金之熱而瀉氣以洩其水之實爾若無水虛腫
此即所謂風氣相搏氣強即除桂枝杏仁名甘
為風水之屬也故亦主發汗

成方切用表卷三上麻黃湯

草麻黃湯亦主之

去桂麻黃節杏仁甘草生名三拗湯

治感冒風寒咳嗽鼻塞

行皮甘草生用
補中有瀉也
忌汗諸證脈浮緊者當身痛宜汗之假令尺脈
寒乾者不可發汗津液不足也渴而小便利若
失小便者不可發汗發汗則四肢厥冷肺腎虛
冷也下利雖有表證不可發汗汗出必脹滿走
津液而胃虛也淋家不可發汗發汗必便血
耗津液反增客熱也衄家不可發汗發汗者無
汗則陰陽俱虛針經曰奪血者不可發汗奪汗者無
血王海藏曰仲景言衄家不可發汗蓋為脈微
也若浮緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯瘧家雖傷
寒身痛不可發汗發汗則瘧表虛熱聚故生瘧
汗之則表益虛熱愈甚而生風故變瘧少陰病

脈沉細數病為在裏不可發汗。少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻或從目出是名下厥上竭難治。脈動數微弱者不可發汗。脈沉遲為在裏反發其汗則津液越出大便難。表虛裏實必譫語。汗家重發汗必恍惚心亂。汗者心之液心必虛。故亂腹中上下左右有動氣者不可發汗。

傷寒傷風辨 傷寒鬱而後能發熱。傷風即能發熱。傷風有涕。傷寒手足微厥。傷風手足皆溫。傷寒脈緊。傷風脈緩。

陰陽表裏辨 陽證之表發熱惡寒頭痛春強便惡寒而滲息冷手足厥逆陽證之裏唇焦舌燥煩渴掀衣揚手擲足大便祕結小便赤澀爪甲紅活身輕易於轉側脈浮洪數陰證之裏不渴跪臥引衣自蓋唇紫舌卷大便溏泄小便清白

成方切用表 卷三 大青龍湯

瓜甲青黑身重難於轉側脈沉細數惟腹痛與嘔陰陽裏證皆有之。三陽經又有陰陽表裏之分。太陽以熱在皮膚項痛項強在經為表。麻黃湯桂枝湯九味羌活湯以口渴尿赤熱入膀胱在腑為裏。五苓散陽明以熱在肌肉日痛不眠在經為表。葛根解肌湯以口渴背寒為熱漸入裏。白虎加參湯若自汗狂譫熱入胃腑為全入裏。三承氣湯少陽以胸脇之間為半表半裏。表多小柴胡湯裏多熱盛者黃芩湯以上皆發熱。太陽惡寒陽明自汗少陽多嘔皆外感證也。凡外感多得之飲食起居七情病生於太陽今之患傷寒者兼內傷者居多也。

大青龍湯 仲景曰太陽中風脈浮發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之。若脈

錄在卷此證

不汗出而煩躁者是也。宜汗有在裏者不實而煩躁是也。宜汗有陽虛者汗下後病不去而煩躁是也。宜汗有陰虛者汗下後病不去而煩躁是也。宜汗有逆利者汗下後病不去而煩躁是也。宜汗有死是也。宜汗有溫經內熱白煩為有根之火外熱白燥為無根之火。故曰燥不煩躁者皆不治。

成方切用表 卷三 大青龍湯

功多於回陽。名之日真武湯。乃收拾分馳離絕之陰陽互鎮於少陰北方之位。全在收拾其水。使龍潛而不能見也。設有一毫水氣上逆龍即得遂其升騰變化。縱獨用附子乾薑以回陽其如魄汗不止何哉。厥後皆旌陽祖師以仙術斬蛟捕至蛟龍遁跡之所戒其家勿蓄勺水。乃至從視水逸去可見水怪原有尺水丈波之能。向非真武坐鎮北方天地間久為龍蛇之窟矣。即此推之人身身陽根於陰其心陽之證乃少陰腎中之真陽飛越。真陽飛越。亟須鎮攝歸根。陰必翕然從之。陰從則水不逆矣。陰從則陽不孤矣。豈更至於飛越乎。故舍天人一致之理以言醫者非又曰傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之。喻嘉言曰前條括寒而言此傷寒二字括風而言風寒之脈證錯見則桂枝與麻黃二湯不可用。不詳者矣。仲

微弱汗出惡風者不可服服之而厥逆筋惕肉瞤此為逆也。以真武湯救之。喻嘉言曰天地體類。煩躁得汗則解。太陽無汗因有煩躁一證兼見則非大青龍湯不解也。究竟本方原於無汗者取微似汗。若有汗者之煩躁全非鬱蒸之比。其不藉汗解甚明。加以惡風脈微弱則是少陰心陽中風之證。若脈浮弱汗出惡風而不煩躁。即是不致厥逆。傷風而速其陽之亡。取仲景不能必用者能識其鄭重之意。即百用不致一誤矣。又曰誤服大青龍湯厥逆筋惕肉瞤者既有少陽之逆矣。更推重真武一湯以救之者其義何居。蓋龍惟藉水可化。而水者真武之所司也。設真武不與之以水。青龍之不能奮然升天可知矣。故方中用苓朮芍附行水收陰。醒脾崇土之

景原文但重作有輕時六字早已發明言但身重而無少陰之欲寐其為寒因可密况作有輕時不似少陰之晝夜俱重又兼厥因可密所以敢力驅其在表之風寒若脈微弱身重欲寐則內顧少陰且乎

麻黃六兩 甘草炙 桂枝兩 杏仁四十枚 石膏雞子大塊

生薑兩 大棗十二枚 先煮麻黃去沫內諸藥煎

一服汗者止後服

仲景製方之意本是桂枝麻黃二湯合用易芍

藥以石膏者所以勝寒鬱之內熱且助青龍

之勢而與雲雨也然去芍藥之酸收增石膏之

成方切用表 卷三十一 大青龍湯

辛散外攻之力猛而無制在寒多風少及風寒

兩停之證則用當而通神其有風無寒之證及

微弱之脈若不知辨而誤用之有厥逆惕瞤而

亡陽爾

小青龍湯 仲景曰傷寒表不解心下水氣乾

嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利少腹

滿或喘者小青龍湯主之 發熱惡寒頭痛身痛

中凡有裏證兼表證者則以表不解三字該之

內有水飲則水寒相搏水蓄胃中故乾嘔而噎

成方切用 卷三十一

少腹 又曰傷寒心下水氣咳而微喘發熱不

渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之

喻嘉言曰風寒挾水飲上逆津液不下行故不

渴則可知其津液不逆為寒去欲解之徵也

乃用不青龍湯大率以輕劑助其欲解之勢爾

麻黃節 桂枝 芍藥 細辛 甘草炙 乾薑三

半夏 五味子升 水一斗先煮麻黃減二升

去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升若

微利者去麻黃加薤花如雞子大熬令赤色黃

成方切用表 卷三十一 小青龍湯

根三兩 半夏燥津液括 噎者去麻黃加附子

一枚炮 水寒塞室氣也附 小便不利少腹

滿去麻黃加茯苓四兩 茯苓淡滲能通 喘者

去麻黃加杏仁半升去皮尖 喘水氣射肺而聲

下氣也 周禹載曰素常有飲之人一感外邪傷皮毛蔽

肺氣停於心下而上下之氣不利焉喘滿咳嘔

相因而見於是五味收金乾薑散陰半夏祛

飲而尤妙在用細辛為少陰經表藥且能走水

五九七

人之水氣大抵發源於腎故少腹滿小便不利因而作喘安知少陰不為遺害乃以細辛搜豁伏邪走而不留而後已上主散之藥皆靈動也

全匱云病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之徐忠可註曰溢飲者水已流行歸四肢以不汗而致身體重蓋表為寒氣所侵而寒肌體着淫而重至乎是表但水寒相雜猶之風寒兩傷內有水氣故以大青龍小青龍主之然大青龍合桂麻而去芍加石膏則水氣不甚而挾熱者宜之儻欬多而寒伏則必以小青龍為當蓋麻黃去杏仁桂枝去生薑而加五味乾薑半夏細辛雖表散而實欲其寒飲之下出也觀仲景論太陽中暈謂身熱疼重而脈微弱乃夏月傷冷水水行皮中所致一物瓜蒂湯主之然日發其汗則惡寒甚而此獨上二湯

成方切用表

卷三十一

小青龍湯

辛

發表為惡豈非以溢飲所犯其源非中暈且腠理稍固不若夏月之易汗乎彼在夏月腠理本疎又中暈在先故主吐然則夏月身不熱非中暈而得是證其亦宜二湯可知也金匱云先渴後嘔者水停心下小青龍湯主之不治渴而願治水去而渴自止矣金匱又云欬逆倚息不得臥小青龍湯主之徐忠可註曰此即支飲的證也不用十棗湯而用小青龍湯必以其挾表也然此必病發於未然而不得臥則勢亦孔亟故暫以桂枝治表蓋半治飲爾

加石膏名小青龍加石膏湯治肺脹欬而上

氣煩躁而喘脈浮者心下有水

人喘目如脫狀脈浮大者越婢加半夏湯主之此條同是欬喘上氣脈浮然前條目如脫狀則喘多矣喘多責寒故以麻黃甘草為主而加石膏以清寒變之熱此獨加煩躁傷寒論中寒得

此條據黃註當去麻

葛根湯

治太陽病項背強几几無汗惡風者

風脈而煩躁者主以小青龍湯故亦主小青龍然雖則氣必熱故仍加石膏爾
葛根湯 治太陽病項背強几几無汗惡風者
病之脈下頰俱病者俯仰不能引頸几几然形容執日几几烏之短羽者動則引頸几几然形容病之脈下頰俱病者俯仰不能引頸几几然形容陽明之脈其支者從大迎下人迎循喉嚨入缺盆陽明之脈其支者從大迎下人迎循喉嚨入缺盆頸上而合於太陽故邪氣太盛太陽則項背強加陽明則頸亦病故曰几几也太陽尚在用桂枝為主已而惡風猶在也故以太陽尚在用桂枝為主方以初有陽明故加葛根為引用然無汗惡風儿几常用麻黃湯加葛根矣乃仍於桂枝湯中加麻黃君葛根者何意非有喘無取乎杏仁不去麻黃復加葛根則葛根亦大開肌肉之藥豈不慮大汗之無制乎故不獨以桂枝監之且有芍藥收之度幾兼發二經之邪而無心陽之慮

成方切用表

卷三十一

葛根湯

辛

矣此證又名剛瘧乃風寒傷筋故拘急而強直也金匱治之亦主此湯剛瘧無汗柔瘧有汗仲景又曰太陽發汗不徹煩躁短氣者亦宜此湯更發其汗經曰何以知汗出不徹以脈濇故也按傷寒失於汗下而短氣為實汗下後短氣者為虛表實宜發汗表虛宜解肌亦治

太陽陽明合病必自下利者

他經有催併之義為併病二經三經同受邪者為合病合病者邪氣甚也太陽陽明合病其證頭痛腰痛肌熱鼻乾目痛脈浮大而長頭腰太陽也肌目鼻陽明也浮大太陽也脈長陽明也陽經合病必自下利邪併於陽則陽實而陰虛陽外實而陰虛則裏虛故下利吳鶴皋曰陰虛陽便為傷寒漏底不治不知與此湯以散經中表邪則陽不實而陰氣平利不治而自止矣趙嗣真曰合病者二陽經或三陽經同病不移者也併病者一經先受病又過一經兩經同病也

如太陽陽明若併而未盡猶在兩經仲景所謂
短氣是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是
謂證罷仲景所謂太陽證罷潮熱手足汗出大
便鞭而語是也法當下之以承氣湯是知罷
則入腑不能不入腑太陽陽明併病治法也
若太陽陽明合病主葛根湯太陽少陽合病主
黃芩湯少陽陽明合病主承氣湯三陰有兩感
而無合病。合病不傳經併病亦與傳經異太
陽多傳變太陽傳陽明水傳土也謂之微邪又
謂巡經得度傳太陽傳少陽謂之越經傳太陽
傳太陰謂之誤傳太陽傳少陰謂之表裏傳
水勝火火勝水此南北二方之變頃刻害人辨
之不早必成不救太陽傳厥陰謂之首尾傳三
陰不至於首唯厥陰與督脈上行與太陽相
接又名巡經得度傳災變至重不為不多矣。

葛根兩麻黃 生薑 桂枝 芍藥 甘草
成方切用表卷三上葛根湯

兩大棗 枝十二 先煮麻黃葛根去沫內諸藥煮溫
服覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及
禁忌

成氏曰輕可去實葛根麻黃之屬是也此以中
風表實故加二物於桂枝湯中仲景以有汗無
之別有汗為風傷用桂枝加葛根湯不用麻黃
無汗為寒傷用此湯張元素曰二湯加葛根所
以斷太陽入陽明之路非太陽藥也若太陽初
病便服升葛是反引邪氣入陽明也喻嘉言曰
仲景於太陽帶陽明證其風傷衛則桂枝湯中
加葛根寒傷營則麻黃湯中加葛根六陽帶少
陽證其風傷衛則桂枝湯中加柴胡寒傷營則
麻黃湯中加柴胡合併之病亦然則陽明以葛

成方切用 卷三上

根為主藥少陽以柴胡為主藥矣乃少陽經專
用二義太陽而略兼陽明則以方來之陽明為
重故加葛根陽明而尚兼太陽則以未罷之太
陽為重故不加葛根恐葛根大開肌肉則津液
盡從外泄爾小兒布痘見點之時亦忌之今人
知忌升麻而恣用葛根兒命遭枉者多矣又曰
金匱論痲病於風木主事之時已申不可汗下
之戒夫妄下損陰則筋失所養而痲妄汗下
則脈失所養而拘急及遇無汗之剛痲又不得
不用葛根湯取其微汗至於下法全不示戒且
云可與大承氣湯見身內之陰為外熱所耗容
有不得下之證但十中不得一二終非可訓
之定法略舉其端聽用者之裁酌爾方中行日
勝膀胱主水胃主穀寒為陰陰氣主下降故太陽
陽明合病經中之邪熱甚胃氣弱不化穀不分
清難進而走注也但用葛根散經中之寒邪麻
黃散太陽之表葛根解陽明之肌桂枝主營衛

成方切用表卷三上葛根湯

之利薑棗健脾胃甘草和中芍藥緩中則經中
之邪散胃中之正回不分清者自分清不顯治
而治在其中矣。太陽陽明合病不下利但嘔
者葛根加半夏以下利則津液去而必渴故也
如此條自下利者竟用本湯假如嘔而復
下利亦即葛根湯倍生薑可不用半夏也。

除麻黃名桂枝加葛根湯 治太陽病項背強
凡凡反汗出惡風者凡凡者頸不舒也頸屬陽
陽明一證即於桂枝湯中去麻黃加半夏名葛
根加半夏湯 治太陽陽明合病不利但嘔
喻嘉言曰此又以下利不利辨別合病主風
主寒之不同也風者陽也陽性上行故合陽明
胃中之水飲而上逆寒者陰也陰性下行故合
陽明胃中之水穀而下奔然上逆則必加半夏

五九九

入葛根湯以滌飲止嘔。但下奔則但用葛根湯。以解兩經之邪。不治利而利自止。爾葛根湯。即第一條桂枝湯加葛根。加黃芩名葛根解肌湯。根不用麻黃者是也。

治發熱惡寒頭痛項強傷寒溫病

麻黃附子細辛湯 治傷寒少陰病始得之反發熱脈沉者

少陰病脈微細。但欲寐是也。太陽發熱之邪。而入而脈沉。餘邪未盡。入裏。而表熱。此證謂之表裏傳。非兩感也。

麻黃二兩 細辛兩 附子一枚 炮去

去上沫內辛附煮取去渣溫服日三

先煮麻黃

太陽證發熱脈當浮今反沉少陰證脈沉當無

成方切用表 卷上 葛根湯 辛

熱今發熱故曰反也。熱為邪在表。當汗。脈沉屬

陰。又當溫。故以附子溫少陰之經。以麻黃散太

陽之寒而發汗。以細辛腎經表藥。聯屬其間。是

汗劑之重者。趙嗣真曰。仲景太陽篇云。病發熱

宜四逆湯。少陰篇云。少陰病始得之。反發熱脈

沉者。麻黃附子細辛湯。均是發熱脈沉。以其頭

痛。故屬太陽。陽證脈當浮。而反不能浮者。以裏

久虛寒。正氣衰微。又身體疼痛。故宜救裏。使正

氣內強。逼邪外出。而乾薑附子。亦能出汗。而散

假令裏不虛寒。而脈浮。則正屬太陽。麻黃證矣。

均。是脈沉發熱。以無頭痛。故名少陰病。陰病當

等證。而正屬少陰。四逆湯證矣。由此觀之。表邪

浮淺。發熱之反。猶輕。正氣衰微。脈沉之反。為重。

此四逆湯。不為不重。於麻黃附子細辛湯矣。又

可見。熱附配麻黃。發中有補。生附配乾薑。補中

有發。件景之旨。甚微矣。按傷寒傳入三陰。尚有

在經表證。如太陰有桂枝加芍藥湯。少陰有麻

黃附子細辛湯。厥陰有當歸四逆湯。之類。皆陰

經表藥也。又按少陰雖有反熱。而無頭痛。厥陰

雖有頭痛。而無身熱。且痛。不如陽經之甚。若身

熱。頭痛。全者。則屬陽證。醫貫曰。有頭痛。連腦者

此係少陰傷寒。宜用麻黃附子細辛湯。不可不

知。經又云。少陰病吐利。手足不逆冷。反發熱者

不死。脈不至者。灸少陰七壯。此又以為陽氣為主

少陰吐利。法當脈逆。以無陽也。發熱為陽氣猶

存。故不死。方中行曰。發熱邪在表也。脈沉少陰

位北而居裡也。以其居裡邪在表而發熱。故曰

反也。以邪在表不在裏。故用麻黃以發之。以其

本陰而標寒。故用附子以溫之。細辛辛溫。通於

少陰。用之以佐主治者。以其專經而向導也。翁

嘉言曰。仲景太陽經。但有桂枝加附子法。並無

謂楚國公孫延林木者理實有之此仲景即於始得之時麻黃與附子合用兼以細辛本藥由裏達外俾外邪得以外解溫經仍以回陽邪外出而真陽不出誠打成一片呼吸相通之大道也快甚去細辛加甘草名麻黃附子甘草湯仲景曰少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也喻嘉言利煩躁嘔渴為無裏證既無裏證病尚在表可知故以甘草易細辛而微發汗又溫散之發法也周揚俊曰言無裏證則亦有反發熱之表在可知也二方皆治少陰表證少陰無發汗之法汗之必至少陰惟此二證用之此方又名麻黃附子湯金匱用治水腫已見麻黃湯附方下此處因列少陰證治效不妨重出

成方切用表卷三上 升麻葛根湯 庚

升麻葛根湯 治陽明傷寒中風頭疼身痛

發熱惡寒無汗口渴目痛鼻乾不得臥及陽明

發斑欲出不出寒暄不時人多疾疫頭痛發熱

痛屬表六經皆有身痛在陽經則煩痛拘急風寒在表故發熱惡寒外束故無汗熱入裏故口渴陽明脈絡鼻依目故目痛鼻乾陽明屬胃胃受邪故不安臥此其受邪之初猶未及乎狂也陽邪入胃裏實表虛故發斑細如蚊點為疹大若錦紋為斑

升麻 葛根 芍藥 甘草 加薑煎

頭痛加川芎白芷 使白芷專治陽明頭痛

痛背強加羌活防風 故兼太陽 熱不退春加

成方切用 卷三上

柴胡黃芩防風 少陽司令柴夏加黃芩石膏 降火 頭面腫加防風荆芥連翹白芷川芎牛蒡

石膏 升散 咽痛加桔梗 清肺利 斑出不透

加紫草茸 涼血潤腸用茸者取其 脈弱加人

參 胃虛食少加白朮 腹痛倍芍藥和之

陽明多氣多血寒邪傷人則血氣為之壅滯辛

能達表輕可去實故以升葛辛輕之品發散陽

明表邪陽邪盛則陰氣虛故用芍藥斂陰和血

又用甘草調其衛氣也 雲岐子曰葛根為君升

成方切用表卷三上 柴葛解肌湯 壬

其升麻甘草升陽解毒故又治時疫 感時疫者

故用陽傷寒未入陽明者勿服恐反引表邪入

陽明也斑疹已出者勿服恐重虛其表也 麻痘

紅點則不可服陽明為表之裏升葛陽明正藥凡斑疹欲出未出之際宜服此湯以透其毒不可便服寒劑以攻其熱又不可發汗攻下虛其表裏之氣如內熱甚加黃連犀角青黛大青知母石膏黃芩黃藥參之類若斑勢稍退潮熱謔語不大便可加大柴胡加苳確調胃承氣下

柴葛解肌湯 代葛根湯 治太陽陽明合病頭

目眼眶痛鼻乾不眠惡寒無汗脈微洪 起太陽脈

起目內

六〇一

皆上額交巔陽明脈上至額顙絡於目風寒上干故頭痛目痛眩痛也惡寒無汗屬太陽鼻乾不眠屬陽明脈洪將為熱也節菴曰此陽明在經之邪若正腑病另有治法

柴胡 葛根 羌活 白芷 黃芩 芍藥 桔梗 甘草 加薑棗石膏一錢煎 無汗惡寒甚者去黃芩

寒邪在經故以羌柴芷葛散之寒將為熱故以黃芩石膏桔梗清之三藥並泄肺熱以芍藥甘草和之也

柴胡升麻湯局 治少陽陽明合病傷風壯熱惡

成方切用表 卷三十一 柴胡升麻湯 夫

風頭痛體痛鼻塞咽乾痰盛咳嗽唾涕稠黏及陽氣鬱遏元氣下陷時行瘟疫劉宗厚曰傷風

寒同論雖有麻黃桂枝之分至於傳變之後亦未嘗悉分之也諸家皆與感冒四氣併中風條混治惟陳無擇別立傷風一方在四淫之首且依傷寒以太陽為始分註六經可謂詳密但風本外邪諸方例用解表發表然受病之源亦有不同若表虛受風專用發表之藥必致汗多不陽之證若內挾痰熱而受風亦宜內外交治不可顯於解表也或曰此云表虛與傷寒中風表虛同歟予曰不同也彼以太陽中風而於有汗無汗分虛實實者加麻黃虛者加葛根俱解表也此云表虛者當固守衛氣而散風者也

柴胡 前胡 黃芩 升麻 葛根 桑皮

荆芥 赤芍 石膏 加薑三片豉廿粒

陽明而兼少陽則表裏俱不可攻祇宜和解在宜柴胡平少陽之熱升葛散陽明之邪三藥皆清前胡消痰下氣而解風寒桑皮瀉肺利溼而止痰嗽荆芥疏風熱而清頭目赤芍調營血而散肝邪黃芩清火於中上二焦石膏瀉熱於肺胃之部風寒為熱故以石膏辛寒為君加薑豉者取其辛散而升發也

九味羌活湯即羌活沖和湯張元素 治傷寒傷風憎寒壯

成方切用表 卷三十一 九味羌活湯 夫

熱頭痛身痛項痛脊強嘔吐口渴太陽無汗及感冒四時不正之氣疫癘諸病有物有聲曰嘔無聲曰吐胃寒則吐邪熱在表則不渴傳裏則渴四時不正之氣謂天地間穢惡之氣及病氣死氣流行傳染也

羌活 防風 蒼朮錢半 細辛五分 川芎 白芷 生地 黃芩 甘草錢一 加生薑葱白一如風證自汗者去蒼朮加蒼朮發表而即實表也 胸滿去地黃加枳殼桔梗 喘加杏仁 汗下兼行加大黃

此足太陽例藥以代桂枝麻黃青龍各半等湯也藥之辛者屬金於人為義故能匡正黜邪羌防蒼細芫芷皆辛藥也羌活入足太陽為撥亂反正之主藥除關節痛甚蒼朮入足太陰辟惡而去溼能除溼下氣及安太陽使邪氣不致傳足太陰脾白芷入足陽明治頭痛在額芫芩入足厥陰治頭痛在腦細辛入足少陰治本經頭痛皆能驅風散寒行氣活血而又加黃芩入手太陰以泄氣中之熱生地入手少陰以泄血中之熱黃芩苦寒生地寒滯二味苟用

成方切用表 卷三十一 神湯

於發熱之後則當若初發熱猶當議減也防風為風藥卒徒隨所引而無不至治一身盡痛為使甘草甘平用以協和諸藥也藥備六經治通四時用者當隨證加減不可執一張元素曰有汗不得用麻黃無汗不得用桂枝若未瘥則其變不可言故立此方使不犯三陽禁忌但陰虛氣弱之人在所禁爾

十神湯方 治時氣瘟疫癘氣初感頭痛發熱惡寒無汗咳嗽鼻塞聲重癘氣由口鼻而入直行中道流布三焦致沿門闔境傳染相似謂之瘟疫頭痛發熱惡寒無汗邪在表也咳嗽鼻塞聲重表實而氣不利也凡患時證而咳嗽者邪欲外出而易愈也

麻黃 葛根 升麻 川芎 白芷 紫蘇 甘草 陳皮 香附 赤芍 加薑葱白

治傷寒須分六經見證用藥此則雖有發熱惡寒頭痛鼻塞等證然屬時氣瘟疫與傷寒不同故總以疏表辛香利氣之藥主之而又加芍藥甘草以和之吳浚曰此湯用升麻葛根能解利太陽傷寒發熱用之則引邪入陽明傳變發斑矣慎之

神木散 治內傷冷飲外感寒邪而無汗者內傷冷飲則寒溼停於中經曰其寒飲食入胃則肺寒肺寒則外內合邪是也寒能瀉血故無汗

成方切用表 卷三十一 神木散

亦治剛瘧先傷風後傷溼及太陽過汗溼家過汗產後血虛破傷風皆發瘧其證頭搖口噤手足搐搦項背反張無汗為剛瘧有汗為柔瘧亦有剛柔不分者不可純作風治宜清熱化痰疎風養血亦有用大承氣者凡陽瘧不厥逆其厥逆者皆陰瘧也宜附子湯附子防風散桂心白木湯

蒼朮 製 防風 二甘草 一兩 加生薑葱白 如太陽證發熱惡寒脈浮緊者加羌活 浮緊帶洪者是兼陽明加黃芩 浮緊帶弦數者是兼少陽加柴胡 婦人加當歸

防風辛溫升浮除風勝溼為太陽主藥蒼朮甘

濕辛烈散寒發汗辟惡升陽能升胃陽氣加甘草者發中有緩也

除蒼朮加白朮二兩薑三片不用葱名白朮湯

海治前證有汗者蒼朮發汗白朮止汗亦治柔痙風而兼

汗。按神朮白朮二湯乃代桂枝麻黃二湯者也。喻嘉言曰此海藏得意之方。蓋不欲無識者輕以麻黃桂枝之熱傷人也。目明仲景不得不表揚海藏之功。

大無神朮散蒼朮浸厚朴各一錢陳皮去白甘草各一錢藿香石菖蒲各錢治感山嵐瘴氣憎寒壯

熱一身盡痛頭面腫大瘡瘡時毒瘡熱時毒感於口鼻傳入

成方切用表 卷三十一 神木湯

陽明邪正交爭陰勝則憎寒陽勝則壯熱流於百節則一身盡痛上行頭面則為腫大。名大頭瘟。蒼朮辛烈升陽辟惡燥溼解鬱厚朴苦溫除溼散滿化食厚腸陳皮理氣通利三焦甘草和中匡正脾土此即平胃散而重用陳皮為君者也。蓋人之一身以胃氣為主胃氣強盛則邪不能入故治外邪必以強胃為先也。加藿香菖蒲取其辛香通竅亦能辟邪而益胃也。吳鶴皋曰大無此方但理脾胃而解瘴之妙自在其中不愧為丹溪之師矣。

局方神朮散茅朮二兩川芎白芷羌活藁本細辛炙甘草各一兩每服四錢加薑葱煎治傷風頭痛無汗鼻塞聲重及風寒咳嗽時行泄瀉頭痛鼻塞是傷風也傷風應有汗若無汗是挾寒也。瀉泄下利者清陽不升木邪尅土風兼溼也。藁本辛

羌芎芷各走一經祛風發汗而勝溼散三陽之邪而能升清者也。加甘草者緩其中也。

許學士神朮散蒼朮一兩脂麻五錢棗五十枚取肉搗丸治火飲結成癖囊水飲結成窠囊非蒼朮辛烈雄壯不能破

之。加脂麻者潤其燥也。用棗肉者補土以制水也。

九製蒼朮散茅山蒼朮九蒸九曬為末治痰飲腹痛

葱豉湯後傷寒初覺頭痛身熱脈洪便當服此

葱白握一豉升煎服取汗出如無汗加葛根三

兩氏

成方切用表 卷三十一 葱豉湯

葱通陽葱中空為肺葉散豉升散均能發汗邪初在表宜先服此以解散之免用麻黃湯者之多所顧忌用代麻黃湯者之多所紛更也。去淡豉加生薑名連鬚葱白湯活人治同

人參敗毒散活人治傷寒頭痛憎寒壯熱項強睛暗鼻塞聲重風痰咳嗽及時氣疫癘嵐瘴鬼瘧或聲如蛙鳴眼赤口瘡溼毒流注腳腫腮腫痲痺毒痢諸瘡斑疹風寒在表則惡寒發熱頭痛痰多咳嗽聲如蛙鳴俗名蝦蟆瘟邪氣實也。風寒溼熱之氣上干則目赤口瘡下流則足腫傷

於陽明則肥腫結於少陰則喉痺壅

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎

枳殼 桔梗 茯苓 甘草 每服一兩加

薑三片薄荷少許煎 口乾舌燥加黃芩 腳

氣加大黃蒼朮 膚痒加蟬蛻

羌活入太陽而理遊風獨活入少陰而理伏風

兼能去溼除痛柴胡散熱升清協川芎和血平

肝以治頭痛目昏前胡枳殼降氣行痰協桔梗

茯苓以泄肺熱而除溼消腫人參甘草輔正以

成方切用 卷三上 人參敗毒散

匡邪疏導經絡表散邪滯故曰敗毒

氣門中推此方為第一三氣合邪豈易當哉其

氣互傳則為疫矣方中所用皆辛平更有參

大力者荷正以祛邪病者日服二三劑使疫邪

不復留証不快哉奈何俗醫減去人參曾與他

方有別耶又曰傷寒宜用人參其辨不可不明

蓋人受外感之邪必先汗以驅之唯元氣旺者

外邪始乘藥勢以出若素弱之人藥雖外行氣

從中餒轉者半出不出重者反隨元氣縮入發

熱無休矣所以虛弱之體必用人參三五七分

入表藥中少助元氣以為驅邪之主使邪氣得

藥一湧而出全非補養衰弱之意也即和解藥

中有人參之大力者居間外邪遇正自不爭而

退舍否則邪氣之縱悍安肯聽命和解耶不知

者謂傷寒無補法邪得補而彌熾即痘疹癩痢

以及中風中痰中寒中暑癰疽產後初時藥不

敢用而虛人之遇重病可生之機悉置不理矣

古方表汗用五積散參蘇飲敗毒散和解用小

柴胡白虎湯竹葉石膏湯等方皆用人參領內

邪外出乃得速愈奈何不察耶外感體虛之人

汗之熱不退下之和之熱亦不退太熱呻吟津

液灼盡身如枯柴醫者技窮正謂元氣已竭故

藥不應手爾僥元氣未竭先用參三五七分

外感用補中益氣加表藥一二味熱服而散外

邪有功千古傷寒顯科從仲景至今明賢方書

無不用參何為今日醫家單除不用全失相傳

宗旨使體虛之人百無一活曾不悟其害之也

蓋不常用參而殺人者與耆耆歸桂薑附等

藥同行溫補之誤不謂與羌獨柴前芎半枳桔

芩膏等藥同行汗和之法所致也安得視等砒

鴆耶嘉靖己未江淮大疫用敗毒散倍人參去

前胡獨活服者盡效萬歷己卯大疫用本方復

效崇禎辛巳壬午大饑大疫道殣相望汗和藥

中惟加人參者多活更有發斑一證最毒惟加

參於消斑藥中全活甚眾凡饑饉兵荒荒之

餘飲食起居不節致患時氣者宜用此法

加陳廩米名倉廩散治噤口痢乃熱毒冲心食

米煎湯治痢後加大黃芒硝名硝黃敗毒散治

熱毒壅積加黃芩名敗毒加黃芩湯治溫病不

惡寒而渴加連翹金銀花名連翹敗毒散治瘡

毒如有風熱加荆芥防風名荆防敗毒散亦治

腸風下鮮血血鮮者為腸風隨感而見也

汗憎寒壯熱鼻塞痰盛頭運目眩正偏頭痛惡風有

風中於腦者

成方切用 卷三上 川芎茶調散

治諸風上攻正偏頭痛惡風有

風中於腦者

風中於腦者

風中於腦者

風中於腦者

風中於腦者

風中於腦者

風中於腦者

風中於腦者

風中於腦者

風中於腦者

止無時也。中風故有汗惡風。風邪在表。故憎寒壯熱。風寒傷於皮毛。腠理密緻。不得泄越。氣併於鼻。故鼻塞。火升故痰盛。痰熱上攻。故頭運目眩。

薄荷 錢八 荊芥 錢四 甘草 炙 羌活 白芷 錢二

防風 半錢 細辛 錢一 每三錢茶調服一方加菊花

錢一 殭蠶 分三 名菊花茶調散治頭目風熱熱明目。

殭蠶消風化痰。

羌活治太陽頭痛白芷治陽明頭痛川芎治少

陽頭痛細辛治少陰頭痛防風為風藥卒徒皆

能解表散寒以風熱在上宜於升散也頭痛必

成方切用表 卷三上再造散 羌活

用風藥者以巔頂之上惟風可到也薄荷荊芥

竝能消散風熱清利頭目故以為君辛香輕清

氣分而搜風熱肝同諸藥上行以升清陽而散

鬱火清陽不升則濁加甘草者以緩中也用茶

調者茶能上清頭目也凡頭痛用羌防芎芷辛

於畏寒塞而痛故用此助肝以升散之也若

服辛散藥反甚者則宜用酸澀收而降之乃愈

再造散 治陽虛不能作汗陶節菴曰治頭痛

汗名曰無陽證庸醫不識不論時令遂用麻黃

脈證中有虛寒之實處方可用也

人參 黃耆 桂枝 甘草 附子 炮 細辛

羌活 防風 川芎 煨薑 棗二枚加炒芍

藥一撮煎

經曰陽之汗以天地之雨名之汗之無汗邪盛

而真陽虛也故以參耆甘草薑桂附子大補其

陽而以羌防芎細發其表邪加芍藥者散中有

收且能滋調營衛為諸陽藥取汗之助也節菴

第知參耆能止汗而不知其能發汗以在表藥

隊中則助表藥而解散也東垣丹溪治虛人感

胃多用補中益氣加表藥即同此意

成方切用表 卷三上麻桂飲 羌活

麻桂飲 治傷寒瘟疫陰暑痧癘凡陰寒氣勝

而邪有不能散者非此不可無論諸經四季凡

有是證即宜是藥勿謂夏月不可用也不必厚

蓋但取津津微汗透出為度此實麻黃桂枝之

變方而其神效則大有同於二方者不可不為

細察

官桂 錢一二 當歸 錢三四 炙甘草 錢一 麻黃 錢二三 陳皮

隨宜用 水一盞半加生薑五七片或十片煎

或不用 八分去浮沫不拘時服 若陰氣不足者加熟

地三五錢 若元氣大虛陰邪難解者當以大
溫中飲更迭為用

大溫中飲景 凡患陽虛傷寒及一切四時勞倦
寒疫陰暑之氣身雖熾熱時猶畏寒即在夏月
亦欲衣被蓋或喜熱湯或兼嘔惡泄瀉但六脈
無力肩背怯寒邪氣不能外達等證此元陽大
虛正不勝邪之候若非峻補托散則寒邪日深
必至不救溫中自可散寒即此方也服後畏寒
悉除覺有躁熱乃陽回作汗佳兆不可疑之畏

成方切用表 卷三 大溫中飲 素

之此外凡以素稟薄弱之輩或感陰邪寒疫發
熱困倦雖未見如前陰證而熱邪未甚者但於
初感時即速用此飲連進二三服無不隨藥隨
愈真神劑也此方宜與理陰煎麻桂飲相參用
熟地三五錢於白朮三五錢當歸三五錢如泄瀉者
人參二錢甚者三錢甘草一錢麻黃三錢柴胡二錢
乾薑炒熟一二錢或用煨薑三五片水二盞煎八分去浮沫
溫服或略蓋取微汗 如氣虛加黃耆二三錢
如寒甚陽虛者加附子一二錢 如肚腹泄

成方切用 卷三上

瀉宜少減柴胡加防風細辛亦可

此方惟氣血兩虛而重感寒邪者宜之非正傷
寒治法

大羌活湯古 治兩感傷寒內經曰傷寒一日巨

腰脊經項痛故頭項痛腰脊強二日陽明受之
陽明主肉其脈俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻
乾不得臥三日少陽受之少陽主膽其脈循脇
絡於耳故胸脇痛而耳聾四日太陰受之太陰
脈布胃中絡於脘故腹滿而噎乾五日少陰受
之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而
渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器絡於肝故煩
滿而囊縮兩感者謂一日則太陽與少陰俱病
有頭痛項強而又口乾煩渴也二日則陽明與
太陰俱病有身熱譫語而又腹滿不欲食也三

成方切用表 卷三 大羌活湯 素

日則少陽與厥陰俱病有脇痛耳聾而又囊縮
厥逆也此陰陽表裏俱病欲汗之則有裏證欲
下之則有表證故仲景不立治法吳鶴皋曰易
老製此方意謂傳經者皆為陽邪一於升陽散
熱滋養陰臟則感之
淺者尙或可平也

羌活 獨活 防風 細辛 防已 黃芩

黃連 蒼朮 甘草炙 白朮錢三 知母 川芎

生地兩 每服五錢熱飲

此陰陽兩解之藥也氣薄則發泄故用羌獨蒼
防芎細祛風發表升散傳經之邪寒能勝熱故
用芩連知母生地防已清熱利溼滋培受傷之

六〇七

陰又用白朮甘草以固中州而和表裏之氣升不至峻寒不至凝間能回九死於一生也仲景

無治法又云兩感病俱作治有先後如表證急當先救表裏證急當先救裏李梴曰表裏俱急者大羌活湯陽證體痛而不下痢者為表急先以葛根麻黃解表後以調胃承氣攻裏陰證身痛而不利不止者為裏急先用四逆散裏後以桂枝救表陰陽未分者陶氏冲和湯探之古法一日太陽少陰五分散主之頭痛加羌活防風口渴加黃芩知母二日陽明太陰大柴胡湯三日少陽厥陰危甚大承氣加川芎柴胡救之劉宗厚曰傷有兼風兼溼不同表裏俱實俱虛之異大抵俱虛為多脈從陽者可治從陰者難治

歸葛飲景岳 治陽明溫暑時證大煩大渴津液枯

成方切用表 卷七 犀角消毒湯 後有方 聖

涸陰虛不能作汗等證

當歸錢三五 乾葛錢二三 水二盞煎一盞以冷水

浸涼徐徐服之得汗即解

舉斑湯 治瘟疫斑毒內陷吳又可曰瘟疫邪毒則斑不出出則毒邪從外解矣如下後斑漸出更不可下設有下證宜少與承氣緩服僅大下則元氣不振斑毒內陷則危宜托裏舉斑湯如下後斑毒隱伏反見循衣撮空脈微者本方加人參三錢得補發出者不死

白芍 當歸錢一 升麻分五 柴胡 白芷分七 穿山甲

錢二 水煎

犀角消毒湯 治瘟疫毒氣發斑痛痒

牛蒡子炒 防風錢二 荆芥錢一 甘草分八 犀角汁 每

服三錢水煎入犀角汁服

柴葛煎景岳 治瘟疫痘疹表裏俱熱能散毒養陰

方見卷十一上嬰孩門疏邪飲附方

成方切用表 卷七 犀角消毒湯 後有方 聖

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷三下

涌吐門正方八

瓜蒂散獨聖散

又三聖散

參蘆散

梔子豉湯

梔子厚

豉湯

梔子生薑豉湯

枳實梔子豉湯

梔子厚

朴湯

梔子大黃湯

稀涎散

乾霍亂吐方

燒鹽

大青湯

吐法

稀涎散

乾霍亂吐方

燒鹽

法

又

搐鼻法

搐鼻如聖散

當歸湯

成方切用

吐

卷三下目錄

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男 有杜雋望

成方切用

涌吐門

邪在表宜汗。在上焦宜吐。在中下宜而吐法絕置不用。使遇當吐之證而不行。涌越則邪氣壅結而不散矣。經曰其高者因而越之。又曰在上者涌之。丹溪曰吐中就有發散之義。張子和曰諸汗法古方多有之。惟以吐發汗者世罕知之。故子嘗曰吐法兼汗其以此夫。

成方切用

卷三下

瓜蒂散

仲

治卒中痰迷涎潮壅盛顛狂煩亂人

事昏沉五癰痰壅食填太陰欲吐不出亦治諸

黃急黃卒然發黃心滿氣喘命在須臾日仲景

云病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中

痞硬氣上衝咽喉不得息此為胸中有寒也當

吐之宜瓜蒂散諸凶血虛家不可與瓜蒂散

言曰寒者痰也痰飲內動身必有汗加以發熱惡寒。至似中風但頭不痛項不強此非外入之風乃內蘊之痰窒塞胸間。

脈乍緊者邪結在胸中心下滿而煩饑不能食

者病在胸中。當須吐之。宜瓜蒂散。手足厥冷。與厥淡相似。其脈乍緊。則有時不緊。殊不似矣。可見痰結在胸。故滿煩而不能食。亦宜瓜蒂散為吐法。

甜瓜蒂黃炒赤小豆 等分各別搗篩為散已合

治之取一錢七以香豉一合熱湯七合煮稀糜

取汁和散溫頓服之快吐乃止吐時須令閉目

緊束肚皮吐不止者葱白湯解之良久不出者

含砂糖一塊即吐諸血虛家老人產婦挾虛

脈微者俱不可服非尺脈絕者不宜便服此恐損胃氣若止胸中窒塞悶亂

成方切用吐瓜蒂散

以物探之得吐即止若探不出方以此湯吐之

胸中痰食與虛煩者不同越以瓜蒂之苦涌以

赤小豆之酸吐去上焦有形之物則木得舒暢

天地交而萬物通矣赤小豆之屬是也赤豆瓜

蒂並能行水滲痰涎頭滿寒熱脈緊不大者宜此散吐之或問何謂木鬱曰厥陰少陽

屬木於命為春乃人身生發之氣也食者陰物也脾胃者坤上也飲食填塞大陰則土盛而反

侮木生氣不得上升而木鬱矣吐去上焦有當形之物則木得條達而遂其升生之氣矣

用而胃弱者改用參蘆

除赤豆名獨聖散 仲景曰太陽中暈身熱疼

重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也。劉宏鑿曰仲景於此病用一物瓜蒂散去胸中之水且變散為湯并無賴於赤小豆與漿水者蓋以物驅逐其水則湯氣行而身重熱立解矣此則內因也由是推之如傷寒濕之從手上者可內臍而解地溼之從手下者可利小便而解上溼下流與下溼上甚為熱者可一

解也除赤豆加防風藜蘆名三聖散和除赤豆

加鬱金韭汁鵝翎探吐亦名三聖散治中風風

痼痰厥頭痛除赤豆加全蠍五分吐風痰加淡

鼓治傷寒煩悶瓜蒂散皆吐劑要知瓜蒂吐痰食宿寒扼鼓吐虛煩客熱如

未經汗下邪鬱胸膈而痞滿者謂之實宜瓜蒂散此重劑也已經汗吐下邪乘虛客胸中而懊

成方切用吐瓜蒂散

懷者宜扼鼓湯此輕劑也丹溪用瓜蒂梔子若參藜蘆等累吐許白雲不透後以附子尖和漿水與之始得大吐也

參蘆散 治虛弱人痰涎壅盛

人參蘆 為末水調一二錢或加竹瀝滑和服

服後以物微探吐之如不探亦未必吐也

病人虛羸故以參蘆代藜蘆瓜蒂宜猶帶補不

致耗傷元氣也丹溪曰人參補陽中之陰蘆反瀉太陰之陽亦猶麻黃苗能發

汗根能上汗也

梔子鼓湯治傷寒汗吐下後虛煩不眠者

治傷寒汗吐下後虛煩不眠者

反覆顛倒心中懊懣及大下後身熱不退心下
結痛或痰在膈中汗吐下後正氣不足邪氣乘
熱者熱而煩擾懊懣者懊懣悶也晝動為陽
夜則主陰陽熱未散陰氣未復故不得眠身熱
去而心結痛者熱盡入裏則為結胸熱不去而
結痛者客熱散漫為虛煩熱仍在表故當散之
梔子十四淡豉四服令微吐

煩為熱勝梔子苦寒入心故以為君淡豉
苦能泄熱腐能勝焦腎氣為腐心氣為焦助梔
子以吐虛煩故以為臣酸苦涌泄為陰也此吐
無形之虛煩若膈有實邪當用瓜蒂散海藏曰
煩氣也

成方切用 卷三下 梔子豉湯

躁血也煩出於肺躁出於腎故用梔子治肺煩
香豉治腎躁亦用作吐藥以邪在上焦吐之則
邪散經所謂在上者因而越之也或問煩躁皆
心為之何謂煩出於肺躁出於腎曰熱則煩熱
甚則躁煩為陽躁為陰大抵皆心火為病火旺
則金燥而水虧惟火獨在故肺腎合而為煩躁
仲景曰病人舊微瀉者不可與服藥言曰
善微瀉則大腑易動服此方不能上湧反為下
泄矣後內經有先泄而後生他病者治其本必
先調之後乃治其他病故此示戒又曰諸梔豉
一法證顯實煩虛煩之不同要皆可用以湧其
餘熱乃因汗吐下後胸中陽氣不足最虛之處
便是容邪之處正宜因其高而越之兩若謂津
液內竭正氣暴虛餘邪不盡則仲景原有炙甘
草湯一法寧敢妄湧
以犯虛虛之戒耶

加甘草名梔子甘草豉湯仲治前證少氣者

壁曰少氣則加甘草以和中人皆知之然既少
氣謂是悞後中虛雖邪氣未退敢用梔豉以湧
吐之乎乃知此證之少氣緣外邪內陷洵是熱
傷元氣而不與但內弱者同此甘草所以不炙
而用也加生薑名梔子生薑豉湯仲治前證兼嘔
者辛以散逆除淡豉加乾薑名梔子乾薑湯仲治傷
寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者日丸藥

大下徒傷其中而不能湧瀦其邪故梔
子合乾薑用之亦溫中散邪之法也除淡豉
加厚朴枳實名梔子厚朴湯仲治傷寒下後心
煩腹滿卧起不安者證已具之實滿煩而不滿
即表證未罷之虛煩合而有之且卧起不安明
是邪熱胸表裏之間無可奈何之象故取梔

成方切用 卷三下 梔子豉湯

子以快湧其邪而合厚朴枳實以
泄腹中之滿亦表裏兩解之法也加枳實大黃
名梔子大黃湯仲治酒疸發黃心中懊懣或熱
痛亦治傷寒食復輕則消導加枳實名枳實梔
子豉湯仲治傷寒勞復大病瘥後起居勞復
為食加薤白名豉薤湯張文治傷寒下利如爛
肉注赤滯下伏氣腹痛諸熱證能散薤白辛溫
能開胸痹及加犀角大青名犀角大青湯治斑
毒熱甚頭痛

吐法 此方可代瓜蒂三聖之屬凡邪實上焦或

痰或食或氣逆不通等證皆可以此代之

蘿蔔子搗碎以溫湯和攪取淡湯徐徐飲之少

頃即當吐即有吐不出者亦從下行矣

一法以蘿蔔子為末溫水調服一匙良久吐涎

沫愈

稀涎散 治中風暴仆痰涎壅盛氣閉不通先通

其關令微吐稀涎續進他藥不可令大吐醒後

緩調治過亦治喉痺不能進食

皂角四挺去皮白礬兩為末溫水調下五分或

成方切用吐卷三稀涎散六

加藜蘆善通頂令人嚏

吳鶴阜曰清陽在上濁陰在下天冠地履無暴

仆也若濁邪逆上則清陽失位而倒置矣故令

人暴仆所以痰涎壅塞者風盛氣湧使然也經

曰病發於不足標而本之先治其標後治其本

故不與疎風補血而先吐其痰涎白礬酸苦能

涌泄鹹能軟頑痰故以為君皂角辛能通竅鹹

能去垢專制風木故以為使固奪門之兵也師

曰凡吐中風之痰使咽喉疎通能進湯藥便止

若盡攻其痰則無液以養筋令人孳急偏枯此

其禁也丹溪曰胃氣亦賴痰以養不

張子和加藜蘆常山甘草名常山散吐痰痰草

合常山必吐

乾霍亂吐方三 治乾霍亂欲吐不得吐欲瀉不

得瀉腹中大痛者霍亂揮霍擾亂也外有所感

爭故上吐下瀉而中絞痛也邪在上焦則吐在

下焦則瀉在中焦則吐瀉交作此溼霍亂證輕

易治若不能吐瀉邪不得出壅遏正氣關格陰

陽其死甚速俗名攬腸沙切勿與穀食即米飲

亦死

燒鹽 熱童便 三飲而三吐之

吐瀉不得邪結中焦鹹能軟堅可破頑痰宿食

炒之則苦故能涌吐童便本人身下降之氣引

火下行乃其舊路味又鹹寒故降火甚速脾此由

鬱極而不得發以致火熱鹽涌於上溺泄於下則

中通矣方極簡易而有回生之功不可忽視準

日鹽調童便非獨用以降陰之不通也

單用燒鹽熱水調飲以指探吐名燒鹽探吐法

治傷食痛連胸膈痞悶不通手足逆冷尺脈全

無食填太陰，抑遏膈，肺之氣不得上升，兩實相搏，故痛連胸膈，陽氣不舒，故手足逆冷。下焦隔絕，故尺脈不至，鹹潤下而軟堅，能破積聚，又能宣通，使不化之食從上而出，則塞者通矣。亦木鬱達之也。經曰：上部有脈，下部無脈，其人當吐，不吐者死。或曰：食填太陰，胸中痞亂，兩寸脈當用事，今反尺脈不見，其理安在？曰：獨陽不生，獨陰不長，天之用在於地，則萬物生長，地之用在於天，則萬物收藏。此乃天地交而萬物通也。故陽火之根，本於地，陰水之源，本於天。上五臟主有形之物，物者陰也，陰者水也，食塞於上，是絕五臟之源，源絕則水不下流，兩尺之脈絕，此其理也。千金用此法三飲三吐，通治霍亂、蠱毒、宿食、腹痛、冷氣、鬼氣。且曰：此法大勝用藥，凡有中食證，忽然厥逆，口不能言，肢不能舉者，名曰食厥。若作中風中氣治之，死可立待。宜先以鹽

成方切用

吐之再用消食導氣之藥。

卷三下

凡云二字

一法用鹽少許於熱鍋中炒紅色，乃入清水煮至將滾未滾之際攪勻，試其滋味稍淡，乃可飲之。每用半碗，漸次增飲，自然發吐，以去病為度而止。又法：凡諸藥皆可取吐，但隨證作湯劑探而吐之，無不可也。搯鼻法：溼家鼻塞、頭疼，或頭額兩太陽痛，宜行此法。

苦瓜帶不拘多少，為末，令病人嚙水一口，將此藥一字吹入鼻中，出黃水愈。溼家頭疼，是濁邪干清陽之分也。鼻者氣竅，上通於腦，下屬於肺，濁邪干之，故清竅不利。瓜蒂苦而善湧，瀉鼻竅受之，則能出濁邪而瀉溼熱。經曰：客者除之，此之謂也。搯鼻如聖散：治纏喉急痺、牙關緊閉。皂角去皮、白礬、雄黃、藜蘆，為末，搯鼻當歸湯：吐虛痰，神効。吐而絕不傷氣血也。

成方切用

卷三下

九

當歸錢五、甘草頭錢一、參蘆錢一，逆流水煎。

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷四上

攻下門 正方二十四 附方一十八

大承氣湯 三一承氣湯 六一順氣 小承氣湯 三化

調胃承氣湯 當歸承氣湯 破棺丹 大黃 大陷

胸湯 散白 小陷胸湯 大陷胸丸 十棗湯 三化神

赤金豆 三物備急丸 備急 太平丸 礪砂

九 敦阜丸 木香檳榔丸 木香導 百順丸 枳

實導滯丸 倒倉法 霞天 蜜煎導法 豬膽導法

成方切用 攻 卷四上 目錄

鹽合草烏導法 大螺着小腹法 番傷寒結胸法

又 附子瀉心湯 見瀉 大黃黃連瀉心湯 見瀉 抵當

湯 見瀉 桃仁承氣湯 見瀉 感應丸 見瀉 久痛丸 見

門 天台烏藥散 見瀉 竹葉薰法 蘿蔔菜薰法

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆蒼培同較

有杜雋望

成方切用

攻下門 凡攻氣者攻其聚聚可散也攻血者

藏者可破可行在經者可針可灸也攻痰者

攻其急真實者暫宜解標多虛者只宜求本

也但諸病之實有微甚用攻之法分輕重大

實者攻之未及可以再加微實者攻之太過

每以致害所當慎也凡病在陽者不可攻陰

病在胸者不可攻腹若此者病必乘虛內陷

成方切用 攻 卷四上

所謂引賊入門也病在陰者勿攻其陽病在裏者勿攻其表若此者病必因誤而甚所謂自撤藩蔽也大都治宜用攻必其病邪之甚者也若實邪既甚自與攻藥相宜不必難之補劑蓋實不嫌攻若但略加甘滯便相牽制虛不嫌補若但略加消耗便覺相妨所以純虛者最不宜清熱實者最不宜緩然實而誤補不過增病病增者可解虛而誤攻必先脫元元脫者無治矣是皆攻法之要也其或虛中有實實中有虛此又當酌其權宜不在急宜攻急宜補之例雖然凡用攻之法所以除

得已乃用之若或有疑再加詳慎蓋攻雖去邪無傷氣傷血實自古仁人所深忌者

正恐其成之難敗之易爾

大承氣湯 仲 治傷寒陽明腑證陽邪入裏胃實

難敗之易爾

大承氣湯 仲 治傷寒陽明腑證陽邪入裏胃實

難敗之易爾

不大便發熱譫語自汗出不惡寒痞滿燥實堅

全見雜病三焦大熱脈沉實者

惡熱是也此為在經仍當汗散若熱邪已入胃
腑痞滿燥熱堅全見者為當下實則譫語亂言
無次也虛則鄭聲一語頻言也陽明多血多氣
法當自汗過汗亡液無水以制火陽明有燥糞
結而不下故妄見妄言也經曰何緣得陽明病
曰太陽病若汗若下若利小便此亡津液胃中
乾燥因轉屬陽明胃實大便難也又曰太陽初
病發其汗汗先出而後汗止者此為陽明證能
食為中風風陽邪能消穀不能食為中寒寒陰
邪不能消穀以此為辨胸悶不食為痞胸腹
膨脹為滿大便枯少為燥腹滿為實亦治陽明剛瘕
痛不大便為實按之石硬為堅
此太陽兼陽明證其證腹滿口噤臥不着席身
足踰齒而無汗謂之剛瘕宜下之者以陽明主

成方切用

卷四上 大承氣湯

二

潤宗筋風寒溼熱傷陽明胃津液不行筋失所
養故以此湯下溼熱行津液喻嘉言曰傷寒腹
滿可下胸滿不可下謂熱邪尚在表也此證入
裏之熱極深極重陽熱既極陰血立至消亡小
下之熱尚不能勝必大下之以承領其一線之
陰陰氣不盡為陽所劫因而得生者多矣既有
下多凶陰之大戒復有急下救陰之法法學者
陰造端在斯矣。經曰陽明居中土也萬物所
歸無所復傳以胃為水穀之海四旁有病
皆傳入胃已入胃腑則不復傳他經矣
大黃四兩酒洗王海救日邪氣居高非酒不到
若用生者則遺高分之邪熱病愈後變生
目赤喉痺頭腫 芒硝三厚朴半枳實五先煎
瀉上熱疾也 朴實將熟內大黃煮二三沸傾碗內和芒硝服
得利則止 陶節菴曰去實熱用大黃無枳實不
通風經用附子無乾薑不熱發表用

麻黃無蔥白不發吐痰用瓜蒂無淡豉不湧竹
瀝無薑汁不能行經 稍蜜導無皂荚不能通秘
結

熱淫於內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者
以寒消之故用芒硝之鹹寒以潤燥軟堅大黃
之苦寒以瀉熱去瘀下燥結泄胃強枳實厚朴
之苦降瀉痞滿實滿經所謂土鬱奪之也屬土
大黃治大實芒硝治大燥大堅二味治有形血
藥也厚朴治大滿枳實治痞二味治無形氣藥
也 然非大實大滿不可輕投恐有寒中結胸痞
氣之變 此大小陷胸湯之所由作也。承順也
而閉者通正氣得舒故曰承氣仲景曰欲行大
承氣先與小承氣若腹中轉失氣者此但初鞭後
瀉不可大承氣攻之若不轉失氣者此但初鞭後
瀉脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜
桂枝湯陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜
麻黃湯此斷其入陽明之路仍從外解則不內
攻也又曰陽明病應發汗醫反下之此為大逆
皆仲景慎於攻下之意也喻嘉言曰陽明以胃
實為正則皆下證也陽明之邪其來路則由太
陽凡陽明證見八九而太陽證有一二未罷仍
從太陽而治之從陽明而治之八九而少陽證略見
則趨少陽凡陽明證雖見八九而少陽證略見
一二則從少陽治之從陽明而治之八九而少陽證略見
內風寒之邪已離太陽未接少陽恰在陽明界
損矣庸愚無識必待七日傳經已盡方敢議下
不知太陽有十餘日不解者若不辨經而但計

成方切用

卷四上 大承氣湯

三

而閉者通正氣得舒故曰承氣仲景曰欲行大
承氣先與小承氣若腹中轉失氣者此但初鞭後
瀉不可大承氣攻之若不轉失氣者此但初鞭後
瀉脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜
桂枝湯陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜
麻黃湯此斷其入陽明之路仍從外解則不內
攻也又曰陽明病應發汗醫反下之此為大逆
皆仲景慎於攻下之意也喻嘉言曰陽明以胃
實為正則皆下證也陽明之邪其來路則由太
陽凡陽明證見八九而太陽證有一二未罷仍
從太陽而治之從陽明而治之八九而少陽證略見
則趨少陽凡陽明證雖見八九而少陽證略見
一二則從少陽治之從陽明而治之八九而少陽證略見
內風寒之邪已離太陽未接少陽恰在陽明界
損矣庸愚無識必待七日傳經已盡方敢議下
不知太陽有十餘日不解者若不辨經而但計

日其誤下仍在大陽至陽明二三日即顯下證反以計日當而錯過及陽明已入少陽又以計日矣行攻下輕者重而重者死矣仲景法日數雖多但有表證而脈沉者猶宜發汗日數雖少若有裏證而脈沉者則宜下之古人有治惡寒戰慄用大承氣下燥屎而愈者此陽邪入裏熱結於裏表虛無陽故惡寒戰慄此陽盛格陰乃熱病非寒證誤投熱藥則死矣

加甘草等分名三一承氣湯 治大承氣證腹

滿實痛調胃證譫語下利小承氣證內熱不便

一切傷寒雜病畜熱內甚燥實堅脹

也成無已曰若大承氣證反用小承氣則邪不

滿不能食仲景所以分而治之後人以三方合

而為一云通治三方之證及傷寒雜病內外一

成方切用 卷四上 大承氣湯 四

切所傷與仲景之方甚相違戾失軒岐緩急之旨使病人暗受其害將誰咎哉加柴胡

黃芩甘草入鐵繡水三匙墜熱開結名六一順

氣湯柴胡大陷胸三方而為一方也治潮熱自

汗發渴譫語狂妄斑黃腹滿便實正陽明腑病

加人參甘草當歸桔梗薑棗名黃龍湯治邪熱

傳裏胃有燥屎心下硬痛身熱口渴下利純清

水有燥屎何以又下清水陶節菴曰此非內寒

人多矣年老氣血虛者去芒硝加麻仁

杏仁芍藥蜜丸名麻仁丸仲治跌陽脈浮而瀼

浮則胃氣強瀼則小便數浮瀼相搏大便則難

其脾為約氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通

調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾主

為胃行其津液者也今胃火乘脾約束津液但

潤燥通腸致大便數而大便難故名脾約與此九

然陽明脾約是也按成氏釋此證謂脾弱胃強

弱即當補矣何為反用大黃朴實乎此脾土過

燥使腸胃津液枯槁致中消便難使脾果弱非

凡宜攻下者惟恐邪未入胃大便秘結又恐初

鞭後瀉未可妄攻故先與小承氣試其轉失氣

太陽即當下矣何待陽明耶朱丹溪曰此由久

病大瀉下之後陰血枯槁內火播灼熱傷元

氣又傷於脾而成肺金受火氣無所攝腎為肺

子肺耗則液虧金耗則木寡於畏土欲不傷其

可得乎脾失傳送脾失轉輸故大便秘而小便

數也理宜滋養陰血使火不熾而全化行木有

制而脾土運津液乃能入胃腸潤而通矣此方

施之熱盛而氣實者則安若熱盛而血虛者勿

膠柱而鼓瑟也

當下諸證發汗不解腹滿痛者急下之利三

滑而數者有宿食也宜下之脈經曰滑為食積

尺中亦微而瀼知有宿食宜下之傷寒六七

者此為實也急下之內經曰諸脈皆屬於目針

照物也陽明病發熱汗多者急下之汗多則

津液而內燥宜急下以存津液少陰瀼瀼之

成方切用

卷四

下諸證

六

下諸證

六

下諸證

六

下諸證

六

下諸證

六

下諸證

六

小承氣湯

仲景一名三

治傷寒陽明證

譫語便

動氣者不可下

諸

動氣者不可下

諸

動氣者不可下

諸

動氣者不可下

諸

動氣者不可下

諸

三日口燥咽乾者急下之邪人未深便作口燥
 此腎水將乾宜急下以救絕之水少陰證六
 七日腹脹不大便者急下之此少陰邪熱入胃
 腑也土勝則水乾宜急下以救腎水少陰病自
 利清水色純青心中必痛口燥者急下之青
 為肝色肝邪乘腎故下利陽邪上攻故口燥此
 亦少陰傳入陽明腑證也厥陰證舌捲囊縮宜
 急下之此證仲景無治法按舌捲囊縮有寒極
 而縮者宜附子四逆加吳茱萸黃湯并灸關元氣
 海慈熨等法又有陽明之熱陷厥陰經陽明
 主潤宗筋宗筋為熱所攻勿榮而急引舌與等
 九故舌卷囊縮此為熱極當瀉陽以救陰以上
 皆大承氣證也張兼善曰胃為水穀之海四旁
 有病皆能傳入胃土燥則腎水乾故陽明與少
 陰皆有用大承氣之條證雖不同其入腑之理則一
 故皆用大承氣有病循衣摸牀兩手撮空者此
 胃熱也錢仲陽小兒直訣云此肝熱也亦承氣
 湯主之妻全善曰嘗治循衣摸牀撮空數人皆

用大補氣血之劑惟一人兼振脾脈代遂於補
 劑中加桂二分亦振止脈和而愈按諸語亦有
 因氣虛陽脫而然者
 當用參附大補之
忌下諸證 太陽病外證未解不可下脈浮大為
 嘔為邪在上焦雖有陽明證不可下陽明病不可下
 發汗反下之此為大逆陽明病不能食攻其熱
 必噦胃中虛冷故也太陽陽明合病喘而胸滿
 宜麻黃湯肺氣清則胃邪自散不可下少陰病
 陽虛人脈弱瀉者不可下脈數不可下數為血
 虛下之則熱邪入裏血愈虛而凶陰惡水者不
 可下下之裏冷不嗜食完穀出頭痛目黃者不
 可下諸四逆厥者不可下陽微不可下下之痞
 動氣者不可下諸

成方切用

卷四

小承氣湯

七

下諸證

七

下諸證

陽明有太陽陽明有少陽陽明自陽明經傳入
 胃腑不惡寒腹滿便鞭者宜大承氣下之若汗
 多發熱微惡寒者為外未解其熱不潮未可與
 承氣若腹大滿不通者可與小承氣微和胃氣
 勿令大泄下謂陽明有在經者未全入腑尤宜
 審慎陽明少自病多由太陽傳入成無已曰自
 太陽少陽傳入者眾所共知自三陰傳入者鮮
 或能識三陰有急下之證多矣豈非仲景之微
 旨與經曰傷寒脈浮緩手足溫者繫在太陰當
 發黃若小便利者不能發黃至七八日大便鞭
 者陽明病也程郊倩曰此證謂之太陰陽明陽
 明為病本之胃實不特三陽受邪能轉屬陽明
 三陰亦能轉屬陽明推之少陰三大承氣
 厥陰一小承氣何非轉屬陽明之病哉

更潮熱而喘及雜病上焦痞滿不通
 大黃四兩厚朴二兩薑炒枳實三枚 水四升煮一升
 二合去渣分溫二服初服當更衣不爾者盡飲
 之若更衣勿服
邪在上焦則滿在中焦則脹胃實則潮熱 猶潮
 來其來有時陽明燥金旺於申酉故
 日晡潮熱傷寒潮熱為胃實無虛證陽邪乘心
 則狂故譫 胃熱干肺則喘故以枳朴去上焦之
 痞滿以大黃瀉胃中之實熱此痞滿燥實堅未
 全者故除芒硝欲其無傷下焦真陰也 陽明證
 有正陽

金匱用治

支飲胸滿

更名厚朴大黃湯

徐忠可

日言支

飲則必稍偏矣然不引痛脇下亦不言脇支滿

而只胸滿雖是偏而不甚偏故可直驅之而用

小承氣氣順則自下也。此即小承氣治腹滿之病而用者。即日三物湯。蓋此重散結氣。故以厚朴為主。彼乃與比。加羌活名三化湯。要治中物湯對照言之也。

風邪氣作實二便不通。其傳化之常也。加羌活者。病本於風也。然中風多虛氣上逆。無用承氣之理。非堅實之體。不可輕投。

調胃承氣湯。治傷寒陽明病不惡寒反惡熱。口渴便閉。譫語腹滿中焦燥實。及傷寒吐後腹脹滿者。邪在表。則身熱汗出而惡寒。邪已入裏。則表證罷。故不惡寒。身熱汗出而反惡熱也。汗多。津液乾。故又入裏。故口渴便閉。無水以制。火內有燥屎。故發見妄言而譫語。吐後不解。腹脹滿者。熱入胃也。然滿而不。陽明病不吐不痛。不宜急下。故少與調胃和之。

成方切用 卷四 調胃承氣湯 九

下而心煩者。吐後煩為內煩。下後煩為虛煩。亦治渴證。中消善食而溲。

大黃酒浸。芒硝兩。甘草錢五。少少溫服。

大黃苦寒除熱。蕩實。芒硝鹹寒潤燥。軟堅。二物下行甚速。故用甘草甘平以緩之。不致傷胃。故曰調胃承氣。去枳朴者。不欲其犯上焦氣分也。

準繩曰。陽明一證。分為太陽。正陽。少陽。三。等。按本草。大黃酒浸。入太陽。經。酒洗。入陽明。經。浸。久。於洗。故能引於至高之分。仲景以調胃承氣。收。入太陽。門。而大黃。註曰。酒浸。湯後。日少少溫服。日當和胃氣。又本湯。治不吐。不下。心煩者。及發。汗不解。蒸蒸發熱者。吐後。腹脹滿者。是太陽。陽。

明去表未遠。其病在上。不當攻下。故宜緩劑。調和之也。至正陽陽明。則日急下之。而大承氣湯。以治其中也。至少陽陽明。則去正陽。而過太陰。其分爲下。故小承氣湯。大黃不用。酒製。少陽不宜下。故去芒硝。又日少與微溲之。勿令大泄下。此仲景之妙法也。大承氣。統治三焦。小承氣。不犯下焦。調胃承氣。不犯上焦。加當歸。薑棗。煎名當歸承氣湯。治裏熱。火鬱。或皮膚枯燥。或咽鼻乾。或便溺秘結。或瘀血。發狂。加當歸。入血。分以潤燥。調營。亦與除芒硝。名大黃甘草湯。治食已即吐。徐忠可曰。食已矣。亦非胃弱不能消。乃胃不容穀。食已即出者也。明是有物傷胃。營氣閉而不納。故以大黃通。

成方切用 卷四 調胃承氣湯 九

營分已閉之穀氣。而兼以甘草調其胃。爾外臺。用治吐水。大黃亦能開脾氣之閉。而使散精於肺。通調水道。用大黃二兩半。芒硝甘草各二兩。下輪膀胱也。

又名破棺丹。治多汗大渴。便閉。譫語。陽結之證。及諸瘡腫熱。董廢翁云。按承氣三方。俱仲景成中津液。爲實熱之邪。燔灼枯槁而死。皆先賢至精至妙之旨也。但後世陽胃脆薄者多。氣血充實者少。審之未的。或致誤投。一下之後。變證蜂起。卒致不救。粗工殺人。往往因此。所以後賢師古人之意。變古人之法。凡審其人病。係實邪。而質非強壯。脈不牢。固者。藥用滋陰。補水之劑。如甘露飲。四物湯。或六味飲。貞元飲。或左歸飲。去茯苓。加花粉。濃煎。頻進。令胃中津液充足。實邪自解。陰氣外溢。則得活。陰血下潤。則便通。奏效雖遲。實稱靈當。此乃仲景功臣。不可不知也。又

六 一 八

成方切用

卷四上

十一

曰治感證大法總以始終照顧胃中津液為第一
一與貴蓋邪之所感皮毛閉塞氣不外達鬱而
成熱熱積皮毛不解漸而肌肉熱矣漸而各經
絡無不熱矣漸而熱氣皆壅塞陽明府中熱矣
此必然之勢也又况邇來稟賦漸薄且喜御酒
肉厚味胃中素有淫熱者多一旦客熱交併區
區陰津幾何能當此烈燄燎原乎凡感證之死
皆由胃汁乾枯故也是以古人立法及其邪之
在表血氣未傷之時當汗之欲熱從汗解則
清寧安固而氣血全保不傷矣當其邪之在裏
血氣漸虧之際可徐俟其來復矣其有氣血素
頓除而氣血可徐俟其來復矣其有氣血素虧
之人三五日後不論表證解與未解裏證急與
不急一見口乾唇焦舌胎黑燥全用滋養清涼
虛甚者并涼藥不用純陰重劑加人參升發運
用但救得胃中津液不竭其人必不即死及其
津液漸充汗自能來宿物自下至所謂胃中之
津液非他即周身氣血所化乃後天之本也凡

人平日之強弱及遇外感賊邪之難治易治可
治不可治強半憑此粗工不知無論新久虛實
但見身熱風藥混表一覺滿悶攻中破氣雜投
不効大黃枳朴繼進必求一便以畢其技能豈
慮熱得風而益熾陰被劫而速
亡何其與先賢之意相反乎

大陷胸湯

仲景

治傷寒下早表邪內陷膈內拒痛

心下因鞅成結胸證或重汗而復下之不大便

五六日舌上燥渴日晡所小有潮熱從心上至

小腹鞭滿而痛不可近者

按之鞭痛者為結胸
之太早邪熱乘虛入結於心膈之間故鞭而痛
又有鞭痛而無熱證者為寒實結胸白散主之
結胸固當下然脈浮大者下之則死以其猶帶
表邪下之重虛結而又結故死嘉言曰太陽誤

成方切用

卷四上

十一

下之脈主病皆在陽在表即有沉緊沉滑之
皆不得以表陰名之
中滿蓋表邪傳裏必先胸膈以至心腹入胃是以
胸膈多帶表證宜微汗胸膈多帶半表半裏宜
和緩胸中痰實者宜湧之如結實燥渴使秘宜
以此湯下之附白散巴豆一分去心皮炒黑
研貝母桔梗各三分治寒實結胸巴豆辛熱以
散寒結貝母苦辛以散痰熱結在胸故以桔梗
浮而上之利膈清表故病在膈上必吐病在膈
下必利也

大黃二 芒硝一 升甘遂一錢 先煮大黃去渣內

芒硝煮一二沸內甘遂末溫服

表邪入裏結於高位以致三焦俱實手不可近

證為危急非常藥所能平故以甘遂苦寒行水

直達為君芒硝鹹寒軟堅為臣大黃苦寒蕩滌

為使三藥至峻而有起死之功

宜若可吐然邪氣與胸中陽氣相結不能分解
壅於心下為鞭為痛非虛煩胸膈實者所可同故
須攻下也低者舉之高者陷之以平為期故曰
陷胸也經又曰太陽病脈浮而動數浮則為風
數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜
汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變
遲膈內拒痛胃中空虛客氣動瀉短氣躁煩心
中懊憹陽氣內陷心下因鞅則為結胸大陷胸
湯主之朱丹溪曰太陽病脈浮而動數今得誤下
矣原文曰太陽病脈浮而動數今得誤下動數
變遲矣又曰胃中空虛又曰短氣躁煩虛之其
矣借曰陽氣內陷心下因鞅而可迅攻之乎

陷胸之方。反緩於承氣。一。下。再。下。寧。不。畏。其。虛。乎。前。文。曰。結。胸。脈。浮。大。者。下。之。死。又。曰。結。胸。證。悉。其。煩。躁。者。死。今。曰。脈。浮。又。曰。煩。躁。大。陷。胸。果。可。用。乎。苦。胃。中。空。虛。客。氣。動。膈。心。中。懊。憹。當。以。梔。子。豉。湯。吐。去。胸。中。之。邪。陶。節。菴。曰。結。胸。乃。下。早。而。成。未。曾。經。下。者。非。結。胸。也。乃。表。邪。傳。至。胸。中。證。雖。滿。悶。尚。為。在。表。正。屬。少。陽。部。分。半。表。半。裏。之。間。只。須。小。柴。胡。加。枳。桔。以。治。未。效。則。以。小。柴。胡。對。小。陷。胸。一。服。諸。然。若。因。下。早。而。成。者。方。用。陷。胸。湯。九。分。淺。深。從。緩。治。之。不。宜。太。峻。上。焦。乃。清。道。至。高。之。分。過。下。則。傷。元。氣。也。崔。行。功。曰。傷。寒。結。胸。欲。絕。心。膈。高。起。手。不。可。近。用。大。陷。胸。湯。不。差。者。此。下。後。虛。逆。氣。已。不。理。毒。復。上。攻。當。用。枳。實。理。中。丸。先。理。其。氣。次。調。諸。疾。其。效。如。神。活。人。云。誤。下。未。成。結。胸。中。者。急。須。與。理。中。湯。自。然。解。了。蓋。理。中。治。中。焦。故。也。胃。中。雖。和。傷。寒。未。退。宜。俟。日。數。足。卻。以。承。氣。再。下。之。蓋。前。來。之。下。未。是。也。其。水。結。胸。者。用。小。半。夏。加。茯苓。湯。小。柴。胡。湯。

成方切用 卷四 小陷胸湯 主

胡去索加牡蠣主之。又有血結胸證。手不可近。漱水不欲嚥。喜忘如狂。大便黑。小便利。宜犀角地黃湯。

小陷胸湯 治傷寒誤下小結胸正在心下按

之則痛脈浮滑者及痰熱塞胸。此則正在心下。前證痛不可近。此則按之則痛。結胸脈沉緊。或寸浮關沉。今脈浮滑。知熱未深。與此湯以除膈熱。

黃連 半升 枳實 一枚

黃連之苦寒以泄熱。枳實之寒潤以滌垢。半夏之辛溫以散結。結胸多由痰熱結聚。故用三物。

以除痰去熱也。劉心山曰。結胸多由痰飲凝結。括囊枳實旋覆之類。皆為痰飲而設也。

大陷胸丸 治傷寒結胸項強如柔痙狀。有汗

瘕。胸膈實滿。故項強而

不能俯。項屬太陽部位。

大黃 兩 杏仁 尖 葶藶 炒 芒硝 各半 合研取

如彈丸一枚。別搗甘遂末一錢。白蜜丸。合煮服。

大黃之苦寒以泄熱。芒硝之鹹寒以軟堅。杏仁

之苦甘以降氣。葶藶甘遂取其行水而直達白

成方切用 卷四 大陷胸丸 主

十棗湯 治太陽中風下利嘔逆表解者乃可

攻之。其人熱熱汗出頭痛。心下痞硬。引脇下痛。

乾嘔短氣。汗出不惡寒。表解而裏未和。邪熱內

蓄。有伏飲者。下利嘔逆。裏受邪也。汗出不惡寒。

嘔短氣。邪熱內蓄。而有伏飲也。此為水氣上逆。

嘔逆頭痛。與表證頭痛稍別。周揚俊曰。此證與

結胸頗同。故湯亦與陷胸相倣。表解後攻。與結胸之戒不殊也。

芫花 炒 甘遂 大戟 等分 大棗 十枚 先煮棗去滓

內前藥末。強人服一錢。虛人五分。或棗肉為丸。病不除者。再服。得快下後。糜粥自養。

芫花大戟之辛苦以逐水飲甘遂苦寒能直達

水氣所結之處以攻決為用三藥過峻故用大

棗之甘以緩之益土所以勝水使邪從二便而

出也十棗湯小青龙湯主水氣乾嘔桂枝湯主

吳茱萸湯主厥陰吐涎沫乾嘔主少陰下利乾嘔

水用小青龙裏有水用十棗李時珍曰仲景治

傷寒太陽證表未解心下有水氣而咳乾嘔發

熱或喘或利小青龙湯主之表已解有時頭痛

惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或咳十

棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所

謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從二便出內經

所謂潔淨腑去陳莖法也或問十棗湯桂枝去

桂加茯苓白朮湯皆屬飲家俱有頭痛項強之

證何也張兼善曰太陽經多血少氣病人表熱

成方切用 卷四上 十棗湯 齒

微渴恣飲水漿為水多氣弱不能施化本經血

氣因而凝滯致有頭痛項強之患不須攻表但

宜逐飲飲盡則自安杜王曰裏未和者蓋痰與

燥氣壅於中焦故頭痛乾嘔汗出短氣是痰膈

也非十棗不能除但此湯不宜輕用恐損人於後忽

除大棗加大黃黑丑輕粉水丸名三花神佑丸

河治壯實人風痰鬱熱支體痲痺走注疼痛溼

熱腫滿氣血壅滯不得宣通及積痰翻胃服二

丸後轉加痛悶此痰涎壅塞頓攻不開再加二

丸快利則止加牽牛大黃大瀉氣血之淫加輕

可輕 各五錢加黃檗三兩大黃煨兩粥丸名小

胃丹治胸膈腸胃熱痰溼痰

赤金丹亦名八 治諸積不行凡血凝氣滯疼痛

腫脹蟲積結聚癥堅宜此主之此丸去病極速

較之硝黃稜莪之類過傷臟氣者大為勝之

巴霜去皮膜略去 錢五分生附子切略炒 錢二

丁香 木香 天竺黃各二錢輕粉錢一硃砂錢二

為末醋浸蒸餅為丸蘿蔔子大硃砂為衣欲

漸去每服五七丸欲驟行者每服一二十九丸用

滾水或煎藥或薑醋茶蜜茴香使君子煎湯為

成方切用 卷四上 赤金丹 五

引送下若利多不止可飲冷水一二口即止蓋

此藥得熱則行得冷即止也如治氣溼食滯鼓

腫先用紅棗煮熟取肉一錢許隨用七八丸甚

者一二十九丸同棗肉研爛以熱燒酒加白糖少

許送下如治蟲痛亦用棗肉和服止用清湯送

下

三物備急丸治食停腸胃冷熱不調腹脹氣

急痛滿欲死及中惡客忤卒暴諸病食滯腸胃

下厥不通故痛脹欲

死內實者宜當下之

巴豆霜 大黃 乾薑 等分蜜丸小豆大每服二三丸中惡口噤者折齒灌之崔氏乾薑易桂枝名備急散

大黃苦寒以下熱結巴豆辛熱以下寒結加乾薑辛散以宣通之乾薑辛溫開五臟六腑通四肢關節三藥峻厲非急莫施故曰備急

太平丸 治胸腹疼痛脹滿及食積氣積氣疝血

疝邪實祕滯等證此方借些微巴豆以行羣藥之力去滯最妙如欲其峻須用巴豆

成方切用 卷四十一 三物備急丸 太平丸 七

陳皮 厚朴 木香 烏藥 白芥子 草薺

寇 三稜 蓬蘂 乾薑 牙皂炒煙 澤瀉各

錢 已上十一味共為細末另將巴豆用滾湯

泡去皮心并膜稱足一錢用水一碗微火煮半

碗將巴豆撈起用乳鉢研極細仍將煎湯攪入

研勻然後量藥多少入蒸餅浸爛搗丸前藥如

茶荳大每用三分或五分甚者一錢隨證用湯

引送下 凡傷食停滯即以木物湯下 婦人

血氣痛或紅花湯下或當歸湯下 氣痛陳皮

湯下 疝氣茴香湯下 寒氣薑湯下 欲瀉者用熱湯送下一錢未利再服 利多不止用冷水一二口即止

硃砂丸本 治一切積聚痰飲心脇引痛

硃砂 巴豆去油 三稜 乾薑 白芷錢五 木香

青皮 胡椒半錢 乾姜 炒 大黃兩 檳榔 肉荳

蔻一 為末醞醋二升煮巴豆五七沸再下三

稜大黃末同煎五七沸入硃砂熬成膏和諸藥

杵丸茶荳大每服五丸薑湯下

成方切用 卷四十一 硃砂丸 七

此治肉積氣積血積通劑也硃砂化肉食性大

熱能爛五金本草言其能化人心功乾姜散痰血

為血故治膈噎癥瘕肉積有殊功

木香青皮行滯氣三稜破血而行氣肉蔻煖胃

而和中白芷散風而除溼乾薑胡椒除沉寒銅

冷大黃巴豆能斬關奪門方內多辛熱有毒之

品用之以破冷攻堅惟大黃苦寒假之以蕩熱

去實蓋積聚既深攻治不得不峻用醋者酸以

收之也玉機微義曰方中因白芷散水行氣故更言治痰飲也。潔古曰壯人無積虛人則有之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四時有感皆能成積若遠以磨空破結之藥治之疾似去

而人已衰矣乾茶礪砂三稜大黃牽牛之類得藥則暫快藥過則依然氣愈消疾愈大竟向益哉故善治者當先補虛使氣血旺積自消如滿坐皆君子則小人自無容地也不問何臟先調其中使能飲食是其本也

敦阜丸 治堅頑食積停滯腸胃痛劇不行等證

木香 山查 麥芽 皂角 丁香 烏藥

青皮 陳皮 澤瀉錢各五 巴霜錢一 右共為末

用生蒜頭一兩研爛加熟水取汁浸蒸餅搗爛丸棗豆大每服二三十丸隨便用湯引送下如未愈徐徐加之

成方切用 **卷四上** 敦阜丸

木香檳榔丸 治胸腹積滯痞滿結痛二便不通或瀉泄下痢裏急後重食瘧實積胸腹痞滿

飲食滯滯滯滯熱鬱積而成二便不通由於熱結裏急後重由於氣滯。按裏急後重有因火熱者火燥物而性急也。有因氣滯者大腸氣壅不得宣通也。有因積滯者腸胃有物結滯也。有氣虛者中氣陷下不能升也。有血虛者津枯腸燥虛坐努責是也。當分證論治脈洪大而實為裏實宜下若脈浮大慎不可下。

莢連醋三稜 黃連吳茱萸 黃檗酒炒 枳殼 陳皮 白青皮醋炒 檳榔 木香錢五 大黃酒炒 香附 黑牽牛二兩 芒硝水丸量人虛實服一方加當歸

酒張子和儒門事親無三稜枳殼只十味絀珠無三稜陳皮名木香導氣丸

溼熱在三焦氣分木香香附行氣之藥能通三焦解六鬱陳皮理上焦肺氣青皮平下焦肝氣瀉痢多由肝木剋脾土。枳殼寬腸而利氣而黑丑檳榔又下氣之最速者也氣行則無痞滿後重之患矣瘧痢由於溼熱鬱積氣血不和黃檗黃連燥溼清熱之藥三稜破血中氣滯莢連破氣中血滯大黃芒硝血分之藥能除血中伏熱通行積滯

成方切用 **卷四上** 木香檳榔丸 百順丸

竝為摧堅化痞之峻品溼熱積滯去則二便調而三焦通泰矣蓋宿垢不除清陽終不得升故必假此以推蕩之亦通因通用之意然非實積不可輕投滑伯仁曰腸胃陽明燥金也下焦少金之鬱也癰閉之用知母黃檗散相火之熾也。

百順丸 治一切陽邪積滯凡氣積血積蟲積食積傷寒實熱祕結等證但各為湯引隨宜送下無往不利
川大黃錦紋者 牙皂角炒微黃一兩六錢 為末湯浸

蒸餅為丸菘豆大每用五分或一錢或二三錢酌宜用引送下或用蜜丸亦可

枳實導滯丸東垣治傷溼熱之物不得施化痞悶

不安腹內硬痛積滯泄瀉

大黃一斤枳實炒黃芩炒黃連炒神麴五錢白朮炒

茯苓錢三澤瀉錢二蒸餅為丸量多寡服

飲食傷滯作痛成積非有以推蕩之則不行積滯不盡病終不除故以大黃枳實攻而下之而痛瀉反止經所謂通因通用也傷由溼熱黃芩

成方切用政卷四上枳實導滯丸手

黃連佐之以清熱茯苓澤瀉佐之以利溼積由酒食神麴蒸薯之物化食解酒因其同類溼而消之芩連大黃苦寒太甚恐其傷胃故又以白朮之甘溫補土而固中也

倒倉法丹

黃牡牛肉肥嫩者二斤切碎洗淨用長流水桑柴火煮糜爛濾去滓取淨汁再入鍋中文武火熬至琥珀色則成矣擇一靜室明快不通風者令病人先一夜不食坐其中每飲一鍾少時又

飲積數十鍾病在上者必吐病在下者必利病在中者吐而且利視所出物可盡病根乃止連

之意則逆上而吐多緩則順下而利多規病之上下而為緩急吐利後必渴不得與湯其小便必長取以飲之名輪迴酒非惟

止渴兼滌餘垢行後倦臥覺饑先與米飲次與稀粥三日後方與厚粥軟飯菜羹調養半月一

月精神煥發沉疴悉痊矣須戒色慾半年一年

戒牛肉五年 霞天膏即照前法每肉十二觔

可熬膏一觔磁罐盛之夏月水浸可留三日寒

成方切用政卷四上倒倉法手

天久留生微用重湯煮入煎劑調服入丸劑每

三分加麴一分煮糊或同蜜煉

朱丹溪曰牛坤土也黃土之色也以順為德而

法健為功者牡之用也肉胃之藥也液無形之

物也積聚久則形質成依附腸胃迴薄曲折之

處以為巢曰豈銖兩之丸散所能窺其藩牖乎

肉液充滿流行無處不到如洪水泛漲浮莖陳

朽皆順流而下不能停留凡屬滯礙一洗而空

澤枯潤搞補虛益損寧無精神煥發之樂乎其

方傳於西域異人中年後行一二次亦卻病養

壽之一助也王綸曰牛肉補中非吐下藥倍補為瀉以瀉為補亦奇方也

蜜煎導法仲景治陽明證自汗小便利大便秘者

胃實自汗小便復利此為津液內竭非熱結也若與下藥則液愈耗矣雖大便秘不可攻之宜俟其欲大便然後用此導之法

蜜七合銅器中微火煎頻攪勿令焦候凝如飴

捻作挺子令頭銳大如指長寸許摻皂角末少

許乘熱納穀道中用手抱住大便出時乃去之

加鹽少許亦可

成方切用政卷四上蜜煎導法三

蜜能潤腸執能行氣皂能通竅津液內竭則不

可攻須俟其欲便乃導而道之不欲以苦寒傷

胃也徐忠可曰此為大便將行而不能潤利者設也結胸痞滿腸結胃有燥屎皆有見證

今但自汗且小便利是津耗熱鬱而乾燥也

豬膽導法仲景治證同前

豬膽一枚取汁入醋少許用竹管長三四寸以

一半納穀道中將膽汁灌入頃當大便

便秘者屬燥屬熱自汗者為亡津液當小便不

利今反利是熱猶未實故不可攻豬膽汁寒勝

熱滑潤燥苦能降醋酸善入故能引入大腸而

通之也海藏法用蜜煎鹽相合或草烏未相合亦可蓋鹽能軟堅潤燥草烏能化寒消

結可隨證陰陽所宜而用之準繩曰凡多汗傷津及屢經汗下不解或尺中脈遲弱元氣素

虛人便欲下而不潤利者宜導法但須分津液枯者用蜜導邪熱甚者用膽導溼熱痰飲固結薑汁麻油浸括蕪根導惟下傍流水者導之

無益非大承氣峻攻不效以實結在內而不在下也至於陰結便閉者宜於蜜導中加薑汁生

附子末或削陳醬薑導之此補長沙之未備也

大螺着小腹法

宋季饒醫熊彥誠年五十五歲病前後便溺不

通五日腹脹如鼓同輩環視皆不能措力與西

成方切用政卷四上大螺着小腹法三

湖珍果僧慧月相善遣信邀至訣別月驚馳而

往於釣橋逢一異客揖之曰方外高人何子子

走趨若是月曰一善友久患祕結病危急欲往

問客曰易事爾待奉施一藥即脫靴入水探一

大螺而出曰事濟矣抵家以鹽半匙和殼生搗

置病者臍下一寸三分用寬帛緊繫之仍辦湯

器以須其通月未以為然姑異謝之至熊家彥

誠昏不知人妻子聚泣諸醫知無他策慢使試

之曾未安席而暴下諸醫愧嘆而散月歸其

人不見矣。能後十六年乃終。此因熱秘而便溺不通。天螺性寒而善分清。故濁水之中一着大螺。便能澄澈。劑之以鹽。取其善潤而已。

罨傷寒結胸法 凡傷寒結胸。其中有中氣虛弱。不堪攻擊。內消須以此法外罨之。則滯行邪散。其效如神。

葱白頭 四兩 **生薑** 四兩 **生蘿蔔** 此味加倍如無以子代之 **右三**

味共搗一處炒熱。用手巾或白布包作大餅。罨胸前脹痛處。此藥須分二包。冷則輪換。罨之無

成方切用 攻 **卷四上** 傷寒結胸法 **苦**

不卽時開通。汗出而愈。但不宜大熱。恐炮烙難受也。

又法以大蒜頭一二十箇搗爛。攤厚紙或薄絹。上貼於脹處。少頃卽散。用治一切腹脹無不神效。

竹葉薰法

凡大便不通。實結在肛門。而不得下。將烈火煮

竹葉一鍋。乘滾熱。傾淨桶內。上撒綠礬末。一握

上薰之。卽通。

又蘿蔔菜薰法。

用蘿蔔菜如上法。亦妙。如無蘿蔔菜。卽青菜亦可。

成方切用 攻 **卷四上** 竹葉

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷四下

消導門 正方一十九
附方三十三

枳木丸 枳木湯 半夏枳木丸 橘半枳木丸
木香枳木丸 木香枳木丸 香砂枳木丸

丸 消飲丸 三黃枳木丸 木香人參乾薑枳木丸
胃散 除溼湯 和胃散 藿香平胃散 木香枳木丸

飲 和胃飲 保和丸 小保和丸 芍藥枳實丸 痞
子 和胃飲 保和丸 小保和丸 芍藥枳實丸 痞

氣丸 伏梁丸 肥氣丸 十香丸 枳實消痞丸
息賁丸 賁豚丸 養榮健脾丸 舒鬱健脾丸

廓清飲 健脾丸 益氣健脾丸 養榮健脾丸 舒鬱健脾丸

成方切用 卷四下 目錄

化痰健脾丸 清火健脾丸 和中解肝煎 排
健脾丸 妙應丸 寬中進食丸

氣飲 葛花解醒湯 大和中飲 小和中飲

鼈甲飲 小分清飲 資生丸 神香散

佐關煎 見祛寒門 抑扶煎 見祛寒門

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男 有杜雋望

成方切用

消導門 消者散其積也。導者行其氣也。脾虛
而為積。或作瀉痢。或成癥痞。以致飲食減少。
五臟無所資稟。氣血日以虛衰。因致危困者
多矣。故必消而導之。峻劑已見
攻下門。茲集緩攻平治之劑。

枳木丸 消痞除痰健脾進食

成方切用 卷四下

白朮 二兩 枳實 一兩 為末 荷葉包 陳米飯煨

乾為丸 痞悶加陳皮 氣滯加木香 傷食加麥芽

神麩

東垣曰 白朮甘溫 補脾胃之元氣 其味苦 除胃

中溼熱 利腰臍間血 過於枳實 尅化之藥 一倍

枳實 苦寒 泄胃中痞悶 化胃中所傷 是先補其

虛而後化 其傷則不峻矣 荷葉 中空 色青 形仰

象 震在人為少陽 膽胃氣元氣 藪氣甲 膽上升

之氣 皆生氣也 食藥感此 氣化胃氣 何憂不上

升乎。燒飯與白朮協力。滋養穀氣。補令胃厚。不致再傷。其利廣矣。王安道曰。勞倦飲食難。俱為於不足之中。分其有餘。夫饑餓不飲。食者胃氣空虛。此為不足而傷也。飲食自倍。腸胃乃傷者。此不足之中。兼有餘而傷也。惟其不足。故補益惟其有餘。故消導。亦有物滯氣傷。宜消補兼行者。亦有物滯氣不傷。但須消導者。亦有不須消導。但須補益者。枳朮丸之類。雖曰消導。固有補益之意焉。若所滯之物。非枳朮丸之力。所能去者。備急丸。煮黃丸。瓜蒂散等。潔古東垣亦未嘗委之而勿用也。景岳曰。枳朮丸。以白朮為君。脾胃得其燥。所以能健。然佐以枳實。其味苦峻。有推牆倒壁之功。此實寓攻於守之劑。惟脾胃氣不虛。而滯勝者。正當用之。若脾胃氣已虛。非所宜也。今人不察。相傳為補脾之藥。而朝吞暮餌。或以小兒瘦弱。製令常服。則適足以傷其氣。助其瘦弱。

成方切用

卷四

枳朮丸

二

金匱用枳實七枚。白朮二兩。作湯。名枳朮湯。治水飲心下堅大如盤。邊如旋盃。心下。上焦陽分也。屬氣分之水。加半夏一兩。名半夏枳朮丸。治脾溼停痰。及傷冷食。淋者。加澤瀉一兩。加陳皮半夏。名橘半枳朮丸。健脾消痞。化痰。加橘皮一兩。名橘皮枳朮丸。治飲食不消。氣滯痞悶。加木香一兩。名木香枳朮丸。治氣滯痞滿。木香。平肝行氣。再加砂仁。名香砂枳朮丸。破滯氣。消飲食。強脾胃。再加乾

薑五錢。名木香乾薑枳朮丸。兼治氣寒。再加人參。陳皮。名木香人參乾薑枳朮丸。開胃進食。加茯苓五錢。乾薑七錢。名消飲丸。治停飲胸滿。嘔逆。加酒炒黃連。黃芩。大黃。炒神麴。橘紅。各一兩。名三黃枳朮丸。治傷肉食溼麩。辛熱味厚之物。填塞悶亂。不快。加神麴。麥芽。各一兩。名麴蘖枳朮丸。治內傷飲食。或泄瀉。

平胃散

治脾有停溼。痰飲痞膈。宿食不消。滿悶嘔瀉。土溼太過。木邪乘不勝而侮之。脾虛不能健運。故有痰食留滯。中焦致生痞滿。

成方切用

卷四

平胃散

三

諸證。胃寒則嘔。溼盛則瀉。及山嵐瘴霧。不服水土。嵐瘴。水土之病。亦由胃虛。故易感也。蒼朮二錢。厚朴二錢。陳皮一錢。甘草一錢。煎傷食。加神麴。麥芽。或枳實。溼勝。加五苓。痰多。加半夏。脾倦。不思食。加參耆。痞悶。加枳殼。木香。大便祕。加大黃。芒硝。小便赤。瀉。加蒼朮。傷寒。頭痛。加葱。豉。取微汗。蒼朮。辛烈燥溼。而強脾。厚朴。苦溫除溼。而散滯。苦溫能為實滿。辛溫能散溼滿。陳皮。辛溫利氣。而行痰。甘草。中

州主藥能補能和為使泄中有補務令溼土底
於和平也景而曰平胃者欲平治其不平也此為胃強邪實者設故其性味從辛從燥從苦而能消能散惟有滯有積者宜之今見方家每以此為常服健脾之劑動輒用之而不察其可
否其誤甚矣

合二陳加藿香名除溼湯治傷溼腹痛身重足軟大便溏瀉加藁朮枳殼桔梗名和解散局治四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐利加藿香半夏名藿香平胃散又名不換金正氣散局治胃寒腹痛嘔吐及瘴疫溼瘡再加人參茯苓草菓

成方切用 卷四下 平胃散 四

生薑烏梅名人參養胃湯治外感風寒內傷生冷夾食停痰嵐瘴瘟疫或飲食傷脾發為痰瘧也老瘧加麥芽炒麴名加味平胃散治宿食不消吞酸噯臭除蒼朮加木香草薹乾薑茯苓名厚朴溫中湯治脾胃虛寒心腹脹滿及秋冬客寒犯胃時作疼痛散以辛熱佐以苦甘滲以甘淡氣溫胃和痛自止矣本方一兩加桑白皮一兩名對金飲子治脾胃受溼腹脹身重飲食不進肢瘦膚腫和胃飲 治寒溼傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃

腕不清嘔惡脹滿等證

陳皮 厚朴各一錢 乾薑炮一錢 炙甘草一錢

此即平胃散之變方也凡嘔吐等證多有胃氣虛寒一聞蒼朮之氣亦能動嘔故以乾薑代之凡藿香木香丁香茯苓半夏菟絲子砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若胸腹有滯而兼時氣寒熱加柴胡以清利之

保和丸 治食積飲停腹痛泄瀉痞滿吐酸積滯

惡食食瘧下痢傷於飲食脾不運化滯於腸胃故有泄痢食瘧等證傷而未甚

成方切用 卷四下 和胃飲 保和丸 五

不欲攻以厲劑惟以和平之品消而化之故曰保和東垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以導其溼傷食者有形之物也輕則消化或損其穀重則方可吐下脈經云大腸有宿食寒燥發熱有時如瘧輕則消導重則下之

山查三兩 神麴炒 茯苓 半夏一兩 陳皮 萊菔子微 連翹五錢 麴和丸麥芽湯下或加麥芽入藥亦可

山查酸溫收縮之性能消油膩腥羶之食故食積消陳麴辛溫蒸普之物能消酒食陳腐之積積子辛甘下氣而制麴麥芽鹹溫消穀而軟堅

聖傷食必兼乎溼茯苓補脾而滲溼積久必鬱
為熱連翹散結而清熱半夏能潤能燥和胃而
健脾陳皮能降能升調中而理氣此傷於飲食
而氣未病者故但當消導也

加白朮白芍去半夏腹子連翹蒸餅糊丸名小
保和丸助脾進食加白朮二兩名大安丸或加
人參治飲食不消氣虛邪微加白朮香附黃芩
黃連厚朴枳實治積聚痞塊合越鞠丸扶脾開
鬱

成方切用 消 卷四下 芍藥枳實丸 六

芍藥枳實丸 治食積痞滿及小兒腹大脹滿時
常疼痛脾胃不和等證此方較枳朮丸其效更
神

白朮炒赤芍藥酒炒枳實炒陳皮一兩 荷葉湯
煮黃老米糊為丸桐子大米飲或滾白湯任下
百餘丸 如臍寒加炒黃乾薑一二兩 如脾
胃虛加人參一二兩

痞氣丸東垣 治脾積在於胃脘大如盤久不愈令
人四肢不收或發黃疸飲食不為肌膚金匱曰
堅而不

移者名稱為病推移不定者名聚為腑病按
病病由陰伏陽蓄氣血不運而成處心下位中
央填塞痞滿皆土病也與脹滿有輕重之分痞
惟內覺滿悶脹滿則外有脹急之形也有中氣
虛衰不能運化精微而成痞者有飲食痰積不
能施化而成痞者有淫熱太甚上乘心下而成
痞者古方用黃連黃芩枳實之苦以泄之厚朴
半夏生薑之辛以散之入參白朮之甘苦溫以
補之茯苓澤瀉之淡以滲之惟宜上下分消其
氣果有內實之證庶可略施疎導世人苦於痞
寒喜用利藥暫時通快藥過滋
其皆由不察中氣不運所致爾

黃連八錢厚朴五錢吳茱萸三錢白朮土炒黃芩二錢茵陳
酒炒乾薑炮砂仁半錢人參 茯苓 澤瀉錢一川烏
炮炒川椒分五桂 巴豆霜分四 蜜丸燈草湯下

成方切用 消 卷四下 痞氣丸 七

黃連瀉熱燥溼治痞君藥仲景治痞滿諸厚朴
砂仁行氣而散滿茵陳苓瀉利水以實脾黃芩
清肺而養陰椒黃燥脾而逐冷薑桂川烏補命
火以生脾土而薑桂又能去痰生新脾無積血
巴豆能消有形滯積為斬關奪門之將藉之以
為先驅加參朮者以補脾元正氣正旺然後可
以祛邪也潔古曰養

除吳茱白朮茯苓澤瀉茵陳川椒砂仁如薑蒲
扶神丹參紅豆名伏梁丸治心積起臍上至心

下大如臂令人煩心除吳茱砂仁桂木黃芩澤
瀉加柴胡莪朮皂角昆布甘草名肥氣丸治肝
積在左脇下有頭足令人發咳痰瘧不已除吳
茱白朮砂仁黃芩茵陳澤瀉加紫苑桔梗天冬
白菴青皮陳皮三稜名息黃丸淡薑湯下治肺
積在右脇下令人灑浙寒熱喘咳發肺癰秋冬
黃連減半除吳茱白朮砂仁人參乾薑川椒黃
芩茵陳加菖蒲丁香附子苦棟延胡獨活全蠍
名賁豚丸淡鹽湯下治腎積發於小腹上至心

成方切用 卷四下 十香丸

下若豚狀上下無時令人喘咳骨疼及男子七
疝女子瘦聚帶下此東垣五積方也雖有破滯
助成功經曰大積大聚其可
犯也衰其大半而止過者死

十香丸 治氣滯寒滯諸病

木香 沉香 澤瀉 烏藥 陳皮 丁香

小茴香 香附酒炒荔枝核煨焦各
等分皂角微火燒
煙盡減

為末酒糊丸彈子大者磨化服九桐子大

者湯引下癩疝之屬溫酒下

枳實消痞丸東垣 治心下虛痞惡食懶倦右關脈

弦脾虛不運故痞滿惡食脾主四肢虛故懶倦
右關屬脾脈弦者脾虛而木來侮之也。經
曰大陰所至為積飲痞隔皆陰勝陽也受病之
臟心與脾也因而鬱塞為痞者火與溼也蓋心
陽火也主血脾陰土也主溼凡傷其陽則火情
鬱而血凝傷其陰則土壅塞而陰聚陰陽之分
施治之法
不可同也

枳實炒黃連薑汁炒厚朴薑炒半夏麩炒麥芽

餅糊丸 人參 白朮炒茯苓錢甘草錢乾薑錢 蒸

餅糊丸

枳實苦酸行氣破血黃連苦寒瀉熱開鬱並消
痞之君藥厚朴苦降散溼滿而化食麥芽鹹溫

成方切用 卷四下 枳實消痞丸

破結氣而軟堅半夏燥痰溼而和胃乾薑去惡

血而通關開五臟六腑
通四肢關節皆所以散而瀉之也參

朮苓草甘溫補脾使氣足脾運而痞自化既以

助散瀉之力又以固本使不傷真氣也玉機微
義曰此

半夏瀉心湯加減法也內有枳木四
君平胃等藥利溼消痞補虛之劑也

廓清飲 治三焦壅滯胸膈脹滿氣道不清小水

不利年力未衰通身腫脹或肚腹單脹氣實非

水等證

枳殼二錢厚朴一錢大腹皮一錢白芥子七分或
二分

陳皮二錢 茯苓二錢 蓮皮用 蘿蔔子生搗一錢如中不甚脹能食者不用

澤瀉錢 水煎食遠服 內熱多火小水熱

數者加梔子木通各一二錢 身黃小水不利

者加茵陳二錢 小腹痛滿大便堅實不通者

加生大黃三五錢 肝滯脇痛者加青皮 氣

滯胸腹疼痛者加烏藥香附 食滯者加山查

麥芽

健脾丸 治脾虛氣弱飲食不消

白朮土人參 麥芽 陳皮二兩 山查去核 枳實兩半

成方切用消 卷四下 健脾丸

脾胃者倉廩之官胃虛則不能容受故不嗜食

脾虛則不能運化故有積滯所以然者由氣虛

也參朮補氣陳皮利氣氣運則脾健而胃強矣

山查消肉食麥芽消穀食戊巳不足脾胃為戊土脾為巳土

故以二藥助之使化枳實力猛能消積化痞佐

以參朮則為功更捷而又不致傷氣也夫脾胃

受傷則須補益飲食難化則宜消導合斯二者

所以健脾也

去山查麥芽加茯苓炙甘草名益氣健脾丸治

脾虛食少去山查麥芽陳皮加當歸芍藥芩藹

麥冬柏子仁名養營健脾丸治脾陰不足飲食

不為肌膚血充然去人參枳實麥芽加香附木

香半夏茯苓神麴黃連當歸芍藥方無 荷葉

燒飯丸名理氣健脾丸治脾胃虛弱久瀉久痢

去人參山查麥芽加神麴川芎香附麴糊丸名

舒鬱健脾丸治脾氣鬱滯飲食不消去山查麥

芽加半夏膽星蛤粉茯苓神麴糊丸名化痰健

脾丸治內傷挾痰去人參山查麥芽加半夏山

梔黃連水丸名清火健脾丸治脾虛有火去人

參山查麥芽加木香檳榔厚朴半夏甘草名和

中健脾丸治胃虛饑不欲食仍用人參名妙應

丸治胃虛不能食臟腑或結或泄去山查加半

夏青皮木香砂仁草蔻乾薑炙甘草茯苓豬苓

澤瀉蒸餅丸名寬中進食補脾胃進飲食

解肝煎 治暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯等證如兼

肝火者宜化肝煎方見瀉火門

成方切用消 卷四下 解肝煎

一書... 升 貴多... 2 反反內

陳皮 半夏 厚朴 茯苓一錢五分 蘇葉 芍藥
錢砂仁七分 加煨薑三五片 如脇肋脹痛加
白芥子一錢 胸膈氣滯加枳殼香附藿香之
屬

排氣飲 治氣逆食滯等證

陳皮 枳殼 藿香一錢五分 香附 澤瀉 烏藥

厚朴一錢 木香七分 或水煎熱服 如食滯

者加山查麥芽各二錢 寒滯者加焦乾薑肉

桂之屬 氣逆之甚者加白芥子沉香青皮檳

成方切用消 卷四下 排氣飲 主

柳之屬 嘔而兼痛者加半夏丁香之屬 痛

在小腹者加小茴香 兼疝者加荔枝核煨熟

搗碎用二三錢

葛花解醒湯 專治酒積或嘔吐或泄瀉痞塞頭

痛小便不利酒熱而兼溼熱積於腸胃故見諸證

葛花 豆蔻 砂仁一錢 木香二分 青皮 陳皮

人參 白朮炒 茯苓四分 神麴炒 乾薑 豬苓

澤瀉三分

過飲無度溼熱之毒積於腸胃葛花獨入陽明

令溼熱從肌肉而解豆蔻砂仁皆辛散解酒故
以為君神麴解酒而化食木香乾薑調氣而溫
中青皮陳皮除痰而疏滯二苓澤瀉能驅溼熱
從小便出乃內外分消之劑飲多則中氣傷故
又加參朮以補其氣也垣曰酒大熱有毒無形之物也傷之只當發汗次利小便上下分消其溼氣今人或用酒癱丸大熱之藥下之或用大黃牽牛下之是無形元氣受傷反損有形陰血除血愈虛陽毒大旺元氣消亡而虛損之病成矣葛花解酒而發散不如枳殼枳椇一名鷄距一名木蜜經霜黃赤而味甘其葉入酒酒化為屋內釀酒多不佳

成方切用消 卷四下 葛花解醒湯 大和中飲 主

大和中飲 治飲食積滯胃聚等證

陳皮 枳實二錢 厚朴 澤瀉 山查 麥芽半錢

砂仁五分 水煎溫服 脹甚者加白芥子 胃

寒無火或惡心者加炮乾薑一二錢 疼痛者

加木香烏藥香附之類 痰多者加半夏

小和中飲 治胸膈脹悶或婦人胎氣滯滿等證

菴豆炒 山查二錢 陳皮 茯苓 厚朴半錢 甘草五分

加煨薑三五片 嘔者加半夏一二錢 脹

滿而氣不順者加砂仁七八分 火鬱於上者

加炒梔子一二錢 婦人氣逆血滯者加蘇梗
香附之屬 寒滯不行者加乾薑肉桂之屬

髓甲飲氏嚴 治瘡久不愈腹中結塊名曰瘡母久瘡

不愈為瘡多成癰於左脇之下名曰瘡母乃
肝之積也。瘡屬少陽膽經。膽與肝相表裏。久瘡
屬在血分。血亦肝所主也。當以髓
甲為君。隨證虛實而施佐使之藥。

髓甲醋炙 白朮土炒 黃耆 白芍酒炒 檳榔 草菓麩

厚朴 陳皮 甘草 等分薑三片棗二枚烏

梅少許煎

久瘡必由脾虛白朮補脾氣黃耆補肺氣使氣

成方切用消 卷四下小和中飲 髓甲飲

足脾運方能磨積也川芎補肝而行血中氣滯
芍藥助脾而散肝經火邪二藥竝和厥陰營氣
營血調則陰陽和矣陰陽不和而爭。瀆下氣
而攻積草菓煖胃而祛寒厚朴破血而散滿陳
皮理氣而消痰甘草和中而補土髓甲鹹平屬
陰色青入肝專能益陰補虛清熱散結故為瘡
瘡之君藥也

小分清飲 治小水不利溼滯脹腫不能受補等

證如兼火者宜大分清飲方見燥

方見卷七下燥溼門

資生丸 健脾胃消食止瀉調和臟腑滋養營

衛張三錫曰余初識繆仲醇時見神中出彈丸
食之即飽因疏其方已於醉飽後頓服二丸徑
投枕臥夙興了無停滯始信此方消食之神也

又善治胎前惡阻

白朮米泔浸用山黃土拌九 人參人乳浸飯

仁三兩 神麩 查肉蒸 橘紅二兩 芡實淨 麥芽麵

雲苓飯鍋上蒸爛 懷藥五錢 藕豆炒去 蓮肉去

一兩 桔梗米泔 真藿香洗 甘草蜜炙 川連薑汁 白

成方切用消 卷四下小分清飲 資生丸 神香散

豆蔻仁炒 澤瀉五分 末之蜜丸每丸二錢重

每服一丸醉飽後二丸細嚼淡薑湯下

按此方九補丸消即枳朮丸之意而推廣之立

方較為穩妥名曰資生重脾胃也

神香散 治胸膈胃脘逆氣難解疼痛嘔噦脹滿

痰飲隔噎諸藥不效者惟此最妙

丁香 白豆蔻仁亦可 等分為末清湯調

下七分甚者一錢日數服不拘若寒氣作痛者

薑湯送下

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷五上

和解門 附方二十九

小柴胡湯 柴胡 枳實 芍藥 黃芩 半夏 甘草 大棗 牡蠣 厚朴 生薑 柴胡 合桂枝湯 柴胡 加龍

四物湯 熟地 白芍 當歸 川芎 柴胡 經湯 小芍藥 甘草湯 白朮 芍藥 黃芩

前胡湯 柴胡 枳實 芍藥 黃芩 半夏 甘草 大棗 牡蠣 厚朴 生薑 柴胡 合桂枝湯 柴胡 加龍

湯 黃芩 加半 夏生薑湯 外臺黃芩湯 黃連湯 溫膽湯 味十

溫膽湯 越鞠丸 逍遙散 八味逍遙散 藿香正氣散 味十

湯 藿香 六和湯 三解湯 清脾飲 薑茶飲 梅蜜

成方切用 和 卷五上 目錄

痛瀉方 甘草黑豆湯 正柴胡飲 柴陳煎

柴芩煎 一柴胡飲 二柴胡飲 三柴胡飲

四柴胡飲 五柴胡飲 歸柴飲 蘆根湯 陰

陽水 栝蒌薤白白酒湯 氣門 半夏瀉心湯 火門

甘草瀉心湯 火門 生薑瀉心湯 火門

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭

男

有杜雋望

有榆蒼培同較

成方切用

和解門 凡病兼虛者補而和之 兼滯者行而和之 兼寒者溫而和之 兼熱者涼而和之 兼燥者潤而和之 兼濕者燥而和之 兼風者散而和之 兼毒者清而和之 兼毒者清而和之 兼毒者清而和之

和之 和之 為義 廣矣 亦猶 土兼 四氣 其於 補

中 和之 為貴 也 故 凡 陰 虛 於 下 而 精 血 虧 損

者 忌 利 小 水 如 四 苓 通 草 之 屬 是 也 陰 虛 於

上 而 肺 熱 乾 咳 者 忌 用 辛 燥 如 半 夏 蒼 朮 細

辛 香 附 芩 歸 白 朮 之 屬 是 也 陽 虛 於 上 忌 消

耗 如 陳 皮 砂 仁 木 香 檳 榔 之 屬 是 也 陽 虛 於

下 忌 沉 寒 如 黃 藥 知 母 梔 子 木 通 之 屬 是 也

大 便 溏 泄 忌 滑 利 如 天 冬 菴 蓉 牛 膝 當 歸 柴

胡 童 便 之 屬 是 也 表 邪 未 解 忌 收 斂 如 五 味

棗 仁 地 榆 文 蛤 之 屬 是 也 氣 滯 者 忌 塞 閉 如

黃 耆 白 朮 山 藥 甘 草 之 屬 是 也 凡 邪 火 在 上

者 不 宜 升 火 得 升 而 愈 熾 矣 沉 寒 在 下 者 不

宜 降 陰 被 降 而 愈 凶 矣 諸 動 者 不 宜 再 動 如

火 動 者 忌 溫 煖 血 動 者 忌 辛 香 汗 動 者 忌 疏

散 其 於 剛 暴 更 甚 者 則 又 在 不 言 可 知 也 諸

靜 者 不 宜 再 靜 如 沉 微 細 弱 者 脈 之 靜 也 神

昏 氣 怯 者 證 之 靜 也 肌 體 清 寒 者 表 之 靜 也 神

口 腹 畏 寒 者 裏 之 靜 也 凡 性 味 之 陰 柔 者 皆

所 當 慎 其 於 沉 寒 更 甚 者 又 在 不 言 可 知 也

夫 陽 主 動 以 動 濟 動 火 上 添 油 也 不 寐 燥 乎

陰 主 靜 以 靜 益 靜 雪 上 加 霜 也 不 寐 滅 乎 凡

前 所 論 論 其 略 爾 而 書 不 盡 言 言 不 盡 意 能

因類而廣之斯知和之為義矣

小柴胡湯 治傷寒中風少陽證往來寒熱

陰熱為陽裏為陰表為陽邪客於半表半裏陰出與陽爭陰勝則寒陽入與陰爭陽勝則熱又曰太陽行身之後屬膀胱寒水為表陽明行身之前屬胃燥金為裏之裏邪在於中近後膀胱寒水則寒近前陽明燥金則熱也寒熱有定時者為瘧無定時者為往來寒熱以熱在表而後邪惡正故惡寒寒已復熱此邪未併於表裏故寒熱微而無定時也胸脇痞滿心煩喜嘔少陽三焦之脈絡心包風邪干之心氣不得宣暢故煩滿或攻胸脇故又痞而痛也邪在表則不煩不嘔在裏則煩嘔表方傳裏故心煩喜嘔也默默不欲食邪在表則呻吟不安在裏則嘔也默默不欲食煩而悶亂邪自表而方傳裏

成方切用 和 卷五上 小柴胡湯

故默默靜也經曰陽入之陰則靜邪在表則能食入裏則不能食今在表裏之間故但不欲食未至於不能食也或脇下痛或腹中痛或渴或利裏虛能食也或欬或悸小便不利裏有停飲耳聾口苦少陽膽脈氣上溢脈弦肝與膽皆屬故口苦脈弦木故脈弦或汗後餘熱不解及

春月時嗽瘧發寒熱婦人傷寒熱入血室血室也男女皆有之婦人傷寒七八日邪當傳裏值經水適來則邪不入腑乘虛而入血室或經水適斷表邪乘虛亦入血室熱與血搏結而不行致有寒熱如瘧暮則譫語如見鬼狀在男子則下血譫語皆為熱入血室婦人傷寒與男子無異惟熱入血室妊婦傷寒為不同也小柴胡在

經主氣在臟主血故更能入血室李東垣曰若血受病亦先調氣謂氣不調則血不行氣夫血

婦也如婦人經病先柴胡以行經之表亦治傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大便革脈細者為陽微結仲景曰汗出為陽得復有外濇脈雖沉緊不得為少陰病所以然者陰脈皆不至頸胸中而還不上循頭程郊倩曰熱雖結而不甚也微惡寒之半表在至於脈沉雖似裏陰則又有微汗出之證以別之凡脈細陽氣一結不但陽證似陰脈亦似陰矣經曰傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具又曰傷寒五六日發熱而嘔醫以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而愈或淫熱在半表半裏而發黃者仍與小柴胡湯雖雜證不能外也

成方切用 和 卷五上 小柴胡湯

柴胡 半斤 人參 甘草 生薑 兩半 夏升

大棗 十二枚 水一斗二升煮六升去渣再煎取

三升溫服一升日三服有汗吐下三禁故但取

小柴胡湯以和之然一方之中柴胡欲出表黃芩欲入裏半夏欲祛痰紛紜而動不和甚矣故去渣復煎使其藥性合而為一漫無異同俾其不至於僨事爾又和非和於表亦非和於裏乃和於中也必煎至最熟令藥氣併停胃中少頃隨胃氣以敷布表裏而表裏之邪不覺潛消默奪所以方中既用人參甘草復加生薑大棗不厭其複至藉胃中天真之氣為斡旋所謂大力者負之而走爾試即以仲景印仲景三黃附子湯中以其人陽邪入陰而熱熾非三黃不能除熱其人復真陽內微而陰盛非附子不能回陽然必各煎後乃得以各行其事而復煎以共

行其事之義。嘔逆加生薑以散逆陳皮以理

氣。煩而不嘔去半夏人參加栝蒌以蕩鬱熱

渴者去半夏加花粉以生津。若不渴外有

微熱去參加桂枝以解肌覆取微汗。咳嗽去

參棗生薑加五味以斂肺乾薑以散寒。咳為氣

也陽明有喘無嗽有嗽非正陽明也。齒燥

無津屬陽。加石膏以清胃止渴。虛煩加竹葉

以涼心糯米以和胃。痰熱加瓜蒌貝母。腹

痛去黃芩。加芍藥。脇下痞去

成方切用 和 卷五上 小柴胡湯 四

大棗。甘令。加牡蠣。軟能。脇下痛加青皮芍藥

心下悸。經日太陽證飲水

故悸。小便不利。水畜。去黃芩。若反。加茯苓。利水

本經頭痛加川芎。散鬱除風。發黃加茵陳以

利溼

膽為清淨之腑無出入其經在半表半裏不

可汗吐下法宜和解。仲景曰少陽中風耳聾目

下則悸而驚。釋曰邪在半表半裏以吐除煩。吐

則傷氣。氣虛者悸。以下除煩。下則內血。血虛者

驚。又口傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽。不可

汗之則譫語。釋曰汗之則津液少陽之脈。謂

之入胃。邪入本經乃由表而將至裏當微熱發

表迎而奪之勿令傳太陰柴胡味苦微寒少陽

主藥以升陽達表為君黃芩苦寒以降陰退熱

為臣。陽奏於陰則發熱用柴胡升陽氣使不陷

降陰氣使不上入陽中則不寒。又曰柴胡黃芩

之苦寒以退熱。半夏生薑之辛溫以退寒。人參

溫以助正氣。半夏辛溫能健脾和胃以散逆

氣而止嘔人參甘草以輔正氣而和中使邪不

得復傳入裏為佐邪在半表半裏則營衛爭。屬

成方切用 和 卷五上 小柴胡湯 五

本經證心下飽悶未經下者非結胸也。乃表邪

枳桔不效。就以本方對小陷胸加枳桔。一服證

然其效如神。李時珍曰少陽證雖在半表半裏

而胸膈痞滿實兼心。肺。上。焦。之。邪。心。煩。喜。嘔。默

默不欲食。又兼脾胃。中。焦。之。證。故用黃芩以治

手足少陽相火。黃芩亦少陽藥也。喻嘉言曰傷

寒分表裏。中。三。治。表。裏。之。邪。俱。盛。則。從。中。而。和

之。於。人。參。甘。草。半。夏。生。薑。大。棗。助。脾。之。中。但。帶

柴胡一味透表。黃芩一味透裏。飲入胃中。聽胃

氣之和而表裏之邪盡服。未盡者加工治之。不

相扞格矣。徐忠可曰小柴胡湯為邪傳少陽。恰

在半表半裏。和解之主方。又能散諸經血凝滯

虛寒面赤發熱脈沉足冷者服之立見危殆及
內有虛寒大便不實婦人新產發熱皆不可用
也李士材曰今人治傷寒不分陰陽表裏藥用
此方去參投之以為平穩殺人多矣不獨峻劑
也喻嘉言曰虛勞發熱者乃衛虛則惡寒營
虛則發熱爾緩調營衛使不亢戰寒熱自止若
誤用小柴胡俾汗多而衛傷於外便
澹而營傷於內虛熱轉加病益甚矣

去半夏加花粉名柴胡去半夏加栝蒌根湯

治往來寒熱而渴及勞瘧

一方也仲景謂瘧邪盛衰出入必在少陽表裏
之間小柴胡湯乃傷寒少陽經天然不易之法
渴者去半夏加栝蒌實亦天然不易之法而施
之於少陽邪傳陽明傷津液之證亦為天然
不易之法蓋渴雖陽明津竭而所以致陽明津
竭者全在少陽之邪觀內經刺法渴者取之少

成方切用 卷五上 小柴胡湯 木

陽非以其木火之熱劫奪胃津而然耶故瘧邪
進退於少陽即以此方進退而施其巧柴胡黃
芩對治木火人參甘草扶助胃土栝蒌生津潤
燥薑棗發越營衛若勞瘧之病其木火盛營衛
衰津液竭所不待言故**去半夏人參薑棗加桂**
并可施此方以治之也
枝乾薑花粉牡蠣名柴胡桂枝乾薑湯治傷
寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便
不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此
為未解也喻嘉言曰少陽證尚兼太陽所以誤
內頭微汗出而胸脇微結也太陽中篇結胸條
下奪之法也此頭汗出而胸脇微結用柴胡桂枝
乾薑湯以裏證未具故從和解之法也小柴胡
方中湯半夏人參而加桂枝以行太陽加乾薑

以散滿栝蒌根以滋乾牡蠣亦治瘧發寒多微
以散結一皆從本例也
有熱或但寒不熱服一劑如神喻嘉言曰此湯
但寒不熱非不似於牡蠣而微甚則大不同仲
景不立論止附一方且云服一劑如神其邪之
輕而且淺從可識矣蓋以衛氣在外營血在內
胸中之陽氣散行於分肉之間今以邪氣痺之
則外衛之陽反鬱於內守之陰而血之痺者
愈瘀結而不散遇衛氣行陽二十五度而病發
其邪之入營者既無外出之勢而營之素痺者
亦不出而與陽爭所以多寒少熱或但有寒無
熱也小柴胡湯本陰陽兩停之方可隨瘧邪之
進退以為進退者加桂枝乾薑則進而從陽痺
着之邪可以開矣更加牡蠣以奠其壘則陰
陽豁然貫通而大汗解矣所以服一劑如神也
其加芍藥以退而**合桂枝湯名柴胡桂枝湯**景

成方切用 卷五上 小柴胡湯 七

治傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心

下支結外證未去者喻嘉言曰心下支結者邪

也此小結胸之正在心下又較輕矣傷寒至六
七日宜經傳已過乃發熱微惡寒肢節煩疼微
嘔其邪尚在太陽之界未入於裏雖心下支結
而外證未除即不可用大陷胸湯以陷胸湯
主裏而不主表也亦不可用小陷胸湯以陷胸
胸湯主飲而不主表也夫支結之邪其在外者
方盛其陷入者原少故但合用柴胡桂枝和
解二法以治其表邪去而支結自開矣
除
黃芩甘草加桂枝茯苓龍骨牡蠣鉛丹大黃名
柴胡加龍骨牡蠣湯治傷寒八九日下之胸
滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側

成方切用 卷五 小柴胡湯

言曰此伏飲素積為變之最鉅者蓋積飲之人津液素結原不足以充灌週身及遇外感一切汗吐下定法漫難輕試其誤下之變更有進于結胸者似此一語八九日過經乃下之可謂慎矣孰知外邪未盡乘虛而陷積飲挾之填滿胸中胸中既滿則腹中之氣不能四布而使道絕使道絕則君主孤危所以心驚而神亂也煩與識語本屬胃此則兼心小使不利本屬津液內竭此則兼小腸火燔一身盡重不可轉側者又神明內亂治節不行百骸無主之明徵也夫邪方在表裏其患已及神明於此而補天浴日寧後尋常表裏所辨故用人參扶苓之補以益心虛神丹之重以鎮心驚龍骨牡蠣之澀以益神功後人不察謂是總三陽而和之之法豈其然哉一按傷寒雖云傳足不傳手其實原無界限此證手少陰心主為邪所逼神明內亂因致識語無倫較他證識語之屬胃實者相去懸絕若

成方切用 卷五上

復以治足經之法治之必無幸矣方中藥止九味用入心藥五種不以為復且用重溫藥三種不以為猛蓋都城震動勢必悉力入援非孤注可圖使伴也至于痰飲搏膈最為剝牀者但用半夏一味表邪內襲首發難端者但從太少之例用桂枝柴胡二味湯邪入陰最宜急驅者但用大黃一味是則治傷寒弊繁之處咸落第二義止從治心諸藥之後一案其結其此等手眼豈凡近

成方切用 卷五 芍藥甘草湯

然。腹痛有寒有熱有虛有實有食積有溼痰有死血有蟲寒痛者痛無增減或兼吐利熱痛者時時痛時止腹滿堅結實痛者痛甚脹滿手不可按虛痛者按之即止食痛者痛甚則利利後痛減死血痛者痛有常處溼痰痛者脈滑痰氣阻礙不得升降蟲痛者時作時止面白唇紅大抵胃脘下大腹痛者多屬食積外邪繞臍痛者者屬痰火積熱臍下少腹痛者屬寒或瘀血仲

成方切用 卷五 白芍藥

白芍藥 甘草 四兩 脈緩傷水加桂枝生薑 脈洪傷金加黃耆大棗 脈瀦傷血加當歸脈弦

成方切用 卷五 執積熱汗後餘熱

執積熱汗後餘熱脈洪實數表為肌熱裏為亦治瘧疾 喻嘉言曰於和法中肯綮加桔梗名柴胡 桔梗湯治春嗽合平胃散名柴平湯治溼癘身 痛身重加青黛薑汗和丸名清鎮丸古治嘔吐 脈弦頭痛及熱嗽本方一分加四物二分名柴 胡四物湯治婦人日久虛勞微有寒熱本方與 四物各半名調經湯以前胡易柴胡名小前胡 湯 崔氏去風痰加陳皮芍藥名柴胡雙解散節 而降餘治同

傷氣再加芍藥脈遲傷火加乾薑

氣血不和故腹痛白芍酸收而苦泄能行營氣

炙草溫散而甘緩能和逆氣又痛為木盛尅土

諸痛皆屬肝木白芍能瀉肝甘草能緩肝而和脾也

藏日稼穡作其甘者已也曲直作酸酸者甲也甲已化土此仲景妙方也

加白朮名白朮芍藥湯治脾溼水瀉身重困

弱保命集日瀉痢不止或暴下者皆大陰受病

黃芩湯治太陽少陽合病自下利者

陽證之身熱頭痛脊強又有少陽證之耳聾脇

成方切用和卷五十一黃芩湯

黃芩兩芍藥甘草兩大棗十二

太陽陽明合病下利為在表與葛根湯以汗之

少陽陽明合病下利為陽邪入裏與承氣湯以

下之此太陽少陽合病下利為在半表半裏與

黃芩湯以和解之

機要用之治熱痢腹痛更名黃芩芍藥湯治下痢

因之加木香檳榔大黃黃連歸尾官桂更名為芍

藥湯治下痢仲景此方遂為治瀉痢之祖方矣

加半夏升生薑二名黃芩加半夏生薑湯治

前證兼嘔者嘔胃氣逆也加半夏生薑以散逆

逆氣也金匱云嘔家用半夏以治亦治膽腑發

欬嘔苦水如膽汁膽液泄則口苦除大棗名黃

芩芍藥湯治熱痢腹痛後重身熱膿血稠黏

及火升鼻衄不止脈洪數

外臺黃芩湯黃芩人參乾薑各三桂枝兩大棗

十二半夏治乾嘔下利

黃連湯治傷寒胸中有熱而欲嘔胃中有寒

而腹痛成氏曰溼家下後舌上如胎者以丹田

成方切用和卷五十一黃連湯

上寒也此傷寒邪氣傳裏而為下寒上熱也胃

中有邪氣使陰不得升而獨治於下為下寒腹

中痛嘔吐不得降而獨治於上為胸中

黃連乾薑桂枝甘草三人參兩半夏升

大棗十二黃連苦寒泄熱以降陽薑桂辛溫除寒以升陰

人參助正祛邪半夏和胃止嘔甘草大棗調中

止痛上中二焦寒熱交戰故以此和解之

溼家下之舌上如胎者丹田有熱胸中有寒也

仲景亦用此湯何耶蓋傷寒分表裏中三治表

裏之邪俱盛則從中而和之故有小柴胡之和

法至於丹田胸中之邪在上下不在表裏即變

柴胡為黃連湯。以桂枝代柴胡。以黃連代黃芩。以乾薑代生薑。飲入胃中。聽胃氣之上下敷布。故不問下寒上熱。上寒下熱。皆可治之也。夫表裏之邪。則用柴芩。用生薑之辛。以散之。上下之邪。則用桂連。用乾薑之辣。以開之。仲景聖法。灼然矣。

溫膽湯 治膽虛痰熱不眠。虛煩驚悸。口苦嘔

涎。膽熱則口苦。膽虛氣鬱。致脾生痰。涎而煩嘔。傷寒病後。多有此證。

半夏薑製 茯苓或用 陳皮去白 甘草 枳實炒 竹筍

加薑煎。或加棗局方無茯苓。如心虛加人參。

棗仁。心內煩熱。加黃連。麥冬。口燥舌乾。去半夏。

以其行。加麥冬。五味。花粉。表熱未清。加柴胡。內

水耗津。加麥冬。五味。花粉。表熱未清。加柴胡。內

虛大便自利。去枳實。加白朮。內實心煩。加黑梔

子。

橘半生薑之辛。溫以之導痰。止嘔。卽以之溫膽。

戴氏云。痰在膽經。神不守舍。亦令人不寐。枳實破滯。茯苓滲溼。甘草

和中。竹筍開胃。土之鬱。清肺金之燥。涼肺金。卽

所以平甲木也。膽為甲木。如是則不寒不燥。而

膽常溫矣。經又云。胃不和則臥不安。又曰。陽氣

滿。不得入於陰。陰氣虛。故日不得與半夏能和

胃而通陰陽。故內經用治不眠。二陳非特溫膽

亦以和胃也。三因云。心虛膽怯。氣鬱生涎。涎與不祥。或短氣。悸乏。或自汗。或溫膽湯主之。嘔則以人參代竹筍。經曰。諸水病者。故不得臥。臥則驚。驚則欬甚。

加人參。棗仁。遠志。熟地名。十味溫膽湯。治夢遺

驚傷。

越鞠丸 統治六鬱。胸膈痞悶。吞酸嘔吐。飲食

不消。六鬱者。氣鬱。血鬱。痰鬱。火鬱。溼鬱。食鬱也。六者之中。以氣為主。氣行則鬱散矣。石酸

嘔吐。由於痰火。飲食不消。由於氣不運行。丹溪曰。氣升則鬱自降。滑伯仁曰。鬱者。結聚而不得發

越。當升者。不得升。當降者。不得降。當變化者。不得變化。所以傳化失常。而病見矣。氣鬱者。胸膈

痛。溼鬱者。周身身痛。或關節痛。遇陰寒。卽發。痰鬱者。動則氣喘。脈沉滑。熱鬱者。昏瞶便赤。脈沉數。血鬱者。四肢無力。能食。食鬱者。腹飽。不能食。

香附醋炒 蒼朮炒 撫芎 神麴 梔子炒 等

分麴糊丸。如溼鬱。加茯苓。白芷。火鬱。加青黛。痰

鬱。加南星。半夏。枯蕒。海石。血鬱。加桃仁。紅花。氣

鬱。加木香。檳榔。食鬱。加麥芽。山查。砂仁。挾寒少

加吳茱萸。

吳鶴臯曰。越鞠者。發越鞠鬱之謂也。香附開氣

鬱。蒼朮燥溼。撫芎調血。神麴子解火。鬱神

鬱。蒼朮燥溼。撫芎調血。神麴子解火。鬱神

鬱。蒼朮燥溼。撫芎調血。神麴子解火。鬱神

消食鬱陳來章曰皆理氣也氣暢而鬱舒矣

為水穀之海五臟六腑之主四臟一有不平則中氣不得其和而先鬱矣此方藥兼升降者將欲升之必先降之將欲降之必先升之蒼木辛烈雄壯固胃強脾能徑入諸經疏泄陽明之溼通行敏濤香附陰中快氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平撫芎是厥陰藥直達三焦上行頭目下行血海為通陰陽氣血之使不但開中焦而已胃主行氣於三陽脾主行氣於三陰脾胃既布水穀之氣得行則陰陽臟腑皆由胃氣而得通利矣

逍遙散

治血虛肝燥骨蒸勞熱潮熱咳嗽有

咳嗽者丹溪曰極為難治此係火鬱之證乃痰鬱其火邪在中用逍遙散以開之不用補陰之藥可往來寒熱口乾便澀月經不調凡肝膽兩

成方切用 和 卷五 逍遙散 古

經鬱火以致脇痛頭眩或胃脘當心而痛或肩

髀絆痛或時眼赤痛連及太陽婦人鬱怒傷肝

致血妄行赤白淫閉沙淋崩濁等證俱宜此方

加減治之易曰風以散之是也

當歸 白芍 白朮 柴胡 茯苓 甘草

分 炙五 加煨薑薄荷煎

肝虛則血病當歸芍藥養血而斂陰木盛則土

衰甘草白朮和中而補土亦以平木柴胡升陽

散熱合芍藥以平肝而使木得條達

補取疏 茯苓清熱利溼助甘木以益土而令心

氣安寧 通心腎 煨薑煖胃祛痰調中解鬱薄荷

搜肝瀉肺理血消風疏逆和中諸證自已所以

有逍遙之名 醫貫論五鬱曰東方先生木木者

鬱則火亦鬱矣火鬱則上自鬱土鬱則金鬱金

鬱則水鬱五行相因自然之理也余以一方治

木鬱而諸鬱皆愈逍遙散是也方中柴胡薄荷

二味最妙蓋膽乃甲木少陽之氣其氣柔嫩象

草穿地而未伸此時若被寒風一鬱即軟萎過

抑不能上伸不伸則下尅脾土而金木併病

矣惟得溫風一吹鬱氣始得暢達也蓋木喜風

搖寒則摧萎溫則發生柴胡薄荷辛能發散溫

能入少陽古人立方之妙如此其甚者方中加

吳茱炒連即左金丸黃連清心火吳茱氣燥肝

成方切用 和 卷五 逍遙散 古

氣亦燥同氣相求以平肝木木平則不生心火

火不刑金而金能制木不直伐木而左金以制

木此左金所以得名也此法之巧者然猶未也

繼用六味地黃加柴胡芍藥以滋腎水俾能生

木逍遙散風以散之也地黃飲雨以潤之也木

有不得其天者乎此法一立木火之鬱既舒木

不下尅土土亦得滋潤無燥熯之患金水自能

相生予謂一法可通五法者如此推而廣之凡

寒熱往來惡寒惡熱嘔吐吞酸嘈雜胸膈痛

小腹痛脹頭運盜汗黃疸癰疫疝氣癰泄等證

皆對證之方推而傷寒傷風傷溼除直中外凡

外感者皆作鬱看以逍遙散加減出入無不獲

效如小柴胡湯四逆散羌活湯大同小異然不

若此方之響應也儘一服即愈少頃復發或類

發而愈甚此必下寒上熱之假證此湯不可復

投當改用溫補之劑如陽虛以四君子湯加溫

熱藥陰虛以六味湯加溫熱藥元機之士不須

予贅矣又曰子以冬月正傷寒黃桂枝湯

寒鬱治不惡寒者作火鬱治此子創論也既曰
寒邪何故入內而反為熱不知即是本身之火
為寒所鬱一步返歸一步久則純熱矣三黃解
毒解其火也葛根升麻火鬱發之也三承氣主
鬱奪之也小柴胡木鬱達之也此理甚簡易劉
守真謂用麻黃桂枝必加涼藥子和六神通解
加石膏於麻黃蒼朮中陶氏謂九味羌活可代
三方皆非也不若逍遙散真可一方代三方也
火為寒鬱熱而渴非外感也余以六味湯滋其水
本故發熱而渴非外感也余以六味湯滋其水
以柴胡舒其木活人多矣

加丹皮山梔名八味逍遙散治怒氣傷肝血

少目暗少則目昏丹皮能瀉血而能視肝傷血
瀉三焦鬱火故薛氏加之以抑肝氣兼以調經
也醫貫曰古方逍遙散柴胡薄荷當歸芍藥陳

成方切用 卷五上 逍遙散

皮甘草白木茯苓其加味者則丹皮梔子余以
山梔屈曲下行泄水改用吳茱萸炒黃連○按
以加味逍遙散六味丸治鬱自薛長洲始也然
長洲之法實得之丹溪越鞠之芍藥即逍遙之
歸芍也越鞠之蒼朮即逍遙之白朮也越鞠之
神麴即逍遙之陳皮也越鞠之香附即逍遙之
柴胡也越鞠之梔子即逍遙之加味也但越鞠
咳而逍遙則和矣越鞠燥而逍遙則潤矣此則
青出於藍後來居上亦從古作述之大凡如東
垣之補中益氣比枳朮萬全無弊矣然豈可謂
枳朮之謬而加熟地名黑逍遙散

藿香正氣散治外感風寒內傷飲食憎寒壯
熱頭痛嘔逆胸膈滿悶咳嗽氣喘及傷冷傷溼
瘧疾中暑霍亂吐瀉凡感嵐瘴不正之氣者並

宜增減用之元氣虛弱人慎用

藿香 紫蘇 白芷 大腹皮 茯苓 三白朮

上陳皮 半夏麴 厚朴 桔梗 甘草

每服五錢加薑棗煎一方加木瓜氣脫能收傷

食重者加消食藥

藿香辛溫理氣和中辟惡止嘔兼治表裏為君

蘇芷桔梗散寒利膈佐之以發表邪厚朴大腹

行水消滿橘皮半夏散逆除痰佐之以疏裏滯

苓朮甘草益脾去溼以輔正氣為臣使也正氣

成方切用 卷五上 藿香正氣散

通暢則邪逆自除矣吳綬曰若太陽傷寒頭痛

相干如妄用之雖汗出亦不解變成壞證者多矣凡傷寒發熱脈沉元氣虛人并夾陰傷寒發

熱者皆不可用藿元禮曰肥人多中氣盛於外而歎於內也肺為氣出之道人肥者必氣

急氣急必肺邪盛肺金尅肝木膽為肝之腑故痰涎壅滯之必先理氣中後氣未盡順痰未

盡降瀉瀉之劑當以藿香正氣散和星香散服此藥非特治中風之證中氣中惡霍亂尤宜

合三味香壽飲名藿香湯治伏暑吐瀉轉筋

六和湯治夏月飲食不調內傷生冷外傷暑

氣寒熱交作霍亂吐瀉及伏暑煩悶倦怠嗜臥

口渴便赤中酒等證

砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏 藟豆
木瓜 人參 白朮 赤茯苓 甘草 加薑
棗煎傷暑加香薷傷冷加紫蘇一方無白朮一
方有蒼朮

藿香砂仁杏仁厚朴香能舒脾辛能行氣而砂
仁厚朴兼能化食木瓜酸能平肝舒筋肝木乘
筋木瓜酸能斂肺助肺金藟豆赤茯苓淡能滲溼
以平肝邪故治霍亂轉筋筋故轉
清熱而藟豆又能散暑和脾半夏辛溫散逆而
止嘔參朮甘溫補正以匡邪甘草補中協和諸

成方切用和卷五十一六和湯

藥薑棗發散而調營衛皆所以和之也吳鶴臯
曰六和

三解湯 治時行瘧之通劑喻嘉言曰瘧發必有
寒有熱蓋外邪伏於

半表半裏適在少陽所主之界出與陽爭陰勝
則寒入與陰爭陽勝則熱即純熱無寒為瘧瘧
溫瘧純寒無熱為牝瘧要皆自少陽而造其極
偏補偏救弊亦必還及少陽之界使陰陽協和
而後愈也謂少陽而兼他經則有之謂他經而
不涉少陽則不成其為瘧矣脈縱屬遷而弦之
一字實貫

柴胡 麻黃去節澤瀉各三錢
瘧邪藏於分肉之間邪正分爭併於表則在表

併於裏則在裏未有所併則在半表半裏麻黃
之辛能散表邪由汗而泄澤瀉之鹹能引裏邪
由溺而泄柴胡升陽退熱居表裏之間而和解
之此但可以治實瘧虛者當辨其氣血晝發屬
氣夜發屬
血而加補劑

清脾飲嚴用 治瘧瘧脈弦數但熱不寒或熱多
寒少腸滿不食口苦舌乾煩渴小便赤澀大便
不利

青皮 厚朴醋炒柴胡 黃芩炒半夏薑製茯苓
成方切用和卷五十一三解湯 清脾飲 丸

白朮土炒甘草炙 草菓 薑引一方加檳榔大渴
加麥冬知母瘧不止加酒炒常山錢烏梅二箇
劫痰截瘧為

瘧為肝膽之邪然多因脾胃受傷而起脾屬溼
土重感於暑溼故見前證也脾既受病木又尅
之故用青皮柴胡以破滯而伐肝半夏厚朴以
行痰而平胃古云無痰
不作瘧 茯苓用以滲溼黃芩用
以清熱草菓辛熱能散太陰之積寒除痰而截
瘧能清青
梁之瘧 蓋先去其害脾者而以白朮甘草調

益母草飲
一名香紅
飲

而補之也此即小柴胡湯加減從溫脾諸方而

甚者歸之崇怪良可笑也劉宗厚曰盛暑陽極
伏陰在內人或納涼澡浴寒客肌肉之間或饑
飽勞役內傷而病作肌肉屬脾發則惡寒戰慄
乃謂之脾寒爾實山風寒溼賜邪鬱理夏時
毛竅疏通而不為病至秋收斂之際表邪不能
發越故進退不已往來寒熱勢如凌虐人之狀
所以名瘧古方多兼理內傷取效由脾胃和精
氣通陰陽和解諸邪悉散實非脾病也世用發
表解肌溫經散寒等法亦未嘗執於燥脾劫劑
也吳鶴臯曰清脾非清涼之謂乃攻去其邪而
脾部為之一清也劉宗厚因草菓之辛熱而譏
焉是未達嚴氏之精矣高鼓峯曰治瘧多方俱
不得要惟此方為中正予每用此加減無不愈
者蓋瘧發寒熱原屬少陽半表半裏故必以小
柴胡為君青皮以解脈之弦數厚朴以寬胃中
之積滯草菓以化痰消壅芥木以實脾土此二

成方切用 和 奎上 薑茶飲 手

味乃補正之義緣瘧固由外感然必內傷而後
外始感焉此東垣之微旨也嚴氏立方最為的
當但竟由飲食起者予每以蒼朮易白朮加陳
皮以合脾胃之意熱多寒少者稍加黃連滑石
寒多熱少者稍加前胡以發其鬱熱無不應手
而驗能審此而消息之何至遷延久病困苦天
下人哉若誤服湯藥病久者不可執此為不易
之法是在學者神而明之爾如服寒藥而致胃
傷者須以人參養胃湯養之服熱藥多者仍以
小柴胡湯多加黃連丹皮生地以解之久而虛
者補中益氣以救之發於夜者益母草飲以
濟之用法雖殊然小柴胡之旨不可脫也

薑茶飲 治赤白痢及寒熱瘧
生薑 陳細茶 每味三錢濃煎
茶助陰薑助陽使寒熱平調竝能消暑解酒食

成方切用 卷五上

毒此方用之屢效勿以平淺而忽之也

除生薑加陳白梅蜜水煎名梅蜜飲治熱痢除
茶加木香肉蔻治冷痢蜜最能

痛瀉要方劉草 治痛瀉不止脾虛故瀉肝實故

傷食不同傷食腹痛得瀉便減今瀉而痛不止
故責之土敗木賊也戴氏曰水瀉而腹不痛
者溼也痛甚而瀉瀉而痛減者食積也瀉水腹
痛腸鳴痛一陣瀉一陣火也或瀉或不瀉或多
或少者痰也完穀
不化者氣虛也

白朮三兩 白芍二兩 陳皮半兩 防風兩 或煎

或丸久瀉加升麻

成方切用 和 奎上 痛瀉要方 甘草黑豆湯 手

白朮苦燥溼甘補脾溫和芍藥寒瀉肝火酸
斂逆氣緩中止痛防風辛能散肝香能舒脾風
能勝溼為理脾引經要藥非此引用不能行陳
皮辛能利氣炒香尤能燥溼醒脾使氣行則痛
止皆以瀉木而益土也

甘草黑豆湯 解百藥毒兼治筋疝莖中挈痛挺

春方邪術而得之用
此方者亦取其解毒

甘草兩 黑豆升半

蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試之不然又加甘

六四五

草其驗乃奇若治筋疝常用甘草梢以梢能徑達莖中也

加大黃名大黃甘草湯治上中下三焦消渴

正柴胡飲景 凡外感風寒發熱惡寒頭疼身痛

痰瘧初起等證氣血和平宜從平散者

柴胡三錢 防風一錢 陳皮半錢 芍藥二錢 甘草一錢 生薑三五片

如熱而兼渴者加乾葛一二錢 如嘔惡者加半夏錢半

如溼勝者加蒼朮一錢 如胸腹有微滿者加厚朴一錢

如寒氣勝而成方切用和 卷上正柴胡飲 柴陳煎 圭

邪不易解者加麻黃一二三錢去浮沫或蘇葉亦可

柴陳煎景 治傷風兼寒咳嗽發熱痞滿多痰

柴胡三錢 陳皮錢五分 半夏錢二 甘草錢一 生薑三五片

如寒勝者加細辛七八分 如風勝氣滯者

加蘇葉錢半 如冬月寒甚者加麻黃錢半

氣逆多嗽者加杏仁一錢 痞滿氣滯加白芥子五七分

柴芩煎 治傷寒表邪未解內外俱熱瀉痢煩渴

喜冷氣壯脈滑數者宜此主之及瘧痢並行內熱去血兼表邪發黃等證

柴胡 黃芩 梔子 澤瀉 木通 枳殼

如瘧痢並行鮮血純血者加芍藥二錢甘草一錢 如溼勝氣陷者加防風一錢

柴胡飲景 一為水數從寒散也 凡感四時不正之氣或為發熱或為寒熱或因勞因怒或婦人熱入血室或產後經後因冒風寒以致寒熱如瘧等證但外有邪而內兼火者須從涼散

成方切用和 卷上柴陳煎 柴胡飲 圭

宜此主之

柴胡三錢 黃芩半錢 芍藥二錢 生地 陳皮半錢 甘草八分

如內熱盛者加連翹一二錢 如外邪盛者加防風一錢

如邪結在胸而痞滿者去生地加枳實一二錢

如熱在陽明而兼渴者加花粉或葛根一二錢甚者加知母石膏亦可

柴胡飲 二為火數從溫散也 凡遇四時外感或其人元氣充實臟氣素平無火或時逢寒勝之令本無內熱等證者皆不宜妄用涼藥以

致寒邪不散則為害匪淺宜此主之

陳皮半錢半夏錢細辛錢厚朴錢甘草八分柴胡錢

錢半或生薑三五片如邪盛者可加羌活防風

白芷紫蘇之屬擇而用之如頭痛不止者加

川芎一二錢如多溼者加蒼朮如陰寒氣

勝必加麻黃一二錢或兼桂枝不必疑也

三柴胡飲景三為木數從肝經血分也凡素

稟陰分不足肝經血少而偶遇風寒或感邪不

深可兼補而散者或病後或產後感冒有不得

成方切用和卷五上二柴胡飲三柴胡飲

不從解散而陰氣虛弱不能外達者宜此

柴胡錢芍藥錢甘草錢陳皮錢當歸二錢湯

以熟生薑三五片如微寒咳嘔者加半夏

四柴胡飲景四為金數從氣分也凡元氣不

足或忍饑勞倦而外感風寒或六脈緊數微細

正不勝邪等證必須培助元氣兼之解散庶可

保全宜此主之若但知散邪不顧根本未有不

元氣先敗者察之慎之

柴胡一二錢人參隨炙甘草錢當歸二三錢湯

薑三五片如胸膈滯悶者加陳皮二錢

五柴胡飲景五為土數從脾胃也脾土為五

臟之本凡中氣不足而外邪有不散者非此不

可此與四柴胡飲相表裏但四柴胡飲止調氣

分此則兼培血氣以逐外邪尤切於時用者也

神效不可盡述凡傷寒瘧疾痘瘡皆所宜用

芍藥炒白朮當歸柴胡一二錢熟地三五錢

炙甘草錢陳皮酌用或寒勝無火者減芍藥

加生薑三五片或炮薑一二錢或加桂枝二

成方切用和卷五上四柴胡飲五柴胡飲

錢則更妙脾滯者減白朮氣虛者加人參

隨宜勞倦傷脾下陷者加升麻一錢

歸柴飲景治營虛不能作汗凡真陰不足外感

寒邪難解者此神方也

當歸兩柴胡錢炙甘草八分或加生薑三五七

片或加陳皮一錢或加人參大便多溇者以冬

木代當歸亦佳

蘆根湯金治傷寒病後嘔噦不下食

蘆根升竹筴升生薑兩粳米合

蘆根甘寒降伏火利小水竹筴甘寒除胃熱清燥金生薑辛溫祛寒飲散逆氣三者皆能和胃

胃和則嘔止加粳米者亦藉以調中州也

陰陽水又名生熟水治霍亂吐瀉有神功藥中治霍亂者最多然有寒熱二證萬一誤用立死不救倉卒患此脈候未審切勿輕投偏熱偏寒之劑惟飲陰陽水為最穩。張子和曰霍亂吐瀉乃風溼腸三氣合邪也溼土為風木所尅鬱則生熱心火上炎故吐瀉者轉筋也脾溼下注故瀉者溼也風急甚則轉筋轉筋者風也又邪在上焦則吐在下焦則瀉在中焦則吐瀉交作。

百沸湯 新汲井水 各半和服

成方切用 和 卷五 蘆根湯 陰陽水 美

陰陽不分而擾亂故上吐下瀉而霍亂飲此輒定者分理其陰陽使和平也

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷五下

表裏門 正方一十四 附方六

大柴胡湯 大前胡湯 柴胡加芒硝湯 葛根黃連黃芩

湯 桂枝加大黃湯 防風通聖散 雙解散 祛風至寶丹

五積散 五積交加散 參蘇飲 扶苓補心湯 芳蘇飲 香蘇飲 三

黃石膏湯 麻黃白朮湯 冰解散 茵陳丸

柴苓飲 四逆散

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭

男

有榆蒼培同較

有杜雋望

成方切用

表裏門 病在表者宜汗宜散。病在裏者宜攻。景復立大柴胡葛根黃芩等法。台表裏而兼治之。後人師其意。則有防風通聖參蘇五積諸劑。姑採數方。以為準則。學者其引而伸之。比例而善用之。則得矣。

大柴胡湯 治傷寒發熱汗出不解陽邪入裏

成方切用

卷五

熱結在裏 非三陰之裏。乃胃腸也。此為少陽。有桂枝加大黃湯。少陰有三承氣。氣厥陰一小承氣。皆兼陽明證也。心下痞硬。而不利者。難。吐利而可下。心煩喜嘔。裏熱已甚。結於胃中。故下之則愈。又曰傷寒下之早。因作痞者。裏虛。傷熱而利也。因表裏不解。故用桂枝人參湯。解表。和裏。若傷寒發熱。汗出不解。心下痞硬。嘔吐而下利者。此為實。故以大柴胡下之。或往來寒熱。煩渴譫妄。腹滿便秘。表證未除。裏證又急。脈洪陽明。或沉實弦數者。裏證為邪在少陽。

柴胡八兩 半夏半升 黃芩 芍藥三兩 生薑五兩 大棗十二

成方切用 卷五下

枳實 四兩 酒浸

表證未除。故用柴胡以解表。裏證又急。故用大黃枳實以攻裏。芍藥安脾斂陰。能瀉肝火。使黃芩退熱解渴。半夏和胃止嘔。薑辛散而棗甘緩。以調營衛而行津液。此表裏交治。下劑之緩者也。

陶節菴曰。傷寒邪熱。傳裏。須看熱氣淺深。用藥。三焦俱傷。則痞滿燥實。堅全見。宜大承氣湯。邪在中焦。則有燥實。堅三證。宜調胃承氣湯。加甘草和中。去枳朴者。恐傷上焦。氣氣之氣也。邪在上焦。則痞而實。宜小承氣湯。去枳實者。恐傷下焦。真陰也。若表證未除。裏證又急。不得不下者。則用大柴胡湯。通表裏而緩治之。大承氣最緊。小承氣次之。調胃承氣又次之。大柴胡又次之。蓋恐硝性燥急。故不輕用。周揚俊曰。仲景於太陽入膀胱腑證。則有五苓散。少陽兼陽明。皆表裏兩解之法也。

成方切用

卷五

大柴胡湯 柴胡加芒硝湯

以前胡易柴胡名。大前胡湯。崔氏取其清。柴胡加芒硝湯。治傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡潮熱。已而微利。此本柴胡證。知醫以圓藥下之。非其治也。潮熱者實也。先宜小柴胡湯以解外。後以加芒硝湯主之。傷寒十三日。為之時。腸滿而嘔。少陽也。胸滿而日晡潮熱。陽明也。邪氣猶在表裏之間。

小柴胡湯 見和 加芒硝六兩

表證誤下邪熱乘虛入胃以致下痢而滿嘔潮熱之證猶在故仍先與小柴胡湯以解外隨後以加芒硝湯以蕩胃熱亦與大柴胡兩解同意

葛根黃連黃芩湯

治太陽病桂枝證發熱惡風

自汗醫反下之利遂不止邪在表而反下之虛其汗熱而利脈促者表未解也為陽盛雖下利而脈促知表未解喘而汗出者外盛所致痛而汗出為裏實氣逆所致與此湯主之

葛根半斤 甘草炙 黃芩二兩 黃連三兩 先煮葛根內

成方切用

卷下 葛根黃連黃芩湯

諸藥煎或加薑棗

表證尚在醫反誤下邪入陽明之腑其汗外越氣上奔則喘下陷則利故舍桂枝而用葛根顯主陽明之表葛根能升陽明清熱甘草以調胃氣不治利而利自止不治喘而喘自止乃太陽陽明表裏兩解之變法也

桂枝加大黃湯

治太陽誤下轉屬大陰腹滿

大實痛者

桂枝湯見表 加大黃兩芍藥三兩

誤下而成結胸則邪在上仍屬太陽今腹滿而大實痛則邪已入太陰經曰諸痛為實痛隨利減故用桂枝以解未盡之表邪加大黃以下內

陷之邪熱桂枝加大黃何為不用芍藥大黃而於桂枝內加之要知從太陽來以太陽為本也越過真日太陰腹痛有三有次第傳經之邪有直入本經之邪有下後內陷之邪此腹滿時痛為下後內陷之邪宜桂枝加大芍藥湯大實痛者桂枝加大黃湯設遇本經直入陰邪腹滿實痛脈沉細者宜急用四物理中等以和之矣黃芩藥者宜減之以胃氣弱易動故也以太陰為寒虛其病多宜溫而不宜下也

成方切用

卷下 桂枝加大黃湯

防風通聖散

治一切風寒溼暑饑飽勞役內

外諸邪所傷氣血佛鬱表裏三焦俱實憎寒壯熱邪在頭目昏暈目赤睛痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽喉不利唾涕稠黏咳嗽上氣大便秘結熱結小便赤澀瘡瘍腫毒折跌損傷瘀血便血腸風痔漏手足瘰癧驚狂謔妄風火丹斑癩疹

防風

荆芥 連翹

麻黃

薄荷

川芎

當歸

白芍 白朮

山梔

大黃

芒硝

枳實

錢

黃芩 石膏 桔梗 甘草 滑石 加生
薑葱白煎自利去硝黃自汗去麻黃加桂枝涎
嗽加薑製半夏

防風荆芥薄荷麻黃輕浮解表使風寒從汗出
而散之於上大黃芒硝破結通幽梔子滑石降
火利水使風熱從便出而泄之於下風淫於內
肺胃受邪桔梗石膏清肺瀉胃風之為患肝木
受之川芎歸芍和血補肝黃芩清中上之火連
翹散氣聚血凝甘草緩峻而和中重用甘草滑石亦猶六一

成方切用 卷五下 防風通聖散

利水瀉火之意 白木健脾而燥溼上下分消表裏交治
而於散瀉之中猶寓溫養之意所以汗不傷表
下不傷裏也

除大黃芒硝名雙解散麻黃防風荆芥薄荷川
翹石膏滑石以解裏復有當歸白芍以連
和血桔梗甘草白木以調氣故曰雙解再加人
參補氣熟地益血黃藥黃連除熱羌活獨活天
麻細辛全蠍祛風蜜丸彈子大每服一丸茶酒
任下名祛風至寶丹喻嘉言曰此中風
門不易之方也

五積散方 治少陰傷寒及外感風寒內傷生冷

成方切用 卷五下

身熱無汗頭痛身痛項背拘急胸滿惡食嘔吐
腹痛寒熱往來脚氣腫痛冷秘寒亦寒瘧惡寒
無汗婦人經水不調上證皆寒
溼為病

白芷 陳皮 厚朴 當歸 川芎 芍藥
茯苓 桔梗 蒼朮 枳殼 半夏 麻黃
乾薑 肉桂重表者
用桂枝 甘草 加薑葱煎又法
除桂芷枳殼陳皮餘藥慢火炒攤冷入桂芷同
煎名熟料五積散用炒者助
其溫散也有汗去蒼朮麻黃
氣虛去枳桔加人參白朮腹痛挾氣加吳茱萸

成方切用 卷五下 五積散

胃寒加煨薑陰證傷寒肢冷虛汗加附子婦人
調經加醋艾
麻黃桂枝所以解表散寒甘草芍藥所以和裏
止痛蒼朮厚朴平胃土而散滿陳皮半夏行逆
氣而除痰芍歸薑芷入血分而祛寒溼枳殼桔
梗利胸膈而清寒熱茯苓瀉熱利水寧心益脾
所以為解表溫中除溼之劑去痰消痞調經之
方也王海藏曰桂枝麻黃芍藥甘草即各半湯
也若桂枝陳皮即平胃散也枳殼陳皮半湯
枳桔半夏等湯也加芍歸治血又加乾薑為厚
朴散此數藥相合為解表溫中之劑諸病調經

六五一

之方雖為內寒外感表裏之分所製實非仲景表裏桂枝麻黃薑附之方也惟在活法變而通之隨節菴曰夫病不身熱頭痛初起怕寒腹痛嘔吐泄瀉路臥沉默不渴脈沉遲無力人皆知為陰證矣至於發熱面赤煩躁揭去衣被脈大人皆不識認作陽證誤投寒藥死者多矣不知陰證不分熱與不熱不論脈之浮沉大小但指下無力重按全無便是伏陰急與五積散一服通解表裏之寒若內有沉寒必須薑附溫之若作熱治而用涼藥則渴愈甚而躁愈急豈得生乎此取脈不取證也接傷寒有合證取脈者又有合脈取證者本方能散寒積食積氣積血積痰積故名五積

合人參敗毒散名五積交加散治寒溼身體重痛腰脚痠疼

成方切用 卷五下 五積散 七

參蘇飲元 治外感風寒內傷飲食發熱頭痛嘔逆咳嗽痰塞中焦眩暈嘈煩傷風泄瀉及傷寒已汗發熱不止已汗而熱不止猶有餘邪亦宜飲身重注瀉者亦宜此方清利之

人參 紫蘇 乾薑 前胡 半夏 茯苓 七錢 陳皮 甘草 枳殼 桔梗 木香 每五錢加薑棗煎外感多者去棗加葱白肺中有火去人參加杏仁桑白皮瀉瀉加白朮 豆蓮肉

元戎云此方有風藥解表氣藥和中外感風寒內積痰飲皆可用也合四物名茯苓補心湯尤能治虛熱及吐衄便血乃虛實表裏兼治之劑然不可過劉宗厚曰此出少陽柴胡例藥治感根自能解肌枳殼橘紅輩自能寬中快膈毋以性涼為疑愚觀藥性非涼亦是辛平之劑去人參加川芎前胡易柴胡薑棗煎名芎蘇飲治傷風寒外有發熱頭痛惡寒內有咳嗽吐痰氣湧此因肺有實熱且表邪甚重故去人參取其清降也

成方切用 卷五下 參蘇飲 三黃石膏湯 八

三黃石膏湯 治傷寒溫毒表裏俱熱狂叫欲走煩躁大渴面赤鼻乾兩目如火身形拘急而不得汗或已經汗下過經不解三焦大熱謔狂鼻衄身目俱黃六脈洪數及陽毒發斑此因熱在三焦閉塞經絡津液榮衛不通遂成此證

生石膏 黃芩 黃連 黃檗 梔子 麻黃 淡豉 茶一撮煎熱服 每服一兩薑三片棗二枚細表裏之邪熱俱盛故以黃芩瀉上焦之火黃連

瀉中焦之火黃檗瀉下焦之火梔子通瀉三焦之火而以麻黃淡豉發散表邪石膏體重瀉火氣輕解肌亦表裏分消之藥也

麻黃白朮湯垣 治大便不通小便赤澀身面俱腫色黃麻木身重如山喘促無力吐痰唾沫發熱時躁躁已振寒項額如冰目中溜火鼻不聞香臍有動氣少腹急痛東垣曰此宿有溼熱伏於營血之中木火乘於陽道為上盛短氣喘促為陰火傷氣四肢痿弱為腎水不足冬時寒水得令乘其肝木尅火凌木大勝必有大復故見諸證。

成方切用 卷五下 麻黃白朮湯 九

青皮 陳皮 黃連炒酒 黃檗炒酒 甘草炙 升麻二分
柴胡 桂枝 人參 黃耆 蒼朮浸 白朮炒土
厚朴 豬苓三分 澤瀉 吳萸 茯苓四分 白苳蔻
炒麩五分 麻黃六分 杏仁四分 研 分二服
前證蓋因表裏俱傷陽氣抑不得升故風火溼熱鬱而為病也桂枝麻黃解表祛風升麻柴胡升陽散火黃連黃檗燥溼清熱而黃檗又能補腎滋陰蔻朴青陳利氣散滿而青柴又能平肝蔻朴又能溫胃杏仁利肺下氣神麩化滯調中

吳萸煖腎溫肝參耆甘草蒼白二朮補脾益氣二苓澤瀉通利小便使溼去而熱亦行方內未嘗有通大便之藥蓋清陽升則濁陰自降矣此蓋合四君五苓平胃麻黃吳萸解毒而為一方者也治證既多故所用表裏寒熱補瀉之藥俱備但皆氣藥而無血藥與五積不同

香蘇飲局方 治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶噯氣惡食內經曰卑下之地春氣常在故東南甲溼之區風氣柔濕易感風寒俗稱感冒受邪膚淺之名也由鼻而入在於上部客於皮膚故無六經形證唯發熱頭痛而已胸膈噯氣惡食則兼內傷也輕為感冒重者為傷又重者為中

成方切用 卷五下 香蘇飲 十

香附炒 紫蘇錢二 陳皮去白 甘草七分 加薑葱煎傷食加消導藥咳嗽加杏仁桑皮有痰加半夏頭痛加川芎白芷傷風鼻塞頭昏加羌活荆芥心中卒痛加延胡索酒一杯
紫蘇疏表氣而散外寒香附行裏氣而消內壅橘紅能兼行表裏以佐之屬紅利氣兼能發表而食亦消矣 甘草和中亦能解表為使也
冰解散後用 治天行一二日頭痛壯熱
麻黃四兩 桂心 甘草炙 白芍二兩 大黃 黃芩三兩



ZW 21101000784648

S

2121.5

15b(1002)

麻黃能開腠發汗桂心能引血化汗黃芩以清
 上中之熱大黃以瀉中下之熱甘草白芍能調
 胃而和中蓋天行瘟疫鬱熱自內達外與傷寒
 由表傳裏者不同故雖一二日之淺可以汗下
 兼行治法絕不同於傷寒也鬱熱畢竟外解為
 易大黃宜減用

茵陳丸 治時氣瘴氣黃病瘧赤白痢等證
 茵陳 梔子 鼈甲 炙 芒硝 二兩 大黃 五兩 常山
 杏仁 兩 炒 三 巴豆 一兩 去 皮 炒 鼓 合 五
 服一丸或吐或利或汗如不應更服一丸不應

成方切用 卷五下 小解散 茵陳丸 十一

則以熱湯投之老幼以意加減
 梔子淡豉梔豉湯也合常山可以涌吐合杏仁
 可以解肌大黃芒硝承氣湯也可以蕩熱去實
 合茵陳可以利溼退黃二藥名茵陳
 湯治黃正藥加巴豆大
 熱以去臟腑積寒加鼈甲滋陰以退血分寒熱
 此方備汗吐下三法故能統治諸病

柴苓飲 治風溼發黃發熱身痛脈緊表裏俱
 病小水不利中寒泄瀉等證
 柴胡 二錢 茯苓 豬苓 澤瀉 白朮 三錢 肉

桂 一錢 水一盞半煎服 如寒邪盛者加生
 薑三五片 如汗出熱不退者加芍藥一二錢
 四逆散 治傷寒少陰證陽邪入裏四逆不溫
熱結於裏或欬或悸或飲或小便不利或腹中痛
 於裏或欬或悸或飲或小便不利或腹中痛
 或泄利下重 皆因熱結於裏 傷寒邪在三陽
 少陰則熱邪漸淡四肢逆而不溫至厥陰則手
 足逆冷經曰熱深厥亦深熱微厥亦微與此湯
 以散傳經之熱

柴胡 芍藥 枳實 甘草 等分為末水調
 飲欬加五味子 乾薑 併主下利 肺與
 大腸

成方切用 卷五下 柴苓飲 四逆散 十一

相表裏上咳下悸加桂枝導引小便不利加茯苓
 利治法頗同 利治法頗同 利治法頗同
 茶 甘 淡 腹 痛 加 附 子 散 寒 泄 利 下 重 加 薤 白 大
 腸 滯 氣 滯 散 寒 泄 利 下 重 加 薤 白 大
 經曰諸四逆者不可下故用枳實泄結熱甘草
 調逆氣柴胡散陽邪芍藥收元陰以辛苦甘酸
 之品合表裏而交治之則陽氣敷布於四末矣

終