


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇二一・子部・醫家類

醫學綱目四十卷（卷二十八至卷四十）〔明〕樓英撰……………一

新刊醫林狀元壽世保元十卷〔明〕龔廷賢撰……………三二七

腰痛 胎前腰痛 產後腰痛 脊痛脊

強

大法

六元正紀論云太陽所至為腰痛又云巨陽即太陽也

虛則頭項腰背痛是太陽膀胱之脈所過遂出別下項循

肩膊內挾脊抵腰中故為病項如板挾脊痛腰似折痺不

可以曲是經氣虛則邪客之痛病生矣夫邪者是風熱濕

燥寒皆能為病大抵寒濕多而風熱少然有房室勞傷腎

虛腰痛者是陽氣虛弱不能運動故也經云腰者腎之府

轉搖不能腎將敗矣宜腎氣丸尚香丸之類以補陽之不

足也膏梁之人久服湯藥醉以入房損其真氣則腎氣熱

腎氣熱則腰脊痛而不能舉久則髓減骨枯發為骨痿宜

六味地黃丸滋腎丸封髓丹之類以補陰之不足也靈樞

云腰痛上寒取足太陰陽明上熱取足厥陰不可使仰取

足少陽蓋足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹經所

過處皆能為痛治之者當審其何經所過分野循其空穴

而刺之審何寒熱而藥之假令足太陽令人腰痛引項脊

尻背如重狀刺其郛中太陽二經出血餘皆倣此彼統一

方治諸腰痛者固不通矣

如久腰痛必用官桂以開之方止腹脇痛亦然

煨腎丸治肝腎損及脾損穀不化腰痛不起者神效貼

立安丸治五種腰痛補腎又治脚氣

破故紙 續斷 乾木瓜 牛膝酒

柱仲 桑寄生 杜仲 草薢 烏藥 側柏葉

右為細末蜜丸如桐子大每服五十九鹽湯或酒任下

本又方治五種腰痛

狗脊 草薢 兔絲子 各一兩酒浸三

右為細末煉蜜如桐子大每服三十九用草薢二兩酒

浸三日取酒服藥空心食前

無杜仲酒治風冷傷腎腰痛不能屈伸并補腎虛取杜仲

一斤切姜汁製炒斷絲用好酒二升浸十日每服三四合

日四五服一方為末溫酒調一錢空心服

驗治腰痛用破故紙炒為末溫酒下三錢

右杜仲牛膝草薢破故紙治腰例

本治腎虛腰痛不能轉側糜茸丸

糜茸 茸亦可兔絲子 取末拍上尚香兩

右為末以羊腎二對用酒浸蒸爛去膜研如泥和丸如

桐子大陰乾如羊腎少入酒糊佐之每服三五十九溫

酒或鹽湯下

戊戌年八月淮南大水城下浸漬者連月予忽臟腑不調

腹中如水吼數日調治得愈自此腰痛不可屈折雖洗面

亦相妨服偏藥不效如是凡三月予後思之此必水氣陰

虛腎經感此而得乃灸腎脬三七壯服此藥

手治腰痛鹿角去止皮取白者熬令黃為末酒服五十七

日三特禁生魚餘不禁新者良陳不佳角心中黃處亦不

中服大神良藥也 治腰痛羊腎為末酒服二方寸七

日三服本藥云羊腎補

右糜茸鹿茸羊腎治腰痛例

丹補腎丸治腎虛腰痛累效

烏藥 側柏葉 右酒蒸晒乾為末為丸如桐子大

經治腎虛脚無力生栗子入袋盛懸乾每日平明吃十餘顆次吃諸腎帶瘵

腰膝痛脈大者腎虛

杜仲 龜板 黃栢 知母

枸杞 五味

右為末猪脊髓為丸

補陰九治陰虛性急腰痛者

龜板 黃栢 知母 側柏葉

右為末地黃膏為丸

腰腿濕痛

龜板 黃栢 青皮 生甘草

右為末研姜一大片次入前藥末一錢研細以蒼耳汁盪起煎令沸服之

腰腿痠痛

敗龜板 威靈仙 蒼耳 蒼耳

右為丸以黑荳汁兼四物湯加陳皮生甘草生薑一片煎吞下

又方

陳皮 威靈仙 知母 蒼朮 白芍

右為末蜜丸服

濕熱腰痛大便泄

龜板 楮皮 蒼朮 滑石

右為末粥丸如內傷白朮山查湯下

蒼朮湯治濕熱腰腿疼痛

蒼朮 滑石

右為末粥丸如內傷白朮山查湯下

蒼朮湯治濕熱腰腿疼痛

蒼朮 滑石

右為末粥丸如內傷白朮山查湯下

蒼朮 濕止痛柴胡 防風 黃栢

右作一服水煎空心服

右龜板黃栢知母治腰痛例

牛膝酒治腎傷風毒攻刺腰痛不可忍

牛膝 川芎 羌活 地骨皮

五加皮 蒼朮 甘草 海桐皮

生地

右到以絹袋裹入好酒二斗浸二七日夏三宿每服一盃日三四盃長令酒氣不絕為佳一法入杜仲一兩炒絲斷

六味地黃丸治腎虛腰痛方見

婦人患腰痛此血分有熱

白芍 生地 當歸尾 黃栢

白朮 黃芩 木通 甘草

川芎 右分四貼煎取食前熱服

右地黃治腰痛例

治腰痛 杜仲 枸杞根

右三味咬咀好酒三斗漬之納罐內密封投於銅器中煮一日服之無節取醉為度

義一姪婦瘧疾初安因衝風又發腰痛白濁已與參朮

檳榔半夏等補方又教以煨牡蠣一錢木通五分炒栢三

分粗末入前方同煎

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

痢後腰痛兩脚無力

陳皮 半夏 白芍 茯苓
蒼朮 當歸 黃芩 白朮

甘草 錢一

右作一服姜三片食前服

婦人月經行後腰痛為虛詳氣血虛於補氣血藥中加杜仲側柏葉等藥

仲側柏葉等藥

世治腰痛用威靈仙丹溪云威靈仙治痛之要藥為細末

每服二錢猪腰子一隻批開摻藥在內濕紙煨熟五更細

嚼熱酒下千金方用威靈仙末一錢溫酒調下逐日以微

利為度病人稍虛禁酒

本治腰腿痛氣滯藥基子

牽牛不以多少用新瓦火燒赤便以牽牛頓在瓦上自

然一半熟一半生不得撥動取頭末一兩入硫黃一分

同研勻分三服每用白麩一匙水和捏作基子五更初

以水一盞煮熱連湯送下痛住即止未住隔日再作子

嘗有此疾每發只一服痛止

世治腰痛不可忍用牽牛不以多少研取頭末去滓不用

取大蒜每一瓣擊開入巴豆肉一粒在內用濕紙裹定煨

令蒜熟去巴豆將蒜研細和牽牛為丸如桐子大每服五

九醋湯茶空心食前重虛實服

治五般腰痛

胡桃肉 五靈脂 黑牽牛 炒
白牽牛 炒 狗脊 炒 草解 炒 沒藥 炒

巴豆 五粒用濕紙裹

右件為末將前胡桃膏醋糊丸如桐子大每服十五丸

風腰疼豈淋無灰酒下 氣腰疼煨葱白酒下 血

腰疼當歸酒下 打撲腰疼蘇木酒下

世治進道病腰疼一年不愈診其兩手脈沉重有力以

通經散下五七行次以杜仲去粗皮細切炒斷絲為末每

服三錢猪腰子一枚薄批五七片先以椒鹽淹去腥水摻

藥在內裹以荷葉以濕紙敷重封文武火燒熟臨臥細嚼

溫酒送下每旦以無比山藥丸一服數日而愈

世治活寄生湯治腎氣虛弱冷臥濕地腰腿拘急筋骨攣

痛或當風取涼過度風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼

痛或腰痛牽引脚重行步艱難

獨活 桑寄生 杜仲 牛膝

細辛 秦艽 茯苓 桂心

防風 芍藥 人參 甘草 乾地黃 二一方用續斷

當歸 芍藥 乾地黃 二一方用續斷

右為粗末每服三錢水二大盞生姜五片同煎至七分

食前服

世防風湯治傷寒後腰痛或皮肉痛痺腿膝疼痛行履艱

難不可俛仰

防風 麻黃 桂枝 杜仲 牛膝 五加皮 丹參 芍藥 羌活

附子 羌活 當歸 羌活 羌活

續斷 羌活 羌活

右咬咀每服五錢水一盞半姜二錢同煎食前服

垣川芎肉桂湯丁未年冬普通甫自河東來有役人小程宿於寒濕之地腰痛不能轉側兩脇痛急作痛月餘不愈腰痛論中所說皆為足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二症屬少陽膽經外絡脈病皆宜去血絡之凝乃愈其內經有云冬三月禁不得針只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血以此方主之

羌活半錢 柴胡一錢 獨活五分 肉桂
芥木各一錢 防風 漢防已各三錢 桃仁五箇去
歸稍 甘草一錢 炒麩五分

川芎一錢

右吹咀水酒煎去查食達熱服

無小續命湯加炒去皮桃仁治風腰痛最妙方見中五積散加桃仁治寒濕腰痛最効方見傷寒發熱

千杜仲酒治腎脈逆小於十口膀胱虛寒腰痛胸中動通四時用之方

杜仲 地黃各四 萆薢 羌活
天雄 蜀椒 芫蕒 桂心
防風 秦艽 烏頭各三 五加皮
石斛各五 細辛三 瓜蒌根 地骨皮
續斷 桔梗 甘草各

右十九味吹咀以酒四斗漬四宿初服五合加至七八合日再

本治久患腰痛

石甜瓜一兩出 附子地五 冬瓜皮
冬瓜仁 枳殼 沒藥 烏藥各五
右為細末每服四錢溫酒調下臨臥時服服日只午後

中時先可晚食申時後不可食專候歸臥服平日膏梁厚味之人腰痛皆是濕熱陰虛治見前陰虛坦如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也於羌活勝濕湯中加黃栢一錢附子五分芥木二錢方見勝濕湯

羌活二錢 防風 獨活 肉桂各三

甘草各二 歸稍五錢 桃仁十五 連翹五

漢防已 黃栢兩 澤瀉 大黃三錢

右吹咀每服五錢如麻頭大酒半盞水一盞去查熱服立愈

羌活湯治腰膝無力沉重

羌活三錢 防風五分 甘草生熟各 草薺寇
黃栢 葛根各五 砂仁一錢 陳皮六分

大黃湯治腰膝無力

知母五分 黃芪二錢 蒼朮 升麻

右為粗末作二服水二盞煎至一盞去查空心熱服

仲腎着湯治身重腰冷如水痛重如帶干錢方見

丹脈瀉者瘀血用補陰丸中加桃仁紅花補陰丸方

世橘核散治腰痛諸般滯氣

山查子兩 橘核五 破故紙兩 乳香錢

玄胡索 菴藷 沒藥 五加皮

紅麩兩

右為末酒調下

雲如神湯治男子婦人腰痛

玄胡索 當歸 桂心 杜仲各等

右為末溫酒調下三錢甚者不過數服

無桃仁酒治腎虛風勞所傷毒腫掣痛牽引小腹連腰痛
用桃仁麩皮炒去皮尖研細每服一錢七熱酒調下有汗
即愈

地龍湯治腰脊痛或打撲傷損從高墜下惡血在太陽
經中令人腰脊痛或脛膈臂膊中痛不可忍臭壅塞不通

中桂分四 桃仁分六 羌活分二 獨活

甘草分一 黃柏分一 麻黃分五 地龍分四

蘇木分六 歸稍錢

右爲粗末勿服五錢水二盞煎三盞去滓食遠熱服
無橘核酒治打撲腰痛惡血瘀蓄痛不可忍用橘核炒去
皮研細每服二錢七酒調服或用猪腰子一箇去筋膜破
開入藥同葱白茴香鹽濕紙裹煨熟細嚼溫酒下
熟大黃湯治墜墮閃到腰痛不能屈伸

木 醫 學 綱 目 卷 二 八

大黃切如 生薑切各

右同炒令焦黃以水一盞浸一宿五更去查服天明取

下如雞肝者即惡物也

丹徐資夫年六十因墜馬腰痛不可轉側六脈散大重取
則弦小而長稍堅予以爲惡血雖有未可驅逐且以補接
爲先遂令煎蘇木人參黃芪川芎當歸陳皮甘草服至半
月後漸散大飲食亦進遂與前藥調下自然銅等藥服一
月而安

治老人因擗撲腰痛

蘇木分一 人參分五 歸頭身錢一 黃芪分五

陳皮錢一 木通分一 木香分五

右研桃仁九枚下接骨藥

食積腰痛

龜板酒 栢葉酒 香附錢 辣芥子
凌霄花半錢
右酒糊丸煎四物湯加陳皮甘草一分吞下
食積腰痛二陳湯加南星 食積痰積如脈有力者宜下

山對氣腰痛香茶內滴入菜油數點頓服
素北風生於冬病在腎脛在腰全腰其 少陰所謂腰痛
者少陰者腎也十月萬物陽氣皆傷故腰痛也

太陽所謂腰痛者正月太陽寅寅太陽也正月陽氣出
在上而陰氣盛陽未得自次故腫腰痛也

腰痛皆屬腎虛治法並見前陰陽虛條
腰痛項強腰似折項似拔衝頭痛乃足太陽經不行也
羌活勝濕湯主之

木 醫 學 綱 目 卷 二 八

羌活 獨活錢一 藥本 防風錢一

蔓荊子分三 川芎分二 甘草分五

右件吹咀都作一服水二盞煎去一半去查溫服食後

運氣腰痛有五

一曰寒經云水鬱之發 腰痛大關節不利屈伸不
便又云太陽所至爲腰痛 太陽之復腰痛反痛屈伸
不便治以熱劑是也
二曰濕經云太陰司天濕氣下臨腎氣上從當其時反腰
痛動轉不便又曰太陽在泉濕淫所勝病腰似折亦治
以熱劑是也

三曰寒濕雜合經云太陰司天之政終之氣寒大舉濕大
化病關節禁固腰痛治以燥熱是也

四曰燥經云陽明司天燥淫所勝病腰痛治以苦溫是也

五

五日燥熱風寒雜合經云少陰司天之政水火寒熱非時氣交民病腰痛初之氣寒乃始陽氣鬱民反周家關節禁固腰腫痛治以濕熱多寒清少也

附子尖 烏頭尖 南星各二 朱砂

麝香 丁香 雄黃 錢半

右為末蜜丸如龍眼大每一丸用生薑汁化開如厚粥

火上烘熱放掌上摩腰中候藥盡貼腰上即烘綿衣縛

定腰熱如火間三日用一丸

世皂角膏治諸腰脚痠痛用好酒二大碗皂角一斤去皮

弦搗碎熬至一半濾去渣再用前汁入銀石器內熬為膏

子隨痛處貼之

聖治風脚腰冷痺痠痛川烏頭三分去皮臍生為末好醋

調塗於布帛上貼之痛即止

山腰疼用牛皮膠化開生薑汁打勻貼痛處

素足太陽脈令人腰痛引項脊尻皆如重狀刺其郛中太

陽正經出血春無見血見刺腰痛篇下同○下

腰背依脊而痛至頭几几然目眩眩欲僵仆刺足太陽郛

中出血見項背強之

刺腰痛引項脊尻背三法此二法取足太陽出血也經

云邪在腎腹脹腰痛大便難背脊項痛時眩取之湧

泉崑崙視有血者悉取之此則足太陽少陰俱取血也

又云足太陽之脈是動則病衝頭痛目似脫項似拔脊

痛腰似折此則視太陽虛熱寒陷下刺施補瀉疾留

灸以調之也

足少陰令人腰痛引脊內廉刺少陰於內踝上二指春

無見血出血太多不可復也

刺腰痛引脊內廉此法出足少陰經血也經曰足少陰

之別名曰太鍾當踝後統踝別走太陽其病虛則腰痛

取之所別也此補足少陰絡也

少陽令人腰痛如以針刺其皮中循循然不可以俛仰不

可以顧刺少陽成骨之端出血成骨在膝外廉之骨獨起

者夏無見血

刺腰痛引少腹控眇不可以仰取腰尻分間經文三出此其一也繆刺論云腰痛引少腹控眇不可以仰息刺腰尻之解兩神之上是腰膈以月死生為病數發針立已左刺右右刺左又骨空論云腰痛不可以轉搖急引陰卵刺八髎與痛上髎在腰尻分間此三節經文大同小異通一法也又足厥陰之脈是動則病腰痛不可以俛仰瘡疝少腹腫視盛虛熱寒陷下調之此則證同法異

陽維之脈令人腰痛痛上拂然腫刺陽維之脈脈與太陽合端下間去地一尺所林註云承山穴也

飛陽之脈令人腰痛痛上拂然甚引悲以恐刺飛陽之脈在內踝上五寸少陰之前與陰維之會其穴在內踝上端

同陰之脈令人腰痛痛如小錘居其中拂然腫刺同陰之脈在外踝上絕骨之端為三疔王註云陽輔穴也

解脈令人腰痛痛而引肩目眩眩然特遺洩刺解脈在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血王註云膝外廉筋肉分間郄外廉之橫脈也

散脈令人腰痛而熱甚生煩腰下如有橫木居其中甚則道洩刺散脈在膝前骨肉分間絡外廉束脈為三疔謂地機穴者非也既云膝前骨肉分間絡外廉束脈當在三里陽陵泉二穴上之骨上與膝分間是穴橫刺三疔也

昌陽之脈令人腰痛痛引膺目眩眩然甚則反折舌卷不能言刺內筋為二疔在內踝上大筋前太陰後上踝二寸

所王註云太陰穴在內踝上二寸刺腰痛目眩眩有三此其一也若痛引肩遺洩者刺解

脈在郄外廉筋肉分間委陽穴也若痛引項脊欲止者刺足太陽委中出血也

解脈令人腰痛痛如引帶常如折腰狀善惡刺解脈在郄中結絡如黍米刺之血射以黑見赤血而已王註云郄中會陰之脈令人腰痛痛上漯漯然汗出汗乾令人欲飲飲已欲走刺直陽之脈上三疔在膝上郄下五寸橫居視其盛者出血王註云承筋穴也禁不可刺可灸三壯

肉里之脈令人腰痛痛不可以效效則筋縮急刺肉里之脈為二疔在太陽之外少陽絕骨之後王註云分肉穴也

厥陰之脈令人腰痛腰中如張弓努弦刺厥陰之脈在臑踵魚腹之外循之累累然乃刺之其病令人善言嘿嘿然不慧刺之三疔王註云魚腹

腰痛上寒刺足太陽陽明 上熱刺足厥陰 不可以俛仰刺足少陽 中熱而喘刺足少陰刺郄中出血王註云

刺腰痛篇取足太陽郄中問六法郄中者膝後屈處兩筋之間橫文膈內也太陰正經二法刺郄中央出血解脈二法刺郄中橫文出血王註云一法刺郄上數寸出血會陰一法刺郄中下五寸出血也

羅張仲文傳神仙灸法療腰重痛不可轉側起坐艱難及冷痺脚筋急不可屈伸灸曲踈兩文頭左右脚四處各三壯每灸一壯二火齊下艾炷纒燒至肉初覺疼使用二人兩造齊吹至火滅午時着灸至人定已來臍臍自動一二行或轉動如雷聲其疾立愈此法神效不可量也

玉腎虛腰痛 腎喻取法以杖量臍平去 人中 委

中

撮腰強痛 命門後二十七壯十四壯 崑崙為之灸

摘忽然氣滯腰疼不可俛仰 志室五分 行間 腰

脊內引痛不可屈伸 逆上痛合谷 逆下痛崑崙 復

溜 腰脊俱痛不可忍 風池 合谷 崑崙

蔡又法 風池 承山 合谷 呂細 三間

東腰脊如痠 湧泉一分 陰谷一分 京骨一分 行間五分

集腰閃到氣痛 尺澤一分 委中 人中 陽陵泉 束

骨 崑崙 下窮

羅腰痛不可俛仰轉側難身寒熱倍多身羸面黃黑足

冷不仁腰重如石 腎輸五分 中脊輸五分 腰輸五分

五腎虛腰痛久不已 肩井 腎輸五分 腰輸五分

之不定者刺八膠見前針 大虛腰痛刺而復發腰重不

能舉體可刺委中動脈出血

索腰痛在身之前足陽明原穴 身之後足太陽原穴

身之側足少陽原穴

甲腰痛脊急脇中滿小腹堅急志室主之 腰脊痛惡寒

少腹滿墜癢閉下重不得小便胞盲主之 腰痛眩寒倦

仰急難陰痛下重不得小便秋邊主之 腰脊痛強引背

少腹俛仰難不得仰息脚痿重尻不舉清赤腰以下至足

清不仁不可以坐起勝脫喻主之 腰痛不可以俛仰中

脊內喻主之 腰脊痛尻脊股髀陰寒大痛虎則血動實

則并熱痛痔痛尻腫中腫大便直出扶承主之 腰痛頸

項痛歷節汗出而步履蹇複不仁腦中痛飛陽主之 大

腸實則腰背痺寒轉筋眩痛虛則鼻衄巔疾腰痛澀然

汗出令人飲食欲走承筋主之 腰痛不可舉足踞中踞

後痛脚痿僕參主之 腰痛不能舉足少坐若下車踏地

脛中矯矯然申脈主之 腰痛如小錘居其中憊然腫痛

不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常寒熱陽輔主之

腰痛控舉少腹及股卒俛不得仰刺氣街 腸臍付寒

腰痛不得臥手三里主之 腰痛大便難湧泉主之 腰

痛不可轉側章門主之 腰痛少腹痛陰包主之 腰

不可以久立俛仰京門及行間主之 腰痛少腹滿小便

不利如癰瘰瘦意恐懼氣不足腸中悒悒太衝主之 腰

足痛而清泄善嘔舉跳舉上窮主之 腰痛快快不可以

俛仰腰以下至足不仁入脊腰背寒次窮主之 腰痛大

便難食泄腰尻中寒中窮主之 腰痛小腹滿下窮主之

腎腰痛不可俛仰陰陵泉主之

腰痛不可舉足

腰痛不可轉側

腰痛不可久立

腰痛不可坐

腰痛不可行

腰痛不可舉

腰痛不可轉

腰痛不可久

腰痛不可坐

腰痛不可行

腰痛不可舉

腰痛不可轉

之府轉播不能腎將熾矣得強者生失強者死又云腎盛怒而不止則傷志志傷則善忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏是也

胎前腰痛

雲通氣散治妊娠腰痛狀不可忍此藥神效用破故紙不以多少瓦上炒香熟為末嚼胡桃肉一箇空心溫酒下三

五加皮散治妊娠腰痛不可忍或膝痛先服此散

杜仲四兩 五加皮 阿膠炙 防風

狗脊 川芎 白芍 細辛

草薢各三 杏仁八十箇 皮炒

右咬咀以水九升煮取二升去渣下膠作三服

五加皮丸治妊娠腰痛不可忍者此丸

醫學綱目卷二十八

續斷炒 杜仲各二 芍藥 獨活各三

五加皮 狗脊 草薢 芍藥

訶子肉各四

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下四十九日三

陰不足 丹仁六嫂有胎腰痛

白朮錢 陳皮三 黃小 人參

條芩 川芎 地黃 歸尾分

甘草些

右分四貼水酒煎服

大紫酒治妊娠腰痛如折用大黑豆二合炒令香熟以酒

一大盞煮取七分去豆空心頓服

木治胎動腰痛捨心或下血取葱白不拘多少溫酒汁飲

之

大治妊娠腰背痛及覆不得產實治妊娠卒腰痛俱用鹿角長六寸燒令赤酒中焯再燒再焯以角碎為度取酒飲之鹿角為末服方寸七

辨方

肘率腰痛不安或腰痛胎轉捨心下血不止用薄蒲汁酒一升服之 妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉捨心或下血不止艾葉一把如雞子大以酒四升煮取二升分為二服良

產後腰痛

保治血癰腹乃刺刺腰痛用四物湯細末三兩加酒煮玄胡索細末二兩每服三錢酒下

雲紫金丸治產後惡寒不快腰痛小腹如刺寒熱腹痛久有瘀血月水不調亦可治心痛與失笑散同

五靈脂各等 真蒲黃各等

醫學綱目卷二十八

右以好米醋調五靈脂末煨火熬成膏干次以蒲黃末搜和丸如櫻桃大每服一二九水與童便各半煮煎至七分至藥化溫服之少頃再進一服惡露即下及有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下

生地黃湯治產後腰疼腹中餘血未盡流為足腫不食

生地汁升 芍藥 甘草各二 丹參四

生薑合 生薑汁合

右切以水三升煮取一升去滓入地黃汁蜜姜汁微火煎一二沸一服三合日二夜三利一二行愈

因產後惡露方行忽然漸少斷絕不來腰中重痛者此由血滯宜桃仁湯如有大痛處必作癰疽當以癰疽法治之

桃仁湯方

桃仁 蘇木 生地各半 蜜去足

桃仁 蘇木 生地各半 蜜去足

桃仁 蘇木 生地各半 蜜去足

桃仁 蘇木 生地各半 蜜去足

桃仁 蘇木 生地各半 蜜去足

桃仁 蘇木 生地各半 蜜去足

水經

右為粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服無時
候惡露下即住服

脊痛脊強

灸刺脊痛脊強有三法

其一取督脈經云督脈之別名曰長強別走太陽實則脊
強取之所別也

其二取足太陽經曰厥挾脊而痛者至項頭沉沉然目眩
眩然腰脊強取足太陽中血絡是也

其三取小腸經云小腹控舉引腰脊上衝心邪在小腸取
之盲原以散之刺太陰厥陰以下之取巨虛下廉以去之
是也

脊脊并腰疼

人中

人中口合水突處針入三分
委中

二寸半思灸又於四時紫脈上去血如
三厘

五樞

印腰脊強不得俛仰刺脊中舉脊內廉痛便難陰痿不用
少腹急引陰及脚內廉內陰谷主之 男子脊急目赤支

溝主之 腰脊強四肢解墜善怒咳少氣鬱然不得息厥
逆肩不可舉陽乃痿身躄章門主之

耳高者腎高腎高則苦背脊痛不可以俛仰

腎脈緩甚為折脊

寒熱二厥 寒厥手足冷 熱厥手足熱

產後寒厥 脚氣頑麻腫痛為痺厥 足痿

不收為痿厥 脚氣衝心為厥逆 產脚氣

王太僕云厥者氣逆上也世謬傳為脚氣讀此始知其病

上古稱之為脚氣也經曰寒厥者手足寒也曰熱厥者手

足熱也曰痿厥者痿病與厥雜合而足弱痿軟無力也曰

痺厥者痺病與厥病雜合而脚氣頑麻腫痛也曰厥逆者
即前寒厥熱厥痿厥痺厥風厥等氣逆上而或嘔吐或迷
悶或脹或氣急或小腹不仁或暴不知人所謂脚氣衝
心者是也

寒熱二厥

大法 丹治厥因痰者用白朮竹瀝 因氣虛血虛者用四物四

君子 熱厥用承氣湯 外感用雙解散加姜竹瀝

素黃帝曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為

寒厥陰氣衰於下則為熱厥帝曰熱厥之為熱也必起於

足下者何也岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於

足下而聚於足心故陽氣勝則足下熱也帝曰寒厥之為

寒也必從五指而上於膝者何也岐伯曰陰氣起於五指

之裏集於膝下而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上

寒其寒也不從外皆從內也

帝曰寒厥何為而然也岐伯曰前陰者宗筋之所聚

於前陰者宗筋之所合也春夏則陽氣多而陰氣

少秋冬則陰氣盛而陽氣衰此人者質壯以秋冬奪於所

用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從之而上也氣因

於中陽氣衰不能滲榮其經絡陽氣日損陰氣獨在故手

足為之寒也

帝曰熱厥何如而然也岐伯曰酒入於胃則絡脈滿而經

脈虛脾主為胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入

則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不榮其四肢也此

人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散消若飲食而

輪散於四肢今醉飽入房則精氣耗不能消若飲食而

搏熱感於中故熱通於身內熱而渴赤也夫酒氣盛而慄

悍腎氣口衰陽氣獨勝故手足為之熱也厥論寒熱二

二厥治

子和西華李政之病寒厥其妻病熱厥前後十餘年其妻服道遙散十餘劑終無可效一日命予診之二人脈皆浮大而無力政之曰吾手足之寒時時清以熱湯清而不能止吾婦手足之熱終日沃以冷水沃而不能已者何也予曰寒熱之厥也此皆得之貪飲食縱嗜慾遂出內經厥論證之政之喜曰內經其理書也十年之疑今而釋然縱不服藥愈過半矣僕曰熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者以溫劑補肺金熱在上者以涼劑清心火分取二藥令服之不輒不旬日政之詣門謝曰寒熱厥者皆愈矣

針灸

靈厥逆為病也足暴清胸若將裂腸若將以刀切之煩而不能食脈大小皆清煖取足少陰清取足陽明清則補之溫則瀉之顛狂

寒厥手足冷

寒厥脈沉數實為熱東垣治中書貼合公脚膝尻背冷脈沉數有力用黃柏滋腎丸再服而愈又治中書左丞姚公茂上熱下寒用既濟解毒湯良愈丹溪治呂宗信腹有積塊足冷至膝用大承氣加減下之愈此皆寒厥有熱也徵沉細 羅征南副元帥大戒木兒年六十秋七月征南予從之過揚州千里時仲冬病自利完穀不化臍腹冷痛足胻寒以手搔之不知痛痒常燒石以溫之亦不得煖予診之脈沉細而微予思之年高氣弱深入敵境軍務煩冗朝夕形寒飲食失節多飲乳酪礙於卑濕陽不外固由是清濕襲虛病起於下故胻寒而逆內經云感於寒而受病微則為咳

盛則為泄為痛此寒濕相合而為病也法當急退寒濕之邪峻補其陽非灸不能病已先以大艾炷於氣海灸百壯補下焦陽虛次灸三里各三七壯治胻寒而逆且接引陽氣下行又灸三陰交以散足受寒濕之邪遂處方云寒濕所勝治以辛熱濕滯於外平以苦熱以苦發之以附子大辛熱助陽退陰溫經散寒為君乾姜官桂大熱辛甘亦除寒濕白朮半夏苦辛溫而燥脾濕故以為臣人參草薏苡甘草大溫中益氣生薑大辛溫能散清濕之邪葱白辛溫能通上焦陽氣故以為佐又云補下治下制以急急則氣味厚故大作劑服之不數服瀉止痛減足胻漸漸溫調其飲食十日平復明年秋過襄陽值霖雨閣旬餘前症復作再依前灸添陽輔各灸二十壯再以前藥投之數服愈

加減白通湯治形寒飲冷大便自利完穀不化臍腹冷痛

足胻寒而逆

附子炮去 乾姜炮去 官桂去皮 甘草炙
草薏苡 半夏七次 人參 白朮各半
右剉每服五錢水二盞半生薑五片葱白五莖煎一盞三分去查空心宿食消盡溫服

寒厥皆屬腎虛經云腎藏志志不足則厥又云腎虛則清厥意不樂又云下虛則厥又云諸厥固泄皆屬於下是也聖黃帝曰少陰之脈獨下行何也岐伯曰不然夫衝脈者五臟六腑之海也五臟六腑皆稟焉其上者出於臍臍滲諸陽滲諸精其下者注少陰之大絡出於氣衝循陰股內廉入腠中伏行骨內下至內踝之後屬而別其下者並于少陰之經滲三陰其前者行出跗屬下循跗入大指間滲諸絡而溫肌肉故別絡結則跗上不動不動則厥厥

則寒矣逆順肥瘦偏○經云經絡堅緊火所治之蓋灸以治之或灸或刺之也

運氣寒厥有二

一曰寒經云水平氣曰靜順靜順之紀其病厥又云歲水太過寒氣流行邪害心火火爆悸陰厥又云歲金不及炎火乃行復則病陰厥且裕是也

二曰寒濕經云太陰司天之政天氣下降地氣上騰民病寒熱是也

雜方

千治丈夫脚腰冷不隨不能行方上醇酒三斗水三斗合着甕中溫漬至膝三日止冷則甕下當着灰火勿令冷

雜方

靈厥而寒甚骨廉而下寒過於膝下陵三重陰絡所過得之留止寒入於中推而行之經下者火則當之經絡堅繁火所治之不知所苦兩躄之下男陰女陽良工所禁針論畢矣靈經篇兩躄之下 寒厥取足陽明少陰于足皆

大醫經卷之三

留之病論

右灸刺寒厥二法補虛也經云足少陽之別名曰光明

去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥取之所別此法

瀉實也又經云亂于臂肱則為四厥取之先去血脈後

取其陽明少陽之榮輸此法治亂氣不補不瀉但徐出入導氣也

垣經云厥在於足宗氣不下脈中之血凝而留止非火調

弗能取之

鑿身熱如火足冷如水可灸陽輔穴又云脰痠冷絕骨取

之

甲厥甚取太陰陽明動者之經 足厥喘逆足下清至膝

湧泉主之 寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕痒痛不

可以食飲肘擊支滿喉中焦乾渴魚際主之 膝以下至

足清不仁不可以坐起尻不舉腰膈主之

熱厥手足熱

陰虛

可承叔平生脚自踝以下常覺熱冬不可加綿於上常

自言曰我資稟壯不怕冷予曰此足三陰虛宜斷慾事以

補養陰血庶乎可免笑而不答年方七十患痿半年而死

手足煩者小便三升盆中溫漬手足

茶熱厥取足太陰少陽皆留之寒熱

產後寒厥

脚氣頑麻腫痛為痺厥

脚氣之疾實水濕之所為也蓋濕之害人皮肉筋脈而

屬於下然亦有二焉一則自外而感一則自內而致其治

法自應不同故詳而論之其為病也有證無名脚氣之稱

大醫經卷之三

自晉蘇敬始關中河朔無有也惟南方地下水寒其清濕

之氣中於人必自足始故經曰清濕襲膚則病起於下或

者難曰今茲北方其地則風土高寒其人則腠理緻密而

復多此疾者豈是地濕之氣感之而為邪答曰南方之疾

自外而感者也北方之疾自內而致者何也言之北方

之人常食瀆乳又飲酒無節過傷而不厭且瀆乳之為物

其氣味則瀆乳其形質則水也酒醴亦然人之水穀入胃

胃氣蒸騰其氣與味宜之於經絡化之為血氣外榮四末

內注五臟六腑周而復始以應刻數焉是謂天地之紀此

皆元氣充足脾胃之氣無所傷而然也苟元氣不充則胃

氣之本自弱飲食既倍則脾胃之氣有傷既不能蒸化所

食之物其氣與味亦不能宣暢旁通其水濕之性流下而

致之其自外而入者止於下脛腫而痛自內而致者乃或

至於手節也經云足脛腫曰水太陰所至為重腫此但言其自外者也所治之法前人方論備矣自內而致者治法則未有也楊太守云脚氣是為壅疾治以宣通之劑使氣不能成壅也壅既成而感者礙惡血而去其重勢經曰畜則腫熱砭射之後以藥治之按東垣論南方脚氣外感清濕作寒治北方脚氣內傷酒醴作濕熱治此實發前人之未發者以人論之不必以南北分寒熱凡外感寒濕者皆屬寒濕不必南方為然凡內傷酒醴者皆屬濕熱不必北方為然但隨脈症及詢其病之由來而施治可也

冬苦病痺厥全文見五厥

垣孫真人云凡四時之中皆不得久坐久立濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣洗足當風取涼皆成脚氣若暑月久立濕冷之地者則濕熱之氣蒸人經絡病發必熱則四肢皆痠疼煩悶若寒月久坐久立濕冷之地者則冷濕之氣上入經絡病發則四肢皆酸冷轉筋世有勤工力學之士久坐久立於濕地不得動靜冷風來入經絡不覺成病也若欲使之不成病者初覺則灸患處二三十壯則愈不復發熱黃帝云當風取涼醉以入房能成此病又云婦人產後取涼多有此疾深宜慎之內經論南方者其地下水土弱霧露之所蒸也江東嶺南大率如此春夏之交山林蒸鬱風濕毒氣為甚足或感之遂成瘴毒脚氣其候則脚先屈弱漸至痺疼脛微腫小腹不仁頭痛煩心痰壅吐逆時作寒熱便溲不通甚者攻心而勢逼治之誠不可緩文

法存所以留意經方偏善此術者豈非江右嶺表此疾之多歟

千外臺總錄所錄皆謂南方卑濕霧露所聚之地其民腠理疎陽氣不能外固因而履之則清濕鬱虛病起於下此因血虛氣弱受清濕之邪氣與血併行於膚腠邪氣盛正氣少故血氣滯滯則痺虛則弱故令痺弱也後人名曰脚氣針經云有道以來有道以去治之多以灸熇為佳以導引濕氣外出及飲醪醴以通經散邪所制之方寒藥少熱藥多多用麻黃川烏姜附之屬內經云濕濕於外以苦發之麻黃苦溫發之者也川烏辛熱走而不能守通行經絡姜附辛甘大熱助陽退陰亦能散清濕之邪又察足之三陰三陽是何經絡所起以引用藥為主治復審六氣中何氣當之治以佐使之藥孫真人云醫者意也隨時增損初

無定方其知言哉

千風毒之氣入人體中脈有三品內外證候相似但脈有異耳若脈大而緩宜服續命湯二劑立瘥若風盛宜作越婢湯加白朮二兩若脈浮大而緊轉駛宜作竹瀝湯又云脈浮大而緊駛此最惡脈也若細而駛者同是惡脈浮大者病在外沉細者病在內治亦不同病人脈微而弱宜服風引湯此人脈多是因虛而得之若大虛短氣力乏可間作補湯隨病冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯即止活治脚氣屬冷者小續命湯煎成旋入生姜自然汁服之最快續命方見前中風門

仲越婢加白朮湯見前

千第一竹瀝湯治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

竹瀝 <small>升五</small>	甘草	秦艽	葛根
黃芩	麻黃	防風	細辛
桂心	乾姜 <small>兩一</small>	防已	升麻 <small>各一</small>
茯苓 <small>兩三</small>	附子 <small>枚二</small>	杏仁 <small>五十</small>	
右咬咀以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗千金翼方無茯苓杏仁有白朮一兩			
第二大竹瀝湯治卒中風口噤不能言四肢縱緩偏痺急風經五臟恍惚怒無常手足不隨方			
竹瀝 <small>四升</small>	獨活	芍藥	防風
茵芋	甘草	白朮	葛根
細辛	黃芩	芍藥 <small>各二</small>	桂心
防已	人參	石膏	麻黃
生姜	茯苓 <small>兩一</small>	烏頭 <small>一枚</small>	
入醫學綱目卷三 天			
右咬咀竹瀝每服四升分六服先未汗者取汗一服相當即止			
第三竹瀝湯治風毒入人五臟短氣心下甚熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不語方			
竹瀝 <small>二升</small>	防風	茯苓	秦艽 <small>各三</small>
當歸	黃芩 <small>千金翼作白芎</small>	人參	芍藥 <small>千金翼作防已</small>
細辛	桂心	甘草	升麻 <small>千金翼作通草</small>
麻黃	白朮 <small>各二</small>	附子 <small>枚二</small>	蜀椒 <small>兩一</small>
葛根 <small>兩五</small>	生姜 <small>兩八</small>		
右咬咀以竹瀝煮取四升分五服初得病即須摩風膏日再痺定止 <small>千金翼無麻黃獨活生薑</small>			
麻黃	石膏	獨活	茯苓 <small>各二</small>

吳茱萸	附子	秦艽	細辛
桂心	人參	防風	芍藥
防已	甘草	乾姜 <small>已上各一兩</small>	白朮 <small>兩三</small>
杏仁 <small>六十</small>			
右咬咀以水一斗六升煮取三升分三服取汗為度右六方表劑			
竹瀝湯若不及熱服輒停存胸膈更為人患每服當使極熱若服竹瀝湯得下者必佳也若加服數劑病及脈勢未折而苦脹滿者可以大醫甲湯下之湯勢盡而不得下可以丸散助湯令下下後更服竹瀝湯令脈勢折將息料理乃佳			
大醫甲湯治脚弱風毒痺氣上及傷寒惡風濕毒山水瘴氣熱毒四肢痺弱方			
醫甲 <small>兩一</small>	防風	麻黃	白朮
石膏	知母	升麻	茯苓
橘皮	芍藥	杏仁 <small>去皮</small>	人參
半夏	當歸	芍藥	萎蕤
甘草	麥門冬 <small>各一兩</small>	羚羊角 <small>各六</small>	大黃 <small>半兩</small>
犀角	雄黃	青木香 <small>各半兩</small>	大棗 <small>二十枚</small>
貝齒	烏頭 <small>一枚</small>	生姜 <small>兩一</small>	薤白 <small>十四枚</small>
麝香 <small>二銖</small>	赤小豆 <small>各五</small>	吳茱萸 <small>合五</small>	
右咬咀以水二斗煮取四升分六服去查食前溫服如人行十里久得下則止一方用大黃半兩煨畏下可止用六銖一方用羚羊角五錢毒盛可用六銖 <small>胡洽有山千金翼無知母升麻獨活皮芎藭人參當歸黃芩</small>			
右治寒濕屬裏			

方見歷節

仲鳥頭湯治脚氣疼痛不可屈伸方見歷節
于麻黃湯治風惡毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不能言毒氣衝心有人病者但一病相當即服此第一服次

第二服第三第四方

麻黃 大棗二十 茯苓三 杏仁三十
防風 白朮 當歸 升麻
芍藥 黃芩 桂心

麥門冬 甘草各二
右咬咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日
三夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二服獨活湯方

獨活四 熟地三 生姜五 葛根
桂心 甘草 芍藥 麻黃各二

右咬咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日
三夜一脚弱時忌飢子戠某犯之一世治不愈

第三兼補厚朴湯治諸氣咳嗽逆氣嘔吐方

厚朴 芎藭 桂心 熟地
芍藥 當歸 人參各二 黃芪
甘草各三 吳茱萸一 半夏兩 生姜一

右咬咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上肥
內入清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十
里久更進服

第四服風引獨活湯兼補方

獨活四 茯苓 甘草各三 升麻一兩
人參 桂心 防風 芍藥
當歸 黃芪 乾姜 附子各二

大豈升
右咬咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相去
如人行二十里久更進服

本益氣血補肝腎祛風濕壯脚膝地黃丸

熟地兩 牛膝 石斛各三 肉蓯蓉
茵芋 防風 川芎 桂心
五味子 附子 薤苳仁各半

右為末煉蜜丸如桐子大每服三四十九酒吞下空心
食前服
治腰脚走注痛此是脚氣宜薤苳丸

薤苳仁 茵芋 白芍藥 牛膝
川芎 防風 獨活各半 熟地
側子各一 桂心 橘紅

右細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九酒下食前日
三服木瓜湯下亦得

三因勝驗丸治元氣不足真氣虛弱及諸虛寒濕氣進襲
手足拳攣脚脂連脚面拘急走注疼痛筋脈不伸行步不
隨常服益其氣壯筋骨黑髮滑皮膚及去一切足弱鶴

附子一枚地黃歸酒浸 天麻酒 牛膝酒
酸苳仁炒 熟地酒 防風各二 木瓜酒
乳香兩 全蝎去毒 麝香二錢 木香

沒藥研 羌活 甘草各半
右件為細末用生地黃三斤洗淨研爛如泥無灰酒四
升煮爛如膏以前藥勻和杵令堅每兩作十九每服用

一九細嚼臨睡酒下如冬月無地黃煉蜜丸如桐子大

每服五十九鹽湯下酒亦可服此藥五七日或半月見效甚速行履如飛千里可至故名勝駿一方加換換草
巴戟木各一兩減消
歸地黃各一兩尤妙
雲蒼木丸治乾濕脚氣筋脈拘攣疼痛不能行

乳香 沒藥各二兩 牛膝 青鹽各半

熟艾四錢 川烏錢 全蝎錢二 蒼木半兩

右為細末共研藥和勻以木瓜一箇大者切一頭留作蓋去穢入上件藥於內將蓋拴定安木瓜於黑瓦中蒸

令極爛取出去皮連藥研成膏却入生蒼木末拌勻丸如桐子大每服五十九空心木瓜湯下以溫鹽酒亦可

日三服忌血與葷

本治腰脚筋骨痠無力酒浸牛膝丸

牛膝三兩 川椒半兩 附子一箇

虎腰骨以者牛兩 虎骨以者牛兩

右咬咀用生絹作袋入藥紫口用養酒一斗春秋浸十日夏浸七日冬浸十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥為末醋糊為丸每服二十九空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

丹脚氣須用提起其濕之在下者藥隨氣血用

治腫痛方

生地 黃栢酒 蒼木益 白朮

防風 枳櫛 川芎 犀角

甘草梢 木通 黃連

熱加芩連 痰加竹瀝姜汁 及時令熱加石膏 大便秘加桃仁 小便澀加牛膝

有食積流注者

蒼木 黃栢 防已 南星
川芎 白朮 犀角 枳櫛
血虛加牛膝龜板 有如常腫者專主濕熱肥人加痰藥

一婦人足腫

生地 黃栢 蒼木 南星

牛膝酒 草龍膽 川芎

脚弱筋痛

牛膝二兩 白芍半兩 龜板炙 黃栢炒

知母兩 甘草兩

右為末酒糊為丸

垣異法方宜論云北方者其地高陵居風寒冷冽其俗飲

滷醢而肉食凡飲滷醢以飲多飲速者為能經云因而大

飲則氣逆又云食入於陰長氣於陽今乃反行陽道是為

逆也夫乳酪醇酒者濕熱之物飲之屬也加以奉養太過

亦滋其濕水性潤下氣不能响故下疰於足脛積久而作

腫痛此飲食下流之所致也通評虛實論云穀入多而氣

少濕居下也况滷醢醇酒之濕熱甚於穀者也至真要大

論云太陰之勝火氣內鬱流散於外足脛腫飲發於中

附腫於下此之謂也故飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾

氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並

行合於四時五臟陰陽揆度以為常也若飲食自倍脾胃

乃傷則胃氣不能施化脾氣不能四布故下流乘其肝腎

之位疰於足脛加之房事不節陰盛陽虛遂成痼疾孫真

人云古人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有之亦此

意也

當歸拈痛湯治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利兼通身疼痛流注手足足脛腫痛不可忍

羌活 甘草 黃芩 茵陳 各半兩

人參 苦參 升麻 葛根 酒炒

蒼朮 歸身 知母 澤瀉 各二錢

猪苓 白朮 防風 各三錢

水煎不拘時候

本草十劑云宜可去壅通可去滯內經云濕淫所勝治以

苦溫羌活苦辛透關節勝濕防風甘草溫散經絡中留濕

故以為君水性潤下升麻葛根苦辛平味之薄者陰中之

陽引而上行以苦發之也白朮苦甘溫和平除濕蒼朮體

輕浮氣力雄壯能除膚膜間濕故以為臣夫血壅而不流

則為痛當歸身辛溫以散之使血氣各有所歸人參甘草

甘溫補脾養正氣使苦藥不能傷脾胃仲景云濕熱相合

肢節煩疼苦參黃芩知母茵陳苦寒乃苦以泄之者也凡

酒制炒以為因用治濕不利小便非其治也猪苓甘溫平

澤瀉鹹平淡以滲之又能導其留飲故以為佐氣味相合

上下分流其濕使壅滯之氣得宣通也

右咬咀每服一兩水二盞半浸藥少時煎至一大盞去

查溫服空心待少時以美饌壓之臨臥一服不須飯壓

羅中書粘合公年四旬有一體幹魁梧丙辰春從征至揚

州脚氣忽作遍身肢體微腫其痛手不能近足脛尤甚履

不任穿靴以騎馬控兩蹬而以竹器盛之以困急來告予

思內經有云飲發於中附腫於上又云諸痛為實血實者

宜決之以三稜針數刺其腫上血突出高一尺餘漸漸如

絲流於地約半升許其色黑紫頃時腫消痛減以當歸拈

痛湯一兩半服之是夜得睡明日再服而愈

肝風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但動飲烏牛溺二三

升使小便利漸漸消當以銅器取新者為佳純黃者亦可

用

垣楊太受云脚氣之疾自古皆尚踈下為疾瘳故也然不

可太過太過則損傷脾胃使營運之氣不能上行反下注

為脚氣又不可不及不及則使壅氣不能消散今立三方

於後詳虛實而用之

痛湯一兩半服之是夜得睡明日再服而愈

肝風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但動飲烏牛溺二三升使小便利漸漸消當以銅器取新者為佳純黃者亦可

用

垣楊太受云脚氣之疾自古皆尚踈下為疾瘳故也然不可太過太過則損傷脾胃使營運之氣不能上行反下注為脚氣又不可不及不及則使壅氣不能消散今立三方於後詳虛實而用之

羌活 獨活 防已 大黃 酒炒

當歸 枳實 枳殼

右咬咀每服五錢或七錢水二盞煎至七分溫服微利

則已量虛實加減

開結導飲丸飲食不消心下痞悶

陳皮 白朮 澤瀉 茯苓

麴 麥蘖 半夏 枳實

青皮 乾姜

如有積塊者加巴豆霜一錢

右為末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三五十九至七十九溫湯下食遠服

又方治濕熱并諸濕容搏腰膝重痛足脛浮腫

檳榔 甘遂 赤芍 葶藶

澤瀉 葶藶 乳香 沒藥

牽牛 大戟 陳皮

右為末麴糊為丸如桐子大每服五十九加至七八十

丸食前溫水送下得更衣止後服前藥忌酒二日又忌麪及甘草三兩日食溫淡粥補胃

乙巳春廉平章年三十八身體充肥脚氣始發頭面渾身肢節微腫皆赤色足脛赤腫痛不可忍不敢扶策手着皮膚其痛轉甚起而復臥而復起晝夜苦楚難以名狀求

予治之平章以北土高寒故多飲酒積久傷脾不能運化飲食下流之所致投以當歸拈痛湯一兩二錢其痛減半

再服腫痛悉除止有右手指末微赤腫以三稜針刺於爪甲端多出黑血赤腫全去不數日因食濕麪肢體覺痛再以枳實大黃湯治之

羌活一錢 當歸一錢 枳實五分 大黃酒煨三錢

夫脚氣之疾皆水濕之為也麪滋其濕血壅而不行故肢節煩疼內經曰風能勝濕羌活辛溫透關節去濕故以為

主血留而不能行則痛當歸之辛溫散壅止痛枳實之苦

寒治痞消食故以為臣大黃苦寒以導麪之濕熱併治諸老血留結取其峻駛故以為使也

右吹咀只作一服水一盞半煎至一盞去渣溫服空心食前利下兩行痛止

世脚氣控涎丹加臘脂一錢枳榔木瓜各一兩卷栢半兩先以鹽水煮半日次日白水煮半日同煎藥為丸每二十

丸加至四五十丸服下惡物立効控涎丹方見 衍有人嗜酒日須五七十盃後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用米大黃一兩剉炒同為末熟蜜為丸溫水下五七十九仍禁酒遂愈

本治風氣積滯成脚氣常覺微腫發則或痛茵芋丸

茵芋一兩 薏苡仁一兩 郁李仁一兩 牽牛子三兩

治腎藏風攻注脚膝方

右細末煉蜜丸如桐子大每服二十九丸薑葱湯下未利加至三十九丸日三快利為度白粥補之

連珠甘遂一兩 木鱉子一兩

右為末猶猪腰子二箇批開用藥末一錢搽勻濕紙裹數重火煨熟放溫五更初細嚼米飲下 積水多則利

多少則利少宜軟飯將息若患一脚須看左右如左脚用在左邊腰子右脚用在右邊腰子藥末止許一錢壬子年在毘陵有姓馬人鬻酒久不見因問其子云宿患腎臟

風今一足發腫如瓠自腰以下巨細通為一律痛不可忍欲轉側兩人挾持方可動或者欲以鉞刀決之予曰不可吾有藥當合以贈如上法服之辰巳間下膿水數

升即時痛止腫退一月後尚拄拐而行予再以赤烏散

今塗貼其膝方愈後十年至毘陵率其子列拜以謝云向脚疾至今不復作雖積年腎臟風併已失去今健步自若矣

草有人重病足不履地者十年良醫殫技其能治所親置之道傍以求救者過一遊僧見之告曰此疾一藥可治但不知此土有否因為之入山求索果得乃葳靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思濟知之遂著其法云採得陰乾月餘搗篩溫清酒和二錢七空心服之如人本性殺藥可加及六錢七利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

集治腎臟風壅積腰膝沉重葳靈仙末蜜和丸如桐子大初服酒下八十九平明微利惡物如青膿桃膠即是風毒

積滯也如未動夜再服一百丸取下後喫粥補之一月
當服溫補藥

子和息帥腰股沉痛行步坐馬皆不便或作脚氣寒濕治
之或作虛損治之烏附乳沒活血壯筋骨之藥無不用之
至六十餘日目赤上熱大小便俱瀆腰股之病如故戴人
診其兩手脈皆沉遲沉者在裏也宜泄之以舟車九瀆川
散各一服去積水二十餘行至早晨服白粥一二頓與
之上馬已能嬰鑠矣 棠溪李十八郎病腰脚大不伸偃
僕跛躄而行已數年矣服藥無功止藥卻愈因秋暮涉水
病復作醫氏使服四斤丸其父李仲安乃乞藥於戴人戴
人曰近日服何藥仲安曰四斤丸曰目昏赤未其父驚曰
日正暴發戴人曰宜速來不來則喪明矣始來策杖而行
目腫無所見戴人先令涌之藥下忽走二十行兩目頓明

入醫學綱目卷二十八

辛

虛

策已棄去比再涌泄能讀官曆日調一月令服當歸丸健
步而歸矣
仲味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄酸則傷骨骨傷則痿名
曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不得獨行榮衛俱
微三焦無所稟四續斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛
冷假令發便為歷節湯之類治之
因恂如脚底如錐刺痛或附腫手腕亦痛而腫大便泄滑
裏急此血少又下焦血分受濕氣為病健步丸主之

生地一兩 蒼朮 芍藥 陳皮各一
大腹子三錢 牛膝 歸尾 茱萸
黃芩各一 桂枝
右為丸每服百丸白木通草煎湯食前下之

三因十全丹治脚氣上攻心腎相擊足心隱痛小腹不仁
煩渴小便秘或利關節變皮疼痛神効不可具述

肉從香酒 石斛酒 狗脊去毛 草薢
茯苓 牛膝酒 地仙子 遠志去心炒

熟地三兩 杜仲去皮炒 右為末蜜丸如桐子大每服五十九溫酒鹽湯任下

本治肝腎風虛氣弱脚不可踐地腰脊疼痛風毒流注下
經行止艱難小便餘瀝此藥補五臟內傷調中益氣涼血
強筋骨益智慧身耐老續斷丸

思仙木五兩 五加皮 防風

薏苡仁 羌活 川續斷酒三 草薢酒
生地酒 牛膝酒 右為末好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮子以

入醫學綱目卷二十八

辛

鹽酒煮木瓜成膏和杵丸如桐子大每服三五十九空
心食前溫酒鹽湯下

本療丈夫腰脚痺緩急行履不穩者以草薢二十四分合
杜仲八分搗篩每日溫酒和服三錢七增至五錢忌食牛

肉 活意苡仁酒治脚痺

薏苡仁 牛膝酒 海桐皮 五加皮
獨活 防風 杜仲各一 熟地

白木 右判為粗末散入生絹袋內用好酒五升浸春秋冬二
七日夏月盛熱分作數貼逐貼浸酒每日空心溫服一

盞或半盞日三四服常令酒氣醞醞不絕久服覺皮膚
下如數百條虫行即風濕氣散

去風補血益氣壯筋骨強脚力虎骨酒

虎脛骨 草薺 仙靈脾 蕙以仁

牛膝 熟地各二

右細剉絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百日婦人去牛膝

六七叔婆血少氣多大便後脚痛而麻

當歸二錢 芍藥 白朮 陳皮

青皮錢 地黃一錢 川芎五分 甘草少

桃仁十八 右分二貼煎

脚氣壅腫便溺阻隔心下痞滿飲食不消宜微利之內傷

脚氣多屬肺氣實經云肺病者汗出尻陰股膝脚筋足皆痛故戴人治脚氣用涌法者良由此也又千金方多汗

之者亦瀉肺之法也今集疎肺氣之方于左

魏德新因赴冬選犯寒而行真元氣衰加之坐臥冷濕飲食失節以冬遇此遂作骨痺骨屬腎也腰之高骨壞

而不用兩膝似折面黑如炭前後腰膝痠痛皆以偏問諸醫皆作腎虛治之予先以玲瓏靈熨蒸數日次以苦劑上

涌寒痰三二升上實下虛明可見矣次以淡劑使白朮除脾濕茯苓養腎水又刺腎膈太溪二穴二日一刺前後一

月平復如故 孫少府監韓彥正暴得疾手足不舉諸醫皆以為風針手足亦不知痛遂召孫診之孫曰此脚氣耳

用檳榔末三錢生薑三片乾紫蘇七葉陳皮三錢水一大盞煎至七分去渣熱服數次而愈

治脚腫者檳榔散主之 陳皮一大 蒼朮一 酒半盞同已上

右煎數沸調檳榔末二錢食後服

聖治脚氣及風寒濕四肢攣急脚疼不可踐地用紫蘇二兩搗碎水三升研取汁以蘇子汁煮粳米粥二合和葱豉椒姜食之即止

右檳榔紫蘇例

世治一切脚氣奇方用川山甲前兩足者燒存性研細入麝香當門子少許多少隨人斟酌要服此藥須去他事至

晚不可進飲食候至夜深腹空時調服坐臥隨意及雞鳴又一服痛立止過一二日便能步履如常極妙如神

治脚氣十二風痺不能行松葉酒用松葉六十斤細剉以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法另其

松葉汁以清米并饋飯泥釀封頭七日後澄飲之取醉得此酒力者甚眾

本虎骨酒治腰脚痛疼急不得屈伸及腿膝冷麻用虎骨一具及脛骨一莖酥炙黃槌碎無灰酒三斗密封七日

空心晚食酒隨意飲 崔治腰脚蒸法取黃荆葉不限多少蒸熟熱置於甕中其

下着火溫之以病人置於葉中須臾汗出葉中旋旋喫飯稍倦即止以綿衣蓋避風仍進葱豉酒以瘥為度

世治諸般脚氣一服除根 防風 羌活 蠲蛻各三 薄荷五

紫蘇分 右曬乾為末每服五錢以無灰酒半碗熱調服訖服至

一時久即前後藥湯傾桶內披厚衣於桶上坐勿令走了藥氣將脚腿蕙之當自下而上汗出直至頂門其出

如水盡為度薰洗用

紫蘇斤 忍冬花兩 木饅頭七 蘇木兩
右為粗末水一中樣桶煎藥味出分三度添用只一用
永除根

脚氣濕洗法 活人書曰凡脚氣服補藥及用湯洗
皆醫之大禁也為南方外感濕氣乘虛襲人為腫痛而言
非為北方內受濕氣注下腫痛而言也蓋濕氣不能外達
宜淋瀝開導泄越其邪名曰導氣除濕湯

葶藶仙 防風 荆芥穗 當歸
地骨皮 升麻 白芍 蒴藋葉
右等分剉細水二斗煮取一斗五升去渣熱淋洗無時

治脚赤腫杉皮煎濃湯洗數次之愈本草云用杉皮煎湯洗

治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨者用草蓆子葉
切蒸薄裹三二易即消 治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿

連骨疼者萌蘗根剉碎和酒醋共三分根一分合蒸熟封
裹腫上三三日即消亦治不仁

治脚氣連腿腫滿久不瘥方黑附子一兩去皮脂生用
搗為散生薑汁調如膏塗傳腫上藥乾再塗之候腫消為
度

治脚氣用無名異化牛皮膠調勻貼患處

治遠行脚腫用之可行千里輕便甚妙

防風 細辛 草烏
右等分為末摻內鞋底內如着前鞋即以水微濕過然
後摻藥

療脚氣風痺不仁五經筋急熊肉半斤於豉汁中和姜
椒葱白鹽醬作醃醋空腹食之

針脚氣腫痛 三里 骨節二 丘墟 針入一 行

間五分 解路 針入五分 商丘 針入五分
治脚氣諸穴隨經選用之 陷谷 三分 行谷 五分

東陽 脚氣針灸大法 此法與千金
風市 百壯三報穴正身平立 伏菟 病人端坐離膝蓋
按捺上有肉起如兔狀是 犢鼻 五十壯 膝眼 二十
穴可灸五十壯三報穴 絕骨 各五十壯 上項諸穴不
三里 上廉 下廉 絕骨 各五十壯 上項諸穴不

痛龍 又脚氣 腎氣 各四十壯 肩井 三里 氣海

交龍 寒濕脚氣紅腫生瘡 中封 五分 陽輔 絕骨 各二

集又法 行間 三里 照海 崑崙 絕骨 京骨

委中 三陰交 玉兩足麻足腿膝無力 風市 在腿外廉垂手中指點到
處是穴針五分續多瀉少

集又足不能行 丘墟 行間 崑崙 太衝 陽輔

三陰交 復溜 三里 本風有一百二十四種氣有八十種唯脚氣頭風上氣當
須藥不絕餘則隨其發動臨時消息但有風氣之人春末
夏初及秋暮得通泄則不困劇所謂通泄者如麻黃壺牛
郁李仁之類是也不必苦寒利藥也

外臺云第一忌噴嚏則心煩煩則脚氣發第二禁大語
大語則傷肺肺傷亦發動又不得露足當風入水以冷水
洗脚兩脚脛尤不宜冷雖暑月常須着綿褲至冬寒倍令

禁忌

洗脚兩脚脛尤不宜冷雖暑月常須着綿褲至冬寒倍令

兩脛溫暖得微汗大佳依此將息氣漸薄損每至寅丑日
割手足甲割少侵肉去氣夏時膝理開不宜當風臥睡
覺令人按按勿使邪氣稽留數勞動關節常令通暢此並
養生之要拒風邪之法也尋常有力每食後行三五步
疲倦便止脚中惡氣墜即下散雖浮腫氣不能上也
羅凡治此疾每旦早飯任意飽食午飯少食晚飯不食
佳惡甘於胃營運之氣失其天度况夜食則血氣壅滯而
陰道愈增腫痛矣

垣第一凡飲食酒及渣酪勿使過度過則傷損脾胃下注
於足脛跗腫遂成脚疾第二欲不可縱嗜慾多則脚氣發
凡飲食之後宜緩行二三百步不至汗出覺困則止如此
則不能成壅也經云逸者行之又云病濕痺忌溫食飽食
濕地濡衣

入醫學綱目卷三六

聖

于凡脚氣之病極須忌房室牛羊魚肉蒜菜菘菜蔓菁
瓠子酒麪酥油浮糜猪雞鷄鴨并忌大怒惟得食梗梁粟
米醬豉葱椒姜橘皮又不得食諸生菓子酸酢之食犯者
皆不瘥

凡脚氣之病始起甚微多不令人識也食飲嬉戲氣力如
故惟卒起脚屈弱不能動有此為異耳 凡脚氣之候或
見食嘔吐憎聞食臭或有腹痛下利或大小便閉滯不通
或胸中衝悸不欲見光明或精神昏憤或喜迷忘語言錯
亂或壯熱頭痛或身體極冷疹煩或覺轉筋或腫或不腫
或脛腿頑痺或時緩縱不隨或復百節緊急或小腹不仁
此皆脚氣狀貌也 脚氣有腫者有不腫者其小腹頑痺
不仁者多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名
脚氣入心如此者死在旦夕 其人黑瘦者易治肥大肉

厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風濕瘦人肉硬肥
人肉軟肉軟則受病難愈 凡脚氣覺病候有異即須大
怖畏決意急治之稍緩則氣上入胸脇逆滿氣上肩息急
者死不旋踵寬者數日必死不可不急治也但見心下急
氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脈促短而數嘔吐
不止者死

足痿軟不收為痿厥

痿厥有二

一屬腎膀胱經云恐懼不解則傷精精傷則骨痠痿厥精
時自下是腎傷精脫也又云三陽為病發寒熱下為癰腫
及為痿厥腦痛是膀胱在下發病也

二屬脾濕傷腎經云凡治痿厥發逆肥貴人則膏梁之
疾又云秋傷於濕上逆而致發為痿厥是也

大醫學綱目卷三六

聖

垣補益腎肝丸治目中溜火視物昏花耳聾耳鳴困倦乏
力寢汗憎風行步不正兩脚軟側臥而多驚脚膝無力腰
已下消瘦

柴胡

羌活

生地

苦參

防已炒各五分

附子炮

肉桂炮

當歸錢

右細末熟水丸如雞頭大每服五十九丸溫水送下此藥
如在冬天中寒或心肺表寒目中溜火噴嚏流涕涕
咳嗽痰涎者止可服一丸須與姜附禦汗湯等藥相兼
服之不可單服此表藥也

健步丸治膝中無力伸不能屈屈而不能伸脚脊腿脚沉
重行步艱難

羌活

柴胡各五錢

防風三錢

川烏錢

滑石炒半兩

澤瀉三錢

防已酒洗一兩

苦參一錢

肉桂

甘草

瓜蒌根

酒製各半

右為細末酒糊為丸如桐子大每服十九粒愈風湯

心送下愈風湯在中風門

腿脚沉重無力者於羌活勝濕湯中加酒洗漢防已五分

輕則附子重則川烏少許以為引用而行經也

右羌活柴胡伸提氣升防已苦參去濕熱桂附反佐之

也

神龜滋陰丸治足痿用酒炙龜板四兩炒黃柏知母各

二兩枸杞五味瓊陽各一兩乾姜半兩為丸每服七十九

相兼服方見舌

丹劑後脚弱漸細用

蒼朮

白芍

龜板

酒炙二

黃柏

右粥丸以四物湯加陳皮甘草煎湯吞之

本草綱目卷六

聖

中書貼合公年三十二歲病脚膝痿弱膝下尻陰皆冷陰

汗腺臭精滑不固請醫黃道寧主以鹿茸丸十句不減至

戊申春始求治于東垣遂診其脈沉數而有力乃曰公飲

醇酒食以膏粱滋火于內逼陰於外醫見其症蓋不知陽

強不能密緻皮膚冷而溢泄以為內實有寒投以熱劑反

瀉其陰而補陽真所謂虛虛實實也其不增虛者猶為幸

也復何望獲效耶即處以滋腎大苦寒之劑制之以急寒

因熱用飲入下焦適其病所瀉命門相火之盛再服而愈

公以厚禮送之更求前藥方師固辭不受或問之曰物不

受義也藥既大驗不復與方何為也曰大寒大熱之藥非

常服者借以從權可也公之病相火熾盛以乘陰位故

用此大寒之劑以瀉相火而復真陰陰既復其位則皮裏

之寒自消矣內經云陰平陽秘精神乃治如通用之則故

病未已新病復起矣此予之意也

右龜板黃柏例皆治一老人痿厥累用虎潛丸不愈後

於虎潛丸加附子立愈如神蓋附反佐之功也

本治後生丈夫酒色過多下焦虛憊足膝軟乏小便滑數

外腎濕痒

兔絲子五兩依法研

石蓮肉兩

白茯苓兩

山藥

茴香各二兩

五味子兩

右為末糊丸如桐子大每服四十九溫酒或鹽湯下空

心服如脚氣及脚膝無力者木瓜酒空心下五十九晚

食前再服立效

丹鄭安人年六十虛而有痰脈緩足弱與半夏天麻白木

湯下酒吞丸愈

東陽吳子萬年五十形肥味厚且多憂怒脈常沉滑自春

來痰氣病醫認為虛寒率與燥熱香竄之劑至四月兩足

弱氣上衝飲食減召予治之予曰此熱鬱而脾虛痿厥之

證作矣形肥而脈沉未是死證但藥邪火盛當此火旺實

難求生且與竹瀝下白木膏盡二斤氣降食進一月後大

汗而死書此以為諸賢覆轍之戒云

夏秋飲酒黃芪人參湯治夏天氣熱盛損傷元氣兩脚痿軟清燥

湯治六七月濕冷大行濕熱相合痿厥病作腰以下痿軟

癱瘓不能行動見法夏條

仲越婢加木湯治肉極熱則身體津脫腠理開汗大泄厲

風氣下焦脚弱成無已云外

麻黃六兩

石膏半斤

生姜

甘草各二兩

白木四兩

大棗十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分溫三服如惡風加附子一枚炮

斗治脚軟用商陸根細切如小荳大煮令熟更入菖荳同爛煮為飯每日煮食以瘥為度其功最効

本治筋骨諸疾手足不遂行動不得遍身風瘡左經丸

草烏白大者木鱉去白膠香 五靈脂各三

兩 斑貓五箇去頭

右為末用黑荳去皮生杵取粉一升醋糊共搜杵為丸

如雞頭大每服一九溫酒磨下治筋骨疾但未會針傷

損者三五服立効此藥曾醫一人軟風不能行不十日

立効專治心腎肝三經通小便除淋瀝通管衛滑經絡

此方因淨聖寺僧得之大有奇功

治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行續骨丹

天麻明淨者白附子 牛膝 木鱉子各半

烏頭一錢川羌活一分地龍一分乳香

沒藥各二硃砂一

右以生南星末一兩無灰酒煮糊為丸如雞頭大硃砂

為衣薄荷湯磨一丸食前服

丹人參酒浸服之治風軟脚弱可逐奔馬故曰奔馬草曾

用有効

運氣痿厥皆屬水虛經云水不及曰涸流涸流之紀其病

痿厥堅下是也

針灸痿厥有五法

其一取腎經云腎足少陰之脈所生病者痿厥嗜臥足下

熱而痛視盛虛熱寒陷下調之也

其二補膀胱與肝經云邪之所在皆為不足下氣不足則

為之痿厥心經補足外踝下留之又云刺大指間上二寸

留之是補申脈太衝二穴是也

其三補足陽明絡經云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸

別走太陰其病虛則足不收脛枯取之所別也

其四補足少陽絡經云足少陽之別名曰光明去踝五寸

別走厥陰虛則痿躄坐不能起取之所別也

其五束縛四末經云痿厥為四末束挽乃疾解之日二不

仁者十日而知無休病已足也

兩足癱瘓兩腿無力 鶴頂在膝蓋骨尖

撮脚弱無力行步艱難 太衝 厲兌補 風市灸

玉叉法 太衝五分瀉 中封五分瀉 三里一寸瀉

集又法 公孫灸半 三里 絕骨 申脈不取 崑

甲痿厥風頭重額痛脚攣股膈外廉骨節痛瘰癧痺不仁

振寒時有熱四肢不舉脚陽主之 痿厥寒足腕不收覺

坐不能起脚攣脚痛丘墟主之 足不收痛不可以行天

泉主之

足陽明之下血氣皆少則下毛無有則稀枯瘞善痿厥足

痺全文見虛實法

脾脈緩其為痿厥全文見治

脚氣衝心為厥逆

丹脚氣衝心宜四物湯加炒栢再宜湧泉穴用附子末津

唾調傅上以艾灸泄引其熱下行

仲八味丸治脚氣上攻入少腹不仁方見治

本草載唐柳宗元脚氣方方論詳見

脚氣衝心用白檳榔一箇如雞心大者為末用童便生薑

汁溫酒共半盞調作一服廣利方不用姜汁酒但用童便

汗溫酒共半盞調作一服廣利方不用姜汁酒但用童便

心胃利

陰虛有

不知

外若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者栝榔為末以栝榔殼汁或茶飲或豉汁調服方寸匕甚利

右栝榔童便例

活三腕散治脚氣衝心腹氣飽悶大便秘滯者最良

獨活

白朮

木瓜

甘草

大腹皮

紫蘇

陳皮

沉香

木香

川芎

栝榔

右同一處杵為粗散每服二錢半水二盞同煎至一盞

去查分三服熱服取便利為効

大腹子散治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子

素蘇

木通

桑白皮

羌活

木瓜

荆芥

赤芍藥

青皮

獨活

枳殼

右咬咀每服四錢水一盞姜五片葱白七寸去查空心

溫服

右栝榔紫蘇例

桑白皮散治脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣

急坐臥不得

桑白皮

栝李仁

赤茯苓

木香

防已

大子

紫蘇子

木通

栝榔

青皮

右咬咀每服三錢姜三片水煎

警以仁散治脚氣弱痺腫滿心下急大便澀

薏苡仁

防風

猪苓

川芎

防已

栝李仁

栝榔

大麻仁

枳實

桑白皮

甘草

羚羊角屑

右為細末每服三錢熱水調下

療脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁

李仁十二分搗碎水研取汁薏苡仁搗碎如粟米取三合

以米作粥空腹食之佳

右栝榔栝李仁防已例

石湯治脚氣衝心用礬石二兩以漿水一斗五升煎

三五沸浸脚

理脚腫滿轉上入腹殺人赤小苳一升水五升煮令極

熱去苳適寒溫浸脚冷重煖之

治脚氣衝心煩悶亂不識人大苳一升水三升濃煎取

汁頓服牛升如未元可更服

主脚氣及上氣取鯽魚一尺長者作鱗食一兩頓服瘥

帝曰願聞六經之厥狀病能也岐伯曰巨陽之厥則腫

首頭重足不能行發為胸作 陽明之厥則癩疾欲走呼

腹滿不得臥面赤而熱妄見妄言 少陽之厥則暴聾煩

腫而熱脇痛筋不可以運 太陰之厥

則腹滿脹後不利不欲食食則嘔不得臥 少陰之厥

則口乾溺赤腹滿心痛 厥陰之厥則少腹腫痛腹脹溼

溼不利好臥屈膝陰縮腫筋內熱甚則瀉之虛則補之不

盛不虛以經取之 太陰厥逆所急變心痛引腹治主病

者 少陰厥逆虛滿嘔變下泄清

治主病者 厥陰厥逆變腰痛虛滿前閉語治主病者

三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死 太陰厥逆

僵仆嘔血善衄治主病者 少陽厥逆機關不利機關不

利者腰不可以行不可以顧發陽氣不可治驚者死

陽明厥逆喘咳身熱善驚嘔血 手太陰厥逆虛汗
欬善嘔沫治主病者 手心主少陰厥逆心痛引喉身熱
死不可治 手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可
以俛仰治主病者 手陽明少陽厥逆發喉痺腫疰治
主病者論

靈厥逆腹脹滿腸鳴胸滿不得息取之下胸二脇欬而動
手者與背俞以手按之立快者是也 厥痺者厥氣
上及腹取陰陽之絡視主病者瀉陽補陰經也

產脚氣

大產後熱悶氣上博而脚氣其狀熱悶聖藥驚悸心煩嘔
吐氣上皆其候也可服小續命湯三劑必愈又云寒中
三陽所患必冷小續命加生姜汁最快者中三陰所患必
熱小續命湯去附子桂枝心一半大煩躁者紫雪最良如

無紫雪用真薄荷煎冷水醫下 湯各半服之

醫學綱目卷之二十八

醫學綱目卷之二十九

腎膀胱部

耳聾 暴聾 耳鳴 耳腫痛 停耳
虫入耳

大法

夫耳者以竅言之水也以聲音之金也以經言之手足
少陽俱會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入
者經也有若蟬鳴者若鐘鳴者有若火熛熛狀者各隨經
見之其間虛實不可不察也假令耳聾者何謂治肺肺主
聲鼻塞者肺也何謂治心心主其如推此法皆從受氣於
始腎受氣於巳心受氣於亥肝受氣於申肺受氣於寅脾
受氣於四季此治法皆生長之道也

經曰精脫者則耳聾夫腎為足少陰之經乃藏精而氣
通於耳耳者宗脈之所聚也若精氣調和則腎藏強盛耳
聞五音若勞傷氣血兼受風邪損於腎藏而精脫者則耳

八腎經綱目卷之二十九

聾也然五臟六腑十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有
相併時并則藏氣逆名之曰厥厥氣相搏入於耳之脈則
今聾其腎病精脫耳聾者其候頰頰色黑手少陽之脈動
則氣厥逆而耳聾者其候耳內渾渾焯焯也手太陽厥而
耳聾者其候聾而耳內氣滿也宜以燒腎散主之

保命集云耳以竅言之腎水也經云腎主耳左藏為腎左
竅為耳又云腎氣通于耳腎和則耳能聞五音矣又云精
脫者耳聾故羅謙甫以精脫耳聾之候為頰頰色黑也
燒腎散治耳聾

磁石 煅七次 附子 一兩炮 巴戟 兩
川椒 一兩去目及閉 附子 一兩炮 巴戟 兩
右為散每服用猪腎一枚去筋膜細切葱白韭白各一
錢入散藥一錢菟絲花一字和勻用濕紙裹於渣灰火內

煨熟空心細嚼酒解薄粥下之十日効行義云陽石

從蓉丸治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉從蓉酒浸切焙 山茱萸去核 石龍芮 石菖蒲

兔絲子酒浸焙 羌活去毛 鹿茸去毛 石斛去

磁石煨過 附子炮去皮臍 全蝎去毒

麝香旋入

右為末煉蜜丸桐子大每服一百丸空心鹽酒鹽湯任

聖治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中入

粳米二合和煮粥入五味如法調和空腹食之作羹及酒

並得

本地黃湯治腎熱聽事不真方見後

右方用地黃磁石為君補腎虛有熱之劑也

道藏氣法時論云肺虛則少氣不能報息耳聾聾乾註云

肺之絡會于耳中故聾此說非也蓋氣虛必寒盛則氣血

俱滯滯而不行也耳者宗氣也肺氣不行故聾也

蠟彈丸治耳虛聾

白茯苓二兩 山藥三兩 杏仁炒一兩半

右三味研為末和勻用黃蠟一兩鑊和為丸如彈子大

鹽湯嚼下有人止以黃蠟細嚼點好建茶送下亦効

茯苓杏仁皆入於太陽山藥大補陰氣惟杏仁利氣

乃補中有通也少氣聾乾者門冬人參五米湯嚼下

經云肝虛則目眩眩無所見耳無所聞善恐治法用四物

湯加防風羌活柴胡葛蒲茯苓神等分煎湯服二十餘帖却

用杜壬姜蝎散開之本草云肝虛則生姜補之是也

世治耳聾九節菖蒲去鬚切小塊十兩蒼朮十兩水合浸

於瓦罐中七日取出去蒼朮單用菖蒲晒乾於糯米飯上

蒸熟晒乾為末糯米飲調食後臨臥服効

大病後耳聾須用四物降火 陰虛火動耳聾者亦如

之 氣逆耳聾有三肝與手太陽少陽也經云肝氣逆則

頭痛耳聾不聰頰腫又云太陽所謂浮為聾者皆在氣也

羅謙甫云手太陽氣厥而耳聾者其候耳內渾渾焯焯此皆氣逆而

手少陽氣厥而耳聾者其候耳內渾渾焯焯此皆氣逆而

聾也治法宜四物湯吞龍薈丸降火及復元通氣散調氣

是也

耳聾必用四物龍薈養陰 復元通氣散治氣逆耳聾

耳聾有濕痰者栝榔神芎丸下之

大黃 黃芩各二兩 牽牛 滑石各四兩

加栝榔

滴水丸每服十九每次加十九白湯下

耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多宜開痰散風熱通聖散滾

痰丸之類 耳因鬱熱以通聖散內加大黃酒煨再用酒

炒三次後入諸藥通用酒炒

犀角散治風毒壅熱習心痰滯兩耳虛聾頭重目眩神

効

犀角屑 甘菊花 前胡去 枳殼炒

菖蒲 羌活 澤瀉 木通

生地各半 麥門冬二兩 甘草一錢

右為散每服三錢水煎食溫服

茯神散治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急昏悶不利

茯神兩 羌活 柴胡 蔓荊子

藥學綱目 卷二九

二七

意苡仁 防風去 菖蒲 五味子
 黃芪各半 甘草一分 麥門冬去心薄切
 右十二味為末每服三錢入生姜三片煎至五分食後
 溫服

本治男子二十歲因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心
 中拂意則轉覺重虛鳴痰痛地黃湯

生地一兩 枳殼 羌活 桑白皮一兩
 磁石搗碎水淘三二次 甘草各半 防風
 黃芩 木通

右為粗末每服四錢用水煎至去渣日二三服不拘時
 候

姜蠅散治耳聾因腎虛所致十年內一服愈出杜
 乾蠅四十九個去殼 生姜切片如蠅大
 乾蠅洗焙去腥熱 生姜十九片開痰

右二味銀石器內炒至乾為細末向晚勿食夜吐酒調
 作一服至二更以來徐徐盡量飲五更耳中聞百十聲

至響便自此有聞法凡更響則聽白湯一盞服先三
 同炒又用姜四十九片煎 蠅上同炒去米差不用

治耳聾酒三升漬牡荊子二升碎之浸七日去渣任性
 服盡雖三十年亦瘥

南方赤色入通於心開竅於耳藏精於心全圖真

治腎虛寒濕腎散菴蓉丸並見虛
 運氣耳聾有四

一曰濕邪傷腎三焦鬱經云太陰在泉濕淫所勝民病耳
 聾渾渾焯焯治以苦熱是也
 二曰燥邪傷肝聾經云歲金太過燥氣流行肝木受邪民
 病耳聾無所聞是也

三曰火邪傷肺聾經云歲火太過炎暑流行肺金受邪民
 病耳聾是也
 四曰風火炎擾於上聾經云少陽司天之政風熱暴布雲
 物沸騰民病聾聵三之氣炎暑至民病熱中聾聵治以寒
 劑是也

雜方

治耳聾用鼠膽一個滴入耳中三次立効

治耳聾立効以乾地龍入指貯在葱尾內為水點之

治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神効

治耳聾又不聞者

緊磁石如川山甲燒存性為

右用新綿裹了塞於所患耳內口中御少生鉄覺耳內

如風雨聲即愈 甘草甘遂各半寸綿裹包插入耳內

又將甘草嚼碎即通妙

通神丹治耳聾

阿魏 巴豆仁各 安息香 桑白皮各錢

珠砂各 大蒜 麻子仁各七

右為細末入二仁與蒜同搗為丸如棗核大每用一

丸綿裹內耳如微痛則出

治耳聾又不効者

大蒜一瓣一頭攪一坑子用芭蕉一粒去皮膜慢火

炮去極熟入在蒜內用新綿裹定塞耳中不過三次

効

治耳聾用麻子五十粒去皮束子一箇同搗九如棗核大

更入小兒乳汁和每用一九綿裹塞耳中覺熱為度一日

一換 治耳聾用骨碎補削作細條火炮乘熱塞耳木草云骨

治耳聾以杏仁七箇去皮拍碎三分以綿裹於中着煎
盞如小豆許以器盛於飯甑中蒸之候飯熟取出於患人
側臥將一裹捻油汁滴入耳中久之又以一裹依前法捻
滴之

世又方用雄猫尿滴入耳中左滴左右滴右如猫不能放
尿用妾擦其齒即有

針灸耳聾有五法

其一取手足少陽手陽明經云耳聾取手小指次指爪甲
上與肉交者先取手後取足又云三焦手少陽之脈是動
則病耳聾渾渾惇惇視盛虛熱寒陷下調之也又云聾而
不痛者取足少陽聾而痛者取手陽明又云耳聾刺手陽
明不已刺其通脈出耳前者

其二取手陽明絡經云手陽明之別名曰偏歷去腕三寸
別入太陰實則聾聾取之所別也又云邪客手陽明之絡
令人耳聾時不聞者刺手大指次指爪甲上去端如韭葉
各一痛立聞不已刺中指爪甲上與肉交者立聞其不時
聞者不可刺也左刺右右刺左

其三取手太陽經云手太陽之脈所生病者耳聾目黃頰
腫視盛虛熱寒陷下調之也又云耳聾無取耳中是也
其四取肝經云肝虛則目眩無所見耳無所聞善恐取
其經厥陰少陽氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫取血者是也
其五取肺經云肺虛則少氣不能報息耳聾聾乾取其經
太陰足太陽之外厥陰內血者是也
耳有膿不可刺經云耳痛不可刺者耳中有膿若有乾膜
取聾耳無聞也

治耳聾用蒼朮一塊長七分將一頭削大一頭截平
尖頭插耳內於平頭上安筋頭大艾炷灸之聾輕者七壯
重者十四壯如覺耳內有熱氣者効

耳聾耳鳴或疼或痒或停耳 听會 在耳中前陷中口
入半寸 翳風 針入半寸 合谷 三里

又法 翳風 在耳後隨後按之引耳中令病人先以錢
閉口捏頭其 聽會 法如

世又法 中渚 臑泣

耳聾兩頰痛引耳中嘔嘔嘔和窅主之 耳聾耳中
主之 頭重頰痛引耳中嘔嘔嘔和窅主之 耳聾耳中
癩澀癩澀者若風狀聽會主之 耳聾填填如無聞嘔嘔
嘔嘔若蟬鳴聽官主之 聾腎風及會宗下窅主之 耳
聾嘔嘔無所聞天容主之 聾耳中不通合谷主之 耳

聾無聞天容主之

病若耳聾脈反浮大而澀者死 千金翼云脈大者
少陽終者耳聾百節盡縱目系絕 全文見

暴聾

夫卒耳聾者由腎氣虛為風邪所乘搏於經絡隨其血
脈上入耳正氣與邪氣相搏故令卒聾也
暴聾皆是厥逆之氣經云暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴
薄也又云少陽之厥暴聾是也

蒲黃膏治卒耳聾

細辛 蒲黃各一分 麩末
杏仁 湯浸去皮尖 各二分
右為末研杏仁如膏和稔如東核大綿裹塞耳中日一
易以差為度

又方龍腦膏

龍腦牛分 椒目半兩 杏仁一分

右件搗研合勻綿裹東核大塞耳中白二易

蜀椒巴荳萹蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中抽腎虛氣耳中如風水之鳴或如打鐘鼓之聲卒暴聾一日一易神效

治耳暴聾

雄黃錢一 巴荳去殼

右研細用葱涎和作一錠子紙捲定塞耳中

治耳暴聾凌膏花葉杆自然汁滴耳中差半門云本草補陰甚捷

暴聾氣蒙耳目不明取天牖寒熱

卒氣聾四瀆主之

耳鳴 與耳聾相參用之

馮官人左耳鳴此勞得之法當補陰而鎮墜之

黃芪 人參 當歸 陳皮

茯苓 升麻 酒柏 防風

甘草 芍藥

分十貼食前熱服飲了去眠一覺

耳中聞聞然是無陰者

右陰虛耳鳴經云液脫者腦髓消腰痠耳數鳴是也

治腎虛耳鳴夜間睡著如打戰鼓覺耳內風吹更四肢抽掣痛黃芪丸

黃芪去芦 白蒺藜炒

黑附子大者 獨羊腎倍 羌活去芦

右細末酒糊丸桐子大每服三四十九空心食前煨葱

搗湯下

太陽所謂耳鳴者陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也

耳鳴因酒過者用大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草

南星桔梗青皮荆芥如不愈用四物湯 耳聾必龍蒼丸食後服 氣實人候柳神芩丸下之

柴胡聽耳湯治耳中叮啞耳鳴耳聾

柴胡 連翹 甘草 蜜虫

水蛭 歸身 人參

右除車虫蛭虜另研外用酒水煎熟去渣方下三末再上火煎一二沸稍熱食後服

運氣耳鳴皆屬風火經云厥陰司天風行太虛雲物搖動

自轉耳鳴三之氣天政布氣乃時舉民病耳鳴又云厥陰之脈耳鳴頭眩又云少陽所至為耳鳴治以涼寒是也

耳鳴無甚夜用烏頭燒灰菖蒲等分末之包裹綿塞耳中立効

治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治又則成聾用生烏頭一味搗得乘溫削如枣核大塞耳中日夜一易不過三日愈

肘治耳中常鳴生地截塞耳數易之以瘥為度

黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脈之所聚也故胃中空則宗脈虛虛則下溜脈有所竭者故耳鳴補客主人手大指爪甲上與肉交者也

耳鳴補法有三此其一也又經云上氣不足耳為之聾鳴補足外踝下留之者二也又云腦為髓之海其輪上在百會下在風府髓海不足則腦轉耳鳴審守其輪調其虛實者也

取法有二經云耳鳴取耳前動脈者一也又云耳鳴取耳中
中指爪甲上左取右右取左先取手後取足者二也取謂
視虛實調之也

劫刺有一經云手太陽之筋其病有聾引頸而痛耳中鳴
其痛轉筋者治在燔針劫刺之以知為度以痛為輸者是
也

耳虛鳴 腎俞 太谿

耳痛聾鳴上關主之刺不可深 耳聾鳴下關及陽谿
陽衝按門陽谷主之 耳聾鳴頸項痛耳門主之 耳鳴

無聞肩貞及完骨主之 耳中生風耳鳴耳聾時不聞商
陽主之 耳鳴百會及頰厭顛息天窓太凌偏歷前谷後
絡主之

心脈微滿為耳鳴癩疾全文見前

耳腫痛

金尚五郎耳腫痛黃水出而臭

桔梗 麻黃 羌活 大黃酒炒
木通 甘草 黃芩半錢

右分三貼熱服

耳濕腫痛用涼膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荆芥羌
活服之更以腦多麟少濕加枯礬吹入耳中

犀角飲子治風熱上壅兩耳聾閉門外腫痛及膿水流

犀角 薄荷 葛蒲 木通 玄參

赤芍 赤小荳 甘菊花去梗各

甘草半兩

右吹咀每服四錢用水十盞生薑五片煎八分溫服不

拘時

解熱飲子治氣虛熱壅耳內聾閉微痛膿血流出

赤芍 白芍 當歸 甘草

右為劉散每服四錢水一盞煎七分食後服以服

清涼飲子

運氣耳痛皆屬熱經云少陽之勝耳痛治以辛寒是也

耳痛 附子炮去皮

右為細末每用不以多少油調滴耳內効一法用醋丸

如杏仁大綿裹置耳中日三易一法搗葛蒲自然汁灌

耳神効

又方治耳痛用食鹽不以多少炒熟用東麩蒸熟青花布

包定枕之立効如神

又用油胡荽肉為末狗胆汁和為丸如桐子大綿裹安

耳中痛立止

瘰癧耳內卒腫痛出膿水不止方礬石燒灰加麝香以筆

管吹耳內日三四度

停耳

耳者宗脈之所聚腎氣之所通足少陰之經也若勞傷

氣血熱氣乘虛入於其經邪隨血氣至耳熱氣聚則生膿

汁故謂之停耳也

紅綿散治停耳出膿

白礬 胭脂

右研勻先用綿杖子纏去耳中膿及黃水盡即用別綿

杖子引藥入耳中令到底搽之即乾如北盛之人積熱

醫學綱目 卷二九

上攻耳中出膿水不瘥用無憂散送雄黃九瀉三四次
行瘥一方單用白礬灰吹入耳中日三次立効

松花散治停耳膿水不絕宜用此方

白礬燒灰 麻勃 木香 松脂

花胭脂各一

右搗羅為末每用時先以綿子淨拭後用藥吹入耳內

効

白蓮散治停耳出膿汁

白礬 烏賊骨 黃連去 龍骨各一

右搗羅為末以綿裹如束核大塞耳中日三易之

麝香散治停耳耳底膿出

桑螵蛸煨大炙存 麝香一字

右為末研令勻每用半字糝耳如有膿先用綿杖子擦

入醫心綱目卷三元

乾一法用射香少黃丹

治停耳膿出不止用五倍焙乾一兩及全蠍燒灰存性

三錢為末糝耳中

耳爛用貝母研末乾糝之

餘禹糧一兩燒醋 烏賊魚骨 釜底墨

伏龍肝附子一枚生用

右件搗羅為末以綿裹如皂角子大內耳中日再易之

如不瘥者內有虫也

石菖蒲一寸巴豆一粒去皮全蠍一枚為末葱涎和如

束核大綿裹塞耳中

治耳熱出汗

滑石 爛石膏 天花粉 防風各一

雜方

右用腦子少許同研為末糝耳中
治停耳膿不止陳橘皮燈上燒灰為末麝香少許二味

和勻每用少許先用綿拭耳中膿淨却上藥 又方杏仁

泥治耳中病或有水出杏仁炒令黑為末葱涎攪和如束

核大綿包塞耳

雜方

治虫入耳用椒末一錢醋半盞浸良久少滴耳中虫

自出千金

治虫入耳不出桃葉搗爛塞耳虫自出

治百虫入耳用麻油灌之即効

治諸般惡虫入耳搗韭汁灌之

治諸虫及虱等入耳用白膠香一味燒烟薰入耳令耳

孔內暖虫自出妙

入醫心綱目卷三元

治蟻入耳以大蒜搗汁灌耳中 又方以鯨鯉甲燒灰

為末以水調滴過滴入耳中即出 又方蜈蚣及蟻入耳

用猪脂一指大炙令香安耳邊即出 治蜈蚣入耳用豕

猪肉掩兩耳即出

治飛虫入耳用好酸米醋一味滴入耳內虫必出不出

即死曾有一人被焦虫入耳其虫口硬如鉄但身軟用此

藥滴之立死而出

治飛蛾入耳以蠶管極氣吸之出 或擊銅器於耳邊

即出

治蜈蚣入耳用半夏生為末麻油調塗耳門外虫聞香

即出

治蜈蚣入耳方用濕生虫研如泥攤紙上烘成紙條安

耳內自出 又方用蠅牛虫去殼研爛滴水五七點再研

勻灌耳內自出無活者尋乾者研亦可

山 蜒蚰及諸般虫入耳麻油灌入或用生葱汁生姜汁亦

可

海 蜒蚰入耳以羊乳灌入即成水

自消為水

治耳中有物不出以細麻繩剪令頭散蘸好膠入耳中

着物上粘之徐徐引出

治水入耳以薄荷汁點立效

骨

腎度

腎度

腎主骨在膝為骨在藏為腎又云腎之合骨也其榮髮也

○又云少陰者冬脈也伏行而濡骨髓者也

骨空

髓空在腦後五分在顛際銳骨之下

一在斷基下

一在脊骨上空在風府上

空在尻骨下空

或在骨空在口下當兩肩

在髓中之陽

空之間

膝四寸

去四寸

骨病忌食甘苦久立經云多食甘則骨痛而髮落又云苦

走骨病無多食苦又云久立傷骨是也

骨病不屈經云手足屈而不伸者病在筋伸而不屈者病在

骨在骨守骨在筋守筋也

牙齒痛 齒搖斷露 牙蛀牙不生

夫齒者腎之標口者脾之候諸經多有會於口者其牙

齒是手足陽明之所過上斷隸於脾上乃足陽明胃之所

脈所貫絡也止而不動下斷嚼物動而不休手陽明太腸

之脈所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒而惡

熱故其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅痛熱甚則

齒動齧斷視脫作痛不已故所治療不同也有惡熱而作

痛者有惡寒而作痛者有惡寒又惡熱而作痛者有惡寒

飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有

牙齒動搖而作痛者有齒袒而作痛者有齒斷為疔所蝕

缺少血出而作痛者有齒斷腫起而作痛者有脾胃中有

風邪但覺風而作痛者有牙上多為虫所蝕其齒缺少而

色變為虫牙痛者有胃中氣少不能於寒袒露其齒作痛

者有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一

藥而盡之哉

牙大痛必用胡椒搗能散其中浮熱監以升麻寒水

石佐以辛涼薄荷荊芥細辛之類

牙痛用清涼藥便痛甚者從治之

荊芥 薄荷 川椒 細辛 樟腦 青鹽

右為木擦牙上

露蜂房 小椒 去目炒

右為粗末煎漱禁語言

牢牙地黃散治牙齒寒痛

麻黃 黃連 羊脛骨灰各一
 升麻 一錢 草薺葉皮 二分 吳茱萸 一錢
 益智仁 歸身 各四分 蘇本 二分 防己
 生地 人參 熟地 羌活 各三分
 黃芪 白芷 各五分

右為細末擦牙上先漱口淨然後用藥

世治牙痛百藥不效用為枝燄燒灰存性擦牙痛處累驗一云荔枝核亦可

外治牙痛獨囊蒜煨乘熱截用頭以熨痛上轉易之亦治虫痛

齒痛茶葉酒煎含之食

口吸涼風和止痛不可忍須騎馬外行口吸涼風則痛止至家則痛復作

家人以為祟祈禱於巫師而不能愈遂求治於先師問其故曰此病乃濕熱而邪也足陽明貫于上齒手陽明貫于下齒陽明多血多氣又加以營氣之味助其濕熱故為此痛因立一方不須騎馬當令風寒之氣常生於齒間以黃連梧桐律之苦寒新薄荷葉荊芥穗之辛涼四味相合而作風寒之氣治其濕熱更以升麻之苦平引入陽明經為使牙齒骨之餘以羊脛骨灰補之為佐麝香少許入內為引用為細末擦之神妙又以調胃承氣去苦硝加黃連以治其本服之下三五行其病良愈不復作

清胃湯治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡入腦在本經中喜寒惡熱乃手陽明經中熱盛而作其齒喜冷惡熱

地黃 升麻 牡丹皮 歸身

棟黃連 六分不好加
 右五味同為細末頓作一服水煎至一半去查候冷細哈之即効

陽明熱牙疼
 大黃 香附 煨有

右為末入青蘆少許無時擦之

淳于意醫齊中大夫病齲齒灸左手陽明脈苦參湯日漱三升五六日愈

卒牙痛苦竹一莖燒一頭得汗多者指痛處立安

患牙痛含山荳根一片於痛處

治牙齒疼痛取槐樹白皮一握切作一升煮去查着蘆少許適溫寒食之日三易

當歸龍胆散治寒熱牙痛

升麻 麻黃 生地 白芷
 羊脛骨灰 各五分 草龍胆 黃連 各一

右為細末擦之神効

益智木律散治寒熱牙疼

草薺 益智 歸身 熟地
 羊脛骨灰 各五分 木律 二 升麻 錢

右細末擦之如寒牙疼不用木律

草薺 散治寒多熱少牙齒疼痛

草薺 黃連 升麻 細辛 葉
 防風 熟地 羊脛骨灰 各五分 歸身 七

右件為細末牙痛處擦之

立効散治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛微惡寒飲大惡熱飲其脈上中下三部陽虛陰盛是五臟內盛六腑陽道脈微小小便滑數立効

防風錢一 升麻錢七 甘草錢三 細辛錢二

草龍胆酒洗

右咬咀頓作一服水二大盞煎至一盞去渣以匙抄在口中燥痛處少時立止如多惡熱飲更加龍胆草一錢

此法不定隨寒熱多少臨時加減如更惡風作痛加草

荳蔻黃連各五分勿加龍胆草

細辛散治寒邪風邪犯腦痛齒亦痛

麻黃去節 桂枝 羊脛骨灰各二錢 羌活半錢 草荳蔻半錢 柴胡 升麻

防風

白芷各二錢 藁本 蒼朮各三錢

歸身四錢 細辛少許

右為細末先嗽後擦之神効

白芷散治大寒犯腦牙齒疼痛

麻黃去節 草荳蔻各一錢 黃芪 桂枝各二錢

羌活半錢 白芷各四錢 藁本三錢 羌活八錢

歸身 熟地各五錢 升麻一錢

右為細末先用水漱洗以藥擦之

蠅稍散治大寒犯腦牙疼

麻黃去節 桂枝 歸身 柴胡

白芷各二錢 升麻 防風 藁本

黃芪各三錢 羌活各五錢 羊脛骨灰二錢

草荳蔻皮一錢 蠅稍少許

右為末用如前法

神功丸牢牙散調胃承氣咸硝加黃連諸方皆治平昔多食肉人口臭牙齒動搖欲落或血出不止乃內傷濕熱膏梁之疾也方見熱條及

澤州李繼之忽患牙痛鉞眉不語藥昇先曰曾記載人云陽明經熱有餘也宜大下之乃付舟車丸七十粒服畢遇數知友留飲強飲熱酒數盃藥為酒所發益吐之吐畢而痛止李大服曰戴人神仙也不三五日又痛再服前藥百餘粒大下數行乃愈

牙痛而腫

軟石膏 升麻 細辛 大黃

白芷 防風 羌活 連翹

川椒 青蘘 龍胆 荆芥

香附各等分

右為細末搽患處

治虫散治大寒犯腦牙齒疼痛及朔風作痛虫痛胃經濕熱腫痛

麻黃去節 羌活 草荳蔻仁各五錢

吳茱萸各八錢 藁本 白芷各三錢 黃芪

升麻各一錢 歸身 益智仁 黃連各四錢

桂枝各一錢 羊脛骨灰 熟地各二錢

右細末先用溫水淨漱口搽之

獨活散治牙根腫痛

川芎 獨活 羌活 防風各半

細辛 荆芥 薄荷 生地各二錢

右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服

虛

一婦人牙痛治療不效口頰皆腫以金沸草散大劑煎湯薰漱而愈方見

八味丸治虛墜牙痛浮腫方見治法

治牙齒腫痛用白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙為散每服用二錢以水一盞半煎十餘沸乘熱燂牙冷即吐之

逆氣

逆氣齒痛皆屬熱經云少陰在泉熱淫所勝齒痛頰腫治以鹹寒是也

地方

治牙齒痛用茄蒂燒灰存性為末傅痛處累驗如無茄蒂用糟茄亦可

飲方

治牙齒痛

常山 大戟 防風 細辛

荆芥 枇杷葉 何首烏 薄荷

入醫學綱目卷之三

葱根鬚 川椒

右煎湯漱之極效

追風散治諸般牙痛

貫衆 鶴虱 荆芥 各等

右咬咀每用二錢加川椒五十粒水一盞煎七分去渣熱漱吐去藥立効

治牙痛以蒼耳子五升水一斗煎五升熱含之疼即吐

吐後復含不過三劑瘥葉亦得 牙痛用胡荽子濃煎湯漱之

引延方

齒痛省藤打碎含之津木部有

治牙齒疼痛用銀珠搽和為丸如蘿蔔子大每用

一丸搽上患處便不疼至三九吐濃涎數口全愈

定痛散治牙風疼痛立効

塞耳方

雄黃定痛膏治牙齒疼痛

細辛兩 白芷生 川烏頭生各乳香錢

右為末每少許擦牙痛處引涎吐之須臾以鹽水灌漱一方無白芷川烏有全蝎草烏

大蒜枚 細辛兩 盆硝二錢 雄黃一錢

猪牙皂角錢四 右為末同大蒜一處搗為膏丸如桐子大每用一九將綿子裹藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右耳良久痛止一九可治數人

透關散治牙疼

蜈蚣頭 蝎稍去 草烏尖如麥粒

川烏底如錢薄者 雄黃如麥大七

胡椒七 入醫學綱目卷之三

右細末用紙捻子蘸醋點藥少許於火上炙乾塞兩耳內閉口少時即効

又方治牙疼用巴豆一粒煨黃熟去殼用蒜一瓣切一頭作蓋刺去中心安巴豆在內以蓋合之用綿裹隨患處左右塞耳中

右塞耳三法前一法治熱疼後二法治寒疼也

年牙散去風冷蚌鱗宜露用之甚効

槐枝 柳枝各長四寸 皂角不蛀者

鹽日十 右同入篋瓶內黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研細

用如常法有庵主年七十餘云祖上多患齒疼脫落得此方効教世用之齒白齊密乃良方也

白牙散

升麻錢一 羊脛骨灰錢二 白芷分一 石膏半錢

麝香分一 右為細末先用溫水漱口擦之妙

麝香刷牙散

升麻錢一 黃連錢二 白芷錢一

羊脛骨灰 草薺錢各三 歸身 防已酒

人參各三 生地 熟地各二 沒石子錢三

五倍子一 右為細末用如前法擦之神効

刷牙方

羊脛骨灰兩 升麻錢一 黃連錢一

右為末擦之

齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手陽明

針灸

針灸齒痛不惡清飲取足陽明上齒痛亦如之經云邪客

於足陽明之絡令人齧衄上齒寒刺足中指次指爪甲上

與肉交者各一痛左刺右右刺左又云邪客五藏之間繆

傳引上齒齒唇寒痛視其手背脈血者去之足陽明中指

爪甲上一痛手大指次指爪甲上一痛立已左取右右取

左王註謂足大指次指為中指也

齒痛惡清飲取手陽明下齒痛亦如之經云大腸手陽明

之脈入下齒中是動則病齒痛頰腫視虛熱寒陷下調

之又云手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰虛則

齒寒痺隔取之所別也又云齒齲刺手陽明不已刺其脈

入齒中者立已是也

治齒痛金釵股火燒針痛處即止

齒牙痛牙槽 呂細灸之治上牙痛 二間一分沿皮

灸之治 委中六分 牙痛 足內踝兩尖上牙龍玄在列缺上青膠 又法

承漿 風府 又法 合谷 內庭 齒痛不取取

齒痛額竅及三間主之 上齒齲兌端及耳門主之

口中下齒痛惡寒頰腫商陽主之 齒齲痛惡清三間主

之 齒齲痛合谷主之 口齒痛溫溜主之 齒齲痛聽

會及衝陽主之 失欠下齒齲下牙痛頰腫下關主之

上齒齲痛惡寒者上關主之 下齒齲則上齒痛掖門主

之 齒痛四瀆主之 上齒齲腫日愈主之 上齒齲痛

惡風寒正營主之 牙齒齲痛浮白及完骨主之 齒牙

不可嚼斷腫角孫主之 上齒牙齲疼陽谷主之 齒齲

痛少海主之

風牙疼 大淵七分 齲齒痛按其陽之來有過者獨熱在左左熱在右右熱

在上上熱在上下下熱 齒齲斷露

羌活散治風寒濕犯腦痛項筋急牙齒動搖內眼袒脫

疼痛

麻黃去根 白芷各三 羌活根半 防風根三

紫本 歸身各三 細辛根 柴胡根

升麻 蒼木各五 羊脛骨灰半

草薺 桂枝各一

右細末先用溫水漱口淨搽之其痛立止

黃連散治冬天寒時分風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼

痛

痛

痛

右細末每少許搽患處自落

牙蛀牙不生

治牙齒等齲數年不愈當作陽明畜血治之用飛仁承氣湯為細末煉蜜九桐子大服之好飲過者多得此疾屢服有效飛仁承氣湯

治蛀牙痛內蒸蘆細末於孔中勿嚙津神妙 方用

江子香油燈上燒過填入穴內

治蛀牙腫痛用不蛀皂角一錠去皮子却用巴豆研於皂子處安巴豆一粒用鹽泥固濟燒灰研細末用刺耳子抄少許填入蛀牙內

治齒齲痛有虫取雄雀糞以綿裹塞孔內日一二次易之良

治齒齲用蘆薈四分炒研細先用鹽搽淨齒傳少許

方用蘆薈白膠香塞蛀孔內 蛀牙取松脂銳如錐者塞孔中少頃虫出脂上

治牙疼

鶴虱 細辛 白芷 乾茄各等分

右件為末每用少許搽痛處如有蛀孔用飯丸藥末塞孔中立効

治牙疼用鶴虱枝插患處立愈

麝香散

麝香 銅綠分 白芨 白礬各二分

白欬半錢

右細末每少許貼牙患處

治虫蝕牙根肉腐用棘針燒取瀝傳十餘次 又研雄黃末傳愈

治牙虫痛不可忍嚼薑陸香其汁立瘥即孔香

治牙虫痛用棘針二百枚用水二升煮一升合之妙

治齲齒以郁李根白皮水煮熟汁含之冷即易之効

治牙温米醋漱出虫自愈 又風蛀牙疼用香白芷細辛煎漱之 又絲瓜兒燒灰存性擦之

治虫牙疼天仙子不以多少燒烟用竹筒抵牙引烟薰之其虫即死永再不發

治蛀牙用小瓦片置油拌葦子燒烟圍在水碗上恰用漏斗覆之以蛀牙受漏斗口中烟其牙內虫如針者皆落水碗中累効

救苦散治一切牙痛及寒風蛀牙疼

草烏 川烏 桂花 良姜

紅荳 胡椒 薑撥 細辛各五分

石膏 官桂各三分

右細末先漱淨裡外乾摻之出涎立愈

治牙疼

薑撥二分 蟬稍 高良姜各一分 草烏五分

右為細末每用半字先含水一口應痛處鼻內搗上吐了水用粘粘藥少許擦牙疼痛處兼治偏正頭疼

治大人小兒多年牙齒不生用黑荳三十粒牛糞火內燒令烟盡細研入麝香少許一處研勻先以針挑不生牙處令血出用藥少許搽不得見風忌酸醜物

髮黃白 髮落不生

腎主髮經云腎之合血也其榮髮者是也

張天師草還丹此藥久服輕身隨風而去如列子之乘

虛也若髮白者從根而黑如未白者永不白有不信者藥拌飯與白猫吃一月即黑

地骨皮 生地 石菖蒲 牛膝

遠志去心 兔絲子酒浸三日炒黃

右各等分爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心

溫酒送下煎湯亦得修製忌女人雞犬見此上少陰下厥性寒也

雜方 青絲散補虛牢牙黑髮

香白芷 白茯苓各五錢 毋丁香 細辛

當歸 川芎 甘草 甘松各三錢

升麻 旱蓮草 地骨皮 生地

熟地 青鹽 破故紙各二錢 寒水石七錢

香附米一兩生薑汁一宿炒 何首烏兩 麝香分五

不入 雜方

右爲細末庚日爲始背東面西擦牙早不見日夜不見

燈刷畢蠟藥餘津潤髮一月白者頓黑忌食雜物

治髮黃黑方見牙動搖

李卿換白髮方云刮老生薑皮一大升於鑊中以文武

火煎之不得令過沸其鑊惟得多油膩者尤佳更不須洗

刮便以姜皮置鑊中密封同濟勿令通氣令一精細人守

之地色未分時便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲

即換人看火一伏時即成置於磁鉢中研極細李方雖曰

一伏時若火候勻至日西即藥成也使時以小簪脚蘸取

如麻子大先於白髮下點藥訖然後拔之再點以手指熟

撚之令入肉第四日當有黑者生神効

治年少髮白拔去白者以白蜜塗毛孔中即生黑髮不生取桐子搗汁塗上必生黑者

療髮黃能生金髮梳之散頭入床底伏地一食頃即止便盡黑不一升脂驗

髮落不生

脈弦氣弱皮毛枯槁髮脫落黃芪建中湯主之髮脫落

及臍下痛四君子湯加熱地

胡氏年十七八歲髮脫不留一莖飲食起居如常脈微

弦而清輕重皆同予曰此厚味成熱濕痰在腸間又日多

吃梅酸味收濕熱之痰隨上升之氣至於頭蒸薰髮根之

血漸成枯槁遂一時盡脫遂處以補血升散之藥用防風

通聖散去芒硝惟大黃三度酒炒煎以四物湯酒製合和

作小劑煎以灰湯入水頻與之兩月餘後診其脈濕熱漸

解停藥淡味調養又二年髮長如初而愈

雜方

滋榮散長養髮落最宜

生薑各一兩 人參兩

右細末每用生薑一塊切斷離藥末於髮落處擦之二

日一次用

聖膏治髮脫落能令再生

黑附子 蔓荊子 栢子仁各半

右爲末烏鷄脂和勻搗研乾置瓦合內封固百日取出

塗在髮脫處三五日即生自然牢壯不脫

甜瓜葉治人無髮搗汁塗之即生

治髮落不生令長麻子一升熬令黑壓油以傅頭髮上

妙 治生眉毛用七月烏麻花陰乾爲末生烏麻油浸每夜

傅之烏麻即秋麻是也

二陰

腎 北方黑色入通於腎開竅於二陰

前陰縮縱等疾屬肝經病見肝部
後陰痔脫肛等疾屬大腸肺病見肺部

欠嚏

腎主欠嚏經云腎為欠為嚏是也

運氣 運氣欠嚏有三

一曰寒經云太陽司天寒氣下臨心氣上從寒清時欬就嚏喜悲數欠是也

二曰火經云少陽司天之政三之氣炎暑至民病嚏欠是也

三曰濕鬱其火經云陽明司天之政初之氣陰始疑民病中熱嚏欠是也

欠伸

六 醫經綱目卷九

手

陽明經 二陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠全文見於病傳實注云氣勝於胃

故欠

逆氣欠伸皆屬風經云厥陰在泉風淫所勝病善伸數欠治以辛是也

針灸 中寒家善欠

黃帝曰人之欠者何氣使然岐伯曰衛氣晝日行于陽夜半則行于陰陰者主夜夜者卧陽者主上陰者主下故

陰氣積于下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡陽氣盛則寤矣瀉足少陰補足太陽

針灸欠伸有二法此篇經文取足少陰太陽是其一也其二取胃經云胃足陽明之脈是動則病振寒善伸教欠視

盛虛實寒陷下調之也

嚏

嚏鼻中因痒而氣噴作于聲也鼻為肺竅痒為火化心火邪熱于干陽明發于鼻而痒則嚏也或故以物擾之痒而嚏者擾痒屬火故也或視日而嚏者由目為五藏精華太陽真火見曜于目心神躁亂而熱發于上則鼻中痒而嚏也

運氣 運氣嚏有三

一曰熱火經云少陰司天之政熱病生於上民病血溢就嚏又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從病嚏就衄又云少陰之復燥熱內作煩躁就嚏又云少陽所至為就嚏又云少陽司天火氣下臨肺氣上從就嚏就衄治以諸寒是也

二曰金不及火乘之經曰金不及曰從革從革之紀其病嚏咳就衄從火化者是也

六 醫經綱目卷九

手

三曰燥金經云陽明所至為就嚏是也

黃帝曰人之嚏者何氣使然岐伯曰陽氣和利滿於心出於鼻故為嚏補足太陽榮眉本一曰眉上也口問篇曰

膜理不容噴嚏不已 風門一分沿皮向後

其人清涕出發熱色和者善嚏

身體拘急

運氣拘急屬寒及寒濕風濕經云諸寒收引皆屬於腎又云太陰司天之政民病寒厥拘急初之氣風濕相搏民病

經絡拘強關節不利治法蓋小續命湯仲景三黃湯之類是也

夢遺 白濁

精滑專主濕熱用黃柏知母牡蠣蛤粉 夢遺專主熱

與帶下同治法

虛實

治遺精夢泄... 氣盛又節淫慾... 謂所愿不得名曰白淫... 盛盈溢者如瓶中沸湯而溢... 備虛不禁者如瓶中有罅而漏... 說經曰腎氣閉即精泄... 又曰腎藏精蓋腎能攝精氣... 皆主於腎今腎氣衰則一身之精氣無所管攝... 出不時也猪苓丸一方正為此設

虛者不

內傷氣血不能固守... 面色白而不澤... 難經云肺太過則令人面白善噫悲

不醫學初集卷九

十一

愁不樂欲哭面色白為寒脈沉厥急按之空虚色白脫氣... 又為脫血又為脫津又為脫液又為脫精又為脫神是元神漂浮于外將離軀之象也其脈按之不鼓猶為亡陽况... 虛空者乎病乃除寒極矣若脈或盛大而濇猶為中寒之病也况虛空者乎宜峻補之

飲食

五味子 川巴戟心 肉苁蓉酒 兔絲子炒

人參 白朮 熟地 骨碎補法

茴香 牡蠣 白龍骨 覆盆子

益智仁 各等

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九空心食前米飲下... 日二三服補精止汗

治遺精夢泄... 固真丹

舶上茴香 葫蘆巴 破故紙 白龍骨

木香 胡苑 羊腎

右五味為末下二味同研成膏和酒浸蒸餅杵熟丸如

桐子大每服三五十九空心鹽湯下

固真丹

晚蚕蛾 肉苁蓉 白茯苓 益智略

龍骨

右用鹿角膠酒浸化開九桐子大每服三粒空心温酒

下乾物服之

補真玉露丸治陽虛陰盛精脫淫瀉... 白茯苓 白龍骨 韭子 兔絲子

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十九温酒下... 得空心食前服少時以美饍壓之

醋糊丸桐子大每五十九空心鹽湯下

右龍骨牡蠣治遺例王元珪虛而泄精脈弦大累與... 加減八物湯吞河間秘真丸及珍珠粉丸其泄不止後

用五倍子一兩茯苓二兩為丸服之良愈此則五倍子... 瀉脫之功敏於龍骨蛤粉也

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐... 陰人通洩

龍骨一兩 大訶子皮五 硃砂一分

縮砂研

右為末麪糊丸葉豈大每服一二十九空心溫酒下熟水亦得不可多服太秘

治虛損補精水壯筋骨益心智安魂魄令人悅澤駐顏輕身延年益壽閉固天癸八仙丹

伏火硃砂 真磁石 赤石脂 代赭石

石中黃 禹餘糧 乳香 沒藥各一

右為末研勻極細糯米濃飲丸桐子大或豈大每服一粒空心溫湯下有人年幾七旬夢遺瀉弱氣微懶然虛損得此方服之頓爾強壯精氣閉固飲食如故于常製自服良驗

經云思想無窮所愿不得意淫於外入房大甚宗筋施縱

發為白淫夢遺等症先賢治法有五

右法用辰砂磁石龍骨之類鎮墜神之浮游是其一也

其二思想結成痰飲迷於心竅而遺者許學士用猪苓丸之類導利其痰是也

其三思想傷陰者潔古珍珠粉丸用蛤粉黃柏降火補陰是也

其四思想傷陽者謙甫鹿茸菟絲子等補陽是也

其五陰陽俱虛者丹溪治一形瘦人便濁夢遺作心虛治用珍珠粉丸定志丸服之定志丸者遠志菖蒲茯苓人參是也

年少壯節欲遺泄者宜清心丸珍珠粉丸清心方珍珠粉丸治白淫夢遺泄精及滑出不收

黃柏皮一斤 真蛤粉一斤

右為細末滴水丸如桐子大每服一百九空心溫酒送下法曰陽盛乘陰故精泄也黃柏降火蛤粉鹹而補腎

陰

精滑不禁方用海蛤粉青黛香附黃柏知母之類

大鳳髓丹治心火狂陽太盛補腎水真陰虛損心有欲速于感動應之于腎疾于施泄此方固真元降心火益腎水大有神效

黃柏二 縮砂一 甘草半 半夏炒

木猪苓 茯苓 紅蓮蕊 益智仁各二

右為丸每服五七十九若只用黃柏甘草縮砂三味為正鳳髓丹只用黃柏甘草二味為小鳳髓丹古人云瀉心者非也乃瀉相火益腎水之劑

治經絡熱夢遺心忪恍惚隔熱清心丸用好黃柏皮一兩研為細末生腦子一錢同研勻煉蜜為丸如桐子大每服十九至十五丸濃煎麥門冬湯吞下大智禪師云夢遺不可全作虛冷亦有經絡熱而得之也嘗治一男子至夜脊心熱夢遺用珍珠粉丸猪苓丸遺止終服紫雪香熱始除又一男子脈洪腰熱遺精用沉香和中丸下之導赤散治其火而愈於此知身有熱而遺者皆熱遺也

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛此遲為清穀亡血失精脈得諸孔動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之

桂枝 芍藥 生姜各三 甘草二

大棗十二 龍骨一斤 牡蠣三斤

右七味水七升煮三升分溫三服

天雄散方

天雄炮 龍骨各三 白朮八 桂枝六

清之不
止為虛

右四味杵為散酒服半錢七日三服不止稍增之
愚壯年得夢遺症每四十五日必一遺累用鳳髓丹河
間秘真丸雖少効終不除根後改用菖蒲遠志韭子桑
螵蛸益智酸棗仁牡蠣龍骨瑯陽等劑為丸服之良愈
又一中年男子夢遺以珍珠粉丸等藥與服了無一効
亦以遠志菖蒲等劑服之隨手而愈

法之文
在為難

猪苓丸用半夏一兩破如芫大猪苓末二兩先將一半
炒半夏色黃不令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大候
乾更用前猪苓末一半同炒微裂入砂瓶內養之空心溫
酒盪湯下三四十九常服於申未間溫酒下○此古方也
今盛行於時而人多莫測其用半夏有利性而猪苓導水
蓋腎閉導氣使通之意也予醫囊中嘗貯此藥緩急與人
三五服皆隨手而驗林監丞庇民亦數服而愈

本草學補本末

卷一

詳此治遺方屬滯者居大半庸醫不知其弊但用
龍骨牡蠣等劑固脫殊不知愈滯愈鬱其病反甚常
治一壯年男子遺白濁少腹有氣衝上每日腰熱卵
作西涼腰熱作則手足冷前陰無氣腰熱退則前陰氣
耕手足溫又且多下氣暮多噫特振隔一旬二旬必遺
脈且弦滑而大午洪大予知其有鬱滯也先用沉香和
中丸大下之次用加減八物湯吞滋腎丸百粒若稍與
蛤粉等清藥則遺與濁反甚或一夜二遺遂改用導赤
散大劑煎湯服之遺濁皆止漸安又一中年男子皆夢
遺醫或與清藥反甚連遺數夜愚先與神芩丸大下之
却製此猪苓丸服之皆得痊安又丹溪先生治鎮守葛
戶蕭伯善便溺精滑不禁百藥不効與試倒倉法而安
於此見夢遺屬滯者多矣

治遺精不禁用局方青州白丸子用辰砂為衣每服
烏金散治遺泄精滑不禁九肋鱉甲每服二字用清酒
半盞童便半小盞陳葱白七八寸同煎七分和查日兩服
本草云鱉甲主
心腹癆瘵堅積

治男子夢遺交心神恍惚者刮鹿角屑三指撮日二
服酒下食療同本草云鹿角屑
逐惡氣惡血

遺精白濁夜夢鬼交 心俞一分沿皮向外一寸半
先補後瀉為宜不宜多

又法 白環俞一寸半夾五寸
壯與中極相平 腎俞中極後隨
年壯

又法 腎俞 心俞 膏肓 關元 三陰下穴
取

腰脊冷弱多白濁失精 脾募三七
曲泉

虛勞失精陰縮莖中痛 大赫三七
中封

遺精五臟虛竭東陽
曲骨端四七壯在陰橫骨中
夾曲如月中中央是也

溺血精出 列缺取針
五分

丈夫失精中極主之 男子精溢陰上縮大赫主之

男子精溢脛瘦不能久立然谷主之 男子精不足太衝
主之

白濁

便濁大槩皆是濕痰流注宜燥中宮之濕用二陳湯加
蒼朮白朮燥去其濕肥白人必多濕痰以二陳去其濕熱
胃弱者兼用人參以柴胡升麻升其胃中之氣 胃中濁
氣下流必用二陳加蒼朮白朮柴胡升麻 一婦人年近
六十形肥奉養膏梁飲食肥美中焦不清積為濕氣流入
膀胱下注白濁白濁即濕痰也用二陳去痰倉朮白朮去
濕補胃加升麻柴胡升胃中之清氣服四貼後濁減大半

却覺胃滿因柴胡升麻升動胃氣痰阻滿悶而然開用二陳湯加炒麩白朮香附以泄其滿若素無痰者雖升動胃氣不滿也兼用青黛檉皮蛤粉炒黃柏炒乾姜滑石為末炒神麩糊丸服之

凡便濁服藥必兼服加減珠粉丸

蛤粉 此二味主胃中濁 檉皮末 大燥
滑石 乾姜炒滑石使降血生乾姜

右為末炒神麩為丸

又方

黃栢炒 黃栢生 蛤粉各一 神麩兩

右為末滴水丸服

白濁者濕熱傷氣久下不止此係火不守也知母黃栢炒

附子各等分水丸服

赤濁者濕熱傷血於二陳湯中加白芍藥仍用炒栢蛤粉

走

虛寒 白淫諸症○痿論曰思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫夫腎藏天一以慳為事志意內治則精全而瀦若思想外淫房室太甚則固

有淫泆不守輒隨瘦溺而下也然本於筋痿者以宗筋弛縱也

內補鹿茸丸治勞傷思想陰陽氣虛益精止白淫

鹿茸酒 兔絲子酒 菟絲炒 白菝藜
肉蓯蓉 紫苑 蛇床子酒 黃蘗
桑螵蛸 陽起石 附子地 官桂各等

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服二十九食前溫送下

茯苓丸治心氣不足思慮太過腎經虛損其陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄

兔絲子酒浸 石蓮去壳 白茯苓去皮

右為細末酒糊為丸如桐子大每服三十九鹽湯下常服鎮益心神補虛養血清小便

金箔丸治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

蠶蛾 破故紙炒 韭子炒 牛膝酒

肉蓯蓉 龍骨 山茱萸 桑螵蛸

兔絲子酒浸 各

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九溫酒空心下

王瓜散治小便白利如泚色此腎虛也

王瓜根 桂心各一 白石脂 兔絲子酒

牡蠣鹽泥燒赤候冷 右為末每服二錢煎大麥粥湯調下日三服食前

草薢分清飲治白濁凝而如油光彩不定凝脚如糊

益智仁 川草薢 石菖蒲 烏藥各等

右吹咀每服四錢水一盞入盞一捻煎七分食前溫服一方加茯苓甘草

恐與驚悸相似實非驚悸也張子和云驚者為自不知故也恐者為自知也蓋驚者聞響即驚恐者自知如人將捕之及不能獨自坐臥必須人為伴侶方不恐懼或夜必

川燈照無燈燭亦恐懼者是也

臟腑恐有四

一曰腎經云在臟為腎在志為恐又云精氣并於腎則恐是也除見虛條及針灸條

二曰肝膽經云肝藏血血不足則恐藏人曰膽者敢也驚怕則膽傷矣蓋肝膽實則怒而勇敢肝膽虛則善怒而不

敢也餘見同上

三曰胃經云胃為恐是也

四曰心經云心怵惕思慮則傷神傷神則恐懼自失者是也

因恐得之為傷周本心年六十歲形氣俱實因大恐正月間染病心不自安如人將捕之狀夜臥亦不安兩耳後亦見火光炎上

食飲雖進而不知味乾而不欲食以人參白朮當歸身為君陳皮為佐加益炒黃柏參各少許煎服自愈月

餘而安經云恐傷腎丹溪用益炒黃柏參各少許煎服自愈

治膽虛常多畏恐不能獨臥如人捕之狀頭目不利人參散

人參 枳殼 五味子 桂心

甘菊花 茯神 山茱萸 枸杞子各三分

右細末每二錢溫酒調服

治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胃中滿悶茯神散

茯神 遠志 防風 細辛

白朮 前胡 人參 桂心

熟地 甘菊花各三分 枳殼兩

右為末每服三錢水一盞姜三片煎六分溫服不拘老

幼皆宜服

治膽虛目暗喉痛數唾眼目眩冒五色所障夢見被人爭訟恐懼面色變者補膽防風湯

防風 人參七分 細辛 芍藥

甘草 茯苓 獨活 前胡各八分

右粗末每四大錢水盞半束二枚煎八分去查食前服

運氣善恐皆屬肝木虛經云木不及曰委和委和之紀其病淫動注恐是也

針灸 內經針灸善恐有三

其一取腎經曰腎足少陰之脈是動病氣不足則善恐心惕惕如人將捕之虛則補之寒則留之是也

其二取肝經云肝虛則目眩無所見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽是也

其三取膽經云膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之取陰陵泉又云善嘔嘔有苦善太息心中惛惛恐人將捕之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔

苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆則少陰血絡以閉膽逆却調其虛實以去其邪是也

心悲內關主之千金

涎出喘少氣吸不足以息然谷主之 澹澹而善驚恐

心悲內關主之千金

醫學綱目卷之二十九

醫學綱目卷之三十一 傷寒部

傷寒通論 續傷寒通論

大法

凡傷於寒則為病熱雖甚不死若兩感于寒而病者必死 尺寸俱浮者太陽受病也常一二日發以其脈上

三日而

病傳三

連風府故頭項痛腰脊強 尺寸俱長者陽明受病也當

陽宜汗

二三日發以其脈俠鼻終于目故身熱目疼鼻乾不得

三日後

所傳三

尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中

陰宜下

終於噎故腹滿而噎乾 尺寸俱沉者少陰受病也當五

六日發

以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴

云經云

一二日少陰者謂初起病時便入少陰不經三陽

也

大抵傷寒發于陽則太陽也發于陰則少陰也凡病一

日

至十二日三陽大陽不能罷者俱治太陽有初得病便

見少陰

熱而惡寒入少陰者不必先自巨陽蓋寒入太陽即

病已入於腑

可下而巳 尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七

日發

以其脈循陰器絡于肝故煩滿而囊縮煩滿謂少腹

者多死

乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此

能食不嘔為三陰不受邪也

三日後

傳陰三

日脈微

小者身

溫者欲

解

問曰傷寒三日脈浮數而微病人身溫和者何也答曰此

為欲解也以夜半脈浮而解者濺然汗出也脈浮而解者

必能食也脈不浮而解者必大汗出也 三日少陽脈小

欲已也

其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰

頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九日少陽病衰

耳聾微聞也十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日

少陰病衰渴止舌乾已而嚏也十二日厥陰病衰囊縮少

腹微下大氣皆去病人精神爽慧也 太陽病頭痛至七

日已上自愈者行其經盡故也若欲再傳經者針足陽明

使不傳則愈

六七日脈至皆大煩而口噤不言躁擾者必欲解也

傷寒六七日無大熱其人躁煩此為陽去入陰故也

若過十三日已上不問也 尺寸陷者大危

若更感異氣變為他病者當依舊壞症而治之若脈陰陽

俱盛重感於寒者變為溫瘧 陽脈浮滑陰脈濡弱者更

遇於風變為風溫 陽脈洪數陰脈實大者遇溫熱變為

溫疔為病最重也 陽脈濡弱陰脈弦緊者更遇溫氣變

為溫疫以冬傷於寒發為溫病脈之變症方治如說

凡發汗欲令手足皆周至發熱然一時間許益佳不可令

如水淋漓耳若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得

日一二服若病劇不鮮當促其服可半日間盡一二服若與病相值即便有所覺重病者一日一夜當時時觀之如服一劑病症猶在故當復作本湯服之至有不汗汗出服三劑乃解若汗不出者死病也 凡服湯藥發汗中病即止不必盡劑吐下之

許學士云記一鄉人傷寒身熱大便不通煩渴鬱冒醫者用巴荳下之頃得瀉利宛然如舊予觀之陽明結熱在裏非大柴胡承氣不可巴荳止去積不能瀉邪熱蘊毒亟進大柴胡等三服得汗而解嘗謂仲景一百一十三方為丸者有五理中隔胃抵當烏梅麻仁是以理中隔胃抵當皆大如彈子煮化而服與湯散無異至於麻仁治脾約烏梅治濕脹皆用小丸以達下部其他逐邪毒破堅癥導滯血開燥並之類皆憑湯劑未聞用巴荳小丸藥以下邪氣

也既下而病不除不免重以大大黃芒硝下之安能無損也哉

欲攻當先表後下

凡傷寒之病多從風寒得之始表風寒入裏則不消矣擬欲攻之猶當先解表乃可下之若表已解而內不消大

滿大實堅有燥屎者自可除下之雖四五日不能為禍也

汗症汗後不罷

服桂枝湯大汗出脈洪大者復與桂枝湯如前法論見

者汗發汗後

日內可二三汗之令

汗吐下

凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈

不鮮

故必待自和也 太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此為壞症桂枝不中與也觀其脈症知犯何逆當隨証治之

下後症

夫病陽多者熱下之則便無陽陰虛大便鞭者下之則必

清穀腹滿

診病

師持脈病人欠者無病也脈之呻者病也言遲者風也擗頭言者裏痛也行遲者表強也坐而伏者氣短也坐而下一脚者腰痛也裏實護腹如懷卵物者心痛也 寸口諸微亡陽諸滿亡血諸發熱諸脈為寒諸乘實者則為厥鬱胃不仁以胃無穀氣脾滯不通口急不能言戰而慄也 而身細弱脈極微而沉也

病六七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁擾必欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知脈浮故知汗出解也若脈和平其人大煩日重臉內際黃者皆為欲解也

寸關尺 河曰脈病欲知愈未愈者何以別之答曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脈為陰陽

八 醫學綱目卷三

中

和平雖劇當愈 計經脈脈論云寸口人迎兩者相應若引與脈旁之人迎脈等者為平人後際云六 凡得病脈脈動數服湯藥更遲脈浮大減小初躁後靜此皆愈症也

脈浮數而微病人身溫和者欲解也 凡病反能飲水者為欲愈 太陰中風脈陽微陰濇而長者為欲愈 少陰中風脈陽微陰浮者欲愈 厥陰中風脈微浮者欲愈不浮未愈

三陽在 太陽病已至未解 陽明病申至戌解 三陰在 少陽病寅至辰解 太陰病亥至丑解 厥陰病丑至卯解

少陰病子至寅解 厥陰病丑至卯解 問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令日中得病夜半

愈者以陽得陰則解也夜半得病日中愈者以陰得陽則

解也 病家人請云病人苦發熱身熱病人自臥師到

解也 病家人請云病人苦發熱身熱病人自臥師到

解也 病家人請云病人苦發熱身熱病人自臥師到

解也 病家人請云病人苦發熱身熱病人自臥師到

解也 病家人請云病人苦發熱身熱病人自臥師到

解也 病家人請云病人苦發熱身熱病人自臥師到

診其脈沉而遲者知其瘥也何以知之表有病者脈當浮天今反沉遲故知愈也假令病人云腹內卒痛病人自坐師到脈之浮而大者知其瘥也何以知之若裏有病者脈當沉而細今脈浮大故知愈也

脈浮緊按之芤問曰病有戰而汗出者因得解者何也答曰脈浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰

脈浮大按之不以脈浮故當汗出而解也若脈浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但出汗耳

戰而汗解不發戰也問曰病有不戰而汗出解者何也答曰脈大而浮數故知不戰汗出而解也

脈微當不戰不汗而解問曰病有不戰不汗出而解者何也答曰其脈自微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液待陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也

診生死右海藏云戰而後解者太陽也不戰有汗而解者陽明也不戰無汗而解者少陽也

太陽病未解脈陰陽俱停必先戰慄汗出而解陽微者汗解陰微者下解論見發凡脈大浮數動滑此名陽也沉

滑弦弱微此名陰也凡陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死陰陽俱盛大汗出不解者死陰陽俱虛熱不止者死又診生死詳法並見診法門

服藥正如方法縱意違師不須治之脈沉為在裏而反發其汗則津液越出大便難表虛裏實久則譫語也論見脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之以榮氣不足血少故也活人云先以小建中湯加黃芪如尺脈遲遲再作一劑也如服藥胡桂枝二錢一湯其湯分小劑和服之愈許學士云一鄉人丘生者病傷寒發熱頭疼煩渴脈雖浮

數無力尺以下遲而弱予曰此雖麻黃症而尺遲弱仲法云尺中遲者榮氣不足血氣微少不可發汗予於建中湯加當歸黃芪今飲翼日脈尚爾其家煎迫日夜督發汗藥幾不遑矣予忍之但只用建中調榮而已至五日尺部方應遂投麻黃湯發二服發狂須臾稍定略睡已中汗矣信知此事誠難仲景雖云不避晨夜即宜便治論見亦須顧其表裏虛實待其時日若不微次氣暫得安插論見以促壽限何足貴哉昔南史載范雲傷寒惡不得前武帝九錫之慶召徐文伯診視以實懇之曰可便得愈乎文伯曰便瘥甚易只恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死猶可况二年乎文伯以火燒地布桃葉設席置雲於其上頃刻汗解撲以溫粉翼日果愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒夫取汗先期尚促壽限况不顧表裏不待時日

便欲速効乎每見病家不奈病未三四晝夜促汗醫者隨情順意鮮不敗事予故書此為戒

脈浮大應發汗醫者反下之此為大逆諸外實者不可下下之則發微熱脈厥者當臍握熱諸虛者不可下下之則大渴求水者易愈惡水者劇太陽症表未解不可下下之為逆論見

脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上瀋反在下微則陽氣不足瀋則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩瀋則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠陽微不可下下之則心下痞論見是復不可下下之

脈浮熱甚反灸之此為實以虛治因火而動必咽燥唾吐微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也脈浮

宜汗反用火灸之邪無從出腰以下必重而痺論見
桂枝本為解肌若其脈浮發熱無汗者不可與也常須
識此勿令悞也 脈浮自汗小便數微惡寒脚攣急忌桂
枝湯攻表論見 酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒
客不喜甘故也

凡用梔子湯病人舊微瀉者不可與服之
若不瀉而下而便攻之內虛熱入挾熱遂利煩躁諸變不可
勝數輕者因篤重者必死矣 太陽病下之其脈促不結
胃者此為欲解也脈浮者必結胃也脈緊者必咽痛脈弦
者兩脇必拘急脈細數者頭痛未止脈沉緊者必欲嘔脈
沉滑者挾熱利脈浮滑者必下血

續傷寒通論
發熱惡寒身痛而脈浮者表証也表証者惡寒是也
惡寒者屬太陽宜汗之

成惡寒一切屬表雖裏証悉具而微惡寒者亦是表未解
也猶當先解其外候不惡寒為外解乃可攻裏也
不惡寒反惡熱手掌心并腋下濺濺汗出胃中乾燥結聚
潮熱大便鞭小便利如常腹滿而喘或譫語脈沉而滑者裏
証也裏証者內熱是也內熱者屬陽明宜下之 傷寒始
發熱惡寒今汗後不惡寒但倍發熱而躁始脈浮而大今
脈洪實或沉數細始惺靜今狂語此為胃實陽盛再汗即
死須下之則愈亦有始得病便變陽盛之症須使下之不
可拘以日數更有心胸連腹膈大段痞悶腹中痛坐臥不
安胃悶喘急極者亦不問他症便下之若失下則氣血不
通四肢便厥醫人不知反疑是陰厥復進熱藥禍如反掌
不可不察也

便瀉急
梔子
瀉下諸
變症
有汗便
數飲酒
者忌桂
枝

邪之客於表者為寒邪與陽相爭則為寒矣邪之入於
裏者為熱邪與陰相爭則為熱矣邪在半表半裏外與陽
爭而為寒內與陰爭而為熱是以往來寒熱邪居表多則
多寒邪居裏多則多熱邪半在表半在裡則寒熱亦半矣
邪在表者必瀆形以為汗邪在裏者必瀉滌以取利其餘
不外不內半表半裏又非發汗之所宜亦非吐下之所對
是當和解則可矣小柴胡為和解之劑也

傷寒表証當汗裡証當下不易之法也發表攻裡本自
不同甘遂神丹不可合飲桂枝承氣安可並進然而假令
病人脈浮而大是表証當汗其人發熱煩渴小便赤却當
下此是表裡俱見五苓散主之 假令傷寒不大便六七
日頭痛有熱者是裏証當下其人小便清者知不在裏仍
在表也當須發汗此是兩証俱見即未可下宜與桂枝湯

假令病人心下滿口不欲食大便鞭脈沉細是裏証當
下其人頭汗出微惡寒手足冷却當汗此兩証俱見者仲
景所謂半在表半在裡也小柴胡主之 假令太陽病表
証未除而醫數下之遂挾熱而利不止心下痞鞭仲景謂
之表裏不解桂枝人參湯主之 本太陽病醫反下之因
爾腹痛是有表復有裡仲景用桂枝加芍藥湯痛甚者桂
枝加大黃 又云太陽病桂枝証醫反下之利遂不止脈
促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩湯主之此皆仲景
治傷寒有表復有裡之法也

大柴胡湯治表裡內外俱熱之症治有表者或脈浮或
頭痛或惡風或惡寒四症中或有一二尚在者乃十三日
過經不解是也治有裡者或譫語或妄語或擲手揚視此
皆裡之急者也若欲汗之則裡証已急欲下之則表証尚

寒熱往
來胸滿
脈弦為
裏

表裡俱
見

八書學綱目卷三

八

在通宜大柴胡湯

無表裡

傷寒四五日後以至過經無表症又於裡症未可下者皆可用小柴胡証加減用之以至十餘日亦可下者皆可用小柴胡不愈者若大便硬者症可下則用大柴胡下之以過經其人稍虛當下者用大柴胡湯則穩當恐承氣太緊病人不禁也仲景云六七日目中不了了睛不和無表裡症大便難身微熱此為實也當下之宜大承氣湯又云病人無表裡症發熱七八日脈雖浮數可用大柴胡下之假令已下脈數不解至六七日不大便者有瘀血也屬抵當湯

百病皆分表裡

治傷寒須分表裡若表裡不分汗下差誤豈為上工且如均是發熱身熱不渴為表有熱小柴胡加桂枝主之厥而脈滑為裡有熱白虎加入參主之均是水氣乾嘔微利發

八醫學綱目卷三

九

熱而咳為表有水小青龍加芫花主之休涼表症罷欬而脇下痛為裡有水十棗湯主之均是惡寒有熱而惡寒者發於陽也麻黃桂枝小柴胡主之無熱而惡寒者發於陰也附子四逆主之均是身軀痛脈浮發熱頭痛身痛者為表未解麻黃湯主之脈沉自利身痛者為裏不和四逆湯主之以此觀之仲景表裏之法甚詳學者宜深究心也

半表半裡

半表半裡者有幾夫邪在榮衛之間謂之半表半裡也太陽陽明之間少陽居身之半表半裡也五苓散分陰陽勝膀胱之半表半裡也理中湯治吐泄上下之半表半裡也

也

太陽陽明

太陽陽明少陽皆屬陽症也太陽者勝膀胱也發熱惡寒則必腰痛而脈浮也陽明者胃也不惡寒及惡熱濇濇汗

出大便秘潮熱而脈長也少陽者膽也口苦咽乾脇下滿發熱而嘔或往來寒熱而脈弦也麻黃湯大青龍湯桂枝湯治太陽傷風寒也大柴胡湯調胃承氣湯小承氣湯大承氣湯治陽明傷寒也小柴胡湯治少陽傷寒也其他藥皆發汗吐下後症也若陽氣獨盛陰氣暴絕即為陽毒必發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑如錦紋或下利黃赤脈洪實或滑促當以酸苦之藥投之令陰氣復而大汗解矣古人云酸苦瀉泄為陰謂苦參大青葶藶苦酒之類皆復其陰氣也微用苦甚則兼用酸苦折熱復陰若熱極發厥陽症似陰者學者當以脈別之

太陰少陰厥陰皆屬陰症也何謂太陰症太陰脾之經主胃脾脹何謂少陰症少陰腎之經主脈細心煩但欲寐或自利而渴何謂厥陰症厥陰肝之經主消渴氣上衝心中疼熱饑不欲食食則吐衄下之利不止也三陰中寒微則理中湯稍厥或中寒下利即乾姜甘草湯大段重者用四逆湯無脈者用通脈四逆湯若陰氣獨盛陽氣暴絕則為陰毒其症四肢逆冷臍腹築痛身如被杖脈沉實病或吐或利當急灸臍下服以辛熱之藥令復陽氣而大汗解矣古人云辛甘發散為陽謂桂枝甘草乾姜附子之類能復其陽氣也微用辛甚則用辛苦若陰極熱躁陰症似陽者學者亦當以脈別之

陰症陽症

陰症陽症辨 靜江府提刑李君長子年十九歲四月病傷寒九日醫者作陰症治之與附子理中九數服其症增劇別易一醫又作陽症議論差互不敢服藥李君邀予往視坐間有數人予不欲直言其症但細為分解令自忖度之凡陽症者身大熱而手足不厥臥則坦然起則有力

八醫學綱目卷三

一

度之凡陽症者身大熱而手足不厥臥則坦然起則有力

陰症陽症

度之凡陽症者身大熱而手足不厥臥則坦然起則有力

不思寒反惡熱不嘔不瀉渴而飲不煩渴不渴
多語其脈浮大而數者陽症也凡症者身不熱而
厥冷惡寒踈臥惡聞人聲或自引衣蓋覆不渴不飲食
小便自利大便反快其脈沉細而數者陰症也今診其
脈數得六七至其母云夜來叫呼不絕又喜飲水
水予聞其言知陽症悉具且三日不見大便且急下之
遂以酒煨大黃六錢甘草炙二錢芒硝五錢煎服至下
數行燥糞二十餘塊是夜汗大出明日又往視之身涼脈
靜夫予思素問熱論云治之各通其臟腑故仲景述傷寒
論云六經各異傳變不同活人亦云凡治傷寒先須明經
絡其義一也昧者不學經絡不問病源按寸握尺妄意病
症不知邪氣之所在動致顛覆真言醫哉昔韓子云醫之
病病在少思真理致之言也學者審之陰症以陽陽症以
陰症見陰陽藏府

入醫學綱目卷之

十一

汗下大 部發寒熱
反和寒
未滿三日可汗而已滿三日者可泄而已此大略言之
耳凡病人有虛有實邪氣傳受遲速不同豈可拘以日數
仲景云日數雖多但有表症而脈浮者猶宜發汗日數雖
少若有裏症而脈沉者即宜下之正應隨脈治之又況六
氣之邪乘虛之經皆自背得之則入太陽或入少陰自面
感之則入陽明之類不必皆始於太陽也兼寒邪有首尾
止在一經或間傳一二經不可以一理推但視脈與外症
治之此活法也假令有人脈浮頭項強痛發熱而惡寒每
日如此不以日數多少正是太陽經受之其餘經皆倣此
大抵傷寒惟憑脈與外症以汗下之若過日多脈尚大浮
數按之不足者尚貴太陽也可發汗而愈若按之實者汗
之必死須下之而愈也若始病脈沉細數外症或腹滿咽

乾或口燥舌乾而渴為熱正青屬裏可下之而愈若無此
症表熱脈沉誤下者必死須用麻黃附子甘草麻黃細辛
附子湯少發汗以治之此皆仲景之確論也 傷寒脈浮
而緊身軀拘急惡寒無熱多熱少面色慘而不舒腰脊
疼痛手足四末微厥此麻黃症也 傷寒脈浮而緩寸大
而尺弱自汗體熱頭暈惡風寒多熱少其面光而不慘煩
躁手足不冷此桂枝症也

傷寒者脈緊而滿傷風者脈浮而緩傷寒無汗傷風有汗
傷寒畏寒不畏風傷風畏風不畏寒大抵太陽病者必脈
浮發熱惡風惡寒惡寒者不當風而自憎寒惡風者當風
而憎寒也 六經皆有傷風傷寒其症各異太陽脈浮有
汗為中風脈弦無汗為傷寒陽明善饑為中風不食為傷
寒少陽兩耳聾目赤皆滿而煩為中風口苦咽乾目眩為

入醫學綱目卷之

十一

傷寒若三陰傷風無變異形症但四肢煩疼餘症同三陽
也 傷風見寒脈者發熱惡風煩躁手足溫而脈反浮緊
蓋發熱惡風煩躁手足溫為中風候脈浮緊為傷寒候也
傷寒見風脈者寒多熱少不煩躁手足微厥而脈反浮
緩蓋多熱少寒不煩躁手足微厥為傷寒候脈浮緩為中
風候也 傷風見寒傷寒見
傷寒發表須當隨病輕重而汗之故仲景有發汗者有和
解者發汗如麻黃湯桂枝湯大青龍湯是也和解如小青
龍湯桂枝麻黃各半湯白虎湯桂枝二越婢一湯柴胡桂
枝之類是也後人不能深究寒邪淺深藥性緊慢一槩用
藥因致天傷其間縱或生全往往汗後虛乏遂至勞復或
變成百病淹引歲月卒至不救此皆由汗下過度陰陽並
竭血氣虧損以致此禍如過病輕但當和解之所謂和其

榮衛以通津液令其自解可也

助汗法

丹溪治傷寒表症用補中益氣湯發散海藏用神木湯白
木湯丸味羌活散發散此皆和解之意不使真氣散夫也
傷寒連服湯劑而汗不出者如中風法蒸之使溫熱之氣
於外迎之無不得汗其法用薪火燒地良久掃去以水洒
之取黍砂栢葉桃葉糖麩皆鋪燒地上可側手厚上鋪席
令病人當上臥溫覆之移時汗立至候周身至脚心熱熱
乃用溫粉撲之汗止上床最得力者黍沙栢葉也糖麩
乃助其厚多少隨用

治傷寒汗不出搖脚法用海蛤粉烏頭各二兩川山甲
三兩為末酒糊和丸大一寸許捏扁置患人足心下壁葱
白蓋藥以帛纏定於暖室取熱湯浸脚至膝下久則水溫
又添熱水候遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以和為

醫學綱目卷三

度

攻理者

傷寒裡症須看熱氣淺深故仲景有直下之者如大承
氣小承氣十棗大柴胡湯是也有微和其胃氣者如調胃
承氣湯脾約丸少與小承氣微和之之類是也

論虛者十補勿一瀉強實者瀉之虛實等者雖瀉勿大
泄之故王叔和序傷寒有承氣之戒

論治大便秘結用通幽湯潤腸湯九皆為血氣津液不足
者設也

乘氣

藥用大承湯最緊小承湯次之調胃承氣又次之大柴胡
湯又次之
瀉大承氣湯治大實大滿滿則胃腹脹滿狀若合瓦大實
則不大便也痞滿燥實四症俱備則用之雜病則進退用
之

大黃治大

厚朴治大

芒硝治燥結
枳實治痞氣

小承氣湯治痞實而微滿狀若饑人食飽飯腹中無轉矢
氣即大承氣湯只去芒硝心下痞大便或通熱甚須可下
宜此方 調胃承氣湯治實而不滿者腹如仰瓦腹中有
轉矢氣有燥糞不大便而譫語堅實之症宜用之

右已上三法不可差差則無者生之有者遺之假令調
胃承氣症用大承氣下之則愈後元氣不復以其氣藥
犯之也若大承氣症用調胃承氣下之則愈後神癡不
清以其無氣藥也小承氣症若用芒硝下之則或利不
止變而成虛矣

三一承氣湯辨○實則瀉之人所共知如緩急輕重之
劑則臨時消息焉如不惡寒反惡熱發渴譫語腹滿而喘

醫學綱目卷三

古

手足濇然汗出急下之宜大承氣湯如邪未深恐有燥糞
少腹痛小承氣湯試之腹中轉矢氣者有燥糞也乃可攻
之不轉矢氣者初鞭後瀉尚未可攻攻之則腹滿不能食
若腹不通止與小承氣湯微和胃氣勿令大泄如發汗不
惡寒但實者胃實也當和胃氣調胃承氣湯主之
大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以
熱不大甚故于大承氣湯中去芒硝又以結不至堅故減
厚朴枳實如不至大堅然邪熱已甚而須攻下者亦未可
投大承氣湯必以輕緩之劑攻之干大承氣湯中減厚朴
枳實加甘草乃輕緩之劑以調胃也設若大承氣湯症反
用調胃承氣湯下之則邪氣不伏小承氣湯症反用小承
氣湯下之則過傷正氣而腹滿不能食故有勿大泄之戒
此仲景所以分而治之未嘗越聖人之制度後之醫者以

此三藥合而為一且云通治三藥之症及傷寒雜病一切所傷若如此說與仲景之方甚相背戾且失軒岐緩急之旨由是紅紫亂失迷惑世人一唱百和使病者暗受其弊將何所咎哉倘有公心審是者當于內經仲景方中求之責使藥症相對以聖賢之心為心則方之真偽自可得而知矣

汗下緩急傷寒之法先言表裏及有緩急三陽表當急裏當緩三陰表當緩裏當急又曰脈浮當汗脈沉當下脈浮汗急而下緩謂三陽表也脈沉下急而汗緩謂三陰裡也麻黃湯謂之急麻黃附子細辛湯謂之緩內經云有瀆形以為汗謂汗之緩裡之表也又云在皮者汗而發之謂汗之急表之表也急汗者太陽緩汗者少陰是藏府之輸應也假令附子麻黃細辛湯是少陰症如得發熱脈沉裏和無汗故

瀆形為汗今麻黃湯是太陽症頭項痛腰脊強脈浮無汗裏和是也在皮者汗而發之可也經曰治主以緩治客以急此之謂也麻黃湯方見傷寒表裏上條

脈浮有表為表急汗假令得肝脈其外症善噦面青善怒其三部脈俱弦而浮惡寒裡和清便自調麻黃湯內加羌活防風各三錢謂肝主風是膽經受病也大便或泄下赤水無數皆裏不和也假令得心脈其外症面赤口乾善笑其尺寸脈俱浮而洪惡寒裡和清便自調麻黃湯內加黃芩石膏各三錢謂心主熱是小腸受病也假令得脾脈其外症面黃善噦善思善味尺寸脈俱浮而緩裡和惡寒麻黃湯內加白朮防風各三錢謂脾主濕是胃經受病也假令得肺脈其外症面白善噦悲愁不樂欲哭其尺寸脈俱浮而濇裡和惡寒麻黃湯內加桂枝生姜各三錢謂肺主燥是大腸

受病也假令得腎脈其外症面黑善恐其尺寸脈俱沉而裡和惡寒麻黃湯內加附子生薑各三錢謂腎主寒是膀胱受病也

脈沉有裡為表急汗已上五症皆表之表也謂在皮者急汗而發之皆腑受病也表之裏者下之當緩謂隨臟表症外顯尺寸脈俱浮而復有裏症謂發熱飲水便利赤瀉或洩下赤水其脈浮按之內實或痛麻黃湯方去麻黃杏仁隨臟元加藥同煎分作五服每下一症初一服加大黃五分如邪未盡又加大黃一錢未盡再加大黃一錢半直候邪盡則止此先緩而後急是表之裏宜下之當緩也

脈沉有表為表急汗麻黃附子細辛湯方見下少陰假令得肝脈其內症滿悶淋洩便難轉筋其尺寸脈俱沉而弦裏和惡寒麻黃附子細辛湯內加羌活防

脈沉有表為表急汗風各三錢假令得心脈其內症煩心心痛掌中熱而噦其尺寸脈俱洪裏和惡寒心經受病於前湯內加黃芩石膏各三錢假令得脾脈其內症腹滿脹食不消怠墮嗜卧其尺寸脈俱緩裡和惡寒脾經受病加白朮防已各三錢假令得肺脈其內症喘嗽洒淅寒熱其尺寸脈俱沉裡和惡寒肺經受病加生薑桂枝各三錢假令得腎脈其內症泄瀉下重足脛寒而逆其尺寸脈俱沉裡和惡寒此腎經受病加姜附各三錢

脈沉有表為表急汗已上五症裡之表也宜瀆形以為汗皆臟受病也裏之裏者下之當急謂隨臟內症已顯尺寸脈俱沉而復有表症謂小便赤大便瀉或瀉下赤水或瀉或咳不能飲食不惡風寒發熱引飲其脈俱沉按之內實而痛此謂裡實宜速下之麻黃附子細辛湯內去麻黃隨臟元

加藥同煎分作三服每下一症初一服如大黃三錢邪盡即止如邪未盡第二服加大黃二錢又未盡第三服加大黃一錢此先急而後緩是裡之裡也宜速下之

汗 非脈浮不可發汗 太陽症非頭痛項強不可發汗 非身熱惡寒不可發汗

其脈微弱或尺脈遲者不可表 其人當汗而衄血者不可表 壞病者不可表 婦人經水適來者不可表 風溫者不可表 濕溫者不可表 虛煩者不可表 病人腹間左右上下有築觸動氣者不可表

曾經發汗若吐若下若溫病仍不解者為壞病 脈尺寸俱浮頭痛身熱常自汗體重其息必喘其形不仁默默但欲眠者為風溫 兩脛逆冷胸腹滿頭目痛苦妄言必多汗者為濕溫 與傷寒症相似但不惡寒身不疼痛脈不

寒者為虛煩 膈上下左右有動氣按之牢若痛者為動氣

太陽咽乾鼻衄淋漓小便不利皆不當汗已經發汗不得重發如無已上忌症雖經發汗邪氣未盡亦當重發之

當汗不汗則生黃其症為風寒所傷陽氣下陷入內而與寒水上行於經絡之間本當發汗以徹其邪醫失汗之故生黃也脾主肌肉四肢痠濕與內熱相合故生黃也 不當汗而汗為膏血之症燥火也當益津液為上而反汗以

亡之其毒擾陽之極則陰也故燥血畜于胃中也 當汗而發汗過多腠理開泄汗漏不止故四肢急難以屈伸也

非陽明之本病不可下陽明本病胃家實故也 非痞滿燥實不可下 非潮熱發渴不可下 非罵言親踈不

可下 非脈沉數不可下 非棄衣而走登高而歌如鬼狀不可下

脈浮者不可下 脈虛者不可下 惡寒者不可下 嘔吐者不可下 不轉矢氣者不可下 轉矢氣者小便清者不可下 大便堅小便數不可用承氣湯攻之 大便鞭小便少者未可攻 陽明病自汗出若發汗

小便自利者不可下 非往來寒熱者不可和 非脇肋急痛者不可和 非胃滿而嘔者不可和

太陽傳陽明其中或有下症陽明症反退而無熱與不渴却頭少陽症是知可解也 太陽症知可解者為頭不痛項不强肢節不痛則知表易解也 陽明症知可解者為無發熱惡熱則知裡易解也 少陽知可解者寒熱日

不移時而作邪未退也若用柴胡而移其時早移之于晏晏移之于早氣移之于血血移之于氣是邪無可容之地知可解也 可解之脈浮而虛不可解之脈浮而實浮而虛者只在表浮而實者知已在裏也汗多不解者轉屬陽明也 傷寒不頭痛知邪不在經若頭痛知邪在經也

六陽傳足傳手經則愈 陽中之陰水太陽是也為三陽之首能巡經傳亦能越經傳 陽中之陽土陽明是也陽明為中州之上主納而不出如太陽傳至此名曰巡經傳也 陽中之陽木少陽是也上傳陽明下傳太陰如太陽傳至此為越經傳 陰中之陰土太陰是也下傳少陽為順下傳少陰為逆如傳少陰為上下傳也如太陽傳太陰為悞下傳也 陰中之陽火少陰是也上傳太陽下傳厥陰為逆如太陽至此乃表傳裏也 陰中之陰木厥

傳厥陰為逆如太陽至此乃表傳裏也 陰中之陰木厥

可下 非脈沉數不可下 非棄衣而走登高而歌如鬼狀不可下

脈浮者不可下 脈虛者不可下 惡寒者不可下 嘔吐者不可下 不轉矢氣者不可下 轉矢氣者小便清者不可下 大便堅小便數不可用承氣湯攻之 大便鞭小便少者未可攻 陽明病自汗出若發汗

小便自利者不可下 非往來寒熱者不可和 非脇肋急痛者不可和 非胃滿而嘔者不可和

太陽傳陽明其中或有下症陽明症反退而無熱與不渴却頭少陽症是知可解也 太陽症知可解者為頭不痛項不强肢節不痛則知表易解也 陽明症知可解者為無發熱惡熱則知裡易解也 少陽知可解者寒熱日

不移時而作邪未退也若用柴胡而移其時早移之于晏晏移之于早氣移之于血血移之于氣是邪無可容之地知可解也 可解之脈浮而虛不可解之脈浮而實浮而虛者只在表浮而實者知已在裏也汗多不解者轉屬陽明也 傷寒不頭痛知邪不在經若頭痛知邪在經也

六陽傳足傳手經則愈 陽中之陰水太陽是也為三陽之首能巡經傳亦能越經傳 陽中之陽土陽明是也陽明為中州之上主納而不出如太陽傳至此名曰巡經傳也 陽中之陽木少陽是也上傳陽明下傳太陰如太陽傳至此為越經傳 陰中之陰土太陰是也下傳少陽為順下傳少陰為逆如傳少陰為上下傳也如太陽傳太陰為悞下傳也 陰中之陽火少陰是也上傳太陽下傳厥陰為逆如太陽至此乃表傳裏也 陰中之陰木厥

傳厥陰為逆如太陽至此乃表傳裏也 陰中之陰木厥

可下 非脈沉數不可下 非棄衣而走登高而歌如鬼狀不可下

脈浮者不可下 脈虛者不可下 惡寒者不可下 嘔吐者不可下 不轉矢氣者不可下 轉矢氣者小便清者不可下 大便堅小便數不可用承氣湯攻之 大便鞭小便少者未可攻 陽明病自汗出若發汗

小便自利者不可下 非往來寒熱者不可和 非脇肋急痛者不可和 非胃滿而嘔者不可和

陰是也上存少陰為實再傳太陰為自安

太陽六傳一太陽者巨陽也為諸陽之首膀胱經病若湯者自入于本也名曰傳本 太陽傳陽明胃土者名曰巡

經傳為發汗不盡利小便餘邪不盡透入于裏也 太陽傳少陽膽木者名曰越經傳也為元受病脈浮自汗宜用

麻黃湯而不用故也 太陽傳太陰脾土者名曰悞下傳為元受病脈緩有汗常用桂枝而反下之所致也常病腹痛四肢沉重 太陽傳少陰腎水名曰表傳裏為病急當

下而反不攻不發所以傳裡也 太陽傳厥陰肝木者為陰不至於首惟厥陰與督脈上行太陽相接名巡經得度

傳 有人病傷寒無汗惡風項既屈而且強予曰項強凡九若根湯症或問曰何謂凡九予曰凡九者如凡疾屈而強

也謝復古謂病人羸弱須憑凡而起候也蓋仲景論中極有難曉處振振欲擗地心中懊憹外氣拂鬱鬱胃不仁膈

內拒痛如此之類甚多成無己云凡九者凡為短項為不

動亦如之非若凡案之凡而可解也甚得仲景之旨

太陽病

發熱

惡寒

惡風

頭痛

項強

身疼痛

太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒 太陽病發熱汗出

惡風脈緩者為中風 太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱

自發陰弱者汗自出當審惡寒漸惡風漸發熱鼻鳴

乾嘔者桂枝湯主之 太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂

枝湯主之 太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗

出欲救邪風者宜桂枝湯 病人臍無他病時發熱自汗

出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯方

桂枝湯方 桂枝 芍藥 生姜各三 甘草二

大棗十二 右咬咀每服五錢水煎去香溫服須臾飲熱稀粥一盞

以助藥力令一時許遍身熱發汗者佳不可令如水

淋漓若一服便得汗勿再服 或無汗或小便數手足

冷者不可服活人云桂枝麻黃若夏月用加黃芩知母

石膏總不如陶尚文用羌活沖和湯為最穩

右桂枝湯許學士云有人病發熱惡寒自汗脈微弱而

浮三服湯而愈此方在仲景一百十三方內獨冠其首

令人全不用何也仲景云太陽中風陽浮而陰弱陽浮

者云至翕發熱宜桂枝湯此脈與症仲景說得其

明後人看不透所以不敢用也 假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒

也尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發汗也此謂

元氣受病而然也又曰陽微則惡寒陰微則發熱發汗

之使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所使也大抵陰

不足陽往從之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上

入陽中則惡寒舉此二端明白易曉何憚而不用桂枝湯

哉 太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者

麻黃湯主之 麻黃 去節先煮去 桂枝二 杏仁七十個

甘草一 右咬咀每服五錢水煎溫服覆取微汗不須歎粥有汗

者勿服

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉澀此為逆也傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者大青龍湯發之

大青龍湯方

麻黃去節 桂枝去 石膏碎

甘草炙 生薑切 大棗六 杏仁二十

右咬咀每服五錢水煎溫服取汗為度若汗周身潤止後服未汗可停待相次服盡不欲汗多恐亡陽故也若汗不止用溫粉撲之

溫粉方

白朮 藁本 川芎 白芷各等

右研為細末每末一兩入米粉三兩和勻撲周身止汗若汗過多恐亡陽遂厥逆惡風煩躁不得眠故宜以此粉止之

右中風脈當浮緩今反浮緊緩者大青龍症也

發熱惡風煩躁手足溫為中風候脈浮緊為傷寒脈是

中風見寒脈也寒多熱少不煩躁手足微厥為傷寒候脈

浮緩為中風脈是傷寒見風脈也蓋脈似桂枝反無汗病

似麻黃反煩躁是也

許學士云仲景治傷寒一則桂枝二則麻黃三則青龍桂

枝治中風麻黃治傷寒青龍治中風見寒脈傷寒見風脈

三者如鼎立人皆能言之而不曉前人處方用藥之意故

醫家多不用無足怪也且脈緩而浮者中風也按論惡

風漸漸惡寒翁發熱仲景以桂枝對之脈浮緊而滿者

傷寒也故頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡寒無汗而喘仲景以麻黃對之至於中風脈浮緊傷寒脈浮緩仲景皆以青龍對之何也予嘗深究三百若症候與脈相對無不應手而愈何以言之風傷衛氣也傷寒榮氣也榮行脈中衛行脈外風傷衛則風邪干陽陽氣不固發越而為汗是以自汗是表虛故仲景用桂枝以發其邪芍藥以和其血蓋中風則病在脈之外其病稍輕雖曰發汗持解肌之藥耳故仲景于桂枝症云令半身熱熱微似有汗不可如水淋漓病必不除是知中風不可大發汗汗過則反動榮血邪氣乘虛襲之故病不除也寒傷榮則寒邪入陰血而榮行脈中者也寒邪居脈中非特榮受病邪自內作則併與衛氣犯之久則浸淫及骨是以汗不出而熱齒乾而煩究仲景以麻黃發其汗又以桂枝甘草助其發散欲

將除內外之邪榮衛之病爾大抵二藥皆發汗以桂枝則發其衛之邪麻黃并榮與衛治之亦自有淺深也何以驗之仲景桂枝第十九症云病當自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不譁以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯又四十七症云發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出者欲救邪風宜桂枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和又第一卷云寸口脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗是知傷寒浮緊者榮衛俱病也麻黃湯中并用桂枝此仲景之言也至於青龍雖治傷風見寒脈傷寒見風脈之病然仲景又云汗出惡風者不可服之服之厥逆便有筋惕肉澀之症故青龍一症尤難用藥須是形症諦當然後可行故王震夫症止用桂枝麻黃

各半湯治之蓋慎之也

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

桂枝 芍藥 甘草 葛根 各二兩

生薑 大棗 各六兩

右咬咀每服五錢水煎溫服覆取汗

無汗者 太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

葛根湯方

葛根 芍藥 生薑 桂枝 各二兩

芍藥 甘草 大棗 各六兩

右咬咀每服五錢去查溫服覆取微汗為度

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯

桂枝二越婢一湯方

桂枝 芍藥 麻黃 甘草 各三兩

生薑 石膏 大棗 各六兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

脈微身 太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少又其人

不嘔清便欲自可一日二度脈微緩者為欲愈也脈微而

惡寒者此除陽俱虛不可更發汗更下更吐面色反有熱

色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃

各半湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝 芍藥 生薑 甘草 各二兩

麻黃 杏仁 大棗 各六兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

凡仲景稱太陽病者皆表症發熱惡寒頭項強痛也若脈浮大則與症相應宜發汗今見表症而脈反微不與症應故不可發汗但用一二各半湯等和之可也

太陽中 若太陽中暍發熱惡寒脈微弱手足逆冷而渴者白虎加人參湯方論見

太陽中 太陽六七日表症仍在脈微而沉反不結胃其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀血在裏故也抵當湯主之

抵當湯方

水蛭 虻蟲 桃仁 大黃 各十枚 炒 去足翅 法足翅 去

右作一服水一盞煎溫服

太陽病身黃脈沉結小腹鞭小便不利者為無血也小便

自利其人如狂者血症諦也亦抵當湯主之

凡仲景稱太陽症脈沉者皆謂發熱惡寒頭項強痛而脈反沉也其症兼發狂小腹鞭者為畜血此條抵當湯是也

太陽濕 煎關節痛小便不利身黃者為濕痺

太陽症 兼卒口噤背反張者為瘧若無汗惡寒名剛症宜葛根湯

若有汗不惡寒名柔瘧宜瓜蒌桂枝湯

太陽陰 病發熱頭痛脈反沉若不瘥身麻痺痛當救其裏宜四逆湯方見

少陰病但欲寐始得之發熱脈沉者麻黃附子細辛湯

麻黃附子細辛湯方

麻黃 附子 細辛 各二兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

右吹咀每服五錢水煎溫服

凡仲景稱太陽病不惡寒者皆謂發熱頭項強痛脈浮而反不惡寒也其証兼渴者為溫病兼汗出者為柔瘧

傷寒六七日發熱微寒肢節煩疼微嘔心下支結外症未去者柴胡加桂枝湯主之

柴胡加桂枝湯方

柴胡一兩 桂枝一兩 黃芩 人參

芍藥 生薑各半 半夏四 大棗三

甘草炙三

右吹咀每服五錢水煎溫服

凡仲景稱表不解者皆謂太陽病發熱惡寒頭項強痛脈浮也蓋病雖屬太陽表症而有裡証兼之者則不言

太陽病但稱表不解也其蕪心下支結者此條柴胡桂枝湯是也

兼心下有水氣乾嘔而欬者小青龍也 蕪腸痛手足溫而渴者小柴胡也 兼心下痞者先用桂枝解表後以瀉心攻痞也

兼下利腹滿脹者先以四逆溫裏後以桂枝攻表也

太陽病欲解時從巳至未解 太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解陰脈微者

下之而解若欲下之調胃承氣湯主之 太陽病浮脈發熱身無汗自切者愈

太陽外症未解不可下之下之為逆欲解外者宜桂枝湯主之

海大小調胃三承氣湯必須脈浮頭痛惡風惡寒表症盡

罷而反發熱惡寒諸語不大便方可用之若脈浮

必結胃若脈浮緩下之必痞氣

許學士云常記一親戚病傷寒身熱頭痛無汗大便不通已四五日予訊問之醫者治大黃朴硝等欲下之予曰子

姑少待予為視之脈浮緩居密室中自稱甚惡風予曰表症如此唯大便不通數日腹且不脹別無所苦何遽便下

之大抵仲景法須表症罷方可下不爾則邪乘虛而入不為結胃必為熱利也予作桂枝麻黃各半湯繼以小柴胡

藥漿汗出大便亦通而解 仲景云凡傷寒之病多從風寒得之始則表中風寒入裏則不消矣擬欲攻之當先表

解乃可下之若表已解而內不消大滿大堅實有燥糞者自可除下之雖四五日不能為礙也若不宜下而便攻之內虛熱入為挾熱自利煩燥之變不可勝數輕者困篤重

者必死矣 原本正文重疊字刪正此段其理甚明大抵風寒入裏不消必有燥糞或大便堅秘須是脈不浮不惡風表症罷乃可下之大便雖四五日不通亦無害若不顧

表而下遂為挾熱利也

表裏發熱

發熱惡寒脈浮者屬表即太陽症也 方論見前 發熱汗出不惡寒反惡熱者屬裏即陽明症也 方論見陽 發熱

脈弦細頭痛者屬半表半裡即少陽症也 方論見口 發熱而嘔者小柴胡湯 發熱欬嗽表不解者小青龍湯

蕪腸痛喜嘔者小柴胡加乾姜五味子湯 發熱而喘表不解者小青龍去麻黃加杏仁湯 蕪腸瀉者麻黃湯 發熱口渴渴有屬表者有屬裏者治法方論甚眾

發熱汗解半日許復煩躁脈浮數大者可更發汗

汗後發熱汗後惡風寒者虛故也不惡寒但惡熱者實也當和胃

氣宜調胃承氣湯 太陽病三日發汗不解蒸熱者

屬胃也調胃承氣湯主之 海藏云大黃黃芩芒硝甘草

調胃承氣湯方 大黃一兩海藏云宜酒浸蓋邪氣居高非酒不到

右吹咀水一盞煮大黃甘草至七分去渣入芒硝更上

火微煮令沸溫服 發熱汗出不解心下痞硬嘔吐而利者大柴胡湯

發汗後身灼熱脈浮汗出身重多眠身熱者風溫

發汗後仍發熱心憊頭眩身潤動振欲擗地者宜真武

湯 汗出熱不去內拘急四肢疼下利脈逆惡寒者

宜四逆湯 汗出熱不去內拘急四肢疼下利脈逆惡寒者

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而

反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈桂枝

湯主之 汗下後仍頭痛發熱心下滿小便不利者桂枝

去桂加茯苓白朮湯 大下後身熱不去心中結痛

者梔子豉湯主之 大下後身熱不去微煩者梔子

乾姜湯 陽明病下之其外有熱手足溫心中懊憹

飢不能食但頭汗出者梔子豉湯

太陽病當惡寒今自汗出不惡寒發熱脈細數者以

吐之過也一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之

者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致為小逆

瘵後更熱者小柴胡湯脈浮者以汗解脈沉者以下解

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

白虎湯方 知母三 甘草一兩 粳米三 石膏八兩

右吹咀每服五錢水煎溫服 脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯

逆汗出熱不去者四逆湯 少陰病下利清穀脈遲裏寒外熱者通脈四逆湯

身熱手足逆冷而脈虛當發者為中暑 傷寒表不解乾嘔發熱而咳下利者小黃龍去麻黃加羌

花湯 太陽與陽明合病必下利其症頭痛腰痛身

熱鼻乾脈浮大而長者宜葛根湯 發熱下利脈微

遲脈逆者通脈四逆湯 太陽與少陰合病自下利其症

頭寒胃滿往來寒熱脈浮大而弦者宜黃芩湯 下利清穀脈沉遲其人面赤微熱而厥者必鬱汗出自

解 發熱下利厥逆不得則者死 發熱而利汗不止者死

發熱吐利心下痞硬者大柴胡湯渴者五苓散不渴者理

中湯 發熱經水適來適斷小柴胡湯刺期門 發熱脈

病甚者為五十九刺穴見溫

太陽病發熱續法

此篇集丹溪游藏諸賢治傷寒皆以補養兼發散之法實本經成敗倚仗生於動動而不已則變作及風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人之旨也蓋凡外傷風寒者皆先因動作煩勞不已而內傷於虛然後外邪得入故一家之中有病者有不病者由虛則邪入而病不虛則邪無隙入而不病也是故傷寒為病屬內傷者十居八九後學無知舉世皆謂傷寒無補法但見發熱不分虛實一利下汗而致天橫者滔滔皆是此實醫門之罪人也今集此法於仲景之後其應如響使人遵之不犯虛虛實實之戒也

入醫學綱目卷三

補中益氣湯加發散藥傷內傷者十居八九其法邪之所奏其氣必虛只用補中益氣湯中從所見之症出入加減氣虛甚者少用附子以行參朮之氣補中益氣湯方見治發熱內傷之病專主東垣內外傷辨其詳世之病此者為多但有挾痰挾外邪者鬱熱於內而發者皆以補元氣為主宜看其所挾而兼用藥

一男子素嗜酒因暴風寒衣薄遂覺倦怠不思飲食半日至睡後大發遍身疼痛如被杖微惡寒天明診之六脈浮大按之豁然左為甚予作極虛受風寒治之人參為君黃芪白朮歸身為臣蒼朮甘草木通乾葛為佐使大劑與之至五貼後通身汗如雨凡三易被得睡覺來諸症悉除

- 白朮 陳皮 乾葛 蒼朮各三
- 人參 川芎各錢 黃芪 歸身

木通各一 甘草五分

右分三貼水煎服

盧兄年四十九歲自來大便下血脈來沉遲滿面黃神倦者二年矣九月間因勞倦發熱自服參蘇飲二貼熱退早起小勞遇寒兩手背與面紫黑昏什少時却醒身大熱安語口乾身痛至不可眠脈之三部不調微帶數重取虛謬左手大於右手以人參二錢半帶飾麻黃黃芪各一錢白朮二錢當歸五分與三五貼得睡醒來大汗如雨即安兩日後再發脇痛欬嗽若睡時嗽不作而妄語且微惡寒診其脈似前而左略帶緊予曰此虛再感寒也再以前藥加半夏茯苓至十餘貼再得大汗而安後身倦不可久坐不思飲食用補中益氣去涼藥加神麩半夏砂仁五七十貼而安

入醫學綱目卷三

一丈夫因勞倦發熱甚倦不可以傷寒治之用

- 人參四錢 白芍藥 陳皮 當歸各三
- 黃芪三錢 蒼朮二錢 木通一錢 甘草少
- 右分三貼水煎服
- 一丈夫發熱五日倦甚略渴得洪脈不甚數略重則散大此內傷症也用
- 白朮二錢 人參 陳皮 柴胡各錢
- 黃芪 蒼朮各一 木通六分 甘草少
- 右分二貼水煎服
- 一丈夫倦甚口乾發熱汗不出用
- 陳皮三錢 人參 白朮 蒼朮各二
- 乾葛半錢 黃芪 木通各一
- 右分二貼水煎服

一丈夫發熱振暈倦意口渴

人參 白朮 白芍 柴胡各二

陳皮三錢 黃芪一錢 木通三錢 甘草少

右分四貼水煎熱飲

王孺人因辛苦發熱

芍藥五錢 白朮三錢 人參 當歸各二

陳皮一錢 川芎 甘草 木通各錢

右分四貼水煎溫服

第四女發熱冒風冷

麻黃 人參各五錢 蒼朮一錢 甘草少

右水煎服溫

右十方皆補養中氣兼發散之劑

杭州葉君章臘月因齋素中飢而胃寒作勞遂患發熱頭

醫學綱目卷三十一

三十一

痛醫與小柴胡湯遂自汗神昏耳聾目不見物予診其脈大如指似有力熱不退與人參黃芪白朮熟附炙甘草作大劑之一日而汗少二日而熱減半耳微有聞目能視物初用藥至四貼前藥中加蒼朮與兩服再得汗而熱除本自法去蒼朮附子又與前藥作小劑服三日而安 呂仲修年六十六歲正月間因忍飢胃寒作勞頭疼惡寒發熱骨節皆疼無汗至次日妄語熱愈甚而妄語時止時作熱亦不為十分自服參蘇飲兩貼汗不出又再進一服以衣覆取汗大出而熱不退至第四日子診其脈兩手皆洪數而右為甚此因飢而胃寒加之作勞陽明經雖受寒氣不可攻擊當急以大劑補之以回其虛俟胃氣充實自能出汗而解遂以參芪白朮歸身陳皮炙甘草每貼加熟附子一片一晝夜服五貼至第三日口稍乾言語有次諸症雖

解而熱未退遂去附子加白芍又兩日思食却作肉交與之及三日精神全二日許自汗出而熱退診其脈不數洪脈却尚有些洪脈作大脈論年高而誤汗此後必有虛症見又與前藥至次日言我大便自病來不曾更衣今穀道通痛坐勢青狀如不堪嚙者必欲投大黃巴豆等劑予謂大便非實秘為是氣因誤汗而虛不得充腹無力可勞仍與前補藥以肉粥及養榮與之一日半煎濃商散湯浸下膝方下大便軟塊者五六枚診其脈仍舊大未欬此因氣血未得回復又與前藥兩貼經兩日小便不通少腹下妨悶頗為所苦但仰臥則點滴而出予白補藥服之未盡於前藥內倍加參芪大劑服兩日小便方利而安 陶明節年十九歲不憚勞動不息農作忽一日因勞倦大發熱而渴恣飲冷泉水數碗次日熱退日不識人言語謬誤自言肚痛不能轉側飲食不進身戰掉不自持又二日求予診之兩手濇大而右為甚遂於氣海灸三十壯用白朮二錢黃芪二錢熟附一片陳皮五分與十貼不効又增發熱微渴餘症仍在却可進二匙稀粥予曰此氣欲利而血未應也於前藥內去附子加當歸以和血因有熱加人參一錢半服三十貼而安 黃芪湯治傷寒兩感初起三焦氣虛自汗及手足汗出或于背偏多或肢膝振搖腰腿沉重而赤日紅但欲睡眠頭而壯熱兩脇熱甚手足自溫兩手心熱自利不渴大便或難或如常度或口乾咽燥或渴飲湯不欲飲水或少飲飲水嘔噦間作心下滿悶腹中疼痛或時喜笑或時悲哭或時太息或時語言錯亂疑作謔言狂語者非也神不守舍耳始得病于寤寐之間或恐悸頭項不甚痛行步只

醫學綱目卷三十一

三十一

如舊此陰盛陽虛之故也兩手脈浮沉不一或左或右往來不定有沉瀟弱微弦五種陰脈形狀按之全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脈也宜先緩而後急緩宜用黃芪湯

黃芪湯方

人參 生姜 黃芩 白茯苓

白朮 白芍藥各一 甘草七 嘔者加藿香

陳皮各五 甚者加乾姜錢一

右咬咀水煎量症加減多少用之 如大便秘結者調

中丸主之

調中丸方

人參 白朮 白茯苓 乾姜

甘草各等

右為末煉蜜丸每兩一十九或五丸每服一二九水少許煎服若病急者黃芪湯每服加乾姜一錢大便結者

理中丸主之

理中丸方

人參

白朮

乾姜炮烈熱以生薑代之

甘草炙

右等分為末煉蜜丸每兩作五丸白湯化下先緩後急也若尤急者無汗宜附子乾姜甘草湯若自汗者宜白朮附子甘草湯量脈症可於四逆湯或真武湯或通脈

四逆湯選用之

四逆湯選用之

馮內翰姪櫟年十六病傷寒日赤而煩渴脈七八至醫欲承氣湯下之已煮熟矣偶東垣從外來馮告之故東垣切脈大駭曰幾殺此兒彼以脈數為熱今脈七至是極熱

也殊不知至真要大論云病有脈從而病反者何岐伯對曰脈至而從按之不鼓諸陽脈皆然此陰盛格陽於外非熱也取姜附來吾以熱因寒用之法治之治藥未就而病者爪甲已青頓服八兩汗漸出而愈

右七法補兼發散隨所見症加姜附甚者熱附微者乾姜又甚者姜附兼施皆反治法也

盛孺人年四十歲外冷內熱身疼頭痛倦忘脈虛微瀼

川芎 柴胡 芍藥各半 羌活

黃柏各二 南星 甘草各三

右分兩貼生薑三片水煎熱服

沈村妻年五十餘滿身骨節痛半日以後發熱黃昏至半夜却退

蒼朮 陳皮 羌活各一 白朮錢

木通 炒栢 通草各五

右咬咀水煎溫服

丁親家於久瘧後暑月泝水又勞苦腿臑痛漸漸渾身痛脇亦痛發熱脈却瀼不甚數予以此勞倦乏力治用

白朮 黃芪 蒼朮 陳皮各一

人參 黃柏各五分 木通各二 甘草各二

右咬咀水煎下龍骨九

小阿婆午後發熱遍身痛血少月經黑色大便閉用

芍藥 黃芩 蒼朮各三 黃柏炒

木通各二

右咬咀水煎服

右四方兼補發散隨所見脈症加炒栢龍骨皆正治法也

陳小娘年二十發熱目閉開口則熱甚湯思水解服濁瀉此食痰也治用

黃芩 甘草 木通各五 陳皮

白朮 乾葛各一 黃連 桔梗各六

右咬咀水煎下保和丸二十九

一丈夫因恐發熱心不安用南星白茯苓各五錢朱砂二錢已上為六貼再用

人參 當歸 柴胡各三 黃芩

川芎 木通各二 甘草 紅花各五

右分四貼水二盞半入金銀器同煎至一盞去香熟調服

右二方兼補發散隨所見症加食積痰熱

神木湯治內傷冷飲外感寒邪無汗者

六書學綱目卷之

蒼朮制 防風各二 甘草炒

右咬咀加葱白生姜同煎服如太陽症發熱惡寒脈浮而緊者加羌活二錢 如太陽症脈浮緊中帶弦數者

是無少陽也加柴胡二錢 如太陽症脈浮緊中帶洪者是無陽明也加黃芩二錢 婦人服者加當歸或加木

香湯或加葶本湯各一錢 如治吹如煎成調六一散三五錢神効

神木湯 加減例

又神木湯六氣加減例 太陽寒水司天 加羌活桂枝餘歲非時變寒亦加冬亦

加 陽明燥金司天 加白芷升麻餘歲非時變涼濕亦加秋亦加

少陽相火司天 加黃芩地黃餘歲非時變雨濕亦加夏

亦加 太陰濕土司天 加白朮葶本餘歲非時變熱濕亦加夏

末秋初亦加 少陰君火司天 加細辛獨活餘歲非時變熱亦加春末

夏初亦加 厥陰風木司天 加川芎防風餘歲非時變溫和亦加春

亦加 已上神木湯六氣加減法非止為司天之氣設也至於

歲之主氣與月建日時同前應見者皆當隨所見依土

例加減之按海藏此論與戴人云病如不是當年氣看

與何年運氣同便向此中求妙法方知皆在至其中之

六書學綱目卷之

者治變氣之法也戴人所謂看與何年同氣求治法者

亦治變氣之法也能將二公之法擴充行之則內經運

氣之本義燦然矣夫內經論運氣有常氣有變氣常氣

者有定紀如其年屬其氣司天當寒其年屬其氣司天

當熱是也變氣者無定紀如其年屬其氣司天當寒反

變熱當熱反寒是也王氏註文釋以經無定紀之變氣

作有定紀之常氣使後學皆以年歲占運氣而其應者

十無一二是以人莫之信而其道湮晦久矣二公生於

數千百年之後復啓其端而續之與程朱續孔孟不傳

之緒同功也今僕謹於海藏逐年司天加藥之後伸餘

歲變常之義其意有不盡者別述運氣類註定之同志

之士幸究心焉 白朮湯治內傷冷物外感風寒有汗者

白朮用蒼朮 防風各一兩 甘草炙 一兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎至七分溫服一日止一二服待二三日漸漸汗少為解

又白朮湯治傷寒上解三陽下安太陰

白朮如汗之改 防風各一兩

右咬咀水煎至七分溫服用後方加減 若發熱引飲者加黃芩甘草 頭疼惡風者加羌活散三錢羌活一兩半川芎七錢細辛二錢半去 若身熱目痛者加石膏湯四錢石膏二錢知母半兩白芷七錢 腹中痛者加芍藥湯三錢芍藥一兩桂枝半兩 往來寒熱而嘔者加柴胡散三錢柴胡一兩半夏半兩 心下痞者加枳實一錢 若有裏症加大黃一錢量虛實加減之邪去止服

禁古以謂有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝然春夏汗孔疎雖代麻黃有汗不當服桂枝宜用黃芪湯和餅之秋冬汗孔閉雖無以黃芪湯不當服麻黃宜用川芎湯和餅之春夏有汗脈微而弱惡風惡寒者乃太陽症秋冬之脈也宜用黃芪湯無汗亦用川芎湯秋冬有汗脈盛而浮發熱惡熱者乃陽明症春夏之脈也宜用黃芪湯無汗亦用川芎湯大抵有汗皆宜黃芪湯有汗則能止之

白朮 黃芪 防風各等
右咬咀每服五七錢至一兩水煎溫服汗多惡風甚者加桂枝
川芎湯無汗則能發之
川芎 蒼朮 羌活各等

醫學綱目 卷三〇

右咬咀每服五七錢至一兩水煎熱服無汗惡風甚者加麻黃一二錢

法云五臟之脈寸關尺也今止寸尺陰陽也若陽緩而陰急表和而裏病陰緩而陽急裏和而表病

黃芪建中加當歸湯治發熱頭疼脈浮數而尺中遲弱者宜先服此藥補血却與麻黃桂枝輩

黃芪 當歸各兩 白芍 桂枝

右咬咀每服五錢姜三片棗一枚水煎日三夜二服如脈尚沉遲再進一服

有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若未瘥則其變不可勝言故立此法使不犯三陽禁忌解表神方

九味羌活湯治濕熱惡寒無汗脈浮緊者宜用此湯以代麻黃

羌活 獨活 蒼朮 白朮 細辛 川芎 生薑 炙甘草 黃芪

防風 細辛 蒼朮 白芷 甘草

已上九味雖為一方然亦不可執執中無權猶執一也

當視其經絡前後左右之不同從其大小輕重之不一

增損用之其効如神用咬咀水煎服若急欲汗者須熱

服以羹粥投之若緩欲汗者溫服而不用湯粥投之

脈浮而不解者先急後緩脈沉而不解者先緩後急九

味羌活湯不獨解利治雜病神效如中風行經者加附子中風秘澀者加大黃中風并三氣合痛等症者各隨十二經絡上下內外寒熱溫涼四時六氣加減而瀉用之煉蜜丸亦可加生地各半治傷寒兩感如神用豆淋酒治破傷風

解表維和鮮四時傷寒混解六經不犯禁忌大白木湯

白朮 石膏 防風 羌活 各二錢

黃芩 白芷 知母 甘草 各一錢

枳實 細辛 各半錢

右咬咀每服半兩水煎溫服未解更一服春倍加防風羌活夏倍加黃芩石膏季夏淫雨倍加白朮白芷秋加桂五錢冬加桂八錢或一兩

五積散治陰經傷寒脾胃不和及感寒邪

入醫學綱目卷三

羌

白茯苓 厚朴 芍藥 當歸

麻黃 半夏 乾姜 人參

川芎 甘草 白芷 枳殼

陳皮 蒼朮 枳實 肉桂

右除枳殼肉桂外餘並為粗末於大鍋內文武火炒令黃熟不至焦用紙攤在板上候冷入枳殼肉桂末和勻入磁盆內每服二錢水一盞姜三片同煎服若傷寒意

白一莖豈豉七粒同煎連服取汗若脾胃不和內傷冷物渾身疼痛頭昏無力胃膈不利飲食不下氣脈不和四肢覺冷或睡裏虛驚至晚心躁困倦即入鹽少許同煎若陰經傷寒手足逆冷及虛汗不止脈細疾面青而嘔更宜加附子同煎加減多少並在臨時消息之

補珍方 無人參

參蘇飲治內外感一切發熱主藥又云前胡葛根自能解肌枳殼陳皮自能寬膈大治中焦滿痞凡有熱不得拘其所見小兒室女尤宜服之

前胡 枳殼 陳皮 甘草

桔梗 木香 人參 紫蘇

乾葛 半夏 茯苓 各八分

右咬咀每服四錢用水一盞生薑五片棗一枚煎服不拘時若素有痰者候熱退以二陳六君子湯間服

右方治痰飲停積中脘閉塞眩暈嘈煩怫悒逆及痰飲中人停留關節手脚痺曳口眼歪斜半身不遂食已則嘔頭疼發熱狀如傷寒者悉治之 一法用此藥三

兩加四物湯二兩合和名茯苓補心湯大治男子婦人虛勞發熱或五心煩熱并衄血吐血便血及婦人下血

入醫學綱目卷三

單

過多致虛熱者並宜服之或因用心太過發虛熱者及往來寒熱者用之神效

柴胡散治邪入經絡體瘦肌熱推陳致新解利傷寒時疫中腸伏暑

柴胡 枳實 甘草

右咬咀水煎食後熱服此藥冬月可以潤心肺止咳除痰熱春夏可以禦傷寒時氣解毒居常不可缺者且倉卒可以易得長幼皆宜服之

山 胃感用帶根蔥煎湯嚼生薑得汗愈

右六方通詳諸表方元氣不虛者服効

第二方熱多者宜服之

第三方寒多者宜服之

第四方痰飲者宜服之

第五六方倉卒宜備之

治傷寒外症全是下症大熱而脈反細不可下者瀉心湯主之方見傷寒脈有力者黃連瀉心湯
人參散治傷寒汗下後餘熱不退或煩或渴面赤者
人參 山梔 藍葉 甘草
白藜皮各等分

右吹咀每服五錢水煎服

雜合病 治不必先理 發熱得之感胃明是外合之邪已得浮數之脈而氣口又緊盛明為食所傷病者又倦怠脈重按俱有謔意而胸膈痞滿間引兩脇其脈輕取又似平弦此又平昔多怒肝邪之所為也細取左尺大細沉弱此又平時房勞之過也治法宜以感胃一節且放後先視其形色之強弱厚薄且以

補中化食行滯清涼胃火而以姜辣行之則中氣稍回傷滯稍行津液得和通軀得汗外感之邪自解醫者不肯詳審求之只顧表散外邪又不推究兼見之邪脈亦不窮問所得之病因與性情之執着巧施雜合治法將見正氣自虛邪氣愈固皆拙工之過也

發熱惡寒近似傷寒者有五種脈浮而緊其人發熱而寒者有惡寒者傷寒之候也脈浮而數其人發熱惡寒或有痛處是欲為癰癤也脈浮按之反濇其人發熱惡寒或胸實而嘔吐者此是傷食也脈浮而滑其人發熱背寒或頭眩而嘔吐此是風痰之症也脈浮而弦其人發熱惡寒或思飲食此是欲化癰疾也能辨其脈又能驗其症斯無誤矣
傷寒與雜症相似不可差 夫傷寒表症發熱惡熱者有三而渴與下雜症同但頭痛身熱目痛鼻乾不得臥白虎主

之乃陽明經病也正陽陽明氣病脈洪大先無形也雜病裏症發熱惡熱而渴但目赤者病臟也手太陰氣不足不能管領陽氣也宜以枸杞生地熟地之類主之脈洪大甚則嘔血先有形也

氣病在裏誤用血藥無傷也為安血而益陰也 血病在裏誤用氣藥如白虎湯者非也為瀉肺而損陰也

辨誤服白虎變症 昔西臺椽葛君瑞二月中病傷寒發熱以白虎湯主之病者面黑如墨本症遂不復見脈沉細小便不禁東垣初不知也及診之曰此立夏以前誤服白虎白虎大寒非行經之藥止能寒臟腑不善用之則傷善氣本病曲隱於經絡之間或投以大熱之藥求以去陰邪他症必起非所以救白虎也可用溫藥升陽行經有難者曰白虎大寒非大熱何以救君之症奈何東垣曰病隱

經絡間陽道不行而本症見矣又何難哉果如其言而愈

大煩熱不止晝夜無度用八關大刺赤眼 熱無度不可止宜陷谷出血

遍身發熱如火狂言妄語氣虛者補手三里氣實者瀉足三里

傷寒胃熱不已 大杼五分 風門七分 中府以手刺入二分 缺盆分

傷寒胃熱不已 中腕瀉 上廉分 下廉分 三里

傷寒四肢熱不已 雲門五分 肩髃 委中 腰膈

傷寒大熱不退 曲池瀉 絕骨補

傷寒熱退後再發熱 風門 合谷 行間 絕骨

惡寒

病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也
惡寒者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也
無熱惡寒脈浮屬太陽方論甚重並見發
惡寒脈微而復利者亡血也四逆加人參湯主之
王叔和
原入霍

四逆加人參湯

人參 乾姜 甘草各一 附子一枚去

右咬咀每服五錢水煎溫服日三

少陰病惡寒身倦而利若利止手足溫者可治利不止手足逆冷者不可治
方論見

少陰病惡寒身倦時煩欲去衣被者可治四逆無脈不煩而躁者死
方論見

八醫學綱目卷三

惡寒手足逆冷若兼大汗拘急下利四逆湯方論見

若兼頭汗心下滿脈沉細大便鞭者小柴胡湯方論見

若夏月中暑脈虛而渴背惡寒者白虎加人參湯方論見

若口中和但欲寐者灸之宜附子湯

發汗後惡寒者虛也發熱發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

芍藥甘草附子湯方

芍藥 白朮各二 甘草三 桂枝四

附子一枚炮

右咬咀每服五錢水煎溫服

太陽病下後脈促胃滿者桂枝去芍藥湯主之

桂枝去芍藥湯方

桂枝去 芍藥 生薑各四 甘草一兩 大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

若微惡寒者去芍藥加附子湯主之
活人云芍藥味酸助去芍藥用辛甘之味發散毒氣也
去芍藥加附子湯方

桂枝 生薑各兩 甘草一 大棗六枚

附子半兩去

右咬咀水煎溫服每服五錢

傷寒汗下後心下痞而惡寒者表未解也先用桂枝湯解表用大黃黃連瀉心湯攻痞若痞而汗出惡寒者表已解也附子瀉心湯主之
方論見

陽明病胃家實若汗多發熱惡寒者表未解也未可與承氣湯方論見

傷寒脈浮汗出微惡寒小便數腳掣急者忌服桂枝湯方論見

八醫學綱目卷三

惡寒續法
大抵大陽病必發熱而惡寒不可過覆衣被及近火氣恐寒熱相搏脈道沉伏愈令病人寒不可過但去被撤火兼飲以和表之藥自然不惡寒矣若婦人惡寒尤不可近火惡寒氣入腹血室結聚針藥所不能治矣

惡風

發熱惡風為表虛屬太陽病方論見發熱發汗後遂汗瀉不止其症似風難屈伸但心下不痛用桂枝加附子湯方論見

惡風項強脇滿手足瀉渴者用小柴胡湯方論見

惡風續法

惡風項強脇滿手足瀉渴者用小柴胡湯方論見

惡風續法

惡風續法

惡風者見風至則惡矣必居密室之內... 然自舒惡寒者則不待風而自寒... 者是也活人云惡寒者不當風而自憎寒惡風者當風而憎寒也

頭痛

發熱頭痛惡風者屬太陽... 頭痛身熱小便赤者宜承氣湯... 在表也宜桂枝湯

小柴胡湯... 頭痛熱心下痞硬滿痛者... 間肺俞肝俞... 枝去桂加茯苓白朮湯

者宜十東湯... 頭痛乾嘔吐涎沫者用吳茱萸湯... 若表解汗出心下鞭引胸痛者用十東湯

頭痛發熱吐利者為霍亂... 而黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大能食者納藥鼻中則愈... 太陽病下之復脈細數者頭痛未止

一丈夫因浴冷水發熱頭痛脈緊此有寒濕也宜溫藥汗之

- 蒼朮 麻黃 乾葛 甘草
陳皮 川芎 芍藥 陳皮 半夏 白朮

蒼朮 人參 木通 甘草
分四貼姜水煎服
一婦人頭痛發熱而渴

白朮 陳皮 川芎 乾葛
木通 甘草
右分四貼水煎溫服

葛根白湯方
葛根 芍藥 知母 蔥白

右以水三升煎至一升熱服
若非大頭夜會中滿及發寒熱脈緊而大者即是腦上

有涎宜用瓜蒂末一錢煖水調下吐涎立愈
傷寒汗下後頭痛起目眩者宜獨活湯

防風 獨活 旋覆花 當歸
右咬咀姜水同煎服

傷寒熱病後頭痛不止者用石膏川芎湯
石膏 川芎

右咬咀每服五錢水煎服
太陽頭痛有汗桂枝湯無汗麻黃湯

陽明頭痛白虎湯
少陽頭痛小柴胡湯
太陰頭痛脈浮桂枝湯脈沉理中湯
少陰頭痛小柴胡湯
厥陰頭痛外傷本經桂

枝麻黃各半湯 嘔而微吐苦水者吳茱萸湯
太陰頭痛者必有痰也少陰頭痛者足寒而氣逆也蓋
太陰少陰二經雖不至頭然痰與氣逆壅於膈中則頭上
氣不得暢降而為痛也

如脈浮而頭痛過在手足太陽刺完骨京骨 如脈浮
而長過在手足陽明刺合谷衝陽 如脈浮而弦過在手
足少陽刺陽池丘墟風府風池此刺頭痛之法也

傷寒頭痛刺合谷 橫竹

項強

發熱惡風項強者屬太陽 方論見發熱 項強脇下滿苦
身熱惡風手足溫而渴者小柴胡湯 若下後不能食身

黃小便難者與柴胡湯必反重 方論見黃 若下後不能食身

太陽與少陽并病項強痛或眩冒時如結胃心下痞鞭

針灸

者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎勿發汗如發汗則謔語
脈弦五六日謔語不止當刺期門

太陽與少陽并病心下鞭頭項強而眩者當刺大椎肺俞
慎勿下之宜服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕發熱無

汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主

之 注云心下滿痛小便不利者成結胃小 濕家之為

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

芍藥 生薑 茯苓 白朮 各兩

甘草 大棗 六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服小便利即愈結胃亦項強

如柔痙狀者大陷胃丸主之

項強卒口禁背反張為瘥 方論

身體痛

發熱惡寒身軀痛者屬太陽病麻黃湯大青龍湯是也

若兼心下支結者柴胡桂枝湯 若兼下利清穀腹脹者

先以四逆溫裏後以桂枝發表 方論見發熱 若尺脈遲

者血少榮氣不足活人先以黃芪建中湯養其血俟尺脈

回却用柴胡等湯和解之 身體疼痛脈沉發熱頭痛不

瘥者四逆湯 方論見 若少陰但欲寐手足寒者附子湯

方論見 發汗後身軀痛脈沉遲者桂枝加芍藥生薑

人參新加湯主之

桂枝 人參 芍藥 生薑 各二

甘草 大棗 六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

身軀痛下利 方論見 身軀痛吐利為霍亂 方論見 身

軀痛手足寒若脈沉但欲寐者附子湯 方論見 若大汗

出熱不去內拘急自利惡寒者四逆湯 方論見 若夏月

中營脈虛而渴者白虎加人參湯 方論見 身痛如被杖

面目青咽痛者為陰毒升麻鳖甲去雄黃蜀椒湯 方論見

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺濕痺之候

小便不利便反快但當利其小便 方論見 濕家之為

病身盡痛發熱而煩身黃如熏可與麻黃加朮湯發其汗

慎不可以大劑攻之

麻黃加朮湯方

麻黃 桂枝 甘草 杏仁 各二

白朮 四兩

右咬咀先以水煮麻黃去沫入諸藥煎溫服覆取微汗

濕家病身上疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大

自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻寒納藥鼻中

第一〇二冊 續修四庫全書 醫家類

濕家其人但欲汗出背強欲得被覆向火若下早則噦曾
滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒渴欲得
水而不能飲則口煩躁也 濕家下之額上汗出微喘小
便利者死若下利不止者亦死

右濕痺活人書為中濕脈沉細為沉緩小便自利者木
附湯小便不利者甘草附子湯五茯苓散而不及麻黃加
木湯并納鼻蕪蓋麻黃納鼻皆是表藥而非脈沉緩之
劑故也

風濕相搏骨節煩疼掣痛不能屈伸近之則痛劇汗出短
氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主
之

甘草

白朮各一

桂枝二

附子炮

右咬咀水煎溫服作四劑活人云身腫者加防風一兩

傷寒八九日風濕相搏身疼體煩不能轉側不嘔不渴脈
浮虛而澀者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利
者去桂加白朮湯主之

桂枝附子湯方

桂枝二

附子炮

甘草六錢

大棗四

生姜切一

右咬咀每服五錢水煎溫服

白朮附子湯方

白朮三

附子一枚炮

甘草二兩

生姜兩

大棗六

右咬咀水三升煮一升分三服溫服一服覺身痒半日

許再服三服都盡其人如月狀勿怪即是木附並走
中逐水氣未得除故耳

病者一身盡疼發熱日晡而劇者多風濕此病傷於汗後
當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡湯

薏苡湯方

薏苡仁

麻黃各半兩去

甘草一兩

杏仁十枚去

右咬咀每服四錢水煎溫服有微汗者避風

風濕身重脈浮汗出惡風者防已黃芪湯身重

問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不
止醫云此可發汗汗之病仍不愈者何也答曰發其汗汗
大出者但風氣去濕氣在故不愈也 若治濕風者發其
汗但微微自欲汗出者風濕俱去也

防已黃芪湯方

麻黃湯法

風濕相搏一身盡痛者補中益氣湯加羌活防風升麻
藥本蒼朮治之如病去勿再服以諸風藥損人元氣而益
其病故也

神木湯治風濕惡寒脈緊無汗 白朮湯治風濕惡風

脈緩有汗但見續傷

右二木湯治風濕又當隨症加減其詳並見症條及白

朮神木二湯後

杏仁湯療風濕身疼痛惡風微腫

桂枝二

麻黃去節湯

芍藥

兩

生姜

杏仁二十五枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

麻黃復煎湯治陰室中汗出懶語四肢困倦乏力走症

疼痛乃下焦伏火不得伸浮而躁熱汗出一身疼痛蓋風濕相搏也以麻黃發汗漸發之在經者亦宜發汗况值季春之月脈緩而遲尤宜發之令風濕去而陽氣升困倦乃退血氣俱得生旺也

麻黃去節用水五盞先煎令沸去沫查再煎至三盞方入下藥 黃芪各二

白朮 人參 柴胡根 防風

生地各五 甘草三 羌活 黃柏各一

杏仁三個去

右以咀作一服入麻黃湯煎至一盞臨卧服勿飽服

當歸拈痛湯治濕熱為病身疼痛一身盡痛

本草卷之三十一

醫學綱目卷之三十一 傷寒部

陽明病 胃實不大便 自汗 不得臥
潮熱 譫語 狂亂 循衣摸牀
渴 嘔 乾嘔

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便胃中燥煩實大便難是也陽明之為病胃家實也問曰緣何得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便者此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明病也 傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陽太陽者身當發黃若小便利不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也 陽脈實因發其汗汗出多者亦為太過太過為陽絕於裏亡津液大便因鞭也

陽明病若能食為中風不能食為中寒 陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛也 陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱必噦也 陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸下之腹滿如故所以然者脈遲故也 陽明病欲解時從申至戌止 傷寒嘔多雖有陽明症不可攻也 陽明病面合赤色不可攻之攻之必發色黃小便不利也 陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈 傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也須當發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯 陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯 陽明病腸下鞭滿大便不利而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯

若上焦得通津液得下胃氣因和身灑然汗出而解
陽明中風脈弦浮大而短氣腹滿脇下及心痛久按之氣

不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱
時時噦耳前後腫刺之小瘥外不解病過十日脈續浮者
與小柴胡湯脈但浮無餘症者與麻黃湯若不小便腹滿
加噦者不治

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下
之則腹滿小便難也許學士云宜小柴胡湯 陽明腹滿脈浮緊口

苦咽乾而喘若發熱汗出不惡寒反惡熱身重者忌發汗
忌加燒針忌下也論見 陽明病脈浮而緊者必潮熱發
作有時但浮者必盜汗出

右胃家實不大便雖三尺之童亦知可下也殊不知仲
景之法雖有胃實症若表未解及有半表者亦先用桂
枝柴胡以解外然後視虛實消息之也

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬
不可攻之當須自欲大便時宜用蜜煎導而通之若土瓜
根及入指膽汁皆可導之

蜜煎導法

用蜜七合入銅器中微火熬稍凝似飴狀攪之勿令焦
候可丸以手捏作挺子令頭銳大如指長二寸許乘熱
急作之納穀道中用手急捺住欲大便時乃去之 又
猪膽汁方用大猪膽一箇瀉汁和醋少許和勻灌入穀
道中如飯時頃大便自去

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心
下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者
此轉屬陽明也小便數者大便必艱不更衣十日無所苦

也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散 陽
明病本自汗出醫更重發汗病已瘥尚微煩不了了者此
大便必艱故也以亡津液胃中乾燥故令大便艱當問其
小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不
久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必大
便也

陽明病潮熱不大便六七日恐有燥糞欲知之法少與小
承氣湯轉矢氣者有燥屎可攻若不轉矢氣者無燥糞不
可攻方論見 陽明病汗出大便艱而譫語者宜小承氣
湯方論見 不大便腹滿者宜下之若但遠臍痛者則為燥

屎宜承氣湯 若心下至小腹滿痛者則為結胃宜陷胃
湯方論見 陽明病不吐不下心煩者宜調胃承氣湯 陽
明病發熱汗出此為越熱不能發黃也但頭汗出身無汗

汗劑頸而還小便利渴飲水漿者此為瘧熱在裏身必
發黃茵陳湯主之 小便利大便乍難乍易有微熱喘
胃不臥者宜大承氣湯論見 陽明症其人喜忘者必
有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖艱大便反

易其色必黑宜抵當湯下之方論見 無表裏症下後脈數
不解消穀易飢六七日不大便者有瘀血宜抵當湯 傷
寒六七日目中不了了睛不和無長裏證大便難身微熱
者此為實也急下之宜大承氣湯 跌陽脈浮而濇浮則
強濇則小便數浮濇相搏大便難其脾為約麻仁丸主
之

麻仁丸丹波云氣實而表藥也

麻仁仁 芍藥 厚朴去心 枳實各四
杏仁 大黃各

右為末蜜和丸如桐子大米飲下二三十九未始益之
每日三服

於少不
陽明口燥但欲飲水不欲嚥者此必血虧而人云則則犀角
湯重則則犀角湯

許學士有一士人宋病二人皆旬日矣一則身熱無汗大
便不通小便如澁神昏而睡診其脈長大而實予用承氣

下之而愈一則陽明白汗大便不通小便利津液少口乾
燥其脈亦大而虛作蜜煎三易之下燥盡得濡利而解其

家曰昔陽明不通何以治之異予曰二症雖相似然自汗
小便利者不可蕩滌五臟為無津液也然則傷寒大症相

似兩症稍有不同宜仔細斟酌正如格局看命雖年月日
時皆同而貴賤窮通不相侔者於一時之中有淺深故知

不可不謹

陽明病發多反無汗其身如虫行皮中狀者此久虛故也

無汗者

虛邪

陽明病反無汗而小便利三日嘔而欬手足厥者必頭
痛若不欬嘔手足不厥者頭不痛

也 陽明胃實脈浮無汗而喘宜麻黃湯

明病無汗小便利心中懊懣者身必發黃宜茵陳蒿湯

脈浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日
當劇

脈沉而遲不能食身體重大便鞭名曰陰結也期十四日
當劇

少陰病但欲寐腹脹不大便者承氣湯主之

胃實續法

傷寒大便不通 期門章門 照海

海已寒丸治陰症服四逆數日不大便躁渴者

自汗

方見

陰論見但

陰論見但

成自汗者謂不因發散而自然汗出也

陽明外問曰陽明外症云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒何也答曰雖得之一
日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也問曰惡寒何故自罷

答曰陽明居中土萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自
止此為陽明病也 傷寒轉屬陽明者其人濇然微汗出

也

本太陽初得病時發其汗先出不微因轉屬陽明也 汗
出身熱不惡寒便難語者宜承氣湯

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

許有人患傷寒自痛鼻乾不得臥大便不通尺寸脈俱大
已數日一夕汗出予謂速以大柴胡湯下之醫駭曰陽明

自汗津液已涸法當用蜜煎何須苦用下藥予謂曰子雖

知蜜煎為穩當還用大柴胡湯此仲景不傳之妙公安能
知之予力爭竟投大柴胡湯二貼愈仲景論陽明之病多

汗者急下之人多謂已自汗若又下之豈不表裏俱虛
又如論少陰云少陰病一二日口乾燥者急下之人多謂

病發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈甚
舉此二端則其可疑者不可勝數此仲景之書世人罕能

讀也予謂仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏之
說凡稱急者有三變謂變汗未至津液乾燥便速下之

則為精捷免致用蜜煎也若胃中識得了了自無可疑若
未能了候用之反不若蜜煎之為穩也

陽明脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反
惡熱身重若發汗則心憤憤反譫語若加燒針必怵惕躁

不得眠若下則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者

和緩

和緩

和緩

和緩

和緩

和緩

和緩

和緩

和緩

和緩

和緩

和緩

梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯
主之若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

陽明病若中寒不能食小便利手足濇然汗出此欲作
瘕瘕必大便初鞭後溼所以然者以胃中冷水穀不別故
也

太陽病發熱汗出不惡寒者為柔痙
汗出不惡寒發熱關上脈細數曰小逆
汗出身熱不惡寒裏症前條陽明病是也 汗出身熱惡
風寒者宜桂枝湯 兼項強痛者桂枝加葛根湯

若夏月中暑自汗身熱惡寒脈微弱口渴渴足冷者白虎
加人參湯主之
傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之
汗出心下痞滿有二症其痞按之濡軟不痛而惡寒者宜
附子瀉心湯其痞按之鞭引脇痛而身體不惡寒者宜十
棗湯

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢急難以屈
伸者桂枝加附子湯主之

桂枝附子湯	附子	桂枝	生薑	甘草
大寒	附子	桂枝	生薑	甘草

右咬咀每服五錢水煎服
翻有一人得太陽症因發汗汗不止惡風小便滿足舉而
不伸予診其脈浮而大浮為風大為虛予曰在仲景方中
有兩症大同而小異一則小便難一則小便數用藥少差
即有千里之失仲景第七症云太陽發汗遂漏不止其人
惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯第十
六症云傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反
以桂枝湯攻表此誤也得之便數咽中乾煩燥吐逆一則
漏風小便難一則自汗小便數或惡風或惡寒病各不同
也予用第七症桂枝加附子湯三啜而汗止佐以甘草芍
藥湯足便得他

二陽併病太陽病發汗不微因轉屬陽明續自微汗出不
惡寒其人面赤燥煩短氣不知痛處但坐更發汗則愈

發汗已身灼熱者名風濕風濕為病脈浮汗出身重多眠
宜葳蕤湯

發汗後大出汗胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與
之

動氣在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤此為逆難治
汗下後汗出而喘者麻黃杏仁甘草石膏湯 下後利不
止脈促喘而汗出者葛根黃芩芍藥湯

汗出下利熱不去厥逆惡寒者四逆湯
汗出下利清穀者通脈四逆湯
其脈數自愈脈緊未愈
汗出不止者死

脈緊反汗出而喘痛吐利者少陰病亡陽 吐利汗出手
足厥冷脈微欲絕者四逆湯 吐利止汗出而厥脈微欲
絕者通脈四逆加猪膽汁湯方論並見吐利

脈陽微而汗出者為自和也汗出多者為太過 陽明汗
多而渴者不可與猪苓湯 脈浮自汗若小便數腳攣急
者不可與桂枝湯

自汗續法
瀉太陽自汗桂枝湯 陽明自汗白虎湯 少陰自汗四
逆湯

陽明症身熱日痛鼻乾不得臥不惡寒而自汗或惡熱而
尺寸俱浮者白虎湯主之 傷寒尺寸脈俱長自汗大出
身表如水石脈傳至于裏細而小及瘧疾但寒不熱其人
動作如故此陽明傳入少陰戊合癸即夫傳婦也白虎加

桂枝主之然脈雖細小當以遲疾別之此症脈疾而非遲
故用此法白虎加桂枝湯方見前如中

活傷寒應發汗而動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗出
筋惕肉瞤此為逆難治先服防風白朮牡蠣散次服建中
湯

防風白朮牡蠣散治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤
防風 牡蠣炒成 白朮各等分

右為細末每服二錢以酒調下米飲亦得日二三服汗
止後服小建中湯

或汗出髮潤與其出如油或大如貫珠着身出而不流
皆為不治之症
傷寒汗多不止內庭 合谷 復溜
二陽併病潮熱譫語而手足熱染汗出者陽明病短氣腹

瀉而手足澀然汗出者俱宜大承氣湯方論見 陽明病
不能食小便不利手足澀然汗出者胃冷欲作痼瘕必大
便初鞭後溏論見

身熱目赤鼻乾不得臥尺寸脈俱長者陽明受病也病人
小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥
屎也宜大承氣湯 汗後大汗出煩躁不得眠欲飲水者
少少與之愈論見 汗下後不得眠若反覆顛倒心中懊
懣者梔子豉湯方論見 若但晝不得眠夜安靜不嘔不渴
無表症脈沉微無大熱者宜乾薑附子湯論見

少陰病欲寐二三日後煩心不得臥者黃連阿膠湯主之
黃連 阿膠各一錢 芍藥一錢

右咬咀水二盞煎八分去渣納膠消盡又納雞子黃攪
勻溫服日三

少陰病下利欲寐六七日後咳而嘔渴心煩不得眠者宜
猪苓湯論見 少陰病但欲寐脈沉細不煩五六日變自
利煩躁不寐者死論見 發熱下利厥逆煩躁不得臥
者死論見

不得臥續法

傷寒吐下後心煩之氣日夜不得眠者酸棗仁湯主之
酸棗仁湯

酸棗仁一升 麥門冬去心 甘草炙 知母半斤

茯苓 川芎 乾薑各一兩

右咬咀每服四錢水煎服

傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不得眠者黃連解毒湯主之

黃連 黃芩 黃柏各半 山梔二錢

一方有阿膠二錢

右咬咀每服五錢水煎服如未知再服進粥以此漸瘥

傷寒瘥後虛煩不得眠心中懊惱者烏梅湯主之

梔子 烏梅 黃芩 甘草

柴胡

右咬咀每服四錢薑三片豉五十粒煎至七分去查溫

服一本有竹葉七片

潮熱

成潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一發指時而

發者謂之潮熱若日三五發者是即發熱非潮熱也潮熱

八寶

屬陽明必於日晡時發者乃為潮熱

陽明病潮熱大便微鞭可與大承氣湯不鞭者不與之若

不大便六七日恐有燥糞欲知之可少與小承氣湯入腹

中轉矢氣者此有燥糞乃可攻之若不轉矢氣者此但初

頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者

與之則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯

和之不轉矢氣者慎不可攻也

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其必重短氣腹滿而喘

有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便

已鞭也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也

其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣

湯微和胃氣勿令大泄下

陽明病胃實譫語而潮熱者承氣湯主之

大承氣湯 海藏云大承氣湯去積實泄滿苦硝散厚朴

大黃 酒浸一兩治大便燥實四逆全者方可用之

枳實 一兩治腹中轉矢氣內有積實

芒硝 一兩治腹中轉矢氣內有積實

右咬咀水二大盞煎枳朴至一大盞下大黃復煎至六

分去查入硝又煎一二沸溫服如未利再作與服以通

為度

小承氣湯 海藏云大黃泄實厚朴

大黃 酒浸一兩治大便燥實四逆全者方可用之

右咬咀同上法煎溫服以利為度不利再服 不大便

舌燥心下滿痛而日晡小有潮熱者宜大陷胸湯

陽明病發潮熱大便澹小便自利胸脇滿不去者小柴胡

湯主之 陽明病發潮熱大便澹小便自利胸脇滿不去者小柴胡

八寶

陽明中風脈弦浮大短氣腹滿腸下及心痛鼻乾不得汗

嗜臥身黃小便難時時噦而潮熱者小柴胡加茯苓主之

傷寒十三日不解胃腸滿而嘔日晡時發潮熱已而微

利此必柴胡症下之而不得利今反利者知醫以丸藥下

之非其治也潮熱者當也先宜小柴胡湯以解外後以柴

胡加芒硝湯主之

柴胡 黃芩 人參 甘草

生薑 半夏 大棗 芒硝

每服五錢水一盞半煎至八分去查納芒硝更微沸溫

服

陽明病脈浮緊者必潮熱發作有時

潮熱續法

活冬月陽明潮熱脈浮而緊者發作有時但脈澹者必盜

汗黃芩湯主之方見下刊

諸語

陽明為病胃家實是也胃實則譫語故譫語宜入陽明門
陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承
氣湯一盞腹中轉矢氣者更服一盞若不轉矢氣勿更與
之明日不大便脈反微澀者裏虛也為難治不可更與承
氣湯 陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎
五六枚若能食者但輒亦宜大承氣湯下之 二陽併病
太陽病罷但發熱手足絳絳汗出大便難而譫語者下之
則愈宜大承氣湯 陽明病其人多汗以津液出胃中燥
大便必輒輒則譫語小承氣湯主之若一服譫語止勿更
服

汗出譫語者必有燥糞在胃中此為風也須下之必過經

乃可下下之若早語言必亂以表虛裏實故下之則愈宜

大承氣湯夫實則譫語虛則鄭聲譫語者謂亂語無次第

發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語成無已

少陽病發汗後及小便數脚躄急誤與桂枝攻表後若胃

不和譫語者少與調胃承氣湯方論 三陽合病腹滿身

重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之

則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之論身重

汗發多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以

通津液後自愈發汗多又重發汗者亡其陽譫語脈短者

死脈自和者不死 諸逆發汗病微者瘥劇者言亂目眩

者死

形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴脈滿者必譫語弱

者發熱脈浮解之當汗出愈

太陽病火劫汗後身黃小便難身體枯燥頭汗腹滿微喘

或不大便久則譫語論見 太陽病二日反躁乃熨其背

而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振

慄自下利者此為欲解也故其汗從腰已下不得汗欲小

便不得反嘔欲失溲足下惡風大便輒小便當數而反不

數及多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故

也 少陽病欬欬而下利譫語小便難者被火氣劫汗故

也吐下汗溫鍼後譫語柴胡湯症罷者此為壞病知犯何

逆以法治之論見

胃滿譫語若下後煩驚小便不利身重不可轉側者柴胡

加龍骨牡蠣湯主之方論

陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門

隨其實滿之澹然汗出則愈 腹滿譫語脈浮緊者刺期

門論見

不止者宜刺期門論見

入血室若熱除脈遲者身涼胃滿如結胃狀者刺期門若

晝則明了暮則譫語者無犯胃氣及上二焦必自愈活人

以小柴胡湯主之論見

傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以承氣湯下

之若小便利者大便當輒而反下利脈調和者知醫以丸

藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為

內實調胃承氣湯主之若下利譫語者有燥屎也宜小承

氣湯方見

氣湯論見

氣湯論見

氣湯論見

氣湯論見

氣湯論見

氣湯論見

右下利謔語其曰脈調和而手足和小便利者陽也故用承氣下之其脈當微厥反少陰但欲寐被火氣劫汗謔語小便難者陰也故當用補劑和之但欲寐下利謔語

許有人病傷寒下利身熱神昏多困謔語不得眠或者見下利便以謔語為陰虛症予曰此亦小承氣症張曰下利而服小承氣仲景之法乎予曰此仲景之法也仲景云下利而謔語者有燥糞也屬小承氣湯而得解予嘗讀素問云微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從多從少視其事也帝曰何謂反治岐伯曰塞因塞用通因通用王冰註云大熱內結注瀉不止熱宜寒療結復須除以寒下之結散利止則通因通用也正合於此又何疑焉
直視謔語喘滿者死下利者亦死 謔語妄言身微熱脈

浮大手足溫者生逆冷脈沉細者不過一日死矣

謔語續法

素謔語者氣虛獨言也全文見註愚用參芪歸木等劑治

難脫陽者見鬼仲景謂亡陽

海黃芪湯治傷寒或時悲哭或時嬉笑或時太息或語言

錯亂失次世疑作謔語狂言者非也神不守室耳兩手脈

浮沉不一舉按全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脈也

甚者用調中九或理中九二方並見

丹浦江鄭兄年二十歲九月間發熱頭痛妄言見鬼醫與小柴胡湯數劑熱愈甚予視之形肥面赤帶白却喜筋骨稍露診其脈弦大而數實脈本不實涼藥所致此因勞倦成病與溫補藥自安遂以參朮為君芍芍為臣黃芪為佐

附子一片為使與二貼而症不減或曰服既數大狂熱而

又大渴用附子誤矣予曰此虛症而誤投寒涼之藥人肥而脈左大於右事急矣非加附子參朮焉能有急效再與一貼乃去附子作大劑與服至五十貼得大汗而愈自後

又補養兩月氣體方始平復 一人五月內患謔語大發熱肢體不能舉喜冷飲診其脈洪大而數用黃芪茯苓濃煎如膏却用涼水調與之三四服後病者昏睡如死狀但

顏色不改氣息如常至次早方醒諸症悉退而安 盧兄汗後再發熱妄言呂仲脩汗後熱不退亦妄言開明節熱退後不識人言語謬妄皆用參芪朮等補劑而愈信哉

謔語屬虛者十居八九

活大小便鞭手足冷脈微細者必鄭聲也當服溫藥白通湯海藏用黃芪加乾薑湯發熱下 候輔之脈極沉細

外熱內寒肩背胸脇斑出十數點謔言狂亂或曰發斑謔語非熱乎予曰非也陽為陰逼上入于肺傳之皮毛故斑

出神不守舍故錯語如狂非謔語也肌表雖熱以手按之須臾冷透如水與葛附等藥數日約二十餘兩得大汗而愈後因再發脈又沉遲三四日不大便與理中丸三日內

約半斤其病全愈以此知侯公之狂非陽狂之狂乃失神之狂即陰虛也

活大便秘小便赤手足溫脈洪數者必謔語也宜用調胃承氣湯

海治老幼及虛人傷寒五六日昏冒言妄小便或淋或澀起臥無度或煩而不得眠並宜百虎湯加山梔一錢

平治熱病及時疫心躁狂亂奔走狀似癩癩言語不定久不得汗及時疫不知人事者以人中黃不拘多少入確內

用泥封固武火煨半日去火候冷取出於地上以盆

狂亂

火劫汗後亡陽心驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆

壯礪龍骨救逆湯方論 汗家重發汗必恍惚心亂小便

已陰痛與禹餘糧丸方見

小腹痛發狂或身黃者宜抵當湯論見發熱

遺尿狂言目反直視者此為腎絕論見

狂亂續法

活病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脈實潮熱狂語如見鬼

狀此陽毒也治陽毒法見陽毒門表者陽毒

困治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋鵲石散

黃連 寒水石各等分

右為細末每服二錢濃煎甘草湯候冷調下

雲傷寒心風狂妄者宜防風黃連湯

黃連 大黃 防風 遠志

茯神各半

右為細末每服一兩水煎服

湖黃芪湯治傷寒或歌或笑或悲哭謔言妄語方見發

陳志仁傷寒狂妄每欲狂走四五人扶捉不定脈虛數用

柴胡湯反劇以參芪歸朮甘草陳皮煎湯一服狂定再服

安睡

傷寒發熱不識單卑 曲池 絕骨 百勞 湧泉

甲熱汗不出狂互引癩疾合谷主之

循衣摸床

傷寒若吐若下後不解不大便五六日至十餘日晡所

發潮熱不惡寒狂語如見鬼狀若劇者發則下識人循衣

摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發熱

譫語者大承氣湯主之若一服利止後服 太陽病以火

劫發汗陰陽枯竭虛燥或不大便久則譫語甚者至噦手

足躁擾捻衣摸牀小便利者可治論見

證有人病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩手撮

空直視喘急更數醫矣見之皆走此誠惡候得之者十中

九死仲景雖有症而無法但云脈弦者生瀉者死已經吐

下難以下藥設且救之若大便得通而脈弦者庶可治也

與小承氣湯一服而大便利諸疾漸退脈且微弦半月愈

或問曰下之而脈弦者生此何意也予曰金匱玉函云循

衣妄撮牀惕不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發

熱譫語者承氣湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋

衣領及捻物者肝熱也此症在玉函列於陽明部蓋陽明

者胃也肝有熱邪淫于胃經故以承氣瀉之且得效脈則

肝平而胃不受克此所謂有生之理諸仲景論不能博通

諸醫書以發明其隱奧吾未之見也海藏云許學士作尋

未疾此論論當然其若以為肝熱之極其

人必妄言亂語難經云脈邪入心主譫語

循衣摸牀續法

嘗治循衣摸牀者數人皆用大補氣血之劑惟一人兼膠

振脈代送於補劑中畧加桂二分亦振止脈和而愈

病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也論見不 服柴胡湯

已渴者屬陽明也以法治之 傷寒脈浮發熱無汗其表

不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎人參湯

主之渴欲飲水無表證者太陽在器轉屬陽明 服桂枝

湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱

時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人

參湯主之王註云若純在表則惡風無時傷寒無大熱

口燥渴心煩脈微惡寒者宜白虎加人參湯陽明病脈

浮緊口苦腹滿而喘若下後渴欲飲水口乾舌燥者白虎

人參湯主之

白虎加人參湯

石膏碎四 知母一兩 甘草一兩 粳米一合

人參二錢

右咬咀每服五錢水煎溫服

右白虎加人參五條治表渴脈洪小便利者

本有人初病嘔吐成爲醫者下之已七八日而內外發熱

人參湯

予診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下且重虛矣

白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八日不解熱結在

裏表裏俱熱者白虎加人參湯正相當也蓋始吐者熱在

胃脘而脈至今虛大三投湯而愈仲景既云傷寒者吐下

後七八日不解表裏俱熱者白虎加人參湯主之又云傷

寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎又云脈浮滑此

以表有熱裏有寒白虎加人參湯主之 固朝林億校正

謂張仲景於此表裏自差矣予謂不然大抵白虎能除傷

寒中渴表裏發熱故前後二症或云表裏俱熱或云表熱

裏寒皆可服之一種脈浮無汗其表不解全是麻黃與葛

根症安可行白虎也林億見所稱表裏不同便謂之差是

亦不思之過也

溫病湯 太陽發熱不惡寒而渴者爲溫病論見溫病活人歲時湯

而有大表解也太陽病者必頭痛身疼

表未解也此表裏兩在也

渴而下利屬少陰其病但兼欲寐小便白者四逆湯兼咳

嘔不得眠小便不利者猪苓湯兼自利純青色水者大承

氣湯有熱者白頭翁湯方論見

消渴氣上衝心寒飢不欲食食則吐或若下之則利不

止若欲飲水者少少與之愈論見

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者

少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者

五苓散主之 發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之

陽明病脈浮緊口苦腹滿發熱汗出不惡寒者下後脈浮

發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

五苓散方

猪苓二兩 澤瀉一兩 白朮三兩 茯苓二兩

桂枝半兩

右咬咀爲散每服三錢白湯調下海藏云五苓散當服

形亡必就陽明燥火成胃發黃故有謂胃承氣症不當

服而服之是爲犯本小便強利津液重亡而成血症輕

則桃仁承氣湯重

猪苓湯方

猪苓去 茯苓 阿膠 澤瀉

滑石各半

右咬咀每服五錢水煎溫服日三

渴而頭汗小便不利兼脇滿往來寒熱者柴胡桂枝乾薑

湯兼發黃者茵陳蒿湯

表不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽而渴者小青龍湯去

半夏加瓜蒌根湯論見 夏月汗出惡寒身熱足冷而渴者爲中暑白虎加人參湯

反酒黃連主之 方見中暑惡寒身熱者症

發熱惡寒腹滿汗出小便利而渴者為肝乘脾刺期門 論

表解不惡寒而渴者宜白虎湯 方論見

渴而脇滿及往來寒熱其症未經汗者小柴胡去半夏加

人參瓜蒌湯若汗下後者柴胡桂枝乾薑湯 詳見胸痞并

渴而心下鞭痛日晡潮熱不大便者為結胃宜大陷胃湯

若但鞭不痛者為痞與瀉心湯不解反渴而小便不利者

宜五苓散 詳見結胃

病在陽明應汗之反以冷水澀之灌之其熱益煩肉上粟

起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差與五苓湯 論見

文蛤散方 文蛤一兩即海蛤粉也河間

右一味為散沸湯調服方寸匕

渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胃中有寒 論見

中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則

吐者名曰水逆五苓散主之

渴欲飲水若太陽發汗後大汗出煩躁不得眠者及厥陰

病氣起衝心心疼吐衄者少與之愈 論見前條 凡得

時氣病至五六日而渴欲飲水不能多不當與之何者以

腹中熱尚少不能消之更與水作病也至七八日大渴欲

飲水者猶當使症與之與之常令不足勿極意也言能飲

一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之

忽然大汗出是為自愈也 活人云凡病非大渴不可飲水

其胃中 和乃佳

凡得病反能飲水此欲愈也但聞病飲水自愈小渴者亦

強與之飲因成其禍不可復救 活人云強飲水致飲停心

下痢脈弱脈數而渴者自愈 論見 渴而發熱

其胃中 和乃佳

其胃中 和乃佳

其胃中 和乃佳

其胃中 和乃佳

其胃中 和乃佳

其胃中 和乃佳

其脈不弦者汗出愈 論見

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥與

猪苓湯復利其小便故也

右活人云切戒太陽症無汗而渴者不可與白虎湯陽

明症汗多而渴者不可與猪苓湯然太陽渴終不可與

白虎耶太陽症得汗後脈洪大而渴者方可與之也陽

明渴終不可與五苓散耶陽明症小便不利汗少脈浮

而渴者方可與之也

濕積法

羅傷寒食少而渴者當以和胃之藥止之不可用涼藥止

之恐復損胃氣愈不能食也白木茯苓是也

海秦二母病太陰病三日不解後嘔逆惡心而脈不浮與

之半硫丸二三服不止復與黃芪建中湯脈中極緊無表

裏病胃中大熱發渴引飲皆曰陽症欲飲之水予反與薑

附等藥緊脈反沉細陽猶未生以桂附薑烏之類酒丸與

百九接之二日中十餘服病人身熱煩躁不寧欲作汗也

又以前九接之覆以厚衣陽脈方出而作大汗翌日大小

便始通下瘀血一盆如猪肝然用胃風湯加桂附三服血

止其寒甚如此亦世之未見也

少陰症口燥舌乾而渴尺寸脈俱沉沉遲則四逆湯沉疾

則大承氣湯 少陰口燥舌乾而渴身表涼脈沉細而虛

者瀉心湯主之此有形無形藥也

人參湯治傷寒七八日汗後心煩燥渴

人參 黃芪 柴胡 葛根各一

山梔 甘草各

右為鹿末每服五錢薑蔥煎溫服

活陽毒倍常燥盛大渴者黑奴丸主之方見 風濕加渴
甚者宜瓜蒌湯方見 中暑伏熱累治不瘥其人發渴不
已酒蒸黃連丸主之方見

脈熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲水不止腹
大而脹尚不厭飲目無精光者死不治

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濺濺然者是轉屬陽
明也 食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇

者屬上焦也 腹痛欲嘔吐者黃連湯主之方論見
嘔而發熱者小柴胡湯主之 發熱微惡寒肢節煩疼微

嘔心下支結外症未去者柴胡加桂枝湯主之論見 太
陽病發熱惡寒身痛嘔逆脈緊者名曰傷寒麻黃湯症

發熱 太陽與陽明合病不利但嘔者葛根加半夏湯
主之活人云頭眩身熱而長是也

葛根加半夏湯 葛根二 麻黃 生薑各一 甘草

芍藥 桂枝各一 半夏二 大枣二
右咬咀以水一斗先煎葛根麻黃減二升去白沫納諸
藥煎取三升溫服一升覆取微汗

嘔而往來寒熱胸脇苦滿者宜小柴胡若兼下利者乃太
陽少陽合病宜黃芩加半夏生薑湯論見往來寒

太陽過經十餘日反二三下之後四五日柴胡症仍在者
先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與

八柴胡湯下之愈 太陽病過經十餘日心下溫欲吐
而心中痛大便反溏腹微滿鬱微煩先此時自極吐下

者與調胃承氣湯若不滿者不可與但欲嘔胸中痛微瀉

者此非柴胡症以嘔故知極吐下也
本渴而飲水嘔者柴胡不中與也論見

先渴却嘔者為水停心下此屬飲家活人云赤茯苓湯主之 先嘔
却渴者此為欲解候也金匱云嘔思

嘔而下利有寒熱者為陽宜黃芩湯大柴胡湯無熱者為
陰宜猪苓湯真武湯並見

嘔而脈弱小便利身熱見厥者難治四逆湯主之
嘔而心煩若汗吐下後者梔子生薑湯若未曾吐汗下

後兼欬而渴者宜猪苓湯論見
嘔多雖有陽明胃實不可攻之論見 嘔家有癰脹者不
可治膿盡自愈 服桂枝嘔者酒客病論見

乾嘔發熱兼自汗惡風鼻鳴者桂枝湯兼表不解有水氣
而欬者小青龍湯方見

乾嘔脇痛若表解身涼短氣汗出不惡寒者十棗湯若兼
往來寒熱脈沉緊者小柴胡湯論見

乾嘔下利若兼表不解發熱而欬者小青龍湯去麻黃加
芫花湯論見 若表身涼脇痛短氣汗出者十棗湯論見

若因下後心下痞硬滿腹中雷鳴日利數行者甘草瀉心
湯論見

若脈微厥逆者宜白通湯若用白通湯後利不止厥逆
無脈者白通加猪膽汁湯論見

乾嘔脈逆若脈微下利者通脈四逆湯白虎加猪膽汁湯
若脈弦遲不利者四逆湯論見

乾嘔續法

飲水即嘔而飲水嘔者柴胡不中與也宜治膈間有水赤茯苓

湯主之

赤茯苓湯治傷寒嘔噦心下滿胃脘間有停水頭眩心悸

赤茯苓一兩 半夏半兩 橘紅 芎藭各半

人參一兩 白朮半兩

右吹咀每服四錢姜五片水煎服

傷寒後嘔者有餘熱在胃脘也竹葉石膏湯加生姜主

之

海葛根湯治傷寒乾嘔不止

葛根 人參各一兩 茯苓半兩 半夏姜製七

白朮半兩 黃芪半兩 麥門冬去心 甘草各一兩

右吹咀每服三錢生薑三片棗二枚同煎服

少陽病 口苦咽乾 眩 往來寒熱

胸滿痛 胸滿 胸痛 耳聾 少陽

病續法

口苦咽乾

少陽之為病口苦咽乾目眩也活人云宜小柴胡湯

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐

下則悸而驚誤下血虛者驚

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則

譫語此屬胃家胃和則愈胃不和則煩悸 傷寒三日少

陽脈小者欲已也 少陽欲解時從寅至辰上

陽明病腹滿脈浮緊口苦咽乾而喘若其人發熱惡寒誤

下之則腹滿小便難若其人發熱不惡寒反惡熱誤下之

則胃空虛為懊憹誤下之則譫語誤加燒鍼則不得眠

腹滿許學士云

眩

眩而口苦舌乾者屬少陽論見 眩而心下鞭項強者屬

太陽少陽併病當刺大椎肺俞忌汗下論見

眩而胃實若能食不惡寒者中風若飽則頭眩小便難者

穀疸皆屬陽明論見

太陽發汗後仍發熱心悸頭眩身腫振振欲擗地者真武

湯主之方論見

動氣在左誤汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤方論見 動氣在

右諸逆誤汗而言亂目眩者死論見 頭眩脈沉緊發

汗則動經身為振振論見

往來寒熱

太陽病不解轉入少陽者脇下鞭滿乾嘔不能食往來

寒熱尚未吐下脈沉緊者與小柴胡湯若已吐下發汗溫

針譫語柴胡症罷此為壞病知犯何逆以法治之 傷寒

五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜

嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心下

悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡主之 血

虛氣盡騰理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分

爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食者臟腑相連其病

必下邪高病下故使嘔也宜

小柴胡湯

柴胡二兩 黃芩 人參 甘草各三

半夏六錢

右吹咀每服五錢生薑五片棗三枚同煎溫服日三服

若胸中煩而不嘔去半夏人參加瓜蒌實一枚 若

渴者去半夏加人參三錢括萎根一兩 若腹中痛者

去黃芩加芍藥三分 若脇下痞硬去大棗加牡蠣一

兩 心下悸小便不利者去黃芩加茯苓二兩 若不渴外有微熱者去人參加桂三分溫覆取微汗愈 若欬者去人參大棗生薑加五味子半兩乾薑三分 凡柴胡病下之不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解 傷寒中風有柴胡症但見一症便是不必悉具

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者宜大柴胡湯 結胃 大柴胡湯

柴胡二兩 黃芩 芍藥各半 半夏製六 生薑一兩 枳實兩 大黃一兩 右咬咀每服五錢加大棗三枚水煎溫服以利為度未利再服

詩有人病傷寒心煩喜嘔往來寒熱醫以小柴胡與之不除予曰脈洪大而實熱結在裏小柴胡安能去之仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯三服而病除蓋大黃滋滌蘊熱傷寒中要藥土叔和云若不用大黃恐不名柴胡須酒洗生用有力

傷寒五六日已發汗而復下之胸腹滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解也宜柴胡桂枝乾薑湯

柴胡二兩 桂枝 乾薑各半 栝萎根 黃芩各一 牡蠣 甘草半兩

右咬咀每服五錢煎溫服微煩再服汗出愈 病人脈微而濡者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着復衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則

發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故裸其身又陰脈遲澀故知血亡也 右脈微因大發汗所致故病當惡寒之時雖盛夏亦欲着複衣脈澀因大下所致故病當惡寒後發熱之時雖盛冬亦欲裸其體是皆亡血陽微陰弱不能勝冷勝熱非是盛夏牽延至盛冬也

脇滿痛 脇滿乾嘔往來寒熱者屬少陽 方論見注 傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡去半夏加人參瓜蒌根主之 得病六七日脈沉浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目

及身黃頸項強小便難者與柴胡湯必下重 本渴而飲水欲嘔者柴胡不可與也食穀者嘔 王註云不嘔者屬柴胡症若因水而嘔者水停心下也 脇滿胃家實或嘔而舌上白胎者或脈弦浮大身黃小便難有熱者俱屬陽明症宜小柴胡湯 方論見 脇滿潮熱大便澀利者小柴胡湯 方論見 湯主之 方論見 太陽病十日已去脈浮細而嗜臥者外已解也若胃滿脇痛者與小柴胡湯脈浮者與麻黃湯 太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漿漿汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也宜

十惠湯 芫花炒 甘遂 大戟各等

右為細末合和之再入白中杵二三百下先以水一升
煮肥惠十枚取五六合去查納藥末強人一錢虛人半
錢車飲寒湯送下平且服若下少病不除者明日更服
加五分利後米粥自養若合下不下令人脹滿遍身浮
腫也昔杜壬問孫兆曰十惠湯畢竟治甚病孫曰治太
陽中風表解裏未和杜曰何以知裏未和孫曰頭痛心
下痞滿脇下痛乾嘔汗出此知裏未和也杜曰公但言
病症而所以裏未和之故要緊總未言也孫曰某嘗於
此未決願聽開論杜曰裏未和者蓋裏與燥氣壅於中
焦故頭疼乾嘔短氣汗出是痰隔也非十惠不治但此
湯不得輕用恐損人於修忽用藥者慎之

婦人發熱惡寒經水適來熱除脈遲身涼腸滿如結胃狀
諸語者則期門論見

不醫學綱目卷三十一

宋

吐下汗後脈微心下痞脇痛氣上衝咽眩胃脈動惕者成
痰論見 下後脈弦者必兩脇拘急論見傷

胸痛續法

傷寒胸痛 支溝 陽陵泉

胃滿

口苦咽乾又耳鳴者滿者屬少陽忌吐下宜柴胡湯論見
太陽陽明合病喘而胃滿者宜麻黃湯論見

少陰病下利咽痛胃滿心煩者宜猪膽湯方論見
太陽病下之脈促胃滿者桂枝去芍藥湯方論見 若脈

促不結胃者欲解也論見 下後胃滿小便不利若兼煩
驚諸語身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯方論見 若

兼噦而舌胎者為濕痺論見 汗下後煩熱胃中空者梔子豉湯主之論見

病症發熱惡寒加桂枝或自汗但頭不痛項不強胸中痞
硬氣上衝咽喉不得息者瓜蒂散主之論見氣

胸痛

胸脇痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見大法活人
病胃中諸實胃中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有

延唾下利十餘行其脈反遲寸口脈微滑此可吐之利則
止

吐下後溫溫欲吐胃中痛大便澹腹滿而煩者宜調胃承
氣湯論見

耳聾

胃腸痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見 口苦耳
聾胃滿者少陽中風論見

未持脈時病人手必自冒胃師因教試令歎而不歎此必
兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

少陽病續法
海辨表裏中三說假令少陽症頭痛往來寒熱脈浮此三
症但有其一即為表也口失滋味腹中不和大小便或閉
而不通或泄而不調但有其一即為裏也如無上下表裏
症餘皆虛熱也是病在其中矣

陽氣毒盛變陽毒
陽毒之為病面赤斑斑如錦紋咽喉腫膿血五日可治
七日不可治宜

升麻鱉甲湯
升麻 二 當歸 蜀椒炒去 甘草各一
鱉甲 手搯大 雄黃研半

右六味以水四升煮取一升頓服之取汗愈肘後千金

升麻 二 當歸 蜀椒炒去 甘草各一

鱉甲 手搯大 雄黃研半

右六味以水四升煮取一升頓服之取汗愈肘後千金

方陽毒升麻湯有桂無蟄甲陰毒用甘草湯無雄黃

陽毒續法

酒陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒腰痛煩悶不安面赤狂言奔走或見鬼或下利脈浮大數面赤斑斑如錦紋咽喉痛下膿血五日可治七日不可治

升麻

犀角 鈔

射干

黃芩

人參

甘草 各等分

右咬咀水煎服食頃再服溫覆手足出汗則解不解重作

陽毒梔子湯治陽毒傷寒發熱百節疼痛

升麻

黃芩

杏仁 各二錢

梔子

赤芍 各一錢

石膏 二錢

知母

大青 各一錢

甘草 五分

柴胡 一錢

芒硝

右咬咀每服半兩薑五片或百粒同煎

大黃散治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂

大黃 一兩

桂心 二分

甘草 炙

芒硝

木通

大腹皮 各一兩

桃仁 二十枚

右咬咀水煎服以利為度

海葛根散治陽毒身熱如火頭痛躁渴咽喉乾痛

葛根 七錢

黃芩

大黃 煨

甘草

山梔

朴硝 各半

右咬咀水煎服

酒黑奴丸治時行病六七日未得汗脈洪大或數面赤目痛身體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五六日已上不解熱在胃中口燥不能言為壞傷其醫所不治或人精鬼已

胡心下尚煖撥開其口灌藥下咽即活兼治陽毒及發斑

麻黃 三兩

大黃 二兩

釜底煤 研

黃芩

芒硝

竈突墨 研

梁上塵

小麥奴 各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大新汲水研下一丸渴者與冷水蒸飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若無汗再服一丸須微利效小麥奴即小麥未熟時叢中不成麥稔之成黑勃是也此藥須是病人大渴倍常躁盛者乃可與之若不渴者服之反為禍耳

脈洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如烟煤宜以水漬布薄之疊布數重新水清之稍投去水搭於胃上須臾蒸熱又漬冷如前薄之仍換新水數十易熱甚者置病人於水中勢緩退則已亦一良法也

陰陽丹砂丸治傷寒陰陽二毒相伏危惡形症

入醫學綱目卷三十一

舟上硫黃

水銀

太陰石

玄精石 各一兩

硝石 兩

太陽石 兩

右為末用無油銚子以文武火炒上項藥令勻如夾色研極細生薑自然汁浸炊餅丸如菉豆大每服五丸龍腦生薑蜜水下壓其躁也若陽毒裏湯下陰毒白湯下不許於屋底炒

太陰病

腹滿

腹痛

王叔和云元陽明篇

吐與利下三門並附入少陰病蓋此三門之病本屬太陰病因在少陰者反多故附入少陰也

腹滿

太陰之為病腹滿而吐食不下自利甚時腹自痛若下之必胸下結硬 太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

本太陽病醫反下之因小腹滿時痛者屬太陰也桂枝加

芍藥湯主之大便實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝加芍藥湯 桂枝 芍藥各一兩 甘草一兩 芍藥三兩

右吹咀每服五錢水煎溫服

桂枝加大黃湯 桂枝一兩 芍藥一兩 甘草半兩 大黃半兩

右吹咀大棗三箇生薑四片水煎溫服

太陰病脈弱其人續自便利設當用大黃芍藥者宜減之

以其人胃氣弱易動故也 太陰中風四肢煩疼陽微脈

瀼而長者為欲愈 太陰病欲解時從亥至丑 腹滿時

痛吐利者為太陰 太陰論見前

霍亂吐利頭痛發熱身痛不渴而腹滿者理中丸加附子

主之 霍亂吐利 下利腹脹滿身痛者四逆溫裏後用桂

枝攻表 腹滿而腹滿視前後部有不利者利之則愈 少陰腹

滿脹不大便者宜大承氣湯 腹滿時減復

弦浮大者宜小柴胡湯 若兼脇下痛脈

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯 腹滿時減復

如故此虛寒從下而上也當以溫藥和之

太陰病腹滿時痛脈浮者宜桂枝湯 陽明脈弦

浮大脇痛身黃而腹滿者小柴胡湯 傷寒腹滿謔

語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱宜刺期門 陽明

病腹滿脈浮緊口苦咽乾而痛若其人發熱惡寒者下之

則腹滿小便難若其人發熱汗出不惡寒反惡熱者下之

則懊憹汗之則謔語加燒鍼則休惕不眠 陽明病腹滿脈遲若頭眩小便難者不可下若潮熱汗出

不惡寒者大承氣主之 三陽合病腹滿身重難轉側謔語遺尿自汗者宜白虎湯

傷寒發熱脈瀼惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗

出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫宜刺期門 腹

滿汗出不惡寒而喘若脈遲潮熱者大承氣湯若脈浮緊

口苦咽燥者忌發汗忌燒鍼忌下 發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之

厚朴生薑人參甘草半夏湯 厚朴 生薑各二兩 半夏六兩 人參一兩

右吹咀每服五錢水煎溫服

下利清穀若發汗必脹滿 傷寒吐後腹脹滿者與

調胃承氣湯 下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯

極吐下後溫溫欲吐胸痛便澹腹滿而煩者調胃

承氣湯 不大便六七日少與小承氣湯不轉矢氣者不可攻之攻

之則腹滿不能食 腹滿吐利者忌下 腹

滿脈浮緊口苦咽乾者忌汗下 腹滿脈遲者忌

下 腹滿脈弱自利設用大黃芍藥宜減之

腹滿續法

活若飲食不節寒中陰經胸膈不快腹滿閉塞唇青手足

冷脈沉細少情緒或腹痛急作理中湯加青皮每服一二

劑胃即快矣枳實理中丸五積散尤妙 腹脹滿者宜枳
梗半夏湯

桔梗半夏湯治傷寒心腹痞滿時發疼痛

桔梗微炒 半夏製 橘紅各一兩

右咬咀每服四錢生薑三片水煎服

少陰症小便遺瀝大便遺失其人病六七日靜重如山
目不視體如冰腹脹滿與物則咽不與則不求其脈沉細
而微疾按之有力宜急下之與大承氣湯

腹痛

腹滿而痛吐利者屬太陰宜四逆湯論見腹滿

若兼頭痛發熱身痛者屬霍亂 霍亂腹痛不渴者理中
丸加人參論見

病腹中滿痛者此為實也宜大承氣湯下之 病人不大
便五六日繞臍煩疼發作有時者有燥糞故使不大便也

醫學綱目卷三十一

毒

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯 大下後六七
日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有
宿食故也宜大承氣湯 汗下後不大便而渴日晡潮熱
從心下至小腹硬滿而痛者宜大陷胃湯方論見

少陰病腹滿下利若小便不利四肢重痛者宜武湯便膿
血者桃花湯若下利清穀手足厥逆脈微欲絕者通脈四
逆湯去蔥白加芍藥

少陰病腹痛若四肢逆而不溫者四逆散加附子方論見

若手足厥冷脈微欲絕者通脈四逆加芍藥湯方論見

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者宜
黃連湯

甘草炙 黃連 乾薑各三 大棗三

煎服法

乾薑各三 大棗三

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

半夏半 人參 桂枝各三

石咬咀水煎服分二服

往來寒熱胃膈滿心煩喜嘔而腹痛者小柴胡去黃芩加
芍藥湯方見往來

傷寒陽脈濇陰脈弦當腹中急痛者先與小建中湯不瘥
者再與小柴胡湯

小建中湯

桂枝一兩 甘草炙 芍藥三兩 生薑一兩

大棗六枚 膠飴八兩

右咬咀每服五錢生薑三片同煎至八分去渣下膠飴

兩匙許再煎化服東垣云芍藥味酸於土中瀉木為君
木亦來海上故脈弦而腹痛肉桂太辛熱佐芍藥以
建中之名
始于此焉

傷寒四五日腹中痛若轉矢氣及少腹滿者此欲自利也

腹痛續法

雲傷寒邪在三陰內不得交通故為腹痛手足之經皆會
於腹如脈弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺太衝太
淵太陵如脈沉而腹痛過在足太陰脾少陰腎手厥陰心
包刺太谿太陵如脈沉細而痛過在足太陰脾手少陰心
刺太白神門三陰交此刺腹痛之法也

四乾霍亂此係內有所傷外為邪氣所遇有用吐藥者則
兼發散之義有用溫藥解散者不可用涼藥宜用二陳湯
加解散藥如川芎蒼朮防風白芷之類是也

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

煎服法

法鄙而不用守死而已凡有此病即先用之吐訖後詳症脈以加減理中湯治中湯欬緩調之

鹽

生薑

右同炒色變以水一碗煎溫服病甚加重使一盞

世勝靈丹治乾霍亂腹痛甚者取千年石灰湯泡服

成病有乾霍亂濕霍亂乾霍亂死者多濕霍亂死者少蓋

吐利則所傷之物得以出洩雖甚重胃中水穀洩盡則止

矣所以死者少及乾霍亂死多者以其上不得吐下不得

利則所傷之物不得出洩壅閉正氣陷絕陰陽煩擾悶躁

喘脹而死者多矣

無乾嘔霍亂者忽然心腹脹滿絞痛壅滯欲吐不吐

欲利不利狀若神靈所附頃刻之間便致闕絕

大醫學綱目卷三

五

黃王叔和原

太陰

傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰當發身黃小

便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必

自止以脾家實腑穢當去故也

海色如煙黃黃乃濕病也一身盡痛色如橘子黃乃黃病

也一身不痛

成濕家之黃也身黃似薰黃雜黃而色暗不明也熱家之

黃也身黃似橘子色甚者勃勃出蒸着衣正黃如黃柏是

其正黃色也色如黃黃一身盡痛發熱者為濕痺若脈沉

緩小便不利者其草附子湯五苓散若脈大頭痛鼻塞者

納藥鼻中則愈矣

評一人病身體痛面黃喘滿頭痛自能飲食大小便如常

早診之脈大而虛鼻塞而煩子曰非濕熱宿穀相搏此乃

頭中寒濕非茵陳五苓不可行也仲景云濕家病身疼痛

發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中初

無病病在頭中寒濕攻鼻故塞納藥鼻中則愈仲景無藥

方此方見外臺刪繁症云治天行熱病蓋通貫臟腑寒濕

沉於骨髓之間或為黃疸宜瓜蒂散即此方也

又有一舟稍病傷寒發黃鼻疼身與目如金色小

便利大便如常或者欲用茵陳五苓子曰非其治也

清道中清道者華蓋肺之經也若下大黃則必腹脹為逆

亦用瓜蒂散先含水次搗之鼻中黃水盡乃愈

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳湯

主之陽明胃家實身無汗但頭汗出小便不利飲水漿發

大醫學綱目卷三

五

茵陳蒿一兩

右咬咀用水三大盞先煎茵陳減半納二味煎熟溫服

日三服小便當利如皂莢汁狀色正赤過一宿腹滿減

黃從小便中去也

身黃胸痛小便難未下者宜柴胡下後者忌柴胡

傷寒發汗後而身目俱黃所以然者以寒濕在裏不解故

也法不可下當於寒濕中求之

太陽病脈浮數為表未解醫反下之若不結胃但頭汗出

餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃

陽明病面赤攻之必發熱身黃小便不利

黃而腹滿脈遲飽則頭眩小便難者雖下之腹滿如故

下後不能食脇下滿痛頸項強小便難而身黃者與

柴胡湯必下重

火後身陽明病被火額上微汗出小便不利者身必發黃 風溫

脈浮汗出身重多眠若被火則微發黃色劇則如驚癇時

瘵癢風溫 太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣

流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃 論見

身黃脈沉結少腹鞭而小便自利其人發狂大便黑者為

畜血宜抵當湯 論見

傷寒身黃發熱者梔子黃柏皮湯主之

梔子 十五 甘草 黃柏 二

右吹咀每服五錢水煎溫服

傷寒身熱在裏身必發黃麻黃連翹湯主之

麻黃 連翹 生薑 甘草 各一

赤小豆 梓白皮 半升 杏仁 二十 大棗 六

右吹咀每服五錢用潦水一盞半煎溫服 麻黃杏仁生

五味其辛發散表邪為陽也赤小豆連翹梓

皮酸苦寒裏為陰也潦水味薄不助陰也

右身黃小便自利小腹鞭而狂大便黑者為畜血則宜

抵當湯下之若小便不鞭其人不狂大便不黑者雖小

便利非畜血也其為症有三一者梔子柏皮湯二者麻

黃連翹赤小豆湯皆治身黃小便利而身不疼者海藏

所謂乾黃是也三者桂枝附子湯去桂加白朮湯皆治

身黃小便利而一身盡痛者活人所謂中濕是也

汗下燒針後心下痞而胸煩者面色青膚腫難治色微黃

手足溫者易治 論見 身黃禁忌 見前汗後身黃

黃續法

海傷寒病遇太陽太陰司天若下之太過往往變成陰黃

一則寒水太過水來犯土一則土氣不及水來侵之多變

此疾一則茵陳茯苓湯加當歸桂枝二則茵陳栝皮湯

姜朮半夏三則茵陳附子湯四則茵陳四逆湯五則茵陳

姜附湯六則茵陳吳茱萸湯方見如左 發黃小便不利

煩躁而渴茵陳湯加茯苓猪苓石當歸官桂主之 韓氏

本湯 發黃煩躁喘嘔不渴茵陳湯加陳皮白朮生薑半

夏茯苓主之 韓氏名茵 發黃四肢遍身冷者茵陳湯加

附子甘草主之 韓氏名茵 發黃肢體逆冷腰上自汗茵

陳湯加附子乾姜甘草主之 韓氏名茵 發黃冷汗不止

者茵陳湯加附子乾姜主之 韓氏名茵 發黃前服姜附

諸藥未已脈尚遲者茵陳加吳茱萸附子乾姜朮通當歸

主之 韓氏名茵 趙宗頴因下之太過生黃脈沉細遲無

力次第用藥至茵陳附子湯大效

按海藏次第用藥者謂先投韓氏茵陳茯苓湯次投茵

陳陳皮湯又次投茵陳附子湯後趙秀才次第飲此

趙秀才因下之早黃病脈寸微尺弱身冷次第用藥至茵

陳四逆湯大效 傷冷中寒脈弱氣虛變為陰黃仲景理

中湯加茵陳服之

茵陳湯治傷寒發黃目赤黃小便赤

茵陳 山梔 柴胡 黃柏 各一

右吹咀水煎空心服以利為度

海往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯主之

一僧傷寒發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不愈

醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服

五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方

用茵陳梔子各三分秦九升麻各四錢末之每用三錢水

四合煎及二合去查食後溫服以和為度
活五苓加茵陳蒿湯治發黃而渴小便不利
茵陳蒿湯分五苓湯分

右二劑拌勻每服三錢日三服水調下

又方傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搖一字許入鼻
中出黃水其驗即用茵陳湯調五苓散服之最效
本治頭中濕熱發黃疽瓜蒂散

瓜蒂二十七 赤小豆 黍米各十四粒
右為細末如大豈大一粒許納鼻中縮入當出黃水慎
不可吹入

活問白虎症亦有身熱煩渴引飲小便不利何以不發黃
答曰白虎與發黃症相近遍身汗出此為熱越白虎症也
頭面汗出頸已下無汗發黃症也
厥傷寒發黃是病已極是有不治者多矣非止寸口近掌
無脈鼻氣出冷為不治之症又若形體如烟熏直視搖頭
者是為心絕環口黑柔汗發黃是為脾絕皆不治之症
也

少陰病 但欲寐嗜臥 口燥咽乾 咽
痛 吐 吐利 下利

但欲寐嗜臥
少陰之為病脈微細但欲寐衛氣衰則行陽寐則行陰而
少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之見方

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日
無症故微發汗也無症謂無
麻黃附子甘草湯

麻黃 甘草各二兩 附子一枚炮
右咬咀每服五錢水煎溫服須二三服以身汗為度
少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯
主之

附子半 茯苓七錢 人參兩 白朮兩
芍藥七錢
右咬咀每服五錢水煎溫服日三

少陰二三日口燥咽乾者大承氣湯急下之方論見口
若咽痛者甘草湯不瘥者桔梗湯方論見
少陰病得之二三日已上心中煩不得臥黃連阿膠湯主

之方見不
陰病二三日至四五日腹滿小便不利若便膿血者桃花
湯主之方論見

若四肢重痛下利者真武湯主之方論見
少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯方見
少陰病下利至六七日變咳而嘔渴心煩不得眠者猪
苓湯主之

少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自
利復煩躁不得寐者死 少陰病六七日息高者死
少陰病脈緊至七八日自利脈微變暴微厥手足反溫者
欲解也方論見 少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在
膀胱必便血也 口燥咽乾但欲寐方論見 欲吐不吐
但欲寐方論見 吐利但欲寐方論見 下利但欲寐方論見

利 少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何出或從口鼻或從目出是名下厥上竭難治 少陰病四逆惡寒而身踈脈不至不煩而躁者死 少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不可治

少陰病四逆其人或欬悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者宜 四逆散

甘草 枳實 柴胡 芍藥各等分
右為細末日飲和查服方寸七日三服如欬者加五味子乾薑各五分并主下利 悸者加桂枝五分 小便不利者加茯苓五分 腹中冷痛者加附子一枚炮令拆 泄利下重者先以水五升煮薤白三升去渣以散三方寸七納湯中煮取一升半分溫再服

少陰病手足逆冷其人若下利後重者此條四逆散加薤白湯若下利脈絕及無脈者通脈四逆湯白通加猪膽汁湯方論見 若身體骨節痛脈沉者宜附子湯 少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯方論見 少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之 少陰病脈沉發熱者宜前條麻黃附子細辛湯 少陰病欲解時從子至寅上 少陰病惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治 少陰病下利止而頭眩時時自冒者死 少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈 少陰病脈細沉數病為在裏不可發汗 少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺部弱滑者不可復下之

太陽病十日已去脈浮細嗜臥者外已解也胃滿膈痛者小柴胡湯脈但浮者麻黃湯 脈浮汗出多眠若身

重息軒者風濕方論見 若合目則盜汗出者二陽合病

口燥咽乾 少陰病得之二三日口燥乾者宜下之大承氣湯 少陰病自利純青色水心下痛口燥乾者宜大承氣湯方論見 傷寒無大熱口燥渴背惡寒者白虎加人參湯 陽明病發熱汗出不惡寒反惡熱若口乾舌燥者白虎加人參湯方論見

太陽病下後不大便日晡潮熱心下滿痛而舌上燥渴者宜大陷胃湯

陽明病口燥但欲嗽水不嚥者必血虛云嗽水不嚥者病在裏也 病人默默欲眠目不能閉起居不安聲啞或咽乾者當作狐惑治之 咽喉乾燥者不可發汗

少陰病二三日咽痛可與甘草湯不瘥桔梗湯 甘草湯用甘草二兩以咀每服四錢水煎去渣溫服日三服 桔梗湯用甘草二兩桔梗一兩以咀每服五錢水煎溫服 少陰病咽中痛半夏散及湯主之

右以咀水煎服少少咽之為散白湯調服方寸七亦效 日三服 調服不效

咸甘草湯主少陰客熱咽痛枯梗湯主少陰寒熱相搏咽痛半夏散及湯主少陰客寒咽痛

少陰病咽中生瘡不能言語聲不出者苦酒湯主之

半夏製十枚 鷄子一箇去黃擘半夏

右二味納半夏著苦酒以鷄子殼置刀鐮中安火上令

三沸去查少少含咽之不瘥更作三劑

脈案當無汗反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復

吐利論

師曰伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有

伏氣當須脈之若脈微弱者當喉中痛似傷寒非疾痺也

病人云實咽中痛離爾今復欲下利見後法

咽痛下利兼胃滿者皆屬陽脈逆而赤者通脈四逆湯下

後復厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯下利

八醫學綱目卷三

陽毒咽痛面赤斑斑如錦紋唾膿血五日可治七日不可

治宜升麻鱉甲湯活人云陰毒升麻湯

陰毒咽痛面目青身痛如被杖五日可治七日不可治升

麻鱉甲去雄黃蜀椒湯活人云陰毒升麻湯

太陽下後脈緊者必咽痛論見 陽明病頭眩而熱者必

咽痛若不效者咽不痛 先驅後熱者下利必自止而

反汗出者其喉為瀉發熱無汗者下利必自止若不汗者

必便膿血其喉不痺論見

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得

嚏臥不能自溫 咽中閉塞不可下下之則上輕下重水

漿不下臥則欲蹠身急頭眩下利日數十行

咽痛續法

潘半夏桂枝甘草湯治伏氣之病謂非時有暴寒中人伏

氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈更微弱先發咽痛似傷寒非喉痺之病必下利始用半夏桂枝甘草湯主之此病只二日便瘥古方謂之腎傷寒也次用四逆主之

半夏桂枝甘草湯

半夏湯 甘草炙 桂心各等

右咬咀每服四錢水煎候冷少少細呷之師傳景半夏

附吐

腹滿時痛而吐者太陰病論見腹滿活人

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐自利而渴論見下利活人

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得

之手足寒脈弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈有

寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯 少陰病但欲

臥不煩而吐五日變自利煩躁不得寐者死論見但

腹痛欲嘔吐者宜黃連湯

病解後虛羸少氣欲吐者宜竹葉石膏湯

乾嘔吐涎沫頭痛者宜

吳茱萸湯

吳茱萸湯 湯池洗

人參三 生姜半

右咬咀水煎去查分二服

發熱渴欲飲水水入則吐者宜五苓散論見

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即

吐乾姜黃連黃芩人參湯主之

乾姜 黃連 黃芩 人參各等

右咬咀水煎服

太陽病吐後汗出不惡寒發熱關脈細數欲食冷食朝暮吐此為小逆

病人脈數為熱當消穀引食而反吐者此因發汗令陽氣微隔氣虛脈乃數也數而客熱者不能消穀以胃中虛冷故也 凡服桂枝湯而吐者必吐膿血也

吐厥逆者甘薑湯是也 吐瀉法

活吐有冷熱二症寸口脈數手心熱煩渴而吐以有熱在胃脘五苓散主之

寒多不飲水而吐者理中湯去朮加生薑主之

陰症喘促及吐逆者返陰丹入口便住

大橘皮湯治動氣在下不可發汗發又無汗心煩骨節疼痛目暈惡寒食則反吐穀不得入先服大橘皮湯吐止後

宜建中湯 陳皮半兩 生薑兩 炙子八 甘草兩

石水三大棗煮取一盞分二服 病人直患嘔吐而脚弱或疼乃是脚氣當作脚氣治之

附吐利 腹滿時痛吐利不渴者太陰病

陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利 少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

少陰病吐利手足不逆冷反熱者不死脈不至者灸少陰七壯 少陰病吐利煩躁四逆者死 少陰病下利數

而嘔渴心煩變不得眠者宜猪苓湯下利 少陰病腹痛

小便不利四肢重痛自下利或嘔者真武去附子加生薑湯

太陽與少陽合病頭痛脇痛往來寒熱自利而嘔者黃芩加半夏生薑湯

利者宜大柴胡湯 發汗後水漿不得入口者為逆

若更發汗必吐下不止嘔吐而利者名曰霍亂 病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此名霍亂自吐下又利止復更發熱也 霍亂頭疼發熱身疼痛熱多飲水者五苓散主之 寒多不飲水者宜

理中湯 人參 乾姜 甘草 白朮

右剉每服四錢水煎去渣溫服如寒甚者加乾姜一兩半 渴欲得水者加白朮一兩半 臍上築者腎氣動也去白朮加桂枝二兩 吐多者去白朮加生薑四兩

下利多者倍用白朮 悸者加茯苓二兩 腹滿者去白朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許自溫勿發揭衣被

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

霍亂吐之發民病嘔吐霍亂注下 太陰所至為中滿霍亂吐下

右濕土霍亂即仲景五苓散理中丸之類是也

歲土不及風乃大行民病霍亂飧泄

右土虛風勝霍亂即羅謙甫桂苓白朮散之類是也

熱至則身熱霍亂吐下六元正

右熱霍亂即活人書香薷散之類是也

靈足大陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別

者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則蠱脹

取之所別也經脈 氣亂於腸胃則為霍亂取之足太陰

陽明不下取之三里五亂篇東垣云足太陰期

吐利止而身痛不休者當消息和緩其外宜桂枝湯惡

寒脈微利止者四逆加人參湯方論見

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四

逆湯加猪膽汁下之

甘草二 乾姜三 附子大一枚猪膽汁半

右三味咬咀水三盞煎至二盞去渣納猪膽汁分作二

次溫服其脈即來

入醫經補卷五

乾嘔下利發汗脈平不煩者以新虛不勝穀氣故也 乾嘔而

利兼脇痛而表解者宜十棗湯心下痞硬而煩者宜甘草

瀉心湯兼厥逆脈微者通脈四逆湯白虎加猪膽汁湯詳

脈陰陽俱厥至於吐利其脈獨不解緊去人安此為欲解

若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食

自可者為欲解

吐利續法內經霍亂法附

活夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆

冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷飲須井底沉極冷頓服之

乃效他藥不能救

香薷散治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦名為霍亂此皆

飽食飽食頓啖乳酪酒膠百品無所不食多飲水漿眠睡

冷席風冷之氣傷於脾胃諸食結而不散陰陽二氣不

不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利不已百脈

混亂榮衛俱虛冷痺筋轉皆宜服此

厚朴二兩 黃連二兩 香薷酒炒 甘草半兩

右為末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之兼治不時

吐利霍亂腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩脚

轉筋痠痛不可忍者須井中沉冷極冷頓服之乃效

羅桂苓白朮散治胃暑飲食所傷傳受濕熱內盛霍亂吐

瀉轉筋急痛腹痛滿悶小兒吐瀉驚風皆宜服此

桂枝 人參 白朮 白茯苓各半兩

澤瀉 甘草 石膏 寒水石各一兩

滑石二兩 一方有木香藿香葛根各半兩

右為細末每服三錢白湯調下或新汲水生薑湯下亦

得有蒙古百戶昔良海因食酒肉飲渣乳得吐瀉霍亂

症從朝至午精神昏憤以困急來告予診視之脈得沉

數按之無力所傷之物已出矣即以新汲水半碗調桂

苓白朮散徐徐服之稍得安靜又於墻陰掘地一穴約

二尺許貯以新汲水在內攪之待一時澄定名曰地漿

用清者一杯再調服之漸漸氣和吐瀉遂止至夜得安

翌日微煩渴遂愈即以錢氏白朮散時時服之良愈或

問用地漿者何也予曰坤為地地屬陰土平曰靜順感

至陰之氣又於墻陰貯以新汲水以取重陰之氣也陰

中之陰能泄陽中之陽霍亂症由暑熱內傷而得之故

痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡又加暑熱七神迷

亂非至陰之氣則不能息予用之者此也內經福萬世

之書豈不信哉 又提學侍其公年七十九歲六月中

暑毒霍亂吐瀉昏冒終日不知人事夜半請予視之診其脈七八至洪大有力頭熱如火足寒如水半身不遂牙關緊急予思內經五亂篇中云清氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衝氣逆行亂於胃中是謂大惋云云亂於腸胃則為霍亂於是霍亂之名自此而生蓋年高氣弱不任暑氣陽不維陰則瀉陰不維陽則吐陰陽不相維則既吐且瀉矣前人見寒多以理中湯熱多以五苓散作定法治之今暑氣極盛陽明得時之際况因動而得之中暑明矣非甘辛大寒之劑不能泄其暑熱滯浮煽之火而安神明也遂以甘露散甘辛大寒瀉熱補氣加茯苓以分陰陽水水調灌之漸省人事諸症悉去後慎言語節飲食三日以參朮調中湯以意增減服之理其正氣逾十日後方平復

入醫學綱目卷三

季

無訶子散治老幼霍亂一服即效

訶子炮去

甘草炙

厚朴薑

乾薑炮

神麴炒

草果去

良薑炒

茯苓

麥芽炒

陳皮各等

右為細末每服二錢候發不可忍時用水煎入鹽少許服之

聖治霍亂用厚朴薑製火上炙令香為末以新汲水調下二錢七佳

大人參散治世娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參

厚朴薑

橘紅各一

當歸炒

甘草各

右為末每服四錢末三枚水煎服

丹霍亂內有所傷外有所感

方集吐瀉還用吐以提其氣起吐用二陳湯加減或用檀香煎湯吐亦可

海霍亂症本自胃家或因寒飲或因飲水或傷水毒或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏轉筋掣痛經絡亂行暴作吐瀉中焦胃氣所主也察其色脈隨經標本此治霍亂吐瀉之法也

外治霍亂吐下不止者艾一把水三升煮至一升頓服

經霍亂吐瀉用屋下倒掛塵泡湯澄清服之大忌飲食入

山霍亂吐瀉用屋下倒掛塵泡湯澄清服之大忌飲食入

腹則死喫水水不妨不可飲熱湯

吐瀉不止或吐轉多四肢發厥虛風不省人事服此四

煎湯煖神效便者

同藥用大棗星為末每服三錢用大棗三枚同煎至八

分五服小者兩服

季

霍亂轉筋治法見轉筋門

霍亂損縮脾飲解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多煩躁者尤宜服之

草果

烏梅

甘草

砂仁各四

乾葛二

烏梅

甘草

砂仁各四

乾葛二

烏梅

甘草

砂仁各四

右吹咀每服五錢生薑五片同煎以水沉冷以解煩或

溫或熱隨意服

無茯苓澤瀉湯治霍亂吐瀉後煩渴飲水

茯苓八

澤瀉四

甘草炙

桂心各二

白朮三

澤瀉四

甘草炙

桂心各二

右吹咀每服四錢生薑三片同煎食前服一方有小麥

五兩

世以小竹杖兩手反抱住於脊骨就杖兒上下各點一穴如先吐先灸上穴先瀉先灸下穴各三百壯百發百中又霍亂諸法不效者灸大椎 又以鹽納臍中灸二十七壯立甦

霍亂吐瀉中脘 天樞 三里 委中
又法上脘 三里

甲霍亂泄出不自知先取太谿後取太倉之原 又法巨關 關衝 支溝 解谿

子又主陰陵泉
東吐利上下俱出藏痺膿血頭重脣痛太白 地機 風府 各五 長強 尺澤 各一

甲霍亂泄利期門主之 厥逆霍亂府舍主之
世霍亂手足厥冷灸三陰交七壯

甲霍亂逆氣魚際太白主之 霍亂遺尿失氣三里主之
世病人合面正臥兩手着身以繩橫亘兩肘尖頭依繩下

依脊兩邊相去各一寸灸三十壯無不驗 霍亂已死但有暖氣者灸承筋七壯立甦 取法以繩從足指端至後

以此度從足跟距地量 取一區於膝等折一半為度 上至膝度極頭處是穴

甲霍亂頸痺不仁承筋主之 千鈞云主 暴霍亂僕泰主

世霍亂遍身轉筋肚痛四肢厥冷欲絕者其脈洪大易治 脈微衰縮舌卷不治

千諸霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止 羅潔古老人云霍亂轉筋吐瀉不止其病在中焦陰陽交

而不和發為疼痛此病最急不可與分毫粥飲穀氣入胃 則必死矣

保凡霍亂慎勿與粟米粥湯入胃即死本草云粟米味酸微寒無毒主養腎氣去脾胃中熱益氣霍亂脾胃極弱不能傳化加粟米豈有能生也邪如吐瀉已多欲住之後宜以稀粥漸漸補養以遲為妙

自利不瀉者屬太陰以其臟有寒故也當溫之宜 四逆湯

甘草兩 乾姜三 附子半

右咬咀水煎溫服強人加附子半筒乾姜一兩半 少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而瀉者屬少

陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便 白以下焦虛有寒不能制水故令色白也 活人云四 少 陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不能眠者猪苓湯主之

少陰病自利清水色純青者心下必痛口乾燥者急下 之宜大承氣湯

孫寶大郎患傷寒經十餘日口燥舌乾而渴心中疼自利 清水衆醫皆相守但調理耳汗下皆所不敢寶氏親故相 謂曰傷寒邪氣害人性命甚速安可以不決之疾投不明

之醫乎召孫至曰即日不可下明日正當下投小承氣湯 遂大便通得睡明日平復衆皆曰此症緣何下之而愈孫 曰不深於書徒知有書耳不知書之奧也口燥舌乾而渴

豈非少陰症乎少陰症固不可下豈不知少陰一症自利 清水心下痛者下之而愈仲景之書明有是說也衆皆欽 服

下利欲飲水者以有熱故也宜 白頭翁湯

白頭翁湯

白頭翁湯

白頭翁湯

白頭翁 黃栢 秦皮 苦連

右吹咀水煎去查温服不瘥再服

少陰病下利白通湯主之 少陰病二三日不已至四五

日腹滿痛小便利或下利或嘔者宜

真武湯

茯苓 芍藥各三 附子一 白朮半兩加減法從

右吹咀每服五錢生薑五片煎至八分温服日三 欬

者加五味子細辛乾姜各一分 小便利者去茯苓

下利者去芍藥加乾姜 嘔者去附子加生薑七片

少陰下利咽痛胃滿心煩者猪膚湯主之用猪膚四兩以

水一盞半煎取一盞去查加白蜜一合半白粉一合二勺

半熬煮和相得温服海液云密

八醫學綱目卷三十一

治厥利 大汗利而厥冷者宜四逆湯 少陰病但欲寐下利者兼

手足厥逆者白通加猪膽汁湯通脈四逆湯方論見 兼

便膿血者宜桃花湯方論見後 少陰病欬而下利諸語

者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗故也 少陰

病下利脈微瀉而汗出必數更衣反少者當温其上灸

之温其上灸 少陰病下利若利自止惡寒而手足温

者可治 大汗出熱不去內拘急四肢疼必下利厥逆而

惡寒者四逆湯主之 傷寒六七日大下後寸脈沉而遲

手足厥逆下部脈不至咽喉不利吐膿血泄下不止者為

難治宜

麻黃升麻湯

麻黃去節二 升麻二 當歸 知母

黃芩 葛根各十分 石膏碎 白朮

乾薑 芍藥 天門冬 桂枝

茯苓 甘草各六

右吹咀每服五錢水煎温服相欠一炊時又進一服汗

出愈

下利脈沉而遲其人面少赤身有微汗下利清穀者必鬱

胃汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

凡厥利當不能食今反能食者恐為除中試食以索餅

不發熱者知胃氣尚在必愈也論見 傷寒先厥後發熱

下利者必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗

而利必自止必便膿血便膿血者其喉不痺 下利後脈

絕手足厥冷時脈還手足温者生脈不還者死 下利

手足厥冷無脈者灸之不温若脈不還反微喘者死 傷

寒發熱下利厥逆躁不得臥者死 傷寒發熱下利至甚

厥不止者死

少陰病下利脈微與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者

白通加猪膽汁湯主之服湯後脈暴出者死微續者生

白通湯 乾薑一 附子一枚

右吹咀每服五錢入葱白二寸同煎温服

白通加猪膽汁湯 乾薑一分 葱白一 附子一枚 童便一合二

猪膽一

右水一盞煎至五分去查入童便膽汁相和得所温服

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不

惡寒其病面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出

者通脈四逆湯主之

甘草炙 乾薑各二 附子一枚 面赤色者加

八醫學綱目卷三十一

蔥九莖 腹中痛者去蔥加芍藥二兩 嘔者加生薑二兩 咽痛者去芍藥加桔梗一兩 利止脈不出者去桔梗加人參一兩

右吹咀每服五錢水煎溫服未瘥急更作一劑其脈續續出者愈

少陰病但欲寐四肢逆而利若下重者四逆散加薤白也

論見厥方 若惡寒身躁者不治欲寐

下利腹脹滿身熱疼痛先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯

攻表桂枝湯 傷寒表不解乾嘔發熱欬而下利者此為

水氣宜小青龙去麻黃加芫花湯方論 太陽與陽明合

病者必自下利葛根湯主之方見太陽病活人云下利而

脈浮大而長 者是其証也 太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若

嘔者黃芩加半夏生薑湯主之下利而頭疼胃滿或口苦

八寶通利藥三

大而弦

黃芩湯

黃芩三 甘草炙 芍藥各二 大棗二

右吹咀水煎溫服若嘔加半夏六錢生薑五片

太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘

而汗出者宜

葛根湯連湯

葛根三 黃連 黃芩各二 甘草炙半

右吹咀每服五錢水煎溫服日進二三服

下利清穀脈沉微手足厥逆者為陰宜通脈四逆湯論見

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之 傷寒

醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏下後身

疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝

湯 少陰病下利便膿血者桃花湯主之 少陰病二三日

至四五日腹滿小便不利下利不止便膿血者宜

桃花湯

赤石脂 四兩 一半全 大米二合 乾薑二錢

右水二大盞煮三味米熟去查納赤石脂細末一方寸

七溫服日三愈勿服

少陰病下利膿血者可刺 下利便膿血若厥而發熱厥

少熱多者病當愈也論見 先厥後發熱無汗者利不止

也論見 下利脈數而渴者令自愈設不瘥者必清膿血

以有熱故也 下利寸脈反浮數尺中自濡者必清膿血

下利脈數不解而下利不止者必挾熱而便膿血也論見

下利語若脈微手足厥但欲寐小便難者為陰宜補劑

八寶通利藥三

和之

若脈和手足溫及不欲寐小便利者為陽宜調胃承氣湯

論見語及前少 陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相

尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣

湯 下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承

氣湯 下利脈反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯

下利脈微者白虎湯也若微瀉嘔而汗出數更衣者當溫

而灸之方論見少

下利脈大者虛也以其強下之故也設脈浮革故爾腸鳴

者屬當歸四逆湯主之

熱利下重者白頭翁湯主之 四肢逆而泄利下重四逆

散加薤白主之論見前

散加薤白主之論見前

下利身痛者若但四肢沉重疼痛小便不利者前條宜
武湯症也 若四肢疼痛厥逆惡寒者四逆湯若通身疼痛

者先以四逆湯溫裏後用桂枝攻表也
下利三部脈皆平按之心下硬者急下之宜大承氣湯

下利後心下痞者此非結熱但胃虛客氣上逆故使鞭
甘草瀉心湯主之

下利咽痛者兼胃滿者猪膚湯瀉厥逆者通脈四逆湯
若下利不止厥逆下部無力咳唾膿血者麻黃升麻湯

下利十餘行胸中痛寸口脈滑者宜吐之則利止
傷寒服湯藥下利不止心下痞硬服瀉心湯後以他藥下

之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在
下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者宜利其小便

赤石脂禹餘糧湯 禹餘糧 各四

右剉碎每服五錢水煎溫服不瘥再服

下後心下痞硬腹中雷鳴乾嘔而利者甘草瀉心湯
下後心下痞硬表裏不解而利者桂枝人參湯

下利脈促表不解喘汗而利者葛根黃芩黃連湯
凡藥下後潮熱胸滿嘔而利者先用小柴胡湯解外

後以柴胡加芒硝湯 凡藥下後諸語脈調和小便
利而下利不厥者調胃承氣湯

鳴而利者當歸四逆湯 下後脈數不解者必
便膿血 下後成陰症厥逆咽不利唾膿而利者

麻黃升麻湯 少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反

去者為欲解也雖煩下利必自愈 傷寒脈浮緩手足溫
至七八日忽暴煩下利日十餘行者必自止

而厥七日下利者為難治 傷寒六七日不利便發熱而
利其人汗出不止者死有陰無陽故也 少陰病但欲臥

不煩至五六日忽自利煩躁不得寐者死 下利
脈沉弦者下重也脈大者為未止脈微數者為欲自止雖
發熱不死 下利有微熱而渴脈弱今自愈 下利脈數
而渴者自愈設不瘥者必清膿血 下利脈數有微
熱汗出今自愈設復發為未解 傷寒下利日十餘行脈
反沉者死 假令下利寸口關上尺中悉不見脈然尺中
時一小見脈再舉頭者腎氣也若損脈來至為難治 下
利清穀不可攻表汗出必脹滿

下利精法
活寒毒入胃者膈下必寒腹脹滿大便黃白或青黑或下
利清穀宜四逆湯理中湯白通加附子湯四逆加薤白散
挾熱利者膈下必熱大便赤黃色及腸間津汁垢膩宜黃
芩湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白湯赤石脂湯
三黃熟艾湯治傷寒四日而大下熱利時作白通湯諸藥
多不得止宜服此湯除熱止利
黃芩 黃連 黃柏 熟艾
右咬咀水煎溫服
薤白湯治傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱悉
主之
豆豉 薤白 山梔
右咬咀用水二升半先將梔子十沸下薤白煎至二升
下豉煎取一升二合溫服

赤石脂丸治傷寒熱利

赤石脂一斤

黃連一斤

當歸各二斤

乾姜一斤

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸米飲下日三服

傷寒濕毒氣盛者下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁宜桃花湯地榆散黃連阿膠散

地榆散治傷寒熱毒不解日晚即壯熱腹痛便利服血

地榆

犀角屑

黃連一斤

葛根各一斤

梔子仁半斤

黃芩一斤

右咬咀每服四錢水一盞入雄白五寸同煎溫服

阿膠湯治傷寒熱毒入胃下利膿血

黃連一斤

山梔一斤

阿膠一斤

黃柏各一斤

右咬咀每服四錢水煎服

傷寒下利後大便不利者腹中痛者宜燥腸丸

附子一斤

龍骨一斤

乾姜一斤

吳茱萸一斤

粟殼一斤

訶黎皮各半斤

右為細末酒糊丸如桐子大每服三十九溫水下利止

勿服

傷寒汗下後裏急後重下利者宜

七宣丸

大黃一斤

桃仁去皮尖

木香

檳榔

柴胡

訶子皮

甘草各半斤

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九溫水下

傷寒汗下後氣逆利不止者寒也宜

枳實芍藥甘草湯

芍藥

枳實炒

乾姜半斤

右咬咀每服五錢水煎服

厥陰病 氣上衝心 飢不欲食 吐衄

虫 厥 少腹滿囊縮

厥陰之為病消渴氣上衝心中夜熱飢不欲食食則吐

蛟 厥陰病渴欲飲水者少少與之愈 厥陰中風脈微

浮為欲愈不浮為未愈 厥陰病欲解時從丑至卯上

厥陰病如桂枝症頭不痛項不強寸脈微浮胃中痞鞅氣上衝

咽喉不得息者此為胃有寒也當吐之宜

瓜蒂散

瓜蒂炒

赤小豆各一斤

右研為細末取一錢用豉一合湯七合先漬之須臾煎

稀糜去渣取汁相和溫頓服不吐少少加得快吐乃止

諸亡血虛家不可與服

活瓜蒂散每服一錢七藥下便臥欲吐且忍之良久不吐

木香一斤

取三錢七湯二合和服以手指探之便吐不吐復稍增之

以吐為度若吐少病不除明日如前法再吐之不可令人

虛也如藥力過時不吐飲熱湯一升以助藥力吐訖便可

食無更服若服藥過多者飲水解散

奔豚氣上衝胃腹痛往來寒熱奔豚湯主之

陰陽易少腹裏急引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉服

中生花者宜燒視散

氣上衝胃口噤不得語欲作剛瘕者宜葛根湯

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹

上衝心者灸其核各一壯與

桂枝加桂湯

桂枝二兩

芍藥

生薑各一斤

甘草一斤

大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服桂枝加桂以助

動氣發汗則氣上衝正在心端論見太陽下後其氣上

衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之

傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胃頭眩脈沉緊若發汗則

動經身為振搖者茯苓白朮甘草湯論見傷寒吐

下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝

咽喉眩胃經脈動惕者久而成痰

氣上衝心續法

李根湯治氣上衝正在心端

半夏 當歸 芍藥 生薑

茯苓 桂枝 黃芩 甘草

甘李根白皮各等分

右咬咀每服五錢水煎溫服

入醫學綱目卷三

飢不欲食

飢不欲食食則吐者厥陰病論見手足厥冷脈乍

緊心煩飢不能食者邪在胸中宜瓜蒂散吐之論見

太陽病吐發汗出發熱不惡寒關脈細數腹中飢口不能

食朝暮吐者此為小逆論見陽明病下後心中懊憹飢

不欲食但頭汗出者宜梔子豉湯論見

吐蚘虫

氣上衝心疼飢不欲食吐蚘者厥陰病論見靜而復

煩須臾復止得食而嘔又煩吐蚘虫者為蚘厥宜烏梅丸

病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘九次服烏梅丸

兩感於寒者三日少陰與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥論見

太陽註云耳聾者少陽 傷寒一二日至四五日而厥者

必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥

應下之而反發汗者必口傷爛赤 成無已云若始得之

手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯

溫之若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經之邪也

四逆散主之必須識此勿令誤也四逆湯方見下又當

外症別之予嘗治一中年婦人惡熱身熱而渴脈數細弱

先厥後熱用溫藥反劇後以四逆散兼參朮各半服之厥

愈脈出洪大而痊

手足厥寒脈細欲絕者宜

當歸四逆湯

甘草 通草各六 當歸 桂枝

細辛 芍藥各一

右咬咀每服五錢入水一升同煎溫服

若其人內有久寒者宜當歸四逆加茱萸生薑湯主之於

原方內加吳茱萸二兩生薑二兩半 嘔而脈弱小便復

利身有微熱見脈者難治四逆湯主之

傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

傷寒脈促手足厥逆者可灸之陰厥陰主逆傷寒六

七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰灸而不止者死

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心中滿而煩飢不

能食者病在胃中當吐之宜瓜蒂散散者有理脈來

數時一止復來曰促脈來緩時一止復來曰結結促二脈

者脈為邪礙而歇止也灸之吐之所以逐去其邪也

少陰病身痛手足寒脈沉者宜附子湯論見傷寒五六

者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出在陽微假令純陰結不得復有外症悉入在裏此為半在裏半在表也脈雖沉不為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

本有人患傷寒五六日頭汗自出自頸以下無汗手足冷心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗出滿悶以為陰症予診其脈沉而緊予曰此症誠可疑然大便秘結非虛結也安得為陰脈雖沉而緊為少陰症多是自利未有秘結者此症半在裏半在表投以小柴胡湯得愈仲景稱傷寒五六日頭汗出云云至得屎而解正此之謂也有人難曰脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰不得有汗何也今頭汗出者故知非少陰何以頭汗出便知非少陰症予

曰此一段正是仲景議論處謂四肢冷脈沉緊腹滿全似少陰然大便秘頭汗出不符為少陰蓋頭者三陽同聚若三陰止胃而還有頭汗出自是陽虛故曰汗出為陽微是陰不得有汗也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脈法云心者火也明少陰則無頭汗者可治有汗者死心為手少陰腎為足少陰相與為上下惟以意逆志者斯可得之傷寒脈而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其脈不爾水漬入胃必作利也

茯苓甘草湯 茯苓 桂枝 芍藥 甘草 右咬咀水煎溫服 少陰病四逆或悸者四逆散加桂枝主之 傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚掣急反與桂枝湯欲

攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾姜湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者四逆湯主之

甘草乾姜湯 甘草 乾姜 右咬咀每服五錢水煎溫服 芍藥甘草湯 芍藥 甘草 右咬咀每服五錢水煎溫服 調胃承氣湯 大黃 芒硝 甘草 問曰症象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而譫語師曰言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰尺寸浮而大浮則為風大則為虛風則生微熱虛則兩脛掣急症象桂枝因加附子參其間桂枝令汗出

附子溫經回陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譫語煩亂更飲甘草乾姜湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯乃脛伸以承氣湯微瀉則止其譫語故知病可愈 少陰病食入則吐復不能吐手足寒脈弦遲者宜吐之 下利而脈下重者四逆加薤白脈微者通脈四逆湯白通湯溫後無脈者白通加豬膽汁湯汗後拘急者四逆湯下後咽不利者麻黃升麻湯 吐利發熱惡寒汗出而厥者屬霍亂宜四逆湯 吐利煩躁欲死而厥者屬少陰宜吳茱萸湯 吐利止脈微欲絕而脈者通脈四逆加豬膽汁湯 中暑口乾而渴治法見中暑門 傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為

臟厥非為蛇厥也。蛇厥者其人當吐蛇，今病者靜而復時，煩此為臟寒。蛇上入膈，故煩須更復止得食而嘔，又煩者，就聞食臭出，其人當自吐蛇。蛇厥者宜烏梅丸主之。

烏梅 七十
細辛 附子炮去
人參
黃柏 桂枝各一
乾薑二
黃連四
蜀椒炒去汗 當歸

右九味共為細末，以苦酒漬烏梅一宿，去核蒸熟，拌成泥和藥，令相得，納臼中加煉蜜，杵二千下，丸如桐子大。食前服十九日，三服稍加至二十九，忌生冷滑物等。凡厥者陰陽氣不相順接，便為厥厥者手足逆冷是也。傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進，寒多熱少陽氣退故為進也。傷寒發熱四日厥反三日厥少熱多其病當自愈，四日至七日熱不除者其後必便膿也。傷寒始發熱六日厥反九日而利，凡厥利者當不能食，今反能食恐為除中，食以索餅不發熱者知胃氣尚在，必愈。恐胃熱來而復去也。後三日脈之其熱續在者期之，旦日夜半愈。所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日併前六日亦為九日，與厥相應，故期之。日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不罷者，此為熱氣有餘必發瘧也。傷寒病厥五日熱亦五日，設六日當復厥不厥者自愈，厥終不過五日以熱五日故知自愈。傷寒熱少厥微，指頭寒，默默不欲食，煩躁數日，小便利已白者，此熱除也。欲得食其病為愈。若厥而嘔，胃膈煩滿者，其後必便血。少腹滿痛而厥為冷結，關元虛痛。少陰四逆，惡寒身踈，無脈不煩而躁死。論見

少陰病但厥無汗而強發之，必動其血。論見 諸四逆厥者不可汗之，諸虛家亦然。傷寒五六日不結胃腹濡脈，虛復厥者不可下，此為亡血下之者死。右厥逆皆忌下，惟前條先熱者必厥厥應下之而反發汗者一法宜下忌汗之。

厥續法
寒厥初得病日便四肢逆冷，脈沉微而不數，足多變臥時惡寒，或自引衣蓋覆不飲水，或下利清穀或清便自調，或小便數外症多惺惺而靜脈沉實按之遲而弱者，知其為冷厥也。四逆湯理中湯通脈四逆湯當歸四逆湯當歸四逆加茱萸生薑湯白通加豬膽汁湯隨症用之。熱厥者初中病必身熱頭痛外別有陽症二三日至四五日方發厥，兼熱厥者厥至半日却身熱蓋熱氣深方能發。

厥須在二三日後也。若微厥却發熱者熱深故也。其脈雖伏按之而滑者為裏熱其人或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘小便赤外症多昏憒者知其熱厥也。白虎承氣湯隨症用之。又有下症悉具而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥，醫人不識却疑陰厥復進熱藥禍如反掌。大抵熱厥須脈沉伏而滑頭上有汗其手雖冷時復指爪溫須便承氣湯下之不可拘忌也。

厥陰症四肢厥冷爪甲青脈沉疾按之有力者為陽則當下宜大承氣湯如脈沉遲按之無力者為陰則當溫宜四逆湯更須速灸之。羅省樞曾德裕男婦二月初病傷寒八九日請予治之脈得沉細而微四肢逆冷自利腹痛目不欲開兩手常抱掖

下昏昏嗜臥口舌乾燥乃曰前醫留白虎加人參湯可服
否予曰白虎雖云治口燥舌乾若只此一句亦未然今此
症不可服白虎者有三傷寒症云立夏以前立秋以下不
可妄用一也太陽症無汗而渴者不可用二也況病人陰
症悉具其時春氣尚寒三也仲景云下利清穀急當救裏
宜四逆湯五兩人參一兩生薑十餘片連翹白九菹水
五大盞同煎至三盞去渣分三服一日服之至夜則止手
足溫翌日大汗而解繼之以理中湯數服而愈孫真人習
業論云凡欲為太醫必須精讀甲乙素問黃帝鍼經明堂
流注十二經絡三候九部本草藥性仲景叔和並須精熟
如此方為太醫不爾猶無目夜遊動致顛頡執此用藥者
再思可矣

不熱症
陽症治驗 真定府趙吉夫年三十三至元五月間因勞

役飲食失節傷損脾胃時發煩躁而渴又食冷物過度遂
病身體困倦頭痛四肢逆冷嘔吐而心下痞醫人不察見
其四肢逆冷嘔吐而心下痞乃用桂枝末三錢七熱酒調
下仍以綿衣覆之作陰毒傷寒治之須臾汗大出汗後即
加口乾舌澀眼白時紅項強硬肢體不柔和小便淋赤大
便秘澀循衣摸床如發狂狀問之則言語錯亂視其舌則
赤而欲裂朝輕暮劇凡七八日家人輩悉謂危殆不望生
全鄰人吉仲完舉予治之診其脈七八至知其熱症明矣
遂用大承氣湯苦辛大寒之劑一兩作一服服之利下三
行折其勝勢翌日以黃連解毒湯大苦寒之劑二兩徐徐
服之以去其熱三日後十分中減五六更與白虎加人
參湯約半斤服之瀉熱氣前症皆退戒以慎起居節飲
食月餘漸得平復內經曰凡用藥者無失天時無逆氣宜

無翼其勝無替其復是謂至治又云必先歲氣無伐天和
當暑有氣方盛之時聖人以寒涼急救腎水之原補肺金之
不足雖有客寒傷人仲景云用麻黃湯內加黃芩知母石
膏之類恐發黃發斑又用桂枝湯之戒况醫以桂末熱酒
調服所謂差之毫釐謬以千里逆仲景之治法經云不伐
天和不贊其復不翼其勝不失氣宜不然則故疾未已新
病復起矣

用熱速熱從平中治 友人劉巨源年六十五歲至正夏
月因勞役飲食失節又傷冷飲得疾醫者往往以為四時
症治之不愈連十日請予治之曰右手三部脈沉細而微
太陰症也左手三部脈微浮而弦虛陽在表也大抵陰多
而陽少今所苦身體沉重四肢逆冷自利清穀引衣自覆
氣難布息懶言語此脾受寒濕中氣不足故也仲景言下

利清穀急當救裏宜四逆湯溫之內經有用熱速熱之戒
口乾但嗽水不嘔早晨身涼而肌生粟午後煩躁不欲去
衣昏昏睡而面赤隱隱紅斑見於皮膚此表實裏虛故也
內虛則外症隨時而變詳內外之症乃飲食勞倦寒傷於
脾胃非四時之症明矣治病必察其下今適當大暑之時
而得內寒之病以標本論之時為標也病為本也用寒藥
則順時而違本用熱藥則從本而逆時此乃寒熱俱傷必
當從平中治中治者溫之是也遂以錢氏白朮散加升麻
就本方加葛根甘草以解其斑少加白朮茯苓以除濕而
利小便人參藿香木香和脾胃進飲食咬咀一兩煎服再
服癢退而利止身溫而神出次服異功散治中湯辛溫之
劑一二服五日得平止藥或曰病雖少愈勿藥可乎予曰
藥攻邪也內經曰治病以平為期邪氣既去強之以藥變

証隨起不若以飲食調養待其真氣來復此不藥而藥不
治而治之理旬日良愈必察其下者謙甫謂時下之宜也
若病人寒熱而厥而面色不澤胃味而兩手忽無脈或一
手無脈者必是有正汗也多用綿衣覆手足令溫暖急服
五味子湯或兼與麻黃細辛甘草湯之類服之時時必有
大汗而解矣

五味子湯治傷寒喘促脈伏而厥
人參分一 五味子兩半 麥門冬心法 杏仁去皮
生薑 陳皮分一 寒子二

右咬咀水煎服
摘治傷寒手足逆冷 大都分一
傷寒六脈俱無復溜 補大回 合谷 中極 支溝一
脈絕穴 復溜 順骨 巨關 三分 氣衝 灸七

手足逆冷時有溫時手足掌心必煖非正厥逆也當消
息之
病若四肢厥逆脈反浮大而短者死

少腹滿囊縮
尺寸脈微緩者厥陰受病也當六七日發其症少腹煩滿
而囊縮論見大法活人云脈沉 病者手足厥冷言我不
結胃小腹痛按之痛者此冷結在膀胱關元也

少腹硬滿小便不利者為畜血若兼身黃發狂者抵當湯主
之不身黃發狂者抵當丸但少腹急結者宜桃花承氣湯
詳見高 傷寒表不解乾嘔發熱而欬或小便不利少腹
滿者小青龍去麻黃加茯苓湯主之
不大便日晡潮熱從心至少腹鞭滿而痛者宜大陷胃湯

少腹滿囊縮續法

活傷寒六七日煩滿囊縮其脈尺寸俱微緩者足厥陰肝
經受病也厥陰病其脈微浮為欲愈不浮為未愈立小建
中湯脈浮緩者必囊不縮外症必發熱惡寒似瘧為欲愈
宜桂枝麻黃各半湯若尺寸俱沉短者必是囊縮毒氣入
腹宜承氣湯下之大抵傷寒病臟腑傳變陽經先受病故
次傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少
陽木為微邪也陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水
水傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣克於脾
土脾再受邪則五臟六腑皆因而危殆榮衛不通耳聾囊
縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五生一死古人
云脾熱病則五臟危又土為木賊則死若第六七日傳厥
陰脈得微緩微浮為脾胃脈也故知脾氣全不受克邪無
所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解
矣

海厥陰症者煩滿囊縮大小便不通發熱引飲腹滿尺寸
脈微緩煩者火也滿者木也雖不吐衄囊縮但急者亦木
也火與木相合四肢厥逆而爪甲青大小便不通地道塞
也發熱引飲邪氣在裏宜溫之下之
已上諸症大小便俱通地道不塞不發渴不引飲邪不
在裏則宜溫之灸之則裏外相接以復陽氣宜服
正陽散
麝香一錢細研性平溫 乾薑光 甘草炙各二
附子一兩炮去皮破碎味辛熱 皂角二兩
右為細末每服二錢白湯下溫服

回陽丹

硫黃半兩味酸溫大熱治心腹腫脹 附子半兩
乾姜半兩 木香半兩 全蝎半兩
葶藶半兩 吳茱萸半兩

右為末酒糊丸如桐子大生薑湯下三五十九併二三服以熱投之衣被取汗

陰氣毒感陰毒

陰毒之為病面青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻煎甲湯去雄黃蜀椒主之升麻煎甲湯方見陽毒

絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細而疾身如被杖咽喉痛五六日可治七日不可治

甘草炙 升麻 當歸各五錢 雄黃二錢
桂枝去皮 蜀椒炒去汗併閉口 紫甲兩半
右吹咀水煎服如人行五里許更進一服覆取汗毒從汗出汗即愈若未汗再服

本陰毒本因腎氣虛冷因慾事或食冷物後傷風內既伏陰外又感寒或先感外寒而後伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發頭痛腰痛腹痛眼疼身倦意而不甚熱四肢逆冷額上及手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失或可起行不甚覺重診之則六脈俱沉細而疾尺部短小寸口或無六脈俱浮大或沉取之大而不甚疾者非陰

症也若服此藥過多則渴轉其躁轉急有此症者急服還陽退陰之藥即安惟補虛和氣而已宜服正元散退陰散五勝散陰症不宜發汗如氣正脈大身熱未瘥用藥發汗無妨

正陽散治傷寒如覺風寒吹者四肢頭目骨節疼痛急服此藥如人行五里許再服連進三服出汗立瘥若患陰毒傷寒入退陰散五分同煎或傷冷傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無有不效

麻黃去 陳皮 大黃生 甘草
乾薑 肉桂 芍藥 附子
吳茱萸 半夏各半

右吹咀麻黃加一半茱萸減一半同為末每服一錢水一盞姜三片煮一枚煎七分熱服以衣被蓋覆取汗切須候汗乾去之如是陰毒不可用麻黃免更出汗

退陰散治陰毒傷寒手足逆冷脈沉細頭痛腰重連服三次小小傷冷每服一字入正元散同煎入鹽一捻陰毒傷寒咳逆煎一服細細熱呷病止

川烏 乾薑等
右為鹿末炒令轉色放冷再搗為細末每服一錢水一盞鹽一捻煎至半盞去渣溫服

五勝散治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沉困倦咳嗽鼻塞不思飲食兼治傷寒夾冷氣并慢陰毒神效

白朮半兩 甘草 五味子 石膏各一兩
乾薑三兩
右吹咀每服五錢水一盞入鹽少許同煎服如冷氣相夾入薑末煎或治陰毒病入艾葉少許煎服

海白朮散治陰毒傷寒心悶煩躁四肢厥冷

川烏炮去 桔梗 附子炮 白朮

細辛各一兩 乾姜炮半

右吹咀或末之白湯調下一錢匕

正陽丹治陰毒傷寒手足厥冷指甲青色體冷脈沉細而微神效 用蔥蔥四五枝陳蜂房四五箇燒存性為細末用蔥蔥搗和丸如彈子大手心內擇定用手帕緊繫定須更汗出以綿被覆蓋如手心熱甚休教解開如服藥先服升麻湯五錢連葱蔥三莖生姜五片水二大盞煎至一盞去渣溫服被覆取汗則愈

陰毒漸深候 積陰感於下則微陽消於上故其候四肢沉重逆冷腹痛轉甚或咽喉不利或心下脹滿結硬躁渴虛汗不止或時狂言爪甲面色青黑六脈沉細而一息

七至以來有此症者速宜於氣海關元二穴灸二三百壯以手足溫煖為效仍服金液丹來甦丹五勝散還陽散退陰散

川烏去皮臍冷水浸七日薄切晒乾紙袋盛之有患 附子炮去 乾姜炮 桂心各半 石黃五兩 太陰玄精石二兩 硝石另 右用生鐵銚先鋪玄精末一半次鋪硝石末一半中間下硫黃末又着硝石一半蓋硫黃却以玄精石末蓋上

還陽散治陰毒面青四肢逆冷心躁腹痛 用硫黃末新汲水調下二錢良久或寒一起或熱一起更看緊慢再服汗出瘥

返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁頭疼四肢逆冷 硝石另 附子炮去 乾姜炮 桂心各半 石黃五兩 太陰玄精石二兩 右用生鐵銚先鋪玄精末一半次鋪硝石末一半中間下硫黃末又着硝石一半蓋硫黃却以玄精石末蓋上

治也

用小盞合着煎三斤炭火燒令得所勿令烟出細研似麩後三味搗羅為末與前藥同研令勻軟飯和丸如桐子大每服十五丸至二十九丸煎艾湯下頻服汗出為度

病重則三十九此方其驗喘促與吐逆者入口便佳又服此藥三五服不退者更於臍下一寸灸之須是晝夜

大段不住手灸不限多少壯數灸之艾炷勿令小小則不得力若其人手足冷少腹硬即於臍下兩邊各開一寸各安一道三處齊下火灸之仍與當歸四逆湯併返

陰丹亦須頻服內外通透方得解若遲誤即死矣又若陰症加以少腹不通及陰囊縮入少腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴灸之仍須與返陰丹當歸四逆湯加吳茱萸生薑慎勿與尋常利小便冷滑藥

火燄散治傷寒惡候

船上硫黃 黑附子生用新臘茶 右為細末先用好酒一升調藥攤入新碗中於火上蕩乾合在瓦上每一碗下燒熟艾一舉大以瓦搗起無令

着火直至烟盡候冷即括取研入磁盒內盛每服二錢酒 益共煎七分有火燄起勿訝傷寒陰毒者四肢冷脈沉細或吐瀉五心煩躁胃中結硬或轉早伏陰在內

湯水不得下或無脈先喫一服如吐却更進一服服後心中熱其病已瘥下至臍腑中表未解者渾身壯熱脈

氣洪大便宜用發表藥或表解者更不發熱便得眠睡渾身有汗若少有瘕結脈實方可用下膈行臍腑藥漸

用調和元氣補治脾胃湯散服此藥三服不應者不可

脈附骨取之方有按之即無一息入至已上或不可數至
此則藥餌難為功矣但於臍下灼火艾如患大三百壯以
來手足不和煖者不可治也倘復和煖以前疏黃及熱藥
助之若陰氣散陽氣來則漸減熱藥而和治之以取瘥也
活治陰虛陽脫體冷無脈氣息欲絕不省人事及傷寒陰
厥百方不效者用葱以索纏如臂大切去根及葉惟存白
長二寸許如大餅樣先以火煨一面令通熱勿令着火乃
以熱面熨病人臍上連臍下又以熨斗滿貯火熨之令葱
餅中熱氣鬱入肌肉中須更作三四餅一餅壞不可熨又
易一餅良久病人當省手足溫有汗即瘥更服四逆湯以
溫其內

海治陰症諸藥不效併湯水不下身冷脈絕氣息短不知
人用葱白熨法若用醋醋拌麩皮炒熟注布袋中蒸熨

入醫學綱目卷三
比上法尤速

代灸塗臍膏

附子 馬蘭子 蛇床子 吳茱萸

肉桂各等分

右為細末可用白麩一匙藥末一匙生薑自然汁煨成
膏攤帛上圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其火
力可代灸百壯腰痛亦可貼之 一法用丁香草撥乾
薑牡蠣燒灰放手心中以唾津調如泥以手掩其陰至
煖汗出為度

陰毒傷寒四肢逆冷者用吳茱萸不拘多少為細末溫酒
和勻生絹袋盛之熱熨脚心令通暢愈若以湯煎溫藥洗
洗以接四肢亦可

本治陰中伏陽破陰丹

硫黃 水銀各一 陳皮 青皮各半

右將硫黃先入銚子內鎔開次下水銀用鐵杖子打勻
令無星傾入黑茶葉內細研入二味用麩糊丸如桐子
大每服三十九如煩躁冷益湯下陰症艾湯下良效

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰症也
急服金液破陰來復等丹其脈遂沉而滑沉者陰也滑者
陽也病雖陰症而見陽脈有可生之理仲景所謂陰病見
陽脈者生仍灸氣海丹田百壯手足溫溫陽回得汗而解
或問滑沉之狀如何便有生理予曰仲景云翁奄沉名曰
滑何謂也沉為純陰翁為正陽陰陽和合故名曰滑古人
論脈滑雖曰往來前却流利旋轉替然與數相似仲景
三語而足也此三字極難曉翁合也言張而復合也故曰
翁為正陽沉言忽降而下也故曰沉為正陰方翁而合俄

降而沉奄為忽忽間仲景論滑脈可謂論當矣其言皆有
法故讀者難曉宜細思之

醫學綱目卷之三十一

醫學綱目卷之三十二

傷寒部

合病併病汗下吐後等病

喘 身重

難轉側 遺尿

盜汗 面赤 壞病

戰慄振搖 筋惕肉瞤

叉手冒心

驚悸

臧結結胃痞氣同異 結胃

痞煩

煩躁 欬 小便利

小便難

尸厥鬱冒 噫 噦 無汗

瘧狀

頭汗 舌白胎 動氣

鼻衄

下血 唾血 畜血 吐血

短氣

心痛 除中 下重 身熱惡

寒身寒惡熱

瘕 疰 狐惑 百合

合病併病汗不吐後等病

太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者

葛根加半夏湯主之

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏湯生薑湯主之

陽明與少陽合病必下利脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

二陽併病太陽出汗不微因轉屬陽明自汗不惡寒太陽症不能面赤燥煩短氣者更發汗則愈

二陽併病太陽症罷潮熱譫語者下之則愈

太陽與少陽併病項強眩暈心下硬如結胃者刺胃脘肝

胸脅

喘

太陽與陽明合病喘而胃滿者不可下麻黃湯主之

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊強鼻

乾不得臥

予曰太陽陽明合病仲景云中有三證下利葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胃滿者麻黃湯也治以麻黃湯得解

太陽病頭疼發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃湯發熱見陽明病脈浮無汗而喘者麻黃湯發熱見不喘家有汗桂枝湯加厚朴杏仁佳

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝去芍藥各一 甘草炙 厚朴各六

杏仁去皮尖二 右咳咀每服五錢水一盞半生薑五片肥棗三枚劈破同煎至八分溫服覆取微汗

表不解乾嘔發熱欬喘者小青龍去麻黃加杏仁湯

陽明病潮熱汗出不惡寒短氣腹滿而喘者大承氣湯

裏實譫語

裏

不大便註云在裏而喘指裏實譫語不能臥者大承氣湯脈沉喘滿反發汗大便難者裏實譫語

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃四 杏仁五十 甘草二 石膏半

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升去查溫服一升

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘 汗後脈沉喘滿大便難譫語者裏實

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

下後利不止脈促而喘汗者葛根黃芩連湯論

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝

下後而喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

喘

加厚朴杏仁湯主之

許有武臣為寇執置舟中艘板下數日得脫乘飽食良
久解衣捫虱次日遂傷寒自汗而脈不利一醫作傷食而
下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘
息高予診之曰太陽下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏
仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一吸喘定再吸藥
熱汗出至晚身涼脈已和矣醫曰其平生不曾用仲景方
不知其神捷如此

傷寒吐下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸床微喘
直視脈弦者生澀者死論見傷寒 濕家下後額汗微喘太
小便利者死論見傷寒 少陰病息高者死論見厥陰 厥冷
無脈灸之不還及微喘者死詳見 直視語謬喘滿者死
論見 脈浮洪汗出如油髮潤喘不休者為命絕論見
大法

喘續法

活陰證喘促者返陰丹主之四肢逆冷喘促入口便佳助
飲水喘

病人小渴與水劇飲之致停飲心下滿結者喘死甚眾當
以五苓散或陷胃丸主之方見渴

身重
三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿
發汗則譫語下之則額上出汗手足逆冷若自汗出者白
虎湯主之

身重
風溫為病脈浮汗出身重多眠身熱汗論見風溫宜
陽明病脈浮緊口苦咽燥腹滿而喘發熱汗出不惡寒身
重忌汗忌燒鍼忌下論見自汗証云
陽明病汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘有潮熱者宜大

承氣湯論見不

風濕脈浮身重汗出惡風者宜
防已黃芪湯

防已一斤 甘草半斤 白木七錢 黃芪去苗一
右咬咀每服五錢生薑四片大棗一枚水盪半煎八分
溫服良久再服服後當如虫行皮中從腰下如水後坐
被上又以一被繞腰已下溫令微汗瘥喘者加麻黃
半兩 胃中不和者加芍藥三分 氣上衝者加桂三
分 下有沈寒者加細辛三分

中暑病發熱惡寒身重痛汗出足冷脈虛而渴者忌汗下
鹹宜瓜蒂散白唐
傷寒脈浮緩身不疼但重無少陰但欲寐吐利證者宜大
青龍湯

身重
下後身重心悸者不可發汗當自汗者乃解論見
陰陽易為病身重少氣少腹急引陰中拘攣上衝胃眼花
者燒視湯論見陰

身重
少陰病腹痛小便不利四肢沉重痠痛下利者真武湯論

身重
難轉側
三陽合病腹滿身重難轉側汗出者白虎湯論見 下後
胃滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡牡蠣湯
論見 風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脈浮
虛而澀者桂枝附子湯論見

身重
遺尿
三陽合病腹滿身重難轉側譫語遺尿汗出者白虎湯論

風溫病脈浮汗出者身重多眠若下之則小便利直利
失溲論見

寸口脈微而澁微者衛氣不行澁者榮氣不運榮衛不能
相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言
衛氣虛則惡寒數欠三焦不竭其部上焦不竭者噫而吞
酢中焦不竭者不能消穀引食下焦不竭者則遺溲

欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷
太陽病火熨其背大汗出語語十餘日振慄下利欲小便
不得反嘔而失溲者此為欲解也論見 遺溲狂言目反
直視者此為腎絕論見

盜汗
三陽合病脈浮大見關上但欲眠睡目合則汗陽明病
脈但浮者必盜汗出論見 而脈浮者云必盜汗是猶有表邪

故 太陽病脈浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒
者表未解也論見

傷寒盜汗者非若雜病之虛是由邪氣在半表半裏使
然也何者若邪氣一切在表干於衛則自然汗出也此則
邪氣浸行於裏外連表邪及睡則衛氣行於裏乘表中陽
氣不緻津液得泄故但睡而汗出覺則氣散於表而汗止
矣其證悉當和表而已

面赤
二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不微因轉屬陽
明續自微汗出不惡寒若太陽症不罷者不可下下之
為逆如此可小發汗設面色綠緣正赤色者陽氣怫鬱在
表當解之蒸之若發汗不出不足言陽氣怫鬱不得越
當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之

不可得其人短氣但坐以汗出不微故也更發汗則愈何
以知汗出不微以脈澁故知也論見 因發不微而面赤燥煩
止是當汗不汗也
故更發汗則愈

脈浮而遲面熱赤而戰慄者六七日當汗出而解反發熱
者搓遲為無陽不能作汗其身必痒也 太陽病如瘧狀
若脈微惡寒面反有熱色而身痒者桂枝麻黃各半湯小
汗之論見

身熱足寒面赤卒口噤背反張者瘧病
陽毒面赤斑斑如錦紋咽喉腫膿血者宜升麻鳖甲湯
方論見

少陽病下利清穀手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒面赤
色者通脈四逆湯加蔥白論見 下利清穀脈沉遲面少
赤手足微厥者必鬱閉汗出解論見

陽明病面合赤色者不可攻之論見

壞病
太陽病三日已發其汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為
壞病桂枝不中與也觀其脈症知犯何逆隨証治之
壞病續法

山治傷寒壞症獨參湯好人參一兩煎服
海陽症大汗大下後亡陽於外亡血於內上而津脫下而
液脫津液兩亡宜以羊肉湯補之矧陰症者豈可不溫補
哉此與傷寒太陽症振搖與真武湯一例外之陽病至此
尚溫况內之陰候豈得不補耶

輒產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若
只用救逆效必遲矣與羊肉湯為效神速病人面色雖見
陽是客熱上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽則

上焦陽氣下降丹田知所歸宿矣夫氣有高下病有遠近証有中外治有輕重各適其至所為故病八九日汗下太過二脈沉細無力多踈足臥惡聽人聲皮有粟時戰如瘧宜羊肉湯主之

當歸 白芍藥 附子炮去皮
龍骨燒通赤 生薑 牡蠣燒赤 桂枝七錢
右為龍末每服一兩羊肉四兩蔥白五寸去黃心同剉爛以水五升一升今之大蓋也熬至一半以來濾絞去渣分三服服之

戰慄振搖

成戰者身為之戰搖也慄者心戰是也戰之與慄戰外而慄內也又云戰為正與邪爭則鼓慄而戰振但虛而不至爭故心聳動而振也戰之與振振輕而戰重也

汗後振

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者宜茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓 桂枝 白朮 甘草 各一兩
右以咀每服五錢水一盞半煎八分去渣溫服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲躡地者真武湯主之

孫太乙官道士周德真患傷寒發汗出多驚悸目眩身戰掉欲倒地眾醫有欲發汗者有作風治者有用冷藥解者病皆不除召孫至曰太陽經病得汗早欲解不解者因太陽經欲解復作汗腎氣不足汗不來所以心悸目眩身轉遂作真武湯服之三服微汗自出遂解蓋真武湯附子白朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽者惟能

乾涸血液爾仲景云尺脈不足榮氣不足不可以汗以此知腎氣怯則難得汗也明矣許學士云鄉里有一姓高者子年三十初得病身微汗脈弱惡風醫以麻黃藥與之汗遂不止發熱心多驚悸夜不得眠語不識人筋惕肉瞤振振動搖醫又進鎮心藥予曰強汗之過也仲景云脈微汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此為逆也惟真武湯可救進此三服佐以清心竹葉湯數日遂愈

下後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也亡血家不可發汗發汗則寒慄而振 太陽病火熨其背大汗出火熱入胃發譫語十餘日振慄自下利者此為解也

未汗戰

脈浮緊按之芤當戰而汗出解脈芤為虛是以發戰脈浮

解

為在表故當汗出解也 太陽病脈陰陽俱停等必戰慄汗出而解 凡柴胡症下之若柴胡症不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而解 脈浮而遲面熱赤而戰惕者當汗出解也反發熱者脈遲不能作汗其身必痒也

筋惕肉瞤 諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰而慄也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故邪中於陰也

筋惕肉瞤

汗出筋惕肉瞤若眩悸振振欲躡地者及服大青龍湯後厥逆者俱宜真武湯 若動氣在左頭汗不止者活人用防風白朮牡蠣次服建中湯 汗下吐溫鍼後若膚動胃煩面色青黃者難治 若經脈動惕脈微心下痞氣衝咽喉者久而成痿

叉手冒心

虛發汗過多叉手冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯

驚悸

少陽耳聾目赤胃滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者宜

柴胡加龍骨牡蠣湯

半夏

大棗

柴胡

生薑

人參

龍骨

鉛丹

桂枝

茯苓

大黃

牡蠣

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

木醫學綱目卷三

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝

去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

桂枝蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝 去皮 三兩 甘草 炙 二兩 生薑 切 三兩 牡蠣 炒 五兩

龍骨 四兩 大棗 十二枚 蜀漆 去腥 三兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

太陽傷寒者加溫鍼必驚也 風溫脈浮自汗身重多眠

若被火者微則發黃劇則如驚癰時瘕瘕 陽明病

脈浮燥口苦咽乾腹滿若加燒針必怵惕煩躁不眠

驚悸續法

海茯苓九治傷寒後或用心勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸

吸短氣

茯神

麥門冬

熟地

牡丹皮

人參

黃芪

桂枝

甘草

牛膝

澤瀉

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大食前溫酒

下二十九

犀角湯治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡

犀角屑

茵陳蒿

茯苓

芍藥

生地

麥門冬

山茱萸

右咬咀每服五錢水一盞半薑二片竹葉三七片同煎

食後服

麥門冬茯苓飲子治傷寒後心神恍惚不得臥

麥門冬

赤茯苓

知母

芍藥

甘草

酸棗仁

陳皮

檳榔

木醫學綱目卷三

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片煎溫服日三服

少陰心悸者四逆不可與也心悸者火懼水也惟腎欺心

故為心悸者是足經上手經也若與四逆湯變無形中惡

候生矣故先以甘草茯苓湯導其濕火以四逆湯溫之者

為心悸全無手經火令入足水也心悸在濕未去終至於

驚故不敢溫之溫之則壞矣

汗後心

汗後心下悸若頭眩身動振振欲僻地者直武湯也

若叉手自冒心者後條桂枝甘草湯也若譫語胃不

和煩悸者活人用調胃承氣湯也 若膈下悸者後

條茯苓桂枝甘草大棗湯也 發汗過多其人叉手自冒

心下悸欲得按者宜

桂枝甘草湯

桂枝四錢 甘草二錢

右二味以水一盞半煎八分去查溫服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚宜

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓八錢 甘草二錢 桂枝四錢 大棗十二枚

右作二服以甘爛水二鍾先煮茯苓減二分納諸藥煮

取一盞去查溫服日三作甘爛水法取水斗許置大盆

中以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗

當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津

液自和便自汗出愈 少陽病耳聾胃滿不可吐下吐下

則悸而驚者註云氣血虛往來寒熱胃腸滿心下悸而小

便不利者小柴胡去黃芩加茯苓湯方論見往來寒熱

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏

急也

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之 傷寒脈結

代心動悸宜

炙甘草湯

甘草兩

生薑三

桂枝去

阿膠兩

右以咀每服五錢水一盞半入酒半鍾煎至八分去查

納阿膠溶盡溫服日三

霍亂吐利心悸者理中丸加茯苓

手足厥冷而悸者茯苓甘草湯手足逆而不溫悸者四逆

散加桂枝

臟結與結胃痞氣大同小異

問曰病有結胃有臟結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關

脈沉名曰結胃也何謂臟結答曰如結胃狀飲食如故時

時下利寸脈浮關脈細小沉緊名曰臟結舌上白胎滑者

難治王叔和云可 臟結無陽症不往來寒熱其人反靜

舌上滑胎者不可攻也王叔和云可刺關 病胃中素有

痞連在臍旁引入小腹入陰筋者此名臟結死

病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之

因作痞所以成結胃者以下之太早故也 傷寒五六日

嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴胡症仍在者

復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗

出而解若心滿而硬痛者此為結胃也大陷胃湯主之但

滿而不痛者此為痞柴胡不中與之與半夏瀉心湯

結胃

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日

晡所有潮熱從心下至少腹而痛不可近者大陷胃湯主

之 太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛

數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫

反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁

煩心中懊憹陽氣內陷心下因輒則為結胃大陷胃湯主

之若不結胃但頭汗出餘處無汗刺頸而還小便不利身

必發黃也丹溪云此症曰胃中空曰短氣躁

傷寒六七日結胃熱實脈沉而緊心下痛按之實鞭者大

陷胃湯主之雲岐云三症脈

大陷胃湯

大黃一兩半去皮 芒硝八錢 甘遂一兩連珠者

大陷胃湯

為細

右水二盞煮大黃至八分去渣下硝一沸下其遂末温服得快利止後服

小結胃病正在心下按之則痛脈浮滑者宜

小陷胃湯

半夏湯洗黃連一瓜蒌一枚用四

右咬咀水二盞先煎瓜蒌至一盞半後用半夏黃連煎取八分去渣温服未和再服微解下黃連便安也

孫工部郎中鄭忠厚因患傷寒胃腹滿面黃如金色諸翰林醫官商議畧不定推讓曰胃滿可下恐脈浮虛召孫至曰諸公雖疑不用下藥鄭之福也下之必死其有一二服藥服之必瘥遂下小陷胃湯尋利其病遂良愈明日面色改白京城人稱服

醫學綱目卷三三

辛

傷寒千餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

但結胃無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胃湯主之

病在陽應以汗解之反以冷水噴之若灌之其熱被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不瘥者與五苓散寒實結胃無熱證者與三物小陷胃湯此三物白散亦可

桔梗三分 巴豆一分去皮尖 貝母三分

右三味為末納巴豆更於日中杵之以白飲和服強人半錢贏者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一碗利過不止進冷粥一碗汗出已腹中痛與芍藥一兩 右熱實結胃及寒實結胃活人不拘寒熱但用陷胃湯

不瘥用枳實理中丸應手而愈

結胃項亦強如柔瘥狀下之則和宜 大陷胃丸

大黃二 葶藶 芒硝 杏仁各三分

右搗羅二味納杏仁芒硝合研如脂相和為丸如彈大後用甘遂末一字白蜜少許水二盞煎至一盞頓服一宿乃下如不下再服 王海藏云大陷胃湯太陽入本藥也大陷胃丸陽明藥也小陷胃湯少陽藥也大陷胃治熱實大陷胃丸無喘小陷胃治痞

心下滿痛如結胃狀若頭下強痛眩暈者刺大椎肝膈若汗下後頭項強痛發熱小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯

若婦人經水來熱除諸語者刺期門

診太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒也反下之若利止必作結胃未止者四日復下之此

作協熱利也 太陽病下之脈浮者必結胃也 太陽少陽併病而反下之成結胃心下硬下利不止水漿不下其人心煩 結胃症悉具煩躁者亦死

結胃續法

若誤下了初未成結胃者急頻與理中湯自然解了更不作結胃蓋理中湯治中焦故也此古人亦說不到後因人消息得之若大段轉損有厥症者兼與四逆湯便安胃中雖和傷寒未退者宜候日數足可下却以承氣再下之蓋前來下之未是故也

西晉崔行功云傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近用大陷胃湯皆不瘥者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻

大小結

氣毒相搏結於胃者當用枳實理中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神應手而愈

枳實理中丸治傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近

枳實十六片 茯苓 人參 白朮

乾薑炮 甘草炮已上

右為末煉蜜丸如雞子黃大每服一九熱湯化下連進

二三服胸中豁然渴者加瓜蒌根一兩自汗者加牡蠣

一二兩煨過下利亦加

增損理中丸王朝奉云大小隨胃湯丸不命者宜與之

人參 白朮 瓜蒌 牡蠣

甘草炙 乾薑炒白 枳實炒 黃芩去枯

右為細末煉蜜為丸如彈子大湯一盞煎服不效復與之不過五六丸胃中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者

不醫學綱卷三三

加瓜蒌根有汗加牡蠣

水結在胃脇間亦名結胃其證頭微汗出但結胃無熱

者小半夏加茯苓湯小柴胡去芩加牡蠣主之

按俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解眾醫以為

濕病用表藥有謂食在膈者治之皆不愈召孫至曰用半

夏茯苓湯遂瘥眾問其故曰頭有汗心下滿非濕症乃水

結胃脇也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿自當遍身

汗若有食心滿頭豈得有汗若言是表身又不疼不惡寒

表証何在故凡水結胃脇頭必有汗耳

小半夏加茯苓湯

氣寒不結 穿結散大實大滿心膈高起氣塞不通者為結也

蟾酥 麝香 輕粉 巴豆另研

右再研過至細以乳汁為丸如黍米大每服二丸用薑

湯下不時服

婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近宜

海蛤散

海蛤 滑石 甘草炙各 芒硝兩

右末每服二錢雞子清調下

小腸通利則胃膈血散腹中血聚則小腸壅小腸壅腹中

血不流行宜此方若小便血散數行更宜桂枝紅花湯發

其汗則愈活人書云此方宜非仲景然其言有理姑存之

針灸 治結胃灸法

巴豆十四 黃連七寸去

右搗細津唾和成膏填入臍中以艾灸其上腹中有聲

其病去矣不拘壯數病去為度繼灸了便以溫湯浸手

帕拭之恐生瘡也

不醫學綱卷三十一

傷寒結胃 先使人心敲骨下正痛處左畔揉之以毫

針刺左畔支溝穴正坐制臂取之次刺左間使名曰雙關刺次

左行間然取之針入七分此支溝行間穴下針五分數內

吸氣長呼一口氣出針即左畔一毫結胃立效右畔

依上刺之慢吸呼吸停針用針獲時而愈無有不效

傷寒結胃痞氣 胸中結痞湧泉 太溪 中衝 太陵

心中結痞隱白 太白 少衝 神門

胃中結痞少商 太淵 大敦 太衝并上下中腕瀉之

通身結胃身黃 湧泉

血結胃面赤大燥口乾消渴胃中疼痛不可忍

期門 太陵 關元如婦不得刺關元胎死

傷寒胸膈痛 期門 太陵 近世治結胃多用金針并用硫磺陽起石者若寒實結

胃或有痞者若熱實結胸必死也

痞

心下痞心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之活人浮者大云結胸與痞同脈沉若關黃瀉心脈浮者大黃黃連瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

大黃 黃連 各二兩 黃芩 兩一

右咬咀以麻沸湯二升漬之一時良久絞去渣分溫再服

惡寒汗出加附子心下痞而復惡寒汗出者宜

附子瀉心湯

大黃 黃連 黃芩 各一兩 附子 一枚炮

右咬咀百沸湯一大盞熱漬之一時久絞去渣納附子

木醫學綱目卷三十一

汁分溫再服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞

當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃

連瀉心湯活人云表症未解心下妨悶者非痞也謂之支

連瀉心湯結柴胡桂枝湯主之胃腸滿微結小柴胡加乾

薑牡蠣傷寒嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之若心下滿

而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯論見結胸

半夏瀉心湯

半夏 湯洗七次 黃芩 人參 甘草 各一兩

黃連 大棗 乾薑 右咬咀每服五錢每一盞半煎至八分去渣溫服半夏

瀉心湯若加甘草而後條甘草瀉心湯治痞嘔噦吐利

也若加生薑而後條生薑瀉心湯治痞嘔噦氣下利也

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷

鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不

盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故

使嘔也宜

甘草瀉心湯

甘草 黃芩 乾薑 半夏 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服活人

下傷寒發熱汗出不解心中痞嘔嘔吐而不利者大柴胡湯

主之心下痞硬嘔逆下利若表解身涼脇痛十水湯主之並見

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷

鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不

盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故

使嘔也宜

甘草瀉心湯

甘草 黃芩 乾薑 半夏 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷

鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不

盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故

使嘔也宜

甘草瀉心湯

甘草 黃芩 乾薑 半夏 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷

鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不

盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故

使嘔也宜

甘草瀉心湯

甘草 黃芩 乾薑 半夏 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷

傷寒發汗若吐若下解後心下痞噎噎氣不除者旋覆代
赭石湯主之活人云有旋覆代赭石湯証其人或欬逆氣
虛者先服四逆湯胃虛者先服理中丸次服

旋覆代赭石湯

旋覆花兩 人參半 生薑一兩 代赭石三
甘草兩 半夏八錢 大棗六箇

右咳咀每服五錢水一盞煎至八分去渣溫服 病解
後心下痞噎噎氣若不不利者此條旋覆代赭石湯也
若下利者前條生薑瀉心湯也

胃中痞硬氣上衝咽不得息者瓜蒂散若心下痞鞭脇痛
氣上衝咽眩者成痰方論並見
本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口煩燥
小便不利者五苓散主之

大黃瀉心湯

九

發熱惡寒身痛表症未解若心下支結妨悶者柴胡桂枝
湯也方見發熱若心下痞而腹滿者即前條
先以桂枝湯解後用大黃瀉心湯也
心下滿似痞而手足厥冷若脈乍結乍疎心煩飢不欲食
者瓜蒂散若脈沉細頭汗惡寒大便鞭者小柴胡湯

太陽病發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛
陰陽並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面色青黃膚腫
者難治今色微黃手足溫易愈

脈浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞
耳

脈浮而大心下反鞭有執屬藏者攻之不令發汗屬腑者
不令溲數溲數則大便鞭汗多則熱愈甚汗少則便難若
脈遲尚未可攻 陽明痞胃實心下硬滿者不可攻之

痞續法

痞傷寒本無痞應發汗醫反下之遂成痞枳實理中丸最
良審知是痞先用枳梗枳殼湯尤妙綠枳梗枳殼行氣先
用之無不驗也

枳梗枳殼湯治傷寒痞氣胸滿欲絕

枳梗 枳殼各二兩

右咳咀以水一盞煎至一盞去渣分二服

煩

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊
者梔子豉湯主之 若少氣者梔子甘草豉湯主之 若嘔
不結胃心下懊懣飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之
陽明病脈浮緊若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊

大醫學綱目卷三

辛

懷舌上白胎者宜梔子豉湯論見 下利後煩按之心下
濡者為虛煩也宜梔

梔子豉湯

肥梔子四箇 香豉半

右水二盞先煎梔子一盞納豉同煎取七分去渣溫服
得快吐止後服

梔子甘草豉湯於梔子豉湯中加甘草半兩餘依前法得
吐止服 梔子生薑豉湯於梔子豉湯中加生薑一兩二

錢餘依前法得吐止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主
之

梔子四兩 乾薑半

右二味以水一盞半煎取八分去渣溫服得吐者止後

服

發汗吐下後心中懊憹而煩若無燥屎大便與者此條梔子豉等湯也若有燥屎不大便者後條小承氣湯也

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈

陽明病下之心下懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯陽明熱滿胃實不大便心煩若吐下後者此條大小承氣湯也若不吐不下者調胃承氣也

證有人病傷寒八九日身熱無汗時時譫語時因下後大便不通三日矣非躁非煩非寒非痛終夜不得臥但心中無曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者未知是何症予診之曰此懊憹怫鬱二症俱作也胃中有燥屎者服承氣

太陽病下後

主

湯下燥屎二十枚得利而解仲景云陽明病下之心下懊憹微煩胃中有燥屎者可攻又云小便不利大便乍難乍易時有微熱怫鬱不臥者有燥屎也承氣湯主之素問云胃不和則臥不安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大便堅者必譫語此所以有時發譫語也非煩非躁非寒非痛所以心中懊憹也聲如歎息而發一聲所謂外氣怫鬱也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也

胃滿而煩

不得眠而煩論見不

胃滿而煩若不經汗兼往來寒熱者小柴胡湯方論見往兼下利咽痛者諸膚湯方論見若汗下後往來寒熱者柴胡桂枝湯方論見往兼身重不可轉側者柴胡龍骨牡蠣湯方論

而煩

發汗若下之而煩熱胃中空者梔子豉湯主之

心下滿

心下鞭滿而煩若滿而不痛腹中雷鳴下利者甘草瀉心湯 脇痛氣衝咽目眩者成痙方論 若滿痛下利不止水漿不下者併病方論

心煩腹

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者宜梔子厚朴湯

梔子厚朴湯 梔子四兩 厚朴一兩 枳實一兩

已上三味用水一盞半煎取八分去渣溫服得吐者止後服

腹滿而煩若有燥屎者前條大承氣湯也若大便澹胃痛欲吐先此時極吐下者調胃承氣湯也論見

太陽病吐之但太陽當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也脈之微數不可灸灸則煩逆論見 嘔時鬱鬱微煩若與小柴胡湯嘔不止者大柴胡湯也若

太陽病下後

主

極吐下後胃滿便澹腹痛者調胃承氣湯也 病欲解者必當先煩乃有汗而解論見 太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈 傷寒發熱汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯主之

病人脈已解而日暮微煩以病新瘥人強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微熱煩損穀則愈 吐利汗後脈平小煩者以胃虛不勝穀氣也論見

心悸而煩若少陽汗後譫語胃不和煩悸者活人用調胃承氣湯論見

若二三日心中悸而煩者宜小建中湯論見 心煩而渴

少陰病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人用四逆

湯論見 若與白通湯後下利不止厥逆無脈乾嘔者白通湯加猪

膽汁 若惡寒身倦時煩欲去衣者可治也論見但 手足厥冷而煩若脈乍結乍緊及心中滿飢不能食者宜

瓜蒂散吐之

若脈緊至七八日自利脈暴變微手足反溫者欲解也 方論並 若下利無脈乾嘔者白通湯加猪膽汁也論見

煩躁

煩躁有表証發熱惡寒體痛脈浮緊者大青龍湯也方論

若發汗不微太陽証不罷其人面赤躁煩短氣者更發汗 則愈論見

不醫學綱目卷三

重

得病二三日脈弱無太陽柴胡症煩躁心下鞅至四五日 雖能食以小承氣湯少與微和之令小安至六日與承

氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭 鞅後必溏未定成鞅攻之必溏須小便利屎定鞅乃可攻

之宜大承氣湯王註云無太陽証也 煩躁不 大便續臍痛發作有時者有燥屎也 下之後復發汗日

夜煩躁不得安眠時安靜不嘔則溏無表証脈沉微身無 大熱者宜

乾薑附子湯

乾薑附子生用

右二味以水三升煮取一升去查頓服

海服薑附湯有二法一法當熱服手少陰心也水包火熱 服以接心火身表寒感外火少也寒從外生熱從內消聲

如凍死寒在外也一法當寒服足少陰腎也寒邪入水冷 服以類腎水身表微熱內水多也熱從外生寒從內消聲 如飲冷寒在內也

發汗若下之病仍不解煩躁者宜 茯苓四逆湯

茯苓

人參

附子一枚生用去皮膽

右劉如麻豆大作一服水一盞半煎至八分去查溫服 煩躁心下鞅若未曾下者即前條無太陽柴胡症以小承

氣少少微和之也若已曾下心下鞅痛短氣躁煩者大陷 胃也若結胃証悉具煩躁者死也方論見

火之下之因燒鍼煩躁者宜 桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

不醫學綱目卷三

重

桂枝半斤 甘草炙 牡蠣炙 龍骨各一

右劉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去查溫 服

太陽病以火熏之不得汗其人必躁如不解必清血名為 火邪

太陽病火熨其背大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發 譫語十餘日振慄下利者欲解也論見

煩躁厥逆若吐利者吳茱萸湯也論見 不得臥者死也論見

成所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁

而逆遲復煩者也從煩至躁為熱未有不漸煩而躁者也 先躁後煩謂怫怫然更作燥悶此為陰盛隔陽也雖大躁

欲於泥水中臥但飲水不得入口是也此氣欲脫而爭...
 如燈將滅而暴明也蓋內熱曰煩謂心中鬱煩也外熱曰
 躁謂氣外熱躁也內熱為有根之火故但煩不躁及先煩
 後躁者皆可治外熱為無根之火故但躁不煩及先躁後
 煩者皆不可治也 臟厥就厥煩躁見方論 躁無暫定而
 厥者為臟厥靜而復煩吐舌而厥者為蛇厥烏梅丸主之
 方論 熱少厥微不欲食煩躁數日小便白者熱除也若
 欲食者愈若厥而嘔胃腸煩滿者便血論見 少陰病但
 欲寐不煩至五六日變自利煩躁不得臥者死論見

煩躁續法

活病人身冷脈沉細疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也宜
 服霹靂散須臾躁止得睡汗出即瘥火祿散丹砂丸金主
 之丹砂丸方
 見活人書

霹靂散治陰盛隔陽煩燥不飲水

附子一枚炮熟取出川冷灰搗
 右為細末分作二服水二盞煎至六分臨熟入蜜半匙

放溫或冷服之須臾躁止得睡汗出即瘥
 海已寒丸此丸不僭上陽生於下治陰症服四逆輩胃中
 發躁而渴者或數日大便秘小便澀亦服此丸上不躁大
 小便自利

肉桂 茯苓各五 良薑 烏頭炮各
 附子炮 乾薑炮 芍藥 茴香炒各
 右等分為細末糊為丸如桐子大溫酒下空心服五七
 十九八九十九亦得酒醋為糊俱可

全破陰州治陰中伏陽煩躁六脈沉伏方論見
 明年鄉人李信道得疾六脈沉伏不見深按至骨則若有

力頭疼身溫煩躁指末皆冷胃中滿惡心更兩臂矣皆不
 識止用調氣藥予診之曰此陰中伏陽也仲景法中無此
 証世人患此者多若用熱藥以助之則為陰所隔絕不能
 導引真陽反生客熱用冷藥則所伏真火愈見消燦非其
 治也須用破散陰氣導達真火之藥使火升水降然後得
 汗而解矣予授此藥二百粒作一服冷鹽湯下不時煩躁
 狂熱手足躁擾其家大驚予曰俗所謂換陽也須臾稍定
 畧睡身已中汗自昏達旦方止身涼而病除矣

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或嘔
 或小便不利少腹滿或喘者宜
 小青龍湯

麻黃 芍藥各三 五味子兩 乾薑
 甘草 細辛 桂枝去 半夏各三

右以咀每服五錢水盞半煎八分去渣溫服 若微利
 者去麻黃加芫花如彈子大棗赤色 若渴者去半夏
 加瓜蒌根三分 若噎者去麻黃加附子一錢五分炮
 若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓一兩 若喘
 者去麻黃加杏仁三分去皮尖

欬而往來寒熱智滿心煩喜嘔者小柴胡去人參薑蔥加
 五味乾薑也方論見
 欬而表解胃實屬陽明病若反無汗小便利而嘔手足厥
 者必頭痛若頭眩不惡寒能食者必咽痛論見
 欬而但欲寒屬少陰病若下利腹痛小便利四肢重痛
 者用真武湯加五味子細辛乾薑也 若下利六七日變
 欬嘔渴不得眠者猪苓湯也 若下利諸語小便難者被

火氣劫也 若四逆者用四逆散加五味子乾薑也並見

傷寒欲逆上氣其脈散者死謂其形損故也 然而失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷論別

丹葉慶和尚因飽醉後發熱嗽而右脇痛渴不安眠

柴胡 黃芩 白朮 陳皮
桔梗 木通各二 人參 麻黃各一
甘草三 右分三貼水煎服

傷寒汗後喘咳不止恐傷肺痿補肺散
人參一 五味子錢五 桑白皮兩 款冬花
蛤蚧對

右為細末每服五錢沸湯一盞調服

傷寒汗下後咳嗽肺虛聲音嘶敗者宜
阿膠散
薯蕷 阿膠炒 五味子 麥門冬法
白朮各一 乾薑炮 桂枝各二 杏仁去皮尖

右剉細末每服七錢水二盞入烏梅肉一錢同煎服

傷寒汗下後喘咳煩躁氣滯泄邪氣逆者用
桔梗湯
桔梗 桑白皮各一 甘草 貝母
訶黎勒各五

右為細末每服五錢入五味子烏梅肉各一錢水二盞同煎服

小便利 小便不利 小便不利表不解若乾嘔發熱而欬少腹滿者小青龍湯

去麻黃加茯苓也方論 若汗下後仍項強發熱心下滿

痛者桂枝去桂加茯苓白朮方論

小便不利胃脇滿若往來寒熱未汗下者小柴胡去黃芩加茯苓汗下後者加柴胡桂枝方論 若煩驚譫語身重不可轉側者柴胡湯加龍骨牡蠣也論見

小便不利大便乍難乍易喘急不能臥者大承氣湯論見

小便不利而渴若脈浮數發熱者五苓散加猪苓湯方論

若頭汗者柴胡桂枝湯加茵陳蒿湯方論

小便不利關節疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫者屬風濕宜甘草附子湯若脈沉緩大便反快者屬濕痺活人用五苓散也方論

小便不利頭汗若脇滿者柴胡薑桂也方論

若發黃者茵陳蒿湯也 小便不利身發黃方論

大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈活人云若大渴引飲須利之

湯 腹痛下利四肢重痛者用真武湯也方論 若四逆者用四逆散加茯苓方論

陽明病小便不利濇然汗出者若欲食者愈不能食者欲作痼瘕痼瘕者寒氣積結也

小便不利續法
陰症治 活陰症小便不利手足厥冷脈微細者不宜服利小便冷滑藥但服返陰丹并取臍下石門穴灸之方論

針灸 集傷寒小便不通取陰谷 陰陵泉 傷寒後小便不利見不通門

小便難

汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風小便難四肢難屈伸宜桂枝附子湯也若太陽症中風以火劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身黃陽盛陰虛欲飲小便難也方論見 若少陰以火劫汗者則欬而不利諸語小便難也論見

下後小便難有二若脈遲浮弱惡風寒下之者則脇滿身黃項強小便難也論見 若陽明胃實發熱惡寒脈浮緊下之者則腹滿小便難也論見 脇痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若下後不食項強者忌柴胡論見

少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃膈榮氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門

太陽病下之不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因至胃家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏和然後復下之得裏和三字中間必有衍文脫簡得字當字若字之誤裏和當是裏未和蓋脫一未字也 下利清穀脈沉遲其人面赤身有微熱者必鬱胃汗出解

小便不利大便乍難乍易喘冒不能臥者大承氣湯論見 諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰慄也論見 眩胃心下鞭若不汗下吐而項強者為併病宜刺大椎肺

若汗下吐後脈微氣上衝咽者成痿論見 欲寐下利止而眩者死論見

尸厥鬱胃續法

海傷寒傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則咽不與則不思六脈細數而不洪大心下無痞腹中不滿大小便如常或傳至十日已來形貌如醉醫見神昏不已多用大承氣湯下之則誤矣蓋不知此熱傳手少陰心經也然又未知自何經而來答曰本太陽經傷風風為陽邪傷衛陰血自燥熱畜膀胱壬病逆傳於丙丙丁兄妹由是傳心心火上迫重肺所以神昏也蓋肺為清肅之臟內有火邪故令神昏宜梔子黃芩黃連湯若脈在丙者導赤散脈在丁者瀉心湯若誤用涼膈散此乃氣中之血藥也如右手寸脈沉滑有力者則可用之或用犀角地黃湯近於是已本方所說若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經血中

熱藥若脈浮沉俱有力者是丙丁俱有熱可以導赤散瀉心湯各半服之則宜矣此症膀胱傳丙足傳手經者下傳上也丙傳丁者表傳裏也壬傳丁者良之難也越經傳者又為腑傳臟也活人云傷寒只傳足經不傳手經者此言不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或止傳一經或間傳三經不可一途取之但視其脈與外證治之此活法也與食則咽者邪不在胃也不與則不思者以其神昏故也邪熱既不在裏誤用承氣下之其死也必矣脈在丙者脈浮也脈在丁者脈沉也脈在丙丁俱有熱者浮沉俱有力也

噫而心下痞硬不利者旋覆代赭湯若下利者生薑瀉心湯也方論

噫續法

水相 傷寒嗜氣者何氣使然答曰胃中氣不交故也少陰經

至胃中交於厥陰水火相傳而有聲故噫氣也宜
如聖加枳實湯

甘草 桔梗各五 枳實三

右剉細每服五錢入五味子半錢水煎服

汗下後 傷寒汗下後喘而噫氣者宜如聖加人參藿香杏仁湯各
分右剉細每服五錢水煎服

後吐 傷寒大吐大下後極虛復極汗出者以其人外氣拂鬱復
與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

飲水而 胃中虛冷不能食者飲水則噦與小承氣湯入腹中不轉
矢氣者不可攻之攻之必脹滿不食與水則噦

本渴而飲水嘔者噦食穀者噦 陽明病胃實不能
食者攻其熱必噦 濕家頭汗出背強惡寒欲覆被

向火者下之早則噦 太陽病以火劫發汗血氣流溢身黃欲嘔頭汗腹滿語

其者至噦捻衣摸床小便利者可治 傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

陽明胃實脈浮大短氣腹滿脇痛喘臥身黃小便難有
潮熱時時噦脈浮者小柴胡若不尿腹滿加噦者不治

噦續法

活噦胃寒所生橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退
陰散主之若服藥不瘥者灸乳直下一指許三壯若婦人

刺屈乳頭下盡處是穴亦有陽症者小柴胡湯橘皮竹茹
湯方見雜

湯方見雜

橘皮乾薑湯

橘皮 通草 乾薑 桂心
甘草各三 人參二

右剉咀每服四錢水一盞煎至六分去渣溫服日三

羌活附子散 半夏生薑湯治噦欲死 半夏一 生薑二兩

右水二盞煎至八分去渣溫服 海傷寒欬逆脈散死 仲景之言不虛偽 大抵原因失

下生 欬逆喉中陰不內 便軟惟宜用瀉心 便硬尤
宜大承氣 二藥神工作者誰 東垣潔古為良劑

濕欬逆者火熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便秘
者宜大承氣下之便軟者瀉心湯主之

海少陰欬逆者此失下也陰消將盡陽逆上行使陰不內

也然陰既盡陽亦將盡也吸入腎與肝陽逆上行陰入不
內故為陽極脈微將盡者不宜下宜服瀉心湯養陰退陽

而已如不用瀉心湯涼膈散去硝黃清肺散亦可若脈左
浮右沉實非表也裏極則反出於表也何以然欬逆舌強

右脈實者知少陰裏也飲水過多心下痞而渴逆者五苓
散主之別無惡候是也惡候生或兼以舌燥語言不正而

反昏冒與咽痛者少陰也速下之宜大承氣湯也何以脈
浮為表浮之實大沉之損小是為表也浮之實大沉之亦

然即非表也邪入已深矣內熱當沉反浮陽極復之表也
陰症者內已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火已

病丁火又消所以遊行相火寒邪迫而萃集於胃中亦欲
盡也故令人發熱大渴引飲欲去蓋覆病人獨覺熱他人

按執之身體肌肉骨髓血脈俱寒此火即無根之火也故

用丁香乾薑之類執藥溫胃其火自下

川烏頭大者三錢炮

右為細末每服三錢用黑豆二十一粒砂糖同泡湯調

乘熱細細飲之

本治陰毒吃逆方

川烏頭

乾薑

附子炮

肉桂

芍藥

半夏

炙甘草

吳茱萸

陳皮

大黃各等分

右為細末每服一錢水一盞生薑三五片煎至七分去

查溫服

肉苳菴湯治傷寒汗後吃逆噫氣

肉苳菴

石蓮肉炒

茴香各一

人參

丁香各半

枇杷葉五片拭去毛炙

右剉細用水四盞生薑十片煎二盞去查空心溫服分

二服

良薑湯

橘皮

良薑

桂枝

當歸各一

麻黃半

杏仁二十

甘草半

檳榔三錢別

右吹咀用水四盞薑十片煎三枚同煎至二盞去查下

檳榔末再煎三沸通口服一盞未已再服老云傷寒

吃逆不止是陰陽氣升降欲作汗升之不下故胃氣上

逆為吃逆無休止宜服此方

無汗

太陽發熱惡風寒體痛脈浮緊無汗其人若喘者麻黃湯

也若煩躁者大青龍湯也 若項背強者葛根湯也

太陽發熱惡風寒體痛脈浮緊無汗其人若喘者麻黃湯也若煩躁者大青龍湯也 若項背強者葛根湯也

若小便少氣衝胃口禁者為剛症亦葛根湯也

若自汗者必自愈

陽明病胃家實法當多汗若反無汗者有四逆脈浮而喘

者邪尚在表宜麻黃汗之身如虫行痒者久虛宜建中之

類小便利而厥者寒邪宜溫之小便不利發黃者必熱宜

苗陳利之也

無汗身痒其人若脈微惡寒面反有熱色者桂枝麻黃各

半湯也

若脈浮遲面赤戰惕發熱者遲為無陽

不能作汗也

若陽明胃實身如虫行者久虛也

汗小便不利其人若身黃頭汗渴飲水漿或懊懣者宜

柴胡湯

若項強發熱心下滿痛桂枝去桂加茯苓

芍藥湯

若身黃脇痛鼻乾嗜臥有潮熱脈浮者

若白木也

無汗禁忌若浮身痛者忌桂枝

解者忌白虎 若少陰欲寐但厥者忌強發汗必動

其血也

與之至有不肯汗出者服三劑乃解若汗不出者死病也

無汗續法

傷寒在表發熱惡寒頭項痛腰脊強無汗尺寸脈俱浮

合谷五分 手陽明商丘 合谷 手太陽腕骨 陽谷

足少陽俠谿 足陽明厲兌 手厥陰勞宮 皆隨經辨

脈刺之 又十二經榮皆可刺 傷寒發汗不出 風池 俠溪 魚際

渠二 內庭 汗

瘡狀

日二三 太陽病如瘡狀一日二三度發其人若脈微緩不嘔清便者欲愈也若脈微惡寒面有熱色身痒者桂枝麻黃各半也方論見 服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘡日再發者汗出必解宜

桂枝二麻黃一湯

桂枝八錢 芍藥五錢 麻黃三錢 大枣二

生薑五錢 杏仁八枚 甘草半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

病人煩熱汗出解又如瘡狀日晡所發者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯 婦人寒熱經水適斷者為熱入血室其血必結故

八寶丹

使如瘡狀發作有時小柴胡湯主之 論見婦人傷寒

頭汗

小便不利其人若胸脇滿往來寒熱者柴胡桂薑也 方論見 若發黃渴飲水漿者宜茵陳湯 方論見

陽明胃實頭汗其人若下血語者為熱入血室宜刺期門 論見 若下後手足溫不結胃心中懊憹飢不欲食者宜梔子豉湯 方論見 若被火額上汗出小便不利者必發黃也 方論見

頭汗心下滿其人若脈沉細微惡寒手足冷口不欲食大便鞭者小柴胡湯 論見厥性

若水結胃無大熱者大陷胃湯孫兆改用半夏茯苓湯

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩目昏翳其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰

陽俱虛身熱則枯燥但頭汗出刺頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至臑手足躁擾捻衣摸

牀小便利者可治 關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死 濕家關節疼痛下之額上汗出微喘小便利者

死下利不止者亦死 濕家頭汗出欲被覆向火者若下之早則噦胃滿小便不利舌上白胎也 論見

孫凡水結胃脇間頭必有汗治以半夏茯苓湯

活病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭汗出者五臟乾枯胞中空虛津液少也慎不可下下之謂之重虛

成頭者謂之會邪搏諸陽津液上湧則汗見於頭也 海頭汗出刺頸而還血証也額上偏多者屬心部為血証也獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

舌上白胎若陽明胃實脇下滿不大便而嘔者小柴胡湯 論見 若下後心中懊憹者梔子豉湯 方論見 若下後噦而胃滿小便不利者丹田有熱胸中有寒也 論見 脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥俛臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足溫者此為欲解或到八日已上反大熱者此為難治設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也 海藏云惡寒必欲嘔者中臟結如結胃狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細沉緊舌上白胎滑者難治也若無陽症不往來寒熱其人反靜者不可攻也 論見

舌胎續法

未醫學類卷三

一一八

舌白胎 成舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三四日已後
舌上有膜白滑如胎甚者或燥澀黃黑是數者熱氣淺深

之故也邪氣在表者舌上即無胎及邪氣傳裏津液結搏
則舌上生胎矣寒邪初傳未全成熱或在半表或在半裏

或邪氣客於胃中者皆舌上白胎而滑也經曰舌上如胎
者以丹田有熱胃上有寒邪初傳入裏也陽明病膈下硬

滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪在半表
半裏也太陽病若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹

舌上胎者梔子散湯主之是邪客於胃中也若病在臟宜
若可下如舌上滑胎者則不可攻是邪未全成熱猶帶表

寒故也 及其邪傳為熱則其舌上之胎不滑而澀也經曰傷寒七
八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥

而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之是熱結津液而
滑者已乾也

若熱聚於胃則為之舌黃是熱已深矣金匱要略曰舌黃
未下者下之黃自去

若舌上黑色者又為熱之極也鍼經曰熱病口乾舌黑者
死以心為君主之官開竅於舌黑為腎色見於心部心部

者火也腎者水也水之邪熱已極鬼賊相刑故知必死也
垣下後病嗽加五味子麥門冬如舌上有滑胎者是胃中

有寒勿用之胃有微寒加辛熱之劑立效 舌燥澀如楊
梅刺者用生薑切厚片蘸蜜於舌上搽之其刺立消神效

無薄荷蜜治舌上白胎乾澀諸語不真先以生薑厚片蘸
蜜水揩洗有用薄荷自然汁與白蜜等分調勻傳之良

動氣

動氣者為築築然動跳於腹者是也 動氣在右不可
發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤
活人云先服防風白朮牡蠣

汗止次服建中湯方見自汗 動氣在上不可發汗發汗
則氣上衝正在心端湯方見氣上衝

發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目暈惡寒食則反
吐穀不能進活人云先服大橘皮湯

下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也 動氣在左不
可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖身有熱臥則

欲蹠 動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱
汗自泄欲得水自灌 動氣在下不可下下之則腹脹滿

卒起頭眩食則下清穀心下痞也 動氣續法

傷寒汗下後臍左有動氣者宜 防葵散

防葵散 防葵一兩 木香不見 柴胡 黃芩各半

右剉為細末每服五錢水煎服 傷寒汗下後臍上有動氣者宜

枳殼散 枳殼五錢 赤茯苓 當歸 三稜炮各

木香 訶梨勒各五 右為末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍右有動氣者宜 前胡散

前胡 赤茯苓 大腹皮 人參各五
木香 檳榔 大黃各三

右為細末每服五錢沸湯點服
傷寒汗下後臍下有動氣者宜
茯苓散

赤茯苓一兩 檳榔三錢 桂心 大腹皮

川茴香炒 良薑各五錢

右為細末每服五錢沸湯點服

如久不治傳為積熱治之難痊不可汗下也

鼻衄

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之活人云衄後脈浮者宜麻黃湯

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表症仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之 不大便頭痛有熱若小便赤者承氣湯也若小

便清而衄者桂枝湯也論見 太陽病脈浮緊發熱無汗而衄者愈也論見

虛則小便難論見 少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻出或從目中出者難治論見 動氣發汗則

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄 陽明胃實口燥但欲

漱水不咽者必衄也 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊方視不能瞬不得眠論見 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

脈微不可汗也若脈浮緊及得續者皆當發之是也
傷寒衄血脈已微者黃芩芍藥湯犀角地黃湯主之
犀角地黃湯治傷寒應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑此方主消化瘀血

芍藥一兩 生地半兩 牡丹皮二錢 犀角半錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎取一盞有熱如狂者加黃芩一兩其人脈大來連腹不滿自言滿者為無熱不用黃芩

茅花湯治鼻衄不止用茅花尖一把以水三盞濃煎汁一盞分二服即瘥無花以根代之

若衄而渴者心煩飲則吐水先服五苓散次服竹葉湯

治傷寒衄血滑石丸

滑石末不以多少飯丸如桐子大每服十九微嚼破新水咽下立止用藥末一錢飯少許同嚼下亦得老幼皆可服湯晦叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不以多少乃止宜服溫藥以調其衝穢見鮮血急以此藥治之

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯也方論見

若陽明胃實譫語者宜刺期門穴論見

太陽病以火熯汗不得汗其人必躁而滑血論見 淋家不可發汗發汗則便血 太陽病下之其脈浮滑者必下

血論見 少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也 傷寒熱少厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈若嘔而

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯也方論見

若陽明胃實譫語者宜刺期門穴論見

太陽病以火熯汗不得汗其人必躁而滑血論見 淋家不可發汗發汗則便血 太陽病下之其脈浮滑者必下

血論見 少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也 傷寒熱少厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈若嘔而

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯也方論見

若陽明胃實譫語者宜刺期門穴論見

太陽病以火熯汗不得汗其人必躁而滑血論見 淋家不可發汗發汗則便血 太陽病下之其脈浮滑者必下

血論見 少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也 傷寒熱少厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈若嘔而

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯也方論見

若陽明胃實譫語者宜刺期門穴論見

太陽病以火熯汗不得汗其人必躁而滑血論見 淋家不可發汗發汗則便血 太陽病下之其脈浮滑者必下

血論見 少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也 傷寒熱少厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈若嘔而

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯也方論見

若陽明胃實譫語者宜刺期門穴論見

太陽病以火熯汗不得汗其人必躁而滑血論見 淋家不可發汗發汗則便血 太陽病下之其脈浮滑者必下

血論見 少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也 傷寒熱少厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈若嘔而

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯也方論見

胃腸燥者必便血也

唾血

咽痛吐血若面赤斑斑如錦紋者為陽毒宜升麻紫甲湯

方論見

若下後利不止手足厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯

見下

脈浮熱甚反灸之必咽燥唾血

吐膿血

畜血

身黃如狂屎黑甚志者為畜血 太陽病表証在而發熱

惡寒脈反沉結而身黃發狂少腹硬滿者若小便利為

無血也小便自利血證諦也宜以抵當湯主之

抵當湯

水蛭十枚

右咬咀作一服水一盞煎七分去渣溫服

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下

之不用餘藥宜

抵當丸

水蛭五枚 蟅蟲五枚 桃仁六枚

右為末煉蜜和作一丸以水一盞煎至七分頓服時

當下血不下再服

太陽病不解熱結勝脫其人似狂若血自下者病愈其外

未解者尚未可攻當先解外外解但小腹急結者宜攻之

桃仁承氣湯

桃仁十二枚 去尖

大黃兩

甘草

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣入硝化開食

後服

陽明症胃家實喜忘大便黑色雖硬反易者有畜血宜抵

當湯

海初便褐色者重再便深褐色者愈重三便黑色者為尤

重色變者以其火燥也如羊血在日色中須更變褐色久

則漸變而為黑色即此意也當詳察之

訛血在上則喜忘在下則發狂

病人無表裏症發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已

下脈不解胃熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血

宜抵當湯若脈數不解血下不止必協熱而便膿血也

成當不大便六七日之際無喜忘如狂之症又無少腹硬

滿之候何以知其有畜血蓋以其脈浮數故也浮則熱客

於氣數則熱客於血下後浮數俱去則病已若下後數去

而浮仍在則榮血中熱去而衛氣中熱在為邪氣獨留心

下善飢邪熱不殺穀潮熱反渴也若下後浮去而數不解

則衛氣中熱去而榮血中熱在血熱合併迫血下行胃虛

協熱消穀善飢血至下焦若下不止則血得以泄必膿血

也若不大便六七日則血不得出泄必畜在下焦為瘀血

故須以抵當湯下之

病者胃滿痞痞舌青口燥但漱水不欲下咽無寒熱脈微

大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血

病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰伏是

瘀血也當下之

衄血唾血畜血續法

海血症古人用藥雖有輕重之殊而無上下之別今分作

上中下三等以衄血嘔血唾血吐血為上部血結胃中為

中部畜血下焦為下部夫既有三部之分故藥亦當隨其

輕重也

汗多為衄血脈浮灸之咽燥為唾血當汗不汗熱入於裏

者為嘔血吐血此在上也犀角地黃湯主之涼膈散加生

地黃亦可然衄唾嘔吐俱在上亦當以輕重分之大凡血

證皆不飲水惟氣證則飲之宜詳之此證乃足太陰所主

脾所不果越而上行所以有吐血嘔血之候也實者犀角

地黃湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐者以脾所主故咸用

芍藥主之是知太陰藥也

血結胃中 頭痛身痛漱水不咽者衄無熱胃滿漱水不

欲咽者甚忘昏迷其人如狂心下手不可近者血在中也

醫學綱目卷三

聖

下部血 桃仁承氣湯主之

畜血下焦 其人發狂小腹滿硬小便利大便反黑及

臍下疼者抵當湯九主之如狂者在中發狂者在下

抵當湯丸藥味同劑如何是一法蓋喜忘發狂身黃屎黑

者疾之甚也但小腹滿硬小便利者輕也故有湯丸之別

桃仁大黃等分水蛭重多者作湯三之二者作丸九之

名取其數少而緩也故湯用煎服一升丸止服七合也

活病人無表症不發寒熱唇燥但欲漱水不欲入咽其脈

微而沉小腹硬滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證

證也大抵傷寒當汗不汗裏熱畜化為血其人喜忘而如

狂血上逆則喜忘血下畜則如狂輕者犀角地黃湯桃仁

承氣湯甚者抵當湯丸須取盡黑物效按太陽病畜血

今云無表証者但說

得陽明畜血為未備

海喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但小腹滿小便利者

輕也

生地黃丸病人七八日後兩手脈沉細微膚冷臍下滿或

狂或躁大便實而色黑小便自利者此畜血証也若老幼

氣虛弱者宜此方主之

生地黃 自然汁一升如無生地 乾漆 半斤

生藕 自然汁半升如無藕 藍葉 一握切細乾

蛭 二十箇去翅 水蛭 十箇 大黃 一兩

桃仁 研碎 右一處入水三升同慢火熬及二升放冷分二服先投

一服至半日許血未下再投之此地黃湯比抵當湯丸

其勢甚輕如無地黃藕汁升數添水同煎抵當丸恐

用之太過不止損血故以此湯主之

治一貧士病脾胃虛與補劑藥愈後繼而居曠室臥熱

炕咳而吐血數次予謂此久虛弱外有寒形而有火熱在

內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱蓋冬

居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒雍遏裏熱火邪

不得舒伸故血出於口因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻

黃湯發汗而不與之遂成衄血却與麻黃湯立愈與此甚

同因與

麻黃人參芍藥湯

麻黃 一錢去 桂枝 半錢 補 白芍藥 一錢

甘草 一錢 五味 五粒 安 門冬 三分 人參 三分

當歸 五分 右咬咀作一服水三盞煎麻黃一味令沸去沫至二盞

入餘藥同煎至一盞去查熱服臨臥一服愈觀此一方
足以為萬世模範也蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服
之但凡虛人合用仲景方者皆當以此為則也

**傷寒吐血諸陽受邪初熱在表應發汗熱毒入經結於
五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當湯也輕者桃仁
承氣湯無服犀角地黃湯三黃丸**

短氣

短氣骨節痛不得屈伸汗出小便不利惡風身腫者為風
濕宜甘草附子湯方論見 短氣腹滿脇痛其人若脈弦
浮大外不解無汗嗜臥身黃小便難有潮熱者小柴胡湯
也論見胃實方
若表未解手足濇然汗出或有潮熱者宜大承氣湯方論
若表解心下痞硬乾嘔短氣者宜十棗湯方論

短氣煩躁若發汗不微續微汗出不惡寒表證不罷面赤
者為併病更發汗則愈論見

若下後心中懊憹心下硬痛者用大陷胃湯論見
跌陽脈微而緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣
坐而伏者短氣也論見

心痛

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未全解也
梔子豉湯主之

陽明病胃實脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾無汗
嗜臥身黃小便難有潮熱時時噦者小柴胡湯論見胃實

心痛續法

傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不可忍宜灸中脘氣

海二穴如小腹有氣上衝者宜灸天樞氣衝三里三陰
交如無此症
除中

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯微其熱脈遲為寒今與
黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除
中必死 眼睛不慧語言不出而穀食反多者此為除中
口雖欲言舌不能語 凡手足厥冷而利不當食而食者
恐為除中試與索餅食之發熱者除中不發熱者非也論

下重

泄利下重若少陰症欲寐四逆者四逆湯加薤白散若熱
者白頭翁湯方論見
脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰已

下必重而痺名火逆也

脈遲浮弱惡風寒者表症醫反下之遂不食脇痛身黃項
強小便難復與柴胡湯必下重論見
下利脈沉弦者下重也論見

身熱惡寒身寒惡熱

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也論見
以桂枝湯治寒次以小 身大寒反不欲近衣者寒在皮
膚熱在骨髓也論見
續增症

射干湯治初秋暴雨冷及天行暴寒其熱喜伏於內咳嗽
曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無唾喉中如梗

射干兩 半夏兩 杏仁兩半去 生薑兩
甘草 紫苑各一 橘皮 肉桂

枳實多各 當歸 獨活 麻黃已上各

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

續增斑

海陽症發斑有四有溫毒發斑有熱病發斑有時氣發斑

有傷寒發斑已上四斑活人

陽斑如

斑如錦紋或發之四末或發之面部或發之胃背色紅

赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下早一則下晚乃外感

熱病而發也宜用玄參升麻湯白虎等藥王輔泰云赤斑

斑出十死一生皆用白虎人參湯阿膠大青

龍湯與紫雲散大妙可下者謂胃承氣湯

溫毒發斑者初春病人肌肉發斑癢疹如錦紋或咳心

悶但嘔者是也冬時觸冒寒毒至春始發初病在表或已

汗吐下而表証未罷毒氣未散以此發斑宜用黑膏主之

又有冬月溫煖人感乖戾之氣冬末即病至春或被積寒

所折毒氣不得洩至天氣暄煖溫毒始發則肌肉斑疹如

錦紋而咳心悶但嘔有清汁宜用葛根橘皮湯主之

黑膏方療溫毒發斑

生地半斤 好豉升

右二味猪膚二斤合一處煎令三分減一絞去查用雄

黃麝香如葶大為末同藥再煎服之其毒便從皮中出

者則愈忌蘊菓

葛根橘皮湯療冬溫木即病至春被積寒所折不得發至

夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑癩癢疹如錦紋而咳心

悶但嘔吐有清汁宜服此湯即止

葛根 橘皮 杏仁去皮 知母

黃芩 麻黃去節 甘草炙

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查溫服

熱病發斑與時氣發斑並同夫病人或末發汗或已經發

汗而熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚所以發斑

瘡癩疹如錦紋俗名謂之熱瘡素問謂之疹大抵發斑不

不可用表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開洩更增癩爛

也宜用玄參升麻湯大青四物湯猪膽雞子湯選用之

玄參升麻湯治傷寒發汗吐下後毒氣不能散表虛裏實

發熱於外故身發癩如錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫

痛

玄參 升麻 甘草炙

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查熱服

大青四物湯治傷寒熱病十日已上發汗及吐利後熱不

除身上斑出

大青 阿膠 甘草炙 豆豉合

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞旋入膠再煎令

溶服

猪膽雞子湯治五六日斑出

猪膽三 雞子一 苦酒三

右三味合煎三沸強人盡服瘦人煎六七沸服之

陽毒升麻湯治斑出面方見

海消毒飲子治癩

黍粘子六 荆芥 防風各二 甘草一

右咬咀水煎服

陰症發癩出曾背又出手足亦稀少而微紅者若作熱症

投之涼藥大誤矣此無根失守之火聚於胃中上獨熏肺

傳於皮膚而為斑點但如蚊蚋蚤虱咬形狀而非錦紋也

宜調中溫胃加茴香芍藥以大建中陰毒升麻煎甲湯之

類其斑自退可謂治本而不治標也海藏云陽明發斑有紅點如斑出於皮膚之間者宜白虎湯心等藥當審之 大建中湯方見治陰毒 陰毒升麻鱉甲

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲絕厥陰脈也服溫藥數日不已又以薑附等藥覺陽微回脈生因渴私飲水一杯脈復退又見頭不舉目不開問之則犯陽易若只與燒棍散則寒而不濟矣遂更用吳茱萸湯一大服調燒棍散連進二服出大汗兩晝夜而愈

欲眠目不閉聲啞為狐惑為區

狐惑之為病狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默欲眠目牽不得閉臥起不安重蝕於咽喉為惑蝕於陰肛為狐不欲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部

則聲啞甘草瀉心湯主之 蝕於下部則咽乾苦參湯洗之 蝕於肛者雄黃散熏之用雄黃一味為末取二瓦合之燒向肛熏之

脈經云病人或從呼吸上蝕其咽喉或從下焦蝕其肛陰蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者猪苓散主之方未考

病者脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四皆一本皆黑若能食者膿已成也

赤茸當歸散主之方見下血

狐惑續法

一婦人狐惑聲啞多眠目不閉惡聞食臭不省人事半月後又手足拘強脈數而微細先與竹瀝薑汁一盞服之忽胃中有汗腹鳴即目閉省人事遂用參朮歸陳入竹瀝薑汁飲之五六貼而愈

活狐惑傷寒與濕蘆皆証初得狀如傷寒或因傷寒變或此疾大抵傷寒腹內熱食少腸胃空虛三垂行作求食蝕人五臟及下部為蠱虫病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽喜眠虫蝕其肛爛見五臟則死常數看其上下唇上唇有瘡虫蝕其臟下唇有瘡虫蝕其

黃銳散主之

治蠱桃仁湯

生艾

大棗十五箇

右水二盞煎至一盞半分三服

黃連犀角湯治傷寒及諸病之後內有膿出下部者

黃連半

犀角一

右水二大盞半煎至一盞半分三服

雄黃銳散治下部膿瘡

雄黃

桃仁去皮尖

右為散以生艾搗汁為丸如棗核大綿裹納下部匾竹葉汁更嘉冬月無艾只用散裹納亦得

百合病

百合病論曰百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也人常默默然意欲食不能食意欲臥不能臥意欲行不能行或有時聞食臭或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥即劇吐利如有神靈者身形雖似和其人脈微數每溺時輒頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸

漸然者四十日愈若溺時快然但頭眩者二十日愈體症

或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨其症治之注人云此名百合傷寒多因傷寒虛勞大病之後不平安後變或奇疾也

百合病發汗後宜服

百合知母湯 百合七枚 知母三兩

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去其水更以井水二盞煎至一盞去查又將井水二盞另煎知母取一盞去查和百合一盞同煎取一盞半分溫再服

百合病下後者宜用

滑石代赭湯

百合七箇 滑石三兩碎 代赭石如彈大一

右先將百合水洗淨浸一宿當白沫出水更以井水二升煎取一盞去查另用水二升煎滑石代赭石取一升

入黃芩半斤

去查後合和同煎取一升半分溫服

百合病吐後宜用

百合雞子湯

百合七枚 雞子黃一枚

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去其水更以井水二升煎取一盞去查納雞子黃攪勻煎五分溫服

百合病不經吐下發汗病形如初者宜

百合地黃湯

百合七箇 生地黃汁一升

右水洗百合浸一宿當白沫出去水更以井水二升煎取一升去查納地黃汁煎取一升五分溫再服中病

勿更服大便當如漆黑

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之用百合一升

以水一斗漬之一宿洗身已食者餅勿以塩菽食之

百合病渴不瘥者宜

括萎牡蠣散

括萎根 牡蠣各等分

右為末飲服方寸七日三服

百合病發熱者一作發熱宜用

百合滑石散

百合兩 滑石三兩

右為散飲服方寸七日三服當微利止服熱則除

宜忌 百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆也

入黃芩半斤

畫

醫學綱目卷之三十三 傷寒部

勞復門 陰陽易

仲景主於咳邪 大病瘥後勞復者枳實梔子豉湯主之

枳實四枚 梔子十四枚 豉一兩

右三味以清漿水二盞空煮退一盞內枳實梔子煮取

八分下豉更煮五六沸去渣溫服覆令取微汗若有宿

食內大黃量虛實加減

傷寒瘥後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之沉

實者以下解之

大病瘥後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

牡蠣洗 澤瀉 蜀漆洗去 商陸洗

海藻洗 括萎根 葶藶各等分

右為散水服方寸七小便利止後服日二

六醫綱目卷之三十三

大病瘥後喜睡久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜

理中丸

傷寒解後虛弱少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

淡竹葉二把 石膏半斤 半夏三兩 人參三兩

麥門冬四兩 甘草炙 嘔者加生姜半兩

右咬咀每服五錢水一盞半入粳米百餘粒煮取八分

米熟湯成去渣溫服

診風家表解而不了了者十二日愈

勞復續法

潮大抵勞者動也動非一種有內外血氣之異焉若勞乎

氣則無力與精神者法宜微舉之若勞乎血與筋骨者以

四物之類補之若勞在脾內為中州調中可已此為有形

病也但見外證則謂之復病非為勞也如再感風寒是已

左記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心不得

寧真勞復也予診之曰勞心之所致神之所舍未復其初

而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾

得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之或者難曰虛則補

其母今補其子何也予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛

則補其母實則瀉其子此虛當補母人所共知也千金曰

心勞甚者補脾氣以益之脾王則感之於心矣此勞則當

補子人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方

治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受陰

同義方治其勞則補其助我者與荀子言未有子富而父

貧同義此治虛與勞所以異也

補脾湯治傷寒得汗瘥後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血

氣不和

人參 白朮 甘草 橘皮去白

青皮去白 乾姜各等分

右為末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得

治勞復麥門冬湯氣欲絕者用之有效能起死回生

麥門冬兩 甘草二兩 粳米合

右麥門冬去心為細末水二盞煎粳米令熟去米約湯

一小盞半入藥五錢七葉二枚去核新竹葉一十五片

同煎至一盞去渣溫服不能服者綿滴口中又治小兒

不能灌藥者宜用此綿滴法 此方不用石膏以其三

焦無火熱也兼白欲死之人陽氣將絕者故不用石膏

若加人參大妙

外大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛

乳一升水四升煎至一升如人饑稍稍飲不得多期十日

服不住住

七 治篤病新起早勞食飲多致勞復欲死燒鷄甲服方寸

活雄鼠屎湯治勞復

梔子十四 雄鼠屎二十七枚兩 枳殼三枚

右為細末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎

七味葱白湯治傷寒或因起動勞復或因吃食稍多皆成此候若復甚者一如傷寒初有此證宜服此方

葱白連 乾葛 新豉半 生姜切一

麥門冬法 熟地三錢 流水四升以杓揚之

右七味用清水平煎三分減二去查分二服漸漸服之取汗

八 醫聖類卷之三

右傷寒勞復莫若仍用丹溪以參芪歸朮加散之劑汗之為的當也

陰陽易

虛邪

傷寒陰陽易之為病其入身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒

視散主之

燒視散取婦人中視近隱處剪燒灰以水和服方寸七日

三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子視襠燒灰

用

嘗治傷寒病未平復犯房室死者命在須臾用獨參湯調

燒視散凡服參一二斤餘得愈者三四人信哉用藥不可

執一也 陰陽易續法

寒熱

治傷寒病新瘥陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞

痛婦人則裏急腰膝連腹內痛名為陰陽易也其男子病

新瘥未平復而婦人與之交按得病名曰陽易婦人病新

瘥未平復而男子與之交按得病名曰陰易若二男二女

並不自相易所以呼為易者以陰陽相感動其甚者於人

如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉眼中生花四

肢拘急小腹絞痛手足拳則死亦有不自死者病苦少腹

裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離脈緩而血氣虛

骨髓竭便恍恍惚氣力轉小着床不能動搖起止仰人

或牽引歲月方死宜燒視散散鼠屎湯竹茹湯青竹茹湯

乾姜湯當歸白朮湯選用之海藏云鼠屎湯者燒鼠屎竹茹湯

至於按正方妙香按按下治諸病陰陽

易中不牛黃鳴射之類是治其熱症也

竹皮湯療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕竹皮青刮一升

用水三升煮取一升絞去查分二服立愈

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致熱氣衝胸手足拘

急搐搦如中風狀宜此湯

瓜蒌根兩 青竹茹剉半升

右以水二升煮取一升二合去查分二三服

妙香丸方見前

百一治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕酸引

數條絞取汁服之良

湖若陰陽易果得陰脈當隨症用之 若脈在厥陰當歸

四逆湯送下燒視散 若脈在少陰通脈四逆湯送下燒

視散 若脈在太陰四逆理中丸送下燒視散所用之藥

各隨其經而效自速也

鼠屎湯療傷寒病後男子陰易

韭白根把一 猥鼠糞十四粒兩

右二味以水五升煮取半升去查再煎三沸温服得效未汗再服亦理諸般勞復

當歸白朮湯治婦人未平復因有所動小腹急痛腰膝四肢不任舉動無力發熱者

白朮 當歸 桂枝 附子生

甘草 芍藥 黃芪 人參各半

生姜兩

右咬咀水煎服食頃再服温覆取微汗瘥

李良佐子病太陽症尺寸脈俱浮數按之無力余見其內陰虛與神木加乾姜湯愈後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重目眩曰唯與大建中三四服外陽內收脈反沉小始見陰候又與已寒

加芍藥茴香等九五六服三日內約服九六七百丸脈復生又用大建中接之大汗作而解

山因女色病陰証傷寒者用陳皮熟鍋內炒焦以酒烹下濾酒飲之

四時傷寒不同

冬為傷寒 春為溫病 夏為暑病 秋為瘧

一歲長幼病相似為溫疫 多眠多汗脈浮為風温 一身盡痛為濕 身反張為瘧

陰陽大論曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣寒冷此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏若能固密則不傷必寒觸胃之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病惟傷寒為毒者以其最為殺厲之氣也中而即病者為傷寒不即病者為寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏變

為暑病暑病者熱極重於温也是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也
凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大温此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也
從春分以後至秋分節前大有暴寒者皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒且時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與温病及暑病相似但治有殊者要在辨其病原寒熱温二者之異則用藥冷熱之品味判然矣
其冬有非節之暖者名冬温冬温之毒與傷寒大異冬温復有先後更相重沓亦有輕重治亦不同
天之政五之氣陽明司天之政終之氣厥陰司天之政終之氣皆病冬温其不應常和而反常者則不可無之而時變也 氣候亦有應至而不至者或有未應至而至者或有至而太過者皆成病氣也
凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四君子湯加散散劑血虛者四物湯加散散劑東垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻藜蘆蒼朮海藏治風濕無汗者用神木湯有汗者用白朮湯治剛症用神木湯加羌活麻黃治柔症用白朮湯加桂心蒼朮治風濕用白朮湯隨證加藥治中腸脈弦細花暈者用黃芪湯此皆與仲景所謂辛苦之人觸胃之病傷寒同意也
附子理中湯其議藥則得之矣曰傷白中未有議其異同者夫傷寒有即病有不即病因其舊有鬱熱風寒外束肌

脈自密鬱發為熱病邪循經而入以漸而深初用麻黃桂枝葦微表而安以病體不甚虛也若中寒則倉卒感受其病即發而暴因其脈理踈豁一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解此氣大虛不急治則死矣

傷寒傷暑傷濕亦如傷寒之漸入也中風中暑中濕亦如中寒之暴受也中寒治法見卒中暴厥門

冬為傷寒

從霜降已後至春分已前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也外皆傷寒法也

春為溫病

從立春節後其中無暴寒又不冰雪而人有壯熱為病者此屬春時陽氣發於外冬時伏寒變為溫病春溫應常紅陽司天之氣太陰司天之氣太陽司天之氣少陰司天之氣少陽司天之氣皆病溫其不應常犯而

入醫經綱目卷三十三

七

反常者不可候之而隨時變易也冬傷於寒春必溫病全文見太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病治見

溫毒

陽脈洪數陰脈實大者遇溫熱變為溫毒論見大治治見

風溫

發汗不解身灼熱為風溫其證脈浮汗出身重多眠蓋其病不獨見於春間故另立風溫門

針灸

尺膚熱甚脈盛躁者病溫也全文見夫精者身之本也故藏於精者春不病溫

凡治溫病可刺五十九穴 成註云所謂五十九穴者刺兩手內外側各三九十二病五指間各一九八病足亦如之頭入髮際一寸傍三分各三九六病顛上一頓會一髮際一廉泉一風池二天柱二內經云氣口靜人迎靜者病除之若氣口人迎皆靜者勿刺

也人迎謂結 王太僕註素問五十九刺云刺頭上五行

五行者以越諸陽之熱逆也謂頭中行上星額會前頂五穴承光通天絡却正骨十穴第三行大抒膺俞缺盆

背俞此八者以瀉胸中之熱也 氣街三里巨虛上下兼此八者以瀉胃中之熱也 雲門髃骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也 五臟俞傍五此十者以瀉五臟之熱也謂背第五行兩傍腎戶神

溫病續法

活夏至前發熱惡寒頭疼身痛其脈浮緊者溫病也春月傷寒謂之溫病冬傷於寒輕者夏至已前發為溫病蓋因春溫暖之氣而發也治溫病與冬月傷寒夏月熱病不同蓋熱輕故也升麻解肌湯最良熱多者小柴胡湯主之不渴外有微熱者小柴胡加桂枝嗽者小柴胡加五味子

入醫經綱目卷三十三

八

煩躁發渴脈實大便秘澀者大柴胡湯微利之虛煩用竹葉湯次第服之

仲景謂溫病壯熱不惡寒活人謂溫病發熱惡寒各不同當以仲景為正

升麻解肌湯治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根 黃芩 芍藥 甘草

桂心 麻黃 石膏

右吹咀每服五錢水一盞半梔子一枚麩八分日三服三四日不解脈浮者宜重服取汗脈沉實者宜下之

雲傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦溫病也經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之 如太陽症汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太陽

陽溫病也 如身熱目赤汗下後過經不愈診得尺寸脈

俱長者陽明溫病也 如胸脇痛汗下後過經不愈診得尺寸脈俱弦者少陽溫病也 如腹滿喘乾診得尺寸脈俱沉細過經不愈者太陰溫病也 如口燥舌乾而渴診得尺寸俱沉過經不愈者少陰溫病也 如煩滿囊縮診得尺寸俱微緩過經不愈者厥陰溫病也是故隨其經而取之隨其症而治之如發斑乃溫毒也

夏為暑病

太陽中暈者發熱惡寒身重而頭痛其脈弦細其遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

太陽中熱暈者其人汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之 活人云夏月自汗惡寒身熱而渴面垢手足心脈微無力者中暑也白虎湯主之

太陽中暈者身熱疼重而脈微弱此由夏月傷冷水水行

皮中所致也一物瓜蒂湯主之

一物瓜蒂湯用瓜蒂二七七箇以水一升煮取五合去查頓服

右瓜蒂湯後賢罕用蓋其劑緩故也若果疼痛不退者亦宜用之

暑病續法

活中暑與熱病外證相似但熱病者脈盛中暑者脈虛以此別之甲乙經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛熱傷氣而不傷形所以脈虛 又有濕溫與中暑同但身涼不渴為異耳

丹暑熱病用黃連香薷飲挾痰者加半夏挾虛者加參芪或用清暑益氣湯

活夏月發熱惡寒頭疼身體肢節痛重其脈洪盛者熱病

也冬傷於寒因暑氣而發為熱病治熱病與傷寒同有汗宜桂枝湯無汗宜麻黃湯加煩燥者宜大青龍湯然夏月藥性須帶涼不可大溫桂枝麻黃大青龍須用加減夏至前桂枝加黃芩半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩蓋桂枝麻黃湯性熱及煖處非西北之比夏月服之必有發黃斑出之失熱病三日内與前湯不瘥脈勢仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者桂枝石膏湯主之此方夏至後代桂枝湯用若加麻黃半兩可代麻黃青龍證用也若三夏至夏為晚發傷寒梔子升麻湯亦可選用之

桂枝石膏湯治法見前論有汗脈緩為桂枝證無汗脈緊為麻黃青龍證

桂枝 半兩 石膏 一兩 黃芩 兩 甘草 一兩

梔子 錢 白芍藥 升麻 乾葛 生薑 三分

右咬咀每服五錢半水一盞半煮至八分去查食頃再服若得汗即停後服

梔子升麻湯治晚發傷寒三夏至夏為晚發

生地 半兩 梔子 兩 升麻 一兩 柴胡 石膏 兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分頓服病不解更作

瑁靜而得之為中暑中暑者陰證當發散也或避暑熱納涼於深堂大廈得之者曰中暑其病必頭痛惡寒身形俱急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越世多以大順散主之是也

中暑身熱惡寒頭疼身重其脈洪盛者熱病

中暑身熱惡寒頭疼身重其脈洪盛者熱病

中暑身熱惡寒頭疼身重其脈洪盛者熱病

中暑身熱惡寒頭疼身重其脈洪盛者熱病

中暑身熱惡寒頭疼身重其脈洪盛者熱病

中暑身熱惡寒頭疼身重其脈洪盛者熱病

暑濕寒濕沉細靜而濕勝傷形者白虎加蒼木湯主之
 動而得之為中熱中熱者陽證為熱傷原氣非形體受病
 也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必
 苦頭疼發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄
 無氣以動乃為天熱外傷肺氣蒼木白虎湯主之
 暑身熱脈洪大動而火勝傷
 活中暑背寒而垢手足微冷煩渴口燥倦怠四肢不痛重
 其脈微弱按之無力白虎湯主之
 困有人頭痛身熱心煩燥渴診其脈大而虛予授以白虎
 湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈弦細芤
 遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而
 脈虛弱所謂弦細芤遲者皆虛脈也仲景以弦為陰朱麗
 亦云中暑脈微弱則虛可知

活酒蒸黃連丸治暑毒深伏累取不瘥無藥可治伏暑發
 渴者

黃連 四兩以無灰
 酒浸蒸乾

右為末糊丸熱水下三十九丸胸膈涼不渴為驗

橘皮湯治中暑痰逆惡寒

橘皮 二兩 生姜 兩 棗子 五枚 甘草 兩半

人參 錢一 竹茹 半

右分五服每服水一盞二分煮取八分去查熱服

竹葉石膏湯治中暑不惡寒

五苓散治中暑頭痛惡心煩躁心下不快

海若先飲冷後傷者五苓散主之此必心下痞懷生委

湯調服佳或四君子湯調中亦可中和後或小便不利或

望中痛宜服下方

蒲黃 錢三 滑石 錢五 生甘草 錢一

中賜脈弦細芤遲黃芪湯主之

人參 黃芪 白朮 甘草

茯苓 芍藥 各等分

右咬咀每服三錢水一大盞生姜三片煎至六分去查

溫服

丹徐三官六月間發熱大汗惡寒戰慄不自禁持且煩渴

予曰此暑病脈之皆虛微細弱而數其人好賭致勞而虛

遂以人參竹葉湯調辰砂四苓散八貼而安

雲口開前板齒乾燥者牙乃骨之精今燥者骨熱也針藥

不能治當灸大椎穴

活濕溫者兩脛逆冷胸腹滿多汗頭痛妄言其人常傷於

濕因而中暑濕熱相搏則發濕溫其脈陽濡而弱陰小而

急治在太陽不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在

身青面色變名曰重暈如此死者醫殺之耳白虎加蒼木

湯主之

小癸丑年故人王彥龍作毗陵倉官夏季時病胸項多汗

兩足逆冷謔語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之其脈

關前濡關後數予曰當作濕溫治之蓋先受暑後受濕暑

濕相搏是名濕溫先以白虎加人參湯次白虎加蒼木湯

頭痛漸退足漸溫汗漸止三日愈此名賊邪誤用藥有死

之理有人難曰何名賊邪予曰難經云五邪有實邪虛邪

正邪微邪賊邪從後來者為虛邪從前來者為實邪從所

不勝來者為賊邪從所勝來者為微邪自病者為正邪又

曰受令心病中暑為正邪中濕得之為賊邪今心先受其

邪

而濕邪勝之水尅火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中最
逆也難經曰濕溫之脈陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽
部濕氣搏暑也小急見於陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕
相搏名曰濕溫是謂賊邪也不特此也予素有停飲之疾
每至暑月兩足汗熱築未嘗乾每服此藥二三盞即愈
溼濕溫汗少者白虎加蒼木汗多者白虎加桂枝白虎加
桂枝方

孫保慶門外有酒家姓姜者善歌唱孫愛之忽數日不見
使人問之則曰病久將命絕孫診之遍身皆潤兩足冷至
膝下腹滿不省人事六脈皆小弱而急問其所服藥取而
視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病耳遂用五
苓散白虎湯十餘貼病少甦再服全愈姜氏既安詣孫謝
因請問曰某得病劇蒙尚藥一治而甦願聞治法孫曰汝

不醫學綱卷三

三

病傷暑也始則陽微厥而脈小無力眾醫謂陰病遂用陰
藥其病愈厥予用五苓散大利小便則腹減白虎解利邪
熱則病愈凡陰病脛冷則臂亦冷汝今脛冷臂不冷則非
下厥上行所以知是陽微厥也

保立夏之後至立秋處暑之間傷寒者身多微涼自汗四
肢沉重謂之濕溫蒼木石膏湯主之即白虎加蒼
木湯是也

蒼木兩

石膏三

知母二錢

甘草一

右咬咀水一盞煎至一半溫服謂內有濕也多不欲飲

水如身熱脈洪無汗多渴者熱在上焦積於胃中宜桔
梗散此非濕溫証
乃熱病也

桔梗散

薄荷

黃芩

甘草

梔子各一

桔梗三

連翹二

右剉每服五錢水煮加竹葉如大便澀加大黃半兩

海消暑丹

半夏一斤

茯苓斤

生甘草半斤

右以醋五升煮半夏夏盡醋乾姜汁作糊無見生水為
丸每服五十九丸熱水咽下精愈修治用之極效 中暑
為患藥下即甦 傷暑發熱頭痛服之尤妙 夏日常
服止渴利小便雖飲水多亦不為害應是暑熱皆不及
此 若痰飲停節並用生薑湯下入夏之後不可缺此

又方消暑丸治頭疼惡心煩躁消渴霍亂
藜蘆粉四 石膏兩 白礬斤 硫黃各一
水浸鉅餅為丸彈子大辰砂為衣用姜汁醋點新汲水
化開服之

丹暑風挾痰挾火實可用吐法
玉龍丸治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神効
硫黃 硝石 滑石 明礬各一

用無根水調丸
秋為瘧
夏傷於暑秋必病瘧治法見
瘧門

脈陰陽俱盛重於陰者變為溫瘧
一歲長幼疾狀相似為溫瘧
春應煖反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫此非
其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者為時
行瘟疫病也論見
傳案

瘟疫續法
活一歲之中病無長幼率相似此則時行之氣俗謂之天
行是也老君神明散務成子螢火丸聖散子敗毒散不拘
日數淺深吐下隨症施行所以聖散子不問陰陽表裏也
老君神明散治瘟疫

非時之
疫

白朮錢一 桔梗分一 細辛兩一 附子去黑皮
 烏頭四兩 右五味為末縫絹袋盛帶之居間里皆無病若有痲
 癩者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則瘥若經三四日抄
 三十七以水一碗煮令大沸分三服

聖散子蘇內翰序全文見活人書時疫流行用聖散子者
 一切不問陰陽之感連服取瘥不可與傷寒比也若疾疫
 之行平旦輒煮一釜不問老幼良賤各一大盞即時氣不
 入

草薺冠十餘 猪苓皮去 石菖蒲

茯苓 良姜 獨活去 附子炮製去

麻黃根去 厚朴去皮 薑本 芍藥

枳殼去穢 柴胡 澤瀉 細辛

防風去 白朮 藿香 半夏

吳茱萸湯洗 蒼朮 甘草各半

右咬咀每服五錢水一盞半煮取八分去查熱服餘查
 再煎空心服之

右二方治疫雖不分陰陽然亦寒多表多者宜之

丹衆人病一般者是謂天行時疫有宜補宜散宜降方

大黃 黃芩 黃連 人參

桔梗 防風 人中黃 滑石

香附 蒼朮

右麩糊為丸每服五七十九分氣血痰作湯使送下氣
 虛者四君子湯送下血虛者四物湯送下痰多者二陳
 湯送下熱甚者用薄荷和前藥同送下
 本藥清臘月截淡竹去青皮浸透取汁治天行熱狂熱疾

中毒并惡瘡毒取汁浸皂角甘蔗治天行熱疾
 丑解一切火病用粉草五兩細切微炒量病人吃得多少
 酒取無灰酒一處研去查溫服須臾大瀉毒亦隨出雖十
 分渴亦不可飲水飲水難救
 右三方熱多裏多者宜之

雄黃研一兩 赤小豆炒 丹參 鬼箭羽兩二

右為細末煉蜜為丸如桐子大每日空心以溫水下五
 丸可與病同床共衣亦不相染矣

活粉成子螢火丸主辟疫疾惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠶諸
 毒五兵白刃盜賊凶害皆辟之

螢火 鬼箭羽皮去 疾藜各一兩 雄黃

雌黃各二兩 礬石汁盡 羚羊角 銀電灰

鐵錘柄入鐵燒焦 未

右九味搗為散以雞子黃并雄雞冠一具和之如杏仁
 大作三角縫囊盛五丸帶左臂上仍可掛於戶上

春應煖而清氣折之則實邪在肝升麻解肌湯主之方見

夏應暑而寒氣折之則實邪在心調中湯射于湯半夏
 桂枝甘草湯選用之

調中湯治夏月初秋忽有暴寒折於盛熱結於四肢則壯
 熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或赤壯熱暈悶脈數
 宜下之

大黃去皮 黃芩 芍藥 葛根

桔梗 茯苓皮去 薑本擇真者無則

白朮 甘草炙已上 各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煮取一盞移時再服之得

快利便止小兒減與服或重亂者不宜服此

射干湯見 半夏桂枝甘草湯治

秋應涼而反大熱抑之則實邪在肺白虎加蒼朮湯茵陳

汁調五苓散治

冬溫丹冬溫為病非其時而有其氣者冬時嚴寒君子當閉藏

而反發泄於外專用補藥帶表藥

作人中黃方以竹筒兩頭留節一節中作一竅內甘草於

中仍以竹木釘塞其竅置大糞缸內浸一月取出晒乾用

治瘟毒此藥一服入補

酒冬應寒而反大溫抑之則實邪在腎宜葶藶湯方見

多眠多汗脈浮為風溫

陽脈浮滑陰脈濡弱更過於風變為風溫論見

發汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗

出身重多眠睡息必澀語言難出若被下者小便不禁

直視失溲若被火者微發黃色刺則如驚癇時瘵癉若火

薰之一逆而引日再逆促命期若發汗已身灼熱者非傷

濕也

風溫續法

風溫者脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必

喘四肢不收嘿嘿但欲眠治在少陰厥陰不可發汗發即

謔言獨語內煩躁不得臥若驚瀉日亂無精如此死者醫

殺之耳 風溫忌發汗宜葶藶湯身灼熱者知母乾葛湯

如渴甚者括萎根湯脈沉身重汗出者漢防已湯

葶藶湯治風溫兼瘵冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛

喉咽乾舌強胃內疼痞腰痛

葛根兩 葶藶分 石膏一兩 白芷兩

麻黃兩 羌活一兩 川芎錢三 甘草兩

杏仁去皮尖雙 青木香錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎半鍾日三四服

知母乾葛湯治風溫身體灼熱甚者

知母錢三 葛根錢八 石膏錢六 甘草

黃芩錢 木香錢 升麻錢各一 葶藶錢三

南星錢二 人參錢 川芎錢各一 麻黃錢

防風錢 杏仁錢 羌活錢各二

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一鍾去渣服

防已湯治風溫脈浮身重汗出方無

防已錢四 甘草錢 黃芪兩 生姜兩

白木兩 人參兩

右咬咀每服五錢水一盞半煮取一中盞去渣飲訖仍

坐被中汗出如虫行或被臥取汗出計學士云風溫誤

治風溫活人本方葶藶湯以有麻黃不敢用宜白木湯

若腰背強硬者加羌活 若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡蠣

若熱甚者加知母 若身體重多汗者加黃芪 若內傷

冷者不加

一身盡痛為濕

痛而發黃為中濕痛不得轉側為風濕活人又以身痛脈

沉為中濕脈浮為風濕亦通治法見太陽病體痛門

身反張為瘵

有汗為柔瘵無汗為剛瘵治法見

婦人傷寒 熱入血室 妊娠傷寒 產後傷寒

熱入血室

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀謔語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之東垣云要見妄語及夢亡人皆謂木火虛而為邪也刺期門與此義同

許學士云有婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣藥延養數日遂成血結胸或勸用前藥予曰小柴胡已遲不可行也無已則有一馬刺期門穴斯可矣予不能針請善針者治之如言而愈或問曰熱入血室何謂而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水適來適斷邪氣乘虛而入血室血為邪迫上入肝經肝受邪則謔語而見鬼復入膈中則血結於胸也何以言之婦人平居水當養於木血當養於肝方未受孕則下行之以為月水既在則中畜之以養胎及已產則上壅之以為乳

皆此血也今邪氣畜血併歸肝經聚於膈中結於乳下故手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也
婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則謔語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈治人云小柴胡湯下之犯

有一婦人溫病已十二日診之其脈六七至而濇寸稍大尺稍小發熱煩赤口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂枝姜一兩日寒熱遂止又云我膈下急痛又與抵當丸微利膈下痛瘕身漸涼脈漸勻尚不了了仍復與小柴胡湯次日又云我但胸中熱燥口乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胸丸半服利三行次日虛煩不藥

時亦有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也恐乘虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生姜加乾姜五味子湯一日咳減二日而病悉愈以上皆用張仲景方

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故如瘧狀發作有時小柴胡湯主之
熱入血室續法
雲婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室妊娠傷寒則不同也宜以四物安養胎血佐以汗下之藥治之

婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脈浮而緩恐熱入血室故倍加芍藥桂枝加芍藥湯
桂枝半兩 赤芍三兩 生姜一兩 大棗六枚
右對細每服五錢水煎

婦人傷寒脈浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後惡熱入血室宜麻黃加生地黃湯
麻黃二兩 桂枝一兩 甘草半兩 生地黃兩
杏仁二十五箇 去皮尖

右咬咀每服五錢水煎
婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜用乾姜柴胡湯
柴胡四兩 括蕪根 桂枝一兩 牡蠣一兩 乾姜 甘草各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去渣溫服初服微煩再服汗出而愈
羅小柴胡加地黃湯治婦人室女傷寒發熱經水適來適

斷晝日明了夜則謔語如見鬼神亦治產後惡露方來忽
 間斷欲死
 柴胡一兩二錢 人參 黃芩 甘草
 半夏 湯洗七次 生地 各七錢
 右為粗末生姜三片葱二枚同煎
 雲婦人傷寒身熱脈長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜躁
 晝寧如見鬼狀經水適斷熱入血室不實滿者小柴胡加
 牡丹皮主之大實滿者桃仁承氣主之
 小柴胡加牡丹皮湯
 柴胡二兩 黃芩七錢 人參二兩 半夏六錢
 大棗三枚 甘草 生姜 錢半 牡丹皮二兩
 右剉細每服一兩生姜同煎
 桃仁承氣湯 方見
 婦人傷寒頭痛脈浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水
 閉而不行心下結硬口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀
 脈沉而數者當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯主之
 柴胡二兩 黃芩七錢 半夏五錢 甘草半斤
 大黃 芒硝 各七錢 大棗 枚 生姜 錢半
 右剉每服一兩生姜同煎去查下芒硝再沸溫服若服
 不沉數即不可下
 本辛亥中寓居毗陵學官王仲禮其妹病傷寒發熱遇
 夜則如鬼物所憑六七日忽昏塞涎响如引鋸牙關緊急
 瞑目不知人疾勢極危召予視之予曰得病之初曾值月
 經來否其家曰月經方來病作而經遂止一二日發寒熱
 晝雖靜夜則有鬼祟從昨日誕生不省人事予曰此熱入
 血室之證也仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則

明了夜則謔語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者
 不曉以剛劑與之遂致胸膈不利涎潮上腕喘急息高昏
 冒不知人事當先化其痰後除其熱予急以一呷散投之
 兩時頃涎下得睡省人事次授以小柴胡加地黃湯三服
 而熱除不汗而自解矣
 雲婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脈沉而遲太陽標
 病少陽本病經水適斷桂枝加附紅花湯
 桂枝二兩 芍藥 生薑 各半 甘草 一兩
 附子 紅花 各五錢
 右剉細每服一兩水三盞煎服
 婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經水
 過多無滿實者甘草芍藥湯
 甘草 芍藥 生地 川芎 各一兩
 右咬咀每服一兩水三盞煎至一盞半去查入髮灰五
 錢調勻溫服不止者刺隱白
 續增姙娠傷寒
 潔黃芪解肌湯治婦人姙娠傷風自汗
 人參 黃芪 當歸 川芎
 甘草 芍藥 芍藥 加蒼朮生地亦可
 右為粗末每服五錢水煎溫服無時
 海若姙娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮
 而弱太陽經病宜表虛六合湯
 四物湯 桂枝 地骨皮 各七錢
 若姙娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病宜表實六合
 湯 四物湯 麻黃 細辛 各半
 若姙娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛者太

陽標病也宜風濕六合湯

四物湯兩 防風 蒼朮各七錢

若妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發班如綿紋宜升麻六合湯

四物湯兩 升麻 連翹各七錢

若妊娠傷寒胸脇滿痛而脈弦少陽症也宜柴胡六合湯

四物湯兩 柴胡 黃芩各七錢

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本病也急下之宜大黃六合湯

四物湯兩 大黃錢五 桃仁六枚尖十

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯兩 人參錢五 五味子錢五

若妊娠傷寒後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯

四物湯兩 厚朴 枳實各五錢

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯兩 梔子 黃芩各五錢

若妊娠傷寒大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏六合湯

四物湯兩 石膏 知母各五錢

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯兩 茯苓 澤瀉各五錢

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯兩 琥珀 茯苓各五錢

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯兩 阿膠 艾各五錢一方加甘草同煎

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合湯

四物湯 附子 桂

若妊娠傷寒畜血證宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下

之 四物湯兩 生地 大黃五錢

婦人妊娠或畜血或當心仁勿妄施要教子母俱無損大

黃四物對服之

安胎方

丹施孺人傷風未解兩足下脛冷嗽多不吐痰頭眩蓋其

性急又當臨月 黃芩錢半 陳皮 白木各一錢 蘇梗三錢

木通 枳殼各五分 麻黃分三 甘草分二

桔梗 蒼朮各半 水煎服無時

婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜桂枝芍藥湯

桂枝 芍藥 當歸各一兩

右剉細末服一兩水煎

婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脈沉者太陰病也

宜芍藥湯 芍藥 白木 甘草 茯苓各一兩

右如前修服

治妊娠傷寒安胎宜阿膠散 人參 白茯苓 阿膠炒 桑寄生

白木各等分

右搗羅為細末糯米飲調下二錢日二服

治妊娠傷寒安胎宜白朮散 白朮 黃芩各五分

右為末每服三錢水一鍾生薑三片上三味破同煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

煎至七分去渣溫服但覺頭眩者禁服二三服向

瘥惟四肢厥冷陰症見者未可服

治妊娠傷寒憎寒發熱當發其汗宜葱白湯

葱白十 生姜二兩

右剉水二盞煎至一盞連服取汁

海葱白一物湯用葱白二把以水一升煮熱取汁令食盡

亦主安胎若胎死須臾即出

治婦人傷寒妊娠服藥例 若發熱惡寒不離桂枝芍藥

若往來寒熱不離柴胡前胡 若大渴者不離知母石

膏五味子麥門冬 若大便泄者不離桂附乾姜白朮

若大便燥結者不離大黃苦茶 若月經適來通斷者不

離小柴胡 若胎不安者不離人參阿膠白朮黃芩 若

發汗者不離煎鼓生薑麻黃旋覆 若頭痛者不離石膏

山梔前胡 非傷暑頭痛者不離柴胡甘草石膏 若滿

悶者不離枳實陳皮 若胎氣不安者不離黃芩麥門冬

人參 若斑發黑者不離黃芩梔子升麻

天治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方

伏龍肝研令極細末調冷臍下三寸乾即易瘥即止

又方 片中泥塗乾即易之二方世本

又方 浮萍 朴硝 蛤粉 藍根 大黃

右為末水調傅臍上安胎解熱極妙

治妊娠霍亂二方附少陰

治妊娠發斑變為黑色宜梔子大青湯

黃芩 升麻 梔子仁各二兩 大青

杏仁各半

右咬咀每服五錢水一盞半細切葱白三寸煎至一盞

去香溫服

產後傷寒

表 產後中風數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾

嘔汗出雖多陽旦證耳可與陽旦湯見太陽病

產後中風發熱面赤喘而頭痛竹葉湯主之

竹葉把一 葛根三 防風 桔梗

桂枝 人參 甘草各 附子一枚

右咬咀每服五錢水一盞煎至五分溫服如煩熱甚去

杏服溫覆使汗出若頭項強用大附子牛錢煎藥揚去

沫嘔者加半夏一錢

產後傷寒續法

產後傷寒 產後發熱惡寒皆屬血氣虛左手脈不足補血右手脈

不足補氣 惡寒發熱又腹痛當去惡血 惡寒發熱乳

汁不通及腹者無子當消用麥芽二兩炒研細清湯作四

服調下 有子當下用木通通草猪蹄汁調煎服

產後纏身熱不可發表并一切苦寒藥必用乾姜治之

大發其熱輕則用茯苓淡滲其熱

大凡產後發熱頭痛身疼不可使作感冒治之此等多是

血虛或敗血作梗宜以平和之劑與服必效如玉露散或

四物加北柴胡等分煎服若便以小柴胡湯及竹葉石膏

之類竟不救者多矣

玉露散治產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便

澀滯悉治之涼膈壓熱下乳

人參 茯苓 甘草各半 苦梗炒

川芎 白芷各一 當歸各 芍藥各

右咬咀每服五錢水一盞煎至七分溫服如煩熱甚大

便秘者加大黃二錢半

續增小兒傷寒

大法

傷寒表裏攻發 有表證惡風惡寒者當發表

春主溫屬木身溫當發汗

煩躁合大發散

同當調其飲食

寒在內身寒而惡熱是熱在內

寒在外身熱而惡寒是熱在外

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

寒在內者

本草

錢傷風食睡口中氣熱呵欠煩悶當發散與大青膏表証也

天麻 白附子 錢半 蝎尾 去毒生 硃砂 研一

青黛 研 天竺黃 七 麝香 七 烏梢蛇肉 酒

右同研細生蜜和成膏每服半皂子或一皂子大月中

兒粳米大同牛黃膏薄荷水化一處服之五歲已上同

甘露散服

雄黃膏治傷風溫壯熱引飲

雄黃 小壹大研 蘇合 根水 甘草末 川甜稍 各三

寒水石 研細 腦子 七 硃砂 分

右研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半皂子大

右大青膏發散食睡口中氣熱呵欠煩悶表証者蓋為三

歲已下小兒未能言者設也

活尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主之方見

海傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和者四君子加細辛

瓜蒌桔梗各一分生薑薄荷煎或加防風川芎各一分內

有寒及遇天寒欲發散者則去瓜蒌加桔梗多虛汗夜啼

者加麥門冬 傷風身熱頭痛氣促者四君子加川芎防

風等分細辛羌活減半同煎

活喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯

雲人參羌活散治小兒寒邪及瘟氣時疫瘡疹頭痛體疼

壯熱多眠不語潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活 獨活 柴胡 人參

芎藭 枳殼 甘草 前胡

桔梗 天麻酒浸 地骨皮各半 白茯苓去皮

右為散每服二錢水一盞入薄荷少許同煎去渣溫服

不拘時候

七寶散治時氣頭昏體熱小兒同乳母服大人亦可

紫蘇葉 香附炒各 陳皮 甘草炙

桔梗 白芷 川芎各一

右吹咀姜末煎服

海麻黃黃芩湯治小兒傷寒無汗頭痛身熱惡寒

麻黃 赤芍 黃芩半 甘草

桂枝各二

右為粗末水煎服

升麻黃芩湯治傷風有汗頭疼發熱惡風

升麻 葛根 黃芩 芍藥各五

甘草一錢

右吹咀每服二錢水煎溫服

右惺惺散等藥發散頭痛發熱惡風寒表證者蓋為三

歲已上小兒能言者設也能言故頭疼惡風寒可問而

知也前五方通治有汗無汗惡風惡寒第五方治無汗

惡寒第六方治有汗惡風

錢與大青膏不解散有下證當下大黃丸主之大熱飲水

不止而善食者可微下餘不可下也此表症也潔古補遺

大便用大黃丸作散于與服之如清便自瀉慎

不可妄下恐外熱透於內而變結胸危証多矣

大黃丸治風熱裏實口中氣熱大小便秘赤飲水不止有

下證者宜服之

川芎兩 黑牽牛半兩半生 大黃酒蒸

甘草二錢

右為細末稀糊和丸麻子大二歲每服十九溫蜜水下

乳後服以瀉利為度未利加丸數

活頭額痛身體發熱大便黃赤腹中有熱四順散連翹飲

三黃丸主之四順散連翹飲三 身體潮熱頭目昏痛心

神煩躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣湯主

之洗心散

頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙聖丸主

之方見食

濕如身表無大熱而小便不利是有濕熱結膀胱仍用勝

濕藥白木茯苓之類利小便則其熱自退

雲小兒傷寒煩熱小便赤澀大便褐色面赤熱者導赤散

錢傷風兼戒兼心則驚悸兼肺則悶亂喘息哽氣長出氣

嗽兼腎則目明各隨補毋藏虛見故也

傷風手足冷脾藏怯也當先和脾後發散和脾益黃散發

散大青膏主之此治陰厥有汗脈沉微者若陽厥無汗脈

傷風自利脾藏虛怯也當補脾後發散補脾益黃散發散

大青膏主之未瘥調中丸主之有下証大黃丸下之後服

溫驚丸

傷風腹脹脾藏虛也當補肺必不喘後發散仍補脾也去

脹場氣丸主之發散大青膏主之

傷風吐瀉治見吐瀉門治吐瀉用益黃

湯治夾驚傷寒熱極生風薄荷散

薄荷葉兩 羌活 全蝎 麻黃去

甘草兩 天竺黃 姜蚕 白附子炮各

右為細末每服一錢水小半盞煎至三分加竹瀝少許

妙

靈小兒表傷寒則皮膚閉而為熱盛即生風欲為驚搐血氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之宜大青膏

肺盛復有風冷則胸滿短氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散散風大青膏主之若止傷寒則不胸滿

腎虛則畏明宜補腎地黃丸有表者開用大傷風下後虛熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無力當生

胃中津液多服白朮散 小兒結熱於內口乾而渴身黃體重者宜白朮散

湯傷寒發渴宜白虎湯 潔大熱飲水能食不大便用大黃九作散服之

右三方白朮散治虛渴為下後而食少胃虛者設也白

虎湯大黃九治實渴為未經下而能食不大便者設也

翼傷寒咳嗽吐清水啞氣長出氣是肺之不足也合用阿膠散面白如枯骨者死不治 身熱咳嗽吐痰者當用福

銀九方見咳 右二方治咳嗽阿膠散治虛嗽為啞氣長出氣者設也

福銀九治實嗽為痰盛喘滿者設也若有表証惡風寒而嗽者當用惺惺散加減四君子湯鼠粘子湯之類是也

陰厥陽厥見大 絜身大熱吐逆不止者茯苓半夏湯即小半夏加茯苓湯方見嘔門

湯傷寒嘔者枳殼半夏湯 枳殼半夏各半

右水一碗姜十片煎至小半碗十歲已下作五服

藿香正氣散治傷寒發嘔

藿香葉 厚朴 半夏 甘草炙

陳皮 蒼朮米泔浸拘

右吹咀每服二錢水半盞姜三片煎至二枚煎至二分去查溫服

瀉大吐者當下之白餅子珍珠丸消積丸三方俱 潮熱

有時胸滿短氣嘔吐者桃枝九方見小兒 積熱門

右七方治傷寒嘔吐前二方治痰飲而吐中一方治有表而吐後四方治有裏而吐其桃枝九治裏熱而吐餘

二方治表寒而吐也

湯傷寒自汗當補虛和陰陽小建中湯減桂加黃芪人參地黃

黃芪兩 白芍兩 甘草 人參

熟地兩

右吹咀每二錢水半盞煎至三分去查服

小兒傷寒形症 頭痛 體痛 鼻塞或流涕 喉內喘

息 兩手脈洪數 頰赤眼澁 身上寒毛起 口鼻出

水 眼赤黃 口乾澁 咳嗽 山根青色 噴嚏

活頭目疼痛而畏人惡寒者此傷寒證也

雲設令小兒卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳尻冷鼻氣熱

為斑疹也與傷寒表証相似此胎氣始發自內之外若與

傷寒表証同治者快也當作斑疹治之

溫病溫病者春月之 溫病溫病而不熱也

四春日溫病 未滿三日先用惺惺散二服後四五日不

解煩渴嘔用白朮散如自汗口燥用製白虎湯至六七日

大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黃通膈丸下

溫

大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黃通膈丸下

大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黃通膈丸下

初覺之時疑是瘡疹只宜用葛根升麻湯解肌

傷寒拾遺 和解因時法 溫中法

灰包熨法

治中風自汗用桂枝湯治傷寒無汗用麻黃湯此仲景表散之法百世不易者也若元氣暴虧者以參芪與桂枝麻黃等藥表散此丹溪補仲景之法亦百世不易者也至於韓祇和戒桂枝而以中風傷寒通作一法治之者此當時之權變非百世之常行也王海藏云仲景用桂枝當漢之末也韓祇和戒桂枝當宋之隆也時世之異不可不知今編祇和之法於篇末以廣後學之見云

韓氏和解因時法

傷寒病有可汗者論中但統言其可汗症及可汗脈或云脈浮而數或云脈浮緊或云脈浮無汗而喘或云脈浮為

在表今畧舉數條後人但憑其脈之大槩並不分脈浮有陰陽虛盛之理又不知有可汗不可汗之症誤投發表藥則多變成陽毒之患矣今舉病人有汗惡風無汗惡寒分二等及據在春已後立秋已前氣候輕重各立方治之庶學者易為開悟耳

病人二三月已前兩手脈浮數或緩或緊按之差軟寸關尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可便投解表藥此是見裏證未見表脈也宜候寸脈力小如關尺即可投解表藥大抵治傷寒病見證不見脈未可投藥見脈未見證雖少投藥亦無害也凡治雜病以症為先脈為後治傷寒病以脈為先證為後

病人兩手脈浮數而脈名曰傷寒若關前寸脈力小關後尺脈力大雖不惡風不自汗出此乃陰氣已盛先見於脈

也若不投藥和之後必惡風及自汗出若立春已後至清明已前宜調脈湯主之清明已後至芒種已前宜葛根柴胡湯主之芒種已後至立秋已前宜人參桔梗湯主之調脈湯

葛根一兩 防風 前胡三分 甘草半兩

右為粗末每服二錢水一盞生姜一塊如小指大劈破煎至七分去渣溫服如寸脈依前力小加東三箇同煎葛根柴胡湯 葛根一兩 柴胡一兩 芍藥

桔梗 甘草三分

右咬咀每服二錢水一盞生姜二片煎至七分去渣熱服如寸脈依前力小加葱白三寸同煎服

人參桔梗湯 人參 桔梗各三分 麻黃一兩

石膏兩 甘草三分

右每服二錢水一盞荆芥五穗煎至七分去渣熱服如寸脈依前力小加麻黃二分去節同煎服

病人兩手脈浮數而緩名曰中風若寸脈力小尺脈力大雖不惡風不自汗出此乃陰氣已盛先見於脈若不投藥和之後必惡風自汗出若立春已後清明已前宜薄荷湯主之清明已後至芒種已前宜防風湯主之芒種已後至立秋已前宜香薷湯主之

薄荷湯 薄荷一兩 葛根半兩 人參二分

甘草兩 防風十兩 右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去渣熱服如三五服寸脈力尚小加薄荷二分同煎

防風湯 防風一兩 桔梗三分 甘草半兩

旋覆花兩 厚朴三分

右咬咀每服三錢水二盞姜一塊同煎熱服如三五寸脈力尚小加荆芥五七穗同煎

香芎湯

川芎一分 石膏兩二 升麻兩三 甘草兩半 厚朴兩半

右咬咀每服二錢水二盞煎七分溫服如三五服後寸脈力尚小加細辛二分同煎

前二段文將中風傷寒各立法者何蓋謂病人始得病三日已前或因中風脈緩或因傷寒脈緊然脈雖先見而症猶未見尚可以藥解之故立方耳

病人兩手脈浮數或緊緩寸脈短反力小於關尺脈者此名陰盛陽虛也若自汗出惡風是邪氣在表陰氣有餘也素問云陰氣有餘為多汗身寒即可投消陰助陽表劑以治之若立春已後清明已前宜六物麻黃湯主之清明已後芒種已前宜七物柴胡湯主之芒種已後立秋已前宜發表湯主之

六物麻黃湯

麻黃去節 葛根七錢 人參五錢 甘草錢五 蒼朮半錢

右咬咀每服三錢水一盞煎二分煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者加荆芥三分三五服後不惡風者汗者加丁香皮半兩

七物柴胡湯 柴胡兩二 蒼朮 荆芥 麻黃兩各一 甘草錢七

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊棗三枚同煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者入葱白三寸如三五服後汗未止者加當歸一兩同煎

發表湯 麻黃去節 蒼朮兩 人參

麻黃去節 蒼朮兩 人參

麻黃去節 蒼朮兩 人參

當歸各半 甘草分三 丁香皮分三 右咬咀每服三錢水一盞入姜一塊棗三枚同煎至七分去查熱服如三五服汗未止猶惡風者加桂枝三分如汗未止更加細辛半兩以汗止為度

病人脈浮或大或緩其脈上出魚際寸脈大於關尺者此名陽盛陰虛也若發胃悶口燥咽乾者乃是邪氣在表

消陽助陰藥以解表若立春已後至清明已前宜人參湯主之清明已後至芒種已前宜前胡湯主之芒種已後至立秋已前宜石膏湯主之

人參湯

人參兩半 芍藥分三 石膏兩二 柴胡 甘草分三

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊煎七分熱服如三五後熱不解者入豉三十粒同煎服

前胡湯方缺宜尋祇和方補之 傷寒便覽有前胡湯方用黃芩如好山梔大青各三錢姜蔥煎服候即服是此

石膏湯

石膏兩三 芍藥兩一 升麻分三 黃芩分三 柴胡兩一 甘草分三

右咬咀每服三錢水一盞半豆一合煎八分熱服如三五服後熱未解者加知母一兩又未解加大黃一兩

病人兩手脈浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者此是陰陽氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可用藥平之若立春已後至清明已前宜解肌湯主之清明已後至芒種已前宜芍藥湯主之芒種已後至立秋已前宜知母湯主之

解肌湯 石膏兩二 麻黃去節 甘草分三

麻黃去節 甘草分三

升麻各半

右吹咀每服三錢水一盞入豉半合煎至八分去查熱服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩石膏一兩芍藥湯

甘草炙半

右吹咀每服三錢水一盞生薑一塊煎至七分去查熱服如三五服後猶惡風者每服加生薑一塊同煎服

升麻兩

右吹咀每服三錢水一盞入生薑一塊同煎至七分去查溫服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩升麻半兩

前三段文將中風傷寒一法治者因病人始得病後脈症俱見若投解劑必不能愈故立前方同法治之

傷風而引內邪出及平內邪既出而為病一也古人云立

此二端恐後人疑其緊脈與緩脈治別也若中風與傷寒

脈異何故仲景無別法治之此乃後人不究仲景之心也

病人始得病一二日至五六日尚有表脈及表症亦可依

脈症投藥凡投解表及發表藥每一日可飲三服病甚

可至五服外不可頓服藥也如症未解次日依前再投如

症依前未解可作熱湯投之加葱白亦可如有汗出

勿厚衣蓋覆恐汗出太過作亡陽症也

診海藏云韓氏微旨可汗一篇有和解因時法言傷寒之脈

頭小尾大傷風之脈頭大尾小李思訓保命新書亦分尺

寸與仲景同之非若前人總言尺寸脈俱浮而緊尺寸脈

俱浮而緩緊則為傷寒無汗緩則為傷風自汗又有傷寒

有汗者傷風無汗者脈亦互差與症不同前人已盡之矣

惟韓李所言頭小尾大即為傷寒尾小頭大即為傷風人

病間有脈症未顯于尺寸者故韓李述為和解因時法也

又恐後人疑其不與前聖合遂於本方內又立加減法數

條亦不越前人之意何其當哉蓋二公者當宋全盛之時

故又戒麻黃桂枝不可輕用改用石膏升麻葛根柴胡之

平劑當時則可非百代常行之道時世遷移之法也可汗

一篇若隨湯液隨症應見自有定規雖明哲不可踰也

寸口小者只於關部下至膀胱本部見之寸口雖小只是

舉之微小沉得之有也非若欲令舉按全無也若果寸口

舉按全無即不可解表只宜溫中不可不知

韓氏溫中法

夫傷寒之說始自黃帝以開其端至於仲景方陳其條目

自後膚淺之學莫知其數立言者只云病在表可發汗病

在裏可下或云不可汗不可下未嘗有溫中之說仲景傷

寒例云尺寸俱沉細太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也

尺寸俱微緩厥陰受病也又辨太陰症云太陰病脈浮可

發汗宜桂枝湯又手足溫自利不渴者宜四逆湯又腹滿

時痛桂枝加芍藥湯辨少陰證云少陰病始得之發熱脈

沉者麻黃附子細辛湯又少陰病二三日麻黃附子甘草

湯又少陰病手足寒身體痛骨節疼脈沉者附子湯又厥

陰症

陰症

陰症

陰症

陰症

陰症

陰症

陰症

陰症

陰症

陰症

陰症

陰症

陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯又少陰病脈沉急溫之宜四逆湯今舉仲景論中數條最是三陰病之良法于今世用之尚有未盡證者焉當校之自至和初歲迄於今三十餘年不以歲之太過不及為則每至夏至已前有病傷寒人十中七八兩手脈俱沉細數多是胸膈滿悶或嘔逆或氣塞或腸鳴或腹痛與仲景三陰病說理同而證不同因茲不敢妄投仲景三陰藥方總見脈沉及胸膈滿便投下藥下之往往不救常斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者胸中便快其病勢重者半日許滿悶依然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之多藥力大熱後必發煩躁因校量此形證今別立方以治之藥多對證不可不傳焉

六醫學綱目卷之三

胸膈寒滿氣短不能相接者便可隨服證投溫中藥以治之 病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短及力小於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹滿身體拘急手足逆冷急宜溫之 若立春已後至清明已前宜溫中湯主之清明已後至芒種已前宜陳皮湯主之芒種已後至立秋以前宜七物理中丸主之

溫中湯 丁皮兩 乾姜炮 白木

陳皮 丁香各二 厚朴一兩

右為細末每服二錢水一盞葱白三寸荆芥五穗煎至七分去查熱服如未快手足尚逆嘔吐者加丁香乾姜各二錢

陳皮湯 陳皮兩 藿香錢 白木 葛根各二 厚朴一兩

右為末每服二錢水一盞姜一塊同煎至七分去查熱服如三服未快手足尚逆嘔吐不定者加半夏丁香桂枝各半兩每服加葱白三寸煎服

七物理中丸 白木 乾姜 人參 桔梗 乾葛 藿香 甘草 右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸水一盞煎八分和查熱服如三服未快手足尚逆嘔吐者加半夏生薑各半兩

病人兩手脈沉細無力雖三部脈力停等亦是陰氣盛也更不須候寸脈短治之或胃膈滿悶身體拘急疼痛手足逆冷速宜溫中藥和之 若立春已後至清明已前宜厚朴丸主之清明已後至芒種已前宜白木湯主之芒種已後至立秋已前宜橘皮湯主之

厚朴丸 當歸 丁皮 厚朴 細辛 人參 甘草 乾姜 右為末煉蜜為丸彈子大每服一丸煎至六分

白木湯 白木 半夏 當歸 厚朴 乾姜 丁香 右為末每服三錢水一盞姜一大片煎至七分去查熱服三五服後脈未有力寸脈尚小者加細辛半兩每服加葱白三寸同煎服

橘皮湯 橘皮 藿香 葛根 生夏 厚朴 右為末每服三錢水一盞姜一大片煎至七分去查熱服三五服後脈未有力寸脈尚小者加細辛半兩每服加葱白三寸同煎服

右爲末每服三錢水一盞生薑如枣大同煎至七分去
查熱服三五服後脈尚小手足逆冷者加細辛半兩
病人胸膈滿悶時時嘔逆肢節痛兩脇下痛腹中鳴此是
停飲宜二苓湯

赤茯苓 木猪苓 白朮各半兩 滑石一兩
通草 白芷各二錢 丁香皮七錢 陳皮半兩
桂枝五錢

右爲末每服三錢水一盞煎至七分去查熱服小便未
快加瞿麥七錢半嘔未止加半夏兩浙惡寒甚每
服加葱白三寸

灰包煎法

病人服前藥胸膈不滿悶者此上焦有陽也或藥力太過
上焦有熱腹滿虛鳴時時疼痛此是被陽藥消逐得上焦

八寶中藥卷之三

半

陰氣并入下焦也雖是下焦積寒冷奈上焦陽盛更難用
溫下焦藥也當用灰包煎之其法用稻草灰或桑柴灰二
三升許入好醋拌和乾濕得所銚內炒令灰熱以帛包裹
置臍下熨之頻先炒灰包常更換令常熱以腹不滿痛爲
度初熨時病人不受者勿聽但令亟熨之不住可也如灰
包熨後得下利三兩行或小便二三升或微似有汗此是
陰氣外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而
解病人三部脈沉寸脈小於關尺此爲陰盛當溫中藥以
消陰氣宜厚朴丸

厚朴丸
人參 白朮 厚朴 陳皮
藿香 當歸 細辛
神木湯亦同治陰躁而渴不可悞用涼藥若熱藥冷服內

有伏陽則可若服已虛按之全無力或病人素無食養者
只可溫服

醫學綱目卷之三

醫學綱目卷之三十四

婦人部

婦人治法通論

大法

婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆屬厥陰天癸既絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰者是祖氣生化之原也厥陰與少陽相表裏故治法無犯胃氣及上三焦為三禁不可汗不可下不可利小便若發汗者同傷寒下早之症利大便則脈數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥制藥之法能不犯此三禁則榮衛自和而寒熱止矣外則和於榮衛內則調於清便先將此法為初治次後詳而論之見症消息同壞症傷寒為之緩治或小便不利大便秘結或積熱於腸胃之間或已成痿或散血氣而為浮腫蓋產理多門故曰同傷寒壞症如發渴而用白虎氣弱而用黃芪血刺痛而用當歸腹痛而加芍藥

已上例症不犯三禁謂產後之久病也若產後暴病又不可拘也如產後熱入血室者用桃仁承氣抵當湯等藥胃堅燥者大承氣不可以泄藥言之產後世人多用烏金四物湯是不分四時之寒熱不分血氣之虛實盲然一槩用藥如此而愈加增劇是誤也大抵產病天行則增損柴胡雜症則加減四物又春夏從柴胡秋冬從四物藥性寒熱病症虛實不可不察也四物湯常宜服餌今立四時增損法于後

四物湯加減治婦人雜病
春倍川芎 夏倍芍藥 秋倍地黃 冬倍當歸
若膝下虛冷腹痛及腰脊間痛宜玄胡六合四物湯
四兩玄胡苦練各一兩若小腹痛亦用玄胡六合

若氣滯經脈故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合四物湯四兩芍藥一兩 若腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥 若婦人血虛心痛腹痛不可忍者去地黃加乾姜名四神湯 若血崩者加生地黃蒲黃 若血虛虛冷崩中去血過多加膠艾 若赤白帶下宜香桂六合湯四物湯四兩桂枝香附各五錢 若以四物湯為末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三四十丸治高年婦人白帶良驗 若以四物湯四兩加甘草半兩蜜丸每兩分作八九丸酒醋共半盞用溫湯化下名當歸煎去敗血生好血 若婦人血積者四物湯加廣茂京三稜桂心乾漆各一兩 若婦人筋骨肢節痛及頭痛脈弦憎寒如瘧宜治風六合四物湯四兩羌活防風各一兩 若婦人或因傷酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者宜四

物二連湯四物湯四兩生地黃生黃連胡黃連各一兩 若婦人骨蒸加地骨皮牡丹皮 若婦人傷寒汗下後飲食減少虛者宜八物湯四物湯四兩黃芪甘草茯苓白朮各一兩 凡婦人百病只四物湯加吳茱萸煎若陽藏少使茱萸陰藏多使茱萸無不效者 右加減雜病例

若保胎氣令人有子四物與確砂四君子湯各半名八珍湯 若妊娠胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠五錢 葱白黃芪 四物湯加減治妊娠傷寒名六合湯方一十五道 右加減治胎前病例 若產後一月內惡物積滯敗血作病或脹或痛胸膈脹悶

或發寒熱四肢疼痛加延胡索沒藥香白芷與四物湯
為細末淡醋湯或童便調下 若血風於產後乘虛
或產後傷風頭痛發熱百節疼痛加荆芥穗天麻香附石
膏藿香各二錢半四物湯共一兩中加之水煎服
若產後虛勞日久而脈浮疾宜柴胡四物湯

川芎 熟地 當歸 芍藥

加柴胡 人參 黃芩 甘草

半夏 右咬咀水煎服

若產婦諸症各隨六經以四物與仲景藥各半服之其效
如神

去血用 芎歸湯治一切去血過多眩暈悶絕傷胎去血產後崩
中去血拔牙去血金瘡去血不止者舉頭欲倒悉能治之
當歸 川芎各等分

右每服五錢水煎服不拘時 若產後眩暈加芍藥
產後腹痛不可忍加官桂童便酒浸 妊娠子死或不
死胎動酒水合煎即下未死者即安 若虛損腹痛少
氣頭眩自汗每服加羊肉一兩生薑十片水煎 若臨
月服之則縮胎易生 若室女婦人心腹疼痛經水不
調水煎服 若產後胎氣不安產後諸疾酒煎服 若
難生倒橫子死腹中先用黑豈一大合炒熱與小便合
煎服 若難產用百草霜香白芷等分童便好醋各一
沸湯浸服甚者再服即分晚矣 若傷藏毒瘕服加槐
花末五分三日取下水塊即愈若吐血亦服此 若血
氣上端下腫空心煎艾湯調下 若產後惡血注心迷
悶喘急腹痛依前用黑豈加生薑自然汗煎服 若產
後頭痛加荆芥 若崩中漏下失血不止加炒香附每

兩入甘草一錢沸湯點服 若有白帶者加芍藥半兩
乾姜等分米飲調下
諸六合治婦人常病及產後常用之藥 治婦人虛勞
局方中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞
也中道藥牡丹煎丸空心食前人參荆芥散暗以食後是
治有熱虛勞也 凡此藥皆治婦人常病及產後常用之
保全也神仙聚寶丹治血海虛寒虛熱盜汗理宜補養
珀之燥腐香之散可以用平面色痿黃肢體浮腫理宜導
濕乳香沒藥固可治血可以用平胎前產後虛實不同逐
敗養新攻補難並積塊 藏赤白漏崩宜於彼者必妨於
此而欲一方通治可乎世人以其品貴名雅又喜其常服
可以安神去邪令人有子殊不知久服者無不有禍自非
藏府能言醫者終不知覺及至變生他病何曾歸咎此丹
子姪女形色俱實遲於得子久服此丹癰發於背症候甚
危脉散大而瀉急以四物湯加減百餘貼而安

調經 經閉 血崩

大法 經水或紫或黑論 經水者陰血也陰必從陽故其色
紅紫火色也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升
氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁往往
見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛
者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水濕之也錯經妄行
者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其
紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷而行溫熱之劑則
禍不旋踵矣良由病原論月水諸病皆曰風冷乘之宜其
相習而成俗也或曰黑北方水色也紫淡於黑非冷而何

予曰經曰亢則害承乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也况婦人性執而見鄙嗜欲加倍厥府厥陽之火無日不起非熱而何若曰風冷必須外得設或有之蓋千百一二者也

經色紫黑為熱

四物湯加黃芩黃連湯治經水如黑豈汁

四物湯兩 黃芩 黃連各一

右為末醋糊丸服

月經黑口渴倦怠形短色黑脉不勻似數

黃柏 香附末 黃芩 甘草 赤芍藥

香附末 各半

右為末醋糊丸白湯下五六十九

永康胡八娘子二十歲二月經事不來忽行小腹痛有塊血紫色

八醫學綱目卷三

白芍藥 白朮 陳皮 黃芩

川芎 木通 甘草

何孺人氣滯血澁脈不滑經不調或前或後紫色日苦兩

大腹外腫麻木有時痒生瘡大便秘滯

麻子仁 桃仁 芍藥 枳殼

白朮 歸頭 蘇葶仙 訶子肉

生地 陳皮 大黃

各為末粥丸如桐子大白湯下五六十九

經水色淡者氣血俱虛也宜八物湯之類八物者四物

四君子也如蕪宅症隨症加藥

樓婦人年四十八因有白帶口渴月經多初血黑色後來

血淡倦怠食少臍上急

白朮 紅花 陳皮 木通

黃芩各五 縮砂 甘草各五分 枳殼

右煎湯下保和丸三十九抑青丸二十九

四物湯加黃芩白朮湯治經水過多

四物湯兩 黃芩 白朮各一

經水過多

黃芩 芍藥 龜板 黃柏

香附 椿樹根皮

右為末酒糊丸空心白湯下五六十九

一婦人脉弦而大不數形肥初夏時倦怠月經來時多

此稟受弱氣不足攝血故行多

白朮 黃芪 陳皮 人參

白朮 黃芪 陳皮 人參

甘草 黃芪 陳皮 人參

四物湯加葵花湯治經水澁少

四物湯兩 葵花 一方又加紅花血見愁

四物湯加熟地黃當歸湯治經水少而色和

四物湯兩 熟地 當歸各一

師曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰曾

與下利若汗出小便利者可何以故師曰亡其津液故令

經水反少設經下多於前者當所苦困當言恐大便難身

無復汗也

將行時 痛為滿 四物四兩加玄胡索苦楝榔木香各一兩治經事將

行臍腹絞痛臨經痛者血澁故也

抑氣丸臨經之時腹痛以四物湯加玄胡索陳皮牡丹

皮甘草痛甚以豆淋酒痛少以童便煮香附入條芩為丸

經水將來而痛者四物湯加桃仁香附黃連

周壁婦人四十餘月經不調行時腹疼行後又有三四日
淋瀝皆穢水口渴面黃倦怠無力

白木

婦身尾

陳皮

黃連

木通

黃芪

黃芩

甘草

分八貼下五靈脂九四十粒食前服

仁十三孺人月經不勻血紫色來作痛倦怠惡寒為人性
急

青皮

川芎

黃芩

牡丹皮

茯苓

乾姜

甘草

分二貼水煎服

一婦人二十歲月經不勻來時先呵欠腹隱疼血紫色食
少無力

白木

黃連

陳皮

牡丹皮

木通

黃芩

人參

朱萸

甘草

分四貼水二盞煎取小盞食前服

桂枝桃仁湯治經候前腹痛不可忍

桂枝

芍藥

生地

桃仁

甘草

右為餘木每服五錢水二盞姜三片棗一枚同煎去渣
溫服

溫服

柴胡丁香湯治婦人年三十歲臨經預先臍腰痛甚則
腹中亦痛經縮二三日

柴胡

羌活

丁香

全蝎

當歸

生地

右都作一服水四盞煎至一盞去渣稍熱食前服

一婦人三十歲每因浴後必用冷水淋通身又嘗大驚遂
患經來時必先少腹大痛口吐涎水後經行後必
水二日其痛直至六七口經水止時方在百藥不效予診
其脉寸滑大而弦關尺皆弦大而急尺小於關關小於寸
所謂前大後小也遂用香附三兩半夏二兩茯苓黃芩各
一兩半枳實玄胡牡丹皮人參當歸白木桃仁各一兩黃
連七錢川練遠志甘草各半兩桂三錢柴萸一錢半分十
五貼水煎入生薑汁兩蠅殼熱服後用熱湯洗浴得微汗
乃已忌當風坐臥手足見水并喫生冷服三十貼全愈半
年後又因驚憂前病復舉腰腹時痛小便淋痛心惕惕跳
驚悸予意其表已解病獨在裏先與灸少衝勞宮崑崙三
陰交止悸定痛次用桃仁承氣大下之下後用香附三兩
蓬朮當歸身各一兩半三稜玄胡索桂大黃青皮俱醋制

本草綱目卷三十四

八

青木香曲香滑石木通桃仁各一兩烏藥甘草縮砂枳櫛
苦練肉各半兩水香吳茱萸各二錢分作二十貼入新取
牛膝濕者二錢生薑五片用荷葉湯煎服訖漸安
經過後而作痛者乃虛中有熱所以作痛
新荷姐頭痛口乾經行後身痛腰甚痛

生地

白木

芍藥

芫蕪

婦身尾

黃柏

甘草

水少酒煎服

治婦人月經滯滯每發心腹臍疔可忍及治產後
惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死者琥珀散

京三稜

蓬莪朮

赤芍藥

劉寄奴

牡丹皮

熟地

官桂

菊花

真蒲黃

當歸

右前五味用烏豈一升生薑半斤切片米醋四升同煮

荳爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒下
空心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳
予家之秘方也若是尋常血氣痛只一服產後血衝心
二服便下常服尤佳予前後救人急切不少此藥亦宜
多合以救人

交加散治榮衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛經血諸
疾並皆治之

生姜斤 生地二斤 白芍藥 當歸

桂心兩 紅花炒無惡 沒藥另研各 蒲黃隔紙

玄胡索醋紙包煨熟用布

右將地黃汁炒生姜滓姜汁炒地黃滓各焙乾用諸藥
為細末每服三錢溫酒調下 若月經不依常蘇木煎
酒調下 若腰痛糖酒調下

瘀血

香附醋炙 桃仁兩 牡丹皮 大黃蒸

當歸各 川芎 紅花兩 瓦龍子煨

右炊餅為丸空心溫酒下三四丸

交加地黃丸治婦人經不調血塊氣痞肚腹疼痛

生地 老姜斤 玄胡索 當歸

川芎 芍藥各二 明沒藥 木香各二

桃仁去皮 人參各兩 香附斤

右為末先以生姜汁浸地黃查以地黃汁浸生姜查晒
乾皆以汁盡為度共十一味作一處晒乾研為末醋糊
為丸空心以姜湯下

交加散治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多

少結聚為癥產後中風

生地 生姜各五兩各

右交互取汁浸一夕各炒黃漬汁盡為度末之準常服
痛酒調下三錢產後尤不可闕

益母草一名天麻未結子時採一握以水五斗煮半乾
去渣再熬成膏每用半小盞和酒并姜汁放開服之大治
去血及血經不調 經不及期者血熱四物湯加黃連

經不及 期者為 血熱 肥人不及日數而多痰者血虛有熱南星白朮蒼朮黃連

香附川芎作丸 婦人患經血紫黑一月兩次行不思食口乾苦時發熱

麥門冬 當歸身 白芍藥 陳皮

白朮各一 人參 地黃 茯苓各半

木通各一 生甘草一

右分十二貼食前熱飲下抑青與點各十五

帶下經水不利小腹滿痛經一月再見者土瓜根散主

之亦主陰 土瓜根 芍藥 桂枝 廔虫各三

右四味杵為散酒服方寸七日三服

經水過期血少川芎當歸人參白朮與痰藥 過期淡
色者痰多也二陳湯加芎歸 過期紫色有塊血熱也必
作痛四物湯加香附黃連

師曰脈微血氣俱虛年少者下血也乳子下利為可否
者此為居經三月一來師曰寸口脈微而澁微則衛氣不
足澁則血氣無餘衛不足其息短其形燥血不足其形逆

榮衛俱虛言語謬誤跌陽脈浮而澁澁則衛氣虛虛則短
氣咽燥而口苦胃氣瀝則失液少陰脈微而遲微則無精

三月一 來為居 經者血 少

三月一 來為居 經者血 少

三月一 來為居 經者血 少

三月一 來為居 經者血 少

三月一 來為居 經者血 少

三月一 來為居 經者血 少

三月一 來為居 經者血 少

三月一 來為居 經者血 少

三月一 來為居 經者血 少

三月一 來為居 經者血 少

三月一 來為居 經者血 少

遇則陰中寒滿則血不來此為居經三月一來 問曰
 人妊娠三月師脈之言此婦人非軀人月經當下其脈何
 類何以別之師曰寸口脈衛浮而大榮反而弱浮大則氣
 強反弱則少血孤陽獨呼陰不能吸二氣不停衛降榮竭
 陰為積寒陽為聚熱陽盛不瀆經絡不足陰虛陽往一作
 故令少血時發酒泚咽燥汗出或澁稠數多唾涎沫此令
 重虛津液漏泄故知非軀音煩滿血月舉一經三月一來
 陰盛則瀉名曰居經謂右脈浮大

四物湯黃芩 如腹痛加黃連一兩夏月不
 經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其
 寒熱後以四物湯和之

婦人血脈不調往來寒熱狀如勞倦

當歸 川芎 甘草 黃芪
 官桂去粗皮熟地 白朮 白芍藥各二

右為細末每服五錢棗子一枚水煎空心溫服白湯點
 服亦得常服不生帶下調血脈養子宮終身無病

升陽舉經湯治經水不調右入脈按之空虛是氣血俱
 脫大寒症輕手其脈數疾舉指弦緊或澁皆陽脫之症陰
 火亦亡見熱症於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲去也當溫
 之降之引之燥之此法大升浮血氣補命門之下脫也諸
 藥言根近苗處去苗便是

柴胡根 當歸根 白朮 黃芪各三
 葉本去 羌活根 防風根各二 紅花
 白芍藥各五 獨活根各 桃仁去皮尖 細辛各六

川芎 熟地水冲 人參去 黑附子炮
 甘草稍多 肉桂去皮不用 五分
 右為煎末每服二錢水三盞煎至八分空心稍熱服
 治婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫
 者一類呼為經病不曾說是陰勝陽是陽勝陰所以服藥
 少效蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地
 凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散
 溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當別
 其陰陽調其血氣使不相乘以平為期宜紫石英丸

紫石英研水 禹餘糧煨 龍骨
 川烏頭炮 桂心 桑寄生 杜仲炒
 五味子 遠志 澤瀉 當歸
 石斛 肉蓯蓉酒 乾姜各二 川椒

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九至五十九空心
 食前服

治婦人天癸已過期經脈不勻或三四月不行或一月
 再至腰腹疼痛素問云七損八益謂女子七數盡而經不
 依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善宜
 此當歸散

當歸 川芎 白芍藥炒 黃芪炒
 白朮兩

右為細末每服二錢酒調下空心食前日三次服法
黃芩加桂枝一兩

問曰婦人年五十數一朝而清血二三日不止何以治
之師曰此婦人前絕生經水不下今反清血此為居經不
須治當自止經水下常五日止者五日愈

針灸

月經不調 陰獨三分此穴大效須待經定

又法內踝下白肉際青脉上灸隨年壯

又法中極 三陰交 腎俞 氣海

經閉久忽大崩復又斷絕復又大行不調者 豐隆六

血止 石門五分

婦人五旬經斷後再行或多或少或瘀或紅並下腹中氣

滿如胎孕 天樞 中脘 氣海各五分

痛月水不以時休止天樞主之千金作腹脹腸 小腹脹

滿痛引陰中月水至則腰脊痛胞中瘕子門有寒引髓脾

水道主之千金引髓脾作

經閉

血枯經閉者四物湯加桃仁紅花 陰虛經脉久不通

小便短澀身疼者四物加蒼朮牛膝陳皮生甘草作湯又

用蒼朮九加蒼耳酒芍藥為丸就煎前藥吞下

右丹溪治血枯大法

經閉不行有三補前人之闕 婦人脾胃久虛形體羸

弱氣血俱衰而致經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸

瘦津液不生夫經者血脉津液所化津液既絕為熱所燥

肌肉漸瘦時見渴躁血海枯竭病名曰血枯經絕宜瀉胃

之燥熱補益氣血經自行矣此症或經適行而有子亦

不安為胎病者有矣此中集胃

或心包脉洪數躁作時見大便秘澀小便雖清不利而經

水閉絕不行此乃血海乾枯宜調血脉除包絡中火邪而

經自行矣此下焦胞

或因勞心心火上行情事不來者胞脉閉也包脉者屬於

心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來

宜安心補血瀉火經自行矣此上焦心

裴澤之夫人病寒熱月事不至者數年又加喘嗽醫者率

以蛤蚧桂附投之曰不然夫人病陰為陽所搏溫劑太過

故無益反害投以涼劑涼血和血藥則行矣已而果然

女子月事不來者先瀉心火血自下也內經曰二陽之

病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消王註曰

大腸胃熱也心脾受之心主血心病則血不流脾主味脾

病則主味不化味不化則精不足故其病則不能隱曲脾

土已虧則風邪勝而氣愈消也又經曰月事不來者胞脉

閉也胞脉屬於心絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通

故月事不來先服降心火之劑後服局方中五補丸後以

衛生湯治脾養血也

五補丸補諸虛安五藏堅骨髓養精神

熟地 人參 牛膝酒洗去 白茯苓

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五丸溫酒下空

心服

衛生湯 白芍藥各二 黃芪三 甘草一

右為末每服半兩水二盞前至一盞溫服空心如虛者

加人參一兩

右東垣潔古治血枯之法皆主於補血瀉火也補血者四物之類瀉火者東垣分上中下故火在中則善食消渴治以調胃承氣之類火在下則大小秘瀉治以玉燭之類玉燭者四物與調胃承氣等分也火在上則得於勞心治以芩連及三和之類三和者四物涼膈當歸等分也潔古先服降心火之劑者蓋亦芩連三和玉燭之類後服五補衛生者亦補氣之劑也

帝曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何何以得之岐伯曰病名血枯此得之少年時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也帝曰治之奈何岐伯曰以四烏嚮骨一鹿茹二味并合之丸以雀卵大如小菴

木醫學綱目卷三

五

以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也腹中論云烏嚮骨主血閉肝散惡血在卵生血瘦鮑魚主血

右岐伯河間治血枯之法

問曰婦人病下利而經水反斷者何也師曰但當止利經自當下勿性所以利不止而血斷者但下利下津液故經斷利止津液復經當自下問曰婦人病經水斷一二月而反經來今脈反微虛何也師曰此前月中若當下利故令妨經利止月經當自下此非軀也婦人血下咽乾而不渴其經必斷此榮不足本自有微寒故不引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其經必復下

有腹痛
有血老
有積結
有胞門
有寒傷
有經絡
有凝堅
有在上
有嘔吐
有涎沫
有成肺
有癰形

汚血

體損分在中盤結臍寒疝或兩脇疼痛與臟相連或結熱中病在關元脈數無痞肌若魚鱗時着男子非止女身在未下多經候不勻今陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣衝急痛膝脛疼煩奄忽眩冒狀如厥癡或有憂慘悲傷多噴此皆帶下非有鬼神久則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實察弦行其針藥治危得安其雖同病脈各異源子當辨記勿謂不然

附末枳殼末各半錢早調服

萬病丸治經事不來統臍痛

乾漆許碎炒牛膝去苗酒浸一兩右為末以生地黃汁一升入二味藥末銀器內慢火熬可丸即丸如桐子大每服二九空心米飲或溫酒下

木醫學綱目卷三

末

瘵月水不利臍下懸逆氣脹滿欲嘔不得睡急劇

當歸四錢乾漆三錢炒

右為末煉蜜丸如桐子大空心溫酒下十五丸

治月經壅滯臍腹痛 當歸 玄胡索

右為末末每服三錢姜三片水一鍾半煎至七分去渣稍熱服

小腸移熱於大腸為伏瘕為沉全文見診病傳變○王註云血溢不利則月事不調

治婦人月水滯澁不快結成瘕塊筋脈大欲死用馬鞭

草根苗五斤挫細水五斗煎至一斗去渣別以淨器盛熬

成膏食前溫酒調下半匙本草云馬鞭草

血極骨治婦乾血氣以川大黃為末用醋熬成膏子

九如鷄頭大每服一九熱酒化開臨臥溫服大便利一二

有熱血

有熱血

行後紅脉自下是婦人之仙藥也加當歸頭
婦人經水不利抵當湯主之亦治男子膀胱瀉急
右經一節方三首皆治汚血有熱而經閉前一方便劑
後二方便劑也
有寒血
紅花當歸散治婦人經候不行或積瘀血腰腹疼痛及
室女月經不通

紅花 當歸尾 紫葳 牛膝

甘草 蘇木細剉各 白芷半兩 赤芍藥八兩

劉寄奴五兩 桂心半兩

右為細末空心熱酒調三錢服之食前臨臥再服若久

血不行濃煎紅花酒下孕婦休服

牛膝散治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝一兩 桂心 赤芍藥 桃仁

玄胡索 當歸 牡丹皮 川芎

木香各七

右每服方寸七為極細末溫酒調下食前

溫經湯若經道不通遠勝寒痛脉沉緊宜此及桂枝桃仁

湯萬病丸

當歸 川芎 芍藥 桂心

牡丹皮 蓬莪朮各半 人參 甘草

牛膝各一

右咬咀每服五錢水一盞半去渣溫服

桂枝桃仁湯方見調

牡丹皮散治婦人月水不利臍腹疼痛

牡丹皮 大黃炒各 赤芍藥 生地黃

桃仁 當歸 桂心 赤茯苓

白木各七 石葶去毛 木香各半

右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去渣

空心溫服

治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕通經丸

桂心 青皮去 大黃炮 乾姜

川椒 川烏 蓬莪朮 乾漆

當歸 桃仁各半

右為末先將四錢用米醋熬成膏和餘六錢末成劑相

中杵丸如桐子大晒乾每服二十九用淡醋湯下加至
三十九溫酒亦得空心食前服
右方六首皆治汚血有寒而經閉前四方輕劑後二方
重劑也
治月水不通屢試有驗厚朴不以多少姜汁炙香細切
濃煎去渣空心服不過三四劑形實氣虛者宜之
積痰傷經不行夜則妄語
瓜蒌子一兩 黃連一兩 吳茱萸一兩 桃仁五十
紅麴一兩 縮砂一兩 山查一兩
右生姜研炒餅為丸
軀脂滿經閉導痰湯加芫連不可服地黃如用姜汁炒
楊村婦人年二十餘兩年經閉食少乏力
黃連二兩 白木一錢 陳皮 滑石各一
黃芩一兩 木通一兩 桃仁十二 甘草一兩
右丹溪治痰結胸腹而經閉之法皆用輕劑導痰降火
也
經云氣上迫肺則心氣不得下通故月事不來今用連朴

之類導痰降火使不上迫於肺故心氣下通而月事來也
 丹溪治一婦人久瘧食少經閉兩手無脈每日與三花神
 祐丸十餘粒津咽之月餘食進脈出又半月脈愈又一月
 經行亦此意也詳見久瘧予嘗體丹溪之意治陳氏婦二
 十餘歲形肥痞塞不食每日臥至未牌吃一盞薄粥吃粥
 後必吐水半碗仍復臥經不通三月矣前番曾暗通黑色
 脈之辰時寸關滑皆有力午後關滑寸不滑詢之因乘怒
 飲食而然遂以白朮一兩半厚朴黃連枳實各一兩半夏
 茯苓陳皮山查人參滑石各八錢縮砂香附桃仁各半兩
 紅花二錢分作十貼每日服一貼各入姜汁二錢殺間三
 日以神祐丸神祕沉香丸微下之至十二日吐止食漸進
 四十日平復如故又汪氏婦五十餘形瘦亦痞不食吐水
 經不通以前藥方加參朮歸為君煎熟入竹瀝半盞姜汁

服之但不用神祐丸下亦平復若咳嗽寒熱而經閉者皆
 於欬門溫痰條求之

凡婦人月事不來用茶調散吐之次用玉燭散等婦
 湯三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開胃進食分
 陰陽利水道之藥也 一婦人月事不行寒熱往來口乾
 頰赤飲食少且暮間咳一二聲諸醫皆用重虫水蛭乾漆
 調砂芫青紅娘子沒藥血竭之類惟載人不然曰古方雖
 有此法奈病人服之必臍腹發痛飲食不進乃命止藥飲
 食稍進內經曰二陽之病發心脾心受之則血不流故女
 子不月既心受積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃誘食乃
 涌出痰一二升下泄水五六行濕水上下皆去血氣自然
 滯流月事不為水濕所隔自依期而至矣亦不用重虫水
 蛭之類有毒之藥如用之則月經終來小洩反閉他症生

矣凡精血不足宜補之以食大忌有毒之藥偏勝而致六
 腑多矣 一婦人年三十四歲經水不行寒熱往來面色
 痿黃唇焦頰赤時咳三三聲問其所服之藥黑神散烏金
 丸四物湯燒肝散驚甲散建中湯寧肺散針艾千百轉劇
 家人意倦不欲求治載人憫之先涌痰五六升午前涌畢
 午後食進餘症悉除後三日復輕瀉之又去痰一二升食
 益進不數日又下通經散瀉訖一二升後數日去死皮數
 重小者如麩片大者如舊膜不一月經水自行神氣大康
 矣
 月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上
 迫肺心氣不得下通故月事不來也全文見水腫胃病
見診病息辨錄
 室女月水不來用雄鼠屎一兩燒存性為細末空心溫
 酒調下一錢神效

掌中金丸治婦人乾血氣

川山甲炮

甘草

苦丁香

川椒

苦葶藶

白附子

猪牙皂角

草烏頭絲三

巴豆用研

右為細末生蔥絞汁和丸彈子大每用一九新綿包之
 內陰中一日即白二日即赤三日即血神效

婦人經水閉不利臟堅癖不止中有乾血下白物礬石
 丸主之

礬石三錢

杏仁一分

右二味末之煉蜜丸棗核大內臟中刺者再內之
 經脈不通已有寒熱此穴大效三陰交三分立有效如
熱神乃經脈要

經脈不通心衝 曲池 支溝 三里 三陰交此四
穴

不通則瀉之如
虛托不行則補之

月經斷絕 中極 三陰交 腎俞 合谷

又法 四清 在丹田傍

經脈不通變成癥症飲食如常腹漸大如蠱 氣海用

瀉水惡物 陰交 取法亦如上

月水不通奔泄氣上下引腰脊痛氣穴主之 女子不

下月水照海主之 婦人少腹堅痛月水不通帶脈主之

月水不利見血而有身則反敗及乳腫臨泣主之

師曰有一婦人將一女子年十五所來診言女子年十

四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰若是夫人親

女必夫人年十四時亦以經水下所以斷此為避年勿惟

後當目下

腎脈微瀉為不月 全見

二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為息奔者

死不治 全見診

血崩

血崩無心痛者 見心

紫黑色成塊者血熱四物加黃連柴胡之類 氣虛血虛

者皆於四物內加參芪 急則治其標白芷湯調百草霜

甚者棕櫚灰後用四物加炒乾姜調理因勞者用人參帶

升補藥因熱者用黃芩因寒者用炒乾姜

丹溪云涎鬱胸中清氣不升故經脈壅遏而降下非開延

不足以行氣非氣升則血不能歸隧道此論血泄之義甚

明蓋開胸膈濁涎則清氣升清氣升則血歸隧道不崩矣

故其症或腹滿如孕或臍腹疔痛或血結成片或血出則

快止則悶或臍上動其治法宜開結痰行滯氣消汚血

痰氣汚 血宜行

開藥方

江氏婦三十五六歲墮胎後血不止食少中消倦怠不起

躁煩六脈沉大而數重取微弦予作怒氣傷肝感動胃氣

遂於二陳湯加川芎白朮縮砂二十貼而安

旋覆花湯治半產漏下脈弦而大

旋覆花 三兩本草云 蔥十四 新絳少

右三味以水三升煮取一升頓服之

治婦人崩中下血不止以衣中白魚鱗香等分為末以

并花水服之日三服差

右三方開痰

行氣方 備金散治婦人血崩不止

香附子四兩當歸尾二兩五靈脂一兩

右為細末每服五錢醋調空心服立效

治下血不止或成五色崩漏方用香附子春去皮毛中

斷之畧炒為末每服二錢用清米飲調下此方徐朝奉傳

其內人有是疾偏服藥不效後服此方遂愈須久服為佳

亦治產後腹痛大是婦人仙藥常服益血調氣

醋附丸治崩漏帶下積聚癥瘕腹痛用香附子不

以多少徐去毛用好醋煮出焙碾末醋煮稠為丸如桐子

大每服三十九丸米飲送下無時婦人數墮胎者此藥尤妙

一方用香附子白芷為丸

縮砂散治血崩用縮砂仁不以多少於新瓦上炒香為細

末米飲調下三錢

右四方行滯氣

治血崩用乾荷葉濃煎湯一碗空心服之立愈或調醋

炒香附末尤妙

治血崩不止五靈脂二錢炒熱加當歸酒同煎或水酒

方治汚血

童便各半盞同煎服一方五靈脂半生半熟為末酒調服

一方水煎五靈脂半乾去渣澄清再煎成膏入神麴末為

丸如桐子大空心溫酒下二三十丸便止

又方 麻茸補 當歸各二 蒲黃炒 右三味為末溫酒調下五錢七日三服

桂枝茯苓丸治婦人有癥在臍上動下血不止方見胎動下血

右四方消汚血

脾胃虛弱

當歸芍藥湯治婦人經脈漏下不止其色鮮紅時值七

月處暑之間先因勞役脾胃虛弱氣短逆自汗不止身熱

悶亂惡見飲食亦不思食沉困懶倦四肢無力大便時瀉

後復因心氣不足其經脈再下不止惟覺氣下脫其元氣

逆上全無惟覺心腹中氣不行氣短則不能言是無力以

言非懶語也此藥主之

人醫學綱目卷三言 黃芪一錢 白朮一錢 蒼朮一錢 當歸身

白芍藥各五錢 甘草炙 生地各三錢 柴胡一錢

熟地黃一錢 陳皮五分 右十味為末作二味水煎去渣熱服空心一服之後

漸減次日諸症悉去頓喜飲食所以者何蓋氣通而聞

飲食之香得平康故也

婦人陷經漏下黑不解膠姜湯主之即芎藭膠艾湯

芎藭 阿膠 甘草各二 艾葉

當歸各三 芍藥各四 熟地黃

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去渣內膠令

消盡溫服一升日三服不瘥更作治婦人胎動無乾姜

四物膠艾湯方見婦人胎動無乾姜

益胃升陽湯治血脫益氣古人之法也先補胃氣以助

生長故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉世皆以為補氣

殊不知其能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之

一身內穀為寶

黃芪二錢 人參有嗽者神麴炒各一 升麻

柴胡各五 白朮三錢 當歸身 甘草炙

陳皮一錢 生黃二錢 全歸逆秋涼不用 一方用生地

右藥末每服三錢或五錢如食添再加之如食減已定

三錢內更減之不可多服每服二錢水煎去渣熱服如

腹痛每服加白芍藥二分中桂少許如渴口乾加乾葛

二分如嗽去人參服不計時候蓋先服此益胃氣升陽

宜德候經歷家人病崩漏醫莫能效切脈之後且以紙珥

其症至四十餘種為制調經升陽除濕湯療之明日而十

減其八前後五六日良愈

調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩不

止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心

氣不足因飲酒勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜臥四

肢不收困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脈緩

而弦急按之洪大皆中指下得之脾土受邪也脾主滋榮

周身者也心主血脈主脈二者受邪病皆在脈脈者血之

府也人者脈之神也心不主令胞絡代之故曰心之脈主

屬心系心系者胞絡命門之脈也主月事生孕皆由脾胃

虛而心包乘之故漏下血水不調也况脾胃為陰陽之根

帶當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

柴胡 防風 甘草 藥本

升麻各一 羌活 蒼朮 黃芪各一

獨活五分 當歸五分 蔓荊子七分

右咬咀水五大盞煎至一大盞去渣稍熱服空心服藥畢待少時以早餅壓之可一服而已如灸足太陰脾經中血海穴二七壯或三七壯立已 此藥乃從權衡之法用風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也若病愈經血惡物已盡主病雖除後必須以黃芪甘草人參當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加和血藥是也若經血氣惡物下之不絕尤宜救其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止 柴胡調經湯治經水不止鮮血項筋急痛脊骨強痛不思飲食

羌活 獨活 藜蘆 升麻各五分

大醫學綱目卷之五

蒼朮錢一 柴胡根切 葛根 當歸身

甘草錢三分 紅花錢一

右咬咀作一服水煎去渣稍熱空心服微汗立止

一婦人經候黑血凝結成塊左脰有血痕水瀉不止殺食有時一化有時不化至今歲四月血塊暴下併水注俱作是前後二陰有形之血脫竭於下既久經候尤不調水瀉日見三兩行食罷心煩不快飲食減少甚至瘦弱東垣先生曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜若不本四時以順為逆非其治也且治之之法必先歲氣無代天和無盛感無虛遺人天殃無致邪無失正絕人長命故聖人云陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之則愈下之則死大抵聖人立法各自有義且如升陽或發散之劑是助春夏之陽氣令其上升乃瀉秋冬收藏殞

殺寒涼之氣此病是也當用此法治之乃升降浮沉之理也夫天地之氣以升降浮沉乃從四時如治病逆之則殺人矣故經云順天者昌逆天者亡可不畏哉夫人之身亦有天地四時之氣不可止認在外人體亦同天地也今經漏不止是前陰之氣血已下脫矣水瀉又數年不愈是後陰之氣血又下陷矣後陰者主有形之物也前陰者精氣之門戶俱下竭是病人周身之氣常行秋冬之令陰主殺此等收藏之病是也陽生陰長春夏是也在人身之中令氣升浮者殺氣上行是也既病則周身血氣皆不生長殺氣又不升其飢肉消少是兩儀之氣俱將絕矣既下元二陰俱脫血氣消竭假令當日元是熱症今下焦久脫已化為寒矣此病久沉久降寒濕太勝當急救之瀉寒以熱降濕以燥大升大舉以助長生補養氣血不致偏枯聖人

大醫學綱目卷之五

手本

立治之法云濕氣大勝以所勝治之助甲風木上升是也故經云風勝濕是以所勝平之也當調和胃氣次用白朮之類以燥其濕而滋元氣如其不止後用風藥以風勝濕此之謂也此藥便是大舉大升以助春夏二濕之久陷下之至治也又一本云此病次用四物隨濕症加減

獨聖散治婦人血崩不止用防風去蘆不以多少為細末酒煮白麵清調下二錢空心食前日二服更以麩作糊酒投之極驗 治血崩夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時服

治崩中不止苦蕒八兩清酒五升煎至二升半分三服不爾者徐徐進之云苦不可久

右大舉大升之劑治崩脈沉弦而洪或沉細而數者皆胃氣下陷也或崩而又久瀉者亦胃氣下陷也故舉之

升之其病愈也

經水漏不住有二補前人之闕 婦人脾胃虛損致命
門脈沉細而數疾或沉弦而洪大有力寸關脈亦然皆由
脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其
色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶者脈必弦細寒作於
中有赤帶者其脈洪數病熱明矣必腹痛或臍下痛臨經
欲行而先發寒熱往來兩脇急縮黃脾胃症出見或四肢
困熱心煩悶不得眠臥心下急宜大補脾胃而升降氣血
可一服而愈或先貴而後賤或先富而後貧病名脫營者
心氣不足其火大熾肝於血脈之中又致脾胃飲食失節
火乘其中形質肌肉頹而不病者此心病也不形於脈故
脾胃飲食不調其症顯矣而經水不時而下或適來適斷
暴下不止治當先說惡死之言勸諭令懼死而心不動以

入醫學綱目卷三十四

大補血氣之藥補養脾胃微加鎮降心火之藥治其心補
陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則
陽氣內動發則心下崩漏血也故經曰大經空虛發
虛者補之末年冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先會殞身失
血自後一次經數日而來今次不止其人心窄性急多驚
以予料之他日必因心氣不足飲食失節得之大方曰容
到彼診得掌中寒脈沉細而緩間而沉數九竅微不利四
肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足飲食
失節脾胃虛弱之證胃脘當心而痛左脇下急縮有積當
臍有動氣腹中鳴下氣大便難諸虛證極多不能盡錄擬
先治其本餘證可以皆去與安心定志鎮墜其驚調和脾
胃大益元氣補其血脈養其心神以大熱之劑去其久寒
凝在皮膚內少加生地黃去命門相火不令四肢痿弱黃

芝當歸人參湯

黃芪一兩 當歸半斤 人參一兩 陳皮五分

草薺七分 神麩半斤 黃連一錢 桂枝半錢

杏仁九箇 麻黃一錢 生地三分 先煎

右為粗末水三大盞先煮麻黃數沸去香入前藥同煎

至一大盞於巳午之前食消盡服之其胃脘痛乃胃上

有客寒與大熱藥草薺九一十五丸其痛立止再與

肝之積藥除其積之根源而愈

右虛挾積滯而崩當治一老婦人血崩不止流流不絕

滿牀皆血起牀不得者三月矣腹滿如孕予作虛挾痰

積汚血治之用四物四兩參末各一兩甘草半兩以治

虛香附三兩半夏兩半茯苓陳皮枳實縮砂玄胡各一

兩以破痰積汚血分二十貼每貼煎乾加荷葉側柏葉

湯再煎服之服盡良愈今再不發神效

栢黃散療經血不止

黃芩一兩 側柏葉 蒲黃各一 伏龍肝兩

右咬咀用水二升煎取八合分為二服

又方治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛

芍藥十二 阿膠 青竹茹各八續斷

地榆 小薊根各三 當歸六 生地

伏龍肝各十

右用水九盞煮取三盞去渣分作三服

治婦人血露蛋砂一兩炒伏龍肝半兩阿膠一兩同為

末温酒調空心二三錢以知為度

伏龍肝散治氣血勞傷衝任脈虛經云非時忽然崩下

或如草汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝兩 甘草兩 赤石脂兩 芎藭三

肉桂兩 熟地兩 當歸 乾姜各七

艾葉二兩 麥門冬兩 去心

右件為粗末每服四錢水一盞水同煎

右四方伏龍肝例蓋燥可去濕也前二方去濕熱後二

方去寒濕按伏龍肝為止血之聖藥先賢治崩用旋覆

花半夏治胎前濕痰而崩止者亦是此意

崩中下血不止小腹痛

芍藥一兩 栝葉六兩 微炒丹

右水一升煎取六合入酒五合煎取七合空心分為二

服一方為細末酒調二錢一方有鹿角膠等分酒調治

白帶臍腹痛

壯礪散治月水不止眾藥不愈者壯礪火煨研細用醋

調成丸再煨過通紅候冷研細出火毒却用醋調艾末熬

成膏和丸如桐子大每服五十九醋艾湯下

陰虛陽搏謂之崩論 涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡

相火故血走而崩也

生地兩 黃連分 黃柏分 黃芩分

羌活 柴胡 知母 升麻

川芎各二 防風分 藜蘆分 甘草分

紅花少 歸身分 細辛分 荆芥穗

蔓荊子分 右咬咀都作一服水三盞煎至一盞去查稍熱服空

心足太陰脾之經中血海二穴在膝膕上內廉白肉際

二寸中治女子漏中惡血月事不調逆氣腹脹其脈緩

者是也灸三壯足少陰腎之經中陰谷二穴在膝內輔

骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之治膝如錐不

得屈伸舌縱涎流煩逆溺難少腹急引陰痛股內痛婦

人漏下不止腹脹滿不得息小便黃如蠶女子如妊身

可灸三壯

小煎湯治崩漏不止色明如水得溫則煩悶者此陽傷

於陰令人下血當補其陰脈數疾小者順大者逆

小煎葉一盞 生地黃汁一盞 白朮兩

右三件入水一盞煎至一半去查溫服

芎藭酒治崩中晝夜不止醫不能治

芎藭兩 生地汁一盞

右用酒五盞芎藭一盞去查下地黃汁再煎二三沸

分為三服

治崩中去血不止

大小煎根白茅根兩

右二味細切用酒五升煮取四升去查分四服

痛下乃熱兼虛四物加黃連

金毒散治血室有熱崩下不止服溫藥不效者

延胡索 瞿麥穗 當歸 乾姜

牡丹皮各一 石膏兩 桂心別研末

蒲黃兩 葶藶七錢

右為細末每服三錢水一盞半空心溫服日二

治崩中下血黃芩不以多少為細末每服一錢燒釋鍾

通亦投酒中令沸却用其酒調服許學士云崩中多用上

陰前所謂天暑地熱經水

經水多去不能住以三補丸加莎根龜板金毛狗脊補

保安丸白薇散補之不效戴人見之曰天癸已盡本不當

下血蓋血得熱而流散非寒也夫女子血崩多因大悲哭

悲甚則肺葉布心系為之急血不禁而下崩內經曰陰虛

陽搏謂之崩除脈不足陽脈有餘數則內崩血乃下流舉

世以虛損治之莫有知其非者可服大劑大劑者黃連解

毒湯是也次以香附二兩炒白芍藥二兩焙當歸二兩焙

三味同為細末水調下又服煥榔丸不旬日而安

丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不

節所得經隔少時其脈兩尺俱弦緊而洪按之無力其證

自覺臍下如米求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物雖多

間下如屋漏水下時有鮮血不多右尺脈時微洪屋漏水

多暴下者是急弦脈為寒多而洪脈時見乃熱少合而言

之急弦者北方寒水多也洪脈時出者命門包絡之火也

黑物多赤物少合成屋漏水之狀也

川芎四分 歸身一分 生艾葉一分 阿膠六分

白芍三分 熟地三分 丁香四分

右為細末作一服水二盞煎至五沸去渣入膠艾再上

火煎至一大盞空心宿食消盡帶熱服之三服效

治血崩

熟艾如雞子大 阿膠兩 乾姜錢

右粗末用水五盞先煎艾葉姜至二盞半入膠消溫分

二服空心服

又方治崩中不止丁香二兩為細末用酒三升煮取一升

空心頓服 必效方用丁香百顆酒煎服 又方益智炒

為細末鹽米飲調下

香礬散治血崩香附不以多少極酸醋浸一宿炒焦為

灰存性每一兩入白礬末二錢米飲調服空心神妙一法

用荷葉湯調尤妙

用香附子去毛炒焦黑存性為細末用極熱酒調下二

錢放溫服不過兩服立愈昏迷甚者三錢七如血山崩不

止者亦能解之米飲調亦可許學士云治下血不止或成

五色崩漏香附子是婦人仙藥也

婦人血崩不止用煥榔燒灰存性碾末以溫酒調下甚

妙

五靈脂散治婦人血山崩諸藥不止者五靈脂炒令烟

盡為末每服一錢溫酒調下一法每服三錢水酒童便各

半盞煎服名抽刀散

琥珀散治崩漏下血

赤芍 香附子 枯荷葉 男子髮皂黃

當歸 樓櫚炒焦 烏紗帽是漆紗帽中取

右等分除樓櫚外其餘並用粗片新瓦上煨成黑灰存

性三分為細末每服五錢空心童便調下如人行十里

再一服七八服即止若產後血去多加米醋京墨麝香

少許 一法先以五積散加醋煎投一二服次服五靈

脂散

療經血不止

婦人經血正淋漓 舊蓬蓬燒作灰

熱酒一盃調八字 自然安樂更無疑

黃牛角鯁用尖燒為黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢白痢

治漏下不止者鹿角燒灰細研食前溫酒調下二錢

又方桃仁燒灰研細食前溫酒調下二錢 又方亂髮皂角水洗淨燒為細末空心溫酒調下二錢

治血久崩夏枯草燒存性為末空心米飲調下此用灰與前用草不同

荊芥散治婦人崩中不止用好麻油點燈多着燈心就上燒荊芥焦色為細末每服三錢童便調下

治婦人漏下血不絕槐花鵝不以多少燒作灰細研食前溫酒調二錢七

治崩中不止不問年月遠近用槐耳燒作末為末以酒服方寸七

神應散治血崩不止桂心不以多少炒極焦存性為末每服一二錢米飲調下

如聖散治血山崩 棕櫚 烏梅各一 乾姜一兩五錢並燒過存性

右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久患不過三服愈

治血崩屢効方 當歸 白芍 乾姜 棕櫚各等

右各煨存性研為細末醋調以有節朱筋左攪四十九轉食前服

又方用棕櫚白礬煨為末酒調二錢服

治暴崩下血百草霜二錢狗膽汁一處并定分作二服當歸酒調下

黃牛角鯁用尖燒為黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢白痢
治漏下不止者鹿角燒灰細研食前溫酒調下二錢
又方桃仁燒灰研細食前溫酒調下二錢 又方亂髮皂角水洗淨燒為細末空心溫酒調下二錢
治血久崩夏枯草燒存性為末空心米飲調下此用灰與前用草不同
荊芥散治婦人崩中不止用好麻油點燈多着燈心就上燒荊芥焦色為細末每服三錢童便調下
治婦人漏下血不絕槐花鵝不以多少燒作灰細研食前溫酒調二錢七
治崩中不止不問年月遠近用槐耳燒作末為末以酒服方寸七
神應散治血崩不止桂心不以多少炒極焦存性為末每服一二錢米飲調下
如聖散治血山崩 棕櫚 烏梅各一 乾姜一兩五錢並燒過存性
右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久患不過三服愈
治血崩屢効方 當歸 白芍 乾姜 棕櫚各等
右各煨存性研為細末醋調以有節朱筋左攪四十九轉食前服
又方用棕櫚白礬煨為末酒調二錢服
治暴崩下血百草霜二錢狗膽汁一處并定分作二服當歸酒調下

又方京墨為末二錢七同燒露蜂房為末三指撮酒調服

治血崩用葫蘆去子穰實荆芥穗燒存性飲湯服

右二十一方皆燒灰黑藥經云北方黑色入通於腎皆通腎經之藥也夫血者心之色也血兒黑即止者由腎水能制心火故也

運氣運氣血崩皆屬風火經云少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫其病血崩是也

治崩不定或淋淫經年者 白礬 硃砂 黃丹 右件將白礬滾開成汁下餘藥細末一處攪勻就成丸

子如彈子大每用一丸新綿裹定內陰中立效

經血過多不止并崩中 三陰交 行間 通理 漏下不止 三陰交 太衝

胞門不開漏下惡血不禁 氣門 血崩并漏下 中極 子宮 敗血不止 三陰交 百勞 風門 中極 腎俞 膏盲 曲池 絕

婦人不字陰暴出經水漏然谷主之 婦人漏血腹脹

滿不得息小便黃陰谷主之 黃崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如紅血也

寸口脈弦而大弦則為瀉大則為乳減則為寒乳則為虛

寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下 寸口脈微而緩微者衛氣疎疎則其膚空緩者胃弱不

又方京墨為末二錢七同燒露蜂房為末三指撮酒調服
治血崩用葫蘆去子穰實荆芥穗燒存性飲湯服
右二十一方皆燒灰黑藥經云北方黑色入通於腎皆通腎經之藥也夫血者心之色也血兒黑即止者由腎水能制心火故也
運氣運氣血崩皆屬風火經云少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫其病血崩是也
治崩不定或淋淫經年者 白礬 硃砂 黃丹 右件將白礬滾開成汁下餘藥細末一處攪勻就成丸
子如彈子大每用一丸新綿裹定內陰中立效
經血過多不止并崩中 三陰交 行間 通理 漏下不止 三陰交 太衝
胞門不開漏下惡血不禁 氣門 血崩并漏下 中極 子宮 敗血不止 三陰交 百勞 風門 中極 腎俞 膏盲 曲池 絕
婦人不字陰暴出經水漏然谷主之 婦人漏血腹脹滿不得息小便黃陰谷主之
黃崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如紅血也寸口脈弦而大弦則為瀉大則為乳減則為寒乳則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下
寸口脈微而緩微者衛氣疎疎則其膚空緩者胃弱不

實則穀消而水化也穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成榮盛則其膚必踈三焦絕經名曰血崩

診婦人漏血下赤白日下血數升脈急疾者死遲者生赤白帶

大法

赤白帶羅先生法或十束湯或神祐丸或玉燭散皆可用之虛者不可峻攻實者可行 血虛加減四物湯 氣虛以米參陳皮間與之 赤屬血白屬氣主治燥濕為先

濕甚者固腸丸 相火動者諸藥中加炒黃柏 滑者加龍骨赤石脂 滯者加葵花

黃連 寒月少加姜附臨機應變先須斷厚味

帶下

帶下與夢遺同法治之 肥人有帶多是濕痰用海石半夏南星炒柏青黛蒼朮川芎 瘦人帶病少如有多是熱

入醫學綱目卷三十四

五

用炒柏粉滑石川芎青黛檉皮 帶漏俱是胃中痰積流下滲膀胱出於大腸小腸宜升提甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加白朮蒼朮仍用九子

治結痰白帶以小胃丹半錢半飽津液下數九候鬱積行御服補藥

白朮兩 蒼朮兩 紅白葵花二錢

白芍半錢

右蒸餅為丸空心煎四物湯下廿九

陶遵道外姑年七十形瘦善啖白帶食前姜湯吞大補丸五十九丸一二次午膳後及臨臥時各與小胃丹十五丸愈

乳香散治赤白帶下

草菓一箇去皮入射香一小塊用麩餅

右為細末每服二錢陳皮飲調下重者三錢

帶下不止用椒目白芷 治白帶用椒目為末米飲調服

濕熱者

檉皮丸治赤白帶有濕熱者

芍藥五 良姜三錢 黃柏二錢各椿根皮二兩

右為末粥丸每服三五十九米飲空心吞下

赤白帶因濕熱勝而下者

蒼朮兩 白芍兩 枳殼三錢 椿根皮兩

乾姜兩 地榆兩 甘草三錢 滑石一兩

治帶下

右末粥丸米飲下

椿根皮二兩 神麩炒 麥皮炒 黃柏炒

芍藥半兩 滑石兩 枳殼兩 蒼朮兩

右為末糊丸桐子大每服五十九空心

入醫學綱目卷三十四

五

固腸丸治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之後用此以燥下濕亦不曾單用看病作湯使椿根皮為末粥調為丸此藥性涼而燥須炒用一方加滑石一半

治白帶因七情所傷脈數者

黃連炒 側柏酒 黃柏炒各 香附炒

白朮炒各 白芷三錢 椿根皮二兩 白芍兩

木香三錢

右為末飯粥為丸米飲湯送下

右五方治帶椿皮例煎燥之劑濕熱感者宜之後一方

有黃連香附木香故可治七情所傷

地榆膏治赤白帶下骨立者地榆一斤用水三升煎至

一半去渣再煎如稠錫絞淨空心服三合日二服 治漏

下五色地榆三兩到用醋一升煮十餘沸去渣稍熱食前

服一合

治婦人赤白帶下三葉酸漿草陰乾為末空心溫酒下三錢七

右三方治帶地榆例寒澁之劑亦濕熱盛而滑脫者宜之按三葉酸漿草葉細如萍叢生莖端有三葉俗又名布谷飯布谷者鳩也蓋鳩常食之故又名鳩糞草衍義誤入苦蕒條即曰三葉酸漿草苦蕒即酸漿歟苦蕒大如金柑味酸可食故亦名酸漿非三葉也三葉酸漿小如金柑地而生葉皆三瓣惟開黃花其莖葉皆酸者

白芍七錢 乾姜炒二錢 香附兩 山茱萸 苦參 梛皮 貝母兩 右為末以酒糊為丸空心下

龜板二兩 黃柏一兩 乾姜一錢 枳子二錢 右酒糊為丸日二服每服七十九

又方治帶下脈數者 枸杞根一斤 生地五斤 右三味以水一斗煮取五升分三服

右三方治帶龜板黃柏地黃例腎水具陰虛者宜之脾傳之腎病名曰疝瘕少腹寬熱而痛出一名曰蠱當

此之時可按可藥全文見診生死○王註云出白濁出白經除痰解脾積滑白濁皆男子之疝也血濁不日月罷腰膝上熱足腫乾瘦閉少腹有塊或定或動前後陰突出陰痔核皆女子之疝也又云女子不謂之疝而謂之殺也小腸移熱於大腸為伏瘕為沉全文見診 赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結于脈故津液涌溢是為赤白帶下本不病結綠五經脈虛結熱

屈滯于帶故女子臍下痛陰中綿綿而下也經曰任脈為病男子內結七疝女子帶下瘕聚王註云任脈自胞上過帶脈貫於臍上故男子內結七疝女子帶下帶脈起于季脇章門似束帶狀今濕熱寬結不散故為病也經曰脾傳之腎名曰疝瘕小腸寬結而痛出一名曰蠱所以為帶下寬結也寬屈也屈滯而病熱不散先以十棗湯下之後服苦練丸大延胡散調下之熱去濕除病自愈矣方見傷寒

苦練丸治婦人赤白帶 苦練丸酒 茴香炒 當歸 右等分為末酒糊為丸每服三五十九空心溫酒下如腰腿疼四物湯四兩加羌活防風各一兩煎湯送下

治赤白帶下腰痛或少腹痛有熱者 梛皮兩 延胡索 桃仁 側柏葉 川練肉 茴香 當歸兩半 香附兩 官桂 烏藥兩 麥皮炒一兩

右末酒糊為丸每服五六十丸神效

治帶下并腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋敗膿血所致本無已期復以此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍藥白礬各半兩礬燒枯另研餘為末同以蠟丸如桐子大空肚及飯前米飲下十九或十五丸候膿盡仍別以補藥佐之

固真丸治白帶不止臍下冷痛喜乾食惡湯飲者方見

治婦人赤白帶下 龍骨兩 船上硫黃三錢

右為末每服半錢無灰酒調空心服一日三服不問遠年近日盡效

伏龍肝散治婦人赤白帶下久不瘥肌瘦瘵黃

棕櫚燒存 伏龍肝 屋梁上塵懸長者妙烟

右等分研和入龍腦麝香各少許每服二錢酒調醋亦

可患十年者半年可安有人經年崩漏不止諸藥不效

脈濡微與此伏龍肝散兼白礬丸服之愈白礬丸用白

二兩黃狗頭骨灰四兩為末

粥九桐子大每服三十九

補經固真湯白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不效診

得心包尺脈極微其白帶下流不止叔和脈經云崩中日

久為白帶漏下多時骨水枯言崩中者始病血崩久則血

少復亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海將枯津

液復亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經為引用為使以

大辛甘油膩之藥潤其枯燥而益津液以大辛熱之氣味

補其陽道生其血脈以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣

以人參補之以微苦溫之藥為佐而益元氣名曰補經固

真湯

柴胡 甘草各一錢 乾姜細末 橘皮不去白

人參二錢 郁李仁一錢 白茯苓七錢

生黃芩一錢 切另入

右件除黃芩外以水二大盞煎至一盞七分再入黃芩

同煎至一盞去查空心無宿食熱服之候少時早饜壓

之

調經補真湯冬後一月微有地泥水泮其白帶再來陰戶

中寒一服立止大進飲食

麻黃半錢 杏仁三 桂枝少 甘草分五

良姜一錢 黃芪分七 人參 歸身

白朮分五 蒼朮分二 澤瀉錢一 羌活分四

防風錢二 柴胡分四 獨活 藜蘆各二分

升麻根 黃芩各五分 乾姜炮二分 白茯苓七錢

右除黃芩麻黃外都為粗末先將二味水二盞煎麻黃

一味令沸掠去沫入餘藥同煎至三盞又再入生黃芩

煎至一盞去查稍熱服空心宿食消盡日高服之一時

許可食早饜

治婦人月經不調每行數日不止兼有白帶漸漸瘵

飲食少味累年無子地黃丸

熟地兩一 山茱萸 白燕蕪 乾姜

白芍兩一 代赭石醋碎各 厚朴

白姜錢一

右細末煉蜜丸如桐子大每服四五十九空心酒下日

三服此龐老方婦人有白帶是第一等病令人不產育

宜急治之此扁鵲過邯鄲問貴婦人所以專為帶下醫

也

桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大寒

肉桂錢一 附子錢三 黃柏 知母各五分

如少食常飽有時似腹脹加白芍藥半錢如不思飲食

加五味子二十箇如煩惱面上麻木如虫行乃胃中元

氣極虛加黃芪一錢人參七分炙甘草二分升麻半錢

為粗末作一服水二盞煎至一盞法如常食遠熱服

香附六合湯治赤白帶下方見婦人大法條即

治赤白帶下年月深久不瘥

白芍兩二 乾姜兩半

右各炒黃色同為末空心米飲調下二錢日二服

坐藥龍鹽香 丁香半錢 全錫五

川烏頭半錢 枯礬錢 龍骨 茴香

歸稍各二錢 玄胡錢 炒黃鹽錢 厚朴錢

酒防已 紅荳 肉桂錢 木通錢

右為末煉蜜丸如彈子大綿裹留絲在外納陰戶內

又方勝陰丹為上藥力小再取三錢內加行性熱藥

三奈子 川烏 大椒各五 柴胡

羌活錢 全錫三 大蘇 破故納真蘇

白礬二分 升麻分 麝香許 甘松分

右為細末同前法用制

又方回陽丹

全錫 升麻各二 草烏頭分 水蛭三箇

黃連三箇去 川烏分 大椒分 柴胡分

大蘇 破故紙錢 三奈子 草撥各五

甘松分 羌活分 枯礬分 炒黃鹽必用

右為極細末依前制如指尖大用綿裹納陰戶中覺臍

下暖為效

酒煮當歸丸治癩疔白帶下疰脚氣腰已下如在水雪中

以火焙炕重厚綿衣蓋上猶冷不任寒之極也面白如枯

魚之象肌如刀削消瘦之速也小便不止與白帶長流而

不禁固自不知覺面白目青藍如菜色目眩無所見身

重如山行步蹇側不能安地腿膝枯細大便秘結口不能

言無力之極食不下心下痞煩心懊懣不任其苦面停垢

背惡寒小便遺而不知此上中下三陽真氣俱竭故噦嘔

不止胃寒之極也其脈沉厥厥而澁按之空虛若脈洪大

而澁按之無力猶為中寒之證况按之虛空者乎按之不

鼓是為陰寒之極也其空虛乃氣血俱虛之極也

當歸兩 茴香兩 黑附子七錢炮制

良姜錢 右四味剉如麻豆大以好酒一升半同煎煮至酒盡為

度炭火焙乾同為極細末入

炒黃鹽 丁香各半 全錫三 柴胡錢

升麻根 木香各一 苦練子 甘草各半

玄胡索錢 右與前四味藥末同為細末酒煮麪糊為丸如桐子大

每服二十九空心宿食消盡淡醋湯下忌油膩冷物酒

麪 當歸附子湯治臍下冷痛赤白帶下

柴胡分 良姜 乾姜 附子各一

升麻分 甘草分六 當歸錢 蜀椒分五

炒黃鹽分 黃柏許 右件為粗末用五錢水二盞煎至一盞去渣熱服為丸

亦得

右炒鹽例東垣回陽丹註云必用炒黃鹽無則不效蓋

寒疝之要藥也

固真丸治白帶久下不止臍腹冷痛其寒瀉之如水陰中

亦然目中溜火上壅視物眩暈無所見齒皆惡熱飲痛須

得黃連末擦之其痛乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒

濕乘其胞內故喜乾而惡濕肝經陰火上溢走於標故上壅而目中溜火腎水侵肝而上溢故目中眵眵無所見而惡熱飲者是少陽陽明經中伏火也當大瀉寒濕以九藥治之故曰寒在下焦治宜緩大忌湯散以酒制白石脂白龍骨以枯其濕以炮乾姜大辛熱瀉寒水以黃柏之大寒為因用又為導導治法云古者雖有重罪不絕人之後又為之伏其所主先其所因之意又瀉齒中惡熱飲也以柴胡為不經之使以芍藥半錢以導之又恐辛熱之藥太甚損其肝經故微瀉之以當歸身之辛溫大和其血脈此用藥之法備矣

- 白赤脂一錢燒赤水 乾姜炮四錢 黃柏酒洗五分
- 柴胡一錢 白龍骨二錢酒洗 白芍五分
- 當歸三錢酒洗

右為細末水煮稀糊為丸如雞頭大每服三十九空心宿食消盡煎白沸湯放溫送下無令胃中停住待少時以早膳壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物與酒濕麪

右石脂龍骨之瀝以去脫蓋濕多滑脫者宜之補其潤腸湯治白帶下陰戶中痛控心而急痛身黃皮緩身重如山陰中如水一名助

- 防風錢一 柴胡二錢 良姜二錢 乾姜一錢
- 陳皮五分 白葵花一錢 生黃芩五分 郁李仁
- 甘草各

右為細末剉散只作一服水二盞煎至一盞去查蒸服

食前
右以花郁李仁之滑以潤燥蓋粘滯着者宜之
摩腰丹治白帶腹痛方見腰痛門甚效

虛而利
治帶下少腹寬結而痛者先以十朮湯下之次服苦練丸大玄胡散調之是先攻後補之法也

治結痰白帶先於半飢時以津下小胃丹十餘粒服至轉積行却用白朮四物等藥補之亦先攻後補之藥也

胡安人白帶下月經甚多食少倦怠面黃經中如有血塊者有如筋脈者與參朮等補血氣調脾胃後諸症皆退惟帶未止以檉皮九王之方見濕

右法治帶下虛而有熱者若虛而有寒脈微面白不澤無力以言者東垣補經固真湯丁香膠艾湯香桂六合湯是也

頃頃丘一婦人病帶下連綿不絕白物或來已三載矣命予脈之診其兩手脈俱滑大而有力得六七至常上熱口乾眩暈時嘔酢水余知其實有寒痰在胸中以八帶

散吐出冷痰二三升皆酢水也問如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹攻以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈 息城李左衛之妻病白帶如水窮漏中綿綿不絕穢臭之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷陽起石硫黃姜附之藥重重燥補汚水轉多戴人斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不禁固故如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰三二升次日下沃水十餘行三遍汗出周身至明旦病人云汚已不下矣次用寒涼之劑服及半載產一男

問曰婦人年五十所病下利數日不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當以溫經湯主之

吳茱萸三兩 當歸 芍藥
 人參 桂枝 阿膠 牡蠣去
 生姜 甘草各二兩 半夏升 麥門冬升
 右十二味以水一斗煮取三升分溫三服 亦主婦人少腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水來過多及至期不來
 丹赤白帶用五靈脂半生半熟為末酒調服
 大治白帶下
 茅花一握 棕桐灰三 嫩蓮葉三 甘草節一
 右為細末空心酒方寸匕
 益母散治帶下赤白惡露下不止益母草開花時採搗為細末空心溫酒二錢日三服 香薷散神效方見前中血即醋炒香附灰也
 八醫學雜書 單
 赤白帶皆屬於血有出於大小腸之分黃荆子炒焦為末米飲調服
 又方治白帶用白芷以石灰炒去皮茵草少許粥糊丸服
 大 白芷散治赤白帶下
 白芷兩 海螵蛸二箇 胎髮一團
 右為細末空心溫酒調下二錢
 治赤白帶下舊蓮房為末入麝香空心米飲下
 治帶下用芍藥炒黑為末每服三錢七調酒下
 赤白帶用生狗頭骨燒灰存性酒調服或入藥服
 治帶下溫水和服雲母末三方寸七立見神效
 崔氏四花穴治赤白帶如神方見前
 赤白帶 中極 白環俞各五 腎俞各五
 又法 中極 白環俞各五 腎俞各五

又法 氣海 中極 白環俞後穴 三陽交後穴
 又法 榮池三分灸三十壯在內踝前後 又法 陽表在足指下 又法 三陰交五分 交儀二十
 漏陰在內踝下五分 又法 赤帶心下赤帶不巳 氣海六 中極 委中五
 分 白帶心下赤帶不巳 曲骨 承陰各七 中極在兩傍
 極在兩傍 婦人得子多變成白水淋漓而下經久身面虛腫
 陰谷二寸 絕骨二寸 如喘滿 魚際透大淵左右共
 帶病太陰主之灸章門穴麥粒大各三壯効
 婦人下赤白沃後陰中乾痛惡合陰陽少腹脹堅小便閉曲骨主之 女子赤白帶腰膈主之 女子赤濕大赫主之 女子絕子陰挺出不禁白淫上竅主之 女子赤白淫心下積脹次竅主之 女子赤淫時白氣移月事少中竅主之 女子下蒼汁不禁赤淫陰中痒痛引少腹控少不可俛仰下竅主之 女子赤少腹腫赤白淫時多時少蠱溝主之 月事不利見赤白而有身及前陰寒行問主之 女子疝及少腹腫泄瀉遺溺陰痛面塵黑目下皆痛太衝主之 女子俠臍疝中封主之 女子疝瘕按之如以湯沃兩股中小腹腫陰挺出痛經水來下陰中腫或痿澆清汁若葵萎血閉曲泉主之 婦人下赤白裏急瘕瘕五樞主之
 腎脈小急肝脈小急心脈小急不鼓皆為瘕大奇論云小急為瘕不鼓則血不流而為瘕也

一第 1021 冊 貴多 醫學全書 第 2 卷 三

三陽急為痲三陰急為疝王註云太陽受寒血聚為疝脈急者曰疝痲少腹痛平人氣

師曰婦人帶下六極之病脈浮則為腸鳴腹滿則為腹中痛數則為陰中瘰癧則生瘡弦則陰疼掣痛 婦人帶下脈浮惡寒者不治

胎前白帶

有孕白帶

蒼朮錢三

白芷錢二

黃連錢一

黃芩錢二

黃柏錢半

白芍錢二

樗根皮錢半

山茱萸錢二

右為末糊丸空心溫酒下五十九

八

里

醫學綱目卷之三十五

婦人部

胎前症

求子

受胎

惡阻

妊娠經來

胎漏下黃汁或如葷汁

胎動不安

胎上逼心

跌撲傷胎毒藥傷胎

胎自墮

妊病可下胎斷胎

胎自墮

十月未足欲產過期不產

難產縮胎法

坐草法

催生法

下死胎法

求子法

大法謂

胎前之道始於求子求子之法莫先調經每見婦人之無子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調則血氣乖爭不能成孕矣詳夫不調之由其或前或後及行後作痛者虛也其少而淡者血虛也多者氣虛也其將行作痛及凝塊不散

者滯也紫黑色者滯而挾熱也治法血虛者四物氣虛者四物加參芪滯者香附縮砂木香檳榔苑仁玄胡滯久而沉痼者吐之下之脈証熱者四物加芩連脈証寒者四物加桂附及紫石英之類是也直至積去滯行虛回然後血氣和平能孕也予每治經不調者只一味香附木醋為丸服之亦百發百中也

婦人肥盛者多不能孕育以身中有脂膜閉塞子宮以致經事不行瘦弱婦人不能孕育以子宮無血精氣不聚故也肥人無子宜先服調理藥

當歸一兩

川芎七錢

白芍

白朮

半夏洗

香附

陳皮各一

茯苓二

甘草一

作十貼每貼姜三片水煎吞後九子

白木二兩 半夏麩一兩 茯苓半兩 橘紅四錢
川芎 香附各一兩 神麩炒半兩 甘草二錢
粥丸每服八十九如熱多者加黃連枳實各一兩服前藥訖却服後益斯丸

厚朴 杜仲 桂心 秦艽各二錢
附子 茯苓各六錢 白微 半夏
乾姜 牛膝 沙參各二錢 人參四錢
細辛半兩

右為末煉蜜丸小豈大每服五九空心酒下加至十九不妨覺有娠三月後不可更服忌食牛馬肉則難產當出月

按此方即秦桂丸也丹溪忌服之者蓋忌於瘦人無血者若肥人濕多者又兼前調理藥而所服丸數十減其

丸只服五分無妨也上三方得之於丹溪之子朱慈誠者累試有効

大五補丸同上三方丸

瘦人無血極精宜酒

天門冬 麥門冬 菖蒲 茯苓
人參 益智 枸杞 地骨皮

遠志 熟地各等分
右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下三十九服本方數服後以七宣丸泄之

增損三才丸

天門冬酒浸去心 熟地酒浸去心 人參去 遠志去
五味子 茯苓酒浸去心 鹿角炙 一法加白馬莖酥
一法加麥門冬令人有力 一法加續斷以續筋骨

一法加沉香煖下焦虛冷
右為細末煉蜜杵千下丸如桐子大每服五十九空心好酒下年老欲補加混元衣全個入藥混元衣者足脂用酒浸晒乾細研為末

紫石英丸治婦人無子

紫石英研半飛

天門冬酒浸去心

當歸切 川芎

紫葳 卷柏

熟地

禹餘糧醋炒七次 牡蒙

石斛去

辛夷各二兩

人參

肉桂

牡丹皮

桑寄生

細辛根

續斷

川烏炮

食茱萸

厚朴姜

乾姜炮

牛膝酒浸各

栝子仁炒 山藟

烏賊魚骨燒灰各

甘草

右二十六味為極細末煉蜜丸桐子大每服二十九酒米飲任下空心食前日二

戴人過謙者營中飲會有一卒說出妻事戴人問其故答曰吾婦為室女時心下有冷積如覆盆按之如水聲以熱手熨之如冰聚來已十五年矣恐斷吾孕是以去之戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人診其寸脈沉而遲尺脈洪大有力非無子之候也可不逾年而孕其良人嘆曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白水調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月而娠一子戴人常用吾此法無不子之婦此言不誣 一婦人年三十四歲夢與鬼神交驚怕異常及見神堂陰司舟楫橋梁如此一十五年竟無妊娠巫覡覘禱無效至鑿腹炙肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中滿

足腫委命于天一日苦請戴人戴人曰陽火盛于上陰水盛于下見鬼神者陰之靈神堂者陰之所升榘橋梁水之用兩手寸脈皆沉而伏知胸中有痰實也凡三涌三泄三汗不旬日而無夢一月而有娠

三十一年者

朴硝 丹皮 當歸 大黃

桃仁 細辛 厚朴 苦梗

赤芍藥 人參 茯苓 桂心

甘草 川牛膝 陳皮 附子

蜚虫 水蛭

右咬咀每服四大錢水酒各半盞煎至六分去渣溫服空心日三夜一溫覆得少汗必下積血及冷赤膿如小

六醫子綱卷五

豈汁斟酌下盡若力弱大困不堪者只一二服止然恐

惡物不盡不得藥力能盡服儘好不用坐導藥

坐導藥治全不產及斷緒服前盪胞湯惡物不盡用此方

皂角 吳茱萸 當歸 細辛

五味子 乾姜 黃葵 白礬

戎塩 蜀椒

右為細末以絹袋大如指長三寸餘盛藥令滿縛定納

婦人陰中坐臥任意勿行走小便時去之更安一日一

度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未見病出可十日

安之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則發疼

痛須候病出盡方已不可中輟每日早晚用藥煎湯

薰之

秦桂丸論 無子之因多起於婦人醫者不求其因起

於何處遍閱古方惟秦桂丸其辭確其意專用溫熱藥近

乎人情欣然投之然服之甘受燔灼之禍猶然不悔

何者陽精之施陰血能攝之精成其子血成其胞胎孕乃

成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也血之少也

固非一端然欲得子者必須調補陰血使無虧欠乃可推

其有餘以成胎孕何乃輕用熱劑煎熬臍血氣沸騰禍

不旋踵矣或曰春氣溫和則萬物發生冬氣寒凜則萬物

消隕非秦桂丸之溫熱何以得子臟溫煖而成胎耶予曰

詩曰婦人和平則樂有子和則血氣均平則陰陽不爭今

得此藥經血必轉紫黑漸成衰少或先或後始則飲食驟

進久則口苦而乾陰陽不平血氣不和疾病蜂起焉能成

胎縱然成胎生子亦多病而不壽以秦桂丸耗損天真之

陰也戒之慎之 補藥亦無妨但忌施干澀人火多者也

六醫子綱卷五

督脈生病女子不孕

治男子無子者用熱艾一團用塩填臍滿却於塩上隨

塩大小做艾丸灸之如痛即換塩直灸至艾盡為度如一

日灸不盡二日三日灸之曾効

又法氣門 在臍元傍

又法子宮 在中極傍各開三寸

又法關元 在臍下三寸

又法子臍中令人有子女子手脚拘攣腹滿痞月水不

下乳餘疾絕子陰痒陰交主之 腹滿痞積聚餘疾絕子

陰痒刺石門 痛下引陰中不得小便 女子絕子衄血在

內不下關元主之 小腹滿名石水痛 婦人子門不端

少腹苦寒陰痒及痛經閉不通中極主之 婦人無子湧

診

泉主之 大疝絕子築質主之 絕子商丘主之 穴在內
中 婦人絕產若未曾產陰廉主之 刺入一分
下 婦人絕產若未曾產陰廉主之 刺入一分

男子脈浮弱而濇為無子精氣清冷

婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為無子年大者得之絕產 脈微弱而濇年少者得此為無子中年得此為絕

產 肥人脈細胞有寒故令少子其色黃者曾上有寒少陰脈浮而緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血絕產惡寒

受胎

成胎以精血之後先分男女者楮澄之論也愚切惑焉後閱東垣方有曰經水斷後一二日血海始淨精勝其血感者成男四五日後血脈已旺精不勝血感者成女此論亦為未瑩何以言之易曰乾道成男坤道成女夫乾坤陰

男女分
左右

醫家類卷之三

六

陽之性情也左右陰陽之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而會精之泄陽之施也血能攝之陰之化也精成其骨此萬物之始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交媾胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系在上下有兩岐一達於左一達於右精勝其血及剛日陽時感者則陽為之主受氣於左子宮而男形成精不勝血及柔日陰時感者則陰為之主受氣於右子宮而女形成或曰分男分女吾知之矣其有雙胎者將何如曰精氣有餘岐而分之血因分而攝之故也若夫男女同孕者剛日陽時柔日陰時感則陰陽混雜不屬左不屬右受氣于兩岐之間者也有三胎四胎五胎六胎者猶是而已或曰其有男不可為父女不可為母與男女之兼形者又若何而分之耶予曰男不可為父得陽氣之虧者也女不可為

雜法

母得陰氣之寒者也兼形者由陰為駁氣所乘而為狀不一以女兼男形者有二一則遇男為妻遇女為夫一則可妻而不可夫又有下為女體上具男之全形此又駁之甚者也或曰駁氣所乘獨見於陰而所成之形又若是不同耶予曰陰牀虛駁氣易于乘也駁氣所乘陰陽相混無所為主不可屬左不可屬右受氣于兩岐之間隨所得駁氣之輕重而成形故所兼之形有不可得而同也
右丹溪此論極造精微發前人之未發是知男女之分已定於萬物資始乾元之際陰陽交媾之時昧者不寤是理妄有轉女為男之法誠矣夫萬物皆資始於乾元獨男女之分不資始於乾元乎

醫家類卷之三

七

胎前當清熱養血 產前安胎白朮黃芩妙藥也 胎前將臨月以三補丸加炒香附炒白芍藥蒸餅丸服 又抑熱以三補用生地膏丸 本連柏為末 有孕八九個月必順氣枳殼蘇莖 前至八九月因火動逆作喘急可用條芩香附為末調下

驗胎法

神方驗胎散婦人三兩個月月經不行疑是兩身却疑血滯心煩寒熱恍惚此藥可驗取之內也外已有身病無邪脈以素問脈洪推之十得八九矣

真雀腦膏 當歸全用重一兩

右二味為細末分作二服濃煎好艾湯一盞調下或好酒調服亦得可待三兩個時辰聞覺腹臍微動仍頻即有胎也動罷即愈安穩無虞如不是胎即不動所滯惡物自行母亦安也如服藥不覺効再煎紅花湯調下必有神効

治婦人經脈住三個月驗胎法真川芎為細末濃煎

診

艾湯下一七投腹內漸動是有胎也

試孕有無 甘草一寸 皂角去皮 黃連少

右為末酒調服有則吐無則不吐每服一錢半

婦人懷胎七月而不可知時時血而轉筋者此為胎也

婦人足少陰脈動甚者任子也

別謂之有子 於手也尺脈搏擊與寸脈殊別則為有孕之

脈娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也脈滑疾重

以手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑

者五月也此皆陰搏陽別之義言尺脈滑數寸脈左

偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如實狀

博別之義謂尺脈實大與寸脈別也分男女左右也

法左疾為男右疾為女俱疾為生二子

為首者是女 看上圖時夫從後急呼之左廻首者是男

右為首者是女也

右按丹溪云男受胎在左于官女受胎在右于官斯言

而就左也女胎在右則右重故廻首時慎護重處而就

右也推之於脈其義亦然胎在左則血氣護胎而盛於

左故脈亦從之而左疾為男左大為男也胎在右則血

氣護胎而盛於右故脈亦從之而右疾為女右大為女

也亦猶經云陰搏陽別謂之有子言受胎處在臍腹之

下則血氣護胎而盛於下故陰之尺脈鼓搏有力而與

陽之寸脈殊別也又如癰癤發上則血氣從上而寸脈

盛發下則血氣從下而尺脈盛發左則血氣從左而左

脈盛發右則血氣從右而右脈盛也丹溪以左大順男

右大順女為醫人之左右手蓋智者之一失也

婦人懷孕愛物乃一截之虛假如肝藏虛其血氣止能

養胎不能榮肝肝虛故愛酸物吃

胎動不安或因傷件或因毒藥重者便致傷胎當以母

形色察之母面赤舌青者子死母活唇口俱青兩邊沫出

者子母俱死面青舌赤口中沫出者母死子活也

婦人娠八月脈實大牢強弦緊者生沉細者死

脈細勻易產大浮緩氣散難產

婦人懷胎一月之時足厥陰脈養二月足少陽脈養三

月手心主脈養四月手少陽脈養五月足太陰脈養六月

足陽明脈養七月手太陰脈養八月手陽明脈養九月足

少陰脈養十月足太陽脈養諸陰陽各養三十日活兒手

太陽少陰不養者下主月水上為乳汁活兒養母懷娠者

不可灸刺其經必墮胎

胎前之脈也少陽三焦脈也屬火而旺夏所以責於三月

四月足太陰脾脈也屬土而旺夏所以責於三月

五月足少陽膽脈也屬木而旺春所以責於三月

六月足厥陰肝脈也屬木而旺春所以責於三月

七月八月九月十月

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也

帝曰何以知懷子之且生也岐伯曰身軀有病而無邪

胎也

娠稟受怯弱便有阻病其狀顏色如故脈息和順但

身肢軀沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食鹹酸甚者或

作寒熱心中憤悶嘔吐痰水恍惚不能支持巢氏謂之惡阻但症有輕重耳

婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此証設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

右絕之者謂絕止醫治候其自安也予常治一二婦阻病吐愈治愈逆因思此仲景絕之之旨遂停藥月餘自安真大哉聖賢之言也

寒症

惡阻即從痰治多用二陳湯
半夏茯苓湯治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食酸鹹多臥少起百節煩疼羸瘦有痰胎孕不牢

半夏 洗一兩 赤茯苓 熟地 各七 橘紅
旋覆花 千金方無旋覆 人參 芍藥

川芎 桔梗 甘草 各半

右咳阻每服五錢姜七片水煎空心兼服茯苓丸 若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知母七錢半 若腹冷下利去地黃加炒桂心半兩 若胃中虛熱大便秘小便赤澀加大黃七錢半去地黃加黃芩二錢五分

寒症 茯苓丸治妊娠阻病心中煩悶吐痰眩暈先服半夏茯苓湯兩劑後服此藥

赤茯苓 人參 桂心 乾姜
半夏 湯泡七 橘皮 各一 白朮 葛根
甘草 枳殼 兩
右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九米飲下日三服一方加麥門冬肘後加五味子

妊娠嘔吐不止者乾姜人參半夏丸主之

乾姜 人參 半夏

右三味末之以生薑汁糊丸如桐子大飲服十九日三服大愈方論半夏動胎而不用今仲景豈獨不知此而服用於此方乎予治婦人病果用半夏未嘗動胎也經云有故無損是也

治惡阻吐清水甚者十餘日粥菜不入者

白朮 人參 丁香 甘草 各一

右為細末每服二錢水一鍾姜五片煎至七分溫服

歸原散治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無效

人參 甘草 川芎 當歸

芍藥 丁香 各半 白茯苓 白朮
陳皮 各一 枳殼 炒 各二 半夏 洗炒 黃

右咳阻每服三錢生薑五片東一枚水同煎

人參 橘皮湯治阻病嘔吐痰水

人參 橘皮 白朮 麥門冬 去心 各

甘草 厚朴 白茯苓 各五
右為粗末每四錢加淡竹茹彈子大生薑三片水同煎

治妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹 橘皮 各二 生薑 茯苓 各四

半夏 兩五

右細切以水六升煮取二升半去查分三服

治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生薑根 橘紅 生薑 枳殼 各

右切以水二盞煎七分空心熱服

治妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹 麥門冬 前胡 橘皮

蘆根

右切細以水一大升煮半升去渣分兩服食前

安胎飲治妊娠惡阻心中憤悶頭重目眩嘔逆不食或胎動不安腰腹疼痛

甘草 茯苓 當歸 熟地

川芎 地榆 白木 黃芪

白芍藥 半夏 阿膠

右以咀每服三錢生姜四片水同煎

肝火

一婦人孕三月吐痰水并飲食每日寅卯作時覺少腹有氣衝上然後膈滿而吐面赤微躁頭眩臥不起沐四肢疼微渴此肝火挾衝脈之火衝上也一日甚一日輕脈和右寸洪大百藥不効者將二月予男病偶用沉香磨水化

入以厚朴米注

抱龍丸一服膈寬氣不上衝二三服吐止眩減食進而安

又應氏婦得胎七月嘔雜吐食脈維心下滿寒氣攻背兩

肘皆痛要人不住手以熱物摩得吐稍疎脈洪大

黃芩 黃連 白木 半夏

甘草 縮砂 陳皮 當歸

山梔 枳殼 香附 人參

蒼木 茯苓 生姜

服二貼後嘔雜吐止心滿塞退但於夜間背肘痛用摩

慰遂與抱龍丸化服其疾如失

一婦人年近三十懷孕兩月病嘔吐頭眩自覺不可禁持以人參白朮川芎以茯苓等藥服五七日愈覺沉重召予脈之兩手弦空而且弱予曰此是惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所

宜教以時用茯苓湯下抑青丸二十四粒五貼自覺稍安

診其脈略有數狀自言口乾苦稍食粥則口酸予意其為

膈間滯氣未盡行教全以川芎陳皮山梔茯苓生薑煎湯

下抑青丸十五粒十餘貼餘証皆平但食及常時之半食後覺口酸不食覺易飽予謂肝熱未平則以白湯下抑青

丸二十粒二十日而安予又脈之見其兩手脈雖和平而

左手弱甚此胎必墮此時肝氣既平參朮可用矣遂用始

初參朮等藥補之預防墮胎以後之虛服之一月胎自墮却得平穩無事抑青丸一味黃連為丸是也

妊娠經來

婦人經月下但為微少師脈之反言有軀其後審然其脈何類何以別之師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按之滑浮之則輕陽明少陰各如經法身反灑浙不欲飲食頭

痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則不驚陽多氣溢陰滑氣

盛滑則多實六經養成所以月見陰見陽精汁凝胞散散

者損墮設復陽盛雙胎二胎今陽不足故令激經也

有餘今經又少故知孕也

胎漏下血

大法 胎漏因氣虛 因血虛 因血熱

師曰婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有

娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻尋婦膠艾湯主之

治胎動下血心腹疼痛死生不知服此湯活即安死即下

此即催生佛手散方見跌撲傷胎

故卒下血不止取阿膠三兩炙搗末酒一升半煎令消一

服愈

立聖散治妊娠下血不止鷄肝三個用酒一升煮熟共食之大効

治胎漏二黃散生地熟地等分剉水三盞煎半乾去渣

治胎下血阿膠二兩搗末生地半斤搗取汁以清酒三升絞汁分三服

治胎漏下血不止胞乾即死宜急治也
生地汁一 陳酒合五

右同煎三五沸溫三服以止為度

治婦人胎漏下血及因事下血枳殼湯
枳殼 黃芩各半 白朮一

右粗末每七錢水一盞煎七分食前服

婦人年二十餘三個月孕發瘧疾後淡血水下腹滿口
大醫學綱目卷三五

白芍 茯苓 黃芩
歸尾 川芎 陳皮分五

東陽婦人三十五歲孕八九個月漏胎不止胎比前時稍覺收小血色微紫有塊食減平時三之一腹微疼無情緒

人參 白朮炒 白芍炒 陳皮
川芎 茯苓 縮砂 大腹皮分三

木蓮藤七
同煎食前下三聖丸五十粒

婦人宿有瘕病經斷來及三月而得漏下不止胎動在
臍上者為瘕瘕害妊娠六月動者前三月經水利時胎下血者後斷三月絕也所以血不止者其瘕不去故也當下其瘕桂枝茯苓丸主之凡胎動多在臍上故知是瘕也

桂枝 茯苓 牡丹去心 桃仁去皮
芍藥各等分

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一九不知加至三九

治胎下血不止取桃樹上乾不落莢子燒灰和水服瘧
不單云莢破血
又治快深積氣

胎漏黃汁下或如荳汁

治妊娠忽然下黃汁如膠或如荳汁胎動腹痛
粳米升五 黃芪兩六

右以水七升煎取二升分為四服

銀芩酒治妊娠下黃汁或如赤荳汁
芩根去黑銀一
半根或切 銀一

右水九升煎取四升每服入酒半升或一升煎分二次

婦人懷胎六月七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非
時胎乘預下故也胎漏徐徐下者胎必墮

胎動不安
胎動不安者由衝任經虛受胎不實也亦有飲酒房室過度損動不安者有悞擊觸而胎動者有喜怒氣字不舒傷於心肝觸動血脈者有信醫宜服煖補反為藥所害者有因母病而胎動者但治母病其胎自安有胎不堅固動及母疾但當安胎其母自愈

永固孕丸

地黃 川芎 黃芪各五 歸身尾
人參 白芍 陳皮各一 白朮一錢

甘草錢三 黃栢些 桑上羊食藤七葉

糯米十四粒

右吹咀煎服

妊娠宜常服當歸散主之

當歸

黃芩

芍藥

苦葶各一

白朮一斤

右五味杵為散酒飲服方寸七日再服妊娠常服即易產胎無苦疾產後百病悉主之

妊娠養胎白朮散主之

白朮

苦葶各四

蜀椒三錢

牡蠣二

右四味杵為散酒服一錢七日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加苦葶心煩痛吐不能飲食加細辛

一兩半夏大者二十枚服後若嘔以醋醬水服之後不解者小麥汁飲之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之

勿置

胎動不安取葶根如足大指者一尺吹咀以水五升煮

取三升去查服一方有生薑五片○丹溪云陰行痛

銀葶酒方見前胎漏條

治胎動不安好銀煮水着葱白作羹食之佳

治妊娠二三月上至八九個月胎動不安腹痛已有所下

艾葉

阿膠炒

當歸

川芎各三

甘草兩

右細切以水八升煮取三升去查內膠令烊分三服日

三

立効散治婦人胎動不安如重物所墜冷如水即佛手散方見

門胎

醫學綱目 卷三五

縮砂散治胎動不安墮在須臾者神効方見毒胎

胎上逼心

紫蘇飲治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子

紫蘇葉兩大腹皮 人參 川芎

陳皮 白芍各半 當歸三 甘草分

右細切分作三服每服用水一盞半生薑四片葱白七寸煎至七分去查空心服

曾有累日婦人產不下服過催生藥不驗予曰此必坐草太早心懷下一點懼氣結而不行然非不順也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上焦閉閉則氣還還則下焦脹氣乃不行矣得此藥一服便產及婦人六七月子懸者

予用此數數有驗不十服胎便近下 陳良甫云治一婦

有孕七個月遠歸忽然胎上衝心而痛坐臥不安兩醫治之無效遂說胎已死矣用葶麻子研細加麝香調貼臍中

以下之命在垂亡召陳診視兩尺脈絕他脈平和陳問二醫作何証治之答曰死胎也陳曰何以知之兩尺脈沉絕

以此知之陳曰此說出在何經二醫無答陳曰此子懸也若是胎死却有辨處而赤舌青子死毋活活面青舌赤吐沫

母死子活唇口俱青母子俱死今面不赤口不青其子未死是胎上逼心宜以紫蘇飲子治之至十服而胎遂下矣

治胎上逼心煩悶方并治胎動困篤用葱白二七莖濃煮汁飲之若胎未死即安已死即出未効再服此方神妙宜之本草云

胎動上迫心痛取艾葉如鷄子大以頭醋四升煎取

二升分溫服 治胎上逼心熱瀉下血神麩半斤搗碎和

通身痛
衝心者
有水

熟水絞取汁三鍾無時溫服止
治妊娠過身痛或衝心欲死不能飲食
白朮五兩 黃芩二兩 芍藥四兩
右水六升煮取一升半分作三服緣胎有水致痛兼易產

跌撲傷胎毒藥傷胎

以藥傷
者速汚
養新

佛手散治婦人妊娠六七月因事集確着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤不絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下又治血上衝心腹滿悶者如湯沃雪此藥催生神効方見胎即當歸川芎等分為散口噤灌之
治胎忽因倒地舉動擊重促損腹中不安子死以川芎末酒服方寸七須臾二三服出

治妊娠從高墜下腹中下血煩悶

八寶丹

大

生地

益母草各一兩

黃芪各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜四片煎至六分去渣無時服

婦人因閃挫傷胎肚疼血崩

歸尾

陳皮

白朮

人參

茯苓

白芍

川芎各三錢

甘草五分

右分四貼水三盞煎取一盞下細砂末一錢五分五錢

脂一錢

毒藥傷
者解毒
和中

治婦人服草藥胎墮腹痛用白匾莖少許去皮為末米飲調服方寸七或濃煎亦可
阿膠散治妊娠或因傾仆或因毒藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣

熟地二兩

白芍

艾葉

當歸

細首歸
砂酒桂
苓九

甘草 阿膠 黃芪各一兩 一方有川芎
右咬咀每服半兩姜三片水一盞同煎溫服無時
治妊娠偶有所傷胎動不安痛不可忍縮砂不以多少和皮炒黑色一方用仁置熨斗內略炒為細末熟酒調下二錢不飲酒者米飲調下覺腹中熱則胎已安矣此方極効

奪命丸治婦人小產下血子死腹中其人憎寒手指唇口爪甲青白面色黃黑胎上搶心則悶絕欲死汗自出或食惡物或悞服草藥傷胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下若胎腐爛腹中危甚者立可取出此方的係異人傳授至妙此即仲景茯苓桂枝丸但用淡醋枝充仁亦芍藥等分是也丹溪亦仿此
胎病可下胎斷胎

胎方

元

治妊娠母因疾病胎不能安可下之取七月七日法麵四兩水二大盞煎取一盞三分綿濾去渣分溫三服立下又方大麩五升清酒一斗煮二沸去渣分五貼隔宿勿食但再服其子如糜母無疾苦千金不傳妙 又方麥蘖一升為末和水煮二升服之即下神効 又方附子二枚為末以淳苦酒和塗右足去之大良 又方取鷄子一枚以三指撮搗放鷄子中服之立出

斷產方

斷子法

用白麩麩一升無灰酒五升打作糊煮二升半用絹帛濾去香作三服候前月經將來日晚下吃一服次日五更吃一服天明吃一服月經即行終身絕子
斷產驗方故香昏方圓一尺燒為末酒飲調服終身不復懷孕 又方油煎水銀空心服如棗核大一丸永斷不

損人

胎自墮

陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因於熱火能消物造化自然病原乃謂風冷傷於子藏而墮此未得病情者也予見賈氏婦但有孕至三月左右必墮診其脈左手大而無力重取則滿知其血少也以其妙年只補中氣使血自榮時正夏初教以濃煎白米湯下黃芩末一錢服三四十貼遂得保全其生因而思之墮因內熱而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月正屬相火所以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠等為安胎妙藥耶好生之工幸無輕視

治姙娠懷胎數落而不結實

甘草 黃芪 人參 白朮

川芎 熟地 吳茱萸 冬等

右為末空心溫酒調二錢忌蒜菜麩李雀肉醋物按丹方以候施之於千百而一者也

醋附丸治數墮胎方見

姙子不成時時墮胎後漏下五色疼痛灸胞門關門左邊門右邊二寸名子戶

十月未足欲產過期不產

婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而產者有經一年二年乃至四年而後產者各依後法治

知母丸治十月未足而痛如欲產煎治產難及子煩用知

母一味為細末煉蜜丸如鷄豆大溫酒嚼下日三服丸如

桐子大飲下二十九

治姙娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子 蒲黃等

右為末蜜丸如桐子大溫酒下二十九以痛止為度

又方蒲黃如末核大篩過以井花水調服

日月未足而欲產者搗葛蒲根汁一二升灌喉中本草

治胎動不安下血

治婦過月不產方

四物湯 香附 芫仁 枳殼

縮砂 紫蘇 水煎服即生

難產縮胎法

世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴養之家若貧賤辛苦者無有也古方書止有瘦胎飲一論而其方為湖陽公主作也實非極至之言何者見其有用此方者

其難自若予表妹苦於難產後遇胎孕則觸而去之予甚憫焉視其形惟勤於針指構思旬日忽自悟曰此正與湖

陽公主相反彼奉養之人其氣必實耗其氣使平和故易產今形肥知其氣虛久坐知其不運必氣愈弱兒在胞胎

因母氣不能自運耳當補其母之氣則兒健易產矣令其有孕至五六個月來告遂于大千方紫蘇飲加補氣藥與

數十貼因得男而其快後遂以此方隨母形色性稟參時令加減與之無不應者因名其方曰達生散

縮胎飲即達生散

大腹皮 人參 陳皮 紫蘇葉各

歸身尾 白芍 白朮各一

甘草 黃楊樹腦七 或加枳殼縮砂青葱五葉

右作一貼吞下益母丸臨月得二十服易生產後無病

按丹溪云難產死胎此血氣滯病也蓋此方補中行滯
 春加川芎 氣虛倍參朮 氣實倍香附陳皮 血
 虛加當歸地黃 形實倍紫蘇 性急加黃連 熱急
 加黃芩 濕痰加滑石半夏 食積加山楂 食後易
 饑加黃楊腦 腹痛加木香官桂黃芩 冬不用芩
 黑神丸一名健生丸 用益母草研末粥丸治婦人臨月
 一日三次服之用縮砂飲送下能催生易產產後服能生
 新血去舊血只以白湯送下虛者煎白朮人參陳皮湯送
 下

縮胎丸八九個月用之

黃芩夏一兩秋七錢冬半兩炒

陳皮兩三

右末粥丸桐子大

又方候九個月用之

黃芩一兩宜煎藥不宜

滑石七錢五分臨月十日煎

右為末粥丸如桐子大每服三十九空心熱湯下

保赤胎丸

白朮

至產已

滑胎枳殼散

枳殼

甘草各二兩

右為細末每服二錢百沸湯點服空心食前日三服凡

懷孕六七月以上即服令兒易生初生胎少黑一百日

肉漸變白此孫真人滑胎易產方抑陽降氣為眾方之

冠也

姙娠治衝任脈虛補血安胎內補丸

熱地二兩 當歸一兩

右細末煉蜜丸桐子大每服三四十九溫酒下上三方
 諸集皆載在人用之如何耳大率婦人妊娠唯在抑陽
 助陰素問云陰搏陽別謂之有子蓋關前為陽關後為
 陰尺中之脈搏之搏手不絕者任身也婦人平居陽氣
 微盛無害及其姙子則方閉經隧以養胎若陽氣盛搏
 之則經脈妄行胎乃不固素問所謂陰虛陽搏謂之崩
 也抑陽助陰之方甚多然胎前藥唯恐羣隊若陰陽交
 雜別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰
 故爾枳殼散差寒若早服之恐有胎寒腹痛之疾以內
 補丸佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調勻有益胎孕
 此前人未常論及

本榆白皮焙乾為末婦人妊娠臨月日三服方寸七令產

極易產下兒身皆塗之信有驗

臨產坐草法

欲產之婦脈離沉細而滑也同名夜半覺時應分
 誕來辰日午定知生難經云脈一呼三至曰離經一呼一
 中則生也 身重熱寒又頻舌下之脈黑復青及舌
 上冷子當死腹中須遣母歸面赤舌青細尋看母活子
 死定難應唇舌俱青沫又出子母俱死總高拊面青舌赤
 沐出類母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢哲不
 虛陳

正產候

十產論一曰正產者婦人懷胎十月滿足忽腰腹作

陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛穀

道挺逆繼之漿破血出兒子送生此名正產

二曰傷產者婦人懷胎未產一月已前忽然臍腹痛疼有

如欲產仍却無事是名試月非正產也... 正產之候即不可令人抱腰亦不可令產母妄亂用力... 兒身未順總方轉動便教產母虛亂用力使兒子錯落忽... 橫忽倒不能正生皆緣產母用力於未當用力之所致也... 直待兒子身順臨逼門戶方始用力一送令兒下生此名... 傷產

右傷產一法最為切要慎勿輕忽也凡十月未足臨產... 腹痛或作或止或痛不甚者名曰弄痛非正產之候或... 腹雖痛甚而腰不甚者非正產之候胎高未陷下者非... 正產之候殺道未挺逆者非正產之候水漿未破血未... 出者非正產之候漿血雖出而腹不痛者非正產之候... 凡未有正產候且令扶行熟忽如行不得或凭物坐之... 或安臥之或服安胎藥一二服得安即止慎勿妄服催

醫學綱目卷三五

生藥餌惶惶到令產母憂恐而挫其志務要產母寬心... 存養調停亦令坐婆先說解諭之如覺心中煩悶可取... 白蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先困其母直待... 子逼門戶腰重痛極眼中如火殺道挺逆時是正產候... 方可用力并服催生藥也予男婦於未產一月已前腰... 腹俱痛全似將產其痛至甚但遇已牌稍止如此者將... 十餘日計無所出因閱此條遂與安胎藥加參朮數服... 間與中藥養之由是平復不痛又二十餘日始產一男... 是時若妄動亂用力并服催生等藥立見危亡矣... 三曰催產者若欲產漿破血下已見是正產候但却未... 生即可服催生以催之忽有經及數日產母困苦亦可... 服藥助產母之正氣令兒速生此名催生... 四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以至兒子不

能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不... 可坐臥寒處當滿房着火常有暖氣令產母背身向火令... 膈下腿膝間常煖血得熱則流散使兒易生此名凍產... 五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼... 傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有... 發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事此名熱產

橫產 六月橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而... 用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令... 產母安然仰臥後令看生之人先推其手令入直上漸漸... 逼身以中指壓其肩推上而正之或以指舉其耳而正之... 須是產母仰臥然後推兒徐徐正之候其身正煎催生藥... 一盞吃了方可用力令兒下生此名橫產

倒產 七曰倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒... 子不能迴轉便直下先露其足當令產母仰臥令看生之... 人推其足入去不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒... 自順云

偏產 八曰偏產者兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏柱左... 腿或偏柱右腿故頭雖露偏柱一畔不能生下當令產母... 仰臥入令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭... 頂端正然後令產母用力一送即便生下若是小兒頭後... 骨偏柱殺道只露其額當令看生之人以綿衣灸溫裹手... 於殺道外方輕輕推兒頭令正便令產母用力送兒生也... 此名偏產

礙產 九曰礙產者兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身回... 轉肚帶攀其有此露正頂而不能生當令產母仰臥令... 看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下撥其

肚帶仍須候兒身正順方今產母用力一送便兒生下此
名礙產

右橫產側產偏產礙產四法若看生之人非精良妙手
不可使用此法恐恣其愚以傷人命也按側產者今世
往往隨其側足生下並無後患子母雙全不必依推足
上之法亦可又礙產者往往肚帶有繩在兒頂上而兒
頭自出在產門外看生之人以手撥其肚帶從兒頭頂
過而下之者又有肚帶纏在頂上一匝而兒與胞衣自
然同下者皆無妨不必以此礙產法入產門裏撥下之
也

十日坐產者古欲臨產時高處繫一手巾今產母以手攀
之輕輕屈足坐身今兒生下非坐在物上也此名坐產

盤腸產

十一日盤腸產者趙都運恭人每產則大腸先出然後產

八醫一科一末三

三

子產後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能療偶在
建昌得一坐婆施一法而收之其法以醋半盞新汲冷水

七分調停噴產母面每噴一縮三噴收盡此良法也

產後腸不收香油五斤煎熱盛盆俟溫坐油盆中約一
頓食時以皂角末吹入鼻中噤作立上妙門

半夏為末搗鼻中則腸上矣 又方以大紙捲蘸香油
點燈吹滅以烟薰產母鼻中腸即上矣 又方以草麻子

十四粒去殼研如膏貼產母頭頂中心腸上即減去

催生法

大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生滑胎
等藥或勢不得已則服之又云切不可坐草及令坐婆亂

禁忌

下手凡催生藥必候腰痠其
下胎胎下葉血破方可服

催生只用佛手散最穩當又効捷方見婦人通
論即歸湯

滑以流
通產

催生如聖散黃芩葵子小半合一方二錢重研爛以酒瀝
去查溫服神妙或漏血胎乾難產痛極者并進三服良久
腹中氣寬胎滑即產須見正產候方可服之歌曰黃葵子
炒七十粒 細研酒調濟君急 若遇臨危產難時 免
得全家俱哭泣

又方以香油白蜜小便和勻各半盞調益母草末服

方止用油蜜小便能下難產

秘錄治橫產不得出車前子末酒服二錢七

若以雙
逐閉索

催生柞木飲子治產難或橫或倒死胎爛腹中此方
屢用神効

大柞木枝大握長一尺 洗淨寸對生用 甘草大者五寸 剉作五段

右用新汲水三升半同入新磁瓶內以紙三重密封之
文武火煎至一升半令香候產婦腰重痛欲坐草時溫

八醫一科一末三

三

飲一小盞腹未重便覺心下開豁如覺再湯又飲一盞
至三四盞覺下重便生此方至驗

治難產礙胎在腹中如已見兒胎衣不出胎死者養慈
子貝母各四兩為末米飲下一匙如相去四五里許不下

再服

又方通明乳香一塊如皂角子大為末磨痛時用新汲水
一小盞入醋少許同煎令產母兩手提兩石燕坐婆調藥

飲水須臾坐草便生無痛楚神良 又方開骨膏乳香研
細五月五日午時滴水丸如鷄頭大每服一粒無灰酒吞

下 又方催生神効乳珠丹乳香研細以猪心血為丸如
桐子大珠砂為衣曬乾每服一粒冷酒化下良久未下再

服一粒如大段難產以蓮葉心蒂七個水二盞煎至一盞
放溫化下一粒良久未下亦可再服此藥靈驗如神合藥

香以開
痰逐汚

又方通明乳香一塊如皂角子大為末磨痛時用新汲水
一小盞入醋少許同煎令產母兩手提兩石燕坐婆調藥

飲水須臾坐草便生無痛楚神良 又方開骨膏乳香研
細五月五日午時滴水丸如鷄頭大每服一粒無灰酒吞

下 又方催生神効乳珠丹乳香研細以猪心血為丸如
桐子大珠砂為衣曬乾每服一粒冷酒化下良久未下再

服一粒如大段難產以蓮葉心蒂七個水二盞煎至一盞
放溫化下一粒良久未下亦可再服此藥靈驗如神合藥

時五月五日午時七月七日三月三日效 又方乳香硃砂等分為細末麝香酒調下 又方腰疼可服乳香人參各一錢辰砂半錢同研細用鷄子清一個調之生薑自然汁放開冷服如橫生倒生即時端順子母平善

大勝金散問曰產難若何答曰胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破與敗血裹其子故難產但服此藥逐其敗血即自生逆生橫生並治之

麝香一錢 鹽豉一兩以青布裹 右為末取秤鍾燒紅以酒淬之調下一錢 催生丹治產婦生理不順產有艱難或橫或逆並皆治之

十二月兔腦髓去皮膜 乳香另研極細 母丁香末錢一分 麝香一分 右三味拌勻以免腦髓和丸如鷄頭大陰乾油紙裹每服一丸溫水下即產兒握藥出

勝金丹治難產神妙敗兔毫筆頭一枚燒為灰研細搗生藕汁一盞下之立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服

主難產搗益母草取汁七大合煎半頓服立下無新者以乾者一大握水七合煎服

易產天麻丸 天麻即益母草六月間帶根採曬乾 右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨產時熱水嚥化

一丸能除產後百病 難產 縮砂 香附醋 枳殼 甘草 滑石

右為末白湯調服 催生蒲黃地龍陳皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微

黃各為末臍足心三處貼如經日不產各抄一錢七新水調服立產此常親用甚妙

催生神効七聖散臨產腰痛方用之 玄胡索 沒藥 白礬 白芷 姜黃 當歸 桂心

右為細末臨產陣痛時燒犁頭鐵通赤燂酒調三錢服一二盃立產

難產吞槐子十四枚逆產燒銅錢通紅放酒中飲之 治胞漿先破惡水來多胎乾不得下時須先與四物湯補養血氣次更煎葱湯放冷令坐婆洗產戶須是款曲洗令氣上下通暢更用酥調滑石末塗產戶裡次服神妙乳珠丹或葵子如聖散見前 催生如聖散治逆產橫生瘦胎

百草霜 香白芷不見火 右二味等分研勻每服二大錢於臨產時以童子小便并少米醋打為膏湯調下集驗方用酒重便各半盞同煎經沸即熱服不過再服并法用等湯調血得 同煎經沸即熱服不過再服黑則止此藥大能回血

又方治橫倒生者 明阿膠炒 滑石末各一錢 葵子二兩 右水一盞半煎至一盞去渣分二服

治難產五六日不得分娩者疲倦虛乏光明水膠二兩用好酒一升半微火焙膠入新鷄子一個盞一錢七塊溫令產母坐椅上伸腰大口作二次服覺小便重復生緣坐草早驚動故也

半夏湯治胎乾而不能產

氣滯者 行氣

外方

半夏一兩 大黃五錢 肉桂七錢 菝仁三十個
右為粗末先服四物湯一二服次服半夏湯生薑三片
水煎服 又方當歸為末調方寸匕酒服之
如聖膏治難產併治胞衣不下兼治死胎

蓮麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞即下速洗去
不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入一方車藤子
錢細研用如上方筆之

催生萬金不傳過仙丹

草麻子十四粒 硃砂 雄黃各一
蛇蛻一尺

右為末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用椒湯淋滌
臍下次安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上以潤帛繫
之須生下急取去藥一丸可用三次一方草麻

入醫學綱目卷之三

方

雜方

三麻四莖脫衣裳研碎將來入麝香若有婦人遺產難
貼在臍中兩分張用麻子三粒巴豆四粒
治產危者立聖丹寒水石四兩內二兩生二兩煨赤取
出同生者研細入硃砂同研如深苑花色每用三分并花
水調如薄糊用紙花剪如杏葉大攤用貼臍心候乾再易
不過三上便產橫逆惡候死胎不下並治神驗寒水石非
方解石也即今人謂軟石膏也此方國初異人傳之妙

催生令產婦兩手各握石燕一枚須臾子下

救產難經日不生雲母粉半兩溫酒調服入口即產萬不

失一陸氏云已救 治橫逆產理不順用伏龍肝細研每
服一錢酒調服之以土着兒頭上戴出妙

世如神散治催生累效靈妙於理固難通於事實殊効臨
產時令人路上尋草鞋一隻取耳燒灰溫酒調下三錢七

針灸

得左足者生男右足者生女覆者兒死側者有驚此藥委
是神奇用此送下催生丸尤妙

獨陰指第三節間 承陰五分
婦人將產預先胎破惡水長流坐草早無血可養枯竭

催生難產及死胎 太衝八分 合谷補 三陰交

五分滿立 足小指節三壯心 產子上衝通心 巨

關令正坐用抱頭地腰微屈針入六分留七呼得氣即

是向後枕骨有痕 合谷三分 三陰交五分

張仲文 橫產難產 右腳小指尖頭灸三壯

又法 獨陰同上法取灸 合谷補 三陰交瀉

難產 三陰交

下死胎法

下死胎法方用桂枝二錢麝香當門子一個同研煖酒

服須臾如手推下比之用水銀等此藥不損血氣趙和叔

傳一方無麝香單用桂末一錢痛時童便調下名救苦散

鄧知縣傳療死胎不出朴硝研細半兩以童便溫服下屢

効 治死胎不下指甲青舌青脹口中作屎臭先以平

胃散一貼作兩服每服酒水各一盞煎至一盞却投朴硝

半兩研細再煎三五沸溫服其胎化血水下 治子死腹

中不出其母氣欲絕水銀二兩吞之立効

治子死腹中不出用辰砂一兩以水煮數沸木之然後

取酒服之立出

療子死腹中真珠二兩為末酒調服盡立出

治妊娠三五個月胎死在腹中不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮各三 當歸一兩

滑石末七 瞿麥 葵子 茯苓

粉草 黃芩各半

右為粗末每服四錢水煎

小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口噤不開格口灌之藥下即活 療妊娠胎死腹中或母疾欲下胎榆白皮煮汁服二升

天治子死腹中或半生不下或半着脊骨在草不產血氣上盪母心面無顏色氣欲絕

猪脂升 白蜜升 淳酒升

右三味合煎取二升分溫二服不能飲隨所能服之

世治生產不順胎死腹中胞衣不下臨產危急妙

蛇退一條全者香 麝香許少

右為末童便酒各半盞調一服即生効

楊氏療有孕月數未足子死腹中母欲悶絕取大豈三升

醋煮濃汁三升頓服立瘥

治妊娠熱病胎死腹中鹿角屑一兩水一盞葱五莖豈

豈半合同煎至六分去渣溫分二服

取死胎烏鷄一隻去尾細剉以水三升煮取二升去鷄

通手用衣帛蘸摩臍下胎自出

產後症 胞衣不下 血暈 血不下

血不止 虛弱 無乳 乳汁自出

陰脫 血塊痛 見腹

產後必用方

凡生產畢令飲童便一盞不得便卧且宜閉目而坐須臾上床仰卧不宜側卧宜堅膝未可伸足高倚床頭厚鋪茵褥遮圍四壁使無孔隙免致賊風乘時時令人以物從心捍至臍使惡露不滯更三日內令產婦常聞醋炭氣或燒乾漆烟若無乾漆以舊漆器燒之以防血暈不問腹痛

不痛有病無病以童便和酒半盞溫服五七服妙

止血暈產婦腹痛以碎安胎上則止

產後當大補血氣為先雖有雜症以末治之

地黃丸治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或胎

衣不下失音不語心胃脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往

來口内生瘡咽喉腫毒心中忪悸夜不得睡產後中風角

弓反張面赤牙關緊急或崩中如豚肝臍腹疔痛煩躁恍

惚四肢腫滿及受胎不穩唇口指甲青黑

生地 研取汁 生薑 各二斤研 蒲黃

當歸 各四

右於銀石器內取生地黃汁炒生薑滓以生薑汁炒地

黃查各令乾四味同焙研為細末醋煮麩糊為丸如彈

子大每服一丸食前當歸酒化下神妙一方只用生薑

生地無蒲黃當歸依交加法制之為末每服三錢溫酒

調下

黑神丸產後服之能生新血去舊血用白湯送下虛者

參朮陳皮湯送下 生門 益母膏治產婦一切傷損一

切血病 方見講

凡婦人因暑月產乳取凉大多得風冷腹中積聚百病

就起迄至於死百方不差桃仁煎主之出產後服之

桃仁 一千二百枚去皮尖

右一味搗令極細熟以上等酒一斗五升研三四遍如

作麥粥法以極細為佳納小長項瓦釜中密塞以糊封

之納湯中煮一伏時不停火亦不令火猛使瓶口常出

在湯上勿令沒之熱訖溫酒服一合日再服

黑神散治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心腹痞滿

或臍腹堅脹振痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾

熱地 蒲黃炒 當歸 乾姜炮

桂心 芍藥 甘草各四 黑芷炒去皮

右為細末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調服

右黑神散寒多及秋冬者宜之若性急形瘦及夏月宜

審之

胎前母滯 產後母虛 產後一切皆不可發表 產

後不可用芍藥以酸寒伐生發之氣故也

大不可吃物過多恐成積滯若未滿月不宜多語喜笑驚

恐憂惶哭泣思慮急怒強起離床坐又行動或作針工恣

食生冷粘硬油膩魚肉之物及不避風寒當時未覺滿月

之後即成羸勞凡產後滿百日乃可交合不爾至死虛羸

百病滋長慎之凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由早行房

也

或曰初產之婦好血已虧汚血或留彼黑神散非要藥

乎谷曰至哉乾元萬物資生理之常也初產之婦好血未

必虧汚血未必積穢府未必寒何以藥為飲食起居勤加

調護何病之有誠有汚血體怯而寒與之數貼亦自簡便

或有他病當求病起何因病在何經氣病治氣血病治血

何用海制此方例令服餌設有性急者形瘦者本有怒火

者夏月坐蓐者時有火令姜桂皆為禁藥至于將護之法

尤為悖理肉汁發陰經之火易成內傷之病也先哲具有

訓戒胡為以羊鷄濃汁作糜而又常服當歸丸當歸建中

湯四順理中丸雖是補劑並是偏熱臟腑無寒何處消受

若夫兒之初生母腹頓寬便咳鷄子且吃鷄蛋不思鷄子

難化夥益發熱展轉生証不知所困寧爾用藥寧不悞人

診

予每見產婦之無疾者必教之以却去黑神散與夫鷄子
夥益諸品肉食且與白粥將理問以此少養魚羹令淡食
之半月後方與少肉若鷄子亦須開淡煮大能養胃却
疾彼富貴之家驕恣之婦卒有白帶頭風氣痛膈滿痰逆
口乾經事不調髮秀軀倦皆是陽盛陰虛之病天生血氣
本自和平口勝曰虛又烏知非此等緣遂有以兆之耶
臨診婦人生產之後寸口脈洪疾不調者死沉微附骨不
絕者生 診婦人新生乳子脈沉小滑者生實大堅弦急
者死

胞衣不下

奪命丹治血入胎衣為血脹不得下

附子 牡丹 乾漆 一分碎之

右為末以醋醋一升大黃末一兩熬成膏和藥丸如桐

子大溫酒吞五七丸不拘時此藥逐去胞中之血血散

脹消胞衣自下矣

花蓋石散治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈惡血奔

心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭發急以童便調一

錢取下惡血如猪肝終身無血風血氣疾膈上有血化為

黃水即吐出或從小便出也 撲傷損 黑龍丸治胞衣不

下神效 方見產後 黑神散治惡露不快胞衣不下 方見

用

牛膝湯治胞衣不出臍腹堅脹急痛即殺人服此藥胞即

爛下死胎亦下

牛膝 瞿麥各四 當歸三 通草六

滑石八 葵子五 右咬咀以水九升煮三升分三服若衣不下腹滿即殺

人推其源皆胞衣有血奔心是以不出服此藥衣即爛

治胞衣不出牛膝一兩葵子一合以水一升煮半升去查分二服

備急丹治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊以錦紋大黃一兩為細末用醋醋半升同煎如膏丸如桐子大患者用醋七分蓋化五丸至七丸服之須臾血下即愈

治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及胎乾不能生產半夏湯主之見前條

下胎丸 半夏 白欬各半

右細末丸如桐子大食後半夏湯下三十九漸加至五十九如未効者須廣其藥榆白皮散主之又効大聖散主之有宿熱者宜服人參荆芥散

雜方

治胞衣不下惟有花蓋石散一件最為要緊若鄉居藥局遠者倉卒無之今採得胡氏方一妙法若產訖胞衣不下稍久則血流胞中為血所脹上衝心胃喘急疼痛必致危篤若有此証宜急斷臍帶以少物繫帶必用力牢固繫之然後截斷使其子血脈不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人只要產母心懷安泰終自下矣累試有驗 治胞衣不下以蛇退炒為細末酒下二錢

如聖膏方見胎前催生 若胞衣不下腹脹則殺人黑豈一合炒熟入醋一盞煎去豈分三服 胞衣不下取龍內黃土一寸研碎同醋調勻內於臍中續煎甘草湯三四合服之出

針灸 胞衣不下用取初洗兒湯服下一盞勿令產母知

針灸

胞衣不下 三陰交 中極各灸

表

又法 照海 內關

女子字難若胞不出崑崙主之 產後血暈

問曰新產婦人有三病一者病瘥二者病發胃三者大便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘥亡血復汗寒多故令鬱胃亡津液胃燥故大便難產後血暈

產後血暈者氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷但服清魂散即醒

澤蘭葉 人參各二 荆芥一 川芎半 甘草一兩 先 右為末用溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽即開

眼氣定省人事 治產後風虛血暈精神昏昧荆芥散 荆芥一兩 槐仁五錢 右細末溫水下三錢微喘加杏仁炒甘草各三錢

治產後血暈身疼直戴眼口角與目外眇向上牽急不知入取鷄子一枚去殼取清以荆芥末二錢調服遂仍依次調治若無他疾則不須治甚敏捷

右荆芥例氣虛人不宜服 下血多而暈者但昏悶煩亂而已當補血下血少而暈者乃惡露不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人

當破血行血 婦人產後血暈此乃虛火載血漸漸暈將上來用鹿角

針灸

婦人產後血暈此乃虛火載血漸漸暈將上來用鹿角

燒灰出火毒研極細用好酒童便調灌下一呷即醒此物行血極効

獨行散治產後血暈昏迷不省衝心悶絕五靈脂半生半炒各二錢為細末溫酒調下二錢口噤者幹開口灌之入喉即愈 一方加荆芥等分為末童便調下

治下胎或產後血上衝心已死用鬱金燒存性為末二錢醋一合調灌之立活

產後血暈心悶氣絕紅花一兩搗為末分作二服酒二鍾煎取一鍾併服如口噤幹開灌之速効 一方用紅花三兩新者無灰酒童便各半升煮取一盞服之

治血暈蘇木三兩細對水五升煮取二升分再服瘥無蘇木方取緋衣煮汁服之亦得

產後血暈不知人及狂語棋麟竭一兩細研為末非時溫酒調下二錢七

六醫學編卷五

夫

紅花散治產後血昏血暈血崩及月事不勻遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮 川歸 紅花

蒲黃炒等分

右細末每半兩酒煎和查溫服如胎衣不下榆白皮湯調半兩立効

右破血輕劑

牡丹散治產後血暈悶絕口噤則幹開口灌之

牡丹皮 大黃炒 芒硝各一兩 冬瓜子半 棗仁三十粒 去皮去

右剉每服五錢水三鍾煎至一鍾半去渣入硝又煎分二服

產書治產後心煩手脚煩熱氣力欲盡血暈連心頭寒熱不禁接骨木破之如算子一握以水一升煎取半升分溫二服或小便數惡血不止服之即瘥此木煎三遍其力一般此是起死之方

右重劑血點滴不出者宜用

花並石散治產後氣欲絕惡血奔心至死者但以童便調一錢取下惡物極妙方見 黑神散治產後血暈用細酒調服佳方見

右二方異多者用之

芎歸加芍藥湯治產後去血過多而暈方見

又方治產後血暈危困

生地汁一升 當歸半升 赤芍藥二錢

右水煎三五沸溫服如覺煩熱去當歸入童便半盞服之

六醫學編卷五

夫

治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕新羊血一盞飲之日三服妙

產後忽冒汗出不識人者暴虛故也破鷄子三枚吞之便醒若未醒可與童便一升甚驗 若產後去血多者又增此疾與鷄子不醒者可急作竹瀝汁一服五合須臾不定再與五合頻與三五服瘥

婦人年三十餘面而白形長心中長有不平事忽半夜詭

子總分後後侵晨暈厥不知人遂急於氣海灼艾十五壯而蘇後以參朮等藥兩月方安

一產婦發胃其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒胃家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰也

陽虛陰虛

氣虛

虛

雜方

虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之齊月也

治產後血暈全不省人事極危殆者用韭菜切入有嘴瓶內煎熱醋沃之便密封瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋氣透入須先扶病人起坐即醒 又方如覺暈即以醋噴面醒來即與醋細細呷之又以醋塗口鼻并置醋於傍使常聞其氣 又法治血暈去者急取乾漆燒取烟以向鼻即醒如無乾漆傷漆器亦可 又方治產後血暈用生半夏末少許吹入鼻中

治胎後血上衝心生薑五片切以水八升煮取三升分三服

醋墨防產時血暈好墨半錠火燒赤投醋中如此三遍出火毒研細每服五分淡醋湯調下

治產後血暈不省人事 三里 支溝 三陰交此穴無

又法 陰交 陽別

又法 神門 內關後穴 關元灸

治婦人惡血不下

當歸炒 芫花炒

右為細末每服三錢酒下又用好墨醋煨末小便酒下

產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈皆痛

如以錐刺

當歸分 桂心 芍藥各半 桃仁去皮尖

沒藥研各 蜜虫去翅 水蛭炒各三

右為末醋糊丸如豌豆大醋湯下

右峻劑

治產惡露不下

乾荷葉兩 鬼箭羽 菀仁 劉寄奴

右為粗末每服三大錢以童便一大盞姜二片生地一分搥碎同煎至六分去渣無時熱服

治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一升頓服

治產後血不去麻子五升酒一升浸一宿明日去渣溫服一升不瘥再服一升不吐不下不得與男子通一月將養如初瘥

黑龍丸治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾垂死者但灌藥得下無不全活神驗不可言

當歸 五靈脂 川芎 良姜

熟地各三

右細末入沙罐中赤石脂泔紙筋鹽泥固濟炭火十斤燒通赤去火候冷取開看成黑槽色取出細研却入後藥

百草霜五錢 硫黃 乳香各一 花蕊石

右五味並細研如桐子大頓服立効

產後血不止

芫歸加芍藥湯治產後血崩眩暈不知人事

川芎 當歸 芍藥各等

右吹咀每服四錢以水一鍾半煎至七分去渣無時熱

服
 產後血崩如豈汁紫黑過多者四物湯加蒲黃生地汁
 阿膠剉根艾白芷煎服

虛中有
 七二孺人產後胃寒哭多血再下身腫脈沉
 當歸 白木 陳皮 川芎
 乾姜 黃芩各二 芍藥一 甘草些
 右分二貼煎服

虛中有
 王孺人因憂慮墮胎後兩月餘血不止腹痛此脾虛氣滯
 惡物行不盡
 陳皮一 白木二 芍藥一 木通
 川芎五 甘草二分
 作湯下五芝丸六十粒食前

臨下者
 治產後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒五升煮
 取二升半分溫再服

壯者
 壯瀾散治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢乏弱頭
 目昏重煩熱
 壯瀾 川芎 熟地 茯苓
 龍骨各一 續斷 當歸 艾葉酒
 五味 人參各半 甘草半 地榆
 右為末每服三錢生薑三片水一盞同煎食前

汚血
 產後後猶有餘血水氣者宜服頭淋酒黑豈五升熬令
 烟盡於甕器內以酒一斗焯之
 右頭淋酒治汚血又能發表也
 治產後惡血不絕腹中絞痛氣息急
 亂髮 阿膠 代赭石 乾姜各三
 馬蹄 乾地黄 牛角鯁 酥炙

寒
 右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三四十九日
 二服
 治產後崩中下血不止葛蒲一兩半劉酒二鍾煎一鍾
 去渣分三服食前溫

推方
 產後血崩取木月及所者或半斤者燒灰為末用麝香
 一錢枳殼去穢內煎濃紙包煨令香熟研細入藥每用一
 錢烏毒湯下

虛熱
 產後虛弱
 右木月益米耳之類木屑也按木耳治崩中帶下效
 產後下血不止桑白皮煮水飲之
 治胎落下血不止以桑木中蝎虫燒末酒服方寸七
 日二服

虛熱
 產後補虛
 人參 白木各一 黃芩 歸身尾各五
 川芎半 陳皮分

治也
 右煎服如有寒加乾姜三分茯苓一錢
 元湯治產後久虛勞而脈浮大者方見婦人門大法
 產後日久虛勞鍼灸不效者三合散此四君子四物小
 治也

虛寒
 白木 川歸 芍藥 黃芪
 茯苓 熟地 柴胡半 黃芩六
 人參一兩 半夏 甘草各六 川芎一
 右為粗末每兩水一鍾半服日三
 當歸羊肉湯治產後雖無疾者但覺虛弱兼心腹痛
 肥羊肉 羊脂水一斗 當歸五 黃芪四

生薑兩六

右以肉汁煮三味取二升五合分為四服若覺惡露不盡加桂三兩惡露下多加芩三兩有寒加茱萸一兩有氣加細辛二兩有熱加生地汁二合

治產婦虛勞不能食十全散方見治虛實法氣血系

當歸建中湯治婦人一切血氣俱損及產後勞傷虛羸不足腹中疼痛吸吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出

方用當歸四兩肉桂二兩甘草二兩白芍六兩姜蔥煎服

治產後虛損飲食不下四物加建中入參白朮茯苓主之

之

產後無乳

累經產而無乳者亡津液故也須服滋益之藥以動之若雖有乳却又不甚多者須服通經之藥以動之仍以藥

六醫學綱目卷三

臍引之蓋婦人之乳資於衝脈與胃經通故也夫抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而其色帶黃所生之子怯弱多病

無乳汁不行有氣血盛而壅閉不行者有血氣弱澁而不行者虛當補之實當疎之疎用通草漏蘆土瓜葶補用鍾乳粉豬蹄鯽魚之屬

治乳無汁
土瓜 漏蘆各三 甘草二 通草兩
右水八升煎取二升分溫三服

下乳汁括萎子淘洗控乾炒令香熟瓦上揅令白色為末酒調下一七合卧少時 產書下乳汁土瓜為末酒服一錢日三服

下乳汁以京三稜三個水二碗煎取一碗洗取汁下為

下乳汁以京三稜三個水二碗煎取一碗洗取汁下為

度極妙

婦人乳不行高菝子糯米各一合細研水一碗攪勻入甘草末一字煎之溫呷頻與妙

立効方下乳汁

糯米 高菝子各半合並淘洗 甘草半兩生

右煎汁一升研藥令細去查分作三服立下

又方 豬蹄一 通草兩

右以水一斗煮作羹食之

湯泉散治婦人乳汁因氣絕少

瞿麥穗 麥門冬去心 龍骨 川山甲炮

王不留行

右為細末每服一錢熱酒調下後吃猪蹄羹少許又用水梳於左右乳上各梳三二十梳日三服依前法

又方治乳汁少

瓜蒌根 薄荷幹身等

右為粗末先吃羊蹄汁一碗次服藥後再吃葱絲羊羹湯少許出効

有人乳脈不行已十七日諸藥無効遇有人送赤豆一斗遂時常煮粥食之當夜乳脈通行

乳汁自出

產前乳汁自出者謂之乳注生子多不育產後乳汁自出蓋是身虛宜服補藥以止之若乳多急痛而出者溫帛熨之漏蘆散亦可

漏蘆二錢 蛇蛻一 瓜蒌十
右為末酒調二錢無時 產後陰脫

產後陰脫

一婦人三十餘歲生女二日後產戶一物如手帕下有
 怕失約重一斤子思之此因胎前勞之傷氣成肝癆所致
 却喜血不甚虛其特感暮天寒恐冷乾壞了急與多黃芪
 半錢人參一錢白朮五分當歸一錢半升麻五分三貼連
 服之即收上得汗通身乃安但下商沾席處乾者落一片
 約五六兩重蓋脂膜也食進得眠診其脈皆滑左略弦視
 其形却實與白朮芍藥各錢半陳皮一錢生薑一片煎二
 三貼以養之 一婦人產子後陰戶中下一物如合鉢狀
 有二歧其夫來求治于思之此子宮也必氣血弱而下墜
 遂用升麻當歸黃芪大料二貼與之半日後其夫復來曰
 服二次後覺響一聲視之已收陰戶訖但因經宿乾者席
 上破一片如掌心大在席其妻在家哭泣恐腸破不可復
 生子思之此非腸胃乃糟粕也肌肉破尚可復完若氣血

人醫學綱目卷之三十五

聖

充足必可生滿遂用四物湯加入參與一百貼三年後復
 有子 治子宮下用黃芪一錢半人參一錢當歸七分升
 麻三分甘草二分作一貼水一鍾煎至三分去查食前服
 却用五倍子末泡湯洗又用末傅之如此數次宜多服藥
 永不下 治陰腫蓋產努力太過致陰脫若脫肛狀及陰
 挺出逼近腫痛舉重房勞皆能發作清水續續小便淋露
 用硫黃烏賊骨各半兩五味子一分為末傅患處兼服參
 芪歸草升麻等補藥 治產後陰下脫人尿燒酒下方寸
 七日 千金雜錄 蠅皮散加蠟
 治產後陰腫下脫內出玉門不閉石灰一升炒極熱湯
 二升投灰中適溫冷燈清坐水中以口玉門斯須平復如
 故 又方以鐵精粉上推內之又灸下橫紋二十七壯
 一法用鐵精羊脂二味攪令稠布裹灸熱推內之鐵精

雜方

是鍛鉄灶中飛出如塵紫色而輕虛可以摩磨器皿者
 又方單炒蛇床子一升乘熱以布裏煨患處亦治產後陰
 戶痛

針灸 治產後陰下脫燒兔頭末傅之

一婦人胞胎門落頰不收常濕 神關 玉泉 五十
 交 下指 中灸 又法 玉泉傍開三十 此 女
 人陰門冷腫 飯來三十
 一婦人陰挺出四肢浮灑身悶少海主之一

人醫學綱目卷之三十五

聖

醫學綱目卷之三十五

小兒通治

錢氏診
五臟所主

心主驚 實則叫哭發熱飲水而搐 虛則困臥悸動不安

肝主風 實則目直視大叫呵欠項急煩悶 虛則咬牙多欠氣熱則外生風氣溫則内生風

脾主困 實則困睡身熱飲水 虛則吐瀉生風

肺主喘 實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者 虛則哽氣長出氣短

腎主虛 無實也惟瘡疹腎實則黑陷 更當別虛實證如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也若目直視大叫哭項急煩悶者難治蓋

肺病久則虛冷肝強實而反勝肺也宜視病之新久虛實虛則補母實則瀉子

肝病哭叫目直視呵欠煩悶項急 心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水 脾病困睡洩瀉不思飲食 肺病悶

亂哽氣長出氣短喘急 腎病目無精光畏明體骨重

肺藏怯 唇白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣喘喘促

噎氣者難治肺虛損故也 脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故名曰怯肺主唇唇白而

光澤者吉白如枯骨者死 此以唇診肺之法也唇白色者衣領及亂髮物者皆熱也宜瀉黃連青丸手搦

喜仰臥使氣得上下通也瀉心湯主之 心氣熱則合面

五藏論

顧解頰開面色既白者皆為難養雖長不過八八之數若

恣色慾不及四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎

不足則下竄蓋骨重惟欲墜下而身縮也腎者陰也腎氣

虛則畏明皆宜補腎地黃丸主之 散腎氣虛則下宜宜地

是也 肝病勝肺 肝病秋見 肺病春見 肝怯不能勝肝當

補脾治肝益脾者母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青

丸主之 肺病勝肝 肺病春見 肝怯受病當補

肝腎治肺補肝腎地黃丸治肺瀉白散主之

五臟相勝輕重 肝病見秋木旺肝勝肺也宜補肺瀉肝

輕者肝病退重者唇白而死 肺病見春金旺肺勝肝也當瀉肺輕者肺病退重者目淡

青必發驚更有赤者當瀉 肝病見冬火旺心勝腎也當補腎治心輕者心病退重者

下竄不語腎怯虛也 腎病見夏水勝火腎勝心也當瀉腎輕者腎病退重者悸

動當搖 脾病見四旁皆放此治之順者易治逆者難治脾怯當面

赤目黃五臟相反隨證治之 右五臟相勝病隨時令乃錢氏擴充內經藏氣法時論

五藏補

瀉青丸又名瀉 導赤散治心火 瀉心湯治心火

安神丸治心虛 益黃散治脾虛 瀉白散治肺熱

阿膠散治肺虛 瀉心散治心火 瀉心丸治心火

地黃丸治腎虛 瀉心丸治心火 瀉心散治心火

熱則從心寒則從腎嗽而氣上從肺風從肝瀉從脾假

今瀉兼嗽又氣上乃脾肺病也宜瀉白益黃散合而服之

脾苦濕肺苦燥氣上逆也其症見瀉又兼面色黃腸鳴吻

吻者宜服理中湯瀉而嘔者宜服茯苓半夏湯如瀉而渴

熱多者宜服黃芩厚朴湯不渴而熱少者宜服白朮厚朴

湯其他五臟若有兼症皆如此類推之更詳後論四時推

移用藥

入醫經約卷三六

三

心主熱自病或大熱瀉心湯主之 實則煩熱黃連瀉心

湯主之 虛則驚悸生犀散主之

肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主之 肝乘心虛邪風熱

煎大羌活湯下大青丸主之 脾乘心實邪泄瀉身熱瀉

黃散主之 腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸主之

肺主燥自病則喘嗽燥則潤之 實則喘而氣盛瀉白散

主之 虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散主之

心乘肺賊邪熱而喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散主

之 肝乘肺微邪惡風眩冒昏憤嗽羌活膏主之 腎乘

肺實邪增寒嗽清利百部丸主之 脾乘肺虛邪體重吐

痰洩瀉嗽人參白朮散主之

肝主風自病則風搖拘急肝苦急急食甘以緩之佐以酸

苦以辛散之 實則風搖力大瀉青丸主之 虛則風搖

力小地黃丸主之

心乘肝實邪壯熱而搖利黃丸涼驚丸主之 肺乘肝賊

邪氣盛則前伸呵欠微搖法當瀉肺先補本臟補肝地黃

丸主之瀉肺瀉白散主之 脾乘肝微邪多睡體重而搖

先當定指瀉青丸主之搖止再見後症則別立法治之

腎乘肝虛邪增寒呵欠而搖羌活膏主之

脾主濕自病則洩瀉多睡體重昏倦脾苦濕急食苦以燥

之 實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散主之 虛則泄瀉

色白腫眩暈白朮散主之

肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之 心乘脾虛邪

壯熱體重而瀉羌活膏蒼朮甘草湯主之 肺乘脾實

邪能食不大便而嘔吐嗽煎煎檳榔大黃湯下瀉瀉丸 腎

乘脾微邪惡寒泄瀉理中丸之類主之

腎主寒自病則足脛寒而逆人之五臟惟腎無實小兒瘡

疹變黑胎則是腎實水射退心火

心乘腎微邪內熱不惡寒桂枝湯主之 肺乘腎虛邪喘

嗽皮遊寒百部丸主之 肝乘腎實邪拘急氣搖身寒理

中丸主之 脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸主之

凡五臟虛弱是自已正令不行乃鬼賊之所射當補本

臟之正氣假令肺病喘嗽時於初春見之法當補腎見於

夏救肺見於秋瀉肺見於冬補心瀉本臟又名寒嗽大抵

五臟各至本位即氣盛不可更補到所克位不可更瀉

云五臟子母虛實果賊正若不達旨意不易得而入焉

在諸者為補和在後者為虛邪乘乘夫為微邪夫乘乘

妻為賊邪本散

白病為正邪

肝病面白 肺病面赤 脾病面青 腎病面黃

心病面黑 若肝病驚搖而又加面白痰涎喘急之類此

皆難治餘做此推之假令春分前風寒也宜用地黃羌活防風或地黃丸及瀉青丸相間服之春分後風熱也宜用羌活防風黃芩或瀉青丸導赤散下之立夏後熱也宜用三黃丸導赤散夏至後濕熱也宜用導赤散瀉黃散合而服之或黃芩人參木香之類秋分後用瀉白散立冬後用地黃丸主之謂腎不受瀉也

深古海
廣補錄
氏法

鎮肝丸瀉青丸去梔子大黃治肝虛 瀉腎丸治脈洪而實前熱地改生地山茱萸是也此治左手本部脈若右尺洪實以風髓丹瀉之此地黃丸即仲景八味丸去桂附若加五味子腎氣丸也此益肺之源以生腎水焉

禁忌

○慈幼論○人生十六歲已前血氣俱盛如日方昇如月

將圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之道不可不謹童子不衣裘帛前哲格言具在人耳裳下體之服帛溫煖甚於布者也裘皮服溫軟甚於帛者也蓋下體主陰得寒涼則陰易長得溫煖則陰暗消是以下體不與綿綿夾厚溫煖之服恐妨陰氣實為確論血氣俱盛食物異消故食無時然腸胃尚脆而窄若稠粘乾硬酸醃甜辣一切魚肉水菜濕麪燒炙煨炒俱是發熱難化之物皆宜禁絕只與熟菜白粥非惟無病且不縱口可以養德此外生栗味鹹乾柿性涼可為長陰之助然栗太補柿太澀俱為難化亦宜少與婦人無知惟務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病迨至成人筋骨柔弱有食則不能思口以自養居喪則不能食素以盡禮小節不謹大義亦虧可不慎歟至於乳母尤宜謹節飲食下咽

乳汁便通情欲中動乳脈便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘡則熱或為口糜或為驚搐或為夜啼或為腹痛病之初來其溺必少便須詢問隨證治母母安亦安可消患於未形也夫飲食之擇猶是小可乳母稟受之厚薄性情之緩急骨相之堅脆德行之善惡兒能速肖尤為關係古之胎教具在方冊愚奚多贅若夫胎孕致疾事起茫昧人多玩忽醫所不知兒之在胎與母同體得熱俱熱得寒俱寒病則俱病安則俱安母之飲食起居尤當慎密不可不知也

大凡小兒過煖生熱熱極生風提抱生瘧餵飼生癖最宜慎之
大喜後食乳食多成驚癇大哭後食乳食多成吐瀉
乳下小兒常多濕熱食積痰熱乃是傷乳為病小兒易

熱疹

怒肝病與脾病最多
脈亂不治 弦急氣不沉緩 傷食 促急 虛驚 浮風 沉細 冷

候兒脈當以大指按三部一息六七至為平和八九至為發熱五至為內寒脈弦為風癇沉緩為傷食促急為虛驚弦急為氣不和沉細為冷浮為風大小不勻為惡候為鬼祟浮大數為風為熱伏結為物聚單細為疳勞凡腹痛多喘嘔而脈洪者為有虫沉而遲潮熱者胃寒也溫之則愈訣曰小兒脈緊風癇候沉緩食傷多嘔吐弦急因知氣不和急促急驚神不守冷則沉細風則浮牢實大便應秘久腹痛之候緊而弦脈亂不治安可救變蒸之時脈必亂不治自然無過總單細疳勞洪有虫大小不勻為惡候脈沉而遲有潮熱此必胃寒來內寇瀉利脈大不可醫仔細酌量宜審究

又不拘五歲上下也

嬰兒未可方脈者俗醫多看虎口中紋顏色與四肢冷熱取之亦有可驗予作二歌紀之曰紫風紅傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃即困脾端又冷熱症歌曰鼻冷定知是瘡疹耳冷因知風熱證通身皆熱是傷寒上熱下冷傷食病若能以色脈參伍驗之所得亦過半矣

百日内不治症 發斑 臍風撮口 馬脾風 龜背 不治症目赤脈貫瞳人 胸腫及陷 鼻乾黑 魚口

氣急 吐虫不定 瀉不定精神不好 大渴不定止之 又渴 吹鼻不噴 病重口乾不睡 時氣唇上青黑點 頰深赤如塗胭脂 鼻孔開張 喘急不定

嬰兒病其頭毛皆逆上者必死 小兒病而胸膈 小兒病困汗出如珠者身不流者死 小兒病而胸膈

口唇枯乾目直視口中氣冷足與頭相低臥不舉身手足 四肢垂其臥正直如縛掌中冷皆死至十日不可復治之 病重面有五色不常不澤者死

生下胎疾 小兒物生氣絕不能啼者必是難產或胃寒所致急以 綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置爐炭中燒之 仍燃大紙條蘸油點火於臍帶下薰之蓋臍帶連兒火熏 時有火氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼 哭如常方可洗浴了即斷臍帶

百壽散小兒初生未滿月已裹用之者老無瘡疥 黃連 硃砂 右水煎令老母拭去口涎淨灌下餘藥傾盆中浴兒遍 身搽妙 又方淨黃連一錢水一盞預先煎下待兒生

未出聲時便用灌下以去腹中惡物臍屎兼解胎中蘊 積熱毒終身不生瘡又去臍風等病 胎實面紅目黑睛多者善笑胎怯面黃目黑睛少白睛 多者多哭更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也 胎肥者生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸瘦目 白睛粉紅色五心煩熱大便難時時生涎浴體法上之 天麻 蝎尾 硃砂 烏蛇肉 白礬 麝香 青黛 右研勻每用三錢水三碗桃枝一握并葉五七枝同煎 至十沸溫熱浴之勿浴背 胎怯者生下面無精光肌肉薄大便白水身無血色時時 哽氣多噦目無精采亦宜以浴法主之 母氣不足則瘦而肉薄父精不足則解頰眼白多 胎熱生下有血氣時時叫哭身壯熱如淡茶色目赤大便 赤黃糞稠急瀉乳浴法主之 小兒在胎時因母有熱或恣食酒麪熱毒之物傳於胎 中令兒生下面赤眼閉身體壯熱哭聲不止口熱如湯乃 胎熱之候也宜生地黃湯 生地 赤芍藥 川芎 當歸 瓜蒌根 右件等分咬咀每服半兩水一盞煎六分產婦亦可服 以此抹入兒口中 凡胎熱服藥不可求速效治法當釀乳漸解之若處以涼 藥攻之必損脾胃加以嘔吐乃成大患宜服生地黃湯用 釀乳 小兒胎中有寒生下不能將護再傷於風其候面 色青白四肢逆冷手足顫動口噤不開乃胎寒之故或寒

胎毒
氣乘虛入臟作腹疼盤腸內疝胎毒治法見其腹痛處
回月裏生驚急取猪乳細研辰砂牛黃各少許調抹口中

神效乳母服防風通聖散三劑其驚自消

治小兒未滿月驚搐似中風欲死者用辰砂以新汲水濃磨汁塗五心上最效

治胎癩驚風皆可服全蝎頭尾全者用生薄荷葉包外以麻線纏火上灸燥為末別研生硃麝香各少許煎麥門冬湯調下

胎毒

小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如柏汁乳食不思啼叫不止此胎黃之候凡有此症乳母宜服生地黃湯仍忌酒麪五辛之物

胎毒

木瓜丸治小兒生下吐者因兒初生下拭口中穢惡不盡咽入喉中故吐木瓜丸主之凡初生急須拭掠口中令

入醫學綱目卷三三

九

淨若啼聲一發則咽下多生諸病矣

木瓜

麝香

臘粉

木香

檳榔各等分

右同研細末麪糊丸如小黃米大每服一二九甘草水下無時

月裏生嘔先用硃砂丸下之如利後用硃沉煎膠其邪氣使穢物自下而不嘔也

胎毒

月裏生赤肌膚如赤丹塗者先用牛黃散托裏續用藍葉散塗外乳母服清涼飲子三大劑

右小兒初生下月裏諸疾蓋胎毒之淺者若一二歲後所生之疾乃胎毒之深者宜權法治之

胎毒

李叔和一日問東垣曰中年來得一子至一歲後身生紅絲瘤不救後三四子至一二歲皆病瘡而死敢問何也

曰予試思之翌日見叔和曰吾得之矣汝腎中伏火精

多有紅絲以氣相傳生子故有此疾遇觸而動發於肌肉之間俗名胎瘤是也汝試視之果如其言遂與滋腎丸數

服以瀉腎中火邪補天真之不足忌酒肉辛熱之物其重以六味地黃丸養其陰血受胎五月後以白朮黃芩二味

作散與服後生兒至三歲前症不復作矣叔和曰先生乃神醫也遂從受學其子今已年壯矣

胎毒

丹溪補遺謂小兒心氣鬱而多瘡疽由胎食過而受毒此至論也小兒識見未萌欲想未動心氣何鬱先哲謂乳下

小兒常多濕熱與胎食過而受毒又有成胎之時父母氣血有寒熱之偏多能致子之病况形體未堅完膜尚脆

嫩何為畧而未論向見一人連年疔病新愈而成一男生來三月病熱右腋下陽明少陽之間生一瘡甫平左腋下

入醫學綱目卷三六

十一

相對又生一瘡膿血淋漓無復生意醫者王壽甫以四物湯敗毒散加參以香附為佐犀角為使大料飲乳母兩月

而安踰三月忽腹脹生赤疹如霞片取剪刀草汁調晚吞沙傳之隨消半月脹移入胞囊為腫黃瑩可畏越兩日囊

裂開兩九顯露出清水以紫蘇葉承熨細末托之旬餘而合夫以父之久病其母寧無憂鬱之火與疔之餘熱毒

致此亦不可不知

胎毒

張進士次子二歲滿頭有瘡一日瘡忽自平遂患痰喘予視之曰此胎毒也慎勿與解利藥眾皆愕然予又曰乃

母孕時所喜何物張曰辛辣熱物是其所喜因口授一方人參連翹川芎黃連甘草陳皮芍藥木通濃煎湯入竹瀝

與之數日而安何以知之見其精神昏倦受病特深決無外感非胎毒而何 予之次女形瘦性急體本有熱懷孕

三月適當暑口渴思水時發小熱遂教以四物加薑茶
陳皮生甘草木通因懶於煎煮數貼而止其後生子二歲
瘡疾遍身忽一日其瘡頓愈遂成痰瘡予曰此胎毒也瘡
若再作病必自安已而果然若於孕時確守前方何病之
有

胎毒
鄭廉使之子年十六初生七箇月患淋病五七日必一
發其發則大痛水道狀如黍如粟者約一杯許然後定診
其脈輕則澁重則弦視其形瘦而長其色青而蒼意其父
必因多服下部藥遺毒在胎留於子之命門而然遂以紫
雪和黃柏末九桐子大晒極乾熱湯下百丸以食物壓之
又半日痛大作腰連腹水道乃行下如黍如粟者一大碗
許其病減十分之八後又與陳皮一兩桔梗木通各半兩
作一貼與之又下如黍粟者一合許而安父得燥熱且能

病子况母得之者乎予書此以證東垣紅瘤之事此亦熱
在血分也

胎毒
陳氏女八歲時癩病遇陰雨則作遇驚亦作口出涎沫聲
似羊鳴予視之曰此胎受驚也其病深痼調治半年亦可
安仍須淡味以佐藥功與燒丹丸繼以四物湯入黃連隨
時令加減半年而安燒丹丸方原本未考按類萃用玄精
勻入寒食漿一錢滴水和成餅餅各一分再研細滴水和
丸如米大一歲五九二歲十九溫水送下
取下惡物為度未知是否

肝主風	角弓反張	搖頭	偏風
驚搐	驚癇	天弔	眼目
雀目疳瘡	赤眼	通睛	偏墜
陰腫囊腫脫囊	疝氣	小便不通	
淋病	遺尿	喉痺	

肝有風目連翳不搖有熱則直視亦不搖得心熱則搖
治肝瀉青丸治心導赤散 凡病或新或久皆引肝風風
動而上於頭目目屬肝風入於目上下左右如風吹不定
兒不任故目連翳也若熱入於目牽其筋脈兩皆皆緊不
能轉視故目直視也若得心熱則搖其子母俱有實熱風
火相搏故也治肝瀉青丸治心導赤散

角弓反張
補腎地黃丸治肝瀉青丸
丹溪云瘧比癩為虛宜帶補多是氣虛有火兼痰用人參
竹瀝治之不用兼風藥此論實發前人所未發湯氏雖云
瘧候十無一生蓋未嘗有此法施於人也

三壯
身軟時醒者為癩身強直反張如弓不時醒者為瘧瘧
候十無一生

搖頭
肝風搖頭諸方不載鄭都丞子患七年搖頭三年下血
已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作
痢或作腸風百藥無效予既視其病又知其詳亦不明其
標本退而思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木盛而
脾上為木所克脾與肺是子母俱為肝所勝而血遂漬於
大便故便血不止遂處一方但損肝祛風而益脾初亦一
時之見只效服而愈十餘日後血止而白膿遂得以安

犀角屑	甘草	瓜蒌根	蛇退皮
防風	釣藤	麻黃	黃芪

羌活 白芍藥各半

右為末東兩丸食後薄荷湯下只二服作效頭搖即止便血隨愈次間服胃風湯數日頓除沈舍人子服之亦

驗

食療云蛇脫皮主去風邪明目治小兒一百二十種驚癩寒熱痔瘡毒安胎藥用 治癩弄舌搖頭者宜用全脫

偏風

全蝎散治小兒驚風中風口眼喎斜言語不正手足偏廢不舉

全蝎去毒炒 僵蚕直者炒 川芎 黃芩去心

甘草 桂枝 赤芍藥 麻黃去蘆各

大麻六錢 大南星湯泡七次去皮切焙乾五錢

右為籠末每服三錢水一鍾半薑七片煎七分溫服無時量大小與之一日三四服忌羊肉

驚搐

按驚搐一也而有晨夕之分表裏之異身熱力大者為急驚身冷力小者為慢驚仆地作聲醒時吐沫者為癩頭目

仰視者為天弔角弓反張者為痙而治各不同也

法 藏府旺時補瀉

潮熱發搐在早晨寅卯時者此肝用事之時也身體壯熱目上視手足動搖口内生熱涎項頸強急此肝旺也

當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸潔古云木之位肝旺也

因潮熱發搐在巳午未時者此心用事之時也心惕目上視白睛赤色牙關緊急口內涎生手足動搖此心旺也當

補肝治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸潔古云火之位心熱也

廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢謂父二大王曰七使潮熱將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿

言八使病錢曰八使邇來日午間即無苦也次日午前果作搐急召錢治之三日而愈蓋預見其目有視而頤赤必

肝心俱熱更坐石杵子乃欲就冷此熱甚也又肌膚素肥盛而本質其脈急促故發搐尅言午時者自寅至午皆心

肝用事之時治之乃瀉心肝補腎自安矣

因潮熱發搐在申酉戌時者此肺用事之時也不甚搐而喘目微斜視身熱如火睡露睛手足冷大便淡黃水是肝

旺當補脾益黃散治肝瀉青丸治心導赤散潔古云脾病則然木賊宜先瀉心肝以泄其熱而後補脾為常

徐氏子三歲病潮熱每日西則發搐身微熱而目微斜露睛四肢冷而喘大便微黃請錢與李同治錢問李曰病何

搐也李曰有風何身熱微溫曰四肢所作何目斜睛露曰搐則目斜何肢冷曰冷厥心內熱曰何喘曰搐之甚也曰

何以治之曰涼驚丸鼻中灌之必搐止錢又問曰既謂風病溫壯搐引目斜露睛內熱支冷及搐甚而喘併以何藥

治之李曰皆此藥也錢曰不然搐者心肝實也身微熱者日西肺用事之時也肺主身溫今且熱者肺虛也目微斜

露睛者肝肺相乘勝也四肢冷者脾虛也肺若虛甚則脾母亦弱木氣乘脾四肢即冷治之當先補脾肺用益黃散

阿膠散得脾虛症退然後治其心肝以瀉青丸導赤散涼驚丸治之九日愈

因潮熱發搐在亥子丑時者此腎用事之時也不甚搐而臥不穩身體溫壯目睛斜視喉中有痰大便銀褐色乳

食不消多睡不省當補脾治心補脾益黃散治心導赤散涼驚丸潔古云皆因大病後脾胃虛損多有此疾

傷風發搐因傷風後得之口中氣出熱呵欠頓悶手足動

搖當發散大青膏主之小兒生來怯弱者多此病也大青膏力

傷風發搐因傷風而得之症同大人傷風寒痰之類常

辦有汗無汗陰陽二症用大青膏小續命之類開發則愈大青膏陰症小續命陽症也

傷寒發搐因傷食後得之身體溫多睡多睡或吐不思

乳食而發搖當先定搐搦退白餅子下之後服安神丸

傷食發搐謂不因他症忽然而搐此因飲食過度致傷

脾胃故兒多睡多吐不思飲食脾胃既虛引動肝風則發

搐當先定其搐加羌活防風煎下瀉青丸後用白餅子下

其食漸漸用調中九異功散養其氣

百日內發搐真者不過兩三次必死假者類發不為重

真者內生驚瀾假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃

發搐也欲知假者口中氣出熱治之可發散大青膏主之

及用塗額浴體法 李司戶孫百日病來搐三五次請眾

醫治或作大甲或作胎驚或作驚癇皆無應者後錢氏用

大青膏如荳許一服發之復與塗額法及浴體法三日而

愈何以然嬰兒初生肌骨嫩怯一被風傷遂不能任故發

搐也然類發者輕以客風在內每遇不任即搐輕則易歇

故發頻也搖稀者是內臟發病不可救也類搐者宜散風

冷故用大青膏亦不可多服蓋見至小易虛易實多即生

熱止宜用下塗額法

麝香字一 蝎尾去毒為薄荷字 蜈蚣各一

牛黃字一 青黛各一 右同研末用熟蜜肉劑為膏新綿帛上塗勻貼額上四

旁可出一指許火上炙手頻慰百日裏外兒可用此塗

顛法

外物驚宜鎮平之以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水

石丸黃連安神丸黃連安神丸見燥條

按外物驚者元氣本不病故治以黃連安神之苦寒氣

動驚者不因外物驚元氣自有病故治以寒水石安神

之甘寒也

鎮心丸涼心經治驚熱痰盛

甜硝白者 人參一兩 甘草炙 寒水石兩半

山藥白者 白茯苓二兩 硃砂一兩 龍腦

麝香各一錢 凡急慢驚陰陽異證切宜辨而治之急驚合涼瀉慢驚合

溫補

右急驚症屬木火土實也木實則搐而力大目上目劄

所謂木太過曰發生其動掉眩顛癇是也火實則身熱

面赤土實則不吐瀉睡合睛故其治法合涼瀉而用涼

驚丸利驚丸之類慢驚症屬木火土虛也木虛則搐而

力小似搐而不甚搐經所謂木不及曰委和其病搖動

注恐是也謂手足搖動腹注泄心恐悸也火虛則身冷

口氣冷土虛則吐瀉睡露睛故其治法合溫補而用羌

活膏益黃散有熱者用東垣黃芪益黃散其東垣非錢

氏羌活膏治慢驚者謂土虛泄瀉火木乘之謂手掌與

腹俱熱之症若火木土俱虛而搖動恐悸注瀉手腹冷

者非羌活膏不能治之

急驚主痰熱當涼瀉之只用降火下痰養血之藥 慢

驚主脾虛所以多死先實脾土後散風邪只用硃砂安神

丸更於血藥中求之如四君子東垣

前代益黃散散藥用

大黃

芒硝

急驚因聞大聲或大驚而發搐過則如故此無陰也當

下利驚丸主之 小兒急驚者本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤則發搐蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚丸主之以除其痰熱不可用巴荳及溫藥大下之恐搖虛熱不消也小兒熱痰客於心胃因聞大聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不聞聲及驚亦自發搐

急驚者陽症也俱肺受病熱痰客於心肺是少陽相火旺經云熱則生風因聞大聲而作蓋謂東方震卦得火氣而發搐火本不動煽得風而動當用利驚丸導赤散瀉青九地黃九指止宜服安神丸

急驚內有熱即生風又或因驚而發則目上連劄潮延搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故

此急驚症也當其搐勢漸減時與鎮心治熱之藥一二服如麝香丸鎮心丸抱龍丸辰砂丸紫雪之類候驚勢已定須更以藥下其痰熱如利驚丸軟金丹桃枝丸之類利下痰熱心神安寧即愈

大黑龍丸治小兒急驚神效方見後急小黑龍丸治小兒急驚輕者

青礞石 青黛 蘆薈 膽星 右為極細末甘草湯為丸如鷄頭大每一丸薑蜜薄許湯下

右二方礞石膽星瀉濕痰之劑為君痰多者宜之

草龍膽 防風 青黛 龍腦 黃連末 牛黃 麝香

右為細末麴糊為丸如粟米大每服一二十九金銀泡湯下之

治陽癇即急驚風

珠砂 臍粉 麝香 蘆薈 白附子 甘草 胡黃連 蝎稍 蠶 右為末二歲已上服半錢七金錢薄荷湯調下三歲一錢七如口不開灌入鼻中

利驚丸

輕粉 天竺黃 青黛 黑牽牛 右同研蜜丸豌豆大一歲一丸溫薄荷湯下食後服海藏云涼驚溫驚利驚自有分別南星胭脂輕粉青黛色味各有輕重

鎮肝丸治小兒急驚風目直上視抽搦昏亂不省人事是肝經風熱也

天竺黃 生地 當歸 竹葉 草龍膽 川芎 大黃 羌活 防風 右為細末煉蜜丸如雞頭大每服二九沙糖水化下先服此後服天麻散

右五方瀉肝木之劑為君前二方輕劑通用後三方峻劑必脈有力血氣實者宜之又聞氏所謂候搐勢定下其痰熱之類是已

五福丸治急驚風生蚯蚓一條研爛入五福化毒丹一丸再研如泥煎薄荷湯少許調化旋灌量兒大小加減服之無不效者

五福化毒丹治驚熱涼心膈

生地

熟地各五兩

天門冬

麥門冬各五兩

三

甜硝

玄參

甘草各二兩

青黛一兩

右上下六味為細末後研入硝黛煉蜜丸如鷄頭大每服

半丸或一丸食後熱水化下

安神丸治法

鎮心丸治法

右三方甘寒瀉火之劑為君小兒血氣虛而急驚者宜之又潔古閣氏所謂候搐止勢減宜安神鎮心之類是

已

慢驚因大病後或吐瀉或只吐不瀉變成脾胃虛損遍

慢驚方

身冷身冷口鼻氣出亦冷手足時瘳瘳昏睡露睛此無陽也括

參湯王之

慢驚者陰證俱賦受病蓋小兒吐瀉病久脾胃虛損若不早治則成慢驚名曰瘳瘳似搐而不甚搐也因脾胃虛

損故大便不聚當去脾胃風先用宣風散導之後用益黃

散史君子九平之則其利自止既已失治則脾胃俱虛致

被肝木所乘是為慢驚當用溫補羌活膏主之

東都王氏子吐瀉諸醫用藥下之至虛變慢驚其候昏

睡露睛手足瘳瘳而身冷錢曰此慢驚也與瓜蒌湯其子

胃氣實即開目而身溫王疑其子不大小便令諸醫以藥

利之醫留八正散等數服不利而身復冷令錢氏利小便

錢曰不當利小便利之必身冷一二日果身冷矣因抱出

錢曰不能食而胃中虛若利大小便則脾胃俱虛當身冷

而閉目即死今幸胎氣實而難衰也錢氏用益黃散史君

子九四服令微能飲食至日午果能飲食所以然者謂利

大小便脾胃虛寒當補脾不可別攻也後又不語諸醫作

失音治之錢曰既失音何開目而能飲食又牙不緊而口

不燥也諸醫不能曉以地黃補腎錢曰此因用涼藥利小

便致脾胃俱虛今脾胃實腎尚虛故補腎必安治之半月

而能言一月而痊

瓜蒌湯

瓜蒌湯

瓜蒌二錢 白甘遂末一錢

右同於慢火上炒焦黃研勻每服一字麝香薄荷湯調

服

右瓜蒌湯錢氏治慢驚法脈有力者宜用蓋濕痰積於

膈中使風火不得開發而身冷故用瓜蒌湯切去濕痰

使風火得伸而身溫搐止若脈無力者不宜用之便當

補脾及溫白丸羌活膏之類

青州白九子治小兒驚風大人諸風

半夏七 南星三 白附子二 川烏半

右為末以生絹袋盛井花水攪出如未出者更以手揉

出如有滓更研再入絹袋攪盡為度於磁盆中日晒夜

露至曉撇去舊水別用井花水攪又晒至來日早再攪

新水攪如此法春五日夏三日秋七日冬十日去水晒

乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸菜豆大每服三

五丸薄荷湯下攤風酒下並無時

錢氏異功散溫中和氣治吐瀉不思食方見吐

驚帝手足瘳瘳睡臥不穩四君子加全蝎去尾尖毒炒

鈞藤白附子炒等分同煎方見治 脾胃虛弱生風多困

四君子加炒半夏麩沒石子等分為細末入冬瓜子少許

同煎服

溫白丸治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷疝洞利及因吐瀉或久病成慢驚癆瘵

天麻生半 白殭去毒 白附子生 天南星炮

右為末湯浸寒食麪為丸如其重大仍於寒食麪中養七日取出用每服五七九至二三九空心生薑米飲下量病勢漸加丸數服之寒食麪謂寒食日煮麥 釣藤飲子治吐利脾氣弱虛風慢驚

釣藤分三 蟬殼 防風去 人參去 麻黃去 白殭去毒 天麻 蝎尾去毒 甘草炙 川芎分 麝香分 一方有蜈蚣 三箇去頭足炙黃 右為末每服二錢水一盞薑三片煎六分溫服量多少

與之寒多者加附子半錢服無時

羌活膏治脾胃虛或吐瀉後為慢驚者亦治傷寒無不效

防風去 川芎 人參去 白附子炮 赤茯苓去皮 天麻兩 白殭去毒 乾蝎炒 白花蛇酒浸 川附子炮 麻黃去毒 肉苳蔻 沉香 母丁香 藿香葉 木香錢二 輕粉 真珠末 牛黃錢半 龍腦半 麝香 辰砂 雄黃各一錢 羌活兩 右為細末煉蜜作劑旋丸如葶大每服一二九食前服或薄煎湯或麥門冬湯化下胃熱急驚勿服性溫故也 返魂丹治小兒諸癇潮發癆瘵口眼相引項背強直牙關緊急目直上視及諸病久虛變生虛風多睡者因在

再不解速宜服之在蘇柔

烏犀二兩 水銀半 天麻酒洗 檳榔各半 殭蚕去毒 硫黃半兩 研末入水銀置磁石盞

白附子炮 川烏炒 獨活去 乾蝎炙 草解炒 肉桂去 當歸酒浸 細辛根 防風去 天南星薑汁 阿膠碎 藿香土 烏蛇酒浸 沉香 槐膠 羌活

白花蛇酒浸 麻黃去 羚羊角絲 陳皮去 木香 人參去 乾薑炮 茯苓去 蔓刺子皮 晚香炒 敗龜板酒 桑螵蛸炒 白芷 烏梅去 虎骨酒浸 砂仁 厚朴去 川芎 附子去 龍腦另 雄黃研 膩粉另 麝香另 烏雞酒 狐肝三 右藥五十八味炮製如法煉密合和搗三五千下丸如

右關氏宗錢氏治慢驚法脈無力者宜之其法以青州白丸子兼異功散羌活膏溫白丸釣藤飲子之類服之至有性往死中得生者今如其法又增入海藏四君子法次於異功散之後返魂丹次於羌活丸膏之後相參用之也

凡吐瀉成虛風慢脾先用奪命散青州白丸子末煎如稀糊入蜜調控下涎後服祛風醒脾等藥

奪命散方見後通治

治虛風八仙散風盛者服之

白天麻 白附子 花蛇肉 防風

南星 半夏 冬瓜子 全蝎各等分

加川烏

右吹咀每服一錢水半盞薑二片葱半枚煎二分熱服加薄荷尤佳

醒脾散昏困者服之

白木 人參 甘草 橘紅

茯苓 全蝎各半 半夏 木香各一

白附子炮四兩 南星炮四兩 陳倉米二兩 木香半兩 加薄荷

錢亦

右為末每服一錢水半盞薑二片葱半枚煎二分漸漸服之不可頓服頓服必吐

釀乳方

人參 木香 藿香 沉香

橘皮 神麴 麥芽各等 丁香半

右吹咀每服四錢水一椀薑十片紫蘇十葉葱三枚煎至半椀乳母食後須去乳汁盡方取服之即仰臥霎時

令藥入乳之絡次令兒吮數口不可過飽此良法也如

嘔定一日急宜截風服八仙散兩日後宜醒脾散如前

件藥俱用不效危困可憂須診太衝脈未絕者當灸百

會一穴前後髮際兩耳尖折中乃是穴也方書所載但

云頂上旋毛中疎不密有雙頂者又有旋毛不正者庸

醫之輩習循舊本快人多矣灸後即當控涎用青州白丸子末再煎如稀糊入煉蜜調奪命散良久涎下細研靈砂米飲調旋抹口中漸看退證如風盛服八仙散昏困服醒脾散常令減乳乳母服釀乳藥如此調理無不愈者間有稟受不堅五行數短者雖神聖功巧不能奪其造化矣 若涎已離隔但在喉中如鋸藥不能入又不可控當用別法擦之兼搐鼻噴嚏得出次服奪命散庶免再作

擦痰方

川烏尖 白附尖各七箇去皮生用 蝎梢七枚

石綠炒

右為末一處和勻用軟雞翎蘸藥入喉中逐漸抽出頻用帕子拭之

錢亦

右湯氏治慢驚法先用奪命散白丸子控涎候涎下一

回用八仙醒脾等一回令乳母用釀乳法如危極者却

灸百會及擦痰法但奪命用礞石氣虛者難用必與東

垣益黃散相兼服之可也

陳氏治慢驚風先服芩蝎散用手法幹出寒痰冷涎自不

痴呆次服油珠膏 後服益真湯溫壯元氣 時服前朴

散寬上實下

芩蝎散治小兒腦髓受風顛顛開解皮肉筋脈急脹腦骨

縫青筋起面少血色或腹中氣響時便青白色沫或嘔吐

痰涎欲成慢驚搐足脛冷者

川芎兩 細辛錢二 藜蘆兩 半夏酒浸

右細末一週兒抄一銅錢用數沸湯調稍熱飢服 如

痰滿胸喉中眼珠斜視速與服若目上直視不轉睛者難救或痰氣壅塞不能嚥藥用一指於兒喉嚨膠中探入就幹去痰涎氣稍得通次用補脾益腎湯或以油珠膏選用此方累世活人多矣

油珠膏治氣逆嘔吐風痰作搐

石亭脂煉黃中揀取 滑石半兩 黑附子炮去
如麻者五錢 南星 醋浸一宿 洗七
半夏 酒浸一宿 洗七

右細末每服一錢用冷清薑汁半盞滴麻油一點如錢抄藥在油珠上須與墜下却去薑汁與兒服之更用清薑汁三五口嚥下肚飢服服訖後一時方與乳食

補脾益腎湯治胎弱吐乳便清而成陰癩氣逆涎潮眼珠直視四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚誤服涼藥所作

木香 當歸 人參 黃芪

丁香 訶子 陳皮 厚朴
 甘草 肉蔻 藜蘆 草菓 茯苓

白木 桂枝 半夏 附子
加炒每服一枚 湯 炮各

右咬咀每服三錢水一盞半薑一片棗一枚煎六分稍熱飢服服訖令揉心腹以助藥力候一時方與乳食渴者加茯苓人參甘草去附子丁香肉蔻 瀉者加丁香訶子肉 嘔吐加丁香半夏陳皮 腹痛者加厚朴良薑 咳嗽加前胡五味子去附子官桂草菓肉蔻 足冷加附子丁香厚朴 惡風自汗加黃芪官桂 痰喘加前胡枳實赤茯苓去附子丁香肉蔻草菓 氣逆不下加前胡枳殼檳榔去當歸附子肉蔻 腹脹加厚朴丁香前胡枳殼

前朴散治心腹結氣或嘔噎吐瀉腹脹痛驚悸

前胡 白木 人參 陳皮
 良薑 藿香 甘草 厚朴

右到每服三錢水一盞煎七分稍熱空心服

小兒誤服涼藥或用吊蘸水繳口因此傷動脾胃或泄瀉或腹脹或腹中響 小兒面少血色常無喜笑不看上而視下 小兒顛顛高急頭縫青筋時便青黃 小兒肥壯糞如清涕或如凍汁 小兒時時扎眼蓋便青白沫有時乾硬 已上五症忽然嘔吐者必成陰癩俗謂慢驚是也 小兒頭熱眼珠青白而足冷或腹脹而足冷或瀉而足冷或嘔而足冷或渴而足冷 諸症無不效也 已上五症忽然吐而作搐者名曰慢脾風速與補脾益腎湯一服三錢重加蝎一枚如因驚而搐者前朴散一服三錢重

加附子前胡各半錢同煎

右陳文忠治慢驚法其治之次第自成一家故另錄之以備採用其醫案所言等蝎散油珠膏累取效

治慢驚神效一用一粒丁香一箇蝎一字辰砂一點血已上俱為末男用男左手中指血女用女右手中指血蘸末擦唇上愈

醒脾丸治小兒慢脾風因吐痢後虛困昏睡欲生風癩

厚朴 白木 硫黃 官桂
入豆腐中 三五沸

天麻 全蝎 防風 官桂
人參各一錢

右為細末酒浸蒸餅和丸如鷄頭大每一九搥碎溫米飲下 蝎梢丸治小兒胎虛氣弱吐痢生風昏困嗜臥或潮搐

全蝎微炒 白附製裂各 硫黃 半夏洗七次

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十九粒芥湯下量兒大小加減服之

世小兒慢驚風身冷瘵癢

天麻 防風 川烏 全蝎去翅足
炮 南星 等分水煎服

湯氏治慢驚

真川烏一枚去 全蝎等

右二件吹咀分二服水二盞薑十片煎半盞旋滴入口中

陰癩即慢驚風

黑附子生去 南星 半夏各二 白附子半

右研細井水浸七日每日換水浸訖控乾入硃砂二錢麝香一錢研勻每服一字薄黃湯調下量兒加減一方

用黑附子生去皮膠為末每服二錢以水一盞半生薑二片煎至半盞分二服量兒加減吐者入丁香五箇同煎空心服或水浸炊餅為丸如粟米大每服二十九生薑湯下亦可

回生散治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風成慢驚大南星重八九錢已上者用地坑子一箇深三寸許用炭火五斤燒紅入好酒半盞在內然後入南星却用炭火三兩條蓋在地坑上候南星微裂取出剉碎再炒勻熟不可稍生放冷為末每服半錢濃煎生薑防風湯調下

又方梓朴散

厚朴 半夏湯洗七次薑汁浸

右米泔三升同浸一百刻水盡為度如百刻水未盡少加大火熬乾去厚朴只將半夏為末每服五分或一字薄苛湯調下無時

豈卷散治小兒慢驚多因藥性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱症者有因病愈而致熱症者有反為急驚者甚多當問病幾日因何得之曾以何藥療之可用解毒藥無不效宜此方

大豆黃卷水浸黑豆生 管仲 板藍根
甘草各

右為末每服半錢水煎服甚者三錢藥水內入油數點煎又治吐虫服不拘時

右諸家雜治慢驚其首一方用人血燕藥末擦唇者甚效後一方解藥太過之毒尤見錢氏憂人之切也

驚兒瀉青色先鎮平以硃砂之類勿用寒涼之藥大禁涼驚丸蓋風木旺必克脾土當先實其土後瀉其木其風木旺症右關脈洪大掌中熱腹皮熱者是也今立一方黃芪益黃散主之人參甘草黃芪各等分此三味皆溫能補脾土益元氣甘能瀉火內經云熱淫於內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒能瀉火酸能瀉肝木而大補肺金所補得金土之位大旺則火虛矣風木何由而來尅土然後瀉風木之旺脾虛者以火邪乘其土位故也故曰從後來者為虛邪火旺能實其木木旺故來尅土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒補金以酸涼故致脾土中金旺火衰則風木自虛矣

黃芪益黃散治胃中風熱

黃芪二錢 人參錢 甘草生五分 白芍藥七

陳皮不去白 黃連炒 白茯苓分

右為食末每服水二匙煎五沸去渣溫服

四 治小兒驚而有熱者

人參 茯苓 白芍藥酒 白朮

右入生薑煎服暑月加黃連生甘草竹葉煎服

陳明遠治小兒驚因脾虛肝乘之手足搐動四肢惡寒而食少

白朮錢 茯苓錢

右煎湯入竹瀝熱下龍膏九二十九保和九二十九

五 奪命散大能捺風涎不問急慢驚風痰潮壅盛塞於咽喉其辨如潮名曰潮涎百藥不能過咽命在須臾但先用此藥入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也

青礞石一兩入此窩子同搗一兩炭火煨
通紅須消盡為度候冷如金色取用

右為細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自然汁入蜜調微溫服之良久其藥自萎痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱祛風散驚等藥慢驚風亦以痰涎潮上塞住咽喉藥食俱不能入醫者技窮勢迫以待其盡但用此藥以青州白丸再研為末煎如稀糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服花蛇川烏全蝎蜈蚣等藥

大黑龍丸治小兒急慢驚風神效

膽星 礞石研各 天竺黃 青黛各半
蘆薈二錢 辰砂 蜈蚣燒灰 殭蚕五

右為末甘草汁為丸如鷄頭大每服一九或二九薑蜜薄許湯下如慢驚用桔梗白朮湯下

續驚丸

琥珀半 青黛半 辰砂二錢 天竺黃二

天麻兩 真珠母二錢 蘆薈 紫胡各半

青皮 甘草各半 膽星二 雄黃半

乳香兩 青礞石兩

右為末甘草湯九如鷄頭大慢驚參末湯下急驚薄許薑蜜湯下

小兒急慢驚風

全蝎四十九箇 辰砂半兩研極

右取蚯蚓十條洗淨入小瓶內以濕火煨蚯蚓化為水和九如胡椒大每三九用順流水化服下

小兒急慢驚風

殭蚕三 辰砂豆大 全蝎箇 真珠末撮

右末取蓬蒿中小虫兒每箇研作一九如麻子大每

一粒用乳汁下

保命丹治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口噤涎不止

虎睛一對安瓦上以龍 珠砂兩 全蝎兩

天麻一 蜈蚣二條去頭 麝香半

右為細末煉蜜九如大莖大瓦罐貯之又入腦麝定急驚薄許蜜湯化下慢驚薄許湯化下各三九

溫驚丸一名粉

南星為末入膽月牛膽中 硃砂一錢 天竺黃一

埽子脂半錢 龍腦五分

右用牛膽汁和丸如雞頭大每服一九小者半九沙糖水下

抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣急風執痰壅喉驚風潮搐及盛毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時與服之

抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣急風執痰壅喉驚風潮搐及盛毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時與服之

丹溪云抱龍丸
心肝藥也

南星如無牛膽者只將生天竺黃一雄黃水

辰砂另研各麝香另研

右為細末煮甘草膏和丸皂莢子大溫水化下百日小

兒每丸分作三四服五歲兒一二九大人三五丸亦治

室女白帶伏暑用鹽少許嚼一二九新汲水送下臘月

雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿水或新水浸南星三

日候透煮軟三五沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄

切焙乾炒黃色取末八兩以甘草二兩半拍破用水二

碗浸一宿慢火煮至半碗去渣漸漸傾入南星末內慢

研令甘草水盡方入餘藥

奪命散治急慢驚風諸藥不效此藥隨手奏功

白附子炮去皮臍半南星炮一

天麻錢辰砂另研二防風半夏各半

全蝎去毒蜈蚣錢麝香半僵蚕炒慢驚

右為末三歲兒半錢薄荷生薑自然汁加好酒沸湯各

少許調服急驚加輕粉腦子各少許

治慢驚甚驗

赤脚蜈蚣酒塗炙白僵蚕炒七辰砂另研

全蝎用薄荷葉青州白丸子三十

右為末入麝香少許慢驚人參麥門冬湯調下急驚加

腦子半黃各少許金銀薄荷湯調下

天麻散治小兒急慢驚風及大人中風涎盛半身不遂

言語艱澀不省人事

半夏錢天麻二錢甘草炙茯苓

白朮錢三

右用水一盞入磁罐內煮令水乾將老薑三錢同煮候

乾為細末每服一錢五分薑湯調下

治驚風墜涎天南星一箇重一兩者換酒浸七伏時取

出新瓦上炭火炙乾烈地上去火毒搗末入硃砂一分研

為細末每服五分荆芥湯空心及午時各調下一服

天麻防風丸治小兒驚風身熱喘滿多睡驚悸搐掣神

昏涎痰不利等症

天麻 防風 人參各一 蝎尾去毒

甘草 硃砂 雄黃 牛黃

麝香各一 僵蚕炒半

右為末煉蜜丸如櫻桃大硃砂為衣每服薄荷湯下

二九

七味羌活膏治急慢驚風壯熱

羌活 獨活 天麻 全蝎去毒

人參 僵蚕炒各 烏蛇肉酒浸一宿

右為末煉蜜丸如皂子大每兩作五十九丸每服一九荆

芥湯下

治小兒驚風全蝎一錢不去頭尾用薄荷葉裹炙乾同

研為末作四服湯下

治小兒驚風僵蚕蝎稍等分天雄尖附子尖共一錢炮

過為末每服一字薑湯調下

小兒驚風釀乳方用白羊頭一箇丁香同熬至熟乳母

空心盪食之

孫女因胎中受濕熱日午發搐昏黑面青每月作一次

未半週難與藥且釀乳飲之

白朮 陳皮 半夏 芍藥

青皮各五 人參 川芎 木通各三

黃連 甘草

右分八服薑五片與乳母煎服

瘵積

小兒急慢驚風發熱口瘡手足伏熱痰熱喘痰嗽並用

涌法重劑用瓜蒂散輕劑苦參赤小豆末酒酸壅汁調服

之後用通神散蜜丸服之間以桑牛陰乾研末調服以平

其氣

福銀丸治小兒急慢驚風積滯

青黛 水銀一皂角子大同 寒食麩

黃明膠 炒焦為末 輕粉炒豆 雄黃

粉霜 硃砂略一 巴豆 一粒 腦麝粉

右研細滴水為丸如麻子大捏扁曬乾金盛之一歲

一丸隨意加減煎寒子湯送下不得化破

治急慢驚風乳香其遂各半兩同研細每服半錢用乳

香湯調下或用童便調下尤妙

右二十方通治急慢驚風蓋謂虛實兩見急慢互出故

有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於痰故礞石

星半之屬通能治之者也分而言之礞石之屬瀉痰青

黛之屬瀉木硃砂之屬瀉火皆治氣實之劑參茸之屬

補土天麻全蝎之屬補木烏附之屬補火又皆治氣虛

之劑故補瀉兼施虛實通治之法也

小兒驚風御孫養燒存性碗覆出火毒生蜜調灌少許

心神不安四君子加辰砂半分寒湯調下 又有一症

欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當用發散藥

驚風或泄瀉等症煩渴者皆津液內耗也不問陰陽宜

煎錢氏白朮散使滿意取足飲之彌多彌好

急慢驚 印堂 急驚風

急驚 支正 下厥 小兒慢驚風灸尺澤二穴 各七壯

如小麥大 睡中驚掣 屬允壯 睡中驚目不合灸

屈肘橫紋上三壯

咬呀甚者發驚 目赤面青身反折者生驚

呵欠面青者驚風 呵欠面黃者脾虛驚

目赤兼青者發驚

驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右

視無聲左視有聲相勝故也更有發時症流古曰男為木

聲右視金位相擊則有聲女為金故右

聲左視無聲左視木位亦相擊有聲

李寺丞子三歲發搐自卯至巳目右視大叫哭錢見曰此

逆也男為陽本發左視無聲則順右視有聲則逆所以然

者左肝木也右肺金也逆則二臟相戰金木相擊而有聲

也治宜瀉強補弱假令女發搐目左視是肺來乘肝肝不

能任故叫哭也當瀉其肺後治其心續治其肝若病在秋

時肺兼旺位當大瀉其肺若病在春時肝旺之時

尚不能勝肺是肺強而肝火弱也當補其肝腎大瀉其肺

若男發搐目右視是肝來勝肺而叫哭當瀉其肝心若病

在春夏時肝旺時常大瀉其肝若病在秋冬時肺

旺之時尚不能勝肝是肝強而肺極虛也當補其肺

大瀉其肝所以言目反視者乃肝主目也凡搐則是風熱

相搏於內風屬肝故外見於目也今此病男反女症故稍

易治於女也先瀉其肺以瀉肺湯主之二日不悶亂知病

退也後用地黃丸補腎三服後用瀉青丸各二服以瀉心

肝五日而愈 又肺虛不瀉者何也曰假令男目右視木

克金肝旺勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛故當

補其肺慎勿瀉也

凡搖男左女右為順易治男右女左為逆難治

心脈急甚為痲癢全文見診治法脾脈急甚為痲癢

驚風不治證 搐而不休休而再搐 驚叫發搐 汗

出足冷 痰滿胸喉 口開目直

治小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危

病也急驚方搐時但扶持之不可擒捉蓋風氣方盛恐流

入筋脈或至手足成拘攣也

驚癇

驚癇即急慢之症但驚癇發時仆地作聲醒時吐沫急慢

驚則不作聲不吐沫也

陽癇初作時病先身熱痲癢驚啼叫喚而後發脈浮者為

陽癇乃急驚也內在六腑外在皮膚為易治若病先身冷

不驚癢不啼呼而作脈沉者為陰癇乃慢驚也此病內在

五臟外在骨髓劇者難治

凡治五癇皆隨臟治之每臟各屬一獸宜以五色丸主

之 犬癇反折上竄犬叫肝也 羊癇目昏吐舌羊叫心

也 牛癇目直視腹滿牛叫脾也 雞癇驚跳反折手縱

鷄叫肺也 猪癇如尸吐沫猪叫腎也

五色丸

硃砂研半 水銀一 雄黃一 鉛三兩 同

真珠末研一

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

如有客痰發熱而有聲煎大黃荊芥湯下五色丸潮

熱有時積熱也桃枝丸主之壯熱不退當地骨皮散下

五色丸 風熱當用防風黃芩湯下大青膏 身溫不熱

當用白虎湯加蒼朮下五色丸

雌黃丸治小兒癩癩欲發眼暗癩癩聲惡舌

雌黃 黃丹一 麝香一

右為末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥末杵

三五百下丸如菉葢大每服三丸溫熱水下一日三服

此方得自名醫之家極有神效

蛇黃丸治驚癇

真蛇黃三箇 鬱金三分 麝香一錢

右為末粳米飯丸如桐子大每服三二丸煎金銀磨刀

水化服

古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡疾煮取汁和諸

藥煮服之彌古者尤佳

治癇方治太陽陽明二經為病

荆芥穗四 白礬二兩

右東肉為丸如桐子大每服二十九丸荆芥湯下次三十

丸四十九丸又次五十九丸俱食前

沉香天麻湯○魏敬甫之子四歲從長老摩頂授記衆

僧念呪因而大恐遂發驚搐痰涎壅塞目多白睛項背強

急喉中有聲一時許方醒後每見皂衣人輒發多服硃犀

龍麝鎮墜之藥四十餘日目前症猶在又添行步動作神思

如痴予診其脈沉弦而急黃帝針經云心脈滿大癩瘈筋

擊又云肝脈小急癩瘈筋擊蓋小兒血氣未定神氣尚弱

因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癩瘈筋擊病久

氣弱小兒易為虛實多服鎮墜寒涼之劑復損其氣故添

動作如痴內經云暴癩瘈眩足不任身取天柱穴是也天

柱穴乃足太陽之脈所發陽蹻附而行也又云癩瘈瘈

瘈瘈

瘈瘈

瘈瘈

不知所苦兩躄主之男陽女陰潔古云晝發治陽躄申服夜發治陰躄照海先各灸兩躄各二十七壯次處

沉香二錢 天麻三錢 羌活五錢 防風三錢

益智二錢 川烏炮去皮二錢 甘草炙 當歸各一錢

半夏湯泡三錢 獨活四錢 附子炮去皮三錢 薄荷一錢

右咬咀每服五錢生薑三片水煎溫服舉痛論云恐則氣下精怯而上焦閉又云從下上者引而去之以羌活獨活苦溫味之薄者陰中之陽引氣上行又入太陽之經為引用故以為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血之不足又養胃氣故以為臣黑附子川烏頭益智仁大辛溫行陽退陰又治寒客傷胃腎主五液入脾為涎以生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯沉香辛溫體重氣清去怯安神故以為使氣味相合

升陽補胃恐怯之氣自得平矣

牛黃丸治因驚中風五癩天吊客忤潮涎癩瘰

白花蛇酒浸取肉 白附子 全蝎 真川烏一兩

生者 天麻 薄荷葉各半

已上六味先為細末次入

雄黃五兩 辰砂三錢 腦子半兩 牛黃二錢

麝香一錢

右為一處和勻麻黃去根二兩酒一升煎麻黃至一盞去麻黃用酒熬藥得所勿至焦赤象手疾丸如芙蓉大密器盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯磨化大能發散驚邪

治五癩得效方

露蜂房一兩 石綠一兩 桂心 遠志心

人參各半 硃砂一錢

右為末粥丸如桐子大每服二三十丸白湯下

湯痰 治小兒驚癩

膽星二兩 全蝎去尾足半兩 白附子一兩 薄荷半兩

僵蚕炒一兩 川芎一兩

右為末粥丸青黛為衣每服一二丸薑湯下

治小兒癩用其遂末一錢猪心一箇取三管頭血三條和甘遂末將猪心批作兩片入藥在內以線縛定外濕布包裹入文武火煨熟不可過度取藥細研入辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸猪心湯化下再服另取猪心煎湯此方神效

斷癩丹治癩瘰後復作連綿不除服之有驗

黃芪蜜水 釣藤 細辛 甘草炙

蛇蛻皮各半 蠟蛻四箇 牛黃另研

治速年驚癩心血不足神驗方蝎虎一枚褐色者用剪子取下四足爪連血細研入生珠末麝香腦子各少許同研

細薄荷湯調下作一服須先用奪命散控下涎次服之能奪造化雖數年癩癩亦能治之此藥所以神效者蓋癩皆心血不足此物各守官其血與心血類也取下如室女之紅鉛服之於心故能補也此藥以怪重去其足而復能行又散方見

小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癩當歸末小莖

大乳汁灌之日夜三四服

治小兒卒得癩用釣藤甘草各二分水五合煮取二

合服如小兒大日夜三大服

廣濟及崔氏方治小兒驚癩諸湯飲皆用釣藤皮又野猪

雀目疳眼

煮肝丸治小兒疳眼翳膜羞明不見物服十日必退如大人雀目者一服效

夜明沙 青蛤粉 穀精草各一

右件為細末每服一錢五七歲已上二錢純猪肝一大片批開糝藥在內攤勻麻線纏定以米泔半碗煮肝熟取出肝湯傾碗內熏眼分肝作三服嚼訖却用肝湯下一日三服不拘時候大人雀目空心服至夜便見物如患多時日二服

龍膽飲子治疳眼流膿生疳翳濕熱為病神效不治寒濕為病者

青蛤粉 羌活 草龍膽各三 黃芩炒二 蛇蛻皮 麻黃二錢 穀精草 升麻二

甘草各半

右為細末每服二錢食後茶清調下

針灸 灸雀目疳眼法○小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際各一壯炷如小麥大 小兒疳眼灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨間陷中

赤眼

導赤散治心熱小便赤眼目赤腫

赤芍藥 羌活 防風各半 大黃 甘草各一

右為末燈心黑豆煎食後服

余平生無赤眼之患用之如神小兒小兒可通用凡眼赤澁之初只用自已小便張目溺出一指接抹眼中便早

閉目少頃即效此以真氣逼去邪熱也

治小兒赤熱腫眼

大黃 白礬

右二味等分為末同冷水調作卷子貼眼立效

針灸 眼忽大小皆赤合谷灸三壯 熱毒風盛眼疼灸中指本節頭三壯

通睛

疳病 牛黃丸小兒通睛皆因失慎築打觸着頭面額角兼倒撲令兒肝受驚風遂使兩目閉睛名曰通睛宜服此

牛黃 白附子炮 肉桂 全蝎 芫花 石膏各一 白芷二 藿香

右為末煉蜜為丸如芡實大三歲已下每服一九薄苛湯下乳食後忌油麪猪肉

偏墜

雜方 小兒狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛十四枚熬焦桂枝半兩二物為散每服八分日再酒調下蜜丸亦通

針灸 偏墜亦宜防葵丸令兒坐於土中午時灸印下偏墜之處七壯防葵丸

小兒偏墜若非胎中所有在後生者於莖下腎囊前中間弦子上灸七壯立愈

胎產疝卵偏墜 囊縫後十字紋 一灸三壯春灸夏

陰腫囊腫脫囊

小兒陰腫由啼叫怒氣閉於下成此疾宜海蛤散

海蛤三 茴香炒三 葱豉仁 白朮 檳榔各半

<p>汚血 右末食前溫酒調下大小加減 陰腫又方 桃仁<small>去皮尖及雙仁者炒三分</small> 白茯苓<small>炒去刺各半兩</small> 右水煎服</p>	<p>熱 脫囊即外腎腫大 木通 甘草 當歸 黃連</p>	<p>藥方 右水煎服 黃芩</p>	<p>效 風冷濕地<small>先用花柳湯洗淨風處</small> 治小兒愛腫如升用甘草煎汁調地龍末塗之立退累效</p>	<p>針灸 用紫蘇葉為末水調傳上又用青荷葉包之治脫囊效 陰腫 鼠瘻<small>灸三</small></p>	<p>藥氣 治小腸疝氣家傳妙方 芫花<small>醋浸</small> 木香 檳榔 三稜<small>各半</small> 茯苓 青皮 全蝎 桂枝 附子 硃砂<small>各一</small></p>	<p>服 右為末將硃砂浸澄去土頭在湯瓶上候成膏子和糖醋打麪糊為丸如豈大每三十九空心溫酒下未效再服</p>	<p>小便不通</p>	<p>玄胡 川苦練<small>各等</small></p>
---	--	---------------------------	--	--	--	--	-------------	--------------------------------

<p>熱 右同為細末每服半錢或一錢捻頭湯調下量多少與之捻頭湯即湯中滴油數點食前服</p>	<p>木通散治心經伏熱小便不通啼叫 木通<small>一兩</small> 牽牛子<small>炒半兩</small> 滑石<small>一兩</small> 右為末燈心蔥白煎服</p>	<p>冬葵子散治小兒腹急 冬葵子<small>一兩</small> 木通<small>一兩</small> 右為末每服一錢煎服</p>	<p>尿深黃色久則尿血 小便不通久脹滿當利小便 淋病 治血淋神效方 紫草 連翹 車前子<small>各等</small> 水煎服 又方 海螵蛸 生地 白茯苓 右等分為末栢葉車前草煎湯調下</p>	<p>氣 治氣淋 赤芍藥<small>一兩</small> 檳榔<small>一兩</small> 右為末燈心同車前煎湯調下 遺尿</p>	<p>虛 治小便不禁或睡中遺出不覺 雞腸草<small>一兩</small> 牡蠣粉<small>一兩</small> 龍骨 麥門冬<small>去心</small> 白茯苓 桑螵蛸<small>各半</small> 右件咬咀每服一錢蒸子一枚擘破煎食前服</p>	<p>又方破故布一味炒為末黃栢煎湯調下</p>	<p>療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞肝等分搗丸如小豈大溫水下日三服</p>	<p>藥 小兒夢中遺尿慈苳仁一合許去心不去殼敲碎入搗一撮同炒黃色用水二鍾煎至半鍾空心服之累效 喉痺</p>
--	---	---	---	---	---	-------------------------	--------------------------------------	---

凡治小兒喉痺宜於大人喉痺法參用之

急用官局碧霞丹研細用薄荷自然汁入醋調以雞翎蘸藥送入喉內徐徐引得吐出痰涎為佳本方論碧霞丹能害人此不然蓋當時遇有合死之人耳

碧霞丹

石綠

附子尖

烏頭尖

蝎稍

右為末為丸薄荷汁化取涎出

喉中嗚咽乳不利 璇璣 急喉痺 天突

此不宜灸之

醫學綱目卷之三十七 小兒部

心主熱 潮熱 積熱 溫病 變蒸

熱 心痛 弄舌 重舌 木舌

舌白胎 鼻衄 遲言 盜汗 自汗

癰腫 腮腫 惡核瘰癧 赤丹

疥癬 眉煉 耳瘡 面瘡 口瘡

瘡 癩頭瘡 脚凍瘡 痘疹治法通論

痘出太密 痘出不快 痘痒塌

痘灰白色 痘黑陷倒靨 痘寒戰 痘

發熱 痘寒熱 痘渴 痘瀉瀉 痘

瀉不渴 痘吐逆 痘腹脹 痘腹痛

痘喘 痘大便秘 痘餘毒 痘入目

痘咽痛 痘風 痘癩瘡 痘瘡痛

痘膿而不加 痘後瘡癤 痘癰 中惡

客忤

肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之 壯熱飲水喘

悶瀉白散主之

肺熱手扞眉目日西熱甚咳嗽寒熱壯熱飲水并桔湯主

之若肺虛熱唇深紅色輕者瀉白散重者涼膈散主之

心熱視其睡口中氣流或合面臥及上竅搖頭咬牙皆心

熱也導赤散主之

脾熱則目黃肚大急喘嗜臥身熱飲水四肢不收瀉黃散

主之 腎虛則下竅畏明地黃丸主之 頰赤由心臟邪熱上攻

也宜服導赤散

面上證左腮為肝右腮為肺額上為心鼻為脾頰為腎

赤者熱也隨證治之 目內皆赤者心熱導赤散主之淡紅者心虛熱生犀散主之青者肝熱瀉青丸主之淺淡者補之黃者脾熱瀉黃散主之無精光者腎虛地黃丸主之

小兒脈沉而數者骨間有熱欲以腹按冷清也

身熱不飲水者熱在外身熱飲水者熱在內

四順飲子治熱在內而不厥 連翹散治熱在外而不厥

小兒發熱手足伏熱痰熱必用吐法輕劑苦參赤小豈末重劑瓜蒂散淡滌汁調服之如不吐用錫箔探之

朱監簿子五歲發熱醫曰此心熱也願赤而唇紅煩燥引飲遂用牛黃丸三服以物瀉心湯下之來日不愈

反加無力而不能食又下之便利黃沫錢曰心經虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛勞之病也錢先用白朮散生胃中津液次以生犀散治之朱曰大便黃沫如何曰胃氣正即瀉自止虛熱也朱曰醫用瀉心湯如何錢曰瀉心湯者黃連一物耳黃連性寒多服則利能寒脾胃也坐久衆醫至皆曰實熱錢曰虛熱若實熱何以瀉心湯下之不安又加面黃頰赤五心煩躁不食而引飲醫曰既虛熱何大便黃沫錢曰便黃沫者服瀉心湯多故也錢與胡黃連丸治愈 鄭人齊郎中者家好收藥散施其子忽臟熱齊自取青金膏三服并一服餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多驚又與青金膏一服又瀉三行加口乾身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘行未安莫生他病否召錢氏至曰已成虛癩先用前

白朮散時時服之後服香朮丸十三日愈 香朮丸即香朮散方見自汗條

小兒客熱在內不思乳食先用導赤散次用益黃散

實熱在內者四順飲之類在上者吐之 方見表裏條

小兒熱病六乙散妙藥也

食傷胃熱黃蒸

白朮一 半夏 黃連各半

加平胃散粥食後白湯下

治小兒驚熱

全蝎 天南星 取心為末一錢 人參三錢

蛇蛻三

右為末薄荷蜜湯調下

風溫熱壯熱相似 潮熱時間發熱過時即止來日依

時又熱此欲發瘧候也

壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也

風溫者身不熱而口中氣熱又有風溫症者但溫而不熱

傷寒熱口熱呵欠頓悶項急 治見傷寒部

痘疹熱噴嚏悸動耳尖冷 治見痘疹部

變蒸熱唇上白泡珠起耳冷 治見變蒸部

疳熱面黃頰赤上廔瘦鼻下赤爛 治見疳部

驚風熱發搐悸癇脈數煩躁顛叫恍惚 治見驚風部

帝曰乳子而病熱脈懸小者何如岐伯曰手足溫則生

寒則死 通評虛實論甲乙

熱證疎利或解化後無虛證勿溫補熱必隨生

潮熱

熱有作止每日應時而發也

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母 甘草 半夏洗七 銀柴胡去

人參 地骨皮 赤茯苓等分 如有驚熱

加蠶蛻天麻黃芩若加秦艽名秦艽飲子

右為細末每服二錢生薑三片水煎食後溫服量大小

加減海藏云地骨皮散即小柴胡湯加減法自汗者地

生犀散治症同前

生犀角控末 地骨皮 赤芍藥 柴胡

葛根各一 甘草炙半

右為細末每服一二錢水煎食後溫服海藏云生犀湯

加減法此少陽陽明相合也

犀角散治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾晚潮熱夜有盜汗

犀角末 地骨皮 麥門冬 枳殼燒

大黃蒸 柴胡 茯苓 赤芍藥

黃芪 桑白皮 人參 鱉甲醋塗炙

右為籠末每錢入青蒿少許水煎量兒大小加減一

鍾煎八分食後溫服

耳朱生曰先治何病錢曰止瀉治痰退熱清神皆此藥也

至晚服盡錢視白更可服三升又煎白朮散三升服盡得

稍愈第三日又服白朮散三升其子不渴無涎又投阿膠

散二服而安

秦艽散治潮熱減食蒸瘦

秦艽切頭 甘草炙 薄荷葉切焙

右為籠末每服二錢水一鍾煎八分食後溫服

潮熱有時胸滿短氣者桃枝丸方見小

風痰熱晚熱早涼水無時此候乃痰作朝而生風熱

即宜金星丸下之或氣弱者不可下宜奪命散以控下涎

次服惺惺散加南星白附子奪命散方見前

金星丸治風熱結聚喉內痰喘喘危咳嗽面紅腫咽膈

雍塞發熱在躁多渴

鬱金末 雄黃另研 膩粉分 巴豆七枚

右為末米醋糊丸麻子大薄青膠茶下

脈經云小腸有宿食常暮發熱明日復止此宿食夜熱也

海藏云夜熱屬陰四順飲之類此血熱在夜也

積熱

久熱也瘧熱亦久但兼面黃與炭土鼻下爛也

小兒積熱者表裏俱熱遍身皆熱頰赤口乾小便赤大

便焦黃先以四順清涼飲子利動臟腑則熱去既去復熱

者內熱已解而表熱未解也當用惺惺散紅綿散加麻黃

微發汗表熱乃去表熱去後又發熱者何也世醫到此盡

不能脫或再用涼藥或再解表或以謂不可醫誤致天傷

者甚多此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱

非熱證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽歸內

身體便涼熱重者用銀白散

清涼飲子每服二錢薄荷三錢同煎方見治 惺惺散方

紅綿散

白蠟炒二 天麻生用 天南星切薄片油

蘇木節另研二

右為末每服一錢水一小盞入紅綿少許同煎至六分

溫服凡小兒風熱頭目不清並宜服之若傷寒有表證

發熱者每服入去節麻黃末五分有裏熱心燥渴者入

滑石末半錢同煎服之

六神散

人參 白茯苓 乾山藥 白朮

白扁豆 甘草炙

右為末每服一大錢水一小盞煎一校薑二片同煎至

五分服此藥用處甚多治胃冷加附子治風症加天麻

治痢加鴛鴦殼

銀白散

乾山藥 白朮 白茯苓各半 人參

白扁豆 知母 甘草炙 升麻各等

右為末每服一大錢水一小盞煎一校生薑二片同煎

溫服不拘時候

桃枝丸取積熱及結胸又名桃符丸

巴豆霜 大黃 黃柏各一 輕粉

礞石各半

右細末麩糊丸粟米大煎桃枝湯下一碎兒五七九五

七歲二三九未碎兒二三九臨臥服

梳頭飲子治小兒畜熱在中身熱狂躁昏迷不食

梳子仁七 豆豉研

右用水三盞煎至一盞看多少服之無時或吐不吐立

效

變蒸熱

診

變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就是五臟之變

氣而七情之所由生也蓋兒生之日至三十二日一變每

變蒸畢即覺性情有異於前何者長生臟腑意智故也何

謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨以象天數

以應期歲以分十二經絡故初生至三十二日一變生癸

屬足少陰腎藏精與志六十四日二變一蒸生壬屬足太

陽膀胱其發耳與飢冷至九十六日三變生丁屬手少陰

心經心藏神其性為喜一百二十八日四變二蒸生丙屬

手太陽少陽其發汗出而微驚一百六十五日五變生乙屬

足厥陰肝肝藏魂喜哭一百九十二日六變三蒸生甲屬

足少陽膽其發目不閉而赤二百二十四日七變生辛屬

手太陽肺肺藏魄生聲二百五十六日八變四蒸生庚屬

手陽明大腸其發膚熱而汗或不汗二百八十八日九變

生巳屬足太陰脾脾藏意智至三百二十日十變五蒸生

戊屬足陽明胃其發不食腸痛而吐乳又手厥陰心包經

手少陽三焦此二經俱無形狀故不變而不蒸也前十變

五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒哀故

云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日

為一大蒸計三百八十四日長其經脈手足受血故能

持握足受血故能行立經云變且蒸則蒸畢而足一歲之

日有餘也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可別

治又六十四日為一大蒸計四百四十八日又六十四日
 三大蒸計五百一十二日共五百七十六日變蒸既畢兒
 乃成人也變者變生五臟也蒸者蒸養六腑也所以成人
 變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸情能既異輕則發熱
 微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼躁
 渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變
 蒸之餘續感寒邪者但變蒸則耳冷體冷上唇發泡狀如
 泡珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日
 夜不絕變者易也蒸於肝則目眩微赤蒸於肺則噴嗽毛
 聳凡五臟六腑筋脈骨節循環各有證應其治法和平之
 劑微表之熱實者微利之或不治亦自愈

千金變蒸論云凡兒生三十二日一變六十四日再變
 變且蒸九十六日三變一百二十八日四變變且蒸一百

六十日五變一百九十二日六變變且蒸二百二十四日
 十變二百五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三
 百二十日十變變且蒸三百二十日小蒸畢後六十四
 日大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二十八日復大
 蒸凡小兒自生三十二日一變再變為一蒸凡十變而五
 小蒸又三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小
 兒所以變蒸者是榮其血脈改其五臟故一變竟輟覺情
 態有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕重其
 輕者體熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚目珠子
 微汗出重者體壯熱而脈亂或汗或不汗不欲食食輒吐
 現目白睛微赤黑精微白又云目白者重赤黑者微變蒸
 畢自精明矣此其證也單變小微兼蒸小劇凡蒸畢者五
 日而衰遠者十日而衰先期五日後期五日為十日之中

熱乃除耳或違日數不歇切勿不可妄治及灸刺海藏云一
十八次蓋前三百二十日為小蒸後二百五
十六日為大蒸也現平與切不喘而吐也
 若身熱耳熱尻亦熱此乃他病可作別治
 紫霜丸治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯熱汗後熱
 不渴及腹中有痰癰哺乳不進乳則吐現食懶先寒後熱
 者

代楮石兩 赤石脂兩 巴豆三十粒 杏仁五十粒
 右先將杏仁巴霜細研為膏却入二石相和更搗一二
 千杵當自相得若硬入少蜜同杵之密器中收三十日
 兒服如麻子大一粒與少乳汁令下食頃後與少乳勿
 令多至日中當小下除熱若未全除明日更與一粒百
 日兒服如小荳大一粒以此定增減紫霜丸無所不
 治雖下亦不虛人

心痛
 心痛當於大人心痛門參用之
 心痛吐水者重痛 心痛不吐水者冷心痛
 靈鑿散治小兒虫咬心痛欲絕
 五靈脂二錢 白礬火飛
 右同研每服一二錢水一鍾煎至五分溫服無時當吐
 出虫

弄舌
 弄舌脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌治勿用冷藥及
 下之當少與瀉黃散漸服之田氏云若肥實者 或欲飲
 水醫疑為熱用冷藥下之者非也飲水者脾胃津液少故
 也又加面黃肌瘦五心煩熱即為疳宜加胡黃連若
 大病未已用藥弄舌者凶

重舌

重舌附舌下近舌根生形如舌而小謂之重舌其着舌下如此者名重舌其着頰裏及上腭如此者名重腭其着齒斷上如此者名重斷皆刺之去血可也

重舌治法用苦竹瀝漬黃柏末點舌上如不愈後用真蒲黃傅之不過三次愈用真蒲黃微炒布鋪地上出火氣煎液之按腫處塗

治小兒重舌馬牙硝塗舌下日三度

治小兒重舌木舌先用新水揉口并舌上下後用皂角針燒灰入腦子少許每用半字糝舌上下出涎立效

治小兒重舌燒烏賊魚骨細研和鷄子黃傅喉及舌上

治小兒重舌欲死亂髮灰細研以半錢傅舌下日不住

用之 重舌素白皮煮汁塗乳飲之 秘錄又以蜣螂燒末唾傅之

木舌

木舌者舌腫漸漸大滿口不急治即塞殺人也

木舌治法用局方中紫雪一分竹瀝半合和之時時抹入口中自消

小兒木舌百草霜滑石芒硝為末酒調傅

舌白胎

舌上生如粥粒桑白皮汁傅之三兩次妙

鼻衄

地黃湯治熱中熱及肺癰鼻血生瘡一切丹毒 生地 赤芍藥 當歸 川芎各等分

右咬咀水煎去查量大小加減服如鼻衄臨熟入生蒲黃少許生瘡加黃芪等分丹毒加防風等分同煎煎驗春冬衄者用生地黃研取汁加生蒲黃少許砂糖并花水浸服之愈 秋夏衄者用車前草一握洗淨同生薑一處研取汁入生蜜一匙先拌查塞鼻次用新汲水和蜜并車前草生薑汁飲之即愈 又方生薑薑根搗自然汁仰頭滴入鼻管中即止次以新汲水和蜜薑汁飲之良

遲言

首蒲丸治小兒心氣不足五六歲不能言

石菖蒲三錢 人參五錢 丹參三錢 天麥門冬心

右為細末煉蜜丸如菉豆大溫水下十九至二十九日

二三服久服效又有病後腎虛不語宜兼服六味地黃丸

九海藏云地黃丸是少陰也與首蒲丸上下通經

雞頭丸治小兒諸病後不能語

雄雞頭一箇 鳴蟬三箇 大黃一兩 甘草一兩 當歸三錢 木通 黃芪各半 川芎

遠志心去 麥門冬去心各三分

右同為細末煉蜜丸如小菉豆大平日米飲下五九空心日三四服兒大者加之久服取效雞蟬二物宜求死者用之不可旋殺孫真人所謂殺生求生去生更遠矣

百舌鳥今之鶯也名反舌主小兒不語炙食之又治虫咬

腎性失音相似病吐瀉及大病後雖有聲而不能語此非失音為腎性不能上接於陽故也當補腎地黃丸主之

失音乃猝病耳 口噤不止則失音聲遲亦同

針灸
明五六歲不語者 心膈

盜汗

錢黃芪散治虛熱盜汗

牡蠣 黃芪 生地各等

右為末煎服不拘時

盜汗睡而自汗出肌肉虛也止汗散主之遍身汗香瓜丸主之

止汗散用故蒲扇灰研細每服三錢溫酒調下無時如無以故蒲代之

實熱

虎杖散治實熱盜汗虎杖水煎服量多少與之無時

溼晉郎中子白嬰至童盜汗凡七年矣諸藥不效予與涼

膈散三黃丸三日病已蓋腎為五液化為五濕相火逼腎腎水上行乘心之虛而入手少陰心火炎上而入肺欺其

不勝已也皮毛以是而開腠理玄府不閉而為汗出也出於睡中者為盜汗以其覺則無之故經曰寢汗憎風是也

先以涼膈散瀉胸中相火相火退次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還本臟玄府閉而汗為之自已

世治小兒盜汗用鬱金末塗兩乳下立效

難方

錢治病有等 張氏三子病大者汗遍身次者上至頂下

至胸小者但額有汗眾醫以麥煎散治之不效錢曰大者

與香瓜丸次者與益脾散小者與石膏湯各五日而愈

汗身

香瓜丸

胡黃連 大黃瓜黃色者 大黃濕熱

柴胡去 鱉甲炙 黃柏 黃連

檀香 青皮各等

中邪汗

右除黃瓜外同為細末將黃瓜剖其頭填入諸藥至滿却蓋口用杖子插定火內煨熟將黃瓜及藥同用麪糊丸如菽豆大每服三三九食後冷漿或新水下大者五

七九不過十九

胃怯汗上至頂下至臍此胃虛當補胃益黃散上之

六陽虛汗上至頂不過胸也不須治之 喜汗厚衣臥而額汗出也止汗散主之

頭汗

癰疽

湯凡癰疽未見之初微見有紅頭瘰子起隱疹者急用不語唾夜半頻頻塗之飲酒了不可用

治發背癰瘡方

羌活 川山甲炒焦 生人骨煨存性

麝香許少

右末煎黃薄苛酒調如陰瘡頭平向內者服之即突

出其功效不可盡述若小兒痘瘡黑陷者只一服而起

萬不失一

腮腫

本治小兒毒氣攻腮赤腫可畏者

皂角去核 天南星生用 糯米合

右為細末薑汁調塗立效

惡核瘰癧

湯小兒惡核生於項頸上遇風寒所折不消結成瘰癧久而潰膿生瘡也宜服四味大黃飲即四頭清涼

瘰癧又方

升麻 射干 連翹 犀角屑

大黃微 朴硝各半

右吹咀水煎大小加減忌酒麪炙燥物

治惡核方

赤小荳 猪牙皂角 硝石 黃藥

木鱉子各半

右末雞子清調塗患處

貼散涼瘰神效方

白膠香 降真香用心無土氣者 海螵蛸

右等分爲末糝患處外以水帛掩之一夜而退

赤丹

赤遊治法宜服犀角散一法先鑱去惡血服上藥犀角散方

風熱 小兒丹毒乃熱毒之氣極與血相搏而風乘之故赤腫

及游走遍身者又名赤遊風入腎入腹則殺人也大抵丹

毒雖有多種病源一也有赤丹毒遍身痒者或女子十五

六而脈未通者多發丹疹皆由血有風毒乘之宜服防已

散

漢防已兩 朴硝 犀角 黃芩

黃芪 升麻各乙

右吹咀竹葉煎大小加減

荆芥散 小兒黑斑紅斑瘡痒癩疹並用防風通聖散治之

防風 天花粉 羌活 生地黃

當歸 蟬脫各等 水煎服

解毒散

寒水石 滑石 石膏 辰砂

右三石等分爲末入辰砂少許量兒大小燈心湯下

又方

赤小荳 木鱉子 椴料子 南星

大黃 朴硝

右爲末用慈姑薄許靛青和蜜水調塗患處外用雄黃

圍之却服荆芥解毒二散

小兒發斑散毒氣用生葵葉絞取汁少與服之

治小兒丹發慎火草生一握搗取汁傳之效

治小兒赤遊丹行於上下至心即死搗芭蕉根汁煎

塗之

治孩子赤丹不止以胡荽汁傳瘡

小兒赤遊行於體上下至心即死以芒硝納湯中取

濃汁以拭丹上

丹瘤熱毒氣客於腠理搏於血氣發於外皮上赤如丹

當以白玉散塗之

白玉粉碎消石 寒水石兩

右末之用米醋或新水調塗

火丹磨銅鐵水調刷上泥傳之 小兒赤遊風用朝南

燕巢泥雞子清調傳將腫處用針割破鮮魚血塗之尤妙

小兒天火丹臍腰起者赤溜不妨用蚯蚓泥炒研細香

油傳之

又法用牛膝一兩去齒甘草半兩生剉碎水煎一大盞

去查調伏龍肝塗之

小兒赤丹伏龍肝爲末芭蕉油調傳 又方用雉雞毛

及鷲毛燒灰香油調傳

又傳丹毒方只一夜消盡用花蕊石生薑薄許自然汁

調鷲毛刷上患處爲妙

治法

禁食

禁食

虛張三太尉女十五歲病此諸醫百藥俱試而不能中石
視之以生料四物湯加防風黃芩一日而愈
生料四物湯治血熱生瘡遍身腫痒及脾胃常弱不禁大
黃等冷藥尤宜服之

生地 赤芍藥 川芎 當歸

防風 各半 黃芩 一錢

右吹咀水煎量大小加減忌酒麪猪羊肉豆腐

雜方

小兒赤溜主傷血熱宜生地黃木通荆芥苦藥帶發表
之類外以芭蕉油塗患處

丹痒者用韭菜按此益與香油以手摩熱於丹上搯之
立愈

小兒丹瘤麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚
效

小兒十種丹瘤腫毒所起形候并方治法

飛龜丹從頂頭起先腫用蔥白研取自然汁塗

古窰丹從頭上紅腫痛用赤小豈末雞子清調塗

三鬼火丹從面赤赤腫用灶心土雞子清調塗

四天火丹從背起赤點用桑白皮末羊脂調塗

五天火丹從兩腎赤腫黃色用柳葉燒灰水調塗

六水丹從兩脇虛腫用生鐵屑為末猪糞調塗

七胡火丹從膈上起黃腫用檳榔為末米醋調塗

八野火丹從兩脚赤腫用乳香末羊脂調塗

九烟火丹從兩脚赤白點用猪槽下土麻油調塗

十胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調塗

右此十種丹赤變易非輕治之或緩則終不救故予不

惜是方能逐一仔細辨認依此方法治之萬不失一如
經三日不治攻入臟腑則終不救不可緩也
赤遊風於身上下至心即死煎薑煎汁洗之

百日内發必死不治

疥癬

小兒經絡熱頭面及身體生瘡四君子加瓜蒌根桔
梗各半錢煎服

洗法

小兒惡瘡天氣溫和頻與澡洗更衣名曰外宜亦不官
服藥小兒不得已而服藥此乃下法若將養合宜何疾可
侵更令乳哺有節勿令過飽其身乃如藥樹此養生之理
也

惡瘡方頻浴身安外宜無病

春用柳條荆芥 夏用東葉槐枝 秋冬用苦參

煎湯洗

傳瘡藥方 剪刀草 黃連 苦參

右等分為末先洗淨次用麻油輕粉調傳

瘡瘡治法浸淫瘡宜用苦瓠散塗之乾癬宜用羊蹄根
絞自然汁調膩粉塗之濕癬宜用青金散貼之

苦瓠散治小兒浸淫瘡漸長不止

苦瓠二 蛇蛻皮 蜂房 梁上塵

右為細末生油調塗攤帛上貼

青金散治小兒濕癬浸淫瘡

白膠香 輕粉 青黛

右研為細末乾瘡上

治小兒風癬不止白礬十二分煖熱酒投化用馬尾

蘸酒塗之

小兒頭面爛瘡木耳春細蜜調傳又冷水調平胃散傳俱乾則易之

眉煉

眉煉治法用青金散傳之如不愈燒小麥存性研細好油調塗

耳瘡耳凍瘡

雜方

小兒耳後月餘瘡如蟻蟻燒以猪油和傳之 耳上生瘡竹葉燒末猪脂傳之妙

楊氏以雞子白和傳立瘡 耳月餘方胡粉和上傳之

耳後月餘黃連末傳之安

白蘇散治小兒凍耳成瘡或痒或痛

黃栢 白蘇各半

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

面瘡

治小兒面瘡通面爛無全膚膿水流滴百藥不效者陳

年臈猪油不入塩者傳之神效

口瘡

如聖散治小兒口瘡不能喫乳者江子一粒或二粒研

爛不去油入硃砂黃丹傳紙絹上少許刺開小兒額門貼

在額上如四邊起粟米泡便用溫水洗去藥恐成瘡更用

葛蒲水洗便安其效如神

南星膏治口瘡小兒難用藥以大天南星去皮取中心

龍眼大為末却用酸醋調塗脚心甚妙

治小兒口瘡飲乳不得以白礬如鷄子大置醋中塗兒

足底二七次即愈

牡礬散治小兒口瘡

牡礬散通紅面出候冷研細以茶 牡草一錢

右和勻時時挑少許搽口中或吐皆無害

口瘡治法乳母同兒宜服洗心散瀉心湯然後用黃栢

末研細搽之 瀉心湯方黃連一味

治口瘡驗方

黃栢半兩 青黛一分 右二件為末頻搽口內愈

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上宜附子

理中湯

癩頭瘡

治久癩頭用黃連細末傳之○治年久癩頭內用苦參

丸食後服之外用苦參末油傳之二月愈

又方用防風通聖散酒製除大黃另研為末再用酒拌

晒乾為末每一錢水煎服日四五服至三十貼見效

又方

川芎 片苓酒 芍藥酒 陳皮各半

白朮酒 當歸酒各 天麻酒 蒼耳半錢

黃栢酒 粉草酒 防風各三

右咬咀煎服四五次服之服過睡片時

小兒癩頭用燒紅炭煨長流水令熱洗之仍用芫荽子煎

猪脂去子用脂傳患處 又法用胡荽子伏龍肝懸龍尾

黃連白礬為末油調傳

頭瘡方

猪油一錢半 雄黃 水銀各二

右研和勻傳瘡上

又方治小兒癩頭并身癩等證用松皮燒灰白膠香枯礬

大黃黃柏油調傳患處 又方用臘月馬脂油搽患處極

妙

頭瘡大笋殼燒為灰量瘡大小用灰調生油傳又加膩

粉佳

小兒頭身諸瘡燒雞卵殼和猪脂傳之

治癩頭

松香一兩乾麝香兩安在石 黑龍尾三錢

鹿垂 白芷兩 松樹皮二錢水銀二錢

黃丹三 雄黃 白礬各二

右為末以血餘入香油煎爛調傳患處

脚凍瘡

生附散治爛脚瘡用生附子為末麪水調傳之愈

痘瘡治法通論

痘疹惟用溫平藥治之不可妄下及妄攻發受風冷

溫平者非熱劑如荆芥薄荷防風牛蒡子甘草之類

人鼠粘子連翹山查甘草此

四味痘疹始必用之藥

診睦親宮中十大王瘡疹云瘡疹始終出未有他證不

可下但當用平和藥類與乳食不受風冷可也如瘡疹三

日不出或出不快即微發之

加藥如一日一貼加藥不出即大發之

類如發後不多及脈平無証即瘡本稀不可更發也有大

熱者當利小便小熱者當解毒利小便

下攻止用抱龍丸治之瘡疹若起能食者大黃九下一二

行即止有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾

陷者百祥丸下之不黑者慎勿下身熱煩躁腹滿而喘大

小便澀面赤悶亂大吐此當利小便不瘡者宜風散下之

也若五七日痲不焦是內發熱氣蒸於皮中故瘡不得焦

痲也宜宜風散下之用生犀角磨汁解之使熱不生必着

痲矣

論曰痲疹之病其為證各異瘡發於外屬少陽三

焦相火也謂之痲小紅屬行皮膚中不出者屬少陽君火

也謂之疹凡顯痲疹若自吐瀉者不可妄治而多言謂邪

氣上下皆出也大凡痲疹首尾皆不可下恐動則生變此

謂少陽通表宜和之也當先安裏解毒次微發之解毒須

安五臟防風湯是也如大便不秘者須微發之藥宜錢氏

方中選而用之如大便過秘宜微利之當歸丸惠變百祥

丸是也初知痲疹若使之併出小兒難禁是以別生他症

也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若既吐利安可下

便宜安裏若不吐瀉者先與安裏藥三五服如能食而大

便秘結內實者宜疎利之若內虛而利者宜用安裏藥一

二服末後一服調以微發之藥要之安裏之藥多發表之

藥少秘則微疎之令邪氣勿壅併而能作番次出使見易

禁也身溫者順身涼者逆二者宜多服防風湯和之

安裏解毒防風湯

防風兩 地骨皮 黃芪 芍藥

荆芥 枳殼 鼠粘子各等

右為末水煎四五錢服若能食而大便實宜當歸丸微

利之

當歸丸 惠變百祥丸二方並見痘

痲夫痲之為病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢溫而

成毒皆太陰濕土雍滯君相二火之所作也因小兒真氣

既盛正氣又旺邪無所容或遇天寒賊傷表或因傷暑痲

由是而出焉治當何如外者外治內者內治中外皆和其
 凝自出至於惡寒者發之表大熱者奪之渴者清之大便
 秘結者下之小便不通者利之驚者安之泄者分之可以
 執一為哉大抵傷寒同治隨經用藥最為高論假令五日
 已裏諸病與瘧疹不能別辨者不可疑作瘧疹必須發之
 但各從其所傷應見治之皆不妨瘧出若強發之其變不
 可勝數矣前人言首尾俱不可下者為瘧未顯于表下則
 邪氣不得伸越此脈證有表而無裏故禁首不可下也尾
 不可下者為瘧毒已顯於外內無根帶大便不實無一切
 裏證下之則瘧氣逆陷故禁尾不可下也又言溫煖蓋覆
 不令通風以癍或身表涼而惡寒或天令寒而惡冷溫
 煖蓋覆不令通風也瘧若已出身熱天暄何必用蓋覆而
 不使之通風乎後人執此二句首尾俱不敢下溫煖不令

八醫學綱目卷之三
 三

通風不知天令之所加人身之所盛致使候人多矣大抵
 前人之言隨時應變後之人不知其變故常執而不移也
 噫首尾俱不可下者以其始終臟腑元無凝滯也若有一
 切裏證及大便結者安得不下溫煖不使之通風以其發
 在冬時故如此也若發在夏時雖未出亦不用此也瘧
 之用藥大率以脈為主浮中沉之診平舉按之候察其虛
 實定其中外則可以萬全矣
 如外傷升麻湯主之方見本門 內傷枳實丸主之 大便硬
 者枳朮丸主之 若傷冷者溫之神應丸三方俱見 惡
 寒者發之宜防風蒼朮湯方見本門 表大熱者奪之此表
 者通言三陽也夫陽盛者氣必上行言奪者治之不令上
 行也是知無三陽表證有三陽裏證於有形也此言表
 總三陽之名也 渴者清之大渴者白虎湯方見本門 小渴

者涼膈散涼膈散去硝黃 大便秘結者下之桃仁承氣
 湯四順飲子柴胡飲子選用察其在氣在血必內實能食
 而秘者可用但當微微潤之 小便不通者利之導赤散
 八正散之類當果上下二焦何經而用之 驚者安之涼
 驚丸重者瀉之瀉青丸 泄者分之寒則異功散四君子
 湯熱則澤瀉茯苓湯

小兒瘧疹初發未能辨認間但求所出之由因內因外及
 不因外內隨其所傷如法服餌防其變故抑其盛氣比之
 他證尤不可緩或發或瀉或解其肌或化其毒求其所起
 之由涼血清肺調其臟腑平其飲食謹其禁忌嚴其養攝
 適其寒溫將理有法俾盡其道使出無不快之經成無不
 痲之潰既愈之後不致毒流汗虛騰目疾膜翳瘡癩瘡
 癩喉閉隘腫潮熱汗泄此治瘧之大畧也 凡未出而發

八醫學綱目卷之三
 三

播者是外感風寒之邪內發心熱之所作也當用茶粉下
 解毒丸犀角地黃湯主之 一發出便密如針頭形熱重
 者合輕其表而涼其內連翹升麻湯 若瘧已發密重微
 喘飲水者有熱證用去風藥微下之 若出不快清便自
 調知其不在表不在裏當微發升麻葛根湯 若青乾黑陷
 身不大熱大小便澀則是熱在內煎大黃湯下宜風散
 若身表大熱者表證未罷不可下 若瘧已出見小熱小
 便不利當以八正散利之 若已發後有餘毒未散復有
 身熱瘡腫之類當茶粉下解毒丸 凡瘡疹已出後有聲
 音者乃形病而氣不病也 瘡疹未出先聲音不出者乃
 形不病而氣病也 若瘡疹出而聲音不出者是形氣俱
 病也當清其肺氣宜用八風湯并涼膈散去硝黃亦可
 小兒痘疹分氣血虛實以四君子四物酒炒茶連等服

實

氣虛參朮加解毒藥 血虛四物加解毒藥

右加解毒者酒炒黃芩炒黃連是也海藏云解毒者三黃湯金花丸之類

痘瘡分人之清濁就形氣上取易怯 痘瘡黑屬血熱 涼血為主白屬氣虛補氣為主中黑陷而外白色起遲者 則補氣中畧帶涼血藥

陳氏補

痘瘡未出已出之間或瀉瀉或腹脹或氣促謂之裏虛 速與十一味木香散治之 如已出之間其瘡不光澤不 起發根窠不紅謂之表虛速與十二味異功散治之 如 已出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或瀉瀉或腹脹 或氣促是表裏俱虛也連與十二味異功散送下七味肉 苳蔻丸治之 丹溪云木香異功散二藥治寒 的當若虛而不寒者瀉不投也 如瘡始出

八音一則一六二

三

一日至十日渾身壯熱大便黃是表裏俱實也其瘡必光 澤必起發必飽滿必易膿而不致損傷若無他疾不宜服 藥 表裏俱實者易出易腐表裏俱虛者易出難腐表虛 難出裏虛難腐隨症治之

治痘要法吐瀉少食為裏虛陷伏倒靨灰白為表

虛二者俱見為表裏俱虛全用異功散救之甚至專附靈 砂亦可若止裏虛減官桂若止表虛減肉苳蔻不減官 桂丁香若能食便秘而陷伏倒靨者為裏實當用錢氏及 丹溪下法若不吐瀉能食為裏實裏實而補則結痘毒紅 活綻凸為表實表實而用表藥則潰爛不結痂凡痘但見 痲點便忌葛根湯恐發得表裏俱虛也

辨陳氏

讀前人之書當知其立言之意苟讀其書而不知其意 求過於用不可得也痘瘡之論錢氏為詳歷舉源流經絡

分明表裏虛實開陳施治之法而又證以論辨之言深得

著書垂教之體學者讀而用之如求方員於規矩較平直 於準繩引而伸之觸類而長之可為無窮之應用也今人 不知致病之因不求立方之意倉卒之際據證驗方謾爾

一試設有不應弁其書而廢之不思之甚也近因局方之 教久行素問之學不講抱疾談醫者類皆喜溫而惡寒喜 補而惡解利忽得陳氏方論皆用燥熱補劑其辭確其文

簡歎然用之翕然信之遂以為錢氏不及陳氏遠矣或曰 子以陳氏方為不足歟曰陳氏方誠一偏之論雖然亦可 謂善求病情者其意大率歸重於大陰一經蓋以手太陰

獨肺主皮毛足太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易於感脾 土惡濕而無物不受觀其用丁香官桂所以治肺之寒也 用附朮半夏所以治脾之濕也使脾與肺果有寒與濕而

兼有虛也量而與之中病則已何傷之有今也不然但見 出遲者身熱者泄瀉者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒 熱虛實率投木香散異功散間有偶中隨手獲效設或誤

投禍不旋踵何者古人用藥製方有向導有監制有反佐 有因用若錢氏方固未嘗廢細辛丁香白朮參芪車有監 制輔佐之藥不專務於溫補耳然其用寒涼者多而於補

助一法畧示端緒未嘗深及痲人之前不可說錢氏之 慮至矣亦將以候達者擴充推廣用之耳雖然渴者用溫 藥痒塌者用補藥自陳氏發之迥出前輩然其多用桂附

丁香辛芳燥熱必未為適中也何者桂附丁香輩富有寒 而虛者固是當虛而未必寒者其為患當何如耶陳氏 立方之時必有挾寒而用一偏之方寧不過於熱乎予嘗

會諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方至正甲申

八音一則一六二

三

陽氣早動正月間也問痘瘡不越一家事投陳氏方童幼死者百餘人雖由天數吾恐人事亦或末之盡也

傷寒男體重面黃女面赤喘急各情寒口中氣熱呵欠頻悶項急瘡疹則顯赤躁多噴嚏悸動昏倦四肢冷傷寒當發散之瘡疹當溫平之有大熱者宜解毒昏睡喜嚏悸者將發瘡疹

辨瘡疹 呵欠 噴嚏 睡中急驚 耳尖冷 眼澁 辨傷寒 口熱 口中醋氣 疥癩不消

瘡疹候面燥顯赤月胞亦赤呵欠頻悶乍涼乍熱咳嗽噴足稍冷夜臥驚悸多睡此瘡疹天行之病也 陸親官十太尉瘡疹眾醫治之王曰瘡未出屬何臟腑一醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢氏曰若言胃氣熱何以乍涼乍熱若言母腹中有毒屬何

臟也醫曰在脾胃錢氏曰在脾胃何以驚悸皆無以對錢氏曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母腹中穢液入兒五臟食至十月即穢液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連米粉下其穢穢之穢此亦母之不潔餘氣入兒臟中本先因微寒又遇風寒邪氣相搏而成痘疹也未出欲作之時熱動五臟則五臟之症先見初欲病時先呵欠頻悶驚悸乍涼乍熱手足冷面頰赤燥咳嗽噴嚏此五臟症俱見也呵欠頻悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面赤頰頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以在腑下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一症肝水痘肺膿疔心為癩脾為疹腎雖無症其候惡者瘡變倒靨而黑陷則歸腎也此由不慎風冷而不能食內虛所致也今太尉瘡子無他證當

用平和藥為治因用抱龍丸數服愈海藏云本先因微寒証用抱龍丸即如瘡疹多熱也瘡疹始出之時五臟症見惟腎無候但見平症耳尻涼耳涼是也尻耳俱冷於腎其居北方主冷也 瘡疹始出之症必先見面燥腮赤目胞亦赤呵欠頻悶乍熱乍涼咳嗽噴嚏足稍冷多睡睡驚並瘡疹之症或生膿泡大瘡或生小紅癍或生癰疹此三等不同何故俱顯上症而後乃出蓋已上諸症太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳道逆於面上故顯是症蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸瘡症皆從寒水逆流而出也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生化之源非五行也非水亦非火此天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則為男子三日四日五日血脈已旺精不勝血則為女子乃二物相搏長身生謂之神又謂之精道與釋二門謂之本來面目是也其子在腹中十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神飢渴皆隨母血兒隨日長筋骨皮肉血脈形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻于一隅隱伏而不發直至兒因內傷乳食濕熱之氣下陷合于腎中二火交攻熱氣不從逆於內理惡血乃發諸瘡疹皆出於腎水其瘡後聚肉理歸於陽明故三番瘡始顯之症皆足太陽膀胱尅丙小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱化為膿者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆從足太陽傳變中來也

始發潮熱三日已上熱暈入皮膚即發瘡疹而不甚多者執留皮膚之間潮熱隨出如早食潮熱不已為水泡之類也已午潮熱為痘也西潮熱為疹也

驗癩法若三日未覺形迹當以生酒塗身上時時看之狀如蚤痕者是也或曰傷寒傷食潮熱與癩疹不能辨者宜以辛涼之劑調之五日已裏發出即汗五日已外無者非癩也各隨應見而治之

治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認間服升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯其驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐宜以藥下之海藏云宜以藥下之者當察其所傷何物生硬升麻葛根湯太陰陽明也性燥散治風熱喘不利閉不利少陽也然欲知其經當以脈別之

小兒耳冷尻冷手足乍暖乍涼面赤時嗽時驚悸此瘡疹欲發候也未能辨認間服升麻湯消毒散已發未發皆宜服仍用胡荽酒黃柏膏若月煩燥食後與白虎湯玉露散熱盛則紫雲咽喉或生瘡與甘桔湯甘露散依前說大人小兒同治法惟大小不同耳海藏云消毒散太陽藥鼻乾不得臥陽明藥也甘露散肺腎藥也甘桔湯少陽藥也紫雲天冬麥冬滋陰生地為血劑玉露散肺腎藥也石膏寒水石為風劑已上

升麻葛根湯治傷寒瘟疫風熱壯熱頭痛瘡疹已未發並宜服之

升麻	葛根	芍藥	甘草
右同為細末每服四錢水一盞半煎至一盞無時溫服			

海藏云升麻葛根湯太陽陽明之藥陳文中云身熱腹痛者身熱濕瀉者身熱驚悸者身熱汗出者身熱足冷者俱不宜服升麻葛根湯恐發得裏虛也

惺惺散治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目泄多睡咳唾氣壅鼻塞清涕

白朮	桔梗	細辛	瓜蒌根
人參	茯苓	甘草	

右咬咀每服二錢水一盞生薑三片入薄荷三葉煎至半盞時時與服活人云加防風川芎亦各隨經也海藏惺惺散治風熱喘不利閉不利和少陽消小便不利也

右二方發表平劑

王朝奉四物解肌湯

芍藥	黃芩	升麻	葛根
----	----	----	----

每服四錢水一盞煎至七分去查服或云小兒傷寒疫癘潮熱瘡疹五日已裏疑似不能辨別者並皆辛涼之劑調之即以四物湯解肌之類海藏云此論即有表也若內傷腹中有物未得

解表發瘡疹

防風	蒼朮	石膏	甘草
川芎	黃芩	石膏	甘草

右為菴末每服二錢生薑三片薄荷七葉水煎日二服此方惡寒者宜用之

大便酸臭不消化畏食或吐乃內傷飲食宜枳朮丸傷冷食飲神鹿丸

一男子年十六歲發熱而昏目無視耳無聞兩手脈皆溢大而畧數知其為勞傷矣時里中多瘧症者雖不知人

與藥則飲與藥則食遂教以參芪當歸蒼朮陳皮大料濃
與之飲至二十餘貼痘始出又二十貼則成膿痘身無全
膚或曰病勞可畏何不用陳氏全方治之予曰此但虛耳
無寒也只前方守之又數十貼而安後詢其病因為先四
五日恐有出痘之患遂極力採樵連日出汗甚多

五藏見

五臟各有一證 肝臟水疱 肺臟膿疱 心臟癍
脾臟疹 婦腎變黑

肝臟水疱色或青肺臟膿疱色或白脾臟疹或如麩糖
色心臟癍其色赤變婦腎則色黑矣此五色凡痘疹一色
者善或二色三色相合而作者凶 第一大小不等

小兒在胎十月食五臟穢血生下則其毒當出故痘疹之
狀皆五臟之液肝主淚肺主涕心主血脾為裹血其瘡出
有五名肝為水疱以淚出如水其色青而小肺為膿疱以

入醫學綱目卷二十七

手

涕稠濁如膿其色白而大心為癍主血其色赤而小次於
水疱脾為疹其色赤黃而小涕淚出多故膿疱水疱皆大
血榮於內所出不多故癍疹皆小又病水疱膿疱者涕淚
俱少以液從瘡出故也譬如泡中容水水去則泡瘦矣

右水疱者俗謂之水痘也膿疱者俗謂之痘子也癍者
俗謂之瘡子也疹者俗謂之麻子也痘之形狀最大水
痘次之癍瘡又次之麻子最小隱隱如麻子也

辨痘

更看時月重輕大抵瘡疹屬陽出則為順故春夏病為順
秋冬病為逆冬月腎旺又感寒病多婦腎變黑又當辨春
膿疱夏黑陷秋癍子冬疹子亦不順也

凡瘡疹只出一般者善 先發膿胞後發疹子者順 先
發水疱後發疹子者逆 先發膿胞後水疱多者順少者
逆 先發水疱後發癍子多者逆少者順 先發疹子後

發癍子者順 先發膿胞後發癍子者逆 海珍云此一句
精脈相合而不齊也用藥亦難矣前云五色多隨五臟
亦有二色相合或有三色即無定也此與前後膿水瘡疹
大小不同先後

凡瘡疹若出辨視輕重若一發便出重者必重也痘夾疹
者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏白者微
重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑如針孔者熱劇也青
乾黑陷昏睡汗出不止煩燥熱渴腹脹喘大小便不通
者困也凡瘡疹當乳母慎口不可令飢及受風寒必婦腎
變黑難治海珍云或熱極反寒水化者亦能變黑當以涼
者內素有熱頭反陷色或灰青似黑中有針眼下陷當急
以清涼藥藥之便結者大黃牽牛之類便軟者金花丸之
類主

輕者作三次出 大小不一等 頭面稀少 眼中無
根窠紅 肥滿光澤

入醫學綱目卷二十七

手

重者一齊並出 密如蚕種 身熱腹脹 瘡灰白色
稠密無縫 瀉渴不止 頭溫足冷
輕變重 犯房室 不忌口 先曾瀉 飲冷水 餌涼

藥
重變輕 避風寒 常和煖 大便稠 不燥渴 忌生
冷 忌外人

右飲冷水耳涼藥若內有實熱者不須忌之
二日三日痘瘡始見微微纔出如粟米大或如黍米大或
如菜豆大似水珠光澤明淨者佳不須服藥

四日五日痘瘡大小不等根窠紅活光澤明淨者輕如稠
密陷頂灰白色瀉渴者重

六日七日痘瘡肥紅光澤者輕如身溫氣促口乾腹脹足
指冷者重

八日九日痘瘡長足肥滿蒼蠟色者輕如寒戰悶亂腹脹
煩渴氣急咬牙者至重也
十日十一日痘瘡當腐落而愈如身熱悶亂腹脹
泄瀉寒戰咬牙者重

全法

黃栢膏如瘡疹已出此藥塗面次用胡荽酒外治法

黃栢

黃栢粉

甘草

紅花

右同為細末生油調從耳前至眼眶並厚塗之日三兩

次如早塗瘡不至面縱有亦少彭氏云痘疹癩眼人多用此法無不出好諸家

錢氏黃栢膏並好諸家

痘瘡初出用鼠粘子為末水調傳頤門並無患眼亦妙

噴喉令快法

胡荽酒 胡荽一味細切四兩以好酒二盞煎一二沸入

胡荽再煎少時用物合定放溫每吸一大口微噴從頂至

足勾遍勿噴頭面病人左右常令有胡荽氣即能辟去汚

入醫藥綱目卷三

三

氣瘡疹出快

痘重為輕法

痘疹初出時或未出時見時人有患者宜預服此藥多

者令少重者令輕以絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性為

末沙糖拌勻乾喫入硃砂末更妙

消毒救苦湯治痘症悉具消化便令不出若已出稀者

再不生痘十一月立此方隨時加減惟通造化明藥性

者能之

麻黃根

羌活

防風

柴胡

川芎

細辛

葉本

升麻

葛根

黃芩

黃連

黃栢

紅花

蘇木

歸身

吳茱萸

白朮

蒼朮

甘草

橘皮

連翹

生地

生地

生地

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去渣稍熱服
疹者因內傷飲食致令氣逆故也大禁牽牛巴豆峻
藥宜半夏枳實大黃益智仁之類去瀉止吐若耳尖冷
呵欠腫驚噴嚏泄瀉知必出痘也宜

升麻

葛根

白芍藥

甘草

歸身

連翹

右咬咀水煎服此定法也後隨症加減

如肺出膿瘕先顯喘嗽或氣高而喘促少加人參黃芩

以瀉伏火而補元氣 如心出小紅瘕必先見噎乾驚

悸身熱肌肉腫脈弦洪少加黃連 如命門出癰疹必

先骨痛身熱其疼痛不敢動搖少加生地黃栢 諸瘕

疹皆為陰症瘕皆因內傷乳食脾胃不足禁氣逆行雖

火勢內熾陰覆其外故錢氏製四物升麻湯發之如有

傳變症依加減法服之

如疹痘則發於脾宜陳氏人參清腦散疹者皮膚瘙癢

水疱者多因傷寒熱毒而發宜升麻散及羌活散方見

瘕乾者宜退火濕者用瀉濕退火止用輕劑荆芥升麻

葛根連翹之類瀉濕乃肌表間濕宜用風藥防風白芷之

類痘初起時自汗不妨蓋濕熱薰蒸而起故也

痘瘕不治症有七 一憂齒痘黑陷喉中涎喘因先受

風冷血氣虛弱即變此症 二憎寒因倦痘子縮伏 三

瘕作坑內無膿血或黑色泡或瘕跡作黑色 四痘癰壅

腫痘毒變疔口臭眼爛牙落 五聲啞氣喘或咽藥腹中

鳴 六痘初出而半在皮膚帶紫黑色不出者 七誤於

踈轉氣啞者 凡出前後心密及兩手心兩足心密者皆

不可治

痘

論痘不治有五 痒塌寒戰咬牙煩躁不止 紫黑色
喘渴不寧 頭溫足冷悶亂欲飲水 目睛上視喘滿氣
促泄瀉不止 灰白色陷頂腹脹喘渴不止

小兒痘疹與傷寒相類頭痛身熱足冷脈教疑似之間
只與升麻湯解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可疎
轉此為大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表猶不可
轉世人不學乃云初覺以藥利之宜其毒也誤矣

血太盛却用疎利亦非也 瘡疹已出不可疎轉出得已定
小兒身耳尻冷咳嗽輒用利藥即害人

醫學綱目卷三

痘

痘疹初起少陽之氣在經熱者故用化毒犀角 凡治疹
宜微利之及痘已靨尚有餘熱停留或作熱或作瘡瘻
或成癰宜四順飲下之不特消餘毒亦免生他症累試累
至癰爛臟虛則腹痛自利或作寒戰或作陰癩死者多
矣

痘疹自初出至已愈之際父母切忌房事

凡痘疹勿令親近狐臭漏腋者房中淫慾者及婦人經
候醉酒薑穢硫黃蚊藥一切腥臊疫汚蒸濕誤燒油髮五
辛發糞淋尿葵油煎卵俱當忌之
痘疹忌外人及穢觸之物雖不受風冷亦不可擡過常
令衣服得中並溫涼處坐臥

痘

痘瘡發熱口乾煩渴不止者切不可與水喫亦不宜與
蜜紅柿西瓜橘子等冷物食之 若腹實中有積熱 痘瘡
欲腐已靨之間忽不能腐腹脹煩渴不可與水蜜等冷物
食之或頭溫足指冷或瀉渴氣促亦不可與之 十二日
十三日瘡痂已落其痂猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可濕
浴亦不宜食炙煖物酸辣五辛有毒之物恐熱毒熏腦眼
目多生翳障

世人徒知憐惜過愛信其俗而不藥病已成而方憂摩
撫從容無所不從豈知愛之適足以害之惜之適足以棄
之始不早治治不全終卒之殞斃勞而無功至是咎醫嗚
呼其計亦繆矣

痘出太密

疎則無毒密則有毒用涼藥解之雖數十貼亦不妨無
害眼之患

醫學綱目卷三

痘

一發便密如針頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹
升麻湯主之
鼠粘子湯治癩疹已出稠密身表熱急與此藥防後青
乾黑陷

鼠粘子 二錢 當歸身 酒 甘草 炙 柴胡

連翹 黃芩 黃芪 各一 地骨皮 二錢

右咬咀每服二錢水煎去查溫服空心服藥畢且勿與
乳食

調肝散治瘡疹太盛宜服令瘡不入眼

生犀 二錢 草龍膽 一錢 黃芪 兩 大黃 二錢
桑白皮 炒黃 兩 麻黃 去 鈞藤子 各一 石膏 兩
瓜萎仁 皮 甘草 二錢

右為鹿末每服二錢水煎食後溫服微利效
 出太多者犀角地黃湯地骨皮鼠粘子湯犀角地黃湯
地骨皮鼠粘子湯即地骨
皮散加鼠粘子是也

又解瘡毒藥

絲瓜 升麻 芍藥炒 甘草生
 山查 黑豆 赤小豆 犀角

右咬咀水煎服

瘡已發密重微喘飲水者有熱證用去風藥微下之

治男子勞傷出痘昏不知人身無全膚者方見痘
未愈

痘出不快

錢氏消毒散 化毒湯活人鼠粘子湯此三方並見本
方風出發也

右三方發瘡痘皆溫平溫涼藥錢氏所謂三日不出或

不醫學綱目卷三七

美

虛

出不快即微發之者是也如微發不出者即就與前項
 藥該每服二錢者即加至三四錢該每日二服者即加
 至三四服如加藥又不出者即用升麻葛根麻黃桂枝
 大發之如大發後不多及脈平無事者即瘡稀不可更
 發如脈洪有熱有大熱者當用四聖導赤八正輩利小
 便有大熱者當用芩連及金花丸輩解毒若利小便解
 毒後又不快則勿發勿下止用抱龍丸治之此皆錢氏
 心法也

勉奴痘已出第三日色淡不肯發此血氣俱虛與此方

人參錢一 白朮錢一 黃芪錢一 婦身酒洗各
錢一

陳皮錢一 甘草錢一 訶子錢一 荳蔻錢一

右煎入好酒些飲之

右治氣血俱虛

痘疹發未透宜四君子湯加黃芪紫草糯米煎凡醫百
 病不可損胃氣故用四君子及糯米等助其胃氣此方
中

六一湯專發痘瘡之膿

黃芪錢六 甘草錢一
 右咬咀每服二錢水六分煎入酒二分同煎至半盞溫
 服更加椒櫬同煎尤好加山藥亦得

右治氣虛

治血散治瘡子或出不快用白芍藥末酒調如欲止痛
 只用溫熱水調下蘇藏云張和之治四肢出不快
加防風大效此症乃大陰藥也

四物湯治痘瘡出不快不甚紅活不起根紫綠血虛故
 也此藥能活血調順痘疾無如此方自古及今用之如寶
 只加甘草服之

不醫學綱目卷三七

美

虛寒

右治血虛
 女子痘後出痘血氣俱虛又值冬寒熱易退不出

丁香錢五 附子錢五 桂枝錢半 甘草錢二

人參兩半 黃芪錢 陳皮 當歸酒洗各
錢五分

異功散治痘瘡已出之間不光澤不起發根窠不紅謂
 之表虛

木香 當歸錢三 桂枝 白朮

茯苓錢二 陳皮錢一 厚朴錢一 人參錢五

肉蔻錢半 丁香錢一 半夏錢半 附子炮去皮
錢半

右咬咀每服二錢水一盞薑五片水三枚煎服

右治虛寒用此必脈虛細四肢身冷者方可用之

藍根散治瘡疹出不快及倒靨一名二聖散救小兒垂
 死

藍根散治瘡疹出不快及倒靨一名二聖散救小兒垂
 死

板藍根一 甘草七

右末每服半錢取雄雞冠血三兩點同溫酒少許食後

調下無時甚則三五服立效丹溪云能

若出不快清便自調知其不在表不在裏當微發之宜升

麻葛根湯

消毒散治瘡未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼膈

去痰治咽喉痛

牛蒡子炒三 甘草半 荆芥穗二錢

右同為籠末每服三錢水一盞半去渣溫服藥性溫平

之劑一法加

鼠粘子湯治小兒痘瘡欲出未能得透皮膚熱氣攻咽

喉眼赤心煩

鼠粘子炒四 荆芥穗 甘草各一 防風半

右為細末沸湯點服臨臥大利咽喉化痰涎止咳老幼

皆宜海藏云太陽少陽之

又法用牛蒡子炒熟為末同荆芥煎服

右三方消毒飲加減法也

化毒湯治小兒瘡痘已出未出並宜服之

紫草茸 升麻 甘草各

右吹咀水二鍾梗米五十粒同煎此陽明之藥也海藏

不快者化毒湯不事

亞玉痘出兩日不甚透食稍進汗微出熱畧減但食物

口中覺有惡味此出得遲發未透須微表之

升麻 甘草 紫草 白木

陳皮 芍藥炒半

作一貼加少酒同煎白芍須炒見其大便雖出不多却

白帶清滑

透肌湯治痘不透

紫草 白芍藥 升麻 林米粉炒各

右三方皆化毒湯加減法也

太陽出不快身之 荆芥甘草防已湯

陽明出不快身之 升麻加紫草湯聖惠方升麻

少陽出不快身之 連翹防風湯聖惠方

四肢出不快 防風芍藥甘草湯

痘疹煩不得眠者甘桔加梔子湯

桔梗 甘草 梔子 各等分煎服

治痘出不快煩躁不得眠者水解散麻黃黃芩湯升麻

黃芩湯主之海藏云黃芩若定其氣血用石膏梔子之類尤

方可用之

水解散治天行頭疼壯熱一二日兼治痘瘡未出煩躁或

出尚身體發熱者

麻黃去節 大黃 黃芩 桂心

甘草各二 芍藥各二

右為籠末患者以生熟湯浴訖以煖水調下二錢相次

二服得汗利便瘥強人服二方寸七風實之人三伏中

亦宜用之若去大黃春夏通用

升麻黃芩湯治痘瘡出不快煩躁不得眠 麻黃黃芩湯

治痘瘡出不快益煩躁昏憤或出尚身疼熱者見上二方

四聖散治瘡疹出不快及倒靨一方有黃芪

紫草茸 木通 甘草各 枳殼炒

右等分為籠末每服一錢水一鍾煎至八分溫服無時

劉提點云疹最要大小分曉錢氏四聖散
用木通枳殼極好若大小流利不必苦況

紫草通疹散小兒痘疹出不快或倒靨毒氣入腹

紫草茸 黃芪 桑白皮 木通

枳殼 白木各等

右為籠末每服三錢水酒各半蓋麝香少許同煎服

紫草木通散治小兒瘡疹

紫草 木通 人參 茯苓

粳米各等 甘草半

右為末每服四錢水煎此小便不利之劑也

人參蠅蛇散治小便不利瘡痘不散燥燥多渴牙咬

齒氣齟喘滿

人參 蠅蛇 白芍藥 木通

赤茯苓 甘草 紫草茸各等 木煎服

紫草散發疹

紫草散發疹

釣藤鈎子 紫草茸各等

右為細末每服一字或五分一錢溫酒調下無時

小兒瘡疹出未快可濃煎紫草汁服

右紫草例為通利膝理要藥也

瘡不從黃狗蠅四五枚用常酒研細服之未從再服冬月

在耳內取之

絲瓜湯發疹最妙絲瓜連皮燒灰存性百沸湯調下

痘疹塌

痘塌者於形色脈上分虛實實則脈有力氣壯虛則脈

無力氣餒實則勢熾虛則氣怯虛以實表之劑加

涼血藥實瘡以大黃寒涼之藥少許與之下其結毒

痘瘡瘡不掩

白木一錢 黃芪半 當歸 陳皮各五

甘草些 水煎溫服

予治一子七歲痘將出未出之際腹泄數行其世色黑不

發根寒三日後瘡塌即黑色口渴其根寒如水亦狀不

紅澤不起發食少脈浮數有力按之虛遂用參芪歸木陳

皮肉荳蔻為君炙甘草訶子桂為佐使水煎熟好酒些少

咽下痒立止食立進根寒紅澤而起發二服全愈

輕者用淡蜜水調滑石末以雞羽潤瘡上

痘疹難任搔之成瘡或膿或血出者敗草散治之切不

可用牛糞灰貼則臭穢癢多矣

屋爛草屋上爛草也如無增頭上爛草亦可用此

右一味為末每研碎篩末若渾身瘡破爛膿水不絕粘

貼衣裳難以坐睡可用二三升攤於床褥上令兒坐臥

其效如神

小兒痘瘡難任候搔成瘡及瘡痴欲落不落用上好白

蜜一味塗於瘡上其痴易落可無紫黑癢痕世傳痘瘡

變成癩癬其痒難任用

陳年鷹精油傳神妙

又方用羊髓骨煉一二沸入輕粉少許研成白膏竟合

盛之塗瘡效

痘灰白色

痘灰白色靜者怯者作寒看躁者勇者嫩發者作熱看

凡痘疹白色將靨如豆殼者蓋因初起時飲水多其壓不

齊俗呼倒靨不妨但服實表之劑如毒氣鬱裏消息他大

小便如大便閉通大便小便閉通小便無妨

吳店小兒周歲痘瘡色白甚痒藥中每加參芪半兩

白木分五 丁香兩 當歸錢 官桂分三

黃芪一水煎服

予族姪女年出痘灰白色身熱喘渴服洪有力與八物湯加連翹桔梗犀角骨半夏木通紫草乾葛石膏杏仁連芩前胡瓜蒌仁服之十貼後色紅活喘嗽緩減漸微但熱未除遂於前方減芪香胡枳連芩七味服三十餘貼而安安後髮皆落月餘方起床虛之盛也○又一男子二十餘歲出痘已破未破者灰白色又雜間以黑陷倒靨者發熱寒戰身痛脈洪或時弦亦與八物加木通紅花紫草陳皮連翹服十餘貼而安

痘黑陷倒靨

紫草散治痘黑陷曾服此方愈元鑿皆云有枳殼難服

紫草

甘草

糯米元云此味極好助胃氣

黃芪各等分水煎服

痘瘡黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者用黃芪人參酒炒紫草治之顏色正者如上治法參芪之補佐以如將出成就之際却色淡不正者屬血虛宜用補血藥當歸川芎芍酒洗之類或加紅花

如將成就之際却色紫不正者屬熱宜用涼藥解毒升麻芩連桔梗連翹之類其者用犀角屑如用後項諸藥色仍之治

回生散治瘡疹倒靨黑陷用人牙燒灰存性入麝香少許研細每服半錢用黃芪白芍藥煎湯調下立效錢氏方中用溫酒調下雲岐方中用升麻紫草煎湯調下海藏云油狀腸垢者通膈丸下之味砂為衣與宜風散相表裏彭氏云只用紫草湯自好錢氏方用麝香及酒蓋瘡症最怕觸禁不可用

治痘瘡黑陷藥不能發者有驗用川山甲一味燒存性為細末入麝香當門子少許一歲五分三歲一錢溫酒調下一服取效雖半身黑陷欲絕者亦能暫甦而發紅色但有目閉無竟者不復生矣此方雖驗回生散又佳

麻黃湯用麻黃剪去根節五錢用蜜一匙同炒良久以水半升煎候沸去上沫再煎去三分之一不用查病瘡痘倒靨黑者乘熱盡服之避風俟其瘡復出一法用無灰酒煎更速但小兒不能飲酒者難服以此藥入表也世傳此法累用

痘黑陷倒靨猪尾湯無比散龍腦膏子無不驗海藏云若

猪尾膏治瘡倒靨用小猪尾尖刺血兩點入生腦子少許同研新汲水調下食後立效

八寶膏

龍腦膏子治時疫發痘瘡及出痘子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治不治其毒入臟決死用生龍腦一錢研細滴猪心血和丸如豆子大每服一丸心煩狂躁者用紫草湯化下若瘡子陷伏者用溫酒化下少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息取安海藏云此法証極而用故

四葉散治痘瘡倒靨黑陷出御院歌曰人猶猪犬臘辰燒每服三錢蜜水調選甚倒靨并黑陷萬兩黃金也合消服月辰日合

人中黃騰月者最佳通風處以火煨成煤水調下三五錢陷者自出丹溪云子和黑陷甚者用燒人屎即此方也 治疹痘不透乾黑危困用山查肉一味為末每服二錢

紫草酒送下量兒大小加減徐徐進三四服即紅活
劉守真涼膈散治小兒痘疹黑陷亦妙然止能治大便
結硬小便赤澀為當若大便小便已通不宜用此惟以易
老去大黃硝者最為穩當

凡痘疹重者猶十活四五黑者無問何如十難救一其
候或寒戰咬牙或身黃腫紫宜急以百祥丸下之復惡寒
不已身冷出汗耳尻反熱者死何以然腎氣大旺脾虛不
能治故也下後身熱氣溫欲飲水者可治以脾氣生勝腎
寒去而溫熱也治之宜解毒不可妄下妄下則內虛多歸
於腎若能食而頭暈起或未焦而喘實者可下之宜四
順飲 瘡赤陷而耳尻反熱者為逆用百祥丸牛李膏各
三服不愈者死

百祥丸一名南陽丸治痘疹黑陷寒戰咬牙身黃紫
腫

紅牙大戰不以多少陰乾藥水煮飲去骨日
中曬乾復納汁煮汁盡藥為末

右水丸如黍米大每服一二十九研芝麻湯下吐利同
無時此方治憂齒甚妙

牛李膏用牛李子不以多少取汁石礬內熬成膏牛李子
主野道邊至秋結實黑子成穗如無生者以乾者為末水
熬代用每服皂子大煎杏膠湯化下此藥須於九月中取
之

睦親宅一大王病瘡疹始用一李膏又召錢氏錢留與抱
龍丸三服李以藥下之其疹稠密錢氏見大驚曰若非轉
下則為逆病王曰李已用藥下之錢曰瘡疹始出未有他
症不可下也但當用平和藥類與乳食不受風冷可也瘡
痂若起能食者大黃丸瀉一二行即止今先下之瘡疹未

能出盡而稠密甚則難治此誤也縱得安其病有二一者
赤二者瀉三者目赤李氏不能治經三日黑陷後復召錢
曰幸不發寒病未困也遂用百祥丸為主牛李膏為助各
二大服至五日間瘡復紅活七日而愈蓋黑者竭腎水也
腎旺勝脾土不尅水故脾虛寒戰則難治所用百祥丸者
以瀉膀胱之腑腑若不實臟自不盛也何以不瀉腎由腎
主虛不受瀉如二服不效即加寒而死矣

治瘡疹黑陷鐵腳靈仙為末炒一錢腦子一分用
溫水調服取下瘡痂為效

無比散治小兒瘡疹惡候
硃砂一兩 牛黃 麝香 樟腦
膩粉一錢

右同研細如有患者小兒一字大人五分入水銀少許

用小猪尾上血三兩點新水同調服寧得睡者然後
取轉下如爛魚腸蒲萄穗之類涎臭惡物便安小兒用
乳汁調妙海藥云此瀉內熱之極不能開發於外則宜
此內難過洋外亦開發於透肌膚之藥與至

小兒瘡疹黑陷方
乾胭脂三錢 胡桃一箇 燒
右為細末煎胡荽酒調下藥一錢立效

右治死血黑陷凡前方用川山甲及麝香等藥治黑陷
皆為氣滯者設也

治瘡疹黑陷用膠月禿梟腦子一箇或二箇以好酒調
服若乾者以好酒浸少時化開依上條服立效禿梟腦
也

若葉散治倒靨用箬葉一味燒灰為末麝香酒下

瘡黑而忽瀉便膿血并痂皮者順水穀不消者逆何以

然且瘡黑屬腎脾氣本強或舊服補脾藥脾氣得實腎雖
用事脾可制之令瘡入腹為膿血及連痂皮得出是脾強
腎退即病出而安也瀉米穀及瀉乳不化者是脾虛不能
致腎故自泄也此必難治海藏云瀉出痂皮根在內也表
木發不化者逆

未從一齊黑者為陷已綻而不齊黑者為將屬

痘寒戰

痘寒戰因倦或發寒戰能令痘子縮伏宜用陳文中異功
散方見海出

寒戰咬牙黑陷者百祥丸下之方見黑嘗治痘瘡寒戰

用白朮送婦加苓治之愈

痘發熱

胡宅痘瘡發熱此血少有餘毒也

入醫學綱目卷三

陳皮 白朮 婦身 白芍藥各三

牛蒡子研破炒 木通 犀角

生甘節 川芎各一錢半

分六貼水蓋半煎食前稍熱服

連翹散治一切熱兼治瘡疹如神

連翹 防風 梔子 甘草各等分

右為木水煎服海藏云治熱在外而

易老云涼膈去大黃芒硝者能解六經中熱此不惟解熱

治小兒痘疹熱候亦使發之則本藥與防風荆芥一物各

半白水煎服

黃芩 黃連 黃柏 山梔炒各

右末滴水丸如葶子大每服五丸白湯下

三黃丸治諸熱

黃芩半 大黃煨 黃連各二錢半

右為細末糊丸葶苈大每服五七九至十五二十九食

後米飲送下

右錢氏云有小熱者解毒海藏謂解毒者三黃九金花

丸之類是也

四聖散方見出 海藏紫草木通湯方見 導赤散方見

八正散方見 有初起煩躁語狂渴引飲若飲水則後來喘不齊急

以涼藥解其標如益元散之類可用

右五方利小便退熱之劑錢氏云有大熱者利小便又

云身熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐此當

利小便蓋此用導赤散之類是也

宣風散

檳榔兩 陳皮 甘草各半 牽牛細研生

右為細末三二歲蜜湯調下五分已上一錢食前易老

加防風

通膈丸利上下氣血藥也

大黃 牽牛 木通各等分

右為細末滴水丸如粟粒大每服三五十九量見大小

虛實加減

右錢氏云有大熱利小便不瘥者宜宣風下之

蔡河有舟師偶見敗浦一東沿流而下漸泊舟次似

開啼聲而微開視之驚見一兒四五歲許瘡疱周匝密不

容隙兩目皎然飢而索食因以粥食之其妻怒曰自家兒

女多悲瘡疱傳染奈何私料蔡河流緩必不遠持兒一鞋

瘡得
水而活

利小便
後熱不
退者下

煩躁
渴引飲
水則喘

逆流而上徧聞皆曰無此兒行二十里又至一村落舟師呼於市曰有兒年狀如許瘡疤死棄河中今復活忽酒邸中有人出曰我某村某人也兒四五歲死於瘡疤舟師出其鞋其人泣曰是吾兒也奉往視驚見兒活流涕拜謝舟師抱兒歸今二十餘矣此兒本死得水而生第未驗其瘡疤之疾寒耶熱耶

痘寒熱
大和散治瘡痘後寒熱往來嗜臥頓悶躁亂

生地 當歸 地骨皮 人參
甘草 白芍藥 各等分

右咬咀每服一錢水半盞煎至三分去查溫服

痘渴

陳十妹年廿歲出痘而有孕七箇半月大渴不甚出透

寒熱交作血虛氣虛

人參 白朮 黃芪 陳皮

甘草 歸身 薑三片酒水各半盞煎服

瘡疹大腸閉瀉或發渴四君子加瓜蒌根桔梗主之若身熱小渴者六味人參麥門冬散治之如不愈或身熱大渴者七味人參白朮散治之又

六味人參麥門冬散
麥門冬 人參 甘草 陳皮
厚朴 薑製各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去查溫服虛人減厚朴

七味人參白朮散 方見消渴門○已上四

初起煩躁渴引飲者急以涼藥解其標

身熱煩渴腹滿而喘大小便澀而赤悶亂大吐此當利小便不瘥者宜風散下之

十一味木香散集驗方本治瘡痘身熱作渴方見後

文中云腹脹渴者渴渴者足指冷渴者驚悸渴者身溫渴者身熱面黃白色渴者寒戰渴不止者氣急咬牙渴者飲水轉水瀉不已者已上九證即非熱也乃津液少脾胃肌肉虛故也宜木香散治之如不愈更加丁香官桂此必

痘渴瀉
陳牙兒十九歲出痘有紅斑吐瀉而渴

蒼朮 白朮 黃芪 陳皮 茯苓 甘草 硝砂 當歸 薑製各半 薑三片同煎服

從子六七歲時患瘡痘發熱微渴自利一小方脈視之利而氣弱察其所下皆臭滯陳積因腸胃熱蒸而下也恐非有寒而虛遂急止之已投一貼矣繼以黃連解毒湯加白朮與十貼以解丁香之熱利止瘡亦出其後肌常有微熱而手足生癩癩與京劇調補踰月而安一男子十餘歲出痘熱時出根脚密嘔吐不食腰背骨節痛大渴喉痛腹亦痛全不食者半月餘脈浮弦洪而數與參芪歸朮炙甘草陳皮半枚生薑煎服之至五日色淡又加桂些少婦遂再用酒製至七日痒甚加丁香三粒附子些少痒止至八日九日渴大作而腹泄瀉牽甚至十日寒戰遂用白朮為君芪陳苓炙甘草歸朮臣至十一日不瀉或痒或譫語但守前藥半月後自吐出痰多而安

十一味木香散治疹痘腹脹渴其效如神必須密察的

木香 大腹皮 人參 官桂

赤茯苓 青皮去白 前胡 訶子皮

半夏 丁香 甘草炙各

右咬咀每服二錢水一盞薑三片煎空心溫服

異功散集驗方瘡痘頭溫足冷腹脹瀉渴方見症

張巽之云吐瀉瀉少食為裏虛異功散減官桂主之此症

瀉渴不可喫蜜水痘出之間不光澤不起發根窠不紅或

瀉渴或腹脹或氣促是為表裏俱虛與異功散送下七味

肉荳蔻丸治之異功散方見

痘瀉不渴 痘疹不渴臟寒下利四君子加乾薑減半主之

八醫學綱目卷三七

痘疹大便不固痘漸黑陷小兒乳母同服

人參 白茯苓 肉荳蔻 黃芪各半

甘草炙二

右咬咀每服一錢水半盞薑五片煎一校煎三分乳母

倍服若大瀉手足厥冷加附子用驗

荳蔻丸治痘疹泄瀉

木香 砂仁 白龍骨 訶子肉

肉荳蔻切異 赤石脂 白礬各七

右為末糊丸如黍米大一歲三十九二歲百丸溫米飲

下瀉止勿服

痘吐逆

痘疹吐逆無痰益黃散有痰一陳湯或橘皮半夏湯不

止者加丁香若吐而瀉者亦宜益黃散及陳氏木香散異

功散 吐而身熱煩渴腹滿喘大小便澀而赤者當利小

痘腹脹

他奴痘後瀉肚急小便少發熱

芍藥分五 川芎分三 白朮分五 陳皮分五

乾葛分三 甘草炙半 木通分二 水煎服

寄子五歲痘後肚急

白朮錢 陳皮 木通各五 犀角

川芎 白芷各七 甘草分三 水煎服

陳文中木香散治痘瘡腹脹渴瀉方見症

腹滿而喘大小便澀身熱面赤悶亂大吐者當利小便不

瘥者宜風散下之全文見

痘腹痛

八醫學綱目卷三七

痘腹痛多是痘毒當臨證消息

吳店子出痘瘡腹痛

丁香分二 官桂 芍藥各一 白朮

當歸各五

右作一貼服 常治痘始出腹痛或身痛脈洪數者解

表涼藥加芍藥甘草漸安

痘喘

痘瘡出後喘急痰盛宜杏甘湯人參清膈散

杏甘湯治痘瘡煩喘渴燥

麻黃 桑白皮 杏仁 甘草

右等分為鹿末每服三錢水一盞煎食後服

痘疹肺不利紫草甘草枳殼湯

人參清膈散

人參	桑白皮	柴胡	當歸
芍藥	知母	茯苓	白木
黃芪	紫苑	地骨皮	滑石
甘草	桔梗	黃芩	石膏
右吹咀每服三錢水煎溫服			
痰實壯熱胸中鬱悶臥則喘急前胡枳殼湯主之			
前胡	枳殼	赤茯苓	甘草
大黃			
右吹咀每服三錢水一盞煎六分旋服			
喘而腹滿大小便澀者利小便不澀者宜風散下之法			
痘出之間或氣促者水香散主之			
痘大便秘			
治瘡疹已出未出大便秘澀或時發渴四君子加瓜蒌			
根桔梗治之			
當歸丸			
當歸	甘草	黃連	大黃
先將當歸熬膏子入藥末三味為丸加服之以利為度			
海惠變百祥丸治瘡疹大便秘結			
紅牙大戟	青州惠		
右用水二盞同煎至水盡為度去大戟將凍焙乾可和			
作劑旋丸從少至多以利為度			
洗心散治瘡疹壯熱大小便不利狂言多渴			
大黃	甘草	當歸	麻黃
白朮	芍藥	荆芥	
右吹咀量病輕重多少薑薄荷煎溫服則平熱服則瀉			
四五日不大便者可用肥嫩猪脂一塊白水煮熟切如			

豆大與兒食之令臟腑滋潤瘡易落百無礙滯			
痘餘毒			
瘡瘡餘毒或肝虛入眼目或肺虛為癩疥或為癰癤發			
在骨節腎之虛也發在肌肉脾之虛也或在筋或在頭或			
在面或牙齒疳蝕或咽喉腫痛各隨經而見皆毒不散蘊			
積而成或病人始不早治或醫者失治遺於經絡其所由			
來蓋有自矣宜服解毒等劑			
痘毒攻脾則泄瀉身浮攻肝則眼生翳膜攻心則煩躁			
啼哭攻腎則耳疼膿聚攻肺則咳嗽痰涎			
治小兒痘瘡餘毒未散食穀太早補住毒氣			
鼠粘子	甘草	犀角	荆芥
防風	白朮	枳殼	水煎溫服
痘入目			
如痘傷眼必用山梔赤芍決明歸翳連翹防風桔梗升			
麻小劑末之調服如眼無光過百日後血氣完復則自明			
治瘡疹後毒氣攻眼或生翳膜赤黑之類宜用四物			
湯加荆芥防風煎服兼用黑豆皮穀精草海蛤甘草等分			
為末用熟猪肝切片蘸服神妙			
痘後生翳數服效用葳靈仙仙靈脾等分洗淨不見火			
與日為細末每服隨時宜第三次米泔下			
錢氏黃柏膏痘初出塗面護眼			
大盛服之不入眼			
蠅蛻散治瘡入眼半年已裏者一月取效			
猪羊蹄甲			

右二味研入羚羊角細末二分拌勻每服一字百日外
兒一二分三歲三四分藥水或新水調下日三四夜一
二食後一年已上者不治

治瘡疹入眼

馬屁勃神 皂莢子十四粒 蛇皮兩半

右入小罐子內鹽泥封固燒存性研細溫酒調下三錢
食後

治瘡疹入眼或翳

括萎根半 蛇皮二

右為細末用羊肝一箇批開入藥末二錢麻線纏定米
泔煮熟頻與食之兒未能食肝乳母多食之

又方用蠟蛻末以水煮羊肝湯調服二三錢

地黃散治小兒心肝熱目赤腫痛生赤翳或白膜遮
睛四邊散漫者尤易治若暴遮黑睛者多致失明宜速用
此方亦治瘡疹入眼

木犀葉日本三七

毒

熟地 當歸各一 黃連 大黃煨各

生地去心 木通各半 防風 羌活

生犀末 蠟蛻土去 木賊 穀精草

白蒺藜 沙苑疾藜已上各 甘草半錢

玄參分五

右為細末每服一字或五分童兒大小加減前羊肝湯
食後調下日三夜一忌口將息大人亦治

治痘瘡風熱毒翳膜遮睛以瀉青丸治之大效初覺
易治

用竹葉湯和沙糖水化下瀉青丸二丸漸至微利神效
瘡入眼用決明撥雲密蒙花通聖蛤粉散之類然無出

原入法

此書治瘡云其若病時隨經而取不使毒氣入眼中之
光明散治瘡痘疹入眼海藏云此少陽太陰之劑

決明子 瓜萎仁各半 赤芍藥 甘草各

右為細末入麝香少許令勻每服二錢生米泔調下臨
臥服

撥雲散治瘡痘入眼及生翳用桑螵蛸真者一兩炙令焦
細研搗為末入麝香少許每服二錢米泔調下

密蒙花散治小兒痘瘡入眼及無辜疳氣入眼

密蒙花三 青箱子 決明子 車前子各一

右末拌勻用羊肝一大片薄批捲上濕帛裹煨熟量多
少空心服之錢氏海藏云

通聖散治瘡痘瘡入眼及生翳

白菊花如無甘菊代之 菘豆 穀精草去根

木犀葉日本三七

毒

右為細末每服一大錢柿乾一箇米泔水一盞同煎候
米泔盡只將柿乾去核食之不拘時日三枚日近者五
七日遠者半月取效

蛤粉散治小兒瘡子入眼

穀精草 蛤粉各等

右為細末每一錢七猪肝一兩許批開捲藥捲了用竹
箬裹麻線縛定水一碗煮令熟入收口竟瓶煎候溫
取食之日作不過十日退

明瘡瘡入眼 大行一

針灸

痘咽痛

如聖餅子治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛海藏云隨經此

牛蒡子炒 甘草各一 麥門冬去心 桔梗一

右為末加竹葉同煎細細服之海藏云蘇門冬竹葉甘

鼠粘子湯 消毒飲二方近見前

小兒痘出欲透皮膚身熱咽喉不利甘草桔梗升麻湯

甘草兩半 桔梗兩 升麻兩半

右剉細每服一大錢水煎服

甘露飲子治心熱咽喉痛口舌生瘡并瘡疹已發未發

並可服之治熱上攻牙根腫痛動搖

生地 熱地 天門冬心去 麥門冬心去

枇杷葉毛去 枳殼炒 黃芩心去 石斛苗

甘草炒 山茵陳

右各等分為籠末每服二錢水一盞煎食後溫服牙齒

腫痛則含嗽并服海椒云此露

田黃丸治小兒痘疹口瘡喉腫痛牙疳臭爛

天門冬 麥門冬 玄參各三 甘草

薄荷各一

右為細末生熟地黃汁和丸櫻桃大每服一九溫蜜水

化服

痘風

痘風分氣血虛實以日子守之多帶氣血不足 虛則

黃芪生血之劑助之界佐以風藥 實則白芍黃芩為君

連翹白芷續斷之類為佐若屬寒陳氏方可用

楊氏女年十餘歲痘發不透屬落後骨節痛食少夜間或

熱此餘毒在內虛甚難於疎導須在補中有通此方主之

當歸 白木各一 犀角二 陳皮一

通草 甘草根各三分 牛膝五分 蘇梗分三

右咬咀生薑三片水煎溫服

男子七歲痘瘡初出不透毒氣攻內骨節作痛兩足不可

直癢痕欠紅活脈浮而和小便赤少

犀角各一 陳皮 木通

右分二貼煎服

痘癩瘡

瘡疹瘡由風火相勝也惟瘡疹能作瘡疹為脾所生脾

虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜為熱

神氣不安因瘡成癩癩子為心所生心生熱熱則生風風

屬於肝二臟相搏風火相爭故發瘡也治之當瀉心肝補

其母括萎湯主之海藏云諸瘡疥癩皆屬於心火無論虛

心火相合故用括萎湯若脾土實火旺逆乘而或癩者此

實邪也便結者瀉青丸便數者瀉青湯亦當以膠別之

括萎湯方見

凡未出而發瘡者是外感風寒之邪內發心熱之所作

也當用茶粉下解毒丸犀角地黃湯主之

治瘡瘡欲出身熱煩躁忽發驚搐宜驅風膏小如聖飲

小便不通八正散延盛利驚丸抱龍丸量症施之

欲發瘡疹先身熱驚跳搐搦此非驚風宜發散藥

麻痘風瘡方

人參 羌活 防風 殭蠶燻

南星製 白附製 甘草炙

右等分生薑三片水煎服其瘡立止

瘡疹病後欲發癩餘瘡難發癩以木勝脾木歸心故也

若涼驚用涼驚丸溫驚用粉紅丸即溫

痘瘡痛

治痘瘡痛用溫驚丸水化下方見前

治瘡出煩痛五物木香散

青木香二 丁香 零凌香各一 麝香一分

每服四錢水一小盞半煎服之熱盛者加犀角一兩如無犀角以升麻代之輕者一服大效

又方以芒硝和猪膽塗疥上令動痂落無癢仍用黃土抹之良此病小便澀有血者中壞瘡背黑腐不出膿者死不療

痘將結腐乾硬而痛宜塗酥潤之腐可揭去則去之如無酥用猪油煎汁代之此痛非服藥可免也

痘膿而不痂痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切

痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切

痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切

痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切

痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切

痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切

痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切

痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切

痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切

痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切 痂居牙切

藥汁盡取出研極細每油乾貼於口上

凡痘瘡方纔著痂即用菜油不住潤之可揭則揭若不潤及遲揭瘡痂硬即隱成癩痕矣

痘痂雖落其癩猶黯或凹凸肉起當用滅癩藥塗之

部粉一 輕粉一分 右研細入煉透猪脂油拌和如膏塗癩上

痘後瘡癩 連翹散治小兒瘡疹癩瘡餘毒作楚或生於頭面耳

疹類赤生瘡 連翹 黃芩 瞿麥 木通 滑石 柴胡 荆芥 牛蒡子 防風 羌活 赤芍藥 甘草各等 每服三錢水一盞煎半盞又入生薄荷尤好

痘瘡多是實毒血熱成癩分上下用藥一日不可緩成膿必用清熱涼血為主赤芍藥甘草連翹桔梗之類

上引用升麻葛根下引用檳榔牛膝更助以貝母忍冬草白芷瓜萎大便燥用大黃寒熱用芩栢此法累效

木香散治小兒癩後生癩如神 地骨皮一 木瓜一 川山甲錢三 麝香一分 右為末米飲下二錢

痘瘡傳藥用貝母南星殭蚕天花粉寒水石白芷草烏大黃猪牙皂角醋調傳患處效

中惡 小兒神守則強邪不干正若真氣衰弱則惡氣中

雄黃散治小兒牙齦生疳蝕瘡 雄黃錢一 銅碌錢二 右二味同研極細每用薑湯大小乾貼

綿黃散治小兒因痘瘡身體及肢節上生疳蝕瘡膿水不絕用出蠟綿黃以生白礬搥碎入蠶內令滿炭火燒令白

雄黃散治小兒牙齦生疳蝕瘡 雄黃錢一 銅碌錢二 右二味同研極細每用薑湯大小乾貼

綿黃散治小兒因痘瘡身體及肢節上生疳蝕瘡膿水不絕用出蠟綿黃以生白礬搥碎入蠶內令滿炭火燒令白

雄黃散治小兒牙齦生疳蝕瘡 雄黃錢一 銅碌錢二 右二味同研極細每用薑湯大小乾貼

綿黃散治小兒因痘瘡身體及肢節上生疳蝕瘡膿水不絕用出蠟綿黃以生白礬搥碎入蠶內令滿炭火燒令白

之其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死是也凡中惡腹大而滿診其脈緊細而微者生脈大而浮者死即服蘇合香丸末醒以皂角末搗鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓又能辟邪客忤亦宜服

降真香 白膠香 沉香 虎脰骨酥

人參 鬼箭草 草龍膽各五錢

右為末次入雄黃五錢麝香一錢煉蜜丸乳香湯化又令兒帶及燒臥內尤妙

治中惡客忤唾化麝香一錢重研和醋二合服之即瘥

龍腦膏治小兒發熱在心胃卒不知人方見痘黑腫門即活人方

凡中暑悶倒急扶在陰涼處切忌與冷若得冷即死當用捕藥及熱湯熨臍腹間煖即瘥如無湯即搗熟土壘於臍上仍撥小窩子尿於中可代湯熨之良久嚼大薑一塊

以水嚥下續用解暑藥

針灸 小兒口中腥臭腸膈氣滿勞宮主之

客忤

湯 客忤者小兒神氣軟弱忽有非常之物或未經識見之人觸之或經歷神廟佛寺與鬼神氣相忤也故謂之客忤亦名中客其狀吐下青黃白色水穀將下時腹痛及倒面變五色其狀若痛但目不上插耳其脈數者是也亦宜服蘇合香丸并真珠散

真珠散治客忤驚風鬼疰驚邪痰熱心舍不寧精神不定心常怔忡睡中驚跳時或咬牙五心煩熱有汗兼喘面赤舌白呵欠煩渴小便赤瀉或吐利黃沫常服辟邪安神

真珠 海螵蛸 滑石各一錢 白茯苓 人參 白附子 甘草炙 全蝎

麝香 腦子另研各五錢 生珠另研一錢 金銀箔各十片

右末和勻半錢煎燈心麥門冬湯入蜜少許調服日午臨臥各一服

客忤因而驚忤者治法用電中黃土研二兩鷄子一枚去殼二件相和入少許水調先以桃柳枝湯浴兒後將此藥塗五心及頂門上陳無擇法用此中黃土如法塗之

治卒客忤噤口不能言細辛桂心等分納口中效

六 醫學綱目卷之三十一

醫學綱目卷之三十一

醫學綱目卷之三十八 小兒部

脾主濕 吐瀉 吐 吐水吐 泄

瀉 乳食不化 赤白痢 腹脹

水腫 疳 虛羸 鶴節 宿食

痞 嘔露 癰 脾弱多困 渴

大小便秘 黃疸 腹痛 驚口 口

瘡 疔 口噤 滯頭 撮口

白附丸通治小兒咳嗽有痰感冒發熱吐瀉心神不安

神效 南星 半夏 白附子 白礬

右為細末薑汁糊丸如桐子大一歲兒服八九丸用薄荷湯化下

吐瀉 小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消

或白色是傷寒當下之併和胃下用白餅子和胃用益黃散主之

兒生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛也更有五臟兼見證 肺睡露

喘喘氣 心驚悸飲水 脾困倦饑睡 肝呵欠煩悶 腎不語長明

當先視兒兼臟症先瀉其所實者而補其虛如脾虛益黃散主之此二症多病於秋夏也

五月夏至後吐瀉身壯熱者此熱也蓋小兒臟腑十分中九分熱也或因傷熱乳食不消瀉深黃色玉露散主之

玉露散一名甘露散 寒水石 生甘草 石膏

之堅白似石膏者如無以方解石代之

五六月身 身溫涼 七分下

六月大暑後吐瀉身大溫而似熱臟腑中六分熱四分冷也吐瀉乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前

少服益黃散食後多服玉露散 廣親宮五太尉病吐瀉不止米穀不化眾醫用溫藥一日而加喘吐不定錢氏曰

當以涼藥治之所以然者謂傷熱在內也用石膏湯三服并服之眾醫皆言吐瀉多而米穀又不化當補脾何以用

涼藥王信眾醫皆用補脾丁香散三服錢醫後至曰不可服此三日後必腹滿身熱飲水吐逆三日外果如所言所

以然者謂六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃即大吐瀉也醫又行溫藥使上焦亦熱故喘而引飲三日當甚

眾師不能治復召錢至見其熱證以白虎湯三服更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯各二服

四日用石膏湯一服及旋合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺黃茯苓以硃砂為衣服五九竹葉湯化下熱退而安

七月立秋後吐瀉身溫臟腑中三分熱七分冷也不能食乳多似睡悶亂嘔氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便不

渴食前多服益黃散食後少服玉露散 廣親宮七太尉七歲病吐瀉是時七月其症全不食而昏睡睡覺而悶亂

嘔氣乾嘔大便或有或無不渴眾醫作驚治之疑睡故也錢曰先補脾後退熱與史君子九補脾石膏湯退熱次日

又以水銀硫黃末研和以生薑水調下一字錢曰凡吐瀉五月內九分下而一分補八月內九分補而一分下此者

是脾虛瀉醫妄治之至於虛損下之即死即當補脾若以史君子九恐緩已又留溫胃益脾藥治之醫者李生曰何

食而噦錢曰脾虛津少即嘔逆曰何瀉青楊水曰腸胃至
虛冷極故也錢治而愈

八月秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾嘔噦瀉青楊
水當補脾益黃散主之不可下也

凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下焦則瀉在上焦則吐上津
必渴用玉露散雖吐時時與啜之過三日必愈 如身熱

脈大小便黃用五苓散元各半熱湯調溫服之 如身涼
脈細小便青早晨益黃散午後玉露散 如遇四五日困

弱宜異功散和中丸開胃丸
如有風而瀉用防風羌活 謂吐瀉兼所病 有熱而瀉

用黃連黃芩大黃 謂吐瀉兼心 有寒而瀉用附子 謂吐
瀉兼腎身冷或足 有濕而瀉用白朮茯苓 謂吐瀉兼本氣
昏倦而逆也 有肺病而瀉用芍藥桂心定喘麥冬人參甚者多

橫榔大便不通加大黃 謂吐瀉兼肺 更詳看病新舊新
則止之久則有腸風之患宜推陳致新法宜風散導過
後用入臍君臣藥調之宜益黃散

傷寒吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣短大便黃白色嘔吐
乳食不消時咳嗽更有五臟兼見症當煎入臍君臣藥先

服大青膏後服益黃散如先曾下或無下證慎不可下此
乃脾肺受寒不能入脾也 謂古云身溫吐瀉咳嗽是風木
橫榔荳蔻湯下大

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此
為胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發

散藥止渴多服白朮散發散大青膏主之 謂古云吐瀉身
者五苓散主之身熱而嘔者當服白

木散後煎橫榔木香湯下大青膏

傷風吐瀉身涼吐沫瀉青白色悶亂不渴噎氣長出氣睡

露晴此傷風在再輕怯因成吐瀉當補脾後發散補脾益
黃散發散大青膏主之此二證多病於春冬也 謂古云身
瀉者則知為寒散脾

小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以涼
藥治之又不能散謂之本傷風醫者亂攻之因脾氣積虛

內不能散外不能解至十餘日其証多睡露睛身溫風在
脾胃故大便不聚而為瀉當去脾間風風退則痢止宜風

散主之後用史君子丸補其胃亦有諸吐痢久不瘥者則
脾虛生風而成慢驚矣

吐瀉過多脾胃虛乏欲生風候者四君子加白附子減
半生薑煎服

玉露散方見
和中散和胃止吐瀉定煩渴治腹痛

人參 茯苓 白朮 甘草 各
乾葛 黃芪 白豆 藿香 各等

右為細末每服三錢水一盞半末三枚去核生薑五片
煎八分食前溫服 海藏云和中散四

小兒周歲吐乳腹瀉
滑石 二 白朮 錢三 乾葛 錢一 陳皮 錢三

右為籠末煎飲之

吐瀉身熱瀉黃多渴錢氏作熱病治在夏秋用玉露散兼
益黃散相間服在春冬用白朮散大青膏亦相間服

萬安膏方見
吐利四肢脹逆腦門低陷四君子加藿香丁香芍藥等

分煎服○錢氏益黃散方見小兒
和胃丸治吐瀉不止欲生慢驚

丁香 白木 半夏 藿香
蝎尾 各一

右為末薑汁打糊為丸如小豆大三歲兒三十九薑湯

下
理中丸治吐利不歇米穀不化手足厥冷方見

金液丹治吐利日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞多睡
露睛口鼻氣涼欲成慢驚風又治大人陽虛陰盛身冷脈
微自汗吐利小便不禁

船上硫黃 十兩先飛煉去砂石秤研為末用砂盆子
盛地先埋一水礮盛水滿盆子在上又以泥固封
乾常以三斤火養二日三夜足加頂火一斤煎成於
藥

右以柳木拖乳鉢研為末每服二錢生薑米飲調下多
服取效大人藥末一兩蒸餅一兩水浸去水餅和丸桐

子大晒乾每服五七九至百九米飲空心下

關氏云吐瀉虛極當速生胃氣宜與理中丸併研金液
丹末煎生薑米飲調灌之惟多服乃效俟胃氣已生手
足漸熱然猶瘳瘳即減金液丹一二分增青州白九子

一二分同研如上服兼用異功散羌活膏溫白九鈞藤
飲子之類仍類與粥雖至危者往往死中得生十救八
九沈存中論金液丹見小兒吐利劇氣已絕服之得活
者數人須多服方驗

芫蕒散治吐瀉煩渴腹脹小便少

船上硫黃 滑石 丁香 芫蕒 各半
右為細末每服一字至半錢米飲調下無時

芫蕒散治虛寒而渴方見 白朮散治虛熱而渴方見
吐瀉身溫瀉黃白似渴錢氏作寒熱雜合病治在夏秋用

玉露散益黃散相間服在冬春用益黃散大青膏相間服

之
異功散溫中和氣治吐瀉不思乳食凡小兒虛冷病先
與數服以正其氣一方加

人參 茯苓 白朮 甘草
陳皮 各等

右為細末每服二錢水一盞生薑五片葱二枚同煎
云此方內君子湯
補脾湯加法也

溫中丸治小兒瀉白胃寒故也腹痛腸鳴吐酸水不思飲
食霍亂吐瀉

人參 白朮 甘草 各等

右為末薑汁麩糊丸如菽荳大米飲下二三十九無時
吐瀉昏睡露睛者胃虛熱吐瀉昏睡不露睛者胃實熱

胃虛熱治法錢氏白朮散和中散是也胃實熱治法錢
氏玉露散河間益元散是也

寒痰
半粟散治小兒脾胃虛寒吐瀉等疾及治寒痰

右咬咀每服三錢水一大盞半生薑十片同煎至八分
食前溫服

白附丸 錢氏吐瀉乳不化傷食也宜下之

馮承務十五歲吐瀉壯熱不思食飲錢氏見兒目中黑睛
少而白睛多面色眊白曰此子必多病面色眊白者神怯

也黑睛少者腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長
成必肌膚不壯不奈寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱

恣酒慾若不保養不過壯年也面上常無精神光澤者如
婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也又虛怯不可

下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛但宜以消積九磨化之為微有食也如傷甚則可下不下則成癖也若實食在內亦可下也下畢補脾必愈隨其虛實無不效者

小兒吐瀉黃疸

三稜 蓬朮 陳皮 青皮

神麩 麥芽 黃連 甘草

白朮 茯苓

右為細末生薑燈心湯調服傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加滑石發熱加薄荷

吐

萬安膏調脾順氣定驚脾胃不足吐乳黃疸治小兒一切等疾

八寶丹

七

木香 沉香 檀香 香附

檳榔 白朮 肉蔻 薄荷

人參 甘草 辰砂 琥珀

真珠 青黛 犀角 黃芪

麝香 史君子 天竺黃

右為末煉蜜丸臨臥服薄荷汁或蜜水米飲化下

萬安膏治小兒脾胃虛弱腹生疳虫癥瘕食積泄瀉常服消疳去積助胃氣和中疎氣滯

人參 木香 沉香 藿香

厚朴 甘草 陳皮 青皮

乾薑 肉桂 史君子 澤瀉

右為末煉蜜丸如芡實大食前米飲化下如熱薄荷湯

下方無木香沉香藿香青皮四君子有白朮蒼朮茯苓猪苓

吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷吐稠涎及血皆肺熱久則虛吐痰涎冷者温之

朱沉丹治小兒嘔吐不止

硃砂 沉香 藿香 滑石

丁香 右為細末每服半錢用新汲水一盞芝麻油滴成花子抄藥在上須臾墜瀉去水却用別水空心送下

抄藥在上須臾墜瀉去水却用別水空心送下

定吐紫金核治小兒一切嘔吐不止

半夏 人參 白朮 木香

丁香 藿香

右為細末稀麩糊為丸如李核大後用沉香一錢為末

硃砂一錢水飛二味同研勻為衣陰乾每服一九用小

枣一枚去核納藥在內濕帛裹燒熟嚼與小兒服後以

米飲壓之

香銀丸治吐

丁香 乾葛 半夏 水銀

右上一三味同為細末將水銀與藥研勻生薑汁九如麻

子大每服一二九至五七九煎金銀花湯下無時

白朮散治小兒吐嘔脈遲細有寒

白朮 人參 半夏 茯苓

乾薑 甘草

右為末每服二錢水一盞薑三片葱一枚煎七分去渣

温服日二三

小兒寒吐者由乳母當風取涼解脫致令風冷入乳變

敗兒若飲之故嘔吐也乳母當食後捏去舊宿敗乳急服
理中湯次用釀乳法其候是寒清痰夾乳吐是也凡有
此候服藥不效胃氣將絕藥不能下當服靈砂丸如大便
通宜來復丹二藥常用驗

吐乳尋田中蚯蚓屎研如泥食前米飲下五分不過三
四次妙方

藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽及轉過度者宜
服

麥門冬去心 半夏炒 甘草炙各 藿香一兩
石膏兩

右為末每服五分至一錢水一盞半煎七分食前溫服

治小兒嘔吐服數有熱麥門冬散
麥門冬 半夏 人參 茯苓各二

甘草錢一
右為末每服二錢水一盞薑三片煎至五分去渣溫服
日二三服

錢氏玉露散方見
治小兒伏暑嘔吐清膈飲子

香薷 淡竹葉各一 白茯苓 人參
半夏 檀香 甘草各半兩 白粳米合

右咬咀煎溫服大小加減

小兒秋夏伏暑多有熱吐其吐黃涎頭額溫五心熱小便
或赤而少乃熱吐也或乾嘔而無物宜香薷飲方見

治小兒疳積黃瘦吐食
川烏錢一 定粉錢三 艾灰錢二 龍骨錢二
右為末滴水丸如龍眼核大捏作餅子每服一餅米飲

風寒吐 磨下
鐵粉丸治延盛潮痛吐逆
水銀砂下 硃砂分 鐵粉 天南星各一

右同研水銀星散盡為度薑汁糊丸如粟米大煎生薑
湯下十五丸至三十九丸無時

田氏朱沉煎 紫金核方見
治小兒吐不定用五倍子二箇一生一熟甘草一握濕
帛裹炮過同搗為末每服米泔調下半錢七瘥

二氣散治虛實冷熱霍亂吐逆
硫黃不灰石者 水銀一分與硫
右同研如墨煤色不見星為度每服一字至五分乾薑
水調下不拘時量兒大小加減此散浮泛難調先酒少

水以指緩緩研之稍稍增湯調之治大人小兒一切吐
逆諸藥不效者服此頃刻如神

凡小兒乳哺不宜飽滿飽滿而必溢故嘔吐 生下吐
針灸 吐乳 灸中庭一壯

吐水吐虫
面脫白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散
主之

冬月吐蛇多是胃虛寒而重作吐用錢氏白朮散加丁
香二粒

吐水不止者屬心痛胃冷 吐水心痛者虫痛 口中
吐沫水者後必虫痛

泄瀉

虛

萬安膏治吐瀉腹痛吐乳方見

吐瀉四君子加陳皮厚朴等分同煎一法加陳

滑瀉

臟腑滑泄四君子加訶子五分米飲調下

傷食瀉

黃承務子二歲病傷食而瀉眾醫與止之十餘日便青

白乳食不消身涼加噎氣昏睡咸謂因篤召錢錢先與益

黃散補肺散各三服三日身溫而不噎氣後以白餅子微

下之又與益脾散三服利止何以然利本脾虛傷食初不

與下之留連十日上實下虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子

母故也今先補脾則肺病自退即身溫不噎氣也然後下

其所傷或曰何不先下後補曰便青為下臟冷若先下必

大虛今先實脾而後下則不虛矣後更與補之乃安益黃

見小兒

寒瀉 溫中丸治胃寒瀉白腹痛腸鳴方見

入醫學綱目卷二十八

土

瀉青亦是寒宜用蘇合香丸平胃散各等分蜜湯調服

便青者因驚風內臟脾氣不和治宜白朮湯

凡大瀉引飲者其病不以新久皆宜服白朮散痢病亦

同治

熱瀉

小兒夏月泄瀉用益黃散 瀉黃赤黑皆熱用益元散

黃栢丸之類

母瀉

史君子丸治疳瘦泄瀉腹脹滿方見

診

小兒大便青辨痰泄脈小手足寒難已脈小手足溫易

已

乳食不化

胃冷

食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

乳食不消初病忽然氣出冷四肢亦冷面白無光澤精

神不定此乃胃氣不和可以大溫藥治之史君子丸益黃

散主之 若病泄瀉日久不瘥乳食不化是脾胃有風冷

先服益黃散二服後用宜風散導之胃宜再補

赤白痢

治小兒痢疾

黃連 黃芩 大黃 甘草

右煎服赤痢加紅花桃仁白痢加滑石末

治痢之法若欲取積只用官局進食丸甚難取積又

能治痢萬無一失積已下急以四君子湯加荳蔻訶子補

之次服厚腸香連丸得效

治小兒赤白痢多體弱不堪下大困重者麻子一合炒

令香熟末每服一錢七蜜漿水和服效

痢瀉痢日久不瘥海內

瀉黃紅赤黑者皆熱毒 瀉青白散不化者胃冷

入醫學綱目卷二十八

土

白附香連丸治腸胃氣暴傷乳哺冷熱相雜渴痢赤白裏

急後重腹痛扭撮晝夜頻併乳食減少

黃連 木香 白附片

右末飯丸如粟米大每服十九至三十九米飲下食

前日夜各四五服

荳蔻香連丸治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴

切痛立效如神

黃連 肉荳蔻 木香

右為細末粟米飯丸如米粒大每服十九至三十九

日夜各四服食前米飲下

木香丸治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連 肉荳蔻 木香

右為細末麩糊丸如黍米大赤痢粟米飲下白痢厚朴

湯下空心

小香連丸治冷熱腹痛水穀利腸滑

木香 訶子肉各一黃連兩

右為細末米飲和丸如葶藶大每服十九至三十九食前頻服之

赤痢四君子加赤芍藥當歸入粟米少許同煎

治熱痢備急方用井花水調騰茶蜜磨生薑湯則飲之

黃栢丸治小兒熱痢下血

黃栢半兩 赤芍藥四

右為木飯和丸如麻子大每服一二十九食前米飲下量兒加減

治小兒赤痢搗青藍汁二升分四服聖惠方治小兒中壘下血

治小兒尿血甘草五分以水六合煎取二合去查一歲

兒一日服令盡

白痢四君子等分加乾薑減半入粟米少許同煎

治小兒久痢淋瀝水穀不消枳實六分搗末以米飲調

二錢七二歲兒服一錢

小兒噤口痢酸乳法

厚朴 枳殼各五分 白朮 芍藥各半

滑石兩 木通 陳皮 甘草各五分

右分四帖細研桃仁七枚水二盞半煎取一盞與母服

服時去宿乳令盡為妙

黃連例錢氏 加黃栢為二聖丸 加橘皮為橘連丸

加榆仁為榆連丸 加黃芩大黃為三黃丸

加阿膠茯苓為阿膠丸 加訶子木香為小香連丸

加荳蔻木香為荳蔻香連丸 加木香白附子為

白附子香連丸治 加阿膠當歸乾薑為駐車丸

小兒腸下滿瀉痢體重四肢不收痲痺積聚腹痛不嗜

食痰瘧寒熱 脾腧二穴在背十一椎下兩旁

秋深冷痢不止 臍下二三寸間動脈中 痢下赤

白脫肛 十二椎下節間 又法翠尾骨上三寸骨陷

間三壯姓如 又法龜尾一壯脊端

腹脹附下

虛家腹脹虛實 凡久病吐瀉之後虛則其脈微細肺主目

胞及脾主四肢若色淡黃目胞腮虛腫手足冷先服塌

氣丸後服異功散和中丸四君子湯益黃散之類用諸溫

藥養真氣四君子湯方見治虛實法

塌氣丸

胡椒兩 蝎尾兩

右為末糊丸如粟米大每服五七九至一二十九陳米

飲下無時一方有木香一錢

調中丸治小兒久傷脾胃腹脹

乾薑 橘紅 白朮 茯苓

木香 砂仁 官桂 良薑各等

右細末糊丸如麻子大每服二三十九食後熱水下

實則脈洪實不因吐瀉久病後亦不因瀉下腹脹而喘

急悶亂更有痰有熱及有宿食不化而腹脹者宜服白餅

子大黃丸解餅丸下之兼須詳認大小便如都不通先利

小便後利大便白餅子方見解餅丸方

小兒熱結於內腹脹壯熱大便赤黃燥悶煩亂者宜瀉

奇丸

腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下之用紫

實者可下虛者

不可下

霜丸白餅子 此言未下而喘者為實故可下若誤下而喘

方見不喘者虛也不可下若誤下之則脾虛氣上附肺而

行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛

甚即目胞腮腫四肢黃色治之用場氣丸漸消之未愈漸

加丸數不可以丁香木香橘皮荳蔻大溫散藥治之何以

然脾虛氣未出故雖腹脹而不喘可以溫散藥治之使上

下分消其氣則愈矣若氣虛已出附肺而行即脾胃內弱

每生虛氣入於四肢面目矣小兒易為虛實脾虛則不受

寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿誤也胃久虛熱

多生疳病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣上行於四

肢而目腫若水狀腎氣浸浮於肺即大喘也此當用場氣

丸病愈後面未紅者虛衰未復故也 此下後喘故宜場氣

之 ○治腹脹者譬如行兵戰寇於林寇未出林以兵攻之

必可獲寇若出林不可急攻則必有失當以意漸收之

即順也寇未出林謂虛氣未出而不喘不目胞腮腫故可

已出林謂虛氣已出為喘為目胞腮腫須用場氣丸漸消之

治小兒虛腹脹先服場氣丸不愈腹中有食積結糞小便

黃時微喘脈伏而實時飲水能食者可下之蓋脾初虛而

後有積所治宜先補脾然後下之後又補脾即愈也不可

補肺恐生虛喘

阿魏丸治小兒食積腹如蜘蛛狀肚痛小便白濁

阿魏 醋浸一宿研 黃連 炒半 花碱 研如粉

山查肉 兩 連翹 半 半夏 一宿一兩

右為末炒神麩糊丸如荀子大每服二十九空心米飲

下喫果子多者加胡黃連米食多者加神麩山查肉食

多者加阿魏

又阿魏丸

阿魏 一兩 黃連 六兩

右為末醋浸阿魏一宿研如泥湯浸蒸餅丸如元氣不

足加人參

小阿魏丸

山查肉 三 石碱 三 半夏 一兩

右為末阿魏半兩醋浸糊丸白湯下

小兒疳病或腹大

胡黃連 二錢去 阿魏 一兩半 神麩 二錢去

黃連 二錢去 麝香 四粒

右為末每服十二粒白木湯下

肥兒丸治小兒病多因缺乳喫食太早所致或因久患

臟腑胃虛虫動日漸羸瘦腹大不能行髮豎發熱無精神

黃連 神麩 麥芽 炒半 木香 一

檳榔 三箇不 史君子 肉苣蕒 各半兩

右為末糊為丸如桐子大每服三二十九量兒加減熟

水吞下

六神丸治如前證

丁香 木香 肉苣蕒 用麩製 各五錢

訶子 半兩 史君子 肉苣蕒 各一兩

右為末以葱肉和丸如麻子大每服五丸至七丸溫米

飲下食前

丁奚者腹大頸小黃瘦是也無辜哺露三候大體相似輕

重立名宜服十全丹

十全丹治丁奚哺露神效方

檳榔 枳殼 青皮 陳皮

<p>三稜<small>炒</small> 蓬木<small>炒</small> 砂仁<small>各半</small> 丁香</p> <p>木香<small>各一</small> 香附<small>兩</small></p> <p>右為末神麴糊丸如黍米大空心食前米飲下百丸一方去香附砂仁丁香三稜枳殼加五靈脂白蔻史君子蘆薈蝦蟇川芎</p>	<p>治小兒腹如蜘蛛四肢瘦者用黑骨雞子破頂入蜘蛛一枚於內以濕紙糊竅用文武火煨熟去蜘蛛食其雞子累效必效救方愈</p>	<p>中滿分消丸</p> <p>黃連 枳實 厚朴<small>各五</small> 乾薑</p> <p>薑黃 猪苓 砂仁 澤瀉</p> <p>茯苓<small>各三</small> 陳皮 白朮<small>各一</small> 半夏<small>各四</small></p> <p>黃芩<small>二兩</small> 甘草<small>一分</small></p> <p>右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九丸溫酒送下消痞丸快利之劑</p>	<p>黃連 枳實 黃芩 甘草</p> <p>人參<small>各三</small> 厚朴<small>各七</small> 乾薑<small>各四</small> 橘皮<small>各一</small></p> <p>薑黃<small>各五</small></p> <p>右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九丸隨乳下</p>	<p>腹脹</p> <p>蘿蔔子 蘇梗 乾葛 陳皮<small>各等</small></p> <p>甘草<small>半</small></p> <p>如食減加白朮煎服</p>	<p>升陽滋血湯二月間一小兒未滿百日病腹脹不大便二日便瘦弱通身黃色宜升陽氣滋血和血補血利大便</p> <p>蝎稍<small>分二</small> 神麴<small>分三</small> 厚朴 當歸<small>各</small></p>
---	---	---	---	--	---

<p>桃仁<small>十</small> 升麻<small>三</small></p> <p>右作一服水一盞煎至半盞去查食前服</p> <p>麻黃升麻湯治小兒面色痿黃腹脹食不下正月四月小兒服之神效</p>	<p>麻黃<small>分二</small> 桂枝<small>一分</small> 杏仁 吳茱萸</p> <p>草薢<small>各</small> 厚朴 麩末 羌活<small>各一</small></p> <p>柴胡根<small>分五</small> 白茯苓<small>一分</small> 白朮 青皮<small>各五</small></p> <p>升麻根 蒼朮 澤瀉 猪苓</p> <p>陳皮<small>各一</small> 黃連<small>分五</small> 黃柏<small>一分</small></p> <p>右咬咀作一服水一大盞煎七分去查食前熱服</p>	<p>寄子年五歲痘後肚急</p> <p>白朮<small>一分</small> 陳皮 木通<small>各五</small> 犀角屑</p> <p>川芎 白芷 蘇梗 甘草<small>各三</small></p> <p>右咬咀水煎服</p>	<p>針灸</p> <p>治腹脹引背飲食多漸漸羸瘦黃可灸脾脘二穴七壯在十一頰下兩傍相去各一寸五分黃疸灸三壯</p> <p>小兒腹滿不能食飲懸鍾主之</p> <p>丁奚即脹治見脹門丹溪條</p>	<p>水腫</p> <p>白文舉兒五歲身面皆腫尿多</p> <p>山梔<small>炒</small> 桑皮<small>炒各</small> 黃芩<small>二錢</small> 白朮</p> <p>蘇梗<small>各一</small></p> <p>右咬咀作三貼水一盞半煎至半盞食前溫服</p>	<p>退腫散氣方</p> <p>赤小豆 陳皮 蘿蔔子 甘草<small>各</small></p> <p>木香<small>分七</small></p>
---	---	--	--	---	--

右為鹿末薑煎服大小加減

又方

白朮炒

木香炮

甘草炙

茴香炒

青皮各半兩巴豆三十粒去膜

右為末米飲調下

又方用錢氏益黃散加木香去丁香加蘿蔔子去訶子為

末大小加減米飲調下

水腫加

腫病腎熱傳於膀胱熱盛逆於脾胃脾虛而不能制腎

水反尅脾土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫也

若加喘者重也何以然腎水勝而尅退脾土反勝心火心

又勝肺肺為心尅故喘或問曰心刑肺肺本見虛今何喘

實曰此有二一者肺大喘此五臟逆二者腎水氣上行傍

侵於肺故令大喘此皆難治

針灸

水氣浮腫 分水三壯

疳

疳者小兒病癖或久吐瀉醫者妄投轉過之藥小兒易

為虛實致令胃虛而三津液內發虛熱外消肌肉一臟虛

則諸臟皆弱其病目胞腫腹脹利色無常或沫青白漸

痊可是腸胃有風積法當宣風散導之後各依本臟補其

母

諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香丸熱則

胡黃連丸主之疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸

瘦弱此冷證也宜史君子丸

史君子丸治臟腑滑及疳瘦下痢腹脹滿不思乳食常

服安虫補胃消疳肥肌

厚朴去蘆皮薑汁 史君子去殼一兩

陳皮去白 甘草炙對 訶子半兩半生

青黛半兩是兼驚及帶熱湯者宜此

右為細末煉蜜和丸如小雞頭大每服一九米飲化下

兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下元方無青

黛

厚腸丸治小兒失乳以食飼之不能消化或生腹脹四

肢瘦弱或利色無常

陳皮分三 麥蘖分五 半夏分三 枳殼分五

蒼朮分三 青皮分二 人參分三 厚朴分二

麩末分五

右為細末麩糊丸如麻子大每服二十九溫湯送下忌

飽食

芩朴丸治小兒疳瘦瀉白水腹脹

芩朮 厚朴各一兩 白朮兩半

右為細末煉蜜丸如小彈子大每服一九米飲化下三

歲已下半丸

治小兒無辜疳吐脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆一兩

并為散每服以猪肝一兩散子一錢七塩少許水煮熟空

心頓服

小兒腹大泄瀉水穀不化喫食不知飢飽累效

神麩炒 麥芽炒 三稜 青皮

香附 山查 厚朴 甘草

藿香 枳實 地黃 砂仁

黃連 苳子各等

右為末白湯調下量兒加減

一富家子年十四歲面黃善喫易飢非肉不飽泄瀉一

歲而愈

月來求治脈之兩手皆大怪不甚瘦倦以為濕熱情脾因
而食少今反形健而多食且不渴予意其疾必疳虫作痢
也取大便視之果蛭虫所為適往他處有一小兒醫在側
教其用治虫藥治之禁其勿用去積藥約回途當為一看
診而止痢也偶勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛
而口乾予曰此去年治虫而不治疳故也遂以去疳熱之
藥濃煎白木湯下三日而瀉止半月後偶過其家見其子
甚瘦予教以白木為君芍藥為臣川芎陳皮黃連胡黃連
入小蘆薈為丸白木湯服之半月而止禁其勿食肉與甜
物三年當自愈

大蘆薈丸治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連 黃連 白蘆薈用 蘆薈

木香 青皮 雷丸 破關白者佳 赤者勿用

木香 辰砂 麝香 另研

右為細末粟米飲和丸如菴荳大米飲下一二十九不
拘時

胡黃連麝香丸治疳氣瘰癧出白虫

胡黃連 白蘆薈 仁各一

木香 各半 辰砂 另研 麝香 另研

右為細末麩糊丸如菴荳大米飲下五七九至十九三
五歲已上者十五九至二十九服無時

榆仁丸治疳熱瘦悴有虫久服充肥

榆仁 去 黃連 去 各

右為細末用猪膽七箇破開取汁與二藥同和入碗內
甑上蒸九分每日一次候日數足研麝香五分蒸餅湯
浸一宿同和成劑丸如菴荳大每服五七九至一二十

九米飲下無時
右四方治瀉而多食為虫疳也
木香丸治時時下利唇口青白 如聖丸治冷熱疳瀉
沒石子丸治洩瀉白濁及疳利滑腸閉痛
木香 黃連 各一 沒石子 一枚 荳蔻仁 二
訶子肉 三
右為細末飯和丸如麻子大米飲下十五九量兒加減
食前
休息痢及疳瀉痢遷延日月百藥俱試飲食不妨便痢
不止用雞子一枚打破鎔黃蠟一塊如指大以雞子和炒
空心喫盡百醫百效無不獲安
小兒疳痢垂死者取盆母草炙食之取足瘥止甚佳
右治瀉而少食為冷疳也
獨脹不瀉治法見脹門
疳疔在外鼻下鼻爛自揉鼻頭上有瘡不着痂漸透耳生
瘡
走馬牙疳神效乾薑白礬末子燒焦存性為末傅患處
鼻疳治法先用甘草白礬湯洗淨後移蘆薈黃連黃柏
末日三傳 一方用米泔洗黃連末傳日三四次亦佳
紅鉛散治走馬疳綠礬不以多少色鮮明者入乾鍋用
炭火燒鍋赤傾出以好酒酒拌勻再入鍋如此數遍色紅
研作細末入麝香少許先以溫藥水洗嗽淨用指蘸藥有
疳處貼之
乳香 輕粉 砒 研各 麝香 少

右先將乳香研細入輕粉磨砒共再研勻用薄紙一葉
葉潤去藥內按過搽紙少許九如黃米大臨臥將藥填
在患處至明則愈忌食醬醋鹽等物

蘭香散治鼻瘡爛

蘭香葉燒灰 二錢 銅青亦 五 輕粉字 二

右末令勻看瘡大小乾貼之

龍骨散治口疳走馬疳

砒霜字 一 粉霜字 一 龍骨錢 一 定粉字 一

龍腦字 半 蟾酥字 半

右先研砒粉極細次入龍骨等研次入定粉等同研每
用少許傳之

經治小兒走馬疳透損骨及小小攻蝕必效方天南星
一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麩裹燒候雄黃作

白粉散治諸瘡

汁以蓋子合定出火毒去麩研為末入麝香少許拂瘡驗

烏賊魚骨末

白芨末七 輕粉七

右末先用清漿水洗拭過貼之

小兒牙疳用茴香桔梗燒灰存性傳之如乾油調傳

五福化毒丹治腫鼻清隔涼血

玄參 桔梗去蘆各 赤茯苓 人參

牙硝 青黛 甘草各一 麝香五

一方有龍腦五分

右除麝香牙硝另研一處為末次和青黛等煉蜜丸如
芡實大金銀箔為衣薄荷湯化下瘡疹餘毒磨生犀角

水下上焦熱壅口齒鮮血宜露鼻氣用生地黃汁化下
食後

大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥熱疳久病者
為瘦冷疳是也冷者木香丸熱者黃連丸主之冷熱之疳
尤宜服如聖丸

胡黃連丸

胡黃連 黃連各半 硃砂分一

右上一二物為細末研入硃砂末都填入猪膽內用淡漿
於砂銚子內懸胎煮一飯時久取出研入蘆香麝香各

一分飯丸如麻子大每服五七九至一二九米飲下

食後 一方加蝦蟇半兩不燒

木香丸

木香 青黛另 檳榔 肉蔻去皮各

麝香另研 續隨子一兩 蝦蟇三箇先用繩繫

右末蜜丸如菴豆大每服三五九至一二九薄荷湯

下食前

如聖丸治冷熱疳瀉

胡黃連 川黃連 白蘘蕪去皮炒各三兩

史君子去殼 麝香另研 乾蝦蟇五箇酒浸

右前藥為末與膏丸如麻子大每服人參湯下二三歲

五七九已上十九至十五九無時

小兒冷疳多渴好以冷地煩躁啼叫飲食不進漸成羸

瘦其候難明有若熱證但大便滑泄百藥不效是因女

子百藥俱試而無偶中者竟與錢氏木香丸不數服而愈

自後凡有此證無不獲驗

錢氏肝疳白膜遮睛

湯氏肝疳眼白青兩眼睛痒

錢氏筋疳瀉血而瘦並當補肝地黃丸主之方見勞瘵節

驚風香九治小兒一切驚疳等病

草龍膽 胡黃連各半 木香 蟬蛻去頭足洗淨

瓜蒂 龍腦 麝香

牛黃各一錢並

右猪膽為丸如桐子及葶藶大驚疳或秘或瀉清米飲

送下小兒五七粒至一二十粒眼疳疳疳下疳渴燥

猪湯下猪肉湯下亦得驚風發搐眼上窺薄苛湯下一

九更水研一丸滴鼻中牙疳瘡口瘡研貼止痛苦練根

湯或白蘆莢湯送下百日內小兒大小便不通水研封

臍中有虫候乾漆麝香各少許并入生油一兩點溫水

化下一大丸慢驚勿服

睡驚九治小兒一切驚疳食積風癩之證

史君子五十塊 香墨一大塊 金銀箔各七 膩粉二錢

入膏聖藥卷三二八

主一

右先將史君子存性同墨研細次入金銀箔乳鉢內研

次入膩粉并麝香少許研令極細稀糊丸如桐子大陰

乾每服一丸薄苛湯磨下一歲已下半丸一名青金丹

極效

田氏涼驚丸治小兒驚熱疳瘦乳疳方見

錢氏心疳面黃頰赤身壯熱當補心安神九主之方見治

湯氏心疳口内生瘡

田氏安神九治心虛疳熱面黃頰赤壯熱驚喘神志恍惚

不寧方見治

驚甲散治疳勞骨蒸

驚甲九助者湯浸 黃芪錢 白芍藥各一

生熟地 地骨皮 當歸 人參去蘆各

右咬咀每服二錢水半盞煎服

猪肚丸治骨蒸疳勞肌體黃瘦

木香半 黃連 生地 青皮

銀柴胡去 驚甲九助者湯浸用童

右為末猪肚一枚入藥於內以線纏之於沙礮內懸胎

煮熟取出細研猪肚為丸如麻子大米飲送下大小加

減不拘時服

龍膽丸治疳病發熱

龍膽 黃連 史君子肉 青皮各等

右為末猪膽汁和丸如桐子大每服三十粒量見加減

臨臥熱水下

右四方治疳熱安神九其寒補心驚甲散其溫補脾後

二方苦寒瀉脾瀉濕熱也

烏犀丸治小兒疳熱腹内生虫肚大手足疲弱丁吳庭

入膏聖藥卷三二八

主一

羸此方治疳

黑牽牛二兩 史君子七錢 青皮二兩 雷丸二錢

苦練皮半兩一方不用練 鶴虱五錢

右同入鍋內炒焦為末麪糊丸如黍米大三歲見二十

九米飲下食前烏犀丸食後黃龍丸

二丁丸治乳癰食癰疳熱如神方見

疳熱當服進食丸磨積仍間服化虫丸後服驚甲散退

熱次服肥兒丸進食丸方見疳

治疳熱化虫丸

白蘆莢 黃連 神麩 麥芽各炒

右末糊丸如黍米大空心米飲下猪膽汁尤佳

肥兒丸方見前

右疳熱當以積熱門參用如熱有作止者與潮熱門參

用可也

脾疳面黃腹大食泥土當補脾益黃散主之方見治法

脾疳食不消胃疳多吐

大胡黃連丸治一切驚疳腹脹重動好喫泥土生米不思飲食多睡吼嚔臍或瀉或秘肌黃瘦毛焦髮黃飲水五心煩熱能殺虫進飲食兼治瘡癬常服不瀉痢依切

胡黃連

黃連

苦練子各一白蘇去半

秋初

乾蟾頭燒存性另

麝香另研

青黛另研蘆薈另研

右先將前四味為細末猪膽汁和為劑每一九如胡桃

大入巴荳仁一枚置其中用油單紙一重裹之同米一

升許蒸米熟為度入後四味為丸少入麪糊丸如麻子

大醫綱目卷三八

大與十九或十五九清米飲下食後臨臥日三服

大蕪蕪湯又名梔子花芩湯治黃疸土色為熱當小便

不利今反利者知黃色髮黃脫落如勝既皆俱受土鼻下

斷作瘡者土逆行也能乳者胃中有喜食土者胃氣面色

黑者為寒大便青為濕褐色血黑色熱高間黃色腸胃治法

當滋營潤燥內除寒熱外致津液

山梔三

黃柏

甘草各

大蕪蕪五

黃連

麻黃

羌活

柴胡各三

防風一

白朮五

茯苓三

當歸四

右件剉如麻荳大作一服水一盞半煎至一盞去查稍

熱服食前

右三方治疳黃食土前一方寒多者宜服後二方熱多

者宜之

疳黃食積

白朮

黃連

苦參

山查各等

右用糊丸如麻子大食後白朮湯下十五九

小兒疳黃難彈劍一小竅入巴荳淨一粒紙糊孔煨熟

去巴荳食之隔一日再喫一二箇

小兒喫泥石膏黃芩陳皮茯苓甘草白朮散煎服

治小兒喫泥及腹肚臍粉一分用沙糖搜丸如麻子大

空心米飲下一九瀉出土瘡瘡如掌

初病疳津液少者當生胃之津液白朮散主之唯多則

妙

龍粉丸治疳渴

草龍膽

定粉炒

烏梅肉焙

黃連各二

右為細末煉蜜丸如麻子大米飲下一二十九無時

三稜散治小兒尿白濁久則成疳宜疎脾土消食化滯

三稜

蓬朮炒

益智仁

甘草各一

神麩炒

麥芽炒

橘紅各半

右為末白湯調下

黃龍丸治停食化積磨積

三稜

蓬朮各三

青皮

陳皮各一

山查

乾薑各七

檳榔半

右晒乾為末糊丸黍米大三歲兒每二十九食後薑湯

下食前烏犀丸相間服此治小兒疳積等證無不效者

烏犀丸方

膽礬丸治疳消癯進食止瀉和胃追虫

綠礬真者

膽礬真者

大棗四十箇

好醋一

已上四物同熬令寒爛候和後藥

史君子去核各 枳實炒三 黃連

各一兩 巴菳去破之

已上五味同炒黑約三分乾入後藥

夜明砂 蝦蟆燒存性 苦練根皮錢五

已上三味再入炒候乾同前四物并羅為末同前膏和

入臼中杵干下如未成旋入熟肉亦不可多恐服之

難化太乾即入溫水亦可九如菴荳大每服二三十丸

米飲溫水下不拘時

肥兒丸治小兒疳積

蘆薈研 胡黃連各二 神麩四 黃連

白木 山查炒各 蕪荑炒二

右為末將蘆薈末拌勻猪膽汁九如粟米大每服六十

丸食前白湯下

本蘆薈丸治小兒疳積秘方

蘆薈 荊芥 黑丑 青皮各等

右治炮為末麪糊丸如粟米大一歲見已下一丸或二

丸亦不妨量大小加減

肺疳氣喘口鼻生瘡常補脾肺益黃散主之方見治

腎疳極瘦身有瘡疥當補腎地黃丸主之方見治

腎疳齒爪黑

右腎疳羸瘦瘡疥治法當與虛羸門相參用之

骨疳喜臥冷地

木香丸治渴好臥冷地

五疳保童丸治小兒乳食不擇冷熱好食肥膩恣食甘

鹹臟腑不和生疳

青黛 苦練根皮 夜明砂 五倍子

蘆薈 黃連 龍膽草 白蕪荑

乾蟾各一 麝香少 蟬腿去嘴瓜 猪膽大者五

右件粟米煮糊為丸如麻子大一歲兒三九不拘時米

飲下日三服忌猪肉

治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽

滴於鼻中連滴三五日效

小兒腦疳者是胎熱所為但頭皮光急頭髮作穗或有

頭瘡腫至顛顛腫則多損眼此疾因兒在胎中母臨月房

事不已而成項軟倒肥而不瘦天柱骨

附子生去 南星

右末生薑自然汁調攤貼患處次服防風丸并瀉青丸

小兒久患疳疾體虛久不進飲食患久諸候退只是天

柱骨無力醫者不識謂之五軟用白殭蚕真者去絲炒為

末每服五分或一錢薄苧酒調下日三更須貼藥

貼藥生筋散

木鱉子三 草麻子三十

右各取肉同研用一錢津調先烘上令熱貼之

右疳五軟蓋痿屬也不若用地黃丸及黃柏龜板之類

為愈

小兒無辜疳者其候面黃髮直時壯熱飲食不生肌

膚積經日月遂致死者謂之無辜疳也言天有鳥名曰無

辜晝伏夜游洗泥衣襪露之經宿或遇此鳥飛從上過將

衣襪與小兒穿臥便令兒有此疾如禽獸生下有瘰癧若

不速去當損其命又腦後有核初生軟而不覺痛其中有

瘰癧

重如米粉得熱氣漸長大則筋結定重隨氣血流散所以
停留于母相生侵蝕臟腑肌肉作瘡或大便泄膿血致使
小兒漸漸黃瘦頭大髮墜手足細弱生十二件無辜疾症
天吊 胡孫瘰 鷺口 木舌 懸壺 重舌 着瘰
臍風 撮口 重舌 乳淵 龜胸

驚甲散
驚甲 三分 檳榔 三 沉香 九 漏蘆

甘草 炙 牛蒡子 炒 史君子 赤芍藥

訶子 炮去核 各半兩

右為瓮末每服一錢水半盞煎六分去渣溫服

多疳者 願會 瘡蝕斷新具穢衝人 勞官

以藥吐下致脾胃虛弱亡失津液且小兒病疳皆愚醫之

所壞病假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當

補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝為

心母法宜先補肝母肝實而後瀉心得母氣則內平而

潮熱自愈醫見潮熱妄謂其實乃以大大黃牙硝諸冷藥

利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如癖病

發作寒熱飲水脇下有形硬痛法當用藥漸消磨之醫反

以巴豆礪砂葶藶下之小兒易虛易實下之既過胃中

津液耗損漸成疳瘦又有病傷寒五六日間有下證以冷

藥下之太過致脾胃虛而津液少即便引飲不止而生熱

也熱氣內耗肌肉外消他邪相干証變諸端亦成疳病又

有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩燥亦能成疳

也

小兒病疳由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或

喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞瘵以其有癖瘕則
令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多即瀉滌脾胃
亡失津液不能傳化水穀其脈沉細益不能飲食致脾胃
虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳矣

肥疳即脾疳也身瘦虛黃乾而有瘡疥其候不一種種異

端今舉舉言之曰瀉或生白膜唇赤身乾黃或黑喜臥冷

地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易腹滿身

耳鼻皆有瘡髮發作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也

心疳者苦要驚啼常只喫水少食辛味耳邊有青脈舌

上有焦點者不治○肝疳者目帶青左脇下硬多吐沫眼

頭黑者不治 脾疳者肚大青筋唇口無血色人中平下

痢不止者不治 肺疳者咳逆氣急瀉白水身上黑斑者

不治 腎疳者要喚酸醋喫水不住小便如粉汁齒黑有

瘡骨出耳乾腦焦不治

虛羸

寒熱 虛羸脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後

脾胃尚弱不能傳化穀氣有冷者時時下痢唇口青白有

熱者身壯熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸主之

夏月不可服如有證則少服之熱者胡黃連丸冬月不可

服如有證則少服之虛羸與疳同治也○木香

小兒疳積其狀漸黃瘦拍背如鼓鳴脊骨如鋸乃積而

生熱成疳也宜服蘆薈丸露星膏

蘆薈丸

龍膽草 黃連 燕莢去皮先炒青色次入

右為末另入蘆薈一分和勻糊飯丸如黍米大二歲兒

服三十九空心米飲送下

露星膏

黃芪蜜水 胡黃連 地骨皮 柴胡各等

右為末煉蜜丸如芡實大隔宿酒浸露一宿次日澄去

酒薄許湯浸服之

橘連丸治疰瘦久服消食和氣長肌肉

橘皮兩 黃連米泔浸一兩半

右為細末另研入麝香五分用猪膽七箇分藥入膽內

漿水煮候臨熟以針微刺破以熟為度煮粟米粥和丸

如粟豆大每服十九至三十九米飲下量兒加減無

時每歲云黃連若燥可

二聖丸治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦宜常服

黃連各一兩 黃柏各一兩

右為細末入猪膽內重湯煮熟丸如芡實大每服二二

十九米飲下量兒加減頓服無妨

小兒疳病肌羸血氣不足同大人勞瘵之疾治之

右以潔古此言論之不拘冷熱虛羸皆用四君子地黃

丸與前藥相兼服為得也

雜方

又方治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用蒼頭一枚燒灰

杵末新汲水下五分七立可

針灸

羸瘦不生肌膚 胃脘灸一

小兒疳瘦於胸下骨尖上灸三壯次於香下端尾翠骨

尖上灸三壯

小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸方不瘥者取尾翠

骨上三寸骨陷中灸三壯

小兒身羸瘦黃豚腹腫四肢懈惰肩背不舉章門二穴各

灸七壯

母氣不足則羸瘦肉極

鶴節即虛羸之

小兒鶴節由稟賦不足血氣不榮肌肉瘦瘠則骨節皆

露如鶴之足皆腎虛不生骨髓之故治法宜錢氏地黃丸

加鹿茸牛膝

宿食

消食丸治宿食不消又名消乳丸

砂仁 陳皮炒 三稜炒 神麩炒

麥芽炒各 香附炒

右末麩糊丸如麻子大食後白湯送下大小加減

七聖丸

三稜 蓬朮 川練 青皮

陳皮 芫花 杏仁

右件等分先用醋浸芫花一宿炒漸乾次入蓬朮同炒

赤色又入陳練等再同炒一處令微焦取出為末前藥

如各半兩杏仁亦用半兩湯浸去皮尖雙仁不用細研

入巴菝二十粒去油和勻醋糊丸如黍米大一歲見常

服二九臨臥溫熱湯送下使日間所食之物一夜而化

永無疳疾能使黃瘦子頓作化生兒今之小兒可去巴

菝只入杏仁名七聖丸是也

痞

枳朮丸方見內 ○飲食不進四君子加薑棗煎 ○枳實

理中丸傷寒

痞者塞也其病腹內氣結脹滿壯熱是也當疎利大便

破結散氣常服進食丸

甘遂散治小兒痞結雖服湯藥暫利而滯實不去心下堅脹按之輒啼內有伏熱破結

甘遂炒 青皮 黃芩 大黃炒

右咬咀煎去渣服量大小加減以利則止用之無不效

戶部張侍郎小娘子患此積結聚已經年矣其候腹滿壯熱大小便閉不食諸醫皆作虛熱潮熱或作胃寒不食治然既不食大小便自然少又欲作疳熱治百藥俱試而無一中勢已窘迫招予視之問曰合服何藥答曰當服甘遂大黃張驚駭曰前諸醫者皆用補劑此女不進食久矣不宜利動腸胃予答曰信我者生逆我者死張曰更有無甘遂而次於此藥方者可否予令即服大承氣湯二服而愈次日診之尚有餘滯積買其症必過數日而腹閉須服前藥始可除根數日後果再閉腹滿痞結再投此藥一服而痊

入醫學綱目卷二十八

小兒急欲乳不能食由客風熱入兒膈流入心脾經即舌厚唇燥口不能吮乳當涼心脾

哺露

哺露者因乳哺不消脾胃衰弱漸不能食血氣減損肌肉不榮柴骨虛露吸吸苦熱謂之哺露也宜齋香進食九本方見

癖

小兒積症面黃腫 肚脹 面合臥地 小便

如油 多嘔 眼暗黃 腹內虛鳴 多睡

眼白黃 赤白痢下 髮黃 眼赤 多瀉

凡有積滯須辨虛實况孩兒虛瘦長短黑白南北古今不同不可一槩論也予今之法實者可服進食丸虛而微白

及疳瘦者宜服肥兒丸肥兒丸方見疳門心海條為丸如黍米大兒一歲十九飯飲下

小兒腹中有癖不食但飲乳是也當漸用白餅子送下

白餅子 滑石 輕粉 半夏湯洗 南星各一錢

巴莖二十四箇去皮膜水

右研勻巴莖後入衆藥以糯米飯為丸如小菜豈大捏

作餅子兒三歲已上三五餅四歲已下一二餅葱白湯

下臨臥服

進食丸治乳食不化心胸脹滿疳積肚疼

木香炒 枳殼炒 當歸 代赭石

硃砂另研 巴莖去油膜 麝香另研

右為細末麪糊為丸如黍米大一歲二九量兒大小加

減米飲送下

入醫學綱目卷二十八

雙聖丸治小兒身熱頭痛飲食不消心腹脹疼痛大小

便不利或下重數起未瘥可再服

巴莖六十箇去皮 甘遂 麥門冬去心

甘草炙 硃砂另研 牡蠣二

右麥門冬甘草甘遂牡蠣四味為細末入巴豆硃砂麩

仁合和搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋丸兒半歲服

如蘇子大一歲服如麻子大分為二九兒二歲服如

麻子大一九兒三四歲服如麻子大二九五六歲服如

麻子大三九兒七八歲服小莖大二九兒十歲微大如

小莖大三九以雞鳴時分服之如至日出不下者熱瀉

飲散合投之即下丸藥皆雙出也若利甚濃前冷瀉數

合與之即止

珍珠丸治小兒一切積聚驚涎宿食乳癖大小便澀滯

療腹脹行滯氣

巴豆仁十四箇水浸 丁香各五分 滑石二錢 輕粉五分留少 木香 白丁香

右為末研勻濕紙裹燒粟米飯為丸如麻子大一歲兒

一九八九歲至十五歲服八九子煎湯放冷下如挾

風熱難動者先服涼藥一貼乳癖者臨臥服數丸

消積丸治小兒食積氣濕氣面黃白多腫大便黃赤酸

臭

砂仁十二箇 丁香九箇 烏梅肉三箇 巴豆去油

右細末糊丸如粟米大三歲已上五六丸已下二三丸

用溫水下無時服大凡小兒身溫壯熱非變蒸之候大

便白而酸臭為胃有畜冷宜此藥消下後服溫胃藥若

身溫壯熱大便赤而酸臭為胃有畜熱宜此藥下後服

涼胃藥無不愈方有史

乳癖 丁香化癖散治乳癖

白丁香 蜜陀僧 硫黃已上各錢 硃砂五分

輕粉少

右研細末每一歲兒服五分男病女乳調女病男乳調

出下黑糞為度後用通膈丸泄之

二丁丸治小兒乳癖 白丁香兩 丁香 蜜陀僧各一 韶粉錢

硫黃錢

右細末糊丸如小豈大三歲兒十九日哺時米飲下飲

乳者乳汁下次日當取下惡物熱即隨退加黃芩一

紫霜丸

代赭石細研水 巴豆二十一粒去

杏仁二十一箇

右為細末飯丸如粟米大每服三五丸至十九皂莢子

湯下無時海藏云五色加減並見治法

湯下無時海藏云五色加減並見治法

驚癇須用礞石藥方可治之

右七方治癇皆峻劑若稍涉虛者必用四君子及益黃

散之類兼服之

治小兒氣癇取三稜針作羹粥以米麪為之與乳母

食每日取一匙大與兒喫亦得作粥與羹熱食之治小兒

十歲已下及新生百日無問癇熱無辜癇癇等皆理之妙

不可言者 針灸 小兒癇氣久不瘥者灸中脘一穴章門二穴各七壯章

門在大橫外直臍季脇肋端側臥曲上足伸下足舉臂取

之 中脘在上脘下一寸臍上四寸居心蔽骨與臍之中

從臍下取病人四指定穴併灸臍後脊骨中二十七壯無

不驗

脾弱多困

脾胃不和四君子加白朮一倍薑蔥煎 脾困四君子

加木香砂仁人參各半錢煎 脾胃虛弱生氣多困四君

子加炒半夏麩沒石子等分為末入冬瓜子少許同煎

治脾風多困用人參散入慢驚散用

人參 冬瓜仁各半 南星切片用漿水盪

右為細末每一錢水半盞煎二三分溫服

渴

渴有三種 一者乘熱積於心脾煩燥大渴引飲宜白

湯謂不因吐瀉大病忽然而作

二者因久病或取轉過度致脾虛引飲宜白朮散方見

海藏云治發渴四君子加乾葛枇杷葉先以薑湯煎各等

分入木瓜少許同煎服亦治虛渴法也

三者因患濕熱病結膀胱小便不利大渴引飲有表裏

症者宜五苓散主之

大小便不通

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水

先嗽口了吸啞兒前後心并臍下手足心共七處每一處

凡三五次嗽口吸啞取赤紅為度須更自通不爾無生意

有此證者遇此方可得再生矣

生下不大便治法先以硬蔥針紐入肛門如大便不下

後用牛黃散送硃砂丸一時自見

醫學綱目卷三八

握宜丸治小兒便難燥結或服瀉藥腹脹悶亂命在須臾

可用此丸不移時大小便自利

巴豆一錢 硃黃 良薑 附子

檳榔 甘遂各等

右為細末粟米飯和丸如菽豆大用椒湯洗小兒男左

女右手握之用綿裹定看行數多少置藥洗去不用即

止 郁李仁凡治權標小兒大小便不通并驚熱痰實欲得

瀉動者

大黃一兩酒浸半日 郁李仁去皮研

滑石細研

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲

兒服三二九量大小與之或乳汁或薄荷湯下食前

黃疸

陽黃則大小便赤澀身熱是脾土與心火相搏為陽病

法當先利小便後下大便

凡治黃病腹脹當用茵陳蒿湯調下五苓散若欲利小便

去大黃欲利大便則加大黃之類有陽證可服謂面赤飲

水者是也茵陳湯五苓散

身疼體背強大小便澀皮膚面目齒爪皆黃小便如屋

塵色利者易治澀者難治宜服五苓散加茵陳煎湯調又

宜服導赤散加茵陳煎或身熱宜服小柴胡湯甚者服承

氣湯

小兒身體蒸熱胸膈煩滿皮膚如青橘之黃白睛亦然

濕熱所致也宜加減瀉黃散主之此藥能退脾土復腎水

降心火

醫學綱目卷三八

黃連 茵陳各別 黃柏 黃芩各四

梔子 茯苓 澤瀉各三

右咬咀都作一服水一大盞煎至六分去查稍熱服食

前

陰黃則清便自調面目及身黃四肢冷是脾虛不能制

腎水當用益黃散下史君子丸益黃散方見治法

淡黃白者胃不和也平胃散調中丸渴者人參白朮散平

散方見泄瀉調中丸方見腹痛月裏生黃見胎

飲水不渴而黃 陽剛穴

黃相 身皮目皆黃者黃病也身痛體背強大小便

澀一身盡黃面目指爪皆黃小便如屋塵色着物皆黃渴

者難治此黃疸也此一證多發於大病後又有一證不因

病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食土渴

者脾疳也又有自生而身黃者胎疳也又書云諸疳皆然色深黃者是也若淡黃者白者胃怯不和也

棗子栝皮湯 治傷寒身黃發熱

棗子八枚 黃栝一斤 甘草炙半斤

右水煎去渣溫服

犀角散 治小兒黃疸一身盡黃

犀角一斤 茵陳 乾葛 升麻

龍膽草 生地各半 寒水石七錢

右吹咀白水煎服一方治小兒忽發黃面目皮肉盡乾

黃以乾葛汁和蜜調服神珍方無乾葛用瓜萎

連翹赤小豆湯 治小兒傷寒發熱身黃

麻黃 連翹 甘草 生薑

赤小豆 生梓白皮各二兩 杏仁四十

大棗十二

右吹咀水煎服一方生小麥苗搗汁服之立效

消食丸 治小兒脾胃不和常服寬中快氣消乳食正顏色

砂仁 陳皮 三稜 蓬朮

神麴炒 麥芽炒 香附米泔 枳殼

檳榔 烏梅各半 丁香二錢

右為末麴糊丸如菴葶大食後紫蘇湯下二三十九

茯苓滲濕湯 治小兒黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲水身體

面目俱黃小便不利不得安臥不思食飲

茯苓五 澤瀉三 茵陳六 猪苓

黃芩 黃連 山梔 防己

白朮 蒼朮 陳皮 青皮

枳殼各二

右吹咀水煎徐徐溫服

治小兒吐瀉黃疸

三稜 蓬朮 青皮 陳皮

神麴 麥芽 黃連 甘草

白朮 茯苓各等

右為末溫水調服若傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加

滑石發熱加薄荷

瓜蒂散 治小兒忽發心滿堅硬脚手心熱變為黃疸不

急治則殺人

瓜蒂七 赤小豆七 秫米七

右為末用一字吹兩鼻內令黃水出餘末盡水調服之

得吐出黃水即愈一方瓜蒂一兩赤小豆四兩為末每

服一錢溫水調服藥下即臥當吐清黃汁為效虛者不

宜服

腹痛

小兒腹痛曲腰乾哭無淚面青白唇黑肢冷為盤腸內

凡有此證急煎蔥湯淋洗其腹揉之蔥蔥臍腹間良久

尿自痛中出其疼立止續次服藥

乳香 沒藥各少許 沒藥明者細研

右件木香一塊於乳鉢內磨水一分滾數沸調乳沒末

此藥只一服效

釣藤膏治小兒腹中極痛乾啼後偃名盤腸內疳

乳香研 沒藥研 木香 薑黃各四

木鱉子仁二十

右先將後三味同為細末次研入上二味煉蜜和成劑

收貯每一歲兒可服半皂子大餘以意加減煎釣藤湯

化下無時次用魏香散

魏香散 蓮木半 阿魏一

右先用溫水化阿魏浸蓮木一晝夜焙乾為細末每服一字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

無蒜乳九治冷證腹痛夜啼

大蒜 一擘慢火煨 乳香 另研

右研為丸如芥菜子大每服七粒乳汁送下

右四方治寒腹痛屬盤腸內引其候曲腰乾哭是也

胃虛冷面皸白色腹痛不思食當補脾益黃散主之若

不利者調中九主之 益黃散治下利而痛也 調中九治下利而痛也

調中九

白木 人參 甘草 炒各 乾薑 炮四

右為細末蜜丸如菽豆大每服五七九至十五九食前

八醫學綱目卷三八

溫水下 海葢云仲景 理中例也

當歸散凡小兒夜啼者臟寒而腹痛面青手冷不吐乳是也宜此方服之效

當歸 去蘆 白芍藥 人參 各一 甘草 炙五

桔梗 陳皮 各一

右吹咀煎五分時時少服愈

右三方治寒腹痛屬胃虛其候不思食是也

熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便赤黃與三黃九人

參湯下 二黃九方見 治發熱法

腹痛夜啼服牛黃如豆大乳化喫之於臍下書田字立

安聖惠

積痛口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡畏

食或大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者白餅子下之後

和胃用白朮散 消積丸白餅子方見 白朮散方見消渴

食積腹痛硬必用紫蘇蘿蔔子之類

小兒好喫糝成肚痛用黃連白酒藥等分為丸服

三稜散治積氣肚痛

砂仁 甘草 益智 炒去 三稜

蓬朮 青皮 炒各 為末白湯點下

重痛面皸白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安虫散

主之小兒本怯者多此病 田氏云虫痛啼哭使仰坐臥不 色或青或黃唇白又目無 指色口吐涎沫此為虫痛

安虫散治小兒虫痛

胡粉 炒 鶴虱 炒 川練子 去皮 白礬 枯二

右為細末每服一字大者五分米飲調下痛時服

治虫動痛極不可忍用乾漆半兩檳榔一枚生用定老

八醫學綱目卷三八

一塊再煨細研三件一處為末空心熱酒調良久取下虫

立愈 驗靈老為室中 加過此物也 ○又方用乾漆一兩搗碎炒令烟盡

出用新汲水入生麻油空心調下

安虫丸治上中二焦虛或胃寒虫動及痛

乾漆 炒烟盡 雄黃 分 巴豆霜 一

右為細末糊丸如黍米大量見大小服之取東引石榴

根煎湯下或苦練根或蕪荑湯下五七九至三三十九

發時服

蕪荑散主治同前凡小兒痛時便高聲啼叫人中上鼻頭

唇口一時黑色脈法當沉弱而弦今反脈大是虫症也

白蕪荑 乾漆 炒各

右為細末每服一字或五分或一錢米飲調下發時服

蛔虫用練樹根為君佐以二陳湯煎下

積痛食痛虛痛大同小異惟重痛者當口淡而沫自出治之隨其症用藥虫與積相似小兒本怯故胃虛冷則虫動而心痛與癩畧相似但目不斜手不搐也安虫散主之
 辛氏女子五歲病虫痛諸醫以巴豆乾漆礪砂之屬治之不效至五日外多哭而倦仰睡臥不安自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無光而慢唇白吐沫至六日胸高而臥轉不安召錢至錢詳視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則為逆矣至次日辛見錢曰夜來三更果瀉錢於瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有元藥錢曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治也辛曰何以然錢曰脾虛胃冷則虫動而今反目青此肝乘脾又更加瀉知其氣極虛也而元藥隨糞下即脾胃已脫兼形病不相應故知死病後五日昏篤七日而死

驚口

大醫集卷末

聖

巢氏病源驚口候者小兒初生口裏白屑滿舌上如驚口故曰驚口此乃胎熱而心脾最盛薰發於口也治用髮經指頭蘸井花水揩拭之睡時黃丹煨出火氣搽於舌上
 如用前法其舌上白屑不脫可煮栗荑汁令濃以綿纏指頭拭之若春夏無栗荑可煮栗木皮如用井花水法小兒初出腹有連舌下有膜如石榴子者中隔連其舌下後令兒言語不發舌不轉也可以爪甲摘斷之微有血出無害若血出不止燒髮灰傳之即止

口瘡

大人小兒口瘡不開牙關緊者諸藥勿效天南星末一錢腦子少許相和研勻用指蘸生薑自然汁蘸藥於左右大牙根上擦之立開

初生口瘡不開不收乳用赤脚蜈蚣去足炙末猪乳汁調下五分三四服愈

小兒生下七日口瘡牛黃些少竹瀝調下一字以猪乳滴口中口瘡搗鼻法用鐵金棗蘆瓜蒂為末水調搗之

熱

清心導痰丸治舌縱涎下方見大人門

小兒滯頭者多涎流出積於頤上此由脾胃冷涎多故也脾之液為涎綠脾胃虛冷不能制其津液故流出於頤
 法當溫脾按內經云舌縱涎下皆屬熱此恐張漢溫脾丹治滯頭效

白朮 青皮各半 半夏麩 丁香各一

右為細末糊丸如黍米大一歲兒十九二歲二十九米

飲下

臍風撮口

小兒洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是胃虛氣不和口頻撮調氣益黃散主之

赤脚金頭蜈蚣 蝎稍尾 蠶蚕七

聖麥五分

右為末先以鷺毛管吹豆大入鼻內噴噴啼叫可醫更用薄荷湯下

雜方

栝累散治斷臍後為水濕所傷或抱濕氣傷於臍中或解脫風冷所乘致令小兒四肢不和臍腫多啼不能乳哺宜速療之

黃栝 釜下墨 亂髮燒各五分
 右為細末每用少許傳之

○臍風濕鹽二兩鼓二合杵成餅子如錢炙熱熨臍上安
又以黃柏末傳之

○小兒臍腫桂心炙熱熨之日四五

○秘臍風瘡用年久東壁泥研傳之

○臍風久者成瘡不乾伏龍肝傳之 又馬齒莧燒葉末
傳之千金

○治小兒臍赤腫杏仁杵如脂傳臍腫上

○治小兒臍中汁出不止并赤腫用枯白礬研細傳之

○治嬰兒因剪臍傷外風致瘡不乾用白礬燬白龍骨各
等分同為末每用少許傳之 又方綿燒灰研細每少許
乾摻之

○撮口夜合花枝煮汁拭口并洗愈

○撮口治法用白殭蚕為末蜜調塗兒穀道又牛黃一錢
入醫學綱目卷三十八

○竹瀝一合時時抹口中即瘥

○小兒初生一七日內忽患臍風撮口百無一效坐視其

死良可憫也有一法世罕知者凡患此證看兒齒齦上有
小泡子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹指輕輕擦破即開口
便安不藥神效

○小兒初生臍風撮口諸藥不效者灸然谷穴在內踝前起
大骨下陷中可灸三壯鍼入三分不宜見血立效

○臍風目上插刺絲竹空

○臍腫 腰對臍骨節間

○臍風撮口在百日內不治

醫學綱目卷之三十八

醫學綱目卷之三十九

小兒部

肺主燥

咳嗽

嗽膿血

喘

馬脾

風

悲哭

夜啼

瘡

鼻

龜胸

龜背

脫肛

肛疝

咳嗽

八九月
嗽者肺感微寒

嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽者其病必實
非久病也其症面赤痰盛身熱法當以葶藶丸下之若久
者不可下也

葶藶丸治乳食衝脾傷風咳嗽面赤痰盛身熱喘促

甜葶藶去土隔
香炒

黑牽牛炒

漢防已

杏仁去皮尖炒另研
如膏各一兩

右為末研入杏膏拌勻蒸陳廋肉和再搗為劑丸如麻
子大每服五丸至七丸淡生薑湯下乳食後或臨夜服

量兒加減

○人參荆芥散治身熱痰嗽胸膈不利宜下痰去熱

人參半兩 荆芥穗兩 大黃二錢

右為細末水煎調檳榔木香細末五分輕粉一字乳後
服如身熱潮熱宜服清涼飲子去大黃三服之後一二
日却入大黃服之令疎利則愈不可便動臟腑

十一月十二月嗽者乃傷風寒嗽也風寒從背第三椎
肺腧穴入當以麻黃湯汗之有熱證面赤飲水痰熱咽喉
不利者宜以甘桔湯兼治之若五七日其證身熱痰盛唾
粘加減三拗湯下之

麻黃去根節三錢水
黃另研

桂枝二錢

杏仁七箇去
皮尖炒

甘草炙一錢

右為末入杏膏拌勻每服一錢水六分煎至四分去

查濕服無時以汗出為度量大小加減若自汗者不宜服之

百部丸治小兒肺寒壅嗽微喘有痰

百部炒

麻黃去節各 杏仁四十箇去皮尖微炒研入

右為末熟蜜子丸如皂子大溫水下二三丸無時日三四服此本方也仲景加松子仁五十箇蜜丸更加胡桃

肉含化大妙一方加甘草二錢

紫蘇子散治小兒咳逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於肺氣或小兒喘氣未定與乳飲之與氣相逆氣不得下

紫蘇子

訶子去核 杏仁尖炒 蘿蔔子

木香

人參去蘆各 青皮 甘草炒各一

右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至五分去渣不拘時服量兒加減

虛盛

有肺盛者欬而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱

以瀉白散瀉之若傷寒咳嗽五七日無熱證而但嗽者亦

虛虛

有肺虛者咳而硬氣長出氣喉中有聲此久病也以阿膠

散補之痰盛者先入脾後以楮銀丸微下之涎退速即補

肺如上述補肺法方見

黃芪湯治小兒咳嗽喘逆身熱鼻乾燥者是熱入肺經

黃芪二

人參半二錢 地骨皮五 桑白皮三

甘草半二錢

右咬咀水煎放溫頻服之

涎嗽四君子加杏仁桑白皮等分半夏麩減半同煎○

咳嗽四君子末煎紫蘇湯調下

咳嗽 肺之生病而成嗽大抵秋冬則實春夏則虛更詳五臟兼見之證以辨虛實若實則面赤飲水身熱痰涎

盛涕唾稠粘咽乾不利喘嗽面腫吐食皆當先補脾益黃

散後瀉肝瀉青丸若咯膿血是肺痿也用清肺散治之若

虛則面白脫色氣少不語喉中有聲唾痰清利法當阿膠

散補之若亡津液用白朮散主之

治嗽大法盛即下之久即補之更量虛實以意加減

福銀丸治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘促

巴豆去油膜皮心 水銀五 黑鉛二錢半

右將巴豆末并墨再研勻和入砂子麝香陳米粥和丸

如菉豆大拾福一歲兒一九三二歲二三九五歲已上

五六九煎薄荷湯放冷送下不得化破更量虛實加減

並食後服虛人先以益黃散實人後

嗽而吐水或青綠水者百祥丸下之方見 嗽而吐痰涎

乳食者白餅子下之方見

小兒痰嗽必用吐法詳見喘條

白附丸治咳嗽有痰方見

勝金方治小兒咳嗽蜂房二兩淨洗去蜂窠及泥土以火

燒為灰每服一字飯飲下

塗唇膏治極小兒咳嗽吐乳久不愈石燕一味為末

每用一捻蜜少許調塗兒唇上日三五次無時

杜氏子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐

痰乃外風寒蓄入肺經令肺病嗽而吐痰風在肺中故也

宜以麻黃散輩發散後用涼藥壓之即愈時醫與珠粉丸

半夏九福銀丸諸法下之其肺即虛而嗽甚至春三月間

尚未愈召錢視之其候面青而光嗽而喘促哽氣又時時長出氣錢曰病困十已八九然所以面青而光者肝氣旺也春三月者肝之位肺衰之時也嗽者肺之病肺自十一月至三月肺即虛癆又曾下之脾肺子母俱虛復為肝所勝此為逆也故嗽而喘促哽氣長出氣也錢急與瀉青丸瀉之後與阿膠散實肺次日面青而不光錢又用補肺而嗽如前又與瀉肝未已而又加肺虛唇白如練錢曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛絕肺病不得時而肝勝之今三瀉肝而肝病症不退三補肺而肺病尤虛此不久生故言死也此證病於秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死

嗽膿血

有喘而咯膿血者乃肺熱食後服甘桔湯久嗽者肺亡

津液阿膠散主之咳而痰實不其喘而面赤飲水者可攝銀丸下之阿膠散即補肺散方見治

甘桔散

桔梗米泔浸

甘草炒各

右為細末每服一大錢水一大盞入阿膠半兩炮過煎至五分食後溫服

甘桔湯仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰吐膿血用生甘草加棧二十餘條

小兒咯血黑豆甘草陳皮煎服

段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血前醫以桔梗湯及防已丸治之不愈涎上攻吐喘不止請錢氏下匾銀丸一大服復以補肺湯補肺散治之或問段氏子咯血肺虛何以下之錢曰肺維咯血有熱故也久則虛癆今涎

上潮而吐當下其涎若不吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐故依法只宜先下痰而後補脾肺必涎止而吐愈為順治也若先補其肺為逆耳此所謂識病之輕重先後為治也

喘

肺虛則喘而少氣先益黃散後補肺散二方並見

京東轉運使李公孫八歲病嗽而喘滿短氣醫者言肺經有熱用竹葉湯牛黃膏治之三日加喘錢氏云此肺氣不足復有寒邪即便喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也前醫曰退熱退涎錢曰何熱之所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也李師有慙色錢治愈

肺實則喘而氣盛瀉白散方見治

溫冷用藥○東都張氏孫九歲病肺熱咳嗽他醫以珠犀龍麝牛黃藥治之一月不愈其證咳嗽喘急悶亂飲水不止全不能食錢氏用史君子九益黃散張曰本有熱何以又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無效錢曰涼藥久則胃寒不能食小兒虛不能食當與補脾候飲食如故即瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食錢以瀉白散瀉肺遂愈張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

小兒結熱上氣喘者四順散一名清涼飲子

治小兒哮喘

黃丹 砒霜

右各等分為末用東肉為丸如麻子大每服三九臨臥

冷茶下

痰嗽喘並用涌法吐之重劑用瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末須蝦蟇汁調服之

萬金丹治洋痰涎喘急方見癩大通用

治肺中風多因嗽而始但服嗽藥不能散其風邪入於肺臟之絡其候喘急面色青黃目能認人口不能言醫不能明其證坐以待盡不亦陋乎紹興王尚書女伴老姬得此病半月相繼而死庸醫俱不能識又張南軒亦得此疾而逝醫師滿目環視而立待盡余悔不得一見豈非天命也哉後有親樓八哥之子病此症是時乃一氣之行諸醫皆言無術而退子父來告急但欲得別是何疾亦不望其活矣余往視之尚留殘喘以橘皮桑白皮罌粟殼三件煎湯化百部九二服急灸肺膈其喘立定而忽能言繼時索

粥自此生矣嗚呼是病有法不遇余者多矣可深惜哉

帝曰乳子中風熱喘鳴有息者脈何如岐伯曰喘鳴有息者脈實大也緩則生急則死通評虛

馬脾風

暴喘而脹滿也

暴喘俗傳為馬脾風也大小便噎宜急下之用牛黃奪命散後用白虎湯平之

牛黃奪命散治小兒肺脹喘滿胸膈起急兩脇扇動陷下作坑兩鼻竅張悶亂喘鳴聲啞而不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不急治死在旦夕

白牽牛 黑牽牛各一兩半 生半燒 川大黃

檳榔各一

右為細末三歲兒每服二錢冷漿水調下涎多加膩粉

少許無時加蜜少許

無價散治風熱喘促悶亂不安俗謂之馬脾風

辰砂二錢 經粉五 其遂乾一錢半

右為細末每服一字用溫漿水少許入滴油一點挑藥在上沉下去却以漿水灌之立效

針灸一法小兒喘脹俗謂之馬脾風又謂之風喉者以草莖

量病兒手中指裏近掌紋至中指尖截斷如此二莖自乳

上微斜直立兩莖於稍盡頭橫一莖兩頭盡頭點穴灸三

壯此法多曾見愈

馬脾風在百日內者不治

悲哭

治小兒拘哭龍齒散

龍齒 蟬殼去地足 鈞藤有鈞 羌活

人參各等

右為末每服一大錢煎六分去查溫熱服

一小兒悲苦彌日不休兩手脈弦而緊戴人曰心火甚則乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云心熾則痛甚故樂甚悲亦甚先令浴以溫湯漬形以為汗也肺主皮毛汗出則肺熱散浴止而啼亦止矣仍命服涼膈散加當

竭桔梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉膈中之邪熱

小兒驚啼邪熱乘心也當安心安神丸主之

小兒驚然忽大啼作聲者必死此火大發則虛其氣故也

夜啼

大法小兒夜啼有四証一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰

客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲腰而啼

此寒證也熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹煖啼時或有汗仰身而啼此熱也若重舌口瘡要吮乳不得口到乳上即啼身顫皆微熱急取燈照口若無瘡舌必重也客忤者見生人氣忤犯而啼也各隨證治之

蒜乳丸治腹痛夜啼 當歸丸治臟寒腹痛二方見

五味子散治小兒夜啼及腹痛至夜輒劇狀似鬼祟

茯苓 陳皮 桂心 甘草各二錢

右為龍末水煎量兒大小加減

三黃丸治腹熱痛夜啼面赤唇焦便赤用人參湯吞下

燈花散治熱證心燥夜啼以燈花三四顆研細用燈心煎湯調塗口中以乳汁送下日三服 一法用燈花塗乳

上令小兒吮之無燈花用燈心燒灰亦妙 又一法燈花七枚鵬砂一字辰砂少許研細蜜調抹唇上立安

小兒夜啼 人參二錢 黃連一錢 甘草五分 竹葉片

生薑片 水煎服

龍齒散治小兒夜啼不止方見拘哭即上本事龍齒散但無羌活一味

又方蟬蛻二七枚去足為末入硃砂一字蜜調送下

馬齒燒研細傳乳上吮之妙 小兒夜啼黃連薑汁炒

甘草竹葉煎服

治小兒夜啼黃連半錢細研清水調下

蒲黃散治小兒重舌方見 牡蠣散治小兒口瘡方見

治客忤夜啼法用本家厨下燒殘火柴頭一箇以火焦頭為上朱書云吾是天上五雷公將來作神將能收夜啼

一縛永不放急急如太上老君律令勅書了勿令兒知立

在牀下倚牀前脚裏立之男左女右效

明夜啼炎中衝一壯即止

世通關散治小兒驚風已退只是聲啞不能言百藥不效者以大天南星一箇炮為末每服一錢猪膽汁調下入喉便能言語

鼻 表丹治小兒赤鼻

雄黃 黃丹分 用無根水調傳

或用葛蒲半葉酒蒸為末調服解毒無根水者天落者是

辛夷葉先焙乾 細辛 木通

白芷 木香各五錢 杏仁去皮尖

右為細末用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和勻於瓦石器中熬成膏赤黃色為度於地上放冷入腦麝各一錢拌勻每用少許塗額上并鼻中神效

龜背 龜肺熱腸滿攻於胸膈即成龜胸

聖治龜背方 大黃錢 天門冬去心 百合 杏仁去皮

木通 桑白皮炙 甜葶藶炒 川朴稍 各半

右為末煉蜜丸如芡實大溫水食後化下三歲已上化二丸

治小兒龜背 蒼木 黃栢酒 芍藥酒 陳皮

防風 山查 葳靈仙 加當歸

又利後加生地黃 為末煉蜜丸食後溫水下

灸

小兒龜背緣肺熱脹滿攻胃腸所生又緣乳母食熱麵五辛轉更高起宜灸兩乳前各一寸五分上兩行三骨罅間六處各三壯柱如小麥大春夏從下灸上秋冬從上灸下若不依此法十灸不愈一二也

龜背

辨

兒生下血風入脊逐於骨髓即成龜背治之以龜尿擦骨取龜尿法當以蓮葉安龜在上後用鏡照之其尿自出

針灸

小兒龜背由令兒坐早有客風吹入脊骨而入於骨髓故使背高如龜之狀也雖有藥方多成痼疾以灸法為要當灸第三椎骨節下兩傍各一寸半肺膈穴又第五椎骨

六 醫學綱目卷三十九

十一

節下兩傍各一寸半心膈穴又第七椎骨節下兩傍各一寸半膈膈穴以小兒中指節為一寸艾柱如小麥大三五壯即止此法累用十有一二得效亦無全效之功

脫肛 龜背在百日內不治

脫肛

治大腸虛弱肛門脫下

龍骨 訶子煨去核沒石子煨去核嬰粟殼煨去核

錢二

右為末白湯點服仍用蔥湯薰洗令軟款款以手托入用新磚瓦一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊敷重壓定使熱氣上透不可過熱令病者以臀坐於布上如覺布溫逐旋減之以常得溫熱為度并常服前藥 五倍子散治小兒脫肛

五倍子 地榆各等

右為細末每服半錢或一錢空心米飲調下

辨

赤石脂散治小兒因痢後努軀氣下推出肛門不入

真赤石脂 伏龍肝各等

右為細末每用五分傅肛頭上頻用按入

治小兒脫肛用五倍子為末量多少揀患處以物觀手捺入切忌食發風毒物

脫肛治法用蒲黃一兩猪脂二兩煉猪脂和蒲黃成膏塗腸頭上即縮入

水聖散治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少杵為細末乾貼患處

脫肛用東北方陳壁泥土湯泡先洗下後薰上又方見脫囊條

不 醫學綱目卷三十九

十一

小兒脫肛瀉血秋深不痊灸龜尾一壯柱如小麥大脊端穹骨也 小兒脫肛者灸膈中三壯 小兒脫肛久不瘥及風癩中風角弓反張多哭言語不擇發無時節盛即吐沫者取百會一穴灸七壯在鼻直入髮際五寸頂中央旋毛中可容豆柱如小麥大

治久痢脫肛見前

脫肛

脫肛

治小兒蛻虫攻下部痒取匾竹葉一握切以水一升煎取五合去查空腹飲之虫即下用其汁煮粥亦佳

治虫狀如蝸牛食下部痒取匾竹葉一握水二升煮熱五歲兒空腹服五合隔宿不食明日早食之尤佳楊氏 腎主虛寒 解頤 頤填 行遲齒遲髮遲 停耳 呵欠 額黑 唇青為寒

解頤

小兒解頤乃是母氣血虛與熱多耳用四君子四物有熱加酒炒黃連生甘草煎服外以綿束緊用白蘇末傳之

解頤治法宜用生地散
解頤生下而頤不合者腎氣不成故也長必少笑更有目白睛多眵白色瘦者多愁少喜也

解頤者頤大頭縫不合如開解故曰解頤此由腎氣不成故也腎主骨髓而腦為髓海腎氣不成則腦髓不足故不能合也凡得此者不過千日其間亦有數歲者乃廢人也人之無腦髓如木無根古人雖有良方吾所以不錄者勞而無功也亦不可束手待斃宜依錢氏補腎萬一有可生之理補腎地黃丸方見勞瘵

天南星散治頤開不合鼻塞不通天南星大者微泡去

皮為細末米醋塗調緋帛上貼頤上灸手頻熨之立效
三辛散治小兒骨應合而不合頭骨開也名曰解頤

細辛 桂心各半 乾薑七錢
右為末以薑汁和傳頤上貼之兒面赤即愈

又方用蛇蛻炒焦為末用猪頤車中髓調傳項上日三四度曾有人作頭巾裏遮護之久而自合亦良法也

頤門不合 膺上膺下各五分二穴各灸三壯灸後未發先合
父精不足則解頤眼白多

頤填
湯氏小兒頤填其頤高大如物填在上汗出毛髮黃而短是也若寒氣上衝則牢韌頭起腫頤熱氣上衝則柔軟又小兒臟腑積熱氣上衝於腦亦致頤填而又肝氣盛風熱衝上而成此候也王環集歌曰頤門腫起定為風此候

應須也不中或若加坑如蓋足七日之間命必終

行運齒遲髮遲

小兒稟受血氣不足者則髓不滿骨故軟弱而不能行腎主髓治法當用錢氏補腎地黃丸加鹿茸五加皮麝香則髓生而骨強自然行矣外甥黃虬知錄之子三歲不能行遂合此方服之有驗

五加皮散治小兒三歲不能行者由受氣不足體力虛怯腰脊脚膝筋骨軟足故不能行用真五加皮為末粥飲調次入好酒少許每服一粟殼許日三服效

羚羊角九補腎肝五六歲不能行
羚羊角 虎脛骨醋炙 桂枝 生地 黃芪 防風 當歸 白茯苓 酸棗仁炒各等分

右為細末蜜丸皂子大食後溫水化下久服取效

黃散治小兒齒不生
大川芎 生地各半 山藥 當歸 甘草炙各一分

右焙為末熟湯調服用搽齒脚

尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮屑塗之即生

香薷煎治小兒白禿不生髮燥痛
陳香薷二 胡粉一 猪脂半

右用水一大盞煎香薷取汁三分去渣入胡粉猪脂相和合勻塗於頭上日頻用之

治小兒頭生白禿髮不生用椿楸樹葉心取汁傳之大

小兒長大不行行則脚細齒久不生則不固髮久不

生生則不黑皆屬氣血虛也宜大劑補之

停耳

紅王散治小兒爛耳

枯白礬 乾薑脂 麝香各一錢

右同研勻先以綿裹杖子擦淨搽之

龍黃散治小兒停耳汁出不止

枯白礬 龍骨末 黃丹半兩 麝香一分

右同研細先以綿杖子擦膿水盡用散一字半分為兩

處吹入耳內日二次

停耳碗黃末傳之日一夜一妙

用蚶蚶灰末吹入立效有瘡者傳之孫其人

呵欠

呵欠面赤者風熱也 面青者驚風也 面黃者脾虛驚

也 多睡者內熱也 氣熱者傷風也

額黑唇青為寒

補陽湯初冬間一小兒二歲大寒證明堂青脈額上青

黑腦後青絡高起唇青舌上白滑喉鳴而喘大便微青耳

尖冷眼澁常常淚下出仍多眵目中不利臥而多驚無搐

即寒

柴胡錢三 升麻錢二 麻黃錢三 吳茱萸錢五

地龍錢五 蝎梢錢少 生地錢五 歸身錢三

甘草錢一 黃芪錢二 黃柏錢一 陳皮錢一

葛根 連翹錢一

右為錢末作一服水一盞煎法如常乳食後熱服始漸

喜睡精神出氣和順乳食旺

血氣虛怯為冷所乘則唇青

雜病 寒熱 瘧 繼病 五硬五軟

寒熱

食積寒熱如瘧渴瀉氣急要合地臥此候先當取下積

只用平胃散次常服進食九平胃散方見大人

曹宜德子三歲面黃時發寒熱不欲食而飲水及乳不

止眾醫以為潮熱用牛黃丸不愈及以止渴乾葛散服之

反吐錢曰當以白餅子下之後補脾乃以消積丸磨之此

乃解也後果愈何以故不食但飲水者食伏於脾內不能

消致令發寒熱用止渴熱吐者藥衝脾故也故下之即愈

高恩檢子八歲病熱驚者皆為傷冷治之以熱藥欲

飲冰水禁而不與內水潤渴煩躁轉生前後皆閉口鼻俱

乾寒熱往來咳嗽時作遍身無汗又欲灸之適遇戴人戴

人責其母曰重裯厚被煖炕紅爐兒已不勝其熱尚可灸

乎其母謝以不明戴人令先服人參柴胡飲子連進數服

下爛魚腸之類臭氣異常渴欲飲水聽其所欲冰雪冷水

連進數杯節次又下三四十行大熱方去又與通膈丸牛

黃丸復下十餘行兒方大痊前後約五十餘行畧計所用

冰雪水飲至一斛向灸之當何如哉

瘧

治小兒瘧疾多與大人同法以出汗為瘧宜桂枝柴胡麻

黃參苓等輩又視其病食病痰以意消息之大抵多是飲

食失節得之須以消導為先可也

萬金丹治大人小兒瘧并哮喘喘急黑豆四十九粒

信一錢先以黑豆浸去皮端午日以乳鉢研細拌勻作大

小丸之黃丹為衣陰乾治哮喘冷茶清吞一丸治瘧空心井

花水吞一丸忌熱物葷腥一日如食熱物即吐

治癰瘡但熱不寒方用黃丹煨通紅臨發密湯調下能

飲酒用酒調一法專服小柴胡湯次服人參前胡湯

草果飲治寒多熱少手足厥冷遍身浮腫肚腹疼痛

厚朴薑 青皮 藜蘆 藿香

甘草 丁皮 神麴 良薑

半夏麴 等分吹咀薑蔥煎空心服

治久瘡露星散 秦艽 柴胡 白朮 白茯苓

檳榔 常山 黃芩 甘草

半夏麴 官桂

右等分吹咀酒醋一半煎露一宿次日早取再溫瀘去

查服陳舍人令嗣久瘡服驗

小柴胡湯 治小兒瘧疾往來寒熱

人參 半夏 柴胡 黃芩

甘草 各等分

右吹咀薑三片棗一枚煎服

青皮湯 治小兒瘧疾作浮腫兼寒熱不退飲食不進

白朮 茯苓 厚朴 青皮

陳皮 半夏 大腹皮 檳榔

三稜 蓬朮 木通 甘草 各等分

右吹咀每服三錢薑水煎服

養胃湯 治外感風寒內傷生冷溫中快膈能辟山嵐瘴

蒼朮 厚朴 半夏 藿香

草果 人參 茯苓 甘草

陳皮

久瘡 鬼哭散 止瘡疾久不愈者效

常山 大腹皮 白茯苓 鱉甲

右吹咀每服三錢桃柳枝各七寸同煎臨發時服畧吐

出涎效

鱉甲飲子 治瘡久不愈腹中結為癥瘕名曰瘡母

鱉甲 白朮 黃芩 草果

檳榔 芫薺 橘紅 甘草

厚朴 白芍藥 各等分

右吹咀薑蔥煎服

大腹皮湯 治小兒瘧疾用藥太早退熱變作浮腫外腎

大腹皮 檳榔 三稜 蓬朮

枳殼 蒼朮 甘草 各等分

右吹咀每服三錢加薑皮蘿蔔子同煎

四獸飲 治五臟氣虛喜怒勞逸不節致陰陽相勝結聚

痰飲發為瘧疾兼治瘧瘧

半夏 人參 白朮 茯苓

草果 陳皮 甘草 各等分

右吹咀加烏梅棗子各一枚生薑三片每服三錢煎服

經效截瘧丹治瘧母結癖寒熱無已

真阿膠 雄黃 硃砂 各等分

右研為細末稀糊丸如桐子大每服一九人參湯候冷

空心服瘧瘧桃枝湯冷服臨發時磨一九塗鼻口畔效

瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者宜下

之弦遲者可溫之弦緊者可發汗浮大者可吐之弦數者

風發也以飲食消息止之

因瘧脈自弦微則為虛代散則死

小兒瘧久不愈灸內庭在足大指次指外 大椎 百

會各隨

繼病

小兒瘧病母有娠乳兒有病如瘧痢他日亦相繼腹太

或瘧或發他人相近亦能相繼北人未識其病懷妊者取

百勞鳥毛帶之又取其蹄枝鞭小兒令速語鄭禮註云鴟

博勞也楚詞云在外見鳴鴟言其鳴惡也白澤圖云屋間

闢不祥即百勞也以此治繼病本草云百勞味平有毒其

毛用之治小兒繼病

治小兒生十餘月後母又有妊令兒精神不爽身體萎

痺名為瘧病用伏翼燒灰細研以粥飲調下五分日四五

入醫學綱目卷三十九

服效若灸令香熟嚼哺兒亦效

千金論小兒有瘧病者是娠婦被惡神導其胎中如疾

小兒令生此病瘧亦小兒也其證微微下利寒熱往來毫

毛髮鬢髮不悅者是也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒

未能行而母更有娠使兒飲此乳亦作瘧也令兒黃瘦骨

立發熱髮落

龍膽湯治嬰兒出腹血脈盛實寒熱温壯四肢驚掣吐

者若已能進哺中滿食不消壯熱及變蒸不解中客入鬼

氣并諸驚癇方悉主之

龍膽草 柴胡 黃芩 桔梗

釣藤皮 芍藥 甘草 茯苓

蛭蝮 大黃

右為散以水一升煮取五合為一劑十歲已下小兒

皆可服若兒生一日至七日分一合為三服八日至十

五日分一合半為三服十六日至二十日分二合為三

服二十日至三十日分三合為三服皆以得下即止此

劑為出腹嬰兒所作若日月長大者亦依此為例必知

客忤及有鬼氣者可加人參當歸各二錢半一百日兒

加一錢一字二百日兒加二錢半一歲加半兩餘藥皆

做此

生者為相繼 死者為傳尸 有脈而無氣謂之尸厥

有氣而無脈謂之行尸 丁奚露哺客忤無辜四異病

也 陽易陰易百合狐惑四奇病也

五硬五軟

仰頭取氣動搖難氣壅痰連胸腹間脚手心如冰冷

硬頭仰為風命不還

入醫學綱目卷三十九

喫食如何不長肌肉少皮寬軟自離尊教瀉痢當時作靈

藥難醫命必危

五歲孩兒不肯行脚軟氣弱命不亨細小不妨榮衛氣長

大須應肉自生宜用參芪等藥錢氏地黃丸治之

右五硬即瘧之屬經所謂暴強直皆屬於風是也

五軟即痿之屬治見疳維方條

醫學綱目卷之三十九

補遺方

中風
至寶丹療卒中急風不語中惡氣絕中諸物毒暗風中熱
客毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蠱毒水毒產後血暈口臭血
出惡血攻心煩躁氣喘吐逆難產悶絕死胎不下已上諸
疾並用童子小便一合生薑自然汁三五滴入於小便內
溫過化下三九至五九神效又療心肺積熱伏熱嘔吐邪
氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾
燥傷寒狂語並皆療之

烏犀角生研 朱砂研 雄黃研 玳瑁屑生研
琥珀研各 麝香研 龍腦研各 金箔五十片
牛黃五 安息香半兩
右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯

煮凝成後入諸藥中攪成劑感不津器中並旋丸如
桐子大用人參湯化下三九至五九又療小兒諸疳急
驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒
服二九人參湯化下
桂苓甘露飲

人參去 茯苓去 薤香各半 茯苓去
白朮 甘草炙 葛根 澤瀉
石膏 寒水石各一兩 滑石二兩 木香一分
右為細末每服一錢白湯下新水生薑湯亦可
順氣散消中熱在胃而能飲食小便黃赤以此下之不可
多利微利至不欲食而愈
朴硝製一兩 大黃四錢 枳實二錢
右吹咀每服八錢水二盞煎八分去渣通口服

膠艾湯治衝任虛損月水過多及妊娠胎動不安男子腹
痛下墜

阿膠炒 川芎 甘草炙 當歸
艾葉炒 白芍藥 熟地各四兩

右剉每服五錢水一盞酒六分煎至八分去渣稍熱服
空心食前日三服甚者連夜併服

震靈丹此丹不犯金石飛走有性之藥不備不燥奪造化
沖和之功大治男子真元衰憊五勞七傷膈腹冷疼肢體
酸痛上感下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱
緩手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口
苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋
瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼
冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎

藏無子服之無不愈者
禹餘糧火炒 紫石英 赤石脂 代赭石如土
用已上四味並作小塊入甘鍋內煮 沒藥去 朱砂飛過
乳香研 五靈脂去 沒藥去 朱砂飛過

右件前後共八味並為細末以糯米粉煮糊為丸如小
雞頭大晒乾每一粒空心溫酒下冷水亦得常服鎮心
神駐顏色溫脾腎理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久
服輕身忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服
極有神效

駐車丸治一切下痢無問新久及冷熱膿血腸滑裏急日
夜無度膈腹絞痛不可忍者

阿膠炒 砂炒如珠子為末 當歸去 黃連去
乾姜兩

右為細末以阿膠膏和併手丸如桐子大每服二十九食前溫米飲下日三服凡小兒服丸如麻子大更量歲數加減

泄瀉 甘草乾姜湯

甘草四兩 乾姜二兩

右咬咀以水三升煮取一升五合去渣分溫再服

暴厥 乾姜附子湯

乾姜兩 附子一枚生用去皮

右二味水煎頓服

肩痛 茯苓丸治臂痛如神

赤茯苓 防風 細辛 白朮

澤瀉 官桂各半 瓜蒌根 紫苑

附子 黃芪 芍藥 甘草各三分

人醫聖初有是方

生地 牛膝酒浸 山芋 獨活

半夏酒浸 山茱萸各一分

右十八味為細末煉蜜為丸如桐子大每服十九溫酒送下食前

見血 當歸四逆加茱萸湯

當歸 桂枝 芍藥 細辛各一兩

通草 甘草各六錢 茱萸三錢

右水六盞煎服

下兒吐 升麻芍根湯

升麻 葛根 芍藥 甘草等分

每服六錢水一盞半煎至八分去渣服寒多即熱服熱多即溫服

小兒吐 開胃丸治乾嘔氣逆不止

半夏麩炒三兩 人參一兩 白朮去 陳皮去

白朮各一兩 右為細末用生姜汁同粳肉和丸如桐子大每服二十九至三十九不拘時用粥飲送下

小兒驚 辰砂丸

辰砂 麝香 牛黃各二分 半夏制

丁香 白附子 鐵粉 天麻

南星制各半兩

右為細末煮粳米飲丸如麻子大每服五丸用荆芥湯不拘時下

人醫聖初有是方

內經運氣類註序文

夫運氣之道上古聖人所以參天地贊化育者也蓋氣流
行於天地間有化有變其化也在人為生有變也在人
為疾死故贊其化育以濟其生者必先制其疾以拯其死
此則醫道之所由設使有生者無夭折享壽考而其德業
可與天地參矣然其道載諸內經者廣大精微非淺學所
可易知是以後世悉皆湮晦今姑舉其大畧言之五運屬
陰守於地內六氣屬陽周於天外其化生於人也五運化
生五臟屬內六氣化生六腑十二經屬外其變疾於人也
五運內變病於五臟甚則兼外六氣外變病於六腑十二
經甚則入內內外變極然後死也五運有平氣太過不及
之殊六氣有常化淫勝反勝相勝之異五運平氣者其歲
化生皆常本位如木平氣敷和之紀其色蒼其味酸之類

中五

生言左是勝子

中五

是其變病皆在本臟如木平氣之病在肝也太過者歲
變平氣為太過其化生皆兼非位如太過發生之紀其色
青黃白其味酸甘辛如兼非位之土金是也其變病皆在
已所勝之臟如木太過則木勝脾土而脾病也其勝乃本
氣有餘而勝故不為他氣報復間有復者是不務其德暴
虐失常也不及者歲變平氣為不及其化生亦兼非位如
木不及委和之紀其果束季其味酸辛亦兼非位之土金
是也其變病皆已所不勝者乘虛勝之而本臟病勝極則
已所生者報復其勝而勝者之臟亦病如木不及則金勝
之而肝病勝則火復金擊而肺亦病也其勝乃乘我之虛
而勝勝之根本不固故為他氣報復凡此五運之氣皆有
定紀者也六氣常化者天地六位之化各守常位生病各
當本處其天地之常化如厥陰司天少陽在泉之歲風化

中五

中五

中五

居上火化居下風病行於上熱病行於下之類而不出他
位也其六位之常化如厥陰司天之歲初之氣化風燥民
病寒於右之下二之氣化寒熱民病熱於中之類而不燥
他氣也凡此六氣之常化皆有定紀猶五運平氣也淫勝
者天地之氣變常內淫而勝也天氣內淫而上勝於下則
已所勝之臟經受邪而病甚如厥陰司天風淫所勝其病
在足太陰脾經也地氣內淫而外勝於內其病在足陽明
胃經也凡此六氣之淫勝猶五運太過皆有勝無復其勝
之盛雖有定紀其勝之動否則無定紀而不可必也反勝
相勝者六位之左右變常乘虛而勝也其乘天地之虛而
勝者為反勝左右自有相勝乘虛而勝者為相勝皆視所
虛之氣侮不勝已者勝之勝極則仍為虛者之子復之如
所虛之氣屬太陰則所勝之氣屬厥陰而病在脾胃經所

八

復之氣屬陽明而病在肝膽經也蓋天地歲氣猶王也左
右步氣猶諸侯也左右勝天地猶諸侯僭亂故曰反勝左
右自相勝猶諸侯自相征伐故曰相勝也凡此六氣之反
勝相勝五運不及故皆有勝有復其氣其動皆無定紀但
隨虛而勝隨勝而復也諸五運皆有定紀者陰靜有常也
六氣少有定紀者陽動多變也五運之平氣之常化為常
其化生為常之常變病為常之變五運之太過不及與六
氣之淫勝反勝相勝為變其化生為變之常變病為變之
變太過淫勝為變之盛不及反勝相勝為變之虛察其常
變以定生死詳其虛實以斷補瀉謹道如法萬舉萬全也
然其經奉行於世惟唐太僕令王冰氏篤好之尤為詮註
而其昭彰道要開示玄微者於功為大但于慮一失而不
得經旨者亦或有之為未盡善也於是不分常變釋六氣

勝復無定紀之變為有定紀之常不分盛虛釋左右乘虛之相勝為司天之淫勝是則運氣之義不明自此始矣後雖有林氏校正孫氏攷誤與夫托名所著玄珠密語天元玉冊及諸家運氣圖說之類然皆不能出王氏之右而救其失反使運氣之義愈晦而書愈繁至於河間所註病機其形容病化之情狀推究火熱之衆多真有發前人未發之妙奈何又以運氣之所屬皆為盛而不察其所屬各有盛虛以盛虛所兼非位之化皆為似而不察其所兼之盛者似虛者是為重失矣夫王氏釋變氣為常氣相勝為淫勝則人不識變而占運氣不應年辰河間釋運氣之所屬皆為盛所兼非位之化皆為似則人不識虛而施治法不對病證遂使世俗皆愀然不信而棄之也其不知變者曰其氣司天屬陰寒今反炎熱其運合太過今反不及此乃

入 醫家類 運氣

三

上古之天道非可占之於今世也其不知虛者曰其病屬熱投寒劑不齊其證當瀉施瀉法反劇此乃北方之治法非可用之於南人也惟戴人云病如不是當年氣看與何年氣運同便向其年求活法方知都在至真中之歌似能破世之感又引而不發嗚呼有定紀之年辰與無定紀之勝復相錯常變今獨求年辰之常不末勝復之變豈得運氣之真哉六氣之盛衰盛熱與虛寒虛熱同其所屬今獨求寒熱之所屬不求寒熱之盛虛豈得寒熱之情哉苟以常變盛虛觀運氣寒熱則古今南北皆可一以貫之而所謂參天地贊化育如視之掌也僕自早歲留意是書鑽研既久似得一二爰據所知挈其宏綱開以節目而類編集之使常變必分盛虛必著或前賢之註未備者開以已意附之庶幾運氣之義燦然復明目之曰運氣補註雖僭踰

之罪莫逃然濟生一念自有不容已者凡吾同志幸改正云

內經運氣類註序文

入 醫家類 運氣

四

醫學綱目卷之四十 內經運氣類註

五運六氣總論

黃帝問曰天有五御五位以生寒暑燥濕風人有五臟化五氣以生喜怒思憂恐論言五運相襲而皆治之終期之日周而復始予已知之矣願聞其與三陰三陽之候奈何合之鬼史區再拜稽首對曰昭乎哉問也夫五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也可不通乎故物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用無方謂之聖夫變化之為用也在天為玄在人為道在地為化化生五味道生智玄生神神在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為濕在地為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水故在天為氣在地成形形氣相感而化生萬物矣然天地者萬物之上下也

醫學綱目卷四

左右者陰陽之道路也水火者陰陽之徵兆也金木者生成之終始也氣有多少形有盛衰上下相召而損益彰矣帝曰願聞五運之主時也何如鬼史區曰五氣運行各終期日非獨主時也帝曰請問其所謂也鬼史區曰臣積考大始天元冊文曰太虛寥廓肇基化元萬物資始五運終天布氣直繩總統坤元九星懸朗七曜周旋曰陰曰陽曰柔曰剛幽顯既位寒暑弛張生生化化品物咸彰臣斯十世此之謂也天元紀大論

此一章論五運六氣之端變化虛虛之始也五運者地之木火土金水治政令於內者也三陰三陽者天之風熱濕燥寒治政令於外者也帝問五運相襲而治者其與三陰三陽外治之候如何合之鬼史區答五運陰陽之治乃天地之道萬物之綱紀變化之父母生殺之本

始神明之府也故其治也物生謂之化物極謂之變陰陽莫測之謂神神用無方謂之聖其變化神聖謂之用在天則為風熱濕燥寒三陰三陽之氣在地則風之氣為木熱之氣為火濕之氣為土燥之氣為金寒之氣為水而成五運之形故在天之形與地相感而萬物育以為物生之化也然天地者萬物之上下左右者陰陽之道路此在天三陰三陽之氣右旋于外以加地也水火者陰陽之徵兆金木者生成之終始此在地五運之形左轉於內以臨天也天上之氣有多少地下之形有盛衰故天上多少之氣與地下盛衰之形相召而損益彰以為物極之變也其氣之多與形之虛相召者益益為變之盛也氣之少與形之衰相召者損損為變之虛也蓋物生之化者天地之常氣在五運曰平氣在六氣曰

醫學綱目卷四

常化也物極之變者天地之變氣在五運曰太過不及在六氣曰淫勝反勝相勝也其變之盛者則五運之太過六氣之淫勝也其變之虛者則五運之不及六氣之反勝相勝也凡此五運六氣所謂變化虛虛經後篇千言萬語皆所以反覆發明此四者學者當潛心以究之也五運氣行各終期日非獨主時者言木火土金水治政各終一歲之期日不獨治歲內六步之時令也蓋經於前篇但論五運不及六氣但論主時不及治歲今始於此篇論五運六氣相感相召而治不獨五運也次論五運各治一歲不獨主時也

從之知迎知隨氣可與期應天為天符承歲為歲直三合為治帝曰上下相召奈何鬼史區曰寒暑燥濕風火天之陰陽也三陰三陽上奉之木火土金水地之陰陽也生長化收藏下應之天以陽生陰長地以陽殺陰藏天有陰陽地亦有陰陽木火土金水地之陰陽也生長化收藏故陽中有陰陰中有陽所以欲知天地之陰陽者應天之氣動而不息故五歲而右遷應地之氣靜而守位故六期而環會動靜相召上下相臨陰陽相錯而變由生也帝曰上下周紀其有數乎鬼史區曰天以六為節地以五為制周天氣者六期為一備終地紀者五歲為一周君火以明相火以位五六相合而七百二十氣為一紀凡三十歲千四百四十氣凡六十歲而為一周不及太過斯皆見矣帝曰夫子之言上終天氣下畢地紀可謂悉矣余願聞而藏之上

不醫學綱目卷四

三

以治民下以治身使百姓昭著上下和親德澤下流子孫無憂傳之後世無有終時可得聞乎鬼史區曰至數之機迫近以徵其來可見其往可追敬之者昌慢之者亡無道行私必得天殃謹奉天道請言真要帝曰善言始者必會于終善言近者必知其遠是則至數極而道不惑所謂明矣願夫子推而次之令有條理簡而不匱久而不絕易用難忘為之紀綱至數之要願盡聞之鬼史區曰昭乎哉問明乎哉道如鼓之應桴響之應聲也臣聞之甲巳之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲木運統之帝曰其於三陰三陽合之奈何鬼史區曰子丑之歲上見少陰丑未之歲上見太陰寅申之歲上見少陽卯酉之歲上見陽明辰戌之歲上見太陽巳亥之歲上見厥陰少陰所謂標也厥陰所謂終

也厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之太陰之上濕氣主之少陽之上相火主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是謂六元帝曰光乎哉道明乎哉論請著之玉版藏之金匱署曰天元紀天元紀大論

此一章覆論前章氣有多少形有盛衰上下相召之義也陰陽之氣各有多少者夫三陰三陽之氣各分多少陰多者太陰次少者少陰又次者厥陰也陽多者太陽次少者陽明又次者少陽也形有盛衰謂五行之治各有太過不及者地五運之形各有盛衰土有太少宮金有太少商水有太少羽木有太少角火有太少徵而太者太過少者不及也上下相召者天右旋之陰陽加於地下地左轉之陰陽臨於天上上下下加臨而相召治歲步也天之陰陽風熱燥濕寒又增火為六數者在天之

不醫學綱目卷四

四

熱分為暑火二氣故三陰三陽各上奉之也地之陰陽木火土金水亦增火為六數者在地之火分為君相二形故生長化收藏各下應之也其天之陰陽下加地氣共治歲也則應天之氣動而不息蓋地之治歲君火不主運惟五運循環故天之六氣加之常五歲右餘一氣與地遷移一位而動不息也地之陰陽上臨天氣共治步也則應地之氣靜而守位蓋地之治步其木君相土金水無殊皆各主一步以終期故其上臨天之六氣共治也常六期齊周復於始治之步環會而靜守位也故治歲動者與治步靜者相召外旋上者與內運下者相臨則陰陽相錯而損益盛虛之變所由生也天以六為節地以五為制者上下相召之數也蓋天之六氣各治一歲故六期一備地之六位其君火以明相火以位故

五歲一周五六相合凡三十歲為一紀六十歲為一周其間相錯之陰或氣類同多而益為太過之感者或氣類異少而損為不及之虛者斯皆可見其變也甲巳之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之地五位一周之數也子午之歲上見少陰熱氣丑未之歲上見太陰濕氣寅申之歲上見少陽相火卯酉之歲上見陽明燥氣辰戌之歲上見太陽寒氣巳亥之歲上見厥陰風氣者天六期一備之數也天地之數五而火熱居三可見天地間熱多於寒火倍於水而人之病化從可推也

論陰陽有不合於古者於黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常請天師而問之曰論言天地之動靜神明為之紀陰陽之升降寒暑彰其兆余聞五運之數於夫子夫子之所言正五氣之各主

八醫學綱目卷四

歲耳首甲定運余因論之鬼史區曰土主甲巳金主乙庚木主丙辛木主丁壬火主戊癸子午之上少陰主之丑未之上太陰主之寅申之上少陽主之卯酉之上陽明主之辰戌之上太陽主之巳亥之上厥陰主之不合陰陽其故何也岐伯曰是明道也此天地之陰陽也夫推之可數者人中之陰陽也然所合數之可得者也夫陰陽者數之可十推之可百數之可千推之可萬天地陰陽者不以數推以象之謂也帝曰願聞其所始也岐伯曰昭乎哉問也臣覽天元冊文丹天之氣經于牛女戊分齡天之氣經于心尾巳分蒼天之氣經於危室柳鬼素天之氣經于亢昂畢玄天之氣經于張翼婁胃所謂戊巳分者本壁角軫則天地之門戶也夫候之所始道之所生不可不通也行大

此一章覆論前章五運六氣所化陰陽之義也其論五天之象所經星宿為運氣之化皆干與支同屬者及連位者齊化也土主甲巳及丑未之上太陰主之者齡天之氣經于心尾巳分之象而心尾者甲地巳分者中宮故甲與丑連位巳與未同屬齊化濕土也金主乙庚及卯酉之上陽明主之者素天之氣經于亢昂畢之象而氏亢者乙地昂畢者庚地故乙與卯同屬庚與酉同屬齊化燥金也木主丙辛及辰戌之上太陽主之者玄天之氣經于張翼婁胃之象而張翼者丙地婁胃者辛地故丙與辰連位辛與戌連位齊化寒水也木主丁壬及巳亥之上厥陰主之者蒼天之氣經于危室柳鬼之象而危室者壬地柳鬼者丁地故壬與亥同屬丁與巳同屬齊化風木也火主戊癸及子午之上少陰主之寅申之上少陽主之者丹天之氣經于牛女戊分之象而牛女者癸地戊分者中宮故癸與子同屬戊與午連位齊化火熱也干之甲乙屬木位東丙丁屬火位南庚辛屬金位西壬癸屬水位北戊巳屬土位中宮支之寅卯配甲乙巳午配丙丁申酉配庚辛亥子配壬癸辰位東南未位西南戌位西北丑位東北為四維屬戊巳故乙卯同屬木丁巳同屬火巳未同屬土庚酉同屬金壬癸亥子同屬水也甲寅位東之首癸丑位北方尾而甲丑連位癸寅連位也丙位南之首辰位東之尾而丙辰連位也戊巳位木火金水中間在天地為門戶在四時為長夏南連午西連申而戊巳午申連位故戊巳無方位而經獨言戊巳分者表章之也辛戌皆位酉之尾而辛戌連位也獨戊火連申夾未土於中癸火連寅夾丑

八醫學綱目卷四

申之上少陽主之者丹天之氣經于牛女戊分之象而牛女者癸地戊分者中宮故癸與子同屬戊與午連位齊化火熱也干之甲乙屬木位東丙丁屬火位南庚辛屬金位西壬癸屬水位北戊巳屬土位中宮支之寅卯配甲乙巳午配丙丁申酉配庚辛亥子配壬癸辰位東南未位西南戌位西北丑位東北為四維屬戊巳故乙卯同屬木丁巳同屬火巳未同屬土庚酉同屬金壬癸亥子同屬水也甲寅位東之首癸丑位北方尾而甲丑連位癸寅連位也丙位南之首辰位東之尾而丙辰連位也戊巳位木火金水中間在天地為門戶在四時為長夏南連午西連申而戊巳午申連位故戊巳無方位而經獨言戊巳分者表章之也辛戌皆位酉之尾而辛戌連位也獨戊火連申夾未土於中癸火連寅夾丑

土於中者蓋濕土在中火游行其間在天居土前在地居土後而土火常相混也故土旺長夏火熱之內丹溪深悟此理發明濕熱相火為病十居八九及有濕鬱生熱熱久生濕之論良以此也其五天之象所經星宿分野獨當五運之干位不及六氣之支位者蓋干之與支即根本之與枝葉經言干則支在其中矣故其化皆干與支之同屬者連位齊化者是根本與枝葉同化者也或曰近世獨以五運之化為出五天之象六氣之化不言五天之象但將正化對化立說以上正化於未對化於丑金正化於酉對化於卯水正化於戌對化於辰木正化於亥對化於巳君火正化於午對化於子相火正化於寅對化於申又以未酉戌亥午寅之正化為實無勝復丑卯辰巳子申之對化為虛有勝復今予所釋經

醫星綱目卷四

文一以運氣之化皆出五天之氣與彼說異者何也曰經旨皎如日星好事者鑿此正化對化之說也謹按經文帝悉陳五運之干六氣之支一併設問非獨問五運不及六氣也岐伯之答亦以五天之象所經星宿一併答五運之干六氣之支非獨答五運而分出六支不答也今何為不究經旨擅將運氣分作二義妄撰正化對化異說上亂聖經下惑後學而作軒岐之罪人也至於勝復之說經但以子午寅申辰戌六歲之紀氣化大而先天無勝復未聞未酉亥氣化少者為實無勝復以丑未卯酉巳亥六歲之紀氣化少而後天有勝復未聞子辰申氣化大者為虛有勝復也



醫星綱目卷四

帝曰善論言天地者萬物之上下左右者陰陽之道路未知其所謂也岐伯曰所謂上下者歲上下見陰陽之所在也左右者諸上見厥陰左少陰右太陽見少陰左太陽右厥陰見太陰左少陽右少陰見少陽左陽明右太陰見陽明左太陽右少陽見太陽左厥陰右陽明所謂面北而命其位言其見也帝曰何謂下岐伯曰厥陰在上則少陽在下左陽明右太陰少陰在上則陽明在下左太陽右少陽在下左少陰右太陽陽明在上則少陰在下左太陰右厥陰太陽在上則太陰在下左少陽右少陰所謂面南而命其位言其見也上下相違寒暑相臨氣相得則和不相得則病帝曰氣本相得而病者何也岐伯曰以下臨上不當位也帝曰動靜何如岐伯曰上者右行下者左行左右周

天餘而復會也帝曰余聞鬼史區曰應地者靜今夫予乃
言下者左行不知其所謂也願聞何以生之乎岐伯曰天
地動靜五行遷復雖鬼史區言其上候而已猶不能編明
夫變化之用天垂象地成形七曜締虛五行麗地地者所
以載生成之形類也虛者所以列應天之精氣也形精之
動猶根本之與枝葉也仰觀其象雖遠可知也帝曰地之
為下否乎岐伯曰地為人之下太虛之中者也帝曰憑乎
岐伯曰大氣舉之也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以
潤之寒以堅之火以溫之故風寒在下燥熱在上濕氣在
中火遊行其間寒暑六入故令虛而化生也故燥勝則地
乾暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂火
勝則地固矣帝曰天地之氣何以候之岐伯曰天地之氣
勝復之作不形於診也脈法曰天地之變無以脈診此之

八 醫學綱目卷四

九

謂也帝曰問氣何如岐伯曰隨氣所在期於左右帝曰期
之奈何岐伯曰從其氣則和違其氣則病不當其位者病
迭移其位者病失守其位者危尺寸反者死陰陽交者死
先立其年以知其氣左右應見然後乃可以言死生之逆
順帝曰寒暑燥濕風火在人合之奈何其於萬物何以生
化岐伯曰東方生風風生木木生酸酸生肝肝生筋筋生
心其在天為玄在人為道在地為化生五味道生智玄
生神化生氣神在天為風在地為木在體為筋在氣為柔
在臟為肝其性為暄其德為和其用為動其色為蒼其化
為榮其毛其政為散其令宜發其變摧拉其青為隕其
味為酸其志為怒怒傷肝悲勝怒風傷肝燥勝風酸傷筋
辛勝酸南方生熱熱生火火生苦苦心生血血生脾
其在天為熱在地為火在體為脈在氣為息在臟為心其

性為暑其德為顯其用為燥其色為赤其化為茂其重羽
其政為明其令鬱蒸其變炎燥其青燔煖其味為苦其志
為喜喜傷心恐勝喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣酸勝苦中央
生濕濕生土土生甘甘生脾脾生肉肉生肺其在天為濕
在地為土在體為肉在氣為充在臟為脾其性靜兼其德
為濡其用為化其色為黃其化為盈其重保其政為證其
令雲雨其變動注其青滂瀆其味為甘其志為思思傷脾
怒勝思濕傷肉風勝濕甘傷脾酸勝甘西方生燥燥生金
金生辛辛生肺肺生皮毛皮毛生腎其在天為燥在地為
金在體為皮毛在氣為成在臟為肺其性為涼其德為清
其用為固其色為白其化為飲其重介其政為斂其令霧
露其變動殺其青蒼落其味為辛其志為憂憂傷肺喜勝
憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦勝辛北方生寒寒生水

八 醫學綱目卷四

十

水生鹹鹹生腎腎生骨髓髓生肝其在天為寒在地為水
在體為骨在氣為堅在臟為腎其性為凜其德凌愴其用
為藏其色為黑其化為瀟其重澹其政為靜其令為寒其
變凝冽其青水電其味為鹹其志為恐恐傷腎思勝恐寒
傷血燥勝寒鹹傷血甘勝鹹五氣更立各有所先非其位
則邪當其位則正帝曰病之生變何如岐伯曰氣相得則
微不相得則其帝曰主歲何如岐伯曰氣有餘則制已所
勝而侮所不勝其不及則已所不勝侮而乘之已所勝輕
而侮之侮反受邪侮而受邪寡於畏也運行
此一章論天右旋於外而寒暑六入以舉其地地受天
六入以為五行左轉化生人物於天之中也天地萬物
之上下左右陰陽之道路者天右旋六節之位也上下
謂在上者司天之位在下者在泉之位左右謂在上之

左右者天左間右間之位在下之左右者泉左間右間之位也故天之三陰三陽於其六位右旋如巳亥歲上見厥陰而左間少陰右間太陽至子午歲厥陰右旋下降則上見少陰而左間太陽右間厥陰常如此逐歲自上旋降於右也面北命其位言其見者謂司天之位在南而面北命其左右則西南為左間之位東南為右間之位而言其所見之陰陽也厥陰在上則少陽在下而左間陽明右間太陰至厥陰右旋下降而少陰在上則陽明在下而左間太陽右間少陽常如此隨司天旋轉也而南命其位言其見者謂地之位在北而面南命其左右則東北為左間之位西北為右間之位而言其所見之陰陽也自天地萬物之上下至此獨論天右旋之氣也上下相遊寒暑相臨氣相得則和不相得則病者

入醫學綱目卷四

十一

言天之右旋遠地方位而其氣與地方位氣相遊相臨其遊同類相生之氣則和不同類相制之氣則病也或氣雖同類相得亦病者惟相火臨於君火為不當位故也經下篇云君位臣則順臣位君則逆逆則病近害速者是也動靜何如者帝謂天動能臨於地地靜不能臨天而難上下相遊寒暑相臨之語也岐伯答上者右行下者左行則知天常於上自右降東而旋迴以臨地地常於下自左升東北而循顯明木君相土金水之位循環臨天而皆動也故左右臨動各皆周天過則復相會也然天之右行即曆家退度之右行其實皆如地之左行而東升西降也應地者靜帝復難下者左行之言也岐伯答天地之體動靜雖殊而其用之變化在地則五行麗地而載生成之形類運於內在天則七曜緯虛

而列應天之精氣運於外其形類與精氣之相隨運動猶根本之與枝葉同乎一氣而不殊故但仰觀七曜之象周旋雖遠可知其動也自上下相遊至此通論天右旋地左轉之氣也地之為下否乎者帝謂天象周旋皆轉於地下而地居其上今日曰下者左行則地之左行為下得非否乎岐伯答地為人之下太虛之中者則上下之義始明矣蓋以其所屬言之則司天在泉之氣屬天者為上五行之屬地者為下以其所在言之則司天者為上在泉者為下而地之五行居中岐伯以所屬言之故曰下者左行帝以所在言之故難地之左行非下也馮附也地居太虛之中何所馮附而不墜也大氣舉之謂風寒暑濕燥火六節大氣旋轉於外任持其地而乾蒸動潤堅濕以入其體也故其入也風寒在下而風居

入醫學綱目卷四

十一

東寒居北燥熱在上而燥居西熱居南濕氣在中而居中央火於未入之前入濕上已入之後在濕下而遊行上下之間也自地之為下至此原地氣一皆本乎天也候診候也言天地之氣及勝復之作統貫六位難以診候唯間氣偏治一位故可隨其所在期之於尺寸左右也九期之之法陽之所在其脈應陰之所在其脈不應故北政之歲人氣面北而寸北尺南地左間之氣在右寸右間之氣在左寸天左間之氣在左尺右間之氣在右尺所以少陰在泉則左間太陰右間厥陰而兩寸俱不應厥陰在泉則左間少陰而右寸不應太陰在泉則右間少陰而左寸不應少陰司天則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應厥陰司天則左間少陰而左尺不應太陰司天則右間少陰而右尺不應也南政之歲人氣

面南而寸南尺北天左間之氣在右寸右間之氣在左寸地左間之氣在左尺右間之氣在右尺所以少陰司天則左間太陰右間厥陰而兩寸俱不應厥陰司天則左間少陰而右寸不應太陰司天則右間少陰而左寸不應少陰在泉則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應厥陰在泉則左間少陰而左尺不應太陰在泉則右間少陰而右尺不應也從其氣則和者陰陽各當尺寸本位也違其氣則病者陰陽或不當其位或迭移其位或失守其位或尺寸反或陰陽交也不當其位者謂陰陽之見不當尺寸本位也迭移其位者謂陰陽迭皆移轉一位也假如南政少陰司天陰皆在寸陽皆在尺迭皆左轉者則陰皆移左而左不應陽皆移右而右應迭皆右轉者則陰皆移右而右不應陽皆移左而左應之類

醫學綱目卷四

主

是也失守其位者謂本位他位皆失守不見也如陰失守則尺寸皆無陰陽失守則尺寸皆無陽非如迭移而相反相交見於他位也尺寸反者假如北政少陰司天陽在寸陰在尺而陽反見尺陰反見寸之類是也陰陽交者假如北政太陰司天陽在左陰在右而陽反見右陰反見左之類是也寒暑燥濕風火在人合之奈何其於萬物何以生化者言天外旋轉大氣六入地中生化人物其在人臟腑形體者如何合之在萬物如何生化也東方生風者天六入之風居東方地體中為生生之始也自風而生木酸肝筋心矣凡東方性用德化政令之類皆本乎風而內合人之肝氣者也故肝居左象風之生於東筋為屈伸象風之動也南方生熱者天六入之熱居南方地體中為生長之始也自熱而生火苦心

血脾矣凡南方性用德化政令之類皆本乎熱而內合人之心氣者也故心居前象熱之生於南血為人之神象火之明曜也中央生土者天六入之濕居中央地體中為生化之始也自濕而生土甘脾肉肺矣凡中央性用德化政令之類皆本乎濕而內合人之脾氣者也故脾居腹象濕之生於中央肉充一身象土之充實大地也西方生燥者天六入之燥居西方地體中為生收之始也自燥而生金辛肺皮毛腎矣凡西方性用德化政令之類皆本乎燥而內合人之肺氣者也故肺居右象燥之生於西皮毛乾於身表象氣之燥也北方生寒者天六入之寒居北方地體中為生藏之始也自寒而生水鹹腎骨肝矣凡北方性用德化政令之類皆本乎寒而內合人之腎氣者也故腎居後象寒之生於北骨為

醫學綱目卷四

主

百骸象寒之堅也五氣更立各有所先其所先非其位則邪當其位則正者謂前五方之氣各治一部之令者也五氣更立治令皆各有所先其所先者風之立非春令熱之立非夏令濕之立非長夏令燥之立非秋令寒之立非冬令是皆非其位之立為勝復之邪也風當春令立熱當夏令立濕當長夏令立燥當秋令立寒當冬令立是皆當其位之立為本氣之正也氣相得則微不相得則甚者言非位所立之邪生變之病其邪與治令之氣相得則病微不相得則病甚也主氣者亦謂前五方之氣各治一歲之政者也歲氣有餘則制所勝而侮所不勝如歲木治政之氣有餘則制土氣而濕化減少傷金氣而風化大行也其不及則已所不勝侮而乘之已所勝輕而侮之如歲木治政之氣不及則金氣勝侮

而乘之燥化乃行土氣輕而侮之濕氣反布也侮反受邪侮而受邪寡於畏者金侮木不及從而乘之則木之子火報復其勝而侮金反受邪也侮金受邪則其不及之木寡於畏而氣復疎伸也自天地之氣何以候至此原人氣一皆本乎天也

<p>北政人氣面北寸脈在北尺脈在南圖</p> <p>乙丙丁戊庚辛壬癸八干每于六歲通該四十八歲</p> <p>地左間之氣在右卯酉歲</p> <p>寸三陰在地左間右間脈除</p> <p>則右寸不應</p> <p>少陰在泉兩寸俱不應</p>		<p>左間太陰</p> <p>實申歲</p> <p>右間太陽</p> <p>存不應</p>		<p>天左間之氣在左</p> <p>尺三陰在天左間</p> <p>則左尺不應</p> <p>厥陰司天</p> <p>右間太陽</p> <p>左尺不應</p>		<p>右間少陰</p> <p>存不應</p> <p>太陰在泉</p> <p>左間少陽</p> <p>存不應</p>		<p>天右間之氣在右</p> <p>子午歲</p> <p>尺三陰在天右間</p> <p>則右尺不應</p> <p>少陰司天</p> <p>天受俱不應</p>		<p>右間厥陰</p> <p>巳亥歲</p> <p>左間少陰</p> <p>存不應</p> <p>太陰司天</p> <p>右間太陽</p> <p>左尺不應</p>		<p>左間少陽</p> <p>存不應</p> <p>太陰在泉</p> <p>右間少陰</p> <p>存不應</p>	
---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--

北政死脈圖

<p>南政人氣面南寸脈在南尺脈在北圖</p> <p>甲巳通該十二歲</p> <p>天左間之氣在右</p> <p>寸三陰在天左間則右寸不應</p> <p>少陰司天</p> <p>天受俱不應</p>		<p>右間厥陰</p> <p>巳亥歲</p> <p>左間少陰</p> <p>存不應</p>		<p>天右間之氣在左</p> <p>尺三陰在天右間則左尺不應</p> <p>厥陰司天</p> <p>右間太陽</p> <p>左尺不應</p>		<p>右間少陰</p> <p>存不應</p> <p>太陰在泉</p> <p>左間少陽</p> <p>存不應</p>		<p>天左間之氣在右</p> <p>子午歲</p> <p>尺三陰在天左間則右寸不應</p> <p>少陰司天</p> <p>天受俱不應</p>		<p>右間厥陰</p> <p>巳亥歲</p> <p>左間少陰</p> <p>存不應</p> <p>太陰司天</p> <p>右間太陽</p> <p>左尺不應</p>		<p>左間少陽</p> <p>存不應</p> <p>太陰在泉</p> <p>右間少陰</p> <p>存不應</p>	
---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--

南政死脈圖

司天尺寸反者死	子午歲 右關太陰 兩寸反應	在泉尺寸反者死	卯酉歲 右關太陰 兩尺反應
少陰司天	巳亥歲 右關太陰 兩寸反應	少陰在泉	左關少陰 兩尺反應
厥陰司天交	右關少陰 兩寸反應	厥陰在泉交	右關少陰 兩尺反應
左關少陰 兩寸反應	在泉陰陽交者死	左關少陰 兩尺反應	左關少陰 兩尺反應
右關少陰 兩寸反應	太陰司天交	太陰在泉交	左關太陰 兩尺反應
右關少陰 兩寸反應	右關少陰 兩寸反應	右關少陰 兩尺反應	右關少陰 兩尺反應

醫學綱目卷四

七

黃帝問曰嗚呼遠哉天之道也如迎浮雲若視深淵視深淵尚可測迎浮雲莫知其極夫子數言謹奉天道余聞而藏之心私異之不知其所謂也願夫子溢志盡言其事令終不滅久而不絕天之道可得聞乎岐伯對曰明乎哉問天之道也此因天之序盛衰之時也帝曰願聞天道六六之節盛衰何也岐伯曰上下有位左右有紀故少陽之右陽明治之陽明之右太陽治之太陽之右厥陰治之厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治之此所謂氣之標蓋南面而待之者也故曰因天之序盛衰之時移光定時正立而待之此之謂也少陽之上火氣治之中見厥陰陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明所

謂本也本之下中之見也見之下氣之標也本標不同氣應異象帝曰其有至而至有至而不至有至而太過何也岐伯曰至而至者氣不至而不至來氣不及也未至而至來氣有餘也帝曰至而未至未至而至何如岐伯曰應則順否則逆逆則變生變生則病帝曰善請言其應岐伯曰物生其應也氣脈其應也

此一章論天之陰陽右周天道之常所謂上者右行者也天道六六之節盛衰者天之三陰三陽右旋天外更治歲政每歲各一盛衰至六歲周遍通得盛衰之節六六也上下有位左右有紀者謂每歲陰陽盛衰之位上下謂司天在泉二位也左右謂司天之左間右間及在泉之左間右間為四紀也凡天右旋之陰陽臨司天之位者其天之政盛至三之氣始布臨在泉之位者其地

之氣盛至終之氣始布而上下二位有二節陰陽盛衰也臨司天之左間者其氣至四之氣盛右間者其氣至二之氣盛臨在泉之左間者其氣至初之氣盛右間者其氣至二之氣盛而左右四紀有四節陰陽盛衰也故此六節陰陽每歲各一盛衰而數得六庚申歲少陽旋來司天治之為初六少陽之右卯酉歲陽明旋來司天治之為六二陽明之右辰戌歲太陽旋來司天治之為六三太陽之右巳亥歲厥陰旋來司天治之為六四厥陰之右子午歲少陰旋來司天治之為六五少陰之右丑未歲太陰旋來司天治之為六六太陰之右周而復始於少陽治之故曰六六之節盛衰也凡此三陰三陽為治之氣皆所謂六氣之標也南面待之者明前少陽之右云云皆南面而立而待之乃右居西而從西旋過東

也少陽之上火氣治之中見厥陰陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明者其火燥風寒熱濕為治之氣皆所謂六氣之本也其中見之氣乃六氣之中氣也通前六氣之標言之則本居上標居下中氣居本標之中故曰本之下中之見也見之下氣之標也中氣者三陰三陽各猶夫婦之配合相守而人之臟腑經脈皆應之也故少陽本標之中見厥陰厥陰本標之中見少陽而互為中氣相守則人之膽三焦少陽經亦絡肝心包肝心包厥陰經亦絡膽三焦而互交也陽明本標之中見太陰太陰本標之中見陽明而互為中氣相守則人之胃大腸陽明經亦絡脾肺脾肺太陰經亦絡胃大腸

六書經卷中

九

而互交也太陽本標之中見少陰少陰本標之中見太陽而互為中氣相守則人之膀胱小腸太陽經亦絡腎心腎心少陰經亦絡膀胱小腸而互交也本標不同氣應異象者謂太陽少陰二氣也太陽之上寒氣治之是標陽本寒不同其氣應則太陽所至為寒生中為溫而寒溫異象也少陰之上熱氣治之是標陰本熱不同其氣應則少陰所至為熱生中為寒而熱寒異象也至於脈從病反如瓜甜蒂苦葱白葉青參補瀉瀉麻黃發汗根節止汗之類皆太陽少陰本標不同之氣異象也其有至而至有至而不至有至而太過者言陰陽旋來治歲之候至而其氣化亦應候至者為至而至者和也候至而其氣化不至者為至而不至旋來之氣不及也候未至而氣化先至者為未至而至旋來之氣有餘也故

氣化應候至者為順未至而至者為逆逆則勝復之變生變生則病作矣物生其應氣脈其應者覆說應則順之義也經所謂厥陰所至為風生之類是物生之應厥陰之至其脈弦之類是氣脈之應也

六書經卷中

十


天道六六之節盛衰圖 陽明治亦酉歲六節盛衰





大陽治辰戌歲六節盛衰 厥陰治巳亥歲六節盛衰



少陰治子午歲六節盛衰 太陰治丑未歲六節盛衰



六氣各有標本中圖



足陽明屬胃絡脾	本屬胃大腸 中絡脾於中 標見手陽明	互	本屬脾肺之 中絡胃大腸於 標見手太陽
手陽明屬大腸絡肺	本屬肺小腸 中絡心於中 標見手太陽	互	本屬心之 中絡肺小腸 標見手少陰
足太陽屬膀胱絡腎	本屬膀胱小腸 中絡心於中 標見手太陽	互	本屬腎心之 中絡膀胱小腸 標見手少陰
手太陽屬小腸絡心	本屬腎心之 中絡膀胱小腸 標見手少陰	互	本屬膀胱小腸 中絡心於中 標見手太陽
足少陰屬腎絡膀胱	本屬膀胱小腸 中絡心於中 標見手太陽	互	本屬腎心之 中絡肺小腸 標見手少陰
手少陰屬心絡小腸	本屬腎心之 中絡肺小腸 標見手少陰	互	本屬膀胱小腸 中絡心於中 標見手太陽

論地道左透以屬外列為屬裏而

帝曰善願聞地理之應六節氣位何如岐伯曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步土

氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之相火之下水氣承之水

位之下土氣承之土位之下風氣承之風位之下金氣承之金位之下火氣承之君火之下陰精承之帝曰何也岐

伯曰亢則害承乃制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病帝曰盛衰何如岐伯曰非其位則邪當其位則正邪則變甚正則微帝曰何謂當位岐伯曰木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子所謂歲會氣之平也

帝曰非位何如岐伯曰歲不與會也帝曰土運之歲上見太陰火運之歲上見少陽少陰金運之歲上見陽明木運之歲上見厥陰水運之歲上見太陽奈何岐伯曰天之與會也故天元冊曰天符帝曰天符歲位何如岐伯曰太乙天符之會也帝曰其貴賤何如岐伯曰天行為執法歲會

為行令太乙天符為貴人帝曰邪之中也奈何岐伯曰中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死帝曰位之易也何如岐伯曰君位臣則順臣位君則逆逆則其病近其管速順則其病遠其患微所謂二火也六微古大論

此一章論地之陰陽左運地理之常所謂下者左行者也地理應六節氣位者地之四方分為六步更治時令以應天外六節氣位之治也顯明之右君火之位者日出顯明卯地之右在方屬東南在時屬春分卯中之後為君火之位也君火之右退行一步相火治之者地氣至南方相火位行令治夏至前後三之氣以應司天之政布其運主戊癸歲以應司天之政治歲也復行一步土氣治之者地氣至西南土位行令至秋分前四之氣

以應司天左間之氣盛其運主甲巳歲以應司天之政治歲也復行一步金氣治之者地氣至西北金位行令治秋分後五之氣以應在泉右間之氣其運主乙庚歲以應司天之政治歲也復行一步水氣治之者地氣至北方水位行令治冬至前後終之氣以應在泉之氣布其運主丙辛歲以應司天之政治歲也復行一步木氣治之者地氣至東北木位行令治春分前初之氣以應在泉左間之氣盛其運主丁壬歲以應司天之政治歲也復行一步君火治之者地氣至東南君火位行令治春分後二之氣以應司天右間之氣盛其運周歲相火代之不主歲也凡此六步治令之時各行本方之氣入於中國故木於東方治令時春氣西行而中國皆東方溫氣與泉左間所居之氣也君相於南方治令時夏氣

北行而中國皆南方熱氣與天右間所居之氣也金於西方治令時秋氣東行而中國皆西方涼氣與天左間所居之氣也木於北方治令時冬氣南行而中國皆北方寒氣與泉右間所居之氣也六氣之下各有所制之氣承之者蓋五行之氣一極則一生而循環相承無一息間斷也相火之下水氣承之者夏相火極水生承之從微漸化至冬著也水位之下土氣承之者冬水極土生承之從微漸化至長夏著也土位之下木氣承之者長夏土極木生承之從微漸化至春著也木位之下金氣承之者春木極金生承之從微漸化至秋著也金位之下火氣承之者秋金極火生承之從微漸化至夏著也君火之下陰精承之者夏君火極陰精承之從微漸化至冬著也其意與陰陽家水胎於午金胎於卯等說

六經學綱卷四

素

大同小異而皆循環相承以為胎也亢過極也亢則害承乃制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病者言六位之氣過極則必害作承氣乃生於下制之使不過也故制則從微化著承者自外列盛極者自外列衰而生化循環害作則敗壞擾亂而生化大病也盛衰非其位則邪當其位則正者覆明上文制則生化外列盛衰之盛衰也蓋制亢下承生化之盛衰惟歲氣和平則其所化循序漸進從微至著而皆當六位之正其歲氣有太過不及則其所化無序或躐等陵節或乘危往勝故變或兼化而為半非其位之邪變或復勝而為全非其位之邪也木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子所謂歲會氣之平者言此八歲皆歲與五運相會而氣和平其盛衰皆能循序當六位之正如餘歲

不與運會則氣有太過不及其盛衰皆無序而非其位也或曰王氏註文釋水承火下者熱其則潤溢象水也土承水下者寒甚則水堅象土也風承土下者雨為疾風吹零也金承風下者風動氣清萬物皆燥也火承金下者火煨金流也林氏校正又引木發而毀拆及厥陰所至為飄怒大涼等語證之河間又以亢則害承乃制六字之義著書伸二家之說其說皆指六位下承之氣為旦夕之暴作今吾子獨謂為四時之循環必將有說通知之而證其得失是非乎曰經下文制則生化外列盛衰盛衰當其位則正非其位則邪數句論下承之義親切詳備足可證其得失是非矣今經云君火之右退行一步相火治之水氣承之復行一步土氣治之木氣承之復行一步金氣治之火氣承之復行一步水氣治

六經學綱卷四

素

之土氣承之復行一步水氣治之金氣承之復行一步君火治之陰精承之一節乃下承生化之盛衰當其位則正者也蓋其盛衰循序不亂感者當法之正位衰者當承之正位而各當本位之正故溫當春熱當夏涼當秋寒當冬而氣候和平以為生長收藏焉此則經之本旨論四時循環當位正化也王氏註文所釋下承之義又引林氏所引木發毀折厥陰所至為飄怒大涼之證乃下承生化之盛衰非其位則邪者也蓋其盛衰無序而亂故木發毀折者暴亢極之木飄半兼暴承下之金殺同化而盛衰半非其位為兼化之邪也厥陰所至為飄怒大涼者暴亢極之木飄怒為暴承下之金涼報復而盛衰全非其位為勝復之邪也故溫非春熱非夏涼非秋寒非冬而或和或乖以為人之百病焉此則王氏

林氏誤用旦夕暴作非位之邪釋經當位之正也然其非位之兼化勝復又有太過不及之殊今河間所伸王氏林氏之說以亢則害承乃制六字釋變氣之義有曰木極似金金極似火火極似水水極似土土極似木皆以亢過極則反似勝已之化者有曰制其則兼化乃虛象者有曰治兼化但當瀉其亢甚之氣為病本不可反誤治其兼化者諸儒此言皆謂五氣變盛之兼化若夫不及者則未之及也謹按五常政大論云木不及曰委和委和之紀其動緩其拘緩其味酸辛其色白蒼其聲角商火不及曰伏明伏明之紀其動彰伏變易其味苦鹹其色玄丹其聲微烈土不及曰卑監卑監之紀其動蕩濇分潰癰腫其味酸甘其色蒼黃其聲宮角金不及曰從革從革之紀其動鏗禁蒼厥其味苦辛其色白丹

八醫經卷之四

五

其聲商徵水不及曰洞流洞流之紀其動堅止其味甘鹹其色靛玄其聲羽宮委和所謂緩其拘緩者緩王註謂縮短也蓋木之條達不及而極則金兼化縮短承於非位以勝之也辰肢體曲戾也拘筋脈拘強也木為金之縮短牽引而曲戾拘強也緩筋脈緩縱也金勝木則土寡于畏故土兼化緩縱於其空隙而拘者自拘緩者自緩也酸辛曰蒼角商皆木不及而天極金於非位承之兼化也伏明所謂彰伏變易者彰火化彰明也伏水化隱伏也變易火不及水兼之而或彰或伏變易不常也苦鹹玄丹徵羽者皆火不及而天極水於非位承之兼化也卑監所謂蕩濇分潰癰腫者蕩癰腫土化壅塞也潰分潰木化啓折也土化壅塞而為蕩癰腫木兼化啓折而為騰濇分潰其壅塞也酸甘蒼黃宮角者土不

及而天極木於非位承之兼化也從革所謂鏗禁者鏗謂金化鏗聲而為欬也禁謂閉氣抑喉而禁忍其欬也蓋金肺太過則欲氣伸而喘喝胸憑仰息金肺不及則欲氣畜而禁忍鏗咳也腎昏也厥逆也金化鏗禁而不及則火兼化昏腎厥逆之氣升於禁忍之處也苦辛白丹商徵者皆金不及而天極火於非位承之兼化也洞流所謂堅止者堅乾止定止也水少堅乾而土兼之定止也甘鹹靛玄羽宮者皆水不及而天極土於非位承之兼化也凡此皆無虛所變之兼化其治法當補本氣之虛非如氣盛兼化之法當瀉今河間例言治兼化但當瀉其亢甚之本氣者可乎其所兼之化皆本氣不足所承者得以勝之而然不治則本氣愈衰承氣愈勝今例言兼化為相似之虛象不可反治之者可乎

八醫經卷之四

六

此則河間誤釋太過不及所變之兼化皆為太過也曰王氏林氏河間氏失經旨意已開命矣然六位下承之氣其所以為正化之常者為兼化勝復之變者為和者為乖者之詳猶有可得聞之而一證之以經旨乎曰至誠無息者道體也陰陽五行在天地間流行一極一生而更互相承循環無端者與道為體也故其相承以陰陽言則冬至陰極陽生承之夏至陽極陰生承之也以五行言之則五行即陰陽之相承特有盛釋之分耳故火盛陽木盛陰木釋陽金釋陰土負陰抱陽為冲氣其在陰陽相承則冬至陰極陽生承之始於長夏土之冲氣極木釋陽生承之次於秋金之釋陰極火盛陽生承之終於冬水之盛陰極土冲氣生承之也夏至陽極陰生承之始於春木之釋陽極金釋陰生承之次於夏君

此句一
極一
更互
承乃
時順
之序
安可
之元

火之盛陽極陰精生承之終於夏相火之盛陽極陰生承之而一歲一周也其在五行自相承則君火相火之下陰精水氣承之水位之下土氣承之若初歲也上位之下木氣承之者二歲也木位之下金氣承之金位之下火氣承之者凡三歲周而復始也故混而陰陽分而五行常如是更互相承循環無端者實由相承之體至誠無息而然聖人在川上所謂逝者如斯夫不舍晝夜正謂此至誠無息之體也然以其相承之體言之則至誠無息隨極而承無常變和乖之殊以其流行之用言之則極於平氣之紀而當其位承之者為正化之常而為和極於太過不及之紀而非其位承之者為兼化勝復之變而為乖也其常者則循序漸進以為四時之周流其變者則或肆威太過而暴極於非位或勢力不及

而天極於非位故所承者皆隨其極制於下而躡等陵節變其本氣以為旦夕之暴化是故半變者本氣半衰下承半盛而為半非位之兼化全變者本氣全衰下承全盛而為全非位之勝復和而變者為德化政令乖而變者為災害皆傷也經所謂發生之紀其變振拉摧拔之類乃太過之兼化木不勝德則收氣復之類乃太過之勝復委和之紀其動纏戾拘緩之類乃不及之兼化肅殺炎赫沸騰之類乃德化政令之勝復水發而雷雪木發而毀折之類乃災害皆傷之兼化厥陰所至為飄怒太涼少陰所至為大暄寒之類乃災害皆傷之勝復也故均是至誠無息之體但其所極所承者有常變和乖之不齊則其應見者有正化兼化勝復及微甚災祥之各異王氏林氏不分變化釋變化為變氣河間不分

虛實釋兼化為盛皆不思之過也
地理應天六節氣位左轉圖



六位之下各有承氣制亢圖 當其位則正

冬至陰盛極陽生承之 陰盛則陽生承之 陽生則陰承之 陰承則陽生承之 陽生則陰承之 陰承則陽生承之
夏至陽盛極陰生承之 陽盛則陰生承之 陰生則陽承之 陽承則陰生承之 陰生則陽承之 陽承則陰生承之
相火之下水氣承之 水氣承之 水氣承之 水氣承之 水氣承之 水氣承之
水位之下土氣承之 土氣承之 土氣承之 土氣承之 土氣承之 土氣承之
土位之下木氣承之 木氣承之 木氣承之 木氣承之 木氣承之 木氣承之
木位之下金氣承之 金氣承之 金氣承之 金氣承之 金氣承之 金氣承之
金位之下火氣承之 火氣承之 火氣承之 火氣承之 火氣承之 火氣承之
君火之下陰精承之 陰精承之 陰精承之 陰精承之 陰精承之 陰精承之
亢則害承迺制生則化外列盛衰 盛衰當其位則正 非其位則邪 木發而毀拆 風木之剋 牛兼 金承之故毀折

火發而暵味火蒸之明半兼
 土發而飄驟土濕之故飄驟
 金發而清明金燥之故清明
 水發而雹雪水寒之故雹雪
 厥陰所至為飄怒大涼風飄之勝全變非
 少陰所至為大暄寒君火之勝全變非
 太陰所至為雷霆驟注烈風濕雨之勝全變非
 少陽所至為飄風燥燠霜凝相火之勝全變非
 陽明所至為散落溫金涼之勝全變非
 太陽所至為寒雪水雹白埃寒霧之勝全變非

帝曰善願聞其步何如岐伯曰所謂步者六十度而有奇故二十四步積盈百刻而成日也帝曰六氣應五行之變何如岐伯曰位有終始氣有初中上下不同求之亦異也

合命曰立謹候其時氣可與期帝曰願聞其歲六氣始於水下一刻終於八十七刻半二之氣始於八十七刻六分終於七十五刻三之氣始於七十六刻終於六十二刻半四之氣始於六十二刻六分終於五十一刻五之氣始於五十一刻終於三十七刻半六之氣始於三十七刻六分終於二十五刻所謂初六天之數也乙丑歲初之氣天數始於二十六刻終於一十二刻半二之氣始於一十二刻六分終於水下一刻三之氣始於一刻終於八十七刻半四之氣始於八十七刻六分終於七十五刻五之氣始於七十六刻終於六十二刻六分終於五十一刻所謂六二天之數也丙寅歲初之氣天數

始於五十一刻終於三十七刻半二之氣始於三十七刻六分終於二十五刻三之氣始於二十六刻終於一十二刻半四之氣始於一十二刻六分終於水下一刻五之氣始於一刻終於八十七刻半六之氣始於八十七刻六分終於七十五刻所謂六三天之數也丁卯歲初之氣天數始於七十六刻終於六十二刻半二之氣始於六十二刻六分終於五十一刻三之氣始於五十一刻終於三十七刻半四之氣始於三十七刻六分終於二十五刻五之氣始於二十六刻終於一十二刻半終之氣始於一十二刻六分終於水下一刻所謂六四天之數也次戊辰歲初之氣復始於一刻常如是無已周而復始帝曰願聞其歲候何如岐伯曰悉乎哉問也日行一周天氣始於一刻日行再周天氣始於二十六刻日行三周天氣始於五十一刻日行

四周天氣始於七十六刻日行五周天氣復始於一刻所謂一紀也是故寅午戌歲氣會同卯未亥歲氣會同辰申子歲氣會同巳酉丑歲氣會同終而復始帝曰願聞其用也岐伯曰言天者求之本言地者求之位言人者求之氣交帝曰何謂氣交岐伯曰上下之位氣交之中人之居也故曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之氣交之分人氣從之萬物由之此之謂也帝曰何謂初中岐伯曰初凡三十度而有奇中氣同法帝曰初中何也岐伯曰所以分天地也帝曰願卒聞之岐伯曰初者地氣也中者天氣也帝曰其升降何如岐伯曰氣之升降天地之更用也帝曰願聞其用何如岐伯曰升已而降降者謂天降已而升升者謂地天氣下降氣流於地地氣上升氣騰於天故高下相召升降相因而變作矣

此一章論天之陰陽與地之陰陽相錯而變生所謂動靜相召上下相臨陰陽相錯者也步者帝覆問上章地之六步也六十度有奇者地之六步繞天一周凡三百六十五度以爲一歲之日數而每步各得六十度有奇也故一日爲一度六十日八十七刻半爲一步而不盈日積二十四步凡四歲則其餘奇積盈百刻而成日於歲終以爲一紀也六氣應五行之變者帝覆取上文天道六六之節及地理應六節氣位二章之義合而問之也言天六氣風熱濕火燥寒之盛衰相應地五行木君火相火上金水之治令者同一歲步而其氣錯之變何如求之也位即步也位有終始者即天六氣之盛者應地五行之治令者同在一歩而其候有終始也氣有初中者即每步始終之盛而治令之氣分爲前後前半步

入醫經綱目卷四

爲初氣主地氣升後半步爲終氣主天氣降也天上地下之氣相錯於位之終始氣之初中不同而求之之法亦異也天氣始於甲地氣始於子者求位有終始之法也言天地之氣皆自甲子歲始求之者謹按其始終之時則其氣候之至可與之期也歲六氣始終早晏者蓋天地二氣之始終有步候之分其在步候則一歲六步每步天地之氣始終各治六十日八十七刻半其在歲候則每歲天地之氣始終各治三百六十五日二十五刻今帝先問一歲六步之氣始終之候早晏也甲子之歲始於水下一刻終於八十七刻半者甲子歲六步其天之氣少陰司天而左間太陰右間厥陰陽明在泉而左間太陽右間少陽皆各於所在之步更盛而相應地氣同治其令今初之氣則在泉左間太陽寒氣盛相應

地東北木氣治令而同主春分前六十日八十七刻半始終之候早晏也二之氣始於八十七刻六分終於七十五刻者司天右間厥陰風氣盛相應地東南君火治令而同主春分後六十日八十七刻半始終之候早晏也三之氣始於七十六刻終於六十二刻半者司天少陰熱政布相應地南方相火治令而同主夏至前後六十日八十七刻半始終之候早晏也四之氣始於六十二刻六分終於五十一刻者司天左間濕氣盛相應地西南土氣治令而同主秋分前六十日八十七刻半始終之候早晏也五之氣始於五十一刻終於三十七刻半者左間火氣盛相應地西北金氣治令而同主秋分後六十日八十七刻半始終之候早晏也終之氣始於三十七刻六分終於二十五刻者右間燥氣盛

入醫經綱目卷四

相應地北方水氣治令而同主冬至前後六十日八十七刻半始終之候早晏也天地之氣在甲子歲六步始終之候早晏餘歲同例推之也歲候者帝因步候而問及歲候也蓋天地於一歲之政天氣之司天在上者共主一歲地氣之主運者居中配之凡二氣之候同其始終於一歲也日行一歲日行一周天也氣始於一刻者甲子歲司天少陰熱氣在泉陽明燥氣中運大宮土氣之候始同治其歲也日行二周天氣始於二十六刻者乙丑歲司天太陰濕氣在泉陽明燥氣中運少商金氣之候始同治其歲也日行三周天氣始於五十一刻者丙寅歲司天少陽火氣在泉厥陰風氣中運大羽水氣之候始同治其歲也日行四周天氣始於七十六刻者丁卯歲司天陽明燥氣在泉少陰熱氣中運少角木氣

之候始同治其歲也此天地之氣在初紀四歲始終之候餘紀同例推之也用者用前歲步始終之候求天地之氣也言天者求之本言地者求之用言人者求之歲交者言用前歲步始終之候也言求天氣者則求風寒暑濕燥火之本氣其標與中氣不必求之也言求地氣者則求木火土金水火之位氣其下承之氣不必求之也言求人氣者則求氣交中所應見之氣其不應見者不必求之也就甲子歲初之氣言之則言求天氣者求司天之熱在泉之燥泉左間之寒也言求地氣者求中運之上本部之木也言求人氣者則求氣交所應見者或熱或燥或寒或土或木五者之氣為常非是五者皆勝復之邪變也氣交者天地二氣之交接以人之身半天樞為界天樞之上至司天之位屬天氣主之天樞之下

入醫門綱目卷五

三五

下至在泉之位屬地氣主之天地二氣於天樞交接之界分屬人氣之所從萬物之所由故曰氣交也凡此天地始終之候且古不易之體也初凡三十度有奇中氣同法者求氣有初中之法也言每步六十日八十七刻半其前三十有奇則為初氣而日屬陽主天樞已下之氣皆升後三十有奇則為中氣而月屬陰主天樞已上之氣皆降就甲子歲初之氣言之天樞已下者謂在泉燥氣泉左間寒氣中運土氣本部木氣皆上升也天樞已上者謂司天熱氣下降也升已而降降者流地降已而升升者騰天故高下相召升降相隨而氣氣錯雜勝侮相乘由是變常化於氣交而作勝復也蓋天地之氣各皆均平則於升降之間各守界分而應歲步本位始終之常化其有盈虛多少則盈而同類多者勝勝





則越出歲步之本位虛而同類少者侮侮則為非歲步本位之氣氣乘來勝故常化變而勝復作矣凡此天地升降之氣隨時變化之用也或曰天之陰陽六節惟司天在泉二節統盛一歲餘四節獨盛一步者何也曰司天在泉二節正當天地之中其升降常在中國相持故統盛一歲餘四節各居四方其升降不在中國惟治令一方所居之氣隨春令西行夏令北行秋令東行冬令南行入歸中國盛之故此四節各隨四時之令獨盛一步也若夫勝復作而出位變常者雖不居治令之力亦入中國往復也曰天氣以風暑濕火燥寒為序而濕居火前地氣以木火土金水為序而土居火後夫濕上一氣其位不同何也曰在天為氣故天以三陰三陽之氣多少為序在地成形故地以五行之形相生為序其以


入醫門綱目卷五

三五

氣之多少為序者從少漸多則陰之序始厥陰厥陰者一陰也次少陰少陰者二陰也終太陰太陰者三陰也陽之序始少陽少陽者一陽也次陽明陽明者二陽也終太陽太陽者三陽也此則天氣以陰陽之多少為序而濕居火前也其以形之相生為序者生生不已則其氣始於木初之氣木生火故君火為二之氣相火為三之氣火生土故土為四之氣土生金故金為五之氣金生水故水為終之氣而復生木此則地氣以五行之相生為序而上居火後也王太僕以少陽次太陽陳無擇以濕上生相火可謂不究經旨矣

天道六氣與地理五行相錯圖





帝曰善寒暑相薄燥熱相臨風火相值其有間乎岐伯曰
 氣有勝復勝復之作有德有化有用有變變則邪氣居之
 帝曰何謂邪乎岐伯曰夫物之生從於化物之極由乎變
 變化之相薄成敗之所由也故氣有往復用有遲速四者
 之有而化而變風之來也帝曰遲速往復風所由生而化
 而變故因盛衰之變耳成敗倚伏遊乎中何也岐伯曰成
 敗倚伏生乎動動而不已則變作矣帝曰有期乎岐伯曰
 不生不化靜之期也帝曰不生化乎岐伯曰出入廢則神
 機化滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長壯老
 已非升降則無以生長化收藏是以升降出入無器不有
 故器者生化之宇器散則分之生化息矣故無不入無
 不升降化有大小期有遲速四者之有而貴常守反常則
 災害至矣故曰無形無患此之謂也帝曰善有不生不化
 乎岐伯曰悉乎哉問也與道合同惟真人也
 此一章論天地陰陽之變寒暑相薄燥濕相臨風火相
 值其有間乎帝承上章天地初中升降之義而問寒濕
 燥熱風火等氣其於升降相薄相值之交接處有
 空隙之間否乎也岐伯答氣有勝復者言天地相薄相
 臨相值者凡五氣有盈虛多少常於升降之交接處強
 弱侵凌乘勢勝復無空隙之間也故其勝復之作於升
 降交接處有為敷和彰顯游蒸清潔滄滄之德者有為
 生榮蕃茂豐備繁欽清諒之化者有為曲直燔燥高下
 散落沃衍之用者有為摧拉炎燥淫瀆滯殺凝洌之變
 者唯變則邪氣居之於人為病死也帝問何謂邪乎言
 何故謂變為邪也岐伯答物之生從于化物之極由乎
 變者言變化二氣猶陰陽晝夜之相反而物之生從化

極由變故變之於化更相薄物則化者成之所由而為正氣變者敗之所由而為邪氣是故謂變為邪也氣有往復用有遲速者言變化之氣皆有往復其往復之用皆有遲速也如經所謂春有鳴條律暢之化則秋有露露清涼之政者是其化氣往復之類是也冬有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復者是變氣往復之類又皆其往復之用遲者也所謂少陰所至為太暄寒陽明所至為散落溫者是其往復之用速者也凡變化必有此往復遲速四者播扇然後化之正風變之邪風始來薄人也成敗倚伏遊於中者即冬傷於寒春必病溫春傷於風夏必食泄及仲景所謂伏氣伏寒之類是也帝問遲速往復播扇風所由生而化而變故因運氣盛衰之變而常然生風者耳人感其風以為成敗者則倚伏

醫學綱目卷四

里

遊行於中不於當時隨所感發作者何也岐伯答成敗倚伏生於動動而不已則變作者倚伏之義始明丹溪所謂傷寒屬內傷十居八九之論深得斯旨也言成敗倚伏遊於中者皆生於人之所動人動有節而自養則其氣和而所感者亦化氣之和來也以為成身之生氣倚伏遊於中焉人動無節而煩勞則其氣乖而所感者亦化氣之乖來也以為敗身之病根倚伏遊於中焉至於動而不已煩勞無休而重感變氣以啓之然後舊之倚伏者始發而變作矣期者變作之期也言變動而不以之動作也不生不化靜之為期而死矣故曰不生不化靜之期也故動物靜則以口鼻出入之息廢而神機化滅為期植物靜則以根柯升降之化已而氣之孤危為期也故動物非息出入則無以生長壯老已植物非

有期乎
動以
生而
化以
不化
期已
言成
言敗
言生
言死

化升降則無以生長收藏是以升降出入無器不有故動植之器乃化生之宅宇氣散則出入升降各相離分而生化息矣故無不入無不升降化有大小自蠢動之微至天地之廣期有近遠自解解之朝生暮滅至聃彭之壽年千百凡此大小遠近四者之有皆貴乎常守反常則災害至而靜期促矣

六化之

帝問曰五運六氣之應見六化之正六變之紀何如岐伯對曰夫六氣正紀有化有變有勝有復有用有病不同其候帝欲何乎帝曰願盡聞之岐伯曰夫氣之所至也厥陰所至為和平少陰所至為暄太陰所至為埃海少陽所至為炎暑陽明所至為清勁太陰所至為寒霧時化之常也厥陰所至為風府為壘少陰所至為火府為舒榮太陰所至為雨府為員盈少陽所至為熱府為行出陽明所至

醫學綱目卷四

里

為司殺府為庚蒼太陽所至為寒府為歸藏司化之常也厥陰所至為生為風搖少陰所至為榮為形見太陰所至為化為雲雨少陽所至為長為蕃鮮陽明所至為收為霧露太陽所至為藏為周密氣化之常也厥陰所至為風生終為肅少陰所至為熱生中為寒太陰所至為濕生終為注雨少陽所至為火生終為蒸溽陽明所至為燥生終為涼太陽所至為寒生中為溫德化之常也厥陰所至為毛化少陰所至為羽化太陰所至為倮化少陽所至為羽化陽明所至為介化太陽所至為鱗化德化之常也厥陰所至為生生化少陰所至為榮化太陰所至為濡化少陽所至為茂化陽明所至為堅化太陽所至為藏化布政之常也厥陰所至為飄怒大涼少陰所至為大暄寒太陰所至為雷電驟注烈風少陽所至為飄風燔燎霜凝陽明所至為

六氣之

散落温太陽所至為寒雪水雹白埃氣變之常也厥陰所至為撓動為迎隨少陰所至為高明酸為撫太陰所至為沉陰為白埃為晦暝少陽所至為光顯為彤雲為暝陽明所至為烟埃為霧為勁切為悽鳴太陽所至為剛固為堅芒為立令行之常也

六氣之

厥陰所至為裏急少陰所至為身熱太陰所至為積飲痞滿少陽所至為噎噎為瘡瘍陽明所至為浮虛太陽所至為屈伸不利病之常也厥陰所至為支痛少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄太陰所至為橋滿少陽所至為驚躁瞽昧暴病陽明所至為癰疽陰股膝脾臍疝足病太陽所至為腰痛病之常也厥陰所至為纏淚少陰所至為悲妄衄衄為行勁太陰所至為中滿霍亂吐下少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌陽明所至為脇痛絞腸太陽所至為寢汗

六氣之

瘰癧之常也厥陰所至為脇痛嘔泄少陰所至為語笑太陰所至為重肘腫少陽所至為暴注暍暴死陽明所至為皴皴太陽所至為流泄禁止病之常也

六化勝

凡此十二變者報德以德報化以化報政以政報令以令報氣高則高氣下則下氣後則後氣前則前氣中則中氣外則外位之常也故風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡泄甚則水閉腫隨氣所在以言其變耳

六氣之用

帝曰願聞其用也岐伯曰夫六氣之用各歸不勝而為化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少陰熱化施於陽明陽明燥化施於厥陰厥陰風化施於太陰各命其所在以徵之也帝曰自得其位何如岐伯曰自得其位常化也帝曰願聞所在也岐伯曰命其位而方月可知也帝曰六位之氣盈虛何如岐伯曰大小異也大者之至徐

六氣盈

而常少者暴而亡帝曰天地之氣盈虛何如岐伯曰天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之運居其中而常先也惡所不勝歸所同和隨運歸從而生其病也故上勝則天氣降而下下勝則地氣遷而上勝多少而差其分微者小差甚者大差甚則位易氣交易則大變生而病作矣大要曰甚紀五分微紀七分其差可見此之謂也帝曰善六元正紀

論大

此一章論五運六氣應見之候也六化之正者常氣也六變之紀者變氣也有化有變有勝有復有用有病之六候者其化之一候六化之正應見也變勝復用病五候六變之紀應見也厥陰所至為和平流泄禁止十二節論化變病三候也其曰時化司化氣化德化之常及布政令行之常者論化之候也其曰氣變之常者論變

六氣之

之候也其曰病之常者論病之候也凡此十二變至言其變一節論勝復之二候也六氣之用至方月一節論用之一候也時化之常者六部生氣之常化也司化之常者司天在泉六位之常化也氣化之常者五運之常化也厥陰所至為風生終為蕭少陰所至為熱生中為寒太陰所至為濕生終為注雨少陽所至為火生終為蒸溽陽明所至為燥生終為涼太陽所至為寒生中為溫者其風生熱生濕生火生燥生寒生六者本氣也終為蕭終為注雨終為蒸溽終為涼四者標氣也中為寒中為溫二者中氣也夫本之下中之見也見之下氣之標也故其生物之德皆始於本氣終於標氣而中氣常居標本之中故言標本則中氣在其中矣惟少陰太陽言中而不言終者蓋少陰太陽中氣與標氣同故言中

則標氣亦在其中矣德化之常者德生植物之常化也
其次德化之常者德生動物之常化也凡此十二變者
言前德化政令病變十二節之候若不當歲步主客正
位而至者則屬變氣而為勝復也凡勝復之候至其勝
氣變德則報復以德變化則報復以化變政令則報復
以政令而其氣之往復不能相移也所變之氣居高則
報復亦高居下則報復亦下居後則報復亦後居前則
報復亦前居中則報復亦中居外則報復亦外而其位
之高下亦不能相移也由是言之則天下風寒暑濕燥
火之變常不能同也南方清燥而早北方雨濕而潦者
有之中原冰雪而寒左右鬱蒸而熱者有之況地理有
高下形勢有大小高者氣寒多清燥下者氣熱多雨濕
小者小異大者大異而錯雜於天道不一之變矣王氏

六書字例卷四 星

釋高下前後中外俱作人身生病之所而不及地理之
分野宜乎程子以天下旱潦常不同之義非運氣主歲
之說也風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝
則濡泄甚則水閉附腫隨氣所在以言其變者勝復為
病之位也假若風於高處勝則人身亦於高處病頭重
而掉眩風於下處勝則人身亦於下處病足動而戰慄
又如熱於高處勝則人身亦於腰上分野病腫熱熱於
下處勝則人亦於腰下分野病腫熱皆隨六氣勝復之
所在高下前後中外以言其變病之所也六氣之用各
歸不勝而為化者謂各歸不勝之方月施化也方月者
假如厥陰司天之歲則陽明之位在京左間其方月東
北初之氣也太陽之位右間其方月東南二之氣也厥
陰之位司天其方月正南三之氣也少陰之位在天左

間其方月西南四之氣也太陰之位在京右間其方月
西北五之氣也太陽之位在京其方月正北終之氣也
故其歲施用太陰雨化施於東南二之氣太陰之位太
陽寒化施於西南四之氣少陰之位少陰熱化施於東
北初之氣陽明之位陽明燥化施於正南三之氣厥陰
之位厥陰風化施於西北五之氣太陰之位皆各命其
所在之化以徵驗其所施之化於歲同法推之也自得
其位在本位之方月施化也如厥陰之歲則太陰自得
於西北五之氣本位施雨化太陽自得於東南二之氣
本位施寒化少陰自得於西南四之氣本位施熱化少
陽自得於正北終之氣本位施火化陽明自得於東北
初之氣本位施燥化厥陰自得於正南三之氣本位施
風化於歲同法推之也大者之至徐而常者六氣之盈

六書字例卷四 星

者為病則其勢反徐而微治法當逆之也少者之至暴
而亡六氣之虛者為病則其勢反暴而甚治法當從之
也人見其氣暴烈驟用峻劑攻之則熱病未已寒病復
始殊不知大者之氣反微少者之氣反甚也
帝曰願聞陰陽之三也何謂岐伯曰氣有多少異用也
帝曰陽明何謂也岐伯曰兩陽合明也 帝曰厥陰何也
岐伯曰兩陰交盡也 帝曰幽明何如岐伯曰兩陰交盡
故曰幽兩陽合明故曰明幽明之配寒暑之異也 帝曰
分至何如岐伯曰氣至之謂至氣分之謂分至則氣同分
則氣異所謂天地之正紀也 帝曰夫百病之始生也皆
生於風寒暑濕燥火以之化之變也經言盛者瀉之虛者
補之余錫以方士而方士用之尚未能十全余欲令要道
必行梓鼓相應由板刺雪汚工巧神聖可得聞乎岐伯曰

論天地
之五運
六氣
之五
十二經
絡而生
病也

審察病機無失氣宜此之謂也帝曰願聞病機何如岐伯曰諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸氣膈鬱皆屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸熱瘧瘵皆屬於火諸痛癢瘡皆屬於心諸厥固泄皆屬於下諸痿喘嘔皆屬於上諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸痙項強皆屬於濕諸逆衝上皆屬於火諸脹腹大皆屬於熱諸躁狂越皆屬於火諸暴強直皆屬於風諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱諸病附腫疼酸驚駭皆屬於火諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱諸病水液澄澈清冷皆屬於寒諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱故大要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之虛者責之虛者責之必先五勝疎其血氣令其調達而至和平此之謂也

此一章論五運六氣之為病治法也病機一十九條實

入醫學綱目卷一 察病之要旨而有者求之無者求之盛者責之虛者責之一十六字乃答篇首盛者瀉之虛者補之之旨而總結一十九條之義又其要旨中之要旨也河間原病式但用病機一十九條立言而遺此十六字猶有舟無操舟之工有兵無將兵之帥今負僭竊之罪以補之夫諸風病皆屬於肝也風木盛則肝太過而病化風如木太過發生之紀病掉眩之類俗謂之陽痿急驚等病治以涼劑是也燥金盛則肝為邪攻而病亦化風如陽明司天燥金下臨病掉振之類俗謂之陰瘧慢驚等病治以溫劑是也諸火熱病皆屬於心也火熱甚則心太過而病化火熱如歲火太過諸譫妄狂越之類俗謂之陽躁譫語等病治以攻劑是也寒水勝則心為邪攻而病亦化火熱如歲水太過病躁悸煩心譫妄之類俗謂之陰

躁顛等病治以補劑是也諸濕病皆屬於脾也濕土甚則脾太過而病化濕如濕勝則濡泄之類仲景用五苓等劑去濕是也風木勝則脾為邪攻而病亦化濕如歲木太過病食泄之類錢氏用宣風等劑去風是也諸氣膈鬱皆屬於肺也燥金甚則肺太過而病化膈鬱如歲金太過甚則咳嗽之類東垣謂之寒喘治以熱劑是也火熱勝則肺為邪攻而病亦化膈鬱如歲火太過病咳嗽之類東垣謂之熱喘治以寒劑是也諸寒病皆屬於腎也寒水甚則腎太過而病化寒如太陽所至為屈伸不利之類仲景用烏頭湯等劑是也濕土勝則腎為邪攻而病亦化寒如濕氣變物病筋脈不利之類東垣用復煎健步等劑是也其在太過所化之物為盛盛者真氣也其在受攻所化之病為虛虛者假氣也故有其

病化者恐其氣之假故有者亦必求之無其病化者恐其邪隱於中如寒勝化火燥勝化風及寒伏反躁熱伏反厥之類故無者亦必求之其病之化似盛者恐其盛之未真故虛者亦必責之凡一十九條病機皆用此一十六字為法求之庶幾補瀉不差也今河間捐此一十六字但以病化有者為盛無者為虛而不復求其假者虛者為未備故引經傳以證其得失也 帝曰五味陰陽之用何如岐伯曰辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽六者或收或散或緩或急或燥或潤或逆或堅以所利行之調氣使平帝曰非調氣而得者治之奈何有無毒何先何後願聞其道岐伯曰有毒無毒所治為主適大小為制也帝曰請言其

制岐伯曰君一臣二制之小也君一臣三佐五制之中也君一臣三佐九制之大也寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之堅者削之客者除之勞者溫之結者散之留者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者益之逆者行之驚者平之上之下之摩之浴之劫之開之發之適事為故帝曰何謂逆從岐伯曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒用寒因熱用寒因塞用通因通用必伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已至真要大論

此一章論內氣不調得病者之治法也蓋內氣不調而得病故所病寒熱之邪但可於其氣之微者逆治之如氣甚而逆治之則正邪格拒不能勝邪命將難全故但

入醫學綱目

卷四

當從其寒熱之邪於外伏其所主之劑於中然後正邪相入而邪就擒矣東垣所謂薑附寒飲承氣熱服及仲景於白通湯加尿膽治少陰丹溪於苓柏湯皆熱炒治色目婦人惡寒之類是也

帝曰氣調而得者何如岐伯曰逆之從之逆而從之從而逆之踈氣令調則其道也至真要大論

此一章論內氣本調因外邪得病者之治法也蓋內氣調而得病故不分寒熱之微甚或逆治之或從治之皆可更不須懼其正邪格拒正固則邪自退矣

帝曰病之中外何如岐伯曰從內之外者調其內從外之內者治其外從內之外而盛於外者先調其內而後治其外從外之內而盛於內者先治其外而後調其內中外不相及則治主病帝曰善火熱復惡寒發熱有如瘧狀或一

日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會過之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相薄盛衰之節亦同法帝曰論言治寒以熱治熱以寒而方士不能廢繩墨而更其道也

不治王

帝曰不治王而然者何也岐伯曰悉乎哉問也不治五味屬也夫五味入胃各歸所喜故酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常也氣增而

久天之由也帝曰善方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上下三品之謂也帝曰三

入醫學綱目

卷四

品何謂岐伯曰所以明善惡之殊貫也帝曰善病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其中外各守其鄉內者內治外者外治微者調之其次平之盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命帝曰善不治五味屬也一本五味二

岐伯曰寒熱燥濕不同其化也故少陽在泉寒毒不生其味辛其治苦酸其穀蒼丹陽明在泉濕毒不生其味酸其氣溫其治辛苦甘其穀丹素太陽在泉熱毒不生其味苦其治淡鹹其穀稬和厥陽在泉清毒不生其味甘其治酸

苦其穀蒼赤其氣專其味正少陰在泉寒毒不生其味辛其治辛苦甘其穀丹白太陰在泉燥毒不生其味酸其氣熱其治甘鹹其穀稬和化淳則鹹守氣專則辛化而俱治故曰補上下者從之治上下者逆之以所在寒熱盛衰而

調之故曰上取下取內取外取以求其過能毒者以厚藥不勝毒者以薄藥此之謂也

反佐法

氣反者病在上取之下病在下取之上病在中傍取之治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清以溫熱而行之故消之削之吐之下之補之瀉之

內調法

帝曰病在中而不實不堅且聚且散奈何岐伯曰無積者求其藏虛則補之藥以祛之食以隨之行李水漬之和其中外可使必已

外治法

帝曰有毒無毒服有約乎岐伯曰病有久新方有大小有毒無毒固宜常制矣大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉菓菜食養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法

醫學綱目卷四

三

治九歲氣

必先歲氣無伐天和無盛盛無虛虛而遺人天殃無致邪無失正絕人長命帝曰其久病者有氣從不康病去而瘠奈何岐伯曰昭乎哉聖人之問也化不可代時不可違夫經絡以通血氣以從復其不足與衆齊同養之和之靜以待時謹守其氣無使傾移其形乃彰生氣以長命曰聖王故大要曰無代化無違時必養必和待其來復此之謂也

約方

帝曰氣有多少病有盛衰治有緩急方有大小願聞其約奈何岐伯曰氣有高下病有遠近證有中外治有輕重適其至所為故也大要曰君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君三臣六奇之制也君四臣八偶之制也故曰近者奇之遠者偶之汗者不以奇下者不以偶補上治上制以緩補下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄適其至

所此之謂也病所遠而中道氣味之者食而過之無越其制度也是故平氣之道近而奇偶制小其服也遠而奇偶制大其服也大則數少小則數多則九之少則二之奇之不去則偶之是謂重方偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其病也帝曰善病生於本余知之矣生於標者治之奈何岐伯曰病反其本得標之病治反其本得標之方 帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

醫學綱目卷四

三

醫學綱目卷之四十

運氣占候補遺序

夫五運六氣上古聖人所以參三才而贊化育者也故位天者天文也位地者地理也通乎人氣之變化者人事也然天道有陰陽多少之殊地理有高下氣至有先後之異人之壽夭生化之期則損益盛虛之變也此其上下參錯而不可以定數求者焉若夫五六之會終期之日刻漏而分數之亦陳其梗槩焉耳至於氣至之先後勝復之麟發安可預擬乎故曰數之可數者人中之陰陽也天地之陰陽不可以數推以象見者也夫象者占候之所始道之所生不可不通也今夫天垂象地成形七曜緯虛五行麗地地者所以載生成之形類也虛者所以列應天之精氣也形精之動猶根本之與枝葉也故形盛則精盛形衰則精衰五星明大減小即五運之太過不及可得而占也今夫

入醫學綱目

乙

地道實天道虛實者氣之所寓虛者色之所因也五氣應於下則五色彰於上五天之經緯成而後五氣之至可得而占也地為人之下太虛之中大氣舉之也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以潤之寒以堅之火以溫之故風寒在下燥熱在上濕氣在中火遊行其間寒暑六入故令虛而化生也故烟埃雲物之態山川草木之容皆可得而占焉至於地理有高下陰陽有多少至高之地陰氣常在至卑之地陽氣常在則高下異占也又春氣始於東夏氣始於南秋氣始於西冬氣始於北行有逆順至有遲速則上下左右異占也是皆形精之必效微而顯信而不爽者歟是故古之至人仰以觀於天文俯以察乎地理中以通乎人事然後可以定神明之紀而成變化之用也世之學者求陰陽於支干配合之間論勝負於主客加臨之位不效

則以為古書不足信也是豈書之罪也哉間因醫校樓氏醫學綱目書覽其後有運氣補註一篇惜其用意甚勤而尚遺古人占候之法是以取諸內經之古列占候十五篇命曰運氣占候補遺以續樓氏之後云
嘉靖乙丑季春日婁東玄沙邵弁偉元識

入醫學綱目

二

運氣占候補遺序

五運氣至之占

帝曰余聞五運之數於夫子不合陰陽其故何也岐伯曰是明道也此天地之陰陽也夫數之可數者人中之陰陽也然所合之數可得者也夫陰陽者數之可十推之可百數之可千推之可萬天地陰陽者不以數推以象之謂也

丹天之氣經於牛女戊分齡天之氣經於心尾巳分牛女戊分化火又與子同屬戊與午連位皆火分也心尾巳分也甲巳化土又與丑連位巳與未同屬皆土分也

天之氣經于危室柳鬼危室土地柳鬼木也素天

之氣經于氐亢卯畢氐亢地界卯畢地也

氣經于張翼婁胃張翼丙地婁胃辛地丙與辛化水也所謂戊巳

分者本壁角軫則天地之門戶也戊巳位木火金水四時

為長夏南連午西連申故戊巳無方位而經門戶在四時分地戊火連申未土於中於火連寅庚土於中於土連巳

濕土在中火游行其間在天居土夫候之所始道之所生前在地居土後而上火常相混也

不可不通也

五氣之至各有五色經于分野氣太過則先之自然可見此占候之所始道之所生不可不通也○五運行大論

五運太過之占

諸壬歲木太過風氣流行脾土受邪上應歲星歲星光明

化氣不政生氣獨治雲物飛動草木不寧甚而播落上應太白星木餘土鬱化政不布於萬物故生氣獨治也風氣

諸戊歲火太過炎暑流行金肺受邪上應熒惑星收氣不行長氣獨明雨水霜寒上應辰星火氣獨行水氣折之辰

諸甲歲土太過雨濕流行腎水受邪上應鎮星變生得位土氣盛

諸乙歲金不及炎暑乃行生氣乃用長氣專勝庶物以茂

五運不及之占

至土崩潰鱗見于陸上應歲星土不勝木

諸庚歲金太過燥氣流行肝木受邪上應太白星收氣峻生氣下草木欬者乾涸隕上應熒惑星金勝而火

諸丙歲水太過寒氣流行邪害心火上應辰星大雨至埃霧朦朧上應鎮星水勝土

氣變物上應熒惑辰星辰戌天符之歲水勝而火絕熒惑

諸丁歲木不及燥乃大行生氣失應草木晚榮蕭殺而甚則剛木辟者悉萎蒼乾上應太白星金勝木之上臨陽明

生氣失政草木再榮化氣乃急上應太白鎮星其主蒼旱丁卯丁酉歲陽明上臨是謂天刑連也木氣既少上氣無

復則炎暑流火濕性燥柔脆草木焦稿下體再生華實齊

化上應熒惑太白火復其金太白白露早降收殺氣行寒雨害物虫食甘黃脾土受邪赤氣後化心氣晚治上勝肺金

白氣乃屈上應熒惑太白星熒惑益明

諸癸歲火不及寒乃大行長政不用物祭而下凝慘而甚則陽氣不化乃折榮美上應辰星水盛火復則埃澍大雨且至黑氣乃辱上應鎮星辰星土復於

諸巳歲土不及風乃大行化氣不令草木茂榮飄揚而甚秀而不實上應歲星鎮星木盛土復則收政嚴峻名草蒼凋蒼殺乃損上應太白歲星金復上臨厥陰流水不冰蟄虫來見藏氣不用白乃不復上應歲星土已巳歲也

諸乙歲金不及炎暑乃行生氣乃用長氣專勝庶物以茂

燥燥以行上應感星收氣乃後上應太白星火盛金復則寒雨暴至乃零米霜雪殺物陰厥且格陽反上行上應辰星水復

諸辛歲水不及濕乃大行長氣反用其化乃速暑雨數至上應辰星土盛水上臨太陰則大寒數舉蟄蚤早藏地積

堅冰陽光不治上應鎮星辛丑辛未歲也土氣專盛復則大風暴發草葉木零生長不鮮黃氣乃損其穀不登上應

復氣應時占

木不及春有鳴條律暢之化則秋有霧露清涼之政春有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燥燥之復

火不及夏有炳明光顯之化則冬有嚴霜霜寒之政夏有慘悽凝凜之勝則不時有埃昏大雨之復

土不及四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓拆之政四

維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖霖之復

金不及夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應夏有炎燥燔燎之變則秋有水電霜雪之復

水不及四維有湍潤埃雲之化則不時有和風生發之應四維發埃昏驟注之變則不時有飄蕩振拉之復夫五運

之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之氣之常也故曰天地之變化神明為之紀陰陽之往復寒暑彰其兆此之謂也氣交變

五星應化占

帝曰夫子之言歲候太過不及而上應五星今夫德化政令災眚變易非常而有也卒然而動其亦為之變乎岐伯曰承天而行之故無妄動無不應也卒然而動者氣之交

變也其不應焉故曰應常不應卒此之謂也帝曰其應奈何岐伯曰各從其氣化也如歲星之化以風應之受感

帝曰其行之徐疾逆順何如岐伯曰以道留久逆守而小是謂省下以道謂順行留久謂過應留之日以道而去

而速來曲而過之是謂省過也曲謂逆行而速來而省察久留而環或離或附是謂議災與其德也如環之速

也火謂罪金謂殺教應近則小應遠則大謂犯星去久大小謂禍福謂禍福芒而大倍常之一其化甚大常之二其膏即也小

常之一其化減小常之二是謂臨視省下之過與其德也德者福之過者伐之是以象之見也高而遠則小下而近

則大故大則喜怒適小則禍福遠歲運太過則運星北越北越謂背運氣相得則各行以道無剋伐之嫌故守常故歲運太過則畏星失色而兼其母如木太過則不及則色

八醫學綱目運氣卷

兼其所不勝如木不及則木星色白也○天氣制勝已地制勝已帝曰其災應何如岐伯曰亦各從其化也故時

至有盛衰凌犯有逆順五星所至之時王相為盛囚死為

重也留守有多少留守日多則災深留守日少則災淺形見有善惡謂

伯曰有喜有怒有憂有喪有澤有燥此象之常也必謹察

五氣動亂占

帝曰夫子之言五氣之變四時之應可謂悉矣夫氣之動亂觸遇而作發無常會卒然災合何以期之岐伯曰氣之動變固不常在而德化政令災變不同其候也東方生風

風生木其德敷和其化生榮其政舒啓其令風其德發其災散落南方生熱生火其德彰顯其化蕃茂其政曜其令熱其變銷燠其災燔熇中央生濕濕生土其德蒸其化豐備其政安靜其令濕其變驟注其災霖潰四方生燥燥生金其德清潔其化繁斂其政勁切其令燥其變肅殺其災蒼隕北方生寒寒生水其德淒冷其化清澁其政凝肅其令寒其變栗烈其災水雪霜雹是以察其動也

五氣鬱發占

五運之氣鬱極乃發待時而作太過不及其發異也太過者其數成不及者其數生土常以生也

八情

高深擊石飛空洪水乃從川流漫衍田牧土駒化氣乃敷雲為時雨始生始長始化始成雲奔雨府雨府太陰所也 霞擁朝陽山澤埃昏其迺發也以其四氣雲橫天山浮游生滅

金鬱之發天潔地明風清氣切大涼乃舉草樹浮烟燥氣以行霧霧散起殺氣來至草木蒼乾金乃有聲山澤焦枯土凝霜凋拂乃發也其氣五夜零白露林莽聲凄怫之先兆也

水鬱之發陽氣乃辟陰氣暴舉大寒乃至川澤凝凝寒雲結為霜雪甚則黃黑昏翳流行氣交乃為霜殺水乃見祥陽光不治空積沉陰白埃昏暝而乃發也其氣二火前後太虛深玄氣猶麻散微見而隱色黑微黃怫之先兆也木鬱之發太虛埃昏雲物以擾大風乃至屋發折木木有

變太虛蒼埃天山一色或氣濁色黃黑鬱若橫雲不起用而乃發也其氣無常木鬱長川草偃柔葉呈陰松吟高山虎嘯巖岫怫之先兆也

火鬱之發太虛腫翳太明不彰炎火行大暑至山澤燔燎材木流津廣廈騰烟土浮霜鹵止水乃滅蕙草焦黃風行惑言濕化乃後刻終大温汗濡玄府其乃發也其氣四動復則靜陽極反陰濕令乃化乃成華發水凝山川水雪焰陽午澤怫之先兆也

地理高下左右占

帝曰四時之氣至有早晏高下左右其候何如岐伯曰行有逆順至有遲速故太過者化先天不及者化後天帝曰願聞其行何謂也岐伯曰春氣西行夏氣北行秋氣東行冬氣南行故春氣始於下秋氣始於上夏氣始於中冬氣始於標春氣始於左秋氣始於右冬氣始於後夏氣始於前此四時正化之常故至高之地冬氣常在至下之地春氣常在六元正紀大論

六氣正變占

黃帝問曰六化之正六變之紀何如岐伯對曰夫六氣正紀有化有變有勝有復有用有病不同其候夫氣之所至也厥陰所至為和平少陰所至為暄太陰所至為埃溽少陽所至為炎暑陽明所至為清勁太陽所至為寒霧時化之常也厥陰所至為風府為豐啓少陰所至為火府為舒

祭太陰所至為雨府為圓盈少陽所至為熱府為行出陽
 明所至為司殺府為庚蒼太陽所至為寒府為歸藏司化
 之常也厥陰所至為生為風搖少陰所至為榮為形見太
 陰所至為化為雲雨少陽所至為長為蕃鮮陽明所至為
 收為霧露太陽所至為藏為周密氣化之常也厥陰所至
 為風生終為肅少陰所至為熱生中為寒大陰所至為濕
 生終為注雨少陽所至為火生終為蒸溽陽明所至為燥
 生終為涼太陽所至為寒生中為溫德化之常也厥陰所
 至為毛化少陰所至為羽化太陰所至為倮化少陽所至
 為羽化陽明所至為介化太陽所至為鱗化德化之常也
 厥陰所至為生化少陰所至為榮化太陰所至為濡化少
 陽所至為茂化陽明所至為堅化太陽所至為藏化布政
 之常也厥陰所至為飄怒大涼少陰所至為大暄寒太陰
 所至為雷震驟注烈風少陽所至為飄風燔燎霜凝陽明
 所至為散落溫太陽所至為寒雪水雹白埃氣變之常也
 厥陰所至為撓動為迎隨少陰所至為高明燭為曠太陰
 所至為沉陰為白埃為晦暝少陽所至為光顯為彤雲為
 曠陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴太陽所至為剛
 固為堅芒為立令行之常也凡此十二變者報德以德報
 化以化報政以政報令以令氣高則高氣下則下氣後則
 後氣前則前氣中則中氣外則外位之常也紀大論
 在泉淫勝占
 歲厥陰在泉風淫所勝則地氣不明平野昧草乃早秀
 少陰在泉熱淫所勝則地氣浮川澤陰處反明
 太陰在泉濕淫所勝則地氣昏黃反見黑
 少陽在泉火淫所勝則地氣明郊野寒熱更至

陽明在泉燥淫所勝則霧露清暝
 太陽在泉寒淫所勝則凝肅慘慄俱至真大論
 司天淫勝占
 厥陰司天風淫所勝則大虛埃昏雲物以擾寒生春氣流
 水不冰
 少陰司天熱淫所勝則暘熱至火行其政大雨且至
 太陰司天濕淫所勝則沉陰且布雨變枯槁
 少陽司天火淫所勝則溫氣流行金政不平
 陽明司天燥淫所勝則木乃晚榮草乃晚生名木斂生苑
 于下草焦上首
 太陽司天寒淫所勝則寒氣反至水且冰俱至真大論
 占六氣之勝
 厥陰之勝大風數舉倮虫不滋
 少陰之勝炎暑至木乃津草乃萎
 太陰之勝雨數至燥化乃見
 少陽之勝暴暑消燥草萎水涸介虫乃屈
 陽明之勝大涼肅殺華英改容毛虫乃殃
 太陽之勝凝凜且至非時水冰羽乃後化至真要大論
 占六氣之復
 厥陰之復偃木飛沙倮虫不榮
 少陰之復赤氣後化流水不冰熱氣大行介虫不復
 太陰之復大雨時行鱗見于陸
 少陽之復大熱將至枯燥燔燭介虫乃耗
 陽明之復清氣大舉森木蒼乾毛虫乃厲
 太陽之復水凝雨水羽虫乃死至真要大論
 釋元則害承乃制

經曰亢則害承乃制制則生化外列盛衰害則敗亂生在大病此數句前人解說極多能會經旨者殊少詳其文意當云亢則害害則敗亂生化大病承乃制制則生化外列盛衰只作兩下解之為是夫天地之間五類生化互有所勝互有所制地氣制已勝天氣制勝已此以地氣之制已勝者言之也夫六氣之用各歸其所不勝而為化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少陰熱化施於陽明陽明燥化施於厥陰厥陰風化施於太陰此地之四方分為六步以應天外六節氣令之治者也天地之氣互為盈虛惡所不勝歸所同和同者盛之異者衰之當其位則盛非其位則衰地氣左遷於中天氣右行於外內外相因盛衰相倚故曰外列盛衰也若夫亢則傷害已勝不受勝已者之施化於是則有復勝復更作敗亂生化的常故

入醫學綱目運氣條

九

上勝則天氣降而下下勝則地氣遷而上甚則易位氣交易則大變生而病作矣所謂害則敗亂生化大病者是也此一勝一制一正一變之異化也河間云亢則害承者之母氣於是承者乃起而制之是知有非位之勝復正不知制則生化外列盛衰為當位之正化也樓氏云火亢則害水承乃制之制生則化至冬著盛是以夏之暑生冬之寒化以冬之寒制夏之暑亢恐不相及之甚是知有當位之正化而不知害則敗亂生化大病為非位之勝復也安可即以此今日既亢之乖氣復為後日得制之平氣耶殊不知亢制字義甚明言亢則非平言制則非亢矣生化的盛衰乃當位之常敗亂生化的非位之變也二家全不分別何也

釋病機十九條

天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以

生喜怒憂思恐故五運之氣內應人之五臟諸風皆眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸濕腫滿皆屬於脾諸氣脹鬱皆屬於肺諸痛痒瘡皆屬於心是也諸厥因泄皆屬於下謂下焦腎肝之疾也諸痿喘滿皆屬於上謂上焦心肺之疾也此皆五臟之疾病機由於內動者也天之三陰三陽化六氣以生寒暑燥濕風火內應人之六腑外引十二經絡諸熱皆屬於火手少陽三焦經也諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火手少陰心經也諸逆衝上皆屬於火手厥陰心包經也諸痙項強皆屬於濕足太陽膀胱經也諸腹脹大皆屬於熱足太陰脾經也諸躁狂越皆屬於火足陽明胃經也諸暴強直皆屬於風足厥陰肝經也諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱手太陰肺經也諸病腫脹酸疼皆屬於火手陽明大腸經也諸轉及反水液渾濁皆屬

入醫學綱目運氣條

於熱手太陽小腸經也諸病水液澄澈清冷皆屬於寒足少陰腎經也諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱足少陽膽經也此皆十二經絡之邪病機由於外入者也劉河間以此著書漫然不分所屬殊不深考何也樓氏但糾其治法之偏而未及乎此故并為正之云爾

醫學綱目運氣占候條

祛病延年日暖杏林存造化
大醫院龔雲林著

壽世保元

光霽堂鐫

回生起死風高橘井仰神功

新刊醫林狀元壽世保元序

壽世保元序

余解綬歸隱林麓間於故篋中
取醫鑑回春仙方神效魯府禁
方諸書時披閱焉惋然歎曰奇
哉金谿龔子術至此乎其用意
良博其濟世之念良殷且苦也

壽世保元

序

余誠慨慕龔所夕遇之矣迺一
日飄然來謁余輾然喜甚徐揖
而進之領畧緒論津津名理悉
皆湊底芝蘭也迺龔子復出秘
書十卷以示余其命名曰壽世
保元余反復玩視見其立論高

著方妙其調治療理核實而有法大都九折臂而成真得醫門家鉢矣嘻亦大奇矣哉曩者諸書業已傳世今茲之集思且殫矣苦尤劇矣方之前刻則昔固精而此尤精之精者也昔固詳

書世保元

序

而此尤詳之詳者也所謂發諸名醫之所未發傳諸名醫之所未傳者端不在是也邪夫醫非仁愛不可託非聰明理達不可任非廉謹淳良不可信是以古之用醫必選名世之後知天地

神祇之次明性命吉凶之數處虛實之分定逆順之理原疾量藥貫微達幽度節氣而候溫冷參脉理而合輕重必參知而隲括焉斯善矣雲林龔子身儒行之粹美躋醫道之聖功固回天

書世保元

序

三

國手所藉以上培聖天子之元和而下躋斯民于仁壽之天者也頃聞魯藩幣聘起其元妃於九死彼且介然却其千金魯藩益高其誼復寵以御醫院榮銜錫以輦

帶華飾賜以龍牌扁額題以醫
林狀元龔子蓋亦有榮遇哉夫
儒林有玉其獨步者命之曰國
士醫林亦有玉其十全者命之
曰國手龔子者得不稱為國手
而當國士哉得不稱為國士而

壽世保元

序

四

寔國手哉以國手彙成國醫之
集以故分門別類靡不具悉邇
流窮源靡不究竟起死回生靡
不効驗將前登岐黃後成劉李
自俞跗涪翁而下卓夙無與儷
矣集成以付剞劂氏公諸寓內

則遵而守之可以壽一人亦可
以壽千萬人推而廣之可以壽
一世亦可以壽千萬世其所裨
益寧以家計年筭哉余故善龔
子善其集成而啟後洵有地也
特為之弁言簡端

壽世保元

序

五

賜進士第榮祿大夫文淵閣大
學士太子太保戶部尚書侍
經筵新建洪陽張位撰

壽世保元
洪陽張位
醫學士

壽世保元自叙

余讀父書，徃徃欲壽一世而未能也。間嘗竊取岐黃倉越劉張朱李諸家之秘旨經驗之良方，彙成五書。曰古今醫鑑，曰萬病回春，曰種杏仙方，曰雲林神效，曰魯府禁方。

壽世保元

自叙

六

業已灼灼於世，雖然醫妙無窮，其間標本異治，虛實瞬易，損增互換，岐中之岐，變外之變，膠古不得師心，又不得夫，豈五書所能竟哉。近來倦遊家居，覩聞覺益日多，緝練覺日益熟，迺採掇名藩之異授，內

府之珍藏，宇內士夫之所家襲，方外異人之所秘傳，間亦竊附已意，發諸前人之所未發，參互勘驗，百投百效者，分門別類，彙次成編，命名曰壽世保元，以示大全，于以補諸書之缺。夫人之丁身，有元神有

壽世保元

自叙

七

元氣，神官於內，氣充乎體，少有不保而百病生矣。余謬為保元云者，正欲保其元神，常為一身之主，保其元氣，常為一身之輔，而後神固氣完，百邪無能，奸百病無由作矣。如世道之在澆漓者，則用勸世歌

砥而規之使天下後世之人咸躋於仁壽之域敢曰壽世保元即調元也調元者宰相之事而竊取爲名高哉噫嘻余放民也遨遊湖海涉迹燕趙梁豫之間辱王公縉紳謬爲恭敬蓋四十襖于茲曩

壽世保元

自叙

八

魯藩君侯與余爲淮南八公交却其千金之爵又顏其扁而贈之命曰醫林狀元以余伎倆予不獲致青雲居嘗空語奇字扁以榮銜若謂經術有元業術亦有元而余幸窺杏林之一班或者亦奪方伎之

一元乎然非余意也書成而付劑劑氏要亦備養生之餌釘云爾何敢與青囊肘後爭埒而用文之以自點也

書

萬曆四十三年歲次乙卯春王正

壽世保元

自叙

九

月上浣之吉太醫院吏目金谿雲林龔廷賢撰



壽世保元凡例

一是集以內經為宗旨用劉張朱李為正印其餘諸家為變法間亦竊附已意旁求可法之言以廣之繁者刪之簡者采之奇而良者遵之掇拾其義細繹其旨無非欲融會貫通以成其全書耳

一首論自軒岐以來歷代明醫方書之宜法者班班可考列之於前俾後學者翹

壽世保元

凡例

十

流窮源知所自來而識所宗焉

一人身五臟六腑十二經絡血氣脾胃陰陽標本五運六氣亢則害承迺制虛實寒熱受病之原皆內經之本旨也學者宜熟讀細玩則知病之原而生死吉凶可槩見矣

一脈訣宗王叔和七表八裏摠歸于劉三點浮沉遲數四脈正所謂有博則有約

也然知要則能守約守約則足以盡其博矣

一藥性予集回春已有二百四十味今增補共四百味編成四韻下註製法以示後學此皆常用之藥足給常病之用其餘古怪冷藥用之者少不能全具姑闕之

一各門先之以脈息其病宜其脈其病忌

壽世保元

凡例

十一

其脈脈之生死於此可見次之以病原病起於何臟腑何經絡或在表或在裏或在半表半裏而治之或汗或吐或下或和釀或先攻而後補或先補而後攻或攻補兼施有病後宜補以杜後患有病後不須補而復元者又急則治標緩則治本大抵病有新久虛實之異治有補瀉宣通之殊耳

一論病原後。隨立一方。是某病用某方。以某方用某藥。條款具陳。証治區別。俾學者對症選用。効不旋踵耳。此明白易知。雖未業醫者。一見了然。亦可對症而投劑也。

一古方乃歷代明醫所製。百發百中者。雖諸書疊出。如四君四物益氣湯。六味丸之類。乃諸病必用之藥。而千古不易之

方可厭煩而不錄乎。此係古人所製。姓名人所共知。茲不復贅。

一今方乃內閣珍奇。諸藩異授。海內縉紳。家藏秘錄。并方外異人。及家君與予所製。歷試四方之病。曾經累效者。錄之。未效者。舍之。每方之下。即載所傳人氏官銜。姓號。示不忘本也。

一醫案有古人所經驗者。亦有予用之。而

効者。蓋折門分類。方法雖詳。然間有奇取効好於本方之外者。不妨詳載。仍具於各門之後。亦以觀變達權之意。以俟學者採用。無者缺之。

一病証多端。時醫偏執古方。妄逞臆見。非惟不能奏効。而返加重其病。此皆由晰理未精。審脉未確。以故或發之太過。而致亡元陽。或下之太驟。而內損陰血。稍

熱則遽用牽牛。硝黃。稍寒則遽用附子。姜桂。不偏於熱。則偏於寒。攻擊太過。能損人天真之氣。有傷脾胃。蓋脾土一傷。則不能生肺金。金衰不能生水。是腎絕生氣之原則。腎水枯竭。而根本壞矣。其餘諸臟。皆失相生之義。則次第而衰。憊焉。正氣既虛。則運用無藉。血滯不行。以致氣血耗散。傳變失常。浸淫日甚。一虛

而百虛出矣。由是諸病蜂起。怪症百端。難以名狀。治以滋補為主。故方雖雜見。而補中益氣湯。六味地黃丸。十全大補湯。但是諸般不足之病。尤能收萬全之功。蓋立齋薛先生論之詳矣。古來作者。代不乏人。而薛先生慧心巧識。擷英咀華。其於三方尤窺厥奧。治病標的。殆無以易此者。予雖未盡膠於三方。而各諸

壽世保元

九例

十四

病皆可收効。今載於各門之後。隨機損益。變化無窮。則亦做此而善通之。學者能細加體認。其於醫道思過半矣。一書已纂成。而又有傳來妙方。不忍棄之。故補遺於各門之末。以備採用。一灸法雖有劫病之功。但取其素所試驗者。集為一處。凡病有宜灸者。可依法灸之。必奏効矣。未奏効者。姑缺之。畢

新編薛林狀元醫案林先生纂著壽世保元目錄

甲集一卷

醫說

五臟六腑脈病虛實九十一條

五臟補瀉主治例

十二經絡

奇經八脈

胎脈

七表八裏總歸四脈

論五臟見四脈應病詩

肉因脈

外因脈

不內不外因脈

定死脈形候歌

脈辨生死

診瘵病生死候歌

診暴病歌

諸脈宜忌生死類

扁鵲華陀察聲色秘訣

診五臟六腑氣絕症候

臟腑論

血氣論

脾胃論

五運六氣

五運主病

六氣為病

九則害承。迺制。體用說

醫論

本草門

藥論

藥性歌括 共四百味

壽世保元

目錄

乙集二卷

中風 預防中風

傷寒

四時感冒

中寒

瘟疫

瘴氣

中暑

中濕

火證

內傷

飲食 嗜酒喪身

鬱證

丙集三卷

痰飲

咳嗽

喘急

哮喘

瘡疾

痢疾

泄瀉

霍亂

嘔吐

番胃

飢逆

噎氣

吞酸

儲雜

諸氣

痞滿

鼓脹

水腫

積聚

五疰

丁集四卷

戊集五卷

補益 老人 痼冷 斑疹 發熱 勞瘵
吐血 衄血 咳血 咯血 嘔血 唾血
便血 弱血 惡熱 惡寒 汗症
眩暈 麻木 癩狂 癩症 健忘 驚悸
怔忡 虛煩 不寐 厥症 心胃痛 腹痛
腰痛 脇痛 臂痛 肩背痛 痛風 脚氣
癩疔 痿癱 消渴 濁症 遺精
淋症 關格 遺溺 小便閉 大便閉 二便閉
痔漏 體氣 脫肛 諸蟲

巳集六卷

頭痛 鬚髮 面病 耳病 鼻病 口舌
齒唇 牙齒 眼目 喉痺 結核 瘰癧
肺癰 肺痿 心漏

庚集七卷

婦人科 婦人總論 調經 經閉 崩漏
帶下 虛勞 求嗣 妊娠 產前 產後
產後 小產 乳病 通乳 斷乳
通治 雜病 疝病

辛集八卷

小兒科 急驚 慢驚 慢脾 諸疳
積疳 熱症 感冒 脾胃 傷食 吐瀉

壽世保元

目錄

二

痢疾 瘧疾 痰喘 咳嗽 發沙 通治
小兒初生七十症 小兒宜 浴兒法 斷臍法 變蒸論
初生雜症論方 胎熱 胎寒 胎肥 胎怯
胎黃 胎驚 鎖肚 不乳 撮口 噤風
胎風 客忤 不尿 夜啼 中惡 天吊
鵝口 口瘡 重舌 木舌 弄舌 牙疳
吃泥 丹毒 赤遊 喉痺 乳塊 眼疾
耳膿 鼻瘡 頭瘡 臍瘡 蟲痛 尾骨痛
陰腫 疝氣 盤腸 氣痛 脫肛 遺尿
尿濁 便血 下淋 吐血 衄血 小便閉
大便閉 水腫 黃疸 汗症 衄血 解頰
行遲 語遲 齒遲 龜胸 龜背 滯頰
顛陷 顛填 手拳 脚拳 痘瘡 疥疹

壽世保元

目錄

三

壬集九卷

外科 癰疽 附骨疽 臂瘰 腸瘰 囊癰
懸癰 瘰癧 疔瘡 便毒 下疳 楊梅瘡
疥瘡 癬瘡 疥瘡 癩風 癩風 膝瘡
諸瘡 膏藥 杖瘡 折傷 破傷風 湯火
蟲獸

癸集十卷

藥品雜治 雜方 瘵病囊圖 神仙接命秘訣
通治 絕糧失食飢餓欲死方 金瘡 齒傷
申毒 骨酸 邪祟 五絕 井塚 蟲毒
救荒辟穀 灸法 目錄畢

新刊醫林狀元壽世保元甲集一卷

太醫院吏目金裕雲林龔廷賢子才編著

龔定國 龔安國 校

南雅太學生蓋印周文卿光澤堂

醫說

大哉醫乎其來遠矣... 醫藥故神農嘗百草黃帝註內經伊尹作湯液雷公製炮炙與夫著書立言垂世者若內經其言深而要其旨遠以弘其考辨信而有據實為醫家之祖下此則秦越人和緩者緩獨能知晉侯之膏肓而未有者惟越人所著八十一難經則皆發明內經之旨又下此則淳于意華陀之能經鴟顧固亦導引家之一術至於剖腹背瀉腸胃而去疾則法

壽世保元

甲集一卷

於神怪矣意之醫狀司馬遷備誌之又下此則張機之金匱玉函經及傷寒諸論誠千古不刊之妙典第詳於六氣所傷而於嗜慾食飲勞傷之所致者畧而不議又下此則王叔和纂岐伯華佗等書為脈經氣陰陽內外辨三部九候分入迎氣口條陳十二經絡治夫二焦五臟六腑之病最為著明又下此則巢元方病源候論似不為無所見若但論風寒而不著濕熱之篇乃其失也又下此則王冰推五運六氣之變撰為天元玉策周詳切密亦人之所難苟泥之則局滯而不通矣又下此則王素孫思邈思遠以絕人之識探慈仁惻隱之心其叙千金方及指出工害人之禍至為憤切後人稍闕其藩垣亦足以其術鳴但不制傷寒之書或不能無遺憾也素難闡明外臺秘要所言方證符禁灼灸之詳頗有所祖述然謂針能殺人不能起死人者則一偏之見也又下此則錢乙雁安時許叔微叔微俱在準繩尺寸之中而無所發明安時雖能出奇應變而終未離於範圍一人皆得張機之粗者也惟乙雁

之關奧而攝其精華建為五臟之方各隨所宜謂肝有相火則在瀉而無補腎為真水則有補而無瀉皆內經之秘尤知者之所取法也奈世知之之淺其遺書散亡出於閻孝忠所集居多孝忠之意初非乙之本真也又下此則上谷張元素河間劉完素雖水張從政元素之與完素雖設為奇異異人以神其授受實聞乙之風而興起者焉若從政則又宗乎完素者也元素以古方今病決不能相值治病一切不以方故其書亦不傳其有存於今者皆後來之所附會其學則東垣李杲深得之果推明內外二傷而多注意於補脾土之設蓋以土為一身之主土平則諸臟平矣從政以汗吐下三法風寒暑濕燥火六門為醫之關鍵其治多攻利不善學者殺久完素論風火之病以內經論病機氣宜下十九條者為原病式間與粹微有非大觀官局諸醫所可擊疑究其說施則不越攻補二者之間也近代名醫若吳中羅益涪州呂復甘肅東垣之餘緒武林羅知悌丹溪朱彥修各托完素之流風又若乙之朱佐

壽世保元

甲集一卷

越之滑壽慈路王節齋餘抗陶節庵吳郡薛立齋咸有著述夫易按果嗟矣自內經以來醫書汗牛充棟不為不多矣蓋醫之有內經由傳道之六經無所不備後賢著述若仲景東垣河間丹溪四子之說可謂醫書之全備猶學庸語孟為六經之階梯不可缺者也故曰外感法仲景內傷法東垣熱病用河間雜病用丹溪然素問論病之因本宜若藥之性脈訣詳論之原運氣法天之候一以貫之於內經斯醫道之大成乃千古不易之定論是為萬世之師法矣

五臟六腑脈病虛實例

凡十一條

肝臟脈病虛實

肝象木王於春其脈弦其神魂其候目其華在爪其充在筋其聲呼其其脈其味酸其液泣其色青其藏血足厥陰其經也與膽合為腑而主其肝為臟而去其脾氣盛為血有餘則病目赤兩脇下痛引小腹善怒

逆則頭眩耳聾不聰額腫是肝氣之實也則宜瀉之肝氣不足則目
 不明兩脇拘急筋掣不得太息爪甲枯而青善怒恐如人將捕之是肝
 氣之虛也則宜補之於四時病在肝愈於夏夏不愈甚於秋秋不死待
 於冬起於春於日愈在丙午丙午不愈加於庚辛庚辛不死待於壬癸
 起於甲乙於時平且慧下肺甚夜半靜禁當風肝部在手關上是也平
 肝脈來綿綿如按琴瑟之弦如揭長竿春以胃氣為本春肝木旺其脈
 弦細而長是平脈也反得微瀉而短者是肺之乘肝金之剋木謂之賊
 邪太逆不治反得浮大而洪者是心乘肝子之乘母為實邪雖病當
 反得沉濡而滑者是腎乘肝母之剋子為虛邪雖病當愈反得緩而大
 者是脾之乘肝為土之凌木為微邪雖病不死肝脈來盛實而滑如循
 長竿曰平肝病脈來急益勁如新張弓弦曰肝死真肝脈至中外之如
 循刀刃頤頤然如新張弓弦色青白不澤毛折乃死

心臟脈病虛實

壽世保元

甲集一卷

三

心象火王於夏其脈如鉤而洪大其候舌其聲言其臭焦其味苦其液汗
 其養血其色赤其藏神手少陰其經也與小腸為腑而主表心氣盛則
 神有餘則病胸內痛脇支滿脇下痛膈背脊痛脾則痛兩臂內痛喜大不
 休是心氣之實也則宜瀉之心氣不足則胸腹大脇下與腰背相引痛
 驚悸恍惚少顏色舌本強善憂悲是心氣之虛也則宜補之於四時病
 在心愈於長夏長夏不愈甚於冬冬不死待於春起於夏於日愈在戊
 己戊己不巳加於壬癸壬癸不死待於甲乙起於丙丁於時日中禁夜
 半甚平且靜禁濕衣熱食心部在左手寸口是也寸口脈來累累如連
 珠如循瑯玕曰平心以胃氣為本夏心火王其脈浮洪大而散名曰平
 脈也反得沉濡而滑者腎之乘心水之剋火大逆不治反得弦而長其
 肝乘心母之剋子雖病當愈反得緩而大是脾乘心子之乘母雖病當
 愈反得微瀉而短是肺之乘心金之凌火為微邪雖病不死病心脈水
 喘喘連屬其中微曲曰心病死心脈前出後倍如操帶鉤曰心死真心

脈弱而搏如循薏苡粟然其色赤白不澤毛折乃死

脾臟脈病虛實

脾象土旺於長夏其脈緩其候口其聲歌其臭香其味甘其液涎其養形
 肉其色黃其藏意足太陰其經也與胃合為腑主裏脾氣盛則
 盛為形有餘則病腹脹澀不利身重苦飢足痿不收行善瘦脚下痛是
 為脾氣之實也則宜瀉之脾氣不足則四肢不用後泄食不化嘔逆腹
 脹腸鳴是為脾氣之虛也則宜補之於四時病在脾愈於秋秋不愈甚
 於春春不死待於長夏於日愈於庚辛庚辛不愈加於甲乙甲乙不死
 待於丙丁起於戊己於時日慧平且甚下肺靜脾欲緩急食前以緩之
 用苦以泄之甘以補之禁溫食飽食濕地濡衣脾部在右手關上是也
 六月脾土旺其脈大阿阿而緩名曰平脈也長夏以胃氣為本反得弦
 而急是肝之乘脾木之剋土為太逆不治反得微瀉而短是肺之乘脾
 子之乘母不治自愈反得浮而洪者是心之乘脾母之歸子當差不死

壽世保元

甲集一卷

四

反得沉濡而滑者是腎之剋脾水之凌土為微邪當瀉脾長而弱來緩
 去數再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰命盡六至曰死病脾
 脈來實而盛數如雞暴足曰脾病死脾脈來堅銳如鳥之啄如鳥之距
 如屋之漏如水之澗曰脾絕真脾脈弱而乍數乍疎然其色不澤乃死

肺象金王於秋其脈如毛而浮其候鼻其聲哭其臭腥其味辛其液涕其
 養皮毛其藏氣其色白其神魄手太陰其經也與大腸合大腸為腑主
 表肺為臟主裏肺氣盛為氣有餘則病喘欬上氣肩背痛汗出尻陰股
 膝踰腫足背痛是為肺氣之實也則宜瀉之肺氣不足則少氣不能報
 息耳聾噤乾是為肺氣之虛也則宜補之於四時病在肺愈於冬冬不
 愈甚於夏夏不死待於長夏起於秋於日愈於壬癸壬癸不愈加於丙
 丁丙丁不死待於戊己起於庚辛庚辛不愈於時下肺禁夜半靜
 日中甚肺欲收急食酸以收之用辛瀉之肺部在右手關前寸口是也

平肺脈微短清如毛秋以胃氣為本病脈來上下如循雞羽曰病肺
病其色白身體但寒無熱時時欲飲其脈微遲為可治秋金肺王其脈
浮濇而短是曰平脈也反得浮大而洪者是心之乘肺火之剋金為大
逆不治反得沉濡而滑者是腎之乘肺子之乘母不治自愈反得緩大
而長阿阿者是脾之乘肺母之歸子雖病當愈反得弦而長者是肝之
乘肺木之凌金為微邪雖病當愈肺脈來沈沈而輕如微風吹鳥背上
毛再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命盡肺脈來
如物之浮如風吹毛曰肺死秋胃微毛曰平胃氣少毛多曰肺病但如
毛無胃氣曰死毛有弦曰春病弦甚曰金病其肺脈至大而虛如毛羽
中入膚然其色青白不澤毛折乃死

腎臟脈病虛實

腎象水王於冬其脈如石而沉其候耳其聲呻其臭腐其味鹹其液唾其
養骨其色黑其神志足少陰其經也與膀胱為腑主表腎為臟主裏

壽世保元

甲集一卷

五

氣盛為志有餘則病腹脹發泄肺脹喘汗出憎風面目黑小便澀是
為腎氣實也則宜瀉之腎氣不足則厥腰背冷胸內痛耳鳴若耳聾為
腎氣之虛也則宜補之腎病者腹大臃腫喘汗出憎風虛則胸中痛
於四時病在腎愈在春春不愈甚於長夏夏不愈待於秋起於冬於
日愈於甲乙甲乙不愈甚於戊己戊己不死待於庚辛起於壬癸無化
塵垢無衣灸於時夜半慧日乘四季甚下哺靜腎欲堅食苦以堅
之賊以泄之苦以補之腎部在左手關後尺中是也腎脈來如引葛按
之益鞏曰胃病腎風水其脈大緊身無痛形不瘦不能食善驚以心
萎者死冬腎水王其脈沉濡而滑名曰平脈也反得浮大而緩者是脾
之乘腎土之剋水為大逆不治反得浮濇而短者是肺乘腎母之歸子
為虛邪雖病可治反得弦細而長者肝之乘腎子之乘母為實邪雖
病自愈反得浮大而洪者是心之乘腎火之凌水雖病不死腎死脈來
發而奪索辟辟如彈石曰腎死冬胃微石曰平胃少石多曰腎病但石

無胃曰死石而有鈞曰夏病鈞甚曰冬病藏真下於腎藏骨節之氣真
腎脈至得而絕如彈石辟辟然其色黃黑不澤毛折乃死 諸真藏見
者皆不治

胆經虛實病候

膽象木王於春是少陽其經也肝之腑也謀慮出焉諸腑皆取決斷於
胆其氣盛為有餘則病腹內胃胃不安身軀習習是為胆氣之實也則
宜瀉之膽氣不足其氣上溢而口苦善太息嘔宿汁心下澹澹如入將
捕之盛中介介數噦是為胆氣之虛也則宜補之

小腸虛實病候

小腸象火王於夏手太陽其經也心之府也水液之下行為澀便者流於
小腸其氣盛為有餘則病小腸熱焦渴乾澀小腹脹脹是為小腸之氣
實也則宜瀉之小腸不足則寒氣多之腸病驚跳不言乍來乍去是為
小腸氣之虛也則宜補之

壽世保元

日集一卷

六

胃經虛實病候

胃象土王於長夏足陽明其經也脾之府也為水穀之海諸臟皆受水
穀之氣於胃氣盛為有餘則病腹脹脹氣滿是為胃氣之實也則宜瀉
之胃氣不足則飢而不受水穀發泄澀澀是為胃氣之虛也則宜補之胃
脈實則腹虛則泄關脈滑胃內有寒脈滑滑為胃氣滿不欲食胃脈虛則
熱在胃內

大腸虛實病候

大腸象金王於秋手陽明其經也肺之腑也為傳導之官變化糟粕出焉
氣盛為有餘則病腸內切痛如錐刀刺無休息腰背痠痺善怒是為大
腸之氣實也則宜瀉之大腸氣不足則寒氣多善泄是為大腸之氣虛
也則宜補之腸其在手寸口脈手陽明經也脈浮則為陽陽實者大腸
實也若腸切痛如錐刺無休息時
膀胱經虛實病候

一第1021册 續修四庫全書 2 2E3

膀胱象水主於冬足太陽其經也腎之腑也五穀五味之津液悉歸於膀胱氣化分入血脈以成骨髓也而津液之餘者入胞則為小便其氣盛為有餘則病熱胞瀦小便不通小腹偏腫痛是為膀胱氣之實也則其瀦之膀胱氣不足則寒氣客之胞瀦小便數而多也面色黑是膀胱之氣虛也則宜補之

三焦虛實病候

三焦者上焦中焦下焦是也上焦之氣出於胃口並咽以貫膈而胸內走掖循大陰之分而行上至舌下至足陽明當與榮衛俱行主納而不化為精微上注於肺脈乃化為血主不上不下也○下焦之氣別迴腸注於膀胱而滲入焉主出而不納故水穀常并居於胃成糟粕而供下於大腸也謂此三焦氣乾水穀分別清濁故名三焦三焦為水穀之道路氣之所終始也三焦氣盛為有餘則脹氣滿於皮膚內輕輕然而

壽世保元

甲集一卷

七

不牢或小便澹或大便難是為三焦之實也則宜瀦之三焦以氣不足則寒氣客之病遺尿或瀦利或胸滿或食不消是三焦之氣虛也則宜補之脘其寸口脈邊上焦有寒尺脈邊下焦有寒尺脈浮者寒陽虛

五臟補瀦主治例

肝虛者陳皮生薑之類補之虛則補其母腎者肝之母也以熟地黃相補之如無他症六味地黃丸主之

實則白芍瀦之如無他証瀦青丸主之實則瀦其子以甘草瀦心湯主

之心者肝之子也

心虛者炒鹽補之虛則補其母肝者心之母生薑補之如無他証以安神

丸主之

實則甘草瀦之如無他症重則瀦心湯輕則瀦赤散主之

脾虛者甘草大棗之類補之虛則補其母心乃脾之母以炒鹽補之實則瀦其子肺乃脾之子以炒白皮主之又云實則黃連枳實瀦之如無他

症宜黃散主之

肺虛者五味子補之實則桑白皮瀦之如無他症阿膠散主則補其母脾乃肺之母以甘草大棗補脾實則瀦其子腎乃肺之子以澤瀉瀦腎腎虛者熟地黃相補之腎無實不可瀦錢仲陽止有補腎地黃丸無瀦腎藥虛則補其母肺乃腎之母以五味子補肺

十二經絡

經而直者為經支而橫者為絡

手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋腋下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上臂下廉入寸口上循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端次注手陽明手陽明之脈起於大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出于柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰下入下齒中還出頰口交人中左之右右之左上俠鼻孔次注足陽明

壽世保元

日集一卷

八

足陽明之脈起於鼻交頰中傍約太陽之脈下循鼻外入上齒中還出頰口環唇下交承漿却循頰後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顛其支者從大迎前下入迎循頰頰入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣街中其支者起于胃口下循臍裏下至氣街中而合以下解開抵伏兔下膝膕中下循脛外廉下足趾入中指內間其支者下廉至中而別下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端次注足太陰

足太陰之脈起於大指之端循指內側向肉際過膝膕後上內廉前廉上臑內循脛骨後交出厥陰之前膝膕內前廉入腹屬脾絡胃上膈俠咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中次注手少陰手少陰之脈起於心中出屬心系下高絡小腸其支者從心系上俠咽繫目系其直者復從心系却上膈下出腋上下循臑內後廉行六陰心主之後下肘內循臂內後廉抵掌後銳骨之端入掌內後廉循小指之內

出其端次注手太陽
 手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出
 肋內側兩筋之間上循膈外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心
 循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頰上頰至目銳眦却入耳中
 其支者別頰上頰抵鼻至目內眦斜絡于顛次注足太陽
 足太陽之脉起於目內眦上額交巖其支者從巖至耳上角其直者從巖
 入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱其支
 者從腰中下俠脊貫腎入腠中其支者從腠內左右別下貫胛俠脊內
 過髀樞循解外從後廉下合腠中以下貫腠內出外踝之後循京骨至
 小指外側次注足少陰
 足少陰之脉起於小指之下斜趨足心出于然谷之下循內踝之後別入
 跟中以上端內出腠內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎
 上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胃中次注手

壽世保元

甲集一卷

九

手厥陰之脉起於胸中出屬心包下歷絡三焦其支者循胸出腋下腋
 三寸上抵腋循膈內行大陰少陰之間入肘中循臂內入掌中循中
 指出其端其支者從掌中循小指次指出其端次注手少陽
 手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間循手裏腕出臂外兩骨
 之間上貫肘循膈外上有交出足少陽之後入缺盆布膈中散絡心包
 下膈循膈三焦其支者從膈中上出缺盆上項繫耳後直出耳上角以
 屈下頰抵頰其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目
 銳眦次注足少陽
 足少陽之脉起於目銳眦上抵頭角下耳後循頰行手少陽之前至肩上
 却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳
 眦之後其支者別銳眦下太迎合于手少陽抵於頰下加頰車下頰合缺
 盆以下胸中貫膈肝屬膽循膈裏出氣街達毛際橫入腠中其直
 者從缺盆下腋循胸過季脇下合膈脈中以下循膈少陽出膝外廉下

外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指
 之間其支者別跗上入大指之間循大指岐骨內出其端還貫甲出
 三毛次注足厥陰
 足厥陰之脉起於大指叢毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝入寸
 交出太陰之後上腠內廉循股陰入毛中過陰器抵小腹俠胃屬肝絡
 膈上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頰頰連目系上出額與督脈會於
 顛其支者從目系下頰裏環唇內其支者復從肝別貫膈上注肺次注
 手太陽
 奇經八脉
 督脈者起於下極之脛並於脊裏上至風府入屬於腦
 任脈者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉上頰循面入頰
 衝脈者起於氣衝並足陽明之經俠膈上行至胃中而散
 帶脈者起於季脇回身一周

壽世保元

甲集一卷

十

陽蹻脈者起於跟中循外踝上行入風池
 陰蹻脈者起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脈
 陽維起於諸陽之會
 陰維起於諸陰之交
 診脈
 皇極經云人之四肢各有脉也下脉三部下部二候以應天數也一脈三
 部寸關尺也下部二候浮中沉也所以應之九數也愚謂脉之理亦微
 矣人有四時之正脉有平生之常脉有內傷之變脉有外感之邪脉有
 重陰之脉有重陽之脉有陽虛而陰乘之脉有陰虛而陽乘之脉有陽
 極而陰生之脉有陰極而陽生之脉有獨見之脉有兼見之脉有初病
 之脉有將愈之脉有可治之脉有不治之脉有左右上下表裏之間有
 餘不足惟在乎分別陰陽能分別陰陽斯可以識脉之體劉復真曰昔
 王叔和以七表八裏脉決人之生死然又文理浩繁今撮其樞要以

沉遲數四脈為宗。知風氣冷熱。主病且浮。而有方者為風。浮而無力為虛。沉而有力為積。沉而無力為氣。遲而有力為痛。遲而無力為冷。數而有力為熱。數而無力為瘡。更分三部。在何部得之。若在寸部。主上焦頭面胸膈之疾。關部。主中焦肚腹脾胃之疾。尺部。主下焦小腹腰足之疾。診其五臟何臟得之。六腑亦然。學者又當以意會。而加精別。庶不致按寸。擇尺之訛云。

七表八裏總歸四脈

浮脈屬陽主表。舉指輕按而得之曰浮。

沉脈屬陰主裏。舉指重按而得之曰沉。

浮而有力為洪。○浮而無力為芤。○浮而長大為實。

沉而有力為滑。○沉而無力為弱。○沉而似有似無為微。○沉而為弦。遲脈屬陰在臟。舉指半重按之。在內再按乃見。丁息三至曰遲。遲而有力為瀉。○遲而無力為濡。○遲而似有似無為緩。

壽世保元

日集一卷

數脈屬陽在腑。舉指輕按而極急。丁息六至曰數。

數而有力為弦。○數而無力為緊。

寸部主上焦頭面之疾。凡於脈按至寸而見者。謂之有力。按至骨而無者。謂之無力。主頭面眼目。虛浮。身重。風寒。齒痛。口眼喎斜。

浮而無力主風。主胸膈痞滿。咳嗽氣急。膈氣。背胃。胸滿。不食。

沉而無力主氣。主嘔吐痞滿。不入水谷。虛汗。拘急。疼痛。不已。

遲而無力主痛。主上焦煩燥。口苦咽乾。客熱。煩渴。頭痛。口瘡。

數而無力主熱。主中焦胸腹之疾。

浮而無力主風。主兩臂拘攣。不能舉。運背脊。筋疼。身軀麻木。

沉而無力主氣。主膨脹。屢嘔。心腹疼痛。上下閉格。不思飲食。

遲而無力主痛。主痠癢。腹痛。遊走不定。上下攻刺。背胃。吐食。

數而無力主熱。主口熱。作渴。嘔吐。霍亂。怔忡。煩燥。寒熱。交爭。

尺部主下焦腰足之疾。

浮而無力主風。主寒邪腰痛。腿膝麻木。陰莖腫痛。大小便不利。

沉而無力主氣。主膝下緊痛。脚膝酸痛。下虛盜汗。小便頻數。

遲而無力主痛。主小腹急痛。外腎痛。墜小便頻數。大便泄瀉。

數而無力主熱。主小便不通。大便閉塞。或作腎癰。煩渴不止。

五臟見浮脈主風虛之病。

心脈浮。主心虛。觸事易驚。神不守舍。舌強不語。語言錯亂。

肝脈浮。主中風。癱瘓。筋脈牽搖。面腫牙疼。腸風下血。

脾脈浮。主脾虛。作嘔。飲食不進。上氣喘急。嘔逆泄瀉。

肺脈浮。主咳嗽。氣急。大便風秘。面浮。面赤。吐血。唾膿。

腎脈浮。主腰疼。牙痛。小腹氣痛。腿足生瘡。足膝無力。

五臟見沉脈主痰氣之病。

心脈沉。主小便淋瀝。咯血。尿血。小便不通。痛而不射。心驚。

肝脈沉。主怒氣傷肝。脇痛。肥氣。眼目昏痛。肚腹脹滿。

五臟見遲脈主冷痛之病。

心脈遲。主小便頻數。心疼。嘔水。怔忡。多悸。伏梁。臍痛。

肝脈遲。主筋挛。骨痛。目昏。多淚。觸事易驚。轉筋。麻木。

脾脈遲。主咳嗽。泄瀉。腹中有虫。痰涎。多壅。飲食不化。

肺脈遲。主寒嗽。喘滿。大便澀滯。皮膚燥。瘰癧。夢泄。大水。

腎脈遲。主小便頻數。滑精不禁。膝酸。膝疼。陰濕。盜汗。

五臟見數脈主瘡熱之病。

心脈數。主煩燥。狂言。舌上生瘡。小便赤澀。眼目昏花。

肝脈數。主眼痛。翳膜。目昏。多淚。頭風。眩暈。婦人血熱。骨蒸。及中風。

脾脈數。主口臭。胃香。齒痛。牙宣。多食不飽。四肢不舉。

壽世保元

日集一卷

脾脈沉。主中滿。不食。痞氣。色黃。手足不仁。嘔吐泄瀉。身腫。

肺脈沉。主咳嗽。多痰。上氣。喘急。咯血。失聲。息音。肺癰。

腎脈沉。主風滯。腰疼。小便不利。陰癰。作脹。奔豚。腹滿。

五臟見遲脈主冷痛之病。

心脈遲。主小便頻數。心疼。嘔水。怔忡。多悸。伏梁。臍痛。

肝脈遲。主筋挛。骨痛。目昏。多淚。觸事易驚。轉筋。麻木。

脾脈遲。主咳嗽。泄瀉。腹中有虫。痰涎。多壅。飲食不化。

肺脈遲。主寒嗽。喘滿。大便澀滯。皮膚燥。瘰癧。夢泄。大水。

腎脈遲。主小便頻數。滑精不禁。膝酸。膝疼。陰濕。盜汗。

五臟見數脈主瘡熱之病。

心脈數。主煩燥。狂言。舌上生瘡。小便赤澀。眼目昏花。

肝脈數。主眼痛。翳膜。目昏。多淚。頭風。眩暈。婦人血熱。骨蒸。及中風。

脾脈數。主口臭。胃香。齒痛。牙宣。多食不飽。四肢不舉。

肺脈數 主咳嗽唾血喉腫目赤大便閉結面生瘡癩
腎脈數 主消渴下注小便血淋下注生瘡除濕瀉熱

左寸心部 浮數頭熱熱驚浮遲腹冷胃虛真沉數狂言并舌強沉遲
氣短力難成去氣不相接續

左關肝部 浮數思風筋即抽浮遲冷眼淚難收沉數背脊常怒氣沉遲
不睡拍變時

左尺腎部 浮數勞熱小便赤浮遲陰腫濁來侵沉數腰疼生瘡沉遲
白濁耳虛鳴

右寸肺部 浮數中風喉熱閉浮遲冷氣渴難禁沉數風痰并氣喘沉遲
氣弱冷涎停

右關脾部 浮數酸宜并盜汗浮遲胃冷氣虛沉數熱多并口臭沉遲
腹滿脹堅生

右尺命門 浮數泄精二在熱浮遲冷氣渴時臨沉數渴來小便數沉遲
虛冷小便頻

九內因脈 喜怒憂思悲恐驚內應氣口
喜則傷心脈必虛 思傷脾脈結中居
怒氣傷肝脈便濡 恐傷於腎脈沉是
脈紫因悲傷胞絡 七情氣口內因之

十外因脈 風寒暑濕燥火燥應人迎
緊則傷寒腎不移 虛因傷暑向胞抽
細緩傷濕要觀脾 浮則傷風肝部應
六邪合脈項當審 免使將寒作熱驚

十一不內不外因脈
勞神過度定傷心 虛滿之中仔細尋
忽然緊脈必相侵 房帷任意傷心絡

勞役陰陽傷腎部 勞役陰陽傷腎部
微滿之中宜村度

因憂傷肺狀必滿 綠驚傷胆動相煩
瀉緩傷燥須觀肺 弱為傷火察心知

甲集一朱 三

三書世保元

疲極筋力便傷肝 指下尋之脈弦弱
未可輕將下例推 飢則緩弦當別議
叫呼損氣因傷氣 燥弱脈中宜熱氣
生死吉凶都在是 能通不內外中因

十二定死脈形候歌
指下如湯沸湧時 且占次死定無疑
魚翔腎絕亦如期 去疾來遲熱臂臂
三陽谷氣久虛空 胃氣分明屋漏滴
髓竭骨枯見兩尺 蝦遊狀如蝦蟇遊
雀啄連連來數急 脾無穀氣定難留
如刀壓刃細推求 更有肺枯并胃之
指下渾然如轉豆 三元正氣已漂流

十三脈辨生死
尾指搖搖頭不動 命絕脈來如彈石
散亂還同脈索形 危去行屍定生變
欲知心絕并榮絕 如麻成促至無休

洞虛子曰蝦遊雀啄代止之脈故名死脈須知氣閉格者時復有之若
非諸續敗脈未克依經斷病而胎笑於大方也蓋病勢消後始盡若其
氣不能相續如蝦遊水動屋漏點滴而無至者死脈也其或痰凝氣滯
開格不通則其脈固有不動者有三兩路亂動時有時無者或尺寸一
有一無者有閉脈絕骨不見者或時動而大小不常者有平居之人忽
然而然者有素無痰病而不時而然者有僵仆卒中而然者皆非也

十四診雜病生死候歌
五寸不止身無病數內有止皆知定
止猶代脈也脈來五寸動而不見止者無病也五十配天地造化之
數易繁辭曰太衍之數五十五十乃備一乃數之始十乃數之極人之
脉息晝夜循環五臟脈一動循一臟五動循環五臟遍五十動是十次
五臟循環遍則數皆極處而不見止者五臟皆平故無病也

四十一止一勝絕却後四年多沒命二十下止即三年二十下止二年應十

甲集一朱 十

三書世保元

五十一止，十年死。已下有止者，暴病。

四十動而見一止者，是三臟欠動，脈之極數。故知一臟絕也。先絕腎經，何以言之？夫天一生水，腎屬水，生成之一數也。人之五臟所生，先生乎腎，腎水生肝木，肝木生心火，命門火生脾土，脾土生肺金，所以先絕腎期應四年而死。二十動而見一止者，兩臟欠動，脈之極數是短腎與肝二經無氣期應三年而死。十動而止者，一臟欠動，脈之極數是腎肝心三臟無氣期應二年而死。十五動而一止者，知腎肝心脾四臟皆無氣期一年而絕也。

新註云：上言脈之動止未，知診切何部而取，據按素問難經云：每於平且寅時，日未出，飲食未進，血氣未亂，醫者可以存神定意，心無外馳，診於指下。右手寸口脈數，脈息至，以決之。夫寸口者，右手氣口也。內經曰：氣口何以獨為五臟主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六腑之大源也。五味入口，藏於胃，變現於氣口。又曰：脈會太淵，寸口是太淵穴也。是知寸口為

壽世保元

甲集一卷

十五

脈大會之處，故能決斷五臟六腑生死吉凶矣。

五診暴病歌

兩動一止或三四二動一止，六七死。四動一止，即心朝以此推排，但依穴也。氏曰：暴病者，喜怒驚恐，其氣暴逆，致風寒暑濕所侵，病生卒暴，拍動胃氣而絕，即死。不過日也。脈兩動而一止，乃胃氣將絕，猶得三四日方死。三動一止而胃氣將盡，猶得六七日死。穀氣絕盡方死。倣此而推，若至十五動而一止，乃死期在於一年矣。

又歌曰

寸平無病何謂死，尺澤原來脈不存。若知此理是何物，猶如草木一無根。

六諸脈宜忌生死類太教

中風宜浮遲忌急實，傷寒熱病宜洪大忌沉細。主有變傷寒已得浮脈沉小者，生浮大者死。咳嗽宜浮濡忌伏沉，心腹痛宜沉細遲忌浮大弦長堅疾，腹脹宜浮大忌遲小。

頭痛宜浮滑忌瀦短，下痢宜微小忌大浮洪。喘急宜浮滑忌瀦，濕病穰穰太熱其脈細小者死。

心腹積聚，脈堅強急者生，虛弱者死。

癩病，脈虛可治，實則死。又云：脈堅實者生，沉細小者死。

狂疾宜實大忌沉細，唾血宜沉弱忌實大。

霍亂宜浮洪忌微瀦，上氣浮腫宜沉滑忌微細。

鼻衄宜沉細忌浮大，中惡宜緊細忌浮大。

金瘡宜微細忌緊數，中毒宜洪大忌細微。

腸辟下膿血，宜浮小沉遲忌數疾大，吐血宜沉小弱忌實大。

墜墮內傷，宜緊弦忌小弱，風痺痿軟宜濡瀦忌數。

腹中有積，忌虛弱，病熱脈靜者危。

血脫而脈實者危，泄而脈大者危。

病在中，脈虛者危，病在外，脈瀦者危。

壽世保元

日集一卷

十六

瘡疽膿血太泄，脈滑數者危。婦人帶下，宜遲滑忌浮虛急疾。

婦人妊六七月，宜實大弦緊，忌沉細虛瀦。婦人產前，脈細小者危。婦人產後，右寸數者危。

婦人已產，宜小實沉細緩滑微小，忌浮虛實大弦急牢緊。腸辟下血，身熱則必寒，則生。

頭痛目痛，卒視無所見者死。洞泄食不化，不得留，下膿血，脈微小，連者生，緊急者死。

欬嗽羸瘦，脈形堅大者死。消渴脈數大者生，細小浮短者死。

水病脈洪大者，可治微細者不可治。厥逆汗出，脈堅強急者生，虛緩者死。

病風不仁，痿痺脈虛者生，緊急者死。上氣喘急，低昂其脈，滑手足溫者生，脈瀦四肢寒者死。

扁鵲華陀察聲色秘訣

病人五臟已奪神明不守聲嘶者死
 病人陰陽俱絕舉衣撻髮妄言者死
 病人陰陽俱絕朱青不能言者死
 病人面黃目青者不死青如草者死
 病人面黃目白者不死白如粉者死
 病人面黃目白者不死白如粉者死
 病人面青目白者不死
 病人面黃目青者九日必死
 病人面赤目白者十日死憂悲思慮心氣內傷面色反好急求相濟
 病人面白目黑者死此謂榮華已去血脈空索
 病人面黑目白八日死腎氣內傷病因留積
 病人面青目黃者五日死
 病人着床心痛短氣脾竭內傷百病復愈
 壽世保元 甲集一卷 十一

病人唇口忽乾者不治
 病人齒忽變黑者十三日死
 病人汗出不流舌卷黑者死
 病人髮如乾麻善怒者死
 病人爪甲青者死
 病人手足爪甲下肉黑者八日死
 病人手足腫其面蒼黑者死
 病人胸膈反出者死
 病人脈絕口張足腫者五日死
 病人足趾上腫兩膝大如斗者死
 病人尸臭者不可治
 心病目黑腎之日壬癸死
 肺病頰赤目腫心之日丙丁死
 腎病面腫唇黃脾之日戊己死
 病人唇腫齒焦者死
 病人舌卷邪縮者必死
 病人髮直者十五日死
 病人髮與眉衝起者死
 病人爪甲白者不治
 病人榮衛竭絕面浮腫者死
 病人手掌腫無文者死
 病人陰囊垂俱腫者死
 病人足跌腫嘔吐頭重者死
 病人尿遺尿不覺者死
 肝病皮白肺之日庚辛死
 脾病唇青肝之日甲乙死
 腎病面腫唇黃脾之日戊己死

壽世保元 甲集一卷 十二
 病人面無精彩若土色不受飲食者四日死
 病人目無精光及牙齒黑色者死 病人口張者三日死
 病人耳目及額頰赤者在五日中
 病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩頰上者亦死五日中
 病人及健人黑色若白色起入目及鼻口者死在五日中
 病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死
 病人面黑目直視惡風者死
 病人面青唇黑者死
 病人面黑唇青者死
 病人面黑兩脇下滿不能自轉反者
 病人陰結腸絕目精脫恍惚者死
 病人陰陽竭絕目眩暗者死
 病人口如魚口不能復閉而氣出多不返者死
 病人耳自口鼻有黑色起入于口者必死
 病人唇青人中反者三日死
 病人唇反人中滿者死

診五臟六腑氣絕證候

青欲如蒼璧之澤不欲如藍
 白欲如鶉羽不欲如蠶
 黃欲如羅縵雄黃不欲如黄土
 病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人汗出如
 水不止一日二日死
 病人膽絕七日死何以知之眉髮之傾
 病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青呼鳥不休一日八日死
 病人心絕六日死何以知之肩息回視立死一日即事十日死
 病人腸小腸絕六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸自汗不止
 病人脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱臄脹泄利不覺出無時度
 十日死

病人胃絕五日死何以知之者痛腹中重不可反覆也
 病人肉絕六日死何以知之耳乾舌皆腫瀉血大便赤泄九日死
 病人肺絕三日死何以知之口張但氣出而不收十日身口虛裏短氣
 病人木腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死
 病人腎絕四日死何以知之齒為暴枯面為正黑目中黃色腰中欲折自
 汗出如流水十日死
 病人骨絕齒黃落十日死諸浮脈無根者皆死已上五臟六腑為根也

臟腑論

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳
 水穀於脾腸矣腎北方天之水故以藏精精始為魂魄乃精之所出
 是精氣之佐使而並其出入水能生木木為之子故膽中藏魄心南方
 太虛火用以藏神生陽曰魂魄乃神之所自出是為神氣之所寓而隨
 其出入火能生土土為之子故脾中藏魂人之丁身精神其主而魂魄

壽世保元

甲集一卷

十九

其使也人之主也精神魂魄性之用也血氣水穀形之用也惟內外交
 相養則精神強而魂魄盛性者受之天必有藏焉心者神所藏腎者精
 所藏脾者魂所藏胆者魄所藏統其藏者心也故能發見於聲臭言視
 之間而不違其則者所以靈也形者資於地必有腑焉肺為傳氣之府
 胃為化水穀之府又為之脾腸以流其查滓濁穢故天地之性人為貴
 豈若異端者之言魂魄哉愚謂人之飲食入口由胃管入于胃中其滋
 味滲入五臟其質入於小腸乃化之則入於大腸始分別清濁澄淨濁
 者結于腐腸津液清者入於膀胱膀胱乃津液之府也至膀胱又分清
 濁濁者入於溺中其清者入於胆胆引入於脾脾散於五臟為延為理
 為涕為淚為汗其滋味滲入五臟乃成五汗五汗同歸於脾脾和乃化
 血行於五臟五腑而統之於肝脾不和乃化為痰血生氣於五臟五腑
 而統之於肺氣血化精統之於腎精生神統之於心精藏一腎之間謂
 之命門神藏心之中竅為人之元氣氣從肺管中出鼻為呼吸也

血氣論

人生之初其此陰陽則亦具此血氣所以得全性命者氣與血也血氣者
 乃人身之根本乎氣取諸陽血取諸陰血為榮榮行脈中滋榮之表也
 氣為衛衛行脈外護衛之意也人受穀氣於胃胃為水穀之海灌漑經
 絡長養百骸而五臟六腑皆取其氣故清者為榮濁者為衛榮衛二氣
 周流不息一日一氣脈行五十度平旦復食于氣口陰陽相貫血榮氣
 衛常相通何病之有一室礙焉則百病由此而生且氣之為病發為
 寒熱喜怒憂思積痞疝瘕癥瘕上為頭眩中為胸膈下為臍間動氣或
 喘促或咳噎聚則中滿逆則足寒凡此諸疾氣使然也血之為病妄行
 則吐血衄瀉則虛勞蓄之在上其人亡齒之在下其人狂逢寒則筋不
 榮而寧急熱則毒內瘀而發黃在小便為淋痛在大便為腸風婦人
 月事進退漏下崩中病症非一凡此諸疾皆血使之也夫血者譬則水
 也氣者譬則風也風行水上為血氣之象焉蓋氣者血之師也氣行則

壽世保元

甲集一卷

三

血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血凝氣存了息之不運則血有
 丁息之不行病出於血調其氣猶可以導達病原於氣區調血又何
 加焉故人之一身調氣為上調血次之先陽後陰也若夫血有敗瘀滯
 泥諸經壅遏氣之道路經所謂去其血而後調之不可不通其變矣然
 調氣之劑以之調血而兩得調血之劑以之調氣則乖張如木香官桂
 細辛厚朴烏藥香附三稜莪朮之類治氣可也治血亦可也若以當歸
 地黃黃芩之血証則可然其性纏滯有虧胃氣胃氣虧則五臟六腑之
 氣亦餒矣善用藥者必以助胃藥助之凡治病當識本末如嘔吐痰涎
 胃虛不食以致發熱若以涼劑退熱則胃氣愈虛熱亦不退宜先助胃
 止吐為本其熱自退然不退但得胃氣已正旋與鮮熱又有傷寒本
 熱兼用寒涼轉其熱不退但與調和胃氣自然安愈
 心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏止知血之出於心
 而不知血之納於肝知氣之出於肺而不知氣之納於腎往往用藥南

轉北較矣假如血病以五苓門冬等劑行其心巴豆大黃逐其積其病猶存者血之所藏無以養也必佐以芎歸則病自止假如喘嗽以枳殼桔梗紫蘇桂姜橘等劑調其氣以南星半夏細辛豁其痰而終不升降者氣之所藏無以收也必佐以補骨脂輩則氣歸原矣病有標本治有先後綱舉而目斯張矣噫此傳心至妙之法敢不與衛生君子共之

脾胃論

夫脾胃者倉廩之官也屬土以滋聚臟安穀以濟百骸故胃於中官職司南政旺於四季體應四肢胃形如囊名水穀之海脾形若掌乘脾胃而升降司運化之權其致呼吸者元氣也脾居其間附胃磨動所以穀氣消而轉輸也胃屬於戊脾乃己也至哉坤元萬物滋生人之元元三焦之氣五臟六腑之脈統宗於胃故人以胃氣為本也凡善調脾胃者當惜其氣氣健則升降不失其度氣弱則積滯矣運食者元氣也生血氣者飲食也無時不在無時不然故無專名亦無定位經言胃氣脈不可

壽世保元

甲集一卷

十一

得見衰乃見耳六脈之偏勝而出獨強獨弱獨洪獨沉之脈是脈無胃氣之神也甚至屋漏雀啄等脈必元氣先竭然後胃氣不相接接故也氣將絕則升降之道廢運化之機弛也夫凡隔不快食不美者是氣之虛也苟或飲食自倍所傷乃一時膨悶過則乎矣若傷之日久仍不寬快者得非元氣虧損而胃氣弱乎古今論脾胃及內外傷辨惟東垣老人用心矣但繁文衍義卒難措用蓋內傷之要有二致焉一曰飲食勞倦即傷脾此常人之患也因而氣血不足胃腕之陽不舉宜補中益氣湯主之二曰嗜慾而傷脾此富貴之患也恣以厚味則生痰而泥膈縱其情慾則耗精而氣散內經曰腎者胃之關夫腎脈從脚底湧泉穴起上股內廉夾任脈抵咽嗝精血枯則乏潤下之力故吞酸即艱難胸膈漸不覺舒爽宜加味六君子湯加紅花二分知母鹽炒一錢主之二曰飲食自倍脾胃乃傷者藜藿人之患也宜保和丸二茵和中丸權之此內傷之由如此而求本之治宜養心健脾疎肝為要也夫心氣和則脾

土榮昌心火脾土之母肝木脾土之賊木曰曲直作酸故脾則胃氣暢矣肺乃傳送之官肺主氣屬金肺金有力則能平肝木不能作酸矣人多執於舊方香燥耗氣之藥致誤多矣子家傳三因和中健脾胃為脾胃家之通用其功效不可盡述原夫世俗但知枳木丸為脾胃之要藥者庸醫之傳也人或信為健脾胃之藥而可久服謬之甚矣不特無效抑且剝削真氣凡知素難太旨者察安危全在於胃氣蓋三焦司納司化司出者本諸元氣凡治內傷不知惜氣者誠寶寶虛虛之謂學者宜致思焉

五運六氣

夫五運者金木水火土也六氣者風寒暑濕燥火也天干取運地支取氣天干有十配合則為五運地支十二對衝則為六氣木氣始於甲地氣始於子天地相合則為甲子故甲子者干支之首也天氣終於癸地氣終於亥天地相合則為癸亥故癸亥者干支之末也陰陽相隔剛柔相

壽世保元

甲集一卷

三三

須是以甲子之後乙丑繼之壬戌之後癸亥繼之三十年為一紀六十年為一周太過不及斯皆見矣然以天干兄弟次序言之甲乙東方木也丙丁南方火也戊己中央土也庚辛西方金也壬癸北方水也以其未婦配合言之甲與己合而化土乙與庚合而化金丙與辛合而化水丁與壬合而化木戊與癸合而化火故甲己之歲土運統之戊癸之歲火運統之詩曰甲己化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木成癸南方火相侵然以地支循環之序言之寅卯屬春木也巳午屬夏火也申酉屬秋金也亥子屬冬水也辰戌丑未屬四季土也以其對衝之位言之子對午而為少陰君火丑對未而為太陰濕土寅對申而為少陽相火卯對酉而為陽明燥金辰對戌而為太陽寒水巳對亥而為厥陰風木故子午之歲君火主之丑未之歲濕土主之寅申之歲相火主之卯酉之歲燥金主之辰戌之歲寒水主之巳亥之歲風木主之詩曰子午少陰君火暑丑未太陰濕土雨寅申少陽相火炎卯酉陽明燥

金主辰戌太陽司水寒已亥厥陰風木舉然五運有主運有客運六氣
有主氣有客氣主運主氣萬載而不易客運客氣每歲而迭遷然則客
運也有太過焉有不及焉太過之年甲丙戊庚壬五陽干也不及之年
謂乙丁己辛癸五陰干也太過者其至先不及者其至後客氣也有正
化焉有對化焉正化之歲謂午未寅酉辰亥之年也對化之歲謂子丑
甲卯戌巳之年也正化者令之實對化者令之虛假令甲子年甲為主
運統主一年子為君火專司一歲一期三百六十五日零二十五刻正
合乎周天三百六十五度四分度之一也一春之中主運以位而相次
於下客運以氣而周流於上主運者木為初之運火為第二運土為第
三運金為第四運水為第五運客運者假如甲巳年甲為土運初之運
即土也土生金二之運即金也金生水三之運即水也水生木四之運
即木也木生火五之運即火也火生土每運各主七十二日零五刻
太過之年太寒前十三日交名曰先天不及之年太寒後十三日交名

壽世保元

甲集一卷

三三

日後天平氣之年正太寒日交名曰得六一歲之內主氣定守於六位
客氣循行於四時主氣者風為初之氣火為二之氣暑為三之氣濕為
四之氣燥為五之氣寒為終之氣客氣者假令子午年少陰君火司天
陽明燥金司地太陰濕土為天之左間厥陰風木為天之右間所以面
南而命其位也二氣在上二氣在下二氣在左二氣在右經曰天地者
萬物之上下也左右者陰陽之道路也地之左間為初之氣天之右間
為二之氣司天為三之氣天之左間為四之氣地之右間為五之氣司
地為終之氣每丁氣各主六十日八十七刻半有奇甲子辰之年太寒
日寅初一刻交初之氣至春分日午時之末交二之氣至小滿日亥時
之末交三之氣至太暑日戌時之末交四之氣至秋分日酉時之末交
五之氣至小雪日申時之末交終之氣所謂一六天也巳酉丑之年太
寒日巳初一刻交初之氣至春分日卯時之末交二之氣至小滿日寅
時之末交三之氣至太暑日丑時之末交四之氣至秋分日子時之末

交五之氣至小雪之日亥時之末交終之氣所謂一六天也寅午戌之
年太寒日申初一刻交初之氣至春分日午時之末交二之氣至小滿
日巳時之末交三之氣至太暑日辰時之末交四之氣至秋分日卯時
之末交五之氣至小雪日寅時之末交終之氣所謂二六天也亥卯未
之年太寒日亥初一刻交初之氣至春分日酉時之末交二之氣至小
滿日申時之末交三之氣至太暑日未時之末交四之氣至秋分日子
時之末交五之氣至小雪日巳時之末交終之氣所謂四六天也蓋因
客運加於主運之上主氣臨於客氣之下天時所以不齊民病所由也

五運主病

諸風掉眩皆屬肝木

掉搖也眩昏亂旋運也風主動故也所以風氣甚而頭目眩暈者由風
木旺必是金衰不能制木而木復生火風火皆屬陽多為兼化陽主乎
動兩動相搏則為之旋轉故火本動也燭得風自然旋轉如春分至小

壽世保元

日集一卷

三十四

滿而為二之氣分風火相搏則多起飄風俗旋風是也四時皆有之由
五運六氣千變萬化衝蕩擊搏推之無窮安得失時而便謂之無也但
有微甚而已人或乘車躍馬登舟環舞其動不止而左右紆曲經曰曲
直動搖風之用也眩暈而嘔吐者風熱甚故也
諸痛痒瘡瘍皆屬心火
人近火氣者微熱則痒甚則痛痛近則灼而為瘡皆火之用也或痒
痛如針刺刺者猶飛進火星灼之然也痒者美疾也故火旺於夏而萬
物著鮮榮美也炙之以火漬火以湯而痒轉甚者微熱之所使也因而
痒去者熱冷皮膚寬緩腰理開通陽氣得泄熱散而去故也或夏月皮
膚痒而以冷水沃之不主者寒能收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越
佛熱內作故也痒得爬而解者爬為火化微則亦能令痒爬冷皮膚辛
燥而屬金化辛能散故金化見而火力分解矣或云痛為風痒為濕非
謂虛為寒也正謂熱之微甚也或疑瘡瘍皆屬火熱而返腐出膿水者

何也猶較肉菜菜極則腐爛而消為汁水也消而腐爛水之化也蓋所為五行之理過極則勝已者反來制之故火熱過極則反無於水化又如鹽能固物令不腐爛者酸寒水化制其火熱使不過極故得久固也萬物皆然

諸濕腫滿皆屬脾土
地之體也土濕過極則痞塞腫滿物濕亦然故長夏屬土則庶物隆也諸氣腫滿皆屬肺金
肺謂腫滿也肺謂奔迫也痰謂手足痿弱無力以運動也木抵肺主氣氣為陽陽主輕清而升故肺居上部病則其氣腫滿奔迫不能上升至於手足痿弱不能運動由肺金本燥燥之病病血液衰少不能榮養百骸故也經曰目得血而能視掌得血而能握指得血而能攝足得血而能步故秋金旺則霧氣蒙鬱而草木萎落病之象也

諸寒收引皆屬腎水
收斂引急寒之用也故冬寒則拘縮矣
六氣為病 風類

壽世保元

甲集一卷

三五

諸暴強直支痛續戾裏急筋縮皆屬於風厥陰風木乃肝膽之氣也
暴卒也強直堅勁也支痛支持也謂堅固支持筋脈不柔而痛也續縮也戾乖戾也謂筋縮裏急乖戾失常而病也然燥金主於緊斂短縮切風木為病反見燥金之化者由亢則害奉乃制也况風能勝燥而為燥也風病執甚而成筋絏者燥之甚也故甚者皆兼於燥也

熱類

諸病喘噎吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之如鼓壅疽癆瘵疝氣結核吐下霍亂腎腫脹鼻窒衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚或悲笑譫妄衄血汗皆屬於熱少陰君火之熱乃真心小腸之氣也
○喘火氣甚為夏熱衰為冬寒故病寒則氣衰而息微病熱則氣盛而息粗而為喘也

○嘔胃腸熱甚則為嘔火氣炎上之象也

○吐酸者肝木之味也由火盛制金不能平木而肝木自甚故為酸也如飲食熱則易於酸矣或言吐酸為寒者誤也且如酒之味苦而性熱能養心火故飲之則令人色赤氣粗脈洪大而數語澀謔妄歌唱悲笑怒如狂胃味健忘煩渴嘔吐皆熱症也其吐必酸為熱明矣况熱則五味皆厚經曰在地為化化生五味故五味熱食則味皆厚也是以肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛腎熱則口鹹或口淡者胃熱也胃屬土土為萬物之母胃為五臟之本故傷生冷堅硬之物則令人噎膈吞酸猶寒傷皮毛能令陽氣壅滯而為病熱也俗醫妄以為冷主溫和脾胃而復愈者猶傷寒用麻黃桂枝藥發去令汗出而愈也若久吐酸不已則不宜溫之當以寒藥下之後以涼藥調之所以中酸而不宜食油膩之物者蓋因能令氣之壅塞也

○暴注下迫也腸胃熱甚而傳化失常火性疾速故也

○下迫裏急後重也火能燥物能令下焦急迫也
○轉筋熱燥於筋而筋轉也或言轉筋為寒者誤也所謂轉者動也陽動陰靜熱症明矣霍亂吐瀉之人必有轉筋之症大法吐瀉煩渴為熱不渴為寒霍亂轉筋而不渴者未之有也或曰以溫湯漬之則愈以冷水沃之則刺何也蓋溫湯能令腠理開發熱氣消散轉筋即止冷水能令腠理閉塞熱氣鬱塞轉筋不止世俗見溫湯漬之而愈妄疑為寒也
○小便渾濁天氣寒則水清寒天氣熱則水渾濁如清水為湯則自渾濁
○腹脹大鼓之如鼓氣為陽熱甚則氣盛故腹脹滿也
○痲淺而大也經曰熱勝血則為痲痲也
○痲有頭小瘡也
○疹浮小隱疹也
○瘡氣赤瘡丹燥熱勝氣也

壽世保元

甲集一卷

三六

○結核熱氣鬱結堅硬如栗中核也。不必潰膿。但令熱氣散自消也。
○吐下霍亂。三焦為水穀傳化之道。若傳化失司。則吐瀉霍亂
也。或言吐瀉為寒者。誤矣。大法吐瀉煩渴。為熱不渴。為寒。或吐瀉如
得之。亦有不渴者。若止則亡液。而後必渴。或寒不渴。若亡津液。過多則
亦燥而渴也。大抵完穀不化。而色白。吐利腹脹。為微清。小便利。清白不
澁。身涼。不渴。脈沉細。而遲者。寒証也。如小兒病熱。吐利乳未消。而色尚
白。不可便言為寒。當以飲食藥物之色別之。若穀雖不化。而色黃。非白
小便赤黃。吐利煩渴。脈洪大。而數者。熱証也。蓋濁白為寒。餘皆為熱。瀉
白者。肺金之色也。由寒水甚。而制火不能平。金肺金自其故。色白也。瀉
青者。肝木之色也。由火盛。制金不能平。木自其故。色青也。如陽寒
少陰。下利清水。色純青。仲景以大承氣湯下之。為熱明矣。若黃者。脾土
之色也。由火盛。水衰。脾土自旺。故色黃也。瀉紅者。心火之色也。瀉黑者。
腎水之色也。由元則害。承瀉。則火熱過極。反兼水化。制之。故色黑也。下

壽世保元

甲集一卷

二十七

痢色黑者。即死。又如瀉痢。皆屬火熱。其本一也。其標則有五。一。其在
皮膚之分。屬肺金。故出白膿。以其血脈之分。屬心火。故為血痢。以其在
肌肉之分。屬脾土。故出黃膿。以其在筋之分。屬肝木。故其膿色。為赤綠。
至骨屬腎水。故紫黑血也。若以下痢黑者。為寒。然則瀉痢之出。紫黑血
者。亦為冷嗽。又如前痢。本濕熱之相兼也。舉世皆言赤痢為熱。白痢為
寒。者。誤之矣。殊不知陰陽之道。猶猶衡也。一高則必一下。一盛則必
一衰。故陽盛者。陰必衰。陰盛者。陽必衰。自然之理也。豈有陰陽一氣。似
盛於腸胃。而固為赤白之痢乎。夫痢何也。蓋因六月間。世之穀肉果
菜。濕熱大盛。入於腸胃。感於毒氣。於腸胃而化為汚水。腐爛為膿。血而下
赤白也。治痢之法。當以苦寒之藥治之。如青朝錢仲陽。處香連。九以治
小兒之痢。深理。亦香苦溫黃連。苦寒苦能燥。燥能勝濕。熱能散
發。腸胃之毒。得愈。則多矣。今世俗醫。且以苦熱藥。性之藥。以治痢。病
之微者。能令腸胃開通。結滯消散。苟瀉一愈。病之甚者。轉不。則痢疾

轉甚。輕則為小溲不通。水腫之疾。重則為腎亂之病而死矣。深可歎哉。
又如婦人赤白帶下之病。同平痢也。蓋人有十二正經。脈有奇經八脈。
帶脈者。奇經之一也。起於季脇。回身一周。如束帶然。婦人下焦濕熱太
甚。津液湧溢。從帶脈淋漓而下也。舉世皆言白帶為寒者。亦誤矣。凡病
此者。必頭目昏眩。口苦舌乾。咽嗝不利。小便赤澀。大便閉滯。脈實而數。
背熱症也。治帶下之法。亦以辛苦寒藥為主。不可驟用燥熱之藥。以損
人生命也。又如酒盞。而大便滯澀者。亦由濕熱也。或水腫。或發黃。皆濕
熱也。嗚呼。人既有形。不能無病。有生不能無死。然醫者。但當救去治之。
若標本不明。陰陽不審。誤投湯藥。實實虛虛。而死者。是誰之過歟。故曰
世無良醫。枉死者。半詎不誣矣。

壽世保元

甲集一卷

三十一

○鼻窒。謂鼻塞也。傷風寒於腠理。而為鼻者。寒能收斂。陽氣不通。物也。人
側卧。則下竅通利。上竅反塞。者。謂陽之經。左右相交於鼻也。
○衄。鼻出血也。
○血溢。血出於上竅也。
○血泄。血出於下竅也。
○淋。熱客膀胱。小便澀痛也。或曰。小便澀而不通。為熱。遺尿不禁。為冷。豈
知熱甚。客于腎部。至於足厥陰之經。廷孔。結極。其氣液不能直通。故
痿痺。而神無所用。津液滲入膀胱。而為澀也。如傷寒少陰。熱極。則遺尿。
其理明矣。世傳藥方。又有冷淋之說。可矣。也已。及觀其所治之方。選用
榆皮。蘆麥。苦寒之藥。其說雖妄。其方乃是。因不知造化變通之理。且半
認是。而非也。學不明。而欲為醫。難矣哉。
○胸。大便澀滯也。由火盛。制金不能平。木生。風風能勝。濕熱能耗。液

故也

○身熱惡寒邪熱在表而返惡寒也故仲景治傷寒之法以麻黃湯汗之或曰寒在皮膚則熱在骨髓熱在皮膚則寒在骨髓此說非也

○戰慄謂火熱過極逆兼水化制之故戰慄而動搖也傷寒日深大汗將出必先戰慄熱極故也人恐懼而戰慄者恐則傷腎水衰也

○驚心卒動而不寧也

○感疑感而志不一也

○悲謂心血熱盛則凌肺金金不受制故發悲哭也悲哭而涕淚俱出者如火煉金反化為水也是以肝熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出涕猶夏熱太盛則林木流津也

○笑心火熱盛喜志發也或以輕手摸入脇肋胸膈冷瘁而笑者擾亂動撓火之化也

壽世保元

甲集十卷

三五

○妄狂妄也心熱神昏則目有所見也

濕類

○諸經強直積飲痞脹中滿吐下霍亂體重肚腫肉如泥按之不起皆屬於濕太陰濕土乃脾胃之氣也

○痙症也強直謂強項也太陽經中濕則令人項強有汗者曰陰痙無汗者曰陽痙仲景所謂剛痙是也

○積飲謂留飲也

○痞否也謂氣不升降也如否卦陽在上陰在下則天地閉塞矣

○陽阻滯也腸胃濕甚則傳化失常也

○中滿土位中央濕則令人中焦滿也

○吐下霍亂謂腸胃濕飲相殺故也

○眩暈清陽為天濁陰為地濕土為病眩暈宜也

○附腫濕勝於下也

○肉如泥按之不起濕勝於身也

火類

○諸熱發熱暴瀉胃味躁擾狂越罵詈驚駭胸膈痰酸氣逆衝上禁深如夜神守噤嚙瘡瘍瘰癧耳鳴及雙嚙涌溢食不下目昧不明暴注疇瘕暴病暴死皆屬於火少陽相火乃心胞絡二焦之氣也

○瘕瘕也君火化同

○瘕熱令肌肉躁動也

○暴瀉卒啞也心火熱盛上冠肺金不能發聲也

○胃昧昏憤也

○燥擾謂熱感於外手足不寧也

○狂越謂狂越禮法而失常也經曰登高而歌棄衣而走罵詈不避親疏熱極故也

壽世保元

甲集一卷

三十一

○罵詈言之惡也水數一道近而善火數一道遠而惡心火熱極則言也

○驚駭若火化同

○胸膈熱脹於內也

○痰酸酸痰者由火盛制金不能平木故也

○氣逆衝上火氣炎上也

○禁深如夜神守噤戰慄也禁冷也喪神守火極而似水化也

○噤嚙中因痒而氣噴作干聲也

○喉痺熱客上焦而咽溢腫也

○耳鳴熱衝聽戶耳中作聲也

○雙水發火盛氣道閉塞耳不聞聲也微則可治久則難通

○嘔消游食不下胃腸熱盛火氣炎上之象也

○目昧不明五臟熱極則目昏不能視物也

○暴注卒瀉君火化同

○腸澼惕跳而肉動也

暴病暴死火性疾速故也由其平日飲食衣服性情好惡不循其宜而失其常久則氣變與衰而為病也蓋因腎水衰虛心火暴盛本不能制之熱氣怫鬱心神昏則筋不用卒倒而無所知也若熱甚至極則死微則發過如故俗云暗風若氣血鬱結不得宣通鬱極乃發若一側得通利否者溼而癱瘓也

燥類

○諸症枯涸乾勁燥揚皆屬於燥陽明燥金乃肺與大腸之氣也

○澀滯身澀滯不滑澤也

○枯不榮生也

○涸不流通也

○乾不滋潤也

壽世保元

曰集一卷

三一

○動不柔和也

○紋揭皮膚開裂也皆血液病爾

十五 寒類

○諸病上下所出水液澄澈清冷癢癢癩疽疔瘡腹滿急痛下痢清白食已不飢吐利腥穢屈伸不便厥逆禁固皆屬於寒足大陽寒水乃腎與膀胱之氣也上下所出水液澄澈清冷如天氣寒則水自然澄清也

○癢氣聚之積或聚或散無有常處也

○癢血結之塊蓋由女子月水沉滯久而成癢也經曰小腸移熱於大腸為虛癢為沉然則血癢亦有熱者也當以標本明之

○癩疔足厥陰經受寒則陰腫也

○堅痞腹滿急痛如水寒則水堅硬如地也

○下利清白水寒則清淨明白也

○已不飢胃熱能消穀寒則不能消穀雖已而亦不飢也

○吐利腥穢寒水甚而制火不能平金肺金自盛故水腥也

○屈伸不便厥逆禁固謂手足踳蹙而冷也

九則善承 剋制體用說

夫氣清太極曰九則善承物極而得復則曰承剋制也蓋陰陽附藏乎氣以爲和五行偏勝而爲害軒岐法則天地把握陰陽人稟太極全體至理而生成者也故內經所言君火之下陰精承之相火之下水氣承之木氣之下金氣承之水氣之下土氣承之土氣之下木氣承之者謂此也水以承土也承於土之下此乃先天和平之配偶耳經言九則善承剋制者謂其九之爲善必得受承者之子以承其勝而剋之也即子復母譬之義耳原夫木極似金火極似水土極似木金極似火火極似土如風木爲病掉眩甚則肢麻拘攣即動而不能動動極靜也火之太過則燥木金病人則渴汗土極之病肉瞶筋惕慢驚癱瘓之類靜極動也金暴熱則反熱水極則冰凝如石人病則收引痞結時工味知陰陽生

壽世保元

曰集一卷

三一

殺之機不究火九則害陰金症出燥燥燥當辨目之黃赤口之乾渴二便通塞脈之遲數以別是非非庶無誤人之弊設若口燥使赤脈不遲然寒戰之甚急宜清涼爲當時醫見燥燥燥逆惡寒少諸屬深熱亦深之理運投熱藥則如傷寒賦云桂枝下咽陽盛則斃又有陰症似陽者亦有識言寒熱欲飲水但不甚渴使清脈遲俗工認爲陽治賦亦云承氣入胃陰盛乃亡凡爲良醫者須慎理陰見可也所以承氣解毒等湯可治似陰之症理中四逆等湯可治似陽之症庸常昧知亦極之變誤指附子可以治熱病涼藥可以療寒疾殊不知有養理當然而用之也吁附子承氣備爲明醫以救入何難又爲庸醫之殺入仁人君子其九則善承剋制之理豈容不加究此心哉且如雜症木九則善其上也土受水之剋害則不善食木曰曲直曲直作酸故爲屬陰中瀉等症生焉其所承於木之下者肺金也土之子綠肺金土氣氣屬陽陽行健其播敷運化氣之力也肺金大腸職司傳導今夫木之九也則陰

金而害土必當扶土之子金氣之壯則能制其木之過所以法當益金而木愈壯可勝情哉又如火亢則害其肺金金受火灼之極病則惡寒懣懣而發晚熱咳渴直俟夜半之後氣血傳過肺經得微汗方解此係承通制之義也苟不扶水以濟金即元氣日索矣法當培其陰精其水以禦君相二火之暴則惡寒退而潮熱減自汗而涼正氣回也人或以辛甘之劑兼以解散之則津液愈涸而真陰愈竭則虛其虛也餘可類推人身安危之機在於陰陽互藏以為和否則五行更勝制害而生病也故經曰氣之勝者則薄其所以不勝而害其所能勝嗟夫亢之所以為害責在承之不足而起之也確乎論歟致中和以全生者良醫也夫易曰造物不致終窮其久病有待時令遷轉而承通制而自愈矣如傷寒待日期傳過而涼者即承通制而痊也此造物化工之妙耳傳經之醫則從漢書有云不察當中醫可也與其亢則害承通制之說以平

壽世保元

日集一卷

三五

扁鵲論醫病有六不治醫者不論於理一不治也輕身重財二不治也食不能過三不治也陰陽并藏氣不定四不治也形虛不能張五不治也信巫不信醫六不治也雲林子曰越人之論一三四五六是矣二則於子心有未適然者何也輕者彼輕也重者彼重也彼輕而我重之則彼之生可活矣不然彼以二吝而後生固病者之不智予以一吝而不治亦醫者之不仁噫古之神醫如此意猶存則世豈可知矣

本草門

藥論

夫藥者天地間之萬物也昔古神農憫倉生之疾苦格物理之精微其用心可為仁矣故本草藥品雖多然其味不過五乃甘辛酸苦咸也而其性不過六溫涼補瀉升降者也且甘辛溫補升者陽也苦酸涼瀉降者

陰也淡滲泄而屬陽酸性陽而味陰故藥有純陽者有純陰者有陰中之陽有陽中之陰有專用其氣者有獨用其味者大抵味之厚者必補氣之重者必降味淡則瀉性輕則升者治在上在表之病降散治在下在裏之疾諸寒涼者治乎血熱諸溫熱者治乎氣鬱氣虛潤以濡燥澀以收溫又甘為諸補之原苦為諸瀉之本辛香者亦升泄之類酸鹹者皆補降之屬所謂補者性味各有其補而其瀉者亦各有其瀉然補中有瀉而瀉中有補如酸入肝生津以制燥至苦入心滋陰以降火辛能潤肺以退寒酸可堅腎以禦熱如欲去其邪在使復其正瀉湯有以捕陰瀉陰有以補陽降則通其自升升則欲其自降惟病有兼感而法當合用故方有奇偶而藥有君臣製之以散者散也或成之以緩者緩也也用湯者瀉也取氣味蕩洋而無所不至用丸者緩也取氣味緩造而有所及遠湯有往熱瀉則宜生補則宜熟丸有大小病在上者宜小丸服于食後或散末以輕調或食丸以緩化病在下者宜大俱服于食前

壽世保元

甲集一卷

三五

或藥後以食壓或湯藥以頓服吞補劑於發於未語之前服藥當必衣臨臥之際醇氣妙試醇之方溫症利丸散之功丸用甘者鮮諸藥毒取甘以緩脾劑投生藥者行諸藥力取率以開胃故病以脾為土始得以攻病之力用酒者欲其上升用鹽者欲其下行丸和鹽者以緩其毒藥用蠟者以藏其氣水丸求其速化以清利蜜丸取其緩行以滋潤用粉者速其功用陳者遠其毒調脾胃之藥丸宜五合和氣血之劑利同醋酒炒以緩其性泡以制其毒浸能滋陰煉可助陽但製有太過不及之弊必用者相反畏惡之情有礙之於理者有療之以意者又有不藥之術出乎才智之巧如針灸灸對淋瀝之類治六淫外病之藥也

魚鱗等法有真有假其固能去其病似亦可治其疾故世之引媚法神符師巫禳集端學巫固離出誑誘之事亦或能解其病但世迷而或於反致耽誤何其不明理之甚哉問或有出好異之士亦乃君民邪勝之災實無能以治正病反有以起其邪感所以天下之理有常有變常者人事之大義變者異端之虐妄如入之有邪術者妖也而物之有靈異者情也曰神者清陽之所化鬼者陰氣之所成四者雖殊然其變則一也且人身之疾有正有邪正者氣血之本病邪者真測之怪疾如狐媚妖或蛟蠃射影鬼魅中惡傳尸之類也大抵妖不勝正而明足以通神精乃形之靈異穢濁厲之物懼有毒以傷其體故狐媚利佩大厭惡之製也畏乃無形之氣畏清陽之藥懼有聲能破其氣治鬼魅因以焚香擊鼓之法也昔古針能愈鬼而藥可驅鬼邪崇於鬼眼知病厄於官直事白及之文男毀土木之侍女此乃前賢經驗之傳以為後學性治之則也

壽世保元

甲集一卷

三

藥有五法

湯劑煎成清液也補須要熟利不燥生並先較定水數煎餉多寡之不同耳去暴病用之取其易升易散易行經絡故曰湯者盪也○治至高之分加酒煎去濕加生薑煎補元氣加大棗煎散風寒加葱白煎去隔病加蜜煎止痛加醋煎凡諸補湯渣滓兩劑併合加原水數復煎待飲飲之亦敵一劑新藥其發表攻裏二者惟前藥發效不必前渣也從後從急之不同故耳膏劑熬成稠膏也藥分兩雖多水煎宜又渣滓復煎數次絞取濃汁以熬成膏去久病用之取其始蝕力大滋補膠固故曰膏者膠也○可服之膏或水或酒隨煎渣酒者飲之可摩之膏或油或醋隨煎宜搗散患處此蓋畫藥力也散劑研成細末也宜施製久留恐走泄氣味服之無效爾去急病用之不循經絡只去胃中及臟腑之積故曰散者散也氣味厚者白湯調服氣味薄者煎熟和粗服

左劑作成丸粒也治下焦之疾者如梧子大治中焦疾者如桑白大治上焦疾者如糯米大因病不能速去取其舒緩遂旋成功故曰丸者緩也○用水丸者或蒸餅作稀糊丸者取其易化而治上焦也用稠糊丸者或飯糊丸者取其難化能達中焦也或酒或醋丸者取其收散之意犯半夏南星欲去濕痰者以生薑自然汁作稀糊為丸亦取其易化也神龜丸者取其清食山藥糊丸者取其滋煉蜜丸者取其遲化而氣循經絡蠟丸取其難能固護藥之氣味勢力全備直過格而作效也○酒漬藥酒也藥須細剉絹袋盛之入酒罈密封如常法煮熱地埋日久氣烈味濃餐晚頻吞經絡速達或攻或補並者奇功洋瀉山蘇干渴未別瀉方雖稍緩服亦益入為散亦佳切勿傾棄○補虛損症宜少飲緩取致攻風濕症宜多飲速取致丸丸藥用藥每藥末一斤則用藥十二兩文火煎煉去沫去色黃濁水成珠為度再加清水四兩和均如此丸度可膠干經久不壞或用重湯熬煉成珠尤妙

壽世保元

甲集一卷

三

藥性歌括 共四百味

諸藥之性各有奇功溫涼寒熱補瀉宣通君臣佐使運用于衷相反畏惡立見吉凶
人參味甘大補元氣止瀉生津調榮養衛去尸用反藜蘆
黃芪性溫收汗固表托瘡生肌氣虛莫少綿軟如粉若發瘡生用熟白木甘溫健脾強胃止瀉除濕兼祛痰痞或陳土壁土炒
茯苓味甘淡滲濕利氣白化痰涎赤通水道去黑皮中有赤筋要去淨不損入目
甘草甘溫調和諸藥炙則溫中生則瀉火一名國老能解毒毒及牛遂
當歸甘溫生血補心扶虛益損逐瘀生新酒洗淨切片焙乾法
白芍酸寒能收能補瀉痢腹痛虛寒勿與有生用者有酒炒用者
赤芍酸寒能瀉能散破血通經產後勿用宜用生
生地酸寒能清濕熱消煩勞兼消瘀血一名干地黄者酒洗切力
熟地微溫滋陰補血生髓填精為藥用酒洗淨切力

色竹刀切片勿犯鐵器忌蘿蔔葱蒜用姜汁炒除腐爛
來門甘寒鮮湯祛煩補心清肺虛熱自安水浸去心用不令人煩
天門甘寒肺痿肺癰消痰止咳喘熱有功水浸去心皮
黃連味苦瀉心除痞清熱明眸厚腸止痢去積下火童使痰火姜汁伏

火指湯氣瀉火果更肝肺火猪胆實火林檎厚火醋炒
黃芩苦寒枯瀉肺火不清大腸濕熱皆可去皮枯朽或生或酒炒
黃柏苦寒降火滋陰骨蒸濕熱下血堪任去粗皮或生或酒或蜜炙
梔子性寒鮮湯除煩吐衄胃痛火降小便便用酒三焦實火炒其清
連翹寒苦能消滯毒氣聚血凝濕熱堪逐去梗心
石羔大寒能瀉胃火發渴頭疼鮮肌立收或生或煨一名鮮石

滑石沉寒滑能利竅鮮湯除煩濕熱可療勿用研爛以水飛淨
知母味苦熱瀉能除骨蒸有汗痰欬皆治去心毛生用酒炒火酒炒瀉
貝母微寒止咳化痰肺癰肺痿開鬱除煩去心黃白色輕熟者佳
壽世保元 日集一卷 三十一

大黃苦寒實熱積聚痞滿痰潤燥疎通便閉
柴胡味苦能瀉肝火寒熱往來瘧疾均可去其要北者佳
前胡微寒宣嗽化痰寒熱頭疼痞悶能安去其要軟者佳
升麻性寒清胃解毒升提下陷牙痛可逐去須青綠者佳
桔梗味苦察咽痛腫載藥上升開胸利壅去其潔白者佳
紫蘇葉辛風寒發表梗下諸氣消除脹滿藥背向並紫者佳
麻黃味辛鮮表出汗身熱頭痛風寒發散去根節宜陳久止汗用根
葛根味甘傷寒發散溫瘧往來止渴解酒白粉者佳
薄荷味辛最清頭目祛風化痰骨蒸宜服一名多應用蘇麻龍腦者佳
防風甘溫能除頭暈骨節痠疼諸風口噤去其
荆芥味辛能清頭目表汗祛風治瘡消熱一名假蘇用穗
細辛辛溫少陰頭痛利氣通關風濕皆用華陰者佳反藜蘆
羌活微溫祛風除濕身痛頭疼舒筋活絡一名羌青

獨活甘苦頸項難舒兩足濕痺諸風能除一名獨活
白芷辛溫陽明頭痛風熱瘡癤排膿通用一名芳香
藜蘆氣溫除頭暈頂寒濕可祛風邪可昇去其
香附味甘快氣開鬱止痛調經更消宿食即莎草根忌鐵器
烏藥辛溫心腹脹痛小便滑數順氣通用一名旁其一名天台烏
枳實味苦消食除痞破積化痰消積倒壁炒熟色黑皮者佳水浸去
枳殼微溫快氣寬胸胸中氣結脹滿堪噉水浸去殼切片炒
白朮辛溫能去瘡癬益氣調元止嘔和胃去壳取仁
青皮苦寒能攻氣滯削堅平肝安脾下食水浸去殼切片
陳皮甘溫順氣寬胸單白和胃消痰去白湯水單洗刮去穢又名舊紅
蒼朮甘溫健脾燥濕發汗寬中更祛瘴疔米泔浸透蒸去黑皮切片炒
厚朴苦溫消脹泄瀉發氣瀉利其功不緩要厚如紫者佳去粗皮草
南星性熱能治風痰破傷強直風搐自安姜湯泡透切片用或烏末裝

半夏味辛健脾燥濕痰厥頭疼嘔吐堪入一名守田反烏頭瀉水炮洗
藜蘆辛溫能止嘔吐發散風寒霍亂為主或用水或酒或煎藥用
枳實辛溫破氣殺蟲祛痰逐水專除疝重難心者佳
腹皮微溫能下隔氣安胃健脾消腫消去多有雜糞毒用黑豆湯洗淨
香茹味辛傷暑便毒霍亂水腫除煩解熱陳久者佳
扁豆微涼轉筋吐瀉下氣和中酒毒能化微炒
猪苓味淡利水通淋消腫除濕多服損腎則去黑皮切片
澤瀉苦寒消腫止瀉除濕通淋除汗自退去毛
木通性寒小腸熱閉利氣通經最能通瀉去皮切片
車前子寒瀉瀉眼赤小便能通木便能實去壳
地骨皮寒解肌退熱有汗骨蒸強除涼血去骨
木瓜味酸瀉腫脚氣霍亂轉筋足膝無力酒洗
葶藶苦溫腰膝冷痛消痰痰癆風濕皆用去其酒洗

壽世保元 甲集一卷 三十二

牡丹苦寒破血通經血分有熱無汗骨蒸去骨
 支參苦寒清熱根火消腫骨蒸補腎亦可紫黑者佳反紫黃
 沙參味甘消胸排膿補肝益肺去熱除風去芦反紫黃
 丹參味甘破積調經生新去惡祛除帶崩反紫黃
 苦參味苦瘡腫瘡疥下血腸風眉脫赤癩反紫黃
 龍胆苦寒瘡服赤疹下焦濕腫肝經熱煩
 五加皮寒祛風痺痺步履堅筋益精止瀉此皮浸酒輕身延壽得
 防已氣寒風濕脚痛熱積膀胱消癰散腫
 地榆沉寒血熱堪用血刺帶崩金瘡止痛如虛寒水瀉切宜忌之
 扶神補心善鎮驚悸恍惚健忘兼除怒志去皮木
 遠志氣溫能醒驚悸安神鎮心令人多記甘草湯浸一宿去骨燻干
 酸棗味酸飲汗酸煩多眠用生不眠用炒去核取仁
 菖蒲性溫開心利竅去痺除風出至妙去毛一寸九節者佳忌飲酒

壽世保元 日集一卷 三十九

栝子味甘補心益氣飲汗扶陽更癢驚悸去壳取仁即拍實
 益智辛溫安神益氣遺精過夢喘逆皆治去壳取仁研碎
 甘松味香香除惡氣治淋香肌心腹痛已
 小茴性溫能除疝氣腹痛腰疼調中暖胃鹽酒炒
 大茴味辛和氣解氣腫痛膀胱止嘔開胃即懷香子
 乾姜味辛表解風寒炮苦逐冷虛熱尤堪然包水浸火煨切片慢火炒
 附子辛熱性走不守四肢厥冷回陽功有皮黑頂正負一兩一錢者佳
 麩裹火煨去皮腐童便浸透香慢火煨干密封故切片用亦有誤用生者
 川烏大熱搜風入骨濕痺寒疼破積之物頂歪斜製同附子
 木香微溫散滯和胃諸風能調行肝瀉肺形如桔實苦口粘牙者佳
 沉香降氣暖胃追邪通天徹地氣為佳
 丁香辛熱能除寒膈心腹疼痛濕胃可曉雄子者如釘子長唯丁香
 砂仁性溫養胃進食止痛安胎通經破帶去壳取仁

華澄茄辛除脹化食消痰止咳能逐惡氣保嫩甜椒青時摘取若止
 肉桂辛熱善通血脈腹痛虛寒濕補可得去根皮不見火好煎用要
 桂枝小梗橫行手背止汗舒筋治手足痺
 吳茱辛熱能調氣痛腹寒疼酸水能治去根湯泡微炒
 延胡氣溫心腹卒痛通經活血跌撲血崩即文胡索
 蕪荑味甘專除濕痺筋節拘攣肺癰肺痿一名穿穀米去壳取仁
 肉蔻辛溫脾胃虛冷瀉痢不休功可立等一名肉蔻殼包殼切片煎
 草蔻辛溫治寒犯胃作痛吐瀉不食能食建寧有淡紅花內白色子是
 訶子味苦澀陽止利痰嗽喘急降火飲肺又訶梨勒六條黑色者佳火
 草菓味辛消食除脹截瘧逐痰解癰辟瘴去壳取仁
 常山苦寒截瘧除痰解傷寒熱水脹能寬消法切片
 良姜性熱下氣溫中轉筋霍亂酒食能攻結實秋收名紅豆蔻苦熱油
 山查味甘磨消肉食療心催瘡消膨健胃一名糖桂子俗呼山查紅豆
 去殼用

壽世保元 日集一卷 四十

神曲味甘開胃進食破結逐痰調中下氣製法六月六日製法方所用要
 麥芽甘溫能消宿食心腹脹滿行血散毒炒淨勿用風乾區區元
 蘇子味辛破痰降氣止咳定喘更潤心肺
 白芥子辛專化膈痰瘧瘰癧服之能安微炒
 甘遂苦寒破癥消痰面浮壅脹利水能安反甘草
 大戟甘寒消水利便腹脹癥堅其功服後反甘草
 芫花寒苦能消腫利水瀉瀉止痰痰吐反甘草
 商陸辛甘赤白各異赤者消腫白利水氣一名梓柳
 海藻鹹寒消癥散癭除脹破癥利水通閉與海帶其布散結消癥功同
 牽牛苦寒利水消腫壅脹痲痺散滯除癭黑者屬水白者屬金効
 葶藶辛苦利水消腫痰飲癯瘵治喘肺癰濕結暑炒
 藜蘆辛寒專治淋病且能墮胎通經立應
 三稜味苦利血消癥氣滯作痛虛損當忌去毛火煨切片醋炒

五靈味甘血痢腹痛止血用炒行而用生。
 我木溫苦善破癰止痛消痰通經最宜去根火煨切片醋炒。
 乾漆辛溫通經破癰逐積殺虫効如奔馬煎炒令烟盡生則投入傷。
 蒲黃味甘逐瘀止瀉補血須炒破血用生。
 蘇木甘酸能行積血產後月經不調跌打。
 桃仁甘寒能潤大腸通經破癰血痕地骨皮去皮尖研如泥。
 葛黃味辛消癰破血心腹結痛下氣最捷。
 檳榔味苦破血生肌血淋瀝血對結能舒。
 金銀花甘寒癰無對去成則散已成則潰。一名忍冬一名野菊一名忍冬一名野菊
 漏芦性溫祛惡毒補血排膿生肌長肉。一名野蘭
 蒺藜味苦療瘡癩疥白癩頭疥除目明。
 白皮味苦功專收斂腫毒瘡癩外科最善。
 蛇床辛苦下氣溫中惡瘡疥癩逐瘀祛風。

毒世保元

日集一卷

四十一

天麻味辛能散頭眩小兒驚癇拘攣癱瘓。
 白附辛溫治百病血痺風癱中風痰症。
 全蝎味辛却風痰毒口眼喎斜風癱發痛。去毒
 蟬退甘平消風定驚殺痔除熱退弱侵睛。去毒
 姜蚕味酸諸風驚癇濕痰喉痺瘡毒瘰癧。去毒
 蜈蚣味辛蛇虺惡毒殺鬼除邪墮胎逐瘀。百足赤者佳去毒
 木鱉甘寒能追瘡毒乳癰腰形消腫最速。去毒
 蜂房酸苦驚癇瘰癧牙疼腫毒瘰癧腸疔。
 花蛇溫毒癰癩喝斜太風疥癩疔毒種街。兩乳四指手頭帶二十四條花尾上
 蛇退辟惡能除癰膜腸疔蠱毒驚癇搗搗。
 槐花味苦痔漏腸風太腸熱痢更殺蛇虫。
 鼠粘子辛能除瘡毒惡疹風熱咽疹可逐。一名牛旁子一名大力子
 茵陳味苦退疸除黃瀉濕利水清熱為涼。

紅花辛溫最消滲熱多則通經少則養血。
 蔓荊子苦頭疼能醫拘攣濕痺淚眼堪除。微炒研碎
 批荊苦寒能驚癇瀉定喘消痰肺熱久嗽。去隔膜根名青木香散氣
 百合味甘安心定喘止咳消淨癰疽可咳。
 秦艽微寒除濕榮筋肢節風痛下血骨蒸。新好羅漢者佳
 紫苑苦辛痰喘欬逆肺癰吐膿寒熱並濟。去頭
 款花甘溫理肺消痰肺癰喘欬補力除煩。去毒
 金沸草寒消痰止咳明目祛風逐水尤妙。一名旋覆花一名金錢花
 桑皮甘辛止咳定喘瀉肺火邪其攻不淺。風寒新嗽生用厚勞久嗽
 杏仁溫苦風寒喘嗽大腸氣閉便難切要。中仁者泡去皮尖去毒入煎
 烏梅酸溫收斂肺氣止瀉生津能安瀉痢。
 天花粉寒止瀉祛煩排膿消腫善除熱痰。
 瓜蒌仁寒寧嗽化痰傷寒結胸解渴止煩。去毒用仁重煎包磚壓於之

毒世保元

甲集一卷

四十二

密蒙花甘主能明目展翳膏盲服之効速。有洗蒸過晒干
 菊花味甘除熱祛風頭暈眼赤取淚殊功。家園內味苦黃小者良去根
 木賊味甘益肝退翳能止目昏更消積聚。
 决明子甘能祛肝熱日疼收淚仍止鼻血。
 犀角酸寒化毒辟邪解熱止血消腫毒蛇。
 羚羊角寒明目清肝卻驚解神智能安。
 龜甲味甘滋陰補腎逐瘀續筋更醫癩癧。即收龜板
 鱉甲酸平勞嗽骨蒸散瘀消腫去痞除癩。去毒
 海藻味鹹破血除癰通經水腫目翳心疾。
 桑上寄生風濕腰痛安胎止崩瘡瘍亦用。
 火麻味甘下乳催生潤腸通結小水能行。微炒薄擦去壳取仁
 山豆根苦療咽痛腫敷蛇虫傷可救急用。俗名金鎖匙
 益母草甘女科為主產後胎前生新去瘀。一名老葶子

一第1021册 續修四庫全書第 24 版反內

紫草苦寒能通九竅利水消腫痘疹最要
紫葳味酸調經止痛崩中帶下。癩癧通用。一名凌霄花
地膚子寒去勝脫熱皮膚瘙癢除熱甚捷。一名鐵掃帚子
練根性寒能追諸虫疥癩止痛立止積聚立通
樗根味苦瀉痢帶崩腸風痔漏燥濕瀉精去粗皮取白皮切片石炒
澤蘭甘苦。瘧腫能消打撲傷損肢體虛浮
牙皂味辛通關利竅敷腫痛消吐風痰妙。去弦子皮用不蛀者
蕪荑味辛。破積殺虫痔瘻癰疥化食除風。一名殺入白芍佳并草煎水
雷丸味苦。毒殺諸虫癩癧瘰癧治兒有功。一名雷殺入白芍佳并草煎水
胡麻仁甘。疔腫惡毒熱補虛損筋壯力強。一名巨勝黑者佳
蒼耳子苦。疥癬細瘡。風濕癱瘓。瘰癧。一名臭耳實多。少刺
蕤仁味甘。風腫爛弦。熱脹。一名眼決。立痊
青箱子苦。肝臟熱毒。暴發赤障。青盲。可服。

壽世保元

日集一卷

四三

谷精草辛。牙齦風痛。口瘡咽痺。眼翳通用。一名義星草
白薇大寒。療風治瘧。人事不為。鬼邪堪却。
白薇微寒。兒疳驚癇。女陰腫痛。疔疔可咬。
青蒿氣寒。童便熬膏。瘧寒盜汗。除骨蒸勞。
茅根味甘。通閉逐瘀。止血。衄血。客熱可去。
大小蘆苦。消腫破血。吐衄咯唾。崩漏可吸。
枇杷葉苦。偏理肺臟。嘔穢不巳。鮮酒清上。布拭去毛。
木律大寒。口齒聖藥。瘰癧能醫。心煩可卻。一名胡桐淚
射干味苦。逐痰通經。喉痺口臭。瘰癧堪憑。一名烏嬰根
鬼箭羽苦。通經墮胎。殺虫破結。破邪除毒。一名衛茅
夏枯草苦。瘰癧癰疽。破癥散結。源瘰能瘳。冬至後發生。夏至時枯
卷柏味苦。瘰癧血阻。風眩痿痺。更敗鬼疰。
馬鞭甘苦。破血通經。瘰癧痞塊。服之。最靈。

鶴虱味苦殺虫追毒。心腹卒痛。蛇虫堪逐。
白頭翁溫。散積逐血。癰癧瘡疔止痛。百節
旱蓮草甘。生髮黑髮。赤痢堪止。血流可截。
慈菰辛苦。疔腫癰疽。惡瘡癰疹。蛇蝎並施。
榆皮味甘。通水除積。能利關節。痲腫痛疔。取裏面。白皮。切片。煎于
鉤藤微寒。療兒驚癇。手足瘰癧。拍搗。口眼。前額。均的。故曰的藤。
菴花味甘。帶痢兩功。赤治。赤者。白治。白同。
辛夷味辛。鼻塞流涕。香臭不聞。通竅之劑。去心毛。
續隨子辛。惡毒蟲毒。通經消積。不可。過服。一名千金子。一名。取仁。紙包。壓去油。
海桐皮苦。霍亂。冬痢。疝瘕。疥癬。牙疼。亦治。
石楠藤辛。腎衰。脚弱。風濕。癱瘓。為妙藥。一名。名。日。女人。不可。久。服。此
鬼白有毒。辟瘟。除惡。毒。鬼。疰。風。邪。可。却。

壽世保元

日集一卷

四四

大青氣寒。傷寒熱毒。黃汗。黃疸。時疫。每服。
側柏葉苦。吐衄。崩漏。能生。髮。精。除。濕。之。劑。
槐實味苦。陰瘡。濕痒。五痔。腫疼。止。涎。極。毒。即。槐。角。黑。子。也。
瓦楞子酸。婦人。血塊。男子。痰癆。癥瘕。可。瘳。即。甜。子。壳。火。煨。醋。淬。
椴樹子苦。禁洩。泄痢。帶下。崩中。腸風。堪。治。
冬葵子寒。滑。胎。易。產。產。後。利。小。便。善。通。乳。難。即。葵。菜。子。
洗羊霍辛。陰。起。陽。興。堅。筋。益。骨。志。強。力。增。即。仙。靈。膠。俗。呼。三。枝。九。草。
松脂味甘。滋陰。補陽。散風。安。胎。膏。可。貼。瘡。一名。羅。青。
覆盆子甘。腎。損。精。竭。黑。髮。明。眸。補。虛。壯。氣。去。毒。
合歡味甘。利。入。心。志。安。眠。助。胃。快。樂。無。慮。即。交。枝。同。
金櫻子甘。遺。精。滑。泄。禁。止。遺。尿。寸。白。虫。殺。霜。后。紅。熟。去。核。
楮實味甘。壯。筋。明。目。益。氣。補。虛。陰。痿。當。服。
郁李仁酸。破。血。潤。燥。消。腫。利。便。開。格。通。導。積。我。取。仁。湯。泡。去。皮。研。碎。

沒食子苦益血生精染鬚最妙禁刺極靈助無食子
 空青氣寒治眼通靈青目赤腫去暗回明
 蜜陀僧賊止痢醫痔能除白癩諸瘡可治
 伏龍肝溫治疫安胎吐血效逆心煩妙哉取年來色變者佳
 石灰味辛性烈有毒辟虫立死墮胎甚速
 穿山甲毒痔癰瘻瘡吹奶腫痛鬼魅替藏用甲對碎土炒成珠
 蛭蚘氣寒傷寒瘟病太熱狂言投之立應
 蜘蛛氣寒孤疔偏痛蛇蝎咬塗疔腫敷用腹大黑色者佳
 蟾蜍氣涼殺疔蝕癰疽瘰癧能辟毒可祛
 刺蝟皮苦主醫五痔除腫疔痛能開胃氣
 蛤蚧味鹹肺癆咯血傳尸勞疔邪疔可却
 蟻蛄味鹹治十水腫上下疔疔不旋踵
 蝸牛味鹹口眼喎僻驚癇拘攣脫肛咸治

壽世保元

甲集一卷

四三

桑螵蛸鹹淋濁精泄除疝腰疼瘰癧莫缺
 田螺性冷利大小便消腫除熱醒酒立見消酒者熱肉金之
 象牙氣平雜物刺喉能通小便諸瘡可瘳
 水蛭味鹹除積聚堅通經墮產折傷可痊即馬蟻蟻
 貝子味鹹鮮肌散結利水消腫目翳清潔
 蛤蚧肉冷能止消渴酒毒瘰癧除疔頂骨
 海粉味鹹大治頑痰婦人白帶鹹能軟堅似海石火煨研如無以路坊
 石鱗味鹹點目腫翳解蠱脹毒催生落地
 海藻峭酸漏下赤白瘰癧驚氣除腫可神一名馬賊魚骨
 無名異甘金瘡折損去瘀止痛生肌有準
 青象石寒硝散金色墜痰消食神妙真測色者佳
 磁石味鹹專殺鉄毒若候吞針繫線即出
 花蕊石寒善止諸血金瘡血流產後血漫不乾研

代赭石寒下胎胎兒疔癰疔癩疔癩疔癩
 黑鉛味甘止嘔反胃鬼疔癰癧安神定智
 良屑味辛諸語恍惚定志養神鎮心明目
 金屑味甘善安魂魄癩狂驚瀾調和血脉
 狗脊味甘酒蒸入劑腰背膝疼風寒濕痺根類金毛狗脊
 骨碎補溫折傷骨節風血積疹最能破血去毛即胡孫良姜
 茜草味苦蠱毒吐血經帶崩漏損傷虛熱
 預知子貴絳衣漬中遇毒聲作誅蠱殺魚
 王不流行調經催產除風厚滋乳癰瘡咬疔剪金子花取酒毒久帶
 狼毒味辛破積癰癧惡瘡鼠疫殺毒鬼精
 藜芦味辛最能發吐腸泄瀉瀉殺虫消蠱又苦藥細辛人參沙參玄參
 草麻子辛吸出滯物塗頂壯氣益足胎出法見取仁
 草撥味辛溫中下氣痰癖陰疔霍亂瀉痢

壽世保元

日集一卷

四六

百部味甘骨蒸勞瘵殺疔蛇虫久嗽功大
 京墨味辛吐衄下血產後崩漏止血甚捷
 黃荆子苦善治欬逆骨節寒熱能下肺氣又名荆實
 女真實苦黑髮烏鬚強筋壯力去風補虛一名冬青子
 瓜蒂苦寒善能吐痰消身腫脹并治黃疸即此瓜對瓜蒂也一名苦丁
 粟壳性溫潤肺嗽怯弱病如神移入如劫不可用用藥水
 巴豆辛熱除胃寒積破癥消痰大能通利一名江子一名巴豆及生
 夜明砂養能下死胎小兒無辜瘰癧瘰癧一名伏翼一名蠅屎
 斑猫有毒破血通經諸瘡瘰癧水道能行去頭疔足米炒用
 鱗沙性溫濕痺癩疹癰風腸鳴消渴可飲
 胡黃連苦治勞骨蒸小兒疳積盜汗虛驚苦酸下條石出者佳忌猪肉
 史君甘溫消疔消濁瀉痢諸虫總能除却微火燒去壳取仁
 赤石脂溫保固腸胃潰瘍生肌凝精瀉痢形赤者為良火煨研

青黛酸寒能平肝木驚癇疳積除熱毒即散花
阿膠甘溫止欬膿血吐衄胎前產後可吸
白礬味酸化痰鮮毒治症多能難以盡述
五倍苦酸療齒疳疔毒痔瘡腹脹除風熱
玄明粉辛能瀉宿垢化積消痰諸熱可療
通草味甘善治膀胱消渴散腫能醫乳癆
枸杞甘溫添精補髓明目祛風陰興陽起
黃精味甘能安臟腑五勞七傷此藥大補
何首烏甘添精種子黑髮悅顏長生不死
五味酸溫生津止渴久嗽更勞金水枯竭
山菜性溫滋精益髓腎虛耳鳴腰膝痛止
石斛味甘欲驚定胃壯氣補虛倍微冷痺
破故紙溫腰膝酸積興陽固精煑酒炒用

壽世保元

印集一卷

甲七

薯蕷甘溫理脾止瀉益腎補中諸虛何怕
茯苓味甘峻補精氣若動便滑
兔絲甘平夢遺滑精腰膝酸痛添髓壯筋
牛膝味苦除濕痺接腰膝酸疼小便淋瀝
巴戟辛甘大補虛損精滑遺強筋固本
仙茅味辛腰足攣痺虛損勞傷陽道興起
牡蠣微寒滋精止汗崩帶腸痛老痰祛散
絨子味苦勝脫疝氣中濕傷寒利水之劑
草薢甘苦風寒濕痺腰背冷痛添精益氣
寄生甘苦腰痠痛頑麻續筋壯骨風濕尤佳
續斷味辛接骨續筋跌撲損損且固遺精
龍骨味甘夢遺精泄崩帶腸痛驚癇風熱
人之頭髮補陰其捷吐衄血暈風癩驚熱

天靈蓋鹹傳屍勞瘵溫瘧血崩投之立瘥
雀卵氣溫善扶陽痿可致堅強能固閉
鹿茸甘溫益氣滋陰泄精尿血崩帶堪任
鹿角膠溫吐衄虛羸跌撲傷損崩帶安胎
臍胎膠熱補益元陽辟邪瘵癆勞傷
紫河車甘療諸虛損勞瘵瘵滋培根本
椒香味辛升胃進食霍亂腹痛中惡鬼氣
安息香辛辟邪辟惡逐鬼消蠱鬼胎能起
蘇合香甘誅惡殺鬼蠱毒癩瘡癰腫能起
熊胆味苦熱蒸黃疸消積去積消積
硃砂有毒潰癰爛肉除積生肌破癥消毒
硫磺性熱掃除疥癬壯陽逐冷寒邪散毒
龍腦味辛目痛頭痺狂燥妄語真為良藥
蘆薈氣寒殺蟲消積癰腫驚風服之立安
天竺黃甘急慢驚風鎮心解熱散邪有功
射香辛暖善通關節伐鬼安驚解毒甚妙
乳香辛苦療諸惡瘡生肌止痛心腹尤良
沒藥溫平治瘡止痛跌打損傷破血通用
阿魏性溫除穢破結卻鬼殺虫傳尸可滅
水銀性寒治疥殺虫斷絕胎孕催生立通
輕粉性燥外科要藥楊梅諸瘡殺虫可托
靈砂性溫能通血脉殺鬼辟邪安寢定魂

壽世保元

日集一卷

甲八

硃砂味辛療癰腫痛上熱瘵瘵化立中
硫磺性熱掃除疥癬壯陽逐冷寒邪散毒
龍腦味辛目痛頭痺狂燥妄語真為良藥
蘆薈氣寒殺蟲消積癰腫驚風服之立安
天竺黃甘急慢驚風鎮心解熱散邪有功
射香辛暖善通關節伐鬼安驚解毒甚妙
乳香辛苦療諸惡瘡生肌止痛心腹尤良
沒藥溫平治瘡止痛跌打損傷破血通用
阿魏性溫除穢破結卻鬼殺虫傳尸可滅
水銀性寒治疥殺虫斷絕胎孕催生立通
輕粉性燥外科要藥楊梅諸瘡殺虫可托
靈砂性溫能通血脉殺鬼辟邪安寢定魂

玳瑁大毒，風痰可吐，甚瘧除，能消沉痾。一名人言一名信所製，名珠珀。
 雄黃甘辛，辟邪，解毒，更治蛇蝎喉風，瘰癧肉。一名人言一名信所製，名珠珀。
 珍珠氣寒，鎮驚，除癩，開聲，磨積，止渴，墜痰。未鑽者研細，炒。
 牛黃味甘，大治風痰，定鬼，安氣，驚癇，靈丹。
 琥珀味甘，安寢，定驚，破瘀，消積，利水，通淋。一名人言一名信所製，名珠珀。
 血竭味酸，跌撲傷損，惡毒瘡癤，破血，有準。一名人言一名信所製，名珠珀。
 石鍾乳，氣乃慳悍，益氣，固精，明目，延壽。
 陽起石，甘，腎氣之絕，陰痿不起，其功甚捷。一名人言一名信所製，名珠珀。
 桑椹子，甘，鮮，金石，燥，清除熱，湯藥，散結，助消化。
 蒲公草，苦，清堅，消腫，結核，能除食毒，堪用。一名黃花地丁草。
 石韋味苦，通利，膀胱，遺尿，或淋，發背，瘡瘍。
 篇蓄味苦，疥癬，疽痔。小兒枕頭，女人陰，赤筋，用者，原蕪，定風，殺鬼，毒，除血，瘰癧。 即天麻苗也。

詩世保元 日集一卷

雞肉金寒，瀉遺精，潤喉，潤筋，助勇，除煩，熱。
 鰻鱧魚，甘，勞，蒸，殺，濕，熱，消，痰，解，渴，有，功。
 螃蟻，味酸，散血，解結，益氣，養筋，除胸，煩，熱。
 馬肉，味辛，堪，強，腰，脊，自，死，老，死，並，棄，勿，食。好肉少食，宜醇酒，下無酒，殺。
 白蛤肉，平，鮮，諸，藥，毒，能，除，疥，瘡，味，勝，猪肉。人懷平，痢疾，生麻者，禁食。
 兔肉，味辛，補中，益氣，止渴，健脾，孕婦，勿食。秋冬，宜食，春夏，忌食。
 牛肉，屬土，補脾，胃，弱，乳，養，虛，羸，善，滋，血，潤。
 猪肉，味甘，量，食，補，虛，動，風，痰，物，多，食，虛，肥。
 羊肉，味甘，專，補，虛，羸，開，胃，補，腎，不，致，陽，痿。
 雄鷄，味甘，動，風，助，火，補，虛，溫，中，血，滯，亦，可。有風人，井，患，骨，蒸，者，俱，不，宜。
 鴨肉，散，寒，補，虛，勞，怯，消，水，腫，脹，退，驚，癇，熱。
 鯉魚，味甘，消，水，腫，補，下，氣，安，胎，其，功，不，訖。
 鮭魚，味甘，和中，補虛，理胃，進食，賜，游，瀉，痢。

野肉微寒，安心，解煩，能至，痛疾，以動風，溫。
 鱧魚，味甘，益氣，補中，能祛，孤，臭，善，散，濕，風，腫，毒。一名人言一名信所製，名珠珀。
 白鴉肉，其，大，補，臟，腑，最，發，瘡，毒，癩，疾，勿，與。
 犬肉，性溫，益氣，壯陽，炙，食，作，湯，陰，虛，禁，食。不可與，蒜，同，食，頭，損，入。
 熊肉，性冷，涼血，補陰，癯，瘦，勿，食，孕，婦，莫，食。一名人言一名信所製，名珠珀。
 芡實，味甘，能益，精，氣，腰，膝，酸，疼，皆，主，溫，脾。一名人言一名信所製，名珠珀。
 石蓮子，苦，療，禁，口，痢，白，濁，遺，精，清，心，良，劑。
 藕，味甘，寒，解，酒，清，熱，消，風，逐，痰，止，吐，衄，血。
 龍眼，味甘，歸脾，益智，健志，怔忡，聰明，廣，記。
 蓮藕，味甘，益，腎，馬，驢，滋，精，固，髓，悅，顏，補，虛。
 柿子，氣寒，能潤，心，肺，止，渴，化，痰，滋，腸，禁，痢。
 石榴，皮，酸，能，禁，精，補，上，潤，虛，弱，尤，妙。
 陳倉，谷，米，調，和，脾，胃，解，酒，除，煩，能，止，渴，利，便。一名人言一名信所製，名珠珀。

詩世保元 日集一卷

萊菔子，辛，喘，下，氣，消，積，衝，積，滯，消，食。
 芥菜，味辛，除邪，通利，利，利，利，利，利，利。
 梨水，味酸，醋，熱，當，茶，除，煩，消，食，瀉，痢，堪，誇。
 沙糖，味甘，潤肺，和中，多食，損齒，濕，熱，生，虫。
 飴糖，味甘，和脾，潤肺，止渴，消痰，中，滿，休，食。
 麻油，性冷，善，解，諸，毒，百，病，能，除，功，難，悉，述。
 白菓，甘，苦，喘，嗽，白，濁，點，赤，壓，酒，不，可，多，嗜。一名銀杏。
 胡桃，肉，甘，補，腎，黑，髮，多，食，生，痰，動，氣，之，物。
 梨，味甘，酸，解，酒，除，渴，止，嗽，消，痰，善，吸，煩，熱。多食，令人，寒，中，作，浮，在，產，婦。
 椎實，味甘，主，療，五，疔，蠱，毒，三，虫，不，可，多，食。
 竹茹，止嘔，能除，寒，熱，胃，熱，效，驗，不，殊，安，眠。一名人言一名信所製，名珠珀。
 竹葉，味甘，退熱，安眠，化痰，定喘，止渴，消煩。一名人言一名信所製，名珠珀。
 竹瀝，味甘，除虛，痰，火，牙，熱，瀉，煩，効，如，開，鎖。一名人言一名信所製，名珠珀。

非前根甘下氣... 燈草味甘通利小水...

艾葉溫平... 葉口氣寒能解百毒...

川椒辛熱... 胡椒味辛心腹冷痛...

石蜜甘平... 馬齒莧寒... 葱白辛溫...

胡荽味辛... 韭菜味辛... 大蒜辛溫...

食塩味鹹... 醋消腫毒... 烏梅味酸...

淡豆豉寒... 蓮子味甘... 大棗味甘...

人乳味甘... 童便味涼... 生薑性溫...

藥共四百... 乃是良工... 新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林...

新刊醫林狀元壽世保元乙集卷之二

大醫院吏目金發雲林葉廷賢子才編著

男 葉廷國 全校

南雍大學生蓋印周文卿光霽堂鐫

中風

脈微而數中風使然... 者○夾寒則脈帶浮遲...

風者百病之長也... 中血脈中經絡之分焉...

壽世保元

乙集卷之二

着四肢如手足拘急... 中臟者多滯九竅...

用清燥湯之類加竹瀝薑汁中於火者河間所謂非肝木之風內中不
淫之邪外侵良由五志過極火盛水衰熱氣怫鬱昏冒而卒也用木
味地黃丸四君子湯之類內有恙怒傷肝火動上炎者用小柴胡湯之
類中於氣者由七情過極氣厥昏冒或牙關緊急用蘇合香丸或藿香
正氣散之類若誤作風治殺死也食厥者過於飲食胃氣自傷不能運
化故昏冒也用六君子湯加水香之類勞傷者過於勞役耗損元氣脾
胃虛衰不任風寒故昏冒也用補中益氣湯之類傷於房勞者因腎虛
精耗氣不歸元故昏冒也用六味地黃丸之類此皆類中風也蓋肉經
主於風河間主於火東垣主於氣丹溪主於濕而為暴病暴死之症類
中風非真中風也治者審之有卒中昏冒口眼喎斜痰氣上壅咽喉有
聲六脈沉伏此真氣虛而風邪所乘用三生飲一兩加入參一兩煎服
即甦若遺尿手撒口開鼻鼾為不治用前藥亦有得生者是乃行經絡
祛寒痰之藥有斬關奪旗之功每服必用人參兩許以祛其邪而補助

壽世保元

乙集二卷

真氣否則不奏效矣有因虛火與濕痰壅盛口眼喎斜不能言語牙
關緊急昏倒不知人事將病人足大指中間半甲半肉上并人中各重
指一十至體即用奪命通關散搗鼻候有嚏可治無嚏不治如牙際不
開用烏梅肉揉和南星細辛末以中指蘸藥擦牙自開隨以蜜湯調奪
命通關散一匙即吐其痰以通經絡亦上湧意也得嚏氣轉即進攝生
飲或清熱導痰湯之類皆效人事稍醒關節動活且先以理氣為急由
後氣未盡順痰未盡消調理之劑惟當以藿香正氣散加南星木香常
歸防風一二劑後次隨證而調之予觀古人之方多用攻擊之劑施於
北方風土剛勁之人脈或可也用於南方風土柔弱之士恐難當耳予
僭補前人之缺略以備天下之通宜若天地之南北人身之虛實固有
不同其男子婦人木略相似學者宜通變而治之慎毋膠柱以調瑟也
理中湯見中寒十味香膏飲見中寒清燥湯見暑發四君子湯見補益
小柴胡湯見傷寒藿香正氣散見霍亂蘇合香丸見諸氣

中風惡證

口閉者心氣絕遺尿者腎氣絕手撒者脾氣絕鼻鼾者肺氣絕及發直吐
沫睛如直視聲如鼾睡皆不治之症也及筋枯不治舉動則筋痛是無
血以滋養其筋故也面赤如粉面赤黑汗絳如珠不治之症也
○一論中風中氣痰厥不省人事牙關緊急湯水不下宜
奪命通關散

皂角如猪牙者去皮弦一二兩用生白礬一兩以苧布包又
水煎去其苦味同煎化去煎再將藥取出煎乾為末
遠細辛去土藥為

右合勻每遇痰厥或喉閉不省人事者先以少許吹鼻候有嚏可治無
嚏不可治却用蜜湯調服一匙即吐痰不吐再服

○一方用半夏為末用少許吹鼻即效
○一治牙際不開用烏梅肉揉和南星細辛末以中指蘸藥擦牙自開
○一治中風痰厥不省人事者用巴豆去殼搗包搗油在壺上將爵少許
壽世保元 乙集二卷 三

壽世保元

乙集二卷

入帛捲作條入桐油浸透燒烟吹滅黃昇

○一治中風不語或倒地不省人事及左癱右瘓口眼喎斜須以諸藥末
服之先用

真麝香三分為細末加麻油三兩攪勻將病人口輪開灌下通其關
竅即便甦醒

○一論卒中不問中風中寒中暑中濕及痰厥氣厥之類不省人事初作
用此方

攝生飲

南星濕帶煨一分 半夏湯泡一分 木香一分 蒼朮生一分
遠細辛一分 石菖蒲一分 甘草生一分

右剉一劑生薑七片水煎溫服痰盛加全蝎炙一枚仍先用通關散吹
鼻

○一論中風痰涎壅盛不能言語不省人事牙關緊急有火有痰有氣或

面赤身熱手足溫暖脈緊盛宜服此方
清熱通痰湯

黃連 黃芩 瓜蒌仁 枳實 麥炒 桔梗 去蘆
白木 去蘆 白茯苓 去皮 陳皮 去白 半夏 南星
人參 甘草

右剉一剉生薑三片棗一枚水煎熟入竹瀝薑汁同服○一方加防風白附子尤効

○一論中風昏冒不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷暑濕或六脈沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈病屬虛寒者宜服
三生飲

南星 生五錢 川烏 去皮尖 生一錢 大附子 去皮尖 木香 一錢半
右剉一剉生薑十片水煎溫服○氣虛之人虛弱之甚加入參二兩

壽世保元

乙集二卷

四

如氣盛人只用南星五錢木香一錢生薑十四片水煎服名星香散
○一論中風卒然倒仆牙關緊急不省人事非解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉一應熱毒又能消食化氣兼治食積下熱并經喉風卒死心頭猶溫灌下立甦

雄黃解毒丸 方見小兒通治 壯盛之人暫服

○一論中風暗風痰厥氣厥不省人事宜服
牛黃紫金丹

牛黃 三分 朱砂 二錢 阿芙蓉 一錢 沉香 一錢 水片 三分
廣木香 五分 麝香 二分

右為細末入乳為丸四十數陰乾每服一丸梨汁送下如無梨汁薄荷湯研化灌下立甦

○一論初中風邪四肢麻痺骨節疼痛手足癱瘓語言蹇澁宜服此方
烏藥順氣散

烏藥 陳皮 各二錢 麻黃 去節 川芎 白芷
枳殼 去殼 各一錢 僵蠶 炒 乾薑 焙 五分 甘草 炙 三分
右剉一剉薑棗煎服○口眼喎斜加薑炒黃連羌活防風荆芥竹瀝薑汁○左癱右瘓加天麻當歸皮膚燥癢加蟬退薄荷
○一論風中腑者多著四肢手足拘急不仁面加五色惡風寒為在表也宜此方

當歸 川芎 白茯苓 去皮 陳皮 半夏 薑炒
烏藥 香附 白芷 羌活 防風 各八分
麻黃 五分 甘草 細辛 各三分

右剉一剉生薑三片水煎熱服
○一論風中臟者多滯九竅唇緩失音耳聾鼻塞目昏二便閉澀為在裏也宜此方

壽世保元

乙集二卷

五

當歸 生地黃 枳殼 去穢 厚朴 薑炒 檳榔
大黃 火麻仁 杏仁 去皮 各羌活 七分 紅花 三分
右剉一剉水煎空心溫服

○一論中風一切風熱大便閉結小便赤澀頭面生瘡眼目赤痛或熱極生風舌強口噤或鼻生紫赤風刺癢疹而為肺風或成風癩而吐呼為大風或腸風而為痔漏或腸鬱而為諸熱識妄驚狂並皆治之
防風通聖散

防風 當歸 川芎 白芍 連翹
薄荷 麻黃 各四分 石膏 桔梗 黃芩 各八分
白木 梔子 荆芥 各三分 滑石 二錢 大黃
芒硝 各四分 甘草 一錢

右剉一剉生薑煎服○自利去硝黃○自汗去麻黃○解利四時傷寒

兩歲每兩加益元散一兩葱白十根豆豉一撮生薑五片水煎服
○一論風中血脈者外無六經之形症內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言為在中也宜此方
養榮湯

- 當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 生地黃 麥門冬去心
- 遠志甘草湯去心 石菖蒲去毛南星黃製 半夏薑製 陳皮
- 白茯苓去心 枳實炒 烏藥 黃連薑炒 防風
- 羌活 秦艽 甘草

右各等分加竹茹一團生薑三片水煎服
○一治中風痰癱舌塞不語并失音不能言語用此方
轉舌膏

- 連翹一兩 梔子五錢 黃芩酒炒 薄荷一兩 桔梗五錢
- 大黃酒蒸 玄明粉五錢 防風五錢 川芎三錢 遠志甘草湯泡

壽世保元

乙集二卷

六

- 石菖蒲六錢 甘草五錢 犀角三錢 柿霜一兩 牛黃五錢
 - 琥珀一錢 珍珠一錢
- 右為細末煉蜜為丸如彈子大朱砂五錢為衣每丸細嚼薄荷湯送下食後臨臥服

○一治中風失音用韭菜汁灌之或用白殭蠶末酒調服

○一治舌大不能言語

- 青黛二錢 水片三分 硼砂二錢 牛黃三分 南薄荷葉三錢
- 右為細末先以蜜水洗舌上後以薑汁擦之將藥蜜水調稀搽舌上

○一治中風不語痰迷心竅舌不能言

- 南星一兩 防風三錢

右為細末麵糊為丸如梧子大每服五十九薑湯送下

○一治中風卒不得語以薑酒煮白芥子付頸一週以帛包之一日一夕即愈

○一治中風瘖瘳不能言
大黃一兩 芒硝一兩 當歸一兩 甘草五錢
右劉冰煎服瀉下後用四物湯加殭蠶一兩作二服服之
○一治腎氣虛弱舌滑不能言足痿不能行
地黃飲子

- 熟地黃 巴戟去心 石棗酒蒸 肉蓯蓉酒洗
- 酒斛 大附子炮 五味子 白茯苓去皮
- 石菖蒲 遠志甘草湯泡 官桂 麥門冬去心各
- 薄荷少許

右劉生薑棗子水煎溫服

○一論風中經絡則口眼喎斜也宜此方

- 復正湯 防風 荆芥 細辛 黃芩 烏藥

壽世保元

乙集二卷

- 天麻 當歸酒洗 白芍酒炒 川芎 白朮去渣
 - 白茯苓去皮 陳皮去白 半夏泡 枳殼去核 白芷
 - 桔梗 殭蠶 甘草
- 右劉生薑煎服

○一治口眼喎斜及手足頑麻

- 蒼朮米泔炒 陳皮三兩 南星五錢 半夏五錢 白茯苓二兩
 - 防風五錢 羌活六錢 天麻五錢 白殭蠶一兩 大川烏炮六錢
 - 粉草六錢
- 右劉生薑三片水煎臨服入生薑汁三匙溫服

○一治諸風口眼歪斜

- 金刀如聖散 川烏泡二錢 草烏泡二錢 防風二錢 川芎二錢 白芷四錢
- 細辛一錢 蒼朮四錢 天麻五分 白朮五分 麻黃五分

雄黃三分

右為細末每服五分。臨睡溫酒調服。

○一治中風口眼不正。語則重急。四肢如故。無他苦。由居處不使。因臥而孔風入耳。客於陽明之經。故令筋急不調。而口歪僻也。

皂角膏

大皂角五兩。去皮子為末。以三年米醋和成膏。左喎塗右。右喎塗左。乾更塗之。

乾更塗之

○一方用新礬石灰。合以酸醋。炒調如泥。口歪向右。即於左邊塗之。向左。即於右邊塗之。候正。如舊。即須以水洗下。大效。

○一治卒暴中風。口眼喎斜。

天仙膏

天南星

草烏

白芨俱用大者

各一枚 殭蠶七箇

右為細末。薑汁調。如筋塗正。便洗去。

壽世保元

乙集二卷

八

○一治口眼喎斜

正顏丹

白芷

獨活

薄荷

右為細末。蜜丸如彈子。大每服一丸。細嚼茶清下。

○一論癱瘓之症。因虛而痰。火流注為病。當時遇治。為妙。若失之於初。痰火停久。便成癱瘓。便生火。火能傷氣。耗血。而痰猶難治矣。如痰痛。則為實。用疎通關節之藥。而與腦麝少許。為引經。如不痛。則為虛。服此藥。通關節之藥。亦要兼服。補氣血藥。如此攻補兼施。而癱瘓可愈矣。

○一論癱瘓者。坦也。筋脉弛縱。坦然而不舉也。痿者。澁也。血氣散漫。澁然而不用也。或血虛。或氣虛。皆正氣虛不足之症也。

○一論中風。手足軟弱。不能舉動。外症自汗者。虛中風也。若手足強。口眼喎斜。伸縮痛者。實中也。

○一論中風。左癱。左半身不遂。屬血虛。乃痰火流注於左。而為左癱也。右癱。右半身不遂。屬氣虛。乃痰火流注於右。而為右癱也。宜

後方

○一論中風。右癱。右半身不遂。屬氣虛。乃痰火流注於右。而為右癱也。宜後方。

○一論一切中風。左癱右瘓。半身不遂。口眼歪斜。語言蹇澁。呵欠噴嚏。頭目眩暈。筋骨時痛。頭或痛。心中忪忡。痰火熾盛。此乃血氣大虛。脾胃虧損。損有痰有火。有風有濕。此總治諸風之神方也。

上池飲 即愈風潤燥湯。加入參烏藥。

人參 去蘆

白木 去蘆炒

白茯苓 去皮

當歸 酒洗

川芎 一錢

白芍 酒炒

生地黃 酒炒

熟地黃 酒炒

南星 一錢

半夏 薑製

陳皮 去水

羌活 酒洗

防風 六分

天麻 一錢

牛膝 去蘆酒洗

紅花 酒洗

柳桂 六分

寒月 酒炒

黃柏 夏月加二分

酸棗仁 炒八分

烏藥 四分

甘草 炙四分

壽世保元

乙集二卷

九

右到一劑。水煎入竹瀝薑汁。清且時溫服。○言語蹇澁。加石菖蒲。

○一患風痰。人多有痰熱。每湯藥宜加竹瀝。煎瀝薑汁。同服。甚妙。三味和一處溫服亦可。

○一論中風等證。因內傷者。非外來風邪。乃本氣自病也。多因勞役過度。耗散真氣。憂喜忿怒。傷其氣者。而卒倒昏不知人。則為左癱右瘓。口眼喎斜。四肢麻木。舌本強硬。語言不清等證。宜此方。

補中益氣湯

黃芪 蜜水炒

人參 去蘆

白木 去油蘆炒

陳皮 一錢

當歸 酒洗

柴胡 去蘆

升麻 五分

甘草 炙一錢

右到一劑。生薑棗子。水煎。服加酒炒黃柏三分。以滋腎水。瀉陰中之伏火也。紅花三分。而入心養血。

○一論中風。卒倒。因勞傷者。過於勞傷。耗損元氣。脾胃虛弱。不任風寒。故昏冒也。宜本方。

○一左癱右瘓加防風羌活天麻半夏南星木香 一語言蹇澁加石菖蒲竹瀝

○一口服喝斜加薑炒黃連羌活防風荆芥竹瀝薑汁

○一中風痰喘因中氣虛飲食素少忽痰壅氣喘頭搖目劄揚手擲足難以候脈視其面色黃中見青此肝木乘脾土依本方加白茯苓半夏水煎臨熱加薑汁同服

○一中風面自十指俱麻乃氣虛也加大附子製木香羌活防風烏藥麥門冬

○一善飲舌本強硬語言不清此脾虛濕熱加神麩麥芽乾葛澤瀉

○一論中風等證因勞者名曰內風房勞過度則真精蒸騰舌本不柔言不利也精血一虧即水竭而心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛湯貴而熱氣熾鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也或一肢之偏枯或半身而不遂或口眼之喎斜或語言之蹇澁悉宜此方或湯或丸皆可用

壽世保元

乙集二卷

六味地黃丸

懷生地黃 酒拌蒸一日令極黑曬乾八兩

懷山藥 四兩

牡丹皮 去骨三兩

山茱萸 酒蒸去核取肉四兩

白茯苓 去皮三兩

澤瀉 三兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十錢空心鹽湯任下忌三白

○一論中風氣血衰弱痰火上炎虛損之症左癱右瘓中風不語手足臂體疼痛動履不便飲食少進人乳二酒盞壯盛婦人香甜者好甜梨汁

一酒盞傾放銀鏵中或錫器內入湯鍋內頓滾熱有黃沫起用清路為度每日五更後一服能消痰補諸虛生血延壽乃以入補人其効無別

其中風不語半身不遂皆照此方治驗尋常以此乳與地黃丸同服屢獲効

屢獲効

○一論補中益氣湯六味地黃丸一方一治元氣脾胃之虛一治腎水陰之弱若病人素稟虛弱者或患病久不愈者或誤服攻擊之過者又非外中於風者悉宜此二方兼而濟之乃正道平和之劑能收萬全之功也若病者虛寒之甚年過四旬之外者又當以十全大補湯益龍固本丹之類專治左癱右瘓年久不愈大補虛寒之聖藥也

加味十全大補湯

黃芪 燉水

當歸 酒洗

大附子 炮裂去皮

牛膝 酒洗

羌活 獨活

甘草 炙各

人參 去蘆

川芎

沉香

杜仲 酒洗

獨活

甘草 炙各

白朮 炒油蘆

白芍 酒炒

木香 各三分

木瓜

薏苡仁 各五分

白茯苓 去皮

熟地黃 各八分

烏藥

防風 去蘆

肉桂

右剉一剉薑棗煎服

壽世保元

乙集二卷

○一論中風左癱右瘓手足不能動舌強蹇於言與上池飲或地黃飲子兼服神効

健步虎潛丸

黃芪 酒洗

當歸 酒洗

甘枸杞子 酒洗

牛膝 酒洗

知母 酒洗

酸棗仁 炒

羌活 酒洗

大附子 炮裂

右為細末煉蜜和猪脊髓五條和為丸如梧桐子大每服百丸空心鹽湯溫酒任下

人參 一兩

白芍 二兩

五味子 五錢

杜仲 酒洗

麥門冬 去心

沉香 五錢

獨活 酒洗

防風 酒洗

白朮 去蘆

生地黃 酒洗

虎膠骨 酒洗

破故紙 酒洗

遠志 去心

木瓜 一兩

防風 酒洗

白茯苓 去皮

熟地黃 二兩

龜板 酒洗

黃柏 酒洗

石菖蒲 一兩

薏苡仁 炒一兩

一論經驗之方滋補之聖藥專治諸虛百損五勞七傷形谷虛瘦色
衰朽中年陽事不舉精神短少未至五旬鬚髮先白并在癱瘓步履
艱辛脚膝酸痛小腹如氣婦人下元虛冷久無孕育服之神效
斑龍固本丹

人參去蘆 乾山藥 二兩 懷生地黃 二兩 熟地黃 二兩
天門冬 二兩 麥門冬 二兩 山茱萸 二兩 核二兩 甘枸杞子 二兩
兔絲子 酒洗 四兩 五味子 二兩 巴戟心 二兩
肉苁蓉 酒洗 二兩 牛膝 酒洗 去蘆 杜仲 薑炒 二兩 覆盆子 五錢
地骨皮 一兩 澤瀉 一兩 遠志 甘草水炮 白茯苓 去皮 二兩
石菖蒲 一兩 車前子 一兩 老川椒 一兩 栝子仁 二兩
木香 二兩 虎脛骨 二兩 大附子 二兩 麩製 煨 去皮 臍切
右為細末用好酒化五仁斑龍膠為丸如梧桐子大每服百九空心溫
酒送下斑龍膠方見補益服至半月陽事雄壯服至一月顏如童子目

壽世保元

乙集二卷

十一

視千里小便清滑脹至三月白髮再黑久服神氣不衰身輕體健可昇
仙位

一洗癱瘓秘方

蛤蚧 一箇 麻黃 四兩 川烏 二兩 草烏 二兩 透骨草 四兩
川椒 四兩 白花蛇 二錢 防風 四兩 紫花地丁 一兩 大鹽 四兩
艾 一把 槐枝 一條

右用水二桶煎中大缸半埋在地入水溫時坐土洗再用水二桶煎渣
候冷時再入熱水或一日或一夜臨出時用水澆頂心數次再用芥末
稀貼患處紙絹裹熱坑上睡汗出盡為度忌早起飲食就臥內妙

一論仙傳史國公浸酒良方 謹沐

聖恩叨居相職節官弗謹遂染風疾半體偏枯手足拘攣不堪行步宜醫
診治良劑屢投今越十載全無寸効乞歸故里廣訪名醫遂至奉先驛
獲遇異人臣陳病狀蒙授一方臣依方浸酒未服之先非人扶不能起

及飲一升使手能梳頭服二升手足屈伸有力服三升語言舒暢行步
如故服四升肢體通緩百節遂和舉步如飛其效如神言之不及盡述
乞賜頒行天下使其黎庶咸臻壽域謹錄是方隨表拜進以聞

防風 去蘆 秦艽 去蘆 草薺 去蘆 羌活 二兩
牛膝 去蘆 虎脛骨 去蘆 龜甲 九肋者 當歸 三兩
晚蠶沙 炒 二兩 蒼耳子 炒 四兩 甘枸杞子 五兩 油松節 炒 三兩
乾茄根 飯上蒸 加白木 二兩 川杜仲 薑酒炒
一方加白花蛇 酒浸去皮 四兩 其效如神

右細劉用好酒三十五斤將注絹袋盛藥懸浸于內封固過十四日將
罈入鍋懸空煮水煮令罈內液響取出埋入土內三日去火毒每開罈
取酒不可以面對罈口恐藥力冲傷眼目每飲一二鐘毋冷藥力斷絕
忌動風之物凡製此酒不可煮之太過則無効只可盡一炷香為度凡
左癱右瘓口眼喎斜四肢麻痺筋骨疼痛三十六種風二十四般氣無

壽世保元

乙集二卷

十二

不効也

一治偏風手足不遂皮膚不仁
仙靈酒

仙靈脾 一名淫羊藿 一斤切碎以生絹袋盛不滲器中用好酒浸之
厚紙重重封固春夏三四月秋冬五六月後開罈隨量飲之常令醞釀
得大醉合時勿令婦人雞犬見之治一切冷風勞氣補腰膝強心力
未夫絕陽不起女子絕陰無子老人昏聩健忘服之最良

一論男婦小兒諸般風症左癱右瘓半身不遂口眼歪斜腰腿疼痛手
足頑麻語言蹇澀行步艱難遍身瘙癢上攻頭目耳內蟬鳴痰涎不利
皮膚癢痒偏正頭風無問新舊及破傷風角弓反張蛇犬咬傷金刀所
傷出血不止敷貼立效痔瘡腫痛血痛楚難禁服之頓愈

千金不換刀圭散 大府劉水山傳 蒼朮 米泔浸
川烏 草烏 地味並用 各二兩

人參 白茯苓 兩頭尖一錢

甘草 五錢 僵蠶 五分 眞白花蛇 酒浸三日去骨

石斛 五錢 川芎 白芷 細辛

當歸 酒洗 防風 去塵 麻黃 荆芥

全蝎 酒洗 何首烏 酒浸天麻 蘇木 各二錢

右為細末每服三分或五分漸加至六七分臨臥酒調下不飲酒者茶亦可服

○一論治男婦血氣衰敗筋骨寒冷外感風濕傳於經絡手足麻木遍身筋骨腰腿疼痛久則成左癱右瘓口眼喎斜諸中風氣不能步履

仙傳黑虎丹 蒼木 米泔浸二草烏 洗淨去皮 生薑 洗淨研碎 生葱 連葉白

右四味和一二處拌勻燻之春五夏三秋七冬十日每日丁番拌勻候日數足晒乾入後藥

五靈脂 乳香 沒藥 各一錢 穿山甲 炮去灰土

自然銅 火煨五分 右同前藥為末好醋糊為丸如梧子大每服三十九空心熱酒送下

間日服尤妙婦人血海虛冷肚腹疼痛臨臥醋湯下止服二三九不可多服服後不可飲冷水冷物但覺麻木為效孕婦不宜服○一女人

雞爪風十指搖動服之立愈

○一治手足拘攣不伸 牙皂 木香 各等分 右劉水煎丁服立效

○一治中風失音不語偏風口眼喎斜時吐涎水四肢麻痺骨間疼痛癱瘓

稀查草五月五日六月六日九月九日採者取藥洗淨曬乾入瓶

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

層層酒酒與氣蒸之。又驅此九通為末煉蜜為丸如梧子大每服

五七十丸溫酒送下

○一人年近四旬忽發潮熱口乾喜飲冷水求醫治以涼藥投之固執四

五日遍身沉重不能動止四肢強直耳聾語言妄語眼閉不省人事六

脈浮大無力此氣血脾胃虧損之極予以十全大補湯去芍藥地黃加

熟附子一服須臾病者漸醒痰响入減以為服桂附參芪之悞予曰此

藥病交攻不必憂疑又進一服過一時許即能轉身動止次日連進數

劑則諸病次第而消矣此從脈不從症而治之也

○一人因寒濕飲食起居失宜左半身并手足不遂汗出神昏痰涎上壅

醫用參芪大補之劑汗止而神思漸清頗能動履後不守禁左腿自膝

至足腫脹甚大重墜如石痛不能忍其痰甚多肝脾腎脈洪大而數重

按則軟渣朝用補中益氣加黃柏知母麥門五味煎送地黃丸晚用地

黃丸料加黃柏知母數劑諸症悉退但自強禁不能全愈耳

壽世保元 乙集二卷 十五

○一治癱瘓諸風 高中玄閣老曾服奏效

乳香 三錢 沒藥 三錢 棉花子 六錢 白糖 六錢

右為細末黃酒化服出活

○一男子體肥善飲舌本硬強語言不清口眼喎斜痰氣湧盛肢體不遂

余以為脾虛濕熱用六君如萬根山梔神麩而痊

○一人中風痰嗽因中氣虛飲食數少忽痰壅氣喘頭搖目劄揚手腳足

難以候脈視其面色黃中見青此肝木乘脾土用補中益氣湯加白茯苓

各半夏前龍眼加薑汁同服

預防中風

○一論中風者俱有先兆之證凡人如覺大梅指及次指麻木不仁或手

足少力或肌肉蠕動者三年內必有中風之至經曰肌肉蠕動名曰微

風故手大指次指手太陰陽明經風多着此經也當預防之宜朝服六

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

稀查草

味地黃丸或八味丸服竹瀝枳木丸與搜風順氣丸二藥間服久而祛之諸病可除何中風之有是以聖人治未病不治已病

○一論此方專化痰消火順氣除濕祛眩暈療麻木消酒食開鬱結養氣血健脾胃平常可服

竹瀝枳木丸

- 白朮去土炒 蒼朮米泔浸鹽水炒各二兩 枳實麩炒
- 陳皮去白 白茯苓去皮 半夏白礬皂角生薑煎水浸一日煮乾
- 南星製同上 黃連鹽炒 條芩酒炒 當歸酒洗
- 山查去子 白芥子炒 白芍酒炒各 人參五錢
- 木香二錢

右為細末以神麩六兩薑汁下蓋竹瀝一碗煮糊為丸如梧桐子大每服百丸食遠臨卧淡薑湯送下

○一論三十六種風七十二般氣上熱下冷腰脚疼痛四肢無力多睡少

壽世保元

乙集二卷

十六

食日漸羸瘦顏色不亮惡瘡下注口苦無味憎寒毛疎積年癢游氣塊丈夫陽氣斷絕婦人久無胎息久患寒瘧嘔吐瀉利腸胃積熱以致腸間痞悶大便結燥小便赤澀腸風痔瘡肢節頑麻手足癱瘓步履艱辛語言寒澁不問男子婦人小兒皆可服之

搜風順氣丸

- 錦紋大黃酒浸九蒸九曬 火麻仁微炒去 郁李仁泡去皮
 - 枳殼麩炒 乾山藥酒蒸 獨活一兩 山茱萸酒蒸去枝
 - 檳榔二兩 兔絲子水洗淨酒炒二兩 車前子炒二兩
 - 懷牛膝去蘆酒洗二兩
- 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十丸茶酒任下百無所忌早晚各一服覺臍腹微動以半肚肺氣補之久患腸風便血服之除根癱瘓語澁服之平復酒後能進一服宿酒盡消中年以後之人過用厚味酒肉多有痰火且不能遠房事往往致除虛火動動則生風所謂一

水不能勝五火也故以此方疎風降火為主不問年高氣弱雄壯婦人並皆治之孕婦勿服

傷寒

脈陽浮而陰弱謂之傷風邪在太陽經也○風傷衛氣○陽浮衛中風也陰弱榮

脈浮緊而無汗謂之傷寒吐也○傷寒實則衛虛○陽脈緊邪在上佳主欲

脈浮頭項痛腰痛脊強病在太陽

脈長身熱鼻乾目疼不得臥病在陽明

脈弦胸脇痛耳聾往來寒熱病在少陽

脈沉細咽乾腹滿自利病在太陰

脈微緩口燥舌乾而渴病在少陰

脈沉瀝煩滿囊縮病在厥陰

脈陰陽俱盛重感於寒而緊瀉瀉為濕瀉陰陽盛傷寒之狀前病熱未

壽世保元

乙集二卷

十七

脈陽浮而陰弱謂之傷風邪在太陽經也○風傷衛氣○陽浮衛中風也陰弱榮

脈陽洪數陰實大大過濕熱相合變為濕毒洪數實大皆熱而熱相合

脈陽濡弱陰弦緊更遇濕氣變為濕疫

病發熱脈沉細表得太陽名曰瘧病

病太陽關節疼痛而煩脈沉細名曰濕痺

病太陽身熱疼痛脈微弦名曰中風

若發汗已身灼然熱名曰風濕○風濕者風氣濕氣相合也○風濕者風氣濕氣相合也○風濕者風氣濕氣相合也

發黃色者則驚瘧時瘧痰色如灰重則死

脈沉細而疾身涼四肢冷煩燥不欲飲水狂悶名曰陽厥傷寒熱感脈沉

大者生沉小者死○沉沉小者生大者死

脈歌

傷寒傷風何以判 寒脈緊瀉風浮緩

傷風自注寒無汗 陽屬胸臍非胃腹

傷寒惡寒風濕身 陰居胸臍非胃腹

浮長弦細沉微緩 脈症先將表裏著 陰病見陽脈有生

傷寒總論

夫傷寒者乃大病也。生死反掌之間。要識機變而治之也。蓋傷寒發熱。惡寒腰痛脊強。則知病在太陽經也。身熱目痛鼻乾。不得眠。則知病在陽明經也。胸脇痛耳聾。口苦舌乾。往來寒熱。而嘔。則知病在少陽經也。腹滿咽乾。手足自溫。或自利。不渴。或腹瀉。時時則知病在太陰經也。煩滿。囊縮。則知病在厥陰經也。引衣。踏足。惡寒。或舌乾口燥。則知病在少陰經也。潮熱。自汗。語。證。發。渴。不惡寒。惡熱。則知病在陽明經也。設若脈證不明。誤用麻黃。令人汗多。亡陽。誤用承氣。令人大便不禁。誤用葶附。令人失血。發狂。正為寒涼。耗其胃氣。辛熱損其汗液。燥熱助其邪熱。庸醫罔入。莫此為甚。傷寒之邪。實無定體。或入陽經。氣分。則太陽為首。其脈必浮。或入

壽世保元 乙集二卷 一八

手。便得或入陰經。血分。則少陰為先。其脈必沉。重手乃得。浮而有力。無力。是知表之虛實。沉而有力。無力。是知裏之寒熱。中而有力。無力。是知表裏緩急。脈有浮沉虛實。証乃傳變。不當治。治之法。先分表裏。寒熱。陰陽。寒熱。標本。先病為本。次病為標。先以治其本。若此為第一義也。問証以知其外。察脈以知其內。全在活法。二字不可拘于日數。但見太陽症。在直攻太陽。但見少陰症。在直攻少陰。但見真陰。直攻真陰。但見一二症。且便作張主。不必悉具。當何如。此為活法。若同而異者。明之。似此而非者。辨之。在表者汗之。散之。在裏者下之。利之。在上者因而越之。下陷者非而舉之。從乎中者和之。直中陰經者溫補之。若解表不可攻。裏日數雖多。但有表證。而脈浮者。尚宜發散。此事不明。攻之為逆。經云。一逆尚引。再逆命期。若表證解而裏證存者。不可攻表。日數少。但有裏證。而脈沉實者。急當下之。此事不明。禍如反掌。經云。邪熱未除。陰加燥熱。劫新積。久矣。如直中陰經。真寒証。然無熱惡寒。不渴。宜

切忌寒涼。此事不明。殺人甚速。陰症似陽。証者溫之。陽症似陰。証者下之。陽毒者。分輕重。下之。陰毒者。分緩急。溫之。陽狂者。下之。陰厥者。溫之。濕熱發黃者。利之。下之。血證發黃者。清之。下之。發斑者。清之。下之。瀉瀉者。下之。濕之。瀉瀉者。消之。渴之。結胸者。解之。下之。太陽證似少陰者。溫之。少陰證似太陽者。汗之。血者。解之。正之。發喘者。汗之。下之。咳喘者。汗之。解之。正之。傷寒者。大下之。大下之。感冒者。微汗之。微下之。勞力傷寒者。溫之。散之。濕熱病者。微解之。大下之。此經常之太法也。有病一經。而用熱藥。寒藥之不同。如少陰證。用白虎湯。四逆散。之寒藥。若少陰證。有用四逆湯。真武湯。之熱藥。若庸俗狐疑。謂能措手。哉。嗚呼。能察其傷寒之證名。而得其傷寒之方。脈如此。親切。乃為良醫。是知寒藥治少陰。陰乃傳經。裏熱也。熱藥治少陰。乃直中真寒也。辨脈定經。識証用藥。真知其為表邪。而汗之。真知其為裏熱。而下之。真知其為直中陰經。而溫之。如此。而汗。如彼。而下。又如彼。而溫。麻黃承氣。投之不獲。蓋附理中。用

壽世保元 乙集二卷 一九

之。必當病矣。然必分輕重緩急。老少虛實。久病新發。婦人胎產。室女經水。大凡有臨焉。而傷寒者。與男子傷寒。治法不同。若無胎產。治亦相同。婦人室女。經水適來。適斷。寒熱似症。者。即是熱入血室。但當和解。表裏。久病者。過極不解。壞証也。新發者。始病也。若者。血氣衰少者。血氣壯。緩者。病之輕也。急者。病之重也。寒藥熱藥。服藥。京服。中和之。濕而服之。戰汗。分四證。要知邪正。盛衰。類傷寒。四證。照常例。而治之也。學者宜究心焉。

傷寒金口訣

這傷寒。世罕稀。多少庸醫。莫能知。仲景石印。節庵。濟千金。不易傷寒。秘方不同。法更異。四時傷寒。各有例。惟有冬月。正傷寒。不與春夏。秋同。治發表。實表。兩妙方。用在三冬。無別治。其傷寒。真中風。表實。表虛。各自中。表虛。自汗。脈浮。緩。疎。邪實。表有奇功。表實。無汗。脈浮。緊。升陽。發表。汗自熱。背脊。寒。背脊。熱。頭。痛。脊。強。下。服。說。俱。屬。太陽。胸。臍。經。有汗。無汗。須分別。

有汗表虛無汗實脈浮緩胸中別春夏秋另有方通用羌活沖和湯
春溫夏熱秋治瀉隨時加減細辨量病與冬者相似淺深表裏脈中
詳脈有浮脈有沉半浮半沉表裏虛實有力無力求虛或瀉或下細推
尋更有汗吐下三法當施當設莫留停兩感症日傳傳一日太陽少陰
連腎與膀胱脈沉火口乾頭痛是其原二日陽明與太陰沉長之脈脾
胃兼自又痛鼻又乾腹滿自利不能安三日少陽厥陰病肝膽脈息是
沉弦耳聾脇痛癢縮古人不治命由天今有方治補遺 陶節庵泄瀉
方不問陰陽兩感傷通用沖和靈寶飲一服兩解寒濕湯更明表裏多
少病治分先後細推詳表病多裏病微麻黃葛根湯最命表緩裏急
攻重調胃承氣急通之寒中陰經口不乾身發熱自下利脈沉細又
無力回陽救急湯最的都言兩感無治法誰知先後有消息結胸症候
分輕重解六二二方是陽明症不得眠鼻乾口痛是根源柴葛湯此
湯一劑猶如渴急遇甘泉耳能耳脇痛半表裏柴胡解立吐痰腹之麻

壽世保元

乙集二卷

二二

咽又乾桂枝大黃湯可斷太陽發黃頭有汗內陳常歸湯獨無汗自
利是臟寒加味理中湯最端時行病在身太熱六神通解須當小水
不利導赤飲下焦蓄血憑斯訣一切下症並結胸六一順氣分明說身
有熱頭無痛而赤飲水不下咽庸醫誤認爲熱症豈知心火活上炎自
是戴陽多不曉復元湯服得安然身如珠眼似火發狂狂時誤認我病
在三焦無人識三五石骨湯最可發斑之症先欬嘔耳聾足冷定無他
依發汗愈斑爛消斑青黛飲其性勞力感寒痼又其調榮養衛金不換
內傷氣血外感寒其與傷寒一例看身出汗熱又渴如神白虎湯最確
食積症類傷寒發熱不惡寒嘔逆身不痛頭痛休疑談只消加味調中
飲氣自緊盛休變延小水利大便黑桃仁承氣對君說熱邪傳裏當
症血熱自利病安貼吐血衄血另有方生地冬連湯最切陰陽難辨
詳陰極發厥而瀉陽欲起并中脈無力急救回陽返本湯水不吐咽瀉
血症加減犀角地黃湯真中寒真厥症回陽救急湯連進陽壽世保元

洪敷三黃巨勝湯之症原無熱精米不與入相類熱結胸脫休誤下桂
苓飲子真奇絕心下硬痛利清水熱結利症醫莫測又嚴語又作湯吐
熱黃龍湯其餅口禁搖頭名瘧症如聖飲內抽添訣瘧後昏沉百合病
柴胡百合湯越以陽症過汗多頭痛振振病不和清湯肉稠虛大甚
溫經益元湯最和男女勞復除陽瘧道過湯治瘧症神氣症類得寒
禁川芎刺刺湯丸暑中身熱寒中冷浮風虛熱脈之端便閉嘔逆難伸
風加味續命湯保命散空症仔細認休認風症誤入命而衣板床食
驗又手摸胸不識人只因汗熱相凝肺并陽散火致如神脾胃中急
証發昏昏神不至湯與之難不識形如出酒多不舉心火起肺起
經症渴心耳赤湯急取身熱渴不頭或神思昏昏亂語言小水不利太
便黑誤投涼藥黃泉病傳心脾夾血症實歸活血湯最安夾瘧症類
傷寒寒熱昏迷頭又眩涎出口中紅赤喘七情內損傷神出命
亂語言加味導痰湯可增木頭病是火行項腫惡寒熱並煎一劑茶進

壽世保元

乙集二卷

二二

消毒飲痰飲喉癰瘰癧此是先腎千古不絕症宜速治
出汗良法
○一嚴冬傷寒不得汗出宜薑蔥各半斤煎湯一盞傾太盆中用小板一
塊橫加盆上令人坐臥其上蒸之氣以席被圍定露其口鼻外可進
發汗藥
○一病人用大指摺住中指中節緊摺其弦十指俱屈合掌夾在兩太陽
中緊繫夾住坐待良久汗自出
○一用發表藥汗不出將蘇葉煎湯以器盛之置於被內兩膝下烘之
又法用薑湯細製周身擦之其汗即出
○一傷寒連日不出汗昏睡不省身熱語亂此汗不得出也用滾水一大
茶壺布包病人脚下踏之不時汗自下而上其病即愈
○一湯安不得汗出用樟樹白皮搗爛炒熱巾包烙身上不時汗出
即已

○一傷寒發熱頭疼身痛用生薑連翹葛根芍藥等分共搗爛為餅投上常藥散汗自出而已 王景明傳

○一傷寒無汗或日久汗不出者用甜梨一個生薑一塊同搗為汁再入童便一碗重湯煮熱服之即汗

○一傷寒單潮發熱無汗五七日不大便死在須臾以桃仁承氣湯打下硬糞如石二次即出大汗而已後以溫膽湯二劑調理而安

○一治傷寒發熱頭痛亦治感冒
生薑一塊 核桃七箇打碎連壳 葱白七根 茶葉一撮
右水三碗煎熱服被蓋出汗

○一論傷寒昏迷不省人事以羌活獨活煎入鼻內可治無則不愈肺氣上絕也可治者隨用皂莢半夏生白朮共一錢五分為末入豆豉湯服探吐痰去其熱即愈

○一論汗出不止將病人髮按在水盆中足冷干外用炒麥粉皮糯米粉

○一論汗出不止將病人髮按在水盆中足冷干外用炒麥粉皮糯米粉

○一論冬月正傷寒頭疼發熱惡寒項脊強重脈浮緩無汗是足太陽膀胱經表症若頭如斧劈身似火炙者宜此方

○一論冬月正傷寒頭疼發熱惡寒項脊強重脈浮緩無汗是足太陽膀胱經表症若頭如斧劈身似火炙者宜此方

○一論冬月正傷寒頭疼發熱惡寒項脊強重脈浮緩無汗是足太陽膀胱經表症若頭如斧劈身似火炙者宜此方

○一論冬月正傷寒頭疼發熱惡寒項脊強重脈浮緩無汗是足太陽膀胱經表症若頭如斧劈身似火炙者宜此方

○一論冬月正傷寒頭疼發熱惡寒項脊強重脈浮緩無汗是足太陽膀胱經表症若頭如斧劈身似火炙者宜此方

○一論冬月正傷寒頭疼發熱惡寒項脊強重脈浮緩無汗是足太陽膀胱經表症若頭如斧劈身似火炙者宜此方

傷寒諸方
龍骨牡蠣燉為末和勻周身撲之其汗自止

傷寒諸方
龍骨牡蠣燉為末和勻周身撲之其汗自止

傷寒諸方
龍骨牡蠣燉為末和勻周身撲之其汗自止

傷寒諸方
龍骨牡蠣燉為末和勻周身撲之其汗自止

右劉生薑三片棗二枚水煎溫服○汗不止加黃芪蜜水炒○喘加柴胡杏仁○胸中飽悶加枳殼麩炒去穢桔梗

○一論春夏秋非時感冒其寒頭疼發熱惡寒無汗脊強脈浮緩此足太陽膀胱受邪是表症宜發表不與冬時正傷寒同治法此湯非湯之

時發寒者可治也夏可治熱秋可治濕治濕病亦有神也可代麻黃桂枝湯木青龍湯各半湯乃太陽經神藥也

羌活沖和湯 又名神解散
蒼朮一錢 羌活二錢 防風一錢 川芎一錢
細辛三分 黃芩一錢 生地黃一錢 甘草三分 白芷一錢

右劉生薑葱白水煎熱服出汗○胸中飽悶加枳殼去穢桔梗去穢○夏月加石膏知母○有汗去蒼朮加白朮再不止去細辛加黃芪蜜水

如再不止以小柴胡湯加桂枝芍藥一錢名神木湯 不作汗加蘇葉

○一論足陽明胃經身熱鼻乾不眠微惡寒頭暈目眩脈微洪宜解肌

○一論足陽明胃經身熱鼻乾不眠微惡寒頭暈目眩脈微洪宜解肌

○一論足陽明胃經身熱鼻乾不眠微惡寒頭暈目眩脈微洪宜解肌

○一論足陽明胃經身熱鼻乾不眠微惡寒頭暈目眩脈微洪宜解肌

○一論足陽明胃經身熱鼻乾不眠微惡寒頭暈目眩脈微洪宜解肌

○一論足陽明胃經身熱鼻乾不眠微惡寒頭暈目眩脈微洪宜解肌

○一論足陽明胃經身熱鼻乾不眠微惡寒頭暈目眩脈微洪宜解肌

屬陽明經病其正陽明脈病別有治法
柴葛解肌湯

屬陽明經病其正陽明脈病別有治法
柴葛解肌湯

屬陽明經病其正陽明脈病別有治法
柴葛解肌湯

柴胡 葛根 芍藥 羌活

石膏末 白芷 桔梗 甘草

右劉生薑煎服本經無汗惡寒去黃芩加麻黃

○一論足少陽膽經耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脈來弦數屬半表半里宜和解此經膽無出入有三禁不可汗下利小便也

柴胡雙解散 即小柴胡湯是也加茯苓白芍

柴胡 黃芩 半夏 人參 甘草

白茯苓 白芍藥 右劉散薑棗煎服○嘔加陳皮竹茹薑汁○痰多加瓜蒌貝母○口乾加知母石膏○心中飽悶加枳殼桔梗○心下痞滿加枳實黃連肉桂甚錯語心煩不得眠合黃連解毒湯○小便不利木便泄瀉合四苓湯

來熱而利加炒黃連白芍。

○一論凡太陰脾經腹滿而痛咽乾而渴手足溫脈沉而有力此因邪熱從陽經傳入陰經也。

桂枝大黃湯

桂枝 大黃 芍藥 甘草 枳實

柴胡

右劉生薑煎臨服加積柳磨水二匙入藥溫服。

○一論傷寒自受其寒病直中陰經是也初得病無熱無頭疼止有腹痛怕寒厥冷或下利嘔吐不渴脈沉遲無力。

加味理中湯

人參 白朮 乾薑炮 甘草 肉桂

陳皮

右劉生薑三片水煎臨服加木香磨下匙薑湯同服。

壽世保元

乙集二卷

三四

○一論足太陰脾經腹滿身自發黃小便不利大便實發渴或頭汗至頸而還脈來沉重者宜用此方。

茵陳將軍湯

茵陳 大黃 梔子 黃芩 枳實 各一錢

甘草稍三分滑石末二錢厚朴

右劉濇水煎熱服以利為度。○但頭汗出身無汗小便不利渴飲水漿身必發黃。此此藥調下五苓散。

○一論傷寒小水不利小腹滿或下焦發熱或引飲過多或小便短赤而渴脈沉數者以利小便為先惟後上津液與陽明汗多者則以利小便為戒。

通赤散

茯苓 猪苓 澤瀉 桂枝 白朮
甘草 滑石 山梔

右劉散水煎下片燈心二十根入煎三服調服。○中濕身自黃者於茵陳。○水結胸症如木通燈心如小水不利而見頭汗出者乃陽虛也。○如得病起無熱但腹脹煩燥不安積米未與入相宜此藥治之。

○一論傷寒邪熱傳裏大便結實口燥目乾煩燥渴飲水不化手足心熱足斑黃陽厥潮熱自汗胸膈滿硬痛等症可代大小承氣湯。○氣三乙承氣大紫胡大陶。○誠言妄語身熱有汗脈宜洪九大手足厥冷脈沉細而微者死。

柴胡 黃芩 芍藥 枳實 厚朴

大黃 芒硝 甘草

右劉散水煎臨服入鐵香木三匙調服。

○一論身熱渴而有汗不解或經行過渴不解者脈來微洪無渴不可服如神白虎湯。

壽世保元

乙集二卷

三十五

石膏 知母 甘草 糯米 人參

麥門冬 五味子 山梔子 天花粉

右劉生薑下片棗一枚淡竹葉十片同煎服。○心煩加竹茹。○濕濕症熱不退而大便溏者依古方加蒼朮。

○一論陽發發時身黃如塗朱眼珠如火狂叫欲走。○太脈洪數煩渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不離已成壞症。○東晉皆熱欲發其病熱不退又復下之太便秘頻小便不利亦有錯治濕症而以此症者又治汗下後三焦生熱脈洪識語晝夜喘息身時加細狂叫欲死者。

黃連 黃芩 黃柏 梔子 麻黃

石膏 厚朴

右劉生薑煎茶煎服。○一治傷寒發熱身口俱黃如金者小便如澀煎栝瀉汁兩藥不效者。

因陳退黃散

柴胡 升麻 茵陳 龍膽草 木通
滑石 黃連 黃芩 黃柏 梔子
甘草

右劉焯藥煎服。○太便寬加大黃。○目精黃倍龍膽草。○虛弱火加人參。○外用生薑搗爛時時於黃處擦之。其黃自退。

○一論陽毒發斑狂妄口大渴吐衄面赤脈數有力發斑黃大渴太便燥腎上氣喘急者桂枝湯縮者難治。

三黃巨勝湯

石膏 黃連 黃芩 黃柏 甘草
大黃 芒硝 枳實 山梔

右劉焯藥煎服。

○一論兩感傷寒頭疼身熱惡寒舌乾口燥以陽先受病者先以此湯投

之如陰先受病者當以六一脈氣湯投下之如裏先下利者當以

者又當以回陽救急湯

沖和靈寶飲

羌活 防風 生地黄 川芎 細辛
黃芩 柴胡 白芷 乾薑 石膏

右劉焯藥煎服加薄荷十片煎一沸熱服出病即止。○冬月去黃芩

石膏加麻黃。

○一論熱邪傳裏發熱胸膈其人如狂小便不利太便黑小腹滿身目黃

下者為欲愈不必服。

桃仁承氣湯

桃仁 桂枝 大黃 芒硝 柴胡

甘草 青皮 枳實 芍藥 當歸

右劉焯藥煎服入蘇木二錢煎一沸熱服。

○一論熱邪傳裏發熱表虛血熱不散熱氣乘虛出於皮膚而為斑也

如疹子重如綿紋重甚則斑爛皮膚或本屬陽候投熱藥或汗下不當下不下

大便自利腸鳴短氣燥熱不通黑斑主不治凡汗下不解耳聾足冷煩悶欬嘔便是發斑之候。

消斑青黛飲

柴胡 女參 黃連 知母 石膏
生地黄 山梔子 犀角 青黛 人參
甘草

右劉焯藥煎服入醋一匙服。○太便寬夫入參加大黃。

○一論血成流不止者或熱毒入深吐血不止者並治若見其自口鼻

並出血者則為上厥下竭不治之症也。

生地承連湯

生地黄 柴胡 黃連 黃芩 芍藥
甘草 川芎 枳實 山梔子 犀角

右劉焯藥煎服入搗韭汁磨黑一匙調之溫服。

○一論煩燥渴欲飲水水入不下者屬瘀血在上焦則邪熱入裏也。

加減犀角地黃湯

犀角 生地黄 當歸 黃連 苦參
枳殼 桔梗 赤芍 芍藥 牡丹皮
甘草

右劉焯藥煎服入藕汁一匙如無非汁亦可。

○一論有傷寒初起時未盡或熱極及吐血不盡醫不知其症遂用涼藥之劑止住其初血留結於心膈之分故痛積而成血結胸也用加減

乙集一卷

二十七

犀角地黃湯治之

○一論傷寒初起無頭眩無身熱便閉四肢厥冷或過於肘膝或腹
痛吐瀉或口吐白沫或流涎或戰慄面如刀割引衣蹙臥不渴脉滿
遲無力即是寒中除經其寒症不從陽經傳來

回陽救急湯

大附子製 乾薑 人參 肉桂 半夏

五味子 白茯苓 甘草炙 白朮炒 陳皮

右劉蕡藥煎服○無脉者加猪膽汁一匙○嘔吐不止加薑汁○泄瀉
不止加升麻黃芪○嘔吐涎沫或有小腹痛加鹽炒吳茱萸

○一論陰極發熱微渴面赤欲坐臥於泥水井中脉沉無力或脈急而
欲絕者不可服涼藥若誤認為熱症而用涼藥死不可復生矣服藥
而燥不止者宜再服燥自定矣決不可服涼藥也
同陽返本湯

壽世保元

乙集二卷

二二八

大附子炮炙火煨 乾薑炮 人參

肉桂 麥門冬 五味子 陳皮 臘茶

右劉蕡藥煎服入蜜一匙頓服之○無脉加猪膽汁一匙○嘔者
入薑汁炒半夏

○一論傷寒發後昏沉發熱渴而譫語失神及百合發復食復等証
柴胡百合湯

柴胡 人參 黃芩 百合 知母

茯苓 芍藥 龍甲 甘草

右劉蕡藥煎服入生地黃湯一匙溫服

○一論傷寒重感寒濕則成剛柔二症頭面赤項強手足搐頭眩山巖
背張身燥飛同治法
如聖飲

羌活 防風 川芎 白芷 柴胡

芍藥 當歸 烏藥 半夏 黃芩

甘草

右劉散生薑三片水煎臨服入薑汁竹瀝溫服○有汗是柔症加白朮
桂枝○無汗是剛症加麻黃杏仁○口燥咬牙者大便實用大黃利之
○一論汗下後頭眩振振欲倒地及肉瞤筋惕或大汗後虛汗出
不止或下後利不止脉來無力
溫經益元湯

大附子製 人參 白朮去蘆 甘草炙 白芍炒

當歸酒洗 黃芪蜜炒 生地黃 乾薑 肉桂

右劉蕡藥糯米炒水煎溫服

○一論傷寒發後血氣未平勞動助熱復運於經絡因與婦人交接淫慾
而復發不易有病者謂之勞復因交接淫慾而無病人反得病謂之
陰陽易子曾見舌出數寸而死者多矣此症最難治然發後發大熱者

壽世保元

乙集二卷

二二九

沉錯語失神小腹絞痛頭不能舉足不能移眼中生花百節解散氣
沖胸男子則陰腫入腹刺痛婦人則裏急後重引腹內痛此男女勞
復陰陽易也宜服

逍遙湯

人參 知母 竹青 如卵縮服應倍加黃連甘草

滑石 生地黃 莖根 柴胡 犀角

右劉蕡藥煎服入燒裊糯米一錢半調服有汗出熱効汗不出再服
以小水利陰頭腫即愈

○一論傷寒熱症入手摸心循衣摸床譫語昏沉不省人事俗醫不識見
病便為風症而因用風藥誤入多矣殊不知汗熱乘於肺金元氣虛不
能自主持名曰撮空症不使利者可治不利者不可治
升陽散火湯

人參 當歸 黃芩 柴胡 麥門冬去心

芍藥 白朮 白茯苓 甘草
右劉宗素遺傳入全自傳曰：此藥服之，有痰加半夏，大便燥者，加芒硝。○大便燥者，加芒硝。○大便燥者，加芒硝。○大便燥者，加芒硝。

黃芪 人參 桂枝 甘草 熟附子
細辛 羌活 防風 川芎 煨生薑
白芍 炒
右劉宗素一效水煎溫服。○夏月加黃芪，石冬月不必加。

○一論右患心下硬痛，下利純清水，諸醫治之，皆不效。此病，下利，復得為虛，傷寒而便用熱藥，止之，就如此新積火，誤入死，矣殊不如此，因邪熱傳裏，胃中燥屎結實，此利非內寒而利，乃且惡日。

壽世保元 乙集二卷 三十一

飲湯藥而利也，直急下之名曰結熱利，症身有熱者宜用此湯。

黃龍湯 大黃 芒硝 枳實 厚朴 甘草 人參 當歸

右劉宗素遺傳，再加桔梗煎一沸熱服。○年老氣血虛者，去芒硝。○一論右患頭身熱，寒微渴，然汗出身痛，脚酸疼，無力，脈空浮，而無方，虛口不談，因見頭疼，惡寒發熱，喘呼，為正傷寒，而大其汗，所以輕重，而其人者，多矣，殊不知勞力內傷，氣血外感，寒邪，宜溫之劑，則愈，名曰勞力感寒症，宜服。

調榮養胃湯 黃芪 人參 白朮 陳皮 當歸 柴胡 甘草 即補中益氣湯去升麻，加川芎羌活防風。

右劉宗素遺傳，子效，白煎服。○內傷外感者，以補中益氣湯八味，為生從六經所見之症，加減用之。○如見太陽症，頭痛，腰痛，脊強，加羌活，本桂枝。○如陽明，則身熱，自痛，而鼻乾，不得臥，加葛根，倍升麻。○如少陽，則胸脇痛，而耳聾，加黃芩，半夏，川芎，倍柴胡。○如太陰，則腹滿而嘔，乾加枳實，厚朴。○如少陰，口燥，舌乾，而渴，加生甘草，桔梗。○如厥陰，煩滿，囊縮，加川芎。○如變症，發斑，加葛根，玄參，倍升麻。○內傷外感，加半夏，竹瀝，仍入薑汁，傳送。

○一論傷寒，漸變，神昏不語，或睡中獨語，一二句，自赤神，焦將水與之，則嘔，不與，則不思，形如醉人，此邪傳入心經，因心火上而過，筋所以神昏，故名曰越經證，宜用。

瀉心導赤飲 黃連 黃芩 甘草 犀角 麥門冬 滑石 山梔 茯神 知母 人參

壽世保元 乙集二卷 三十一

右劉宗素遺傳，燈心煎服，入生地黃汁二匙。○一論右患傷寒，無頭痛，無惡寒，身微熱，面赤微渴，目無精光，口出無倫語，脈數無力，此汗下太過，下元虛弱，此無根虛火，注上，名曰戴陽症，宜復元湯。

熱附子 甘草 乾薑 人參 五味子 麥門冬 黃連 知母 芍藥

右劉宗素遺傳，初得症，無熱，狂言，煩燥，不妄，精采不與，入相當，不可認，為發狂，而用下藥，死者多矣，不知此因邪熱結膀胱，名曰如狂症，宜用桂枝飲子。

猪苓 澤瀉 桂枝 甘草 黃柏 知母 白朮 山梔 滑石

○一論有患無頭疼無惡寒止發大渴小便利大便黑口出無味語此內傷血滯肝脾之症使久昏迷沉重錯語故名來血如見鬼祟
雷歸活血湯

- 當歸 赤芍 甘草 紅花 桂枝
- 乾薑炒 枳殼炒 柴胡 人參 生地黃
- 桃仁泥

右劉薑一片水煎入酒三匙同服三劑後去枳仁紅花乾薑桂枝加白木茯苓

○一論有患增寒壯熱頭痛皆沈迷悶上氣喘急口出涎沫此因內傷七情以致痰迷心竅神不守舍神出舍空則痰生也名曰來痰如見鬼祟瘧症類傷寒與此同治法
加味導痰湯

- 茯苓 去皮 半夏 湯泡 南星 薑炒 枳實 麥炒 黃芩

壽世保元

乙集二卷

三三二

- 白木 去蘆 陳皮 桔梗 黃連 瓜蒌仁
- 人參 甘草

右劉薑煎服入竹瀝薑汁同服

○一論食積類傷寒頭疼發熱惡寒氣口脈緊盛但身不痛此與傷寒經云飲食自倍腸胃乃傷輕則消化重則吐下宜用
加味調中飲

- 蒼朮 米泔浸 厚朴 薑汁炒 陳皮 白木 去蘆炒 山查 去子
- 神麩炒 枳實 麥炒 草果 黃連 薑炒 甘草
- 乾薑 炮

右劉生薑煎服○腹中痛加桃仁○痛甚大便實熱加大黃下之去其果乾薑右劉散薑煎服入竹瀝薑汁同服
○一論脚氣類傷寒頭疼身熱惡寒支節痛便閉嘔逆脚軟不能轉動但起於脚膝耳禁用補劑及淋洗宜服

加減續命湯

- 防風 芍藥 白朮 川芎 防己
- 桂枝 麻黃 甘草 蒼朮 羌活

右劉薑環燈心煎服○暑中三陽所患必熱脈來數去附子桂枝麻黃加黃芩黃柏柴胡○寒中三陽所患必冷脈來遲加附子○起於風者脈來浮加獨活○元氣虛加入參少許○大便實加大黃

○一論天行大頭病發熱惡寒頭項腫痛脈洪取作瘵火治之其喉痛者亦照此方治之
麥連消毒湯

- 柴胡 甘草 桔梗 川芎
- 荆芥 黃連 防風 羌活 枳殼
- 連翹 射干 白芷 鼠粘子

壽世保元

乙集二卷

三三三

右劉薑生薑煎服加竹瀝薑汁同服○先加大黃利一二次○後依本方去大黃加入參當歸調理

○一論三月前後謂之晚發感冒寒疫頭疼發熱惡寒體痛而渴脈浮緊有力無汗年力壯盛之人用羌活中和湯緩故用此
六神通解散

- 麻黃 甘草 黃芩 石膏 滑石
- 蒼朮 川芎 羌活 細辛

右劉薑葱豆豉煎服出汗中病即止
○一論傷寒虛煩心驚微熱四肢無力體倦者又治六七日別無別症候昏沉不知人事六脈俱微者無脈欲出汗者宜此
安神益志湯

- 柴胡 人參 麥門冬 知母 五味子
- 竹茹 茯苓 遠志 甘草 生地黃 當歸

黃連 苦參 甘草

右劉散毒發煎服。

○一論傷寒頭痛發熱身痛惡寒口乾不思飲食時醫誤投發表文等藥過多發得表虛上氣喘急口乾不食肢體昏沉汗大出以致凶陽等症用此。

加減補中益氣湯方見內傷依本方加柴胡升麻用蜜炒白芍酒炒桂枝酸棗仁炒熟附麻黃根浮小麥倍加黃芪。

○一論傷寒頭痛發熱口乾服藥發表解肌之藥而日晡發熱尤甚或日輕夜重此陰虛火動也宜用。

六味地黃丸方見勞瘵依本方六味作湯藥加酒炒黃柏知母。

○一論傷寒孤感多眠聲啞及唇口生瘡宜用。

槐子 艾各一兩 棗子十五箇

右劉每服五錢水煎溫服。

壽世保元

乙集二卷

三十四

○一論汗吐下後心胸滿悶或頭痛微汗虛切不得眠反覆顛倒心中懊憹乃燥熱拂鬱於內而氣不宣通故也宜服。

枳殼湯

肥梔子 淡豆豉

右水煎溫服。○煩燥者慎燥不得眠也慎燥者鬱悶不舒之貌煩者氣也火入于肺也燥者血也火入於腎也故用梔子以治肺煩豆豉以治腎燥少氣虛滿加甘草。○嘔噦加生薑橘皮。○有宿食而煩燥者加大黃。○下後腹滿而煩加枳實厚朴。○下後身熱而煩加甘草乾薑。○瘧後勞復加枳實。

○一論傷寒已經汗下表裏俱虛津液枯竭心煩發熱氣逆欲吐及諸煩熱並宜服之。

竹葉石膏湯

石膏二錢 半夏一錢 麥門冬去心一分 人參一錢

甘草一錢

右劉下竹葉石膏生薑各五六片粳米百餘粒水煎服熱極發狂倍加知母石膏。

○一論陽毒傷寒藥下雖通結胸不軟痛楚喘促或發狂亂者宜用。

大白頸地龍四條洗淨研爛入生薑自然汁一匙白蜜半匙薄荷汁一匙更入片腦一分或半分研勻徐徐灌令盡良久漸快穩睡一兩飯時久即與揉心下片時再令睡當有汗則愈若服下半時不應須再服一次効。

○一論傷寒自汗大便燥結不通且便於老人并日久不能服藥者又恐硝黃變為別症又有屎已入直腸者以此法最便益。

蜜煎導法方見大便閉。

○一論傷寒陽明自汗反小便利而大便燥硬不可攻者用此。

壽世保元

乙集二卷

三十五

○一論傷寒小便不通先將麝香半夏填患人臍中上用葱白日曬焙燥成餅封於臍上用布帶縛住良久下用皂莢燒爛入除中其水煎通婦人亦用皂莢煎湯厚洗不便處小水亦通。

竹茹溫膽湯

柴胡二錢 竹茹一錢 枳實一錢 黃連一錢
人參五分 麥門冬五分 陳皮一錢 半夏九分 茯苓一錢
香附八分 甘草三分

○一論傷寒經汗下後而熱不退頭疼不清脈數實身尚煩燥渴不止是陰陽交此症甚危其人平素有積熱而或因心事起火也宜用。

加減解毒湯

右劉一劑生薑三片棗二枚水煎溫服。

○一論傷寒經汗下後而熱不退頭疼不清脈數實身尚煩燥渴不止是陰陽交此症甚危其人平素有積熱而或因心事起火也宜用。

黃連二錢 梔子五分 黃芩五分 柴胡二錢 知母二錢
 乾葛一錢 羌活二錢 防風一錢 連翹一錢 人參五分
 當歸一錢 生地黃一錢 甘草一錢

右剉一劑水煎溫服。

○一論傷寒新瘥方起勞動應事或言勞神而惟復發熱者曰勞復
 益氣養神湯

人參一錢 白茯苓七分 當歸 日芍 麥門冬
 知母 梔子各一錢 別胡七分 陳皮五分 升麻三分
 生甘草三分

右剉一劑水煎溫服。

○一論傷寒復身熱大小便赤如血色者。

胡黃連一兩 山梔子二兩 去皮入蜜半兩 拌和炒令微焦 二味搗羅
 為末用豬腸子和丸如梧子大每服用生薑一片烏梅一箇重便

壽世保元

乙集二卷

三十一

人發半日去蓋食後後小便同濕下十九立效。

○一傷寒婦人得病難瘥未滿百日不可與男入交合為陰陽之病必而
 急手足拳欲死丈夫病名為陰易婦人名為陽易連當汗之當瘥滿日
 且不可療宜服此藥。

乾薑四兩為末每服二錢米湯調服服後衣被出汗得解手足伸
 愈。

○一論傷寒汗下後不解或投藥錯誤致患人困重至死或發陽二症不
 明七日以後皆可服或終日昏悶不省人事發熱發渴似有狂言一切
 危急之症宜此服後額上鼻尖有微汗是其應也。

奪命獨參湯

揀參一兩

右切作二劑水煎不拘時服渣再煎服。

○一論傷寒見吐瀉者雖有大熱不可下之蓋胃虛寒則吐瀉大凶

兆急用炮乾薑理中湯加烏梅二箇花椒十粒蓋蛇開酸苦則安却以
 小柴胡湯退熱

理中湯

人參 白朮 去蘆炒乾薑 甘草 炙

右剉薑棗煎服。

○一論陰陽二症結胸神效方此勝胸水氣瀉心三方。

鶴頂丹

白礬一錢 銀硃五分

右同研為末用小便盞置炭火上抄末一錢入盞中溶化急搗丸如
 馮前症每用丸研細茶清調勻溫服或入薑湯少許其心上有
 微聲結者自散不動臟腑不傷真氣無間虛實皆可用之益白礬化痰
 解毒銀硃是木銀煉成能破積故治結胸又治痰人聲嘶神效
 薑煎法

壽世保元

乙集二卷

三十七

治傷寒胸膈不寬一切寒結熱結水結食結痞結血結痰結支結大小
 結胸痞氣結者俱用生薑搗爛如泥去汁取渣炒熱細包漸漸揉心
 胸膈下其滿痛豁然自愈如薑渣冷再入薑汁再炒再煖熱結不用炒
 ○一傷寒結胸有痰有熱有氣滯有咳失聲喘急口渴等症
 解熱下痰湯

蘇子 白芥子 枳實 黃連 黃芩
 黃柏 杏仁 烏梅 石膏 瓜蒌
 桔梗 甘草

右剉生薑三片水煎頓服。

○一傷寒結胸聲啞用白果去殼搗爛加蜜調勻重湯煮熟成塊取出
 無時服濃茶送下立已。

○一傷寒濕瀉方

黃連 生薑 艾葉 苦參

右劉水煎服

○一熱病有膿上下食入猪膽一枚苦酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死即愈。

壽世保元

乙集二卷

三十八

四時感冒

○一論四時傷寒瘟疫頭疼寒熱往來及治內外兩感之症春月得病宜用此方
香蘇散

紫蘇葉二錢香附三錢 陳皮三錢 甘草五分

右劉薑蔥煎熱服○頭痛加川芎白芷細辛○發汗加麻黃杏仁○咳嗽加杏仁桑白皮○疹痘未成加升麻乾葛○痢疾加枳殼黃連○痞疾加檳榔草果○泄瀉加白木茯苓○惡寒潮熱加桂枝麻黃○身疼加羌活烏藥○胸膈飽悶加桔梗枳殼○心下痞加枳實黃連薑炒○

壽世保元

乙集二卷

三十八

有痰加半夏○嘔吐加藿香半夏○脚膝拘攣加木香檳榔羌活木瓜
名檀蘇散○口乾加乾葛○夾食加山查神麩
○一論時令不正瘟疫流行感冒發熱惡寒頭疼身痛咳嗽喘急或欲吐
疹此藥不問陰陽兩感並宜服之
才神湯

川芎 甘草 麻黃 紫蘇 白芷

升麻 陳皮 香附 赤芍 乾葛

右劉每二兩薑蔥煎熱服出汗○潮熱加黃芩麥門冬○咳嗽加桔梗
桑白皮半夏○頭痛加細辛石膏葱白○心膈脹滿加枳實半夏○胸
膈膨悶加枳殼桔梗○飲食不思加砂仁白朮○嘔逆加丁香砂仁○
鼻吻不止加烏梅黃芩○腹痛加酒炒白芍○冷氣痛加官桂○大便
閉加大黃芒硝○痢加枳殼當歸
○一論傷寒頭痛壯熱惡寒及傷風痰涎咳嗽鼻寒聲重四時瘟疫

頭面腫痛刺疾發熱諸般瘡毒及小兒驚風喘嗽痘疹時行一切惡毒並治

人參敗毒散

柴胡 前胡 羌活 獨活 枳殼
桔梗 茯苓 川芎 人參 甘草
右剉一兩生薑薄荷煎服。咳嗽加半夏。熱毒加黃連黃芩黃柏梔子。風熱加荆芥防風名刺防敗毒散。酒毒加乾葛黃連。疥癬加金銀花連翹去入參。
○一論四時傷寒傷風頭痛項強壯熱惡寒身體煩痛咳嗽上雍涕唾稠粘自汗惡風等症宜服。
清風百解散
蒼朮 荆芥 麻黃 白芷 陳皮各一錢
甘草三分

壽世保元

乙集二卷

三十九

右剉一兩生薑煎服。咳嗽加烏梅。升麻葛根湯同服。
○一論傷寒時疫增寒壯熱頭痛發熱惡寒身乾不得眠兼治痰厥不時人多病疫乍暖脫衣及小兒痘疹已發未發疑似之間並治。
升麻葛根湯

升麻 葛根 白芍 甘草
右剉一兩生薑煎服。頭痛加葱白煎服。咳嗽加杏仁桑白皮。上焦熱加黃芩薄荷。無汗加麻黃。因痛加桔梗。發背丹毒加玄參。

○一論傷寒傷風頭疼發熱口乾鼻燥四時瘟疫流行先用發表散。

葛根倍用 西芎 黃芩 甘草
右剉一兩生薑三片葱白三根水煎服。出汗。
○一論傷寒無汗頭疼發熱身痛口乾等症宜服。

發表丸

甘草 麻黃 升麻 葛根各四兩蒼朮二兩
右為細末煉蜜為丸如肥皂子大每服一丸生薑豆湯下如過三百外加黃酒一鍾再加一丸。
○一論傷寒前二日在表法當活可用雙解散連進數服必愈。
雙解散前後二方
防風通聖散方見中風益元散方見中暑此二方合而服之當得汗而解若不解者病已傳變。
○一治傷寒行軍散秘方。
葦豆麻黃各一升雄黃三錢共為末每服一錢重者二錢無根水下走出汗愈。
○一治四時感冒傷寒發汗後經中餘熱未解。
柴胡 前胡 枳殼 桔梗 連翹

壽世保元

乙集二卷

四十

黃芩 赤芍 葛葛 茯苓 半夏
川芎 薄荷 甘草
右剉生薑煎服。煩燥加麥門冬淡竹葉。
○一論傷寒太熱不止煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深者熱內甚及汗吐下後諸藥不能退其熱者用。
黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 梔子
右剉水煎服。

○一治傷寒熱極發狂不認親疎燥熱之極長垣成都高傳用能解下分研末凉水調服立効。
○一論惡風寒流涕涕寒禁噴嚏此即肺氣虛不能實肌理。
補中養氣湯方見內傷依本方加麥門冬五味子。
○一治傷風感冒頭疼發熱。

古石灰、棗豆粉、爛羊花各等分

右為末，每少許吹兩鼻，一二次，効。

○一論傷風寒後，餘毒未散，上攻頭頸，鼻聲重，怒氣上攻，時常有血從腦上落，至口中，或出紅痰，此陽道未利，作梗非血症病也。

防風五分 川芎七分 辛夷五分 甘草生口分 薄荷五分
羌活三分 獨活七分 升麻六分 葛根七分 白芷四分

藥本四分 黃芩八分

右到一劑，生薑三片，水煎服，清陽道以通關節，然後可以表正也。次服

人參養榮湯
熟地黃六分 白芍七分 麥門冬一錢 五味子六分 黃柏酒炒三分
遠志四分 陳皮三分 人參四分 白朮六分 白茯苓四分
歸身酒洗 川芎四分
右到一劑，水煎服。

壽世保元

乙集二卷

四十一

中寒

脈中寒，脈瀉陰陽俱虛，法當無汗，有汗傷命。

○一論中寒卒倒，昏迷不省者，先用熱酒薑汁各半盞灌服，稍醒後進理中湯，方見于後。

○一論真陰症，四肢厥冷，腹痛如錐，急服大附片，薑桂如神。此中寒寒之甚，其急於濟上，二穴，濟下，一穴，濟左右兩穴，每七壯，即効。

○一論四肢渾身冷，極唇青，脈沉細，宜急用葱熨法，并灸灸臍中，與氣海關元，二三十壯。

○一論三陰中寒，一切虛冷，厥逆嘔噦，陰盛陽虛，及陰毒傷寒，四肢厥冷，臍腹刺痛，咽喉痛，嘔吐下利，身背自汗，脈沉細，唇青而黑，諸虛寒等症，宜用。

意法

葱細切 麥麩各三升 鹽二升

右用水和勻，分作一疋，炒令極熱，用重絹包之，乘熱臍上冷處，湯一包，其葱包既冷，再用，水拌濕炒，依前用之，至糜爛不用，別取葱汁，日夜敷之，勿往，如大小便不通，用此亦可以行其勢。

○一論五臟中寒，口噤失音，四肢強直，兼胃脘停痰，冷氣刺痛，又治臍毒下寒，泄利，腹脹大便，或黃或白，或青或黑，或有清液，宜此方。

理中湯

人參 去蘆 白朮 去蘆炒 乾薑炒 甘草 炒各二錢

右到一劑，生薑三片，棗二枚，水煎服。○如寒冷之甚，加大附子，炮裂煨去皮，臍一錢，名附子理中湯。○苦寒加乾薑五分。○腹痛去白朮加附子一錢。

○一論中寒，脈虛而微，細雖燥熱煩渴，可煎理中湯，水中浸冷服之，不可熱服用，寒涼藥服之，決死。

壽世保元

乙集二卷

四十二

○一論中寒，怕寒身涼，四肢厥冷，腹痛吐瀉，無脈者，此寒中陰經也，宜服此方。

回陽救急湯

人參 去蘆 白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 陳皮 半夏 湯泡
乾薑炒 肉桂 大附子 炮去 五味子 甘草 炙

右到生薑煎服。○無脈加豬膽汁一匙。

○一論中寒，外感寒邪，頭疼身痛，內傷生冷，肚腹脹痛，表裏皆中寒邪也，宜此方。

五積散
白芷 陳皮 厚朴 薑炒 桔梗 枳殼 去穢炒
川芎 白芍 酒炒 白茯苓 去皮 蒼朮 米泔浸 當歸 酒洗
半夏 湯泡 各乾薑 官桂 各五分 麻黃 八分 甘草 三分

右到生薑煎服。

○一治陰毒傷寒面青心硬四肢冷
正陽散

大附子 乾薑 甘草 麝香 皂莢引入厥陰
經也
右剉水煎服

瘟疫

脈陽瀉弱陰弦緊更遇濕氣變為瘟疫

溫病汗不出出不至足者死厥逆汗自出脈堅強者生虛軟者死

○一論天行瘟疫傳染患瘟疫之家將出病人衣服於壁上蒸過則一
家不染若親戚鄉里有患瘟疫欲去者問先將清油抹鼻孔任進氣
外又將棉擦於鼻內探取噴嚏三五個則不染○又方以雄黃末塗
孔行動從容位而入易子病微氣出於口者方病微氣出於陰門者相

壽世保元

乙集二卷

四十三

對坐立之間必須識其向背

○一斷瘟疫法令人不相傳染以艾炙病人床四角各十壯勿令人知
秘法也

○一論瘟疫之氣令人不相傳染及傷寒用

屠蘇酒
大黃十五銖 白朮十銖 桔梗十五銖 川椒十五銖
防風六銖 烏頭六銖炒 桂枝十五銖 藜蘆六銖炒
右咬咀碎囊盛以十二月晦日早懸沉井中至泥正且平曉出懸井中

中屠蘇之東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一
無病一家飲一里無恙飲藥酒三朝還置井中若能歲歲飲可代代無
病當家內外非皆悉著藥辟瘟氣也忌豬肉生葱桃李雀肉等物
○一宜避時瘟方用臘月二十四日井花水在平且第一汲水感淨器中

鼻入山多少浸乳香至歲且五更暖令溫從小至天每次以乳香小
塊飲水一二兩下則一年一家不患疫

○一凡入濕病之家常以雞鳴時存心念四海神名三七遍百邪不犯
東海神阿明 西海神巨乘 南海神祝融 北海神禺强
每入病人室存心念三遍勿出口

○一論瘟疫之病皆是大熱之症不可安用熱藥
天靈蓋散傳白者用雄黃為末醋調搽上內外抹之即愈每用重便
或解毒湯大涼藥將天靈蓋散煎服之立効

○一治瘟疫不相傳染方用赤小豆以新布袋盛入井中浸二日舉家各
服一二升
辟穢丹
乳香 蒼朮 細辛 甘松 川芎
降真香

壽世保元

乙集二卷

四十四

右為末熟火炒之疫邪遠避

○一九味羌活湯治瘟疫初感一二日間服之取活而愈其効如神
○一論眾人病一般者天行時疫也其症頭面腫大咽喉不利舌乾口燥
增寒壯熱時氣流傳不問四時瘟疫通用此方

加減散毒散
防風 荆芥 羌活 獨活 前胡
升麻 乾葛 赤芍 桔梗 川芎
白芷 薄荷 牛蒡子 甘草 柴胡

右剉薑蔥煎熱服出活
○一論時毒頭面紅腫咽喉堵塞水藥不下若染有臟腑積熱發為腫毒
瘡癤一切惡毒紅腫而痛宜此方
漏蘆湯
漏蘆三銖 升麻一銖五 玄參一銖 牛蒡子炒一銖

連翹一錢 桔梗一錢 黃芩酒洗五分 大黃酒浸

甘草各一錢 藍葉一錢半如無以青藍五分代之

右剉一劑水煎服。大便實加芒硝一錢。

○一治太頭瘟病額大項腫。

八聖散 大尹詩印洲傳

黃芩 黃連 黃柏 蒲黃各五錢 雄黃

蛇退炒 雞內金炒 白丁香各二錢

右為末每服一錢用藍龍根煎湯送下。

瘴氣

○一論夫嵐瘴源蒸毒之氣其狀血乘上焦病欲來時令人迷悶發燥狂妄亦有不能言者皆由敗血凝滯毒涎聚於脚經所致宜驅瘴湯

壽世保元

乙集二卷

四十一

人參 柴胡 黃芩 半夏 大黃

枳殼 甘草各等分

右剉每服一兩薑棗煎空心服。○啞瘴食後服。

○一論海內縉紳遊宦四方水土不服常用此方若任兩廣尤宜多服理脾却瘴湯

陳皮炒 白朮去蘆炒 茯神去皮 黃芩炒 梔子炒

半夏薑製各 神麴炒八分 山查肉一錢 黃連薑汁炒 前胡各七分

蒼朮米泔浸 鹽水炒八分 甘草五分

右剉生薑煎服不拘時。下日一服或間日一服可免瘴病何也蒼白朮去蘆炒連清熱解毒二陳化痰查理脾百病自却矣更宜戒酒色慎起居。

○一論四時不正之氣寒瘴時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛吐利中身冒風吐瀉中濕身重泄瀉或不伏水土脾胃不和或飲食停滯復

感外寒頭痛增寒或吐逆惡心胸膈痞悶或發寒熱無汗者宜霍亂正氣散主之。方見霍亂。

○一論四時傷寒瘟疫時氣及山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下痢赤白或出遠方不伏水土並治之。

不換金正氣散

蒼朮米泔浸 陳皮 厚朴去皮薑汁 藿香

半夏湯泡 薑汁 甘草

右剉薑棗煎服。

一頭痛加川芎白芷。

一口燥心煩加柴胡乾葛。

一瘧疾加常山檳榔草果。

一咳嗽加桔梗杏仁五味子。

一身體疼痛加麻黃桂枝赤芍。

壽世保元

乙集二卷

四十六

一嘔逆加丁香砂仁。 一氣塊加三棱枳殼檳榔小茴香。

一熱極太便不通加大黃芒硝。 一腹脹加香附枳殼白豆蔻。

一胸膈脹滿加枳實砂仁莪朮。 一兩足浮腫加木瓜大復皮五加皮。

一加入參茯苓草果名入參養胃湯。

一加川芎官桂前胡卷芩腎丸治脾胃肝腎俱虛風入四體筋骨痠痛不仁仍早晨常服炒黑豆淋酒。

○一論傷風傷寒頭目不清如被疫氣所侵之人少覺頭昏腦悶急取此之毒氣隨散永無傳染真仙方也。

救苦散

芎藭藜蘆三。 雄芷皂角四。 玄胡牡丹皮。 朱砂為伴侶。

一照透玄門。 起死回生路。 有人知此術。 永無傷寒苦。

川芎 藿香 藜蘆各三錢 牡丹皮 玄胡索

朱砂水浸 各雄黃水飛 白芷 牙皂各四錢

右為末用一匙兒兒啼水在口中以竹筒吹入兩鼻內噴之出清涕為佳凡猶類受濕者吹之即愈

中暑

惡虛微細弦花進皆為中暑不可汗下但候熱利小便為要

夫暑者乃長夏盛熱之令也人當避熱之亢相安於清涼之宜毋易為灼毋致檢檢其知道者夏以黍稷扶陽順之則祥逆之則殃故三伏灸灸三夏暑蒸騰理開洩其氣不藏孫思邈云長夏宜服五味子人參麥門冬以收耗散之金其氣不足者倍加人參其不善養者坐臥於風涼之處扇不息於寢寐之時或拭以冷布或浴以涼泉則勝理靈矣逆其時令即病曰傷暑矣其藏於肌表之間至秋收斂陽回邪正交爭故寒熱競作病名曰瘧者也其有過食瓜果好飲梅漿冷水天泉會水及受食涼粉生蔬此傷暑於腸胃或為霍亂等症宜於秋病發曰痢疾即寒

壽世保元

乙集二卷

四一

等症此皆人傷於暑者也飢渴于道途及乘虛而冒暑或應氣之兼勝而病曰暑病感之深者曰中暑皆作頭疼昏憒發熱渴寒則身熱而脈大惟傷暑則身熱而脈小又有暑風者神昏身倦拘急類若中風症相似此為極重之候蓋必其人元氣素弱真陰不足感於金消水潤之時則內外兩虛法當清補倍加生脈散綠玕乃陽分陰內表裏不實清暑益氣湯最為精確以香茹飲為引者之藥

○一論暑者天地炎蒸之氣中之多成吐瀉身熱頭痛渴甚則昏迷不知人事如渴是病切不可飲以冷水令臥濕地當以熱湯灌之候其醒醒投之以藥可也盛暑時切戒勞苦淫慾之事諺云六月莫入房勝似灸背身誠是言也虛弱之人尤宜謹言
○一論凡人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發熱或熱熱刺之肌有大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃為天熱外傷肺氣也宜入參白虎湯主之方見前卷

○一論凡人避暑於深堂大厦而得病者名曰中暑其病必頭痛惡寒身熱形拘急肢節痛而煩心肌膈大熱無汗為房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜用辛溫之劑以解表散寒五積散主之方見前卷
○一論傷暑則脈虛而身熱口燥而乾或吐或瀉或背惡寒者蓋暑傷心不受邪則包絡受之包絡相火此火助火則熱感而昏不醒也夫此清心利小便為至
黃連香薷飲

川厚朴 去皮薑汁 白扁豆 微炒五錢 香薷 去土五錢
加黃連薑汁炒名黃連香薷散
右到一劑水煎入酒一分沉冷不拘時服熱則作瀉心煩熱多或吐逆加薑汁炒黃連手足搖擲不省人事加黃連羌活酒小使不利加滑石赤茯苓吐加霍香陳皮少加薑汁嘔加生薑半夏口渴加乾葛天花粉瀉利加白木茯苓○脈虛弱加入參五味麥門多虛

壽世保元

乙集二卷

四一

汗不止加黃芪白朮○心煩燥加梔子薑炒黃連調長砂末服之○胸膈飽悶加枳殼桔梗
○一論傷暑飲冷當風取涼嘔吐不止用
二陳湯合香薷散加生薑烏梅煎服
○一論一切外感風寒暑濕之病內傷飲食生冷之症悉宜此方
二香散

香薷 一錢 二扁豆 炒 厚朴 薑汁炒黃連 薑汁炒薄荷
半夏 薑汁 陳皮 大腹皮 桔梗 去蘆 紫蘇
白茯苓 去皮 蒼朮 米泔洗白芷 各一錢 甘草 二分
右到一劑薑棗煎服
○一論夏月暑中危篤而大便下血者
香薷解毒湯
黃香薷 錢厚朴 薑炒 白扁豆 炒 山梔 炒 黃連 炒

黃柏炒 黃芩炒各二錢

右剉水煎服。

○一論傷暑身熱煩渴引飲小便不利者此胃脘積熱也。益元散 一名天水散 一名六一散

白滑石水飛六兩 粉草微炒一兩

右為細末每服二三錢加蜜少許熱湯冷水任下如欲發汗以葱白豆豉煎湯調下。○或用生蜜和為丸如彈子大每服一丸涼水研化服亦可。

○一論傷暑身熱口乾煩渴心神恍惚小便赤澀大便泄瀉者此脾胃虛而陰陽不分也宜服。

五苓散

猪苓

澤瀉

白朮去蘆

白茯苓去皮肉桂

右剉散白朮煎服。○本方去猪苓名四苓散。○加茵陳名茵陳五苓散。○

黃芩炒

乙集二錄

四十九

加辰砂名辰砂五苓散。○一方加大黃治初痢亦治積聚食黃并酒。○

量入虛實多則三錢少則二錢須煎藥八分熟然後入之。○陽虛加芍藥升麻去肉桂。○狂言亂語加辰砂酸棗仁。○頭疼目眩加川芎羌活。

○咳嗽加五味桔梗。○心氣不足加入參麥門冬。○痰多加半夏陳皮。

○喘急加馬兜鈴桑白皮。○大便不通加大黃芒硝。○氣塊加三稜莪朮。

○心熱加黃連石蓮肉。○身痛拘急加麻黃。○口乾噁水加乾葛葛根。

○服黃酒疸及五疸加茵陳木通滑石。○身熱加梔子烏梅。○伏暑鼻衄加茅根煎調百草霜末。○五心熱加勞加桔梗柴胡。○有痰有熱。

加桑白皮入參前胡。○水腫加甜葶藶木通滑石木香。○吊腎氣加吳茱萸枳殼。

○小腸氣痛加小茴木通。○霍亂轉筋加藿香木瓜。○小便不利加木通滑石車前子。○喘咳心煩不得眠加阿膠炒。○疝氣加小茴香川練子楸榔子桂薑蔥煎入鹽一捻同服。○女子紅汗加梔仁牡丹皮。○嘔吐去桂加半夏生薑。

○一論伏暑作寒熱未解宜五苓散合白虎湯主之。伏熱後或冷水沐浴或吃冷物清氣在脾令且作寒除壯熱渾身酒漸更加桂出汗便解。

○一論傷暑煩渴小便不利大便泄瀉者宜用。香茹散各四苓散名如參湯加木通滑石。○內熱心煩加黃芩黃連山梔調辰砂末虛倍加入參。

○一論伏暑身體倦怠神昏頭重吐利宜服。

十味香薷飲

黃芪蜜炙

厚朴薑炒

木瓜

香薷

扁豆

甘草

○一論長夏濕熱蒸入人感之四肢困倦精神短少懶於動作胸膈痞脹肢節痠痛或氣高而喘身熱而煩心下痞悶小便黃而澀大便溏而或利或渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣未病也其脈中得

清暑養氣湯

乙集二錄

五十

洪緩若濕熱相搏必加以遲遲病雖互換少蓋其脈暑濕今則一也宜清燥之藥治之。

黃芪一錢 蒼朮一錢 升麻一錢 人參 白朮去蘆

陳皮 神麴炒 澤瀉各五分 甘草炙 黃柏酒炒

當歸酒洗 青皮去穢 麥門冬去心乾葛各三分 五味子九粒

右剉一劑水煎服。

○一論發熱惡寒身重疼痛小便澀瀉酒然毛髮手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥脈弦細虛虛裏中腸也。

補中益氣湯方見內傷。依本方加香薷扁豆有熱加黃芩。

○一論外不受寒止是內傷米水冷物腹痛泄瀉或霍亂吐逆者。

理中湯方見中寒加神麴麥芽蒼朮砂仁此專治內傷中消食也。

○一論注夏暑屬陰虛元氣不足也夏初春末頭疼眼花腿酸脚軟食

少體弱五心煩熱口苦舌乾精神因倦無力好睡胸膈不利水泄
脈數無力是名注夏病服
參歸益元湯

人參 去渣
白茯苓 去皮
黃柏 酒炒
當歸 酒洗
麥門冬 去心各一錢
知母 酒炒各七分
甘草 三分
白芍 酒炒
懷熟地黃
陳皮

右劉一劑棗一枚烏梅一箇炒米一撮水煎服○飽悶加砂仁白豆蔻
○惡心加烏梅蓮肉炒米○噦加竹茹○煩燥加辰砂酸棗仁竹茹○
瀉加炒白朮山藥砂仁烏梅法熟地知母黃柏○小水短赤加木通山
栝○胃腕不開不思飲食加厚朴白豆蔻益智仁砂仁蓮肉去熟地黃
黃柏知母○腰痛加杜仲破故紙小茴香○腰酸無力加牛膝杜仲○
皮焦加地骨皮○頭目眩暈加川芎○虛汗加黃芪酸棗白朮○勞瘵
加牡蠣山藥辰砂椿根皮○虛驚煩熱加辰砂酸棗仁竹茹○口苦舌

言廿作元

乙集二卷

五十一

乾加山柘烏梅乾葛

○一論夏月最難調理而途中九甚故附方預知暑濕清熱解煩可免中
暑霍亂泄瀉痢疾等症

驅暑益元湯

人參 二錢
麥門冬 去心
陳皮
白朮 去渣一錢
白茯苓 去皮一錢
香茹 各七分
黃芩 炒三分
五味子 十粒
白芍 酒炒
知母 酒炒

右劉生薑煎服

○一論途中傷暑而作水瀉腹痛煩渴者行人不伏水土夏秋月宜隨身
備此丸以防之

胃苓丸

蒼朮 米泔洗炒
白茯苓 去皮
肉桂 五錢
厚朴 姜汁炒
白朮 去渣土炒
澤瀉 一兩

人參 五錢
黃連 姜汁炒
白芍 炒一兩
甘草 炙五錢
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五六十丸清米湯下
○一論此方清上焦熱潤肺生津止渴
清上梅綠丸

烏梅 不拘多少以濕水
白沙糖 半斤
右為細末入南薄荷葉頭末半斤共搗成膏丸如彈子大每用一丸口
中嚼化行路備之解渴長妙
千里梅花丸 長途備用
枇杷葉 乾葛末 百藥煎 烏梅肉 蠟梅花
甘草 各一兩 俱為末

右用蠟五兩光澤蠟開投蜜一兩和藥末搗二三百下丸如鴉頭實
夏月長途合化一丸津液頓生寒香清腹妙不可言
○一夏末秋初熱氣酷烈不可於中庭脫露身背受風取涼五臟俞穴

言廿作元

乙集二卷

五十二

愈於背或令人扇風或拉露手足此中風之原若染諸疾便服八味丸
能補理肺臟禦邪氣仍忌三白恐泄藥性

○一人感暑發熱胸膈作痛飲湯自汗用發表之藥昏瞶譫語大便不實
吐痰甚多用十全大補一劑預退又用補中益氣加炮薑三劑全愈
○一人夏月入房食冰果腹瀉余用附子理中湯而愈有同想此者不信
別用二陳本連之類而死

○一人雖感暑喜然火四肢常欲沸湯清之而亦吐痰一似實火吐舌宿
食亦出惟食椒薑之物方快余為食入反出乃脾胃虛寒用八味丸及
十全大補加炮薑全愈不月不復

○一傷暑與傷寒俱有發熱若誤作傷寒治之則不可也蓋寒傷陽熱傷
氣傷寒則外惡寒而脈浮緊傷暑則不惡寒而脈虛此為異耳經云脈
感身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑治宜小柴胡湯加知母石膏
或人參白虎湯天久瀉用濕冷大行者木白虎湯若元氣素弱而傷之

重者清苦益氣湯治之

八味丸見補益 補中益氣湯 見內傷 十全大補湯 見補益
附子理中湯 見中寒 六味丸 見補益 小柴胡湯 白虎湯 俱見傷寒

中濕

脈浮而緩濕在表也脈沉而緩濕在裏也或弦而細或緩而濡皆風濕相搏也脈經曰濕家為病一身盡疼發熱而身已似重黃也

濕者因坐臥濕地遠行入水或冒風雨久着汗衣多食生冷濕麵酒後多飲冷水類能致之不自覺耳蓋濕能傷脾脾土一虧百病由是生焉而為喘嗽瀉而為嘔吐滲而為泄瀉溢而為浮腫濕熱則發黃濕熱體則重著濕入關節則一身盡痛濕聚痰涎則昏不知人至於為身熱為鼻塞為直視為鄭聲為虛汗為脚氣為腹中脹臍下堅為小便難木便自利皆其證也治濕之法必以健脾燥濕分利為主經云治濕不利

辛甘平 保元

乙集二卷

五十三

小便非其治也宜蒼朮白朮茯苓猪苓澤瀉車前之類或因濕而生痰故用二陳湯加羌活防風酒去風行濕蓋風能勝濕故也木抵宜微活及利小便使上下分清其濕是治也

○一論中濕而身盡痛者乃風濕相搏邪在表也

除濕羌活湯

羌活 一錢 防風 升麻 柴胡 各一錢 藥本 蒼朮 米泔浸 各二錢

右剉一劑生薑煎服
○一論中濕而腫脹泄瀉者乃濕傷脾邪在裏也

滲濕湯
蒼朮 米泔製 白朮 去蘆 茯苓 各一錢 陳皮 澤瀉 各一錢 厚朴 薑炒 香附 砂仁 枳實 各七分 甘草 三分

右剉一劑薑棗煎服
○一論腎氣虛弱令臥濕地腰背拘急筋掣骨痛當風腦涼過度風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼痛牽引脚重行步艱難并白虎歷節風痛獨活寄生湯

獨活 桑寄生 牛膝 杜仲 秦龜 細辛 桂心 川芎 白芍 茯苓 去皮 人參 當歸 酒洗 熟地黃 防風 羌活 甘草 威靈 丁友用 各二兩 好酒 煨 日飯 三五次 良驗

右剉薑棗煎空心溫服○外用金鳳花柏子仁朴硝木瓜前湯洗浴每日洗三次

○一論寒濕客於經絡腰脚酸痛渾身麻木五積散去之方見中寒
○一論脾胃受濕身重倦怠好臥治脊痛項強似拆頂似拔上冲頭痛及足太陽經不行

辛甘平 保元

乙集二卷

五十四

羌活勝濕湯

羌活 獨活 各一錢 藥本 川芎 二分 甘草 五分 防已 一錢 外加黃芪錢白朮一錢

右剉一劑生薑煎服○如身重腰沉沉然經中有濕熱也加黃柏一錢大附子五分蒼朮二錢

○一論中濕遍身疼痛不能轉側及皮肉痛難忍者
經驗白朮酒 白朮 去蘆 油土炒 一兩

右剉作一劑好酒煎溫服

○一論濕氣作痛或腫或脹或黃或瀉
蒼朮膏 蒼朮 米泔浸 搽去黑皮 切片 曬乾 不拘多少

右用水熬成膏，白湯調服。如暴發紅腫痛甚者，以臘糖敷之。
○一論筋骨疼，或濕熱流注，腰下作痛。
二妙湯

川黃柏、薑酒炒五錢、蒼朮、米泔浸炒一兩
右為末，每用一匙，沸湯入薑汁調食，前服痛甚者，加葱三根，水煎空心服。

○一論中濕遍身骨節疼痛，除濕膏

廣膠三兩、生薑半斤搗汁、乳香、沒藥、取末各一錢半
右入銅杓內，火上熬化，移在滾湯內，以蒜搗碎，入花椒末少許，再攪勻，攤厚帛或絹上貼患處，用鞋底烘熱熨之。

○一夏月患濕不能行走，指屈者，九月間收茄根，懸葦箔下煎湯洗之。
○一凡空屋久閉者，不宜輒入，欲入先以香物及蒼朮之類焚之，俟煙氣發散後，方可入，不然感之成病，不閉并害，尤宜慎之。

○一凡濕氣流注之病，痛不可忍，用金銀花帶葉和酒攪研爛，用淨瓦礫放火中烘熱，敷患處立已。

○膏藥方
生薑帶皮取汁一碗，葱汁一碗，葱連青帶葉用，加牛膠半斤，慢火熬成膏，入麝一錢，在內用布帛攤膏藥，貼痛處，取出濕水，如疔虫即愈。

火證

浮而洪數為虛火，沉而實大為實火。虛火見於左寸為心火，見於右寸為肺火，見於左關為肝火，右關為脾火，兩尺為腎經命門之火。男子兩尺洪大者，必遺精除火盛也。
人之臟腑各皆有火，但有虛實之不同耳。然實火以瀉，如黃連瀉心火，黃芩瀉肺火，芍藥瀉脾火，石膏瀉胃火，木胡瀉肝火，知母瀉腎火，此皆苦

寒之味能瀉，有餘之火，若飲食勞役內傷元氣，火不兩立，為陽虛之病，以甘溫之劑除之，如黃芪、人參、甘草之屬。若陰微陽強，法相火熾盛，以乘陰位，為血虛之病，以甘寒之劑降之，如當歸、地黃之屬。若心火亢極，熱內實，為陽強之病，以鹹冷之劑降之，如太黃、芒硝之屬。若腎水虛，傷真陰失守，無根之火，為陰虛之病，以壯水之劑制之，如生地、玄參之屬。若有腎經命門火衰，為陽脫之病，以溫熱之劑濟之，如附子、乾薑之屬。若有虛過，冷物抑遏陽氣於脾土，為火鬱之病，以升發之劑除之，以升陽散火湯主之。諸經實火，照後方調之，毋執。

○一論男子婦人四肢發熱，筋骨間熱，肌表熱，如火捫之，烙手此病，多因血虛而得之，或胃虛過食冷物，鬱遏陽氣於脾土之中，火鬱則發之，升陽散火湯

升麻 葛根 羌活 獨活 白芍
人參各六分 炙甘草一分 柴胡三分 防風二分 半生甘草二分

右到一劑，生薑煎服，忌生冷等物。

○一論三焦實火，六經積熱，煩燥作渴，口舌生瘡，小便赤，大便結，一切有餘之火，涼膈散

連翹一錢 黃芩一錢 梔子一錢 桔梗一錢 薄荷五分
大黃一錢 芒硝一錢 甘草三分
右到水煎入，密同服。○咽喉痛，加桔梗、荆芥。○酒毒，加黃連、乾葛、名清心湯。用蜜竹葉同煎。○咳而嘔，加半夏、生薑。○吐血、嘔血，加當歸、赤芍、生地。○小便淋瀝，加滑石、赤茯苓。○風眩，加防風、川芎、石膏。○斑疹，加乾葛、荆芥、川芎、赤芍藥、防風、桔梗。○咳嗽，加桑白皮、杏仁、桔梗。○陽毒發斑，加當歸。○結胸心下滿，加桔梗、枳殼。○譫語發狂，踰牆赴井，皆陽熱盛，加黃連、黃柏、赤芍藥。○眼生翳障，赤流淚，加菊花、木賊、生地、黃芩。

大金花丸 解諸熱臟伏火

黃連 去毛 黃芩 去朽 黃柏 去皮 梔子 去殼各等分

右為末滴冰為丸如梧子大每服四五十九白溫水下○一方加括

梗大黃酒製治上焦一切熱證兼治鼻紅

○一論積熱積痰并五臟三焦有餘之熱下利食痞腸悶咽痛服目

赤腫中暑中熱煩燥等症及初發腫毒並治

黃金丸

大黃 鬱金 極小者佳 牙皂 去筋膜各等分

右為細末用牛膽汁入磁罐內煎成稀膏和藥為丸如梧子大每服

三五十九量病重加減白湯下大便少行一二日即止不傷元氣

○一論上焦積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癩咽喉不利大小便閉滯

一切風熱亦能碎酒食諸滯

神芎丸

黑丑 四兩 滑石 四兩 大黃 二兩 黃芩 二兩 黃連 五錢

川芎 五錢 薄荷 五錢

右為末滴水丸如梧子大每服五十九用溫水送下

○一論上焦積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癩咽喉不利大小便閉滯

一切風熱亦能碎酒食諸滯

神芎丸

右為細末煉蜜為丸如貝服大每服一九臨臥嚙化或食後以茶清嚙

下

○一婦人年四十餘夜間發熱早晨退五心煩熱無休止時半年後去麻

皆數伏而且乍浮取全不應手以升陽散火湯四劑而熱減大半胸中

覺清快勝前再與二劑熱悉退後以四物湯加黃柏知母少佐以炒黑

乾薑二十劑全安

○一治骨蒸內熱之病時發外寒寒過內熱附骨蒸盛之時四肢微瘦足

跌腫者其病在臟腑之中

太白散

白石膏火煨為末新汲水調下方寸匙以身無熱為度

內傷

取垣曰右手氣口脈大於人迎十倍過在少陰則二倍太陰則三倍右手

三部屬三陰少陰在關主脾太陰在寸主肺厥胃太熱故脾肺二臟之

脈皆緊盛

右寸氣口脈急大而數時一代而溢此飲食失節傷脾也若元氣不相接時

右關脾脈大而數謂獨大於五部也數中顯緩時一代也此脾虛也

右關胃脈損弱甚則隱而不見但內顯脾脈之大數緩緩時一代此飲

食失節之脈也

右關脈沉而滑此宿食不消之脈也

內外傷辨

人迎脈大於氣口為外傷氣口大於人迎為內傷外傷則寒熱發作而

無間內傷則寒熱間作而不齊外傷惡寒難忍內傷惡寒小或感外

就溫暖即解外傷惡風乃不禁一切風寒內傷惡風惟惡小或感外

傷證頭在鼻故鼻氣不利而推盛有力內傷者不然內傷證頭在口故

口不知味而腹中不和外傷者無此外傷則邪氣有餘發言壯厲且先

輕而後重內傷則元氣不足出言懶怯且先重而後輕外傷者皆熱而

手心不熱內傷則手心熱而手背不熱外傷則頭痛常常有之直而傷表

方罷內傷頭痛有時而作有時而止若顯內症多者則是內傷重而外

感輕宜以補養為先若顯外証多者則是外感重而內傷輕宜以發散

為急

○一論飲食勞傷傷脾則不能生血故血虛則發熱熱則氣散血耗而脈

力或時易機或時飽悶不思飲食變病百端如濕熱外感重者則先理

感六分而治內傷四分見効即往如外感輕則內傷藥用六分矣治萬病其効如神

東垣云夫飲食不節則胃病胃病則氣短精神減少氣不足以息言語怯弱腹中不和口不知穀味或胃當心而痛或上支而胸膈其則胃弱喘身熱而煩胃既病則脾無所重受故亦從而病焉若形體勞傷則脾病脾病則愈積蓄臥四肢不收或食少小便黃赤大便或秘或泄或虛坐只見此白膿或泄黃屎無氣以動而倦或黃赤小便則胃不能獨行津液故亦從而病焉若外感風寒俱無此證故易分別耳

確實之症不可不知因往往以內傷不足之病誤作傷寒外感有傷之病汗之吐之差之而致誤之千里醫者宜虛醫之耳

壽世保元

乙集二卷

五十九

夫內傷因七情鬱結飲食勞役為不足之病始生于裏而發于表也其病倦怠四肢不收頭暈目眩時時止其熱始盛于心則間次發于肢體如風寒時時畏懼氣短喘促懶于言語脈必微細或弦而數或虛而大而數只此分辦則內外易見矣

一論中氣不足或誤服冠伐四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節勞倦身熱脈洪大無力或頭痛暈與自汗或氣高而喘身熱而煩脈微細軟弱自汗體倦少食或中氣虛弱而不能攝血或飲食勞倦而患瘧痢等症因脾胃虛而不能愈者或元氣虛弱感月風寒而不脈象非用此代之或入房而後勞役感月或勞役感月而後入房者愈加附子思謂人之一身以脾胃為主脾胃氣實則肺得其所養肺氣既盛水自生焉水升則火降水火既濟而全天地交泰之令矣脾胃既虛則脾胃無生氣故東垣先生著脾胃內外傷等論時時然皆以兩脾胃為本所製補中益氣湯又冠諸方之首觀其立方本旨可知矣故曰補中益氣湯

補脾正此謂也前所治症藥其略餘當彼此而類推之是方之妙非註以表明之

補中益氣湯

黃芪五分 人參一錢 白朮五分 當歸五分
陳皮七分 柴胡 升麻 甘草各五分

右剉一劑薑棗煎服

如感風寒頭痛發熱加防風川芎白芷各一錢羌活七分汗多加黃芪五分

如汗多夫升麻柴胡加炒酸棗仁一錢夜間不睡亦加之

如虛火上炎加玄參一錢

如陰虛生火加酒炒黃柏知母各七分夏月亦可常用

如陰虛吐痰加貝母一錢

如世瀉去常歸加白茯苓一錢澤瀉一錢白芍藥一錢

如氣虛甚若必少加大附子製過以行參芪之力也手足冷或腹瀉亦加之

如心刺痛者乃血虛不足加當歸五分白豆蔻七分

如用心太過神思不寧怔忡驚悸加茯神酸棗仁炒柏子仁各一錢遠志石菖蒲各七分

如咽乾及酒者加乾葛七分天花粉一錢

如飲食少或傷飲食加神麩麥芽山查各一錢

如精神短少者倍加入參夏加五味子十粒麥門冬去心一錢

如頭暈加牡蠣龍骨煨各一錢

如頭痛者加藜蘆一錢細辛三分

如脾痛加牛膝杜仲炒各一錢

如脾弱如木瓜一錢漢防已五分

如有痰加半夏製七分貝母一錢
 如咳嗽夏加片苓知母麥門冬各一錢
 如久嗽肺中有伏火者減入參加片苓紫菀各一錢
 如食不下胸中有寒或塞滯加青皮五分木香三分
 如脚軟乏力或痛加酒炒黃柏一錢牛膝五加皮各一錢
 如五心煩燥加生地黃若氣浮心亂以朱砂安神丸鎮固之則愈方是
 怔忡

○一論中氣虛而胃弱不愛食及食不消化不舉力或常發熱快冷神疲
 倦怠或帶痰嗽
 加味六君子湯
 人參一錢 白朮去蘆炒一錢 陳皮八分 白茯苓去皮一錢
 半夏製八分 乾薑七分 山查肉一錢 甘草炙三分
 砂仁五分

右到一劑水煎服
 乙集二卷 六十一
 一論此方藥在中和專理心脾氣弱神昏體倦多困少力飲食不進中
 滿痞噎心忪上喘嘔吐瀉痢等症久服養氣補神醒脾益精祛風除邪
 參苓白朮散
 人參一錢 白朮去蘆一錢 白茯苓去皮七分 白扁豆炒一錢
 山藥一錢 蓮肉去心皮七分 桔梗去蘆七分 薏苡仁一錢
 砂仁五個 甘草炙四分

右到一劑水煎服
 一論凡遇勞役辛苦用力過多即服此二三劑免生內傷發熱之病
 補氣湯
 嫩黃芪一錢 水炒人參 白朮去蘆炒 陳皮
 麥門冬去心各五味子十箇 甘草炙七分

右到一劑水煎服
 一論此方藥在中和專理心脾氣弱神昏體倦多困少力飲食不進中
 滿痞噎心忪上喘嘔吐瀉痢等症久服養氣補神醒脾益精祛風除邪
 參苓白朮散
 人參一錢 白朮去蘆一錢 白茯苓去皮七分 白扁豆炒一錢
 山藥一錢 蓮肉去心皮七分 桔梗去蘆七分 薏苡仁一錢
 砂仁五個 甘草炙四分

○一論凡遇勞心思慮損傷精神頭目昏眩心虛氣短驚悸煩熱等症
 補血湯
 當歸酒洗 白芍酒炒 白茯苓去皮水 酸棗仁炒
 麥門冬去心各人參一錢二分 川芎 懷生地黃
 陳皮 梔子炒各五分 五味子十五箇 甘草炙五分

右到一劑水煎服
 一論脾胃虛弱元氣不足四肢沉重食後昏沉懶於動作嗜臥無力
 補胃湯
 黃芪蜜炒二錢 人參五分 甘草炙一錢 當歸三分
 柴胡三分 升麻三分 蒼朮米泔浸 青皮去蘆五分
 神麴炒七分 黃柏酒炒三分

右到一劑水煎服
 一論病後元氣虛弱脾胃虧損此藥補氣和血健脾理胃進食飲食壯
 壽世保元
 乙集二卷 六十二
 能身健元氣實四肢清火化痰解鬱風氣
 參苓白朮丸
 人參一兩 白朮去蘆土炒 白茯苓去皮 懷山藥炒一兩
 白扁豆一兩 薑汁炒 桔梗去蘆一兩 薏苡仁炒 兩 蓮肉去心皮二兩
 陳皮一兩 半夏湯泡蘆汁 砂仁五錢 黃連蘆汁炒一兩
 神麴炒一兩 香附一兩 當歸酒洗一兩 白芍兩炒 兩
 甘草炙五錢

右為未重者煎湯打神麴為丸如梧子大每服百丸食後米湯下加
 遠志去心一兩亦炒
 一論此方養元氣健脾胃生肌肉潤肌膚益血秘精安神定志壯筋力
 養精神進飲食之上品也又治虛勞瘦怯泄瀉腹脹滿喘咳等症
 陽春白雪糕
 白茯苓去皮 懷山藥 芡實仁 蓮肉去心皮各四兩

右到一劑水煎服
 一論此方藥在中和專理心脾氣弱神昏體倦多困少力飲食不進中
 滿痞噎心忪上喘嘔吐瀉痢等症久服養氣補神醒脾益精祛風除邪
 參苓白朮散
 人參一錢 白朮去蘆一錢 白茯苓去皮七分 白扁豆炒一錢
 山藥一錢 蓮肉去心皮七分 桔梗去蘆七分 薏苡仁一錢
 砂仁五個 甘草炙四分

陳倉米半升 糯米半升 白沙糖一斤半
右先將藥米二末用麻布袋盛放甌內蒸極熟取出放籃其內却入白
沙糖同搗極勻樣作一塊用米末印作餅子晒乾收貯男婦小兒任
意取食妙不可言

○一秀才勞役失宜飲食失節肢體倦怠發熱作渴頭痛惡寒誤用人參
收毒散痰喘昏憤揚手擲足胸膈發斑如蚊所咬余用補中益氣湯加
薑桂麥門五味補之而愈

○一男子發熱煩渴時或頭痛因服發散藥反加嘔急腹痛其汗如膏晝
夜譫語余慮此勞傷元氣誤用所致其腹必喜手拂胸之果然遂與十
全大補加附子一錢服之熱雖熾而不醒舉家驚惶及覺諸病頓止再
劑而痊凡八飲食勞投起居失宜見一切火症悉屬內真寒而外假熱
故肚腹喜暖口畏冷物此乃形氣病氣俱不足法當純補元氣為萬
一人因勞役失於調養忽然昏憤此元氣虛火妄動大疲而作急令灌

壽世保元 乙集二卷 六十三

童便神思漸爽更用參芪各五錢尋歸各三錢玄參胡山施安草各
一錢服之稍定察其形候佳又以十全大補湯加五味麥門之而安
凡入元氣素弱或因起居失宜或因飲食勞傷或因用心太過致遺精
白濁自汗盜汗或內熱肺熱潮熱發熱或口乾作渴痰痛舌裂或胸乳
膨脹脇肋作痛或頭暈時痛眩暈目花或心神不寧痛而不寐或小便
赤澀莖中作痛或便溺餘滴脘腹除冷或形容不充肢體畏寒或氣
急促或更有一切熱症皆是無根虛火但服煎湯固其根本諸症自見
若或其風熱則慎矣

○一人面如血紅發熱終日不食沉困相火冲上予以
補中益氣湯前半碗童便半碗合而服之日進五服而愈
一論大凡木病後殺消水去精散衛心多致便利枯竭宜當補中益氣
為主蓋為中州流灌即與胃行其津液者也况大腸主津小腸主液
亦皆受於胃氣一赤津液自行失燥其若別當以辛潤之只此

飲食

東垣云胃中元氣盛則能食而不傷過時而不飽脾胃俱旺則能食而肥
也脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉蓋脾胃而
邪氣盛也又有善食而瘦者胃伏太邪於氣分也則能食脾虛則肌肉
削即食亦也

本此飲食不進以脾胃之藥治之多不效者亦有謂為人之有生不善攝
養房勞過度真陽耗傷坎火不溫不能上蒸脾土冲和失布中州不運
是致飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消太腑泄瀉此
皆真火衰弱不能蒸氣脾土而然古云補腎不若補脾謂補脾不若
補腎腎氣壯壯丹由之火上蒸脾土脾土溫和中焦自治則能進食矣
今飲食進少且難消化屬脾胃虛寒蓋脾胃屬土乃命門火虛不能生

壽世保元 乙集二卷 六十四

壬而然不宜直補脾胃常服八味丸補火生土也方見補益
天食者謂穀肉菜果之物也經云陰之所生未左五味陰之五官傷在五
味穀肉菜果口嗜而欲食之心自裁制勿使過焉則傷其正矣或有傷
于食者必先問其人或因喜食而多食之耶或因饑餓而急食之耶或
因人所勉強勸而強食之耶或因病後宜禁之物而誤食之耶如因喜
食得之當先益其胃氣胃氣素強損穀自愈消導耗氣之藥不必服也
如因饑餓得之當先益其胃氣胃氣傷所傷之物自消導矣宜香砂養
胃湯去之如因勉強勸而得之宜行消導之劑百消丸主之若因病後
得之當以補養為主宜參苓白朮散主之
其所傷之物有寒熱之不同所傷之人有強弱之各異主治之法無一定
也所謂熱物者如膏粱辛辣厚味之物是也穀肉多有之寒物若水水
瓜桃生冷之物是也菜果多有之治熱以寒大黃牽牛是也治寒以熱
丁香巴豆是也如以熱攻熱以寒攻寒則食難去藥毒猶存胃氣重傷

禍不旋踵矣故傷熱物者三黃枳朮丸甚則利氣九通之傷冷物者香砂養胃湯甚則萬億九通之如冷熱不調者備急丹主之

人知飲食所以養生不知飲食失調亦以害生故能消息使適其宜是謂賢哲防於未病凡以飲食無論四時常令溫暖夏月伏陰在內暖食尤宜不欲苦飽飽則筋脉橫解腸胃為痔因而太飲則氣逆甚逆養生之道不欲食後便臥及終日穩坐皆能凝結氣血久即損壽食後常以手摩腹數百遍仰面呵氣數百口趨趨緩行數百步謂之消化食後便臥令人患肺氣頭風中痞之疾蓋榮衛不通氣血凝滯故爾故食訖宜行步躊躇有作修為迺佳語曰流水不腐戶樞不蠹以其動然也食飽不得速步走馬登高涉險恐氣滿而激致傷臟腑不欲夜食脾胃好音聲聞聲即動而磨食日入之後萬響俱絕脾胃不磨食之即不易消不消即損胃損胃即番即不受穀氣穀氣不受即坐臥袒肉操扇此當毛孔盡開風邪易入感之令人四肢不遂不欲極饑而食食不可過飽不欲極

壽世保元

乙集二卷

六十五

渴而飲飲不可過多食過多則結積飲過多則成痰癆故曰大渴不大飲木饑不大食恐血氣失常卒然不救也荒年饑年飽食即死是驗也嗟乎善養生者養內不養外善養生者養外者以恬淡歸神而血脈使一身之流行沖和百病不作養外者恣口腹之欲極滋味之美窮飲食之樂雖肌體充腴容色悅澤而酷烈之氣內蝕臟腑形神虛矣安能保合大和以臻遐齡莊子曰人之可畏者衽席飲食之間而不知為之戒過也其此之謂乎

一論治內傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿疼痛外感風寒濕氣頭疼身熱增寒遍身骨節麻木疼痛七情惱怒相沖飲食不下心腹氣痛

行氣香蘇散

- 紫蘇 陳皮 香附 烏藥 川芎
- 羌活 枳殼 去積 麻黃 甘草

因濕加蒼朮

右劉生薑煎服○外感風寒頭痛加葱白三根○內傷飲食如山查神麴去麻黃

一論脾胃虛弱不思飲食口不知味胸腹痞脹疼痛等症用此

香砂養胃湯

虛弱入宜此

人參七分

砂仁

白豆蔻

白朮

蒼朮

厚朴

甘草

香附

陳皮

白茯苓

白朮

黃連

枳殼

神麴

山查肉

香附

水香

白朮

當歸

神麴

甘草

如泄瀉去桔梗加白芍

右為朱荷葉一塊煎湯下大米煮粥為丸如梧子大每服八十九食後白湯下○如元氣虛弱加黃芪蜜炙二兩人參一兩懷山藥二兩蓮肉去心炒二兩

一論人稟素弱脾胃虛怯上焦有火有痰有鬱氣有食積胸中不快飲食少思尋常可服

壽世保元

乙集二卷

六十六

一論脾胃虛弱不思飲食嘔吐泄瀉胸痞腹脹噎膈并虛勞咳嗽吐痰大便頻數或腹痛等症尋常無病之人服之百病皆除

理氣健脾丸

白朮

當歸

神麴

甘草

白茯苓

黃連

枳殼

神麴

山查肉

香附

水香

白朮

當歸

神麴

甘草

如泄瀉去桔梗加白芍

右為朱荷葉一塊煎湯下大米煮粥為丸如梧子大每服八十九食後白湯下○如元氣虛弱加黃芪蜜炙二兩人參一兩懷山藥二兩蓮肉去心炒二兩

三補枳木丸

白朮去腐炒 陳皮去白 枳實炒 黃連炒
 黃芩炒 黃柏炒 白茯苓去皮 貝母去心
 神麩炒 山查去核 麥芽炒 加砂仁三錢

右為細末荷葉煎湯下梗米煮稀粥同藥搗和為丸加梧桐子大每服一百丸食後薑湯送下有熱茶清送下服後飲食自然多進人之精血皆因穀氣而生蓋脾乃肺之母實乃消化之氣下降何痰之有

○一論中氣虛損脾胃怯弱飲食不下或瀉或痢有調胃實腸之功用大鯽魚去腸屎淨入蒜五六瓣於內用布包水濕火煨熟去蒜食魚且二三次自然進食又治腸噎食不下

○一論此方能消酒消食消痰消氣消水消痞消腫消脹消積消痛消現此藥消而不見響而不動藥本尋常其功甚捷

壽世保元

乙集二卷

六十七

百消丸

黑丑頭末二兩 香附米炒 五靈脂各一兩
 右為細末醋糊為丸如棗豆大每服二三十丸或五六十丸食後薑湯送下

○一治胃中停滯寒冷之物及療心腹諸卒暴痛開脹滿不快宜用備急丹

大黃

巴豆去殼

乾薑各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三九溫水送下○若卒中客忤心腹脹滿卒痛如錐氣急口噤停尸卒死者用熱酒灌下以腹中鳴轉即吐下立效忌食豬肉冷水肥膩之物

萬億丸方見通治一切飲食所傷腹滿疼痛

○一治過食寒硬冷物食積太陰厥陰或嘔吐痞滿服神

神麩

半夏

茯苓

枳實

山查

神麩炒

乾生薑

砂仁

三棱

莪朮

右劉生薑煎服

○一治過食熱物煎炒厚味有傷太陰厥陰嘔吐痞脹或瀉利者
 青皮 陳皮 枳實炒 白朮炒 白芍炒
 黃連炒 山查肉 麥芽炒 各一 大黃酒蒸五分 甘草三分
 右劉水煎溫服

嗜酒喪身

夫酒者祭天享地順世和人行氣和血乃陶情性世人能飲者固不可缺凡遇天寒冒露或入病家則飲酒三五盞壯精神辟瘴癘飲者不過量力而已過則耗傷血氣也古云飲酒無量不及亂此言信矣飲者未嘗得於和氣血抑且有傷脾胃傷於形亂於性顛倒是非皆此物也早酒傷身宿酒傷脾為嘔吐痰沫醉後入房以竭其精令人死亦不知雖知

壽世保元

乙集二卷

六十八

者亦迷而不戒養浩高入當寡慾而養精神節飲食以介眉壽此先聖之格言實後人之龜鑑也本草云酒性大熱有毒大能助火一飲下咽肺先受之肺為五臟華蓋屬金木燥酒性喜升氣必隨之痰鬱于上溺澀于下肺受賊邪不生腎水不能制心火諸病生焉其始也病淺或嘔吐或自汗或瘡疥或鼻衄或泄利或心脾痛尚可散而出也其久也病深或為消渴為內疽為肺痿為痔漏為鼓脹為黃疽為朱明為哮喘為勞嗽為吐衄為癰疽為疔狀之病倘非高明未易處治凡嗜酒者可不慎乎

○一論治酒病當發汗其次莫如利小便使上下分消其濕可也此藥治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖小便不利或大便稀薄飲食減少等症宜服
 烏花解醒湯

葛花五錢

砂仁五錢

白豆蔻去殼

人參二錢五分

白木去心炒 白茯苓去皮 猪苓 乾生薑 素有利熱者加黃連 姜汁炒一錢

右為細末和勻每服三錢白湯調下。但得微汗酒病去矣。論云此蓋不

得已用之豈可待賴。日日飲酒即是方氣味辛溫。偶因病酒服之則不

損元氣。何者。飲酒病故也。若頻服之則損久不絕也。

○一治燒酒醉傷不醒者。急用菽豆粉搗為切片。將筋即口用冷水送下。

○一論此藥能壯胆進飲食。令人飲酒不醉。用。

八仙劉散
丁香 砂仁 白豆蔻去壳各 粉葛 一兩
白藥煎二錢半 木瓜 益實一兩 桑寄生 兩 甘草二錢半

右細劉人不能飲酒者。只抄一錢細嚼。酒下。即能飲酒。不醉。只此。

詩世保元 乙集二卷 六九

○一論飲酒過多。太醉。難醒。服此解之。

石葛湯 石膏五兩 葛根剉 生薑剉各五錢

右剉每服五錢。水煎服。

○一論腹中脹氣。痞滿。面黃。黃黃。將成癰疾。飲食不進。日漸肌瘦。如欲飲

酒。先服之。多飲不醉。
白林丸 丁香五十箇 木香三錢 橘紅去白三兩 小茴香五錢
三稜炮三錢 莪朮炮三錢 人參一兩 砂仁二十箇
白豆蔻三十箇 乾薑三錢 生薑二兩去皮切片 焙乾
甘草炙三錢

右為細末。煉蜜為丸。朱砂為衣。每二兩作五丸。每服一丸。細嚼。生薑湯

○一論酒積面黃。赤色。腹脹。不消。

甘遂一錢 用糟頭猪肉二兩。細切如泥。入遂末。在內和勻。通作一丸。

解酒仙丹 魯府傳 白果仁八兩 葡萄八兩 薄荷葉一兩 側柏枝一兩

細辛五分 朝腦五分 細茶四兩 當歸五錢

丁香五分 官桂五分 砂仁一兩 甘松一兩

右為細末。煉蜜為丸。如茶實大。每服一丸。細嚼。茶清送下。極能解酒。

神仙醒酒丹 周濟京山王傳 葛花五兩 赤小豆花 菘豆花各二兩 家葛花搗碎水澄粉

真柿霜四兩 白豆蔻末五錢 右取細末和勻。用生藕汁搗和作丸。如彈子大。每用一丸。嚼而嚥之。立

醒。 詩世保元 乙集二卷 七一

○一論飲酒人。元氣虛弱。四肢無力。飲食愈少。面紅如粧。宜用

補中益氣湯。加陳皮半兩。夏葛白芍。神曲麥芽。枳殼。○小便閉。加麥

門冬。○大便閉。加桃仁。紅花。火麻仁。

○一備者。善飲。便滑瀉。瀉食。減胸滿。腹足漸腫。症屬脾腎虛弱。用加減金

匱腎氣丸。進食。腫消。更用八味丸。胃強脾健。而愈。

○一人善飲酒。泄瀉。腹脹。吐痰。作嘔。口乾。此脾胃之氣虛。先用六君子加

神麴。止瀉。再用益氣湯。加茯苓。生夏。泄脹亦愈。此症若熱。熱藥。用

葛花解醒湯。分消其濕。濕既去。而瀉未已。須用六君子。加神曲。實脾土。化酒積。然雖為酒。而作實。因脾土虛弱。不可專主濕熱。醒醉湯 用青椒。檳榔。者不用。用上磨法。粗皮。核。細切。如粉。下片。以粉。草末。二兩。炒鹽。二兩。拌勻。入磁罐內。密封。以沸湯。煎服。自然生津。液。醒。

極妙

吃酒不醉方

薄荷五錢 乾葛一兩 桂花三錢 白梅肉五錢

右為末為丸先放口內舌下自然化酒

斷酒法 用驢駒衣燒灰調酒服

傷酒不藥法 心中酒食停積或積久嘔飲過多一切服下胸腹脹滿不消

消

用鹽花須擦牙肉溫水漱下不過三次如湯潑雪即時覺腸通快誠妙法也

妙法也

○一治飲酒過多熱胸膈以致吐血衄血

葛花二兩 黃連四兩

右為末以大黃末整常和為丸如梧子大每服百丸溫水送下

○一人飲酒過度太醉不醒一家惶惶無計可施來為用權術枝上救

壽世保元

乙集二卷

七十一

葉酒乾打碎末真葛花末二味各等分每服三錢滾白水調服立醒

極妙證

脈多沉伏或促或細或代氣鬱則必沉而濁濕鬱則必沉而緩熱鬱則必沉而數痰鬱則脈弦滑血鬱則脈芤而結促在體脈必滑而緊盛在

上見于寸鬱在寸見于關鬱在下見于尺左右皆然

六鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當降者不得降當變化者不

得變化也此為傳化失常六鬱之病見矣氣鬱者胸膈痛脈沉滑濕鬱

者周身走痛或關節痛過陰寒則脈沉細痰鬱者動喘寸口脈沉

滑熱鬱者昏悶小便赤脈沉數血鬱者四肢無力能食便紅脈沉食鬱

者噎噎腹飽不能食人迎脈平和氣口脈緊盛者是也

○一論丹溪曰氣血冲和百病不生一有佛鬱諸病生焉其症有六氣血

疾濕熱食是也此方開諸鬱之總司也

六鬱湯

香附童便炒 蒼朮米泔洗 神麴炒 梔子炒

連翹 陳皮 川芎 貝母

枳殼炒 白茯苓 蘇梗各一錢 甘草五分

右剉十劑水煎服○痰鬱加南星至真○熱鬱加柴胡黃芩○血鬱加

梔仁紅花○濕鬱加白朮羌活○氣鬱加木香檀榔○食鬱加山楂

仁

○一論解諸鬱火痰氣開胸膈思飲食行氣消積散熱用此

加味越鞠丸

蒼朮米泔洗浸一兩 香附童便洗三兩神麴炒一兩

梔子炒五錢 陳皮去白一兩白朮去蘆炒黃連酒炒一兩

山查去子二兩白茯苓去皮一兩 羅漢子炒五錢連翹五錢

枳實炒一兩當歸酒洗一兩 黃木香五錢

壽世保元

乙集二卷

七十一

右為末薑汁打糊為丸如梧子大每服五六十丸食後白湯下

○一論氣濕痰熱血食六鬱此實胸膈快膈之藥也

越鞠二陳丸

蒼朮米泔洗 山梔子炒黑 南星

香附童便炒 山查肉 陳皮 神麴炒

白茯苓去皮 海石 南星 帶炭煨 半夏湯泡炒

枳殼去蘆炒 甘草炙五錢 天花粉各二兩

右共為細末滾水和成丸如梧子大每用二錢食後服用薑酒煎湯成

善湯茶清任下食後服

壽世保元乙集卷之二

新刊醫林狀元壽世保元丙集三卷

太醫院吏目金絡靈林華廷醫子才編著

男 龔定國 校
龔安國

南雍大學士龔印周文卿光緒堂編

痰飲

脈弦者寒飲也。○其脈偏弦者飲也。○肺飲不弦但喘短氣。○又云脈浮而細滑傷飲。○脈弦數有寒飲春夏難治。○脈沉而弦者飲飲肉積。○其人短氣四肢歷節走痛脈沉者有留飲。○左右手關前脈浮弦大而實膈上有稠痰也宜吐之。○病人百藥不効關上脈伏而大者痰也。○眼胞及眼下如炭烟熏黑者亦痰也。○久得消尿痰飲膠固脈道阻滯也卒難得開必費調理。

壽世保元

丙集三卷

痰者病名也。生於脾胃然脾胃氣盛飲食易化何痰之有或食後因之氣滯勞碌驚恐風邪致飲食之精華不能傳化而成痰飲矣有流于經絡皮膚者有滯于臟腑支節者有溢于身無所不至痰氣既感必勝主或奪於脾之太絡也氣則倏然止地此痰厥也升於肺者則喘急咳嗽迷於心者則怔忡恍惚走於肝則眩暈不仁。腸助脹滿關於腎則哈而多痰漉流於中腕則嘔瀉而作寒熱注於胃則咽膈不利有痰宜劑入於腸漉漉有聲散於胸背則揪觸一點痰痛或痰如手大或如指下甚散則有痰聚則不利。一身上下變化百病治常各從所由是以虛宜補之火宜降之氣宜順之鬱宜開之食宜導之風寒濕熱宜發散清燥以除之故曰治病必求其本。

三陳湯

一論有 濕痰 熱痰 風痰 老痰 寒痰 食積痰
宜後方加減

陳皮 去白半夏 湯泡
右到一劑生薑三片水煎溫服
一錢甘草五分

一濕痰感者身軟而重加蒼朮白朮

一熱痰加黃連黃芩痰因火盛逆上降火為先加白朮黃芩軟石膏黃連之類○眩暈嘈雜者火動其痰也亦加山梔黃連黃芩

一風痰加天麻枳殼南星白附子殭蠶牙皂之類氣虛者加竹瀝氣實者加荆瀝俱用薑汁

一老痰用海石半夏瓜蒌香附連翹之類五倍子佐他藥大治頑痰宜煎藥中存物咯不出嚥不下此痰結也用藥化之加蘇麻欬堅之類宜瓜蒌杏仁海石桔梗連翹香附少佐朴硝薑汁煉蜜和丸喻服之脈滑者卒難得開必費調理氣實痰熱結者吐難得出或成塊吐咯不出氣滯者難治

一寒痰痞塞胸中倍加半夏甚者加麻黃細辛烏頭之類痰厥頭痛亦加半夏

一食積痰加神曲麥芽山查炒黃連枳實以消之甚者必用攻之宜力兼血虛者用補血藥送下中焦有痰消食積也胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛矣○噫氣吞酸此係食積而鬱有熱火氣動上加黃芩南星

一血虛有痰加天門冬知母瓜蒌仁香附米竹瀝薑汁帶血者更加黃芩白芍桑白皮血滯不行中焦有飲者取竹瀝加生薑汁非汁飲三五盞必胸中煩燥不寧後愈

一氣虛有痰加入參白朮脾虛者宜補中氣以運痰降下加白朮白芍神曲麥芽兼用升麻提起肉傷夾痰加入參黃芪白朮之類薑汁俾送或加竹瀝尤妙

一痰在膈上必用吐法濕之不去膠固稠濁者必用吐脈浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就發散之義凡用吐藥宜升提其氣使吐如

壽世保元

丙集三卷

防風川芎桔梗茶芽生薑薑汁之類或瓜蒂散凡吐用布緊勒肚於不通風處行之

一痰在腸胃間可下而愈和實甘遂巴豆大黃芒硝之類凡痰用利藥道多脾胃易虛則痰易生而多

一痰在筋下非白芥子不能達

一痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝不開在經絡中亦用竹瀝必佐以生薑非此隔間有痰或癩狂或健忘或風痰俱用竹瀝與荆瀝同功氣虛少食用竹瀝氣實能食用荆瀝

一凡人身上中下有塊是痰也問其平日好食何物吐下後方用藥

一凡人頭面頸項身中有結核不痛不紅不作膿者皆痰注也宜隨處用藥消之

一凡痰之為物無處不到為隨氣升降故也

○一論竹瀝大治熱痰及能養血清熱有痰厥不省人事錢死者得竹瀝

詩世保元 丙集三卷 三

瀝之送懸誠起死回生藥也

用木竹早筆竹截長二尺許每段劈作二片大者劈作四片入井水浸一小時以薄磚二塊排定將竹片架於磚上兩頭露一二寸下以烈火迫之兩頭以盆盛瀝每六分中加薑汁一分服之痰熱甚者止可加半分耳用此竹瀝加入湯藥內服之尤妙取荆瀝亦治熱痰亦照此法取之

○一論痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液瀾變為痰飲故曰痰因火動降火為先火因氣逆順氣為要

加減二陳湯

橘紅 去白 半夏 製一 白茯苓 去皮 貝母 一錢 枳實 一錢
白木 去蘆 一分 連翹 五分 黃芩 一錢 防風 五分 天花粉 七分
香附 一錢 甘草 三分
右劉生薑三片水煎溫服

○一論熱痰在胸膈間不化吐咯不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結開結化痰湯

陳皮 半夏 枳殼 桔梗 貝母
瓜蒌仁 黃連 黃芩 梔子 蘇子 桑皮
朴硝 杏仁 甘草

右劉木煎入薑汁磨末吞服

○一論遍身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢麻痺不仁或背脊心下點如粟冷麻末沉滑乃是濕痰流注經絡關節不利故也

清濕化痰湯

南星 泡 半夏 製 陳皮 去白 茯苓 去皮 蒼朮 炒 羌活 酒炒
白芷 白芥子 甘草

右劉木煎入竹瀝薑汁磨末吞服○骨體痛甚及有腫塊作痛者行

詩世保元 丙集三卷 四

曰痰塊加乳香沒藥海石朴硝○頭頂痛加川芎威靈仙○手臂腫痛加薄荷引南星等藥至痛處

○一論肉傷七情痰迷心竅神不守舍神出舍空則痰生以致言喪壯熱頭痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫証類傷寒兼治中風痰厥氣厥不省人事者

清熱導痰湯

入參 白木 去蘆 茯苓 去皮 陳皮 去白 半夏 製 南星 姜製 枳實 炒 桔梗 黃連 黃芩 瓜蒌仁 甘草

右劉生薑煎入竹瀝薑汁同服

家傳清氣化痰丸 製造甚得法化痰清火開膈順氣消滯除脹醒酒消食殊效

大南星 四兩 大半夏 四兩 二味先用米泔水各浸三五日以透為度洗淨切片以碗下值盛貯曬乾先薑汁次皂汁又次礬汁又取

硝水四乾

一用生薑汁浸一日夕曬乾

一用皂角煎水去渣浸一日夕曬乾

一用白礬一兩煮水浸一日夕曬乾

一用和硝一兩水浸一日夕多洗曬乾

青皮去穢 陳皮去白 枳殼去穢 枳實去穢 白木去蘆

白茯苓皮 蘇子炒 白芥子炒 羅補子炒 杏仁去蘆 香附薑水炒

瓜蒌仁 乾葛 桔梗去皮 杏仁去蘆 白豆蔻殼 前胡去蘆

神曲炒 麥芽炒 山查蒸去 白豆蔻殼 前胡去蘆

甘草各一兩

右為細末用前浸四味藥水加竹瀝一碗泡蒸餅為丸如梧子大每服

五七十丸或茶或薑湯任下

一論健脾胃清火化痰頑痰能開陳風養血清上焦之火除

壽世保元

丙集三卷

五

胸膈之痰清頭目眩暈

千金化痰丸

膽星四兩 半夏美髮牙皂同煮 陳皮去白 白茯苓去皮

枳實去穢 海石大段 天花粉二兩 片苓酒炒 黃柏酒炒

知母酒炒 當歸酒洗 天麻火燉 防風去蘆 白附子酒炒

甘草三兩 大黃酒蒸九 白木炒二兩 氣虛加人參八錢

右為細末神麩二兩打糊為丸如梧子大每服七八十九茶任下

秤金 一名金珠化痰丸治痰嗽如神又治勞嗽

用半夏一斤米泔水浸十日換水三次取出切作兩半曬乾用白礬

五斤水一桶入鐵鍋內化開將半夏入礬水內浸二十日取出切作

四瓣曬乾用生薑十斤另研取汁再入半夏浸二十日取出曬乾為

細末聽用粉草十斤去皮為粗入鍋內添水煎數沸取出以布濾去

渣將淨水仍入鍋內熬成膏子和成劑每病重者用藥二錢半輕者

二錢金箔十張和一大丸與病人喻化忌房事此藥神效不可勝數

一治痰壅方 梨汁一鍾 生薑汁半鍾 蜜半鍾 南薄荷末三兩

右和勻重湯煮十餘沸任其食陰降痰驗如奔馬

一論痰飲為病或癩或狂或眩暈等症無不奏效

白丸子 中州傅明岐傳 川南星四兩半夏十兩 白附子五兩小川烏三兩

右俱切片春七夏三秋八冬十日水浸一日一換日曬夜露其星半另

放磁器內少加薑汁同浸去麻性次將前藥磨又將絹巾濾去渣將

粉曬乾白米糊為丸如梧子大每服五六十丸薑湯滾水任下其藥放

舌上不麻為度方妙

釣痰仙方 曾府秘方 礞砂一錢 白礬半生半 磁青上細磁打下 瓜蒂五分

壽世保元

丙集三卷

六

青蒙石 內下

右共研細末每用二匙薄荷滾湯調入鼻內即愈

一人氣短有痰小便赤澀足跟作痛尺脈浮大按之則澹此腎虛而痰

飲也用四物送六味丸不月而康仲景先生云氣虛有欲用腎氣丸補

而逐之誠開後學之蒙瞶液無窮之天狂腎氣丸即六味丸也

一儒者體肥善飲仲秋痰喘用二陳茶連茶甚加梨皮杏仁益汗氣從

加貝母枳殼不特發熱余以為脾肺虛寒用八味丸以補土培補中益

氣以接中氣而愈

一婦人因怒吐痰胸滿作痛服四物二陳茶連枳殼之類不應更加枳

風之劑半身不遂筋漸牽縮四肢痿軟日哺益甚內熱口乾形體憔悴

余以為鬱怒傷脾肝氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味地

黃丸調治喜其誠疾年餘愈形體康健

補中益氣湯 見內傷 六味丸 八味丸 俱見補益

咳嗽

脈咳所因浮風緊寒數熱細濕房勞清難右關濡者飲食傷脾左關咳短疲極肝寒浮短肺傷法當咳嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉實熱濕滑多痰痰滿少血形盛脈細不足以息沉少伏匿皆是死脈惟

有浮大而嗽者生。夫嗽謂有聲肺氣傷而不消嗽謂有痰脾濕動而生痰咳嗽者因傷脾氣而動脾濕也病本須分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也或云因風寒者鼻寒聲重惡寒者是也因火者有聲痰少而無者是也因勞者盜汗出兼痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急身重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大槩耳亦當明其是否也治法乳分新久虛實新病風寒則散之熱則清之痰涎則化之濕熱則瀉之久病便屬虛屬氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之飲

壽世保元

丙集三卷

七

之際之則治虛之法也

○一論四時感冒發熱頭疼咳嗽聲重涕涕稠粘中脘痞滿嘔吐痰涎壅中快膈不致傷脾此藥大解肌熱潮熱將欲成癆痰嗽喘熱並効用

參蘇飲

紫蘇

前胡

桔梗

枳殼去穢

乾薑

陳皮

半夏湯泡

白茯苓去皮各一錢

甘草三分

人參五分

水香三分劫病熱嗽

右劉玉蘭薑棗煎服○若未寒感冒惡寒無汗咳嗽喘急或傷風無汗鼻塞聲重加麻黃二錢杏仁一錢金沸草一錢以汗散之○若初感冒肺多有熱加杏仁桑皮黃芩烏梅○胸滿痰多加瓜蒌仁○氣促喘嗽加知母貝母肺寒咳嗽加五味乾薑○心下痞悶煩熱嘔穢惡心或停酒不散加薑炒黃連枳實乾薑陳皮倍用之○鼻衄加烏梅麥門冬白茅根○心虛發熱加柴胡黃芩○頭痛加川芎細辛○咳嗽吐血加升

麻牡丹皮生地黃○人熱咳嗽久不愈加知母貝母麥門冬○見血加阿膠生地黃烏梅赤芍牡丹皮○吐血痰嗽加四物湯名於苓補心功

○一論上氣喘逆咽喉不利痰滯咳嗽口舌乾渴

二母清順湯

天門冬一錢

麥門冬一錢

知母一錢

貝母一錢

甘草湯人參五分

當歸身一錢

枳殼一錢

山梔子一錢

女參一錢

桔梗一錢

天花粉一錢

薄荷七分

生甘草三分

右劉水煎服

清熱寧嗽化痰定喘丸

橘紅五錢

青黛三錢

貝母七錢

瞻星一兩

天花粉七錢

桑白皮七錢

杏仁七錢

桔梗七錢

黃芩五錢

前胡七錢

甘草三錢

壽世保元

丙集三卷

八

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服下丸淡薑湯化下

○一論痰咳肺弱力不効者多屬氣血虛弱四肢沉困宜八物湯加黃柏知母貝母麥門五味瓜蒌紫蘇陳皮等分煎棗煎服

○一論咳嗽早間吐痰甚多夜間喘急不寐然早間多痰及肺虛飲食所化夜間喘急乃肺虛陰火上衝以後方服之

補中益氣湯方見內傷依本方加麥門冬五味子○六味地黃丸方見補

益依本方加麥門冬五味子

○一論傷風寒鼻流清涕寒禁噴嚏此肺氣虛不能實腠理以補中益氣湯主之

○一論咳嗽面自鼻流清涕此肺虛而兼外邪

補中益氣湯加茯苓半夏五味而愈

○一論咳嗽吐痰尖音聲啞此元氣虛弱而致也

補中益氣湯加黃柏知母天門冬麥門冬五味杏仁黃芩瓜蒌仁

一論咳嗽吐痰手足時冷此肺虛寒以補中益氣湯加炮乾薑
 一論聲音不出用新棉花不拘多少瓦上慢火炒焦置懷中神中時時
 將一二粒口中咀嚼嚙之使喉中常有味久聲自出

一治語音不出用
 真蘇子二兩訶子三箇 杏仁三十 百藥煎二兩
 右為末每服二錢熱酒調服

一治久嗽語聲不出
 訶子去核 杏仁炮去皮 通草二錢
 右判每服四錢煨薑五片水煎食後溫服

一論年老人日久咳嗽不能卧者多年不愈用
 猪板油四兩 蜂蜜四兩 米糖四兩
 右三味熬化成膏時時刻刻挑一匙口中嚙化三五日其嗽即止

壽世保元 同集三卷 九

銀杏膏
 陳細茶四兩 白果肉四兩 半去殼 去殼
 核桃肉四兩 家蜜半斤
 右藥入內煉成膏不拘時服

一治久嗽不痊并虛勞喘嗽
 紫苑去蘆頭 款冬花各一兩 百部五錢
 右為末每服三錢生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後臨卧各一服

一論久嗽并連嗽四五十年者用連皮生薑自然汁丁勻加白蜜一茶
 匙同放茶碗內煎一滾溫服三四次即止

一切咳嗽上氣者下道土專賣此藥不拘新久皆效
 乾薑 桂心紫色 羊棘 皂莢炮去皮 子肥
 右三味並另搗下篩了各秤分兩和合後更搗篩一遍煉白蜜搜和又
 搗一二千杵每服三九如梧桐子大不限食之先後嗽發即服日進三

五服忌葱蒜油膩食物
 一論年久近日咳嗽喘急等症
 神吸散 國子博士顏心吾傳

粉草三分 枯白礬五分 款冬花五分 石骨煨五分 官桂三分
 右為細末每服三分三釐準秤至夜食後靜坐片時將藥放帛上以竹
 筒五寸長直插喉內用力吸藥速亦不問吸藥全盡為度以細茶下口
 嗽而睡之忌雞魚羊鵝一切動風發物并生冷諸物惟食白煮猪肉雞
 子戒三七日宜用公猪肺一劑加肉半斤梔子一箇下筒炒成炭桑
 白皮不拘多少用水同炊至熟爛去藥至五更病人不要開口言語令
 入將湯肺喂之病人嚼吃任用餘者過時再食神效

一論久嗽痰喘百藥不效并久年不痊者或能飲酒入久嗽尤效
 清金膏 曲阜令孔桂窓傳

壽世保元 同集三卷 一
 天門冬去心 麥門冬去心 貝母四兩 杏仁去皮 半夏洗 桑葉四兩
 右五味切片水熬去渣取汁五碗入白粉葛末四兩蜜一斤共煎汁入
 罈內重湯煮六日成膏取出每白無時頻服之

一入時唾痰涎內熱作渴肢體倦怠勞而足熱用清氣化痰益甚余曰
 此腎水泛而為痰法當補腎不信另進痰痰丸一服吐瀉不止飲食不
 入頭暈眼閉始信余用六君子湯數劑胃氣漸復却用六味丸月餘諸
 症悉愈

一入咳嗽氣喘鼻寒流涕余用參蘇飲一劑以散寒邪更用補中益氣
 以實脾胃而愈後因勞怒仍作自用前飲益甚加黃連根腎腹脹不食
 小便短少二陳四苓前症愈劇小便不通余曰腹脹不食脾胃虛也小
 便短少肺腎虛也悉因攻伐所致投以六君子加黃芪炮薑五味一劑
 諸症頓退再用補中益氣加炮薑五味數劑全愈

一治咳嗽秘方

一治咳嗽秘方

欵冬花三錢 石燕三錢 硼砂七厘 甘草三錢
右為末吹入喉內用細茶漱下即好

喘而急

脈滑而手足溫者生脈沉瀉而四肢寒者死數者亦死為其形損故也
肺受邪則喘手太陰肺專主外感無汗而喘屬表實有汗而喘屬表虛
凡久喘未發扶正氣為要已發攻邪為主太樞喘急甚者不可用苦寒
水氣盛故也

○一論外邪在表無汗而喘者
五虎湯

麻黃三錢 杏仁三錢 石膏五錢 甘草一錢 細茶一撮
右到一劑生薑蔥水煎熱服加桑白皮一錢尤良

壽世保元

百集三卷

一一

○一論在裏邪實不便脈寬而喘者

三乙承氣湯
大黃 芒硝 厚朴 枳實 甘草 加木香

右到生薑三片水煎熱服

○一論痰盛而喘者 此治痰喘不能臥入扶而坐數日一服而安用
干縷導痰湯

南星一錢 半夏七箇火炮破 赤茯苓 枳殼一錢
皂角一分炙甘草一分炙

右到生薑一指大木煎服

○一論七情鬱結上氣而喘者用
四磨湯

人參 檳榔 沉香 烏朮

右四味各用和磨汁合下處溫服之

三子湯 治氣喘如神

蘇子 白芥子 蘿蔔子 水煎服立已

○一論腹脹氣喘坐卧不得者宜服
沉香散

沉香二錢 半木香二錢 半枳殼三錢 蘿蔔子三錢
右到一劑生薑三片水煎溫服

○一論喘急因內傷元氣氣不接續而喘者宜用
補中益氣湯方見內傷

○一論陰虛火動火炎上攻而喘者宜此
清肺滋坎湯方見勞瘵一用六味九加黃柏知母亦效

○一論虛陽上攻氣不升降上感下虛痰涎壅盛喘促短氣咳嗽而喘者
蘇子降氣湯

壽世保元

丙集三卷

十一

蘇子五錢 陳皮 厚朴姜汁炒前胡 肉桂各二錢
半夏五錢 當歸三錢 甘草一錢

右到薑棗煎服
○一論老人痰嗽氣喘宜服

三子養親湯

白芥子八分 蘿蔔子八分 蘇子八分 南星水炮 半夏水炮
陳皮六分 枳實六分 片苓八分 赤茯苓八分 甘草二分

右到一劑生薑三片水煎溫服

○一入體肥善飲仲秋痰喘用二陳苓連益甚加桑皮杏仁盜汗氣促加
貝母枳殼不時發熱予以為脾肺虛寒用八味九以補土母補中益氣
湯接補中氣 八味九見補益

哮喘

肝大抵脈浮而滑易治微細而澀難治。夫孝乳以聲響易名喉中如水雞聲者是也專主痰涎宜用吐法亦有虛而不可吐者治之有以紫金丹導痰小胃丹劫之而愈者有以六味地黃丸補中益氣湯兼而進之而愈者必須量虛實而治之也。

千金定喘湯 治哮喘如神
麻黃三錢 桑白皮三錢 杏仁一錢 蘇子二錢 白果一箇
款冬花三錢 黃芩一錢 半夏五錢 甘草一錢

右到白水煎食遠服
諸病原來有藥方 惟愁喘喘最難醫 麻黃桑杏蘇子
白果冬花更又良 甘草黃芩同半夏 水煎百沸不須煎
病人遇此仙丹藥 服後方知定喘湯
一論人素有喘急遇寒暄不常發則不已哮喘夜不得睡者用此
蘇沉九寶湯

壽世保元

丙集三卷

十一

紫蘇 陳皮 薄荷 麻黃 杏仁 桑白皮
大伏皮 官桂 甘草 杏仁 桑白皮

右到用生薑三片烏梅一箇水二碗煎至八分食後服即效如佳服惟慎勞碌取厚味節慾日間常服此順氣化痰九夜臥時服抑火潤下九如除根須修合六味地黃丸加黃精知母人參紫苑五味子百合各二兩淨小麥粉炒蜜四兩打糊為丸每服百丸空心柿餅湯送下餅隨食之

二母丸 治哮喘

知母二錢 貝母二錢 貝母去心 百藥煎一兩

右為細末將烏梅肉蒸熟搗爛為丸如梧子大每服三十丸臨臥或食後薄皮薑湯送下

論喘氣哮喘上喘不休或是腫脹水絨肺癆俗謂之喘氣病用此

小商草一把用猪精肉四兩入水同炊令熟食肉并湯其草于月生七八月有四肢莖葉朱砂有花子
一論九遇天氣欲作雨者便發喘喘甚至卧不得飲食不進此乃肺竅中積有痰涎乘天陰寒氣從背且鼻而入肺肺脹作聲此病有治至終身者亦有子母相傳者每發即服不過七八次覺痰腥其吐吐白色是絕其根也用此方

白砥一錢 枯白藜三錢 淡豆豉
右挾作丸如菽豆大但覺寒發用冷茶送下七九其有九九以不發為愈再不必多增丸數慎之小兒服二九
導痰小胃丹 方見前 治哮喘經年不愈宜久久服之斷根
一論哮喘氣急而不得息者宜用均氣八仙湯

壽世保元

丙集三卷

十四

麻黃二錢 杏仁三錢 石膏三錢 桔梗一錢 片苓二錢
知母二錢 貝母二錢 生甘草一錢

右到一劑水煎服
一治上氣喘急經年咳嗽肺癆久不愈遇發即服服三五次永不復發奪命丹

人詳一錢 白礬二錢 白附子三錢 南星四錢 半夏五錢
右先用人言與白礬一處於石器內火煨紅出火黃色為度切不可犯鐵器却和半夏南星白附子為末生薑汁煮凝稠為丸黍米大朱砂包衣每服七丸小兒二九非化水下忌食熱物

哮喘靈秘丹 方上異凡傳
膽南星 二兩 大半夏 二兩 用白礬五錢 牙皂五錢 赤茯苓 二兩
苦葶藶 二兩 大貝母 二兩 沉香 一兩 青礬石 五錢 天竺黃 二錢
珍珠 三錢 犀角 一錢 烏犀角 一錢 白礬 一兩 硃砂 一兩

風化硝五錢 花蕊石五錢 孩兒茶五錢 款冬花一兩 鈴白霜五錢
右為細末煉蜜為丸如梧子六每服三十九臨睡淡薑湯下外製六
味地黃丸空心服百發百中真仙方也

○一治素患哮喘之疾發則喘急痰嗽上壅不時發發令重勞後成百
節然早服六味丸加黃柏知母人參紫苑五味百合各二兩浮小麥粉
蜜四兩打粉為丸每服百九空心柿餅湯下能隨食之夜以時服後方
各一料而愈

千金定乳丸

南星

貝母

白附子

錦紋大黃

青世保元

如黍米大盞湯下亦可

○一人嗜乳十數年發則上氣喘促咳嗽吐痰自汗四肢厥冷六脈沉細
此氣虛脾弱

黃芪

杏仁

甘草

○一人自幼患哮喘之症每遇寒即發發則上氣喘急咳嗽痰涎上壅年
久不瘥已成痼疾百藥罔效予與此方一料全愈

清上補下丸

懷生地黃

白茯苓

遼五味子

枳實

黃連薑炒一兩五錢 杏仁去皮一兩五錢 半夏薑炒一兩五錢
瓜蒌仁去油一兩五錢 枯芩酒炒一兩五錢 甘草五錢
右為細末煉蜜為丸如梧子六每服三錢空心淡薑湯下

瘧疾

○瘧疾數發皆順沉細虛微為逆○瘧脈自弦微則為虛代散則死

瘧症皆因先傷於暑次感於風客於榮衛之間腠理不密復遇風寒因而
不出合於腸胃之外與榮衛並行晝行於陽夜行於陰並則瘧作
病止併於陽則熱併於陰則寒淺則日作深則間作在氣則在血則
髮軟本經曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦結者傷食弦滑者
多痰弦而緊者宜下浮大者宜吐弦澀者宜溫此治瘧之大法也
多寒少心煩少睡者屬心名曰瘧瘧用柴苓湯但寒少熱腹脹足冷者
屬腎名曰寒瘧用桂附二陳湯先寒而後大熱咳嗽者屬肺名曰瘧

壽世保元

丙集三卷

十六

用參蘇飲熱長寒短筋脈抽搐者屬肺名曰風瘧用小柴胡湯加烏藥
香附寒熱相停嘔吐痰沫者屬脾名曰食瘧用清脾飲後食後夜發
兩虛發時咳嗽不盡保養遂成癆瘵若能清心養體節食避風如此調
治無不愈矣

散邪湯

川芎

羌活

白芷

麻黃

白芍

防風

荆芥

紫蘇

右劉生薑三片葱白三根水煎露一宿食早溫服○瘧疾加陳皮在
濕加蒼朮○寒食加香附

○一論瘧疾有汗莫無汗正氣為主宜用
正氣湯

柴胡 前胡 川芎 白芷 半夏 麥門冬
檳榔 草果 青皮 茯苓 桂枝 甘草
右劉蕡藥煎預先熱服。

○一論瘧疾不論先寒後熱先熱後寒諸瘧通用清脾飲

青皮去穢厚朴薑炒白朮去蘆半夏薑炒柴胡 黃芩 茯苓
草果 甘草

右劉生薑五片水煎溫服。

○一論諸瘧寒熱交作陰陽不分口乾發渴小便赤澀或作吐瀉用加減柴苓湯

柴胡 黃芩 半夏薑製猪苓 澤瀉 蒼朮米泔浸
青皮 厚朴薑炒檳榔 草果 烏梅 甘草
右劉蕡藥煎服。

壽世保元

丙集三卷

○一論五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚痰飲阻衛氣相搏發為瘧疾并治諸瘧

四獸飲

人參 白朮去蘆白茯苓去橘紅 半夏姜製 草果仁
烏梅去核 甘草 生薑 棗子各等分

右劉以鹽少許淹食頃用厚皮搗包裏以水濕之慢火炮令香熟焙乾每服一兩水一椀煎半椀溫服未發前連進數服神効。

○一論人平素不足兼以勞役內傷挾感寒暑以致瘧疾寒熱交作肢體倦怠乏力少氣或瘧發經年不愈則氣血皆虛瘧邪深入名曰瘧瘵此方治之

加味補中益氣湯

黃芪蜜炒 人參 白朮去蘆 陳皮 當歸 升麻 白芍 黃芩 半夏

甘草 五分

右劉蕡藥煎空心服。○有汗加桂枝五分。○黃芪○熱感倍柴苓○渴加麥門冬天花粉。

○一論傷暑發瘧宜服香茹散

香茹 四錢 厚朴薑炒 扁豆 各一錢 烏梅 一箇
右水煎臨熟入薑汁一匙溫服。

○一論熱瘧火盛舌卷焦黑鼻如烟色六脈洪弦而緊此乃陽毒而深先以青布相疊數重新汲水漬之搭于胸上須臾再易如此三次熱勢稍退即服此藥。

龍虎湯

柴胡 一錢 黃芩 一錢 半夏 七分 石膏 二錢 知母 一錢
黃連 五分 黃柏 一錢 梔子 八分 粳米 五十粒

壽世保元

丙集三卷

十八

○一治瘧瘵太熱煩燥宜用地龍飲子

生地龍 三條研入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調和服如熱加龍腦少許

○一治虛弱之人患瘧初起感寒者宜五積散依本方用薑葱煎服方見中卷

○一論體虛之人患瘧寒多不愈者不可用截藥宜用分利順元散

川烏一兩去皮附子一兩去皮 南星二兩半生 木香五錢不
右劉每服四錢生薑十片棗七枚水一盞煎七分當發早晨連進二三服半生半熟能分解陰陽也

○一論諸瘧不問先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日并發或間

日一發頭疼惡心煩渴引飲氣急喘急口苦咽乾諸藥不效者服此
截之

常山飲子

常山二錢 草果二錢不去皮 知母二錢 良薑一錢五分 烏梅一錢

右到一兩一劑棗五枚未發時前連進三服

○一論瘧疾夜發者乃陰經有邪此散血中之風寒也宜此

麻黃桂枝湯

麻黃一兩 桂枝二錢 黃芩五錢 枳仁去心三錢 甘草炙三錢

右到水煎服桃仁散血緩肝之藥

○久瘧腹中有癥用冰磨沉香下雄黃解毒丸打下黑血如泥極見其
驗也方見通治

○一海外高僧傳于周少峰治瘧疾不問新久虛實寒熱諸般鬼邪邪症

壽世保元

丙集三卷

十九

瘧瘧瘧瘧一服立愈其効如神

番木鱉馬鱉子去殼 雄黃一錢 朱砂一錢 甘草一錢

右共為細末每服四分其瘧將發預先吃飯一碗將藥水酒調服被益
臥睡即愈

○一治瘧疾先寒後熱熱多寒少或單熱不寒者

桂枝五錢 石膏五錢 知母五錢 黃芩一錢

右到水煎服

○一治瘧疾服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也

小柴胡湯加石膏知母桂枝水煎服

○一治久瘧不能食胸中鬱鬱欲吐而不吐以此吐之

雄黃 甜瓜蒂 赤小豆各等分

右為末每服五分溫水調下以吐為度

○一論久瘧結成癥瘕癖在胸脇之間諸藥不愈者宜

瘧瘧飲

蒼朮酥酒 草果去皮 桔梗 青皮 陳皮

良薑各五 白芷 白茯苓 半夏湯泡 枳殼炒

桂心 乾薑三錢 蘇葉 川芎各二 甘草炙三錢

右每服一兩水煎入鹽少許空心服

○一治久瘧腹中痞塊用

阿魏丸

醋炙 三棱醋浸 莪朮醋浸 香附子未醋浸

陳皮一兩 真阿魏五錢

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸淡薑湯送下

○一論瘧疾一月一發或二日一發或三五日一發或經三兩月或半年
一載或誤用止截太過久不能愈者此元氣脾胃大虛以

補中益氣湯方見內傷依本方加常山檳榔知母貝母一二劑立已愈後

補中益氣湯方見內傷依本方加常山檳榔知母貝母一二劑立已愈後

壽世保元

丙集三卷

二十

去四味只用本方調理多服自然正氣盛則邪氣自退矣

○一論患瘧寒熱用止截之劑反發熱惡寒飲食少思神思昏倦脈或浮
洪或微細此陽氣虛寒以

補中益氣湯方見內傷依本方參芪歸朮各用三錢甘草一錢五分加炒

乾薑炮附子各一錢一劑寒熱止數劑元氣復

○一論經年久瘧氣血俱虛而三日五日一發者以

十全大補湯方見補益依本方益氣在陽分淺而易治邪氣在陰分深

而難治宜多服為良

○一治三年久瘧不瘥用棟參乾生薑各五錢酒調服汗出立止

○一凡瘧後形體骨立發熱惡寒食少體虛補中益氣內參芪歸朮各加

三錢甘草一錢五分炮薑二錢一劑而寒熱止數劑而元氣復

○一掃人瘧久不已發後口乾倦甚用七味白朮散加麥門五味作大劑

煎與之飲再發補可乃用補中益氣加茯苓半夏十餘劑而愈凡瘧瘧

前與之飲再發補可乃用補中益氣加茯苓半夏十餘劑而愈凡瘧瘧

余常以參朮各一兩生薑四兩煨熟前服即止或以大劑和中益氣加煨薑尤効生薑一味亦効。

○一凡久瘧多屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱除火下流則寒熱交作或吐瀉不食戰慄泄瀉手足厥冷皆脾虛弱宜益氣湯諸症悉愈若手足厥冷加大附子。

○一婦人久患瘧瘵作則經不行形虛脈大頭痛懶食大便泄瀉小便淋瀝口乾唇裂內熱腹脹益由久瘵正氣已虛陰火獨旺以益氣湯治之尋愈惟不時頭痛加蔓荊子而止又兼六味丸而經行。

痢疾

脈宜微小不宜浮洪且滑大不宜弦急身寒則生身熱則死。

痢者古之滯下是也多由感受風寒暑濕之氣及飲食不節有傷脾胃積鬱結而成也其在太便窘迫裏急後重數至固而不能便腹中疼痛

壽世保元

內集三卷

三二

所下或白或赤或赤白相雜或下鮮血或如豆汁或如魚腦膿血相雜或如屋漏水此為感之有輕重積之有淺深也其濕熱積滯下於血分則赤下於氣分則白赤白兼下氣血俱受邪也雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治之但分新久更量元氣用藥凡痢初起元氣未虛必須下之下去後元氣虛弱痢稍以耆不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛寒者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下太便了而不了者血虛也數至固而不便者氣虛也○丹溪曰痢赤屬血自小便來白屬氣自大便來。

下痢不治症

下如瀉崩者生半死 下若屋漏水者必亡 下若糜爛色者必死
下純黑者死 下如竹筒直者死 下純紅者難治

身熱脈大者死是亦大槩言之耳小使絕不通為胃絕
領因將軍丸 治痢之總司也

鋪紋好大黃一斤切薄片分作四處聽用。

一分用川黃連去毛二兩剉片水浸汁拌大黃同炒乾為度。

一分用吳茱萸去梗二兩用米泔泡出汁拌大黃同炒乾為度。

一分用乳乳汁浸拌大黃同炒乾為度。

右四分共合一處為細末酒打米糊為丸如梧子大將三半子蒸三瓶將一半晒乾各包聽用。

如白痢用吳茱萸煎湯送下三十九半生半熟。

如赤痢用黃連煎湯送下三十九半生半熟。

如赤白痢用吳茱萸黃連煎湯送下三十九半生半熟。

先服此下之。

香通化滯湯

壽世保元

內集三卷

三二

當歸尾一錢 白芍一錢 黃連一錢 黃芩一錢 黃柏一錢

枳殼去穢炒五分 檳榔一錢 大黃三錢 滑石二錢

甘草二分 木香一錢

右剉水煎空心熱服。

○一論下痢白多不拘新久或用前藥下後未愈者用此和之。

白木和中湯 當歸酒洗 白芍炒上 白木炒上 白茯苓去皮陳皮中

黃芩炒中 黃連炒有紅甘草下 木香少許

右剉水煎食前服。

○一論下痢紅多不拘新久或用前藥下後未愈者用此調之。

當歸調血湯 當歸一錢 川芎一錢 白芍三錢 黃連一錢 黃芩一錢 桃仁研一錢 升麻五分

右到一劑水煎空心服。如白痢加吳茱萸炒下錢茶連用酒炒。白痢加白木茯苓陳皮香附各下錢。
 ○一治赤痢血痢痛不可忍。又治流痔其效如神。病雖重。下一服即愈。逐瘀湯

阿膠炒 枳殼炒 茯苓 茯神 白芷 川芎
 赤芍 生地黃 莪朮 木通 五靈脂炒

生甘草各一桃仁去皮大黃各一錢
 右到一劑水一鍾半入蜜三匙再煎服。

○一治素有積熱下痢白膿腹痛脹脹晝夜無度。瀉至大便閉結小便不通。此三焦有實熱也。服此即愈。或下痢紅或赤白相雜皆效。
 清膿解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 梔子 大黃 倍用 連翹 滑石
 木通 車前子 海金沙 枳實 莪朮

壽世保元

內集三卷

二十三

右到水煎空心服。

○一治脾泄瀉痢疾屬氣虛宜此。
 加味六君子湯

又參 白朮去蘆 白茯苓去皮 黃芪各一錢 懷山藥二錢
 砂仁研一錢 甘草五分

右到一劑水煎三枚水煎空心溫服。如腹痛加炒黑乾薑木香各五分。烏梅一箇。

○一論下痢赤白膿血相雜腹痛裏急後重晝夜無度。日久不愈不能起床。不思飲食疲倦之甚。或服藥亦峻利之過者宜。

加減補中益氣湯。方見內傷。依本方去柴胡加白芍炒澤瀉木香砂仁白豆蔻地榆御米殼 醋炒三分。

○一論噤口痢。服藥過久。又服攻伐等藥。他醫而不效者。以代形氣極弱去無休息。稀色惡候。出者並與投之。

表臟復元湯

人參三錢 白朮去蘆炒一白茯苓去皮 白豆蔻去殼研
 乾薑炒黑 粟殼炒子蜜水 製附子五分 烏梅三箇
 木香一錢 甘草炒五分

右到一劑北棗三枚水煎空心溫服。相再煎服。謹節飲食。

○一論噤口痢其症有冷有熱。有冷熱不調。皆須先發散表裏。如手心熱。目赤是熱。宜散。如散加陳米煎服。如手心冷及純下白痢者是寒。宜用。適肉不去。心為未用。米飲調服三錢。敗毒散方見內傷。又治噤口痢。熱冷皆然。若神效。加白芍黃連尤效。

○一治噤口痢。飲食不下。
 參朮白朮散方見內傷。依本方加石蓮肉石菖蒲各一兩。或存氣加木香五錢。

壽世保元

內集三卷

二十四

○一治下痢噤口。諸藥不效者以。

醇酒半盞。薑汁半盞。合米湯半盞。三味合一處入陳乾松葉一握。搗爛。一併合之。胃口立開。如口不開。用鐵筋撥開牙齒。灌下立已。

○一治噤口藥食俱不受用。
 田螺殼炒連殼搗爛。入麝少許。調勻。填滿臍內。引熱下降。服藥再不吐矣。

○一治噤口痢。食不下。

老蒼米炒香熟為末。洋搗火煨。每米粉三四匙。鹽少許。白滾水下。

○一治下痢噤口。點服方。
 用首胎黃。每錢加雄黃五分。胡黃連四分。片腦少許。共為細末。羅羅點兩眼角。

○一治下痢噤口。傳明。依傳。
 用首胎黃。磁器收入水銀。蒸佳。入麝少許。點兩眼角。即能食。

一治下痢禁口，胡荽恒傳

用雞丁隻去毛，葱切片入罐內，用胡椒末五錢，入水同煎，用炭布重

一治下痢禁口飲食不下，多是胃中熱甚

川黃連三錢，人參一錢五分，甘草五分，一方加石蓮肉各一錢

右用承煎，終日呷之，如吐再強飲，但得一二呷，即便好

又方以秤槌燒紅，用好醋淋冷，病人開口，吸氣吞之，即效

一治痢疾發能，益元散用人參白朮煎湯，調下，類服，自止

一治久痢休息不止，百方不效，用黃連末木香末十分之一，搗成細末

油入藥水，黃爛搗為丸，每服五十九粒，空心米湯下

一入年老久痢不止，肌瘦如柴，晝夜苦楚，命已垂危，用人參二兩，水煎

服之，鼻有微汗而甦，後用十全大補湯調理而安

一入下痢小腹急痛，大便欲去不去，此脾胃氣虛而下陷也，用補中益

氣送八味丸二劑而愈，此等症候，因利藥致損元氣，肢體腫脹而死者

不可救藥

一入停食，患痢，腹痛下墜，或用疎導之劑，兩足腫脹，食少體倦，煩燥作

渴，脈洪數，按之微細，以六君子加枳實各二錢，吳茱萸五味各一錢，煎

熱冷服之，即甦，而諸症退，再劑全安，此假熱而治以假寒也

一入嘔吐不食，腹痛後重，自用大黃等藥，二劑腹痛益甚，自汗發熱，昏

憤，脈大子用，參朮各二兩，炙甘草炮乾薑各三錢，升麻一錢，水煎，一服而

甦，又用補中益氣湯加炮乾薑二劑而愈

一入痢後兩足浮腫，胸腹脹滿，小便短少，用分利之劑，遍身腫脹，氣喘

急，日兩足浮腫，脾氣下陷也，胸腹脹滿，脾虛作痞也，小便短少，脾不能

生腎也，身腫，氣喘，脾不能生肺也，用補中益氣湯加大附子，以助陽氣，

後因飲食勞倦，兩目浮腫，小便短少，仍服前藥頓愈

一入下血，服犀角地黃湯等藥，其血愈多，形體消瘦，發熱，少久，後

重此脾氣下陷，余用補中益氣加炮薑一劑而愈

一入血痢及下血不止，以六味丸加地榆阿膠炒黃連黃芩生地黃

一入患痢後重，自知醫用芍藥湯後，重益甚，飲食少，患腹寒，肢冷，予以

為脾胃虧損，用六君子湯加木香炮薑二劑愈

泄瀉

脈多沉傷於風，則浮傷於寒，則沉細，傷於暑則沉微，傷於濕則沉緩，洩而

腹痛，脈弦者死，反云脈緩時微，小者生，浮大數者死

夫泄瀉屬濕，屬氣虛者有火，有痰，有食積，有寒，有脾泄，有腎泄，凡瀉水腹不

痛者，濕也，飲食入胃不化，完穀不化者，氣虛也，腹瀉瀉者，如瀉瀉痛，一

陣瀉，一陣者，火也，或瀉或不瀉，或多或少，或少者，痰也，腹痛甚而瀉瀉，後

痛減者，食積也，肚腹痛，四肢冷者，寒也，常常泄瀉者，脾泄也，五更泄瀉，

腎泄也，宜分別而治也，太僕泄瀉，因濕傷其脾者，居多，以胃苓湯加減

胃苓湯 主方

蒼朮 米泔浸厚朴 薑汁炒陳皮 枳殼 澤瀉 各一錢

白朮 法製 炒白茯苓 五錢 白芍 五錢 肉桂 甘草 各

右剉一劑，生薑三片，棗二枚，水煎，溫服，泄瀉稍久，加升麻防風，有

熱者，加酒炒黃連，有寒者，加炒乾薑，暴泄水瀉，加滑石，食積，加

山查神麩，有痰，加半夏烏梅，氣虛，加入參白朮，氣鬱，加香

久瀉，加乾薑肉蔻，暴瀉，赤白相雜，腹痛裏急後重，去桂，加檳榔木香

黃連，水煎服

一論泄瀉，飲食入胃不化，完穀不化者，氣虛也

益氣健脾湯

丙集三卷 二十五

二十六

人參 白朮去蘆 白茯苓去皮 陳皮 白芍炒
蒼朮米泔浸 乾薑炒黑 柯子煨 肉寇麩煨 升麻酒洗
甘草炙

右劉薑棗煎服。○腹痛加桂。忌油膩。
○一論泄瀉腹痛瀉水如熱湯痛一陣瀉一陣者火也宜
加味四苓散。

白朮去蘆 白茯苓去皮 澤瀉 木通 梔子 黃芩
白芍 甘草

右劉燈心十莖水煎空心服。
○一論泄瀉或多或少或瀉或不瀉者痰也宜
加味二陳湯。

陳皮 半夏薑炒 白茯苓去皮 白朮去蘆 蒼朮米泔浸 厚朴姜炒 砂仁
山藥炒 車前子 木通 甘草炙

壽世保元 丙集三卷 二二七

右劉一劑生薑三片烏梅一箇燈心十莖水煎溫服。
○一論泄瀉腹痛甚而泄瀉瀉後痛減者食積也用
香砂平胃散。

蒼朮米泔浸 陳皮 厚朴姜炒 白朮去蘆 白茯苓去皮 半夏姜炒
砂仁 香附炒 神麴炒 白芍炒 甘草炙

右劉生薑煎服。
○一論劉草怒痛瀉要方。傷食腹痛得瀉便減今瀉而痛不止故去心
敗木賊也。

白朮炒 三錢 白芍炒 一錢 陳皮炒 五分 防風 一錢
右劉水煎溫服。

○一論泄瀉瀉腹痛四肢厥冷者寒也宜
附子理中湯。

白朮去蘆 乾薑炒 人參 白茯苓去皮 砂仁 厚朴姜炒

蒼朮米泔浸 熟附子 甘草炙
右劉生薑水煎服。

○一論泄瀉氣弱身飽常稀瀉者此脾泄也用
扶脾散。

蓮肉去心 不去 陳皮 一兩 白茯苓 一兩 白朮陳壁土 炒 三兩 麥芽 炒 五錢
右為細末每服二錢白砂糖二錢滾白朮送下補脾助元氣令人能食
止瀉。

○一論滑瀉日夜無度腸胃虛寒不禁宜服
八柱散。

人參 白朮去蘆 肉寇煨 乾薑炒 柯子煨
大附子麩裹 梁殼蜜水炒 甘草炙

右劉一劑薑一片烏梅一箇燈心一團水煎溫服。
補脾丸 症治同前。

壽世保元 丙集三卷 二二八

白朮去蘆 十兩 四分 肉桂 二小筒 三枚
蓮肉去心 炒 人參 各一兩 甘草 炙
山藥炒 陳皮 各七錢 乾薑炒 三錢
右為細末煮粥加炒神麴末打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心淡
薑湯下專治老人弱人脾泄瀉殊中。

○一論泄瀉脾腎虛弱便晨五更作瀉或全不思食或食而不化大便不
實者此腎泄也凡飯後隨即大便者蓋脾腎虛所以有水穀之分脾
氣雖強而腎氣不足故飲食下咽而大便溏也治法用三神丸
主之。

三神丸
破故布 四兩 炒 肉豆蔻 二兩 生用

右為末用大紅棗四十九箇生薑四兩切碎同煮用米煮熟去薑取棗
肉和為丸如梧子大每服五十九丸空心薑湯下加吳茱萸泡炒一百五

味子二名四神丸治經年久瀉不止者神效

○一人善飲便滑溺澀食減胸滿腹足漸腫症屬脾胃虛寒以金匱腎氣丸夜進腫消更用八味丸胃強脾健而愈

○一人病瀉每至五更輟即利此腎泄也用五味子散敷腹而愈因起居不慎泄復作年餘不瘥此命門火虛不能生脾土法當補其母火竹土之母也遂用八味丸補其母瀉即止食漸進東垣云脾胃之氣虛則能食而肥虛則不能食而瘦全賴命門火為生化之源滋養之根也故用八味丸委効只用六味丸亦可

○一論太便滑利小便閉澀或腹體漸腫喘嗽唾痰為脾胃氣血俱虛十全大補湯方見補益送下四神丸

○一論腎虛久瀉不止用六味地黃丸加五味子破故布肉豆蔻裝菜並方見補益

○一論久瀉多因及用消食利水之劑損其真陰元氣不能自持遂成久瀉

壽世保元

丙集三卷

二十九

若非補中益氣湯四神丸滋其本源後必脫落腹脹小便淋瀝多致不起

○一人患泄瀉日久不止以致元氣下陷飲食入胃不化完穀不化肌肉消削肢體沉困面自兩足腫滿上氣喘急此元氣脾胃虛之甚也宜補中益氣湯方見內傷依本方減當歸加酒芍茯苓澤瀉山藥蓮肉木香乾薑炒黑止泄瀉之良方也

○一泄瀉因內傷勞倦飲食化運作瀉及脾胃素虛濕熱但遇飲食勞倦即發而肢體酸軟沉困泄瀉者以益氣湯去當歸加炒芍茯苓木香苓澤瀉薑棗煎服

○一治久瀉大腸滑泄五倍子炒五兩為末麩糊為丸如梧子大每服五九米飲下日三服

○一治泄瀉手足冷不渴腹痛用入參白朮乾薑甘草水煎熱服中寒者加附子

○一治久瀉大腸滑泄五倍子炒五兩為末麩糊為丸如梧子大每服五九米飲下日三服

○一治久瀉大腸滑泄五倍子炒五兩為末麩糊為丸如梧子大每服五九米飲下日三服

○一秘方治泄瀉

取桑根水濕灰火焙熟食之不二四箇即止

○一治泄瀉二三日或腹疼痛生薑豆豉胡椒煎湯熱服立止

○一治暴泄不止小便不通重前子炒為末每服二錢米飲調下其根葉亦可搗汁服此藥利水道而不動元氣

○一治泄瀉用積實肚一枚淨洗去脂膜入大蒜在內以米煮爛搗碎入蒼朮滑製陳皮厚朴薑炒甘草炙等分為末同桂為丸如梧子大每服三五十九空心米湯下薑湯亦可

○一治許州黃太守患泄瀉二三年不愈每飲燒酒三鍾即止二三日以為常畏藥不治召余診之六脈弦數先服此藥以解酒劫後服理氣健脾胃丸加澤瀉而愈方見傷食門

○一治許州黃太守患泄瀉二三年不愈每飲燒酒三鍾即止二三日以為常畏藥不治召余診之六脈弦數先服此藥以解酒劫後服理氣健脾胃丸加澤瀉而愈方見傷食門

壽世保元

丙集三卷

三二

宜黃連一兩生薑四兩

右為二處以慢火炒令薑乾脆色去薑取連搗末每服二錢空心開茶清下甚者不過二服專治久患泄瀉

○一治大便澀泄米穀不化用黃連酒炒白芍煨吳茱萸炒各等分

○一治泄瀉手足冷不渴腹痛用入參白朮乾薑甘草水煎熱服中寒者加附子

○一治久瀉大腸滑泄五倍子炒五兩為末麩糊為丸如梧子大每服五九米飲下日三服

○一治久瀉大腸滑泄五倍子炒五兩為末麩糊為丸如梧子大每服五九米飲下日三服

○一治久瀉大腸滑泄五倍子炒五兩為末麩糊為丸如梧子大每服五九米飲下日三服

○一人食下即瀉而即瀉不飲食一此食之即瀉諸藥不效以生紅柿

○一人食下即瀉而即瀉不飲食一此食之即瀉諸藥不效以生紅柿

○一人食下即瀉而即瀉不飲食一此食之即瀉諸藥不效以生紅柿

三白散 治一切泄瀉如神

白朮去蘆炒 白芍五分 白茯苓去皮澤瀉一錢 厚朴姜炒

黃連各一錢 乾薑五分 烏梅肉兩用三錢

如兼傷食加神麩炒麥芽炒各一錢

右對生薑三片水煎食前服為神麩為丸服尤效

霍亂

明大者生。○脈微弱而遲者死。○脈代者霍亂氣少不語舌捲筋縮者不治。

夫霍亂者揮霍變亂也。其證心腹卒痛嘔吐下利發熱增寒頭暈眩暈瀉而不吐或吐而不瀉先心痛則先吐先腹痛則先瀉。然腹痛則吐瀉俱作甚則轉筋頰頓手足厥冷死生反掌間耳。治宜霍亂正氣散加生薑為上。不惟可以瀉散風邪亦可調理吐瀉蓋有極瀉名瀉霍亂

壽世保元

丙集三卷

三十一

死者少也。若上不得吐下不得瀉名乾霍亂而死者多也。治之急須以鹽湯灌之令其大吐庶有可生者。切莫與穀食雖米飲一呷入口即死。必待吐瀉過二三時直至飢甚方可與稀粥。慢調可也。轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也。

○一論四時不正之氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛吐瀉中者冒風吐瀉中濕身重泄瀉或不服水土脾胃不和飲食停滯復感外寒頭痛憎寒或嘔逆惡心胸膈痞悶或發熱無汗者並治。

霍香正氣散

霍香 二錢 紫蘇 陳皮 厚朴 薑汁炒 半夏 薑汁炒

白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 桔梗 去蘆 大腹皮 白芷 各一錢

甘草 五分

右對生薑三片煎服。○霍亂轉筋加木瓜。○腹痛加芍藥。○吐瀉加官桂。○飲食不化心下痞悶加香附砂仁。○米飲不

化加神曲炒麥芽炒。○肉食不化加山楂。○心下痞加枳實青皮。○中暑冒風加香茹扁豆。○時氣增寒壯熱加柴胡乾葛。○發熱加麥門冬淡竹葉。○口渴作瀉小便不利合五苓散。○濕熱相搏霍亂轉筋瀉瀉開亂合黃連香茹散。○心腹絞痛加木香。○若頻欲登園不通利者加枳殼。

○一論霍亂之疾未有不由內傷生冷外感風寒而致也。余用霍香正氣散治之百發百中。一歲之內常治百人未有弗效者。但在熱者須加黃連炒黃連寒甚者加乾薑萬無一失。又腹痛加桂。痛甚夫霍香加吳茱萸小便不利加茯苓。如乾霍亂加枳殼白茯苓官桂最毒。

○一治虛弱之人上吐下瀉霍亂手足厥冷腹痛脈微者乃陰症也。理中湯

人參 白朮 去蘆炒 乾薑炮 甘草 各等分

壽世保元

丙集三卷

三十二

若霍亂吐瀉加青皮陳皮名治中湯

若霍亂心腹作痛先以鹽湯頻服候吐出即進此藥

若嘔吐者於湯中湯內加丁香半夏生薑十片

若泄瀉加橘皮茯苓名補中湯

若瀉瀉不已於補中湯內加附子一兩

若不喜飲食米穀不化加砂仁附子陳皮茯苓

若霍亂吐下心腹作痛手足厥冷去白朮加附子名四順湯

若傷寒結胸先以枳梗湯再不愈及諸吐利後胸痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實茯苓名枳實理中湯

若瀉者再於枳實理中湯加天花粉。○渴欲飲水加白朮

若霍亂轉筋理中湯加木瓜石羔

若瀉上逆者腎氣動也去白朮加桂枝名理中湯

若情多加茯苓

若腹滿去白朮加附子

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脈

一論霍亂吐瀉上吐下瀉腹內疼痛及乾霍亂俗名攪腸沙真陰症手足厥冷宜服

理中丸

人參 乾薑炮 白茯苓 去皮甘草 各等分

右為末煉蜜為丸每重一錢細黃淡薑湯下忌食米湯此即理中湯改為丸取土能塞水之義若仍煎湯則不効矣

一論乾霍亂者俗名攪腸沙其症因宿食不消心腹攪痛欲吐不吐欲瀉不瀉揮霍極亂所傷之物不得出洩故也死在須臾急宜多進薑湯探吐之冷物出盡却服理中湯或理中丸亦可更刺十指出血并委中

壽世保元

丙集三卷

三三三

出血

一霍亂身熱口渴此熱暑中也宜加減茹苓湯

猪苓 澤瀉 香茹 乾薑炮 赤茯苓 一錢

天花粉 二錢 白朮 去蘆 黃連 各五分 甘草 三分

右到一劑生薑煎服如熱極加石膏知母泄極加升麻滑石腹瀉加炒芍藥五分桂三分寒瀉亦加此

一霍亂吐瀉用生薑細切以新汲水調益元散頓服之立止

一論霍亂吐瀉因飲冷或胃寒或寒飢或木怒或乘舟傷動胃氣令人上吐下瀉不止頭暈眼花手足轉筋四肢厥冷用藥遲緩須臾不救

百沸湯

吳茱萸 五錢 木瓜 五錢 食鹽 五錢

右三味同炒焦用百沸湯煎隨病人意冷熱服之

一左用枯白礬為末每服一錢百沸湯煎服

一治傷食吐瀉腹脹

白朮 去蘆 白茯苓 去皮 陳皮 川厚朴 去皮 澤瀉 各一兩

猪苓 八錢 蒼朮 米泔浸 神麴 炒 七錢 麥芽 炒 七錢 砂仁 三錢

木香 二錢 甘草 炙 五錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每下丸米湯研化下

一治脾虛氣陷吐瀉煩渴用

人參 白朮 炒 白茯苓 去皮 懷山藥 藿香 葛根 升麻

右為細末每服二錢米湯調下

一論霍亂已愈煩熱多渴小便不利宜

壽世保元

丙集三卷

三四

麥門冬湯

人參 白朮 去蘆 白茯苓 去皮 陳皮 半夏 姜炒

麥門冬 去心 甘草 小麥 烏梅

右到生薑五片水煎溫服

一論乾霍亂上不得出下不得利出冷汗氣欲絕者

鹽一大把炒令黃入童便一碗溫和服之少頃吐下即愈

一治霍亂吐瀉心腹作痛

炒鹽二碗布包紗護其腹前非腹肚上截以針穿火熨氣透則甦

續又以炒鹽熨其背則十分無事

一治霍亂轉筋用皂角末吹入鼻中得嚏即愈

一霍亂轉筋用大麥一握煎湯盪洗北人以麥糖代之使腹理開洩陽

氣散愈也河間云熱氣燥燥於筋則攣熱而痛也

一轉筋入腹欲死者生薑二兩搗爛以酒五盞煎服

一霍亂上吐下瀉 鄧對峰傳

用蕪菜搗汁一盞重湯煮服之立止。

一霍亂吐瀉腹痛服藥即吐無法可施

用百沸湯半碗并泉水半碗合而服之即安名陰陽湯極效。

一霍亂吐瀉

樟樹皮一把水煎服立止。

一論霍亂不拘寒暑吐瀉不出腹痛煩燥之症霍亂死在旦夕者

病人腿腕橫紋上離溫水拍打紫紅脈見以布針或磁石刺破出血

即愈。

一治霍亂吐瀉 藿香梗一味煎水服立效一方加陳皮尤效。

嘔吐

壽世保元

丙集三卷

三五

脈滑數為嘔代者霍亂微滑者生滑數凶斷

嘔吐者飲食入胃而復逆出也。有聲無物謂之噦。有物無聲謂之吐。嘔吐

謂之噦。有物胃氣有所傷也。中氣不足所致。有外感寒邪者。有內傷飲

食者。有氣逆者。三者俱以藿香正氣散加減治之。有胃熱者。清胃保中

湯。有胃寒者。附子理中湯。有嘔噦痰涎者。加減二陳湯。有木寒停胃者。

茯苓半夏湯。有久病胃虛者。比和飲。醫者宜審而治之也。

藿香正氣散方見霍亂治諸嘔吐。照後加減。

一論外感寒邪嘔吐者。依前方。

一論內傷飲食嘔吐者。依前方。加砂仁山查神曲。

一論有氣逆嘔吐者。依前方。加木香砂仁白豆蔻。

一論胃虛有熱作嘔吐者。宜後方。

清胃保中湯 藿香一錢 白朮一錢 陳皮八分 半夏八分 白茯苓八分

砂仁三分 黃連二錢 黃芩二錢 梔子三錢 甘草二分

加枇杷葉去毛

右到一劑生薑三片長流水和黃泥攪淨二鍾入藥煎至一鍾併

服。吐逆甚加伏龍肝一塊。因氣加香附一錢。枳實一錢。去

白朮。心煩不寐加竹茹。酒傷脾胃加乾葛天花粉白豆蔻。

一論嘔噦痰涎者

加減二陳湯 陳皮 半夏 白茯苓 甘草 人參

白朮 竹茹 砂仁 山梔 麥門冬

右到一劑生薑三片棗一枚水煎徐徐溫服。

一論水寒停胃作嘔吐者

茯苓半夏湯

茯苓去皮 半夏 陳皮 蒼朮 米泔浸厚朴

壽世保元

丙集三卷

三六

砂仁五分 藿香八分 乾薑三分 烏梅一錢 甘草三分

右到一劑生薑三片水煎徐徐服。

一論陰症嘔吐或手足厥冷腹痛屬虛寒者。附子理中湯。方見中

寒門。

一論久病胃虛嘔吐月餘不納水穀。即嘔。開藥亦嘔者。

比和飲 人參 白朮 白茯苓 藿香 陳皮

砂仁五分 神麴 甘草三分

右到一劑用陳倉米下合順流水二鍾煎沸。泡伏龍肝。研細。攪淨。

取一鍾。生薑三片棗二枚。同煎七分。稍冷服。別以陳倉米煎湯。時時

日進藥。三服。即止神效。

一論卒暴嘔吐虛弱困乏無力及久病人嘔吐飲食不入。即此

人參一兩切片水煎徐徐服之立止。

○一治胃氣冷吃食即欲吐白豆蔻五錢為末以好酒下薑椒溫調服日三匙。

○一治冷涎嘔吐陰症乾嘔。

吳茱萸湯五錢 生薑五兩 人參三分 大棗五箇

右剉水煎食前服。

○一治患嘔吐聞藥即嘔百方不効以扶龍尾為末水丸寒兩粒乳打服對症藥遂不再吐如神。

○一治熱症嘔吐或增寒發熱口苦。

小柴胡湯多加生薑人參須分兩或加烏梅。

○一治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足心皆熱有是竹茹湯

半夏薑汁浸乾葛 青竹茹 甘草生

右剉薑棗煎服或加前胡。

壽世保元 丙集三卷

○一治嘔吐屬乾者

黃連一錢 石膏二錢

右為末白滾水送下。

○一治熱嘔不止

梔子炒黑 朴硝各等分

右為末每服二三匙白滾水送下。

○一論大腸結燥嘔吐不止湯藥不入老人虛人多有此症幽門不通上冲穀門嘔吐泛滿之症法須先以導前通其幽門然後服藥蓋人身之氣上下週流不通必宜其上如前吐法是也上不安必較其下也。

藿香 厚朴 姜炒 陳皮 白木 去蘆炒半夏 姜製

白茯苓 去殼砂仁 各五分 枇杷葉 糖洗 煎 甘草 三分

生薑 一錢

右坐水煎服。

○一治嘔吐宿滯脘腹脹長手足俱冷脈微細用附子理中丸服盡其脈浮大按之而細用參附湯一劑而愈。

○一論陰虛於下令人多嘔者乃諸陽氣浮無所依從故嘔咳上氣喘以六味地黃丸用薑湯送下。

○一嘔吐不食腹脹後重自用大黃等藥一劑腹痛益甚胃汁發熱情脈大予用參朮各一兩炙甘草煨薑各三錢升麻一錢水煎服而愈又用益氣湯加炮薑二劑而愈。

翻胃

脈浮緩者生沉瀉者死。○脈瀉而小血不足脈大而弱氣不足。

天翻胃之症其來也未有不由膈噎而始為膈噎者喜惡不常憂思勞役驚恐無時七情傷於脾胃燥而止痰痰與氣搏升而不降飲食不下血氣留於咽嗝五噎結於膈膈者為五膈法當順氣化痰溫解養胃如陽

壽世保元 丙集三卷

脈緊而瀉者為難治之症夫番胃即膈噎膈噎乃番胃之漸大法有四

血虛氣虛有痰有熱血虛者脈必數而無力氣虛者脈必緩而無力氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必死有熱者脈必數而有九有痰者脈必滑數二者可治血虛者則以四物湯為主左手脈無力氣虛者則以四君子為主右手脈無力者則以四物湯為主不可治大腸無血故也痰以二陳湯為主寸關脈沉或伏或大有氣結滯通氣之藥皆可

用寸關脈沉而瀉大不可用香燥熱劑宜瀉滋味又曰膈噎番胃之疾得之六淫七情遂有火熱炎上之作多升少降又有外為除火上炎番胃者作除火治之太便秘結用重便竹瀝薑汁薑汁牛羊乳粉氣而用

○一論膈有十般之病其皆同出於一源皆因動性不能發洩則鬱於肝人之膈膜屬肝木否則木乘土位木曰曲直作酸酸則能收其胃腕因之而收水窒礙乃作膈症宜用此湯

當歸活血潤膈湯

當歸 錢五分 桃仁 一錢 廣陳皮 八分 川厚朴 一錢
黃連 一錢 大腹皮 一錢 紅花 七分 片白木 七錢
炙甘草 三分 善酒 加葛根 七分

右對子刺水煎服

按五噎者雖有五原其初在於氣弱血枯之人思慮勞欲而成者也。氣弱則運化不開血枯則道路閉塞蓋心生血腎生氣任脈乃陰之根。則精潤任脈不潤矣。任脈循咽膈胸中胃之三脘一而而下。腎虛則肝田清氣不升故中焦之化脾雖思味而愛食因升降不調而噎。噎矣宜認慈以復精血須節志以和心脾用當歸活血潤腸湯去白木加入參一錢白豆蔻七箇黃柏酒炒七分知母七分梔子炒一錢八婁仁炒一錢遠志甘草湯去心八分紅棗三枚水煎服。

○一論膈噎胸中不利大便結燥痰嗽喘滿脾胃滯滯此能推陳致新在膈氣之聖藥也。

壽世保元

丙集三卷

三九

入參利膈丸

人參 三錢 當歸 二錢 藿香 一錢 厚朴 姜汁炒 枳實 炒
大黃 酒蒸 木香 一錢 檳榔 五錢 甘草 炙 三錢
右為末淘水為丸如梧子大每服五十九丸溫水下

○一論噎食轉食宜

加減不換金正氣散

蒼朮 米泔浸陳皮 去白 厚朴 姜汁炒 藿香 半夏 姜汁炒
枳實 炒 白朮 去蘆 白茯苓 去皮 白豆蔻 去殼 甘草

右對生薑三片水煎服

○一論噎膈者皆由七情之氣太過鬱則生火生痰而致病也。則耗氣耗血以致虛氣虛不能運化而痰涎虛不能滋潤而生火或胡食而暮吐或暮食而朝吐或食已即吐者日久不愈候極香燥攻之

過多以致危殆宜以
補中益氣湯方見內傷依本方去柴胡升麻加半夏白茯苓白芍酒炒枳實炒神麴炒黃連薑炒

○一番胃不食脾胃虛弱不進飲食宜
太倉丸

丁香

砂仁

白豆蔻 去壳陳倉米 黃土炒米熟

右為細末生薑自然汁為丸如梧子大每服百丸食後用淡薑湯送下有怒氣加香附子姜汁炒

○一論五噎者氣鬱勞食思也

氣噎者心悸上下不通噎噎不徹胸膈苦痛

憂噎者天際苦厥逆心忡悸動手足厥冷

勞噎者苦氣隔膈下支滿胸中填塞冷言足逆冷不能自溫

食噎者食無多少胸中苦塞常痛不得帶息

壽世保元

丙集三卷

四十一

思噎者心悸動喜忘目視恍惚皆憂思嗔怒寒氣上攻胸膈

五噎丸 治胸中虛寒日久噎逆逆氣飲食不下結氣不消

人參 五分 白朮 四錢 白茯苓 四分 陳皮 六分 細辛 四分

川椒 五分 吳茱萸 五分 桂心 五分 乾薑 五分 炒 大附子 四錢 去皮

右為末煉蜜為丸如梧子大每服三九酒下日三次服

保和丸 治胃熱者宜

陳皮 半夏 薑汁炒 白茯苓 去皮 連翹 神麴 炒

山查肉 蘿蔔子 炒 黃連 薑炒 五錢

右為末稀米糊為丸如梧子大每服六七十丸入參煎湯送下

○一論胃反不受食食已即嘔吐

入參 二兩 白朮 一兩 半夏 湯洗 生薑 三兩 白蜜 一兩

右五味以水五升和蜜湯之二三升下煮取一升半分三次服之

○一論反胃嘔吐無常時飲入口即吐困弱無力聖藥

人參二兩咀片水煎服立効再用入參汁煮稀粥與服。
○一治番胃用六君子湯加炮薑白豆蔻黃連煎服。
○一治轉食方

反契雞一隻黃熟去骨入人參當歸菖各五錢為末再與取與食之勿令入共食。

○一人年過五十得噎証胃脘作痛食不下或食下良久復出大便結燥人黑瘦甚診其脈右關弦滑而洪關後略沉小三部俱沉弦帶花此中氣不足木來侮土上焦濕熱鬱結痰涎下焦血少故大便結燥除痰上衝吸門故食不下用四物湯以生血四君子湯以補氣二陳湯以祛痰二石成劑加黃炒黃連炒枳實括蕤仁少加砂仁又間服調腸丸百餘劑全安調腸丸方見大便秘。

○一治番胃用大附子一個入於坐於磚上四面着火漸逼漸入生薑自然汁壽世保元 丙集三卷 四二

又依前火逼乾復浸之約生薑汁可盡半碗許搗碎末每服一錢用粟米湯下不過三服立効。

○一治噎膈大便燥結橘杏麻仁丸

陳皮為末 杏仁去皮尖火麻仁去殼各郁李仁去殼右三仁俱搗為膏用棗肉和入石臼內杵為丸每服五十九粒寬煎湯送下。

飢逆

脈浮而緩者易治弦急而按之不鼓者難治。脈結或促或微皆可治。脈代者危。右關脈弦者木乘土位難治。發飢者氣逆上衝而作聲也。一名欬逆因氣逆奔急上行作吐發聲有數者不同不可不辨有胃虛腸熱者宜橘皮竹茹湯有胃虛寒者宜丁香

柿蒂湯有腎氣虛損陰火上衝者宜六味地黃丸有胃氣不足脾虛數氣不相續而發飢者宜補中益氣湯加生脈散黃柏以降虛火或加附子服之立愈有陽明肉實失下而發飢者宜六一順氣湯下之而飲水太過成水結胸而又發飢者宜小陷胸湯或用小青龍湯去麻黃加附子治寒相搏發飢太妙有傳經傷寒熱症誤用煎桂等藥助起火邪痰火相搏而為逆者宜黃連解毒湯白虎湯及竹瀝湯。

○一論飢逆因吐利後胃虛腸熱而欬逆者。橘皮竹茹湯 陳皮二錢 人參一錢 甘草炙一錢 竹茹一錢 加柿蒂一錢 丁香五分。

右劉一劑生薑五片棗二枚水煎溫服身熱發渴加柴胡黃芩去丁香。○一論吐利後太病後胃中虛寒欬逆至七八聲相連收氣不回者薑

丁香柿蒂湯 壽世保元 丙集三卷 四二

人參 白茯苓 陳皮 良薑 丁香 柿蒂各一錢 甘草五分

右劉一劑生薑五片水煎服。○一論欬逆而無脈者用人參復脈散。

人參 白朮 麥門冬 白茯苓 五味子 陳皮 半夏 竹茹 甘草

右劉生薑五片水煎服。

○一論人因飽食後得氣發飢逆連聲不止者宜順氣消滯湯

陳皮 半夏 白茯苓 丁香 黃連 姜炒 神麩炒 香附 白朮 甘草 柿蒂 竹茹

右劉生薑五片水煎服。

○一論腎氣虛損虛火上衝而作欬逆者自膝下上衝直出子口者陰火
上衝難治

六味地黃丸方見補益 依本方作湯加柿蒂沉香木香砂仁

○一論中氣不足肝虛微氣不相接續而作欬逆者宜
補中益氣湯方見內傷 依本方加麥門五味黃柏酒少加熟附子

○一論傷寒陽明內實失下而發呃逆者用
六一順氣湯方見傷寒

○一治傷寒發熱而呃逆者用黃芩子炒不拘多少水煎服。

○一論傷寒發渴而飲水太過成結胸而發呃逆者用
小陷胸湯

黃連二錢 半夏二錢 瓜蒌實二錢

右劉一劑生薑三片水煎服。

○一論傷寒表症未解心下有水氣乾嘔欬逆又治寒喘欬逆以
小青龍湯

桂枝 乾薑 細辛 半夏 芍藥 五味子

熟附子 甘草

右劉水煎服

○一論傷寒陽症呃逆潮熱小柴胡湯加生薑竹茹搗皮

○一論有傳經傷寒誤用薑桂等熱藥助起痰火而作呃逆者用
黃連解毒湯方見戒片 白虎湯方見傷寒

○一論因服攻病藥致傷胃氣下陷而元氣將離以致胃氣共升出之氣
疲斃或久病人而至於呃逆者乃三焦元氣與胃氣俱竭乃危惡之兆也
宜用

大補元湯
嫩黃芪 蜜水炒棟參 去蘆一分 白朮 去蘆炒 煨山藥 一錢

廣陳皮七分 石斛七分 白朮仁 研六分 廣木香三分

沉香三分 甘草炙七分

右劉一劑生薑三片紅棗二枚粳米一撮水煎不拘時溫服

○一論一切呃逆用柿蒂燒存性為末酒調服立止 一方每服用柿蒂七
箇焙為末黃酒調下

○一服法治呃逆服藥無効者用硫黃乳香各等分為末以酒煎服

○一方用雄黃二錢酒一盞煎七分急令患人飲其熱氣即止

○一治呃逆法見後法

○一治痰逆欲死者其肺脈弱都不治用半夏生薑各一兩每服五錢水
煎服

○一治咳逆連咳四五十年者
生薑汁半合蜜一匙與煎令熱溫服如此三服瘳

噯氣

胸噯氣者胃中積滯右寸關緊滑可治弦急則難兩寸弦滑留飲胸間或橫在
寸有積上欄

夫噯氣者胃虛火鬱之所成也 因胃中有火治癆之法虛則補之熱則清
之氣則順之氣順則痰消也

○一論噯氣者胃中有火有痰也宜用
星半湯

南星 薑製 半夏 薑製 石膏 香附 炒梔子 各等分

右劉一劑生薑煎服或以薑汁糊作丸亦可然胃中有熱痰上不能
痰故也

○一論噯氣聲聞於外因氣膈膈悶有痰舌黑乃痰之症也宜服
道痰湯

陳皮 半夏姜炒 白茯苓去皮 香附
 青皮去穢 黃芩炒 黃連姜炒 瓜蒌仁 砂仁 甘草
 右劉生薑三斤水煎服

○一論婦人噯氣胸緊連噯十餘聲不盡噯出氣心頭略寬不噯即藥盡
 破鬱丹

香附醋煮 梔子仁炒 黃連姜汁炒 枳實炒 檳榔一兩
 莪朮煨一兩 青皮一兩 瓜蒌仁一兩 蘇子一兩
 右共為末水丸如梧子大每服二十九食後滾水送下或以分心氣飲
 服之立効

○一上合飲食失宜胸膈膨脹噯氣吞酸以自知醫用上陳枳連香附之
 類前症益甚更加足指腫痛指縫出水余用補中益氣加茯苓半夏治
 之而愈若腿足浮腫或喉腫寒熱嘔吐亦用前藥

壽世保元

百集三卷

四十五

吞酸

脈弦而滑兩手或浮而弦或浮而滑或沉而滑或沉而洪或洪而數或沉
 而遲胸中有寒飲洪數者痰熱在胸膈時吐酸水飲成潮胃也

夫酸者肝水之味也由火盛制金不能平木則肝木自甚故為酸也如使
 食熱則易於酸矣或言吐酸為痰者誤也乃濕熱在胃山上使飲食入胃
 被濕熱鬱為食不得化故作吞酸如穀肉羶蓋在器濕則易為酸也必
 用吳茱萸順其性折之乃在活法

○一論吞酸儲雜酸水刺心者乃痰火鬱氣也宜
 清鬱二陳湯

陳皮 半夏薑炒 茯苓
 梔子炒 蒼朮米泔炒 川芎
 白芍炒 七分 甘草三分
 香附 黃連薑炒
 枳實炒 各八神麩炒 五錢

右劉丁劑生薑煎服
 ○一論鬱積吐酸者用
 萊連丸

蒼朮米泔浸 陳皮一兩 半夏姜炒 白茯苓去皮 黃連二兩半
 吳茱萸月倍用 冬
 右為細末蒸餅為丸如菽豆大每服三五十丸食後白滾湯送下

○一論噯氣吞酸儲雜有痰有熱有氣有食胸膈不寬飲食不化以
 香薷和中丸

白朮去蘆 山查肉 連翹各四兩 白茯苓去皮 半夏姜汁炒
 枳殼去穢 陳皮去白 神麩炒 各二 乾生薑二兩 萊菔子炒
 白豆蔻炒 各五錢 木香五分

○一論婦人心酸乃痰飲積在脾胃間時時酸心或吐水宜
 壽世保元
 百集三卷
 四十六

吳茱萸丸

大麥芽炒 五錢 肉桂 五錢 吳茱萸易洗 蒼朮米泔
 陳皮五錢 神麩炒 五錢

右為細末水煮稀麵為丸如梧子大每服五七十丸飲送下
 ○一論醋心每醋氣山坎如酸醋不可留者用吳茱萸一合水一鍾煎七
 分頓服縱濃亦須強飲留有人心如蟹破服此方効

○一治口吐清水用
 蒼朮鹽土 白朮去蘆 陳皮 白茯苓 滑石炒 水煎服

○一儒者四時喜燥熱飲食或吞酸噯腐或不使不實足指絲滑此脾
 氣虛寒下陷用六君子加薑桂治之而愈稍為寒宜諸疾仍作用前藥更
 加附子使許數劑不再發

○一婦人吞酸噯腐嘔吐痰涎面色純白或服三陳黃連枳實之類則痰
 熱作渴肚腹脹滿予曰此脾胃虧損未傳表中也信仍作火治吐酸噯腐

服如過余以六君加附子木香治之此氣漸醒飲食漸進虛火歸經入以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏兼服愈

○一治食後吐酸水用乾薑吳茱萸各二兩為末每服方寸匙酒調服

二服以冷服之立効

饋雜

夫胃為水穀之海無物不受若夫濕麵魚膈水果生冷以及煎餅調和滑難化等物恣食無節朝傷暮損而成清痰稠飲滯于中官故謂之饋雜

嗔食吞酸痞滿甚則為香胃嘔噎即此之由也夫饋雜之為症也以氣不飢似痛不痛而有懊惱不自寧之况者是也其症或兼噎氣或兼痞滿或兼惡心漸至胃脘作痛實痰火之為患也治法以南星半夏橘紅之類以消其痰麥連梔子石膏知母之類以降其火蒼朮白朮芍藥之類以健脾行濕壯其本元又覺忘口即然無有不妥者也

壽世保元

○一論饋雜乃痰因火動也宜化痰清火湯

南星 薑炒 半夏 薑炒 陳皮 黃連 黃芩 梔子 知母
石膏 蒼朮 米泔 白朮 去蘆 白芍 甘草

右劉生薑煎服

○一論饋雜因血虛而作按宜養血四物湯

當歸 川芎 白芍 炒 熟地 黃 煨 人參 白朮 去蘆
白茯苓 皮 半夏 姜炒 黃連 姜炒 梔子 炒 甘草

右劉生薑煎服

○一論婦人心胸饋雜多是痰症或云是血饋而用豬餘血炒之則愈此以血道血歸原下此方治中脘心腹冷痰心下嘈雜口出清水腸肋

急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷脈沉遲弦細宜此

旋覆花湯 陳皮 半夏 姜炒 赤茯苓 旋覆花 人參 白芍 炒
細辛 桔梗 官桂 甘草

○一論婦人心胸饋雜用

茯苓補心湯 即四物湯合參蘇飲是也

○一治心中饋雜坐臥不安 蔡完體傳 陳皮 一錢 半夏 八分 白茯苓 一錢 赤茯苓 八分 酸棗仁 炒 八分 益智仁 三分 麥門冬 去心 甘草 二分

右劉生薑煎服

○一人多思慮以致血虛五更時饋雜是也宜以四物湯加香附山梔黃連貝母

壽世保元

○一肥人饋雜宜用

二陳湯少加撫芎蒼朮白朮炒梔子水煎服

○一論饋雜者痰火內動如粗食在膈令人不自安也宜痰火越鞠丸

海石 研水飛 膽星 瓜蒌仁 去油 山梔 炒黑 青黛 水飛過
香附 童便浸 蒼朮 米泔浸透 梔子 炒 撫芎

右各等分爲細末湯泡蒸餅爲丸如菜豆大每服百丸臨臥白湯送下

○一論饋雜屬火者宜

加味三補丸 黃芩 去朽 黃連 去尾 黃柏 去皮 香附 米 醋浸 炒 蒼朮 米泔浸透 梔子 炒 枳實 炒

右各等分爲細末水杵稀糊爲丸如菜豆大每服七十八丸臨臥茶清送下

諸氣

脈沉便知是氣沉極則伏滿難愈其或沉滑氣蒸痰飲病也

入稟天地陰陽之氣以生藉血肉以成其形一氣周流于其中以成其神形神俱備乃為全人故氣陽而血陰灌溉周身而無一毫之阻斷也血則隨氣而行氣載乎血者也

一論男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮忿怒傷神或臨食憂成或事不隨意使抑鬱之氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心膈痞悶脇肋虛脹噎塞不通噎氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口舌乾苦飲食減少日漸羸瘦或木腸虛閉或因病之後胸中虛

壽世保元

丙集三卷

四一九

病不思飲食並皆治之

分心氣飲

- 青皮 去穢 陳皮 半夏 姜炒 白茯苓 去皮 木通
- 官桂 赤芍 桑白皮 大腹皮 紫蘇
- 羌活 甘草

右剉作劑生薑三片棗二枚燈心十根水煎溫服○性急加柴胡○多怒加黃芩○食少加砂仁神麩○咳嗽加桔梗半夏○胸膈痞悶加枳實香附○三焦不和加烏藥○氣閉加蘿蔔子枳殼○氣滯腰疼加水瓜枳殼○上焦熱加黃芩○下焦熱加梔子○翻胃加沉香磨服○水氣面目浮腫加猪苓澤瀉車前木瓜葶藶麥門冬○氣塊加三棱莪朮○一方去赤芍羌活加枳殼桔梗木香檳榔香附莪朮香治憂思鬱怒諸氣

一論七情之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出

吐等症
五下或中脘痞悶氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲急

- 加味四七湯
- 半夏 湯泡 白茯苓 去皮 川厚朴 薑炒 紫蘇 二兩 桔梗 二兩
- 枳實 二兩 甘草 一兩

右剉作十劑生薑七片棗一枚水煎熱服一方治梅核氣加檳榔○一論一切氣滯心腹滿悶疼痛脇肋脹滿難消嘔吐酸水痰涎不利頭目昏眩食積酒毒及米穀不化或下痢膿血大小便秘結滯不快風壅積熱口苦煩燥涕唾稠粘此藥最能流濕潤燥推陳致新滋陰抑滯散鬱破結活血通經消氣分之聖藥也宜此

- 利氣丸
- 大黃 生用 黑丑 頭末 木香 一兩 檳榔 一兩 枳殼 炒
- 香附米 炒 四兩 青皮 去穢 陳皮 一兩 莪朮 一兩 黃連 一兩

壽世保元

丙集三卷

五十一

右為細末水丸梧子大每服五七十九或百丸臨臥淡薑湯送下以利為度如不利再加丸數通利則愈瑞竹堂加黃芩當歸各一兩

一論脾胃不和過食生冷油膩粉膩滯滯不化胸膈滿悶嘔逆惡心腹脹膨脹心脾疼痛增寒壯熱或面自四肢浮腫甚致臌脹閉滿上氣喘急睡臥不安但是有因氣所傷寒氣咽氣脹氣滯氣塞氣冷氣癰氣氣塊一切氣並治用此

- 沉香化氣丹
- 香附子 一斤 炒 內 黑牽牛 頭末 蒼朮 米泔浸 青皮 去穢 炒
- 陳皮 五兩 山藥 二兩 枳殼 炒 枳實 炒 砂
- 厚朴 薑汁 炒 三稜 煨 莪朮 炒 二兩 紫蘇 二兩
- 木香 一兩 沉香 五分 丁香 二兩 砂仁 二兩
- 官桂 五錢 乾薑 炮 一兩 良薑 一兩

草果 去壳一兩

白豆蔻 去壳一兩

南星 炮一兩

半夏 炮一兩

人參 五錢

白茯苓 去皮一兩

檳榔 一兩

石菖蒲 二兩

薤白 二兩

神麩 炒一兩

山查 去子一兩

蘇合香 九

右為細末，醋糊為丸，如梧子大，每服五十九丸，臨臥淡薑湯送下，物疏布氣，空心鹽湯下，如要大便通利，漸加至百丸，仍看老幼盛衰，增減其數。

此藥蠲積聚，化滯氣，逐惡氣，消食，寬中，快膈，消痞，理氣，孕婦不宜服。

五九疎風順氣，和胃，健脾，消滯，化食，寬中，快膈，消痞，理氣，孕婦不宜服。

一論男婦中風，中氣，牙關緊閉，口眼喎斜，不省人事，并傳屍，屍體發熱，暴卒，心疼，鬼魅，疔瘡，小兒急慢驚風，婦人產後中風，赤白痢疾，一切急暴之症，最能順氣化痰，神效。

蘇合香丸

沉香 木香 丁香 白檀香 安息香 蘇合香 香附米 白朮 去蘆 訶子肉 草撥 犀角 剉屑 朱砂 絲一片 腦

壽世保元 丙集三卷 五十一

蘇合油 入藥 右將各味，咀成片，為細末，入膠，得安，息香，蘇合油，同藥，攪勻，煉去其油，每丸秤過，一錢用蠟，包裝，每用，大人一丸，小兒半丸，去蠟皮，以鹽湯，自然汗化，開擦牙關，另煎薑湯，少許，調藥，灌下。

一人飲酒太醉，後氣往外，仰頭，吐不盡，有出氣無收氣，此乃氣不歸元，死在須臾，諸藥不效，余以

菲菜根，搗入，陳醋，醱，炒熟，絹包，熨，臍下，此下包，冷，又另換一包，熨臍下，溫氣，氣，降而，歸元矣，妙不可言。

痞滿

脈來弦實者，順虛弱，拘逆

痞滿與脹滿不同，脹滿內脹而外亦形痞，則內痞痞悶而外無脹急之形也，蓋由陰伏陽蓄，氣血不運，而成位心下之止，腹滿痞塞，皆土病之所

為耳有因誤下，復氣，心邪乘虛而入於心之分野，有因食積，積於心，行而作痞者，有濕熱太甚，土來心下，而為痞者，治之用黃連，黃芩，枳實之苦，以泄之，厚朴，生薑，半夏之辛，以散之，人參，白朮之甘，溫以補之，茯苓，澤瀉之鹹，淡以滲之，大藥與濕同治，使上下分消可也。

一論按之堅而軟，無塊，為痞，多因是痰氣鬱結，或飲食停滯者，加味二陳湯

陳皮 半夏 薑沙 白茯苓 去皮 枳實 姜沙 黃連 薑汁沙

山查 去子 木香 青皮 去穢 砂仁 甘草

右到生薑煎服。

一論痞滿宜調中補氣，消痞，清熱，攻補兼施，而當也。

平補枳朮丸

白朮 去蘆 土 白芍 酒炒 一兩 陳皮 枳實 薑沙 黃連 一兩 各

人參 沙三兩 白芍 酒炒 一兩 陳皮 枳實 薑沙 黃連 一兩 各

木香 各五錢

壽世保元 丙集三卷 五十一

右為細末，荷葉煎湯，打米糊為丸，如梧子大，每服五十九丸，食遠米湯下，漸加至六七十丸。

一論內傷元氣，脾胃而作心下痞者，宜大補元氣也服。

加減補中益氣湯 方見內傷

如脈緩有痰而痞，加半夏黃連。○脈弦四肢滿閉，便難而心下痞，加黃連柴胡甘草。○大便閉燥，黃連，桃仁，少加大黃歸身。○心下痞，分肉加白芍黃連。○心下痞，腹脹，加白芍砂仁五味子。○如天寒，必加乾薑或肉桂。○心下痞，寒者，加附子黃連。○心下痞，嘔逆，加陳皮生薑黃連。○冬月，加黃連，少加丁香藿香。○能食而心下痞，加枳實三錢黃連五分。○如不能食，心下痞者，勿加之，依本方食也。心下痞，則服前枳朮丸而愈。

一論一切心下痞，及年久不愈者，宜用

大消痞丸

黃連六錢 黃芩六錢 枳實五錢 半夏四錢 陳皮四錢
 厚朴四錢 猪苓五分 澤瀉三錢 葛黃一兩 乾生薑二錢
 人參四錢 神麴二錢 砂仁三錢 甘草二錢 白朮一兩
 右為細末蒸餅為丸如梧子大每服五十九漸加至百九空心白滾湯送下

○一男子胸膈作痞飲食難化腹積木九久而形體消瘦發熱口乾脈浮大而微用補中益氣加桂薑諸症悉退惟見脾胃虛寒遂用八味丸補命門相火不月而飲食進三月而形體克此症若不用前丸多服腹脹喘促腿足浮腫小便淋瀝等症急用加減腎氣丸亦有得生者

○一治痞悶氣積食積宜服

內消丸

- 青皮 陳皮 三稜 莪朮 神麴 麥芽
- 香附 炒各等分

壽世保元 丙集三卷 五十三

右為細末醋糊為丸如梧子大每服三五十九茶清送下

○一腹中窄狹須用蒼朮若肥人自覺腹中窄狹乃是濕痰流灌臟腑氣不升降燥飲用蒼朮香附行氣如瘦人自覺胸中窄狹乃是熱氣薰蒸臟腑宜黃連蒼朮

○一論心下堅如盤者

枳實 炒一錢 白朮 去蘆三錢

右對一劑水煎服

補中益氣湯方見內傷八味丸方見補益

鼓脹

經云其脈大堅以滿者脹也。關上脈浮則內脹。遲而滑者脹。脈盛而緊者脹。脈浮大者易治。虛小者難治。水病腹大如鼓。脈實者生。虛者死。洪大者生。微細者死。中惡腹大四肢滿脈大而緩者生。浮而

紫者死

丹溪云七情內傷六淫外感飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化故陰陽不交清濁相混遂道雍塞而為熱熱留為濕濕熱相生遂成脹滿經云鼓脹者是也以其外雖堅而中空無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱脹若蠱之義

陰陽愆伏榮衛凝滯三焦不能宣行脾胃不能傳布脹滿之所由生也曰穀脹曰水脹曰氣脹曰血脹謂之四病或寒或熱或虛或實又不可以無別也若久病羸乏卒病脹滿喘息不得與夫臍心突起或下利頻數百方調治未見一愈者矣

朝賢暮急者為血虛暮寬朝急者為氣虛朝暮俱急者氣血俱虛

脈經曰胃中寒則脹滿此論內傷不足之邪乃久病也寒者非寒冷之寒乃陰虛之義故用參朮以補脾胃為君蒼朮茯苓陳皮為臣黃芩麥門為使以制肝木少加厚朴以消腹脹氣不運加木香氣正陷加升麻柴胡

壽世保元 丙集三卷 五十四

提之血虛加四物湯有痰加半夏經云寒因寒用者是也積脹久脾胃虛者雖有大小便不利之證乃氣不運血不潤也當大補氣血為主慎不可用下藥也鼓脹為病多端宜照後方加減調治毋得執泥以誤人也

○一論病人初起心腹脹滿因于食傷脾胃濕痰氣鬱食積而作脹也用此通治之劑宜

香砂和中湯

藿香 砂仁 各一錢 蒼朮 炒一錢 厚朴 薑汁 廣陳皮 刮去

半夏 薑汁 白茯苓 去皮 枳實 炒 青皮 去穢 神麴 炒

山查肉 各一錢 白朮 去蘆 甘草 三分

右對一劑水煎服

○一論脾虛鼓脹手足倦怠短氣漉泄者此調治脹滿王道之藥各病虛弱之人宜服

六君子湯

白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 半夏 薑製 陳皮

甘草 右劉生薑煎服。一方加當歸白豆蔻蘇梗尤妙。

○按經曰寒因寒用故用補劑以治脹初服則脹久服則通此惟精達經旨者知之庸醫未定道也若朝寬暮急為血虛加當歸

川芎暮寬朝急為氣虛依本方朝暮俱急亦加當歸

○一論男婦因於氣惱而心腹脹滿或痰嗽喘急者予常見因氣而作脹滿者甚多而用此方甚効下分心氣飲方見諸氣

依本方加檳榔枳殼香附為藥

木香消脹丸 治症同前

木香 二錢 檳榔 五錢 陳皮 大腹皮 枳殼 炒

壽世保元

百集三卷

五十五

桑白皮 蘇子 炒 香附子 炒 各 蘇子 炒 香附子 炒 各

右為細末水煮稀神麴為丸如梧子大每服五七十九淡薑湯送下
○一論腹脹發熱以陽并陰則陽實而陰虛陽勝則外熱陰虛生內熱必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宣導飲食如故固致脹滿者為之熱脹宜用

枳實分消湯

川厚朴 去皮薑汁 枳實 炒 二 大黃 酒蒸 一 官桂 二 錢

甘草 五分

右劉一劑薑煎服嘔吐加半夏自利去大黃寒多加乾薑

○一論中滿鼓脹氣脹水脹熱脹宜

中滿分消丸

人參 二錢 白朮 去蘆炒 薑黃 五錢 猪苓 去黑皮 甘草 炙 一錢 砂仁 乾生薑 各 二澤瀉 陳皮 知母 各 二錢

白茯苓 去皮 枳實 炒

半夏 姜炒 黃連 姜汁 炒 黃芩 酒炒

右為細末水浸蒸餅為丸如梧子大每服百丸焙熱食遠白湯送下

○一論老人虛人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脈浮遲而弱此名寒脹香朴湯

川厚朴 姜汁 炒 大附子 炮去皮臍 木香 一錢

右劉一劑生薑七片棗二枚水煎熱服

○一論中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥逆食入反出下虛中滿腹脹心下痞下焦躁寒沉厥奔豚不收宜

中滿分消湯

益智 半夏 姜炒 升麻 茯苓 去皮 木香 各 三分

黃芪 炒 吳茱萸 炒 草豆蔻 川厚朴 姜汁 炒 各 川烏 炮

人參 澤瀉 青皮 去穢 當歸 柴胡

壽世保元

百集三卷

五十六

黃連 姜炒 澄茄 黃柏 酒炒 乾薑 生薑 各 二分

右劉一劑水煎服忌房勞酒濕麴生硬冷物
○一論中滿腹脹內有積聚如石堅硬令人坐臥不寧二便澀滯上氣喘促或通身虛腫

廣茂清堅湯

川厚朴 去皮薑汁 黃芩 炒 黃連 姜炒 益智仁 草豆蔻

當歸 各 五分 半夏 姜炒 廣木 升麻 紅花

柴胡 澤瀉 神麴 炒

右劉一劑生薑煎食遠溫服忌酒醋濕麴

○一論濁氣在上則生腹脹清氣在下則生發泄宜

木香順氣湯

木香 三分 厚朴 姜炒 青皮 去穢 陳皮 益智

澤瀉 乾生薑 茯苓 半夏 吳茱萸 湯分
當歸 蒼朮 各五分 升麻 柴胡 各一分 草豆蔻 三分

右對一劑水煎服服忌生冷硬物

○一治鹽脹

黑丑頭末 木香 甘遂 各一錢

右為末用猪腰一對俱分破將藥撒在一腰子內合住帛包灰火焙熟空心或食一箇或食二箇大便行膿血見效

○一論血鼓腹如盆脹積聚痞塊宜

化蠱丸

三棱 礞 莪木 類

水蛭 石及沙琥珀 乾漆 砂 硃砂 肉桂 大黃 各一分

右為末用生地黃自然汁和米醋調勻為丸如梧桐子大每服十九丸

心溫海下童便亦可

四炒枳殼丸

枳殼 四兩 去穢切作兩指而大塊分四處

一兩 用蘿蔔子一兩炒去子不用

一兩 用岩木四兩炒去岩木不用

一兩 用乾漆一兩炒去乾漆不用

一兩 用公苗一兩炒去公苗不用

右用原炒枳殼四味用水一石碗煎至二碗去渣投粉為丸如梧子大每服五十九食後米湯下

水腫

水腫之症有陰有陽。察脈觀色。問症須詳。陰脈沉遲。其色青白。不渴而瀉。小便清澀。脈或沉數。色赤而黃。燥糞赤濁。其為陽。水腫氣急而小。

便澀。○血腫氣滿而四肢寒

腹脹。因內傷七情所致。取效微遲。四肢浮腫。肚大身重。此雙腹脹。因外感風濕所致。取效甚速。又有水腫氣腫之分。以指腫處有陷。隨起隨陷者。氣腫。先須理氣。指起遲者。水腫也。只須導水。立愈。凡年四十已上。氣血壯盛者。得效之後。善自調攝。終身不發。五十以後。氣血稍衰。調攝不謹。時或再復。此藥尚能治之。但屢復屢治。而元氣耗則難為矣。脈浮洪。易治。沉細。難治。浮洪者。只用金不換木香丸。沉細者。兼用沉香快肥丸。先服木香流氣飲。

○一論諸氣痞滯不通。胸膈膨脹。口苦咽乾。嘔吐不食。或有背腹膨脹。走注刺痛。及喘急痰嗽。面目虛浮。四肢腫滿。大小便閉澀。又治憂思太過。怔忡。鬱積。脚氣。風濕。痰結。腫痛。喘滿。脹急。此藥調順榮衛。流通血脈。快利三焦。安和五臟。凡治諸腫。當先用此。

香世保元

百集三卷

五十八

木香流氣飲

木香 七錢

白朮 五錢

草果 七錢

木瓜 五錢

木通 一兩

右對八錢生薑三片。棗二枚。水一石。煎至七分。去渣。熱服。本方加沈

香枳殼。大黃。去蘆。香石菖蒲。各二十四。味流氣飲。○蠱腫。加白豆蔻。○腫滿。加黑牽牛。○頭面腫。加葱白。○肚腹腫。加枳實。倍青陳皮。○勝至。脚腫。加桑白皮。

○一論金不換木香丸。治蠱腫之神藥也。先服木香流氣飲。三五劑。通加白豆蔻。次用金不換木香丸。收功。後用沉香化氣丸。調理。或心頭煩熱者。竹葉石膏湯。熱甚。加黃芩。前賢論蠱腫之症。有五。不治者。而黑。如微

肚大青筋，掌腫無紋，胸膈無坑，臍中凸起，此五疳亦能治之。間有得生者，如取下黑水者，不治，陽事不舉者，不治，其餘青黃紅紫，皆能治之。又丁証或腫或消，或作泄瀉，知脾弱即瀉，名曰泔水橫流，服此宜之。其腹自消，其病自止，忌一切生冷毒物，油鹽醬醋，魚鮮鵝鴨，房事等件，一百日無有不效者。

金不換木香丸

- 大戟 五錢 芫花 錢五分
- 大黃 生五錢 青皮 去穢三錢
- 桐椒 一錢 川椒 去日五錢
- 苦葶 生五錢 射于 三錢
- 連翹 五錢 砂仁 五錢
- 甘遂 五錢 黑丑 頭末二錢
- 陳皮 五錢 南木香 五錢
- 益智仁 五錢 檳榔 五錢
- 桑白皮 五錢 木通 去皮五錢
- 巴豆 去壳半錢
- 大腹皮 五錢
- 澤瀉 五錢

右二十二味，為末，醋糊為丸，如梧子大，每服五十九，壯盛人加七，八十九，第一消頭面腫，五更初用葱白酒送下，第二消中膈胸腹腫，五

壽世保元

丙集三卷

五十九

更初用陳皮湯送下，第二消臍已下脚腫，五更初桑白皮湯送下。

沉香快脾丸

- 青皮 四錢 陳皮 四錢
- 白木 去蘆四錢 白茯苓 四錢
- 沉香 二錢 丁香 三錢
- 連翹 四錢 商陸 四錢
- 神麩 四錢 麥芽 四錢
- 右二十四味，為末，麵糊為丸，如梧子大，每服三四十九，煎前用之，第一五更葱白湯下，第二五更陳皮湯下，第三五更紫蘇湯下，第四五更桑白皮湯下。

沉香化氣丸 治濕常服調理

- 青皮 去穢 陳皮 三棱 煨 我木 煨 人參
- 白木 去蘆 白茯苓 山藥 砂仁 白豆蔻

丁香 木香 沉香 檳榔 石菖蒲 各六錢
 官桂 一兩 蘿蔔子 二兩 黑丑 頭末 二兩 八錢
 右為末，醋糊為丸，如梧子大，每服五十九，煎湯下。

一治前証服藥，忌鹽醋，一百日之後，用藥開鹽法。
 猪苓 澤瀉 白朮 白茯苓 肉桂 鹽各等分

右每用七錢，用鯽魚一箇，破肚去淨，將前藥入魚肚內，加麝香少許，入瓦內，火焙黃色，存性，為末，薑棗湯調服。
 一論腹脹緊硬如石，或陰囊腫大，先用甘草煎湯一鍾，熱服之後，即用此藥數之。

大戟 芫花 甘遂 海藻 各等分
 右為末，醋糊和藥塗腫處，一加椒目尤效。

按右諸方，治諸鼓脹腫滿，殊效，其中有病人氣血虛，不敢服者。

壽世保元

丙集三卷

六十

又有服之而不效者，此皆得病日久，或快投攻擊太過，以致脾腎元氣虛損之極，宜服後諸方，實有起死回生之功也。

一凡看龜識症：一、朝腫暮消是陽蠱；二、朝消暮腫是陰蠱；三、腫上青筋起，氣喘潮熱是氣蠱；四、四肢不收，無肉肚大是食蠱；五、遍體肚不脹，是翳油蠱；六、遍身潮熱是脾蠱；七、房室過多，是腎蠱；八、泄瀉潮熱，是脾蠱；九、脚墜上下小便不通，是胃蠱。

一論水腫，四肢頭面皆浮，而腫或單腹鼓脹，皆屬脾虛，不能制水，氣虛不能運化，治之補元氣，養心血，健脾胃，以培其本，清濕熱，平肝木，利水道，以治其標，此藥主之。

- 行濕補氣養血湯
- 大棟 參 去蘆 不油 白朮 去穢 陳皮 當歸 川芎
 - 白芍 酒炒 白茯苓 蘇梗 厚朴 姜炒 大腹皮
 - 蘿蔔子 炒 海金沙 木香 木通 甘草

右劉薑棗煎服。○氣虛倍參苓朮。○血虛倍芍歸芍。○小便短少加猪苓澤瀉滑石以消其腫也。○服後腫脹俱退惟面足不消此陽明經氣虛倍用白朮茯苓。

○一論單腹脹只宜補中行濕利小便切不可下。宜用行濕補中湯。

人參八分 白朮二錢 白茯苓一錢 蒼朮一錢 澤瀉五分 陳皮一錢 厚朴一錢 黃芩八分 麥門冬五分 澤瀉五分

氣不運加木香木通氣下陷加柴胡升麻

朝寒暮熱急血虛加當歸川芎白芍炒香附黃連姜炒去人參

朝暮急者氣血俱虛宜雙補之

○一論腫脹之症因內傷而得者或慢服攻擊殺伐之過以致元氣脾胃虛損之極腫脹尤甚于前此氣血兩虛腎水乾涸用此方以金匱腎氣丸

壽世保元 丙集三卷 六一

九兼進 加味補中益氣湯

黃芪炒二錢 人參一錢 白朮去蘆炒 白茯苓二錢 陳皮八分 當歸酒洗 白芍酒炒一分 柴胡四分 升麻三分 蘿蔔子炒一錢 厚朴一錢 甘草炙二分 枳實炒五分

右劉下劑生薑煎服

○一論脾胃虛弱脚腫小便不利或肚腹脹痛四肢浮腫或喘急痰感已成虛症其効如神此症多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而致症者非此藥不能救必以補中益氣湯早晚兼服可收全功矣

金匱腎氣丸

懷熟地黃四兩 白茯苓三兩 牛膝去蘆 肉桂 澤瀉 車前子 山茱萸酒蒸 山藥 牡丹皮各一兩 大附子炮去皮臍

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服百丸空心米飲送下臨卧服補中益氣湯

○一論單腹脹及脾虛腫滿腸間閉塞或胃口作痛此補中有消之意也

黃芪二兩 人參二兩 白朮去蘆黃土 白茯苓二兩 陳皮三兩 半夏泡七次 蒼朮米泔浸炒 香附童便浸炒 白芍五錢 黃連去葉更煎水炒 蘇子炒一兩 蘿蔔子炒一兩 山查肉炒二兩 薏苡仁炒三兩 澤瀉炒一兩 沉香六錢另研五加皮炒二兩 草豆蔻酒拌炒

法製瓜蒌一兩。○用大小瓜蒌二箇每箇入胡椒三錢多者重

右為細末煎藥大腹皮湯打黃米糊為丸如梧子大每服百丸日進三服白湯送下

壽世保元 丙集三卷 六十一

右方治小瘰多不便動者每不用此味亦獲奇効如有更妙

○按右諸方治腫脹虛皆宜用此王道之劑病者若其腹腫難一服即令朝服九藥久服湯藥或三朝五日間服蠟桃丸或石幹散亦服謂之下棋打劫而治病者暫據一時之寬醫者一補一攻亦善治之良法也

○丁人脾胃虛弱肚腹鼓脹遍身腫脹之成窠其脈沉細右寸為甚此脾肺虛寒之症治以八味丸或金匱腎氣丸以補腎陰行生化之源至春服之小便通又數劑腫消即止前藥復與六君子湯加木香官桂炮薑以燥脾道氣而瘳後因不戒性病復作但有氣惱或飲食稍多即泄瀉仍用八味丸倍附子

○一儒者失於調養飲食難化胸膈不利或用行氣消導藥咳嗽喘促服行氣化痰藥肚腹漸脹服行氣分利藥睡臥不能兩足浮腫小便不利大便不實脈浮大按之微細兩寸皆短此脾腎虧損朝用補中益氣加

蓋附及用金匱腎氣加骨脂因果各數劑諸症漸愈再佐以八味丸兩
月乃能步履却服補中八味半載而康。

補遺

蟾桃丸 查國主秘傳治男婦渾身頭面手足浮腫肚腹脹滿疼痛上氣
喘急千金不傳之妙。

沉香三錢 木香三錢 乳香三錢 沒藥三錢 琥珀一錢

白丑半用頭黑丑用牙皂煎濃水浸半日俾爛底煇

檳榔牙皂煎汁浸透煇熟

右為細末牙皂水打稀麵糊為丸如梧子大每服二錢七分五更後
砂糖煎湯送下。

○張靜虛道人治蠱脹神方 詳其總錄

石幹散

右幹一錢 黑丑一錢 沉香五分 木香五分 檳榔一錢

壽世保元

丙集三卷

六十三

苧蔴八分 琥珀五分 海金沙一錢

右共為末聽用患者先服五皮散一二帖然後服此末藥實者下錢虛
者九分空心葱白湯下隔一日下服輕者二帖重者不過三帖全愈後
服健脾養胃之藥永不發也服藥要忌葷腥二七則腸胃清病根拔

○一治腫脹仙方名金粟兒

紅芽木戟一斤紅棗三斤水浸一日夜去大戟用聚晒乾食之立消

○一治水腫黑豆煮去皮焙乾為末每二錢米飲調服

○一治腫脹仙方名天命飲

白商陸根似木形者搗取汁下合生薑自然汁二合點黃酒下蒸和
服空心三日服一次元氣厚者服五次薄者三次止忌葷醬凡人午
五十以裏者可服五十以外者不必用

○一治腫用

粟米菘豆各下抄猪肝下葉切碎三味煮作粥食之至重者不過五

次其腫自消切忌氣惱生冷之物

○一治十腫水病不瘥垂死者

用青頭雄鴨一隻治如食法細切和米并五味煮極熟化粥食之

○一治用鯉魚下尾重一斤和冬瓜葱白煮食之

○一治用瀨蝦蒸下筒入猪肚內煮熟去蝦蒸將肚一日俱食盡

○一治蠱腫

用田螺不拘多少水漂加香油下蓋于水內其涎自然吐出取其涎
曬乾為末每服不過三分酒調下其水自小便而下其氣自大便而
出其腫即消即服養脾胃之藥為妙

○一治水氣腫滿腹脹者

用黑白牽牛頭末每服二錢太麥麵三錢水和為餅以灰煨熟取出
食之茶湯送下太便秘利後灸臍上一寸臍下一寸半各一七壯効

○一治十腫蠱脹輕者服此立効

苦丁香去梗微焙為末用棗肉為丸如梧子大每服二十丸空心米
湯下行水日進二服

○一治十腫水氣五蠱脹氣其効如神一人患腹脹陰囊腫大不下熱而
病愈真仙方也

甘遂赤皮細花不蛀用蒼麥麵水和作厚餅內抄神麩末將餅厚包
甘遂在內灰火中燒熟取出晒乾為末每用一錢二分以細麵約下
兩許合和水調起作麵片次用商陸二錢半巴豆一箇去殼水一碗
半砂鍋內煎至一碗去渣再入鉄鍋內入煎麵片煮熟食之其商陸
湯任其意服與不服不在其限服不二時水從大便出如血血
即下血氣盡即氣下當時腫消若有喘嗽盡皆安貼若腹中塊瀉消
散只下服見効忌葷醬冬瓜香油葱腥之物半月後用鹽亦須炒過
用之若蠱症加胡椒一錢與巴豆同煮其巴豆須看虛實加減其壯
者加至二三箇無妨

壽世保元

丙集三卷

六十四

積聚

脈來實強者生沉小者死。○脈來沉者積也。在寸口積在胸中。在關上積在臍脘。在尺部積在少腹。脈在左積在左。脈在右積在右。脈在中央。○脈來小沉而實者。脈中積聚不下。食食則吐。

積者生於五臟之陰也。其發有根。其痛有常處。脈必結伏。聚者成於六腑之陽也。其發無根。其痛無常處。脈必浮結。由陰陽不和。臟腑虛弱。以七情失常。所以為積。聚則久。則為癥。癥成塊。不能移動。者是癥。或積或無。或上或下。或左或右。積是氣。聚不能成塊。塊有形之物。死血。此理。雖然在中。為癥。飲右為積。左為死血。大法。以積聚之積。削之行氣。開痰。為要。積塊不可專。用下藥。徒損其氣。動亦不。使。之。條。化。其。外。血。塊。去。須。太。補。痞。塊。在。皮。東。膜。外。須。用。補。藥。宜。天。子。湯。加。香。附。枳。實。開。之。

壽世保元 百集三卷 六十五

○一論五積六聚癥瘕痞塊飲食積死血成塊塊化堅湯

- 白木去蘆 白茯苓去皮當歸酒洗 川芎 香附炒
 - 山查 枳實炒 陳皮 半夏姜炒 梔仁去皮尖
 - 紅花 莪朮炒 甘草
- 右劉劉生薑三片水煎溫服。○肉積加黃連。○麩積加神麩。○左有塊倍用芎。○右有塊加青皮。○飽脹加雞子。○壯人加三稜。○弱人加人參。
- 一論五積六聚癥瘕積血積食積氣積一切積塊或中或左或右或上或下久不愈者用此。
- 消積保中丹
- 陳皮去白 半夏湯泡切片白茯苓去皮 白木去蘆炒
 - 香附醋炒 青皮去核 木香三錢不 檳榔七錢

- 莪朮醋炒 三稜醋炒 萊菔子炒一兩砂仁炒四錢
 - 神麩炒一兩 麥芽炒六錢 白芥子炒一兩黃連姜汁炒
 - 梔子仁姜汁炒 梔仁去皮尖 紅花五錢 當歸酒洗
 - 川芎八錢 直阿魏醋炒 乾漆炒煙
- 右為細末薑汁酒打稀糊為丸如梧子大每服八十九食後白湯送下
- 體虛人加入參丁兩外宜化鐵骨貼之。
- 一論五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疼痛上氣室塞小便脹滿大小便不利宜以

大七氣湯

- 三稜 莪朮 青皮 陳皮 桔梗 藿香 益智
- 香附 肉桂 甘草

右劉劉生薑三片棗子一枚水煎溫服查再煎服。○心腹癥加烏藥枳殼。

壽世保元 百集三卷 六十六

○一論心腹堅脹腸下緊硬胸中痞塞喘滿短氣癥瘕積塊化痰飲食胸腹脹氣進食消脹軟堅用此

- 三稜煎丸 三稜生細對半片搗為末以酒三青皮去穢二兩 羅蔔子炒二兩
 - 神麩炒二兩 麥芽炒三兩 乾漆炒三兩 杏仁湯泡去皮尖
 - 硃砂用磁盆細研又水調塗于
- 右為細末三稜為丸如梧子大每服十五丸加至二十九食遠米飲送下。
- 一論男婦五積六聚七癥八瘕破一切血下下切氣宜消癥破積丸
- 三稜煨 大黃煨 乾漆炒去烟 硃砂入醋 巴豆去油各
- 右為末醋糊為丸如梧子大每服三九至七九空心米湯送下量虛實加減服之不可過服損入之真氣。

○一論癥積心腹內結一塊如拳漸上撞心及腹脹痛
保安丸

大黃 三兩 酒浸 乾薑 炮一兩 大附子 炮去皮臍五錢

龍甲 醋炙一兩 伏時炙

右為末陳米醋丁升煮去四五合和藥為丸如梧桐子大每服二十九
五更醋湯下天明時再服五九取積如魚腸膿血爛泥而下

○一論虛弱之人腹中積聚癥塊脹滿疼痛面黃肌瘦肚大青筋不思飲食此藥消痰利氣扶脾助胃開胸快膈消痞除脹清熱消食久服積塊漸消大效
加味保和丸

白朮 去蘆炒 枳實 麩炒 陳皮 去白 半夏 泡姜炒

白茯苓 去皮 蒼朮 米泔浸 川厚朴 姜炒 香附 酒炒一兩

神麩炒三兩 山查肉 三兩 蘿蔔子 炒一兩 連翹 二兩

壽世保元

一曰集三卷

二十七

黃連 酒炒 黃芩 酒炒 麥芽 炒一兩 三稜 醋炒一兩

我朮 醋炒 木香 五錢

右為細末薑汁糊為丸如梧子大每服五十九加至七八十九食後白湯送下

○一論五積六聚七癥八瘕或左或右或上或下或腹中有時攻作疼痛諸醫誤治以致擊太過以致面黃肌瘦四肢困倦不思飲食諸症宜以此方久服則元氣漸復脾胃漸壯蓋養正積自除譬如滿座皆君子縱有一小人自無容地而出此潔古之言豈欺我哉

加減補中益氣湯

黃芪 錢五分 人參 一錢 白朮 去蘆炒一兩 白茯苓 去皮

陳皮 七分 柴胡 五分 當歸 酒洗一錢 半夏 泡姜汁炒

山查肉 五分 枳實 麩炒五分 厚朴 姜炒七分 甘草 炙四分

右對一剗生薑三片棗一枚水煎溫服與前加味保和丸兼而服之

則病根自拔
○按右諸方虛弱人患積塊久不愈者宜化鐵膏

肥皂 四兩 生薑 四兩 葱 半斤 蒜 半斤 皮硝 半斤 化水

○一治痞塊心下堅硬狀若覆杯者服此一料即愈

三稜 莪朮 檳榔 草果 陳皮

木香 山查 各二兩 小茴 甘草 各一兩 砂仁

枳實 一兩 浮鐵皮 各五錢 厚朴 姜炒 蒼朮 米泔浸 沉香 三錢

右為末酒糊為丸如梧子大每服十五九薑湯下

○一治痰塊痞塊血塊氣塊不拘冷熱諸塊皆效

我朮 二兩 麥芽 二兩 神麩 二兩 龍甲 二兩 山查 二兩

壽世保元

丙集三卷

六十八

青皮 二兩 砂仁 一兩 枳實 一兩 香附 二兩 巴豆仁 一兩 不

右巴豆仁同我朮香附將水浸煮一晝夜去豆不用炒乾為末將打米糊為丸如梧子大每服五十九空心酒送下如婦人腹內血塊氣塊作痛加紅花酒炒一兩當歸一兩荔枝核一兩烏藥一兩官桂五錢如瘕塊加陳皮一兩半夏曲一兩

○一治腹中痞氣兩脇痞積血塊痰積等症

琥珀 二兩 阿魏 二兩 五錢 綿布包

青皮 四兩 三稜 取前青皮三兩用前阿魏以水化之

赤藥子 童便炒 黃連 炒二兩內一兩用吳茱萸一兩酒浸同

片苓 二兩 辰砂 三錢 煨火炒

陳皮 二兩 枳實 五錢 白豆蔻 二兩 甘草節 五錢

瓜蒌仁 二兩 沉香 一錢

右為末神麩一斤打糊為丸如梧子大每服五十九食後白湯送

○一治諸氣食積及噎膈痞滿胸脇刺痛癥瘕疝氣並治
神仙一塊氣

青皮 陳皮 三稜 莪朮 香附 重便炒
神麩 麥手 蘿蔔子 白丑 頭末 檳榔
鬱金 黃連 各五錢 枳實 三錢 皂角 二錢半 百草霜 二錢半
右為細末麵粉為丸如菜豆大每服三五丸視疾上下為食之先後
熱酒盪湯任下

○一中洲吳仰泉夫人年五旬患腹中積塊如盤大腹脹年餘後漸即不
倒承腹中如雷響氣不送口乾吐白沫下氣通則腹中稍寬五心煩熱
不思飲食肌瘦如柴醫者入並無寸效一家哭泣後事俱備束手待
斃而已召余至診六部脈數氣口緊盛余知是前醫誤以寒涼殺伐之
過使真氣不運而瘀血不行予以大物湯加半夏陳皮木香厚杜羅荷
香世保元

子大腹皮海金沙服三劑後小便下血塊如雞肝狀服至十二劑打下
黑血塊盈許腹中仍有塊塊又以大物湯加枳實香附五劑而痊正足
養正而積自除也信哉不誣

○一人腹中積塊面黃肌瘦腹大如鼓死在旦夕
用瑞午凡收下真蒲陰乾切薄片放碗內用滾米湯泡熟蒸之待溫
飲之打下小塊如百條內一木條長二尺餘病即愈

○一賤瘡妙方 照磨陳拓所傳
甘草五錢 甘遂五錢 硃砂五錢 沒藥五錢 葱白七寸
白蜜一小盞
右用馬齒莧同鱉肉搗成膏貼塊上効
一千金貼瘡膏 薛英巡傳
黃丹十兩水飛七阿魏三錢 乳香三錢 沒藥五錢

當歸三錢 兩頭尖五錢 白芷五錢 川山甲十片
木鼈子十箇 麝香一錢

右俱為細末用香油一斤槐花柳桑榆各二尺四寸巴豆一百二十箇
去油鼓單麻子丁百二十箇去油先將鐵鍋盛油炭火煎滾入巴豆單
麻在內熬焦撈去渣次下前藥用桃柳等條不住手攪均稠然後下丹
滴水成珠為度磁器收貯一男子腹內有痞者先以溫熱好醋將丹上
洗淨量所患大小用麵團圍定用皮硝一升放入麵團內鋪定用蓋
硝上封半盛火不住手發候稍化盡再用溫醋洗去用紅絹攤膏貼於
患處用舊布鞋底灸熱熨兩三時每七日一換貼藥重者不過三七腫
血化去一小兒幼女患痞者臘醋蒸硝洗之用紅絹攤膏貼患處一人
將小兒雙手抱住在肩上用木篦子搗爛搽於雙臂上後用紅布
鞋底厚灸於腹內太懸處

○一戴雷門夫人年近三旬患腹左有一大塊堅硬如石有時作痛肚腹
膨悶經水不調或前或後或多或少或閉而不通白帶頻下夜間發熱
脈急數予以
千金化鐵丸

當歸 酒洗一兩 白芍 酒炒一兩 川芎 七錢
白木 兩五錢 白茯苓 去皮一兩 陳皮 去白一兩
半夏 一兩 枳實 錢五分 木香 二錢
檳榔 五錢 羅蔔子 炒五分 三稜 兩五分
桃仁 去尖 紅花 五錢 乾漆 炒五分
琥珀 五錢

五疽

右為細末醋打麵糊為丸如梧子大每服三錢白湯送下早晚各進一
服服藥其塊潰消經即調而後即孕生二女也

脈經曰凡黃候寸口脈近掌無脈口鼻黑色並不可治。大抵脈大在死微細者生無脈鼻氣冷者不治也。沉渴欲飲水小便不利者必發也。內經曰諸濕腫滿皆屬脾土夫黃疸為病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱積于脾胃之中久而不散故其土色形于面與肌膚也。蓋脾主肌肉肺主皮毛母能令子虛母病子亦病是故有諸中者必形諸外其有五日黃汗曰黃疸。曰酒疸曰穀疸曰女勞疸雖有五者之分終無寒熱之異丹溪曰不必分五同是濕熱如蠶相似故曰治濕不利小便非其治也。又曰濕在上宜瀉汗濕在下宜利小便。二法宜用使上下分清其濕則病無有不失者也。

○一論治腎疸目甚甚至強身俱黃小便赤澀者宜

腎疸湯

羌活 防風 藜蘆 獨活 柴胡各五分
白茯苓二分 澤瀉三分 猪苓四分 白朮五分 蒼朮一錢

壽世保元

百集三卷

七十一

黃栢二分 人參三分 葛根五分 神麴炒六分 甘草三分
升麻一錢 右剉下剉水煎熱服

○一論濕熱發黃汗黃尿赤及寒熱嘔吐而渴欲飲冷水身目俱黃小便不利不思飲食用

茯苓溲濕湯

猪苓 澤瀉 蒼朮泔浸 白茯苓 陳皮
枳實炒 黃連炒 黃芩 梔子 防己
茵陳 木通

右剉生薑三片水煎服。如飲食不思乃傷食加砂仁神麴炒麥芽炒各等分

○一論黃疸專屬濕熱益難相似

茵陳五苓散

茵陳三錢 白朮一錢 赤茯苓一錢 猪苓一錢 澤瀉一錢

蒼朮二錢 山柰二錢 滑石二錢 官桂二分 甘草二分

右剉燈心水煎服

○一論五疸俱是脾胃濕熱相蒸以致遍身發黃如梔子水染者是也病勢日久醫誤以寒涼之過損傷元氣脾胃以致身微黑瘦四肢沉山折寒發熱不思飲食等症宜以

加味益氣湯

黃芪錢五分 人參一錢 白朮二錢 陳皮八分 當歸一錢
柴胡五分 升麻五分 茵陳 蒼朮 米泔浸梔子炒
猪苓 澤瀉 赤茯苓 黃連 滑石各一錢
甘草炙四分

右剉生薑煎服以六味地黃丸加蒼朮白朮茵陳黃栢各二兩蜜丸相蒸而進之

○一治發黃症身目俱黃如蠶色小便如澀菟相法諸藥不效用

壽世保元

丙集三卷

七十一

加味解毒湯

黃芩 黃連 黃栢 梔子 柴胡
茵陳 龍膽草 木通 滑石 升麻
甘草

右剉燈心煎服。大便實加大黃。○目睛黃信龍膽草

○一治發黃脈沉細而遲肢體逆冷腰已上自注宜用

加味薑附湯

茵陳二兩 大附子一枚 乾薑炮一兩 甘草炙一兩

右剉四劑水煎服。

○一治黃疸 安後馬進發備極切

露珠飲

露珠即土豆形如粉搗爛取汁半碗湯底立效

○一治黃腫妙方 王少川傳

蒼朮一斤 廣陳皮半斤 川厚朴五兩 草果一兩
 砂仁一兩 茵陳穗半斤 香附米一斤 青礬四兩
 右青礬同附米炒燥過俱為細末醋打麩糊為丸如梧子大每空酒
 下薑湯亦可

○一治黃腫病最捷用此
 綠礬丸

五倍子炒黑 綠礬四兩 針砂炒紅 神麩半斤
 右為細末注薑汁煮紅肉為丸如梧子大每服六七十丸酒下不
 能飲酒米湯下終身忌食葷類
 ○一治黃腫飲食無味四肢無力行步倦怠脈滿而濡或腹有積塊脹滿
 加減胃苓湯

蒼朮 木甘 陳皮 厚朴 姜炒 猪苓 澤瀉
 白朮 去蘆 炒 白茯苓 藿香 半夏 姜炒 大腹皮
 壽世保元 丙集三卷 廿三 加山

山查 蘿蔔子 三枝 莪朮 青皮 去穢
 甘草 右劉生薑三斤聚二十枚水煎溫服
 ○一治黃疸倦怠脾胃不和食少小便赤宜以
 平胃散合五苓散加消石

○一治黃腫腹中有積塊脹滿者用
 退金丹 山東李百嶺傳
 蒼朮 酒炒 香附 八兩 青皮 姜炒 陳皮 四兩
 厚朴 姜炒 烏藥 四兩 三枝 煨 一兩
 莪朮 煨 一兩 青礬 八兩 同用 百

右為細末醋糊為丸如梧子大每服五十九丸米湯送下
 ○一治清瘦食短五積六聚七噎八瘕心腹疼痛潮熱等症不問大人小
 兒皆可用此

紫金丸
 血竭 二兩 沉香 一兩 青皮 去穢 陳皮
 厚朴 姜炒 枳殼 去穢 炒 百草霜 一兩 秦艽 一兩
 三棱 醋炒 蓬朮 醋炒 皂莢 四兩 醋
 香附 去毛 針砂 醋炒 乾漆 炒過 性
 甘草 五錢 一方加 仙朮 白朮 各一兩

右為細末用大麩糊去皮核打糊為丸如梧子大每服六七十丸
 酒送下或米飲亦可
 ○一治遍身發黃妄言如狂若熱胸滿不可逆此中焦畜血為患宜
 推仁承氣湯打下瘀血即愈
 ○一治黃病愛吃茶者用
 白朮 去蘆 炒 蒼朮 各一兩 軟石膏 煨 二兩 白芍 炒
 黃芩 各一兩 薄荷葉 七錢 膽星 陳皮 各一兩

壽世保元 丙集三卷 廿四
 右為細末砂糖水調神麩為丸如梧子大每服五六十丸砂糖水下
 ○一治黃病愛吃塵泥者用
 黃泥 一斤 砂糖 四兩 和

右為細末黃連蜜為丸如梧子大每服五六十丸空心糖湯下
 ○一治黃病愛吃生米者
 陳皮 白芍 炒 神麩 炒 麥芽 炒 山查
 白茯苓 去皮 石膏 各一錢 厚朴 七分 蒼朮 一錢 二 藿香 五分
 白朮 一分 煎五甘草 三分

右劉水煎熟入砂糖下蛤蜊殼食前服
 ○一治黃腫秘方
 大煨煨丁箇黑礬三錢猪肚丁箇上二味裝入肚內煮爛煨去骨
 用黃湯洗令肚淨吃之即愈

○一治女勞疸方

四苓散合四物湯去川芎加茵陳麥門冬滑石甘草
 ○一治諸黃疸口淡怔忡耳鳴脚軟微寒發熱小便白濁此為虛症用
 八味丸方見補益用四君子湯吞下
 ○一治黃疸病醫不愈耳目悉黃余飲不消胃中脹熱生黃衣蓋胃中存
 乾糞使病用煎
 猪脂一小升溫熱頓服之日三炙燥糞下去乃愈

新刊醫林狀元壽世保元丙集三卷

醫世保元

丙集三卷

三三

新刊醫林狀元壽世保元丁集卷之四

太醫院吏目金鈴雲林葉廷賢子才著

甲 葉安國 仝校

南羅大學生蓋印周文卿校刊

補益

脈法氣虛脈細或緩而無力右手弱血虛脈大或數而無力左手弱陽虛
 脈遲陰虛脈弦真氣虛脈緊男子久病氣口脈弱則死強則生女人病
 久入迎強則生弱則死
 夫人之正氣不足曰虛復繼者愈曰損致病之因有六焉一曰氣二曰血
 三曰精四曰神五曰胃氣六曰七情過勞六氣委和則各司其職曰無
 病失養違和陰陽偏勝危則則諸病生焉夫氣乃肺之主血乃肝藏之

壽世保元

丁集四卷

精乃腎主之神乃心之主飲食乃脾胃之主七情則七神主之凡應事
 大繁則傷神味談則誦飢而言多則傷氣經然想思則傷精久視則
 則傷肝飲食勞倦則傷脾久行傷筋久立傷骨久坐傷肉此五勞七傷
 之屬也其有真藏素薄之人又兼斷喪太早者其陰根本受虧腎水一
 虧則火必勝勝則剋肺金肺主皮毛則腠理不密鼻不聞香臭火炎痰
 升而致咳嗽甚致腎水枯竭肺子能令母虛是也金水既病則五臟六
 腑皆為火賊此火乃內出之火宜補精血而火自退管服五仁斑龍膠
 丸培復精神之聖藥也夫鹿者得先天氣質之厚又食靈苗之精故曰
 壽性角乃眾體之首一身精華所聚者也方名五仁者謂精參杞之類
 是也男婦虛弱之病服之以復其元非此不能故斑龍膠丸為血肉上
 品之良劑善轉旋心腎竅填五內益精神充氣血滋益於一身兼以參
 杞門冬鮮地骨皮等為佐配以八物湯如乾嗽痰中見血者加三門冬
 牡丹知母五味製梅其却病延年之功誠在斯矣世俗補陰丸以知母

黃柏為主者。但可施於壯盛人。縱慾相火之多。皆可矣。若虛損精血不足之症。已成者。及五十歲。則元陽精氣何由而生。又人輒以人參肺熱。還傷肺之說。將人參為虛損人之忌物者。蓋不究心於本草經耳。參本味甘微寒。善補五臟。安精神。健脾胃。生津液。況素問言虛損治以甘溫。乃萬世不易之定論也。彼何期後學。泥近書所註。肺熱還傷肺之句。惑焉。則可說壯人患內外感。并積熱固結於肺。宜清涼滌道。若槩以虛損虛火痰嗽。及氣虛中滿者。妄議人參為不可用。是惑世誣人。陷於不韋甚矣。

○一論元氣虧損。脾胃虛弱。飲食少進。或肢體腫脹。或大便不實。澀瘦而黃。或胸膈虛痞。痰嗽香酸等症。

四君子湯

人參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮

甘草 炙 一錢

右剉一劑。薑棗煎服。○加陳皮名其功散。○加半夏陳皮名六君子湯。

壽世保元

一集四卷

二

○去茯苓加乾薑名理中湯。

○一論心血虧損。肝脾腎血虛。發熱或暈熱甚。頭目不清。或煩燥不寐。胸膈作脹。或脇作痛等症。

四物湯

當歸 酒洗

懷熟地 黃各三錢

白芍 酒炒 二錢

川芎 分 錢五

右剉一劑。水煎溫服。

○一論氣血虛弱。惡寒發熱。煩燥作渴。或不時寒熱。眩暈昏聩。或大便不實。小便赤淋。或飲食少思。小腹痛等症。宜用八物湯。又名八珍湯。即四君子湯合四物湯是也。

○一論凡人元氣素弱。或因起居失宜。或因飲食勞倦。或因用心太過。致遺精白濁。盜汗自汗。或內熱肺熱。潮熱發熱。或口乾作渴。喉痛舌裂。或胸乳膨脹。脇肋作痛。或頭頸時痛。眩暈眼花。或心神不寧。搖而不寐。或小便赤澀。莖中作痛。或便溺餘瀝。臍腹陰冷。或形容不克。肢體畏寒。或

鼻氣急促。或更有下切熱。汗身是無不虛火。宜服後方。

十全大補湯

人參 去蘆

白朮 去蘆

白茯苓 去皮

當歸 酒洗

川芎

白芍 酒炒

熟地黃

黃芪 蜜炒

肉桂

麥門冬 去心

五味子

甘草 炙

右剉散。生薑棗子。水煎溫服。

○一論老年。房有少艾。致頭痛發熱。眩暈喘急。痰涎壅盛。小便頻數。口乾引飲。通吾生刺。縮故。如荔枝。然下唇黑裂。而目俱赤。煩燥不寐。或時時身。路手。此腎經虛火。遊行於外。投以十全大補湯。如山茱澤瀉丹皮。山藥麥門冬五味附子。水煎服。熟練良久。脈症各減三四。再與八味丸服之。而愈。

○一論中氣不足。肢體倦怠。口乾發熱。飲食無味。或飲食失節。勞傷身熱。

壽世保元

一集四卷

三

脈洪大而虛。或頭痛惡寒。自汗。或氣高而喘。身熱而煩。或脈微細軟弱。自汗。體倦。少食。或中氣虛弱。而不能攝血。或飲食勞倦。而患痲痺。或痲痺因脾胃虛。而不能愈。或元氣虛弱。感冒風寒。不勝發表。宜用此代之。或入房而後感胃。或感胃而後入房。亦用此湯。急加附子。或游痲痺痛。急用附子理中湯。此方能治一切諸病。誤用攻擊之藥。太過。以致元氣脾胃虛損之極。病已垂殆。用之。實有起死回生之效。宜此。

○一論經云。壯水之劑。以制陽光。夫人之生。以腎為主。人之病。多由腎虛。而致者。此方乃天一生水之劑。無不可用。若腎虛發熱。作渴。小便淋閉。痰壅。朱音。咳嗽吐血。頭目眩暈。眼花耳聾。咽喉燥痛。口舌瘡裂。齒不堅。固。腰膝痠軟。五臟虧損。自汗盜汗。便血諸血。凡肝經不足之症。宜用之。蓋水能生木。故也。此水化為痰之聖藥。血虛發熱之神劑。又治腎虧精血不足。虛熱不能起床。加大附子肉桂各二兩。名八味丸。又治腎陰

虛弱津液不降，敗濁為痰，能治欬逆。又治小便不禁，收精氣之虛脫。益養氣滋腎，制火導水，使機關利而脾土健實。宜此。

六味地黃丸

懷生地黃 八兩 兩要其精，復生。地黃，酒洗淨，入砂鍋內，蒸熟，切厚片。入後，藥同，再加工薑汁，再蒸。非此，則取用，非此，則取用。

山茱萸

酒蒸，去核。四兩。

懷山藥

四兩。白茯苓 三兩。

牡丹皮

去骨。澤瀉 三兩。

右忌鐵器，將藥精製，秤為一處，入石臼內，搗成餅，晒乾，或微火焙乾，或確杵，或石磨，為細末，煉熟蜜一斤，加水一磅，和為丸，如梧子大，晒乾，磁器收貯。每服三錢，空心溫酒任下。忌：辛、白、腎水不能攝養，脾土多吐，痰唾，薑湯下。○麥門、五味、八仙、長壽丸。○腰痛，加鹿茸、木瓜、續斷。○消渴，加五味子。○諸淋，應倍茯苓、澤瀉。○若入夜多小便，加益智仁、去澤瀉，減茯苓一半。○若入下元虛冷，胞轉不得小便，應急切補，四五。

壽世保元

一集四卷

四

日困，重危者，培澤瀉，選精去澤瀉。○虛火耳聾，加黃柏、知母、遠志、石菖蒲。○小兒遺尿，加破故、益智仁、人參、肉桂。○小兒鶴節，加鹿茸、牛膝、人參。○小兒解頰，頭縫開解，不合也，加入人參。○小兒稟賦腎經虛熱，耳內生瘡，或肌肉消瘦，骨節皆露，各節痛，加鹿茸、牛膝，各一兩，五味子四兩。若願解，不谷、牙齒不生，眼睛不黑，腿軟，難行，最宜此藥。○一論大補元氣，培填虛損之聖藥也。即六味地黃丸，依原方，再加五子，是也。

五子益腎養心丸

甘枸杞子 四兩

栢子仁 二兩

覆盆子 二兩

楮實子 炒 二兩

沙苑藜 炒 二兩

右共十一味，為細末，用蜜八兩，入班龍膠，先煉次入，浮小麥粉四兩，芡實粉四兩，水調亦入，膠蜜同煉，熟和藥，再杵，于餘下。丸如梧桐子大，每日服百丸，淡鹽湯下。

○一論腎虛不能制火，六味地黃丸主之。○腎非獨水也，命門之火，竝焉腎不虛，則水足以制火，虛則火無所制，而熱証生矣。名之曰陰虛火動。河間氏所謂腎虛則熱是也。今人足心熱，陰股熱，腰脊痛，率是此証。若人得之，為順，少年得之，為逆，乃咳血之漸也。地黃、茱萸、味厚者，也。經曰：味厚為陰中之陰，故能滋少陰，補腎水，澤瀉、味甘、鹹，甘從土化，鹹從水化，寒從陰化，故能入水藏，而瀉水中之火。丹皮、氣寒、味苦、辛，寒能勝熱，苦能入血，辛能生木，故能益少陰，平虛熱。山藥、茯苓、味甘者，也。甘從土化，土能防水，故用之以制水藏之邪，且益脾胃，而培萬物之母也。○一論腎虛移熱於肺，咳嗽者，六味地黃丸主之。○有足心熱，內股熱，腰痛，兩尺脈虛大者，病原於腎虛也。地黃、茱萸、味厚者，也。味厚為陰中之陰，故能益腎，腎者水藏，虛則水邪歸之，故用山藥、茯苓，以引水邪，邪歸之，則生濕熱，故用澤瀉、丹皮，以導坎中之熱，滋其陰血，去其邪熱，則精日生，而腎不虛，病根既去，咳嗽自瘳矣。

壽世保元

一集四卷

五

○一論消渴者，煩渴引飲，小便如膏，六味地黃丸主之。○先有消渴，善飲而後，小便如膏者，名曰下消，懼其燥熱，漸深，將無水矣，故用此方，以救腎水。地黃、茱萸、質潤，味厚，為陰中之陰，故可以滋少陰之腎水。丹皮、澤瀉，取其鹹寒，能制陽光。山藥、茯苓，取其甘淡，能療膏渴。○一論渴而未消者，八味丸主之。○此即六味地黃丸，加附子、肉桂，也。渴而未消，謂其人多渴，喜得茶飲，不若消渴之求飲無厭也。此為心腎不交，水不足以濟火，故令其液口乾，乃是陰無陽而不升，陽無陰而不降，水下火上，不相既濟，故用肉桂、附子之辛熱，壯其少火，用六味丸，益其真陰，真陰益，則陽可降，少火壯，則陰自升，故底底加新，枯龍、海狗、未得，用至意，維新，惟明者知之。味者，鮮不以為迂也。昔漢武帝病渴，張仲景為處此方，至聖之藥，今備可也。○一論腎間水火既虛，小便不調者，八味丸主之。○腎主水，火主二便，而司開腎間之水，竭則火獨治，能開而不能開，火病，小便不出，腎間之

火息則水獨治能開不能閉人小便不禁是方也以附子肉桂之溫熱益其火以地黃藥煎之濡潤壯其水火欲實則丹皮澤瀉之鹹酸者可以收而瀉之木欲實則茯苓山藥之甘淡者可以制而滲之水火既濟則開關治矣

一論腎間水火俱虛者八味丸主之○君子觀象於坎而知腎俱水火之道焉故曰七節之旁中有小心小心少火也又曰腎有兩枚左為腎右為命門命門相火也相火即少火取夫一陽居下二陰為坎水火並而為腎此人生與天地相似也今人入房感而陽事急者陰虛火動也陽事先痿者命門火衰也真水竭則陰氣不寒真火息則感其不熱故人終有善藥傳焉是方也地黃藥煎丹皮澤瀉山藥茯苓六味丸也所以益少陰腎水桂附辛熱物也所以益命門相火木火得其養則二腎復其天矣

壽世保元

十集四卷

六

從故嘔咳上氣此陰虛於下而孤陽上浮方也地黃藥煎潤味厚可使滋陰丹皮澤瀉氣味酸寒可制陽光山藥茯苓味甘而淡可使調下

一論腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿宜六味丸加黃柏知母主之○腎者水藏無水則火獨治故令腎熱腎主督脈督脈者行于脊裏腎熱則督脈虛故令腰脊不舉骨枯髓減者枯潤之極也腎主骨故曰骨痿是方也地黃藥煎味厚而能生陰知柏苦寒而能瀉火澤瀉丹皮能去坎中之熱茯苓山藥能制腎間之邪玉水曰壯水之主以制陽光此方主之

一論入房太甚筋縱弛發為陰痿八味丸主之○腎坎象也一陽居於二陰為坎故腎中有命門之火焉凡人入房甚而陰事作強不已者水衰而火獨治也陰事柔痿不舉者水衰而火亦敗也丹溪曰天非此火不足以生萬物人非此火不能以有生奈之何而可以無火乎是方

也桂附味厚而辛熱味厚則能入陰辛熱則能益火故能入少陰而益命門之火地黃藥煎味厚而質潤味厚則能養陰質潤則能壯水故能滋少陰而壯坎中之水火欲實則澤瀉丹皮之鹹酸可以引而瀉之水欲實則山藥茯苓之甘淡可以滲而制之水火得其養則腎官不弱命門不敗而作強之官得其職矣

八味丸治下元冷憊心火上炎瀉欲飲水不能攝養多吐痰唾及治消渴小便反多婦人轉胞小便不通

一論腎勞背難俯仰小便不利有餘瀝瀝生瘡小腹裏急便赤黃者六味地黃丸加黃柏知母主之○腎者藏精之藏也若人強力入房以竭其精不久則成腎勞腎主精精主封填腎精以入房而竭則骨隨是枯矣故背難俯仰前陰者腎之竅腎氣足則能管攝小便而洩溺惟宜腎氣怯則欲便而不利既便而有餘瀝斯之謂矣其開關之常也腎者水藏傳化失宜則水氣留之水氣留之則生濕熱故令諸濕生瘡

壽世保元

一集四卷

七

也小腹裏急者此真水枯而真火無制真水枯則命門之相火無所畏真火無制故灼膀胱小腹之筋膜而作裏急也便赤黃亦皆火之所為地黃藥煎味厚者也味厚為陰中之陰故足以補腎門之陰血山藥茯苓甘淡者也甘能制濕淡能滲濕故足以去腎虛之陰濕澤瀉丹皮酸寒者也酸能潤下寒能勝熱故足以去腎間之濕熱董相知母苦潤者也潤能滋陰苦能瀉火故足以伏龍雷之相火夫去其灼陰之火滋其濟火之水則腎間之精血自生矣

一論氣短有痰小便赤澀足根作痛尺脈浮大按之則澹此腎虛而痰飲也用四物送六味丸而已

一論六味地黃丸專補左尺腎水之藥八味丸既補左尺腎水兼補右腎相火之藥少年水虧火旺宜服六味丸老年水火俱虛宜服八味丸况老年腎臟真水既虛邪水乘之而為濕熱以作腰痛足痿痰唾清濁小便不禁淋閉等症非桂附之溫散而能治者乎

○一論八味丸治下元虛憊心火上炎渴欲飲水或腎水不能攝養多吐痰唾及男子消渴小便反多婦人轉胞小便不通

○一養生書云立秋後宜服張仲景八味丸治男子虛弱百病衆所不察者久服輕身不老加以種養則成地仙

○一論命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化或臍腹疼痛夜多漩瀾經云益火之源以消陰翳即此方也又治婦人脾轉小便不通殊効

八味丸

懷生地黃用酒蒸 山茱萸肉酒蒸 山藥各四兩

白茯苓去皮 牡丹皮 澤瀉各三兩

肉桂用三分厚者去皮方 大附子一兩半重者切四片重

右忌鐵器共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服小十九空心滾白米送下

壽世保元

丁集四卷

八

○一治腎虛虛弱面色黧黑足冷足腫耳鳴耳聾肢體羸瘦足膝軟弱小便不利或多或少腰脊疼痛用八味丸加鹿茸五味子名十補丸

○一論凡有人不耐勞不能食冷或飲食脹大便不實或口苦常嘔如癆服涼藥愈感或盜汗不止小便頻數腰腿無力或喘律或呼吸覺冷入腹或陰囊濕癢或手足冷或面白或黧黑或畏寒短氣以上諸症皆屬虛症八味丸主之此丸用附子有功夫附子一物大辛熱除三焦痼冷六腑沉寒氣味勁悍有回陽之功命門火衰非此不補惟雖有亦但炮製如沃或用甘草防風同炒或重便交浸以去其毒復以地黃等味同用以制其熱潤其燥緩其急假其克槌之功而駕馭其悍悍之勢則雖久服亦有功而無害惟在善用之而已若執泥有果有沉寒痼冷之疾棄而不其能療乎觀東垣八味丸論則較然矣

○一論諸虛百損五勞七傷滋腎水降心火補脾土添精神益氣和血壯筋骨潤肌膚聰耳明目開心定智強陰壯陽延年益壽此藥性味溫

而不熱清而不寒久服則坎離既濟陰陽協和火不炎而神自清水不滲而精自固矣平補之聖藥也

加減神仙既濟丹 尚書劉春岡方

揀參去蘆 嫩鹿茸酒炙 山茱萸酒蒸去核

甘枸杞子酒洗 嫩黃芪蜜水炒 懷山藥二兩

肉蓯蓉酒洗 遠五味子二兩 川巴戟水泡去

川牛膝去蘆酒洗 川杜仲去皮酒 白茯苓去皮本

遠志甘草水酒 石菖蒲去毛 小茴香酒炒

懷生地黃酒洗 懷熟地黃酒蒸 鹿絲子酒蒸搗餅 麥門冬去心

天門冬去心 兔絲子酒蒸搗餅 當歸身酒洗

川黃柏酒炒 知母去毛 栝子仁二兩

右為細末煉蜜和熟棗肉為丸如梧桐子大每服百九空心鹽湯送下或酒任下忌三百

壽世保元

一集四卷

九

○一論此方主滋養肝腎補益心血利足腰實肌膚悅顏色真衛生之良藥也

歸茸丸

懷熟地黃酒蒸 懷山藥酒洗 山茱萸酒蒸去核

白茯苓去皮 牡丹皮一兩 澤瀉一兩

當歸酒洗 嫩鹿茸酒炙 遠五味子內兩

懷牛膝去蘆酒洗 官桂二兩 大附子炮去皮

右為細末鹿角膠半斤酒打稀糊為丸如梧桐子大每服五十九空心鹽湯溫酒任下

○一論五仁斑龍膠專治真陽元精肉之以致胃氣弱下焦虛憊及夢泄自汗頭眩四肢無力此膠能生精養血益智寧神順暢三焦培填五臟補心腎美顏色却病延年乃虛損中之聖藥也

五仁斑龍膠法

鹿角連髓益骨者佳。自解者不用去蓋。生淨五十兩。裁作三十段。新汲淡泉井水浸洗去垢。吹去角內血腥穢水。盡同人參五兩。天門冬去心皮五兩。麥門冬去心五兩。甘枸杞子八兩。去蒂。川牛膝去蘆。五兩。五品藥以角入淨鍋內。注水至罈肩。用箬殼油紙封固。罈口大鍋內注水。文武火密煮。三晝夜足。時常加入沸湯於鍋內。以補乾耗。取出。澆去渣。將汁復入。罈口。砂鍋內熬成膠。聽用和藥末。其角去外。鹿皮淨者為名。鹿角霜也。

仙傳斑龍丸

滋補中之聖藥

鹿角霜

鹿角膠

柏子仁另研

兔絲子酒製

懷生地黃

酒蒸下日

右為末。先將鹿角膠磁器內煨化。化開。却將膠酒攪糊。和藥。杵一。下。九。如梧桐子。大。每服五十丸。淡鹽湯下。酒亦可。

昔有一道人。貨此藥。曰。尾問不察。滄海竭。九轉神丹。俱慢。唯有此。

壽世保元

丁集四卷

龍頂上珠能補。玉堂閣下血。此藥理百病。養五臟。補精氣。壯筋骨。益心志。安魂魄。令人悅澤。駐顏。經身延年益壽。久服成地仙。

長生固本酒

人參

甘枸杞子

懷山藥

遠五味子

天門冬水潤

麥門冬水潤

懷生地黃

懷熟地黃各二兩

右剉片用生絹盛之。煮酒三十斤。以若封罈口。放罈內水。貴罈水不過罈口。以米百粒。放罈上。候氣薰蒸。米熟。住火。埋土。出火毒。飲之。此藥甚平和。治勞疾。補虛。為醫家久服。而如童子。忌蘿蔔。蒜。食之。與地黃相反。令人易白髮。以麵不思。亦忌。早飯。

一論仙家酒。大能益心氣。補腦髓。治消渴。勞怯。及風火。症。老人尤宜。其。年。幼。壯。盛。潔。淨。無。病。婦。人。乳。每。用。一。吸。即。以。指。塞。鼻。孔。吸。而。閉。而。漱。乳。與。口。津。相。和。然。後。以。鼻。內。引。上。吸。使。氣。由。明。堂。入。胞。方。可。徐。徐。嚥。下。片。五。七。次。為。一。度。不。漱。而。服。者。何。異。飲。酪。于。腸。胃。兩。

一論治諸虛百損。五勞七傷。用大乳一盞。好酒半盞。入銀鍍或錫鍍。內。湯。浸。每。五。更。服。

又方。甘室人。經血。或首。經。最佳。以棉帛。吸之。陰乾。入乳香末。少許。乳汁。和丸。如櫻桃大。每食。下。粒。取。女。人。氣。一。口。乳。汁。送。下。

一論。主。壯。元。陽。益。真。氣。助。胃。潤。肺。宜。補。精。膏。

牛髓兩兩

胡桃肉四兩

杏仁四兩

山藥汁拌蒸熟

人參四兩

紅棗肉四兩

右將杏仁。胡桃肉。山藥。棗子。四味。搗。為。膏。用。蜜。一。斤。煉。去。白。沫。與。牛。髓。同。和。勻。入。磁。罐。內。置。薄。紙。墊。下。日。空。心。以。干。匙。用。酒。或。白。湯。化。服。

呂洞賓補屋修牆養生訣

少年。憂。氣。征。則。為。豈。精。中。年。力。弱。弱。則。將。藥。餌。調。真。息。自。有。元。陽。養。氣。壯。君子。小。人。莫。知。陰。陽。相。推。之。妙。幼。年。之。人。精。強。力。壯。不。願。身。形。損。食。其。味。

壽世保元

一集四卷

一一

樂。人。為。美。不。知。老。之。將。至。百。病。來。侵。登。因。幼。年。骨。脈。未。至。父。母。恩。養。早。娶。妻。室。或。因。幼。失。父。母。任。意。蕩。醉。飽。行。房。以。致。口。舌。苦。乾。虛。熱。盜。汗。諸。症。侵。染。無。藥。治。療。呂。公。留。下。秘。訣。用。人。參。不。拘。多。少。切。碎。將。水。同。煮。候。熟。取。起。陰。乾。選。小。雞。雞。二。三。隻。每。日。將。米。喂。養。待。雞。生。卵。每。日。食。三。五。七。箇。不。過。百。日。之。內。大。有。功。効。形。容。嬌。美。返。本。還。元。若。有。烏。雞。更。好。如。用。雄。雞。同。食。此。參。生。抱。小。雞。日。往。月。來。其。功。不。可。具。述。

一論。治。傷。寒。汗。吐。下。後。及。行。倒。倉。法。吐。下。後。諸。病。誤。用。攻。擊。之。過。以。致。元。氣。耗。傷。用。此。補。之。韓。飛。霞。曰。人。參。煉。膏。回。元。氣。於。無。何。有。之。御。王。道。也。又。肺。虛。嗽。亦。宜。以。人。參。膏。補。之。如。肺。虛。兼。有。火。邪。者。人。參。膏。與。天。門。冬。膏。對。服。之。妙。

人參膏

人參。去。蘆。不。拘。多。少。切。片。入。砂。鍋。內。淨。水。文。武。火。熬。乾。一。半。傾。放。瓶。內。將。渣。又。煎。又。如。前。併。之。於。瓶。內。九。煎。三。次。驗。參。渣。無。味。乃。止。却。將。

三次所煎之汁，瀝去渣，仍入砂鍋內，文武火慢慢熬成膏，如入參一斤，只好熬成，下碗足矣。及成膏入碗，隔宿必有清水浮上，亦宜去之。只留稠膏，每服一二匙，清米湯下，口漱下。

白木膏

白木要好，雪白者去蘆油，不用淨一斤。入砂鍋水熬三次，取汁瀝去渣，入砂鍋內，文武火慢慢熬，至三碗。入蜜四兩，又熬成膏，入磁罐收貯，封固。土埋七日，出火毒，取出，每服四五匙，不拘米湯調服，善補脾胃，進飲食，生肌肉，除濕化痰，止泄瀉。

茯苓膏

大白茯苓，堅硬不拘多少，去黑皮，為細末，用水漂淨，漂者，漂時先令少用水，如和麪之狀，令濕方入水漂淨，取下沉者，以淨布細去水，晒乾，再為末，再漂再晒，凡三次，復為細末，每末一斤，拌好白蜜二斤，令勻，貯長磁瓶內，封固，置鍋內，桑柴火懸，脂盡，下日抵脫連。

壽世保元

丁集四卷

十三

瓶裝埋五穀內，次早倒出，以舊在上者，裝瓶下，舊在下，都裝瓶上，再煮，再以五穀內，凡三日夜，次早取出，埋淨土中，七日，出火毒，早晚用三四匙，嚼少時，以白湯下，補虛弱，治痰火，殊效。

延壽丹

用白茯苓十斤，淨鍋內，煮一夜，晒干，日去皮，切片，掛蜂蜜二斤，蒸三炷香，晒乾，再加蜜，再蒸再晒，如是三次，為細末，煉蜜為丸，如梧子大，每服三五十九，溫水送下，久服大補，殊效。

地黃膏

真懷慶大生地黃一斤，酒洗，令淨，加麥門冬去心四兩，貯砂鍋內，入水，熬乾一半，傾入磁盆內，又入水，又熬，凡三次，將汁瀝去，渣將汁用文武火，慢慢熬，至三碗，入蜜四兩，又熬成膏，入磁罐內，封固，入土埋，出火毒，取出，每服一二匙，空心白湯服，能補腎水，真除填精，補血，生血，為奇。

枸杞膏

甘枸杞一斤，放砂鍋內，入水，熬十餘沸，用細絹羅濾過，將渣搗碎，淨如前，再入水，熬濃，取汁三次，去渣，不用，將汁再瀝入砂鍋，再慢火熬成膏，入磁器內，不可泄氣，不論男婦，每早晚用酒調服，能生精補元氣，益榮衛生，血性顏色，天補諸虛，百損，延年益壽。

○一論此膏能鎮玉池，存精固本，通二十四道血脈，鎮三十六道竹節，主一身之毛竅，貼之血脈流暢，龜健，不寒，精氣充足，精神百倍，功壯陽助氣，返老還童，固下元，通達三關，乃遂行之道，老人貼之，夜無小便，大人精不泄，補益虛損，延年益壽，至寶。又治男子下元虛冷，小腸瀉氣，痞積，單腹脹，浦井一切腰腿骨節疼痛，半身不遂，貼三日，神效。婦人子宮久冷，赤白帶下，久不坐胎，產後腹痛，貼之，三日，神效。千金封臍膏，內閣秘傳。

天門冬

生地黃

熟地黃

木鼈子

大附子

壽世保元

丁集四卷

十三

杏仁

蛇床子

遠志

牛膝

肉蓯蓉

官桂

兔絲子

肉豆蔻

虎骨

鹿茸

麥門冬

紫梢花 各二錢

右為細末，入油一斤四兩，文武火熬，色去渣，澄清，入黃丹半斤，水飛過，松香四兩，熬用槐柳條攪，滴入不散，為度，再下硫黃雄黃，朱砂赤石脂，龍骨各二錢，為末，入內，除此不用見火，將藥微定，再下臘胸臍一副，阿芙蓉麝香各三錢，麝香一錢，不見火，陽起石沉香木香各三錢，俱不見火。

右為細末，入內，待藥冷，下黃蠟六錢，放磁器內，盛之，封固，放水，中浸三日，去火毒，取出，攤紙上，或紅絹上，亦可貼之，六七日，方無力，再換，丁方加乳香沒藥母丁香，此方其效如神，不可不識，其詳載於金匱，人靈不可輕授。

謂曰

靈龜衰弱最難全 好把玄書仔細看 助老精神還少貌 常時貼上返童顏 金龜出入超凡聖 接補殘軀越少年 雖然不到天仙位 却向人間作地仙 太和丸

飲食勞役 所關非細 飲食失節 損傷脾胃 勞役過度 耗散元氣 脾胃損傷 元氣衰劇 乃成內傷 諸病難治 保合太和 預防惡慮 大補諸虛 專進飲食 清痰降火 解鬱消滯 養氣健脾 王道之劑 不問老幼 男女通治 白木 去油 煨山藥 二兩 蓮肉 去心皮 當歸身 酒洗 白芍藥 二兩 辛及 湯泡 切片 川黃連 一兩 山查 一兩 神龜 一兩 香附 一兩 木香 五錢 龍眼肉 一兩 甘草 五錢

壽世保元 丁集四卷 十四

人參 五錢 嫩黃耆 一兩 白豆蔻 去殼 五錢 右為細末 荷葉如掌 大者前湯下 陳倉米半 麩麥粉和為丸 如梧桐子大 每服百丸 食後臨臥米湯送下 年幼氣壯者去參芪 坎離丸 ○治燈癩讀書苦 學問易忘 士大夫勤政勞心 精神昏倦 妙不可言 思慮房慾 人為所累 思慮過度 心血耗費 房慾失節 腎水枯涸 腎水一虛 心火自熾 醜成勞瘵 難症難治 防其未然 坎離既濟 補髓添精 調榮養衛 聰耳明目 安神定智 滋陰降火 百病皆治 且誦千言 不忘所記 龍骨 五錢 龜甲 五錢 遠志 湯泡 水泡 一兩 白茯苓 去皮 木 酸棗仁 一兩 石菖蒲 五錢 當歸身 一兩 麥門冬 一兩 天門冬 一兩 熟地黃 二兩 人參 五錢

山茱萸 酒蒸 去核 一兩 五味子 一兩 山藥 一兩 川黃柏 去皮 酒 知母 去毛 一兩 甘枸杞子 一兩 栝子仁 一兩 右忌鐵器 精製合為一處 石臼內搗成餅 晒乾磨為細末 煉蜜 酒水 珠 每蜜一斤 加水一碗 調和 煎藥為丸 如梧桐子大 每服三錢 空心 心益湯或酒任下 節然忘 三百 長春不老仙丹

治諸虛百損 五勞七傷 滋腎水 養心血 添精髓 壯筋骨 扶元陽 潤肌膚 聰耳明目 寧心益智 烏鬚黑髮 固齒牙 返老還童 延年益壽 壯陽種 子 却病 輕身 長生不老 真陸地神仙 仙茅 酒洗 黃精 酒蒸 赤何首烏 米泔浸 洗 焙 燥 為 白何首烏 同上製 大懷熟地黃 酒洗 去心 大懷生地黃 酒洗 去心 天門冬 酒洗 去心

壽世保元 丁集四卷 十五

麥門冬 水酒去 白茯苓 去皮 人乳浸 巨勝子 二兩 甘枸杞子 二兩 遠志 湯泡 二兩 覆盆子 二兩 兔絲子 酒洗 淨 炒 燥 二兩 揀參 二兩 嫩鹿茸 酒洗 補骨脂 酒炒 二兩 懷牛膝 去蘆 酒 川杜仲 去皮 酒 肉苁蓉 酒洗 二兩 川巴戟 水酒去 遠志 湯泡 二兩 青鹽 二兩 小茴香 酒洗 二兩 川草薢 酒洗 山茱萸 酒洗 二兩 川椒 去目 陰虛火動 素有熱者 加川黃精 酒炒 知母 酒炒 各二兩 紫河車 一具 用壯盛婦人首生男胎 以米泔水 洗淨 右已錄 常用 黃道吉日 精製 秤和 一處 石臼內搗成餅 晒乾 磨為細末 煉蜜 酒水 珠 每蜜一斤 加水一碗 調和 煎藥為丸 如梧桐子大 每服三錢 空心 心益湯或酒任下 節然忘 三百 長春不老仙丹

呼吸靜功妙訣

人生以氣為本以息為元以心為根以腎為蒂天地相去八萬四千里入
心腎相去八寸四分此腎是內腎膈下一寸三分是也中有一脉以通
元息之浮沉息總百脉一呼則百脉皆開一吸則百脉皆閉天地化上
流行亦不出呼吸二字入呼吸常在於心腎之間則血氣自順元氣自
固七情不熾百病不治自消矣

每子午卯酉時於靜室中厚褥鋪於榻上盤脚大坐眼自視臍以綿塞
耳心絕念慮以意隨呼吸二往一來上下於心腎之間勿亟勿徐任其
自然坐一炷香後覺得口鼻之氣不覺漸和柔又一炷香後覺得口
鼻之氣似無出入然後緩緩使脚開目去耳塞下榻行數步又復臥榻
上少睡片時起來啜淡粥半碗不可作勞惱怒以損靜功每日能專心
依法行之兩月之後自見功效

不煉金丹

壽世保元

丁集四卷

十八

且吞玉液呼出臟腑之毒吸採天地之清太上玉軸六字氣訣道藏有
三軸經言五臟六腑之氣因五毒薰灼不和又六欲七情積久生疾內
傷臟腑外攻九竅以致百骸受病輕則痼疾甚則官廢又重則喪生故
太上憫之以六字氣訣治五臟六腑之病其法以呼字而自瀉出臟腑
之毒氣以吸而自採天地之清氣以補之當且小驗旬日大驗年後第
病不生延年益壽衛生之寶非久勿傳呼有六曰呵呼咽嘘嘻吹也吸
則一而已呼有六者以呵字治心氣以呼字治脾氣以咽字治肺氣以
嘘字治肝氣以嘻字治膽氣以吹字治腎氣此六字氣訣分主五臟六
腑也凡天地之氣自子至巳為六陽時自午至亥為六陰時如陽時則
對東方勿盡閉窗戶然息風入乃解帶正坐呼齒五千六以定神先授
口中濁津漱鍊二十百下候口中成清水即低頭向左而嚥之以意送
下候汨汨至腹間即低頭開口先念呵字以吐心中毒氣念時耳不得
聞呵字聲聞即氣虛及損心氣也念畢仰頭閉口以鼻徐徐吸天地之

清氣以補心氣吸時耳亦不得聞吸氣聞即氣虛亦損心氣也但何謂
令短吸時令長即吐少納多也吸氣即低頭念呵字耳復不得聞呵字
聲呵字又仰頭以鼻徐徐吸清氣以補心亦不得聞吸時如此吸者六
次即心之毒氣漸散又以天地之清氣補之心之元氣亦漸復矣又
依此式念呼字耳亦不得聞呼聲如此者六所以散脾毒而補脾元也
次又念咽字以瀉肺毒以吸而補脾元亦須六次次念嘘字以瀉肝毒
以吸而補脾元噀以瀉膽毒以吸而補脾元吹以瀉腎毒以吸而補脾元如
此者並各六次是謂小周小周者六六三十六也三十六而六氣遍臟
腑之毒氣漸消病根漸除祖氣漸完矣次看是何臟腑受病如眼病即
又念噀字二字各十八遍仍每次以吸補之總之三十六是為中周
中周者第二次三十六通為七十二也次又再依前呵呼咽嘘嘻吹六
字法各為六次並須呼以瀉之吸以補之愈當精虔不可怠廢此第
次三十六也是為大周即總之為一百單六次是謂百八訣也午時屬

壽世保元

丁集四卷

十九

陰時有病即對南方為之南方屬火所以起陰毒也然又不若子後已
前面東之為陽時也如早起床上回東將六字各為六次是為小周亦
可治眼病也凡眼中諸症惟此訣能去之他病亦然神乎此太上
慈旨也略見玉軸真經而詳則得之師授也如病重者每字作五十次
九三百而六腑周矣乃漱鍊燕液叩齒如初如此者三即通為九百次
無病不愈秘之秘之非人勿傳○孫真人云天陰霧惡風猛寒勿取氣
也但附之

相國袁郡八十八翁介漢記
正德戊寅歲二月月中旬一胡僧貌黧而頰者造門請余與之語話不異
常人問其所長自稱善數計余曰數計何奇僧曰人皆數計多取則飽
僧且無飽弗數則饑僧且無饑余亦未深信因呼從者延之於別室漫
試之為數米二升麩如之禱以幽菽菜葷諸物僧據按狼食斯須殆盡
時余方治官未暇即所以從者問以師飽將吾以復而主人翁耳曰吾

安得飽居兩日間以師儼乎曰吾安得發時遂去去不可物色久之復來
復來應門語余曰余方欲為公嘗一功德七十金發百僧公諾之乎余
對曰十金可辦也僧因復留與之食食如前值有客從海上來者顧余
論金丹僧閉目搖手曰公勞矣適所講求者亡論未成竟爾食耳余
以其言其復稍稍叩之僧曰天地間自有一種丹耳非石非金丹在靈
臺金石無用也時夜將半矣僧手出一物示余乃刺度諸也以羊皮為
之穿跡漸磨滅猶依稀可觀僧指示余曰此宋元以前人也昔在五臺
山跌坐時有一黃冠者授我服食方今不可記年矣今得而服之十年
之後不知其身之輕於鴻也公倘欲問平則舉以告公慎毋學金丹金
丹不可學也筆緒既其僧口誦其訣命余自書書訖讀之卒無心可也
僧知余易之則起而執余手曰公無訝然吾非庸於人者其幸藏是也
再檢而讀之可也雖然行行其能留余亦寢寢於後箇中不復有為焉
備余請告歸每意有不慊輒悶悶廢餐又時而怒然若憊也方坐而自

壽世保元

丁集四卷

二

朕朕裂方以療之蒸婦忽言曰公不憶胡僧乎公嘗言宋太醫亦曾
食此穢也今其方尚存蓋請試之余笑曰微汝言吾幾忘之向因疑其
鹿馬而博千金也今姑妄為之不中無損也乃命童採取其所修治者
一惟其方是依服後即諸病如遺矣未幾而肌粟遍体生而復平平
若嫩皮骨焉始信胡僧非欺人而不佞之目皮相也嘗其時彼豈無心
奇術可攝生乎美玉在門余自失售耳抑余服是方多年矣即未能
饑飽若胡僧延壽若胡僧然使余得至耄至耄而余耳目聰明及
人也敢忘胡僧力哉是方也欲舉而它授人也安知不以余之疑胡僧
者疑余乎因識其顛末詳子姓藏之留俟知昔者携之同登壽域云
扶桑至寶丹歌

扶桑扶桑高拂雲海東日出氣氤氳氣滄海變巨幾億載此樹移根今尚
存結子如丹忽如漆綠葉英英翠可捫真人採鶴天地氣皆與紅霞共
吐去濯磨入鼎即靈藥芝木區區表許羣松有人已仙去我今朝夕

從此若葉分葉分願王汝綠陰裏自有根源
胡僧曰盤食時絲結成錦繡人食生脂延年除谷益嫩榮之葉性本和平
不冷不熱生於郊野之外者懶為蛇蝎所治須擇家園中嫩而存時
採數十斤洗以長流之水摘去其蒂暴於日中以乾為度復取巨勝子
為臣煉蜜為丸如梧桐子大十古曰擇一誠實之人面授修製之方不
可委諸僮僕仍宜在靜室中屏其婦人女子及鷄犬等物修合既成日
服二次約至百丸白滾水下三月之後體生軫粟此是藥力所行慎勿
驚畏旋則通體光潔如凝脂然服至半年之後精力轉生諸病不作久
服不已自躋上壽老人服之黃健眼明髮白返黑又能消痰生液補髓
添精功効不細此仙家服食上品秘密難逢傳匪其人當有殃咎戒
寶之

老人

壽世保元

丁集四卷

三

老者安之不以筋骨為禮廣庭專席何堪勉強支臨衰年之戒一也戒之
在得樂念痛無去取家之成敗開懷盡付兒孫優游自如清心寡慾二
也衣履綿葛不且華麗粗重慎於脫着避風寒暑濕一候小心調攝
三也飲溫暖而戒寒涼食細軟而遠生硬必須減少頻頻慢食不可吞
多慌慌不噉四時宜製理氣健脾補養之藥四也其為壽幽望遠而早
起莫同少壯晝歡而晚歸惟適與而止五也不問子孫賢否衣食節
自當預備身強強德壽如春寒秋熱可得久乎常以朝不保暮四字為
意六也若能持此六戒雖不用藥庶乎可安矣若家貧子孫不能備
只當安命持守閉門端坐願養天年而已不可貪費貴備及生福懷自
速其壽也

延年良箴

四時順攝晨昏護持可以延年
三光知敬雷雨知畏可以延年
孝友無間禮義自閑可以延年
謙和辭讓損己利人可以延年

物來順應事過心寧可以延年。口勿妄言意勿妄想可以延年。行住坐力勿為形勞可以延年。悲哀喜樂勿令過情可以延年。寒溫適體勿後華豔可以延年。呼吸精和安神閉房可以延年。詩書悅心山林逸興可以延年。身心安逸四大閑散可以延年。

衰老論

天一五之精妙合而結兩腎中間白膜之內。一點動氣大如筋頭鼓舞。化開通身真氣。三焦消化水穀外禦六淫內當萬慮晝夜無停。八面受攻由是神隨物化。氣逐神消榮衛告衰七竅反常帝無所察。如用流丹不寤而涕耳無聲。嗚呼。食口乾。寐則涎溢。溲不利而自遺。便不

壽世保元

丁集四卷

三三

通而或泄。由是真陰妄行。脈絡疏澁。則對入。時睡夜則獨臥。惺惺故使之。導引按摩。以通滯滯。固激津。寒痰以清。既焦枯。雖云老者非內不飽。肥則生氣非入不煖。煖則生淫。僥倖補藥。如油盡添油。燈枯而速滅。老子云。以其厚生。所以傷生也。况有明修禮貌。暗伏姦雄。麴蘗其腸胃。脂粉感其清真。孤陽獨盛。水殺易消。自恃飲噉。過入恣造。欺天之罪。宿緣既盡。惡根臨頭。其或厭飲。沉酣。身居勤儉。志益貪婪。方聚地毛之穗。忽作女子之夢。傾天下之色。不足止其欲。徧天下之財。不足其貪。

一論年高之人。陰虛。筋骨痿弱。無力。面無光澤。或難食。少痰。多或或喘。或便溺。數瀉。陽痿。足膝無力。者。并治形體瘦弱。無力。多困。腎氣久虛。憔悴。寢汗。發熱。作渴。並皆治之。

八仙長壽丸

大懷生地黃 酒拌 砂鍋內蒸一日 玉

山茱萸 酒拌 蒸去 乾山藥 四兩 白茯苓 去皮 木
牡丹皮 去骨 各 益智仁 炒 二兩 水 遠五味子 二兩
麥門冬 心 二兩 夫

右忌鐵器。為細末。煉蜜。丸。如梧桐子大。空心。溫酒。或炒。鹽。湯。送。下。夏。秋。白。滾。湯。下。○腰痛。加。鹿。茸。當。歸。木。瓜。續。斷。○酒。海。加。五。味。子。麥。門。冬。各。一。兩。○老人。下。元。冷。胞。轉。不。得。小。便。膨。急。切。痛。四。五。日。困。篤。欲。死。者。川。澤。瀉。去。益。智。○諸。淋。瀝。數。起。不。通。倍。扶。苓。用。澤。瀉。去。益。智。○夜。多。小便。加。益。智。一。兩。減。伏。苓。一。半。○治。虛。寒。牙。齒。痛。浮。○治。耳。聾。及。虛。心。耳。鳴。用。全。蠍。四。十。九。枚。炒。微。黃。色。為。末。每。服。三。錢。調。酒。送。下。百。九。空。心。服。

一論此膏。填精補髓。化為筋。萬神具足。五臟盈溢。諸病血滿。髮白。黑。返老。還童。行如奔馬。日進數服。終日不食。亦不饑。開通。強記。日。詞。萬。言。神。識。高。邁。夜。無。夢。想。人。生。二。十。七。歲。以。前。服。此。一。料。可。壽。三。百。六。十。

壽世保元

丁集四卷

三三

歲四十五歲以前服者。可壽二百四十歲。五十四歲以前服者。可壽一百一十歲。六十三歲已上服之。可壽至百歲。服之。十劑。絕。其。陰。陰。功。成。地。仙。矣。一。料。分。五。處。可。救。五。人。癘。疫。分。十。處。可。救。十。人。勞。瘵。修。合。之。時。沐。浴。志。心。勿。輕。示。人。

人參 好揀者 老 真懷生地黃 十斤 淨洗 白茯苓 膠 者 去 皮 筋 者 去 皮 筋

白砂蜜 五斤

右將參。為細末。忌鐵器。蜜用生絹。濾過。地黃。取自然汁。去渣。同藥。下。處。伴。和。勻。入。磁。器。內。封。固。淨。紙。二。十。餘。重。密。封。入。重。湯。煮。凡。藥。裝。火。煮。六。日。如。連。夜。火。即。三。日。夜。取。出。紙。數。重。包。瓶。口。入。井。內。去。火。毒。一。伏。時。取。出。再。入。膏。湯。內。煮。一。日。出。水。氣。取。三。匙。作。三。盞。祭。地。百。神。香。設。拜。至。誠。端。心。每。清。晨。以。二。匙。溫。酒。化。服。不。飲。酒。者。白。湯。化。下。忌。雞。犬。聲。及。婦。人。孝。子。見。之。

仙曰：予所製此方，加沉香琥珀各五錢，其功效異於世傳之方。乾咳者，有痰，病不由脾，故無痰也。易曰：燥萬物者莫熯乎火，相火一熯，則五液皆涸。此乾咳嗽之由也。生地黄能滋陰降火，密能潤生津，損其肝者，益其氣，故用不參，虛則補其母，故用茯苓。又地黃白蜜能潤肺，而多茯苓，任而屬土，用之以佐一物，此水位之下，去氣乘之之義，乃立方之道也。

○一論陽春白雪糕，凡年老之人，當以養元氣，健脾胃為主。每日三服，不可缺。此糕也，王道之品，最益老人。方見內傳。

齊大夫諸澄曰：麗女則養血宜，及時而嫁。弱男則節色宜，待壯而婚。男子破陽太早，則傷其精氣；女破陰太早，則傷其血脈。

書云：精未通而御女，以通其精，則五臟有不潤之處，果日有難狀之疾。

壽世保元 丁集四卷 二四

書云：男子以精為主，女子以血為主。故情感則思，思則氣，氣則懷胎。若孤陽絕陰，獨陰無陽，終心熾而不遂，則陰陽交爭，乍寒乍熱，久而為勞。

彭祖曰：美色妖麗，嬌姿盈房，以致虛損之禍。知此可以長生，陰符經曰：淫聲美色，破骨之斧鋸也。世之人若不能棄靈燭，以照迷途，徒志以割。

愛慾則流浪生死之海，害生於恩也。書云：年高之時，血氣既弱，陽事輒盛，必慎而抑之，不可縱心恣意。下度不泄，一度火滅，一度增油，若不制而縱慾，火將滅，更去其油。

春秋秦醫和視晉疾之疾曰：是謂近女室，非鬼非食，惑於喪志。公曰：女不可近乎，曰節之。

女樞曰：元氣者，腎間動氣也。右腎為命門，精神之所舍，惡精保重，榮衛週流，神氣不竭，與天地同壽。

書曰：志意極精，不知潛虛損生也。譬如枯朽之木，遇風則折，凝滯之水，遇冰則凝，能愛惜節清，亦得長壽也。

抱朴子曰：才不遠，強思之力不勝，強學之傷也。是矣。強之一室，真氣在後，壽之木。夫飲食所以養生也，然便醉而強酒，飽而強食，未有不疾者。其身况慾乎？慾而強，元精去，元神離，元氣散，戒之。

書云：飽食過房，勞損血氣，流溢滲入，太腸時便清，血腹痛，病名腸痹。又云：大醉入房，氣竭肝傷，丈夫則精液衰少，陰痿不舉，女子則月事未微，惡血滯留，生惡瘡。

書云：忿怒中盡力，房事虧虛，氣竭發為癰疽，惡懼中入房，除陽偏虛，自汗盜汗，積而為勞，遠行疲乏，入房為五勞，月事未絕而交接，生取又冷氣入內，身而發黃不痊。

一金瘡未瘥，而交合，動於血氣，令瘡敗壞，恐入房者，得淋疾，莖中寒而失血色，致脫胎，腎下急痛，死。

壽世保元 丁集四卷 二五

滋滋味，省思慮，節嗜慾，戒暴怒，持元氣，龍言語，輕得失，破憂沮，除身想，遠好惡，收視聽。

又 惜氣存精，更養神，少思寡欲，勿勞心，食惟半飽，無兼味，酒止三分，莫過頻，每把戲言，多取笑，常含藥，莫莫生噴，炎涼，詐詐都休問，任我逍遙，過百春，附：太學士高 等題今日伏聞。

聖躬益安，中外無不懽忻，乃臣等竊聞佳哲，有言調聖疾，病尤當謹守初愈之時，益容火初退，不可犯觸，當以懲忿為要，元氣初還，不可有驚，以疾為要，以此自持，且復一日，則容火益消，元氣漸復，口壯氣矣，此真調攝之術也。

皇上聖明，必然洞見，何待臣等言之，但太馬微忠，實有不能自己者，伏望

皇上平氣寧神倍加靜養勿以思慮勞心勿以動作勞形節制起居多進
粥食以保衛
天和不止今日如此即太安之後仍復如此久之自然
聖躬強固精神倍增萬年無疆之慶端在是也臣等下情無任忠愛
懇仰望之至奉
聖旨朕知道了

痼冷

丹溪曰人之一身貴乎陰陽升降和平無偏若在偏勝即為之患痼冷之
症由入之一身真陽耗散脾胃虛弱加於寒冷物有傷脾胃固結其寒於
臟腑不散以致手足厥冷畏冷憎寒飲食不化嘔吐涎沫或太瀉泄
或小便頻數治法宜暖下元兼理脾胃又有脾虛而畏寒者令人咳嗽
尤當詳而治之

壽世保元 一集四卷 二十六

○一論陰症身靜而重語言無聲氣少難以喘息目睛不明了口鼻氣
水漿不入大小便不禁面上惡寒有如刀刮先用葱熨法次服理中湯
葱熨法方見中寒
加味理中湯

大附子 炮去皮 人參 白朮 去蘆 乾薑 炒 肉桂
陳皮 白茯苓 去皮 甘草 減半炙
右剉生薑三斤棗二枚水煎熱服
○一論陽症歸陰陰囊縮八手足厥冷腹痛脹滿汗大出脈或洪弦
固陽湯

黃芪 蜜水 人參 各一
乾薑 炒 一錢 白朮 炒 一錢
大附子 炮 一錢 白朮 去蘆 炒 二錢
右剉一劑水煎熱服

○一脫陽症多因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不省人事或傷寒
新瘧誤與婦人交小腹緊痛公腎縮入面黑氣喘冷汗自出須臾不救
先以葱白炒令熱熨臍下次用
附子 一錢去皮 白朮 去蘆 炒 乾薑 炒 各
右剉每劑五錢水煎服須臾又下服○方用葱白連根六七十根研爛
熱酒調服外用炒鹽熨臍下氣海勿令氣冷
○一治陰症腹痛手足厥冷急用
三仙散
大附子 炮去皮 官桂 乾薑 炒 各
右共為細末每服三錢滾酒調服即愈

○一論陰症腹痛身冷宜
回陽散
硫黃 四分 胡椒 六分

壽世保元 一集四卷 二十七

右為細末每服三分燒酒調服
○一治陰症秘方
硫黃化開傾入井水內取出為末飯為丸如梧桐子大每服一錢溫
酒送下

○一治陰症用黑豆不拘多少鍋內炒熟乘熱以好酒浸之就以葱白
合泄氣低溫飲酒大效
○一治陰症用魚鱗一紙燒存性胡椒四十九粒為末熱酒調下
○一治陰症腹痛手足厥冷陰縮用朝腦二錢或三錢滾酒和服用枯白
藥以水調塗於兩手相合於大腿內夾之良久汗出即愈

○一治陰毒手足逆冷脈息沉細頭疼腰重兼治陰毒咳嗽等症
川烏頭乾薑等分為粗散炒令轉色放冷再搗為細末每服一錢水
一盞蓋一椀煎取半盞溫服
○一治陰症

用大艾炷灸臍中，將蒜搗汁擦臍上，後放艾多灸之，其臍上下左右各開一寸，用艾炷灸至五七壯為度。

如五莖縮入於內，速令入提定，急將斷艾丸如菘豆大，放在臍口灸，二壯其莖即出，仍服加味理中湯。

一論陰疝小便縮入臍內，用粗肥母雞一隻，利刀將脊上急急剪去，用手扯開，連毛帶屎，令病人腹臍上冷入脚，臍上須更熱透小便即出。

○一論因女色成陰疝者，宜回陽膏。

白礬生三錢 黃丹二錢 乾薑五錢 母丁香一箇 胡椒十五箇

右為末，用醋和得所以，男左女右手，握藥搭臍上，被蓋出汗即愈。

○一治陰疝極効方
芥菜子 七錢 乾薑 三錢

書世保元 一集四卷

右為末，水調作餅，貼臍上，手帕縛之，上放些鹽，以熱氣氣之，數次汗出為度，又將病人小便，陰疝在臍上，盡頭處用艾炷灸七壯神効。

○一治陰疝不能服藥，不得汗出者，回陽散。

丁香 乾薑 乳香 沒藥 胡椒各三錢

右為末，每用三錢，以唾調塗在兩手掌心，安於兩臍間，以手帕縛之，用綿被蓋之，其汗自出。

○一紫陰及大小便不通

小芥菜子半碗，為細末，不用黃丹，丁椒，醋煎滾，滾調糊攤臍上，以紙蓋住，熱如火，不妨以三炷香為度，將藥去了，用青布沾凉水，涼之，如得熱不用水，更好。

○一紫陰用胡椒乾薑各二錢，為細末，唾津調塗自己手心，心綿帛蓋於臍上，上仰臥効。

斑疹

脈多沉伏或細而散，或絕無，滑伯仁曰：脈者血之波瀾，故發斑者，血聚於肌膚，故脈伏，脈陽浮而數，陰實而大火感而表，故陽脈浮數，下焦實者，故陰脈實大。

夫斑有色點而無頭粒者是也，疹浮小有頭粒者，隨出隨收，收則又出，也非若斑之無頭粒者，當明辨之。

若發斑紅赤為胃熱，若紫不赤為熱甚，紫黑為胃爛，故赤斑半生半死，黑斑者九死一生，大抵鮮紅起發稀朗者吉，紫黑者難治，紫黑斑者死也。九斑欲出未出之際，宜先以升麻湯先透其毒，脈虛加入參，太步而大便不寬，加白朮，斑已出不宜再發也，斑不可汗，斑稠不宜下，如脈洪數熱感煩渴者，人參化斑湯。

○一論陽毒赤斑，出狂言吐膿血，乃熱毒蘊於胸中而發，斑也宜以升麻湯。

升麻湯 升麻二錢 犀角屑 射干 人參 生甘草各一錢

右剉一劑，水煎溫服。

○一論只因內熱發於皮膚，如蚊蟲之咬，不宜汗下，但清熱降火涼血氣為要，若斑黑為不治之症，宜用人參化斑湯。

人參三錢 石膏一兩 知母二錢 當歸 紫草茸 白茯苓 去皮 甘草各三錢

右剉二劑，水煎服。

○一論氣分有熱發斑者，宜柴胡湯。

柴胡三錢 黃芩二錢 半夏二錢 人參一錢 紫草二錢 黃連二錢 茯苓二錢 甘草一錢

右作一劑生薑煎服。
○一論血分有熱發斑者宜當歸散。

當歸 赤芍 生地黄 黃連 紅花

石膏 右對水煎服。

○一論癰疹因風熱客于肌腠氣血積阻而成也宜加味敗毒散。

羌活 獨活 前胡 柴胡 當歸
川芎 枳殼去穢 桔梗 茯苓 人參各五分
薄荷 甘草各二分加白木 防風 荆芥
蒼木米泔浸赤芍藥 生地黄各五分

右對一劑薑棗煎服此因感冒風濕以致發斑者服之良驗。

壽世保元 一集四卷 三十

○一論斑者如酒指點而不起者紅斑可治紫斑十活其一斑無生也如有斑見宜服解毒化斑湯。

牡丹皮 生地黄 木通 歸尾 知母
茜根 紫草茸 牛蒡子 遠志 甘草湯 甘草稍者
好犀角以乳汁磨 川山甲炒成珠研 未一錢

發熱

夫發熱者非止一端癰病中俱有發熱醫者當照各門治法治之蓋病在虛實寒熱之不同豈可一例而治耶。
○一論傷寒發熱是寒邪入衛與陽氣交爭而為外熱陽氣主外為寒所薄而其失職故為熱其脈緊而有方是外之寒邪傷衛也治主外宜服

九味羌活湯方見傷寒。
○一論傷暑發熱是火邪傷心元氣耗散而熱邪入空室中故發為熱汗大泄無氣以動其脈虛遲而無力是外之熱邪傷榮也治主內宜服清暑益氣湯方見中暑。

○一論內傷發熱是陽氣自傷不能升達降下陰分而為內傷乃陽虛也故其脈大而無力屬肺脾宜服補中益氣湯方見內傷。

○一論陰虛發熱是陰血自傷不能制火陽氣升騰內熱乃陽旺也故其脈數而無力屬心腎經曰脈大無力為陽虛脈數無力是陰虛宜服清離滋坎湯方見勞瘵。

○一論太病後氣血兩虛遂成勞怯潮熱往來盜汗自汗或無汗燥熱甚俗便以柴胡地骨皮往往不效其病愈劇。
○一論男子血虛有汗潮熱者以人參養榮湯方見後。
○一論男子氣虛有汗潮熱者以補中益氣湯方見內傷。

壽世保元 一集四卷 三十一

○一論血虛無汗潮熱者以茯苓補心湯方見婦人虛勞。
○一論氣虛無汗潮熱者以人參清肌散方見後。
○一論女子血虛有汗潮熱者以茯苓補心湯。
○一論氣血兩虛無汗潮熱者以逍遙散方見婦人虛勞。
○一論發熱咳嗽咯血以人參五味子散骨蒸者五蒸湯清骨散以上皆治勞熱之聖藥也方俱見後。
○一論男婦四肢發熱肌表熱妙火烙桐之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中即火鬱則發之即火鬱湯升陽散火湯

升麻 葛根 白芍 羌活 獨活
人參各五分 柴胡八分 防風 生甘草 炙甘草各三分
右對一劑生薑煎服已寒涼生冷之物。
○一論夜則靜晝則發熱者此熱在氣分也宜

小柴胡湯方見傷寒依本方加梔子黃連地骨皮

○一論晝則靜夜則發熱者此熱在血分也宜

四物湯方見補益依本方加黃柏知母黃連梔子牡丹皮柴胡

○一論晝夜俱發熱者此熱在氣血之分也宜

四物湯方見補益合小柴胡湯方見傷寒依本方五味再加黃連山枝子

仁一劑而安

○一論于午潮熱者

加減逍遙散

當歸

甘草

秦朮

右剉水煎服

○一論一切發熱體寒非雜病發熱者此邪在半表半裏也宜

壽世保元

一集四卷

三三

柴苓湯

小柴胡湯方見傷寒五苓散方見中經二方相合是也

○一論積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦顏色枯槁淚淚短氣飲食無味也

入參養榮湯

人參

白朮去蘆

遠志去心

當歸

白芍酒炒

甘草炙

陳皮

熟地黃

白茯苓去皮

黃芪蜜炙

桂心

五味子

右剉薑棗煎服

○一論男婦氣虛無汗潮熱者宜

人參清肌散

人參

柴胡

右剉薑棗煎服

白朮去蘆

半夏

粉葛

白茯苓去皮

當歸

甘草

赤芍

○一論虛勞潮熱咳嗽紅痰盜汗宜

人參五味散

黃芪

陳皮

桑白皮

右剉生薑烏梅半箇水煎加知母青蒿

○一論男婦五心煩熱骨蒸勞熱宜

清骨散

人參一錢

熟地黃一錢

右剉水煎服

赤茯苓五分

柴胡二錢

薄荷七分

秦朮五分

生地黃二錢

胡黃連五分

右剉水煎服

○一論發熱口乾小便赤澀夜則安睡晝則發熱此熱在氣分也

清心蓮子飲方見赤白濁

壽世保元

一集四卷

三三

○一論男婦肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不寐其熱洪大而厚宜

按全無肉經曰脈虛血虛脈實血實又名血虛發熱証象白虎清脈不

正實為辨也若誤服白虎必死此病得之於錢因勞役起宜服

當歸補血湯

嫩黃芪蜜水炒

右剉一劑水煎服

○一入虛勞發熱自汗諸藥不能退其熱者服當歸補血湯一劑如神

○一沈大尹不時發熱日飲水水數碗寒藥一劑熱渴益甚形體日瘦不

脈洪火而數時或無力王太僕曰熱之不熱其無火寒之不寒其

其無水又云倏熱往來是無火也時作時止是無水也選用補腎用加

咸八味丸不月而愈

○一男子七十有九頭痛發熱眩暈喘急痰涎壅盛小便頻數口乾引飲

遍舌生刺縮飲加荔枝然下唇果裂面自俱赤煩燥不寐或時發閉

烟火上衝急飲涼茶少解已瀆於死脈洪大而無倫且有刀割其勢然
手此腎經虛火游行於外投以十全大補加山茱澤瀉丹皮山藥麥門
五味附子二鍾熱寐良久脈症各減三四再與八味九服之諸症悉退
後長珍物而痊

○一儒者發熱口乾小便頻澀大便秘結盜汗遺精遂致廢弱用當歸六
黃湯三劑盜汗頓止用六味地黃丸一服調和用十全大補湯及前九
兼服月餘諸症悉愈

○一人年近四旬忽發潮熱口乾喜飲冷水求醫治以涼藥投之數服罔
效四五日渾身沉重不能動止四肢強直耳聾語謔妄言眼閉不省人
事六脈浮大無力此氣血脾胃虛損之極予以十全大補湯去地黃白
芍加熟附子一服須臾病者解睡痰響入咸以為服桂附參芪之快予
曰此藥病交攻不必憂疑也強又進一服過一二時許即能轉身動止
次日連進數劑則諸病次第而消瘳矣此從脈不從症而治之也

壽世保元

一集四卷

三二四

○一人發熱煩渴時或頭痛因服發散藥反加喘急汗如米盡夜
譫語余意此勞傷元氣譫汗所致其腹必喜手按詢之果然與十全大
補加熟附子一錢服之熱雖退而不醒舉家驚惶及究諸症頓退再劑
而痊凡人飲食勞役起居失宜見一切火症悉屬內真寒而外假熱故
肚腹喜暖口畏冷物此乃形氣病氣血俱虛屬不足法當純補元氣為
善治者矣

六味丸 八味丸 十全大補湯 俱見補益

勞瘵

脈骨蒸勞熱脈數而虛熱而清必殞其軀加汗加欬非藥可除
夫陰虛火動勞瘵之疾蓋由相火上乘肺金而成之也傷其精則陰虛而
火動耗其血則火亢而金虧人身之血猶水也血之精華最厚於精也
不謹養者縱其慾而快其心則精血滲洩故臟腑津液漸燥則火動葉

肺而生痰因其燥則痰枯于肺管不利於出故欬而聲乾原乎精之則
陰虛陰虛則相火衝胃而變為涎也一火煎燥則痰涎逆上胃皖不利
則多嗽聲蓋痰因火動欬因痰起痰之黃厚者為有氣可治狀如魚涎
白沫者為無元氣難愈然斯病之起非止過慾而已或五味之保或七
情之極或勞役之過耗散元氣損傷脾胃氣血虧損臟腑虛弱六脈沉
細微瀆而數百病由是次第而生蓋腎水一虛則相火妄動相火上炎
薰灼肺金肺受火邪所煎所以為咳為喘為熱為痰為喘急為盜汗為
吐血衄血為便血尿血為四肢倦怠為五心煩熱為咽乾聲啞為耳鳴
眼花為遺精便濁為魚脹腫滿為一切難狀之症治之宜滋腎水養心
血扶元氣健脾胃以培其本降相火清濕熱化痰涎潤肺金以治其標
宜以清離滋坎湯補中益氣湯河車地黃丸太平丸瑞蓮丸寧嗽膏白
雲糕之類宜對證選用慎毋執泥蓋此病非一朝一夕之故其所由來
者漸矣然治之非一方一藥所能瘳焉宜以上諸方對症投之不可

壽世保元

一集四卷

三五

以開鬱效有難於速期久而腎水上升則相火下降火降則痰消嗽止
水升則氣足神完水火既濟又何疾之不愈哉又須病者堅心愛命絕
房勞戒惱怒息妄想節飲食廣服藥以自培其根可也萬一毫釐不謹
則諸病迭起縱虛扁復難亦難為矣可不慎乎

○一論因房慾過度而成陰虛火動勞瘵之症發熱咳嗽吐痰喘急盜汗
五心煩熱吐血衄血咽乾聲啞夜夢遺精耳鳴眼花六脈沉數而瀕
清離滋坎湯

懷生地黃一錢 懷熟地黃一錢 麥門冬一錢
當歸一錢 白芍一錢 懷山藥一錢 天門冬一錢
白茯苓一錢 牡丹皮六分 白朮一錢 山茱萸一錢
黃柏五分 知母五分 甘草三分 澤瀉五分
右列藥煎濕服○痰盛加竹瀝薑汁○熱盛加童便入乳同服○盜
汗加黃芪蜜水炒酸棗仁炒○嗽盛加貝母瓜蒌仁

○熱盛加地骨皮○心下怔忡恍惚不寐加遠志去心酸棗仁炒○遺精加龍骨牡蠣煨○胸中不快加陳皮○泄瀉加蓮肉陳皮去黃柏知母○吐血衄血加犀角玄參○氣虛加入參○陽虛加熟附子○喘聲聲啞加桔梗玄參

○一論虛勞發熱口乾咳嗽吐痰喘急自汗四肢困倦無力不思飲食大便泄瀉肚腹脹腫滿六脈浮數無力

- 加減補中益氣湯
- 黃芪 蜜水炒
 - 陳皮 六分
 - 蓮肉 一錢
 - 人參 一錢
 - 當歸 酒洗
 - 甘草 炙三分
 - 白朮 去油蘆炒
 - 白茯苓 去皮
 - 白芍 一錢
 - 懷山藥 一錢

右劉蕢棗煎服○痰盛加薑粟半夏○嗽盛加五味子○口渴加麥門冬○腹脹加厚朴薑炒○利痞加枳實炒○泄瀉加炒黑薑○喘咳吐加薑炒半夏○腫滿加猪苓澤瀉木通○憎寒發熱加柴胡○元氣

下陷加升麻○元陽虛加熟附子肉桂

○一論年少之人稟賦薄弱不能謹慎新要太過以致腎水枯竭相火妄動而成陰虛火動之症渾身發熱咳嗽吐痰喘急上羣夜多盜汗五心煩熱日輕夜重吐血衄血尿血便血咯血唾血肺癰肺痿咽乾聲啞口乾發渴耳鳴眼黑頭眩昏沉腰膝腫滿小便淋瀝夜夢遺精足膝酸軟肌肉消瘦四肢困倦飲食少思血虛發熱之神藥也

河車地黃丸

懷生地黃 先將酒洗淨再入酒拌勻粗碗盛坐放砂鍋內重湯煮半日取出加酒再煮至熟黑為度再入生薑汁拌勻曬八

山茱萸 酒拌蒸去核 懷山藥 四兩

白茯苓 去皮煎 藥酒洗淨

牡丹皮 去骨 澤瀉 三兩

右忌鐵器為細末用頭生胞衣丁且男用男胎女用女胎長流水洗令淨磁碗盛放砂鍋內文武火蒸七日極爛入白內杵如泥入藥酒打

餘下丸如梧桐子大每服百丸空心滾白湯送下腎水不能補養脾土多吐痰喘急湯送下或用斑龍膠酒化開為丸尤妙如病人大便乾燥日乾作渴此相火太旺加黃柏酒炒知母酒炒麥門冬去心五味子各二兩同丸服

○一論虛勞久嗽紅痰肺痿肺癰卧不倒狀嗽聲不絕者宜用

- 化痰太平丸
- 天門冬 去心 麥門冬 去心 知母 去毛 貝母 去心 款冬花
 - 杏仁 去皮 洛當歸 酒洗 生地黃 熟地黃 黃連
 - 阿膠 蛤粉炒成珠 蒲黃 京墨 桔梗 去蘆
 - 南薄荷葉 各一兩 麝香 少許 白蜜 四兩

右為細末將蜜煉為丸如彈子大臨臥濃煎薄荷湯先灌漱候中細嚼下丸津液送下

○一論陰虛火動吐血咯血咳嗽痰涎喘急大飲肺氣止咳化痰定喘之

壽世保元 丁集四卷 三七

如神寧嗽膏

- 天門冬 八兩 杏仁 炮去皮 貝母 去心 百部 四兩
- 百合 四兩 款冬花 五兩 紫苑 三兩

右已上俱為粗末長流水煎三次入飴糖八兩蜜一斤再熬又入阿膠四兩白茯苓水飛去筋膜四兩晒乾二味入煎汁內和勻如糊成膏每服三五匙

○一論治虛勞脾胃虛弱不思飲食泄瀉等症

理氣健脾丸 方見飲食治男婦虛勞肚腹脹痛泄瀉不止咳嗽吐痰上喘痞悶宜

陽春白雪糕 方見內傷治虛勞百病可兼煎湯丸進之大有補益

○一論虛勞發熱痰喘汗泄瀉腹痛脾胃虛弱飲食少思骨瘦如柴宜

瑞蓮丸

乾山藥 炒二兩 蓮肉 去心皮 白朮 去土 茯苓 去殼炒
揀參 一兩 白茯苓 去皮 陳皮 一兩 白芍 炒一兩
粉草 炙五錢

右為細末用公猪肚一箇洗淨水煮爛搗和為丸如梧子大每服百丸米湯送下

○一論此膏治五勞七傷諸虛勞極元氣虛損脾胃虧弱養血和津滋陰抑陽寧嗽化痰退熱定喘止瀉除濕真王道之劑也

當歸身 酒洗 懷生地黃 一斤 懷熟地黃 四兩 甘枸杞子 一方
白芍 一斤 人參 四兩 蓮肉 四兩 遼五味子 一兩
麥門冬 五兩 地骨皮 四兩 白朮 去土油 白茯苓 去皮十
懷山藥 五兩 貝母 三兩 薏苡仁 八兩 甘草 三兩

壽世保元

丁集四卷

三十一

右劉細和足水一斤微火煎之如乾再加水十斤如此四次瀉去滓取汁文武火熬之待減去三分每斤煉淨熟蜜四兩春五兩夏六兩共熬成膏每服三匙白湯化下○吐血加牡丹皮二兩○骨蒸加青蒿汁並便各二碗同熬

○丁人足熱口乾吐痰頭暈服四物黃柏飲食即減痰熱益甚用十全大補加麥門五味山藥山菜而愈

○丁男子年十六夏月作渴發熱吐痰唇燥遍體生疥兩腿尤多色暗作痒日晡愈熾仲冬腿患瘡人脈洪數余曰疥瘡疔也瘡皆腎經虛症鉅之膿出其氣氤氳余謂火旺之際必患瘡遂用六味地黃十全大補不二旬而諸症愈瘡具仍用前藥而愈抵多娶妻至其症復作父母憂之偶其外親雖其年少謹疾亦服地黃丸數斤煎藥二百餘劑而愈

○一余嘗聞士子讀書作文辛苦最宜節飲然心而不節則火動火動則腎水日耗水耗則火熾火熾則肺金受害何變為癆此固深知讀書之苦洞得病情之由而患者不可不知所預防也

○一陰虛火動發熱煩燥服諸藥不効者非真便不能奏効益氣湯去麥升加生地赤苓白苓天冬麥冬赤芍五味黃柏地骨皮知母貝母銀柴胡龜板

○一若熱味復法晝見夜伏晝伏不睡而動或無定處而作口舌生瘡者若從脚起乃無根之火也以此味丸及十全大補湯加麥門冬五味子

○一治陰虛火妄五心煩熱用七八歲無病童子小便去頭尾髮首者一盞或食前或食後服之每日二三服之降火滋陰最速童便紅黃者勿用若候服傷脾胃而作泄瀉慎之

○一儒者形體魁偉冬日飲水自喜壯實余曰此陰虛也不信一日口舌生瘡或用寒涼之劑肢體倦怠發熱惡寒余用六味地黃丸補中益氣而愈

壽世保元

丁集四卷

三十九

○一治勞瘵陽旺不御用皮硝不拘多少放湯官即手掌心內兩手合住自化其陽自瘵病愈用起陽法好燒酒和黃泥塗陰毛際處一日其陽即起

○丁方治陽旺用絲瓜小藤搗爛敷玉莖陽即倒矣

○丁方瘵陽効經霜絲瓜不拘大小白馬尿浸一日陰乾為末每服三錢空心白酒送下

○丁方縮陽法馬蝗蜞一名馬蟻起九條入水碗養住至七月七日取出陰乾擇有老少入麝香并合香三樣一般多研細末用蜜少許為餅過

陽旺時即將少許藥左脚心即時陽痿過則復其原
一論勞者勞於神傷者傷於形容儀飽過則傷思慮過度則傷
心色慾過度則傷腎起居過勞則傷形喜怒悲恐過度則傷神又風寒
暑濕則傷外儀飽勞後則傷內靈感之則病夜感之則病衛分衛經
行內外交運而各從其晝夜始勞一一起為二二傳於三三通於四
四至其五五復犯一一至於五邪乃深藏真氣自失使久肌肉消神氣
弱飲食減行步難乃其如此則雖有命亦不能久也

攝養良箴

養生之術九百有節人之壽夭在乎調攝一有所偏百病俱發五勞七
傷積傷氣血釀成陰虛痰喘熱脈來清數病成虛怯猶根根枯治當
補接斡旋元氣滋養枯竭神醫妙手庶免天折病者堅心咬釘磨礱調
攝經年藥餌千帖妄想要息房勞要絕惱怒要除飲食要節若犯絲毫
噬臍莫及洗心滌慮謹遵成法雲林格言非為浪說却疾延年千金秘
訣

壽世保元

丁集四卷

四十

一羊城馬伊所著補沉痾諸醫固効召子治愈遂成莫逆之友前廢庚戌
夏乃郎年二旬餘素稟清弱酷嗜酒慾頻年屢遭驚駭至冬遂成虛勞
之恙召子至診其六脈弦數無方其症潮熱增寒盜汗如雨時微痰嗽
手掌熱而手指冷心驚悸而夢遺以上諸症皆屬腎水枯竭心血乾涸
相火上炎薰灼肺金元氣受傷脾胃虧損而臟腑氣血皆耗竭矣子治
以十全大補湯看病加減施治用地黃丸壯水之主以制陽光加歸參
酸志以補心血用瑞連九白雪糕以補元氣脾胃每日如此服之如彈
天平一般不可偏勝倘有偏則病劇而不可復救藥矣何也若偏
於補陽藥多則陽旺而陰愈消而相火愈熾則咽喉腫痛生瘡瘰癧之
症可立而待矣若偏於補陰藥多而用地黃當歸泥滯脾胃不進而為
瀉痢腫脹喘滿等症生焉所以用藥不敢偏勝有如此矣子將前四藥
服之旬日頗有微効分付病家執此以往調攝期以歲年持功復以千

百庶可免危而就安也子緣有司召速暫離而去殊持病家欲速則另
更醫不審病原誤認為陽虛擬投為附參芪之類數服諸症稍減之家
欣然而返罪子用歸地之過遂連進補陽之藥不半月而陽火愈熾則
咽痛聲啞諸症出矣病之至此雖日進歸地數片亦無用矣醫之至此
急進大乳葷便以遏其火將脾胃復燬以致上熱未除而中寒復生泄
瀉之病又作若兩斧之伐一枯不數月而告終矣吁醫者不悟妄治之
失病家不悔欲速之差惟付諸天命可勝歎哉

補遺

神仙粥

山藥蒸熟去皮一斤。鴨頭黃半斤。養熟去殼搗為末。入粳米半升。燉
火煮成粥空心食之。或入葷子末二三兩在內尤妙。食後用好熱
酒飲一二盃妙。此粥善補虛勞益氣強志壯元陽止泄瀉神妙。
一論男子勞傷而得瘵疾漸見瘦癯并傳屍瘵瘵宜服

壽世保元

一集日未

四二

雙元酒

猪猪腰一對用童便二盞無灰酒一盞以新瓦合貯之密封煨火
熱至中夜五更初溫熱飲酒食腰子病篤一月効平日度快者亦可
服益以血養血全勝金石草木之藥。如吐血加繡針草根二兩和
効。

一治帶蒸勞熱方

生地黃一斤搗取汁三度搗絞汁盡分再服在利即減之以身涼為
度如勞瘦骨蒸日晚寒熱咳嗽喘急用生地黃汁三合煮白粥臨熟
入地黃汁攪令勻空心食之。

一論治虛勞咳嗽痰喘自汗

用公猪肺不見水用銀絲剛加九葛葉子在內蒸爛五更時細
嚼吃下
一治勞瘵勞嗽及腸風下血虛勞瘵并蠱艾心痛

鰻鱺魚二斤治如食法切作投子塊入鍋內以酒二盞煮後入薑醋於中食之。

一論傳屍勞瘵有傳染減門者用鰻鱺魚白水蒸食之用骨燒烟煎病人斷根。

一論治傳屍勞瘵病乃有遺百物思吃者用此方百發百中。

白梗草麻子淨仁下 乳香各五分 沒藥各五分 石膏一錢

葱三根

右用猪肝心肺一副莫下水將藥和作一處灌入猪肺眼內管中用線扎住用五十斤桑柴慢慢文火煮爛不拘時食之。

一論久咳痰火方

生薑汁 生藕汁 白果汁 蘿蔔汁 梨汁

荸薺汁

以上各汁七錢同入砂鍋火熬加白糖霜四兩再煎數次下蜜二兩

壽世保元

一集四卷

四三

再煎入猪油二錢同煎成膏聽用。

白茯苓去水 白明砂一兩 白木去薑油

右為細末入前膏攪勻為丸如芡實子大每用三九嚼化五更時再進無以愈為度。

一論血虛肺燥皮膚折裂肺痿咳嗽膿血吐痰喘急咳嗽失聲等症又云去積聚風痰補肺潤五臟三蟲伏尸除瘟瘧輕身益氣令人不飢延年不老。

天門冬膏

天門冬每斤用十斤或五斤先用溫水洗淨揀過再用半溫水洗淨時即去水只待軟透至膏去皮心搗碎每斤先入水五碗同煮三次乾却傾出濾汁再入水再煎煎淨如此三次將三汁下同再煎成膏再入蜜四兩慢火熬成膏埋土三百出火毒每服二三匙不拘時白滾水送下。

吐血

一切諸宋血證脈沉小身涼者生脈大身熱者死吐後脈微者可治吐功後復太熱麻反躁急者死。

夫人身之血名曰榮夫榮者調榮潤於身之物也血生精故血充則力強體健顏色青為血虛色紅為血熱白色氣血兩虛血屬陰陰乃陽守也陰有虧者則陽氣得以倚附焉其陰精一虛則眾火炎眾液沸騰矣行矣益人之五內心主血脈生血肝藏血尤水也中和則循經調暢寒則凝滯熱則射射惟小兒不知冷熱衣被過厚亦致客熱則鼻衄也鬱熱結於陽明之經及傷寒鼻流血名曰紅汗邪隨而解矣治法不同其男婦皆于陰血以致君相二天協動繫於心脾而成血症其先天真陰不足者欲雖不淫亦作動輒精竭而論相火暴熾冲上血湧諸管而來鮮者宜涼補之劑止之痰者不可用涼墨及十灰散三七等劫藥

壽世保元

一集四卷

四三

阻寒惟清涼引血歸元補益滋陰降火為良藥也。

一論吐血皆因虛火妄動血得熱而妄行此方主之。

涼血地黃湯

犀角乳汁磨服入藥

赤芍七分

知母一錢

玄參一錢

生地黃酒洗 牡丹皮二錢

黃連酒炒 黃芩酒炒 黃柏酒炒

天門冬去心 扁柏葉三錢 茅根二錢

右剉水煎入後十汁飲同服。一吐血成塊者加大黃一錢杏仁十箇

去皮尖研如泥。衄血加梔子玄參沙參。溺血加木瓜牛膝條芩制

穗地榆倍知母。便血加黃連槐花地榆荆穗烏梅。善酒者加乾葛

天花粉

十汁飲

藕節

甜梨

茅根

韭菜

蘿蔔

家園生地黄
京墨鹿胎汁

沙蜜

竹瀝

煎便

右十汁合作一處不見火入煎湯藥半鍾頻服之不可間斷服至血止再服後滋陰清火湯同服。

一治吐血不止神方

家園生地黄半斤洗淨搗爛生大黃末一方寸七

右煎地黄汁三沸下大黃末調勻空心服溫飲一小匙一日三服血即止。

一治吐血咳嗽上喘心忪脉洪火盛死在須臾

家園生地黄北人吐為淡麥如過地有之取來洗淨搗汁半鍾白煎

便半鍾二味合一處重湯煎一沸溫服立効

一論吐血覺胸中氣塞上吐紫血者此上焦積熱也宜
桃仁承氣復方見傷寒

壽世保元

一集四卷

四四

一治諸失血

韭菜連根洗淨石臼內搗爛入童便在內用布搗去渣重湯煎熟濁者居下不用此用清者或單服或入藥服俱好或調日草霜一錢服之血止効

一論吐血血宜用
滋陰清火湯

當歸一錢 川芎五分 赤芍七分 生地黄一錢 黃柏乳汁炒

知母錢一 麥門冬去心 牡丹皮一錢 玄參一錢 犀角一錢

山梔仁炒 阿膠炒 甘草三分

右剉一劑水煎入十汁飲同服如不思飲食加白朮去蘆一錢

一治吐血不止屬實熱者 胡雲閣傳

將軍丸
錦紋大黃酒拌九蒸九晒為末水丸如梧桐子大每服四五十九日

滾水下血條苓湯下

一論先吐血而後見痰者是陰虛也宜
清火滋陰湯

天門冬去心 麥門冬去心 生地黄

梔子 黃連 山藥

赤茯苓去皮 甘草

右剉水煎入童便同服。
一論先吐痰而後見血者是積熱也宜
清肺湯

白茯苓去皮 陳皮 當歸 生地黄 芍藥

天門冬去心 麥門冬去心 黃芩 山梔 紫苑

阿膠炒 桑白皮各等 甘草減半 烏梅一箇

右剉一劑水煎服喘急加蘇子去天門冬

壽世保元

一集四卷

四三五

一治吐血一服立止

歸尾 赤芍 生地黄 百合 貝母
梔子炒 麥門冬去心 蒲黃炒黑 牡丹皮各七 川芎

熟地黄 阿膠炒 桃仁去皮尖
右剉一劑生薑一片水煎服。

一論痰中見血
當歸一錢 白芍一錢 白朮一錢 青皮五分 桃仁去皮尖

牡丹皮五分 黃芩八分 桔梗五分 貝母一錢 梔子八分

甘草三分

潮熱加柴胡赤茯苓

右剉生薑二片水煎溫服
一論每言語過多即吐血一二日久有此症遇勞即作此勞在肺氣其血必散視之果然宜服

補中益氣湯方見內傷 依本方加麥門冬五味子山藥地黃 獲神速志立

○一論吐血每遇勞即作咳嗽有痰吐血 脾肺腎三脉皆洪數宜

○丁男子鰥居數年素勤苦勞則吐血發熱煩燥服犀角地黃湯風高而

○一儒者素勤苦吐血發熱不知入事余以為脾胃虛損用十全大補湯

○一童子年十四發熱吐血余謂宜補中益氣以滋化源不信用其涼降

壽世保元

一集四卷

四十六

耗矣又精血篇云男子精未滿而御女以通其精則五臟有不满之處

補遺

○一凡人因酒色過度或勞役太過或場屋勞心內損極深或心肺脉破

側柏葉蒸乾 揀參 去蘆各等分

右為細末每服二錢入飛羅麵二錢新汲水調和如稀糊服○一方用

○一人吐血不止發熱面紅胸膈脹滿手足厥冷煩燥不寧用

當歸身二錢 川芎一錢 官桂三錢

衄血

衄血者鼻中出血也陽熱拂鬱下於足陽明而上熱脈血妄故衄也

右對一劑水煎溫服

壽世保元

一集四卷

四十二

人乳 童便 好酒

右三味各等分碗盛重湯煮乾飲之立止

一治鼻衄久不止

一治鼻衄

用蘿蔔自然汁和酒飲之則止蓋血隨氣運轉氣有通順所以妄行

一治衄血不止將頭頂髮分開百會穴將新汲井泉水一匙滴穴上立

○一治鼻衄不止。

用山桅子白芷等分燒存性為細末吹入鼻中其血立止。

○一治鼻血。

用菘豆粉細茶為末凉水調服立止。

○一治鼻血不止。

括入中白置新瓦上焙乾以溫湯調服即旋補內積鹹垢是也。又方用入中白一錢頭髮燒灰一錢射香一分為細末吹鼻少許立止。

○一治鼻衄不止。

用大蒜去皮搗爛如左鼻出血貼左脚心右鼻出血貼右脚心如兩鼻出血貼兩脚心血止即以溫水洗脚心。

○一人年近五旬素稟怯弱患衄血長流五晝夜百藥不止六脉洪數無力此去血過多虛損之極以八物湯加熟附子等分又加真蒲草五錢水煎服連進二劑其血遂止又依前方去蒲草調理十數劑而痊。

壽世保元

一集四卷

四八

○一治鼻中出血。

用小兒胎髮燒灰吹之其血立止。

○一治鼻血不止。

太蛇刺十數條搗爛入井花水和稀患輕者清飲重則并渣滓稠服立愈久不復作。

○一女子因翻身往後一跌鼻血長流止後一有所感其血即出諸醫不效○一方用水和白麩包大附子一箇在內火煨熟去附子用麩燒存性為末每服二錢白水和服永不發。

八物湯方見補益

咳血

○一論咳血出於肺咳嗽痰中帶血也。

清咳湯

當歸

白芍

杏仁 去皮 貝母 各一錢 白朮 去蘆

牡丹皮

黃芩

梔子 八分

青皮 去穢

桔梗 各五分

甘草 三分

右剉一劑水煎服。潮熱加柴胡赤茯苓。咳血不易治。喉不容物。痰髮即咳血滲入喉愈滲愈咳愈滲飲濃粥百不三死。服寒涼自不一生。

○一論因嗽而去痰痰內有血者是也宜用。

當歸 一錢

白芍 一錢

生地黃 五分

貝母 二錢

知母 一錢

天花粉 五分

白茯苓 八分

桔梗 一錢

麥門冬 去心 一錢

甘草 五分

右剉一劑水煎溫服。

壽世保元

一集四卷

四九

○一論咳血方

天地丸

天門冬 一斤 懷生地黃 酒拌炒 內蒸至黑 半斤

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服三丸溫酒送下日進三服。

○一論咳血痰盛身熱多是血虛。

用青黛煎蘆仁訶子海石山梔為末薑汁蜜丸噙化嗽盛加杏仁後以八物湯加減調理痰盛加痰藥。

咯血

○一論咯血者出於腎咯出血者亦是亦有痰帶血絲出者宜清咯湯。

陳皮 半夏 黃炒

白茯苓

知母

貝母 去心

生地黃 各二錢

梔子 七分

杏仁 去皮

阿膠 五分

桑白皮五分 甘草五分 柳桂二分

右劉生薑煎服

一方治症同煎

白木五分 當歸一錢 芍藥一錢 牡丹皮五分 桂枝二分 黃芩八分 青皮五分

山梔八分 桔梗七分 貝母一錢 黃芩八分 青皮五分

甘草三分

右劉水煎服。一方無青皮黃芩。有知母黃柏麥門冬。

一論吐血咯血。大能潤肺止咳宜此。

天門冬丸

天門冬去心 白茯苓 去皮 阿膠炒 杏仁 去皮尖 貝母

甘草各五錢

右為細末煉蜜為丸。如芡實子大。每服一九。含口中噙化下。日夜可服十九。

壽世保元

丁集四卷

五十一

嘔血

一論尤惡心而嘔出成升碗者。是多因怒氣鬱結所致。治方

當歸 川芎 芍藥 生地黃 山梔炒

右劉水煎服。臨服入黃便一盞。薑汁少許同服。

一論嘔血脈大發熱喉中痛者。此是氣虛宜用

黃芪 人參 黃柏 荆芥 當歸

生地黃

右劉水煎服。

一論怒氣逆甚而嘔血用

瓜蒌仁 當歸 生地黃 桔梗 通草

牡丹皮

右劉水煎服

唾血

一論唾血者。出於腎。鮮血隨唾而出也。

麥門冬 去心 天門冬 去心 知母 貝母 桔梗

黃柏 熟地黃 玄參 遠志 去心 乾薑 炒減半

右劉水煎服

便血

一論下血者。太便出血也。乃臟腑蘊積濕熱之毒而成。或因氣鬱酒色過度。及多食炙煇熱毒之物。或風邪之胃。或七情六淫所傷。使血氣逆亂。榮衛失度。皆能令以下血。此方治大便下血。不問糞前糞後。赤腸風下血皆治。

壽世保元

丁集四卷

五十二

解毒四物湯

當歸 酒洗 川芎 五分 白芍 炒六分 生地黃 一錢 黃連 炒一錢

黃芩 炒八分 黃柏 炒七分 梔子 炒黑 地榆 八分 槐花 炒五分

阿膠 炒六分 側柏葉 六分

右劉一劑。水煎溫服。○腹脹加陳皮六分。○氣虛加入參三分。白木三分。木香三分。○腸風下血。加荆芥五分。○氣下陷。加升麻五分。○心血不足。加白茯苓六分。○虛寒。加炒黑乾薑五分。○一方去阿膠。加苦參七分。

一論木便下血去多。心虛四肢無力。面色痿黃。宜

滋陰臟連丸

懷生地黃 懷熟地黃 各四兩 山茱萸 酒蒸 六錢 牡丹皮 酒炒

澤瀉 三兩 白茯苓 去皮 各三兩 山藥 四兩 川黃連 酒炒

槐花 炒五分

大黃 酒蒸 九次 炒黑

槐花 炒五分

大黃 酒蒸 九次 炒黑

右為細末裝入雄猪大臍頭內兩頭扎住糯米三升水浸透米去水將藥臍藏糯米既內蒸一炷香時為度搗藥臍為丸如梧桐子大每服八十九空心鹽湯下。

○一虛人太便下血用補中益氣湯加砂阿膠酒炒椿根皮地榆槐花見內傷。

○一下血服藏連丸等藥其血愈多形體消瘦發熱少食果急後重此脾氣下陷以補中益氣湯加砂黑乾薑立止。

○一論腸風下血者必在蓋蓋是名近血色青而鮮其脉必浮宜參敗毒散方見感冒依本方加黃連。

栢葉湯 治腸風下血。

側栢葉

當歸

生地黃

黃連

枳殼炒

槐花

地榆

荆芥

川芎

甘草減半

右剉一剉烏梅一箇生薑三片水煎空心服。

壽世保元

丁集四卷

五十二

槐角丸 治腸風下血不問糞前糞後遠年近日皆効。

槐角子

一兩枳殼炒

黃芩酒炒

黃連

黃柏酒浸

防風

荆芥

地榆

歸尾酒洗

側栢葉酒浸

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心米湯送下忌生冷戒房事燒酒蒜毒等物。

○一論臟毒下血必在糞後名遠血也宜八寶湯。

黃連

黃芩

黃柏

梔子

連翹

槐花

各一錢

甘草

各四分

右剉一剉水煎空心服。

○一論太便下血太腸痛不可忍肛門腫起此下焦熱毒感也宜加味解毒湯。

大黃

黃連

黃芩

黃柏

梔子

赤芍

連翹

枳殼炒

防風

甘草

右剉水煎空心服。

○一治腸胃閉悶下血積熱臟毒。

黃連四兩炒枳殼去核四兩炒

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服七十九茶清送下。

○一論腸風臍毒便血痔漏下血宜栢黃丸。

栢黃丸

槐花四兩炒黃連四兩酒炒

右為細末入猪大臍內兩頭扎住入粟米二斤水同煮爛去米用藥臍搗丸如梧子大如濕加些麩丸每服八十九空心米湯送下。

○一論太便下血久不止者此臍臍虛故也面色痿黃身體羸瘦宜斷紅丸。

斷紅丸

鹿茸去毛

大附子炮去

皮膜

當歸酒洗

續斷酒浸

鹿茸去毛

壽世保元

丁集四卷

五十三

黃芪炒 阿膠炒 側栢葉炒 白朮炒 各一兩

右為細末醋煮米糊為丸如梧桐子大每服七十九空心米湯送下。

丹溪云下血久不愈者後用溫劑先用四物湯加炮乾薑升麻後服斷紅丸收効。

腸風下血熱者其血鮮冷者其血青黑或成塊。

○一備者素勤苦因飲食失節太便下血或赤或黯半載之後非便血則盜汗非惡寒則發熱血汗一藥用之無効六脉浮大心脾則瀉此思傷

心脾不能攝血歸源然血即汗汗即血其色赤黯便血盜汗皆火之升

升微甚耳惡寒發熱氣血俱虛也乃午前用補中益氣以補脾肺之源

舉下陷之氣午後用歸脾加交門五味以補心脾之血以耗散之液不

兩月而諸症悉愈。

○一人素善飲酒不時便血或在糞前或在糞後食少體倦面色痿黃此

脾氣虛而不能統血以益氣湯加果集黃連

脾氣虛而不能統血以益氣湯加果集黃連

脾氣虛而不能統血以益氣湯加果集黃連

○一男子便血精滑發熱○一男子便血發熱○一男子發熱黃米豆小
便不禁俱屬脾腎虧損用六味九益氣湯以滋化源並皆得愈

○一論下血服犀角地黃湯等藥其血愈多形體消瘦發熱少食黃連後
重此脾氣下陷以益氣湯加炮薑立效

○一治大便下血用石蓮肉四兩去殼捶碎入公猪肚內水煮熟去蓮肉
將肚并湯食之立止

○一治大便下血秘方
觀音救苦丹 馬伏所傳
木香四兩 黃連二兩

右將黃連切片煎汁浸木香慢火焙乾為末烏梅肉搗為丸如梧子大
每服六十九空心白漆米送下

○一患腸風下血者何也人腸皆有脂裹之厚則腸胃而安腸中本無血
血緣有風或有熱以消其脂腸遂清滲入身中血初患者必服冷藥而

愈服之過者則腸寒而脂愈不生其血必再作凡然者其血鮮冷者其
血青黑察其冷熱用藥可也冷者用斷紅丸熱者用四物湯石黃連解
毒湯加苦參槐角地榆側柏葉

腸胃流熱則毒閉暴腫用蝸牛細研塗之則消

○一治臟毒下血黃連解毒湯合四物湯相傳為未滴水為丸每服八九
十九空心陳米飲送下

補中益氣湯方見內傷歸脾湯方見健忘六味丸方見補益

瀉血

○一論瀉血者小便出血心移熱於小腸也宜服
清腸湯

- 當歸 生地黃 倍 梔子 炒 黃連 芍藥
- 黃柏 蘆麥 赤茯苓 木通 扁蓄

知母 麥門冬 去心各甘草減半
右剉一劑燈心烏梅水煎空心服○瀉血莖中痛加滑石枳殼去芍藥
茯苓

金黃散 治尿血
槐花淨炒 鬱金 濕帶包 火煨各一兩
右為細末每服二錢淡豆豉湯調下

○一治小便下血不止
地骨皮燒酒一鐘煎至七分去渣空心服立止

○一治小便瀉血
旱蓮草車前草各取自然汁每空心服半茶鍾愈

○又方用壯年無病人頭髮不拘多少燒存性以側柏葉搗汁入糯米糊
為丸如梧子大每服百丸四物湯送下

○一治瀉血効方

音廿七保元 丁集四卷 五十五

小前根 生地黃 各二通草 滑石 蒲黃 炒
淡竹葉 當歸 藕節 山梔 甘草 各六分
赤茯苓 車前子 各八分

右剉一劑水煎空心服

○一治尿後有鮮血
用神三枚燒灰陳米煎湯調服因肺性寒故也

○一治尿血
六味地黃丸加黃柏知母效

○一尿血因心腎氣結所致或房勞過度而得之或由精氣清熱
虛火動榮血妄行耳 尿行則不痛 尿淋血行則痛

○一治暴熱尿血
山梔子去皮炒水煎服

○一治小便出血以車前草根葉多取洗淨取汁頻服可通五淋

惡熱

惡熱非熱明是虛症經曰陰虛則發熱陽在外為陰之僞陰在內為陽之僞

惡寒

惡寒非寒明是熱症亦有久服熱藥而得者河間謂火極似水熱甚而反

壽世保元 丁集四卷 五十六

汗症

脈大而虛汗而濡者汗在寸為盜汗在尺為盜汗傷寒脈陰陽俱緊

也自汗大生蓋以其開腠理故也

一論自汗屬陽虛時常而出也宜用

參芪湯 黃芪蜜炒 人參 白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 當歸酒洗 熟地黃 白芍 酒炒 酸棗仁 炒 牡蠣 一錢 陳皮 七分 甘草 二分 烏梅 一箇

右剉一劑棗二枚浮小麥一撮水煎溫服

一論自汗虛弱之人可服

大補黃芪湯 黃芪蜜炒 人參 白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 當歸酒洗 白芍 酒炒 熟地黃 山茱萸 酒洗 肉桂 五分 甘草 二分 防風 七分

右剉一劑棗二枚水煎溫服

壽世保元 丁集四卷 五十七

一論盜汗屬陰虛睡中而出醒則止也此方治盜汗之聖藥也

當歸酒洗 黃芪蜜炒 生地黃 熟地黃 各二錢 黃連 黃芩 各一錢

右剉一劑水煎空心服

一論盜汗屬氣血兩虛者宜

滋陰益陽湯 當歸酒洗 熟地黃 生地黃 白芍 酒炒 各黃柏 蜜炒 知母 蜜水炒 人參 五分 白朮 去蘆 白茯苓 去皮 黃芪 各 陳皮 八分 甘草 三分

右剉一劑棗二枚浮小麥一撮水煎溫服

一論自汗盜汗宜膏膠理也男子朱精女人夢交自汗盜汗宜

桂枝 白芍 酒炒 龍骨 煨 牡蠣 煨 甘草 炙

右到一劑 煎二枚水煎服

四製白朮散 白朮 四兩 黃芩 炒 一兩 石斛 炒 一兩 牡蠣 炒 一兩 麥冬 炒 一兩

右止用白朮為末 每服三錢 粟米湯調服

○一論心注者心孔有汗則別處無也宜

茯苓補心湯

白茯苓 去皮 人參

白朮 去蘆

當歸

生地黃

酸棗仁 炒

麥門冬 炙

陳皮

黃連 炒 辰砂 新末 礬石 三分

右到一劑 煎二枚水煎服 一箇浮小麥一握水調服

○一秘方治汗時出汗公猪肚洗淨裝入料木在火中焙過為末

砂鍋內水煑令爛將肚并湯一併食之用糯米煎乾為末每用小麥

黃芪六一湯

黃芪 六兩 甘草 一兩

加肉桂 白芍 名黃芪建中湯

○一論額上常有汗出不論冬夏者得之醉後當風所致頭少諸病之命

酒能發陽所以飲必見面汗後陽氣上升頭面之陽氣必開當風坐臥

風亦入之以致頭面出汗名曰漏風宜

黃芪六一湯

黃芪 六兩 甘草 一兩

加肉桂 白芍 名黃芪建中湯

右各用蜜炙十數次出火毒每服一兩水煎服

○一論自汗不寐因內傷及一切虛損之症所得者用補中益氣湯

升麻俱用蜜水炒少加製附子麻黃根浮小麥方見補益

○一論腎氣虛弱盜汗發熱用六味地黃丸方見補益

○一論腎氣虛弱盜汗發熱用六味地黃丸方見補益

○一論氣血俱虛而盜汗者用十全大補湯方見補益

○一論方治汗盜汗

五倍子為末津液調搽脫止癢勒住一宿即止○方用白朮末

津液調搽脫止

○一論頭汗邪在諸經○有血血亦有頭汗○有頭汗小便不利者死○

關格不得尿有頭汗者死○元氣下脫有頭汗如珠不流者死○乘汗

發黃者死

鎮液丹

防風 炒 蘆酒

黃芪 兩五錢

白朮 去蘆 炒

中桂 一兩

白芍 兩五錢

大附子 炮製 炙 去皮 膽砂 二兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空心酒下加酸棗仁

炒一兩

○一治脚注方

白礬 五錢 乾葛 五錢

右到水煎逐日洗之五日自然無汗

○一治盜汗方

用牙猪心一箇水二碗入砂鍋內煮爛熟為度去心少許以

人參各二錢半又煮心汁內煎至上半盞去渣不煎者用猪心食在

不向

○一論凡內傷及一切虛損之症自汗不寐者總用益氣湯加製附子麻

黃根浮小麥其効捷於影響但升麻柴胡俱用蜜水炒過以觀其升發

勇悍之性又欲引參芪等藥至肌表不可缺也○如左寸脈浮洪而目

汗者心火炎也本方倍參芪加麥門五味黃連各五分○如左關脈浮

弦而目汗者厥風邪也本方加桂枝芍藥若不除虛只用桂枝可也○

左尺脈浮洪無汗而自汗者水虧火盛也本方加黃柏知母各五分○

地一錢壯水之主以制陽光○右關脈浮洪無汗而自汗者其依左

倍參芪○右尺脈洪數無力而自汗者或盜汗相火挾心火之勢而狂

伐肺金也宜當歸六黃湯

一論自汗盜汗乃陰陽兩虛或睡或醒時常而出也益氣湯去升柴加茯苓酒芍酸棗炒牡蠣煨各一錢黃柏蜜炒知母蜜炒烏梅一箇棗一枚浮小麥一撮水煎服

一人四時出汗畏風不敢背離衣冬天氣喘氣不相接遇夏熱汗流濕服八物湯不效服補中益氣湯少已予以荆芥防風羌活桂枝薄荷甘草一劑而痊

一治自汗盜汗久不止者用優菟絲帶露桑葉為末每服三錢空心米飲調服

新刊醫林狀元壽世保元丁集卷之四終

新刊醫林狀元壽世保元戊集卷之五

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

男

龔廷賢

龔廷賢

故

南雍太學生龔印周文卿光靈堂

眩暈

脈風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎眩而滑虛脈則無治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨證治

眩者言其顛堂言其轉言其昏眩暈之與胃眩其義一也其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒益虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也風則有汗寒則無汗熱則重滯此四氣乘虛而眩也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩也

壽世保元

戊集卷五

欲過度腎家不能納氣歸原使諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之出於血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或瘀不行皆能眩暈是眩暈推尋致病之因乎治法隨機應敵其間以升降鎮墜行焉最不可不施汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與大小陰病下利止而頭眩時自暈者此虛極而脫也識者將有採薪之憂清暈化痰湯 主方治眩暈之總司也

陳皮 去白

半夏 薑汁炒

白茯苓 去皮各

枳實 麩炒一錢

川芎

黃芩 酒炒各

白芷

細辛

南星 薑汁炒

防風

羌活 各七分

甘草 三分

右剉一劑生薑三片水煎服以此作丸亦可○氣虛加入參七分白朮去蘆一錢○血虛加當歸倍川芎○有熱加黃連薑炒七分

○一論頭旋眼黑惡心煩悶氣短促上喘無力言語心神顛倒目不敢開

如在風雲中頭苦裂身重如山四肢厥冷不得安睡此乃胃氣虛弱候痰而致也

半夏白朮天麻湯方見頭痛

○一論勞役之人饑寒眩暈者脈虛弱也

補中益氣湯方見內傷依本方加半夏天麻白芍熟地黃○一眩暈傷氣

虛有濕痰者依本方去柴升加白茯苓川芎半夏天麻桔梗白朮

○一論陰虛火動眩暈者脈必數也

清離滋坎湯方見勞瘵依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許

○一論真陽不足上氣喘急氣短自汗虛極欲倒如坐舟車眩暈手足冷脈沉細也

參附湯

人參五錢 大附子炮三錢

右剉作一劑生薑十片水煎熱服

壽世保元 戊集五卷 二

○一論眩暈之症因氣虛痰火炎上故也

清陽除眩湯

人參六分 白朮一錢 白茯苓一錢 陳皮一錢 半夏湯泡一錢

天麻八分 旋覆花八分 檳榔八分 甘草四分

右剉一劑生薑三片水煎服

○一論肥白人日常頭眩眼昏卒時暈倒者名曰痰暈

清痰祛眩湯

南星薑泡 半夏薑炒 天麻 蒼朮米泔浸川芎

陳皮 茯苓去皮 桔梗 枳殼去穢 烏藥

酒芩 羌活各八分 甘草三分

右剉生薑水煎臨服入竹瀝薑汁全服

○一論體虛之人下時為痰所中口不能言眩暈欲倒手足厥冷

薑附湯

乾薑一兩 大附子生去皮臍一枚

右剉每五錢水煎溫服

○一論下切失血過多眩暈不醒者

芎歸湯

川芎 當歸各等分

右剉水煎溫服○虛甚加製過大附子

○一論氣血兩虛而挾寒作頭目眩暈者

十全大補湯方見補益依本方如有痰加陳皮半夏

○一治一人形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上壅手足麻痺

口乾引飲水脈洪數而虛予以為腎經虧損不能納氣歸原而頭暈不能攝水歸元而為痰陽氣虛弱而麻痺虛火上炎而作渴以補中益氣湯合地黃丸料治之而愈

○一人氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩人浮大按之如無予以為腎

壽世保元 戊集五卷 三

家不能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈八味丸方凡補

起左三脈洪而有力予為足三陽虧損用補中益氣湯加麥門五味及

加減八味丸而愈

○一大方痰暈湯

法製半夏一錢 橘紅一錢 赤茯苓一錢 黃芩酒洗七分

黃連五分 黃柏酒炒七分 知母七分 石膏一錢

白朮一錢五分 薄荷五分 川芎五分 甘草炙五分

右剉一劑生薑三片水煎臨臥服

○一生胃形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上湧手足麻痺口

乾引飲水脈洪數而虛余以為腎經虧損不能納氣歸原而頭暈不能

攝水歸原而為痰陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴補中益氣合六

味丸料治之而愈其後或勞役或入房其病即作用前藥隨愈

○一孟遺氣短痰帶服苦香之劑痰盛滿尿兩尺浮大按之如盤全以爲腎家不能納氣歸元香燥致甚用八味丸料三劑而愈。
 ○一孫都憲形體豐厚勞神善怒面赤陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從腹起左三脈洪而有力右三脈洪而無力余謂是三陰虧損用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈。
 十全大補湯見補益六味丸見補益補中益氣湯見內傷八味丸見補益

麻木

脈浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在後體也脈浮而緩屬濕爲麻痺脈緊而浮屬寒爲痲痺脈澀而乳屬死血爲木不知痲痺內經曰風寒濕三氣合而爲痺故寒氣勝者爲痲痺濕氣勝者爲痲痺問曰雷者不去四肢麻木拘攣也經又曰痲者寒氣多也有寒故痲也其不痛不仁者病久入深榮衛之行遊經絡時疎故不痛皮膚不榮故

壽世保元

戊集五卷

四

爲不仁夫所謂不仁者或周身或四肢唧唧然麻木不知痛癢如繩扎縛初解之狀古方名爲麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是濕痺死血然則曰麻曰木者以不仁中而分爲二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而風寒濕三氣聚之故周身痲痛麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也。

○一論麻木遍身手足俱麻者此屬氣血兩虛宜加味八仙湯

當歸酒洗 川芎 熟地黄各七分 白芍酒炒八分
 人參六分 白朮去蘆 白茯苓去皮 陳皮八分
 半夏曲七分 桂枝三分 柴胡四分 川羌活五分
 防風五分 秦艽六分 牛膝六分 甘草炙三分
 右剉一劑生薑二片棗一枚水煎食遠服。○氣虛加黃芪蜜炒八分

○一論麻是渾身氣虛也加減益氣湯

黃芪蜜炒人參 白朮去蘆 陳皮 當歸各一升
 柴胡 木香各五香附 青皮去穢川芎各八分 桂枝 甘草各三分

右剉一劑生薑煎服。

○一論十指痲痺并面目皆麻此亦氣虛也。

補中益氣湯 依前方去青皮川芎桂枝加麥門冬羌活防風烏藥附子
 ○一論木是濕痰死血也

雙合湯

當歸 川芎 白芍 生地黃 陳皮
 半夏蜜炒 白茯苓去皮桃仁去皮尖 紅花三分 白芥子一錢
 甘草三分

壽世保元

戊集五卷

五

右剉一劑薑十片水煎熟入竹瀝薑汁同服。

○一論手足麻痺因濕所致

香蘇散方見威身 依本方加蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木瓜。

○一論感風濕手膊或痛或木或遍身麻木

五積散方見中藥

○一論婦人七情六鬱氣滯經絡手足麻痺開結舒經湯
 紫蘇 陳皮 香附 白烏 川芎 蒼朮米泔浸
 羌活 南星 半夏 當歸各八分 桂枝四分 甘草三分

右剉生薑三片入薑汁竹瀝服。

○一論口舌麻木延及兩角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身麻木

止麻消痰飲

黃連 半夏 瓜蒌仁 黃芩 白茯苓 桔梗
 枳殼 麩炒 陳皮 天麻 細辛 南星 甘草
 右剉生薑三片水煎服。○血虛加當歸。○氣虛加入參。○亦有十指麻
 木胃中有濕痰死血加蒼朮白朮少佐熟附子。行經中死血者四物湯
 加桃仁紅花非汁。忌生冷魚腥發風發熱之物。

○一論十指疼痛麻木不仁。
 大附子木香各等分。每服三錢。薑三片水一盞煎七分服。
 ○一論婦人遍身麻痺。謂之不仁。皆因血分受風濕所致。用祛風散送下
 五補丸。

祛風散
 生川烏 白朮 去蘆 白芷 各三錢 甘草 二錢
 右為細末。酒調吞下。五補丸。

壽世保元 戊集五卷 大

黃芪 一兩 人參 五錢 附子 一個 當歸 三錢 白芍 酒炒 五錢
 右為細末。煉蜜為丸。如梧子大。每服五七十丸。祛風散送下。
 ○一論不仁者。謂不柔和也。麻痺不知針灸不知是也。經曰。諸虛乘寒而
 鬱。胃不仁。蓋其血氣虛弱。不能流於一身。於是正氣為邪氣所伏。故
 肢體頑麻。不知痛癢。寒過厥如死。而鬱且胃也。用桂麻各半湯。不愈
 者。補中益氣湯入薑汁。設或身汗如油。喘不休。喘而直視。水漿不入者。
 此為命絕也。

○一論風熱血燥。皮膚瘙癢。頭面手足麻木。
 清涼潤燥湯
 當歸 酒洗 生地黃 各一錢 黃連 黃芩
 川芎 各一錢 天麻 防風 羌活
 細辛 六分 甘草 五分 荆芥 各八分
 右剉水煎。食遠服。麻甚加川烏炮三分。

○一論面上木處。可將桂枝為末。用牛皮膠和少水。化開調敷之。厚二
 分。若脚底硬木處。可將牛皮膠。蜜化。入生薑汁。調和。仍入南星末五錢。
 和勻。用厚紙攤貼。二三分。乘半熱。貼脚底上。用溫火烘之。此外治法
 ○一治兩手指麻木。四肢困倦。怠惰嗜臥。乃熱傷元氣也。
 黃芪 八錢 人參 五錢 白芍 二錢 柴胡 二錢半
 升麻 二錢 五味子 十個 四生甘草 五錢 炙甘草 二錢
 右剉水煎。稍熱空心服。

○一治兩腿麻木。沉重無力。多汗。喜笑。口中涎下。身重如山。語聲不出。右
 寸脈洪大。
 黃芪 三錢 當歸 二錢 蒼朮 四錢 陳皮 五錢
 藥本 二錢 柴胡 三錢 升麻 黃柏 酒炒 一錢
 知母 酒炒 一錢 五味子 一錢 生甘草 二錢半
 右每對五錢。水煎空心服。少待以早飯壓之。

壽世保元 戊集五卷 七

○一治皮膚間有麻木。乃肝氣不行故也。
 黃芪 一兩 白芍 一兩半 橘皮 去白 一兩半 澤瀉 五錢
 炙甘草 一兩
 右剉水煎溫服。

癩狂
 癩脈搏大滑者。生沉小緊急。不治。○狂脈實大生。沉小死。○癩脈虛可治。
 實則死。
 內經曰。巨陽之脈。則腫首頭重。足不能行。發為胸作。胸作。其目。是蓋陽氣
 逆亂故也。卒然暴仆。而不知人。氣復則甦。此則癩之類也。又曰。陽明
 之脈。則癩疾。欲走。呼腹滿。不得臥。面赤。而熱。妄見妄言。又曰。其則乘衣
 而走。登高而歌。踰垣上屋。罵詈。不避親疎。是蓋得之於陽氣。太盛。胃與
 大腸。實熱。燥火。鬱結于中。而為之耳。此則癩狂之候也。曰癩曰狂。公而

言之亦有異乎難經謂重陰者癲重陽者狂素問註云多喜為癲多怒為狂然則喜傷於心而怒傷於肝乃二臟相火有餘之症難經陰陽之說恐非理也夫抵狂為痰火實盛癲為心血不足多為求善高遠不得志者有之癲病獨主乎痰因火動之所作也治法癲者宜吐狂宜下癲則宜安神養血兼降痰火雖然此三証者若神脫而目睛如愚痴者縱有千金我酬吾未如之何也已矣

癲者喜笑不常顛倒錯亂之謂也狂者大開目與人語所求皆見之事為狂也又云狂者狂亂而無正統讖語者合目自言日用常行之事為讖也又蓄血症則重復語之鄭聲者聲顛無力不相接續造字出於喉中為鄭聲也陰附陽則狂陽附陰則癲脫陽者見鬼脫陰者目盲

○一論癲者心血不足也此方主癲狂喜笑不常養血清心湯

壽世保元

尺集五卷

八

人參

白朮 去渣

白茯苓 去皮

遠志 去心

酸棗仁 炒

川芎

生地黄

石菖蒲 各一錢

當歸

麥門冬 去心各半

右剉一劑水煎服

○一論狂者痰火實盛也宜後清心痰痰在土之若風熱實盛者宜防風通聖散方見中風依本方加牡丹皮生地黄桃仁主之治一切大風癲狂之疾

○一論喜笑不休者心火之盛也

以海鹽二兩火燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待溫三次啜之以鈔探吐熱痰次服

黃連解毒湯方見前依本方加半夏竹葉竹瀝姜汁少許

○一論婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也加味逍遙散

當歸 白芍 白朮 去皮 柴胡 生地黄 遠志 去心 桃仁 去皮尖 蘇木 紅花 甘草

右剉一劑水煎服加小柴胡湯生地辰砂水煎服
○一論癲狂無時披頭大叫欲殺人不識水火古人治狂謂之失心苦參主心腹結氣故足以治時熱狂言

苦參丸 苦參為末煉蜜為丸如梧子大每服三三十九薄荷湯送下
○一論一切癲癩風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行驚邪纏結煩服此比經効

抱膽丸 水銀二兩 朱砂一兩研鉛一兩半 乳香一兩研 右將鉛入銚內水銀結成砂子次下朱砂滴乳香熟用柳木棍研勻丸

壽世保元

尺集五卷

九

如焚實天每丁九空心井花水衣下病者得睡切莫驚動覺來即安再服下丸除根○一方薄荷湯化下亦可

○一論癲狂失心不寐此方用朱砂能鎮心安神酸可便收引故棗仁能安神歸心香可便利氣故乳香能通達心志許學士加入人參亦謂人參能寧心耳

寧志膏 辰砂一兩 酸棗仁 炒五錢 乳香 五錢 加入人參一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每丁九薄荷湯化下

○一論癲狂失心此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰

白金丸 白礬三兩 鬱金 七兩

右為末米糊丸每服五十九溫水送下
○一論癲狂五疳驚悸一切怪症此皆痰火實盛也

清心液痰丸

大黃酒蒸 四兩 青蒙石 煨 五錢 沉香 二錢半
牙皂 五錢 犀角 五錢 麝香 五分 朱砂 五錢 爲末

右爲細末，水丸，每服四五十九滾水送下。

○一論心風者何，蓋君火在心，因怒發之，相火助成，痰動于中，腸氣上攻，迷其心竅，則爲癲爲狂，所怒之事膠固於心，輒自言談，失其條序，謂之心風，與風何干也？若痰不感者，則有感亦輕。

○一論久患心風，癲狂健忘，怔忡失志，及恍惚驚怖，入心神不守，舍多言不定，此藥大能安神養血，寧心定志。

紫河車 丁具 長流水 洗淨 慢火 焙乾 爲末 煉蜜 爲丸 空心 酒送下

○丁人癲狂，亂打走叫，上房用瓜蒂散吐出其痰，數升，又以承氣湯下之。○丁人氣心風，即是痰迷心竅，發狂亂作用，真花藥石，煨黃酒滓，丁次爲末，每服一錢，黃酒調下。

風痰鬱火也

○一論癲狂五癰，眩暈時作時止，痰涎壅盛，心神昏憤，此爲紅血虛而致風痰鬱火也。

驅風豁痰湯

人參 白朮 去蘆 白茯苓 去皮 半夏 姜炒 陳皮
枳實 麩炒 當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 懷生地黃
桔梗 去蘆 南星 瓜蒌仁 白附子 僵蚕
天麻 遠志 甘草 黃連 姜炒 甘草

右剉，一劑生薑五片，水煎，溫服。

○一癲狂健忘失志，及恍惚驚怖，入心神不守，舍多言不定，一切氣虛虛損，用紫河車丸補藥內服之，大能安神養血，寧志治健忘驚悸怔忡不寐，以六味丸加遠志石菖蒲人參白茯苓神當歸酸棗仁炒。

○一治心恙狂感，用無灰酒二碗，真麻油四兩，共和勻，楊枝二十條，逐十條攪，丁下

攪過，楊枝直候油酒相和，如膏，煎至七分，狂者強灌之，令熟睡或吐或不吐，覺來即醒。

○一治狂言鬼語。

用蝦蟆一箇，燒爲末，酒調服。

○一治癲狂諸病。

將軍湯

大黃 四兩 酒浸一宿

右用米三升，煎之，分作三服。

癲狂病者，多怒爲癲，多喜爲狂，癲者精神不守，言語錯亂，妄見妄言，甚高罵詈，是也。狂之病始發，少臥少食，自賢自貴，妄笑妄動，登高而歌，棄衣而走，是也。癲病者，責邪之并於肝，狂病者，責邪之并於心也。此皆實症，宜瀉而不宜補，故用大黃以瀉之，取其苦寒無物，不降可以瀉之，又必數日後，方可與食，但得寧靜，便爲吉兆，不可見其瘦弱，減食以瀉藥。

言世保元

戊集五卷

十一

補之，及以飲食飽之，病必再作，戒之戒之，緩與之食，方爲得體，故曰損其氣，則病易愈，所以然者，食入于陰，長氣于陽，故也。又宜淡痰丸之。

○一治癲狂不止，得之驚憂極者，用甜瓜蒂半兩，爲末，每服一錢，井水調。

○一治邪狂癲癩，不欲眠，妄行不止，用白雄雞二隻，煮熟，五味調和作羹。

○一治因驚憂憂，朱心或思過多，氣結不散，積成痰涎，留滯心包，窒塞心竅，以致狂言妄語，呬呼奔走。

雄朱丸

朱砂 煨 明淨者 研 雄黃 明淨者 研 白附子 一錢

右和勻，以猪心血和爲丸，如梧桐子大，另用朱砂爲衣，每服三粒，用人參黃耆煎湯送下，常服一粘，能安魂定魄，補心益智。

○一牧童小子，平日口中胡說，一片鬼話，令人驚駭，子胎之脈洪大，此實熱也，以蚯蚓數條，研爛，井水調服，立愈。

癩證

癩虛為驚為風癩

癩證者發則止地閉亂無知嚼舌吐沫背反張目上視手足搐搦或作不畜聲者是也蓋癩疾之原得之于驚或在母腹之時或在存生之後必以驚恐而致疾蓋恐則氣下驚則氣亂恐氣歸腎驚氣歸心併於心腎則肝脾獨虛肝虛則生風脾虛則痰極而通其發也暴故冷風痰上湧而癩作矣內經曰然所以令人化地者厥氣併于上下實下虛清濁倒置故令人化地閉亂無知者濁邪干乎天君而神明閉也舌者心之苗而脾之經絡連于舌本陽明之經絡入上下齒縫中故風邪實于心胃則舌自挺風邪實于陽明則口自噤一挺一禁故令嚼舌吐沫者風熱盛于內也此風來潮洶之象背反張目上視者風在太陽經也足太陽之經起于睛明橫脊而下風邪干之則實而動急故目上視而背

三才世保元

戊集五卷

十二

反張也手足搐搦者屬肝木筋風熱盛于肝則一身之筋牽攣故令手足搐搦也搐者四肢屈曲之名搐者十指開握之義也或作六畜聲者風痰鼓其氣竅而聲自變也聲之弄笛為六孔閉塞不同而官商別異是也

夫癩之為病角弓反張手足搐搦口吐涎沫俗云猪圈風也亦因金痰木旺生風外由驚邪入內以致之蓋癩病一月數發者易治周年一發者難治虛實之判也實則即攻之虛者先補可也治法當先以瓜蒂散吐之用甜瓜蒂為末每服一錢井水調下蓋投之即大吐後熱睡勿令驚起即効後以湯藥調理

○一論癩症宜下宜吐茶子喜湧而能吐頑痰宜取一升搗爛煎湯服得木吐便止

○一論諸癩神智不寧時發狂躁多言好怒面容不澤定神至寶湯

生地黃五錢 枳實 貝母 白茯苓 去皮
黃連 遠志 去心 石苜蓿 酸棗仁 炒
枳實 炒 瓜蒌仁 天花粉 甘草 少許

右劉生薑三片水煎服
○一論癩者痰涎壅滯然也
加減道痰湯 主方神効

南星 薑製 半夏 薑製 陳皮 去白 白茯苓 去皮
瓜蒌仁 枳實 炒 桔梗 山梔子
黃芩 黃連 薑炒 各 甘草 三分 木香 五分 另煎
辰砂 為末 五分

右劉一劑生薑煎入竹瀝薑汁磨末香調辰砂末同服
○一論癩屬氣血虛而兼痰火者此攻補兼施平肝解鬱清火化痰除痰量諸癩之症

壽世保元

戊集五卷

十三

清心抑膽湯

當歸 酒洗 白芍 酒炒 白朮 去蘆 炒 白茯苓 去皮
陳皮 去白 半夏 薑汁炒 枳實 炒 竹茹
石苜蓿 黃連 薑炒 香附 炒 各一錢 麥門冬 去心
川芎 人參 遠志 去心 甘草 各四分

右劉一劑生薑煎服
○一論大人小兒忽然昏暈倒地五癩之症

朱砂 水飛用猪心一個剖開入砂末五錢濕布包煨火炙熟取砂淨
巴豆仁 五錢石炭一兩炒紅入仁在內及冷取仁將灰又炒又以石
南星 沸湯浸三次剉姜製二兩全蝎 去頭尾炙二錢

龍膽草 二兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服十五丸薑湯送下
○一論風癩搐搦心志發狂棄衣而走登高而歌或數日不食踰垣上屋

吳言為醫公避親疏妄見鬼神一切潮熱及風中厥逆牙關閉塞立可吐
三聖散

防風去蘆三兩瓜蒂炒二兩 藜蘆去苗加減用或一兩或半兩或

右為粗末每服五錢用薑汁二盞煎三沸瀉於大碗中再用薑汁一盞煎

渣三沸却入先煎葱白煎三沸澄清候溫徐投下不必盡瀉吐如吐

不止煎葱白湯三五口立解如不吐再煎之如服藥多不出出
涎再飲薑汁益湯各一兩蓋投之如不出以光燄喉中探引即出矣須

用白盆一個黑盆不見涎形狀吐出青黃痰沫二三升為効時時飲之

吃微溫白粥一二盞此三聖散汗吐下三法俱行防風發汗瓜蒂下瀉

藜蘆瀉吐凡用法則禁忌症候小者勿服病久雖合吐勿服吐後人

勿服○主病不正勿服○泉口不能正勿服○先正病人心神昏室

中善侍病者一二入溫克和柔善誘患人則妙矣隄防吐後致損胃損
呼咩病人諸狂必損吐瀉罷可與米水及新水降心火勿食熱物

壽世保元

尺集五卷

十四

○一論諸風癱瘓不能言語怔忡健忘恍惚去來頭目眩暈胸中煩燥痰

涎壅塞精神昏憤心氣不足神志不寧驚悸憂慮虛煩少睡或發癲狂

小兒驚癇風搖大人暗風羊癲風癱發時如雷其効如神

千金保命丹 侍御何中寶經驗

朱砂二錢 珍珠一錢 瞻星三錢 甘草

白附子炮 雄黃 薄荷各一錢 防風

金箔 牛黃各一錢 僵蠶炒 犀角鎊

枳殼去穢 桔梗去蘆 地骨皮 神曲炒

白朮去蘆 人參 遠志去心 柴胡各三錢

天麻二錢 麝香少許 紫河車七錢

膽礬分 錢七 冰片少許 黃芩七錢

天竺黃一錢 荆芥七錢 蠟退分 錢七

川芎 牙皂各一錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大

金箔為衣用時取開每服一丸薄荷煎湯磨化下不拘時服忌猪羊肉銀茶核桃動風之物

○一參伯王播庵公患癩七年諸醫罔效召余治以追風祛痰丸發神

九二藥兼進半載而愈逾四年未發復因不潔保養病發如前先後

求余治余以此方製藥一料投之輒効迄今數載不發氣體已復原矣

纂傳公優渥贈余扁曰醫士無雙余因此方屢驗故更一字名曰

醫士無雙丸

南星

半夏二位用白礬皂角生薑煎湯浸一日夜透切片

當歸身酒洗

懷生地黃酒洗 軟石膏各一兩 天麻七錢

殭蠶

荆芥穗 川獨活 烏犀角

白茯苓去皮木 遠志甘草水炮

麥門冬去心 酸棗仁炒

辰砂

棟參 白朮去蘆油 陳皮去白

川黃連去毛各

白附子煨 真牛黃 珍珠

川芎

黃芩 甘草各三錢 金箔三十片

右為細末好酒打粉糊為丸如梧桐子大金箔為衣每服五十九空心

壽世保元

尺集五卷

一五

白湯送下最能祛風化痰降火補氣養血理脾寧心定志輕者半料奏

効重者一料除根

○一兒十五歲御女後復勞役考試失意患癩症三年矣渴澀則吞用十

全大補湯加味歸脾湯之類更以紫河車生研如膏入蒸糯米飯為丸

如梧子大每服百丸日三四服而痊後患遺精盜汗發熱仍用前藥及

六味丸而愈此方治癩不拘老幼皆効

清心滾痰丸 治諸風癱瘓有殊効方見癩症

○一治驚癇方

白礬一兩半生半枯荆芥穗二兩

右為末麵糊為丸如黍米大朱砂為衣每服二十九薑湯送下

健忘

夫健忘者陡然而忘其事也盡心力思量不來為事有始無終言談不

首尾... 心脾... 傷於心則血結... 脾則胃氣衰憊而慮愈深... 脾土凝神定智之劑... 調理亦當以幽閑之處安樂之中使其絕於憂慮...

歸脾湯 主方 黃芪蜜炒 人參 白朮 去蘆 白茯苓 去皮 當歸 酒洗 遠志 龍眼肉 酸棗仁 炒 木香 甘草 炙

壽世保元 戊集五卷 一六

右劉... 加味歸脾湯... 神不寧而健忘... 仁茯神... 加減補心湯

人參 白朮 白茯苓 陳皮 當歸 白芍 酒炒 生地黃 遠志 龍眼肉 石菖蒲 麥門冬 去心 酸棗仁 炒 黃柏 酒炒 知母 甘草

遠志 龍眼肉 白茯苓 去皮 玄參 丹參 桔梗 各五錢 一方加酒炒黃連二兩 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大... 每服三二十九臨臥燈心竹葉煎湯送下... 如飲食不思大便不實恐不宜也又當服後方

麥神定智丸 功同補心丹 人參 一兩五錢 白朮 去蘆 炒 白茯苓 去皮 白茯苓 去心 遠志 龍眼肉 石菖蒲 去心 酸棗仁 炒 麥門冬 去心 各 牛黃 另研一錢辰砂 二錢半水飛為衣

壽世保元 戊集五卷 一七

二物之靈以養心之靈... 入心味厚可使養陰... 治易忘近理矣 聰明丸 春元周用延經驗

右為末每服一錢酒調下日三服 一論讀書辛苦而有房勞者 當歸 生地黃 白朮 玄參 各一錢川芎 白芍 白茯苓 黃柏 酒炒 知母 酒炒 麥門冬 去心 山梔 炒 甘草 各五分 右到一劑生薑煎服

虛損用紫河車入補藥內服之。大能安神養血。寧志治健忘驚悸怔忡。不寐。用六味丸加遠志石菖蒲入參白茯苓當歸酸棗仁炒。

驚悸

○一論諸虛健忘等症。以十全大補湯去川芎黃芪肉桂加陳皮遠志石菖蒲麥門冬酸棗仁黃柏知母。

壽世保元

戊集五卷

十八

○一人聞聲即驚。醫者令其入坐於堂上。使兩人扶之。醫自堂下。以小兒木棍手擊而口云。吾擊汝亦常事耳。再何必驚。且擊且言。患者視之久。而驚遂定。此深得平治之法也。

○一論驚悸怔忡健忘不寐。屬心血虛者。補心湯 主方
當歸一錢二分 川芎七分 白芍炒一錢 生地黃一錢二分
白茯苓一錢 遠志去心八分 酸棗仁炒八分 麥門冬去心一錢
黃連姜汁炒一白木去蘆一錢 玄參五分 甘草炙三分
右到一劑水煎溫服。○一方加柏子仁。

○一論血虛心神不安驚悸怔忡不寐並治。安神鎮驚丸
當歸一兩 白芍一兩 川芎七錢 生地黃兩五錢
白茯苓七錢 木貝母去心 遠志七錢 酸棗仁炒五錢

麥門冬去心 黃連姜汁炒 陳皮去白 甘草三錢
朱砂研末 兩 陳皮去白 甘草三錢
右為末煉蜜為丸。如菽豆大。每服五十九。食遠裏湯送下。

益氣安神湯

○一論七情不遂相感而心虛夜多驚寐。睡臥不寧。恍惚驚怖。癡癲。心氣虛者。
當歸一錢 黃連姜汁炒 生地黃 麥門冬去心
酸棗仁炒 遠志一錢 各 白茯苓去心 人參
黃芪蜜炒 瞻星 淡竹葉各一錢 小草六分
右到一劑薑一片棗一枚水煎服。

壽世保元

戊集五卷

十九

○一論驚悸怔忡健忘不寐。屬心血虛者。補心湯 主方
當歸一錢二分 川芎七分 白芍炒一錢 生地黃一錢二分
白茯苓一錢 遠志去心八分 酸棗仁炒八分 麥門冬去心一錢
黃連姜汁炒一白木去蘆一錢 玄參五分 甘草炙三分
右用雄猪心血三箇入竹瀝打糊為丸。如梧桐子大。金箔為衣。每服五十九。食遠白湯送下。小者三十九。

○一論驚悸多驚。有一法。於警中藏粗大靈砂一囊。二於枕中置真絳香一囊。皆能杜絕惡夢而除夜驚。
○一論夜夢。○陰虛夢大水恐懼。○陽虛夢大火燔灼。○陰陽俱虛。相殺。○上感驚飛。○下感驚墜。○飽夢與人食。○饑夢取人食。○心驚夢燔灼。○心虛夢救火。陽物堅。○肝虛夢結草。○肝虛夢樹木。○肝虛夢起。○脾虛夢飲食不足。○脾實夢築垣蓋屋。○肺虛夢白物。○肺實夢赤刃血戰。○腎虛夢舟船溺水。○腎實夢伏水中。若有所畏。

怔忡

夫怔忡者心中不安惕然如入將捕是也屬血虛有愈便動屬虛時作時止者痰因火動瘦人多是血少肥人屬痰怔忡者心胸躁動謂之怔忡此心血不足也多因富貴戚戚貧賤不遂所願而成

○一論血虛火盛怔忡心恍惚煩燥不寧
養血清心湯

當歸酒洗 川芎七分 白芍酒炒 生地黄酒洗
黃連酒洗 片苓去水 梔子炒八分 酸棗仁炒
遠志去心 麥門冬去心 各甘草三分

右剉一劑生薑煎服

○一論心煩燥悸驚悸怔忡胸中氣亂此血虛而火盛也

朱砂安神丸
朱砂研五錢 當歸酒洗二錢 生地黄酒洗一錢 黃連酒洗六錢

壽世保元

戊集五卷

二十一

甘草五分 一方加入參白朮茯神酸棗仁炒麥門冬去心各等分
分爲末煉蜜爲丸如黍米大每服五十九丸食遠米酒送下

○一論思慮即心跳者是心中無氣少血故作怔忡也

四物安神湯
當歸酒洗 白芍酒炒 生地黄酒洗 熟地黃 人參
白朮去蘆 白茯苓 酸棗仁炒 黃連姜炒 梔子炒
麥門冬去心 竹茹 辰砂研入 烏梅一個

右剉一劑煎服

○一論心氣怔忡而自汗者不過一二服而愈

參歸腰子
人參五錢 當歸身五錢 猪腰子一對
右先以腰子用水二碗煮至三碗半將腰子細切入五味藥同煎至八分吃腰子以藥汁送下如吃不盡腰子同上二味藥煎乾爲細末山

藥類約丸如梧子大每服三五十九丸米湯送下
○一論精神虛憊恍惚不寧心患昏憤氣不足健忘怔忡
加味寧志丸

人參 白茯苓去皮 遠志去心 水炮石菖蒲米泔浸
酸棗仁炒 黃連去毛 栝子仁各一兩當歸酒洗
生地黄酒洗各 木香四錢 朱砂研水飛一兩二錢半一半入藥

右爲細末煉蜜爲丸如棗豆大每服時麥門冬去心煎湯下五六十九

虛煩

夫虛煩者心胸煩擾而不寧也多是體虛者積養有乖等語不謂虛煩
一氣有所偏勝也或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛內經曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒今入虛煩多是陰虛生內熱致虛勞之人腎水有虧心火內蒸其煩必躁吐瀉之後津液枯竭煩而

壽世保元

戊集五卷

二十一

有渴惟傷寒及大病後虛煩之症却無霍亂臨病宜審之
巢氏病原曰心煩不得眠者心熱也但虛煩不得眠者膽冷也

○一論病後虛煩不得眠及心膽虛怯觸事易驚短氣悸乏或復自汗濕溫膽湯

半夏湯泡 竹茹 枳實炒各 陳皮四錢半
白茯苓去皮二分 甘草三分
右剉分二劑量煎服○一方加酸棗仁炒遠志去心五味子熟地黃人參各等分

○一論木病後表裏俱虛內無津液煩渴心燥及諸虛煩熱其相似但不惡寒身不痛不可汗下宜服

不寐

竹葉石膏湯方見傷寒

不寐有二種有病後虛弱及年高入陽衰不寐者有痰在膽經神不守舍亦令不寐虛者用六君子湯加炒酸棗仁黃芪痰者用溫膽湯減竹茹一半加南星炒酸棗仁傷寒不寐者當求之本門

○一論心膽虛弱晝夜不眠百方無效服此如神
高枕無憂散
人參五錢 軟石膏三錢 陳皮 半夏 姜炒 白茯苓 去皮
枳實 麩炒 竹茹 麥門冬 去心 酸棗仁 炒 甘草 各一錢

右劉丁劑龍服五箇水煎服
○一論勤政勞心痰多少睡心神不足
養心湯
人參 麥門冬 去心 黃連 微炒 白茯苓 去皮 白茯神 去木
當歸 酒洗 白芍 酒炒 遠志 去心 栢子仁 酸棗仁 炒
陳皮 甘草

右劉蓮肉五箇去心水煎服
安神復雙湯
當歸 川芎 白芍 酒炒 熟地黃 益智仁
酸棗仁 炒 遠志 甘草 冰片 山藥 龍眼肉 各等分
右劉薑棗煎服

○一論心氣不足恍惚多忘或勞心膽冷夜臥不睡此藥能安神定志
加味定志丸
人參 三兩 白茯神 去木 遠志 甘草 水炮 石菖蒲 二兩
酸棗仁 炒 二兩 栢子仁 炒 去殼 二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大朱砂乳香為衣每服五十九丸臥臥
湯送下
附睡法
睡不厭蹴覺不厭舒臥者曲膝卷腹以左右肋側臥修養家所謂狎

子脈是也如此則氣海深滿丹田常暖腎水易生益入弘多舒體而臥則氣直而寤者神散而不寐故臥惟覺時可舒體耳○西山紫雲通引千金方睡訣云睡則必屈覺正而伸早晚以時先睡心後睡眼晦菴以為此古今未發之妙

○一論膽虛睡臥不安心多驚悸
酸棗仁 一兩 炒 令香熟
右為末每服二錢不拘時竹葉湯調下

○一治心下怔忡眠倒即大聲打鼾睡即醒不寐余用
羚羊角 烏犀角 各用水磨濃汁入將用或養心湯或復睡湯內服之立效蓋打鼾睡者心肺之火也

○一治膽虛常多畏恐不能獨臥如入捕狀頭目不清
人參 枳殼 五味子 桂心 甘菊 花
白茯神 栢子仁 各三 山茱萸 五分 栢子仁 熟地黃 各一錢

右為末每服二錢溫酒調服
毒世保元 戊集五卷 二十二

厥症

脈陽厥脈滑而沉實陰厥脈細而沉伏
氣虛則發厥血虛則發熱厥者手足冷也氣虛陽虛則陰寒之故發厥也血虛陰虛則陽寒之故發熱也氣虛發厥者當用溫藥血虛發熱者不宜用涼藥當用溫藥氣血之藥以補之宜者陰黃芪建中湯之類是也又有二種病實熱者極而手足厥冷所謂熱深厥亦深此當用涼藥須以脈別之此最難辨
○一論陽厥者是熱深則厥深蓋陽極則發厥也急宜六乙順氣湯治之
○一論陰厥者始得之身冷脈沉四肢厥逆足膝厥者宜用白朮或白朮不瀉小便色白宜四逆理中湯之類仍速灸關元百壯鼻尖有汗為度
○一論痰厥者卒然不省人事喉中有水雞聲者是也用牙皂白礬等分

研末吹鼻。即以香油。入薑汁少許。灌之。立醒。或燒竹瀝。薑汁。灌之亦可。

○一論。蛇厥者。乃胃寒所致。經曰。蛇者。長蟲也。胃中冷。即吐蛇。宜理中湯。加炒川椒五粒。檳榔五分。吞烏梅丸。

○一論。氣厥者。與中風相似。但風中。身溫。氣中。身冷。以藿香正氣散。加南星。木香。烏藥。如有痰。以四七導痰湯。主之。

○一論。暴怒。暴死者。名曰氣厥。蓋怒則氣生。氣上則上焦氣實。而不行。下焦氣逆。而不吸。故令暴死。氣上宜降之。

五磨飲子

木香 沉香 檳榔 枳實 台烏藥

右五件等分。白酒磨服。立醒。

黃芪建中湯。見汗証。六一順氣湯。見傷寒。四逆湯。見中寒。理中湯。見中寒。藿香正氣散。見霍亂。四七湯。見諸氣。導痰湯。見痰飲。

壽世保元

戊集五卷

二十四

心胃痛

脈沉細而遲者。易治。浮大弦長者。難治。

胃脘痛者。多因。雜慾。口腹。喜將。辛酸。飲熱。酒前。薄復。食寒。涼生。冷朝。傷。暮損。日積。月深。自。鬱。成積。自。積。成痰。痰。火。煎。煎。血。亦。妄。行。痰。血。相。雜。妨。碍。升。降。故。胃。脘。疼。痛。吞。酸。噯。氣。體。積。惡。心。皆。腸。胃。反。胃。之。漸。者。也。俗。醫。以。燥。熱。之。藥。治。之。以。火。濟。火。悞。矣。古。方。有。九。種。心。胃。痛。曰。飲。曰。食。曰。風。曰。冷。曰。熱。曰。悸。曰。蟲。曰。疰。曰。疔。來。痛。夫。所。謂。冷。者。惟。一。耳。豈。可。例。以。熱。藥。治。之。乎。須。分。新。久。若。明。知。身。犯。寒。氣。口。得。寒。物。而。病。於。初。得。之。時。宜。用。溫。散。溫。利。之。藥。若。病。久。則。成。鬱。矣。鬱。則。成。熱。宜。用。炒。山。梔。為。君。熱。藥。為。之。嚮。導。則。邪。易。伏。病。易。退。病。安。之後。若。縱。恣。不。改。病。必。再。作。難。治。矣。此。病。雖。可。久。不。食。不。死。必。須。待。服。藥。數。劑。痛。定。過。下。日。漸。而。少。食。方。得。痊。安。其。有。真。心。痛。者。大。寒。觸。犯。心。君。又。曰。活。血。衝。心。手。足。青。過。節。者。曰。發。

夕死夕發。且死。非藥。所能。療。焉。○一論。胃脘積有鬱熱。刺痛不可忍者。此方治心胃痛之主方也。

清熱解毒湯

山梔仁二錢 枳殼去穢五分 炒川芎一錢 黃連炒一錢

陳皮五分 乾薑炒五分 蒼朮米泔浸七分 香附炒一錢

甘草三分

右劉丁劑。生薑三片。水煎。熱服。服後。戒食。大半日。再服。丁劑。神效。如痛甚。加薑汁二三匙。入藥同服。

○一論。諸積氣為痛。心膈痛。腹痛。血痛。胃氣痛。脇下痛。大便不運。氣噎宿食不消等症。

神保丸

木香二錢半 胡椒二錢半 全蝎七枚 巴豆心一枚去皮

右為末。入巴豆霜。再研。湯浸。蒸餅。為丸。如麻子。大。朱砂三錢。為衣。每服。

壽世保元

戊集五卷

二十五

三七粒。○心膈痛。柿蒂。心湯下。○腹痛。柿蒂。煎湯下。○血痛。炒薑醋湯下。○肺氣盛者。白礬粉各一錢。黃丹一錢。同研。為散。煎茶。白皮糯米飲。調三錢下。○氣喘。紫白皮糯米飲下。○腎氣痛。脇下痛。炒茴香酒下。○木便不通。蜜調檳榔末一錢下。○氣噎。木香湯下。○宿食不消。茶下。或酒漿飲任下。○酒熱毒。過度。痰飲。致胃痛。柿蒂湯下。○諸氣。惟胸膈氣。脇下痛。最難治。獨此藥。能去之。○有人病。項痛。請醫。皆以為風。治之。數月。不瘥。乃流入。皆醫。久之。又注右脇。痛甚。苦乃令服之。一投。而瘥。再服。除根。

○一論。心胃刺痛。并兩脇肋痛。嘔吐。胸痞。大便堅。六脈數。或發熱。口乾。清上飲。

柴胡 黃芩 赤芍 厚朴 枳實 梔子
鬱金 黃連 半夏 青皮 大黃 芒硝
甘草

右劉生薑三片水煎服

一治心氣及胃脘諸痛鬱火所致者

肥梔子去殼 枳實炒 一錢 香附童便炒

右劉水煎三滾入薑汁三白匙再煎一滾去渣入百草霜二匙調服

一治心胃痛不可忍或心神恍惚

梔子炒 黃連炒 二味倍用茯苓神效水煎服立止

一治因食多煎炒燒餅米拌熱麵之類以致熱鬱胃脘當心而痛吐

吐不已漸成昏胃

黃連六錢 甘草一錢

右劉水煎溫服立止

一治胃脘心氣作痛有熱者

酒餅炒 梔子炒 石膏煨各三錢

右劉水煎一服立止

壽世保元

戊集五卷

二十六

一論男婦小兒常憤心腹作痛宜服此下料以拔病根永不復發此藥能清痰涎消食積酒積茶積肉積一切諸積在胃脘當心而痛及惡心嘔雜嘔氣嘔吐吞酸脾疼諸痛神效無價金丹

白朮去蘆炒

麥芽炒

赤茯苓去皮

砂仁

萊菔子炒

瓜蒌仁

甘草各二錢

枳實炒

神麴炒

川芎

草豆蔻

乾生薑各五錢

川厚朴去皮

蒼朮炒

半夏湯泡各

黃連陳土炒

黃芩陳土炒

陳皮去白

檳榔各三錢

豬苓

澤瀉

白螺蛸殼

青皮去穢

香附子童便炒

木香

右為細末青荷葉泡湯浸晚粳米研粉作糊為丸如梧桐子大每服七十九多至百九米湯送下吞酸加吳茱萸湯泡寒丸用五錢熱月用

二錢半久病挾虛加入參扁豆石蓮肉各五錢時常口吐清液加炒滑石一兩牡蠣煨五錢

一論胃脘痛屬寒者

丁胡三建湯

丁香 良薑 官桂各一錢五分

右劉一劑水一碗煎七分用胡椒五十粒炒為末調入藥內頓服

方用良薑末三分米湯調下立止

一治心胃刺痛不可忍屬胃口冷氣所致者

乾薑炒 官桂 蒼朮炒 半夏姜汁炒

右劉生薑煎服

一論一切氣痛心痛肚疼及冷氣痛

良薑一兩 吳茱萸炒 胡椒一兩

右為末每服五分輕者三分用飛過盤三分溫酒調服

壽世保元

戊集五卷

二十七

一論氣自腰腹間攻心痛不可忍腹中水冷氣如洗手足寒厥冷山梔子去殼 大附子去殼 右為粗末每服二三錢酒煎八分入鹽一捻溫服

一治諸般心腹氣痛或瘀血作痛

梔靈丹 梔仁五錢 五靈各五錢

右為末醋糊為丸如梧子大每服二十九酒下或醋湯下

一人心胃刺痛手足稍冷出汗指甲青白藥不効余用當歸三錢煎湯外用木磨木香沉香烏藥枳殼磨濃調服立止

一論寒邪冷氣入乘心絡或臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背脊甚則經年不瘥

桂附丸 西園公屢驗

川烏頭炮 附子三兩 乾薑炮 官桂二兩

右為細末西園公屢驗

川椒去日微炒赤石首二兩

右為細末，以蜜為丸，如梧子大，每服三十丸，溫水送下，覺至痛處即止，不止，加至五十丸，以知為度，若早朝服，無所覺，至午後，再進二十丸，若久心痛，每服三十丸，至五十丸，盡一劑，終身不發，治心前痛，如神。

○一論心腹疼痛，無作必胸滿，嘔吐厥冷，面赤唇麻，咽乾口燥，寒熱不時，而脈洪大，屢服寒涼，損真之故，內真寒而外假熱也，且脈弦洪，而有怪狀，乃脾氣虧損，肝脈乘之，而然當緩補其真。

補中益氣湯方見前，依本方加半夏茯苓吳茱萸。
○一婦人胃氣高，心而痛，刺右寸關俱無，左雖有微，而似絕，手足厥冷，病勢危，為察其已，眼胞上下青黯，此脾虛肝木乘之，脈弦而急，宜急補其中氣，用木香和芎以行肝氣，用吳茱萸散脾胃，其痛即止。

痛急與下刺，後先服，前熱再進，諸病悉愈，何使泥其真氣，而妄用攻伐之藥，禍不旋踵。

壽世保元

戊集五卷

二二八

○一婦人懷抱鬱結，不時心腹作痛，年久不愈，諸藥不應，余用歸脾加炒山梔而愈。

○一唐儀部胸內作痛，月餘，腹亦痛，左關弦長，右關弦緊，此脾虛肝乘，所以補中益氣加半夏木香二劑而愈，又用六君子湯二劑而安，此面色黃中見青。

○一論心腹者，必面上白斑，唇紅，又痛後，便能食，時作時止，若是也，用陳湯加苦練根皮煎服，上半月，盡頭向上，易治，下半月，盡頭向下，難治，或口痛，而久臥不安，自按心腹，時大吐，或青或黃，唇緩，目無睛光者，此蟲痛也。

○一治蛔蟲作痛神方
用苦練根上及洗淨白水煎露，丁宿次日早燒豬肉丁塊，吹其氣，然後服藥，其法上半月服其蟲盡下。

○一治寸白蟲作痛

用酸石榴東南根二兩，檳榔五錢，太黃五錢，白水煎露，一宿，次日五更，吞服，未服先燒此肉，與其氣不可食，其藥上半月服之，立効。
○一論胃冷，蛇蟻上攻，心痛嘔吐，四肢冷。

烏梅丸
當歸四錢 人參六錢 炮薑一兩 肉桂六錢 大附子炮六錢
川椒去日微炒細辛六錢 黃連炮一兩 黃芩六錢 枳實六錢 芍藥六錢
右為細末，烏梅三十箇，去核，搗爛，入丸，為丸，如梧子大，每服五十丸，空心，鹽湯送下，烏梅用好醋漬一宿，去核，於五升米飯上蒸，如神。

和藥令相得，納印中，柁三寸，入竅和丸，又治胃脘發咳，而嘔，嘔則長蟲出。

○一論蟲攻心痛，并腹中有塊，按之不見，往來痛，無休止，化蟲丸
鶴虱三錢 胡粉炒 白礬炒 苦練根皮去淨皮

壽世保元

戊集五卷

二二九

檳榔各五錢
右為末，麩糊為丸，如梧子大，每服十五丸，米飲，入真芝麻油一二點，打勻服之，其蟲小者化為水，大者出下。

○一婦人年四旬，心胃刺痛，痛時止，不思飲食，食則即吐，手足厥冷，胸中痞悶，口乾，作渴，余曰：此胃中有蟲也。以陳湯加檳榔，枳實，烏梅，花椒，炒黑，乾薑，苦練根皮，生薑煎，一服，打下蟲，二大碗遂止。

○一論急心痛
五靈脂去砂石 玄胡索炒 莪朮火煨 良薑炒
當歸各等分

右為末，每服二錢，熱醋湯調下。
○一論諸心氣痛不可忍者
終雪散

白礬 一兩 朱砂 一錢 金箔 三片
 右為末每服一錢五分輕者一錢空心白湯調下
 一論心攻方

白礬 一兩 白礬砂 一錢五分
 右為細末薑汁打麩糊為丸如黃豆大每服一丸溫酒送下
 一論心胃氣痛如神

用生礬枯礬等分為末麩糊丸如櫻桃大每服三丸燒酒送下立止
 一治心胃刺痛黑砂糖半鍾熱酒調服
 一治心氣痛五靈脂一錢枯礬二分為末溫酒調下
 一治心胃痛至死用良薑末三分米泔調下立止

一徐四可治胃脘痛用炒鹽一錢生薑七片水煎一鍾溫服立止
 一論心腹不問寒熱新久下服立止
 官桂 一錢五分 白芍 二錢 酒炒 甘草 五分

壽世保元 戊集五卷 三十一

右對水煎服○如感胃寒邪加香蘇散有熱加黃連○如太便秘及下
 痢初起任服涼藥不通腹痛不止加大黃根散立效
 一治胃脘痛甚諸藥不效者

黃連 六錢 大附子 炮去灰膜 一錢
 右對一劑生薑三片棗一枚水煎稍熱服
 一治心疾黃劑子炒焦為末米飲調下
 又方密一小鍾酒一碗同煎煎淡調枯礬末一錢溫服出汗

一治諸血諸氣痛不可忍及心脾氣血諸痛又治血滯腰痛
 三香沉麩丸 內翰蘇沈方
 朱砂 血竭 沒藥 各一分 沉香 一分 木香 半分

麝香 半分
 右生為末磁器煮生甘草膏九如皂角子大每服一丸薑薑湯下
 婦人產後血氣痛並主之亦治腰痛血滯腰痛用續斷牛膝仁炒煎

湯磨下血暈用乳香泡湯研化服

腹痛

厥心痛痛不得息脈細小遲者生尿大而疾者死

夫腹痛者有寒氣客於中焦于於脾胃而痛者有宿積於腸胃結滯不
 散而痛者有痛而嘔者有痛而泄者有痛而大便不通者有熱者有
 虛痛者有實痛者有濕痰痛者有死血痛者有藥痛者種種不同治之
 皆當辨其寒熱虛實隨其所得之証施治若外邪者散之內積者逐之
 寒者溫之熱者清之虛則補之實則瀉之泄則調之閉則通之血則消
 之氣則順之蟲則追之積則削之加以健理脾胃調養氣血斯治之也

一論風寒外感飲食內傷七情惱怒過度肚腹疼痛初起者
 行氣香蘇散方見飲食

一論外中寒邪內傷冷物肚腹綿綿痛不已而手足厥冷者

壽世保元 戊集五卷 三十一

五積散方見中寒
 一論肚腹疼痛有寒有熱有食有氣治一切肚腹痛之總司也
 開導逆氣湯

蒼朮 炒 一錢 陳皮 五分 香附 炒便浸 一錢 白芷 一錢
 川芎 一錢 白茯苓 去皮 一錢 乾薑 炒 五分 滑石 一錢
 山梔仁 炒 一錢 神麩 炒 一錢 甘草 少許

右對一劑水煎溫服
 一論綿綿痛無增減脈沉遲者寒痛也
 薑桂湯

乾薑 肉桂 良薑 各七分 枳殼 去穢炒
 陳皮 砂仁 厚朴 姜汁炒 吳茱萸 炒 各一錢
 香附 一錢五分 木香 五分 甘草 三分
 右對生薑煎服○痛不止加玄胡索茴香乳香○六極手足冷加附子

去其寒食良薑○泄瀉去積散
○一論作痛乍止脉數者水瀉也
散火湯

黃連炒 白芍炒 枳殼去穰 厚朴去皮
香附 撫芎各一錢 木香 砂仁 茴香各五分
甘草三分

右到一劑生薑一片水煎痛甚不止加胡索

○一論肚腹滿硬痛久不止大便實脉數煩渴者積熱也
枳實大黃湯

枳實 大黃 檳榔 川厚朴各二甘草三分

木香五分另研

右到一劑水煎溫服

○一論痛不移處者是死血也

壽世保元

戊集五卷

三十一

活血湯

當歸尾 赤芍 桃仁 去皮尖牡丹皮 玄胡索

烏藥 香附子 枳殼去穰各一錢 紅花 官桂各五分

木香五份另川芎七分 甘草二分

右到一劑生薑一片水煎服

○一論小便不利而痛腹中鈎引脇下有聲者是濕痰也

○一論湯加減方是濕痰也

○一論以手按之腹軟痛止者是虛痛也

溫中湯

良薑 官桂 益智仁 砂仁 木香另研

香附米 厚朴姜炒 陳皮 小茴香酒炒當歸

玄胡索 甘草各五分

右到一劑生薑煎服

○一論食積腹痛其脉弦其痛在上以手重按愈痛甚欲大便利後其痛減者是也
加味平胃散

蒼朮米泔浸炒陳皮一錢

厚朴姜炒 半夏姜炒
川芎五分 香附一錢 枳實姜炒 木香三分

神麩炒二錢 山查一錢 乾薑七分 甘草三分

右到一劑生薑三片水煎溫服

○一論時痛時止面白唇紅者是蟲痛也

椒梅湯

烏梅 花椒 檳榔 枳實 木香

香附 砂仁 川練子去核 肉桂 厚朴姜炒

乾薑 甘草各五分

右到一劑生薑一片水煎服

壽世保元

戊集五卷

三十三

三仙名 治蟲痛

雄黃 白礬 檳榔各等分

右為米飯丸如黍米大每服五分食後白水下○乾痛者不吐不泄而但痛也有時者淡食而饑則痛厚味而飽則發也○經曰腹疾乾痛有時當益蟲此之謂也

○一孩子腹中作痛看至死腹中揣摸似有大小塊諸醫不効子只食人慢慢以手揉揉痛處半日其蟲自大便出而愈

○一婦人腹痛如錐刺每痛至死不歇者手太麻洪數此腸癰毒也

用穿山甲炒白芷貝母鹽蛋大黃各一太劑水煎服打膿血自小便中出即愈

○一李儀部常患腹痛治以補中益氣加炒山梔即愈

○一朱太守因患腹痛作瀉或兩脇作脹或胸乳作痛或寒熱往來或小便不利飲食不入嘔吐痰涎神思不清此肝木乘脾土用小柴胡加山

梔炮薑茯苓陳皮製黃連... 丁人內停飲食外感風寒... 附川芎一服而止... 客寒乘虛而作也... 香再服即愈

一婦人臍腹疼痛不省人事... 矣于用白芍五靈脂本通去皮... 七分去渣溫服

一論白芍藥味酸微寒... 也如夏中熱腹痛少加黃芩... 三錢甘草一錢五分... 腹痛更加桂二錢

言世保元

尺集五卷

三十四

腹痛

丹溪曰脈必沉而弦... 痰大者是腎虛也... 夫腰乃腎之府... 一論常帶腰痛者腎虛也

補腎湯... 當歸酒洗... 陳皮... 杜仲酒洗... 知母酒洗... 甘草炙三分

白芍酒炒... 生地黃... 熟地黃... 小茴香酒炒... 破故布酒炒... 牛膝去蘆酒洗... 白茯苓去皮各人參五分... 黃酒去皮酒炒

右到一劑... 皮如常服... 湯下酒亦可

一論腰膝濕熱作痛者... 清熱勝濕湯

蒼朮米泔製... 陳皮去白... 威靈仙... 澤瀉各五分... 甘草三分

右到生薑三片... 下入黑丑... 五分... 加熟附子一錢... 金皮川烏

黃... 一論氣滯腰痛... 立安散... 當歸酒洗... 小茴香酒炒... 右為細末... 一論腰痛神方... 魚鱗炒成珠... 一論此方專滋腎水

言世保元

尺集三卷

三十五

玄胡索炒... 杜仲去皮... 黑丑一兩半... 胡桐肉去皮泡... 牛膝去蘆酒洗... 川草薢... 知母酒炒... 胡桐肉去皮泡... 牛膝去蘆酒洗... 右為細末... 一論此方專滋腎水

○一論腎氣虛弱肝脾之氣襲之令人腰膝作痛屈伸不健冷痺無力夫腎水藏也虛則肝脾之氣乘之故冷痺屈伸不健者筋骨俱病也經曰能屈而不能伸者病在筋能伸而不能屈者病在骨故知骨伸不便為筋骨之病也冷痺者陰邪實也無力者氣血虛也

獨活寄生湯方見中經

○一論元氣虛弱腰痛白濁以補中益氣湯方見內傷依本方加黃柏知母白芍俱酒炒牛膝去蘆酒洗杜仲薑酒炒

○一論腎經虛損腰腿通身疼痛壯腎散 扶海何睛散
仙靈脾酒浸 遠志味心 已戟去心 杜仲酒炒
破故布酒炒 肉苁蓉酒炒 青鹽八兩 大茴香五兩
小茴香炒五兩

壽世保元

戊集五卷

三十六

右為末每服二錢用豬腰切開搽藥末在內煎藥火煨熟細嚼酒下

○一論腰痛入骨作腎虛治諸藥不效者此瘀血痛也
大黃半兩更入生薑半兩同切如小豆大於鍋內炒黃色投水二碗煎五更初頓服天明取下腰間瘀血物用盆盛如雞肝樣痛即止

○一治腰痛不能轉側點藥後少頃復舊神妙
雄黃二錢 黃丹一錢 硫磺三錢 去黃丹名火龍升
右為細末令患人仰睡以銀絲蘸藥點取木角頭少許工二次神效

○一治腰痛良方
杜仲姜酒炒 破故布炒五分 小茴香 薑酒炒 人參三分
右為末用豬腰子二箇切開入藥末煎帶水清同食即愈

○一治腰痛秘方 王景明傳
當歸酒洗 杜仲酒炒 大茴香 小茴香 酒炒 羌活

獨活 右對丁大劑用頭生酒浸一宿次早濾汁溫熱服之用渣將酒再煎服服立效

補遺 青娥丸 馬伏所秘傳 治諸虛百病大補之聖藥也素患腰痛者殊效
仙茅勿用酒洗 白茯苓去破 川杜仲去皮酒洗
川茸蘇 酒洗去根 懷生地黃 酒洗去根 當歸酒洗 巴戟心酒洗 天門冬酒洗 肉苁蓉酒洗 黃精酒洗 鹿茸酥炙四兩

○一治一切腰痛如神 宋東園傳
黑五半生半炒為頭末水和丸如梧子大硫黃末為衣每服五十九空心鹽湯送下

壽世保元

戊集五卷

三十七

右為細末好酒打糊為丸如梧子大每服百九空心鹽湯好酒佳下

○一治一切腰痛如神 宋東園傳
黑五半生半炒為頭末水和丸如梧子大硫黃末為衣每服五十九空心鹽湯送下

脇痛

脈雙弦者肝氣有餘兩脇作痛 夫脇痛者厥陰肝經為病也其症自兩脇下痛引小腹亦當視內外所感之邪而治之若因暴怒傷筋氣結飲食過度冷熱失調此傷筋或痰積流注於脇與血相搏皆能為痛此內因也若傷寒少陽耳痛痛風寒所襲而為脇痛此外因也治之當以散結順氣化痰和血為主平其肝而導其滯則無不愈矣

○一論左脇下痛肝積屬血或因怒氣所傷或跌撲閃挫所致而為痛也
疎肝飲 主方

黃連 吳茱萸 柴胡 當歸 酒洗各一錢 青皮 去穢 五錢
批仁 研如泥 枳殼 炒各 川芎 白芍 酒炒各 紅花 五分

右剉一劑水煎食遠服。

○一論右脇痛初肝邪入肺也。
推氣散 治肝邪入肺右脇痛甚腹滿不食

片薑黃 枳殼 炒各 桂心 少許 甘草 炙五分
一方加 陳皮 一錢五分 半夏 薑炒一錢

右剉一劑生薑三片水煎食遠服。

○一論左右脇俱痛肝火盛而木氣實也。
柴胡芍歸湯

壽世保元

戊集五卷

三十九

柴胡 川芎 白芍 青皮 去穢 枳殼 炒各
香附子 當歸 龍膽草 木香 砂仁

右剉一劑薑一片水煎溫服。

○一論因內有濕熱兩脇痛甚伐肝木之氣瀉肝火之要藥也。
當歸龍膽丸

當歸 龍膽草 山梔子 黃連 大黃 酒洗各
蘆薈 青黛 各五錢 木香 五分 麝香 五分 加柴胡 五錢
青皮 炒一兩

右為細末神麩打糊為丸如梧桐子大每服二十丸薑湯送下。

○一論勞傷身熱脇痛者脈必虛也。
補中益氣湯方見內傷本方加川芎白芍青皮木香砂仁小茴根殼去
黃芪白朮升麻

○一論左脇下有塊作痛不移者是死血也
活血湯方見瀉痛依本方加青皮去穢為藥

○一論男子房勞兼怒風府脹悶兩脇脹痛此色然損肝氣傷肝
六味地黃丸料加柴胡當歸二劑而安方見補益

○一論婦人口苦脇脹此肝火也用小柴胡湯加黃連梔子少愈更以四君
子湯加當歸白芍柴胡調脾胃而瘥

臂痛

臂為風寒濕所搏或睡後手在被外為寒邪所襲遂令臂痛及乳痛以熨
枕兒傷於風寒而致臂痛者乘夜後方對症用之

○一論有因濕痰橫行經絡而作臂痛者
二末湯

蒼朮 米泔浸白朮 去蘆 南星 陳皮 白茯苓 去皮

壽世保元

戊集五卷

三十九

香附 酒炒 羌活 威靈仙 半夏
甘草 各一錢

右剉一劑生薑煎服。

○一論臂痛因于寒者
五積散方見中寒

○一論臂痛因于氣者
烏藥順氣散方見中風

○一論臂痛因于濕者
觸澤湯

當歸 赤芍 黃芪 羌活 薑黃
防風 甘草 炙各等分

右剉生薑五片煎服。
○一論臂痛起于其表或一臂痛或兩臂俱痛者

五積交加散 葉圭薄得効

五積散合入參敗毒散加木瓜葛葉煎服未効再加牛膝未効可服烏藥順氣散加羌活木瓜

○一論凡腎軟無力不任重者乃肝腎氣虛風邪容滯於榮衛之間使血不能周養四肢故有此症肝主項背與臂膊腎主腰膝與脚膝其二臟若偏虛則隨其所主而病焉今此症乃肝氣偏虛宜補肝腎六味丸去之

○一男子年六十餘素善飲兩臂作痛恪服祛風治痰之藥火加麻不效熱體軟痰湧腿膝拘痛口紫語澀頭自暈重口用赤涎身如蟻行皆也白屑始信謂余曰何也余曰臂麻體軟脾無用也痰涎自出脾不健痛也口針語澀脾氣傷也頭自暈重脾氣不能升也痒起白屑脾氣不能營也遂用補中益氣加神效半夏茯苓三十餘劑諸症悉退又月參末煎膏治之而愈

壽世保元

戊集五卷

四十

肩背痛

○一論脈洪而大脈促上緊者肩背痛沉而滑者痰滯也

證痰湯

半夏製

梔子炒

陳皮

海桐皮

枳殼各八分

桔梗

赤芍

蒼朮製

香附各七分

茯苓各六分

川芎

薑黃各五分

甘草二分

右剉一劑生薑煎服如痛甚頭刺加朴硝二錢

○一論肩背痛不可回顧者太陽氣鬱而不行也以風藥散之春消腫強腰似折項似援此足太陽經不通行以羌活勝濕湯

羌活勝濕湯

藜蘆一錢

防風一錢

羌活

獨活各二錢

蔓荆子六分

甘草六分

川芎一錢

右剉一劑水煎服○身痛腰沉經中有濕寒加防已一錢輕者炮附子重者炮川烏各五分

○一論背心下點痛者痰氣之所聚也

參合湯

陳皮

半夏製

茯苓去皮

烏藥

僵蠶炒

川芎

白芷

麻黃

枳殼炒

乾薑

紫蘇

香附

蒼朮

羌活各等分

甘草減半

右剉薑棗煎服

○一論風熱乘肺肩背強直作痛提肩散

防風

羌活

藜蘆

川芎

白芍炒各七分

黃連酒炒

黃芩酒炒各五分

甘草四分

壽世保元

戊集五卷

四二

右剉一劑生薑三片煎服○濕加蒼朮防已薏苡仁各五分○氣虛加人參○汗多加黃蘗蜜炒下錢○血虛加芍歸地黃

○一論肩背痛汗出小便數而少風熱乘肺肺氣鬱結也當瀉風熱則通氣防風湯

防風

羌活

陳皮

人參

甘草各五分

藜蘆

青皮各三分

白豆蔻

黃柏各二分

升麻

柴胡

黃芪製水炒

右作一劑水煎食後溫服○如面白脫色氣短者不可服

○一論體虛人背脊上惡風或夏月怕脫衣及婦人產後被冷風吹入經絡故常冷痛或手足冷至骨者又治腰痛及一切冷痺痛又治濕氣

禦寒膏

用生薑八兩取自然汁入牛膠三兩乳香沒藥末各一錢五分細切內煎化就移在滾水內順以柘條攪至成膏又入花椒末少許再攪

勻用皮子... 痛風 日脫下或起小痕不効

痛風

夫痛風者皆因氣體虛弱... 痛風脈理多端有且定而夜甚...

○一論痛風... 後夜甚者血弱陰虛...

壽世保元

戊集五卷

四十二

風走注風膝大脛瘦曰鶴膝風是也

參五秦光湯 當歸二錢 苜蓿七分 赤芍酒炒 生地黃酒浸 秦光去蘆一分 蒼朮童便浸 羌活五分 川獨活一錢 黃柏酒炒 五加皮二錢 黑狗脊去根毛黃連姜汁炒 黃芪酒炒 紅花酒洗 黃芪酒炒 人參二錢 牛膝去蘆酒浸 杜仲每一錢水三鍾并炒二錢 生甘草三分 右劉樅枝七根每長一寸半燈心七根水煎服入童便好酒各一盞空心溫服渣再煎服忌酒麵鯉魚濕熱辛熱○如天將作雨陰陽晴白而預先覺痛甚者加防風天麻升麻○午後夜甚者血弱陰虛加升麻五分牡丹皮一錢○早上午甚者氣滯陽弱加連翹沉香竹瀝乳法○痛甚者倍羌活紅花酒炒連茶涼血則痛止○此症乃筋與骨症初

者乃外淫侵入木入及年近衰者不善養而得蓋筋屬肝血骨屬腎水內損所致耳

○一論濕熱作痛不拘上下用之蒼朮妙于燥濕黃柏妙于去熱二物皆有雄壯之性亦簡易之方也加半膝則治濕熱下流兩脚麻木或如冰燎之熱者

二妙散

蒼朮 未泔浸 黃柏 乳汁潤透

右為末每服三錢用酒調下痛甚加生薑汁熱服

○一論血脈凝滯筋絡拘攣肢節疼痛行步艱難活血理氣第一品也

舒筋散

玄胡索炒 當歸 辣桂各等分 右為末每服三錢酒調下玄胡索活血除風理氣

十全大補湯 治勞倦過身疼痛加半夏摻製在桂

壽世保元

戊集五卷

四十三

○一婦人年七十餘遍身作痛筋骨不甚不能伸屈遍身作痒如蟻行山乾目赤頭暈痰壅胸膈不利小便短赤夜間殊甚用六味地黃丸杜加山梳柴胡水煎服

○一論痰血濕痰壅手足肢節之間筋骨之會空竅之所而作痛也肢節沉重者是濕痰晚間病重者是瘀血也

趕痛湯

乳香 沒藥 地龍酒炒 香附童便浸 桃仁 紅花 甘草節 牛膝酒浸 當歸 羌活 五靈脂酒淘去土

右劉水煎溫服

○一論寒濕之氣滯滯關節麻木疼痛

續斷丸 黃芪一兩 人參七錢 白朮七錢 白茯苓 兩熟地黃二兩

山藥一兩 山茱萸肉一兩 牡丹皮一兩 薏苡仁一兩 續斷一兩
 麥門冬一兩 石斛一兩 防風七錢 桂心一兩 鹿角膠
 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒下
 ○一論人手足不能屈伸遍身疼痛
 消風飲 臨川徐培鴻試驗

陳皮 白朮 當歸 酒洗 白茯苓 各錢 玄胡索
 半夏 美製 牛膝 去蘆 川芎 各八分 防已 羌活
 獨活 秦九 各六分 枳殼 去穢 防風 各五分 木瓜 四分
 甘草 三分

右劉子刺生薑煎不拘時服。○氣虛加入參八分
 ○一論一切遍身骨節疼痛或流注作痛不可忍者為效

人參 白朮 白茯苓 去皮 當歸 川芎
 赤芍 生地黄 防風 羌活 獨活
 壽世保元 戊集三卷 四十四

天麻 南星 陳皮 黃芩 甘草
 右劉生薑煎服

○一論風濕相搏一身盡痛以益氣湯加羌活防風藥者不洽如病
 去勿再服以諸風藥損入元氣而益其病故也

○一男子兩膝痛不可忍者 臨川徐積吾試效
 黃芪 蜜炒 揀參 五錢 當歸 身 酒洗 一錢 熟地黃 一兩
 蒼朮 兩五錢 獨活 一兩 杜仲 兩五錢 牛膝 去蘆 酒
 秦九 一兩 官桂 三錢 小茴 五錢 桑寄生 一兩
 木瓜 五錢

右為細末酒打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心酒下
 ○一論雷火鍼
 蒼朮 五錢 川芎 三錢 硫黃 二錢 半 川山甲 三錢 蔓荊子 三錢
 皂角 三錢 麝香 五分 雄黃 二錢 艾葉 不計

右為末紙捲如指大以草紙七層貼患處將藥燃起淫之知痛則止
 ○一論尉法治諸風惡毒冷痺麻木腫痛或遍身骨節痛如癢腫病似
 即散

蒼朮 二兩 羌活 一兩 獨活 一兩 蛇床子 五錢 蔓荊子 五錢
 川山甲 五錢 雄黃 三錢 硫黃 三錢 麝香 三分
 右為末炒熱以絹包敷患處下法以醋拌炒作餅燒秤搗放餅上用粗
 包厚之

○一論雷火鍼法
 呪曰
 天火地火三昧真火鍼天開鍼地地裂鍼鬼鬼滅鍼人入得生
 百病消除萬病消滅 攝過
 右法可遇患人應痛處針之用帝三層或五層為病加減微痛於痛處
 穴上將紙針向燈火點着隨後念咒三遍針疾立除其針用五月五日

壽世保元 戊集五卷 四十五

東引桃枝削去皮兩頭如雞子樣長五七寸用火
 ○一人每夜肢體時痛或用清痰理氣之劑不效常痛加以導滯骨痛漫
 腫形體倦怠內熱盜汗脈浮大按之微細此陽氣虛寒用補中益氣加
 附子一錢入參五錢腫痛悉愈又以十全大補百餘劑而康

○一人形體豐厚筋骨軟痛痰涎作渴喜飲冷水或用愈風湯天麻花等
 藥痰熱益甚服半黃清心丸更加肢體麻痺余以為脚腎俱虛用補中
 益氣湯加減八味丸三月餘而痊已後連生七子皆踏七旬外科精醫
 云凡入入服加減八味丸必肥健而多子信哉

○一治白虎歷節風走注疼痛兩膝熱腫
 虎脛骨 酥炙 黑附子 炮製去皮臍各一兩
 右為細末每服二錢溫酒調下七日再服

脚氣

尿弦者風濡弱者濕洪數者熱遲瀉者寒夜瀉者虛牢堅者實結則因氣散則因凝緊則因怒細脈因悲

脚氣者濕熱在足而作氣痛也濕熱分爭濕勝則令人增寒熱勝則令人壯熱此其為証亦有兼頭痛者類傷寒惟其得病之始本於脚氣為異耳又不可以脚腫為拘亦有痛而不腫者名曰乾脚氣亦有緩緩不隨者名曰緩風亦有疼痛不仁者名曰濕痺亦有轉筋者名曰風毒此在醫者體會而辨証用各有治法不同大抵脚氣之疾發疾也喜通而惡塞故孫真人曰脚氣之疾皆由氣貫而死終無一人以服藥致虛而死故脚氣之人皆不得大補亦不得大瀉是方也木通防已價價通劑也可以去熱蒼白二木燥劑也可以去濕然川芎能散血中之氣犀角能利氣中之血先痛而後腫者氣傷血也重用川芎先腫而後痛者血傷氣也重用犀角若大便瀉者加桃仁小便澀者加牛膝肉桂加芩連時熱加石膏有痰加竹瀝全在活法初勿拘也凡脚氣攻心喘急

壽世保元

戊集五卷

四十六

不止嘔吐不休皆死水犯火故也

一論專治脚氣增寒壯熱者此濕熱在足而作氣痛也防已飲

蒼朮 鹽水炒 白朮 黃柏 酒炒 防已 生地黄 酒洗
川芎 檳榔 木通 犀角 甘草梢

右剉水煎空心服

一論脚氣初發下身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先用此藥導之次用當歸拈痛湯服之

羌活道滯湯

羌活 獨活各一錢 當歸一錢 防已 炒一錢 大黃 酒蒸一錢 枳實 炒一錢

右剉水煎服

一論濕熱脚氣為病肢節煩痛肩背沉重胸脇不利兼遍身疼痛下注

足脛腫痛脚膝生瘡赤腫及裏外生瘡膿水不絕或痒或痛並宜服之當歸拈痛湯

羌活

茵陳各一錢 當歸 酒洗 防風 去塵 知母 去毛

澤瀉

猪苓 白朮 去蘆各人參 苦參

升麻

葛根 各四分 蒼朮 酒炒 甘草 各一錢

右剉水煎空心服

一論三陽經脚氣流注脚膝上熾熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風用

人參敗毒散各一錢方見感冒門加倉米泔炒大黃酒蒸各一錢作一服生薑煎空心服皮膚瘙癢赤疹加蟬退

一論風濕流注經絡間肢節緩緩不隨老人脚膝疼痛不能履地七聖散

川牛膝 酒浸 杜仲 酒炒 續斷 川草薺 防風 川獨活 甘草 各一兩

壽世保元

戊集五卷

四十七

右焙乾為末每服二錢酒調服

一治脚氣止痛可方

乳香 沒藥 天麻 白附子 僵蠶 右剉各等分為細末每服五分空心酒調服

一治濕氣攻注腰脚痛行步不得

當歸 酒洗 肉桂 玄胡索 草薺 沒藥 各二兩 杜仲 酒炒一錢

右為細末每服二錢空心溫酒調下

一治脚氣浮腫

川牛膝 去蘆 酒洗 威靈仙 一錢 蒼朮 木泔洗 漢防已 一錢 五加皮 一錢 川獨活 五分 當歸 身一錢 川黃柏 酒炒

右剉一劑生薑煎入酒一杯同服

一有人氣如火從脚入腹者此虛極也蓋火起於九泉之下也此病
 十不救一治法以四物湯加黃柏知母降火之藥服之外以大附子為
 末津調貼脚心湧泉穴以引火下行
 一按此條言猶有未盡者如果勞怯陰虛之人有此因宜作陰虛治若
 壯實之人有此則足虛鬱成熱之候也予嘗見雨途行衣濕得此症以
 後所製加味二妙丸一料服之而愈後醫數人皆驗若誤作陰虛治則
 成痰疾矣

○一治足跟痛有痰有血熱
 血熱四物湯加黃柏知母牛膝有痰者五積散加木瓜
 ○一論兩足濕痺疼痛或如火燎之熱從足趾起漸至腰膝或府痺痿
 軟乃濕熱為病皆食酒嗜慾乘風所致然耳
 加味二妙丸
 蒼朮 酒製 黃柏 酒浸 牛膝 去蘆

壽世保元 戊集五卷 四八

當歸尾 酒洗 草薢 一兩 防已 一兩
 龜板 炙 一兩或六錢 板加熟地黃 二兩亦可
 右為細末好酒打糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心薑棗湯下
 ○治一切寒濕虛冷脚氣腫痛焦枯經年臥床不能動履者獨活寄生湯
 各等分入好酒煮飲之效方見中濕門
 ○一論男婦五勞七傷腎氣衰敗精神耗散風濕流注脚膝酸疼行步艱
 辛飲食無味耳焦眼昏皮膚枯燥婦人臍冷無子下部積寒腸風痔漏
 吐血瀉血諸風諸氣並皆治之

經進地仙丹 西園公履驗
 黃芪 炒 一兩 人參 一兩 白朮 去蘆 白茯苓 去皮
 何首烏 三兩 川烏 炮 一兩 大附子 炮去皮 白附子 炮二兩
 牛膝 酒浸 肉蓯蓉 酒浸 川椒 去目炒 覆盆子 二兩
 兔絲子 酒制 川草薢 二兩 骨碎補 去毛炒 烏藥 二兩

天南星 炮 二兩 防風 二兩 羌活 二兩 木鱉子 去殼
 地龍 去土 金毛狗脊 去毛赤小豆 二兩 甘草 一兩
 右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服三四十丸空心溫酒送下
 陶隱居以此地仙丹編入道藏經時有人毋幼午時得風氣疾久治不
 差五十餘年隱居修合日進三服諸病頓愈髮白返黑齒落更生人常
 言者方三年無病可治冷病三年無藥可用噫有是哉余近若脚膝酸
 痛服經進地仙丹三日而愈由是知天下無不可治之病醫書無不可
 用之方特在於遇醫之明不明耳

二十四味輕脚丸 專治風濕用
 當歸 酒洗 川芎 一兩 草薢 酒浸 蒼朮 酒浸 炒
 牛膝 酒洗 杜仲 酒炒 木瓜 七錢 橫櫛 一兩
 枳殼 一兩 木香 七錢 續斷 酒洗 威靈仙 七錢
 防風 七錢 羌活 一兩 獨活 七錢 細辛 一兩

壽世保元 戊集五卷 四九

麻黃 七錢 五加皮 七錢 海桐皮 七錢 石楠藤 一兩
 薏苡仁 一兩 五靈脂 七錢 乳香 五錢 沒藥 七錢
 右為細末酒浸薑湯為丸如梧桐子大每服五十九丸熱桂枝湯下或
 枳殼木瓜湯下
 ○一論寒濕脚氣疼痛不仁兩足脈來沉細者此痺症也內經曰寒氣勝
 者為痺痺氣勝者為痿痿者痺令疼痛不仁是寒而且著也兩足脈足
 脈來沉者為濕運者為寒是方也用桂附溫其寒已未制其濕甘香
 家藥也扶土氣之不足制濕氣之有餘然必冷服者欲桂附之性行于
 下而不欲其橫行于上也

六物附子湯
 大附子 炮去 桂心 防已 各四錢 白朮 去蘆
 白茯苓 去皮 甘草 炙 一錢
 右剉水煎空心服

一論兩膝腫痛膝枯者名鶴膝風也或拘後不詳感胃寒濕或法
水履霜以致兩足痛如刀割虎咬之狀膝腫大不能行動
補中益氣湯去柴升陳皮加附子牛膝杜仲防風羌活川芎白芍
地黃草薢防己生薑黃芩煎服

一論兩腿酸軟或赤或白足跟患腫或痛或痒後痛或如無皮或如破
裂日晡至夜脹痛熱以補中益氣湯加入八味丸料補其肝腎

一論兩足心發熱作痒以滾湯浸漬而出水肌體骨立作渴吐痰此
脾腎虛而水乏為痰也以補中益氣湯兼進六味丸久而元氣復而諸
症愈

一論脚發熱則咽喉作痛肉熱日乾痰涎壅上此腎經虧損火不歸經
以補中益氣湯加麥門五味及加減八味丸服愈

一論兩腿逸則筋緩痿軟而無力勞則作痛如針刺脈洪數而有力此
腎肝陰虛火之象也用六味丸而愈

壽世保元

庚集五卷

五十一

一論八味丸治脚氣足少陰經脚氣入腹腹脹痛上氣喘急腎經虛寒
所致也此証最急以腎水承心火死不旋踵八味丸方見補益

一論八味丸治脚弱加續斷並蘇若人加平膝准焉○治鶴膝風加牛
膝入參鹿茸

一論人以兩足發熱或脚跟作痛用六味丸及四物湯加麥門五味去參
芩而愈後因勞後發熱惡寒作渴煩燥用當歸補血湯而安

一論人足熱口乾吐痰頭暈服四物湯加黃連黃柏飲食即減痰熱自止
用十全大補湯加麥門五味山藥山茱而愈

一論風濕氣足脛腫痛用此藥洗立効

- 防風 荆芥 苦參 番白草 地榆
 - 青藤 麻黃 蒼耳草 蒼朮 生葱
 - 炒鹽 威靈仙各一兩
- 右用米一桶煮熟於桶內薰蒸痛處出微汗待湯稍溫再洗痛處一二

次覺痛癢如發者只用桃柳榆柳桑椹大芥木枝煎水洗亦効
一論凡人患寒濕脚氣疼痛不仁者內服煎劑外宜以此湯再洗之
壅疾洗之無病不長

一椒湯洗法

用川椒二兩葱一握生薑如掌大一塊水一盆煎湯洗之
一治遠行脚打成泡

用之調生麵糊貼於夜間乾不兩毒破
一論兩足痛如刀割不可忍按

先用生薑切片蘸香油擦痛處隨用生薑火燒熱搗爛敷患處須臾
薑乾而痛止神効

一論脚氣冲心
用白礬三兩煎水浸洗兩足良久自愈

一論脚走急發石塊脚底腫不能行其痛不可忍按

壽世保元

庚集五卷

五十一

用燒紅磚一塊將藥末於尿盆內下密以半日取來放在紅磚上
將腫脚底立在草鞋上火逼尿氣入皮裏即消此病諸方不載如不
早治爛入脚底俗曰爛

一治脚氣腫痛脚膝風不能動履
用真生薑汁一碗入半膠一兩熬成膏入乳香沒藥末各一錢攪勻
絹帛攤貼腫消痛止次日將藥水入藥碗內去水又攤又貼効不
補中益氣湯見內傷 六味丸 八味丸俱見補益當歸補血湯九發

十全大補湯見補益

補遺

一論鶴膝不能動履脚痛難當及麻木風濕屬虛寒者宜之

- 神仙風藥酒 秦歸身一兩 大川芎一兩 片白朮 去蘆 白茯苓 去皮
- 大川烏 炮五錢 軟防風 五錢 荆芥 穗 五錢 羊角天麻 五錢

全蠍 三錢 香白芷 五錢 北細辛 五錢 何首烏 五錢
 新草烏 炮五錢 威靈仙 五錢 金釵石斛 五錢 川牛膝 去蘆 五錢
 川獨活 五錢 羌活 三錢 麻黃節 三錢 石楠藤 五錢
 薏苡仁 酒洗 赤桂 五錢 川乾薑 五錢 尖橫柳 五錢
 宣木瓜 五錢 真石乳 二錢 明沒藥 二錢 川續斷 五錢
 白芥子 米泔炒 嫩黃芪 五錢 兩頭尖 五錢 南木香 一錢
 漢防己 五錢 桑寄生 五錢 赤茯苓 一兩 虎脛骨 燉乳浸
 骨碎補 五錢 甘草節 五錢

右各一處用生頭酒九升文武火熬熟去火毒早晚飲酒隨量
 一治男婦風濕相搏腰膝痛或因坐臥濕地雨露所侵身骨節痠痛
 風濕脚氣並治

秘傳藥酒方
 白芷 桔梗 白芍 川芎 麻黃
 壽世保元 戊集五卷 五十二

茯苓 半夏 肉桂 甘草 多一兩 陳皮
 厚朴 薑汁炒 枳殼 炒 當歸 各一兩 蒼朮 炒 兩 牛膝 去蘆 二兩
 杜仲 酒炒 木瓜 五錢 檳榔 五錢 烏藥 二兩 防己 一兩
 獨活 五錢

右各別以麻布袋盛用無灰好酒五斗將藥袋懸於壇內密封固壇
 口放鍋內煮一時久然後取出過三日後去藥隨酒飲之樽罍乾未
 酒稠為丸如梧桐子大每服七八十丸空心溫酒下○腿膝疼痛加川
 烏虎脛骨○腰痛加破故紙肉蓯蓉枸杞子
 江廣秘傳藥酒方 治脚膝腫痛并手足痛
 五加皮 八兩 川牛膝 去蘆 杜仲 酒炒 當歸 懷生地黃 各三
 地骨皮 二兩

右剉散用好酒五斗入藥重蒸煮一炷香土埋三日出水再隨量飲之
 ○一婦人下體腫痛用大參敗毒散加蒼朮枳殼威靈仙痛殺又以酒

湯加蒼朮黃柏防己紅芍澤瀉
 ○一秘方治脚氣腫痛用木瓜為末好酒調敷患處立止
 ○一治兩脚俱是疔瘡腫毒骨痛用獨活切片鋪於患處每蒜丁片用文
 一壯去毒再換再灸灸至愈

壽世保元 戊集五卷 五十三

癩疝

內經曰肝脈大急沉皆為疝心脈滑搏急為心疝肺脈沉搏為肺疝又三陽急為癧二陰急為疝

夫疝者由榮衛虛弱寒濕不調致令邪氣乘虛入於心腹中遂成諸疝或則小腹疼痛或連臍連上搶心甚則手足厥冷或大小便閉結其諸疝因邪氣留滯乃成積聚令人羸瘦少氣洒淅寒熱嗜臥飲食不養肌肉或腹滿嘔泄遇寒則痛又有婦人小腹腫痛攻及一腿者亦疝氣也

壽世保元

戊集五卷

又五十三

- 川練子 小茴香 破故布 青鹽 山茱萸酒蒸去核
- 吳茱萸 三稜 莪朮 通草 橘核
- 荔枝核 甘草各等分

右剉水煎空心服立效收功加馬蘭花蒼朮○如夏秋之月暑入膀胱疝氣作痛加黃連香茹扁豆木通滑石車前子

○一論疝氣腫痛或大便閉結或小便赤澀或有寒有熱兼治之神方也
川練子酒蒸去核 胡蘆巴炒 小茴香酒炒 青鹽
黑丑搗碎 木香 大黃 滑石 木通
吳茱萸炒 烏藥 車前子各等分

右剉水煎空心服
○一治疝氣小腸氣 南塘桂試效
猪苓 澤瀉 蒼朮 赤茯苓 桂皮
川木通 白芍 川練子 玄胡索 烏藥

- 青皮 紫蘇 馬蘭花 橘核仁三十尖 枳實
- 甘草各等分

右剉生薑煎服
○一論治疝疝及奔豚小腸氣臍腹太痛
七疝湯 知府劉水山傳一方

玄胡索 小茴香酒炒 川練子 全蝎炒 人參
大附子炮 山梔子炒 木香各等分
右為細末每服三錢空心溫酒調服
秘方 治疝同前

青鹽二錢 木通 甘草各一錢川烏炮三錢燈草一錢
右剉一劑水煎空心溫服

○一論治外腎腫痛諸般疝氣不論新久一服如神予嘗用此丸治疝疝氣偏墜已經行餘年服至三料除根永不復發

壽世保元

戊集五卷

五十四

- 木香 金鈴丸 麝香使方
- 木香 乳香 沒藥 大附子炮 麝香使方
- 小茴香酒炒 川練子 玄胡索 全蝎 人參各等分

右為細末好酒打糊為丸如梧子大每服百丸空心熱酒送下服正

○一論疝氣發於寒月者寒邪入膀胱也
加減五積散方見中寒 依本方加玄胡索專治醉飽後色然不飽傷小
腹致成疝氣其症自小腹連兩脇下心頭吊痛額出微汗宜之
○一論疝氣發於暑月者暑氣入膀胱也
加減香苓散

- 枳殼炒 陳皮 香附 蒼朮 麻黃
- 香茹 猪苓 澤瀉 木通 滑石
- 車前子 三稜 莪朮 川練子 玄胡索
- 甘草

右劉蕡葱煎熱服。○專治偏墜氣初起，瘧寒壯熱，發表輕者，一服而愈。
 ○一論，疝氣偏墜疼痛，屬腎虛者，久服除根。
 六味地黃丸，方見補益，全料內加。

人參 三兩 甘枸杞子 三兩 巴戟肉 三兩

懷生地黃 六兩 用桂 二兩 酒 二碗
 破故芷 二兩 水 三碗 地黃 三錢 各一兩 青 三錢 煎至
 右為細末，酒打麪糊為丸，如梧子大，每服百丸，淡鹽湯下。

○一論，狐疝者，晝則氣出而腎囊腫大，令人不堪，夜則氣入而腫脹皆消，稍無疾苦，蓋狐之為物也，晝則出穴而溺，夜則入穴而不溺，以斯疝病之故曰狐疝。夫晝陽也，夜陰也，晝病而夜否者，氣病而血不病也。補中益氣湯方見內傷，依本方加酒炒黃柏知母。

○一論，癩疝者，頑疝也，舉丸雖大而無疾苦也。此以父子相傳，得於有生之初已然，非若者生之後，三因所致之疾也，故不必主治。

壽世保元

戊集五卷

五十五

○一論，諸疝疼痛，太學生徐擴五傳

猪苓 澤瀉 木通 赤茯苓 胡蘆巴
 川練肉 海藻 牽牛 巴戟 桂竹茹

右劉水煎空心服。

○一論，治疝氣，許碧池傳

檳榔一兩 木通五錢 橘核 川練子 小茴香
 白茯苓 白朮 猪苓 澤瀉各一兩

右劉水煎空心服。

○一治，偏墜氣痛，用江子數枚，核角箇，三味同炒至褐色，去殼將三味搗爛，頭酒煎服，立愈。

○一論，治偏墜氣。

猪懸蹄燒存性為末，每服三錢，黃酒調服。

○一論，治疝氣。

猪毛燒灰，每服二錢，空心熱酒送下，立愈。方加小茴炒。

○一治，疝氣偏墜腫痛不可忍。

槐子一錢炒為末，入鹽三分，空心熱酒送下，立消而止。

○一治，陰囊風癢。

淨萍煎水洗之，如成瘡，用黃連輕粉雞蛋先燒灰，將末擦之，即愈。

○一治，陰囊癢不可忍。

猪肉湯加胡椒煎湯洗之，立愈。

○一治，陰囊腫痛，疝門癢，痒抓破出血，好了又痒者。

人言酸醋二碗，熬至一碗，洗患處，立愈。

○一治，外腎腫大疼痛者。

大黃末，醋調敷患處，立消。

○一周少峰親家患疝氣，偏墜腫痛不可忍，者遇一秀才傳一方，用草土水和作乾泥，拍作大餅，火烘於火上烘熟，貼患處，冷則再易，立愈。

壽世保元

戊集五卷

五十六

○一外腎因撲損而傷，舉丸偏大有時疼痛，有中者，瘀血名曰血疝，宜於夜分之時，自以一手托其下，一手按其上，由輕至重，九弄百迴，隨月之間，瘀血盡散，陳氣皆行，誠妙術也。雖年深日久，無不愈之。

○一治，外腎着驚縮上者。

麝香二錢 朝腦三錢 高臣子一茶鍾

右用高臣葉，搗為膏，貼臍上。

○一治，疝氣，戴耕愚傳。

荔枝核三錢 燒小茴炒一錢 川練肉一錢

右為末，鹽酒調服，看時令先要發散寒暑。

○一治，疝氣偏墜，車左源傳。

蒼朮一斤 童便 酒 各浸三日 炒乾 橘核一兩

右為末，酒糊為丸，每服百丸，空心酒送下。

○一治，外腎腫大麻木痛硬，及奔豚疝氣偏墜。

七製金鈴丸

川練子不妊者四十丸。去皮切片分七製。○七箇用。小茴香二錢五分。同炒。并用茴香。○破故紙二錢五分。同炒。并用故紙。○黑牽牛二錢五分。同炒。并用牽牛。○鹽一錢。同炒。并用鹽。○斑貓十。四箇。去翅。同炒。去斑貓不用。○巴豆肉十四箇。切作四段。同炒。去巴豆不用。○蘿蔔子二錢五分。同炒。去子不用。○外加

大茴香炒 青木香 南木香 辣桂各二錢五分

右為細末。酒糊為丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前酒下。積年可助。打降瘀血。症本方加玄胡索半兩。略炒。沒藥為末。酒調下。

○一治腎大如拳。不過三服除根。

船上小茴香 青皮 荔枝核各等分

右剉散。炒黃。出火毒。為細末。酒調。一錢。日進三服。

○一治疝氣外腎腫脹神効。

壽世保元

戊集五卷

五十七

四聖散

小茴香炒 川山甲炒 全蝎炒 南木香各等分
右為丸。每服二錢。酒調服。下腸止嘔。

痿痺

痿者手足不能舉持是也。又名軟風。下身瘦弱不能趨步。及手戰搖不能握物。此症屬血虛。血虛乃陰虛。陰虛生內熱。熱則筋弛。步履艱難。而手足軟弱。此乃血氣兩虛。風濕之症。古方通用風藥。治之非也。我東垣丹溪二先生治法。始合經意。而以清燥湯主之。丹溪又分濕熱。濕痰。氣虛。血虛。痰血等法。濕熱用東垣健步丸。燥濕降陰火。如蒼朮。黃柏。黃芩。牛膝之類。濕痰。用陳湯。加蒼朮。白朮。黃芩。黃柏。竹瀝。薑汁。氣虛。用君子加蒼朮。蒼朮之類。血虛。用四物湯。加黃柏。蒼朮。補陰丸。亦有食積死血妨礙。不得下降者。此從食積死血治之。他如滑石散。二妙散。虎骨丸。皆

治痿之要藥也。

○一論。六七月間。濕令大行。子能令其實。而熱旺。濕熱相合。而刑庚太勝。故寒涼以救之。燥金受濕。熱之邪。從寒水生化之源。源絕。則腎筋痿。之病大作。腰下痿軟。癱瘓。不能動履。

清燥湯

黃芪 鐵水炒 蒼朮 米泔浸 白朮 去蘆炒 陳皮

澤瀉 各五分 人參 白茯苓 去皮 升麻 各三分

麥門冬 去心 當歸 身酒洗 生地黃 神麴 炒

猪苓 各二分 黃柏 酒炒 柴胡 黃連 各一分

五味子 九箇 甘草 炙二分

右剉。一劑。水煎。空心溫服。

○一論。此藥能去風。順氣。活血。壯筋。之治。痲痺。後。即。有。痲。痛。不。能。行。履。者。曰。痲。風。或。兩。脚。腫。痛。是。經。絡。細。名。曰。痲。風。風。寒。治。一。切。痲。痺。痿。軟。風。濕。痿。痺。

壽世保元

戊集五卷

五十八

虛之候

大防風湯

當歸 酒浸一錢 川芎 七分 白芍 酒炒一錢 熟地黃 一錢

黃芪 蜜炙一錢 人參 五分 防風 一錢 羌活 五分

牛膝 酒洗五分 杜仲 姜炒一錢 白朮 五錢 大附子 炮去皮臍

甘草 炙五分

右剉。一劑。生薑五片。棗一枚。水煎。溫服。

○按右四物。以補血。參芪。木草。以補氣。羌防。以散風。濕。以和。關。節。牛膝。杜仲。以補腰腎。以附子。行參芪之氣。而走。周身。脈絡。蓋治氣血兩虛。扶風。濕。而成痿痺。不能行者。之聖藥也。觀其治。痲。後。風。可見矣。然可以治。不足之痿弱。而不可治。有餘之風痺也。

○一論。五子。益腎。養心。丸。治。精。血。虧。損。下。部。痿。軟。無。功。不。能。步。履。益。精。養。血。壯。筋。健。步。丸。治。症。同。前。

黃芪一兩 山藥一兩 五味子一兩 破故紙一兩

人參一兩 白芍一兩 熟地黃四兩 枸杞子一兩

牛膝一兩 兔絲子一兩 當歸一兩 白朮一兩

杜仲一兩 虎骨一兩 龜板一兩 蒼朮一兩

黃柏一兩 防風一兩 羌活一兩 漢防己一兩

右為細末用猪香鬮七條煉蜜為丸如梧子大每服百丸空心鹽湯下

○一治一切麻痺痿軟風濕血虛之候又治痢後脚弱緩痲不能行服名曰刺風或兩脚腫痛足脛枯細名曰鶴膝風以十全大補湯去肉桂加防風羌活牛膝杜仲大附子煨

○一人兩足痿弱不能動止予以

鹿茸 人參各五錢

右到一劑水煎空心溫服連進數服而愈

○一治兩足痿弱不能行者

壽世保元 戊集五卷 五二九

用新種火燒紅以好醋洗之候乾布包烙膠上邊處立能行動

○一治腎氣虛憊腰膝酸疼行步無勞

起痿丹 兔絲子酒洗二兩 胡蘆巴酒炒 肉桂各二兩 川單薛

破故紙酒炒 沙苑藜炒 沙苑藜炒 沙苑藜炒 沙苑藜炒

川杜仲酒炒 防風酒洗 甘枸杞子各二兩

河間方去枸杞加桂減半

右為末酒煮猪腰子搗爛和丸如梧子大每服七八十丸空心酒下

消渴

消渴脈數大者活虛小病深固難脫

夫消渴者由壯盛之時不自保養任情縱慾飲酒無度遺精多或服丹

石遂使腎水枯竭心火大熾燥二焦在烈五臟乾燥由是渴利生焉口

煩渴口燥渴口強中三證者消渴也。多渴而利燥渴者由熱中所致但

飲食皆作小便自利不渴者虛弱短氣強中者陽具小交而精薄

由凡消渴之人當防思難狂所損者一飲酒二房勞鹹食及麪俱忌

也。大抵脈大者易治細小者難醫也

○一論消渴引飲無度尿寬者是也

黃連 牛乳汁 生地黃汁 生藕汁 各等分

右二味及汁為膏入和牛乳黃連法其和蜜為膏徐徐於舌上以白湯

此少送下或將前二味藥和汁為丸如梧子大每服五十九白湯送下

○一論治三消總治之方服之立應

人參 白朮 去蘆 白茯苓 去皮 當歸酒洗 生地黃各一錢

黃柏酒炒 知母 去皮 黃連 麥門冬 去心 天花粉

黃芩 各八分 桔梗 五分 甘草 三分

壽世保元 戊集五卷 五三〇

右到一劑水煎服

天池膏 治三消如渴

天花粉 黃連 各半斤 人參 知母 去心

白朮 各四兩 五味子 三兩 麥門冬 去心 懷生地黃汁 二碗

藕汁 二碗 入乳 牛乳 各一磅 生藕汁 二酒鍾

右先將天花粉七味切片用米泔水十六碗入砂鍋內浸半日用桑柴

火慢熬至五六碗濾清又將蜜搗爛以水五碗煎至二碗同前汁又煎

去二三碗入生地等汁慢熬如饒加白蜜一斤煎去白沫又熬如膏

入磁罐內用水浸三日去毒毒每用二三匙或五明之或用白湯送下

○一論消渴口乾心熱用天花粉一味水煎服之立效

○一論治三消渴神效用藥絲湯如無藥絲湯却以煎絲湯殺絲繩煎湯

皆可代之無時飲之極效益此物屬火有陰之用大能瀉膀胱中伏火

引陰水上潮于口而不渴也

○一論陰虛火盛煩渴引飲無度
養血清火湯

當歸 鐵 川芎 八分 白芍 酒炒 生地黃 酒洗
黃柏 鹽炒 知母 一錢 麥門冬 一錢 石蓮肉 五分
天花粉 七分 黃連 八分 烏梅肉 五分 薄荷 五分
甘草 五分
右剉水煎溫服
○一治消渴病通用

生地黄膏

生地黄東如桃大一把洗切研細以新水一碗調服入冬蜜一匙同煎至半取出入入參五錢白茯苓去皮二兩為末拌和磁器密收用匙挑服夏月可加五味子麥門冬

○一治消渴

壽世保元

戊集五卷

六一

玉泉丸

人參 黃芪 半生 半 白茯苓 乾葛 麥門冬
烏梅肉 焙 甘草 各一兩 天花粉 五錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九溫湯下

○一人消渴引飲無度或令食非苗或炒或作羹無入鹽日兩三次其渴遂止

○一人消中日夜尿七八升者磨角燒令為末以酒調服五分匕日三漸加至方寸匕

○一治消渴

天華散

天花粉 一兩 生地黃 一兩 麥門冬 五錢 五味子 五錢 粉葛 五錢
甘草 五錢

右剉糯米一撮水煎服

○一論腎水枯竭不能運上作消渴恐生癰疽
參芪救元湯

黃芪 蜜炒 人參 粉草 炙 麥門冬 去心 五味子 各等分
右剉水煎入米砂少許不拘時服
○一論一常入平日口乾作渴因飲酒食炙應補劑房勞凡若此類過多致冷腎水枯竭不能上制心火故有此証後必有疽發也宜先服此以絕其源及癰疽後服此尤有益也

八味丸

懷生地黃 酒浸 焙 山藥 一兩 白茯苓 去皮
牡丹皮 八錢 山茱萸 帶枝 酒浸 焙 五味子 微炒
肉桂 五錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五六十九五更時淡鹽湯送下溫酒亦可

壽世保元

戊集五卷

六一

○一論心腎不交消渴引飲有火病渴用湯藥者不必用加減八味丸而愈其疾本以腎水枯竭不能制心火上炎是以生渴此藥降心火生腎水

○一人不時發熱日飲水數碗寒藥二劑熱渴益甚形體日瘦大便淋大而數時或無力王太僕曰熱之不熱責其無火寒之不寒責其無水又云條熱往來是無火也時作時止是無水也法宜補腎用加減八味丸不用而愈

○一治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛或形體憔悴汗發熱五臟瘡損以六味丸加肉桂二兩五味子四兩

○一人形體魁偉冬日飲水自喜壯實余曰此陰虛也不宜下口舌生瘡或用寒涼之劑肢體倦怠發熱惡寒以六味丸補中益氣湯而愈

○一睡熱肉熱不時而熱作渴瘵瘵小使頻數而作口舌生瘡者此下焦陰火也以六味丸效

痲病

痲病之誤也。強淫者，強強而動，直項項急而首反張也。此以風寒濕三者客于太陽，傷其大筋，筋牽而急，故令痲也。然得之風濕者，令人有汗而不惡寒，名曰痲。得之寒者，令人無汗而惡寒，名曰剛。痲者，以桂枝湯主之。是也。是方也。有麻黃杏仁，則可以發表散寒。有桂枝芍藥，則可以解肌驅風。有防風防已，則可以驅邪勝濕。有人參甘草，則可以益氣柔筋。有小芎黃芩，則可以利陰去熱。乃附子之熱，可以溫經，而亦可以去濕者也。

二症歌

原來痲病屬膀胱，口噤如癰身反張。此是傷風感寒濕，惟有葛根湯第一。故分兩証有柔剛，無汗為剛須葛湯。桂枝芍藥湯為第一，二証皆宜續命湯。

壽世保元

戊集五卷

六三

剛痲去桂用麻黃，柔痲去麻用桂。只依此法最為良。

小續命湯

麻黃 去節 人參 黃芩 酒炒 白芍 酒炒 川芎 酒洗
防已 杏仁 去皮尖 桂枝 甘草 各一錢 防風

大附子 炮去皮臍 右剉 一劑水煎溫服

葛根湯

葛根 麻黃 桂枝 芍藥 甘草

右剉 生薑 大棗 水煎服

○一論剛柔二症，頭強口噤，身反張，手足攣，搖頭面赤，項強急，與痲病同。

治法

如聖飲
柴胡 黃芩 半夏 赤芍 川芎
白芷 當歸 防風 羌活 烏藥

甘草

右剉 生薑 水煎服。○有汗是柔痲，加白木桂枝。○無汗是剛痲，加麻黃。○口噤咬牙 大便實，加大黃利之。

○一論痲病有二：發熱惡寒，頭項強，腰脊反張，口噤面赤，癰瘰如癰，有汗柔痲，無汗名剛，以補中益氣湯去黃芪柴升，加川芎白芍熟地白茯苓。○剛痲身熱面赤脈緊，加防風羌活黃芩乾葛，去白木。○柔痲身不熱手足冷，脈沉細，加熟附子羌活。○風痰痲，加羌活防風瓜蒌枳實桔梗片，竹瀝薑汁，去入參白木。○破傷風痲，加殭蚕全蝎防風羌活南星瓜蒌仁枳實黃芩桔梗竹瀝薑汁，去白木人參。○汗吐下多，發痲者，本方倍入參黃芪當歸生地劑，芥羌活白木。

濁症

○兩尺脈洪數，必便濁，夫精

壽世保元

戊集五卷

六四

精之主，寄在心，精之藏，則在腎。凡人酒色無度，思慮過情，心腎氣虛，不能管攝，往往小便頻數，便濁之所由生也。因小便而出者，曰尿精，因見閉而出者，曰漏精。心不足而挾動者，為赤濁，心不足而腎冷者，為白濁。陰不升，陽不降，上下乖換，是以有清濁不分之症。大率多是濕痰流注，直燥中官之濕，兼降火升舉之法，此為至要之語也。

○一論便濁之症，因脾胃之濕熱下流，滲入膀胱，故使便濁赤白，渾濁不清也。宜燥中官之濕，用升麻柴胡提氣使大便潤而小便長，不宜用寒涼傷血之藥。

主方

陳皮 八分 半夏 八分 茯苓 一錢 蒼朮 米泔炒 黃柏 酒炒
柴胡 七分 升麻 三分 白朮 去蘆 神曲 炒 五分 牡蠣 煨 五分
梔子 炒 一錢 蛤粉 三分 滑石 一錢 甘草 三分
右剉 一劑 生薑 三片 白果 九枚 水煎 空心服 渣再煎 煎服 忌煎炒辛辣物

○一論心中煩燥思慮憂鬱抑鬱小便赤濁或有沙膜夜夢遺精滑泄痛便赤如或酒色過度上感下虛心火上炎肺金受克故口苦咽乾成消渴四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白五心煩燥此藥溫平清心養神秘精大有奇效 赤濁者心虛有熱也 清心蓮子飲

石蓮肉 人參各二錢 黃芪 蜜炙 赤茯苓各二錢
麥門冬 夫心 地骨皮 黃芩 車前子各一錢
甘草三分 熱加柴胡瀉荷各一錢

右剉一剉燈草十根生薑三片水煎空心服。○上感下虛加酒炒黃芩知母各一錢
○一論心經伏暑小便赤濁而有熱也 加味四苓散
人參 茯苓半 白朮 去蘆 赤茯苓 去皮 猪苓 澤瀉

壽世保元

戊集五卷

六十五

香薷 石蓮肉 麥門冬 夫心各等分
右剉水煎空心溫服

○一論小便白濁頻數無度凝白如油光彩不定凝脚澄下凝如膏稠此真元不足下焦虛寒之所致也
草薺飲
益智仁 川草薺 石菖蒲 烏藥
一方加茯苓甘草

右各等分剉一劑水煎入鹽一捻空心溫服。○腎虛加牛膝杜仲山藥
○便赤加澤瀉麥門冬

○一論白濁初起或半月者下焦虛熱之所致也
滋腎散
川草薺 麥門冬 夫心 遠志 夫心 黃柏 酒炒 兔絲子 酒炒
五味子 酒炒 各等分

右剉一剉竹葉三片燈草一團水煎空心服
○一論赤白濁乃水火之不分也
水火分清飲

益智仁 草薺 石菖蒲 赤茯苓 車前子
猪苓 澤瀉 白朮 去蘆 陳皮 枳殼 炒
麻黃 各等分 甘草二分

右剉半水半酒煎空心服久病去麻黃易升麻
○一治遺精白濁
玉環丹 弟雲嵩傳

五色龍骨 左顧牡蠣 蓮花鬚 芡實 石菖蒲
五味子 黃柏 酒炒 各一兩

壽世保元

戊集五卷

六十六

右為細末用金櫻子煎湯為糊入臼內搗千餘下成餅為丸如梧子大
每服五丸 溫酒下 乾物壓之
○一治遺精白濁
山藥 一兩 黃柏 酒炒 二兩 牡蠣 火煨 礬白 茯苓 去皮 一兩
右共為細末酒糊為丸如梧子大每服五十丸空心水酒送下

○一論白濁夢泄遺精及滑出而不收者
標根丸
標根白皮 有黃柏 炒 褐色 蛤粉 炒 青黛
乾薑 炒 黑 滑石 各等分

右為細末水和丸如梧子大每服百丸空心溫酒下虛勞四物湯下
○一論白濁經年不愈或時夢遺形體瘦弱當作心虛治之
定志丸

遠志 甘草 水炮 石菖蒲 各二兩 人參 一兩 白茯苓 去木 三兩
黃柏 酒炒 二兩 蛤粉 炒 二兩

右為禾煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服三十九空心米湯下

○一治小便白濁出髓條者

人參

白朮

白茯苓

青蘊

破故紙

大茴香

益智仁

酸棗仁

左顧牡蠣煨各一兩

右為末酒糊為丸如梧子大每服三十九溫酒米飲任下

○一論瘦人陰虛火動患赤白濁者

清離液坎湯方見勞瘵依本方加草薢牛膝山梔菴蓄赤芍藥

○一論久患白濁不止而作頭暈者以益氣湯加白茯苓半夏

○一論發熱口乾小便頻濁大便閉結盜汗遺精甚至發癆用當歸六黃

湯二劑盜汗頓止用六味九二便調和用十全大補湯及前九兼服用

餘悉愈

○一論肥人濕痰患赤白濁者

二陳湯方見痰飲依本方加蒼朮白朮人參當歸生地麥門山梔黃柏草

壽世保元

戊集五卷

六十七

蘇牛膝為膏

○一論肝腎脾虛損赤白濁久不愈者六味九補中益氣湯早晚兼服

六味九方見補益補中益氣湯方見內傷依本方加白茯苓半夏

○一入久患白濁發熱體倦用補中益氣加炮薑四劑白濁稍止再用六

味地黃兼服諸症悉愈

○一入患頭暈白濁余用補中益氣湯加茯苓半夏而復患腰痛用山

藥山藥五味草薢遠志頗愈又因勞心盜汗白濁以歸脾湯加五味而

愈後不時眩暈用八味九全愈

補遺

○一治遺精白濁

木賊

小川芎各五錢

粉葛居其中一兩

蛇退一寸半頭向上考

挂壁顯神通

右用酒煨空心服

○一治赤白濁陳雲岳傳

木通去節七錢滑石三錢

粉草四錢

黃荆子一勻

右剉水煎空心服立已

遺精

遺精白濁當歸及結壯動緊二症之治

天房泄若其候有三年少壯感燥燥強強則情慾不自知覺此泄如

之滿而溢也是為無病不藥可也或心氣虛不能止泄如瀉之

而出也人多有之其病猶輕則以和中之劑治之其病重則以

腎不攝精此泄如崩而漏者也其病最重須作大補湯九治之

○一論心所慕而作夢遺此若火既動而相火隨之治在心

黃蓮清心湯

荷蓮

生地黃

當歸

人參

遠志去心

壽世保元

戊集五卷

六十八

白茯苓

酸棗仁

石蓮肉

甘草

右剉水煎服加麥門冬去心尤妙

魯藩泰典王驗方 治遺精

人參

石蓮肉

蓮鬚

芡實

麥門冬去心

白茯苓

遠志去心

甘草

右剉水煎服○丁方加石棗栢子仁石菴蒲黃柏酒炒

○一論心神寧靜則精固君相火息則濁清有是証者益因抗乎心

精而然劫龍雷火動其水濁而不澄尾閘不禁即精竭而不固

補心寧神滋陰固本

益智固真湯

昔武五錢一錢人參三錢

白朮去蘖

白茯苓

當歸身酒洗

白芍酒炒

麥門冬去心

五味子

巴戟肉三錢

益智仁去殼

酸棗仁

山藥一錢

澤瀉一錢 升麻五分 黃連五分 黃芩一錢
黃柏酒炒 知母一錢 蓮花蕊一錢 甘草稍五分
右剉分作二劑。水煎服。心服。

○一論心神不安腎虛每自泄精等症。

安神固精丸 黃柏酒炒 知母酒炒各二兩 龍骨煨 芡實
蓮蕊 白茯苓 去皮 遠志 去心 山茱萸肉 各三兩

右為細末。煮山藥糊為丸。如梧桐子大。朱砂為衣。每服五十九。米湯下。
○一論夜夢遺精或滑精虛損之極。久不能止者。

滋補丹 人參 白朮 去蘆 炒 白茯苓 去皮 當歸 酒洗 川芎
白芍 酒炒 熟地黃 酒蒸 甘枸杞子 杜仲 酒炒 牛膝 去蘆
天門冬 去心 麥門冬 去心 破故布 酒炒 遠志 酒洗 牡蠣 煨

壽世保元

戊集五卷

六十九

龍骨煨 金櫻子 去毛 蓮蕊 甘草 炙 各等分

右為細末。山藥末打糊為丸。如梧桐子大。每服百九。空心酒下。

○一論男子發熱遺精。或小便不禁。或腰膝痠痛。

補中益氣湯 方見內傷 合六味丸 方見補益 二方合作湯劑。水煎服。以滋

○一論嗜慾無度。夢遺精滑。晝夜長流。百方固効。病將垂危者。

玉堂丸 扶薄何睛嶽傳 蓮鬚 色黃者佳 石蓮肉 淨肉 一斤 芡實 淨肉 十二兩
麥門冬 四兩 水潤去心

右用公豬肚一箇。入家蓮肉帶心皮一斤。入砂鍋內。水煮熟。將肚內
肉晒乾。同前藥為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服百九。空心酒下。
湯送下。其効如神。

○一男子水藏虛。遺精盜汗。往往夜夢。鬼交。
積猪腰一枚。以刀開去筋膜。入木附子末一錢。七以濕紙裹。煨熟。空

心稍熱服之。便飲酒一二盞。亦甚妙。三五服効。
○一論養元氣。生心血。健脾胃。滋腎水。止盜汗。除遺精。降相火。壯元陽。
養心滋腎丸 臨川徐紹志傳

人參 一兩 酸棗仁 炒 二兩 遠志 甘草水炮
相子仁 去油 炒 白芍 酒炒 一兩 懷熟地黃 酒蒸
當歸 酒洗 石菖蒲 去毛 六錢 麥門冬 去心 二兩
天門冬 去心 二兩 懷生地黃 酒洗 牡蠣 煨 二兩
遠志 去心 二兩 懷山藥 炒 一兩 白茯苓 去皮 水
蓮肉 去皮 心 芡實 去壳 一兩 知母 去心 酒炒
黃柏 去皮 酒炒 二兩 蓮蕊 一兩

右為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服七十丸。空心酒下。
○一論神者精氣之空也。神以御氣。氣以攝精。故人病則神疲。於心則
神散。於腎則腎神之舍也。晝之所為。夜之所夢。男子夢交。而精泄。女子

壽世保元

戊集五卷

七十

夢交。而精泄。是皆不知清心養神之道。斯人也。神不守舍。從欲而
動。晝有所感。夜有夢。心不靜。急腎不攝。精久而不巳。遂成虛損。或有
神氣委靡。急慮猖狂。風邪乘其虛。鬼氣干其正。與妖魅交通。皆是反難
狀之疾也。以
鎮神鎖精丹 主之。

人參 白茯苓 遠志 甘草
酸棗仁 炒 石菖蒲 去毛 各一兩 白龍骨 煨 杜子仁
辰砂 水飛 五錢 留

右共為末。煉蜜為丸。如彈子大。每服一丸。棗湯下。
○一治精滑久不愈。
牡蠣砂鍋內煨。醋淬。七遍。為末。醋糊為丸。如梧桐子大。每服五十九。空
心酒下。
○一治心虛夢泄。

用白茯苓去皮。下味為末。米飲空心調下。
 ○一治遺精虛漏。小便餘瀝。及夜多小便者。
 用益智仁二十四箇。水煎入鹽少許。同服。
 ○一夢泄不止。脈弦而大。
 石蓮肉六兩 甘草一兩

右為細末。每服二錢。食前燈心湯下。
 ○一入勞則遺精。齒牙即痛。用補中益氣。加半夏茯苓芍藥。并六味地黃。
 丸漸愈。更以十全大補。加麥門五味。而痊。

○一入白濁。夢遺。口乾作渴。大便閉澀。平後。熱甚。用補中益氣。加芍藥玄
 參。并加減八味丸。而愈。

○一入莖中痛。出白津。小便閉時作痒。用小柴胡。加山梔澤瀉炒連木通。
 膽草茯苓。二劑頓愈。又兼六味地黃丸。而痊。

○一入便血。精滑發熱。○一男子尿血發熱。○一男子發熱遺精。或小便
 去壽世保元 戊集五卷 七十一

不禁。俱屬腎經虧損。用地黃丸。益氣湯。以滋化源。並皆得愈。
 ○一入午後有熱。遇勞遺精。其齒即痛。此脾腎虛熱。先用益氣湯。送六味
 丸。更以十全大補湯。而愈。

○一入夢遺。精滑。氣血虛。用十全大補湯。加山茱山藥五味麥門。
 補中益氣湯。見內傷。六味丸 八味丸 十全大補湯。俱見補益。

諸淋

脉盛大而實。初生。虛細而滑者。死。

夫淋者。有五淋之別。氣砂血膏。勞是也。皆由膏粱之味。濕熱之物。或燒酒
 炙肉之類。過多。或用心太過。房勞無節。以致心腎不交。水火無制。而成
 五淋之症。名雖有五。大槩屬熱者居多。故有新久虛實之不同耳。學者
 審症。而變通焉。慎毋膠柱以調瑟也。

論氣砂膏勞血五淋。

○氣淋為病。小便澀滯。常有餘瀝不盡也。○砂淋為病。陰莖中有砂石。而
 痛。溺不得卒出。砂出痛止也。○膏淋為病。溺濁如膏也。○勞淋為病。遺
 房勞即發。痛引氣衝也。○血淋為病。遇熱則發。其尿血候。其色澤也
 黃者。知其為小便難也。

○一論心經蘊熱。臟腑閉結。小便赤澀。陰閉不通。及熱淋尿淋。○如酒後
 恣飲。而得者。則小便澀出。而痛既出。而癢。以此藥主之。

八正散
 大黃 蘆薈 木通 滑石 瞿麥
 梔子 車前子 甘草各等分

右剉剉。燈草水煎。空心服。
 ○按右方治諸淋。屬實熱宜之。

○一治五淋神方
 海金沙散

去壽世保元 戊集五卷 三三二

當歸 雄黃 川牛膝 酒洗 大黃 酒洗 木香
 海金沙 各等分

右為細末。每服一錢五分。臨臥酒調服。兩服見效。
 ○按右方治諸淋。不問虛實宜之。

○一治淋瀝。疼痛兼紅淋。
 滋陰清火散

當歸 生地黃 熟地黃 黃柏 酒炒 知母 酒炒
 黃芩 黃連 水通 桑白皮

右剉水煎。空心服。
 ○一治諸淋久不止者。

加味滋陰散
 當歸 川芎 白芍 熟地黃 陳皮
 半夏 姜炒 白茯苓 去皮 甘草 各五分 升麻 柴胡

牛膝去蘗 黃柏酒炒 知母酒炒 白朮去蘗 蒼朮去蘗

右劉水煎露下宿空心服

○一論諸淋多屬膀胱之氣虛弱不能運水道而成諸淋也宜

補中益氣湯殊效方見內傷

○一論下淋入不止乃元氣下陷故也宜

補中益氣湯方見內傷伏苓方參其減半加川芎白芍熟地半夏茯苓牛膝黃柏知母蒼朮水煎露下宿空心服

○一論縱慾強留不泄淫精滲下而作淋者

益元固真湯

人參 白茯苓 蓮蕊 巴戟 升麻

益智仁 黃柏酒炒各 山藥 澤瀉各一錢 甘草稍三錢

右劉水煎空心濕服

○一治小便淋瀝不通又治老人虛寒者患死血作淋痛不可忍宜

壽世保元 戊集五卷 七十一

六味地黃丸方見補益依本方倍茯苓澤瀉又治小便頻數不禁去澤瀉用益智仁

心經有伏熱與火府丹數服而渴止食進此本治熱用以治渴可謂道變也

○一李司馬輩中作痛小便如淋口乾哩痰此思色精降而內敗用補中

益氣湯六味地黃丸而愈

○一儒者發熱無時飲水不絕每食則小便澀痛大便壅痛此精竭復耗

所致用六味丸加五味子及補中益氣其謹守得愈若肢體甚寒喜

熱飲食用八味丸

○一治老人陰痿思色精不出內敗小便水道澀痛如淋用八味丸加車

前牛膝立効

○一老人精已竭而復耗之大小便牽痛愈痛愈愈便則愈痛服以八

味丸最有功效

補遺

○一治血淋

壽世保元 戊集五卷 七十四

阿膠炒二兩 澤瀉 滑石 赤茯苓各一兩

右劉水煎空心服

關格 夫關格者謂膈中覺有物礙欲吐不升欲降不降飲食不食此為氣之橫

格也必用吐其氣之橫格必在吐也痰涎有痰以一陳湯探吐之吐中

便有降有氣虛不運者補氣藥中升降

生地黄二兩 枳實 木通 黃芩炒各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸木通煎湯送下加甘草

名導赤散

許學士云丁卒極瀉日飲水斗許不食者三月心中煩悶時已十月余朝

枳縮二陳湯

枳實一錢 砂仁七分 白茯苓 去皮貝母 去心 陳皮
蘇子 瓜蒌仁 厚朴 姜炒 香附 重便炒 川芎 八分
木香 五分 沉香 五分 甘草 三分

右剉一劑。生薑三片。水煎。入竹瀝。麝香。沉香。服。

○一陰陽關格前後不通。尋常通利大府。小便自行。中有轉胞。下症諸藥不効。夫敗則脹滿悶亂而死。予嘗以甘遂末水調敷臍下。內以甘草節煎湯飲之。及藥汁至臍。二藥相反。胞自轉矣。小便來如湧泉。此救急之良訣也。

遺溺

夫尿者。賴心腎二氣之所傳送。而流為溺。若心腎氣虛。陽氣蒸。致令膀胱傳送失度。則必有遺尿不禁之患矣。經云。膀胱不利為癃。不約。

壽世保元

戊集五卷

七十一

為遺尿也。大宜溫補。清心寧神。又有前後不順。致為癃。及小兒胞冷。俱能令入遺尿。失禁。各須隨症治之。

○一論小便不禁。出而不覺者。是有熱不禁者。有用五苓散。方見中集。依本方。去桂。加黃柏。黃芩。黃連。梔子。山茱萸。肉五味子。水煎。空心服。

○一論小便不禁。虛弱。常用五苓散。方見前集。依本方。合四物湯。方見補益。加山茱萸。肉五味子。共十。

一味。水煎。空心服。

○一治腎氣不足。小便頻數。日夜百餘次。

縮泉丸

烏藥

益智仁 各等分

右為細末。山藥。糊為丸。如梧子。大每服七十丸。空心。鹽湯下。
○一治遺尿不禁。

雞胫胫 丁貝并鴨 水洗男用雞胫 女用雞胫 右為細末。每服二錢。空心。滾白湯調下。二三服。即愈。

○一治遺尿失禁。

益智仁七個。桑螵蛸七個。為末。酒調服。用熟白果七個。送下。

○一治夜多小便。

益智仁二十四個。研碎。入鹽。同煎服。

○一治小便多者。

葶藶散。煎服之。永不夜起。

○一治夜多小便。

用胡桃。反火。煨熟。臨臥。溫酒調下。

○一治小便。內虛熱者。頻數不禁。

用六味地黃丸。服効。

○一氣不足。脈微。而瀉。小便頻數。用小茴香。不拘多少。同鹽炒。為末。取糯

米糕。下片。夜飲。煎。服。立効。

○一治小便頻數。用猪尿胞。洗淨。以糯米。煮爛。入椒。少許。同煮。去米。只取

胞。切。乾。用。

○一治小便遺尿。失禁。多是氣虛。以益氣湯。去柴胡。加茯苓。熟地。黃肉。桂

益智仁。

○一治小便頻數。或勞而益。甚。屬脾氣虛弱。以益氣湯。加山藥。五味子。

○一論身體虛弱。夜常遺尿。失禁。

人參 八分 白朮 一錢 山藥 一錢 益智仁 七分 山茱萸 六分

當歸 一錢 白芍 一錢 黃芪 一錢 酸棗仁 七分 甘草 四分

右剉。作。一劑。水煎。服。

○一論遺尿。失禁。身體虛弱。補中益氣湯。方見內傷。依本方。去柴胡。加山藥。一錢。益智仁。七分。山茱萸。肉。七分。白芍。酒炒。一錢。酸棗仁。炒。七分。

○一人因勞發熱小便自遺或時不利余作所火陰挺不能約制午前用補中益氣加山藥黃柏知母午後服地黃丸月餘諸症悉愈此症若服燥劑而頻數或不利用四物麥門五味甘草若數而黃用四物加山藥黃柏知母五味麥門若肺虛而短少用補中益氣加山藥麥門若陰挺痿痺而頻數用地黃丸而愈。

○一論腎與膀胱俱虛氣衰之不能約制故遺尿不約或睡中自出加味地黃丸

懷生地黃酒蒸四兩 懷山藥二兩 牡丹皮一兩五錢
 白茯苓一兩 山茱萸酒洗去核 破故布炒二兩
 益智仁一兩 人參一兩 肉桂五錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服百九空心煎湯下
 ○一論小便內起泡盈相此腎氣衰也用紅雞冠花為末每服三錢空心酒調下

壽世保元 成集五卷 七十七

小便閉

小便不通由膀胱與腎俱有熱故也腎主水膀胱為津液之府此二經表裏而水行於小腸入胞者為小便腎與膀胱既熱熱入於胞熱氣太盛故結澀令小便不通小腹脹滿氣急甚者水氣上逆令心急腹滿乃至於死診其脈緊而滑直者不得小便也

○一論膀胱有熱小便閉而不通也

尊水散

當歸	藟麥	車前子	滑石	赤茯苓
澤瀉	猪苓	木通	石蓮子去殼	山梔子
黃連	黃柏酒炒	知母酒炒	甘草	

右剉燈草煎空心溫服

○一論小便不通百法不能奏效服此無不愈

禹功散

陳皮 半夏姜製 赤茯苓 猪苓 澤瀉
 白木沙 木通 條苓 山梔子炒 絡升麻三分
 甘草二分

右剉一劑水二鍾煎至一鍾不拘時服少時以鷄翎蘸痰吐之得涎而止妙在吐涎之滴水之器閉其上竅則涎之則水通流淡矣

○一論小便不通脈細故也期朝不通便令人嘔名曰關格又曰不通而危矣一見嘔症便不可救經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立滅危此之謂也

○一論小便閉塞用藥過多而不通者是元氣虛而不能輸化也以補中益氣湯主之

○一論小便淋瀝不通以六味丸倍茯苓澤瀉

○一論小便不通先將麝香半分填患人臍中上用葱白用燻各搗爛成

壽世保元 成集五卷 七十八

餅封于臍上用布帶縛住良久以下用皂莢燒煙薰入陰中其水竅自起婦人亦用皂莢煎湯熏洗便處即通

○一論小便不通膀胱熱者 朴硝為細末每服二錢七茴香煎酒調下

○一論小便不通腹脹 土蘇黎炒黃為末黃酒調下

○一論小便不通用猪膽投熱酒中服之立通

又方用蚯蚓研以冷水濃煎服半碗立通大能惡疾不知人事欲飲者服之立效

○一論小便不通臍下滿悶者 海金沙一兩 臘茶五錢

本為細末每服三錢生薑甘草稍煎湯調下

○一論小便不通兩尺脈俱沉微乃陰虛故也出服通淋藥安之藥不効

大附子一枚重二兩者炮去皮臍鹽水浸溼湯兩味剉碎四劑每服水二盞燈心七根煎食遠服

一論小便不通腫喘嗽用補中益氣湯金匱腎氣丸兼服

一治小便不通服涼藥過多服滿幾死以附子理中湯加琥珀末

一婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息以附子下民不得溺故致此病名曰轉脬但利小便則愈八味丸主之方見補益

一治男子消渴小便反多婦人轉脬小便不通宜服八味丸○又治婦人陰冷

立齋云治老人陰痿思色精不出內敗小便道澀痛如淋八味丸加車前子牛膝

若老人精已竭而復耗之木小便壅滯愈痛愈急愈便則愈痛此藥最效

八味丸見補益

一治小便不通用瞿麥一箇焙熟嚼吃黃酒送下立通

壽世保元

戊集五卷

七十九

一治小便不通并傷寒雜症而不可以藥通利者用此藥立通

皮硝煎化用青布蘸水搭膝上并小便上熱則易之

一治小便不通已經七八日通身手足腫滿諸醫罔效余以皮硝煎湯入木脚盆內令病人坐上薰蒸冷則添滾湯外用鹽炒熱膠上覆身

腫處良久便通腫消而愈

一治小便不通小腹脹滿不愈治即殺入

連根葱白一斤搗爛炒熱以布裹分作兩處更替熨臍下即通如

麝香丸妙

一治小便不通諸藥無效或轉胞至死此法用之小便自出

猪尿胞一箇傾出尿用鷄毛筒去頭尾插入窠孔內線扎定以口火

氣令滿胞用線管下再扎住將管口放在小便頭上可數孔解後下線手搓其氣透裏自然小便即出功

大便閉

脈多沉伏而結陽結脈沉實而數陰結脈伏而遲或結者人虛人便結脈雀啄者不治

天陰陽二氣貴乎不偏然後津液流通腸胃調益則傳送如經矣每至

理三焦氣滯運轉不行遂成閉結之患其患有五日風閉氣閉熱閉寒

閉濕閉是也更有發汗利小便及婦人產後亡血走耗津液往往皆能

令人閉結燥則順之滋則活之閉則通之寒則溫之熱則清之此則一

定之法也

一論大腸實熱大便閉結不通用大黃皮硝牙皂三味各等分木煎一服立通

又方用大黃末三錢皮硝五錢用好燒酒一碗泡名服之立通

又方用皮硝五錢熱酒化開送下為加香油三四茶匙隨服立通

壽世保元

戊集五卷

八十一

一論凡大便閉結不通上瀉下利不閉者須從後通

在幽門以辛潤之專治大腸血少結燥不通

潤腸湯 通幽湯去大黃火麻仁

當歸稍五分 生地黃二錢 熟地黃二錢 枳仁五分

紅花五分 升麻一錢 火麻仁一錢 大黃一錢

甘草五分

右剉水煎去渣調檳榔末二錢稍溫服

一論大便閉結至極昏不知人事用大田螺三枚以鹽丁小撮和定

生搗碎置病人臍下寸三分用寬帛繫繫之即通

一論大便閉結

導氣丸 木香 檳榔 火麻仁 枳殼

右將枳殼每箇切作四片用不蛀身用三寸生薑五片巴豆三枚略搗

碎不去殼油用米一盞將枳殼同煮熟去三味不用只將枳殼剉細焙乾為末入前三味末煉蜜為丸蜜湯下不拘時服

一治大便不通

烏柏木方停一吋劈破以水煎取小半盞服之立通不用多喫極難

一人大小便閉數日不通用商陸搗爛敷臍上立通

一論自汗大便秘結不通且便於老人并日久之不能服藥者

蜜導法

蜜煉如飴乘熱然如指長一吋兩頭如銳納谷道中良久下燥糞若加皂角末少許更効

香油導法

用竹管蘸葱汁深入大便內以香油一半溫米一半同入豬尿胞內燃入竹管將病人倒放脚向上立時即通

一論自汗小便便利而大便燥硬不可攻以此方導之

壽世保元

尺集五卷

八十一

豬膽導法

豬膽一枚傾去一小半仍入好醋在內用竹管相接套入谷道中以手指撚之令膽汁直射入內少許即通蓋酸苦益陰以潤燥也

一論大便不通并傷寒雜症用藥不行者

粟米水煮至熟入大麻仁微炒不拘多少入粥內再煮一二沸飲湯即通

一論虛弱老人大便必澀不通

潤腸丸

杏仁炒去 枳殼炒去 大麻仁炒 陳皮炒 阿膠炒

防風各二分 右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五十九白湯送下

一老儒素有風熱飲食如常大便十七日不通肚腹不脹兩尺脈洪大而虛此陰火內燥津液用六味丸二十餘劑至三十二日始欲用豬

膽潤而通利如常

一婦人年七十有二痰喘內熱大便不通兩月不寐脈洪大重按微細此屬肝肺腎虧損朝用六味丸夕用逍遙散各三十餘劑許所進飲食百餘碗腹始痞悶乃以豬膽汁導而通之用十全大補調理而去若聞前藥飲食不進諸症復作

一治老人大便閉澀連日不通

大麻仁一盞半研水浸取汁芝麻半盞炒研水浸取汁荆芥穗一兩推仁去皮尖炒研一兩入鹽少許同煎服之立効

活血潤燥丸

當歸酒洗 懷生地黃一兩 懷熟地黃一兩 大麻仁一兩 枳殼炒 杏仁去皮尖 右為細末煉蜜為丸如梧子大每服七十九空心溫水送下

壽世保元

尺集五卷

八十二

一治大便不通

大黃 皮硝 牙皂 右三味各等分水煎一服立通

二便閉

一論大小便不通關格不利燒皂角細研粥飲下三錢立通

一方用不蛀皂角安瓦上燒着置馬桶內坐上薰其蒸門自通

二便閉結甚難醫急炒鹽來塞滿臍蒜片攤鹽堆艾熨利便良法少人知

一論葱豉餅專治老人大小便不通

生薑半兩 葱白根葉一盞 豆豉三十粒 右搗爛安臍中須烘熱臍中以帛扎定良久氣透即通或再換一餅又方用蜂蜜一鍾入皮硝二錢滾湯一茶鍾化下

○一治大小便不通

明礬末一匙安臍中。冷水滴之。冷透腹內。自然通。如疔管灸無腫孔。即於灸盤上用帛作圈子。籠灸盤。在內仍以水滴之。若灸無瘻。以鹽燒過。入臍內。蒜片上灸之。

○一論關格脹滿。大小便不通。

獨蒜燒熟。去皮。綿裹納下部。氣立通。冷即易。脹滿不能服藥者。用之。

○一論大小便不通者。此氣閉也。

鐵脚丸

皂角去皮。子炙。不拘多少。為細末。酒打。麩糊為丸。如梧子大。每服三十丸。酒送下。

○一論大小便不通。此方治之。殊効。

蝸牛膏

用蝸牛三枚。去殼。搗為泥。加麝香少許。納臍中。以手揉按。即立通。

壽世保元

庚集五卷

八三

用田螺亦可

○一治大小便不通

六七月間。尋手糞中有大蛻。不拘多少。用線串起。陰乾。收貯。用時。取一箇。要全者。放淨磚上。四面以炭火烘乾。以刀從腰切斷。如大便閉。用上半截。小便閉。用下半截。各為細末。新汲水調服。二便俱閉者。則全用之。

○一治大小便不通

猪牙皂角末。猪膽汁調。竹管吹入。糞門。○小便不通。葱湯吹入。口。愈。

○一人大小便不通。十餘日。腹脹欲死。諸醫用。硝黃牽巴等藥。罔効。予以冬葵子。丁劑。水煎服。立通。

○一論大小便不通。聖危者

聖危散

苦瓜蒂 五錢 川烏炮

草烏炮

香白芷

牙皂炮

細辛各三錢 胡椒一錢 麝香少許

右為細末。用小竹筒。將藥少許。吹入臍內。即通。神速。

○一論臍腑實熱。或小便不通。或大便不通。或大小便俱不通。顛倒散

大黃六錢 滑石三錢 皂角三錢

右為細末。溫酒送下。如大便不通。依前分兩。如小便不通。黃三石六角。如前如大小便俱不通。黃石均分。角亦如前。

○一治大小便不通。百方不効。肚腹脹痛。咽喉塞。或痰壅。感氣。傷寒。結胸。臥不側床。水米不下。死在須臾。此關門氣閉不通。用甘遂五分。炒。聚火煨熟。取出。為末。入麝香三厘。用飯搗為丸。淡姜湯下。立通。或小便不通。或大便不通。或大小便俱不通者。皆効。

痔漏

壽世保元

庚集五卷

全四

痔漏小竅。易治。浮洪而軟弱者。難愈。

夫痔漏之原。由乎酒色過度。濕熱而生。或平歲。濕注于經絡。遂至谷道之左右。衝突為痔。久而成漏。者。也。痔輕而漏重。瘻貫而漏。治痔之法。不過涼血清熱而已。至於治漏。初則宜涼血清熱。久則宜滋養殺蟲。而兼平溫散也。或曰。痔漏。是根源。何故而用溫溫。殊不知。痔止。出血。始。終。是熱。漏流膿水。始。是濕熱。終。是濕寒。不用溫藥。何以去濕。而散寒。乎。非正痔漏。百病中。多有始熱而終寒者。如渴瀉。如嘔吐。初作。則腸胃氣實而熱。久作。則腸胃氣虛而為寒矣。

○一論痔瘡腫痛。初起立效。

祛風辟毒湯

黃連一錢 黃芩一錢 連翹五錢 赤芍一錢 枳殼一錢

大黃酒蒸五分 苦參一錢 黃柏一錢 槐花一錢

右剉。水煎。空心服。為末。水丸。用溫水下亦可。

○一論內經曰二陰皆屬腎雖見症於太腸實陰虛而火盛也
祛毒養榮湯

當歸一錢 芍藥二錢 生地黃酒洗 黃連酒炒一錢
黃芩一錢 黃柏酒炒 知母一錢 連翹一錢
升麻五分 荊芥一錢 槐角二錢 皂角子二錢
皂角刺二錢 天花粉二錢 黃芪一錢 人參七分
甘草節一錢

右剉一劑水煎空心熱服遠酒色則全愈

○一論千金不換刀圭散治痔漏百發百中左見中風

濟生蓮蓬散

蓮蓬焙一兩 當歸五錢 五倍子五錢 黃連五錢
乳香五錢 沒藥五錢 礬紅四錢 錦紋大黃一兩

壽世保元

戊集五卷

八五

黑頭末炒一兩

右共丸味為細末欲服藥前一白勿食晚飯次日空心用淡猪肉汁一
鍾好酒一鍾半和猪肉汁前秤藥一錢二分調服午後于淨黃土上疎
宣時見出為驗或如爛杏五色相雜亦為驗矣如散藥難服用酒糊丸
如葶豆大每服一錢五分淡猪肉湯下此方神效不可輕忽切忌燒酒
色慾發物魚羊肉

○一論治痔漏累驗

蝟皮丸 長葛張明山傳

刺蝟皮酒浸剉當歸酒洗二兩 槐角酒浸炒二兩
黃連酒炒二兩 地骨皮酒炒乾二兩 甘草蜜炙二兩

乳香二錢 核桃十箇內取隔三十六片

右為細末醋糊為丸如梧子大每服二千五九白湯或酒早晚一服一
月後平復神效

○一論凡人衣食豐饒思得必于飲食色慾所致及有乘酒犯房者
除根必須服此滋陰補內之藥宜戒醇酒厚味寒慾可也
腋連固腎丸

懷生地黃六兩 山藥四兩 山茱萸肉四兩 白茯苓去皮三兩
牡丹皮三兩 澤瀉二兩 黃連淨四兩 黃柏去皮四兩
知母三兩 槐角三兩 人參三兩 當歸二兩
皂角二兩 天花粉二兩

右各為細末用雄猪木賊丁長去脂油瀉藥末于內兩頭用絲線縛住
用糯米一升為飯將半熟撈起去湯將藥末藏于飯中如蒸飯之熟
待冷些取出去兩頭無藥線之腸將藥腸入淨石臼內研碎出時
渣如不粘如飯粒之好丸如梧子大曬乾每服百九空心白滾
水送下

○一論痔漏多年不瘥有神方也

壽世保元

戊集五卷

八六

收功補漏丸 臨川徐海亭驗

白茯苓去皮 赤茯苓去皮 沒藥各二兩 破故布四兩
右藥俱不犯鐵器於石臼搗成塊春秋酒浸三日夏一日冬五日取出
木籠蒸熟晒乾為末酒糊為丸如梧子大每服二十丸緩緩加至五十
丸止空心溫酒送下元當以此方加入全料大味地黃丸同作一處同
丸服治年久漏不愈者下料全愈

○一論漏瘡先須用補藥以補氣血用參芪歸木為主木劑服之外以附
子為細末津調作餅子如銅錢厚以炙多炙之漏大者炙亦大漏小
者炙亦小炙令微熟不可令痛餅乾即易之再和再炙又以補氣血
藥作膏貼之

○一論痔瘡膿血淋漓口乾作渴肺熱便血自汗盜汗以益氣湯加茯苓
半夏炮乾薑脾胃動後用六味丸兼進而愈

○一治蓮花痔瘡 余紹坤得效

黃連三錢 烏梅三十 大黃三錢 穿山甲 炒三錢

右剉丁剉水煎空心溫服
補遺

○一治痔漏熱症有瘀血作痛取出瘀物通利大小腸
川芎 白芷 赤芍 枳殼 阿膠 炒
莪朮 生地黃 扶神 木通 五靈脂
批仁 大黃 白茯苓 甘草

右剉一劑生薑三片蜜二匙水煎食前服以利為度

○治痔漏脫肛便血方
川黃連 多用酒浸約二 枳殼 去穢 炒
防風 去蘆 二兩 當歸 全用 四兩

右四味為細末以前浸黃連酒和麵糊為丸如梧桐子大每服七八十丸空心米飲或沸湯送下已煎炒酒麴羊鵝魚腥之物

壽世保元 戊集五卷 八十一

生肌散 五倍子 炒黃色 乳香 沒藥 孩兒茶 各一錢 白礬 五分

右為細末每次用竹管吹入漏瘡口內

○一治痔瘻道中蟲痒不止用赤銀葉膏各二兩同研相和然如棗形狀薄綿片裹內下部明白蟲出若痛者如用三分作先

融氣

大香散 肉肉秘傳 琥珀 乳香 各一錢 白膠香 三錢 白芷 二錢 當歸 蛤粉 五分 枯礬 三錢 密陀僧 五錢

右為細末洗淨腋下每日擦之有加銅線者

○一治瘡氣方

蜘蛛一箇生煎大者將瓦煨盡二箇一盛一盞泥封固火煨輕粉一錢枯丁一錢赤石脂一錢先服通藥後用自已小便洗以此擦之

○一治體氣并口齒惡臭方
丁香 五錢 藿香葉 零零香 甘松 各三兩 香附 白芷 當歸 桂心 檳榔 益智仁 各一兩 白豆蔻 去壳 麝香 五分

右為細末煉蜜為丸枳子下九如梧子大每嚼五丸至下且身體馨香

○一治體氣方
枯礬 一錢 輕粉 二分 蛤粉 二錢 密陀僧 五分

右為細末研勻每以少許擦之

○一治服氣方
烏龍丸 當歸 酒洗 懷生地 二兩 白茯苓 去皮 甘枸杞子 炒一兩

壽世保元 戊集五卷 八十二

石蓮肉 炒一兩 蓮蓬 五錢 丁香 三錢 木香 五錢 青木香 五錢 乳香 五錢 京墨 五錢 水片 一分 五厘

右為細末用陳米飯荷葉包燒過搗爛入地黃為丸如黃豆大麝香一分黃酒化為衣每服三四十九丸臨臥半飽用砂仁一二分炒入酒內送下婦人加烏藥醋炒三錢香附米童便炒三錢

收功後藥 人參 當歸 生地黃 乳香 沒藥 官桂 木香 各一錢 麝香 酒浸 用青皮 陳皮 白芷 良姜 麻黃 米殼 甘草 各一錢

右剉木煎服出汚外用枯礬川椒各一兩為末擦腋下終身忌鹹魚羊肉去大小便不可與女人同廁

○一治胡臭神方

真礬粉研細先用酒洗淨次擦上藥立除每三日擦一次擦一月

而斷根何以知其然也其患人多患油耳若病根一去則油耳自乾此為驗也

○一治腋氣五更時用猪精肉二天片以甘遂末二兩拌之按腋下至天明以生甘草二兩煎湯飲之良久瀉出穢物類在腋間之處則可惡穢氣傳入故也依法三五次即愈虛弱者則自為之其他密陀僧胡粉之類皆寒藥以治其本耳

○一治體氣秘方專治五膈五噎痞塞諸虛百損五勞七傷體氣日氣類氣一切諸般臭氣初服一二百體遍香若常服身體康健壯陽滋腎補益丹田其功不可盡述

透體異香丸

沉香

木香

丁香

藿香

沒藥

甘松

縮砂

丁皮

官桂

白芷

零荳香

細茶

香附子

孩兒茶

白豆蔻

壽世保元

成集五卷

九十九

檳榔

人參各一兩 乳香

檀香

三奈

細辛

益智仁 當歸

川芎

烏藥各五錢

麝香

朝腦各一錢薄荷一兩

右先將大粉草半斤剉片水煎去渣將汁熬成膏將前藥為末煉蜜為膏搗和為丸如芡實大清晨噙化下九黃酒送下忌生冷毒物解之

沐浴方

防風

荆芥

細辛

當歸

羌活

獨活

皂角

藿香

白芷

藁本

番白草

水紅花

川芎

甘松

右剉水煎沐浴令入香肌膚去風癬

脫肛

脫肛小而緩者易愈

夫脫肛者乃虛寒下脫其病或因腸風痔漏久服寒涼坐勞而下脫或因久痢裏急後重迫而脫也又有產婦用力過多及小兒啼號努氣久痢不止風邪襲虛而脫也

夫脫肛者肝門番出也蓋肺與大腸為表裏肝者大腸之門肺者肝之門結痔寒則脫出醫主大便故肺腎虛者多有此症若大腸濕熱用升陽除濕湯若血熱用四物加祿麥槐花血虛四物加白朮茯苓麥芽加黃連槐花升麻鹿膠用補中益氣湯加芍藥歸身六味地黃丸主之

升陽除濕湯 自下而上者引而竭之
升麻 柴胡 防風 猪苓 澤瀉
蒼朮 陳皮 神麴 麥芽 甘草
右剉水煎空心溫服○胃寒腸鳴加益智半夏
○一論脫肛乃脾肺虛寒下脫肛門翻出也
提乳散

壽世保元

成集五卷

九十九

黃芪蜜炒

人參

白朮

當歸身

白芍炒

乾薑炒

柴胡

升麻

羌活

炙甘草

右剉水煎服

洗法

用五倍子三錢白礬一塊水煎溫洗以芭蕉葉或荷葉緩緩托之

○一方以蜘蛛七箇燒有性為末每少許香油調付

○一方以死龍頭一枚燒令烟盡搗末敷上以手按按之

○一方以烏龍尾即梁上塵灰同鼠糞和之燒烟於桶內令坐其上薰之數遍即止不脫為效

○一治太便脫肛翻出腫痛

有茨生栢樹子川黃連各二兩以酒二壺每早空心服

○一論脫肛者肛門翻出虛寒脫出也益氣湯去柴胡加生地白芍茯苓

枯梗炒乾...

一治脫肛氣熱者宜

能勝五分 牛膝一分 孩兒茶二分

右為末以入乳調搽肛上熱汗自下而肛收矣

百虫

脉沉實者生，虛大者死。尺脉沉而滑者為白蟲。凡飲食積滯，服藥不效者，生助急者死。

外臺云：蟲脈當沉弱而弦，今反洪大，即知蛔蟲甚也。

九蟲形狀

一曰伏蟲長四寸，為羣蟲之長。

二曰蛟蟲，又曰長蟲，動則吐清水，出則心痛，其心則殺入。

三曰白蟲，長一丈，又曰寸白蟲，相生子孫，轉大長至四五寸，或兩寸許。

壽世保元

戊集五卷

九十一

弱而動或因食甘肥不節，其動則腹痛，發作時，去來上下，痛在積息，亦攻心，痛口喜吐涎，及吐清水，黃傷心者死。

四曰肉蟲，狀如爛杏，令人煩滿。

五曰肺蟲，狀如蠶，令人嗽而聲嘶。

六曰胃蟲，狀如蝦蟆，令人嘔逆吐酸。

七曰弱蟲，狀如瓜瓣，又名隔蟲，令人多睡。

八曰赤蟲，狀如生肉，令人腸鳴。

九曰蟻蟲，形如細微，狀如菜蟲，居洞腸之間，因臟腑虛弱而致發，動則為痔，為疥癩，因入瘡處，以生諸癰疽瘰癧，滿疥，無所不為。

殺道蟲者，由胃弱腸虛而蟻蟲下乘也。殺道肛門大腸之候，蟻蟲在九竅之內，下蟲也在於腸間，若臟腑氣爽則不妄動，胃弱腸虛則蟻蟲乘之。輕者或痒或蟲從谷道中滋出，重者侵於肛門，瘡爛。一論諸般痞積，面色瘡黃，肌羸瘦，四肢無力，皆緣內有蟲積，或好食。

生米或好食壁泥，或好食茶炭鹹辣等物者，是蟲積，只此一服除。

青皮 去穢 陳皮 三稜 醋炒 莪朮 醋炒 香附

益智仁 藿香 官桂 桔梗 大黃

檳榔 甘草

右對水煎露一宿，五更空心溫服，不得少飲食，不然則藥力減，而蟲積不行矣。服藥頃，肚腹必疼，泄下如魚凍，或長蟲或血，驚至日午，蟲相下盡，方用溫粥止之，後服退黃九一料全愈。

退黃九 平胃散六兩 綠礬一兩

右用醋糊為丸，如梧子大，每服六十九，棗湯送下。忌生冷發氣熱等物。

萬應九 治諸蟲

右為細末，用苦練根皮一斤，皂角不蛀者十斤，用和一大碗煎成膏，攪和前三味藥為丸，如梧子大，外用沉香木香雷丸各二兩，為細末，先用沉香為衣，後用木香雷丸為衣，每服三九，四更時分，用沙糖水送下。

一論，小兒諸蟲，生蟲不時啼哭嘔吐清水，肚腹脹痛，唇口紫黑，腸鳴，化蟲丸。

青黛 蘆香 胡黃連 蕪荑仁 蝦蟆虎屎

川芎 白芷 各五分

右為細末，豬膽汁浸蒸，蒸九如麻子大，每服二十九，食後臥時，杏仁湯送下。

○一治下部生蟲其肛爛見五臟便死。

艾葉入雄黃末入管中薰下部令烟入即愈。

○一治下部蟲痒木槲蒸取管以水銀和檢長三寸以綿裹宿納下部中明日蟲皆出又治痔瘡。

○一治蟲已蝕下部肛盡腸穿者取長股蝦蟆背者下極雞骨下分燒為灰合吹下部令深大效。

○一論婦人陰中生瘡如蟲咬痛用。

樵葉搗爛綿裹納陰戶中下日換三次即愈。

○一論婦人陰蝕瘡陰戶中有細蟲其痒不可當食入臟腑即死令入發寒熱與發症相似用。

猪肝切作木片以花椒葱拌猪油煎乾待冷納陰戶中少頃取出換下片其蟲入肝盡出再用後方洗之。

洗桐散

壽世保元

戊集五卷

卷三

五倍子

花椒

蛇床子

苦參

白礬

葱各等分

右水煎薰洗神效。

新刊醫林狀元壽世保元戊集五卷

新刊醫林狀元壽世保元已集卷之六

大醫院吏目金裕雲林龔廷隆子才編

龔廷國 龔安國 龔安國 龔安國

南雍太學生蓋印周文卿光齋堂鐫

頭痛

脈頭痛短滑應須死浮滑風痰必易除寸口緊急或短或浮或弦皆主頭痛。夫頭者諸陽所聚之處也諸陰至頭而還惟足厥陰有絡上頭至額頂其脈浮索弦長洪大者屬風熱痰火而致也其脈微弱虛濡者屬氣血兩虛必丹田竭而髓海空為難治也甚有真頭痛者脈無神而腦中發嘔痛其心神煩亂為真頭痛也且發夕死夕發旦死蓋頭痛暴起者如涼塞發熱惡寒乃感冒所致也其曰頭痛者有虛有火有痰厥頭痛者有

壽世保元

已集六卷

偏有正益左邊宜小柴胡湯加川芎當歸防風羌活其偏於右邊頭痛者補中益氣湯加白芷獨活蔓荊子酒蒸其肩稜處痛者二陳湯加酒炒片苓羌活薄荷其腦頂痛者宜入參敗毒散加川芎藁本酒炒黃柏木瓜紅花酒炒大黃。

○一論一切頭痛主方不問左右偏正新久皆效。

清上蠲痛湯

當歸酒洗一錢 小川芎一錢 白芷一錢 細辛三分

羌活一錢 獨活一錢 防風一錢 菊花五分

蔓荊子五分 蒼朮一錢 片苓酒炒一錢 麥門冬一錢

甘草生三分

右剉一劑生薑煎服。

一左邊痛者加紅花七分柴胡一錢草龍膽酒洗七分生地黃一錢

一右邊痛者加黃芪一錢乾葛八分

一正額上眉稜骨痛甚者食積痰壅用天麻五分半夏一錢山查一錢

枳實一錢

一當頭頂痛者加藥本一錢大黃一錢酒洗

一風入腦髓而痛者加麥門冬一錢蒼耳子一錢木瓜荆芥各五分

一氣血兩虛常有自汗加黃芪一錢五分人參白芍生地黃各一錢

一論年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭

痛頭眩目暈心忪煩熱百節酸疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚

癢痒面上遊風狀若蟻行及一切頭風兼療婦人血風攻注頭目昏痛

並皆治之

追風散

防風去蘆一兩荆芥穗一兩羌活五錢川芎一兩

白芷五錢全蝎去毒尾天麻五錢白僵蠶一兩炒

白附子炮五錢石膏煨一兩天南星炮一兩川烏炮去皮天

壽世保元

草烏炮去毒地龍五錢雄黃二錢五分乳香二錢五分

沒藥二錢五分甘草炙一兩

右為細末每服五分茶湯調食後臨臥服清頭目利咽喉消風化痰

○一論痰厥頭痛其症眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無方以言心神

顛倒目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安

臥此乃胃氣虛損停痰而致也

半夏白朮天麻湯

黃柏酒洗一分乾薑炒二分澤瀉

天麻黃芪蜜炒人參

神麩炒白朮去蘆炒麥芽炒

陳皮各七分半

右剉生薑三片水煎熱服可下劑而愈

○一論頭痛偏左者屬血虛火盛也

加味四物湯

當歸川芎生地黃黃柏酒炒知母酒炒

蔓荆子黃芩酒炒黃連酒炒梔子炒藥本各等分

右剉一劑水煎溫服○風感加防風荆芥

○一論頭痛偏右者屬痰與氣虛也

黃芪益氣湯

黃芪蜜炒人參白朮去蘆陳皮半夏姜汁炒

當歸酒洗川芎藥本甘草炙各五分升麻

黃柏酒炒細辛各三分

右剉一劑薑棗煎服

○一論頭左右俱痛者氣血兩虛也

調中益氣湯黃芪蜜炒人參甘草炙蒼朮米泔浸川芎各六分

壽世保元

升麻柴胡陳皮黃柏酒炒蔓荆子各三分

當歸六分細辛二分

右剉水煎溫服

○一論偏正頭風一切頭痛諸風眩暈頭目昏重

都梁丸香白芷切碎晒乾為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸荆芥點膜

茶細嚼下

○一論眉稜骨痛者風熱并痰也

選奇湯

羌活防風各二錢酒片苓一錢五分冬月不

半夏姜汁炒甘草一錢夏月

右剉一劑水煎食後服

○一論雷頭風者頭痛而起核塊也頭面疼痛憎寒發熱約急狀如傷寒

升麻湯

升麻

蒼朮 米泔浸 薄荷葉各等分

右剉水煎服

○一譚侍御但頭痛即吐清水不拘冬夏吃薑便止已三年矣余作中氣虛寒用六君子加當歸黃芪木香炮薑而瘥

○一論頸項強急筋痛不能回顧者

烏藥順氣散加羌活獨活木瓜

○一治偏正頭痛頭風

羌活

白芷

細辛

川芎

蔓荊子

薄荷

防風

甘草各等分

右為細末每服二三茶匙白湯調下

○一人頭痛發熱眩暈喘急痰涎壅盛小便頻數口乾引飲適古生刺繡做如荔枝然下唇里裂面俱赤煩燥不寐或時寒間如烟火上衝急

壽世保元

已集六卷

四

飲涼茶少解已至于死脉洪大而無倫且有方捫其身烙手此腎經虛火遊行于外投以十全大補加山茱澤瀉牡丹山藥麥門五味附子一

鐘熟睡良久脉症略減三四再以八味丸服之諸症悉退後地珍物

○一治頭風腫痛偏正不拘

用艾槌爛鋪布上將快捲成筒次將黃蠟溶化灌入筒內以瀉為度

如左邊疼將藥燒烟入右耳右邊左即安

○一論半邊頭痛

祛痛膏

防風

羌活

藜蘆

細辛

菊花各五分

南星

草烏

白芷各

錢

右為末用蓮蓬慈丁把洗淨同煎藥搗成膏銅鍋頓熱草烏木小以油

搗藥貼痛處周圍以生麵糊封之再用乾帕包定其痛即止

○一方加菊花獨活各一錢五分草烏一錢麝香一分

鬚髮

醫者所論人鬚髮者雖皆毛類而所主五臟各異故有老而鬚白有髮不

白者或髮白而鬚眉不白者臟氣有所偏故也夫髮屬於心黑髮屬於

故上生鬚屬於腎黑髮屬於肝故則生男子鬚氣外行上

為鬚下為髮故女子官入無勢則亦無鬚而鬚髮無異於男子則知不

屬腎也明矣

婦人無鬚無血氣乎岐伯曰今婦人之生有餘于氣不足于血衝任之脉

不榮唇白故鬚不生

官者其鬚獨去其故何也曰官者傷其宗筋血泄不復皮膚故鬚不生

天官未嘗被傷其鬚不生其故何也曰天官稟賦不足宗筋不成就鬚生

天下第一烏鬚方 閣老高中玄傳

五倍子一斤擇整箇者箇箇槌破去蠶土擇粗粒如黃豆大次煎如

壽世保元

已集六卷

五

赤豆六次者如黃豆大分三樣入新鍋內炒如栗殼色以青濕布

包之以脚踏成餅晒乾為末錫罐盛貯氣實封口勿令泄氣藥用

紅銅末半斤淘去皮土見清水令乾入鐵鍋內炒大熱傾入醋醋少

半碗拌勻濕透再炒入醋七次研為末羅過以絹帛另包聽用

白礬 四兩為末

皂礬 四兩為末

白芨 四兩切片

研為細末帶包

右每遇染髮時剪鬚髮多少用藥如五倍子九錢銅末一錢八分白礬

白芨皂礬各九分再加食鹽九分共入于碗內再研極細入小銅杓內

以濃茶調如稀糊放木炭火上徐徐熬之不任手攪勻熬成稠糊

度預先以肥皂水洗淨鬚髮待乾以振子挑藥裹鬚髮上油

兜住外用烏帕包裹至頂解衣護枕而睡至半夜驗藥將乾用手搜去

殘藥如乾括用茶油潤去藥至天明洗面擦洗鬚髮如面皮上

處以指蘸香油塗摩即用軟布擦去油時染後仍以香油少許潤之即

明黑可觀先一月染三四次後半月染一次永不落白
野狐倒上樹 尚書劉三九傳

黑鉛四兩 汞二錢

右先將鉛化成汁後入汞凝成其子剪成錢樣外用鐵絲穿作十三串
聽用再用大磁罐一箇入無蓋好醋三碗將鉛錢入罐內懸於醋上醋
醋二指內泡卷指一箇鴨嘴膽礬四錢用磁碟封口蓋之再用黃泥封
固夏月日中晒七日冬月糠火煨七日出確底摘一孔出醋不用掛起
碟來掃下藥霜來用脂皮包住收之臨用藥時將髮用溫水洗淨就
濕再用脂皮包手指拍藥霜粘在髮上自然黑到根神效切忌香肥
皂水洗

烏鬚方 刺史周如梅傳

官粉五分 白礬三錢 白石灰二錢 樟腦二分
麝香一分 輕粉三分 百草霜八分

壽世保元

已集六卷

六

水銀一錢先將銀一錢在開入水銀結成砂子
右為末用鹹水和放滾塗髮上燒半炷香即洗去

青雲獨步丹 烏鬚髮延年益壽

赤白何首烏 共三斤用黑豆二升洗淨浸首烏一晝夜去汁水將
豆搗碎與首烏同煎乾內熟地五錢

赤茯苓 半斤用牛乳浸過者乾 白茯苓 半斤用牛乳浸過者乾
兔絲子 半斤酒浸蒸熟搗爛焙乾 當歸身 酒洗三兩

補骨脂 酒炒四兩 甘枸杞 酒浸焙三兩

懷牛膝 甘草水泡四兩 懷生地黃 酒浸入砂仁三錢同煎
真沒藥 一兩五錢去砂土

右心鐵器晒乾為末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸空心酒下午開

薑湯下臨臥薑湯下忌食白

造酒烏鬚方 本府來推府傳

懷生地黃四兩真生薑汁四兩赤白何首烏各斤新法製過地黃

小紅棗肉三兩 大當歸二兩 麥門冬兩 甘草二兩
胡椒肉三兩 蓮肉三兩 土蜜三兩

右先用酒洗淨地黃將何首烏水去渣入地黃黃後乾再用薑汁水燉
乾為度便將地黃搗爛以一官斗糯米水十斤作酒麴藥加常候酒
漿來方以水調勻地黃入酒糟內過三日去糟將前藥切片入絹袋中
懸酒罈內等殼包封毋令出氣放鍋內煮三炷香為度後以酒罈埋土
中三宿去水毒任意飲三五杯

烏鬚秘方用龜尿 研墨塗髮烏時 要取龜尿亦有法
猪鬃刺鼻龜尿

烏鬚秘方

用馬蝗蚱尋起數條系包要用時將雞血或猪血將馬蝗入血內令
食飽針出血同龜尿同研墨塗髮上可烏一月乃烏鬚秘方也

烏鬚神妙方 本府蘇通府傳

壽世保元

已集六卷

七

五倍子 炒末一錢 白芨末八分 食鹽三分
沒石子 末三分 白礬三分 黑礬三分 細辛末三分
柯子末三分

右為細末熟茶調稀重湯煮入黑礬再煮面上生光搽髮上油底裏黑

烏鬚狐狸倒上樹 周賓崇傳自蜀中得來

山茄要極黑者收約有八九升來去蒂以夏布包洗法藥水將山茄
扭自然汁四五碗入上等好墨四五錢打碎黑礬四五錢一味俱入
山茄汁內貯新瓦罐中每用將竹片蘸藥汁于髮上自尾倒上切
莫粘肉上則洗不去了

一論烏鬚生髮良方

蒲公英四兩 血餘洗淨四兩 青鹽四兩 研

右用磁罐一箇盛蒲公英十層血餘一層青鹽一層蓋泥封固添秋
五日夏三日夜七日桑柴火煨令烟盡為度候冷取出碾為末每服一

錢侵晨酒調下。

- 一儒者因飲食勞役及惱怒鬚髮脫落余以為勞傷精血除火上炎所致用補中益氣加麥門五味及六味地黃丸加五味鬚髮頓生如故。
- 一男子年二十頂髮脫盡用六味地黃丸不數日髮生寸許兩月復舊。
- 一史萬湖云有男女偶合髮脫落無藥調治至數月後復生。

面病

難經曰入面獨能耐寒者何也蓋入頭者諸陽之會也諸陰脈皆至頭項中而還獨諸陽脈皆上至頭而足陽明胃之經起鼻交頤中入齒中俠口環唇倚頰車上耳前過客主人穴其或胃中風熱或風熱乘之令人面腫或面鼻色紫風刺癢疹或面熱面寒隨其經症而治之。

○一論面寒者陽明經虛寒也。

升麻附子湯

壽世保元

八

升麻

葛根

白芷

黃芪

大附子炮七分

人參

草豆蔻

益智仁三分炙甘草五分

右剉一劑連鬚葱白二根水煎溫服。

○一論面熱者陽明經風熱也。

升麻黃連湯

升麻

葛根各一錢白芍七分

川芎四分

薄荷

荆芥

各三分蒼朮八分半黃連酒洗五酒芥六分

犀角四分半

白芷

二分甘草五分

右剉水煎食後服。

○一論面生瘡者上焦火也。

清上防風湯

防風

一錢荆芥五分

連翹八分

山梔五分

黃連五分

黃芩

酒炒七薄荷五分

川芎七分

白芷八分

桔梗八分

枳殼五分 甘草三分

右剉一劑水煎入竹瀝同服。

○一論面唇紫黑乃陽明經不足也

升麻白芷湯

升麻

白芷各一錢芍藥

蒼朮各三分

黃芪

人參各七分葛根一錢半甘草四分

右剉一劑薑棗煎服宜早後午前取天氣上升於中使陽氣達於面也

○一論面生粉刺者肺火也

清肺飲

連翹

川芎

白芷

黃連

黃芩

荆芥

桑皮

苦參

山梔

貝母

甘草各等分

右剉水煎臨臥服

壽世保元

巳集六卷

九

○一點痣方

以巴豆七箇石灰等分爲末以鹹水搜在毒內藏獨木於巴豆石灰內候米爛將痣用針撥動以米膏點之三日不洗自然脫落

○一起字出毒方

礬石灰 紫參灰各一錢人參五錢 鹹一錢

加百草灰

辣蓼灰各一兩

右爲末水調寫字上有泥起搽去再上

○一出刺毒方

馬肉不拘多少儘冷蒼蠅作壤生蛆出晒乾爲末以針撥動青處搽藥其青自出

○一抓破面皮

用生薑自然汁調輕粉搽患處更無痕迹

○一洗面方

每早以漱口水吐在手掌中洗面久久自然光潤粉刺自消

○一治赤紅爛臉

水銀一錢 柏油蠟一錢 共搗塗之

○一治面上瘡鼻酒刺

雄黃一錢 硫黃五分 鉛粉一錢

右共為末乳汁調塗臍上敷次日溫水洗之如此三上去矣

耳病

脈兩寸脈浮洪上魚為益兩尺脈短而微或大而數皆屬陰虛法當補陰
抑陽○左寸洪數心火上炎兩尺脈洪者或數者相火上炎其入必遺
精夢與鬼交兩耳蟬鳴或聾

耳者屬腎而開竅於少陽之部通食於手三陽之間坎離交則聚氣以司
聰而善聽也關於腎而貫於腦內經曰五臟不和則九竅不通其耳鳴
耳者屬腎而開竅於少陽之部通食於手三陽之間坎離交則聚氣以司
聰而善聽也關於腎而貫於腦內經曰五臟不和則九竅不通其耳鳴

壽世保元

已集六卷

十

耳聾耳聾者皆屬腎虛水不上頭清氣不升所致也從補益門治之其
壯年及小兒耳腫耳痛耳停乃三陽風熱壅遏所致也宜升陽散火湯
加黃柏知母晚間兼服金花丸可矣 ○黃連解毒湯 大黃
○一論思慮煩心而神散精脫於下則真陰不上泥丸而氣不聚故耳鳴
耳重不聽及耳內痒

安神復元湯

黃芪蜜炒一錢 人參一錢五分 當歸酒洗一錢 柴胡一錢

升麻五分 黃連酒炒一錢 黃芩酒炒一錢 黃柏酒炒一錢

知母一錢 防風一錢 蔓荊子七箇 甘枸杞子一錢五分

麥門冬一錢 茯神一錢 小蘇一錢 酸棗仁炒一錢五分

甘草五分

右剉二劑圓眼肉三枚水煎服

○一論勞傷氣虛風聲虛聾耳鳴勞傷氣虛火鼓其聽戶也氣

聾者經氣滯塞於聽戶也風聲者風熱閉其聽戶也虛聾者氣血虛耗
而神不用也毒聾者膿血瘰癧妨於聽戶也久聾者病非一日邪氣瘴
聚也凡是聾者勢必耳鳴故總繫其耳鳴也

千金補腎丸

當歸酒洗 白芍酒炒 懷熟地黃酒蒸黃芪蜜炒

人參 白茯苓去皮木 山茱萸酒蒸去牡丹皮

澤瀉 芩絲子酒製 蛇床子 肉苁蓉

石斛 乾薑 桂心 大附子炮去皮臍

巴戟去心 遠志去心 細辛 甘草各二兩

石菖蒲一兩 防風一兩五錢 羊腎二枚 共二十三味

西園公加山藥二兩殊效

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服十五丸加至三四十丸甚湯下

○一論虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛或憂鬱痰滯喘咳

壽世保元

已集六卷

不利煩燥不寧

通明利氣湯

蒼朮蜜水炒 白朮去蘆炒 梅萸八分 陳皮蜜水浸

香附童便炒 貝母三錢 生地黃蜜汁浸 黃連酒洗

黃芩蜜水炒 黃柏酒炒 梔子仁炒二錢 玄參酒洗

木香五分 檳榔一錢 粉草炙四分

右剉二劑生薑水煎入竹瀝同服

○一論陰虛火動而耳聾或鳴者

六味地黃丸見補益 依本方加黃柏知母石菖蒲遠志去心屢驗

○一治耳鳴主方

黃連 黃芩 梔子 當歸 陳皮

膽星各一錢 龍膽草 香附各八分 玄參七分 青黛

木香各五分 乾薑三分

右剉一劑生薑三片前七分入玄明粉三分痰盛加五分食後服如作
九子加薑膏五分麝香二分為末神麴糊為丸每服五十九淡薑湯送
下如腎虛而鳴者服六味地黃丸

○一論耳主風者耳腫作痛牙關緊急乍寒乍熱飲食不下是也
射干散 苦竹吳紹源傳

升麻 桔梗 射干 昆布 連翹

甘草 右剉水煎熱服汗出立愈并治面腫牙痛咽喉痛神效

○一治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾
生烏頭一味搗得乘濕削如棗核大塞耳且易夜易不三日愈

○一論寒藥治耳聾殊效
石菖蒲一寸 巴豆一粒去壳全蝎一箇去足尾
右為末葱涎為丸如棗核大線裝塞耳即通

壽世保元

已集六卷

十二

○一論寒藥專治耳聾或因病因氣及感風邪而聾者若年老而聾者
蚯蚓去土陰乾為末七分麝香三分用葱蒜汁許塞于內左側塞
右耳右側塞左耳左右俱聾兩耳俱塞

○一治耳聾

通靈丹 安息香一分 錢五 桑螵蛸一分 錢五 阿魏一分 錢五 朱砂五分

草麻子仁 七箇 巴豆仁 七箇 獨蒜 七箇

右為細末入二仁與蒜同研為丸如棗核樣每用一丸線聚入耳內覺
微痛即去

○一論停耳生膿并黃水

紅綿散 枯白礬五分 乾胭脂粉二分 麝香少許 片腦一分
熟地甘石五分

右為末先以棉杖子展乾膿水另將鴉翎管子送藥入耳底○一方用
蚌竹粉易禁甘亦效

○一治耳空腫出膿水
用枯礬為末以筆管吹耳內日三四次或以綿絮塞耳中

○一治耳熱耳出膿汁
甘草炙 升麻 木通 赤芍 桑白皮炒

生地黃 前胡 赤茯苓 蔓荊子 甘菊花 各等分
右剉薑棗煎服

○一治人耳如蠅鳴服四物湯耳鳴甚此元氣虛損之症五更散六味
丸食前服補中益氣湯頓愈此症若血虛而有大用八珍湯加黃連

加芍歸山梔虛用補中益氣加山梔午前用四物加白木茯苓久須
用補中益氣午後甚用地黃丸

壽世保元

已集六卷

十三

○一論治人因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱腸痛用小柴胡合四物加山
梔茯苓陳皮而瘥

○一論耳鳴因虛火妄動心神不寧以益氣湯去升麻參芪加半夏茯苓
川芎白芍竹茹黃柏黃連天麻荊子細辛

○一治耳中常鳴生地黃截塞耳數易之以瘥為度○一法以黃連灰火
中煨之用良

○一治耳鳴肺火盛腎氣虛以四物湯四錢黃柏三錢童便煎空心服

○一寒婦耳內外作痛不時寒熱脈上魚際此血盛之症用小柴胡湯加
生地以抑其血而愈又項間結核如貫珠寒熱用加味歸脾湯加味逍
遙散調補肝脾而愈

六味丸方見補益補中益氣湯方見內傷八珍湯方見補益四君子湯方
見補益四物湯方見補益小柴胡湯 加味道遙散 加味歸脾湯
方俱見婦人虛勞

○一專治耳鳴耳聾，獨勝丸

川黃柏去皮，小兩入乳拌勻，煎乾，再月鹽水炒，褐色。

右為細末，水糊為丸，如梧子大，每服百丸，空心，溫湯送下。

○一治耳內腫痛，膿血出。

白礬枯末，入麝香少許，吹耳中，日三四度，或綿裹塞耳中，立癒。

○一治耳聾。

細辛為末，鎔黃蠟為丸，如鼠糞大，綿裹塞耳中，又宜灸耳前，兩中庭。

○一治氣道壅塞，兩耳聾。

用甘草，如棗核大，綿裹塞耳中，却以甘草放口內，隨嚥，又宜生葱白塞耳內，頻換，即通。

鼻病

壽世保元

七集六卷

一日

膨右手脈浮洪，而數為鼻衄，左手脈浮緩，為鼻淵。夫鼻者肺之候，時常和則吸引香臭矣。若七情內鬱，六淫外感，則鼻之過，則鼻氣不能宣調，清道壅塞，即為病也。為血為氣，為熱為寒，為虛為實，塞不通，為濁涕，不聞香臭，此皆臟腑不調，邪氣鬱於鼻，而清道壅塞矣。寒則溫之，熱則清之，塞則通之，壅則散之，可也。

○一論肺熱鼻流濁涕，塞不通，又治鼻不聞香臭，神愈散

細辛白芷與防風

羌活當歸半夏芎

桔梗茯苓陳皮輩

十般等分，剉和同

三錢，薄荷薑煎服

氣息調勻，鼻空通

○一治腦滿

防風

荆芥

獨活

連翹

藜蘆

辛夷

甘草

細辛

牙皂

石菖蒲

右剉水煎服，如數服未效，可將後藥三味為末，綿裹塞鼻內，即效。

○一論鼻流濁涕，不止者，名曰鼻淵，乃風熱在腦，傷其腦氣，腦氣不固而液自滲泄也。

養耳散

白芷一兩

辛夷仁

蒼耳炒各一錢

薄荷五錢

右剉水煎服

○一論鼻中流出臭膿，名曰腦滿

辛夷散

辛夷花一錢

黃芪一錢

人參一錢五分

當歸一錢

白芍一錢

川芎一錢

白芷一錢

細辛八分

黃芩酒炒一錢，甘草六分。右剉，一劑燈心三十根，水煎，食遠服。

○一治顏疔或鼻疔

乳香

沒藥各五分

孩兒茶一錢

雞腔脬焙黃色一錢

壽世保元

七集六卷

十五

右為末，搽患處

○一老人鼻中流涕，不乾

獨蒜四五箇，搗如泥，貼脚底心，下用布貼之，其涕再不發

○一男子酒齋鼻

雄猪膽每日早以好酒調服一箇，不過半月，如舊

○一治癩鼻，方

用硫黃為細末，甚者加草烏尾為末，以酥油調，搽患處，如癩痛，苦用，梔子煎湯服之，或洗藥處，即愈

○一論鼻赤，久不瘥，用大黃芒硝，檳榔等分，為末，水調，敷患處，三四次，洗淨，以新銀杏，去殼，嚼爛，敷於鼻上，不過五七次，復舊

○一治赤鼻

檳榔為片，將茄汁浸晒一二次，為末，面上紅腫，硫黃以乳浸滿碗，頓入湯鍋煮乾，先須用唾濕鼻，方味藥上

○一論鼻淵頭眩
清泥丸欬神湯

人參 防風 麥門冬 去心當歸頭 枯苓 酒炒
小草 黃連 酒炒 各五分 蔓荊子 八分 升麻 生甘草 各三分
明天麻 半夏 製各七分

右剉水煎食遠服。○腦漏者加蒼耳子二錢黃芪一錢

○一論鼻流涕久而不愈乃成腦漏必因虧損元陽以致外寒內熱甚則
有滴下腥臭之惡者也知保養服藥方可

加味防風湯

防風一錢 人參一錢 片苓 酒炒一錢 白芨一錢
麥門冬 錢法心 二生甘草五分 當歸頭一錢 白芍一錢
懷生地 酒洗一錢 黃柏 酒炒一錢 黃芪一錢 黃連 酒炒一錢
知母一錢 百合一錢

壽世保元

巳集六卷

十六

右剉水煎食遠溫服

○一論鼻流長流名鼻淵也

當歸 川芎 白芷 人參 白茯苓

麥門冬 防風 秦朮 荊芥 薄荷

蒼耳子 香附子 蔓荊子 甘草 各一兩 天竺黃 三錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三四十九米湯下

○一男子面白流涕不聞聲穢三年矣用補中益氣湯加麥門山梔而愈

○一論色慾太過虛損白濁鼻軌出清涕如泉湧者

補中益氣湯方具內傷依本方加黃柏知母白芷細辛藜蘆五味子白芍
辛夷蒼耳葉水煎溫服

○一論肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

川芎 白芷 細辛 藜蘆 防風
辛夷仁 木通 甘草

右剉水煎溫服

○一治鼻中肉贅鼻不可近痛不可擤以

白礬末加礬砂少許吹其上頂之化水而消與勝濕湯合瀉白散下
劑此厚味擁濕熱蒸於肺門如雨露之地突生芽菌也

○一治鼻中肉贅

用藕節有毛處下節燒灰存性為末吹患處立瘥

○一治血熱入肺名曰酒渣鼻此九主之

苦參 丹末 四兩 當歸 淨末 二兩

右和勻酒糊為丸如梧子大每服七八十九食後熱茶下

○一治鼻疳爛通鼻孔 予治陳都憲夫人患此得効

鹿角 一兩 白礬 一兩 俱放在瓦上隔火煨過

人頭髮 五錢 在燈木上燒過

右為末先用花椒湯洗淨搽藥於疳上三四次即愈如瘡不收口用尼

壽世保元

巳集六卷

十七

松燒灰存性研末乾搗之即收

○一人酒瘡鼻紅赤赤用此方晚服用六味地黃丸全料加當歸二兩苦

參四兩空心服不兩月而愈

金花丸

黃連 二兩 枯苓 二兩 黃柏 二兩 梔子 一兩

大黃 九兩 酒蒸 桔梗 二兩 白粉葛 二兩

右為細末井水丸如梧子大每服七八十九白溫水下

口舌

○左寸洪數心熱苦○右寸浮數肺熱口辛○左關弦數而虛膽虛口苦

甚洪而實肝熱口酸○右關沉實脾胃有實熱口甘兼洪數者口瘡或

為重舌木舌脈虛者中氣不足口瘡若服涼藥不愈者宜理中湯

夫口舌之為病或為重舌木舌或為糜爛生瘡之類經云肝熱則口酸心

熱則口苦，脾熱則口甘，肺熱則口辛，腎熱則口鹹，有口淡者，胃熱也。口臭者，乃腐爛腐爛之氣，蘊積於胸膈之間，而生熱，衝發於口也。口瘡者，脾氣凝滯，加之風熱，而然也。治當以清胃瀉火湯主之。此正治之法也。如服涼藥，不巳者，乃上焦虛熱，中焦虛寒，下焦陰火，各經傳變所致。當分別而治之。如發熱作渴，飲水，口瘡者，上焦虛熱也。補中益氣湯主之。如手足冷，肚腹作痛，大便不實，飲食少，思口瘡者，中焦虛寒也。附子理中湯主之。如哺熱內熱，不時而熱，作渴，痰唾，小便頻數，口瘡者，下焦陰火也。六味地黃丸主之。如食少便滑，面黃肢冷，火衰土虛也。八味丸主之。若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，若從脚起，乃無根之火也。亦用八味丸，及十全大補湯，加麥門冬、五味子，更以附子末，唾津調搽涌泉穴。若藥用涼藥，損傷生氣，為害匪輕。

○一論心肺虛熱，口瘡咽痛，膈悶，小便淋瀝不利，清金蓮赤散。

壽世保元 巳集六卷 十八

黃連 黃芩 梔子 木通 澤瀉
 生地黃 麥門冬 甘草
 右剉生薑三片，水煎，食後頓服。

○一論上焦實熱，心胃二經之火，而作口舌生瘡，腫痛，都并咽喉牙齒耳面腫痛皆効。

清胃瀉火湯

連翹 桔梗 黃連 黃芩 梔子
 玄參 升麻 生地黃 薄荷 甘草
 乾葛 七分

右剉水煎，頻頻溫服。

○一論飲酒過度，舌本強腫，言語不清，此脾虛濕熱，以益氣湯加神麩麥芽乾葛澤瀉。

○一論上焦虛熱，發熱作渴，飲食不勞，則體倦，此內傷氣血，而作口舌生瘡。

補中益氣湯方見內傷，依本方加麥門冬、五味子。

○一論中焦虛寒，手足冷，肚腹痛，大便不實，飲食少，思而作口舌生瘡，以附子理中湯方見中寒，依本方。

○一論哺熱內熱，不時而熱，作渴，痰唾，小便頻數，而作口舌生瘡者，此下焦陰火也。以六味地黃丸方見補益，依本方。

六味地黃丸方見補益，依本方。

○一論如食少便滑，面黃肢冷，如作口舌生瘡者，此火衰土虛也。以八味丸方見補益，依本方。

○一論若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，而作口舌生瘡者，若從脚起，乃無根之火也。以八味丸及十全大補湯方見補益，依本方。加麥門冬、五味子。

○一論口瘡，氣鬱，癰爛，久而不瘥者，用黃柏五錢，青黛一錢，五分，為末，每用一錢於舌上津嚥下。

壽世保元 巳集六卷 十九

○一論口瘡，用黃連、川椒等分，為末，每少許搽瘡上，當效。良久，以涼水漱，嚥咽喉有瘡，加孩兒茶。

○一治口舌生瘡，加味陰陽散。

黃連 乾薑 青黛 孩兒茶 各等分

右為末，每用少許搽瘡處，立効。

○一治口瘡良方，徐杏庄老師傳。

生白礬一錢 朱砂二分

右共為末，敷上立愈。

○一論口舌生瘡，咽喉腫痛，咳嗽痰涎，清聲潤肺，寬胸除熱。

上清丸 黃濱江傳。

百藥煎四兩 薄荷清沫四兩 砂仁二兩 訶子五錢
 桔梗五錢 甘松五錢 寒水石二兩 玄明粉五錢

礪砂五錢 片腦一錢

右為米甘草熬膏丸如梧子大每服三五丸茶清下

玄門丹

天門冬去心 麥門冬去心 玄參各等分

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸嚥化下

一人口內如無皮狀或咽喉作痛喜熱飲食此由氣虛寒而外虛熱也
用加減八味丸而愈

一人舌腫舒出口外舌者心之苗又脾之經絡連舌本故舌下其脈當
責於心脾二經經所謂熱勝則腫也月蓮子去殼碎與棗核中油炒
作擦燒烟薰之而愈本草云草麻主浮腫惡氣取油塗之葉主風腫不
仁搗蒸敷之則其能解風腫肉熱也可知矣

一人胃弱痰厥口舌生瘡彼服滾珠丸愈感反而不止惡食倦怠此胃
氣被傷也予以香砂六君子湯數劑少可再以補中益氣湯加茯苓半
夏而愈夫胃氣不足飲食不化亦能為痰補中益氣乃治痰之法也苟
虛症而用峻利之劑鮮不危哉

一人脾胃虛服養胃湯枳木丸初有效而久反虛口舌生瘡勞則愈盛
此中氣虛寒用理中湯少愈更以補中益氣湯加半夏茯苓而安夫養
胃湯香燥之劑也若飲食停滯或寒滯中焦服則燥開胃氣消滯消化
最為近理使久服則津液愈燥胃氣愈虛况胃氣本虛而用之豈不反
甚其病哉亦有房勞過度真氣衰敗或元氣不足不能上蒸中州不運
致飲食不進者以補真丸治之若丹田之火上蒸脾土脾土溢和中焦
自治飲食自進何口瘡之不愈哉

一人舌青黑有狀乃熱劇也良由思慮過度氣氣所得病者要將舌來
土壁上貼之方好予製此方即效

清心散

赤茯苓銹皮一錢 酸棗仁一錢 麥門冬去心一錢 遠志五分 水淘去心

黃連一錢 胡麻仁一錢 枳殼去穢八分 小木通八分

小甘草三分

右剉水煎溫服

一男子口臭牙齦赤爛腿膝痿軟或用黃柏等藥益甚時或口鹹此腎
經虛熱以六味丸悉愈

一治口瘡喉痛牙疼妙藥 陳上余傳

礪砂一錢 孩兒茶二分 雄黃二分 青黛一厘

玄明粉一厘 胡黃連三厘 水片一厘

右共研末擦止

一香茹治口氣甚捷蓋口臭是脾胃有鬱火溢入肺中失其清和甘美之
意而濁氣上干故也

一補舌厚方 賈蘭峰傳

香砂世保元 七 已集六卷

二二

用鮮蠟燒灰每二錢用乳香沒藥各二分半塗之即生肉如去多唇
舌用川烏草烏為末攤布一條以滾水調冷貼之即不覺痛可用刀
取如流血以陳石灰塗之愈後舌硬用白雞冠血點之即軟

一生舌方

用活蟹一箇蒸乾為末收之如遇此患敷上合口即已

一治舌上腫硬

用百草霜海益等分為末并花水調敷患處○又宜真蒲黃末頻擦
舌上內以黃連一味煎湯服以瀉心火

一治舌長過寸研木片敷之即收

一治舌無故出血如泉槐花炒為末擦之立止

一治舌忽脹出口外俗云是蜈蚣毒用雄雞冠血一小盞浸之即縮入

一活生不收名曰陽強

一舌縮不能言名曰陰強

○一男子舌常破而無皮狀或咽喉作痛服清咽利膈散愈時子以
理中湯治之乃愈

蘭唇

內經云脾氣通於口又云脾之榮在唇蓋燥則乾熱則裂風則爛寒則揭
若唇腫起白皮皸裂如蠶齒名曰齒唇有唇腫重出如肉者有本相米
大如齒如瘤者或因七情動火傷血或因心火傳脾經或因厚味積
熱傷脾太要審本病察兼症補脾氣生脾血則燥自潤火自除風自息
腫自消若患者忽略治者不察矣用清熱解毒之藥或用藥線搗去皮
反為翻花敗症矣

○一論肝經怒火風熱傳脾唇腫裂或患唇齒唇
柴胡清肝散

黃芩炒各一錢黃連一錢五分山梔七分

壽世保元

巳集六卷

二五二

當歸一錢五分川芎六分 生地黃二錢 升麻二錢五分

牡丹皮一錢五分甘草三分

右剉一劑水煎食後頓服若脾胃弱去苓連加白朮茯苓

○一論陰虛火動唇燥裂如繭

濟陰地黃丸

熟地黃酒製 山茱萸酒蒸 乾山藥 遠五味子
麥門冬去心 當歸身 肉苁蓉 甘枸杞子

甘菊花 巴戟肉各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空心白湯送下

○一論中氣傷損唇白生瘡或齒牙作疼惡寒發熱肢體倦怠食少自汗
或頭痛身熱煩燥作渴氣喘脈大而虛或微細軟弱

補中益氣湯

黃芪蜜水炒 甘草炙 一錢五分白朮去蘆

當歸 橘紅各一錢 柴胡 升麻各五分
右剉一劑水煎服

牙齒

脈石才關脈洪數或弦而洪腸胃中有風熱齒痛○尺脈洪大而虛為腎
虛主齒動搖踈豁相火上炎而痛
夫牙齒有乃骨之萃也骨乃腎主之則諸經血脈津液皆潤澤清涼矣蓋
血足則涼涼即骨堅固血虛則熱熱則齒浮動人之上唇人中之下牙
屬督脈下前齒屬任脈其兩頤上下及環口皆屬手陽明二經故牙床
屬土牙齒猶如木栽土上土涼則根固土熱則焦搖牙即骨也骨不能
痛其痛者牙齦肌肉也人食梅多者牙即齧麻痺而不能力嚼者非木

壽世保元

巳集六卷

二五三

酸制土耶其牙齦肉脫骨火也牙疎脆者骨之相火也經曰諸痛痒瘡
瘍皆屬心火緣心火之下陰精承之若承之者不承何痛之有其牙患
之名有風牙蟲牙牙疳牙宣蓋由一火之不齊也故熱則生風風字有
虫又曰血遇火則沸而出牙宜也熱兼外邪則腫痛真陰未成而熱熾
者曰疳疳乃潰爛之速凡為治者保腎水者知其本清胃火者知其標疎
風邪者知其權蓋風藥善通經開膜則是火鬱宜發之義耳修養家常
食淡些則血不凝戒慎厚味甘辛香燥則不積火治牙至藥不効時熱
之積也蓋因縱然而陰虛嗜味以爲補而益增其火其目下嗜慾之節
乃為移邊晚景不甚苦於牙也真陽明火多者易作牙病也凡用椒姜
巴豆薑櫞性熱辣者擦而定痛雖快於一時實乃資邪益深矣戒之戒
之其小兒牙疳牙痛者慈以甘嗜以味而不知節厚其衣重其緜而不
知搗乳兒作疳者母之遺熱也烘焙純綿夜煖圖於睡寐况其陰
未成所以為害甚也固不可不留心究明於斯矣○經云腎衰則齒齕

精固則齒堅

○一論一切牙齒腫痛皆屬胃經火盛多是辛熱厚味及服溫暖之藥過多以致胃熱上下牙痛牽引頭腦面熱其齒喜冷惡熱者加味清胃散

當歸尾 生地黃 牡丹皮 升麻 黃連
加防風 荊芥 軟石膏各等分

右剉水煎服
若牙齦腫痛者加防風白芷羌活細辛
若牙齦脫而血出者加扁柏葉黃芩荊芥梔子
若虛損人牙痛者加黃柏知母人參甘草
若滿口浮而痛不能力嚼者加連翹玄參芍藥
小兒牙疳者乳母服加天花粉玄參白芷
醇酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛連頭面頸項作痛者並加犀角連翹

壽世保元

已集六卷

二十四

甘草○胃寒齒痛加草豆豉細辛防風羊脛骨灰去牡丹皮
○一論胃得實熱齒痛或上片痛尤甚者

涼膈飲
連翹 梔子 大黃 酒蒸為世硝 黃芩
薄荷 知母 升麻 石膏 黃連
甘草各等分

右剉水煎服
○一論風牙疼痛
草烏二錢米泔水細辛一錢
白殭蠶五條炒 水片一分
全蝎稍五錢洗去燥

右研勻搽患處開口流涎內服清胃散

○一治牙風腫痛
涼牙散

軟石膏一兩 川烏三錢 草烏三錢 花椒三錢

右俱生用為末擦牙漱口吐之即愈
○一陳省齋遇一道人治牙痛如神
巴豆去壳三枚真川椒七粒
右先將川椒略焙為末次入巴豆同研極爛入穀米飯此須搗研為末
丸如黍米大每用一丸貼痛處

○一陳恕軒治牙痛不可忍者
花椒炒 胡椒 白礬半生半枯食鹽炒

右各為末合和同研每少許擦痛處吐涎即止
○一治風冷齒痛
白芷 細辛 良薑 萹撥 川椒
香附 蜂房炒

右各等分為末擦牙搗鼻
壽世保元 已集木末 二十五

○一治牙痛方
黑豆一兩炒 鹽六錢 花椒 五錢 生薑 六錢 連翹 六錢
艾六錢

右白水煎漱吐涎
○一論牙屬腎骨之餘不作痛者乃手足陽明經之火泄血壅牙根齒齦浮起作痛也宜清胃火為主其牙齦腫脆刺下漸覺齒稀牙蛀去乃屬腎之真陰虧欠牙不堅矣宜服六味地黃丸

滋陰清胃固齒丸 善治牙疼且能固齒
山藥末一兩 牡丹皮末一兩 黃柏酒炒末一兩 黃連酒炒末一兩
升麻末一兩 當歸酒洗末一兩 玄參末一兩 乾葛末一兩

右用知母一兩 山查肉二兩煎濃湯去渣淨汁煮為粉為糊又用細米飯一盞研爛和為粉同又研勻調勻上公味末為丸如黍米大以水飛過朱砂為衣晒乾每服三錢食後白湯送下要忌一切厚味辛辣

過朱砂為衣晒乾每服三錢食後白湯送下要忌一切厚味辛辣

諸甜等物

一治胃經虛熱齒牙作痛者

補中益氣湯方見內傷 依本方加熟地黃牡丹皮白茯苓白芍藥

一治齒動作渴屬脾胃虛弱陰火熾盛者

補中益氣湯方見內傷 依本方加酒炒黃柏知母

一治每勞心則齒縫脹而不能咀嚼此元氣虛弱也

補中益氣湯方見內傷 依本方

一論齒浮作痛耳齒黑口乾作渴日指則刺此脾虛也用益氣湯加減八味丸而愈

一朱士部午後有熱遺精其齒即痛此脾腎虛熱先用補中益氣送六味丸更以十全大補湯而愈

一男子齒浮作痛耳齒黑口乾作渴日指則刺此脾虛弱也用補中益氣湯加減八味丸而愈

一男子口臭牙齦赤爛喉痰軟或用黃柏等藥益甚時或口澀此腎經虛熱余用六味地黃丸悉痊

一男子每足發熱牙即浮腫此足三陰虛火用加減八味丸而不復作

一論腎氣虛寒牙齦作痛面色黧黑精神憔悴脚膝無力飲食少思或痰氣上升小便頻數齒不堅固或口舌麻悶畏飲冷水以八味丸而愈

一治胃中客熱牙疳去血口臭齒齦腫痛腐爛

甘露飲子

枇杷葉 石斛 黃芩 枳殼 天門冬

麥門冬 生地黃 熟地黃 山茵陳 甘草

右剉水煎服

一李小園患滿口牙齒疼痛潰爛動搖飲食不下乃牙疳也諸醫不效

忽遇一道人傳方一擦即愈

川椒炒一錢半 銅青一錢 硼砂一錢

壽世保元

已集六卷

二十六

右三味為末每少許擦患處流涎之色

一治牙疳牙根內臭爛黑色有膿作痛

雞內金即雞內皮白芷五錢 麝香一分

右為細末用溫鹽水漱口貼患處

一治牙疳臭爛久不愈

白硼砂一錢 白礬一錢 麝香五分 青黛三分 輕粉二分

雄黃二分 冰片一分

右為細末候睡去時以竹管吹藥吹在牙疳上或以雞翎掃之

一論牙痛或腫風牙蟲牙牙動牙長痛不可忍 宋知府傳

馬蜂窩 白蒺藜 花椒 艾葉 葱頭

荆芥 細辛 白芷 各等分

右剉散醋煎口驗良久吐出膿痰

一治牙痛蟲蛀不已諸藥無效者

壽世保元

已集六卷

二十七

救苦丹

蟾酥三分 刺乳乳汁也 少許 港花磁蓋內 雄黃二分 細辛二分

冰片二分

右將酥乳調和細細納在蛀牙孔內或痛牙齦縫中口中涎任流出之

內服加味清胃湯

一治風牙腫痛用雄黃二分麝香少許擦於蟲孔中蟲死痛止

一治風牙蟲牙作痛

用黃蠶蜂窠一箇以花椒填滿其窠以白蠟一錢封口燒存性入白

芷羊脛骨灰各一錢同研為細末先以清茶漱口淨然後以藥擦之

及數痛處如有蟲蛀孔作痛以少許塞孔中立驗

固齒明目烏雞髮髻方

牙痛胃火 厚味所起 齒動胃虛 房勞過矣

補腎牙疳 清火痛止 節然其淡 何疾不愈

經驗良方 擦牙固齒 明目烏鬚 香口潤體

久而用之 其妙無比

何首烏 黑豆 槐角 骨碎補 沒石子

熟地黃 沒石子 青盞 細辛 地骨皮

右共為細末 每早擦牙 滾水嚥下

勞烏鬚 髮白底 不白固齒 牢牙 固齒 烏鬚 髮秘方

臨川劉雲 傳

熟地黃 二兩 破故紙 炒 二兩

青盞 二兩 細辛 一兩 地骨皮 二兩

右共為細末 每早擦牙 良久 滾水嚥下

擦牙烏鬚方 本縣下侯傳

壽世保元

白茯苓 細辛 牙皂 存五倍子

右各等分 為細末 頻擦牙 日久 髮自黑

一擦牙固齒 宜口臭 烏鬚 髮 吏部吳繼球 試効

旱蓮草 陰乾 切碎 半斤 香附米 四兩

右二味 入砂鍋 炒黑 存性 為末 擦牙

一固齒烏鬚 王斗岳傳

青盞 炒 一兩 槐角子 炒 一兩

牡丹皮 酒洗 一兩 破故紙 酒炒 七錢

細辛 酒洗 五錢 熟地黃 酒洗 一兩

沒石子 三錢 百藥煎 二錢

右共為末 每早擦牙 嚥下

一擦牙防齒患

取青槐枝 搥半碎 半斤 水四碗 煎一疏 去渣 入好盞 丁石 乾更將

搥炒 研細 擦牙 溫水 漱口 吐水 洗眼 日明 齒固

修合日期 五月五日 六月六日

眼目

脈左寸脈洪數 心火炎上也 闕弦而洪 肝火熾也 右寸關俱弦 決肝木

夾相火之勢 而來侮所不勝之金 而刺已所勝之土也

夫天運拂經 則兩瞳薄蝕 人身遠利 則兩目眇昏 是眼目之在人 猶日月

之麗天 明則其常 而昏則其變也 下身之中 惟目最為貴重 者 臟腑之

精華 蒸為血脈 之宗 會聚為東垣 曰 按陰陽應象論 云 諸脈皆屬於目

又曰 目得血而能視 五臟六腑之精氣 皆上注於目 而為之精 精之氣

為眼骨之精 為瞳子筋之精 為黑眼血之精 為目窠之總絡 氣之精 為

白眼肌肉之精 則為約束 環繞筋骨 血氣之精 而與脈併而為系 上屬

於腦 後出於項 是故瞳子黑眼法 於陰白眼赤目法 於陽 故陰陽合德

而為精明 也是以五臟六腑 十二經脈 三百六十五絡 其血氣皆稟受

於脾土 上貫於目 而為明 故目者心之使也 心者神之舍也 若精神亂

而守守 然覺非常之怪 邪中其精 則精散 則視岐 觀于物 為兩也 既

事煩擾 飲食失節 勞役過度 致脾胃虛弱 心火太盛 則百脈沸騰 血脈

並行 經曰 天明則日月不暝 邪害空竅 是也 董院使曰 目之首尾 赤睛

屬心 其滿眼白睛 屬肺 其烏睛 圓大 屬肝 其上下肉胞 屬脾 而中間黑

瞳一點 如漆者 腎實主之 是隨五臟 各有證應 然論其所主 則瞳子之

關繫 重焉 何以言之 目者 肝之候也 肝取木 腎取水 水能生木 木平肝

母 腎為子 母而能相離 故肝腎之氣 充則精彩光明 肝腎之氣

乏 則皆蒙眩暈 烏輪赤暈 刺痛 滑散 此肝熱也 膽生清淚 枯黃 暈此

肝虛也 瞳人開大 深白 偏斜 此腎虛也 瞳人焦小 或帶微黃 此腎熱也

又曰 白睛帶赤 或紅筋者 其熱在肺 上胞下胞 或目唇間 如赤點者 其

熱在脾 又曰 眼者 輕膜裹水 照徹四方 淵源及本 非天上之水 入其

為之主宰乎 杭而論之 則拘急牽礙 瞳青胞白 癢而清淚 不赤不疼 是

之謂風眼 烏輪突起 胞硬腫紅 眩淚濕蒸 裏熱刺痛 是之謂熱眼 運而

淚胞腫而乾，上壅膜腫，酸澁微赤，是之謂氣眼。其或風與熱并，則淚而浮赤，風與氣搏，則癢滿昏沉，血熱交聚，故生淫膚粟肉，紅縷偷針之類。氣血不至，故有眇視，胞里雀眼，皆障之形。然赤而隱紅者，為虛熱，紅而兼赤者，為實熱。兩皆呈露，生肉者，此心熱血旺，白睛紅膜如赤者，此氣滯血凝，熱證。瞳仁內湧，白睛帶濕色浮而赤也。冷證，瞳人青綠，白睛枯槁，氣沉而濁也。眼熱經久，復為風冷所乘，則赤爛，眼中不赤，但為痰飲所注，則作惡，肝氣不順，而來就，所以羞明，熱氣蓄聚，而傷胞，所以胞合到河間曰：在腫則為表，當除風散熱，在膜則為裏，當養血安神。如暴失明，皆虛翳膜，淚斑入眼，此風熱也。二云：斑入眼，此肝氣盛而發在標也。宜表散以去之。如昏弱不欲視物，內障見黑花，瞳子散大，皆裏也。血少神勞，腎虛也。宜養血補水，去神以調之。觀諸公所論治法之法，大槩以清心涼肝調血，順氣為先，不可固執水能生木之說，而偏補養蓋腎水惡燥，設遇虛證，亦不過以當歸地黃等藥潤養之，輕則溫補。

壽世保元

卷六

三十一

之亦可也。况夫肺能發燥，肝亦好潤，古方常用杏仁乾柿，飽糖沙蜜為佐，果非潤益之意乎。抑且脾者，諸陰之首，目者血脈之宰也。故脾虛則五臟之精氣皆失，所司不能歸明於目矣。心者君火也，主藏神明，宜靜而安。相火化行，其令相火乃胞絡之火，主百脈皆榮於目，既勞役妄動，又因邪氣所併，而損血脈，是故諸病生焉。醫者雖宜養血安神，又當兼理脾胃，良法也。至於退翳一節，尤關利害。凡翳起於肺，肺家受熱，輕則膜腫，重則生翳，有曰真珠翳，狀如碎米，若易散者，曰梅花翳，狀如梅花者，難消，雖翳自熱生，然治法先退翳，而後退熱者，謂熱極生翳，若先去赤熱，則血為之凝，而翳不能去，其有赤眼與之涼藥過多，又且滌之，以水不反掌，而水凝眼特，一團水耳。水性清澄，尤不可規規於點洗，緣其富感失節，嗜慾無度，勞役眼力，泣涕過傷，寒風常刺，目日不避烟火，飲啖諸多，此皆患生於臟腑者也。專事點洗，可乎哉。在乎察受病之因，究標本之理，推明運氣以調之，斟酌藥餌，以平之，也者，又能靜。

坐間居澄神息慮，節飲食，戒色慾，專內視，簡外觀，愛護目力，則無有不安者矣。

○一論暴發眼腫如桃，并赤眼痛，瀝難開者，祛風清熱散

當歸尾	赤芍	芍藥	生地黃	黃連
黃芩	梔子	連翹	薄荷	防風
荆芥	羌活	桔梗	枳殼	白芷稍
甘草				

右劉，丁劑燈草七根，水煎，食後服。○腫痛甚，加大黃芒硝。○風熱如蔓，荆子牛旁子。○烏珠痛，加天麻川烏。○生翳。○犯眼，加蒼木朱砂。○眼生翳障，加白蒺藜。○眼目被火打傷，青腫，加大黃。○如杖瘡腫痛，未破，作增寒壯熱，或打重血氣攻心，加大黃梔仁。○如打撲傷損，內重，瘀血不散，加桃仁大黃，服之立愈。

壽世保元

已集六卷

三十一

○一論治眼暴發赤腫，臉高苦痛，不可忍，苦湯

連翹	桔梗	紅花	細辛	各二分	
當歸身	夏月核	甘草	桑木	米泔浸	
羌活	太陽	升麻	陽明	柴胡	少陽
藜蘆	各二錢	生地黃			
黃芩	知母	各三分	川芎	六分	

右劉，丁劑水煎，臨臥服。

○一洗眼赤眼，暴發腫痛，不可忍，黃連

黃連	黃柏	各一錢	生白礬	二分
----	----	-----	-----	----

右劉，膠棗一枚，煎米半鐘，洗之立愈。

○一洗暴發爛弦風眼

用烏藥不拘多少，瓦器盛於二灰內，晒之至白色，須晒十餘日，方好。

再入黃連末十分之一。每用少許水和。臨洗眼立效。

○一治眼暴發腫痛。用白礬枯過為末。每用三錢以生薑去皮。取自然汁調如膏。抹於上。令患人閉目。將藥貼眼上。燒煙盡。痛即止。用溫水輕輕洗去。神效。

○一治眼暴發赤腫。痛淚隱澁難開。用青礬炒三錢。黃生六錢。各為細末。并花水調作餅子。如眼大先將水洗淨。眼次用餅貼眼上。後用餅子貼睛上。病人仰睡。用水潤餅。如乾再潤。三時即已。

○一治法如前。用大黃末新汲水調塗兩眉上。頭兩腦水潤之。須臾腫消痛止。

○一治法如前。用黃連末五錢。薄荷二錢。半為末。用雞清和。隔布塗眼上。良久乾則以水潤之。即效。

○一論凡眼疾暴發新久。腫痛不可忍。皆緣心家火起所致也。并治一切翳障等疾。光明丸 李中山傳

- 生地黃 白芷 羌活 獨活 甘草
 - 薄荷 防風 荆芥 木賊 甘菊花
 - 草決明 黃連 黃芩 黃柏 大黃
 - 連翹 桔梗各二錢 歸尾 川芎各三錢
- 右十九味為末。煉蜜為丸。如菉豆大。每服三五十九。白熱水送下。清晨晚各進一服。
- 一論暴發眼。馮火片陽湯
- 黃芪八分 人參七分 甘草五分 柴胡一錢五分
 - 升麻一錢八分 當歸三錢 川芎三錢 生地黃三錢

黃芪二錢 梔子二錢 薄荷二錢 菊花二錢

葛本二錢 枳實一錢六分 甘枸杞子二錢 龍膽草二錢

右到一劑用水一鍾酒一鍾煎至一鍾。臨臥服。渣再用水三鍾煎至一鍾。溫服。即愈。如未全愈。將第三天渣用水二鍾煎至一鍾。溫服。忌食辛辣。不得休息。故上為此症也。

○一論內障眼得之。脾胃元氣虛弱。心火與三焦俱盛。飲食失節。形體勞。冲和養胃湯

黃芪一錢五分 人參一錢 甘草一錢 五當歸酒洗一錢

白朮 去蘆一錢 白芍 酒炒六分 白茯苓三分 柴胡七分

升麻一錢 葛根一錢 羌活一錢五分 防風五分

黃連七分 黃芩七分 乾薑一分 五味子二分

右到一劑水煎。稍熱服。

○一論肝主目。肝受熱而不能視。血弱則肝氣無以養。養肝氣不榮。則有花也。久視艱澁。太皆赤色。此血不足。肝之失養也。近風有淚。皆之虛也。黑睛上有翳不散。此亦因勞受風。血弱不能行也。宜服此藥。補肝血。滋膽水。益腎氣。大有殊效。

家傳養肝丸

熟地黃酒蒸 肉蓯蓉酒洗

砂苑 茯苓 各一兩 枳實子 炒五錢

羊子肝 小肝 菜黃 焙乾為末

右為細末。煉蜜為丸。如梧子大。每服五十九。加至七十九。至百九。早晚湯下。午茶下。臨臥酒下。不飲酒。人當歸湯下。即補肝重明丸。亦為甘其。

○一論黃連虛弱。動勞眼目昏暗

- 當歸酒洗一錢 白芍 酒炒一錢 川芎一錢 生地黃二錢
- 人參五分 白朮 去蘆一錢 黃柏一錢 知母一錢

密蒙花五分 克蔚子一錢 龍膽草酒洗四分 黃芩酒炒七分

右剉丁劑水煎服。

○一論病目用涼藥過多以致隱澁難開
防風七分 黃芪一錢 甘草炙五分 蔓荆子三分
當歸五分 白芷三分 升麻七分 柴胡五分

右剉一劑水煎服。

○一論日晡兩目紫澁不能瞻視此元氣下陷也。
補中益氣湯方見內傷依本方倍參芪

○一論腎水枯竭神光不足眼目昏暗此壯水之主以制陽光
壯水明目丸
熟地黃一兩二錢 澤瀉八錢 山茱萸酒蒸取肉
白茯苓酒洗 川芎三錢 生地黃五錢
牡丹皮八錢 蔓荆子一兩 甘菊花五錢 黃連五錢

壽世保元 巳集六卷 三十四

柴胡三錢 五味子五錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五十九酒送下。

○一論遠年近日爛眩風眼翳障青盲腫痛百病。
點眼仙方 臨川馬伏所傳
麩仁三錢多去皮將竹帚碾去油方入藥用筆筒捲將藥鋪上
珍珠研細 五厘生用綿布包打碎琥珀二分生用布包打碎研爛
能膽一分五厘生研 牛黃一分生用
麝香半分生研 片腦一分五厘生研

右先秤眼藥罐次加蜜秤後入藥攪已上八味和勻點眼。

○一論暴發風熱時行火眼神效
緊金錠 陳省齋秘傳方
川黃連四兩剉粗末將井花水十鍾浸二十三日入鍋煎至三鍾去渣

再熬至半鍾下米膠一錢二分溶化調後藥為錠
銅綠五錢 輕粉二錢 官粉三兩

右共為細末以黃連汁調為錠陰乾用時以井水磨加龍膽五分水片
二分丸服

○一論兩目翳障爛弦風熱皆眼色眼皆症
光明散
蘆甘石上貯的用四兩 珍珠四錢

右二味用竹筒包定將銀新紫泥罐作餅包石珠在內為丸外用
膽二錢研細二錢火硝二錢研末為衣再用紫泥罐包裝曬乾用火
煅煉以七根線香為度煉四炷香用重布包之其色愈妙又煉根半
香以好醋洗之又煉根半香散又聽用前煉過末藥一錢加龍膽一分
火硝一分為極細末點眼其効如神

壽世保元 巳集六卷 三十五

腎虛邪毒疾醫之悉愈能治百十二種眼疾能醫二十年目不通明者
惟有彈入反背而醫者不治

仙傳珊瑚紫金膏 薛共巡秘傳

白蘆甘石 南方此名羊脂其質如膏七日用灰火銷銀砂研內煨
黃丹 諸名國乃漆水飛過三次晒乾研細研一兩

海螵蛸 即烏賊魚骨刺者皮中煨火炙過細研二錢
乳香 光明者入砂鍋內煨火炒去粗細研二錢
沒藥 光明者入砂鍋內煨火炒去粗細研二錢

白礪砂 光明者入砂鍋內煨火炒去粗細研二錢
青鹽 去泥土細研五分 麝香 煉淨去皮細研五分

右將前七味各研細研足合下處入乳鉢內再研極細無聲後入礪片
二味再研極勻將蜂窠用細絲濾過熬蜜滴成珠夏老冬嫩春秋
老嫩之間用蜜調藥令稀稠得所磁器內封固不可泄氣點眼神効

○入兩自作痛服降火祛風之藥兩目如翳翳珠珠其全大補湯敷劑諸症悉退服補中益氣湯兼六味丸而愈復因勞役下後目滿體倦服十全大補而痊

○一人年二十素嗜酒色兩目赤痛或作或止兩目洪大按之微痛余謂少年得此病自當失明聖藥遂而行不辨不日果皆愈余遂以六味丸料加麥門五味二劑頓明

○一人目赤不明服祛風散丸藥反更明重聽脈大而虛此因勞心過度飲食失節以補中益氣加扶神散山藥石菖五味類愈又勞役復甚用十全大補兼以前藥漸愈却用補中益氣湯加前藥而痊

○一儒者日晡兩目昏流不能瞻視此元氣下陷用補中益氣加參其效劑愈也

○一論眼病之後候有上熱白睛紅多眵淚每時而痛此是元氣太過而真氣不能通九竅也故取白昏花不明以益氣湯為妙藥

壽世保元

已集六卷

三二六

防風白芷蔓刺子

○一論內障眼得之元氣脾胃虛弱心火與三焦俱盛飲食失節形體勞役不得體息故上為此病也以益氣湯加白芍茯苓葛根羌活防風黃連黃芩乾薑五味去陳皮

○一論諸般翳障睛肉內障青盲等症益府秘傳撥雲龍散

蕤仁

白朱砂

好珍珠

真能膽三分以磁石盛放火上烘去水用二分五厘
研砂三四分將磁石一磅以火煮乾為末用二分
研砂二錢五分牛黃二分五厘琥珀五分 水片一分

當門子一分 白丁香一分 海螵蛸水煮過六七次二分
人龍蝦子入童子口中吐涎食虫即消瘰癧破開河水洗訖令其
右精製一處細研任其點眼者復明古今天下第一仙方不可妄傳
匪人秘之秘之

一治氣血虛損眼目昏翳此壯水以制陽光有快服寒病之過暈暗全
不通路以十全大補湯加沉香大附子白豆蔻

東垣謂目能遠視不能近視火盛而水虧也法當補腎六味地黃丸主之
目能近視而不能遠視有水而無火也法當補心定志丸加茯苓主之

又曰不能近視視黃丸不能遠視臥服定志丸是皆道乎手足少陰
經也是以知不能近視者腎水虧火盛也不能遠視者心血不足也

定志丸

遠志去心

加白茯苓二兩

石菖蒲各二兩 人參一兩

白茯苓三兩

壽世保元

已集六卷

三二七

右為未煉蜜為丸朱砂為衣每服二十丸茶湯下
六味地黃丸方見補益

喉痺

附聲啞 疰腮

喉痺者喉浮洪而益者喉痺也。脈微而伏者死。
內經曰一陰一陽結謂之喉痺。一陰者少陰君火。心主之脈氣也。一陽者少陽相火。三焦之脈氣也。二麻並絡於喉氣熱則內結結則腫脹腫脹甚則喉痺喉痺則不通而死矣夫推原上二經惟足太陽則下項其餘皆湊于喉噤然內經何獨言一陰一陽經為喉痺蓋君相二火獨勝則熱正絡故痛者速也。余謂一言可了者火也故十二經中言盛

乾益痛喉腫頰腫者本強皆君火為之也惟咽痺急速相火所為也夫
君火者猶小火也相火者猶龍火也。人火藥木其勢緩龍火藥木其勢
速內經之言喉痺則與咽舌其兩間耳然其病同於火故不分也後之

者。少陽相火。三焦之脈氣也。二麻並絡於喉氣熱則內結結則腫脹腫脹甚則喉痺喉痺則不通而死矣夫推原上二經惟足太陽則下

項其餘皆湊于喉噤然內經何獨言一陰一陽經為喉痺蓋君相二火獨勝則熱正絡故痛者速也。余謂一言可了者火也故十二經中言盛

乾益痛喉腫頰腫者本強皆君火為之也惟咽痺急速相火所為也夫
君火者猶小火也相火者猶龍火也。人火藥木其勢緩龍火藥木其勢
速內經之言喉痺則與咽舌其兩間耳然其病同於火故不分也後之

醫者各詳其狀強立名曰單乳或雙乳蛾子舌脹木舌喉腫喉閉定馬喉閉氣上行故轉於喉之兩側近外腫作以其形似足謂乳蛾一為單一為雙其此乳蛾差小者名喉閉於舌下復生以小舌下名曰子舌脹熱結於舌中舌為之腫名曰木舌脹木者強而不柔也其病於咽喉腫達於外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風喉痺暴發喉症名曰走馬喉風此八種之名雖詳若不痛之火則相去遠矣其微者可以鹹麥之而大者以辛散之今之醫者皆有其藥也如薄荷少助散白藥并硝銅綠之類也至於走馬喉腫何特此乎其生死人反掌之間耳其最誤入者無如砒針此血出則病已易曰血去腸出良以此也昔余治一婦人木舌脹其舌滿口諸醫不愈令以針針小而銳者之五七度腫減三日方平計出血幾至盈斗又治一男子纏喉風腫表裏皆作藥不能下余以煎藥灌於鼻中下十餘行始以拔毒散傳之陽起石燒碎與伏龍肝各等分細末之以新水掃百遍于時熱始退腫

壽世保元

已集六卷

三十八

始消又嘗治一貴婦喉腫蓋龍火也雖用涼劑而不可使令服猛龍火宜以吹逐之入火者煎餅之火是也乃使曝於烈日之中登於高堂之上令待知湯火爐坐藥銚于上使藥常極熱不至太沸通口時時吸之百餘次然火自散此法以熱行寒不熱而打格故也木抵治喉痺用針出血最為上策但人畏針委曲勿時時息或命凡用針而有不創者宜搗生薑塊調以熟白湯時時吸之則創口易合人中亦有法然痛微者可用病速者恐遲則殺人故治喉痺之人與救火同不容緩持內經火鬱發之發謂發汗喉咽中豈能有汗故出血者乃發汗之一端也後之君子母執小方而曰吾藥不動臟腑又妙於出血者幸遇小疾而獲効不幸遇大病而死矣毋遺後悔可也

○一切喉痺危急死在須臾牙關緊閉病人太指外邊指甲下根不問男女左右只用布針針之令血出即効如大段危急兩手太指俱針之其功尤捷

○一論治不測急慢喉痺咽喉腫痛不通
龍腦破毒散

益硝研細四錢白殭蠶八分去青黛八分 甘草生八分
蒲黃五分 馬勃三分 片腦一分 麝香一分

右各為細末神足同研極勻磁盒收貯如真病症每用藥一錢以新汲水少半盞調勻細細啣嚙如是喉痺即破出血便愈如不是喉痺自藥消散若是諸般舌脹用藥半錢以新汲水調勻在舌上下嚙津唾如是小兒一錢作四五服亦如前法用並不計時候

馬勃一名馬毛菌也虛軟如紫紫強之紫灰出狀如狗肺生濕地園中久腐處主惡瘡馬亦傳諸瘡良以蜜採拌以水調啣治喉痺咽喉痛

○一論咽喉腫痛痰涎壅盛初起或壯盛人上焦有實熱者可服
清咽抑火湯
連翹一錢五分片苓一錢 梔子一錢 薄荷七分

壽世保元

已集六卷

三十九

防風一錢 桔梗二錢 黃連一錢 黃柏五分
知母一錢 玄參一錢 牛蒡子一錢 大黃一錢
朴硝一錢 甘草五分

右劉一劑水煎頻頻服○聞生過揚海瘡初加防風山奇糧二兩

○一論虛火上炎喉痛喉內生瘡喉閉熱毒最能降火滋陰
滋陰降火湯

當歸一錢 川芎一錢 白芍一錢二分懷熟地黃一錢二分
川黃柏一錢 知母生一錢 天花粉一錢 白桔梗去蘆二錢
甘草生三錢 加玄參一錢

右劉水煎入竹瀝一盞溫服

○一論喉痺腫痛聲啞不出飲食不下陰虛相火上炎咳嗽痰喘潮熱虛勞等症內服此藥外以神仙通隘散吹之其愈
滋陰清火湯

懷熟地黃一錢 山藥一錢
 牡丹皮一錢 澤瀉一錢
 黃柏一錢 知母一錢
 甘草一錢

右到一劑水煎服外用硼砂一錢化嚙下除痰消毒如神
 ○一論咽喉腫痛屬虛弱者或服藥過多而作渴者皆宜服清上養中湯

小甘草 桔梗各二錢 玄參 當歸
 黃芩各一錢 陳皮去白 白朮去蘆 白茯苓去皮
 麥門冬去心 連翹各八分 人參 防風
 金銀花各五分

右到水煎食後服有痰加貝母
 ○一論喉痺腫痛不能言語或吐或瀉或不食或四肢冷痺但此症無不愈者此從治之法也
 已集六卷 四十

通關散
 炙甘草一錢五分 人參 白朮去蘆 白茯苓去皮
 桔梗二錢 防風七分 荆芥 薄荷各五分
 藜蘆炒 或加大附子炮各五分

右到水煎頻頻與服
 ○一論喉痺雙單乳蛾風腫吐熱不下死在須臾治一切喉痺之總司也
 山豆根為末用能膽和為丸用雞胥皮陰乾研末為丸如菉豆大每用下丸放香上徐徐嚙下立愈

○一治喉風等症
 起死回生散
 蜈蚣三條焙存膽礬一錢 全蝎三錢
 蟬退三錢焙存蟾酥三錢 穿山甲三錢
 乳香五分

川烏尖一錢
 右為末每服一錢五分或二錢小兒每服一分或六分
 和藥酒送下出汗為度如口不開灌服忌雞豬羊油麵七日
 ○一論單蛾雙蛾風喉喉痺腫痛水漿不入死在須臾
 寶崇周家試驗
 膽礬一錢五分 硼砂一錢八分 雞內金一錢 枯白礬二錢
 百草霜三錢以末未黑為止

右各為細末用絹羅過用中指感藥擦上患處又含於後用清荷湯漱口如甚將藥剝尖刺破用藥按上或用鷄毛蘸藥帶藥刺上滿口刷攪引痰出盡則愈○一方加熊膽五分更效
 ○一論喉風腫痛幾死 雙橋周家屢驗
 茶子 霜梅 醋

右三味研爛去渣將藥汁蘸掃喉即吐痰而愈
 ○一論喉痺腫痛湯水不下死在須臾用此一吹即活
 壽世保元 已集六卷 四十

牛黃二分 硼砂一錢 雄黃三分
 右為細末每用一分五厘吹入喉內
 ○一論喉癰腫痛 車左源傳效
 鬱金一錢 雄黃五分 巴豆肉去壳四箇二箇半用二箇用
 右為末三味攪勻每用一分二厘入竹筒內吹患處小兒用六厘

○一治喉閉風閉難治者
 猪牙皂角一條用蜜調和水煎如急立服緩則露一宿尤妙如倘口緊者擊開灌之須將危者即愈

○一治喉風危急
 用大黃為末竹筒盛之安青魚膽七箇入末待乾研末聽用遇患喉癰吹入鼻中或喉中立刻效
 ○一治時氣纏喉風漸入喉塞水穀不下牙關緊急不省人事
 神應散

雄黃 枯礬 藥蘆生用 牙皂炙黃

右各等分爲細末。每用豆大一粒吹入鼻內。吐痰神效。

○一論喉痺乳蛾咽喉腫痛。湯水不入。死在須臾。

巴豆去壳搗爲末。入細辛末少許。全研勻。搽在喉內中間斷。如左患塞。右鼻右患塞。左鼻孔中。雙腫左右相替塞之。咽喉立開神效。

○一論喉痺腫痛。水漿不入。死在須臾。扶滿劑良准傳。

先以皂角細辛爲末。擦牙。次用陳藍松葉。燒灰。霜梅肉。生艾葉。搗爛。全。扎於快頭上。隨喉數次。吐痰盡。即食百沸湯。後用米粥調服。

○一治咽喉腫痛。

百藥煎 硼砂 甘草 生白礬各等分

右四味爲細末。每服一錢。食後米飲調。細細呷嚥。

○一論喉風腫痛。

皂角爲末。醋調塗於頸上。乾則易。其乳蛾即破而愈。

壽世保元

巴集六卷

四十二

○一論喉風腫痛不可忍。

霜梅五七箇。去核。白礬二兩。研爛。用好醋一碗。入藥。同煮。以礬化爲度。待溫。用快扎綿線兩。上下至喉。先繳牙外。自外而繳至舌下。舌下又繳。至舌上。繳至喉。其痰自湧出。痰帶絲者。即愈。無絲者。絲斷不治。

○一論喉痺壅塞不通者。

用紅藍花搗取汁一小鍾。服之。以爲爲度。如冬月無藍花。可浸乾者。濃煎取汁。如前服效。

○一論咽喉腫痛。

吹喉散 周印池傳

牙硝一兩五錢 硼砂五錢 雄黃二錢 冰片二分

殭蠶二錢

右共爲細末。每用少許吹喉立效。

○一治咽喉腫痛。水吞不下。

用青蓋白礬。各等分。爲末。吹患處。有痰吐出而愈。

○一論咽喉腫痛。水漿不入。死在須臾。

真礬爲末。用林頭點入。對喉上。即時消散。其效速如風。

○一論久嗽喉痛。

小太平丸 人參二分 五味子三分 天門冬 去心 二錢 玄參八分 微墨三分

右爲細末。煉蜜爲丸。噙化下。○痰盛加貝母。

○一論勞後過傷。忽咽喉腫閉。不省人事。喘促痰湧。汗出如水。肢體痿軟。脈浮大而數。此飲食勞後。無根虛火上炎也。

補中益氣湯。方見內傷。依本方。加肉桂。煩。

○一論咽喉腫痛。口舌生瘡。勞則愈。此肺氣虛。勝時有熱也。

補中益氣湯。方見內傷。依本方。加玄參酒炒。黃柏。知母。補愈。去知。加山

壽世保元 巴集六卷 四十二

藥山菜黃

○一論咽喉腫痛。服藥過多。或過勞。痛愈甚。此中氣虛熱也。

補中益氣湯。方見內傷。依本方。加炒蒼連。

○一論積熱上攻。痰涎壅盛。喉痺。瘡。腫。痛。難禁。

上宮清化丸 內閣秘傳。

黃連去毛 桔梗 去蘆 各六分 山豆根 粉草 各四錢

薄荷葉一錢 白礬砂六分

右爲細末。煉蜜爲丸。如大實。大時常噙化。

○一論喉痛有痰聲啞。

薄荷二兩 細茶一兩 白礬砂七錢 烏梅肉二十一箇

貝母一錢 冰片三分 孩兒茶五錢

右爲細末。煉蜜爲丸。如皂角子大。每噙化下。

○一論聲啞

新刊醫林狀元壽世保元 卷六

五三三

甘草 烏梅 桔梗 烏藥

右剉水煎溫服

○一治出聲音方

訶子兩 木香一兩 甘草五錢

右剉水煎入生地黃汁一合再煎數沸放溫分六服食後日進半料

○一論聲嘶失音

鐵笛丸

當歸酒洗一兩 懷生地黃一兩 懷熟地黃一兩 天門冬法心黃炒五

麥門冬法心黃炒五錢 知母五錢 人參三錢

白茯苓夫皮一兩 訶子五錢 阿膠炒五錢 烏梅肉十五箇

人乳一兩 牛乳一兩 甜梨汁一兩

右為細末煉蜜為丸如黃豆大每服八九十九訶子湯下蘿蔔湯亦可

○一治失音

壽世保元

巳集六卷

四四

用梨花新瓦上炒熟煨之隨處細嚼工十粒久久自愈

○一治失音

用生白礬煉蜜為丸服效

○一治聲嘶失音不出

用密入猪板油切爛入瓷內重湯浸熟食之

○一論瘰癧腫痛

防風 荆芥 羌活 連翹 牛蒡子 甘草各等分

右剉水煎服外用赤小豆末醋調敷患處毒氣入喉痛治一方用石炭

不拘多少炒七次地下窰七次醋調塗腫處立愈

○一論治疔腮疔瘡腫痛及吹乳

南薄荷三錢 斑猫去翅足炒三分

右為末每服一分燒酒調下立消服藥後小便頻數服益元散一服

○一治喉痛生肉以繩裹快頭懸指肉上日六七度易

○一人患喉閉以防風通聖散治之腫不能噤此症須針之乃可奈牙關已閉遂刺少商穴出血口即開更以膽礬吹患處吐痰一二碗許仍投前藥乃愈嘗見患此疾者長針不刺多刺少商穴在手大指內側去爪甲角如韭葉許

○一人喉閉腫痛寒熱脈洪數此少陰心火少陽相火二經為病其症最惡惟刺患處出血為上因彼長針先以涼膈散服之藥從鼻出急乃願刺則牙關已開不可針遂刺少商穴以手動去黑血口即開仍刺喉間准以前藥及前吹喉散吹之頓愈又以人參散毒散加其連玄參牛旁子四劑而平經曰火鬱發之謂發汗出血及發汗之一端也河間云治喉之火與散火同不空少商穴以刺防敗毒散加其連玄參用防救者多矣每治咽喉腫痛或生瘡毒以刺防敗毒散加其連玄參用防風通聖散

○一男子口舌常破如無皮狀或咽喉作痛服諸涼藥愈甚予以理中湯

壽世保元

巳集六卷

四十五

劑乃愈

○一人脚發熱則咽喉作痛內熱口乾痰涎上壅此腎經虧損火不攝經用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而痊

○一人患喉痛日晡益甚此血氣虛而有熱用八珍湯而愈後每入房發熱頭痛用補中益氣湯加麥門五味及六味丸常服後不復作

○一丹溪先生云咽喉痛屬血虛用四物加竹瀝陰虛火上炎者必用玄參氣虛加入參竹瀝又云咽喉腫痛有陰虛陽氣飛越痰結在上者脈必浮大重取必盛去死為近宜入參一味滋補細飲之如作實症治之禍如及掌此發前人之未發救無窮之天柱

○一人因怒氣大吐將下腮脫落任按不上眾視措手子以烏梅燒餅塞於兩腮坐牙重頭控虛張口流涎須臾隨手撮上

○一治喉痛如生毒物并車螻蟻咬喉痛並治

補遺

○一治喉痛如生毒物并車螻蟻咬喉痛並治

○一治喉痛如生毒物并車螻蟻咬喉痛並治

○一治喉痛如生毒物并車螻蟻咬喉痛並治

○一治喉痛如生毒物并車螻蟻咬喉痛並治

○一治喉痛如生毒物并車螻蟻咬喉痛並治

○一治喉痛如生毒物并車螻蟻咬喉痛並治

巴豆半夏各等分將此一味用上好醋放小罐子裏煎熟取巴豆半夏一起研末用麻布包做數粒如豆子大以前醋浸之取一粒含在喉痛處至熱又換別粒含之直至吐瀉而後已既以稀粥補之而愈忌冷水猪油。

○一利膈生津止渴消食常用之藥也。

烏梅一兩 蘇州薄荷葉四兩

右為細末白糖霜四兩蜜丸如芡實大每用一丸嚥化。

○一治喉風咽痛重乳蛾 姜節煎傳

烏梅去核研末在喉嚨身上陰乾取燒灰存性為末點患處立已

○一治咽喉腫痛生瘡聲啞危急之症及治虛勞聲嘶喉痛神仙通隘散 賈蘭峰秘方。

白礪砂二錢 孩兒茶一錢 蒲黃六分 青黛一錢
牙硝六分 枯礬六分 片腦二分 黃連末五分

壽世保元

巳集六卷

四十六

白滑石一錢 寒水石一錢 黃柏末五分

右為末吹喉中立刻效。

○一治喉中熱毒腫痛喉閉乳蛾等症。

熊膽一分 雄黃五分 礪砂一錢 蓮荷葉五錢

青鹽五分 膽礬少許

右為末煉化白沙糖為丸如芡實大即時吞壓一丸自化入喉神效。

○一治聲音不出。

真蘇子二兩 訶子三箇 杏仁三十箇 百藥煎二兩

右為末每服二三錢熱酒調下。

○一要欲好聲音。

用杏仁一升熬去皮尖酥一兩蜜少許為丸如梧桐子大空心米湯送下十五丸。

○一治痰音

皂角一枚去皮子蘿蔔二箇切作片水煎服之不過三服能語聲出

結核

結核者火因痰注而不散鬱結堅硬如栗中核也或在頸脇或在手足或在頭頰或在臂在腋如腫毒不紅不痛不作膿不必潰發但冷熱氣散則核自消大法宜二陳湯加竹瀝多服為效。

梅核氣者窒礙於咽喉之間咯之不出嚥之不下如梅核之狀者是也。因喜怒太過積熱蘊蘊而成屬痰鬱結致有斯疾耳治宜導痰開鬱清熱順氣加陳皮半夏川芎香附山梔黃芩枳殼蘇子之類是也如老痰凝結不開以鹹能軟堅之藥海石是也。

○一論咽喉結核成塊如核梅者腫硬疼痛四肢下俱有及頸項腫硬不能轉頭。

壽世保元

巳集六卷

四十七

消解散

南星泡 半夏姜炒 陳皮 枳實 桔梗

前胡 柴胡 黃連 連翹 赤芍

防風 獨活 白附子 白芥子 蔓荊子

我朮 木通 蘇子 甘草

右剉生薑燈草煎服。

○一論不問男婦遍身疔瘡成塊如移不紅不痛皆痰流注而成結核也

醉翁仙酒 方上異人傳。

白頭翁一斤去葉用搗分作四服每下服四兩用酒煎一日三次服之。二日服盡而已。

○一秘方 治症同前不可言。

草麻子一斤去殼用陶人放公猪肚內酒煮肚爛為度取出草麻子晒乾為末用前爛猪肚片干下為丸酒送下。一日服三次。

一論婦人遍身痰核不紅不腫不癢內消之劑。

- 陳皮 半夏 白茯苓 當歸 川芎
- 枳實 黃連 香附 桔梗
- 連翹 防已 羌活 龍膽草 柴胡
- 甘草

右剉生薑三片水煎服。

一論結核渾身手足俱有核如胡槐者并治胸中胃脘至咽門窄狹如線疼者此風痰氣熱所致也。

- 陳皮一錢 半夏七分 枳殼一錢 枳實七分
- 桔梗五分 前胡八分 黃芩一錢 香附童便浸三分
- 荆芥七分 羌活七分 木香五分 檳榔八分
- 僵蚕二分 射干七分 威靈仙七分 甘草七分

壽世保元

已集六卷

四十八

右剉下刺生薑三片煎服。

一論痰核氣核疔腮疔瘡及吹乳等症內消散 朱賓淵傳。

南薄荷葉三錢 斑猫去翅足炒三分

右為末每服三分燒酒調下立消服藥後小便頻數服益元散以助子清丸如菉豆大每服下丸茶下加至五丸却每日減下丸減至三丸後每日服五丸治癰癧名內消丸。

一論痰核方 庠生分右伯傳。

- 歸尾一兩 赤芍稍一兩 五連翹一兩 蒙朮七錢五分
- 細辛八錢 羌活一兩 獨活一兩 防風一兩五分
- 荆芥八錢 薄荷一兩 桂枝一兩 赤芍一兩
- 小川芎六錢 白芷稍一兩 甘草節六錢

右為末每服三錢食後酒調服。

一論痰核在喉嚨上下或生在兩腋下并治瘰癧 庠生欽所傳

- 防風一兩五分 山慈孤一兩 川山甲七錢 射干二兩
- 紅肉銷二兩 白芷稍一兩 車前子一兩 漢防已二兩
- 何首烏二兩 牛旁子 連翹 桔梗各一兩五分
- 烏藥一兩 金銀花 夏枯草各二兩 薄荷一兩
- 獨活一兩 姜盞一兩 半夏一兩 赤芍一兩五分
- 皂角刺二兩 小川芎一兩 當歸尾一兩 甘草五錢

右剉刺水煎食後服。○有潮加柴胡黃芩各五錢。

一男子素善怒左項微腫漸大如升用清痰理氣而太熱作渴小便頻濁余謂腎水虧損用六味地黃丸中益氣而愈亦有胸脇等處大如升斗或破如菌如榴不開大小俱治以前法必多服以愈為度。

一治痰癧妙方 陳拓所傳

壽世保元

已集六卷

四十九

天花粉三兩 昆布酒洗八錢 貝母一兩 姜盞炒一兩五分

全蝎酒洗五箇 黃連炒五錢 土木鱉去壳十 知母一兩
川山甲土炒一兩 陳皮一兩 青皮炒一兩 歸尾七錢
黃芩酒炒一兩 連翹去心一兩 紅花五錢 海藻酒洗一兩五分
施子一兩五分 蒲公英二錢 夏枯草一錢五分

右將前十七味君臣藥分作十劑其蒲公英夏枯草每劑各照數用白水煎服時加濃酒一杯同服。

一治痰核金星膏 蘇九寧傳

- 金星鳳尾草一兩五分 實竹葉一兩 葱白三十根
- 側柏葉一兩五分

右用香油一斤浸藥一白用火熬着藥焦黃為度用細布袋濾去渣仍入鍋熬熟油一斤淨入上好鉛粉三兩用竹攪勻文武火熬看起烟黑色再入鉛粉四兩着四五十五鍋仍用竹攪勻滴水成珠連鍋

放在地上再攪去火毒

○一治瘰核氣核。陳出雲傳

黃芩一錢三分 枳實一錢

連翹一錢 海帶七分

白芥子八分 甘草三分

右剉水煎食後服。

○一治瘰核。

用拍子葫一斤。晒乾為細末。每用末二兩。又將天門冬連翹各用

一兩為末。入小布口袋內。將白水酒一小瓶。煨熟。當三二日食後。再

服。一兩半月內即消。

○一治瘰核頸天。戴雷門傳

牛旁子五分 枳實五分

桔梗八分 黃芩八分

僵蚕五分

連翹八分

防風八分

貝母一錢

壽世保元

已集六卷

五十

海藻洗一錢

金銀花一錢

枯礬一錢

夏枯草八分

右剉。下劑。白水煎食後服。

○一治瘰核。心泉姓傳

用黃泥作筒。人生白礬四兩。鹿角蛇一條。在筒內。陰乾。火煨化為末。

每服一分。溫酒調服。立消。

○一治項後側少陽經中疔瘡。不變肉色。不問大小。及日月深淺。或有赤

硬腫痛。

生山藥一排。去皮。草麻子二筒。去壳。

右二味研勻。攤布上貼之。如神。

○一治梅枝氣

加減四七湯

蘇梗

茯苓

陳皮

枳實

厚朴

青皮

南星

砂仁

半夏

益智仁

白豆蔻 神曲炒

瘰癧

右剉。生薑煎服。

夫瘰癧者。多因氣血所傷。而作斯疾也。夫抵人之氣血。循環無滯。瘰癧之

患。如調攝失宜。血凝結皮肉之中。忽然腫起。狀如梅子。久則滋長。瘰癧有

五種。曰石肉。筋血氣是也。瘰癧有六種。曰骨脂。膿血石肉是也。治法瘰癧

二者。切不可針破。針破則膿潰。則殺入。惟脂瘰癧。可破去脂粉。即為其

不可。輕易為。余將瘰癧之分于後。醫者宜審辨之。則不悞也。

消瘰湯

海藻洗

昆布燒存性

麥麩一兩。五錢。白芷一兩。

龍膽草

枯白礬

海蛤粉各二兩。通草

松蘿各一兩。半夏二兩。五錢

壽世保元

已集六卷

五十一

右為末。每服五錢。酒煎。甘草蝦魚猪肉。五辛諸毒等物。又要吞礬丸。

○一論治瘰癧瘰癧。便毒惡瘡。久漏不愈者。

經驗瘰癧丸

白礬生四兩。為末。黃蠟二兩。溶化。聚手。丸如梧桐子大。每服三十丸。

空心清湯下。

○一論內府秘傳方。治瘰癧。

海藻熟水洗淨。昆布洗淨。

海粉飛過。

海螺醋。

甘草少許。

海帶。

海螺蛸。

右如項下。搖皆用。長螺蛸。不搖用。圓螺蛸。各等分。為末。煉蜜。為丸。每夜臨

臥。口中噙化。下丸。功效不可言也。

○一論瘰癧神方。兼祛鼠疥。瘰癧肉。

用羌花根。洗淨。帶濕。不可犯鐵器。須於木石器中。搗取。用鐵一。條

浸。半日。或一宿。以線穿。瘰癧。則落。如未落。再換。線。不過三次。自落。

後用龍骨、貝子、赤石脂、各等分，為末，敷瘡口，即合。如無根，用元化泡，水浸，雞子殼，煎，用法，用之，無不効。

一論洗瘡秘方

用染指草、名金鳳花、一科，煎水，頻洗。夏用鮮，秋冬用乾的煎水洗。

一治癰驗方

沉香 乳香 丁香 木香 藿香 各一錢五

右用臘月，毋猪眼子七箇，同藥，醇好酒，蒸三炷，香露，下，值連，藥，乾，為末，煉蜜為丸，如白果大，臨臥，吞化，服，一料，効。

一治頭下卒結，喉乾，痰積。

海藻一斤，洗去鹹，酒浸，欲之，加昆布等分，為末，煉蜜為丸，如白果大，含口中，稍稍嚥下。

一治癰消塊

神効開結散

壽世保元

已集六卷

五三

沉香

木香 各二錢 橘紅 四兩

珍珠 口 十 粒 入 藥 中 以 湯 煮 之 以 湯 煮 之 以 湯 煮 之 以 湯 煮 之

猪腰子肉

四十九枚 月 解 猪 者 生 項 曲 加 棗 子 六

右為末，每服一錢，臨臥，酒調，徐徐嚥下，患小，三五服，大者，一劑，愈，忌酸鹹，油膩，滯氣之物，須用，除自，於，靜，至，修，合。

肺癰

肺寸口脈數而實者，肺癰也。其脈短而滑者，自痿，浮大者，難治。

夫肺癰者，由寒熱之氣，內合於肺，其氣結聚之所成也。蓋因調理失宜，勞傷，血氣，風寒，得以乘之，寒生熱，熱生燥，燥積不散，遂成肺癰。咳而胸滿，右脇脹痛，二脚腫滿，咽乾，口燥，煩悶，多渴，時出黃唾，腥臭，狀如糯米，湯者，難治。有膿而嘔者，不可治。嘔膿盡而止，則自愈。若吐黃色膿，或帶粉紅色者，即肺痿也。木抵脈細而沉，裏虛而變，瘕矣。

一治肺癰，吐膿，腥臭，不可聞者，肺癰也。

肺寸口脈數而虛者，肺痿也。

黃芪 蜜水 沙防風 金銀花 忍冬藤 金魚草 牛膝 桔梗 各等分

右用鴨丁一隻，縱死，開破，入前七味藥，手鴨肚內，用好酒，煮，鴨為食，鴨藥，渣，肺乾，為末，酒調，服，後，服，淨，膿，湯。

淨膿湯 此湯吃鴨後，其形。

甘草四兩，剉，作太帖，用水煎，服，如，射，不，得，吐，出，之，服，後，化痰止咳丸。

白卷一兩，枯百草霜一兩

右二味，為末，滴，水，為丸，每服三五丸。人參五味子各二錢，煎，湯，送下，作三百用。

一論治肺癰 用白鴨一隻，去內臟，用蔥，艾仁，杏仁，各一兩，入鴨腹中，俟其熟，藥，只，用，鴨肉，吃，大，能，補，肺。

壽世保元

已集六卷

五三

一論肺癰吐膿腥臭

用菹豆以病人口嚼，不覺其氣味，是肺癰也。

一論肺癰 以薏苡仁略炒，為末，糯米飲調，服入粥，煮，吃，亦可，或水煎，服，湯，下，膿，血而安。

鐸肺丹

凡治肺癰，必以此藥，間而服之，以護膈膜，不致潰透，心，肺，葉，切，斷，即，蒸，蠟，丸，用，蜜，水，送下。方見癰癧。

肺痿

肺寸口脈數而虛者，肺痿也。

肺痿之候，久咳不已，汗出過度，重亡津液，便如爛瓜，下如米脂，或乾而，不渴，渴者，自愈。欲飲者，欲痰，此由肺多，唾涎沫，而無，膿，者，肺痿也。

一論肺痿咳嗽其証碎碎燥咳胸中隱隱而痛肺弱無功
意以仁散

當歸 白芍 黃芪 人參 五味子
麥門冬 黃芩 桑白皮 百部 薤白仁
右劉生發煎服

心漏

一論胸前有孔常出血水者謂心漏也。

鹿子丸

嫩鹿茸去毛附子 炮去皮及腐花各等分

右為末聚肉為丸每服三十丸空心好酒送下

一論腸下生漏瘡如牛眼之狀膿水不止

用鹽少許安白牛乳肉然後煎以鹽煎上即瘡愈不

壽世保元

已集六卷

五十四

牛耳不帶雞腦其如其諸漏瘡外用蒜切片於瘡上煎之即愈
敷灸灸即愈

一論漏瘡血水出不止

蛇皮 燒灰三錢 五倍子

龍骨各五錢

川續斷 五錢

鹿茸少許

右為細末用津唾調厚敷處立止。

新刊醫林狀元壽世保元庚集七卷

大醫院吏目金裕雲林龔廷賢才編著

男 龔定國 校

南雅太學生張印周文卿光齋書

婦人科

婦人之病有可治有不可治者皆由其心性善惡所關也。聞有德性未良
舉止端重者盡婦道者敬翁姑親夫教子凡內助理家女工非曰桑麻
之事無不盡善者必無疾病雖或有之亦易為治也。有等逆妬嫉惡
尊凌卑惟其衣食自私自全無宗祀之念犯有七夫助無一能天怒地入
膏肓雖盧扁亦難治。子因婦識此病借立醫方以為勸戒其真前
產後等病各自有方開列于後

壽世保元

庚集七卷

婦人總論

夫婦人乃亥陰所集常與溫居榮衛和平諸疾無由而生。榮衛虛弱則百
病生焉。經云二七而天矣。至任脈通太衝脈盛月事以時上下交感則
有子矣。其天矣者不一生也。任脈通者陰用之道泰也。太衝脈盛者
血氣俱盛也。何謂之月經。月者陰也。經者絡也。過期而行經者血衰
也未期而行者血熱也。經行作痛者氣之滯也。來後或作疼者氣之
虛也。其色紫者為風黑者多痰淡者多痰如煙塵水者血不足。余考古
方耗其氣以調其經則以為人之正氣不宜耗也。太衝者氣也。任脈者
血也。氣升則升氣降則降血隨氣行無暫息若獨耗其氣血無所施正
氣既虛邪氣必勝故百病生焉。其經安詳調乎。凡心生血脾統之胃為
之元也。養其心則血生。其脾則血足。氣勝則血行。矣安得獨耗其氣
哉。此調經之要法也。行經之時保如產母一失其真為病不淺。當戒

怒莫損於衝任遂色慾其損於血海一存抑鬱宿血必停定於腰脇注於腿膝過新血擊搏則形痛不已故於四肢則麻木不仁入於血室則寒熱不定或怔忡而煩悶或入室而狂言或湧上出或歸太腸皆四氣七情之所致也余考產後一科胎前血氣用藥溫暖於理最當治法至於子和論產後出血數斗世人皆以血氣兩虛妄用溫熱之劑養血補虛止作寒治舉世皆然故有誤者殊不知如天地之孕物陰陽和合人物俱生陰陽偏勝豈得孕乎譬如瓜果在木旱花實落故文秋後十八日寸草不結乃寒不發生也今婦人終於十月而產者反為寒治則非理矣若子和之法常行溫涼溫熱之劑皆所禁也以余常用和暖之劑使血得暖以流通其氣露自盡故無後患耳况生產有難易血氣有盛衰豈可偏執一法能盡產後無窮之變焉余每經歷新產月裏用溫暖治効者十之八九用溫涼治効者百無二三此考子和之法施於月外後熱自甚陰虛潮熱往來寒行溫涼之劑故無效耳其月裏

李壽世保元 庚集七卷 二

不慎哉人子受胎雖係陽精所養賴母血而成亦若瓜果賴枝葉所蔭也今婦人終於十月而產者即瓜熟蒂懸脫落之意雖胃寒身傷食調理不宜急迫則隨手而愈間有失珍重不補十月而動胎產者猶若枝蔓瓜果有所傷也胞係腐爛胎始墮落故此得病則難愈矣昔人所謂小產傷如大產者此也凡婦人新產藥術俱虛膠理不密或冒風寒或傷飲食或惡露不通或血行過度如此四者俱能發熱身疼腹痛又不可相類而用藥也又如產後脾胃既虛或多食鷄子冷物所傷脾胃遂成傷食以致身熱氣口脈盛當行消食之藥世人多因身熱便為外感然行溫涼之藥發汗退熱胃氣轉傷豈無死者產後半月之前雖去內外之邪亦宜兼行血氣如過半月已後若有雜症不可專執產後一門治熱又宜各類中求之庶無誤認病體矣

調經諸方

一論此方調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水不調腰腹疼痛崩中

漏下血痕塊硬發軟疼痛妊娠宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內搏惡露不下結生癥聚小腹堅痛時作寒熱婦病頭四物湯

當歸身酒洗川芎 白芍藥酒炒懷熟地黃各二錢

右剉一劑水煎溫服者病加減

- 一經候難來腹中陣陣作痛作止者血氣實也用生地加黃連香附桃仁紅花玄胡索牡丹皮莪朮
- 一經水常不及期而行者血熱也用生地加黃連黃芩白芍
- 一經水常過期而來者瘦人多是血少倍當歸地黃加黃芪甘草少佐以紅花桃仁泥以為生血之引用也肥人大槩是氣虛挾痰阻滯升降然也去地黃加參芪甘草茯苓半夏陳皮香附
- 一常過期而紫黑成塊者血熱也多作腹痛用生地加香附黃連玄胡索五靈脂乳香沒藥

李壽世保元 庚集七卷 三

- 一經類而血淡色者痰多血少也用生地黃合二陳湯煎服
- 一肥盛婦人經水或三二個月一行者痰盛而胎脂閉塞經脈以葶藶湯加香歸香附蒼朮白朮
- 一經水適來適斷往來寒熱如癆者合小柴胡湯煎服
- 一經行過三五日腹中綿綿走痛者此血行而滯氣未盡行也加木香檀榔煎服
- 一經水行後而作疼者氣血俱虛也加四君子湯煎服
- 一經事欲行腰腹絞痛臨經者血澀也加川練子小茴木香檳榔玄胡索一行經時忍著氣悶後得心腹腰脇痛不可忍脈弦急不勻乃瘀血作痛也加桃仁紅花玄胡索青皮行血即愈
- 一經行不止加炒阿膠地榆荆芥穗
- 一婦人因經血過多得五心煩熱日晡潮熱加胡黃連二三服効
- 一婦人筋骨肢節痛及遍身頭疼兩手脈弦增寒如瘧母以散風止痛之

劑固効。加羌活防風秦艽官桂立効。

血崩初起不問虛實加荆芥穗炒上燒過防風升麻如不止加蒲黃炒

白木炒升麻

治血崩加荆芥黃芩香附

治崩漏加沙參益母草香附炒阿膠炒 蒲黃炒 陳皮 白木

甘草 去當歸不用

赤白帶下加柴胡升麻 酒炒各半夏薑汁炒白茯苓 蒼朮 滑石炒

黃柏酒炒知母酒炒乾薑炮升陽除濕帶自除也。

胎動下血不安加艾葉阿膠炒黃芩 白木 砂仁 香附 糯米

胎死腹中加官桂白芷麝香 一產後惡露不行加益母草桃仁蘇木

產後血虛昏暈木醒加入參白木白茯苓乾姜香附甘草

腹中氣塊加木香檳榔 一血積塊痛加三稜莪朮官桂乾漆炒

口乾煩渴加麥門乾葛烏梅 一骨蒸勞熱加知母地骨皮柴胡

壽世保元

庚集七卷

四

小便閉澀加澤瀉木通 一木便不通加桃仁大黃

虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁炒

心神恍惚加遠志酸棗仁白茯苓砂仁研

嘔加藿香半夏砂仁陳皮 一瀉加白茯苓白木蓮肉山藥炮乾姜

婦人經水先期而至血紫有塊腰痛手足冷痺口乾頭眩胸痞本方加

條芩荆芥香附小茴香胡蘆斷杜仲地榆甘草

婦人血塊作痛不可忍者加三稜莪朮青皮陳皮小茴香附吳茱萸玄

胡索木香甘草姜棗煎服。

婦人經水不行或經吐血不止本方下兩加川大黃酒浸炒一兩水煎

入童便同服立効。

婦人女子經信愆期以致鼻衄崩漏經去行本方去地黃加桃仁山梔炒

大黃酒炒甘草共七味水煎服入童便同服。

婦人經行三日後來多不止本方加伏龍肝地榆蒲黃柏側柏葉黃

連白茯苓甘草梔子十三味。因氣機加香附。脾胃虛少食加白木

一論婦人經不調或腹痛白帶或淋瀝不止或肌瘦者頭目眩暈面色

痿黃四肢無力以十全大補湯加香附陳皮玄胡砂仁阿膠沉香小茴

香吳茱萸。

一論室女十四歲經脈初動名曰天葵水至失於調理心腹脹滿惡寒

發熱頭身通疼此感寒血氣不順宜服小溫經湯和氣散主之。

小溫經湯

桂枝三分 白芷四分 羌活四分 柴胡四分 白木五分

砂仁四分 當歸酒洗 香附炒一 川芎七分 黃芩七分

熟地黃一錢甘草二分 枳殼去穢 小茴酒炒 白芍酒炒血氣

刺心腹難忍加玄胡乾漆炒各五分 咳嗽加杏仁七錢 五味子

附桔梗射右到丁劑生薑三片水煎熱服

和氣散

壽世保元

庚集七卷

五

香附炒五錢黃芩四錢 枳殼炒 陳皮 藿香

小茴酒炒 白木去蘆 玄胡索 砂仁 草果炒三錢

甘草八分 厚朴去皮五錢

右爲細末每服二錢空心米湯調下酒亦可

一論室女十五六歲經脈不通日夜寒熱手足麻痺飲食少進頭眩惡

心嘔吐腹中忽然結塊痛者此症候食生冷所傷可服。

加減四物湯

香附炒一錢當歸酒洗 川芎 枳殼炒 柴胡

白芍酒炒各黃芩 陳皮 三稜酒炒 莪朮酒炒各

熟地黃一錢白芷 玄胡索 小茴酒炒 白木去蘆炒

青皮去穢 砂仁 肉桂 甘草各五分

右到作劑水煎空心熱服身痛加羌活

一論室女十七八歲經脈不通或百日或半年顏色青黃飲食少進寒

熱往來四肢困倦頭眩目眩眩痛結塊五心煩熱嘔吐膨脹此乃脾胃
受傷血氣俱弱快食生急宜和氣血扶脾胃先以逍遙散次服加味
八物湯後服調經丸

逍遙散
當歸酒洗二分 白芍酒炒 柴胡二錢 黃芩一錢 川芎七分
熟地黃七分 半夏煨炒 七人參五分 麥門冬五分 甘草四分
右判散生薑三片水煎熱服後服八物湯下劑又可服調經丸散服
若少壯加酸棗仁炒以欬心血
加味八物湯

香附 當歸 白芍酒炒 白朮去蘆 川芎
人參 熟地黃 小茴香炒 黃芩 柴胡
白茯苓 去皮甘草 腹瀉加玄胡索枳殼乾漆 嘔吐加半夏 加其安
砂仁 手足麻痺加肉桂 咳嗽加杏仁五味子款冬花
壽世保元 庚集七卷 六

右判水煎服
調經丸
香附酒洗 白朮去蘆 枳殼炒
赤芍 陳艾醋炒 陳皮 小茴香炒 川芎
厚朴姜汁炒 熟地黃 酒蒸各一兩半 青皮酒洗 玄胡索
砂仁 三稜醋浸煨 莪朮醋浸煨 牛膝酒洗 白芷
粉草各一兩

右為細末醋打米糊為丸如梧子大每百粒空心米湯送下
○一論婦人二十歲後遇經脈動來沿身疼痛手足麻痺熱頭暈目眩
加減五積散

厚朴姜汁炒 蒼朮 米泔浸川芎 白茯苓 去皮 當歸酒洗
半夏炒 白芍酒炒 獨活 羌活 牛膝去蘆
桔梗 枳殼炒 麻黃去根 陳皮各等分

甘草三分
右判散生薑煎服○咳加五味杏仁○瀉去枳殼加肉冠
○一論婦人二十三歲經水不調或赤白帶下或如梅汁淋漓或成疔
有膿上三月者此乃氣血虛弱漸生潮熱咳嗽飲食少進四肢倦痛
火變生骨蒸即成癆瘵急當調治可服前加味八物湯四劑並服
大溫經湯

香附 八分 當歸酒洗 八白芍酒炒 七熟地黃 鹿茸酒洗 各
人參 白茯苓 去皮 白朮 去蘆 吳茱萸炒 玄胡索
川芎各五分 砂仁 陳皮 小茴香炒 各沉香三分
黃蘗酒炒 阿膠炒 肉桂 甘草各三分
右判一劑生薑三片水煎空心熱服如汗不止加酸棗仁炒黃芪蜜炒
咳嗽加杏仁五味子半粒枳殼各五分潮熱加柴胡黃芩
○一論婦人二十四五歲所服藥好加味四物六君湯

壽世保元 庚集七卷 七
加味四物六君湯
厚朴姜汁 半夏煨炒 當歸酒洗 香附酒洗 枳實炒
白茯苓 去皮 川芎 赤芍 蘇葉 檳榔
桔梗 白朮去蘆 各砂仁 紅花 黃連酒炒 各
全胡三分 陳皮四分 甘草二分

右判散生薑三片水煎空心熱服
○一論婦人二十五六歲血虛虛冷經水不調或時小腹疼痛或赤白帶
如魚腦或似米泔不分信期每日淋漓不止面色痿黃四肢無力頭
暈眼花目眩服四物補經湯兼服烏雞丸調理

四物補經湯
香附 當歸 白芍酒炒 各熟地黃 川芎各五分
黃芪蜜炒 白茯苓 去皮 白朮 去蘆 黃芩 玄胡索
陳皮各四分 砂仁 小茴香炒 人參 阿膠炒

沉香另研 吳茱萸各二分
右劉生薑三片水煎空心煎服

烏雞丸
海金沙 側柏葉 鹽水浸焙
當歸 酒洗 白木 去皮 川芎 各二兩 白芍 酒炒 熟地黃 二兩
羌活 一兩半 防風 絡 一兩 人參 一兩 砂仁 各一兩 粉草 三錢

右劉用白毛烏肉膳雞一隻不問三五年前者俱好殺淨去腸屎毛將藥
一半入雞肚中放銅鍋內好酒五盞水二瓶文武火煮至雞爛取出
取肉切細同藥酒乾為末用糯米粉酒水煮稠為丸如梧桐子大每
九空心米湯吞下酒亦可

○一論婦人二十七八歲身體虛敗經水不時淋漓或成片或下黑水
色青黃虛虛眼花四肢困倦此四五劑後服前大溫經湯一劑
止經湯

壽世保元 庚集七卷 八

常歸 酒洗 三分 白木 去皮 八分 芍藥 酒炒 川芎 熟地黃
香附 阿膠 黃芩 蒲黃 炒 側柏葉

砂仁 各七 甘草 炒
右劉生薑煎空心煎服○咳加五味子杏仁去皮○肚痛加枳殼玄胡
密乾漆○氣急加半夏蘇子各五分

○一治婦人經水來多不五月斷艾下兩好生酒炒三次磁器內入水煎
滾去渣服服立止

○一論婦人三十一二歲年年生育取血過多以致經水不調不時腹中
疼痛結塊飲食少進困倦目眩潮熱往來五心煩燥此血虛胃熱也服
紅花當歸散兼用八物湯

紅花當歸散
當歸 酒洗 八川芎 赤芍藥 熟地黃 黃芩
香附 各六分 枳殼 五分 玄胡索 五分 厚朴 姜炒 小茴香 酒炒

柴胡 陳皮 三稜 醋煨 莪朮 醋煨 牛膝 酒炒
紅花 三分 甘草 二分

右劉生薑煎空心煎服

○一論婦人三十四五歲因經水來時身熱坐臥不安於翅邊腹理處
引火入通身麻痺不能轉側肺經受風咳嗽痰盛宜服五積交加散
以消又服八物湯十餘劑

五積交加散 只可服一二劑勿多服
羌活 一錢 當歸 酒洗 川芎 獨活 白芷
厚朴 姜炒 蒼朮 米泔炒 防風 去毒 枳殼 姜炒 陳皮
半夏 姜炒 麻黃 桔梗 白茯苓 柴胡 各八分
桂皮 四分 甘草 三分

右劉生薑煎服再服去柴胡加烏藥藥各一錢酒煎服
○一論婦人三十六七歲經行太過血氣虛耗胃氣不足故經水來則
壽世保元 庚集七卷 九

八珍湯 當歸 酒洗 白木 去皮 各五分 茯苓 去皮 人參 川芎
熟地黃 白芍 酒洗 各三分 甘草 三分 加香附 八分

右劉生薑煎服○一論婦人三十八九歲經脈不行腹中有塊頭暈眼花不思飲食
血斷身餘血未盡不時攻痛成痰宜我木散逐去餘血

我木散 香附 三兩 當歸 酒洗 莪朮 醋煨 玄胡索 赤芍藥
枳殼 姜炒 熟地黃 青皮 大粒 白木 去皮 黃芩 各二兩
三稜 醋煨 小茴香 炒 砂仁 各八錢 乾漆 炒 烏州 紅花 各五錢

右為細末每服二錢空心好米酒調服

○一治婦人腹中常覺疼痛上下不定經年積血也

青皮 陳皮 三稜 莪朮 香附 烏藥 乾姜

右各等分醋煮乾為末心陳皮湯調下

○一治婦人因十二三歲經水斷絕五十二三復來或淋漓或成疔或痛下不止宜服和經湯兼四物補經湯烏雞丸相間服之可好和經湯若一帖即去熱氣香附陳皮小茴是也

和經湯

白芍 酒炒 分當歸 酒洗 熟地黃 白茯苓 黃芩 香附 白朮 去蘆 川芎 酸棗仁 炒 蒲黃 炒

阿膠 炙 各 白芷 一錢 陳皮 小茴 酒炒 各 甘草 右到每服一兩薑蔥煎服四物補經湯烏雞丸方俱見前

○一凡婦人經水不調或前或後或多或少時常頭暈眼黑耳鳴赤白帶下腰腹疼痛五心煩熱四肢沉困胸膈痞滿不思飲食肌瘦減削一切百病皆治宜此

調經滋補丸

香附米 酒醋重便湯各浸下 當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 各 懷生地 黃白 砂 錫 蒸 白朮 去蘆 炒 白茯苓 去皮 一兩 陳皮 一兩 懷山藥 一兩 山茱萸 酒蒸 去核 牡丹皮 一兩 小茴 酒炒 玄胡索 一兩 阿膠 蛤粉 炒 一兩

右為細末酒醋打糊為丸如梧子大每服百丸空心米湯送下

○一論婦人五十歲以外經水猶不斷顛倒倒不准而來當預防恐成敗血症也此丸其妙

十全丹

當歸頭 二兩 懷山藥 三兩 白朮 二兩 人參 二兩 黃芩 酒炒 二兩 白茯苓 去心皮 一兩 懷生地黃 酒拌烘乾四兩 綿地榆 二兩

鹿角霜 二兩 黃精 酒炒 黑二兩

右共為細末用艾葉三兩水二碗煎至一兩去渣入淨小麥粉六兩煎勻為熟糊和藥為丸每日空心二百五十九丸補氣養血湯送下

○一治婦人因怒生痰胸膈作痛服四物二陳本連枳殼之類不應更加祛風之劑半身不遂筋脈攣攣四肢痿軟目睛益甚因熱口乾形體倦怠息予以為醫誤後得肝氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味丸調治其病即愈

○一治婦人嗜熱肢體瘦倦飲食少無味月經不行或鼻衄或血崩久矣或用順氣消熱等劑不愈更加寒熱且時欲作嘔此乃肝怒傷脾脾胃虛火錯經妄行而然宜以補中益氣湯六味丸

○一治婦人多怒經行旬餘方止後淋瀝無期肌體瘦瘦口乾肉熱盜汗如洗日晡熱甚皆由肝脾虧損無以生後元氣以補中益氣湯加茯苓遠志麥門冬酸棗仁五味牡丹皮龍眼肉

壽世保元 庚集七卷

逍遙散方見後 補中益氣湯方見內傷 六味丸方見補益 十全大補湯方見補益

斷產方論

婦人欲斷產者不易之事雖曰天地大德曰自然亦有臨產艱難或生而不可或不正之虞為尼為媼不欲受孕而欲斷之者故錄驗方以備所用然其方頗眾且多有用水銀虫水蛭之類孕不復懷難免受病此方平和而有異驗其方後

一婦人斷產驗方

故蚕紙方圓下尺癭為末酒調服終身不復懷孕也

○一千金斷產方 油煎水銀丁日方息空心服如棗大一圓永斷不孕且不損人

○一斷子法

用白麵麵一升無灰三斗打作糊著至三升半絹袋濾去渣分作三服

候月經來且晚吃一服五更吃一服天明吃一服經事即行

經閉

脈女人尺脈微而右手脈大者其常也若腎脈微瀆或浮或沉而斷絕不勻或沉或浮而急者經閉不調之候也

丹溪曰經候有積閉不通者有不及期與逾期者有妄行者有色紫黃及淡者有成塊者有作痰者夫經不通或因脾胃不和飲食少進而血氣或因潮熱諸血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而血氣或因因痢疾失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨症用之或因心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心氣使血生而經自行矣

壽世保元

庚集七卷

十一

當歸一錢 川芎八分 白芍酒炒一錢 生地黃一錢 大黃七分

官桂四分 厚朴煨炒 枳殼一錢 枳實一錢 黃芩一錢
蘇木一錢 紅花五分 桃仁十個 烏梅一個

右劉生薑三片水煎空心溫服不效劑而奏效

○一治婦女經水不通腹中積塊癥瘕攻注別痛為服

歸尾酒洗 赤芍 白芍 青皮 三稜酒炒
莪朮醋炒各香附醋炒一烏藥七分 官桂 蘇木
紅花各五分

右劉一劑水煎入酒一盞空心服

○一治婦女經閉二三年不通脈下下塊如碗口大間或吐血或便血發熱咳嗽吐痰盜汗等症宜

養血調經丸
當歸酒洗 川芎 兩 白芍酒炒 熟地黃四兩 山茱萸酒炒

白茯苓二兩 懷山藥二兩 牡丹皮一兩 澤瀉一兩 梔子仁一兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服三錢空心淡薑湯送下

○一治婦人血痕疝腫膝下脹滿或月經不行發熱懶倦
當歸八分 桂心六分 玄胡索四分 白芍酒炒六分 血竭六分

蒲黃炒六分
右為末每服一錢空心酒調下

消積通經丸

香附米醋炒艾葉酒炒 當歸酒洗 川芎一兩 赤芍一兩
生地黃二兩 桃仁一兩 紅花酒洗 三稜酒炒 莪朮酒炒
乾漆炒一兩

右為細末醋糊為丸如梧子大每八十九臨臥淡醋湯送下

○一治婦女月經不通崩漏出血不止 付此張玉陽傳

壽世保元

庚集七卷

十三

當歸半錢 川芎一錢 白芍半錢 生地黃一錢 知母一錢

黃柏酒炒三分 桃仁一錢 紅花一錢 牡丹皮一錢
大黃酒炒一分 蘇木酒炒一分 莪朮酒炒一分 茅根

右劉一劑水煎空心服

○一治室女經水不行 翰林張明宇傳
當歸 川芎 赤芍 生地黃 荆芥穗
枳殼炒各馬鞭草一錢 牡丹皮 杜牛膝 生蒲黃各五分
桂心二分 烏梅半個

右劉一劑水煎服日三劑過期不行加澤瀉葉

○一治室女經閉咳嗽發熱屬虛弱者宜

養益通經湯
牡丹皮 當歸各一錢 白芍 生地黃 陳皮
白朮去蘆 香附各一錢 川芎八分 柴胡 黃芩各七分

右山一劑水煎空心溫服。
通經調氣湯 治症同前

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 生地黃 香附米醋炒
牡丹皮 八錢 柴胡 六錢 黃柏酒炒 大知母酒炒 牛膝酒洗 八錢
桃仁 去皮尖 紅花 二味量加

右劑十劑水煎空心一服食後一服。

一治婦人經閉不通不論新久下取良法。
下取通經丸

乳香 沒藥 孩兒茶 巴豆 去殼 血竭
葱白各五分 斑貓 五個

右為末共搗為丸每服三五丸麝香筒口上將藥緊住送入陰戶內三四寸許俟一炷香經水即下

壽世保元 庚集七卷

十四

一治婦人月氣素弱或經閉或經水三月不行此乃悲傷傷肺以補中益氣湯加桔梗貝母兼進六味丸

一治婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎前之藥不應余診視之曰面青脈滿寒熱往來肝經血病也此驚恐傷脾肝之症非胎也不信仍用胎前散不應余用加味歸脾逍遙之藥各二十餘劑諸症漸愈彼欲速效別服通經丸藥下腹下血皆憤自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用人參炮姜一劑漸愈又用十全大補湯五十劑而安

一治婦人久患瘧形體怯弱內熱晡熱自汗盜汗飲食少思月事不行或不通經九虛癆悉具此因虛而致瘧因瘧以閉經也用補中益氣湯及六味地黃丸瘧愈經行

一治婦人性沉多慮月經不行的胸膈食少或作脹或吞酸予以爲中氣虛寒用補中益氣加砂仁香附煨姜一劑而胸膈和飲食進更以六君加芎歸貝母桔梗生姜大棗數劑脾胃健而經行調矣

一治婦人經閉不通不論新久下取良法。
下取通經丸

崩漏

婦人漏血下赤白且下血數升脈急者死。又曰尿小虛滑者生。太緊實數者死。又云尺寸脈虛者漏血脈浮不可治也。夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脈虛損故也。衝任任脈之海皆起於胞內而手太陽小腸之經也。少陰心之經也。此二經上爲乳汁下爲月水婦人經脈調適則月水依時若勞傷衝任氣虛不能制其經脈血非時而下淋漓而不止謂之漏下也。致五臟傷損。

壽世保元

庚集七卷

十五

色隨臟不同若五臟皆虛損者則其色隨血下其脈寸口弦而大弦則爲藏大則爲芤藏則爲寒芤則爲虛虛寒相搏其脈爲芤婦人即半產而漏下。又云尺脈急而弦大風邪入少陰之經女子漏自下赤白下下赤白不止脈小虛滑者生脈太緊實數者死也。又漏血下赤白日下血數斗脈急疾者死遲者生也。又云尺寸脈虛者漏血脈浮不沉治也。若經候過多其色紫黑甚者崩下吸吸少氣膈腹吞酸則汗出如雨尺脈微小由衝任虛寒爲風寒客乘胸中氣不能固可灸關元百壯在臍下當中三寸

一治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下冰漿之物皆因飲食不節勞傷所傷或素有心氣不足致令心火乘脾必念情嗜甘則倦乏力氣短氣急脾去滋榮周身者也脾胃虛而心胞寒之故漏下月水不調也。况脾胃爲血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑風氣上衝以勝其濕又六火轉則發之宜用

升陽...

當歸酒洗五錢半 蒼朮一錢半 升麻一錢 防風一錢 羌活一錢半 獨活五分 蔓荊子七分 甘草多一錢

右剉作三劑水煎空心溫服少時以助氣脈之可平服而愈又灸足太陰脾經血海穴二十七壯此藥乃從權之法因風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以收其血之暴崩也往後必須服黃芪人參當歸炙甘草之類數服以補之

一治婦人崩漏多因氣脈使而下者

黃芪五分 人參五分 白朮一錢 當歸身酒洗一錢 川芎五分 白芍酒炒一錢 熟地黃一錢 香附黑一錢 蒲黃炒五分 地榆五分 升麻三分

右剉一劑水煎空心服

壽世保元

原集二卷

一六

一治婦人經水過多不止者

樗根皮七錢 白芍炒一兩 黃芩炒一兩 龜板多一兩 黃柏炒三錢 香附子重便沒一宿二錢半

右為末酒糊為丸如梧子大每服五十丸空心溫酒白湯任下

一治婦人血崩氣血兩虛而兼熱者

當歸酒洗一錢 川芎七分 人參一錢 黃芪一錢 防風八分 荆芥一錢 白芍酒炒八分 真阿膠炒一錢 艾葉炒一錢 蒲黃炒一錢 黃連酒炒一錢 黃芩酒炒一錢 白朮炒一錢 生地黃一錢 姜汁炒一錢 地榆一錢 山梔子炒黑一錢 甘草生三分

右剉一劑水煎空心溫服或臨睡煎服

一治婦人血崩或作肚腹刺痛者

蒲黃炒 五靈脂 官桂 雄黃 甘草各一錢 右剉一劑水煎服一錢姜湯調下

一治血崩崩露去多心神恍惚... 復元養榮湯

遠志肉五分 人參一錢半 酸棗仁一錢 黃芪一錢 荆芥八分 白芍酒炒一錢 當歸頭一錢 地榆一錢 白朮一錢 甘草三分

右剉棗一枚水煎服如虛極發喘不省人事口噤以醋灌其口又將鐵錐燒通徑入醋碗內沸起醋氣薰蒸鼻息此產後消渴法

一治婦人經候凝結黑血成塊左癱右瘓血脫竭于下既久經候不調水泄日三四行食能煩心飲食減少人形瘦弱此皆氣血虛人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務也其能生血陽生陰長之理人身以穀氣為寶故先理胃氣為要 益胃升陽湯

黃芪酒炒一錢 人參一錢 甘草多一錢 陳皮一錢 白朮去蘆二錢

壽世保元

原集三卷

十二

當歸一錢 柴胡五分 升麻五分 神曲炒一錢 生薑各二分 右剉一劑水煎服

一治婦人血崩... 腹痛加白芍三分中桂少許如口乾作渴加葛根五分

一異人傳授秘方治血崩如神

金鳳膏 白毛烏肉雄雞一隻用死水泡去毛去腸雜不用將金櫻子之根洗淨切片裝入肚內酒煮令熟去藥將雞酒任意食之

一治血崩試効方

懷生地黃用砂仁陳皮煎牡丹皮六分 石棗酒蒸去核六分 懷山藥五分 條芩酒炒八分 蒲黃六分 炒阿膠八分 香附酒炒六分 白芍酒炒八分 白朮六分 黃連八分 陳皮五分 甘草一分

右合一劑生薑三片棗一枚不拘時服

一治婦人五十以上經脈暴行內經曰火主速不可以冷病治之如丁

峻藥即死，止可... 後用四物湯... 和經可也。

一方治血崩... 用槐花... 每服三錢...

一方治血虛... 內熱血不... 崩桂心...

一方治血崩... 用益智仁... 每服二錢...

一方用乾... 為粗末... 入罐內...

一方雞子... 一個去黃... 入銀朱...

壽世保元 庚集七卷 一八

一方五靈... 煎炒... 每服一錢...

一方香附... 米炒黑... 為末每...

一婦人崩... 漏面色黃... 或赤時...

益氣湯... 加防風... 白芍黃...

一女子漏... 下惡血... 月經不...

止皆因... 飲食不... 節勞倦...

漏下月... 水不調... 也况脚...

防風... 活薑... 荆子...

一婦人... 經行太... 過血氣...

一婦人患... 崩過服... 寒涼之...

帶下

婦人帶... 下木極... 之病脉...

痒痛則... 生疔... 眩則陰...

婦女下... 白而... 不甚...

擾而不... 澄清... 然耳...

謂之帶... 下屬於... 心胞...

淋原乎... 心胞... 係於...

云崩中... 日久... 為白...

之此乃... 窮源... 探本...

壽世保元 庚集七卷 一九

及以... 牛... 補... 之...

損傷以... 致腐敗... 而來...

增遂其... 醫或... 非醫者...

內固九... 十六... 味保元...

黃芪一... 錢 人參... 二錢...

巴戟肉... 二錢 石斛... 七分...

物... 能奏效者宜六龍固本丸大効

○一論此藥能生... 孕男婦元氣充足... 產後虛者血山崩... 得孕婦及諸虛皆有殊効者也

六龍固本丸
懷山藥 四兩 巴戟肉 四兩 山茱萸肉 四兩 川練子肉 五兩 黃芪 二兩
小茴香 一兩 補骨脂 二兩 補腎脂 二兩 補腦脂 二兩 補髓脂 二兩
人參 二兩 蓮肉 二兩 木瓜 一兩 用水三碗煎至一鐘排上三味
同微炒乾為度
當歸身 二兩 生地黃 二兩 白芍 一兩 川芎 一兩
四味用童便二鐘好酒一鐘拌浸下日煨又湯又煨乾

壽世保元

庚集七卷

二十

右為末用班龍膠一粘和九如梧子大每服百九空心淡鹽湯下
班龍膠方見補益人多難得子常用煉蜜為丸服之亦効
○一治婦人經水不調臍腹冷痛赤白帶下子宮虛冷久無子息先宜服
五積散加香附吳茱萸小茴入米糖一塊煎服減糜黃後服此丸藥

白鳳丹
嫩黃芪 燻水 人參 去蘆 白朮 去蘆 白茯苓 去皮 當歸身 酒洗
川芎 白芍 酒炒 肉桂 大附子 剉碎 去皮 酒洗
川乾姜 炒 胡椒 小茴香 酒炒 破故紙 酒炒 艾葉 酒炒
烏藥 二兩 各吳茱萸 炒 甘草 各一 香附米 醋炒 六兩
蒼朮 米泔浸炒 四兩
右剉片用白毛烏肉雞一隻重二斤死水泡去毛屎并頭尾不用放
鍋內將藥片蓋上入好酒煮爛為度取去骨同藥在鍋焙乾為末將
雞酒汁打稀米糊為丸如梧子大每服五十九空心好酒送下

一治婦人赤白帶下宜
補中益氣湯 加黃柏知母香附半夏川椒蘇川練子肉黃芪先服此湯
次進後丸藥

歸附地黃丸
當歸 酒洗 川芎 一兩 白芍 酒炒 熟地黃 酒蒸 香附子 酒洗
黃柏 去皮 酒洗 知母 去心 酒洗 陳皮 一兩
五味子 半兩 蒼朮 米泔浸炒 五錢 椿根皮 酒炒 一兩
一方有白朮化一兩一方無五味有山茱萸肉二兩○人虛時
右為細末酒糊為丸如梧子大每服五十九空心淡鹽湯下後用乾物
壓之忌葱白蘿蔔胡椒煎炒發熱之物
○一治婦人赤白帶下用
滋源丹
當歸 酒洗 熟地黃 酒蒸 斷文 酒炒 各 香附 酒洗 川芎

壽世保元

庚集七卷

三

人參 各一兩 白芍 酒炒 阿膠 粉炒 白朮 去蘆 芡米 米泔
椿根皮 酒炒 黃柏 酒炒 各 地榆 七錢 白茯苓 去皮 白石脂 火炒
右為細末米醋糊為丸如梧子大每服五十九空心米湯送下
○一治婦人赤白帶下上熱下寒口出惡氣或咽乾或牙痛或耳鳴或流
身流注或痛或發熱增寒或口吐酸水或心腹氣痛或下五色膿其用
清玉散

當歸 酒洗 川芎 赤芍 生地黃 陳皮
半夏 姜製 白茯苓 蒼朮 米泔浸 香附 黃連
黃芩 柴胡 去蘆 升麻 牡丹皮 甘草
右剉一劑生薑煎服
○一治婦人白帶其効如神 心身疑傳
硫黃不拘多少將豆腐副去中一塊入硫黃居上仍用豆腐蓋住砂
鍋底放稻草鋪之放豆腐於內上仍用草蓋入水煮一日頻添水

至豆腐黑為度取出硫黃研為末將白芍紙包水濕火煨切片為末各等分合下處和勻水打麪糊為丸如梧桐子大每早空心用五分好燒酒一鍾送下服五日後即愈如未愈每早服一錢服至五日全愈

○一治婦人白帶男子白濁下淋
乾薑炮一兩 百草霜一兩 為末每服一錢溫酒調下

○一治婦人赤白帶下不論年月深久不瘥
乾薑炒黑五錢 白芍酒炒二兩

右為細末每服一錢空心米飲調服

又方 白雞冠花為末每服三錢空心酒調下赤帶用赤雞冠花用鹿角燒灰存性為末好酒調下空心服二匙

又方 雞子開頂入硫黃末三分濕紙裹火煨嚼吃好燒酒下

又方 蒼朮米泔浸焙乾姜炮各等分為末每服二錢空心酒調服

又方 白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰炒焦為末清米飲空心調服

壽世保元 庚集七卷 三

又方 硫黃五錢炒化胡椒四十九粒為末好酒調服

又方 硫黃五錢用烏梅肉三錢搗丸黃豆大每五九空心酒送下

又方 黃荆子炒焦為末空心米飲調服以能燥濕痰也亦可治心痛治赤白帶下

五倍子炒桃仁炒去皮尖各等分為末每服二錢空心燒酒調服

○一治婦人久患白帶瘦削無力倦怠微腫腰膝痠痛飲食無味面黃目腫煩熱小便淋瀝以十全大補湯去粘加車前子地骨皮鹿角膠大獲全效

○一婦人帶下四肢無力蓋四肢者土也此脾胃虛弱濕痰下注以補中益氣湯兼歸脾湯二藥治之愈

○一婦人年踰六旬內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下或用化痰行氣前症益甚飲食愈少肢體或麻或燥服祛風化痰體虛麻手足或冷或熱日漸消前此症屬脾氣虛弱而不能治肺祛風之劑復損諸經也當滋化

源以補中益氣湯加白茯苓半夏炮乾薑如聖丹

白礬 蛇床子各等分

右為末醋糊為丸如彈子大服脂為衣薄綿裹留指線二尺許懸於深火五戶中定坐半日熱極而換大抵此疾多因子宮不潔胎毒未盡

○一治婦人帶下腸有敗膿淋瀝不已腥穢甚甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿所致卒無已期須以白礬乃已

白芷一兩 單葉紅荻根二兩芍藥白者 白礬各五錢枳殼另研除為末同以蠟丸梧子大空心飯前米飲下十九或十五九種藥仍別他藥補之

五積散方見中寒補中益氣湯方者為十全大補湯方者為歸脾湯方者為

虛勞

壽世保元 庚集七卷 三

夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者世有空女童男積想在心思慮過當多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉何以致然蓋憂愁思慮則傷心傷心則血逆竭血逆竭則神也先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虛故咳嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒怒發焦筋脈變五臟至此成勞最為難治或有以為血熱用涼藥解殊不知血得熱則行冷則凝九經水少漸至不通手足骨肉煩疼漸至羸瘦漸生潮熱脈來微數此陰虛血熱陽往乘之水不能滅火火逼水涸當養陰血慎勿以藥通之

○一論治婦人以血旺氣衰為本心生血肝藏血令血衰而氣感者由心氣虛耗又不能生血又不能制乎肺金使肺氣得以乘乎肝木肝之虛損則不能藏血漸至枯涸不榮經絡因月信不調矣此藥專補心元之虛抑其肺金之盛調和榮衛滋養血脈其疾自愈諸治氣血過多虛勞發熱及吐血衄血咳嗽喘上塞胸膈不舒虛勞熱嗽痰喘無汗等症

茯苓補心湯

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 懷熟地黃 陳皮
半夏酒炒 白茯苓去皮 桔梗去蘆 枳殼去穢 延胡索
乾葛 紫蘇各七分 人參 木香各五分 甘草三分

右劉一劑生薑菓子煎服。
○一論婦人諸虛百損五勞七傷經脈不調肢體羸瘦此藥專調經水滋

血脈補虛勞扶元氣從脾胃養心神潤腸燥清頭目定心驚安神魂是
潮熱除骨蒸止喘嗽化痰涎及盜汗在血為開胃氣利腸腑除積滯
煩渴散寒熱祛體疼大有奇效不能盡述
濟陰至寶丹

當歸酒洗 白木去蘆炒 白芍酒炒 白茯苓去皮各生 知母去毛
貝母去心 香附酒便炒 地骨皮 麥門冬去心 陳皮去心
薄荷 柴胡 甘草各三分 右劉一劑生薑菓子煎服

壽世保元

庚集七卷

二五

○一論婦人經絡失血少條絲熱盜汗或思慮傷脾不能攝血以致妄行
或淫心怔忡驚悸不寐或心脾傷痛嗜睡少食或夢思傷脾血虛發熱
或肢體作痛大便不調或經候不准肺熱內熱或癩癧流注癰疽疔毒
歸脾湯

黃芪蜜水炒 人參 白木去蘆炒 白茯苓去皮 當歸酒洗
遠志制碎 冰酸棗仁炒 龍眼肉絡 一木香 甘草炙 各五分
右劉一劑生薑菓子煎服

加味歸脾湯
治痰血已去或脾經失血小腹脹痛無痛發熱盜汗或脾傷不能攝血
或心脾傷痛嗜睡少食或夢思傷脾血虛發熱或肢體作痛大便不調
或經候不准肺熱內熱等症依前方加紫胡梔子丹也
○一論婦人血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏沉心忪煩赤口燥咽
乾發熱盜汗或食嗜酸及血熱相搏用木香不調膈腹脹痛寒熱如痢及

治室女血弱陰虛寒衝不和痰涎潮熱肢體羸瘦以致骨蒸勞熱宜
逍遙散

當歸 白芍酒炒 白木去蘆炒 白茯苓去皮 柴胡
甘草多一錢

右劉煨薑一塊入薄荷少許水煎溫服。○加牡丹皮山梔仁炒 名加味
逍遙散

一婦人發熱齒痛日晡甚甚月水不調此脾經血虛加升麻去心 柴胡
復痛仍以前藥加川芎而瘳

○一論婦人虛勞血氣脾胃虛損之極發熱痰嗽喘急之甚損火妄動肌
肉消削內股沉困夜出盜汗精神短少或大便稀瀉或腹中積塊或癯
母癯瘦面黃肌瘦百藥罔效宜

五仙湯
嫩黃芪蜜水 揀參去蘆 白木去蘆炒 當歸酒洗各 甘草炙 一錢

壽世保元

庚集二卷

三五

右劉一劑龍眼五個蓮肉七個水煎溫服。○有熱加地骨皮知母。○嗽
加五味子桑白皮。○痰加貝母半夏。○渴加五味子麥門冬。○吐血加
生地黃犀角玄參茅根油。○血虛加熟地黃白芍藥。

○一論婦人血氣兩虛五心虛熱或白帶頻頻注下先賢有云婦人性悍
必多燥火且少有不如意處心中燥急感池之火上騰五心如烈也宜
十珍飲子
懷山藥半 杜仲蜜炒 人參一錢 白木去蘆 懷生地黃半
白茯苓去皮 當歸一錢 川芎七分 白芍酒炒 一 甘草三分

右劉煨二枚燈心七莖水煎空心服。
○一治肝膽經寒熱往來晡熱潮熱身熱熱不飲食或怒火口苦耳
聾或咳嗽熱或脇痛膝痛轉側不便兩脇痞悶或瀉痢或嘔吐酸水宜
小柴胡湯
柴胡二錢 黃芩一錢 半夏七分 半夏一錢 甘草五分

右劉一劑薑棗煎服

加味小柴胡湯

治肝膽經風熱耳前後腫痛或結核癩癧或寒熱嘔熱或經候不調等症即小柴胡湯加梔子牡丹皮

○一論腎虛發熱作渴嘔痰小便淋瀝頭暈眼花咽燥唇裂齒不堅肉腰腿酸軟自汗盜汗便血諸血失痞水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑

六味丸

懷生地 自製入兩用酒 山茱萸 酒蒸乾山藥 各四 牡丹皮 白茯苓 去皮澤瀉 各三兩

右為末煉蜜為丸梧子大每服三錢空心白滾水下

○一論婦人經水不調或不通虛勞吐血衄血咳血便血發熱咳嗽盜汗痰喘心慌一切虛損勞怯骨蒸老鴛等症並皆治之此方作湯服亦可滋陰地黃丸

壽世保元

庚集七卷

三七

懷熟地黃 四兩 懷山藥 二兩 山茱萸 酒蒸去核二兩

白茯苓 去皮 牡丹皮 澤瀉 去毛各二兩 麥門冬 去心

生地黃 酒洗 知母 去毛 貝母 去心 當歸 酒洗 白芍 酒炒

香附米 童便浸炒各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空心鹽湯送下痰唾痰涎湯送下

○一論婦女五勞七傷虛勞骨蒸五心煩熱心虛怕驚經水或前或後或淡白或紫色時常注帶下或因煩勞性氣惱怒產後失調致赤白帶滲

及夜臥身熱上下疼痛及午後神疲腰酸腿酸倦或心嘈又時飽悶及夢寐不消或衝任二脈結癥瘕隱隱又服大有功效

白鳳丹

真正白絲毛烏骨雄雞一隻先以黃芪末二兩當歸末二兩甘草末五錢三味和米粉七合勻作七分調成小塊雞食之約有六七日即死不

出血去毛腸不用

當歸身 酒洗川芎 二兩 白芍 酒炒三兩 懷生地黃 酒洗五兩

天門冬 去心兩 人參 一兩 丹參 水洗三兩 山藥 三兩 山茱萸 酒蒸去核三兩

小茴香 酒炒 懷牛膝 去蘆酒洗 木瓜 一兩 鹿角霜 四兩

知母 炒三兩 秦艽 去蘆二兩 銀柴胡 二兩 胡黃連 一兩 鱉甲 醋炙一兩

生甘草 一兩 麥門冬 去心二兩

右俱製如法剉勻將雞切作小塊俱盛於磁罈內用水二分好酒二分米醋一分罈口用柿漆紙封固置大鍋內桑柴火煮三晝夜取出日晒夜烘一乾又入汁拌又烘晒以汁盡為度為極細末煉蜜和柱千餘下

九如梧桐子大每服百丸空心淡鹽湯送下

○一論婦人為癸母吐血咳嗽發熱盜汗經水不行此悲傷脾以補中益氣湯加桔梗貝母知母炙服歸脾湯送下六味丸

壽世保元

庚集七卷

三七

從脚起乃無根之火也以下全大補湯加麥門五味子

○一婦人患勞嗽不時發熱或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚汗口乾兩足如炙遍身皆熱昏憤如醉良久熱止方覺或喘熱至且方止此陰血虛而陽氣弱也朝用六味丸料夕用十全大補湯月餘諸症稍愈更兼以補中益氣湯兩月餘而愈

求嗣

易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生則絪縕者升降凝聚之謂也媾精者配合交感之謂也必二氣合則生且生矣否則獨陰不成孤陽不生理有必然者知此則人之不成孕育者豈無由哉抑豈未始竟無二交媾之遇哉遇而不適其會是亦獨陰孤陽之謂也不知者謂於天命則泥矣間雖有鴛為資藥餌以養精血候月經以種孕育之說又多峻補以求詭遇則求嗣未得而害已隨之予之痛惜也矣矣夫

之道有四一曰擇地二曰養稜三曰乘時四曰投虛是也蓋地則母之血也種則父之精也時則精血交感之會也虛則去舊生新之初也予嘗聞之師曰母不受胎氣勝血衰故也病則傷於寒熱感於七情氣凝血滯榮衛不和則經水先後不一多寡不均謂之陰失其道何以能受父不種子氣虛血弱故也弱則原於色慾過度傷損五臟五臟皆有精而藏於腎精既弱譬之射者力微矢在安能中的謂之陽失其道何以能施究斯二者皆由己之不能自寬以至真元耗散陰陽枯遂成不孕者多矣動輒歸咎天命不亦謬哉故必地盛則種可授又必時適而俱得焉則未有不懷孕而生子者矣雖然至難養者精與血至難通者時與虛苟不憑以藥餌之力示以調攝之宜候以如期之法則養與通者竟茫然矣是知種子之法以調經養精為首而用藥須審乎和夫婦尤必各相保守旬月之間可使精血俱盛而待時也常夫月經一來即記其時而養以子時辰乃兩日半也至此積穢湯液既新血

壽世保元

庚集七卷

三六

初生所謂時與虛者俱會其常此時而有入道之感雖平生不孕者亦孕矣尚何疑哉是乃屢試屢驗百發百中者也嗚呼是說也豈非道云乎哉蓋培植元氣顧養天真特資藥力以佐助之所謂人定亦可以勝天者是也及其既孕將欲要定生男女先以父生年丁亥在上母生年一亥在下以受胎月居中是乾坎艮震陽象也是巽離坤兌陰象也可預知其年其月為生男其年其月為生女可預定焉予敢統編圖後編者告

壽世保元

父母之年上下舉 坐胎之月為中主 乾坎艮震是男 巽離坤兌是女 筭男却生女 三五九歲死 筭女却生男 終以鬼來纏 若是正胎者 壽考不須言

乾三 坎三 艮三 震三 巳上是男胎 巽三 離三 坤三 兌三 巳上是女胎

千金種子方
進火之時至陰節間而止不兩則過子宮蓋深則少陰之分肅殺之方何以生化淺則厥陰之分融和之方故能發生所以受胎之處在淺不在深也非經後不可用事經後十日男一百女三百男此外皆不虛胎太風大雨太寒太暑陰晦日月蝕皆不可交我生子疇冀瘖瘡四體不完且自損壽

一論九婦人無子多因七情所傷致使血衰氣盛經水不調或前或後或多或少或色淡如水或紫如血塊或崩漏帶下或肚腹疼痛或子宮虛冷不能受孕宜進此藥而効可通神

調經種玉湯 女參 桃 范 川 傳
當歸身 酒洗 川芎 四錢 白芍 酒炒 三錢 熟地黃 酒蒸 白茯苓 去皮 三錢 陳皮 三錢 香附米 炒 六錢 吳茱萸 炒 四錢 玄胡索 三錢 牡丹皮 三錢 若先期三五日色紫者血虛有熱也加條芩三錢

壽世保元

庚集七卷

三九

若過期經水色淡者血虛有寒也加官桂 桂枝 炒 艾葉 炒 各二錢 右制作四劑每劑用生薑三片水一碗半煎至一碗空心服服後煎臨服時經至之日服起一服下劑藥盡經止則當交媾即成孕矣若未成孕經當斷絕俟經來再服四劑必孕無疑矣百發百中一論此方常服順氣養血調經脈益子宮療腹痛除帶下種子屢効不可盡述

種子濟陰丹
香附米 四兩 一兩醋浸 一兩酒浸 一兩米泔浸 一兩薑便浸
各浸三日焙乾為末 益母草 二兩 巳上二味忌鐵器
艾葉 醋浸炒 真阿膠 蛤粉炒成珠 二兩 當歸 酒洗 一兩 川芎 一兩 白芍 酒炒 一兩 懷熟地黃 姜汁炒 二兩 陳皮 去白 一兩 半夏 湯洗 姜汁浸 香附 白茯苓 去皮 白朮 炒 二兩 條芩 炒 一兩 牡丹皮 酒洗 吳茱萸 湯洗 玄胡索 四錢 小茴香 鹽酒炒 五錢

沒藥五錢 川續斷一兩 麥門冬一兩 甘草炙三錢
 右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服白丸空心米湯送下溫酒亦
 俱可氣虛加參一兩 一左加山藥石棗各一兩
 一論孕者子嗣全在調經理脾血氣充旺調其經候去其妬忌其服空
 方自然有子

調經月事湯

當歸一錢 川芎七分 白芍酒炒 熟地黃酒炒 陳皮八分
 白朮一錢 香附酒炒 砂仁三分 丹參五分 條芩酒炒 一錢
 甘草四分 水煎空心服
 先期者熱加黃連黃芩汁炒七分 倍黃芩 後期者血虛加黃芩
 一倍 倍黃芩 腹痛者加玄胡索 牡丹皮各一錢 發熱加
 柴胡地骨皮 赤白帶下加柴胡升麻 俱酒炒各七分 及黃芩汁炒
 白茯苓者木 米泔炒 黃柏知母俱酒炒 乾薑炮 升麻酒炒也 肥膩

壽世保元

庚集二卷

三

者聚脂滿子宮加商星半夏者木茯苓 瘦弱者血少不能攝精信
 芎歸 經血過多加炮姜五分 荆芥穗炒八分 地榆九分 經閉不
 通加桃仁紅花蘇木 氣虛者加黃芪藥陳皮香附柴胡
 一治婦人胎血不足久無子者能便胎孕
 六味地黃丸方是虛勞依本方全料加薑使炒香附二兩煉蜜為丸服
 為鳳丸

香附米一兩 白芍一兩 陳皮一兩 白朮一兩 去蘆陳土炒一兩
 山藥一兩 小茴香二兩 吳茱萸酒洗 水浸去 淮肉一兩 心皮
 酸棗仁一兩 大附子一個 看忠 黃芪酒洗 阿膠酒炒
 黃柏一兩 知母一兩 懷生地黃酒洗 砂炒 肉桂一兩
 右用雄鷄骨雞一隻 帶死去毛 尿淨 蒸熟 搗爛 同前藥末煉蜜

九每服二錢 臨經之日 每日三服 半月見效 多服 恐生 雙胎
 補天育嗣丹 大方 伯王如水膏

嫩鹿茸 酥炙 虎骨 酥炙 敗龜板 酥炙 補骨脂 鹽水炒 二兩
 懷生地黃 法製 碎者不用 煎藥 入 兩好酒浸一宿 山茱萸 酒洗
 懷山藥 四兩 白茯苓 去心 三兩 三兩 瘦弱乾再後 牡丹皮 酒洗
 澤瀉 二兩 天門冬 去心 皮 二兩 三兩 三兩 甘枸杞子 酒當歸身 酒洗 四兩
 右忌鐵器 為細末 用

紫河車 一具 此乃混池皮也 又名混元衣 取首身胎者 先用米泔水
 洗淨 此乃初結之真氣也 再入長流水浸一刻 以取生氣 取回入碗內
 放砂鍋內 蒸一日 極爛 如糊 取內先傾自然汁 在藥末內 略和勻 此不
 元正氣汁也 將河車 放石臼內 杵如泥 却將藥末 同杵勻 為丸 如乾
 加些煉蜜 秤勻 為丸 如指子大 每服三錢 空心 溫酒 送下 忌 三百 此生
 天元真氣 以入 補氣 玄妙 不可 言也

壽世保元

庚集七卷

三

續嗣壯元丹 種子天下第一方
 嫩鹿茸 酥炙 真沉香 一兩 肉蓯蓉 酒洗 去甲 一兩 天門冬 法心 一兩
 麥門冬 法心 一兩 揀參 一兩 熟地黃 酒洗 二兩 巴戟 法心 一兩 甘枸杞子 一兩
 山藥 四兩 栝子仁 四兩 白茯苓 法製 五兩 一兩 山茱萸 酒洗 法
 當歸 酒洗 一兩 川杜仲 酒洗 一兩 牛膝 法製 一兩 鹿角 法製 一兩 鹿角 法製 一兩
 小茴香 一兩 鹽炒 破故紙 一兩 何首烏 米泔浸 一兩
 石菖蒲 去毛 一兩 朱砂 五錢

右為細末 酒打麵糊 丸如梧子大 每服四十九 空心 溫酒 湯下 忌 糖酒
 胡椒 乾姜 煎炒 之物 專治 虛損 傷事 不舉 少弱 多情 願 必 腎 不 交 難
 成 子 嗣 遺 精 白 濁 五 勞 七 傷 切 虧 損 之 疾 無 不 應 驗 臨 臥 再 進 三 服
 魯府 遺 種 子 藥 酒 方
 白茯苓 法製 大紅棗 法製 法製 取
 白蜂蜜 又加 糖 漿 入 前 三 味 攪 勻 再 用 棗 皮 大 兩 入 棗 餅 內

黃芪蜜炙 人參 白朮去蘆 當歸 川芎
 白芍炒 生地黃 熟地黃 小茴 甘枸杞子
 覆盆子 陳皮 沉香 木香 官桂
 砂仁 甘草各五錢 乳香 沒藥 遠五味子各三

右為細末共入蜜罐內和勻每葉封口麪外固入罐內木柴火煮三炷香取出埋于土中三日去火毒每日早晚二時男女各飲數合勿令大醉安規定規改易容顏添髓駐精補虛益氣滋陰降火保元調經壯筋骨潤肌膚白再黑齒落更生目視有光心力無倦行步如飛身壯不羸能除百病交媾而後生子也神不可傳與非人醫之寶之

一治婦人子宮虛冷帶下白淫面色萎黃四肢酸軟痛倦無力飲食減少經脈不調血無顏色肚腹時痛久無子息服藥更其戒氣惱怒忌食冷食其効如神

艾附暖宮丸

壽世保元 庚集七卷 三三

香附米 蘇合香 三兩 當歸 三兩 川芎 二兩 白芍 酒炒 二兩
 懷生地 酒蒸 一兩 黃芪 蜜炒 二兩 川續斷 一兩
 吳茱萸 三兩 官桂 五錢

右為細末醋糊為丸如梧子大每五十九空心淡醋湯下

一論婦人氣盛於血變生諸症所以無子者常頭暈腦滿怔忡皆服抑氣散

香附米 童便 白茯苓 去皮 木一
 右為末每二錢空心滾水調下

一論婦人妬嫉懷夫無子蓋正土公朝小人忌之美色入室步妬妬之成宜此可免妬忌之病也

去妬丸

天門冬 去心 赤黍米 去殼 微炒 慧波仁 去殼 炒 各四兩
 右為末煉蜜為丸每服百丸食後白湯送下婦人常服則不妬也

姪娠

經云陰陽別謂之有子此是氣血和調陽施陰化也診其手少陰脈動甚者姪子也少陰心脈也心主血脈又腎名胞門子宮尺中腎脈也尺中之脈按之不絕者姪娠脈也三部沉浮正等按之無斷絕者有娠也又左手沉實為男右手浮大為女左右俱沉實生二男左右俱浮大生二女又尺脈左偏大為男右偏大為女左右俱大產一子又左右手尺脈俱浮為產二男不兩女作男生俱沉為產一子不兩男作女生又左手尺中脈浮大者男右手尺脈沉細者女又得大陰脈為男得太陽脈為女大陰脈沉太陽脈浮欲知男女遺面南行還復呼之左迴首是男右迴首是女又看上面時夫從後急呼之左迴首是男右迴首是女婦人姪娠其夫左邊乳房有核是男右邊乳房有核是女

姪娠一月名曰胎形飲食稍酸美受御宜食大麥無食腥辛之物是謂

壽世保元 庚集七卷 三三

水貞足厥陰之足厥陰者肝之脈也肝主血一月之時血流滋潤不出故足厥陰之足厥陰穴右足大指歧間白肉際是

姪娠二月名曰胎氣無食腥辛之物居必靜處男子勿勞百節皆痛是謂始藏也足少陽之足少陽者膽之脈也主於精二月之時兒精成於胞裏故足少陽之足少陽穴在足小指間本節後附骨上寸陷中者是

姪娠三月胎當此之時血不流形像始化未有定儀見物而變欲令見貴盛公主好人端坐莊嚴不欲令見僂僂僂僂惡形人及猿猴之類無食姜兔無食刀繩欲得男者操弓矢射雉鷄乘肥馬於田時觀虎豹及走犬其欲得女者則著簪珂環珞弄珠璣欲令子美好端正者數觀白磁美玉看孔雀食鯉魚欲令兒多智有力則噉牛心食木及雞子腎良虛德則端心正坐清虛和一坐無邪立無偏倚行無邪態且無邪視耳無邪聽口無邪言心無邪念無妄喜怒無得恩感食無邪腐

胎無氣足思欲瓜果酸味酸腐好芬芳惡臭是謂外象而變也
手主心主養之手心主者脈中精神內屬於心能混神故手心主養之手
心主穴在掌後橫文是診其妊娠脈滑疾重以手按之散者胎已三月
也

孕後四月之時始受水精以成血脈其食宜稍粒其養宜魚雁是謂盛養
以通耳目而行經絡洗浴遠避寒暑是手少陽養之手少陽者三焦之
脈也內屬於府四月之時見六府順成故手少陽養之手少陽穴在手
小指間本節後一寸是也診其妊娠四月欲知男女左脈疾為男右脈
疾為女左右俱疾為生二女當此之時慎勿瀉之必致產後之殃何謂
也是手少陽三焦之脈內屬於三焦形體和心志節飲食

妊娠五月始受火精以成其氣此必身起洗浣衣服深其屋室厚其衣
朝吸天光以避寒熱其食宜雜麥其養宜牛手和以菜羹調以五味是
謂養氣以定五臟者也一本云宜食魚鱉是太陰養之足太陰脾之脈

三寸也診其妊娠脈平手按之不脈在疾不滑者五月也又其脈在
必向懷脈脈者必胞明脈遲者必腹滿喘脈浮者必水脹為滿

妊娠六月始受金精以成其筋欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及
視走馬宜食熟鳥猛獸之肉是謂變脈養筋以養其爪以牢其骨骨足
陽明養之足陽明者胃之脈主其口自六月之時見口自皆成故足陽
明養之足陽明穴在大衝上一寸是也

妊娠七月始受木精以成其骨筋搖支無使定止動作屈伸居處必燥飲
食避寒常宜食稻抗以密膝理是謂養骨密齒者也手太陰養之手太
陰者肺脈主皮毛七月之時見皮毛已成故手太陰養之手太陰穴在
手大指本節後白肉際陷中是診其妊娠七月脈實大牢強者生流細
者死懷胎七月而不可知時時變而轉筋者此為胎動而動者非
繩也懷胎七月膝下羊餘水其胎必倚而墮此非時胎動預下故也

主四季五月之時見四殺皆成故足太陰養之足太陰穴在足內踝上
三寸也診其妊娠脈平手按之不脈在疾不滑者五月也又其脈在
必向懷脈脈者必胞明脈遲者必腹滿喘脈浮者必水脹為滿

妊娠八月始受土精以成其肉其心靜其氣和是謂養胎而光澤
顏色手陽明養之手陽明者大腸脈大腸主九竅八月之時見九竅皆
成故手陽明養之手陽明穴在大指本節後宛宛中是診其妊娠八月
脈實大牢強弦者生沉細者死

妊娠九月始受石精以成皮毛六府百節莫不畢備飲醴食甘後帶自時
而待之是謂養毛髮多才力足少陰養之足少陰者腎之脈腎主續精
九月之時見脈續續皆成故足少陰養之足少陰穴在足內踝後微近
下筋動脈是也

妊娠十月五臟俱備六府齊通納天地於丹田故使關節入神感備然可
預修滑胎方法也

一論婦人經脈不行已經三月者不脈不止則是胎也
驗胎散

川芎為末每服一錢空心艾葉煎湯調下覺腹內微動則有胎也若服
後一日不動非胎必是經閉

一治婦人經水過月不來難阻有無胎孕
艾醋湯

用好醋艾服半盞後腹中甚大痛是身孕不為痛定無孕

一論婦女經候不行身無病似有胎而六脈俱勻乃是孕婦之脈
也精神如故惡聞食氣或嘔一物或大吐或時吐清水此名惡阻切
勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎
保生湯

人參二錢 白朮五錢 橘紅五錢 香附子五錢 烏藥五錢
甘草二錢 每剉一兩水一盞半生薑五片水煎七分去渣溫服不
拘時候或為茶湯調亦可
一論惡阻 謂婦人有孕惡心阻其飲食也宜服
艾醋湯

當歸酒洗 白芍酒炒 白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 陳皮
半夏 湯洗切片用香油炒香 香附 炒
香附 炒各等分 甘草 減半 砂仁 神麩 炒

右劉生薑三片。棗二枚。水煎溫服。

○一婦人有孕嘔吐不止。予用

半夏薑汁炒用。一半陳皮茯苓甘草用。一半生薑七片煎服。立止。

○一論妊娠三月。其經月來三五次。但不多。飲食精神如故。此血盛有餘。見大能飲。自不來矣。後果然。

○一論子煩。謂妊娠煩燥而亂心神也。宜選

竹葉湯。

白茯苓 去皮 防風 去蘆 一麥門冬 去心 黃芩 各一錢半

右劉一劑竹葉五片。水煎溫服。

○一論子癇。謂妊娠痰涎潮熱。目閉口禁。不省人事也。

壽世保元 庚集七卷 三十一

養羊散

當歸酒洗 川芎 防風 獨活 白茯苓 去皮

五加皮 薏苡仁 杏仁 去皮 酸棗仁 炒 木香

養羊角 甘草

右劉生薑五片。水煎溫服。

○一論兒在腹中。用多年空房。下鼠火中。土丁塊。令孕婦常食之。即止。

○一論子懸。謂妊娠心胃脹痛。胎氣不和。心腹脹痛。或臨產驚恐。氣結連日不下。及胎前一切諸疾。悉宜此方。加減治之。

紫蘇和氣飲

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 人參 紫蘇

陳皮 大腹皮 甘草

右劉生薑五片。葱白七寸。水煎溫服。○腹痛加香附木香。○咳嗽加枳殼桑白皮。○熱加黃芩。○嘔吐加砂仁。○泄瀉加白朮。去蘆炒。白茯苓

卷去皮。○感冒加羌活麻黃。○傷食加山楂香附。○氣喘加香附烏藥。○一論子腫。謂妊娠七八個月前後。面自虛浮。肢體腫滿也。宜

當歸 川芎 白芍 煨 熟地黃 白朮 去蘆炒

厚朴 姜炒 甘草 右劉劑水煎溫服。

○一論子氣。謂妊娠自三月成胎之後。兩足自腫。而漸腫。腰膝以來。行步艱辛。以至喘悶。似水氣之狀。至於胎前。間有黃水出者。謂之子氣。

天仙散 天仙藤 糖醋炒 木香 蘇蘇 陳皮 香附 炒

烏藥 木瓜 甘草

右劉生薑煎服。加蒼朮七炒。

○一論子淋。謂妊娠小便澀痛。頻數也。宜後方

壽世保元 庚集七卷 三十二

子淋散 麥門冬 去心 赤茯苓 大腹皮 木通 甘草

右劉淡竹葉十片。水煎空心服。

○一論轉胞。謂妊娠卒不得小便也。因胎長逼近於胞。胞為所逼。而側

今人。數度胞即膀胱也。然子淋與轉胞相類。但小便頻數。而痛。而子淋頻數。出少而不痛。為轉胞。間有微痛。終是與淋不同。並宜五苓散加炒阿膠。又宜交養散。治孕婦轉胞。小便不通。及男子小便不通。皆效。

冬葵散 冬葵子 辛 兩 山梔子 炒 兩 木通 三錢 滑石 兩 研 此藥難得。時且用

右劉一劑水。下五苓散。煎八分。溫服。外以冬葵子滑石梔子。為末。田螺肉

搗膏。或生葱汁。調膏。貼臍下。立通。

○一妊娠轉胞。不得小便者。用木物湯。加半夏陳皮。各三錢。湯服之。探吐

以升提其氣。上竅通。而下竅自利也。

○一論胎漏，謂妊娠有胎而血漏下，屬氣血虛而有熱也。

當歸尾 川芎各五錢

右劉一劑好酒煎入重便一盞同服。一服立止如神。

膠艾四物湯 治症同前

當歸一錢 川芎八分 白芍一錢 煖熱地黃酒蒸一錢

真阿膠 炒成珠八分 條芩一錢 白朮一錢 砂仁炒一錢

香附炒一錢 艾葉少許 粳米一撮 水煎服。

丁方加蒲黃炒一錢 陳皮七分 杜仲並水炒一錢 續斷一錢 甘草炒四分 去其葉不用 只用煎服。

一治胎動出血產門痛，黃連為末煎服。

一論胎動，謂胎因事跌仆，子死腹中，或下者痛不已，口燥後死。

用此藥探之，若子死腹中，立便逐下，若腹痛隨止，子母俱安，又治胎前。

壽世保元

庚集七卷

三八

難產胎衣不下，及產後血暈不省人事，狀似中風，血崩漏不止，腹中血刺，疔痛，血滯，浮腫，血入心經，語言顛倒，如見鬼神，血脈相搏，身熱，或似癰非癰，一切胎前產後，狼狽等症，並皆治之，其佛手散。

當歸酒洗一兩

川芎七錢

右劉一劑水煎，趁熱再入酒煎，溫服。如口燥，押開，灌之，如人行五里，許再進之，便醒立產。如胎漏下血不止，以酒煎入重便一盞，溫服。

一治胎氣動，用鯉魚一箇，水煮熟，湯飲之，立效。

一因重動胎，致胎不安，動搖不已，及下血，從速者，四物湯，合四君子湯。

加條芩、阿膠、砂仁、白朮，各生。

一論安胎，謂安胎，有因病而胎動者，但服此藥，其胎自安，復胎。

不安，因病而胎動者，但服此藥，其胎自安，復胎。

一論孕成之後，覺氣不安，或腹微痛，或腰間作癢，或飲食不美，或胎動。

下血及五六箇月，常服此藥，其效。

當歸身一錢 川芎八分 白芍一錢 煖熱地黃酒蒸一錢 條芩一錢 半

白朮炒二錢 砂仁一錢 陳皮一錢 蘇梗八分 甘草四分 炒

右劉一劑，水煎，溫服。下血不止，加蒲黃炒、阿膠炒各一錢。腹痛加。

香附醋炒、枳殼炒各一錢。

一論孕產，謂婦人懷孕，血氣虛弱，不能養胎，以致數月而墮也。

當歸補中湯

黃芪 養水炒人參 白朮 去蘆炒當歸 川芎

白芍炒 乾薑炒 阿膠炒 五味子 杜仲 姜酒炒

木香 甘草炙 水煎，溫服。

一論胎前陰化，胎孕乃成，血氣虛弱，不克養胎，其胎則墮。又有胎前。

情，肉火便動，亦能墮胎，火能消物，造化自然，子見一婦，復有孕，至三個月。

壽世保元

庚集七卷

三九

月左右必墮，胎其脈左平大，而無乃重，按則澀，知其血少，以其止，其只補中氣，使血自榮，時正初夏，教以濃煎白朮湯，下黃芪末一錢，換數劑，得保全而生一子也。蓋孕至三月上，屬相火，所以易墮。

安胎丸 妊娠宜常服之

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 條芩略一 白朮 去蘆炒五

右為細末，酒糊為丸，如梧子大，每服五十丸，茶湯任下，空心日服，愈。

清熱之劑也，瘦人血少，有熱胎動不安，素懷孕者，宜服之，以治其源。

而後無患也。一婦人小產，常服此，以保胎，至十月完足，潮連肉去。

心四兩，砂仁炒二兩，共為末，每二三匙，米飲調下，日服三四次。

一論婦人常懷小產，久而不育者，可服過七個月，不必服。

千金保孕丹

當歸酒洗 熟地黃 酒蒸人參 一兩 半 白朮 去蘆炒 條芩 二兩 陳皮 一兩 香附子 童便浸一兩 續斷 酒浸一兩 杜仲 酒炒一兩

右為細末糯米飯為丸梧子大每服七十丸白湯下。
 一方去人參加砂仁川芎阿膠艾葉益母草棗肉為丸。
 一論婦人曾經小產今有孕預先培補為妙大凡婦人墮胎只是奇經
 廢弛衝任帶脈受虧而然宜服此湯大有益也
 加味八珍湯

黃芪二錢 人參二錢 白朮去蘆一錢 甘草三分皆歸酒洗一錢
 川芎七分 白芍酒炒一錢 知母一錢 熟地黃酒洗一錢 防風七分
 山藥一錢 升麻四分 黃柏酒炙炒褐色 益智仁研八分
 已上剉一劑水煎溫服

一治婦人每懷胎至三四月必墮不肯服藥
 用四五年老母雞煮湯入紅殼小黃米煮粥食之不斃而胎竟固全至
 月滿而生
 一論妊娠身居富貴口厭甘肥愛藥不常食物不節既飽便即致人
 壽世保元

胎肥厚根蒂堅牢行動艱難因致墮胎在胎前必見難生八月可服此藥止
 二服補其血而順其氣使子易生而胎易落也又治小產必血腹痛及
 胎衣不下
 保生無憂散

當歸 川芎 白芍各七分 乳香 枳殼各一錢
 木香 甘草各五分 血餘燒灰四 枳殼各一錢
 右剉一劑水煎溫服

一治胎肥墮胎動止艱辛臨月服之續胎易產
 瘦胎散
 枳殼五錢 香附子三錢 甘草一錢半
 右為末每服二錢百沸湯調服
 一論妊娠至八九個月服數劑甚好令身易產腹亦少痛
 達生散

當歸身酒洗白芍酒炒 白朮去蘆人參 陳皮
 紫蘇各五分 大腹皮洗甘草各三分 或加砂仁五分 枳殼炒八
 分 尤妙 右剉一劑葱五根水煎服
 如胎肥氣喘加黃楊腦七個此黃楊樹梢兒也此物能養胎不實
 夏加黃芩春加川芎冬加砂仁○氣虛倍加參朮○氣實倍加陳皮香
 附○血虛倍加歸地黃○性急多怒加柴胡○有熱加黃芩○食
 少加砂仁神曲○渴加麥門冬○食易飽多加黃楊腦○有熱加半
 夏姜湯泡切片香油炒黃芩○腹痛加木香

一論妊娠七八月間服此胎氣欲求令人易產凡患產難者多由內熱
 灼其胞液以致臨產之際乾澀而難或脾氣怯弱不能運化精微而
 胞液不足亦產難之道也故用白朮茯苓益其脾土而培萬物之母
 黃芩清其胎熱其胎熱熾火而存胞液乃陳皮者取其辛利能流動中
 氣化其肥甘使胎氣不滯兒身不肥耳此東胎之義也
 壽世保元

東胎丸
 茯苓七錢 陳皮三兩 黃芩夏二兩春秋七錢 白朮二兩
 右為末酒糊丸梧子大每五十丸米湯送下
 一孕婦胎痛

當歸 川芎 條苓酒炒 阿膠炒 香附
 玄胡索 水煎溫服
 治孕婦心痛
 玄胡索五錢 當歸一錢 乳香五分 甘草一錢
 右剉水煎溫服

治孕婦腹痛或胎動不安
 砂仁炒二兩 條苓炒紫蘇一兩半 白朮去蘆炒一兩
 右為末每服三錢紫蘇湯調服
 一治孕婦腰痛狀不可忍

補骨脂不拘多少，存上炒令香熟，為細末，嚼核桃肉半個，空心溫酒調下二錢。

一治姙娠偶因所觸，或墮胎傷胎，致胎動不安，腹中痛，不忍有砂仁不拘多少，研半內，盛覆火炒令熟，透去皮，搗羅為末，每服二錢，用熱酒調下，領更覺腹中胎動，虛極熱，即胎已安，神效。

一治姙娠大便閉澀艱難

當歸 川芎 白芍 生地黃 枳殼 去穢

黃連 右劉水煎溫服

一論姙娠下痢赤白腹中疝痛

當歸五分 白芍一錢 白朮五分 白茯苓五分 澤瀉五分

木香三分 檳榔三分 黃連五分 黃芩五分 甘草三分

右切作一服水一盞半煎至一盞，空心溫服，如白痢腹痛甚，有惡寒也，去麥連加乾薑炒三分。

壽世保元 庚集七卷

四十一

一治姙娠腹痛下痢膿血不止

黃連八分 厚朴姜炒 阿膠炒 當歸各六分 艾葉

黃柏 乾薑各五分

右為末，空心米飲調下方寸匕，日三服。

一論姙娠泄瀉腸鳴腹冷痛手足厥逆

人參 白朮炒 乾姜炒 甘草炙 加肉蔻砂仁

右切生薑三片，棗二枚，水煎，空心溫服。

一論姙娠癰疾寒熱相半并產後癰疾

當歸 川芎 白芍 青皮 陳皮

半夏 白茯苓 枳殼 甘草 良薑

紫蘇 乾薑 甘草

右劉薑棗煎服，日服。

一論姙娠風寒咳嗽痰喘滿悶

百合蒸 貝母 紫苑 白芍 前胡

赤茯苓 去皮 桔梗 甘草 生薑五片水煎服

一論姙娠咳嗽用貝母炒為末，所砂糖拌勻，丸如雞頭，實大口，冷酒送下。

一論姙娠忽然口噤吐沫不省人事，言語錯亂

二合湯

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 懷生地黃 陳皮

半夏 鱉炮 白茯苓 去皮 來簡冬 去心 遠志 酒洗 石菖蒲

竹茹 甘草 右劉生薑水煎服

一論姙娠不語非病也，聞有此者，不須服藥，臨產日，且服此藥，即愈。

一論婦人懷胎如抱一物

麻經云：設令官中人，皆察婦無失，常夜夢寐交連，邪氣或懷，似胎而成，胎前之疾，皆當治下宜也。

助鬼丹

壽世保元 庚集七卷

四十二

吳茱萸 川烏頭 秦艽 柴胡 白蠟 炒

巴戟去心 右為末，煉蜜為丸，如梧子大，每服七丸，蜜酒送下，出惡物即愈。

一論姙娠癰瘕痞塊及二者疑似之間者，久服，安養胎氣，消散癰瘕，消補丸。

枳殼 炒 檳榔 黃連 黃柏 黃芩

當歸 阿膠炒 木香 各一兩

右為末，水丸，梧子大，不拘時，海米飲下，二十九日進二三服。

一論姙娠或時有白濁白帶而下

四物湯合二陳湯，加蒼朮杜蘅龍骨等藥。

一論姙娠遺尿失禁

白朮 白芍 酒炒 各等分

右為末，酒調方寸匕，日三服。

一論妊娠瘵嗽見紅

當歸身 熟地黃 天門冬去心 麥門冬去心 紫苑各五分
桑白皮蜜炙 杏仁去皮 甘草炙 桔梗 片苓
五味子 阿膠炒各二分半

右剉加竹茹一團水煎服入小煎汁同服。
一婦人每孕不數月即墮忽又孕三月患嘔吐吞酸暖氣增雜腸鳴泄瀉胃脘疼痛

陳皮一錢 半夏麩七分 白茯苓一錢 白朮一錢 蒼朮一錢 神曲炒五分 香附炒一分 藿香四分 黃連三分 川芎一錢 甘草四分 右剉薑棗煎服。

一治胎孕九個月將產消息用猪肚一箇依法煮葱五味煮乾食之不盡再服不與別人食。
一妊娠誤服毒藥及諸般毒藥物

壽世保元

庚集七卷

四四

白通豆生去皮為細末清米飲調方寸七神効。

一妊娠下血服涼血之藥下血益甚食少體倦此脾氣虛而不能攝血以補中益氣湯治之乃愈。

一治婦人墮胎昏憤不時吐痰自用養血化痰之劑昏憤不省自汗不搐痰涎壅出投以為中風欲用祛風化痰藥予曰此屬脾氣虛寒所致遂用十全大補湯去程加知母防風山藥升麻黃耆熟地知母仁。

一妊娠氣喘痰盛諸藥不應問治於余詢之云素有白帶始於目下兩月餘其面亦然此陰虛有痰飲也用六味丸料數劑而愈。

一妊娠每至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身及頭面此是脾肺氣虛朝用補中益氣丸夕用六君子加蘇梗而愈凡治妊娠母泥其月數須見其經症候便用某藥為善。

妊娠傷寒治法

一治妊娠傷寒護胎法
井底泥 青黛 伏龍肝
右為末調勻塗於孕婦臍中二寸許如乾再塗上以保胎孕也。

一治妊娠傷寒傷風勿輕服藥發熱頭疼惡風身痛
紫蘇 陳皮 香附 川芎 白芷
甘草 右剉一劑薑葱煎服。

加味四物湯 專治妊娠傷寒諸症
當歸身 川芎 白芍 熟地黃各等分

右剉每服五六錢水煎溫服。
如妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊加麻黃細辛。

如妊娠傷寒中風表裏自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱加黃芪地黃。
如妊娠傷寒風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛加防風蒼朮。
如妊娠傷寒胸膈滿痛脈弦加柴胡黃芩。

壽世保元

庚集七卷

四五

如妊娠傷寒太便秘小便赤氣滿而脈沉數加大黃生桃仁去尖炒。

如妊娠傷寒小便不利加茯苓澤瀉。如妊娠傷寒小便赤。

如妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲加附子去脂桂少用。

如妊娠傷寒畜血症加生地黃大黃酒浸。
如妊娠傷寒身熱太渴蒸熱加熟地長而大者加石膏知母。

如妊娠傷寒下後過解而不愈加黃芩加錦紋加升麻連翹。
如妊娠傷寒下後咳嗽不止者加人參五味子。

如妊娠傷寒下後虛痞腹滿加厚朴枳實炒。
如妊娠傷寒不得眠者加梔子黃芩。

如妊娠傷寒汗後血痛不止者胎氣損者加阿膠及甘草黃芪。
如妊娠傷寒浮腫自利腹中痛去地黃加桂枝炒。

如妊娠傷寒自利腹中痛飲食不下脈沉者去地黃川芎加白朮黃芪。
如妊娠傷寒頭痛項強身熱口乾胸脇疼用生地黃加柴胡前胡人參。

妊娠食忌

一受孕之後不可食之物切宜忌之非惟有感動胎氣之虞然於物理亦有厭忌者設戒不能戒忌非特延月難產亦能令兒破形母損可謂戒食之要也

食雞肉糯米合食令子生寸白蟲
 食鯉魚鱸魚及鷄子令兒成疳多瘡
 食羊肉令子缺唇蓋鬼乃不能而孕生子則口中吐出是以忌焉
 鴨子共乘棊同食令子倒生心寒
 羊肉合食是毒食之令子面生對黑子
 食水漿絕產
 食山羊肉令子多病
 食蟻蠶令子傾生
 食蠶蠟馬肉延月難產

食雞子令子項短及損胎
 食豆醬合食食之墮胎
 食羊肉合子不耻多產
 食子薑令子多指生瘡
 食蝦蟇鱔魚令兒瘡癩

產育

如此之類無不驗者則知聖人胎教之法豈非慮極自其然乎

一產母面赤舌青母活子死母面青舌赤口沫出子活母死母面青舌青口兩邊沫出身重寒熱市下青黑反舌上冷遇此症者子母俱死不可救

一胎產橫逆多因淫草太早努力過多兒身未轉或已破水其血必乾致胎難轉若先露脚謂之逆逆者謂之橫當以小絹紮於兒手足心針入一二分三四刺之以監察其上輕輕送入兒得痛驚轉下縮即當回順而生矣

一論產難或橫或倒死胎爛胎於腹中者幾危腹痛或腰痛欲生草時將神非飲即濕飲下蓋便覺心下開結如渴又飲下蓋覺下重便難更無諸苦橫生倒逆不過三服即正子死腹中不過三服即下能保母子兩全最為神驗有一婦人橫產手出至臍腫脹但欲截其手不保其生

屢服催生藥不効以此藥濃煎一碗與服少頃再與一碗再服少時忽云我骨節都拆開了快扶起我血水俱下按出死胎全不費力可謂更生以此救入百發百中

催生神效

生梓樹刺枝如小指大者一握淨洗半碎下葉下刺者處處有之

甘草五錢 右剉下大劑新汲水一碗半入新瓦罐內用紙三重密封

之文武火煎八分溫服

一治胎婦臨產艱難或十二日不下者服此自然轉動下生

三合濟生湯

當歸 三錢 川芎 二錢 枳殼 去穢 炒 蘇蘇 八分 香附 炒 一錢 半

大腹皮 半錢 汁洗 一錢 甘草 七分

右剉水煎待腰痛甚服之即產

催生如意散 臨產腰痛方服之

壽世保元

庚集七卷

人多一發 乳香 一錢 辰砂 五分

右為末臨產之時急用雞子清下個調藥用生薑自然汁調開冷服

如橫生倒產即時順正子母均安

一論產後子或死胎已動身歸湯加紫蘇酒水煎服死者即下未死者即安

一論胎衣既破其血已涸或元氣困憊用八珍湯斤許再加益母草一斤水數碗煎熟時時飲之飲盡再煎○孕婦臨月預服此藥自進一服則子易生而胞易落也

一論橫逆逆產須更不救子母俱亡

蛇退一條 蟬退十四箇胎髮 丁九並燒灰

右為末分作三服酒調下須更進一服仰臥露時即下

一治產難或心不下者蛇退燒灰同麝少許研細溫酒調下立產

一論臨產破水三五日不下將死未絕者 江月池傳

魚鱗用大者三五香油浸過燈上燒之滴下油入酒內其灰研末酒調服立下。

一論難產難胞乾胎不得下。香油蜂蜜各一兩和勻入銅鉢內燈火煎一二沸掠去沫調白滑石末一兩攪勻頓服外以油蜜塗坊服上下。

一婦人分娩艱難產子已死元氣勞傷用油紙捲燒斷臍帶取其陽氣以補之俄間見啼作聲若以刀物如常斷之其母亦難保生。

天子死腹中者多因驚動大卓或觸犯禁或抱腰太重或頻探拭水胞衣先破血水先盡而胎乾涸故耳其候產母唇舌皆青者子母俱死若舌黑或脹悶甚者然其子已死矣先以平胃散一二兩酒水各半煎却投枳硝半兩即熟皮硝服或用硝一二兩以重便調下亦妙。

一治胎衣不下雞子清三個去黃以酸醋一合和之吸入口中即下。

一治胎衣不下即嚼生葱白數根即下。

壽世保元

庚集七卷

四十八

一治胞衣不下。紅花二兩炒清酒五爵法之溫服此乃氣弱而瘀血凝於胞也故用酒壯其氣紅花散其血。

一胞衣不下因產母元氣虛弱者用芎歸湯倍桂以溫之自下。

一治婦人難產及橫生逆產如神。用蛇退炒焦為末每五分酒調下。

一治赤胎不下難治難產及橫生倒生。用桂心為末每二錢痛時用溫酒調下。

一治用腐香五分為末加桂末二錢酒和服。

一治產後胎衣不下惡血冲心腹中血塊。錦紋大黃二兩為末以好醋半升熬成膏丸如梧子大以醋化五丸服之須臾即下又治月經不調。

一治橫生逆產胎死腹中不下。

公老巢腰子一付輕粉一分松香一分共搗作三四丸辰砂為衣以酒調服立下。

一治胎衣不下令產婦嚼自己髮尾放口中令嚼破衣即下。

一論婦人分娩交骨不開或五七日不下垂死者。活命芎歸湯。

川芎 當歸各一兩 生男女婦人髮一握燒灰存性。自死驅殼 一佃如無古越者亦可研矣。

右為末每二兩水煎服良久不問生死胎即下。

一論妊娠十月滿足或因惡情內傷或患潮熱之症又兼產前多飲熱毒之物瘀血相搏七情怒氣所傷胎產難進之厄惟怕不謹輕用藥下子取胎觸死胎兒在腹不能所出今備妙方防此之禍但服一二帖加烏金丸二顆甚効。

活水無憂散 益母草二兩大枳殼一兩當歸四錢 川芎一錢 白芍二錢。

壽世保元

庚集七卷

四十九

生地黃二錢官桂一錢 急性子四錢陳皮一錢 甘草八分。生鯉魚一箇。

右各剉分二服每用水三碗煎至一七碗臨服之時加好醋一匙每三碗加烏金丸一顆如其死胎不下急取無根水再煎藥渣連進二服即救其性命果妙不可輕傳。

一論臨產艱難橫生逆產胎死不下及產後諸病。烏金丸。

真阿膠一兩八錢蛤粉 蘇木一兩 艾葉端午日收去梗二兩。穀麥二芽 晒乾各二兩 龍衣即蛇退腰蟻者一條焙乾又要蛇頭。

右共為細末煉蜜為丸如芰實大每用一丸重便和酒化下。

九修合此藥煉天月二德天醫生氣吉印安神安胎酒掃淨室此太極而生兩儀九宮而分八卦婦人難大聲喊首要在夜間寂靜無戒至誠先念淨口淨心淨身淨天地神呪又念呪曰天精精地靈靈精。

靈靈左朝北右朝北辰入逢此藥各保安寧急如律令

○治橫生逆產三五日不下死在須臾 兼師師傳
用從往下蛇退一條長尺餘者燒灰存性為藥等分研末黃蠟化

一箇皮硝化水吞下

○治難產交骨不開產門不開皆由元氣虛弱胎前失於調攝以致血
氣不能運達而然也交骨不開除氣虛也用活命丹歸湯補中益氣湯
產門不開者氣血虛也用上全大補湯活命丹歸湯方見前

○一治難產乘胎衣不下及死胎不下
巴三輩七脫衣箋 細研如泥入麝香搗作餅兒臍下貼

須臾子母便分張

○一治難產或橫或逆或血海乾涸或胎死不下惟懼無措死在須臾
丁方用草麻子十四粒去殼研塗兩脚心衣即下可即脫去如不夫則
腸出如此時就以此藥貼臍心縮回其腸多用此藥不妨如胎前

○一治難產或橫或逆或血海乾涸或胎死不下惟懼無措死在須臾
三言世保元 庚集七卷 五十

右用好酒半鍾童便半鍾入硝煎一二沸溫服之下百發百中

○一治胎死腹中或產母氣之安頓產道乾澀或手足冷腹痛
即五積散見中集依本方去麻黃加川烏附子南星阿膠炒木香

補中益氣湯方見內傷十全大補湯方見補益

○一治女入出生腸用脚盆盛貯其腸取羊煎水洗過蓋華水其腸洗過
則腸消後用冷水噴胸前其患者因感氣則腸收又用入以手托之
使腸入內後用馬恰菴水洗用湯控於門口上女人眠側高起此病
一時即愈

產後

產後扶氣清血服都宜虛叔和云新產之服緩滑去骨大弦急死來
候口清痰不調死沈細附骨不絕生

九產畢不閉腹痛不痛有兩無病以童子小便和酒其一二鍾溫服則百病
不生少坐上升俯高立腰仰臥不時喚喚及以醋茶湯或月醋湯炭及
燒漆器更以手從心捍至臍下使惡露不滯如此三日以防血暈血逆
酒雖行血亦不可多恐引血入四肢且能昏健宜取食白粥少許一月
之後宜食猪蹄少許仍慎言語七情寒暑身梳頭洗足以百日為度若氣
血素弱者不計月否則患手足腰腿痠疼等症名曰產勞最難治療
初產時不可問是男女恐因言語而泄瀉或以愛憫而動氣皆能致病
不可稱痛恐致虛驚不可剖舌恐傷心氣不可刺胸恐致血逆須血氣
平復方可治事犯時微若秋毫成病重如山獄不可戒

天產後血暈其由有三有用心使力而常者有下血多而暈者有下血少
而暈者其暈雖同其治特異若下血多而暈者當補血以芍歸湯為主
或惡露不止者倍炒黑乾姜止之若去血少而暈者當補血去之但凡
血暈不省人事用大炭置產母後以醋沃之使醋氣薰入產人口鼻

三言世保元 庚集七卷 五十

若亦吐重者亦省人事矣○一法用非萊細切盛于有醋瓶中以醋
沃之急封瓶口以瓶嘴納產婦鼻中插之即醒○一法用有漆器燒
燻薰之即醒○一法用荆木糖研末用一分吹鼻即醒○一法用鹿角
燒存性每一錢酒灌下即醒

夫產後發熱有去血過多者有勞力過傷者有惡露不盡者有飲食未節
者有感冒風寒者有來食傷寒者有因傷挾外感者有三日蒸乳者俱
能發熱增寒并身疼腹痛不可相類而用藥也

○一論去血過多發熱者脈必虛大無力內無煩楚此非有餘之熱乃陰
虛生內熱耳以歸木保產湯主之

○一論有傷力發熱或早起勞動發熱者亦用歸木保產湯主之

○一論惡露不盡亦發熱惡寒必脇肋脹滿進大小腹有塊作痛者宜黑
神散主之

○一論脾胃虛弱飲食必難消化以致停滯發熱必有噯氣作酸者宜

臭而口中無味胸膈悶。氣口脈必盛發熱惡寒頭痛。其理脾虛。
一論感冒風寒而發熱者其脈弦而緊或惡露欠通頭疼身痛發熱惡寒手足厥冷。肚腹疼痛宜五積散主之。此藥祛除敗血生新血調和榮衛滋養臟腑使陰陽不相勝負邪氣不能相干。則無寒熱之患。並加米醋少許同煎本方去麻黃方見中寒。

一論傷寒夾食必惡食胸膈脹痛頭疼發熱氣口脈來緊盛宜行氣香蘇散下消下發而治之方見初食。

一論內傷元氣外感風寒其脈洪大而虛其症身熱而煩頭痛惡寒而渴自汗氣高而喘宜補中益氣湯加減治之方見內傷。

一論產後蒸乳發熱惡寒者必乳閉脹硬疼痛令產母搽乳汁通其熱自除不藥而愈。

一論產後發熱惡寒或口眼喎斜等症皆是氣血虛甚當以大補氣血為主若左手脈不足補血藥多於補氣藥右手脈不足補氣藥多於補血藥。

壽世保元

庚集七卷

五十一

一論產後中風切不可偶作風治不可服小續命湯之類宜大補氣血若中風口喎乃血虛而風入夾口筋得風則急故口喎也若角弓反張乃体虛而風入於諸陽之經故獨腰背脊急如角弓反張之狀也以歸水保產湯去香附乾薑加秦光卷活又宜常歸劑各等分水下酒少許煎七分灌之如口喎用匙輕開微灌下但下咽即効又宜荆芥略炒為末每服三錢黑豆淋酒調下童便亦可。

一論產後虛癰諸病惟宜十全大補湯此藥性溫平補養血氣壯健脾胃乃諸虛百損第一方也。

一產後血暈者乃下血過多而眩暈也。不省人事者氣血大脫而神不用也。故用人參剉作劑水煎服。蓋人參甘溫益元氣之品。可以回氣。可以生血。身熱氣急者加重便一爵身寒氣弱者加大附子三錢外以炭火以醃醋沃之使醋氣熏入鼻則能收斂神効。
一論產後諸疾以宋治之大補氣血為主此方治一切諸病氣血虛損

脾胃怯弱或行或不血過多或飲食未節或怒氣相沖以致熱惡寒自汗口乾心煩喘急心腹疼痛頭眩眼黑耳鳴等症不語或精神不省人事並皆治之。

歸水保產湯

當歸酒洗一川芎 白芍酒炒一熟地黃酒蒸白朮去蘆炒一
白茯苓一錢陳皮八分 香附米童便炒一錢 乾薑炒黑八分
甘草炙三分氣虛加入參七分

右剉下劑生薑三片棗一枚水煎服。如去血過多倍芍歸乾姜。
一胸膈脹滿加枳實炒砂仁厚朴姜炒山查去子。兩脇肋痛加青皮去穢肉桂。小腹痛加黃芪蜜水炒酸棗仁炒。口乾苦加麥門冬去心俱煨醋炒。有汗加黃芪蜜水炒酸棗仁炒。口乾苦加麥門冬去心。
○身不發熱小腹脹不可忍用桃仁去皮搗爛五錢韭菜汁和酒送下立効。惡露不行加益母草牡丹皮桃仁入童便酒同服。吐痰加牛

壽世保元

庚集七卷

五十二

夏貝母。咳嗽不止加遠五味桑白皮。着氣喘加烏藥。昏憤口喎不語加荆芥穗。

一論婦人產後下十八證服之如神。

照神散

棕皮灰 當歸酒洗 赤芍 白芍 生地黃
熟地黃 香附米炒 玄胡索 乾姜炮 五靈脂
蒲黃炒各一沷酒 乳香各五錢 莪朮 芫花 大黑豆
右為細末每服三錢溫酒童便調下。
一胞衣不下。敗血攻心眩暈欲絕服此即愈。
一將產血多兒食不盡餘血裹胎難產服此棄子救母。
一臨產用力太早兒不及轉橫生出出亦當急救母命。
一子死腹中母必肢體冷痛口角出沫指甲青黑服此即出。
一惡露未盡失而不治又過酸鹹收斂之物因而得崩漏。

血暈眼花起坐不得。

敗血乘虛散流四肢浮腫。

敗血入心煩躁發狂言語錯亂或見鬼神似癲。

月中飲冷敗血凝聚腹痛難忍或致瀉痢。

敗血停留肢節間遍身疼痛。一敗血結聚小便閉澀大便艱難。

肺竅鼻中氣黑。一敗血流入小腸小便出血。

敗血沖心喉中氣急發喘。

敗血滯脾胃中心腹脹滿嘔吐似翻胃。

產後諸般怪症難以名狀者多是敗血所致服此立效其仙方也。

一治產後心腹痛血不行或見物作惡危急之甚。

當歸三錢 川芎二錢 白芷 官桂 玄胡索

牡丹皮 蒲黃 五靈脂 沒藥各一錢 白芍酒炒三錢

右剉一劑水煎入童便空心服。

壽世保元 庚集七卷

五十四

一治產後小腹作痛有塊脹滿而瀉以四物湯加玄胡索紅花

一論產後停食胸膈飽悶身發寒熱不思飲食

理脾湯

蒼朮炒陳皮一錢 厚朴姜汁炒砂仁七分 神麩炒一錢

山查法一麥芽炒一錢 乾薑炒八甘草炙二分

右剉一劑生薑三片水煎服。泄瀉加白朮白茯苓。大便閉加桃仁

紅花。小便閉加天腹皮。

一治產後三日牙關緊急眼目直視四肢厥冷乾姜炒黑五錢水煎入

童便溫服立效。

一論產後暈倒不省人事眼黑耳鳴等症并胎前風不省人事口吐涎

加味佛手散

當歸 川芎 荆芥各等分

右剉一劑水煎入童便溫服。

一論產後惡露不快腰疼小腹痛時作寒熱惡痛不思飲食下治久積
惡血月水不調又療心痛水腸氣痛血氣痛欲死者又治心腹疼痛及
兒枕痛不可忍又或血迷心竅不省人事又治壯人青筋症用
失笑散

五靈脂 水淘去砂醋煮 真蒲黃炒各等分

右剉酒煎溫服。一法為細末每服三錢醋醋成膏白湯化下痛甚

加川芎肉桂玄胡索各二錢。

一論產婦小腹作痛忽牙關緊急灌以失笑散良久即甦。又用四物湯

加炮乾薑白朮陳皮。

一治產後血虛昏暈不醒以四物湯加入參白朮茯苓炮乾薑附子

一論產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒者以

四物湯加玄胡索附子桃仁紅花青皮澤蘭牡丹皮水煎服。

若以手按腹愈痛此是瘀血為患宜服此藥或失笑散消之。

壽世保元 庚集七卷

五十五

若按之反不痛是血虛宜四物湯加參朮茯苓

若痛而作嘔是胃虛宜六君子湯。若痛如作瀉者宜六君子湯加乾

薑炒白芍酒炒。

一論產後勞者產中之名也產中虛喘喘之作寒作熱病外瘧狀名曰產

勞此是虛之氣血不相順接虛故作寒作熱無時休息症似瘧實

非瘧也治宜大補氣血使其氣血順接則病愈矣故用人參補氣當歸

補血糯米益胃葱豉醒脾而指腎者取其以類相從能補系胞之區也

猪腎湯 治產後勞發熱盜汗

人參 當歸各等 猪腰子一箇白糯米半合葱白三根

淡豆豉一合

以水煮熟取清汁十盞入藥二錢煎至八分不拘時服。

一治產後虛勞發熱

猪腰子一對去白膜切作柳葉片用薑酒拌先用糯米一合入葱椒

○一治產後發熱自汗肢體疼痛名曰蘇粉

當歸羊肉湯

當歸酒洗 人參各七錢黃芪一兩 生薑五錢

右剉用羊肉斤五錢清汁五大盞去肉入前藥煎至四盞去渣

○一論產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連翳此去血過多元氣虧損陰火熾盛宜

十全大補湯方見補益 加炮薑丁剉而煎又散劑而安

○一論產婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛用十全大補湯而愈

○一論產後血邪心神恍惚言語失度睡臥不安宜

快神散

白茯苓去皮人參 龍齒研 琥珀研 赤芍

黃芪 牛膝去蘆各生地黄一錢桂心五分

壽世保元

庚集七卷

五十六

右剉每服用米煎服

○論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神智不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令

不語如此但服此藥

八珍散 治產後敗血停蓄於心迷塞心竅舌強不語

人參 石菖蒲 懷生地黃 川芎各一兩細辛一錢

防風 辰砂另研各甘草一錢

右為末每下錢薄荷湯調下不拘服

○一論產後咳逆不止

用乾柿一個切碎以水一盞煎至六分熱呷之即止

○一論產後汗出不止

嫩黃芪 熟地黃 牡蠣粉 白朮去蘆炒 麥門冬去心

防風去蘆 白茯苓去皮當歸酒洗

右剉紅棗二枚水煎服

○一論產後消渴飲水不止

當歸酒洗 川芎

五味子 知母去毛 白芍酒炒 生地黃 麥門冬去心

右剉水煎服

○一論產後胸膈脹

當歸酒洗 川芎

陳皮 半夏湯泡姜砂仁 香附炒 厚朴姜汁炒

甘草 生薑煎服

○一論產後瘧疾

當歸酒洗 川芎一錢 白芍酒炒 白朮去蘆炒 白茯苓去皮

柴胡八分 青皮去蘆八分 甘草三分

壽世保元

庚集七卷

五十二

○一論產婦血痢小便不通臍腹疼痛以生馬齒莧搗爛取汁三六合煎

沸下蜜一合調頓服即愈

○一治產後痢疾不問赤白主方

當歸酒洗 川芎 白芍炒 白朮去蘆炒 白茯苓

陳皮 木香 香附炒 神麴炒 乾薑炒

甘草炙 右剉水煎服○不思飲食加砂仁○小便不利加薤白

○一治產後泄瀉

人參 白朮煨蘆土 白茯苓去皮 陳皮

乾姜炒 澤瀉 厚朴姜汁炒 砂仁 白芍炒

甘草炙 右剉姜棗煎服

○一治產後嘔吐

陳皮 半夏湯泡姜白朮去蘆炒 白茯苓去皮 砂仁

藿香 人參 神麴炒 當歸酒洗 甘草炙

右劉生薑五片水煎服

○一治產後頭痛

黃芪炙水炒人參 白朮去蘆炒陳皮 當歸

升麻 柴胡 細辛 蔓荊子 川芎

藜蘆 甘草 右劉生薑三片水煎服

○一治產後咳嗽痰喘發熱

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 熟地黃 陳皮

牛夏煨汁泡 白茯苓 去皮枳殼炒 桔梗去蘆 前胡

蘇槿 乾葛 人參 木香 甘草

右劉散姜棗水煎服

○一產婦咳嗽痰喘面赤口乾內熱肺熱後作無時此陰火上升當歸脾腎遂用補中益氣湯六味地黃丸而愈

壽世保元

庚集七卷

五十八

○一論產後下血諸藥不應飲食少思肢體倦怠此中氣虛弱用補中益氣湯加吳茱炒黃連五分同煎服止但怔忡少寐盜汗未止用歸脾湯治之而愈

○一論產後大便不通因去血過多太腸乾澀或血虛火燥乾澀不可計其日期飲食數多用潤之必待腹滿腸脹自欲去而不能者乃結在血脈用猪膽汁潤之若服苦寒藥潤通及傷中焦元氣或愈加難通或通而瀉不能止必成敗症若屬血虛火燥用加味逍遙散氣血俱虛八珍湯慎不可用麻子杏仁枳殼之類

○一產前產後大便不通

當歸酒洗 川芎 防風去蘆 枳殼炒各甘草炙二錢

右劉生薑煎服忌動風之物用酒送之亦妙

○一產後五七日不大便切不宜妄服藥丸用大麥芽炒為末每服于錢

湯調下與粥同服

○一論產後胞損小便淋瀝不止

人參二錢半白朮去蘆二錢白茯苓去蘆黃芪炙炒一陳皮一錢

桃仁去殼尖甘草炙五分

右劉一劑水煎服羊胞後入藥煎服

○一論婦人子宮腫大二日損落一尺殊難治肝已而面黃體倦飲食不味肉熱崩熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸症悉愈仍復生

○一論產後陰閉不開發熱惡寒用十全大補湯加五味子散劑而愈

○一論產後中益氣湯加五味子散劑而愈若初產腫脹或燥痛而不閉者用加味逍遙散若腫脹既消而不閉者補中益氣湯切忌寒涼之劑

○一論產後陰閉不開發熱惡寒用十全大補湯加五味子散劑而愈

○一論產後陰閉不開發熱惡寒用十全大補湯加五味子散劑而愈

○一論產後陰閉不開發熱惡寒用十全大補湯加五味子散劑而愈

○一論產後陰閉不開發熱惡寒用十全大補湯加五味子散劑而愈

○一論產後陰閉不開發熱惡寒用十全大補湯加五味子散劑而愈

壽世保元

庚集七卷

五十九

食益二兩參之即止

○一論產後生腸不收皆由氣虛血弱所以懸下但養氣和血其物自收

人參 白朮 去蘆炒 當歸 川芎

甘草炙 右劉水煎服若懸下則入升麻五分升提之日用熱

手心常暖腰肚但腰肚氣暖其物亦收

○一治產後生腸不收

草麻子去殼研成膏貼頭項心即收內服補中益氣湯倍升麻去柴

○一論產後因于死經斷不行下日小腹忽痛陰戶內有物如石硬塞之

而痛不禁此乃石瘕也

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 生地黃 桃仁去殼尖

紅花 大黃 三棱 檳榔 玄胡索

澤瀉 香附 血竭 水煎空心服

○一論產後有種疾醫則多汗汗則大便閉故難於用藥唯此藥最嘉
二子飲

蘇子

火麻子 去殼二味各半合研洗研極細用水再研取汁

一盞分十次煮粥啜之此粥不惟產後可服太抵老人諸病皆效

○一論產後除戶腫大用吳茱萸煎湯洗之

○一產婦惡寒發熱余欲用八珍加炮薑治之其家知醫以為風寒用亦

柴胡湯余曰寒熱不時乃氣血虛不信仍服一劑汗出不止諸病不絕

煩熱作渴肢體抽掣余用十全大補二劑益甚脈洪火重按如無仍以

前湯加附子四劑稍緩數劑而安

○一產婦瀉痢年餘形體骨立內熱肺熱自汗盜汗口舌糜爛口吐痰下

碗許脈洪入重按全無此命門火衰脾土虛寒而假熱然痰在乃脾虛

不能統攝歸元也用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼補脾血而

健其脾胃

小產

小產重於大產蓋大產如果熟自脫小產如生珠破其皮殼斷其根蒂豈
不重於大產但人輕忽致死者多矣治法宜補形氣生新血去瘀血若
未足月痛而欲產者歸補中湯倍加知母止之若產而血不止入參黃
芪湯補之若產而心腹痛者歸川芎湯止之胎氣弱而小產者八珍湯
固之若出血過多而發熱者參湯汗不止急用獨參湯發熱煩躁肉膈
筋惕八珍湯木渴面赤脈洪而虛者歸補血湯即黃芪一兩當歸三錢
是也身熱面赤脈沉而微四君煎劑東垣云晝發熱而夜安靜是陽氣
自旺於陽分也晝安靜而夜發熱是陽氣下降於陰中也如晝夜俱
發熱者是重陽無陰也當峻補其陰王太僕云如大寒而甚熱之不熱
是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止時節而動是無火也如大熱
而甚寒之不寒是無水也熱動復止夜發晝止時動時止是無水也

庚集七卷

卒

陽氣自旺者補中益氣湯陽氣陷者除者四物二通湯即四物加胡連
川連是也重陽無陰者四物湯無火者八味丸無水者六味丸

○一論小產氣虛血下不止宜
人參黃芪湯

人參 黃芪 當歸 白朮 去蘆炒 白芍 酒炒

艾葉 醋炒各 阿膠 炒 二錢 右剉 下劑水煎服

○一論氣血虛半產宜
芎歸補中湯 方見前條

○一論小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒
當歸川芎湯

當歸 川芎 白芍 炒 熟地黃 玄胡索

桃仁 紅花 香附 青皮 澤蘭

牡丹皮 右水煎入童便好酒各半盞同服

壽世保元

庚集七卷

卒

右小產腹痛以手按腹愈痛此是瘀血為患宜用此藥或失散者若
按之返不痛此是血虛宜用四物參苓白朮若痛如作此是胃虛宜
用六君子若痛而作瀉此是脾虛宜用六君子送二神丸
○一妊娠五月服剪紅丸而墮腹中脹痛服破血之劑益甚以手按之益
痛余曰此峻藥重傷脾胃受患用八珍倍入參黃芪加半夏乳香沒藥
二劑而痛止數劑而全愈

○一婦人年二十餘瘦疾墮胎時咳服清肺解表喘急不寐請治余以為
脾土虛不能生肺金藥損益甚先與補中益氣加茯苓半夏五味炮姜
四劑漸愈往視之又與八珍加五味及十全大補湯全愈

○一小產下血不止此氣虛之甚也以補中益氣湯去升柴加白芍川芎
香附砂仁艾葉阿膠炒

乳病

乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒所逆氣則所過
厚味所醜以致厥陰之氣不行故竅不得通而汁不得出陽明之血滯
鬱致熱甚而化膿亦有乳之子隔有滯痰口氣燥熱含乳而理熱氣
所吹逆生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散矣
此不治必成癰癤治法疎厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行
汗濁之血以生甘草之節清腫毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角
刺金銀花當歸或湯或散或加減隨意消息然須以少酒佐之若加以
艾火兩三壯於腫處其效尤捷不可輒用針力必至危困若不得於夫
不得於姑舅愛怒鬱悶所夕積累滯氣消四所氣滯逆送成腫核在太
甚予不痛不痒數十年後方為癰腫名曰奶岩以其形似巖石似似似
也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治
法亦有可先之理

壽世保元

庚集七卷

本三

○一論有兒者名為外吹乳有孕者名為內吹乳可以急治宜服

立効散

白芷 貝母

各等分爲末每服二錢好酒調服○若無乳行加漏蘆酒煎調服

○一論婦人乳腫作痛欲成癰毒宜
神効瓜蒌散

大瓜蒌黃熟者一箇連皮子穰以重重布包火煨搗爛每丁劑生筒
白芷一錢半 玄參二錢 升麻五分 歸尾二錢 桔梗一錢
連翹二錢 柴胡一錢 青皮一錢 川芎八分 天花粉一錢半
知母一錢 木通一錢 穿山甲炒錢木鱉子二箇 玄胡索二錢
右剉一劑水煎溫服

○一治婦人患吹乳腫痛未成膿者用生半夏一箇爲末將葱白半寸搗
和爲丸綿裹塞鼻一夜即愈左乳塞右鼻右乳塞左鼻神効
○一外敷吹乳方

葱一大把搗爛作餅厚攤乳上將瓦罐盛灰火撲在葱上蒸出汗即消
腫痛甚妙或內將紫蘇煎湯燻服

○一治婦人吹乳

韭菜地中蚯蚓糞研細末醋調厚敷於上乾則再易三次即愈

○一治吹乳用益元散五錢用豆豉葱白湯調下頻服即愈

○一治吹乳法

入患家閉房上或牆頭地下掃草四指長以手捺默念我佛面前一科
蓮結下子來獻西王金頭娘子害吹奶明問左邊若邊意者應火寶告
再說吹口氣來賢郎出不可回頭將草手緊捺出放在牆縫以土厚
蓋不可透風即能止痛消腫妙哉

○一法治吹乳用黃紙書山田火大人五字貼乳上立効

○一論婦人年五十外乳癰初已而又致穿破不得收功者宜
狗脈飲子

壽世保元

庚集七卷

本三

黃芪 每斤 當歸身二錢 白芍 兩 川芎 一錢 生地黃 兩
茯苓 七分 柴胡 五分 青皮 五分 宜木瓜 四分 皂角子 一錢 甘草 三分

右剉一劑水煎服○太便不通加火麻仁炒二錢黃連酒炒二錢

○一論內外吹乳乳癰腫痛已成夫成服之立癒
牙皂燒存性蛤粉炒過等分爲末每服五錢好酒調下以醋爲度
熱服出汗立愈外用巴豆三箇燒存性香油調敷放癰頭上上用膏藥
貼之四圍用鐵槌散

白芨 白薇 白芷稍 赤芍稍 爲末蜜調敷癰四圍立愈

○一治內外吹乳及潰漿服之立効

黃芪 人參 當歸 川芎 白芍
木通 天花粉 連翹 漏蘆 青皮
橘蓬 防風 白芷 貝母 瓜蒌

穿山甲少 皂角刺 乳香 甘草

水煎食後服

○一論乳勞乳癰已成化膿為水去成即消治乳之方甚多獨此神效藥

癰瘡毒尤妙無比 名神效瓜蒌散
瓜蒌大者兩 當歸酒洗 甘草各五錢 乳香另研 沒藥另研各一
右作二劑用酒三碗煎至二碗分三次飲之更以消敷患處一切癰疽
腫毒便毒皆效

○一治吹乳腫痛不可忍者

升麻 甘草節 白芷梢 青皮 歸尾
連翹 貝母 金銀花 瓜蒌仁 傅用橘葉

右剉水煎入酒半碗同服不拘時

○一治乳癰風神方

壽世保元

庚集七卷

北細辛一錢 白芷梢八分 歸尾一錢 赤芍八分 防風一錢

莪朮八分 桔梗八分 烏藥一錢 麻黃二錢 小甘草三分
右剉一劑水煎加熱酒同服以渣搗患處出汗為度

乳岩

婦人奶岩始有核腫如蟹核子大不痛不癢五七年方成瘡初便宜多服
疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之門或如
人口有唇赤汁膿水浸淫胸膈氣攻疼痛用五皮膏貼去其腐肉生新肉
漸漸收斂此症多生於憂鬱積念中年婦人未破者尚可治成瘡者終
不可治宜服
十六味流氣散

當歸 川芎 白芍酒炒 黃芪蜜水炒人參
官桂 厚朴姜炒 桔梗 枳殼去穢 烏藥

木香 檳榔 白芷 防風 紫蘇

甘草 乳癰加青皮

○一治婦人乳岩久不愈者
右剉生薑煎服

○一治婦人乳癰或乳岩初起先服荆防敗毒散一劑以敗其毒次進消
公英連根葉洗淨搗汁入酒飲之將渣敷患處立消其敗毒散即人參
敗毒散方見傷寒去入參加防風荆芥連翹是也

○一婦人年踰三十每怒後乳內作痛或腫此肝火所致與小柴胡合四
物湯加青皮桔梗香附枳殼而愈彼欲絕去病根自服流氣飲遂致朝
寒暮熱益加腫毒此氣血被損而然予與八珍湯三十餘劑其氣壯
元氣易復而得愈也

壽世保元

庚集七卷

○一婦人乳內腫一塊如雞子大旁則作痛久而不愈服此藥不效
乳癰症也屬肝經血少所致先與神功瓜蒌散四劑更傷氣血之脈
退再服八珍湯倍加香附夏枯草藉公英仍間服前散月餘而消亦有
乳疽一症其狀腫硬水悶雖破而不潰腫亦不消尤當急服此散及屬
熱炎斯二症乃七情所傷氣血所損亦勞症也宜戒怒節飲食慎起居
否則不治

○一婦人患乳癰氣血頗實但瘡口不合百法不應予與瓜蒌神功散四
劑少可更與數劑及豆豉餅灸之而愈又一婦人患此未潰亦與此藥
三劑而消良由云如有乳癰便服此藥可杜絕病根如毒已成能化膿
為水毒未成者則從大小便中散之

神功瓜蒌散方見前小柴胡湯方見婦人虛勞四物湯八珍湯俱見補班

通乳

神功瓜蒌散方見前小柴胡湯方見婦人虛勞四物湯八珍湯俱見補班

神功瓜蒌散方見前小柴胡湯方見婦人虛勞四物湯八珍湯俱見補班

神功瓜蒌散方見前小柴胡湯方見婦人虛勞四物湯八珍湯俱見補班

神功瓜蒌散方見前小柴胡湯方見婦人虛勞四物湯八珍湯俱見補班

○一論婦人遺精怯弱血氣虛耗產後無乳宜補養之補用當歸補血湯

當歸身酒洗五錢

嫩黃芪蜜水炒一兩

右到一劑葱白十根煎服

○一論產後乳脈不行身體壯熱痰痛頭目昏痛此涼膈厥熱下乳玉露散

當歸一分 三川芎五錢

芍藥一錢半 人參一錢半 白茯苓二錢半

白芷五錢 桔梗炒五錢 甘草二錢半

右到水煎服時溫服○煩熱甚大便結加大黃一錢二分 金銀花乳

脈不行結成瘰癧疼痛黃蘗蜜炙當歸金銀花甘草各二錢半水煎入

酒半鍾食後溫服

○一方下乳

三母散

牡蠣 知母 貝母 為細末以猪蹄湯調下

壽世保元

唐集七卷

六六

○一論產後乳汁絕不用猪蹄一雙煮置田兩先水煎兩汁後同煎其

煎去渣食後服之又用木梳頭上梳垢取下男流者尤如梳子大每

服七八丸空心順流水下

○一論產後氣血不足經血衰弱乳汁澀少

猪蹄一對 通草二兩 川芎一兩 穿山甲十四 甘草一錢

右用水五升煮汁飲之忌生冷避風寒夏月不宜朱蓋更以葱白湯

○一治乳汁不通

通草七分 曹麥

柴胡 天花粉各一 桔梗二錢

青皮 白芷 木通 赤芍

連翹

甘草各五分 水煎食後服更煎乳房

○一治乳婦思慮滯結乳汁不行宜

湧泉散

王不留行酒白丁香

漏蘆

天花粉

白姜薑炒

穿山甲炒黃色各五錢

右為細末每服三錢食後用猪蹄湯調服

○一治乳汁不行

核桃仁十箇去皮搗爛

穿山甲末一錢 黃酒調服

○一治產婦少乳

穿山甲 天花粉各五錢

入猪蹄水煮令爛去渣服之立愈

○一婦人產後子而無乳服下乳藥但作脹謂小乳皆氣血所化久脹

而無乳是血氣竭而津液亡也當補其氣血自然有乳矣乃與八珍湯

倍加參朮少加肉桂十數劑奏效

斷乳

○一論小兒二歲或五六歲當斷乳不肯斷者宜用

斷乳靈骨膏

壽世保元

唐集二卷

六六

山梔子三箇燒灰存性 雄黃少許 辰砂少許

右三味為末入生麻油哩粉各少許調勻候兒睡抹于兩肩上醒來

便不食未效再抹

○一論婦人欲斷乳方

歸尾 赤芍

紅花酒洗 牛膝酒洗 水煎服

○一論婦人血氣方盛乳房作脹或無兒吃乳脹痛增寒熱

麥芽一二兩炒水煎服立消其耗散血氣如此何脾胃虛弱飲食不消

方中多用之一云麥芽最消腎若氣血虛而乳汁自出者宜十全大補

湯服之其子多不育

婦人通治

夫通治方者蓋胎前產後一切雜症皆可治也或一方而治數症不可入於專門皆是熟試之有驗者雖曰通治亦不可膠柱鼓瑟也

○一論婦人胎前產後諸病三十六種冷血風八十二種風痲氣中風淋
 瀝血聚胎孕不安死胎不下胞衣不落一脹立効產後腹內膈下如刀
 刺赤白帶下嘔逆填塞心氣煩滿懷胎近產一日一丸臨產不覺痛者
 經脈不通或來頻併飲食無味面赤唇焦手足頑麻遍身生黑點血癩
 者產後中風傷寒癰疽如板者麻黃湯研化服

神祕萬靈丹

何首烏去皮用黑豆拌九 當歸酒洗 兩頭尖各五 川烏火炮去尖
 草烏水浸過 大茴香 川芎 人參去蘆 防風去蘆尾
 白芷 荆芥穗 桔梗米泔浸 甘草炙 麻黃用木炭三
 天麻已上十二味各 白朮去蘆米 木香不見 遠細辛
 血竭各五錢 蒼朮乾為末 米泔水洗過 入酒浸一宿晒
 右共二十味俱為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼黃酒送下
 ○一論婦人胎前產後一切之症功效甚大

壽世保元

庚集七卷

六八

濟陰返魂丹

益母草 五月端午六月六採根葉洗于曬乾不拘多少
 右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼米飲吞下
 一胎前胎動不安下血不止水煎麥元米湯或當歸湯亦可
 一胎前產後腹痛作聲或寒熱往來狀如癩疾者俱溫米湯下
 一胎前產後各先用一丸重便酒化下安魂定魄血氣自然調順諸病
 不生又能破血養脈息調經絡功效不能盡述
 一產後胎衣不下落在胞中及產前一切產難橫生不順死胎經閉不下
 脹滿腹中悶心煩妙鹽湯下
 一產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒各半送下
 一產後氣喘咳嗽胸膈不利惡心口中吐酸水向自浮腫兩脇疼痛攪動
 失力者溫酒下
 一產後兩太陽痛吹心忪氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻

百節疼痛溫米湯送下
 一產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事薄荷煎
 然汁下如無生者煎煎乾薄荷湯下及童便酒各半送下
 一產後面垢顏赤耳心煩熱或結成血塊腹脹奔痛時發寒熱有冷汗者
 童便酒各半送下
 一產後未解瀉血氣不通咳嗽四肢無力臨睡自汗不止月水不調久
 而不治則為骨蒸之疾童便酒下
 一產後鼻衄口乾舌黑童便酒各半送下
 一產後太小便不通煩燥口苦者薄荷自然汁下如無生者薄荷煎湯
 一產後痢疾米湯下
 一產後赤白帶下煎膠艾湯下
 一產後漏血水煎米湯下
 一產後赤白帶下煎膠艾湯下
 一產後漏血水煎米湯下
 一勒奶痛或成癰為米水調塗乳上一宿自瘳或生搗爛敷上亦可
 一婦人久無子息溫酒下服至一月決有効驗

壽世保元

庚集七卷

六九

○一論此方治產前產後腹痛體熱頭眩及諸疾產了未進別物即先
 服此藥能除諸疾逐敗血生新血
 佛手散 一名普歸湯
 川芎 當歸酒洗三兩
 右剉水酒各半煎溫服
 一治諸般失血 傷胎去血 產後去血 血崩去血 金瘡去血
 一治牙去血不止
 一切去血過多心煩眩暈閉絕不省人事頭暈目眩頭眩倒懸能治之
 一產後眩暈宜加酒炒芍藥治之
 一產後腹痛不可忍者加桂心等分酒煎童便煎服立効名桂香散
 一產後子死或去死胎動不安酒水同煎連煎服若已死服之便下未
 死其胎即安此經累効萬不失一
 一產後臨月服之則縮胎易產產後諸疾

一治虛損之腹中疝痛往來寒熱吸少氣不能支持頭眩自汗服以拘忌每服用精羊肉二兩薑十片水煎熱溫服

一婦人室女心腹疼痛經脈不調用冰煎服

一姪娠胎氣不安產後諸疾加酒煎服

一婦人血氣上喘下腫二味等分為細末每二錢空心艾湯調服

一產後虛損敗血衝心腹脹氣絕者神效

一難生倒橫子死腹中先用黑豆一太合炒熱水一盞入童便一盞煎茶四錢煎至三盞分爲二服未效再作

一產後惡血在心迷悶喘急腹痛夜前用黑豆加生薑自然汁半合煎服

一腫毒下血每服一錢半炒入槐花末半錢水煎服三五日取下血塊即愈

一產後頭痛加荆芥煎服 一味血亦宜服之

女聖丸 香附米乃女中之聖藥以其氣香則能無滯氣也味酸能除無道之火

壽世保元

庚集七卷

七十一

其性勇毅多暢可解婦女經絡多滯之傷本草云言世保元言其氣男子不敢服非也生春去皮毛用一斤准分作四劑一用鹽水加煎汁浸透蒸略炒主降痰調下部血二用米醋浸透蒸略炒主散氣補血一用山梔仁四兩同炒去梔子不用主降火一用童便洗過不炒爲末一方加芍藥各二兩共爲末酒後麩糊爲丸如梧桐子大每五七十九丸隨引子送下○經水不調酒送下○胎前諸病艾湯下○產後諸病芍藥湯下○胸脇脹滿用薑湯下○頭暈薄荷荆芥湯入薑汁下○白帶非冷乃自庚辛金來主分心氣所致用小茴香湯或木香湯○其餘病者與男子同症隨其用引不能者只用白湯下

婦人雜病

○一論室女寒濕師尼風體倦作寒作熱面赤心煩或時自汗痘類時疫但脈弦長欲男而不可得者

斷然丸

一名抑陰丸 生地黃 二兩酒浸片爛 黃芩 五錢 硬柴胡各五赤芍一兩 秦艸 五錢

右爲末加煉蜜少許丸如梧子大每服五三十丸烏梅煎湯下

○一論暑居獨陰無陽慈心萌而多不遂是以惡寒發熱全無瘧疾柴胡抑肝散

蒼朮炒一錢香附一錢 川芎七分 神麴炒八分山梔炒一錢 連翹五分 柴胡二錢半青皮炒二錢赤芍一錢半生地黃五分 牡丹皮一錢地骨皮一錢右對水煎服

○一論婦人與鬼交通者由賦賦神不守故鬼氣得藉藉也其狀不欲見人如有對悞時獨言笑或時悲泣是也取息運伏或如鳥獸自非爲病也又脈來綿綿不知度數而顏色不變乃亦是此候也宜安神散

壽世保元

庚集七卷

七十一

白茯苓去皮木一兩半 白茯苓去皮人參 石菖蒲各一兩 赤小豆半兩 右對水煎服

○一論婦人心氣不足精神恍惚夜夢顛倒與鬼交通語言錯亂或發狂恐怖悲憂慘感虛煩少睡甚怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩宜服補養氣血安神鎮心宜此

妙香散

黃芪一兩 人參五錢 白茯苓去皮白茯苓神心西山藥一兩 遠志一兩 甘草炮過去心 木香二錢半桔梗五錢 甘草炙五錢 麝香研 錢另辰砂三錢另研

右爲細末每服二錢不拘時溫酒調服

真清散

○一論婦人陰腫者是虛損受風邪所爲胸絡虛而有風邪客之風氣乘於陰與血氣相搏令氣否澁膠理壅閉不泄越故令腫也宜

真清散

○一論室女寒濕師尼風體倦作寒作熱面赤心煩或時自汗痘類時疫但脈弦長欲男而不可得者

石葛蒲 當歸 秦艽 吳茱萸

右對葱白五寸水煎空心服

一治婦人陰中腫痛不即忍洗法
艾葉五兩 防風三兩 大戟二兩

右對水煎熱洗切宜避風冷

一洗法

小麥 朴硝 白礬 五倍子

右對同葱白煮熱水洗之

一論婦人陰中痛者是熱氣所為三毒在於腸胃之間因腸胃三毒動作
便於陰內其熱作熱微則為疥癩乃痛也宜
將軍散

大黃 微炒 黃芩 黃連 各一 赤芍 玄參

丹參 山茱萸 取肉 蛇床子 各五錢

壽世保元 庚集七卷 七十二

右為細末每夜食前溫酒調下

一治陰痒以小蘇木不拘多少水煮湯熱洗日三次用之熱煮湯亦可

一治用杏仁燒作灰承熱線裹納陰中且二易之

一治婦人陰冷症方
遠志二分 乾薑生 蓮花各三分 蛇床子 五味子各四分

右為細末先以皂屎塗陰門中然後燒線二錢納陰中熱即為效

一治以硫黃末煎湯洗

一治陰門下脫先以淡竹根煎水先火用

五倍子 白礬 為末炒之

又方

用溫鹽湯洗軟用玉靈脂燒煙薰之次用草麻子研爛塗頂上吸久
即洗去

一治婦人陰中生瘡

杏仁燒末 雄黃 礬石 麝香少許

右四味研細末和傳陰中

一治婦人陰戶作痒
用猪肝炙燥納入陰戶則蟲俱引出而痒自止

一治女人生門硬如石衣攢痒痛不可忍
青魚膽七箇或鯽魚膽七箇亦好用絲綿二三錢燒灰存性同魚膽調
取鴨毛搽上立効其硬不過半個時即軟

一治女人生門查出流黃臭水作痛取錦繡二三錢燒灰存性酒調鴨
毛搽上其毒即收一時即愈

一婦人交腸病者糞從小便出尿從大便出溼濁不分必是夏月伏暑
而致須用五苓散加牛膝海金沙木通通其但令大小便各歸本職即
安西園公治臨頓徐少川丹服此藥而愈加其前示

一治婦人姪亂思色久之必有猪尾相侵情甚相通似睡不醒交後昏
迷淫精淋漓而不自覺日見容色衰頹用
鹿角屑搗細末以水調方寸匕服之即愈也

一治女人陰中生瘡如蠶或痛用
桃葉搗爛綿裹納陰中三四易即瘥

壽世保元 庚集七卷 七十二

茄病

一治女人生門上茄病取茄蒂剉爛煎水洗若另出者用皂莢煎線
二人牽住用皂莢煎線之用絲線纏其毒上過一晚即落若生門邊縛上
亦用茄蒂煎水洗如在內用枯荻與茄蒂煎水洗

一論婦人茄病原因生產月未滿是因取重物膀胱墜下若見紅茄紫
茄可治白者不治

人參三錢 半白木 煨薑 二 當歸 三錢 川芎 二錢 白芍 煨三錢
懷熟地黃 二錢 半 陳皮 煨白 三 枳殼 炒 一 錢 半

沉香二錢 肉桂二錢 吳茱萸湯泡二錢
右到一劑除沉香磨水生薑一片水煎空心服
甘草炙五分
再服白散

白薇二錢 當歸三錢 川芎三錢 懷熟地黃三錢
白芍二錢 蒼朮三錢 牡丹皮半錢 澤蘭二十片
靈骨花即紫葳花三錢
右到二劑澤蘭葉每劑十片水煎空心服後煎洗之藥其物自止
洗藥

宜黃連五錢 金毛狗脊八錢 水楊柳根一兩
五倍子八錢 魚腥草一兩 枯礬七錢
右為散每帖用如數大罐貯藥煎液放桶內去罐上紙蓋蒸氣水
溫傾小半在盆內洗次日再將前藥煎液蒸薰如前洗其物自收次服三
朱九斷根

醫世保元

辰集七卷

音

吳茱萸水泡七次 家茱萸陳者佳溫水洗去塵垢
山茱萸去核各一兩 白茯苓炒去刺八錢
小茴香七錢炒入鹽少許海藻八錢洗去鹽
玄胡索七錢半 牙枯槓八錢半
白茯苓七錢半 川練子去核一兩半
五味子七錢半 花青皮去穢七錢半
右十二味俱要足秤不可短少為極細末用真正頭酒調早米粉打糊
為丸如梧桐子大空心白湯送酒下

新刊醫林狀元壽世保元卷之八

本醫院吏目劉錫麟林葉廷賢子才者

男葉南公校

南瀾大學學生書印周文卿校刊

小兒科

○小兒形色論 論歌脈症十五條

夫小兒半週兩歲為嬰兒三四歲為孩兒五六歲為小兒七八歲為幼童
九歲為童子十歲為稚子矣小兒半歲之間有病當於額前眉梢髮際
之間以名中食三指輕手滿額按之兒頭在左用右手在右用左手食
指為上中指為中名指為下若三指俱熱主感受風邪熱氣壯發熱
熱嗽若三指俱冷主外感內傷發熱吐瀉若食中指熱主上熱下冷若

醫世保元 卷之八

中指熱主寒食指熱主胸膈氣滯乳食不消又要觀形色假如面
之為病則面青心之為病則面赤肺之為病則面黃脾之為病則面白
腎之為病則面黑先要分別五臟形症次看真標本而治之無不效也

○凡問審候歌

觀形察色辨因由 陰弱陽強髮硬柔 若是傷寒雙足冷
要知有熱肚皮赤 鼻冷便知是寒疹 耳冷應知風熱症
瀉身皆熱是傷寒 上熱下冷傷食病

○觀形察色面目圖

眼胞絡屬脾 赤主肝有驚 左腮屬肝
眼烏珠屬肝 赤主肝有驚 右腮屬肺
眼瞳人屬腎 不睡睛昏屬 額屬心
眼尾角屬心 紅主心有熱 鼻屬脾
眼白睛屬肺 白主肺有寒 頭屬腎



對面部

左腮屬肝其色青者為順白者為逆若色赤主肝經風熱發熱拘急青黑主驚風腹痛淡赤主潮熱痰嗽

右腮屬肺其色白者為順赤者為逆若赤色甚者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於腎則小便赤澀或淋閉不通

額上屬心其色赤者為順黑者為逆若青黑主驚風腹痛痰涎啼哭微黃主盜汗頭暈乾燥骨蒸骨熱

鼻屬脾其色黃者為順青者為逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便閉而鼻燥咽血

頰屬腎其色黑者為順黃者為逆若色赤主腎與膀胱有熱而小便不通

面赤心家熱 面黃脾有積 面白肺家寒 面青肝有積 面青肝有積 面黃脾有積 面白肺家寒 面青肝有積

壽世保元

辛集八卷

一

眼赤心經熱 眼青肝有積 眼白肺有積 眼青肝有積 眼青肝有積 眼白肺有積 眼青肝有積

鼻青吐瀉 鼻赤吐瀉 鼻黃吐瀉 鼻青吐瀉 鼻青吐瀉 鼻黃吐瀉 鼻青吐瀉

風池紅多啼 風池黃出逆 風池青出逆 風池紅多啼 風池紅多啼 風池黃出逆 風池青出逆

面黃多食積 面赤是驚風 面白多成瀉 面黃多食積 面黃多食積 面赤是驚風 面白多成瀉

○手指脈紋式 夫小兒三歲以下有脈須看男左女右手虎口三關紋理兩手食指本節

為風關中節為氣關第三節為命關其紋曲直不同如紋只在木節病易治透過中節則病重過第三節則難治驚則紋青淡紅則寒熱在表

深紅必主傷寒疹紋則病久紋細則腹痛多啼乳食不消紋直射指甲必主驚風惡候紋黑如墨必因重難醫此乃神聖王巧之也



虎口又手處是也三關在第三指及第二節第一節風關第二節氣關第三節命關

脈指歌

小兒食指辨三關男左女右一般看皆知初氣中風候末是命門易亦難

要知虎口氣紋脈倒指看紋分五色紅黃紫赤五臟和紅紫依稀有損

益紫青傷食氣虛煩青黑之時証候逆忽然純黑在其間好手醫人心

膽寒若也直上到風關粒米短長分兩端如鎗衝射驚風至分作枝叉

有數般只反裏順外為逆順逆交連病已難又頭長短尤可辨如此醫

人仔細看初看掌心中有熱便知身體熱相從肘熱脚冷傷積定脚熱

額熱是感風額冷脚熱驚風所得瘡疹發來耳後紅孩兒無事忽大啼不

是驚風是天熱大吐氣促長聲驚誤吃熱毒悶心竅急須吐下却便解

若推驚藥真堪笑痲疾多氣冒頭皺不努不皺腸有風公熱不調分亦

壽世保元 辛集八卷 三

白胎胎因毒熱相攻十二種痲何為忌禁口刮腸大不同孩兒有病不

可下不熱自汗兼自瀉神困煩悶四肢冷乾嘔氣虛神怯怕吐面黃

毛焦體瘦氣喘熱食不化鼻塞咳嗽及虛痰脈細腸鳴煩燥方將



致現紫無汗是傷寒浮發傷風有汗液浮於多是風熱盛而元氣
食積滯於腹中痛不依強閉喉間作氣急喘促之時疹症生緊數之際
驚風至劇轉慢驚作癩痰厥實風潮發搐搦而細者為痲痺平而動
者因便閉脈洪大小便中血崩漏有氣急驚悸滑去痰濕冷所傷喘急
客忤若須証大小不勻為惡候二至為胎三至至五至為胎四至至六
至平和曰無疾七至八至病九至十至病勢急此証中無

心脈

心脈浮數驚悸熱 傷者焦喘明白訣 吊腸疝氣及盛腸
離結口瘡小腸泄

心脈沉遲臍腹寒 諸氣有冷痛難留 小便頻數腸中冷

肝脈

肝脈浮數疔疔風 目赤翳膜又主筋 流淚出血眼生翳
或痒或痛怕羞明

脾脈

肝脈沉遲主有寒 面青唇白眼昏淚 諸病似以慢厥候
良醫仔細要察脾

脾脈浮熱熱痰涎 能食胃惡脾脈堅 滯頤口瘡停滯結

唇紅臉赤胃中熱 更加吐瀉腹脹傳 氣虛胃弱不能食

滯頤嘔惡醒脾也 傷寒咳嗽遍身熱 氣急痰盛或癆疹

肺脈浮數主便血 傷寒咳嗽遍身熱 氣急痰盛或癆疹

瀉痢潮熱大腑泄 臟腑滯腸或酒泄 仍有咳嗽與痰涎

下根不定即無根 傷陰腫脹痛又赤 口臭咬牙是腎驚

腎脈浮數實有熱 停身齒內出鮮血 臟腑停滯入腎囊 偏墜膀胱尤不痛

光澤虛火最難當

小兒死症真訣

黑色如針懸眼下 虛驚也須怕忽然腹痛鼻青時 不必更求醫
橫入耳此候必死 必死黑色繞口及連目者者定 不定則起眉間也不良
十日必死 人中黑色入口來 孩子入鼻埋水腫之病準頭黑者腎
氣滅咳嗽切忌白入眉 肺絕要者 孩子吐時鼻色白命斷難再得中
風切忌面如紅馬能得不久長 目爛無光兼直視必定三朝死更有睡人
不動時死候要者 知目似開如又不開 此是死之候 目禁全然不進乳
此病終不起瀉下之物如瀉血孩兒不得活長吐不止止又吐沫更勞
心頭潮久不食更咳久終與死為隣 瀉下不歇歇又來指下下白
便艱難又太渴 異難得活 大便用藥全不進 痛也無功 再上生瘡
黑斑出腎人無此術 四肢皆逆冷 無由難得醒 體熱多應 不應
休 要藥精神 痘疹出後熱不退 此候應為害 下毒青黑不止時 不用

辛集八卷

良醫之德之後加燥渴命必難得活 腫脹時氣又虛必久命不延

小兒死候形症

大衝無脈滿口粉身身出黑汗舌縮生瘡五心凸腫瀉出黑血丹毒遍身
消止又瀉直視看人而黑狂燥驚叫咬人吐瀉不止魚白氣急喘乾黑
燥忽作鴉聲啼哭無淚兩眼半開四肢癱瘓氣喘無煙肚大青筋四肢
逆冷汗珠不流唇反舌縮用手撮入搖頭動身顛門作坑坑如牽絲掛
腰凸肚鼻內氣冷患者皆於已上並是死候難以醫探不可順情

看兒眼法

小兒諸病但是兩眼無精光黑精無運轉自轉無聲苦如魚眼插眼之狀
箇箇不洽或神藏於內外若昏困者無妨其病為馬而眼中神氣不脫
者可以活眼者五臟木腑神氣之所發神氣已脫脈雖僅存亦未能保
○相兒命短長法
兒初生呼聲連延相屬者壽聲絕而復揚者不壽

喘聲散不成人。

喘小者不壽。

六天者壽。

汗血者多死，不壽。

頭四破不成人。

早坐早行早齒早語皆惡性非佳兒。

髮稀少者強不聽人言。

兒生枕骨不成者能言而死。

掌骨不成者能匍匐而死。

膈骨不成者能立而死。

骨口者死。

頭下破者死。

陰囊下白者死。

喘聲深不成人。

通身軟弱如無骨者不壽。

自開目者不成人。

汗不流不成人。

常搖手足者不成人。

頭毛不周匝者不成人。

額上有旋毛者早貴妨父母。

尻骨不成者能偃而死。

踵骨不成者能行而死。

身不收者死。

股間無生肉者死。

陰不起者死。

如縫通達黑者壽。

壽世保元

李集八卷

○心敬馬

脈訣醫家曰：小兒脈促急為虛驚。○直挺元派數洪緊為急驚。○沉遲散緩為慢驚。○虎口脈紋青紫為驚風。○紅者風熱輕。○赤者風熱盛。○青者驚積。○紫者驚熱。○青紫相半驚積風熱俱有。主急驚風。○青而淡紫伸縮未去主慢驚風。○紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出而不出主慢驚風。○形勢漸入裏者順。○出外者逆。

夫急驚風者因內有熱邪外挾風邪心家受熱而極驚風家生風而發熱。夫木制在金火盛則金受剋金衰不能平木木能生火火得風則燥燥起故子母縱橫血亂氣併痰涎壅塞閉塞不通風火蕃盛而不得泄其烈而盛急驚也其症牙關緊急壯熱涎潮驚視反張搐搦攣動唇口俱眼眼引頰併六脈浮散洪濇治先搐鼻通關痰涎壅盛以吐風散吐之。次用敗毒散保命丹或雄黃解毒丸下之驚退而神志未定投安神散。

一但噴嚏不下通關不曉眼睛昏轉口中出涎兩足攣跳肚腹搐動或神緩而摸床尋衣症篤而神昏氣促心中熱痛忽大呼聲者不治。

噫驚散

半夏

牙皂

等分合用豆許吹入鼻中

○一論小兒急慢驚風發熱口噤不省人事手心伏熱痰涎咳嗽上壅喘急並宜湧法。

吐風散

全蝎炒一箇瓜蒂炒十箇赤小豆三十箇

右為末每二歲兒服一字。溫水飲調下。未吐再服。

○一論小兒急驚風初起發熱手足搐搦眼上視等症并一切感冒風寒頭疼發熱咳嗽鼻塞聲重及痘疹欲出發搐并時行瘟疫等症宜加味敗毒散。

羌活

獨活

前胡

紫胡

白茯苓去皮人參

壽世保元

李集八卷

枳殼炒黃芩桔梗

天麻

全蝎

姜麥

白附子

地骨皮

川芎

甘草

右作一劑生薑三片水煎熱服。

○一論小兒急驚搐搦眼番口噤搖頭天吊痰嗽喘熱服南極壽星湯。

膽星

防風

白附子

蟬退

薄荷

甘草

右剉水煎服。

○一論小兒潮熱驚啼

木通

車前

赤茯苓

麥門冬

蟬退

防風

白芍

甘草

燈草

水煎服

○一論小兒驚風咳嗽痰喘

天南星

大者炮去殼為末每服一錢生薑三片水煎溫服。

○一論小兒胎驚內傷肚腹堅硬目睛上視手足搐搦用弓反張喉喘喘

熱一切急慢驚風並皆治之

至聖保命丹

南星炮用生薑水浸一宿取出半夏同上製青黛

薄荷各一兩全蠲去尾尖天麻 白附子各炒姜蚕姜汁炒

防風 鬱金 甘草各五錢麝香少許朱砂為末五錢

右為細末煉蜜為丸朱砂為衣或實大每服一丸燈心薄荷湯化下

○一論小兒痰喘急慢驚風至死但能開口灌下無不活者用

千金散 內閣秘傳

全蠲炙熟 直姜蚕各三分朱砂四分 牛黃六釐 冰片

天麻 黃連各四分膽星 甘草各二分

右為末每服五七釐薄荷燈心金銀煎湯不拘時調下

○一論驚風退後恍惚虛怯安神定志調理之劑

安神散

壽世保元

辛集八卷

八

人參 茯苓去皮 遠志去心 天麻 白附子

麥門冬去心 全蠲去尾 蓮肉 茯神去皮 朱砂各等分

右為細末每服燈心湯調下

○一論小兒因發熱驚搐不乳視其脈紋如亂魚骨此風熱急驚之症也

先用抱龍丸少許祛風化痰後用六君子湯加柴胡枳實平肝逐熱退

而驚定愈矣

○一論小兒痰癆啼哭額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君

子湯加木香柴胡鈎藤鈎藤啼漸緩更加當歸又二劑而安

○一論小兒目內色青發搐目上視啼哭不已或用牛黃清心丸不愈反咳

牙頻悶小便自遺此肝經血氣虛甚故耳余用補中益氣湯及六味地

慢驚馬

夫慢驚風者因外感風寒內傷乳食而作吐瀉或得大病之餘或誤吐下

之過脾胃兩虛脾與肺母子也母虛亦令子虛而生枯痰胃虛則能生

風風能動能開故其症目偏喜開痰涎咽喉如牽錐狀口鼻氣冷唇緩

面青涎流口角將復瘳飛是也治宜祛風活痰健脾生胃不可妄用腦

麝巴粉等藥其有眼閉四肢厥冷者名曰慢脾風極危焉選用回陽之

藥手足漸溫復以醒脾散理之其服藥不效大衝脈尚有者灸百會穴

但面黃神慘魚口鴉聲胃痛腸動身冷粘汗頭搖髮直睛定口瘡喘喘

尸吐唇縮氣逆者不治

加味和中散 治小兒慢驚風

人參 白朮去蘆 白茯苓去皮 陳皮各五分 半夏七分

全蠲炒五分 天麻七分 細辛三分 薄荷 甘草各二分

右到一劑生薑蜜煎服乳母亦宜服之

○一論小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沈默默不食宜

醒脾散

壽世保元

辛集八卷

九

人參 白朮去蘆 白茯苓去皮 木香 全蠲

姜蚕 白附子 天麻 甘草

○一論去天麻姜蚕加泡南星半夏炮陳倉米二百粒水煎旋服之

右到生薑三片棗一枚水煎服

○一論慢驚乃元氣虛損而至昏愵急灸百會穴若待下痰不愈而後灸

之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總歸虛處惟脾受之無

風可逐無驚可療此因脾虛不能攝涎而作痰也此方專治慢驚涎潮

發搐或吐或瀉不思飲食神昏氣弱宜用

紫金錠子

人參 白朮去蘆 白茯苓去皮 白茯神去皮 山藥炒

乳香 赤石脂煨辰砂 各三錢 麝香一錢

右為細末以糕下兩為丸如彈子大金箔為衣每下粒薄荷湯研化服

○一論小兒嘔吐不食手足攣攣痰涎上壅手足指冷額黑唇青此腎水騰

心火也用五味異功散加木香炮姜頰安乃去炮姜再劑而愈
 ○一 小兒潮熱發搐痰涎上湧手足指冷左腮至中酉時青中隱白手足時搐此肝經虛弱肺金所勝而潮搐脾土虛弱而手足冷也用補中益氣湯以調補脾肺用六味地黃丸以滋補肝腎而愈蓋病氣有餘宜認爲元氣不足若用瀉金伐肝清熱化痰則誤矣
 ○一 小兒慢驚睡多驚啼九面黃服細者難治用此藥與乳母服之釀乳法

木香 沉香 藿香 丁香 減半 陳皮
 人參 神麩炒 麥芽炒
 右劉每服四錢紫蘇十葉生薑十片棗子一枚水煎先令乳母食後搵去宿乳汁服之即便臥安時令藥入乳之脈次令兒吮不可過飽亦服法五味異功散方見脾胃補中益氣湯方見脾胃六味地黃丸方見諸疳

壽世保元

辛集八卷

十一

慢脾

慢脾之症面赤額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭禁口咬牙床手足微搐不收或身冷或身溫而四肢冷其脈沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極經歸虛處惟脾所受故曰慢脾風若逐風則無風可逐癆驚則無驚可療但脾開痰涎壅滯而然耳世所謂慢驚難療者慢脾風是也宜服
 加味四君子湯

人參一錢 白茯苓五分 蒼朮三分 炮乾姜四分 白朮炒六分
 製附子一分 羌活三分 炙甘草四分
 右劉生薑三片棗一枚水煎服
 ○一 論慢驚慢脾危惡之症藥力不到者但看兩脚面中間陷處有太冲脈即灸百會穴三五壯注如小麥大灸後仍與醒脾之劑調之

○ 論小兒慢脾風肉虛昏迷不醒宜加味大醒脾散

人參 白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 橘紅
 木香 南星 炮 全蝎 去毒炒 天麻 煨 丁香
 山藥 炒 石蓮肉 去殼 石菖蒲 肉豆蔻 砂仁
 甘草 炙 右劉生薑三片棗子一枚水煎服回陽加附子
 ○ 一 論小兒驚風後聲啞不能言及諸病後不能言
 天南星一箇炮去皮爲末每半字五歲兒半錢豬膽汁調令盛前服
 ○ 一 論治慢驚慢脾之聖藥也一錠即有起死回生之功頃刻奏效故名回生錠
 人參 五錢 白朮 去蘆油 白茯苓 去皮 懷山藥 桔梗 各一兩
 甘草 三錢 膽星 五錢 赤石脂 煨 五辰砂 三錢 乳香 二錢另

壽世保元

辛集八卷

十一

諸疳

脈訣啓蒙曰小兒脈象細爲疳勞○虎口紋白色白色者爲疳夫疳者甘肥無節乳哺不調或稟賦怯弱血氣不足蓋十五歲已前爲疳已後爲勞也書載五疳病關五臟要亦脾家有二臟有積夫治疳而傳其餘也脾家病去餘臟皆已症雖分乎冷熱治當以補爲先宜用地黃丸五疳膏肥兒丸之類
 ○ 一 論小兒疳病面黃肌瘦肚大青筋大便色疳白小便混濁或澄之如消疳湯
 山查 白芍炒 黃連 姜汁炒 白茯苓 白朮 去蘆

○一治小兒疳積發熱肝大青筋骨瘦如柴消疳退熱飲

澤瀉各一錢青皮四分 甘草生三分 右對一劑薑棗煎服

○一論肝膽經熱毒癰癤或耳內耳下生瘡發熱潮熱或肝經熱毒下生

九味柴胡湯 柴胡 黃芩 炒各五人參 山柰 半夏 龍膽草 當歸 芍藥各三分甘草二分 水煎服

○一論小兒肝疳白膜遮睛肝經虛熱血燥或風客淫氣而虛癰結核

或四肢發搐眼目抽動痰涎上壅凡傷損出血多抽搐發熱又治腎疳 腦熱消瘦手足如水寒熱往來滑泄肚脹口鼻熱渴面黃肌瘦或黑而 驚遍身兩耳生瘡或耳內出水或發熱自汗盜汗便血諸血失疔或小便 淋閉咳嗽吐血或咽喉燥痛口舌瘡裂或稟賦不足肢體瘦弱解脫 鶴節五疳五軟或畏明下窺或早近女色精血虧耗五臟虧損凡屬腎 肝諸虛不足之症皆宜用此以滋化源其功不能盡述

六味地黃丸 懷生地黃 酒浸砂炒內磁碗盛蒸至極黑拍碎入 山茱萸 酒蒸去 乾山藥 略切牡丹皮 去骨白茯苓 去皮 澤瀉 去毛各三兩

○一治小兒五疳潮熱面黃肌瘦煩渴壯大青筋手足如柴精神困倦 試有效無疾預服此藥則諸疾不生心氣虛弱者服半月身體健壯

保嬰五疳膏

青皮炒 蘇橘紅 五錢 白朮 去蘆蜜水炒一 白茯苓 七錢半

麥門冬 去心 史君子肉 炒七錢半 山查肉 五錢 麥芽 炒五錢

金櫻子肉 炒五錢 芡實仁 二錢 蓮肉 心 炒一錢半

右為細末和勻重七兩每次用藥末一兩煉蜜四兩調成膏每日中晚 晚間各服一二茶匙濕水漱口○身熱咳嗽加地骨皮百部○肚腹飽 脹大便稀水腹鳴作聲或蟲出不知加檳榔二錢木香 一錢 弱加人參二錢半

○一論消疳化積磨癰清熱伐肝補脾進食殺蟲潤肌膚養元氣真王道 肥兒丸

人參 三錢半 白朮 去蘆 白茯苓 去蘆 黃連 炒三錢 胡黃連 五錢 史君子 四錢 神麩 炒 麥芽 炒 山查肉 炒三錢 甘草 炙三錢 蘆薈 二錢 半 碗底泥封固置坑中四面各插火煨透用

壽世保元 辛集八卷 十三

癖疾

夫癖塊者嬰兒飲食失調三焦關格以致停滯腸胃不得宣通初起為積 久則氣血與痰聚積塞于腹脇及瘰癧縱飲生冷漿水亦能成之其症 作痛有時面黃肌瘦倦怠無力或生潮熱寒熱是也治先定去寒熱次 用消堅故結和脾益胃之劑理之更用次去時藥久之自効

○一論小兒腹中癖塊發熱增寒口乾小便赤或大便稀澀或腹脹腫滿 或痰嗽喘熱不思飲食面黃肌瘦四肢困倦等症

淨府湯 柴胡一錢 黃芩八分 半夏炒八分 人參三分 白朮 去蘆炒八分 白茯苓 二錢 猪苓五分 澤瀉 二錢 三稜 煨七分 莪朮 煨七分 山查肉 一錢 胡黃連 三分 甘草 三分

右劉一劑生薑三片棗二枚水煎服
 ○一論小兒癰積日久不消元氣虛弱脾胃虧損肌肉消削肝大青筋痞
 熱口乾肚腹脹滿
 抑肝扶脾散

人參五分 白朮分炒八分 茯苓八分 陳皮六分 青皮分炒
 龍膽草分洗 白芥子分炒 柴胡三分 山查肉八分 神麩分炒 六分
 黃連分炒 一胡黃連三分 甘草三分
 右劉一劑生薑三片棗二枚水煎服
 黃龍丸 扶瀉劑小兒傳
 雄黃一錢半蜈蚣二條砂鍋內炒去 蘆薈三分 阿魏三分
 牛黃一分 天竺黃三分

右為末化黃蠟一兩為丸如黃豆大先服七丸則熱退次服九丸則塊
 消三服十一丸則病除症用黃蠟煎雞子清入藥于內黃酒下

壽世保元

辛集八卷

一百

肥兒丸方見前內 治疳積如神
 ○一專貼癰積氣塊身熱口內生疔此藥用狗皮攤貼患處疔個重
 七錢貼三日止熱七日覺腹微痛十日大便下膿血為驗大有神效忌
 生冷腥葷發物百日

神仙化癰膏

真香油吐 酥秦丸五錢 三棱五錢 黃丹一分 二兩水飛過炒紫
 黃柏五錢 穿山甲片 四當歸三錢 莪朮五錢 全蝎十四箇
 大黃三錢 蜈蚣五錢 木鱉子七箇
 右將藥入油內煎黃色為度瀉去渣搗爛待用油冷時下黃丹用文武
 火熬槐柳條不住手搗黑烟起滴水成珠手試軟硬方可離火次下五
 味細藥並入搗爛和渣於內
 真阿魏一兩乳香五錢 沒藥五錢 麝香一錢 皮硝二錢 風化
 攪勻以磁器內盛之如用坐水內鑲開不可火上化如有刀擗平者

加琥珀一兩在內無不效驗
 ○一將軍百戰百勝膏 貼癰如神

大黃 白芷各二兩三稜 莪朮各一兩木鱉子十箇
 蜈蚣十條 穿山甲片 五巴豆十箇 五草麻子十箇 五箇
 黃連五錢 槐柳條三百寸
 香油一斤入藥熬黑色去渣瀉淨再加皂丹一斤熱湯水成珠再加血
 竭五錢盧香五錢天竺黃五錢輕粉五錢阿魏五錢麝香五分胡黃連
 二錢硼砂二錢為末下油為妙
 ○一治小兒癰疾發熱之甚及眼腫方

明目化癰丹

牛黃一分 片腦一分 熊膽一分 麝香三錢 乳香三錢
 右共為細末先將乳油於銅粉中炭火上滾黃色下前藥忌取出攪勻
 於油車上上丸如米粒大男左女右肝時點入大眼角內含眼自化頭

壽世保元

辛集八卷

十五

上出汗至胸前第二九汗至膝上第三九汗至膝下再點三九服滿
 下膿血即愈妙不可言
 化癰金丹 內閉秘傳
 蟾酥水泡 黃蠟各二錢 羚羊角 牛黃各五分 麝香三分
 巴豆肉一錢 硃砂 冰片各一分

右為末丸如菜子大每用一粒用扁頭針在患處刺破皮入之用清酒
 貼上一伏時揭起其癰化膿血出盡服調理脾胃之藥而愈
 ○一論小兒患癰年深不愈諸醫以攻冠殺伐之劑屢投不愈以致元氣
 耗傷脾胃損傷血氣乾涸肢體羸瘦面色萎黃肚大青筋身熱自汗喘
 急氣促泄瀉腹脹浮腫不思飲食予以補中益氣湯及服而愈

熱證

小兒之病惟熱居多天熱有虛有實實則面紅目赤寒則口乾渴小便

赤澀大便堅閉五心煩熱日夜焦啼發壯熱宜大連翹飲主之虛則面
 白眼青氣微口中清冷恍惚神疲大便稀而小便頻夜出盜汗發熱
 宜醒惺散主之其有身體乍冷乍熱佛醫驚湯上盛下虛此冷熱不調
 候也如熱在表宜汗在裏宜下表裏俱熱則宜解散其或表裏已解熱
 又時來此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外不可再服藥必使陽欲
 於內身體自涼宜參苓白朮散主之又有潮熱則發熱有時驚熱顛叫
 恍惚夜熱多發日山餘熱寒邪未盡食熱肝腹先發熱肝熱骨蒸盜汗
 壯熱一向不止煩熱心燥不安積熱煩赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困
 倦少力客熱來去不定瘧熱寒熱飲水寒熱發如瘧狀血熱已午時發
 熱瘧發熱身熱尖冷十六者大同而小異諸症得之各有歸其間或
 有三兩症交互者宜隨其輕重而處治之蓋小兒氣稟純陽臟腑生熱
 陰陽氣變蒸於外致令身熱也若肝熱則兩眼赤痛流淚羞明或生
 翳疳心熱則口內生瘡小便赤腫淋瀝不通肺熱則鼻衄不止大腑閉

壽世保元

辛集八卷

十六

結脾熱則多涎沫日內長流心脾熱則生重舌舌舌胃熱則作口臭
 熱則耳聾或出膿汁此五臟所生主熱各不同是不可以舉論也木抵
 熱則生風風則悞矣

○一論小兒心經邪熱心與小腸受感及水實之處常宜通利壅則結滯
 則脫熱則溢盛則淋平涼心火三焦自順不待疾作而解証成而療若
 疎待有之矣十五味加湯使用經絡通暢客熱邪風邪胃之肺經
 心將受之不受觸傳于小腸或閉或泄或赤或白淋瀝不通滯衛不通
 壅之作疾其發多端以致腸熱眼自赤腫唇白舌赤津液不生涕唾稠
 盛須在表裏俱得其宜風悉能散之痰熱亦自消除連翹之功可謂

大連翹飲

- 連翹 監麥穗 滑石 車前子 牛勞子
- 赤芍藥 八山梔子 木通 當歸 防風 各四分
- 黃芩 各一分 柴胡 甘草 各一分 荆芥 穗二錢 蠶退 五分

右劉作于劑竹葉石膏煎服十匙水煎服風厥熱發熱加麥門冬
 ○胃熱丹熱加大黃○胎熱胎毒發熱加薄荷葉○癰疽疔毒
 ○一論小兒驚風積熱毒唇口腫破生瘡不認出血口臭煩熱咽乾燥不
 寧先疔疔餘毒未解或頭面身體多生瘡癩宜
 五福化毒丹

犀角 身三錢 桂梗 一兩 生地黃 酒浸赤茯苓 去皮鼠粘子 各
 粉草 林梢 各三錢 連翹 玄參 各六錢 青黛 二錢
 右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸源荷湯研化下兼
 ○一論小兒驚風一症乃小兒表皮長骨常覺精神不須服藥其有積
 風咳嗽痰涎鼻塞聲重變蒸發熱宜服此方

醒睡散

- 人參 白朮 去蘆 白茯苓 去皮甘草 炙 桔梗 白芍 炒
- 天花粉 細辛 薄荷葉 右劉每服二錢水煎服

壽世保元

辛集八卷

十七

感冒

○一論小兒感冒風或冒暑
 用老葱三四根春碎爛以手揉來相搗瀉乾烘溫暖同病者搗之
 通氣處再搗搗幾遍取出汁立愈又不相妨
 出痘疹屢驗絕妙

○一治小兒面青身冷默然不語用燭火通身手足按穴熨之立醒
 ○一論小兒傷寒頭痛壯熱惡寒咳嗽鼻塞聲重痰涎欲出發熱驚風
 嗽手足攣攣等症宜服

- 人參 敗毒散
- 羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼
- 桔梗 白茯苓 川芎 薄荷葉 人參
- 甘草 右劉每服一錢

○一論小兒風寒外感驚風內積發熱喘促咳嗽痰涎潮熱搐搦初作

人多

老活

獨活

前胡

小膏

桔梗

天麻各五錢薄荷

地骨皮各三錢甘草一錢

右為細末煉蜜為丸如茨實大每服一丸薑湯研化下

○一論小兒四時感冒傷風癰瘰身熱昏睡氣粗喘滿痰涎壅嗽及驚風潮搐瘧毒中暑并瘡疹欲出發搐皆可服之壯實小兒三五日服一丸可免驚風痰嗽等疾宜

地龍丸

南星 研末入臘月黃牛肝中浸乾

天竺黃

雄黃

辰砂 研各四錢 麝香一錢

石為細末乳甘草膏獨丸如草角子大每服一丸薄荷湯研化下百餘內者作三服或用臘雪水養甘草膏冰和藥尤佳

壽世保元

辛集八卷

一八

按右方若風熱痰嗽或急驚發搐昏睡咬牙形病俱宜用此方若初見風寒咳嗽痰盛氣喘者屬邪內作也先用一味參蘇飲若邪既解而腹脹吐瀉或發搐咬牙睡而露睛為脾肺氣虛也用四君子湯加陳皮名異功散切忌祛痰表散若過服而致前症者尤宜溫補脾肺參蘇飲方見咳嗽

脾胃

○一論小兒諸病因藥攻伐元氣虛損脾胃衰憊惡寒發熱肢體倦怠飲食少思或兼飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴尿赤大弦虛或微細軟弱右關寸獨甚亦宜用之大人久病或過服攻伐之劑虧損元氣而諸症悉具者最宜此湯調補若無前症致兒為患尤宜用之

補中益氣湯

黃芪 炙水炒棟參 各八分 白朮 去油蒸當歸身 白朮 各一錢

陳皮 甘草 各五升麻 柴胡 各二分

○一論小兒脾胃虛弱或因攻伐之劑致飲食少思或食而難化或發作嘔或大便不實脾胃虛損吐瀉少食宜用

四君子湯

人多

白朮 去蘆炒白茯苓 去皮甘草 各等分

右劉蕪煎服

六君子湯

治脾胃虛弱飲食少思或大便不調肢體消瘦面色萎黃

○一論小兒脾胃虛弱吐瀉不食或發搐痰盛或睡而露睛手足冰冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有疾致兒患此者母亦當服之

異功散

壽世保元

辛集八卷

一九

人參 白茯苓 去皮白朮 去蘆炒甘草 各等分

右劉蕪煎服

傷食

經云脈滑者有宿食也。虛口脈紋黃色為脾家有積。○小兒脈乳者為夫小兒傷食皆因乳哺不節過食生冷堅硬之物脾胃不能消化積滯中脘外為風寒所感或因夜卧失蓋以致頭身熱面黃目眩發熱腹痛脇脹足冷肚熱喜睡神昏不思飲食或惡食或惡心或嘔或噎或口酸或大便敗卵臭或氣短痞悶或胃口作痛或心下痞滿按之則痛此皆為陳積所傷也宜以藜蘆丸利之若內停於食或外又感寒邪者則入迎氣口俱緊盛頭疼惡寒拘急兼前症宜以和散去積散之曰乳者奶也哺者食也乳後不可與食食後不可與乳小兒脾胃虛弱乳食易傷難以消化初得成積久則成癖成疳變為百病不可不慎

萬應丸 不見通治治傷食百病

一論內傷乳食肚腹脹痛外感風寒頭疼發熱宜服

太和散

紫蘇

陳皮

香附

羌活

蒼朮

小荷

枳殼

山查

神麴炒

麥芽炒

甘草

生薑三片水煎溫服

一治小兒食積腹痛膨脹肚硬青筋 塔山王景明傳

黑丑炒 生半檳榔各三錢木香五分

右為細末每服五分黑砂糖調入滾水服之消

一論小兒時驚傷食皮黃肌瘦肚大腹脹用此焦散令常食之

消食餅

蓮肉去皮

山藥炒

白茯苓 去皮

芡實去殼炒

神曲炒

麥芽炒

扁豆炒

山查去子

壽世保元

辛集八卷

三

右各等分為末每四兩入白麴一斤水同和烙焦餅用

一論此藥消食止泄止吐消疳消積消脹定腹痛益元氣祛脾濕

啓脾丸

人參

白朮 去蘆炒

白茯苓 去皮

山藥

蓮肉 去皮

山查肉

陳皮

澤瀉

甘草 各五錢

右為末煉蜜為丸如葶豆大每二十四粒空心米湯送下小兒常服消積

食諸疾服之立愈

一論小兒傷食肚大腹脹

用微酒小麴一放為末打入雞子一箇攪勻入盞少許蒸熟食之每早

服一二次可數次而愈

一論健脾胃進飲食消積滯殺疳蟲長肌肉乃保嬰第一方也

保嬰丸

臨川徐培鴻試驗

人參三錢

白朮 去蘆

五檳榔紅

淨五

白茯苓 去皮

四錢

甘草 各二錢

青皮 錢三 砂仁 二錢 木香 二錢 五山藥 五錢 蓮肉 去皮

史君子 三錢 山查肉 二錢 三奇神麴炒 三錢

右共為細末用生荷葉包漚米煮熟去荷葉漚米拌爛以淨布扭出再

煮成糊為丸如葶豆大每二十五丸或三十五丸至五十九丸陳米炒熟

煎湯不拘時服

一論小兒食積後發牙欲吐頃間腹脹昏憤鼻青黃赤此脾土傷而心肝

所動食積發厥也先令雞翎探吐出酸物頓醒節其飲食勿藥而愈

一論小兒疳積成腹脹痛用白酒麴末同煎連末為丸服之愈

一論小兒因停食腹痛服峻利之藥後患瘡日曠而作此元氣下陷以補

中益氣湯治之

千金肥兒餅 小兒無病日當食三五餅可防患於未然妙不可言

嬰孩恒關乳

飲食不消停

胃脾一傷損

吐瀉兩相能

痰嗽加喘喘

熱積致疳驚

面黃肌瘦削

腹脹肚青筋

壽世保元

辛集八卷

三

赤子焦啼呼 慈母苦傷情 吾心懷幼切 家蓮子茯苓

芡實乾山藥

扁豆黃連仁

已上各四兩

神麴麥芽陳

人參史君子

山查國老并

六味每二兩

占糯米二升

藥米均為末

布裹甑內蒸

白糯米斤半

調和餅印成

每食二三餅

諸病即安寧

肥兒王道藥

價可擬千金

吐瀉

夫小兒吐瀉皆因不氣未定六淫易侵以調護失常乳食不節遂使脾

胃虛弱清濁相干瀉作而然太寒有冷有熱有食積三者之不同也瀉

冷者脾胃虛寒水穀不化小便白而大便青或如糟粕手足厥冷或吐

或瀉宜助脾胃去之如土之症或兼有外感風寒內傷生冷身溫乍涼

乍熱作吐瀉者宜藿香正氣散去之熱者脾胃有濕大便黃而小便赤

口乾煩渴四肢溫酸或吐或瀉宜甘露散去之如上之候為藥中身安

熱作吐瀉者宜如苓湯主之或益元散亦可食積者因傷食過多積滯
脾胃則吐脹發熱若吐如酸醜氣若瀉如敗卵其宜用九散利即愈
利後不愈乃脾胃虛弱仍以助胃膏主之凡吐瀉初起即服燒針丸
固之即効木抵注瀉之症多因乳食過傷脾胃乳食停滯則為嘔吐乳
食傷脾則為泄瀉吐瀉不止漸至日深道其胃氣之虛而傷其脾也

吐瀉不治症
小兒瀉不定精神好者脾敗也○吐瀉唇深紅者內熱故也不與必死○
面黑氣喘者不治○大瀉不定止之又瀉腎敗也○遺瀉不與者死○
燒針丸 治吐瀉如神
黃丹 水飛過朱砂 白礬 火般各等分

右為末棗肉為丸如黃豆大每服三四丸或針尖上放燈焰上燒過在
性研爛涼米泔水調服瀉者食前吐者無時外用棗豆粉以湯干為粉
作膏塗兩脚心如瀉塗額門止則去之

壽世保元

辛集八卷

二二

○一治脾胃虛弱吐瀉不食凡虛寒症先服此以正胃助
五味異功散

人參 白朮 去蘆 茯苓 去皮 陳皮 甘草 炙

右劉散姜棗煎服
○一論小兒吐瀉脾胃虛弱飲食不進腹脹滿腸鳴久瀉虛寒症
助胃膏

人參 白朮 炒 白茯苓 去皮 丁香 木香
砂仁 白豆蔻 肉豆蔻 官桂 藿香
甘草 各一錢 陳皮 四錢 山藥 四錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸米湯化下兼治乳便積或
睡夜啼胎寒腹痛

○一論四時不正之氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛胃風
吐瀉中濕身重泄瀉脾胃不和或飲食停滯復感外寒頭疼增寒或嘔

逆惡心膈膈痞悶或發寒熱無汗
藿香正氣散

藿香 一錢 紫蘇 八分 陳皮 厚朴 姜炒 半夏 姜炒
白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 桔梗 大腹皮 白芷
甘草 炙 各五分 劉子劑姜棗煎服

○一論小兒夏秋之月霍亂吐瀉身熱口渴
加減如苓湯

猪苓 七分 澤瀉 七分 白朮 去蘆 五 赤茯苓 去皮 黃連 五分
香茹 七分 乾葛 七分 天花粉 二錢 甘草 五分

右劉生薑煎服○如熱極加石羔知母○瀉極加升麻○腹痛加炒白
芍一錢桂三分寒痛亦加

○一論小兒五種泄瀉赤白痢疾宜用
鐵劑

壽世保元

辛集八卷

二二

文蛤 一兩 炒 白朮 二錢 牛生 半粒 黃丹 二錢

右為末用黃蠟一兩化開為丸如棗豆大每服大人十五丸小兒五七
丸用茶一錢姜一錢煎湯下

○一論小兒瀉痢疾用蜜三匙括蔡末三錢蘿蔔汁調服出微汗忌
欲飲乳食不進瀉因失治變成慢驚風痲不問陰陽虛實宜服之

七味白朮散
人參 白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 藿香 木香
乾葛 甘草

右劉薑棗煎服○如小兒頻瀉利將成慢驚加山藥扁豆肉豆蔻各
一錢姜汁一七煎服○若慢驚已作加細辛天麻各一錢全蝎三箇白

附子八分若小兒冬月吐瀉多是胃寒胃虛所致加丁香二錢若
胃虛不能食而大瀉不止者不可用淡滲之藥方胃氣少安山之日

水散補之。○如不能食而渴者。倍乾葛加天花粉。○如能食而渴者。倍黃連。○小兒嘔吐不止宜。

水香 半夏麴

陳皮各二錢 砂仁

右為細末薑汁打糊和成錠辰砂為衣淡姜湯送下

○一論小兒久瀉久痢不止及滿口生瘡白爛如疔痛哭不已諸症同効

巴豆去殼 瓜子仁 七箇 燒紙錢一箇共搗一處如泥津調貼在兩

眉間正中待成疔揭去即愈

○一論小兒泄瀉用巴豆研末為膏貼在額門上燒線香下此法

○一論小兒泄瀉不止用山藥炒為末不拘多少入粥同煮食之立止

○一論小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或暴瀉者藥到

口即嘔吐瀉乳母愛驚傷脾大便不實先用補中益氣湯後用五味異

壽世保元

辛集八卷

二十四

功散及四神丸調治其母不兩月而子母俱痊

○一論小兒傷食嘔吐服對伐之藥嘔中見血用清熱涼血之藥又太便下

血唇色白而或青問其故於余余曰此脾土瀉損肝木所乘而然也今

空心用補中益氣湯食速用異功散以調補中氣使深血各歸其位而

○一論小兒吐瀉不止或取轉過多四肢發厥虛風不省入事用此四肢漸

暖神識漸省

回陽散

禾南星為末每服三錢入京棗三枚同煎溫服

○一治小兒吐不定

五倍子二箇一匙甘草一匙用濕紙裹炮過同為末每服半匙米

痢疾

夫小兒八痢者乃飢飽勞役風寒暑濕因觸冒天地八風之邪而得故以

命者止大抵多由脾胃不和飲食過度積於脾胃不能消化又為風寒暑濕于之故為此症候然則赤白傷風則純下清血傷濕則下如豆汁冷熱交并赤白兼下若下迫後重裏急後重者亦性急速而能燥物故也或夏末秋初忽有暴疾於盛熱無所發散客傳肌肩之虫蟻於外則為瘧疾於內則為痢內外俱發則為癰痢凡痢病久則令腫滿下焦偏冷上焦偏熱則為上實下虛若脾胃濕熱之毒蒸蒸滯道而上以致胃中閉塞而禁口之症又有工方丁家之內上下傳染者幼相似是受毒痢也當先抽其毒運以平其外察其結以調其內其所以傷別其虛實冷熱以治之條然明白不致妄投也

痢疾不治證

○小兒下痢如豆腐色者死○下痢屋漏水者死○下痢日久大孔如孔者死○下痢如新筒法水者死○又小兒赤白同下久而不禁小便赤

澀腹痛發熱唇紅舌胎氣促心煩坐卧不安狂渴飲水穀道微閉時復

壽世保元

辛集八卷

二十五

面容似枯飲食全不進救急不治

清熱化滯湯 治痢主方

黃連吳茱萸煎湯 枳殼去殼炒黃芩

白芍藥 陳皮

甘草 白茯苓去皮

右剉生薑二片水煎空心溫服○初起積熱正熾加大黃芒硝○血痢

加酒炒黃芩當歸地榆○白痢加厚朴枳殼○赤白並下加川芎歸尾

桃仁紅花滑石陳皮乾姜炒黑○白痢久虛加白木黃芪茯苓去其連

枳殼○赤痢久虛下後未愈去芩連加川歸白芍白木川芎阿膠珠○

裏急後重加木香檳榔○腹痛加白芍川歸玄胡索枳殼○小便赤少

加木通椿苓澤瀉○下如豆汁加白木香木防風○食積加山楂枳實

麥芽神曲○久痢氣血兩虛加人參黃芪當歸川芎升麻肉蔻○下後

二便流利惟後重不去者氣陷于下也以升麻提之

○一論小兒痢疾屬熱居多用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃仁紅

花印疔加滑石末同煎

關板丹

黃丹兩 飛過二黃蠟一兩 乳香一錢 沒藥一錢 杏仁去皮生

巴豆去油八

右將四味為細末將黃蠟鑊開後將末藥同攪拌勻攪冷成丸如黃
瓦大每服一丸空心服紅痢冷甘其湯下白痢冷乾薑湯下水瀉冷米
湯下忌生冷油膩

一治休息痢及疴瀉日久不能安

用鷄子一枚打破用黃蠟一塊如指大鋪內鑊以雞子拌和炒熟

一治小兒痢疾方

用雞子一箇冷水下鍋煮二三沸取出去白用黃研碎以生薑汁半小
鍾和勻與兒服之不用茶神效

一治小兒患痢脫肛色赤或痛以補中益氣湯送香連疔而愈後復食

壽世保元

辛集八卷

二十六

作瀉復脫肛不入仍以益氣湯服更以葶麻仁研末項內

一治小兒久痢裏急後重欲去不去手足並冷皆身氣虛寒下陷也以
補中益氣湯加木香補骨脂倍加升麻柴胡

一治紅痢及噤口

用田螺搗爛盒麻中項刺效

一治痢不拘赤白

白蘿蔔汁蜜各等分攪勻服三四匙效

一治小兒噤口痢用甜菜一箇穿空入塞填滿紙筒火煨熟切立止

一治噤口痢湯飲米穀不下者

石蓮子去殼并內紅皮及心為細末每服見大小或五分或一錢下
錢用陳香米湯調下如嘔加生薑汁一匙

一治血痢用苦參炒為末每服三分或五分米湯調下

一治白痢用肉豆蔻包煨乳香一粒共為末每服二三分米湯調服

○一治久痢不止用陳蘿蔔煎湯下服立止○下左用葛菜煎湯服效
○一治瀉痢久不止不肯服藥用肉豆蔻煨去油礮末三錢麥麩四兩同
和切麵入葱搗煮如常食之

瘧疾

夫瘧者外因感受風寒暑濕內因飲食飢飽而作也其症不一先寒後熱
者名寒瘧先熱後寒者名溫瘧寒而不熱者名牝瘧熱而不寒者名癘
瘧不寒而熱骨節疼痛身重腹脹自汗善嘔者名濕瘧瘧氣吞酸胸膈
不利者名食瘧一日一發受病一月間日一發受病半年連發五日則
一且者氣血俱病也起于三陽者多熱而發于三陰者多寒而
發于夜發于日者隨症而治發于夜者加無藥并用升提暫瘧可截久
瘧加補經久不愈終兒飲水結瘧中脫名曰瘧母此最難痊一二發開
用截太早必變滑腫疔利之疾然嬰兒之瘧自飲食得之居多治須以

壽世保元

辛集八卷

二十七

消導扶胃氣為本此秘訣也

○一論食瘧嘔吐酸沫及時行瘧瘧不問寒熱後熱諸瘧通用

清脾飲

青皮 厚朴姜炒 草果 白朮去蘆 白茯苓去皮

柴胡 黃芩 半夏姜炒 甘草

右剉薑煎服○小便赤加滑石澤瀉

○一論傷食感寒發瘧及中脫虛寒嘔逆惡心等症

養胃湯

蒼朮 米泔浸厚朴姜汁炒 陳皮 半夏姜炒 白茯苓去皮

人參 草果 藿香 甘草

右剉烏梅一箇生薑水煎服

截瘧飲

白朮去蘆 蒼朮 米泔浸陳皮 青皮去穢 柴胡

黃芩

猪苓

澤瀉

常山

甘草

右判薑棗水煎露一宿溫服。○有汗而熱多者加入參芪前胡知母

○無汗熱多者加乾葛紫蘇。○寒多加乾姜薤白。○痰多加半夏貝母

○食積加枳實山查神曲麥芽。○夜咳者加除分加宜歸止麻。○二日

三日一愈者加大參黃芪白木烏梅去茶木。○單寒加乾姜附子人參

去柴芩猪苓澤瀉。○腹痛加厚朴枳實。○室女熱入血室加小胡湯

截癩仙丹

五月五日午時用雄黑豆四十九箇先一日以水泡去皮研爛入水

五分同搗為丸如黃豆大雄黃一錢為丸除乾枚貯即發日早晨向東

無根水下九忌熱酒熱物一時仍忌食腥生之物三日黑豆即

○一乳見瘡疾宿塊

川芎

生草

白芍藥各一錢

生夏

炒芩各一錢

右作一服薑三片煎下薑中未生錢

壽世保元

三集八卷

二八

一治風濕邪積用天靈膏燒存性為末每服三錢溫酒調下

痰喘

痰者風之苗然生於心痰生於火火者痰之根靜則伏於脾土動則發於

肺金水澄則清水沸則渾小兒痰嗽乃心火剋制肺金或寒邪停留肺

膈寒化為熱必生痰喘或逆上氣肺脹動為馬脾風又為風痰若

不速治立見危殆

奪命丹

治小兒風流瀉瀉利痰去風

青蒙石煨為末煉蜜為丸如粟豆大每七八丸傳湯下

○小兒風痰吐沫氣喘咳嗽肚腹膨脹不思飲食

小兒肺脹喘嗽 多人看作风喘 六黃散二茶半 人參分兩等分

五味研成細末 蜜水調量稀稠 每將一茶下咽 不用神針灸灸

右其證肺脹喘滿胸高氣急口脇抽動陷下作坑兩鼻竅張口亂喘

聲裏不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不急治死于旦夕也

定喘湯 治喘喘氣急

麻黃六分 杏仁三枚 法披尖半夏七分 甘草水泡 黃芩微炒三分

桑白皮蜜炙蘇子四分 款冬花六分 甘草二分 白果五枚 炒去

右判水煎溫服不必用生薑

○一論小兒脾胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心肚腹膨

脹腰背倦痛虛勞冷嗽諸藥無效者服

人參八錢 紫苑一兩 款冬花八錢 桑白皮 麥門冬 貝母 二錢半

桔梗炒二分 紫蘇五錢 檳榔五錢 木香五錢 杏仁錢 去皮炒八

五味子八錢 馬兜鈴二錢半

右為末煉蜜為丸如龍眼大每九丸薑湯化服

一論小兒喉中痰壅喘甚神效方

壽世保元

三集八卷

二九

用巴豆一粒搗爛作一丸以綿花包裹男左女右塞鼻痰即墜下

咳嗽

夫咳嗽者肺為嬌臟外主身之皮毛內為五臟華蓋形寒飲冷燥熱鬱蒸

最為傷也而肺實肺虛皆能傷痰而發咳也咳嗽之症難作一途咳謂

無痰有聲肺氣傷而不清嗽謂無聲有痰肺濕動而生痰咳謂有聲

有痰因傷肺氣兼動脾濕也其症感風寒者鼻寒聲重聲寒者怯聲怯

寒夾熱者則熱煩受濕者為纏帶停水者則怔忡若痰飲則咳有痰聲

痰出咳止火極則咳聲不轉而赤痰結肺氣則喘滿氣急息重風痰壅

盛則咳至極頻吐乳食與痰俱盡方得少息而或實或虛則視痰之黃

白唾之稀稠而可知也以二歲論之春乃上升之氣夏乃火氣炎上秋

白濕熱傷肺冬則風寒外束以一日論之清晨本曰痰火午後皆曰痰

虛夜間或有食積其咳而吐膿血者肺熱感也久痰不已必傷腎性頑

涎甚，至眼腫紫黑如物傷損，或味微赤如血，大可畏入，治法風寒，宜散頭熱，宜清利受熱，用勝濕之藥，停水且瀉水之劑，痰飲即愈，痰久位則降，大肺脹則養血，咳而風痰，痰宜春胃而去風痰也，况肺生胃門，更能溫中，故表順則其氣滋潤，肺經和順，三焦一將見氣壯，則咳漸減，胃後則痰不生，肺滋則咳不有，乳母忌食積風寒，咳何從而生乎。

○一論春夏秋傷風咳嗽痰熱喘急，非夾驚傷寒等症宜雄朱丸。

牛膽南星 天花粉各一薄荷
 荊芥 防風
 雄活 天麻 朱砂 雄黃各六錢 麝香三分
 右為細末，粳米飯，薄荷湯送下。

○一論冬月感寒咳嗽夜不得睡，以此發之。

九寶飲

薄荷 紫蘇 大腹皮 麻黃 桂枝

壽世保元 辛集八卷 三十

桑白皮 杏仁 陳皮 甘草
 右剉生薑三片，烏梅一箇，水煎服。

○一論小兒四時感冒，發熱頭疼，咳嗽喘急，痰涎壅盛，鼻塞聲重，涕唾稠粘，及肉傷外感，一切發熱等症，宜服。

參蘇飲

紫蘇 陳皮 桔梗 前胡 半夏
 乾葛 白茯苓 去皮 枳殼 去穢 人參 木香
 甘草 右剉生薑煎服。

○一論小兒咳嗽吐痰。

用甜梨一箇，空小孔，入細砂一分，燒熟，與服，或搗汁亦可。

○一論小兒一切咳嗽，不用。

寧嗽膏

麻黃 杏仁 去皮尖 桔梗 去蘆 甘草 知母

貝母 款冬花 黃芩 紫苑各五錢 黃連 四錢
 香附 重炒 牛膽南星 一兩
 右為細末，煉蜜為丸，如芡實大，每下丸，白湯食後化下。

○一論小兒身熱感冒，鼻流清涕，或鼻塞咳嗽吐痰，輕者不藥，候一二日，自愈，重者服此方，治痰為主，輕輕和解之。

白木 去蘆 一白茯苓 去皮 桑白皮 蜜炙 川芎 五分 桔梗 五分
 橘紅 五分 半夏 泡五分 防風 四分 甘草 三分 薄荷 三分
 枯芩 炒三分 右剉，一劑生薑水煎服。

○一治小兒傷風咳嗽發熱，服解表之劑，如喘促出汗，此解肺氣虛，以補中益氣湯加五味子。

發沙

小兒發沙，有陰有陽，陰沙則腹痛而手足冷，陽沙則腹痛而手足溫，或其症似寒非寒，似熱非熱，四肢厥冷，不思飲食，容顏慘起，為症不一，俗呼為沙病，非沙也，多由感冒風寒，而受水傷濕得之，其治之法，宜用熱水蘸搭臂膊，將背麻痺，刮之，候紅色出為度，若宜以針刺其十指背，近爪處，一分許，仍將兒兩手，自臂持下，令血聚指頭，方刺，或視其身背有紅點，以燈草蘸香油，點燈燻之，已上諸法，使腠理開通，寒邪易散，氣血通暢而已矣。

○一論小兒攪腸沙，心腹腰諸痛，用火龍丹。

壽世保元 辛集八卷 三十五

通治

神效萬應丸

雄黃 煅硝 各二錢
 共研細末，每用簪挑些點眼角，太背男左女右立愈。

朱砂 巴豆去殼 寒食麵

右先將朱砂研爛即將巴豆同研極細却以寒食麵好酒打成糕入藥中仍同研百餘下再抹和為丸如黍米大凡所服不過三五丸而已看虛實加減照後引下

- 一感冒風寒毒熱湯下出汗
- 一心痛艾葉煎湯入醋少許送下
- 一心胸氣脹淡薑湯送下
- 一嘔疾空心茶清送下
- 一瘧疾薑湯下
- 一切雜病茶清下
- 一內傷飲食茶清下
- 一伏暑熱飲水送下
- 一霍亂吐瀉薑湯下
- 一肚腹痛熱茶送下
- 一急慢驚風薄荷湯下

太乙混元丹

紫河車焙乾二錢 白梅花三錢 辰砂一兩甘草一兩水煎
 滑石六兩用杜仲皮二兩煎水去 香附米一兩蜜水煎送

壽世保元

辛集八卷

三十一

粉草一兩半 甘松四錢 莖米一兩 三砂仁三錢 皮三益智去殼六錢
 山藥二錢 炒人參錢 黃芪一錢 炒白茯苓錢 白茯苓二錢 半
 遠志一錢 甘草水炮去心 桔梗一錢 木香一錢 麝香三分
 牛黃三分 天然黃一錢 丁方無混元衣梅花

右共為細末煉蜜為丸如龍眼大含酒為衣每服量兒大小加減大人婦女諸病並皆治之

- 一中風痰厥不省人事薑湯研下
- 一傷寒來驚發熱薑湯研下宜出汗
- 一停食嘔吐腹脹太使酸臭姜湯下
- 一泄瀉米湯下
- 一咳嗽喘急麻黃杏仁湯下
- 一蟲痛苦練根湯下
- 一夜啼不止薑湯下
- 一霍亂紫蘇木瓜湯下
- 一赤白痢疾陳倉米湯下
- 一積聚腹痛薑湯下
- 一疝氣偏墜大小茴香湯下
- 一急驚搐搦薄荷湯下

一慢驚人參白朮湯下

一小便不通車前子湯下

一發熱金錢薄荷湯下

一中暑煩渴燈心湯下

一疳熱身瘦肚大手足細或淋或瀉或腫或脹或喘或嗽陳倉米湯下

一論小兒諸病有餘壯盛者宜服萬應丸小兒諸病不足虛弱者宜服雄黃解毒丸

雄黃解毒丸 雄黃二錢半 鱗金二錢半 巴豆二十四箇去油

右為末醋煮糊為丸如黍米大每服七丸熱茶清吞下

一疳風卒然倒仆牙關緊急角弓反張不省人事茶清送下吐後立甦

一小兒急驚風痰熱等症加牛黃五分研砂一錢水糊左薄荷湯下

一纏喉風急喉閉每七丸研化以熱水研白梅花調下或熱茶下即甦然則流通之意纏喉風卒死心頭猶溫者灌下即甦

壽世保元

辛集八卷

三十一

一疳疾中有毒用沉香磨水送下泄下黑血如泥極真立効

一諸積下痢煎五苓散送下

一疳瘡加全蠍一錢見角下錢麝香少許滴水丸每服二十丸茶下若始不覺是疳瘡不曾發汗過數日方覺即寒熱體痛皆罷毒氣公裏須用利藥使內中毒氣下泄此藥主之

一瘰癧瘡加斑貓七箇去翅足糯米炒冷茶下

一切熱毒瘰癧又能取積消食下熱茶下

小兒初生

小兒五宜

一小兒分乳初離母體口有穢毒啼聲未發急用軟綿裹指拭去口中穢汁倘或不及預煎甘草黃連濃汁灌之待吐出惡沫方換乳吃或用好朱砂水飛過煉白蜜調和成膏如小豆大乳化服三日內止進三粒

以除胎毒痘疹之患也

一初生三五日宜新綿念臥勿豎頭抱出免致驚癇

一乳與食不宜一時混吃兒生疳積

一兒衣宜用年老人舊裙舊袴改作小兒衣衫念兒有壽雖富貴之家玆不可製絳綾羅縐絨之類與小兒穿不惟生病抑且折福

一兒生四五箇月止與乳吃六箇月以後方與稀粥哺之周歲已前切不可吃膏腥生冷之物念兒多痰苦待二三歲後臟腑稍壯方與豈腥庶可若到五歲後食之尤嘉 一云小兒永無雜疾大忌雜肉絕妙

洗兒法

一初生兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍疔等症浴兒調和湯水須看冷熱得宜不可久浴久浴則傷風寒夏不可久浴久浴則傷熱浴時當護兒首免風邪而入不使發熱成癩疾用五根湯洗以免瘡疥之患

壽世保元

辛集八卷

三五

五根湯

桃根 柳根 梅根 桑根 槐根
加苦參 白芷 同煎碎諸不祥
右每味一兩洗淨切碎用水煮去渣加猪膽汁一枚候水溫洗放金銀銅器則辟諸惡邪之氣

斷臍法

一小兒初生洗訖斷臍不可用刀割以軟絹裹臍或隔單衣咬斷蓋臍不可令長又不可太短只取兒足掌長如長引針風則成臍風之患短則傷臍內痛面青啼叫臍帶中有穢蟲宜急擦去不然入腹成疾

變蒸論

夫小兒之初生血氣未足陰陽未和臟腑未實骨格未全有變蒸之候然若異帶也蒸者發熱也所以變蒸五臟蒸六腑須要變蒸多則則

節臍由是而全胎毒亦因變而散氣血方榮性情有異後未出

輕可也自生之日始每至二十日一變凡人有三百六十五骨除手足

十五碎骨外正有三百二十骨自生下骨而止下日十骨三十二日為

一變骨氣始全一變生一臟或一腑十變則臟腑始足每變輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼燥渴轉舌五日

解重則小兒解九小兒之病無不由變蒸而得也而不熱不驚無他

病候是暗變者多矣此受胎氣壯故也凡變蒸須看兒唇白如上唇微

腫有如則毒或有珠泡子者是真變蒸之候也此則決不可妄投針灸

藥餌若誤之則為藥引入各經證遂難識而且纏綿不脫反為藥之所

害也或因傷食因傷風因驚嚇等項來雜相值而發令人疑惑亦須

守候二三日俟其病勢其的食則消食是風則行痰是驚則安神隨

症調治或非變蒸時而得傷寒時行溫病則口上無白泡其診皆相似

惟耳及尻通熱此為他病可作除治藥勿料者矣可不詳究耶

壽世保元

辛集八卷

三五

小兒初生雜證論方

大小兒初出腹骨氣未斂肌肉未成猶尚是血血熱則堅而成肌肉也又云如水上之泡草頭之露夫初生一臘之內天地八風之邪豈能避良由在胎之時母失愛護或勞動氣血相干或坐卧飢飽相役飲酒食肉冷熱相制恐怖驚撲血脈相亂繼毒于內損傷胎元而降生之後故有胎熱胎寒胎肥胎怯胎驚胎黃諸症生焉外因浴洗拭口斷臍炎燥之不得法或綁抱驚恐乳哺寒溫之乖其宜致令噤口臍風鎖肚不乳等症病而致此亦難治療良可哀憫小兒雜病諸方悉陳于後

- | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 胎熱 | 胎寒 | 胎肥 | 胎怯 | 胎黃 | 胎驚 | 鎖肚 | 不乳 | 臍風 |
| 撮口 | 噤風 | 客忤 | 不尿 | 夜啼 | 中惡 | 天弔 | 驚口 | 口瘡 |
| 重舌 | 木舌 | 弄舌 | 牙疳 | 吃泥 | 丹毒 | 赤遊 | 喉痺 | 乳蛾 |
| 眼疾 | 耳膿 | 鼻瘡 | 頭瘡 | 臍瘡 | 蟲痛 | 疔瘡 | 陰腫 | 疝氣 |

盤腸 氣痛 脫肛 遺尿 尿濁 便血 下淋 吐血 衄血
 小便閉 大便閉 水腫 黃疸 汗症 解顛 鶴節 行遲 諸逆
 語遲 齒遲 龜胸 龜背 滯顛 顛陷 顛填 手拳 脚拳
 痘瘡 疥疹

胎熱

○一論胎熱因母孕時食熱毒之物過多。令兒生下身熱面赤眼閉。口中氣熱焦喘燥渴。或大小便不通。法當漸次解熱。先冷乳母。服藥兒服乳。即解決。不可速効。以涼藥攻之。必致嘔吐。而成大患也。慎之慎之。

生地黄 二錢 澤瀉 二錢 半指苓 去黑皮 赤茯苓 去皮 天花粉 各一錢
 茵陳 甘草 各一錢

右劉散每服三錢水一盞煎七分。冷乳母搗去宿乳。却服藥。少頃乳之。
 壽世保元 辛集八卷 三六

胎寒

○一論胎寒乳母孕時受寒。生下再感外邪。令兒面色青白。四肢厥冷。大便青黑。口冷。腹痛身起寒慄等症。即宜當歸散服之。

當歸炒 黃芪蜜炙 桂心 黃芩 細辛
 龍骨細研 赤芍各二錢

胎肥

○一論胎肥小兒生下肥肉厚。遍身血色紅。滿月以後漸漸羸瘦。目白睛粉紅色。五心煩熱。大便難。時時生涎。當浴體更別父母肥瘦。肥不可生。瘦不可生。肥。

胎怯

○一論胎怯小兒面無精光。肌肉薄弱。大便白水。身無血色。時時明氣。歲且無精彩。宜以浴體法主之。

天麻末 二錢 蝎稍去毒 朱砂 各半錢 白礬 青黛 各二錢
 烏蛇肉 三錢 酒浸焙 麝香 一字

胎黃

○一論胎黃者皆因乳母受熱而傳於胎也。兒生下遍體面目皆黃。狀如黃金。色身上壯熱。大便不通。小便如梔子汁。乳食不思。啼哭不止。宜以

生地黄 赤芍 川芎 當歸 天花粉
 猪苓 澤瀉 赤茯苓 茵陳 甘草 各等分

胎驚

○一論胎驚者由胎前調適乖常。飲食嗜慾。忿怒驚撲。母有所觸。胎必感之。或外挾風邪。有傷於胎。故子乘母氣生下。即病也。其候月內。遍壯。眼握拳。口咬牙。身腰強直。涎潮。嘔吐。搐搦。驚啼。眼縮。顛陷。或頰赤。或面青。眼合。其有著。撮口之類。亦此一種之所發也。視其眉間。氣色紅赤。鮮碧者。可治。若黯青黑者。不治。虎口指紋曲。公裏者。可治。反出外者。不治。治宜解散風邪。利驚。心痰。順氣。青金丸主之。慎不可作。

青金丸

壽世保元 辛集八卷 三七

作痛啼哭不乳即有口內堅硬之症或牙齦腫痛或口內出血用如聖調薄荷湯以手指攪過再用其母油髮蘸墨通口擦之仍用絹蘸新井水展口即愈

客忤

一論客忤者初生兒因別房暑若外人來氣息忤之一名中人是為客忤也及家人或乘馬行得馬汗氣息或衣未穢暴之氣未盥洗物衣便向兒邊皆令忤也小兒衣布帛中不得有頭髮積中亦謂曰客忤常時衣白帶皆令中忤亦能驚兒致病欲防之法從外來所忌之物當將避之勿令兒見慎護一歲之內方無忌也

不尿

一論小兒初生不尿者有因在胎之時母食糟粟火等毒之物熱氣流毒世保元

辛集八卷

四十一

入胎出竟因飲血是以生下肚腹脹脹腎腫如癰勝四傍有青黑色及口撮即不可救也如有青黑色不飲乳者取葱乳湯葱白切作四散用乳汁半小盞同煎片時分作四次服即服之即愈

夜啼

一論小兒夜啼者此是邪熱乘心也宜花火膏用燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上令兒吮之
一治小兒觸犯驚風而夜啼者宜醋炭薰服蘇合香丸
一治小兒柴頭一箇長四五寸削平下向朱砂寫云撥火杖撥火杖差來提神將捉着夜啼鬼打殺不要效急急如律令
又治夜啼不止用朱砂書印字貼於頭即止
一治小兒夜啼用柳園內無葉之竹名為仲人杖取三尺放兒睡處勿使兒知即時愈

一治小兒夜啼不止伴心經有熱在虛冷安神散 人參 黃連 姜汁炒各 甘草五分右剉竹葉二十片生薑一片水煎服
一治小兒夜啼狀若鬼祟 蟬退七箇半截為末初生抄一字薄荷湯入酒少許調下或者不信將上半截為末伏前湯調下復啼如初古人立法莫知其妙

中惡

一論中惡者謂花邪氣也小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死辟邪膏 治中惡
一治夜啼用尿漆約水洗淨莫令人知覆在兒床下即止
一治夜啼用朱砂筆寫在小兒臍上 子勝卵午

天弔

一治小兒天弔潮熱 降真香 白膠香 沉香 虎頭骨 鬼臼 龍膽草 人參 白茯苓 去皮各五錢 右為細末入雄黃五錢麝香一錢煉蜜為丸乳香湯下

辛集八卷

四十一

一治小兒天弔潮熱 鈎藤散 鈎藤 人參 犀角 鎊屑各全蝎 右剉作四劑水煎溫服 天麻 各二錢半 甘草炙一錢半

鵝口

一論小兒鵝口口瘡者胃中濕熱也小兒口中百病皆由口瘡重則不能吮乳及咽喉腫塞一切熱毒

牛黃散

牛黃 冰片 硼砂 辰砂 雄黃

青黛各二分牙硝一分半黃連末八分黃柏末八分

右共入乳鉢內研勻每用少許傳入口內

○一治小兒驚風不能食乳用地龍搗水參瘡即愈即虛蟲也

口瘡

○一治口瘡

瀉心湯 用川黃連淨為細末每服一字蜜水調下

○一論小兒口舌生瘡乃心脾受熱口瘡赤心脾熱口瘡白脾臟冷口瘡

黃脾臟熱宜用

吳茱萸末醋調傳脾心移夜即愈藥性雖熱能引熱下行其功至良

○一論治小兒滿口白爛生瘡口瘡

壽世保元

辛集八卷

四二

白朮 猪苓 澤瀉 木通 生地 赤苓 肉桂 甘草各一分

○一論小兒白口瘡 黃丹巴豆仁同炒焦去豆用丹搽瘡上立已

咽喉并口瘡 我也有妙方 白礬二錢許 硼砂一錢強

咽喉用吹入 口瘡蜜調當 一次若不愈 再用管安康

重舌

○一論重舌者脾經實火也小兒心脾有熱重下有形如舌而小者名曰

重舌及唇山兩傍生瘡

當歸連翹湯 治重舌

歸尾 連翹 白芷 鎔 三 大黃 煨 甘草 各一分 右剉作一劑水煎食後服

○一方治重舌用蒲黃塗之 ○一方用膽礬研細敷之

○一治小兒重舌木舌乃舌下生舌也

用三棱針於舌下紫脈刺之即愈又宜竹瀝調蒲黃末敷之舌上

○一治小兒緝舌用布針舌下針數下以唐雞屎一搽即愈

○一治小兒緝舌不乳啼哭用布針蘸桐油燒紅針下類換滑湯也一論即

木舌

○一論木舌乃舌腫硬不柔和脾經有實火也

瀉心散 治木舌弄舌

藿香葉七分山梔一錢 軟石膏五分防風四分 甘草七分半

右剉一劑水煎不拘時服

○一治木舌 百草霜 芒硝 滑石 為末酒調傳之

弄舌

○一論小兒舌微露而即收名弄舌屬心脾虧損用補脾散補之舌舒長

而收緩名吐舌乃心脾積熱少用前瀉心散去芒硝舌生瘡作渴飲冷

壽世保元

辛集八卷

四三

胃經實熱用瀉心散作瀉其冷屬胃經虛熱用四君子湯食少作瀉或

大便不實脾胃虛弱也用吐瀉門七味白朮散若午後甚者脾血虛也

四物湯多加參木茯苓末應用內傷門補中益氣湯木病未已而弄舌

弄舌微微露即收 得於病後最難瘳 出長收緩名舒舌

熱在心脾不用藥

補脾散 治弄舌

人參 白朮 去蘆各白芍酒炒 白茯苓各八分 陳皮

川芎各六分黃芪 蜜炙 當歸酒洗 甘草各四分

右剉每劑三錢生薑煎服

牙疳

○一論牙疳者陽明之熱也小兒齒疔流涎腮腫走馬牙疳等症

清胃升麻湯

升麻 川芎 白芍 生薑 黃連 酒炒 生甘草 焙 五枚 石膏 一錢 白朮 七分 白芷 三分

右剉水煎服能散即合散而吐之漱藥不用白朮半身

○一治小兒走馬牙疳疔時腐爛即死用婦人溺桶白垢來煨一錢許入銅錄三分煨香一分半敷之立效

立効散 治走馬牙疳

青黛 黃柏 枯礬 五倍子 各一錢

右為細末用米泔水先漱口內搽入患處

○一論小兒走馬牙疳疔時腐爛即死用婦人溺桶白垢來煨一錢許入銅錄三分煨香一分半敷之立効

玉蟾散

蛇皮即蝦蟆不鳴不吐者身兩黃泥泥煎成餅二錢去毒連一錢許

壽世保元

辛集八卷

四兩

盛一錢許香少許右為細末濕則乾擦乾則香油調抹之

吃泥土

○一論小兒愛吃泥土乃脾胃熱所致面色青黃或見蟲動此症治法

若不急治癰瘰生焉

清胃養脾湯

軟石膏 黃芩 陳皮 白朮 去蘆 白茯苓 去皮

甘草 胡黃連 使君子 去殼

右剉等分水煎瀉腹或為細末放于飲食內令兒服之

黃金餅 治疳吃泥土

粟末土為末濃煎黃連汁和為餅服之立愈

丹毒

○一論小兒丹毒赤腫風熱狂燥腫出不安胸膈悶咽喉腫痛九道血妄行遍身丹毒及瘡瘡已出表出不能快透或已出熱不解急服犀角消毒飲

牛勞子 微炒 荆芥穗 防風 黃芩 各一錢 犀角 一錢

甘草 各五分 右剉水煎不拘時服如無犀角以升麻代之

泥金膏 治丹毒赤遊風

陰地上 蚯蚓糞 熟皮硝 蚯蚓糞 三分之二 共一處研細新汲水調調厚敷患處乾則再止

喉痺

○一論小兒喉痺腫脹兩傍腫者為雙乳蛾易治下傍腫者為單乳蛾難治乳蛾差小者為喉痺熱結於咽喉且麻且痒腫遠於外名纏喉風喉痺暴發暴死者名走馬喉風宜後方

壽世保元

辛集八卷

四五

雙疔湯 主方

桔梗 二錢 山豆根 一錢 牛勞子 一錢 荆芥穗 八分 玄參 八分

升麻 三分 防風 八分 生甘草 一錢 竹葉 五箇

水煎瀉腹外用硼砂下味喻化嚥下除痰消腫

○碧雲 碧雲真青黛 硼砂 煨硝 盆過 蒲黃 甘草 末俱等分搽咽喉

喉冷咽喉腫痛水漿不下或生瘡重舌本舌

○一治喉痺乳蛾氣絕者即時活

單乳蛾用巴豆一粒去殼打碎入綿裹殼內塞鼻在左塞右在塞

右若雙乳蛾用二粒塞兩鼻

○一喉痺乳蛾風口古生瘡用黑牛膽一箇入生白礬末二兩銀朱五錢入膽內除乾取出研末每少許吹入喉內神效

眼疾

○論小兒兩眼腫痛。上焦火盛也。

吹鼻散 暴發赤痛

乳香 沒藥各五分 雄黃三分 火焰一兩 黃丹水飛一分

右為細末。每少許吹兩鼻孔。

○一論小兒未周患兩眼腫痛。

拔毒膏 用黃連為末。水調敷脚心。手心自愈。如腫痛難開。加姜黃牙皂。

朴硝為末。同敷太陽穴。手心足心。加葱搗爛敷之。尤妙。

○一方熟地黃。下兩。以新汲水浸透。搗爛貼兩脚心。布裹住。効。

○一治小兒雀目。不計時月。

蒼木。下兩。為末。每服一錢。不計時候。以好羊子肝。下筒。以竹力。搗批開。

摻藥在內。麻繩扎定。以粟米泔。下大盞。煮為度。患人先薰眼。濕服。

耳疾

壽世保元

壬集八卷

四六

○一論小兒耳腫耳痛。停耳。乃三陽風熱。壅遏所致。宜升陽散火湯。加黃

柏知母。晚服。兼服金花丸。

○一論小兒耳熱。出汁作痒。乃痰也。腎火上炎也。宜用

清腎湯。

防風

天花粉

貝母

黃柏 薑水炒 白茯苓

玄參

白芷

蔓荊子

天麻

半夏 炮各五

生甘草二分半 生薑三片。水煎服。

○一治小兒耳後。月餘。瘡。燒蝟。蝟。糞。合猪脂。敷之。

○一治小兒患。膿耳。出膿水。成瘡。以蝟。糞。水。吹耳中。

○又方治膿耳。

羽澤散

枯蕪為末。少許吹入耳中。即已。

○下方用五倍子。燒存性。為末。吹入耳中。亦効。

○一方用。粗出雞卵殼。炒黃色。為細末。香油調。灌耳內。即時痛止。

鼻瘡

○一論小兒鼻瘡。熱壅。傷脾。肺。主氣。通於鼻。風濕之氣。乘虛。客於皮膚。入

於血脉。故鼻下兩傍。瘡。濕。痒。爛。是名鼻瘡。其瘡。不痛。汁。所流。處。又成瘡。

澤瀉散。主之。

澤瀉散 治鼻瘡

澤瀉

澤瀉 藜蘆

右為細末。用甘草煎湯。調食後。臨臥服。

○一治久患鼻瘡。膿。極。厚。者。用百草霜。研細。每服五分。冷水調服。

頭瘡

○一論小兒頭生。肥。瘡。或。多。生。風。手。搔。痒。成。瘡。膿。水。出。不。止。

壽世保元

壬集八卷

四六

二掃光

細茶一錢。口嚼爛。水銀一錢。茶。鈎。牙。皂。花椒。各二。為末。香油調服。

○一治小兒頭瘡。經年不瘳者。

白礬五錢 胡粉一兩 水銀一兩 黃連一兩半 黃芩一兩

大黃一兩半 苦參一兩半 松脂一兩半 蛇床子十八粒

右為細末。以臘。凡。猪。脂。和。研。水。銀。不。時。敷。之。

○一治小兒頭瘡。胎毒。諸風。熱。惡。瘡。瘡。瘡。

黃柏 黃連 白芷 五倍子 各等分

右為細末。用井花水。調。稀。稠。得。所。塗。開。在。碗。內。覆。菜。兩。磚。上。用。炭。火。灼

艾。煙。薰。蒸。以。黑。紙。為。度。仍。取。下。煎。藥。再。研。作。末。清。油。調。塗。如。有。惡。瘡。用

煎。油。調。塗。立。効。

○一治小兒頭生。禿。瘡。用。通。聖。散。酒。特。除。太。黃。另。用。酒。炒。共。為。末。再。以。酒。拌

燻。乾。每。服。一。錢。水。調。服。外。以。白。炭。燒。紅。淬。入。水。中。乘。熱。洗。之。更。以。煎。艾

子。依龍尾龍尾黃連白熟為末油調敷之。

臍瘡

○一論小兒因剪臍外傷於風邪以致臍瘡不乾用
禁龍散

枯禁

龍骨煨各五分 共為細末每用少許乾擦臍上。

○一論小兒臍中汁出疔痛用粘鷄未乾敷○又方黃柏末敷之○又方蘇
鹽煨灰存性擦之亦可

虫蝨積

○一論小兒蟲積腹痛凡腹疼口中出清水者蟲積也。
追蟲散

使君子二錢 檳榔一錢 作二劑水煎食遠服。

壽世保元

辛集八卷

四八

使君散

使君子去殼一錢 檳榔一錢 雄黃五分

右為末每服一錢苦練根皮煎湯調下。

○一治小兒蟲積腹痛用巴豆下枚去殼搗去油以朱砂下粒同研勻用
雞子下筒開頂微去白入藥在內攪勻仍將紙糊口用稗圍坐在鍋內
水煮熟令兒食之或以茶清送下即打取所積蟲效極捷。

○一治小兒吐就蟲

日鼻中來大不堪 如或白蟲兼黑色

靈丹縱服病難安

練陳湯

苦練根皮 二錢 陳皮 半夏 姜炒 白茯苓 錢皮各一

甘草五分 右剉二劑生薑煎服

○一治小兒肚大腹脹蠱積瘦弱用馬慈下名地黃食之打下虫來肚腹止

○一治小兒各月吐酸蟲後是胃寒胃虛所致
錢氏白木散

人參 白木去蘆 白茯苓 去皮 薑香 木香
乾葛 甘草各二錢丁香二粒 每服三錢水煎服。

尾骨痛

○一論小兒尾骨痛者乃是陰虛痰火所致也。
滋陰化痰湯

當歸酒炒 川芎 白芍酒炒 熟地黃 黃柏酒炒
知母酒炒 陳皮 半夏 姜炒 白茯苓 去皮 甘草 各等分
右剉少用官桂為引或以前胡木香為引如痛不止加乳香沒藥

陰腫疝氣

壽世保元

辛集八卷

四九

○一論小兒陰腫疝氣者寒邪所聚也。五倍子燒存性為末好酒調服。
○一治疝氣偏墜腫痛不可忍者塊子炒為末每服一錢入鹽調下止。

○一治小兒疝氣小腹痛引腰脊身不能直 京師傳
青皮 陳皮 三棱 莪木炮 木香
檳榔 川練肉 芫花 鹽炒 各等分 牽牛 生取末各
巴豆肉 不去油一錢

右為細末麵糊為丸如麻子大每三九空心下服午前一服薑湯下
○一治小兒陰囊忽腫或坐臥多時或風邪或蠱蟻吹者
蟬退半兩水一大碗煎湯洗腫處其痛立止若不消再煎再洗內服
五苓散燈草煎服方見中書

又方用葱園內蚯蚓糞以甘草汁調塗腫處或薄荷汁調亦可

○一治小兒肚大腹脹蠱積瘦弱用馬慈下名地黃食之打下虫來肚腹止

盤腸氣

○一論小兒驚風氣者即驚風也。其口閉脚冷或大便青色。不實上唇乾者是也。此多因生下洗滌感風冷而致也。急用葱湯淋洗其腹。揉腹。臍腹間良久。尿且湧。此驚風乳香散。治驚腸氣痛。

乳香 沒藥 各等分 共為細末 以木香煎湯調服

脫肛

○一論小兒脫肛。皆因久患瀉痢所致。太陽頭自塞閉。故而不收。此也。用葱湯薰洗。令軟。送上。或以五倍子末敷而。頻托入。又以五倍子煎湯。洗之亦可。

○又方。以蠶頭燒存性。為末。香油調敷。以此物燒煙薰之。久久自收。又以陳壁土。泡湯。先薰後洗。亦效。

○提氣散。治小兒脫肛。極效。

壽世保元 辛集八卷 五十一

遺尿

○一論小兒遺尿。朱禁。皆腰膝冷弱也。益智仁。七箇。桑螵蛸。七箇。為末。酒調服。用熟白果。七箇。送下。故紙散。用被故紙。炒為末。每服一錢。熱湯調下。

○一治小兒遺尿。六味丸。加被故紙。益智仁。人參肉桂。

尿濁

○一治小兒尿濁。澄之。如米泔水也。澄清飲。

白朮 去蘆 白茯苓 去皮 白芍 炒 黃連 姜汁炒 澤瀉 山查 一錢 各青皮 四分 甘草 生三分 剉一劑 水煎 空心服

便血

○一論便血者。熱傳心肺也。凡初生嬰兒。七日之內。大小便有血出。此由胎氣熱盛之所致也。謂母食酒麵炙燥熱毒物。流入心肺。兒在胎內。受之。熱毒亦傳於心肺。且女子熱入於心。故小便有血。男子熱入於肺。故大便有血。治法。生地黄。取自然汁。入蜜少許。和勻。溫服。男女皆效。

下淋

○一論小兒下淋。乃膀胱有熱。水道不通。淋瀝不止。或尿如豆汁。或如沙石。或如林如。皆或熱淋。尿血。

五淋散 赤茯苓 去皮 赤芍藥 二分 山梔子 二分 條芩 三分 當歸 甘草 各五分 一方。加生地。澤瀉。木通。滑石。車前子。各二分。

吐血

○一論小兒吐血。衄血。下血。宜用。

黃金丸 黃芩 不拘多少 為末 煉蜜為丸 如雞頭實大 三歲兒 每一丸 搗湯化 黃連末 一錢 淡豆豉 二十箇 水一盞 煎六分 去渣 溫服 量兒大小 加減

○一治吐血衄血

栢枝散
栢枝晒乾 藕節晒乾 各等分爲末。三歲兒服半錢。藕汁和茶下。匙日湯調下。

便閉

○一治小兒初生。大小便不通。腹脹欲死。急令人以溫水漱口。淨口。及前前後後。心并臍下手足心。共七處。每一處九三五次。漱口。吸吮取紅赤。而度須臾。自通。不爾。則無生意。
○一論小兒小便不通者。膀胱火盛也。
神通散
小便閉澁不堪言。爲用兒茶末一錢。爲靈靈湯來送下。

壽世保元

辛集八卷

五十一

○一治小便不通。腹脹欲死。野地蔞藜子。不拘多少。焙黃色。爲末。以酒調服。
○又方。用大麻。燒灰。酒調服。
○一論小兒大便不通者。歲時有熱也。小兒風熱滯。留胃上焦。胸膈高起。大便不通。

沒藥散

沒藥 六黃 枳殼炒 桔梗絡 木香 甘草 各二錢
右剉碎。薑三片。水煎服。

○一治新生小兒。二三日不大小便。用葱汁入乳。各半調勻。抹在口中。同乳帶下。即通。

○一治小兒大小便不通。

取連根葱白一莖。生薑一塊。淡豆豉二十粒。鹽一小匙。同研爛。搗作餅。子貼臍中。烘熱貼之。用絹帛扎定。良久。氣透。自通。不通。再易。二餅。二妙散。

六七月間。尋牛糞中。有蟻蟻。不拘多少。用線穿起。陰乾。收貯。用時。取一二筒。要全者。放淨磚上。四面以灰火烘乾。以刀從腰切斷。如大便閉。用上半截。小便閉。用下半截。二便俱閉。全用。爲細末。新汲水調服。

腫滿

○一論小兒腫滿。土虧水旺也。非四肢腫滿。陽水陰水。皆可服。
加味五皮散

五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮 茯苓皮 各一錢
加薑黃 木瓜 各一錢。剉散。水煎服。○一方。去五加皮。加薑黃。茶

黃疸

壽世保元

辛集八卷

五十二

○一論小兒黃疸。寒熱嘔吐。而渴。或飲冷水。身體面目俱黃。小水不利。不得安臥。不喜飲食。
茯苓滲濕湯

茯苓 茵陳 山梔 黃連 黃芩
防已 白朮 蒼朮 陳皮 青皮
枳殼 指苓 各一錢。澤瀉 三分 水煎。徐徐溫服。○如小便不通。加水通。如傷食。不思飲食。加神效麥芽砂仁。

汗症

○一論小兒盜汗。潮熱往來。
胡黃連柴胡。各等分。爲細末。煉蜜爲丸。如鷄頭子大。每丁九。至三九。銀器中。用酒少許。化開。更入冰五分。重湯煮。二十沸。放溫。食後和渣服。
○一治小兒虛汗。或心血液盛。亦發爲汗。此藥收斂心氣。

新羅人參

川當歸各三錢

右細割用雄猪心一箇切三片每服二錢猪心一丁片并水一盞半煎食前作兩次服

一治小兒盜汗因食封令之物過多或熱水淘飯大能損土為水之所傷則不能制其津液故成汗自出也

牡蠣煨二錢黃芪蜜炙生地黄各一兩 剉散水煎服

一治小兒盜汗用五倍子為末津液調塗臍中二宿即止○又方用何首烏為末津液調塗臍內効

解顛

一論小兒解顛者生下顛門不合也長必多愁少笑目白睛多面色眊白肢體消瘦皆腎虛也

壽世保元

辛集八卷

五十四

不盛所以腦髓不足故不能合○丹絡治解顛以八物湯有熱加酒炒黃連生黃芩甘草水煎服外用布帛緊束及以白朮末傅之

人參二錢

懷熟地黃四錢 嫩鹿茸

牡丹皮

山茱萸酒蒸去核各三錢

山藥

白茯苓去皮

右為細末煉蜜為丸如芡實大用入參煎湯研化食遠服

鶴節

一論小兒鶴節因血氣不充故肌瘦薄骨節露如鶴之膝

懷熟地黃酒蒸八錢

澤瀉去毛 牡丹皮去梗

一方加鹿茸酥炙

山茱萸酒蒸去核

白茯苓去皮當歸酒洗各三錢

牛膝去蘆酒洗各二錢

乾山藥

右為細末煉蜜為丸芡實大每用熱水研化食前服仍以天南星炮剉皮臍研細末八米醋調敷絹帛上烘熱貼之亦良法也

行遲

一論小兒行遲肝腎虛弱骨髓不充不能行步

加味地黃丸

懷熟地黃八錢

山藥四錢

山茱萸酒蒸去核

白茯苓去皮

牡丹皮

澤瀉各三錢

嫩鹿茸酥炙

懷牛膝酒洗

五加皮三錢

右為細末煉蜜為丸黍米大每服一錢空心溫湯送下

一論小兒稟受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦腹大面腫語遲行遲手足如筒神色昏慢牙齒生遲諸遲

調元散

乾山藥五錢

人參

白茯苓去皮

白朮神去皮木各二

當歸

川芎

黃芪蜜炙各二甘草炙一錢半

右剉薑棗煎不拘時服嬰兒乳母同服

壽世保元

辛集八卷

五十五

語遲

一論小兒語遲者心氣不足也

石菖蒲

人參

遠志甘草水炮當歸

乳香

朱砂另研各一錢

右為細末煉蜜為丸黍米大每服十丸食遠梗米飲送下

齒遲

一論小兒齒遲者腎不足也

骨蒸散

川芎 乾山藥 當歸 白芍炒 甘草炙各二錢半
右為細末每服二錢白湯調下食後服將此乾藥末擦牙即生

龜胸

○一論小兒龜胸者因肺熱脹滿攻於胸膈即成龜胸也又云綠乳母食
麵熟物五辛轉更胸起高也

龜胸丸

川大黃 煨六分 天門冬 去心 百合
木通 去節 枳殼 炙炒 桑白皮 蜜炙 杏仁 去皮尖炒

軟石膏 各一錢

右為細末煉蜜為丸每服五丸溫水化下食後服此服仍宜
兩身前各了寸半上兩行三骨際間六處各灸三壯春夏從下灸起秋
冬從上灸起依法灸之

壽世保元

辛集八卷

五二六

龜背

○一論小兒龜背者由兒生下風邪客於脊入於骨髓致成龜背也龜背
龜背並用龜尿點其骨節自愈取龜尿法用青蓮葉葉龜在土用鏡照
之其尿自出

龜背丸

枳殼 炙炒 防風 去蘆 獨活
當歸 麻黃 去節各三錢 大黃 煨 前胡 去蘆

右為細末煉蜜為丸每服十五六丸看兒大小以米湯下食
後服仍灸肺俞穴在三椎下兩傍各一寸半心俞穴在五椎下各一寸半
膈俞穴在七椎下兩傍各一寸各灸三壯以小兒中指節為一寸艾炷
以小麥灸五壯愈

○一治小兒龜背兒生下客風入脊遂於骨髓即成龜背自注以通氣散

節即平取龜尿法用蓮葉置龜于上尿自出

諸遲

○一論小兒行遲齒遲解頰頰填五收驚膠膝腎痛齒落睛白多怒凡此皆
因稟受腎氣不足當以大味丸加鹿茸補之若因精氣未滿而御女以
通多致頭目眩暈吐瀉或發熱足熱腰腿酸軟或自汗盜汗二便
瀉痛變生諸疾難以名狀余常用大味丸八味二丸及補中益氣之類
加減用之無不奏效方見補益

○一小兒五歲不能言成以為廢人矣但其形瘦癯乃肺腎不足遂用大
味丸加五味鹿茸及補中益氣湯加五味兩月餘形氣漸健將半載能
發一二言至年許始聲音明明方見補益

滯頰

壽世保元

辛集八卷

五二七

○一論滯頰乃涎流出而清子頰間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎自沉
不能收約法當溫脾為主宜服

溫脾丸

半夏 姜汁炒 木香 五錢 丁香 二錢 白姜 炒五錢 白朮 去蘆炒一
青皮 去穢五錢 陳皮 五錢

右為細末薑汁打稀糊丸麻子大每三二十九米飲送下

頰陷

○一論頰陷乃臟腑有熱渴飲水漿致成泄瀉久則血氣虛弱不能平
腦骨故頰如坑不得滿平宜用
黃狗頭骨炙黃為末鷄蛋清調敷之即愈

頰填

一論願填者願門腫起也脾主肌肉乳食不常飢飽無度或熱或寒乘于脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹願突而向如物堆塚毛髮短黃自汗是也若寒氣上衝則牽鞞熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量輕重兼以調氣小兒肝盛風熱交攻亦然未易聽耳

手拳

一論手拳不展稟受肝氣怯弱致筋脈攣攣兩手伸展無力宜服

當歸

薏苡仁

秦朮

米仁

棗仁

防風

羌活各等分

右為末蜜蜜為丸如鷄頭實大勝香湯化下量兒大小服之

脚拳

一論脚拳不展所屬腎氣不足榮氣未充脚指拳縮無力不能伸屈宜

言世保元

王集八卷

五八

川牛膝

山茱萸肉

人參

當歸身酒洗

牡丹皮

懷生地黃

補骨脂

右為末煉蜜為丸如芡實大空心搥湯送下

一治富翁子八歲不能步履皆因看得太嬌放不著手兒身未得去氣以致肌肉軟脆筋骨薄弱用黃土入于火視內與穿內服地黃丸加入參鹿茸牛膝虎膠骨服未半料兒能行矣

一治小兒稟賦腎經虛熱耳內生瘡或肌肉消瘦骨節酸痛皆由邪不味丸加鹿茸牛膝各一兩五味子四兩若願解不食牙齒不生服精不黑腿軟難行最宜此藥

痘瘡

夫痘瘡者乃胎毒之所致也嬰兒在胎之時感其穢毒之氣藏於臟腑之中發時有逆逆之不同耳若值寒暄不常之候痘疹由是而發因其

受成深而為疔疔馬大抵始發之時有因外感風寒而得者有因內傷飲食而得者有因時氣傳染而得者有因跌撲驚恐而得者大凡初起未見紅點與傷寒相類發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎等症身熱未明疑似之間急須表散可服敗毒散以微發其汗則胎毒隨汗而解而痘疹亦隨發而出矣痘苗一見之際則禁表藥恐發得表虛故也雖視痘之疔疔疔疔者輕不須用藥而稠者重宜以九味神功飲以化其毒痘自出至痊愈此如減用之能除諸疔毒已解盡又看痘之起脹何如如痘不起脹此元氣虛也宜以保元湯去之而痘必起脹又看痘之貫膿何如如痘不貫膿此氣血虛也宜內托散加入乳好酒此貫膿之巧法也貫膿已滿又看收靨何如若靨不靨深陷黑陷嘔吐白沫為表虛宜用香散治之若靨不靨寒戰咬牙牙痛泄瀉為裏虛宜用功散治之有過服熱藥以致熱毒猖狂血氣壅滯痘爛不靨者宜小柴胡湯倍倍骨解之收靨已畢又看痘後有無餘毒

言世保元

王集八卷

五九

若餘毒盛必因過服附子熱毒失解聚而不散以致渾身手足赤腫成癩毒也宜消毒飲五福化毒丹治之又有毒攻發為諸病宜臨症而治之大小痘瘡七日以前為裏實不可投溫燥之藥能助毒也八日以後為裏虛不可投寒涼之劑能伐生氣也但世俗不分寒熱但見痘出不快舉手悉用陳氏治虛寒熱藥殊不知痘瘡屬燥熱者多宜丹溪涼血解毒治之若繁投熱劑豈無死者今不知致病之因又不求去毒之意倉卒之際據症檢方漫爾一試設有不應非其書而感之不惑之甚也余觀陳氏其意大率歸重于太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛足太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易于外感脾土惡濕而無物不受觀其用了香薑桂所以治肺之寒用木附半夏所以治脾之濕使肺果有寒脾果有濕而兼有虛也量而與之中病則已何傷之有今徒見瘡之出遍身身熱者非利者繁條者氣急者渴思飲者不問寒熱虛實若投木香散與功散間有傷中隨手獲效或誤投禍不旋踵何者古人用藥

製方有精道有監制有反佐有因用陳氏之方之時必痘瘡而括寒者其用燥熱神之故其宜也今未發寒而用一偏之方寧不為於熱乎余嘗會諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方也若痘瘡虛寒淡白色痒癢屬虛寒者宜用之若發熱壯盛者宜用紅紫色燥痒此屬熱毒宜涼血自陳氏方盛行後虛寒者得生屬熱毒者悉不救痘是胎毒古入治法只解毒然氣血虛則又發毒氣不出及不能成故陳氏之法既行而解毒之旨遂隱只顧救其虛寒之極而不能治其燥熱之極也予思治法陳氏與丹溪寒熱兼用俱不可廢如痘瘡陷頂灰白色者或閉亂腹脹泄瀉者屬虛寒宜用其功等方治之如熱盛紅紫燥痒者屬熱毒者急用涼血之藥消毒等散相兼而用之豈有不中其病耶予謂痘疹乃小兒之酷疾生死反掌古人論之不一有見於寒者有見於熱者學者不可執一而誤赤子之生何也蓋痘疹乃胎毒所致初生小兒失於拭去口中穢毒者一誤也及長失於未用預防胎毒免痘之方者二

壽世保元

辛集八卷

六一

誤也初起發熱有汗而不汗者三誤也將出之際有不當汗而汗者四誤也既出之後有毒盛痛腫毒而不腫者五誤也起脹貫臍之毒有痛補虛而不補者六誤也首尾証平不當下而下者七誤也首尾實熱瀉下而不瀉者八誤也首尾虛寒當溫補而不溫補者九誤也也有過服熱藥致痘瘡後餘毒留滯而不腫者十誤也凡此十誤當預慎之務加通變故曰寒者溫之熱者涼之虛者補之實者瀉之又曰化而裁之神而明之若斯治者庶免小兒夭枉之禍耳

視痘顏色輕重之法

空谷而響應形動而影隨夫痘瘡之發也內熱和緩達於外者必輕便閉煩燥彰於外者必重有諸中形諸外理勢之自然也夫顏色貴潤澤而嫌昏暗貴光彩而嫌枯澀貴淡紅而嫌黑滯貴圓淨而嫌破碎貴清淨而嫌干場貴結實而嫌虛薄貴稀疎而嫌稠密根緊收緊宜分陰陽見點動活更怕臉浮出要參差血宜歸附耳後心喉少於他處為佳骨板

兩額額前光潤不泄為妙一發熱偶出者重瘡疹者半輕半重其外微紅者輕外黑裏赤者微重外赤裏黑者重瘡內黑點如針孔者甚重青乾紫陷昏睡汗出煩燥熱渴腹脹喘喘大小便閉者困也善治者觀其形色而辨之輕者獲安重者能取效矣

痘疹辨疑賦

胎毒蓄積發於痘瘡傳染由於外感輕重過於內傷初起太陽主水克于丙丁後歸陽明血水化為膿漿若然有變如反若救疾兮從新何如焦額如落水分拯溺不及寒寒欲知表裏虛實須明寒熱溫涼証候殊形臟腑易狀肝火激成水泡肺主涕而膿漿心斑紅紫脾疹赤黃經居下不受汚濁為變黑而可防觀其內症推乎外臟呵欠煩悶兮肝木之囚咳嗽喘噴兮肺金之象自帶赤兮心火延於胸膈手足厥冷而昏睡兮脾土困于中央耳尻屬腎溫暖如常一處灼熱痘症垂張先分部位次察炎祥陽明從自落鼻太陽形於頭上心火炎熱則舌乾而

壽世保元

辛集八卷

六一

赤肺金傳結則胸膈先傷手足屬乎脾胃肝膽主助助之傍項項三陽交會腰背統乎膀胱外症明兮用心想像泄者邪盛于下吐者邪甚于上氣逆而腹脹隱隱毒甚而腰痛惶惶心熱甚而驚悸胃邪實而癩狂口燥咽乾肺受火邪而液渴便閉尿澀皆因火旺而津亡欲識痘之輕重當觀熟于形狀毒甚兮心如灸上毒微兮內外清涼寒熱往來神氣爽定知痘出必禱祥數番漸出兮春回陽谷三聲湧出兮火烈崑岡蠱蟲蚤班刻期而歸陰府蛇皮蟬退引白而返泉鄉雖紫紅豈嫌灰印最宜淡紅滋潤切忌黑陷乾黃色要明潤兮猶恐薄嫩之易破痘貴乾結兮又愁痒場之難當面煩稀而毒落清安可保胸膈密而連串吉凶難量頂要尖圓不宜平陷漿宜飽滿切忌空瘡皮宜光而愁嫩腐宜活而怕光結實高聳始終無慮丹浮皮肉必主刑傷唇面預腫兮八九如何可過腰痛胃爛兮一七疔疔定主災殃瘡堆口舌毒纏頸項咽瘡喉腫飲食難宜為刺膿血毒甚無藥人力難盡天命非張痘瘡焦落辨別陰陽

人中上下。生處為良。足腰先若黑。屬多而少。吉祥。

神斷秘訣

細嫩無分地
皮膚無光亮
痘腫皮不腫
滿面皆稠密
頭身色不潤
初起瘡貼肉
見點如川樣
頭面左見大
十四痲堪落
日中光射斗
五經穴瘡上

粘連一片紅
胸前不空閑
眼開口又開
仔細看陰陽
腫綠臭難當
起後肉難通
焦枯黑陷傷
項刻又尖長
依然乾燥膿
手足亂抽搐
斜視眼不分

七朝虛癩塌
一身紅紫泡
陰陽俱無絕
天庭漿不足
此服脾氣絕
寒熱不分別
心腎二經絕
此般形像見
沉沉睡不食
若有此疾
縱然與儲壽

乾燥定無膿
九日若西天
水日一場空
此兒必有傷
不久命須亡
癩塌七朝中
此痘火中央
不美有奇方
延日不能生
不日命須傷
遲日一場空

壽世保元

辛集八卷

六三

舌尖上見黑
目白睛紅赤
初見雲中月
膿黃色不活
勝凸四肢浮
仔細看身疥
十四痲該落
見點如川樣
目定神昏熱
舌上浮血點
如神真秘訣

心經冠肺經
唇紅豆三般
雲中隱隱丹
乾極脚攤紅
睛黃赤鼻頭
咽喉前後心
膿瘡食不進
針苗接一連
喉痰膝下水
喉瘡熱不清
學者要精明

皮紅胭脂樣
黃漿胃先腐
兩朝三日後
牙疳瀉不食
類般顏色異
陰陽并腦後
無神死蛇臭
乾紅主絕水
飲湯非下瀉
皮紅痘不起

半月此兒亡
焦裂飲茶終
兒命待西天
半月命須終
十五命難留
腎古頂陰生
兒命必身逃
十命九難延
頃刻命難存
心經克肺經

延生第一方

預解胎毒免痘門

○一論小兒初生。臍帶脫落後。取置新瓦上用炭火四圍燒。至烟將盡。放地土上用瓦蓋之。類蓋之。存性研為末。預將朱砂。透明粉。為極細末。水飛過。臍帶若有五分。取朱砂用二分。五釐。生地黃。當歸。身煎濃汁。一二。規殼。調和。前兩味。搽兒口。上臍間。及乳母乳頭上。一日之內。晚至盡。次日大便。遺下穢污濁垢之物。終身永無瘡疹。及諸疾。生子。得。一。子。十分。分。妙。法。也。

○一論小兒未出痘疹。每遇交春。分秋。分時。服。一。丸。其。痘。毒。能。漸。消。化。若。只。服。一。二。次。亦。得。減。少。其。毒。能。消。化。必。保。無。虞。此。方。神。秘。本。不。欲。輕。傳。但。慈。幼。之。心。自。不。能。已。願。與。四。方。君。子。共。之。

神効消毒保嬰丹

纏豆藤 一兩 五錢 其藤八月間收。其藤上纏豆藤。黑豆三十粒
赤豆 七十粒 山查肉 一兩 新升麻 五錢 荆芥 五錢 防風 五錢
生地黃 一兩 川獨活 五錢 甘草 五錢 當歸 酒洗 五錢 赤芍 五錢

壽世保元

辛集八卷

六三

連翹 七錢 黃連 五錢 桔梗 五錢 辰砂 水飛 一兩 牛蒡子 一兩 砂過
苦絲瓜 五錢 薄荷 一兩 牛蒡子 一兩 牛蒡子 一兩 牛蒡子 一兩
右為極細末。和勻。淨砂糖拌丸。每服一丸。濃煎甘草湯化下。○
其前項藥須預辦。精料。遇春。分秋。分。或正月十五日。七月十五日。陰合。
務在精誠。忌婦人。狗。狗。合時。向太陽。祝。白。神。仙。真。藥。體。合。自然。嬰兒。
吞服。天地。齊。年。吾。素。太上。老。君。急急。如。律。令。勅。一。氣。七。遍。
全生保安散 魯府秘傳治小兒不出痘疹

麻黃 羌活 防風 升麻 生地黃
黃柏 酒浸 各川 荊芥 藜蘆 乾葛 蒼朮
黃芩 酒浸 生苧 柴胡 各二分 紅花 蒼朮
蘇木 白木 陳皮 各一分 甘草 細辛
黃連 各三分 連翹 吳茱萸 各半分 歸身

右判一劑。立春。立夏。立秋。立冬。之日。水煎。露一宿。次早。溫服。如一年之。

內依時服此四服神效永不出痘
滌穢免痘湯 太尹王天中傳自方上異人
十月經期後取練樹子一升取貯到正月初一日半夜子時父母只令
一人知將練子入鍋內用水煮湯待溫洗兒全身永不出痘真仙方也
鄉隣出痘預服禁坊

一凡鄉隣覺有時行痘疹可以預防宜節其飲食謹其起居加減衣服限
其藥餌亦制節謹度順天之道也
蒜油擦法
用蒜油每夜臨臥時以手中二指蘸油擦兒頭額項背腰兩手腕兩足腕
然後睡即可以便輕此亦暢達流通升脫凝滯之義也

三豆湯
大黑豆 赤小豆 菘豆
各一盞甘草一兩細切每日用四味瓦甌水煨熟爛連豆帶湯飲之

毒世保元 辛集八卷 六二四
之豆解腎經之毒制相火也赤小豆解心經之毒制君火也菘豆解
陽明經之毒制胃火也用豆者又以形治以類從也易簡而便里用食
治以便資雅其為神巧矣乎
永不出痘三五散 賈蘭峰傳
用有雄鷄蛋七枚內取一枚開一孔去清黃為裝入鮮明好朱砂四錢
九分其孔以紙糊用雞抱出雞雛將朱砂採日精月華各七日夜收貯
聽用再打起頭結絲瓜一個俟老成種乾燒成灰存性為末每服朱砂五
分絲瓜灰五分為細末降蜜水調服服過三次永不出痘疹鄰家出痘
就宜服之

油飲子
若遇痘疹行時左右隣家出痘者可預服之用真香油一斤煎過連日
與兒飲盡永不出痘
若其後筋紋斷法

凡耳後筋紋似水紅色為上赤紅色次之木紅色宜速火紫黑青色者不治
又須條均直上耳尖而無分枝者為上若分枝纏繞者雖淡紅亦凶其
或過髮際者多不可救

紙擦法
用學書竹紙或燒錢草紙烘乾作擦亦如小指大蘸清油于燈上往來薰
炙令紙條無泡不淋咤又飽蘸油又薰熾令油無泡即點擦子將患若
房內燈內閉令黑猶有光處以紙之有共左額右額右額有何色
點中庭有何色點兩額宜以擦子在兩耳邊及鼻邊平點兩處宜
以擦子在兩眼角平點看其皮中厚薄可指是赤是紫是塊是點是然
明白若是麻疹則浮于皮外肉內無根若是痘疹根在肉內極深若以
擦子當額及中庭正照則黯而不見然于有灰影即指去今明以此照
之病情在內者可以預見若日間以天日光觀之則不見矣
初起發熱治法

毒世保元 辛集八卷 六三五
一論發熱之初急宜表法使發汗胎毒及外感不正之氣增寒壯執頭嘔
腰痛腹脹或喘嗽痰涎鼻流清涕或因驚恐跌蹙而發搐搦用弓反張
上宮天串一切內外所感盡從汗散則痘出自然稀少但熱甚者其毒
亦盛熱微者其毒亦微然表藥必在紅點未見之前可服

敗毒散
升麻 乾葛 紫蘇 川芎 羌活
防風 荆芥 前胡 薄荷 桔梗 去蘆
枳殼 去穢 牛蒡子 蟬退 山查肉 地骨皮
甘草
右判一劑生薑丁片水煎臨服加葱白汁五匙熱服○一方無乾葛加
紫草○如熱甚加柴胡黃芩○冬加麻黃○暑月加香薷○瀉加猪苓
澤瀉
○一論小兒痘疹發熱者服之不出見苗者服之出種聞夫痘疹之

起脹妙不可言

神効復生丸 方伯主如承傳

賞歸身

西芎

升麻

乾葛

白芎

人參

黃芪

甘草

辰砂

紫草

右為糯米糰米糰為丸如雞頭子大每服一丸河水煎滾入黃酒少許

○一論痘初發熱一服即輕百發百中

預服西靈丹

紫草茸一兩 山豆根 五錢 升麻 小者 葛根

蟬退 淨者

姜糖 炒去絲 白附子

連翹 去心 各全蠍 去毒 十生 甘草 五分

雄黃 一分 麝香 一分 蟾酥 一分 蘇合 一分 化 銀 一分

右十味為末用麝酥丸如皂角子大每服一丸紫草湯下

○一論痘瘡初出先用此藥塗面若用之早則痘瘡不生於面用之遲雖出亦稀少

壽世保元

辛集八卷

六十六

玉顏膏

黃柏 兩 法皮 一葉 豆粉 四兩 甘草 生 四兩 紅花 二兩

右為末香油調成膏從耳前眼唇面上並塗之且三五度

出痘法

避穢氣

腋下狐臭氣

房中淫泆氣

行遠勞汗氣

溝渠瀟惡氣

婦人經候氣

諸瘡腥臭氣

硫黃蚊煙氣

吹滅燈燭氣

誤燒頭髮氣

紫烟魚骨氣

葱蒜菲蕪氣

煎炒油煎氣

醉酒暈腥氣

麝香燥穢氣

又禁忌

生人往來

罵罵呼怒

對梳頭

對搖席

勿掃地

勿對荒言

勿飲食甜藥

勿僧道師巫入房

以上穢氣禁忌諸條謹之則痘可變輕不謹則輕變重矣

○一論外解諸方凡被房事經水生產之穢所犯者以太黃煎煙解之

凡被五辛厭者以生薑燒煙解之凡被酒厭者以茵陳煎煙解之

凡被死屍之氣及厲氣所犯者以太黃煎水燒煙解之

凡被胡臭太羊厭者燒楓葉解之

凡遇風雨燒蒼水楓葉解之

凡一切惡氣通以乳香燒煙薰之仲景曰小兒痘時宜燒乳香餅諸毒

氣蓋紫衛遇香則行遇臭則凝故也

世俗煮醋薰豆謂其能活血然醋氣收斂故婦人血崩者用黃連煎煙

欲升發而不欲收斂故不宜耳常見用醋薰痘發痒搔破而難癒者

○一論痘疹初出時宜用此酒遍噴四面床壁及與患者服後人皆飲能

辟穢毒又以淨胭脂點兩眼角防痘入眼

胡蔓酒

胡蔓三兩細切以酒二鍾煎沸用紙密封久令氣出候冷去渣從頂

壽世保元

辛集八卷

六十七

至額領微微塗之更噴背脊胸腹及兩脚背邊再用蒲扇壁閉戶遍

酒之尤妙

○一論痘瘡欲出已出熱尚未解毒氣太盛稠密成疔忌進此三四服快

透消毒外神專治內蘊邪熱咽痛不利痰涎壅喉眼赤臉腫項結核

腫毒毒聚通身風疹毒赤癩等症

消毒飲

牛蒡子 微炒 四錢 荆芥 甘草 各一錢 防風 去蘆 半錢

一方加黃芩一錢 犀角 鎊 五分

右剉水煎溫服

○一論痘瘡已出痘毒太盛以此消毒飲或出不快皆宜服之二云痘瘡欲

出渾身壯熱不思飲食若服此下劑即內毒已消二兩煎即解其毒

若全出即當日頭焦只三服瘡子每用此治壯盛小兒痘出毒盛殊効

消毒者宜神功散尤妙

化毒湯

紫草茸五錢 川升麻 甘草各二錢半

右剉每服二錢糯米五十粒同煎服。

一論瘡出毒氣大熱血紅一片不分地界如蚊蚤種或諸失血或口爛七日必脫諸症可服能解神效。

九味神功散

黃芪 人參 白芍 紫草 紅花

生地黃 牛蒡子 甘草 前胡 甘草 牛蒡子

右剉水煎溫服渣煎煎服。○熱毒者加黃連黃芩各一錢末起毒加太黃。○有膿加麩退去毒足。○若頭粒淡白者有寒乘之加桂一錢。○如太便閉加大黃。

一瘡發為癩神功散不渴或渴者用紅花子一兩煎湯服之。○紅花亦好加半兩子尤妙能散毒也。○切不忌口。

壽世保元

辛集八卷

六八

能助陽氣之火大發者用黃土百沸湯碗蓋泡取汁少加沙糖飲之立止。

一瘡出二百內頂陷者非虛也。用神功散活血退火。

四日以前有寒症其色黑慘綠元陽加桂。

色白者寒乘之神功散加桂。

腹痛者寒乘也神功散加桂。

面紅不退地界不分者神功散倍前胡。

吐者寒乘乘火炎而實也神功散倍前胡。

泄瀉者火盛而存也神功散加升麻以提之。

身已涼汗不止者血隨氣溢也。用神功歸五錢黃芪三錢酸棗仁炒一錢。

作一劑水煎服立止。

有癰疽白疔子腐服切不可用。一陳湯使燥陽明經使狐陽無陰不能化也。

一瘡用杏仁煎湯磨白附子服即止。

二遍身疼痛者以木香十味磨服即止。

一藥行作疔此內熱而外為麻寒所乘用荆芥穗紙裝藥粉糊粘住紙頭令不散燈上燒了却于桌上擦去灰快放手指疔疔頭點藥疔疔下即散退無毒疔疔之立止。

一行藥聚足而發疔認定是疔疔或黑而硬或有紅絲或為太紫初未

曾解毒者仍以神功散加雄黃黃連黃芩大黃煎服却用照法雄黃工

錢研脂脂重浸水金銀調雄黃末點疔頭上立時即紅疔亦神功也蓋

雄黃能解毒脂脂能活血也。

一瘡九日十日作瀉先失解毒者宜用。

定中湯

真正黃土一大塊碗盛以百沸湯泡即以碗蓋少傾出用如冷傾於湯內外以熱水盪之加入雄黃一錢朱砂五分二味為末和勻以黃土湯

壽世保元

辛集八卷

六九

兩者少加沙糖溫服二服立止。

一論瘡癩脹痛者或濕濕者或足指冷濕者或驚悸渴者或身濕渴者或身熱回脫白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不止者已上九證即非熱也乃脾胃肌肉虛渴液少故也。林所散主之如不愈更加丁香官桂多煎服丁香攻裏官桂發表其表裏俱實而瘡不致於瘁塌喘渴而死矣。

一瘡十日二十日當盤不脫發熱蒸者宜用。

甘露回天湯

沙糖半酒鐘百沸湯調一大碗溫服立時熱退。豆糜萬發萬中真有一回天之力也。

看疔不治法

初出身者不治。○出如黍稷者不治。○隨出隨沒者不治。○如蚊咬者不治。○氣血相失者不治。○倒出者不治。○飲水如從者不治。

肺氣不流也

看...

輕者熱輕病亦除

飲食如常多藥宜

根自頂紅是紫黑

○起脹治法

保元湯

人參 去蘆二錢

嫩黃芪三錢

甘草一錢

右制一劑生薑一片水煎溫服

研末二錢酒調服

桂丁錢當歸二錢川芎一錢水煎溫服

一二日初出...

會也...

壽世保元

之藥...

安子...

二三日根...

元湯...

四五日根...

桂枝...

五六日氣...

以全...

六七白氣...

加官...

七八日毒...

發陽...

一症至此...

症亦死

一理...

死症也

八九日...

駕其血...

十一二...

加白木...

十三四...

不可...

十四五...

渴甚...

有肉...

九症...

壽世保元

不正...

九症...

二百...

若頭...

若胸...

○若兩...

○一論...

參苓...

人參

蓮肉...

砂仁...

右為...

貫...

○一論痘瘡血氣虛損或風邪積毒沖觸使瘡毒內陷伏而不出或出而不勻快此藥活血勻氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出易收易癒

內托散

苗莖 人參 當歸各二錢 川芎 防風 桔梗 厚朴姜汁炒白芷 甘草各一錢 木香 官桂各三分

右方如紅紫乾燥黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩用此藥調穿山甲炒成珠為末五分同服

若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救裏官桂枳殼○當歸酒洗而不貫膿者倍參芪當歸煎熟服入木乳汁好酒同蒸服此藥服之功

法也○泄瀉加丁香乾薑肉豆蔻○一論痘瘡已成出齊而腫脹或已脹滿而難癒者由內虛故耳宜煎既出灰白色及頂平不起或陷伏者氣血大虛也宜此方

壽世保元

三集八卷

三三

○一論痘瘡虛寒八九日色白如水泡頂陷根白瘡場寒戰咬牙等症

回陽酒 鹿茸酥炙 大附子麩包煨去皮臍 嫩黃芪 當歸酒洗

右剉酒煎溫服

○一論痘出至貫膿收靨之時倒塌陷伏心慌喘急悶亂死在須臾

好揀參丁兩水煎濃汁灌下即甦

○一論灰白黑陷嘔吐白沫為毒虛

木香散 木香磨 前胡 甘草炙 赤茯苓去皮訶子煨取肉 大腹皮 人參五分 陳皮 肉桂各八分丁香雄者五粒 半夏姜製八分

右剉一劑生薑三片水一鍾煎八分溫服○嘔吐甚加白豆蔻去殼

○一論寒戰咬牙瘡場泄瀉為裏虛

當歸酒洗 肉豆蔻煨去 陳皮 白朮去蘆炒白茯苓去皮 大附子煨炮煨去 半夏姜汁炒厚朴姜炒 肉桂各八分 人參五分 小丁香七粒 木香磨八分

右剉一劑生薑三片棗一枚水一鍾煎至八分溫服○泄瀉甚加罌粟

○一論此方鮮毒發痘之聖藥也治紅斑黑陷頂不起痘疔一切惡症危者用此立見起死回生之功也

小靈丹 雄黃 朱砂各二錢 乳香 沒藥各一錢五分 大蟾蜍取心肝尾焙乾三錢 麝香三分 右研細末取猪心血雞冠血丸如皂子大每服一丸身無大熱生酒化

壽世保元 辛集八卷 三三

下熱甚不飲酒者紫草燉心湯下即時紅活而起如服此不效者大無可生之理也

○一論痘瘡初出老壯忽然黑陷心中煩燥氣急喘滿狂言妄語如見鬼神急宜治之不然毒氣入臟必死

人牙散 人牙煨包性 為細末每二箇作一服酒調下立効

又秘方用人牙一箇火煨 朱砂三分 雄黃三分 為細末先用甘草湯末煮成膏調入三味再用無灰好酒調稀灌下治惡毒瘡疹不發危急之甚服之立効

無價散 治症同前

人牙 猫牙 猪牙 犬牙 右等分各將灰火燒留烟在碗蓋蔽存性為末每五六歲服三四分好熱酒調下瘡場寒戰泄瀉者煎其功散調下若無猫牙用前人牙下味

亦好但不加酒牙金方

○一論痘疹咳不寒戰六七日陷而不發不貫膿陷入黑色氣欲絕者神效有瀉者不瀉服

三仙散 趙真江傳

穿山甲半斤用好漿兒酒一斤以山甲燉火氣乾再浸再炙以酒乾為度 穿山甲一兩 麝香一分 朱砂 以麻黃水煮過下錢

右為細末每服五七分或一錢溫酒調下○一方治前症單用穿山甲用炭火炒成珠為末每服五七分木香湯調服亦効

○一論痘疹紫黑乾枯變黑身如火灸之熱不瀉者可服犀角散 吳普陽傳

烏犀角 羚羊角 二味磨京水服之有回生之妙

萬金散

壽世保元

辛集八卷

七十四

人貓猪大臘殼燒 少許微煎以水調 百者救生無一死 黃金萬錠也難消

右將前四物的糞於臘日早晨日未出時貯於銀鍋內用炭火燒令烟盡為度但見瘡發不快倒唇黑陷者及一切惡瘡每用一室蜜水調服其効如神

○一論痘疹自出至收靨時理不宜下者用此導之若既靨之後有前症者又宜下也

○一論痘疹中有長大紫黑者為赤毒把在症不起發急用簪挑破膿以四聖散

珍珠散 五粒鐵器上煨 菴豆 四十九粒燒 頭髮燒存性不拘多

右為細末用擦向油調成膏子將兒在溫煨處步存心風寒燥氣先用簪尖平撥開疔口將藥糞入疔內即變紅色餘瘡皆起但挑破出

黑血或挑開用口嘔去黑血或用綿裹指指去黑血即愈蓋破疔而毒

氣得散也

○一女子出痘至脹滿時多紫黑爪破流血此症屬毒太盛用皮疔不拘多少入花椒下撮煎茶用靑布蘸搗患處頓頃良效即起眼加舊

收靨治法

○一凡痘十日十二日痘漸收靨自上而下為順自下而上為逆其過身皆靨雖數顆不靨尚能終入猶蛇退皮雖一節被傷不能退者起即死也

○一十日至十二日當靨不靨其身不壯熱閉亂不寧則喉氣煩渴咬牙隄力散加木香當歸以救陰陽表裏若以蜜水西瓜紅柿等為物食之速死

○一凡當靨不靨而透寒戰咬牙爪破此虛寒也宜與功散

○一凡過服熱藥以致熱毒猖狂在血氣壅盛痘爛不靨者內服小柴胡湯

壽世保元

辛集八卷

七十五

猪尾膏 外用散草散付之

○一凡痘不收靨氣急上痰聲啞且閉無神者死後痲紅者吉白無血色者毒氣歸內也恐生餘症

一治痘疹抓搔成膿血淋漓宜

用蓋房多年爛草或蓋牆爛草亦可其草經霜露感天地陰陽之氣非解毒藥其功不能盡述取草不拘多少晒乾或焙乾為末貼患處上將通身瘡破膿水不絕貼此衣裳難以坐卧可用土升攤於席上令兒坐卧其効如神仍服木香散加丁香官桂同煎服

疔疔疔口不收 瘡癩鼻爛血膿流 齒疔疔疔疔疔疔

患處塗之病自瘳

猪尾膏

龍腦半字 研細為泥猪心血為丸辰砂為衣紫草湯化下

一治痘疹抓破稀爛

一治痘疹內入土室新卷上痘乾癢灰存指為末如濕乾按如乾癢無所不至遇逢子土日此疾有藥即起以抄許神服之移時即紅活如常不吝寶貴其法用狗繩七枚搗細和醋酒少許調服蛇虱月極多易得久月藏於耳中不可不知此蠅夏月狗身上飛都是也

一痘疹屬虛寒者直可延至十數日後方死屬毒盛轉色者不過七八日蓋痘出胎毒自出外一二三日方出此毒氣尚在內出至六日則常盡此於表七八九日成膿而結痂矣若毒氣盛在內則不出不見其反內入臟腑故須以六日以前毒氣出之時急用涼血解毒之藥以驅之六日以後毒氣及矣故其死最速也此毒氣少者只是氣血不足不能成膿成痂故結起日久而後死此毒氣盛者之分也

壽世保元

辛集八卷

七十七

痘後餘毒

小兒痘疹餘毒輕則肌表津液癢癢重則肢節痠腫作痛若發熱而大便閉結者消毒飲發熱而大便調和者消熱消毒散大便調和而渴者麥門冬飲腫痛發熱而渴者仙方活命飲大凡根赤而作痛者血虛也四物湯加牡丹皮色白而作痛者氣虛也四君加黃歸芍藥色赤而作痛者血熱也四物湯加連翹金銀花色白而不燥痛者氣虛也托裏散不成膿或不腐血氣俱虛也八珍湯既潰而不斂脾氣虛也六君子湯按之隨指復起者內有膿也即刺之勿使內攻膿出兒安不必服藥如膿稀薄或反作痛或倦意熱渴或作痛等症皆屬氣血虛甚急以參芪犀朮之類補之若虛中見惡症者不可投實中無惡症者多自愈

活命飲 托裏散 方見應症

一論痘後餘毒或先服解毒散而散以至頭頂胸背手足肢節赤腫成癰毒者宜消毒飲或五福化毒丹

消毒飲

鼠粘子炒 荆芥穗 甘草 防風各五分 犀角鎊末二分 金銀花三分 右剉水煎服

一論痘後餘毒赤腫頭面身體多生瘡癩在熱難癒唇口腫破生瘡者齧出血口臭咽喉腫痛口渴等症

五福化毒丹 犀角鎊 三錢 桔梗 一兩 生地黃 赤茯苓 牛蒡子各五錢 連翹 六錢 玄參 三錢 青黛 二錢 朴硝 粉草各三錢

右為細末煉蜜為丸如痛眼大每服下九薄荷湯化下若熱毒未盡浸研漿時時以鷄翎刷之隨手退去其效如神

一論一切癰疽疔毒腫痛發熱作渴 清熱消毒散

壽世保元

辛集八卷

七十七

連翹

山梔

黃連

當歸各五分 川芎

芍藥炒

生地黃 各六錢 金銀花 一錢 甘草 二分

右剉一劑水煎服

一論痘毒發熱作渴咽痛

麥門冬飲

麥門冬 各六分 黃芩 三分 甘草 五分 人參 女參 各三分 金銀花 五分

右剉水煎服 咽痛加桔梗五分

一論痘後赤毒不出

天花粉

桔梗

白茯苓 去皮 訶子肉

石膏 滑

甘草

右為末水調封貼在碗內外以水竹七葉黃荆七條縛作一束貼於碗內即時服

一論痘後赤毒不出

○一論痲瘋... 易治且無形亦不具秘

○一論痲瘋... 少用白礬研碎塞入

○一論痲瘋... 疔瘡入眼成翳用蠟

○一論痲瘋... 不可不戒

○一論痲瘋... 虎糞... 灸甘草一兩

壽世保元 卷八

○一論痲瘋... 通明散

當歸 川芎 芍藥 生地黃 防風 乾芍 菊花 蠅退 天花粉 各等分

穀精草倍 右判散水煎服眼赤腫加黃連

秘方 黃丹 輕粉各一錢 右為末用葱管吹入

治痲疹傷眼... 用清茶湯洗眼

陳皮中 半夏 姜炙中 貝母上 天花粉上 麥門冬 去心上

右判水煎食遠服 治小兒痲瘋後咳嗽

白砒一錢 雄黃 板礬 寒水石 火煨各一錢

右研細末用菜豆粉打糊丸

鹽勝秘傳沖虛至寶丹 治痲初起氣血兩虛

壽世保元 卷八

赤芍 懷生地 白芷 白芨 牡丹皮 水通 麻黃 牛蒡子 甘草各四兩

右共咀片用水三斗... 渣共煎汁煎酒水成

梅必蕊 穿山甲 川黃連 酒炒杏仁 黃芩

右為細末前膏一牛為丸... 象皮用一兩酒炒磨下

大附子 五錢 沉香 二錢 麝香 三分 冰片 一錢 馬橫柳 五錢

鹿茸五錢 辰砂三錢 金鎖匙一兩 小豬無核 木香二錢
 白附子二錢 仙茅一兩 黑豆汁煮 甘草五錢
 右為末白清醇打細末為丸如龍眼大每下丸酒化下立起
 神仙救苦丹 菴澤傳

治癩初起三五日熱不出又瀉又嗽喉痛腰痛或癢或癢或可治如
 症初出葱白湯下驚風准瀉咳嗽痰喘如神

白附子五錢 山東者佳 大竺黃二錢 全蝎二錢 膽星一兩
 姜茶炒一兩 肉豆蔻五錢 柯子麩包煨去核五錢 麝香一分
 麝香五錢 蒲公英花五錢 朱砂一錢 雄黃二錢
 川黃連二錢

右為細末煎膏為丸如龍眼大金箔為衣滾水化下

起死回生散

治癩瘡至七八日忽然變黑收入腹內遍身抓破吮喘死在須臾服此

壽世保元

辛集八卷

八

從新另發此立可回生扶壽神仙傳

當歸 川芎 白芍 生地黃 升麻
 紅花 上階加白芷 下階加生薑
 遍身黑陷加麻黃象糞微炒如一歲兒用下錢大則用二三錢
 右到一劑半水酒煎服從新發出腳下有黑疔至七八日用針挑去
 以水之膏點之即拔去毒連進二三服

麻疹

古謂麻即疹也疹出如麻成癩瘡也癩瘡成疹皆象其形而名也夫麻
 一也癩出於五臟屬陰陰主血故癩有血形而有汗其症寒熱備有也
 癩出於六腑屬陽陽主氣故癩有形而無脈其形多實熱而無寒也
 為症既異則治法亦殊癩宜內實可用補劑癩宜解散惟初
 熱發表相以耳既出之後痘則補氣以生血癩宜補陰以制陽何也

蓋疹發則陰分受其熱煎而血多虛耗故治以清火滋陰為主而不
 可少動其氣所以人參白朮半夏若燥悍之劑宜早當深忌也世知癩
 證所繫之重而不知疹之發人尤甚其甚多忽而不備良可太息矣
 一論疹發熱之初多似傷風惟疹子則咳嗽噴嚏流涕清涕眼胞腫其
 淚汪汪面浮腫雙腮赤惡心乾嘔穢臭耳但見此候即是疹子便宜
 避風戒食厚味用藥以表散之使皮膚通暢疹理開而疹毒易出
 一論疹之初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩宜
 升麻葛根湯

升麻 葛根 白芍各一錢 甘草五分
 右到生薑水煎服加紫蘇薄荷以解肌切忌大汗斑不結者亦宜乃麻
 疹初起之神方也
 一論麻疹既出下且而又沒者乃為風寒所束麻毒內攻若不治胃爛
 而死可用

壽世保元

辛集八卷

八

消毒飲
 犀角子四錢 荆芥二錢 甘草生一錢 防風去蘆牛錢
 右到水煎服加烏犀角尤妙
 一論麻疹已出而復沒或出不盡心虛哭啼不止十分危急死在須臾
 或下痢腹痛可用
 三仙湯 蘇陵劉孟門傳
 黃芩去朽 白芍藥生用 各等分水煎溫服如神
 一論麻疹已出譫語煩燥作渴者可用
 白虎解毒湯

石膏 知母 黃連 黃芩 黃柏
 一論麻疹已出大小便閉可服 防風通聖散方見中風門
 一論麻疹已出譫語小使閉者宜

生地黄 木通 甘草 淡竹葉七片 水煎服。

○一論麻疹已出泄瀉不止可服。

四苓散 猪苓 澤瀉 白朮 去蘆白茯苓 各等分 水煎服。如小便短少者或小便不通者加車前木通。

○一論麻疹已出寒熱似癘可服。

柴胡湯 柴胡 黃芩 半夏 茯苓 猪苓 澤瀉 白朮 去蘆

白茯苓 去皮 甘草 右剉碎煎服。

○一論麻疹已出大便下血或小便下血吐血衄血或一便閉澀疹稠

犀角解毒湯 犀角 升麻 生地黄 五分 牡丹皮 一錢 赤芍 一錢

黃連 枯黃芩 黃柏 梔子 右剉水煎服。

如吐血衄血加炒山梔子通便和服。

○一論麻疹前後有熱潮不退等症並為血虛血熱可服。

壽世保元 辛集八卷 八二

四物湯 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 血虛風熱血熱用生

右剉水煎服。○發湯加麥門冬犀角汁。○嗽加瓜蒌霜。○有痰加貝母

陳皮去白。

○一論麻疹正出之時雖不進飲食得麻疹淡紅潤澤真止不為

也蓋熱毒未解內蘊實熱自不必食退後若不常備用四物湯加

麩砂仁一二帖決能食矣如胃氣虛者忌少下地黃。

○一論麻疹既出之時如色紅紫乾燥暗晦乃火虛毒熾宜四物湯用生

地黃加紅花酒炒黃芩。

○一論麻疹既出已過三日不能沒者乃內有虛熱宜用四物湯進之如

失血之症加犀角汁。

○一論麻疹退後若有牙根腐爛鼻血橫行並為失血之症急用四物湯

加茵陳木通生犀角之類以利小便使熱下行如赤白痢疾

不治之症也。

○一論麻退之後須避風寒戒水濕如或不謹遂致終身之咳嗽患無

有愈也。

○一論麻疹前後大忌猪肉魚酒雞子之類恐惹終身之咳只宜用老雞

精肉食之助滋味可也。

○一論孕婦出麻宜以四物湯中加白朮不食今艾葉安胎清熱為主胎

失無已口唇赤黃矣如胎氣上冲急用芩根艾葉煎湯為生機服

之更以四物湯大進之。

○一論疹子沒後餘熱內攻循衣摸床譫言妄語神昏妄志者如熱

餘毒未除必先見諸氣色雖預防之始終以升麻葛根湯為主或消

散解毒湯隨症選用仍忌魚腥葱蒜之物。

壽世保元 辛集八卷 八三

補遺 十仙湯 序班孫儀泉傳 治疹後餘毒

柴胡 葛根 玄參 黃連 黃芩

梔子 陳皮 茯苓 枳殼 生地黃

右剉生薑煎服。

○一小兒疹後咳嗽腹脹喘急煩燥泄瀉為疹毒未盡也宜青黑

黃芩 連翹 玄參 知母

桔梗 杏仁 白芍 麻黃 牛蒡子

乾葛 陳皮 厚朴 甘草

右剉水煎服。

新刊醫林狀元壽世保元壬集卷之九

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著

龔定國 龔安國 校

南雍太學生蓋印周文卿光霽堂鈔

外科諸證

癰疽

夫癰疽者皆由氣血不和... 肺之氣拂鬱於內... 熱之藥熱毒結深... 乎昔所食肥膩多燻... 致虛邪熱毒內攻...

壽世保元

壬集九卷

血而成也... 者沮也... 癰者有頭小瘡也... 凝滯夾心火之熱... 小之不同也... 廣大者癰也... 白色焦枯觸之而痛... 過二三寸者瘡也... 沉澱難療若陶室之燧... 喉癰之類亦其急者也... 也夫癰疽之疾須要察...

失先後次序凡人年四十已上... 不見之處稍有瘡癤... 微至頭喪命者多矣... 至於燎原之勢不可撲滅... 是先後次第之要訣也... 知味一善也... 語聲清朗... 小便如淋... 惚嗜卧... 肢沉重... 青黑面自四肢浮腫... 耳聾恍惚驚悸語言顛倒...

壽世保元

壬集九卷

二

善佛至則吉而安七惡全見必危而死矣

審症虛實訣

一凡大按乃痛者病深... 即復者有膿不復者可消... 膿也又手按上下不熱者... 膿但氣腫若有血慎之慎之... 中軟者此為有膿審也... 熱偏有軟處當軟處切不可針破也... 刺破不可療也

雜忌須知

一凡病時忌怒忌疑慮忌身體不潔... 瓜果醃菜等物... 瓜果醃菜等物... 瓜果醃菜等物...

凡一切癰疽瘡腫毒痛疔疔未好之時如往有喪之家取券并拜望等項其瘡腫即復發切忌切忌

用藥治法

凡癰疽等項本毒初起一二三日內即服飛騰神駿膏此藥治初起至潰爛之際俱可服服後汗出將惡毒盡皆發散腫痛立消其効如神若瘡已潰爛勿服如無神駿膏初起即服槐花酒或千金消毒散一二劑患處即用灸法灸之瘡初出至七日內皆可灸七日外不可灸瘡未及灸初起即以葱蜜膏或金蟾膏貼之即消至四五日腫痛未消用芙蓉膏敷之立効敷之至六七日作膿將潰未潰之時不得用破用針九頻點瘡頭自然皮破出膿瘡自初起至此膿將出未出之際即服真人活命飲一二劑瀉下膿血其瘡潰爛用猪蹄湯洗淨以三神膏搽之內服千金內托散以托毒毒出外間服蠟礬丸以護膜二藥相兼服之勿間不計其數再看潰爛流膿不止此氣血衰微脾胃虧損肌肉

壽世保元

壬集九卷

三

不痊瘡不斂口用猪蹄湯洗淨將生肌散搽上外貼神異膏內服十全大補湯兼進八仙糕又服自愈好後再服加減八味丸可以絕根庶免再生若平日無瘡時首項服之尤為防患於未然也以上治法俱要依次第而行未有不奏效者皆百發百中之良法也

○一論飛龍奪命丹乃外科惡毒第一方也方見後諸瘡

○一論癰疽發背瘰癧鼠瘻氣瘻等症此專門之方其効捷如奔馬

飛騰神駿膏

麻黃二斤去節取杏仁四兩南熱水炮去皮尖用砂鉢搗爛又入水

防風去蘆淨四兩地骨皮去骨淨四兩甘草四兩

木鼈子去殼十四頭髮洗淨燈草一大把

黑鉛一塊

右熬膏法不用柴燒用白炭五十斤用大銅鍋一口將前藥入鍋內注清水二三桶熬至五六分看藥水濃時藥渣濾起藥水另放缸注又將

前渣入鍋內再入水一二桶又熬至五六分藥汁又注前沙內如前法三次去渣將前二灰汁并作一鍋熬至乾去黑鉛頭髮燈草三味不用其味香甜磁罐收貯五年不壞遇病每服三錢好熟酒調膏臨時用被蓋出大汗為度徐徐去被不可被風吹吹早用猪蹄湯服食汗後以此虛入以地補之以復元氣好酒調服隨入酒量以醉為度汗出立愈此治瘡毒初起至潰破時前後皆可服神効

○一論凡人初患癰疽發背已結未結赤熱腫痛即用灸法先以紙覆其上立視後其紙先乾處即是結疽頭處取大蒜去皮橫切三五錢厚安在頭上用木炭炷於蒜上灸之三壯換一蒜片復灸痛者灸至痛不痛灸至痛方住最要早灸早灸為上方發一二日者十灸十愈三四日者六七愈五六日者三四愈過七日則不可灸矣若有十數頭下處生者用大蒜搗成膏作餅于鋪瘡頭上聚艾燒之亦可若背脊初發赤腫內有一粒黃如粟米者即用獨蒜切片如前法灸之次日去癰

壽世保元

壬集九卷

四

自潰矣

○一論凡癰疽發背一切無名腫毒初起

葱蜜膏

生葱生蜜猪膽一箇傾石鉢內共搗成餅貼患處日換三四次即消

金蟾膏 治疔疔疔

生白礬末五錢加麝香一分取活蝦蟆一箇去腸肚同搗爛如泥四圍留頂出氣不過一夜即愈

○一論癰疽發背及一切疔腫毒不問已成未成但癢痛者

槐花酒

槐花四五兩炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去渣煎服其毒即消

○一論癰疽發背無名腫毒疼痛醫所不識初起壯盛人宜

黑白牽牛各二兩搗碎好酒一碗煎八分露一宿次日溫服大便下

膿血即愈

一論初起一切惡瘡毒腫疼痛丹瘤癩癧疔腫魚口五發癰疽初起一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚亂坐卧不寧皮膚壯熱大便閉結小便赤澀等証並治妊娠勿服千金消毒散

連翹二錢 黃芩一錢 赤芍一錢 當歸尾一錢
金銀花一分 皂角刺一錢 天花粉一錢 牡蠣一錢
麻黃一錢 防風一錢 大黃一錢 芒硝一錢

右剉丁劑酒水各半煎服。
○一論腸癰便毒疔腫癰疽初起即消已腫即潰血從大便中出瘡潰後勿服。

加減真人活命飲 又名千金內消散

當歸尾 錢五分 赤芍一錢 白芷一錢 木鱉子 去殼一錢
穿山甲 錢五分 金銀花 三錢 皂角刺一錢 白燭蠟 一錢

壽世保元

三集九卷

瓜蒞仁 錢五分 天花粉一錢 乳香一錢 沒藥五分
大黃三錢 甘草節五分

右剉一劑酒水煎服

○一論癰疽發背腫痛如錐刺不可忍者登時痛止。
芙蓉膏

芙蓉葉 黃荆子 各等分 爲末

右二味入石臼內搗極爛用雞子清調敷患處置頂如烟起此方用在未潰之先或將潰之際。

○一治癰疽發背已潰爛者

三神膏

草麻子仁 一合 陳醋一大碗 鹽一撮

右三味置鍋中用槐條攪成膏先將猪蹄湯洗淨或米泔水洗淨用鷄翎續續搽上其皮即皺其肉即生。

○一論諸瘡惡毒發背癰疽痛不可忍此藥能衛護內膜驅解諸毒自然內消。

加味蠟藥丸

黃蠟一兩 枯白礬一兩 乳香一錢 沒藥一錢
雄黃二錢

右爲細末用蠟鎔化爲丸朱砂爲衣如梧子大每服五十九視瘡上下蜜水送下。

○一論癰疽瘡毒皆由氣血凝滯風毒壅結此藥發散外邪流行氣血排膿止痛生肌長肉之劑當用於五六日間已潰未潰而作痛者宜服之加味千金內消散

黃芪 鹽水炒 人參 當歸酒洗 川芎 白芍酒炒
白芷 防風 川厚朴 姜炒 桔梗 官桂

瓜蒞仁 去殼 金銀花 甘草節

壽世保元

五集九卷

六

右剉每服一兩水煎入好酒半盞去渣溫服日進二三服之後瘡口有黑血出者及有汗出此藥之功也不問証候猛惡未成者自散已成者即潰矣。○痛甚加乳香沒藥倍當歸芍藥。

○一論癰疽潰後須當大補氣血和脾胃其毒外出實爲切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令醫者當識類而長之可也或見腫平痛寬遂以爲安漫不知自無補接調養之功愈後虛証復見因而轉爲他病而危劇者多矣。

收功萬全湯

黃芪 蜜水炒 一錢 人參 一錢 白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮一錢
當歸身 五分 川芎 七分 白芍 酒炒 七分 懷熟地黃 一錢
官桂 三分 白芷 三分 陳皮 五分 甘草 三分

右剉一劑生薑二片水煎溫服。如作渴加麥門冬五味子。如煩燥

加生地黃麥門冬。如有痰加薑棗半夏。如泄瀉加厚朴薑炒。如小便不利加澤瀉。如怔忡不寐加遠志酸棗仁炒。如胸膈不寬加厚朴薑炒山查肉。右方治癰疽發背諸瘡毒潰膿後毒氣已盡氣血虛弱不長肌肉不合口膿清欲作餘症者宜之。

○一論患癰疽發背出膿後脾胃虧損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無力者。
八仙糕
人參 去蘆四兩 白茯苓 去皮四兩 乾山藥 四兩
芡實 去壳四兩 蓮肉 去心四兩 不油白朮 去蘆米泔洗切片炒四兩
白糖霜 一斤半 白粳米 二升水 淘淨磨極細末

右將藥末米粉糖霜和勻處揉極勻篩放籠內竹刀割成小片蒸熟入鍋再焙乾任意食之。

書世保元

壬集九卷

七

效瘡止痛生肌散

官粉火煨黃色 黃柏一錢 黃連 乳香

沒藥 孩兒茶 各五分

右為末搽瘡上并治下疳黃水熱泡等瘡

○一論癰疽發背潰爛便要此湯盪洗

猪蹄湯

當歸 赤芍 白芷 羌活 露蜂房

生甘草 各五錢

一方加黃芩

右細剉看瘡大小用藥如瘡大加料用之先將猪蹄兩隻一斤只用白水三升煮熟將汁分為兩次擦去上面油花并下面渣肉每次用藥一二兩投於汁中再用文武火煎十數沸去渣以故布蘸藥湯溫溫徐徐薄擦瘡上死肉惡血隨流而下淨洗訖以布帛拭乾貼膏藥仍避風

忌人口氣吹之有胡臭入并月經見行婦人及猪犬並不許入病人房內洗瘡切勿以手觸着

○一論一切惡瘡癰疽發背等症此藥能追毒去死肉有膿無頭用此點頭上自然皮破出膿

替針丸

人言為宋人錯內上蓋明禁燒不響為度一錢

礪砂五分 巴豆十粒 乳香三分 沒藥三分

白雄丁香七分

右為細末麪糊為丸如豆大用時以溫水磨化頻點瘡頭上神效

替針散

用木鱉子川烏二味磨水以鷄翎蘸掃瘡上留口大一處出膿如藥水乾再刷上不時即穿

○一論治癰疽發背發項發腦等毒不拘已潰未潰俱用此敷貼如腫

壽世保元

壬集九卷

八

毒未潰通敷自消如已潰將此敷周圍腫掀之處其破口處以神丹膏貼之每日換兩三次不許見風神效

二合消毒散

文蛤煨碎炒黑色為末三兩六錢

輕粉研三錢 黃柏去皮蜜炙為末寒水石煨為末一兩

右末合為一處用新涼水一半蜂蜜一半調令不稀不稠如瘡毒尚未開將腫處遍敷之用綿紙覆手上但乾即以水掃之朝夕更換二次如夏月或午時再換一次亦可若已破將此藥敷于周圍掀腫處正有膿破口處用神丹膏滿貼之不必留口亦一日三換

○一論癰疽發背潰爛久不生肌肉用此立効但此方用之不可太早

合口收功散

血竭二錢 乳香 沒藥 輕粉

龍骨各 錢五 赤石脂二錢 朱砂

海螵蛸各五分

右共為細末散在膏上即生肌肉
○一論癰疽發背諸瘡不脫已成已潰者皆可用之癰疽發背者
日換兩三次中毒換一次其藥力方能勝毒諸瘡潰膿後不長肌肉不
合口者神效

神異膏

當歸尾 五錢 川芎 五錢 赤芍 二錢 生地黃 四錢
防風 五錢 羌活 五錢 白芷 五錢 玄參 五錢
黃芪 五錢 官桂 三錢 桃仁 四十九个杏仁 四十九箇
木鱉子 十四箇 何首烏 三錢 牛勞子 五錢 穿山甲 四錢
露蜂房 三錢 蛇退 二錢 大黃 二錢 黃精 二錢
亂髮 男者一團 柳枝 四十九節 每長一寸
右用酒煮油二斤四兩將藥入鍋內煎至五夏三秋皆十日以藥漿
文武火煎油黑色以穿山甲浮起為度將油去渣煎酒滴成珠

清世保元 壬集九卷 九

陸續下黃丹十四兩柳條攪不住手成膏軟硬得所再下乳香沒藥各
三錢血竭三錢降真香末三錢次冷定下射香末二錢水浸二三日六
水性攤用

○一論癰疽瘡瘍發後及瘰癧口乾渴甚舌或生黃及未患先渴此腎水
枯竭不能上潤以致心火上炎水火不能既濟故心煩燥作渴小便頻
數或自渴陽痿飲食不多服膏滋潤或服鹿角充瘦服此以滋腎水降
心火諸症頓止及治口舌生瘡不絕
加減八味丸

懷生地黃 八兩好酒拌砂鍋內蒸半日搗膏
山藥 一兩 桂心 去皮五錢 石棗 淨肉四兩酒蒸搗膏
澤瀉 切片蒸燥乾 白茯苓 去皮各五錢 遠志 五味子 二兩 五錢
牡丹皮 五錢
右為末入二膏加煉蜜少許丸如梧子大每服六七十丸

○一凡人久服加減八味丸必肥體而多子此不生癰疽瘡毒
患消渴等症
○一患癰疽之人雖云有熱皆因虛而得之愈後發渴及先渴而發癰疽
非八味丸不能治

○一人病癰疽多有愈後發渴而不救者治之惟八味丸最效疽安而渴
者服此則渴止疽安而未渴者服此九則永不生渴氣血壯盛或未
疽而先發渴者服此不惟渴止疽亦不作

○一人平日口乾作渴因飲酒食炙燥補劑房勞過度此類過多致心火
水枯竭不能上潤心火故有此症後必有疽發也宜先服八味丸以化
其源及癰疽後服此尤有益也

○一論癰疽發背諸瘡出膿潰爛日久不愈飲食少思身體倦怠口舌乾
燥或寒熱往來驚悸少睡以補中益氣湯去柴胡加蒼朮麥門神曲五
味黃柏少睡加炒酸棗仁肉桂五分如服多或

清世保元 壬集九卷 十

清倍加參茸歸朮
一加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實為切要凡膿血出
多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不詳時令藥性即長
之可也或見腫平痛氣逆以為安漫不知有無補接調養之功愈後虛
症復見因而轉為他病而危劇者多矣

附骨疽

丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味及勞役與酒後凌水得此陽滯於陰之
証也又曰環跳穴痛不止生附骨疽以蒼朮為君佐以黃柏之辛行以
毒皮冬加桂枝夏加條芩藥性加杜仲牛膝以生甘草為佐作木料
煎入薑湯食前飲之痛甚者煎藥十數劑發不動少加麻黃丁二劑
又不動者恐疽將成急掘地坑以灰煨坑通紅沃以小便令其熱亦
坐于坑中以席或綿衣圍抱下體使熱氣薰蒸熱氣散則疽自消矣

○一論癰生，膿外側或因寒濕行，因貫痛於足少陽經分，微侵足陽明經，堅破慢腫，行步作痛，或不能行。

內托黃芪湯
柴胡 連翹 肉桂 大力子 黃芪
當歸尾 黃柏 升麻 白芷 甘草各八分
右剉一劑水酒各一盞煎至一盞食前溫服。

○一治附骨疽
黃連消毒飲
黃連 羌活各一錢 黃芩 黃柏 葦本
防已 桔梗 歸尾各五分 生地黃 知母
獨活 防風 連翹各四分 黃芪 人參
甘草 陳皮各三分 蘇木 澤瀉各二分

右十九味切作一劑水煎服。一若人年七十因寒濕地氣得附骨疽下

壽世保元

壬集九卷

十一

左腿外側少陽膽經之分微侵足陽明經分，潤六寸長，一小尺，紫硬，慢腫不辨肉色，皮澤，但行步作痛，以指按至骨大痛，與此藥一服即止，次日堅軟腫消而愈。

○一論頑瘡惡毒，年久不愈，多有附骨在內，先用貝母濃煎湯洗淨，刮去腐肉，用刀撥去附骨，或用蟻蟬腦子五六箇搗爛敷上，其骨即出，然後用人言五厘研細末，入黃銅燈蓋內，用醋一小鍾慢火熬乾，收地，三日即出，銅線來研極細，用雞翎蘸搗瘡上，即痛即出水，腐肉去淨，然後用藥。

珍珠象牙膏 楚黃膏 江傳
珍珠用豆腐切細片，將珍珠在內，兩片合在，得定入水煮三柱
象牙末一錢 天花粉末五分 官粉末一錢 白堊一錢
香油五錢
右共合下處八味內，重湯煮化，成膏，貼患處神效。

○一治諸瘡大瘡，痛不辨肉色，漫腫光色，名曰附骨癰。又治瘡由久不愈，酒調服燒灰略存性。

腎癰

丹溪曰：腎癰者，腎居小腹之後，在下，此陰中之陰道，是位儲，曰太陽多血，然氣運不到，血亦罕來，中年後尤慮患此，總有腫痛，奈之，腫痛但見虛弱，便與滋補血氣，可保終吉。若無滋補之功，其禍多在結痂之後，或半年以來，乃病多致束手，慎之慎之。

○一論足太陽經中，左右尺脈俱緊，按之無力，尻腎生癰，堅硬腫痛大作，內托羌活湯。

壽世保元

壬集九卷

十二

羌活 黃柏 酒炒各 防風 葦本
黃芪 一錢 五苓木 米泔浸 連翹 陳皮
肉桂 三分 歸尾 各一錢
甘草 炙各五分

腸癰

丹溪曰：腸癰當濕熱積滯，入風難治。千金謂腸癰，安治必殺人，其病小腹重強，按之則痛，小便如淋，時時汗出，復惡寒，身及甲錯，肚腹緊急如腫之狀，脈數者微有膿也，甚則赤膿已，有膿脈若遲緊者，未有膿也，若腹脹大轉側有水聲，或連臍生瘡，或腹自臍出，或大便膿血，急服蠟茶丸酒下，兼進後方。

○一論腸癰便毒，癰疽初起，即消已腫，即消血從大便中出，其千金內消散方見癰疽，即加戒其人活命飲。

○一論肚内生癰及癰疽惡毒宜

內消沃雪湯

當歸身

白芍

黃芪

甘草節

連翹

香白芷

貝母

陳皮

麝香

乳香

沒藥

穿山甲

天花粉

金銀花

木香

青皮

甚者加大黃

右剉酒水煎服。秘方是世所奇授之如神。

○一論腸癰腹痛不安或腹滿不食小便赤婦人產後虛熱多有此疾但

疑忽間便不服服亦無效視其右關脈花者是也。

薏苡仁二兩

牡丹皮一兩半

瓜蒌仁一兩

右剉一兩水煎服。丁左加川芎桂枝。

○一婦人腹痛如錐刺每痛至死不敢着手六脈洪數此腸癰毒也。

穿山甲

白芷

貝母

麝香

大黃

壽世保元

壬集九卷

十一

右剉一木劑水煎服打平腹血自小便中出即愈後無患宜少不煎炒藥物。

○一治腸癰日久潰爛出膿腹內刺痛不可忍者。

用鐵針一尺長三枚針刺腸下條貫針在內推腸腸出轉經氣入

入囊門內送到病處方是瘰癧之處即將腸腸針動針尖出則瘰癧

毒膿隨針而出用手重按補處膿出盡而愈此仙傳秘法也。

囊癰

丹溪曰囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流又滲道阻滯

或虛水道不利而然膿盡自矣不藥可也惟在善於調攝耳又得因

重流流入囊腫甚而膿自聚膿畢凡懸掛水出以論其未敷之死以

蘇葉包裏仰臥之。

○一論瘰癧入囊者湯治致入悉由濕熱入肝結處治而用兩劑藥也。

此形膿皮脫翠花懸皆皆不死。

○丁方用野紫蘇葉面青背紅者是也焙乾葉熟之如蠟以香油調敷

藥脫無皮者外以青荷葉包之其皮自生。

懸癰

○一論懸癰此瘡生谷道外腎之間初發甚癢狀如松子四十日赤腫如

桃治遲則破而木小便皆從此出不可治矣。

國老湯

用橫紋大甘草二兩截長三寸許取出山澗中流水一碗不用煎水

河水以甘草煎藥末歸火慢炙不可急注須用三時久水易乾度勝

視草中潤透却以無灰酒二碗煮至一破溼成百服半月消盡

將藥散

大黃散

貝母志

白芷

甘草節各半

壽世保元

壬集九卷

十四

右剉酒水調空心服。瘰癧加當歸丁半。

○一論肝經濕熱玉莖患瘰癧或便毒瘰癧癰腫或潰爛作痛小便流

滲或穿鼻瘰癧。

龍膽瀉肝湯

龍膽草酒洗炒澤瀉各一錢

車前子炒

生地黃酒洗

當歸尾酒洗

山梔炒

黃芩炒

甘草各五分

右剉水煎空心服

瘰癧

瘰癧係血氣痰熱必起於少陽一經不守禁忌延及陽明太甚食水

鬱氣之積曰風曰熱皆此一毒也引變須分厚薄實者易治虛者

處此其屬膽經主決斷有相人且氣多血少婦女見此其月經如期不

作寒熱者易治積久轉為潮熱危矣自非斷然仙術不治也

○一論瘰癧者經所謂結核是也或在耳前後地及頤頰下連缺盆皆為瘰癧或在胸膈及胸之側下連兩腋皆為瘰癧馬力半足少陽主之獨形而小者為結核續數連結者為瘰癧形長如輪者為馬力也

○一論遠項起核名曰蟠蛇瘰癧延及胸膈連腋下者名曰瓜藤瘰癧左耳根腫核者名曰惠袋瘰癧右耳根腫核者名曰蜂窩瘰癧

○一論瘰癧馬力生耳前後或項下胸膈間累累如珠者未破已破皆治消毒化堅湯

- 當歸一錢 白芍六分 黃連一錢 玄參六分
- 天花粉六分 連翹一錢五分 柴胡一錢 黃芩五分
- 牛蒡子七分 龍膽草四分 升麻七分 桔梗一錢
- 陳皮八分 羌活七分 薄荷四分 海昆布七分
- 甘草四分

壽世保元

二集九卷

十五

右到丁劑生薑煎服○丁方加甘草節知母貝母海藻更佳

升陽調經丸

- 升麻八錢 葛根五錢 芍藥三錢 連翹五錢
 - 黃連五錢 黃芩酒炒五錢 生黃芩四錢 黃柏酒炒五錢
 - 桔梗五錢 歸尾三錢 三稜酒炒五錢 莪朮酒炒五錢
 - 草龍膽酒洗五錢 夏枯草五錢 甘草炙五錢
- 右藥秤丁半另研為末煉蜜為丸如棗豆大每服丁百二十九白湯下
丁半作咀片每服五錢水煎服半日即痊
- 一論久患瘰癧流注以致氣血兩虛瘦削抑鬱飲食少思或四肢患腫肉色不變或日晡發熱或潰而不斂久不愈者
- 益氣養榮湯
- 黃芪多 人參 白朮去蘆炒各當歸酒洗
 - 川芎 白芍炒黃 懷生地黃 陳皮

香附 貝母各一錢 柴胡 地骨皮

桔梗 甘草各五分

右到丁劑水煎食遠服○如瘰癧加橘紅○如腸下刺癢加青皮或木香○如午後有熱或頭微眩加黃柏炒○如膿水清倍入參黃芪當歸

○如女人在經氣胸膈不利倍香附貝母○如月經不調加牡丹皮當歸

○一論瘰癧兼諸瘡皆治

柳氣內消散

- 當歸 川芎 白芍炒 白朮去蘆炒
- 青皮去穢 白芷 半夏姜炒 陳皮
- 桔梗 羌活 獨活 厚朴姜炒
- 防風 黃芩 烏藥 香附
- 檳榔各一兩 蘇子一兩五錢 沉香三錢 木香
- 人參 粉草各五錢

壽世保元

二集九卷

十六

右到水煎服○十餘服即消若再發照分兩劑藥末酒糊為丸如梧子大每服五十九酒送下

○一論瘰癧未破在左為瘰癧瘰癧宜

內消調經散 山東李西嶺傳

- 升麻八分 葛根 龍膽草 黃連 桔梗
 - 連翹 黃芩 黃柏 莪朮 三稜
 - 甘草各五分 當歸尾 白芍各三分
- 右到水煎服○稍虛加夏枯草○有痰加天花粉知母各五分○少微加柴胡四分
- 一論在右名馬刀瘰癧未破宜
- 柴胡通經湯
- 柴胡 連翹 歸尾 甘草 黃芪
 - 厚朴子 三稜 桔梗各二分 詩遠五分 紅花

○一論一切瘡毒疔毒諸般無名腫毒及因時傷風傷寒增寒壯熱無名初覺者

趙府小靈丹

乳香

沒藥

輕粉

血竭

朱砂

川烏尖

草烏尖

細辛

巴豆霜

蟾酥

麝香減半

右為細末糯米糊為丸如黃米大雄黃為衣每服十二丸小兒五七丸用葱白三根劈開入丸在內細嚼好酒送下以被蓋出汗發風婦人存孕不可服

○一論一切疔瘡惡毒腫痛神效

類聖散

川烏

草烏

芥末

細辛

白芷

薄荷

防風

甘草各五錢

壽世保元

壬集九卷

十九

右為細末雞清調塗患處留頂

○一凡患疔瘡癰疽疔毒此藥能令肉消去毒化為黑水從小便出無丁失不可輕視

知母

貝母

白芷

半夏

天花粉

皂角刺

金銀花

穿山甲炒

乳香各一錢

右剉丁劑用無灰酒丁碗前至半碗去渣只作一服溫服不得加減再將渣搗爛加秋過芙蓉葉丁兩搗爛用蜜調并花水和敷瘡口上加乾垂用蜜水潤濕過一宿自然消不必用第二服藥也忌發物

○一人脚面生疔形雖如粟其毒甚大宜峻利之藥攻之因其怯弱以鹽蒜灸五十餘壯疔遂止再灸片時乃知痛更用膏藥封貼再以人參散毒散漸愈夫至陰之下道遠位僻且怯弱之人用峻利之劑則藥力未到胃氣先傷虛虛之禍有所不免不如灸之得宜

便毒

便毒一名跨馬癰此奇經衝任為病而難見於厥陰經之分野其經多血

又名血疔或先有疔瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱毒血聚而成也初發宜疎利之即散或膿後如常川托裏肉補之藥

○一論便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三錢以生薑為食前服得利二三行立効射干開紫花者是

○一論便毒極効方

追毒散

當歸尾

赤芍

白芷

金銀花

天花粉各一錢

白姜炒六枚

木髓子十箇

大黃三錢

芒硝二錢

丁方加五靈脂更妙

壽世保元

壬集九卷

二十

右剉丁劑好酒煎露一宿五更熱服厚蓋發汗利一二行即愈其確黃符群藥煎將熟入再二沸用之○丁方加射干去芒硝

○一論魚口便毒方

神異散

金銀花

天花粉

木髓子各二錢

連翹

黃芩各八分

山梔子七分

皂角刺三錢

木香五分

大黃三錢

右剉丁劑酒水煎空心服

○一治便毒腫痛神方 徐完愚傳

大黃

全蝎

蟬退

姜侯

穿山甲炒成白芷稍

貝母

當歸尾各一錢

右合丁劑水煎後加入木香薑煎丁去渣去渣入好生酒煎成丸加酒於丁條同煎服

○一治魚口瘡方

用豬膽一枚投熱酒一碗濕服即肉消

○一治魚口便毒方

木鱉子去壳三 巴豆去壳火燒 川山甲四片炒 姜豕三箇

五倍子五箇

右為末黃酒調下

○一治魚口便毒方 陳雲岳傳

姜豕炒三十六 川山甲炒 蜈蚣二條 甘草節一錢

大黃三錢 杏仁去皮尖一 五靈脂二錢 全蝎一個

皂角子炒一錢 金銀花一錢

右剉丁劑酒水各半煎服

下疳

壽世保元

壬集九卷

二十一

下疳瘡乃男子玉莖生瘡皆因所欲不遂或交接不潔以致邪毒流注而成瘡毒日久不愈或成便毒或損爛陽物多致危篤又魚口瘡如精瘡皆其類也俗云疳瘡未已便毒復來生也

如精瘡此蓋因婦人陰中先有宿精因而交接虛熱薰蒸即成此疾初發在陰頭如粟類拂之痛甚兩山此清膿作口孔蝕之大痛婦人有生於玉門內正似疳蝕瘡不痛為異耳

消疳敗毒散專治下疳瘡

防風六分 獨活六分 柴胡一錢五分 連翹七分

荆芥七分 黃柏八分 知母七分 黃連七分

赤芍九分 蒼朮七分 赤茯苓九分 木通九分

龍膽草九分 甘草三分

右剉丁劑燈心二十四寸水煎空心服如有便毒毒入虛實加大黃一二錢煎服

○一治下疳瘡

天靈蓋一枚 紅褐 小紅藥各燒存性各等分

右為極細末先用好細茶煎濃洗淨瘡

○一治下疳瘡不可忍如神

官粉五錢 水片二分 水銀三分 用錫三分 製

右為細末搽瘡上

○一治下疳潰爛

珍珠存性 片腦各一分 人手指甲 足指甲燒成灰各一

血餘燒成灰各等分

右為細末搽瘡處

○一蒸疳疔方

皮硝一兩 乳香 雄黃 孩兒茶各五分

右入小鍋內外用牛糞火煨其硝自化藥之晚上使以心口涼

壽世保元

壬集九卷

二十一

○一治陰頭上疳瘡 何和宇傳

五倍子燒灰存性一 朱砂七分 孩兒茶五分

水片半分 輕粉二分 五厘 水銀一分

右共為細末撒患處如從一邊爛起加狗骨煨灰二分如從兩

爛起加鹽煨燒灰二分

○一治疳瘡秘方

八寶丹

乳香 沒藥 孩兒茶 紅褐子灰

海巴焙一箇 珍珠炒 象牙煨 龍骨煨各五分

右為細末先用米泔水洗瘡拭乾搽上神效

○一疳瘡膿清不結疔不愈日久不愈者用

六味地黃丸加黃柏知母麥門冬四五劑而愈

○一治下疳瘡藥 陳鍾岳傳

水片二分 珍珠另研三分
 蘆薈一分 輕粉抄三分
 右共研細末搽患處如有破香油調搽

一治疔瘡
 黃柏去皮以猪膽炙透為末搽瘡上

一治陰囊上生瘡
 用甘草煎水濕洗却用麻茶末敷之

一治陰頭生瘡
 用溪港中螺蛳入乾鍋內煎過先以鹽水洗五七次後以此藥敷之

一治妬精瘡
 用木由螺南箇杓殼收過存性為末入輕粉敷之

一治外腎生瘡
 用粟豆粉一分蚯蚓屎二分水研塗乾又敷

壽世保元

二集九卷

二十三

一治腎臟風發瘡疥

用紅椒去自水浸半日和生杏仁研爛擦兩手掌擦外腎極效

一治下部生濕癢發瘡而痛寒熱大小便澀食亦減身面微腫
 馬齒莧四兩研爛入青黛二兩再研勻敷上

一治下疳瘡
 白礬一兩 黃丹八錢熬熟為末

右研為細末以沸湯中惡水洗過拭乾敷上

一治疔瘡發神方
 鍾乳石二分 朱砂三分 珍珠三分 琥珀一分五厘

片腦一分五厘
 右為細末每用土茯苓四兩豬蹄一隻煎水三碗早間服一丸晚間服一丸
 未四厘午間服一丸調前藥末四厘晚間服一丸調藥末四厘午日服
 三次共下分二厘十日服盡其瘡必愈其猪蹄隨用之忌動風發物牛

肉燒酒最忌之神良之秘方也

楊梅瘡

夫屬瘡者一名楊梅瘡因其形相似乃氣受之故堅實凸起又名縮花瘡血
 受之其形扁塌而澀又名果子瘡亦類其像而俗呼之也此病曰天
 瘡者一名異而實同源治瘡當別自致者重傳染者輕蓋自致者必
 淫慾太妄以至陰處起火及縱口滋味三焦皆熱精竭血結滯滯諸
 而成者他俗傳以母猪犬羊肉雞鮑毒物發出諸毒毒珠不知在水上
 添油炙又有相露出而未速效者過康敗毒散則傷五內其氣毒入
 伏以藥搗萬痛致使出不得出收不能收延遲不得杜絕手足心皮皆
 似白雞瘡風友後筋骨疼痛風塊惡候皆未獲良治而然也凡遇此思
 此裏解毒湯外用千里光明湯搗頭洗浴太效

壽世保元

二集九卷

二十四

當歸一錢五分 川芎一錢 赤芍一錢五分 生地黃一錢

連翹一錢 黃芩一錢 黃連一錢 酒炒防風一錢

荆芥穗七分 苦參 酒炒二錢 羌活一錢 薏苡仁二錢

皂角子 二十一分 防己一錢 木瓜五分 生甘草三分

土茯苓 二兩 濕者四兩
 右對水二碗煎一丸濕服渣再煎服○虛弱人加入參一錢○自生者
 加黃柏一錢 川牛膝一錢 川獨活一錢 宜服二十帖 每帖煎三次 下日
 服一帖

千里光明湯
 青木香 黃連 黃柏 黃芪 防風

荆芥 苦參 蒼耳子 蛇床子 羌活
 升麻 麻黃 甘草各五錢 雞腸草 一兩 青葉 一兩
 右作一劑用布包水煎於無風處服下煎藥即以湯浴洗涼了又加

紙藥湯洗着實洗後拭乾十日後不必頻洗其藥法并入前藥
再洗雞腸草一名千里光明其又名九里明俗名藤葉實其葉稍大如
岐開花白色處處有也

○一治楊梅瘡初起先服防風通聖散十餘劑後服此散功亦無不應
十全丹 雲來弟驗

雄黃 朱砂 乳香 沒藥 孩兒茶
當歸 白芷 丁香 槐角各一錢

輕粉用花殼下燒前末調蒸水吞

右為細末飯為丸如豆大每服三十九粒茶送下

○一治楊梅瘡先服防風通聖散加蒼朮二兩同煎服後服此散
白醇皮二兩 皂角子一兩 防風二兩 細辛一兩 三錢

川烏二兩 草烏二兩 雲來弟驗

右到十劑每十劑用土茯苓一斤豬肉半斤煎服

壽世保元 二集九卷 二五

○一治楊梅瘡 黃左川傳

連翹四兩 金銀花四兩 牙皂二兩 杏仁二十一箇

蟬退二十一箇 肥珠子三十箇 冷飯團一斤

右俱對用酒拌炒作十帖水煎服

○一治楊梅瘡毒 黃仰溪傳

青藤二兩 當歸尾二兩 皂角刺二兩 金銀花一兩五錢

五加皮一兩 白鮮皮二兩

右到分作十二劑每劑用土茯苓四兩水煎服先服通聖散

○一治楊梅瘡 南塘怪驗

漢防已七錢 槐花二錢 五倍子四錢

右三味為末用土茯苓半斤研爛肉半斤切碎共作一服用酒煎服

○一治楊梅瘡良方 胡雲齋傳

歸尾一兩三錢 牛膝一兩三錢 黃芩一兩三錢 大黃一兩三錢
水瓜一兩 金銀花一兩三錢 皂角刺八錢 蟬退五錢
土茯苓二斤

右到分作十帖每帖用紅棗白果皂角子各十枚煎白三滾水煎服
服忌黃豆

○一治天泡瘡神方

用鐵秀研細磨濃擦瘡上立已

○一論凡人患楊梅天泡瘡等症致成一切難狀之疾或楊梅瘡癩
骨經手不脫口者或筋骨疼痛瘰癧無時或遍身疔瘡或手足
破出血或癢身起皮發癩如疥癩下層或赤白癩瘡或風癩或皮
好骨爛口臭難言及年老膿瘡不愈一切頑症悉能治癒神功
通仙五寶丹

鍾乳粉三分 大朱砂一分五厘 琥珀一分五厘 水片一分五厘

壽世保元 二集九卷 二五六

珍珠一分五厘

右為細末用白飛麩炒三分共一錢二分分作十二帖每十日一帖且
一分用土茯苓一斤水煎上二碗每使服用半碗和服其十二碗下日
俱要吃盡不可別用茶湯下日一服有不效者而愈者有瘰癧而愈者
如病重者愈須再服下料忌雞鵝魚牛羊等發物及房勞

○一治楊梅風塊作腫作痛及遍身瘰癧毒一切無名腫毒

草烏四兩 南星二兩 半夏二兩 五倍子三兩 黃連五錢

大黃一兩 黃柏一兩 姜黃一兩 乾生薑五錢

右各為細末共和勻用葱汁米醋調成膏貼塊上腫痛以葱醋調之
令乾燥其膏下日又取下如些新的復再貼以消瘰癧

○一楊梅瘡愈後遺毒一層下層頑皮瘡不可留

牛油 香油 柏油 黃蠟各一兩 杏仁三錢

牛油 香油 柏油 黃蠟各一兩 杏仁三錢

白礬粉

輕粉

水銀

雄黃

川椒 去目炒研 檀腦各一錢

檀榔一箇研末杏仁四升去皮男

大楓子 取白肉四十箇另研

右共和勻用柏油八錢俱入乳鉢內研至不見水銀星為度九如銀子大待疥癩破將藥丸于患處滾過

○一治遍身風痒生瘡疥

土蒸麩苗煎湯洗之

○一治老人生皮膚疥癩癢

藜蘆根為末脂油調搽即愈

○一鼻閉香芥藥 後山李懷敬傳

大楓子三十箇去壳 朝腦三錢研碎勻再入

水銀一錢研至不見水銀星為度後入

右共一處再研用金碗盛在內用瓦蓋口勿令泄氣用所搽于心內以

壽世保元

三集九卷

三九

鼻閉數日即已或搽亦可

癬瘡

○一風癬癩癧疥癩血風諸瘡腫毒

歸尾一錢五分赤芍

黃芩

黃連

黃柏各一錢 大黃三錢

防風八分

木鱉子去壳一箇

金銀花 苦參各二錢

右剉丁剉水煎露下夜五更服○若腸風腸痔下血去木鱉子加槐花

丁錢

○一治一切癬瘡癩癧疥癩

胡粉另研

雄黃另研

硫黃另研各一

大草烏三錢生用

斑蝥一錢

砒霜五分

全蝎稍三錢

麝香三分

右為細末先用羊蹄根煎湯擦動次用藥少許擦患處

○一治乾癬不癢

天南星 草烏各一箇生用

右為末用羊蹄根搗絞汁調塗

○一治遍身頑癬

大楓子四十九川槿皮一兩 斑蝥去翅足五川椒一錢

輕粉二錢 杏仁三錢 海桐皮二錢

右共為末河水井水各一碗浸一夜蘸汁擦之

○一治癬癩効方 萬壽鵝傳

用馬蜂窠一箇仰放炭火上用蒜蓉末漸漸填滿下面火炙令窠

未蠟脚醋調塗上即愈

○丁切疥癬癩瘡及諸瘡不能拔口者立見收口

腥腥草 取乾者末為末

雄黃一錢 銀硃一錢

木鱉子 去壳一箇

艾葉不拘多少

壽世保元

王集九卷

三十一

右為末搗搗燒烟煎患處立效

○一治疥癬坐板血風痛痒神効

孫方李存君傳 大楓子去壳四 水鱉子去壳二川椒二錢

枯礬二錢 輕粉一錢 水銀一錢 朝腦一錢

右為末柏油搗勻先將艾湯洗令淨待燥抓破擦患處大効

○一治牛皮癬癩癧癩

牛脚水燒灰存性為末香油調搽立効

○一治癬瘡

用錫箔貼令極緊快將痒時於癬上各刺百針血出盡煎湯洗之

未愈再刺再洗

疥瘡

白礬之候頭上白點斑剝初似癬而上有白皮膚久則生加厚成瘡

偏頭洗刮除其流頭皮膚瘡孔如筋頭大裏有膿汁出之痛而有微瘡其裏有蟲甚細微難見九蟲論亦云是蟻蟲動作而成此瘡乃至自小便及長大不瘳頭髮悉落故謂之白禿也宜以後方而治之

○一治瘡瘡方
 藜蘆二錢 枯礬二錢 苦參二錢 五倍子二錢

右為細末香油調搽

○一治香瘡方 臨頰楊子登傳
 仙人垢 即埋菴道人指板店上垢膜也研爛不拘多少

右用鯽魚以香油煎熟去魚將油調仙人垢塗香上一錢厚工二次食
 ○一治香瘡
 先用水洗令淨用燒酒和芥末調塗即愈立已

○一治香瘡
 膽礬二錢 乳香二錢 沒藥二錢 冰片五錢

壽世保元

壬集九卷

三十一

食鹽三錢 木柏油一兩

右同草煎久下前三味煎充方搽

○一治瘡瘡如神 雲松葉 驗
 紫草三錢 木柏油一兩 膽礬一錢 沒藥二錢

石乳三錢 樟腦二錢 淮鹽炒三錢
 右為細末香油調勻先將頭髮剃淨再洗令淨擦藥下日搽下大神效

○一治小兒白禿瘡
 黃柏皮五錢 枯礬一錢五分 硫黃 韶粉 輕粉各一錢

右為細末臘月猪油調日搽三次又用木香研碎同處

○一治香頭瘡
 用鯽魚下箇重三四兩去腸肚以亂髮填滿紙裹燒存性雄黃一錢 共為末清油調敷先以藥洗拭後用藥

又方以苦練皮燒灰用猪脂調敷

癩風

紫癩風白癩風乃因心苦汗出及醉飽並浴後毛竅開時乘風出房得之扇風侵透皮膚所致宜服胡麻散或追風丸外以洗擦藥治之
 ○一論紫白癩風并癩及面上酒瘡又名粉瘡面刺俱可服之

胡麻散
 胡麻子 赤色扁者佳另研五兩 白芷二兩
 何首烏二兩 防風二兩 蔓荊子一兩五錢

甘菊花一兩 苦參酒炒三兩 威靈仙二兩
 升麻二兩 川當歸二兩 小芍藥二兩

牛芎子 微炒二兩另白茯苓三兩 荆芥穗三兩
 薄荷葉二兩 片黃芩酒炒二兩 黃連酒拌一日炒二兩

壽世保元

壬集九卷

三十二

白芍酒炒二兩
 右為細末每服三錢食遠服秋分後至春分白酒調服春分後至秋分茶清調服用米糊細丸食遠白湯下亦可

○一治白癩風
 追風丸

何首烏四兩 荆芥穗四兩 蒼朮米泔浸焙苦參四兩

右為細末好肥皂三斤去皮弦子入砂鍋內水熬成膏稱丸如梧子大每服五六十九空溫酒或茶任下忌一切動風之物

○一治白癩風
 用雄雞腎白果仁搗爛擦患處

○一治汗斑方
 白蓮花 半夏

右各等分為末飛麩糊為丸如彈子大用鹽湯擦之

○一治紫癩風白癩風即如今汗斑之類

白附子

雄黃

密陀僧

右各等分為細末用帶皮生薑自然汁調以茄蒂醃藥擦之即愈

○一治紫白癩風神方

雄黃二錢

雌黃二錢

硫黃二錢

白硫二錢

白礬二錢並用透明者佳

右共為末每用時先一浴令遍身出汗次以搗生薑汁藥布包患處擦之良久以熱湯淋洗

○一治白癩風方

用杜蘅葉子生搗為末作湯服之每服三錢

癩風

夫癩風者天地殺物之風燥金之氣也故燥而不應燥而不濕燥金之

壽世保元

三集九卷

三十三

體盛故一容千人則榮衛之行滯命入不仁而麻木也毛落眉脫首燥風伐其榮衛而表氣不同也遍身癩疹者上氣下血俱病也諸痛為癩諸痒屬虛癩風之痒固多有蟲而衛之虛不可証也是証也玉環刺以主之白花蛇血氣之屬也用血氣之屬以驅風豈不油然而獨乎然其性中有毒同氣相求直達癩風毒舍之處豈不居然而效乎見用之性善於癩癩則亦可以癩癩苦參之性善於去熱則亦可以去風昔人吞以防風通聖散此方乃汗下之劑也非榮衛虛弱者所宜今以玉屏風散更之則黃芪可以排膿補長防風可以利氣疎邪白朮可以實脾而補肌矣

補氣瀉榮湯

- 黃芪三分
- 人參二分
- 當歸三分
- 生地黃四分
- 黃芩三分
- 黃芩四分
- 建翹六分
- 升麻六分
- 桔梗五分
- 甘草一錢五分
- 全蝎三分
- 地龍三分

桃仁二箇 蘇木三分 胡桐淚一分 蜜蠟一枚去翅足紋

水蛭三枚少許射香少許

右剉一劑水煎服

○一論治癩風手足麻木毛落眉脫遍身癩疹搔痒成癩等症

愈風換肌丹

白花蛇

丁條頭尾全者酒浸二三日去骨陰乾

苦參四兩

皂角五斤去皮法酒浸丁條取出以水煎

苦參酒

右為末以皂角膏和丸如梧子大每服七十九以防風通聖散送下

用苦參五斤好酒三斗漬一月每服一合日三服

苦參丸

苦參一斤

金銀花

防風

荆芥

羌活

獨活

當歸

川芎

赤芍

連翹

壽世保元

三集九卷

三十四

右為末剉獨活為丸如梧子大每服百九苦參酒下

○一治癩風

如聖丹

- 全蝎五錢
- 天麻一兩
- 五錢
- 獨活一兩
- 羌活一兩
- 防風一兩
- 五錢
- 荆芥一兩
- 羌活一兩
- 細辛一兩
- 白芷一兩
- 川芎一兩
- 當歸一兩
- 白芍一兩
- 人參五錢
- 白朮去蘆一兩
- 枳殼去穢一兩
- 桔梗一兩
- 黃連五錢
- 黃柏去皮一兩
- 大黃一兩
- 芒硝五錢
- 麻黃一兩
- 石膏一兩
- 滑石一兩
- 皂角刺一兩
- 鬱金五錢
- 山梔子一兩
- 連翹一兩
- 大梔子去壳一兩
- 獨活五錢

右三十味為細末用紅米糊為丸如梧子大每服五七十丸用六安茶清送下日三服半身全愈小便尿如散水黑色此病之深者只用此藥二料如眉毛髮脫落日漸生長切不可食羊肉鴿雞豬頭蹄鯉魚生冷如肯食後百日全愈如痔瘻裂只用大楓子壳煎湯洗表夏石膏疔石依方秋冬二味減半過春分秋分服防風通聖散一帖空心服利三四次以粥補之方見中真

○一治偏風眉髮脫落者

取皂角刺九蒸九晒為末每服二錢溫酒送下久服眉髮再生肌膚悅潤眼自倍明

○一治木風惡疾雙目昏暗眉髮自落

瘰癧瘰癧此方特効皂莢刺三斤灰火蒸炙晒乾為末煎大黃湯調服數日開髮生肌細目明諸病立痊

○一治木麻風即木風瘡

○一治木麻風即木風瘡

壬集九卷

三五

用大瓠一升細布袋盛之放在湯水內洗之乾淨取出以麻黃煎湯將藥運布袋浸之良久取起晒乾再用甘草煎湯浸晒乾又用苦參煎湯晒乾又用薑便浸晒乾又用薑葱煎湯浸晒乾不必取起就放鍋內煮乾就焙乾為末每出一兩加射香二錢蟾酥三錢共為一處入磁器內每服一錢石蒜花煎湯下花即山中石上生白鮮如錢樣以香耳草煎湯洗浴然後服藥七日見効能厚者十日一服弱者二十日一服神効

賺瘡

夫賺瘡者皆由腎臟虛寒風邪滲氣外攻三重之有難於除交之側風熱毒氣流注兩脚生瘡腫爛疼痛臭穢步履艱難此病生於脈管為血以其骨上肉少皮薄故難愈至有多年無已瘡口開爛皮爛肉現臭穢不可醫治法當先取虫然後敷藥須起足端坐勿多行履庶可痊矣

○一論賺腿生瘡或癢疥等症

四生散

白附子 黃連 羌活 沙苑蒺藜

右各等分為末每服二錢用猪腰子批開入藥濕布裹包煨熟細嚼湯下風濕酒下

○一論賺瘡乃濕毒所致及治漏瘡

黃白散

黃柏去皮一兩輕粉三錢

右為細末用猪膽汁調塗濕則乾搽

○一論遠年近日一切賺瘡潰爛至骨疼痛當時止痛生肌如神

三香膏

乳香二錢 松香三錢

右為細末真生香油調用包瘡子等藥毒者密針刺孔將藥攤其上

○一治賺瘡方

壬集九卷

三六

蘇葉煎取汁藥中上用完蘇葉藥上布批住即効

○一治用松香為末入葱根葉等分同搗為餅外用石乳香為末少搽藥餅上搭在瘡口布帛緊扎二日一換並茶洗淨

○一治賺瘡方

密陀僧八錢 石乳二錢 血竭一錢 銅青八分

右為末將油帶刺孔相油搽瘡上搽藥在油上隔時時効

○一治賺瘡頑瘡諸瘡許敬吾傳

拍油二兩 黃蠟三錢 白蠟三錢 香油三錢

密陀僧一兩五錢為末

右將上四味入瓷碗內火上煎化頓入陀僧在內攪不住成餅為

度將油搽刺孔上藥油帶反指以孔在下貼瘡

○一治兩足生賺瘡諸瘡久不已後山李慎微傳

輕粉一錢 官粉二錢

○一治諸般疥癩其爛不堪者
雄黃 生白礬

右各等分煎水洗之

○一治濕癩癬方

黃蠟一錢 白朮一錢 銅綠一錢 黃丹一錢

童女髮一錢

右用香油二兩入鍋內熬入藥同煎時搗作十數碎入鍋內煎

○一治凍瘡

用茄子根濕煎湯洗并山雀兒腦塗之

○一治諸般瘡久不瘥年久不愈者後痛發後腫破出黃水不止

用雞子黃一枚搗碎黃蠟各等分清油煎滾石同煎於後入藥

患處如治脚手並癩用藥搽之存性勿入煎粉煎爛

○一治頭上風瘡腫痛癩爛

壽世保元 壬集九卷 四一

用包銀珠粗細煎爛搽之

○一治蛇頭指

用雞子開下竅將指入內待化水又換之高如此一夜即瘥

○一手足患癩爪黃腫痛作膿不可忍

用蒜加石灰搗爛敷上立已

○一蛇頭指痛不可忍

用蜈蚣一條焙乾為末清油煎滾

○一又指無名腫毒痛不可忍

白朮末一錢 蟾酥三分

右共和為一處用雞清調陰常時腫痛瘥

○一治血風瘡

石膏 硫黃 百藥膏

右各等分相油調搽

○一治諸般疥癩其爛不堪者
紅藥末 黃丹 官粉 松香各一錢
銀珠三分

右為細末煎水洗之

○一治脚上諸般瘡癩癬

水銀一錢 沒藥五分 煎瓦焙乾黃丹五錢

細茶三錢 大楓子十筒去壳 輕粉一錢

黃蠟五錢 石乳香五分 煨 片腦三厘

真麻油一盞

右藥俱研極細末篩過用真麻油同煎用文武火慢煎成膏

冷方下片腦再煎一刻取用細嫩油搽瘡未破者大小為度不宜太

潤十日一換每時用藥煎水洗瘡也方脚

大黃 苦參 蒼朮 防風

壽世保元 壬集九卷 四十二

金銀花 艾葉 茶葉

右各等分煎湯洗之

○一多年瘡久不愈者用藥搽之收口

黃蠟二兩 黃丹四兩 輕粉 乳香 沒藥各二錢

血竭 孩兒茶各一錢

右為細末先將真麻油半斤熬熱滴入成珠下黃蠟化開再入黃丹

起離火方下諸藥攪勻久確收用

○一番花瘡及似花之狀

胭脂 貝母各三錢 胡粉二錢五分 珊瑚

沒藥各二錢

右為細末先用溫漿水洗淨後搽之

○一月餘瘡或生小耳內

胡粉炒微黃 枯白礬 黃丹煨 黃連

輕粉

射香少許

右為藥以燈火先之拭乾後將藥上月麻油調敷即愈。

○一治脚前腫上... 用飛黃丹入... 搽之

○一治脚前腫上... 用飛黃丹入... 搽之

○一治脚前腫上... 用飛黃丹入... 搽之

○一治脚前腫上... 用飛黃丹入... 搽之

○一治脚前腫上... 用飛黃丹入... 搽之

○一治脚前腫上... 用飛黃丹入... 搽之

○一治脚前腫上... 用飛黃丹入... 搽之

○一治脚前腫上... 用飛黃丹入... 搽之

○一治脚前腫上... 用飛黃丹入... 搽之

壽世保元

壬集丸卷

四十三

當歸酒洗二兩

白芍乳汁炒二兩

懷生地黃酒洗二兩

防風去蘆二兩

熟地黃酒蒸二兩

川黃柏鹽水炒一半各一兩

知母去毛二兩酒炒

白木壁土炒一兩

土茯苓六兩

苦參去刺皮四兩

甘草一兩

右為細粉用豬肚下筒好酒開壺文武火蒸爛搗和藥末為丸如梧子大每服五十九酒送下忌雞魚牛羊肉

○一治瘰癧久不愈

黃芪二兩

當歸一兩五錢

白芍二兩

白芷三錢

川烏一兩

厚朴五錢

陳皮一兩

炙甘草二錢

右判藥並煎服

膏藥

○一治一切風寒濕氣手足拘攣骨節酸疼男子瘡積婦人血疲及腰脇諸般疼痛結核癰癤頑癬頑瘡積年不愈腫毒初發楊梅腫塊未破者俱貼患處腫脹痛瀉痢瘧疾俱貼臍上兩白而寒尤效咳嗽喘急寒惡心胸膈脹悶面色痿黃心寒氣痛俱貼臍心真重傷力渾身痛者貼後心腹脹痛小腸氣等症貼臍下治無不効

神異膏 傳參將方

木香 川芎 牛膝 生地黃 細辛

白芷 秦艽 歸尾 枳殼 獨活

防風 大楓子 羌活 黃芩 南星

草麻子 半夏 蒼朮 貝母 赤芍

杏仁 白朮 茅香 兩頭尖 艾葉

連翹 川烏 甘草節 肉桂 良薑

續斷 威靈仙 荆芥 藥木 丁香

壽世保元

壬集丸卷

四十四

金銀花 丁皮 藜香 紅花 青風藤

烏藥 蘇木 玄參 白蘇皮 姜蚕

草烏 桃仁 五加皮 山梔子 牙皂

苦參 穿山甲 五倍子 降真節 骨碎補

蒼耳頭 蟬退 蜂房 鼈甲 全蝎

麻黃 白芨各一兩六黃二兩 蜈蚣廿一條 蛇退三條

右用桃柳榆槐桑練栝七色樹枝各三寸七寸下俱切粗片用真麻油十二斤浸藥及三宿春五秋七冬十宿後煎藥枯油黑為度用麻布濾去渣貯磁器內另以松香不拘多少先下淨錫溶化後取起每香二斤用藥油四兩拭水軟硬得法仍濾入水鉢中令人扯抽色如黃金即成膏矣

○一治風寒濕氣所侵跌撲閃挫傷損一切疼痛皆貼患處心腹痛俱貼痛處哮喘咳嗽貼背心瀉痢貼臍上頭眩眼痛貼太陽穴及治一切無

名腫毒疔疽發背瘡癰濕毒腫瘡疔毒時便貼處即消已成亦能投
膿長肉止痛甚效不能盡述。

神祕萬金膏
草烏 川烏 大黃各六錢 當歸 赤芍
白芷 連翹 白芨 白薇 烏藥
官桂 木鼈子各八錢 槐柳桃桑棗各四錢

右劉散用真麻油二斤浸藥一宿用火熬至藥焦色以生絲絹濾去渣
不用油再入鍋內以文武火熬至滴水成珠不散方下飛過黃丹十
二兩要炒過陸續下均滴水成珠不散為度後入乳香沒藥末各四錢
攪勻聽用。

一治杖撲湯火傷損瘡毒不問已潰未潰肉雖傷而未壞者用之自愈

壽世保元

二集九卷

四二五

肉已死而用之自清新肉易生搽至肉色漸白其毒始盡生肌如
棍杖者外皮不破肉肉糜爛其外皮因肉嫩乾縮堅硬不消爬連好肉
作痛故俗云疔疔疔皮致膿無從而泄肉愈脹痛難以潰飲法弱之人
多成破傷風症每致不救若杖瘡內有瘀血者即有用生磁片於患
處破去塗以此藥則疔疔死肉自清膿液自出所潰亦淺生肌之際亦
不結痂又免被揭之痛殊有功效

當歸膏

當歸一兩 生地黃一兩 黃蠟一兩 麻油六兩

右先將當歸地黃入油煎黑去渣入蠟溶化候冷攪勻即成實矣蓋當
歸地黃麻油二蠟生肌止痛補血精筋與新肉相宜日曬尤妙

○一治諸瘡腫毒及諸病等症神效

神效萬靈膏 五臺山無窮禪師秘藏方
當歸 川芎 赤芍 生地黃 熟地黃

防風 羌活 獨活 連翹 山梔
黃連 大黃 玄參 苦參 白芷

五倍子 兩頭尖 皂角 桔梗 白芨
白薇 紅牙大戟 山慈菇 天花粉 官桂各六錢

草麻子 八十 木鼈子 四十 杏仁 四十 筒巴豆肉 四十 穿山甲 十片
右劉散用真麻油二斤四兩髮餘四兩入藥浸春秋二百夏一百冬五
日油藥放鐵鍋內文武火熬用槐柳枝長寸許各三十根同熬焦色用
麻布濾去渣再放油鍋內熬滴水成珠不散傾出瓶內秤準油二斤下
山東黃丹一斤松香二兩姜汁煮過黃蜡二兩桐油二兩然至不老不
燥冷了乳香沒藥血竭孩兒茶阿魏百草霜各三錢射香五分或下
錢輕粉三錢馬寶膏三錢俱為細末藥油將好投下早恐波藥氣再
熬不相手為度將膏藥埋土內三四日出火海磁瓶內收貯防濕搽貼
倘膏藥加抗粉不拘多少不粘手為度

○一治諸瘡疔毒發背疔毒諸病法下後

○一瘡疽發背癰疽瘡毒純起一貼即消火焙雙手上下十層百餘次
出行為度如有膿血之瘡貼上膏藥便能不用手摩

○一疥瘡癬瘡搔癢貼上不用手摩

○一風癩皮膚先用木鼈子火煨熟搗爛放臍上貼之

○一咽喉喘嗽貼膏有焙手摩百次

○一無名腫毒貼患處瘡初起焙手摩出活諸毒發陰陽男子貼丹田婦
人貼血海焙手摩百次

○一打破損刀傷貼患處如虛腫貼腫處焙手摩百次

○一熱嗽冷嗽傷力貼肺俞焙手摩百次

○一風痰癱瘓貼心坎痛處焙手摩百次

○一男婦諸瘡塊用麩作圈放瘡上用皮硝一兩錫黃五錢大蒜二顆將
為一處用膏貼瘡上硝黃蒜放圈內以裂手火研藥上要透熱煨木

壽世保元

七集九卷

四二六

〇 髓子肉於背內小兒瘡塊不用硝磺煨手摩百次。
 〇 男婦偏正頭風俱貼太陽穴煨手摩百次。
 〇 男子遺精女人白帶煨木龜子肉男貼丹田女貼血海煨手摩百次。
 〇 蠱脹貼心下膈上煨木龜子肉煨手摩百次。
 〇 左癱右瘓濕氣瘰癧貼患處煨木龜子肉煨手摩百次。
 〇 暗風貼肺俞穴并心口下三寸煨手摩百次。
 〇 月經不調貼血海煨手摩百次。
 〇 醉後嘔吐貼肺俞心口煨手摩百次。
 〇 冷氣冲心痛貼腹際痛依病大小貼煨手摩百次。
 〇 四時傷寒貼脊心煨手摩百次出汗為度。
 〇 已上諸般疼痛照法貼之煨手摩百次其患處即愈。

杖瘡

壽世保元

壬集九卷

四十七

〇 杖打破脚腫痛。
 〇 金鳳花科一握搗爛加泥敷患處如乾又塗上。一夜血散而愈。
 〇 杖瘡久不愈者。
 〇 雄猪骨曬日夜搽破腫處立已。
 〇 杖打血侵腦腫痛。
 〇 石灰三錢入水攪澄再入香油五錢用金銀脚攪打成膏以雞翎蘸上使血水長流須臾腫消痛止。
 〇 杖之先
 〇 用白蠟細切入碗內滾酒泡服打者不痛。
 〇 杖瘡方
 〇 用麻油二分水一分薑片一錢入碗內用銀絲攪成膏用鴨毛刷上外用帛貼日四五次吐血下行立時腫消痛止。
 〇 治杖瘡及遠年近白一切頑瘡。

黃蠟二兩 黃香二兩為末去黑香油三兩須溫
 乳香末五分 沒藥末五分
 右先將蠟入磁碗內慢火化開用筋敲碎邊續入黃香乳沒取碎雜火入溫香油於內攪勻待冷入水缸內去火毒三日取出油單并雜藥貼患處。

〇 杖打傷重敗血攻心欲死
 蘇木三錢 紅花三錢 歸尾三錢 大黃二錢
 右共為末童便一木鍾煎至一鍾不拘時熱服。
 〇 杖打後潰爛久不愈者此氣血虛也。
 人參 白朮 去蘆炒倍 白茯苓 去皮 當歸
 白芍 陳皮 熟地黃 香附子
 貝母 桔梗 甘草各等分
 右對下劑水煎空心服。〇 往來寒熱加柴胡地骨皮。〇 口乾加五味子。

壽世保元

壬集九卷

四十八

〇 來門冬。〇 臘清加黃芪。〇 臘多加川芎。〇 肌肉遲生加白薇肉桂。
 白龍瘡膏 方外異人傳
 臘猪油一兩七 白蠟 輕粉 定粉各五錢
 黃蠟三錢 朝腦二錢五分 乳香一錢 沒藥二錢
 冰片一分
 右為末先以猪油同二蠟化開入藥末調攤貼之。
 寄杖神丹 何和守傳 此藥服後任打無妨且血不侵痛。
 乳香 沒藥各五分 血竭 孩兒茶
 三七各一錢 木茸 焙乾 白蠟各二錢 辰砂七分
 青木香一錢 海螵蛸五分 琥珀三分 天靈蓋火煨三分
 右為末沙糖為丸如苦味大每服三丸將酒送下即打者不侵痛如未受膏用兩手揉背即消。
 〇 杖瘡潰爛生蛆用皂糞煎過為末乾膠其內蛆即死。

折傷

夫折撲墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金刃傷皮破出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀者宜攻利之若亡血者宜補行之又察其折傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊唯宜先逐瘀血通經絡和血止痛後調氣養血補益胃氣無不效也

大凡傷損不同壯弱及有無瘀血情俱宜服熱藥便以酒佐之推陳致新其功甚矣

○一論跌傷骨折用藥一厘黃酒調下如重車行十里之候其骨接之有聲初跌之時整理如舊對性綿衣蓋之勿令見風方服藥休移動端生

日製忌婦人雞犬等物

一厘金 大梁孫都督秘傳神效

土龍一箇新瓦上焙巴豆一箇去壳 半夏一箇生用

壽世保元 壬集九卷 四十九

乳香五分 沒藥五分 自然銅火用此 自然銅火用此

右為細末每服一厘好酒送下不可多用多則補得過起妙不可言

○一被打破重惡血攻心或不石壓死非跌傷從高墜下致死氣絕不能言語取藥末便急劈開口以熱薑便灌之下方用半麻燒灰調酒服

○一凡跌傷打傷腫痛不可忍者以生葱搗爛熱蒸之甚妙

○一傷肢折臂者即將折處懸上綁定用好酒一碗旋熱將雄雞一隻刺血在內橙白乘熱飲之仍將雄雞搗爛炒熱敷上包縛冷再換亦治刀刃傷痛與血隨止

○一折傷先用止痛法

○一治跌撲傷損紅腫屬熱毒者并接斷

○一治跌撲傷損紅腫屬熱毒者并接斷

天花粉三兩 薑黃 白芷 赤芍藥各一兩

右為末濃茶調探患處

○一治跌打傷損傷骨先用手扯伸後用小奶雞一工隻搗爛搭正外用杉木板夾之次日再換取效如神

○一論打撲傷損至重木小便不通瘀血不散肝腹膨脹上攻心腸悶亂至死者此藥通下瘀血方可服補損藥

大成湯

大黃二錢 芒硝二錢 枳殼二錢 厚朴一錢

當歸一錢 桃仁一錢 蘇木一錢 紅花五分

木通一錢 甘草少許

右到水煎服

○一論從高墜下惡血流於脇下痛不可忍

復元湯

壽世保元 壬集九卷 五十

柴胡五錢 當歸六錢 穿山甲土炒 桃仁去皮 五十

紅花二錢 瓜蒌仁二錢 大黃酒浸一兩 甘草二錢

右到一兩水二盞酒一盞煎七分溫服以初發為度

○一論墜墜挫閃氣血凝滯攻刺腰痛

羌活桃仁湯

羌活 蒼朮 米泔炒 當歸尾 玄胡索

桃仁去皮 紅花 牛膝去蘆 杜仲酒炒

破故紙炒 小茴香酒炒 乳香 官桂

右到一劑半水半酒煎服

○一治跌撲傷損

真牛膠一兩 乾冬瓜皮一兩

右二味剉碎入鍋內同炒焦枯存性為細末每服五錢好酒一鍾調服服後仍飲熱酒二三盞厚蓋得微汗痛即止一宿接完如神效

○一論跌撲所傷，為數不繁，或元氣虛寒，腫不消，或元氣清熱，腫不消，或元氣虛寒，腫不消，或元氣清熱，腫不消。堅硬不痛，肉色不變，久而不潰，潰而不斂，或筋斷骨節，一切冷症，並治回陽玉龍膏。

草烏二錢炒 南星一兩煨 均薑一兩地 白芷一兩

赤芍一兩炒 肉桂五錢

右為末，熟湯調，搽熱酒亦可。

接骨止痛神方

楮根皮 茸花枝 又名合歡樹，又名夜合花

右二味，用水一盞，煎至七分，加酒一鍾，調入火煎，過天蓋，下二錢，服，當時痛止。

○一治跌撲傷損

蟹二隻，連殼搗爛，好酒一盞，煎去渣，服，渣數服。

○一治打撲青腫疼痛

壽世保元

主治九卷

五十一

用酒梳梳，於水類，搗碎，其膏，立見。

○一論打撲跌損，傷牙咬刀傷，出血，請般，腫毒，出膿，後肌肉不生，痛不，止，血定，痛生肌散。

乳香三錢 沒藥三錢 血竭二錢 黃丹飛過五錢

白芷二錢五分 龍骨火煨三錢 軟石膏煨去火，兩朝，腦少許

右為細末，磁器盛，每以椒末，燒，血止痛，生肌。

○一治傷損等症，失血過多，或因跌打，血氣耗損，氣衰，熱煩燥，作湯。

八珍湯

人參 白朮 白茯苓 當歸

川芎 白芍 熟地黃 各一錢 甘草五分

右煎，藥水，煎服。

○一治被火打傷，筋骨，跌撲，損傷，氣血，虛弱，等症，宜。

萬病無不效，方見補益。

○一治打撲損傷，落馬，墜車，一切疼痛。

乳香 沒藥 川芎 白芷 赤芍 各一兩

生地黃 牡丹皮 各二兩 甘草 五錢

右為細末，每服三錢，溫酒，并童便，調下。

○一治風損，如神膏，謝時風傳。

用生薑汁，葱白汁，好醋，各一盞，下黃丹末，半斤，同煎，又下香油四兩，再入桐油四兩，熬，滴水，成珠，不散，下黃丹一兩，再熬，成珠，入射香五分，則風損，如神。

五分，則風損，如神。

破傷風

天破傷風者，有因毒暴傷，損風，傷之，間，得，推，經，絡，致，使，筋，骨，更，作，身，體，不，張，口，緊，不，開，齒，者，邪，氣，入，脈，有，因，諸，痞，不，瘳，榮，衛，虛，弱，肌，肉，不，生，瘳，眼。

壽世保元

主治九卷

五十二

不台風，亦能外入於筋，為破傷風之候，有諸痞，不瘳，眼，皆言，謂，艾，為，上，丹，即，煎，煮，而，不，知，火，熱，毒，透，經，絡，受，不，可，勝，數，微，則，發，熱，甚，則，生，風，筋，或，肩，弓，反，張，口，緊，目，斜，亦，有，破，傷，風，不，斂，而，病，者，因，瘳，者，白，痴，瘳，口，閉，塞，氣，應，於，陽，故，熱，易，為，鬱，結，熱，甚，則，生，風，也，古，方，藥，論，甚，少，以，此，與，中，風，同，論，故，不，另，立，條，也，惟，河，間，論，病，同，傷，寒，証，治，通，於，表，裏，分，別，陰，陽，有，在，表，有，在，裏，有，在，表，裏，半，裏，者，在，表，宜，活，在，裏，宜，下，在，表，裏，之，間，宜，和，解，不，可，過，其，治，也，故，表，脈，浮，而，無，力，者，太，陽，也，脈，長，而，有，力，者，陽，明，也，脈，浮，而，弦，小，者，少，陽，也，若，明，此，三，法，而，施，治，不，中，者，難，矣，但，中，風，之，人，尚，可，淹，延，歲，月，而，破，傷，風，始，雖，在，表，隨，即，轉，臟，多，致，不，救，大，概，內，氣，虛，弱，而，有，鬱，熱，者，得，之，若，內，氣，壯，實，而，無，鬱，熱，者，雖，傷，而，無，害，也。

○一論破傷風，邪初在表者，急服此藥，以解之，稍遲則邪入於裏，與此藥不相合矣。

羌活防風湯

羌活 防風 藁本 川芎 白芍

當歸 地榆 細辛 甘草各一錢

右剉水煎熱服

○一論破傷風在坐表生重急服此湯稍緩邪入於裏不可用矣

羌活 防風 川芎 菊花 麻黃

石膏 前胡 黃芩 細辛 枳殼

白茯苓 蔓荊子 甘草各五 薄荷 白芷各二分半

右剉水煎熱服

○一論破傷風邪傳入裏一舌強口噤項背反張筋惕抽搦痰涎壅盛胸腹滿悶便溺閉赤時或汗出脈洪數而強也宜煎之

通裏湯

毒世保元

壬集九卷

五三

川芎 羌活 黃芩 大黃各二錢

右剉水煎溫服臟腑通利為度

○一論風傷腎而腰痛者或左右痛無常處牽引兩足宜

五積散加防風全蝎三箇方見中寒

○一論破傷風及金刃傷打撲傷損并癩狗咬傷能定痛生肌

玉真散

天南星 為防風所制服之不麻 防風

右各等分為細末破傷風以藥敷口然後以溫酒調一錢如牙關緊急

角弓反張用藥二錢重便調下○打傷欲死但心頭微溫以童便灌下

二錢并進下服○癩狗咬破先口嚼藥水洗淨用綿拭乾藥更不許

發無腫大効

○一治破傷風

初覺有風急取慈蔞堆內蟬蟪蟲一二箇用手捏住待虫口中吐出

水就抹破處身家稍厚衣裹待少時瘡口覺麻兩脇微汗出立効如

風腰急過取此蟲三五箇剪去尾肚內黃水自出塗瘡口再滴此少

熱酒飲之汗出立効爛草房上亦有此蟲

○一治破傷風五七日未愈已至角弓反張牙關緊急服之神効

蟬退去頭足土淨五錢

右為末用好酒一碗煎滾服之立効

○一治破傷風

奪命丹 川烏 火般去黑皮一兩 雄黃一錢

右為末葱汁為丸如蓮子大每服一丸用葱葉一片將藥裹內火微燒

嚼爛黃酒下衣蓋汗出即愈

○一治破傷風及風火咬傷方見灸法

灸法 治破傷風及風火咬傷方見灸法

毒世保元

壬集九卷

五三

雄黃 香白芷

右各等分好酒煎服如牙關緊急者灌之即効

湯火

凡遇湯火所傷切勿用冷水冷泥蓋熱氣得氣則却深搗爛大筋

骨慎之慎之先以鹽末和米醋調敷瘡上以醋泥塗之仍用醋塗不

絕暫救痛苦下面急搗生地黄醋調敷瘡上宜俟瘡止雖厚至數寸不

一切湯火傷既云 龍樹王如來授吾行持北方壬癸禁火大法

龍樹王如來吾是北方壬癸水收漸天下火星辰千里火星辰

急急如律令

呪畢即搗真武印吹之即用少許水洗雖火燒手足成炭亦立愈

○一治湯火被火燒破瘡毒疼痛三方俱効

○一方用大黃末蜜和塗之立愈
 ○一方用雞子清磨京墨塗之。上用三層紙蓋之。
 ○一方用生白礬為末香油調搽瘡破處不拘時。
 ○一治湯火傷。

用擇猪毛不拘多少焙乾燒灰存性。研細末。真香油調。量瘡處大小。周圍厚敷於上。中留一孔。一日一次。慢上。圍搗如難急。速及不。留口。則潰而有痕痕矣。

○一治湯火燒此藥止痛解毒生肌
 清涼膏
 生地黃二兩 黃連 山梔子 白芷各一兩
 葱白十根

右剉細用香油四兩煎至地黃等焦黑濾去渣再煎入黃蠟五錢慢火熬蠟化傾磁盆內以雞翎掃瘡上

壽世保元 士集九卷 五十五

○一治湯火燒瘡
 家園生地黄旋取新者搗取自然汁入香油黃蜡少許砂鍋內熬成膏以雞翎掃瘡上
 ○一湯火傷用水磨炭末塗之或磨土朱塗之或用真桐油塗之
 ○一方用雞頭切開水磨濃漿敷之立效
 ○一方用黃柏為末香油調搽立已

蟲獸

○一癩狗咬方
 斑猫 下日二日三日至七日止用七筒以七日外每日用一筒可
 雄黃 二錢 麝香 三分小兒不用亦可或川二三厘
 滑石 五六錢或一二兩亦可
 右俱觀人靈氣虛常用糯米一勺與斑猫同炒以赤為度斑猫去頭尾

翅足各為細末每帖用土三茶匙酒調服如不飲酒米湯亦可服藥去毒物於小便中出或口吐出都是大小塊子毒出後於瘡口下去三寸灸三壯效○先喫香油一碗次用油洗瘡口○又沙糖水調塗仍服沙糖水一兩碗

○一被火傷
 用生葛根汁服并洗傷處或白礬末細磨口瘡即止

○一被驟馬咬
 用馬鞭草燒灰油調敷之

○一百蟲入耳
 用薑汁灌之或葱汁尤良或猪肉少許炙香置耳邊亦出或蒜管入耳內口吸之虫隨出

○一癩狗咬傷
 番木糖即馬錢子磨水吃即看腦頂上有紅頭髮急宜扯去

壽世保元 二集九卷 五十六

○一癩瘡方
 朱砂 雄黃 膽礬
 右各等分射香減半端午日取蝦蟇新者酥和為丸一擦立止

○一癩狗咬傷神方
 斑猫 去翅足七箇 香附 七分
 右共為細末作一服燒酒調下如腹痛不可忍者吃猪肉湯一兩口解之即止不一時亦使出如狗形下末即已避避風七日

○一蜈蚣入耳以雞肉置耳邊自出

○一蜈蚣咬痛不可忍用燒紙捲緊燒烟薰咬口立止○一方用紡線根

○一蜈蚣咬痛不止獨蒜摩患處痛止○又宜烏雞糞水調塗之○又宜

○一蛇咬
 蜈蚣研敷之

雄黃

五靈脂

白芷

貝母

右各等分爲末

每服二錢，酒調服。又以白礬煎水化洗傷處，功

一蛇咬

端牛製

雄黃

白礬

右各等分爲末

酒調服。如指大，每服七丸。念藥王菩薩經王菩

薩

七酒煎水送下

一蝎咬

雄蝎入痛在一處，雖蝎入諸處，痛但將蝎半搗爛，塗在傷處，

即解

散蝎牛食，蝎故也。手浸冷水，痛亦止。

一治蝎蟻

天南星 三箇 膽礬 五錢

右用

酒半斤化，成水入三末，搗切，成錠子。每時酒送下。又

又治

牙疼，用酒入此，餅小，餅數次即止。

壽世保元

壬集九卷

五十七

一治

用酒半斤，生酒，凡被所傷，將餅貼住，勿令氣上行，服後即

當解，夫不然，則所傷之處，必消爛矣。

一風犬咬

入急於無風處，以冷水洗淨，即服韭菜汁一匙，兩七日，又下

碗

四十九日，共七碗，百日息，食魚肝，終身忌狗肉，方得保全。否則，下湯

丸

死，下風犬，下日咬，入止，入用此方，得活，親試其驗。一月，藥味

傳

世處，立愈。

一辟

毒法

龍益

練花

羌花

苦參

藜蘆

川烏

右共

爲末，肉爲丸，乾，煨之。又方用黃鱈魚，同餅末，搗碎，

一辟

毒方

用

燒魚乾，於室內燒之，即化爲水矣。

一凡蛇入七竅，開蛇尾，納川椒數粒，以帛封之。其蛇自出，更煎人參

湯飲之。或飲酒食蒜，以解內毒。如被蛇咬，食蒜飲酒，更煎枳殼塗患

處，加艾於蒜上灸之。其毒自解。凡毒蟲傷，並效。

一金猫辟鼠法

椿樹葉 冬青葉 絲瓜梗葉

右各等分，每四季燒烟薰于室中。其鼠遠避。一年燒四次。

一治

鼠入耳

用獨尿滴耳中，即出。取猫尿，以手塗耳，其尿自出。或將獨尿

則蟲死，難出。或用炒芝麻，按之，則虫亦出。更不如獨尿之效。

一治

百蟲入耳

搗韭汁，灌耳中，即愈。又宜川椒末，下搗，以醋半盞，調下。或

十四步，即出。又宜火對繩葉，搗之，取汁，灌耳中。又宜

壽世保元

壬集九卷

五十八止

一治

蟻入耳

用穿山甲，燒存性，爲末，水調，灌之，即出。

一治

百蟲入耳不出

以雞冠血，滴入耳中，即出。

一治

蟻入耳

地龍一條，納葱葉中，化水，滴耳中。其蟻亦化，爲水。

一治

黃蜂毒

以熱酒，洗之，立效。或用清油，搽上，即愈。

一治

蚊蟲

用黃荆子，爲末，入人言末，加艾，以帛捲，燒烟薰之。

一治

壁虱臭

用蜈蚣，燒烟薰之。又方，青鹽水，灌洗床帳，永絕其迹。

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著

龔廷賢 龔安國 校

南雅太學生龔印周文卿光齋書

單口雜治

食鹽治

- 一凡覺胸中酒食停積或被人勸飲過多一切諸物心下脹滿只用鹽花擦牙齒濕水漱下不過三次如湯發雪即時舒暢通快也
- 一用鹽指擦牙齒少時吐水放掌中洗眼夜見小字此擦牙牙固洗眼眼明
- 一小便卒不通炒鹽納臍中即下

壽世保元

癸集十卷

- 一乾霍亂上不得吐下不得利出冷汗氣將絕用鹽一大匙炒令紅置子小便一碗二味溫和服之少頃吐下即愈俗名攪腸沙腹痛
- 一肝臟氣虛風冷搏於筋通麻轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱清之
- 一齒齦宣露每日拾鹽納口中以熱水含漱百遍不過五日即堅密
- 一眼生浮翳粟翳翳膜遮睛取雪白鹽生研少許以太燈草煎鹽輕手指定浮翳就點凡三次不疼痛勿驚恐屢効
- 一面上酒刺并酒齶鼻切忌手搔手擠只用無灰好鹽炒過如痒即將鹽擦之如出血出承即將鹽按在傷處止之久自除根
- 一蝎螫痛不可忍以苦鹽點木眼角若熱左邊點左螫右邊點右或只以鹽湯漬傷處亦妙
- 一婦人陰戶極痒極難忍以鹽塗之即已
- 一寸白虫上攻心痛用鹽煮馬齒莧一匙入醋半盞吞食之少時下

香油治驗

- 一腳氣作痛每用鹽塗擦脚膝至足甲淹少時却用熱水泡洗即已
- 一喉痺腫痛用鹽炒研末吹患處五七次吐出涎即愈
- 一中風不語或痰厥氣厥忽然倒仆不省人事急用香油三四兩入麝香末二三分攪勻將病人之口幹開灌下通其閉痰即便甦醒如無麝香用生薑自然汁半盞許同服亦可
- 一中信毒或因氣惱自服急用香油灌之一碗餘或吐或行下即愈若以酒調服者難救其毒發於周身也
- 一瘰癧毒毒并天泡楊梅等瘡用香油一斤入水半鍾煎煉油耗白烟起住火以磁瓶收貯每早晚用熟油一鍾對好無灰酒一鍾溫服七日除根
- 一心夜禁牙關欲死者用隔年老葱白三五根搗如泥取汁將病人口幹開用銅茶匙送葱汁入喉中用香油四兩灌下油不可少用但

壽世保元

癸集一卷

- 一得葱油下喉其人即甦少時將腹中所積等物化為黃水從大小便出微利為佳永不復發若葱乾無汁畧加水在內搗汁
- 一諸虫入耳香油灌之即出
- 一產後生腸不收用香油煉熟以盆盛候溫却令產婦坐油盆中約一頓飯久用皂角末少許吹鼻中令作嚏立上神効
- 一傷寒三五日忽有黃用生香油一盞水半盞雞子白一枚和之令勻頓服之
- 一虫咬心痛香油搗熟熱服一盞
- 一中菌毒用香油一盞入甘草不拘多少煎下沸勿令黑冷服即解
- 生薑治驗
- 一嘔吐不止用生薑一大塊薄切勿令折斷層層搗在內用水濕麻布裝之外用紙裹水濕火煨令紙乾取出麻布并紙用姜搗爛和稀米湯呷服即止北方無生薑用夏布亦可

一 咳嗽連嗽四五十聲者，厚連皮生薑自然汁各加白蜜二茶匙同煎，茶鍾內噴滾溫服三四次即愈。

一 感冒風寒發熱頭眩腹痛，用連皮生薑一大塊連根葱白七根連皮核桃三枚打碎細茶一撮水二碗煎熱服，被蓋出汗。

一 痔瘡突由紫痛生豆不便，先用韭菜洗淨以沸湯煎於瓦木炭內，薰之通手洗，即愈。如未消用生薑切薄片放在痔上痛甚處，以熱艾作炷於上灸三壯，黃水即出自消。若肛門上有兩三個痔，三五日後如前法逐上灸之，屢效。

一 老人咳嗽喘急煩熱不下，食食即吐，海腹脹滿，生薑汁十五合，白砂糖四兩，二味相和微火溫之，一二下滾即止。每度含半匙，漸漸下注。

一 傷寒胸膈不寬，一切寒結熱結，水結食積，結血結痰，結支結六，心膈痞氣，結者俱用生薑搗爛如泥，去汁取渣，炒乾研細，包於紙內，煎心膈下其滿積，自然愈。如痰液，再入姜汁再煎，再煎即愈。

一 葱白治驗 神功妙法

一 虛快人肢痺，患地塊或作痛或不痛，或感寒於經絡，肢體疼痛，或四肢筋脈骨痛，又治流注，并跌打傷損，腫痛，用葱白切細炒熱，貼患處，冷則易之，再貼腫處，即已。此外補陽氣而通經脈之法也。

一 刀斧傷破血流不止，痛若難禁，急將葱白搗爛炒熱，付傷處，痛與血隨止。葱冷，再二易，遂不復痛。

一 小便不通，小腹脹滿，不急治即殺，入急用連根葱白一斤，搗爛炒熱，以宜熱分作兩處，更替熨，即通。加些射香在內。

一 婦人胎漏時時下血，用葱白一打，濃煎汁飲之。

一 婦人吹乳，乳起腫痛不可忍，用葱連根搗爛鋪乳患處，上用瓦罐盛，火蓋在葱上，一時蒸熱汗出即愈。

一 白虎風走注痛痺，用三至陳醋醃一瓏葱白一斤，煮下沸瀝出，布帛熱裹，痛處愈。

一 疔腫無名腫毒，以葱白共蜜搗爛，貼患處，立愈。

一 人因傷其指，拍碎小甲，發裂，索命，急搗葱白之，其痛不止，急取葱白，公糖灰火煨熟，剝皮劈開，其間有淨取，拍患處，仍多搗，取淨，微易，若者，凡三易之，立愈。又一夫因候截去一指，亦用此法，則血止，痛消，亦不潰，良方也。

一 酒疾太使下血，旬日不止，用生蘿蔔搗碎，大圓筒，置于一枝，青葉汁餘及下根，用磁瓶取井水，煮十分熟，爛，去米，添醋，空心任意飲之，立止。用銀器重湯煮之佳。

一 腹內初有積聚，服此利下，如鴉卵大，即愈。用蘿蔔切如麵條，半盞，煎香油，煮至一盞，同炒黃色，入水二盞，煎至一盞，連蘿蔔，空心溫服，通後，以米飲調養三日。

一 吐血衄血，用蘿蔔汁一鍾，入鹽少許，服之即止。或以蘿蔔汁搗汁，同飲，及滴入鼻中亦妙。

一 牙宣出血，用白蘿蔔搗汁，一匙，加鹽一錢，不時嗽口即止。

一 疥癩瘡毒不止，用蘿蔔一箇，取一孔，納硫黃不拘多少，巧塞口，灰火中燒成汁，取出搗研，再加脂油同搗，外加硫黃銀珠各少許，搗研，一擊，音不出，用蘿蔔三入，切斤，入皂角一挺，去皮子，水一盞，煎至半碗，以下服之，不過三服，能語聲出。

一 蜈蚣咬傷，痛不止，用獨頭蒜擦患處，痛立止。

一 一切無名腫痛，惡毒，發背，癰疽，用蒜搗碎，擦患處，立消。

一 痢疾用古墓中石灰，太蒜搗為丸，如梧子大，米湯送下。

一 心痛五月五日午時，取獨蒜五個，搗如泥，入黃丹二兩，為丸，鴉頭子大，晒干，醋磨下丸服之。

一 蒜味辛熱，為陽中之陽能令人氣腎關亂而自吐，若蛇虫蠱毒，為

本草世保元

卷一

四

宜身插益以蒜一升吐李道念之鷄雛齊諸記云郭坦之兒食蒜一
睡吐消食龍於頃刻蒜之妙用如此
一治蘭格脹滿木小便不通用獨頭大蒜燒熟去皮綿裝納下部氣立
通又治腹滿不能服藥以此道之冷則易之功

苦參治驗

一時疫熱病狂言心燥結胸垂死
苦參切片微炒每服五錢水煎溫服連進數服有汗無汗即痊達蘇
以酒煎熱服

一傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛

苦參五兩烏梅二十兩片水一升煎一升分服

一傷寒三四日已嘔吐更宜苦參

苦參為末每服二錢酒調服得吐立瘥

壽世保元

癸集十卷

五

一天行時病四五日結胸滿身熱壯熱

苦參一兩以醋一升煮取一升二合盡飲食當吐即愈天行毒病
非苦參醋藥不解用溫酒復汗愈

一狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火

苦參為末蜜丸如梧子大每十九粒酒湯下

一遍身風熱細疹痒痛不可忍連胸膈臍腹及近陰處皆然痰涎亦多
夜不得睡

苦參一兩皂角二兩水一升揉漚取汁銀石器熬成膏和苦參末為
丸如梧子大食後溫水送下九至二十九次日便愈

一瘡疥蓋能殺虫

苦參炒研出為末米飲下

一發背或疔疔瘡痛亦癩癧痒

苦參炒為末水丸每服三錢酒送下

一楊梅棉花等瘡

苦參生搗汁飲之效

一腸風瀉血并血刺熱痢

苦參炒帶烟出為末米飲下下左炒焦為末水丸梧子大每粒九
一發黃瘡疽食勞頭旋惡心忪鬱對不安而發黃由米飢太食胃氣
所致勞瘵者因勞瘵為名瘵疽者因食而致

苦參三兩龍胆草一合為末牛胆丸如梧子大生大麥湯下五九日
三服勞瘵加救子仁三七八

一治赤心痛又治飲食中毒魚肉菜等取吐愈

苦參三兩好酒一升半煮八分分二次熱服

一治酒渣鼻

苦參四兩當歸二兩為末酒糊丸茶下

一治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癩瘡痒難忍時出黃水及

生大風手足爛壞眉毛脫落一切風疾並治

苦參四兩荆芥一兩為末水糊丸梧子大每十九粒茶下

一治楊梅瘡風木麻風等瘡能治內熱消痰毒補心養氣

苦參半斤洗淨剉碎分作一處將藥袋裝浸酒一壺春以浸一月秋
夏浸十日後早晚開服大治瘡科之神藥平居無病浸此藥能消一
切風毒理脾胃常服每壺用半斤有瘡用一斤每壺用酒十五壺

一苦參湯齊大夫病滿齒含公為之作苦參湯日漱三升五六日病愈
蓋取其苦能安齒竅寒能去風熱也後人無風毒有用苦參湯者齒
久而病腰重降多故也

一白痢肚腹疼痛

百草霜為末每服二錢空心熱酒調服米湯亦可

一久瘧不愈

壽世保元

癸集十卷

六

百草霜二錢 香附米三錢 研末生薑為丸每服三十丸空心服
下隔一日用一服不過三服効

一 哮喘下血

百草霜末每服三錢米飲調下

一 吐衄用糯米湯下

一 口鼻出血用一字吹入鼻

一 皮破血出及發瘡出血搽非藥立止

一 便血血痢男用公猪血女用雞血和百草霜為丸或以酒煎服

一 血崩

一 用陳槐花二兩百草霜半兩為末生薑三錢燒紅秤飽流酒下

一 諸癆并腫瘡

百草霜 過江龍 印砂為石灰燒過為末一錢研細搽瘡上即取
水飲豁口神効

壽世保元

癸集十卷

一 舌燥閉塞關亂

百草霜 食鹽 等分并花水調塗舌上

一 治熱心氣疼

百草霜末每服三錢熱童子小便調下

一 婦人產後下血不止

雜草燒金秀一錢酒調服

一 治吐血及傷酒飽食低頭掬損吐血不多并血妄行口鼻俱出者

未失者投之無不効百草霜每三錢酒調服

一 治跌撲損傷瘀血入腸胃下血溺如瘀血者

百草霜研細好酒調服

○雜方

法製芽茶 清火化痰消食止渴鮮酒

芽茶一斤淨水白檀香末五錢白豆蔻末五錢片腦一錢 右用

甘草熟地等為茶將三味藥末推為餅干不拘時嚼嚥任意
法製枸杞子 補諸虛滋腎水延年益壽

甘草枸杞子 紅者 白檀香末五錢白豆蔻四錢 片腦一錢 右用

甘草骨并枸杞子二味末為衣任意服用

法製人參骨并府傳 補元氣生津液輕身延年

人參骨并府傳 補元氣生津液輕身延年 白檀香末二錢白豆蔻末一錢片腦三分研右甘

草骨同煎為衣

上清丸

龍腦薄荷三兩 烏梅肉二兩 孩兒茶五錢 硼砂三錢

真玄明粉五錢 百藥煎五錢 冰片三分 白砂糖三兩 右為

細末薄荷湯丸如彈丸噙化

丁方有詞子無玄明粉 百藥煎 梅蘇餅 清上焦潤咽喉生津液化痰降火止咳嗽

壽世保元

癸集十卷

南河荷葉三兩 紫蘇葉五錢 白粉葛一兩 白砂糖八兩

烏梅肉一兩半另末 右為細末入片腦一分半研細施入同研勻和

煉蜜和成劑畧帶硬此丸如櫻桃大每一丸噙化

桂花餅 清痰降火止咳生津

桂花一兩 孩兒茶五錢 詞子七箇 甘草五分

右到末桂花水為餅每嚼下九滾水下

玉露霜

真乾菜豆粉一斤 研細薄荷葉一斤以水微溫之用醋先將薄荷

鋪席上用棉布隔住篩子篩豆粉于布上又用薄荷鋪上蓋住紙糊

封固蒸上正氣為度取出去薄荷每豆粉一斤用白糖霜四兩

查梨膏

用鮮肥山查十斤去核甜梨十斤去核共搗收自然汁入鍋煎熟如

汁五斤入蜜四兩其收成膏

法製豆豉

太生夏一斤。先用湯泡七次。姜升浸七日。白礬水浸七日。硝水浸七日。皂角水浸三日。再用白礬水浸七日。硝水浸七日。易至七日。大者切片。小者為末。如蜜龜名。半夏膏。古者名法製。生夏一斤。加薄荷葉六兩。炙甘草三兩。

歌曰

開胃健脾效。止嘔未必虛。更能治嘔吐。痰涎。腹中不。夏月能消渴。冬天却解寒。隨時細嚼。有益甘。利溲入生。千萬

- 排草末四兩
- 檀香一兩
- 甘松一兩
- 陵陵香三兩
- 丁香三錢
- 薄荷葉二錢
- 真射二錢
- 荔枝壳一兩七錢
- 白芷二兩五錢
- 大黃二兩
- 北細辛五錢
- 酥合香油二兩
- 右為末用

壽世保元

癸集十卷

九

衣香方

- 官桂二兩
- 白芷三兩
- 大黃二兩
- 三奈一兩
- 小茴五錢
- 細辛七錢
- 薄荷葉一兩
- 右為末用

德州肥皂

- 獨活五錢
- 白芷三兩
- 細辛七錢
- 紅豆五錢
- 右為末。肥皂三斤。藥末。糖一斤。共提煉為丸。

上香茶餅

- 檀香一兩
- 椰子皮一兩
- 兪茶一兩
- 硼砂一兩
- 沉香一錢
- 薄荷葉一兩
- 甘松一兩
- 烏梅肉五錢
- 右為末。甘草一斤。水七斤。熬成膏。為丸。再加些冰片。尤妙。

京山王府香豆豉

- 鹽一斤
- 薄荷葉
- 草果十個
- 去皮
- 薛羅三兩
- 小茴一兩
- 花椒二兩
- 官桂二兩
- 砂仁二兩
- 紅豆去皮五錢

陳皮切絲五錢 甘草二兩 杏仁去皮切四 瓜仁五錢

橙皮切系二兩 紫蘇葉一兩 生薑切系 時菜瓜 計斷法切 右藥俱為末。於三月三或五月五用大黃豆一官斗。水淘淨。一宿。控乾。籠蒸熟。冷。一宿。細細拌勻。用篩羅去粗渣。蒸酒三九。高者。糖。豆。約二指厚。用黃蒿或楮葉。并蔴。密覆七日。上有黃衣。取。晒干。入料物。六月六日下。不用水。攪勻。一日。拌四五次。裝缸內。逐日。輪。轉。至三七。頃。出。晒。半乾。湯。復入。坛內。取用。或將油。拌。即是。湯。豆豉。

糯米醬法

糯米一小斗。如常法。做。成。酒。醬。入。炒。鹽。十斤。淡。豆。豉。半。升。花椒三兩 胡椒五錢 大茴二兩 小茴二兩 乾姜二兩 右與酒漿。藥。俱。合。作。一。處。磨。成。醬。即。成。醬。調。和。五。味。最。佳。

神仙醋

清明日用粘米一小斗。注水浸七日。不許下手。放水。米內。去。一。七。

壽世保元

癸集十卷

十

日後將米。放。瀝。包。吊。在。屋。簷。上。四。月。八。日。取。下。米。入。水。三。盞。挑。條。攪。一。七。日。封。固。罐。內。六。月。六。日。來。開。其。味。酸。美。


三仙延壽酒

好上等。淮。花。燒。酒。一。罈。入。龍。眼。去。壳。一。斤。桂。花。四。兩。白。糖。八。兩。封。固。經。年。愈。久。愈。佳。其。味。清。香。甜。每。隨。飲。不。可。過。醉。能。安。神。定。智。察。心。悅。顏。香。口。却。疾。延。年。

寒製陵酒妙方

烏頭去皮。細辛 白芷 良姜 官桂 去皮 白木 各十二兩 杏仁 一斤 六兩 去皮 尖 右為末。入。白。細。麵。二。百。斤。攪。勻。用。黃。豆。五。斤。煮。熟。累。冷。同。和。一。處。踏。成。泥。塊。內。用。桑。葉。包。裹。外。用。白。紙。包。裹。當。風。處。置。隨。時。上。酒。七。番。一。次。方。用。米。一。斗。用。此。麵。十二。兩。

○ 壽世保元




此圖專治紅痰晝夜不止骨蒸勞熱聲啞肌瘦氣弱等症若吐血者行七日愈用呵兩鼻孔入三分要與鼻孔一般大緊的不可出氣治紅痰每次用小酒盞香甜入乳雞蛋兩箇新鮮猪胰子油切極細三味攪勻磁器或銀鍾盛砂鍋內蒸熟每早空心服七日吃七次每呵後方吃


壽世保元

卷十卷

十一



此圖專治中滿氣急用呵膈上亦治女人經水不通兼止夢遺膈上未呵之先將射查三厘乳香下錢孩兒茶沒藥黃檀香各一錢共為細末將蜜調作餅一餅貼膈上用生薑一片切如藥餅大半個銅錢厚用斬文丸如豆子大不論丸數燒得差熟得膈內微熱即去藥就呵之先一次用此藥以後不必用



此圖入在病人馬口內進二分治流精晝夜不止初開馬口先用黃蠟條如快頭透開

三樣圖器總論

每呵論病者歲次為呵數每歲下呵要足三百六十下數如病者十歲每轉十呵要三百六十呵有寒宜呵多呵幾呵更好不可缺數凡夫呵氣的男女俱要未呵之先五七日用好酒肉白米飯與食補起他的氣方纔氣完病者得効更速若男子病用童女女人病用童男壯盛無病者呵之若丈夫病用女人呵婦人病用男子呵亦可

神仙接命秘訣

壽世保元

卷十卷

十二

一陰一陽道之體也二弦之氣道之用也三家之無文感於神靈之中而成丹也萬卷丹經俱言三家相會盡矣三五合一之妙藥世間仙者皆不知下羊之處神室黃道中央戊己之門此喻中五即我也真龍去虎真鉛真汞金木水火此四象皆喻陰陽玄牝二物也煉已築基得藥溫養沐浴脫胎神化盡在此二物運用與己一毫不相干即與天地運行日月無二也插真云先把乾坤為鼎器坎將烏兔藥來烹煉二物歸黃道我金丹不鮮生此一詩言盡三家矣十言萬語俱盡三姓會合雖語句不同其理則一而已矣但週天度數分在六十四卦之內以為筌蹄朝進陽火暮退陰符其數內暗合天機也

訣曰此乃仙師口口相傳之秘旨也貴之寶之

一三三五與三七四九行來五十一六十三兮七十五八十七兮九返七若人知此陰陽數便是神仙上天梯

河圖數

三五一都三箇字，東明者實然稱東三南二同成五北一西方四其之
 成已自倍生數五三家相見結嬰兒嬰兒是一合其氣十月胎完合其
 先天度數 ①⑧⑥④② 濕熱火
 ②⑨⑦⑤③① 朝中暮紫

朝進陽火
 戌時居右自十六起至四止，煉已之
 四度數東井西降詩云河車迴旋幾千
 遭正謂此工夫也。


待先天至自十六起至四止就換於左起三至十七止即換於
 在右自二四六八十吹噓不用上藥右邊數盡即換於左從一二五七

壽世保元 卷十卷

九十一行盡工夫吐水而睡其樂通身無礙不到自然而然也即沐浴
 也經云採藥為野戰罷功為沐浴此之謂也自此得藥之後却行溫養
 火候之功十月共六百卦終身外有身矣却行仙出殼之功一日
 十飯不覺飽百自不食不顯飢渴矣秘之秘之此士師工夫待入道聖
 全方可行之

九行之時先令病人仰面平枕口噴熱水或乳香酒一口然後令童女照
 前數吹之吹法先取紅鉛用末破身童女所行經脈以及布擦洗令淨
 或淨花亦可攪下晒乾如用時將藥童便洗下晒乾收起臨用時以童
 便化開滴於童額小頭口邊入鼻內將大頭令童女口噴使力吹之如
 上法病人候吹氣即吹以童女氣忌葱蒜酸辣之物久行之能接補
 延年行後如覺內熱可服入乳即能解之

索箭式



通治

一論鮮諸毒瘡諸病利開敷通治百病此藥其能起死回生當神效
 萬鍊濟人奇効不可盡述凡居家出入與太土動火兵及開廣其
 任宜行兵尤不可無之

神仙太乙紫金丹 一名萬病解毒丹 一名紫金錠 一名玉聖丹

山茨菰 南北震處有之俗名登樓藥其花似紫雲色白上有黑
 之點則苗極細根極長與有海老頭其根相類但葉無毛其
 狀有毛色紫其根洗淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨

壽世保元 卷十卷

川文蛤 一名五倍子 一名洗腐香 一名洗腐香 一名洗腐香
 十金子 一名洗腐香 一名洗腐香 一名洗腐香 一名洗腐香
 紅牙大戟 一名洗腐香 一名洗腐香 一名洗腐香 一名洗腐香
 血者其之根也

右製法宜端午七夕重陽或天月德黃道上吉日修合量藥多寡預
 期數日前主人及醫士俱齋戒沐浴易新潔衣巾於神靜室焚香將
 前五味各為極細末設盥洗盆出入必淨手黃香各用新潔器盛然
 蓋至期夙興主人率醫士焚香陳設藥品拜禱

天地畢用數盆各盛盆配各分兩攪和數百次極力仍重羅兩遍依方
 用糯米濃飲調和於木拍內許數千下極光潤為度每錠一錢每服
 一錠痛勢重者連服通利一兩行無妨用溫粥補性要在齊心至誠
 極其潔淨如法修製毋令喪服熱氣不具足人婦人鷄犬見之
 一切飲食藥毒毒瘡氣惡菌河鮑喫死牛馬駝鹿等諸毒並用涼水

一 臨牀南方毒瘡癰傷入癰癩思不快即磨服一錠或吐或利
一 癰疽發背對口天蛇頭無名疔腫楊梅等一切惡瘡諸風惡疹赤瘡
未破時及痔瘡並用無灰漆酒磨服○及用凉水調塗瘡上日夜各
數次癰瘡立消已潰出膿血者亦減分數

一 陰陽二毒傷寒心悶狂言妄語胸膈壅滯邪毒未盡及瘟疫及喉閉
羅喉風冷水薄荷一小葉研下

一 心氣痛并諸氣用淡酒或淡麥湯磨服

一 赤白痢疾泄瀉肚腹急痛霍亂攪腸沙等症及諸瘵症並用薄荷湯
一 男子婦人急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼氣狂亂失心羊兒猪頭
等風中風中氣口眼喎斜牙關緊急語言蹇澀筋脈牽縮骨節風腫
手脚腰腿周身疼痛行步艱辛諸風諸痛並用淡無灰酒下

一 白蠟瀉水死心頭暖者驚死鬼迷死未隔宿者冷水磨灌下
一 蛇毒風犬一應惡虫傷冷水磨塗傷處另用淡酒磨服

壽世保元

癸集十卷

十五

一 久近瘵疾胸膈時東流水煎桃柳枝湯灌下

一 小兒急慢驚風五疳五痢脚病黃腫癩疹瘡疔牙關緊急並用藥水
薄荷小葉同磨下及搽量兒大小一丸作一二服

一 牙疳酒磨塗及含藥少許良以吞下

一 湯火傷瀉水磨塗傷處

一 打撲傷損炒松節無灰酒下

一 年深日近頭疼太陽疼用酒入薄荷研爛貼花貼太陽穴上
一 諸腫腫脹大麥芽煎湯下

一 婦人女子經水不通紅花煎湯下有孕婦入不可服
一 家患得死弟兄弟五人已死者三方士令服此藥遂各進一錠一下
惡物如膿狀一下死虫如蟻形俱獲生其入遂以此藥廣濟死症無
不驗者

一 女子久患勞瘵為屍虫所噬磨一錠服之一時吐下小虫十餘條後

服蘇合香丸半月遂如常藥品雖不言補而瘦入服之並效誠濟世
衛身之寶也每料費銀不過一錢可救數十人內有山茨菰千金子
皆有子可種仁入君子合以濟入陰功不小

一 牛馬六畜中毒亦以此藥救之

一 方加雄黃透明者三錢歷試治諸瘡癰

萬應剪金丹 天數五地數五金木水火土若入病血氣能救世間苦
青皮三錢 黃連三錢 半夏七錢 烏梅七個 杏仁二十五個
陳皮三錢 木香一兩 枳殼二錢 巴豆三錢
黃丹三錢 乳香 沒藥各一兩 御米五錢 黃蠟二兩 入木中
若為末用黃蠟熔開入藥末和勻如硬加蜜少許為丸如梧桐子大
每服十九湯後下○紅珀甘草湯下○白痢乾姜湯下○赤白痢
椿根白皮湯下○產後痢黃歸湯下○噤口痢蓮肉山藥防風粟米
湯下○久痢下如魚腦濃汁用真入養臟湯加附子一片煎湯下○

壽世保元

癸集一卷

十六

水泄用五苓散煎湯下○霍亂吐瀉姜湯下○口吐清水訶子湯下
○咳嗽桔梗杏仁湯下○頭痛腹痛冷氣沖心下元虛損酒下○氣
痛宿食不消生薑湯下○心痛酒下○腹痛葱白湯下○膈下痛芥
菜湯下○蛇虫寸白虫咬心痛檉柳湯下○時氣井花水下○溲身
壯熱沙糖水下○陽毒傷寒梔子黃連湯下○陰毒傷寒附子棗
湯下○虛熱柴胡竹茹湯下○寒熱烏梅湯下○上焦虛熱太黃湯
下○脾胃虛寒酒下○一切風病升麻湯下○大小便不通水通湯
下○一切瘡癩癰毒湯下○五勞七傷猪胆湯下○打撲傷損酒下
○小兒天吊驚風防已湯下

十仙奪命丹

三稜 義木 木香 沉香 丁香 沒藥
川芎 皂角 苦亭力 巴豆 去壳 去油 各等分

右為細末棗肉為丸如櫻桃大每下九空心凉水送下

- 一 極核氣
- 一 鼓脹滿
- 一 積聚痞結
- 一 癥瘕氣塊
- 一 冷腹痛瀉水下
- 一 冷心疼
- 一 經脈不通
- 一 食積
- 一 氣積
- 一 冷積

絕糧失食肌餒欲死方

飲食者生人之所資。數日之絕。便能致命。本草有不飢之文。而醫方莫言。斯術者。當以其涉在仙奇之境。非庸俗所能遵。故也。遂使荒饑之救。屍橫路良。可哀乎。今略載其易為者。云若晚值奔竄在無人之鄉。及墜。路谷空井深塚之中。四顧絕。便須飲水。服氣。其服法如左。
 開口以舌料上下齒。取津液而咽之。一日得三百六十咽。便佳。漸習乃可。至午自然不飢。三五日小疲。極過此。便漸輕。復有食。十二時六成。若道法恐危逼之地。不能聽。方面及時之早晚。故不論此。若有水者。亦無妨。便與左手貯。祝曰。丞孫更之。賜其之。狼正赤黃行無過城下。諸醫以自

壽世保元

卷集十卷

十七

防畢三叩齒。右手三叩左手。如此三遍。便飲之。後復有孟。器貯水尤佳。亦在辛執右手。以物扣之。如法日服三升。便不復飢。即差。若可得。遊涉之地。周行山澤間者。

但取松柏葉。細切水服。二三日。三升便佳。又掘取白茅根。洗淨切服之。此三物得行。燥石上搗碎。服者。食方寸。辟一日。又有大。長者。取含光明。而熟以水服。盡此。則解十日。亦小豆亦佳。得熟。二。豆黃末。服一二升。辟十日。草中有。木天門。麥門冬。黃精。萎蕤。貝母。或生。或熟。皆可。用。食。樹木上。自耳及。檀。榆。白皮。並可。辟。飢也。

若過。荒年。穀。貴。無以。充。腹。應。須。藥。濟。命。者。取。稻。米。一。斗。淘。汰。之。百。蒸。百。曝。搗。日。一。食。以。水。得。三。十。日。都。止。則。可。終。身。不。食。日。行。三。百。里。又。方。糲。米。一。斗。酒。三。升。漬。之。出。曝。之。又。漬。酒。盡。

金瘡

夫金瘡者。或刀斧鎗劍所傷。出血不止。若出血太多者。外用止血生肌之藥。內用清心補血。而調理之。木抵脉浮細。易治。緊數者。難醫。

- 一治金瘡出血不止
海螵蛸五錢 白龍骨五錢 五倍子一兩 赤石脂一兩 血竭三錢五分 麝香少許
- 右為細末。以冷水洗淨。傳於傷處。百發百中。
- 一治刀傷石磕損。血不止。腫毒不可忍。
用葱一大把。切爛。炒如泥。熱研。乘熱。傅之。如冷。再換。其痛即止。
- 一治傷破手足。血出不止。一時無藥。即以自已小便。淋洗。傷處。痛止。而即愈。
- 一治石傷刀損破者。

壽世保元

卷集十卷

十八

用磚上陳石灰。研細末。傳腫破處。血止。即愈。不出膿。又不痛。神效。

○ 一止血住痛生肌

嫩老鼠尾。未。毛。者。不。拘。韭菜根

右各等分。石臼搗爛。入嫩石灰末於內。搗乾成餅。為度。陰乾。用時。以刀刮。藥末。敷。傷處。忌。婦人。雞。犬。見。之。

○ 一論金鎗所傷。并一切腫瘡。馬斷梁等瘡。

一拾金
用臘月黑牛膽。一箇。裝入石灰四兩。白礬一兩。陰乾。取出。入黃丹炒。

○ 凡一切手足皮膚。偶然出血。不止。或鎗力刺傷。或傷致。血。長。流。不。止。用。手。指。緊。捺。患。處。或。麻。繩。扎。在。半。日。或。一。日。即。住。愈。服。八。物。湯。生。血。氣。為。主。

○一治新傷能收斂金瘡口無疤痕
用劉寄奴為末炒之立效

○一治金瘡前所傷

用松樹皮生為末石灰煨通紅研為末和勻傅之止血收瘡口

○一治毒箭傷破欲死者

用藍汁傅之如無藍用靛青搽瘡口立愈

○一治打破肢體血出不止 中州傳體發傳

用生半夏為末搽患處立止

○一凡刀所傷血不止切勿飲水令血不止而死者多若血不止急以布蘸熱湯盆之冷水浸之即止

○一箭頭入骨肉不能出者

用鵝管石為末撒在四圍箭頭自出

○一治刀斧車傷斫斷手足血出不止痛入骨髓急用手按上捉住

壽世保元

卷十卷

降真香 一兩 錫末 老松香 五錢

右同研極細重便洗淨四圍用藥敷住止血住痛生肌接骨

○一治金瘡腫痛出血不止寒熱口乾此氣虛血無所附而血不歸經也

以補中益氣湯加五味麥門冬之陽氣復而愈

○一治刀斧傷破打破跌破出血不止開口不合用此止血生肌住痛立時見效

金瘡散

銀末

血竭

髮灰

人指甲 燒存性

珍珠 燒存性各等分

右為細末研勻每用搽於患處立效

○一治金針入而針折在肉中

以鼠腦搗如膏塗之○鉄棘竹木諸刺在肉中不出并蛇骨刺入痛方燒死鼠敷之

齒傷

○一論齒咬破指頭痛不可忍久則爛脫手指非手等諸症不難急用人尿使瓶盛之將患指浸在內一宿即愈如爛者用食蛇龜殼燒灰敷之如無龜用龍殼燒灰搽數亦可

中毒

八為百藥所中傷其脈洪大者生微細者死又曰洪大而遲者生微細而數者死大凡百毒所中用甘草豇豆水煎服之能解百毒○下法宜多灌香油最良

○一治信毒水粉山砒霜一切殺人之毒

巴豆殼炒碎十四箇花椒去目五分 甘草五分

右共搗為末凉水化服即時嘔吐如不吐再服其毒盡出如嘔吐不止

壽世保元

卷十卷

用舊壁土滾水泡服立止

○一論中砒霜毒於肉飯中得之者則易治飲酒中得之者則散歸百脈難治若在胃腸作楚可吐在腹中可下急服藥得吐泄則愈

○一中砒霜毒諸方

○一方用豇豆半升細搗去渣以新汲水調服

○一方用入糞汁灌之立愈

○一方用臘月猪苦膽服之立已

○一方用早稻草燒灰以新汲水淋汁絹中濾過吞服下碗毒從下利

○一方刺羊血飲之立效

○一方用黑鉛并水磨服效

○一方用生麻油一盞灌之即愈

○一方用羊血陰乾收貯用井花水調服

○一方用新殺鴨血吃之不用水調

○一 中砒霜水粉毒

用膳禁一分研爛入井水一小盞和勻服之立解

○一 中山砒霜毒將死

用絲瓜根木槿葉研涼水吃了二碗立解

○一 中竹毒水粉山砒霜并小兒難積用葱蒜食之立解

○一 中巴豆毒黃連湯飲之效

○一 中巴豆毒利下不止

乾薑炮 黃連炒

右各等分爲細末每服二錢涼水調服

○一 中米粉毒

陳壁隔法確屑水丸百草霜爲衣水送下

○一 解砒霜毒

硫黃四錢 黃豆粉五錢

壽世保元

癸集一卷

二十一

右爲細末冷水調類類緩服冬月用酒服如肚極痛加

用雞毛探吐吐後用溫溫稀粥四五山不可食飯糕以此救數人效

○一 治誤吞金鎖并銅錢

羊脛骨炭火燒存性爲末每服三錢茶飲送下取下物從大便中出

○一 治誤吞銅錢或金銀等物不能化者

用杏仁濃煎湯服之其物自下

○一 治誤吞針

用雄磁石爲末水丸如櫻桃大吞下即服通利之藥打下水便而出

○昔有一女子將針失嚥下肚諸醫不治用奎豆煮熟同韭菜吃下

針同菜從大便而出

○一 兒誤吞針嚥喉不下死在須臾

用黑砂糖和黃泥爲丸吞下泥粘針中肉大便而下

○一 方用木炭燒紅急搗細末茶湯調服之

○一 方用磁石一塊帶呵之自出

○一 中半夏毒以生薑汁飲之

○一 中杏仁毒搗鹽汁解之

○一 中桐油毒柿餅嚼吃立解

○一 中葱椒閉氣不通新汲水飲之

○一 中藜蘆毒葱薑汁服之解

○一 中啞芙蓉毒或致不省人事用醋醋溫熱入砂糖灌下二碗探之

○一 中草烏小烏附子之毒嘔吐不止以香油灌下立解

○一 方用多年陳壁土泡湯如酒用水調服之

○一 飲饌中毒用黑豆甘草煮汁飲之無中砒毒者亦效

○一 治人或酒後口海或發熱太甚夜間吃水誤食水蛙在腹或至三五

箇月而面黃肌瘦腹脹滿悶諸藥不效

用泥土爲丸香油爲衣丸如蠶豆大每服一百丸或二百丸空心溫

壽世保元

癸集十卷

二十一

水送下其蛙隨土而下日油能泄瀉泥土水蛙之出也故效

○一 治誤食河豚魚毒一時危困倉卒無藥最能殺入用香油多灌之毒

出盡即瘥○又法用日葵末以沸湯調灌之立解

○一 治誤吞田螺便毒吞下死在須臾

用鴨一隻以水灌入口中少頃將鴨倒懸令出涎水與病人服之其

骨即化

○一 治誤食鱸鱉蝦蟇毒

用豆豉下太合煎及水浸令豉水濃溫服之此二物令人大小便秘

臍下痛有致死者

○一 治誤食蠟中毒黃連蘇飲二兩蒸即解

○一 方以生薑汁或乾蒜汁服俱效

○一 治疔中六畜肉毒用犀角濃磨水服二碗良

○一 治誤中斑貓毒者黑豆汁飲之又宜澤蘭葉搗汁飲之

一諸骨微咳 池素水傳
黃蠟為丸如棗大小將溫茶飽服多多為佳然暖服三九常時諸骨
或吐或下如神

一雞骨散

用香油煎滾待溫服之即吐出

一諸般骨痛發自喉喉吞吐不得撮攪食下即化如無穢穢肉凡孩
燒灰水調下亦化

邪祟

脈來乍大乍小乍長乍短為邪祟脈又寸尺有脈關中無脈為鬼脈
鬼脈之得病之初便驚悸或發狂木鬱無脈切太極之下寸口之上在
脈者皆不用服藥宜符咒治之或從俗送鬼亦可
秦承祖灸鬼法

壽世保元

癸集一卷

二十五

一治一切驚悸癆瘵等症
以膏者兩手大指指用細麻繩扎縛定以木艾炷置於其中兩介甲
及兩骨節肉肉四處着火一處不着即不效灸七壯神效

一論狐鬼精迷入不問男女被他感惑直傳至死無法可治者
其狐鬼精不入用山陰戶一扇其入即昏迷不省或男子求陽物上
一扇即昏迷用真桐油抹在陰戶陽物上其狐即大噴而去如不可
言殺之

一論婦人與鬼魅交通藉屍屍疫此方最效

辟邪丹

虎頭骨二兩 朱砂

雄黃

雌黃

鬼白

皂莢

蘇黃仁

鬼箭

拔毒膏各一兩

右為寺燒蜜為丸如彈子大藥盛二九男左女右繫臂上或常病人
內燒之一切鬼邪不勝近耳

一客者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣逆
人心胸如不即治亦能殺入搗墨水和服一錢匕

一飛尸者遊走皮膚穿隙附發刺痛變作無常
一遁尸者附骨入肉攻擊血脈發不可得近見屍現則哀哭便作
一風尸者淫淫因未不知痛之所在每發皆沉得風雪便作
一沉尸者纏骨結氣衝心脇每發絞切遇寒冷便作
一尸注者舉身沉重精神錯亂覺昏厥每節氣至則輒至大惡

右俱宜服蘇合香丸 左見諸氣

一論中惡客忤心腹脹滿痛如錐刀刺痛氣急口禁俯尸卒死皆以
熱湯或酒送下若不下扶頭起灌令下喉須臾瘥未與三九腹當
鳴轉吐下便愈若口已噤亦須扶頭灌之藥入喉即瘥忌食豬肉
冷水肥膩之物

備急丹

壽世保元

癸集十卷

二十六

大黃

巴豆去壳油

乾薑各等分

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服三九量老幼虛實用之

一論卒暴驚風疔鬼心腹脹痛如錐刺下血便死不知入膏及吐膿齒
睡不覺者諸惡毒氣病方此是漢文帝時太倉公淳于意方故名
倉公散

白礬生

皂莢

雄黃

拔毒膏各等分

右四味各等分為細末每用如馬大納竹管中吹入病人鼻內待覺則
氣通便活若未曉更吹之以餅為度能起死回生 一方治急疔氣
纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事名如聖散加蝎梢七
枚吹鼻吐痰

一論治然鬼捕鬼病人不省氣鬼方
用鹿角屑搗末以水調方寸匕即言實也
一論疔惡屍毒氣入無人所居之室及造天地鬼神壇場或來時

絕面赤無語者名曰尸疰亦曰鬼疰即中惡之謂也延藥復死宜移屍入東首使主人焚香北面禮拜之更行後火醋薰鼻法則可復甦否則七竅逆血而死

一論凡感臭穢瘴毒者名曰中惡不治即死宜燒灰火下杓以醋沃之冷患人鼻受醋氣則可復甦既蘇以蘆香正氣散服之方見雜錄

一凡男婦交感而死在男子名曰脫陽在女子名曰脫陰男子雖死陽事猶然不萎女子雖死陰部猶然不閉亦有夢中脫死者其陽必舉陰必泄尸容有喜色為可辨也皆在不救

一論初到客舍館驛及久無人居冷房睡中為鬼物所厲但聞其人吃吃作聲便令入吐喚如不醒可用

牛黃

雄黃各一錢 朱砂五分

右共為細末務用一錢床下燒一錢用酒灌之

壽世保元

疾集十卷

二十七

丹法治婦人如癩或作或輟恍惚不省人事一日略甦診視問忽開床上有香氣繼又無所知識丹溪曰氣因血虛亦從而虛邪因虛入理或有之遂以秦承祖灸鬼法灸之病者哀告曰我自去我自去則愈○一論凡官舍久無人到積濕容易侵入預製此藥之可遠此害極宜暑月燒之以却瘴疫并散邪氣

大倉公辟瘟丹

- | | | | | |
|------|----|----|----|-------|
| 茅朮一斤 | 台烏 | 黃連 | 羌活 | 白朮各半斤 |
| 川芎 | 草烏 | 細辛 | 紫草 | 獨活 |
| 防風 | 甘草 | 藥本 | 白芷 | 香附 |
| 當歸 | 荆芥 | 天麻 | 官桂 | 甘松 |
| 乾薑 | 三奈 | 麻黃 | 牙皂 | 芍藥各四兩 |
| 麝香 | | | | |
- 右為末紅棗肉為丸如彈子大每用一丸燒之

一空中惡損汗灌鼻中又宜慈心黃刺鼻乳中血出良

論崇脈

崇脈面色黯慘或斜視如淫凡尿乍大乍小乍浮乍沉乍長乍短乍有乍無或錯雜不倫或刮駛暴至或沉伏或雙弦或釣啄或滾運或橫阻或促散或尺部大於寸關或關部大於尺寸皆是崇崇得之刮駛鈎象多見於脾洪運滾多見於肝橫隔促散多見於心肺木抵崇脈心脈虛散肝脈洪盛尤可驗焉蓋心藏神肝藏魂心虛則驚傷昏迷神不守舍而神氣得以入其魂耳

補遺

一治客忤卒死

提魂湯

麻黃三兩去節

杏仁七十箇去皮尖甘草一兩

右剉水二碗煎至一碗去渣灌之通治諸卒死

壽世保元

疾集十卷

二十八

一男子被鬼擊身有青痕作痛者

金銀花煎湯飲之即愈本草謂此藥大治五種飛尸此其驗也

五絕

- 一曰自縊
- 二曰墻壁壓
- 三曰溺水
- 四曰壓屍
- 五曰凍死

凡五絕皆以等夏為末冷水為丸如豆大納鼻中愈心溫者下日可治○又治卒死並夏末如木豆大吹鼻中

扁鵲治產後暈絕半夏為末冷水丸如豆大納鼻孔中即已

一救自縊死

凡自縊高懸者徐上抱住解繩不得絕斷上下步被放倒微攪其喉龍以手掩其口鼻勿令透氣一人以脚踏其兩肩以手挽其頭髮常令急勿使緩縱一人以手摩其胸臆屈伸其手足若已僵直漸已強在

之。一人以脚裹衣抵住其門勿令泄氣又以竹管吹其兩耳候氣從口出呼吸眼開仍引按不住須更以少姜湯或清粥灌之喉潤漸漸能嚥乃止此法自且至暮雞已冷可活自暮至且陰氣盛為難救心下微溫者雖下日已上亦可活百發百中。○丁法以半夏末吹鼻中。○丁治自縊氣已脫極重者只灸湧泉穴男左女右脚灸三壯即活。○丁法男用雄雞文用雞雞刺雞冠血滴入口中即活。

○一救水瀕死者。○一溺死者先以刀割開溺者口橫放筋一集令其牙齦之便可出水又令一健夫屈兩足着肩以上背相貼倒懸之而行令出其水仍先取燥土或壁土置地上以溺者仰臥其上更以土覆之止露口眼自然水氣吸入土中其人即甦仍急用竹管各於口耳鼻勝門內更吹吹之令上下氣相通又用半夏末搗其鼻又用皂角末綿裹塞其門須臾出水即活。○丁方艾炙臍中即活。

壽世保元

癸集十卷

二十一

○一凍死及冬月落水微有氣者脫去濕衣隨解活人熱衣包暖用米炒熱囊盛熨心上冷即換之或炒薑皮亦可候身溫暖目開氣回後以溫酒或姜湯粥飲灌之若先將火炙必死。○一用雄黃酒硝各等分為末磨兩眼角。

○一墜死及墜跌死心頭溫者急扶坐起將手提其髮用半夏末吹入鼻內少甦以生薑汁同香油打勻灌之次取藥服如無藥以小便灌之。○一取東邊桃柳枝各七寸煎湯灌下。○一中惡魔死者不得近前呼喚但唾其面不醒即咬脚跟及拇指略移動臥處徐徐喚之原無靈不可點燈照待少甦用皂角末吹鼻取嚏或用韭汁灌鼻內亦可。

井塚

○一凡夏月不可淘井井中及深塚中皆有伏暑氣入則令人鬱悶殺人

如欲入必須先以雞鴨鴨鳥毛投之直下至底則無伏氣毛若徘徊不下則有毒氣也亦有納生六畜等物其中若有毒其物即死若或不取而入當先以酒數升先洒井塚中四邊畔定少時然後可入若覺有此氣衝欲死者速取其井中水洒入面令飲之又以灌其頭及與體即活若無水取他水用之。

再聖毒母

○又方如已中毒以水噴其面并令水調雄黃末一二錢入水噴之若轉筋入腹痛欲死者使四人捉手足灸臍左邊二寸十四壯又生薑一片碎破酒五盞煮濃頓服又醋煮衣絮令微溫裹轉筋處又濃煮薑湯通毛洗凍疾手足麻脚肋間即甦。

壽世保元

癸集十卷

三十一

夫毒者有數種皆妖魅感之氣而毒人也令人心腹攪動痛如有物咬血肉皆爛若不即治食入五臟則死此病有緩有急急者十數日便死緩者延引歲月遊走腹內氣力漸復而即死直發則心腹痛煩燥而助申之物變為虫漸食臟腑則死矣欲救之法令人吐申者木括脈數而細死浮緩而疾者生。

晉福散

○一治毒毒方

右為末每服三錢新汲水調下即吐也。未吐再服必吐。

○一論解一切毒并毒如被狐鼠毒鼠毒毒毒河豚毒疫死牛馬膿肉毒或蛇虫毒人所傷又治一切惡瘡諸風癩疹及無名腫毒隨手取效萬無一失凡人出入不可無此藥。

萬病解毒丸又名神仙太乙靈金丹方見通雅。○凡中藥毒不論年月遠近但煮一雞卵去殼以小銀針插入其中供食入口下飯之頃取銀針俱黑即為中毒。

嚼生大豆不覺醒者蠶豆皮服爛者蠶豆白蓉味甘不甜者蠶豆水碗申沉足蠶浮非蠶

一辟蠱用葶藶果俗名地菜須用江南所產大者切晒為末常隨身每以白湯調下二錢傳聞下蠱之家知有此物便不敢使其術矣

一治百蠱不愈用白雞鴨血灌入口中良

一解毒毒蠱毒由蛇諸毒

太甘草節以真麻油浸年歲愈多愈妙取甘草嚼或水煎服神效

仙傳解毒蠱法 凡入蠱毒人家方入先開念咒三遍或七遍云父為頭頭蟲母為羅蛇女眷屬七千人吾盡識得汝

右入門先開通蠱毒福舉眼從左手直上駝屋椽下過却低頭如有茶酒食物來即左手潛入衣服內搜取陰毛一莖於盤內稱歸就土如前開念咒三遍如有藥盤上自有虫物出來却將毛罽之方知本主自中又方垢膩散取白礬一塊冷病人咀之如蟻齶甜即是蠱毒乃用

壽世保元 癸集一卷 三十一 枕內垢膩不拘多少俟即吐出惡物也

救荒辟穀門

辟穀仙方

黑豆五升淨洗後蒸三遍晒乾去皮

水麻仁三升湯浸漚漚出晒乾膠水拌晒去皮淘淨三遍碾搗下豆黃右為末用糯米粥合和成團如拳大入籠蒸從夜至子住火至寅取出於磁器內盛貯不令風乾每服一二團以飽為度不得食一切物

第一頓七日不食第二頓七七日不食第三頓三百日不食渴即研火麻子漿飲更滋潤臟腑容顏勝常若果重皮物用葵子三合杵碎而湯飲開導胃脫以待沖和無損

救荒代糧丸

黑豆去皮一升貫衆一兩 甘草一兩 白茯苓去皮五錢 吳木五錢 砂仁五錢

壽世保元

癸集一卷

三十二

右切碎用米五升同豆熬熟文武火直至米熟去各藥取豆湯丸如雞頭子大將瓦瓶密封每嚼一丸則任食苗葉可以終日飽飽無草殊木素所不識亦無毒甘甜與進飯糧亦同

防儉餅

栗子紅果胡桃柿餅四果去核皮於罐內下處搗爛揉勻於作厚餅晒乾收之以防荒儉之用○余見一僧化緣但有所得即置此四果搗爛印作磚塊紙包晒乾收登櫃內下兩月晒一次積久至多砌作一窩人莫能知後遇飢荒人皆逃竄而僧獨留于寺中食此亦嘗動一富翁製此成牆以防飢饉行以賑濟飢人此真大之陰功也

辟穀散

山藥 蓮肉去心皮炙實去壳 白扁豆去壳炒 菜豆去壳炒 薏苡仁去壳小茴炒四兩 白梗米炒黃二升 右共磨為細末每五錢滾白湯調服或用白湯調蒸糕食之亦妙

山藥 蓮肉去心皮炙實去壳 白扁豆去壳炒 菜豆去壳炒 薏苡仁去壳小茴炒四兩 白梗米炒黃二升

右共磨為細末每五錢滾白湯調服或用白湯調蒸糕食之亦妙

凡遠行水火不便或修行人欲省錢用黃芪赤芍各三錢
風半錢烏頭一錢炮於石臼內搗一子許煉蜜丸如彈子大惡行遠路
飽乾飯一頓服一丸可行五百里服一丸可行一千里
長生不老辟穀丹

雲南雪白大茯苓去黑皮令淨定粉黃丹白松脂白沙蜜黃蠟各二兩
朱砂五錢金箔二十個水銀三錢先將蜜蠟松脂於淨磁碗內熔為汁
傾藥在內以木匙攪勻候溫就木丸如指頭大用木銀為衣有死水銀
法先洗手淨用木銀三錢點在手心內以指頭研如泥見手心青黃
藥三五九擦擦後以金箔沙置攤碗內以藥丸在內搖動使金箔沙
藥上密器收貯服時用乳香末半錢水三小盞煎湯溫送下不
後第百發即以麩和白茯苓末焙成餅食半飽已後藥石丹出亦
不飢渴又則交過五臟養性壽長生不死諸人得服並無所忌使人
添氣力悅顏色身輕體健百病皆除救世寶方濟世之良方也

壽世保元 卷十卷 二十三

妙法其間若欲依便不功事但七日之內吃藥必隨下至五月
在月田永不出矣服時面東背西念咒一遍吹在藥上如此七遍以
乳香湯送下呪曰

天清地寧至神至靈三皇助我六甲護形去除百病使我長生清淨淨
心為甲庚左招南斗右招七星五方立化與天長生吾奉太上老君
急急如律令

養元辟穀丹 治五臟消百病和脾胃補虛損固元氣填精補髓能令瘦者
肥老者壯常服為佳

用黃糖牛肉不拘多少去筋膜切作片子太片用河水洗數遍令血味
盡仍用河水浸一宿次日再洗一二遍水洗為度用無灰好酒入瓦甌
內黃泥封固桑柴文武火煮一夜取出焙乾為末如黃沙色者佳無黑
無用每年末丁斤加入後藥二斤為則
人參 四兩 白朮 去土炒 白茯苓 去皮為末 桑寄生 仁 炒

懷山藥 水瀝切片同煎 蓮肉 炒去心
小茴香 炒四兩 乾姜 炒四兩 白扁豆 炒
青鹽 四兩 甘草 四兩 烏梅肉 二兩
川椒 去目炒二兩

右藥為末與米粉牛末和勻外用小紅藥五斤陳年薄酒五斤
極爛去核加煉蜜二斤半共和為丸如彈子大每服二九不
湯水吞下嚼吃一日服三五次永不飢按此方實王道之妙用平時
預容荒亂之時可以避難濟飢雖一兩月不食不損胃中元氣
寶之如渴只飲冷水

灸法門

一定分寸取本入男左女右手中指相屈如環即以神心從中納
壽世保元 卷十卷 二十四

量兩頭橫紋角即截斷為一寸用之不誤最為的當

一點穴法皆要正四維無使歪斜灸時恐八不正徒壞好肉矣若
卧立並不得泰縮坐點則坐灸則點則灸立點則灸反此下動
則不得其真穴矣然下火則灸先陽後陰先上後下先左後右先少
後多宜審用之

一論艾性本小經云九氣欲艾性根下廣三分若不及三分使水氣不
得透病未愈則難愈是性欲天惟頭與四肢欲小耳但去風邪而已
小兒及肺弱者如麥大

一點艾火古忌松柏檜榆桑棗竹木木切宜避之今用清麻油點燈
傳火於艾葉點發其艾是也兼滋潤灸瘡至愈仍不疼痛用蠟燭更
佳

一着艾時宜正巳午時方可用火若午後未時氣盛不點火并失
傷飽憂愁恐怒罵詈喜笑天陰雨下風雷閃電人神血忌並皆宜

下支時必先以蒜切片擦穴上然後安艾不然則動止之間其艾必落矣。

一着艾火痛不可忍預先以手指緊其穴處或以鐵物壓之即止。

一着艾有眩暈者神氣虛也仍以冷物壓艾處其量自懸再得良人以稀粥或姜湯與飲之以壯其神復如前法以終其事。

一着艾火後須要發所患即瘥不得瘥發其疾不愈若見灸瘥不發者用故鞋底灸令熱慰之三日而發仍以小雞糞魚豆腐等熱毒之物與食之謂以毒攻其瘥必發若氣血衰弱者調之以藥餌。

一灸後瘥者未發宜烏桕樹葉貼之。

一灸後切宜避風冷節飲酒戒房事速七情可擇幽靜之居養之為要。

一灸瘥痛不止用柏葉芙蓉葉端午時採陰干為細末每遇灸瘥痛蓋于脫了水調少許如膏貼紙上貼之即愈。

一灸瘥洗法以葱艾薄荷煎水溫洗令逐風邪。

壽世保元

彙集十卷

三十五

一灸瘥已發黑爛疼痛用桃枝柳枝胡荽黃連煎水溫洗。

一灸瘥出血用百草霜為末搽之即止。

一灸瘥已發可用膏藥貼之。一二日。一易使瘥膿出多而疾除也。必用真麻油入治病之藥或祛風除濕養氣滋血療損補虛之藥。瘥入之為妙。

取穴法

脊骨二十下節大椎三節至尾骶共二十四節。

合谷一名虎口 手大指次指岐骨間陷中 手陽明大腸脈所過為原處。

實按法

曲池 肘外輔骨屈肘兩骨中以手拱胸取之 手陽明大腸脈所入為合谷。

頰車 下名橋關 耳下曲頰端近前陷中開口有空。

肺俞 項後第三椎下兩傍相去各一寸五分千金對乳引繩度之。

權以搭手左取右右取左當中指末是正坐取之。

心俞 五椎下兩旁相去各一寸五分正坐取之。

肝俞 九椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之。

脾俞 十一椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之。

腎俞 十四椎下兩旁相去脊中各一寸五分與臍平正坐取之。

膏肓俞 四椎下近五椎上兩旁相去脊中各三寸正坐曲脊伸兩手以臂着膝前令端直手大指與膝頭齊以物支肘毋令搖動取之。

銅人灸百壯多至五百壯如病人已困不能正坐當令側卧上唇令取穴灸之。又當灸臍下氣海丹田關元中極四穴中取一穴又灸足三里以引火氣。

腰俞 二十一椎節下間宛宛中以拱身伏地舒身兩手相重支額從四膝後乃取其穴。

百會 前頂後一寸五分頂中尖旋毛中可容豆直兩耳尖。

壽世保元

彙集十卷

三十六

中腕 膈上四寸居心蔽骨與膈之中胃之募手太陽少陽足陽明任脈之會上紀者中腕也。

丹田 膈下二寸三焦募也。

關元 膈下三寸小腸之募足三陰任脈之會下紀者關元也。

氣海 膈下一寸半宛宛中男子生氣之海。

三里 膝下三寸胫骨外廉木筋內宛宛中兩肌肉分間舉足取之極重按之則跌上動脈止矣。

灸諸病法

一論中風口噤不開牙關緊閉及中風皆效。

人中 一穴 頰車 二穴 三里 二穴 合谷 二穴

一論中惡風心煩悶毒欲死秘穴立效。

取兩足大指下橫紋隨年壯灸之。

一論中風口噤不開

機閱二穴在耳下八分微前至五壯即語。

一論風中血脈則口眼喎斜。○中腑則肢體廢。○中臟則性命危。九治莫如發表調氣血治痰諸法。然可扶持。若若救全功。火攻為良也。

論風中血脈口眼喎斜。

聽會二穴在耳前陷中張口得之有穴動處應手。

頰車二穴在耳下三韭葉許陷者宛宛中開口得之。

地倉二穴在口吻傍四分近下有脈微動者是。

九噲向右者為左邊脈中風而緩也。宜灸左噲陷中二十七壯。噲向左者為右邊中風而緩也。宜灸右噲陷中二十七壯。

一論風中腕手足不遂等症。

百會一穴在頂中旋毛中。

肩髃二穴在肩髃陷中。取之。

壽世保元

彙集十卷

三七

曲池二穴在肘外側肘骨屈伸曲骨中以手撻胸取之。紋頭陷中是。

風市二穴在膝外兩筋骨平立。骨下取手著屈中指去處宛宛中。

三里二穴在膝下三寸脛骨外太筋內筋骨之間陷者宛宛中。

絕骨二穴在足外踝上三寸動脈中。

九覺手足痒或不仁或痛良火乃已。此將已此中腑之候宜灸此七穴。病在左則灸右在右則灸左。

一論風中臟氣寒凝上。不語昏危者下火立效。

百會一穴在頂中旋毛中。

風池二穴在頭額後髮際陷中。

大椎一穴在項後第七椎上陷者是。

肩井二穴在肩髃上陷者缺盆上入骨前一寸半以三指按之。其其中。

曲池二穴同前。

間使二穴在掌後三寸兩筋間。

足三里二穴同前。

九覺心中憤亂神思不怡或手足麻痺。此將中臟之候。不問是風與氣可速灸此七穴。但依次第灸之。各五七壯。日別灸之。隨年壯止。如素有人尤須留意。此灸法可保無虞。此法能灸卒死。九人風發強忍怕痛不肯灸。忽然卒死。謂是何病。風入臟故也。

一論暴啞不能言者。

速灸臍下四寸。并小便陰毛際骨陷中各灸一七壯。重者二十七壯。男左女右手足中指頭盡處各灸二七壯神效。

一論癱瘓不拘五般。

以兩手中指相合灸之神效。

一治癰疾。

晝發灸陽蹻申脈。在外踝下赤白肉際。

夜發灸陰蹻照海。在內踝下赤白肉際。各二十七壯。

壽世保元

彙集一卷

三十一

一治癱瘓邪及癱狂諸般。皆治不瘳者。

以兩手并兩足大姆指用軟繩急繞之。灸三壯。要四處者。半在四半在兩要。四處盡燒。一處不燒。則不效矣。此法神效。

一論癰疽。秘法。九夜夢驚死者。皆由平日神氣不足。致使睡時神不守舍。魂不依寐。凡癰者。切不可執燈照之。但向暗中呼其名。即醒。又一法。驚人足踵及大指。甲側。即醒。又法。用牙皂末吹入鼻中。亦妙。若經一二更者。亦可灸之。又一法。灸大敦穴。七壯。即醒。

一論婦人月家得此。不時發熱。手足浮腫。東如鷄爪。疼痛。取左右臍骨兩傍各有一小窩。共四穴。俗謂之鬼眼。各灸三壯。即愈。

一治陰毒腹痛。脈欲絕者。

先以男左女右手足中指頭盡處。各灸三壯。又灸臍下一寸五分。名氣海穴。三寸名關元穴。各灸七壯。極效。

一論真陰症。四肢厥冷。腹痛如錐。脹急。服大附姜桂。如冰。此中為真陰。

之甚皆急灸臍上二穴臍下一穴臍左右兩穴每七壯則効
一論中寒陰症神法但手足溫暖脉不至人事無汗惡有汗即生不暖
不醒者死

氣海穴在臍下二寸五分丹田在臍下二寸關元在臍下一寸艾灸
二十七壯

一論哮喘神法

胸中兩邊各醫中二穴百會穴用艾灸之立已

一論霍亂吐利及傷寒急患逆運法不絕

乳根在正直氣下空下指許骨間陷中婦人則居乳頭後之乳頭齊
處是穴艾炷如小麥大灸三壯男左女右火到肌即瘥只是三壯不
可多灸

一論呢逆即欬逆

灸氣海三五壯氣海直臍下二寸半

詩世保元

彙集一卷

三十九

一論灸瘧法無問新久

令病人仰臥以線量兩乳中間折其半從乳比至下頭盡處其穴男
左女右灸之 式樣 〇 〇 〇

一治瘧疾神

冷病人既足於平正處並脚立用繩一條自脚板周圍截斷却於項
前般過背上一兩繩頭盡處脊骨中是穴先點記待將發急以艾灸之

二十七壯其寒熱自止此法曾遇至人傳授妙不可言名曰背脊穴也

一論腹中有積及木便閉結心腹諸痛或腸鳴泄瀉

以巴豆肉搗為餅填臍中灸三壯可至百壯以効為度

一論灸遠年咳嗽不愈者

將病人乳上大約離一指頭者其低陷之處與乳直對不偏在此名
為直背穴如婦人即按其乳頭直向上看其乳頭所到之處即灸之

骨穴之地位灸艾三柱其艾只可如赤豆大男灸左女灸右不可在左

錯其嗽即愈如不愈則其病再不可治矣

一論灸勞虫於癸亥日灸兩腰眼低陷中之穴每穴灸艾七炷若多十
一炷尤妙先隔二日前點穴方醫至半夜子時一交癸亥日朔便灸

其虫俱從大便中出即用艾炷之藥於江河中如虫有黑者則其
在內已傷人腎臟矣此不可治虫宜謹避瘴有數虫如蜈蚣如小蛇

如蝦蟆如馬尾如亂絲如爛髮如蒼蠅如壁油虫上此下白形疑足
細而有口或如白蟻孔中皆出此皆勞瘵根毒若傳至三人則如

人形如鬼狀

一論四花穴治骨蒸勞熱以稍釋心量口縫如何開折其多少以如此
長裁紙四方當剪小孔別用長稍桿踏脚下前取時大指為正後

取脚曲脚橫文中為止斷了却還在結喉下垂向背後有稍為正處
即以前小孔紙當中安灸為四花灸紙角也四灸七壯此四穴正合

太陽行背二行高前膈會四穴

一論瘧疾三五壯即愈有灸至三十壯百愈者

一論小兒大人吐瀉日久垂危者

天樞二穴在臍傍各開二寸是氣海一穴在臍下二寸半

中腕一穴在臍上四寸

一論霍亂已死而腹中尚有暖氣者

以鹽納臍中以艾灸不計其數

一論霍亂垂危

男左女右手全握一條伸手放在地上取骨一版置肩上有骨名肩

井穴灸三壯即効

一論霍亂腹痛神効

霍亂二穴在臍旁二寸在兩臍上肘骨骨間以手按指換換骨

臍上不可放艾炷至百壯為佳

一論霍亂神効

臍上不可放艾炷至百壯為佳

一論霍亂神効

臍上不可放艾炷至百壯為佳

一論霍亂神効

臍上不可放艾炷至百壯為佳

詩世保元

彙集十卷

四十一

一論 膻中一穴在膺部中行兩乳中間陷中仰肘取之灸七壯禁食

三里二穴在膝下三寸筋外廉兩筋間灸七壯

一論 頭痛連齒時發時止連年不愈謂之厥逆頭痛

曲差二穴在耳上對耳摺前正尖上可灸五七壯左痛灸左右痛灸

一論 牙疼 隨左右所患肩大微近後骨縫中小舉臂取之當骨縫陷

中灸五壯灸畢項大痛良以乃完永不發

一論 牙痛百藥不效

用艾炷如麥大灸兩耳當門尖上三壯立止

一論 治心疼神法

兩手肘後陷處酸痛是穴先用香油半鍾重湯煮溫服即用艾入水

粉揉爛為炷每處灸五壯其痛立止

一論 偏墜氣痛妙法

草麻子一歲一粒去皮研爛貼項項上却令患人仰臥待兩膝

壽世保元

卷一

四十一

相對以帶子綁住中指於兩指合縫處艾炷粒大灸七壯即時止

去神效

一論 蠱毒及瘡塊

中腕一穴或兩分三寸石關二穴

分水一穴左右耳門穴

再用線比患人五指指之長作朝圓貫以銅錢調下

脊骨處

一論 瘡癤妙法

以雙線繫開元舊錢下小懸於頸上道中處所錢胸前直垂而下孔

對臍為卒却將項上之線懸於喉上向背垂下至錢孔對臍而止

用墨點孔之中再錢之兩邊點處各灸一火至十餘壯更服他藥瘡

積即消其效甚速

一論 黃疸

病人養黃自上下數至下第十三椎下兩旁各量一寸灸三七壯功

一論 血良法

項後髮際兩筋間宛宛中灸三壯立止凡吐血自此入腦注鼻皆妙

法也

一論 秘法

急用線一條纏足小指左孔取左右孔取右俱出則俱聽弱於指頭

上灸三壯如兼耳大若切多時不止者屈手大指就骨節末上灸各

三壯左取右右取左俱切則俱取

一論 下血不止秘法

命門一穴用錢一條自地至心截斷令患人平上取之即向後自

地比至脊盡處是穴又須按其突處瘰癧亦可灸不痛則不灸也灸

可七壯止永斷根不發

一論 脫肛秘法

百會一穴尾髓一穴各灸三壯炷如小麥大當正午時用桃柳枝煎

壽世保元

卷一

四十二

湯浴淨灸之神效

一論 灸腸風膿毒便血久不止者

以患人平立量脊骨與臍平處權上灸七壯或年深者更於椎上兩

旁各灸一寸灸七壯無不除根

一論 痔疾先以柳枝濃煎湯洗痔便艾灸其上連灸三五壯忽覺下道

氣轉入腸中因大轉先止後撤

○灸諸瘡法

一論 一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不痛者灸至痛

其毒隨火而散蓋火以暢達拔引毒毒比從治之法也有回生之功

一論 蒜灸法用大蒜頭去皮切三文錢厚灸瘡上用艾炷於蒜上灸之

三壯換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其太勢不能為奇如瘡大

用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換如不痛或不作膿或不

起發或陰瘡尤宜多灸而仍不痛不作膿不起發者不治此氣血虛

之種也

一論腦項後疽一名未疽俗名對口

男左女右脚中指下俯面第三紋正中用好斷艾灸七壯

一論發背癰疽初起未破

用雞卵半枚蓋瘡上四圍用麵餅敷住上用艾灸印亮米上以病人覺痒成泡為度其汗出即愈

一灸疔瘡

用大蒜爛搗成膏塗疔四圍留瘡頂以艾灸多之為度其瘡難愈者多灸百餘壯無不愈者又灸疔蛇蝎蜈蚣咬瘡瘰癧瘰癧

一論灸痔神法

用蒜薄其其虫圓而痛去足將此虫合放痔上用艾灸灸七壯立消

一論痔漏腫痛膿水粘滯不可忍

用艾炷如梧桐子大灸尾細骨尖上七壯全愈

醫世保元

卷一

四十二

一論瘰癧已破未破以男左女右手搦拳後紋畫處距耳大艾炷灸三壯三四日已

一論瘰癧用養榮湯其瘰皆消惟一二不消者用額蝦蟆一介剝取皮蓋瘰癧上用艾炷灸七壯立消

一治兩脚俱是疔瘡腫毒骨痛用獨蒜切片鋪放痛腫處每蒜一片用艾炷二壯去蒜再換再灸至愈為功

一論赤白汗斑神法

或以針刺之出血亦已宜灸來白穴先於兩乳頭上塗毒令兩手直伸夾之染黑處即是穴也

一論破傷風及風犬咬傷此方最易而效

用胡桃壳半個填稠人糞滿仍用槐白皮襯托傷處用艾炷之若過身汗出其人太困則愈速年者將傷處如前灸之亦愈

一論瘋狗咬傷并治瘰癧

用穿山甲剉黃土炒熟艾

班猫

右為末和勻作炷如黃豆大每一齒傷處用烏柏葉貼瘡口灸十口壯如無烏柏葉以乾入糞薄貼之

一人被火打死或腸死灸百會穴在頭頂中艾炷三壯立甦

一論婦人難產及胎衣不下

急於產母右脚小指尖頭上灸三壯如小麥大立產

一論婦人無子及經生子久不再孕及懷孕不成者

以女人右手中指飾艾一寸反指向上量之用草丁條量九寸舒足仰卧所量草自臍心直垂下至草盡處以筆點定此不是穴却以原草平指以指處橫安前點處其草兩頭是穴按之有動脈灸三壯如筋抄大神驗

一論小兒初生三四日至七日內口噤不吮乳多啼者是客風中於脾

循流至心脾二經速使舌強唇撮

醫世保元

卷一

四十四

灸承漿穴取法在唇後下宛宛中是穴灸額車一穴各七壯在耳下曲頰骨後是穴

一論小兒腦風以艾炷臍下即治

又方用線比兩口自折中以墨記之放臍中四下灸七壯又用針針七個刺兩眉口圓圍下百餘下又用房四角草為艾將小兒在太左上右各轉三遭令出汗即已

一論小兒慢驚慢脾危症藥力不到者但看兩脚面中間陷處有大衝

脈即灸百會穴其穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖折中在頭之中心端正旋毛處是也如有雙旋及旋毛不正者非艾炷約小麥許但三五壯而止灸後仍與醒脾散等補藥

一論小兒雀目夜不見物灸手太指甲後一寸肉臍橫艾頭白肉際各

丁柱如小麥大

一論小兒吼氣

無名指頭灸之良也

一論小兒脫肛漏血每斷臍胸振痛不可忍者百會三壯。

一論小兒驚風

男左乳黑肉上女右乳黑肉上週歲灸三壯二歲兒灸五七壯神效。

一灸蛇毒

人被蛇所傷用艾當穴處灸之引去其毒即差。

益府秘傳太乙真人董麻法能補諸虛百病益壽延年。

- 麝香五分為末入膏內後用藥末敷麝香上將麝香團圍在上用槐
- 龍骨 虎骨 附子 南木香 雄黃
- 朱砂 乳香 沒藥 丁香 胡椒 夜明沙
- 五靈脂 小茴 兩頭尖 青鹽

壽世保元

彙集一卷

四二

右各等分共為細末入膏中用艾灸之

夫肺為五臟之華蓋聲音之所出入皮毛以之滋潤腎水由之而生脈理不密則為風寒暑濕乘虛而入矣有七情常調抑之有鬱結此肺利之或不密而傷於辛燥之藥則氣不散滯於肺中多生粘痰而喘急咳嗽或傷於房勞飲食不節致使吐血咳血作寒作潮頭暈體倦精神怯弱飲食不進等症醫者治之無不則必用此堅治其效可勝言哉用麝香以引透諸藥入五臟六腑之中天無不入小無不至

丁香香堅守其胃助飲食之進香攝入腎以實其子使肺無漏泄夜明沙以補其血散內傷之有餘乃伏翼之糞食蚊子蓋取其早食雨露夜飲入血而得天入之氣故能補五勞七傷之病非此不能達也乳香沒藥木香小茴升降其氣不致咳嗽龍骨蛇骨朱砂雄黃以削病根兩頭尖巡視各經絡有推前挽之功附子胡椒補其元氣使血行血室氣歸氣任痰散為津液五靈脂運其脾則有餘補不足用此

皮之瘦弱則神藥之少也非其原之患用艾灸之打打除毒起死回生之功使其患勞瘵失血除虛清精白濁陽事不舉精神倦怠瘵火等症婦人赤白帶下子宮冷極無子凡百重病無所不能療者用此灸法則接入性命奪造化之成功延年益壽得虛為之妙術矣其法先用艾作二團將藥一料分作三分先以麝香入膠後以麝香藥在內按藥以裨皮蓋上以艾灸灸至二十壯但覺熱氣自上而下或自下而上身熱透其人必倦急沉沉而睡矣至六十壯必大汗如淋上至泥丸下至湧泉骨髓內風寒身濕臟腑平五勞七傷盡皆技除至一百壯則病鮮有不冰釋者矣灸時慎風寒戒神賦生冷酒色其効難以備述當珍藏之毋輕傳千古秘妙也

壽世保元

彙集一卷

四六

新刊醫林狀元彙集丁卷

正保貳歲初秋
風月宗知刊行