


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇〇六・子部・醫家類

- 理虛元鑑二卷〔明〕汪綺石撰……………一
- 虛損啓微二卷〔清〕洪煒撰……………三一
- 專治血症經驗良方論一卷〔清〕潘爲縉撰……………五五
- 金匱翼八卷〔清〕尤怡撰……………七五
- 中風論一卷〔清〕熊笏輯……………二九七
- 醫醇賸義四卷〔清〕費伯雄撰……………三二九
- 血證論八卷 醫學一見能一卷〔清〕唐宗海撰……………四五九
- 歐壘燃犀錄不分卷〔清〕燃犀道人撰……………六一三
- 經效產寶三卷續編一卷〔唐〕昝殷撰……………六五三

乾隆辛卯小春月鐫

古吳柯德修訂

翻刻必究

理虛元鑑

傷寒析疑
膨脹平衡

痘學要旨
女科寶鑑

俟續刻

味研堂藏板

理虛元鑑 序

歲甲戌予守吳陵得一士柯子心齋其先世所慈人也家傳忠厚多業醫者令祖錦堂先生僑寓錫邑之鵞湖遂家焉心齋性聰穎個儻不附時俗文章有奇氣精書法無通家學隱識為遠到材迄今二十載矣一衿潦

陳春

倒踉蹌場屋豈其愛博而不專欵顧多才者多藝不相妨也遇合會有時耳予患頭風訪醫仰藥無纖毫之效心齋診予脉乃云治病不求其本真為頭痛治頭得製一方却與所患不相涉服後痛漸愈不啻陳琳之檄及見

伊令伯德修所刻理虛元鑑因
知心齋製方之意之所由來也德
脩柯君雖未晤言其學業之淵
博已於所訂者窺見一斑且是書
沉埋剝蝕歷有年所當世不知有
是書即見之誰復心為倚石作
者今柯君不掠美以付剞劂系訂

陳序

而表彰之更可見其用心之厚矣
噫學固貴崇其本業必有待乎
時不歎醫道也是為序

晉

乾隆三十六年歲次辛卯嘉平
月閩中陳焱晉亭氏題于
姑蘓署次

余年未三十獲交柯君德脩今六十
有九矣君業醫余喜地學輒談論天
下技術地關一家休咎醫關一人死
生鉅根人求名不成改業圖利相地
習鑿自誤誤人曷有底耶然地誤世
載後醫誤旦夕間爾君天姿穎敏勇
就塾同學分授經悉耳熟背誦故潛

華序

心醫學得深造焉本世醫復從明師
指授探源溯流廣搜博記多購未見
書理虛元鑑其一也君於疑難症立
辨製方不傳睫案簡當老鑿懾服入
都名大振醫院諸人避席太原守病
邀入幕山右撫司以下咸呂扁靈目
之君善導引長余數歲健食如虎嘯

步履捷於少壯人余日就衰頹每以
屏俗緣毋懈位功為勗君之邃于醫
不但貫串諸家得於靜悟者尤多來
余家劇談不厭延治者悉甚久之迺
去今欲刻理虛元鑑公諸世余四十
餘年知已述其槩弁諸簡端
乾隆三十六年歲次辛卯三月朔日

華序

二

牛毛道人華杰撰

醫學祖雪水難經而方不傳製方首
推仲景嗣後各立一說仲景治冬寒
而河下明溫暑涼古理脾胃東垣講
內傷子和攻痰飲丹溪究陰虛之家為
醫學之宗至王安道以冬寒分出中寒
傷六氣元方以溫暑分出熱病中暑
羅五甫以內傷分出勞傷名傷隱君

柯序

一

以痰飲分出濕痿燥痰疝和以陰虛
分出真陰虛陽其論尤為明晰古人
立說各具一長合其所長乃稱全璧余
編觀諸家虛症猶未盡厥奧雍正乙
巳仲秋購得倚石先生理虛元鑑寔
發前人所未發其治陰虛之法金肺
為五臟之天也治陽虛之法健中脾為百

髓之也其方甚多藥味甚多神農
本經為三百六十五種效法周子度數
仲景一百十三方取本經藥九十一種入
傷寒論中或合經之大經或合經之一
目乃詳於傷寒推及諸病也倚石先
生獨詳于暑勞益風之暑濕多乘
暑而入正氣固則受病少治暑勞是

柯序

二

治其本也諸病所始多耳余亦留心
於六氣司天主客進退乘除偏勝而
人病焉不諳司了審病誤投藥餌者
過半元鑑亦未及之則孫名之論虛
勞猶仲景之論傷寒非舉一而廢百
也韓昌黎謂孟子之功不在禹下倚
石豈在仲景下耶豈道大而渺不知

天地人不可與言醫不通儒佛儼不可
與言醫余淺昧愧未貫徹但願業醫
者廣為探討會其指歸則吾道幸
甚斯世幸甚

乾隆歲次辛卯初夏古吳柯懷祖題
於復韻齋

柯序

三

傳云三折肱為良醫楚辭云九折臂而成
醫出禮云醫不三世不服其藥則業醫者
貴者且久也曹伯祖韻伯之本諸生精研
醫理箋疏辨論極夥自著耒菴錄等書
數種向未梓行表舅祖陳時行韻伯之滴
派子伯又所受業者淵源固應不棄也家
藏書頗備刻本抄本若干卷札與析疑辨
雜克窮幽奧又占琴川楊資生先生討論有
年凡儒生淵博而貫通者廣資稽攷則伯
又於醫原本先世多究明師博訪良友冥

柯跋

搜彙指可証專且久矣今來菴錄等書已
刊刻行世是書乃倚石先生所著之抄本之
一不敢自私鐫刻公世既以闡古人之秘以
表乃力之自云爾

乾隆三十六年歲次辛卯小春朔又五日

姪男有田謹跋

原序

綺石先生醫道高玄虛勞一門尤為獨闡之宗嘗曰
人之稟賦不同而受病亦異顧私己者心肝病少顧
大體者心肝病多不及情者脾肺病少善鍾情者脾
肺病多任浮沉者肝腎病少矜志節者肝腎病多病
起於七情而五臟因之受損先生憫世人之病虛勞
者委命於庸醫而輕者重重者危深可痛傷特校昔
賢之書幾千百家如四時各司一氣之偏未逢元會
乃伏讀素靈而啟悟門得其要領添訂補註集一一
書辨症因詳施治審脈法正藥說精純密審後岐黃

原序

而啟發者也其功豈淺鮮哉奈書成身歿易篋之日
猶諄諄以斯世之責至囑於兩世兄及諸門下士而
不肖亦與聞道命焉今先生雖逝而道在人間長君
伯儒能讀其書次君東菴能繼其志猶子濟明及門
下武林君賓沈子能廣其傳然則先生固未嘗逝也
先生不忍後世病此者天折而莫救故臨終以山中
宰相事業專付仲君仲君會世變遂棄棘闈而潛心
於箕裘之紹是書之成實其發明者居多所恨身丁
喪亂受梓無人大懼淹沒先生之德是望後之仁人
君子體先生之心登此書於梨棗而廣傳之則吾儕

幸甚天下後世讀其書飲其澤者幸甚受業趙何宗
田氏謹識

原序

二

理虛元鑑總目

卷上

治虛脈法總括

治虛脈法分類

治虛有三本

治虛二統

陽虛三奪統於脾

陰虛之症統於脾

虛症有六因

心腎論

心腎不交論

心腎不交與勞嗽總論

五交論

吐血論

紅症初治法

勞嗽症論

勞嗽初治法

乾咳嗽論

目錄

咳嗽痰中帶血珠血絲

論勞嗽吐血能治不能治大旨

虛勞內熱骨蒸論

虛火伏火論

遺精夢洩論

腎痺論

白濁白淫論

女人虛勞

尸注傳屍癆等症

虛勞當治其未成

知節

知防

二護

三候

二守

三禁

四難

勞傷非弱症

嘔吐見血非弱症

傷寒見血非弱症

腸風便血不同怯症

陽虛陰症辨

懶惰症辨

老年怯症難治說

卷下

虛勞本治方

治虛藥說一十八辨

目錄

二

理虛元鑑卷上

古吳柯懷祖德修氏訂

同里華曠賓旭氏正

綺石先生著

治虛脈法總括

脈來緩者為虛。軟微弱皆虛也。弦為中虛。細而微者氣血皆虛。小者氣血皆少。又脈芤血氣脫。沉小遲者脫氣。以上皆勞倦之脈。又微而數者為虛熱。微而緩滑者為虛痰。

治虛脈法分類

卷上

一

一心腎不交。兩寸弦數。兩尺沉細。傳曰：左寸脈遲。心虛。右寸微滑。精氣洩。

二夢洩遺精。尺寸脈遲而澁。心腎不交。夢洩精洩。真元耗散。不壽之徵。又曰：寸數脾弦。兩尺細數。精離位。

青年左尺微澁。色慾傷正。傳曰：諸朮動微。緊男子失精。女鬼交心。脈短小。夢遺精。尺數相火熾而遺。

三漏精。右尺弱如髮。細天精。搖搖寒精自出。馬口有粘膩之累。房事不久。絕孕。

四腎痺。寸虛弱而澁。尺沉細而數。

五夜熱。微澁虛數。或沉或滑。軟弱而細。

六骨蒸數太或滑急促細而數

七乾咳嗽左寸濇數右大急數

八虛痰喘軟細弱氣口微細而數或滑大而虛

九血虛痰火左寸濇而弦數右寸虛大而滑或數而

濇尺中虛濇又曰細而繁數細則血虛數必咳嗽緊

則為寒寒因血虛而客於肺經反而作熱故脈數而

咳嗽也

十咳嗽痰中帶血珠右寸滑而數或濇而弱即煎厥

之症

十一咳嗽帶血寸數而大或滑而緊急關寸弦而濇

卷上

即煎厥

十二勞嗽吐血咳血嘔血咯血即薄厥脈得諸濇濇

為亡血乳為失血濇為血少際氏曰心脈濇肺脈虛

或乳或遲為亡血失精嘔者兼胃火脈經云吐血唾

血脈滑小弱者生寔大者死唾血堅強者死濡滑者

生

十三傳屍勞脈經云男子平人脈滑大為勞極虛濇

亦為勞

十四氣口脈弦而數者脈痿也

十五六脈軟弱陽虛極也

治虛三本

治虛有三本肺脾腎是也肺為五臟之天脾為百骸

之母腎為性命之根治肺治脾治腎治虛之道畢矣

夫東垣發脾胃一論便為四大家之首丹溪明滋陰

一着便為治勞症之宗立齋究明補火謂太陽一照

陰火自殫斯三先生者皆振古之高人能同一時之

習尚闢岐黃之心傳者然皆主於一偏而不獲全體

之用是以脾胃之論出於東垣則無弊若執東垣以

治者未免以燥劑補土有拂於清肅之肺金滋陰之

說出於丹溪已有弊若執丹溪以治者全以苦寒降

火有礙於中州之土化至於陽常有餘陰常不足此

寒一偏之見難為古人諱者而後人沿習成風偏重

莫辨凡遇虛火虛熱陰劇陽亢之疾輒以黃耆補腎

知母清金未能生腎家真水而反以熄腎家真火夫

腎者坎象一陽隔於二陰之間二陰者真水也一陽

者真火也腎中真水次第而上生脾土脾土又上生

心火腎中真火次第而上生脾土脾土又上生肺金

故生人之本從下而起如羲皇之畫卦然蓋腎之為

臟合水火二氣以為五臟六腑之根真水不可滅真

火不可熄乎然救此者又執立齋補火之說用左歸

右歸丸不離從蓉鹿茸桂附等類而不顧其人之有
鬱火無鬱火有鬱熱無鬱熱更不慮其曾經傷肺不
傷肺夫虛火可補理則誠然如補中益氣湯用參芪
朮草之甘溫以除大熱然苟非清陽下陷猶不敢輕
加升柴歸薑辛熱之品乃反施之鬱火鬱熱之症奚
帝抱薪救火乎余唯執兩端以用中合三部以平調
一曰清金保肺無犯中州之土此用丹溪而不泥于
丹溪也一曰培土調中不損至高之氣此用東垣而
不泥於東垣也一曰金行清化不覺水自流長迺合
金水於一致也三藏既治何慮水火乘時乃統五臟

卷上

四

以同歸也但主脾主腎先賢頗有發明而清金保肺
一着尚未有透達其精微者故余于論肺也獨詳此
治勞之三本宜先切究也

治虛二統

治虛二統統之於肺脾而已人之病或為陽虛或為
陰虛陽虛之久者陰亦虛終是陽虛為本陰虛之久
者陽亦虛終是陰虛為本凡陽虛為本者其治之有
統統于脾也陰虛為本者其治之有統統于肺也此
二統者與前人之治法異前入治陽虛者統之以命
火八味丸十全湯之類不離桂附者是前入治陰虛

者統之以腎水六味丸百補丸之類不離知柏者是
余何為而獨主金土哉蓋陰陽者天地之二氣二氣
交感乾得坤之中畫而為離離為火坤得乾之中畫
而為坎坎為水水火者陰陽二氣之所從生故乾坤
可以兼坎離之功而坎離不能盡乾坤之量是以專
補腎水者不如補肺以滋其源肺為五臟之天孰有
大於天者哉專補命火者不如補脾以建其中脾為
百骸之母孰有大於地者哉

陽虛三奪統於脾

卷上

五

就陽虛成勞之統於脾者言之約有三種曰奪精曰
奪氣曰奪火氣為陽火者陽氣之屬精者水火之兼
色慾過度一時奪精漸至精竭精者火之原氣之所
主精奪則火與氣相次俱竭此奪精之兼火與氣也
勞役辛勤太過漸耗真氣氣者火之屬精之用氣奪
則火與精連類而相失此奪氣之兼火與精也其奪
火者多從奪精而來然亦有多服寒藥以致命火衰
弱陽痿不起者此三種之治奪精奪火主於腎奪氣
主于脾余何為而悉統于脾哉蓋陽虛之症雖有奪
精奪火奪氣之不一而以中氣不守為最險故陽虛
之治雖有填精益氣補火之各別而以急救中氣為

最先有形之精血不能速生無形之真氣所宜急固此益氣之所以切于填精也。同哀甚之火者有相激之危。續清純之氣者有冲和之美。此益氣之所以妙于益火也。夫氣之重於精與火也如此。而脾氣又為諸火之原。安得不以脾為統哉。余嘗見陽虛者汗出無度。或盛夏裹綿。或腰痠足軟。而成痿症。或腎虛生寒。木實生風。脾弱滯濕。腰背難於俯仰。肢股不可屈伸。而成痺症。或面色皎白。語音輕微。種種不一。然皆以胃口不進。飲食及脾氣不化為最危。若脾胃稍調。形肉不脫。則神氣精血可以次第而相生。又何有亡

卷上

木

陽之虞哉。此陽虛之治所當悉統於脾也。

陰虛之症統於肺

就陰虛成勞之統于肺者言之。約有數種。曰勞嗽。曰吐血。曰骨蒸。極則成尸。其症有兼有不兼。有從骨蒸而漸至勞嗽者。有從骨漸漸至吐血者。有竟以骨蒸枯竭而死。不待成勞嗽者。有竟從勞嗽起而兼吐血者。有竟從吐血起而兼勞嗽者。有久而成尸。其者有始終只一症。而或痊或斃者。凡此種種。悉宰於肺。治所以然者。陰虛勞症。雖有五勞七傷之異名。而要之以肺為極。則故未見骨蒸勞嗽吐血者。預宜清金

保肺已見骨蒸勞嗽吐血者。急宜清金保肺。曾經骨蒸勞嗽吐血而愈者。終身不可亡護肺。此陰虛之治所當悉統於肺也。

虛症有六因

虛症有六因。有先天之因。有後天之因。有痘疹及病後之因。有外感之因。有境遇之因。有醫藥之因。因先天者。指受氣之初。父母或年已衰老。或乘勞入房。或病後入房。或妊娠失調。或色慾過度。此皆精血不旺。致令所生之子。天弱。故有生來而或腎或肝。心或脾肺。其根蒂處。先有虧。則至二十左右。易成勞怯。

卷上

七

然其機兆。必有先現。或幼多驚風。骨軟行遲。稍長。讀書不能出聲。或作字動輒手振。或喉中痰多。或胸中氣滯。或頭搖目瞬。此皆先天不足之徵。宜調護於未病之先。或預服補藥。或節養心力。未可以其無寒。無熱。能飲能食。并可應接世務。而恃為無懼也。即其病初起。無過精神倦怠。短氣少力。五心煩熱而已。豈知危困即在目前也。

因後天者。不外酒色勞倦。七情飲食所傷。或色慾傷腎。而腎不強固。或勞神傷心。而心神耗憊。或鬱怒傷肝。而肝弱不復調和。或憂愁傷肺。而肺弱不復肅清。

或思慮傷脾而脾弱不復建運先傷其氣者氣傷必及於精先傷其精者精傷必及於氣或發於十五六歲或二十左右或三十上下病發雖不一而理則同歸耳

因痘疹及病後者痘迺先天陽毒疹乃先天陰毒故痘宜益氣補中則陽毒之發也淨而終身少脾病疹宜清散養榮則陰毒之發也徹而終身少肺病苟致失宜多貽後患故凡後此脾泄胃弱腹痛氣短神瘁精虧色白足痿不耐勞動不禁風寒種種氣弱陽衰之症皆由痘失于補也凡肺風哮喘音啞聲嘶易至

卷上

傷風咳嗽等類種種陰虧血枯之症皆由疹失于清也至於病後元氣尚虧更或不自重命以勞動傷其氣以縱慾竭其精頃間五藏齊損恒致不救尤宜慎之因外感者俗語云傷風不醒結成癆若元氣有餘者自能逼邪使出或腎精素厚水能救母或素無鬱火鬱熱則肺金不得猝傷若此者不過為傷風咳嗽年老者則為痰火而已不至於成癆也若其人或酒色無度或心血過傷或肝火易動陰血素虧肺有伏火一傷於風火因風動則癆嗽之症作矣蓋肺主皮毛鳳邪一感於皮毛肺氣便逆而作嗽似乎傷風咳

嗽殊不經意豈知咳久不已提起伏火上乘於金則水精不布腎源以絕且久嗽失氣不能下接沉涵水子不能救金母則癆嗽成矣

因境遇者蓋七情不損則五癆不成惟真正解脫方能達觀無損外此鮮有不受病者從來孤臣泣血孽子墜心遠客有異鄉之悲閨婦有征人之怨或富貴而驕洩滋甚或貧賤而窘迫難堪此皆能亂人情志傷人氣血醫者未詳五藏先審七情未究五癆先調五志大宜罕譬曲喻解縛開膠蕩洗者惕之以生死偏僻者正之以道義執着者引之以洒脫貧困者濟之以錢財是則仁人君子之所為也

卷上

因醫藥者本非勞症反以藥誤而成或病非因感冒而重用發散或稍有停滯而妄用削伐或並無裡熱而槩用苦寒或弱體侵邪未經宣發因其倦怠驟患其虛而漫用固表滋裏遂致邪熱膠固永不得解凡此能使假者成真輕者變重所宜深辨也

心腎論

夫心主血而藏神者也腎主志而藏精者也以先天生成之體論則精生氣氣生神以後天運用之主宰論則神役氣氣役精精氣神養生家謂之三寶治之

原不相離故於滑精夢洩種種情病者必本於神治於怔忡驚悸種種神病者必本於氣治蓋安神必益其氣益氣必補其精

心腎不交

虛勞初起多由於心腎不交或一念之煩其火翕然上逆天旌搖搖精離深邃者夢而遺深者不夢而遺深之極者漏而不止其或症成骨痿難於步履者畢竟是少火衰微別成陽虛一路不為陰虛之症也其單見心腎不交滑精夢洩夜熱內熱等侯者此為勞嗽之因而未成其症也其因心腎不交心火炎而

卷上

十一

乘金天突急而作癢咯不出咽不下喉中如有破絮粘塞之狀此勞嗽已成之症也

心腎不交與勞嗽總論

在心腎不交之初或夢洩滑精體倦骨痿健忘怔忡或心脾少血肝膽動煩上冒下厥種種諸症但未至傷肺絡成蒸熱者可用養心丸或歸脾丸主之其養心丸內以石蓮肉桂交心腎於頃刻歸脾丸內以龍眼木香甘溫辛熱之品直達心脾主神中而生血引經文主明下安之義以補火為治故凡火未至於乘金補火亦是生土之妙用而何慮乎溫熱之不可從

治也哉若夫陰劇陽亢木火乘時心火肆炎上之令

相火舉燎原之煽肺失降下之樞腎鮮長流之用以

致肺有伏逆之火膈有膠固之痰背畏非時之感胸

多壅塞之邪氣高而喘咳嗽頻仍天突火燃喉中作

癢咯嚙不能嗽久失氣氣不納于丹田真水無以制

火於是濕挾熱而痰滯中焦火載血而厥逆清竅伏

火射其肺係則能坐而不能臥膈痰滯乎胃絡則能

左而不能右斯時急宜清金保肺以宣清肅之命平

肝緩火以安君相之位培土調中以奠生金之母滋

陰補腎以遏陽光之煽一以中和為治補其虛載其

卷上

十一

隔鎮其浮定其亂解其爭制其過潤其燥疏其滯

收其耗散庶有濟也若執補火之說用辛熱之品與

彼寒涼傷中者異病而同治豈不殆哉

五交論

勞嗽吐血之症其難於脾肺之交不必遍論五臟但

取其要處言之夫虛症總由相火上炎傷其肺金而

相火寄於肝腎故余於清金之外再加白芍酸斂以

收之丹皮平潤以抑之二物能制水之過又能滋水

之枯此治金木之交也至於木得火勢而上乘于金

金失降下之令已不能濟水之源木強土受其剋水

募於畏亦乘風木之勢而上乘消混于胸膈而為痰涎壅塞膠固稠膩不可開以礙清肅之化此因水土不交水又乘之而肆虐粗工每以陳半香朴治痰之標殊不知此迺水乘木火而上泛為痰比之雜症二陳所主之痰天淵不同余但於清金劑中加牛膝車前澤瀉以導水下行土自安位金水平調天地清肅矣此調水土之交及水土之變也

吐血論

有不從勞嗽而吐血先之者心火肝木之為病主也然又煎厥薄厥之分煎厥者從陰虛火動煎灼既久

卷上

三

血絡漸傷旋至吐血其勢較緩薄厥者薄乃雷風相薄之薄心熱為火火熱為風風火相薄厥逆上衝血遂苑亂湧出其勢較急煎厥卑動於心火不得風助故無勢而緩薄厥兼動于肝火得風助故有勢而急大抵性急多盛怒者往往成薄厥且是症也又當防其瘀血滲入肺系鬱而不散以至積陽為熱積陰為疰喘嗽交加病日以深而成勞嗽也大凡治吐血宜以清金保肺為主金今既煎厥木得其平而火自不敢肆至于骨蒸之久煎灼真陰火炎傷肺亦宜急救化源度乎水得所養而火漸熄不至為勞嗽之漸

也

紅症初治法

吐紅薄厥之症初治用犀角地黃湯不効者以犀地雖有涼血止血之功而其力尚緩故也凡吐血正湧之時法宜重在止血宜以炒蒲黃炒側柏葉棕灰三味為主佐以紫苑犀角地黃白芍之類若血勢過盛不止者再用清金散碧玉丹一墜其火即降更不止再加童便甚至血勢湧溢並湯藥無隙可進者須以熱酒濯其兩足自能引火下行而血漸止然後投以上藥可也

卷上

三

勞嗽症論

余於勞嗽症嘗列四侯以為準夫四侯者肺有伏逆之火膈有膠固之痰皆畏非時之感胸多壅塞之氣然此四侯以肺火伏逆為主餘三侯則相因而至蓋肺為五臟之天司治節之令秉肅清之化外輸精于皮毛內通調乎四瀆故飲食水穀之精微由脾氣蒸發以後悉從肺為主上榮七竅下封骨髓中和血脉油然沛然施於周身而何痰涎之可成苟惟肺為火薄則治節無權而精微不布於上下留連膈膜之間滯而為痰痰老則膠固而不可解氣無以宣之也又

肺主皮毛外行衛氣氣薄而無以衛外則六氣所感
 怯弱難禦動輒受損則本病而復標邪乘之或本火
 標風則風助火勢而清火且滯其氣驅風必燦其營
 本火標寒則寒火結聚而散寒則火煽降火必寒收
 本火標暑則暑火同氣本火標濕則濕火交煎虛勞
 一遇此等標邪觸發或兼傷寒或兼瘧痢必至輕者
 重而重者危故於時已至而氣未至時未至而氣先
 至或至而太過至而不及等皆屬虛風賊邪所宜急
 防之也胸者心肺交加之部火炎攻肺而氣不得以
 下輸則氣多壅塞尤不當以寬胸理氣之劑開之摠
 之肺氣一傷百病蜂起風則喘痰則嗽火則咳血則
 咯以清虛之臟纖芥不容難護易傷故也故於心腎
 不交之初火雖乘金水能救母金未大傷者預當防
 維清肅之令以杜其漸而况勞嗽已成可不以保肺
 為治哉

勞嗽初治法

勞嗽初起時多兼表邪而發蓋肺部既虧風邪乘虛
 而入風寒入肺化為火邪邪火與內火交灼則肺金
 愈傷而咳嗽因之不止庸醫但知勞嗽為內藏本病
 而驟以芫朮益其氣歸地補其血甚以白芍五味寒

仁斂其邪則邪氣深滯腠理膠固而難拔矣余凡遇
 此症先以柴胡前胡清理表邪及桔梗貝母堯令之
 類清潤而不泥滯者以清理肺金或六七劑後方用
 清涼滋陰之品以要其終但柴胡可多用幾劑前胡
 止可用一二劑若表邪一清柴胡亦須急去也

乾咳嗽論

乾咳者有聲無痰病因精血不足水不濟火火氣炎
 上直陰燔灼肺藏慘澹而咳也丹溪云此係火邪鬱
 於肺中而不能發水火不交所致宜補陰降火症從
 色慾來者瓊王膠最捷午後咳陰虛也黃昏咳火氣
 上感於肺也

咳嗽痰中帶血珠血絲

此症大約皆從鬱火傷肺肺金受邪不能生水水火
 不相濟則陰火亢陽而為痰血凝結火載上逆迺煎
 厥之漸也多因志節拘滯預事而憂或鬱怒傷肝或
 憂憤傷心不能發洩而成若不早治肺金受傷之至
 火盛血逆成塊成片夾痰而出有時無痰而出輕則
 見於清晨甚則時上頻見或折鬱憤怒則隨觸隨見
 卽煎厥也不急治則為薄厥而病篤矣
 論勞嗽吐血能治不能治大旨

血症生死之辨以大肉不消者其病輕大肉漸消者其病重若大肉脫盡者萬無生理倘虛熱已退紅症已止痰嗽皆除而大肉未消或既消而脾胃猶強藥食滋補大肉漸長起則猶可治設使仍前不長者斷然不可治即使飲食自健亦不過遷延時日而已每見患怯之人起居如常正當進膳之時執匕箸而去者卽此症也凡患此症者如心性開爽善自調養又當境遇順適則爲可治若心性繫滯或善怒多鬱處逆境而冤抑難堪處順境而酒色眷戀又不恪信醫藥死何疑焉

卷上

七

虛勞內熱骨蒸論

虛勞發熱皆因內傷七情而成人之飲食起居一失其節皆能成傷不止房勞一端爲內傷也凡傷久則榮衛不和而發熱七變蒸七類不一凡骨脈皮肉五藏六腑皆能作蒸其源多因醉飽後入房及憂思勞役或病飲食失調暨大喜大怒大瀉大瀉嚴寒酷暑房勞不能調攝邪氣入內而成注七之爲言住也外邪深入連滯停住而不能去也注不治則內變蒸蒸失治則咳嘔吐痰咳血而病危矣故夜熱內熱虛熱爲虛勞之初病骨蒸內熱潮熱則虛勞之本病也宜

及時調治毋使滋蔓治法以清金養榮疎邪潤燥爲主則熱自退矣

虛火伏火論

諸火可補火諸熱不可補火又他藏有虛火可補火肺藏有伏火不可補火斯言寔發前人未發之旨何謂諸火可補火火者虛火也謂動於氣而未着于形其見於症易升易降條有條無其發也儘有燎原之勢或面紅頰赤或眩暈厥冒種七不同而皆可以溫潤補腎之劑以收其浮越而引歸於性根命蒂之中補之可也何謂諸熱不可補火熱者寔熱也謂其先

卷上

七

動於氣久而漸着於形如燒熱之物相似其見于症有定時無定處無升降無遷其夜間准熱日間不熱者爲夜熱其裏而恒熱而皮膚未熱者爲內熱其熱如在骨髓間蒸出而徹于皮膚者爲骨蒸勞熱此種七蒸熱有清法無溫理補之不可也何謂他藏有虛火可補火肺藏有伏火不可補火蓋肺與四藏有別如肝腎龍雷之火可補而伏脾胃寒格之火可補而越心家虛動之火可補而定惟肺之一藏屬金七畏火尅火喜鑠金故清肅之藏最畏火此言其藏質也肺居膈上其氣清其位高火若上冲則治節失令

而痰滯氣塞喘嗽交加故至高之部極畏火此以部位言之也然或偶然浮越之火猶不犯此禁獨至伏逆之火出于陰虛陽亢火乘金位謂之賊邪以其火在肺葉之下故名伏以其火只星七便能使金令捍格故名逆凡若此者症必膠痰固隔吸短呼長脉必細而數細為血脉數為火勝此在少年為勞嗽之根四十以外為血虛痰火之兆宜用清法無用溫理其斷不可補者也

遺精夢洩論

精雖藏于腎而寔主於心七之所藏者神七安則氣

卷上

定氣為水母氣定則水澄而精自藏於命門其或思慮過度則火水不交快情恣慾則精元失守所以心動者神馳神馳則氣走精逐而流也且心主血心血空虛則邪火上壅而消其靈舍於是神昏志蕩天精搖七瀉夢交作而精以洩其甚者不待夢而時洩此時以降火之法治之而火不可降即以龍骨牡蠣瀉精之品施之亦屬隨止隨發殊不知神不歸舍斯精不歸元故腎病當治其心宜以養氣安神為主以瀉參滋血之品為先君火既安相火自能從令神清氣爽而精安有不固者哉

人身之精融化於周身如樹中膠汁本無形質至因情動搖遂各成形質而出其所出者已為精之一死物矣是不獨精出於腎然也他如貪心動則津出哀心動則淚出愧心動則汗出皆為精所施化多出皆能傷精但與遺精者相較則感有淺深質有厚薄傷有輕重耳

腎痺論

此即遺精痿症也其初起於酒色不節精血日竭水火俱衰肝風脾濕腎虛生寒三氣合聚而為腎痺宗筋不能束骨節利機關足難步履腰背難以俛仰坐

卷上

臥難支摠因傾盡真元而筋骨日瘁也法宜清氣安神以養心脾之血潤參滋血以歸肝腎之陰

白濁白淫論

白濁白淫從新久定名初出莖中痛而濃濁如膏謂之白濁久之不已精微弱而薄痛亦漸減至後聞淫聲見女色而精下流清稀而不痛則謂之白淫也白濁全屬火至白淫則火衰而寒勝矣此因腎家元氣降而不升故粘絲帶膩馬口含糊而不已治法宜回陽氣而使上升固其精元而不使下陷則病自止矣外此有症非屬虛而濕熱下注者宜從丹溪治法又

有所求不遂志意鬱結而精洩及氣虛人精失氣而遺者皆非虛病也

女人虛勞

女人虛勞有得之鬱抑傷陰者有得之蓐勞者有得之崩帶者其鬱抑傷陰雖以調肝為急終是金能克木蓐勞崩帶雖以補腎為急終是金能生水此陰虛成勞摠不離乎清金以為治也蓐勞非即是勞嗽蓐勞重然後傷肺而勞嗽以成治當以歸脾養榮兼清金主之別有氣極一種短氣不能言者却不在陽虛例迺肺病也此症雜陳皮亦在所忌

卷上

尸疰傳屍勞等症

夫勞極之候血虛血少艱于流布甚至血不脫於外而但畜於內畜之日久週身血走之隊道悉痺不流而營分日虛於是氣之所過徒蒸瘀血為熱乚久則蒸其所瘀之血化而為蟲遂成尸疰瘵症其或因濕火蒸化或因死痰滲入清竅而成皆是類也自此竭人之神氣養虫之神氣人死則虫亦死其遊魂之死者傳親近之一脉附入血脈似有如無其後五日榮長人日凋瘁而命隨以斃故傳屍勞又與尸疰症不同尸疰因虛損而成若傳屍則在素無虛損之人

一傳染即現出勞怯候或發熱骨蒸或咳嗽吐血唇紅面青等症者是所傳亦分五藏在脾腸瘵在心吐血在肝與肺則咳嗽也治尸疰以清金養榮為本其殺虫斷祟當以獺肝獺爪熊指啄木等丹治之至犯傳屍者一見其外症唇紅面青骨蒸內熱飲食健啖而人漸瘦不已者必有蟲也治以獺爪百部丸主之

虛勞當治其未成

患虛勞者若待其已成而後治之病雖愈亦是不經風浪不堪辛苦的人在富貴者猶有生理貧者終難保也是當於其未成之先審其現何机兆中何病根

卷上

爾時即以要言一二語指示之令其善為調攝隨用湯液十數劑或用丸劑膠劑二三斤以斷其根豈非先事之善策哉

知節

節為節省之義虛勞之人其性情多有偏重之處每不能樽節其精神故須各就性情所失以為治其在湯而不收者宜節嗜慾以養精在滯而不化者宜節煩惱以養神在激而不平者宜節忿怒以養肝在躁而不靜者宜節辛勤以養力在瑣屑而不坦夷者宜節思慮以養心在慈悲而不解脫者宜節悲哀以養

肺此六種皆五志七情之病非藥石所能療亦非眷屬所可解必病者生死切心自訟自克自悟自解然後醫者得以盡其長眷屬得以盡其力也

知防

虛人再經不得一番傷寒或一番痢疾或半年幾月瘡疾輕傷風感冒亦不宜輒受所以一年之內春防風又防寒夏防暑熱又防因暑致涼而致感寒長夏防濕秋防燥冬防寒又防風此八者病者與調理病人者皆所當知即醫師亦須深明五運六氣之理每當時序推遷氣候偏重即宜預為調攝挽救以補陰

卷上

三

陽造化之偏而制其太過扶其不足經云母翼其勝毋贊其復閑其未然謹其將然修其已然即此之謂也

二護

寒從足起風從肩俞肩際而入病者常護此二處則風寒之乘於不意者少矣其間有最緊要者每當時氣不佳之際若肩背經絡之間覺有些少浙瀝惡寒肢節凌軟拘束周身振顫立身不定光景即刻斷食一週其稍重者畧散以煎劑自脫然而愈若時氣初染不自覺察再加以飲食闕湊經邪傳裏輕者蒸灼

幾日重者恒致大害

三候

前者四季之防六氣本而防標之說也若夫二十四侯之間有昃與本症為仇者其侯有三一為春初木盛火升一為仲夏濕熱令行一為夏秋之交伏火鑠金此三侯中如有一侯未曾透過雖嗽平吐止火降痰寧病者怡然以為無事矣而不知氣候之相對有在於尋常調燮之外者一交三侯遂與本症大逆平者必復七者必深七者不救是惟時七防外邪節嗜慾調七情勤醫藥思患而預防之方得涉險如夷耳

卷上

三

二守

二守者一服藥二攝養二者所宜守之久而勿失也蓋勞有淺深治有定候如初發病尚輕淺亦有不藥而但以靜養安樂而自愈稍重者治須百日或一年煎百劑丸二料膏一服便可斷除病根至于再發則直陰大損便須三年為期此三年間起於色者節慾起于氣者慎怒起于文藝者拋書起於勞倦者安逸起於憂思者遣懷起于悲哀者達觀如是方得除根至於三發則不可救矣且初發只須生地玄參百合桔梗之類便可收功至于再發非人參不治是在病

者之盡其力而守其限藏所患之淺深近久量根本之輕重厚薄而調治之勿驟急取效勿惜費恣情勿始勤終怠則得之矣

三禁

治勞三禁一禁燥烈二禁苦寒三禁伐氣是也蓋虛勞之痰由火逆而水泛非二陳平胃縮砂等所開之痰虛勞之火因陰虛而火動非知柏芩連梔子等所清之火虛勞之氣由肺薄而氣窒非青枳香薷薤子等所豁之氣乃至飲食所禁亦同藥餌有因胃弱而用椒胡茵桂之類者其害等於二陳有因煩渴而啖生冷鮮菓之物者其害同於知柏有因氣滯而好辛辣快利之品者其害甚於青枳此三禁不可不知也

四難

一家中如父母慈兄弟友夫婦摯而有別僮僕勤而不欺此四者在人而不在已在本家而不在醫師故曰難也夫治勞之淺者百日收功稍深者期年為限更深者積三歲以為期其日逾久則恩勤易怠其效難期則厭棄滋生苟非金石之堅難免噴室之怨一着失手滿盤脫空雖非醫師之過而為醫者亦不可不知也

勞傷非弱症

有平時心腎不虧並無弱症偶有房勞猝然嘔血者其血從胃中來不得以怯症論治宜以分理安胃為主不必用黃芩花粉元參等藥之涼亦不必用黃芪白朮山藥之補只須柴胡貝母桔梗澤瀉丹皮白芍麥冬之類治之更有勞傷筋力而得者只宜調其胃氣而自愈

嘔血見血非弱症

往七有人患嘔血甚多醫者遂認為弱症誤也此先傷於怒七氣傷肝七藏原有血積于中後傷于寒七入胃故嘔吐嘔吐傷氣氣帶血而暴厥耳是不可與怯症之血同論當於治嘔藥中加查肉先行其瘀止其吐後再徐調其他症自可萬全也

傷寒見血非弱症

有勞倦傷血瘀積胃絡兼受風寒七邪迫血火不能降以致吐血衄血不可以弱症施治若誤投涼劑則寒愈結而血難止只宜散其風寒少加調血歸經之品使邪外洩而火下降則血自止矣或問何以辨之曰頭痛惡寒戰慄手足逆冷而其人素無虛症如虛火上炎不足之候身體不瘦突然而起者是也

腸風便血不同怯症

每見先天不足之人得腸紅便血之症不肯自認爲勞怯且以爲輕病而不治久七至氣血盡而不治者甚多不知虛弱之人飢飽勞役風寒暑濕乘虛而入兼之酒色太過濕滯中州元陽下陷客風腸火流入腸胃氣滯血凝腐敗潰亂而成土崩河決之勢若不速治將成大患治法如何曰不過散其風燥其濕寬其腸行其氣活其瘀止其血升其陷而已散風用炒黑防風荆芥爲主此二味生用則能散風於上部炒用則散風于二腸荆芥尤爲要藥寬腸行氣以炒枳

卷上

某

殼爲主止血以炒黑蒲黃醋炒地榆爲主行瘀以紫苑爲主兼有調血歸經之妙升陷以升麻柴胡爲主慘濕以白朮澤瀉茯苓爲主風散濕除氣行瘀散元陽生發則病自愈能節勞戒氣貶酒却色善自調攝且知起居服食禁忌自不復發更兼以調和氣血補助先天之劑投之與虛勞血症收功之法同治終身可以無患

陽虛陰症辨

有男子脾腎氣虛腰膝無力目眩耳鳴形體憔悴澹澹無度飲食少進步履艱難似乎陰虛弱症而非也

何以辨之曰不咳嗽不內熱骨蒸不潮熱吐紅是也然其脉必軟緩微弱虛寒之極治法當同陽返本健脾胃益胃交補心腎爲主則寒谷陽回萬物發生矣

軟懶症辨

有一種軟懶之症四肢倦怠面色淡黃或膈中氣滿不思飲食其脉沉遲滯滯軟弱無力或表氣不清惡寒發熱當其寒則脉愈加沉滯當其熱則脉微見細數或傳裏內熱則脉氣沉洪或洪數總之定帶軟弱不清之象此內傷兼外感其邪只在肌表筋骨之間未深入藏腑其所感尚輕故不成傷寒瘧痢等疾而

卷上

某

爲此軟弱因循之症也久七不治成硬頭黃者居多若脾虛濕勝者則成黃腫若肺氣不足者流入清虛之府則壅爲痰嗽若血少者遷延歲月則成內熱或五心煩熱日晡潮熱漸似骨蒸勞熱矣此症大都得藜藿窮檐之輩間有膏粱之人因房勞不節或竊玉偷香恐懼憂驚或埋首芸窗用心過度或當風取涼好食生冷致風寒傳染鬱而不散乃內傷兼外感而成其外象酷似弱症若察症不的初起據投以涼劑補藥則邪正混淆不得清徹以致寒邪閉遏鬱于絡絡而爲內熱遂成真病人家子弟患此類多諱疾忌

醫不便以直告人自認虛弱見醫者投以清理散邪之品反不肯服所以難治亦難辨也然則何以辨之曰頭不痛身不熱不煩嗽不唾血但腿痠脚軟蒸內熱胸中邪氣隔緊食不易飢與之食則食不與亦不思或今日思此物明日即不喜又思別物適口如怯症之嘗食勞也治法當其未入裡時宜和解分消托之使出用八物湯加減去黃芩加前胡山查陳皮之類濕勝有痰者重以二陳湯稟氣厚者加枳殼用此散劑邪自解散若邪已入裏雖從肌表散去則宜重在分消使邪從小便而出表裡既清之後唯以養

卷上

其

氣養血之品培其本源若起于憂驚思慮者以交固心腎之藥要其終則霍然矣玉芝云外感軟懶之症切不可發汗亡之則虛暈欲倒以其兼內傷重也治宜柴胡防風葛根蘇梗陳皮山查枳殼澤瀉瀉等味主之小便不利者加車前質弱者去枳殼數劑後加丹參再後加當歸若脾虛下泄者稍加煖味若血虛內熱者少加丹地骨皮此症須以百日為期若未及百日而不肯服藥者變成黃症矣

老年怯症難治說

諺有少無風癩老無癆之說故中年以後人往亡有

勞嗽吐血咳血症不肯自認為怯症曰不過是血虛痰火而已不知少年精血易生老年氣血易虧精力不長病此更難得愈然則施治有老少之別乎曰少年之病難治而易愈老年之病易治而難愈所以易治者為其相火易衰色心已淡性氣已灰怒氣少動故也若二者不戒死期更促耳至於治法則從同也

理虛元鑑上卷終

卷上

其

理虛元鑑卷下

古吳柯懷祖德修氏訂

朱鴻恩 吳明志 門人呂如 華宸 錢錫三 有田心齋氏校

同里華曦賓旭氏正

綺石先生著

虛勞本治方

歸養心脾湯 治夢遺滑精

人參 黃芪 白朮 芡寔 北五味 甘草

熟地 棗仁 茯神 山藥 當歸身

參固氣氣固則精有攝而不遺生地滋陰七滋則

火有制而不浮越當歸養血芡實固腎茯神棗仁

卷下

安神寧志芡實藥艸補氣調中氣旺神昌則精固

而病自愈遺甚加萸肉蓮鬚思慮過度加蓮肉不

禁加石蓮金櫻膏足痿加牛膝杜仲龜板膠

歸養心腎丸

生地 熟地 黃芪 白朮 山藥 芡實

茯神 棗仁 歸身 萸肉 五味 甘草 煨

蜜丸空心白湯送下三錢

二地滋陰當歸養血茯神棗仁補心芡實藥草調

氣補中五味芡實固精滋腎氣虛加人參久遺加

杞子金櫻漏滑加蓮鬚芡實心火盛加石蓮寒精

自出加菴蓉鹿茸沙苑兔絲洩瀉加澤瀉蓮肉腰

膝軟弱艱于步履加牛膝杜仲龜鹿膠

養心固本丸

玄武膠 紅麴炒珠 鹿角膠 紅麴炒珠 萸肉 杞子 人參

黃芪 石蓮肉 白朮 甘草 棗仁 地黃

淮牛膝 內石蓮將肉桂一錢同煮一日去肉桂

用煉蜜丸收功固本藥也

養心固腎湯 治漏精

生地 當歸 茯神 山藥 芡實 萸肉

陳皮 甘草 五味 石蓮肉 河水煎空心服

卷下

桑螵蛸散 治遺精漏不止

桑螵蛸一味焙為末酒漿調服一錢三四服即止

補元湯 治腎痺

生地 杞子 黃芪 白朮 杜仲 牛膝

山藥 茯苓 當歸 甘草 不拘時服

清熱養榮湯 治虛勞內熱骨蒸

柴胡 丹皮 地骨皮 生地 當歸 白芍

玄參 茯苓 麥冬肉 生甘草 燈心三十寸

河水煎服

加味固本膠

生地 熟地 桔梗 茯苓 天冬肉 玄參
川貝 百合 阿膠 紫苑 麥冬肉 甘草
白蜜二筋收膠

集靈膠

天冬 麥冬 生地 熟地 玄參 桔梗

甘草 白蜜五筋收膠

清金養榮丸

生地 麥冬肉 花粉 川貝 玄參 白芍

茯苓 地骨皮 丹皮 甘艸 內生地將薄荷

湯煮爛搗膠同蜜為丸

卷下

三

清金甘桔湯

治乾咳嗽

桔梗 川貝 麥冬肉 花粉 生地 玄參

白芍 丹皮 粉甘草 燈心 河水煎

清金百部湯

治虛勞久嗽

桔梗 玄參 川貝 百部 生地 麥冬

丹皮 白芍 甘草 地骨皮 燈心

喘急加白前海粉竹茹如痰吐稠粘脾肺火盛加

清金散竹茹花粉

清金加減百合固金湯

百合 桔梗 川貝 桑皮 杏仁 花粉

麥冬 茯苓 陳皮 生甘草

大聖藥

春加佛耳草即麴兼頭立夏日採取為餅夏加苧

蘇根秋加金沸草冬加款冬花發熱加柴前二胡

咽痛元參麝肝素有血症生地丹皮

固金養榮湯

桔梗 桑皮 川貝 茯苓 百合 杏仁

陳皮 甘草 生地四兩荷葉湯煮爛搗膏同蜜

為丸此方與百合固金湯為治血虛痰火主藥

清金甘桔湯

治咳嗽痰中帶血絲血珠

卷下

四

桔梗 生地 白芍 丹皮 麥冬 玄參

川貝 茯苓 阿膠 甘草 此方中加紫苑

犀角 名膠苑清金湯治咳嗽痰中夾血為丸治

咳嗽痰中夾血珠血絲血片去生地桔梗加地骨

皮百部名膠苑犀角湯治勞嗽吐血

加味犀角地黃湯

犀角 生地 赤芍 丹皮 蒲黃 燈心三十

寸荷葉一大張煎湯代水

瓊玉膠

生地 茯苓 人參 各等分蜜收

固本腎氣丸 治陽虛

人參 黃芪 白朮 茯苓 當歸 生地

炙草 芡仁 煨姜 鹿角膠

還元丹 亦治陽虛

遠志 杜仲 牛膝 補骨脂 山藥 茯神

鎖陽 五味 杞子 山萸肉 熟地 菖蒲

煉蜜為丸淡鹽湯下

獺爪丸 治傳屍勞

獺爪 製 獺肝 乾 敗龜板 銀胡 百部 沙參

生地 桔梗 地骨皮 丹皮 麥冬 甘草

卷下

五

共為末每以五分或至七分投入煎劑或丸或膠加入潛使服勿令病者知覺

百部清金湯 傳屍勞

百部 骨皮 人參 麥冬 桔梗 生地

丹皮 芍藥 茯苓 甘草

治虛藥說一十八辨

人參 外感風邪元氣未瀉審用

人參大補元氣冲和粹美不偏不倚故在陰補陰在陽補陽能溫能清可升可降三焦並治五藏咸調無所不可故其治病也除元氣充實外感有餘無事於

補者則補之反成壅塞所謂寔也若夫虛勞之病或氣血陰陽水火寒熱上下諸症與夫火痰鬱濕滯脹吐利胃厥煩渴及胎前產後痘疹久病病後一經虛字則無不宜而不可少此人參之所以能迴元氣於無何有之鄉而其功莫大也自東垣丹溪先後發明並無異議庸醫不察執節齋之說以為人參補陽沙參補陰若補陽則助其火甚至云虛勞人服參者必至不救以致舉世畏參如砒鴆而不敢試豈不誤哉

黃桓 知母 禁用

卷下

六

丹溪心法有云虛損吐血不可驟用苦寒恐致相激只宜瓊玉膠主之何事首尾矛盾又載三補丸以芩連柏三味主之大補丸以黃柏一味主之乃至滋陰百補丸知柏並用後之學者宗之凡遇虛勞咳嗽吐血虛火虛熱之疾皆以知柏一味以為清火滋陰殊不知虛勞之火虛火也相火也陰火也即丹溪云虛火可補人參黃芪之屬相火係於肝腎之間出入於甲膽聽命於心君君火明則相火伏若君火不明則相火烈焰冲天上感清虛之竅耳聾鼻乾舌痛口苦頭暈身顫天突急而淫七作癢肺葉張而咳嗽頻仍

當此時也惟有清氣養榮滋方寸靈臺之雨露以寧
膈中之煩燥則甲胆乙肝之相火不撲而自滅矣陰
火者龍雷之火也起於九泉之下遇寒水陰墮則其
焰愈騰若太陽一照自然消隕此三火者皆無求於
降火滋陰亦何事乎知柏而用之以貽害乎且黃柏
傷胃知母滑脾胃傷則飲食不進脾胃滑則洩瀉无度
一藏一腑乃生人之本經云得穀者昌失穀者亡又
曰陽精上奉其人壽陰精下降其人夭今以苦寒傷
胃豈非失穀者亡乎以冷滑洩脾胃豈非下降者天乎
想世用此者意在滋陰而不知苦寒下降多亡陰陰

卷下

七

虧而火易熾意在清金而不知中土既潰絕金之源
金薄而水益衰吾知用此者未見其利徒見其害耳
每見虛勞之人未有不走脾胃而死者則知柏之厲
也

麥冬 五味 初病酌用

治肺之道一清一補一斂故麥冬清人參補五味斂
三者肺怯之病不可缺一者也然麥味之清斂固有
道焉蓋虛勞之初起亦有外感而成故其初治必兼
柴前以疎散之未可驟加斂補施治之次第宜然若
不知初病久病之分或驟清驟補驟斂則肺必致滿

促而不安邪氣濡滯久而不徹此非藥之害實由用
之失節耳若夫疏解之候邪氣既清元氣耗散則當
急用收斂清補為主舍此三物更何求焉况五味木
但以收斂肺為功兼能堅固心腎為虛勞必用之藥
乃在用之不當者反咎五味酸能引痰致嗽畏而棄
之殊不知病至於伏火乘金金氣耗越之際除却此
味更用何藥以收之耶

澤瀉 宜用

夫肺金為氣化之源伏火蒸灼則水道必汗汗則金
氣不行而金益病且水停不流則中土濡濕而奉上

卷下

八

無力故余治勞嗽吐血之症未有不以導水為先務
者每稱澤瀉有神禹治水之功夫亦嘗究其命名之
義矣蓋澤者澤其不足之水瀉者瀉其有餘之火也
惟其瀉也故能使生地白芍阿膠人參種七補藥之
品得其前導則補而不滯惟其澤也故雖走濁道而
不走清道不若猪苓木通腹皮等味之消陰破氣直
走無餘要知澤瀉一用肺脾腎三部咸宜所謂功同
神禹者此也古方用六味丸用之功有四種願生微
論論之極詳庸醫不察視為消陰損腎之品置而不
用何其謬甚

桑皮 宜用

桑白皮清而甘者也清能瀉肝火之有餘甘能補肺氣之不足且其性潤中有燥為三焦逐水之妙劑故上部得之清火而滋陰中部得之利濕而益土下部得之逐水而散腫凡虛勞症中最忌喘腫二候金逆被火所逼高而不下則為喘土卑為水所侮陷而失隄則為腫喘者為天不下濟於地腫者為地不上交于天故上喘下腫天崩地陷之象也是症也惟桑皮可以調之以其降氣也故能清火氣於上焦以其折水也故能奠土德于下位奈何前人不察以為性不純良用之當戒不知物性有全身上下純粹無疵者惟桑之與蓮乃謂其性不純良有是理乎

卷下

九

桔梗 宜用

夫肺如華蓋居最高之地下臨五藏以布治節之令其受病也以治節無權而氣逆火升水滲上泛濕滯中州五藏俱乖百藥少效惟桔梗稟至清之氣其升浮之性兼微苦之味至清故能清金升浮故能載陷微苦故能降火寔為治節君主之劑不但引清報使而已此味升中有降以其善清金金清自能布下降之令故也清中有補以其善保肺肺固自能為氣血

之主也且其質不燥不滯無偏勝之敵有十全之功服之久自能清火消痰寬胸平氣生陰益陽功用不可盡述世之醫者每畏其開提發散而於補中不敢輕用多用沒其善而掩其功可惜也

丹皮 地骨皮 宜用

夫黃柏知母其為倒胃敗脾之品固宜黜而不錄矣然遇相火爍石流金之際將何以處此曰丹皮地骨皮平正純良用代知柏有成無敗丹皮主陰抑火更兼平肝骨皮清火除蒸更兼養肺骨皮者枸杞之根也枸杞為補腎之要藥然以其升而實于上也但能

卷下

十

溫髓助陽虛勞初起相火方熾不敢驟用若其根伏而在下以其在下也故能資腎家真水以其皮故能舒肺葉之焦枯涼血清骨利便退蒸其功用較丹皮更勝且其味本不苦不致倒胃質本不濡不致滯脾施治允當功力萬全有知柏之功而無其害最為善品

生地 宜用初病審用

世人以生地為滯痰之物而不敢輕用是不知痰之隨症而異也雜症之痰以燥濕健脾為主傷寒之痰以去邪清熱交通中氣為主惟虛症之痰獨本於陰

虛血少火失其制乃上剋肺金金不能舉清降之令
精微不徹於上下滯而為痰作咳治宜清肺則邪自
降養血則火自平故余於清金劑中必兼養營為主
營者血也陰者水也潤下之德也清金若不養榮如
吹風滅火風勢愈逆烈焰愈生清金養營者為引水
制火沾濡瀰漫烟氣永息故桔梗桑皮貝母之類清
金之品也生地丹皮當歸之類養營之品也而養營
劑中又以生地為第一以生地治雜症之痰則能導
痰之道能滯化痰之氣且其力滋補反能助痰之成
若加之虛勞劑中則肺部喜其潤心部喜其清腎部

卷下

喜其滋肝部喜其和脾部喜其甘緩而不冷不滑故
勞嗽骨蒸內熱吐血咯血劑中必無遺生地之理除
勞嗽初起客邪未清痰嗽盛時亦暫忌生地滯泥若
表症既除內熱蒸灼非生地之清潤以滋養化源則
生机將絕矣若畏其滯而始終不用乃是不明要義
也

茯苓 宜用

有為茯苓善滲下元不足者忌之非也蓋茯苓為古
松精華蘊結而成入地最久得氣最厚其質重其氣
清其味淡重能培土清能益金淡能利水惟其得土

氣之厚故能調三部之虛七熱虛火濕氣生痰凡涉
虛者皆宜之以其質中和粹美非他迅利剋伐者比
也夫金氣清降自能開水之源土氣調平自然益氣
之母三臟既理則水火不得凌凌故一舉而五藏均
調又能為諸陰藥之佐而去其滯為諸陽藥之使而
宜其道補不滯清洩不峻利精純之品無以過之

黃芪 宜用

余嘗說建中之義謂人之一身心上腎下肺右肝左
惟脾胃獨居於中黃芪之質中黃表白白入肺黃入
脾甘能補中稟能實表夫勞倦虛勞之症氣血既虧

卷下

中外失守上氣不下下氣不上左不維右右不維左
得黃芪益氣甘溫之品主宰中州中央旌幟一建而
五方失位之師各就其列此建中之所由名也故勞
嗽久七失氣氣不根於丹田血隨氣溢血既虧氣
亦飛揚斯時也雖有人參回元氣於無何有之鄉究
竟不能固直元於不可拔之地欲久安長治非黃芪
不可蓋人參之補迅而虛黃芪之補重而實故呼吸
不及之際芪不如參若夫鎮浮定亂返本還元統氣
攝血實表充裡其建立如墻壁之不可攻其節制如
將令之不可違其饒益如太倉之不可竭其禦邪扶

正如兵家之前旄中堅後勁不可動搖種七固本收功之用參反不如芪故補虛以黃芪為培垣白朮作基理有見服參久久漸至似有若無進道用有餘終是浮弱不禁風浪若用芪朮兼補可至風雨不畏寒暑不侵向來體弱者不覺脫胎換骨誠有見於此也除勞嗽初起中土大傷氣大方盛心肺雖失其和脾胃猶主其事此時只宜養榮為主黃芪微帶尚宜緩投若久病氣虛肺失其制脾失其統上焉而飲食漸難下焉而泄瀉頻作此時若不用黃芪以建中白朮以實土徒以沉陰降濁之品愈傷上奉升騰之用必

卷下

七

無濟也

白朮 宜用初病審用

虛勞初治未有不以清金為第一義者而清金之品生地阿膠丹皮白芍之外又有如麥冬之清心保肺玄參之甘寒清火為虛勞所必須然有一種中土素弱之人脾胃不實并麥冬亦微惡其冷元參亦且嫌其寒久漸妨飲食漸陷中氣於斯時也又宜以培土調中為主其法在雜症門中用藥頗多惟虛症內培土之劑止有黃芪白朮茯苓山藥有功而無過夫虛勞之培土也貴不損至高之氣故一陳之煖脾胃

之烈固萬萬不可即福豈之健脾苡仁之勝瘴猶未免於走血俱未盡善若乃四味之中茯苓山藥雖沖和而無峻補回生之力即芪朮二種並用又以朮為土部專經之劑兼為益氣之品故能培土以生金而至高之部胥有類也夫朮性微燥於虛症似當緩投然却喜其燥而不烈有合中央之土德且補土自能生金如山岳之出雲蒸霧降為雨露以濡萬物而何病慘之有哉繆仲淳謂其燥能傷陰殊不知傷陰為蒼朮厚朴之類豈可以白朮微燥中和之品同語耶且治法收功之時非培土則浮火終不歸根知白朮

卷下

七

之功大矣

柴胡 酌用

柴胡升清調中平肝緩脾清熱散火理氣通血出表入裏黜邪輔正開滿破結安管扶衛凡藏府經絡無所不宜在虛勞初起或為外感時邪固為必須之品至於七情所結浸淫鬱滯有待宣通合此柴前二胡則無有秉性純良出其右者矣故每用些少以佐之然後專用清源補斂之品迺為十全即其調理之人中間或擾或感亦必急用柴胡防風葛等味清微之然後仍用補斂庶免關門捉賊之患但其性升散用

者當中病即止不可多用常用耳更有女人抑鬱傷陰與夫聲勞之後必當選用蓋多鬱則傷元氣柴胡平肝散鬱功最捷也後人因陳藏器一言忌用柴胡遇內傷外感之症將反用麻黃紫蘇等味以散之耶陳皮 偶用

夫桔梗本以載氣上行而氣火以平者可見虛勞之氣皆由於火侵肺也若雜症之有胸膈氣滯皆由於寒濕侵胃故用陳皮之辛以利之誠為至當乃世醫不察虛勞雜症之分但見胸口氣滯輒以陳皮理氣不知陳皮味辛而性燥辛能耗肺氣之清純燥能動

陰虛之相火本以理氣七反傷矣惟清金之久化源初動脾氣未健胃口漸覺涎多可少加陳皮以快之使中宮一清未為不可又或時氣偶來脾胃濡瀉亦可暫用數劑以清理之然亦須去病則已不宜常用蘇子 不必用

夫虛勞至火既乘金之氣高而不降治宜平其火而已不必下其氣也惟雜症之喘急而氣高者有三子養親之說而醫者混以治勞以為得直蘇子下之則氣可平而火可降喘可定而痰可消不知其復也必增劇矣惟白前一味為平喘之上品凡擷肚擡肩氣

高而急能坐而不能臥能仰而不能俯者用此以平之取效捷而元氣不傷大非蘇子可比

枳殼 不可用

虛勞施治曰清金曰安神曰培土曰調肝曰益腎而惟補之一字徹乎終始故火亦補痰亦補滯亦補三焦五藏六府十二經絡無所往而不宜補者乃有謬妄之流一見中氣塞滯不究虛實便用枳殼以代之不知虛勞治氣與雜症不同其滯也不可以利之其高也不可以下之其治滿也不可以破之陳皮蘇子已不當用况枳殼青皮乎

杞子 酌用

虛勞之施治有次序先以清金為主金氣少肅即以調脾為主金土咸調則以補腎要其終故初治類多用元參麥冬漸次菟朮終治牛膝龜鹿膠杞子之類收功奏效返本還元凡屬陰虛未有不以此為扼要者也然杞子之性太溫若君火未明相火方熾肺葉舉張之時龍雷鼓動之後投此劑則嗽必頻熱必盛溺必滴血必湧溢而不可止世醫每執杞子性涼之說試問性若果涼胡為與陽之驟耶

當歸 審用

夫當歸之養榮以佐清金也尚矣然其味未免於辛其性未免於溫雖有養血大功亦為行血活血之品故治吐血症者宜待血勢既定血絡稍固君相二火咸調然後以此大補腎水以收功若執古人之論謂當歸命名之義使氣血各得其歸不顧血症新久而用之亦有誤處

桂圓 審用

龍眼大補心血功並人參然究為溫熱之品故肺有鬱火亢亢而血絡傷者服之必劇世醫但知其補而昧於清溫之別凡遇虛勞心血衰少夜臥不寧之類

輒投之殊不知肺火既清之後以此大補心脾信有補血安神之效若肺有鬱伏之火服之則反助其火或正當血熱上冲之時投此甘溫大補之味則血勢必湧溢而加冲不可不慎也

理虛元鑑下卷終

中國醫學大成第七集

內科類
虛勞叢刊之一

虛損啟微 全

上海大東書局印行

虛損啟微提要

清洪緝菴撰。緝菴字洪燁。浙江餘姚人。書成於乾隆辛巳。其上卷首述經義。闡明調攝之義。保持固有元神。庶幾可免致虛成損。得盡其天年。次論證。既不能遵行古人攝生調神諸法。或以酒為漿。或以妄為常。或醉飽入房。或飲食過度。或喜怒失常。或七情內傷。皆能致虛。陰虛者。其病則為發熱煩躁。頭紅面赤。唇乾舌燥。吐血衄血。陽虛者。其病則為怯寒憔悴。氣短神疲。頭暈目眩。嘔惡食少。腹痛飧泄。二便不禁等。至若欬嗽吐痰。遺精盜汗。氣喘聲痞。筋骨疼痛。心神恍惚。肌肉漸削。婦人月閉等症。治法之要。陰虛補陰。陽虛補陽。或咳嗽。或失血。或骨蒸。或遺精。或婦人月閉。各列現證。按證施治。及諸虛見證。分別陰陽寒熱虛實治法。次論虛損勞瘵。次論虛損傳變。論五勞七傷六極。辨虛火。論脈。論爪。論癩。辨虛損危

虛損啟微 提要

虛損啟微 提要

候。辨似損非損。其下卷列方七十二道。鑑別各方。專治證候。及加減各法。辨證詳明。用藥準確。斷非他書所能及。實為虛勞類中最要之書也。

張序

余友洪君緝菴。病棄舉業。潛心醫學。不數年。得其奧。嘗示所著虛損啓微。採集精要。辨論明晰。非他方書所及。或以多錄成方為議。不知成方者。規矩也。規矩積古今而不可易。有所變通。視夫人之善用其巧。緝菴此書。真具有與人規矩。不能使巧之微。緝菴又最孝。其學醫也。雖因己病。而實圖治其母夫人之疾。始余嘗見其秤藥量水。心極精審。多語余藥性。故余於醫道。獨學緝菴而得者。其所著敢易視耶。况又為人之所不能易視者耶。惜其亡後。多致散逸。恐不久為醫家覆瓿用矣。特錄存之。時

乾隆辛巳小春中浣羅山張廷枚識

虛損啓微 張序

一

虛損啓微 張序

二

自序

陸宣公見古方。必手鈔錄。范希文自以不為良相。當為良醫。余癡瘵也久。勸於文史。旁涉方書。於虛損一症。尤加體會。自救也。因以救人。肱蓋三折矣。歲壬申。隨侍山陽官署。暇輒以己意條疏數語。積而成卷。或亦啓微之論。發古人之所未發。而其方則仍采諸古。古即不宜於今。斟酌之。增減之。神而明之。存其人也。重九後三日。病夫洪煒識於淮署之飲默軒。

虛損啓微 自序

一

虛損啓微 自序

二

虛損啓微目錄

卷上

經義.....一
論證.....一〇
陰虛論治.....一一
陽虛論治.....一二
咳嗽.....一二
失血.....一三
骨蒸.....一六

虛損啓微目錄

論噴.....三三
虛損危候.....三四
辨似損非損.....三五

卷下

列方.....一
六味地黃丸.....三
八味丸.....三
大補元煎.....四
左歸飲.....四
右歸飲.....五

遺精.....一七
女人月閉.....一八
諸虛見症.....一九
論虛損勞瘵.....二六
論虛損傳變.....二七
論五勞七傷六極.....二八
辨虛火.....三〇
論脈.....三一
論爪.....三三

二

左歸丸.....六
右歸丸.....七
八珍湯.....九
十全大補湯.....九
人參養榮湯.....九
五福飲.....一〇
七福飲.....一〇
獨參湯.....一〇
養心湯.....一一
天王補心丹.....一一
柏子養心丸.....一二

人參固本丸.....一二
一陰煎.....一三
加減一陰煎.....一四
二陰煎.....一四
三陰煎.....一五
四陰煎.....一六
五陰煎.....一七
大營煎.....一七
小營煎.....一八
坎離交濟丹.....一八
地六湯.....一九

虛損啓微目錄

補陰益氣煎.....二五
舉元煎.....二六
歸脾湯.....二六
加味歸脾湯.....二七
百合固金湯.....二七
烏賊魚骨丸.....二八
五物煎.....二八
理中湯.....二九
理陰煎.....二九
四味回陽飲.....三〇
六味回陽飲.....三〇

金鎖正元丹.....一九
金鎖思仙丹.....二〇
水陸二仙丹.....二〇
固精丸.....二一
直指固精丸.....二一
家韭子丸.....二二
豬肚丸.....二二
秘元煎.....二三
固陰煎.....二三
苓朮兔絲丸.....二四
補中益氣湯.....二四

四

溫胃飲.....三一
鎮陰煎.....三一
壽脾煎.....三一
一禿丹.....三三
六氣煎.....三四
保飲煎.....三四
抽薪飲.....三四
從薪飲.....三六
清化飲.....三六
秦朮鱉甲散.....三七
柴胡梅連丸.....三七

虛損啓微

清 姚江 緝菴洪 煒霞城纂

鄞縣 曹赤電炳章圈點

卷上

經義

上古天真論曰。今時之人。以酒為漿。以妄為常。醉以入房。以欲竭其精。以耗散其真。不知持滿。不知御神。務快其心。逆於生樂。起居無節。故半百而衰也。

本神篇曰。五藏主藏精者也。不可傷。傷則失守而陰虛。陰虛則無氣。無氣則死矣。

○故智者之養生也。必順四時而適寒暑。和喜怒而安居處。節陰陽而調剛柔。

虛損啓微 卷上 經義

虛損啓微 卷上 經義

如是則僻邪不至。長生久視。

生氣通天論曰。凡陰陽之要。陽密乃固。兩者不和。若春無秋。若冬無夏。之猶四時因

而和之。是為聖度。故陽強不能密。陰氣乃絕。陰平陽秘。精神乃治。陰陽離決。精

氣乃絕。

宣明五氣論曰。久視傷血。久臥傷氣。久坐傷肉。久立傷骨。久行傷筋。

痺論曰。陰氣者。靜則神藏。躁則消亡。

五癯津液別篇曰。陰陽不和。則使液溢。而下流於陰。髓液皆減而下。下過度則虛。

虛故腰痛背痛而脛痠。陰陽不和。則精氣俱亂。不相統攝。故液溢於下而流

調經論曰。陽虛則外寒。陰虛則內熱。

衛氣篇曰。下虛厥。上虛則眩。

通評虛實論曰。所謂氣虛者。言無常也。能接續不尺虛者。行步恒然。尺虛則下虛也。

遺遙飲……………三七

金水六君煎……………三八

貝母丸……………三九

一柴胡飲……………三九

二柴胡飲……………四〇

三柴胡飲……………四〇

四柴胡飲……………四一

五柴胡飲……………四一

正柴胡飲……………四二

柴陳煎……………四三

麥煎散……………四三

虛損啓微 目錄

虛損啓微 目錄

然。去如焰之速是心精之子奪也。草乾而死。子奪無根者。陽盡時也。脈至如散葉。浮泛無根是肝氣子奪也。木葉落而死。木敗。脈至如省客。省客者。脈塞而鼓。如省問之客去來無定。是腎氣子不足也。懸去棗華而死。華言去棗華。開落之時火王。○脈至如丸泥。堅強短脆。是胃精子不足也。榆莢落而死。榆莢水敗而時火王。○脈至如橫格。長而且堅。如橫。是膽氣子不足也。禾熟而死。禾熟於土敗也。○脈至如弦。如弦之細是胞精子不足也。胞子官命門元陽也。病善言。下霜而死。不言可治。善言則陰氣不藏而虛陽外見。故至下霜時虛。○脈至如交漆。交漆者。左右旁至也。旁至而纏綿不清。微見三十日死。陰陽偏敗。死期已促。○脈至如湧泉。浮鼓肌中。而浮鼓於肌肉之中。降太陽勝氣子不足也。少氣味。非英而死。外實內虛。陰精不足。故為少氣味。○脈至如類土之狀。按之不得。無力。按之即是肌氣子不足也。五色先見。黑白發。死。肌氣即脾氣。黑色者土敗。白色者木敗。不可得是肌氣子不足也。五色先見。黑白發。死。而水反乘之也。白乘於土。土敗於水。

虛損啓微 卷上 經義

七

木敗矣。○脈至如懸雍。懸雍者。浮揣切之益大。浮短下垂。內乳下懸。雍是十二俞輸之子不足也。俞皆在背。為十水凝而死。陰陽絕。○脈至如偃刀。偃刀者。浮之小急。叩刀按之堅大急。叩刀五藏苑熱。寒熱獨并於腎也。五藏熱而獨并於腎也。如此其人不得坐。腰為腎。立春而死。立春陽氣盛。○脈至如丸。短滑不直。手不直手者。按之不可得也。是大腸氣子不足也。棗葉生而死。棗葉生。火王克金。○脈至如華者。輕浮柔弱。令人善恐。不欲坐臥。行立常聽。是小腸氣子不足也。心陽與心。表裏故。季秋而死。丙戌。玉機真藏論曰。大骨枯槁。肩垂項傾。腰重膝軟。○大肉陷下。○尺膚細削。則腎肉消。則胸中氣滿。喘息不便。其氣動形。動則氣不歸原。而肺藏敗矣。期六月死。尺者一歲。陰真藏脈見。乃予之期日。以定其死期。○大骨枯槁。腎大肉陷下。胸中氣滿。喘息不便。內痛引肩項。病及期一月死。月。前已甚。故期一。真藏見。

虛損啓微 卷上 經義

八

乃予之期日。大骨枯槁。腎大肉陷下。胸中氣滿。喘息不便。內痛引肩項。心身熱。脫肉破。至。此而肝亦敗矣。真藏見。十日之內死。五藏俱傷。真藏又見。○大骨枯槁。腎大肉陷下。脾肩髓內消。骨枯動作益衰。肉陷真藏未見。期一歲死。雖諸症未全。然敗竭已兆。僅支一年。歲易氣新。不能再振矣。見其真藏。乃予之期日。○大骨枯槁。腎大肉陷下。胸中氣滿。脾腹內痛。心中不便。心肩項身熱。破。胸脫肉。肝目匡陷。真藏見。目不見人立死。神氣已脫。其見人者。至其所不勝之時則死。神氣猶存。故必死。○真肝脈至。中外急如循刀刃。責責然。如按琴瑟。弦色青白不澤。毛折乃死。○真心脈至。堅而搏。如循薏苡子累累然。短。實色赤黑不澤。毛折乃死。○真肺脈至。大而虛。如以毛羽中人。膚色白赤不澤。毛折乃死。○真腎脈至。搏而絕。甚如指彈石。辟辟然。色黑黃不澤。毛折乃死。○真脾脈至。弱而乍數乍疎。色黃青不澤。毛折乃死。必得五藏之血氣而充也。○諸真藏脈見者。皆死不洽也。

虛損啓微 卷上 經義

九

論證

虛損啓微 卷上 論證

一〇

虛損之由。不論酒色勞倦。七情飲食。皆能致此。而惟陰陽之辨為最要。陰虛者。其病則為發熱躁煩。頭紅面赤。唇乾舌燥。咽痛口瘡。吐血衄血。便血尿血。大便燥結。小水痛澀等證。陽虛者。其病則為怯寒。憔悴氣短。神疲頭暈。目眩嘔惡。食少腹痛。飧泄。二便不禁等證。至若欬嗽吐痰。遺精盜汗。氣喘聲瘖。筋骨疼痛。心神恍惚。肌肉漸削。夢與鬼交。婦人月閉等症。則又無論陰陽。而凡病至甚者。皆其所必至。然腎為五藏之本。水為天一之源。則凡患虛損者。實惟腎水之虧。十居八九。蓋腎水虧則肝失所滋。而血燥生。腎水虧則水不歸源。而脾痰起。腎水虧則心腎不交。而神色敗。腎水虧則盜傷肺氣。而欬嗽頻。腎水虧則孤陽無主。而虛火熾。節齋先生云。人若色慾過度。傷損精血。必生陰虛火動之病。丹溪先生

云。凡患虛者。多陰虛也。古人豈欺我哉。

陰虛論治

陰虛者多熱。以水不濟火。而陰虛生熱也。欲滋其陰。惟宜甘涼醇靜之物。大忌辛溫。如乾薑、桂附、故紙、白朮、蒼朮、半夏之屬。斷不可用。即如人參、黃耆、枸杞、當歸、杜仲、兔絲之類。是皆陰中有陽。尤當斟酌。蓋陽旺則陰愈消。熱增則水益涸矣。然陰虛之熱。為真水之虧。寒涼之品。又不可妄用。其有火盛而不得不從寒治者。亦當兼壯水之劑。可止即止。以防其敗。斯得滋補之大法矣。

夜熱或午後熱。或喜冷便實。此皆陰虛生熱。水不制火也。宜加減一陰煎。○驚悸失志。火在心腎也。宜二陰煎。○若外熱不已。而內不甚熱。則但宜補陰。不宜清火。宜一陰煎。或六味地黃湯。

虛損啓微 卷上 陰虛論治

虛損啓微 卷上 陰虛論治 效嗽

一一

陽虛論治

陽虛者多寒。以陽氣不足而寒生於中也。欲補其陽。惟辛甘溫燥之劑為宜。勿兼清涼寒滑之品。如生地、芍藥、天麥冬、沙參之屬。皆非所宜。而石斛、元參、知柏、芩連、龜膠之類。則又切不可用。

氣血俱虛者。宜大補元煎。或八珍湯。十全大補湯。○五藏俱虛。宜平補者。五福飲。○命門陰分不足者。左歸飲。左歸丸。○命門陽分不足者。右歸飲。右歸丸。○氣分虛寒者。六氣煎。○脾腎陰分虛寒。諸變不一者。理陰煎。○三焦陽氣大虛者。六味回陽飲。○氣虛脾寒者。一炁丹。○胃氣虛寒者。溫胃飲。理中湯。○血虛寒滯者。五物煎。

效嗽

虛損啓微 卷上

三七

腎水不能制火。所以克金。陰精不能化氣。所以病燥。故有咳嗽喘促。咽痛喉澹聲啞等症。只宜甘涼至靜之劑。滋養金水。使肺腎相生。不受火制。則真陰漸復。而嗽可漸愈。○火盛者。宜四陰煎加減。○火微者。宜一陰煎。六味地黃湯。或左歸飲。○兼受風寒而嗽者。宜金水六君煎。或百合固金湯。○貝母丸治嗽最佳。

失血

陰平陽秘。五藏調和。何失血之有。惟真陰有傷。則或吐或衄。所不能免。但當察其有火無火。及火之微甚而治之。切勿概用寒涼之劑。

火盛載血上行。脈症俱熱。急則治標。不得不暫用芩、連、梔、柏、竹葉、童便之屬。或以抽薪飲。徒薪飲之類主之。○若陰虛而兼微火者。宜保陰煎。或清化飲。或加減一陰煎。○上盛下虛。血隨氣上。氣降則血自歸經。宜一陰煎。加鬱金、香附之

虛損啓微 卷上 失血

虛損啓微 卷上 失血

一一

類。○若無實火。而全屬陰虛。陰血失守。而為吐為衄者。是宜甘醇養陰。以靜制動。以和治傷。使陰氣安靜得養。則血自歸經。宜一陰煎。或六味地黃湯。或小管煎之類。○若陰虛連肺。而兼嗽兼血者。宜四陰煎加減。○若因勞役。別無火症。心脾腎三陰受傷而動血者。宜五陰煎。五福飲。六味地黃丸之類。○若陰虛於下。格陽於上。六脈無根。而大吐大衄者。此火不歸源。真陽失守也。宜右歸飲加減。或八味地黃湯亦可。思慮勞倦過傷者。多有此症。○若因勞倦而素易嘔瀉。致脾不攝血。而為吐血下血者。宜六味回陽飲。大加白朮。勿用涼藥。○若大吐大衄。六脈細脫。手足厥冷。危在頃刻。而血猶不止者。速用鎮陰煎。其血自止。若血脫至甚。氣亦隨之。至厥逆昏憤。速當益氣以固生機。宜獨參湯。或六味回陽飲。四味回陽飲。用寒涼即死。○凡喘滿咳嗽。左右膈間。隱隱作痛。病在肺也。宜清降不宜升浮。膈中牽痛如縷。懊懣嘈雜。病在心包絡也。宜養營。不宜耗

散。○胸腹膨脹。不知饑飽。多涎沫無味。病在脾也。宜溫中。不宜酸寒。○脅肋牽痛。躁擾喘急寒熱。病在肝也。宜疏利。或宜甘緩。不宜祕滯。○氣短聲啞。蒸熱盜汗。咽乾喉痛動氣。病在腎也。宜壯水。不宜香燥。○大嘔大吐。煩渴頭痛。大熱不得臥。病在胃也。宜大瀉。或宜大補。○若血色如硃。光亮如漆。吐出即乾。以指甲剔之。成片而起者。雖能食不飽。後必暴脫而死。若血中見似肉似肺。如爛魚腸。此胃中脂膜。為邪火所燥。凝結而成。方書咸謂必死。然吐後凝結。既去而不發熱。能進飲食。調理得宜。多有得生者。○出於肺。多帶痰沫。及粉紅色。出於心包。色必正赤。如朱漆光澤。若吐出便凝。摸之不粘指者。為守藏之血。見之必死。出於脾者。亦必鮮紫濃厚。但不若心包血之光澤也。出於肝者。血必青紫稠濃。或帶血縷。或有結塊。出於腎者。或從咳逆。或從咯吐。或稀痰中雜出如珠血。雖無幾。色雖不鮮。其患最劇。出於胃者。多兼水液痰涎。吐則成盤成盞。汪洋滿地。○

虛損啓微 卷上 失血

一五

虛損啓微 卷上 失血 骨蒸

一六

失血後頭暈發熱者。往往有之。此是虛火上炎外擾之故。不可誤認外感。○血若暴湧如潮。喉中汨汨不止。脈見虛大。此火勢未斂。不可便與湯藥。急以熱童便。或藕汁灌之。俟半日許。脈勢稍緩。可進調養之劑。服藥後脈漸調和。飲食漸進。肢體輕捷。面色不赤。足膝不冷。身不灼熱。額無冷汗。澀便如常。雖有紫黑血塊。時欲咯出。而無鮮血上行。方許可治。血雖止而脈大不減。或雖小而弦細數疾。或弦硬不和。慎勿輕許可治。亦有他部柔和。而左手關尺弦強者。為陰虛火旺。最為危兆。其變有三。一則陰火引血復上而暴脫。一則虛陽發露而發熱。一則火上逼肺而喘咳。此終不救。○血不止者。用童便最效。或搗側柏葉以童便二分。酒一分。和飲之。大能止血。○吐血新止後。用燕窩冰糖各四錢。同煮服之。連服五七日。永不復發。

骨蒸

凡治骨蒸。熱深在裏。一切輕揚之藥。皆在所禁。若用以升散之。反引熱勢外出。而增其熾灼。乾涸津液。肌肉枯槁。求其止在內熱。且不可得。安望其熱除病止乎。水虧血燥。陰火沸騰。宜加減一陰養。加青蒿主之。○若精血留於經脈。阻滯為熱。積陰為疰。蒸久血乾。速宜去瘀。麥煎散主之。○又風附於骨。亦令蒸熱盜汗。宜秦艽龍甲散。或柴胡梅連丸。○又有陽邪入骨。不能泄越。而先寒後熱。脈長有汗者。宜用石膏。

遺精

虛損而兼遺泄者。如實漏卮。最難調治也。或緣君火之搖。或緣相火之盛。或緣玉門之不固。或緣心腎之不交。又或氣不攝精。而滑脫不禁。或元陽衰憊。而關閉亂流。急須反觀內養。而以藥餌調劑。必使痛斷根株。然後本病可得瘳也。

虛損啓微 卷上 遺精

一七

虛損啓微 卷上 女人月閉

一八

君火不清。神搖於上。精搖於下。火甚者。宜先以二陰煎之類。清去心火。火不甚者。宜先以柏子養心丸。天王補心丹之類。收養心氣。然後用藥固之。○相火易動。肝腎多熱。而易於疏泄者。惟經驗猪肚丸為最。或用固精丸之類。然須察其火之微甚。宜清者。亦當先清其火。○玉門不固者。宜荅朮兔絲丸。或水陸二仙丹。金鎖正元丹。金鎖思仙丹之類。○心腎不交者。宜坎離交濟丹。○氣不攝精者。宜秘元煎。或舉元煎。壽脾煎。或十全大補湯。○元陽不足者。宜右歸丸。八味丸。家韭子丸。或固腎丸之類。

女人月閉

凡婦女病損至旬月半載後。未有不經閉者。此因陰竭。所以血枯。最為危殆。必須漸漸通利。方可回生。若或久久斷絕。斷難施治。然欲其不枯。無如養營。欲其通

之。無如充之。但使雪消。則春水自來。血盈則經脈自至耳。若再用桃仁。紅花之類。是與榨乾汁者無異。非治法也。

血枯經閉。通用烏賊丸。○水不制火。夜熱盜汗。及煩渴咳嗽者。宜一二三四五陰等煎。擇宜用之。○慾念不遂。心脾鬱結者。宜逍遙飲。○三陰虧弱。無寒無熱。平藏者。宜小管煎。五福飲。或左歸飲。左歸丸之類。○三陰虧弱。兼陽虛者。宜大營煎。理陰煎。及右歸飲。右歸丸。八味地黃湯丸之類。

諸虛見九症

兩額紅或唇紅。陰虛於下。逼陽於上也。仲景先生云。其面戴陽者。下虛故也。

虛而渴欲多飲。腎水不足。引水自救也。又火乘金位也。

足心如烙。虛火燦陰。湧泉涸竭也。

虛損啟微 卷上 諸虛見症

一九

虛損啟微 卷上 諸虛見症

二〇

暗啞聲不出。腎氣竭也。蓋聲出於喉。而根於腎。經曰。內奪而厥。則為瘖俳。腎氣虛也。

虛而喘急。陰虛肺格。氣無所歸也。又水不制火。衝脈上衝也。

喉乾咽痛。真水虧。虛火上炎也。

不眠恍惚。血不養心。神不能藏也。又腎不交心。心火無制也。

時多煩躁。陽中無陰。柔不濟剛也。

易生嗔怒。水虧木燥也。

盜汗不止。有火則陰不能守。無火則陽不能固也。

骨痛如折。腎主骨。真陰敗竭也。尋常痛。骨衰而火乘之也。

筋急痠痛。肝失所滋也。

痰如清水。而口不渴。水泛為痰。脾不制水也。

虛損啟微 卷上

痰多白沫而口渴。水沸為痰。陰火煎熬也。宜壯水以制相火。

心下跳動。氣不歸精也。經曰。胃之大絡。名曰虛里。出於左乳下。其動應衣。宗氣泄也。欲納氣歸原者。惟有補陰以配陽一法。

小便黃澀淋瀝。真陰虧。氣不化水也。

消瘦。精不生氣也。又燥萬物者。莫熾乎火。陰火盛也。若肉極者。陰火久灼難治。若勞倦傷脾而然。宜用十全大補湯。

善驚。火起於心也。或心傷而神不安也。

爪甲痛。木極筋虧。金氣乘之也。用猪膏養筋。

腰脅痛。肝腎虛也。

不能久立。筋不束骨也。當滋腎生肝。

不能獨臥。肝腎虛也。

虛損啟微 卷上 諸虛見症

虛損啟微 卷上 諸虛見症

虛損啟微 卷上 諸虛見症

三一

虛損啟微 卷上 諸虛見症

三二

皮毛枯。無津液以充澤皮毛也。

足心痛。肝腎傷也。

手指微脹。言語急遽。真陰虧也。當清金滋水。

合目恍惚不寧。陰虛而三焦包絡之火遊行也。

內熱。五心熱。水虧火炎也。

虛損呃逆。水不制火。木挾火勢。衝逆而上也。

口瘡。心火上炎也。宜天王補心丸。

目昏。腎虛也。宜六味地黃。加柴胡。五味。

虛而大便結。水虧液涸也。宜地六湯。

胸膈隱痛。腎虛不能納氣歸源。氣滯於上。而不流暢也。補陰之中須納氣。

虛損頭暈。上焦陽氣虛也。或陰虛血損。氣逆上衝也。

怔忡不寧。血虛或有痰也。各藏有疾。皆能與包絡之火合動而為怔忡。隨其所犯而補瀉之。更須從包絡而調之。平之。如各藏移熱於心。以致包絡火動。治亦如之。

健忘。心血不足。而痰與火亂其神明也。又腎不足而志衰。不能上通於心也。

臚中不樂。怒則氣上。恐則氣下。一怒一恐。拂於臚中也。宜用柴胡、蒼澤。以升降之。

亦有可用連以平其逆者。

胸中痞塞。居暗避人。病名卑慄。血不足也。宜養營湯加減治之。

自覺吾身之外。更有一我。病為離魂。心氣虛也。單補其心。心足而魂自定。

鬚髮脫落。腎枯火炎。肺失治節。而內風妄動也。

虛人頭頂出汗。腎水不足。而腎火有餘也。宜滋腎清肺。用桑葉、熟地、五味、麥冬、蜜丸。服二月愈。若用止澀之藥。則目昏耳聾矣。

虛損啓微 卷上 諸虛見症

二三

虛損啓微 卷上 諸虛見症

二四

虛人每飯頭汗。胃火勝也。宜用固本。加元參、五味、棗仁。

兩足不能步履。肝腎虛。精血不足也。或因氣虛不能運動。宜用補中益氣湯。及牛膝、欒斛、黃耆。

舌根苦直。不能嚥唾。脾不能行氣於三陰也。

手足煩痛。不欲行動。骨肉空虛也。

飲食不甘。肌肉漸削。脾元失守。化機日敗也。

懸心。胃陰不足。胃火消燦心血。而懸懸不寧也。

虛損善穀。陰虛火盛。則速於傳化也。

氣短口乾。氣不足。無以化液也。又金受火制也。

氣逆左脅。上嘔酸水。脈弦數而濡。此火鬱肝血燥也。

按之至骨。其熱烙手。骨困不任腎熱也。惟烏梅能引諸藥入骨。而收其熱。

面黑羸瘦。肌膚甲錯。不能飲食。此血積胃中。而中土失其灌溉。虛極也。

汗出淋漓。一晝夜津液隨熱勢外越。速用人參。

夢與鬼交。真陰敗也。血海瘀積。經斷蒸熱。亦有是症。宜補血加參以行之。

虛而臍腹疼痛不止。腎水虧極也。重用杞子。

少腹拘急。小便牽痛。真陽內衰也。

惡寒不樂。而五心煩熱。重陰覆其陽。火不得伸也。宜用升柴以舉之。

下唇生瘡。此血瘀營虛發熱。蒸其所瘀之血。化而為蟲。遂成此症。蓋即傳尸勞之

爛也。

足寒無論陰陽。凡下虛者。皆能致此。治須辨別。又肺氣虛則逆而不行。無以及於

四肢也。

虛而氣噎。火盛則津枯。津枯則氣噎也。

虛損啓微 卷上 諸虛見症

二五

虛損啓微 卷上 諸虛見症

二六

膝下冷。火不歸源也。若上氣喘。命門衰絕也。

不時瀉泄。脾腎虛弱也。或心火不生脾土也。

髮尖生穗。血虛火炎也。

身冷。營衛虛寒也。宜用當歸、乾薑。

論虛損勞瘵

凡損傷元氣者。本皆虛症。而古方以虛損勞瘵。各分門類。則病若有異。亦所宜辨。

蓋虛損之虛。有在陽分。有在陰分。其病尚淺。或用益火。或用滋陰。見症施治。各

有宜也。至若勞瘵。則或為骨蒸。或為乾嗽。吐血吐痰。營衛俱敗。疢羸日甚。其病

深在陰中之陰分。多有不宜溫補者。此虛與勞。似乎各有分別。然要而論之。則

勞瘵之症。特不過陰虛之極深極重者耳。凡陰虛用藥失當。或誤用辛溫。或妄

投消伐。遂至日甚而成瘵矣。有不可不慎也。

論虛損傳變

不論陰陽。虛損日久。皆能傳變。有謂男子自腎傳心肺肝脾。女子自心傳肺肝脾。腎者。此其說不可信也。難經云。損脈為病。一損損於皮毛。皮聚毛落。二損損於血脈。血脈虛少。不能榮於五藏六府。三損損於肌肉。肌肉消瘦。飲食不為肌膚。四損損於筋。筋緩不能自收持。五損損於骨。骨痿不能起床。反此者。至脈之病也。從上下者。骨痿不能起於床者死。從下上者。皮聚毛落者死。觀此上損下損之說。其義極精。蓋凡思慮勞倦外感等症。則傷陽。傷於陽者。病必自上而下也。色慾醉飽內傷等症。則傷陰。傷於陰者。病必自下而上也。自上而下者。先傷乎氣。故一損於肺。而病在聲息膚腠。二損於心。而病在血脈顏色。三損於胃。而病

虛損啟微 卷上 論虛損傳變

二七

虛損啟微 卷上 論五勞七傷六極

二八

在飲食不調。四損於肝。而病為癯癯疼痛。五損於腎。而病為骨痿。二便不禁。此先傷乎陽。後及乎陰。陽竭於下。則孤陰無以獨存。而不可為也。自下而上者。先傷乎精。故一損於腎。而病為泉源乾涸。二損於肝。而病為血動筋枯。三損於脾。而病為痰涎壅盛。四損於心。而病為神魂失守。五損於肺。而病為短氣喘呼。此先傷乎陰。後及乎陽。陰竭於上。則孤陽無以獨存。而不可為也。然二者之損。又皆以脾胃為生死之大關。蓋脾胃者土也。萬物之本也。若上過乎此。則傳肝傳腎。不可治矣。下過乎此。則傳心傳肺。不可治矣。故曰心肺損而神衰。肝腎損而形敝。脾胃損而飲食不歸血氣。夫迨其傳變已深。而希望回生。不已晚乎。所貴君子者。亦在乎防微杜漸而已。

論五勞七傷六極

虛損啟微 卷上

五勞者一曰肺勞短。氣面浮鼻。不聞香臭。二曰肝勞面。目乾黑口。苦精神不守。恐畏不能獨臥。目視不明。三曰心勞。忽忽喜忘。大便苦難。或時鳴瀉。口内生瘡。四

曰脾勞。舌本苦直。不得嚙唾。五曰腎勞。背難俯仰。小便不利。色赤黃而有餘瀝。莖內痛。陰囊濕生瘡。小腹滿急。六極者。一曰氣極。令人內虛。五藏不足。邪氣多。正氣少。不欲言。二曰血極。令人無顏色。眉髮落。忽忽喜忘。三曰筋極。令人數轉筋。十指爪甲皆痛苦。倦不能久立。四曰骨極。令人瘦削齒苦痛。手足煩疼。不可立。不欲行動。五曰肌極。令人羸瘦無潤澤。飲食不生肌肉。六曰精極。令人少氣。噲噲然內虛。五藏氣不足。毛髮落。悲傷喜忘。七傷者。一曰大飽傷脾。善噫欲臥。面黃。二曰大怒逆氣傷肝。少氣目閉。三曰強力舉重。久坐濕地。傷腎少精。腰背痛。厥逆下冷。四曰形寒寒飲傷肺。少氣欬嗽。鼻塞。五曰憂愁思慮傷心。苦驚喜忘喜怒。六曰風雨寒暑傷形。髮膚枯夭。七曰恐懼不節傷志。恍惚不樂。又有

虛損啟微 卷上 辨虛火

三〇

志勞。思勞。心勞。憂勞。瘦勞。亦名五勞。陰寒。陰痿。裏急精寒。精少。陰下濕。精滑。小便苦數。臨事不舉。亦名七傷。種種區別。愈繁愈亂。按圖索驥。貽誤實多。皆非求本之論也。要之。五藏不可不分。輕重不可不辨。氣血陰陽水火。不可不知。虛症之治。無餘蘊矣。若其強作解人。硬派名目。幾何而不至殺人於反掌間也哉。

辨虛火

虛火二字。混淆已久。貽誤最多。不可以不辨也。夫火有陰盛格陽之火。有陰虛火動之火。有純屬陰虛。似火非火之火。所謂陰盛格陽者。龍雷之火。得水愈熾。得熱則散。內真寒而外假熱。真正之虛火也。補陽即消矣。有曰虛火宜補溫。能除大熱者。此之謂也。所謂陰虛火動者。真水虧乏。邪火妄行。神魂躁動。內外枯熱。是亦不得不謂之虛火。若補陽。則助其熱矣。有曰陽旺陰愈消。熱增水益涸者。

此之謂也。所謂似火非火者。原無外火銷燬。止以真陰虧竭。泉源斷流。而致為乾枯燥旱。是又不可不名為虛火。此則腎水大傷。非純補真陰莫濟矣。有曰補陰以配陽者。此之謂也。

論脈

虛損之脈。凡甚急甚數甚細甚弱甚澀甚滑甚短甚長甚浮甚沉甚疏甚緊甚洪甚實者。皆是其候。然陰陽之辨。則全以遲數二字為損症之大關鍵。雖其遲數中。又有浮沉大小之不同。要以陰虛脈數。陽虛脈遲。不可易也。大凡數脈不及六至者。可治也。六至以上者。難治也。若數甚而再加弦緊細小。則百無一生矣。然脈數至極多有兼滑。但見其滑愈甚者。其死愈近。以決短期。萬無或爽也。遲不甚遲。而脈中有神者。治之甚易。可數劑取效也。遲敗之極。而微弱無神者。

虛損啓微 卷上 論脈

三一

虛損啓微 卷上 論脈

三二

死在頃刻。雖大進溫補。無能為力也。

陰虛脈數。陽虛脈遲。是固然矣。及病至危篤。亦有數之至而漸緩者。以陰脫盡而陽亦日亡也。又有遲之甚而轉數者。以陽敗極而陰亦漸散也。此不得視為佳兆。正死期之日促耳。

陰陽雖為對待。然世人勞損。畢竟陰虛脈數者居多。陽虛脈遲者恆少。所以但見脈數。便須認定陰虛。斷不容混。惟知愈虛則愈數。愈數則愈虛。而弱症思過半矣。

弦脈者。虛損最忌。又最多也。脈經謂之中虛。崔真人謂之土敗。以余觀之。亦當先辨遲數。蓋凡遲緩而弦者。其為中虛土敗。不待言耳。若數中兼弦。則以水枯木燥。愈燥愈弦。愈弦愈燥。並不關中土之病。即使木氣燥極。亦致凌脾。究竟補水為主。而快脾等劑。斷不可用。毫釐之失。何啻千里之差。

世人右尺虛者極多。粗工不察。動云補火。不知火上浮則右尺必虛。不定屬腎寒也。若不加詳審。而遽投溫熱。鮮不致誤矣。

論爪

指爪為精血之餘。凡於診候之際。若見乾黃。覺有枯槁之色。則其髮膚營氣。具在吾目中。而損之微甚。亦可從此而識矣。此可於脈色之外。參觀並用。而資其工巧者也。

論嘔

凡陽虛之人。因氣虛也。陽氣既虛。即不能嘔。仲景先生曰。欲嘔不能。此人肚中寒。故以陽虛之證。而忽見嘔者。最是回生之佳兆。

虛損啓微 卷上 論爪 論嘔

三三

虛損啓微 卷上 虛損危候

三四

虛損危候

虛損既成。百脈空虛。精血枯涸。使非大投補劑。何以望生。若有不能服諸補之藥者。此為虛不受補也。不治。

勞損吐血失血後。嗽痰不止。而極多極濁者。此其精血飲食。皆化為痰。經曰。白血出者死。即其類也。不治。

嗽而下泄上喘者死。或嗽而肛門生瘻者。亦不治。

左右為陰陽之道路。其有不得左右眠。而認邊難轉者。此其陰陽之氣。有所偏竭也。不治。

嗽而左不得眠肝脹。右不得眠肺脹。皆為死症。

虛損原無外邪。所以病雖至困。終不憤亂。其有別無邪熱而忽譫妄失倫者。此

神去之兆。心臟敗也。必死。

勞嗽瘖啞。聲不能出。或喘急氣促者。肺藏敗也。必死。

嗽而聲啞。喉痛不能藥食者。不治。

勞損肌肉脫盡者。脾藏敗也。必死。

虛損多有筋骨疼痛。若痛至極。不可忍者。此血竭不能榮筋。肝藏敗也。必死。

勞損既久。再及大便。泄瀉不能禁止者。腎藏敗也。必死。

辨似損非損

虛損之症。必有所因。而似損非損之症。其來則驟。蓋以外感風寒。不為解散。而誤作內傷。或用溫補。或用清涼。或用消導。以致外邪鬱伏。久留不散。而為寒熱往來。及為潮熱咳嗽。其症全似勞損。若用治損之法以治。則滋陰等劑。愈以留邪。

虛損啓微 卷上 辨似損非損

三五

虛損啓微 卷上 辨似損非損

三六

熱蒸。久久非損成損矣。欲辨此者。但當審其並無積漸之因。或身有疼痛。而微汗則熱退。無汗則復熱。或見大聲欬嗽。脈雖弦緊而不甚數。或兼和緩等症。則雖病至一兩月。而邪有不解。病終不退者。本非勞損。毋誤治也。

寒熱往來不止者。宜一二三四五柴胡等飲。酌宜用之。或正柴胡飲亦可。○兼咳嗽者。柴陳煎。○若脾腎氣虛而兼咳嗽者。金水六君煎。或邪有未解而兼寒熱者。仍加柴胡。

有一種血分鬱滯。氣行而血不行。徒為蒸熱。俟蒸氣散。微汗而熱退者。此宜活血為主。

虛損啓微

清 姚江 緝菴洪 燁霞城纂

鄞縣 曹赤電炳章圈點

卷下

列方

六味地黃丸

右歸飲

十全大補湯

獨參湯

八味丸

左歸丸

人參養榮湯

養心湯

大補元煎

右歸丸

五福飲

天王補心丹

左歸飲

八珍湯

七福飲

柏子養心丸

虛損啓微 卷下 列方

虛損啓微 卷下 列方

人參固本丸

三陰煎

小管煎

金鎖思仙丹

家韭子丸

苓朮兔絲丸

歸脾湯

烏賊魚骨丸

四味回陽飲

壽脾煎

抽薪飲

一陰煎

四陰煎

坎離交濟丹

水陸二仙丹

豬肚丸

補中益氣湯

加味歸脾湯

五物煎

六味回陽飲

一禿丹

從薪飲

加減一陰煎

五陰煎

地六湯

固精丸

秘元煎

補陰益氣煎

生脈散

理中湯

溫胃飲

六氣煎

清化飲

二陰煎

大管煎

金鎖正元丹

直指固精丸

固陰煎

舉元煎

百合固金湯

理陰煎

鎮陰煎

保飲煎

秦朮鱉甲散

柴胡梅連丸 逍遙飲 金水六君煎 貝母丸

一柴胡飲 二柴胡飲 三柴胡飲 四柴胡飲

五柴胡飲 正柴胡飲 柴陳煎 麥煎散

六味地黃丸 治腎水虧損小便淋閉頭目眩暈腰腿痠軟陰虛發熱自汗盜汗憔悴瘦弱精神疲困失血失音水泛為痰病為腫脹壯水制火之劑也

熟地黃 入膏 山萸肉 四兩 山藥 四兩 澤瀉 三兩

白茯苓 三兩 丹皮 三兩

右為細末和地黃膏加煉蜜為丸桐子大每服七八十九空心食前白滾湯或淡鹽湯任下此方用水煎湯即名六味地黃湯下八味丸亦同

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛等症王太僕先生云益火之源以消陰翳即此謂也即前六

虛損啓微 卷下 列方 三

味地黃丸加肉桂製附子各一兩

大補元煎 治男婦氣血大壞精神失守危劇等症此回天贊化救本培元第一要方

人 參 補氣補陽以此為主少則熟地 補精補陰以此為主少則山藥 補二錢 杜仲 二錢 當歸 補二錢 去之 枸杞 二錢

山藥 二錢 杜仲 二錢 當歸 二錢 去之 枸杞 二錢

黃 肉 者 去 之 炙 甘 草 錢 一 二

水二鍾煎七分食遠溫服如元陽不足多寒者於本方加附子肉桂炮薑之類隨宜用之如氣分偏虛者加黃耆白朮如胃口多滯者不必用如血滯者加川芎去山萸如滑泄者加五味故紙之屬

左歸飲 此壯水之劑也凡命門之陰衰陽勝者宜此方加減主之

熟地 三錢 或加 山藥 二錢 枸杞 二錢

炙甘草 一錢 茯苓 一錢 山萸肉 者 少 用 之

水二鍾煎七分食遠服如肺熱而煩者加麥冬二錢血滯者加丹皮二錢心熱而躁者加元參二錢脾熱易饑者加芍藥二錢腎熱骨蒸多汗者加地骨皮二錢血熱妄動者加生地二三錢陰虛不寧者加女貞子二錢上實下虛者加牛膝二錢以導之血虛而燥滯者加當歸二錢

右歸飲 此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝者宜此方加減主之此方與大補元煎出入互用如治陰盛格陽真寒假熱等症宜加澤瀉二錢煎成用涼水浸冷服之尤妙

熟地 四兩 山藥 二錢 山萸 一錢 枸杞 二錢 肉桂 一錢 附子 三錢

甘草 錢 一 杜仲 二錢 肉桂 錢 一 附子 三錢

水二鍾煎七分食遠溫服如氣虛血脫或厥或昏或汗或運或虛狂或短氣

虛損啓微 卷下 列方 五

者必大加人參白朮隨宜用之如火衰不能生土為嘔噦吞酸者加炮薑二三錢一如陽衰中寒泄瀉腹痛加人參肉豆蔻隨宜用之如小腹多痛者加吳茱萸五七分如淋帶不止加破故紙一錢如血少血滯腰膝軟痛者加當歸二三錢

左歸丸 治真陰腎水不足不能滋養營衛漸至衰弱或虛熱往來自汗盜汗或神不守舍血不歸原或虛損傷陰或遺淋不禁或氣虛昏運或眼化耳聾或口燥舌乾或腰痠腿軟凡精髓內虧津液枯涸等症俱宜壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣宜此方主之

大懷熟 八兩 山藥 四兩 枸杞子 四兩 山萸黃 四兩

川牛膝 酒洗蒸三兩 兔絲子 四兩 鹿膠 四兩

龜膠 四兩 炒 必 用

山藥 四兩 山萸黃 四兩

鹿膠 四兩 炒 必 用

右先將熟地蒸爛杵膏。加煉蜜丸桐子大。每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸。如真陰失守。虛火炎上者。宜用純陰至靜之劑。於本方去枸杞。鹿膠。加女貞子三兩。麥冬三兩。如火燥肺金。乾枯多嗽者。加百合三兩。如夜熱骨蒸。加地骨皮三兩。如小水不利不清。加茯苓三兩。如大便燥結。去兔絲。加肉蓯蓉三兩。如氣虛者。加人參三四兩。如血虛微滯。加當歸四兩。如腰膝痠痛。加鹽水炒杜仲三兩。如藏平無火而腎氣不充者。加破故紙三兩。去心蓮肉。胡桃肉各四兩。龜膠不必用。五液皆主於腎。凡屬陰分之藥。皆能走腎。有謂必須導引者。皆見之不明耳。

右歸丸。治元陽不足。或先天稟衰。或勞傷過度。以致命門火衰。不能生土。而為脾胃虛寒。飲食少進。或嘔惡膨脹。或番胃噎膈。或怯寒畏冷。或臍腹多痛。或大便不實。瀉痢煩作。或小水自遺。虛淋寒疝。或寒侵谷。而肢節痺痛。或寒在

虛損啟微 卷下 列方

七

下焦。而水邪浮腫。纏之。真陽不足者。必神疲氣怯。或心跳不寧。或四體不收。或眼見邪祟。或陽衰無子等症。俱速宜益火之源。以培右腎之元陽。而神氣自強矣。此方主之。

大懷熟八兩 山藥四兩 山黃肉四兩 鹿角膠四兩
 枸杞四兩 兔絲子四兩 杜仲四兩 當歸三兩
 肉桂二兩 附子二兩 附子二兩 附子二兩

右丸法如前。或丸如彈子大。每嚼服二三丸。以滾白湯送下。其效尤速。

如陽衰氣虛。必加人參以為之主。或二三兩。或五六兩。隨人虛實。以為增減。蓋人參之功。隨陽藥則入陽分。隨陰藥則入陰分。欲補命門之陽。非人參不能捷效。如陽虛精滑。或帶濁便瀉。加補骨脂酒炒三兩。如遺泄腎泄不止。加北五味三兩。肉豆蔻三兩。麵炒去油用。如飲食減少。或不易化。或嘔惡吞酸。皆

虛損啟微 卷下

脾胃虛寒之症。加乾薑三四兩炒黃用。如腹痛不止。加吳茱萸二兩湯炮半日炒用。如腰膝痠痛。加胡桃肉連皮四兩。如陰虛陽痿。加巴戟肉四兩。肉蓯蓉三兩。或加黃狗外腎一二副。以酒煮爛搗入之。

八珍湯。治氣血兩虛。調和陰陽。
 人參二錢 白朮二錢 茯苓二錢 甘草一錢
 熟地三錢 當歸二錢 川芎一錢 芍藥二錢
 水煎溫服。

十全大補湯。治氣血俱虛。惡寒發熱。自汗盜汗。肢體困倦。眩暈驚悸。喘熱作渴。遺精白濁。二便見血。小便短少。便泄閉結。喘欬下墜等症。

即前八珍湯加黃耆。肉桂各一錢。

人參養榮湯。治脾肺俱虛。惡寒發熱。肢體瘦倦。食少作瀉。口乾心悸。自汗等。

虛損啟微 卷下 列方

九

虛損啟微 卷下 列方
 一〇
 人參 黃耆 當歸 白朮
 甘草 桂心 陳皮 熟地
 五味 茯苓 白芍 遠志
 加薑棗水煎服。

五福飲。凡五臟氣血虧損者。此能兼治之。足稱王道之最。

人參 熟地 當歸 白朮
 炙甘草 熟地 當歸 白朮

水二鍾。煎七分。食遠溫服。或加生薑三五片。凡治氣血俱虛等症。以此為主。或宜溫者。加薑附。宜散者。加升麻柴葛。左右逢源。無不可也。
 七福飲。治氣血俱虛。而心脾為甚者。即前方加棗仁二錢。遠志三五分。製用。
 獨參湯。治大吐大瀉後。血脫氣隨。速宜益氣。

人參二兩

加大棗煎服。服後宜熟睡。

養心湯 治體質素弱。或病後思慮過多。心痛驚悸不寐。

歸身 生地 熟地 茯神各一

人參 冬錢半 麥冬錢半 棗仁 柏子仁各八分

炙甘草四分 五味十五

加燈心。蓮子。水煎八分服。

天王補心丹 寧心保神。固精益血。壯力強志。令人不忘。去煩熱。除驚悸。清三焦。

解乾渴。育養心氣。此方之傳。未考所自。道藏偈云。昔志公和尚日夜講經。鄧

天王憫其勞。錫之此方。固以名焉。

生地黃四兩 人參 元參各五 丹參

虛損啓微 卷下 列方 一一

遺志肉 桔梗 白茯苓各五 五味

當歸酒洗 麥冬炒 天冬炒 柏子仁炒

酸棗仁兩各炒

右為細末。煉蜜為丸。每兩分作十丸。金箔為衣。每服一丸。燈心棗湯化下。食遠

臨臥服。或作小丸亦可。

柏子養心丸 治心勞太過。神不守舍。合眼則夢。遺洩不常。

柏子仁 紙包不抽者以 白茯苓 酸棗仁

生地黃 當歸身各二 五味子 辰砂

犀角 甘草各半

右為末。煉蜜丸如芡實大。金箔為衣。午後臨臥。各津嚼一丸。

人參固本丸 治脾虛煩熱。金水不足。及肺氣燥熱。作渴作嗽。或小便赤色。短

少澀滯如淋。大便燥結。此陰虛有火之聖藥也。

人參二兩 天冬 麥冬 生地

熟地四兩

蜜丸桐子大。每服五六十丸。空心淡鹽湯下。中寒之人不可服。如欲作膏。俟

煎成。外加白蜜四兩。

一陰煎 此治水虧火勝之劑。故曰一陰。凡腎水真陰虛損。而脈症多陽。虛火

發熱。及陰虛動血等症。皆宜用此。加減主之。

生地二錢 熟地三錢 芍藥二錢 麥冬二錢

甘草一錢 牛膝半錢 丹參二錢

水二鍾。煎七分。食遠服。如火或躁煩。入真龜膠二三錢化服。如氣虛者。間

用人參一二錢。如心虛不眠多汗者。加棗仁。當歸各一二錢。如汗多煩躁

虛損啓微 卷下 列方 一三

虛損啓微 卷下 列方 一四

者。加五味子十粒。或加山藥山茱萸。如見微火者。加女貞子一二錢。如虛

火上浮。或吐血或衄血不止者。加澤瀉一二錢。茜根二錢。或加川續斷一二錢

以瀝之亦妙。

加減一陰煎 治症如前。而火之甚者。宜用此方。

生地二錢 熟地三錢 芍藥二錢 麥冬二錢

炙甘草五分 知母 地骨皮各一

水二鍾。煎服。如躁煩熱甚便結者。加石膏二三錢。小水熱澀者。加梔子一

二錢。如火浮於上者。加澤瀉一二錢。或黃芩一錢。如血燥血少者。加當歸

一二錢。

二陰煎 此治心經有熱。水不制火之病。故曰二陰。凡驚狂失志。多言多笑。或

癆疹煩熱失血等症。宜此主之。

生 地二錢 麥冬二錢 棗仁二錢 甘草一錢
元 參半錢 黃連二錢 茯苓半錢 木通半錢
水二鍾。加燈草二十根。或竹葉亦可。煎七分。食遠服。如痰勝熱甚者。加九製
膽星一錢。或天花粉一錢五分。

三陰煎新 此治肝脾虛損。精血不足。及營虛失血等症。故曰三陰。微有火者。宜
一陰煎。無火者宜此主之。

當 歸二錢 熟 地三錢 甘 草一錢 棗 仁二錢
芍 藥三錢 人 參實宜

水二鍾。煎七分。食遠服。如嘔惡者。加生薑三五片。汗多煩躁者。加五味子十
四粒。汗多氣虛者。加黃耆一二錢。小腹陰痛。加枸杞二三錢。如有脹悶。
加陳皮一錢。如腰膝筋骨無力。加杜仲、牛膝。

虛損啓微 卷下 列方

一五

虛損啓微 卷下 列方

一六

四陰煎新 此保肺清金之劑。故曰四陰。治陰虛勞損。相火熾盛。津枯煩渴。欬嗽
吐衄多熱等症。

生 地二錢 麥 冬 芍 藥 百 合
沙 參各二錢 甘 草一錢 茯 苓五分

水二鍾。煎七分。食遠服。如夜熱盜汗。加地骨皮一二錢。如痰多氣盛。加貝
母二三錢。阿膠一二錢。天花粉亦可。如金水不能相滋。而乾燥喘嗽者。加熟
地三五錢。如多汗不眠。神魂不寧。加棗仁二錢。如汗多兼渴。加北味十四
粒。如熱甚者。加黃柏。如易針。一二錢。鹽水炒用。或元參亦可。但分上下用
之。如血燥經遲。枯澀不至者。加牛膝二錢。如血熱吐衄。加茜根二錢。如多
火便燥。或肺乾咳咯者。加天門冬二錢。加童便亦可。如火載血上者。去甘草。
加炒梔子一二錢。

虛損啓微 卷下

五飲煎新 凡真陰虧損。脾虛失血等症。或見瀉泄未甚者。所重在脾。故曰五陰。

忌用潤滑。宜此主之。

熟 地五錢 山 藥二錢 扁 豆二錢 炙甘草一錢
茯 苓半錢 芍 藥二錢 五 味子廿粒 人 參實宜
白 朮一錢

水二鍾。加蓮肉去心二十粒煎服。

大營煎新 治真陰精血虧損。及婦人經遲血少。腰膝筋骨疼痛。或氣血虛寒。心
腹疼痛等症。

當 歸二錢 熟 地三錢 枸 杞二錢 炙甘草一錢
杜 仲二錢 牛 膝半錢 肉 桂一錢

水二鍾。煎七分。食遠溫服。如寒滯在經。氣血不能流通。筋骨疼痛之甚者。必

虛損啓微 卷下 列方

一七

虛損啓微 卷下 列方

一八

加製附子一二錢方效。如帶濁腹痛者。加故紙一錢炒用。如氣虛者。加人
參、白朮。中氣虛寒嘔惡者。加炒乾薑一二錢。

小營煎新 治血少陰虛。此性味和平之方也。
當 歸二錢 熟 地二錢 芍 藥二錢 枸 杞二錢

山 藥二錢 炙甘草一錢
水二鍾。煎七分。食遠溫服。如營虛於上。而為驚恐。怔忡不眠多汗者。加棗仁、
茯神各二錢。如營虛兼寒者。去芍藥。加生薑。如氣滯有痛者。加香附一二
錢。引而行之。

坎離交濟丹新 此治心腎不交等症。

熟 地五兩 生 地三兩 茯 神半兩 遠 志八錢
阿 膠二兩 雞子黃六個 炙甘草一兩 蓮 肉四兩

四七

此方地黃一熟却有一熟倒陰陽水火既濟之妙扶神通心氣而下交腎復以雞子黃色赤入心補離中之氣健志通腎氣而上交心復以阿膠色黑入腎補坎中之精俾水火渾合一氣交相為濟然煤合嬰始作用全賴黃婆故以蓮肉甘草補土而為交通上下之佐使也

右先將地黃杵爛加煉蜜丸桐子大空心食前滾白湯送下三錢。如見微火者加麥冬三兩或元參二兩隨宜用之。無寒無熱者加兔絲子二兩人參二兩。如心氣浮散不入於精者加五味子一兩茯苓一兩。

地六湯新 治水虧液涸大便秘結。

熟地六錢 茯苓三錢 麥冬三錢 白芍一錢

生地三錢 柏子仁二錢

水二鍾煎七分溫服。或加砂仁五六分。

金鎖正元丹劑 治真氣不足遺精盜汗目暗耳鳴吸吸短氣四肢痠倦一切虛損等症。

虛損啓微 卷下 列方

一九

虛損啓微 卷下 列方

二〇

補骨脂十兩酒 肉苁蓉酒洗

巴戟去心

葫蘆巴各一

文蛤八兩 茯苓六兩

龍骨二兩

珠砂三兩

右為細末酒糊丸桐子大每服二十九空心溫酒鹽湯送下。

金鎖思仙丹 治男子嗜慾太過精血不固此澀以去脫之劑。

蓮蕊 艾實 石蓮子各十 金櫻子膏三斤

右以金櫻膏入前三味藥末和丸桐子大空心鹽湯下三十九服久精神完固。

大能延年平時服食忌葷菜車前。

水陸二仙丹 治精脫腎虛夢遺白濁等症與補陰藥同用甚有奇效。

金櫻膏一斤 用金櫻子不拘多少入粗麻布袋內擦去毛刺搗爛入缸以

水沒頭浸一二宿濾去渣取汁以綿濾二三次却入銅鍋用桑柴文火熬

成膏取起以碗瓶收貯聽用。

艾實粉一斤

右二味和勻丸桐子大每服二三百丸空心淡鹽湯下。

固精丸 治下元虛損白濁如脂或胞氣虛寒腰重少力小便無度並效。

牡蠣煅 兔絲子煅 韭子炒 龍骨煅

北五味炒 白茯苓 桑螵蛸酒炙 白石脂等分

右為細末酒糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯下。

固精丸 治腎虛有火精滑心神不安。

黃柏酒炒 知母酒炒 牡蠣煅 龍骨煅

蓮蕊 艾實 山茱萸 遠志製

茯苓各三

右為末山藥糊丸桐子大每服五十九空心溫酒下。

虛損啓微 卷下 列方

二一

虛損啓微 卷下 列方

二二

家韭子丸 治少長遺精及男子虛劇陽氣衰敗小便白濁夜夢遺精此藥補

養元氣。家韭子炒六兩 鹿茸酒炙 肉苁蓉酒長 牛膝酒長

熟地 當歸各二 兔絲子煅 巴戟各一

杜仲炒 石斛 桂心 乾薑各一

酒糊丸桐子大每服五七十丸加至百餘丸食前溫酒任下。

豬肚丸 止夢遺泄精進飲食健肢體此藥神應瘦者服之自肥莫測其理。

白朮五兩 苦參三兩 左牡蠣煅四兩

右為末用雄豬肚一具洗淨以磁罐煮爛木石臼搗如泥和藥再加肚汁搗半

日丸如小豆大每服四五十丸日進三服米飲送下久服自覺身肥而夢遺永

止。

秘元煎新 治遺精帶濁等病。此方專主心脾。

遠志八分 山藥二錢 芡實二錢 白朮半錢
棗仁二錢 茯苓半錢 炙甘草一錢 人參二錢
五味十粒 金櫻子二錢

水二鍾煎七分。食遠服。此治久遺無火。不痛而滑者。乃可用之。如尙有火覺熱者。加苦參一二錢。如氣大虛者。加黃耆一二三錢。固陰煎新 治陰虛滑泄。帶濁淋瀝。及經水因虛不固等症。此方專主肝腎。

人參二錢 熟地三錢 山藥二錢 山黃半錢
遠志七分 甘草一錢 兔絲二錢 五味十四粒
水二鍾煎七分。食遠溫服。如虛滑遺甚者。加金櫻子肉二三錢。或醋炒文蛤一錢。或烏梅二個。如陰虛微熱而精血不固者。加川續斷二錢。如下焦陽

虛損啟微 卷下 列方

二三

虛損啟微 卷下 列方

二四

氣不足。而兼腹痛泄者。加補骨脂。吳茱萸之類。隨宜用之。如肝腎血虛。小腹痛而血不歸經者。加當歸二三錢。如脾虛多濕。或兼嘔惡者。加白朮一二錢。如氣陷不固者。加炒升麻一錢。如兼心虛不眠。或多汗者。加棗仁二錢炒用。

苓朮免絲丸新 治脾腎虛損。不能收攝。以致夢遺精滑困倦等症。

白伏苓 白朮半錢 蓮肉各四 五味酒蒸
山藥各二 杜仲酒炒 炙甘草五錢 免絲子用好水淘淨

右用山藥末。以陳酒煮糊為丸。桐子大。空心滾白湯。或酒下百餘丸。如氣虛神倦不能收攝。有加入參三四兩尤妙。補中益氣湯原 治勞倦傷脾。中氣不足。清陽不升。外感不解。體倦食少。寒熱瘧

虛損啟微 卷下

痢。氣虛不能攝血等診。

人參 黃耆炒 白朮炒 甘草各一錢半
當歸一錢 陳皮五分 升麻 柴胡各三

右加薑棗水煎。空心午前服。補陰益氣煎新 此補中益氣湯之變方也。治勞倦傷陰。精不化氣。或陰虛內乏。以致外感不解。寒熱瘧瘧。陰虛便結不通等症。凡屬陰氣不足。而虛邪外侵者。用此升散。無不神效。

人參二錢 當歸二錢 山藥二錢 陳皮一錢
熟地三五錢 炙甘草一錢
柴胡一二錢 升麻三五分
水二鍾。加生薑三五七片。煎八分。食遠溫服。

虛損啟微 卷下 列方

二五

虛損啟微 卷下 列方

二六

舉元煎新 治氣虛下陷。血崩血脫。亡陽垂危等症。有不利於歸熱等劑。而但宜補氣者。以此主之。

人參 黃耆各三五 炙甘草一錢 升麻五分
白朮一錢

水一鍾半。煎七八分。溫服。如兼陽氣虛寒者。桂附。乾薑。隨宜佐用。如兼滑脫者。加烏梅二個。或文蛤七八分。

歸脾湯生 治思慮傷脾。不能攝血。致血妄行。或健忘。怔忡。驚悸。盜汗。嗜臥。少食。或大便不調。心脾疼痛。瘧痢鬱結。或因病用藥失宜。尅伐傷脾。以致變症者。最宜用之。

人參 黃耆 白朮 茯苓
棗仁各二 遠志 當歸各一 木香

四九

炙甘草各五

水二鍾。加圓眼肉七枚。煎七分。食遠服。

景岳先生云。此湯之用木香。特因鬱結疼痛者設。如無痛鬱等症。必須除去木香。以避香燥。豈不於氣虛血動者為尤善乎。又遠志味辛。氣升而散。凡多汗而躁熱者。亦宜酌用。

加味歸脾湯薛 治脾經血虛發熱等症。即前方加柴胡、山梔各一錢。

生脈散醫 治熱傷元氣。肢體倦怠。氣短口渴。汗出不止。或金為火制。水失所生。而致欬嗽喘促。肢體痿弱。脚軟眼黑等症。

人參五錢 麥冬 五味各三

水煎服。

百合固金湯

虛損啓微 卷下 列方

二七

熟地 生地 麥冬 當歸

芍藥 百合 貝母 元參

桔梗 甘草

烏賊魚骨丸經 治血枯經閉。

烏賊魚骨四兩 蘆茹一兩 即

右為末。以雀卵搗丸。小豆大。每服五丸。或十丸。鮑魚煎湯下。以飯壓之。鮑魚即今之淡乾魚也。

五物煎新 治婦人血虛凝滯。蓄積不行。小腹痛急。產難經滯。及痘瘡血虛寒滯等症。

當歸七錢 熟地三錢 芍藥二錢 川芎一錢 肉桂三錢

水一鍾半。煎服。兼胃寒或嘔惡者。加乾薑炮用。水道不利。加澤瀉或猪苓。

氣滯者。加香附或丁香、木香、砂仁、烏藥之類。

理中湯神 治太陰病。自利不渴。陰寒腹痛。短氣欬嗽。霍亂嘔吐。飲食難化。胸膈噎塞。或瘧疾。瘴氣。瘟疫。中氣虛損。久不能愈。或中虛生痰等症。

人參 白朮炒 乾薑炒 炙甘草各三

右四味。搗篩為末。蜜丸雞黃大。以沸湯數合和一丸。研碎溫服之。日三四。夜二服。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯。湯法以四物依數切。用水八升。煎取三升。去渣溫服一升。日三服。

理陰煎新 此理中湯之變方也。凡脾腎中虛等症。宜剛燥者。當用理中六君之類。宜溫潤者。當用理陰大營之類。欲知調補。當先察此。此方通治真陰虛弱。脹滿嘔噦。痰飲惡心。吐瀉腹痛。婦人經遲血滯等症。

虛損啓微 卷下 列方

二九

熟地三五七錢 歸五七錢 炙甘草一 乾薑一二三

或加桂一二錢

三〇

水二鍾。煎七八分。熱服。

若治脾腎兩虛。水泛為痰。或嘔或脹者。加茯苓一錢半。或加白芥子五分以行之。

若泄瀉不止。及腎泄者。少用當歸。或并去之。加山藥、扁豆、吳茱萸、破故、肉豆蔻、附子之屬。

若腰腹有痛。加杜仲、枸杞。若腹有脹滯疼痛。加陳皮、木香、砂仁之屬。

四味同陽飲新 治元陽虛脫。危在頃刻者。

人參一 製附子二 炙甘草一 炮乾薑二

水二鍾。武火煎七八分。溫服。徐徐飲之。

六味同陽飲新 治陰陽將脫等症。

人參或二兩 製附子 炮乾薑各二 熟地五錢 或

熟地五錢 或

歸身三錢代以冬或多益動善 炙甘草一錢

水二鍾。武火煎七八分。溫服。如肉振汗多者。加炙黃耆四五錢。或一兩。或冬

朮三五錢。如泄瀉者。加烏梅二枚。或北五味二十粒亦可。如虛陽上浮者。

加茯苓二錢。如肝經鬱滯者。加肉桂二三錢。

溫胃飲方 治中寒嘔吐。吞酸泄瀉。不思飲食。及婦人臍寒嘔惡。胎氣不安等症。

人參或一兩 白朮一兩 炒扁豆二錢 陳皮一錢 或

乾薑一錢 炒焦 炙甘草一錢 當歸一錢 歸一錢 不用

水二鍾。煎七分。食遠溫服。如下寒帶濁者。加破故紙一錢。如氣滯或兼胸

腹痛者。加藿香、丁香、木香、白豆蔻、砂仁、白芥子之屬。如兼外邪及肝腎之病

者。加桂枝、肉桂。甚者。加柴胡。如脾氣陷而身熱者。加升麻五七分。如水泛

為痰而胸腹痞滿者。加茯苓一二錢。如脾胃虛極。大嘔大吐。不能止者。倍用

虛損啟微 卷下 列方

三一

虛損啟微 卷下 列方

三二

參朮。仍加胡椒二三分許。煎熟徐服之。

鎮陰煎方 治陰虛於下。格陽於上。則真陽失守。血隨而溢。以致大吐大衄。六脈

細脫。手足厥冷。危在頃刻。而血不能止者。速宜用此。使孤陽有歸。則血自安也。

如治格陽喉痺上熱者。當以此湯冷服。

熟地一兩 牛膝二錢 甘草一錢 澤瀉錢半

肉桂一錢 製附子五七分 或

水二鍾。速煎服。如兼嘔惡者。加乾薑炒黃一二錢。如氣脫倦言。而脈弱極

者。宜速速多加人參。隨宜用之。

壽脾煎方 一名攝管煎。治脾虛不能攝血等症。凡憂思鬱怒。結勞。及誤用攻

伐等藥。犯損脾陰。以致中氣虧陷。神魂不寧。大便脫血不止。或婦人無火崩淋

等症。凡兼嘔惡。尤為危候。速宜用此。單救脾氣。則統攝固而血自歸源。此歸脾

湯之變方。其效如神。若犯此症。而再用寒涼。則胃氣必脫。無不即斃者。

白朮二三錢 當歸二錢 山藥二錢 棗仁錢半

炙甘草一錢 遠志三五分 炮乾薑三錢 蓮肉二十粒

人參急者用一二錢

水二鍾煎服。如血未止。加烏梅二個。凡畏酸者。不可用。或加地榆一錢半亦

可。滑脫不禁者。加醋炒文蛤一錢。下焦虛滑不禁。加鹿角霜二錢為末。攪入

藥中服之。氣虛甚者。加炙黃耆二三錢。氣陷而墜者。加炒升麻五七分。或

白芷亦可。兼溼泄者。加補骨脂一錢炒用。陽虛畏寒者。加製附子一二三

錢。血去過多。陰虛氣餒。心跳不寧者。加熟地七八錢。或一二兩。

一黍丹方 治脾腎虛寒。不時易瀉。腹痛陽痿。怯寒等症。此即參附湯之變方。

人參 製附子各等

虛損啟微 卷下 列方

三三

虛損啟微 卷下 列方

三四

煉白蜜丸如綠豆大。每用滾白湯送下三五分。或一錢。凡藥餌不便之處。或隨

途次。隨帶此丹最妙。

六氣煎方 治男婦陽氣虛寒等症。

黃耆錢 肉桂 人參 白朮

當歸 炙甘草

水煎服。

保陰煎方 治男婦帶濁遺淋。色赤帶血。脈滑多熱。便血不止。及血崩血淋。或經

期太早。凡一切陰虛內熱動血等症。

生地 熟地 芍藥各二錢 山藥

川續斷 黃芩 黃柏各錢 生甘草一錢

水二鍾。煎七分。食遠溫服。如小水多熱。或兼怒火動血者。加焦梔子一二錢。

貝母丸新 消痰熱潤肺止咳。或肺癰肺痿。乃治標之妙劑。

貝母一兩。為末。用沙糖或蜜。和丸龍眼大。或嚼化。或嚼服之。若欲劫止久

嗽。每貝母一兩。宜加百藥煎。蓬砂。天竺黃各一錢。佐之尤妙。如無百藥煎。即

炒醋文蛤一錢亦可。或粟殼亦可酌用。若治肺癰。宜加白礬一錢。同貝母

丸服。如前最妙。

一柴胡飲新 一為水數。從寒散也。凡感四時不正之氣。或為發熱。或為寒熱。

或因勞因怒。或婦人熱入血室。或產後經後。因冒風寒。以致寒熱如瘧等症。但

外有邪而內兼火者。須從涼散。宜此主之。

柴胡二錢 黃芩錢半 芍藥二錢 生地

陳皮半錢 甘草八分

水一鍾半。煎七八分。溫服。如內熱甚者。加連翹一二錢隨宜。如外邪甚者。

虛損啟微 卷下 列方

三九

虛損啟微 卷下 列方

四〇

加防風一錢佐之。如邪結在胸而痞滿者。去生地。加枳實一二錢。如熱在

陽明而兼渴者。加天花粉或葛根一二錢。熱甚者。加知母。石膏亦可。

二柴胡飲新 二為火數。從溫散也。凡遇四時外感。或其人元氣充實。臟氣素

平無火。或時逢寒勝之令。本無內熱等症者。皆不宜妄投涼藥。以致寒滯不散。

宜此主之。

陳皮五錢 半夏二錢 細辛二錢 厚朴五錢

生薑七片 柴胡二錢半 甘草八分

水一鍾半。煎七八分。溫服。如邪感者。可加羌活。白芷。防風。紫蘇之屬。擇而用

之。如頭痛不止者。加川芎一二錢。如多濕者。加蒼朮。如陰寒氣勝。必加

麻黃一二錢。或兼桂枝。不必疑也。

三柴胡飲新 三為木數。從肝經血分也。凡人素稟陰分不足。或肝經血少。而偶

感風寒者。或感邪不深。可兼補而散者。或病後產後感冒。有不得不從解散。而

血氣虛弱。不能外達者。宜此主之。

柴胡二錢 芍藥錢半 炙甘草一錢 陳皮一錢

生薑五片 當歸二錢 熟地

水一鍾半。煎七八分。溫服。如微寒效嘔者。加半夏一二錢。

四柴胡飲新 四為金數。從氣分也。凡人元氣不足。或忍饑勞倦。而外感風寒。

六脈緊數微細。正不勝邪等症。必須培助元氣。兼之解散。庶可保全。宜此主之。

柴胡三錢 炙甘草一錢 生薑七片 當歸三錢

人參錢半 而用之

水二鍾。煎七八分。溫服。如胸膈滯悶者。加陳皮一錢。

五柴胡飲新 五為土數。從脾胃也。脾土為五藏之本。凡中氣不足。而外邪有

虛損啟微 卷下 列方

四一

虛損啟微 卷下 列方

四二

不散者。非此不可。此與四柴胡飲相表裏。但四柴胡飲止調氣分。此則兼培血

氣。以逐寒邪。尤切於時用者也。神效不可盡述。

柴胡三錢 當歸三錢 熟地三錢 白朮三錢

芍藥錢半 炙甘草一錢 陳皮不用

水一鍾半。煎七分。食遠熱服。寒勝無火者。減芍藥。加生薑三五七片。或炮乾

薑一二錢。或再加桂枝一二錢。則更妙。脾滯者。減白朮。氣虛者。加人參隨

宜。腰痛者。加杜仲。頭痛者。加川芎。勞倦傷脾陽虛者。加升麻一錢。

正柴胡飲新 凡外感風寒。發熱惡寒。頭疼身痛。痰瀉初起等症。凡血氣平和。宜

從平散者。此方主之。

柴胡三錢 防己一錢 陳皮錢半 芍藥二錢

甘草一錢 生薑五片

水一鍾半煎七八分。熱服。如頭痛者。加川芎一錢。如熱而兼渴者。加葛根一二錢。如嘔惡者。加半夏一錢五分。如濕勝者。加蒼朮一錢。如胸腹有微滯者。加厚朴一錢。如寒氣勝而邪不易解者。加麻黃一二三錢。去淨沫服之。或蘇葉亦可。

柴陳煎。治傷風兼寒。咳嗽發熱。痞滿多痰等症。

柴胡二錢 陳皮錢半 半夏二錢 茯苓二錢

甘草一錢 生薑三片

水一鍾半。煎七分。食遠溫服。如寒勝者。加細辛七八分。如風勝氣滯者。加蘇葉一錢五分。如冬月寒甚者。加麻黃一錢五分。氣逆多嗽者。加杏仁一錢。痞滿氣滯者。加白芥子五七分。

麥煎散

虛損啓微 卷下 列方

四三

虛損啓微 卷下 列方

四四

鱉甲 乾漆 大黃 生地

柴胡 赤苓 石膏 白朮

甘草 小麥

思則火結心包。加常山以開其結。

虛損啓微終

鑄新年一十五熙康

天都潘雲師著

血症良方

麟振堂藏板

序

五行並生天地而民非水火
不生活則五行中獨水火為
用大按諺三山六水一田之
說而山又為水之源則水之

徐序十

用尤大人身小天地也譬諸
天地山骨也水血也土田則
肉焉而已矣以血貫於骨肉
中猶水之源于山而流于土
也水乾則土槁血殫則人亡

專治血症經驗良方論 序

勢所必至理有固然歙州潘君雲師篤行君子也著治血症良方一書以爲人生水常不足火常有餘欲其壯水也莫先降火欲降火而以涼藥

徐序二

治者什無一生以童便治者百無一死緣洩溺出於人身與血同源是以人補人焉爾雲師少通經術以久病讀方書盡得其典要知洩溺之功

用大久服不懈沉痾頓起且精健踰疇昔不忍以良方私諸已大暢厥辭以公海內是作者之意也潘君雖家海陽而久移崑婁之間與吾倩趙

徐序三

茶陵姍姍茶陵曾稱其嗜學稽古卓爾不羣樂善好施根於天性今讀其書而知其人固篤於救世而小見之于方藥者乎唐陸宣公旣謫忠州

常閉戶不見一人又避謗不
著書地苦瘴癘爲古今集驗
方五十篇以傳世余名位遠
不逮宣公而憂讒畏謗實過
之今衰病日甚無意當世擬

徐序四

學忠州集方以送日見雲師
所述而釐然有會於心遂題
數行以識于後

肯

康熙壬辰歲之陽月

賜進士出身山東道監察御史

協理河南江南道稽察吏
戶二部事巡視南城督理
京營充

大清一統志纂脩官校對

徐序五

御選古文淵鑒前內府中書科

中書舍人管理誥敕丁卯
山西主考加三級年家眷
弟徐樹穀拜撰



序

天都潘子雲師近居吾里與余交言及前此屢患血症余因知其善病也而不知其善醫也後見軀幹日益魁偉余又第知其善頤養也而未暇詳其所以頤養也去年春舊疾復萌不踰時即愈且強壯一

趙序一

如未發時余詢其故因出其所著服童便論示余曰此余之所以有病而卒無病也余將以療一己之病者療天下之病顧此中三昧非子不能知非子不能言余既惟子之是正并願得子言以弁於首使觀者知潘子之論亦即趙子之目

且令百千里外服其說者即無異延趙子於家而服其劑也余因閱其論而躍然起曰潘子於此道竟已三折肱乃爾耶余嘗謂醫者視病無不審其陰陽虛實者陰虛則補陰陽虛則壯陽此一定之理而陰虛者常至不治則以醫家但知

趙序二

制陽以配陰而不知補陰以配陽也蓋陰衰則陽盛非陽盛也陰不能制陽而陽亢乎上也醫者見其脈數虛大咽乾喉痒咳嗽吐血遂謂是陽之不可不制也而芩連知栢投之不已嗟乎陰陽之不可受伐均也今以陰虛故并陽而伐之

何異患風痺人曰吾左臂已病矣
右臂何為獨完而并以酒色伐之
乎勢必陰陽俱竭後即有扁鵲倉
公亦且望而却走也善乎昔人之
論曰服寒涼者百不一生服童便
者百不一死蓋補陰而不傷陽者
莫童便若也余少奉先人之教補

趙序三

陰配陽之論東駿受書即耳熟焉
歲庚午歸自北雍遂絕意舉子業
思欲盡究黃岐諸書迄今二十餘
載閱歷諸血症無慮千百療治之
法稍知出入變化而終無以易乎
補陰配陽之義觀潘子之論抑何
實獲我心也閱是編者謂是潘子

之書也可謂是趙子之書也可患
血症者由其說謂即延趙子於家
而服其劑也可謂潘子實三折肱
之良醫而受其療治也亦無不可

時

康熙歲次壬辰季夏年家眷教弟

趙光弼拜撰



趙序四

叙

嘗讀周禮一書醫人掌萬民之疾職隸天官心竊疑之何其鄭重也及廣搜軒岐之書閱焉義蘊宏深真能補造化之所未及始知良醫固於良相洵不誣已

許序一

余於己丑歲就館于新出潘子雲師家晨夕晤對見其氣體豐厚盈溢必有善於調養之法因詢其故迺謂余曰向嬰血之症勢甚刻醫藥罔效思覓一良方又不可得會閱本草綱目知童便



專治血症遂服之立愈今越數載精力遠勝於昔夫而後知病之所以愈之後之所以調養不逾日服童便初無他法是真血症之良方也今歲季夏雲師携書一卷問叙於余之展

許序二

玩之即血症良方論其中致病之由養病之道服童便之法無不詳審精密又為考之不可得童便而以白便代之者設一變通之途并將歷來微驗備載於末為庸愚者儆醒將來

縵折頗合軒岐大旨顧吾窺
 雲師之意亦深憫人之抱此症
 皆不知童便之為良方遂致
 損者十有六七天地以生物為
 心而人即心天地之心是雖目所
 未見耳所未聞猶存一欲立明
 許序三
 達之念况身得其效目擊人之
 服此而生不服此而死亦何忍知之
 而不言之之而不盡乎故雲師
 不惜勤勞採集諸家所論血症
 云服童便者融會言之而又捐
 貲刊刻廣施於世以為斯人之

專治血症經驗良方論 叙

指南舉凡抱此症者得此方
 人之有起死回生之樂其利
 澤及人又何可量哉然則雲
 師非知醫者而功同於良相
 矣
 康熙歲次壬辰季夏吳江許錫
 許序四
 元 譔



專治血症經驗良方論

天都潘為縉雲師氏著

玉峰趙光弼方郭氏校

坦上仇一璞魯珍氏叅

血症良方論

夫人受天地之氣以生。受天之陽氣為氣。受地之陰氣為血。天包乎地。地統乎天。故氣常有餘。血常不足。經曰。年至四十。陰氣自半。而起居衰。

血症良方

麟振堂

又曰。男子六十四歲而精絕。女子四十九歲而經斷。夫以陰氣之成。止洪三十年之用。已先虧矣。若之何。而可不養耶。但孤陽不生。獨陰不成。陽和則發生。陰和則成實。陽生陰長。陽殺陰藏。陰在內。陽之守也。陽在外。陰之使也。陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則寒。重寒則熱。重陰必陽。重陽必陰。陽虛則外寒。陰虛生內熱。陽盛生外熱。陰盛生內寒。陽亢則焦。

枯陰凝則固閉。陽病者上行極而下。陰病者下行極而上。犯賊風虛邪者。陽受之。食飲不節。起居不時者。陰受之。此皆一定之理。總而言之。一身之陰陽。即為一身之氣血。然陽能統陰。陰不能統陽。故血隨氣行。亦如夫唱婦隨。善養陰者。無有不善養陽者也。彼昧昧者。徇情縱欲。以致精氣既衰。血亦消耗。泛溢以我之所生。反為我之所賊。是亦不知養生之道者也。故補陽必

血症良方

麟振堂

於陰中求陽。補陽而不碍肝腎。則陽得陰助。而生化無窮。補陰必於陽中求陰。補陰而不碍脾肺。則陰得陽升。而血脈自盛。蓋血者中焦受水穀之氣。取水穀之精。變化而赤。乃成血。統於脾。生於心。藏於肝。布於肺。施於胃。臟得血而能津。腑得血而能潤。目得血而能視。舌得血而能言。手得血而能持。足得血而能行。血為榮氣。為衛。晝夜循環。運行不息。一有感傷。調理失宜。遂致

陽盛陰虛錯經妄行火載則上行挾濕則下行
是以上溢清道從口鼻而出留滯濁道由胃脘
滲入腸間從下部而出分經言之嘔血吐血胃
也咳血鼻血肺也痰中帶血脾也咯血絲腎也
溺血出小腸膀胱也下血大腸也牙宣胃與腎
也又血從汗出者謂之肌衄從舌出者謂之舌
衄心與肝也從委中出血者謂之臍血腎與膀
胱也無潮熱者輕有潮熱者重又有婦人血癥

血症良方

三

麟振

血癥之病總之皆血症也名號不一大約俱係
熱症但有虛實新舊之不同而或妄言為寒者
誤也然血從下流者為順易治血從上溢者為
逆難治書云形役則陽無神靜則陰生惟陽盛
則陰必衰陰虛則火必動血從火起錯經而妄
行故逆上溢口鼻而吐衄者多非出於肺即出
於腎苟不分虛實妄行劫劑則陽不抑日以熾
陰不補日以消矣故曰難治抑陽補陰乃其要

專治血症經驗良方論

也若血從下出者非熱乘乎陰即濕蒸於血可
清可涼者也血成積者非死血內凝則瘀血未
盡可行可破者也故曰易治若不窮究其源則
實實虛虛之患不能免也據古來諸名家所論
皆云吐血咳血咯血唾血等症多是陽盛陰虛
故血不下行因火炎上之勢而上出大法補陰
抑火使復其位若胸中氣塞上吐紫血者當以
順氣為主先吐血後見痰嗽者是陰虛火動先

血症良方

四

麟振

痰嗽後見紅者是積熱勞傷嘔出全是血者胃
口熱極鬱蒸而出或暴吐紫血者此熱傷血死
於中若吐紅俱帶痰涎一二碗不止者此是飲
食不節大傷脾氣宜以健脾為要久嗽後痰中
俱帶血絲者咳傷肺金宜以清肺為急唾出俱
是粉紅色中帶血點者此係色慾太過腎水已
竭咯出成塊者死血內凝損傷絡脈所致若盛
怒後驟然吐血者此怒氣傷肝肝藏血故泛溢

歷陳治法如聽太翁公對文帝語意亦從公乘陽慶耶

而上鼻血者陽熱佛鬱於足陽明故血妄行宜以涼血行血為主至于溺血屬膀胱濕熱大抵小便出血則小腸氣秘氣秘則便難痛者謂之淋不痛者謂之溺血下血當別其色鮮紅者為大熱色瘀者次之此因飲酒過多及啖糟藏炙燂等物之故治血症者不可常用血藥蓋常用血藥則泥而不行惟治火則止夫火亦不一相火之外又有臟腑厥陽之火五志之動各有火

血症良方

五

麟表

起相火者所謂一水不勝二火之火出於天造厥陽者所謂一水不勝五火之火出於人欲凡有血症者身熱脈大是火邪勝若身涼脈靜是正氣將復也他如傷寒衄血多有在經表邪吐血皆屬傳經裏證以當汗不汗熱毒入內迫血妄行從胃腕而出也甚至唾膿血無不因邪熱鬱發所致當以散邪為主又未可常用血症治也按古方治血症者不可勝計未能備載然不

述其一二大槩未免茫無畔岸故採其最著者列之于後雖不免掛一漏萬亦庶乎備知者之參考耳凡血症大約以四物湯為主芎歸芍地是也隨症加減若陽乘於陰血熱妄行不能即止服茜根散茜根阿膠黃芩甘草側柏葉生地其甚者用四生丸生荷葉生艾葉生栢葉生地是也若來如湧泉用七生湯生荷葉生薑生地生藕汁生韭葉生茅根搗汁磨金墨服之是

血症良方

六

麟表

也出於胃實者用犀角地黄湯犀角生地白芍丹皮虛者用建中湯桂枝甘草大棗白芍生薑阿膠是也氣塞者用桃仁承氣湯芒硝甘草大黃桂桃仁是也內有鬱熱用生地黃散枸杞柴胡黃連地骨天冬白芍甘草黃芩黃芪生地熟地是也若咳嗽咽乾勞傷肺胃用大阿膠丸阿膠麥冬茯苓神栢子仁百部根杜仲丹參貝母防風山藥五味熟地遠志人參茯苓是也此數方

俱係古名家所定。歷有神驗。但症有不同。當因時加減。熱者加以清熱之藥。痰勝者加以消痰之藥。氣逆者加以順氣之藥。實者攻虛者補神而明之。存乎其人。要未可膠柱而鼓瑟也。抑吾竊有慮者。治病之法有四。曰望。曰聞。曰切。曰望與聞固是上乘法。世縱不乏其人。而未可槩望之。醫者今之所恃者。惟問與切耳。而問與切不可偏廢。每見世之看病者。問之非不甚詳。而診視脈

血症良方

七

麟林

息。不過指頭三點。所謂脈診。神診。色診。證診。形診。五過。四失。絕不參伍其間。第就俗醫伎倆。不隨意用藥。脈既不能詳悉。病豈能得其本原。如水投石。固其宜也。况抱病之家。每每貪圖便利。藥不取之醫家。但求方以贖之。藥舖不論道地。不計分兩。不擇藥材之高下。不知炮製之失宜。是藥便服。以此而欲起死回生。庸可得乎。且吳下風俗。尤重祈禱。病愈輒歸功鬼神。甚者遂有

執醫家之真方服市僧之假藥自是抱病家通患

不藥而愈之說。嗟乎。藥果可以弗服。則義軒岐伯已不必傳其說。而千百年来。諸名家之各著其書者。亦為多事矣。豈理也哉。但症有內外。時有冬夏。體有虛實。藥之溫涼寒熱。一或誤投。其禍立見。故吾論失血一症。雖略載幾方。不過備人查閱。而亦不可以輕服。若服之可暫。可常。可時。可急。若要。病不。發。必。須。常。服。方。可。除。根。入藥亦可。單服四時皆宜。內外悉效。無論體之虛實。厚薄。吐血。嘔血。咯血。咳血。牙宣。鼻衄。皆可

血症良方

八

麟林

治者莫若童便之為第一良方也。

專治血症良方

童便

自便

味鹹性溫不寒無毒素問名澁
 綱目名輪迴酒李時珍名還元
 湯凡吐血嘔血咳血咯血鼻衄
 牙宣一切等症服此一味無不
 立愈服法列後
 與童便之功略緩如家貧不可
 得童便以此代之服法列後

血症良方

九

麟按

按童便乃津液之濁者滲入膀胱而出本經云
 其味鹹而善走其性溫而不寒為除勞熱骨蒸
 咳嗽吐紅及婦人產後血暈悶絕之聖藥晉褚
 澄勞極論云降火甚速降血甚神飲澁溺百不
 一死服涼藥百不一生言其功力之優勝也其
 遺書又云人喉有竅則咳血殺人喉不停物毫
 髮芥蒂必效血既滲入愈滲則愈效愈效則愈
 滲惟飲澁溺自然立愈也可見澁溺為肺腎有

火者必須之藥經云飲入於胃游溢精氣上輸
 於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱
 夫水道者關門也主分泌水穀糟粕入大腸水
 汁滲入膀胱膀胱者州都之官津液之府氣化
 則能出矣陰陽應象論云清陽為天濁陰為地
 地氣上為雲天氣下為雨故清陽出上竅濁陰
 出下竅也人之小便者入胃亦隨脾之氣上
 歸於肺下通水道而入膀胱乃循其舊路也故

血症良方

一

麟按

能治肺腎諸病引火下行凡人精氣清者為氣
 濁者為血濁之清者為津液清之濁者為小便
 然則小便者本與血同類也是以高走血分能
 伏虛熱使火不上炎血不妄溢而高療諸血症
 也蘇恭云久嗽失血以致上氣失聲者服童便
 立愈日華子亦云咳血吐血衄血悶血瘀等症非
 童便不能療故本經主治寒熱頭痛溫氣者能
 除邪熱故耳若以入藥參互論治陰虛咳嗽

聲啞喉間血腥氣宜同枇杷葉天冬麥冬蘇子
 桑白皮沙參五味子生地欵冬花百部等藥治
 內傷吐血或痰血停留作痛宜同蘇朱降香茜
 草續斷牛膝牡丹皮蒲黃等藥治產後血暈宜
 同澤蘭荆芥白芷續斷延胡索牛膝蘇木等藥
 此端以血分言也。若以兼治他症論如聖濟
 總錄以童便治頭痛。孟詵必效方以童便治
 骨蒸發熱。聖惠方以童便治絞腸痧痛消渴
 血症良方
 下痢。張仲景以童便治中暑熱死。千金方
 以童便治金瘡出血火燒悶絕。外科發揮以
 童便治折傷跌撲。通變要法以童便治人咬
 手指。普濟方以童便治赤眼腫痛。集驗方
 以童便治鬼氣症病。蘇恭本草以童便治痕
 積。簡便方以童便治瘡疾渴甚腋下狐臭。
 海上奇方以童便解諸菜毒。救急方以童便
 治痔瘡腫痛。成無己以童便治傷寒少陰下

血症良方

士

麟技堂

利不止乾嘔欲飲水。肘後方以童便治中惡
 不醒。日華子以童便治產後胞衣不下。陳
 藏器本草以童便治蜘蛛咬毒。集簡方以童
 便治勞聾已久。是童便之為用亦多矣。童便之
 為功亦大矣。寧獨血症可治哉。然吾專以血症
 言者。亦以余身抱其病。頗得童便之力。歷有神
 效。并目擊世之服童便而生。不服童便而死者。
 不可枚舉。故不憚博採而詳說之。為世之抱血
 血症良方
 症者進一妙劑也。余自幼寓居婁水。習舉子業。
 年十二三。稍知此中妙境。遂晝夜鑽研。罔顧勞
 苦。五年。嬰咯血症。家大人見病勢甚劇。將書卷
 束之高閣。令默坐靜養。服參苓芍地百餘劑。勢
 稍減。根終未除。遂歸歛。養病二載。一歲中。或發
 一二次。或發三四次。發時。未免神氣沮喪。精血
 消耗。非不竭力葆攝。究不能止其復發。時有善
 於內養者。授余坐功之法。亦終無益。二十歲。就

血症良方

三

麟技堂

婚吳下室人素知余多病温涼寒暑曲為維持
調護藉此少安至二十三歲舊症大發每日吐
血竟至升許兼之咳嗽氣喘面紅潮熱飲食少
進漸至不起驟聞人聲稍高便欲暈去一日之
中昏暈者數次奄奄一息苦無生機吳郡諸名
醫畢集俱束手無策復於葺城周浦廣請名醫
診視斟酌用藥皆云病勢沉重恐難痊可舉家
憂慮無計可施余亦自分必死惟有檢點後事

血症良方

三

麟板堂

而已然於病中稍可坐起便廣搜岐黃之書其
中所載血症一條方既紛然論亦不一即有經
驗良方恐藥不對症亦不敢擅服向於婁水小
典得本草綱目一部偶為詳閱知童便一味尚
治血症疏註甚明據云人之有血症者大約俱
由虛火上炎冲動肺葉以火鑠金遂致咳嗽咳
之不已而血亦隨之逆行滲漏而出亦有不因
咳嗽而驟然吐血者雖經絡各有不同總由陰

虛火旺血不歸經之故若服童便則引火歸原
而血亦順下各歸經絡自無妄溢之患余乃從
其說急為服之每日四五次便覺吐血稍稀服
之數日便覺面亦不紅氣亦不喘而潮熱亦退
咳嗽亦止服之月餘血症遂愈而飲食照常行
坐如舊服之年餘血症竟不復發迄今七載服
之無間而肌膚豐潤精力遠勝於昔即居常所
服藥亦不過地黃丸加減他無所服也去歲因

血症良方

古

麟板堂

往婁分析後又因伯父之喪相助料理未免間
斷初意血症已久愈即不服童便或亦不至再
發不意去歲三月間痰中復見血絲血點亟服
童便數日而愈家翼六兄向年亦有血症其勢
頗為沉重余力勸服童便從余說服之無間遂
愈今已數年不發可見凡有血症者不可一日
不服童便也每見世之治血症者輒以梔連知
柏壯水以制火自以為恪遵古法然罕有奏效

者則以用之者未得其當也。甚而好奇者，又矯枉過正，輒云陽能統陰，血之妄行者，陰盛陽衰之故，當以扶陽為主，遂投之以乾薑、肉桂等物。以火是真速其死也。間有以秋石代者，此乃水澄火鍊真元之氣盡失，服之何益。豈若童便之功甚大，效甚速乎。故凡有血症者，家如殷實，宜置二三童子，令其多飲米汁，開水溺出白色者，日服之。若貧者，不可得童便，竟以自便代之，久服

血症良方

便於貧者無濟

五

麟振堂

亦必全愈。余因身得其效，屢欲刊刻服法，以濟世人。顧以南北奔馳，未遑及此。今歲長夏，在鹿城小典，稍得寬閒，遂不辭溽暑，遍採諸書所言，致有血症之由。惟童便可以奏效者，逐一錄之，并將服法、養病法，詳載於後，以便世之抱血症者有所遵行。而又以余之平日所見，服童便而生，不服童便而死者，數人表而出之，庶足徵予言之有據也。

專治血症經驗良方論

服童便法

一取童子十一二歲以下，至九歲止，擇其肥胖淨白，素無疾病者，方可用其溺。若面黃體瘦，身有瘡疥者，彼既血脈不和，正氣不足，不可用。一童子不可令其多食腥羶厚味，酸鹹太過者，蓋多食腥羶，則其氣臊多；食酸鹹，則其味苦。臨服時，必令連飲滾水數碗，或多與米飲，以助水道，使彼靜坐，俟其溺至，皆色白而味淡者，服之。

血症良方

六

麟振堂

若童子畏服開水，或與錢，或與菓，務誘其多飲數碗，其溺立至。愚夫愚婦之見，輒云溺為人服，童子必黃瘦，多疾病，不能長大。余服之已十餘年，童子共計有數人，皆長而有室，淨白肥胖，並無疾病，可驗俗見之誤。一童子溺時，以磁碗盛之，令去其頭尾，溺畢，乘熱立飲，蓋熱則真氣尚在其行，甚速冷則但存鹹寒之性矣。

六九

一服童便須日進三四服。若間斷一日則從前數日之功俱廢。寒天用熱湯溫碗不至易冷。稍入姜汁或韭汁二三點。徐徐服之。自然奏效。然必於食遠時服之。方有益。

服自便法

一童便不可得。即以自便服之。效雖未及童便。久服病亦自愈。凡腥羶辛辣酸鹹太過者。槩行忌食。

血症良方

七

薛振堂

一服自便者。清晨起先小解一二次。因隔宿停留。不無積熱在內。不宜服。隨將燈心湯或豆腐漿連飲數碗。少頃溺若不來。再飲粥湯一二碗。靜坐片時。其便必至。乘熱服之。一服自便者。原因有病而服。則氣血有虧。其溺恐未能清徹。如水。若拘定雪白者。方服。一日之中。不可多得。但與淡茶色相似者。便可服也。所慮者。人病亦知禁止房事。稍愈即忘其故。我正

更體貼周到

須時加猛省

非惟却病直可與談禪理

不知元陽既散。精氣自失。雖服之無益也。一不慣服童便自便者。初服時恐有惡心嘔吐等患。惟屏定氣息。或以指捉鼻。使不知氣味。吸而盡服之。既久自無此患也。

養病法

一抱血症者。須處靜室。凝神滌慮。早眠晏起。不可浮躁。亦不可多言。浮躁則肝火易旺。多言則精氣易耗。皆於病體有礙。故惟久於靜養。其症

血症良方

六

薛振堂

自然漸愈也。一每見已之吐紅。未免心中憂懼。鬱鬱不樂。要知病已臨身。一時料難立愈。惟將死生置之度外。百念俱空。萬緣皆息。自然心地清涼。病體痊可。古所謂有病常如無病是也。一病中調攝甚難。飲食最要謹慎。飢固不可飽。亦不宜。清晨宜用生雞子一箇。調勻用滾豆腐漿沖入。乘熱飲之。五更時或用人乳一盞。亦妙。

為急性人下針

又為下乘
人說法益
見作者苦
心

若乳冷。用重湯溫服。至於生冷油膩炙煇五辛
酸澁之物。俱要忌食。蓋有病之人。與無病之人
不同。無病者之飲食。皆能化為精血。有病者不
能融化。必致停留。已然之病未痊。而未然之病
又至矣。

一病體之寒暖。亦要得宜。受寒易於增病。太熱
又助火上行。血亦隨之泛溢。務使著衣時漸增
漸減。方妙。若驟脫驟著。則氣體已虛。風邪易入。

血症良方

九

麟振堂

既屬內傷。又遭外感。不大可慮乎。

一血來時。不可卧倒。卧倒則血逆上行。須將藤

椅靠坐。夜則覆藉。以被褥。必血稍止。方可臥。若

口乾。略呷生地藕節湯數口。以滋津液。

一病愈後。尤宜葆攝。切不可。以我病已愈。不妨

任意縱恣。酒與色。務必永絕。即賭博諸事。亦不

可偶為。蓋勝負之間。未免患得患失。最易升火。

火既炎上。血必驟至。何可以無益之事。致敗家

喪身乎。故勞力事不可為。而勞心事亦不可為。
兢兢業業。庶免病之復發。古所謂無病常如有
病是也。

證驗

朱震亨曰。余見一老婦。年逾八十。貌似四十者。
詢其故。據云。嘗有血症。有人教服人尿。服之四
十餘年。老健無他病。其後年至九十餘。可見溲
溺不但能治病。且能使人益壽也。

血症良方

十

麟振堂

李士材曰。司寇姚公。痰中帶血。喉間有血腥氣。
百藥不愈。余按其脈。細而數。約有七至。此腎水
竭。而相火旺之故。因進以童便之說。服之遂愈。
至老不發。可見童便不但能治病。且能使病不
再發也。

吳郡有成衣者。素嗜酒。濕熱蒸臟腑。忽嘔血數
升。立時昏暈。余呼小童。以溺灌之。乃甦。扶歸。余
勸之日。飲自便四五次。月餘復至。余家飲食如

舊○顏○色○不○改○可○見○傷○於○酒○而○致○血○症○者○服○自○便○即○愈○也○

華○亭○有○一○士○子○家○貧○不○能○娶○直○至○四○旬○娶○一○再○醮○婦○未○免○不○謹○三○四○月○後○咳○嗽○發○熱○數○日○血○如○潮○湧○余○令○其○亟○服○自○便○并○寓○居○菴○觀○絕○房○事○彼○從○余○說○遂○愈○可○見○傷○於○色○慾○而○致○血○症○者○服○自○便○立○愈○也○

武○林○有○顯○者○氣○體○素○偉○飲○啖○兼○人○忽○嬰○咯○血○症○

血○症○良○方

主

麟○振○堂

醫○家○知○其○素○善○飲○且○多○姬○妾○酒○後○入○房○勢○所○必○有○遂○進○以○血○分○藥○佐○以○參○芪○豈○知○助○其○相○火○病○勢○益○增○余○以○戚○末○往○候○進○以○童○便○之○說○一○服○便○覺○稍○可○服○之○三○月○遂○愈○可○見○酒○色○兩○傷○而○致○血○症○者○服○童○便○亦○能○漸○愈○也○

石○門○一○閩○商○新○婚○數○日○即○遠○出○未○免○思○家○念○切○遂○致○鬱○火○炎○蒸○吐○紅○不○止○勢○甚○劇○余○勸○其○服○自○便○每○日○四○五○次○數○日○血○遂○止○可○見○童○便○之○功○也○

症○者○服○自○便○立○愈○也○

婁○上○有○貧○者○以○步○擔○販○魚○為○業○魚○市○在○天○妃○閣○離○城○四○十○餘○里○每○日○傍○晚○步○至○閘○裝○魚○百○斤○四○更○挑○入○城○清○晨○趕○早○市○如○是○者○年○餘○得○嘔○血○症○骨○瘦○如○柴○坐○以○待○斃○余○勸○之○服○自○便○月○餘○而○愈○可○見○勞○力○而○致○血○症○者○服○自○便○即○愈○也○休○陽○有○業○釘○鐵○店○者○寓○居○婁○江○性○暴○無○子○多○鬱○稍○不○如○意○即○怒○甚○遂○致○鬱○怒○傷○肝○吐○血○不○止○服

血○症○良○方

主

麟○振○堂

平○肝○解○鬱○等○藥○不○效○余○令○以○雞○子○荳○腐○漿○沖○童○便○服○之○遂○愈○可○見○鬱○怒○傷○肝○而○致○血○症○者○服○童○便○即○愈○也○

歙○西○有○販○豕○者○酷○暑○中○從○鄰○邑○挑○婦○途○間○又○經○暴○雨○寒○暑○兩○感○遂○致○咳○嗽○咳○嗽○不○已○繼○之○以○血○服○姜○桂○等○藥○病○勢○日○甚○聞○童○便○甚○妙○遂○服○其○幼○子○之○便○竟○愈○魯○珍○仇○兄○云○爾○可○見○寒○暑○兩○感○而○致○血○症○者○服○童○便○立○愈○也○

說得此身
所關甚大
就酒色一
輩冬月見
之亦當汗
流浹背

同郡有販苧為業者。寓居婁東。偶吐血痰數口。余曰。此血症之漸也。宜服童便。不可得當。以自便服之。彼不以為然。未幾血大至。百藥不效。因以余言質諸庸醫。醫云。小便性寒。恐妨胃氣。飲食必減。彼遂終不服。卒殞命。可見不服童便之害。非淺也。世之服小便而血症立愈者甚多。不服而致斃者亦不少。不能備載。第就目擊者略誌數人。以令人警心。觸目云。

血症良方

重

辭技堂

夫余之著是論也。罔憚勤勞。而捐貲以刊。是書也。又不惜工本。非素明醫理。而假此以沽名。亦非急於謀食。而藉此以取利也。余家素溫飽。未嘗究心岐黃術。第見世人不思得此生。甚難受之。天地育之。父母幼既無知。失於調養。壯年已有知識。自當愛護己身。為承先啓後計。而乃縱恣無忌。或耽於酒色。或樂於鬪力。或因寒暑失時。飢飽過甚。致病之由不一。總由不惜此軀。無

此見善致
病者方規
為老生常
談耳

清夜曉鐘
驚醒許多
春夢

所不為之故。及病已臨身。方悔而思返。延醫服藥。一不效。遂歸咎藥力之無功。醫家之不善。又另換名醫。希圖立愈。獨不思藥餌雖治病之物。若犯必死之症。亦非草根木實。可以挽回。譬如備土以防。水不壅塞。其涓涓之流。而欲壅塞其滔天之勢。備水以防。火不撲滅。其熒熒之光。而欲撲滅其燎原之威。能乎哉。古聖人所以有不治已病。而治未病之說也。更可慨者。少年顯達。

血症良方

重

麟聚堂

不思建功業。垂芳名。顧惟酒色。是問。不為長夜之飲。即圖魚水之歡。奔走門下者。且多方覓丹石之藥。以求媚。其為害曷可勝道。至若膏梁子弟。不事樵蒲。便崇豪飲。紅樓翠館。覓柳尋花。北里南隣。採蘭贈芍。以若所為。必致身嬰惡疾。又豈獨血症一途哉。而吾專以血症言。亦以世人因血症而殞命者。十居六七。余每每見之。心甚不忍。寤寐弗安。是以纂成此帙。刊以濟世。庶閱

願凡有生者

是書者人人知自養之道。人人知服童便自便之法。而有此症。可以立愈。無此症。亦可以養安。有廣○復○萬○間○曾○次長幼卑尊無不各遂其生。各得其所。是余之素心也。夫書將告竣。夢一羽客謂余曰。聞子有血症良方一卷。行將付梓。請試述之。余遂將卷中所言一一告之。羽客曰。子可謂知無不言。言無不盡。蒼蒼者其默佑之乎。及覺恍乎如見。亦可驗余救世之苦心。夢寐中如或遇之矣。雖然童

血症良方

三

薛振堂

便一味。非上池之水。橘井之泉。可以起死回生。延年益壽。要不過以人身之水。制人身之火。以童稚之元陽。補吾身之精氣耳。所貴抱病者小心翼翼。凡有礙於病者。一切謹慎。不為依法服之。自然萬無一失。若酒色如故。飲食不節。起居恐○杯○水○難○救○車○薪○火○耳無常。是雖素無病者。猶將諸病畢集。况有病者乎。此秦緩所以不能救膏肓。越人所以不能治骨髓也。至於小便之源流氣化。東垣已詳辨之。

固無俟余之贅言已。

血症良方

三

薛振堂

嘉慶癸酉年

吳門尤在注先生手定

金匱翼

心太平軒藏板

東南書院

大父拙吾府君家傳

十年隨吾父移居花溪又四年而大父歿事太
 淺而所熟聞於吾父之口述者十有三二焉忍
 人欲舉其事而無由也謹錄而載之家乘大父
 諱怡字在涇號拙吾曾大父第三子曾大父有田千
 畝會伯祖鼎黃公非辜被累驚幾盡及析產大父僅
 受田三十畝繼又以事棄去遂為寡人某年除夕漏
 鼓移盞無粒米大母偕吾父枯坐一室中燈半滅大
 父方賣字於佛寺晨光透乃攜數十錢易米負薪而

九氏家傳

歸業醫始不著於時大母以針指佐食嚴寒雞數鳴
 刀尺猶未離手卒以是致疾大父時追悼之不蓄姬
 妾者二十年大父甚貧困往來皆一時名流若番禺
 方東華錢唐沈方舟寧國洪東岸同郡若顧秀野沈
 歸愚陳樹滋徐龍友周迂村李容山諸先生皆折節
 與交楠自曉事後未見有一雜賓至者性沉靜淡於
 名利晚年治病頗煩稍暇即讀書澹花飼鶴觀魚以
 適其幽閑恬淡之意間作古文時文絕類荆川然非
 所專力也已已得疾不服藥絕粒待盡易箒前一日

索紙筆書留別同社諸公詩字畫蒼勁不異平時詩曰柳蹏松塵有前緣交好于今三十年曲水傳觴宜有後旗亭畫壁猥居前病來希逸春無分老至淵明酒已捐此後音塵都隔斷新詩那得到重泉蓋絕筆也所著醫書數種已刻者金匱心典集註醫學讀書記以及北田吟稿二卷皆已膾炙人口大父少時學譽於馬元一先生先生負盛名從游者無筭晚得大父喜甚謂其夫人曰吾今日得一人勝得千萬人矣後先生著書甚多皆大父所商榷以傳於此見前輩

九氏家傳

之卓識云孫世楠述

此藹谷先生所作家傳也先生人品學問為吳中名宿今讀其家傳益信家學淵源英賢繼起實有所本云澹安附識

九氏金匱翼序

傷寒而外金匱一書又雜症之大法門也吾吳尤在涇先生學術淵深天機敏妙嘗以其吟咏自得之餘究心靈素有金匱心典集註北田讀書錄行世又出其生平見聞所以羽翼金匱者條分縷晰列為八卷祖述仲景

序

遺意蒼萃各家之說恭以論斷所渭廣長舌大法輪可想見先生濟世婆心矣余生也晚不獲親炙先生討論精奧讀其書如見其人焉聞諸故老云先生鍵戶著書絕意榮利一時名宿如方東華顧秀野沈歸愚李容山諸君相與結城南之社其詩採入

國朝別裁集為時所誦習者已久晚年為
人治病多奇中蓋歷數十年精意研
殫宜其神妙莫測是書余得之及門
平舟沈子復於星門陳子慶借校為
正缺補名之曰金匱翼竊仿傷寒附
翼之義夫科舉之學揣摩家猶曰
中式况於病乎則是書為金匱羽

序

翼而先生為仲聖功臣矣是為序

嘉慶十有八年癸酉三月長洲後學徐錦
書於心太平軒



吳門過駕橋
北趙亮彩

聞之著書難選書尤難晉理之難知也
其書汗牛充棟以別贗存真如披
沙揀金覽之博尤貴擇之精吾鄉尤
在涇先生通儒也邃於醫理所著
醫書數種已刻者早已家置一編而

序

治雜病一書祇存鈔本是書之必傳
於後無庸贅述獨惜其未廣所
傳也吾宗澹安大兄昔同遊西疇
夫子門析疑賞奇師深喜其好學
迄今積三十年孜孜不倦宜其之方踵

至名動公卿乃復虛懷若谷雖盛暑
晚情余必剪燭深談也嘗出郭
氏傷寒論補亡尤氏雜病兩書正偽
補缺相與商確者久之今尤氏書校
刊已成促其先付剞劂名之曰金匱

序

二

翼尤氏固為仲聖功臣而 澹安亦
屬尤氏知己矣是為序

弟柏雪峰氏拜書



余始在汪幼習儒業長精於醫
於古方書靡不畢貫而治病
要方一以仲景為宗既以其道
活人靈無以昭後世也迺注仲
景金匱即查所傳金匱心典

原序

一

是也間又取雜病討論之集為
八卷詳其証候析其治法表裏
虛實之辨補瀉溫涼之用開卷
瞭然如指掌焉嗚呼此道之難
知也久矣今睹是書抑何其深

切而著明也惜其所注仲景傷寒論名貴珠集者余不待而見之然在注不專以醫名其所為詩必宗老杜一如其醫之必宗仲景云

原序

二

乾隆三十三年歲次戊子

嶽岩老人世輔書於常邱山塘
之思永堂

金匱翼總目

卷一

中風

濕症

瘟疫

卷二

痰飲

飲食

血症

卷三

膈噎反胃附

虛勞

發熱

惡寒

瘧疾

卷四

金匱翼

總目

一

尸症

癩狂驚癇附

疸症黃病附

消渴

水氣

脹滿

積聚

卷五

頭

項背

臂

眩暈

耳

鼻

口

舌

齒

咽喉

卷六

心痛

胃脘痛

腹痛

腰痛

脇痛

四肢腫

顛振

脚氣

痺症

卷七

咳嗽

喘

嘔吐

泄瀉

痢疾

卷八

夢遺

精滑附

便秘

閉癰

遺溺附

交腸

淋症

疝症

診候生死要法

金匱翼總目終

金匱翼

總目

二

金匱翼卷一目錄

中風統論 開關 固脫 泄大邪 轉大氣

逐痰涎 除熱風 通竅隧

灸膻穴 五臟分治

失音不語

口眼喎斜

偏風

歷節風

鶴膝風

金匱翼 卷一目錄

風緩

風搔癢

諸濕統論 散濕 溲利 下濕 上下分消

瘟疫大法

金匱翼卷一

飼鶴山人尤在涇先生怡

長洲後學徐錦炳南氏讀

中風統論

中風之病。昔人有真類之分。蓋以賊風邪氣所中者為真。痰火食氣所發者為類也。以愚觀之。人之為病。有外感之風。亦有內生之風。而天人之氣。恒相感。名真邪之動。往往相因。故無論賊風邪氣從外來者。必先有肝風為之內應。即痰火食氣從內發者。亦必有

金匱翼

卷一 中風統論

肝風之始基。設無肝風。亦祇為他病已耳。寧有卒倒偏枯歪僻牽引等症哉。經云風氣通于肝。又云諸風掉眩。皆屬於肝。諸濕腫滿。皆屬於脾。諸寒收引。皆屬於腎。由此觀之。則中風之病。其本在肝。猶中溼之屬於脾。中寒之屬於腎也。雖五藏各有中風之症。然風在他藏。則又顯他藏之證矣。豈如今人之所謂中風哉。而其為病。則有藏府經絡淺深之異。口眼歪邪。絡病也。其邪淺而易治。手足不遂。身體重痛。經病也。邪差深矣。故多從倒仆後見之。卒中昏厥。語言錯亂。府

病也。其邪為尤深矣。大抵倒仆之候。經府皆能有之。

其倒後神清識人者在經。神昏不識人者在府耳。至

于唇緩失音耳聾目翳遺尿聲鼾等症。則為中藏病

之最深者也。然其間經病兼府者有之。藏病連經者

有之。府藏經絡齊病者有之。要在臨病詳察也。至於

真邪虛實之故。治法通塞之宜。苟不預為講求。何以

應斯倉卒哉。夫邪氣所觸者。邪風暴至。真氣反陷。經

絡府藏卒然不得貫通。不相維繫。內經所謂邪風之

至。疾如風雨是也。藏邪所發者。藏氣內虛。肝風獨勝

金匱翼

卷一 中風統論

二

卒然上攻九竅。旁溢四肢。如火之發。如泉之達。而不可驟止。肝象木而應風。而其氣又暴故也。又邪氣所觸者。風自外來。其氣多實。肝病所發者。風從內出。其氣多虛。病虛者氣多脫。病實者氣多閉。脫者欲其收。不收則死。閉者欲其通。不通亦死。約言治要。蓋有八法。茲用條列於後。神而明之。存乎其人耳。又五藏中風分治之方。余見古方龐雜失旨。不適于用。謹刪正五方。并錄出以備檢用云。

卒中八法

夫醫之治病。猶將之禦敵。宰之治民也。禦敵有法。奇正虛實。隨機應變。不知法。則不足以禦敵矣。治民有道。刑政教化。以時而施。不明道。則不足以臨民矣。病有陰陽表裏。虛實緩急之殊。醫有寒溫汗下補瀉輕重之異。不知此。則不足以臨病矣。故立中風八法。以應倉卒之變。至于隨證緩調。另詳其法於後。蓋病干變。藥亦干變。凡病皆然。不獨中風。余于此首言之者。亦一隅三反之意爾。

一日開關

金匱翼

卷一

卒中八法

三

卒然口噤目張。兩手握固。痰壅氣塞。無門下藥。此為閉證。閉則宜開。不開則死。搯鼻。指齒。探吐。皆開法也。

白礬散聖濟 治急中風。口閉涎上。欲垂死者。

白礬二兩生 生薑一兩連皮搗水二升煎取一升二合

右二味。合研瀉。分三服。旋旋灌之。須臾吐出痰毒。眼開風退。方可服諸湯散。救治若氣衰力弱。不宜吐之。

又方

白礬如拇指大一塊為末 巴豆二粒去皮膜

右將二味于新瓦上煨令焦赤。為度煉蜜丸。芡實大。每用一九。綿裹。放患人口中。近喉處。良久吐痰立愈。一方加牙皂一錢。煨研取三分。吹鼻中。

急救稀涎散事本 治中風涎潮。口噤氣閉不通。

猪牙皂角四挺肥實不蛀者去黑皮 晉礬光明者一兩

右為細末。和勻。輕者半錢。重者一錢七。溫水調灌下。不大嘔吐。但微微冷涎出一二升。便得醒。次緩緩調治。大服亦恐過傷人。孫兆方

全匱翼 卷一 一日開關 四

金匱翼

卷一

一日開關

四

勝金丸本 治同前

生薄荷半兩 猪牙皂角二兩搗碎水一升二味同浸并汁慢火熬成膏

瓜蒂末 藜蘆末各一兩 硃砂半兩研

右將硃砂末一分。與二味末研勻。用膏子搜和。丸如龍眼大。以餘硃砂為衣。溫酒化一九。甚者

二九。以吐為度。得吐即省。不省者不可治。

二日固脫

猝然之候。但見目合口開。遺尿自汗者。無論有邪無邪。總屬脫症。脫則宜固。急在元氣也。元氣固。然後可

以圖邪氣。

參附湯

人參

製附子

用參須倍于附。或等分。不拘五錢或一兩。酌宜用。薑水煎服。有痰加竹瀝。

三曰泄大邪

昔人謂南方無真中風病。多是痰火氣虛所致。是以近世罕有議解散者。然其間賊風邪氣亦間有之。設遇此等。豈清熱益氣理痰所能愈哉。續命諸方。所以

金匱翼

卷一 二曰固脫

五

不可竟廢也。俟大邪既泄。然後從而調之。

小續命湯 河間云。中風面加五色。有表症。脈浮而惡寒。拘急不仁。此中風也。宜以加減續命。隨症治之。古今錄驗

麻黃

桂枝

杏仁

芍藥

甘草

人參

川芎

防已

黃芩

各一兩 附子半兩 製 防風一兩 半

右為粗末。每服五七錢。水一盞半。生薑五片。煎至一盞去滓。稍熱服。食前。加減法。無汗惡

寒。加麻黃防風杏仁。有汗惡風。加桂枝芍藥

杏仁。無汗身熱不惡風。加葛根二兩。桂枝黃

芩各依本方加一倍。有汗身熱不惡寒。加石

羔知母各二兩。甘艸一兩。無汗身寒。加附子

半兩。乾薑二兩。甘艸三兩。有汗無熱。加桂枝

附子甘艸各依本方加一倍。肢節攣痛。或木

不仁。加羌活四兩。連翹六兩。凡中風不審六

經之加減。雖治之。不能去其病也。

戴氏加減法 多怒加羚羊角。熱而渴。去附

金匱翼

卷一 三曰泄大邪

六

子加秦芫。恍惚錯語。加茯神遠志。不得睡。

加棗仁。不能言。加竹瀝。神虛無力。去麻黃。

加人參。

又雲岐子加減。見準繩類方

三化湯

古河間云。中風外有六經之形證。先以加

減續命湯。隨症汗之。內有便溺之阻隔。復以三化

湯下之。

厚朴

枳實

大黃

羌活各等分

右剉如麻豆大。每服三兩。水三升。煎至一升半。

終日服之以微利為度。

經云脾胃太過則令人四肢不舉。又曰土太過則敦阜。阜高也。敦厚也。既厚而又高則令除去此真膏染之疾。非肝腎經虛之候也。何以明之。經云三陰三陽發病為偏枯痿易。王注云三陰不足則發偏枯。三陽有餘則為痿易。易為變易常用而痿弱無力也。其治宜三化湯瀉令氣弱陽衰土平而愈。若脾虛則四肢亦不用也。經云土不及則卑監。卑者下也。監者陷也。坑也。四肢

金匱翼 卷一 三日泄大邪 七

皆稟氣于胃而不得至經。必因于脾。乃得稟也。今脾不能為胃行其津液。四肢不得稟水穀氣。日以益衰。脈道不利。筋骨肌肉皆無氣以生。故不用焉。其治則宜十全散加減四物去邪留正也。
按續命三化並攻泄大邪之劑。人壯氣實者宜之。若氣弱無力者不可用也。余故錄肘後等方于後。以備參用。蓋醫者法必求備。而用必極慎也。

肘後紫方 療中風脊強身痙如弓。

雞屎 二升 大豆 一升 防風 三兩

水二升。先煮防風取三合汁。豆雞矢二味。熬令黃赤色。用酒二升。淋之去滓。然後入防風汁。和分再服。相去人行六七里。覆取汗。避風。

荆芥散 治中風口噤四肢搐搦。或角弓反張。

荆芥一味。畧炒為末。酒服二錢。

賈似道云。此方出曾公談藝錄。前後用之甚驗。其子名順者。病此已革。服之立定。真再生丹也。

金匱翼 卷一 三日泄大邪 八

華佗愈風散。治婦人產後中風。口噤手足痙。如角弓。或產後血暈不省人事。四肢強直。或心眼倒築。吐瀉欲死者。亦只此一味。微炒為末。每服三錢。豆淋酒調服。或童子小便服之。口噤則抉齒灌下。藥下如神。王貺指迷方。加當歸等分水煎服。

豆淋酒法

黑豆二升。熬令聲絕。酒二升。納罇中急攪以絹濾取清。頓服取汗。

續命煮散 復管衛却風邪

桂枝七分 白芍 甘草 防風

獨活 人參 熟地黃 當歸

川芎 荆芥穗 細辛 遠志去心

乾葛 半夏各五分

右剉作一貼入薑三片水煎服

四日轉大氣

大氣不息之真氣也不轉則息矣故不特氣厥類中即

真中風邪亦以轉氣為先經云大氣一轉邪氣乃散

金匱翼 卷一 四日轉大氣 九

此之謂也

八味順氣散凡患中風者先服此順養真氣次

進治風藥

人參 白朮 茯苓 陳皮

青皮 台州烏藥 香白芷各一兩 甘艸半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分溫服

勻氣散良方即順風勻氣散

白朮 烏藥一錢 人參 天麻一錢

沉香 青皮 白芷 木瓜

紫蘇 甘艸各五分

右剉作一貼薑三片水煎服

五日逐痰涎

或因風而動痰或因痰而致風或邪風多附頑痰或痰病有如風病是以掉搖眩暈倒仆昏迷等證風固病兼治痰則可痰病兼治風則不可

滌痰湯 治中風痰迷心竅舌強不能言

南星製 半夏泡七次 枳實炒 茯苓各二錢

金匱翼 卷一 五日逐痰涎 十

橘紅半錢 右菖蒲 人參各一錢 竹茹七分

水一鍾半生薑五片煎八分食後服

清心散 治風痰不開

薄荷 青黛 礞砂各二錢 牛黃

冰片各三分

右為細末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥末蜜水調稀擦舌本上

六日除熱風

內風之氣多從熱化昔人所謂風從火出者是也

是

證不可治風。惟宜治熱。內經云。風淫於內。治以甘涼。外臺云中風多從熱起。宜先服竹瀝湯。河間云。熱盛而生風。或熱微風甚。即兼治風也。或風微熱甚。但治其熱。即風亦自消也。

竹瀝湯 治熱風。心中煩悶。言語蹇澇。

竹瀝 荆瀝各五分 生薑汁三合

右三味相和。溫服三合。以酒調服良。一方竹

瀝。荆瀝梨汁各二合。陳醬汁半合。相合。微煎一

二沸。濾清。細細灌入口中。治中風不語昏沉不

識人。一方竹瀝五合。人乳汁二合。三年陳醬

汁半合。三味相和。分三服。治熱風舌強不得語。

心神煩悶。一方竹瀝二升。生葛汁一升。生薑

汁三合。三味相和。溫分三服。日夜各一服。

地黃煎 治熱風。心煩悶。及脾胃間熱。不下食。

生地汁 枸杞根汁各二升 生薑汁一升

酥三升 荆瀝 竹瀝各五分 天冬

人參各八兩 茯苓六兩 梔子仁 大黃四兩

右先煎地黃等汁。成膏。餘五物為散。內攪調。每

服一七日。再漸加至三七。覺利減之。

七日通竅隧

風邪中人。與痰氣相搏。閉其經隧。神暴昏。服暴絕者。急與蘇合至寶之屬。以通之。蓋惟香藥為能達經隧。通神明也。

蘇合香丸

白朮 硃砂研 烏犀角屑 青木香

香附 訶子煨取肉 白檀香各二兩 龍腦研五錢

薰陸香 安息香另末無灰酒一升熬膏 蘇合香油入安息香

金匱翼 卷一 七日通竅隧 十一

膏內各 麝香研七錢半 沉香 丁香

華撥各二兩

右為細末。入研藥。勻用安息香膏。并煉白蜜和

劑。每服旋丸。如梧桐子大。清晨取井花水。溫冷

任意化服。四丸。溫酒亦得。空心服。

至寶丹 方詳準繩。茲不贅

八日灸膈穴

中風卒倒者。邪氣暴加。真氣反陷。表裏氣不相通。故也。灸之不特散邪。抑以通表裏之氣。又真氣暴虛。陽

絕于裏陰陽二氣不相維繫藥石卒不能救者亦惟灸法為能通引絕陽之氣也。

灸風中腑手足不遂等症

百會一穴 在頂中央旋毛中陷可容豆許

髮際是兩耳前兩穴

肩髃二穴 在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂取之

曲池二穴 在肘外輔屈肘曲骨中以手拱胸取之橫紋頭陷中是

風市二穴 在膝外兩筋間平立舒下手著腿當中指頭盡處陷者宛宛中

足三里二穴 在膝眼下三寸筋外廉兩筋間

金匱翼

卷一 八日灸論穴

三

絕骨二穴 在足外踝上三寸動脈中

灸風中臟氣寒涎潮不語昏危者下火立效。

百會一穴

大椎一穴 一名百勞在項後第一椎上陷中

風池二穴 在頸額後髮際陷中

肩井二穴 在肩上陷解中缺盆上大骨前一寸半以三指按取之當其中指下陷者中是

曲池二穴

間使二穴 在掌後三寸筋間陷中

足三里二穴

灸風中脈口眼歪斜。

聽會二穴 在耳前陷中張口得之動脈應手

頰車二穴 在耳下八分

地倉二穴 在俠口吻旁四分近下有脈微動者

凡喎向右者為左邊脈中風而緩也宜灸左喎

陷中二七壯喎向左者為右邊脈中風而緩也

宜灸右喎陷中二七壯艾炷大如麥粒頻頻灸

之以取盡風氣口眼正為度。

金匱翼

卷一 八日灸論穴

四

灸中風卒厥危急等症。

神闕 用淨鹽炒乾納臍中令滿上加厚薑一

片蓋之灸百壯至五百壯愈多愈妙薑焦則易

之

丹田 臍下三寸氣海 臍下二寸俱連命門為生氣之

海經脈之本灸之皆有大效。

凡灸法炷如蒼耳大必須大實其艾又須大熟

初得風之時當依此次第灸之火下即定千金

翼云愈風之法火艾特有奇能針石湯藥皆所

不及也。

灸法頭而上炷艾宜小不宜大。手足上乃可粗也。又須自上而下不可先灸下。後灸上。

趙氏曰口之喎。灸以地倉。目之斜。灸以承泣。

苟不效。則灸人迎。夫氣虛風實而為偏。上不得

出下不得泄。真氣為風邪所陷。故宜灸。經云。陷

下則灸之是也。

范子默記崇寧中凡兩中風。始則口眼歪邪。次

則涎潮閉塞。左右共灸十二穴。得通氣。十二穴

金匱翼

卷一

八日灸論穴

左

者。聽會頰車。地倉百會。肩髃曲池。風市足三里

絕骨。髮際大椎。風池也。依而用之。無不立效。

羅謙甫云。凡治風。莫如續命湯之類。然此可以

扶持疾病。要收全功。必須艾火為良。

已上八法。不過約言治要耳。而風氣善行數變。

證狀不一。茲更備舉諸風。條列如左。學者習而

通焉。則思過半矣。

擬五藏中風分治之方。

新腎風菴蓉丸

菴蓉 熟地 防風 虎骨

山藥 牛膝 黑豆 石斛

當歸 獨活 錢半

蜜丸。梧子大。每百丸。空腹食前酒下。

新肺風人參湯

人參 兩 麻黃 八錢 羚羊角 三錢 白蘚皮 三錢

防風 一兩 桔梗 五錢 杏仁 廿一粒 石羔 七錢

甘草 五錢

右為散。每服三錢。水煎去滓溫服。

新脾風白朮湯

白朮 白茯苓 防風 防己 各七錢

人參 甘草 各五錢 白芍 附子

麻黃 薏仁 各一兩

右剉細麻豆大。每服三錢。水煎入生薑汁半分。

同煎取七分。去滓服。無時。日三。

新心風犀角丸

人參 三兩 犀角 一兩 遠志 生地黃

天冬 各五錢 石菖蒲 五錢 赤箭 紫石英 各五錢

一第1006 丹黃參日全書第 7 版文小

防風 七錢 茯苓 三兩 細辛 三錢 丹砂 一兩
即辰砂

龍腦 麝香 各一錢

右為末。蜜丸。雞豆大。每服一九。溫酒下。無時。

新定 肝風天麻散

天麻 二兩 川芎 一兩 人參 一兩 羚羊角 一兩
五錢

犀角 七錢 烏蛇 三寸 栝子仁 酸棗仁

鈎藤 各一兩 甘菊 一兩

右為散。豆淋酒下一錢七。漸加至二錢七。日三

夜一。

中風失音不語

失音者。語無音聲。蓋即瘖也。夫喉嚨者。氣之所上下也。會厭者。聲音之門戶也。其氣宣通。則聲音無所阻礙。若風邪搏于會厭。則氣道不宣。故令人失音。其邪氣入藏者。則并不能言語也。外臺云。肝風其口不能言。脾風聲不出。或上下手。又云。脾之脈挾喉連舌本。心之別脈係舌本。今心脾藏受風邪。故舌強不得語也。河間云。內奪而厥。謂腎脈虛弱。其氣厥不至舌下。則舌瘖不能言。足廢不能用。經名瘖痺。地黃飲子主

之。此而論之。失音者。語言如故而聲音不出。為藏之虛也。舌強不能語。雖語而蹇澀不清。痰涎風氣之所為也。不語者。絕無語言。非神昏不知人。即藏氣厥不至舌下。要須分別治之。

河間地黃飲子

熟地黃 巴戟 去心 石斛 山茱萸

茯苓 酒浸 附子 泡 五味子 肉桂

白茯苓 麥冬 石菖蒲 遠志 去心 等分

右為末。每服三錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。

金匱翼 卷十 中風失音不語

薄荷七葉。同煎至八分。服無時。

滌痰湯

清心散 二方並見前逐痰瀉門

寶鑑茯神散

茯神心 炒 薄荷 二兩 蝎梢 去毒 五錢

右為末。每服一二錢。溫酒調下。此治風氣挾痰

不語之劑。

口眼歪斜

足陽明脈循頰車。手太陽脈循頸上頰。一經俱受風

寒筋急引頰。令人口喎。目不能正視。又云風入耳中。亦令口喎。緣坐臥處對耳有竅。為風所中。筋牽過一邊。連眼皆緊。睡著一眼不合者是也。

外臺治中風。面目相引。口喎。牙車急。及舌不得轉方。

獨活 三兩 竹瀝 生地黃汁 各一升

三味合煎。取一升。頓服之。即愈。

又方

牡蠣 礬石 附子 竈下黃土

金匱翼 卷一 口眼歪斜 尤

右各等分。為末。取三年雄雞冠血。和藥敷其上。候復故。便洗去之。千金翼云。左喎塗右。右喎塗左。

戴元禮云。有無故日眼喎斜。投以中風藥不效。蓋緣骨虛中受風邪所致。當于此求之。不可例作尋常中風治之。

又方

草麻子去殼爛搗。右喎塗左。左喎塗右。或以鱈血入麝香少許塗之。

偏風

偏風者。風邪偏客身之一邊也。其狀或左或右。手不能舉。足不能履。內經所謂風邪之氣。各入其門戶。所中則為偏風是也。亦有陰陽偏廢。左右不相貫通。或凝痰死血。壅塞經絡者。其狀與偏風等也。蓋左右者。陰陽之道路。不可偏也。偏則陰陽傾而隔矣。經絡者。血氣所流注。不可塞也。塞則氣血壅而廢矣。和利陰陽。疏滄經絡。治內傷之道也。大藥攻邪。針熨取汗。治外感之道也。

金匱翼 卷一 偏風 辛

甄權防風湯 療偏風

防風 一兩 羌活 二兩 川芎 一兩 白芷 一兩

葛根 二兩 杏仁 二兩 白朮 一兩 人參 二兩

牛膝 一兩 狗脊 一兩 草薺 一兩 薏仁 二兩

麻黃 四兩 石羔 二兩 桂心 二兩 生薑 五兩

水一斗二升。煮取三升。分三服。服一劑覺好。更

進一劑。灸風池。肩髃。曲池。支溝。五樞。陽陵泉。巨

墟。下廉。合七穴。一度灸之。即差。外臺

麻子仁湯 治偏風手足不遂。口眼喎斜。

麻子仁 黑豆緊小者 鵝糞各二合 垂柳枝半寸長者二握

四味。先以酒七升煮柳枝取五升。炒鵝糞麻仁

黑豆等令黃。乘熱投柳枝酒內。須臾去滓令淨。

每服旋取。溫服二合。至三合。空心臨卧各一服。

活絡丹

川烏 草烏並泡去皮 胆星各六兩 地龍去土焙乾

乳香去油 沒藥各二兩

蜜丸。桐子大。每服二三十丸。溫酒下。

戴氏云。病症有終身不愈者。其在腰。或屈而不能伸。

金匱翼 卷一 偏風

或伸而不能屈。在手足亦然。治法活血為先。多服四

物湯。吞活絡丹佳。

夜合醞酒方 治中風手足攣縮。不得屈伸。

夜合枝 桑枝 槐枝 栢枝

石榴枝各生用五兩 羌活二兩 防風五兩 糯米五升

黑豆緊小者生用五升 細麴七斤

共十味。以水五斗浸五枝。同煎取二斗五升。去

滓。浸米豆二宿。蒸熟。與麴羌活二味拌和。造酒

依常醞法。封七日。壓去糟。取清酒三合。至五合。

時飲之。令常有酒氣。勿令過醉亂氣。

熨法 治中風骨節疼痛。

天麻 半夏 細辛各二兩

絹袋二个。各盛藥令勻。蒸熱。交互熨痛處。汗出

則愈。數日再熨。

歷節痛風

歷節風者。血氣衰弱。風寒襲入關節。不得流通。真邪

相攻。所歷之節。悉皆疼痛。故謂歷節風也。病甚則使

人短氣自汗。頭眩欲吐。肢節攣曲。不可屈伸。亦有熱

金匱翼 卷一 歷節痛風

毒流入四肢者。不可不知。

歷節腫痛。的是濕病。由飲酒當風。或汗出入水所致。

經云。濕流關節是也。挾寒者。其痛如掣。挾風者。黃汗

自出。其遍身走痒。徹骨疼痛。晝靜夜劇。發如虫啣者。

謂之白虎歷節。

沒藥散

沒藥研半兩 虎脰骨酥炙三兩

二味搗末。每服二錢。溫酒調下。日三。

大棗湯

大棗十五枚 附子一枚 甘草一尺 黃芪四兩

麻黃五兩 生薑二兩

水七升。煮取三升。每服一升。日三。

白頭翁酒 治諸風攻痛。四肢百節。

白頭翁草一握。搗以醇酒投之。頓服。

又方

黑豆炒半升 威靈仙二兩 桑根白皮一兩

三味用醇酒一升半。煎取八合。去滓。頓服之。桑

皮換桑枝佳。張杲嘗患兩臂痛。服諸藥無效。

金匱翼 卷十一 歷節痛風 三

一教取桑枝一小升。切細炒香。以水三大升。煎

取二升。一日服盡。無時。數劑而愈。

犀角湯 治熱毒流入四肢。歷節腫痛。千金

犀角二兩 羚羊角一兩 前胡 黃芩

梔子仁 射干各三兩 大黃 升麻各四兩

豉一兩

水九升。煮取三升。去滓。分三服。一方有獨活

一兩半。元參。生乾地黃各一兩半。芩根半兩。無

黃芩。射干。大黃。蓋熱毒非苦寒不能瀉而去之。

而熱傷陰氣者。又須甘寒以滋益之。至于攻走骨節。則獨活。牛蒡根。尤有專長也。

白花蛇

白花蛇酒浸去皮 何首烏去黑皮 蔓荊實

牛膝酒浸各四兩 威靈仙 荊芥穗 旋覆花各二兩

七味搗末。每一錢。溫酒調下。空心臨臥服。

牛膝

牛膝酒浸 當歸 赤芍各一兩 虎骨酥炙令黃二兩

芒硝別研 芎藭兩 桃仁去皮尖雙仁

金匱翼 卷十一 歷節痛風 請

七味為散。每服空心溫酒調下一錢。至二錢

抵聖散

虎脛骨不計多少打碎酒浸

一味為散。每服半錢。入薄荷末一錢。人參末半

錢。煎乳香酒調下。仁齋云。虎骨酥炙黃。搗碎

如米。每骨一升。以酒三升。浸五日。空心服一盞

冷則煖之。

麝香丸 治白虎歷節。諸風疼痛。游走無定。狀如

蟲。嚙晝靜夜劇。及一切手足不測疼痛。

大川烏八角者三箇生用 全蝎二十一箇生用 黑豆二十一粒生用

地龍去土五錢生用

右為細末。入麝香半字。約三同研勻。糯米飲糊

丸如茶豆大。每服七丸。甚者十九丸。夜卧令膈空

温酒下。微出冷汗。一身便瘥。

許叔微云。予得此方。凡是歷節。及不測疼痛。一二服便瘥。在歙州日。有一貴家婦人。遍身走注疼痛。至夜則發如虫嚼其肌。多作鬼邪治。予曰。此正歷節痛。三服愈。

金匱翼 卷一 鶴膝風

鶴膝風

蚬螂丸

蚬螂一條頭尾全者 白附子 阿魏 桂心

白芷各一兩 乳香三分 當歸 芍藥

北漏蘆 威靈仙 地骨皮 牛膝

羌活 安息香 桃仁各一兩生同 沒藥三分

右十六味。蚬螂桃仁白附阿魏桂心白芷安息

香乳香沒藥九味。同童子小便并酒二升炒熟

冷後。入餘藥為丸。蜜九彈子大。空心温酒化下。

一丸。蚬螂即全蝎也。氣味甘辛平。有毒。主諸風。癱瘓及中風。半身不遂。目眼歪斜。諸痿。手足抽。

風緩

風緩。即攤緩。其候四肢不舉。筋脉關節無力。不可收攝者。謂之攤。其四肢雖能舉動。而肢節緩弱。憑物不能運用者。謂之緩。或以左為攤。右為緩。則非也。但以左得之。病在左右。得之病在右耳。推其所自。皆氣血虛耗。肝腎經虛。陰陽偏廢而得之。或有始因他病。服吐下之藥過度。亦使真氣內傷。營衛失守。一身無所

金匱翼 卷十 風緩

稟養而然也。聖濟

風緩者。風邪深入。而手足為之弛緩也。夫脾主肌肉。四肢胃為水穀之海。所以流布水穀之氣。周養一身。脾胃既虛。肢體失其所養。于是風邪襲虛。由腠理而入肌肉。由肌肉而入脾胃。安得不為之緩廢乎。又人之一身。筋骨為壯。肝主筋。腎主骨。肝腎氣虛。風邪襲之。亦有肢體緩弱之症。是當先去風而後益之。仁齋

天麻浸酒方 治癱緩風不計淺淺。久在牀枕

天麻 龍骨 虎骨 骨碎補

烏蛇酒浸去皮骨 白花蛇全 羌活 獨活

惡實根 牛膝各半兩 松節剉 敗龜板酥炙

乾熟地黃 當歸 川芎 茄根

附子一枚泡去皮臍 大麻仁 原蠶沙炒各一兩

共十九味。以咀如麻豆用酒二斗浸。密封。春夏三日。秋冬七日。每一盞不拘時溫服。

四斤丸 治風寒濕毒與氣相搏筋骨緩弱四肢

痠疼痒痺。

宣木瓜去穢切焙 天麻 牛膝焙 菴蓉洗切焙

金匱翼 卷十 風緩 走

右四味各一斤。用好酒浸三日。外用熟附子虎

骨酥炙各二兩為末。用浸藥酒調麩糊丸桐子

大。每服三四十九。食前溫酒。或豆淋酒下。

一方加當歸三兩。乳香沒藥五靈脂各半兩。麝

香一錢。名大四斤丸。

新定

人參 黃芪各半兩 白朮 何首烏

肉蓯蓉 兔絲子 牛膝各四兩 白茯苓

川草薢 骨碎補 狗脊 川附子各三兩

川烏 羌活 防風 地龍

全蝎各一兩

右為末酒糊丸。梧子大。每服五十九。溫酒下。

風瘙癢

風瘙痒者。表虛衛氣不足。風邪乘之。血脈留滯。中外

鼓作。變而生熱。熱即瘙痒。久不瘥。淫邪散溢。搔之則

成瘡也。

防風湯淋洗方

防風 苦參 益母草各三兩 白蒺藜炒五兩

金匱翼 卷十 風瘙癢 末

荆芥穗 蔓荆實 枳殼各二兩

每用三兩。水一斗。煎至八升。乘熱淋洗患處。

松葉酒方。

松葉一斤。酒一斗。煮三升。日夜服。出汗。

胡麻散 治脾肺風毒。攻注皮膚。瘙痒手足生瘡。

及遍身瘡癩。發赤黑。勝子。肌熱疼痛。

胡麻炒令香熟 枳殼各二兩 防風 蔓荆實

威靈仙 苦參 何首烏米泔浸透去黑皮炒乾

川芎 荆芥穗 甘艸炙各兩 薄荷半兩

右爲散每服二錢溫酒下。或煉蜜丸梧子大每

服三十九

洗方

思永堂松年大仙常用此方治遍身瘡癩作

紫背浮萍

半碗

豨薟艸

一握

蛇牀子

五錢

蒼耳子

一兩

防風

五錢

煎湯薰洗數次無不愈者。

風癩癰

三

諸濕統論

濕氣不一。有天之濕。霧露雨是也。天本乎氣。故先中表之營衛。有地之濕。水泥是也。地本乎形。故先傷皮肉筋骨血脈。有飲食之濕。酒水乳酪之類是也。傷于脾胃。有汗液之濕。汗液亦濕也。止感於外。有人氣之濕。太陰濕土之所化也。乃動于中。天之濕汗之地之濕滲之。飲食之濕在上吐之。在中奪之。在下者引而竭之。汗液之濕亦以汗取之。人氣之濕屬太陰所化。在氣交之分。土兼四氣。寒熱溫涼。升降浮沉。備在其中。當分上下中外而治。以兼化四氣。淫佚上下中外無處不到也。天率在上。則病頭重。胃滿嘔吐。在外則身重腫脹。在下則足脛跗腫。在中則腹脹中滿痞塞。其所用藥。亦兼寒熱溫涼以爲佐使而治之。

濕之爲病。有自外入者。有自内生者。必審其方土之病本。東南地下。多陰雨。地濕。凡受必從外入。多自下起。是以重腿脚氣者多。治當汗散。久者宜疏通滲泄。西北地高。人食生冷濕麪。或飲酒後。寒氣拂鬱。濕不能越。或腹皮脹疼。甚則中滿水蠱。或週身浮腫如泥。

金匱翼

卷一

諸濕統論

三

按之不起。此皆自內而生者也。審其元氣多少。而通利其二便。責其根在內者也。然方土內外。亦互相有之。但多少不同。須對症施治。不可執一也。

中濕與風寒氣合者為痺。其寒多者為痛。為浮腫。非木附桂不能去也。其風多者為煩劇。為流走。非麻黃薏苡烏頭不能散也。其濕多者為堅滿。為氣閉。非甘遂葶藶枳朮不能泄也。

散濕之劑

麻黃加朮湯 金匱云濕家身煩疼。可與麻黃加

金匱翼

卷一

散濕

三

朮湯。發其汗為宜。慎不可以火攻之。

麻黃 三兩 桂枝 二兩 甘草 一兩 白朮 四兩

杏仁 七十個 去皮尖

水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取

二升半。去滓。溫服八合。覆取微汗。

按此治寒濕在表之劑也。寒固當汗。而濕在表者。亦非汗不解。故以麻黃散寒。以白朮除濕。取微汗者。汗大出。則濕反不去也。

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治風濕一身盡疼發熱

日晡所劇。此病傷于汗出當風。或久傷取冷所致也。方詳金匱。茲不贅。

羌活勝濕湯 治濕氣在表。脈浮身重。不能轉側。自汗。或額上多汗。此為風濕。

羌活 獨活 各一錢 川芎 藥本

防風 炙艸 各五分 蔓荊子 三分

如齧痛中冷。沉沉然者。有寒濕也。加酒洗。漢防己附子各五分。

按此治風濕在腠理及關節之劑。吳鶴皋云。無

金匱翼

卷一

滲利

三

竅不入。惟風藥為能。故凡關節之病。非羌獨等不能到也。

滲利之劑

五苓散 通治諸濕。腫滿。嘔逆。泄瀉。痰飲。濕癰。身

痛身重。

猪苓 茯苓 白朮 澤瀉

桂

為末。每服三錢。服後多飲熱水。汗出愈。

腎著湯 治傷濕身重。齧冷如坐水中。

乾薑炮 茯苓各四兩 甘艸炙 白朮生各二兩

右每服四錢。水一盞煎七分。空心溫服。

已上溫利之劑。濕兼寒者宜之。

清熱滲濕湯

黃柏鹽水炒 黃連 茯苓 澤瀉各一錢

蒼朮 白朮各一錢半 甘艸五分

水二鍾煎八分服。

此清滲之劑。濕而熱者宜之。

下濕之劑

金匱翼 卷一 下濕 三

舟車神佑丸

甘遂 芫花 大戟各一兩並醋炒 大黃二兩

青皮 陳皮 木香 檳榔各半兩

黑牽牛頭末 輕粉一錢 取虫加燕糞半兩

為末水丸。空心服。治法服法詳載準繩痰飲門

青木香丸方見痼症

上下分消之劑

除濕湯治傷濕發熱惡寒身重自汗骨節疼痛

小便閉。大便溏。胷脚痺冷。皆因坐臥卑濕。或冒

雨露。或著濕衣所致。

半夏麩炒 厚朴薑製 蒼朮米泔浸炒 生白朮

藿香葉 橘紅 白茯苓各一兩 炙甘艸七錢

右咬咀。每服四錢。薑七片。棗一枚。水煎。食前溫服。

升麻除濕湯 治傷濕腫瀉腸鳴腹痛。

升麻 柴胡 羌活 防風

半夏 益智仁 神麩 澤瀉各五分

麥蘖麩 陳皮 猪苓 甘草各三分

金匱翼 卷一 上下分消 三

蒼朮一錢

右作一服。生薑三片。棗二枚。水煎去滓。空心服。

東垣云。雖有治濕必利小便之說。若濕從外來而入

裏。用滲利之劑以除之。是降之又降。重竭其陽。而復

益其陰也。故用升陽風藥。即差。大法云。濕淫所勝。必

助風以平之也。愚謂濕病用風藥者。是助升浮之氣

以行沉滯之濕。非以風勝之之謂也。又濕在上在表

者。多挾風氣。非汗不能去也。荆防羌麻祛風之品。豈

能行濕之事哉。

瘟疫大法

瘟疫之病。近代諸家多與溫病同論。以其聲稱之同。與病形之似也。然而瘟疫者。天地之厲氣也。最為惡毒。感之而病者。往往致死。其甚者。致于滅門。若冬春間之溫病。苟調治得理。則未必致死。亦必不傳染多人。故其方法。宜應別論。且也歲運有太過不及之殊。天時有恒雨恒暘之異。是以疫厲之行。亦有表裏寒溫熱濕之分。其可以一槩論哉。約而言之。計有三門。若其表裏俱病。而盛于表者。則用東垣普濟消毒之

金匱翼

卷一

瘟疫大法

三

法。若其病不在表。又不在裏。而獨行中道者。則用吳又可達原飲之法。若其表熱既盛。裏症復急。治表治裏。救療不及者。則用陶尚文三黃石膏湯之法。此瘟疫入手法門也。亦有邪氣獨盛于表。而裏無熱症者。則活人敗毒散之治也。亦有寒濕獨行。而病在肌皮。胃膈者。則東坡聖散子之證也。合前三法。共為五法。以余所見。則未有不兼裏者。而有寒濕而無蓄熱。亦十中未得其一二也。然而法不可不備。惟用之者。得其當耳。因並錄五方于左。以見瘟疫之端如此。其病

稍久。或六七日。或十餘日。熱淡不解者。則同傷寒溫熱治之。

普濟消毒飲子

東垣

黃芩酒製 黃連酒製 人參 三錢 陳皮

元參各二錢 廿艸 連翹 板藍根

馬勃 牛蒡子酒 僵蚕 升麻各一錢

柴胡 五分 桔梗 三分

泰和二年四月。民多疫厲。初覺憎寒壯熱。體重。次傳頭面腫盛。目不能開。上喘咽喉不利。口燥舌乾。俗云

金匱翼

卷一

瘟疫大法

三

大頭傷寒。諸藥雜治。終莫愈。漸至危篤。東垣曰。身半以上。天之氣也。邪熱客于心肺之間。上攻頭目。而為腫耳。須用芩連等藥。共為細末。半用湯調。時時稍熱服之。半用蜜丸。噙化。服盡。良愈。活者甚眾。如大便硬。加酒蒸大黃一錢。或二錢。以利之。腫勢甚者。以砭針刺之。或加防風川芎薄荷當歸各五錢。水煎。時時服之。

達原飲

檳榔 二錢 草果 五分 厚朴 一錢 芍藥 一錢

甘艸五分 黃芩 知母一錢

右七味以水二鍾煎八分服。

吳又可曰疫癘之邪從口鼻而入舍于伏脊之內去表不遠附胃亦近乃表裏之分界即內經瘧論所謂橫連膜原是也感之淺者或俟有觸而發感之深者中而即病其始陽格于內營衛運行之機阻遏于表遂覺凜凜惡寒甚則四肢厥逆至陽氣困鬱而通厥回而中外皆熱昏昧不爽壯熱自汗此時邪伏膜原縱使有汗熱不得解必俟伏邪已潰表氣潛行于內

金匱翼

卷一

瘟疫大法

三

精氣自內達表表裏相通振慄大汗邪方外出此名戰汗脈靜身涼而愈也若伏邪未盡必復發熱其熱有久有淺因所感之輕重與元氣之盛衰也要皆始先惡寒既而發熱至于發出方顯變症其症或從外解或從內陷外解則易內陷則險更有先後表裏不同有先表後裏者有先裏後表者有但表而不復裏者有但裏而不復表者有表而裏再表者有裏而表再裏者有表裏分傳者有表多于裏者有裏多于表者此為九傳從外解者或發煩或戰汗自汗從內陷

者胃膈痞悶心下脹滿腹痛燥結便閉熱結旁流協

熱下利或嘔吐惡心譫語舌黃及黑胎芒刺等症因

症用治脈不浮不沉而數晝夜皆熱日哺益甚頭疼

身痛不可用辛熱藥汗之又不可下宜用達原飲以

透膜原之邪為當也若見各經加入引各經藥不可

執滯感之輕者舌胎亦薄脈亦不甚數如此者必從

汗解如不能得汗邪氣盤錯于膜原表裏不相通達

未可強汗衣被過汗湯火劫汗也感之重者舌上胎

如粉膩葯後反從內陷舌根先黃漸至中央此邪漸

金匱翼

卷一

瘟疫大法

美

入胃也前方加大黃下之若脈長洪而數汗多渴此邪氣適離膜原欲表未表白虎湯症也如舌上純黃色兼見裏症此邪已入胃乃承氣湯症也有兩三日即離膜原者有半月十日不傳者有初得之四五日厭厭轟轟至五六日陡然勢張者凡元氣勝者毒易傳化元氣薄者邪不易化即不易傳不傳則邪不去淹留日久愈沉愈伏因誤進參芪愈壅愈固不死不休矣

三黃石羔湯 治瘟疫大熱無汗發狂不識人

石羔 三錢 黃芩 黃連 黃柏 各一錢
五分 豆豉 半合 麻黃 一錢 梔子 五枚

右作一服。水二盞。煎至一盞三分。連進三五劑。愈。

按疫邪充斥內外。為頭痛身熱。為煩渴悶亂。發狂不識人。欲表之則裏已急。欲裏之則表不退。此方清裏解外。合為一方。譬之大軍壓境。孤城四面受圍。雖欲不潰。不可得矣。或千金雪煎。或古今錄驗麥奴丸。並佳。稍輕者。大青消毒湯。

金匱翼

卷一

瘟疫大法

五

又時病表裏大熱欲死方。

大黃 寒水石 芒硝 石羔

升麻 麻黃 葛根 紫葛 等分

右為末。方寸匕。水服日二。

聖散子 東坡治一切山嵐瘴氣。時行瘟疫。傷寒風濕

等疾。有非常之功。如李待詔所謂內寒外熱。上實下虛者。此藥尤效通神。宋嘉佑中。黃州民病疫瘴大行。得此藥。痊活者不可勝記。蘇東坡撰文勒石以廣其傳。聖散子之功益著。徽州鄭尙

書在金陵。用此治傷寒活人甚眾。故知其大能散寒濕。驅除瘴癘。實有超凡之効也。

蒼朮 裝 防風 厚朴 薑製 豬苓

澤瀉 煨 各 白芷 川芎 赤芍藥

藿香 柴胡 各半 麻黃 升麻

羌活 獨活 枳殼 細辛

吳茱萸 泡 藜蘆 茯苓 各七

草豆蔻 良薑 炙甘草 半 大附子 一枚

右為粗末。每服三錢。水二鍾。棗一枚。煎八分。稍

金匱翼

卷一

瘟疫大法

熱服

活人敗毒散

羌活 獨活 前胡 柴胡

枳殼 白茯苓 桔梗 人參 各一

川芎 一兩 甘草 半兩

右為細末。每服二錢。水一盞。入生薑二片。煎至

七分。溫服。或沸湯點亦得。

門人 平舟沈安伯

金匱翼卷一 男 龍翔 召南 全棧字

金匱翼卷二目錄

痰飲統論 攻逐 消導 和 補 溫

清 潤

傷食

傷酒

不能食

穀勞

食亦

諸血統論

金匱翼

卷二目錄

吐血

風熱 鬱熱 暑毒 畜熱
勞傷 陽虛 傷腎

鼻衄

齒衄

舌衄

大衄并汗血

金匱翼卷二

飼鶴山人九種經先集

長洲後學徐錦炳南氏讀

痰飲統論

人之有形。藉水飲以滋養。水之所化。憑氣脈以宣流。蓋三焦者。水穀之道路。氣脈之所終始也。若三焦調適。氣脈平均。則能宣通水液。行入於經。化而為血。灌溉周身。設三焦氣滯。脈道不通。則水飲停滯。不得宣行。因之聚成痰飲。為病多端。古方論痰有四。痰飲懸

金匱翼

卷二 痰飲

飲。溢飲。支飲。是也。詳見金匱要畧。然又有留飲。癖飲。流飲。伏飲之異。其聚而不散者曰留飲。僻處脇下者曰癖飲。流移不定者曰流飲。沉伏於內者曰伏飲。又因酒而成癖者曰酒癖。因寒多所致者曰冷痰。因熱邪所傷者曰熱痰。病雖多端。悉由三焦不調。氣道否滯。而生病焉。是以氣行即水行。氣滯即水滯。故知飲之為病。在人最多。善治者。以宣通其氣脈為先。則飲無所凝滯。所以治痰飲者。當以溫藥和之。蓋人之氣血。得溫則宣流也。及結而成堅癥。則兼以消痰破飲之

劑攻之

痰之源不一。有因熱而生者。有因氣而生者。有因風而生者。有因驚而生者。有因積飲而生者。有多食而生者。有因暑而生者。有傷冷物而成者。有因脾虛而成者。其為病也。驚痰則成心痛癩疾。熱痰則成煩躁。懊憹頭風爛眼。風痰則成癱瘓。大風眩暈。暗風悶亂。飲痰成脇痛。四肢不舉。每日嘔吐。食痰成瘧痢。口臭。痞氣。暑痰頭昏眩暈。黃疸頭疼。冷痰骨痺。四肢不舉。氣刺痛。酒痰飲酒不消。但得酒次日又吐。脾虛生痰。

金匱翼

卷十一 痰飲

食不美。反胃嘔吐。氣痰攻注。走刺不定。丹溪

痰生於脾胃。宜實脾燥溼。又隨氣而升。宜順氣為先。分導次之。又氣升屬火。順氣在於降火。熱痰則清之。溼痰則燥之。風痰則散之。鬱痰則開之。頑痰則軟之。食痰則消之。在上者吐之。在中者下之。又中氣虛者。宜固中氣以運痰。若攻之太過。則胃氣虛而痰愈甚矣。節齋

治痰七法

一日攻逐

古云。治痰先補脾。脾復健運之常。而痰自化。然停積既甚。譬如溝渠瘀壅。久則倒流逆上。污濁臭穢。無所不有。若不決而去之。而欲澄治已壅之水。而使之清。無是理也。故須攻逐之劑。

神仙墜痰丸

黑牽牛取頭末 皂角酥炙 白礬生

為末。水丸。桐子大。酒下三五十九。

控涎丹

甘遂 大戟 白芥子 等分

金匱翼

卷十一 痰飲

右為末 糊丸 臨臥薑湯服五七丸。至

十九。痰猛加丸數。

李時珍曰。痰涎為物。隨氣升降。無處不到。入心則成癩癩。入肺則壅竅。為喘欬背冷。入肝則膈痛乾嘔。寒熱往來。入經絡則麻痺疼痛。入筋骨則牽引鈞痛。入皮肉則癩癧癰腫。陳無擇三因方。並以控涎丹主之。殊有奇功。一名妙應丸。又人忽患胸背手足腰項筋骨牽引鈞痛。走易不定。或手足冷痺。氣脈不通。此乃痰涎伏在心膈。

上下。隨氣攻注。隧道閉塞所致。誤認癱瘓非也。須以此藥治之。

十棗湯

芫花醋炒 黑色甘遂水煎 大戟 各等分

右為細末。以水一升半。煮大棗十枚至八合。去滓。調藥末。強人一錢七。弱人五分。平日服之。不下。更加五分。下後。以糜粥調養之。河間云。芫花之辛。以散飲。大戟之苦。以泄水。其甘遂直達水氣所結之處。乃泄水飲之聖藥也。

金匱翼 卷二 痰飲 四

礞石滾痰丸 王隱君曰。痰病古今未詳。方書雖有五飲諸飲之異。而莫知其病之源。或頭風作眩。目暈耳鳴。或口眼蠕動。眉稜耳輪痛痒。或四肢遊風腫硬。似疼非疼。或齒頰痛。牙齒浮痛。或噯氣吞酸。心下嘈雜。或痛或噦。咽嗑不利。咯之不出。嚥之不下。其痰似墨。或如破絮。桃膠。蜆肉之狀。或心下如停冰鐵。心氣冷痛。夢寐奇怪。失志癲癇。或足腕痠疼。腰背骨節卒痛。或四肢筋骨疼痛。難以名狀。並無常處。或手臂痛麻。狀若

風溼。或脊上一條如線之寒起者。或渾身習習如臥芒刺者。或眼粘溼癢。口糜舌爛。喉痺等證。或繞項結核。狀若瘰癧。或胸腹間有如二氣交紐。噎息煩悶。有如煙火上衝。頭面烘熱。或中風癱瘓。或勞瘵荏苒之疾。或風毒脚氣。或心下怔忡。如畏人捕。或喘欬嘔吐。或嘔冷涎。黑汁綠水。甚為肺癰。腸毒。便膿。癰跛。內外為病百端。皆痰所致。其狀不同。難以盡述。蓋津液既凝為痰。不復周潤三焦。故口燥咽乾。大便秘結。而如枯骨。

金匱翼 卷二 痰飲 五

毛髮焦槁。婦人則因此月水不通。若能逐去敗痰。自然服何有效。余用滾痰丸以愈諸疾。今特相傳於世云。
青礞石一兩沉香五錢大黃酒蒸熟 各入
右將礞石打碎。用焰硝一兩。同入瓦罐。鹽泥固濟。晒乾火煨。石色如金為度。研末。和諸藥。水丸如梧子大。白湯食後服。人壯氣實者。可至百丸。服後仰臥。令藥在胸膈間。徐徐而下。除逐上焦痰滯惡物過膈。然後動作食湯水。方能中病。明

日當下痰積惡物若不下加十九。

愚按痰之與飲同類而異名者耳。痰者食物所化。飲者水飲所成。故痰質稠而飲質稀也。痰多從火化。飲多從寒化。故痰宜清而飲宜溫也。痰多膠固一處。飲多流溢上下。故痰可潤而飲可燥也。是以控涎十棗為逐飲之真方。礞石滾痰乃下痰之的藥。易而用之。罕有獲效者矣。學者辨之。

二曰消導

凡病痰飲未盛。或雖盛而未至堅頑者。不可攻之。但

金匱翼

卷二 痰飲

六

宜消導而已。消者損而盡之。導者引而去之也。

和劑二陳湯 治痰飲為患。或嘔逆惡心。或頭眩心悸。或中脘不快。或食生冷飲酒過度。脾胃不和。

並宜服之。

半夏薑製 橘紅各五兩 白茯苓三兩 甘草一兩

右咬咀每服四錢。水一椀。薑七片。煎八分。熱服。

無時。一方有大棗一枚。本方加枳實桔梗名

桔梗半夏湯。

生導痰湯。

半夏湯洗七次 天南星泡去皮 赤茯苓 枳實

橘紅各一兩 甘草炙半兩

右咬咀。每服四錢。水薑煎。食後溫服。

青礞石丸 治食積成痰。

青礞石敲碎如棗子大以硝磺 茯苓

半夏湯泡七次 天南星浸火製 黃芩各五錢

風化硝三錢益淨者冬月以

右為細末。神麴糊入薑汁為丸。如梧子大。每服

三五十九薑湯送下。一方加薑汁菖蒲滑石。

金匱翼

卷二 痰飲

七

一方無南星有白朮。一方有枳實倍礞石。

一方加蒼朮五錢。滑石一兩。

又方

半夏 陳皮 白朮 白茯苓

大黃 黃芩 人參 炙甘草

礞石各一兩 沉香五錢

右為末。以竹瀝一大碗半。薑汁三匙。拌勻晒乾。

如此五六度。仍以竹瀝薑汁糊丸。小豆大。每百

丸。臨臥薑湯吞下。

又方

牽牛頭末二兩 滑石二兩 大黃一兩 木香

黃芩 礞石 枳殼 青皮

陳皮 檳榔各五錢 沉香二錢

為末。水丸。桐子大。薑湯下五十九。

半夏丸 治膈痰結實滿悶喘逆。

半夏薑汁製五兩 皂莢五挺去皮并水煮半夏 生薑五兩全半

為末。密為丸。梧子大。薑湯下二十九。

金匱翼

卷二 痰飲

八

治熱痰結在胸膈。咯吐不出。滿悶作痛。名痰結。

又脇下痛。作寒熱。欬嗽氣急。亦痰結也。

製半夏 陳皮 赤苓各一錢 桔梗

枳殼 瓜蒌仁各一分 黃連 黃芩

梔子 貝母 蘇子 桑皮

杏仁 芒硝各五分 木香 甘草各三分

右剉作一貼。薑三片。同煎至半。納芒硝溶化。去

滓。又入竹瀝薑汁調服。

鶴頂丹 治諸頑痰迷塞。開竅不通。聲音不出。

白礬黃丹。各一兩。火煨為末。麪糊丸。麻子大。每服三十九。研末入全蝎少許。薑湯調灌之。吐痰立愈。

青州白丸子 治風痰壅盛。嘔吐眩暈及癱瘓中風。

半夏七兩 南星三兩 白附子二兩 川烏五錢

右生為細末。清水浸。春五夏三。秋七冬十日。朝

夕換水。候日數足。乃取納生絹袋中。漉過其滓。

再研再漉。以盡為度。澄清去水。晒乾為末。以糯

米粥清糊丸。菉豆大。薑湯吞下三五十丸。局方。

金匱翼

卷二 痰飲

九

如癱瘓風。以溫酒送下。如小兒驚風。薄荷湯下。

百一選方加川芎二兩。天麻殭蠶全蝎各一兩。並

生川。為細末。麪糊丸。

瑞竹堂方。加天麻全蝎木香枳殼各一兩。

三曰和

始因虛而生痰。繼因痰而成實。補之則痰益固。攻之

則正不支。惟寓攻於補。庶正復而痰不滋。或寓補於

攻。斯痰去而正無損。是在辨其虛實多寡而施之。

橘皮湯

半夏製五兩 茯苓 陳皮各三兩 細辛

青皮 桔梗 枳殼 甘草炙各二兩

人參 旋覆花去夢各一兩

右剉散每服三錢。生薑五厚片煎服。直

六君子湯

人參 白朮 茯苓 甘草減半

陳皮 半夏各一錢

水二錢薑五片煎至一鍾去滓不拘時服。

四日補

金匱翼

卷二 痰飲

寸

夫痰即水也。其本在腎。痰即液也。其本在脾。在腎者氣虛水泛。在脾者土虛不化。攻之則彌盛。補之則潛消。自非聖知。罕能得其故也。

濟生腎氣丸

四君子湯

苓桂朮甘湯

五日溫

凡痰飲停凝心膈上下。或痞或嘔或利。久而不去。或雖去而復生者。法當溫之。蓋痰本於脾。溫則能健。痰

生於溼。溫則易行也。

千金半夏湯 治冷痰

白朮三兩 半夏一升 生薑八兩 茯苓

人參 桂心 甘草炙 附子炮各二兩

水八升。煮三升。分溫服。

吳茱萸湯

吳茱萸 人參 半夏薑製 桂心各二兩

茯苓二兩 甘草一兩

薑棗湯煎三錢。空心溫服。日二。

金匱翼

卷二 痰飲

上

聖濟總錄曰。氣為陽。陽不足者。不能消導水飲。則聚而成痰。浸漬腸胃。上為嘔逆吐酸。下為洞泄寒中。久不已。則令人消瘦。少氣倚息。妨於飲食。昔人治痰飲。多以溫藥和之。為此故也。

沉香茯苓丸 溫脾胃。利胸膈。和氣血。

沉香一兩 白茯苓 半夏製 人參

丁香二兩 甘草 陳皮去白 肉豆蔻煨

檳榔五錢

共末。蜜丸。桐子大。薑湯下。二十九。

本事神木丸

茅山蒼朮 一斤去皮為末 生芝蔴 半兩水二瓊研滅取汁

大棗 十五枚煎爛去皮核研 右三味搜和乘熱入日杵

丸如梧子大乾之每日空腹溫湯吞下五十九加至一百丸二百丸忌桃李雀蛤初服心膈微

燥進山梔散一服不燥矣

許叔微云予平生有二疾一則臧府下血二則膈中停飲血有時而止停飲則無時而愈始因年少時夜坐為文左向伏几案是以飲食多墜向左邊中夜以

金匱翼 卷二 痰飲

後稍困乏則飲酒兩三杯既臥就枕又向左邊側睡氣壯盛時殊不覺三五年後覺酒止從左邊下漉漉有聲脇痛飲食殊減十數日必嘔吐數升酸水暑月止是右邊身有汗熱熱常潤左邊病處絕燥徧訪名醫及海上方服之少有驗間或中病止得月餘復作其補則如天雄附子礬石其利則如牽牛大戟甘遂備嘗之矣予後揣度之已成癖囊如潦水之有科臼不盈科不行水盈科而後行者也清者可行濁者依然停蓄蓋下無路以決之也是以積之五七日必稍吐

去而稍寬數日復作夫脾土惡溼而水則流溼莫若

燥脾以勝溼崇土以填科臼則疾當去矣於是悉屏

諸藥一味服蒼朮三月而疾愈自此一向服數年不

嘔不吐胸膈寬飲啖如故暑月汗周體而身涼飲亦當

中下前此飲漬于瓶目亦多昏眩其後燈下能書細

字皆蒼朮之力也予初用茅朮半年後止用燥烈味極辛者削去皮不浸極有力而亦自然不燥也山梔散用山梔一味乾為之末沸湯點服故知久坐不可伏向一邊時或運動亦消息之法

金匱翼 卷二 痰飲

六日清

或因熱而生痰或因痰而生熱交結不解相助為虐是以欲去其痰必先清其熱昔人所謂痰因火盛逆上者治火為先也其證咽喉乾燥或塞或壅頭目昏重或欬吐稠粘面目赤熱

潔古小黃丸

南星 半夏 黃芩 各一兩

為末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每五七十九生薑湯下食後服

二陳湯加黃芩連翹山梔桔梗薄荷亦佳。

聖濟 驚梨煎丸 治熱痰涼心肺利胸膈解毒補虛

益氣

驚梨 大者二十枚 去皮取汁 皂莢 十條 去皮 水揉取汁

生地黄 八兩 搗取汁 薄荷 生搗取汁 白蜜 八兩 同煎 熬成膏

人參 白茯苓 半夏 各一兩 枳椇 三兩

青皮 去白 炒 桔梗 甘草 各三分

右共為末搗膏為丸。梧子大荆芥湯下二十九

日二。一方有木香菴蓉白茯苓山藥白朮羌

金匱要略 卷二 痰飲

活防風

聖濟 千金散 治熱痰壅盛胸膈不利。

半夏 薑汁製 各五錢 蛤粉 各五錢 甘草 凝水石 三錢

右共末。水下三錢空心服。以利為度。一方有

羌活

七日潤

肺虛陰涸。枯燥日至。氣不化而成火。津以結而成痰。是不可以辛散。不可以燥奪。清之則氣自化。潤之則痰自消。

杏仁煎 治燥痰在肺中。上氣欬嗽。或心胸煩熱。

杏仁 去皮尖 三兩 生薑汁 白蜜 飴糖 各一兩

桑皮 貝母 木通 各一兩 紫苑 二錢半

五味 各一兩

右剉碎。用水三升。熬至半升。去滓。入前杏仁等

四味。再熬成膏。每服一匕。含化。一方有欬冬

知母。一方有生地汁紫蘇子。

節齋化痰丸 治鬱痰老痰。膠固稠粘。難于咯唾。

天門冬 片苓 酒炒 瓜蒌仁 橘紅

金匱要略 卷二 痰飲 五

海石粉 各一兩 香附 鹽水炒 芒硝 桔梗

連翹 各五錢 青黛 二錢

右為末。煉白蜜入薑汁少許。和丸。櫻桃大細嚼。

一丸清湯下。

傷食

傷食者。飲食自倍。腸胃乃傷也。當分上中下三焦而治。在上吐之。在中消之。在下奪之。

羅太無云。大抵內傷之理。傷之微者。但減食一二日。所傷之物。自得消化。此良法也。若傷之稍重者。以藥內消之。傷之太重者。以藥除下之。

瓜蒂散 宿食在上脘。用此吐之。所謂在上者。因而越之也。

瓜蒂 炒 赤豆 煮等分

金匱翼 卷二 傷食

右為細末。以豉七合。煮汁和散。一七服。一法

溫漿水調服一錢七。取吐為度。

經云。上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。謂食塞於上。而脈絕於下也。何者。陽火之根。本於地下。陰水之源。出於天上。食塞於上。是絕五藏之源。源絕則水不下流。兩尺脈絕。吐去上焦之物。而脈自通。如不能吐。則非食病。而是根蒂之先拔。故死。或以陰陽水三升。煮白鹽一升。令消分三服。刺吐去所食。即愈。出千金方。

紅丸子 壯脾胃。消宿食。去膨脹。

京三稜 蓬朮 青皮 去白 陳皮 去白 各

炮薑 胡椒 各三斤

右為末。醋麵糊丸。如梧子大。礬紅為衣。每服三十九。食後薑湯下。易簡方有阿魏。

治食索粉成積方

紫蘇濃煎汁。加杏仁泥服之。即散。

治食狗肉不消。心下堅。或腹脹。口乾大渴。心急發熱。狂言妄語。或洞下。

熱狂言妄語。或洞下。

金匱翼 卷二 傷食

杏仁一升。去皮尖。研。以沸湯三升。和絞汁。三服

狗肉原片。皆出淨。或以蘆根煮飲之。亦消。

千金治所食不消方

取其餘類。燒作末。酒服方寸匕。便吐。其宿食即瘥。

按飲食停滯中脘。雖藉葯力為之消磨。然所以運行藥力者。胃氣也。故有屢經消食行氣。而食不下者。余即於前所用藥內。加入參一二錢。治之如神。學者不可不知。

備急方 治寒飲食過傷。心腹卒痛如錐刺。

川大黃 末 乾薑 末 巴豆 去皮心研 去油用霜

右各等分。和合一處研勻。煉蜜為丸。小豆大。溫水下。一丸。實者加一丸。一云每服三丸。未知更服三丸。腹中轉鳴。當吐下便愈。

東垣導滯丸 治傷溼熱之物。不得旋化而作痞滿。悶亂不安。便閉者。

黃芩 茯苓 白朮 黃連 各三錢

澤瀉 二錢 枳實 神麴 各五錢 大黃 兩

金匱要略 卷二

右為末。湯浸蒸餅為丸。食遠沸湯下五十九。

傷食與停食宜分兩項。傷食者。飲食自倍。腸胃乃傷。病在不及。消化停食。不論食之多少。或當

食而怒。或當食而病。在氣結而不能化也。治傷食宜偏重于食。或吐或下。或消。若停食則偏重

在氣。惟理氣而兼之以消。吐下之法不可用也。大都傷食當分上中下三焦。而停食則專在胃

脘也。

傷酒

千金療卒大醉。恐腸爛方。

作湯著大器中。漬之。冷復易之。酒自消。夏月亦用之佳。

又方 絞茅根汁飲二升。

又方 搗生葛汁飲之。無鮮者。乾葛煎服亦佳。

又方 粳米一升。水五升。煮使極爛。漉去滓。飲之良。

良。

葛花解醒湯 治酒病。嘔逆。心煩。胸滿。不食。小便不利。

金匱要略 卷二 傷酒

不利。

青皮 三分 木香 半錢 橘紅 人參

豬苓 茯苓 各一錢 神麴 澤瀉

乾薑 白朮 各二錢 白薏仁 砂仁

葛花 各半兩

右為極細末。每服三錢。白湯調服。但得微汗。則酒病去矣。

羅謙甫云。夫酒者。大熱有毒。氣味俱陽。乃無形之物也。若傷之。止當發散。使汗出。則愈。最妙法也。其次莫

如利小便。二者乃上下分消其溼。何酒病之有。今之治此者。乃用酒癥丸。大熱之劑。下之。又用牽牛大黃下之。是無形元氣病。反傷有形陰血。乖誤甚矣。

不能食

不能食者。胃中元氣虛也。然有虛冷虛熱之異。宜分別治之。

消食丸 治數年不能食。

麥蘖 麴各一 乾薑 炮 烏梅 焙各

蜜丸服十五丸。日再加至四十九丸。亦治反胃。

又方

神麴 炒黃 二兩 麥蘖 炒黃 二兩 烏梅 四兩 乾木瓜 半兩

茯苓 甘草 炙各二 錢五分

金匱翼 卷二 不能食 五

蜜丸櫻桃大。每服一丸。不拘時細嚼白湯下。

一方無木瓜。有人參乾薑。

又方

豉心 一升 麥芽 麴 各一兩 川椒 一升

乾薑 末一升

右五味篩。以蜜拌。食後酒服方寸匕。

以上三方並治胃虛冷不能食之劑。

資生丸 健脾開胃消食止瀉調和藏腑滋養營

衛。

白木 米泔水浸川山黃土拌九蒸晒去土切片焙乾三兩 橘紅

山查 蒸 神麴 炒各二兩 白茯苓 人乳非飯上蒸晒乾一兩五錢

人參 人乳浸透飯鍋上蒸透三兩 白豆蔻 微炒 澤瀉 炒各三錢五分

川連 薑汁炒 桔梗 炒 藿香 甘草 蜜炙五錢

扁豆 炒 蓮肉 去心炒 麥芽麵 炒

山藥 炒 芡實 炒各一兩 薏仁 炒三兩

右為末。煉蜜丸。每服二錢。細嚼淡鹽湯下。

凝神散 收斂胃氣清涼肌表。

人參 白木 茯苓 山藥 各一錢五分

金匱翼 卷二 不能食

扁豆 知母 生地黃 粳米

甘草 各一錢 淡竹葉 地骨皮 麥冬 各五錢

右作一服水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾食

遠服。

高鼓峯云腎乃胃之關關門不利升降息矣關門即氣交之中天之樞也故腎旺則胃陰足胃陰足則思食若關門枯槁腎水不能上達當急以六味加歸芍養之若血燥大腸乾枯有黑屎積壅胃底則當以熟地五錢當歸三錢白芍桃仁二錢麻仁三錢微微潤

之視其形體如常氣血尚足即于前方內可加大黃

二錢助血藥大腸一順利胃自開矣一開之後大劑

六味左歸等類不數服之方有濟也。

以上治胃虛氣熱之劑。

范汪療胃氣虛不能食四肢重短氣調和五藏并

療諸病調中湯方。

薤白 升切一升 枳實 六枚 橘皮 三枚 大棗 十二枚

粳米 三合 香豉 六合

水六升。先煮薤白得四升。內諸藥煮取一升半。

金匱翼 卷二 不能食

適寒溫服。一方有生薑一兩延年無枳實有

茯苓人參。

按此以甘辛氣味和暢胃陽推揚穀氣虛者延年

方較良。

本事治脾腎虛弱全不進食一神丸。

破故紙 炒四兩 肉苳蔻 生二兩

右為細末。用大肥棗四十九枚。生薑四兩切片

同煮棗爛去舊取棗剝去皮核。用肉研為膏。入

芍和梓丸。如梧子大。每服三十九鹽湯下。有人

全不進食服補葯皆不效予授此方服之頓然能食此病不全作脾虛蓋腎氣虛弱真元衰劣譬如金鼎之中置之米穀下無火力雖終日不熟其何能化黃魯直嘗記服兔絲子淘淨酒浸曝乾爲末日超數匙以酒下十日外飲啖如湯沃雪亦此理也

寬中進食丸 滋形氣喜飲食

人參 炮薑 青皮各一錢 大麥芽炒

縮砂仁炒 甘草炙各一錢半 白茯苓 橘紅

金匱翼 卷二 不能食

澤瀉 白木各三錢 枳實四錢 荳蔻五錢

猪苓七錢 神麴炒 木香各五分 半夏七錢

右爲末湯浸蒸餅爲丸桐子大每服三十九溫米湯送下食前

穀勞

穀勞者胃受水穀其氣虛弱不能傳化穀盛氣虛則令人怠惰嗜臥肢體煩重腹滿善飢而不能食食已則發穀氣不行使然也

沉香湯

沉香 白木土炒 紫厚朴薑汁炒各一兩 人參

白茯苓 半夏薑製 木香 草荳蔻

甘草 陳皮 黑乾薑

生薑大棗水煎三錢溫服日二

金匱翼 卷二 穀勞

肘後云飽食便臥得穀勞病令人四肢煩重嘿默欲臥食畢輒甚用大麥藥一升椒一兩並炒乾薑三兩搗末每服方寸七日三

食亦

內經曰。大腸移熱於胃。善食而瘦。謂之食亦。夫胃為水穀之海。所以化氣味而為營衛者也。胃氣和。飲食有節。氣血盛而膚革充盈。若乃胃受邪熱。消燂穀氣。不能變化精血。故善食而瘦也。病名食亦。言雖食亦若飢也。又胃移熱于膽。亦名食亦。以膽為陽木。熱氣乘之。則燂土而消穀也。

甘露飲 治胃熱善食不生肌肉。

生地 熟地 天冬 麥冬

金匱翼 卷一 食亦

片苓 石斛 枇杷葉 甘草

枳殼 茵陳 一兩

水煎三錢服。

諸血統論

失血諸證。妄行于上則吐衄。衰澗于內則虛勞。妄返於下則便紅。積熱膀胱癰閉。尿血滲透。腸間則為腸風。陰虛陽搏則為崩中。溼蒸熱癩則為滯下。熱極腐化則為膿血。火極似水則血色紫黑。熱勝于陰則發為瘡瘍。溼滯於血則發為疔瘡。癰疹皮膚則為冷痺。蓄之在上其人喜狂。蓄之在下其人喜忘。

血出上七竅為血溢。大小便二血為血泄。然內經云。溢則後血。是血下出亦可云。溢正不必拘也。

金匱翼 卷二 諸血統論

先見血後見痰嗽多是陰虛。先見痰嗽後見血多是痰火積熱。

凡吐衄血太甚不止。當防其血暈。用茅根燒酒將醋酒之。令鼻嗅氣以過其勢。或蒸然以冷水噴其面。使驚則止。

血虛眩暈卒倒。不可艾灸驚哭叫動。動則乘虛而死矣。須以當歸川芎白芍熟地黃黃耆人參白朮茯苓陳皮荆芥穗甘草各七分。棗二枚烏梅一個同煎服。凡用血藥不可單行單止。又不可純用寒涼。必加辛

溫升藥。如用寒涼藥用酒煎酒炒之類。乃寒因熱用也。久患血證。血不歸元。久服藥而無效者。以川芎爲君則效。丹溪

凡嘔吐血。若出未多。必有瘀於胸膈者。當先消而去之。驟用補法。血瘀成熟。多致不起。

業師薛一瓢先生。治陸元賓勞傷吐血後。日漸消瘦。有時發寒熱。飲食減少。微有乾欬。四肢無力。語亦懶。師用大當歸一隻。重二兩者。木器搥鬆。陳酒煎。令服三劑。以其人素不飲酒。改用酒水各半煎。

金匱翼 卷二 諸血統論

果三服而諸病皆愈。鶴年

風熱吐血

風陽邪也。熱火氣也。併入絡中。則血溢絡外。其證乍寒乍熱。咳嗽口乾。煩燥者是也。宜以辛涼入血之藥治之。

聖惠荆芥地黃湯

荆芥穗爲末。生地汁調服二錢。

駱隆吉曰。風火既熾。當滋腎水。此以荆芥發陽邪。而以地黃養陰氣也。

聖濟荆芥穗散

荆芥穗 山梔仁 片芩 蒲黃

水煎五錢。溫服。晚再服。以差爲度。

鬱熱失血

鬱熱失血者。寒邪在表。閉熱於經。血爲熱迫而溢於絡外也。勿用止血之藥。但疎其表。鬱熱得舒。血亦自止。若表已解而熱不消。血不止者。然後以清熱降血之藥治之。若肺氣已虛。客熱不去。欬嗽咽乾。吐血嗽血者。宜以甘潤養血爲主。而以辛藥涼肺佐之。如大

金匱翼 卷二 風熱吐血

阿膠丸之類

寶鑑大阿膠丸

阿膠微炒 生地黃 熟地黃 卷柏

乾山藥 五味子 雞蘇葉 大薊各一兩

茯苓 栝子仁另研 百部 遠志

人參 麥門冬 防風各半兩

右爲細末。煉蜜丸。彈子大。煎小麥麥門冬湯下一丸。食後。

大薊飲子 解鬱熱。止吐衄。亦治辛熱物傷肺胃。

嘔吐血名肺症

大薊根洗 犀角鎊 升麻 桑白皮炙

蒲黃炒 杏仁去皮尖各二錢 甘草炙 桔梗炒各一兩

水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服。

和劑龍腦雞蘇丸 治胸中鬱熱欬吐血衄血

涼上膈止虛煩。

雞蘇淨葉一斤即龍腦薄荷 生乾地黄末六兩後入

麥冬 人參 阿膠 蒲黃

柴胡剉同木通以沸湯大半升浸一宿絞汁後入膏各二兩 黃耆一兩

金匱要略 卷二 鬱熱吐血 三

甘草半一兩

右為細末以蜜二升先煉一二沸然後下生地

黃末不住手攪時時入絞下柴胡木通汁慢慢

熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和為丸如

碗豆大每服二十丸熱水下。

側柏散 治鬱熱內損心肺吐血下血其出如湧

泉口鼻俱流須臾不救服此即安

側柏葉蒸乾二兩半 荆芥穗燒灰 人參各一兩

右為末每服三錢入白麵二錢新汲水調如稀

糊啜服。

暑毒失血

暑毒失血者脈大氣喘多汗煩渴蓋心主血而暑氣

喜歸心也此病多於酒客及陰虛之人有之

千金治酒客瘟疫中熱毒乾嘔吐血方。

蒲黃 犀角 括蕪根 甘草各二兩

桑寄生 葛根各三兩

水七升煮三升分三服。

局方枇杷葉散 治暑毒攻心嘔吐鮮血。

金匱要略 卷二 暑毒失血 三

香薷二錢 厚朴 甘草 麥冬

木瓜 茅根各一錢 陳皮 枇杷葉

丁香各五分

為末每服二錢薑水煎服。

畜熱吐血

畜熱吐血者熱畜血中因而妄行口鼻皆出勢如湧

泉膈上熱胸中滿痛脈洪大弦長按之有力精神不

倦或血是紫黑成塊者須用生地黄赤芍茜根牡丹皮

三製大黃滑石桃仁泥之屬從大便導之此非釜底

抽薪之法。不能奪火熱上湧之勢也。

海藏云。畜血喜忘如狂。身熱屎黑者。疾已甚也。但小腹滿。小便不利者。輕也。

滑伯仁曰。血溢血泄。諸畜血證。其始也。子率以桃仁大黃行血破滯之劑。折其銳氣。而後區別治之。雖往往獲效。然猶不得其所以然也。後來四明遇故人蘇伊舉。問論諸家之術。伊舉云。吾鄉有善醫者。忘其姓字。每治失血畜妄。必先以快藥下之。或問失血復下。虛何以當。則曰。血既妄行。迷失故道。不去血利瘀。則以

金匱翼 卷二 畜熱吐血 三

妄為常。曷以禦之。且去者自去。生者自生。何虛之有。子聞之愕然曰。昔者之疑。今釋然矣。按去者自去。生者自生。人易知也。瘀者未去。則新者不守。人未易知也。細心體驗。自見。

簡要濟眾

川大黃一兩為末。每服一錢。以生地汁一合。水半瓊煎三五沸。服無時。

藕汁茯苓飲

生藕汁 小薊根汁 生地黃汁

茯苓 蒲黃 炒黑

後二味等分為末。每服二錢。用三汁調下。按虛人未可下者。宜此法清熱。且利瘀也。

按千金云。凡吐血後。體中但惓惓。心中不悶者。輒自愈。假令煩躁。心中悶亂。紛紛嘔吐。顛倒不安者。當急以瓜蒂杜蘅人參等。吐去清黃汁。或血一二升無苦。蓋謂中有瘀血不盡故也。然與其湧而上之。不若導而下之。之為順也。吐法昔人且不忍。而況於下法乎。

金匱翼 卷二 畜熱吐血 三

直指方

鮮生地黃搗汁煮飲。日數升良。

四生丸 治吐血衄血熱妄行乘于陰也。

生荷葉 生艾葉 側柏葉 生地黃 等分

右搗爛為丸如雞子大。每服一九。用水二鍾煎。

一鍾去滓服。一方有生薄荷葉無荷葉。

十灰散 治嘔吐欬嗽血。

大薊 小薊 柏葉 荷葉

茅根 茜根 大黃 梔子

棕櫚皮 牡丹皮

右等分燒存性。出火毒。研為極細末。用生藕汁及生蘿蔔汁磨松墨半碗調服五錢即止。

氣逆失血

氣逆失血者。血從氣逆得之。暴怒而厥也。經云陽氣者。大怒則形氣絕。而血菀於上。使人薄厥。又怒則氣逆。甚則嘔血。及殮泄是也。必有胸脇滿痛等證。宜芍藥陳皮枳殼貝母之屬。行其氣而血自下。或肝火因氣而逆者。必有煩躁燥渴等證。宜芍藥生地黄丹皮金匱翼 卷二 氣逆失血 三五

小烏沉湯

烏藥去心 甘草炒 香附子炒砂盆漸去毛

右為細末。每服一錢。不拘時沸湯點。

按大怒氣逆。必有火熱從之。上行宜以黃連青黛香附柴胡甘草山梔等藥。平其肝則自愈。獨進溫燥寧無偏勝之弊。且非古人抑怒全陰之意。

勞傷吐血

勞傷吐血者。經所謂用力太過。則絡脈傷是也。蓋絡

脈之血。隨經上下。往來不休。若絡脈有傷損之處。其血因得滲漏而出矣。如是者。須和養血氣。安順謹調。使損者復完。則血脈循行如故。所謂勞者逸之是也。此等未關藏氣。但體性堅凝。尚可望其生全。若不能如此。而或縱情違理。絡脈完已復損。則必無幸矣。

髮灰散

亂髮 燒灰

每服二錢。米醋湯調服。亦治小兒尿血。

治吐血不止。將本人血。磁鍋焙乾為末。每一錢二

金匱翼 卷二 勞傷吐血 三五

分。以參麥煎湯調下即止。

凡吐粉紅色痰涎者。是肺絡損傷而血滲也。治以

鮮藕白糯米紅棗三物。煎湯頻服。久之自愈。此

方係正白旗遲維職所授。用之良驗。進公會任崇明及六合縣

係一榜出身。三世明醫。

陽虛失血

陽虛失血者。脾胃氣虛。不能固護陰氣也。仁齋直指云。血遇熱則宣流。故止血多用涼劑。然亦有氣虛挾寒。陰陽不相為守。榮氣虛散。血亦錯行。所謂陽虛陰

必走是耳。外證必有虛冷之狀。其血色必黯黑而不鮮。法當溫中。使血自歸經絡。可用理中湯加南木香。或甘草乾薑湯。其效甚著。曹氏云。吐血須煎乾薑甘草湯與服。或四物理中湯亦可。若服生地黃竹茹藕汁。去生便遠。

三因云。理中湯能止傷胃吐血。以其最理中脘。分利陰陽。安定血脈也。

按經云。榮氣出於中焦。是以脾胃為統血之司。而甘溫氣味。有固血之用也。世醫畏其能動血。雖遇

金匱翼 卷二 陽虛失血 三

常用而不敢用者多矣。厥疾不瘳。誰之過歟。或有仿千金例。於伏龍肝甘草乾薑白朮之中。加阿膠之潤。黃芩之苦。以折炎上之勢。而復既脫之陰。亦內經甚者從之之意也。

理中湯

甘草乾薑湯 二方見金匱心典

黑神散 和劑

黑豆 炒半升
去皮 乾熟地黃 酒浸 當歸 去蘆 酒製
肉桂 皮 去粗 乾薑 炮 甘草 炙

芍藥 蒲黃 各四兩

右為細末。每服二錢。酒半瓊。童子小便半瓊。不拘時煎服。

凡吐血脈微身涼惡風者。須于地黃芍藥中加肉桂一錢。虛冷人多有此證。

傷胃吐血

傷胃吐血者。酒食過飽。胃間不安。或強吐之。氣脈賁亂。損傷心胃。血隨嘔出也。

簡易黑神散 治傷酒食醉飽過度。胃絡內傷。及

金匱翼 卷二 傷胃吐血 三

低頭掬損吐血。致多口鼻俱出。

百草霜 不拘多少 村居者佳

右研細。每服二錢。糯米湯下。喜凉水者。新汲水調服。

鼻衄

鼻衄有表寒裏熱之異表寒者傷寒不解而閉熱於經也許傷寒門裏熱者陽明之熱而血為熱迫也宜犀角地黃湯主之或陽明之熱不得下通而反上壅者宜拔萃犀角地黃湯通其下而上自愈諸衄血家不可與白虎湯虛者亦不可與卒得之腹痛而利者但可溫之

羅謙甫云經歷晉才卿膏梁而飲至春病衄易醫數四皆用苦寒之劑俱欲勝其熱而已然終不愈而飲

金匱翼

卷二鼻衄

美

食起居浸不如初肌寒而時躁言語無聲口氣臭穢惡冷風而其衄之餘滴則未絕也彼惟知見血為熱而以苦寒攻之抑不知苦瀉土土脾胃也脾胃人之所以為本者今火為病而瀉其土火固未嘗除而土已病矣土病則胃虛胃虛則營氣不能滋榮百脈元氣不循天度氣隨陰化而無聲肌寒也粗工嗜嗜以為可治熱病未已寒病復起此之謂也項彥章治一婦患衄三年許醫以血得熱則洩溢與瀉心涼血之劑益困衄出數滴輒昏去六脈微弱而

寸為甚曰肝藏血而心主之今寸口脈微知心虛也心虛則不能主血而逆而妄行法當補心兼養脾氣脾者心之子實則心不虛也與琥珀諸補心藥遂安按心虛補脾即千金脾旺則氣感於心之意然補脾藥未議及竊謂當兼補脾陰不當專補脾氣也犀角地黃湯 易老云治鼻衄此藥為最勝

犀角 芍藥 丹皮 各一錢 生地 四錢

甘草 五分

水一鍾半煎八分服 拔萃加大黃黃連黃芩

金匱翼

卷二鼻衄

美

茅花湯

白茅花水煎濃汁兩碗分二服如無花以根代之

人參蓮心散

人參 一錢 蓮子心 一分

共為末以水空心下二錢以差為度 一方蓮

子心五十個糯米五十粒為末酒調服治勞心

吐血

髮灰散

髮灰一錢 人中白五分 麝香一分
用少許吹鼻中立愈。

元珠雞蘇散

雞蘇葉 黃耆 生地 阿膠

白茅根各一兩 麥門冬去心 桔梗 蒲黃炒

貝母去心 甘草炙五錢

每服四錢薑三片水煎服

麥門冬飲子 治脾肺虛弱氣促精神短少吐血

吐血

金匱翼 卷二 鼻衄

人參 麥門冬 當歸各五分 五味子五個

黃耆 甘草 芍藥各一錢 紫苑五分

右以咀分作二服水二瓊煎至一瓊去滓溫服

食後一方有生地無甘草芍藥紫苑名清肺

飲子

齒衄

齒衄有手足陽明與足少陰之異蓋手陽明入下齒中足陽明入上齒中而腎主骨齒又為骨之餘也大抵屬陽明者多有餘故有便閉口臭齒齲腫痛等證凡素嗜肥甘或善飲胃強者多有之屬少陰者多不足故口不臭牙不痛雖痛不甚但齒搖不堅凡陰虛羸瘦好色者多有之而宜清宜補為治迥別不可不分也

元珠云齒衄多陽明熱盛所致緣手足陽明俱入齒

金匱翼 卷二 齒衄

中而衝任二脈並附陽明陽明者多氣多血之經也陽明有熱發則隨經上入齒中血如潮湧疼痛不已甚則昏昧予率用三製大黃末二錢枳殼湯少加童便調下並去黑糞數塊其血頓止要知腎虛出血者其血必點滴而出齒亦悠悠而疼決不如此之暴且甚也

東垣清胃飲 治醇酒厚味或補胃熱藥太過以致牙疼不可忍牽引頭腦滿面發熱或齲齒腐潰出血不止此陽明火也

生地黄二錢五分 升麻 當歸 牡丹皮

犀角 連翹各一錢 甘草 黃連各五分

水煎服。

按陽明熱實上薰口齒者宜此清之若大便閉結不通者須加大黃從下奪之。

外臺方 治滿口齒出血枸杞根洗煎湯漱嗽驗

元戎地黄引子 治腎血齒衄不止

熟地黄 生地黄 地骨皮 枸杞子等分

焙乾為末每服二錢蜜湯調服無時 寶鑑用

金匱翼 卷二 齒衄 聖

治衄血往來久不愈日三服良

安腎丸 治腎虛陰火上炎服家藥而愈甚者宜

淡鹽湯送下三五錢間進黑錫丹方見喘證

或用腎氣丸煎服效鶴年

舌衄

舌衄者舌出血不止也心主血在竅為舌若心藏蘊熱血得熱而妄行或溢于心之竅則有舌上出血之證甚者出如湧泉

聖濟阿膠散

阿膠炒 黃耆蜜炙 蒲黃新者

共末用生地黄汁空心調下二錢

千金方

亂髮燒灰水服方寸七日三服

金匱翼 卷二 舌衄 聖

大衄 血汗附

大衄者口鼻耳目皆出血是也由熱氣乘虛入血則血妄行與衛氣錯溢于竅也阿膠湯主之

阿膠湯

阿膠 蛤粉炒 蒲黃 五錢

水煎去滓入生地黃汁服急以帛繫兩乳

神白散 治血汗

用人中白瓦上炙研末入麝香少許和勻空心酒下二錢 一方有髮灰

金匱翼

卷二 大衄

醫

聖惠散 治大衄久衄及諸竅出血不止

人中白一團雞子大綿五兩燒研每服二錢温水服

大便下血統論

許學士云予苦疾三十年畜下血藥方近五十餘品其間或驗或否或始驗而久不應者或初不驗棄之再服有驗未易厯談大抵此病品類不同對病則易愈如下清血色鮮者腸風也血濁而色黯者藏毒也肛門射如血線者脈痔也亦有一種下部虛陽氣不升血隨氣而降者仲景云脈弦而大芤則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精此下部虛而下血者

金匱翼

卷二

大便下血統論

醫

是也若得革脈却宜服温補藥虫痔宜蒸千金川蠟皮艾者佳子嘗作頗得力

黑地黃丸頗佳 鶴年

結陰便血

結陰便血者以風冷之邪結于陰分而然蓋邪在五藏留而不去是之謂結陰邪內結不得行則病歸血分故為便血經曰結陰者便血一升再結二升三結三升正此之謂宜外灸中脘氣海三里以引胃氣散風邪內以平胃地榆湯温散之劑止之 景岳

寶鑑平胃地榆湯 治邪陷陰分結陰便血。

陳皮 厚朴 蒼朮 甘草

地榆 人參 白朮 當歸

芍藥 升麻 乾葛 茯苓

神麴 乾薑 炒 香附 各等分

右以咀。每服五錢。加薑棗煎。空心服。一方無

香附。有附子益智。

胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃。水穀不化。及下

血久而無度者。即八物湯去地黃甘草加官桂

金匱要略 卷二 結陰便血 吳

等分。每服二錢。水一大瓊。粟米百餘粒同煎七

分。去滓。稍熱服。蓋亦陰結之類。為陰氣內結。故

去甘寒而加辛熱。結者散之也。

經驗方

荆芥一味。畧炒為末。米飲服二錢。

地榆湯 河間曰。陰結便血者。以陰氣內結不得

外行。血氣無宗。滲入腸下。致使漸多。此湯治之。

地榆 四兩 甘草 三兩半 縮砂 七枚

右為末。每服五錢。水三瓊煎至一半。去滓溫服。

溼熱便血

溼熱便血者。血濁而色黯。滑氏所謂足太陰積熱。久而生溼。從而下流也。赤豆當歸散主之。若但熱而無溼者。腹中痛。血色鮮。連蒲散主之。

赤豆當歸散

赤小豆 三升 浸令芽出 曬乾 當歸 十兩

右二味杵為散。漿水服。方寸匕。日三服。

連蒲散

生地 當歸 白芍 枳殼

金匱要略 卷二 濕熱便血 吳

川芎 槐角 黃芩 各一錢 黃連

蒲黃 炒各一錢 二分

水二鍾煎八分服。

泊宅編云。乾柿燒灰。米飲服二錢。本草柿治腸癖。解熱毒。消宿血。又百一選方云。曾通判子病下血十年。川此方一服而愈。

王煥之知舒州。下血不止。郡人陳宜父。令其四時取和葉。其方如春取東枝之類。燒灰調二錢服而愈。

潔古芍藥黃連散 治腹痛下血有熱。

芍藥 黃連 當歸各半 大黃 一錢

淡桂 五分 甘草 錢二

每服五錢。水煎。痛甚者。調木香。檳榔末一錢用。

淡桂者。畧借辛溫。以助藥力。且拔病本也。

一方平胃散加槐花。當歸。枳殼。烏梅。丹溪

中虛脫血

中者脾胃也。脾統血。脾虛則不能攝血。脾化血。脾虛則不能運化。是皆血無所主。因而脫陷妄行。其血色不甚鮮紅。或紫或黑。此陽敗而然。故多無熱證。而或

金匱要略 卷二 中虛脫血 吳

見惡心嘔吐。宜理中湯。溫補脾胃。中氣得理。血自歸經矣。

理中湯

理物湯 卽理中四物合劑

黃土湯

白朮 甘草 附子 地黃

阿膠 黃芩各三兩 龜心黃土半升

水八升。煮取三升。分溫三服。

腸痔下血

本草治腸痔在腹內有鼠爛出血方

白燕菜 貫衆 狼牙根 椿東引枝

槐東引枝白皮者 白蟻頭一個 雄黃半兩

蝟皮一分

右爲末。臘月猪脂和爲丸。如彈子。大綿裹內下

部日三易

附方

木耳五錢 浸一宿。洗淨。空心生食。禁茶湯半日

許。如嫌淡。少加鹽。三服必愈。但不能除根耳。鶴

金匱要略 卷二 腸痔下血 吳

年自試驗過

洩血

洩血有虛有實。實者下焦結熱。血為熱迫。尿血成淋。虛者房勞內傷。血失統御。溺血不已。亦有心藏有熱。熱乘于血。血滲小腸而尿血者。當參合脈證治之。凡小便血出。成淋作痛。或雜尿而出者。從膀胱中來也。如血出不痛者。為尿血。乃心移熱于小腸。血從精竅中來也。

濟生小薊飲子 治下焦結熱之劑

生地 四兩 小薊根 滑石 通草

金匱翼 卷二 洩血 五

蒲黃 炒 淡竹葉 藕節 當歸

山梔仁 甘草 炙各半兩

右以咀。每服四錢。水一錢煎分空心溫服。

一方有白茅根阿膠

鹿茸散 治下元虛憊。小便尿血。日夜不止之劑

鹿茸 酒洗去毛塗酥炙令黃 生地黃 焙 當歸 焙各二兩

蒲黃 一合 冬葵子 炒四兩半

右為極細末。每服三錢。七空心溫酒調服。日二。

一方煉蜜為丸。如梧子大。每服二十九。食前

炒鹽湯下。

如神散 治心藏有熱。熱乘于血之劑。

阿膠 蛤粉炒 山梔 車前子 黃芩

甘草 炙各二錢半

右為細末。每服半錢。或一錢。井華水調服。日三。

此方合犀角地黃湯用之良。

髮灰散 亂髮燒存性為末。每服二錢。以醋二合

湯少許調服。或以側柏葉汁調糯米粉和。九梧

子大。湯服五十九。

金匱翼 卷二 洩血 五

鹿角膠丸 治房室勞傷小便出血。

鹿角 一兩炒成珠 沒藥 油髮灰 各六錢

右為末。取白茅根汁打糊為丸。梧子大。空心鹽

湯吞七八十九。

門人 平卅沈安伯

門人 星門陳步羔 全校字

男 珊 圖南

龍翔 召南

金匱翼卷三目錄

膈噎反胃統論

痰膈 血膈 氣膈 疝膈 梅核膈氣

雜療方

虛勞統論

營衛不足 肺勞 心勞 腎勞 脾勞

風勞 熱勞 乾血勞 傳尸勞

發熱統論

勞倦 火鬱 血虛 陽浮 痰積 瘀血

金匱翼卷三目錄

骨蒸 食積酒毒發熱 藏府血氣分治

惡寒

瘧疾統論

風瘧 溫瘧 淫瘧 癰瘧 牡瘧 痰瘧

食瘧 虛瘧 瘵瘧

金匱翼卷三

飼鶴山人

長洲後學徐錦炳南氏讀

膈噎反胃統論

膈隔也飲食入咽不得輒下噎塞膈中如有阻隔之者故名曰膈噎。又其病正在膈間食不得下氣反上逆隨復吐出故又名膈氣反胃者飲食入胃全無阻隔過一二時輒復吐出有反還之意故曰反胃。甚者朝食暮吐暮食朝吐有翻傾之義故亦名翻胃。不似

金匱翼卷三 膈噎

噎隔之噎然後吐不噎則不吐也

噎隔之病有虛有實實者或痰或血附着胃脘與氣相搏翳膜外裹或復吐出膈氣暫寬旋復如初虛者津枯不澤氣少不充胃脘乾癯食滯不下虛則潤養實則疏瀹不可不辨也

飲食下咽不得入胃為噎食不下通氣反上逆為塞東垣乃謂陽氣不得出者為塞陰氣不得降者為噎豈非謂入食從陰而氣出從陽耶其文則深其旨反晦至謂先用陽藥治本後用堵塞瀉標吾不知其何

所謂矣

子和論膈噎累累數百言。謂三陽結熱前後闕流。下既不通。必反上行。所以噎食不下。夫膈噎胃病也。始先未必燥結。久之乃有大便秘少。若羊矢之證。此因胃中津氣上逆。不得下行而然。乃胃病及腸。非腸病及胃也。又因河間三乙承氣之治。謂噎膈之病。惟宜川下。結散陽消。其疾自愈。夫脘膈之病。豈下可去。雖仲景有大黃甘草。東垣有通幽潤腸等法。為便秘嘔吐者立。然自是食入輒吐之治。非所論于食噎不下。

全醫真 卷三 膈噎

也。獨其所謂慎勿頓攻。宜先潤養。小著湯丸。累累加用。開膈自透。或用苦酸微溲。膈涎因而治下。藥勢易行。設或不行。蜜苦鹽下。導始終勾引。兩藥相通者。其言甚善。蓋痰血在脘。不行不愈。而藥過病所。反傷真氣。非徒無益矣。故以小丸累加。適至病所。無過不及。以平為期。則治噎之道也。但須審是痰是血而行之耳。膈噎之證。大都年踰五十者。是津液枯槁者居多。若壯年氣盛。非血卽痰。近見有津液枯槁之劑。治一少年肥實男子。至死不悟。哀哉。鶴年

先嬌傳一方云。用燒酒一斤。浸海蜇花頭一斤。入磁瓶內埋地數年。則海蜇化為水矣。取飲半酒杯。妙。鶴年又識。

痰膈

痰膈因七情傷于脾胃。鬱而生痰。痰與氣搏。升而不降。遂成噎膈。其病令人胸膈痞悶。飲食輒噎。不得下入胃中。必反上逆而嘔。與痰俱出。治法宜調陰陽。化痰下氣。陰陽平均。氣順痰下。病斯已矣。

和劑四七湯 治喜怒哀憂思悲恐驚之氣結成痰。涎狀如破絮。或如梅核。在咽喉之間。咯不出。嚥

金匱真 卷三 噎膈

不下。此七情所為也。中脘痞悶。氣不舒快。或痰飲。嘔逆。惡心。並皆治之。

半夏製二錢 茯苓一錢 紫蘇葉八分 厚朴錢二分 水一盞。生薑七片。紅棗二枚。煎至八分。不拘時服。

丁沉透膈湯 和劑 治脾胃不和。痰逆惡心。或時嘔吐。飲食不進。十膈五噎。痞塞不通。並皆治之。

人參 砂仁 香附各一兩 青皮 木香 肉豆蔻 白豆蔻 丁香各半兩

1851 丹黃參日車全書第 0 反文內

陳皮 藿香 沉香 厚朴各七錢五分

草菓 半夏 神麴各二錢五分 甘草五錢

麥芽五錢 白木二兩

每服四錢水一盞薑三片棗一枚不拘時熱服

滌痰丸

半夏麴 枯礬 皂角炙刮去皮弦子 元明粉

白茯苓 枳殼各等分

右爲末霞天膏和丸量人虛實用之

血膈

金匱翼

卷三

噎膈

四

丹溪治一少年食後必吐出數口却不盡出膈上時作聲面色如平人病不在脾胃而在膈間其得病之由乃因大怒未止輒食麴故有此證想其怒甚則血菀于上積在膈間礙氣升降津液因聚爲痰爲飲與血相搏而動故作聲也用二陳加香附蘼汁蘿蔔子二凡以瓜蒂散敗醬吐之再一日又吐痰中見血一盞次日復吐見血一鍾而愈

一中年人中脘作痛食已乃吐面紫霜色兩關脉澀乃血病也因跌仆後中脘卽痛投以生新血推陳血

之劑吐血片碗許而愈

一中年婦人反胃以四物加帶白陳皮留尖去皮桃仁生甘草酒紅花濃煎入驢屎以防生虫與數十貼而安

一人咽膈間常覺有物閉悶飲食妨礙脉澀稍沉形色如常以飲熱酒所致遂用生薑汁每服半盞日三服至二斤而愈

一人食必屈曲下膈梗澀微痛脉右甚澀而關沉左却和此汚血在胃脘之口氣因鬱而爲痰必食物所致詢其去臘日飲剗剗酒三盞遂以生薑汁冷飲細呷之盡半斤而愈

金匱翼

卷三

噎膈

五

一貧叟病噎膈食入卽吐胸中刺痛或令取蘼汁入鹽梅滿汁少許細呷得入漸加忽吐稠涎數升而愈此亦仲景治胸痺用薤白取其辛溫能散胃脘痰涎惡血之義也 愚謂此不獨辛溫散結之義蓋亦鹹能潤下而酸味最能開膈胃止嘔吐品味不雜而意旨周密殊可取也

一婦年及五十身材畧瘦小勤于女工得噎膈證半

年矣飲食絕不進而大便燥結不行者十數日小腹
隱隱然疼痛六脉皆沉伏以生桃仁七箇令細嚼杵
生韭汁一盞送下片時許病者云胸中畧覺寬舒以
四物六錢加括蕪仁一錢桃仁泥半錢酒蒸大黃一
錢酒紅花一分煎成止藥一錢取新溫羊乳汁一錢
合而服之半日後下宿糞若干明日腹中痛止漸可
進稀粥而少安後以四物出入加減合羊乳汁服五
六十貼而安

江應宿治一老婦年近七旬患噎膈胃脘乾燥屬血

金匱翼 卷三 血脈

六

虛有熱投五汁湯二十餘日而愈其方蘆根汁藕汁
甘蔗汁牛乳生薑汁少許餘各半錢重湯煮溫不
拘時徐徐服

滋血潤腸湯 治血枯及死血在膈飲食不下大

便燥結

當歸酒洗三錢芍藥煨 生地黃錢各半紅花酒洗

桃仁去皮尖炒大黃酒煨 枳殼麩炒各一錢

水一鍾半煎七分入韭菜汁半酒盞食前服

秦川剪紅丸 良方

雄黃另研木香各五錢 枳榔 三稜煨

蓬朮煨 貫仲去毛 乾漆炒烟 陳皮各一兩

大黃一兩

右麩和九梧子大每五十九食前米飲送下吐

出瘀血及下虫為效

氣膈

氣膈病使人煩懣食不下時嘔沫淳于意作下氣湯
治此疾一日氣下二日能食三日愈然下氣湯方不
傳

金匱翼 卷三 血脈 氣膈

七

一村夫因食新筍羹噎納間忽為一噎延及一年百
藥不效王中陽乃以葦撥麥芽炒青皮去穰人參苦
桔梗柴胡白朮南木香高良薑半夏麩共為末每服
一錢水煎熱服次日病家報云病者昨已痛極自己
津唾亦嚥不下服藥幸納之胸中沸然作聲覺有生
意敢求前劑況數日不食特將氣未盡擬待就木今
得此藥可謂還魂散也王遂令其搗碎米煮粥將熟
卽入藥再煎一沸令啜之一吸而盡連服數劑得回
生因名曰還魂散後以之治七情致病吐逆不定面

黑目黃日漸瘦損傳為噎證者多驗但忌油膩魚腥
粘滑等物

永類鈴方治噎膈不食黃犬乾俄數日川生粟或米
乾飼之俟其下糞淘洗米粟令淨煮粥入薤白一握
泡熟去薤入沉香末二錢食之。

救急癆氣噎方

半夏 柴胡各三兩 生薑三兩 羚羊角 犀角

桔梗 昆布 通草 炙甘草各二兩

水八升煮三升分三服

金匱翼

卷三

氣膈

八

療因食即噎塞如炙嚮在膈不下方

射干六分 升麻四分 桔梗四分 木通一錢

赤苓八分 百合八分 紫苑頭二十枚

水二大升煎九合去渣分溫三服食遠

重膈

張文仲備急方言幼年患反胃每食羹粥諸物須臾
吐出貞觀中許奉御兄弟及柴將諸名醫奉勅調治
竟不能療漸疲困候絕旦夕忽一衛士云服驢小便
極效遂服二合後食只吐一半哺時再服二合食粥

便定次日奏知宮中五六人患反胃者同服一時俱
瘥此物稍有毒服之不可過多須熱飲之病深者七
日當效後用屢驗

廣五行記永徽中絳州有僧病噎數年臨死遺言令
破喉視之得一物似魚而有兩頭遍體悉是肉鱗致
鉢中跳躍不止以諸味投鉢悉為水時寺中刈藍作
靛試取少許置鉢中蚩繞鉢畏避須臾蚩化為水後
人以靛治噎疾每效

治梅核膈氣方

金匱翼

卷三

虫膈

九

取半青半黃梅子每個用鹽一兩淹一日夜晒乾又
浸又晒至水盡乃止用青錢三個夾二梅麻線縛定
通裝磁罐內封埋地下百日取出每用一梅含之嚮
汁入喉即消收一年者治一人收二年者治二人其
妙絕倫

昆布九 治五噎咽喉妨塞食飲不下

昆布洗 麥門冬 天門冬並去心焙

訶黎勒去核各一兩五錢 木通 川大黃微炒

川朴硝 郁李仁湯浸去皮微炒 桂心 百合各一兩

羚羊角屑 杏仁去皮尖 蘇子微炒 射干各五錢

柴胡去蘆 陳皮去白 檳榔各二錢半

右爲細末。煉蜜和搗三百杵。丸如梧子大。每服三十丸。不拘時。熱酒送下。夜飯後。用綿裹彈子。大一丸。嚙化。

雜療方

普濟方云。反胃吐食。藥物不下。結腸三五日。至七八日。大便不通。如此者必死。昔金州周禪師。得正胃散方于異人。十痊八九。君子收之。可濟人命。用白水牛

金匱翼 卷三 梅核隔

喉一條。去兩頭節。并筋膜脂肉。及如阿膠黑片。臨時旋炙。用米醋一盞。浸之。微火炙乾。淬之。再炙。再淬。醋盡爲度。研末。厚紙包收。或遇陰濕時。微火烘之。再收。遇此疾。每服一錢。食前。陳米飲調下。輕者一服立效。集驗療反胃。朝食暮吐。暮食朝吐方。

羊肉去脂膜。作脯。以好蒜。盪空腹。任意食之。立

見效驗

聖濟總錄治咽喉妨礙。如有物吞吐不利方。

杵頭糠 人參各一錢 石蓮肉炒二錢

水煎服。日三次

虛勞統論

虛勞一曰虛損蓋積勞成虛積虛成弱積弱成損也
虛者空虛之謂損者破散之謂虛猶可補損則平有
復完者矣

古有五勞五蒸六極七傷之名而不一其說然五勞
者主五藏心勞肝勞脾勞肺勞腎勞是也五蒸者主
軀體膚蒸肉蒸脈蒸筋蒸骨蒸也六極者氣極血極
筋極肌極精極骨極合內外兼陰陽者也七傷者大
飽傷脾大怒氣逆傷肝強力舉重久坐溼地傷腎形

金匱要略卷三 虛勞統論

寒飲冷傷肺憂愁思慮傷心大恐懼不節傷志風雨
寒暑傷形合形藏神而言者也外此所謂志勞憂勞
瘦勞思勞及陰寒陰痿裏急精速等證為七傷者皆
非也

損證有自上至下者有自下至上者而皆以中氣為
主故難經一損損于肺皮聚而毛落二損損于心血
脈虛弱不能榮于藏腑婦人則月水不通三損損于
胃飲食不為肌膚此自上而下者也一損損于腎骨
痿不能起于牀二損損于肝筋緩不能自收持三損

損于脾飲食不能消尅此自下而上者也機要云虛

損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽故損自上而

下治之宜以辛甘淡過于胃則不可治也感熱則損

陰故損自下而上治之宜以苦酸鹹過于脾則不可

治也夫脾胃居中而運水穀脾胃氣盛四藏雖虛猶

能溉之不然則四藏俱失其養矣得不殆乎故曰過

于脾胃者不治

治損之法莫善于難經謂損其肺者益其氣損其心

者調其營衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝

者緩其中損其腎者益其精蓋肺主氣益之使充也

心主血而營衛者血之源和之使無偏也脾運水穀

而主肌肉調之適之毋困其內亦无傷其外也肝苦

急緩之使疎達也腎主精益之使不匱也後人不辨

損在何藏藥與養陰清火術亦疎矣

陳藏器諸虛用藥凡例本出千金此在初學殊足以

為準則若夫得心應手神明變化端不在此區區形

迹間也

虛勞營衛不足

金匱要略卷三 虛勞統論

虛勞營衛不足者脈極虛乳遲短氣裏急四肢痠疼腹中痛或悸或衄或手足煩熱咽乾口燥宜甘酸辛藥調之甘以緩急酸以養陰辛以養陽也

小建中湯方

白芍 六兩 甘草 桂枝 生薑 各三兩

大棗 十二枚 膠飴 一升 虛甚者加黃耆 一兩

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上

微火消解溫服一升日三服深師治虛勞腹滿

食少泄瀉者無膠飴有人參二兩半夏一升

金匱翼 卷三 虛勞營衛不足 古

必效方治虛勞失精加龍骨白欬各一兩古

今錄驗治虛勞裏急小腹急痛氣引胸脇或心

痛短氣以乾薑代生薑加當歸四兩

經云肝生于左肺藏于右心位在上腎處在下脾居

四臟之中生育營衛通行津液一有不調則失所有

所行矣必以此湯溫健中臟故名建中中藏者脾胃

也脾欲緩急食甘以緩之故以飴糖為君甘草為臣

桂枝辛熱散也潤也營衛不足潤而散之芍藥酸寒

收也泄也津液不足收而行之故以芍桂為佐生薑

辛熱大棗甘溫胃者衛之源脾者榮之本衛不足益之必以辛榮不足補之必以甘甘辛相合脾胃健而榮衛通故以薑棗為使也

大建中湯方

治內虛裏結少氣手足厥冷小腹

攣急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中

寒痛或唇口乾精自出或手足乍寒乍熱而煩冤

酸疼不能久立多夢失精

黃耆 當歸 桂心 芍藥 各二兩

人參 甘草 各一兩 半夏 黑附子 炮各二兩

錢半 每服五錢水二觔薑三片棗二枚煎一觔去滓

食前溫服本方加白朮菴蓉麥冬川芎熟地

茯苓名十四味建中湯皆補益榮衛之劑也

我甘草湯 治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動

如常不出百日危急者十一日死

炙甘草 四兩 桂枝 生薑 各三兩 麥冬 去心

麻仁 各半 人參 阿膠 各二兩 大棗 二十枚

生地黃 一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去

滓內膠消盡溫服一升日三服。

朱雀湯 治勞傷心氣變生諸疾。

雄雀肉一隻取 赤小豆一合 人參 赤苓

紫石英 小麥 大棗肉各一兩

紫苑 遠志 丹參各半兩

炙甘草二錢半

右細剉拌勻每服三錢用水一瓊煎六分去滓

食遠溫服奇效

肺勞

金匱翼 卷三 虛勞營衛不足 七

肺勞者呼吸少氣咳嗽喘急喘乾氣極則皮毛焦乾

津枯力乏腹脹喘鳴由預事而憂或風邪久住而成

宜分邪正冷熱而治之。

紫苑湯 治氣極皮毛焦枯四肢無力喘急短氣

不足以息

紫苑茸洗 乾薑炮 黃耆 人參

五味子 鐘乳粉 杏仁麩炒 甘草炙各等分

右吹咀每服四錢水一瓊薑三片棗一枚煎服

無時

葛可久保和湯 治風寒久嗽成勞及肺燥成痰

者服之決效

知母 貝母 天冬 麥冬

款冬各三錢 花粉 薏仁 杏仁炒去皮尖各二錢

粉草炙 紫苑 五味子 馬兜鈴

百合 桔梗各一錢 阿膠 生地黃

當歸 紫蘇 薄荷各五分 生薑三片

右水煎入飴糖一匙服三日三服食後進。

一方無地黃有百部。若血盛加蒲黃茜根藕

金匱翼 卷三 肺勞 七

節大薊茅花根。痰盛如半夏橘紅茯苓枳實

括婁炒 喘盛加桑白皮陳葶子蘇子 熱

盛加山梔炒黑 黃連黃芩連翹 風熱加防風

金沸草甘菊花 寒盛加桂枝五味子臘月加

乾薑

心勞 心勞者恍惚驚悸少顏色熱則煩心口乾溺澀寒則

內慄夢多恐怖由曲運神機而成熱則清之寒則溫

之養血安神則一也

遠志引子 治心勞虛寒。夢寐驚悸。

遠志 去心 茯神 去木 肉桂 人參

棗仁 炒 黃耆 當歸 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢。水一瓊薑五片煎服無時。

麥門冬湯 治心勞虛熱。唇口赤。煩渴溺澀。

麥門冬 去心 遠志 甘草煮 人參 黃芩

生地黃 茯神 石膏 煨各一兩 甘草 炙半兩

煎服法同前。

腎勞

金匱翼 卷三 心勞 六

腎勞之證。面黑足冷。耳聾膝軟。腰痛。少腹拘急。小便不利。八味腎氣丸主之。此為腎藏不足。內生寒冷。王太僕所謂腎虛則寒動于中也。

八味腎氣丸方

熟地黃 八兩 山藥 各四兩 牡丹皮

建澤瀉 白茯苓 各三兩 附子 製 肉桂 各一兩

右為末煉蜜丸。如桐子大。每服七八十九。空心

滾湯下。本方加五味子鹿茸名十補丸。本

方去附子加五味子二兩名加減八味丸。

薯蕷丸 補丈夫一切病不能具述方。

薯蕷 枸杞子 續斷 茯苓

牛膝 兔絲子 巴戟 杜仲 各一兩

菴蓉 二兩 五味子 山萸肉 蛇牀子 各一兩

右為散。酒調方寸匕。日三夜二。禁醋蒜。

治腎勞精敗面黑方。

肉菴蓉四兩。水煮令爛。薄細切。研精。羊肉分為

四度。下五味以米煮粥。空心食。聖濟總錄

許學士本事方。唐鄭相國云。予為南海節度使時。年

七十有五。粵地卑溼。傷于內外。眾疾俱作。陽氣衰絕。

乳石補益之藥。一切不應。元和七年。有訶陵國船主。獻此方。經七八日。而覺應驗。自爾常服。其功神驗。十年二月。罷郡歸京。錄方傳之。其方用破故紙十兩。揀

洗為末。用胡桃肉去皮十二兩。研如泥。即入前藥末。

更以好煉蜜和勻。如餡。盛瓷器中。旦日以溫酒化藥。

一匙服之。不飲酒。溫熱水化下。彌久則延年益氣。悅

心明目。補益筋骨。但禁食芸薹。羊血。蓄人呼為補骨

脂丸。

脾勞

脾勞之證。食不化。心腹痞滿嘔吐吞酸而色痿黃甚者。心腹常痛。大便泄利。手足逆冷。骨節痠疼。目漸消瘦。由脾胃久積風冷之氣所致。亦名冷勞。木香猪肚丸主之。

木香猪肚丸方

木香 附子 郁李仁 乾薑

陳皮 麥冬各一兩 肉豆蔻一兩 熟艾

鱉甲 柴胡 神麩各二兩 厚朴三兩 薑水炒

金匱翼 卷三 脾勞

鍾乳粉 桂心各五錢

共末用雄猪肚一具。去脂膜。切細入好米醋三升。煮爛研細入末。搗和。丸梧子大。空心温酒米飲任下二十九。

千金治虛補勞方

羊肚一具 白朮一升

右二味以水二斗。煮取六升。每服二升。日三。

又方

猪肚一具 人參五兩 蜀椒 乾薑各二兩

葱白七兩 白梁米半升

右六味。以咀諸藥。令相得利。米內肚中。縫合勿令泄氣。取四斗半水。緩火煮爛。空腹食之。大佳。兼下少飯。

濟生白朮湯 治脾勞虛寒。嘔吐不食。腹痛泄瀉。

胸滿善噫。

人參 白朮 草菓 肉豆蔻各一兩 熟

厚朴 陳皮 木香 麥芽各一兩

炙草半兩

金匱翼 卷三 脾勞

每服四錢。水一瓊。薑五片。棗一枚。煎服。無時。

風勞

風勞之證。肌骨蒸熱。寒熱往來。痰嗽盜汗。黃瘦毛焦。口臭或成疔。利由風邪。淹滯。經絡。瘀鬱。而然。其病多著于肝。亦名肝勞。

寶鑑秦朮鱉甲散

鱉甲一兩 柴胡 地骨皮 秦朮

知母 當歸各半兩

右為粗末。每服半兩。水一瓊。入烏梅一枚。青蒿

五葉同煎至七分去滓溫服臨臥空心各一服
如嗽多可加阿膠麥冬五味 元戎有桃柳枝
各七個薑三片為柴胡鱉甲散大便硬者服之
大便溏者半氣半血服逍遙散 元珠云體虛
之人最易感于邪氣當先和解微汗微利之從
其性而治之次則調之醫者不知邪氣加于身
而未除便行補劑邪氣得補遂入經絡往往至
死不可不知也

柴胡飲子 太無

金匱翼 卷三 風勞

人參 黃芩 炙草 大黃

芍藥 柴胡 當歸 各半兩

每服四錢水薑煎溫服

麥煎散 治少男室女骨蒸黃瘦盜汗肌熱口臭

婦人血風攻注四肢 方見發熱門

良方團魚丸 治骨蒸勞嗽累效

貝母 前胡 知母 杏仁 各一兩

柴胡 半兩

用團魚二個同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾

為未再以團魚骨甲煮汁一瓊和藥九梧子大
每服二三十丸煎黃耆六一湯空心送下病既
安仍服黃芪六一湯方調理

廣濟療骨蒸肺熱每至日晚即惡寒壯熱頰色微赤
不能下食口漸羸瘦方

生地黄 三兩 葱白 一把 香豉 二兩 炙甘草 五錢

童子小便 二升

右五味以地黄等於小便中浸一宿平晨煎兩
沸絞去滓澄取一升二合分溫二服相去如人

金匱翼 卷三 風勞

行七八里服一劑差止

直指全鱉丸 此與良方團魚丸治同

知母 貝母 杏仁 浸去皮各三兩 柴胡 二兩

川芎 一兩 當歸 明阿膠 炒酥各半兩

右羶截入厚磁器中用中等活鱉一個生宰去

頭以鱉肉并血并藥用醇酒五升同浸一宿密

紙封次早慢火同煮香熟令病者隨意食之只

留鱉甲并骨并藥焙乾為末以浸藥酒汁調米

粉為糊丸桐子大每七十丸米飲下

傷寒餘熱未盡或失于調攝致欬嗽寒熱吐血衄血纏綿日久狀如勞瘵此皆元氣虛邪氣留著例用養氣生血藥兼小柴胡青蒿鱉甲或前胡犀角石羔等隨證加減無有不愈者切不可純用補劑亦不可誤認為虛損勞怯輕用杜仲熟地山萸等溫補之藥也

熱勞

熱勞者因虛生熱因熱而轉虛也其證心神煩躁面赤唇焦身熱氣短或口舌生瘡是也明醫雜著云人之一身陽常有餘陰常不足況節慾者少過慾者多精血既虧相火必旺火旺則陰愈消而勞瘵咳嗽咯血吐血等證見矣故宜常補其陰使陰與陽齊則水能制火而水升火降斯無病矣

金匱翼

卷三

風勞熱勞

五

補陰丸方

黃柏去皮酒炒知母去皮酒炒龜板酥炙透杞子
鎖陽酥炙白芍酒炒天冬去心各熟地酒蒸
五味一兩乾荷炒紫冬川五錢
右為末入煉蜜及猪脊髓三條和勻杵丸桐子

大每服八九十九空心淡鹽湯送下寒月可用溫酒下丹溪原方有陳皮牛膝當歸虎骨無杞子天冬五味乾薑用酒煮羊肉為丸

瓊玉膏

生地黄四斤茯苓十二兩人參六兩白蜜一斤
右先將生地黄熬汁去滓入蜜煉稠再將參苓細末和入磁罐封水煮半日白湯化服 臞仙加琥珀沉香各五錢

金匱翼

卷三

熱勞

五

按虛勞之人氣血多有鬱聚之處故雖形衰氣少而脇下迫塞不得左右臥者虛中有實也臞仙于滋補之中寓通行之意如張僧繇畫龍一經點睛通體皆靈而用之者往往獲效是豈徒參地苓蜜之力哉

大造丸

紫河車一具米泔洗淨少加酒蒸
收龜板酥炙天冬各一兩麥冬二錢
熟地二兩夏加五味七錢
右除熟地另杵外共為末用酒煮米糊同熟地搗膏丸桐子大或蜜丸亦可每服八九十九空

心臨臥鹽湯下。冬月酒下。婦人去龜板加當歸

二兩

大補天丸 治男婦虛損勞傷形體羸瘦腰背疼

痛遺精帶濁

紫河車 初胎者一具米泔浸淨入小砂罐內加

水一碗煮沸候冷取起放竹籃中四圍

用紙糊密知母乳炒龜板酥炙各黃柏蜜炙

烘乾為末 熟地 五兩 肉蓯蓉 牛膝 麥冬

山藥 炒 虎脰骨 酥炙 茯苓 各一兩

杜仲 何首烏 人參 白芍 各一兩

金匱翼 卷三 熱勞 羌 羌

枸杞 二兩 生地 酒洗 天冬 當歸

北五味 各一兩 冬加乾薑 半兩炒焦

右為細末用猪脊髓三條蒸熟加煉蜜和搗為

丸桐子大每服八十九空心淡鹽湯下冬月酒

下。治骨蒸便溺口渴者方。

青蒿 烏梅 秦艽 甘草

小麥

水煎服

草還丹 治陰虛骨蒸。

青蒿 五升童便三斗

文武火熬約童便減至二斗去青蒿再煎至一

升入猪膽七個再熬數沸用甘草末收和為丸

梧子大每服五十九

又方

鮮地骨皮 三錢 紅棗 七枚 煎湯代茶日一劑

治骨蒸神效若治童勞加燕窩一錢 鶴年

金匱翼 卷三 熱勞 羌 羌

黃耆鱉甲煎 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠

五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晡潮熱夜有

盜汗胸脇不利減食多濁欬唾稠粘時有膿血

黃芪 知母 桑白皮 炙甘草

赤芍藥 紫苑 各五錢半 地骨皮 秦艽

白茯苓 生地 柴胡 各六錢 肉桂

人參 苦桔梗 各三錢 鱉甲 酥炙

天冬 各一兩 半夏 五錢 右為粗末每服三錢水一瓊煎至七分去滓食

後溫服一名人參黃芪散

乾血勞

乾血血瘀而乾也。瘀則生熱內傷肝肺發熱咳嗽。日以益甚。不已則成勞。金匱所謂經絡營衛氣傷內有乾血。肌膚甲錯兩目黯黑者是也。

天黃麻蟲丸

大黃二兩 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁

杏仁 蠱蟲 麻蟲 蟻螬各一升

芍藥 乾地黃 乾漆一兩 水蛭百枚

金匱翼 卷三 乾血勞 天

右為末。蜜丸小豆大。酒服五九日三服。

王念西云。虛勞發熱。未有不由瘀血者。而瘀血未有不由內傷者。人之起居飲食。一有失節。便能成傷。瘀積之血。半不可拔。新生之血。不得周流。與日俱積。其人尙有生理乎。仲景施活人手。眼以潤劑。濡乾血。以蠕動。啖血之物。行死血。死血既去。病根以剷。而後可從事于滋補矣。陳大夫百勞丸。可與此互用。

喻嘉言曰。此世俗所稱乾血勞之良治。血結在內。手足脈必相失。宜服此方。然必兼大補劑。瓊玉膏之類。

服之。按相失者不相得也。血結脈不通使然。

陳大夫百勞丸 治一切勞瘵積滯。疾不經藥。瘵者宜服。元戎

錦紋大黃去皮及黑心四錢 乳香 沒藥

當歸各一錢 人參二錢 桃仁去皮尖另研如泥

蠱蟲 水蛭各十四枚炒

右為極細末。煉蜜丸。桐子大都作一服。可百丸。

五更用百勞水下。取惡物為度。服白粥十日。

按都作一服。服當作劑。劑量也。量病之輕重而

製其大小也。云取惡物為度。則非一服令盡可知。

金匱翼 卷三 乾血勞 天

傳尸勞

知。

張雞峯云。傳尸勞者。緣尸疰及挾邪精鬼氣而成者也。大槩寒熱淋漓。沉沉默默。不的知其所苦。而無處不惡。積年累月。漸就委頓。既死之後。又復傳易他人。者是也。茲須以通神明去惡氣諸藥治之。

百一選方 治傳尸勞

天靈蓋三錢酥炙 鱉甲極大者醋炙黃為末

黃為末秤 鱉甲稱一兩九 助者更妙

天靈蓋三錢酥炙 鱉甲極大者醋炙黃為末

黃為末秤 鱉甲稱一兩九 助者更妙

天靈蓋三錢酥炙 鱉甲極大者醋炙黃為末

桃仁一錢五分 去皮尖研 青蛇腦小豆許 酥炙 色轉 為度 無蛇腦亦得

虎糞內骨 安息香半兩以上 為末 絹篩篩過

檳榔二錢半 別為細末 麝香一錢 別研 青蒿取近梢三四寸 細剉六兩

豉三百粒 楓葉二十片 葱根 二十一 個 拍破

童便半升 桃柳李桑東引枝各七莖 長七寸 如筋頭大 細剉

右先將青蒿桃柳桑枝楓葉葱豉以官升量

水三升煎至半升去滓入安息香天靈蓋虎糞

內骨鱉甲桃仁童便同煎取汁去滓有四五合

將檳榔麝香同研均調作一服早晨溫服以被

金匱要略 卷三 傳尸勞

覆出汗恐汗內有細蟲以帛拭之即焚此帛相

次須瀉必有蟲下如未死以大火焚之並棄長

流水內所用藥切不可令病人知之日後亦然

十來日後氣體復原再進一服

獾肝散

獾肝一具陰乾杵末飲服方寸七日三未愈再

服肝後云此方甚效 金匱

寶鑑紫河市丸 治傳尸勞服三月必平復其餘

勞證須數服神效

紫河車一具 川米泔水浸 焙乾 鱉甲 酥炙

桔梗去蘆 胡黃連 芍藥 大黃

敗鼓皮心醋炙 貝母去心 龍膽草

黃葯子 知母各二錢半 芒硝 犀角

蓬朮各一錢半 硃砂 研二錢

右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣食前溫

酒服二十九如膈熱食後服重病不過一料

金匱要略 卷三 傳尸勞

星

發熱統論

有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱故苦以治五臟五臟屬陰而居於內辛者以治六腑六腑屬陽而居于外故曰內者下之外者發之

飲食勞倦為內傷元氣元氣傷則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用人參黃耆等甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足者也勞心好色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而變為火矣此謂陰虛火旺勞瘵之症故丹溪發陽有

金匱翼 卷三 發熱統論 三

餘陰不足之論用四物加黃柏知母補其陰而火自降此用血藥以補血之不足者也益氣補陰皆內傷症也一則因陽氣之下陷而升提之一則因陰火之上升而滋降之一升一降迥然不同矣節齋

平日發熱熱在行陽之分肺氣主之故用白虎湯以瀉氣中之火日晡潮熱熱在行陰之分腎氣主之故用地骨皮散以瀉血中之火白虎湯治脉洪故抑之使秋氣得以下降也地骨皮散治脈弦故舉之使春氣得以上升也

治熱之法有五。一曰和。二曰取。三曰從。四曰折。五日奪。假令小熱之病當以涼藥和之。和之不已。次用取為熱勢稍大。當以寒藥取之。取之不已。次用從為熱勢既甚。當以溫藥從之。謂藥氣溫也。味隨所為。或以寒因熱用。味通所用。或寒以溫用。或以汗發之不已。又用折為病勢極甚。當以逆制之。制之不已。當以下奪之下奪之不已。又用屬為求其屬以衰之。緣熱深陷在骨髓。無法可出。針藥所不能及。故求屬以衰之。求屬之法。是同聲相應。同氣相求之道也。如或又不已

金匱翼 卷三 發熱統論 三

當廣求其法而治之。譬如孫子之用兵。在山谷則塞淵泉。在水陸則把渡口。在平川廣野當清野千里。塞淵泉者。刺命穴。把渡口者。奪病發時前清野千里。如肌羸瘦弱當廣服大藥以養正。

勞倦發熱

勞倦發熱者。積勞成倦。陽氣下陷。則虛熱內生也。其症身熱心煩。頭痛惡寒。懶言惡食。脉洪大而空。狀類傷寒。切戒汗下。但服補中益氣湯一二服。得微汗則已。非正發汗。乃陰陽氣和。自然汗出也。

補中益氣湯

黃芪錢半 人參 炙甘草錢一 白朮土炒

陳皮 當歸各五分 升麻 柴胡各三分

右加薑三片。棗二枚水煎。本方加芍藥五味。

名調中益氣湯

火鬱發熱

火鬱者陽氣為外寒所遏不得宣行鬱而成火或因胃中過食冷物鬱遏陽氣于脾土之中令人心煩手足心熱骨髓中熱如火燎此為鬱熱經云火鬱則發之

金匱翼 卷三 發熱統論 三

東垣火鬱湯

升麻 葛根 白芍藥 柴胡根各一兩

防風 炙草各五分

右咬咀每服三四錢水二大瓊入連鬚葱白三寸煎去滓稍熱服

血虛發熱

血虛發熱亦從勞倦得之東垣云飢困勞役之後肌熱煩躁用渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉大虛按

之無力經云脉虛則血虛血虛則發熱症象白虎惟脉不長實為辨也誤服白虎旬日必變

當歸補血湯

黃芪一兩 當歸二錢 生地黄錢五 生草一錢

右作一服水煎溫服食前

陽浮發熱

陽氣虛浮其端有二或脾胃氣虛陽浮于外其症上見嘔惡下為溇泄其脉大而不實身雖大熱切忌寒涼宜甘辛溫藥溫其中使土厚則火自斂也或腎虛火不歸經游行于外其症煩渴引飲面赤舌刺唇黑足心如烙或冷如冰其脉洪大無倫按之微弱宜入味腎氣丸之屬導火下行也

金匱翼 卷三 發熱統論 三

理中湯

八味腎氣丸方見虛勞門

王肯堂云相火寄于命門命門者男子以藏精女子以繫胞因嗜慾竭之火無所附故厥而上行桂附與火同氣而其味辛能開腠理致津液通氣道據其窟宅而招之同氣相求火必降下矣且火從腎出者是

以繫胞因嗜慾竭之火無所附故厥而上行桂附與火同氣而其味辛能開腠理致津液通氣道據其窟宅而招之同氣相求火必降下矣且火從腎出者是

水中之火也。火可以水折，而水中之火不可以水折。故巴蜀有火非焉，得水則熾，得火則熄。則桂附者，固治浮游相火正劑歟。

痰積發熱

積痰發熱者，其脉弦滑。其證胸膈痞塞，背心疼痛。活人書所謂中脘有痰，令人憎寒發熱，狀類傷寒，但頭不痛，項不強為異。

瘀血作熱

瘀血發熱者，其脉澀。其人但漱水而不欲嚥，兩腳必厥冷。少腹必結急，是不可以寒治，不可以辛散，但通其血，則發熱自止。

金匱翼

卷三 發熱統論

三

當歸承氣湯

當歸

大黃

各四錢

芒硝

甘草

各二錢

右咬咀入薑煎。一方無芒硝，有芍藥，各清涼

飲子

骨蒸熱

骨蒸熱者，熱伏于內，而氣蒸于外也。其證肌熱盜汗，黃瘦口臭，久而不愈。此骨蒸伏熱，營衛不通之所致。

也。少男室女多有此證。

麥煎散

方見虛勞門

柴胡梅連散 治骨蒸勞熱，久而不愈。三服除根。

其效如神。

柴胡

人參

黃芩

甘草

胡黃連

當歸

芍藥

各半兩

右為末，每服三錢，童便一瓊，烏梅一個，猪胆五匙，猪脊髓一條，葦根半錢，水一鍾，同煎至七分，去滓，溫服無時。原方有前胡，無人參，黃芩，甘草。

金匱翼

卷三 發熱統論

三

草當歸芍藥。余蓋從柴胡飲子增入，以備補虛瀉熱之用。去前胡者，不欲重散也。

食積酒毒發熱

食積者當暮發熱惡聞食臭時時噁腐其脈滑或實活人所謂傷食令人頭痛脈數發熱但左手人迎脈平和身不疼是也酒毒者脈數溺赤經云酒氣與穀氣相搏熱盛于中故熱遍于身內熱而溺赤是也。

加味越鞠丸

蒼朮 神麴 香附 黑山梔

撫芎 針砂 山查

右為末糊丸。

金匱翼

卷三 食積酒毒發熱

三

酒煮黃連丸

黃連八兩用酒二斗入瓦罐內重湯煮爛取出晒乾為末滴水丸桐子大每五十九食前溫水下。

分治藏府上下血氣諸熱。

錢氏瀉青丸 治肝熱

當歸 焙 龍膽草 川芎 山梔

羌活 防風 大黃

右為末蜜丸雞頭子大每服一九一方彈子

大竹葉湯化下一丸。

龍薈丸 治肝藏積熱

當歸 焙 龍膽草 梔子 黃連

黃柏 黃芩 各一錢 大黃 蘆薈

青黛 各半 木香 二錢 麝香 五分 別研

右為末煉蜜丸如小豆大小兒如麻子大每二十九生薑湯下。

外臺麥門冬飲 療心勞不止口赤乾燥心悶肉

毛焦色。

金匱翼

卷三 分治諸熱

三

生麥冬 一升 陳粟米 一升 雞子白 二七枚

淡竹葉 三升 切

右先以水一斗煮粟米竹葉取九升去滓澄清後取七升冷下雞子白攪五百轉去上沫下麥門冬煮取三升分三服。

濟生黃芩湯 治心熱口瘡煩渴小便不利。

生地 木通 甘草 黃連

黃芩 麥冬 梔子 澤瀉

每服四錢水一瓊薑三片煎服無時。

瀉黃散 治脾熱口臭咽乾目黃

藿香葉七錢 山梔一兩 石羔半兩 防風四兩

甘草二兩

右剉同蜜酒拌。微炒香為末。每服二錢。水一錢。

煎清汁飲

外臺療脾熱方。

石羔一斤碎 生地汁一升 淡竹葉切五升 赤蜜一升

水一斗二升。煮竹葉取七升。去滓。內石羔煮取

一升五合。去滓。下地黃汁兩沸。下蜜煎取三升。

金匱翼 卷三分治諸熱 單

細細服。

瀉白散 治肺熱。

桑白皮炒黃 地骨皮各一兩 甘草炙半兩

右為末。每服二三錢。水一錢。入粳米百粒煎。食

後服。易老加黃連。海藏云。加山梔黃芩方

能瀉之。

東垣滋腎丸 治腎熱。

黃柏三兩 知母二兩 桂二錢

右為末。熱水丸。桐子大。每七八十九。...

前百沸湯下。

外臺三黃湯 治腎熱。大小便閉塞。耳鳴色黑。

大黃切別漬 黃芩 芒硝各三兩 梔子十四枚

甘草炙一兩

右以水四升。先煮三物。取一升五合。去滓。下大

黃更煎兩沸。下芒硝。分三服。

外臺梔子煎 治膽實熱。精神不守。

梔子二十枚 甘竹茹一兩 香豉六合 大青

橘皮各一兩 赤蜜三合

金匱翼 卷三分治諸熱 單

水六升。煎取一升七合。去滓。下蜜更上微火煎

兩沸。分再服。

導赤散 治小腸實熱。小便赤澀而濁。

生地黃 木通 甘草各等分

右為末。每服三錢。水一錢。入竹葉七片。同煎至

五分。食後溫服。丹溪云。導赤散。正小腸藥也。

瀉白湯 治大腸實熱。腹脹不通。俠臍痛。食不化。

口生瘡。喘不能久立。

淡竹葉 黃芩 梔子仁 柏皮炙各半兩

茯苓 芒硝各一兩 生地黄三兩 橘皮半兩

右剉每四錢入薑棗煎空心服。

千金竹葉湯 治胃熱

竹葉 小麥各一升 知母 石羔各三兩

黃芩 茯苓 麥冬各二兩 人參一兩

生薑五兩 括蕒根 半夏 甘草各一兩

右吹咀以水一斗煮竹葉小麥取八升去滓內諸藥煮取三升分三服老小分五服。

千金地黃煎

金匱要略 卷三 分治諸熱 聖

生地黄汁四升 茯苓三合 知母 葳蕤各四兩

括蕒根五兩 竹瀝三合 生薑汁 白蜜

生麥冬汁 生地骨皮汁各一升 石羔八兩

右以水一斗二升先煮諸藥取三升去滓下竹

瀝生地黄麥冬汁微火熬四五沸下蜜薑汁微

火煎取六升初服四合日三夜一加至六合夏

月作散服之

東垣云發熱而不能食自汗短氣者虛也以甘寒之劑瀉熱補氣能食而熱口舌乾燥大便難者以辛苦

大寒之劑下之瀉熱補水當細分之不可槩論

涼膈散 治上焦積熱煩躁面赤頭昏咽痛喉痺

口瘡頰腫便溺閉赤譫妄睡臥不安一切風壅

新薄荷 連翹 黃芩 梔子

甘草各兩半 大黃 芒硝各半兩

右末每服二三錢竹葉七片蜜三匙煎食後服

與四物各半服能益血洩熱名雙和散本事加

赤芍乾葛治諸熱病累效 玉機云輕者宜桔

梗湯本方去硝黃加桔梗舟楫之品浮而上之

金匱要略 卷三 分治諸熱 聖

去膈中無形之熱且不犯下二焦也

八正散 治下焦積熱二便閉澀口渴咽乾舌瘡

血淋

大黃 瞿麥 木通 滑石

扁蓄 車前子 山梔 甘草各等分

右為末每服二錢入燈心水煎服

通膈丸本 治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如煙搶

上

人參 川黃連 茯苓各三兩 硃砂一分

真片膳 少許

右爲細末。研勻。煉蜜丸如梧子大。熱水下三五丸。日二三服。

四順清涼飲子 治血分熱

大黃 蒸 甘草 炙 當歸 芍藥 各等分

右收咀。每服五錢。用水一椀半。薄荷十葉同煎。至七分。去滓。溫服。潔古云涼風至而草木實。清涼飲子。乃秋風撤熱之劑也。

海藏桔梗湯 治氣分熱

金匱翼 卷三 分治諸熱 罌

桔梗 連翹 山梔 薄荷

黃芩 甘草 各等分

右爲粗末。竹葉白水煎。溫服。汗之熱服。

惡寒

惡寒有陽虛陽鬱之異。陽虛者宜補而溫之。陽鬱者宜開發上焦以升陽明之氣。丹溪所謂久病惡寒。當用解鬱是也。

桂枝加人參附子湯 治陽虛腠理不固惡寒自汗其脈浮虛。

桂枝 白芍 各一兩 甘草 炙一兩 附子 炮半個

人參 一兩

每服五錢。生薑三片。棗一枚。水煎服。

金匱翼 卷三 惡寒 罌

陽鬱治案

進士周。年近四十。得惡寒證。服附子數百貼。而病益甚。脈弦而緩。遂以江茶入生薑汁香油些少調飲之。吐痰一升許。減大半。又與通聖散去麻黃硝黃加當歸地黃百貼而安。

一女子惡寒。用苦參赤小豆各一錢爲末。壺水調飲之。吐痰甚多。繼用南星川芎蒼朮黃芩酒打麵爲丸服愈。元珠云。上焦不通。則陽氣抑遏。而皮膚分肉無以溫之。故寒慄。東垣升陽益胃湯。用升發之劑。開

發上焦以升陽明之氣出于表而溫之也丹溪吐出溼痰亦開發上焦使陽氣隨吐伸發出外而溫之也故寒慄皆愈二者乃陽鬱表寒之要

大建中湯 療中虛怯寒

黃芪 當歸 桂心 白芍 各二錢

人參 一錢 甘草 一錢 半夏 黑附 炮去皮各二錢半

右八味。以水一斗。每服五錢。水二瓊。薑三片。棗二枚。煎至一瓊。去滓。食後溫服。

羅謙甫治僉院董誠彥。夏月勞役過甚。煩渴不止。極

金匱翼 卷三 惡寒 吳

飲渣乳。又傷冷物。遂自利。腸鳴腹痛。四肢逆冷。冷汗自出口。鼻氣亦冷。六脈如蛛絲。時發昏憤。衆大醫議以葱熨臍下。又以四逆湯五兩。生薑二十片。連鬚葱白九莖。水三升。煮取一升。去滓。涼服。至夜半。氣溫身熱。思粥飲。至天明而愈。許魯齋先生聞知。嘆曰。病有輕重。方有大小。治有緩急。僉院之病。非大方從權急治。不能愈也。

昔有一婦人。惡寒特甚。盛暑亦必服皮衣數件。晝夜常坐臥牀褥。飲食如常。亦一無所苦。更名醫數

四。終莫能治。補瀉寒熱溫涼備嘗之矣。一醫以玉屏風散大劑煎水。以大鍋令患者蒸。蒸半日許。汗出得愈。 鶴年識

瘧疾統論

少陽膽為風木之府。瘧家寒熱之邪必歸少陽。是以瘧脈多弦。少陽居半表半裏之間。其氣從陽則熱。從陰則寒也。瘧者金火交沴。故其病寒熱並作也。氣分受邪。發于六陽時。血分受邪。發于六陰時。淺者每日一發。深者間日一發。極深者三日發也。淺者屬陽。陽性易動。故日行之氣觸者便發。深者屬陰。陰性常靜。故日行之氣屢觸而始發也。

金匱翼

卷三 瘧疾統論

四

恣飲冷水瓜菓脾胃轉傷邪氣不達綿延難愈。

凡瘧疾多熱久而不解者其人必本陰虛。法當益陰除熱。非當歸鱉甲製首烏牛膝之屬不能除也。多寒而久不解者其人必本陽虛。法當甘溫散邪。非乾薑附子桂枝人參之屬不能已也。

瘧邪在陽者其證多汗。感而即發。邪不能留。其留藏不去者。惟陰邪耳。陰邪不能作汗。雖以汗藥發之亦不得。惟甘潤和陰。如當歸牛膝之屬多服。久服自能出汗而解也。

傷寒往來寒熱勞瘵寒熱如瘧。傷食勞役脚氣疝氣腫毒初起。俱有寒熱。陰虛證。每日午後發熱。惡寒至晚亦得微汗而解。脈弦而數。但不大弦為辨耳。俱不可誤認為瘧也。凡病寒熱有期者瘧也。無期者諸病也。

凡瘧病自陰而漸陽。自遲而漸早者。由重而輕也。自早而漸遲。自陽而漸陰者。由輕而重也。凡感邪極深。發愈晏而作愈遲者。必使漸早。漸近方是佳兆。故治此疾者。春夏為易。秋冬為難。

金匱翼

卷三 瘧疾統論

四

瘧邪必從汗出。邪在陰者必汗出至足。乃佳。然非麻葛輩可發。但開鬱通經。其邪熱即散。而為汗矣。其虛者非參芪歸地。則終不能得汗也。

古稱風寒暑濕皆能成瘧。然必客于營衛之舍。然後成瘧。不爾不成瘧也。夫營之有舍。猶人之有傳舍也。營衛之氣日行一周。歷五臟六腑。十二經絡之界。分必其舍有邪。與日行之衛氣相遇。則病作。離則病休。故發作有時。與傷寒大異也。

俗有傷寒變瘧。瘧變傷寒之說。思謂傷寒變瘧者本

是瘧邪因其氣特甚故一發而不自止。道汗出氣衰乃復返于舍而後日作。非傷寒能變瘧也。瘧變傷寒者本是傷寒。因邪氣先中少陽故寒熱如瘧。其邪遞引遞出。遍滿三陽之界。因而發熱不止。設不解則又轉而之三陰。非瘧邪能變傷寒也。是以始先似瘧之證。熱雖退。身表尚有餘熱。不似瘧之熱退即涼也。始先似傷寒者。汗常液體而熱不退。過一二日忽振寒而發熱。或熱退一日而復作寒熱。非如傷寒之汗出即熱退而邪解也。學者智識既具。自當獨斷。豈可習金匱翼 卷三 瘧疾統論 辛

焉不察。自同衆人也。

久瘧不退。邪氣陷入陰分。虧損營血。有熱無寒。口燥唇乾。有似傷寒。人皆謂之變傷寒。不知其為傳勞瘵也。脈將散大。或細數。而死期至矣。

風瘧

風瘧者。脈浮多汗。惡風。多于春時得之。經云。以春病者。惡風是也。亦有發于秋者。經云。夏暑汗不出者。秋成風瘧是也。楊仁齋云。風瘧是感風而得。惡風自汗。煩燥頭疼。風陽氣也。故先熱後寒。可與解散風邪。

溫瘧

溫瘧者。先熱而後寒。與風瘧大畧期同。其但熱而不寒者。經所謂得之冬。中于風寒。氣藏于骨髓之中。至春夏陽氣大發。邪氣與汗皆出。此病藏于腎。其氣先從內出之于外也。外臺云。病瘧六七日。但見熱者。溫瘧也。與夏傷暑而秋病瘧者不同。又有先傷風而後傷寒者。亦先熱而後寒。名曰溫瘧。與此亦不同。

桂枝白虎湯

知母 六兩 甘草 炙 二兩 石羔 一升 桂枝 三兩

金匱翼

卷三

溫瘧

辛

粳米 六合

右剉每服五錢。水一瓊半。煎至八分。去滓。溫服。

汗出即愈。

延年療溫瘧壯熱不能食知母鱉甲湯

知母 鱉甲 炙 骨皮 各三兩 常山 二兩

竹葉 一升 石羔 四兩

水煎分三服

溼瘧

溼瘧者。寒熱身重。肢節煩疼。服滿善嘔。自汗。陳無擇

云因汗出復浴。溼舍皮膚。及冒雨溼所致。當從太陽論治。除溼湯主之。寒多者。必兼溫行陽氣也。

除溼湯

半夏

厚朴

蒼朮

米泔製

白朮

生

藿香

橘紅

白茯苓

各一兩

甘草

炙七錢

右咬咀。每服四錢。薑七片。棗一枚。水煎。食前溫服。

本方去白朮。加人參。艸果水。薑烏梅煎。即和劑人參養胃湯。脈無力寒多。加薑附。脈有力

熱多。加芩連柴胡。朴蒼薑藿發散也。半果茯苓

金匱翼 卷三 溼痹 至

金匱翼

卷三

溼痹

至

橘劫痰也。人參惟虛人最宜。

痺瘧

痺單也。言獨熱而無寒也。經云。陰氣孤絕。陽氣獨發。

則熱而少氣煩冤。手足熱而欲嘔。名曰痺瘧。此以陽

藏而病陽證。與諸瘧證亦不同。其治之之法有三。一

者熱氣內蓄而表有客寒。則當散以辛涼。一者客邪

已解而蘊熱獨盛。則當清以苦寒。或甘寒。一者邪火

雖盛而氣血已衰。真陰已耗者。急宜壯水固原也。

備急竹葉常山湯 治痺瘧及溫瘧。

常山 三兩 淡竹葉 一握 小麥 一升

水五升。煮一宿。明旦煮取二升。分溫三服。

牡瘧

瘧多寒者。名曰牡瘧。金匱云然也。然牡當作牝。傳寫

之誤耳。衛州書云。瘧多寒者。痰多也。痰為水類。能遏

絕其陽氣于裏。使不得外達。故寒多不熱。雖熱亦不

甚也。用蜀漆散者。吐去其痰。陽氣一伸。其疾自愈。夫

牡屬陽。牝屬陰。寒多為陰。故宜曰牝。

牡蠣湯

金匱翼

卷三

痺瘧 牡瘧

至

牡蠣 各四兩 麻黃 各四兩 蜀漆 三兩 甘草 二兩

右先取蜀漆三。過去腥水八升。煮蜀漆麻黃等

得六升。去沫。內餘藥。煮取二升。飲一升。吐復飲

之。

痰瘧

痰瘧由夏月乘涼飲冷。及臥溼地。飢飽失時。脾胃不

和。痰積中脘。所致其脈弦滑。其證胸痞嘔吐。或時眩

暈者是也。微則消之。甚而實者。蜀漆常山之類。攻而

去之。虛者。四時飲之。屬補而去之。

常山散

常山一兩剉碎。以好酒浸一宿。瓦器煮乾為末。每服二錢。水一盞煎半盞。去滓停冷。五更服之。不吐不瀉效。

四獸飲

半夏

茯苓

人參

艸果

陳皮

甘草

烏梅肉

白朮

各等分

右咬咀同薑棗等分。以鹽少許淹服。食頃厚皮紙裹煨令香熟焙乾。每服半兩。水煎。未發前併

金匱翼

卷三

痰瘧

瘧

進三服。

食瘧

食瘧一名胃瘧。飲食無節。傷胃而成。其證腹痛中滿。不能食。食則嘔逆。噎腐吞酸。其脈氣口獨盛。戴復庵法。平胃散加艸果砂仁吞紅丸子。方並見食門先醒齋筆記。梁溪王興甫。偶食牛肉。覺不快。後遂發瘧。飲食漸減。至食不下咽。已而水飲亦不下。白湯過喉間。嘔出作碧色。藥不受。小便一滴如赤。茶大便閉。醫皆束手。仲淳忽至。視之令仰臥。以指按

至心下。偏右大叫。因詢得其由。用丸藥一服。至喉輒不嘔。水道漸通。次日下黑物數塊如鉄。其病如失。丸藥用礬紅和平胃散作末。棗肉丸。白湯下三錢。

虛瘧

虛瘧者。或體虛而病瘧。或因瘧而致虛。六脈微弱。神氣倦怠。是以補養正氣為主。經云瘧脈緩。大虛使用藥。不宜用針。蓋病瘧而脈虛。氣先餒矣。故不宜用針。而宜用藥。所謂陰陽形氣俱不足者。勿刺以針。而調以甘藥也。

金匱翼

卷三

食瘧

瘧

補中益氣湯

小建中湯

二方俱補虛散邪之劑。楊仁齋云。有中年人。藏府久虛。大便常滑。忽得瘧疾。嘔吐異常。惟專用人參為能止嘔。其他瘧藥並不可施。遂以二陳湯加人參縮砂。倍用白豆蔻。一二服。病人因自覺氣脈頓平。於是寒熱不作。蓋白豆蔻能消能磨。流行三焦。營衛一轉。寒熱自平也。新定人參烏梅散。治虛瘧久瘧。少氣不食。亦治

勞瘧勞瘧者遇勞即發經年不差者是

人參 三錢 烏梅 一枚 黃芪 當歸

茯苓 陳皮 各一錢 鱉甲 製首烏

白米 各二錢

右都作一服加薑煎

瘧瘧

瘧瘧者老瘧也。三日一發其氣深固卒不得出有累年不愈者亦曰三陰瘧。大抵瘧病在三陽者宜汗宜和。在三陰者宜溫宜利。甚者非吐下不能拔其病根。

金匱翼 卷三 虛瘧瘧瘧 五

也其脇下有塊者名曰瘧母以鱉甲丸主之

千金常山丸

常山 三兩 鱉甲 二兩 知母 一兩 甘草 五錢

蜜丸梧子大末發前酒服十九臨發一服正發

又一服

鱉甲丸

鱉甲 香附 各二兩 三稜 蓬朮 各一兩

常山 一兩 阿魏 二錢

右並用醋浸神曲糊丸白湯下梧子大五十九

積消及半即止

仁齋云瘧之經久而不歇其故何耶有根在也日飲白水日敗血是耳瘧家多蓄痰涎黃水或停滯心下則常山能吐之或結癖脇間則常山能破其癖而下之其有純熱無寒或蘊熱內實之證投以常山大便點滴而下似泄不泄須用北大黃為佐大泄數下然後獲愈也又婦人產後敗血流經亦能令人寒熱如瘧至暮則發發則身痛如被杖宜通經活血之劑鹿角屑和血止痛如神

金匱翼 卷三 瘧瘧 五

門人 平舟沈安伯

星門陳步羔 全校字

珊 圖南

男 龍翔 召南

金匱翼卷三

金匱翼卷四目錄

東亞同文書院大印

尸疰

五尸 諸疰 鬼迷鬼擊

癩狂

驚癇

疸症

黃疸 穀疸 酒疸 女勞疸 陰黃

虛黃 表邪發黃 急黃

消渴統論 治法

水病

風水 皮水 石水 腎水

脹滿統論

脾脹 肝脹 膜脹 血脹 食脹

熱脹 實脹 虛脹

積聚統論

肥氣 伏梁 痞氣 息賁 奔豚 氣積
血積 瘵瘵 石瘵瘵聚 米瘵 肉積

通治諸積

金匱翼卷四

飼鶴山人九在澤先生楷集

長洲後學徐錦炳南氏讀

尸疰

五尸

惡氣所發。一病而五名也。其症令人寒熱淋瀝沉沉
默默無處不惡。或腹痛脹急。不得氣息。上衝心胸。及
攻兩脇。或礫礫踊起。或攣引腰脊。是也。其得之疾速
如飛走狀者。名曰飛尸。停遁不消。去來無時者。名曰

金匱翼

卷四 五尸

道尸。沉痼在人藏府者。名曰沉尸。衝風則發者。名風
尸。隱伏積年不除者。名伏尸。然雖有五者之名。其為
鬼惡邪氣則一也。亦可通以一法治之。

雄黃丸 治卒中飛尸。腹痛脹急。上衝心胸及攻

兩脇。或礫礫踊起。或攣引腰脊。

雄黃 研 大蒜 各一兩

二味搗丸如彈子大。每服一丸。熱酒化下。未差

更服。

蒺藜子丸 治同前

疾藜子炒去刺

為末蜜丸小豆大。食後水下二十九。

木香丸

木香 丁香各三 鬼箭羽 桔梗

當歸 陳皮去白 紫蘇微炒各 白栝榔四枚

桃仁去皮尖雙仁炒

右搗篩。每服五錢。水煎溫服無時。日二。

蒸熨方 治遁尸飛尸及風毒腫流入頭面四肢

芥子蒸熟焙

金匱翼 卷四 五尸 二

為末以鉛丹二兩拌勻。分作兩處用疎皮袋盛之。更換蒸熱以熨痛處。

麝香散 治卒中惡氣。心腹刺痛。

麝香 一分 犀角屑 木香各半

為末。每服二錢。空心熱水調下。日二。未止再服。

又方

韭根一握 烏梅十四枚 吳茱萸湯浸焙乾

水五升。煮以病人櫛內其中。三沸。櫛浮者生。沉

者死。煮三升。時飲之。

按櫛有通疏之用。浮屬陽。沉屬陰。陽主開而陰主閉。卒死客忤者。邪氣暴加。諸陽乍閉。得陽而開則生。得陰而閉則死也。

本事方云。飛尸者。遊走皮膚。穿藏府。每發刺痛。變作無常。遁尸者。附骨入肉。攻鑿血脈。每發不可得近見尸。喪聞哀哭便發。風尸者。搖躍四肢。不知痛之所在。每發昏沉。得風雪便作。沉尸者。纏骨結藏。冲心脈。每發絞切。遇寒冷便作。注尸者。舉身沉重。精神錯雜。常覺昏廢。每節氣致變。輒成大惡。並宜用太乙神精丹。

金匱翼 卷四 五尸 三

及蘇合香丸。及忍冬葉剉數斛。煮令濃。取汁煎之。如雞子大。一枚。日三。

頃在徽城日。嘗修合神精丹一料。庚申余家一婦人夢中見二蒼頭。一在前。一在後。手中持一物。前者云到也。未後應云到也。擊一下。爆然有聲。遂覺覺後心一點。痛不可忍。昏悶一時許。子忽憶神精丹。有此一症。取三粒令服之。遂至府。過少頃。婦已無病矣。云服藥覺痛止神醒。今如常矣。日後相識。利有邪氣。與一二服。無不應驗。方在千金中。乃治中風之要藥。但

近世少得曾青磁石為難合耳。

太乙神精丹 治客忤霍亂腹脹滿尸疰惡風

顛狂鬼語蠱毒妖魅。

雄黃油煎七日 雌黃 硃砂 磁石

曾青各一兩 金芽石六錢

右各研細將雌雄黃硃砂醋浸三日曾青用好酒浸銅器中紙封曝七日如天陰用火焙乾六味同研勻用砂盆盛令藥滿得三分許以此准合子大小先以赤石脂末固縫外用六一泥固

金匱要略

卷四

四

濟訖候透乾以晴明六合吉日別用泥作三個柱子高五寸令平穩如鼎足狀安合子下置炭火三斤逐漸添炭常令及五斤只在盆底不得過口煨五日為度放冷水中浸合子候透剝去泥將合子輕手取開其藥精英五色畫在蓋上亦有三色者純白為上研細聚肉為丸如粟米大每服一九米飲下如噤口牙緊幹開前齒灌下醒諸疰

疰者住也邪氣停住而為病也皆因精氣不足邪氣

乘之伏于筋脈流傳藏府深入骨髓經久不已時發

時止令人昏悶無不痛處其因風邪所觸者則為風

疰臨喪哭泣死氣所感者則為尸疰鬼邪所擊者為

鬼疰其風疰之去來擊痛遊走無常者又為之走疰

其他又有氣血溫涼勞泄等疰之名病各不同其為

停住不去則一也詳見千金外臺聖濟諸書。

羌活湯 治風疰心腹刺痛上攻胸背。

羌活 橋紅 大腹皮焙各三錢 桑白皮一兩五錢

金匱要略

卷四 諸疰

五

芎藭一兩 大豆炒一合

搗末每服三錢水煎溫服良久再服。

杏仁丸 治尸疰。

杏仁去皮尖雙仁炒 亂髮灰各一錢

研勻和丸如小豆大每服五丸猪膏酒下。

八毒丸 治鬼疰中惡心痛癩積蠱注鬼氣。

雄黃研 珍珠研 礬石煨 巴豆去皮心炒去油

丹皮各一兩 附子去皮臍 藜蘆二兩 蜈蚣去頭足炙一條

右為末蜜丸如小豆大米飲下二九得吐為效。

一方用雄黃礬石硃砂附子炮藜蘆丹皮巴豆各一兩蜈蚣一條爲末蜜丸小豆大每服五七丸冷白湯送下無時。

厚朴丸 治一切氣疰大腸結澁背膊刺痛及食物不消奔豚氣逆。

厚朴薑汁炒 桂心 大黃醋炒

桃仁去皮尖雙仁炒

爲末蜜丸如小豆每服三十九米飲下食後臨臥服微利卽效。一方加附子二兩。

金匱要略 卷四 諸疰

鬼迷鬼擊

鬼迷者心氣不足精神衰弱幽陰之氣乘虛而感令人喜怒不常情思如醉或狂言驚怖向壁悲嘔夢寐多魘與鬼交通乍寒乍熱腹滿短氣不食診其脈人迎氣口乍大乍小乃鬼魅所持之候也鬼擊之病得之無漸卒著人如矛戟所傷令人胸脇腹滿急痛不可按抑或卽吐血或卽下血輕者獲免重者或致不救治宜符禁之法兼辟邪安正之劑。

治鬼迷不醒方

雄黃一味研如粉吹入兩鼻中差。

安息香取一皂子大焚令煙起邪自退。

治妖魅病人不言鬼方。

生鹿角鎊一味爲細末每服一錢言卽差。

治卒中鬼擊方。

雞冠血一味澀口中令下咽仍破雞以榻心下。

冷卽棄于道旁。

肘後方 治鬼擊諸病卒然著人如刀刺狀胸脇腹內切痛不勝抑按或吐血鼻血下血一名鬼

金匱要略 卷四 鬼迷鬼擊

排以醇酒吹兩鼻內良。

千金方

吹醋少許入鼻中。

癩狂驚癇

狂病多火而屬陽。或以謀為失志。或以思慮鬱結。屈無所伸。怒無所洩。以致肝胆氣逆。木火合邪。乘于心則為神魂不守。乘于胃則為暴橫剛強。故治此者。以治火為先。或痰或氣。察其甚而兼治之。

生鉄落飲 治痰火熱狂。墜痰鎮心。

生鉄斤四十 入火燒赤。砧上搥之。有花出如蘭如

蛾紛紛落地者。是名鉄落。用水二斗。煮取一斗。

用以煎藥。

金匱翼

卷四 癩狂驚癇

八

石羔

三兩 龍齒煨研

茯苓

防風

各一兩半

元參

秦艽各一兩

竹瀝一升

右咬咀。入鉄汁中。煮取五升。去滓。入竹瀝和勻。

温服二合。日五服。

按此以重下氣。以寒抑熱之法。易老治一人病。陽厥。怒狂罵詈。或歌或哭。六脈無力。身表如冰。發則叫呼高聲。因奪其食。又以大承氣湯下之。五七行瀉渣穢數斗。身温脈生而愈。蓋鉄落飲。以抑無形上怒之火。承氣湯。所以下有形內結之熱也。

真珠丸 本方 治肝經因虛。內受風邪。臥則魂散而

不守。狀若驚悸。

真珠三分另 乾地黄

當歸各一兩半 人參

棗仁 柏仁

犀角 茯苓

沉香 龍齒各一兩

為細末。蜜丸。梧子大。辰砂為衣。每服四五丸。

金銀薄荷湯下。日午夜臥各一服。

許學士云。肝藏魂者也。游魂為變。平人肝不受邪。故

臥則魂歸于肝。神靜而得寐。今肝有邪。魂不得歸。是

金匱翼

卷四 癩狂驚癇

九

以臥則魂揚。若離體也。此方以真珠母為君。龍齒佐之。真珠母入肝為第一。龍齒與肝同類故也。龍齒虎睛。今人例以為鎮心藥。不知龍齒安魂。虎睛定魄。蓋言類也。東方蒼龍木也。屬肝而藏魂。西方白虎金也。屬肺而藏魄。龍能變化。故魂遊而不定。虎能專精。故魄止而有守。予謂治魄不寧者。宜以虎睛。治魂飛揚者。宜以龍齒。萬物有成理而不失。亦在夫人達之而已。

寧志膏 本事

人參

棗仁各一兩 辰砂五錢 乳香二錢半

蜜丸彈子大每服十九薄荷湯下。一方有琥珀茯神石菖蒲遠志名人參琥珀丸。一方無人參用酒調服名靈苑辰砂散。

一僧忽患癩疾不得眠臥諸藥不效孫兆曰今夜睡著明後日便愈也但有鹹物任與師吃待渴卻來道至夜僧果渴孫以溫酒一角調藥一服與之有頃再索酒與之半角其僧便睡兩日夜乃覺人事如故人問其故孫曰人能安神矣而不能使神昏得睡此乃靈苑中辰砂散也人

不能用之耳。

許學士云于族弟緣兵火失心製寧志膏與之服二十粒愈親舊傳去服之皆驗。

靈苑云服辰砂散訖便令安臥不可驚覺待其自醒卽神魂定矣萬一驚寐不可復活吳正甫少時心病服此一劑五日方寤遂痊。

安神丸 治癩癩驚狂痰火之症能鎮心安神。

人參 茯苓 棗仁 炒 當歸
生地 酒炒 黃連 酒炒 橘紅 南星 薑製各一兩

天竺黃 五錢 雄黃 牛黃 各二錢 琥珀 各二錢

爲末蜜丸桐子大礞砂爲衣米飲下五十九忌動風辛熱之物。

本事驚氣丸 治驚憂積氣心受風邪發則牙關緊急痰涎昏塞醒則精神若癡。

附子 橘紅 天麻 南木香

僵蠶 白花蛇 麻黃 各五錢 蘇子 一兩

乾蝎 一分 南星 洗浸薄切薑汁 硃砂 一分

金匱翼 卷四 癩狂驚癩

爲末入龍腦麝香少許同研極勻蜜丸如龍眼大每服一九金銀薄荷湯化下。

許叔微云此子家秘方也戊午年軍中有一人犯法褫衣將受刃而得釋神失如癡余與一粒服訖而寐及覺病已失矣山東提轄張載揚妻因避寇失心已數年余投此方不終劑而愈又黃山沃巡檢彥妻狂厥者踰年更十餘醫不驗予投此方去附子加鉄粉亦不終劑而愈鉄粉非但化涎鎮心至如推抑肝邪特異若多恚怒肝邪大甚鉄粉能制伏之素問云

厥陽怒狂。治以鉄落飲。金制木之義也。

茯苓丸

辰砂 石菖蒲 人參 遠志

茯苓 茯神 鉄粉 半夏麴

胆星 各等分

爲細末。生薑四兩。取汁和水煮和丸。如桐子大。別用硃砂爲衣。每服十粒。加至二十粒。夜臥生薑湯下。此醫官都君方。余嘗用以療心疾。良驗。

金匱要略

卷四 癲狂驚悸

三

鎮心丸 治心風。狂言多驚。迷悶恍惚。

人參 茯神 犀角 各一兩 牛黃

鉛粉 各七錢半 硃砂 水飛 龍齒 研 胆草

天竺黃 研 遠志 生地 各半兩 金箔 五十片

鉄粉 七錢半研

爲細末。蜜丸。桐子大。每服七丸。竹葉湯送下。無時。

温胆湯 治心虛胆怯。觸事易驚。或夢寐不祥。短氣悸乏。或自汗。譫妄不寐。合目則驚。此氣鬱生

涎。涎與氣搏。故變生諸症。

半夏 枳實 竹茹 各一兩 橘紅 五錢

炙草 四錢

每服四錢。水一盞半。生薑七片。棗一枚。煎七分。

十味温胆湯 治症如前。而挾虛者宜之。

半夏 枳實 陳皮 去白各二錢 棗仁 炒

遠志 肉桂湯製 熟地 酒焙 竹茹

人參 各一錢 茯苓 五分 炙草 五分

水二鍾。生薑五片。紅棗一枚。煎一鍾服。

金匱要略

卷四 癲狂驚悸

三

滾痰丸 王隱君 方見痰門。

按癲狂之病。屬痰熱相結。多在肝胆胞絡之間。余遇此症。輒投礞石滾痰丸。二三錢。下膠痰如桃膠。蜆肉者。五升許。即愈。若痰少熱多。陽明內實者。當如羅謙甫之治醜斯兀。闌發狂熱渴。用大承氣一兩半。加黃連二錢。以下其熱。俾便通汗。出乃愈。

丑寶丸 治一切癲癩。怔忡。搖擲難治之疾。祛風清火。豁痰調氣。開心定志。安神鎮驚。

妙香丸 治驚癇百病亦治傷寒潮熱積熱結胸

發黃狂走燥熱大小便不通

巴豆 三百十五粒去皮 牛黃 研 膩粉 研

龍腦 研 麝香 研各 辰砂 飛九兩 金箔 九十片研

研勻煉黃蠟六兩入白蜜三分同煉令勻為丸

每兩作三十九白湯下二九日二服

通涎散 治忽患癲狂不止或風涎暴作氣塞倒

仆

瓜蒂 五錢 為末每服一錢井花水調下涎出即

金匱翼 卷四 癲狂驚癇 古

愈如未出含砂糖一塊下咽涎即出

鶴年 予治崑山清水灣一人發狂先為刺 首會

神庭 人中三穴後以

蜀漆 水并炒熟 龍骨 煨 牡蠣 煨各 黃連 五分

生大黃 三錢 水煎服一劑即安

按狂症未有不從驚得者龍齒最能安魂者也

未有無痰者驚則氣逆氣逆則痰聚蜀漆最善劫

痰者也未有無火者火性炎上故登高而歌棄衣

而走黃連能瀉心火病屬陽明故用大黃以瀉之

釜底抽薪法也 鶴年

金匱翼 卷四 癲狂驚癇 古

黃疸

已食如飢但欲安臥。一身面目及爪甲小便盡黃也。此為脾胃積熱而復受風溼。瘀結不散。濕熱蒸鬱。或傷寒無汗。瘀熱在裏所致。是宜分別濕熱多少而治之。若面色微黃而身體或青黑赤色皆見者與純熱之症不同。當于濕家求之。

加減五苓散

茵陳 猪苓 白朮 赤苓 澤瀉

六茵陳湯

金匱要

卷四

黃疸

三

茵陳蒿 半兩 大黃 三錢 梔子 四枚

水三升。先煮茵陳減一半。內二味。煮取一升。去滓。分三服。小便利出如皂角汁。一宿腹減黃從小便出也。如大便自利者。去大黃。加黃連二錢。寇宗奭治一僧。因傷寒發汗不徹。有畱熱。面身皆黃。多熱。期年不愈方。

茵陳 山梔 各三錢 秦朮 升麻 各四錢

為散。每用三錢。水四合。去滓。食後溫服。五日病減。二十日悉去。

搐鼻瓜蒂散 寶鑑

瓜蒂 二錢 母丁香 一錢 黍米 九粒 赤豆 五分

為細末。每夜臥時。先含水一口。卻於兩鼻孔搐上半字。便睡。至明日。取下黃水。

許叔微云。夏有篙師病黃症。鼻內酸疼。身與目黃如金色。小便赤澀。大便如常。此病不在藏府。乃黃入清道中也。若服大黃。則必腹脹為逆。當瓜蒂散搐之。令鼻中黃水出盡則愈。

孟詵方。

金匱要

卷四

黃疸穀疸

七

瓜蒂丁香赤小豆各七枚

為末。吹豆許入鼻。少時黃水流出。隔一日用。差乃止。一方用瓜蒂一味為末。以大豆許吹鼻中。輕則半日。重則一日。出黃水愈。

穀疸

始於風寒。而成于飲食也。金匱云。風寒相搏。食穀即眩。穀氣不消。胃中苦濁。濁氣下流。小便不通。陰被其寒。熱流膀胱。身體盡黃。名曰穀疸。又云。穀疸之為病。寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黃。為穀疸。茵

陳蒿湯主之。

茵陳蒿湯即前大茵陳湯

此下熱之劑。氣實便閉者宜之。不然不可用。

茯苓茵陳梔子湯實錄 治殺疸。心下痞滿。四肢

困倦。身目俱黃。心神煩亂。兀兀欲吐。飲食遲化。

小便瘀澀發熱。

茵陳一錢 茯苓五分 梔子 蒼朮去皮炒

白朮各三錢 黃連 枳殼 猪苓

澤瀉 陳皮 防己各二分 黃芩六分

金匱翼

卷四 殺疸

六

青皮一分

長流水煎。去滓空心溫服。

梔子茵陳。洩溼熱而退黃。黃連枳殼泄心下痞

滿。熱能傷氣。黃芩主之。溼熱壅胃。一朮青皮除

之濕熱。流注經絡。膀胱。二苓防己利之。

胆礬丸本事 治男婦食勞。面黃虛腫。疰癘氣塊。

胆礬無石者三兩 黃蠟二兩 大棗五十枚

用石器入頭醋三升。下胆礬大棗。慢火熬半日。

取出棗子去皮核。次下黃蠟再熬一二時如膏。

入臘茶二兩。同和為丸。桐子大。每服二十九。茶

清下。日三。

許叔微云。宗室趙彥才下血。面如蠟。不進食。蓋酒病

致此。授此服之。終劑而血止。面色鮮潤。食亦如常。

治溼熱黃病。助脾去濕方。乾坤生意

針砂搗淨鋪木淘白。色以米醋于鉄銚內。浸一宿。炒乾。再炒三五次。候通紅。二兩五錢。

陳粳米半升。水浸一夜。搗粉作塊。煮半熟。 百草霜一兩

右三味。搗干下。丸如桐子大。每服五十九。用五

加皮牛膝根木瓜根浸酒下。初服若瀉。其病本

金匱翼

卷四 殺疸

六

去也。

脾勞黃病方。摘元

鍼砂四兩。搗七次。 乾漆應存性。二錢。 香附三錢。 平胃散五錢。

為末。蒸餅丸。如桐子大。湯下。

萬病有積神方。先醒齋筆記

蒼朮 厚朴薑汁炒 橘紅 甘草

查肉 茯苓 麥芽各二兩 檳榔一兩

綠礬醋煨研細。一兩五錢。

為末。棗肉丸。梧子大。每服一錢。白湯下。日三服。

凡服藥者忌食蕎麥河豚犯之即死。

子每治脫力勞傷而黃能食四肢無力用造酒丸

平旦散加皂礬透針砂淡醋湯下十九日二

酒疸

小便不利心中懊懣而熱不能食時時欲吐面目黃或發赤斑山入醉當風入水所致蓋酒溼之毒為風水所遏不得宣發則蒸鬱為黃也。

茵陳蒿湯 治酒疸心中懊懣小便黃赤。

茵陳蒿 葛根 赤苓各五錢升麻

金匱要略

卷四

秦艽 括蔞根各三錢山梔五分

水煎三錢溫服日一以差為度。

小麥飲

生小麥二合水煎取汁頓服未差再服。

大黃湯 治酒疸懊懣脛腫溲黃而發赤斑。

大黃兩炒二山梔 枳實 豉炒三合

水煎四錢溫服日二加茵陳亦得。

葛根湯 濟生

乾葛 二錢 梔子 二錢 枳實 豉各一錢

炙艸 五分

水煎溫服無時。

女勞疸

色慾傷腎得之金匱云額上黑微汗出手足心熱薄暮即發膀胱急小便自利名曰女勞疸蓋黃疸熱生於脾女勞疸熱生于腎故黃疸一身盡黃女勞疸身黃額上黑也仁齋云脾與腎俱病為黑疸。

凡房勞黃病體重不眠眼赤如硃心下塊起若瘕十死一生宜灸心俞關元二七壯及烙舌下以婦人內

金匱要略

卷四

酒疸女勞疸

衣燒灰酒服二錢。

范汪亦云女勞疸氣短聲沉者取婦女月經布和血燒灰空腹酒服方寸七日再不過三日必瘥。

陰黃

病本熱而變為陰非陰症能發黃也韓祗和云病人三五日服下藥太過虛其脾胃以其津液渴飲水漿脾土為陰濕所加與熱邪相會發黃此陰黃也當以溫藥治之如兩手脈沉細遲身體逆冷皮膚粟起或嘔吐舌上有胎煩躁欲坐臥泥水中遍身發黃小便

赤少。皆陰候也。

茵陳橘皮湯 韓氏 治身黃脈沉細數熱而手足寒喘嘔煩躁不渴者。

茵陳 橘紅 生薑 各一兩 半夏

茯苓 各五錢 白朮 二錢五分

水四升。煮取二升。分作四服。

小茵陳湯 韓氏 治發黃脈沉細四肢及遍身冷。

附子 一枚炮 炙草 一兩 茵陳 二兩

水四升。煮取二升。分三服。一方有乾薑無甘

金匱要略 卷四 陰黃

茵陳名茵陳附子湯 韓氏

茵陳理中湯 治身冷面黃脈沉細無力或泄而

自汗。小便清白。名曰陰黃。

人參 白朮 炮薑 炙草

茵陳

右咬咀。每服五錢。水煎。

羅謙甫治真定韓君祥。暑月勞役過度。渴飲涼茶及

食冷物。遂病頭身肢節沉重疼痛。汗下寒涼。屢按

不應。轉變身目俱黃。背惡寒。皮膚冷。心下硬。按之

病脈緊細。按之空虛。兩寸脈短。不及本位。此症得

之因時熱而多飲冷。加以寒涼過劑。助水乘心。反

來侮土。先傷其母。後及其子。經所謂薄所不勝。而

乘所勝也。時值霖霖。濕寒相合。此為陰黃。以茵陳

附子乾薑湯主之。內經云。寒濕於內。治以甘熱。佐

以苦辛。溼瀉所勝。平以苦熱。以淡滲之。以苦燥之。

附子乾薑辛甘大熱。散其中寒。為君。半夏草薹辛

熱。白朮陳皮苦甘溫。健脾燥濕。為臣。生薑辛溫。以

散之。澤瀉甘平。以滲之。枳實苦辛。泄其痞滿。茵陳

金匱要略 卷四 陰黃

苦微寒。其氣輕浮。佐以薑附能去膚腠間寒溼。而

退其黃。為使也。煎服一兩。前症減半。再服悉愈。又

與理中湯服之。數日得平復。

李思訓謂發黃皆是陽症。凡云陰黃者。皆陽壞而成

陰。非原有陰症也。茵陳乾薑湯。是治熱症壞而成寒

者之藥。學者要窮其源。蓋即於本病主治藥內。加熱

藥一味以溫之。如桂枝湯加大黃之意。

虛黃

病在中氣之虛也。其症小便自利。脈息無力。神思困

倦。言語輕微。或怔忡眩暈。畏寒少食。四肢不舉。或大便不實。小便如膏。得之內傷勞役。飢飽失時。中氣大傷。脾不化血。而脾土之色白見於外。金匱云。男子痿黃。小便自利。當與虛勞小建中湯。又畧例云。內傷勞役。飲食失節。中州變寒之病。而生黃者。非傷寒壞症。而只用建中理中。大建中足矣。不必用茵陳也。

表邪發黃

即傷寒症也。東垣云。傷寒當汗不汗。即生黃。邪在表者。宜急汗之。在表之裏。宜滲利之。在半表半裏。宜和解之。在裏者。宜急下之。在表者。必發熱身痛。在裏者。必煩熱而渴。若陽明熱邪內鬱者。必痞結脹悶也。

麻黃連翹赤小豆湯。發汗之劑。

麻黃去節 連翹 炙草 生薑各二兩

赤小豆 一升 杏仁四十個 生梓白皮 一升去皮尖

大棗十二枚

勞水一斗。先煮麻黃百沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。半日服盡。

茵陳五苓散 滲利之劑。

茵陳蒿末 一錢 五苓散 五分

水調方寸七日三服。

柴胡茵陳五苓散 和解之劑

五苓散 一兩 茵陳 五錢 車前子 一錢

木通 一錢 柴胡 五分

分二服。水一盞半。燈心五十莖煎服。連進數服。

小便清利。愈。因酒後者。加乾葛二錢。

急黃

卒然發黃。心滿氣喘。命在頃刻。故名急黃也。有初得病。身體面目即發黃者。有初不知黃。死後始變黃者。此因脾胃本有蓄熱。穀氣鬱蒸。而復為客氣熱毒所加。故發為是病也。古云發熱心顛者。必發為急黃。

瓜蒂散 廣濟 療急黃

瓜蒂 赤小豆 丁香 黍米各二枚

薰陸香 麝香等分 青布二方寸 燒灰

右為細末。白湯下一錢。得下黃水。其黃則定。

消渴統論

消渴病有二。一渴而飲水多。小便數。有脂如麩片。甜者。是消渴也。二吃食多。不甚渴。小便少。似有油而數者。是消中也。三渴飲水不能多。但腿腫腳先瘦小。陰痿弱。數小便者。是腎消也。古今錄驗
消渴大禁有三。一飲酒。二房室。三鹹食及麵。能慎此者。雖不服藥。自可無他。不知此者。縱有金丹。亦不可救。慎之慎之。

金匱要

卷四 消渴統論

三

李詞部曰。消渴之疾。發則小便味甜。按洪範云。稼穡作甘。以理推之。淋餒醋酒作脯法。須臾即皆能甜也。人飲食之後。滋味皆甜。積在中焦。若腰腎氣盛。則上蒸精氣。化入骨髓。其次為脂膏。其次為肌肉。其餘則為小便。氣燥者。五藏之氣味鹹者。潤下之味也。若腰腎虛冷。不能蒸化於上。穀氣則盡下而為小便。故甘味不變。下多不止。飲食雖多。而肌膚枯槁。譬如乳母。穀氣上泄。皆為乳汁。消渴疾者。穀氣下泄。盡為小便也。又肺為五藏之華蓋。若下有煖氣上蒸。即潤而不渴。若下虛極。即陽氣不能升。故肺乾而渴。譬如釜中

有水以板蓋之。若下有火力。則煖氣上騰。而板能潤。若無火力。則水氣不能上。板終不可得而潤也。故張仲景云。宜服八味腎氣丸。並不可食冷物。又飲冷水。此頗得效。故錄正方于後云。

八味腎氣丸

方見腎勞

服訖後再服後方以壓之。

黃連

二十分

麥冬

十二分

苦參

十分

生地

七分

知母

七分

牡蠣

七分

括蕒根

七分

為末。牛乳為丸。桐子大。暴乾。漿水或牛乳下。二十九日再服。病甚者。差後須服一載以上。即永

金匱要

卷四 消渴統論

三

絕病根。一方有人參五兩以上。見本事方。又療消渴。日苦舌乾方。

麥冬

五兩

花粉

三兩

烏梅

十個

小麥

三合

茅根

各一升

水九升。煎取三升。去滓。分四五服。細細含咽。療飲水不消。小便中如脂方。崔氏

黃連

各五兩

括蕒根

為末

生地汁。利。併手丸。如桐子大。每食後牛乳下。五十九日二服。一方用生括蕒汁。生地汁。牛乳

汁。和黃連任多少。衆手捻爲丸。如桐子大。麥冬飲服三十九。漸加至四五十丸。輕者三日愈。重者五日愈。名羊乳丸。

麥冬飲子 治膈消胸滿煩心短氣

人參 茯苓 麥冬 知母

五味子 生地 生甘草 葛根

括蕒根

右等分。咬咀。每服五錢。水二盞。竹葉十四片。煎至七分。去滓溫服。

金匱翼

卷四 消渴統論

六

河間云。心移熱於肺。爲膈消。膈消者。心肺有熱。胸滿煩心。津液燥少。短氣。久則引飲。爲消渴也。麥冬飲子主之。

麥冬丸 消渴之人。愈與不愈。常須慮有大癰。以

其內熱而小便數。故也。小便數。則津液竭。津液

竭。則經絡澁。經絡澁。則營衛不行。營衛不行。則

熱氣留滯。必于大骨節間發癰疽。而卒。當預備

此藥除腸胃實熱。兼服消渴方。

麥冬 茯苓 黃芩 石膏

玉竹各八分 人參 龍胆草各六分 升麻四分

枳實五分 生薑 括蕒根各十分 枸杞根

爲末。蜜丸。桐子大。茅根粟米汁下十九。日二服。

若渴則與後藥。

括蕒根 生薑 麥冬汁 蘆根各三分

茅根切三分

水一斗。煮取三升。分三服。

冬瓜飲子 治消渴能食小便如脂。麩片。日夜無

度。冬瓜一箇。剖開去穢。入黃連末十兩。仍將頂

金匱翼

卷四 消渴統論

七

蓋好。熱灰中煨熟。去皮細切。研爛。用布取汁。每服一盞。日三夜二服。

葶藶丸 療消渴成水病浮腫方。

甜葶藶隔紙炒 瓜蕒根 杏仁麩炒 漢防己各一兩

爲末。蜜丸。桐子大。每服三十九。茯苓湯下。日三

白朮散 治諸病煩渴。津液內耗。不問陰陽。皆可

服之。大能止渴生津。

乾葛二兩 白朮 人參 茯苓

炙草 藿香 木香各一兩

為粗末。每服三錢。水一盞半。煎至一盞。溫服。

猪肚丸 治消渴。

猪肚一具 黃連洗淨 白梁米各五兩 花粉

扶神各四兩 知母三兩 麥冬二兩

右六味為末。內猪肚中縫塞。置甑中蒸極爛。乘熱入藥。臼中搗為丸。若硬加蜜。九。梧子大。每服三十丸。加至五十丸。日二。

金匱翼

卷四 消渴統論

三

水病

風水

水為風激而上行也。其脈浮而洪。其症骨節疼痛。惡風。而目四肢皆腫。是宜驅散風氣為主。風去則水自下也。

麻黃附子湯

麻黃三兩 甘草一兩 附子一枚

水七升。先煎麻黃去上沫。內諸藥。煮取二升半。

溫服八分。日三。此治風水。挾寒之劑。

金匱翼

卷四 水病風水

三

越婢湯

麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩 大棗十五枚

甘草二兩

水六升。先煮麻黃去上沫。內諸藥。煮取三升。分

溫三服。此治風水。挾熱之劑。

香薷丸外臺

乾香薷五十斤

細剉。內釜中。以水淹之。出香薷上數寸。煮使氣盡。去滓。澄清。慢火煎令可丸。丸如梧子大。每服

五十九日三稍加之。以小便利為度。無所忌。

藟朮丸

乾香藟 一斤 白朮 七兩

先將白朮為末。後濃煎香藟汁和丸。如桐子大。飲服十九。日夜四五服。利小便良。

五加皮散 利劑

五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮 茯苓皮

以上三方。並苦辛淡利之法。東垣云。風水宜以

金匱翼 卷四 風水

三

辛散之。以苦瀉之。以澹滲利之。使上下分消其

濕。

皮水

從肺閉得之。蓋肺主諸氣而行水道。肺閉則水不下。行而泛溢皮膚。狀與風水相似。但不惡風為異。

防己茯苓湯

防己 黃芪 桂枝 各三兩 茯苓 六兩

甘草 二兩

水六升。煮取三升。分溫服。

崔氏療大腹水腫。上氣。小便赤澀。頸脈動。不得臥

方。

苦葶藶 五兩炒 杏仁 二兩炒 大棗 四十枚飯上

先搗葶藶一百杵。再另搗杏仁三百杵。總和棗膏搗爛。丸如棗核大。空心服八九。日晚食消。更

服五九。米飲下。三日後平日服五九。晚服三九。

葶藶散 聖濟 治十種水氣。百方不愈。而四肢俱

腫。氣息喘急。眠臥不安。小便澀澀。腹脹氣悶。水

不入口。命垂絕者。

金匱翼 卷四 皮水

三

椒目 微炒 猪苓 三兩 澤瀉 四兩 牽牛

苦葶藶 炒 六

加薑葱煎三錢。酒半鍾沖服。良久吃葱白粥一

碗。酒一鍾。而東熱服。百日消盡。

白前湯

白前 二兩 紫苑 二兩 半夏 五合 澤漆根 三兩

水一斗。內藥誌水痕。後加水七升。微火煎令至

痕邊。去滓。內藥六種。白朮 二兩 吳茱萸 五合 桂

心 三兩 人參 一兩 乾薑 一兩 括婁 五合 微火煎

取三升。分三服。小便當利。或泄下。勿怪。氣即降。腫即減。

海藻散 治男子婦人通身浮腫。喘悶不便。

海藻 大戟 大黃 續隨子去殼各一兩

剉碎。好酒二盞。淨盆內浸一宿。取出曬乾。後用。

白牽牛頭末一兩 滑石半兩 芒遂麩炒黃一兩 青皮去白

橘紅各半兩 肉豆蔻一个

共前藥一處為細末。每服二錢。平明淡茶清調。

下。至辰時取下水二三行。腫減五六分。隔二三

金匱翼 卷四 皮水石水 誥

日平明又一服。腫消。忌鹽魚肉百日。小兒只用

一錢。五歲以下用半錢。孕婦不可服。

石水

從膀胱不利得之。四肢瘦。腹大腫。是其症也。王太僕云。下焦為分注之所。氣窒不利。則溢而為水也。亦名裏水。其根在少腹是也。

鯉魚澤漆湯

鯉魚重五斤者一頭以水二斗煮汁去魚 澤漆五兩 茯苓三兩

桑白皮三升 澤瀉五兩

將後四味。內魚汁中煮取四升。去渣。分四服。小便當利。漸消也。忌酢物。千金翼有赤小豆甘草麥冬人參生薑。一方無澤漆。有赤小豆白朮陳皮葱白。

千金療膀胱石水。腹腫四肢瘦方。

桑白皮六兩 射干 茯苓 黃芩各四兩

澤瀉五兩 白朮四兩 澤漆一升 防已一兩

大豆三升

水五斗。先煮大豆取三斗。去滓澄清。取汁一斗。

金匱翼 卷四 石水腎水 誥

下諸藥煮取三升。分溫三服。

禹功散 張子和云。病水之人。如長川泛濫。非盃杓可取。必以神禹決水之法治之。故名禹功散。

黑牽牛頭末四兩 茴香一兩炒為末

每服一二錢。以生薑自然汁調下。當轉下氣也。

腎水

腎為水藏。而元陽寓焉。腎虛陽弱。水無所制而泛溢。肢體浮腫。咳嗽喘急。腰重足冷。小便不利。或因脾胃虛弱。治失其宜。元氣復傷。而變症者。非金匱加減腎

氣丸不效。

金匱腎氣丸

白茯苓 三兩 附子 五錢 牛膝 官桂

澤瀉 車前 山萸肉 山藥

丹皮 各一兩 熟地 四兩

為末。和地黃膏煉蜜丸。桐子大。每服七八十九。空心白湯下。

金匱翼

卷四 腎水

三

脹滿統論

二陰一陽發病。善脹。心滿善噫者。腎膽同逆。三焦不行。氣畜於上也。

三陽盛。入於陰。病臌脹。而頭痛。言三陽之邪盛也。盛則滿。滿則溢。而入於陰之分矣。夫頭為陽。腹為陰。陰病故腹脹滿也。

有所墮墜。惡血留內。腹中滿脹。不得前後。此上傷厥陰之脈。下傷少陰之絡。腹脹屬脾胃者。則飲食少。屬他藏府者。則飲食如常。其脹在皮膚孫絡之間者。飲

金匱翼

卷四 脹滿統論

三

食亦如常。其在腸胃有膜之間者。則飲食亦少。其氣壅塞於五藏。則氣促急。不食而病危矣。是故病在表者易治。在府者難治。入藏者不治。

腹脹滿。氣不通者。加厚朴以破滯氣。腹中夯悶。此非腹脹滿。乃散而不收。可加芍藥收之。是知氣急而脹宜厚朴。氣散而脹宜芍藥以收之。

脾脹

濕氣歸脾。壅塞不行。其脈濡。其體重。其便不利。大便澀而不暢。經云。諸溼腫滿。皆屬於脾。又土鬱之發。民

病心腹脹跗腫是也。又脾土受溼不能制水。水漬於腸胃而溢於皮膚。漉漉有聲。怔忡喘息。卽爲水脹是也。

小温中丸 治脾虛肝實不能運化不可下之。

陳皮 半夏 神麴 茯苓各一兩

白朮二兩 生香附 針砂醋炒紅各一兩五錢

苦參炒 川連炒 厚朴各半兩 甘艸三錢

爲末。醋水各一盞。打糊爲丸。桐子大。每服七八十丸。白朮六錢。陳皮一錢。生薑一片。煎湯吞下。

金匱翼 卷四 脾脹 三

虛甚加人參一錢。病輕者服此丸六七兩。小便卽長。病甚者服一斤後。小便如常。

胃苓湯 和脾胃去濕消脹。

蒼朮 厚朴薑汁炒 陳皮 白朮

茯苓各一錢 澤瀉 猪苓各一錢 甘草六分

官桂五分 加薑煎

禹餘糧丸三四因 許學士朱丹溪云。此方乃治膨脹之要藥。

蛇含石大者三兩。置新鉄鏡上。入炭火中燒與鏡子一般紅。傾入醋中。候冷取出。研極

細。禹餘糧石三兩。眞針砂五兩。淘淨炒乾。入餘銅器內。煮乾爲度。置鏡上。入炭中燒紅。傾淨磚上。候冷研細。以上三物爲主。其次量人虛實加入下項。

羌活 木香 茯苓 川芎

牛膝酒浸 桂心 白薤炒 茴香炒

蓬朮 附子 青皮 京三稜炮

白茯苓 當歸酒浸各半兩

爲末。入前末拌勻。以湯浸蒸餅。振去水。和藥再杵極勻。丸如桐子大。空心温酒。白湯下三十九。

金匱翼 卷四 脾脹肝脹 三

至五十九。最忌鹽。一毫不可入口。否則發疾愈甚。但試服藥。卽於小便內旋去。不動藏府病去。日二三服。兼以温和調補氣血藥助之。眞神方也。

肝脹

怒動肝火。逆於中焦。其症口苦脈弦。脇及小腹脹滿。或痛發。則身熱氣逆是也。

左金丸

黃連六兩 吳茱萸一兩

粥為九椒目大每服三十九自湯下。

按繆刺論謂有所墮墜惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡是火逆之外又有血滯一症火無形以苦辛平之血有形故以利藥行之。

新定

赤芍

生地

歸尾

桃仁各一錢

紅花

香附童便浸二錢

大黃酒浸一錢半

丹皮

青皮醋炒各八分

金匱翼

卷四

肝脹腹脹

聖

臍脹即氣脹

胸膈脹滿也。經云濁氣在上則生臍脹是也。宜升清降濁。蓋清不升則濁不降也。又七情鬱結氣道壅隔。上不得降下不得升腹大而四肢瘦削即氣脹也。

木香順氣湯

木香

蒼朮

草薢

青皮

益智仁

陳皮

澤瀉

茯苓

半夏

乾薑

吳茱萸各一分

升麻

柴胡各一錢

厚朴四分

人參

當歸各五分

水二盞煎一盞食前溫服。

通幽湯 東垣云濁陰本歸六府而出下竅今在上是濁氣逆行清道氣亂於中則脹作矣治在幽門泄其陰潤其燥使幽門通利大便不閉則濁陰得歸下地臍脹腹滿俱去矣。

當歸

升麻

桃仁

紅花

甘草炙各一錢

生地

熟地各五分

一方加枳殼五分

本方加大黃麻仁名當歸潤腸湯治同。

血脹

金匱翼

卷四

臍脹血脹

聖

汚血成積石瘕之屬也。經云石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉。蟬以留止。日以益大如懷子狀可導而下。

經驗桃奴丸

桃奴

延胡索

蝦鼠糞

香附

官桂

砂仁

五靈脂

桃仁去皮尖各等分

為末每服三錢溫酒調下。

雞矢醴散

宣明

大黃

桃仁去皮尖

乾雞屎各等分

為末。每服二錢。水一盞。薑三片。煎湯調下。

奪命丹 治瘀血入胞衣。脹滿難下。服此血即消。

胞衣自下。

炮附子 半兩 牡丹皮 一兩 乾漆 一兩 碎之 炒令煙盡

為末。醋一升。大黃末一兩。同熬成膏。和勻。丸如

桐子大。溫酒下五七丸。

食脹 一名穀脹

飲食過節。停滯中焦。其症吞酸。噯氣。惡聞食臭。得食

則益甚。經云。飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受之

金匱翼 卷四 血服食脹 聖

則入五藏。入五藏則膜滿閉塞是也。是宜消而去之。

甚則下之。所謂中滿者。瀉之於內也。

枳實導滯丸

大黃 一兩 枳實 麩炒 黃芩 俱酒炒 黃連 俱酒炒

焦神麩 各五錢 白朮 土炒 茯苓 三錢 澤瀉 二錢

為末。蒸餅為丸。

人參丸 外臺 療久心腹痛脹。痰飲不下食。

人參 白朮 枳實 各六分 厚朴

青木香 大黃 枳殼 各六分 茯苓 八分

橘皮 五分

蜜丸。桐子大。生薑大棗煎湯送下。二十九日二

服。漸加至三十九丸。

無碍丸 治脾病橫流。四肢脹滿。

木香 五錢 京三稜 炮 蓬莪朮 炮 枳殼

郁李仁 湯浸去皮 大腹皮 二兩

為末。炒麥芽粉糊丸。桐子大。每服二十九丸。生薑

湯下。

熱脹

金匱翼 卷四 食脹熱脹 聖

熱聚於裏。口乾便閉。經云。諸腹脹大。皆屬於熱是也。

枳殼剉散 治熱症脹滿。

厚朴 枳殼 桔梗 各半兩 炙草 一錢

大黃 蒸三錢

剉每服三錢。薑五片。棗二枚。烏梅一枚。煎服。

愚按熱脹有二。假令外傷風寒有餘之邪。自表入

裏。寒變為熱。而作胃實腹滿。仲景以大承氣下之。

亦有膏粱之人。濕熱鬱積於中。而成脹滿者。宜清

熱導濕。東垣中滿分消丸主之。

中滿分消丸 治中滿熱脹有寒者勿用。

黃芩二錢 黃連炒五錢 薑黃 白朮

人參 炙草 猪苓各一錢 茯苓

乾薑 砂仁各二錢 枳實 半夏各五錢

厚朴黃製一兩 知母炒四錢 澤瀉 陳皮各三錢

為末蒸餅為丸如桐子大每服百丸熱白湯下。食後量病人虛實加減。

寒脹

其症有二有寒氣襲表而脹於外者經云膚脹者寒

金匱翼 卷四 熱脹寒脹 附

氣客於皮膚壅壅然不堅腹大身盡腫皮厚以手按其腹脊而不起腹色不變此其候也有寒氣入裏而脹於內者蓋陰氣凝聚久而不散內攻腸胃則為寒中脹滿泄利之症經云藏寒生滿病是也在表者溫而散之在裏者溫而行之。

溫胃湯 治冷則氣聚脹滿不下食。

熟附子 當歸 厚朴 人參

半麩 橘紅 生薑各一兩 炙草一兩

川椒去合口者三錢 剉散每服三錢。

木香場氣丸 元戎

丁香 胡椒各三錢 柳李仁四錢 白朮

枳實各一兩 檳榔 木香 蝎尾各半兩

為細末飯丸菘豆大每服十九加至十五丸薑湯下。此溫行之劑治單腹脹最妙若胸脇脹

滿一身而目盡浮鼻塞咳逆清涕出當用小青龍湯二三服分利其經卻進消脹藥。

實脹

胃氣實則脹也脈大堅便閉按之痛仲景云腹滿按

之痛者為實可下之經云中滿者瀉之愈又云下之則脹已是也。

金匱翼 卷四 寒脹實脹 附

沉香交泰丸 治脹而大便燥結者。

沉香 橘紅 白朮各二錢 厚朴五錢

吳茱萸 枳實 青皮 木香

茯苓 澤瀉 當歸各二錢 大黃酒浸一兩

為末蒸餅為丸梧子大每服五十九加至七十八十九溫湯下微利為度。

四妙丸 治老幼腹脹血氣凝滯用此寬腸順氣。

商州枳殼厚而緣背者去穢四兩分作四分一用蒼朮一兩同炒

一川萊菔子一兩同炒一川乾漆一兩同炒一川茴香一兩同炒

炒黃後去四味只取枳殼為末以四味煎汁

煮麪糊丸桐子大每食後米飲下五十九

虛脹

中氣虛衰脾胃不健而三焦痞塞是為氣虛中滿經云足太陰虛則鼓脹也其脈奕其色白其症腹脹按之不痛溇泄腸鳴宜溫養陽氣為主塞因塞用也

參朮健脾湯

金匱翼

卷四

實脹虛脹

吳

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏

縮砂

厚朴

薑製各一錢炙草三分

水薑煎服一方無甘草有麥芽山查因甘能滿中

積聚統論

積者積累之謂由漸而成重而不移聚者聚散之謂作止不常痛無定所故曰積者陰氣聚者陽氣

積聚之病非獨痰食氣血即風寒外感亦能成之然痰食氣血非得風寒未必成積風寒之邪不遇痰食氣血亦未必成積經云卒然多食飲則腸滿起居不節用力過度則絡脈傷血溢腸外與寒相搏并合凝聚不得散而成積此之謂也經論心肝腎皆有積心曰伏梁心下堅直如梁木也肝曰肥氣脇下氣聚如

金匱翼

卷四

積聚統論

吳

覆杯也腎曰奔豚往來上下如豚之奔也又有伏瘕瘕聚血瘕伏瘕者伏結於內疝瘕者衝痛如疝瘕聚者聚散不常血瘕者血凝成瘕也難經又補脾肺之積脾曰痞氣氣痞而不運肺曰息賁響有聲也巢氏又有瘕瘕之辨謂其病不動者瘕也雖有癖而可推移者瘕也瘕者微也有形可見也瘕者假物成形也張子和又分九積酒積者目黃口乾食積者酸浸心腹氣積者噎氣痞塞涎積者咽如拽鋸痰積者涕唾稠粘癖積者兩脇刺痛水積者足腫脹滿血積者打

撲肺痰。肉積者。贅瘤核癭各治法詳見本方。

許學士云。犬抵治積。或以所惡者攻之。所喜者誘之。

則易愈。如礞砂阿魏治肉積。神麩麥芽治酒積。水蛙

蟲治血積。木香枳榔治氣積。牽牛甘遂治水積。雄

黃膩粉治痰積。礞石巴豆治食積。各從其類也。若用

羣隊之藥。分其勢。則難取效。

肥氣

經曰。肝之積。名曰肥氣。在左脇下。如覆杯。有頭足。久

不愈。令人發咳。痰瘧。連歲不已。欬。肺病也。積氣上攻

金匱翼

卷四

積聚統論肥氣

吳

至肺則欬。侮所不勝也。痰瘧。二日瘧也。肝所生病。為

往來寒熱。連歲不已者。積不去。則瘧亦不已也。

溫白丸。通治五積。及十種水氣。八種痞氣。五種

淋疾。九種心痛。七十二種風。三十六種遁尸注

忤。癩癩。翻胃。噎塞。脹滿。不通。

紫苑

去苗 菖蒲 九節者 吳茱萸 湯洗七次焙乾

柴胡

厚朴 薑製各一兩 桔梗 去蘆 茯苓 去皮

皂莢

去皮子 桂枝 乾薑 炒 黃連

川椒

去日及閉口 者微炒出汗 巴豆 去皮膜油 人參 各半兩

川烏 炮去皮 臍八錢

為細末。入巴豆研勻。蜜丸。桐子大。每服三丸。漸

加至五丸。七丸。生薑湯送下。臨臥服。有孕忌服。

易老云。本方治肥氣。加柴胡。胡芎。

驚甲丸 治肥氣體瘦。飲食少思。

驚甲 一枚重四兩者。洗淨。以醋和黃泥。固濟。背。上。可厚三分。令乾。

京三稜 炮剉 枳殼 炒黃 川大黃 剉炒 各三兩

木香 忌火 桃仁 去皮尖。雙仁。用。麩炒。微黃。細研。如膏。一兩半。

右除驚甲外。俱搗為細末。後泥一風爐子。上開

金匱翼

卷四

肥氣伏梁

吳

凡可安驚甲。取前藥末。并桃仁膏。內驚甲中。用

好米醋二升。時時旋取入驚甲內。浸火熬令稠。

取出藥。卻將驚甲去泥淨。焙乾。搗為細末。與前

藥同和搗為丸。梧子大。每服二十九。溫酒送下。

空心臨臥各一服。

伏梁

經曰。心之積。名曰伏梁。起臍上。大如臂。上至心下。久

不愈。令人煩心。心為火藏。心受邪。則火內鬱而煩也。

溫白丸 加石菖蒲。黃連。桃仁。

桃奴散 治伏梁氣在心下。結聚不散。

桃奴 三兩

爲末。空心溫酒調下一錢。桃奴是桃實著樹不落。正月中採者是也。

痞氣

經曰脾之積名曰痞氣。在胃脘。覆大如盤。久不愈。令人四肢不收。發黃疸。飲食不爲肌膚。脾氣行乎四肢。脾氣既痞。四肢無以受氣。故不收。不收猶不舉也。脾色黃而合肉。氣痞不運。熱鬱於中。故黃色外見。而肌膚日削也。

金匱翼

卷四

伏梁痞氣息賁

辛

溫白丸 加吳茱萸乾薑。

息賁

經曰肺之積名曰息賁。在右脇下。覆大如五。久不已。令人灑淅寒熱。喘咳發肺壅。肺主氣而合皮毛。肺鬱成積。壅於內者不能衛於外。故灑淅寒熱。痺於上者不復降於下。故喘咳發肺壅。壅也。

溫白丸 加人參紫苑。

奔豚

經曰腎之積名曰奔豚。發於少腹。上至心下。若豚狀。或上或下。無時。久不已。令人喘逆。骨痿少氣。腎爲水藏。而喜凌心。故上至心下。奔突如豚。腎居下焦。而善逆。故令人喘逆。腎合骨而爲氣之根。故骨痿少氣。

溫白丸 加丁香茯苓遠志。

氣積

氣滯成積也。凡憂思鬱怒。久不得解者。多成此疾。故王宇泰云。治積之法。理氣爲先。氣既升降。津液流暢。積聚何由而生。丹溪乃謂氣無形。不能作聚成積。只一消痰破血爲主。誤矣。天地間有形之物。每自無中生。何止積聚也。戴復菴只以一味大七氣湯。治一切積聚。其知此道歟。

金匱翼

卷四

奔豚氣積

辛

大七氣湯

香附一錢 青皮 棟皮 桔梗

官桂 藿香 益智 菖蒲

三稜各一錢 甘草七分

爲末。每服四五錢。薑三片。棗一枚。水煎服。肝

積肥氣。用前湯煎熟待冷。卻以鉄器燒通紅。以

藥淋之。乘熱服。肺積息賁用前湯加桑皮半
夏杏仁各五分。心積伏梁用前湯加石菖蒲
半夏各五分。脾積痞氣用前湯下紅九子。

腎積奔豚用前方倍加茴香炒棟子肉。此濟
生方也。指迷有半夏無三稜。統旨有元胡
索薑黃草薤無桔梗

血積

痛有定處。遇夜則甚。其脈芤澀。婦人產後及跌撲勞
力者。多有此症。或憂怒傷其內。風寒襲於外。氣逆血

金匱翼

卷四 氣積血積

三

寒凝結成積。內經云。卒然外中於寒。若內傷於憂怒。
則氣逆。六輸不通。溫氣不行。凝血蘊裏而不散。此之
謂也。

加減四物湯 東垣 治婦人血積。

熟地

當歸

川芎

芍藥

肉桂

廣皮

三稜

乾漆 炒煙盡
各等分

為粗末。每服二錢。水煎服。丹溪當歸丸。無桂

漆。有神麩百草霜酒和丸。

處瘕

經云。小腸移熱於大腸為伏瘕。河間云。大腸熱氣苑
結。津液消耗。腹痛秘澀。檳榔丸主之。

檳榔丸

檳榔

大黃 剉碎

枳殼 炒

木香

桃仁 去皮

大麻仁 另研各

尖炒

一兩

為末。蜜丸。桐子大。每服十九。至十五丸。溫酒下
無時。

石瘕瘕聚

石瘕者。血留止。結硬如石。即血瘕也。經云。寒氣客

金匱翼

卷四

瘕瘕石瘕瘕聚

三

於子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當瀉不瀉。血以留
止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生於女子。
可導而下。亦名瘕聚。經云。任脈為病。男子七疝。女子
瘕聚。此之謂也。

新定

大黃

三錢用酒同三稜蓬朮
沒一宿去稜朮不用炒 桃仁 三十粒去

肉桂

附子 四錢

木香 一錢

青皮 二錢

醋炒

當歸

五錢

乾漆

炒煙盡

為末。酒糊丸。桐子大。每服五十九。淡醋湯下。溫

酒亦可。

米瘕

乾德中。浙江有慎恭道。肌瘦如勞。惟好食米。缺之則流清水。情似憂思。食米頃頃復如常。眾醫莫辨。後遇蜀僧道庶。以雞屎及白米各半合。共炒為末。水一盞調服。良久病者吐出如米形。遂差。其病為米瘕是也。

肉積

阿魏丸

阿魏

金匱翼

卷四

米瘕肉積

五

山查肉

各一兩

連翹

五錢

黃芩

六錢

右三味為末。以阿魏醋煮為糊丸。如梧子大。每

服五六十丸。食前白湯下。

又治肉積蟲積。一應難消難化。腹中飽脹疼痛。皆

能取效如神。不傷元氣。元珠名積塊丸

京三稜

莪朮

自然銅

蛇合石

雄黃

蜈蚣

木香

沉香

鐵花粉

天竺黃

阿魏

全蝎

蘆薈

冰片

右為極細末。用雄猪胆汁煉為丸。如梧子大。每

服七八分。重者一錢。五更酒送下。塊消即止。不

必盡劑。用黑狗胆汁尤妙。

通治諸積

宣明三稜湯

治癥瘕疝瘕。積聚不散。堅滿痞

脹。飲食不下。

京三稜

白朮

蓬朮

當歸

枳殼

木香

為末。每服三錢。沸湯調下。

金匱翼

卷四

肉積通治諸積

五

三因散聚湯 治九氣積聚。狀如癥瘕。隨氣上下。

發則心腹絞痛。攻刺腰脇。小腹脹。大小便不

利。

半夏

枳殼

當歸

厚朴

枳殼

茯苓

附子

川芎

吳茱萸

杏仁

桂心

橘紅

為末。每服四錢。水一盞。薑三片。煎七分。空心溫

服。大便不利加大黃。

諸積太倉丸

陳倉米 四兩 以巴豆二粒去皮同炒至米香豆

黑勿令米焦去豆不用再入橘紅 四兩 為末和

九桐子大薑湯送下五九日二。

萬病紫苑丸 卽溫白九加羌活獨活防風。

萬病感應丸 卽溫白九減去川椒加下藥。

羌活 三稜 甘遂 杏仁

防風 各一兩 威靈仙 一兩

金匱翼

卷四

通治諸積

藥

門人

平舟沈安伯

星門陳步羔

珊瑚 圖南

龍翔 召南

男

全校字

金匱翼卷四

東亞圖書印

金匱翼卷五目錄

頭痛統論

風頭痛 熱厥頭痛 溼熱頭痛

寒溼頭痛 痰厥頭痛 腎虛頭痛

肝厥頭痛 食積頭痛 血虛頭痛

氣虛頭痛 偏頭痛 雷頭風

大頭痛

項背痛

臂痛

眩暈 風虛眩暈 肝厥頭暈 下虛眩暈

金匱翼

卷五 目錄

熱風頭眩

耳痛統論 風聾 厥聾 腎虛耳聾 膿耳聾耳

鼻淵鼻塞

舌脹舌出

口瘡

齒痛

咽喉 客熱咽痛 客寒咽痛 咽痛失音

咽喉妨悶 喉痺諸法

金匱翼卷五

飼鶴山人尤在溪先生集

長洲後學徐錦炳南氏讀

頭痛統論

頭象天。六腑清陽之氣。五藏精華之血。皆會於此。然天氣所發。六淫之邪。人氣所變。五賊之逆。皆能相害。或蔽覆其清明。或瘀塞其經絡。因與真氣相薄。而為痛也。因風而痛者。抽掣惡風。有汗而痛。因暑熱而痛者。或有汗。或無汗。則皆惡熱而痛。因濕而痛者。痛而

金匱翼

卷五 頭痛統論

頭重。遇天陰尤甚。因痰飲而痛者。亦頭昏重而痛。慣欲吐。因寒而痛者。惡寒而脉細急。氣虛而痛者。遇勞則痛甚。其脉大。血虛而痛者。善驚惕。其脉扎。

東垣治頭痛。大率皆以酒芩酒連酒柏加風劑。如清空膏。安神散。清上瀉火湯之類。但雜用羌防升柴藜蔓等藥。殊欠紀律。學者師其意可也。元珠茶調散簡要可用。

治頭風久痛。須加芎歸紅花少許。非獨治風兼和血止痛也。細茶最能清上風熱。久痛以之作引。彌佳。東

垣謙甫皆常用之。

許學士荆芥散。獨用荆芥治風。煨石羔治熱。何等簡要。東垣清空膏諸方。蓋師其意而擴充之。

風痰頭痛。多兼嘔逆眩暈。若用風藥。其痰愈逆。其痛益甚。和劑玉壺丸。乃是的確藥。東垣變為白朮半夏天麻湯。則兼氣虛而言之耳。

腎厥頭痛。肝厥頭暈。本事方論之最詳。

玉真丸。硫黃半夏。溫降之力彌大。石羔硝石。寒下之能甚長。夫陰氣上逆。其來最暴。治以純陽。必多格拒。

金匱翼

卷五 頭痛統論

故須羔硝為之佐使。令其相入而不覺其相傾耳。黑錫丹亦見此意。

茸珠丹。有二方。一用硃砂鹿茸二味為丸。蓋亦補虛墜浮之意。一用硃砂同草烏瞿麥黃藥子火煨。獨取硃砂為末作丸。此不特硃砂經火有毒。即草烏之辛散。瞿麥黃藥之苦降。並已成灰。吹去不用。而碩需其相濟。記可得耶。

搐鼻諸方。本事獨用辛溫。東垣河間並用辛涼。夫久蓄之風。多化為熱。而閉鬱之氣。非溫不通。隨病斟酌。

從少從多。則賢者之責也。

頭風餅子。有用五味子全蠍土狗各七個醋和作餅者。用南星川芎等分。同蓮鬚葱白搗爛作餅者。有用草麻子乳香者。有用大黃苳同井底泥搗貼者。然外治之藥。無論邪之寒熱。並宜辛溫開達。徒用苦寒鬱閉益甚。苟非熱極。不可輕用。

頭痛之因。非止一端。有風有寒。有濕有熱。有兼氣兼氣者。如火與濕合。內經所謂少陽司天之政。一之氣其熱鬱於上。頭痛嘔吐昏憤是也。有火勝水復者。內

金匱翼 卷五 頭痛統論

經所云歲金不及。炎火迺行。復則陰厥。且格陽反上行。頭腦戶痛。延及腦頂發熱是也。有胃實者。經所謂頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生是也。有腎厥者。經所謂頭痛顛疾。下虛上實。過在足少陰。巨陽甚則入腎是也。有心熱者。經所謂心煩頭痛。病在膈中。過在手巨陽。少陰是也。有痰飲者。其病在脾。東垣所謂太陰痰厥。頭痛眼黑。嘔吐悶亂。亦濕勝也。有內風者。風從火化。其病在肝。不特厥陰之脈與督脈上會于巔。蓋即肝藏沖逆之氣。亦能上至巔頂也。又有真氣不

守。厥而上行。天門真痛。上引泥丸。名真頭痛。多不可治。古方云。與黑錫丹。灸百會穴。猛進參附烏沉。或有可生。然天柱折者。亦難為力矣。

風頭痛

風頭痛者。風氣客于諸陽。諸陽之脈。皆上于頭。風氣隨經上入。或偏或正。或入腦中。稽而不行。與真氣相擊。則痛。經云。風氣循風府而上。則為腦風是也。其挾寒挾熱。則隨症審而治之。

經驗治頭痛。風熱痛不可忍者方。元珠名茶調散。

金匱翼 卷五 頭痛統論

小川芎 一兩 香白芷 五錢 細芽茶 三錢

片黃芩 二兩 酒拌炒再拌再炒

荆芥穗 四錢 薄荷葉 三錢

右細末。每服二三錢。茶清調下。一方有菊花

防風殭蠶。

石羔散

石羔 二兩 炭火 川芎 一兩 炙甘草 半兩

右為末。每服一錢。葱白好茶同煎湯調下。食後

日二服。

一方決明子作枕去頭風明目佳

本事白附散 治風寒客于頭中疼痛牽引兩目

遂至失明

白附子 一兩 麻黃 川烏 南星 各半

全蠍 五个 乾薑 硃砂 麝香 各二錢半

右為細末酒調一匙服暑睡少時效

三五七散 治風寒入腦頭痛惡寒目眩

防風 二兩 茱萸 炮薑 茯苓 各一兩

細辛 炮附子 各七錢五分

金匱翼 卷五 風頭痛 五

右為細末每服二錢溫酒調下局方

芎辛湯 治風寒溼在腦頭眩暈嘔吐

川芎 三錢 細辛 白朮 各一錢半 甘草 一錢

右剉作一貼入生薑五片芽茶少許水煎服

生

東垣云高巔之上惟風可到故味之薄者自地升天者也所以頭痛皆用風藥治之然患病人血必不活而風藥最能燥血故有愈治而愈甚者此其要尤在養血不可不審也

熱厥頭痛

熱厥頭痛者胃熱氣盛不能下行也其證頭中熱痛雖嚴寒猶喜風寒微來煖處或見煙火則痛復作其脈數或大者是也

小清空膏

片芩細切酒拌勻晒乾為末茶清調下

治熱厥頭痛方

大黃酒炒三次為末茶清調服

熱氣在頭以風藥引之則熱彌盛而痛益甚大黃

金匱翼 卷五 熱厥頭痛 六

苦寒瀉熱得酒則能上行瀉腦熱昔人所謂烏巢

高巔射而去之是也茶性清上故諸頭痛藥中多

加用之

新定

生地 三錢 知母 酒炒 黃芩 酒炒 各一錢 薄荷

黑山梔 甘菊 甘草 荆芥 各五分

紅花 三分

右作一服水煎食遠服便閉加酒炒大黃一錢五分此方治頭痛煩熱喜見風寒稍近煙火則

痛復作。或便閉不通者。往往取效。古法動作。輒頭重痛。熱氣潮者。屬胃。丹溪云。頭痛如破。酒炒大黃半兩。茶清煎服。

溼熱頭痛

溼熱頭痛者。溼與熱合。交蒸互鬱。其氣上行。與清陽之氣相搏。則作痛也。東垣云。諸溼熱頭痛。清空膏主之。又云。溼熱在頭而頭痛者。必用苦吐之。或用搐鼻藥。

清空膏

療風溼熱頭痛。上壅損目。及腦痛年深。

金匱翼

卷五

溼熱頭痛

七

不止

羌活

防風

柴胡

川芎

各一兩 七錢 五錢

炙草

半兩

黃連

一兩

黃芩

三兩

一兩

半酒

製

一兩

半炒

右為細末。每服二錢。入茶少許。湯調如膏。抹在口內。少用白湯送下。臨臥。

搐鼻散

青黛

石羔

芒硝

鬱金

薄荷

牙皂

右為末。搐鼻。東垣白芷散。有白芷。無牙皂。青

黛

又頭重如山者。溼氣在頭也。用紅豆散。

紅豆 十粒

麻黃

瓜蒂

各五

連翹

羌活

各三

錢

右為末。搐鼻。

透頂散

本事

細辛

表白者

瓜蒂

七箇

丁香

三粒

糯米

七粒

冰片

麝香

各一

黑

右為極細末。每一大豆許。患人隨左右搐之。良

金匱翼

卷五

溼熱頭痛

八

久出涎。一升許則安。此藥性味。視前搐鼻散

稍溫也。當隨證審而用之。

子和神芎丸

治溼熱壅滯頭目。赤腫疼痛。大小

便閉澁。

大黃

黃芩

各二

牽牛

生

滑石

各四

黃連

薄荷葉

川芎

各半

兩

右為末。滴水為丸。梧子大。每服五十九。食後溫

水送下。

缺寒溼頭痛一門 鶴年補集

頭痛由于溼熱上壅者頗多然亦有因寒溼者金匱所云頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病在頭中寒溼故鼻塞納藥鼻中則愈愚以為本事透頂散正治寒溼頭痛之劑否則丁香細辛治溼熱頭痛無乃以火救火歟

痰厥頭痛

痰厥頭痛者病從脾而之胃也夫脾主為胃行其津液者也脾病則胃中津液不得宣行積而為痰隨陽明之經上攻頭腦而作痛也其證頭重悶亂眩暈不

金匱翼 卷五 寒濕頭痛 九

休兀兀欲吐者是也。

半夏白朮天麻湯 治太陰痰厥頭痛眼黑頭旋

惡心煩亂肢冷身重。

半夏 陳皮 去白 麥芽 各七錢半 神麩

白朮 五錢 黃芩 炙 蒼朮 米泔 天麻

茯苓 人參 澤瀉 各五錢半 黃柏 一分

乾薑 三分

稍熱服食前 一方加生薑一片

外臺云頭痛非冷非風此屬有痰也濃煎茶啜

一二升探吐之吐已復吐候苦汁出乃止不損人待渴自止妙

茶調散 子枳 瓜蒂好茶二味等分為末每二錢薑

汁調空心服之取吐。

半夏茯苓湯 治熱痰嘔逆頭痛

半夏 二錢 赤苓 一錢 陳皮 去白 甘草 各五分

黃芩 五分 生薑 三片

煎作一服

頭痛連眼痛此風痰上攻用兩前茶川芎白芷防

金匱翼 卷五 痰厥頭痛 十

風天台烏藥細辛當歸為末湯調服。

防風飲子 療風痰氣發即頭旋嘔吐不食

防風 人參 橘皮 各二兩 白朮

茯苓 各三兩 生薑 四兩

右剉碎以水六升煮取三升去滓分溫四服一

日服盡忌醋桃李雀肉蒜麪

直指方云二陳湯加荆芥治頭風兼治痰壅酒

壅又云頭風證眉稜耳角俱痛投以風藥不效

投以痰藥收功眼目亦腫羞明而痛以之涼劑弗瘳

與之痰劑獲愈也。

玉壺丸 治風痰吐逆頭痛目眩胸膈煩滿飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫。

天南星 生半夏 各一兩半 天麻 半兩 頭白麵 三兩

石為細末滴水為丸。梧子大每服三十九。用水

一大瓊先煎令沸下藥五七沸候藥浮即熟漉

出放溫別用生薑湯下。不計時。一方有白朮

五錢雄黃水飛三錢半。

東垣壯歲病頭痛每發時兩頰盡黃眩暈目不

金匱翼

卷五

痰厥頭痛

十一

欲開嬾于言語身體沉重兀兀欲吐數日方過

潔古老人曰此厥陰太陰合而為病名曰風痰

以局方玉壺丸加雄黃白朮治之。

芎辛導痰湯 治痰厥頭痛。

川芎 細辛 南星 陳皮 去白

茯苓 各一錢半 半夏 二錢 枳實 甘草 各一錢

右作一服水二鍾薑七片煎至一鍾食後服。

此導痰湯加川芎細辛為引使上行也方殊簡要。

腎虛頭痛。

腎虛頭痛者腎陰不足虛陽無附而上攻素問所謂頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽許學士謂之腎厥頭痛是也。

玉真丸 治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂

之腎厥其脈舉之則弦按之則堅。

硫黃 二兩 石羔 煨過 半夏 硝石 各一兩

右為細末研勻生薑汁和丸桐子大陰乾每服

二十九薑湯或米飲下更灸關元百壯良虛寒

金匱翼

卷五

腎虛頭痛肝厥頭痛十一

者去石羔加鍾乳粉一兩。

黑錫丹

沉香 附子 葫蘆巴 肉桂 各半

茴香 破故紙 肉荳蔻 金鈴子

木香 各一兩 黑錫 硫黃 與黑錫結砂 子各二兩

右為末全研酒煮麪糊為丸如梧子大陰乾以

布袋擦令光瑩每服四十九空心薑鹽湯送下。

一方有陽起石半兩巴戟一兩。

肝厥頭痛

肝厥頭痛者。肝火厥逆。上攻頭腦也。其痛必在顛頂。以肝之脈與督脈會于巔故也。雖太陽之脈亦上額交巔。然太陽頭痛必惡風寒。而厥陰頭痛必多眩暈。或厥逆抽掣也。

龍薈丸 方見厥 加甘菊羚羊角氣實便堅者用之。

虛者宜生地羚羊角甘菊麥冬之類。滋之清之。使肝柔則厥自已。

抑青丸

黃連一味。吳茱萸湯浸一宿為末。粥丸。

金匱翼 卷五 食積頭痛 主

瀉青丸

當歸 去蘆 龍膽草 川芎 梔子

川大黃 煨 羌活 防風 去蘆各

右為末。煉蜜丸。雞豆大。每服一九。竹葉湯全沙

糖溫水化下

食積頭痛

食積頭痛者。食氣上攻。胃氣不清也。子和云。邪在胃而頭痛者。必下之。其證必兼痞膈噎酸。噫敗卵臭。或飽食則痛甚。其脈右手滑盛者是也。

館職張學士。嗜酒散誕。忽頭痛發熱。醫作傷寒治之。愈甚。孫兆脈之。右手脈甚數。左手脈和平。曰。此疾非傷寒。學士好酒。啖食所傷也。遂川食藥五七九。經食久。膈漸寬。痛遂減。再進利膈藥。遂獲安。

紅丸子 方見飲食門

治中湯

即理中湯加青皮陳皮等分。

血虛頭痛

血虛頭痛者。血虛脈空。自魚尾上攻頭痛者是也。產

後多有此證。魚尾眉尖後近髮際是。魚尾在眉梢後。穴是也。

川芎當歸湯 當歸 等分

川芎

為細末。每服二錢。水煎溫服。

一方 川芎 半兩 為末。每服二錢。臘茶調下甚效。

一方 當歸 一兩 酒一升。煮取六合。飲至醉效。

一方 四物湯加甘菊薄荷。

新定

生地 二錢 當歸 一錢 蔓荊 五分 黃芩 一錢

白芍 一錢 炙草 三分 甘菊 七分 川芎 五分

氣虛頭痛

氣虛頭痛者。清陽氣虛不能上升也。其脈必弦微。其證必倦怠氣短惡風寒不能食。

羅太無云。參謀柏仲實年六十餘。一月間患頭痛不可忍。邀往視之。其人云。近在燕京。患頭昏悶微痛。醫作傷寒治之。汗出後。痛轉加。復汗解。痛益甚。遂歸。每召醫用藥雷同。到今痛甚不得安臥。惡風寒而不喜

金匱翼

卷五

氣虛頭痛

五

食飲診其脈弦微而細。氣短而促。懶言語。內經曰。春氣者病在頭。今年高氣弱。清氣不能上升。頭面故昏悶。此病本無表邪。因發汗數四。清陽之氣愈虧。不能上榮。亦不能外固。所以頭苦痛而惡風寒。不喜飲食。氣弱而短。宜升陽補氣。頭痛自愈。

黃芪 一錢 人參 一錢 白朮 當歸

白芍 各五錢 陳皮 炙草 升麻

柴胡 蔓荊 各三分 川芎 細辛 各三分

右咬咀作一服。水煎食後溫服減半。再服愈。

新定

人參 黃芪 白朮 各一錢 甘草 五分

當歸 陳皮 各七分 升麻 二分 蔓荊

細茶 各八分 白芍 一錢

右作一服水煎。

偏頭痛

偏頭痛者。由風邪客於陽經。其經偏虛者。邪氣湊于一邊。痛連額角。久而不已。故謂之偏頭痛也。

王荆公患偏頭痛。裕陵傳禁中秘方。用生菜菹汁一

金匱翼

卷五

偏頭痛

六

蜆殼仰臥注鼻中。左痛注右。右痛注左。或兩鼻皆注。亦可。數十年患。皆一注而愈。

一婦人患偏頭痛。一邊鼻塞。不聞香臭。常流清涕。或作臭氣。一陣遍治。頭痛藥皆不效。一醫教服芎犀丸。不十數服。忽然嚏突出一鉅稠膿。其疾遂愈。

芎犀丸。此方兼祛風清熱之長。而得參膠等安

定氣血。雖虛人亦可用之。安內攘外。並行不悖

也。

川芎 硃砂 水飛內一石羔 龍腦 各四分

人參 茯苓 炙草 細辛各二兩

生犀角 梔子各一兩 阿膠炒一兩半 麥冬三兩去心

右為細末。蜜丸。彈子大。每服一丸。食後細嚼茶酒任下。

節齋云。久病頭風。畧感風寒。便發寒熱。頭須重綿厚。怕包裹者。此屬本熱而標寒。世人不識。悉用辛溫散之。輕時得效。誤認為寒。殊不知其本有鬱熱。毛竅常疎。故風易入。外寒束其內熱。閉逆而為痛。辛熱之藥。雖能開通。閉逆散其表之寒邪。然以熱濟熱。病本益

金匱翼 卷五 偏頭痛 十七

深惡寒愈盛矣。惟當瀉火涼血。而佐以辛溫散表之劑。以從法治之。則病可愈。而根可除也。

雷頭風

雷頭風者。頭痛而起核塊。或頭中如雷之鳴。蓋為邪風所客。風動則有聲也。亦有因痰熱者。蓋痰生熱。熱生風也。其法輕則散之。甚則吐之下之。

新定消風散熱方

薄荷七分 連翹 黃芩 黑山梔

犀角 荆芥 牛蒡子各一錢 桔梗

甘草各五分

右作一服水煎。

二仙散 子和云。雷頭風。每用此藥吐之。次用神芎丸下之。一名茶調散。

瓜蒂 好茶等分

右為末。每二錢。薑汁調。空心服之。取吐。

神芎丸方見溼熱頭痛門

治痰火上升。壅於氣道。兼乎風火。頭中痛而有聲。輕如蟬鳴。重如雷響。

金匱翼 卷五 雷頭風 十八

半夏一兩 牙皂 大黃酒浸透溼紙包煨再

天蟲 連翹 橘紅 桔梗

天麻各五錢 片芩七錢 薄荷葉三錢 香白芷

青礞石 粉草各一錢

右為末。水浸蒸餅丸如棗豆大。食後臨臥茶吞二錢。以痰利為度。然後用清痰降火煎藥調理。

大頭痛

大頭痛者。頭痛而腫大如斗。乃天行疫癘病也。

普濟消毒飲子

黃芩 酒炒 川連 各半 薄荷 一錢 橘紅 二錢

元參 二錢 甘草 二錢 連翹 一錢 鼠粘子 一錢

板藍根 一錢 馬勃 一錢 天蟲 炒七 升麻 七分

柴胡 各二錢 桔梗 各二錢

右共為細末，用湯調，時時服。或拌蜜丸，喻化或加防風薄荷川芎當歸，咀如麻豆大，每服五錢。水煎去渣，熱服之。食後時時服之。如大便秘，加酒煨大黃一錢，或二錢，以利之。腫熱甚者，宜研刺之。一方無薄荷，有人參三錢。

金匱翼

卷五

大頭痛

五

東垣監濟源稅時，長夏多疫癘病。初覺憎寒，體重，次傳頭而腫，盛目不能開，上氣喘急，咽喉不利，舌乾口燥。俗云大頭天行，親戚不相訪問，傳染多死。張縣丞亦患此，醫以承氣湯加藍根下之，稍緩，翌日其病如故。下之人緩，莫能愈。漸至危篤，東垣診之，謂曰：夫身半以上，天之氣也；身半以下，地之氣也。此邪客于心肺之間，上攻頭目而腫痛，反以承氣下之，瀉胃中之實熱，是誅伐無過也。夫安知適其病所為故哉？遂處方用黃

連黃芩味苦寒，瀉心肺間熱，以為君。元參鹹微

寒，甘草甘寒，瀉火補氣，以為臣。連翹鼠粘子薄

荷辛平，板藍根味甘寒，馬勃白僵蠶味苦平，散

腫消毒，定喘以為佐。升麻柴胡苦平，行少陽陽

明二經，使氣得升。桔梗味苦辛溫，為舟楫，不令

下行。服之良愈。乃施其方，全活甚眾。名普濟消

毒飲子。

金匱翼

卷五

大頭痛

五

項背痛

本事方云。一親患項筋痛。連及背。不可轉。服諸風藥皆不效。余嘗憶及千金有腎氣攻背附丸。予強與之。兩服頓瘳。自後與人皆有驗。蓋腎氣自腰夾脊上至曹谿。然後入泥丸宮。曹谿一穴。非精於搬運者不能透。今逆行至此。不得通用椒以引歸經。則安矣。

椒附丸

大附一枚六錢已上者炮去皮臍末之。

右每末二大錢。好川椒十粒。用白麵填滿。水一

金匱翼

卷五 項背痛

瓊半。生薑七片。同煎至七分。去椒入鹽。通口空

心服。

回頭散 治頭項強急筋痛。或到枕轉項不得者。

烏藥順氣散。加羌活獨活木瓜。

順氣散

烏藥

橘紅各二錢

麻黃

川芎

白芷

桔梗

枳殼各一錢

天蟲炒

炮薑

炙草五分

加薑蔥煎。

臂痛

臂痛有痰有虛有氣血凝滯。各隨症治之。

指迷茯苓丸 治中脘留伏痰飲。臂痛難舉。手足

不得轉移。此治痰之第一方也。

半夏二兩 茯苓一兩 枳殼去穢炒半兩

風化朴硝二錢五分

右為末。薑汁麩糊丸。如梧子大。每服三十九。薑

湯下。

十味釀散方見痺症門

治中風血虛臂痛舉動難支

金匱翼

卷五 臂痛

三

眩暈

雞峯云。夫風之病起于。心氣不足。胸中畜熱而實。故有頭風。面熱之所為也。痰熱相感而動風。風心相亂。則悶瞀。故謂之風眩。悶瞀也。又云。頭風目眩者。由血氣虛。風邪入腦而牽引目系故也。五臟六腑之精。皆上注於目。血氣與脈并上為目系。屬于腦。後出于項中。血脈若虛。則為風邪所傷。入腦則轉。而目系急。故成眩也。診其脈洪大而長者。風眩也。

金匱要略

卷五

眩暈

三

相感而動風者。風自内生者也。血氣虛。風邪入腦者。風從外入者也。內風多從熱化。引之則彌盛。外風多從虛入。清之則轉加。二者不可不辨也。

素問云。頭痛。巔疾。下虛上實。過在足少陰。巨陽。甚則入腎。徇蒙。招尤。目暝耳聾。下實上虛。過在足少陽。厥陰。甚則入肝。下虛者。腎虛也。故腎虛則頭痛。上虛者。肝虛也。故肝虛則頭暈。徇蒙者。如以物蒙其首。招搖不定。目暝耳聾。皆暈之狀也。

高鼓峯云。腎陰不足。三陽之燄。震耀于當前。中土虛

衰。下逆之光。上薄于巔。頂陰虛而眩者。目中時見火光。土虛而眩者。必兼惡心嘔吐也。

按中土虛衰。不能下蔽真陽。則上乘清道。所謂上入之光也。然亦有中虛肝氣動而暈者。如土薄則木搖也。大抵眩暈多從肝出。故有肝虛頭暈。腎虛頭痛之說。雖亦有肝病頭痛者。要未有眩暈而不兼肝者也。

金匱要略

卷五

風虛眩暈

三

聖濟總錄云。風頭旋者。以氣虛怯。所稟不充。陽氣不能上至于腦。風邪易入。與氣相鼓。致頭旋而暈也。亦有胸膈之上。痰水結聚。復犯大寒。陰氣逆上。風痰相聚而結。上衝於頭。亦令頭旋。治當用人參丸祛痰丸之類者也。

風虛眩暈之方

守中丸 治風虛頭眩腦轉。目系急。忽然倒仆。

人參 白朮 甘菊 枸杞子

山藥 各二兩 白茯苓 十兩 麥冬 三兩 生地黄 二十斤

右為細末。先川生地黄汁于銀器內。入酥三兩。

白蜜三兩。同煎。遂旋掠取汁。上金花令盡。得五

升許于銀器內拌炒前七味藥漸漸令乾入白
蜜同搗數千杵丸如梧子大每服五十九空心
溫酒送下服百日後五臟充滿肌膚滑澤此藥
須擇四季旺相日或甲子日修合亦名五芝地
仙金髓丸

防風飲子

本事治風眩頭暈川芎散

山萸肉 一兩 山藥 人參 甘菊花

小川芎 扶神 各半兩

金匱翼 卷五 風眩頭暈 三

右為細末每服二錢酒調下不拘時日三服

肝厥頭暈之方

本事鈎藤散

鈎藤 陳皮 半夏 麥冬

茯苓 茯神 人參 甘菊

防風 各半兩 甘草 一分 石羔 一兩

右為粗末每服四錢水一盞半薑七片煎七分

去滓溫服

下虛眩暈之方

沉香磁石丸 治上盛下虛頭目眩暈耳鳴耳聾

沉香 青鹽 並川研 蔓荊 甘菊 各五錢

巴戟 葫蘆巴 山藥 炒 川椒 去目炒

磁石 火煨醋拌細研水飛 山萸肉 陽起石 火煨研

附子 各一兩炮

右為細末用酒煮米和丸梧子大每服五十九
加至七十九空心鹽湯下

熱風頭眩之方

羚羊角湯 治熱毒風上衝頭目旋暈耳內虛鳴

金匱翼 卷五 肝厥頭暈下虛眩暈熱風頭眩 三

羚羊角 二兩 菊花 三兩 防風 藜本

元參 黃芩 杏仁 去皮尖 石菖蒲

炙甘艸 各一兩

每服五錢水煎食後溫服一方有羌活前胡

耳病統論

耳者腎之竅而胆與胃之脈所過之處也故其病亦有數種有氣厥而聾者有腎虛而聾者有風火壅閉腫痛或鳴或聾者有熱氣乘虛隨脈入耳而為膿耳者有耳出津液結核塞耳而為聾耳者又有左聾右聾左右俱聾之異左聾者有所忿怒過極則動少陽胆火故從左起以龍薈丸主之右聾者多因色慾過度致動少陰相火故從右起以六味地黃丸主之左右俱聾因醇酒厚味無節則動陽明胃火故從中起

金匱翼

卷五 耳病統論

三

以通聖散滾痰丸主之統三者而論之忿怒致耳聾者為尤多也

風聾

風聾者經氣虛而風乘之正氣不通風邪內鼓則耳中引痛牽及頭腦甚者聾閉不通也

魚腦膏 治風聾日久

生鯉魚腦

二兩

當歸

細辛

附子

去皮

白芷

菖蒲

各三兩

共為末以魚腦置銀器中入藥在內微火煮候香

去滓入瓷盒中候凝取如棗核大綿裹塞耳中

一方以竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之令烱置耳中

一方以鯉魚胆汁滴入耳中

久聾方

草麻子

粒去油

遠志

乳香

磁石

皂角

半搗爛

生地龍

中者

全蝎

二個

右為細末入蠟搗圓挂入耳

犀角飲子 治風與熱合上壅耳內痛腫聾閉

犀角

木通

石菖蒲

甘菊花

金匱翼

卷五 風聾

三

元參

赤芍

赤小豆

各二錢

甘草

一錢

水二鍾生薑五片煎一鍾不拘時服若風熱壅

盛便悶心煩者宜防風通聖散亦有胃中痰火

壅熱生風上攻清道因而耳鳴築築然氣閉而

不通鼻塞不利口不知味痰多高熱不清脈滑

數大或弦內經所謂頭痛耳鳴九竅不利腸胃

之所生也宜半夏麩橘紅甘菊茯苓甘草知母

酒苳麻黃石羔桔梗桑皮之屬

鼠粘子湯 治風熱壅盛耳內生腫如櫻桃痛極

迎翹 黃芩酒炒 牛蒡子炒 元參

桔梗 梔子炒 生甘草 龍胆草炒

板藍根

右剉水煎食後服。隨飲酒一二盞。

厥聾

厥聾者。經脈氣厥而聾也。巢氏云。臧府氣逆。名之爲厥。厥氣相搏。入于耳之脈。則令聾。手少陽之脈動而氣厥者。其候耳內焯焯焯也。手太陽厥而耳聾者。其候聾而耳內氣滿。然厥聾之候。大都肝胆氣逆所致。其症必起于卒暴之間。蓋肝胆並善逆。而其氣多暴也。以龍薈丸瀉肝胆。降逆氣。中有辛香。并能通竅也。

金匱翼

卷五 厥聾

无

龍薈丸

當歸焙 龍胆草洗 山梔炒 黃連

黃柏 黃芩各一兩 大黃 蘆薈

青黛各半兩 木香二錢 麝香五分

煉蜜丸。桐子大。薑湯下。二三十丸。便不堅者去

大黃。一方無黃連。黃柏。有青皮柴胡。胆星。

秘傳降氣湯。加石菖蒲。治氣壅耳聾。大有神效。方見氣門。

腎虛耳聾

腎藏精而氣通于耳。腎虛精少。其氣不通于上。則耳聾不聰。經云。精脫者耳聾是也。其候頰顴色黑。瘦悴力疲。昏昏憤憤。因勞則甚。亦謂之勞聾。

肉苁蓉丸

肉苁蓉酒浸一宿切焙 附子去皮臍 山茱萸炒 桂心

巴戟天去心 石斛去根 乾熟地焙 澤瀉

金匱翼

卷五

腎虛耳聾

无

兔絲子酒浸一宿別研 人參 白茯苓 蛇床子炒

牡丹皮 當歸酒浸 菖蒲米泔浸一宿

炙草 黃芪 遠志 芍藥

防風各一兩 羊腎一對去筋膜炙

蜜丸。梧子大。每服二十九丸。食後溫酒下。漸加至

三十九丸。日三。一方有乾薑細辛。酒糊丸。亦得。

益腎散 治腎虛耳聾。

磁石製 巴戟 川椒各一兩 沉香

石菖蒲各半兩

右為細末。每服二錢。用猪腎一具。細切。和以葱白。少許鹽。并藥。溼紙十重。煨令香熟。空心嚼以酒送下。一方有附子。無沉香。菖蒲。

大安腎丸。加磁石。羌活。石菖蒲。良。

憶有戈雨亭令郎。十餘歲。痘後耳漸重聽。日甚一日。幾與聾無異。業師薛一瓢診之云。此必痘涉

腎經。幸而收功者。所以告乏日甚一日。為之圖維。

于六味方中。加入鹽水炒紫衣核桃肉三兩。鹽水炒杜仲三兩。石菖蒲二兩。蜜丸開水下。服一料而

金匱翼

卷五 腎虛耳聾

手

愈。鶴年

膿耳。耳聾。

百指云。熱氣乘虛。隨脈入耳。聚熱不散。膿汁時出。謂之膿耳。治宜蔓荊子散。外用石羔明礬黃丹真蚌粉。龍骨麝香等分為末。綿繻竹拭耳。參之。又耳間有津液。輕則不能為害。風熱搏之。津液結。鞣成核。塞耳。令人暴聾。謂之耳聾。治宜四物加羌活柴苓連翹元參等分。外用生猪脂地龍釜底墨等分。細研。以葱汁和。捏如棗核。薄綿裹入耳。令潤。即挑出。

蔓荊子散

蔓荊子 赤芍 生地 甘菊

桑皮 赤茯苓 升麻 麥冬

木通 前胡 炙草各一錢

水二盞。薑三片。紅棗二枚。煎一盞。食後服。

黃龍散 治膿耳。

枯白礬 龍骨研 黃丹 麝香少許 麝脂各一錢

右為末。以綿杖子。搨去耳中膿水。以藥摻入。少

金匱翼

卷五 膿耳

手

許。日日用之。勿令風入。

鼻淵鼻塞

經曰胆移熱于腦則為辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也。王注曰胆液不澄則為濁涕不已如水泉者故曰鼻淵。此為足太陽與陽明脈俱盛也可與防風通聖散加黃連薄荷。夫足太陽主表之風寒足陽明主裏之熱云太陽陽明俱盛者謂表邪與裏熱搏結久之寒亦化熱鬱伏于腦類而不解也。
腦滿有老人腎經虛寒使然者用八味及煖腎之劑而愈。元珠

金匱翼

卷五

鼻淵鼻塞

三

鼻塞不聞香臭或但遇寒月便塞或略感風寒亦塞不時舉發者世俗皆以為肺寒而用解表辛溫通利之藥不效殊不知此是肺經多有火邪鬱甚則喜見熱而惡風寒故遇寒便塞偶感便發治法清金降火為主而佐以通利之劑若如常鼻塞不聞香臭者只作肺熱治之瀉火消痰或丸藥喻化或末藥輕調緩服久服無不效若平素原無鼻塞之病一時偶感風寒而致鼻塞聲重或流清涕者只作風寒治之。
防風通聖散

元珠去硝黃其滑石石羔減半多加辛夷花先用三五貼再用此為丸每七十九早晚白湯送下。

雄黃丸 治鼻鼈。

雄黃 五分 枯礬 一錢 瓜蒂 二錢 麝香 少許

右為丸取如豆大搐鼻亦治瘰肉。

蒼耳散 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵。

辛夷仁 五錢 蒼耳子 一錢 白芷 一兩 薄荷 一錢

右為末葱茶湯調下二錢。

金匱翼

卷五

鼻淵鼻塞

三

治鼻中肉贅莫不可近痛不可搖者方。

以白礬末加礪砂少許吹其上頃之化水而消與勝濕湯瀉白散二貼此厚味擁濕熱蒸于肺

門如雨霽之地突生芝菌也。

鉛紅散 治肺風鼻赤生瘡。

舶上硫黃 白礬灰 各半兩

右為末入黃丹少許染與病人面色相同每上半錢津液塗之洗漱罷及臨卧再上兼服升麻湯下瀉青丸除其本也。

舌脹舌出

臨安民有因病傷寒而舌出過寸。無能治者。但以筆管通粥飲入口。每日坐于門。一道人見之。咨嗟曰。吾能療此。頃刻間耳。奈藥不可得。會中貴人罷直歸。下馬觀病者。問所須。乃梅花片腦也。笑曰。此不難。即遣僕馳取。道人屑為末。搽舌上。隨手而縮。凡用五錢。醫說

又方 舌脹出口。以草麻子油蘸紙作燃燒烟熏之。

金匱翼

卷五

舌脹舌出

三

治腫滿如猪胞方

釜下墨末以酢和厚傅舌上下。脫去更傅。須臾

即消。或死決去血汁。竟傅之。彌佳。千金方名百草霜散

一方

釜下墨和鹽等分醋調塗。

余小兒師魯幼時。忽患舌脹。余以煨過皂礬取紅色者少許研末。搽舌上。少頃便差。

口瘡

口舌生瘡。其候有二。一者心胃有熱。氣衝上焦。熏發口舌。其症口臭。作渴發熱。飲冷是也。外臺含煎主之。一者胃虛食少。腎水之氣逆而承之。則為寒中。脾胃虛衰之火。被迫上炎。作為口瘡。其症飲食少思。大便不實。或手足逆冷。肚腹作痛。經曰。歲金不及。炎火乃行。復則寒雨。暴至厥陰。乃格陽反上行。民病口瘡是也。宜附子理中湯。參朮甘草補其中。乾薑附子散其寒。使土溫則火自斂也。

金匱翼

卷五

口瘡

三

外臺含煎

升麻

大青

射干

苦竹葉

梔子

黃柏

蜜

生地汁

生元參汁

各五合乾者二兩

薔薇根白皮

五兩

右以水六升。煎取二升。去滓。入生地蜜等同煎。

如飴細細含之。差止。外臺云。薔薇根角蒿為

口瘡之神藥。

黃連膏

聖濟

黃連

三兩

猪脂

一斤

白蜜

四兩

羊髓

研二兩

右以慢火煎猪脂取油去滓。人黃連又煎令黑色。下羊髓令化。以綿濾去滓。入蜜更煎成膏。瓷盒盛。每含一棗大。日三五度嚙津不妨。

附子理中湯

生薑煎

生薑汁 一盞 白蜜 三兩

同煎十沸。瓷瓶盛。時時以熱水調一匙。含嚙之。按聖濟論口瘡。有實有虛。實則清之。虛則溫之。最為明晰。然二者之外。又有腎虛火動一症。而腎虛

金匱翼

卷五 口瘡

三

之候。又有二端。一者腎藏陰虛。陽無所附。而遊行于上者。宜六味之屬。壯水戀火。一者腎藏內寒。陽氣不安其宅。而飛越於上者。宜七味八味之屬。溫藏飲陽也。雖有元藏陰火上攻。口舌之說。乃用巴戟白芷良薑等味。殊未妥協。惟附子蜜炙含嚙。差為可耳。

集簡方 治口舌生瘡

溺桶泥 七分 枯礬 三分

二味研勻敷之。有涎拭去之。數次即愈。

齒痛

牙齒者。骨之所終。髓之所養也。又手足陽明之支脈入於齒。故骨髓之氣不足。與夫陽明之脈虛。不能有所滋養。于是乎有牙齒之疾。其候甚多。治療之法。固不可略也。若陽明脈虛。風冷乘之而痛者。謂之風痛。重居齒根。侵蝕不已。傳受餘齒而痛者。謂之虫痛。若足少陰脈虛。不能榮養于骨。因呼吸風寒。或飲漱寒水而痛者。謂之腎虛。齒風痛。風痛者。齒齦多腫。或赤得風則痛愈甚。虫痛者。齒齦有竅。甚則搖動。宣露。虛痛者。悠悠戚戚。無甚大痛。而亦久而不已也。亦有腎虛陰火上衝作痛者。其候手足冷。腰膝軟痛。氣上衝。頭面熱。色赤。頸筋粗大。舌不大赤。齦不甚腫。七味湯加骨碎補牛膝治之。一服如神。

去風之劑

皂莢湯

皂莢 一挺 去皮子 露蜂房 一枚 鹽 一分

三味擘剉。分爲三貼。每貼以漿水煎熱。漱冷吐。

當歸連翹飲

當歸 川芎 連翹 生地

防風 荆芥 白芷 羌活

黃芩 黑山梔 枳殼 甘艸

細辛

水煎服

東垣蝎梢散

麻黃 錢 白芷 羌活 防風

藜本 柴胡 升麻 各五分 當歸 六分

蝎梢 少許 生地 一錢 細辛 三分 草豆蔻 一錢

金匱翼 卷五 齒痛 羌

羊脛骨灰 二錢

右爲細末。先用溫水漱口淨後擦之其痛立止

一方有熟地黃連吳茱萸。

補腎去風之劑

地黃丸 治腎藏虛食冷熱齒皆痛

生地黃 一兩 白茯苓 防風 獨活

枸杞子 山藥 各半兩

六味搗羅爲末煉蜜丸梧子大每空心煎棗湯

下十九至十五丸 聖濟

張文仲療齒根欲脫方

生地黃搗以綿裹貼齒根常含之甚妙

地骨皮湯

地骨皮 生乾地黃 各一兩 細辛 半兩

戎鹽 一分

每用五錢水煎三五沸熱漱冷吐以差爲度。

地黃湯

生地黃 二兩 獨活 一兩

每用五錢以酒一盞浸一宿煎十餘沸熱嗽冷

金匱翼 卷五 齒痛補腎去風 單

吐以差爲度

殺虫之劑

白礬散 治齲齒齦腫出膿汁

白礬 燒灰 熊膽 各一分 蟾酥 雄黃

麝香 各半

右爲散每用半錢傅牙根。一方有乾蝦蟇半

分

牛膝散 治風齲疼痛解骨槽風毒痛

牛膝 一兩 燒灰

每以少許末著齒間含之。

又方

郁李根一握。水一盞煎至六分熱含之。吐虫長六分黑頭。

又方

大醋一升。煮枸杞根白皮一升。取半升含之。虫立出。肘後

補腎之劑

地黄丸

金匱翼

卷五

齒痛殺虫補腎

四

人參

山萸各四兩 生地五斤 白蜜一升

枸杞根三兩 白茯苓二兩 酥少許

右將參苓杞萸爲末。以好酒一斗煎至三升。去滓。入地黄汁酥蜜同煎。至可丸。卽丸如小豆大。每服二十九。溫酒送下。日三服。漸加至五服。

八味丸

安腎丸

咽喉

咽者。嚥也。喉者。候也。咽接三脘以通胃。故以之嚥物。喉通五藏以系肺。故以之候氣。氣喉穀咽。皎然明白。千金謂喉嚥主通利水穀之道。咽門主通藏府津液。神氣謀也。

喉以納氣。故曰喉主天氣。咽以納食。故曰咽主地氣。一陰一陽結。謂之喉痺。一陰謂心主。一陽謂三焦。二脈並絡于喉。氣熱內結。故爲喉痺。

喉風喉痺。皆由膈間素有痰涎。或因七情不節。而作

金匱翼

卷五

咽喉

聖

火動痰上。壅塞咽喉。所以內外腫痛。水漿不入。言語不出。可謂危且急矣。

兩寸之脈浮洪而溢者。喉痺也。脈微而伏者死。

熱結咽喉。腫遶于外。且麻且痒。腫而大者。名纏喉風。纏喉風之症。先兩日胸膈氣緊。出氣短促。忽然咽喉腫痛。手足厥冷。氣閉不通。頃刻不治。纏喉風多屬痰火。其咽喉內外皆腫者是也。

喉痺之症。宜速用針法吐法以救之。若懸雍垂。則不可刺破。刺則殺人。懸雍者。生于上腭音聲之關也。藏

府伏熱。上衝咽喉。則懸雍腫長下垂也。

乳蛾。俗名也。古方通謂之喉痺。以一邊腫者為單蛾。兩邊腫者為雙蛾。然雙蛾易治。單蛾則難治。

噤痛者。咽喉不能納穀與唾。而地氣閉塞也。喉痺咽痛者。咽喉俱病。天地之氣並閉塞也。蓋病喉痺者。必兼咽痛。病咽痛者。不必兼喉痺也。

凡咽喉痺。不可純用涼藥。目前取效。上熱未除。中寒復起。毒氣乘虛入腹。胸前高腫。上喘下泄。手足厥冷。爪甲青紫。七日後。全不食。口如魚口者死。

金匱翼

卷五 咽喉

聖

客熱咽痛

客熱咽痛者。凡風邪客喉間。氣鬱成熟。故為痛也。統旨云。有初得病發熱而咽喉自痛者。此得之感冒後。頓厚衣被。或用辛熱。即臥。遂成上壅。或有壅熱而欲取寒涼。為外邪所襲者。俱宜甘桔湯。甘以除熱。辛以散結也。

喉痺咽痛。一鄉皆相似者。屬天行運氣之邪。勿用酸寒之藥。點之下之。鬱其邪于內。不得出也。

清咽利膈散

薄荷 防風 元參 甘艸各五分

桔梗 連翹各一錢 大黃酒炒 芒硝

牛蒡 荆芥各七分 片苓酒炒 梔子各五分

右作一貼。水煎溫服。食後。醫鑿

甘桔湯

甘艸二兩 桔梗一兩 米

每服五錢水一鍾。半煎服。錢氏加阿膠。海藏

加牛蒡子。竹茹。太無加荆芥。生薑

丹溪云。咽痛必用荆芥。陰虛火炎必用元參。

金匱翼

卷五 客熱咽痛

聖

必用方加荆芥薄荷元參防風黃芩各一兩

聖濟總錄云。一切咽喉痛。紫雪為要藥。

絳雪散 治咽喉熱痛腫塞。

寒水石半兩 礞砂 牙硝 硃砂各研一錢

龍腦半錢

右為細末。每一字。摻入口。嚥津。

千金烏扇散

生烏扇十兩 升麻三兩 羚羊角 通艸

芍藥各二兩 薔薇根切一升 生地切五升 猪脂二斤

生艾葉 六銖

右咬咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎取苦酒盡膏不鳴爲度去滓薄綿裹膏似大杏仁大內喉中細細吞之。

碧雪 治積熱口舌生瘡心煩喉閉。

芒硝 青黛 寒水石 石羔 煨各飛研

朴硝 硝石 馬牙硝 各等分

甘艸煎湯二升入諸藥再煎用柳枝不住攪令溶方入青黛和勻傾入砂盆內冷卽成霜研末

金匱翼

卷五 客熱咽痛

聖

每用少許以津含化如喉閉以竹管吹入喉中。

牛蒡子湯

牛蒡子 錢二 元參 犀角 升麻

黃芩 木通 桔梗 甘草 各一錢

水煎食後服此辛涼解散之劑。

聖濟射干丸方

射干 一兩 香豉 一合 杏仁 去皮尖炒 芍藥

犀角 各二兩 升麻 一兩 炙艸 半兩

蜜丸小彈子大每一丸含化嚥津日三五服。

元參散

元參 一兩 升麻 射干 大黃 各五錢酒浸

甘艸 二錢五分炙

每服五錢水煎時時含嚥。

客寒咽痛

鍼經云寒氣客于會厭卒然如癭此寒氣與痰涎凝結咽喉之間宜以甘辛溫藥治之切忌寒涼邪鬱不解則疾成矣。

千金母薑酒

金匱翼

卷五 客寒咽痛

聖

母薑汁 一升 酥 牛骨髓 各一升 桂心

秦椒 各一兩 防風 一兩 芍藥 獨活 各一兩

右爲末內薑汁中煎取相淹濡下酥髓等合調

微火三上三下煎平旦溫清酒一升下膏二合

卽細細吞之日三夜。

半夏桂甘湯 治冷症無陽咽疼喉閉。

辣桂 甘艸 炙 半夏 製

右件等分剉每服三錢水一大盞煎半盞候冷

細細呷之 治人

伏氣之病謂非時暴寒中人伏于少陰之經始先不覺旬日乃發先發咽痛次必下利古方謂之腎傷寒宜用半夏桂甘湯

咽痛失音

咽痛失音者風熱痰涎壅閉咽門也亦有陰虛肺損者蓋肺象金而出聲音金破則不鳴金實亦不鳴辨之之法實者壅遏不出虛者聲嘶破也

宣明訶子湯

訶子 四箇半 生半熟 桔梗 一兩半 炙半生 甘草 二寸半 炙半生

金匱翼

卷五

咽痛失音

醫

右為細末每服二錢用童子小便一盞水一盞煎五六沸溫服甚者不過三服即愈

海藏發聲散 治咽喉痛語聲不出

括萋 一個 白殭蠶 去頭炒 半兩 甘草 錢二 炙

右為細末每服三錢溫酒或生薑自然汁調下用五分綿裹喻化嚥津亦得日兩三服寶鑑有桔梗七錢半炒為末每一錢入朴硝一錢七和勻口含嚥津

咽喉妨悶

咽喉如有物妨悶者肺胃壅滯痰氣相搏結于喉間金匱所謂咽中如有炙燔千金所謂咽中貼貼狀如炙燔吞不下吐不出者是也其症婦人多鬱者恒患之聖惠方云憂愁思慮氣逆痰結皆生是疾也

醫學正論喉乾燥痛四物加桔梗荆芥黃柏知母煎服立已

咽喉乾枯常如毛刺吞嚥有碍者風燥也宜荆防敗毒散加薄荷黃芩倍桔梗入生薑煎服

厚朴湯

金匱翼

卷五

咽喉妨悶

醫

厚朴 薑汁 炙 赤苓 紫蘇葉 各一兩 半夏 薑製一兩 每服三錢入生薑三片同煎食後溫服

杏仁煎

杏仁 去皮尖 雙仁炒 桑根白皮 貝母 各一兩 酥 半兩

生薑汁 二合 生地汁 二合 大棗 六十枚 紫苑 二分

甘草 炙 桔梗 炒 五味子 地骨皮

赤茯苓 去皮各一兩 人參 三分

共十四味研杏仁以水五升濾取汁將草藥細剉同煎至二升以綿濾去滓續下酥及地黃汁

慢火煎成膏。每食後含一匙。細細嚥津。

按喉間痰氣結聚成核。久而不散。則生燥澹。厚朴湯用辛味以破之也。杏仁煎。假潤藥以通之也。

發聲散 治咽痛生瘡妨悶。

黃瓜羹 大者一枚 桔梗半 七錢 白礬錄 五錢 甘州 二錢

右為末。每取少許乾搗。如咽腫紅紫色。加朴硝

一錢。如喉中有小白頭瘡。入白礬末五分。

通噎散 治喉痛生瘡聲啞。

白礬砂 二錢 孩兒茶 青黛 滑石

金匱翼 卷五 咽喉妨悶 集

寒水石 各一錢 蒲黃 馬牙硝 枯白礬 各六分

黃連 黃柏 各五分 片腦 二分

右為細末。煉化白砂糖和丸。芡實大。卧時舌壓

一丸。自化入喉神效。

一人但飲食若別有一咽喉。斜過膈下。徑達左脇而

作痞悶。以手按之。則漉漉有聲。以控涎丹十粒服之。

少時痞處熱。作一聲轉瀉下痰。飲二升。再食正下而

達胃矣。

喉痺諸法

喉痺者。咽喉腫塞痺痛。水漿不得入是也。由脾肺不利。蘊積熱毒。而復遇暴寒折之。熱為寒閉。氣不得通。結于喉間。其症發熱惡寒。喘塞脹悶。不急治。殺人。針刺出血。搗鼻吐痰。皆急法也。

文潞公喉腫咽痛。喉科治之。三日愈甚。上召孫兆治之。孫曰。病得相公書判筆一管。去筆頭。露水點藥入喉。便愈。孫隨便刺相公昏仆不省人事。左右皆驚愕。流汗。孫乃笑曰。非我不能救相公。須臾嘔出膿血升餘。旬日乃平復如故。予嘗治一男子喉痺。于太谿穴

金匱翼 卷五 喉痺諸法 集

刺出黑血半盞而愈。由是言之。喉痺以惡血不散故也。

凡治此疾。暴者必先發散。發散不愈。次取痰。取痰不愈。次取汚血也。雙全善 綱目 火鬱則發之。即發散之意。

也。血出多則愈。有針瘡者。薑汁調熱水時時呷之。

治急喉痛。於大指外邊指甲根齊針之。不問男左女

右。只用人家常使針針之。令血出即效。如大段危急。

兩手大指多針之。甚妙。夷堅志

挑背法。於暗室中。用紅紙條照背。上隱隱有紅

點用針挑破喉痺將死者破盡即甦。

元公章少卿述聞德府士人攜僕入京其一患喉閉
脹滿氣喘塞不通命在須臾詢諸郡人云惟馬行街
山水李家可看治即與之往李駭曰此症甚危猶幸
來此不然死耳乃于筒中取一紙撚用火點着半烟
起吹滅之令僕張口刺于喉間俄吐出紫血半合即
時氣寬能言及啖粥搽藥敷之立愈士人甚神其術
後還鄉里村落一醫偶傳得此法云咽喉病發于六
府者如引手可探及刺破瘀血即已若發于五藏則

金匱翼

卷五 喉痺諸法

三

受毒牢深手法藥力難到惟用紙撚為第一然不言
所以用之之意後有人拾得其殘者蓋預以巴豆油
塗紙故施火即着藉其毒氣徑赴病處以破其毒也
牙關緊閉者以烟薰入鼻中即時口鼻涎流牙關自
開醫說

周密齊東野語云密過南浦有老醫授治喉痺垂死
方用真鴨嘴膽磨為末醋調灌之犬吐膠痰數升即
差臨江一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用之即
差屢用無不效驗神方也濟生方用膽磨二錢半白礬

蘇炒五錢研每以少許吹之吐涎名二聖散

孫兆治潘元從急喉痺以藥半錢吹入喉中少頃吐
出膿血立愈潘謝曰非明公不能救贈金百兩願求
其方孫曰猪牙皂白礬黃連等分瓦上焙為末耳既
授方不受所贈

解毒雄黃丸

雄黃 鬱金各一 巴豆去皮油

細末醋糊丸菜豆大茶清下七丸吐出頑痰立
甦水漿不得入口者醋磨灌喉取吐未吐再服

金匱翼

卷五 喉痺諸法

三

丹溪云薑汁殭蠶末治咽痛喉痺神效

喉痺吹藥

白礬末一錢同巴豆一粒同炒去巴豆取礬研
細末吹之即吐濁痰名碧雲散再入輕粉麝香
少許名粉香散吹乳蛾即開

玉鎖匙

焰硝七錢 礬砂二錢 白礬一錢 龍腦一字

為末以竹管吹半錢入喉中神效直指

指鼻透關散

雄黃研 猪牙皂去皮 藜蘆各一分

右為末每用一匙分彈入兩鼻中關透即差。

凡人患喉閉及纏喉風用藥開得咽喉可通湯水急吃薄粥半碗或一碗壓下餘熱不爾即病再來不可不知也咽喉既可身熱頭疼不止此感外邪看脈氣及大小便有表症則發散有裏症則微下之皆愈愈後虛喘而身不熱者必是服涼藥過多而下虛也當服鎮重溫藥一服如黑錫正元之類以粥壓之。

冰梅丸 治喉風腫痛如神。

金匱翼 卷五 喉痺諸法 聖

天南星三十個 大半夏 白礬 白鹽

防風 朴硝各四兩 桔梗二兩 甘艸一兩

大梅實揀七分熟者一百個

先將硝鹽水浸一伏時然後將各藥研碎入水拌勻方將梅實置于水淹過三指為度浸七日取出晒乾又入水中浸透晒乾藥水乾為度方將梅子入磁罐封密如霜衣白愈佳用時綿裹嚙口中徐徐嚙汁下痰出即愈。時行喉痛宜用普濟消毒飲子。

神效散 治喉痺語聲不出猪牙皂角和霜梅為

末嚙之急喉痺其聲嘶者有如痰在喉響此為肺絕之候宜用人參膏救之用竹瀝薑汁放開頻頻服之如未得參膏獨參湯亦得早者十全七八次則十全四遲則十不全一也。

爛喉痧方 筆友張瑞符傳

西牛黃五厘 冰片三厘 眞珠三分

人指甲五厘男病用 象牙屑三分

青黛六分去灰脚淨 壁錢二十個焙土壁磚上者可用木板者不可用

金匱翼 卷五 喉痺諸法 聖

共為極細末吹患處效

筆友張瑞符湖州府人也予往來二十年矣其為人也敦厚和平年過五旬並未生育雖置妾亦終不得懷孕忽一日途遇李相士即導喜云爾當生子矣李乃張之同鄉友也張錯愕曰我半生已來並未生育爾何得相戲若此李曰我昔年曾看爾相許爾無子今爾陰囊紋已滿面豈無子之相後果如其言予因問張曰爾一生如何為善張曰生平並未行善只有兩事亦人所當為者也一舍弟

早亡。所遺一子。我撫養長大。而舍弟所有主顧。我已相與二十年矣。舍姪既長。我使之去。彼不願我。曰。爾在我處。我甚有益。但爾不去。終身只作店夥。我所不忍。今與爾筆。同往各主顧家。相致曰。此即我舍弟某之子也。今已長。可仍用其筆。况此子自幼在我店習業。彼之筆。即我之筆也。又此方甚。我所不秘。餘亦並無所為。予曰。只此可稱善矣。有姪少孤。撫之成立。并使其能繼父業。有救急之方。而公之于世。善莫大焉。予得是方。并述其始末云。

金匱翼 卷五 喉痺諸法 蓋

爾 錫年

門人 平舟沈安伯

星門陳步羔 全校字

珊 圖南

男

龍翔 召南

金匱翼卷五

金匱翼卷六目錄

東亞同文書院大學圖書印

熱厥 寒 虛 氣刺

血瘀 虻蛟

痰積胃脘痛

肝乘胃 腎逆胃

寒冷腹痛

熱痛 冷熱痛 風痛 食積痛

死血痛

金匱翼 卷六 目錄

風虛腰痛

溼冷 濕熱 腎虛 食積

瘀血

脇痛統論

肝鬱 肝虛 腎虛胸脇痛

肝火 汚血 息積

四肢腫

顫振

腳氣統論

腳氣痺攣 腳膝腫痛 少腹不仁

上氣 冲心 腫滿漸成水狀

差後復發

痺症統論

行痺 痛痺 著痺 熱痺

腸痺 胞痺 臂痺 攣症

金匱翼

卷六 目錄

二

金匱翼卷六

飼鶴山人九

長洲後學徐錦炳南氏讀

心痛統論

方論心痛有九種。曰飲。曰食。曰風。曰冷。曰熱。曰蟲。曰悸。曰疰。曰去來。悸者動也。心虛則動而痛也。疰者住也。惡氣所著也。去來者。作止不常。亦邪氣也。但疰為陰而去來為陽耳。

金匱翼

卷六 心痛統論

一

者痛。陽氣不及。邪氣勝之者亦痛。血因邪泣在絡而不行者痛。血因邪勝而虛者亦痛。

五藏六府任督支脈皆絡於心。是以各藏府經脈挾其瀋氣。自支脈上乘於心。皆能作痛。然必有各藏府病形與之相應。經云心痛引少腹。上下無定處。溲便難者。取足厥陰。心痛腹脹。噎然。大便不利。取足太陰。心痛短氣。不足以息。取手太陰。心痛引背。不得息。刺足少陰。不已。刺手少陽。此之謂也。

胃居中焦。稟冲和之氣。為水穀之海。三陽之總司。凡

飲食寒邪氣血蟲邪惡氣亦如心痛有不一之因也
惟肝木之相乘者尤甚其症胃脘當心而痛上支兩
脇膈咽不通飲食不下病名食痺食痺者食已心下
痛吐出乃已是也其腎水上逆者次之腎水上逆者
寒厥入胃也

胃者土氣也主乎痞故胃病者或滿或脹或食不下
或嘔吐吞酸或大便難或瀉利而色浮而黃者皆是
胃之本病也其有六淫五邪相乘於胃者大率與前
所列心痛之形狀相類但其間必與胃本病參雜而

金匱翼

卷六 心痛統論

二

見之也憂思忿怒之氣素蓄於中發則上冲旁擊時
復下注若三焦無所阻滯任其游行則不能作痛雖
痛亦微若有濕痰死血阻滯其氣而不得條達兩相
搏擊則痛甚矣

余家有治心胃痛丸方

白胡椒 枳殼 白檀香 紅花

五靈脂去砂 廣木香

各為末於六月六日修合水泛為丸每用七丸

噙化少頃痛即止余因名之曰靈香丸此條宜注胃脘

痛中鶴年識藥共六味五味各一兩五靈用
五兩子憶昔年合藥時配分兩仿御若此
熱厥心痛

金鈴子散 保命

金鈴子 延胡索各一兩

右為末每服三錢酒調下痛止與枳朮丸

左金丸

川黃連六兩鹽水炒 吳茱萸去開口鹽水浸一伏一兩

右為末水泛為丸或粥糊丸每服三十九開水

送下

金匱翼

卷六 熱厥心痛

三

機要云熱厥心痛者身熱足寒痛甚則煩躁而吐
其脈浮大而洪當灸太谿崑崙謂表裏俱瀉之是
為熱病汗不出引熱下行表汗通身而出者愈也
灸畢服金鈴子散則愈痛止服枳朮丸去其餘邪
也

丹溪云心膈痛曾服香燥熱藥復作復結轉深轉

痼宜山梔炒黑二兩香附鹽水浸炒一兩川芎一

兩黃芩黃連並酒炒木香檳榔各二錢五分赤麴

番降香各五錢芒硝二錢為末生薑汁童子小便

各半盞調二錢精時服。

心寒痛

大建中湯

蜀椒二合炒去汗 乾薑四兩 人參二兩

以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後

更服當一日食糜粥溫覆之。

扶陽益胃湯

附子炮去皮臍二錢 乾薑炮一錢半 草豆蔻 益智仁

金匱翼

卷六

心寒痛

四

官桂

白芍

甘草

人參各一錢

吳茱萸

陳皮

白朮各五錢

右剉如麻豆大都作一服水二盞薑三片棗二

枚同煎至一盞去滓溫服食前。

羅謙甫治漕運使崔君長男雲卿年二十五體本

豐肥奉養齊梁時時有熱證友人勸進寒涼藥食

寒物至元庚辰秋發瘧醫以砒霜等藥治之新汲

水下禁食熱物瘧病未除反添吐瀉脾胃復傷中

氣愈虛腹疝腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦

屢醫未効至冬不差延至四月勞役煩惱過度前

症大作請余治之診得脈弦細而微手足稍冷而

色青黃不澤情思不樂恐人煩擾飲食減少微飽

則心下痞悶嘔吐酸水每發作冷汗時出氣促不

安須人額相抵而坐少時易之予思內經中氣不

足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則乃為痿

厥心悅又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得

熱則已非甘辛大熱之劑則不能愈遂製此方經

金匱翼

卷六

心寒痛

五

熱溫中散寒故以為君草豆蔻益智仁辛苦溫治

客寒犯胃為佐脾不足者以甘補之炙甘草甘溫

白朮陳皮苦溫補脾養氣水挾木勢亦來侮土故

作急痛桂辛熱以退寒水芍藥味酸以瀉木來尅

土吳茱萸苦熱瀉厥氣上逆於胸中為使三服大

勢去痛減半至秋先灸中脘三七壯以助胃氣次

灸氣海百餘壯生發元氣滋榮百脈以還少丹服

之喜飲食添肌肉皮膚潤澤明年春灸三里二七

壯乃胃之合穴亦助胃氣引氣下行又以芳香助

脾服育氣湯。加白檀香平治之。戒以懲忿窒慾。慎言語。節飲食。一年而平復。

金匱治心痛微背寒冷者方。

赤石脂 乾薑 蜀椒各四分 附子炮二分

烏頭炮一分

右為末。蜜丸。梧子大。先食服一九。日三。不住稍增之。

余嘗治一香山人。心痛。問之。則服藥已一月矣。向左臥則右痛。向右臥則左痛。仰臥則痛在前。偃臥

金匱真 卷六 心寒痛 六

則痛在背。坐立則痛在上。無一刻少安。余因此中虛。與以小建中湯。重用飴糖。炙甘草四劑而安。

心虛痛

良方妙香散 治心氣不足。時時疔痛。按之則止。

虛煩少睡。夜多盜汗。常服補益氣血。養心止痛。

黃芪薑汁炙 山藥 茯神去木 茯苓去皮

遠志去心炒 人參 桔梗 甘草炙各半兩

木香煨二錢半 辰砂三錢另研 麝香一錢另研

右為細末。每服二錢。不拘時。

按此方宜去茯苓麝香。蓋心氣已虛。惟宜收養。有木香之通。不宜更益。麝香之散。有茯苓之淡。不必加以茯苓之滲也。昔人云。按之痛止者為虛。宜以酸收之。勿食辛散之劑。又云。病久氣虛。血損。及素作勞。羸弱之人。患心痛者。皆虛痛也。有服大補之劑而愈者。不可不知。

氣刺心痛

氣針丸 治久積風壅。心胸築痛。兩脇心膈。有似

金匱真 卷六 心虛痛 七

針刺。六脈沉伏。按之手足不可近。此藥屢試神驗。常服疏滯氣。止刺痛。

木香 枳榔 青皮 陳皮

大黃各四分 牽牛取頭末半斤

蜜丸。梧子大。每服三十九。薑湯送下。食前量虛

實加減。

新定烏附丸 治氣刺攻痛。但忍氣即發者。

天台烏藥二兩 白豆蔻五錢 沉香五錢

茯苓一兩 香附四兩 甘草一兩

右為細末。煉蜜九彈子大。每服一九。食後淡生薑湯化下。

一粒金丹 治氣痛。

鴉片二錢半 阿魏一錢 木香 沉香各五分

牛黃二分半

右將沉香木香牛黃為末。以鴉片阿魏放碗內。滴水溶化。和蜜為丸。菘豆大。金箔為衣。每一粒。熱氣痛。涼水下。冷氣痛。滾水下。

神保丸 治諸氣疰痛。心腸腹脇腎氣皆治。

金匱翼 卷六 氣刺心痛

全蠟七個 巴豆十粒去皮為霜 木香 胡椒各二錢半

硃砂二錢半內一半為衣

右為末蒸餅和丸。麻子大。硃砂為衣。每五七丸。薑湯溫酒任下。

血瘀心痛

拈痛丸奇效下同

五靈脂去淨砂子 蓬莪朮煨 木香 當歸各等分

蜜丸梧子大。每服二十九。食前橘皮湯送下。

手拈丸

延胡索 五靈脂 草果 沒藥各等分

右為細末。每服三錢。熱酒調下無時。

經驗失笑散

五靈脂淨好者 蒲黃等分

右為末。每服二錢。用黃醋一杓熬成膏。再入水一盞。煎至七分。熱服。

丹溪云。死血作痛。脈必澀。作時飲湯水下。或作呢。壯人用桃仁承氣湯下之。弱人用失笑散和之。或以歸尾川芎牡丹皮蘇木紅花延胡索桂心桃仁泥赤麩

金匱翼 卷六 血瘀心痛 九

番降香之屬煎成。童便酒韭汁大劑飲之。

虻咬心痛

蕪荑散 治大人小兒虻咬心痛。經云。虫貫心則殺人。欲驗之。犬痛不可忍。或吐青黃綠水涎沫。或吐虫出發有休止。此是虻咬心痛也。宜速療之。

之。

蕪荑 雷丸各半兩 乾漆搗碎炒令煙盡一兩

右為細末。每服三錢。溫水七分。蓋調和。服不拘時。甚者不過三服。小兒每服半錢。

烏梅丸 治藏寒。虻虫動作。上入膈中。煩悶嘔吐。

時作時止。得食即嘔。常自此涎。有此症候。謂之

虻厥。此藥主之。

烏梅三百個 黃柏炙 細辛去苗 肉桂

附子炮去皮臍 人參各六兩 乾薑炮 當歸

蜀椒去目及閉口者。微炒出汗。各四兩 黃連十六兩

右異搗篩合治之。以醋浸烏梅一宿。去核蒸之。

五斗米下。飯熟搗成泥。和藥令相得。內臼中加

煉蜜。杵二千下。丸如梧子大。每十五丸。溫米飲

金匱真 卷六 虻咬心崩 十一

食前下。

化蟲丸 治寸白虫。

黃丹半兩 錫灰一兩 定粉二兩

右同研極細末。每服一錢。先燒猪肉五文。吃了。

後以生油一口許調藥服。至晚取下。婦人有胎

不可服。

痰積胃脘痛

丹溪白螺殼丸

白螺殼火煨 滑石 蒼朮 山梔子

紅麴炒 香附前便 南星炮製 青皮

枳殼炒 木香 半夏 砂仁各半

桃仁炒去皮尖

右為末。春加川芎。夏加黃連。秋加吳茱萸。

用生薑汁浸蒸餅為丸。菉豆大。每服五十九。

海蛤丸 丹溪 治痰飲心痛。

金匱真 卷六 痰積胃脘痛 十二

海蛤燒灰研極細過數日火毒散用之 瓜蒌仁帶穢

右以海蛤粉入瓜蒌內。乾濕得所為丸。每服五

十九。

加味二陳湯 治痰飲食積。胃脘作痛。或脹或痞。

陳皮 半夏 茯苓 炙草

枳實 川連 滑石 木通

山查 乾葛

此中焦溼痰蘊熱痞滯不通。以二陳加連枳山查。清滌中宮。妙在乾葛升引清氣。滑石木通蠲

除濁氣。清升濁降。痛脹自除。

肝乘胃痛

新定吳茱萸湯 治胃脘痛不能食。食則嘔。其脈弦。

人參 一錢 吳茱萸 三分 川連 六分 茯苓 二錢

半夏 一錢 宣州木瓜 七分

右作一服水薑煎。

腎逆胃痛

新定桂苓湯

金匱翼 卷六 肝乘胃痛腎逆胃痛 三

桂 一錢 茯苓 三錢 人參 一錢 甘草 五分

芍藥 一錢 生薑 五分

右作一服。水煎空心服。

按古法有生韭汁和五苓散為丸。空心茴香湯下。蓋亦取泄水氣益土氣之意。愚謂白朮之滯。不如人參之益胃。韭汁之辛。不如生薑之散逆。且猪澤亦過傷腎氣。不如芍藥之攝水下行也。

寒冷腹痛

腹痛屬寒冷者。多是口食寒物。鼻吸冷氣。脈澀氣阻。則為疼痛。其症四肢逆冷。唇口變青。其脈沉或緊。經云寒氣客於脈中。則脈寒。脈寒則縮。縮則脈細。急細急則外引小絡。故卒然而痛。得炅則痛立止。或吐清水。所謂寒氣客於腸胃。厥逆上出。故痛而嘔也。宜溫散或溫利之。

木事溫脾湯

厚朴 乾薑 甘草 桂心

金匱翼 卷六 寒冷腹痛 三

附子 各二兩 大黃 四錢

右咬咀各一兩。水二鍾煎六分。頓服。治鋼冷在腸胃。泄瀉腹痛。宜先取去。然後調治。不可畏虛。以養病也。

溫脾丸 外臺

大黃 麥芽 乾薑 各三兩 厚朴 炙

當歸 附子 炮 甘草 炙 桂心

人參 枳實 各一兩

蜜丸如梧子大。十五丸。日三增至二十九。

按溫脾丸。大黃多而用蜜九少服。急法緩用也。溫脾湯。大黃少而作湯服。且不川參歸。緩法急用也。總之病非實熱。法不可下。而鋼冷在藏。不下則病不去。故權宜於緩急之間如此。若其中無積滯者。則但宜緩之而已。不必下也。或挾虛者。則兼補之。

外臺附子湯

附子炮 甘草炙各二兩 宿薑一兩 倉米半升

半夏製四兩 白朮三兩 大棗二十枚

金匱翼

卷六 寒冷腹痛

十四

水一斗。煮三升。去滓分三服。治虛冷腹痛佳。

外臺建中湯 治氣血虛寒。不能榮養心脾。其痛連綿不已。而亦無急暴之勢。按之則痛反緩。或按之便痛。重按卻不甚痛。此正是虛症。經所謂虛者聶辟。氣不足。按之則氣足以溫之。故快然而不痛是也。

黃耆 白芍各三兩 甘草炙 桂心各二兩
生薑六兩 半夏五兩 大棗十二枚 飴糖十兩
右以水八升。煮取三升。分三服。

治當臍痛。便溺不利。怯寒脈虛者方。

熟地三錢 肉桂五分 白芍一錢 桂枝五分

當歸 茯苓各一錢

水煎服。

治臍下冷撮痛。陰內冷如冰。延胡苦棟湯方。

熟地二錢 川棟 延胡各五分 附子

肉桂各七分 炙甘草一錢

右都作一服。水四盞。煎至一盞。去滓稍熱服。空心食前。

金匱翼

卷六 寒冷腹痛

十五

溫中湯 治戊土已衰。不能運化。又加客寒。聚為滿痛。散以辛熱。佐以苦甘。以淡泄之。氣溫胃和。痛自止矣。

厚朴薑製一兩 橘皮去白兩 乾薑七錢 甘草炙

草豆蔻 茯苓去皮 木香各半兩

右為粗末。每服五錢。水二盞。薑三片。煎一盞。去粗。溫服食前。

局方神保丸

全蠍 巴豆各十個 木香 胡椒各二錢

右爲末入巴豆研勻湯化蒸餅丸如麻子大硃砂爲衣每服五七丸此藥大能宣通藏府治諸積氣爲痛。

熱痛

熱痛者二便閉赤喜冷惡熱經云熱留於小腸腸中痛痺熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不通也宜寒宜下勿遽補也。

肘後療卒腹痛方 掘土作小坑以水滿中攪取汁飲之差。

金匱翼 卷六 熱痛 十六

統旨清中湯

黃連 山梔炒各二錢 陳皮 茯苓各一錢半
半夏一錢 薑湯七次 草豆蔻仁搗研 甘草炙各七分
水二鍾薑三片煎八分食前服。

冷熱痛

冷熱痛者經所謂寒氣客於經脈之中與戾氣相搏則脈滿滿則痛而不可按也寒氣稽留熱氣從上則脈充大而血氣亂故痛甚不可按也治之宜兼寒熱而調之。

一方 草豆蔻七分 炒山梔二錢 右二味爲末以薑汁調粥丸服之。

苦楝丸 治奔豚小腹痛。

川楝子 茴香各二兩 附子一兩炮去皮臍 右三味酒二升煮盡爲度焙乾細末之每藥末一兩入延胡索半兩全蝎一十八箇炒丁香一十八粒別爲末和勻酒糊丸梧子大温酒下五十九空心服。

金匱翼 卷六 冷熱痛 十七

風痛

風痛者邪風內溢腸胃與正氣相搏而痛也其症惡風脈弦腹中奔響急痛仲景所謂陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯是也。

小柴胡湯

柴胡 黃芩 半夏 甘草炙
人參 乾薑 大棗
水煎服按此方宜照仲景加減法腹痛者去黃

芩加芍藥

和劑抽刀散

川白薑 五兩判入巴豆肉一錢一字同炒至豆黑去豆

良薑 五兩入斑蝥二十五個同炒至黑去斑蝥

石菖蒲 五兩半糯米六兩錢炒黃

石為末每服二錢空心溫酒調下。

仁齋直指云。有一田夫醉飽之餘。露星取快。一枕天明。自此脾疼。攻刺百藥罔效。淹淹數載。後遇至人。授以抽刀散。數服頓愈。則知風露之根。入在脾胃。良薑

菖蒲為能散其邪。巴蚤借氣為能伐其根。觀此可以通一畢萬矣。然而痛不復作。養脾之劑。獨不可繼。是而調理之乎。療病如濯衣。必去其垢污。而後可以加漿。餘醫者意也。請借是以為喻。

食積痛

食積痛者。經所謂飲食自倍。腸胃乃傷也。其症惡心惡食。吞酸噯腐。其脈多沉實。當分三焦而治。在上吐之。在中消之。在下下之。

吐之方

金匱要略 卷六 風痛 太

白鹽二升。以水三升。煎服吐下即定。

下之方

川大黃 乾薑 巴豆 去皮心研壓去油等分

蜜丸如小豆大。溫水下一丸。實者加一丸。未知

服三丸。腹中鳴轉。下行便愈。此治寒飲食過傷

心腹卒痛。如錐刺之狀。若傷濕熱之物。不得化

而悶亂便閉者。宜厚朴三物湯。或枳實導滯丸

良。厚朴三物湯

燒鹽半斤。溫湯五六升。和服探吐。

吳鶴臯云。凡腹痛連脇膈。手足冷。脈沉伏者。多是飲

食痰飲填塞。至陰。抑遏少陽。上升之氣。不得敷暢。兩

實相搏。令人自痛。肢冷脈伏。皆陽氣閉藏之象也。經

曰木鬱達之。故用吐法。鹹能稟堅。故用燒鹽。

消之方

取其餘類燒作末。酒服方寸匕。如食肉即以肉

如所食者燒作末乃效。鶴年

又治雜食痰實不消。心腹堅痛方。

金匱要略 卷六 食積痛 尤

白鹽二升。以水三升。煎服吐下即定。

下之方

川大黃 乾薑 巴豆 去皮心研壓去油等分

蜜丸如小豆大。溫水下一丸。實者加一丸。未知

服三丸。腹中鳴轉。下行便愈。此治寒飲食過傷

心腹卒痛。如錐刺之狀。若傷濕熱之物。不得化

而悶亂便閉者。宜厚朴三物湯。或枳實導滯丸

良。

厚朴三物湯

厚朴二兩炙 去皮 枳實二枚大 者炙 大黃四兩

水二斗。煮枳實厚朴二味至五升。下大黃煮取二升。溫服一升。以利為度。

死血痛

死血痛者多從鬱怒及飽食後急走得之。其痛必有定處。其脈必芤。微則和之。甚則下之。

桃仁承氣湯

桃仁五十粒 去皮尖 桂枝二兩 去皮 大黃四兩 芒硝二兩

甘草二兩 炙

金匱翼 卷六 死血痛

三

右五味。以水七升。煮取二升半。去滓。內芒硝。更上火。微沸。下火。先食。溫服五合。日三服。當微利。虛者加地黃蜜丸。以緩除之。

一方

婦人油頭髮燒如灰。細研篩過。溫酒調下二錢。元豐中丞相王郁公。小腹痛。國醫治之。百藥不止。服此即愈。

風虛腰痛

風虛腰痛者。腎虛而風冷乘之也。其尺脈虛浮而痛。多抽掣。或拘急且痠。而上連脊背。不時速治。喜流入腳膝。為偏枯冷痺。緩弱之疾。

獨活寄生湯

獨活三兩 細辛 牛膝 桑寄生

秦艽 茯苓 白芍 人參

熟地黃 防風 杜仲 川芎

當歸各二兩 桂心 甘艸

金匱翼 卷六 風虛腰痛

三

每服五錢。水煎空心服。

甘豆湯直指 治腎虛內蓄風熱。腰痛或大小便不通。

生甘草二錢 黑大豆二合

加生薑七片。水煎服。

治腎藏風攻至腳膝痛。

連珠甘遂一兩 木鱉子一個雄 一個雌 去殼

右為末。積猪腰子二個。破開藥末一錢。摻勻。溼紙裹數重。慢火煨熟。放溫。五更初細嚼米飲下。

如積多則利多。少則少也。宜軟飯將息。若患一
 脚。御看左右。如左脚用左邊腰子。右用右邊者
 藥末止一錢。壬子年在毘陵。有馬姓人鬻酒久
 不見。因詢其親云。宿患腎藏風。今一足發腫如
 瓠。自腰以下。巨細通為一律。痛不可忍。欲轉側
 必兩人扶持。方可動者。欲以鉞刀決之。子曰未
 可。子有藥當合以贈。如上法服之。辰巳間下膿
 如水晶者數升。即時痛止腫退。一月拄拐而行
 子再以赤烏散。令塗貼其膝方愈。後十年過毘
 陵。牽其子列拜以謝云。向年脚疾。至今不復作。
 雖積年腎藏風。併已失去。今健步自若矣。
 經云。邪之所湊。其氣必虛。留而不去。其病則實。若不
 決而去之。而欲以補藥攻疾。非徒無效而已也。余讀
 本事方。有取乎此。故備錄如右。

溼冷腰痛

溼冷腰痛者。坐臥冷溼。久久得之。金匱所謂腎著是
 也。其症痛而冷重。遇陰或久坐則甚。腎著湯主之。
 腎著湯

生附湯

附子生一分 蒼朮炒 杜仲各半兩 薑汁炒 生乾薑

白朮 茯苓 牛膝酒浸 厚朴製

甘草炙各二兩

右剉每三錢。薑四片。棗二枚。食前服。

牽牛丸 治冷濕流注。腰疼不可屈伸。

黑牽牛 延胡索微炒 補骨脂三味另研另搗另炒取末

各二兩

右煨蒜研膏。龙如桐子大。每服五十九。食前葱

金匱翼 卷六 溼冷腰痛

酒鹽湯任下。楊氏家藏方

子和禹功散 治水氣流注腰痛。

黑牽牛四兩 茴香炒

右為末。薑汁調一二錢服。

溼熱腰痛

脾有濕熱。傳之於腎。得之醇酒厚味。內傷中氣。濕熱
 蘊積。流注腎經。令人沉重疼痛。遇天陰或久坐而發。
 其脈緩者是也。

東垣蒼朮湯

蒼朮五錢去濕止痛柴胡三錢行經防風風勝濕錢半去

黃栢一錢半除熱止痛

水二鍾煎至一鍾空心食前。

丹溪治濕熱腰腿痛方。

龜版酒炙二兩蒼朮酒炒蒼耳

威靈仙酒浸一兩側柏半兩

右為末。酒糊為丸。每用黑豆汁煎四物湯加陳

皮甘草生薑煎湯下。一方有白芍知母。

腎虛腰痛

金匱翼 卷六 溼熱腰痛 腎

腎虛腰痛者精氣不足足少陰氣衰也。足少陰者腎之經也。其脈貫脊屬腎抵腰中。精氣不足則經脈虛而痛。其症形羸氣少行立不支而臥息少可無甚大痛而悠悠戚戚屢發不已。經云腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣。此之謂也。丹溪云腎虛者其脈大。

本事麋茸丸

麋茸鹿茸亦可兔絲子製各兩茴香五錢

右為末以羊腎二對陳酒煮爛去膜研如泥和

丸桐子大陰乾如羊腎少太乾以酒糊佐之。每

服三五十九溫酒或鹽湯下。

青娥丸

破故紙四兩炒香杜仲淨入兩薑汁炒胡桃肉十兩

右為末酒糊丸梧子大每三五十九空心溫酒

送下蜜丸亦可百一補髓丹有鹿茸二兩沒藥

一兩。

無比山藥丸

赤石脂煨茯苓去皮山茱萸去核巴戟去心

牛膝酒浸熟乾地黄酒浸澤瀉各一兩

金匱翼 卷六 腎虛腰痛 龜

兔絲酒浸杜仲去皮切山藥各三兩

五味子六兩肉蓯蓉酒浸四兩

蜜丸梧子大每服三十九空心溫酒或鹽湯下。

余治一姓顧婦女患腎虛腰痛用猪腰二枚破開

納鹽水炒杜仲末縫好煮熟去藥任意服之而愈

鶴年

食積腰痛

食積腰痛者食滯於脾而氣傳於腎也。夫腎受脾之精而藏焉者也。若食不消則所輸於腎者非精微之

氣為陳腐之氣矣。而腎受之。亂氣傷精。能無痛乎。亦有醉飽入房太甚。酒食之積。乘虛流入少陰。腰痛難。以俯仰者。疏滯其源。澄清其流。此大法也。或云四物合二陳。加麥芽神麴。杜仲黃柏官桂砂仁葛花桔梗之類。

神麴酒

陳久神麴一塊。燒通紅。淬老酒。去神麴。通口不。青蛾丸兩服。頓愈。

青蛾丸 見前

金匱要略 卷六 食積腰痛

瘀血腰痛

瘀血腰痛者。因剝及強力舉重得之。蓋腰者一身之要。屈伸俯仰無不山之。若一有損傷。則血脈凝滯。經絡壅滯。令人卒痛。不能轉側。其脈澀。日輕夜重者。是也。

茴香酒

破故紙 炒香 茴香 炒 辣桂 等分

右為末。每服二錢。熱酒調。食前。故紙主腰痛。主行血。仁齋

和劑復元通氣散 治閃挫腰脇痛

舶上茴香 炒 穿山甲 蛤粉炒 延胡索 醋炒

白牽牛 炒 甘草 炙 陳皮 去白各

南木香 一兩

右為末。每服一錢。熱酒調下。食前。

金匱要略 卷六 瘀血腰痛

鍾食遠服。

肝虛脇痛

肝虛者。肝陰虛也。陰虛則脈絀急。肝之脈貫膈布脇。肋陰虛血燥。則經脈失養。而痛。其症脇下筋急。不得太息。口昏不明。爪枯色青。遇勞即甚。或忍飢即發者。是也。

滑氏補肝散

酸棗仁炒四錢 熟地一錢 白朮炒一錢 當歸

山茱萸 山藥 川芎 木瓜各一錢半

金匱翼

卷六

肝虛脇痛

辛

獨活

五味各三分

右為末。每服五錢。水煎服。

肝體陰。而用陽。此以甘酸補肝體。以辛味補肝用。加獨活者。假風藥以張其氣也。一方有人參黃芪牛膝石斛栝子仁桃仁。無山藥獨活五味。

補肝湯

乾地黄三錢 白芍一錢半 當歸 陳皮各一錢

川芎七分 甘草五分

右六味。都作一服。水煎。此亦甘酸辛兼補體用之法。

一方阿膠為丸。梧子大。每服二錢。空心白滾湯下。

一方雞子黃一枚。調吞日二服。

以上二方。皆甘酸補肝體之法。

腎虛胸脇痛

房勞過度。腎氣虛弱。羸怯之人。胸脇之間。多有隱隱微痛。此腎虛不能納氣。氣虛不能生血之故。氣與血。猶水也。盛則流暢。少則壅滯。故氣血不虛。則不滯。既

金匱翼

卷六

腎虛胸脇痛

辛

虛則鮮有不滯者。所以作痛。宜用熟地破故紙之類。補腎。阿膠芍歸之類和血。若作尋常脇痛治。即殆矣。戴云。曾有一人。脇痛連膈。進諸藥味。并大便導之。其痛殊甚。後用辛熱補劑。下黑錫丹方愈。此乃腎肝虛冷作痛。愈疎而愈虛耳。

肝火脇痛

肝火盛而脇痛者。肝氣實也。其人氣收善怒。經云。肝病者兩脇下痛。引少腹。善怒。又云。肝氣實則怒。是也。其脈常弦急數實。其口當苦酸。其痛必甚。或煩熱。或

渴或二便熱澀不通。

龍薈丸方 丹溪云治肝火脇痛要藥

龍胆草 當歸並酒洗 梔子 黃連

黃柏 黃芩各一兩 大黃酒浸 青黛

蘆薈各五錢 木香二錢 麝香五分

蜜丸小豆大薑湯下二三十九。

元珠云。一人性躁夏月受熱忽左脇間痛。皮膚紅如

碗大發水泡瘡三五點脈弦數醫作肝經鬱火治之

用黃連青皮香附川芎柴胡之類進一劑痛益甚且

金匱翼 卷六 肝火脇痛 三

增熱皮紅大如盤水泡瘡又加至三十餘粒醫以水

調白鬱金末敷於前劑加青黛龍胆進之夜痛益甚

脇中如鉤摘之狀次早視之紅已及半身矣水泡又

增至百數後詢黃古澤乃以大瓜瓠一枚連皮搗爛

加粉草二錢紅花五分藥進而痛止蓋前藥苦寒益

資其燥瓜瓠之為物柔而潤滑於鬱不逆甘緩潤下

故奏效捷也。

汚血脇痛

汚血脇痛者凡跌撲損傷汚血必歸脇下故也其症

畫輕夜重或午後發熱脈短澀或搏其人喘逆經云
肝脈搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇下令
人喘逆是也。

東垣復元活血湯

柴胡半兩 瓜蒌根 當歸各三錢 紅花

甘草 川山甲炮各二錢 大黃酒浸一錢半

桃仁去皮尖研如泥五十枚

右除桃仁外剉如麻豆大每服半兩水盞半酒

半盞同煎至七分去渣大溫服之以利為度。

金匱翼 卷六 汚血脇痛 肆

鍼經云有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不

積於脇下則傷肝肝胆之經俱行於脇下經屬厥陰

少陽宜以柴胡為君以當歸和血脈又痛者急也甘

草緩其急亦能生新為臣穿山甲瓜蒌根桃仁紅花

破血潤血為之佐大黃酒製以盪滌敗血為之使氣

味和合氣血有所歸痛自定矣。

芍藥散 治婦人脇痛

白芍藥 延胡索 肉桂各一兩

香附二兩醋一升鹽半兩同煮乾

右為細末每服二錢不拘時白湯下。

息積

內經曰病脈下滿氣逆二三歲不已病名曰息積夫消息者陰陽之更事也今氣聚於脇下息而不消積而不散故滿逆而為病然氣不在胃故不妨於食特害於氣而已治宜導引服藥藥不可獨治蓋導引能行積氣藥力亦藉導引而行故也聖濟同下

推氣散 治石脇痛脹滿不食。

片薑黃 枳殼 桂心各五錢 炙草二錢

金匱翼

卷六 息積

書

右為細末每服二錢薑棗湯調下食遠服。

赤茯苓湯 治息積脇下氣逆滿悶。

赤茯苓 桂心 陳皮炒半兩 高良薑一兩

大腹皮五錢 吳茱萸三分 甘草一分

水煎三錢空心溫服日二。

白朮丸

白朮陳土炒 枳實炒 桂心各一兩半 人參

陳皮去白炒 甘草蜜炙 桔梗炒各一兩

為末蜜丸梧子大空心酒下三十九日二。

胸痛附

生地黄五斤絞取汁微火煎三沸投白蜜一升再煎取三升每服半升日三。

金匱翼

卷六 息積

書

四肢腫

經云結陽者腫四肢。河間云四肢者諸陽之本也。陽結故不得行於陰陽脈不行故留結而為腫也。

犀角湯

犀角屑

元參

連翹

柴胡

各半兩

麥門冬

芒硝

各一兩

升麻

木通

各三錢

沉香

射干

去毛

甘草

炙各一分

右為末每服三錢。水一大盞。同煎至八分。食前去滓溫服。余曾治手十指獨腫大者。與此藥

金匱翼

卷六

四肢腫顛振

美

愈有傷寒後手足腫而赤者。與此亦愈。但去柴胡。沉香芒硝不用。加枳殼一味。蓋柴胡散氣。沉而沉香之溫燥。不如枳殼之和利也。芒硝瀉陽明之陽。以其人便澀。故去之耳。

顛振

顛振手足動搖不能自止。迺肝之病。風之象。而脾受之也。肝應木。木主風。風為陽。陽主動。脾應土。土主四肢。四肢受氣於脾者也。土氣不足。而木氣鼓之。故振

振動搖。所謂風搖末疾者是也。

按手足為諸陽之本。陽氣不足。則四肢不能自主。而肝風得以侮之。肝應木。熱生風。陰血衰則熱而風生焉。故犯此症者。高年氣血兩虛之人。往往有之。治之極難奏功。

金匱翼

卷六

顛振

美

脚氣之源

內經曰暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂寒暑風濕之氣雖本乎天而皆入乎地而人之足履之所以往往受其毒也始從足起漸及小腹甚乃上攻心胸若不急治遂至殺人况五藏經絡脾與肝腎皆從足指上走腹中故脚氣之候或嘔吐惡食或腹痛下利或二便閉塞不通或胸中冲悸不欲見明或精神昏憤錯語善忘或頭疼壯熱或身體冷痛時覺轉筋或少腹不仁或髀腿頑痺或百節攣急

金匱翼

卷六 脚氣之源

三

或緩縱不隨症狀不一以其自脚得之故均謂之脚氣而又有乾濕之異乾脚氣之狀血脈痞滿皮膚痛痺脛細痠疼食減體瘦臧府秘滯上冲煩悶濕脚氣之狀脚先腫滿或下注生瘡浸淫滋水或上攻心腹咳嗽喘急而浮膝腫見食嘔吐為病不同蓋陰陽體藏所分其為風毒濕氣則一要當隨其病症所在而治之

脚氣痺攣

脚氣痺攣者寒氣多也寒則筋急熱則縱寒則脈閉

熱則流寒搏於筋脈則攣痺不能轉移艱於步履甚則不可屈伸也

肉菴蓉丸

菴蓉 牛膝 天麻 黃耆

首烏 木瓜 各十兩酒五斤浸一日晒入後藥

狗脊 續斷 草薺 各三兩

共末用木瓜三枚剉空入青鹽一兩開口飯上蒸研成膏入上件和丸如乾加酒糊丸梧子大

鹽湯酒任下三十九

金匱翼

卷六 脚氣痺攣

三

石南丸 脚氣攣痺去風溼活血絡益元氣

石南 白朮 牛膝 同上 天麻

防風 枸杞 黃耆 二兩 鹿茸

桂 一兩

共為末用木瓜一枚去皮瓢蒸爛搗膏入糊丸

梧子大酒下三十九

楊氏家藏方 治寒濕脚氣腿膝疼痛行步乏力

胡蘆巴酒浸一宿焙破故紙炒香各四兩為末

以木瓜切頂去瓢安藥在內令滿用頂合住簽

之爛蒸搗九梧子大每服七十九空心溫酒下

脚氣脚膝腫痛

脚膝腫痛者風寒濕氣客於氣血不能宣通則壅滯為腫凝寒為痛人之氣血得溫則行遇寒則止故也又邪氣初中但在於下而未及乎上所謂傷於濕者下先受之也疏導其下固護其中法斯善矣

防已湯

防已

猪苓

郁李仁

枳榔

木通

枳殼

紫蘇

赤茯苓

金匱翼

卷六

脚氣脚膝腫痛

單

炙草

一兩

薑水煎四錢

一方有白朮

經驗加味二妙丸

治兩脚濕痺疼痛或如火燎

從足附熱起漸至腰膝或麻痺痿軟皆是濕熱

為病此藥主之

蒼朮

四兩

米

黃柏

二兩

酒

川牛膝

一兩

防已

當歸尾

川草薢

龜版

酥炙各

右為細末酒煮麵極熟糊丸如梧子大每一百

九空心薑鹽湯下

檳榔散

治風毒脚氣腫痛

橘葉

杉木節

各一

右用童子尿一盞醇酒半盞煎六分濾清乘熱

調檳榔末二錢

仁齋

脚氣少腹不仁

金匱云脚氣上入少腹不仁腎氣丸主之蓋濕滯之氣自下侵上腎虛陽弱不能禦之則漸入少腹而痺

著不仁矣腎氣丸理腎之氣者也腎氣得理邪氣自

金匱翼

卷六

脚膝少腹不仁

單

下而不仁者仁矣

腎氣丸

熟地黄

八兩

萸肉

山藥

茯苓

澤瀉

丹皮

附子

製

肉桂

右八味末之煉蜜為丸梧子大每服三錢空心

淡鹽湯下

三因吳萸丸

治脚氣入腹腹中不仁喘急欲死

吳茱萸

湯洗

木瓜

去瓢切片

右為末酒糊丸梧子大每服五十九至百丸酒

飲任下。或以木瓜蒸爛。研膏為丸。尤妙。

腳氣上氣

腳氣上氣者。風毒濕氣循經上入於肺故也。肺主氣。而司呼吸。邪氣入之。則氣道奔迫。升降不順。故令上氣喘滿甚者。不得偃臥也。

桑白皮湯

桑白皮炙二兩 陳皮一兩 葶藶苦者炒研一兩

杏仁去皮尖

共為末。水煎。薑棗湯入末三錢。再沸溫服。當利

金匱翼

卷六

腳氣上氣

聖

一二行。腫氣下即差。三五日服一次。一方無

杏仁。

活人桑白皮散

桑白皮 郁李仁各一兩 赤苓二兩 木香

防已各一兩 紫蘇子 木通 檳榔

青皮各七錢半

每服三錢。薑三片。水煎。

腳氣衝心

腳氣衝心之候。令人心胸煩悶。嘔吐氣急。甚者脈絕

不出欲死也。蓋風濕毒氣。初從足起。久而不治。則上衝心胃之分。最為急候。下氣除濕泄毒。不可緩也。

吳茱萸湯

吳茱萸半兩 木瓜一兩 檳榔二兩雞心者佳

水煎五錢。入竹葉一把。以快利為度。一法咬

咀。每服八錢。水一中盞半。生薑五片。煎至一盞。

去滓溫服。無時。

蘇長史茱萸湯

吳萸六升 木瓜二枚

金匱翼

卷六

腳氣衝心

聖

水一斗三升。煮取三升。分三服。如人行十里久

進一服。或吐或汗或利。或大熱悶即差。

木香湯

青木香 生黑豆皮二兩 大黃炒

紫雪一兩

水煎五錢。入紫雪三錢。分二服。頃再服。當下燥

糞

杉木節湯

杉木節 橘葉一升 大腹七枚 童便三升

同煮取一升半。分二服。如一服得快利即止。唐柳宗元患脚氣。夜半瘖絕。左脇有塊如大石。且死。困塞不知人。三日矣。家人皆號哭。榮陽鄭洵美傳此方服之。半日頃氣通立愈。

犀角散 治脚氣衝心煩喘悶亂。頭痛口乾。坐臥不得。

犀角屑 枳殼去麩炒 沉香各七錢半 紫蘇梗葉

檳榔 麥冬去心 赤苓去皮各一兩 木香

防風各半兩 石膏研細二兩

金匱翼

卷六

脚氣腫滿漸成水狀

右咬咀。每服八錢。水一中盞半。煎至一大盞。去渣入淡竹瀝一合。更煎一二沸。溫服不拘時。

脚氣腫滿漸成水狀

脚氣衝滿。漸成水狀者。邪氣上攻脾腎也。夫脾土氣也。腎水氣也。脚氣者。清濕之疾。其氣最易感於脾腎。同氣相求之義也。脾受邪則濕氣不行。腎受邪則水氣不化。水濕二氣。內外合邪。積而成滿。閉而成脹也。

赤苓湯

赤茯苓 防己 桑白皮 陳皮半兩

旋覆五錢 杏仁 麻黃去根節 白朮

紫蘇一兩 水煮黑豆汁鍾半。煎藥五錢薑半分。

脚氣差後復發

脚氣差後邪氣未盡。正氣未復。或觸惱怒。或感風濕。則其疾復發。與前症往往相似。然與前法輒不應。要在隨時令。審氣體而治之。

四斤丸 乾濕脚氣差後常服令永不發。

牛膝 木瓜 肉蓯蓉 天麻各一斤

金匱翼

卷六

脚氣差後復發

聖

酒五斤。浸一日。晒乾為末。用浸酒熬膏丸。梧子大。酒下三十九。

痺症統論

內經謂風寒濕三氣雜至合為痺。其風氣勝者為行痺。寒氣勝者為痛痺。濕氣勝者為著痺。行痺者行而不定。世稱謂走注疼痛是也。痛痺者疼痛苦楚。世稱謂痛風是也。著痺者著而不移。世稱謂麻木不仁是也。夫痺者閉也。五藏六府之正氣為邪所閉。則痺而不仁也。

內經論痺。又有骨筋脈肌皮五痺。大率風寒溼所謂三痺之病。又以所遇之時。所客之處而命其名。非此金匱翼 卷六 痺症統論 吳

行痺痛痺著痺之外。又別有骨痺筋痺脈痺肌痺皮痺也。風寒濕三氣襲人經絡。入於骨則重而不舉。入於脈則血凝不流。入於筋則屈而不伸。入於肉則不仁。入於皮則寒。久不已則入五藏。煩滿喘嘔者肺也。上氣喘乾脈脹者心也。多飲數洩夜臥則驚者肝也。尻以代踵。脊以代頭者腎也。四肢懈惰發咳嘔沫者脾也。大抵顯藏症則難治矣。

行痺

行痺者風氣勝也。風之氣善行而數變。故其症上下左右無所留止。隨其所至。血氣不通而為痺也。治雖通行血氣宜多以治風之劑。又壽天剛柔篇云。病在陽者名曰風。病在陰者名曰痺。陰陽俱病名曰風痺。風痺云者。以陽邪而入於陰之謂也。故雖驅散風邪。又必兼以行血之劑。又有血痺者。以血虛而風中之亦陽邪入陰之所致也。蓋即風痺之症。而自風言之。則為風痺。就血言之。則為血痺耳。若其他風病而未入於陰者。則固不得謂之痺症矣。

金匱翼 卷六 行痺 吳

四妙散 治行痺走注疼痛。

威靈仙 酒浸焙 乾五錢 羯羊角灰 三錢 蒼耳子 一錢

白芥子 炒一錢

細末每服一錢七。薑湯下。

如意通聖散 治行痺走注疼痛。

當歸 陳皮 麻黃 炙草

川芎 御米殼 丁香 等分

右用慢火同炒令黃色。每服三錢。水煎服。

按麻黃之猛而得粟殼之瀉。則內行經絡。不復外

發皮毛。故得治痺痛之疾。芎歸所以行血。陳皮丁香所以行氣。氣血以行。邪氣以去。炙草則和藥緩急之川耳。慢火同炒者。欲令氣味和合。使不相驚而相就也。

丹溪治痺走注疼痛方

蒼朮

各酒炒 黃柏二錢 酒成靈仙

白芥子

各一錢 羚羊角灰一錢

上薑一片。水煎服。

摩風膏

金匱翼

卷六 行痺

吳

草麻子

一兩去皮研 草烏頭半兩生用 乳香一錢另研

以猪脂鍊去滓成膏。入藥攪勻。以手心摩按如火之熱。卻以藥塗摩。攻注之處大妙。

痛痺

痛痺者。寒氣偏勝。陽氣少。陰氣多也。夫宜通而塞。則為痛。痺之有痛。以寒氣入經而稽遲。泣而不行也。治宜通引陽氣。溫潤經絡。血氣得溫而宣流。則無壅閉矣。河間云。痺氣身寒。如從水中出者。氣血不行。不必寒傷而作。故治痛痺者。雖宜溫散寒邪。尤要宣流壅

閉也。

沒藥散 治遍身百節走注疼痛。

沒藥

二兩研 虎骨四兩酥炙

右為細末。每服五錢酒下。日三服。

一粒金丹

草烏頭

剉炒 五靈脂各一兩 地龍去土炒

木鱉子

各半兩 白膠香一兩另研 當歸去蘆一兩

麝香

一錢另研

右為細末。糯米糊丸。梧子大。每服三丸。溫酒下。

金匱翼

卷六 痛痺

吳

服藥後微汗為效。原方有細墨乳香各半兩。

沒藥一兩。八神丹有防風。無當歸。細墨麝香。沒藥。麪糊丸。酒服十九。云汗出則瘳。麻自散。

藥麪糊丸。酒服十九。云汗出則瘳。麻自散。

著痺

著痺者。濕氣勝也。夫濕土氣也。土性重緩。榮衛之氣與濕俱留。則著而不移。其症多汗而濡。其病多著於下。有挾寒挾熱。在氣在血之異。須審而治之。

經驗加味二妙丸

方見脚氣脚膝腫痛

治濕熱在下。在血之劑。兩足溼痺疼痛。或如火

燎從足跗熱起漸至腰膀或麻痺痿軟皆是濕熱為病此藥主之。一方無葶藶有虎脛骨一兩。

又治婦人腳疼怕冷夜劇日輕。

生地 白芍 歸梢各五錢 黃柏炒

黃芩 白朮 蒼朮 陳皮各三錢

牛膝二錢 甘草梢一錢

右分四服水煎帶熱服。

按足三陰虛而濕熱襲之多為腳痛。一朮二黃並

金匱翼 卷六 著痺 辛

除濕熱地芍歸膝益陰陳皮甘草和中。陰氣益則熱易清。中氣和則濕易除。與加味二妙同一機軸。除熱蠲痛湯 溼痺氣分多者用此分而消之。

蒼朮米泔浸炒 白朮 羌活 茯苓

澤瀉 陳皮各一錢 甘草五分

水煎入薑汁竹瀝各二三匙。

大羌活湯

羌活 升麻各一錢 獨活七分 蒼朮

防風 甘草 威靈仙 茯苓

當歸 澤瀉各五分
右剉作一服水二盞煎至一盞溫服食前後各一服忌酒麵生冷硬物。

羅謙甫云真定張大素嗜酒五月間病手指節腫痛屈伸不利膝臏亦然心下痞悶身體沉重不欲食食即欲吐面色痿黃精神短少至六月間求予治之診其脈沉而緩緩者脾也難經云俞主體重節痛俞者脾之所主四肢者脾之所屬蓋其人素嗜酒加之時助濕氣大勝流於四肢故為腫痛內經云諸溼腫滿

金匱翼 卷六 著痺 辛

皆屬脾土仲景云溼流關節肢體煩疼此之謂也內經云溼淫於內治以苦溫以苦發之以淡滲之又云風勝溼羌活獨活苦溫透關節而勝濕故以為君升麻苦平威靈仙蒼朮防風苦辛溫發之者也故以為臣血壅而不流則痛當歸辛溫以散之甘草甘溫益氣澤瀉鹹平茯苓甘平導濕而利小便以淡滲之使氣味相合上下分散其濕也。

熱痺

熱痺者閉熱於內也內經論痺有云其熱者陽氣多

陰氣少。病氣勝陽。遭陰。故為痺熱。所謂陽遭陰者。府藏經絡。先有畜熱。而復遇風寒濕氣客之。熱為寒鬱。氣不得通。久之寒亦化熱。則痺熱熾然而悶也。

升麻湯

升麻 射干 甘草 芎藭各二兩

麥冬 萎蕤 生薑各三兩 赤小豆炒三合

人參二兩

每服四錢。入生地黃汁半合。青竹葉十五片。水煎溫服無時。

煎溫服無時。

金匱翼

卷六

熱痺

聖

河間升麻湯 治熱痺。肌肉熱極。體上如鼠走。唇

口反縱。皮色變。

升麻三兩 茯苓 人參 防風

犀角 羚羊角 羌活各一兩 官桂三錢

右為末。每服四錢。水二盞。薑二片。竹瀝半酒杯。

同煎至一盞。溫服無時。

千金犀角湯 治熱毒流入四肢。歷節腫痛。方見風症

腸痺

腸痺者。內經所謂數飲而出不得。中氣喘爭。時發殮

泄是也。夫大腸者。傳導之府。小腸者。受盛之官。皆水穀氣味出入之要路也。今風寒濕三氣痺之邪氣。獨留正氣。遂閉。由是水道不通。糟粕不化。則雖多飲而不得洩。便中氣喘滿。而時發殮泄也。

吳茱萸散 治腸痺。寒濕內搏。腹痛氣急。大便殮

泄。

吳茱萸湯炮 乾薑炮 甘草炙 肉苳蔻煨各五錢

砂仁 神麩 白朮各一兩 厚朴薑汁炒

陳皮去白 良薑各二兩

金匱翼

卷六

腸痺

聖

右為末。每服一錢。食前米飲下。

胞痺

胞痺者。內經云。少腹膀胱按之內痛。若沃以湯。澀於小便。上為清涕。是也。膀胱藏津液。而稟氣化。邪氣痺之。水氣不行。則畜而生熱。積而成實。故按之內痛。若沃以湯。而澀於小便也。足太陽之脈。其直行者。從臑入絡。腦邪氣不得下通於胞者。必反而上逆於腦。腦氣下灌出於鼻竅。則為清涕也。

腎瀝湯 治胞痺。小腹急痛。小便赤澀。

麥冬 五加皮 犀角各一錢 杜仲

桔梗 赤芍 木通各一錢半 桑螵蛸 一个

右水盞半。入羊腎一隻。去脂膜切細。竹瀝少許。同煎一盞去滓。空心頓服。日再服。一方有桑皮無螵蛸。

按腸痺胞痺。同為內痺。而胞痺為腎虛熱壅。膀胱腸痺為風寒濕著於脾胃。腎瀝湯用清涼以化熱壅。吳茱萸散用辛辣以開邪痺也。

腎著湯 治胞痺小便不通

金匱翼

卷六

胞痺臂痺

書

臂痺

臂痺者。臂痛連及筋骨。上支肩胛。舉動難支。由血弱而風中之也。

十味劉散

附子 黃芪 當歸 白芍各一錢

川芎 防風 白朮 茯苓

肉桂各七分 熟地酒浸焙乾二錢

右水二鍾。薑三片。棗二枚。食後臨臥服。

本事方服桑枝法。桑枝一小升。細切炒香。以水三

大升。煎取二升。一日服盡。無時。圖經云。桑枝平

不冷不熱。可以常服。療體中風痺。乾燥脚氣。四

肢拘攣。上氣眼暈。肺氣嗽。消食利小便。久服輕

身聰明耳目。令人光澤。兼療口乾。仙經云。一切

仙藥。不得桑枝煎。不服。出抱朴子。政和間子嘗

病二臂痛。服諸藥不效。依此作數劑。臂痛尋愈

治風寒濕痺。四肢麻木不仁。烏頭粥法。

川烏頭生末四錢。用香熟白米作粥半碗。慢火

同熬令稀薄。不要稠。下薑汁一茶匙。許蜜三大

金匱翼

卷六

臂痺

註

匙攪勻。空心啜之為佳。如若中濕。更入薏苡米

二錢。增米作一中碗服。許氏云。此粥大治手足

麻木不遂。腫痛不能舉者。左氏風濕末疾。謂四

肢為末也。脾主四肢。風邪客於肝。則滯脾。脾為

肝剋。故疾在末。此以穀氣引風濕之藥。徑入脾

經。故四肢得安。此湯劑極有力。予嘗以此方授

人。服者良驗。

攣症

攣皆屬肌。經云。肝主身之筋。膜故也有熱。經云。肝氣

熱則筋膜乾筋膜乾則筋急而攣是也。有寒。經云寒多則筋攣骨痛。又云寒則筋急是也。有濕熱。經云溼熱不攘。大筋綆短。小筋弛長。綆短為拘。弛長為痿。是也。有虛。經云脈弗榮則筋急。屈伸不利。仲景云血虛則筋急是也。

治案

楊吉老治欬丞張德操內筋攣。脚不得屈伸。逾年動則令人抱。楊吉老云此筋病宜服下三方一年而愈。治筋極養血地黄丸。春夏服之

金匱翼

卷六

治案

痿

熟地

蔓荊各一分

山黃

黑狗脊炙

地膚子

白朮

乾漆

鱗糟炒

天雄

車前子各一分

葶藶

山藥

澤瀉

牛膝

右為細末。煉蜜為丸。如梧子大。每服五十九。溫酒下。空心。

酒下空心。

治筋痺。肢節冷痛。羚羊角湯。秋服之

羚羊角

肉桂

附子

獨活各一兩

白芍

防風

川芎各一兩

右為粗末。每服五錢。水一盞半。生薑同煎至八分。取清汁服。日可二三服。

冬服之

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦艽

附子

官桂

白芍各七分

乾薑

茯苓

防風

當歸各一兩

獨活一兩三分

右為粗末。每服三錢。水一盞半。聚一枚同煎至八分。去滓。空心食前服。

金匱翼

卷六

治案

痿

八分。去滓。空心食前服。

門人

平舟沈安伯

星門陳步羔

男

珊

圖南

龍翔

召南

金匱翼卷六

金匱翼卷七目錄

文咳嗽統論

冷嗽 熱嗽 鬱熱 飲氣 食積 燥嗽

虛寒 腎咳 失音

喘統論

痰實肺閉 水氣乘肺 寒邪入肺

令火燥肺 腎虛氣逆 胸喘 血積肝傷

嘔吐論

剛壯 清涼 消痰逐水 消食去積 行氣

去風和胃 理中安虻 和導 益胃

泄瀉統論

溼瀉 寒瀉 熱瀉 久泄 食泄 酒泄

腎泄 殮泄

痢疾統論

寒下 和利 疎解 溫通 溫補 冷瀉

和養

金匱翼卷七

飼鶴山人九在澤先集

長洲後學徐錦炳南氏讀

咳嗽統論

經言五藏六府皆令人欬。蓋有自外而入者。風寒暑濕燥火是也。有自內而發者。七情飢飽勞傷是也。風寒諸氣先自皮毛而入。皮毛者肺之合。皮毛受邪。內從其所合則欬者自外而入者也。七情飢飽內有所傷則邪上逆。肺為氣出入之道。故五藏之邪。上觸于肺亦欬。此自內而發者也。然諸風所感。有不為欬者。病邪特甚。徑傷藏府。不啻于皮毛。七情所傷。亦有不嗽者。病邪尚淺。止留本藏。未即上攻。所以傷寒以嗽為輕。而雜病以嗽為重也。

咳嗽一症。其因實多。辨症不明。妄投希效。亦安賴有醫治哉。當按昔賢所述。如咳嗽有風寒。有火。有勞。有痰。有肺脹。風寒者。鼻塞聲重。惡風寒是也。宜發散行痰。又有咳喘聲啞。或咽痛。遇冷則發者。此謂寒包熱也。解表則熱自除。肺中有痰者。遇冷亦發。宜解表豁

痰火鬱者咳多痰少。面赤焦煩是也。勞者盜汗出痰多唾紅作寒熱是也。痰者咳動便有痰痰出咳止是也。肺脹者動則喘滿氣急聲重是也。

丹溪已上數條。合而觀之。參之居養。合之氣體。雖有不中。亦不遠矣。

治嗽最要分別肺之虛實。痰之滑濇。邪之冷熱。及他藏有無。侵凌之氣。六府有無。積滯之物。虛者人參黃芪之屬。補之。使氣充則藏自固。實者葶藶杏仁之屬。瀉之。使邪去則肺自寧。痰滑者。南星半夏之屬。燥其濕。痰濇者。瓜蒌杏仁之屬。潤其燥。寒者。乾薑細辛溫之。熱者。黃芩梔子清之。氣侵者。五味芍藥收其氣。使不受邪也。積滯者。枳實瓜蒌逐其客。使無來犯也。

冷嗽

冷嗽者。身受寒氣。口飲寒漿得之。蓋肺主氣。外合皮毛。而其經內循胃口。故外內得寒。皆能傷之。經云。形寒飲冷。外內合邪。因而客之。則為肺咳是也。其症呼吸不利。嘔吐冷沫。胸中急痛。惡寒聲嘶。得溫則減。得寒益甚。

仲景小青龍湯 散外寒。蠲內飲。

麻黃 芍藥 乾薑 炙甘草

細辛 桂枝各三兩 五味子 半夏各半升

右八味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

此散寒蠲飲之神劑。東垣云。肺寒氣逆。則宜五味子同乾薑治之。有痰者以半夏為佐。按金匱厚朴麻黃湯。加厚朴石羔杏仁小麥。減桂枝芍藥。聖濟乾薑湯。加紫苑杏仁。減芍藥細辛半夏。

金匱翼 卷七 冷嗽 五

外臺羊肺湯。加欬冬。紫苑白前。食茱萸。減麻黃芍藥。半夏。易簡杏仁湯。加人參。茯苓。杏仁。去麻黃。其乾薑。五味。甘艸。則四方如一轍也。蓋本一青龍。而各有裁制耳。

加減麻黃湯

麻黃去節一兩 桂枝 炙甘草各半兩 陳皮

半夏各七錢 杏仁五十箇 去皮尖微炒另研

右細剉。每三錢。紫蘇七葉。生薑四片。煎服。

三拗湯

麻黃 杏仁 甘艸各等分

右以咀。每服三錢。生薑三片。煎服微汗愈。深

師有細辛。外臺加桂枝名小投杯湯。和劑

加蘇子茯苓桑皮陳皮名華蓋散。

聖濟怡糖煎

傷糖 乾薑炒一兩 豉炒二兩 杏仁五十箇

右分二劑煎去滓。入傷糖乾薑末服。

按咳嗽經年不愈。餘無他症。服藥無效者。得三拗

湯恒愈。多用清涼。屢發屢甚。別無熱症者。得傷糖

金匱翼 卷七 冷嗽 四

煎遂差。不可不知也。局方於麻黃杏仁甘艸中

加阿膠貝母桑葉知母欸冬半夏。蓋雜清潤于辛

溫之內。凡陰虛邪伏者。服之最宜。名欸冬花散。

熱嗽

熱嗽有久暴之異。暴者時熱傷肺也。肺象金而惡熱。

得之則脈數氣促。口渴胸膈不利。咽喉腫痛。子和云。

熱乘肺者。急喘而嗽。面赤潮熱。手足寒。乳子每多有

之。久者風寒不解。久而化火。肺受火邪。氣從火化。有

升無降。其候咳唾痰濁。煩熱口渴。或吐膿血。甚者身

熱不已。則成肺勞。

六味竹葉石羔湯

石羔煨 淡竹葉 桔梗 薄荷葉

木通 甘艸各一錢

水煎服

又治熱嗽。諸藥不效者方。

人參 石膏 甘艸 半夏

麥冬 知母 五味 杏仁

枇杷葉

金匱翼 卷七 熱嗽 五

水煎服

按五味子治嗽。新病惟熱傷肺者宜之。若風寒所

客。則斂而不去矣。久病氣耗者。非五味子不能收

之。然熱痰不除。則留固彌堅矣。

紫苑丸

衍義云。一婦人患肺熱久嗽。身如炙。此瘦將成

肺勞。以枇杷葉木通欸冬花紫苑杏仁桑白皮

各等分。大黃減半。各如常製。治訖同為末。煉蜜

丸如櫻桃大。食後夜卧。各含化一丸。未終劑而

愈。此瀉肺中積熱之劑。

八參清肺湯和劑 治肺痿吐血年久勞嗽喘急坐

卧不安。

人參 炙甘草 阿膠炒 杏仁去皮尖

桑皮 知母 粟殼去蒂蓋 烏梅去核

地骨皮各等分

每服三錢。水鍾半。薑一片。棗一枚。食後溫服。

按此方治勞嗽最宜。蓋以溫補虛損之陰。以酸收散。之陽也。

金匱翼

卷七 熱嗽

元霜膏 治虛勞熱嗽。咯血唾血神效。

烏梅汁 梨汁 柿霜 白沙糖

白蜜 蘿蔔汁各四兩 生薑汁一兩

赤茯苓末八兩用乳汁浸九次 欵冬花 紫苑並末各二兩

右共入砂鍋內熬成膏。丸如彈子大。每一丸隔

卧含化嚥下。

定肺丸

欵冬花 紫苑 知母 貝母

人參 炙甘草 桑白皮 馬兜鈴

御米殼 五味子 麥冬 百部

烏梅肉等分

右為細末。煉蜜九。櫻桃大嚥化下一丸。

直指人參紫苑散 治虛勞欵嗽

人參 五味子 紫苑茸 陳皮

貝母 紫蘇葉 桑白皮炒各一兩 白茯苓二兩

杏仁 甘草炙各七錢五分 川芎 半夏麩

阿膠蛤粉炒五錢

右吹咀。每服一兩。水二鍾。薑七片。烏梅一個。煎

金匱翼

卷七 熱嗽

一鍾溫服。

鬱熱嗽

鬱熱者。由肺先有熱。而寒復客之。熱為寒鬱。肺不得通。則喘咳暴作。其候惡寒。時有熱。口中乾。咽中痛。或失音不出是也。宜辛以散寒。涼以除熱。或只用辛散。使寒去則熱自解。若遽以苦寒折之。邪氣被抑。遺禍不小。

本事利膈湯

雞蘇葉 荆芥 桔梗 牛蒡子

甘艸

殭蠶

元參

各一兩

右爲末。每服一錢。沸湯點服。日三。

方古庵云。肺主皮毛。人無病之時。榮衛周流。內氣自皮膚腠理。普達于外。一或風寒外束。則內氣不得外達。便從中起。所以火升痰上。故咳嗽。宜用辛溫或辛涼之劑。以發散風寒。則邪退正復而嗽止也。

飲氣嗽

飲氣嗽者。其症喘咳上氣。胸膈注悶。難于偃臥。許仁金匱翼 卷七 飲氣嗽 八

則云。由所飲之物。停滯在胸。水氣上冲入肺。便成咳嗽。此而不治。則爲水氣。醫餘亦云。此症宜利水道。化痰下氣。不爾則成水。

溪師白前湯

白前 二兩

半夏

紫苑

各三兩

大戟

七合

水一斗。漬一宿。煮取三升。分作數服。

芫花散

芫花

乾薑

白蜜

等分

右用前二味爲末。內蜜中攪令相和。微火煎如

糜。服如棗核一枚。日三夜一。備急方。用枳殼

二兩炒。水煮去滓。內白糖一斤。服如棗大。

葶藶大棗瀉肺湯

葶藶

不拘多少 炒令黃

右件細研。丸如彈子大。水三盞。棗十枚。煎一盞。去棗入藥。煎七分。食後服。孫兆治一人吐痰。頃間已升餘。欬不已。面色鬱黯。精神不快。兆告曰。肺中有痰。胸膈不利。當服仲景葶藶大棗湯。一服訖。已覺胸中快利。畧無痰唾矣。外臺用葶

金匱翼

卷七

飲氣嗽

九

麩杏仁各一升。大棗六十枚。合搗如膏。加蜜作丸。梧子大。桑白皮飲下六七十九。以大便通利爲度。本事棗膏丸。無杏仁。有陳皮。苦桔。梗。棗肉。丸。梧子大。每服五七丸。飲下。許叔微云。余常患停飲。久漬肺經。食已必噎。漸喘。覺肺系急。服此良驗。

蘇子降氣湯 治久年肺氣欬嗽喘逆。上盛下虛

痰涎壅盛。胸膈噎塞。

紫蘇子

炒

半夏

製各二錢半

前胡

甘艸

炙

厚朴薑汁炒 陳皮去白各一錢 當歸半錢 沉香七分

水二鍾。生薑三片。煎至一鍾。不拘時服。虛冷人加桂五分。黃芪一錢。

一人痰嗽脇下痛。以白芥子瓜萋桔梗連翹風化硝竹瀝薑汁加蜜丸噙化茶清下。

按痰飲有寒有熱。凡咳而面赤。胸腹脇常熱。惟手足乍有涼時。其脈洪者。熱痰在胸膈也。宜寒潤清膈之劑下之。面白悲噓。脇急脹痛。脈沉細弦遲者。寒痰在胸腹。宜以辛熱去之。

金匱翼

卷七 飲氣嗽

十

痰熱久嗽。氣急胸滿。知母杏仁蘿蔔子貝母各二錢。生薑一片。水煎服。

玉液丸 治熱痰壅盛。欬嗽煩熱。

寒水石燒令赤出火毒 半夏洗焙為末 水飛過三十兩

白礬粘十兩 細研

右合研麩糊丸。梧子大。每服三十九。食後淡薑湯下。

治婦人形瘦。有時夜熱痰嗽。月經不調。

香附童便浸晒乾 瓜萋中 青黛下

右為末。薑汁蜜調。噙化豆大一丸。

食積欬嗽

食積欬嗽者。穀肉過多。停凝不化。轉為敗濁。隨呼吸之氣而上溢入肺。肺者清虛之府。不能容物。則有欬而出之耳。王節齋云。因欬而有痰者。欬為重。主治在肺。因痰而致欬者。痰為重。主治在脾。但是食積成痰。痰氣上升。以致欬嗽。只治其痰。消其積。而欬自止。不必用肺藥以治嗽也。

瓜萋丸

金匱翼

卷七 食積咳嗽

十一

瓜萋仁 半夏 山查 神麩等分

右為末。以瓜萋瓤拌為丸。竹瀝薑湯送下。

元珠云。食積痰嗽。非青黛瓜萋仁不除。其人面色

青黃不常。或面上如蟹爪路。一黃一白者是也。

又方 杏仁蘿蔔子各二兩。為末。粥丸服。

又方 治食積痰嗽發熱。一陳加瓜萋萊菔子山

查枳實神麩。

燥欬

肺燥者。肺虛液少。而燥氣乘之也。其狀欬甚而少涎。

沫咽喉乾。氣哽不利。子和云。燥乘肺者。氣壅不利。百節內痛。皮膚乾燥。大便秘澁。涕唾稠粘。潔古云。欬而無痰者。宜以辛甘潤其肺也。

延年天門冬煎

生天門冬煎汁一升 生地黄汁五升 橘皮

炙甘草 人參二兩 白蜜五合 牛酥二合

白糖五兩 杏仁一升 貝母 紫苑

通艸三兩 百部 白前二兩 生薑汁一合

右以水六升。煮貝母等取二升五合。去滓。入天

金匱翼

卷七 燥欬

王

門冬地黃汁煎減半。內酥蜜薑汁等煎。令可丸。取如雞子黃大。含嚥之。日四五次。

杏仁煎

杏仁皮一升去尖 白糖 酥 生薑汁一合

蜜五合 貝母八合別研 蘇子一升研取汁

右先搗杏仁如泥。內後六味同煎如稠糖。取如

棗大含嚥之。日三。

又有一種肝燥礙肺者。其症欬而無痰。脇痛潮熱。女子則月事不來。此不當治肺而當治肝。蓋本非肺病。

肝血燥則肝氣強而觸肺藏也。滋之調之。血液通行。乾欬自愈。

千金豕膏丸

髮灰 杏仁熱令黃色

右二味等分。研如脂。以豬膏和酒服。如桐子大

三九。日三神良。

上清丸 清聲潤肺。止欬嗽。爽氣定神。

白沙糖八兩 薄荷葉四兩 柿霜四兩

礪砂 寒水石 烏梅肉各五錢

金匱翼

卷一 燥欬

王

片腦五分

右為末。甘艸水熬成膏。和丸芡實大。每一丸嚥化。

虛寒嗽

虛寒嗽者。其寒不從外入。乃上中二焦。陽氣不足。而寒動於中也。或初雖起于火熱。因過服寒涼消尅。以致脾土受傷。而肺益失養。脈微氣少。飲食不入者。急宜溫養脾肺為主也。

加味理中湯

人參 白朮 乾薑生 甘艸炙

橘紅 茯苓 半夏 細辛

五味等分

右咬咀每服三錢薑棗煎食前服。戴元禮云
飲水一二口而慙止者熱嗽也呷熱湯而得停
者寒嗽也治熱嗽以小柴胡加五味冷嗽以理
中湯加五味皆以試之驗。直指方理中圓加

阿膠五味。

濟生紫苑湯 治肺虛寒嗽喘急無熱症者。

金匱翼

卷七

虛寒嗽

古

紫苑茸洗

乾薑炮

黃芪

人參

五味子

鍾乳石

杏仁麩炒去皮尖

甘艸炙各五錢

右咬咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服

腎欬

腎虛氣逆者腎之脈從腎上貫肝膈入肺中。循喉嚨
腎中陰火上炎入肺則欬腎中陰水隨經入肺亦欬
內經云欬嗽煩寃者是腎氣之逆也。又少陰所謂欬
嘔上氣喘者陰氣在下。陽氣在上。諸陽氣浮無所依
從。故欬嘔上氣喘也。水則濟生腎氣補而逐之火則

六味都氣之屬引而下之。又有一種少陰腎症。水飲
與裏寒合而作嗽。腹痛下利者。宜真武湯加減治之。

真武湯

白茯苓

白朮

白芍各一兩

熟附子半兩

右剉散每二錢半。加生薑細辛五味子各半錢
薑三片。食前煎服。

咳嗽失音

咳而失音。有新久虛實之異。新者多實痰火閉鬱。所
謂金實不鳴也。久者多虛肺損氣脫。所謂金破亦不

金匱翼

卷七

腎欬

五

鳴也。實者逐邪蠲飲易治。虛者補肺養氣難治。亦有
肺已虛損而風寒未盡。或痰火閉塞者。則攻補俱碍。
其治尤難也。

訶子飲 治久嗽語聲不出。

訶子肉

杏仁各一錢

通草半錢

分二服。每服水二鍾薑三片煎一鍾。食遠溫服。
一方訶子四箇。有桔梗一兩半。甘艸二寸。

杏仁煎 治嗽失音不出。

杏仁三兩

生薑汁

蜜各一兩

木通

桑白皮

貝母各二兩 紫苑一分 五味各一兩

水三升煎半升去滓入杏仁蜜薑汁再熬成稀膏食後卧噙化一匙。

又方 皂角一握去皮弦子蘿蔔三箇切片水一碗煎至半碗服之不過三服能使語出聲。

治盛寒失音不語咽喉痒痛。

桂心 杏仁各一兩

為末蜜九櫻桃大綿裹嚥津。

戴云有嗽而咽痛失音多進冷劑而聲愈不出

金匱翼 卷七 咳失音 天

者宜生薑汁調消風散少少進之或只一味薑汁亦得又云聲啞者寒包其熱也宜細辛半夏生薑之屬辛以散之若痰熱壅于肺者金空則鳴必清肺中邪滯用清咽寧肺湯主之。

清咽寧肺湯

桔梗二錢 炒山梔 黃芩 桑皮

甘艸 前胡 知母 貝母

水二鍾煎八分食後服。

和劑欬冬花散 治肺已虛而風寒未盡喘滿煩

悶痰涎壅盛鼻塞流涕咽喉不利。

杏仁 阿膠炒 麻黃去根 半夏湯洗

欬冬花 桑葉 知母 貝母各一兩

右吹咀每服二錢水一鍾薑三片水煎食前溫服。準繩用炙甘草與半夏加一倍

喘統論

三因方云喘病肺實者肺必脹上氣咽中逆如欲嘔狀自汗肺虛者必咽乾無液少氣不足以息也王宇泰云喘而無汗煩躁脈浮大者汗之喘而有汗腹滿脈沉實者下之又云喘而自汗腹滿便閉氣口脈大于人迎下之無疑外此則不宜輕下也。

欬嗽氣急喉聲如鼾者為虛喉中如水雞聲者為實戴復庵云有痰喘有氣喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者凡喘便有痰聲氣喘者呼吸急促而無痰聲胃

金匱翼

卷一 喘統論

大

氣虛喘者擡肩擗肚喘而不休火炎上喘者乍進乍退得食則減食已復甚大槩胃中有實火膈上有稠痰得食入咽墜下痰涎其喘即止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也。

痰實肺閉

肺虛如器而不容物痰熱實之則氣不得宣呼吸壅滯喘急妨悶胸膈痞痛徹背者宜濟生瓜萋實丸此與水氣相似但水即飲也飲體稀而痰質稠飲多寒

而痰多熱耳。

濟生瓜萋實丸

瓜萋實

研

枳實

去瓢

桔梗

半夏

等分

右為末薑汁打糊為丸如梧子大每服五七十丸食後淡薑湯下。

元戎葶藶大棗湯

葶藶

二兩炒紫
色并成丸

以水三升大棗二十枚同煮取二升去滓內麻

黃五味子各半兩取清令二日服一劑盡差外

金匱翼

卷七 痰實肺閉

九

臺方葶藶杏仁二味并末棗肉丸此又加麻黃

五味其用彌廣矣。

水氣乘肺

喘因水氣乘肺者經所謂不得卧卧則喘者是水氣之客也古法心下有水氣上乘于肺喘而不得卧者以直指神秘湯主之若腎中水邪干肺者則以濟生腎氣丸主之。

神秘湯

人參

陳皮

桔梗

紫蘇

半夏 桑皮 檳榔各一錢 炙甘草五分
五味子十五粒
右用水薑煎食遠溫服。

寒邪入肺

喘因寒邪入肺者。經曰邪在肺。則病皮膚痛。寒熱上氣。喘欬動肩背。因背受寒邪伏于肺中。關竅不通。呼吸不利。右寸沉而緊。亦有六部俱伏者。宜發散。則身熱退而喘定。小青龍三拗湯之屬。若內兼火熱。外顯煩躁者。宜散而兼清。麻杏甘石之屬。

金匱翼

卷一 水氣乘肺

中

小青龍湯

麻黃 桂枝 芍藥 細辛
甘草各三錢 乾薑三錢 半夏 五味子各半升
右以水一斗。先煮麻黃去上沫。內諸藥。煮取三升。強人服一升。羸者減之。

三拗湯方見款門

令火燉金

喘因夏月火燉肺金者。上焦熱甚。煩渴多汗。肺主氣而屬金。金畏火逼。氣不得降而反上行。從化于火也。

八參白虎湯

人參 石羔 知母 甘草
粳米

腎虛氣逆

喘因腎虛。氣吸不下者。或因氣自小腹下起而上逆者。但經微勞。或飢時即發。宜以六味補陰之屬。壯水配火。若足冷而熱者。須以八味安腎之屬。導火歸元。

安腎丸

肉桂去粗皮 川烏頭炮去皮臍 桃仁麩炒

金匱翼

卷一

令火燉金腎虛氣逆

中

白茯苓炒去刺 巴戟去心 山藥 茯苓

肉苁蓉酒浸 石斛去根 草薢 白朮

破故紙各四兩

右為末。煉蜜為丸。梧子大。每服三十九。鹽湯送下。空心食前。

小安腎丸 治腎虛冷憊。陰火上升。喘嗽齒痛腰痛。

痛。

香附子 川烏頭 川棟子以上各一斤
四升全煮 茴香十二兩 熟地黃八兩
候乾切焙

川椒去目及閉口者

右六味為細末酒糊丸桐子大每服二十九至三十九空心臨卧鹽湯温酒任下。

喘喘

喘喘者積痰在肺遇冷即發喘鳴迫塞但坐不得卧外寒與内飲相搏宜小青龍湯主之若肺有積熱熱為寒束者宜越婢湯主之。

小青龍湯方見前

越婢加半夏湯

金匱翼 卷一 喘喘

麻黃 六兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 一兩

半夏 半斤 大棗 十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去上沫内諸藥煮取三升分温三服。

定喘湯

白果二十一枚去殼切碎炒黃色 麻黃 半夏

杏仁 蘇子 桑皮 欵冬花各二錢

黃芩炒一錢半 甘草 一錢

水三鍾煎二鍾分二服徐徐服無時一方無

黃芩

按仲景云欵而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀越婢加半夏湯治之又肺脹欵而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍加石膏湯主之丹溪云肺脹而欵者用訶子青黛杏仁佐以海石香附瓜萆半麩蜜丸噙化仲景之治乃傷寒法也邪從皮毛入肺則肺脹故治以散邪之劑丹溪之治乃陰虛火動迫肺及濁痰瘀血凝結于内故治以收斂消痰之劑然亦有引動腎間虛氣喘不得卧足冷如冰者非濟生腎氣

金匱翼 卷七 喘喘

不效丹溪治喘喘之症未發以扶正氣為主八味腎氣温腎行水之謂也已發用攻邪氣為主越婢青龍泄肺蠲飲之謂也。

定喘丸 治虛人痰多欵嗽胃滿氣逆行坐無時連年不已。

人參二錢半 南星 半夏各二錢 苦苧藤 五錢

右為末生薑自然汁糊丸黍粒大每三五十丸

生薑湯下亦可漸加。

血積肝傷

喘因血積傷肝者。經曰肝脈搏堅而長。色不青。當病墜若搏。因血在脇下。令人喘逆是也。

全匱翼

卷七 血積肝傷

論

嘔吐統論

仁齋直指云。嘔吐出于胃氣之不和。人所共知也。然有胃寒。有胃熱。有痰水。有宿食。有膿血。有氣攻。又有所謂風邪干胃。凡是數者。可不究其所自來哉。寒而嘔吐。則喜熱惡寒。四肢淒清。法當以剛壯溫之。熱而嘔吐。則喜冷惡熱。煩躁中乾。法當以清涼解之。痰水症者。吐沫怔忡。先渴後嘔。與之消痰逐水輩。宿食症者。胸腹脹滿。醋悶吞酸。與之消食去積輩。腥氣燥氣薰炙惡心。此膿血之聚。經所謂嘔家有癰膿。不須治。

全匱翼

卷七 嘔吐統論

論

膿盡自愈是也。七情內鬱。關格不平。此氣攻之症。經所謂諸鬱干胃。則嘔吐是也。若夫風邪入胃。人多不審。率用參朮助之。攔住寒邪。於此尤關利害。其或惡聞食臭。湯水不下。粥藥不納。此則翻胃之垂絕者也。辨之不早。其何以爲對治乎。雖然。足陽明之經。胃之絡脈也。陽明之氣下行則順。今逆而上行。謹不可泄。固也。然嘔吐者。每大便秘結。上下壅遏。氣不流行。蓋思所以區畫而利導之。他如汗後水葯不入口者。遂嘔而脈弱。小便復利。身微熱而手足厥者。虛寒之

極也識者憂焉。

潔古論吐以氣積寒。分屬上中下三焦。大旨元從啟元子食不得入。是有火食入反出。是無火來至中焦吐。則獨以積字該之。夫中焦氣交之分。主運行上下和調陰陽。其病有虛有實。有寒有熱。其治亦不拘一法。豈區區毒藥去積。柝柳木香和氣。所能盡其事哉。東垣論吐以嘔吐噦。分屬太陽陽明少陽。以其經氣血多少而為聲物有無之別。未見著實。

剛壯之劑

金匱翼

卷七 剛壯

美

吳茱萸湯 治冷涎嘔吐。

吳茱萸沸湯泡洗三次焙乾 生薑各一人參三分

大棗五箇

右剉每服四錢。水盞半。食前服。

本事附子散 治反胃嘔吐。

附子一枚極大者。坐于磚上。四面著火漸漸逼熱。淬入生薑自然汁中。再用火逼再淬。約盡薑汁半盃。焙乾末之。每服二錢。水一盞。粟米少許同煎七分。不過三服。

清涼之劑

本事竹茹湯 治胃熱嘔吐。

乾葛三兩 甘艸三錢 半夏一兩 薑汁半盞 漿水一升 煮耗半

右為粗末。每服五錢。水二盞。薑三片。棗一枚。竹茹一錢。同煮至一盞。去滓溫服。

許叔微云。胃熱者。手足心熱。政和中一宗人病傷寒。得汗身涼。數日忽嘔吐。藥與食俱不下。醫者皆進丁香霍香滑石等藥。下咽即吐。予曰。此正汗後餘熱留胃脘。孫兆竹茹湯正相當耳。急治藥與之。

金匱翼

卷七 清涼

美

即時愈

龐老枇杷葉散

枇杷葉刷淨 人參各一錢 茯苓半兩 茅根二兩

半夏一錢

右細剉每服四錢。水一盞半。生薑七片。漫火煎至七分。去滓入柝柳末半錢和勻服之。此方宜入行氣

新定清中止嘔方

半夏一錢 茯苓二錢 陳皮一錢 竹茹一錢

乾葛 五分 生薑 五分 蘆根 五錢 枇杷葉 三片

麥冬 一錢 白風米 百粒

消痰逐水之劑

大半夏湯 治痰症嘔吐。

半夏 製二人參 三兩

石每四錢 薑七片 蜜少許 熟煎服。

小半夏茯苓湯 金匱云嘔家用半夏以去其水

水去嘔止。

半夏 一升 生薑 半斤 茯苓 三兩

金匱翼 卷七 消痰逐水 天

石三味以水七升。煮取一升半。分温再服。

局方二陳湯 治痰飲嘔惡頭眩心悸。

陳皮 半夏 製各三錢 茯苓 二錢 炙甘草 一錢

水二鍾 薑三片 食遠服。

東垣云辛藥生薑之類治嘔吐。但治上焦氣壅表實

之病。若胃虛穀氣不行胸中痞塞而嘔吐者。惟宜益

胃推揚穀氣而已。故服小半夏湯不愈者。服大半夏

湯立愈。此仲景心法也。

本事神木丸 治嘔吐清水。亦治嘔酸。

方見痰飲門

經云太陰之復嘔。而密默。唾吐清液。治以苦熱。是嘔水屬濕也。或一味蒼朮製炒為丸服之。

丹溪云。或問吞酸。素問明以為熱。東垣又以為寒何也。曰吐酸與吞酸不同。吐酸是吐出酸水如醋。平時

津液隨上升之氣鬱而成積。成積既久。濕中生熱。故從水化。遂作酸味。非熱而何其有鬱積之久。不能自

涌而出。伏于肺胃之間。咯不得上。嚔不得下。肌表得風寒。則內熱愈鬱。而酸味刺心。肌表温煖。腠理開發

金匱翼 卷七 消痰逐水 完

或得香熱湯丸。津液得行。亦可斲解。非寒而何。素問言熱者。言其本也。東垣言寒者。言其末也。但東垣不

言外得風寒而作收氣立說。欲瀉肺金之實。又謂寒藥不可治酸。而用安胃湯加二陳湯。俱犯丁香。且無

治熱濕積鬱之法。為未合經意。予嘗論治吞酸。用黃連菜萸各製炒。隨時令迭為佐使。蒼朮茯苓為輔。湯

浸蒸餅為小丸吞之。仍教以糲食蔬果自養。則病自愈。

消食去積之劑

治中湯 治食症嘔吐。

人參 白朮 乾薑炮 甘艸炙

青皮 橘皮等分

右剉每服三錢棗一枚煎服積聚大便多者加

大黃二君子許。

二陳湯加縮砂丁香亦治宿食嘔吐。

潔古紫沉丸 治中焦吐食由食積與寒氣相格

故吐而疼。

砂仁 半夏錢各三 烏梅去核 丁香

金匱翼 卷七 消食去積 辛

枳榔各二錢 沉香 杏仁 白朮

木香各一錢 陳皮五錢 白芷各五錢 巴霜各五分

右除巴霜另炒外為細末和勻醋糊為丸如黍

米大每服五十九食後薑湯下愈則止。

溫中法麴丸 治食已心下痛陰陰然不可忍吐

出乃已病名食痺。 法麴炒 麥芽炒 白茯苓 陳皮去白

厚朴 枳實各一兩 人參 附子製

炮薑 炙草 桔梗各五錢 吳茱萸湯炮

右為細末煉蜜丸梧子大每服七八十九食前熱水送下一方有當歸細辛。

行氣之劑

加減七氣丸 治氣鬱嘔吐。

半夏製二兩半 人參 辣桂 厚朴製各一兩

茯苓一兩半 甘艸炙半兩

右剉散每三錢半薑七片棗一枚煎服加木香亦得。

去風和胃之劑

金匱翼 卷七 行氣 去風和胃 辛

霍香正氣散 治風邪入胃嘔吐。

半夏錢 川厚朴製各三兩 藿香葉 橘紅各一兩

甘艸炙七錢

右剉散每三錢薑三片棗一枚食前煎服。

清胃丸 治嘔吐脈弦頭痛。

柴胡一兩 黃芩七錢半 甘艸炙 人參各五錢

半夏三錢 青黛二錢半

右細末每薑汁浸蒸餅丸桐子大每五十九薑湯下。

理中安虵之劑

安虵丸

人參 白朮 乾薑 甘艸

川椒 烏梅

導利之劑

金匱大黃甘艸湯 治食已即吐

大黃 四兩 甘艸 一兩

水三升。煮取一升。分溫再服。

此上病療下之法。夫陽明之氣順而下行者也。若

金匱翼

卷七 理中安虵 導利 三

下焦不通。其氣必反而上行。是以食已即吐。用大黃以通大便。則氣復順而下行矣。所謂濁氣自歸濁道也。

東垣通幽湯 治幽門不通。上衝吸門。嘔吐噎塞。

氣不得上下。治在幽門。

熟地 生地 各二錢 紅花 五分 桃仁泥 七粒

當歸 甘艸 升麻 各五分 大黃 一錢

右咬咀都作一服。水二大盞煎至一盞。去滓熱服。

準繩云。陰虛邪氣逆上。窒塞嘔噦。不足之病。此地道不通也。當用生地黃當歸桃仁紅花之類。和血涼血。潤血兼用甘艸以補其氣。微加大黃。甚硝以通其閉。大便利邪氣去。則氣逆嘔吐自愈矣。

益胃之劑

廣濟芫薹子湯 治翻胃嘔吐。不下食。腹中氣逆。

人參 一兩 白芫薹 七粒 甘艸 炒 一兩 生薑 五兩

水四升。煮取一升五合。去滓分溫三服。相去如人行五六里。

金匱翼

卷七 益胃 三

丁香煮散

丁香 石蓮肉 各十枚 北棗 七枚 生薑 七片

黃秫米 半合

右以水一碗半。煮稀粥。去藥取粥食之。

欬嗽嘔吐痰血飲食

欬而嘔吐。痰食俱出者。傷于胃氣。昔人所謂肺病連胃是也。嘔血帶痰而出者。傷于肺之絡。金匱所謂熱傷血脈是也。吐食者。一陳湯加減治之。吐血者。補肺湯主之。

加減二陳湯

半夏一錢 杏仁一錢 茯苓一錢 炙草五分

橘紅一錢 竹茹八分 生薑一片 粳米一百粒

右藥用清水煎服。加枇杷葉蘆根佳。

補肺阿膠湯

阿膠一錢 兜鈴五分 炙艸五分 干芎一錢

杏仁七粒 糯米一百粒

都作一服。甚者加生地黃藕汁。

金匱翼

卷七 欬吐痰血飲食

三

泄瀉諸症統論

戴復庵云。瀉水腹不痛者濕也。飲食入胃。輒瀉之完。穀不化者。氣虛也。腹痛瀉水。腸鳴痛一陣瀉一陣者。火也。或瀉或不瀉。或多或少者。痰也。腹痛甚而瀉瀉後痛減者。積也。陰泄者。水穀不化而完出。濕兼風也。漉泄者。漸下污積粘垢。濕兼熱也。鶩泄者。所下澄徹清冷。小便清白。濕兼寒也。濡泄者。體重軟弱。泄下多水。濕自甚也。滑泄者。久下不能禁固。濕勝氣脫也。故曰濕多成五泄。

金匱翼

卷七 泄瀉統論

三

濕瀉

濕瀉一名濡泄。其脈濡細。其症泄水。虛滑腸鳴。身重腹不痛。由脾胃有濕。則水穀不化。清濁不分。久雨潮溢。或運氣濕土司令之時。多有此疾。內經所謂濕勝則濡泄。左傳所謂雨淫腹疾者是也。又水寒之氣入客腸間。亦令人濡瀉。經云太陽之勝。寒客下焦。傳為濡泄是也。

本事芎藭丸 治風濕滑泄

芎藭 神麴 白朮 附子炮各等分

右為細末。麩糊丸如梧子大。每服三五十丸。米飲送下。

許叔微云。左氏述楚子圍蕭。蕭將潰。無社告叔展曰。有麥麩乎。有山鞠藭乎。意欲令逃水中以避。是知芎藭能除濕。予常加朮附以製方。治脾濕而瀉者。萬無不中。此藥亦治殮泄。

劉草窗瀉濕湯

生白朮 三錢 白芍 二錢 陳皮 炒一錢
防風 一錢 升麻 五分

金匱翼

卷七 濕瀉

美

右剉作一貼。水煎服。此用風藥以舉其氣。抑勝其濕也。河間云。有腸胃燥鬱。水液不能宣行于外。反以停濕而泄。或燥濕往來。而時結時泄者。此又濕瀉之變。余見有老人久泄。飲牛乳而泄反止者。此類是耳。

胃苓湯

治脾濕太過泄瀉不止。

平胃散

五苓散 各等分

右剉水煎服。平胃散治酒泄不已。飲後尤甚。加丁香縮砂麥芽神麩各五錢為末。米飲調二錢。

立愈

升陽除濕湯

方見殮泄

東垣云。予病脾胃久衰。視聽半失。氣短精神不足。此由陽氣衰弱。不得舒伸。伏匿于陰中耳。癸卯歲六月間。淫雨陰寒。踰月不止。時人多病泄利。一日予體重肢節疼痛。大便泄下。而小便閉塞。治法諸泄利。小便不利。先分利之。又云。治濕不利小便。非其治也。噫。聖人之法。布在方策。其不盡者。可以意求耳。今客邪寒濕之淫。從外而入。裏若用淡滲之劑以除之。是降之又降。復益其陰。而重竭其陽。則陽愈削。而精神愈短矣。故必用升陽風藥。羌活獨活柴胡升麻各一錢。防風根半錢。炙甘草半錢。同咀。水二鍾煎至一盞。去滓。稍熱服。大法云。濕寒之勝。助風以平之。又曰。下者舉之。得陽氣升騰而去矣。又云。客者除之。是因曲而為之直也。醫不達升降浮沉之理。而一槩施治。其愈者幸也。

金匱翼

卷七 濕瀉

三

寒瀉 一名鶩瀉

鶩瀉者。水糞并趨大腸也。夫脾主為胃行其津液者。

也。脾氣衰弱不能分布，則津液精粕并趨一竅而下。金匱所謂脾氣衰則鶩溇也。又寒氣在下，亦令人水糞雜下，而色多青黑，所謂大腸有寒則鶩溇也。

補本丸

蒼朮

川椒去目炒各一兩

末之醋和丸如桐子大，每服五十九丸，食前溫水下。一法惡痢久不效者，彌佳。小兒丸如米大。

桂枝湯 治太陽經傷動傳太陰下利為鶩溇。大

金匱翼

卷七 寒瀉

美

腸不能禁固，卒然而下，中有硬物，欲起而又下，欲了而又不了，小便多清，此寒也。宜溫之。春夏

桂枝湯 秋冬白朮散

川桂枝

白芍藥

白朮各半兩 炙草二錢

每服半兩水一盞煎七分去滓溫服。

白朮散

白朮

白芍藥各三錢

乾薑炮半兩

炙艸二錢

右為細末，如前服之。甚則除去乾薑加附子三錢，謂辛能發散也。

附子溫中湯 治寒瀉腹痛，或水穀不化。

附子炮

乾薑炮各一錢半

人參

白朮

白茯苓

白芍

炙艸各一錢

厚朴

豆蔻 陳皮

右作一貼水煎空心服。

熱瀉

熱瀉者，夏月熱氣乍乘太陰，與濕相合，一時傾瀉如水之注，亦名暴泄。內經所謂暴注下迫，皆屬於熱是也。其症腹痛自汗，煩渴面垢，脈洪數或虛，肛門熱痛。

金匱翼

卷七 熱瀉

美

糞出如湯，或兼嘔吐，心腹絞痛者，即霍亂之候也。

香薷飲

香薷去土

白扁豆半斤

厚朴半斤

去皮微炒 薑汁炙熱

右咬咀，每服三錢，水一盞煎七分，沉冷不拘時服。一方加黃連四兩，薑汁炒令黃。

六和湯

香薷二錢

砂仁

半夏

杏仁

人參

甘艸炙各五分

赤苓

藿香

白扁豆薑汁炒

厚朴

木瓜

水二鍾薑五片。紅棗一枚煎一鍾。不拘時服。

久泄

久泄不止百藥不效。或暫止而復來。此必有陳積在腸胃之間。積一日不去。則瀉一日不愈。必先逐去陳積而復補之。庶幾獲益。如果係藏虛滑泄。審無腹痛。脈微虛不沉滯者。可以溫澁之藥固之。

本事溫脾湯 治痼冷在腸胃間。連年腹痛泄瀉。休作無時。服諸熱藥不效。宜先取去。然後調治。易瘥。不可畏虛以養病也。

金匱翼 卷七久泄

單

厚朴

乾薑

甘艸

桂心

附子

生各二兩 大黃生四錢碎切湯一盞浸半日濾去渣煎湯時和渣下

右細剉水二升半。煎八合。後下大黃汁。再煎六合。去滓澄去脚。分三服。自夜至曉。令盡。不受食。前更以乾薑丸佐之。

乾薑丸

乾薑

巴豆

去心炒黃 人參

大黃 各一兩

右除巴豆餘為末同研。煉蜜丸如梧子大。服前湯時。用湯下一丸。

震靈丹一名紫金丹 治一切沉寒痼冷。久瀉久痢。臍腹冷痛。嘔吐不食。及婦人血氣虛損。崩漏帶下。

帶下。

禹餘糧

火煨醋淬不計遍數手摺得碎為度 紫石英

赤石脂

丁頭代赭石

如禹餘糧製法各四錢

已上四味。並作小塊。入甘鍋內。鹽泥固濟。候乾。用炭十斤煨通紅。火盡為度。入地理出。火毒二宿。

滴乳香

另研

五靈脂

去沙石研石篩 沒藥 去沙石研各二兩

金匱翼 卷七久泄

單

硃砂

水飛一兩

右八味並為細末。以糯米粉煮糊為丸。如芡實大。晒乾出光。每一丸。空心溫酒或冷水下。忌猪羊血。恐減藥力。婦人醋湯下。

乳豆丸

治滑泄不止。諸藥無效。

肉豆蔻

生為末

右用通明乳香。以酒浸過。研成膏。丸如桐子大。每五十九。空心米飲送下。

和劑桃花丸

寒瀉腹中痛。服諸熱藥以溫中。並

不見效。登固不迭。穢物隨出。此屬下焦。宜桃花丸以溫澁之。

赤石脂 乾薑炮等分

右為末。麩糊丸如梧子大。每服三十九。空心食前米飲下。日三。

河間訶子散 治泄久腹痛漸已瀉下漸少。宜此藥止之。

訶子一兩半生半熟 黃連 三錢 木香 半兩 甘艸 二錢

右為細末。每服二錢。以白朮芍藥湯調下。如止

金匱翼 卷七 久世

之未也。宜因其歸而送之。子訶子散內加厚朴

一兩。竭其邪氣也。按收澁之劑。固腸丸。訶子散

皆治熱滑。扶脾丸。桃花丸。皆治寒滑。蓋滑泄雖

同。而有陰陽之分也。以下食泄

加味平胃散 治食積瀉。噎氣作酸。泄而腹痛甚

瀉後痛減。冥如抱壞雞子。得效云。傷食積而瀉

者。糞白可驗。且腹必耕痛。方泄是也。

蒼朮 厚朴 陳皮 甘艸

縮砂 艸果 山查子 麥芽

水煎服。有停飲食數日。乃瀉。後屢作屢止。飲食稍多。即發。名曰瀉瀉。宜枳朮麩藥丸。以下酒泄

治飲酒過多。遂成酒泄。骨立不能食。但飲一二杯。即發。經年不愈方。

蒼朮 厚朴 陳皮 甘艸

丁香 縮砂 乾葛 麥芽

神麩

石為末。空心米飲調下。二錢。

治傷酒晨起必瀉方。

金匱翼 卷七 食泄酒泄

人參 白朮 乾薑 炙甘艸

茯苓 乾葛 陳皮 川黃連酒浸

右剉薑水煎服。

腎泄

腎泄者。五更溏瀉也。腎雖水藏。而中有元陽。為脾土之母。又腎者主蟄封藏之本。而開竅于二陰。腎陽既虛。既不能溫養于脾。又不能禁固于下。故遇子後陽生之時。其氣不振。陰寒反勝。則腹鳴奔響作脹。瀉去一二行。乃安。積月不愈。或至累年。此病藏于腎。宜治

下。而不宜治中者也。

五味子散

五味子 二兩 吳茱萸 半兩細粒

右二味同炒香熟為度。細末每二錢陳米飲下。

許氏云。頃年有一親識。每五更初欲曉時。必溲

泄一次。如是數月。有人云此名腎泄。感陰氣而

然。得此頓愈。

四神丸

肉豆蔻 五味子 各二兩 補骨脂 四兩

金匱翼 卷七 腎泄

吳茱萸 一兩浸炒

右為末。生薑八兩。紅棗一百枚。煮熟取棗肉和

丸如梧子大。每服五七十丸。空心或食前白湯

下。一云夜食前更進一服。蓋煖藥雖平日服之

至夜力已盡。無以敵一夜陰氣之故也。 澹寮

無五味吳萸。有茴香一兩。木香半兩。一方去五

味吳萸。入神麩麥芽。

按五更溲泄。不獨腎虛一端。酒積寒積食積皆

作此病。槩與溫腎非其治矣。食積酒積治法詳

久泄。吞紅丸子。或單服麩葉枳朮丸。寒積者積

寒在脾腎。宜魏氏椒朴丸。

椒朴丸

益智仁 去殼 川椒 炒出 川厚朴 薑製

陳皮 白乾薑 茴香 各炒分

右用青鹽等分。于銀石器內。以水浸乾藥。慢火

煮乾。焙燥為末。酒糊丸如梧子大。每服三十九

加至四十九。空心鹽湯溫酒任下。

傷酒者。濕熱在脾。宜理中湯。加乾葛黃連。或葛花

金匱翼 卷七 腎泄

解醒湯。吞酒煮黃連丸。

飲食過多。脾胃之氣不能運化。其人必噯氣如敗

卵。宜治中湯。加砂仁半錢。吞紅丸子。或單服麩葉

枳朮丸。

飧泄

飧泄。完穀不化也。脾胃氣衰。不能熟腐水穀。而食物

完出。經所謂脾病者。虛則腹滿。腸鳴。飧泄。食不化是

也。又清氣在下。則生飧泄者。謂陽氣虛。則下陷也。又

風氣入脾。亦令飧泄。夫風者木氣也。而行于土中。風

性善行傳化疾速則熟腐不及經所謂久風入中爲腸風殞泄者是也又脾所生病爲胃滿嘔逆殞泄者亦木氣制土之所致也又虛邪舍于腸胃多寒則腸鳴殞泄食不化者土性喜溫而惡寒多寒則變化無權也故殞泄之病約有三端一曰虛二曰風三曰冷而皆以虛爲本也亦曰虛泄。

胃風湯 治風冷虛氣入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疝痛。

人參 茯苓 川芎 官桂

金匱翼 卷七 食世 柴

當歸 白芍 白朮 各等分

每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去渣稍熱空心服。若虛勞嗽加五味子。若有痰加半夏。若發熱加柴胡。若有汗加牡蠣。若虛寒加附子。若寒甚加乾薑。皆依本方等分。

防風芍藥湯 治殞泄脈弦身熱腹痛而渴。

防風 芍藥 各二錢 黃芩 一錢 蒼朮 三錢

水煎服此治風入脾之法也。

鞠蒟丸 方見瀉泄

吳茱萸散 方見瀉泄

升陽除濕湯 治胃氣不升清氣在下殞泄不已。

蒼朮 柴胡 升麻 羌活

防風 澤瀉 豬苓 神麴 各七

麥芽 陳皮 各五分 甘艸 三分

水二盞煎一盞去滓空心服如胃寒腸鳴加益智仁半夏各五分薑棗同煎。

靈樞云頭有疾取之足謂陽病在陰也足有疾

金匱翼 卷七 殞泄 是

取之上謂陰病在陽也中有疾傍取之中者脾胃也傍者少陽甲胆也脾胃有疾取之足少陽甲胆也甲風木也東方春也胃中真氣者穀氣也飲食不化穀氣下流者濕勝故也故曰濕多成五泄宜助甲胆風以克之又是升陽助清氣上行之法也大抵此症本胃弱不能克化奪食少食欲使胃氣不困也若藥劑大則胃不勝藥泄亦不止當漸漸與之不可多服餌也。經云殞泄取三陰三陰者太陰也宜補中益氣湯

去當歸加白芍。東垣云。清氣在下者。乃人之脾胃氣衰。不能升發陽氣。故用升麻柴胡。助甘辛之味。以引元氣之升。不令下陷為瀉泄也。

加味四君子湯 治氣虛泄瀉。

四君子加肉豆蔻煨訶子炮各一錢薑棗煎。一方加縮砂藿香炮薑各五分。山藥蓮子陳皮各一錢。烏梅一箇。名參苓蓮朮散。

諸痢治法統論

痢疾古名滯下。亦名腸澼。以其滯澁腸藏。下多不快。而澼澼有聲也。或赤或白或赤白相雜。或下腸垢而無糟粕。或糟粕相雜。雖有痛不痛之異。然皆裏急後重。逼迫惱人。

痢疾古有赤熱白冷。及五色分屬五臟之辨。然藏府寒熱。當以脈症互參。雖有前說。存之而已。若執此認病泥矣。

準繩謂後重。因邪壓大腸墜下者。當用大黃枳榔輩。如謙甫水煮木香膏。東垣白朮安胃散等方。瀉其所

金匱翼

卷七 諸痢統論

完

壓之邪。則後重自除。若邪已瀉。其重仍在者。知大腸虛滑不能自收。而重。當用御米殼等澁劑。固其滑。收其氣。用亦愈也。議論自正。但水煮木香白朮安胃二方。皆以御米殼為君。且有烏梅五味白芍訶子。並無枳榔大黃。而云然者。豈未之察耶。

又謂大腸為邪墜下之重。其重至圍後不減。大腸虛滑不收之重。其重至圍後隨減。愚謂邪墜之重。圍後當減。虛滑之重。圍後不減。茲反言之。亦有誤耶。

又謂休息痢多因兜住積滯。以至時作時止。宜四君子吞駐車丸。再投去積。却用兜劑。按四君駐車都非去積之劑。然議論自正。

敗毒散。發散風溫。益元散。解利熱邪。故俱治發熱下利。

治痢大法。後重者宜下。腹痛者宜和。身重者除濕。脈弦者去風。膿血稠粘。以重藥竭之。身冷自汗。以毒藥溫之。風邪內縮者。汗之則愈。鶩溏為利者。溫之而已。又曰。在表者發之。在裏者下之。在上者湧之。在下者去者送之。過者止之。

金匱翼

卷七

分治痢症諸方

辛

又曰。食寒冷者。宜溫熱以消導之。傷濕熱者。宜苦寒以內疎之。風邪內陷者。升舉之。濕氣內盛者。分利之。裏急者。下之。後重者。調之。腹痛者。和之。洞泄腸鳴。無力不及拈衣。脈細微而弱者。溫之收之。膿血稠粘。數至固而不能便。脈洪大而有力者。下之寒之。

分治痢症諸方

寒下之劑

潔古大黃湯

大黃一兩

好酒二大盞。浸半日許。煎至一盞半。去滓分二

服。頓服之。痢止勿服。如未止再服。取利為度。後

服芍藥湯和之。痢止再服白朮黃芩湯。盡徹其

毒也。審係寒積留滯。則宜溫下之法治之。

韓悉大黃湯

川黃連一兩

妙一兩 吳茱萸 廣木香

大黃二兩 酒浸炒

右為末水丸。量人虛實加減丸數。蓋暑毒與食

金匱翼

卷七

寒下

辛

物相搏結在下。腕則升降出入不得。循其正。糟粕欲行不得行。而火復迫之。則將藏府脂膏。逼迫而下。故取大黃驅熱毒。下糟粕清腸臟也。如膿血相雜。而脈浮大者。慎勿以大黃下之。下之必死。謂氣竭也。而陽無所收。不收則死。

和利之劑

芍藥湯

潔古

行血調氣。經曰。澁而便膿血。知氣行

而血止也。行血則便膿自愈。調氣則後重自除。

芍藥一兩 當歸

黃連

黃芩各半

大黃 三錢 桂 二錢 甘艸 炒 枳榔 各二錢

木香 一錢

右九味。咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。

溫服。一方無桂。甘有枳殼。名導滯湯。

先醒齋滯下丸

川連 薑汁炒 滑石 八兩 白芍 酒炒 甘艸 炙 三

枳榔 四兩 枳殼 五兩 木香 二兩

右為末。荷葉湯稍加薑汁和丸。如菉豆大。每服

四錢。

金匱翼 卷一 和利

至

凡燥煩渴惡心者。勿用木香。元氣虛弱者。

勿用枳榔枳殼。裏急色赤者。加當歸。惟惡心

嘔吐不思食勿用。白多加吳茱萸 湯泡七分 稠

豆 炒 二錢 陳皮 一錢 赤多加烏梅肉 一錢 山查

肉 二錢 紅麴 一錢 腹痛加白芍 三錢 甘艸 三錢

口渴及發熱。調滑石末 三錢 小便赤少。或

不利。亦加之。惡心欲吐。即噤口痢。多加人參

石蓮肉。綠色升麻 醋炒 久利不止。加肉豆蔻

一錢 蓮肉 去心炒 扁豆 茯苓 各二錢 人參 三錢

劉河間曰。夫治諸痢者。莫若以辛苦寒藥治之。或

微加辛熱佐之。蓋辛熱能發散邪氣。開通鬱結

苦能燥濕。寒能除熱。使氣宣平而已。其濕熱鬱

抑。欲利不利。宜以韓忞加大黃利之。

當歸導氣湯 東垣

當歸 芍藥 各一錢 生地 二錢 甘艸 一錢

枳榔 木香 各二錢 青皮 槐花 炒 各

澤瀉 五分

右為末。用水煎。食前溫服。如小便利去澤瀉。

金匱翼 卷七 疎解

至

惡心去槐花。加薑汁炒黃連。燥渴減木香一

半。

丹溪青六丸 治血痢。及產後腹痛自利。能補脾

補血。去三焦濕熱。

六一散 三兩 紅麴 炒 半 酒糊丸

按和者。和養其腸胃。利者通利其積滯。凡正不

足而邪有餘者。宜倣此法治之。

疎解之劑

活人敗毒散 治下利發熱脈浮者。

人參 川芎 羌活 獨活

前胡 茯苓 枳殼 桔梗

炙艸 柴胡 陳倉米

右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓服無時一名倉廩湯

藿香正氣散

香薷飲

下利雖曰有積有熱如川藥不效即是腸胃有風邪熱者赤者與敗毒散冷者白者不換金正

金匱翼

卷七 溫通

著

氣散治痢之法大要以散風邪行滯氣開胃院為先不可遽用粟殼龍骨牡蠣輩以閉澀腸胃邪氣得補而愈甚不為纏擾振痛則為裏急後重所以日夕淹延而未已也肉蔻訶子白朮輩恐其補住寒邪亦不可遽投

溫通之劑

葛氏療利色白食不消者為寒下方

豉一斤 薤白一把

水三升煮取二升及熱頓服之此不從暑毒而

發者或過啖生冷或坐臥高堂大屋寒氣所乘

脾亦不運故隨感而為痢以葛氏豉薤湯治之

如逾二三日寒化為熱其病形與暑毒同也

黑丸子

烏梅肉 杏仁去皮尖另研十四粒 巴霜去油半錢

百草霜六錢

右為細末和勻稀糊為丸如黍米大每服十五丸加至二十九白湯送下一方有半夏縮砂各十四粒

金匱翼

卷七 溫補

謹

感應丸

溫補之劑

理中湯

人參 白朮 炮薑 炙艸

水煎服如利不止宜加豆蔻木香有熱加黃

連

真人養臟湯

人參 白朮各六錢 白芍 木香各一兩六錢

甘艸 肉桂各八錢 肉豆蔻麩裹煨五錢

御米殼蜜炙 訶子肉一兩

右咬咀。每服四錢。水一盞半。煎至八分。去滓。食

前溫服。忌生冷魚腥酒麪油膩之物。如滑泄

夜起。久不差者。可加附子四片。此溫補兼收

之劑。臟虛滑脫者宜之。若有熱者不可用也。宜

冷澁之劑。

冷澁之劑。

外臺方治傷寒八九日至十餘日。大煩渴作熱。三

焦有瘡。懸下利。或張口吐舌。目爛口瘡。不識人。用

金匱翼 卷七 冷澁 藥

此除熱毒。止痢。龍骨半斤。水一斗。煮四升。沉之。并

底冷服五合。漸漸進之。肘後方治熱病下利欲

死者。龍骨半斤。研。水一斗。煮取五升。候極冷。稍飲

得汗。即愈。效。又治久利。休息不止者。龍骨四兩

打碎。水五升。煮取二升半。分五服。冷飲。仍以米飲

和丸。每服十九。按三方。並用龍骨水煎。冷服。蓋

以冷除熱。而以澁固脫爾。

和養之劑 駐車丸 治一切下痢。無問冷熱。

阿膠十五兩 搗碎。蛤粉炒成珠。以醋四升。熬成

膏。當歸十五兩 川黃連三十兩 炮乾薑十兩

右為末。同阿膠膏。杵成丸。梧子大。每服三十九

食前米飲下。日三。

凡蘊熱血痢。裏急而痛甚。雖已疎通。蕩滌。然其

痛不減者。非熱亦非積也。營血虧少。陽剛勝陰

故爾。用藥當以血藥為佐。營血一調。其痛立止

矣。

金匱翼 卷七 門人 藥

平舟沈安伯

星門陳步羔 全校字

男 珊 圖南

龍翔 召南

金匱翼卷七

金匱翼卷八目錄

夢遺精滑論

清心 清燥濕熱 秘固精氣 赤白濁

便秘統論

虛秘 實秘 風秘 冷秘

熱秘 氣秘

閉癘遺溺論

小便不通 小便不禁

交腸

金匱翼 卷八 目錄

諸淋

沙石淋 勞淋 血淋 氣淋 膏淋

痼症統論

溫劑 逐水 除溼 降心火 和血

散氣 寒熱兼行 逐氣統經

診候生死要法

金匱翼卷八

創鶴山人尤在齋集

長洲後學徐錦炳南氏讀

夢遺精滑

夢遺精滑。雖皆屬火。而有心腎之異。動於心者。神搖於上。則精遺於下也。不必治腎。但清其心。而夢自已。蓋精之藏貯。雖在腎。而精之主宰。則在心。是以少年伶俐之人。多有此病。而田野愚魯之人。無患此者。總由心之動靜而已。動於腎者。壯年氣盛。久節淫慾。經絡壅熱。精乃不固。經所謂陽強不能密。陰氣乃絕是也。而此病復有二。有出於木者。有出於水者。以二藏皆有相火故也。宜分別治之。又有脾胃濕熱。下流腎經。精氣不清。而遺者。得之醇酒厚味過多也。直指所謂心腎之外。又有脾精不禁。小便漏濁。手足乏力。腰背酸疼。當用蒼朮等劑。以斂脾精。斂脾謂何。精生於穀也。

金匱翼 卷八 夢遺精滑

清心之劑

安神丸

生地 水飛當歸各一錢 甘草五分

黃連一錢五分

湯浸蒸餅為丸。如黍米大。每服十五丸或二十丸。津咽或用溫水送下。

導赤散 婁全善云。一壯年夢遺白濁與澁精藥

益甚。改用導赤散。大劑服之。遺濁皆止。

生地 木通 甘艸等分 竹葉二十片

水煎服。一方加人參麥門冬

茯神湯 治思想太過夢泄夜臥心悸

人參 清心之劑

茯神去皮木一錢五分 遠志 石菖蒲 茯苓各一錢

棗仁炒一分 人參 當歸各一錢 甘草四分

黃連 生地各八分

水二鍾。蓮子七枚。搥碎煎八分。食前服。

蓮子六一湯 治心熱夢遺赤濁。

石蓮肉連心用六兩 甘艸多一兩

右為末。每服二錢。食後燈心一小撮煎湯調下。

王荆公妙香散 安神閉精定心氣

人參 益智仁 龍骨五色者各一兩 白茯苓

茯神去木 遠志去心各半兩 硃砂研 甘草炙各二錢半

右為細末。每服二錢。空心溫酒調服。

真珠丸

真珠六兩以牡蠣六兩用水同煎。去牡蠣以真珠為末。

右於乳鉢內研三五日後。寬著水飛過。候乾用

蒸餅和丸。如梧子大。每服二十九。食前溫酒送下。

下。

珍珠粉丸

黃柏新瓦上炒赤 真蛤粉各一斤 真珠三兩

金匱翼 卷八 清心之劑

右為末。滴水丸。梧子大。每服一百丸。空心溫酒送下。

送下。

法曰。陽盛乘陰。故精泄。黃柏降火清心。蛤粉鹹

而補腎陰。易老方無真珠一味。正傳

定志珍珠丸 治心虛夢泄。

蛤粉 黃柏 人參 白茯苓各三兩

遠志 石菖蒲 青黛各二兩 樗根白皮一兩

右為末。麵糊丸。梧子大。青黛為衣。空心薑鹽湯

下五十丸。正傳

本事清心丸 治年壯氣盛久節淫慾經絡壅熱

夢漏心忪恍惚

好黃柏皮 一兩 為細末用生腦子 一錢 同研煉

蜜丸如梧子大每服十丸至十五丸濃煎麥冬湯下

大智禪師云夢遺不可全作虛冷亦有經絡熱而得之者是也常治一人至夜脊心熱夢遺用珍珠丸猪苓丸遺止後服紫雪脊熱始除或清心丸亦佳本事

金匱翼

卷八

清心清燥濕熱之劑

清燥溼熱之劑

神芎丸

大黃 黃芩各二兩 黑丑頭末 滑石各四兩

黃連 川芎 薄荷葉各半兩

滴水丸桐子大每服五十九食後溫水下局方無黃

連 婁全善云一中年夢遺與瀉藥勿效改與神

芎丸下之後與猪苓丸遂愈

猪苓丸 治年壯氣盛溼熱鬱滯夢遺

半夏 一兩 破如豆粒用猪苓 二兩 為末先將一

半炒半夏色黃勿令焦出火毒取半夏為末糊

九梧子大候乾用前猪苓末一半又同炒微裂

入瓷餅內養之空心溫酒或鹽湯下三四十九

常又服於未申間以溫酒下此方以行為止治濕熱鬱滯小水頻數夢遺精滑良蓋半夏有利性而猪苓導水即腎氣閉導氣使通之意

一男子夢遺醫與瀉藥反甚先服神芎丸大下之卻服此猪苓丸愈可見夢遺屬鬱滯者多矣經驗猪肚丸 治夢遺泄精進飲食健肢體此藥

金匱翼

卷八

清燥濕熱之劑

神應

白朮五兩 苦參三兩 牡蠣左顧者煨研四兩

右為末用雄猪肚一具洗淨以瓷罐煮極爛木

石搗如泥和藥再加肚汁搗半日丸如小豆大

每服四五十九日進三服米飲送下久服自覺

身肥而夢遺永止

和劑威喜丸

白茯苓去皮四兩切塊同猪苓二錢半於磁器內煮二十餘沸晒乾不用猪苓

黃蠟 四兩

右以茯苓為末。溶黃蠟搜和為丸。如彈子大。每空心細嚼。滿口生津。徐徐嚥服。以小便清和為度。效忌米醋及怒氣動性。

三仙丸

益智仁二兩川鹽二兩炒去鹽烏梅一兩半炒山藥一兩另為末

右用山藥末煮糊為丸。梧子大。每服五十九。用硃砂為衣。空心臨臥以鹽湯下。

蒼朮丸

茅山蒼朮去粗皮一斤米泔浸一日夜焙乾舶上茴香炒三

金匱翼

卷八

清燥濕熱之劑

六

川烏炮去皮臍破故紙各二兩炒川棟子蒸取肉焙乾三兩

白茯苓二兩別研龍骨二兩

右末酒糊丸。梧子大。硃砂為衣。每服五十九。空心縮砂仁湯下。粳米飲亦可。

此直指所謂脾精不禁。當用蒼朮輩以斂脾精。是也。若有熱者宜鳳髓丹。

秘固精氣之劑。

葛元真人百補交精丸

熟地黃酒浸一宿切焙乾四兩五味子六兩山藥

牛膝酒浸一宿焙乾肉蓯蓉酒浸一宿切碎焙乾各二兩

杜仲去粗皮慢火炒斷絲三兩澤瀉 山茱萸 茯神

遠志 巴戟肉 柏子仁微炒另研

赤石脂各一兩

右為細末。煉蜜丸。如梧子大。每服二十九。空心酒送下。一方有石羔一兩。

固真散

白龍骨 一兩 韭子 一合

右為末。每服二錢。七空心用酒調服。此二藥大

金匱翼

卷八

秘固精氣之劑

七

能澁精固真氣。煖下元。一方有白茯苓。兔絲子。醋和丸。桐子大。每服五十九。溫酒鹽湯下。名玉露丸。一方加天雄。鹿茸。牡蠣。酒糊丸。梧子大。每服五十九。酒下。日再。名內固丸。

玉鎖丹 治玉門不閉。遺精日久。如水之漏。不能關束者。

文蛤八兩白茯苓二兩白龍骨一兩

右為細末。米糊丸。梧子大。每服七十九。空心淡鹽湯下。臨睡更進一服。極效。加蓮鬚或肉二兩。

芡實二兩兔絲子四兩牡蠣一兩山藥糊丸
炒

赤白濁

有濕熱下流而致者病從脾而及腎也丹溪曰大率
多是濕痰流注治宜燥濕降火珍珠粉丸主之。

真珠粉丸

黃柏炒 蛤粉炒各 珍珠三兩

石為末水糊丸如梧子大每服一百丸空心温

酒下黃柏苦而降火蛤粉珍珠鹹而補腎也。

金匱翼

卷八 赤白濁

八

又方加樗白皮青黛乾薑炒滑石等分神麴糊

丸盧氏曰病因濕熱的矣然亦不可專用寒涼

藥故用炒柏之類又以乾薑之温而佐之也。

又方海蛤黃柏各三兩樗根白皮青黛各二兩

人參白茯苓各三兩遠志石菖蒲各二兩麴糊

丸梧子大每服五十九空心薑鹽湯下名定志

珍珠丸。又方加知母炒牡蠣煨粉山藥炒等

分為末糊丸梧子大每服八十九鹽湯下。

草薺分清飲

益智仁 川草薺 石菖蒲 烏藥等分

右咬咀每服四錢水一盞入鹽一捻煎七分食

前温服。一方加茯苓甘草。

治腎虛白濁方聖濟總錄

肉蓯蓉 鹿茸 山藥 白茯苓等分

右為末米丸梧子大每服三十九棗湯下。

小兒絲子丸

石蓮肉二兩 白茯苓一兩 兔絲子酒浸研

懷山藥二兩內以七錢五分作糊

金匱翼

卷八 赤白濁

九

右為細末用山藥末糊丸梧子大每服五十九

温酒或鹽湯下空心服。一方有五味子名元

兔丹。一方無山藥名扶兔丸。

便閉統論

潔古云。藏府之秘。不可一概論治。有虛秘。有實秘。有風秘。有冷秘。有氣秘。有熱秘。有老人津液乾燥。婦人分產。亡血。及發汗利。小便病後。血氣未復。皆能作閉。不可一例用硝黃利藥。巴豆牽牛。尤在所禁。按仲景云。脈浮而數。能食不大便者。此為實。名曰陽結。期十七日當劇。脈沉而遲。不能食。身體重。大便反鞭。名曰陰結。期十四日當劇。東垣云。陽結者散之。陰結者熱之。前所云實閉。熱閉。即陽結。所云冷閉。虛閉。即陰結也。

金匱翼

卷八

便閉統論虛閉

十

虛閉

虛閉有二。一以陰虛。一以陽虛也。凡下焦陽虛。則陽氣不行。陽氣不行。則不能傳送。而陰凝於下。下焦陰虛。則精血枯燥。精血枯燥。則津液不到。而腸藏乾槁。治陽虛者。但益其火。則陰凝自化。治陰虛者。但壯其水。則涇渭自通。

菴蓉潤腸丸

肉菴蓉 酒浸焙 沉香 另研

為末。用麻子仁汁打糊為丸。梧子大。每服七十九。

空心服

益血潤腸丸

熟地 六兩 杏仁 炒去尖 麻仁 各三兩 已上

枳殼 橘紅 各二兩 阿膠 炒 肉菴蓉 各一兩

蘇子 荆芥 各一兩 當歸 三兩

末之。以前三味膏。同杵干餘下。加煉蜜為丸。如桐子大。每服五六十丸。空心白湯下。

五仁丸

金匱翼

卷八

虛閉

七

栝子仁 半兩 松子仁 桃仁 杏仁 各一兩

郁李仁 一錢 陳皮 四兩 另為末

右將五仁另研如膏。入陳皮末。研勻。煉蜜丸。梧子大。每服五十九。空心米飲下。

黃芪湯 治老人虛閉

綿黃芪 陳皮 去白各半兩

右為末。每服三錢。用大麻仁一合。研爛。以水投取漿水一盞。濾去滓。於銀石器內煎。後有乳起。即入白蜜一大匙。再煎令沸。調藥末。空心食前。

服閉甚者不過兩服愈

實悶

實悶者胃實而關東垣所謂胃氣實者悶物胃氣虛者閉氣是也其人能食小便赤其脈沉實。

麻仁丸

厚朴薑製枳實炒芍藥各八兩大黃蒸焙一斤

麻仁別研五兩杏仁去皮尖炒五兩半

右為末煉蜜和丸梧子大每服二十九臨卧溫水下大便通利則止。

金匱翼 卷八 實悶

三

木香逐氣丸

兵榔雞心者青皮去白陳皮去白各半兩南木香二錢半

川巴豆肉一錢半研如泥漸入藥同研

右件並末生薑自然汁調神麩末為糊丸麻子大每服十九薑湯下如氣攻腹痛枳殼木瓜煎湯下。

按實悶有寒有熱熱實者宜寒下寒實者宜溫下麻仁丸厚朴三物湯治實而熱者逐氣丸溫脾湯治實而寒者也。

風悶

風悶者風勝則乾也山風搏肺藏傳於大腸津液燥澁傳化則難或其人素有風病者亦多有悶或腸胃積熱久而風從内生亦能成悶也。

皂角丸 治大腸有風大便閉結。

皂角炙去子枳殼去瓢炒

右為末煉蜜丸梧子大每服七十九空心米飲下或加麻仁杏仁防風陳皮亦得。

東垣潤腸丸

金匱翼 卷八 風悶

三

當歸梢 羌活 大黃煨各半兩麻仁

桃仁去皮尖各一兩

蜜丸桐子大每服三五十丸白湯下。

冷悶

冷悶者寒冷之氣橫於腸胃凝陰固結陽氣不行津液不通其人腸內氣攻喜熱惡冷其脈遲澁者是也。

半硫丸

半夏湯洗七次焙乾為細末硫黃明淨好者研令極細用柳木槌子殺過

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入

白內杵數百下。丸如梧子大。每服十五丸。至二十九。無灰溫酒。或生薑湯任下。婦人醋湯下。俱空心服。

準繩云。熱藥多秘。惟硫黃煖而能通。冷藥多泄。惟黃連肥腸而止泄。

熱閼

熱閼者。熱搏津液。腸胃燥結。傷寒熱邪傳裏。及腸胃素有積熱者。多有此疾。其症面赤身熱。腹中脹悶。時欲作冷。或口舌生瘡。

金匱翼 卷八 冷閼熱閼 齒

大黃飲子 治身熱煩躁。大便不通。

大黃濕紙裝 煨二錢 杏仁炒去皮尖 枳殼麩炒 梔子仁

生地黃各錢半 人參 黃芩各七分 川升麻一錢

甘艸炙五分

右作一服。水二鍾。薑五片。豆豉二十一粒。烏梅一枚。煎至一鍾。不拘時服。

氣閼

氣閼者。氣內滯而物不行也。其脈沉。其人多噫。心腹痞悶。肺脹。此不可用藥通之。雖或暫通。而其閼

益甚矣。或迫之使通。因而下血者。惟當順氣。氣順則便自通矣。

蘇子降氣湯。加枳殼杏仁煎。此藥流行肺氣。

蘇感丸 卽蘇合四分。感應六分。研和別丸。大凡

腹痛而嘔。欲利其大。便諸藥皆令人吐。惟蘇感

丸。用薑汁泡湯下。最妙。

六磨湯 治氣滯腹急。大便秘澀。

沉香 木香 檳榔 烏藥

枳殼 大黃各等分

金匱翼 卷八 氣閼 圭

右六味熱湯磨服。

閉癃遺溺

太無論小便不利三端。一者大便瀉而小便澀為津液偏滲。治宜分利而已。二者熱搏下焦濕熱不行。必通泄則愈。三者脾胃氣澀不能通調水道。下輸膀胱。可順氣令施化而出。然津液偏滲。有脾肺之分。濕熱不行。亦有腎與膀胱之別。更當參合脈症而分辨之。東垣以小便不通。皆邪熱為病。分在氣在血而治之。如渴而不利者。熱在上焦。氣分為肺熱不能生水。是絕小便之源也。宜蒼味滲泄之藥。以清肺泄火。滋水之化源。如不渴者。熱在下焦。血分為陰受熱邪閉塞。其流宜氣味俱陰之藥。以除其熱。泄其閉塞也。此以上下二焦分氣血言。然在下焦亦有氣壅血污之分。即在上焦亦有氣虛氣窒之異。不可不察也。

元珠論遺溺閉癃。惟肝與督脈三焦膀胱主之。經云肝足厥陰之脈。環陰器。所生病遺溺閉癃。督脈者女子入繫廷孔。其孔溺孔之端也。其男子循莖下至纂與女子等。其生病癃痔遺溺。三焦者足太陽少陰之所將。太陽之別也。上踝五寸。別出貫膈腸出於委陽。

金匱翼

卷八

閉癃遺溺論

七

並太陽之正。入絡膀胱。約下焦實則閉癃。虛則遺溺。然刺灸之法。但取厥陰督脈三焦俞穴。而不及膀胱者。以膀胱但藏溺耳。其出溺皆從三焦及肝督脈也。按經云腎開竅於二陰。又云腎合膀胱。余常見老醫以白通六味腎氣等藥。辨陰陽虛實而治之。其效捷於桴鼓。而此論獨不在腎。故當總統諸家。而參考之。則無遺義矣。

丹溪云小便不通。有正治。有隔二隔三之治。如不因他故。但膀胱有熱者。則宜黃柏知母之屬瀉膀胱。此正治也。如因肺燥不能生水者。則宜車前茯苓之屬清肺氣。此隔二之治也。如因脾濕不運而精不升。以致肺不能生水者。則當蒼朮白朮之屬燥脾利濕。此隔三之治也。但所謂清肺之法。自宜外臺百合飲子之類。清潤兼行。庶幾得理。若車前茯苓滲利之品。以求其水。益資其燥矣。

丹溪又謂不論氣虛血虛。實熱痰閉。皆宜吐之以提其氣。氣升則水自降。譬之滴水之器。必使上竅通而後下竅之水出焉。夫病在下。取之上。內經之旨也。天

金匱翼

卷八

閉癃遺溺論

七

地之氣不升則不降。吐亦法之巧耳。然必痰實氣閉者。乃可用之。未可以之概治氣虛血虛等症也。

元珠閉癃遺溺不禁之辨。謂閉者小便不出。塞而不通也。癃者罷弱而氣不充。淋淋瀝瀝。點滴而出。或澀而疼。一日數十次。俗名淋病者是也。閉則是急病。癃則是緩病。遺溺睡夢中溺出。醒而方知是也。不禁者。日夜無過數。頻頻而溺也。

小便不通

有下焦蓄熱者。因經所謂膀胱不利為癃也。巢氏云。金匱翼 卷八 閉癃遺溺小便不通 太

膀胱與腎為表裏。而俱主水。熱氣太盛。故令結澀。小便不通。腹脹氣急。甚者水氣上逆。令心腹痛嘔。乃至於死。其脈緊而滑直者是也。

廣濟方

冬葵子 滑石 茯苓 通草 各三兩

茅根 四兩 苾硝 二兩 湯成下

水煮分溫三服。相去如人行六七里。若不得溺。急悶欲絕者。以鹽二升。大鑊中熬。以布綿裹臍下。按之。小便當漸通也。曾試有驗。

聖濟總錄方

獨顆大蒜一枚。梔子仁三七枚。鹽花少許。三味爛搗攤紙上。貼臍良久。即通。未通塗陰囊上立通。

掩臍法

連根葱勿洗。帶土生薑一塊。淡豆豉二十一粒。鹽二匙。同研爛。捏餅烘熱。掩臍中。以帛紮定。良久氣透自通。不然再換一劑。

有肺熱不降者。東垣曰。小便閉而不渴者。熱在下焦。金匱翼 卷八 小便不通 五

血分真水不足。膀胱乾涸。乃無陰則陽無以化。法宜苦寒之屬。以補腎與膀胱。使陰氣行而陽自化。則小便自通。其渴者。熱在上焦。氣分。肺中伏火。不能生水。膀胱絕其化源。宜氣味俱薄淡滲之藥。以瀉肺火清肺金而滋水之化源。

百合飲子 外臺

桑白皮 六分 通草 百合 各八分 白茅根 一分

水四升。煮取二升。去滓溫服。有下焦陽虛不化者。夫腎開竅於二陰。腎中陽虛。則

二陰之竅閉則大小便俱不得出如重陰泣寒地道閉塞惟與白通湯多加蔥白陽氣一至二便立通矣。

白通湯

蔥白 四莖 乾薑 一兩 附子 一枚

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服加人尿五合尤佳傷寒并用猪胆者所以從上焦格拒之陰此病獨加人尿者所以通陰中閉塞之陽也。

金匱翼

卷八 小便不通

羊

有下焦陰虛而陽不化者其狀脚膝軟弱無力陰汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉是不可以淡滲之劑利之利之則陰愈竭而水益不行矣宜苦寒之屬以補腎與膀胱所云使陰氣行而陽自化也。

滋腎丸

黃柏 酒洗焙 知母 酒洗焙 肉桂 一錢

右為細末熟水丸芡實大每服百丸加至二百丸百沸湯空心下

內經曰熱者寒之又云腎苦燥急食辛以潤之

以黃柏之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君以知母苦寒瀉腎火故以為佐肉桂辛熱寒因熱用也。

丹溪云諸淋皆屬於熱余每用滋腎丸每百丸可用四物湯加甘草梢杜牛膝木通桃仁滑石木香煎湯空心吞服兼灸三陰交如鼓應桴累試累驗。

有轉胞不得小便者由胞為熱所迫或強忍小便俱令水氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內

金匱翼

卷八 小便不通

羊

水應出不得出小腹急痛不得小便不治害人亦有虛人下焦氣冷不治胞系了戾者宜分而治之。

滑石散

寒水石 二兩 葵子 一合 滑石 一兩 亂髮灰

車前子 木通 各一兩

右剉散水一斗煮取五升時服一劑即利。

八味丸 治腎虛小便不通或過服涼藥而閉澀愈甚者及虛人下元冷胞轉不得小便膨急切痛經四五日困篤欲死者每服五十九溫鹽湯

下。

小便閉尿滿方 小青菜 炒枳殼不拘分兩煎

湯薰洗即通。

小便不禁

有命門陽衰不能約束水液者。經所謂水泉不止。膀胱不藏。乃失守之死候也。急宜溫固腎氣。多有生者。

濟生鬼絲子丸

鬼絲子製二兩

肉苁蓉

酒浸二兩

牡蠣煨

桑螵蛸

酒炙五錢

五味子

鹿茸

酒炙各二兩

雞胫胫

炙乾五錢

金匱翼

卷八

小便不禁

三

附子炮二兩

右為末酒糊丸桐子大。每服七十九。空心鹽湯

溫酒任下。

有脾肺氣虛不能約束水道而病為不禁者。金匱所謂上虛不能制下者也。宜補中益氣之屬為主。而以固澇之劑佐之。張景岳曰。小便不禁。古方多用固澇。此亦治標之意。而非塞源之道也。蓋水雖主於腎。而腎上連肺。若肺氣無權。則腎水終不能攝。故治水者。必先治氣。治腎者。必先治肺。不然徒障狂瀾無益也。

又古方書論小便不禁。有屬熱屬虛之辨。不知不禁

之謂。乃以小水太利為言。皆屬虛寒。何有熱症。若因

熱而小便頻數。則淋瀝點滴不能禁止。而又出之不

快。或多痛澀。非遺失不禁之謂矣。倘以虛寒誤認為

熱。而妄投瀉火之劑。豈不殆哉。

巢氏云。人睡中尿出者。是其素稟陰氣偏盛。陽氣偏

虛。膀胱與腎氣俱冷。不能制於水。而夜臥陽氣衰伏

不能制於陰。陰氣獨盛。則小便多。或不禁而遺尿也

治之方

金匱翼

卷八

小便不禁

三

雄雞肝 桂心

二味等分搗為丸。服如小豆大一枚。日三服。

交腸

交腸者大小便易位而出由冷熱不調陰陽不順而氣亂於下也婦人多有此症。

加減四物湯

四物 五錢 益元散 二錢半

水酒各一盞煎至八分去滓空心溫服。

按此症前人有以五苓散為治者此又一法也。

一法以舊烏紗帽燒灰服者。

金匱翼 卷八 交腸

諸淋

諸淋者由腎虛而膀胱熱也腎氣通於陰陰津液下流之道也膀胱與腎為表裏為津液之府腎虛則小便數膀胱熱則水下澀數而且澀則淋瀝不宣故謂之淋其狀小便數起少出少腹弦急痛引於臍有石淋勞淋血淋氣淋膏淋之異。

透格散

消石 一兩 不夾泥土雪白者生研為末每服二錢。

金匱翼 卷八 諸淋 註

勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子米煎湯下通後便須服補虛丸散。血淋小便不出時下血疼痛滿急。熱淋小便熱赤色臍下急痛並用冷水調下。氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下。石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下沙石令人悶絕將藥末先入銚內隔紙炒至焦為度再研用溫水調下。並空心調藥使消如水乃服之。沈存中 靈苑方淋症所感不一或因房勞或因忿怒或因醇酒厚味

房勞者陰虛火動也。忿怒者氣動生火也。醇酒厚味者。釀成濕熱也。積熱既久。熱結下焦。所以淋瀝作痛。初則熱淋血淋。久則煎熬水液。稠濁如膏如沙如石也。夫散熱利小便。只能治熱淋血淋而已。其膏石沙淋。必須開鬱行氣。破血滋陰方可也。古方用鬱金。琥珀開鬱也。青皮木香行氣也。蒲黃牛膝破血也。黃柏生地黃滋陰也。東垣治小腹痛。用青皮黃柏。夫青皮疎肝。黃柏滋腎。蓋小腹乃肝腎部位也。

沙石淋

金匱翼 卷八 諸淋沙石淋 三

沙石淋者膀胱結熱。水液燥聚。有如沙石。隨溺而出。其大者留礙水道。痛引小腹。令人悶絕也。

人參散方

人參 通草 青鹽 研 海金沙 別研各一分

莎艸根 炒去毛 半兩

右為散。合研勻。每服二錢。空心米飲下。

海金沙散

海金沙 滑石 石羔 木通

井泉石 碎 甘草 炙

右六味等分為散。煎燈心湯調下二錢。不拘時。

鱉甲散

鱉甲燒存性。搗羅為散。每服三錢。空心溫酒調下。

下。

茅根湯

茅根 細切 葛花 為末 露蜂房 為末 右分三服。每服以水三盞。煎溫服。

三因石燕丸 治石淋因憂鬱氣注下焦。結所食

鹹氣而成。令人小便礮痛不可忍。出沙石而後

小便通。

金匱翼 卷八 沙石淋 三

小便通。

石燕 火燒通赤。水中淬三 石韋 去毛 瞿麥 穗 滑石 各一兩

右為細末。麴糊丸。梧子大。每服十九。食前用瞿

麥燈心煎湯送下。日二三服。

外臺療石淋方

石首魚頭 十四 當歸 等分

二味杵散。以水二升。煮一升。頓服立愈。或單服

魚頭石亦佳。

魚頭石亦佳。

白茅湯 治婦人產後諸淋無論膏石冷熱皆治之。

白茅根 五錢 瞿麥 白茯苓 各二錢 沙參 七分

人參 各一分 蒲黃 桃膠 葵子 各七分

甘草 五分 紫貝 二個 石首魚頭中骨 四個

右剉分二貼入薑三片燈心二十莖空心水煎服。

勞淋

勞淋者勞傷腎氣內生虛熱熱傳膀胱氣不施化以

金匱真 卷八 沙石淋勞淋 夫

致小便淋澀作痛此症勞倦即發故謂之勞淋其候小腹痛引莖中者是也。

兔絲子丸 治腎勞虛損溲便不利淋澀不已。

兔絲子 別研人參 黃芪 芍藥

滑石 各一兩 木通 車前 各一兩 黃芩 三分

冬葵子 炒 合

右為末蜜丸梧子大每服二十九食前溫酒或

鹽湯下日二。

白芍藥丸 治勞淋小腹痛小便不利。

白芍藥 熟地黃 當歸 鹿茸 各一兩

右細末蜜丸梧子大每服三十九阿膠湯下。

血淋

血淋者熱在下焦令人淋澀不通熱盛則搏於血脈血得熱而流溢入於胞中與溲便俱下故為血淋也

白茅根湯

白茅根 芍藥 木通 車前子 各三兩

滑石 碎 黃芩 各一兩 亂髮 燒灰 冬葵子 微炒 各半兩

右八味搗篩每服三錢水煎溫服日三。

金匱真 卷八 勞淋血淋 夫

雞蘇飲

雞蘇葉 竹葉 各二兩 滑石 木通 各五兩

小薊根 一兩 生地黃 六兩

每服五錢水煎溫服不拘時以利為度。

四汁飲

葡萄汁 生藕汁 生地汁 蜜 五合

右俱取自然汁與蜜和勻每服七分一盞銀石

器內慢火煎沸溫服不拘時。

瞿麥湯 治血淋尿血。

爛滑石 赤芍 瞿麥穗 車前子生

赤茯苓 石葦去毛 桑白皮炒 阿膠炒

黃芩 生地黄洗 甘草炙 白茅根等分

右為細末。每服二錢。入髮灰一錢。沸湯調下。

琥珀散

琥珀為細末。每服二錢。燈心一握。腦荷少許。煎

湯調下。

茅根飲子

張文仲方 治胞絡中虛熱。小便赤淋。此心氣

虛而熱氣乘之也。
金匱翼 卷八 血淋 三

茅根 一升 茯苓 三兩 人參 乾地黄 二兩

右四味。以水五升。煮取一升五合。分溫五六服。

一日服盡驗。

又方 陶氏

苧根十枚。水五升。煮取二升。一服。血止神驗。

本事火府丹 治心經蘊熱。小便赤少。五淋塞痛。

生乾地黄 二兩 黃芩 一兩 木通 三兩

右為末。煉蜜丸。桐子大。每五十九。燈心湯下。

新定

生地黄 三錢 麥冬 二錢 茅根 五錢 竹葉 三錢

滑石 二錢 葵子 一錢 川木通 一錢 黃芩 一錢

右作一服。水煎服。虛人用緩。加甘草五分。實人

用急。加川芎一錢。

牛膝膏 治死血作淋

牛膝四兩去蘆 桃仁去皮 歸尾酒浸各

生地黄 赤芍各一兩 川芎 五錢

右剉片。用甜水十鍾。炭火慢慢煎至二鍾。入麝

香少許。分作四次。空心服。

金匱翼 卷八 血淋 三

氣淋

氣淋者。氣閉不能化水。病從肺而及於膀胱也。其候

小腹滿。尿澀。常有餘瀝。許仁則云。氣淋者。氣壅小便

不通。遂成氣淋。此病自須依前療。水氣法。然亦有氣

熱不能化水者。當以清肺金為主也。

瞿麥湯

瞿麥 桑白皮 甘艸各半兩 木通

赤茯苓 陳皮去白各一兩 滑石碎一兩半 冬葵子炒一合

右共八味。搗篩。每服三錢。入蔥白二寸。同煎。溫

服。

桑白皮湯 治氣淋結澀便不利。

桑白皮 一兩 茅根 二兩 木通 乾百合 各二兩

右搗篩每服三錢水煎溫服無時

石韋散

石韋 去毛 赤芍 各半 白茅根 木通

瞿麥 川芎 硝 葵子 各一兩 木香 一兩

滑石 二兩

右吹咀每服四錢水一盞煎至六分去滓食前

金匱翼 卷八 氣淋

三

溫服

沉香散 治氣淋多因五內鬱結氣不宣行陰滯

於陽而致壅閉小便脹滿便溺不通。

沉香 石韋 去毛 滑石 王不留行

當歸 各半 葵子 白芍 各七錢半 橘皮

甘草 各二錢半

右為散每服二錢煎大麥湯下。

膏淋

膏淋者小便肥濁色若脂膏故名膏淋亦曰肉淋。

磁石丸

磁石 火煨醋淬 肉蓯蓉 酒浸 澤瀉

滑石 各一兩

右為末蜜丸梧子大每服三十九溫酒下不拘

時 如臍下妨悶加沉香一錢以行滯氣。

秋石丸 此直指方也治濁氣干清精散而成膏

淋黃白赤黯有如肥膏蜜油之狀。

白茯苓 一兩 桑螵蛸 蜜炙 鹿角膠 搗碎 炒黃

秋石 各半兩

金匱翼 卷八 膏淋

三

右末研糕糊丸梧子大每服五十九人參煎湯

下。

三因鹿角霜丸

鹿角霜 白茯苓 秋石 各等分

右為細末糊丸梧子大每服五十九米飲下。

疝症統論

昔人論疝。有專主厥陰經者。有專主任脈者。有兼言五藏者。主厥陰者。謂肝之脈環陰器。抵少腹。是厥陰之分。乃受疝之處也。主任脈者。謂內經任脈為病。男子內結七疝。故任之脈為疝之源也。兼五藏者。謂內經心脈搏急為心疝。肺脈沉搏為肺疝。又太陰脈滑為脾風疝。太陽脈滑為腎風疝。少陽脈滑為肝風疝。之類是也。以愚觀之。則疝病未有不本於肝者。蓋任為陰脈之海。其脈同足厥陰。並行腹裏。而五藏之疝。

金匱翼 卷八 疝症統論 謹

其脈曰搏急曰滑。夫搏急是肝脈滑則為病風。風氣通於肝。故任脈諸藏雖皆有疝。莫不連合肝經。所謂有形如瓜。有聲如蛙。或上於腹。或下於囊者。方可謂之疝病。其不與肝相干者。則不得謂之疝矣。至論疝病之因。有主寒者。有主濕熱者。有火從寒化者。要之疝病不離寒濕熱三者之邪。寒則急。熱則縱。溼則腫。而尤必以寒氣為之主。其有熱者。寒邪鬱熱於內。非熱能病疝。亦非熱能變寒也。故曰熱為寒鬱。則可熱從寒化。則不可。又疝者痛也。不特睪丸腫痛為疝。即

腹中攻擊作痛。控引上下者。亦得名疝。所以昔賢有腹中之疝。與睪丸之疝之說。戴人且謂婦人亦有疝。凡血澗不月。少腹有塊等症。皆是要不離乎肝經為病。蓋肝者藏血主筋。而其氣暴且善攻冲也。

諸疝名狀。巢氏戴人言之最詳。巢氏辨列七疝。曰厥疝。曰寒疝。曰氣疝。曰盤疝。曰疝。曰狼疝。其厥熱心痛。吐食不下者。名曰厥疝。腹中氣乍滿。心下盡痛。氣積如臂者。曰癥疝。寒飲食。即脇下腹中盡痛。曰寒疝。腹中乍滿乍減而痛。曰氣疝。腹中痛在臍旁。曰盤疝。腹中臍下。

金匱翼 卷八 疝症統論 謹

有積聚曰疝。疝。小腹與陰相引而痛。大便難曰狼疝。此皆痛在心腹之疝也。戴人亦分七疝。曰寒。曰水。曰筋。曰血。曰氣。曰狐。曰癥。寒疝其狀囊冷。結硬如石。陰莖不舉。連控睪丸而痛。得之坐臥濕地及磚石。或冬月涉水。或風冷處。使內過勞。宜以溫劑下之。久而無子。水疝其狀腎囊腫痛。陰汗時出。或囊腫狀如水晶。或囊癢搔出黃水。或小腹按之作水聲。得之飲水。或醉酒使內過勞。汗出。而遇風寒。溼之氣聚於囊中。故水多令人為卒疝。宜以逐水之劑下之。筋疝其狀陰

莖腫痛。或潰或膿。或裏急筋縮。或莖中痛。痛極則瘡。或挺縱不收。或白物如精。隨洩而下。得之房室勞傷。及邪術所使。宜以降心火之藥下之。血疝其狀如黃瓜。在小腹兩旁。橫骨兩端約中。俗云便癰。得之春夏重感大燠。勞於使內。氣血流溢。滲入脬囊。留而不去。結成癰腫。膿少血多。宜以和血之劑下之。氣疝其狀上連腎區。下及陰囊。或因號哭忿怒。則鬱久而脹。號哭怒罷。則氣散者是也。宜以散氣之劑下之。狐疝其狀如瓦。臥則入小腹。行立則出。腹入囊中。狐晝出穴。

金匱翼 卷八 疝症統論溫劑

而溺夜入穴而不溺。此疝出入上下往來。正與狐相類。亦與氣疝大同小異也。宜以逐氣流經之藥下之。癰疝其狀陰囊腫絕。如升如斗。不痒不痛。得之地氣卑溼所生。故江淮之間。秋溼之處。多感此疾。宜以去溼之藥下之。此皆痛在罌丸之疝也。

溫劑

溫法有二。外入之寒。溫必兼散。内生之寒。溫必以補。子和論疝多從勞山得之。然並不立補法。愚謂寒從外入者。其病多實。寒從内生者。其病多虛。設不能辨。

而概與散法。難免虛虛之咎矣。余采當歸羊肉等。以補子和之未備。且遵仲景之舊法也。

和劑胡蘆巴丸。治疝氣偏墜。痛不可忍。甚則嘔吐悶亂。

吐悶亂

胡蘆巴炒一斤 川棟子去核炒一斤 川烏炮去皮

巴戟去心炒各六兩 茴香鹽水炒十二兩 吳茱萸洗炒十兩

右為末。酒糊丸。如梧子大。每服十五丸。至二十丸。空心溫酒下。食前。一方有黑牽牛。

烏頭桂枝湯 仲景治寒疝腹中痛逆冷手足不仁

金匱翼 卷八 溫劑

烏頭

右一味。以蜜二斤煎減半。去滓。以桂枝湯五合解之。得一升。初服二合。不知即服三合。又不知復加至五合。其知者。如醉狀。得吐者為中病。

桂枝湯和榮衛散寒邪。止痛烏頭直入厥陰。逐寒氣用蜜煎者。緩其毒也。一方只用烏頭水。

煮去滓。內蜜煎。令水氣盡服之。名烏頭煎。

當歸生薑羊肉湯。

當歸 三兩 生薑 五兩 羊肉 一斤

水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。若寒多者。加生薑十片。痛多而嘔者。加陳皮二兩。白朮一兩。

金匱治寒疝腹中痛。及脇痛裏急者。當歸生薑羊肉湯主之。

衍義云。服之無不應驗。有一婦人產當寒月。寒氣入產門。臍以下脹滿。手不欲犯。此寒疝也。師將與抵當湯。謂有瘀血。非其治也。與仲景羊肉湯。一服而愈。

海藏附子建中湯

金匱翼

卷八 溫劑

三

桂

白芍

甘艸

飴糖

附子

製

白蜜

生薑

此溫養營血之劑。亦有虛在氣分者。丹溪云。疝有挾虛而發者。其脈不甚沉緊。而豁大無力者是也。然其痛亦輕。唯覺重墜牽引耳。當以參朮為君。疏導藥佐之。如桃仁。川棟。茱萸。木香。橘核之類是也。逐水之劑

醉後飲水過多。脾氣不化。則流入下焦。或房勞汗出入水。腎氣不治。則滲入呼囊。此水疝之源也。子和以

導水禹功。治蔡叅軍疝痛。瀉水三十餘行。腫痛立消。蓋必決去其水。而疝乃愈。若雜進薑附。水溼為燥熱所壅。則三焦閉塞。水道不行。而腫痛益甚矣。

禹攻散

黑丑

頭末 四兩 茴香 炒 一兩

右為末。以生薑自然汁調。一二錢臨臥服。

宣胞丸 治外腎腫痛。

黑牽牛

半生半熟 取頭末 一兩

川木通 炒 一兩

青木香

一兩 用鹽炒 七枚 同炒 香

金匱翼

卷八

逐水之劑 除濕之劑 三

右為細末。酒糊為丸。如梧子大。每服三十九。溫酒下。

除溼之劑

水濕同氣也。然水汪洋而濕淹濡。故水可逐。而濕宜滲。水成形而濕化氣。故水無陽而溼有熱。子和水疝癰疝所由分也。學者辨諸。

元戎加味五苓散

朮

茯苓

猪苓

澤瀉

肉桂

川棟子

右爲末。

降心火之劑

治疝降心火之說。子和語焉而未詳。戴氏有心火下降。則腎水不患不溫之語。然與子和之治不同。子和所謂降心者。治在筋疝。莖腫痛潰膿血。戴氏所謂降心者。治在木腎。頑痺結硬如石。大抵子和主清降。使心火下泄。如加味通心散之類。戴氏主鹹降。使心火下濟。如海藻漬堅丸之類。然而治法懸殊矣。

加味通心散 治膀胱實熱。小腸氣痛。

金匱翼 卷八 降心火之劑 四

瞿麥穗 木通去皮 梔子仁 黃芩

連翹 甘艸 枳殼去瓤 川棟去核各等分

右剉散。每服五錢。水一盞半。燈心二十莖。車前草五莖。同煎空心溫服。

海藻漬堅丸 治木腎如斗。結硬如石。

海藻 昆布 川棟實 吳茱萸湯炮各一兩

木香 青皮 小茴香 荔枝核炒

延胡索炒 肉桂各五錢 海帶 橘核炒

桃仁麩炒去皮 木通七錢

酒糊九。梧子大。每服六十九。溫酒鹽湯任下。

和血之劑

子和所謂血疝。卽今人所謂癰癰也。學九腫痛潰出膿血。以病在血分。故名血疝。血行則疝亦愈。故當和血。

桃仁當歸湯 治疝因瘀血作痛。

桃仁去皮尖 當歸梢酒洗 延胡索各一錢半

川芎 生地黃 赤芍藥

吳茱萸 青皮醋炒各一錢 牡丹皮八分

金匱翼 卷八 和血散氣之劑 三

水二鍾。薑三片。煎八分。食前服。

散氣之劑

氣聚則寒。氣散則通。是痛之休作。由氣之聚散也。故曰治疝必先治氣。

青木香丸

黑牽牛取末十二兩 補骨脂炒 葶藶各四兩

木香二兩 檳榔用酸粟米飯裹溼紙包火中煨令紙焦去飯四兩

右爲細末。清水滴爲丸。如菉豆大。每服三十九。

熟水下。

寒熱兼行之劑

疝氣有寒束於外。鬱熱在內。攻刺急痛者。法必寒熱兼行。如倉卒散之類。丹溪云。用之無有不效。蓋川烏頭。治外束之寒。山梔仁。治內鬱之熱也。

倉卒散

山梔仁四十九箇 附子一枚

右剉散。每服二錢。水一盞。酒半盞。煎七分。入鹽一捻。溫服即愈。

丹溪方

金匱翼 卷八 寒熱兼行之劑 聖

山梔仁 川烏 吳茱萸 檳榔

桃仁各等分

右研水煎服。

逐氣流經之劑

許學士云。疝病多因虛。而得之。不可以虛而驟補。邪之所湊。其氣必虛。留而不去。其病則實。故必滌去所畜之邪。然後補之。是以治疝諸藥。多借巴豆氣者。蓋為此也。

天台烏藥散東垣下同

天台烏藥 木香 茴香炒 青皮去白

良薑炒各五錢 檳榔判二枚 川棟十箇 巴豆十四枚

右入味。先以巴豆打碎。同棟實用。麩炒候黑色。去巴豆。麩俱不用。外為細末。每服一錢。溫酒調下。

下。

川棟子散

川棟子判碎。用巴豆十四粒打碎。一匙。炒黃色。去巴豆。 木香

茴香鹽一匙。炒黃。去鹽各一兩。

右為細末。每服二錢。空心食前。溫酒調下。

金匱翼 卷八 逐氣流經之劑 聖

診候生死要法

五藏者中之守也。中藏盛滿氣勝傷悲者聲如從室中言。是中氣之濕也。言而微終日乃復言者。此奪氣也。衣被不歛。言語善惡不避親疎者。此神明之亂也。倉廩不藏。是門戶不要也。水泉不止者。是膀胱不藏也。得守者生。失守者死。五藏者身之強也。頭者精明之府。頭傾視深。精神將奪矣。背者胸中之府。背曲肩隨。府將壞矣。腰者腎之府。轉搖不能。腎將憊矣。膝者筋之府。屈伸不能。行則僂附。筋將憊矣。骨者髓之府。不能久立。行則振掉。骨將憊矣。得強則生。失強則死。脈要精微論

金匱翼

卷人

診候生死要法

胃

人一呼脈四動以上曰死。脈絕不至曰死。乍疎乍數曰死。人無胃氣曰逆。逆者死。脈從陰陽病易已。脈逆陰陽病難已。脈得四時之順曰病無他。脈反四時及不間藏曰難已。春夏而脈瘦。秋冬而脈浮大。命曰逆四時也。風熱而脈靜。泄而脫血。脈實病在中。脈虛病在外。脈澹堅者皆難治。命曰反四時也。水穀為本。故人絕水穀則死。脈無胃氣亦死。所謂無

胃氣者。但得真藏脈。不得胃氣也。平心脈來。累累

如連珠。如循琅玕。曰心平。夏以胃氣為本。病心脈來

喘喘連瀾。其中微曲。曰心病。死心脈來。前曲後居。如

操帶鉤。曰心死。平肺脈來。厭厭聶聶。如落榆莢。曰肺

平。秋以胃氣為本。病肺脈來。不上不下。如循雞羽。曰

肺病。死肺脈來。如物之浮。如風吹毛。曰肺死。平肝脈

來。奕奕招招。如揭長竿。末稍曰肝平。春以胃氣為本。

病肝脈來。益實而滑。如循長竿。曰肝病。死肝脈來。急

益勁。如新張弓弦。曰肝死。平脾脈來。和柔相離。如雞

金匱翼

卷人

診候生死要法

脾

踐地。曰脾平。長夏以胃氣為本。病脾脈來。實而盈數

如雞舉足。曰脾病。死脾脈來。銳堅如烏之喙。如鳥之

距。如屋之漏。如水之流。曰脾死。平腎脈來。喘喘累累

如鉤。按之而堅。曰腎平。冬以胃氣為本。病腎脈來。如

引葛。按之益堅。曰腎病。死腎脈來。發如奪索。辟辟如

彈石。曰腎死。平人氣象論

形氣相得。謂之可治。色澤以浮。謂之易已。脈從四時。

謂之可治。脈弱以滑。是有胃氣。命曰易治。取之以時。

形氣相失。謂之難治。色夭不澤。謂之難已。脈實以堅。

謂之益甚。脈逆四時為不可治。所謂逆四時者。春得肺脈。夏得腎脈。秋得心脈。冬得脾脈。其至皆懸絕沉澹者。名曰逆四時。五實死。五虛死。脈盛皮熱。腹脹前後不通悶。此謂五實。脈細皮寒。氣少泄利前後飲食不入。此謂五虛。漿粥入胃泄注止。則虛者活。身汗得後利。則實者活。玉機真藏論

形盛脈細。少氣不足以息者危。形瘦脈大。胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左

金匱翼

卷八

診候生死要法

身

右相失不可數者死。中部之候雖獨調與眾相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。脫肉身不去者死。真藏脈見者死。九候之脈皆沉細懸絕者為陰主冬。故以夜半死。盛躁喘數者為陽主夏。故以日中死。寒熱病者以平旦死。熱中及熱病者以日中死。病風者以日夕死。病水者以夜半死。其脈乍疎乍數。乍遲乍疾者。日乘四季死。形肉已脫。九候雖調猶死。七症雖見。九候皆從者不死。脈不往來者死。皮膚著者死。瞳子高者。太陽不足。戴眼者。太陽已絕。此決

死生之要也。三部九候論

乳子而病熱。脈懸小者。手足溫則生。寒則死。乳子中風熱。喘鳴肩息者。脈實大也。緩則生。急則死。腸澼便血。身熱則死。寒則生。腸澼下白沫。脈沉則生。浮則死。腸澼下膿血。脈懸絕則死。滑大則生。腸澼之屬。身不熱。脈不懸絕者。滑大者曰生。懸澹者曰死。癩疾脈搏大滑。久自已。脈小堅急。死不治。癩疾之脈虛則可治。實則死。消痺虛實。脈懸小堅。病久不可治。脈實大病久可治。通評虛實論

金匱翼

卷八

診候生死要法

身

陽從左。陰從右。老從上。少從下。是以春夏歸陽為生。歸秋冬為死。反之則歸秋冬為生。一上一下。寒厥到膝。少者秋冬死。老者秋冬生。形弱氣虛死。形氣有餘。脈氣不足。死。脈氣有餘。形氣不足。生。方盛衰論得守者生。失守者死。得神者昌。失神者亡。本病論平人而氣勝形者壽。病而形肉脫。氣勝形者死。形勝氣者危。壽夭剛柔篇熱病七八日。脈微小。病者溲血。口中乾。一日半死。脈代者。一日死。熱病已得汗出。而脈尚躁喘且復熱

喘甚者死。熱病七八日，脈不躁躁不數，散後三日中有汗，三日不汗，四日死。熱病不知所痛，耳聾不能自收，口乾陽熱甚，陰頗有寒者，熱在髓，死不可治。熱病已得汗而脈尚躁盛，此陰脈之極也，死。其得汗而脈靜者生，熱病脈盛躁而不得汗者，此陽脈之極也，死。脈盛躁得汗靜者生。熱病不可刺者有九：一曰汗不出，大顛發赤，噦者死。二曰泄而腹滿盛者死。三曰目不明，熱不已者死。四曰老人嬰兒，熱而腹滿者死。五曰汗不出，嘔下血者死。六曰舌本爛，熱不止者死。七曰咳而衄，汗不出，出不至足者死。八曰髓熱者死。九曰熱而瘰者死，腰折癩癧，齒際齟也。凡此九者，不可刺也。熱病篇

熱病脈靜，汗出已，脈盛躁，是一逆也。病泄脈洪大，是二逆也。著痺不移，腠肉破，身熱脈偏絕，是三逆也。淫而奪形，身熱色天然白，及後下血，衄血，衄篤重，是四逆也。寒熱奪形，脈堅搏，是謂五逆也。

脈一呼再至曰平，三至曰離經，四至曰奪精，五至曰死，六至曰命絕。此至之脈也。一呼一至曰離經，再呼

金匱翼

卷八

診候生死要法

與

一至曰奪精，三呼一至曰死，四呼一至曰絕命。此損之脈也。損之為病，一損損於皮毛，皮聚而毛落，二損損於血脈，血脈虛少，不能榮於五藏六府，三損損於肌肉，肌肉消瘦，飲食不能為肌膚，四損損於筋，筋緩不能自收持，五損損於骨，骨痿不能起於床。反此者，至脈之病也。從上下者，骨痿不能起於床者死，從下上者，皮聚而毛落者死。脈來一呼再至，一吸再至，不大不小曰平。一呼三至，一吸三至，為適得病，前大後小，即頭痛目眩，前小後大，即胸滿短氣。一呼四至，一吸四至，病欲甚，脈洪大者，苦煩滿，沉細者，腹中痛，滑者傷熱，澀者中霧露。一呼五至，一吸五至，其人當困，沉細夜加，浮大晝加，不大不小，雖困可治，其有大小者難治。一呼六至，一吸六至，為死脈也。沉細夜死，浮大晝死。一呼一至，一吸一至，名曰損人，雖能行，猶當著床，所以然者，血氣皆不足故也。再呼一至，再吸一至，名曰無魂，無魂者當死也。人雖能行，名曰行尸。上部有脈，下部無脈，其人當吐不吐者死。上部無脈，下部有脈，雖困無能為害，所以然者，人之有尺，譬如

金匱翼

卷八

診候生死要法

與

樹之有根。枝葉雖枯槁。根本將自生。有根本。人有元氣。故知不死。
扁鵲云。筋絕不治。九日死。手足爪甲青黑。呼罵口不
息也。

門人 平舟沈安伯

星門陳步羔 全校字

珊 圖南

男 龍翔 召南

金匱要略卷八

金匱要略

卷八

診候生死要法

法

參校諸同人姓氏

朱青溪

沈安伯

沈竹坪

邱士庶

顧心安

錢理安

邱雲坡

顧晴川

潘小愚

顧心梅

陳步羔

夏晉安

姪 東屏

姪 惕峰

男 圖南

男 召南

男 召南

江右熊笏著

中風論

醉經閣校刊

中風論一書安義熊林陵先生著聞向無刊本也戊寅夏間余泛里中世醫郭君秋泉借閱其家藏抄本喜是書明於內景不獨為中風立論即中風一症灼有見地全卷無

序

一槩棧語因手錄之嗣詢此書所由來秋泉云嘉慶季年吾閩陳脩園先生治療出一時名醫右熊君耳其名不遠千里來証所學脩園下榻欽其緒論即知熊有撰述奈深

自謙秘不肯示人一日熊外出脩園門下士私發其篋得此書傳鈔之欲再檢他本詰胡熊束裝歸矣余於客冬購得林陵輯註難經讀其中精義名言悉從靈素體會而出

序

二

與中風論相表裏欲合刻而公諸世未逮也今夏家端植兄擬刊醫書余以此論告即欣然出資付梓並自任校讐之役一字之疑必求參酌剞劂竣事屬叙緣起余思熊氏

書出當有目共賞固無待余之表彰而端植隱於市廛能不沒前賢之美俾懸齋家獲指南可多得哉惟讀難經輯註知林陵先生尚有傷寒金匱合註醫案一隅錄兩種肆

序

三

中徧訪無此書端植能一搜羅襄刻熊氏全集尤余之厚望也夫時光緒甲申八月子莊林慶祺謹序

昔神農黃帝岐伯俞跗以神聖之資闡陰陽之奧創典醫籍拯濟疾苦實與教養政治相輔而行故三墳之書先于五典蓋醫之學備在君相矣厥後有伊尹湯液亦其類也東漢以來君相

自序

罕有知者而其學遂降為藝術若醫和醫緩扁鵲之傳皆其最也迨皇赫百家之說不禁醫卜攻靈樞素問神農本草經扁鵲難經猶傳於世漢之太倉公華元化張仲景之徒皆精其術倉

公元化無傳書惟仲景有傷寒金匱兩書實與本經湯液靈素難經相為表裏此醫學之大成也晉太醫令王叔和錯解義例纂亂原文而醫學始晦相沿至今卒無起而正之者雖有諸家

自序

華出於抒所見究與靈素難經不能符合其弊在于不信古經不取內景枉逞胸臆是以得不償失名不副實著作雖多去古愈遠矣近世醫方本草諸書專執心肝脾肺腎顛倒金

身水火土滿紙空談毫無實義
莫不家置一冊沿為習俗寧不
可破此時即起軒岐盧扁洪聖
賢而正之不目為怪則斥為妄耳
笈學術淺陋惟于古聖之書頗
曾究心觀其診病脈法經絡營

自序

三

衛內景臟象皆與後世諸編不同
蓋理字于氣氣字于形後人舍
形氣而言理故其術實淺而不
適于用古人求實理于形氣之中
故其術精切而多奇中今欲實
從形氣中以求治病之理不得

不詳之如左以就正于高明庶不
於按劍相說也夫

道光辛巳孟春江右熊 笈叔陵

甫自叙

自序

四

中風論目錄

論臟象

論經絡次序

論經絡淺深

論奇經八脈

論總

論宗氣

論營氣

論衛氣

中風論

目錄

論脈訣

論病因

論中風

論八風

論輕重

論寒熱

論證候

論風脈

論治法

醉經閣

論藥餌

附案數則

中風論

目錄

二

醉經閣

中風論全卷

江右熊 笏叔陵 輯

長樂陳念祖修園 定

論臟象

肝藏魂屬足厥陰經。有正絡入肝。絡膽。主春木風令。旺於春。以膽為府。屬足少陽經。有正絡入膽。絡肝。七情主怒。聲主呼。液為淚。五官目。凡藏府之相表裏者。因諸經相屬相絡也。後世用五行幹枝相配亦屬鑿空腐說。

心藏神屬手少陰經。有正絡入心。絡小腸。主夏君火。
中風論 一 醉經閣

熱令。旺於夏。以小腸為府。屬手太陽經。有正絡入小腸。絡心。心君無為。五官舌。

心主無形。代心君行事。屬手厥陰經。有正絡歷膻中。徧歷三焦。主長夏相火暑令。旺於夏。以三焦為府。亦無形。屬手少陽經。有正絡歷三焦絡膻中。七情主喜。聲主笑。液為汗。

脾藏意屬足太陰經。有正絡入脾。絡胃。主四季濕土令。寄旺於四季。以胃為府。屬足陽明經。有正絡入胃。絡脾。七情主憂思。聲主歌。液為涎。五官口。

肺藏魄屬手太陰經。有正絡入肺。絡大腸。主秋金燥令。旺於秋。以大腸為府。屬手陽明經。有正絡入大腸。絡肺。七情主悲。聲主哭。液為涕。五官鼻。

腎藏精與智。左藏智。右藏精。屬足少陰經。有正絡入腎。絡膀胱。主冬水寒令。旺於冬。以膀胱為府。屬足太陽經。有正絡入膀胱。絡腎。七情主恐懼。聲主呻。液為精。五官耳。

五藏以心君為主。心君無為。寂然不動。其藏堅固。邪不能侵。侵之則神去而死。凡心之用。皆手厥陰。
中風論 二 醉經閣

心主代為用事也。

心主即膻中宗氣也。但有氣而無形。專代心君用事。故名之相火。譬如宰相代人君施政也。後世錯認右腎為相火。考之靈素難經及仲景書。皆無此說。此因叔和脈法將三焦配入右尺。三焦本屬相火。故遂錯認右腎為相火耳。心主是本名。因心主無形可指。故素問借任脈之膻中穴名之曰膻中。是從其外而名之也。靈樞借護心之脂膜名之曰心包絡。是從其內而名之也。二者皆是借名非本名也。唯心主二字乃

是本名。因其代心君行事。為性情之主。故曰心主。三焦亦有氣而無形。即衛氣之間行於府者也。烏鵲名為原氣。乃腸胃中行津化液之氣也。蓋心主是宗氣。內經所謂大氣積於胸中。命曰氣海者是也。凡肝之怒。肺之悲。腎之智。脾之思。皆秉此氣為用。三焦是衛氣。內經所謂衛出下焦。閤行於六府者是也。凡上焦之飲食主納。中焦之主腐化。下焦之二便主出。皆秉此氣為用。此二者皆有氣而無形。馬元臺謂三焦有形如脂者妄也。

中風論

三

醉經閣

腎有兩枚。其左者為腎。右者為命門。男子以右腎藏精。女子以右腎繫胞。此言出於難經。不見於內經。然內經謂衝脈為血海。循腹右繫於腎。又謂男子二八。太衝脈盛。精始至。女子二七。太衝脈盛。月事以時下。又謂男子無月事。衝脈不洩。則上榮而生鬕鬚。女子有月事。衝脈下洩。則鬕鬚不生。宦者損其衝脈。則鬕亦不生。觀難經男以藏精。女以繫胞之語。則右腎為命門者。即內經之衝脈循腹右下行。繫於右腎。謂男女之天癸所以傳生者也。猶曰此生生受命之門耳。

則命門乃水也。非火也。後世沿叔和之謬。謂左腎為水。右腎為相火。已屬大謬。李時珍反用此法。詆毀難經。可知後世醫家於內景藏象全然不識。而猶妄意著作。其書尚可信乎。

或問子以命門為天癸。然則腎中無火矣。無火則腎中真陽又是何物也。曰腎中真陽即是衛氣之根。內經謂衛出下焦。難經謂腎間動氣。又謂生氣之原者是也。此兩腎皆有之。且膀胱亦有之。奈何專屬之右腎耶。

中風論

四

醉經閣

內經曰。初生之來謂之精。男女構精。萬物化。兩精相搏。謂之神。陰陽合而神明。隨神往來。謂之魂。而神明動。生即肝。並精出入。謂之魄。精血充而運動。心有所憶。藏魂也。故脾主意。慮善而動。謂之智。官故藏智。此五謂之意。故藏意。慮善而動。謂之智。官故藏智。此五藏之所藏。謂之五神。所謂性也。

凡五藏皆不可病。而心藏為最。然內經難經論病。多以五藏為言者。乃指五藏所主之病。非謂五藏為受病之地也。譬如怒為肝之所主。其受病之地。乃在衛氣宗氣之上僭。內經所謂氣有餘善怒也。又如恐為

腎之所主。其受病之地。乃在衛氣宗氣之下陷。內經所謂氣不足善恐也。俗書不知從受病之氣分施治而輒從五藏用藥則誤矣。

五藏為藏神最密之所而名為陰者。以其為陰經所屬也。六府為傳受渣滓之所而名為陽者。以其為陽經所屬也。唯膽為清淨之地不受穢濁。而亦名府者。亦以其為陽經所屬也。內經謂藏府皆取決於膽。故膽為決斷之官。

中風論

五 辨經絡

論經絡次序 此宗氣領營血所行也。營行脈中。

經脈發源在左乳旁下。以手按之有動脈者是也。素問名為胃之大絡。虛里穴。靈樞名為脾之大絡。大包穴。蓋脈本營血。乃水穀所主。故以脾胃互稱。此只一穴。在左乳旁下。若右乳旁下則無有。不論男女人人皆然。此等要緊之穴。內經言之甚清驗之。此身亦甚明。乃諸家竟不知此為何事。可為浩歎。虛里出澗液下三寸大包在腹下六寸。第一手太陰肺經。從左邊虛里穴上注肺。由左腋間走左手大指。即此脈。是從胸走手也。正絡入肺。

第二手陽明大腸經。從寸口脈後斜分至腕臂。脈反即此走上至頭。是從手走頭也。正絡入大腸。

第三足陽明胃經。從頭上接前脈。由胸前而下至足背。是從頭走足也。正絡入胃。

第四足太陰脾經。從足指接前脈。由膝而上至胸注心中。是從足走胸也。正絡入脾。

第五手少陰心經。從胸中接前脈。由臑間而至手小指。是從胸走手也。正絡入心。

第六手太陽小腸經。從手小指外側接前脈。而上至頭。是從手走頭也。正絡入小腸。

中風論

六 辨經絡

第七足太陽膀胱經。從頭上接前脈。由背而下至足小指。是從頭走足也。正絡入膀胱。

第八蹻脈。男用陽蹻。女用陰蹻。從脛上接前脈。上至背俞。轉從腹衝下行於足。正絡無。

第九足少陰腎經。從足心接前脈。由膝內而上至胸。是從足走胸也。正絡入腎。

第十手厥陰心主經。從胸中接前脈。由臑而至手中指。是從胸走手也。正絡散入膻中。

第十一手少陽三焦經從手指背接前脈。由手腕外上至耳側是從手走頭也。正絡歷三焦

第十二足少陽膽經從頭上耳側接前脈。由身之旁下至足是從頭走足也。正絡入膽

第十三足厥陰肝經從足下接前脈。由膝而上至胸中注於肺是從足走胸也。正絡入肝

以上諸脈各有兩端。先行於左者畢然後再注肺。由右腋間走右手太陰經手陽明經以次至足厥

陰經亦如其左。不復繁縷然後再交於督脈

中風論

七 醉經問

督脈從右足厥陰經上頭而來。由頭頂中間入頸循脊中直下至尾骨。分兩支入前陰合交任脈。此脈只一條無正絡

任脈從前陰接前督脈。由腹中間上胸復注於肺。為週而復始。此脈亦一條正絡無

以上左右十二經兩躡督任凡二十八脈。共長十六丈二尺。一息六寸。計二百七十息即遍一度。凡人一日一夜有一萬三千五百息則遍五十度也。

凡營血隨宗氣行於脈中者。用此審次第詳後營行

論經絡淺深

此衛氣所行也。衛行脈外。人身頭與手足是一殼子。五藏六府皆在殼子之內者也。十二經絡皆在殼子之外者也。然此殼子又有淺深不同。今分列於後。

第一層為太陽所行之地。手太陽一。足太陽二。陽蹻二。督脈一。凡七脈為衛氣極盛之地。

第二層為陽明所行之地。手陽明一。足陽明二。凡四脈為衛氣總滙之地。

第三層為少陽所行之地。手少陽一。足少陽二。凡四脈為衛氣初出之地。

中風論

八 醉經問

以上三層皆名為表。少陽近裏為半表半裏之界。

第四層為太陰所行之地。手太陰一。足太陰二。凡四脈為衛氣初退之地。

第五層為少陰所行之地。手少陰一。足少陰二。凡四脈為衛氣退藏之地。在脈亦在此層當云五脈

第六層為厥陰所行之地。手厥陰一。足厥陰二。凡四脈為陰盡陽生之地。過此則入藏矣。

以上三層皆名為裏。

凡衛行脈外者。用此察淺深詳後論衛氣篇。知此則知偏枯之風。專在衛矣。

凡十二經脈各有支脈。通於藏腑者名爲正絡。凡風之入藏者由此。

凡十二經脈。其陰經陽經相交處。名爲交經別絡。

如手太陰交手陽明足陽明交足太陰之類。其陽經交陽經者在頭陰經交陰經者在腹則無別絡。

凡十二經脈各有小脈。從氣穴旁出者名爲孫絡。又

小絡。又共有三百六十五氣穴。即有三百六十五孫

絡。其病最輕。
中風論 九 醉經閣

論奇經八脈

陽維即手三陽足三陽諸氣穴旁出之孫絡也。

陰維即手三陰足三陰諸氣穴旁出之孫絡也。

陽蹻即足太陽之別支。通少陰者也。男子脈度以陽

蹻爲經。陰蹻爲絡。

陰蹻即足少陰之別支。通太陽者也。女子脈度以陰

蹻爲經。陽蹻爲絡。

督脈即背脊當中一條。督脈之孫絡

任脈即胸前當中一條。任脈之孫絡。

以上六者共有三百六十五氣穴。此皆旁出孫絡不入營行之度。

衝脈爲血海。循腹右下行。與右腎相通。男子以之藏

精。女子以之繫胞。胞即子宮。爲月事所從出。即天癸

也。難經謂右腎爲命門。即此。衝行腹右。與左乳虛里

穴相對。蓋人身血液分爲兩途。其從左乳下。隨宗氣

動而行於十二經脈之中者。名爲營血。所以陰形而

生肌者也。其從腹右下注。衝脈通於右腎者。名爲天

癸。所以種子傳生者也。營血從左乳下發源行於脈

中。故左乳旁下有動氣。應手。衝血從腹右下注於右

腎胞中。其血本靜。故右乳旁下並無動氣。此左右之

所以不同也。營血養身故不可傷。傷之則死。衝血傳

生原有可洩。故關官者流。雖傷衝血。亦不死。此營血

爲病所以獨重。而衝血爲病所以較輕也。

帶脈橫通於腰。所以聯絡諸經者也。

以上二者皆不入營行之度。與諸經孫絡相似。故

亦列於奇經。

中風論 十 醉經閣

凡此八者皆血之積而不流者也。內經名爲奇邪血絡難經則名爲奇經。蓋血之行於脈中者如川河之流。血之溢於孫絡者如湖海之會。古人用此以審病耳。譬如陽維之血溢於上則爲鼻衄齒衄之類。陰維之血溢於下則爲圓血淋血之類。兩維同病則爲吐血嘔血之類。其孫絡上貫於膈也。衝帶爲病則爲崩漏帶下之類。內經難經分晰甚明。李時珍輩乃謂另有八脈考之古經既不合証之此身亦不確。又假此爲修真之說。無識者流莫不被其誑惑。往往因修煉

中風論

十一

醉經習

而成癆瘵。生平所見亦多矣。故詳辨之。

以上諸條皆形體實義也。凡病惟絡病最輕。經病稍重。府病又重。藏病最重。此審病輕重之大法。形體實義既明。然後附於形體之氣血陰陽始可得而知之矣。有宗氣有營氣有衛氣另詳於左。

論總

人身養生之氣有二。一曰呼吸天氣。蓋人在天地氣交之中。如魚之在水也。魚在水中而不見水。人在氣中亦不見氣。試觀平人扼吭則絕。無天氣也。試觀暴

絕人氣回則甦。通天氣也。天氣無形而至剛。故古之聖人有服氣却穀之法。天氣至清全憑呼吸爲吐納。其呼吸之樞則以肺爲主。內經所謂天氣通於肺也。天氣有春溫夏熱秋燥冬寒。及四季濕土不同。得其平則能養人。失其平則病。內經所謂天食人以五氣是也。一曰飲食地氣。即胃所受之水穀也。試觀平人絕穀則飢。試觀疴瘠人美食則肥。則地氣之養人可知矣。地氣養人有形而至柔。故形體豐肥者其氣反弱。地氣至濁全憑喉舌爲出入。其飲食之權則以脾

中風論

十一

醉經習

爲主。內經所謂地氣通於嗑也。地氣有三。食穀者智。人爲萬物之靈也。食肉者勇。鷹虎之屬也。食草者力。牛馬之屬也。又有五味屬木者。酸屬火者。苦屬金者。辛屬水者。鹹屬土者。甘。內經所謂地食人以五味是也。凡嬰兒在胎中亦有天氣地氣爲養。蓋其呼吸飲食皆資於母也。地氣有形。故醫書多言之。若天氣無形。醫家多不知爲何物。故諸書皆置而不言。無怪醫術之多陋也。

論宗氣

宗氣者乃呼吸天氣所生其所居在胸膈之間內經曰宗氣出於上焦又曰呼則氣出吸則氣入其大氣之搏而不行者積於胸中名曰氣海是也凡人身之力惟胸膈間最大此即宗氣也凡頭背手足之力皆取絡於胸膈此氣又名膻中又名心包絡即心主也常代心君用事稱為相火蓋心為君火端拱無為者性之體也膻中宗氣為相火代心君行事者情之用也情動則氣必隨之即宗氣也內經謂心之合在血脈正指宗氣代心君用事與營血俱行脈中耳其領

中風論

三

醉經閣

營血行於脈中也即從左乳旁下虛里穴起以次行於各經一呼一吸為一息一息行六寸已詳於經絡次序

論營氣

營氣即營血也血不自行必賴氣以行之即宗氣領率之也故稱之曰營氣此飲食地氣所生乃水穀之精液故內經曰水穀入胃清者為營血又曰水穀入胃游溢精氣上輸於脾脾為胃行其津液乃化為血以奉生身又曰營氣出於中焦中焦即腐化水穀之

地也中焦生血化為兩途其從腹右注於衝脈者為血海其血靜而不動即天癸也其從腹左乳下隨宗氣走於二十八脈者為營血此則動而不止者也凡營血行度手之三陰從胸走手手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹先行左十二經後行右十二經其行度左右交通是以凡病之在營分者病左則必及於右病右則必及於左斷不能左右各分也營行脈中為陰

論衛氣

四

醉經閣

衛氣又名人氣以其網維羣動為知覺運動之主也又名陽氣以其溫養一身也合而凝之則為衛陽此受命養生之主也乃合呼吸天氣與飲食地氣所生天氣無形而至剛衛氣兼之故其性慄悍內經又名之曰悍氣與營血專資地氣其性精專者判然不同內經曰飲食入胃濁者為衛濁字正言其慄悍耳因其慄悍故不能行於脈中而必行於脈外此衛陽之所以不同於營陰也

衛氣有體有用所謂體者衛氣之根也其根在腎內

經謂衛氣出於下焦常從足少陰之分間行於藏府者是也難經稱爲腎間動氣後世稱爲丹田眞陽卽此衛氣無形必有所附而始留下焦乃脂膏最多之地衛陽卽附於脂膏中故曰衛氣出於下焦譬如燈附於油則長明不息也故後人又指爲水中之火不獨人也凡物之膏皆可然則凡有生之物莫不各有陽氣附於膏中矣所謂用者衛氣之枝葉也其義繁多另詳於左

中風論

素

醉經閣

其一曰間行於五藏則五神生從下焦而合於上焦宗氣應於心則生神而爲喜笑應於肺則生魄而爲悲哭應於肝則生魂而爲怒呼應於腎則生智而爲恐噫應於脾則生意而爲思歌總名之曰慧也。

其二曰間行於六府則水穀化從下焦而上合於宗氣應於胃則主納應於膽則主決應於小腸則主腐化應於大腸則主傳送應於膀胱則主滲利總而名之則曰三焦所以行津化液也凡大小二便之開合皆三焦衛氣之所司難經謂之原氣
其一曰出入於經絡則寤寐分方其出也從腎藏行

於少陰之分少陰爲衛氣出入之門戶由太陽陽蹻上注於目則

目張而寤矣此二脈皆上至於目之精明穴然後行於陽經而五官

爲之用凡陽經皆行於手經而手爲之用行於足經

而足爲之用間行於藏而慧生間行於府而飲食入

此衛氣之出而爲寤也兩邊齊出且一時分馳者也

方其入也從太陽陽蹻而下走陰蹻由少陰之分而

注於腎則目合而寐矣故寐者無五官之用不在諸

陽經也無手足之用不在手足諸經也無飲食之需

不間行於腑也唯從腎注心從心注肺從肺注肝從

中風論

素

醉經閣

肝注脾從脾注腎循環而已然雖內注於五藏而在外之經脈不爲用則不能麗於實而生慧但游於虛而爲夢凡人夜之所夢多屬晝之所爲者衛氣之所習也其寤語者亦然此衛氣之入而爲寐也亦兩邊齊入且一時並收者也若衛氣欲入於陰而寐而勉強持之使出而爲寤則必呵欠內經謂陰引而下陽引而上陰陽相引故欠者是也

其一曰衛行有淺深衛行脈外內經所謂衛外而爲固者也難經名爲守邪之神然有淺深之別焉其法

分脈為六層。外一層為太陽。次陽明。三少陽。四太陰。五少陰。六厥陰。凡傷寒傳經即此寅卯辰三時行三層少陽。巳午未三時行一層太陽。申酉戌三時行二層陽明。亥子丑三時行四層太陰。子丑寅三時行五層少陰。丑寅卯三時行六層厥陰。故太陽衛氣最盛。少陽為初進。陽明為初退。若三陰則歛藏矣。此法難經不載出仲師傷寒論夫同此衛氣。既有寤寐開合。又有行度淺深也。曰素問生氣通天論曰。此篇專論陽氣者。若天之有日。故天常以日光明。可見寤寐者。譬猶日行南陸為

中風論

七

醉經閣

冬行北陸為夏也。淺深譬猶日出為晨。日中為午。日入為昏也。內經又有一刻少陽。二刻太陽。三刻陽明。四刻三陰之法。則推求更密矣。蓋衛氣慄悍。行度迅速。故大開合之中。復有小開合。內經比之於日。誠不誣矣。

其一曰。衛分行左右。衛氣行度。但有寤寐淺深之法。並無左右交通之法。其出而為寤也。則兩邊齊出。故兩目亦齊開。其入而為寐也。亦兩邊齊入。故兩目亦齊合。其出也。一時分馳。故手足五官之動。亦無先後。

其入也。一時並收。故手足五官之靜。亦無先後。其淺深也亦然。可見衛行是左右分布矣。是以病之在衛分者。病右則不及於左。病左則不及於右。仲師云。風則傷衛。即是指此。此中風所以獨有偏枯之症也。李東垣不識此中至理。乃分左為血。右為氣。然則人身有病。左不關氣。右不關血乎。此等淺陋之見。諸醫不能斥之。反從而附和之。殊可怪也。

以上皆從靈素難經金匱諸書。考證確鑿。施之診治。歷有明效。故記之。

中風論

六

醉經閣

論脈訣

後世知斥高陽生之謬訣。而不知辨王叔和之脈經。總由不讀靈素之過也。靈素謂人迎為頸脈。即結喉兩邊之人迎穴也。叔和則指為左手脈名。難經謂陽得寸內九分。陰得尺中一寸。並無關脈地步。叔和則強分三段。又將奇經八脈。概附兩手。分為九道。種種虛誕。真堪捧腹。至分左寸為心。小腸。左關肝膽。左尺腎膀胱。右寸肺大腸。右關脾胃。右尺命門三焦。其法並不見於靈素難經。即後之仲師書中。亦無有也。後

世又有各自為法。顛倒安置者。吁。五藏六府本生成之物。可以任人提挈。視如傀儡乎。今試詰之曰。仲師謂尺寸俱者。名曰傷寒。若以此部位論之。則是五藏六府皆病。何以止言曰太陽病耶。吾知其必無應矣。然則諸家脈法。皆欺人之語。不足信也。惟靈素難經仲景之脈。乃古聖所貽。各有至理。且其法相同。謹摘其要如左。

一曰經脈診法。即手足陰陽十二經也。外病必先起於經脈。內病亦必發現於經脈。故為診病第一要法。

中風論

九

難經

經脈有三陽。可以審衛氣。以衛氣盛於陽經也。經脈有三陰。可以察營血。以營血盛於陰經也。內經取結喉旁。人迎穴為陽明脈。以候三陽經及衛氣。取兩寸口。又名氣口。為太陰脈。以候三陰經及營血。其法人迎盛於氣口一倍為少陽病。二倍為陽明病。三倍為太陽病。氣口盛於人迎一倍為少陰病。二倍為厥陰病。三倍為太陰病。難經則括其法於兩手尺寸中。以寸候三陽。尺候三陰。關為陰陽之界。其尺寸相較法亦如內經。以人迎氣口相較也。仲師之法與難經

同。

一曰藏氣診法。分淺深為五層。第一層極浮者為肺。內經謂皮毛為肺之合。又謂藏真高於肺。難經謂三菽之重。仲師同。第二層略浮者為心。內經謂血為心之合。又謂心藏血脈之氣。難經謂六菽之重。仲師同。第三層浮沉之中者為脾。內經謂肉為脾之合。又謂脾藏肌肉之氣。難經謂九菽之重。仲師同。第四層略沉者為肝。內經謂筋為肝之合。又謂肝藏筋膜之氣。難經謂十二菽之重。仲師同。第五層極沉者為腎。內經謂骨為腎之合。又謂腎藏骨髓之氣。難經謂按之至骨。仲師同。

中風論

三

難經

凡此五者。以見陽脈為府病。見陰脈為藏病。如三菽見洪為大腸。見細為肺。餘可類推。又以輕者為府病。甚者為藏病。如三菽略瀆為大腸。瀆甚為肺。餘可類推。凡此五者。各有主脈。肺瀆。又名心洪。脾緩。肝弦。腎石也。如三菽見洪為心火形金。餘可類推。以上二法。平人則不見。惟病人乃見之。如病在經

脈則寸尺之診必變於常。如病在藏府則菽數之診必變於常。隨其所變見而斷其病十不失一。

一曰平脈敗脈診法 平脈者春微弦夏微洪秋微

毛冬微石四時旺脈皆有和緩胃氣故曰微也微也勿認

為敗脈者春但弦夏但洪秋但毛冬但石四時旺

脈皆無和緩胃氣故曰但也但也勿認蓋脈本營血隨

宗氣而動宗氣即呼吸天氣所生天氣有春溫夏熱

秋燥冬寒之遞嬗宗氣應之亦有春弦夏洪秋毛冬

石之遞嬗若營血乃飲食地氣所生其性精專有常

中風論

三

醉經閣

而不變與宗氣相融故反泯其迹而為微弦微洪微

毛微石故曰胃氣也若無胃氣則無營血相隨脈中

僅止宗氣獨行但見弦洪毛石而已故曰敗脈也凡

見敗脈者為無胃氣雖不病亦不可救是名真藏脈

凡脈有胃氣者雖極危之病亦有可生故曰人病脈

不病者生脈病人不病者死即此義也 此法斷病

百不失一惟傷寒初起則不可用此法以傷寒初起

必見邪盛之脈則審胃氣之法更當細辨若傷寒十

日以後亦可用此法。

一曰脈體診法其法有三

一是呼吸數診法一息四至為平 五六至為數

二三至為遲 數極為散 數時一止為促 遲時

一止為結 止有定數曰代

一是手指輕重診法 輕取曰浮 重取曰沉 浮

沉皆有中獨取無曰芤 浮沉皆無中獨取有曰牢

浮無沉有曰伏 浮有沉無曰革 有力曰實

無力曰濡

一是脈動形狀診法 流利曰滑 凝滯曰澀 大

中風論

三

醉經閣

曰洪 小曰細 過指曰長 不及曰短 勁疾曰

緊 從容曰緩 端直曰弦 厥厥而搖曰動

以上凡二十四脈精而熟之可以該諸書診法但

其斷法甚多難於詳載故僅錄其脈名。

以上皆詳靈素仲師藏象及診脈審病之法若夫

病之所由起或從外因或從內因但取切要於中

風者詳於後

論病因

病有外因如六氣之風寒暑濕燥熱八方之溫熱燥

寒是也有內因如飲食飢飽喜怒哀樂愛惡欲是也
凡此者皆各有所及之經有某經之脈象如寸主陽經尺主陰經即有某經之見症如三陽有頭痛三陰有腹痛之類且各有所應之藏有某藏之脈象心病則六菽脈洪肝病則九菽脈弦即有某藏之見症心病多怒笑肝病多愁之類此皆確有幾兆無難洞見者也但久病者邪正俱衰則見症與脈象多不如初起之明白清楚然其大要則固可知也如見症雖不似初起總必有一二未除脈象雖與初起不同而其可愈不可愈總必有胃氣可據脈以和緩為胃氣此從古聖賢相傳要訣歷試不爽者也病之多門不及詳論今專以風門論之

中風論

三

醉經閣

論中風

風為八邪之長夫人而知之矣至於傷寒之中風與偏枯之中風其所以判然不同之故則自晉迄今千餘年竟無一人道及可見歷來諸家多憤憤也殊不知出在靈素特未許淺見窺及耳夫傷寒之中風乃六氣之風詳在素問五運行大論篇此條四時天氣與宗氣相名宗氣即呼吸天氣所生其感於人也

必入管中故初起必有惡風發熱等症且管血本左右遞注故病則左右俱病斷無偏枯之症偏枯之中風乃八方之風詳見靈樞黃帝與岐伯論八風篇中此是四方賊風與衛氣相襲其入於人也但在一隅而不及管血故起首無惡風發熱等症且衛氣本左右分布兩邊各出故病左者不及右病右者不及左此所以有偏枯之症也知此則風之源頭清矣再專就八方風論之

中風論

三

醉經閣

論八風

其法分東西南北為四正又分東南西南東北西北為四維合計為八方各有主氣南風熱東風溫西風燥北風寒東南風溫而熱西南風燥而熱東北風寒而溫西北風寒而燥此其平也太過者則賊風矣賊風輕其中於人也亦輕賊風重其中於人也亦重乘衛氣之隙而襲入之也賊風又名邪風
八方之溫熱寒燥只以東西南北辨之不論四時皆有與六氣之春溫夏熱秋燥冬寒各主一時者不同也

衛氣溫養形體內經所謂衛外而為固難經所謂守邪之神也衛氣固密則百邪不能侵若少有罅隙則邪即襲之矣其隙在頭則中於面但為口眼喎邪而已其手足固無恙也其隙在手經則中於臂但為腕臂不舉而已其頭足固無恙也其隙在足經則中於髀極但為步履遲重而已其頭手固無恙也其隙在左則中左而右無恙其隙在右則中右而左無恙中足少陰則舌枯而語言蹇澇少陰之脈上紫舌本中手厥陰則神倦而多健忘手厥陰心主本代心君行事也中手少陽則三焦不

中風論

三

醉經閣

利而多噎氣且大便不行中足太陽則膀胱不清而多溲濁甚至小便癃閉而不能出以膀胱氣化全憑衛氣滲利衛氣為邪風所襲不能滲利故癃閉也種種諸症難以枚舉總各視其隙之所在耳內經曰邪之所湊其正必虛以比斲材木堅者不入脆者皮弛正謂此也是以此症多發於中年以後之人以其衛氣不無少衰也若少壯之人則百中無一以其衛氣正盛也後人不明衛氣之義乃有左血右氣之說失之遠矣又有謂血虛生內風者亦不甚切殊不知內

風之生乃衛氣之虛而有隙如谷虛則生風耳非血虛也虛則有隙而邪風入之故曰內風感召外風也衛氣出於下焦為生風之根即內經所謂腎間動氣也其開合寤寐出入間皆以足少陰經為門戶少陰即腎之經脈也其經有兩條左右各一故衛氣之行驅殼行於藏府者亦左右分布凡人之始初結胎時其形如兩甲即兩腎也而衛氣寓焉故其開合寤寐出入間行亦必左右分布此內景之確而可信者特粗工不能識耳

中風論

三

醉經閣

動氣之根即是腎氣然必曰腎間動氣者以其為知覺運動之主故加一動字以稱之若兩邊衛氣平均則知覺運動自然爽健精明若一邊衛氣無病一邊衛氣有病則知覺運動必不能如平日之爽健精明矣語云眾擎易舉獨力難勝可以為譬

風中於左則病在左中於右則病在右獨口角之喎斜則不然中左者口必喎右中右者口必喎左所以然者中左則左邊衛氣不用而經脈弛緩不收右邊衛氣獨用而經脈牽引拘急故必喎右口角經脈是陽明經脈於

昏口者左 其中右者做此

論輕重

兩邊齊中左右俱不仁者最重不能運動不知痛痒者名爲不仁此卽仲師所謂卒病。卒病者陡然猝或發昏不知人也左或右但中一邊者稍輕此卽仲師所謂偏枯也。詳此二者皆病之大經者也若中風入藏則不可救矣或但口眼喎斜或但臂不舉或但足不用或但舌暗不能言或但麻木有定處。麻木卽此五者皆病之在孫絡者若久而不治亦能漸入大經矣。左右二大經三百六十

中風論

三

醉經閣

五穴名爲孫絡故在藏者極重其生死只在二三日間在大經者稍輕往往連年累月始可漸愈在孫絡最輕有不藥而亦能自愈者

以上從病之所在論輕重也

人身衛氣應於五神則爲知覺遍於四體則爲運動原是左右齊應兩邊合用故能使耳目聰明心思精詳手足便利若風邪傷衛有一處不相應卽有一邊不爲用則知覺運動皆爲之遲鈍矣所謂一馬不行百馬休也所以中風之後往往多滯鈍之病雖平生

極性急爽利之人亦變而爲迂柔寬緩蓋心欲前而

身不與之俱前以志不能率氣。衛氣不能率形也是

以知覺多錯亂迷忘運動多艱難遲鈍此皆論病後

邪風已衰衛氣未復原也當夫初起之時則全視邪

風之微甚以定病情之輕重其邪風之甚者昏不知

人卽邪風之微者亦昏不知人其風中一邊者昏不

知人卽風中小絡者亦昏不知人以衛氣粹爲邪風

所襲不能自主也一二日後或七八日後邪風少衰

衛氣之已傷於左者雖未能驟復其未傷於右者

中風論

三

醉經閣

則必運動而人事始漸清醒矣再數日後或一二月後未傷之衛氣必漸溉及已傷之衛氣於是偏枯者亦漸漸靈活矣若治之得法則未傷之衛氣既可漸溉相助而已傷之衛氣又可逐日生發如是則兩邊均平而知覺運動依然復舊矣其辨輕重之法初起昏不知人痰鳴氣促一日之後卽能平靜清醒此受邪極微病之最輕者也或一二日後始能平靜清醒此受邪略甚病之稍重者也或七八日後或十餘日後始能平靜清醒此受邪較甚病之重大者也或仍

不能平靜清醒。而反息高鳴喘者。此受邪最重。直入於藏。正氣盡去。病之不可救者也。

以上從邪風之微甚診輕重也。

論寒熱

偏枯之風。以四方之位定八風之寒熱。傷寒之風。以四時之序分六氣之寒熱。者絕然不同。蓋八風之寒熱。不拘四時皆有也。夫八方之風。其幾微渺。非神聖不能察識。如黃帝明堂一篇。後來諸家俱茫然不知其所指。又安能察識八風哉。吾輩雖不能審之於未

中風論

羌

醉經閣

形。未嘗不可辨之於已著。則當據初起之症為斷。

如風之變乎常者。從東來則面必青。舌必紫。甚者

舌卷囊縮。筋必惕。惕者動也。俗言肉跳也。目珠多斜轉。從南來

則面必赤。舌必焦。甚者生芒刺。肌必熱。目之白珠必

有紅處。從西來則面必白。舌必燥。甚者如白霜積

粉皮必粟起。謂毛髮豎立也。目珠多上視。翻白。從北來則

面必紫。舌必黑。甚者裂縫息必齟。如寐者呼吸有聲。俗言寒睡也。目

之白珠必有黑處。從中央來。此四維合併者也。則面必黃

舌必黃黑。甚者多涎垢。肌必潮濕粘手。目之白珠必

黃。其東南西南東北西北來者。各以其方之法為斷。

以上諸症。但見一二症。便是。不必悉具也。此皆從

所受之風而定其寒熱也。

論證候。初起時所必有者。凡七症。或有或無者。凡十七症。

初起猝發。必昏不知人。

必有痰涎壅盛。痰涎即人身津液。本隨衛氣布一

身者也。風傷衛。則不能行津布液。於是津液皆隨宗

氣。逆居膈中。與呼吸之氣相上下。故壅於喉間也。凡

中風論

三

醉經閣

風之寒者有之。此宜即風之熱者亦有之。此宜俗醫

多用熱藥開痰者非也。芴嘗治此症。投以大涼劑。立

開

必有皮膚發亮。八風雖有寒熱之不同。然總為陽

邪。以陽邪而動衛陽。兩陽兩合。故發亮。

必有短氣。衛氣不能行津布液。則津液皆聚膈中。

而宗氣之呼吸為之不利。故短氣。

必有自汗。風為陽邪。不閉腠理。故自汗。汗即衛氣

所布之液也。風邪傷衛。不能約束皮毛。汗孔空。故汗

自出 亦有無汗者熱甚也

必有半身不動 詳論八風

必有體重 兩邊衛氣皆用則身輕有一邊不用則身重。

以上七症初起時所必有者也 若無以上諸症則非中風矣

或語言蹇澁 或暗不能言 少陰為衛氣出入門

戶其脈上貫膈絡會厭穴 此發聲之地如榮於舌本

衛為風所傷重則暗不能言輕則蹇澁。

中風論

三

醉經閣

或大便自遺 或大便燥結 衛氣間行於府者為

三焦原氣傷重則不能約束故自遺傷輕則不能傳

送故閉結常見有僅閉一二日而大便乾燥如石者

此熱勝也有閉至二十餘日而仍溏者此濕勝也。

或小便遺溺 或小便澀閉 衛氣唯下焦為盛其

間行於府者為三焦然必先從膀胱起故內經以三

焦與膀胱並稱膀胱有出竅而無入竅凡三焦水液

之注入膀胱全憑下焦衛氣蒸滲而入乃從小便而

出若風傷衛則衛外之衛氣經絡者皆進入膀胱滲

利太過則為遺溺不能滲利則為澀閉俗書謂遺溺

為腎絕者非也嘗見有遺溺而仍愈者矣凡小便中

久澄之而有如膏如粉者乃下焦有熱蒸鍊水液有

如煎膏者然故初出甚清澄久則稠蓋初出尚熱如

膏之熱則不凝也澄久則冷如膏之冷則必涼也不

可認此為虛寒 小孩小便初出清澄久變色如白漿

書指為寒則誤矣 或陽事暴舉 衛出下焦即腎間動氣衛之在外者

雖為風傷而在下焦者反鬱閉不泄故暴舉嘗見有

中風論

三

醉經閣

中風偏枯之後反連生數子者矣然其偏枯猶不愈

者以衛氣不能行於表也

或陽事痿弱 此因在外衛陽已傷挹取其下焦衛

氣外泄則腎間動氣不強然其偏枯轉易愈者昔一

友患此竟不藥而偏枯愈愈後半年陽事復強可知

此症當緩以俟其生發不可用熱藥損筋

或心悸善忘 悸即怔忡也衛不行津則津停為水

水停胸下則令人悸 詳內經 或智慮多疑 衛陽傷則不能取決其神不足故

或噁氣不食 此非不食乃腹中不甚飢耳。衛傷一
邊則三焦氣化不速不能消水穀也

或消穀善飢 此惟風淫於內者有之內經所謂風
能消穀也昔一友患此治以鹹寒之藥一日而偏枯
喎僻皆愈。

或心煩不寐 衛氣浮於外與風相合不得行於陰
則目為之不瞑詳內

或貪眠嗜卧 此惟風入少陰者有之仲師曰少陰
之為病但欲寐。

中風論

三 辨經閣

或呵欠不止 一邊已傷之衛氣不行於陽但欲入
於陰一邊未傷之衛氣能行於陽陽引而上陰引而
下陰陽相引故呵欠此症最多。

或頭痛如箍 此邪風盛於三陽陽經也三陽之脈
皆上行於頭風性上僭故頭痛

或背反如折 此邪風盛於太陽督脈陽蹻也此三
脈行於背風邪入之則三脈皆急背反者身往後仰
面語所謂角弓反張也內經名為痙其症兼有目直
視頭搖手足搐搦即抽掣中風之一邊動此症較重乃風邪

兼入營分故兼見此症專在衛分者無此症也

以上十七症初起時或有或無者也

凡所必有之症乃偏枯中風之本症無此則非矣其
有或無之症乃因其人受邪有輕重經絡有虛實人
之形體起居不同故病情亦有不同也此皆從其初
起而言之耳若夫纏延日久則人情百變病情亦百
變雖大禹神聖亦不能鑄鼎象物窮盡怪相也然可
愈不可愈尚可以約略言之今併附數則於左。

中風論

三 辨經閣

一偏枯日久以致骨節之間肌膚之內漸生痰涎外
見浮腫者難愈人身生氣寄於津液亦猶天地生氣
寄於水也凡天下之無形而有形者皆水也易曰天
一生水請看草木昆蟲莫不皆然人身津液得衛氣
以統之則能生血生肌若衛氣為風所耗則形體必
瘦若津液停而為痰涎注於肢節肌膚之間則必始
瘦而後腫內經謂風氣客於諸經之絡道切而為沫
又謂沃沫聚之則極肌膚而為腫者是也沃沫即痰
涎也俗書不知此理或指為寒濕或指為脾虛誤矣
殊不知此症多生於熱譬如以水擦手熱則生泡以

1. 續修四庫全書 子部 醫家類 2 三一八

火炙肌亦生水泡可知熱從風生。沃沫微聚亦如水泡而已。此因日久衛氣大耗。一時難於復舊。故難愈。若無此則易矣。

一偏枯日久手足拘攣不能屈伸者難愈。內經曰陽氣者精則養神柔則養筋。筋雖為血所養必得衛氣以溫之而後舒卷自如。難經謂血主濡之氣主煦之。若日久衛衰營血耗無以養筋是由氣分而累及血分。由淺入深故難治。

一偏枯日久脈見沉細數急者難治。凡中風之脈必浮大而緩考之靈素仲師皆是如此。說驗之診治亦是如此。脈有日久而此脈猶不退者有日久而此脈盡退獨見四時平脈者有變見遲脈者皆屬易愈。惟變成沉細數急者最為難愈。所以然者以其病已分入血分也。沉主血分細為血少數急為有氣無血。蓋脈本宗氣領營血而行宗氣無形而悍急營血有形而遲緩。二者相配而後脈均。若無血則宗氣獨行故數急也。血不足以充之故細也。一見此脈便是營血已傷故難愈。凡病以入營者為重也。

以上皆節取大概言之。尚有風非風謄風痺等名未能詳及。然而中風諸義則已括盡無遺矣。其左癱右瘓等名且皆立自後人。徒有其名毫無實義。夫營衛行度經絡淺深靈素仲師皆言之甚詳。後人不知此處探求。輒暗中摸索。或謂中風為虛或謂為火或謂為痰或謂為氣或謂為風痰氣三者併合。或謂風痰火諸邪夾發。究不能得病源實在。更有以中魔中暑中毒一切混雜邪病而分為類。中直中者此皆源流不清內景不明紙上談兵無濟實用者也。

中風論 三

論風脈

中風之脈其起首必浮大而緩考之靈素仲師其言既同驗之診候閱歷。又千人如一。浮以手指輕重取之。大以脈之形狀取之。緩以脈之至數取之。一至數即一呼。四至蓋風則傷衛風為陽邪故大。衛行脈外故浮。病初起時但在脈外之衛分。未入脈內之營分。其脈中之營血宗氣依然照常行度故緩也。緩是脈之動數宗氣領營血而動宗氣一呼營血二動宗氣一吸營血

二動。一呼一吸脈凡四動。是名為緩。乃是無病平脈。因中風但傷衛而不傷營。故脈應照常緩也。然則何以辨邪風之輕重。曰浮大異常者其邪重。浮大同等者其邪輕。浮大略見者其最輕。斷病之法。只取浮大為病脈。非指緩為病脈也。緩為平人之脈。故不可作病看。然則但言浮大足矣。何必又言緩。曰古人言此正以明病不在營耳。若入營則不能緩矣。後人不識此理。往往將平脈混入病脈。此脈學之所以晦也。

其八風之邪。則又從浮大中兼見之。脈別之如風從中風論

三 醉經閣

東來者為木邪。主溫化。其大中必兼弦象。從南來者為火邪。主熱化。其大中必兼滑象。從西來者為金邪。主燥化。其大中必兼濇象。從北來者為水邪。主寒化。其大中必兼緊象。從中央來者為土邪。主濕化。其大中必兼濡象。其東南西南東北西北四維相併而來者。則各以其方之脈兼見之。如見其弦象滑象錯出。則為風從東南南來之類。凡此諸脈。歷斷千人。無一遁者。孰謂脈法難憑耳。八方之風。分為溫熱燥寒濕五等之中。溫熱燥居其三。皆熱症也。寒則僅居其一。濕則有從寒從熱之不

同。可知中風一症。熱病居多。故南人中風較多於北人。而生平瘵病。每以涼藥奏效。其源皆從此中悟出。近日諸醫。但執庸陋俗書。暗中摸索。輕者釀成廢人。重者卒致不救。不如勿藥為高。

偏枯日久。則脈多變矣。然亦一二年其脈仍浮大而緩者。此風邪與衛氣相合而不去。如銀之入水也。銀為其症。必將復中。蓋陽邪未去。勢必再召新邪也。復中則病加劇。若治之得法。不但復中可免。即偏枯亦可愈也。其脈為沉細數急者難愈。其脈變為遲者可愈。

中風論 三 醉經閣

愈。一息三至。名為遲。其脈浮大全退。而見四時平脈者。易愈。中風在三陽經。則浮大之脈寸部盛於尺部。在三陰經。則浮大之脈尺部盛於寸部。若陰陽諸經俱中。則尺寸俱浮大如一。此分辨經絡之法。

論治法

治法無他。專從衛氣治之而已。衛氣有根本。有枝葉。有表有裏。衛出下焦。為腎間動氣者。根本也。從少陰之分。間行五臟。則為知覺性靈。間行六府。則為三焦氣化。此皆裏也。溫養形體。為守邪之神者。表也。從諸

經而行於脈外。則為運動形體。五官得之而耳目聰明。四體得之而手足持行。此皆枝葉也。其根本在腎。附於脂膏。則為水中之火。如燈之附於油也。根本治法。有宜補火者。如燈之添草。則光焰益大。有宜補水者。如燈之加油。則長明不熄。世俗專以補火為事。則油竭者光亦熄矣。其枝葉在經。溫於肌肉。則附於汗液。如樹木之以皮行津。得春夏陽氣。而後漿汁盛也。枝葉治法。有宜用散者。如樹之津氣通。則榮茂。有宜用收者。如樹之皮津泄。則枯槁。世俗專以斂補為事。
中風論
三九 辨經別

之傷衛氣。乃邪風與衛氣相混耳。其所以知覺運動。皆為之不靈者。譬如三軍之卒。有一軍與賊私和。則號令不行。匪獨一軍不行也。勢必三軍皆為掣肘。觀望不前矣。故善治中風者。必先從而分之。使邪風與衛氣相離。而後風可淨。而衛氣仍為我用也。此侯氏黑散。所以用白礬之意。喻嘉言謂為填塞空竅。夫白礬善消物。豈是填塞之藥。可謂鑿矣。
凡風之入。必乘衛氣之隙。其隙多起於內熱。蓋寒則衛氣斂。故冬時之人多無汗。熱則衛氣散。故夏時之人多大汗。寒則腠理閉。故無隙可入。熱則腠理開。故有隙可乘。其內熱或生於七情。或生於飲食。每見好者多有中風之病。此所謂以內因而感。召外因也。後人有所謂胃熱生內風而致者。其言甚是。然不知此為衛氣之病。究屬一得之見。嘉言謂猝倒不省人事。為陽虛而妄擬參附為治。總由不識衛氣有表裏之義耳。素問生氣通天論曰。陽氣者。煩勞則張。此論專言衛氣煩勞即內熱也。張即開也。此衛氣因熱起隙之由也。又曰。辟積於夏。使人煎厥。辟亦開也。夏則腠理汗孔

皆開也。煎即煩也。厥者逆也。謂氣逆於上則多熱也。此皆言內熱。又曰目盲不可以視耳聾不可以聽。潰潰乎若壞都汨汨乎不可止。此即形狀中風昏不知人之象也。

衛氣之隙由於表氣不固則散藥似不可用矣。然用溫藥為散則不可。若用涼藥為散。乃至妙之法。蓋涼則腠理斂而散則衛氣通。嘗見偏枯兼有麻木者。內經謂衛氣不通者為皮痺不仁。衛氣痺閉即麻木也。或用滋陰養血之劑而愈者。緣受病本輕得此甘寒

中風論

望 醉經閣

陰藥解其內熱耳。若受病稍重者。便難取效。可知此症非從血治也。其過服溫補者。多至成廢。蓋此症本由於內熱。而又多外熱之邪也。東風溫南風熱西風燥四方之氣熱居其三

南方地土溫暖其人腠理常開而衛氣疎故多中風。北方地土寒涼其人腠理常閉而衛氣密故中風者少。惟尊貴人溫暖太過者偶有之。然亦易愈也。南人中風後赴北方而愈者。嘗見三人矣。俱服蘇合香丸而愈素問曰。陰精所奉者其人壽。西洋志謂歐羅巴以北地寒

人多壽。葛淄巴處南。四時皆熱。其人不壽。非虛言也。凡久病者。必先顧其脾胃。以血氣之生發。全於脾胃之運化也。然二者之治法。判然不同。脾為陰為藏。為胃行其津液者也。其治法宜燥。燥則健。宜補。補則強。故其藥宜甘溫。胃為陽為府。為水穀之海。其治法宜潤。潤則化。凡亢土不能腐物。宜通。通則運。故其藥宜清涼。喻嘉言謂養胃與補脾。有天淵之別。葉天士謂胃不強者。以涼通之則強。脾不健者。以溫補之則健。內經曰胃欲寒飲。腸欲熱飲。寒飲即清涼養胃之義。

中風論

望 醉經閣

熱飲即甘溫補脾之義。腸即小腸也。為受盛之地。凡穀之腐化皆變腐水穀。而後脾始挹其精微。以生氣在小腸之內。皆變腐水穀。而後脾始挹其精微。以生氣。血。水穀精氣。故不言脾而言腸也。喻氏葉氏之言。正與內經合。特二君皆從治病悟出。故立言不與內經同耳。

脾胃之治不同。然則何以別之。曰即以其病別之。其病起於寒症。而不能食者。則宜燥補脾土。而用甘溫藥。其病起於熱症。而不能食者。則宜潤通胃氣。而用清涼藥。不獨始病為然。即久病亦然。譬如偏寒偏熱。

之病。既退之後。猶不能食。投以涼劑。則胃氣立開。世俗只知補脾之法。不知養胃之法。往往見熱病不食。輒以涼藥碍脾。疑而不敢用。其貽害者多矣。李東垣作脾胃論。不能確切分疏。僅為調停之說。亦由傳派不清。內景不明耳。其有先患熱病後變寒症者。則用補脾法。先患寒病後變熱症者。則用養胃法。凡病久脾胃不旺。仍各從其病為治也。

論藥餌

中風論

聖

醉經閣

昔扁鵲但論脈書。經未傳禁方。故無方論。因未遇傳人。而遽遭李謚之害也。秦國太醫自以技不神農。如扁鵲使刺客害之。本經伊尹湯液。又無傳書。往往為後世所淆亂。張仲師有金匱方。亦多散逸。如葛雅川孫思邈之徒。皆剽竊金匱方。而自為書。究不能明其旨。近世如李時珍之綱目。未免太雜。雖小說妄談亦為採入。汪詒菴之本草。未免太迂。淡竹葉。陸草也。乃棟木部。其他外謬亦多。方藥之道。幾於晦矣。竊以平生所試驗。質諸仲景遺書。充類至盡。固可以意求之也。茲擇其切要者列左。

中風論

聖

醉經閣

病在衛氣。則當從衛分用藥。衛氣有表裏不同。表者行津為汗。溫養形體之陽氣也。裏者受命之根。水中之火。即腎間動氣也。腎間動氣。即衛氣之根。出於下焦。附於脂膏。為水中之火。其治有四法。火衰者。溫中以益之。如燈之添草也。其藥則有附子肉桂胡巴。故紙乾羌吳萸及椒磺茴香之屬。其方則有四逆回陽理中溫中之類。火盛者。壯水以制之。如燈之添油也。其藥則有地黃白芍知母黃柏元參龜膠及丹皮芩連之屬。其方則有八味知栢八味六味封髓古有封髓丹固精之類。火離於水。虛陽外浮者。則先用溫中引陽下歸於根。後用壯水懸陽。使不復越。則陰平陽秘矣。火鬱於水。真陽不伸者。則於益陽之中。加以透發。如麻黃附子細辛之意。則陰退陽盛矣。衛行脈外。為守邪之神。溫於肌肉。運於形體。為肌表之陽。其治有六法。或表陽外閉。無汗煩悶。則發汗以疏之。如麻黃桂枝羌活獨活之類。或表陽外洩。汗出不止。則固表以斂之。如白芍龍骨牡蠣附子黃芪之類。或表陽太盛。肌熱如灼。則涼肌以解之。如

石膏知母胡連地皮之類。或表陽太虛厥冷惡寒。則溫經以助之。如桂枝乾羌參芪香薷之類。或衛氣盛於陽經而衰於陰經。上逆者則苦以降之。如龍膽梔子黃連蘆薈之類。或衛氣盛於陰經而衰於陽經。下陷者則辛以升之。如升麻葛根白朮黃芪之類。

以上皆從衛分審病用藥之大略也。若夫中風之治。則又當細辨之。

風為陽邪。衛為陽氣。兩陽相合而不相爭。故無惡寒。中風論 四十五 辨經

發熱等症。陽主開故有自汗。衛為風所消。則知覺運動俱為之不用。故猝倒不知人。仲景用獨活以解外。因其有汗故只用輕表。白菊秦艸以解風。白芍以固衛氣。歸身以附營氣。白朮以安宗氣。尤妙入白礬以澄之。不使風與衛相渾。以遺日後之患。此侯氏黑散所以為至當至確之法也。但中風必有從寒從熱之不同。則此方亦有加溫加涼之各異。特孫思邈從金匱錄方時多遺脫耳。中風之從寒化者。何以辨之。曰其四肢必厥。必無汗。

寒則厥。餘症與前同。其治宜竣表。如麻黃湯加三生飲之類。嘗用防風通聖散而愈者五人。其方則麻黃桂枝防風羌活白朮白芍當歸枳殼大黃芒硝也。因藥力甚猛。自能分開邪正。故不加入白礬。

中風之從熱化者。何以辨之。曰其舌必枯。乾裂四肢必熱。必大汗。熱氣所蒸。餘症與前同。其治宜涼解。如清涼飲子及玳瑁散主之。然揔不如白虎湯竹葉石膏湯為妙。生平嘗用此二方。治十餘人皆有殊効。亦因藥力甚猛。自能分開邪正。故亦不必白礬澄之也。中風論 四十六 辨經

以上二條皆初起用藥之法。若不如此多至拘攣痿廢矣。其後治之法又當細辨之。

中風數日之後。人事漸醒。諸症漸減者。邪風衰也。然餘邪之與衛氣相融者。必不能淨。衛氣之為風耗者。必難驟復。故往往有偏枯善忘諸恙。其治又當從營養氣之中。加入竹瀝荊瀝為引。或加羌汁為引。初從熱化者。忌然藥力既輕。取效必不能速。又宜久服之。乃能有功也。蓋竹瀝荊瀝乃草木行津之處。衛氣之在表。亦如樹木之以皮行津。故用此為引。

中風日久則衛氣必衰。欲在表之衛氣盛。必須益其
腎間動氣。如樹木培其根本。則枝葉暢茂也。若專用
芪朮以助表陽。則宗氣必僭而生熱。而風之餘邪不
除。人參黃芪白朮若加入歸芍地黃以配之。則又僅
生營血而已。而於衛氣無益。若用桂附之類。雖能益
腎間動氣。亦易於生熱。昔人創易老地黃飲子。用桂
枝附子與生地麥冬白菊同用。服之亦有效驗。必加
蒴瀝然總不如紫河車之妙。其性得血氣之餘。既非
草木可比。且又不寒不熱。而為衛氣生發之源。蓋人

中風論

聖

辭經閣

身結胎時。其形如兩甲。即兩腎也。此衛氣受生之始。
河車即從此兩甲而生。以包護於五官四體之外。即
衛氣外行軀殼衛外為固之始。以血肉之屬。為血肉
之補。同氣相求。乃無上妙品也。

近日廣東出有再造丸。服之亦間有效者。而不知其
為何藥。後於靜芸齋集驗良方中見之。即蘇合丸之
加減耳。其方皆辛香行氣之藥。用之於寒化者。則效
用之於熱化者。多不效。其曰中左者用四物湯下。中
右者用四君子湯下。亦不過沿襲左血右氣為詭遇

之訛。究非治病正理。

夫人益衛氣之法。多主用酒。靈樞謂飲酒者衛氣盛
先行絡脈。後行經脈。是以知有何脈之動。今驗之人
事。凡飲酒者。懦夫有強毅之氣。愚夫有明決之氣。笨
人有輕便之氣。靜者好動。嚙者多言。此皆緣衛氣先
盛。則知覺運動迥異於常耳。是以扁鵲對齊桓侯有
酒醪之語。然則欲益衛氣。正不必戒酒。但不可太過
太過反耗氣。不可太熱。太熱反生病。宜別圖浸紹酒
酒之法乃馬蓼麴所作。馬蓼麴性剋削。能蕩滌腸胃。非過食
中風論

聖

辭經閣

油膩者不能受燒酒。雖熱。然是水中之火。故為佳。但
不宜多飲耳。蓋天地無全功。聖人無全能。是在養生
者。宜自為斟酌也。揚州有百花酒。甚佳。京都史國公
酒亦佳。

食物不必過拘。不論寒熱。皆可取食。蓋食雜則無偏
寒偏熱之患。若認定一類為食。則偏矣。素問曰。物增
而久。謂專食天之由也。可以知戒。嘗見中風偏枯人。
謹守醫戒者。雖服藥而不愈。其放飯流飲者。雖不藥
而自愈。可知治病之道。在於得訣。不在戒口也。唯是

習俗相沿必多疑慮。今亦從俗但戒動風之物。如雄雞、鯉魚、黃鱔、鮮蝦、香椿、鮮菌六者而已。其他俱不必戒也。至於日用暈肉、蔬菜與衛氣相習已久。戒之則無以養胃氣矣。

凡素有小恙。與中風本病無涉者。則不必兼治。反分藥力。縱欲除盡。亦必愈後治之。如腸風痔血等症。此血溢於陽明正絡而來。內經所謂陰絡傷。腸在下故曰陰絡。則血下溢為圜血。大便是也。此屬血分與衛氣風邪無涉。故不必兼治。且此為輕恙。風為重恙。不可治輕而棄重也。

中風論

完

醉經閣

凡服藥餌。有不宜服而服之。反無恙者。以其本無甚病。縱誤服藥餌。亦不過如多食寒物多食熱物而已。蓋無病則人身氣血不為之動。故得無恙也。若因其無恙而輒信為可服。服之日久。未有不增病者矣。此亦物增而久之義也。有不宜服而服之。即有害者。以其本有病。稍一誤用。則其害立應。蓋有病則人身氣血已動。再加誤藥。以助其病。則病愈劇矣。故曰不服藥為中醫。

凡過服藥餌者。其效遲。往往寒之不見其涼。溫之不見其熱。因其胃口與藥習慣耳。有連服十數劑不甚見功。其實已暗受其益。譬如嗜酒之人。一旦使之戒酒。則反覺難過矣。

中風論

辛

醉經閣

附案

奉新張希良卒倒不知人。頭破出血。喉中痰鳴。遺溺汗大出。兩手兩足皆不順適。眾醫咸指為脫。已煎參附湯矣。余望其色面赤而光。切其脈浮大而緩。急止參附。投白虎湯一劑而痰靜。再劑而漸醒。次日左手足能動。而右則否。始知偏枯在右矣。因連服數劑。右手亦愈。但不思食。眾疑服藥過涼。止之弗聽。再服清涼數劑。乃大飢能食。倍於平日。而病全愈。或曰何以斷其必夾火。而面赤之必非戴陽乎。曰戴陽為虛陽。中風論

上脫其脈必散。斷不能緩。故確知。細急不分至數者為散。若見此脈須桂附以納之。

新建劉四美。猝不知人。目閉痰鳴。只右手動。餘不動。無汗。醫者投以參附。三日後遂頭搖舌裂。余用防風通聖散。大汗出而甦。因欲再進。阻於俗醫。改用輕補劑。遂成偏枯。筋急不能屈伸。竟廢。

南昌盧生病如劉四美。誤服參附。已六日矣。亦用前方三帖而甦。再用原方加減八帖而全愈。可知此症多受補藥之害。

安義尉白映昇年六十餘。尚健如壯年。從不服藥。癸酉夏月。赴城隍廟燒香。忽跪不起。口中喃喃語不明。白。一家謂受神譴也。昇歸。則喉中痰鳴。已僵矣。余視其舌如錯而黑。用大秦朮湯。倍生地。加石膏。三日而盡。五劑乃甦。而左半不能動。再用十劑。仍無效。因盡去風藥。專用元參。天冬。麥冬。生地。酒芍。白菊。知母。服兩月而愈。

奉新李榮光。體肥多痰。生平好服芪朮。雖當歸亦不敢服。一日猝倒不知人。口喎。右手不動。舌黑而乾。焦中風論

用白虎湯加麥冬。元參。生地。當歸。白芍。白菊。四劑而甦。右亦漸動。怕藥涼。不肯再服。竟成偏枯。語言蹇澀。靖安辛文祥。好服補藥。因而泄瀉。醫者謂其脾虛火衰也。時年已極力溫補而瀉愈甚。肌肉消盡而泄。食入即出。臥床一月矣。繼而猝不知人。口眼喎斜。不能言。右半不動。余用生地。八兩。麥冬。四兩。白蜜。一盞。囑代茶常服。連服半日。果泄止。遂放心服之。一日盡一帖。二日而甦。再服至六七日。而手足亦動。仍不能言。再服一二日。而大便脹急。不得出。已十餘日。於是

改用承氣湯加薄荷服二帖大便通而手足皆_{言亦出矣再服前方}麥冬生地一月全愈計服生地三十斤或問其故曰人身腸胃有三十六曲豈能食入即出此明是溫補太過三焦氣化轉運太速即火泄也熱積於內而猶行溫補以致內熱感召外風故猝中邪風用潤藥以緩其傳送故泄止以解其內熱故風息。

姑錄數案以明中風多熱病乃確有所見非從紙上

空談且可知一切俗書不足信也彼景岳全書醫門

中風論



聖經 醉經閣

法律醫宗必讀等書皆夢囈耳吾未見其能愈此病也奈何甘聽其誑而不辨耶。

序

秦有良醫曰和曰緩彼其望色辨候洞見膏肓
非所謂神靈詭異者歟乃其論針灸論湯藥三
言典要開啟後人又何其純粹以精也豈不以
疾病常有怪病罕逢惟能知常方能知變故於
命名之日早以和緩自任歟夫疾病雖多不越
內傷外感不足者補之以復其正有餘者去之
以歸於平是即和也緩治也毒藥治病去其

五良藥治病去其七亦即和法也緩治也天下
無神奇之法祇有平淡之法平淡之極乃為神
奇否則眩異標新用違其度欲求近效反速危
亡不和不緩故也雄自束髮受書習舉子業東
塗西抹迄無所成遂乃決然舍去究心於靈素
諸書自張長沙下迄時彥所有著述並皆參觀
仲景覽乎尚已其他各有專長亦各有偏執求
其純粹以精不失和緩之意者千餘年來不過

數人因思醫學至今蕪雜已極醫家病家目不
睹先正典型羣相率而喜新厭故流毒安有窮
哉救正之法惟有執簡馭繁明白指示庶幾後
學一歸醇正不惑殊趨爰將數十年所稍稍有
得而筆之於簡者都為一集名曰醫醇共二十
四卷分為六門曰脈症治首察脈次辨症次施
治此三者為大綱就治字中又分三層曰理法
意醫有醫理治有治法化裁通變則又須得法

醫醇臞義

序

二

外意也乃災梨半載而烽火西來赤手渡江愁
苦萬狀棲身異地老病日增風雨之夕林木叫
號半壁孤燈青影如豆回首往昔如夢如塵良
足悲矣自念一生精力盡在醫醇一書欲再發
刻以大暢和緩之風而坊刻定本與家藏副本
盡付祝融求之二年不可復得昔人謂人生得
幾句文字流傳大關福命此言誠不我欺也近
因左足偏廢艱於步履坐臥一室益復無聊追

憶醫醇中語隨筆錄出不及十之二三兒子輩復請付梓予以並非全書不欲更災梨棗而門下士以為雖非全豹亦見一斑且指迷處正復不少若并此湮沒則大負從前醫尚和緩之苦心矣勉從其請改題曰醫醇賡義而自序其顛末如此惟願閱是編者諒予之心悲予之遇匡其不逮而惠教之則幸甚

同治二年歲在癸亥仲春之吉武進費伯雄晉

醫醇賡義

序

三

卿氏題於古延陵之寓齋

李小湖先生題辭

訪費晉卿明經伯雄於武進之河莊即贈

舟泊石橋灣水行變而陸巾車赴河莊隻輪轉
輾轉一路枷板聲納禾場已築烏下多白頸農
來尚赤足不放鋤柄空種麥秋雨沐西風忽戲
我吹帽墮巖麓驀然見嘉山上有參軍躡天使
步古賢催詩送題目村氓那得知獨造幽人屋

其二

醫醇賡義

題辭

四

瀆傳孟簡跡山被孟嘉名嘉山對黃山兩山夾
一城城為備倭設濱江古屯兵江落沙洲拓幸
遠波濤驚五門不通櫂四至皆陸程鴻聚到今
日草草稱太平君家城南隅環堵出書聲別舍
咫尺相接病腊來千形仁心濟仁術不出慰蒼生
名士為名醫倍洩山川靈

其三

入門未見君壁懸兩小影一坐紅豆村一招采

1875 丹 續修四庫全書 2 330

逆艇自題南北曲優八元人境俗子但尋醫新
腔復誰領不破萬卷書安試藥三品由來藝通
道神悟到毫穎會稽名書家轉掩志高迥竟陵
號茶神風雅爲齒冷無怪閭畫師天子呼不省

其四

儒林與文苑千秋照簡編豈無藝術傳別表冠
世賢華陀許頌宗婦孺驚若仙本草三千味難
經八十篇格致卽聖學名與精神傳况用拯危

醫醇賡義

題辭

五

殆能奪造化權活人較良相未知誰後先莘渭
不巷遇徒手難問天孟城一匹夫所值蒙生全
日濟什百人功德歲萬千大哉農軒業託始堯
舜前

發凡

一是編先論病症隨載自製方後附成方非敢
僭越古人後先倒置欲令閱者先將病症及
治法了然於胸中然後再取古方一一參看
使知印證古人之處全不在拘執成法而亦
不離成法乃爲能自得師

一東垣丹溪一補陽一補陰實開兩大法門惟
升柴知柏非可常用故方中凡有此四味者

醫醇賡義

發凡

六

概不多錄後人但師其溫補脾胃及壯水養
陰之法可也

一傷寒一門頭緒紛繁非數千百言所能盡集
隘故不復登

醫醇賡義目錄

卷一

脈法

四家異同

重藥輕投辨

同病各發

中風

中寒

暑熱濕

卷二

秋燥

火

醫醇賡義

目錄

一

勞傷

腦漏

鼻衄

齒牙出血

關格

卷三

咳嗽

痰飲

結胸

疔瘡

黃痺

三消

卷四

痿

痺

脹

下利

諸痛

三衝

醫醇賡義

目錄

二

醫醇臚義卷一

武進費伯雄晉卿甫著

男應蘭編次

榮祖
紹祖

校字

晉卿脈法

脈乃命脈氣血統宗。氣能率血。氣行血從。

內經亦言血脈而氣在血先之義自見。並無語病。後人著脈經。遂謂脈為血脈。氣往應之。其下文又云。脈不自行。氣動脈應先。

醫醇臚義卷一

說氣應脈後說脈應氣。尺幅之中。自相悖戾。今特正之。

右寸為肺。所以主氣。百脈上通。呼吸所繫。左寸為心生血之經。一氣一血。賴以養形。

天地之大用。莫先於水火。人身之至寶。不外乎氣血。陰以抱陽。陽以攝陰。陰陽生長。互相為根。故兩寸又為諸經之統領。胸中附右寸。膻中附左寸。此上以候上之義也。

其在右關。脾胃屬土。倉廩之官。水穀之府。

右外以候胃。內以候脾。土為萬物之母。脾胃不敗。則正氣猶存。病家所以重胃氣也。

其在左關。肝膽之部。風陽易動。不宜暴怒。

左外以候肝。內以候膽。肝膽應春。所以生長。然風陽易動。亢則為害。最宜善調。

右尺命門。釜下之火。日用必需。是可補助。

經謂尺外以候腎。尺裏以候腹。五臟惟腎。

醫醇臚義卷一

二

有兩枚。故兩尺不分左右。皆屬於腎。腹中則統命門。大小腸膀胱皆在其中。究竟不分配。則混淆無主。後人無所持循。今將命門歸於右尺。大腸隸之。命門火衰。便不能薰蒸脾土。百病從此而生。但宜善為溫養。不可過燥。

左尺腎水。性命之根。與右尺火。並號神門。

腎歸左尺。膀胱小腸隸之。天一生水。性命。

之原尺脈有神縱有重恙猶能轉吉若兩尺敗壞決無生理

部位既明當知脈象切脈之時不宜孟浪以我中指先按關上前後二指寸尺相向

掌後高骨是名曰關先將中指正按關上再將前後二指平放寸尺之上人長排指宜疎人短排指宜密

脈有七診浮中及沉左右判別上陽下陰

醫醇賡義

卷一

三

寸脈浮取關脈中取尺脈沉取左與右即左右手分屬之臟腑上與下即寸以候上尺以候下也

九候之法即浮中沉三而三之分部推尋

浮以候寸中以候關沉以候尺是合寸關尺為三候也每部之中又各有浮中沉三候是分寸關尺為九候也

別有一種名曰斜飛尺則猶是寸關相違

斜飛之脈尺部如常關寸之脈斜行透過高骨一手如此者甚多浮沉之間與常脈稍異

更有一種正位全無反出關後大象模糊

反關之脈正位全無反出關後形如血管大象至數不甚分明畢竟反常之事不足為訓診時尤宜善會

男脈左大女脈右盛男子寸強女子尺勝

醫醇賡義

卷一

四

男為陽女為陰故男脈左大女脈右大男子寸盛尺虛陽勝陰也女子尺盛寸虛陰勝陽也

脈應四時遞相判別春弦夏洪秋毛冬石

春初發生有枝無葉故脈弦以象之夏令繁盛枝葉暢茂故脈洪以象之秋令肅清草木黃落故脈毛以象之冬令閉藏水土堅凝故脈石以象之長夏屬土則脈更宜

於和緩

五臟之脈各部分見。先能知常方。能知變。

五臟之脈各有木象。反常則為病。

心脈浮大。肺脈浮濇。肝脈沉弦。腎脈沉實。脾胃之脈和緩得中。右尺命火與心脈同。

舊說心脈之浮浮大而散。肺脈之浮浮濇而短。肝脈之沉沉弦而長。腎脈之沉沉實而濡等語。予竊有所未安。夫心為君火。火

醫醇臈義

卷一

五

性炎上。故脈宜浮。君火柔和。故浮大而不一。洪數。但用浮大二字。狀心脈最佳。若兼散象。則氣血虛脫。疾不可為矣。散字宜節去。肺主氣。故脈亦浮。其兼濇者。氣多血少。故也。若兼短。則氣病而為肺害。短字宜節去。肝脈沉弦固也。若長脈當候於寸尺。不當候於關。上長字宜節去。又云腎脈之沉沉實。而濡濇脈之象。浮而且小。與沉實相反。

斷不能相兼。濡字更宜節去。

臨診脈時。虛心靜氣。虛則能精。靜則能細。以心之靈。通於指端。指到心到。會悟參觀。

切脈之道。全貴心靈。手敏活潑。潑地一片。化機方能因應。此在平日講求精切。閱歷既多。指下之妙。得之於心。不能宣之於口。實有此種境界。即如六陽之脈。偏於浮大。其沉候即在常脈之中。候不得謂之沉候。

醫醇臈義

卷一

六

全無也。六陰之脈。偏於沉細。其浮候即在常脈之中。候不得謂之浮候。全無也。又況病有新久。體有強弱。年有壯老。見症雖同。施治不一。化裁通變。則泛應各當矣。脈來太過。外感為病。脈來不及。內傷之症。外感六淫。風寒暑濕。煉火也。其脈必有洪數。弦緊。滑大等象。內傷七情。喜怒哀思悲恐驚也。其脈必有細濇。濡微弱。小。乳散等。

象

人之大氣積於胸中呼吸出入上下流通呼出之氣由心達肺吸入之氣肝腎相濟

大氣積於胸中所以統攝一身呼出則由心達肺吸入則由肝納腎故論根氣則歸本於腎而樞紐實在中州

呼吸定息遲數可別一息四至和平之極五至為常亦無差忒三至為遲遲乃寒結二損一敗

醫醇賡義

卷一

七

不可復活六至為數數即病熱七至為疾熱甚危急若八九至陽竭陰絕

一息四至脈極和平其謂五至無病間以太息者是言四至中時多一至乃人之息長如三年一閏五年再閏非論一息五至之本脈也其實一息五至常人甚多亦非病脈惟三遲六數七疾乃為寒病熱病其一二至與八九至則為陰絕陽絕無從施

治

浮脈在上輕按即得肌膚之間百不失一沉脈在下主裏主陰按至筋骨受病最深

浮脈屬陽主表沉脈屬陰主裏浮沉遲數脈之大端四者既明餘脈詳看

浮遲表寒浮數表熱沉遲裏寒沉數裏熱餘可類推

大綱秩然條目宜審滑濇虛實亦為要領

醫醇賡義

卷一

八

浮沉以辨表裏遲數以辨寒熱是為脈之大綱滑與濇所以驗氣血之通塞虛與實所以分邪正之盛衰是為脈之條件脈症雖多不外乎此故以下分為八門以總括之

浮脈上泛如水漂木輕取即得重按不足芤脈如葱輕平而空浮沉俱有但虛其中如按鼓皮其名曰革中沉俱空陽亢陰竭

浮脈爲陽。主一切表病。故脈在肌膚之間。芤主失血。中空者。氣不能攝血故也。革脈弦大而浮。故謂虛寒相搏。其實乃陰不抱陽。孤陽上浮。真陰下脫之象。

肌肉之下。其脈爲沉。重按乃得。病發於陰。弦大而沉。厥名曰牢。氣凝血結。濁陰混淆。沉極爲伏。三候如無。氣機閉塞。真陽已孤。

沉脈屬陰。主一切裏症。牢則多主畜血積。

醫醇賡義

卷一

九

聚。伏則氣分閉塞。清陽不能發舒。

遲脈爲寒。氣凝血滯。若損與敗。不可復治。遲而一止。其名曰結。氣血錯亂。兼主冷積。結雖時止。至數無常。代則有定。氣血消亡。

遲爲陰寒。氣不宣通。故至數艱緩。遲而時有一止。旋止旋還。並無定數。謂之結脈。乃氣血錯亂。寒氣積聚所致。若止不能還。兼有定數。便是代脈。四動一止。五六日死。兩

動一止。三四日死也。

數脈爲熱。其陰必虛。若因風火。則爲有餘。熱甚則疾。一息七至。八九爲極。煩冤而死。數而一止。其脈爲促。多主肺癰。鬱熱陽毒。

數脈爲熱。不外虛實兩端。疾則熱甚而危。極則必無生理。促乃數而一止。亦無定數。熱鬱於中。故多肺胃之病。

滑脈主痰。亦主諸氣。氣盛痰多。往來流利。動脈

醫醇賡義

卷一

十

如豆。多見於關。若在寸尺。陰陽兩慳。

滑亦陽脈。痰氣盛。故往來流利。動脈多見關部。若在寸爲陽動。主亡陽汗多。在尺爲陰動。乃陰虛熱極。女子見於寸關。卽爲孕娠。

澹爲血少。往來澹滯。血不養氣。艱難而至。血少不潤。故往來艱澹。輕刀刮竹。如雨沾沙。俱極形似。

虛脈如何往來無力。浮中如常。沉候虧缺。濡脈浮小。如水漂棉。輕取無力。重按豁然。微脈更虛。有無之間。氣血虧損。病勢顛連。散脈無定。渙而不收。元氣將敗。如水浮漚。弱脈在下。似弦非弦。沉細而軟。不宜壯年。細則更沉。如髮如絲。行於筋骨。虛寒可知。短脈氣病。見於寸尺。不能滿部。真陽遏抑。

虛脈往來無力。三候俱有。而沉候實空。濡

醫醇騰義 卷一

十一

脈小而且浮。浮中俱有。沉候如無。微則但有浮中。並無沉候。散則渙散無定。氣血皆脫之象。弱脈但有中沉兩候。浮候如無。細脈則更沉而且小。如一絲在筋骨之間。短則氣弱。真陽不能通暢。以上各脈皆由氣血虛弱。故彙在虛字門中。不附於浮沉兩部。

貫脈之來。三候有力。更大於牢。邪滯鬱結。洪脈

上湧與洪水同。泛泛不已。熱盛於中。大脈較濁。來剛去柔。正虛邪盛。病進可憂。弦脈勁直如張弓弦。木旺克土。痰飲連綿。弦而彈轉。其脈為緊。為寒為痛。浮沉宜審。寸尺之脈。有時而長。過於本位。毗陰毗陽。

實脈三候有力。更大於牢。為邪滯鬱結。洪則如湧如沸。邪熱熾盛。大則正虛病進。久病更危。弦為肝之本象。木旺尅土。故主氣

醫醇騰義 卷一

十一

又主痰飲。浮緊為寒。沉緊為痛。並為氣病。長過於寸。則毗陽而亡陰。長過於尺。則毗陰而亡陽。又為關格之徵。以上各種皆是實病。故彙入實字門中。不附別部。

惟有緩脈悠悠揚揚。是為胃氣。見之吉祥。別有一種。怠緩近遲。血虛氣弱。積濕可知。

緩者從容和緩。所謂胃氣也。悠悠揚揚。意思欣欣。此八字最能傳緩字之神。病家得

此定可無害。若怠緩無神，乃是濕病，不可不知。

一切病症不外三四。何症何脈，辨之貴真。不能殫述，自可引伸，神而明之，存乎其人。

四家異同

仲景立方之祖，醫中之聖。所著傷寒、金匱諸書，開啟屯蒙。學者當奉為金科玉律。後起諸賢，不可相提並論。所謂四大家者，乃張子和、劉河間、

醫醇賡義 卷一

三

李東垣、朱丹溪也。就四家而論，張劉兩家善攻，善散，即邪去則正安之義。但用藥太峻，雖有獨到處，亦未免有偏勝處。學者用其長而化其偏，斯為得之。李朱兩家一補陽一補陰，即正盛則邪退之義。各有灼見，卓然成家。無如後之學者，宗東垣則詆訶丹溪，宗丹溪則詆訶東垣。入主出奴，膠執成見，為可嘆也。殊不知相反實以相成。前賢並非翻新立異，即發熱一症而論，仲景

謂凡熱病者，皆傷寒之類也。故有桂枝、麻黃等湯，以治外感之發熱。至內傷之症，東垣則以甘溫治陽虛之發熱，丹溪則以苦寒治陰虛之發熱。各出手眼，補前人所未備。本隨症治症，未嘗混施。乃宗東垣者，雖遇陰虛發熱，亦治以甘溫。參芪不已甚，而附桂、宗丹溪者，雖遇陽虛發熱，亦治以苦寒。參麥不已甚，而知栝。此尚何異於操刃乎？非東垣、丹溪誤人，不善學東垣、丹溪白。

醫醇賡義 卷一

四

誤以誤人也。吾願世之學者，於各家之異處，以求其同處，則辨症施治，悉化成心，要歸一是矣。

重藥輕投辨

無錫顧左患中脘不舒，飲食減少。予診其脈，左關甚弦，右部略沉細。此不過肝氣太強，脾胃受制耳。乃出其前服方，則居然承氣湯。硝與黃各七八分，朴與實各五六分。方案自載，宗仲景法。重藥輕投，噫人之好怪，一至此乎？予為製抑木

和中湯三劑而愈。今特申辨之。蓋三承氣湯有輕有重。原為結胸大症而設。故用斬關奪門之法。救人於存亡危急之秋。非可混施於尋常之症也。今以脾胃不和之小恙。而用此重劑。彼蓋以大手筆自居。又恐藥力太猛。故將重藥減輕。用如不用。免得立見敗壞。以巧為藏身耳。殊不知重藥既可輕投。何不輕藥重投。豈不更為妥當乎。揣其意。不過以身負重名。若用尋常方法。

醫醇賡義 卷一

五

不見出色。故小題大做。以自眩其奇。醫家敢於以藥試人。病家亦甘於以身試藥。此風日起。流毒無窮。予故不憚煩言。諄諄辨論。以為厭故喜新者之明戒。

抑木和中湯 自製

- 茯苓 四錢
- 鬱金 二錢
- 青皮 一錢
- 廣皮 一錢
- 茅朮 一錢
- 厚朴 一錢
- 當歸 二錢
- 茯苓 二錢
- 白朮 一錢

- 木香 五分
- 砂仁 一錢
- 佛手 五分
- 白檀香 五分

同病各發。巧不離乎規矩。而實不泥乎規矩。岳忠武不深究陣圖。以為陣而後戰。本屬常法。然運用之妙。在乎一心。尤以臨機應變為要。旨哉言乎。吾於古方亦猶是已。真珠母丸。本許學士治游魂為變。夜寐不安。而設。予嘗以此方略為加減。治三

醫醇賡義 卷一

六

種重恙。無不應手而效。蓋同病各發。見症雖異。而致病則同。化裁變通。於不執成見中。確有定見。斯頭頭是道矣。予非教人蔑古荒經。欲人師古人之意。而不泥古人之方。乃為善學古人。且執古方以治今病。往往有冰炭之不入者。尤不可以不審也。

丹徒張姓女。患五心煩擾。自頭至腰。時時作顫。坐卧不安。予製馴龍湯。連服數十劑而愈。

馴龍湯 白製

龍齒 二錢 眞珠母 八錢 羚羊角 五分

杭菊 二錢 生地 六錢 當歸 二錢

白芍 一錢 薄荷 一錢 沉香 五分

續斷 二錢 獨活 一錢

紅棗 十枚 鈎藤 勾 四錢 後入

常州丁姓女。患驚悸氣促喉舌作痛。予製馴

龍馭虎湯。連服數十劑而愈。

醫醇臞義 卷一

七

馴龍馭虎湯 白製

龍齒 二錢 琥珀 一錢 眞珠母 八錢

生地 六錢 玉竹 四錢 瓜蓰皮 三錢

石斛 三錢 柏子霜 二錢 白芍 一錢 五分

薄荷 一錢

蓮子 二十粒 打碎勿去心 沉香 四分 以乳磨冲

無錫孫左身無他苦。飲食如常。惟徹夜不寐。

間日輕重如發。瘧然。豈載未愈。予診其脈。左

關獨見弦數。餘部平平。因思不寐之症。共十

三條。從無間日重輕之象。惟少陽受病。方有

起伏。但少陽爲半表半裏之經。不進則退。安

能久留。此實與厥陰同病。甲乙同源。互相膠

結。故有起伏而又延久也。爲製甲乙歸藏湯。

連服數十劑而愈。

甲乙歸藏湯 白製

眞珠母 八錢 龍齒 二錢 柴胡 一錢 醋炒

醫醇臞義 卷一

末

薄荷 一錢 生地 六錢 歸身 二錢

白芍 一錢 五分 酒炒 丹參 二錢 柏子仁 二錢

夜合花 二錢 沉香 五分

紅棗 十枚 夜交藤 四錢 切

中風

經曰。風者百病之長也。風性輕而善走。無微不

入。其中人也。易其發病也。速故爲百病之長。人

惟衛能掉外。營能固內。腠理秘密。毛竅不開。斯

賊風外邪無能侵犯。否則正氣一虛。外風乘間。何隙由表入裏。而病亦由淺入深矣。衛氣不能捍外。則風入於肌肉。故手指麻木。而肌肉不仁。若是者。名曰中絡。營血不能固內。則風入於經脈。故身體重着。步履艱難。若是者。名曰中經。由此而深入。則為中府。府者。胃府也。胃為六府之長。職司出納。風入於胃。胃火熾盛。水穀之氣不生。津液而化痰涎。痰隨火升。阻塞靈竅。故昏不

醫醇賡義 卷一

九

知人也。由此而深入。則為中臟。臟者。心臟也。心體純陽。風性颺舉。風火上擾。神明散亂。故舌不能言。而口流涎沫。此偏枯症中。由淺入深之次第也。論治者。河間主火。東垣主氣。丹溪主痰。是因火召風。因氣召風。因痰召風。反以火氣痰為主。而風往從之。標本倒置。誠如喻嘉言之所譏。蓋其人有火氣痰偏勝之處。因中於風。則有火者為風。火有氣者為風。氣有痰者為風。痰風為

主。而火與氣與痰。乃與風合併交作。方為標本分明。惟侯氏黑散。填竅以堵截外風一節。後人每多誤解。以為空竅之處。惟腸與胃。若將腸胃之空竅填塞。則水穀且不得通行。人將何以自立。若有形之水穀。仍能灌輸。則無形之邪風。豈反不能直走。蓄此疑者。不知凡幾。殊不思邪害空竅。內經已明明言之。所謂空竅者。乃指毛竅及腠理言之。故侯氏黑散中。用牡蠣礬石等

醫醇賡義 卷一

三

收瀼之爽。欲令腠理秘密。毛竅固閉。正如暴寇當前。加築城垣。以堵截之。使不得入耳。非欲將腸胃之空竅。一併空塞也。只因誤會一填字。遂將空竅二字。亦一齊錯解。故特為明白剖析。庶幾積惑可除。且侯氏黑散中。尚有精義。未經揭出。再為表章之。其用牡蠣礬石。為堵截之計。固也。而其尤要者。則在於收瀼斂肝。使在內之肝風不動。則先去其內應。而勾結之患除。雖有邪

風。孤。立。無。援。亦。將。自。退。矣。因。思。保。障。靈。府。之。法。無。如。治。脾。胃。以。實。中。州。脾。氣。旺。則。積。濕。盡。去。而。痰。氣。不。生。胃。氣。和。則。津。液。上。行。而。虛。火。自。降。治。病。大。法。無。過。於。斯。至。倉。猝。之。時。病。勢。危。急。則。又。當。逆。而。折。之。雖。峻。猛。之。劑。不。得。不。隨。症。而。施。矣。

中絡

中絡者。風入肌表。肌肉不仁。或手指足趾麻木。

加味桂枝湯主之。

醫醇臚義 卷一

三

加味桂枝湯 自製

桂枝 八分 白芍 一錢五分 甘草 五分

懷牛膝 二錢 川牛膝 一錢五分 當歸 二錢

蠶沙 四錢 秦艽 一錢 防風 一錢

紅棗 五枚 薑 三片

中經

中經者。風入經脈。身體重着。步履艱難。養血祛風湯主之。

養血祛風湯 自製

生地 五錢 當歸 二錢 白芍 一錢 酒炒

桂枝 六分 茯苓 三錢 白朮 一錢

虎脛骨 一錢五分 續斷 二錢 獨活 一錢 酒炒

秦艽 一錢 牛膝 二錢 木香 五分

紅棗 十枚 薑 三片 桑枝 一尺

中府

風火熾盛。胃津不能上行。痰塞靈竅。昏不知人。

醫醇臚義 卷一

三

加味竹瀝湯 自製

加味竹瀝湯 自製

麥冬 二錢 石斛 三錢 羚羊角 一錢 五分

橘紅 一錢 膽星 五分 僵蠶 一錢 五分 炒

天麻 八分

淡竹瀝 半杯

薑汁 一滴 同沖服

中臟

心為一身之主。風火上犯。則神明散亂。舌不能

言口流涎沫甚或神昏聳睡面色油紅此為難治姑擬清心飲以備救急之一法

清心飲 自製

牛黃 五分 琥珀 一錢 黃連 五分

丹參 三錢 遠志 五分 葛蒲 八分

橘紅 一錢 膽星 五分 麥冬 一錢

淡竹葉 二十張

中臟虛症四肢懈故昏不知人遺尿聳睡此更

醫醇賡義 卷一 圭

難治姑擬陰陽兩救湯以備一法

陰陽兩救湯 自製

熟地 八錢 附子 三錢 人參 二錢

兔絲子 八錢 枸杞 四錢 茯神 二錢

遠志 一錢 乾河車 三錢 炮薑炭 一錢

煎濃汁時時飲之

口眼喎斜

足陽明之脈夾口環唇足太陽之脈起於目內

皆胃有痰火又風從太陽而來兼擾陽明故筋脈牽掣而口眼喎斜也消風返正湯主之

消風返正湯 自製

羌活 一錢 天麻 八分 蝎尾 五支

殭蠶 一錢五分 貝母 二錢 羚羊角 一錢

石斛 三錢 花粉 二錢 麥冬 二錢

黃荊葉 五張

半身不遂

醫醇賡義 卷一 圭

氣虛者手足弛縱食少神疲不能步履黃芪九物湯主之

黃芪九物湯 自製

黃芪 二錢 防風 一錢 黨參 五錢 茯苓 二錢

白朮 一錢 鹿膠 一錢五分 獨活 一錢

牛膝 二錢 甘草 五分

大棗 二枚 薑 三片

血虛者筋節拘攣手指屈而不伸不能步履舒

筋通絡湯主之

舒筋通絡湯 自製

生地 四錢 當歸 二錢 白芍 一錢五分

川芎 一錢 枸杞 三錢 木瓜 一錢

金毛脊 二錢 去毛切片 楮實子 二錢 川斷 二錢

獨活 一錢 酒炒 牛膝 二錢 秦艽 一錢

紅棗 十枚 薑 三片 桑枝 一尺

中風僵卧

醫醇賸義 卷一

五

氣血皆虛。手不能舉。足不能行。語言蹇澁。補真

湯主之。

補真湯 自製

紫河車 二錢 乾切 熟地 五錢 附子 一錢

山萸肉 一錢 五分 當歸 二錢 白芍 一錢五分

茯神 二錢 丹參 二錢 遠志 五分

麥冬 二錢 石斛 二錢 獨活 一錢

牛膝 二錢 酒炒

紅棗 十枚 薑 三片

附肝風

頭目眩暈。肢節搖顛。如登雲霧。如坐舟中。滋生

青陽湯主之。

滋生青陽湯 自製

生地 四錢 白芍 一錢 丹皮 一錢

麥冬 一錢五分 青黛拌 石斛 二錢 天麻 八分

甘菊 二錢 石決 八錢 柴胡 八分

醫醇賸義 卷一

五

桑葉 一錢 薄荷 一錢

靈磁石 五錢 整塊同煎

附腎風

頭目眩暈。中心懸懸。驚恐畏人。常欲蒙被而卧。

滋腎息風湯主之。

滋腎息風湯 自製

熟地 四錢 當歸 二錢 枸杞 三錢

羌活 四錢 甘菊 二錢 巴戟天 三錢

菴茶 三錢 天麻 八分 獨活 一錢

紅棗 十枚 薑 三片

中風門諸方

侯氏黑散 治大風四肢煩重心中惡寒不足

菊花 四分 白朮 十分 茯苓 三分 細辛 三分

牡蠣 三分 桔梗 八分 防風 十分 人參 三分

礞石 三分 黃芩 三分 當歸 三分 乾薑 三分

川芎 三分 桂枝 三分

醫醇賡義 卷一

七

共研為末酒服一方寸七日三服禁一切辛

辣熱物六十日止則藥積腹中不下熱食即

下矣

愈風丹 治諸風症偏正頭痛

羌活 一兩 細辛 一兩 甘菊 一兩 天麻 一兩

獨活 一兩 薄荷 一兩 何首烏 一兩

共研末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼茶

清下

胃風湯 治虛風症能食手足麻木牙關急搐

目內蠕動胃風面腫

升麻 一錢二分 白芷 一錢二分 麻黃 一錢

葛根 一錢 當歸 一錢 蒼朮 一錢

甘草 一錢 柴胡 五分 羌活 五分

藜蘆 五分 黃柏 五分 草薺 五分

蔓荊子 五分

薑 三片 棗 一枚

醫醇賡義 卷一

七

薏苡仁湯 治中風手足流注疼痛麻痺不仁

難以屈伸

苡仁 三錢 當歸 一錢二分 芍藥 一錢二分

麻黃 五分 官桂 五分 蒼朮 一錢二分

甘草 八分

生薑 三片

排風湯 治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精

神錯亂及五臟風發等症

防風 一錢 白朮 一錢 當歸 一錢 白芍 一錢
 肉桂 一錢 杏仁 一錢 川芎 一錢 甘草 一錢
 麻黃 一錢 白蘚皮 三錢 茯苓 三錢 獨活 三錢
 薑 三片
 人參補氣湯 治手指麻木
 人參 二錢 黃芪 二錢 升麻 五分
 柴胡 五分 白芍 五分 生甘草 五分
 炙甘草 五分 五味子 五分

醫醇賡義 卷一

无

不加引

桂枝湯 治風從外來久客於絡留而不去此

方主之

桂枝 二錢 白芍 三錢 甘草 三錢

大棗 二枚 薑 三片

小續命湯 治中風不省人事漸覺半身不遂

口眼喎斜手足顛掉語言蹇澀肢體麻痺精神昏亂頭目眩暈痰火并多筋脈拘急不能

屈伸肢節煩痛不能轉側
 防風 四分 桂心 四分 黃芩 一錢
 白芍 四分 杏仁 四分 甘草 四分
 川芎 四分 人參 四分 防已 二錢
 麻黃 一錢 附子 七分
 棗 二枚 薑 三片
 附易老六經加減法

麻黃續命湯治中風無汗惡寒本方中麻黃

醫醇賡義 卷一

无

杏仁防風各加一倍

桂枝續命湯治中風有汗惡風本方中桂枝

白芍杏仁各加一倍

白虎續命湯治中風有汗身熱不惡寒本方

中加知母石膏各一錢四分去附子

葛根續命湯治中風有汗身熱不惡風本方

中加葛根一錢四分桂枝黃芩各加一倍

附子續命湯治中風無汗身涼本方中加附

子一倍乾薑甘草各一錢

桂附續命湯治中風有汗無熱本方中桂枝

附子甘草各加一倍

防風通聖散 治諸風驚搐手足煖癱小兒急

驚風大便急邪熱暴盛肌肉蠕動一切風症

防風 五分 川芎 五分 當歸 五分 白芍 五分

大黃 五分 芒硝 五分 連翹 五分 薄荷 五分

麻黃 五分 山梔 五分 石膏 五分 黃芩 五分

醫醇臚義

卷一

三

桔梗 五分 白朮 五分 荊芥 五分 甘草 五分

滑石 五分

薑 三片 涎嗽加半夏 五分 破傷風加羌活

全蝎各 五分

烏藥順氣散 治風氣攻注四肢骨節疼痛遍

身頑麻語言蹇澁手足不遂先宜多服此藥

以疎氣逆然後隨症投以風藥

麻黃 二兩 陳皮 二兩 烏藥 二兩 川芎 一兩

殭蠶 一兩 白芷 一兩 甘草 一兩 枳殼 一兩

桔梗 一兩 乾薑 五錢

共研為末每服三錢溫酒調下

加味六君子湯 治四肢不舉屬於脾土虛衰

須服此專治其本不加入風藥

人參 一錢 茯苓 一錢 甘草 一錢

廣皮 一錢 半夏 一錢 麥冬 三錢

竹瀝 半杯

醫醇臚義

卷一

三

口渴去半夏加玉竹不熱者加附子

資壽解語湯 治中風脾緩舌強不語半身不

遂

防風 一錢 附子 一錢 天麻 一錢 官桂 八分

棗仁 一錢 羌活 五分 甘草 五分 羚羊角 八分

竹瀝兩大匙薑汁兩滴同沖服

天麻丸 治風因熱而生熱盛則動宜以靜勝

其燥養血通絡兼去腎風

天麻 四兩 酒浸 牛膝 四兩 酒浸 苧薺 四兩
 元參 四兩 杜仲 七兩 附子 一兩
 羌活 三兩 獨活 三兩 當歸 十兩
 生地 一片
 共爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五七十丸空心溫酒下
 竹瀝湯 治四肢不收心神恍惚不知人事口不能言

醫醇賡義 卷一

重

竹瀝 二升 生薑汁 二升 生薑汁 二合
 右三汁和勻分三次溫服
 千金地黃湯 治熱風心煩及脾胃熱壅食不下
 生地汁 五升 枸杞子汁 五升 真酥 一升
 荆瀝 五升 竹瀝 五升 人參 八兩
 茯苓 六兩 天冬 八兩 大黃 四兩
 梔子 四兩

後五味爲細末納前汁內調勻服一方寸匙日漸加以利爲度
 涼膈散 治心火上盛膈熱有餘目赤頭眩口瘡唇裂吐衄涎嗽稠粘二便淋閉胃熱發斑諸風痲痺手足搐逆
 連喬 梔子 薄荷 大黃
 芒硝 甘草 黃芩
 棗一枚 葱一根

醫醇賡義 卷一

重

地黃飲子 治舌瘡不能言足廢不能用腎虛弱其氣厥不至舌下
 熟地 巴戟 山茱萸 肉蓯蓉
 石斛 附子 五味 茯苓
 菖蒲 遠志 甘草 官桂 麥冬 各等分
 薑三片 棗一枚 薄荷葉六張
 黑錫丹 治真元虛憊陽氣不回陰氣逆冲三焦不和冷氣刺痛飲食無味腰背沉重膀胱

久冷及陰症陰毒四肢厥冷不省人事急用
棗湯吞一百粒即便回陽

沉香 一兩 酒炒 葫蘆巴 一兩 研末水飛 陽起石 一兩

肉桂 五分 破故紙 一兩 白茴香 一兩

肉荳蔻 一兩 麩煨 木香 一兩 金鈴子 一兩 蒸去皮核

硫黃 二兩 黑錫 二兩 去滓

用鐵鍋先炒硫黃黑錫結成砂子於地上出
火毒研令極細條藥並細末和勻自朝至暮

醫醇臚義 卷一 五

以研至黑光色為度酒 丸如梧子大陰乾

入布袋內擦令光瑩每用四十九鹽薑湯下
急症多者用至百丸

古今錄驗續命湯 治中風身體不能自收口

不能言胃昧不知痛處或拘急不得轉側

麻黃 三兩 杜枝 三兩 當歸 三兩

人參 三兩 石膏 三兩 乾薑 三兩

甘草 二兩 川芎 三兩 杏仁 四十枚

右九味以水一斗煮取四升溫服一升汗出
則愈

千金三黃湯 治中風手足拘急百節疼痛煩

熱心亂惡寒經日不欲飲食

麻黃 四分 獨活 四分 細辛 二分

黃芪 二分 黃芩 三分

右五味以水六升煮取三升分三次服一服
小汗二服大汗心熱加大黃二分腹滿加枳

醫醇臚義 卷一 五

實一枚氣逆加人參三分悸加牡蠣三分渴

加瓜瓞根三分先有寒加附子一枚

近效白朮附子湯 治風虛頭重眩苦食不知

味暖肌補中益精氣

白朮 二兩 附子 一枚 甘草 一兩

右三味剉為末每用五錢薑五片棗一枚煎

七分去渣服

中寒

一陰一陽之謂道。天地萬物莫之能外。陽主發舒。陰主收斂。陽主生長。陰主肅殺。人受二氣之中。以生。陰陽調和。康強壽考。次則陽氣勝者。雖不無少偏。猶足自立。至陰氣一盛。則陽氣漸消。疾病夭折。不可究詰矣。寒者陰氣也。即肅殺之氣也。寒氣中人。為禍最烈。仲景欲利濟萬世。著傷寒中寒為二論。傷寒論十卷。炳如日星。後世奉為科律。卒病論六卷。自晉以來。久已散失。無

醫醇臞義 卷一

五

可稽考。然其分為兩門之意。則可揣而知也。傷寒者。傳變之症。多由發熱而起。經所謂。凡熱病者。皆傷寒之類也。人之陽氣。未至大衰。雖感冒風寒。一時陽為陰掩。究竟真陽尚在。則陽回氣復。而病亦旋瘳。自有傷寒論以來。後之註釋者。若陳氏柯氏吳氏。代有發明。至喻氏尚論篇。更暢其說。學者融會貫通。可以泛應各當。故此編於傷寒門中。概不置喙。非闕也。實亦無庸更贊。

一詞也。今於中寒門。分列數條。蓋恐人不知。傳經直中之分。仍以治傷寒之法治中寒。則大不可耳。傷寒者。寒從外來。中寒者。寒從內發。傷寒多發熱之候。中寒則但有厥冷。而無發熱之候。此必其人之真陽先虧。坎中之火。漸為水掩。又必有澄寒痼冷。伏於臟府。一遇寒氣。積病猝發。極為危險。故非氣雄力厚之溫劑。不能斬關奪門。以回真陽於俄頃。非如傷寒傳經之症。可以

醫醇臞義 卷一

五

按部就班也。見症列後。

真心痛

真心痛者。水來尅火。寒邪直犯君主。腕痛嘔吐。身冷手足青至節。甚則旦發夕死。茯神四逆湯主之。

茯神四逆湯 自製

茯神 二錢 附子 三錢 乾薑 一錢
人參 二錢 甘草 五分 木香 六分

砂仁 一錢

水三鍾煎至一鍾微溫服

厥心痛

厥心痛者中寒發厥而心痛也。雖在包絡。然已
是心之外府。故手足厥逆。身冷汗出。便溺清利。
甚亦朝發夕死。白朮四逆湯主之。

白朮四逆湯 自製

白朮 三錢 附子 三錢 乾薑 一錢

醫醇賡義 卷一 三

人參 二錢 茯苓 二錢 甘草 五分

大棗 三枚

水三鍾煎一鍾微溫服

直中少陰

腎氣厥逆腹痛下利。手足厥冷。小便清利。茴香
四逆湯主之。

茴香四逆湯 自製

小茴香 二錢 附子 三錢 乾薑 一錢

破故紙 二錢 杜仲 五錢 茯苓 二錢

甘草 五分

大棗 三枚 水三鍾煎一鍾溫服

直中厥陰

肝氣厥逆。脇下及腹中絞痛。下利。手足厥冷。指
爪皆青。茱萸附桂湯主之。

茱萸附桂湯 自製 吳萸 七分 附子 二錢 肉桂 八分

醫醇賡義 卷一 四

當歸 三錢 白芍 一錢 白朮 一錢

木香 六分 烏藥 一錢

棗 二枚 薑 三片

中寒門諸方 凡涉傷寒門傳經者不錄

附薑白通湯 治暴卒中寒厥逆嘔吐瀉利色
青氣冷肌膚凜慄無汗盛陰沒陽之症

附子 五錢 乾薑 五錢 葱白 五莖

豬膽 半枚

先將附薑二味煎好後入葱汁膽汁和勻溫服

附薑歸桂湯 治暴卒中寒兼傷營血者

附子 二錢五分 乾薑 二錢五分 當歸 二錢五分

肉桂 二錢五分

水二盞煎至一盞入蜜一蛤蜊殼溫服

附薑歸桂參甘湯 治陽氣將回陰寒少殺

附子 一錢五分 乾薑 一錢五分 當歸 一錢五分

醫醇賡義 卷一

望

肉桂 一錢五分 人參 二錢 甘草 二錢

大棗二枚蜜三蛤蜊殼溫服

辛溫平補湯 治暴中寒症服前三方其陽已

回身溫色活手足不冷吐利漸除用此平補

臟腑調和營衛俾不致有藥偏之害

附子 五分 乾薑 五分 當歸 一錢

肉桂 五分 人參 一錢 甘草 一錢

黃芪 一錢 白朮 一錢 白芍 一錢 酒炒

五味子 十二粒

大棗二枚加蜜五蛤蜊殼溫服

四逆湯 治三陰經症四肢厥冷虛寒下利急

溫其臍

甘草 二兩 乾薑 三兩 附子 一枚

右三味以水二升煎一升二合分溫再服

通脈四逆加減湯 治下利清穀裏寒外熱厥

逆惡寒脈微欲絕之証即前四逆湯 而赤

醫醇賡義 卷一

望

者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥三兩嘔

者加生薑二兩咽痛者去生薑芍藥加桔梗

一兩利止脈不出者去桔梗加人參二兩

桂枝去芍藥加麻辛附子湯 治中脘痛心下

堅大如盤邊如旋杯水飲所作

桂枝 三兩 麻黃 二兩 細辛 二兩

甘草 二兩 附子 一枚 生薑 三兩

大棗 十二枚

水七升煮麻黃去沫內諸藥煮取二升分三服當汗出如蟲行皮中即愈

附子粳米湯 治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆

滿嘔吐

附子一枚 半夏半升 甘草一兩

大棗十枚 粳米半升

水八升煮米熟湯成去渣溫服一升

大建中湯 治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹

醫醇賡義

卷一

聖

中寒土衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近者

蜀椒二合 乾薑四兩 人參二兩

水四升煮取二升去渣入飴糖一升微火煮

取一升半分溫服

大黃附子湯 治脇下偏痛發熱其脈緊弦此

寒也以溫藥下之

大黃二兩 附子二枚 細辛二兩

以水五升煮取二升分三服

理中湯 治自利不渴寒多而嘔腹痛脈沉無

力或厥冷拘急或結胸吐衄

白朮二兩 土炒 人參一兩 乾薑一兩 炮

甘草一兩 炙

每服四錢 自利腹痛加木香利多者倍白

朮 渴者倍白朮 倦卧沉重利不止加

附子 腹滿去甘草 臍下動氣去朮加

醫醇賡義

卷一

醫

桂 悸加茯苓 胸痞加枳實 吐衄加

川椒烏梅

回陽救急湯 治身不熱頭不痛惡寒戰慄四

肢厥冷腹痛吐瀉指甲唇青或無脈或脈沉

遲無力

附子五分 乾薑五分 肉桂五分

人參五分 白朮一錢 茯苓一錢

半夏七分 陳皮七分 甘草二分

五味子九粒 無脈加猪膽汁

暑熱濕

四序流行。春生夏長。秋收冬藏。故春為風木。秋為燥金。冬為寒水。各司其令。惟夏則暑熱濕三氣迭乘。合操其柄。此蓋大化循環之運。不期然而然。而亦不得不然也。所謂不期然而然者何也。天一生水。貞下起元。由水生木。由木生火。至是而天氣下降。地氣上騰。大生廣生。百物蕃阜。

醫醇賸義

卷一

聖

此所謂不期然而然者也。所謂不得不然者何也。夏為火令。秋為金令。由夏入秋。乃火下起。金不惟不能相生。而反相尅。秋令不幾於或息乎。全賴地氣上騰。長夏土旺。由火生土。藉土生金。此又大化斡旋之妙用。四序方得流行。生尅方不顛倒。所謂不得不然者此也。但暑熱之氣自。上而下。濕氣自下而上。人在其中。無時無處不受其薰蒸燔灼。致病已非一端。又况起居不慎。

飲食不節。其受病尚可問乎。金匱有瘧濕喝之

訓。後賢推而廣之。立方愈多。醇駁互見。蓋傷寒有瘧病。時邪亦有瘧病。而時邪之瘧。與傷寒之瘧。又復不同。三氣之瘧。只須究其致病之由。或由風熱。或由暑熱。或由濕熱。見症治症。直截了當。若牽涉傷寒之瘧。較量比例。雖繁稱博引。更令人滋惑矣。且三氣為病。非有沉寒痼冷。如冬月傷寒之比。若拘執太陽篇中之瘧病動輒麻

醫醇賸義

卷一

聖

黃桂枝何異。抱薪救火乎。茲特舉症於前列。方於後。使閱者了然釋然。

剛瘧

剛瘧者。頭痛項強。手足搐逆。甚則角弓反張。發熱無汗。此風熱盛也。熱傷榮血。筋脈暴縮。風入經絡。肢節拘攣。風熱合而為病。赤芍連喬散主之。

赤芍連喬散 自製

赤芍 一錢五分
連喬 二錢
葛根 二錢
花粉 三錢
豆豉 三錢
防風 一錢
薄荷 一錢
獨活 一錢
甘草 四分
經霜桑葉 二十張

柔痙

柔痙者。身體重着。肢節拘攣。有汗而熱。暑熱為天之氣。其來甚速。其去亦甚速。體重筋攣。乃熱邪為濕所留。故有汗而熱不退也。白木苡仁湯

醫醇賡義 卷一

聖

主之

白木苡仁湯 自製

白木 一錢
茅朮 一錢
苡仁 八錢
茯苓 三錢
當歸 一錢五分
赤芍 一錢
薄荷 一錢
連喬 一錢五分
花粉 三錢
甘草 四分
鮮荷葉 一角
傷暑

傷暑者。汗多體倦。渴而引飲。心煩脈虛。加味白虎湯主之。

加味白虎湯 自製

石膏 五錢
知母 一錢
人參 一錢
茯苓 二錢
山藥 三錢
麥冬 二錢
石斛 三錢
甘草 四分
粳米 一合煎湯代水
中暑

醫醇賡義 卷一

聖

猝然而倒。昏不知人。身熱口噤。此熱邪內犯。君主黃連滌暑湯王之。

黃連滌暑湯 自製

黃連 五分
黃芩 一錢
梔子 一錢五分
連喬 一錢五分
葛根 二錢
茯苓 二錢
半夏 一錢
甘草 四分
傷熱

暑濕氣合鬱為大熱。五心煩躁。坐卧不安。渴飲

胸痞此三氣迭乘已成燎原之勢宜急下存陰。

三焦通治三解湯主之。

三解湯 自製

黃連 五分
黃芩 一錢
大黃 四錢

梔子 一錢
花粉 二錢
連翹 一錢
半夏 一錢
茯苓 二錢
木通 一錢

澤瀉 五分
青荷梗 一尺

醫醇賡義 卷一

哭

傷濕

傷濕者四肢倦怠食少胸痞加味神木湯主之。

加味神木湯 自製

白朮 一錢
茅朮 一錢
當歸 一錢

茯苓 二錢
苡仁 四錢
厚朴 一錢

砂仁 一錢
半夏 三錢
佩蘭葉 一錢

川牛膝 一錢
荷葉 一角
薑 兩片

嘔吐 暑月嘔吐乃飲食不節外感不正之氣也。四正散主之。

四正散 自製

藿香 一錢
茅朮 一錢
厚朴 一錢

砂仁 一錢
茯苓 二錢
廣皮 一錢

半夏 一錢
神麴 三錢

淡竹茹 八分
薑汁 兩小匙 沖服

醫醇賡義 卷一

李

泄瀉

暑月泄瀉乃貪涼受寒過食生冷腸胃受傷所致和中化濁湯主之。

和中化濁湯 自製

茅朮 一錢
厚朴 一錢
茯苓 二錢
枳殼 一錢

青皮 一錢
砂仁 一錢
木香 五分
烏藥 一錢

炭查 三錢
神麴 三錢
車前 二錢

荷葉 一角
煨薑 三片

霍亂轉筋

暑月受邪。鬱於中焦。上吐下瀉。手足厥冷。筋脈抽掣。化逆湯主之。

- 化逆湯 自製
- 黃連 六分
- 吳萸 三分
- 厚朴 一錢
- 青皮 一錢
- 藿香 五分
- 木瓜 一錢
- 木香 五分
- 白蔻 六分
- 獨活 一錢
- 烏藥 一錢
- 茯苓 四錢
- 茯苓 二錢

醫醇賡義 卷一

至

各半水煎服

發黃

脾經受濕。胃經受熱。鬱蒸發黃。加味茵陳湯主之。

加味茵陳湯 自製

- 茵陳 二錢
- 木通 五分
- 赤苓 三錢
- 澤瀉 五分
- 苡仁 一兩
- 茅朮 一錢
- 厚朴 一錢
- 薄荷 一錢
- 青皮 一錢

藕三兩。苡仁一兩。同煎湯代水。

甘草 四分

柏仁 二錢 車前 二錢

天冬 二錢 生地 四錢 沙參 四錢 丹參 二錢

加味三才湯 自製

虛體夾濕。淋濁不痛。加味三才湯主之。

苡仁 一兩 煎湯代水

澤瀉 五分 車前 二錢 甘草 四分

醫醇賡義 卷一

至

草薺 二錢

丹皮 二錢 赤芍 一錢 木通 一錢

牡丹皮湯 自製

主之

濕熱內蘊。移於下焦。小便混濁。作痛。牡丹皮湯

淋濁

青荷梗 一尺

車前 二錢

附三氣門諸方凡涉傷寒門症病者不錄

海藏神木湯 治內傷冷飲外感寒邪而無汗者

蒼朮 二兩 防風 二兩 甘草 一兩

葱白生薑同煎服

白朮湯 治內傷冷物外感風寒有汗者

白朮 三兩 防風 二兩 甘草 一兩

每服三錢薑三片煎服

醫醇賸義 卷一

聖

人參瀉肺湯 治肺經積熱上喘咳嗽胸膈脹

滿痰多大便澀

人參 黃芩 梔子 枳殼 薄荷

甘草 連翹 杏仁 大黃 桑皮

桔梗 各等分

每服七錢水二盞煎八分服

天門冬散 治肺壅腦熱鼻乾大便秘澀

天冬 八分 桑皮 八分 升麻 八分

大黃 八分 枳殼 八分 甘草 八分

荆芥 一錢

水二盞煎八分食後服

赤茯苓湯 治膀胱濕熱小便不通口苦舌乾

咽喉不利

赤苓 猪苓 葵子 枳實 瞿麥

木通 黃芩 車前 滑石 甘草 各等分

薑三片煎八分服

醫醇賸義 卷一

聖

龍腦雞蘇丸 除煩熱鬱熱肺熱咳嗽吐血鼻

衄消渴鬱溼膈熱口瘡清心明目

薄荷 一兩 生地 六錢 麥冬 四錢

蒲黃 二錢 阿膠 二錢 黃芪 一錢

人參 二錢 木通 二錢 甘草 一錢

銀柴胡 一錢

共研末蜜丸如梧子大每服二十九

利扁散 治脾肺大熱虛煩上壅咽喉生瘡

薄荷 荆芥 防風 桔梗 人參
牛旁子 甘草 各一兩

共為末每服二錢不拘時沸湯點服

地黃煎 治熱積

地黃 一斤 茯苓 四兩 知母 四兩

玉竹 四兩 花粉 四兩 麥冬 四兩

人參 二兩 石膏 八兩 地骨皮 四兩

共研末加白蜜竹瀝薑汁為丸如梧子大每

醫醇賡義 卷一 五

服三十九

碧雪 治一切積熱咽喉口舌生瘡心中煩躁

及天行時熱發強昏憤

芒硝 朴硝 硝石 馬牙硝 青黛

石膏 寒水石 水飛 甘草 各等分

先將甘草煎湯二升去渣入諸藥再煎用柳

木棍不住手攪令消溶得所再入青黛和勻

傾入砂盆內候冷凝結成霜研為細末每用

少許含化津嚥不拘時候如咽喉壅閉以小
竹筒吹藥入喉中即愈

麻黃杏子薏苡甘草湯 治一身盡痛日晡發

熱此傷於汗出當風風濕為病也

麻黃 四兩 甘草 一兩 苡仁 半斤

杏仁 七十粒

每服四錢煎八分有微汗避風

防已黃芪湯 治風濕相乘身重汗出惡風

醫醇賡義 卷一 五

防已 一兩 甘草 五錢 白朮 七錢

黃芪 二兩

共剉細每用五錢大棗一枚薑三片水煎八

分服服後當如蟲行皮中從腰下如水暖坐

被上又以一被繞腰以下令微汗

和劑五積散 治感冒寒邪頭疼身痛項背拘

急惡寒嘔吐內傷生冷及寒濕客於經絡

白芷 三兩 茯苓 三兩 半夏 三兩

當歸 三兩 川芎 三兩 甘草 三兩

肉桂 三兩 白芍 三兩 枳殼 六兩

麻黃 六兩 陳皮 六兩 桔梗 十二兩

厚朴 四兩 乾薑 四兩 蒼朮 四兩

每服四錢薑三片葱白三根煎七分熱服

活人敗毒散 治瘟疫風濕風痰頭痛目眩憎

寒惡熱山嵐障氣

羌活 一兩 獨活 一兩 前胡 一兩

醫醇賸義 卷一

柴胡 一兩 茯苓 一兩 枳殼 一兩

桔梗 一兩 人參 一兩 甘草 五錢

共為末每服二錢水二盞薑三片煎七分溫

服

清熱滲濕湯 治熱濕鬱蒸煩熱食少神倦

黃柏 二錢 鹽水炒 黃連 五分 茯苓 二錢

澤瀉 二錢 蒼朮 五分 白朮 五分

甘草 五分

水二鍾煎八分服

二木四苓湯 治諸濕腫滿一身盡痛發熱煩

悶二便不利

白朮 蒼朮 茯苓 猪苓 澤瀉

黃芩 羌活 芍藥 梔子 甘草 各等分

薑三片燈心一撮煎服

羌活勝濕湯 治脊痛項強腰如折項如拔上

衝頭痛

醫醇賸義 卷一

羌活 一錢 獨活 一錢 藜蘆 一錢

防風 一錢 蔓荊子 一錢 川芎 八分

甘草 四分

水煎八分溫服

除濕湯 治寒濕所傷身體重着腰脚酸疼大

便澹泄小便或澹或利

半夏 二錢 厚朴 二錢 蒼朮 二錢

藿香葉 一兩 陳皮 一兩 甘草 七錢

白朮 一兩 茯苓 一兩

每服四錢棗二枚薑三片

人參白虎湯 治傷暑汗多而渴

知母 六錢 石膏 一斤 甘草 二兩

粳米 一合 人參 三兩

水一斗煮米熟湯成去渣溫服一升

清暑益氣湯 治傷暑四肢倦怠胸滿氣促肢

節疼或氣高而喘身熱而煩心下痞脹小便

醫醇賡義 卷一 堯

黃數大便溏泄口渴不思飲食自汗體重

人參 一錢 黃芪 一錢 升麻 一錢

蒼朮 一錢 白朮 五分 神麩 五分

陳皮 三分 炙草 三分 黃柏 三分

麥冬 三分 當歸 三分 乾葛 三分

澤瀉 三分 青皮 三分 五味子 三分

水煎服

生脈散 治熱傷元氣肢體倦怠氣短懶言口

乾作渴汗出不止

人參 麥冬 五味子 各等分

水煎服

竹葉石膏湯 治暑熱煩燥

石膏 一兩 半夏 二錢 人參 三錢

麥冬 三錢 甘草 二錢 竹葉 二十張

薑三片水煎服

香薷飲 治一切暑熱腹痛或霍亂吐瀉煩心

醫醇賡義 卷一 本

等症

香薷 一斤 厚朴 八兩 白扁豆 八兩

水煎服 加茯苓甘草名五物香薷飲

去扁豆加黃連名黃連香薷飲

十味香薷飲 治伏暑身體倦怠神昏頭重吐

利

香薷 人參 陳皮 白朮 茯苓

黃芪 木瓜 厚朴 扁豆 甘草 各五錢

每用一兩水煎服

桂苓甘露飲 治伏暑發渴脈虛水逆

茯苓 一兩 澤瀉 一兩 白朮 一兩

石膏 一兩 滑石 四兩 寒水石 一兩

猪苓 五錢 人參 一兩 甘草 一兩

乾葛 一兩 木香 一兩 藿香 一兩

肉桂

共為末每服三錢溫湯調下

醫醇賡義

卷一

李

五苓散 治暑濕為病發熱頭疼煩躁而渴

白朮 一兩 茯苓 一兩 猪苓 一兩

澤瀉 二兩 桂枝 五錢

共為末每服二三錢熱湯調下

三黃石膏湯 治濕火熾盛

黃連 五分 黃芩 一錢 黃柏 一錢

石膏 三錢 元參 一錢 山梔 一錢

知母 一錢 甘草 七分

水煎服

蒼朮白虎湯 治煩渴汗多舌胎白膩

蒼朮 二錢 石膏 五錢 知母 一錢

甘草 五分 粳米 一撮

水煎服

六和湯 治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒

熱交作胃暑伏熱煩悶成痢

香茹 三錢 砂仁 五分 半夏 五分

醫醇賡義

卷一

李

杏仁 五分 人參 五分 甘草 五分

赤苓 二錢 藿香 一錢 扁豆 二錢

厚朴 一錢 木瓜 一錢

紅棗 五枚 薑 三片

消暑丸 治伏暑引飲脾胃不利

半夏 一斤 甘草 八兩 茯苓 八兩

薑湯糊為丸如梧子大每服五十九

地榆散 治中暑昏迷不省人事欲死者并治

煩躁口苦舌乾頭痛惡心不思飲食及血痢

地榆 赤芍 黃連 青皮 各等分

每服三錢水煎服

大順散 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水

穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐

甘草 乾薑 杏仁 桂枝 各等分

共為末每服二三錢湯點服

醫醇賡義

卷一

李

醫醇賡義卷二

秋燥

燥為六淫之一。內經於此條並未大暢其說。至西昌喻氏著秋燥論一篇。謂世俗相沿。誤以濕病為燥病。解者亦競以燥病為濕病。而於內經所謂秋傷於燥。上逆而咳。發為痿厥。數語全然誤會。可謂獨具隻眼。大聲喝破矣。惟篇中謂秋不遽燥。大熱之後。繼以涼生。涼生而熱解。漸至

醫醇賡義

卷二

春記

大涼而燥。令乃行焉。此則燥字之義。乃作大涼解。而燥中全無熱氣矣。獨不思秋陽以暴之一語。朱子註中謂秋日燥烈。言暴之乾也。可見秋陽甚於夏日。燥非全主乎涼。乃篇中又申其說。以為天道春不分不溫。夏不至不熱。則秋不分不燥之意。隱然言下矣。信斯言也。則必秋分以後。方得謂之秋燥。是燥病亦只主得半季。而秋分以前之四十五日。全不關秋燥矣。由斯以推。

則冬。至。以。後。方。是。傷。寒。春。分。以。後。方。是。春。溫。夏。至。以。後。方。是。三。氣。而。於。冬。至。以。前。春。分。以。前。夏。至。以。前。秋。分。以。前。之。四。十。五。日。內。所。感。者。為。何。氣。所。得。者。謂。之。何。病。乎。愚。謂。燥。者。乾。也。對。濕。言。之。也。立。秋。以。後。濕。氣。去。而。燥。氣。來。初。秋。尚。熱。則。燥。而。熱。深。秋。既。涼。則。燥。而。涼。以。燥。為。全。體。而。以。熱。與。涼。為。之。用。兼。此。二。義。方。見。燥。字。圓。相。若。專。主。一。邊。遺。漏。一。邊。恐。非。確。論。竊。附。管。見。或。亦。愚。

醫醇臞義 卷二

二

者千慮之一云

肺燥

肺受燥熱發熱咳嗽甚則喘而失血清金保肺湯主之。

清金保肺湯 自製

- 天冬 一錢五分
- 麥冬 一錢五分
- 南沙參 三錢
- 北沙參 三錢
- 石斛 二錢
- 玉竹 三錢
- 貝母 二錢
- 茜根 二錢
- 杏仁 三錢

雙皮 三錢 茯苓 二錢 蛤粉 三錢

梨三片 藕五片

肺受燥涼咳而微喘氣鬱不下潤肺降氣湯主之。

潤肺降氣湯 自製

- 沙參 四錢
- 雙仁 四錢
- 桑皮 二錢
- 蘇子 二錢
- 杏仁 三錢
- 旋覆花 一錢
- 橘紅 一錢
- 鬱金 二錢
- 合歡花 二錢

醫醇臞義 卷二

三

鮮薑皮 五分

心燥

心受燥熱渴而煩寃養心潤燥湯主之。

養心潤燥湯 自製

- 松子仁 二錢
- 柏子仁 二錢
- 天冬 二錢
- 丹參 二錢
- 當歸 二錢
- 犀角 五分
- 生地 五錢
- 人參 一錢
- 茯神 二錢
- 甘草 四分

藕汁半杯冲服

心受燥涼。心煩而膈上喘滿。清燥解鬱湯主之。

清燥解鬱湯 自製

人參 一錢 丹參 三錢 茯神 二錢

半夏 一錢 柏仁 二錢 當歸 二錢

鬱金 二錢 廣皮 一錢

沉香四分 人乳磨冲

肝燥

醫醇臚義 卷二

四

肝受燥熱。則血分枯槁。筋縮爪乾。涵木養榮湯主之。

涵木養榮湯 自製

生地 三錢 熟地 三錢 當歸 二錢

白芍 一錢 棗仁 一錢五分 木瓜 一錢

秦艽 一錢 人參 一錢 麥冬 一錢五分

五味子 五分

紅棗十枚 桑枝一尺

肝受燥涼。血滯不行。筋短脇痛。當歸潤燥湯主之。

當歸潤燥湯 自製

歸身 二錢 白芍 一錢五分 紅花 五分

木瓜 一錢 秦艽 一錢 丹參 二錢

牛膝 二錢 川斷 二錢 獨活 一錢

楠餅四錢 紅棗十枚

脾燥

醫醇臚義 卷二

五

脾本喜燥。但燥熱太過。則為焦。上而生機。將息。令人體疲便懶。反不思食。此正如亢旱之時。赤地千里。禾稼不生也。澤下湯主之。

澤下湯 自製

人參 一錢 當歸 二錢 白芍 一錢

生地 六錢 白蘇子 三錢 大麻仁 三錢

石斛 三錢 山藥 三錢 料苳 三錢

紅棗十枚

腎燥

腎受燥熱。淋濁溺痛。腰脚無力。久為下消。女貞湯主之。

女貞湯 自製

- 女貞子 四錢
- 生地 六錢
- 龜版 六錢
- 當歸 二錢
- 茯苓 二錢
- 石斛 二錢
- 花粉 二錢
- 萆薢 二錢
- 牛膝 二錢
- 車前子 二錢

醫醇賡義 卷二

六

大淡菜三枚

腎受燥涼。腰痛足弱。洩便短瀝。菴蓉湯主之。

菴蓉湯 自製

- 肉菴蓉 三錢
- 漂淡枸杞 三錢
- 兔絲子 四錢
- 當歸 二錢
- 杜仲 三錢
- 料苳 三錢
- 茯苓 二錢
- 牛膝 二錢
- 甘草 四分
- 紅棗十枚
- 薑兩片

胃燥

胃受燥熱。津液乾枯。渴飲殺穀。玉石清胃湯主之。

玉石清胃湯 自製

- 玉竹 三錢
- 石膏 四錢
- 花粉 二錢
- 石斛 三錢
- 生地 五錢
- 人參 一錢
- 麥冬 二錢
- 蛤粉 四錢
- 山藥 三錢
- 茯苓 二錢

甘蔗汁半杯冲服

醫醇賡義 卷二

七

小腸燥

小腸受燥熱。水穀之精不能灌輸。洩溺澀痛。滋陰潤燥湯主之。

滋陰潤燥湯 自製

- 天冬 一錢五分
- 麥冬 一錢五分
- 琥珀 一錢
- 丹參 二錢
- 元參 一錢五分
- 生地 五錢
- 阿膠 一錢五分
- 蛤粉炒 丹皮 一錢五分
- 澤瀉 一錢五分
- 牛膝 一錢五分

燈心三尺

大腸燥

大腸受燥熱則臟陰枯槁腸胃不通大便秘結。

清燥潤腸湯主之。

清燥潤腸湯自製

生地 三錢

熟地 三錢

當歸 二錢

麻仁 三錢

芫仁 四錢

郁李仁 二錢

石斛 三錢

枳殼 一錢

青皮 一錢五分

醫醇賸義 卷二

八

金橘餅一枚

附秋燥門諸方

滋燥養榮湯

治皮膚皴揭筋燥爪乾

當歸 二錢

生地 一錢五分

熟地 一錢五分

白芍 一錢五分

秦艽 一錢五分

黃芩 一錢五分

防風 一錢

甘草 五分

水煎服

大補地黃丸

治精血枯涸燥熱

黃柏 四兩

熟地 四兩

當歸 三兩

山藥 三兩

知母 四兩

枸杞 三兩

莢肉 二兩

白芍 二兩

生地 二兩

肉苁蓉 一兩

元參 一兩

五錢

研細末蜜為丸如梧子大每服七八十九

潤腸丸 治脾胃中伏火大便秘澀或乾結不

通全不思食

麻仁 五錢

桃仁 五錢

羌活 五錢

醫醇賸義 卷二

九

歸尾 五錢

大黃 五錢

皂角仁 五錢

秦艽 五錢

研細末蜜為丸如梧子大每服三五十九

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門

不開噎塞不便燥秘氣不得下

當歸 一錢

升麻 一錢

桃仁 一錢

生地 五分

熟地 五分

紅花 三分

甘草 三分

水煎調橫榔末五分服

清涼飲子 治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩 二錢 黃連 五分 薄荷 一分

元參 一分 當歸 一分 白芍 一分

甘草 一錢

水煎服

元戎四物湯 治臟結秘澇者

當歸 熟地 川芎 白芍 大黃

醫醇賡義 卷二

桃仁 各等分

水煎服

大補丸 降陰火補腎水治陰虛燥熱

黃柏 四兩 知母 四兩 地黃 六兩

龜版 六兩

共研末加猪脊髓和煉蜜丸每服七十丸

清燥救肺湯 治諸氣贖鬱諸痿喘嘔

桑葉 二錢 石膏 二錢 甘草 一錢

人參 七分 麻仁 一錢 阿膠 八分

麥冬 二分 杏仁 七分 枇杷葉 一片

水煎服痰多加貝母瓜婁血枯加生地熟

甚加羚羊角

瓊玉膏 治肺燥咽乾而咳

地黃 四斤 茯苓 兩 人參 六兩

白蜜 二斤

先將地黃熬汁去渣入蜜煉稠再將參苓為

醫醇賡義 卷二

末和八磁罐隔湯煮一炷香白湯化服又方

加琥珀沉香各五錢

麥門冬湯 治火逆上氣咽喉不利

麥冬 七升 半夏 一升 人參 三兩

甘草 二兩 粳米 三合 大棗 十二枚

水煎米熟湯成溫服一升

活血潤燥生津湯 治內燥津液枯少

當歸 二錢 白芍 一錢 熟地 四錢

天冬 一錢五分 麥冬 一錢五分 括婁 三錢
桃仁 八分 紅花 五分

水煎服

黃芪湯 治心中煩 不生津液 不思飲食

黃芪 三兩 熟地 三兩 白芍 三兩

天冬 三兩 麥冬 三兩 茯苓 一兩

人參 三錢 五味子 三錢 甘草 三錢

共研末每服三錢加烏梅薑棗煎

醫醇臈義 卷二

三

火

外因之病風為最多內因之病火為最烈風者天之氣火者人之氣也火之為物本無形質不能孤立必與一物相為附麗而始得常存故方其靜也金中有火而金不銷也木中有火而木不焚也水中有火而水不沸也土中有火而土不焦也但見有金有木有土而不見火也五行各有其用五行惟火無體火之體即以金

木。水。土。之。體。為。之。體。也。及。其。發。而。莫。可。遏。也。銷。金。燠。石。焚。崗。燎。原。而。炎。威。乃。不。可。嚮。邇。矣。人。身。之。火。何。獨。不。然。方。其。靜。也。肺。氣。肅。而。大。腸。潤。金。不。銷。也。肝。氣。平。而。膽。氣。清。木。不。焚。也。腎。氣。充。而。膀。胱。通。水。不。沸。也。脾。氣。健。而。胃。氣。和。土。不。焦。也。一。經。激。發。則。金。銷。水。涸。木。燬。土。焦。而。百。病。叢。生。矣。其。因。於。風。者。為。風。火。因。於。濕。者。為。濕。火。因。於。痰。者。為。痰。火。陽。亢。者。為。實。火。勞。傷。者。為。虛。火。血

醫醇臈義 卷二

三

虛者為燥火。遏抑者為鬱火。酒色受傷者為邪火。瘡瘍蘊結者為毒火。又有一種無名之火。不歸經絡。不主病症。暴猝舉發。莫能自制。則氣血偏勝所致也。種種火症。或由本經自發。或由他經侵剋。或有數經合病。必察其所以致病之由。方能對病施治。業醫者尚慎旃哉。

肺火

肺火自本經而發者。緣燥氣相逼。清肅之令不

能下行故肺氣焦滿微喘而咳煩渴欲飲鼻端微紅肌膚作癢潤燥瀉肺湯主之

潤燥瀉肺湯 自製

玉竹 四錢 婁皮 三錢 桑皮 三錢

沙參 四錢 麥冬 二錢 黃芩 一錢

貝母 二錢 杏仁 三錢 苡仁 四錢

梨汁半杯冲服

心火

醫醇臈義 卷二

十四

心火熾盛五中煩躁面紅目赤口燥唇裂甚則衄血吐血加味瀉心湯主之

加味瀉心湯 自製

黃連 五分 犀角 五分 蒲黃 一錢

天冬 二錢 丹參 二錢 元參 一錢五分

連翹 二錢 茯苓 二錢 甘草 五分

淡竹葉二十張 燈心三尺

心血大虧心陽鼓動舌絳無津煩躁不寐加味

養心湯主之

加味養心湯 自製

天冬 五分 麥冬 一錢 生地 五錢

人參 一錢 丹參 二錢 龜版 五錢

當歸 五分 茯苓 二錢 柏仁 二錢

棗仁 一錢 遠志 五分 甘草 四分

淡竹葉二十張

肝膽火

醫醇臈義 卷二

十五

肝膽火盛脇痛耳聾口苦筋痿陰痛或淋濁溺血加味丹梔湯主之

加味丹梔湯 自製

丹皮 二錢 山梔 一錢 赤芍 一錢

龍膽草 一錢 夏枯草 一錢 當歸 一錢五分

生地 四錢 柴胡 一錢 木通 一錢

車前 二錢

燈心三尺

脾火

脾有伏火。口燥唇乾。煩渴易飢。熱在肌肉。加味瀉黃散主之。

加味瀉黃散 自製

防風 一錢 葛根 二錢 石膏 四錢

石斛 三錢 山梔 一錢五分 茯苓 三錢

甘草 四分

荷葉一角 粳米一撮 煎湯代水

醫醇賡義

卷二

六

腎火

腎火者。龍火也。龍不蟄藏。飛騰於上。口燥咽乾。面紅目赤。耳流膿血。不聞人聲。加味腎熱湯主之。

加味腎熱湯 自製

磁石 四錢 牡蠣 四錢 生地 四錢

白朮 一錢 白芍 一錢 人參 一錢

元參 二錢 甘草 五分

猪腎二枚煎湯代水

陽火可瀉。陰火不可瀉。况龍性難馴。逆而折之。反肆衝激。故丹溪滋腎丸。於滋陰藥中。加肉桂一味。導龍歸海。從治之法。最為精當。茲更推廣其意。製潛龍湯主之。

潛龍湯 自製

龍齒 二錢 龜版 八錢 生地 五錢

龍骨 二錢 知母 一錢 黃柏 一錢

醫醇賡義

卷二

七

人參 一錢 元參 二錢 蛤粉 四錢

肉桂 四分

鮑魚一兩 切片煎湯代水

胃火

胃火熾盛。煩渴引飲。牙齦腐爛。或牙宣出血。面赤發熱。玉液煎主之。

玉液煎 自製

石膏 五錢 生地 五錢 石斛 三錢

麥冬二錢 玉竹四錢 葛根二錢
桔梗一錢 薄荷一錢

白茅根八錢 甘蔗汁半杯 冲服

小腸火

心經之火移於小腸。遺溺淋濁。或澁或痛。琥珀導赤湯主之。

琥珀導赤湯 自製

琥珀一錢 天冬一錢五分 麥冬一錢五分

醫醇賸義 卷二 六

生地五錢 丹參二錢 丹皮二錢

赤芍一錢 木通一錢 甘草梢五分

淡竹葉十張 燈心三尺

大腸火

肺經之火移於大腸。大便鞭秘。或肛門腫痛。槐子湯主之。

槐子湯 自製

槐米三錢 婁仁三錢 枳殼一錢 蜜水炒

天冬一錢五分 麥冬一錢五分 玉竹三錢
麻仁三錢 蘇子三錢 杏仁三錢

甘草四分

金橘餅一枚 白芷蘇三錢

風火

風助火勢。其性上升。面紅目赤。口燥咽疼。法當清潤。上焦使陽邪不能侵犯。兼用輕揚解散之品。俾上升者一舉而熄。消風散火湯主之。

醫醇賸義 卷二 九

消風散火湯 自製

天冬一錢五分 麥冬一錢五分 元參二錢

茯苓二錢 桔梗一錢 柴胡一錢

薄荷一錢 蠅衣一錢 桑葉一錢

連翹一錢 牛蒡子三錢 婁皮二錢

竹葉十張 黑芝蘇三錢

濕火

重陰生陽。積濕化熱。濕火相乘。渴飲舌白。勝濕

清火湯主之

勝濕清火湯 自製

茅木 一錢五分

白朮 一錢五分

茯苓 二錢

苡仁 八錢

石斛 三錢

石膏 五錢

知母 一錢

猪苓 一錢

澤瀉 一錢五分

荷葉一角

痰火

痰為頑濁之物。一得火勢其性愈劣甚則陽狂

醫醇臚義 卷二

三

煩躁。語言錯亂。清火滌痰湯主之。

清火滌痰湯 自製

丹參 二錢

麥冬 二錢

茯神 二錢

柏仁 二錢

貝母 二錢

化紅 一錢

膽星 五分

僵蠶 一錢五分

菊花 二錢

杏仁 三錢

淡竹瀝半杯 薑汁一滴 沖服

實火

氣分偏勝。壯火升騰。發熱錯語。口燥咽乾。陽狂

煩躁。加味三黃湯主之。

加味三黃湯 自製

黃連 五分

黃芩 一錢

黃柏 一錢

連翹 五分

丹皮 二錢

山梔 一錢五分

赤芍 一錢

薄荷 一錢

水三鍾煎一鍾熱服

虛火

醫醇臚義 卷二

三

虛火者。飢飽勞役。正氣受傷。陽陷入陰。發熱神疲。飲食減少。東垣於此等症。用補中益氣湯。以升柴。升舉陽氣。又為之補脾和胃。此正有得於內經。虛者溫其氣之旨。故甘溫能除大熱。開治陽虛。一大法門。無如世之學東垣者。不辨陰陽虛實。雖陰虛發熱。及上實下虛者。動輒升柴。禍不旋踵矣。因自製和中養胃湯。以明宗東垣者。當師其意云。

和中養胃湯 自製

黃芪 二錢

人參 一錢

茯苓 二錢

白朮 一錢

甘草 四分

當歸 二錢

料豆 四錢

柴胡 一錢

薄荷 一錢

廣皮 一錢

砂仁 一錢

苡仁 四錢

棗二枚

薑三片

燥火

燥火者血虛之所致也。血能養氣則氣不妄動。

醫醇賸義 卷二

三

而陰陽得其平。營血一虧。則內失所養。而臟府皆燥。火亦隨生。令人毛髮衰脫。肌膚枯槁。身熱咽乾。雪乳湯主之。

生地 三錢

熟地 三錢

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

玉竹 四錢

五味子 五分

當歸 一錢五分

白芍 一錢

山藥 三錢

人乳一大杯 藕汁一大杯 水二鍾煎服

鬱火

所欲不遂鬱極火生。心煩慮亂身熱而躁。解鬱合歡湯主之。

解鬱合歡湯 自製

合歡花 二錢

鬱金 二錢

沉香 五分

當歸 二錢

白芍 一錢

丹參 二錢

柏仁 二錢

山梔 一錢五分

柴胡 一錢

薄荷 一錢

茯神 二錢

紅棗 五枚

橘餅 四錢

醫醇賸義 卷二

三

邪火

酒色太過。下元傷損。腰膝無力。身熱心煩。甚則強陽不痿。加味三才湯主之。

加味三才湯 自製

天冬 二錢

生地 五錢

人參 二錢

龜版 八錢

女貞子 二錢

旱蓮 一錢

茯苓 二錢

丹皮 二錢

澤瀉 一錢五分

黃柏一錢 杜仲二錢 牛膝一錢五分

紅棗五枚

毒火

癰瘍初起腫痛大熱煩渴引飲黃金化毒湯主之

黃金化毒湯 自製

黃連五分 金銀花二錢 赤芍一錢

丹皮二錢 連翹一錢五分 大貝二錢

醫醇賡義 卷十一 毒

花粉二錢 菊花二錢 薄荷一錢

甘草五分

淡竹葉二十張

附火症門諸方

黃連解毒湯 治一切火熱表裏俱盛狂躁煩

心口燥咽乾錯語不眠吐血衄血熱甚發斑

黃連 黃芩 黃柏 梔子 各等分

水煎服

升陽散火湯 治表裏俱熱捫之烙手及胃虛

過食冷物抑遏陽氣於脾土並宜服此

柴胡八錢 防風二錢五分 葛根五錢

升麻五錢 羌活五錢 獨活五錢

人參五錢 白芍五錢 炙甘草三錢

生甘草三錢

每用五錢薑棗煎湯服

涼膈散 治心火上盛中焦燥實煩躁口渴目

醫醇賡義 卷十一 毒

赤頭眩口唇唇裂吐血衄血大小便秘

連翹四兩 大黃二兩 芒硝二兩

甘草二兩 梔子一兩 黃芩一兩

薄荷一兩

共為末每服三錢加竹葉生蜜煎

當歸龍薈丸 治一切肝膽之火神志不寧躁

擾狂越頭運目眩耳鳴耳聾胸膈痞塞咽噎

不利

當歸 一兩 龍膽草 一兩 梔子 一兩

黃連 一兩 黃柏 一兩 黃芩 一兩

大黃 五錢 青黛 五錢 蘆薈 五錢

木香 二錢 麝香 五分

蜜為丸薑湯下

龍膽瀉肝湯 治肝膽經實火脇痛耳聾膽溢

口苦陰腫陰痛白濁洩血

龍膽草 一錢 黃芩 一錢 梔子 五分

醫醇賡義 卷二 美

澤瀉 一錢 木通 一錢 車前 二錢

當歸 二錢 生地 三錢 柴胡 一錢

甘草 五分

水煎服

瀉青丸 治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒筋

痿不起目赤腫痛

龍膽草 山梔 大黃 川芎

當歸 羌活 防風 各等分

蜜為丸竹葉湯下

瀉黃散 治脾胃伏火口燥唇乾口瘡煩渴易

飢熱在肌肉

防風 四兩 藿香 七錢 山梔 一兩

石膏 五兩 甘草 二錢

共研末每用三錢蜜酒調服

清胃散 治胃有積熱上下牙痛牽引頭腦滿

面發熱或牙室出血唇口腫痛

醫醇賡義 卷二 毛

生地 四錢 丹皮 二錢 黃連 五分

當歸 一錢 升麻 五分 石膏 四錢

水煎服

甘露飲 治胃中濕熱口舌生瘡吐衄齒血

生地 熟地 天冬 麥冬 石斛

茵陳 黃芩 枳殼 甘草 枇杷葉 等分

每服五錢一方加桂苓名桂苓甘露飲又

本事方加犀角

瀉白散 治肺火皮膚蒸熱瀝浙寒熱喘咳氣

急

桑白皮 二錢 地骨皮 二錢 甘草 五分

粳米 一撮

水煎服易老加黃連

導赤散 治小腸有火便赤淋痛面赤狂躁口

糜舌瘡作渴

生地 木通 甘草梢 淡竹葉 等分煎

醫醇賸義 卷十一 五

蓮子清心飲 治憂思抑鬱發熱煩躁火盛尅

金口苦咽乾漸成消渴遺精淋濁五心煩熱

石蓮肉 人參 黃芪 茯苓 柴胡

黃芩 地骨皮 麥冬 車前

甘草

水煎服

導赤各半湯 治傷寒後心下不硬腹中不滿

二便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中

獨語目赤口乾不飲水與粥則咽不與勿思

形如醉人

黃連 五分 黃芩 一錢 犀角 五分

知母 一錢 山梔 五分 滑石 三錢

麥冬 一錢 人參 一錢 甘草 五分

茯神 二錢

加燈心薑棗煎

普濟消毒飲 治大頭時瘟頭面腫盛目不能

醫醇賸義 卷十一 五

開咽喉不利口渴舌燥

黃芩 一錢 黃連 五分 廣皮 一錢

甘草 五分 元參 一錢 連翹 五分

馬勃 五分 薄荷 一錢 板藍根 三錢

牛旁子 二錢 殭蠶 五分 升麻 五分

柴胡 一錢 桔梗 一錢

水煎服便秘加大黃

紫雪 治內外煩熱狂易叫走發斑發黃口瘡

脚氣熱毒菌毒

寒水石 八兩 石膏 八兩 滑石 八兩
磁石 八兩 升麻 四兩 元參 四兩
甘草 四兩 犀角 二兩 金箔 一兩
羚羊角 三兩 沉香 二兩 木香 二兩
丁香 二兩 朴硝 一斤 硝石 一斤
辰砂 三兩 麝香 二錢
前藥共研細末先將朴硝二石兩味熬化再

醫醇賡義卷二

三

入前藥微火煎將柳木棍攪透候汁將凝加入辰砂麝香

人參清肌散 治午前發熱氣虛無汗

人參 一錢 茯苓 二錢 白朮 一錢

炙草 四分 半夏 二錢 當歸 一錢

赤芍 一錢 柴胡 一錢 葛根 二錢

加葛棗煎

白朮除濕湯 治午後發熱背惡風四肢沉困

小便色黃又治汗後發熱

人參 五錢 赤苓 五錢 炙草 五錢

柴胡 五錢 白朮 一兩 生地 七錢

地骨皮 七錢 知母 七錢 澤瀉 七錢

每服五錢如有刺痛加當歸七錢

清骨散 治骨蒸勞熱

銀柴胡 一錢 胡黃連 一錢 秦艽 一錢

鱉甲 二錢 地骨皮 二錢 青蒿 二錢

醫醇賡義卷二

三

知母 二錢 炙草 五分

水煎服

二母散 治肺勞有熱不能服補氣之劑者

知母 貝母 等分

研末湯服三錢

元參升麻湯 治發斑咽痛

元參 升麻 甘草 等分

水煎服

消斑青黛飲 治熱邪傳裏裏實表虛陽毒發

斑

青黛 五分 黃連 五分 犀角 五分

石膏 四錢 知母 一錢 元參 一錢

梔子 五分 生地 四錢 柴胡 一錢

人參 一錢 甘草 五分

薑棗煎加醋一匙和服大便實者去人參

加大黃

醫醇賡義 卷十一 辛

玉屑無憂散 治喉風喉痺咽物有礙或風痰

壅塞口舌生瘡

元參 五錢 黃連 五錢 荊芥 五錢

貫衆 五錢 山豆根 五錢 茯苓 五錢

甘草 五錢 砂仁 五錢 滑石 五錢

硼砂 三錢 寒水石 三錢

共研末每用二錢清水化服能除三尸去八

邪辟瘟療渴

勞傷

勞者五臟積勞也。傷者七情受傷也。百憂感其心。萬事勞其形。有限之氣血。消磨殆盡矣。思慮太過則心勞。言語太多則肺勞。怒鬱日久則肝勞。飢飽行役則痺勞。酒色無度則腎勞。方其初起。氣血尚盛。雖日日勞之。而殊不自知。迨至愈勞。愈虛。胃中水穀之氣。一日所生之精血。不足以供一日之用。於是榮血漸耗。真氣日虧。頭眩

醫醇賡義 卷十一 辛

耳鳴。心煩神倦。口燥咽乾。食少氣短。腰脚作痛。種種俱見。甚者咳嗽咽疼。吐血衄血。而疾不可為矣。秦越人謂虛勞則必有所損。精確不磨。其曰虛而感寒。則損其陽。陽虛則陰盛。損則自上而下一損。損於肺皮聚而毛落。二損損於心血。脈不能榮養臟腑。三損損於胃。飲食不為肌肉。虛而感熱。則損其陰。陰虛則陽盛。損則自下而上。一損損於腎骨。痿不起於牀。二損損於肝筋。

緩不能自收持。三損損於脾。飲食不能消化。自上而下者。過於胃則不可治。自下而上者。過於脾則不可治。蓋深知人身之氣血。全賴水穀之氣以生之。其急急於脾胃之旨。可見。即因勞致虛。因虛致損之故。亦昭然若發蒙矣。至其論治法。謂損其肺者。益其氣。損其心者。調其榮衛。損其脾者。調其飲食。適其寒溫。損其肝者。緩其中。損其腎者。益其精。語語精當。度盡金針。後人格

醫醇臚義 卷二

書

遵成法。可以不惑於歧途矣。七傷者。金匱謂食傷。憂傷。飲食傷。房室傷。飢傷。勞傷。經絡榮衛氣傷。是言此七者。皆是內傷。所以成虛勞之故。後人妄謂陰寒。陰痿。裏急。精少。等為七傷。則專主腎臟而言。豈有五臟之勞。專歸一臟之理。蓋七傷者。七情偏勝之傷也。夫喜怒哀思悲恐驚。人人共有之境。若當喜而喜。當怒而怒。當憂而憂。是即喜怒哀樂發而皆中節也。此天下之

至和。尚何傷之與。有惟未事而先意。將迎既去而尚多留戀。則無時不在喜怒憂思之境中。而心無復有坦蕩之日。雖欲不傷。庸可得乎。然七情之傷。雖分五臟。而必歸本於心。喜則傷心。此為本臟之病。過喜則陽氣太浮。而百脈開解。故心臟受傷也。至於怒傷肝。肝初不知怒也。心知其當怒。而怒之太過。肝傷則心亦傷也。憂傷肺。肺初不知憂也。心知其可憂。而憂之太過。肺

醫醇臚義 卷二

書

傷。則心亦傷也。思傷脾。脾初不知思也。心與為思維。而思之太過。脾傷則心亦傷也。推之悲也。恐也。驚也。統之於心。何獨不然。故治七傷者。雖為肝脾肺腎之病。必兼心臟施治。始為得之。

心勞

心勞者。營血日虧。心煩神倦。口燥咽乾。宜調補營衛。安養心神。宅中湯主之。
宅中湯 自製

天冬 二錢 紫河車 二錢 人參 二錢
 茯神 二錢 黃芪 二錢 當歸 二錢
 白芍 一錢 丹參 二錢 柏仁 二錢
 遠志 五分 甘草 水炒
 蓮子 二十粒 去心

肺勞 肺勞者。肺氣大虛。身熱氣短。口燥咽乾。甚則咳嗽吐血。益氣補肺湯主之。

醫醇賡義 卷二十一 五

益氣補肺湯 自製

阿膠 二錢 蛤粉炒 五味子 五分 地骨皮 二錢
 天冬 二錢 麥冬 二錢 人參 二錢
 百合 三錢 貝母 二錢 茯苓 二錢
 苡仁 四錢

糯米一撮煎湯代水

肝勞

肝勞者。陽氣拂逆。陰氣虧損。身熱脇痛。頭眩耳

鳴。筋節弛縱。加味扶桑飲主之。

加味扶桑飲 自製
 熟地 五錢 當歸 二錢 白芍 一錢
 川芎 八分 木瓜 一錢 棗仁 二錢
 牡蠣 四錢 茯苓 二錢 廣皮 一錢
 甘草 五分 金毛脊 二錢 續斷 二錢
 嫩桑枝 二兩煎湯代水

脾勞

醫醇賡義 卷二十一 五

脾勞者。或飲食不調。或行役勞倦。積久脾敗。四肢倦怠。食少身熱。行健湯主之。

行健湯 自製

黃芪 二錢 人參 二錢 茯苓 二錢
 白朮 一錢 甘草 五分 當歸 二錢
 白芍 一錢 青蒿梗 一錢 廣皮 一錢
 砂仁 一錢 料豆 三錢 木香 五分
 大棗 二枚 薑 三片

腎勞

腎勞者真陰久虧。或房室太過。水竭於下。火炎於上。身熱腰疼。咽乾口燥。甚則咳嗽吐血。來蘇湯主之。

來蘇湯 自製

天冬 二錢 麥冬 二錢 生地 三錢

熟地 三錢 南沙參 三錢 北沙參 三錢

白芍 一錢 赤芍 一錢 沙苑 三錢

醫醇賡義 卷十一 素

貝母 二錢 磁石 四錢 杜仲 三錢

茜草根 二錢 牛膝 二錢 杏仁 三錢

蓮子十粒 去心

喜傷

過喜則心氣大開。陽浮於外。經脈弛縱。建極湯主之。

建極湯 自製

天冬 二錢 琥珀 一錢 辰砂 五分

五味 五分 棗仁 二錢 黃芪 二錢

人參 二錢 當歸 二錢 白芍 一錢五分

丹參 二錢 柏仁 二錢

紅棗十枚 薑三片

怒傷

怒甚則脇痛鬱極則火生。心煩意躁。筋節不利。入夜不寐。冲和湯主之。

冲和湯 自製

醫醇賡義 卷十一 素

山萸肉 二錢 棗仁 二錢 當歸 二錢

白芍 一錢五分 人參 二錢 茯神 二錢

甘草 五分 沙苑 三錢 蒺藜 三錢

紅棗五枚 橘餅四錢

憂傷

憂愁太過。忽忽不樂。灑淅寒熱。痰氣不清。萱草忘憂湯主之。

萱草忘憂湯 自製

桂枝 五分 白芍 一錢五分 甘草 五分
 鬱金 二錢 合歡花 二錢 廣石
 半夏 一錢 貝母 二錢 茯神
 柏仁 二錢
 金針菜 一兩煎湯代水
 思傷
 思慮太過。心煩意亂。食少神疲。四肢倦怠。一志
 湯主之。

醫醇賡義 卷二

聖

一志湯 自製

人參 二錢 茯神 二錢 白朮 一錢五分
 甘草 五分 黃芪 二錢 益智 一錢五分
 遠志 五分 柏仁 二錢 廣皮 一錢
 木香 五分
 大棗 二枚 薑 三片
 悲傷

悲則氣逆。膈鬱不舒。積久傷肺。清肅之令不能

下行。加味參蘇飲主之。

加味參蘇飲 自製

人參 二錢 蘇子 二錢 沉香 五分
 桑皮 三錢 婁皮 三錢 橘紅 一錢
 半夏 一錢 丹參 二錢 柏仁 二錢
 苡仁 五錢
 薑 兩片
 恐傷

醫醇賡義 卷二

聖

恐則氣餒。骨節無力。神情不安。補骨脂湯主之。

補骨脂湯 自製

補骨脂 二錢 益智 一錢 菴蓉 四錢
 熟地 五錢 當歸 二錢 人參 二錢
 茯苓 二錢 遠志 五分 白芍 一錢
 丹參 二錢 牛膝 二錢
 大棗 二枚 薑 三片
 驚傷

驚則氣浮。真陽外越。真陰不守。心悸筋惕。大安湯主之。

大安湯 自製

白芍 一錢五分 酒炒 五味子 五分 牡蠣 四錢 煨研
龍齒 二錢 木瓜 一錢 酒炒 棗仁 二錢 炒研
地黃 五錢 人參 二錢 茯苓 二錢
柏仁 二錢

金器一具同煎

醫醇臚義 卷二

聖

附虛勞門諸方

桂枝龍骨牡蠣湯 治失精亡血目眩髮落女

子夢交

桂枝 五分 白芍 一錢 五分 甘草 五分
龍骨 二錢 牡蠣 四錢

棗二枚 薑三片

天雄散 治陽虛亡血失精

天雄 三兩 白朮 八兩 桂枝 六兩

龍骨 四兩

共為末每服五分日三服

黃芪建中湯 治氣血虛弱四肢倦怠氣短懶

言

黃芪 二兩 白芍 六兩 桂枝 三兩
甘草 三兩

薑二兩大棗十二枚飴糖一升水七升煮

三升分服

醫醇臚義 卷二

聖

樂令建中湯 治臟府虛損身體消瘦潮熱自

汗將成癆瘵

前胡 一兩 細辛 五錢 黃芪 一兩
人參 一兩 桂心 五錢 橘皮 一兩
當歸 一兩 白芍 一兩 茯苓 一兩
麥冬 一兩 甘草 一兩 半夏 七錢 五分

共研末每服二錢

十四味建中湯 治營不調積勞虛損形體瘦

弱短氣嗜卧

當歸 白芍 白朮 麥冬 甘草

茯苓 人參 川芎 肉桂 附子

黃芪 半夏 熟地 茯苓 各等分

每用三錢棗二枚薑三片水煎服

薯蕷丸 治虛勞不足風氣百病

薯蕷 卅分 當歸 十分 桂枝 十分 地黃 十分

神麩 十分 豆卷 十分 甘草 廿八分 川芎 六分

醫醇賸義 卷二 胃

麥冬 六分 白芍 六分 白朮 六分 杏仁 六分

人參 七分 柴胡 五分 桔梗 五分 茯苓 五分

阿膠 七分 乾薑 二分 白蘘 二分 防風 六分

大棗百枚

共研末蜜為丸如彈子大空心酒服一九

酸棗仁湯 治虛勞虛煩夜不得眠

棗仁 二升 甘草 一兩 知母 二兩

茯苓 二兩 川芎 二兩

水六升煮三升分溫服

炙甘草湯 治諸虛勞不足汗出而悶

甘草 四兩 桂枝 三兩 生薑 三兩

麥冬 半升 麻仁 半升 人參 二兩

阿膠 三兩 大棗 三十枚 生地 一斤

酒七升水八升煮取三升分溫服

十全大補湯 治男子婦人諸虛不足五勞七

傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊

醫醇賸義 卷二 胃

拘急疼痛夜夢遺精面色痿脚膝無力

人參 茯苓 白朮 甘草 生地

當歸 白芍 川芎 黃芪 肉桂 各等分

共為末每服五六錢薑棗煎服

聖愈湯 治一切失血或血虛煩熱躁渴睡卧

不安或瘡瘍膿血出多五心煩熱

熟地 三錢 生地 三錢 當歸 二錢

人參 二錢 黃芪 二錢 川芎 一錢

水煎服

還少丹 大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗

筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠小便渾濁

山萸肉 一兩 山藥 一兩 遠志 一兩

牛膝 一兩 五味子 一兩 茯苓 一兩

巴戟 一兩 肉蓯蓉 一兩 熟地 二兩

菖蒲 一兩 茴香 一兩 杜仲 一兩

楮實子 一兩 枸杞子 二兩

醫醇臚義

卷二

聖

共研細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十九
人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體疲

倦食少作瀉

白芍 一錢五分 人參 一錢 陳皮 一錢

黃芪 二錢 桂心 四分 當歸 二錢

白朮 一錢 甘草 四分 熟地 三錢

五味 五分 茯苓 二錢 遠志 五分

大棗 二枚 薑 三片

參朮膏 治虛弱受風諸藥不應元氣日傷虛

症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

人參 白朮 等分

水煎稠湯化服之

人參散 治邪熱客經絡痰嗽煩熱頭目昏痛

盜汗倦怠一切血熱虛勞

黃芩 五錢 人參 一兩 白朮 一兩

茯苓 一兩 赤芍 一兩 半夏 一兩

醫醇臚義

卷二

聖

柴胡 一兩 甘草 一兩 當歸 一兩
葛根 一兩

每服三錢大棗二枚薑三片同煎

保真湯 治虛勞骨蒸

當歸 五分 生地 五分 熟地 五分

黃芪 五分 人參 五分 白朮 五分

茯苓 五分 甘草 五分 天冬 一錢

麥冬 一錢 白芍 一錢 黃柏 一錢

知母一錢 五味一錢 柴胡一錢

地骨皮一錢 陳皮一錢 蓮子一錢

棗二枚 薑三片 水煎服

三才封髓丹 治諸虛發熱心腎不交遺精夢泄

天冬一兩 熟地一兩 人參一兩

黃柏三兩 砂仁一兩 甘草七錢

研末麵糊丸如桐子大每服五十九

醫醇賡義 卷二

果

天真丸 治一切亡血過多形體消瘦飲食不

進腸胃滑泄津液枯竭

精羊肉七斤去筋膜脂皮 肉苁蓉十兩

當歸十二兩 山藥十兩 天冬一斤

右四味為末安羊肉內用陳酒四瓶煨令酒盡加水二升煨候肉糜爛再入黃芪末五兩人參末二兩白朮末二兩糯米飯為丸如梧子大每早晚各服一百丸

補陰丸 治陰發熱脚膝無力

黃柏八兩 知母三兩 熟地三兩

龜版四兩 當歸一兩 白芍二兩

牛膝二兩 陳皮二兩 瑣陽一兩

虎骨一兩 酥炙

共研末酒煮羊肉丸如桐子大每服五六十丸

大造丸 治虛損勞傷咳嗽潮熱

醫醇賡義 卷二

果

紫河車一具 龜版二兩 黃柏一兩

杜仲五錢 牛膝一兩 天冬一兩

麥冬一兩 地黃二兩 茯苓砂仁六錢 同煮去之

人參一兩

研末酒米糊丸每服四錢鹽湯下婦人去龜版加當歸

人參固本丸 治肺腎勞熱

人參一兩 天冬四兩 麥冬四兩

生地 四兩 熟地 四兩

蜜丸如桐子大每服七十九

天王補心丹 治心血不足形體虛弱怔忡健

忘心口多汗口舌生瘡

生地 四兩 人參 一兩 元參 一兩

丹參 一兩 茯苓 一兩 桔梗 一兩

遠志 五錢 棗仁 一兩 柏仁 一兩

天冬 一兩 麥冬 一兩 當歸 一兩

醫醇賸義 卷二 辛

五味 五錢

蜜丸如彈子大硃砂為衣燈心湯下一丸

龜鹿二仙膠 治虛弱少氣夢遺泄精目視不

明

鹿角 十斤 龜版 五斤 人參 一斤

枸杞 二斤

桑柴火熬膏每用三錢溫酒服

六味地黃丸 治五勞七傷精血枯竭自汗盜

汗頭暈目眩遺精失血消渴淋濁舌燥咽疼

地黃 八兩 黃肉 四兩 山藥 四兩

丹皮 三兩 茯苓 三兩 澤瀉 三兩

蜜丸鹽湯下四五錢

歸脾湯 治思慮太過勞傷心脾怔忡健忘驚

悸盜汗發熱體倦食少不眠

人參 一錢 茯苓 一錢 白朮 一錢

黃芪 一錢 棗仁 一錢 當歸 一錢

醫醇賸義 卷二 辛

遠志 五分 木香 五分 甘草 五分

龍眼肉十枚大棗二枚薑三片

當歸補血湯 治傷於勞役肌熱面赤煩渴引

飲脈大而虛

黃芪 一兩 當歸 二錢

水煎服

腦漏

腦漏者鼻如淵泉涓涓流涕致病有三曰風也

火也寒也鼻為肺竅司呼吸以通陽賊風侵入隨吸入之氣上徹於腦以致鼻竅不通時流清涕此風傷之腦漏也陽邪外鑠肝火內燔鼻竅半通時流黃水此火傷之腦漏也冬月祁寒感冒重陰寒氣侵腦鼻竅不通時流濁涕此寒傷之腦漏也致病不同施治各異宜隨症辨之風傷腦桑菊愈風湯主之

醫醇臈義 卷二

至

桑葉 三錢 杭菊 三錢

當歸 一錢五分 桔梗 一錢

川貝 二錢 杏仁 三錢

黑芝蔴 一撮

火傷腦清肝透頂湯主之

清肝透頂湯 自製

羚羊角 一錢五分 夏枯草 二錢

丹皮 一錢五分 元參 一錢

石決 八錢

桔梗 一錢

蔓荆子 一錢五分

枳殼 一錢

川芎 八分

蟬衣 一錢五分

陳橄欖 二枚

桑葉 二錢

薄荷 一錢

寒傷腦通陽聖化湯主之

通陽聖化湯 自製

當歸 二錢

白朮 一錢五分

辛夷 一錢

川芎 一錢

羌活 一錢

天麻 六分

香附 二錢

白芷 五分

紅棗 五枚 薑 三片

醫醇臈義 卷二

至

鼻衄

鼻衄一症與吐血不同吐血者陰分久虧龍雷之火犯肺日受薰灼金氣大傷其來也出漸其病也最深故血從口出而不從鼻出鼻衄之症其平日肺氣未傷祇因一時肝火蘊結驟犯肺穴火性炎上逼血上行故血從鼻出而不從口出每見近來醫家因方書犀角地黃湯條下有統治吐血衄血之語一遇鼻衄卽以犀角地黃

湯治之。究竟百無一效。此其弊在拘執古方。不明經絡。蓋犀角地黃多心腎之藥。用以治肝肺。宜其格不相入矣。予自製參龍湯一方。專治鼻衄。無不應手而效。此實數十年歷歷有驗者。可知醫道當自出手眼。辨症察經。不可徒執古方。物而不化也。

參龍湯 自製

羚羊角 一錢 牡蠣 四錢 石斛 三錢

醫醇臆義 卷二

書

南沙參 四錢 麥冬 一錢五分 川貝 二錢 去心研

夏枯草 一錢 丹皮 一錢 黑荆芥 一錢

薄荷炭 一錢 茜草根 二錢 牛膝 二錢

茅根五錢 藕五大片

齒牙出血

經日中焦受氣。取汁變化成赤。謂之血。此知血生於中焦。而主於心。故五臟各有守經之血。而六腑則無之。其散於脈內者。隨衝任督三經。遍

行經絡。其散在脈外者。周流於肌腠皮毛之間。凡吐血衄血。牙齦齒縫出血。皆散在經絡之血。湧而上決者也。近人謂巨口吐紅。及牙齦齒縫出血者。謂之胃血。此說大謬。蓋胃為外腑。職司出納。為水穀蓄洩之要區。其中並無一絲一點之血。即牙宣出血一症。不過胃火熾盛。肉不附骨。故血熱而上湧。其牙不宣而出血者。乃陰虛陽亢。龍雷之火。衝激胃經所致。湖州錢左患齒

醫醇臆義 卷二

書

縫出血。牙並不宣。多則血流盈盞。晝夜十餘次。面紅目赤。煩擾不安。為製蒼玉潛龍湯。連服十餘劑而愈。

蒼玉潛龍湯 自製

生地 四錢 龜版 六錢 石膏 三錢

龍齒 二錢 石斛 三錢 花粉 二錢

丹皮 一錢 羚羊角 一錢 沙參 四錢

白芍 一錢 五分

藕三兩茅根五錢同煎湯代水

關格

關格一症所係最大靈素諸書及秦越人張長沙俱皆論列而未有成方後起諸賢又絕無論及此症者迨雲岐子謂陰陽易位病名關格所傳九方動輒腦腐硝黃皂角非開透即劫奪奄奄將斃之人其能堪此乎是有方不如無方醫學中反添一重魔劫矣素問謂人迎一盛病在

醫醇廣義

卷二

五

少陽二盛在太陽三盛在陽明四盛以上為格陽寸口一盛病在厥陰二盛在少陰三盛在太陰四盛以上為關陰經絡分明言言典要而惜乎治法不傳也秦越人發為陰乘陽乘之論乃合寸尺之脈並言之寸上過位入魚際為溢尺下過位入尺澤為覆此陰陽之偏各造其極最為精當而惜乎治法不傳也張長沙謂寸口脈浮而大浮為虛大為實在尺為關在寸為格又

醫醇廣義

卷二

五

曰心脈洪大而長則關格不通又謂跌陽脈伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入名曰關格凡三言之其曰在寸為格在尺為關者乃言陰陽不相榮也其曰心脈洪大而長則關格不通者言五志不安營衛虧損孤陽獨發故上下不通也曰跌陽脈伏而濇者乃胃氣敗壞之明徵也察脈論症更為詳盡而惜乎治法不傳也至西江喻氏力講調和營衛不偏陰不偏陽聽胃氣之自為敷布不問其關於何而開格於何而通一惟求之於中握樞而運以漸透於上下榮氣通則加意於榮衛氣通則加意於衛因立進退黃連湯一方又立資液救焚湯一方以為標準此與雲岐子之九方霄壤懸殊矣而愚則以為所重者尤在於上苟在上之格者能通則在下之關者亦無不通嘗見患此症者多起於憂愁怒鬱即富貴之家亦多有隱痛難言之

處。可。見。病。實。由。於。中。上。焦。而。非。起。於。下。焦。也。始。則。氣。機。不。利。喉。下。作。梗。繼。則。胃。氣。反。逆。食。入。作。吐。後。乃。食。少。吐。多。痰。涎。上。湧。日。漸。便。溺。艱。難。此。緣。心。肝。兩。經。之。火。煎。熬。太。過。榮。血。銷。耗。鬱。蒸。為。痰。飲。食。入。胃。以。類。相。從。穀。海。變。為。痰。藪。而。又。孤。陽。獨。發。氣。火。升。痰。宜。其。格。而。不。入。也。格。與。關。皆。為。逆。象。惟。治。之。以。至。和。導。之。以。大。順。使。在。上。者。能。順。流。而。下。則。在。下。者。亦。迎。及。而。解。矣。故。於。調。

醫醇廣義 卷二

美

養。榮。衛。之。中。平。肝。理。氣。此。一。法。也。於。調。養。榮。衛。之。中。和。胃。化。痰。亦。一。法。也。於。調。養。榮。衛。之。中。兼。清。君。相。之。火。又。一。法。也。關。格。既。成。本。難。施。治。但。仁。人。孝。子。必。不。忍。坐。視。危。亡。欲。於。死。中。求。活。非。精。心。研。究。不。可。續。製。四。方。以。備。參。酌。肝。氣。犯。胃。食。入。作。吐。宜。解。鬱。和。中。歸。桂。化。逆。湯。主。之。

歸桂化逆湯 自製

當歸 二錢 白芍 一錢二分 肉桂 五分
 青皮 一錢 茯苓 二錢 蒺藜 四錢
 鬱金 二錢 合歡花 二錢 木香 五分
 牛膝 二錢 玫瑰花 五分
 紅棗 五枚 降香 五分
 痰氣上逆。食入嘔吐。人參半夏湯主之。

人參 二錢 半夏 三錢 廣 三錢

醫醇廣義 卷二

美

扶苓 二錢 當歸 二錢 沉香 五分
 鬱金 二錢 砂仁 一錢 佩蘭 一錢
 苡仁 四錢 牛膝 二錢
 佛手 五分 白檀香 五分
 孤陽獨發。阻格飲食。甚則作呃。和中大順湯主之。

和中大順湯 自製

人參 二錢 麥冬 二錢 丹參 三錢

柏仁二錢 丹皮二錢 生地四錢
赤芍各一錢 潼白蒺藜各三錢 赭石三錢
合歡花二錢 赭石服研

竹瀝兩大匙 薑汁兩滴 同沖服

二氣雙調飲 通治關格

二氣雙調飲 自製

人參二錢 茯苓二錢 山藥三錢
歸身二錢 枸杞三錢 乾菝蓉三錢

醫醇賡義 卷二

本

牛膝二錢 廣皮一錢 半夏一錢五分
砂仁一錢 青皮一錢五分 蜜水炒

沉香五分 人乳磨沖

附關格門諸方

喻氏進退黃連湯 平調榮衛不偏陰不偏陽

所謂運中樞以聽其進退也

黃連八分 炮薑八分 人參一錢五分
薑汁炒 半夏一錢五分 大棗二枚
桂枝一錢 薑製

進法本方諸藥俱不製水三鍾煎一半溫服
退法不用桂枝黃連減半或加肉桂五分如
上逐味製熟煎服法同每早加服附桂八味
丸三錢

資液救焚湯 治五志厥陽之火

生地二錢 麥冬二錢 人參一錢五分
炙甘草一錢 阿膠一錢 胡麻仁一錢
柏子仁七分 五味子四分 紫石英一錢

醫醇賡義 卷二

李

寒水石一錢 生犀汁磨二分 滑石一錢二分
生薑汁二茶匙 敲碎不為末

除四汁及阿膠共八味用名山泉水四鍾緩
火煎至一杯半去渣八四汁及阿膠再緩火
畧煎至膠烊化斟出調牛黃末五釐日中分
二三次熱服空朝先服附桂八味丸三錢
附雲岐子九方 此等方法斷不可
用錄之以為鑒戒
柏子仁方

人參 半夏 茯苓 陳皮 柏仁
甘草 麝香 郁李仁

薑三片

人參散

人參 麝香 冰片

甘草湯調服

既濟丸

附子 人參 麝香

醫醇賡義 卷二

李

檳榔益氣湯

檳榔 人參 白朮 當歸 黃芪

陳皮 升麻 甘草 柴胡 枳殼

生薑煎服

木通二陳湯

木通 陳皮 半夏 茯苓 甘草

枳殼

生薑煎服

導氣清利湯

猪苓 澤瀉 白朮 人參 甘草

木通 梔子 茯苓 檳榔 枳殼

大黃 厚朴 麝香 黑牽牛 廣皮

半夏 藿香 柏仁

生薑煎服

加味麻仁丸

大黃 白芍 厚朴 當歸 杏仁

醫醇賡義 卷二

李

麻仁 檳榔 木香 枳殼

蜜為丸

皂角散

大皂角

燒存性研細末以猪脂一兩調服又服八正

散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心茶服

大承氣湯

以上九方只圖取快目前不顧削伐元氣然

此等藥入口輕者增劇劇者立斃究竟目前亦不快也

醫醇賡義卷二終

醫醇賡義卷二十一

杏

醫醇賡義卷三

咳嗽

經曰五臟皆咳非獨肺也。可知心肝脾腎四經各有咳嗽之症。不過假途於肺耳。只此二語。度盡金針。後人不明此義。一遇咳嗽。不辨其所以致咳之由。但從肺治。又安怪其效者少而不效者多耶。茲將肺臟之咳。詳列於前。心肝脾腎之咳。條載於後。庶幾辨症則了然無疑。施治則知

醫醇賡義

卷三

十

所措手矣

肺熱而咳。上焦微喘。肌表漫熱。口燥咽乾者。玉環煎主之。

玉環煎 自製

玉竹 四錢

羚羊角 一錢五分

沙參 四錢

麥冬 二錢

石斛 三錢

貝母 二錢

婁皮 三錢

蛤粉 四錢

梨汁半杯冲服

肺寒而咳。乃水邪射肺。水冷金寒。咳吐痰沫。胸作懣。肌膚慄冽者。薑桂二陳湯主之。

薑桂二陳湯 自製

炮薑 五分 桂枝 五分 橘紅 一錢

半夏 一錢 葶藶子 二錢 當歸 一錢

茯苓 二錢 白木 一錢 蘇子 五分

杏仁 三錢

苡仁一兩煎湯代水

醫醇臞義 卷三

二

肺虛而咳。肌表微熱。神倦氣短。不時火升失血。咽痛者。保肺濟生丹主之。

保肺濟生丹 自製

天冬 一錢五分 麥冬 一錢五分 人參 一錢

沙參 四錢 五味 五分 玉竹 三錢

女貞子 二錢 茯苓 二錢 山藥 三錢

貝母 二錢 茜草根 二錢 杏仁 三錢

藕三兩切片煎湯代水

虛之甚者。火升體羸。咳嗽失血。咽破失音。此為碎金不鳴。症極危險。金水濟生丹主之。

金水濟生丹 自製

天冬 一錢五分 麥冬 一錢五分 生地 五錢

人參 一錢 沙參 四錢 龜版 八錢

玉竹 三錢 石斛 三錢 茜草根 二錢

婁皮 三錢 山藥 三錢 貝母 二錢

杏仁 三錢

醫醇臞義 卷三

三

淡竹葉十張。鷄子青一個。藕三兩煎湯代水。

肺實而咳。胸腕喘滿。時吐稠痰。降氣和中湯主之。

降氣和中湯 自製

蘇子 一錢五分 沉香 五分 海石 三錢

婁仁 四錢 萊菔 二錢 芥子 一錢

橘紅 一錢 半夏 一錢 桑皮 二錢

貝母二錢 杏仁三錢

薑汁兩小匙冲服

實之甚者。痰氣閉結。語音不出。此為塞金不鳴。

金牛湯主之。

金牛湯 自製

鬱金二錢 牛旁子三錢砂研 陳麻黃四錢蜜水炙

瓜婁皮三錢 蘇子一錢五分 芥子一錢

沉香五分 貝母二錢 杏仁三錢

醫醇賡義 卷三 四

橘紅一錢 半夏一錢 桑皮二錢

枇杷葉兩張 刷毛蜜炙

嗜飲太過傷肺而咳者。加減葛花湯主之。

加減葛花湯 自製

葛花二錢 鷄棋子三錢 花粉二錢

石斛三錢 沙參四錢 麥冬一錢五分

茯苓二錢 苡仁四錢 橘紅一錢

貝母二錢 杏仁三錢

橄欖二枚 打破陳者亦可用

風痰入肺。久經吼咳者。鷺梨湯主之。

鷺梨湯 自製

鷺管石五錢研 陳麻黃五錢蜜炙 當歸一錢五分

茯苓二錢 婁仁四錢 蘇子一錢五分

桑葉一錢 橘紅一錢 半夏一錢

貝母二錢 杏仁三錢

梨汁兩大匙 薑汁兩小匙 同冲服

醫醇賡義 卷三 五

肺氣壅塞。致成肺癰。咳吐膿痰。氣甚腥穢者。石

花湯主之。

石花湯 自製

白石英三錢煨研 合歡花二錢 鮮百部四錢

沙參四錢 麥冬一錢 貝母二錢

桑皮二錢 蘇子一錢 杏仁三錢

茯苓二錢 苡仁四錢

淡竹葉十張 金絲荷葉兩張去背上白皮

肺葉痿敗。喘咳夾紅者白膠湯主之。

白膠湯 自製

嫩白芨 四錢 研末 陳阿膠 二錢 沖湯調服

心經之咳。痰少心煩。夜不成寐。玄妙散主之。

玄妙散 自製

玄參 一錢五分 丹參 三錢 沙參 四錢

茯神 二錢 柏仁 二錢 麥冬 一錢五分 硃砂 拌

桔梗 一錢 貝母 二錢 杏仁 三錢

醫醇賡義 卷三 七

夜合花 二錢

淡竹葉十張 燈心三尺

肝經之咳。痰少脇痛。易怒頭眩。丹青飲主之。

丹青飲 自製

赭石 三錢 麥冬 一錢五分 杭菊 二錢

石斛 三錢 童蔘 三錢 白蔘 三錢

沙參 四錢 桑葉 一錢 橘紅 一錢

貝母 二錢 杏仁 三錢

旋覆花 一錢 絹包 扎好

脾經之咳。胸滿痰稠。食少體倦。木米湯主之。

木米湯 自製

當歸 一錢五分 茯苓 三錢 白朮 一錢五分

苡米 八錢 橘紅 一錢 半夏 一錢五分

萊菔 二錢 杏仁 三錢 海石 三錢

婁仁 四錢

薑汁兩小匙 沖服

醫醇賡義 卷三 七

腎經之咳。或喘或喘。痰味鹹而有黑花者。山虎湯主之。

山虎湯 自製

蛤蚧尾 一對 酒洗 生地 四錢 蛤粉 炒 沉香 五分

破故紙 一錢五分 人參 二錢 沙參 四錢

茯苓 二錢 山藥 三錢 貝母 二錢

杏仁 三錢 麥冬 一錢五分

人乳半杯 薑汁兩滴 同沖服

五臟傳府之咳附後

經曰。五臟咳久傳於六府。脾咳不已。則胃受之。胃咳之狀。咳而嘔。嘔甚。則長蟲出。胃乃脾之妻。故脾咳必傳於胃。胃受邪。則水穀不安。故發嘔。長蟲處胃中。以助運化。嘔甚。則長蟲亦隨氣而出也。加味二陳湯主之。
加味二陳湯 自製

橘紅 一錢 半夏 一錢五分 茯苓 二錢

醫醇賡義 卷三

入

白朮 一錢 苡仁 四錢 枳殼 一錢

砂仁 一錢 蘇梗 一錢

花椒子二十四粒 薑三片

肝咳不已。則膽受之。膽咳之狀。咳嘔膽汁。膽為清淨之府。肝邪中之。則膽不安。而汁內沸。故所嘔皆苦水。西清湯主之。

西清湯 自製

桂枝 五分 梔子 一錢五分 蘇子 一錢五分

桑皮 二錢 杏仁 三錢 橘紅 一錢

半夏 一錢 茯苓 二錢 吳茱 三錢

鬱金 二錢

薑三片

肺咳不已。則大腸受之。大腸咳狀。咳而遺矢。肺與大腸。庚辛金也。風陽外燥。肺熱移於大腸。更兼風入空竅。宜其咳而遺矢矣。當培土化熱。兼以息風。迴風養臟湯主之。

醫醇賡義 卷三

九

迴風養臟湯 自製

沙參 四錢 蘇子 五分 枳殼 一錢

前胡 一錢 桑葉 一錢 茯苓 二錢

白朮 一錢 苡仁 四錢 橘紅 一錢

貝母 二錢

荷葉蒂 一枚

心咳不已。則小腸受之。小腸咳狀。咳而失氣。氣與咳俱失。小腸下口。接大腸之上口。小腸化則

大腸通。小腸咳。則氣達於大腸。故下焦之濁氣。不時宣泄也。潔宮湯主之。

潔宮湯 自製

沙參 四錢 茯神 二錢 遠志 五分 甘草水炒

歸身 二錢 麥冬 二錢 貝母 二錢

橘紅 一錢 半夏 一錢 白木 一錢

砂仁 一錢

薑三片

醫醇臚義 卷三

十

腎咳不已。則膀胱受之。膀胱咳狀。咳而遺溺。膀胱為津液之府。咳則氣不能禁而遺溺也。加味茯苓湯主之。

加味茯苓湯 自製

茯苓 三錢 兔絲 四錢 杜仲 三錢

破故紙 一錢五分 當歸 二錢 貝母 二錢

橘紅 一錢 半夏 一錢 杏仁 三錢

白木 一錢

合桃肉二枚過口

久咳不已。則三焦受之。三焦咳狀。咳而腹滿。不欲飲食。此皆聚於胃。關於肺。使人多涕吐。而面浮腫。氣逆也。久咳則三焦俱病。聚於胃。首胃為五臟六府之本也。關於肺者。咳必動肺。面浮氣逆。皆肺病也。通理湯主之。

通理湯 自製

歸身 二錢 茯苓 二錢 白木 一錢

醫醇臚義 卷三

十一

苡仁 四錢 枳殼 一錢 橘紅 一錢

半夏 一錢 厚朴 一錢 蘇子 一錢五分

桑皮 二錢 砂仁 一錢 青皮 一錢

薑三片

附咳嗽門諸方

補肺湯 治肺虛咳嗽

人參 一錢 黃芪 二錢 五味 五分

紫苑 一錢 桑皮 二錢 熟地 三錢

入蜜少許和服

補肺阿膠散 治肺虛有火咳無津液而氣硬

者

阿膠一兩 馬兜鈴一兩 甘草一兩

牛旁子一兩 杏仁七錢 糯米一兩

水煎分溫服

百合固金湯 治肺傷咽痛喘嗽痰血

生地一錢 熟地三錢 麥冬一錢五分

醫醇賸義卷三

百合三錢 當歸一錢五分 白芍一錢

貝母一錢五分 甘草五分 元參一錢

桔梗一錢

水煎服

紫苑湯 治肺傷氣極勞熱久嗽吐痰吐血

紫苑二錢 阿膠二錢 蛤粉拌炒 知母一錢

貝母二錢 桔梗一錢 人參一錢

茯苓二錢 甘草五分 五味子十二粒

蓮子十粒 去心

秦艽扶羸湯 治肺痿骨蒸或寒或熱成勞咳

嗽聲啞不出

柴胡一錢 秦艽一錢 人參一錢

當歸一錢五分 鱉甲一錢五分 地骨皮五分

紫苑一錢 半夏一錢 甘草五分

水煎服

黃芪鱉甲散 治男女虛勞客熱五心煩熱四

醫醇賸義卷三

肢倦怠咳嗽咽乾自汗食少日晡發熱

黃芪五錢 鱉甲五錢 天冬五錢

秦艽五錢 柴胡三錢 地骨皮三錢

茯苓三錢 桑皮三錢 紫苑三錢

半夏三錢 白芍三錢 生地三錢

知母三錢 甘草三錢 人參一錢

桔梗一錢五分 肉桂一錢五分

每用一兩水煎服一方加薑三片

秦艽鱉甲散 治風勞骨蒸午後壯熱咳嗽肌

瘦頰赤盜汗脈來細數

鱉甲 三錢 秦艽 一錢五分 知母 一錢五分

當歸 一錢五分 柴胡 一錢 地骨皮 二錢

烏梅 一個 青蒿 五葉

水煎服汗多加黃芪二錢

蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下

虛痰涎壅盛喘嗽嘔血或大便不利

蘇子 一錢五分 半夏 一錢 前胡 一錢

厚朴 一錢 橘紅 一錢 當歸 二錢

甘草 五分 沉香 五分

水煎服

定喘湯 治肺虛感寒氣逆膈熱而作哮喘

白菓 二十一粒 麻黃 四分 半夏 一錢

款冬花 一錢 桑皮 二錢 蘇子 一錢五分

杏仁 二錢 黃芩 一錢 甘草 五分

水煎服

咳血方 治咳嗽痰血

青黛 一錢 斐仁 一錢 海石 一錢 山梔 一錢 訶子肉 一錢

杏仁 各等分

蜜為丸嚙化

獨聖散 治多年咳嗽肺痿咯血

白芨 一錢 研細末每服二錢臨卧時糯米湯下

清咽太平丸 治膈上有火早間咯血兩頰常

赤咽喉作痛不清

薄荷 十兩 川芎 二兩 防風 二兩

犀角 二兩 柿霜 二兩 甘草 二兩

桔梗 三兩

蜜為丸如梧子大每服五十九

犀角地黄湯 治肝胃火盛吐血衄血咳血便

血及腸毒發斑

生地 一兩 犀角 一錢 白芍 一兩

生地 五錢

丹皮 二錢

每服五錢

桑皮等汁十味煎 治咳嗽經久將成肺痿乍

寒乍熱唾涕稠粘喘息氣上唇乾吐血

桑皮汁一升 地骨皮汁三升

生地汁五升 麥冬汁二升 生葛汁三升

淡竹瀝三升 生薑汁一升 白蜜一升

棗膏一升 牛酥三合

醫醇賡義 卷三 七

共熬成膏每服五錢

二陳湯 治一切痰飲為病咳嗽脹滿嘔吐

心頭眩心悸

半夏 二錢 陳廣 一錢 茯苓 一錢

甘草 五分

薑三片水煎服

清肺飲 治痰濕久留咳嗽氣逆

杏仁 二錢 貝母 二錢 茯苓 二錢

桔梗 一錢

甘草 五分

橘紅 一錢

五味子 五分

薑三片

金沸草散 治肺經傷風頭目昏痛咳嗽痰多

金沸草 一錢 前胡 一錢 細辛 三分

荆芥 二錢 茯苓 二錢 半夏 一錢

甘草 五分

棗二枚 薑三片

醫醇賡義 卷三 七

百花膏 治喘咳不已或痰中有血

川百合 欵冬花 等分

蜜丸如彈子大噉化

痰飲

痰飲者先生痰而後停飲積水為病也人非水穀不能生活然水氣太盛不能流行則病亦叢生論者謂人身所貴者水也天一生水乃至充周流灌無處不到一有瘀蓄即如江河迴薄之

處穢壅積聚水道日隘橫流旁溢必順其性因其勢而利導之庶得免乎泛濫此說是矣然謂為天一之水充周流灌以至於痰蓄則竊以為不然夫天一之水精也血也津液也此人身之聖水惟患其少不患其多安有變為痰飲之理且停飲之人往往嘔吐所吐之水或清或黃或酸或腐動輒盈盆天一之水顧若此之賤且多乎蓋水穀入胃除散精之外其勢下趨由小腸

醫醇臆義卷三

大

而膀胱乃氣化而出無所為飲也惟脾有積濕胃有蘊熱濕與熱交蒸脾胃中先有頑痰膠粘不解然後入胃之水遇痰而停不能疾趨於下日積月累飲乃由是而成又况嗜茶太過者濕傷脾嗜酒太過者熱傷胃過嗜生冷者寒傷脾胃各各不同而於是痰飲懸飲溢飲支飲留飲伏飲遂由淺入深而釀成痼疾矣見症與治法均列於後

痰飲

痰飲者水從胃出下走腸間轉轉有聲胸中微痞頭目作眩桂木二陳湯主之

桂木二陳湯 自製

桂枝 八分 白朮 一錢 廣皮 一錢

半夏 一錢 茯苓 三錢 枳實 一錢

澤瀉 一錢 牛膝 一錢 車前 二錢

薑三片

醫醇臆義卷三

大

懸飲

懸飲者水流脇下咳吐引痛脇乃肝膽之位水氣在脇則肝氣拂逆而肺金清肅之令不能下行故咳而引痛也椒目瓜萁湯主之

椒目瓜萁湯 自製

椒目 五十粒 瓜萁 五錢 桑皮 二錢

葶藶子 二錢 橘紅 一錢 半夏 一錢

茯苓 二錢 蘇子 一錢 茯苓 三錢

薑三片

溢飲

溢飲者。水氣旁流於四肢也。脾受水邪。溢入四末。故肢節作腫。身重無力。桂苓神朮湯主之。

桂苓神朮湯 自製

桂枝 八分 茯苓 三錢 白朮 一錢

茅朮 一錢 苡仁 八錢 廣皮 一錢

半夏 一錢五分 厚朴 一錢 砂仁 一錢

醫醇賡義 卷三

三

薑三片

支飲

支飲者。水停心下。入於胸膈。咳逆倚息。短氣。其形如腫。桑蘇桂苓湯主之。

桑蘇桂苓湯 自製

桑皮 三錢 蘇子 二錢 桂枝 八分

茯苓 三錢 澤瀉 一錢五分 大腹皮 一錢五分

橘紅 一錢 半夏 一錢五分 杏仁 三錢

猪苓 一錢

薑三片

留飲

留飲者。留而不去也。心下痞滿。作噦。頭眩。芎歸桂朮湯主之。

芎歸桂朮湯 自製

川芎 八分 當歸 二錢 桂枝 八分

厚朴 一錢 枳實 一錢 廣皮 一錢

醫醇賡義 卷三

三

半夏 一錢五分 茯苓 三錢 天麻 六分

菊花 二錢

薑三片

伏飲

伏飲者。伏而不出也。痰滿喘咳。吐發。則寒熱背腰痛。其人振振身瞤。此乃三陽之氣。為陰邪遏抑鬱而不舒。桂枝半夏湯主之。

桂枝半夏湯 自製

桂枝 半夏湯 自製

桂枝 八分 半夏 一錢五分 茯苓 三錢
廣皮 一錢 白朮 二錢 芥子 一錢
厚朴 一錢 紫蘇 一錢 貝母 二錢
甘草 四分

薑三片

附痰飲門諸方

苓桂朮甘湯 治胸脇支滿頭目作眩

茯苓 四兩 桂枝 三兩 白朮 三兩

醫醇賸義 卷三

三

甘草 二兩

水六升煎三升分溫服

甘遂半夏湯 治留飲結於腸胃

甘遂 大者三枚 半夏 十二枚 白芍 五枚

甘草 如指大一枚

右四味以水二升煮取半升去渣加蜜半升

和藥汁煎取八合溫服

小青龍湯 治水飲溢出於表營衛不利宜發

汗以散其水

麻黃 三兩 白芍 三兩 五味 半升

乾薑 三兩 甘草 三兩 細辛 三兩

桂枝 三兩 半夏 半升

水一斗煮取三升分溫服

大防已湯 治支飲上入膈中

防已 三兩 人參 四兩 桂枝 二兩

石葯 八兩

醫醇賸義 卷三

三

水六升煎取二升分溫服

防已加茯苓芒硝湯 治支飲胸膈痞滿

防已 二兩 桂枝 二兩 人參 四兩

茯苓 四兩 芒硝 三合

水六升煎取二升分溫服

澤瀉湯 治支飲之在心下者

澤瀉 五兩 白朮 二兩

水二升煎一升分溫服

厚朴大黃湯 治支飲胸膈痞滿

厚朴 一尺 大黃 六兩 枳實 五枚

水五升煮二升分溫服

椒目葶藶大黃丸 治腹滿口舌乾燥腸間有

水氣者

防已 一兩 椒目 五錢 葶藶 一兩

大黃 一兩

研末蜜丸如梧子大每服十九日三服

醫醇臈義 卷三

毒

小半夏加茯苓湯 治濕痰懸飲

半夏 一升 茯苓 四兩 生薑 八兩

水七升煮一升五合分溫服

茯苓飲 治痰飲胸痞

茯苓 三兩 人參 三兩 白朮 三兩

枳實 二兩 陳皮 三兩 生薑 四兩

水六升煮二升分溫服

二賢湯 治一切痰飲

橘皮一斤 甘草 四兩 食鹽 四兩

水四升煎一升分溫服

豁痰湯 治一切痰疾

柴胡 一錢 半夏 一錢 桔苓 五分

人參 五分 甘草 五分 紫蘇 五分

陳皮 一錢 厚朴 五分 南星 五分

薄荷 五分 枳殼 五分 羌活 五分

薑三片

醫醇臈義 卷三

毒

老痰丸 潤燥開鬱降火消痰治老痰凝滯喉

間吐咯難出

天冬 一兩 黃芩 一兩 海粉 一兩

橘紅 一兩 連翹 五錢 桔梗 五錢

青黛 一錢 香附 五錢 芒硝 二錢

婁仁 五錢

研末煉蜜加薑汁和丸如梧子大每服五十

丸

御愛紫宸湯 解宿酒噦嘔惡心痰唾不進飲

食

木香 五分 砂仁 一錢 白芍 一錢

檀香 一錢 茯苓 二錢 官桂 五分

藿香 一錢 陳皮 一錢 葛根 二錢

良薑 五分 丁香 五分 甘草 五分

水煎服

四七湯 治七情鬱結痰涎如敗絮或如梅核

醫醇賡義 卷三

美

咽之不下吐之不出

半夏 二錢 茯苓 二錢 厚朴 二錢

紫蘇 一錢

棗一枚 薑三片

大川芎丸 消風壅化痰涎利咽膈清頭目

川芎 二兩 薄荷 四兩 桔梗 三兩

甘草 二兩 防風 二兩 細辛 五錢

研末蜜丸如梧子大每服五十九

小川芎丸 治膈上痰

川芎 二兩 大黃 二兩

研末皂角水為丸如梧子大每服三十九

神芎導水丸 治一切熱痰鬱結

黃芩 一兩 黃連 五錢 川芎 五錢

薄荷 五錢 大黃 一兩 滑石 四兩

黑丑 二兩

研末蜜丸如梧子大每服三十九

醫醇賡義 卷三

美

二陳湯 治一切痰飲為病咳嗽脹滿惡心頭

眩

陳皮 一錢 半夏 二錢 茯苓 二錢

甘草 五分

薑三片

清氣化痰丸 治熱痰

半夏 膽星 橘紅 枳實 杏仁

黃芩 茯苓 等分

淡薑汁和丸每服三錢

半夏天麻白朮湯 治痰厥頭痛四肢厥冷

半夏一錢 麥芽三錢 神麩三錢

白朮一錢 蒼朮一錢 人參一錢

黃芪二錢 陳皮一錢 茯苓二錢

澤瀉一錢 天麻六分 乾薑二分

黃柏五分

研末每服五錢

醫醇賡義 卷三 夫

茯苓丸 治痰停中脘兩臂疼痛

半夏一兩 茯苓一兩 枳殼五錢

風化硝二錢 五分

淡薑汁和丸每服二錢

結胸

結胸有五。一為邪氣結胸。二為痰氣結胸。三為滯氣結胸。一為水氣結胸。其一則誤下之結胸也。雖同一中脘痞滿。而受病不同。施治各異。倘

一退投為禍最烈。學者當明辨之。

邪氣結胸不外因寒因熱。寒氣遏抑則胃陽不通。故中脘痞滿。四肢倦怠。祛寒平胃散主之。風熱內鬱則胸脘煩悶。心神焦躁。梔子解鬱湯主之。

祛寒平胃散 自製

炮薑五分 廣皮一錢 茅木一錢

厚朴一錢 佩蘭一錢 歸身一錢 五分

醫醇賡義 卷三 夫

茯苓二錢 木香五分 砂仁一錢

鬱金二錢

佛手柑五分

梔子解鬱湯 自製

黑山梔二錢 瓜蒌葉切一個 連翹二錢

薄荷一錢 葛根二錢 蘇梗一錢 五分

豆豉三錢 鬱金二錢

淡竹葉二十張 白茅根五錢

痰氣結胸當分燥濕痰隨火升壅於中脘竹瀝
滌痰湯主之濕痰上泛窒滯中都香蘇二陳湯
主之

竹瀝滌痰湯 自製

川貝 二錢

天竺黃 六分

羚羊角 一錢

桑皮 二錢

瓜婁仁 四錢

石決明 八錢

杏仁 三錢

全福花 一錢

絹包

淡竹瀝半杯薑汁兩滴同沖服

香蘇二陳湯 自製

卷三

三

沉香 六分

蘇子 二錢

橘紅 一錢

半夏 一錢

茯苓 二錢

枳殼 一錢

厚朴 一錢

杏仁 三錢

鬱金 二錢

苡仁 四錢

薑汁兩小匙沖服

滯氣結胸症有緩急治分輕重古人成法具在
按症用藥尤宜謹慎

壯熱神昏譫語胸滿拒按舌焦黑起刺脈實有力此為大結胸大承氣湯主之

大承氣湯

大黃 五錢

芒硝 五錢

枳實 一錢

厚朴 一錢

五分

先將枳實厚朴煎好後入大黃再後入芒硝

煎數沸

發熱譫語便鞭胸痞拒按舌焦黃脈實有力此

醫醇臞義 卷三

三

為小結胸小承氣湯主之

小承氣湯

大黃 五錢

厚朴 一錢

枳實 一錢

先將厚朴枳實煎好後入大黃約百沸

結胸痞滿按之則痛脈來浮滑者小陷胸湯主

之

小陷胸湯

黃連 五分

婁仁 五錢

半夏 一錢

水煎服

結胸失下。以致胸中大實。元氣大虧。不下。則脹滿而死。下之。則元氣隨脫。所謂下亦死。不下亦死也。然於死中求活。須一而攻。下一而保。真如黃龍湯一法。人參大黃並用。用意雖佳。然究竟互相牽制。補者不補。而攻者不攻。不若先服攻下之劑。俟藥力已達。病所隨後。即服保納元氣之劑。以收攝之。因自製承氣保真湯。十中可救

醫醇賡義卷三

三

三四此所謂天命難知。人事當盡。有一線生路。必須竭力挽回也。

承氣湯

即大黃芒硝枳實厚朴四味。先煎服。俟滯氣將動。隨服保真湯。

保真湯 自製

人參 三錢 附子 二錢 乾河車 四錢
當歸 三錢 五味 五分 兔絲子 八錢

大棗三枚 薑三片

水結胸。心下至少腹。鞕滿痛不可近。或潮熱。或無大熱。但頭微汗出。脈沉。名水結胸。大陷胸湯主之。

大陷胸湯

大黃 五錢 先洗去渣。入芒硝 五錢 煎數沸。再入甘遂末 一錢 溫服。

按此藥過於峻猛。萬不可輕投。予自製決壅順

醫醇賡義卷三

三

流湯。頗能於平穩中取效。決壅順流湯 自製

大黃 三錢 木通 三錢 瓜婁菓 一个
厚朴 一錢 青皮 一錢 枳實 一錢
瞿麥 二錢 車前子 二錢

水煎服

誤下之結胸。因邪未入陽明。下之太早。徒傷元氣。邪反乘虛而入。居於心胸之間。內既不能從

腸胃而下外又不能從肌表而出逗遛蘊結胸
腕痞滿按之不痛蓋無形之邪非有形之滯邪
在。心。胸。而。不。在。胃。也。諸。瀉。心。湯。主。之。其。藥。味。分
兩。當。隨。症。隨。時。謹。慎。加。減。
誤下之結胸。心下痞。而復惡寒汗出者。附子瀉
心湯主之。

附子瀉心湯

附子 大黃 黃連 黃芩

醫醇賡義 卷三

毒

誤下結胸痞滿不痛身寒而嘔飲食不下者半
夏瀉心湯主之。

半夏瀉心湯

半夏 黃連 黃芩 甘草 人參

乾薑 大棗

誤下結胸下利穀不化腹中雷鳴心下痞滿乾
嘔心煩者甘草瀉心湯主之。

甘草 倍用 半夏 黃連 乾薑 大棗

痰瘧

經曰。痰瘧皆生於風。其畜作有時者何也。岐伯
之對。極爲詳明。後之論者。乃謂瘧病皆起於少
陽。緣少陽爲半表半裏之經。進而與陰爭。則寒
退。而與陽爭。則熱。此解相沿已數百年。初閱之
似亦近理。細思之。頗爲不然。蓋瘧有一日一作
者。有間日一作者。有三日一作者。輕重懸殊。豈
爲謂之皆在少陽乎。且進而與陰爭。退而與陽

醫醇賡義 卷三

毒

爭。誰進之而誰退之。豈病之自爲進退乎。當其
寒也。鼓頷戰慄。固屬病進。及其熱也。譫語神昏。
豈得謂之病退乎。細繹經文。乃恍然大悟。經曰。
此皆得之夏傷於暑。熱因得秋氣。汗出遇風。及
得之以浴。水漿舍於皮膚之間。邪氣與衛氣并
居。此明明說暑熱之氣先入於內。後受風寒。包
裹熱邪是熱邪在裏。寒邪在外也。及其與衛氣
同發。先發在外之寒邪。故先寒。次發在內之熱

邪。故。後。熱。至。得。汗。之。後。風。勢。漸。解。故。寒。熱。俱。平。則。有。寒。有。熱。乃。邪。之。循。序。而。發。而。非。進。與。陰。爭。退。與。陽。爭。斷。斷。然。矣。其。一。日。一。作。者。何。也。邪。在。衛。也。經。曰。衛。氣。者。晝。日。行。於。陽。夜。行。於。陰。內。外。相。薄。是。以。日。作。此。言。衛。氣。行。於。人。身。一。日。一。周。邪。氣。與。衛。氣。同。行。故。瘧。亦。一。日。一。作。也。其。間。日。一。作。者。何。也。邪。在。營。也。經。曰。邪。藏。於。皮。膚。之。內。腸。胃。之。外。此。營。氣。之。所。舍。也。邪。氣。在。於。營。分。則。

醫醇賡義 卷三 美

雖。衛。氣。獨。發。而。邪。氣。在。內。不。與。之。並。行。更。歷。一。周。而。邪。氣。始。與。衛。氣。相。遇。故。瘧。亦。間。日。一。作。也。其。三。日。一。作。者。何。也。邪。在。府。也。經。曰。邪。氣。與。衛。氣。客。於。六。府。有。時。相。失。不。能。相。得。故。休。數。日。乃。作。也。可。知。人。之。一。身。由。衛。而。營。由。營。而。府。自。表。及。裏。自。有。一。定。次。第。邪。氣。在。府。已。入。第。三。層。故。瘧。亦。三。日。一。作。也。治。之。之。法。當。先。投。辛。溫。解。其。外。裏。之。寒。更。進。辛。涼。清。其。內。蘊。之。熱。俾。得。邪。從。

汗。出。而。病。可。霍。然。至。於。在。營。在。府。按。經。投。劑。方。有。端。緒。雄。於。前。賢。無。能。為。役。何。敢。自。矜。獨。得。妄。議。古。人。然。釋。經。辨。症。不。得。不。細。細。推。敲。誰。謂。醫。為。小。道。內。經。易。讀。乎。哉。初。發。寒。邪。宜。辛。溫。解。散。辟。寒。散。主。之。辟。寒。散。自。製。

川芎 八分 防風 一錢 白芷 五分
廣皮 一錢 半夏 一錢 羌活 一錢

醫醇賡義 卷三 美

秦艽 一錢 枳殼 一錢 蘇梗 一錢

薑 三大片

次發熱邪宜辛涼解散。清暑散主之。清暑散 自製。

薄荷葉 二錢 青蒿梗 一錢五分 石斛 三錢
貝母 二錢 葛根 二錢 連翹 一錢
豆豉 三錢 杏仁 三錢
淡竹葉 二十張

寒熱俱重體盛脈實者交加散主之。虛人禁用。

交加散 自製
附子 七分 石膏 五錢 羌活 一錢
防風 一錢 廣皮 一錢 連喬 五分
葛根 二錢 豆豉 三錢 薄荷 一錢
藿香 一錢

瘧邪在營間日一作者和營雙解散主之

醫醇臚義 卷三 寒

和營雙解散 自製

當歸 二錢 柴胡 一錢 葛根 二錢
廣皮 一錢 半夏 一錢五分 貝母 二錢
茯苓 二錢 防風 一錢 薄荷 一錢
蘇梗 一錢

薑皮 八分 河井水煎服

大瘧在府三日一作者返正湯主之
返正湯 自製

當歸 二錢 茯苓 二錢 白朮 一錢
炮薑 五分 葛根 二錢 廣皮 一錢
半夏 一錢五分 貝母 二錢 砂仁 一錢
青皮 一錢
大瘧日久正氣虛而邪未解者斑龍托裏湯主之。

斑龍托裏湯 自製
陳鹿膠 十錢五分 製首烏 二錢 當歸 二錢
角霜炒

醫醇臚義 卷三 寒

茯苓 二錢 白朮 一錢 廣皮 一錢
半夏 一錢五分 貝母 二錢 砂仁 一錢
黨參 四錢 蘇梗 一錢五分
大棗 二枚 薑 三片

冬令受寒伏藏於腎春夏舉發寒變為熱先熱後寒名曰溫瘧清正散主之

清正散 自製
青蒿梗 一錢五分 薄荷 一錢 廣皮 一錢

貝母 二錢 葛根 二錢 山梔 五分

連喬 五分 豆豉 三錢 杏仁 三錢

茅根 五錢

肺素有熱陽氣盛而不衰故但熱而不寒令人消燥脫肉名曰癰瘡玉露散主之

玉露散 自製

玉竹 四錢 花粉 二錢 沙參 四錢

麥冬 二錢 石斛 三錢 貝母 二錢

醫醇膳義 卷三

聖

杏仁 三錢 茯苓 二錢 山藥 三錢

梨三大片

附瘡症門諸方

白虎加桂枝湯 治身熱不寒骨節煩疼渴而

作嘔

知母 六兩 甘草 二兩 石膏 一斤

梗米 二合 桂枝 三兩

每用五錢水煎服

蜀漆散 治瘧之寒多熱少者

蜀漆 燒去腥 雲母 燒二日夜 龍骨 等分

研為末未發前漿水服半錢

牡蠣湯 治牡瘡

牡蠣 四兩 麻黃 四兩 甘草 二兩

蜀漆 二兩

水八升先煮蜀漆麻黃去上沫內諸藥煎取

二升分溫服

醫醇膳義 卷三

聖

柴胡去半夏加瓜蒌根湯 治瘧發渴者亦治

勞瘧

柴胡 八兩 人參 三兩 黃芩 三兩

甘草 三兩 瓜蒌根 四兩 大棗 十二枚

生薑 二兩

水一斗二升煎六升分溫服

柴胡桂薑湯 治寒多微熱或但寒不熱

柴胡 八兩 桂枝 三兩 乾薑 二兩

黃芩 三兩 花粉 四兩 牡蠣 二兩
甘草 二兩

水一斗二升煎六升分溫服

鱉甲煎丸 治久瘧結為癥瘕名曰瘧母

鱉甲 十二分 烏扇 三分 黃芩 三分 柴胡 六分
鼠婦 三分 乾薑 三分 大黃 三分 白芍 五分
桂枝 三分 葶藶 三分 石葦 三分 厚朴 三分
丹皮 五分 瞿麥 二分 紫葳 三分 半夏 二分

醫醇賸義 卷三

聖

人參 一分 蝨蟲 五分 阿膠 三分 蜂房 四分

赤硝 十二分 蜣螂 六分 桃仁 二分

共研末先用灶下灰一斗清酒一斛五升浸
灰候酒盡一半濾去灰納鱉甲於中先煮極
爛取汁和藥末為丸如梧子大空心服七丸
日三服

桂枝黃芩湯 和法中兼解表熱

柴胡 二兩 黃芩 四錢 人參 四錢
五分

甘草 四錢 半夏 四錢 石膏 五錢
知母 五錢 桂枝 一錢

水煎分溫服

人參柴胡引子 和法中畧施攻裏

人參 柴胡 黃芩 甘草 大黃
當歸 白芍 各等分

每用三錢加生薑一片煎服

柴朴湯 治瘧起於暑濕兼有食滯者

醫醇賸義 卷三

聖

柴胡 一錢 獨活 一錢 前胡 一錢

黃芩 一錢 蒼朮 一錢 厚朴 一錢

陳皮 一錢 半夏 一錢 茯苓 一錢

藿香 一錢 甘草 三分

薑三片

祛瘧散 治表裏之邪已透而中氣虛弱者

黃芪 六錢 人參 一錢 茯苓 二錢
白朮 一錢 砂仁 一錢 草菓 五分

陳皮 一錢 五朮 五分 甘草 五分

烏梅 二枚

棗 二枚 薑 三片

二木柴胡湯 統治諸瘧視其表裏寒熱之輕

重酌量加減

白朮 一錢 蒼朮 一錢 柴胡 一錢

葛根 二錢 廣皮 一錢 甘草 五分

棗 二枚 薑 三片

醫醇賡義 卷三 四

小柴胡湯 統治諸瘧量病加減

柴胡 一錢 半夏 一錢 人參 一錢

甘草 五分 桂枝 五分

棗 二枚 薑 三片

半夏散 治痰瘧熱多寒少頭痛作吐面色帶

赤者

半夏 一分 藿香 一分 羌活 一分

川芎 一分 牽牛 半分

研細末每用三錢食後白湯調重

四獸飲 治久瘧脾胃虛弱痰氣不清

黨參 三錢 茯苓 二錢 白朮 一錢

甘草 五分 廣皮 一錢 半夏 一錢

草菓 五分 烏梅 二枚

棗 二枚 薑 三片

常山飲 瘧久不已者用此截之瘧本不可截

止姑錄三方不過明古有是法耳

醫醇賡義 卷三 聖

常山 二錢 草菓 一錢 檳榔 一錢

知母 一錢 貝母 一錢 烏梅 一个

酒水各半煎露一宿日未出面東空心溫

服

截瘧七寶飲 治實瘧久發不止

常山 草菓 檳榔 青皮 厚朴

皮 甘草 等分

酒水各半煎露一宿於當發之早面東溫

服

二十四味斷瘧飲 治久瘧

常山 草菓 檳榔 知母 陳皮

青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩

荆芥 白芷 人參 紫蘇 蒼朮

白木 半夏 良薑 茯苓 桂枝

葛根 甘草 杏仁 烏梅 各等分

每用一兩棗二枚薑三片發日早服

醫醇賸義 卷三

聖

黃瘧

經曰面目發黃。小溲赤澁。安靜嗜卧者。黃瘧也。此係脾有積濕。故倦怠嗜卧。胃有積熱。故發黃。溺赤。但濕自内生。熱有外感。故內經有開鬼門。潔淨府之法。開鬼門者。開其腠理。使熱邪從肌表出也。潔淨府者。瀉其膀胱。使濕邪從小便出也。然外感之熱。可從汗解。若陽明內蘊之熱。發汗則劫陰。而內熱更甚。祇宜清胃熱。利脾濕。而

汗吐下之法。均不可用矣。至於陽黃陰黃。穀瘧酒瘧。女勞瘧。種種不同。見症治法。條列於後。

陽黃

面目發黃。口燥而渴。小溲赤澁。胃火熾盛。濕熱薰蒸。是為陽黃。導黃湯主之。

導黃湯 自製

葛根 二錢 花粉 二錢 山梔 一錢五分

連喬 五分 木通 二錢 茵陳 三錢

醫醇賸義 卷三

聖

草薺 二錢 茯苓 二錢 澤瀉 一錢五分

車前 二錢

苡仁 一兩 煎湯代水

陰黃

面目發黃。身冷不渴。小便微黃而利。此為陰黃。

茵陳木附湯 主之

茵陳木附湯 自製

茵陳 三錢 白朮 二錢 附子 一錢

茯苓 當歸二錢 廣皮一錢
半夏一錢 砂仁一錢 苡仁八錢
薑皮八分

穀痺

穀痺者脾胃不和食穀則眩穀氣不消胃中濁氣下流小便不通寒熱入於膀胱身體盡黃名曰穀痺和中茵陳湯主之

和中茵陳湯 自製

醫醇賡義 卷三

吳

當歸二錢 茯苓二錢 白朮一錢
廣皮一錢 厚朴一錢 木香五分
砂仁一錢 草木一錢 山梔五分
茵陳三錢 葶藶二錢 車前二錢
生熟穀芽各二錢 生熟苡仁各五錢 煎湯

代水

酒痺

酒痺者平日嗜飲濕火薰蒸面目發黃甚則

黑心中嘈雜雖食甘芳如啖酸辣小便赤澀
陳玉露飲主之

茵陳玉露飲 自製

茵陳三錢 玉竹三錢 石斛三錢
花粉二錢 葛根二錢 山梔一錢
廣皮一錢 半夏一錢 茯苓二錢
葶藶二錢

苡仁一兩 煎湯代水

醫醇賡義 卷三

吳

女勞痺

女勞痺者膀胱急小腹滿身盡黃額上黑足下熱大便黑而時澀此因血瘀不行積於膀胱少腹故仲景用硝石礬石散峻攻其瘀自極精當但今人之體質遠不逮古人若復峻攻更傷元氣擬通利下焦兼去瘀之法桃花化濁湯主之

桃花化濁湯 自製
桃仁二錢 紅花五分 牛膝二錢

延胡索 一錢 歸尾 一錢 赤芍 一錢

丹參 二錢 茵陳 三錢 澤瀉 一錢

車前 二錢

降香 五分 血餘灰 一撮

附黃痺門諸方

大黃梔子湯 治黃痺熱甚脈實者

梔子 十四枚 大黃 一兩 枳實 五枚

豆豉 一升

醫醇臈義 卷三

五

水六升煎至二升分溫服

茵陳蒿湯 治黃痺濕熱俱盛者

茵陳蒿 六兩 梔子 十四枚 大黃 二兩

水六升煎二升分溫服

茵陳四逆湯 治陰黃肢體逆冷腰以上自汗

茵陳 二兩 乾薑 一兩 附子 一枚

甘草 一兩

水煎分溫服

小茵陳湯 治發黃脈沉細遲四肢及偏身冷

茵陳 二兩 附子 一枚 甘草 一兩

水煎分溫服

茵陳附子湯 治服四逆湯身冷汗不止者

茵陳 一兩 附子 一枚 乾薑 二兩

水煎分溫服

茵陳茶黃湯 治服茵陳附子湯症未退及脈

伏者

醫醇臈義 卷三

五

茵陳 一兩 吳萸 一兩 當歸 一兩

附子 一枚 不通 一兩 乾薑 一兩

水煎分溫服

茵陳橘皮湯 治身黃脈沉細數身熱而手足

寒嘔喘煩躁不渴者

茵陳 一兩 橘皮 一兩 生薑 一兩

白朮 一兩 半夏 五錢 茯苓 五錢

水四升者三升分溫服

茵陳茯苓湯 治發黃脈沉細數四肢冷小便

澁煩躁而渴

茵陳一兩 茯苓一兩 桂枝一兩

猪苓一兩 滑石一兩

研末每服五錢如脈未出加當歸

梔子大黃湯 治酒瘴心中懊憹或熱痛

山梔十四枚 大黃一兩 枳實五枚

豆豉一升

醫醇臈義 卷三

至

水六升煮二升分溫服

白木湯 治酒瘴因下後變為黑瘴目青面黑

心中如啖蒜齧大便黑皮膚不仁脈微而數

白朮一錢 桂心五分 枳實一錢

豆豉三錢 葛根二錢 杏仁二錢

甘草五分

水煎服

加味四君子湯 治色瘴

人參一錢 茯苓二錢 白朮一錢

甘草五分 黃芪二錢 白芍一錢

扁豆三錢

紅棗二枚 薑五片

小兒絲子丸 治大勞瘵

石連肉二兩 茯神一兩 兔絲子五兩

山藥三兩

山藥打糊為丸每服五十九

醫醇臈義 卷三

至

茯苓滲濕湯 治黃瘴寒熱嘔吐渴欲飲水身

體面目俱黃小便不利

茵陳二錢 茯苓二錢 猪苓一錢

澤瀉一錢 白朮一錢 陳皮一錢

蒼朮一錢 黃連五分 山梔一錢

秦艽一錢 防已一錢 葛根二錢

水煎服

參朮健脾湯 治發黃日久脾胃虛弱飲食不

思

人參 一錢

茯苓 二錢

白朮 一錢

陳皮 一錢

當歸 一錢五分

白芍 一錢

甘草 五分

棗 二枚

薑 三片

當歸秦艽散

治五痺口淡咽乾倦怠發熱微

冷

白朮 一錢

茯苓 二錢

秦艽 一錢

醫醇賸義 卷三

毒

當歸 五分

川芎 一錢

白芍 一錢

熟地 二錢

陳皮 一錢

半夏 麩炒 三錢

甘草 五分

薑 三片

茵陳附子乾薑湯

治寒涼藥服多變陰黃者

附子 一錢

乾薑 一錢

茵陳 二錢

草薹 一錢

白朮 一錢

枳實 一錢

半夏 一錢

澤瀉 五分

茯苓 二錢

廣皮 一錢

薑 五片

清飲

治瘧症發熱

柴胡 一錢

赤苓 二錢

桑皮 二錢

川芎 一錢

甘草 五分

紅棗 二枚

薑 三片

青龍散

治風氣傳化氣不得泄鬱熱煩渴面

日發黃引飲

醫醇賸義 卷三

毒

地黃 二錢

仙靈脾 二錢

防風 二錢

荆芥 一兩

何首烏 三錢

研末每服三錢

小柴胡加梔子湯

治邪熱留於半表半裏而

發黃者仍以和其表裏為法

柴胡 一錢

黃芩 一錢

人參 一錢

甘草 五分

半夏 一錢

梔子 五分

大棗 二枚

生薑 三片

水煎服

三消

上消者肺病也。肺氣焦滿。水源已竭。咽燥煩渴。引飲不休。肺火熾盛。陰液消亡。當於大隊清潤。中。佐。以。滲。濕。化。痰。之。品。蓋。火。盛。則。痰。燥。其。消。燥。之。力。皆。痰。為。之。助。虐。也。逢原飲主之。

逢原飲 自製
天冬 一錢五分
麥冬 一錢五分
南沙參 四錢

醫醇賡義 卷三

北沙參 三錢
胡黃連 五分
石斛 三錢
玉竹 三錢
蛤粉 四錢
貝母 二錢
茯苓 三錢
廣皮 一錢
半夏 一錢五分

梨汁半杯冲服

中消者胃病也。胃為穀海。又屬燥土。痰入胃中。與火相乘。為力更猛。食入即腐。易於消燬。經所謂除中。言常虛而不能滿也。宜清陽明之熱。潤燥化痰。祛煩養胃湯主之。

祛煩養胃湯 自製

鮮石斛 五錢
熟石膏 四錢
天花粉 三錢
南沙參 四錢
麥冬 二錢
玉竹 四錢
山藥 三錢
茯苓 三錢
廣皮 一錢
半夏 一錢五分

甘蔗三兩煎湯代水

下消者腎病也。坎之為象。一陽居於二陰之中。腎陰久虧。孤陽無依。不安其宅。於是飲一溲一。

醫醇賡義 卷三

或飲一溲。二夾有濁淋。腿股枯瘦。而病益深矣。急宜培養真陰。少參以清利。烏龍湯主之。

烏龍湯 自製
元武版 八錢
生地 六錢
天冬 二錢

南沙參 四錢
蛤粉 四錢
女貞 二錢

料荳 三錢
山藥 三錢
茯苓 二錢

澤瀉 一錢五分
鹽水炒
車前 二錢

藕三兩煎湯代水

附消渴門諸方

金匱腎氣丸 治男子消渴小便反多飲一澠

一

地黃 八兩 萸肉 四兩 山藥 四兩

丹皮 三兩 雲茯苓 三兩 澤瀉 三兩

肉桂 一兩 附子 一兩 牛膝 三兩

車前 三兩

每用五錢水煎服

醫醇賸義 卷三

美

文蛤散 治渴欲飲食不止者

文蛤 五兩

研為末以沸湯五合和服一方寸匙

竹葉黃芪湯 治消渴症氣血虛胃火盛而作

渴

生地 三錢 黃芪 二錢 麥冬 一錢

當歸 一錢 川芎 一錢 黃芩 一錢

甘草 一錢 白芍 一錢 人參 一錢

石膏 三錢 半夏 一錢 竹葉 一錢

淨水煎服

地黃飲子 治消渴咽乾面赤煩躁

生地 熟地 人參 黃芪 天冬

麥冬 枳殼 石斛 澤瀉 甘草

枇杷葉 各等分

每服五錢食遠服

白朮散 治虛熱而渴

醫醇賸義 卷三

美

人參 一兩 白朮 一兩 茯苓 一兩

甘草 一兩 五味 三錢 柴胡 三錢

葛根 二兩 藿香 一兩 木香 一兩

研末每服五錢水煎服

宣明黃芪湯 治心移熱於肺為肺消飲少澠

多

黃芪 三兩 五味 二兩 人參 二兩

麥冬 二兩 桑皮 二兩 熟地 一兩

枸杞 一兩五錢

研末每服五錢水煎服

宣明麥門冬飲子 治心熱移於肺傳為膈消

胸滿心煩精神短少

人參 茯苓 麥冬 五味 生地

炙草 知母 葛根 花粉 各等分

每服五錢加竹葉十四片水煎服

易老麥門冬飲子

醫醇賡義 卷三

李

人參 杞子 茯苓 甘草 五味

麥冬 各等分

薑水煎服

猪肚丸 治強中消渴

黃連 四兩 粟米 四兩 花粉 四兩

茯苓 四兩 知母 二兩 麥冬 二兩

地黃 四兩 葛根 二兩

研細末將大猪肚一个洗淨入末藥於內以

麻線縫好煮極爛取出藥別研以猪肚為膏

加煉蜜搗為丸如梧子大每服五十丸

天門冬丸 治初得消中食已如飢手足煩熱

背膊疼悶小便白濁

天冬 一兩 土瓜根 一兩 瓜瓞根 一兩

熟地 一兩 知母 一兩 菴蓉 一兩

五味 一兩 鹿茸 一兩 澤瀉 一兩

鷄內金 三具 牡蠣 二兩 苦參 一兩

醫醇賡義 卷三

李

桑螵蛸 十枚

蜜丸如梧子大每服五十丸

猪腎薺苳湯 治消中小便數

猪腎 二枚 薺苳 三兩 大豆 二斤

石膏 三兩 人參 二兩 茯苓 二兩

知母 二兩 葛根 二兩 黃芩 二兩

磁石 二兩 花粉 二兩 甘草 二兩

水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗下藥煮

至五升分溫服

腎瀝散 治腎消發渴小便數腰疼痛

人參 一兩 遠志 一兩 黃芪 一兩

內金 五錢 桑螵蛸 一兩 澤瀉 一兩

桂心 五錢 熟地 一兩 茯苓 一兩

龍骨 一兩 當歸 一兩 麥冬 一兩

川芎 一兩 五味 五錢 炙草 五錢

元參 五錢 磁石 五錢

醫醇賸義 卷三

李

研末用羊腎一對先煎次用藥五錢薑五分煎服

醫醇賸義卷三終

醫醇賸義 卷四

醫醇賸義卷四

痿

經曰諸痿起於肺說者謂肺氣空虛金不伐木肝火鬱結大筋短縮小筋弛長故成痿症此特可為筋痿言之耳至於脈痿肉痿骨痿豈得謂之金不伐火金不伐土金不伐水乎是必不然矣解經者不必過事高深但求諦當經又曰治痿獨取陽明只此一節便可知肺胃相關諸痿

醫醇賸義 卷四 春記

起於肺治痿重陽明之故蓋胃為水穀之府一身之精神氣血從此而生其糟粕則下歸小腸其精華則上輸於肺肺受精氣然後澤沛諸臟茲以所求不得躁急熱中肺受薰蒸葉焦成痿不能散精於他臟故痿起於肺也其獨取陽明者因胃為五臟六府之海所以滋養一身又主潤宗筋宗筋主束骨而利關節也從此悟徹則五臟之痿可以次第區別矣

四二七

經曰肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄着則生痿躄也其下又曰所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦則此症全因肺陰耗散肺氣空虛所致蓋肺為主氣之臟肺傷則元氣薄弱而不能下行故足膝無力而不能任地是肺痿即氣痿也玉華煎主之

玉華煎 自製

玉竹 四錢 五味 一錢 麥冬 三錢

醫醇賡義 卷四

沙參 四錢 黨參 四錢 茯苓 二錢

白朮 一錢 山藥 三錢 川斷 二錢

牛膝 二錢

元米一撮煎湯代水

經曰心氣熱則下脈厥而上上則下脈虛虛則生脈痿樞折挈脛縱而不任地也百脈皆朝於心心陽上亢則在下之脈亦厥逆而上上愈實則下愈虛故為脈痿關節之處如樞紐之折而

不可提挈足脛縱緩則脈不通而懈弛也調榮通脈湯主之

調榮通脈湯 自製

天冬 二錢 生地 五錢 丹參 二錢

柏仁 二錢 黨參 四錢 茯苓 二錢

白朮 一錢 黃連 四分 當歸 二錢

川斷 二錢 牛膝 二錢

紅棗十枚 桑枝一尺

醫醇賡義 卷四

經曰肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣發為筋痿肝膽相連肝熱則膽亦熱膽汁內沸故發為口苦血為火劫不能養筋筋急而攣故為筋痿也水木華滋湯主之

水木華滋湯 自製

生地 五錢 當歸 二錢 白芍 一錢

丹皮 二錢 山梔 五分 羚羊角 五分

木瓜 一錢 酒炒 黨參 四錢 茯苓 二錢

白朮一錢 川斷二錢 牛膝二錢

人乳一杯 桑枝一尺

經曰脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿。脾與胃屬土而分燥濕濕土既熱則燥土更烈故胃乾而渴熱於內則脾陰耗損故肉不仁而為痿也坤順湯主之

坤順湯自製 黨參四錢 茯苓二錢 白朮一錢

醫醇臚義 卷四 四

甘草四分 山藥二錢 花粉三錢 石斛三錢 料豆三錢 川斷二錢 牛膝二錢

紅棗五枚 蓮子十粒 去心

經曰腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿又曰有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發為骨痿腰者腎之府脊者腎

之所貫腎傷故腰脊不舉遠行勞倦則傷骨逢大熱而渴者或外感之熱或內蘊之熱皆消陰耗髓故骨枯而痿也滋陰補髓湯主之

滋陰補髓湯自製 生地五錢 龜版八錢 黃柏一錢 鹽水炒

知母一錢 虎脛骨一錢五分 枸杞三錢 鹽水炒

當歸二錢 黨參四錢 茯苓二錢

白朮一錢 金毛脊五分 川斷二錢

醫醇臚義 卷四 五

牛膝二錢

猪脊髓一條同煎

痺

經曰風寒濕三氣雜至合而為痺也夫六淫之邪暑燥火為陽風寒濕為陰陰氣迭乘營衛不通經脈阻滯筋骨肉三部俱病而三痺之症作矣其風氣勝者為行痺風為陰中之陽中人最速其性善走竄入經絡故歷節作痛而為行痺

寒氣勝者為痛痺。寒為陰中之陰。乘於肌肉筋骨之間。營衛閉塞。筋骨拘攣。不通則痛。故為痛痺。濕氣勝者為着痺。着者重着難移。濕從土化。病在肌肉。不在筋骨。所謂腰間如帶五千錢者。是也。古有三痺湯。今復自製三方。以附於後。風痺者。血不榮筋。風入節絡。當以養血為第一。通絡次之。去風又次之。若不補血而先事搜風。木愈燥而筋益拘攣。殊非治法。先用大劑補血。

醫醇賡義 卷四

六

去風後即加入參苓白朮以補氣分。營衛平調。方無偏勝之患。溫經養榮湯主之。

溫經養榮湯 自製

- 生地 三錢 切片紅花炒 熟地 三錢 切片砂仁炒 枸杞 三錢
- 當歸 二錢 白芍 一錢五分 鹿筋 五錢 切片
- 木瓜 一錢 酒炒 川斷 二錢 獨活 一錢 酒炒
- 桂枝 五分 秦艽 一錢 甜瓜子 三錢 炒研
- 木香 五分

紅棗十枚 薑三片 桑枝一尺
痛痺者營衛受寒。不通而痛。宜調養氣血。溫通經絡。龍火湯主之。

龍火湯 自製

- 菴蓉 三錢 肉桂 五分 黨參 四錢
- 茯苓 二錢 白朮 一錢 歸身 二錢 酒炒
- 白芍 一錢 酒炒 木香 五分 川斷 二錢
- 獨活 一錢 酒炒 角霜 四錢 蠶沙 三錢

醫醇賡義 卷四

七

紅棗十枚 薑三片

着痺者病在肌肉。當補土燥濕。立極湯主之。立極湯 自製

- 黨參 四錢 附子 六分 當歸 二錢
- 茯苓 三錢 白朮 一錢 茅朮 一錢
- 破故紙 一錢五分 杜仲 二錢 川斷 二錢
- 獨活 一錢 牛膝 二錢
- 紅棗五枚 薑三片 苡仁 一兩 煎湯代水

三痺之外。又有臟腑之痺。症治詳後。肺痺者。煩滿喘而嘔。此一條。明是肺胃同病。肺居至高。脈循胃口。肺氣受邪。從胃而上。清肅之令。不能下行。故煩滿而喘。其作嘔。則胃亦受邪。水穀之氣不安也。桑朴湯主之。

桑朴湯 自製

- 桑皮 二錢
- 厚朴 一錢
- 橘紅 一錢
- 半夏 一錢
- 茯苓 二錢
- 沉香 五分

醫醇賸義 卷四

八

- 蘇子 一錢五分
- 杏仁 三錢
- 婁皮 二錢
- 貝母 二錢
- 鬱金 二錢

佛手五分 薑三片

心痺者。脈不通。煩則心下鼓。暴上氣而喘。噎乾善噫。厥氣上則恐。此一條。乃心經主病。而兼腎病也。心為生血之臟。百脈皆朝於心。心脈支者。挾咽直者上肺。心營不足。故脈不通。心氣不舒。故心下鼓。暴氣上而喘。噎乾善噫。則支脈與直

脈俱病也。厥氣乃腎之邪。水來尅火。神衰而恐。恐屬於腎。腎病應於心。故為兼病也。宜養心營。通心氣。火能生土。則可以制水矣。通陽抑陰煎主之。

通陽抑陰煎 自製

- 當歸 二錢
- 琥珀 一錢
- 辰砂 五分
- 丹參 三錢
- 遠志 五分
- 沉香 五分
- 破故紙 一錢五分
- 益智仁 一錢
- 扶神 二錢

醫醇賸義 卷四

九

- 白朮 一錢
- 棗 二枚
- 薑 三片

肝痺者。夜卧則驚。多飲數小便。上為引。如懷。此一條。乃肝經主病。而波及脾胃者也。肝為多血之臟。而方藏魂。肝受邪。則魂不安。而夜卧驚悸。木鬱生火。積而成熱。故多飲而小便數也。上為引者。渴而引飲也。如懷者。腹大如懷物也。此由肝火上升。犯胃。故胃熱而渴。肝氣下行。尅脾。故

脾弱而脹也。宜養血疎肝。兼調脾胃。三靈湯主之。

三靈湯 自製

當歸 二錢 白芍 一錢 羚羊角 一錢五分

龍齒 二錢 石決 六錢 半夏麴 三錢

柴胡 一錢 葛根 二錢 茯神 二錢

白木 一錢 青皮 一錢

東瓜子 三錢煎湯代水

醫醇賡義 卷四

十

腎痺者善脹。尻以代踵。脊以代頭。舊解謂腎為脾胃之關。腎痺則邪及脾胃。故腹善脹。尻以代踵者。足變不能伸。脊以代頭者。身僂不能直。此說近似而未暢。蓋善脹者。乃腎中真陽不運。重陰凝結所致。尻以代踵者。緣少陰之脈斜走足心。出於然谷之下。循內踝之後。別入跟中。腎痺則兩足廢而不能行也。脊以代頭者。乃精氣耗散。天柱不振也。當發腎中之陽。使重陰解散。精

氣來復。庶幾首與足漸有起色。消陰來復湯主之。

消陰來復湯 自製

鹿茸 一錢 附子 八分 枸杞 三錢

兔絲 四錢 當歸 二錢 破故紙 一錢五分

益智 一錢 小茴香 一錢 金毛脊 二錢 去毛切片

木香 五分 獨活 一錢 酒炒 牛膝 二錢

棗二枚 薑三片

醫醇賡義 卷四

十一

脾痺者四肢懈。發咳嘔汁。上為大塞。此一條。乃脾病而兼肺病也。脾主四肢。脾病故四肢懈。惰土敗則金衰。故發咳。脾病則胃亦病。故嘔汁。地氣上升。天氣不降。乾金之令不行。故上為大塞也。安貞湯主之。

安貞湯 自製

黨參 四錢 炮薑 六分 當歸 二錢

半夏 一錢 茯苓 三錢 白木 一錢

厚朴一錢 砂仁一錢 桑皮二錢

杏仁三錢 蘇子一錢五分

陳香櫞皮六分

腸痺者數飲而出不得。中氣喘爭。時發殮泄。小腸上通胃口下接大腸。病在小腸鬱而成熱。故渴而數飲。下焦之氣閉塞不通。故小溲不得出。氣化不及膀胱。水不下行。逆而犯肺。故中氣喘爭。小水不入州都。而併入大腸。故時發殮泄也。

醫醇賸義卷四

主

加味木通湯主之

加味木通湯自製

木通二錢 橘紅一錢 半夏一錢五分

赤苓二錢 貝母二錢 桑皮二錢

杏仁三錢 瞿麥二錢 牛膝二錢

車前一錢

燈心三尺

胞痺者少腹膀胱按之內痛。若沃以湯。澁於小

便。上為清涕。膀胱氣閉。水液滿而不出。故按之

內痛。氣有餘則生火。內有熱故如湯之沃也。足太陽之脈起於目內眥。上額交巔。其直者從巔入絡腦。膀胱氣閉。故小便下澁。清涕上流也。利濟湯主之。

利濟湯自製

澤瀉一錢 沉香五分 枳殼一錢

青皮一錢 赤苓二錢 當歸二錢

醫醇賸義卷四

主

赤芍一錢 廣皮一錢 牛膝二錢

車前一錢

小薊根五錢

附痺症門諸方

三痺湯 治手足拘攣風寒濕三痺

人參 黃芪 當歸 川芎 白芍

生地 杜仲 川斷 防風 桂心

細辛 茯苓 秦艽 川膝 獨活

甘草

棗一枚 薑三片

桂枝五物湯 治痺在上

黃芪 三兩 桂枝 三兩 白芍 三兩

生薑 六兩 大棗 十二枚

水煎分溫服

十味到散 治痛連筋骨肩臂難支

附子 一錢 黃芪 二錢 當歸 二錢

醫醇賡義 卷四

十四

川芎 一錢 白芍 一錢 防風 一錢

白朮 一錢 芍藥 二錢 肉桂 五分

熟地 四錢

棗二枚 薑三片

薏苡仁湯 治痺在手足麻木不能屈伸

苡仁 四錢 當歸 二錢 白芍 一錢

肉桂 五分 麻黃 五分 甘草 五分

蒼朮 一錢

棗二枚 薑三片

通痺散 治痺在身半以下兩足至臍冷如水

不能自舉者

天麻 獨活 當歸 川芎 白朮

藁本 等分

研末每用三錢酒調服

人參 治痺在脈

人參 一兩 麥冬 一兩 茯神 一兩

醫醇賡義 卷四

十五

石脂 一兩 龍齒 一兩 遠志 一兩

菖蒲 一兩 黃芪 一兩 熟地 二兩

蜜為丸如梧子大每服三五十九

瓜婁薤白湯 治胸痺不得卧心痛徹骨

瓜婁葉 一枚 薤白 三兩 半夏 三兩

白酒四升同煮取一升半分溫服

腎瀝湯 治胞痺小腹急痛小便赤澁

麥冬 一錢 五加皮 一錢 犀角 一錢

杜仲 二錢五分
桔梗 二錢五分
赤芍 二錢五分
木通 二錢五分
桑螵蛸 一兩

加羊腎一枚竹瀝少許同煎分溫服

吳茱萸散 治腸痺腹痛氣急大便殭泄

吳萸 五錢
乾薑 五錢
甘草 五錢

砂仁 一兩
神麴 一兩
肉蔻 五錢

白朮 一兩
厚朴 一兩
陳皮 一兩

良薑 五錢

醫醇賸義 卷四 夫

研末每服一錢食前米飲下

羚羊角散 治筋痺肢節束痛

羚羊角 薄荷 附子 獨活 白芍

防風 川芎 等分

薑三片

羌活湯 治皮痺皮中狀如蟲行腹脇脹滿大

腸不利語不出聲

羌活 細辛 附子 沙參 羚羊角

白朮 五加皮 生地 官桂 枳殼
麻黃 白蒺藜 杏仁 丹參 草薺
五味 郁李仁 苜蒲 木通 檳榔
赤苓 各等分

薑五片水煎分溫服

升麻湯 治熱痺肌肉極熱體上如鼠走唇口

反縮皮毛變紅黑

升麻 一錢 人參 一錢 茯神 二錢

醫醇賸義 卷四 七

犀角 一錢 羚羊角 一錢 官桂 三分

防風 五分 羌活 五分

薑三片 竹瀝半杯

巴戟湯 治冷痺脚膝疼痛行步艱難

巴戟天 二錢 附子 五分 五加皮 二錢

川牛膝 一錢五分 石斛 二錢 甘草 五分

草薺 一錢 茯苓 二錢 防風 一錢

防己 一錢

薑三片

犀角散 治心痺神情恍惚恐畏悶亂不得睡

及語言錯亂

犀角一錢 羚羊角一錢 人參二錢

沙參三錢 防風一錢 天麻一錢

天竺黃一錢 茯神二錢 升麻一錢

獨活一錢 遠志一錢 麥冬一錢

甘草一錢 龍齒一錢 丹參一錢

醫醇賡義 卷四 末

牛黃一分 麝香一分 冰片一分

研末每服一錢五分麥冬湯調服

人參散 治肝痺氣逆胸膈引痛睡卧多驚筋

脈拘急

人參一兩 黃芪一兩 杜仲一兩

棗仁一兩 茯神一兩 五味一兩

細辛一兩 熟地一兩 秦艽一兩

羌活一兩 丹砂五錢

每服一錢不拘時調服

溫中法麴丸 治脾痺發咳嘔涎

法麴一兩 麥芽一兩 茯苓一兩

陳皮一兩 厚朴一兩 枳實一兩

人參五錢 附子五錢 乾薑五錢

當歸一兩 甘草五錢 細辛五錢

桔梗五錢 吳萸三錢

研末蜜丸如梧子大每服七十九

醫醇賡義 卷四 丸

紫蘇湯 治肺痺上氣不下

紫蘇一錢 半夏一錢 陳皮一錢

桂心五分 人參五分 白朮一錢

甘草三分

棗二枚 薑三片

牛膝酒 治腎痺復感寒濕

牛膝一兩 秦艽一兩 川芎一兩

防己一兩 茯苓一兩 官桂一兩

獨活 一兩 丹參 一兩 麥冬 一兩
 加皮 四兩 石斛 一兩 杜仲 一兩
 附子 五錢 乾薑 五錢 苡仁 一兩
 地骨皮 五錢 火麻仁 一兩

好酒一斗浸三五日每服半杯

脹

經曰厥氣在下營衛留止寒氣逆上真邪相攻
 兩氣相搏乃合為脹一則曰厥氣再則曰寒氣

醫醇臞義卷四

辛

可知各種脹症皆由濁陰上干清道所致衛氣
 遇寒則滯營血遇寒則凝營衛不調不能捍衛
 陰邪乃得乘虛而入何臟虛即入何臟何府虛
 即入何府真氣與邪氣相搏而五臟六府遂各
 有脹病矣茲將見症及治法詳列於後
 經曰心脹者煩心短氣卧不安心本純陽寒邪
 來犯陰陽相戰故煩滿短氣而卧不安也治之
 之法但須發其神明摧蕩邪氣使浮雲不能蔽

日自然離照當空太陽之火
 湯主之

離照湯 自製

琥珀 一錢 丹參 三錢 硃砂 五分
 茯神 三錢 柏仁 二錢 沉香 五分
 廣皮 一錢 青皮 一錢 鬱金 二錢

燈心 三尺 薑皮 五分

厥脹者虛滿而喘咳肺為主氣之臟居於至高

醫醇臞義卷四

辛

寒氣逆上肺氣壅塞清肅之令不能下行故虛
 滿而喘咳當溫肺降氣以解寒邪溫肺桂枝湯
 主之

溫肺桂枝湯 自製

桂枝 五分 當歸 二錢 茯苓 二錢
 沉香 五分 蘇子 一錢 橘紅 一錢
 半夏 二錢 瓜蒌 四錢 桑皮 二錢
 薑汁 兩小匙冲服

肝脹者。脇下滿而痛。引小腹。肝為將軍之官。氣血皆盛。但木喜條達。寒氣上逆。則兩氣相積。而肝木怒張。脇下乃肝之本位。痛引小腹。則壅極而決矣。當疎肝化濁。青陽湯主之。

青陽湯 自製

青皮 一錢五分

柴胡 一錢

茯苓 四錢

烏藥 一錢

炮薑 五分

廣皮 一錢

延胡 一錢

木香 五分

鬱金 二錢

醫醇賡義 卷四

圭

花椒子二十四粒 打碎

脾脹者善噦。四肢煩悅。體重不能勝衣。卧不安。脾為濕土。而主四肢。寒氣乘之。則土德衰。而真陽不運。故善噦。而肢體疲重。夜卧不安也。當扶土滲濕。兼解寒邪。薑木二仁湯主之。

薑木二仁湯 自製

炮薑 五分

白朮 二錢

茯苓 三錢

半夏 一錢

當歸 二錢

以仁 八錢

砂仁 一錢 厚朴 一錢 木香 五分 廣皮 一錢

生熟穀芽 各四錢 煎湯代水

腎脹者。腹滿引背。中央然。腰髀痛。腎本屬水。寒氣乘之。水寒則成冰。氣益堅凝。坎中之真陽。不能外達。故腹滿引背。時形困苦。腰髀痛。則下元虛寒。營血不能流灌也。當溫腎祛寒。溫泉湯主之。

醫醇賡義 卷四

圭

溫泉湯 自製

當歸 二錢

附子 八分

小茴香 一錢

破故紙 一錢五分

合桃肉 拌炒

烏藥 一錢

杜仲 三錢

牛膝 二錢

木香 五分

廣皮 一錢

青皮 一錢

薑三片

胃脹者。腹滿。胃脘痛。鼻聞焦臭。妨於食。大便難。胃為水穀之府。職司出納。陰寒之氣上逆。水穀

不能運行故腹滿而胃痛水穀之氣腐於胃中故鼻聞焦臭而妨食便難也當平胃祛寒溫中平胃散主之

溫中平胃散 自製
炮薑 五分 砂仁 一錢 木香 五分

穀芽 三錢 神麴 三錢 廣皮 一錢

茅朮 一錢 厚朴 一錢 枳殼 一錢

青皮 一錢

醫醇臈義 卷四

陳香櫟皮 八分

大腸脹者腸鳴而痛濯濯冬日重感於寒則殮泄不化大腸為傳道之官居小腸之下司變化而出糟粕寒氣上逆變化失度故腸鳴腹痛而有水聲重感於寒故完穀不化也當溫通湯胃上下兼顧但治大腸猶為無濟顧母理臟湯主之

顧母理臟湯 自製

枳殼 一錢五分 青皮 一錢 厚朴 一錢
乾薑 五分 穀芽 二錢 當歸 二錢
茯苓 二錢 白朮 一錢 木香 五分
白蔻 六分

橘餅 三錢 切片

小腸脹者小腹臘脹引腰而痛小腸為受盛之官居胃之下受盛水穀而分清濁水液滲於前糟粕歸於後寒氣上逆則化物不出故小腹臘

醫醇臈義 卷四

毒

脹引腰而痛也當分理水道俾二便通行則脹滿自解通幽化濁湯主之

通幽化濁湯 自製
枳殼 一錢 青皮 一錢 木通 一錢五分

車前 二錢 赤苓 二錢 萸仁 三錢

厚朴 一錢 木香 五分 烏藥 一錢

穀芽 三錢

薑 三大片

膀胱脹者少腹滿而氣癢膀胱主藏津液氣化則出蓋水氣循下焦而滲入膀胱膀胱有下竅而無上竅津液之藏皆由氣化滲入然後能出寒氣上逆則水氣窒塞不通故少腹滿而小便癢也當理氣行水俾寒水得真陽而通利既濟湯主之。

既濟湯 自製

當歸 二錢 肉桂 五分 沉香 五分

醫醇賡義 卷四

美

廣皮 一錢 澤瀉 五分 牛膝 二錢

瞿麥 二錢 車前 二錢 苡仁 四錢

癸花子 四錢 炒研同煎

三焦脹者氣滿於皮膚中輕輕然而不堅上焦如霧中焦如漚下焦如瀆此狀其氣與水之流行而究無實在形質受寒氣逆故氣滿於皮膚之中因無形質故雖脹而輕輕然不堅也當調和氣血疏通行水通皮飲主之。

通皮飲 自製

廣皮 一錢 青皮 一錢 東瓜皮 二錢

茯苓皮 四錢 當歸 二錢 厚朴 一錢

枳殼 一錢 砂仁 一錢 澤瀉 五分

車前子 二錢

鮮薑皮 一錢

膈脹者脇下痛脹口中苦善太息膈為中正之官決斷出焉肝雖強非膈不能斷但氣血皆少

醫醇賡義 卷四

美

為清靜之府寒氣干之故脇痛口苦氣鬱不舒

故善太息也當輕揚和解後辛湯主之

後辛湯 自製

柴胡 一錢 鬱金 二錢 廣皮 一錢

當歸 二錢 茯苓 二錢 梔子皮 一錢 薑汁炒

蒺藜 四錢 枳殼 一錢 合歡花 二錢

佛手 五分

水脹

經曰目窠上微腫如新卧起之狀其頸脈動時咳陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也蓋上既目腫下又脛腫中則腹大水氣已徧行周身此必中州脾胃先敗土不勝水日積日甚泛濫不收甚頸脈動而時咳乃橫流溢出犯胃射肺病勢至此危急之至原非尋常之劑可以取效但舟車疏鑿等法又過於峻猛誠恐水氣雖去元

醫醇臚義卷四

素

氣隨亡仍歸於敗耳為製消陰利導煎主之消陰利導煎自製

| | | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|
| 當歸 | 二錢 | 茯苓 | 三錢 | 白朮 | 一錢五分 |
| 廣皮 | 一錢 | 厚朴 | 一錢 | 肉桂 | 五分 |
| 附子 | 八分 | 木通 | 五分 | 大腹皮 | 一錢五分 |
| 牛膝 | 一錢五分 | 澤瀉 | 一錢五分 | 車前 | 二錢 |
| 鮮薑皮 | 一錢 | 苡仁 | 一兩 | 煎湯代水 | |

膚脹者寒氣客於皮膚之間蹙蹙然不堅腹大

身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也此症由於內則宗氣失守虛氣無歸外則寒氣客於皮膚徧身流竄故腹大身腫而皮厚但氣為無形之邪雖腫而不堅按之則氣散而不能驟起當扶正祛寒理氣化濁祛寒建中湯主之

祛寒建中湯自製

當歸二錢 白芍一錢 茯苓二錢

醫醇臚義卷四

素

白朮一錢 附子八分 廣皮一錢
厚朴一錢 枳殼一錢 白朮六分
木香五分 煎炒

棗二枚 薑三片

鼓脹者腹脹身皆大大與膚脹等色蒼黃腹筋起此其候也此症外象雖與膚脹略同然色蒼黃腹筋起兩端便與前症迥別蓋黃為脾之本色蒼則木氣勝而見於脾腹起青筋則肝邪熾

盛而脾土敗壞症勢甚危當扶土抑木兼化陰邪扶抑歸化湯主之

扶抑歸化湯 自製

- 黨參 三錢
- 茯苓 二錢
- 白朮 一錢五分
- 當歸 二錢
- 附子 八分
- 木瓜 一錢
- 青皮 一錢
- 蒺藜 三錢
- 廣皮 一錢
- 厚朴 一錢
- 木香 五分
- 砂仁 一錢
- 牛膝 二錢
- 車前 二錢

醫醇賡義 卷四 三

薑三大片

附腫脹門諸方

金匱防己黃芪湯 治水腫

- 防己 一兩
- 黃芪 一兩
- 白朮 三兩

甘草 五錢

棗一枚薑七片水煎分溫服

防己茯苓湯 治水腫

- 防己 三兩
- 黃芪 一兩
- 桂枝 二兩

茯苓 六兩 甘草 二兩

水煎分溫服

枳朮湯 治水腫

枳實 七枚 白朮 二兩

水煎分溫服

實脾散 治陰水發腫用此先實脾土

- 厚朴 一兩
- 白朮 一兩
- 木瓜 一兩

- 大腹皮 一兩
- 附子 一兩
- 木香 一兩

醫醇賡義 卷四 三

- 草菓 一兩
- 茯苓 一兩
- 乾薑 一兩

甘草 五錢

每用四錢水煎服

復元丹 治脾腎俱虛發為水腫四肢虛淨心腹堅脹小便不通兩目下腫

附子 二兩

- 木香 一兩
- 茴香 一兩

- 川椒 一兩
- 厚朴 一兩
- 獨活 一兩

- 白朮 一兩
- 陳皮 一兩
- 吳茱 一兩

桂心 一兩 澤瀉 五錢 肉桂 五錢

檳榔 五錢 研末糊丸如梧子大每服五十九

導滯通幽湯 治脾濕有餘氣不宣通而目手

足浮腫

木香 五錢 白朮 五錢 桑皮 五錢

陳皮 五錢 茯苓 一兩

水煎分溫服

醫醇賸義 卷四

三

胃苓湯 治水腫

陳皮 五錢 蒼朮 五錢 厚朴 五錢

甘草 六分 白朮 一錢 茯苓 一錢

澤瀉 一錢 猪苓 一錢 官桂 三分

水煎服

驅風敗毒散 治風水皮水凡在表宜從汗解

者

人參 一錢 獨活 一錢 桔梗 一錢

柴胡 一錢 枳殼 一錢 羌活 一錢

茯苓 一錢 川芎 一錢 前胡 一錢

甘草 一錢 荆芥 一錢 防風 一錢

薑三片

調榮散 治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮

肉赤紋名為血

蓬木 川芎 當歸 延胡索 白芷

檳榔 陳皮 赤芍 桑皮 大腹皮

醫醇賸義 卷四

三

赤芍 葶藶 瞿麥 各一錢 大黃 五分

細辛 官桂 甘草 各五分

紅棗二枚 薑三片

防已散 治皮水腫如裏水在皮膚中四肢習

習然動

防已 一兩 桑皮 一兩 黃芪 一兩

桂心 五錢 赤芍 二兩 甘草 五錢

每用五錢水煎服

導水茯苓湯 治頭面偏身腫如爛瓜手按之塌陷手起則隨手而起喘滿倚息小便澁少赤苓 麥冬 澤瀉 白朮 各三兩 桑皮 紫蘇 檳榔 木瓜 各一兩 大腹皮 陳皮 砂仁 木香 各七錢五分 每用五錢燈草二十五根如病重者可用藥五兩再加麥冬二兩燈草五錢水一斗於砂鍋內熬至一大盞溫服

醫醇賡義 卷四

毒

人參芎歸湯 治煩躁喘急虛汗厥逆小便赤

大便黑名血脹

人參 二錢五分 肉桂 二錢五分 五靈脂 二錢五分
 烏藥 五錢 蓬朮 五錢 木香 五錢
 砂仁 五錢 炙草 五錢 川芎 七錢
 當歸 七錢 半夏 七錢
 每用一兩紅棗二枚薑五片
 化滯調中湯 治脾弱氣脹

白朮 一錢五分 人參 一錢 茯苓 一錢
 陳皮 一錢 厚朴 一錢 山查 一錢
 半夏 一錢 神麴 八分 麥芽 八分
 砂仁 七分 薑 三片
 人參丸 治經脈不利化為水流走四肢悉皆腫滿名曰血分其候與水相類若作水治非也宜服此

醫醇賡義 卷四

毒

人參 當歸 大黃 肉桂 瞿麥

赤芍 茯苓 各五錢 葶藶 一錢

蜜丸如梧子大先服十五丸加至三十丸

見現丸 治寒氣客於下焦血氣閉塞而成痕

聚腹中堅大久不消者

附子 四錢 鬼箭羽 三錢 紫石英 三錢

澤瀉 二錢 肉桂 二錢 延胡索 二錢

木香 二錢 檳榔 二錢 血竭 一錢五分

水蛭一錢 三稜五錢 桃仁三十粒
大黃二錢

酒糊丸如梧子大每服三十九

溫胃湯 治憂思結聚陽不能通大腸與胃氣

不和脹滿上衝

附子 厚朴 當歸 白芍 人參

甘草 陳皮 各一錢五分 乾薑一錢 川椒三分

水煎服

醫醇賸義 卷四

美

強中湯 治寒傷脾胃致成脹滿甚則腹痛

人參二錢 青皮二錢 廣皮二錢

丁香二錢 白朮一錢五分 附子一錢

草菓一錢 乾薑一錢 厚朴一錢

甘草五分

水煎服

五皮飲 治水病腫滿上氣喘急

陳皮一錢 青皮一錢 茯苓皮五錢

大腹皮一錢五分 鮮薑皮一錢

水煎服

中滿分消丸 治中滿鼓脹氣脹熱脹

厚朴一兩 枳實五錢 黃連五錢

黃芩五錢 半夏五錢 陳皮四錢

知母四錢 澤瀉三錢 茯苓二錢

砂仁二錢 乾薑二錢 薑黃一錢

人參一錢 白朮一錢 甘草一錢

醫醇賸義 卷四

美

猪苓一錢 蒸餅丸如梧子大每服五六十九

中滿分消湯 治中滿寒脹二便不通四肢厥

逆

川烏一錢 乾薑一錢 畢沅茄一錢

生薑一錢 黃連五分 人參一錢

當歸一錢五分 澤瀉一錢五分 青皮一錢

麻黃五分 柴胡一錢 吳萸五分

草薢五分 厚朴一錢 黃芪一錢
 黃柏五分 益智三分 木香三分
 半夏三分 茯苓一錢五分 升麻三分
 水煎服

舟車丸 治水腫水脹形氣俱實

黑牽牛四兩 大黃二兩 酒浸 甘遂一兩 麵煨
 大戟一兩 芫花一兩 青皮一兩
 橘紅一兩 木香五錢 輕粉一錢

醫醇賡義 卷四 美

水泛丸每服三十粒

疏鑿飲子 治遍身水腫喘呼口渴大小便秘

羌活 秦艽 檳榔 大腹皮 茯苓皮
 椒目 木通 澤瀉 商陸 赤小豆各等分
 鮮薑皮一錢

下利

下利一症內經謂之腸澼。後來論症者不下數
 卜家。其專主腸胃而言者固屬掛漏。其主濕熱

及招涼食冷者亦不過時痢一門。至分賸內傷
 外感三陰三陽。虛實寒熱則頗為詳明。周至矣。
 但虛者補之。實者瀉之。寒者溫之。熱者清之。本
 屬定法。豈獨痢症為然。愚意尚有吃聚兩條。試
 申言之。外感各有主病。內傷各有主經。從此分
 別更易下手。外感之邪不外風寒暑濕燥火。風
 入腸胃故為殞泄。內犯於肝寒氣中人腹痛下
 利。內犯於腎暑濕鬱蒸腹痛下利。兼有赤白內

醫醇賡義 卷四 美

犯於脾燥氣中人口渴心煩下利白帶。內犯於
 肺火邪熾盛渴飲不止下利膿血頻數不休。內
 犯於心此外感六淫與五臟相應者也。至內傷
 之症傷於肝者脇痛腹痛作噎下利傷於腎者
 腹痛腰痛身冷下利傷於脾者胸懣身重噦惡
 食少下利傷於肺者口燥咽乾微咳下利傷於
 心者煩躁渴飲下利不休。此內傷之所致也。感
 於風者表解之感於寒者溫通之感濕熱者清

利之感於燥者清潤之感於火者滌蕩之當各隨所主之病以施治傷肝者解其鬱傷腎者保其陽傷於脾者運其中傷於肺者存其津傷於心者泄其亢當各隨所主之經以施治此特就內傷外感兩義縷析言之其他各症痢症滯參所已載者概不復贅

感風下利身熱脈微弦者迴風外解湯主之
迴風外解湯 自製

醫醇賸義 卷四

單

| | | |
|-------|-------|-------|
| 柴胡 一錢 | 薄荷 一錢 | 前胡 一錢 |
| 桔梗 一錢 | 枳殼 一錢 | 葛根 二錢 |
| 豆豉 三錢 | 廣皮 一錢 | 茯苓 二錢 |
| 白木 一錢 | | |

薑皮 六分 荷葉 一兩

感寒下利腹痛手足冷舌白口不渴脈沉細者
溫中化濁湯主之甚者加附子
溫中化濁湯 自製

| | | |
|--------|--------|-------|
| 炮薑 五分 | 小茴香 一錢 | 烏藥 一錢 |
| 木香 五分 | 廣皮 一錢 | 厚朴 一錢 |
| 當歸 五分 | 茯苓 二錢 | 白木 一錢 |
| 佛手柑 五分 | | |

感暑濕者煩渴腹痛下利膿血粉米湯主之
粉米湯 自製

| | | |
|-------|-------|-------|
| 花粉 三錢 | 苡米 一兩 | 藿香 一錢 |
| 薄荷 一錢 | 黃連 五分 | 黃芩 一錢 |
| | | 酒炒 |

醫醇賸義 卷四

單

| | | |
|-------|-------|-------|
| 木香 五分 | 木通 一錢 | 當歸 一錢 |
| 赤芍 一錢 | 酒炒 | 五分 |

荷葉一角 菜豆一撮

感燥下利咽乾作渴腹痛下利白滯金玉保和湯主之

金玉保和湯 自製

| | | |
|--------|-------|-------|
| 金石斛 四錢 | 玉竹 三錢 | 婁皮 三錢 |
| 黃芩 一錢 | 酒炒 | 當歸 五分 |
| | | 茯苓 二錢 |

山藥 三錢 廣皮 一錢 枳殼 一錢

苡仁 四錢

荷葉一角 陳粳米一撮煎湯代水

火盛下利晝夜不休作渴腹痛時下膿血消炎

化毒湯主之

消炎化毒湯 自製

黃連 六分 黃芩 一錢 大黃 四錢

銀花 二錢 甘草 五分 花粉 二錢

醫醇賡義 卷四 聖

木通 一錢 青皮 一錢 當歸 一錢五分

赤芍 一錢

淡竹葉二十張

肝鬱下利脇痛腹痛噫氣食少大順湯主之

大順湯 自製

蒺藜 四錢 鬱金 二錢 烏藥 一錢

木香 五分 廣皮 一錢 厚朴 一錢

枳殼 一錢 青皮 一錢 茯苓 二錢

白朮 一錢

橘餅 四錢 煨薑三片

腎氣虛寒腹痛下利完穀不化手足俱冷者立命開陽湯主之

立命開陽湯 自製

乾河車 二錢 破故紙 一錢五分 合桃肉 半炒

益智仁 一錢五分 附子片 八分 當歸 一錢五分

茯苓 二錢 白朮 一錢 小茴香 一錢

醫醇賡義 卷四 聖

木香 六分 烏藥 一錢

煨薑三片

脾虛下利食少神疲胸腹時痛者大中湯主之

大中湯 自製

黨參 四錢 附子 七分 茯苓 三錢

白朮 一錢五分 當歸 二錢 廣皮 一錢

厚朴 一錢 枳殼 一錢 烏藥 一錢

木香 五分

大棗二枚 薑三片

肺熱移於大腸口燥微咳下利白滯者育金煎

主之

育金煎 自製

沙參 三錢

石斛 三錢

茯苓 三錢

白木 一錢五分

山藥 三錢

料豆 三錢

當歸 二錢

橘紅 一錢

蓮子二十粒 打碎去心

醫醇臞義 卷四

齒

心火下陷煩擾不安下利膿血者蒲虎湯主之

蒲虎湯 自製

生蒲黃 各六分

琥珀 一錢

丹參 三錢

茯神 二錢

當歸 二錢

赤芍 一錢

黃連 六分

木香 五分

燈心三尺

附下利門諸方 錄其醇粹少疵者以備參用

芍藥湯 行血則便自愈調氣則後重除

芍藥 一兩

當歸 五錢

黃連 五錢

黃芩 五錢

大黃 三錢

肉桂 二錢五分

甘草 二錢

檳榔 二錢

木香 一錢

每用五錢水煎服

白木黃芩湯

服前藥痢疾雖除更宜調和

白木 二兩

黃芩 七錢

甘草 三錢

水煎分三服

黃連阿膠丸

治冷熱不調下利赤白裏急後

醫醇臞義 卷四

鑿

重膈腹痛口燥煩渴小便不利

黃連 三兩

茯苓 二兩

阿膠 一兩

以連芩為細末水熬阿膠為丸如梧子大每

服三十九丸空心米湯下

白頭翁湯

治熱痢下重欲飲水者

白頭翁 二兩

黃連 三兩

黃柏 三兩

秦皮 三兩

水七升煮三升分溫服

加減平胃散 治腸紅血痢

白朮 一兩 厚朴 一兩 陳皮 一兩

木香 三錢 檳榔 三錢 甘草 七錢

桃仁 五錢 人參 五錢 黃連 五錢

阿膠 五錢 茯苓 五錢

每服五錢棗二枚薑三片水煎服

蒼朮地榆湯 治脾經受濕血痢

蒼朮 三兩 地榆 一兩

醫醇賡義 卷四 痢

每服一兩水煎服

槐花散 治腸風血痢

槐花 青皮 荆芥穗 等分

研末每用五錢水煎服

犀角散 治熱痢下赤黃膿血心腹困悶

犀角屑 一兩 黃連 二兩 地榆 一兩

黃芪 一兩 當歸 五錢 木香 二錢

研末每服三錢水煎服

羚羊角丸 治一切熱痢及休息痢日夜頻數

併治下血黑如雞肝色

羚羊角 一兩 黃連 二兩 黃柏 一兩

赤苓 五錢

研末蜜和丸如桐子大每服二十九薑蜜湯

下暑月下利用之尤驗

生地黃湯 治熱痢不止

生地 五錢 地榆 七錢 甘草 二錢

醫醇賡義 卷四 痢

水煎服

鬱金散 治一切熱毒痢下血不止

川鬱金 五錢 槐花 五錢 甘草 二錢

研末每服一二錢食前用豆豉湯調下

茜根散 治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食

茜根 一兩 地榆 一兩 生地 一兩

當歸 一兩 犀角 一兩 黃芩 一兩

梔子 五錢 黃連 二兩

每服四錢水二鍾入豆豉五十粒薤白七

寸煎六分溫服

十寶湯 治冷痢如魚腦者

黃芪 四兩 熟地 一兩 人參 一兩

茯苓 一兩 當歸 一兩 白朮 一兩

半夏 一兩 白芍 一兩 五味 一兩

官桂 一兩 甘草 五錢

研末每服二錢水二鍾加薑三片烏梅一个

醫醇賸義 卷四 痢

煎六分食前溫服

芍藥黃芩湯 治泄利腹痛或後重身熱及下

膿血稠粘

黃芩 一兩 芍藥 一兩 甘草 五錢

每服一兩水二鍾煎六分溫服如痛加桂少

許

香連丸 治下利赤白裏急後重

黃連 二十兩 吳萸 十兩 木香 四兩 炒赤去之 錢八分

研末醋糊丸如梧子大每服三十丸

地榆芍藥湯 治瀉痢膿血脫肛

蒼朮 八兩 地榆 三兩 卷柏 三兩

芍藥 三兩

參苓白朮散 治久瀉及痢後調理者尤宜

人參 一斤 山藥 一斤 蓮子 一斤

白朮 二斤 砂仁 一斤 桔梗 一斤

扁豆 一斤 茯苓 一斤 苡仁 一斤

醫醇賸義 卷四 痢

甘草 一斤

研末每服三錢米湯調下或加薑棗煎服

倉廩湯 治噤口痢有熱及毒氣衝心食入即

吐

人參 茯苓 甘草 前胡 川芎

羌活 桔梗 獨活 柴胡 枳殼

陳倉米 各等分

每服五錢薑三片水煎服

諸症

人之一身自頂至踵俱有痛病其始也或因於風或因於寒或因於火或因於氣病各不同而其為氣凝血滯則一也氣能捍衛則外感何由而入營能流灌則內病何自而生不通則痛理固宜然茲將痛病略舉其凡其咽痛疝痛肢節痛見於肺病疝病痺病中者不復贅

頭痛

醫醇賡義

卷四

辛

頭痛有因於風者肌表不固太陽受風巔頂作痛鼻竅微塞時流清涕香芷湯主之

香芷湯 自製

- | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|------|
| 香附 | 二錢 | 白芷 | 六分 | 當歸 | 一錢五分 |
| 川芎 | 八分 | 防風 | 一錢 | 桑葉 | 一錢 |
| 菊花 | 二錢 | 蟬衣 | 一錢 | 蔓荊子 | 一錢五分 |
| 桔梗 | 一錢 | | | | |
| 黑芝 | 二錢 | | | | |
| 蘇 | 三錢 | | | | |

有因於火者肝陽上升頭痛如劈筋脈掣起痛連目珠當壯水柔肝以息風火不可過用風藥蓋風能助火風藥多則火勢更烈也羚羊角湯主之

羚羊角湯 自製

- | | | | | | |
|-----|----|----|------|----|------|
| 羚羊角 | 二錢 | 龜版 | 八錢 | 生地 | 六錢 |
| 白芍 | 一錢 | 丹皮 | 一錢五分 | 柴胡 | 一錢 |
| 薄荷 | 一錢 | 菊花 | 二錢 | 夏枯 | 一錢五分 |

醫醇賡義

卷四

辛

蟬衣 一錢

紅棗十枚 生石決八錢 打碎

有血虛頭痛者自覺頭腦俱空目眊而眩養血勝風湯主之

養血勝風湯 自製

- | | | | | | |
|----|------|----|----|----|------|
| 生地 | 六錢 | 當歸 | 二錢 | 白芍 | 一錢五分 |
| 川芎 | 一錢 | 枸杞 | 三錢 | 五味 | 五分 |
| 棗仁 | 一錢五分 | 柏仁 | 二錢 | 杭菊 | 二錢 |

桑葉一錢

紅棗十枚 黑芝蔴三錢

眼痛

眼目之疾。本有專科。致病多端。非可枚舉。茲因痛病。姑拈虛實兩條。以發其凡。目睛紅腫。眵淚多。而目中如有沙子者。風火盛也。黃連清火湯主之。

黃連清火湯 自製

醫醇臈義 卷四

圭

黃連五分 元參一錢五分

赤芍一錢 丹皮一錢五分

荊芥一錢 防風一錢

蟬衣一錢 前胡一錢

竹葉十張 燈心三尺 芝蔴三錢

目睛不腫。微紅羞明。眼珠作痛。此為陰虛夾火。滋陰降火湯主之。

滋陰降火湯 自製

生地六錢

丹皮二錢

沙參四錢

杏仁三錢

生石決六錢

齒痛

齒痛實症。陽明風火上升也。葛根白虎湯主之。

葛根白虎湯 自製

圭

葛根二錢

石斛三錢

防風一錢

淡竹葉二十張

齒痛虛症。腎虧而夾有胃火也。齒為後天所生。之骨亦屬於腎。况腎為胃關。水不制火。故浮陽作痛也。清熱胃關煎主之。

清熱胃關煎 自製

女貞二錢

茯苓二錢

麥冬二錢

穀精珠一錢

生石決六錢

山藥三錢

料豆三錢

貝母二錢

蟬衣一錢

打碎

石膏五錢

連喬一錢五分

桔梗一錢

白茅根五錢

花粉三錢

薄荷一錢

生地 六錢 龜版 八錢 花粉 三錢

石斛 三錢 薄荷 一錢 葛根 二錢

連喬 一錢五分 桔梗 一錢

甘蔗三兩同煎

舌痛

舌卷而腫。塞口作痛。難於語言。此心陽熾盛也。先用生蒲黃三錢。泡湯頻嗽。再服清心飲。

清心飲 自製

醫醇賡義 卷四

黃連 五分 蒲黃 一錢五分 犀角 五分

元參 一錢五分 丹參 二錢 連喬 一錢五分

婁皮 三分 茯苓 二錢 薄荷 一錢

竹葉二十張 燈心三尺

舌色絳紅。邊尖破碎。舌有血痕而痛者。乃陰液大虧。心火上熾也。大澤湯主之。

大澤湯 自製 天冬 二錢 生地 六錢 人參 一錢五分

龜版 八錢 麥冬 一錢五分 茯神 二錢

柏仁 二錢 蛤粉 四錢 丹參 二錢

石斛 二錢

燈心三尺 藕五大片

肺氣脹痛

營衛不調。肺氣滿。則肺葉皆舉。微喘脇痛。瀉肺湯主之。

瀉肺湯 自製

醫醇賡義 卷四

全瓜 婁 一個 桑皮 三錢 蘇子 一錢五分

沉香 五分 茯苓 二錢 鬱金 二錢

杏仁 三錢 枳殼 一錢 苡仁 四錢

橘紅 一錢

薑兩片

心氣厥痛

心本純陽。寒邪上犯。陰陽相爭。厥逆作痛。雙解瀉心湯主之。

雙解瀉心湯 自製

黃連 五分 附子 八分 遠志 五分 甘草水炒

丹參 二錢 茯神 二錢 鬱金 二錢

廣皮 一錢 沉香 五分 合歡花 二錢

燈心三尺 薑三片

肝氣作痛

肝為將軍之官。其體陰。其用陽。故為剛臟。一有鬱結。氣火俱升。上犯胃經。痛連脇肋。加味左金

醫醇賸義 卷四

美

湯主之

加味左金湯 自製

黃連 五分 吳萸 二分 瓦楞子 三錢 煨研

畢沅茄 一錢 蒺藜 三分 鬱金 二錢

青皮 一錢 柴胡 一錢 醋炒 延胡索 一錢

木香 五分 廣皮 一錢 砂仁 一錢

佛手 五分

肝虛作痛

肝主藏血。故為血海。操煩太過。營血大虧。虛氣無歸。橫逆脹痛。調營飲肝飲主之。

調營飲肝飲 自製

歸身 二錢 白芍 一錢五分 酒炒 阿膠 一錢五分 蛤粉炒

枸杞 三錢 五味 五分 川芎 八分

棗仁 一錢五分 炒研 茯苓 二錢 廣皮 一錢

木香 五分

棗二枚 薑三片

醫醇賸義 卷四

美

脾濕脹痛

脾本濕土。寒邪乘之。寒與濕凝。是為重陰。脘下至當臍。脹滿作痛。悅脾湯主之。

悅脾湯 自製

白木 一錢 茅朮 一錢 茯苓 二錢

附子 八分 砂仁 一錢 木香 五分

烏藥 一錢 苡仁 四錢 青皮 一錢

神麩 三錢 炒

薑三片

腎氣厥痛

腎為水臟。寒邪相犯。水寒成冰。少腹厥痛。開陽湯主之。

開陽湯 自製

附子 八分

故紙 一錢五分

益智 一錢

當歸 二錢

杜仲 一錢

烏藥 一錢

木香 五分

廣皮 一錢

青皮 一錢

醫醇賡義 卷四

素

茯苓 二錢

薑三片

胃虛作痛

胃為穀海。其實而痛者。當消當攻。於結胸症內。已詳言之。茲但舉胃氣虛弱。腕中作痛者。養胃湯主之。

養胃湯 自製

白芍 一錢

茯苓 二錢

白朮 一錢

甘草 四分

山藥 三錢

黃芪 二錢

黨參 四錢

木香 五分

砂仁 一錢

廣皮 一錢

大棗 二枚 薑三片

胃寒作痛

胃氣虛寒。不能納穀。嘔吐作痛。桂朴湯主之。

桂朴湯 自製

肉桂 四分

厚朴 一錢

當歸 二錢

醫醇賡義 卷四

素

茯苓 二錢

白朮 一錢

丁香 五分

砂仁 一錢

白芍 一錢

廣皮

鬱金 二錢

棗 二枚 薑三片

胃中蟲痛

胃氣反逆。長蟲不安。其作痛也。陡然而來。截然而止。返蟄湯主之。

返蟄湯 自製

當歸二錢 茯苓二錢 白朮一錢
 苡仁四錢 廣皮一錢 鶴虱一錢五分
 雷丸一錢 烏藥一錢 砂仁一錢
 厚朴一錢

開口花椒二十四粒

三衝

新產之後以去瘀為第一。無病則服生化湯。有病則於治病藥中加生化湯。若惡露未行。不耐

醫醇臚義卷四

本

久坐平卧太早。必有三衝之患。一曰衝胃。胸脘痞懣。時時作嘔。去惡平胃散主之。一曰衝肺。氣喘鼻掀。頭汗微出。去惡肅肺湯主之。一曰衝心。頭眩神昏。不能語言。而斃矣。姑於萬分危險之中。勉立一法。以盡人事。去惡清心湯主之。

去惡平胃散 自製

當歸一錢 川芎一錢 桃仁一錢
 炮薑五分 炭查三錢 廣皮一錢

茅朮一錢 厚朴一錢 木香五分
 砂仁一錢

蘇木三分 降香五分

去惡清肺湯 自製

當歸一錢 川芎一錢 桃仁一錢
 炮薑五分 炭查三錢 延胡一錢
 蘇子二錢 桑皮三錢 橘紅一錢
 貝母二錢

醫醇臚義卷四

本

蘇木三分 降香五分 童便一杯沖服

去惡清心湯 自製

當歸二錢 川芎一錢 桃仁一錢五分
 炮薑六分 炭查三錢 延胡一錢
 琥珀一錢 生熟蒲黃各六分 丹參三錢
 牛膝二錢

燈心三尺 蘇木三分 降香五分

醫醇臚義卷四終

血證論
醫學一見

〔清〕唐宗海撰

據復旦大學圖書館藏清光緒十六年唐氏刻本影印原書版
框高二〇九毫米寬二九〇毫米

光緒庚寅年刊

血證論

唐氏家藏版

血證論原敘

先君子體羸善病故海早歲即習方書有志輒調治之癸酉六月驟得吐血繼復轉為下血查照各書施治罔效延請名宿仍無確見大約用調停之藥以俟病表而已因此徧覽方書每於血證當三致意時里中人甚謂鄉先輩楊西山先生所著失血大法得血證不傳之秘門下鈔存私為鴻寶吾以先君病故多方購求僅得一覽而其書議論方藥究亦未能精詳以之治病卒鮮成效乃廢然自返寢饋於內經仲景之書觸類旁通豁然心有所得而悟其言外之旨用治血證十愈七八今先君既逝

血證論原敘

而荆妻馮氏又得血疾親制方劑竟獲安全慨然曰大丈夫不能立功名於天下苟有一材一藝稍足補救於當時而又吝不忍傳陋哉爰將失血之證精微與義一一發明或伸古人所欲言或補前賢所未備務求理足方效不為影響之談書成自顧而轉憾悟道不早不能延吾父之壽也然猶幸此書之成可以救天下後世也時

光緒十年歲在甲申重九後一日容川唐宗海自敘

凡例

一血證自古絕少名論故是書條分縷析務求精詳間有煩文冗字意取明顯故不刪削

一時賢論及血證率多影響是書獨從內難仲景探源而出發揮盡致實補唐以下醫書之所不逮故除引經之外餘無採錄亦間有一二暗合者皆係偶同並非掠美識者鑒之

一是書分別門類眉目極清即不知醫者臨時查閱無不了然最便世用之書

一是書議論多由心得然其發明處要皆實事實理有憑有驗

血證論首卷上

凡例

或從古聖引伸或從西法參得信而有徵之說也並非杜撰可比

一是書單為血證說法與雜證不同幸勿執彼例此亦幸勿以此議彼

一是書單論血證外有中西醫判六經方證通解兩書嗣出始於雜證推闡無遺容後刊出再求賞析

血證論目錄

第一卷總論六條

陰陽水火血氣論

男女異同論

臟腑病機論

脈證生死論

用藥宜忌論

本書補救論

第二卷血上干證治十四條

吐血

嘔血

咯血

唾血

欬血

鼻衄

腦衄

巨衄

耳衄

齒衄

舌衄

大衄

零腥

吐膿

血證論目

第三卷血外滲證治七條

血汗

血箭

血痣

血瘰

瘡血

刀傷血

跌打血

第四卷血下泄證治六條

便血

便膿

尿血

月經血

崩帶

產血

第五卷血中瘀證治五條

瘀血

蓄血

血蟲

血腫付

經閉

胎氣

第六卷失血兼見諸證

| | | | |
|----------|----------|--------------------------------|----|
| 瘡癩 | 咳嗽 | 發熱 | 厥冷 |
| 寒熱 | 出汗 | 發渴 | 心煩 |
| 臥寐 夢寤 | 喘息 | 呃噦 | 痰飲 |
| 痞滿 積聚 癥瘕 | 腫脹 | 怔忡 | 驚悸 |
| 健忘 | 恍惚 癲狂 見鬼 | 眼目 <small>目黃出火見鬼 昏花目珠紅</small> | |
| 暈痛 | 耳病 | 口舌 | 咽喉 |
| 聲音 | 腹痛 | 痿廢 | 遺精 |
| 痺痛 | 淋濁 | 便閉 | 瀉泄 |

血證論 目

| | | | |
|----------|-------|----------------------|-----|
| 飲食 | 感冒 | 瘧掣 <small>拘急</small> | 暑疫 |
| 食復 | 勞復 怒復 | 時復 | 房勞復 |
| 附抱兒瘵論 | | | |
| 第七卷方解 | | | |
| 古今方共七十五條 | | | |
| 第八卷方解 | | | |
| 古今方共九十三條 | | | |
| 遺方續補 | | | |

血證論一卷

四川彭縣容川唐宗海著

陰陽水火氣血論

人之一身不外陰陽而陰陽二字即是水火水火二字即是氣血水即為氣火即為血何以言水即為氣哉氣著於物即化為水是明驗也蓋人身之氣外充皮毛內走腸胃上出口鼻下吸關元關元在膀胱腎間氣之根蒂也腎為水臟膀胱為水府氣即水中之陽隨太陽經脈布護於外則為衛氣上交於肺則為

血證論 卷一

呼吸五臟六腑息以相吹止此一氣而已然氣生於水即能化水水化於氣亦能病氣氣之所至水亦無不至焉故太陽之氣達於皮毛則為汗氣挾水陰而行於外者也太陽之氣上輸於肺膀胱腎中之水陰即隨氣升騰而為津液是氣載水陰而行於上者也氣化於下則水道通而為溺是氣行水亦行也設水停不化外則太陽之氣不達而汗不得出內則津液不生痰飲交動此病水而即病氣矣又有肺之制節不行氣不得降因而瘵閉滑數以及腎中陽氣不能鎮水為飲為瀉不一而足此病氣即病水矣總之氣與水本屬一家治氣即是治水治水即是

治氣是以人參補氣實則甘寒滋潤大生水津津液充足而肺金腴潤肺主氣其葉下垂以納氣得人參生津以補肺故氣得所補益焉即如小柴胡仲景自注云上焦得通津液得下胃氣因和是通津液即是和胃氣蓋津液足則胃上輸肺肺得潤養其葉下垂津液又隨之而下如雨露之降五臟戴澤莫不順利而濁陰全消亢陽不作肺之所以制節五臟者如此設水陰不足津液枯竭上則痿軟無水以濟之也下則閉結制節不達於下也外則蒸熱水陰不能濡於肌膚也凡此之證皆以生水為治法故清燥救肺湯生津以補肺氣豬苓湯潤利以除痰氣都

血證論卷一

氣丸補水以益腎氣即如發汗所以調衛氣也而亦戒火攻以傷水陰故用白芍之滋陰以收汗原用花粉之生津以救汗液即此觀之可知滋水即是補氣然補中益氣湯六君子腎氣丸是皆補氣之方也何以絕不滋水哉蓋無形之水陰生於下而濟於上所以奉養是氣者也此水則宜滋有形之水質入於口而化於下所以傳導是氣者也此水則宜瀉若水質一停則氣便阻滯故補中湯用陳朮以制水六君子用苓半以利水腎氣丸亦用利水之藥以佐桂附桂附以氣藥化水苓澤即以利水之藥以化氣真武湯尤以朮苓利水為主此治水之邪即以治

治氣與滋水之陰即以補氣者固并行而不悖也且水邪不去則水陰亦不能生故五苓散去水邪而即能散津止渴並能發汗退熱以水邪去則水陰布故也然水陰不滋則水邪亦不能去故小柴胡通達津液而即能下調水道總見水行則氣行水止則氣止能知此者乃可與言調氣矣何以言火即為血哉血色赤大之色也大者心之所主化生血液以濡周身火為陽而生血之陰即賴陰血以養火故火不上炎而血液下注內藏於肝寄居血海由衝任帶三脈行達周身以溫養肢體男子則血之轉輸無從規驗女子則血之轉輸月事時下血下注於血海

血證論卷一

之中心火隨之下濟故血盛而火不亢烈是以男子無病而女子受胎也如或血虛則肝失所藏木旺而愈動火心失所養火旺而益傷血是血病即大病矣治法宜大補其血歸地是也然血由火生補血而不清火則火終亢而不能生血故滋血必用清火諸藥四物湯所以用白芍天王補心湯所以用二冬歸脾湯所以用參仁仲景炙甘草湯所以用寸冬阿膠皆是清火之法至於六黃湯四生丸則又以大瀉火熱為主是火化太過反失其化抑之即以培之清火即是補血又有火化不及而血不能生者仲景炙甘草湯所以有桂枝以宣心火人參養榮湯所

以用遠志肉桂。以補心火。皆是補火生血之法。其有血寒血痺者。則用桂枝細辛艾葉乾薑等。稟受火氣之藥。以溫達之。則知治火即是治血。血與火原屬一家。知此乃可與言調血矣。夫水火氣血固是對子。然亦互相維繫。故水病則累血。血病則累氣。氣分之水陰不足。則陽氣乘陰。而干血陰分之血液不足。則津液不下。而病氣故汗出過多。則傷血。下後七津液則傷血。熱結膀胱。則下血。是水病而累血也。吐血欬血。必兼痰飲。血虛則精竭。水結痰凝不散。失血家往往水腫。瘀血化水。亦發水腫。是血病而兼水也。蓋在下焦則血海膀胱同居一地。在上焦則肺主

血證論 卷上

四

水道。心主血脈。又並域而居在軀殼外。則汗出皮毛。血循經脈。亦相倚而行。一陰一陽互相維繫。而况運血者。即是氣守氣者。即是血氣。為陽氣盛。即為火盛。血為陰。血虛即是水虛。一而二。二而一者也。人必深明此理。而後治血理氣。調陰和陽。可以左右逢源。又曰血生於心火。而下藏於肝。氣生於腎水。而上主於肺。其間運行上下者。脾也。水火二藏。皆係先天人之初胎。以先天生後天。人之既育。以後天生先天。故水火兩藏。全賴於脾。食氣入胃。脾經化汁。上奉心火。心火得之變化。而赤是之謂血。故治血者

必治脾為主。仲景炙甘草湯。皆是此義。以及大黃下血。亦因大黃秉土之色。而大泄地道故也。地黃生血。亦因地黃秉土之潤。而大滋脾燥故也。其餘參芪運血統血。皆是補脾。可知治血者。必以脾為主。乃為有要。至於治氣。亦宜以脾為主。氣雖生於腎中。然食氣入胃。脾經化水。下輸於腎。腎之陽氣。乃從水中蒸騰而上。清氣升而津液四布。濁氣降而水道下行。水道下行者。猶地有江河以流其惡也。津液上升者。猶土膏脈動而雨露升也。故治氣者。必治脾為主。六君子湯和脾利水以調氣。真武湯扶脾鎮水以生氣。十棗陷胸等湯。攻脾奪水以通氣。此去水邪以

血證論 卷上

五

補氣之法也。又有水津不灌。壯火食氣。則用人參滋脾以益氣。花粉清脾以和氣。凡治氣者。亦必知以脾為主。而後有得也。李東垣治病。以氣為主。故專主脾胃。然用藥偏於剛燥。不知脾不制水。固宜燥脾不升津。則宜滋氣。分不可留水。邪氣分亦不可無水津也。朱丹溪治病。以血為主。故用藥偏於寒涼。不知病在火熾。宜寒涼病在土穢。宜甘緩也。此論不專為失血立說。然治血者。必先知之。而後於調氣和血。無差爽云。

男女異同論 參看經血胎產門

世謂男子主氣。女子主血。因謂男子血貴。女子血賤。並謂男子之血與女子不同。而不知皆同也。其不同者。女子有月信。男子無月信。只此不同而已矣。夫同是血也。何以女子有月信。而男子無月信哉。蓋女子主血。血屬陰。而下行其行也。氣運之而行也。女子以血為主。未常不賴氣以運。血氣即是水。前論已詳。氣血交會之所在。臍下胞室之中。男子謂之丹田。女子謂之血室。實則肝腎所司。氣與血之總會。氣生於水。而化水。男子以氣為

血證論 卷一

六

主。故血入丹田。亦從水化。而變為水。以其內為血所化。故非清水。而極穠極稠。是之謂腎精。女子之氣。亦仍能復化為水。然女子以血為主。故其氣在血室之內。皆從血化。而變為血。是之謂月信。但其血中。仍有氣化之水。液故月信亦名信水。且行經前後。均有淡色之水。是女子之血。分未嘗不借氣分之水。以引動而運行之也。知此。則知男子之精。屬氣。屬水。而其中未嘗無血。無火。且知女子之經。屬血。屬火。而其中未嘗無氣。無水。是以男子精薄。則為血虛。女子經病。則為氣滯也。問曰。男子主氣。女子主血。其中變化。誠如茲之所云矣。而女子何以必行經。男子何

以不行。經。答曰。經血者。血之餘也。夫新故乘除。天地自然之理。故月有盈虧。海有潮汐。女子之血。除舊生新。是滿則溢。盈必虧之道。女子每月則行經一度。蓋所以洩血之餘也。血主陰。而下。所以從下洩。而為經血。至於男子。雖無經。可驗。然亦必洩。其餘。男子以氣為主。氣主陽。而上行。故血餘不從下洩。而隨氣上行。循衝任脉。上繞唇頤。生為鬚鬚。死為鬚鬚者。即所以洩血之餘也。所以女子有月信。上遂無鬚鬚。男子有鬚鬚。下遂無月信。所主不同。升降各異。只此分別而已。夫世謂男女血迥不侔。豈知變化之道哉。夫必明氣血水火變化運行之道。始可治氣血水

血證論 卷一

七

火所生之病。女子要血。循其常。男子亦要血。循其常。若血失常。道即為血不循經。在女子。雖無崩帶。亦不受胎。男子雖無吐衄。亦不榮體。至失常之至。則女子未有不崩帶。男子未有不吐衄者也。故女子血貴。調經。男子亦貴。調經。但男子吐衄。乃上行之血。女子崩帶。乃下行之血。不可例論耳。然使女子吐衄。則亦與男子無殊。男子下血。則亦與崩帶無異。故是書原非婦科。而於月經胎產。尤為詳悉。誠欲人觸類引伸。於治血。庶盡神歟。又曰。女子胞中之血。每月一換。除舊生新。舊血即是瘀血。此血不去。便阻化機。凡為醫者。皆知破血通經矣。獨於男女吐衄之

證便不知去瘀生新之法。抑思瘀血不行。則新血斷無生理。觀月信之去舊生新。可以知之。即瘡科治潰。亦必先化腐而後生肌。腐肉不化。則新血亦斷無生理。且如有膿管者。必爛開腐肉。取去瘀骨而後止。治失血者。不去瘀而求補血。何異治瘡者。不化腐而求生肌哉。然又非去瘀是一事。生新另是一事也。蓋瘀血去。則新血已生。新血生。而瘀血自去。其間初無間隔。即如月信下行。是瘀去也。此時新血已萌動於血海之中。故受孕焉。非月信已下多時。然後另生新血也。知此。則知以去瘀為生新之法。並知以生新為去瘀之法。生血之機。有如此者。而生血之原。

血證論 卷一

則又在於脾胃。經云中焦受氣。取汁變化而赤。是為血。今且舉一可見者言之。婦人乳汁。即脾胃飲食所化。乃中焦受氣所取之汁也。婦人乳子。則月水不行。以此汁既從乳出。便不下行。變血矣。至於斷乳之後。則此汁變化而赤。仍下行。而為經。血人皆知。催乳須補脾胃。而不知滋血。尤須補脾胃。益血即乳也。知催乳法。便可知補血法。但調治脾胃。須分陰陽。李東垣後重脾胃者。但知宣補脾陽。而不知滋養脾陰。脾陽不足。水穀固不化。脾陰不足。水穀仍不化也。譬如釜中煮飯。釜底無火。固不熟。釜中無水。亦不熟也。予親見脾不思食者。用溫藥而反減。用涼藥而

反快。予親見催乳者。用芪朮鹿茸而乳多。又親見催乳者。用芪朮鹿茸而乳轉少。則以有宜不宜耳。是故宜補脾陽者。雖乾薑附子。轉能生津。宜補脾陰者。雖知母石膏。反能開胃。補脾陽法。前人已備言之。獨於補脾陰。古少發明者。予特標出。俾知一陰一陽。未可偏廢。

補脾陰以開胃進食。乃吾臨證悟出。而借傷寒論存津液三字為據。此外固無證據也。書既成。後得泰西洋人醫法五種。內言胃之化穀。乃胃汁化之。并有甜肉汁。苦胆汁。皆入腸胃化穀。所謂汁者。即予所謂津液也。西醫論臟腑。多言物而遺理。如此條。

血證論 卷一

者。實指其物。而尚不與理相背。適足以證予所論。故並志之。

臟腑病機論

臟腑各有主氣。各有經脈。各有部分。故其主病。亦各有見證之不同。有一臟為病。而不兼別臟之病者。單治一臟而愈。有一臟為病。而兼別臟之病者。兼治別臟而愈。業醫不知臟腑。則病原莫辨。用藥無方。烏親其能治病哉。吾故將臟腑大旨。論列於後。庶幾於病證藥方。得其門徑云。

有名而無物。即心中之火氣也。然此氣非虛懸無着。切而指之。乃心中一點血液。湛然朗潤。以含此氣。故其氣時有精光。發見。即為神明。心之能事。又主生血。而心竅中數點血液。則又血中之最精微者。乃生血之原泉。亦出神之淵海。血虛則神不安。而怔忡。有瘀血亦怔忡。火擾其血。則懊懣。神不精明。則虛煩不眠。動悸驚惕。水飲剋火。心亦動悸。血攻心。則昏迷痛欲死。痰入心。則癩火亂心。則狂。與小腸相為表裡。遺熱於小腸。則小便赤澀。火不下交於腎。則神浮夢遺。心之脈上挾咽喉。絡於舌本。實火上壅。為喉痺。虛火上升。則舌強不能言。分部於胸前。火結則為

血證論卷一

十

結胸為痞。為火痛。火不宣發。則為胸痺。心之積曰伏梁。在心下。大如臂。病則臍上有動氣。此心經主病之大旨也。包絡者。心之外衛。心為君主之官。包絡即為臣。故心稱君火。包絡稱相火。相火心經宣布火化。此心之能事。皆包絡為之。見證治法亦如心臟。肝為風木之臟。膽寄其間。膽為相火。木生火也。肝主藏血。血生於心。下行胞中。是為血海。凡周身之血。總視血海為治亂。血海不擾。則周身之血無不隨之而安。肝經主其部分。故肝王藏血焉。至其所以能藏之故。則以肝屬木。木氣冲和條達。不致遏鬱。

則血脈得暢。設木鬱為火。則血不和。火發為怒。則血橫決。吐血錯經。血痛諸證。作焉。怒太甚。則狂。火太甚。則頰腫面青。目赤頭痛。木火剋土。則口燥泄痢。餓不能食。回食逆滿。皆係木鬱為火之見證也。若木挾水邪上攻。又為子借母勢。肆虐脾經。痰飲泄瀉。嘔吐頭痛之病。又作矣。木之性主於疎泄。食氣入胃。全賴肝木之氣以疎泄之。而水穀乃化。設肝之清陽不升。則不能疎泄。水穀滲瀉中滿之證。在所不免。肝之清陽。即魂氣也。故又主藏魂。血不養肝。火擾其魂。則夢遺不寐。肝又主筋。瘕瘕囊縮。皆屬肝病。分部於季脇。少腹之間。凡季脇少腹疝痛。皆責於肝。其經

血證論卷一

十一

名為厥陰。謂陰之盡也。陰極則變陽。故病至此。厥深熱亦深。厥微熱亦微。血分不和。尤多寒熱并見。與少陽相表裡。故肝病及膽。亦能吐酸嘔苦。耳聾目眩。於位居左。多病左脇痛。又左脇有動氣。肝之主病。大畧如此。膽與肝連。司相火。膽汁味苦。即火味也。相火之宣布在三焦。而寄居則在膽府。膽火不旺。則虛怯驚悸。膽火太亢。則口苦嘔逆。目眩耳聾。其經繞耳故也。界居身側。風火交煽。則身不可轉。側手足抽掣。以表裡言。則少陽之氣內行三焦。外行腠理。為榮衛之樞機。逆其樞機。則嘔吐胸滿邪客。腠理入與陰爭。則熱出與

陽爭則寒。故痿疾少陽主之。虛勞骨蒸亦屬少陽。以榮衛廢理之間不和。而相火熾甚故也。相火挾痰則為癩癩。相火不戢則肝魂亦不甯。故煩夢遺精。且膽中相火如不亢烈則為清陽之木氣。上升於胃。胃上得其疎達。故水穀化元烈則清陽遏鬱。脾胃不和。胸脇之間骨盡處。乃少陽之分。病則其分多痛。經行身之側痛則不利。屈伸。此膽經主病之大畧也。胃者倉廩之官。主納水穀。胃火不足則不思食。食入不化。良久仍然吐出。水停胸膈。寒客胃中。皆能嘔吐不止。胃火炎上則飢不能食。拒隔不納。食入即吐。津液枯竭則成膈食。糞如羊屎。火

血證論卷一

十二

甚則結鞭。胃家實則譫語。手足出汗。肌肉潮熱。以四支肌肉皆中宮所主故也。其經行身之前。至面上。表證目痛鼻乾。發瘧不能仰。開竅於口。口乾咽痛。氣逆則噦。又與脾相表裡。遺熱於脾。則從濕化。發為黃痺。胃實脾虛則能食而不消化。主燥氣。故病陽明。總係燥熱。獨水泛水結。有心下如盤等證。乃為寒病。胃之大畧其病如此。脾稱濕土。土濕則滋生萬物。脾潤則長養臟腑。胃土以燥納物。脾土以濕化氣。脾氣不布則胃燥而不能食。食少而不能化。譬如釜中無水不能熟物也。故病膈食大便難。口燥唇焦不能生

血。血虛火旺發熱盜汗。若濕氣太甚則穀亦不化。痰飲瀉泄腫脹腹痛之證。作焉。濕氣挾熱則發黃發癩。腹痛狀熱。手足不仁。小水赤澀。脾積名曰痞。氣在心下如盤。脾病則當臍有動氣。居於中洲。主灌四旁。外合肌肉。邪在肌肉則手足蒸熱。汗出或肌肉不仁。其體陰而其用陽。不得命門之火以生土。則土寒而不化。食少虛羸。土虛而不運。不能升達津液以奉心。化血滲灌諸經。經云脾統血。血之運行上下全賴乎脾。脾陽虛則不統血。脾陰虛又不能滋生血脈。血虛津少則肺不得潤。養是為土不生。金益土之生。金全在津液以滋之。脾土之義有如是者。

血證論卷一

十三

肺為乾金。象天之體。又名華蓋。五臟六腑受其覆。胃凡五臟六腑之氣皆能上薰於肺。以為病。故於寸口肺脈可以診知五臟。肺之令主行制節。以其居高清肅下行。天道下際而光明。故五臟六腑皆潤利而氣不亢。莫不受其制節也。肺中常有津液潤養其金。故金清火伏。若津液傷則口渴氣喘。癆瘵欬嗽。水源不清而小便澀。遺熱大腸而大便難。金不制木則肝火旺。火盛刑金則蒸熱喘欬。吐血癆瘵並作。皮毛者肺之合也。故凡膚表受邪皆屬於肺。風寒襲之則皮毛洒淅。容於肺中則為肺脹。為水飲衝肺。以其為嬌臟。故畏火亦畏寒。肺開竅於鼻。主呼吸。為氣

之總司。蓋氣根於腎。乃先天水中之陽。上出於鼻。肺司其出納。腎為水。肺為天。金水相生。天水循環。腎為生水之原。肺即為制氣之主也。凡氣喘欬息。故皆主於肺。位在胸中。胸中痛。屬於肺。主右脇。積曰息。責病則右脇有動氣。肺之為義。大率如是。腎者水臟。水中含陽。化生元氣。根結丹田。內主呼吸。達於膀胱。運行於外。則為衛氣。此氣乃水中之陽。別名之曰命火。腎水充足。則火之藏於水中者。韜光匿影。龍雷不升。是以氣足而鼻息細微。若水虛。則火不歸元。喘促虛勞。諸證并作。咽痛聲啞。心腎不交。遺精失血。腫滿欬逆。痰喘盜汗。如陽氣不足者。則水泛為

血證論卷一

十四

痰。凌心沖肺。發為水腫。腹痛奔豚。下利厥冷。亡陽大汗。元氣暴脫。腎又為先天。主藏精氣。女子主天癸。男子主精。水足則精血多。水虛則精血竭。於體主骨。骨痿故屬於腎。腎病者。膝下有動氣。腎上交於心。則水火既濟。不交則火愈亢。位在腰。王腰痛。開竅於耳。故虛則耳鳴耳聾。腫人屬腎。虛則神水散縮。或發內障。虛陽上泛。為咽痛頰赤。陰虛不能化水。則小便不利。陽虛不能化水。小便亦不利也。腎之病機。有如此者。膀胱者。貯小便之器。經謂洲都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。此指汗出。非指小便。小便雖出於膀胱。而實則肺為水之上源。

上源清。則下源自清。脾為水之隄防。隄防利。則水道利。腎又為水之主。腎氣行。則水行也。經所謂氣化。則能出者。謂膀胱之氣。載津液上行外達。出而為汗。則有雲行雨施之象。故膀胱稱為太陽經。謂水中之陽。達於外。以為衛氣。乃陽之最大者也。外感則傷其衛陽。發熱惡寒。其經行身之背。上頭項。故頭項痛。背痛。角弓反張。皆是太陽經病。皮毛與肺合。肺又為水源。故發汗須治肺。利水亦須治肺。水天一氣之義也。位居下部。與胞相連。故血結亦病水。水結亦病血。膀胱之為病。其畧有如此。三焦者。有名而無象。乃統軀殼之內。合上中下三停。而總名之。

血證論卷一

十五

曰三焦。夫既無定位。何以必存其名哉。蓋三焦實有主氣。如太虛之中。皆積氣也。知太虛非虛。則知三焦亦非虛名矣。氣之根在腎。為命火。充於三焦。異其名曰相火。三焦之氣。即是命火之氣。其所以為決瀆之官者。蓋膀胱司有形之水。水無氣。則不行。必得三焦之火。以化之。而後決瀆通快。三焦相火。又游行於腠理之間。故腠理生熱發寒。亦治三焦。小腸受盛之官。變化出焉。上接胃府。下接大腸。與心為表裡。遺熱則小水不清。與脾相連。屬土。虛則水穀不化。其部分上與胃接。故小腸燥。屎多借胃藥治之。下與肝相近。故小腸氣痛。多借

肝藥治之。

大腸司燥金喜潤而惡燥寒則滑脫熱則秘結泄痢後重痔漏下血與脾相表裡故病多治肺以治之與胃同是陽明之經故又多借治胃之法以治之。

以上條列皆臟腑之性情部位各有不同而主病亦異治雜病者宜知之治血證者亦宜知之臨證處方分經用藥斯不致南轅北轍耳。

脈證死生論

血證論 卷一

十六

醫者所以治人之生者也。未知死焉知生知死之無可救藥則凡稍有一毫之生機自宜多方調治以挽回之。欲辨死生雖明脈證高士宗以吐血多者為絡血吐血少者為經血謂吐多者病輕吐少者病重而其實經散為絡絡散為孫絡如幹發為枝枝又有枝要皆統於一本也以經絡之血分輕重實則分無可分醫旨又謂外感吐血易治內傷吐血難療三指禪謂齒衄最輕鼻衄次之嘔吐稍重欬咯唾血為最重謂其病皆發於五臟而其血之來最深不似嘔吐之血其來出於胃間猶淺近也此如仲景近血遠血之義以此分輕重於理尚不差謬第鼻衄嘔

血證論 卷一

吐血雖近而輕而吐衄不止亦有氣隨血脫登時即死者欬咯唾血雖遠而重亦有一哈便出微帶數口不藥可愈者仍不可執以定死生矣夫載氣者血也而運血者氣也人之生也全賴乎氣血脫而氣不脫雖危猶生一線之氣不絕則血可徐生復還其故血未傷而氣先脫雖安必死以血為魄而氣為魂魄未絕而魂先絕未有不死者也故吾謂定血證之死生者全在魄氣之平否吐血而不發熱者易愈以榮雖病而衛不病陽和則陰易守也發熱者難治以血病氣亦蒸則交相為虐矣吐血而不欬逆者易愈欬為氣喘血傷而氣不喘是腎中之水能納其氣以歸根故易愈若欬不止是血傷火灼腎水枯竭無以含此真氣故上氣欬逆為難治再加喘促則陽無所附矣大便不溏者猶有轉機可用滋陰之藥以養其陽若大便溏則上越下脫有死無生再驗其脈脈不數者易治以其氣尚平脈數者難治以其氣太疾浮大草數而無根者虛陽無依沉細澀數而不緩者真陰損失皆為難治若有一絲緩象尚可挽回若無緩象或兼代散死不治矣凡此之類皆是陰血受傷而陽氣無歸故主不治若陰血傷而陽氣不浮越者脈雖虛微遲弱亦不難治但用溫補無不回生益陽虛氣弱者易治惟陰虛氣不附者為難

血證論 卷一

十七

四六九

治所謂血傷而氣不傷者。即以氣之不傷。而知其血尚木盡。損故氣猶有所歸附而易愈也。氣之原委。吾於水火血氣論已詳言之。參看自見。

用藥宜忌論

汗吐攻和為治雜病四大法。而失血之證。則有宜不宜。傷寒過汗。傷津液。吐血既傷陰血。又傷水津。則水血兩傷。恭然枯骨矣。故仲景於衄家。嚴戒發汗。衄忌發汗。吐咯可知矣。夫脈潛氣伏。斯血不升。發汗則氣發。洩吐血之人。氣最難斂。發洩不已。血隨

血證論卷一

十八

氣溢而不可遏。抑故雖有表證。止宜和散。不得徑用麻桂。羌獨果係因外感失血者。乃可從外表散。然亦須斂散兩施。毋令過汗。亡陰。蓋必知血家忌汗。然後可商取汗之法。至於吐法。尤為嚴禁。失血之人。氣既上逆。若見有痰涎而復吐之。是助其逆勢。必氣上不止矣。治病之法。上者抑之。必使氣不上奔。斯血不上溢。降其肺氣。順其胃氣。納其腎氣。氣下則血下。血止而氣亦平。復血家最忌是動氣。不但病時忌吐。即已愈後。另有雜證。亦不得輕用吐藥。往往因吐便發血證。知血證忌吐。則知降氣止吐。便是治血之法。或問血證多虛。汗吐且有不可。則攻下更當忌。

矣。予曰不然。血之所以上者。以其氣騰溢也。故忌吐汗。再動其氣。至於下法。乃所以折其氣者。血證氣盛火旺者。十居八九。當其騰溢而不可遏。正宜下之。以折其勢。仲景陽明證。有急下以存陰法。少陰證。有急下以存陰法。血證火氣太盛者。最恐亡陰。下之正是救陰。攻之不啻補之矣。特下之須乘其時。如實邪久留。正氣已不復支。或大便溏瀉。則英雄無用武之地。只可緩緩調停。純用清潤降利。以不違下之之意。斯得法矣。至於和法。則為血證之第一良法。表則和其肺氣。裡者和其肝氣。而尤照顧脾腎之氣。或補陰以和陽。或損陽以和陰。或逐瘀以和血。或瀉

血證論卷一

十九

水以和氣。或補瀉兼施。或寒熱互用。許多妙義。未能盡舉。四法之外。又有補法。血家屬虛癆門。未有不議補者也。即病家亦喜言補。諸書重補者。尤十之八九。而不知血證之補法。亦有宜有忌。如邪氣不去而補之。是關門逐賊。瘀血未除而補之。是助賊為殃。當補脾者。十之三四。當補腎者。十之五六。補陽者。十之二三。補陰者。十之八九。古有補氣以攝血法。此為氣脫者說。非為氣逆者說。又有引火歸元法。此為水冷火泛者立說。非為陰虛陽越者立說。蓋失血家如火未發。補中則愈。如火已發。則寒涼適足以伐五臟之生氣。溫補又足以傷兩腎之真陰。惟以甘寒

滋其陰而養其陽。血或歸其位耳。血家用藥之宜忌。大率如是。知其大要而後細閱全書。乃有把握。

本書補救論

世之讀朱丹溪書者。見其多用涼藥。於是廢熱藥。貽誤不少。而丹溪不任咎也。蓋丹溪之書。實未常廢熱藥。世之讀陳修園書者。見其多用熱藥。於是廢涼藥。為害尤多。而修園不任咎也。蓋修園之書。實未嘗廢涼藥。兩賢立論。不過救一時之偏明。一己之見。世之不善讀者。得其所詳。忽其所畧。豈知兩賢所略。

血證論

卷一

二十

亦曰人所已詳。吾固不必詳焉耳。初何嘗廢熱。不言哉。即如予作此書。亦多用涼藥。少用熱藥。然非棄熱藥而不用。特以血症宜涼者多。非謂血症全不用熱藥也。予於每條當用熱藥者。未嘗不反覆言之。慎毋誤讀是書。而有偏重涼藥之弊。總在分別陰陽。審症處方。斯無差忒。又予是書。為血症說法。與雜症不同。况此書以治雜症。固謬若執雜症以攻此書。尤謬。讀吾書者。未知流弊若何。吾且為此論。先下一針砭。

血證論二卷

四川彭縣容川唐宗海著

吐血

平人之血。暢行脈絡。充達肌膚。流通無滯。是謂循經。謂循其經常之道也。一旦不循其常。溢於腸胃之間。隨氣上逆。於是吐。出。蓋人身之氣。游於血中。而出於血外。故上則出為呼吸。下則出為二便。外則出於皮毛。而為汗。其氣沖和。則氣為血之帥。血隨之而運行。血為氣之守。氣得之而靜。謐氣結。則血凝。氣虛。則

血證論

卷二

吐血

一

血脫氣迫。則血走氣不止。而血欲止不可得矣。方其未吐之先。血失其經常之道。或由背脊走入膈間。由膈間溢入胃中。病重者。其血之來。辟辟彈指。漉漉有聲。病之輕者。則無聲響。故凡吐血。胸背必痛。是血由背脊而來。氣迫之行。不得其和。故見背痛之證也。又或由兩脇肋走油膜入小腸。重則潮鳴有聲。逆入於胃。以致吐出。故凡失血。復多腰脇疼痛之證。此二者來路不同。治法亦異。由背上來者。以治肺為主。由脇下來者。以治肝為主。蓋肺為華蓋。位在背。與胸膈血之來路。既由其界。分溢出自當。治肺為是。肝為統血之臟。位在脇下。血從其地而來。則又以治

肝為是然肝肺雖係血之來路而其吐出實則胃主之也凡人吐痰吐食皆胃之咎血雖非胃所主然同是吐證安得不責之於胃况血之歸宿在於血海衝為血海其脈麗於陽明未有衝氣不逆上而血逆上者也仲景治血以治衝為要衝脈麗於陽明治陽明即治衝也陽明之氣下行為順今乃逆吐失其下行之令急調其胃使氣順吐止則血不致奔脫矣此時血之原委不暇究治惟以止血為第一要法血止之後其離經而未吐出者是為瘀血既與好血不相合反與好血不相能或壅而成熱或變而為癆或結痂或刺痛日久變證未可預料必亟為消除

血證論卷二吐血

二

以免後來諸患故以消瘀為第二法止吐消瘀之後又恐血再潮動則須用藥安之故以甯血為第三法邪之所繫其正必虛去血既多陰無有不虛者矣陰者陽之守陰虛則陽無所附久且陽隨而亡故又以補虛為收功之法四者乃通治血證之大綱而綱領之中又有條目今并詳於下方云
一止血其法獨取陽明陽明之氣下行為順所以逆上者以其氣實故也吐血雖屬虛證然係血虛非氣虛且初吐時邪氣最盛正雖虛而邪則實試思人身之血本自潛藏今乃大反其常有翻天覆地之象非實邪與之戰鬪血何從而吐出哉故不去

其邪愈傷其正虛者益虛實者愈實矣况血入胃中則胃家實雖不似傷寒證以胃有燥屎為胃家實然其血積在胃亦實象也故必亟奪其實釜底抽薪然後能降氣止逆仲景瀉心湯主之血多者加重便茅根喘滿者加杏仁厚朴血虛者加生地當歸氣隨血脫不歸根者加人參當歸五味附片有寒熱者加柴胡生薑或加乾薑艾葉以反佐之隨證加減而總不失其瀉心之本意則深得聖師之旨而功效亦大蓋氣之原在腎水虛則氣熱火之原在心血虛則火盛火熱相搏則氣實氣實則逼血妄行此時補腎水以平氣迂濶之談也補心血以配火不及之

血證論卷二吐血

三

治也故惟有瀉火一法除暴安良去其邪以存其正方名瀉心實則瀉胃胃氣下泄則心火有所消導而胃中之熱氣亦不上壅斯氣順而血不逆矣且大黃一味能推陳致新以損陽和陰非徒下胃中之氣也即外而經脈肌膚軀殼凡屬氣逆於血分之中致血有不和處大黃之性亦無不達蓋其藥氣最盛故能克而制之使氣之逆者不敢不順既速下降之勢又無遺留之邪今人多不敢用惜哉然亦有病之輕者割雞馬用牛刀萬可久十灰散亦可得效義取紅見黑即止之意其妙全在大黃降氣即以降血吐血之證屬實證者十居六七以上二方投之立

效然亦有屬虛屬寒者在吐血家十中一二為之醫者不可不知也。虛證去血太多其證喘促。精神氣不續。六脈細微。虛浮散數。此如刀傷出血。血盡而氣脈盡。危脫之證也。獨參湯救護其氣。使氣不脫。則血不奔矣。寒證。身不攝。陰血因而走溢。其證必見手足清冷。便溏。遺精。脈細。面色慘白。唇口淡和。或內寒外熱。必實見有虛寒。熱之其精。甘草乾薑湯主之。以陽和運陰血。日月一出。燭火無。退而陰血自守矣。然血係陰汁。失血則陰虛。剛燥之劑。不其斯忌。故此法未可輕用。什伯之中。亦間有陽不攝陰者。醫者不可造次。須細心參酌可也。

血證論 卷二 吐血

四

也。以上數法。用之得宜。無不立愈。其有較庸醫治壞而血不止者。延日已久。證多雜見。但用已上諸方。未能盡止血之法。審係瘀血不行而血不止者。血府逐瘀湯主之。火重者加黃芩。黃連。痰多者加雲苓。瓜霜。欬逆加杏仁。五味。寸冬。盜汗身熱加青蒿。冬桑葉。黃柏。牡蠣。喘者加杏仁。蘇子。身痛。胸腹滿。大便閉。為瘀結。加大黃。如欲求詳。參看痰瘀癆熱等門。乃盡其治。又有審病之因而分別以止其血者。治法尤不厭詳。因於酒及煎炒厚味之物者。其證脈數滑。口乾燥。胸中煩熱。大小便不利。宜用白虎湯。加茵陳。炒梔。大黃。藕節。治之。因於外感者。先見頭痛惡寒發

熱脈浮而緊者。為寒犯血分。外束閉而內逆壅。是以吐血。麻黃人參芍藥湯治之。若脈浮而數者。為傷風。風為陽邪。宜小柴胡湯。加荊芥。防風。當歸。白芍。丹皮。蒲黃。知母。石膏。杏仁。治之。若因瘟疫外證。頗似傷寒。而內有伏熱。攻發。口舌胎白。惡熱。羞明。小便短赤。大便濁垢。心中躁煩。脈見滑數。宜升降散。加桃仁。丹皮。花粉。生地。前仁。石膏。杏仁。甘草。治之。犀角地黃湯亦治之。若因於暑。則發熱。心煩。暑者濕熱。二氣合化之名也。以清熱利濕為主。升降清化湯。加防己。木通。前仁。治之。病輕者去大黃。因於怒氣逆上。血沸而吐者。宜丹梔逍遙散。加青皮。牡蠣。蒲黃。胆草。治

血證論 卷二 吐血

五

之氣。火太甚者。則用當歸。蘆薈。蒼九。以平其橫決。因於勞倦困苦。飢飽不勻。以及憂思抑鬱。心神怔忡。食少氣短。吐血虛煩者。宜用歸脾湯。主之。中土虛寒者。加煨薑。虛熱者。加柴胡。山梔。因於跌打損傷。以及用力努掙。而得失血之證者。法宜補氣以續其絕。消瘀以治其傷。四物湯。加黃芪。人參。續斷。桃仁。紅花。陳酒。童便。治之。因於色慾過度。陰虛火旺。其證夜則發熱。盜汗。夢交。耳鳴。不寐。六脈細數。芫草。宜地黃湯。加蒲黃。藕節。阿膠。五味。治之。止血之法。此其大畧。如欲變化而盡善。非參透全書。不能絲絲入穀。總而論之。血之為物。熱則行。冷則凝。見黑則止。遇寒亦止。

故有用熱藥止血者。以行血為止血。薑艾等是也。有用涼水止血者。或用急流水。或用井華水。取冷則凝之義。芩連諸藥。亦即冷止之義。有用百草霜。京墨。十灰散等。以止血者。取見黑則止之義。黑為水之色。紅為火之色。水治火。故止也。此第取水火之色。猶能相剋。而奏功。則能知水火之性。以消息用藥。何血證難治之有。又有用鹹以止血者。童便。馬通。揚塵水之類。此內經鹹走血之義。童便尤能自還神化。服制大邪。以滋腎水。大有功用。故世醫云。服童便者百無不生。不服童便者百無不死。本人小便。清晨每服一碗。名回龍湯。各種隨筆。贊回龍湯之妙者甚夥。

血證論卷二 吐血

六

病家皆所當服也。顧止血之法雖多。而總莫先於降氣。故沉香降香。蘇子。杏仁。旋覆。枳殼。半夏。貝厚。朴香。附之類。皆須隨宜取用。而大黃一味。既是氣藥。即是血藥。止血而不留瘀。尤為妙藥。識得諸法。其於止血之用。思過半矣。夫所謂止血者。非徒止其溢入胃中之血。使不吐而已也。蓋大吐之時。經脈之血。輻輳而至。其溢入胃中者。聽其吐可也。下可也。即停留胃中。亦與糟粕無異。固無大害也。獨動於經脈之中。而尚未溢出者。若令溢出。則不可復返矣。惟急止之。使猶可復還。經脈仍循故道。復返而為沖和之血。所謂止血者。即謂此未曾溢出。仍可復還之。

血止之使不溢出。則存得一分血。便保得一分命。非徒止已入胃中之死血已耳。今醫動言止血。先要化痰。不知血初吐時。尚未停蓄。何處有痰。若先逐痰。必將經脈中已動之血。盡被消逐。則血愈枯。而病愈甚。安能免於虛損乎。惟第用止血。庶血復其道。不至奔脫。爾故以止血為第一法。

二消瘀血。既止後。其經脈中已動之血。有不能復還。故道者。上則着於背脊胸膈之間。下則着於脇肋少腹之際。着而不和。必見疼痛之證。或流注四肢。則為腫痛。或滯於肌腠。則生寒熱。凡有所瘀。莫不壅塞氣道。沮滯生機。久則變為骨蒸。乾血癆。瘰癧。

血證論卷二 吐血

七

可不急去之也。且經隧之中。既有瘀血。踞住則新血不能安行。無恙終必妄走而吐溢矣。故以去瘀為治血要法。用花蕊石散。令瘀血化水而下。且不動五臟真氣。為去瘀妙藥。如無花蕊石。用三七。鬱金。桃仁。牛膝。醋炒大黃。亦有迅掃之功。顧舊血不去。則新血斷。然不生而新血不生。則舊血亦不能自去也。譬諸君子之道。不長則小人之道。亦不消。須知瘀血之去。乃新血日生。瘀血無處可留。迫之不得。不去。故或化而走小便。或傳而入大腸。花蕊石化血。從小便去。醋黃散下血。從大便去。但能去瘀血。而不能生新血。不知克敵者存乎。將祛邪者賴乎。正不補血而。

去瘀瘀又安能盡去哉。治法宜用聖愈湯以補血。加桃仁丹皮紅花枳殼香附雲苓甘草補瀉兼行。瘀既去而正不傷。治瘀之法大指如是。然亦有宜用溫藥者。內經曰血者喜陰而惡寒。寒則澁而不流。溫則消而去之。且有熱伏陰分。涼藥不效。而宜用從治之法。以引陽出陰者。方用仲景柏葉湯。為寒凝血滯之正治。亦瘀血伏於陰分之從治法也。然三藥純溫。設遇火烈之證。非其所宜。或畧加柔藥調之。則合四物湯用。又有合瀉心湯用者。則直以此反佐之也。以上通論治瘀之法。而瘀血着留在身。上下內外。又各有部分。不同。分別部居。直探巢穴。治法尤百不

血證論卷二吐血

失一審。係血瘀上焦。則見胸背肩膊疼痛。麻木通滿等證。宜川血府逐瘀湯。或人參瀉肺湯。加三七鬱金荆芥。使上焦之瘀一並廓清。血瘀中焦。則腹中脹滿。腰脇着痛。帶脈繞臍一周。下連血室。女子以繫胎。男子以束體。乃血之管領也。凡係血證。未有帶脈不病者。今有瘀血滯於其分。則宜去之。以安帶脈。帶脈在中焦脾之部分。即從脾治之。觀仲景腎着湯。可知治脾。即是治帶。帶有瘀血。宜用甲己化土湯。加桃仁當歸薑黃。主之。腰痛甚者。加鹿角尖。脇腹痛甚者。加蒲黃重脂。血瘀下焦。腰以下痛。小腹季脇等處脹滿。是血瘀肝之部分。或積胞中。血海為痛。宜歸

芎芩笑散。主之。大便閉結者。均加大黃。仲景逐瘀大劑。則有抵當湯。桃仁承氣湯。數方。皆苦寒大破下。為治瘀能事。亦有當用溫藥下之者。生化湯及牛夕散。主之。本女科治產後惡露及胞衣不下之方。余謂男女雖異。其血則同。同是下焦瘀血。故借用其方。往往有驗。且下焦原係陰分。上焦之瘀。多屬陽熱。每以溫藥為忌。下焦之瘀。多屬陰凝。故產婦喜溫而忌寒。以其血在下焦也。知此。則知以溫藥治下焦瘀血。尤為合宜。然亦須審係寒凝。乃用溫藥。若血室熱。則仍是桃仁承氣之證。又有瘀血流注四肢。疼痛腫脹者。宜化去瘀血。消利腫脹。小調經湯。加知母雲

血證論卷二吐血

苓桑皮牛膝治之。又有瘀血客於肌腠。阻滯榮衛。發寒發熱。似瘧非瘧。骨蒸盜汗。欬逆交作。用小柴胡湯。加當歸桃仁丹皮白芍。主之。寒甚者。再加芥穗細辛。熱甚者。再加花粉粉葛青蒿。知母。效有痰火。加瓜霜杏仁。寸冬五味雲苓。知母。水飲上沖。加葶應子。益小柴胡。原是從中上疎達肝氣之藥。使肝氣不鬱。則暢行肌腠。榮衛調和。今加去瘀之品。則偏於去瘀。凡瘀血阻滯。榮衛者。用之。立驗。總而論之。血瘀於臟腑之間者。久則變為乾血。化為癆蟲。血瘀於軀殼之間者。或病偏枯。或化癭膿。血瘀於肌腠之間者。則變骨蒸。毛髮焦折。肢體瘦削。一切不治之證。總

由不善去瘀之故。凡治血者必先以去瘀為要。另詳瘀血門。三甯血吐既止。瘀既消。或數日間。或數十日間。其血復潮動而吐者。乃血不安其經常故也。必用甯之之法。使血得安。乃愈。其法於止吐消瘀中。已寓厥治。然前藥多猛峻。以取效。乃削平冠盜之術。尚非撫綏之政。故特將甯血旨意。重加發明。以盡其用。有外感風寒。以致吐血。止後。榮衛未和。必有身痛寒熱等證。香蘇引。加柴胡黃芩當歸白芍丹皮阿膠治之。有胃經遺熱氣燥血傷。而血不得安者。其證口渴噦氣惡聞人聲多躁怒。聞木音則驚。臥寐煩而不安。犀角地黃湯主之。重則合白虎湯。大

血證論 卷二 吐血

十一

涼以清胃熱。輕則止用甘露飲。以生胃津。而血自愈。有因肺經燥氣。氣不清和。失其津潤之制。節而見喘逆。欬嗽等證。以致其血牽動者。清燥救肺湯主之。火甚加犀角。血虛加生地。痰多加尖貝。潤燥甯血。為肺痿等證之良方。萬可久。十藥神書。專醫虛損失血。用保和湯亦佳。潤肺利氣。平燥解鬱。前方清純。此方活動。隨宜取用。血自安靜。而不動矣。有因肝經風火鼓動。煽熾。而血不能靜者。則見口苦咽乾。目眩耳鳴。脇痛逆氣。躁怒決裂。骨蒸妄夢。以逍遙散。平劑和之。審係肝經風氣鼓動。而血不甯者。再加桑寄生。薑蠶。玉竹。東仁。牡蠣。青蒿。此從仲景白頭翁湯得

來。仲景治產後血痢。取白頭翁。平木息風。蓋肝為藏血之臟。風氣散而不藏。則必平之。使安。而後血乃得安也。又或肝火偏勝。橫決而不可遏。致令血不能藏者。則宜加阿膠。山梔。膽草。胡黃連。前仁。牛膝。青皮。牡蠣。當歸。蘆薈。九。尤破瀉肝火之重劑。但不如逍遙散。加減之穩。又有衝氣上逆。其證頭赤。頭暈。火逆上氣。咽喉不利。乳下動脈。辟辟。彈指。頸上動脈。現出皮膚。衝脈原不上頭項。咽乾者。以衝為血海。屬肝。因肝脈而達於咽也。頭脈動。面赤色者。以衝脈麗於陽明。衝氣逆。則陽明之氣隨逆。故也。內經謂衝為氣街。又謂衝為血海。氣逆血升。此血證之一大關鍵。

血證論 卷二

吐血

十一

也。故仲景治血。以治衝為要。麥門冬湯主之。陳脩園謂去粳米。加白蜜。尤能滋補其陰。予謂治衝脈。獨取陽明。仲景既引其端。後人即當擴而充之。審其衝陽太旺者。知母。枳殼。白芍。煅石膏。均可加入。以清折之。梔子。黃芩。木通。前仁。牛膝。利陽明之水者。尤可加入。以分消之。此衝脈之氣。上合陽明之治法也。然衝為氣街。氣根於腎。血海即丹田。腎氣之所藏也。若衝脈挾腎中虛陽。上逆喘急者。宜用四磨湯。調納逆氣。是仲景桂苓甘草五味湯意。但仲景用桂枝。化膀胱之寒水。謂氣從少腹。上衝咽喉。面熱如醉。或熱流於兩股。或小便難而昏冒。忽上忽下。如電光之

閃灼無定。乃陰盛格陽。而陽氣飛越。故以辛溫化之。今係失血。陰氣既傷。再用桂枝。豈不犯陽盛則斃之戒。故用沉香代桂。以納浮陽。而即用人參以滋陰。沉香直走下焦。烏藥治膀胱腎間之氣。衝為血海。居膀胱腎間之地。治陽明者。治其末。治膀胱腎間者。是治其本也。若腎中陰氣大虛。而衝陽不能安宅。則用四磨湯。加熟地。東皮。山藥。五味。枸杞子。滋陰配陽以安之。若其人素有水飲。格陽於上。因而動血者。仲景桂苓甘草五味湯。又為對證。第其方與血證本不相關。可加當歸。白芍。丹皮。阿膠。或用蘇子降氣湯。利痰降氣。以靖衝逆。或用小柴胡湯。加龍骨牡蠣。

血證論 卷二

吐血

十二

以導衝逆。桂苓蘇子湯。是治痰飲以治衝之法。小柴胡。又是清火以治衝之法。本方治熱入血室。血室者。肝之所司也。衝脈起於血室。故又屬肝。治肝即是治衝。血室在男子為丹田。在女子為子宮。其根繫於右腎。腎中真陽寄於胞中。為生氣之根。乃陰中之陽。肝木得之發育條達。是為相火。其火如不歸根。即為雷龍之火。龍骨牡蠣。乃陽物而能蟄藏。取其同氣。以潛伏陽氣。此尤治衝脈更進一層之法。合小柴胡。大有清斂相火之功。若腎經陰虛。陽無所附。雷龍之火上騰者。用二加龍骨湯。加阿膠。麥冬。五味。以引歸其宅。亦妙。腎氣丸。麥味地黃湯。皆可酌用。二方。

一以溫藥化氣。一以陰藥滋降。腎居衝脈之下。又為衝脈之根。安腎氣即是安衝氣。衝氣安而血海甯。自不至於潮上矣。總而論之。血之所以不安者。皆由氣之不安故也。甯氣即是甯血。以上所論。各氣治法。亦云詳備。在臨證者。細審處之。四補血邪之所襲。其正必虛。不獨補法是。顧虛即止血。消瘀用攻治法。亦恐其久而致虛。故亟攻之。使邪速去。以免其致虛耳。但彼時雖恐其虛。而猶未大虛。故以去邪為急。若延日已久。未有不虛怯者。即血既循經。一如平人。而前次所吐之血。已屬有去無回。其經脈臟腑。又係血所走洩之路。非用封補滋養之法。

血證論 卷三

吐血

十三

烏能完全。補法不一。先以補肺胃為要。肺為華蓋。外主皮毛。內主制節。肺虛則津液枯竭。喘嗽痿燥。諸證作焉。因其制節不得下行。故氣上而血亦上。未有吐血而不傷肺氣者也。故初吐必治肺。已止尤先要補肺。用辛字潤肺膏。滋補肺中陰液。肺既津潤。則其葉下垂。氣澤因之得以下降。利膀胱。傳大腸。諸竅通調。五臟受益。如肺葉枯焦。不能覆下。則翹舉而氣亦上逆。不得卧息。外應皮毛不榮。下則二便不調。足痿臍燥。百病俱生。惟此膏潤津。為痿燥良劑。近人黃坤載所立地魄湯。補土生金。補金生水。於補肺之法。頗得平時代茶可用。生脈散。黃芪糯米湯。加阿。

膠麥冬尤能充補肺臟。凡此皆滋補肺陰。為失血必有之證。治也。而陳脩園謂血雖陰類。運以陽和。心肺之陽一宣。如日月一出。燭火無光。諸般邪熱俱除。血自不擾。而循經矣。故又有溫補肺陽之法。用保元湯。甘溫除大熱。使肺陽布濩。陰翳自消。設有痰飲。欬嗽者。加五味杏仁。或用六君湯。加炮薑。五味。內經云。形寒飲冷。則傷肺。上二方為形寒者。立補肺之法。凡陽虛生外寒。及濁陰干上焦者。用以扶肺之陽。洵屬良劑。然失血之人。多是陰虛。若執甘溫除大熱之說。妄投此等藥料。鮮不致誤。故年來從脩園法者。能醫雜證。而不能醫虛癆。以其偏於補陽故也。第

血證論 卷二

吐血

十四

以理論之。原有氣不攝血之義。故竹伯之中。亦有一二宜補陽者。因並列其方。使人參觀。以盡其變。心為君火。主生血。血虛火旺。虛煩不眠。怔忡健忘。痲遺秘結。神氣不安。用天王補心丹。啟腎之水上。交心火。火不上炎。則心得所養。心經水火不相濟者。以此補水甯心。若不關水虛。但由本臟之血虛。火旺者。則但用養血清心之藥而已。硃砂安神丸。瀉心火。補心血。並安心神。凡怔忡昏煩不寐之證。皆可治之。若心陽不收。汗出驚悸。以及心火不下。交於腎。而為夢遺溺赤等證者。隨用上二方。再加龍骨牡蠣。東仁。蓮心。浮麥等。以斂戢之。此為心經血虛火旺之大法。

其有心經火虛。不能生血。瘦削悸怯。六脈細弱。宜用人參。養榮湯。補脾胃。以補心。內經云。中焦受氣取汁。變化而赤。是為血。是湯補心。化血。以奉周身。名養榮者。專主以陽生陰。和腸榮血。凡氣血兩虛。變見諸證。皆可服也。然女人血崩。及產後亡血過多。均以溫補為主。因其血下瀉。屬於脫證故也。至於吐血。乃血脈奮興。上干陽分。是為逆證。宜溫補者最少。然亦有陽不統陰。暴脫大吐。陰亡而陽亦隨亡者。溫補又為要法。甚矣醫者辨證。不可不詳。而用藥不可執一也。故近日從丹溪者。專用苦寒。從脩園者。專用溫藥。皆是一弊。脾主統血。運行上下。充周四體。且是

血證論 卷三

吐血

十五

後天五臟皆受氣於脾。故凡補劑。無不以脾為主。思慮傷脾。不能攝血。健忘怔忡。驚悸盜汗。嗜臥少食。大便不調等證。歸脾湯統治之。脾虛發熱。加丹皮炒梔。兼肺氣燥者。加麥冬。五味。脹滿而水穀不健運者。加陳皮。煨薑。或加阿膠。以滋血。或加柴胡。貝母。以解鬱。或加魚膠。以固血。獨於熱地。不可加入。以礙其統攝。運行之用。蓋此乃以陽生陰。以氣統血之總方。不似四物六味。以陰益陰也。且脾與肝腎。滋陰之法。亦各不同。若脾陰虛。脈數身熱。咽痛聲啞。慎柔五書。用養真湯。煎去頭煎。止服二三煎。取無味之功。以補脾。為得滋養脾陰之秘法。楊西山專主甲己化

土湯亦頗簡當。而人參花粉尤滋生津液之要藥。世但知砂半
薑。為扶脾進食之要藥。不知脾陽不足。不能薰化水穀者。砂
半薑。自係要藥。若脾陰不足。津液不能融化水穀者。則人參
花粉。又為要藥。試觀回食病。水穀不下。由於胃津乾枯。則知津
液。尤是融化水穀之本。近日西洋醫法。書傳中國。與內經之旨
多有牴牾。實則內經多言其神化。西洋多滯於形迹。以內經之
旨。通觀之神化。可以該形迹。然西人逐迹細求。未嘗無一二通
於神化者也。內經之旨。謂脾主消磨水穀。肝膽之氣。寄在胃中。
以疎泄水穀。西醫則云。穀入於胃。有甜肉汁。來注以化之。又苦

血證論 卷三

吐血

十六

膽汁注於小腸以化之。與胃津合併。化其穀食。內經所言。化穀
以氣。西醫所言。化穀以汁。有此氣。自有此汁。今人讀內經。不知
經文舉精以該粗。竟至得用而遺體。反不若西醫逐迹以求。尚
知穀食之化。在於汁液也。但西醫有此論。而用藥不經。不足為
訓。吾於滋胃汁。每用甘露飲。清燥養榮湯。葉氏養胃湯。滋脾汁。
用人參固本湯。炙甘草湯。去桂枝。加白芍。滋膽汁。用小柴胡湯。
去半夏。加花粉。生津化穀。以折衷中西之醫法。而為補養脾陰
要義。知此。庶可補李東垣脾胃論之所不足。若果脾陽不旺。不
能磨化水穀者。則用六君子加香砂以燥之。如欲專意填補。則

仲景小建中湯。尤勝補陽致陰。為虛癆聖方。今即不能恪遵。但
得其意。則於歸脾六君補中益氣諸方。可以變化神奇。用收廣
效。歸脾湯。從建中湯。重濁處用。意補中湯。從建中湯。輕清處用。
意第此方。桂枝陽燥於血。證有宜不宜。用者審之。如命門真火
不能生土。吐利厥冷。陰火上衝。頭面赤色。惡心逆滿。用正元丹。
溫補少火。而又無壯火食氣之虞。是能得小建中之遺意者也。
葛可久白鳳膏。化平胃散之燥。變為柔和。又用酒送。取五穀之
精。合諸藥以養脾胃。治飲食不進。發熱勞倦。和血順氣。功效最
大。肝為藏血之臟。血所以運行周身者。賴衝任帶三脈以管領

血證論 卷三

吐血

十七

之。而血海胞中。又血所轉輸歸宿之所。肝則司主血海。衝任帶
三脈。又肝所屬。故補血者。總以補肝為要。李時珍謂。肝無補法。
蓋恐木盛侮土。故為此論。不知木之所以剋土者。肝血虛則火
擾胃中。肝氣虛則水泛脾經。其侮土也。如是。非真肝經之氣。血
有餘也。且世上虛癆。多是肝虛。此理自東垣脾胃論後。少有知
者。肝血虛。則虛煩不眠。骨蒸夢遺。宜四物湯加參仁。知母。雲苓。
柴胡。阿膠。牡蠣。甘草。斂戢肝魂。滋養肝血。清熱除煩。為肝經陰
虛滋補之法。又有肝經氣虛。臟寒魂怯。精神耗散。桂。甘。龍。牡。湯。
以斂助肝陽。陽虛遺精。驚悸等證。宜之。獨與失血未盡。合宜以

其純用氣分藥故也。仁熟散用血分藥較多。溫潤養肝血功與炙甘草湯相近。若肝之血不暢和亦可用滑氏補肝散。以酸味補肝體。以辛味補肝用。妙獨活一味。借風藥以張其氣。若去獨活加桑寄生則又有甯息風氣之妙。方意實從逍遙散套出。但此方氣味俱厚。純於補肝。逍遙散氣味較薄。故純於和肝。凡肝有鬱火。胸脇刺痛。頭眩心悸。頰赤口苦。寒熱盜汗。少食嗜臥。無不治之。又有肝經血脈大損。虛悸脈代者。法宜大生其血。宜仲景炙甘草湯。大補中焦。受氣取汁。並借桂枝入心。化赤為血。使歸於肝。以充百脈。為補血第一方。世醫補血而不得血之化源。

血證論 卷三

吐血

十八

雖用歸地干石無益。果能參透此旨。則歸脾湯之用。遠志。仁。是入心理血之源也。逍遙散之用丹梔。是入心清血之源也。從此一隅三反。自有許多妙用。腎為水臟。上濟君火。則水火既濟。上交肺金。則水天一氣。水升火降。不相射而相濟。安有不戢自焚之患。設水陰之氣虛。而火熱之氣亢。喘欬蒸灼。痰血癆瘵。均作矣。凡人後天之病。久則及於先天。寇深矣。若之何。凡治虛者。不可以不早也。地黃湯主之。補腎之陰。而兼退熱利水。退熱則陰益。生水則陰益。益膀胱化氣。有形之水。氣下洩。則無形之水。陰如露上騰。而四布矣。以濟君火。則加枸杞元參。以輸肺。

金則加生脈散。火甚者。再加黃柏知母。如小便清和。無痰氣者。只須專意滋腎。左歸飲多服為佳。回龍湯滋陰降火。同氣相求。視無情草木尤勝。如陰虛火旺。足痿筋焦。骨蒸頭暈。用丹溪大補陰丸。滋陰潛陽。以苦寒培生氣。較地黃湯更優。以上補腎陰法。又有宜補腎陽者。腎為水臟。而內含陽氣。是為命火。此火上泛。則為雷龍之火。下斂。則為元陽之氣。引雷龍之火。以歸根。則無上熱下寒。頭暈腰痛。腫喘癆閉之證。用腎氣丸。從陰化陽。補火濟水。以治之。再加牛膝車前。或黃柏知母。更能利水折火。如不須化水。但須補陽者。則用黃氏天魂湯。是從仲景附子湯套。

血證論 卷三 吐血

十九

出雖不及附子湯力量之厚。較附子湯藥尤純和。血家忌剛燥。閒有宜補元陽者。亦以此等為佳。夫腎中之陽。達於肝。則木溫。而血和。達於脾。則土敦。而穀化。筋骨強健。手足不清冷。衛氣固。不惡寒。皆腎陽足故也。然腎水賴陽以化。而腎陽又賴水封之。此理不可偏廢。補腎者所宜細求。以上所論補法。輕重進退。各有法度。非如張景岳輩。多集補藥而已也。總而論之。血證屬虛。癆門固宜滋補。第恐瘀邪未清。驟用補法。則實以留邪為患。而正氣反不受益。歷見乾血癆瘵等病。皆係醫人橫用滋補。以致舊血不去。新血不生。不知舊血客於經絡臟腑之間。如木之有。

蛙不急去之。非木死。其蛙不止也。故仲景治乾血。用大黃廔蟲丸。夫既成虛癆之證。而內有乾血。猶須峻藥去之。則其虛未成者。更不可留邪為患。故實證斷不可用補虛之方。而虛證則不廢實證諸方。恐其留邪為患也。或虛中實證。則攻補兼用。或十補一攻。在醫者之善治焉。

以上所論吐血。始終治法畧備。惟於兼證變證。不及詳言。另立門類。條分縷析。查證治者。可以鈎考而得之。

嘔血

血證論

卷二 嘔血

二十

吐血者其血撞口而出。血出無聲。嘔血者血出有聲。重則其聲如蛙。輕則呃逆。氣不暢遂而已。同是血從口出。治與吐血無異。但吐無聲而嘔有聲。證既小異。而治法若不加詳。安能絲絲入殼。以輕重論。則吐輕而嘔重。吐則其氣尚順。嘔則其氣更逆也。以臟腑論吐血。其病在於胃。嘔血則病在於肝。何以言之。蓋肝木之氣。主於疎泄脾土。而少陽春生之氣。又寄在胃中。以升清降濁。為榮衛之轉樞。故傷寒論少陽為病。有乾嘔嘔吐不止之病。是少陽轉樞不利。清氣過而不升。濁氣逆而不降也。金匱嘔旋沫頭痛胸滿者。吳茱萸湯主之。取吳茱萸降肝之濁氣。肝氣降

而嘔自止。是肝木失其疎泄之常。橫肆侮土。故成嘔逆。主用吳茱萸降肝之濁氣。肝氣不逆。則嘔止矣。由此觀之。可知凡嘔皆屬肝膽。而血又肝之所司。今見嘔血之證。斷以調肝為主。諸家皆言嘔血出於肝。而未詳其理。吾故旁引金匱傷寒以證明之。但金匱傷寒之嘔。乃雜病之嘔。屬於氣分者也。而失血之嘔。則專主血分。治法自有不同耳。

先乾嘔。然後嘔血。嘔血後。仍發乾嘔者。皆少陽之逆氣也。用大柴胡湯。加蒲黃丹皮桃仁。白歸治之。嘔血既止。再服小柴胡湯。以調和榮衛轉樞表裡。上焦得通。津液得下。胃氣因和。嘔噦自

血證論

卷二 嘔血

廿一

止血自安靜而不上潮矣。然肝膽相連。膽病未有不及肝者。丹梔逍遙散。可並治之。但嘔不吐。屬少陽。嘔吐兼有。屬肝經。肝氣善怒。其火最橫。觀傷寒論。肝氣侮肺。名曰縱刺期門。肝氣侮脾。名曰橫刺期門。皆取刺法以瀉之。則知肝氣怒逆。而為嘔逆。尤宜攘除肝火。不可縱敵為患。今本仲景刺法之意。變用湯藥。宜當歸蘆薈丸。加丹皮蒲黃。凡發怒嘔血。以及肝氣橫逆。其證惡聞人聲。欲死不欲生。欲按劍殺人。及驚狂罵詈。不認親疎。皆肝經無情之火。非此大劑。不能殲除。若此時因循。延至日久。病氣未衰。正氣先衰。虛中

挾實不攻不愈。欲攻不堪。是猶宋用賈似道養奸遺患。至國促而始去之晚矣。若審其病稍輕者。但須涼肝血。調胃氣。則嘔血自止。犀角地黃湯。加柴胡枳殼。服後血止。再服逍遙散。加阿膠牡蠣香附。以收功。

有平時嘔酸嘔苦。以及失血之後。常嘔酸苦者。嘔酸是濕熱。試觀夏月熱湯。過夜則變為酸味。便知嘔酸是濕熱。嘔苦是相火。膽寄相火。膽汁苦。故相火之味。能變胃津使苦。宜借用左金丸。再加血分藥。以治血分為宜。蓋此二藥。辛苦降泄。治血藥中。以為引導尤效。

血證論 卷二 嘔血

二十二

嘔血止後。如肝膽火旺。血虛煩燥。頰赤口渴。胸脇刺痛。發熱盜汗。魂夢不安。此乃相火內熾。欲作骨蒸癆瘵。宜柴胡清骨散。以治之。如兼欬嗽。喉間作癢。乃肝肺之氣不相調。宜用四逆散。香蘇引。再加杏仁枳殼。枯芩。知母當歸。白芍。治之。如覺喉中常有氣哽塞。善噦氣打呃者。乃肝與心之氣不暢。故也。香蘇引。加柴胡薄荷。射干。大力。尖貝。當歸。旋覆花。治之。逍遙散。尤通治肝經之要藥。加減得宜。皆能應手取效。

嘔雖屬於肝膽。然亦未有不關胃府者也。胃氣逆上。治法已詳。吐血門。今并為醫者補言之。凡血證帶嘔者。但治其血。血止而

嘔自止。凡嘔證帶血者。有如回食病。嘔後見血水。此胃逆血枯。難治之證。大半夏湯。麥門冬湯。治之。玉女煎。加蒲黃。麻仁。亦效。四物湯。加甘草。寸冬。枳殼。茯苓。藕汁。蘿蔔汁。生薑。荊竹油。皆清利胃氣。養血止嘔之藥。

此篇論血。單以嘔立論。然失血證。未有單見一證。而不兼見諸證者。今欲詳其條目。不得不分門立說。至於用方。則須參考諸證。而變化之。若拘守一門。以求方治。豈不膠柱鼓瑟。

咯血

血證論 卷二 咯血

二十三

咯血者。痰帶血絲也。昔人謂咯血出於心。謂心主血脈。咯出血絲。象血脈之形。故也。又謂咯血出於腎。蓋腎主五液。虛火上升。則水液泛上。凝而為痰。然第吐痰已也。而何以又帶血絲哉。蓋腎氣下行。則水出膀胱。今腎經之氣。不化於膀胱。而反載膀胱之水。上行。為痰。膀胱者。胞之室。膀胱之水。隨火上沸。引動胞血。隨之而上。是水病兼病血也。觀女人先發水腫。然後斷經者。名曰水分。是水病而連累胞血之一證。又觀傷寒論。熱結膀胱。其血自下。夫熱結膀胱。是水病也。而即能惹動胞中之血。從小便而下。又水病兼動胞血之一證也。據此。可知水泛為痰。而亦能

牽引胞血。古法但謂咯血出於腎。而未能發明。致庸劣者。竟謂其血出於腎臟。不知五臟真血。吐出一絲。便死不治。蓋臟中所藏。不過數點血耳。豈有日日隨痰帶出者乎。謂咯血出於腎者。乃腎氣不化於膀胱。水沸為痰。而惹動胞血之謂也。此論從古未經道及。而予從傷寒悟出。千慮一得。不容自秘。醫者知此。則可知治咯之法。並可知治痰之原矣。仲景猪苓湯化膀胱之水。兼滋其血。最為合法。再加丹皮蒲黃。以清血分。凡痰之原血之本。此方兼到。或用地黃湯加旋覆花。五味天冬。寸冬蒲黃。火甚者。用大補陰丸加海粉牛膝雲苓丹皮蛤蚧。凡此數方。皆主

血證論 卷二 咯血

二十四

利痰立法。是就腎主咯血之說。以出治也。腎水化於膀胱。故瀉膀胱。即是瀉腎。膀胱與血室同居一地。膀胱之水不泛。則自不動血室之血矣。數方皆治膀胱兼治血室。故效。夫痰為腎之所主。血實心之所主也。况水火互根。腎病及心。心病亦及腎。其有心經火旺。血脈不得安靜。因而帶出血絲。欬逆咽痛者。導赤飲加黃連丹皮血餘蒲黃天冬寸冬。夫貝茯苓治之地骨皮散。加茯苓射干旋覆花牛膝。太平丸亦治之。以上數方。皆就咯血出於心之說。以立法。心主血脈。部居胸中。與肺為近。肺氣欬逆。猶易牽動心部之血。故痰欬者。往往帶出血絲。治

血絲以心為王。肺為水之上原。水不清而凝為痰。痰不降而牽動血。治肺之痰。又是治咯血捷法。蓋痰血之來。雖由心腎。而無不關於肺者也。太平丸為治肺通劑。紫苑散保和湯。皆善能滌除肺痰。補瀉兼到。另參欬血唾血門。可盡其治。

唾血

脾主消磨水穀。化生津液。津液騰溢。水陰四布。口中清和。湛然如露。是以終日不飲。而口不渴。亦終日閉口。而唾不生。惟脾之津液不能清和散布。於是凝聚而為唾。是唾者。脾不攝津之故。

血證論 卷二 唾血

二十五

也。知脾不攝津而唾津。則知脾不攝血而唾血矣。唾津其常耳。而唾血則又甚焉。蓋津乃氣分之陰液。其源即在胃中。凝而為唾。其來既近。其傷不多。至於唾血。則出於陰分。內經云。脾為陰中至陰。蓋五臟俱屬陰經。而脾獨名太陰。以其能統主五臟。而為陰之守也。其氣上輸心肺。下達肝腎。外灌溉四旁。充溢肌肉。所謂居中央。暢四方者。如是血。即隨之運行不息。所謂脾統血者。亦即如是。世醫不識統血之義。幾指脾為貯血之器。豈不思哉。脾能統血。則血自循經。而不妄動。今其血走洩胃中。為唾而出。是脾之陰分受病。而失其統血之常也。審係脾經火重。唇口

乾燥大便結脈滑實者宜用瀉心湯加當歸生地白芍花粉寸冬枳殼蒲黃甘草若是脾經陰虛脈細數津液枯血不甯者麥冬養榮湯加蒲黃阿膠甲己化土湯加生地花粉人參寸冬藕節側柏葉萊菔汁枳殼皆滋利脾陰之要藥如或七情鬱滯脾經憂慮傷其血而致唾血者以脾主思慮故每因思慮而傷脾陰睡臥不甯怔忡勞倦飲食不健宜用歸脾湯以補心脾再加阿膠柴胡炒梔棕灰血餘以解鬱火清血分此治脾兼治心脾為思慮所傷者應手而效又凡脾經憂抑則肝木之氣遏於脾土之中不能上達故清陽不升鬱為內熱不須清熱但解

血證論 卷二 唾血

二十六

其鬱鬱升而火不過矣道遙散主之。

脾土陰而用陽脾經陰虛火鬱者上法畧備又有脾之陽氣不旺無以統運陰血心戰脈弱四肢清冷飲食不健自汗身熱者用歸脾湯補脾之陽以生血人參養榮湯正元丹皆治之亦有清晨唾血每早初醒血液滿口唾出即淨明晨又唾乃臥後血不歸經溢出口中實證則由肝不藏血必有頭痛口渴便閉之證用當歸蘆薈丸治之虛證則由脾不統血必有怔忡虛煩不眠等證用歸脾湯加丹皮山梔棕灰五味治之此證與腎虛齒衄相似宜參看之。

高士宗曰偶然唾血一哈便出者不藥可愈謂其血近胃如先血後便為近血一般故不藥可愈吾謂亦宜少用清胃之藥可服甲己化土湯加銀花竹茹萊菔汁丹溪又謂唾血皆屬於腎是混唾咯為一證而以腎血之來其路最深其證最重用保命生地散治之吾謂先唾痰水唾久然後唾血者此血來路遠其證深可用丹溪法治之然亦有丹溪法所不能治者即吾所定諸方亦有不能盡治別參吐欬諸門自有治法勿謂予論之不備也。

血證論 卷二 咳血

二十七

咳血

肺主氣欬者氣病也故欬血屬之於肺肺之氣外合於皮毛而開竅於鼻外證鼻塞皮毛固閉則其氣反而內壅嗆出喉間發為欬嗽此外因之欬也肺之氣下輸膀胱轉運大腸通調津液而主制節制節下行則氣順而息安若制節不行則氣逆而欬此內因之欬也夫外因之欬不過其竅閉塞肺氣不得達於膚表於是內奔喉間而為欬其於肺之本體固未常受傷也至於內因之欬則由於制節不行之故蓋肺為金體其質輕清肺中

常有陰液沖養其體。故肺葉下垂。如天道下際。其氣澤之。下降亦如雨露之下。滋因之。膀胱通大便。調五臟六腑之氣。皆得潤利而不壅。過肺氣通調之益也。設肺中陰液不足。被火剋刑。則為肺痿。肺葉焦舉。不能下垂。由是陰液不能隨之下。注肺中之氣。乃上逆而為欬。此內因之欬。難治之證也。以上二者。乃肺之本病。自致欬嗽者也。又有為他臟所干。而亦欬嗽者。則以肺為華蓋。諸臟皆居其下。故他臟痰飲火氣。皆能上薰衝射。使肺逆欬。故內經欬論詳別臟腑。而總言之曰。聚於胃。關於肺。病雖由於他臟。而皆關於肺。此肺之所以主欬嗽也。人必先知欬嗽

血證論卷二 咳血

二十八

之原。而後可治欬血之病。蓋欬嗽固不皆失血。而失血則未有。不咳嗽者。或外感失血。病由皮毛。內合於肺。自應欬嗽。或由胃中積熱。火盛乘金。氣上而欬。或由肝之怒火。上逆而欬。此失血之實證。必致欬嗽者也。或由陰虛火旺。肺失清肅之令。痿燥作欬。或挾脾經憂鬱。心經虛火。以致欬嗽。或腎經陰虛。陽氣不附上。越而欬。此失血之虛證。不免欬嗽者也。又有痰欬。界在半虛半實之間。又有氣欬。屬在虛多實少之證。或先欬而後失血。或先失血而後欬。或暫欬即愈。或久欬不止。種種不一。必細推究之。而於失血虛癆。庶得調治之法。

一實欬。外感風寒。先見頭痛惡寒發熱等證。仲景云。欬而喘息。有音。甚則吐血者。用麻黃湯。李東垣師其意。用麻黃人參芍藥湯。可見欬嗽吐紅之證。多有因外感者。古法用麻黃。乃劫病之劑。且是氣分之藥。於血分尚少。調治須知欬固氣病。然使不犯血分。又何緣而失血也哉。故必以兼顧血分為宜。醫宗金鑑用蘇子降氣湯。予則用小柴胡湯。加紫蘇荊芥當歸白芍丹皮杏仁。於氣分血分兩兼治之。最得和表清裡之法。火重秘結者。加酒軍。惡寒無汗者。加麻黃。胸脇腰背刺痛脹滿者。為有瘀血。再加桃仁紅花。蓋小柴胡為通利三焦。治肺調肝和榮衛之良方。

血證論卷二 咳血

二十九

加減得宜。左宜右有。凡血家兼有表證者。以此方為主。極為妥當。普明子止嗽散。亦可用。但藥力薄。不堪治重病。如咳嗽輕帶血少者。又須用此輕劑以調之。斯為中病。而不致太過。止血者。再加蒲黃藕節。清火者。再加枯芩寸冬。降痰加貝母茯苓。降氣加杏仁枳殼。補血加當歸生地。凡上兩方。及加減之法。皆為新病欬血而設。其有外感既久。陳寒入肺。火欬喘滿。因而失血者。乃欬嗽氣逆。牽動諸經之火。以剋肺金。肺氣亦能牽動胸背脈絡之血。隨欬而出。是病雖生於寒。而實因寒動火。治法但溫其寒。益動其火。宜清火疎寒。面面俱到。斯不差爽。用千金麥門冬

湯並小柴胡。加蘇子冬花。蓋寒中包火者。宜小柴胡加減。以清鬱火。火中伏寒者。宜千金麥門冬湯。以搜陳寒。或用細辛代麻黃。再加黑薑五味。尤去肺寒要藥。但血證多忌剛燥。更合枯苓寸冬玉竹瓜霜以柔之。用火中伏寒。庶幾調劑得法。然而寒在肺中久。亦變從火化。既化為火。便宜專治其火。兼溫其寒。是猶抱薪救火矣。以上所論外感風寒。變為欬血。此證最多。醫者誤治。往往釀成癆瘵。慎之慎之。此外又有內受瘟暑濕熱者。亦能攻發而為欬血。其證身熱口渴。小便不利。胸腹煩滿。與外感風寒相似。治宜專清其裡。忌發其表。蓋此病皆襲人口鼻。浸人

血證論 卷二 咳血

三十

脈絡伏留腸胃膜原之間。不似傷寒從膚表入者。故但用清裡之藥。不可發表。以張病勢。裡清則表自和。欬血自止。人參瀉肺湯治之。若其人素厚味。胃火炎上作欬者。用犀角地黃湯。加麥冬五味杏仁枳殼藕節。又或肝經怒火逆上。侮肺作欬。則用柴胡梅連散。加青皮牡蠣蒲黃丹皮生地。又有熱邪激動水氣水上衝肺。欬逆不得卧。或其人面目浮腫者。仲景謂之風水。用越婢湯。血家風火內動。激水氣上升者。毋庸以麻桂發表。平肝風。宜柴胡白芍桑寄生薑蠶青蒿荆芥薄荷之屬。清肺火宜枯苓知母石膏天麥冬。清肝火宜膽草黃柏。清心火宜黃連炒梔。治

激動衝上肺中之水。宜葶藶杏仁防已桔梗杏仁雲苓。合此數品藥。以求方治其於風火激動水氣衝肺。肺脹欬嗽之證。乃為合宜。蓋仲景越婢湯。是治外感肺脹之法。吾所論者。乃血證內傷肺脹之法。吾曾治數人。有用瀉白散。合葶藶瀉肺湯而效者。有用二陳湯。加知母石膏荆芥薄荷防已木通而效者。有用小柴胡加荆芥紫蘇杏仁防已木通寸冬兜鈴而效者。又丹溪云。此證多是痰挾瘀血。碍氣為病。若無瘀血。何致氣道如此阻塞。以致欬逆倚息而不得卧哉。用四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝薑汁治之。丹溪此論。洵中病情。蓋失血之家。所以有痰皆血分

血證論 卷二 咳血

三十一

之火所結而成。然使無瘀血。則痰氣有消容之地。尚不致喘息欬逆而不得卧也。血家病此。如徒以肺脹法治之。豈不南轅北轍。丹溪此論。可謂發蒙振聵。第其用四物湯加減。於痰瘀兩字未盡合宜。予謂可用通竅活血湯。加雲苓桔梗杏仁桑皮全皮尖貝小柴胡加當芍桃仁丹皮雲苓。尤妥。此皆血家欬嗽屬實證者。再參兼證欬條更詳。

一虛欬。肺為嬌臟。無論外感內傷。但一傷其津液。則陰虛火動。肺金被刑。金失清肅。下降之令。其氣上逆。嗽痰欬血。變為肺痿。重病吐白沫如米粥。咽痛聲啞。皮毛洒淅。惡寒憎熱。皆金損之

證不易治也。此病無論寒久變火。火鬱似寒。總以十藥神書保和湯治之。蓋肺經火甚。則煎熬水液。而為痰。水液傷。則肺葉不能腴潤。下垂。其在下之肝腎氣。又薰之。肺葉焦舉。不能制節。故氣逆為欬。氣愈逆。痰愈滯。所以久欬不止也。此方潤肺滌痰。止血和氣。無論寒久變火。鬱似寒痰。血痿燥等證。皆統治之。凡由外傷變作虛欬。癆證者。以此方為第一。又有肺中陰虛。木臟氣燥。生痰帶血。發為痿欬。以及失血之後。肺燥成痿。痰凝氣鬱。久欬不止。此乃內傷所致。不必治其餘病。但補其肺。諸證自愈。用清燥救肺湯。甘涼滋潤。以補胃陰。而生肺金。肺金清潤。則火

血證論

卷二 咳血

三十二

自降痰自祛。氣自調。欬自止。血枯加生地。火甚加犀角。痰多加貝母。帶血加蒲黃。以上二方。於肺經虛火治法。甚詳。失血之人。多是陰虛火旺。照上治法者。十居八九。亦有一二屬肺經虛寒者。內經云。形寒飲冷。則傷肺。肺惡寒。多痰唾。上氣。仲景用甘草乾薑湯治之。然金匱自言遺溺小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。則明見有虛冷遺溺之實據。乃用甘草乾薑以溫之。且其脈必沉弦遲微。痰必清稀泛溢。不似清燥保和二湯所治。故主溫藥。吾謂可用六君子為主。再加當歸白芍炮薑五味。則於止欬止血皆宜。脾經虛寒。痰動欬嗽者。此方亦宜。若脾經虛

火生痰帶血。則宜逍遙散。加寸冬藕節蒲黃。若肝經虛火。生痰帶血。亦宜逍遙散。加丹皮山梔五味。又有腎經虛火。生痰帶血者。另詳唾血咯血門。肝腎虛證。均詳吐血門。降衝氣條。並詳見六卷欬嗽門。

一痰欬。肺中痰飲。實熱氣逆。而欬血者。揚湯止沸。不如釜底抽薪。瀉肺丸主之。夫欬血之證。未有不與痰為緣者。人身之氣。以運血。人身之血。即以載氣。血少則氣多。不能載之。壅於內。而為熱。熱則水津被灼。煎熬成痰。是以火旺則痰成。痰成則滯氣之往來。氣阻則壅積。而益生其熱。故痰甚而火益旺。此時補虛則

血證論

卷二 咳血

三十三

助邪。此時逐邪。則重虛。是惟攻補兼用。庶幾兩得其治。先用十藥神書消化丸。臨臥用飴糖拌吞。以攻其實。即啞化太平丸。以補之。攻補兼施。為除暴安良之妙法。時醫但事滋補。豈不誤了。多人若病家。兢兢不敢用消化丸者。可用二陳湯以和解之。二陳降氣利水。為祛痰通劑。若欲兼利肺氣。加杏仁蘇子桑皮。欬逆倚息不得臥者。為水飲沖肺。肺葉不得下降。加葶藶大棗。若火甚者。加瓜霜黃芩老連。火輕者。加寸冬知母。兼理風寒。加柴胡荊芥防風。兼理血分。加當歸白芍丹皮桃仁。上方皆是去實痰之治法。又有虛痰。乃肺經陰虛。燥氣生痰。粘着喉間。滯澀聲

音喘欬發熱脈細數者不宜滲利再傷水津但宜滋潤以生津津生則痰豁宜保和湯清燥救肺湯紫苑散如喉中有痰核氣核哽塞不得吞吐者為梅核證乃心火凝痰宜豁痰丸加大力子香蘇飲加桔梗枳殼尖貝雲苓旋覆甘草亦治之又有胃中痰氣動膈證見胸脇逆滿欬喘噦呃者失血家往往有之宜用礞石滾痰丸治之若胃中氣虛挾痰飲者宜旋覆代赭石湯兼治血分則加當歸芍藥蘇木兼治火熱則加寸冬枯苓噦呃詳六卷茲論痰欬未及備載痰欬之證又有肝氣上逆干犯肺經挾痰滯氣以致欬嗽其證口苦頭痛頰赤多怒兩脇作痛宜溫

血證論卷二 咳血

三十四

膽湯加青皮白芥柴胡炒梔若肝火橫決怒逆者加薑黃大黃若肝經虛火鬱而生痰宜用丹梔逍遙散加龍骨牡蠣阿膠貝母夫痰飲之病其標在肺其本在腎腎水上泛是為痰飲痰飲沖肺乃生欬嗽故治痰飲以腎為主腎經陽虛不能鎮水水氣泛上振寒喘欬者用真武湯加細辛乾薑五味若腎水因寒而動上凌心火心悸喘欬虛陽上浮咽痛而熱宜用苓桂木甘湯加細辛五味溫寒利水然此乃單為痰飲立法血家陰虛陽亢多忌剛燥往往以此等藥劑為忌即係腎陽不能化水以致便短喘欬痰飲上干亦只宜腎氣丸從陰化陽溫而不烈此方自

宋元來莫不珍為至寶謂失血虛癆上熱下寒陽浮於外陰孤於內惟此方引陽入陰用藥神妙顧腎陽虛浮者此方誠為至寶若腎陰虛浮者此方又非所宜夫失血之人浮熱昏煩痰喘欬嗽多是真陰內虛陽無所守究陽之所以不守實由陰虛使然非陽虛也徑投此方陰未生而陽愈亢名為以陽生陰實則以陽促陰也如果上熱下寒外陽內陰之證則尺脈必微弱大小便必澹泄手足必清冷即渴欲飲亦是飲一溲二乃用此方最為神效設純是陰虛則此方又不宜用即欲以陽生陰亦只可少用桂附以反佐之如滋腎丸知柏各五錢而桂只五分借

血證論卷二 咳血

三十五

以從陽引陰耳豈可多用桂附而助陽以敵陰哉若是腎中陰虛火上水升凝滯為痰則宜豬苓湯主之地黃湯加麥冬五味旋覆阿膠杏仁蛤蚧牛膝亦仲景豬苓湯意而滋補之功尤多參看咯血門更詳一氣欬無痰無血但是氣喘作欬乃失血家真陰虛損以致肺氣不斂腎氣不納其病至重最為難治審其由肺氣不斂者其人不能仰臥臥則氣逆而欬欬則心下扇動或肺葉偏枯則側臥一邊翻身則欬不休俱宜用清燥救肺湯加百合五味琥珀鍾乳石以鎮補肺金金得保養則能覆下收斂而氣自不欬審

其由腎氣不納者。其人短氣喘息。陰火上衝。兩額發赤。咽喉不利。仲景謂失血脈數。發熱而欬者不治。即謂此陽不附陰。氣不歸元之重證。六味丸加沉香。五味寸冬。磁石以滋補鎮納之。使氣既吸引歸腎。而腎水滋生。又有以封鎖其氣。則氣自不欬逆矣。或用腎氣丸加寸冬。五味牛膝。借桂附以引氣歸元。陳脩園謂肺腎不交。水天俱虛。用二加龍骨湯。加阿膠寸冬。五味。子按腎氣丸二加龍骨湯。皆是腎陽虛。肺陰虛。上熱下寒之治法也。若肺腎之陽俱虛。元氣不支。喘息困憊者。則宜用保元湯加五味。上三方又不恰切。若肺腎之陰俱虛者。上三方均不中肯。失

血證論卷二 咳血

三十六

血家氣喘欬逆者。多是陰虛氣生於腎。而主於肺。肺陰足則氣道潤而不滯。腎陰足則氣根蓄而內涵。惟肺陰不足。是以氣燥而欬。腎陰不足。是以氣浮而欬。此乃肺腎陰虛不交之證。治宜參麥地黃湯。及三才湯以滋二臟之陰。納肺氣則加百合。五味。鍾乳石。納腎氣則加磁石。沉香。五味。此外又有衝氣上逆之治法。說詳吐血及六卷欬嗽門。

一骨蒸欬。失血證久欬不止。發熱盜汗。世謂之骨蒸勞欬。乃肝之血分。夾有瘀滯。癥結。則肝氣鬱而不和。肝寄相火。肝氣即相火也。相火內行三焦。外行腠理。血分無瘀滯。則腠理無阻。是以

相火往來。溫養肌肉。而不遏抑。故肌肉不寒冷。相火溫之也。而亦不發熱。相火不遏鬱之故也。觀婦人經水不調。每遇行經必發寒熱。為血分瘀滯所致。則知失血骨蒸。為血分瘀滯鬱遏相火而使然也。小柴胡湯清理之。若延日既久。發熱欬嗽不止。恐成癆瘵者。用團魚丸。疎理肺氣。滋利肝血。攻補兼用。方法最善。一癆蟲欬。心中鬱鬱微煩。面色不赤。乍白。喉中癢。不可耐。咳嗽不止。不知香臭。宜用月華丸。調肺殺蟲治之。究蟲之生。乃由瘀血停聚。熱蒸濕腐。又被肝風扇動。是以化生癆蟲。既變成蟲。則從蟲治之。而亦須兼去瘀血。以除其根。清濕熱。以條其源。息風

血證論卷二 咳血

三十七

木以靖其機。聚毒藥以殺其類。此方數法兼備。於治癆蟲已得大概。另詳癆蟲門。參看自知。

又有肺癆欬嗽。吐膿血者。另詳吐膿門。

又有食積之火。沖肺作欬。其火多在五更。流入肺中而欬。此病不關血分。然虛人往往有之。隨用小柴胡。逍遙散。加山查。神曲。麥芽。萊菔子。炒梔子。冬。黃昏欬嗽。為陽將入陰。浮火不能內飲。入肺而欬。且用五味子。川蚊蛤。兜鈴等治之。

其餘雜病欬嗽。不關血證者。自有方書可查。茲不具論。

鼻衄

鼻為肺竅。鼻根上接太陽經脈。鼻孔下夾陽明經脈。內通於肺。以司呼吸。乃清虛之道。與天地相通之門戶。宜通不宜塞。宜息不宜喘。宜出氣不宜出血者也。今乃衄血何哉。金匱謂熱傷陽絡。則衄血。熱傷陰絡。則便血。陰絡者。謂軀殼之內。臟腑膜油之脈絡。內近腸胃。故主便血。陽絡者。謂軀殼之外。肌肉皮膚。脈絡之血。從陽分循經而上。則干清道而為衄也。然則陽絡者。太陽陽明之絡脈也。蓋太陽陽明統主人身軀殼之外。陽絡之血傷

血證論卷二鼻衄

三十八

於太陽者。由背上循經脈至鼻為衄。仲景所謂春夏發太陽者是也。傷於陽明者。由胸而上循經至鼻。仲景所謂秋冬發陽明者是也。今分兩條論之。

太陽王開。春夏陽氣本應開發。若一鬱閉。則邪氣壅而為衄。其證鼻塞頭痛。寒熱昏憤。或由素有鬱熱。應春夏開發之令而動。或由風瘟者。疫攻發而動。又有傷寒失汗。邪無出路。因由血分洩而為衄。此名紅汗。乃邪欲自愈。醫者不可不知。然即紅汗論之。可知太陽之氣不得洩於皮毛。則發為紅汗。即可知太陽之熱不得越於外者。必逼而為鼻衄也。皮毛者肺之合。太陽之

氣外主皮毛。內合於肺鼻。又為肺之竅。欲治太陽之衄者。必以治肺為主。觀傷寒論治太陽用麻杏理肺。則知治肺即治太陽矣。法宜清瀉肺火。疎利肺氣。肺氣清則太陽之氣自清。而衄不作矣。風寒外來。皮毛洒淅無汗者。麻黃人參芍藥湯。如肺火壅盛。頭昏痛氣喘。脈滑大數實者。人參瀉肺湯。加荊芥粉葛蒲黃。茅根生地。童便。久衄血虛。用丹溪止衄散。加茅花黃芩荊芥杏仁。以上數方。鼻塞者。俱加麝香黃連。蓋風寒雜證。鼻塞多是外寒閉之。此證鼻塞者尤多。乃是內火壅之。如用羌活。則鼻愈塞矣。故用黃連麝香以開火之閉。衄血既止。宜多服止衄散原方。

血證論卷二鼻衄

三十九

及六味地黃湯以收功。又有腎經虛火浮游上行。干督脈經。而衄血者。必見腰痛項脊痛。頭昏足厥冷等證。所以然者。腎經虛火上行故也。宜用止衄散。去黃芪。加碎補牛膝續斷粉葛鹿角尖。童便元參治之。蓋督脈麗於太陽。故以治太陽者兼治督脈。亦猶衝脈麗於陽明。而以治陽明者兼治衝脈也。太陽為少血之經。督脈乃命元之主。其血均不可損。衄止後。即宜用地黃湯加天冬阿膠血餘五味以補之。

陽明主闔。秋冬陰氣本應收斂。若有燥火傷其脈絡。熱氣浮越。失其主闔之令。逼血上行。循經脈而出於鼻。其證口渴氣喘鼻

塞孔乾目眩發熱。或由酒火。或由六氣之感。總是陽明燥氣。合邪而致。衄血。蓋陽明本氣原燥。病入此經。無不化而為燥。治法總以平燥氣為主。瀉心湯。加生地。花粉。枳殼。白芍。甘草。或用犀角。地黃湯。加黃芩。升麻。大解熱毒。鼻衄止後。宜用玉女煎。加蒲黃。以滋降之。再用甘露飲。多服。以調養之。肆飲。梨膠。藕汁。萊菔汁。白蜜等。皆與病宜。

以上兩條治法各異。然鼻總係肺經之竅。血總係肝經所屬。故凡衄家。目必昏黃。仲景云。目黃者。衄未止。目了慧者。其衄已止。以肝開竅於目。血擾肝經。故目黃也。治宜和肝。而其血犯肺竅。

血證論卷二鼻衄

四十

出。又宜和肺。今且不問春夏。不分秋冬。總以調治肝肺為主。生地黃湯治之。服後衄止。再服地骨皮散。以滋之。蓋不獨衄血宜治肝肺。即一切吐咯。亦無不當治肝肺也。肝主血。肺主氣。治血者必調氣。舍肝肺而何所從事哉。

又凡衄血久而不止。去血太多。熱隨血減。氣亦隨血亡矣。此如刀傷。血出不止。則氣亦隨亡。而血盡則死也。急用獨參湯救之。手足冷。氣喘促。再加附子。以引氣歸根。如其人鼻口黑黯。面目茄色。乃血乘肺臟之危候。緩則不救。二味參蘇引治之。此等危證。在所不治。用參蘇飲。亦理應如是。救濟耳。其效與否。非敢期。

必。

按病在腸胃者。藥到速病。在經脈者。藥到緩。衄血病在經脈。兼用外治法。亦能取急效。用十灰散塞鼻。並吞咽十灰散。為極穩妥。或用人爪甲煨為末。吹鼻止衄。或用壁錢窠塞鼻。取其脈絡以維護之。龍骨吹鼻。能乾結血孔。免衄。白礬吹鼻。性走竅。截血。醋和土敷陰囊。為肝所屬。肝主血。敷囊以收斂肝氣。則肝血自止。上病取下。治尤有理。蟬血滴鼻中。龍血點鼻。溫水浸足。使熱氣下引。相病人中指。用濕紙貼腦頂。熨斗熨紙。令乾。乃湯熨取火之法。數者或效或不效。備錄其方。以資採擇。

血證論卷二鼻衄

四十一

衄家不可發汗。汗則額陷。仲景已有明禁。以此例推。可知一切血證。均不宜發汗。醫者慎之。

雖與吐欬諸證不同。然其為血一也。宜參看各門。庶治之百不失一。

腦衄

腦衄者。口鼻俱出血也。乃鼻衄血多。溢從口出。非別有一道來血也。亦非真從腦髓中來。此不過甚言鼻衄之重。而因名之曰腦衄耳。蓋吐血多者。血每滄入鼻中。故衄血多者。血亦溢入口。

中。治法用白紙摺十餘疊。打濕貼腦頂。用熨斗熨令熱氣蒸騰。其衄自止。此乃因腦衄之名。望文生義。而出熨腦止衄之法。非探本之治。故有效有不效。其實腦衄。只鼻衄之甚者耳。宜照鼻衄分經用藥。斯不致循名失實。

腦衄治法與鼻衄同。但腦衄出血既多。易成虛證。宜參蘇引用。人參以補之用。蘇木以行之。如衄甚不止。身熱脈浮。喘促足厥者。乃氣隨血洩。陰脫陽亡。危急之候也。宜獨參湯加附子稠煎。服後得睡。汗不出。熱稍退。氣稍息。則命根乃定。此等虛脫之證。血家最少。而最危。勿因其少。而誤用涼瀉。

血證論卷二 腦衄

四十二

目衄

白珠黑珠均無出血之竅。目下眼皮。只有淚竅。乃陽明經脈所貫注。春秋傳稱蔡哀侯之淚盡。繼之以血。則是血從淚竅出也。陽明脈起於承泣穴。淚竅出血。乃陽明燥熱所攻發。犀角地黃湯加歸尾赤芍銀花白芷粉葛牛膝石膏草稍治之。如風熱重。大便閉者。通脾瀉胃湯治之。陽明之脈。繞絡於目。故凡治目多。治陽明。吾嘗觀審視瑤函。外障目翳諸方。共一百零。而用大黃者七十餘方。可知瀉陽明胃經之熱。是治目疾一大法門。治目

衄者可以類推。凡白虎湯甘露飲玉女煎均治陽明方。醫者審虛實先後而用之。罔不奏效。

夫目雖陽明經所屬。而實肝所開之竅也。血又肝之所主。故治目衄。肝經又為要務。地骨皮散加柴胡炒梔蓋母草及丹梔道遙散治之。謹按病發於肝者。多是怒逆之氣。火耳鳴口苦胸脇刺痛。宜從肝治之。可用上二方。及當歸蘆薈丸。龍膽瀉肝湯治之。病發陽明者。發熱口渴。目乾鼻乾。大便燥結。宜從陽明法治之。

小眼角乃少陽經脈所絡。原無出血之竅。少陽相火隨經脈而出。沖動肝經。血分則生血筋。竅入瞳珠。及努肉長出。亦能流血。但不多耳。宜小柴胡加青皮當歸紅花膽草丹皮。外用杏仁白礬銅礫點之。

血證論卷二 目衄

四十三

大眼角乃太陽經脈所絡。名精明穴。太陽氣血充足。眼角內結赤肉如珠。有大眼角內不起肉珠者。乃太陽之氣不足故也。太陽經有風熱。則大眼角生血筋努肉。或微滲血點。外治總以血筋努肉之法。治之內服防風通聖散去麻黃大黃芒硝。再服防風歸芍湯調之。點藥如上。

以上兩條均非目衄正病。以其起血筋亦係血分為病。故兼及

之此書為血說法其有目疾膜翳等項均有眼科專書儘多可採茲不具論

耳衄

耳中出血謂之耳衄。腎開竅於耳。而腎脈却不能上頭。腎與心交。假心之府。小腸之脈。上貫於耳。為司聽之神。所居其形如珠。皮膜包裹。真水。是為神之所出。聲之所入。內通於腦。為空虛之府。他物不得而擾之。即或腎虛。陰火上衝。則為耳鳴。神水不足。則為耳聾。亦斷無血從此出者。其有血從耳出者。則以足少陽

血證論 卷二 耳衄

四十四

膽脈繞耳前後。手少陽三焦之脈入耳。相火旺。挾肝氣上逆。及小腸相火內動。因得挾血妄行。或因瘟疫躁怒。火氣橫行。肆走空竅。衄出於耳。總係實邪。不關虛勞。治法總宜治三焦。膽肝與小腸經。自無不愈。小柴胡湯加五淋散統治之。分治肝膽宜龍膽瀉肝湯。治三焦柴胡梅連散。治小腸宜導赤散。加黃芩黃連薄荷川芎。三經皆司相火。治法大抵相同。愈後皆宜多服六味地黃湯。補水濟火。外治法用十灰散吹耳中。麝香龍骨末和吹耳中。壁錢窠燒灰吹入。燕窠坭塗耳前後。

齒衄

齒雖屬腎。而滿口之中。皆屬於胃。以口乃胃之門戶故也。牙牀尤為胃經脈絡所繞。故凡衄血。皆是胃火上炎。血隨火動。治法總以清理胃火為主。胃中實火。口渴齲腫。發熱便閉。脈洪數者。通脾瀉胃湯。加蒲黃藕節治之。如大便不閉者。不須下利。但用清涼解之。犀角地黃湯。加豈根貫仲枳殼萊菔汁。胃中虛火。口燥齲糜。脈細數。血不足者。宜甘露飲。加蒲黃以

血證論 卷二 齒衄

四十五

止衄。玉女煎引胃火以下行。兼滋其陰。以上兩條所論齒衄。虛實二證。均屬於火。有火中挾風者。宜加防風白芷。火中挾濕者。宜加防己木通。亦有腎虛火旺。齒齲血滲。以及睡則流血。醒則血止者。皆陰虛血不藏之故。統以六味地黃湯。加牛膝二冬。碎補蒲黃。上盛下虛。火不歸元。尺脈微弱。寸脈浮大者。加桂附。外治之法。宜用冷水嗽口。取血遇冷則凝之義。醋漱。取酸以收之。之義。百草霜。十灰散。取血見黑則止。亦以清降其火。火降則血降也。枯礬五倍子。蚯蚓。同為末。糝。更能固牙。

舌衄

舌乃心之苗。觀小兒吐舌弄舌。舌木舌重。皆以去心經風火為主。則知舌衄皆是心火亢盛。血為熱逼而滲出也。治法總宜清。澁心火。導赤飲如老連大力連翹蒲黃牛膝元參治之。舌腫脹。衄血多者為火太盛。瀉心湯主之。心煩神昏者。安神丸如童便。血餘灰治之。夫舌雖心之苗。然口乃胃之門戶。舌在口中。胃火薰之。亦能出血。大便秘者。玉燭散加銀花治之。口渴兼發熱者。竹葉石膏湯加蒲黃藕節治之。舌本乃肝脈所絡。舌下滲血。肝

血證論卷二舌衄

四十六

之邪熱。四物湯加桃仁紅花炒梔丹皮牛膝赤苓。重則宜用當歸蘆薈丸。龍膽瀉肝湯。蓋舌衄雖同。而此外所見之證。必顯有分別。故分心胃肝三經治之。非強為區別也。

外治之法。與齒衄同。

大衄

大衄者。九竅出血之名也。此非疫癘。即中大毒。人身止此九竅。而九竅皆亂。危亡之證。法在不治。惟有猝然驚恐。而九竅出血者。可用硃砂安神丸。加髮灰治之。

零腥

零腥者。吐出星點。黃白色。細如米粟。大如豆粒。氣極腥臭。雜在漩唾之中。而非漩唾。乃吐血之後。血分瘀熱所化。或未吐血之前。血分之熱。化為星點。先吐星點。後乃吐血。總係血分瘀熱。變化而成。治宜清熱化血。降氣消痰。以其似痰。必假痰氣而生。故也在未吐血之前。而見零腥者。總以降氣消痰為主。蓋此時血尚未動。但當治其氣分。氣分清而零腥自除。豁痰丸治之。小柴胡湯亦治之。在既吐血之後。而見零腥者。總以清熱化血為主。

血證論卷二零腥

四十七

以其在吐血之後。乃瘀血壅熱而出。故宜兼治瘀血。太平丸治之。生地黃散亦治之。此證古書不載。吾臨證往往遇之。因撰其名。而論列之。以補血證之缺。

吐膿

膿者。血之變也。血不阻氣。氣不戰血。則血氣調和。瘡癤不生。血滯氣則凝結。為痛。氣蒸血則腐化。成膿。軀壳外者。易治。至於吐膿。則出於臟腑之內。其證最危。在中焦以下。則便膿。在中焦以上。則吐膿。夫人身之氣。乃水所化。氣即水也。故血得氣之變。蒸

亦化而為水。不名曰水而名曰膿者。以其本係血質。雖化為水。而較水更濃也。當其未化。則仍是血。消瘀則膿自不生。及其既化。則同於水。逐水則膿自排去。

一肺癰。乳上第三根肋骨間名肺募穴。隱隱痠痛。食豆而香。是癰將成。仲景云。風舍於肺。其人則欬。口乾喘滿。咽燥不渴。時時吐濁沫。時時振寒。熱之所過。血為之凝滯。蓄結癰膿。吐如米粥。始萌可救。膿成則死。謂重者肺壞而死。若肺不壞。亦有可救。故仲景又曰。口中辟辟燥。欬胸中隱隱作痛。脈數而實。喘不得臥。鼻塞不聞香臭者。葶藶大寒瀉肺湯主之。吐膿如米粥者。甘桔

血證論卷二吐膿

四十八

湯主之。仲景此論。非謂除此二方。別無治法。不過分別未成膿者。當瀉實。已成膿者。當開結。指示兩條門徑。使人知所從事。且曰。以此湯主之。明明有加減之法。見於言外。余因即瀉實開結二義。推而廣之。其未成膿者。用通竅活血湯。加麻黃杏仁石膏甘草。從表以瀉之。無表證者。用人參瀉肺湯。加葶藶大寒。從裡以瀉之。如病勢猛急。須外攘內除。則用防風通聖散。三方力量雄厚。於仲景瀉實之法。庶盡其量。如識力不及。只用甘桔湯。加荊芥薄荷杏仁黃芩。亦許免疚。然而無功。其已成膿者。急須將膿涂去。高者越之。使從口出。用千金葶藶湯。或用瓜蒂散。加

冬瓜仁桃仁苡仁枳子。或用白散。加黃連瓜蒌。皆取在膈上。則吐使膿速去。以免久延為患。白散尤能吐能下。加升麻鬱金。以助其吐下之機。再加黃芩瓜蒌。以解其火。更善。如只須下瀉。不宜涌吐。則合甘桔瀉肺二湯。再加赤豆牙苡仁。防已瓜蒌杏仁。知母枳殼。使從下降。或用桔梗甯肺湯。補瀉兼行。如此則於仲景開結之法。庶盡其妙。惟收口之法。仲景未言。然亦可以義例求也。諸瘡生肌。皆用溫補。肺為金臟。溫則助火。刑金。只宜清斂。以助金令。使金氣足而肺自生。人參清肺湯治之。後服清燥救肺湯以收功。

血證論卷二吐膿

四十九

一脾胃癰。與肺癰治法畧同。但肺癰多由外感風邪而成。故有發表之法。脾胃癰則由濕熱酒毒。七情之火。內蘊而成。故無發表之法。胃癰初起。中脘穴在臍上四寸。必隱隱作痛。脾癰初起。章門穴在臍上二寸。旁開六寸。必隱隱作痛。二病皆食豆而香。其證寒熱如瘡。皮膚甲錯。腹滿咽乾。治宜攻熱下血。熱去而血不停。更從何地釀為癰膿哉。故凡內癰膿未成者。以奪去瘀熱為主。丹皮湯治之。膿已成者。以排膿為主。膿即水也。逐水即是排膿。赤豆苡仁湯治之。膿血既去之後。則臟腑空虛。見火象者。人參固本湯。加黃芪茯苓。以清補之。若現虛寒之象。則用六君

子湯加黃芪當歸煨姜以溫補之方外有方視其所兼之證隨宜用之筆楮難盡

此外如胸背腰脇肝膈大小腸凡有瘀熱壅血均能成癰總以丹湯主之近上焦者去苾硝加葶藶黃芪桔梗荆芥甘草中下焦者加薑黃餘詳便膿門

此書原專論血證所以兼及內癰者以癰膿之病皆由血積而成知血之變癰膿即可知血之能為乾血能變癆蟲知內癰之生寒熱即可知血證之鬱熱矣但癰膿之證係血家實積與失血虛證有異然不以此反觀合勘亦無以盡血證之情偽

血證論

卷一 吐膿

五十

血證論三卷

四川彭縣容川唐宗海著

汗血

汗者氣分之水其源出於膀胱內經云膀胱者洲渚之官津液藏焉無化則能出矣旁胱之氣從三焦行腠理充肌肉達於皮毛以衛外為固陽氣衛外百邪不入故其經稱為太陽也其有威暑天氣亢陽蒸動膀胱水氣騰布於外則發為汗此猶天之有雨陽布陰和自然無病有時外傷風寒皮毛疎泄發熱汗出

血證論三卷

汗血

者乃太陽之氣為邪所病不能衛外故汗得泄出其有心胃肝脾熱濕之病亦令汗出者此猶土潤溽暑亦能蒸作雲雨也又有七陽自汗者則由膀胱腎中之元陽脫泄故其水陰之氣隨而奔溢散渙不收氣為水之所化水即氣也汗即水也氣脫外泄故汗出也知此則知汗出氣分不出血分矣然汗雖出於氣分而未嘗不與血分相關故血分有熱亦能蒸動氣分之水而為盜汗蓋血氣陰陽原互根互宅陰分之血盛則陽分之水陰自然充達陽分之水陰足以布護濡濡則陰分之血愈為和澤而無陽乘陰之病矣若陽分之水陰不足則益傷血分之陰故



傷寒汗出過多。則虛煩不眠。以其兼傷血分之陰。心主血。分
分之陰傷。則心氣為之不甯也。又有傷寒。即當從汗而解。今不
得汗。乃從鼻衄而愈。其衄名為紅汗。蓋陽分之邪。宜挾陽分之
水發而外出。今既不能外出。乃乘陰分之血。從鼻衄出。名為紅
汗。是為陽邪干陰之一驗。故古謂陽乘陰則吐衄。知陽乘陰而
內逆者。發為吐衄。則知陽乘陰而外泄者。發為皮膚血汗矣。血
者心之液也。皮毛者肺之合也。治法宜清心火。火清則陽不乘
陰。兼治肺金。肺調則皮毛不泄。涼血地黃湯。加桑皮地骨皮。蟬
退。百合蒲黃。治之。血虛火甚者。當歸六黃湯。治之。氣虛血少者。

血證論三卷

汗血

二

當歸補血湯。加桑皮地骨皮丹皮。蟬退。棧灰。枯芩。秦皮。治之外。
用石灰散。扑之。仿仲景汗出不止。用溫粉扑法之意也。或用桃
花。扑之亦可。
皮毛者肺之合也。汗出皮毛。故汗血宜治肺金。以歛皮毛。人參
清肺湯。加蒲黃。最宜。
血者肝之所司也。肝火亢烈。逼血妄行。宜當歸。蘆薈。九。從內以
攻治之。喻嘉言治女子經血閉。而周身汗出者。謂是陰分之熱。
泄出陽分。用此方。破經血。即以苦堅。止汗。汗血同原。若肝火亢
甚。而汗血者。借用此方。尤為合法。

胃火亢甚。亦能汗血。以胃主肌肉。熱蒸肌肉。故令汗血。室竹葉
石羔湯。加蒲黃。虫。退。丹皮。全皮。治之。犀角地黃湯。亦治之。
總論曰。汗者陽分之水。血者陰分之液。陰與陽原無間隔。血與
水本不相離。故汗出過多。則傷血。下後亡津液。則傷血。熱結膀胱
則下血。是水病而不離乎血者也。吐血咳血。必兼痰飲。血虛
則口渴。而津液不生。失血家。往往水腫。瘀血化水。亦發為腫。是
血病而不離乎水者也。故衄血家。不可再發汗。以血病則陰液
既虛。不可發汗。再傷氣分之水。以致陽分之液。亦虛也。又先水
腫。再吐血者。不治。以水病。不可重傷其血也。觀小柴胡。調津液。

血證論三卷

汗血

三

而即治熱入血室。觀桃仁承氣。破血結。而即治小便不利。皆是
治水。即以治血。治血。即以治水。蓋在下焦。則血海膀胱同居一
地。在上焦。則肺主水道。心主血脈。在軀壳外。則汗出皮毛。血循
經脈。一陰一陽。皆相聯屬。吾於水火血氣論。已詳言之。人必深
知此理。而後於治血理氣。調陰和陽之法。可以左右逢源。

血箭

從毛孔中流出一條血來。有似箭之射出。故名血箭。由心肺火盛。逼血從毛孔中出。治宜清心火。以除血出之源。涼血地黃湯。加蒲黃。又宜瀉肺火。以斂皮毛之氣。使毛孔不滲瀉。則血自止。瀉白散。加生地。虫退。百合。五倍子。枯芩。蒲黃。杏仁。白芨。心肺兼治。宜用生地黃散。

血出過多。昏憤不省人事者。與吐衄血脫氣散無異。宜獨參湯。加附片。蒲黃。當歸。補血湯。十全大補湯。皆可擇用。

血證論三卷

血箭

四

外治法。水調桃花散。敷血孔。則血止。或用京墨磨醋搽。或用石灰散。乾糝花。蕊石散。糝均效。

血痣

血痣初起。其形如痣。漸大如豆。觸破時。長流鮮血。此由肝經怒火鬱血凝聚而成。內服丹桅逍遙散。及涼血地黃湯。觸破流血者。用花蕊石糝之。血止後。用田螺散。枯去本痣。另用生肌藥收口。未觸破。未流血者。古無治法。吾擬用蝨蟲為末。薑醋調搽。玉京三稜磨醋搽。真琥珀擦熱。每日數次。內服之藥如上。

血證論三卷

血痣 血瘡

五

血瘡

癬疥血點。血疙瘩。一切皮肉赤瘡。名色不一。今統稱之曰血瘡。皆由血為風火所擾。火甚則起點起疙瘩。風甚則生蟲作癢。火甚赤痛者。涼血地黃湯。加荊芥。蟲退。紅花。杏仁。治之。風甚作癢者。和血消風散。治之。知血瘡之病。則凡一切火遊丹。漆瘡。風丹。諸治法。總不外是。兼熱者。色白。或流黃水。照上二方。加蒼朮。赤苓。兼寒者。或青黧硬腫。加桂尖。外用銀花。陳艾。花椒。食鹽。煎水洗。另搽大楓丹。油調最效。

瘡血

瘡者血所凝結而成者也。或是寒凝或是熱結或是風腫或是濕鬱總是凝聚其血而成。初起總宜散血。血散則寒熱風濕均無遺留之迹矣。其繼則調膿化毒。此即吐膿條內所言瘀血化膿之義。治宜托裡使氣達瘡。所以蒸血成膿。蓋瘡之成由於血結。膿之成亦由血化。血何以能化成膿。得氣之蒸而腐化成膿也。氣即是水。吾已論之。屢屢惟其氣即是水。故血隨氣化。亦變為水。不名為水而名膿。以其由血所化。較水更膿耳。毒既化膿。

血證論三卷

瘡血

六

自不內攻。方其未潰。氣虛者難於蒸化。及其既化。雖氣實者亦隨膿滲泄而轉為氣虛矣。法宜固元以大補其氣。此與本書內證原不干涉。然同是血病。故兼論之。以互相發明。蓋氣迫血則逆而為吐。血滯氣則凝而為瘡。疽氣迫血者宜破氣以和血。血滯氣者宜破血以和氣。故吐衄宜補血。血旺則氣平。諸瘡宜補氣。氣旺則血行也。至於既穿潰後。則軀壳已有破損。與壅閉之證迥別。試看鍼功刺期門。瀉肝刺肺。俞瀉氣。以一鍼之孔。尚能大瀉臟氣。况潰膿之孔甚大。其能大瀉內氣可知矣。故凡潰後宜大補元氣。不似吐衄乃氣盛血虛。只宜滋血以平氣。而不

宜助氣以動血也。然瘡潰之餘。亦有瘀熱未清者。亦不得驟用溫補。吐血之後。亦有元陽大虛者。又不得拘守清涼。故吐血家審其血亡而氣亦隨亡。與陽氣不能攝血者。十全養榮歸脾參附等湯。亦所宜用。瘡家潰後。固為必需之方。而亦有餘毒未盡者。上方又其所忌。醫者不容執一。

諸瘡內治。初起腫硬。總宜散血。仙方活命飲。主之。惡寒無汗。加麻黃。發熱心煩。加老連。石膏。大便燥結。加大黃。瘡內頑梗。滯乃陰證。結毒無氣。以發之也。加桂。天。生。薑。大。棗。瘡內平塌不起。以及走散者。恐毒內攻。加黃芪。大。棗。生。薑。蓋血凝於氣分之際。

血證論三卷

七

血行則氣行。故以破血為主。是善調氣之法也。若吐衄則是氣乘乎血。分之內氣降則血降。當以破氣為主。一內一外。反觀自知。

諸瘡調膿。宜以托裡消毒散為主。蓋血既凝而不化。則須補氣以與之。戰使蒸騰腐化。托令速潰。以瘡乃血凝氣分之病。惟恐氣不足以化之。故宜補氣而制血。若吐衄則是氣乘血分。惟恐氣逆而血升。故宜平氣以調血。與此不同。

諸瘡既潰。屬於虛損。宜固元以益氣。內補黃芪湯主之。又審膿乾者其氣虛。蓋氣即是水。氣不足故水少而乾。且氣既不足。則

不能送膿外出。故留滯而結。膿管黃芪建中湯。重加銀花赤豆。牙當歸治之。若膿清者。是血虛。膿為血所化。血少故膿清。當歸補血湯主之。炙甘草湯加黃芪亦治之。養榮湯亦治之。

又曰潰後屬虛。然亦有瘀未化盡者。仍不得峻補。以留毒內服。托裡消毒散。外用烏金膏化之。此如失血虛中夾瘀。亦不得關門逐賊。潰久而仍有膿管者。尤宜用烏金膏化之。若徒生其口。內毒攻發。終不愈也。此如乾血癆。內有乾血。非去其乾血。而新血亦不能生。皆虛中夾實。治血則虛虛補虛。則實實未易療治。只得攻補兼施。以盡人事。

血證論三卷

瘡血

八

又曰吐血止後。宜補血以調氣。瘡疽潰後。宜補氣以生血。吐衄在血分。氣實血虛也。瘡疽在氣分。血實氣虛也。外治之法。消腫宜遠志膏。用遠志酒煮搗敷。及金黃散。化腐去瘀。骨宜巴豆炒黑研點。名烏金膏。田螺燃子亦佳。生肌宜乳香沒藥為末。名海浮散。再加珍珠化腐生肌散亦佳。治瘡之法。此不足以盡之。茲不過舉外證。以勘內證。明於諸瘡之血。而吐衄之血。乃愈明。

創血

刀傷出血。與吐衄不同。刀傷乃平人被傷出血。既無偏陰偏陽之病。故一味止血為要。止得一分血。則保得一分命。其止血亦不分陰陽。有以涼藥敷上而血止者。桃花散是也。有以熱藥敷上而血止者。黑蓋灰是也。不似吐衄出於偏陰偏陽之病。氣故吐衄家止血。必以治病氣為主。病氣退。斯吐衄亦退。與刀傷迥不同也。然刀傷二三日後。則亦與吐衄畧同。有瘀血腫痛者。宜消瘀血。刀口敷花蕊石散。腫處用乳香沒藥射香三七葱白搗

血證論三卷

創血

九

敷瘀血消散。則腫痛自除。內服黎洞丸治之。刀傷去血過多。傷其陰分。證見心煩發熱口渴。法宜補氣以生血。血足津生。則不渴矣。聖愈湯加杏仁花粉兒茶乳香沒藥甘草。此在吐衄則宜補血而抑氣。以內證係血分之氣。不可使氣乘血也。刀傷則是氣分之血。故宜補氣以生血。氣達患處。乃能生肌。氣充肌膚。乃能行血。與治內證者不同。其有氣虛不能統血。氣寒不能生血者。則宜八珍養榮參附等湯。以固氣者。固血吐血家亦間用此等藥物。然刀傷之血在氣分。皮膚尤衛氣所統。破其皮膚。氣先漏泄。故以補氣為主。若內證吐血屬陰分血。

傷而氣未傷。故以補血為主。醫者須分別內外。而知其同中之異。異中之同。則得之矣。

客問刀傷何以善於冒風。答曰。人之所以衛外者。全賴衛氣。衛氣生於膀胱。達於三焦。外循肌肉。充於皮毛。如室之有壁。宅之有牆。外邪不得而入也。今既破其皮肉。是猶壁之有穴。牆之有竇。揖盜而招之入也。是以刀傷更易外感。病見發熱。頭痛。牙關緊閉。吐痰。抽掣。角弓反張。皆是衛氣為病。所不同者。多一出血證而已。治法列後。

無汗者為風中挾寒。閉其皮毛。宜用小柴胡湯加荊芥防風。紫

血證論三卷

創血

十

蕪蓋小柴胡乃治熱入血室之方。凡外邪干血分者。小柴胡湯皆能疎理而和解之。加宣助衛氣之藥。則偏治衛氣。而主發汗矣。破傷風治法如是。即失血家虛人感傷。以及產後傷寒治法。皆可參知。若刀傷去血過多。不可再發汗者。宜當歸地黃湯。即四物湯加去風之藥。以補血而驅邪也。失血家吐血過多。與產後去血過多。而復得胃感之證者。與此治法無異。皆宜先滋其血。以助汗源。後宣其氣。以解外邪。有汗者為風中挾熱。沸出肌肉之間。法宜清散其熱。當歸芍藥湯加薑蚕虫。退若無便結者。加大黃治之。此即傷寒論發熱汗

出用白虎湯。燥結者用承氣湯之意。醫者得其意而變化之。自有許多法門。

夫刀傷氣分之血病也。故邪在表者。從氣分以發之。邪在裡者。從氣分以奪之。邪在半表半裡者。從氣分以和之。兼用血藥。斡旋其間。血調而氣亦調。氣調而血愈治矣。若失血家。乃血中之氣病也。故有感胃。則但取調血。而兼用氣分之藥。以斡旋之。與此同而不同。

凡是刀傷冒風。總宜薑蚕虫。退振和葱白敷之。力能拔風消腫。神效。

血證論三卷

創血

十一

刀傷潰爛與瘡同治。此即吐膿條內所謂瘀血變化成膿之說也。血凝不散。為氣所蒸。則化而成膿。血者陰也。氣者陽也。陰從陽化。故膿似水。以氣之所化。即為水也。而又非水者。則以其為血所化。仍不失血之本質。故稠濁似水。實則水與血交並而成形者也。故凡去膿之藥。即是去水之藥。而提膿之藥。又即是乾水之藥。內服八珍湯加苡仁。本通六君子湯加當歸赤豆芽。治之外敷化腐生肌散。提膿加龍骨生肌加珍珠。此舉刀傷之血。與吐衄之血。較論其義。務期血證互勘而明。其於刀傷治法。固未詳也。然其理已具。識者鑒之。

跌打血

跌打折傷一切。雖非失血之正病。而其傷損血脈。與失血之理。固有可參。因並論之。

凡跌打。已破皮出血者。與傷寒治法無異。外用花蕊石散敷之。內服化腐生肌散。血止瘀去而愈。如流血不止者。恐其血瀉盡。則氣散而死。去血過多。心神不附。則煩躁而死。宜用當歸補血湯。加棗仁、人參、珠砂、白臘、茯神、甘草治之。外用人參為末。珍珠血結象皮為末。糝之。如亡血過多。煩躁口渴。發熱頭暈等證。止

血證論三卷

跌打血

十二

大補其血。聖愈湯。加棗仁、寸冬、紫胡、花粉、丹皮、珠砂。或用獨參湯。亦可。此條可悟失血過多。陰虛發渴之理。

凡跌打未破皮者。其血壞損。傷其肌肉。則腫痛。傷其筋骨。則折碎。在腰脇間。則滯痛。傷重者。制命不治。不制命者。凡是疼痛。皆瘀血凝滯之故也。無論接骨逐瘀。總以藜洞丸去大黃。加續斷。碎蛇治之。外用然銅、官桂、沒藥、乳香、桂尖、大黃、斑蝥、蠟虫。酒調敷之。自效。若是已傷之血。流注結滯。着而不去者。須逐去之。石則或發為吐血。或釀作癰膿。反為難治。宜當歸導赤湯下之。若已發吐血。便從吐血法治之。若已發癰膿。便從癰膿法治之。

跌打最危險者。則有血攻心肺之證。血攻心者。心痛欲死。或心煩亂。或昏迷不省人事。歸芎散加乳香、沒藥治之。失笑散亦治之。此與產婦血攻心。血迷心。治法畧同。血攻肺者。面黑胸脹。發喘作渴。乃氣虛血乘肺也。婦科治產後氣虛。瘀血入肺。面如茄色。急用參蘓飲救之。金鑑載跌打血乘肺者。亦用此方。所謂乘肺。非第乘肺之氣分而已。乃是血干肺藏之危候。肺為清虛之府。其氣能下行。以制節諸臟。則氣順而血自甯。其氣不順。則血干氣分。而為吐衄。今其血直干肺臟。較之干氣分者。為更危。殆急用人參以補肺。肺得補。則制節行。而氣下降。使血亦隨氣而

血證論三卷

跌打血

十三

下再用蘓木以行血。血行氣順。或可救於萬一。夫如此危候。仍不外清金保肺。以助其制節。則凡一切血證。其當清金保肺。以助其制節。舉可知矣。第肺虛而制節不行者。則宜人參以保肺。肺實而制節不行者。則宜葶藶以瀉肺。肺寒而制節不行者。則宜薑半以溫肺。肺熱而制節不行者。則宜知母以清肺。一切血證治肺之法。均可從此隅反。

跌打後有作嘔者。以損傷之人。受驚發怒。肝氣無有不動者也。肝木傷肺。是以發嘔。小柴胡湯加丹皮、青皮、桃仁治之。跌打後有效。切喘逆者。乃血蘊於氣分之中。宜十味參蘓飲以

疎發其氣。氣散則血散。與內傷欬切者不同。內傷欬血。是氣蘊於血分之中。若發其氣。愈鼓動其血。而不甯矣。故以清理其血為主。二者須對看。

內有瘀血則發渴。血虛亦發渴。有瘀血者。身痛便結。玉燭散治之。血虛發渴者。心煩不寐。盜汗身熱。竹葉石膏湯。加生地治之。凡失血發渴者。可以類推。

跌打損傷。既愈之後。有遇節候。或逢陰雨。或逢濕熱。傷處每作疼痛。甚則作寒作熱。此乃瘀血着而未去。留伏經絡之間。不遇天氣節候。其身中運行之氣。習慣而不相驚。一遇天氣節候。蒸

血證論三卷

跌打血

十四

動。則不能恬然內伏。故作痛也。宜小調經湯。小溫經湯。通脈四逆湯。隨其上下內外。以分治之。

血證論四卷

四川彭縣容川唐宗海著

便血

大腸者。傳導之官。化物出焉。謂大腸下脾胃之化物。為中宮作傳導之官。故呼為地道。乃中宮之出路也。其經與肺相表裡。肺為清金。大腸即為燥金。在五行本屬一家。故診脈者。可於肺部診大腸焉。大腸之所以能傳送者。全賴於氣。氣者肺之所主。不獨大腸賴肺氣之傳送。即小便亦賴肺氣以化行。此乃肺金制

血證論四卷

便血

節之能事。而大腸之氣化經道。又與之合。故治病者。多治肺也。大腸位居下部。又係腎之所司。內經云。腎開竅於二陰。又曰。腎為胃關。故必腎陰充足。則大腸腴潤。厥陰肝脈。又統後陰。腸與胞室。又並域。而居。故肝經與腸亦相干涉。是以大腸之病。有由中氣虛陷。濕熱下注者。有由肺經遺熱。傳於大腸者。有由腎經陰虛。不能潤腸者。有由肝經血熱。滲漏入腸者。乃大腸與各臟相連之義也。但病所由來。則自各臟而生。至病已在腸。則不能復還各臟。必先治腸。以去其標。後治各臟。以清其源。故病愈而永不發矣。

一先血後便為近血。謂其血即聚於大腸去肛門近。故曰近血。此有兩等證治。一為臟毒下血。一為腸風下血。臟毒者。肛門腫硬疼痛。流血與痔漏相似。仲景用赤豆當歸散主之。取赤豆牙以疎鬱。取當歸以和血。赤豆性能利濕。發牙色赤。則入血分。以為排解之用。當歸潤滑養血。以滋大腸。則不秘結。仲景畧示其端。以為治臟毒者。必須利濕熱和血脈也。非謂此二藥外。別無治臟毒之法。吾即此藥引而伸之。若大腫大痛大便不通者。宜解毒湯取防風枳壳等。疎理其氣。即赤豆牙義也。取大黃赤芍等。滑利其血。即仲景用當歸之義也。若大便不

血證論四卷

便血

二

結腫痛不甚者。不須重劑。用四物湯加地榆。荆芥。槐角。丹皮。枯芩。土茯苓。地膚子。苡仁。栝榔。治之。四物湯即仲景用當歸養血之義。所加諸藥。即仲景用赤豆牙以疎利濕熱而解血鬱也。仲景但用養血疎鬱。今恐濕熱難解。故兼用清藥。欲止血者。兼服十灰散亦可。

臟毒久不愈者。必治肝胃。血者肝所司。腸者胃之關。胃若不輸。濕熱於腸。從何而結為臟毒哉。肝之血分。如無風。火則亦不迫結。肝門矣。治胃宜清胃散。加銀花。土茯苓。防己。黃柏。苡仁。車前。升清降濁。使陽明之濕熱。不再下注。則臟毒自愈。治肝者宜龍

胆瀉肝湯道遙散。

又有肺經遺熱傳於大腸而久不愈者。必見寸脈浮數洪澀。口渴。黃欬逆等病。方用人參清肺湯。取烏梅。粟壳。酸澀之品。以收肺氣。而餘藥安肺。肺有不遺熱與腸矣。若去此二味。而用薄荷。桔梗。以代之。則又義取解散。在人變化耳。

腸風者。肛門不腫硬。而但下血也。臟毒下血多濁。腸風下血多清。仲景書無腸風之名。然傷寒論云。太陽病。以火攻之。不得汗。其人必躁。到經不解。必圜血。太陽病下之。脈浮滑者。必下血。兩條皆謂太陽外邪內陷而下血。又云。陽明病。下血。讖語者。為熱

血證論四卷

便血

三

入血室。厥陰篇云。若厥而嘔。胸脇煩滿者。其後必便血。此即今所謂腸風下血之義。夫腸居下部。風從何而襲之哉。所以有風者。外則太陽風邪傳入陽明。協熱而下血。內則厥陰肝木虛熱生風。風氣煽動。而血下。風為陽邪。久則變火。治火即是治風。凡治腸風下血。總以清火養血為主。火清血甯。而風自熄矣。壽世保元。用槐角丸統治之。而未明言其義。吾謂此方。荆防治太陽。陽明傳入之風。烏梅。川芎。治肝木內動之風。餘藥甯血清火。以成厥功。宜其得效。然而外風協熱。宜得仲景葛根黃連黃芩湯之意。使內限之邪。上升外達。不致下迫。斯止矣。治病之法。高者

抑之。下者舉之。吐衄所以必降氣。下血所以必升舉也。升舉非第補中益氣之謂。開提疎發皆是。升舉萬根黃連黃芩湯。加荆芥當歸柴胡白芍槐花地榆桔梗治之。若肝經風熱內煽而下血者。必見脇腹脹滿。口苦多怒。或兼寒熱。宜瀉青丸治之。逍遙散小柴胡。均可加減出入。謹按肝風所以能下血者。何也。肝主血。血室又居大腸膀胱之間。故熱入血室。有小便下血之證。內有積血。有大便黑色之證。蓋肝血上干。從濁道則吐。從清道則衄。肝血下滲。從清道則尿血。從濁道則下血。肝為風木之臟。而主藏血。風動血不得藏。而有腸風下血之證。上數方力足平之。

血證論四卷

便血

四

或用濟生烏梅丸亦妙。以烏梅欬肝風。以殭蚕息肝風。風平火熄。而血自甯矣。然肝風動血。宜得仲景白頭翁湯之意。以清火消風。較有力量。或四物湯。合白頭翁湯。兼補其血。治風先治血。血行風自滅。此之謂也。如無白頭翁。則擇柴胡青蒿白薇代之。桑寄生得風氣而生。代白頭翁更佳。又曰肝經之橫。以肺金不能平木故也。肺與大腸。又相表裡。借治肺經。亦隔治之一法。虛者人參清肺湯。實者人參瀉肝湯。凡腸風臟毒下血過多。陰分虧損。久不愈者。腎經必虛。宜滋陰臟連丸。滋腎陰。以達大腸最妙。六味丸加菴蓉槐角皆宜。

一先便後血為遠血。謂其血在胃中。去肛門遠。故便後始下。因名遠血。即古所謂陰結下血也。黃土湯主之。黃土名湯。明示此證係中宮不守。血無所攝而下也。佐以附子者。以陽氣下陷。非此不能舉之。使黃芩者。以血虛則生火。故用黃芩以清之。仲景此方。原主溫暖中宮。所用黃芩。乃以濟附子之性。使不燥烈。免傷陰血。普明子謂此證必脈細無力。唇淡口和。四支清冷。用理中湯。加歸芍。或歸脾湯。十全大補湯。時醫多用補中益氣湯。以升提之。皆黃土湯之意。凡中土不能攝血者。數方可以隨用。但仲景用溫藥。兼用清藥。知血之所以不甯者。多是有火擾之。凡

血證論四卷

便血

五

氣實者則上干。氣虛者則下陷。今醫但用溫補升提之藥。雖得治氣虛之法。而未得治血擾之法。予即仲景之意。分別言之。若陰虛火旺。壯火食氣。脾陰虛而肺氣燥。失其欬攝之制者。人參清肺湯治之。若肝經怒火。肺經憂鬱。以致血不藏攝者。歸脾湯加炒梔寸冬阿膠五味。或用丹梔逍遙散。加阿膠桑寄生地榆。此即黃土湯。主用黃芩之義也。若係虛損不足。下血過多。脾氣不固。腎氣不強。面色痿黃。手足清厥。六脈微弱。虛浮者。宜大補肝脾腎三經。人參養榮湯。補脾膠艾四物湯。加巴戟甘草補肝。斷紅丸補腎。此即黃土湯。主用附子之義也。能從此擴而充之。

自有許多變化。豈楮墨間所能盡者。
予按此證與婦人崩漏無異。女子崩中屬虛陷。此病亦屬虛陷。
女子崩中屬虛寒。而亦兼有虛熱者。男子此證亦屬虛寒。而亦
兼有虛熱者。蓋女子之血有經。男子之血亦有經。同是離經之
血。下泄而出。故病情相類也。但所出之竅各有不同。崩漏出前
陰。故多治肝以和血室。便血出後陰。故兼治肺腎以固腸氣。腎
主下焦。主化氣上升。腎足則氣不下陷。肺與腸相表裡。肺氣欬
則腸氣自固。醫者能知此理。而又參用女子崩中之法。可以盡
其調治。

血證論四卷

便血

六

又按此證與吐衄同是血病。然一則其氣上行。一則其氣下行。
故虛實治法畧有不同。

便膿

此證有二。一是內癰。一是痢疾。
一內癰在上中焦者。其膿已潰。嘔吐而出。在下焦者。或少腹癰。
小腸癰。腸癰。肝癰。膿血均從大便瀉出。初起時。其部分必隱隱
刺痛。脹滿。脈沉滑數。甚則痛如刀錐。欲病此者。未有口不發渴。
以此血積均應發渴。癰初起。血已凝聚。故應發渴。此時急奪其
血。則不釀為膿。以免潰爛之險。用丹皮湯加乳香、沒藥、柴胡、荆
芥、山甲治之。如血已化膿。便宜排膿。赤豆苡仁湯。逐水即是排

血證論四卷

便膿

七

膿潰後屬虛。宜補養生肌。八珍湯主之。參看吐膿門自詳。
容問積血何以變而成膿。答曰。血者陰之質也。隨氣運行。氣盛
則血充。氣衰則血竭。氣着則血滯。氣升則血騰。故血之運。氣運
之即。瘀血之行。亦氣行之。血瘀於經絡臟府之間。既無足能行。
亦無門可出。惟賴氣運之。使從油膜達腸胃。隨大便而出。是氣
行而血自不留也。若氣不運之。而反與相結。氣為血所鬱。則痛
血為氣所蒸。則化為膿。今舉外證比例。凡氣盛者。瘡易托化。氣
虛者。瘡難托化。氣即水也。氣至則水至。故血從氣化。則從其水
之形。而變為膿。刀傷粘水。亦從水而化。膿水即氣之質。血從氣

化有如此者是故閃跌血積得氣化之則腫處成膿不得氣化之則腫處仍是血以知血從氣氣運血凡治血者必調氣使氣不為血之病而為血之用斯得之矣

一痢證便膿血其證裡急後重欲便不便或白或赤或赤白相半或下痢垢濁皆非膿而似膿者也夫腸胃之中除却糟粕只微有脂膏水液而已膏脂屬血分水液屬氣分病氣分則水混而為白痢病血分則血擾而為赤痢氣血交病則赤白相半由何處釀成真膿而從大便泄出哉有之則毒聚腸胃將腸胃膏血脂肉蒸化為膿或下如爛瓜或如屋漏水此腐腸潰胃之危

血證論四卷 便膿

候與癰瘡之腐爛無異此非尋常治痢之法所能克也吾今借仲景之法證之乃得有膽有識之術仲景云陽明病脈數下不止必協熱而便膿血少陰病下利便膿血者可刺厥陰病脈數而渴者必圍膿血以有熱故也此雖無方然曰可刺曰有熱故也已示人瀉濕清熱之法防風通聖散去麻黃芒硝加赤豆防己為表裡瀉腎之大劑地榆散為清熱之通劑仲景又曰少陰病下利便膿血者桃花湯主之此湯溫澀似與可刺有熱之說大相逕庭不知病久則熱隨膿血而瀉實變為虛觀癰膿潰後屬虛損則知便膿血久而屬虛症譬之天時其初則酷暑流金

轉瞬而涼感振落衣夏甚者不得不換冬衰矣况腸胃血液既化為膿恐其滑脫故主桃花湯溫澀填補之一服愈餘勿服者仲景意謂此乃急時澀脫之法止後便當滌除餘病無以澀傷氣無以燥傷陰也蓋膿血乃傷陰之病故一時權宜而少用乾薑後仍不可多服也吾推其意審其病後有虛熱者逍遙散歸脾湯加柴胡山梔寸冬花粉此祖桃花湯用糯米之意審其病後有虛寒者六君子加當歸黑薑白芍或人參養榮湯皆可此祖桃花湯用乾薑之意成無己注桃花湯謂陽證內熱則溢出血陰證內寒則下紫血如脈肝是明以桃花湯為治陰證之

血證論四卷 便膿

方惟即鮮血分陰陽未確蓋色不足憑凡痢證須審脈微沉遲手足厥冷腹痛喜按唇淡口和為陰證附子理中湯加當歸白芍木香此乃可補桃花湯所不逮矣消渴口熱胸腹脹滿堅實拒按為熱證則用三一承氣湯此乃可盡仲景有熱可刺之能事矣至於尋常紅白則不須如此重劑病在水分者痢下白濁此如暑雨不時行潦汗漲是濕甚而傷氣也審其脈數身熱口渴者為熱濕止清利之四逆散合猪苓湯去阿膠再加厚朴老連枯芩黃柏其脈沉弦遲口不渴手足清冷者為寒濕胃苓湯加

煨薑有食積者。均再加麥。禾神曲。山查。萊服子。白痢之故。總是水不清之故。水即氣也。吾於水火論已詳言之。故調氣即是治水。導水須於上原。調氣以肺為主。是治肺乃清水之原。即是調氣之本。細思此病發於秋時。秋乃肺金主氣。金不清。肅是以水濁。氣滯而為痢。知此理則知迫注者肺之肅不通者金之收也。人參瀉肺湯以導其滯。小柴胡加花粉杏仁。只壳桑皮。茯苓。知母。桔梗。以和之。人參清肺湯以收功。此乃專為治肺立法。示醫者以法門。使知所從事。非臨證必用此方也。且病無單見。未有肺病而餘臟不病者。故臨證時尚須變化。病在血分者。則利下

血證論四卷

便膿

十

純紅口渴便短。裡急後重。脈滑大者。地榆散加酒軍。只壳厚朴。前仁。澤瀉。脈細數者。不必下之。但用原方。若血黯黑。脈遲。手足冷者。屬虛寒。黃土湯治之。紅利之故。總是血分為病。血生於心。火而下藏於肝。肝木內寄相火。血足則能濟火。火平則能生血。如火太旺。則逼血妄行。故血痢多痛。如刀。錐。乃血痛也。肺金當秋。剋制肝木。肝不得達。故鬱結不解。而失其疎泄之令。是以塞而不通。調肝則木火得疎泄。而血分自甯。達木火之鬱。宜小柴胡。去半夏。加當歸。白芍。白頭翁湯。或四物湯。加蒲黃。靈脂。元胡。黃柏。胆草。枯芩。柴胡。桑寄生。肝風不扇。則火息。鉤藤。青蒿。白頭

翁。柴胡。桑寄生。皆清風之品。薑。蠶。蟲。退。亦能祛風。肝氣不遇。則血暢。香附。枳。榔。橘。核。青。皮。沉。香。牡。蠣。皆散利肝氣之品。茯苓。牡。草。秦。皮。枯。芩。又清肝火之品。當歸。生地。阿膠。白芍。又滋肝血之品。桃仁。地榆。靈脂。川芎。又行肝血之品。知理肝之法。而治血痢無難。肝藏血。即一切血證。一總不外理肝也。各書痢證門。無此論說。予從各書旁通會悟而出。實先從吾陰陽水火血氣論。得其原委。故此論精確。不似他書捉影容。曰。凡瀉泄皆脾胃所主。痢亦泄瀉之類。何以不主脾胃哉。答曰。滲瀉洞瀉。誠屬脾胃。故內經曰。長夏善病洞瀉寒中。以長夏為脾主氣故也。痢發則多

血證論四卷

便膿

十一

在秋天。而其情理脈證。亦與洞瀉不同。雖關於脾胃。而要以肝肺為主。乃得致病之原。禁口者。下痢不食。是火熱瀉攻胃。氣被傷。而不開。各書俱遵丹溪。用石蓮湯。金鑑謂內熱。或上衝心。作嘔。噤口者。用大黃黃連。好酒煎服。以攻之。余按腸胃所以能食者。以胃有津液。清和潤澤。是以思食。西洋醫雖滯於迹。亦間有可信處。言穀入於胃。即有胃津注之。將穀渾化。如糜。常探胃津攪飯。頃刻亦化為糜。據此論說。則胃之思食。全是胃津使然。試觀犬欲得肉。則涎出於口。此涎即欲食之本也。人之胃津。其思食之情。亦類乎此。今胃

為邪熱濁氣所攻踞。其清和之津。盡化而為濁滯。下注大腸。則為痢。停聚胃中。則拒不納食。丹溪石蓮湯。雖知清火補胃。然石蓮是蓮米有黑壳者。今醫用石蓮子。不知何物。斷不可用。即蓮米性亦帶澀。痢證宜滑以去着澀。乃所忌。且胃中濁滯。非洗滌變化。不為功。此方雖寒熱未差。然未能洗滌其滯。變化其濁。非起死回生之方也。清溫散飲竹葉石膏湯。人參白虎湯。麥冬養榮湯。出入加減。庶可以洗胃變津。為開胃進食之良法。至嘔不食。金鑿用二黃好酒。取其峻快。以攻逆。然治逆洵為得法。而不知化生胃津。終未得進食之本也。吾意以為宜用大柴胡湯。加

血證論四卷

便膿

十二

石膏花粉人參。則攻逆生津。開胃進食。兩面俱到。治噤口者。從無此論。吾今悟出切實之理。為斯人大聲疾呼。海始欲以文章報國。今已自分不能。庶幾發明此道。稍有補於斯民歟。查對各書言痢證者。說法不一。張景岳主溫。朱丹溪主涼。喻嘉言主發汗。利水。陳修園主寒熱合治。皆有至理。景岳謂夏月貪涼。過食生冷。至秋伏陰內動。應時而為下痢。佐關煎治之。此即仲景下利不止。用四逆湯。桃花湯之意。乃虛寒治法。然必須有虛寒實據。乃用此法。朱丹溪謂濕熱蒸灼。氣血為粘膩。用黃連解毒湯。是即仲景白頭翁湯意也。此類最多。然必有熱證之實

據。乃用此法。喻嘉言謂宜從汗先解其外。外邪內陷。而為痢。必用逆流挽舟之法。引其邪而出於外。人參敗毒散主之。此即仲景協熱下痢。用葛根黃連黃芩湯之意。第仲景升發邪氣。兼清其熱。而喻則辛溫升散。未能兩面俱到。即如仲景白頭翁湯。亦取白頭翁能升達其氣。知開提疎發。為治下迫後重之良方。喻嘉言自以逆流挽舟。獨得其秘。而未能根柢。仲景是以得半遺全。吾擬用柴胡湯。去半夏。加花粉當歸白芍枳壳粉葛。自謂升發清降。兩得其治。喻氏又謂若邪熱已奔迫大腸者。毋庸更從外解。急開支河。從小便而順導之。金匱柴胡湯。阿膠散主之。

血證論四卷

便膿

十三

此即仲景利不止者。當利其小便之意。大清涼散藥。微內外。最有力。從高原導水。使不浸漬腸胃。擬用甘桔湯。加桑皮杏仁。枳壳。防己。木通。石膏。雲苓。苡仁。柴胡。卜荷。生薑。白芍。治之。斯於喻氏發表利水之法。或更有發明。陳修園謂此證有藏寒府熱。胃寒腸熱之辨。仲景瀉心湯。擇用如神。余謂寒熱合病。必有寒熱兼見之實證。不得籠統言之。而混用寒熱雜方也。即如仲景烏梅丸所治之證。消渴氣上衝心。心中疼熱。飢不欲食。此熱證之實據也。食即吐。蚘下之利不止。此寒證之實據也。惟其有此府熱藏寒之實據。故用烏梅丸。兼寒熱治之。又如仲景生薑瀉心

湯所治之證云。心下痞硬。乾噎食臭。此火證也。腦下有水氣。腹中雷鳴。此水病也。惟其有此火在胃中。水在腸間。之實據。故用生薑瀉心湯治之。初頭硬大便後半溏者。此胃中有寒。腸中有熱。陳修園擬用理中湯加大黃。此皆有寒熱兼見之實據。醫者辨證必如是之嚴。而後用藥處方。不失銖黍。以上四家治法。合而用之。而治痢不虞束手矣。

黃坤載曰。人之大便所以不失其常者。以肺主傳送。而腸不停。肝主疎泄。而肛不閉。宜用參朮以助肺之傳送。用桂枝以助肝之疎泄。此黃氏論大便秘結之語也。吾從此語旁通之。而因得

血證論四卷

便讀

十四

痢證之原。以知痢者。肺氣傳送。太力故暴注。大腸肝氣鬱而不疎。故肛門閉塞。欲便不便。而為通脹。此從黃氏之論推求之。而痢證迫而不通之故。誠可識矣。第桂枝參朮與痢證不合。痢證肺氣之奔迫。以其火熱暴注也。故傷寒論飲食入胃。即下利清。水完穀者。乃肺之傳送太急。熱之至也。宜急下之。據此則治奔迫者。當以清火為主。人參清肺瀉肺二湯治之。肝氣不得疎泄。亦由木鬱為火。結而不暢。桂枝溫木是益其火。得毋慮不戢。自焚乎。觀仲景白頭翁湯。用秦皮白頭翁。以涼達肝木。四逆散裡。急後重者。加薤白。以疎鬱。則知助脾疎泄之法。矣。當歸蘆薈丸。

瀉肝湯。丹稅逍遙散。加減治之。至於和肝調肺。止奔迫。解鬱閉。一方而肝肺並治者。自古無之。余擬用白頭翁湯。加石膏知母。杏仁。桔梗。枳殼。檳榔。柴胡。麥牙。當歸。白芍。甘草。治之。輕劑則用小柴胡。加歸芍。杏仁。桔梗。枳殼。檳榔。麥牙。花粉。調和肺肝。則肺氣不迫。注肝氣得開。利矣。又或肝氣欲泄而下注。肺氣欲收而不開。故痢多發於秋。秋金肺氣閉而不開。肝氣決裂。而不通。是以迫痛。此又從黃氏之義。另翻一解。而各書均不載者也。治宜甘桔湯。加白芍。以桔梗開提肺氣。以白芍平治肝木。本此意。以為加減。則芫甲。胆草。青皮。秦皮。蘆薈。皆平肝之藥。當歸。生地。桃

血證論四卷

便讀

十五

仁。靈脂。元胡。皆治肝經血分之藥。枯芩。寸冬。桑皮。知母。皆清肺之藥。枳殼。貝母。杏仁。陳皮。皆肺經調氣之藥。隨宜致用。變化在人。焉有不治之痢哉。調血則便膿自愈。調氣則後重自除。此二語為千古治痢之定法。而亦相沿治痢之套法耳。蓋泛言調血。則歸芍地榆。用盡而不效。泛言調氣。而陳皮木香。多服而無功。不知木香。陳皮。乃調脾氣之藥。痢雖脾病。而其所以逼迫者。肝肺之咎也。知調肝肺。則善調氣矣。血乃血海所總司。血海居大腸之間。故痢症。臍下極痛者。必有膿血。痛不甚者。無膿血。以臍下血海之血痛故也。

知理血海。則善治血矣。

普明子謂痢證多兼食積。宜用枳壳厚朴大黃。輕則用山查神曲萊服子麥牙。此論最淺而中肯。

久痢不止。肺氣下泄。則魄隨之陷。而魄脫則死。肺藏魄。治宜調補肺氣。人參清肺湯以固之。如寒清者。桃花湯治之。仲景阿膠

勑散。即是清肺固脫之方。四神丸。梅丸。皆是桃花湯之義方。難盡舉。升提固澀。總須分寒熱用藥。斯無差爽。

休息痢者。止而復作。乃固澀太早。留邪在內。故時復發作。治宜按上治痢之法。視何經見證。則用何經之藥。以消除其邪。伏邪

血證論四卷 便服

十六

既去而痢。自不作。如羊脂白蜜黃連末服。不過取滑去着。寒去火之義。尤未若視其邪所發見之情。而分經用藥。更為對證。又補論曰。凡噤口痢。上噤下痢。法宜和中。此與霍亂對看。自明霍亂上吐下瀉。必以和中而愈。則知噤口痢。上噤下痢。亦必以和中而愈。第霍亂是中寒。而發為上下俱脫之證。法主理中湯以溫之。噤口痢。上閉下滯。其為中熱。可知。熱結於中。上下不開。和中之法。宜反理中湯。諸藥以寒涼治之。生薑瀉心湯。去乾薑為宜。人參白虎湯亦佳。

尿血

膀胱與血室。并域而居。熱入血室。則蓄血。熱結膀胱。則尿血。尿乃水分之病。而亦干動血分者。以與血室并居。故相連累也。其致病之由。則有內外二因。

一外因。乃太陽陽明傳經之熱。結於下焦。其證身有寒熱。口渴腹滿。小便不利。溺血疼痛。宜仲景桃仁承氣湯治之。小柴胡湯加桃仁丹皮牛膝亦治之。

一內因。乃心經遺熱於小腸。肝經遺熱於血室。其證淋秘刺痛。

血證論四卷 尿血

十七

小便點滴不通者。呼赤淋。治宜清熱。治心經遺熱。虛煩不眠。或昏睡不醒。或舌咽作痛。或怔忡懊懷。宜導赤飲。加炒梔連翹丹皮牛膝。治肝經遺熱。其證少腹滿。脇肋刺痛。口苦耳聾。或則寒熱往來。宜龍胆瀉肝湯。加桃仁丹皮牛膝玉京。

尿血治心與肝。而不愈者。當兼治其肺。肺為水之上源。金清則水清。水清則血甯。蓋此證原是水病累血。故治水即是治血。人參瀉肺湯。去大黃加苦參治之。清燥救肺湯。加藕節蒲黃亦治之。

以上結熱之證。其血溺出。皆有淋滴不通之象。乃尿血之實證。

也。此外又有虛證。溺出鮮血。如尿長流。絕無滯碍者。但當清熱。滋虛兼用止血之藥。無庸再行降利矣。蓋前陰有二竅。一為水竅。一為血室之竅。血竅在女子則為胎孕之門。血竅在男子則為施精之路。故女子血室之血能由此崩漏而下。男子血室之血亦能由此走洩而出。是以尿血之虛證。與女子崩漏之證。無異。宜用四物湯加減治之。肝如鬱火者。加丹皮炒梔。柴胡。阿膠。芥灰。心經血虛火旺者。加老連。阿膠。血餘灰。脾氣虛寒不能攝血者。四支清冷。脈微遲。面黧淡。加魚鱉黃芪。人參。艾葉。黑薑。甘草。五味。治之。房勞傷腎。加鹿膠。海鯁。蛸。燒。燻。散。治之。又有肺虛

血證論四卷

尿血

十八

不能制節其下。以致尿後滲血者。審係肺陰虛。則兼氣逆痰欬。口渴等證。人參清肺湯主之。若肺陽虛。不能治下。則必有遺溺。足冷。水飲喘嗽之證。甘草乾薑湯治之。

經血

婦科已有專書。然男女血本同原。故并論之。經云。女子二七而天。癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。故能有子。天癸者。謂先天腎中之動氣。化生癸水。至者。謂至於胞中也。水為陽氣所化。陽倡而陰必隨之。血者。陰也。衝任主之。故應癸水而即輸血於胞中。血之應水而下。是謂以陰從陽。有如妻之從夫。衝任兩脈。皆起胞中。上屬陽明。陽明乃後天水穀之海。居中宮。稱戊土。化氣取汁。變赤為血。隨衝任兩脈。以下合癸水。是謂戊與癸合。

血證論四卷

經血

十九

男女皆然。男子主氣。故血從水化。而為精。女子主血。故水從血化。而為經。血是男子之精。水中有血。女子之經。血中有水。故行經前後。俱有水漿可驗。夫此水乃腎中冲陽之氣所生氣。亢則水竭。而血不濡。熱證於是乎生。氣寒則水冷。而血不運。寒證於是乎生。矣。故凡調血。先須調水。調水即是調氣。氣生於腎。而主於肺。血生於胃。而藏於肝。以血海為肝之部分。肺金司氣之制節。又為水之上源。調血調水。人當知所從事。矣。故或調氣中之水。以滋血。或調血中之氣。而利水。是女子調經之法。即凡為血證之治法。學者宜鑒觀之。

血熱者水不足也。因見行經趨前發熱口渴諸證。四物湯加天冬、麥冬、枯苓、花粉、柴胡、阿膠、牛膝等藥以滋水者濡血。或用六味地黃湯以滋肺腎亦能啓水之源。此以滋水為養血之法也。血寒者水不溫也。因見經水後期黯淡清冷之狀以及凝滯疼痛兼作四物湯加茯苓、甘草、桂枝、黑薑、附子等藥以溫水者行氣氣行則血行也。

血虛者行經太少以及乾枯淡薄諸虛證。猶雜出難言。審係腎中天癸之水不足者必骨熱氣逆足痿脈數子宮乾澀經血前後均無漿水宜左歸飲加兔絲、龜板、阿膠、寸冬、五味、菴蓉以滋

血證論四卷

經血

二十

天癸之水審係胃虛陽明衝任之血不足者經水必淡。只有水漿而少鮮血宜炙甘草湯養榮湯酌而用之以補生血之源。而血虛可治矣。

血滯者瘀血阻滯因見身痛腹脹寒熱帶漏散經閉經諸證。總是瘀血阻滯其氣若無瘀血則經自流通安行無恙。何緣而錯雜變亂哉。凡此之類故總以去瘀為要。四物湯加元胡、桃仁、香附、乳香、沒藥、主之有熱加黃芩、黃連、有寒加乾薑、附片、王清任血府逐瘀湯。膈下逐瘀湯皆宜。瘀血之甚者非仲景土瓜根下瘀血等湯不治。另詳瘀血門。

總而論之。血氣二者原不相離。血中有氣氣即是水。吾於本條及水火氣血論已詳言之。知此則知瘀血阻滯者乃血阻其氣。是血之咎。故破散其血而氣自流通。桃仁、丹皮、靈脂等在所以用血分有熱者乃氣分之水不足以濡血。故令血熱用梔芩等以瀉火。瀉火即是滋水也。血分有寒者乃氣分之水冰凝濕滯而不化。故濡滯不流通也。吳萸、細辛、桂枝、艾葉以溫水者溫血。水溫則氣和氣和則血和。觀此可知男子瘀血熱結寒凝治法。與此皆無異矣。觀於生天癸以生血之法則知男子滋腎養血之法。觀於補陽明以補血之原則知男子補血之原矣。觀於滋肺以養血之法則知男子生津以養血之法。以至血熱而水凝為痰。血虛而水溢為汗。同類異情無不畢見。

血證論四卷

經血

二十一

崩帶

婦人面色青黃。肢體消瘦。心戰腰酸。時下濁物。其物黃赤青白。或黑。并下是帶脈之血。傷損而成。故名曰帶證。古法又分白濁一條。謂帶下是帶脈為病。其色汗雜。白濁則是心脾腎三經為病。其色純白。而所用之方。仍相彷彿。其實同一病也。皆是帶脈為病。吾為指明曰。白濁五帶。所下似血非血。乃胞中之水也。此水清則為天癸。以濟經血。前論詳矣。此水濁則為白濁。為五帶。水濁而血因以濁矣。蓋帶脈下繫胞宮。中束人身居身之中央。

血證論四卷

崩帶

二十三

屬於脾經。脾經土氣沖和。則帶脈甯潔。而胞中之水清。和是以行經三日後。即有胞水黃明如金。是腎中天癸之水。得帶脈脾土之制。而見黃潤之色。乃種子之候。無病之月信也。若脾土失其沖和。不能制水。帶脈受傷。注於胞中。因發帶證。白濁汗雜。治宜和脾。以利水治脾。即是治帶。治帶即治水也。觀腎着湯用白朮。治腰痛如帶。五千錢者。腎着名湯。明言是腎中水邪。着於帶脈。故從脾治之。以土治水。而帶脈自愈矣。即此可知。女子帶證。是水不清。濁證。仍是水不清。不必強分。總以和脾利水為主。胃苓湯主之。挾熱者去桂枝。加黃芩。黃連。黃柏。夾寒者加細辛。

吳子。夫脾土鬱蒸。濕氣腐化。變生五帶。赤白汗濁。理脾解鬱。宜道運散。加防己。木通。主之。熱加丹皮。梔子。黃柏。寒加台烏。艾葉。砂仁。以上所論。雖未盡帶濁之治。然已得法門。學者推而廣之。遇熱證。則硝黃甘遂。未必非宜。遇寒證。則參朮芪附。尤所必用。以及寒熱錯雜。皆可隨證制方。有紙筆不能盡傳者。在醫師之自悟也。

崩漏者。非經期而下血之謂也。少者名曰漏。下多則名為血崩。行經而去血過多。如水之流。不能止者。亦是血崩。古名崩中。謂血乃中洲脾土所統攝。脾不攝血。是以崩潰。名曰崩中。示人治

血證論四卷

崩帶

二十三

崩必治中洲也。月經名曰信水。以五行惟土主信。土旺則月水有信。土虛則失信而漏下。甚則崩中矣。治法總以治脾為主。或勞倦傷脾。或思慮饑飽傷脾。脾虛不攝。宜用歸脾湯。加艾葉。阿膠。灶心土。大虛者。宜十全大補湯。加阿膠。續斷。升麻。炮薑。棗仁。粳皮。再用魚肚。鹿角霜。蓮米。薑鹽。炮食。以調養之。黃芪。糯米。當歸。煎服。亦大補氣血。六君子。養榮湯。炙甘草湯。皆脾經補益之藥。可以加減用之。凡是崩中。此為正治。又有治肝以治脾之賊者。肝經怒火妄動。木鬱剋土。火擾而血不得甯。其人善怒。頭痛。口苦。目眩。脇腹脹滿。六脈弦數。與脾經虛寒之證。顯有不同。宜

歸脾湯。加丹皮、山梔、柴胡、白芍、寸冬、五味、補脾、土、清肝、火、兩。而俱到。或用丹梔、道遙、散、加牡蠣、阿膠、蒲黃。謹按帶漏雖是水病。而亦有夾瘀血者。以血阻氣滯。因生帶漏。小調經湯。隨寒熱加減治之。崩中雖是血病。而實則因氣虛也。氣下陷則水隨而瀉。水為血之侶。氣行則水行。水行則血行。宜服補氣之藥。以升其水。水升則血升矣。補中益氣治之。合崩帶觀之。一是水病。一是血病。女子男子皆有血與水之病。宜通觀之。

血證論四卷

崩帶

二十四

產血

婦人胎中。有血衣以裹兒。血衣之下。又有水衣。以襯墊之。將產則胎水先破。水衣先下。然後血衣破。而兒生。兒生之後。血衣乃下。世謂水衣墊胎。水衣既行。則其胎顛墜。是以免出。此乃着述之論。未得其所。所以然也。夫胎產之事。乃關氣化。豈猶什物之襯墊懸墜。所可擬者。吾為指出其理。曰。天地之大。總是以陽統陰。人身之生。總是以氣統血。氣乃腎中水化之陽。故氣着於物。還復為水。吾是以有氣即是水之論。婦人懷子。墊胎之水衣。即氣

血證論四卷

產血

二十五

也。胎乃氣載舉之。氣即是水。故水墊其胎。實則氣載其血也。將產之時。水衣先行。氣下行。故水下。行水行。實則氣行也。氣既下行。則其胎血自隨之。而下。血之從氣。又如妻之從夫。豈有氣行而血不行者哉。故胎之未生。氣載之。胎之將產。氣運之。知此則知護胎者必調氣。催生者必行氣。而治一切血證。皆宜治氣。舉可於此悟出。

將產之時。腰腹大痛者。以氣欲行而血未行。血阻其氣。而氣必欲迫之。使行。故令大痛。此必初胎初產之婦。血道新開。礙氣之行。故其痛極甚。或數產之婦。內有瘀血。阻滯其氣。故令大痛。若

壯婦身無瘀血。則將產時微痛而已。或微脹而已。蓋其氣行而血隨之下。血道既是熟路。又無瘀血阻滯。何痛之有。其極痛而胎不下者。催生之法。總宜行血。不使阻滯。其氣則氣下而胎隨。以下佛手散主之。父骨不開者。加敗龜板及婦人油髮燒灰。義總取於活血。血活則氣通胎順而自生矣。

既產之後。身痛腰痛。惡血不盡。阻滯其氣。故作痛也。蓋離經之血。必須下行不留。斯氣無阻滯。自不作痛。又能生長新血。若瘀血不去。則新血不生。且多痛楚。宜歸芎失笑散。及生化湯治之。夫產後百脈空虛。亟宜補血。而猶力主去瘀者。瘀血不去。則新

血證論四卷

產血

二十六

血斷無生理。吾於男女異同論。已詳言之。雖產後大虛。仍以去瘀為急。去瘀正為生新計也。吐衄家須去瘀血。觀此益信。

產後血暈。由血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。甚者悶絕。口噤。神昏氣冷。有下血過多而暈者。屬虛。但昏悶煩亂而已。法當補血。宜炙甘草湯及八珍湯。加杏仁、龍骨、硃砂、丹皮。有下血少而暈者。乃惡露上搶於心。心下滿急。神昏口噤。絕不知人。法當破血。宜當歸、元胡、血竭、沒藥、芥穗、京墨、煨紅醋、淬童便。引血暈之證。吐衄家間亦有之。醫者不可不知。

產後血崩。乃紫氣空虛。不能攝血歸經。大劑歸脾湯主之。如兼

汗出氣喘者。乃是血脫氣散之危證。參附湯加阿膠、熟地、茯苓、甘草。以救之。然又有怒氣傷肝。肝氣橫決。血因不藏者。歸脾湯加炒梔、阿膠、艾葉、柴胡、逍遙散。加阿膠、牡蠣、棕灰、炒梔、蓮葉。香附皆宜。

敗血干肺。口鼻黑色。面如茄色。或發鼻衄。乃氣逆血升之危候。或則喘急。或欬逆欲死。總緣肺虛不能制節其下。是以下行之血。得以上干。宜參、燕、飲主之。鼻衄加杏仁。喘欬加五味。吐衄家血干肺臟者。亦與此同。

敗血干心。心氣閉塞。舌強不語。神昏譫語。如見鬼狀。宜歸芎失笑散。加龍腦、硃砂、血竭、沒藥。治之。牛膝散加杏仁、琥珀、熟地、人參皆宜。

血證論四卷

產血

二十七

敗血干脾。則嘔逆腹脹。不能飲食。生化湯加半夏、茯苓、枳殼、厚朴。如發為水腫。是血從水化。而變為水。與血變為膿無異。既從水化。則從水治之。五苓散加蒲黃、丹皮。以利之。

總之血以下行為順。上行為逆。知產血上逆之為病。則愈知吐衄之血。上逆為病也。但吐衄與產血。其病原不同。故治法亦異。此外尚有數證。乃產後多有之證。亦與吐衄義可參觀。因連類及之。條列如左。

產後喘促最危之候。因榮血暴竭。衛氣無依。為血脫氣散之證。宜參附湯飲之。四磨湯亦可。若因敗血乘肺。氣喘目黑。鼻起烟煤者。是為肺氣將絕之證。參蘇飲治之。二證一是腎氣虛脫。而陽上越。一是肺氣虛竭。而血上乘。兩方皆主人參。大生水。津水者。氣之母也。方主補氣。故用人參以滋水。滋水即是補氣。而陽上越者。佐附子以引之。歸根血上干者。佐蘇木以速之。下降誠產後救危之良方。男子血氣脫絕之證。亦不能外此義也。

血證論四卷

產血

二十八

與血配最吉之兆。若陰虛於內。陰浮於外。濺濺汗出。是為自汗。與微汗有別。法宜補陰而引陽。聖愈湯加附子。五味。寸冬。龍骨。治之。若大汗亡陽。其汗如水之流。乃元氣脫散。氣即水也。氣脫故大汗。非大劑參附湯不能回陽。又有但頭汗出。至頸而還者。乃血不得其和。氣因鬱而上蒸。故但頭汗出。仲景謂之鬱冒。用小柴胡湯解之。盜汗陰虛者。當歸六黃湯治之。此與吐衄家汗出。諸證有相通處。宜參觀之。

產後發熱。因陰血暴傷。陽無所附。四物湯加炮薑。從陰引陽。為正治之法。若頭痛惡寒而發熱者。屬外感。不當尋常傷寒治。

之。惟宜用四物湯。加荆芥。柴胡。蔥白。和血解表而愈。又有停食發熱者。必見脹悶。噯氣。嘔噦等證。異功散加山查。神麩。麥牙。厚朴。生薑。治之。若因瘀血擁滯而發熱者。必見身腹等處刺痛之證。生化湯治之。若去血過多。煩躁口渴。面赤身熱者。當歸補血湯治之。若陰虛陽無所附。孤陽外越。而發熱者。急進參附湯救之。金鑒此條。於產後發熱虛實之證。畧備。與男子亡血發熱者。治法相同。但亡血是血上行。產後是血下行。一逆一順。其間畧有不同耳。

血證論四卷

產血

二十九

不及備載。另有產科諸書可查。

又補論曰。產後氣下洩。故多脫證。吐血氣上逆。故少脫證。吐血之脫證。皆宜降產後之脫證。則宜升。此絕不同。

血證論五卷

四川彭縣容川唐宗海著

瘀血

吐衄便溺其血無不離經。凡係離經之血。與榮養周身之血。已睽絕而不合。其已入胃中者。聽其吐下可也。其在經脈中而未入於胃者。急宜用藥消除。或化從小便出。或逐從大便出。務使不留。則無餘邪為患。此血在身不能加於好血。而反阻新血之化機。故凡血證。總以去瘀為要。世謂血塊為瘀。清血非瘀。黑色

血證論五卷

瘀血

為瘀。鮮血非瘀。此論不確。蓋血初離經。清血也。鮮血也。然既是離經之血。雖清血。鮮血。亦是瘀血。離經既久。則其血變作紫血。譬如皮膚被杖。血初被傷。其色紅腫。可知血初離經。仍是鮮血。被杖數日。色變青黑。可知離經既久。其血變作紫黑也。此血在經絡之中。雖已紫黑。仍是清血。非血塊也。是以能隨氣運行走入腸胃。吐下而出。設在經絡之中。即是血塊。如何能走入腸胃。耶。至於血塊。乃血入腸胃。停留片時。立即凝結。觀宰割猪羊。滴血盆中。即時凝結。便可知矣。故凡吐衄。無論清凝鮮黑。總以去瘀為先。且既有瘀血。便有瘀血之證。醫者按證治之。無庸畏阻。

瘀血攻心。心痛頭暈。神氣昏迷。不省人事。無論產婦。及吐衄家。有此證者。乃為危候。急降其血。而保其心。用歸芎失笑散。加琥珀。砂射香。治之。或歸芎湯。調血竭。乳香。末亦佳。瘀血乘肺。類逆喘促。鼻起烟煤。口目黑色。用參蘇引。保肺去瘀。此皆危急之候。凡吐血。即時斃命者。多是瘀血乘肺。壅塞氣道。肺虛氣促者。此方最穩。若肺實氣塞者。不須再補其肺。但去其瘀。使氣不阻塞。斯得生矣。葶藶大寒湯。加蘇木。蒲黃。五靈脂。童便。治之。

瘀血在經絡臟腑之間。則周身作痛。以其堵塞氣之往來。故滯

血證論五卷

瘀血

二

碍而痛。所謂痛則不通也。佛手散。加桃仁。紅花。血通續斷。秦艽。柴胡。竹茹。甘草。酒引。或用小柴胡。加歸芍。丹皮。桃仁。荆芥。尤通治內外之瘀。方義較穩。瘀血在上。焦或髮脫不生。或背膊胸膈頑硬刺痛。目不了了。通竅活血湯。治之。小柴胡湯。加歸芍。桃仁。紅花。大蘗。亦治之。瘀血在中。焦則腹痛。脇痛。腰臍間刺痛。着滯血府逐瘀湯。治之。小柴胡湯。加香附。薑黃。桃仁。酒軍。亦治之。瘀血在下。焦則季脇少腹脹滿。刺痛。大便黑色。失笑散。加醋軍。桃仁。治之。膈下逐瘀湯。亦穩。

瘀血在裡則口渴。所以然者。血與氣本不相離。內有瘀血。故氣不得通。不能載水津上升。是以發渴。名曰血渴。瘀血去則不渴矣。四物湯加桃仁、丹皮、蒲黃、三七、花粉、雲苓、枳殼、甘草、小柴胡湯加桃仁、丹皮、牛膝。皆治之。溫經湯以溫藥去瘀。乃能治積久之瘀。數方皆在酌宜而用。

瘀血在腠理。則榮衛不和。發熱惡寒。腠理在半表半裏之間。為氣血往來之路。瘀血在此。傷榮氣則惡寒。傷衛氣則惡熱。是以寒熱如瘧之狀。小柴胡湯加桃仁、紅花、當歸、荆芥。治之。瘀血在肌肉。則衄衄發熱。自汗盜汗。肌肉為陽明所主。以陽明

血證論五卷

瘀血

三

之燥氣。而瘀血相蒸。鬱故其證象白虎。犀骨地黃湯加桃仁、紅花。治之。血府逐瘀湯加醋炒大黃。亦治之。

瘀血在經絡臟腑之間。則結為癥瘕。瘕者。或聚或散。氣為血滯。則聚而成形。血隨氣散。則沒而不見。方其既聚。宜以散氣為解。血之法。九氣丸主之。在胸膈上者。加桔梗、枳殼、瓜蒌、生薑、甘草。在右者。加蘇子、桑皮、陳皮。在左者。加青皮、牡蠣、當歸。在中焦大腹者。加厚朴、枳殼、防己、白芍、甘草。在小腹下者。加橘核、小茴、荔枝、橫柳、川棟子、靈脂。氣散則血隨而散。自不至於結聚矣。至其既散之後。則又恐其復聚。宜以調血為和氣之法。此時痰氣既

散處於血分之中。但一調血。則氣自和。而不復聚矣。逍遙散加丹皮、香附。治之。歸脾湯加柴胡、鬱金子。亦治之。癥者。常聚不散。血多氣少。氣不勝血。故不散。或純是血質。或血中裏水。或血積既久。亦能化為痰水。水即氣也。癥之為病。總是氣與血膠結而成。須破血行氣。以推除之。元惡大憝。萬無姑容。即虛人久積。不便攻治者。亦宜攻補兼施。以求克敵。攻血質。宜抵當湯。下瘀血湯。代抵當丸。攻痰水。宜十棗湯。若水血兼攻。則宜大黃、甘遂湯。或秘方化滯丸。外治法。貼觀音救苦膏。

血證論五卷

瘀血

四

詳吐膿便膿。瘡膿。門茲不再贅。

瘀血在經絡臟腑之間。被氣火煎熬。則為乾血。氣者。腎中之陽。陰虛陽亢。則其氣上合心火。是以氣盛。即是火盛。瘀血凝滯。為火氣所薰。則為乾血。其證必見骨蒸、癆熱、肌膚甲錯、皮起鱗屑。名為乾血癆。病至此者。十治二三。仲景大黃蟅蟲丸。治之。蓋既係乾血。便與氣化。隔絕。非尋常行血之品所能治也。故用諸蟲。嚙血之物。以銷蝕乾血。瘀血不去。新血且無生機。况是乾血。不去。則新血斷無生理。故此時雖諸虛。早見。總以去乾血為主也。如膽識不及。可以滋補之藥。送下此丸。亦調停之一術。

瘀血在經絡臟腑之間。被風氣變化。則生癩。蟲氣者腎水之所化也。故氣動即為濕風者。肝陽之所生也。故風動即為熱濕蒸也。其辨法。面色不赤。不白。不青。不黃。唇口生瘡。聲啞。咽癢。煩。不甯。遺精。白濁。髮焦。舌燥。寒熱盜汗。口出穢氣。不知香味。喜見人過。常懷忿怒。夢見亡先。驚悸欬逆。或腹中有塊。或腦後兩邊有小結核。或食豆而香。又用乳香薰其手背。帕覆手心。須臾毛長。至寸許。每日平旦精神尚好。日午向後。四肢微熱。面無顏毛。皆是癩蟲之候也。月華丸主之。多食鰻魚肉。既有滋補。又善殺

血證論五卷

癩血

五

癩蟲。或用鰻魚骨。燒黑。鯊甲炒為末。煎人參。當歸。白芍。白薇湯送下。補虛殺蟲。相輔而行。若專事殺蟲。金蟾丸亦可間服。金線蛙燒服亦妙。黑貓殺取肝。焙乾為末。月初五更空心服。大能殺除癩蟲。可代獺肝。獺爪為末。酒下。癩蟲居肺葉間。咯血聲嘶者。皆能治之。癩蟲乃血化之蟲。最為靈異。其人死後。蟲為妖孽。傳染家人。為傳尸癩。殺三。八者。其蟲不治。傳尸之證。與其所感之病人無異。金鑑謂宜服傳尸將軍丸。方載丹溪心法中。今查丹溪心法不載此方。然以將軍名况。其主用大黃可知。夫傳尸蟲孽。傳染人

身。亟宜除去。故主攻下。亦如仲景攻乾血法。以免留邪為患也。此蟲一傳人身。便能聚積人身之血。以為窠囊。食息生育。變化無窮。吾謂可用移尸滅怪湯。殺其蟲而奪其血。斯無遺留之邪矣。以上二證。大便不溏泄者。尚可攻治。溏泄者。不能任藥。必死。

血證論五卷

癩血

六

血

蓄血者或傷寒傳經之邪或瘟疫時氣之邪傳於血室之中致周身之血皆為邪所招致而蓄聚胞中小腹脹痛其人或寒或熱晝日明了夜則譫語甚則發狂呼叫打罵內經所謂血在上喜忘血在下如狂是也癩犬咬傷毒聚胞中故令發狂皆屬蓄血之證仲景抵當湯治之桃仁承氣湯亦治之若膽識不及可用膈下逐瘀湯加大黃若血猶未結但是熱入血室夜則譫語用小柴胡湯加桃仁丹皮治之

血證論五卷 蓄血血腫

血 腫

血腫之證。脇滿小腹脹滿。身上有血絲縷。煩燥激水。小便赤。大便黑。腹上青筋是也。醫書俱云是婦人之病。惟喻嘉言謂男子恒有之。面色痿黃。有蟹爪紋路。脈雖虛極。而步履如故。多怒善忘。口燥便秘。脇脹腹疼。迨脹之既成。腹大如箕。遂不可救。東南最多。所以然者。東海饒魚鹽。魚者甘美之味。多食令人熱中。鹽者鹹苦之味。其性偏於走血。血為陰象。初與熱合。不覺其病。日久月增。中焦沖和之氣亦漸為熱矣。氣熱則結。而血不流矣。於

是氣居血中。血裏氣外。一似婦人受孕者然。至隔月時。腹如抱。斃推而言之。凡五方之膏梁厚味。椒薑桂糝。成熱中者。皆其類也。治之之法。以六君子湯加乾薑川芎。防己為末。陳米荷葉煎湯。泛丸。白湯下。執中央以運四旁法也。

謹按喻氏之論。其言血腫之原。最為詳確。惟所主之方。與氣熱則結。而血不流之說。未能脗合。蓋六君子與所加之藥。於治痰。厥為宜。且須寒飲方為切合。如論所謂。應用清和理氣之品。攻劑代抵當。凡主之和劑。丹梔道滯散。加薑黃香附治之。諸書皆用桃奴散。或琥珀散治之。第兩方用溫藥。亦血因寒凝之劑。與

血證論五卷

血腫 附血腫

喻氏所論。又有不同。醫者審證擇用可也。

又有石痕腸覃。狀如懷子。腹日以大。月事以時下者。為腸覃。以寒客於腸外。氣病而血不病也。宜橘核丸主之。月事不以時下者。為石痕。乃寒氣客於子門。子門閉塞。惡血當下不下。以留止。故成石痕。是氣病而血亦病也。宜琥珀散。桃奴散治之。後服溫經湯。

單腹脹者。為血腫。若四肢皆脹。或先從四肢腫起。其色紅者。謂之血腫。亦有不紅者。血從水化。而為水。故不紅也。或得於吐衄之後。瘀血化水。而腫。或得於婦人經水不行。血化為水。而腫。既

化為水。則兼治水。五皮飲。加當歸。白芍。蒲黃。丹皮。桃仁。治之。或用乾漆。雄黃。醋丸。麥牙湯下。亦可。

又凡臃脹浮腫。俱要分陰證陽證。陰證脈沉澀弦緊。必有寒痰。諸證宜中滿分消湯。加桃仁。陽證脈數口渴。便短氣逆等證。宜小柴胡湯。加知母。石膏。防己。丹皮。桃仁。豬苓。茯苓。車前子。治之。另詳六卷腫脹門。

血證論五卷

血證論

九

經閉

婦女經閉有四。一寒證。一熱證。一實證。一虛證。

寒閉者。積冷結氣。經水斷絕。至有歷年。胞門為寒所傷。經終凝。堅。陰中掣痛。少腹惡寒。上引腰脊。繞臍寒疝。或瘀血不行。留為石瘕。皆霜凝水結之象也。用溫經湯主之。或用溫藥下之。附子理中湯。加當歸。桃仁。大黃。細辛。牛膝。肉桂。生化湯下之。尤穩。經通之後。再服腎氣丸收功。

熱證者。胞為血室。血室為肝之所司。肝火橫逆。從胞脈上迫於

血證論五卷

經閉

十

心肺。心肺之氣。不得下通。則發寒熱。頭暈耳鳴。煩躁多怒。咳逆氣上。治宜平其肝火。使肺氣得下降。心血得下注。斯經通矣。當歸蘆薈丸。加桃仁。以攻之。丹梳道。遙散。加桃仁。以和之。又曰。衝任兩脈。起於胞中。上屬陽明。若胞中火逆。隨衝任兩脈。上冲頭暈。煩赤。咽喉不利。發熱口渴。欬逆喘息。此乃胞氣上逆。合於陽明之氣。而為燥動之證。法宜從陽明以折衝逆。使火下降。斯經通矣。玉燭散。治之。如脾胃素虛。不便攻治者。玉女煎。加桃仁。丹皮。治之。金匱麥門冬湯。尤能逆折衝氣。數方皆從陽明降氣。使氣下達。胞中則經自通。又有從腎中引氣下行。以通經之法。用

六味地黃湯。加知柏牛膝前仁。此又引衝氣下行。隔治之法。實證經閉者。婦人少腹如敦狀。小便微難而不渴。此為水與血結在血室也。大黃甘遂湯主之。又仲景曰。婦人傷寒。仲風經水適斷。胸脇滿。如結胸之狀。謔語者。此為熱入血室也。小柴胡湯主之。婦人經閉。藏堅癖不止者。中有乾血。濕熱腐變化。出白物。礬石凡納入陰戶。吾謂可用土瓜根湯。加黃柏防己治之。又或小腹結痛。大便黑色。小便不利。明知血欲行而不肯利。下宜抵當湯主之。時方可用隔下逐瘀湯。

虛證經閉者。或因失血過多。面與爪甲之色。俱淺淡黃白。血既

血證論五卷

經閉

十一

從上而脫。更何從再注胞中。以為經水哉。治法宜止其吐衄之血。使其下行。再補其虛。則血生而氣順。下注胞中。斯經得通矣。四物湯加牛膝。枳殼。降香。玉京。血餘。童便。茯苓。甘草。阿膠。或因過淫精竭。腎中天癸之水。不至胞中。則不能引動衝脈之血。是為陽不倡。陰水不化。血宜滋補其水。以益天癸。左歸飲主之。三才湯亦主之。或因生產過多。傷血血枯。聖愈湯主之。或室女血枯。名為童癆。室女正當血盛之時。而乃經少血枯。以致骨蒸。飢熱。面色枯白。兩顴發赤。懶於飲食。皮乾消瘦。咳嗽喘息。此宜大滋其血之化源。使血驟生。而諸病乃退。炙甘草湯主之。又或婦

人女子。不得隱曲。心念不遂。脾氣抑鬱。以致胃病。不思飲食。息少神怔。忡健忘。脾不化汗。心不化赤。是血虛而無經。水血虛則生內熱。肌肉乾瘦。如風之消物。故又名風消。其證難治。宜歸脾湯主之。血虛則火盛。無制心。乘肺金。金氣不行。不能運布水津。留於胸中。津液盡化。為痰。欬嗽不已。日久成癆。經所謂傳為息。責則不能治。謂喘息也。都氣丸。加人參。麥冬。冬仁。五味。鍾乳石。治之。天王補心丹亦治之。保和丸。清燥救肺湯。皆可借治。息責。葉氏養胃湯。加熱地。五味。雲苓亦佳。

經血原委已於四卷詳言之。茲特就經閉大畧。出其證治。化裁

血證論五卷

經閉

十二

通變則存其人。未民所論生血之法。男女畧同。治血證者。須切究之。

胎氣

婦人以血養胎。血或不足。或不和。於是胎氣諸證。此與本書血證不涉。然皆血分中事。不類而類。因并論以啟人之悟。

孕婦胎中止有水。血二者而已。水即是氣。故生產時。水衣先至。後下血。衣行經時。亦先下漿。水後下鮮。血水者。氣之所化。氣屬陽。血屬陰。水先乎血。是為陽先乎陰也。故行經也。必天癸之水。至於胞中。而後衝任之血應之。亦至胞中。於是月事乃下。其受胎也。亦必天癸先交。而衝血後聚。故不曰男女構血。而曰男女

血證論五卷 胎氣

十三

構精者。水與血混合之名也。既成胎後。腎中之陽氣。則化水以養胎。胃中之水穀。則取汁化血。從衝任兩脈下注胞中。以養胎。胎中水足。則血不燥。胎中血足。則氣不亢。水血調和。則胎孕無病。所以有病者。皆水與血不和之故。胎病多端。吾且斬斷葛藤。但就水血二者立法。可以通一舉萬矣。

惡阻者何也。胎中之水火。上逆入胃。故也。衝任乃胞脈。皆上屬於陽明。陽明之氣。下行為順。今因有胎。子宮收閉。衝氣不得下。洩轉而上逆。挾胞中之水。以干胃土。則為痰水上溢。因而嘔吐。治宜調胃利痰。二陳湯加枳殼砂仁。生薑藿香治之。香砂六君

子湯亦治之。水降則氣降。胃得安而不嘔吐矣。又或胞氣上逆。上合陽明燥氣。而為火。亦致吐逆。嘔苦嘔酸。噦氣拒食。胎塞於下。氣逆於上。多生火證。故世謂胎前不宜熱藥。以此之故。法宜清胃降火。小柴胡湯主之。麥門冬湯亦治之。

子噎者何也。胎中之水火。上干於肺。故也。養胎全賴水與血二者。若水不足以濡血。則血燥。血不足以濟水。則氣熱。燥熱相合。是為胎火。胎火循衝脈而上干。犯肺。金則欬喘交作。兩頰發赤。咽喉不利。氣噎欬嗽。故名子噎。仲景麥門冬湯治之。時方玉女煎加五味亦妙。方中牛膝正取其降衝逆。半夏降衝逆。降水也。

血證論五卷 胎氣

十四

牛膝降衝逆。降火也。皆以墮胎之藥。安胎用之。得宜正無畏縮。又有胎中之水上泛為痰。衝肺作欬。以致子噎者。於法又宜去水。蘇子降氣湯。六君子湯。加五味細辛。炮薑治之。若是水火兼動。而致欬嗽。宜瀉白散。加杏仁。瓜霜。白前。枯芩。枳殼。甘草。或葶藶人參。瀉肺湯治之。但葶藶猛不可多用。

孕婦少腹痛。仍分水分血分兩端。在水分者。膀胱之氣不能化水。則子臟脹滿。水不得泄。必見小便短澀。脹喘諸證。審係熱結不行者。導赤散加山梔。防己。以清之。審係寒結而陽氣不化者。五苓散治之。取其水利。則少腹之痛自止。橘核丸加茯苓亦治

之在血分者。胞為肝腎所司。肝陽不達於胞中。則胞血凝滯而痛。四物湯加艾葉、香附、阿膠、小茴、腎陽不達於胞室。則胎冷痛。上連腰脊。四物湯加杜仲、故紙、白鳥、艾葉。此名胞阻。謂胞中陰血與陽氣阻隔也。重則用腎氣丸。輕則用膠艾四物湯。血與水皆陰也。水為先天陽氣所化之陰液。血為後天胃氣所化之陰汁。腎陰又轉賴胃之水津而生。胃氣又實藉腎之生陽而旺。今有腎中之生陽不足者。脈弦發熱。愈脹而下墜。腹痛惡寒。子宮欲開。仲景用附子湯治之。保腎之陽。以扶胃氣。此補陽法也。又有胃中之水津不足者。則子臟乾燥。悲傷欲哭。象如神

血證論五卷

胎氣

十五

靈所憑。數欠伸。所以然者。以腎水不足。衝血不足。無所潤養。腎水在下。則為胞中之天。癸在上。則為口中之津液。臟燥則肺金不得津液之潤養。故肺主悲傷。欠伸者。明係腎病。如神所憑者。血燥則心不化液。而神無守也。甘麥大棗湯滋腎之陰。從衝任以輸水於腎。而腎陰因藉以生。此補陰法也。觀此二條。一切資陰補陽之法。可以貫通。胎漏亦分水與血二證。下血者屬血熱。因其火甚。故通血妄行。宜四物湯加阿膠、炒梔、側柏、葉、黃芩。下水者。或如豆汁。下至升許。名曰孤漿。去水太多。則胎乾枯。必倚而墜。水即氣也。惟其氣

泄。是以水泄。黃芪糯米濃煎。補而滋之。茅根、白朮、人參、鹿角霜、桑鱗、白銀、酒水煎服亦佳。再按血統於脾。而藏於肝。肝主疎泄。故漏血。治以歸脾湯。加柴胡、山梔、阿膠。於法尤合。水生於腎。而制於肺。肺氣不納。故漏水。今觀肺中虛寒。不能制下。則小便遺溺。可知肺氣不納。所以漏水之理矣。宜用白朮、人參、海鱗、龍骨、牡蠣、石合、訶子、苧根、白銀。

子淋者。小便淋瀝。亦分水淋、血淋二者。水淋病在膀胱。脹閉澀滯。宜五淋散加木通、澤瀉。血淋者。病在血室。陰中割痛。下滴血

血證論五卷

胎氣

十六

煎四物湯加菝葜、茅根、藕節、條芩、赤苓、草梢。子懸者。胎氣上逼。懸塞心胸。亦分水分血分二者。水分之病。由於氣虛。水泛為痰。壅塞其胎。濁氣上逆。脈必沉滑遲弱。六君子湯加枳殼、紫蘇、腹毛、川芎、香附治之。血分之病。由於血虛。胎中厥陰肝經相火上僭。舉胎上逼。宜小柴胡合四物湯。再加雲苓、黃連、黃柏、六味丸加牛膝、麥冬。以引之使下。亦高者抑之之義。毋畏牛膝之墮胎也。又按子懸之證。有孕七八月。產母血虛。胎無所養。上行求食者。但用下降之藥。不能治也。宜大補其血。炙甘草湯去桂枝。加淮藥、棗、仁治之。聖愈湯加白朮、雲苓、甘草亦

治之。甘麥大麥湯皆宜。又當美其飲食。用當歸、芍藥、山藥、白芷、芫
實、豬蹄、炮服最佳。

子氣者。水腫也。胞與膀胱並域而居。胞宮為胎所站。侵逼膀胱。
以致膀胱之水不能化行。亦由膀胱之氣化先有不足。故能為
胎所用。五苓散主之。若是胎火乘肺。化源不清。以致便短水腫
者。去桂枝。加知母、麥冬、黃芩、杏仁。防己治之。

子煩者。血虛也。血者心之所生。血足則心火不煩。胎既耗血。胎
中之火。又上與心火相合。火擾其心。是以虛煩不得眠。酸枣仁
湯治之。珠砂安神丸亦治之。

胎氣

子眩者。氣分之痰也。其證目眩頭暈。皆由胎水上逆。為痰之所
致。二陳湯加紫蘇、枳殼、杏仁、薑汁、竹瀝治之。

子癇者。血分之風也。其證忽然昏冒。卒倒無知。手足抽掣。過時
則醒。口噤反張。乃孕婦血虛。風邪入肝之所致。法宜補血。驅風。
四物湯加鈎刺、防風、茯神、桑寄生、獨活、羚羊角、道遙散、小紫胡。
皆可借治。

小便不通者。氣不足也。氣化則水能出。今小便點滴不通。是胞
係下壓其溺竅。故也。究其所以。下壓溺竅之故。則因腎氣不足。
不能舉胎而上。此名轉胞。宜腎氣丸主之。又或胃氣不足。不能

升提其胎。補中益氣湯主之。

大便不通者。血不足也。孕婦之血足。則無病。血既不足。則供胎
猶未能給。更何能分給諸臟。是以必現口渴。欬逆。發熱。大便不
通等證。治宜滋生其血。血足則大便自通。四物湯加杏仁、麻仁、
茯苓、兔絲子。治之。道遙散加麻仁、枳殼、厚朴亦治之。

總而論之。胎氣不和者。皆是水分之病。調水則氣自和。胎火太
旺者。皆是血分之病。調血則火自熄。能知水火血氣之故。則治
胎不難。治失血之證。亦不難。即治雜證。更無所難。

此書為失血說法。胎氣一門。皆連類而及之者。然胎病之發。尤
血證論十五卷 胎氣 十八

水火血氣之顯然者。能參透此條。則於水火血氣四字。自無隱
慮之情。其他胎病。有未備錄者。另有胎產之書可查。

四川彭縣容川唐宗海著



癆瘵

癆瘵之證。咯血痰嗽。遺精瀉泄。潮熱盜汗。瘦削疲倦。夢與鬼交。或夢亡先。喜見人過。常懷忿怨。平旦尚好。午後病便加增。發熱心煩。口燥鼻乾。臉紅唇赤。骨蒸肺癆。咽痛失音。若渴不止。則不治矣。其原得於酒色傷損。以及失血之後。瘀血鬱熱。化生癆蟲。蝕人臟腑之精血。變生諸般怪證。病人死後。蟲氣傳染。家人名

癆瘵

一

曰傳尸。又名尸症。謂其自上注下。見證與前死之人相似故也。辨蟲之法。或腹中有塊。或腦後兩邊有小結核。或用乳香薰手背。以帛覆手心。良久手上出毛長寸許。白黃者可治。紅者稍難。青黑者死。若薰手無毛。非癆蟲證也。又或用真安息香。燒烟吸之。不嗽者非傳尸。烟入即嗽。真傳尸也。癆蟲之形。或似蠅。或似紅絲馬尾。或似蝦蟆。或似麴。或有足無頭。或有頭無足。或化精血歸於元氣之內。若傳至三人者。其蟲靈怪不可治。凡用藥治蟲。勿令病者知之。恐蟲覺悟。難取下也。夫癆蟲何由而生哉。木必先腐。而後蟲生之。人身亦必先有瘵。

血虛熱鬱。蒸乃生癆蟲。蟲者。風木之氣所化。人身肝主風木。又主藏血。肝臟之血。若有癆積。日久猶木之先腐也。於是肝臟之風氣鬱遏。蒸煽將瘵血化生為蟲。既化為蟲。即從蟲治之。宜天靈蓋散治之。然天靈蓋不易得。且不宜用。可用川椒代之。或金蟾丸亦可。余每用乾漆。明雄川椒。棟根皮。白頭蚯蚓。升麻。鬱金。共為末。白湯五更時服。其蟲不吐。即下。義固取於殺蟲。而尤在乾漆。鬱金。兼治瘵血。以瘵蟲是瘵血所化。殺蟲是治其標。去瘵是治其本也。諸書但言殺蟲。而不知蟲之所自生。宜乎未得其治也。吾為指出癆蟲是瘵血所化。治瘵血是治其本也。辨證錄用。

癆瘵

二

移尸滅怪湯。治癆蟲傳尸。方以去瘵為主。故效。癆蟲之生。由瘵血所化。而癆蟲既生。蝕人精血。人之正氣。日以消耗。不治其虛。但殺其蟲。病終不能愈也。月華丸主之。義取補虛而去瘵。殺蟲兼施。其治乃萬全之策。鰻魚肉常食。亦佳。或鰻魚骨。龜甲。知母。棗皮。柴胡。當歸。青黛。桃梟。為丸。人參湯下。亦攻補兼行之術。又凡濕熱積痰。皆能生蟲。與小兒疳蟲無異。用金蟾丸。即愈。不比血化之蟲。靈怪難治也。既殺蟲後。但當滋補其虛。陰虛者。十居八九。瓊玉膏主之。加黃

柏知母紫河車更佳。陽虛者十之二三。六君子湯主之。

欬嗽

雜病欬嗽。另有方書可查。未及備論。茲所論者。虛癆失血之欬。嗽也。失血家十有九欬。所以然者。肺為華蓋。肺中常有津液。則肺葉腴潤。覆垂向下。將氣斂抑。使其氣下行。氣下則津液隨之。而降。是以水津四布。水道通調。肝氣不逆。腎氣不浮。自無欬嗽之病矣。血者火化之陰汁。津者氣化之水液。二者本相濟相養。水不濟火。則血傷。血不養氣。則水竭。水竭則津不潤。肺血傷則

血證論六卷

欬嗽

三

火來剋金。金被火剋。不能行其制節。於是在下之氣。始得逆上。氣既逆上。則水津不能隨氣下布。凝結為痰。在下之水。邪又得隨氣而升。泛為水飲。皆致欬嗽。吾於欬血門已詳論之。茲復條列如左。以便查核。

一肺臟津虛。火氣乘之。致成燥欬。氣喘痰澀。或帶血絲。久成肺痿。清燥救肺湯治之。

一痰火凝結。欬逆發渴。喉中痰滯者。由於津液不散。阻塞氣道。治宜清利其痰。滋養其津。紫菀散主之。

一水飲沖肺。欬逆倚息不得卧者。由於失血之人。肝經風火太

盛。激動其水上衝肺。卧則肺葉張。水飲愈衝。是以不得卧息。草

蓆大棗瀉肺湯治之。瀉白散亦治之。吾每用二陳湯治飲。加蘇

子。柴胡。白芥。枯苓。石膏。杏仁。荆芥。薄荷。枇杷葉。風火兼治。尤效。

此與雜病欬嗽。因寒動水者有異。因寒動水。以致水飲衝肺者。

宜小青龍及真武湯。血證欬嗽。多是內動風火。激水而上。青龍

真武等。又其所忌。醫者辨之。

夫虛癆欬嗽。原於火剋金。水乘肺。而切究其故。則病皆在於胃。

胃為水穀之海。化生津血。血不足則火旺。津不生則肺燥。水氣

不化。則飲邪上干。治胃火。宜白虎湯。加生地。百合。五味。或玉女

血證論六卷

欬嗽

四

煎治胃痰。宜滾痰丸。指迷茯苓丸。輕者用豁痰丸。治胃中水飲。

宜二陳湯。加蘇子。白芥。防己。枳殼。杏仁。生薑。若水飲挾火者。加

柴胡。枯苓。當歸。白芍。

內經云。五臟六腑皆有欬嗽。而無不聚於胃。關於肺上。條分肺

胃。治已詳。茲有一方。可以統治肺胃者。則莫如小柴胡湯。肺火

盛。加寸冬。心火盛。加黃連。當歸。肝火盛。加當歸。胡黃連。黃昏欬

嗽。為火浮於肺。加五倍子。五味子。以斂之。五更欬嗽。為食積之

火。至寅時流入肺經。加萊菔子。痰凝氣滯者。加瓜霜。旋覆。杏仁。

桔梗。射干。尖貝。水飲上衝者。加葶藶。桑皮。細辛。五味。有寒加乾

薑雲苓。若兼外感發熱惡寒。鼻塞頭痛。而咳嗽者。宜小柴胡湯。加荆芥。紫蘇。杏仁。薄荷。蓋小柴胡能通水津。散鬱火。升清降濁。左宜右有。加減合法。則曲盡其妙。又有瘀血作欬。其證欬逆倚息而不能卧。與水飲衝肺之證。相似。蓋人身氣道不可有塞滯。內有瘀血。則阻碍氣道。不得升降。是以壅而為欬。氣壅即水壅。即是水故也。水壅即為痰飲。痰飲為瘀血所阻。則益衝犯肺。經坐立則肺覆瘀血。亦下墜其氣。道尚無大碍。故欬亦不甚。卧則瘀血翻轉。更為阻塞。肺葉又張。愈難斂。戢是以倚息不得卧也。若仍照水飲衝肺用葶藶大棗。

血證論六卷

欬嗽

五

湯是得治飲之法。而未得治瘀之法。矣。須知痰水之壅。由瘀血使然。但去瘀血。則痰水自消。宜代抵當。凡加雲苓。法夏。輕則用血府逐瘀湯。加葶藶。蘇子。又有欬嗽。側卧一邊。翻身則欬。蓋甚者。諸書皆言側卧一邊。乃失血欬。不治之證。而不知仍是瘀血為病。蓋瘀血偏著一邊。以一邊氣道通。一邊氣道塞。氣道通之半邊。可以側卧。氣道塞之半邊。側卧則更閉塞。是以翻身則愈加欬逆也。宜血府逐瘀湯。加杏仁。五味。主之。側卧左邊者。以左邊有瘀血。故不得右卧也。右卧則瘀血翻動。益加壅塞。宜加青皮。龜甲。莪朮。以去左邊之瘀血。側卧右邊者。以右邊有瘀血。

故不得左卧也。宜加鬱金。桑皮。薑黃。以去右邊之瘀血。凡此瘀血欬嗽之證。諸書少言及者。朱丹溪略引其端。亦未申明。吾於臨證有悟。不惜大聲疾呼者。正欲起死人而肉白骨。豈敢秘而不傳哉。又有衝氣欬逆者。以衝脈起於血海。循行而上。麗於陽明。血海受傷。則衝脈氣逆。上合陽明。而為火逆。燥欬之證。麥門冬湯主之。王女煎亦治之。二方皆從陽明以抑衝氣之顛。使不逆也。又有衝氣挾肝經相火上乘肺金者。其證目眩口苦。噎欬數十聲不止。欬牽小腹作痛。發熱頰赤。宜四物湯。合左金丸。再入人。

血證論六卷

欬嗽

六

屎猪膽汁。牡蠣。五味。治之。蓋血室為肝之所司。衝脈起於血室。故肝經之火。得緣衝氣而上。小柴胡湯。加五味。青皮。龍骨。牡蠣。丹皮。地骨皮。亦治之。重者加胡黃連。衝脈本屬肝經。然其標在陽明。而其根則在於腎。蓋衝脈起胞中。而腎氣即寄在胞中。腎中之氣。上於肺。而為呼吸。亦借衝脈之路。以上循入肺。是以臍旁衝脈之穴。謂之氣街。內經又明言衝為氣街。衝脈之與腎經。交合者如是。是以衝脈每挾腎中之虛火上逆。而欬喘促咽乾。兩額發赤。宜猪苓湯。加五味。知母。牛膝。黃柏。熟地。龜版。或麥味地黃湯。以安之。三才湯。加鐵落。以鎮。

之。或大補陰丸。合磁硃丸。加五味。以吸御氣。使歸於腎。則不效。逆矣。又有胞中之水。內動衝氣。挾水上逆。而欬者。其證上熱下寒。龍雷火升。面赤浮腫。頭暈咽痛。發熱心悸。大便反滑。腰痛遺溺。桂苓甘草五味湯治之。腎氣丸亦治之。參看吐血欬血門更詳。

欬嗽之病。其標在肺。其本在腎。血家欬嗽。尤多生於腎虛。腎者氣之根也。腎經陰虛。則陽無所附。氣不歸根。故浮喘欬逆。宜三才湯。加五味子。沉香。陳脩園用二加龍骨牡蠣湯。加阿膠。麥冬。五味。其附子須少用。只作引導耳。余每用知柏地黃湯。少加五

血證論六卷

發熱

七

味肉桂。以為報使。常服都氣丸亦佳。又有腎經陽虛。不能化水。腰痛便短。氣喘欬逆者。腎氣丸加五味治之。更有腎水泛上。脾土不制。而為水飲欬嗽者。乃屬五飲雜病。非失血家應有之證。自有各書可查。茲不贅及。

發熱

吐血家。脉靜身涼。不藥可愈。以陰虛虧而陽猶不亢。陰與陽尚得其和。故易愈也。或身有微熱。皮毛似汗。此為陽來求陰。水來就血。亦可自愈。所謂發熱者。與身有微熱不同。

失血家。陽氣鬱於血分之中。則身熱鬱冒。但頭汗出。身熱者。火閉於內。而不得達於外。故也。但頭汗出者。火性炎上。外有所束。則火不能四達。故愈炎上。而頭汗也。治法宜解其鬱。使徧身微汗。則氣達於外。而陽不乘陰。熱止血亦治矣。此如盛暑過熱。得雨而解。小柴胡湯主之。

又有瘀血發熱者。瘀血在肌肉。則翕翕發熱。證象白虎。口渴心煩。支體刺痛。宜當歸補血湯。合甲己化土湯。加桃仁。紅花。柴胡。防風。知母。石膏。血府逐瘀湯亦治之。瘀血在肌腠。則寒熱往來。以肌腠為半表半裡。內陰外陽。互相勝復也。宜小柴胡湯。加當

血證論六卷

發熱

八

歸白芍。丹皮。桃仁。荆芥。紅花。治之。桃奴散。加黃芩。柴胡。亦治之。瘀血在腑。則血室主之。證見日晡潮熱。晝日明了。暮則譫語。以衝為血海。其脈麗於陽明。故肖陽明燥熱之證。桃仁承氣湯治之。小柴胡湯。加桃仁。丹皮。白芍。亦治之。瘀血在臟。則肝主之。以肝司血。故也。證見骨蒸癆熱。手足心燒。眼目青黑。毛髮摧折。世以為難治之證。而不知瘀血在肝臟。使然。宜柴胡清骨散。加桃奴。琥珀。乾漆。丹皮。治之。以上所論。皆屬血家發熱之實證也。又有發熱之虛證。分血虛水虛兩類。另條如左。

血虛者。發熱汗出。以血不配氣。則氣盛而外泄也。或夜則發熱。以夜主血分故也。或寅卯時即發熱。以寅卯屬少陽。肝血既虛。則少陽之相火當寅卯旺時而發熱。地骨皮散。加柴胡、青蒿、胡黃連、雲苓、甘草治之。又或胞中之火。因血不足。上合陽明。燥氣日晡潮熱者。犀角地黃湯治之。水虛者。水為氣之所化。水津不足。則氣熱。皮毛枯燥。口咽生瘡。遺精淋瀝。午後發熱。大補陰丸。以補水濟火。或清燥救肺湯。從肺胃以生水。津水足以濡血。則陽氣不亢。燥熱自除。五蒸湯亦統治之。

血證論六卷

發熱

九

復有陰虛於內。陽浮於外。而發熱者。須大補其陰。而復納其陽。故產後發熱。用四物湯。加黑薑。失血發熱。亦可用之。火重者。再加芩連。若腎陰不足。真陽外浮。發熱喘促者。是為陰不戀陽。陽不入陰。宜從陰引陽。用二加龍骨湯。加五味、寸冬、阿膠。或三才湯。加鹽炒肉桂少許。桑葉、雲苓、白芍、蟲草、秦皮、牛膝、五味、知母、沉香、龜版。此外又有食積發熱者。手足心腹熱。胸滿噦呃。大便不調。日晡及夜發煩。宜枳殼、厚朴、大黃。消去之。則不壅熱矣。勿謂虛人無實證也。

厥冷

雜病四支厥冷。為脾腎陽虛。不能達於四末。四逆湯主之。若失血之人。而亦間有發厥者。則多是熱邪內陷。伏匿在裡。外見假寒。身如冷水。目昏神暗。脈伏不見。或冷一陣。反而發熱。或厥數日。反發熱數日。其厥多熱少者。是陽極似陰。熱之至也。厥少熱多者。是伏熱猶得發洩。熱尚淺也。此即傷寒論厥陰篇所謂熱深厥亦深。熱微厥亦微。是矣。蓋厥陰肝經內寄膽火。病則火伏陰中。而為厥。火出陽分。則反熱。發熱固是火。甚發厥則火伏於

血證論六卷

厥冷

十

內而更感矣。先宜治其伏火。使火得發。轉厥為熱。次乃更清其熱。斯可愈耳。若論證為雜病發厥。而用熱藥。是促其命也。其辨法。雜病之厥。吐利不止。脈脫氣微。有寒無熱。伏火之厥。則厥後微露熱形。口不和。便不溏。小便不清。心中疼熱。煩躁不甯。惡明喜暗。渴欲得飲。吐衄隨厥。而發皆現真熱假寒之象。先以清化湯。合升降散。攻其伏熱。或當歸蘆薈丸。攻之。次以五蒸湯清之。厥止熱不退者。再用大補陰丸。地黃湯。以滋陰。發厥之證。又有寒閉於外。而火不得發者。用仲景四逆散。加荆芥、老連、枯苓。審其陽陷於內。而不出者。白頭翁湯。以清達之。升

陽散火湯以溫發之。二方酌宜而行。血家發熱。固多是真熱假寒。然亦有真寒者。去血太多。氣隨血洩。以致中氣怯而不旺。元氣損而不足。四支厥冷。不思飲食。大便溏瀉。此乃虛則生寒之證。法宜溫補。十全大補湯。參附湯。養榮湯。隨宜用之。

寒熱

發熱惡寒。多是外感傷其榮衛。傷榮則寒。傷衛則熱。平人治法。須用麻桂發散。失血皆陰血。大虧不可再汗。以耗其氣分之水。

血證論六卷

寒熱 出汗

十一

液。只可用小柴胡湯。加荆防紫蘇杏仁薄荷前胡粉葛等。以和散之。免犯仲景血家忌汗之戒也。若不關外感。係本身榮衛不和。發為寒熱。似瘧非瘧者。不可作瘧治之。只用小柴胡。或逍遙散。和其榮衛而愈。又有瘀血作寒熱者。其身必有刺痛之處。血府逐瘀湯治之。此與雜病寒熱有異。醫者須知。

出汗

汗者氣分之水也。血虛則氣熱。故蒸發其水。而出為汗。但頭汗出身不得汗者。乃陽氣內鬱。冒於上而為汗。以小柴胡湯解其

鬱。則通身得汗而愈。蒸蒸汗出者。乃血虛氣盛。沸溢為汗。宜用白虎湯。加當歸。蒲黃。蟲退。治之。手足澀澀汗出者。以胃中或有瘀血。食積。四支為中洲之應。火熱中結。故應手足汗出也。宜玉燭散。加枳殼。厚朴。以攻之。結去而汗自止矣。睡中盜汗者。睡則氣歸血分。血不足則氣無所歸。故氣泄而汗出。宜當歸六黃湯治之。或地骨皮散。加棗仁。知母。茯苓。五味。黃芪。黃柏。

以上所論。皆失血家陰血內虛。陽氣過發之病。亦有陰陽兩虛。自汗盜汗者。宜歸脾湯。加麥冬。五味。或當歸六黃湯。加附子。又有大汗亡陽者。在雜病亡陽。則單屬陽虛。失血家大汗亡陽。

血證論六卷

出汗 發渴

十二

則兼是陰虛。陽無所附。非大劑參附湯。不能回陽。雖用獨參湯。卷之而愈。

此論血家出汗。與雜證出汗有別。參看汗血發熱門更詳。

發渴

血虛則發渴。有瘀血則發渴。水虛亦發渴。

血虛發渴者。血為陰。氣為陽。血少則氣多。陽亢無陰。汁以濡之。故欲飲水也。法宜補血。血足則氣不熱矣。聖愈湯。加天冬。花粉。治之。或當歸補血湯。加花粉。苧根。玉竹。寸冬。

痰血發渴者。以津液之生。其根出於腎。水與血交會。轉運皆在胞中。胞中有痰血。則氣為血阻。不得上升。水津因不能隨氣上布。但去下焦之痰。則水津上布而渴自止。小柴胡加丹皮。桃仁治之。血府逐瘀湯亦治之。挾熱蓄血者。桃仁承氣湯治之。寒痰滯者。溫經湯治之。

水虛發渴者。以肺胃之水津不足。是以引水自救。水津雖由水穀所化。而其氣實發源於腎中。腎中天癸之水。至於胞中。循氣街隨呼吸而上於肺部。肺金司之。布達其氣。是以水津四布。口舌胃咽皆有津液。而不渴也。若腎中之水不足。則不能升達上

血證論六卷

發渴

十三

焦。是以渴欲引水。宜啟下焦之陰。以滋津液。地黃湯加人參。麥冬。訶子。或左歸引。加兒茶。人參。玉竹。三才湯。加知母。治之。夫水津雖生於腎。而實布於肺。又有腎中之水。津本足。而肺金鬱滯。不能散布。以致水結為痰。咽乾口渴。宜小柴胡湯。通上焦之滯。使肺氣通調。則水津四布矣。又曰。津液雖生於腎。布於肺。而實賴胃中水穀。以滋其化源。胃中燥結。則津不生。三一承氣湯。治之。胃中蘊熱。則津不生。玉泉散。治之。胃經肌熱。則津液被灼。人參白虎湯。治之。胃中虛熱。則津不生。麥冬養榮湯。治之。上分三條。皆失血多有之證。與雜證消渴不同。參看可也。

心煩

煩者。心不安也。心為火臟。化生血液。轉賴血液。以養其火。故心字篆文。即是倒火。火降則心甯也。失血家。亡血過多。心火失其滋養。故多發煩。火太甚者。舌上黑胎。夜不能寐。黃連阿膠湯。主之。心中懊懣者。以火不得宣。故鬱而不樂也。宜梔子豉湯。加連翹。桔梗。大力。生地。連志。老連。草。稍治之。若火不甚。而血太虛者。心中了戾。不得。是為虛煩。歸脾湯。加硃砂。麥冬。炒。梳。治之。逍遙散。加龍骨。棗仁。亦治之。仲景酸棗仁湯。尤為治煩要藥。若煩而

血證論六卷

心煩

十四

兼躁。手足妄動。此為虛中夾實。內有燥屎。必見二便不調。發熱口渴。脈數有力等證。在傷寒為承氣證。在失血家。須兼顧其虛。宜玉燭散。或用玉女煎。加元明粉。煩躁之極。循衣摸牀。小便不利者。陰尚未盡。猶可救一二。小便不利。死不治矣。此與陰躁不同。陰躁不煩。而但躁。且必現陰寒可據之證。須細辨之。又有產後血虛。心煩短氣者。雖同是心煩。然產血下行。氣多虛脫。其血之虛。皆由於氣虛。故心煩而必兼短氣。宜歸脾湯。當歸補血湯。養榮湯等。以補氣者。生血。而心煩自愈。至吐血家。則其氣上逆。多是氣實血虛。證見心煩。尤血不養心之甚者也。若再

補其氣則氣益甚而血益虛。心愈不得其安矣。治宜補血清火。硃砂安神丸治之。須參看卧寐怔忡驚悸門。

卧寐

夢寤附

卧者身著席頭就枕之謂也。寐者神返舍息歸根之謂也。不得卧寐之證。雜病猶少。失血家往往有之。

不得卧有二證。一是胃病。一是肺病。

胃病不得卧者。陰虛則邪併於陽。煩躁不卧。此與傷寒論陽明篇微熱喘冒不得卧者為胃石燥屎之義同。三一承氣湯治之。

血證論六卷

卧寐夢寤

十五

若無燥結。但係煩熱者。竹葉石膏湯。白虎湯治之。兼理血分。則宜用玉燭散。玉女煎。又有胃中宿食。脹悶不得卧者。越鞠丸。加山查。麥牙。萊菔子。蓋陽明主闔。和其胃氣。使得還。其主闔之令。斯能卧矣。

肺病不得卧者。肺為華蓋。立則葉垂。卧則葉張。水飲衝肺。面目浮腫。欬逆倚息。卧則肺葉舉。而氣益上。故欬而不得卧。葶藶大棗瀉肺湯。攻去其水。則得卧矣。或二陳湯。加乾薑。細辛。五味。溫利水飲亦可。若是火逆之氣。挾痰上衝者。則又宜水火兼瀉。痰甚者。消化丸。主之火甚者。滾痰丸。主之。平劑則宜二陳湯。加

柴胡瓜蒌枯苓旋覆杏仁薑汁竹瀝。保和湯亦治之。若無痰飲。但是火氣上衝者。其人晝日不欬。卧則欬逆。氣不得息。乃肺痿。葉焦。卧則肺葉翹舉。氣隨上衝。欬欬不已。宜清燥救肺湯。加生地花粉。百合。五味。以斂之。再加鍾乳石。以鎮降之。且肺之津生於腎中。如腎水不能上濟。上焦衝氣逆上。欬不得卧者。當從腎治之。六味丸。加參麥散。再加牛膝。以引氣下行。加磁石。以吸金氣。使歸於根。

不昧之證有二。一是心病。一是肝病。

心病不寐者。心藏神。血虛火妄動。則神不安。煩而不寐。仲景黃連阿膠湯主之。陰虛痰擾。神不安者。猪苓湯治之。一清火。一利水。蓋以心神不安。非痰即火。余每用硃砂安神丸。加茯苓。琥珀。或用天王補心丹。

血證論六卷

卧寐夢寤

十六

肝病不寐者。肝藏魂。人寤則魂游於目。寐則魂返於肝。若陽浮於外。魂不入肝。則不寐。其證並不煩躁。清睡而不得寐。宜斂其陽。魂使入於肝。二加龍骨湯。加五味。棗仁。阿膠。治之。又或肝經有痰。擾其魂。而不得寐者。溫膽湯。加棗仁。治之。肝經有火。多夢難寐者。酸棗仁湯。治之。或滑氏補肝散。去獨活。加巴戟。四物湯。加法夏。棗仁。蟲草。龍骨。夜合皮。亦佳。

又按魂雖藏於肝。而晝遊於目。目在面部。乃肺胃之所司。肺胃之氣擾而不靜。亦能格魂於外。使不得返也。宜生地白合麥冬知母枳壳五味白芍甘草棗仁花粉茯苓治之。人參清肺湯亦治之。又有虛悸恐怖不寐之證。仁熟散治之。思慮終夜不寐者。歸脾湯加五味治之。須參看怔忡煩悸門。

又有昏沉多睡之證。在雜病為邪入陰分。在失血虛癆乃血脫之後。元氣不支。是以昏睡。如汗出氣喘危急之候也。參附湯救之。寤屬陽。故不寤為陽虛。人參養榮湯亦治之。若身體沉重倦怠嗜卧者。乃脾經有溼。平胃散加猪苓澤瀉治之。六君子湯加

血證論六卷

脾麻夢寤

十七

防己苡仁補中益氣湯亦治之。此論多睡。多是陽虛。然亦有膽經火甚而多昏睡者。龍膽瀉肝湯治之。

夢乃魂魄役物。恍有所見之故也。魂為病則夢女子花草神仙歡喜之事。酸棗仁湯治之。魄為病則夢驚怪鬼物爭鬪之事。人參清肺湯加琥珀治之。夢中所見即是魂魄善魄惡魄。故魂夢多善魄夢多惡。然魂魄之所主者神也。故安神為治夢要訣。蓋氣安神湯治之。又有癆蟲生夢。照癆蟲法治之。又有夢而遺精。詳遺精門。

再按睡而惡明喜暗者。火邪也。側卧不得轉身者。少陽之樞機

不利也。側卧一邊者。詳欬嗽門。

喘息

人不喘息則氣平靜。血何由隨之吐出哉。故失血家未有不喘息者。有實喘有虛喘。

實喘之證有二。一是鬱閉。一是奔迫。鬱閉者氣不達於外。而壅鬱於內也。失血家陽乘陰。此證維多。傷寒喘息者用麻桂發之。血家忌汗。又忌升發。以動其血。與傷寒開鬱閉之法不同。宜小柴胡湯加杏仁。以轉樞外達。使腠理通。榮衛和。斯達氣於外。

血證論六卷

喘息

十八

不壅於內而為喘矣。如果有外感閉束。不得不疎解者。宜香蘇引加杏仁。枳壳甘草。或千金麥門冬湯。借麻黃以解外。而兼用清裏之藥。不致過汗亡陰。乃為調劑得宜。

奔迫者上氣喘急。由於氣盛於下。而逆於上。失血家火盛逼血。往往其氣粗賁。宜大瀉其火。火平則氣平。用厚樸枳殼大黃。使地道通氣下瀉。則不上逆矣。若內有瘀血。氣道阻塞。不得升降。而喘者。亦宜上三味。加當歸白芍桃仁丹皮治之。若是痰氣阻塞者。清化丸主之。若小便閉者。下竅塞。故上竅壅也。宜五淋散加防己。只壳杏仁桑皮葶藶。

虛喘亦有二證。一是肺虛。一是腎虛。肺虛作喘者以肺居上。焦制節五臟開竅於鼻。以通外氣。以斂內氣。血虛則火盛津傷。肺葉痿而不下。垂故氣不得降。喘息鼻張甚。則鼻厥。若無開關。乃肺痿之重證也。生津補肺。宜清燥救肺湯。兼治鬱火痰滯者。宜保和湯。或太平丸。吾謂肺葉下墜。宜兼用鎮斂之法。三才湯。合生脈散。再加百合。五倍子。白芨。花粉。杏仁。尖貝。鍾乳石。治之。又有喘息由於鼻塞不通者。以肺中之火鬱閉鼻管。故氣并於口。而為喘也。太平丸加射香。即是上通鼻竅之妙藥。與傷寒鼻塞有異。毋誤治也。

血證論六卷

喘息

十九

腎虛喘息者。以氣之根原於腎。失血家火甚水枯。不能化氣。是以氣短而喘。致逆喘息。頰赤咽乾。宜大補陰丸。加牛膝五味。以潛降之。若是陰虛陽無所附。氣不歸根者。地黃湯合生脈散。加磁石牛膝沉香。以滋納之。若小水不化。兼腰痛者。乃是腎中之陽不能化氣。宜腎氣丸治之。

上係肺腎分治之法。如欲兼而治之。即從諸方化裁可也。此外如蘇子降香湯。四磨湯。皆肺腎兼治。但未能照顧血證。用者須知加減。

又曰。中宮虛則氣少。人參主之。中宮實則氣粗。大黃主之。

呃噦

久病聞呃為胃絕。須審脈證。斷之不得。但據呃逆遂斷其死也。失血家氣不順利。多有呃逆。新病形實者為伏熱。攻發火性炎上。氣逆而呃。清熱導氣。宜三物湯。或柴胡梅連散。加枳殼檳榔。若膈間有痰閉滯者。宜滾痰丸。指迷茯苓丸。又有瘀血阻滯。而發呃者。必見刺痛逆滿之證。大柴胡湯加桃仁丹皮蘇木治之。血府逐瘀湯亦治之。若久病發呃。形虛氣弱者。為胃中空虛。客氣動膈。所謂客即痰火氣也。治痰氣宜旋覆代赭石湯。或二陳湯。加丁香枳殼。治火氣宜玉女煎。加旋覆赭石柿蒂。或用梅連散。加柿蒂枳殼五味。俗治呃逆。但用丁香柿蒂。丁香性溫降痰。柿蒂性寒清火。二物騎牆之見。故多不效。須分寒熱用之。

血證論六卷

呃噦

二十

噦者吐氣也。血家氣盛。此證最多。其治法與呃逆同。惟有傷食。胃中壅塞而發噦者。宜越鞠丸。加旋覆枳殼萊菔子。

以上皆治胃之法。而心氣不舒。亦有發呃噦者。常見人有抑鬱。心氣不暢。則胸中喉間常有物哽塞。時發噦呃。不得快利。治法當清其心。調其氣。宜二陳湯。加黃連連翹。大力桔梗。瓜霜。當歸。光貝。治之餘詳痰飲門。

痰飲

痰飲之證已詳於欬血咯血欬喘諸條。茲因失血諸人無不兼痰飲者。故更言之。不憚煩復。

痰飲者。水之所聚也。人身飲食之水。由口入。由膀胱出。肺氣右散之。脾氣滲利之。腎氣蒸化之。是以瀉而不留也。此水不留。則無飲邪矣。人身津液之水。生於腎中。寄居胞室。隨氣而上。布於肺經。是為津液。津液散布。則不凝結。而為痰矣。

上焦血虛火盛。則煉結津液。凝聚成痰。肺為之枯。欬逆發熱。稠

血證論六卷

痰飲

廿一

粘滯塞此。由血虛不能養心。則心火亢甚。剋制肺金。津液不得散布。因凝結而為痰也。豁痰丸治之。二陳湯加黃連、黃芩、柴胡、瓜霜亦治之。玉女煎加茯苓、白前、旋覆。或保和丸以滋肺。胃為燥土。燥氣甚則津結為痰。指迷茯苓丸主之。頑痰壅塞者。滾痰丸治之。

痰粘喉中。哽塞不下者。名梅核氣證。仲景用七氣湯。理氣除痰。血家病此。多兼鬱火。宜指迷茯苓丸加甘草、桔梗、紫蘇、香附、旋覆、薄荷、射干、瓜霜。大力。余按咽中。乃少陰脈所繞。心經火甚。往往結聚成痰。發為梅核。宜甘桔湯加射干、山梔、茯苓、神連、翹、薄荷。

再生半夏一大枚。切片醋煮三沸。去半夏。入射香少許。沖前藥服。又衝脈亦挾咽中。若是衝氣上逆。壅於咽中。而為梅核。必見頰赤、氣喘等證。審其挾水飲而上者。桂苓甘草五味湯治之。審其挾痰火而上者。猪苓湯加海粉、瓜蒌霜、旋覆花治之。

夫痰為津液所凝。而津液之生。原於腎下焦。血虛氣熱。津液不升。火沸為痰。猪苓湯。地黃湯。隨加大貝、五味、寸冬、旋覆、冬花、海粉、牛膝、白前、龍骨、牡蠣、黃柏、知母等藥。

飲由水氣停蓄。其責在於膀胱。若膀胱之水。因寒上泛。胸腹漉漉。有聲。喉中潮響。欬嗽哮喘等。此為土不治水。肺受其僣。通用

血證論六卷

痰飲 痞滿

廿二

二陳湯治之。六君子湯。真武湯。小青龍湯治之。

按失血之人。由於陰虛火旺。少病寒飲者。即或欬吐痰水。審其脈滑數。心煩熱者。仍是火盛水溢。火逆之。至是以水逆之。甚也。其治法。清火瀉水。兼而行之。宜葶藶大棗瀉肺湯。消化丸。及二陳湯。加苓、連、柴、胡、白前、根。參看欬喘諸條。乃詳。

痞滿

積聚 癥瘕

心下為陽明之部分。乃心大宣布其化之地。君火之氣。化血。下行。隨衝脈以藏於肝。即從心下而起。腎水之陽。化氣上行。隨衝

脈以交於肺。由肺散布以達肌膚。亦從心下而出。蓋此地為陽明中土。乃水火血氣上下往來之都會也。火降血下。氣升水布。則此地廓然。設若火不降。則血不下。而滯於此矣。設若氣不布。則水不散。而結於此矣。觀傷寒論治心下痞滿之證。用瀉心湯以瀉火。用十棗湯以瀉水。甘草瀉心湯。生薑瀉心湯。水火兼瀉。五苓散解水結。柴胡湯解火結。可知此地須水升火降。斯為既濟之形。設上火下水。阻於中宮。遂成天地否象。故名曰痞。血家火浮於上。與水不交。往往見痞滿之象。審係火氣不得下降者。瀉心湯治之。或加生附子以開其痞。審係膀胱水中之陽逆於

血證論六卷

三

心下。不得外出者。以小柴胡湯轉其樞機。而水火皆通達矣。如水火交結。輕者為結胸。小結胸湯主之。重者為陷胸。大陷胸湯治之。若單是水氣結聚者。二陳湯。枳朮丸治之。若是食積胃中脹痛。噎腐者。平胃散。加山查。神曲。麥牙治之。今醫但知停食痞滿。而不知痞滿之證不一而足。此外尚有胸痺等證。皆未論列。茲所論者。乃失血家間有之證也。凡遇以上諸證。再能酌加歸地。芎。赤。芍。丹。皮。等。以照顧血證。斯為面面俱到。又有積聚之證。或橫互心下。或盤踞腹中。此非凝痰。即是裹血。通以化滯丸主之。凝痰用清茶送下。裹血用醋酒送下。無論臍

上臍下。左右兼治。又凡在臍下。多是血積。抵當丸治之。又有癥瘕。見於臍下。或見或沒。為癥常見。不沒為瘕。瘕宜臍下逐瘀湯。抵當丸。瘕宜橘核丸。按痞滿者。胸膈間病。積聚者。大腹之病。微瘕者。下焦之病。統以真人化鐵湯。加吳萸治之。統以逍遙散和之。另詳瘕血門。

腫脹

腫脹者。水病也。氣病也。失血家往往水腫。氣腫。抑又何哉。蓋以血之與氣。水之與火。互相倚伏。是二是一。吾於水火血氣論及

血證論六卷

腫脹

二十四

調經去痰諸條。已言之。茲復不憚煩勞。曰氣即水也。血中有氣。即有水。故肌肉中有汗。口鼻中有津。胞中有水。是水與血。原并行不悖。失血家。其血既病。則亦累及於水。水蓄胞中。則為尿結。水淫脾胃。則為脹滿。水浸皮膚。則為水腫。治法。皮膚水腫者。宜從肺治之。以肺主皮毛故也。肺為水之上原。肺氣行。則水行。宜瀉白散。加杏仁。桔梗。紫蘇。茯苓。五皮飲。亦治之。大腹脹滿者。宜從脾治之。補土利水。則水行而土敦。胃苓湯主之。六君子湯。加苡仁。防己。亦主之。胞中水結。小腹脹滿者。五苓散治之。猪苓湯亦治之。諸水又皆腎之所主。腎氣化。則上下內外之水俱化。宜

六味地黃丸。

以上所舉之方皆平劑也。醫者又須審別陰陽。隨加寒熱之品。乃能奏效。審其口渴渴赤喜涼脈數者為陽水。則知柏苓連山。梔石膏天冬麥冬可加入。審其口和溺清喜熱脈濡為陰水。則桂附乾薑吳子細辛可加入。失血家陽水居多。陰水最少。醫者須臨時細審。

又有瘀血流注亦發腫脹者。乃血變成水之證。此如女子胞水之變血。男子胞血之變精。瘡科血積之變膿也。血既變水。即從水治之。宜照上所舉諸方。分寒熱加減。再加琥珀三七當歸川

血證論六卷

腫脹 怔忡

二五

芎朮奴蒲黃以兼理其血。斯水與血源流俱治矣。古稱婦人錯經而腫者為水化為血。名曰水分。經水閉絕而腫者為血化為水。名曰血分。其實治法總宜從水治之。方證加減舉不外此也。觀於婦人水分血分之說。則知血家所以多腫脹者亦是水分血分之病也。此與雜證水腫有別。勿妄用舟車丸及消水聖愈湯等。另詳血腹門。

怔忡

俗名心跳。心為火臟。無以養之。則火氣衝動。是以心跳安神。

丸清之。歸脾湯加麥冬五味以補之。凡思慮過度及失血家去血過多者。乃有此等虛證。否則多挾痰瘀。宜細辨之。

心中有痰者。痰入心中。阻其心氣。是以心跳動不安。宜指迷茯苓丸。加遠志菖蒲老連。火貝。棗仁。當歸治之。硃砂安神丸。加龍骨。遠志。金箔。牛黃。射香治之。

心中有瘀血者。其人健忘。瘀血下墜。阻其心氣。不得升達。是以跳踊。血府逐瘀湯治之。硃砂安神丸。加菖蒲。鬱金丹皮。乾漆亦治之。

又有胃火強梁。上攻於心。而跳躍者。其心下如築。驚然。聽之有

血證論六卷

怔忡 驚悸

二六

聲。以手按其心下。復有氣來抵拒。此為心下有動氣。治宜大瀉心胃之火。火平則氣平也。瀉心湯主之。或玉女煎加枳殼厚朴。赭石。旋覆花。以降之。再加鬱金。義朮。以攻之。使血氣火三者皆平。自不強梁矣。此證須參看驚悸健忘門。

驚悸

悸者。懼怯之謂。心為君火。君火宣明。則不憂不懼。何悸之有心。火不足。則氣虛而悸。血不養心。則神浮而悸。仲景建中湯治心

氣虛悸。炙甘草湯治。心血不足而悸。今則以養榮湯代建中。以歸脾湯代炙甘草湯。一治氣虛。一治血虛。又有飲邪上干水氣凌心。火畏水剋而悸者。桂苓甘木湯治之。失血家多是氣血虛悸。水氣凌心者絕少。又曰正虛者邪必湊之。凡是怔忡驚悸健忘。恍惚一切。多是痰火沃心。擾其神明所致。統用金箔鎮心丸主之。

驚者猝然恐惕之謂。肝與膽連。司相火。君火虛則悸。相火虛則驚。蓋人之膽壯則不驚。膽氣不壯。故發驚惕。桂枝龍骨牡蠣甘草湯治之。恐畏不敢獨卧者。虛之甚也。仁熟散治之。又凡膽經

血證論六卷

驚悸

二七

有痰則膽火上越。此膽氣不得內守。所以驚也。溫膽湯加龍骨。牛黃。棗仁。琥珀。柴胡。白芍。治之。復有陽明火盛。惡聞人聲。聞木音則驚者。此內經所謂氣并於陽。故發驚狂者也。乃肝膽木火來剋脾土。法宜大瀉陽明之火。大柴胡湯治之。當歸。蘆薈。丸亦治之。血家病驚。多是陽明火盛。病虛驚者。亦復不少。用以上諸方。又須兼顧血證。以盡其化裁。勿執桂甘龍牡等湯。而不知宜忌也。

健忘

健忘者適然而忘其事。盡心力思量不來。凡所言行。往往不知首尾。病主心脾二經。蓋心之官則思。脾之官亦主思。此由思慮過多。心血耗散。而神不守舍。脾氣衰憊。而意不強。二者皆令人猝然忘事也。治法必先養其心血。理其脾氣。以凝神定志之劑。補之。亦當處以幽閒之地。使絕其思慮。則日漸以安也。歸脾湯主之。若心經火旺者。是火邪擾其心神。治宜清火甯心。天王補心丹治之。亦有痰凝留於心包。沃塞心竅。以致精神恍惚。凡事多不記憶者。宜溫膽湯。合金箔鎮心丸治之。硃砂安神丸。加龍骨。遠志。菖蒲。茯神。炒黃丹。亦治之。失血家心脾血虛。每易動痰。

血證論六卷

健忘

二八

生火健忘之證尤多。

又凡心有瘀血。亦令健忘。內經所謂血在下如狂。血在上喜忘。是也。夫人之所以不忘者。神清故也。神為何物。即心中數點血液。湛然朗潤。故能照物。以為明。血在上。則濁蔽而不明矣。凡失血家。猝得健忘者。每有瘀血。血府逐瘀湯。加鬱金。菖蒲。或硃砂安神丸。加桃仁。丹皮。鬱金。遠志。

恍惚

癩狂 見鬼

大病傷寒之後。欲食不食。欲卧不卧。欲行不行。精神恍惚。若有

鬼神附其體中者名曰百合病。謂百脉一宗。合致其病。肺主百脉。肺魄不甯。故病如此。諸多恍惚。未盡名狀。必見溺赤。脈數之證。乃肺金受剋之驗也。仲景用生地。百合滑石治之。此專言雜病。餘邪為患者也。失血家陰脈受傷。凡是恍惚不甯。皆百合病之類。總宜清金定魄為主。清燥救肺湯。加百合。茯神。琥珀。滑石。生地。金箔治之。地魄湯亦治之。或瓊玉膏。加龍骨。羚羊角。百合。或入參清肺湯。加百合。滑石。

大凡夜夢不甯者。魂不安也。魂為陽。夜則魂藏。而不用。魂不能藏。故夜夢不甯。寤時恍惚者。魄不安也。魄為陰。寤時而陰氣不

血證論六卷

恍惚 顛狂 見鬼

二元

足故恍惚不定。治魂以肝為主。治魄以肺為主。二者對勘自明。然恍惚驚悸。惑亂怔忡。癲狂。皆是神不清明之證。且人身有魂魄二者。而所以主是魂魄者。則神也。故凡諸證。總以安神為主。安神丸。金箔鎮心丸治之。

語言錯亂為癲。多由喪心失魄。痰迷心竅所致。統以金箔鎮心丹治之。怒罵飛走為狂。由於火邪逼迫。心神迷亂。四肢躁擾。痰丸主之。

見鬼者。癲狂之類也。陽明病。胃有燥屎。則目中見鬼。宜三一承氣湯下之。失血家瘀血在內。亦謔語見鬼。以其同為實邪。故俱

能擾日之明也。桃仁承氣湯治之。

暈痛

傷寒雜病。頭暈痛者。風寒也。血家暈痛。則多是痰火。誤用發散藥。鮮不增劇。

痰氣上攻。頭目沉重昏花。兀兀欲吐。首如裹物。右手脈實。陰雨增痛。是痰候也。二陳湯加防風。川芎。酒苓。薄荷。細辛。石膏治之。病重者。消化丸治之。

火逆暈痛者。煩渴引飲。見火增劇。掉頭更痛。口苦。噎乾。溺赤。便

血證論六卷

暈痛

三元

閉。左手脈數。是火診也。大柴胡湯治之。當歸。蘆薈丸亦治之。輕則小柴胡湯加菊花。

以上所論。皆暈痛之實證。又有暈痛之虛證。須分暈與痛之兩門。而後施治。有別也。

肝虛則頭暈。內經云。諸風掉眩。皆屬於肝。肝血不足。則生風。風主動。故掉眩。失血之人。血虛生風者多。逍遙散加川芎。青箱子。夏枯草治之。或但滋肝臟。以為息風之本。左歸飲加牛膝。巴戟。杭菊。細辛。枸杞。

腎虛則頭痛。內經所謂頭痛顛疾。下虛上實。過在少陰是也。

味地黃丸。加細辛、葱白射香治之。若是腎厥頭痛，乃腎中濁陰上逆於頭上，實下虛，手足厥冷，宜腎氣丸。加細辛、葱白，此證之痛連齒入腦，與尋常微痛者不同。血家頭痛，似此者少，宜用六味丸者多。

又曰：頭暈痛雖是兩病，失血之人，往往兼見二證。由於血虛則風動而暈，火動而痛，吾謂不分暈痛，亦不分治肝治腎。總以四物湯加元參、枸杞、菴蓉、玉竹、天麻、細辛、知母、黃柏、棗皮、牛膝。

眼目

目黃 出火 見鬼 昏花

血證論六卷

暈痛 眼目

三一

眼為肝竅，又陽明脈絡所繞，故其為病皆肝胃兩經之咎。

眼珠黃者在胃，經屬濕熱，甚則通身皆黃，小便必然不利，宜五苓散加茵陳、梔子、秦皮、黃柏，知母治之。在肝經是瘀熱，仲景云：衄家目黃者，衄未止，是血中有熱故也。凡是血熱者，其目多黃。四物湯加柴胡、枯芩、丹皮、蘇木、茵陳、紅花治之。目珠紅亦是瘀血，治與上同。

目中出火者，一是胃火亢甚，必兼口渴，身熱等證，犀角地黃湯加石膏、花粉、銀花、枳殼治之。一是肝火外越，必兼口苦耳鳴等證，當歸蘆薈丸治之。

目中見鬼者，一是胃有燥屎，目神昏花，三一承氣湯治之。一是肝經血虛，蓄有瘀熱，夜則譫語，大柴胡湯加桃仁、丹皮治之。目運者，肝之風火也，觀羊角風可悟，宜小柴胡湯加當歸、白芍、防風、菊花治之。眼花者，腎之陰虛，瞳神展，腎客熱犯之，時見黑花，或成五色，宜地黃湯加枸杞、硃砂、磁石、菴蓉、石決明、元參、知母、細辛治之。

以上所舉皆血家間有之病，其餘目疾非血家兼有者不贅。

耳病

血證論六卷

眼目 耳病

三一

陳脩園曰：腎開竅於耳，而腎脈却不上頭，腎與心交，假道於心，腑小腸之脈，以入耳中，名曰聽宮，為司聽之神所居，其形如珠，皮膜包裹真水，若真水破，而耳立聾，有為大聲所震而聾者，皮膜破也。或聾或不聾者，心腎不交也。宜磁硃丸以交心腎，有先耳鳴而後聾者，腎虛不能閉藏陰氣，室塞於陽竅也。宜六味丸去丹皮加磁石、五味、龜板，令陰氣自感於本宮，不觸於陽竅而愈。若外感暴聾，總不外少陽一經，足少陽膽脈繞耳輪，手少陽三焦脈入於耳，邪氣壅塞聽宮為其所格，宜逍遙散去白朮，加黃芩、半夏、生薑、竹黃、羚羊、玉竹治之。風火交煽，宜防風通聖散。

肝火熾甚。宜當歸蘆薈丸。尺脈弱者。宜桂附地黃丸。尺脈數者。宜大補陰丸。俱加磁石。葛蒲菴蓉。神而明之。存乎其人。非筆楮所能盡。

按上陳脩園說最明。但又有久病之人。以及產婦。中宮大虛。不能堵塞肝腎之氣。以致虛火上衝。而發耳鳴者。雖係膽與腎中之火。却要填補脾胃。以堵塞之。歸脾湯加柴胡。山梔。魚鱉。蓮米。五味。治之。四君湯加蓮米。芡實。苡仁。黃精。白芍。淮葯。亦治之。

口舌

血證論六卷

耳病 口舌

三三

五臟六腑。皆秉氣於胃。五臟六腑之氣。亦皆發見於胃。口者胃之門戶。故五臟六腑之氣。皆見於此。口苦是膽熱。小柴胡湯加黃連。治之。口甘是脾熱。甲己化土湯加花粉。茵陳。炒梔。茯苓。枳殼。厚朴。枯苓。石膏。治之。口酸是濕熱。觀天羹肉。過夜則酸。便知酸是濕熱所化。葛根黃連黃芩湯加防己。茵陳。木通。滑石。花粉。雲苓。治之。或蒼朮。黃柏。老連。吳萸。亦治之。口鹹是脾濕。潤下作鹹。脾不化水。故鹹也。二陳湯加旋覆。藿香。白芍。檀香。吳萸。治之。胃苓湯亦治之。或六味地黃湯加旋覆。牛膝。白朮。從腎中化水。納之。下行。以隔治之。口淡是胃虛。六君湯隨寒熱加減治之。

口澀是風熱。通聖散。去芒硝。大黃。治之。口麻是血虛。聖愈湯加薄荷。治之。口臭是食積之火。平胃散加山查。神曲。麥牙。枯苓。石膏。治之。口中糜爛。是膀胱遺熱於小腸。熱氣不得下泄。故糜及於口。導赤散加花粉。二冬。銀花。燈心。前仁。梔子。治之。喉腥是肺火痰滯。瀉白散。合甘桔湯。再加射干。兜鈴。枯苓。杏仁。尖貝。二冬。百合。瓜霜。治之。總而論之。口乃胃之門戶。總以治胃為主。宜分寒熱。用甘露飲。平胃散。加減治之。

舌為心之苗。而居口中。臟腑之氣。發見於口者。多着於舌。故即舌胎。可以診知臟腑諸病。傷寒邪在表者。舌無胎。在半表半裏。

血證論六卷

口舌

三四

者。舌乃有胎。入裏則胎結矣。故凡有胎。皆係內證。胎白為濕熱。小柴胡湯加花粉。石膏。滑石。木通。治之。胎黃為燥熱。犀角地黃湯加知母。石膏。花粉。酒軍。枳殼。治之。黑胎芒刺為實熱。大承氣湯治之。若胎黑而舌滑潤者。乃水極似火。真寒假熱之證。四逆湯加膽汁。人尿。蔥白。治之。血家虛火。又宜地黃湯加肉桂。牛夕。五味。龍骨。以引導之。又凡舌腫。舌裂。痛瘡等證。均是心脾火毒。瀉心湯治之。大清涼散亦治之。若舌根木強。或舌短縮者。皆是少陰經風邪內動。陰火上騰之候。地黃飲子加羚羊角。治之。

上所論口舌諸證。血家間亦有之。要宜以血證為主。參以上各法。斯為本末兼權之術。

咽喉

咽喉為肺之關。胃之門。少陰心脈之所終。肝經衝脈之所夾。凡此四經皆血之所司也。故失血家往往有咽痛之證。凡咽痛而聲不清利者。為肺火。肺主氣。氣管中痛。故聲不清利。甘桔湯加兜鈴。枯杏。杏仁。尖貝。老連。寸冬。百合。薄荷。治之。凡咽痛而飲食不利者。胃火也。胃上口為食管。食管痛。故飲食不利。白虎湯加

血證論六卷

咽喉

三五

銀花酒軍。桔梗。枳殼。治之。咽喉作痛。而上氣頰赤者。肝經衝脈逆上之火也。宜玉女煎。加旋覆射干。再用鹽炒。安桂少許。以引火下行。喉中塞腫及潰爛。皆是少陰心經之火。宜瀉心湯。加豆根。大力。桔梗。甘草。薄荷。細辛。膽星。牛黃。治之。腫塞者。外用人木甲。雞內金。急性子。全蝎。合巴豆。沙過。去巴豆。再加火硝。硼砂。水片。膽礬。青黛。老連。枯礬。吹上。吐痰血即愈。潰爛者。外用雄黃。老連。珍珠。桑椹。蛻寒水石。牛黃。硼砂。射香。吹之。又有梅核證。在痰飲門參看。

再按血家咽痛。多是肺胃虛火。及衝脈火逆。吾於效嗽諸條。言

之甚詳。癆蟲蝕咽。見聲音門。宜參滙。

聲音

失血家。初病失音。多是風火。聲音者。肺之所主。肺金清明。則聲音顯明。失血家。肺全陰虛。為火所剋。肺竅不通。鼻塞聲閉。若係外感。閉其氣者。宜小柴胡湯。加杏仁。桔梗。荆芥。薄荷。治之。若是肺中實熱。壅遏其竅。而聲音閉者。人參瀉肺湯。治之。又有津液乾枯。肺痿。葉焦。聲音嘶小者。乃失血之虛弱證。人參清肺湯。清燥救肺湯。治之。常用白密。尖貝。人參。胡桃。百合。蒸服。又有癆蟲

血證論六卷

聲音 腹痛

三六

居於肺間。嚙壞肺臟。金蝕不鳴。喉中痰數。喘熱難已。此為癆瘵。難治之證。宜百部。人參。明雄。獺爪。白芨。百合。鱗砂。射香。桔梗。甘草。獺肝。鱧魚骨。治之。又凡癆瘵。而咽喉破爛者。均在不治。總宜上方。外用珍珠。人參。牛黃。明雄。吹之。夫聲音者。氣所從出也。氣根於腎。故聲音之出。實由腎生氣。不歸元。則效愈甚。氣愈乏。而聲愈乾。宜以都氣丸。主之。加人參。沉香。訶子。腎氣丸。亦治之。

腹痛

血家腹痛。多是瘀血。另詳瘀血門。然亦有氣痛者。以失血之人。氣先不和。是以血不平而吐衄。但血家氣痛。與雜病氣痛有別。雜病氣痛。則痛之甚。血家氣痛。痛不大甚。但覺胸腹之中。不得和暢。有鬱滯結聚之形。宜逍遙散。加薑黃香附。枳朮。烏。治之。再參瘀血痞滿門更詳。

痺痛

身體不仁。四支疼痛。今名痛風。古曰痺證。虛人感受外風。客於脈分。則為血痺。仲景用黃芪五物湯。以桂枝入血分行風。最效。

血證論六卷

腹痛 痺痛

三七

失血家血脈既虛。往往感受外風。發為痺痛。或游走不定。或滯著一處。宜黃芪五物湯。重加當歸。丹皮。紅花。如血虛火旺之人。風中兼火。外見痺證。內見便短。脈數口渴等證。則不宜桂枝之辛溫。宜四物湯。加防風。柴胡。枯芩。丹皮。血通。秦艽。續斷。羚羊。桑寄生。玉竹。寸冬。治之。血虛生風。往往而然。當歸。紅花。荆芥。酒水煎服。

瘀血竄走四支。亦發疼痛。證似血痺。惟瘀血之痛。多如錐刺。脈不浮不拘急。此畧不同。另詳瘀血門。

又有周痺脚氣。疫濕走注者。皆係雜證。此不具論。

痿廢

痿者。足廢不能行之謂。分五痿治之。心氣熱則脉痿。筋縱而不任地。天王補心丹。加丹皮治之。肝氣熱為筋痿。則筋急而攣。四物湯。加羚羊。續斷。秦皮。黃柏。地骨皮。治之。脾氣熱為肉痿。胃乾而渴。肌肉不仁。四物湯。加人參。山藥。枯芩。黃柏。澤瀉。雲苓。治之。腎氣熱則骨痿。腰脊不舉。地黃湯。及大補陰丸。治之。肺氣熱則津痿。不能灌溉於足。疲茶不行。清燥救肺湯。治之。以上治法。雖分五臟。而總係陰虛熱灼。筋骨不用之所致。欲熱之退。莫如

血證論六卷

痿廢 遺精

三八

滋陰。欲陰之生。莫如獨取陽明。陽明者。五臟六府之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關。陽明虛則宗筋縱。帶脉不引。故足痿不用也。宜瓊玉膏。加玉竹。煨石膏。石斛。花粉。珍珠。竹茹。治之。玉女煎。加犀角。亦治之。然痿廢之原。雖在於胃。而其病之發見。則在於筋骨。凡虎骨。龜版。鹿筋。豬脊髓。牛骨髓。狗脊骨。碎補。牛膝。苡仁。枸杞。兔絲子。續斷。皆可加入。以為嚮導。

痿證與脚氣有異。切不可誤用風藥。

遺精

世謂上吐血下遺精其病不治謂其上逆下竭立見消耗也然病此者但未沉久猶可圖治蓋遺精失血雖是兩病其實一而已矣精者腎中陽氣所化乃天一所生之癸水也女子十四則癸水至於胞中而衝任兩脈即通將心火所化之血轉輸入胞與癸水交合水從血化是為月信男子十六則癸水亦至於胞中而衝任兩脈亦輸入胞與癸水合血從水化是之謂精胞者精之舍即血之室也吐血者是胞中血分之病遺精者是胞中水分之病血與水上下內外皆相濟而行吾已言之屢矣故病血者未嘗不病水病水者亦未嘗不病血也是以吐血多兼

血證論六卷

遺精

三十九

瘦飲瘵血亦變水腫淋秘亦有下鮮血者以血與水原相倚伏耳精者水之所化遺精者水病也而又吐衄是血亦病也先吐衄而後遺精是血病累及於水先遺精而後吐衄是水病累及於血治法無論先後總以治肝為主胞宮乃肝之所司精與血皆藏於此治血者必治胞治精者亦必治胞胞為肝所司故皆以治肝為主肝寄相火氣主疎泄火熾氣盛則上吐血而下遺精地骨皮散加柴胡胡黃連知母黃柏牡蠣龍骨茯苓蒲黃血餘灰治之丹桅逍遙散加阿膠龍骨牡蠣蒲黃以平之吐血甚而遺精輕者以治吐血為主生地黃散加金櫻子牡蠣治之遺

精甚而吐血輕者以遺精為主地黃湯加血餘灰龍骨牡蠣治之

仲景治遺精有用天雄附子法腎氣不納心火不下交於腎有用肉桂法皆陽虛之證也若失血家則多是火遺即心腎不交亦是水不濟火其為夢遺十之八九蓋肝經火旺則魂不內守恍惚有見亦有無夢而遺仍屬相火之甚者火甚則神不清是以昏沉迷悶不覺精之走失此較有夢而遺者其火更甚毋得誤認為陽虛之證也大補陰丸加生棗仁牡蠣龍骨茯苓神治之若氣不攝精者其人必見虛寒之狀不徒以有夢無夢為別也

血證論六卷

四十

淋濁

淋者小便短數淋瀝不通之謂也單病此者自有諸書可考血家病此特其兼見者耳然二便為消息之門戶若一閉塞則上中焦不得消息故傷寒論有言急下者有言當利其小便者有言有小便則生無小便則死者無一不吃緊於此此水病也水與血相為倚伏吾已言之屢屢單病血不病水者易愈以水調則其血雖病猶有水以濡之也若病血而又累及於水則上而喘欬外而腫熱下而淋濁均不能免水病則無以濡血而血證

亦因以難愈矣。吾於尿血腫效。已詳言之。可以參看。

血家病淋。多是肺痿。肺主制節。下調水道。肺痿則津液不流。氣不得下。而制節不達於洲都。是以小便不利。宜生地百合花粉。知母杏仁桑皮滑石桔梗猪苓阿膠草梢治之。

血家血虛火旺。心遺熱於小腸。不能泌別清濁。則小便赤短淋瀝。導赤飲加炒梔前仁老連白芍燈心。

脾土不化。亦能壅滯。使小水不利。五苓散治之。濕中挾熱者。去桂尖。加茵陳防己黃柏炒梔。

前陰屬肝。肝火怒動。莖中不利。甚則割痛。或兼血淋。宜龍膽瀉

血證論六卷

淋濁

四一

肝湯加肉苁蓉。或地黃湯加菴菴黃柏前仁治之。若血淋則加地榆蒲黃。

腎為水臟。膀胱為水府。腎中陰虛。水源枯竭。則小便不化。知柏地黃湯。少加肉桂以反佐之。若是陽虛不能化水者。金匱腎氣丸治之。

以上分別臟腑施治。即陳脩園以三焦為決瀆之義也。脩園用五淋散統治三焦。吾謂不如分別上中下。而又各區臟腑。以施治。尤為精細。

濁者小水不清。或白或黃。或青或赤。此如暑天洪水泥潦之類。

乃溼熱為之也。溼甚用胃苓湯。加黃芩黃連黃柏白芍治之。熱甚用茵陳梔子黃柏秦皮木通前仁防己草梢治之。

又有敗精為濁者。或由思淫不遂。或由淫而精停。宜單草分清飲。加鹿角屑桑螵蛸白芍肉苁蓉治之。

又有中氣虛弱。小便滴在地上。即變色者。宜六君子歸脾湯治之。

便閉

二便皆脾胃之出路。小便是清道屬氣。大腸是濁道屬血。失血

血證論六卷

便閉

四二

家血虛便燥。尤其應得。四物湯加麻仁主之。血燥者加桃仁酒軍氣燥者加杏仁枳殼。風燥者加皂角仁白芷防風。火燥者宜加枳殼厚朴大黃芒硝。

大腸乃胃之關門。胃為燥土。若胃有燥尿而不下者。其責不在大腸而在胃。其證口渴手足潮熱。或發譫語。三一承氣湯下之。或四物湯加麻仁枳殼厚朴酒軍以滋降之。

又小便數而不禁。大便反閉者。名為脾約。謂脾津下泄無以潤腸故也。仲景用脾約丸治之。丹溪謂宜清肺燥。肺清則小水有制。而脾得灌溉。宜用清燥救肺湯治之。

腎開竅於二陰。腎虛陰不足。無以潤腸者。宜左歸飲。加黑芝。麻肉。從蓉治之。

肺與大腸相表裏。肺遺熱於大腸。則便結。肺津不潤。則便結。肺氣不降。則便結。肺遺熱者。人參瀉肺湯治之。肺津不潤者。清燥救肺湯治之。肺氣不降者。清燥救肺湯。合四磨湯。再重加杏仁。或少加葶藶。以治之。與便血條合看自明。

此外又有瘀血閉結之證。或失血之後。血積未去。或跌打損傷。內有瘀血。停積不行。大便閉結。或時通利。仍不多下。所下之糞。又帶黑色。腹中時時刺痛。口渴發熱。脈帶澀象。宜用桃仁承氣湯治之。或失笑散。加杏仁。桃仁。當歸。白芍。

血證論六卷

開便

四三

瀉泄

失血虛癆。最忌瀉泄。以脾胃敗壞。不能任藥。且少納穀。胃氣將絕。故也。雜病瀉泄。用參朮薑苓。應手取效。此則薑朮補脾。轉傷其陰。下咽之後。立見喘熱。竟成枯骨矣。然使用滋陰之藥。則脾已瀉泄。益陰則愈動其瀉勢。必土崩不救矣。病至此者。吾莫如之何也。已擬用黃土湯作調停之計。效否不敢必也。

以上所論。乃虛極胃將絕之瀉也。如非胃氣將絕之瀉。便當按

證治之。毋得誤斷其死。以恐駭病人。

濕瀉者。如水傾下。腸鳴身重。其腹不痛。胃苓湯主之。

風泄者。大便不聚。或帶清血。八珍湯加粉葛。丹皮。防風。白芷。

寒泄者。腹中切痛。雷鳴。鴨溇。下利。清白色。附子理中湯主之。六君子湯加薑附亦治之。

暑泄者。煩渴。尿赤。暴瀉如水。越鞠丸加香茹。粉葛。蓮翹。前仁。大力。白芍。黃連。扁豆。枳殼。厚朴。生薑。合香。

飧泄者。米穀不化。香砂六君子治之。此與暴注完穀為肺氣迫下者不同。暴注則水與穀食入即下。為熱迫三一承氣湯。

食積泄者。瀉後痛減。臭如抱壞雞子。噫氣作酸。失血虛人。停食作瀉者。尤多。宜道遙散。或小柴胡湯。均加山查。神曲。麥芽。萊菔子。治之。越鞠丸。平胃散。皆治之。

又有泄血泄痢者。另詳便血門。

又有腎泄。五更作泄。一名晨泄。乃色慾過度。足冷氣虛所致。宜四君子湯。加熟地。枸杞。兔絲子。巴戟。杜仲。故紙。肉叩。五味。桑皮。治之。豬腎一枚。加故紙。小茴。青鹽。燒服亦可。

血證論六卷

便閉瀉泄

四四

飲食

水穀入胃。其濁者為渣滓。下出幽門。達大小腸而為糞。以出於穀道。其清者。倏然而化。依脾氣而上升於肺。其至清而至精者。由肺而灌溉乎四體。為汗液。津唾助血脈。益氣力。為生生不息之運用也。其清中之者。下入膀胱而為溺。此虞天民醫學正傳所論。其言水穀消化之道甚明。故全錄之。故凡食不化者。責之於脾。六君子湯主之。水不化者。責之於肺。二陳湯加防已。桑皮。桔梗。木通。治之。消渴者。肺火也。甘露飲加花粉。治之。消穀者。

血證論六卷

飲食

四五

胃火也。白虎湯加老連。人參。枳殼。厚朴。生地。治之。飲一溲二為下消。腎虛也。腎氣丸主之。食入即吐。為火逆。瀉心湯加生薑。竹瀝。治之。但用水漱口而不欲飲者。多是經脈中有瘀血。宜四物湯加紅花。血通。乾漆。水片。葱白。桃仁。治之。食入良久。翻胃吐出。或不化而餒泄者。為脾不磨食。六君子湯加肉叩。故紙。吳萸。五味。治之。

夫人之所以能化食思食者。全賴胃中之津液。吾於總論已詳言之。有津液則能化食。能納食。無津液則食停不化。觀膈食病。食入反吐。糞如羊屎。可知無津液則食不能化之故矣。觀噤口。

痢咽乾。津竭。食不得下。可知無津液則食不能納之故矣。痢噤口者。另詳便血門。膈食不化。以及血虛津枯。不思飲食者。宜用左歸飲加花粉。人參。玉竹。黨參。蓮米。白芍。芝麻。治之。或葉氏養胃湯加人參。芝麻。花粉。當歸。淮藥。黃精。杏仁。治之。

一凡平人內傷飲食。多是中寒洞泄。治宜理中湯。平胃散。以溫燥之。若失血之人。內傷飲食。則反多壅實生熱之證。往往手足潮熱。口乾。氣逆。衝脈作欬。若用溫燥之藥。不惟飲食不化。且更加壅熱矣。用小柴胡湯加枳殼。厚朴。大黃。輕則加萊菔子。麥牙。越鞠丸。加減亦治之。

血證論六卷

飲食

四六

感冒

血家最忌感冒。以陰血受傷。不可發汗故也。然血家又易感冒。以人身衛外之氣。生於太陽膀胱。而布散於肺。血家肺陰不足。壯火食氣。不能散達於外。故衛氣虛索。易召外邪。偶有感冒。即為頭痛寒熱身痛等證。若照常入治法。而用麻桂。羌獨。愈傷肺。津。肺氣益索。而不能達。不惟涸血分之陰。愈以助氣分之邪矣。治惟和解一法。為能補正祛邪。宜先生其津。使津足而火不食氣。則肺氣能達於皮毛。而衛氣充矣。次宜疎理其血。使血分。

則不留邪為患。而外邪自解矣。宜小柴胡湯加杏仁、荆芥、防風、紫蘇、主之。口渴加花粉。去半夏。身痛加粉葛。內動痰火者。再加茯苓、旋覆花。內動寒水者。另用蘇子降氣湯治之。外感風寒客於肺中。外證已退。久欬不愈者。失血家往往有之。宜千金麥門冬湯。其麻黃搗茸蜜炙。變峻為緩。以搜陳寒。寒客肺中。久則變而為熱。故用此方。或小柴胡加蘇子、薄荷、細辛。亦與麥門冬湯彷彿。感冒甚重。傳變為熱者。宜照傷寒法治之。清熱攻裏。可以任量。惟失血家不得輕用。吐法戒之。

血證論六卷 感冒

四七

失血之人。有狀似感冒。而實非感冒者。由於肺痿氣虛。時時涕淚。惡寒鼻塞。流清涕。乃金被火剋。內塵外閉。衛氣不布之故。只宜清養肺金。毋得妄用發散。以張火熾也。太平丸補散兼行。以治之。千金麥門冬湯。小柴胡湯皆宜。小柴胡湯通上焦之津液。以調和榮衛。尤平穩而神奇。

瘧 掣 拘急

瘧者。角弓反張。掣者。手足抽扯。拘急者。頭勾足局。肘膝相攝。傷寒中風。凡遇此等。分三面治之。失血家亦宜分三面施治。而用

藥畧有不同。眉列如左。

角弓反張者。太陽經病也。無汗用葛根湯。有汗用桂枝加葛根湯。血病此多是血燥生風。筋灼而掣。麻桂皆其所忌。前方不中與也。宜四物湯加粉葛、防風、荆芥、獨活、羚羊、桑寄生。續斷、杏仁治之。手足抽掣。口目斜引者。少陽經病也。傷寒中風。用大秦芩湯。此方風藥雖多。尚兼滋補。血家病此亦可借用。再加阿膠、羚羊、人參、花粉。以柔潤熄風。則與血家更宜。面前拘急。屬陽明經。傷寒中風得此者。三一承氣湯治之。血家

血證論六卷 瘧拘急

四八

得此為陽明津液大虛。筋為之縮。法宜大生津液。玉女煎加花粉、玉竹、粉葛、竹茹、人參、寸冬、白芍、枳殼治之。又曰。肝主筋。肝病則驚駭筋攣。今且不必縷分。總以治肝為主。四物湯加羚羊、角、冬仁、木瓜、荆芥、枯芩治之。此乃血家發瘧之治法。非通治諸瘧之法。讀者須知。

暑 疫

暑者。濕熱合氣之謂也。熱蒸則濕動。濕鬱則熱過。濕熱合化。是為暑氣。月令所謂土潤溽暑。此之謂矣。熱甚則心煩。口渴。脈數。

溺赤濕甚則泄痢腫滿喘急閉悶病狀不一。總係濕熱二氣而已。血家陰虛濕熱之邪。尤易感受。宜統以大清涼飲治之。濕甚者再加防已。雖不能盡暑之治法。然本此方以推廣之。可以得變通之妙。

又有陰暑實非暑也。乃夏月伏陰內動之寒症。毋循名而失實。疫者四時不正。惡戾臭穢之氣。觸人為病。病氣又能傳染。是名曰疫。沉冬則無。夏秋常有。其氣觸人。皆從口鼻而入。內伏臟腑之中。發作則狀熱頭痛。變瘧動痢。狂躁腫急。不一其形。雖有外證。不得發表。但解其裏。則表氣自和。清瘟敗毒飲加酒軍治之。

血證論六卷 著疫 四九

血家陰虛疫邪易發。故並言之。另有瘟疫專書。詳明者多。宜細查閱。此第舉其大意耳。

食復

失血家胃氣清和。津液自生。火自降。痰自順。而病亦自愈矣。若傷飲食。則中宮壅滯。氣與火不得順利。上衝於肺。則為欬。嗽外蒸肌肉。則發熱。內鬱於心。則為煩。由是血不得甯。因之復發。名為食復。宜甲已化土湯。加枳殼厚朴炒梔麥牙為主。欬者加紫苑寸冬。五味杏仁發熱者加石膏。知母。心煩者加老連當歸腹。

痛者加酒軍。已動血者加桃仁蘇木。或用逍遙散照上加減法。亦調和胃氣之善方。小柴胡湯亦可。

仲景治食復。言有宿食者。皆主芍藥大黃。義取二物力能推盪。蓋宿食不去。不獨阻新食之進。且傷氣壅邪。轉生諸疾。故主大黃以速去之。以免傷其正氣。勝查麴之功。千萬醫者須知此理。臨證庶有膽識。

夫失血之人。所以易於停食者。多是胃中有熱。食多飲食。既食之後。脾津枯少。不能糜爛消化。是以易於停食。宜四君子湯加黃精淮藥玉竹花粉麥牙白芍生地甘杞當歸寸冬查肉蘿腹。

血證論六卷 食復 五十

汁煎服此等治法。但讀東垣脾胃論者。斷不能知。

勞復 怒復

靜則氣平。而生陰動則氣躁。而生陽。煩熱喘欬。隨之而作。失血病因勞動而復發者。十之五六。亟宜調息。瞑目。以收斂浮動之氣。使陰生陽秘。而血乃不復動矣。人參固本湯加蒲黃蘇木治之。煩熱甚者。宜用地骨皮散加炒梔蒲黃。欬甚者。宜人參清肺湯治之。或三才湯加五味雲苓沉香甘草。清燥救肺湯亦治之。血復止後。多飲獨參湯。乳睡以息之。

怒復者。怒氣傷肝。相火暴發。而血因奮興。當歸蘆薈丸以瀉之。龍膽瀉肝湯以清之。丹梔逍遙散以和之。小柴胡湯加牡蠣青皮以抑之。血潮不止者。瀉心湯加當歸白芍沉香香附降香以止之。十灰散用香附檳榔童便醋調服以止之。去血過多則陰愈傷。火愈元。怒氣愈不能平。宜當歸人參沉香香附生地五味以大補之。少與之食。以消息之。

總之失血之人。戒勞更要戒怒。醫學考辨有戒怒詩云。病家誤戒忿怒。忿怒無非些小故。血隨氣上要循經。猶如輕車就熟路。吾臨血證多矣。每有十劑之功。敗於一怒。病家自誤。醫士徒勞。

血證論六卷

勞怒復

五一

堪發一歎。

時復

時復者。謂血家春夏得病。至次年春夏復發。秋冬得病。至次年秋冬其病復發。值其時而仍病。故曰時復。夫人身五臟六腑。與天之氣運呼吸相通。原是一體。故天之陰陽能構人之疾病。其實非天病人也。乃人身氣血先有偏盛。故感天氣之偏盛而病。遂作焉。

血家病得於春者。乃肝經血虛。火旺。春木之氣。內通於肝。肝經

感木氣而風動火發。故值春時。舊病復作。其已發吐衄者。宜地骨皮散加蒲黃枯芩。膽草杏仁。柴胡荆芥醋炒。大黃治之。尚未發作者。預服丹梔逍遙散加牡蠣阿膠龍骨香附五味。或用左歸飲加阿膠龜板牡蠣五味以滋養之。使肝腎陰足。則火伏而不動矣。凡冬。日春時得血病者。均宜用此法以養肝腎。使陽氣封澁而不洩。斯病不發矣。又凡肝經火動者。必先有熱。蒸口苦。魂夢不甯。諸證。柴胡清骨散亦治之。

失血之病得於夏者。乃心經火旺。次逢夏月復發。宜瀉心湯加丹皮蒲黃生地木通草稍降香牛膝。其未發時。若見煩熱。即宜預服生地黃散以遏止之。或天王補心丹以養之。又按夏月暑

血證論六卷

時復

五二

感病多發於陽明。以陽明主燥。暑熱相合。故多屬陽明。病在陽明者。口渴身熱。煩燥便閉。惡聞人聲。脈勢洪大。以此為辨。其吐出之血。亦必甚多。宜犀角地黃湯加粉葛銀花知母蒲黃酒軍枳殼。若尚未動血。初覺發熱口渴者。玉女煎加虫退秦皮茵陳枳殼。或先服甘露飲以養胃陰。免動燥氣。秋乃金令。肺氣主之。凡失血家。至秋時皮毛收斂。未能秘密。往往外合風氣。內壅熱邪。發欬動血。尤為容易。病家醫家皆須善為調理。庶可補天再造也。若是秋時得病。是病本得於肺。次逢

秋月本臟不潤。復發痿燥。而欬血者。清燥救肺湯。加生地。蒲黃。治之。人參清肺湯。加紫苑。當歸。蒲黃。亦可。萬可久。太平丸。既滋肺陰。兼清風痰。尤治肺良方。若肺氣鬱而不布。衛陽不外達。津液不下降。皮毛洒淅。寒熱作欬者。宜小柴胡。加荊芥。防風。桔梗。杏仁。蒲黃。蘇木。花粉。寸冬。桑皮。全皮。枇杷葉。治之。風寒客於肺中。久欬不止者。宜千金麥門冬湯。其麻黃。搗茸。灸過。以搜陳寒。或重用太平丸。重加薄荷。亦和散之法。冬令屬水。腎氣主之。此時陰氣堅凝。則陽氣潛藏。龍雷不作。若陰氣不足。則陽氣不潛。况此時陽氣皆入於內。人身陰虛者。既

血證論六卷

時復

五三

多內熱。加以陽氣入內。兩熱相合。令失冬令寒凝之象。此與冬行夏令無異。是以火迫血動。而復發也。治法宜滋腎陰。泄內熱。使其陰凝。陽秘。復成為大冬之令。斯病愈矣。已動血者。玉女煎。加蒲黃。丹皮。蘇木。繼服大補陰丸。六味丸。以收功。乘其未發。先用參味地黃湯。滋之火之不藏。如三冬不雪。臘月鳴雷。潛納陽氣。皆可加龍骨。牡蠣。吾於衝脈言之甚詳。須參看。凡物有根者。逢時必發。失血何根。瘀血即其根也。故凡復發者。其中多伏瘀血。以及過節氣。遇陰雨。而即蒸熱發動者。均是瘀血為病。宜血府逐瘀湯。加乾漆。桃奴。治之。或用仲景大黃廬蟲

丸。少少與之。此理須知。方不為血證所瞞。

房勞復

血之運行。聽命於氣。氣乃先天腎水之中。一點生陽。靜而復動。化生精血。若以房勞傷其精血。則水虛而火發。氣動而血升。烏在其病之不發乎。宜都氣丸。加麥冬。龜鹿膠。治之火盛者。大補陰丸。加鹿膠。桑螵蛸。海螵蛸。治之。或加味虎潛丸。脾腎兼治。或三才湯。加桑螵蛸。秋石。海粉。黃柏。紫梢花。治之。失血之人。以養息為第一。若不思房勞。是自促命期。於醫何咎。

血證論六卷

房勞復

五四

附抱兒癆論

世謂婦人有胎。復得欬嗽發熱。骨蒸。或吐血。或夢交。名為抱兒癆。其胎不能孕滿十月。或七八月。或五六月。胎便萎墮。兒不長。成其母坐產之後。不得滿月。定然廢命。古書不見名論。俗醫又無治法。世皆以死證目之。而死者果相接踵。良可哀也。夫婦人懷孕。其氣血既給養胞胎。又加以病。再耗其氣血。一身之氣血。無多。那堪兩件消耗。是以其胎不能長養。而母被胎困。又受病。侵雙斧伐枯樹。不死何待。顧其受病之重。誠如所云。而果得治

法何難起死回生哉。吾妻病此，親手調治，竟得保全。始知抱兒
癆之所以不起者，失治之咎耳。夫婦人血和，然後有子。血病於
是胎病。治之之法，總視其證。有時以安胎為主，胎安則母自安。
有時以治病為主，病去則胎自固。據其見證，照病用藥，自無不
愈者也。大旨此病，世皆謂為極虛之證，而不知此病多是實邪。
何以言之？蓋人身除腸胃中，皆不可有物塞碍。是以針砭刺穴，
停住片時，即能堵塞其氣。況胎乃頑然一大物，塞於下部，則氣
實而喘，氣逆而嘔，氣盛而為火，皆以其壅塞故也。夫人之懷孕，
不啻藏珍而胎之病人，有如積塊，是以懷孕之脈沉分搏，指亦

血證論六卷

抱兒癆

與下焦積塊之脈相似。第積塊攻而通之，則實邪去而人安胎。
則無攻通之法，是以不便施治。然有逆實之證，亦須消息以補。
兼攻，斯不至留病為患。蓋必擺脫一切拘禁，而後可救。皆不能
救之。死證內經云：有故無殞，亦無殞也。則知不拘禁例，一意治
病為安胎最上之法。故抱兒癆吐血逆滿，不須顧胎，直宜涼血。
泄癉丹皮、桃仁，皆所不忌。瘀血既去，則不壅熱，去舊生新，胎反
得新血之養。若氣逆火甚，非尋常杏仁、枳殼、枯芩等藥所能治。
者，酒炒大黃亦間可用。又凡此病皆胎氣壅於下部，反而上薰。
肺金直當其氣，故治抱兒癆以保養肺金為第一要法。清燥救

肺湯、紫苑散主之。痰凝氣阻，欬逆不休者，豁痰丸治之。水飲冲
肺，肺脹欬嗽，不得卧息者，葶藶大棗瀉肺湯主之。桔梗甯肺湯
補瀉兼行，保和湯多補少瀉，皆宜酌用。此病發於胞中，其本在
下，清理肺金，不過治標之法耳。然胎在下部，既不能攻治其本，
則不得不重治其標，保助肺金，以敵病氣。雖病氣上薰，亦無碍
也。且肺為華蓋，位雖居上，而通調水道，下輸膀胱。又主制節下
達大腸，肺調則大腸不滯，氣得從大腸而泄，則胎雖阻之，而上
薰之勢亦稍殺矣。肺調則小水通利，氣得從小水而洩，則胞中
之氣亦得從小水泄下。蓋膀胱者，胞之室，膀胱暢則胞氣可借

血證論六卷

抱兒癆

之得舒而上薰之勢亦少殺矣。若大便燥結者，急宜用清燥救
肺湯，加大麻仁、白芍、肉苁蓉、枳殼、厚朴，當歸治之。若小便不利
者，急宜用清燥救肺湯，加草稍、生地、木通、防己，知母、桑皮治之。
且小便出膀胱，屬太陽經，主皮毛，大便出大腸，屬陽明經，主肌
肉。二經調達，則肌肉皮毛之氣皆清理而不滯，自不發寒蒸熱
矣。第皮、毛、肌肉之熱，屬氣分者，既可以免，而腠理之熱，屬血分
者，並不關於二經。人身腠理之氣，乃三焦所司。三焦屬相火，內
寄於肝膽，而下藏於胞室。今胞室既為胎所站，則相火上壅，而
為嘔吐失血者，往往而然。相火之氣循經外達，壅於腠理，則生

寒熱甚則骨蒸。推原其故。以胞室為胎所站。相火不得任意游行。是以墜過。此時不能奪去其胎。只得清泄胞中之氣。使相火有所洩。斯不致大墜耳。宜四物湯加黃柏知母赤苓澤瀉。皮草梢肉苁蓉。此是治胞室以滋相火之本也。外用小柴胡湯以和其腠理。蒸熱之甚者。可用清骨散以瀉之。此是治少陽以清相火之標也。是時胞宮不便重治。只合多清少陽。以重治其標。即不全愈。而亦殺其病氣矣。如欲胞室腠理面面兼治。則宜四物湯合柴胡清骨散治之。夫抱兒癆之病根。雖在胞。而其受病則在於肺。惟其肺金津虛。無以轉輸於下。是以胞中之水火皆

血證論六卷

抱兒癆

五七

得泛上而為病。無論欬熱諸證。總宜大滋其肺。使肺津得潤。肺氣得降。則胞中之水火。雖欲上逆。而亦不為害。救肺湯紫苑散。太平丸。保和湯。人參清肺湯。阿膠瀉白散。可常服之。第胞宮之水火上逆。則病見於肺。而水火之根。又實根於腎中胞宮之相火。腎中之陽也。胞宮之水陰。天癸之水也。須極力滋補其腎。使水化則不為痰。陰足則不動火。此為正本清源之治。腎中陰虛而火動者。則水結為痰。為欬。為腫。為淋。閉骨蒸。地黃湯加杏仁。五味。寸冬。桑皮。黃柏。知母。以清之。腎中陽虛不化水者。則水停為欬。為痰。為腫。為淋。閉清穀不化。宜地黃湯加故紙。杜仲。艾葉。

附片。台烏。沉香。木通。以瀉其陽。若腎中痰火上逆之至。喘欬不止。胎亦上逼。照上用六味地黃湯。加龍骨。牡蠣。鍾乳。石。牛膝。半夏。五味。寸冬。失貝。治之。此等墜降之藥。各書俱云墜胎。然無病之胎。固忌此等。今既有腎氣逆上之病。高者抑之。有病病受墜而下之。乃適當其胎之正位。胎反其位。而不上逼。何墜之有。至於氣逆之極。發動吐血。嘔欬。呃噦。諸般上逆之證。宜降氣者。枳殼。厚朴。葶藶。檳榔。任量而施。宜降火者。酒軍。胡黃。連。知。柏。膽。草。隨宜取用。亦所不妨。况乎胎中吐衄。多因素有瘀血。阻滯胎氣。兩不相容。是以動血。欲去瘀血。凡桃仁。丹皮。靈脂。紅花。元胡等。

血證論六卷

抱兒癆

五八

皆宜用之。若徒守拘禁。與養癰成患。無異。醫者果能破除俗見。而參透其所以然。於治抱兒癆。何難起死回生哉。又曰。用藥雖不必徒守拘禁。然亦須審病中病。而止。勿毫無顧忌。而不知輕重也。慎之。夫胎之所以病。產母者。以其衝脈為病也。衝脈起胞中。上屬陽明。至胸中。而散胎氣。循衝脈入胃。上肺。其病產母。凡一切嘔欬。吐衄。發熱。骨蒸。皆衝脈之咎。治衝之法。吾於吐血。欬血。產血。胎血。經血。欬嗽。諸門言之甚詳。能熟查之。自有活法。產母之所以繫胎者。帶脈也。帶脈解則胎墜矣。若見腰痛之證。

則早用當歸白朮熟地淮藥杜仲故紙東皮龜膠黃柏黃芪知母兔絲甘杞續斷雲苓治之其餘帶脈治法詳經血產血門產母既病抱兒癆困憊之極胎不能保則亦無須存胎但以安保護母為急歸芎湯加人參糯米苧根阿膠聽其安可也墮亦可也胎既下後但照正產按法治之去瘀生新自無不愈

再按抱兒癆產前已大虛耗一旦產後必見險危之證較之尋常正產更宜預防一汗出不止獨參湯救之浮熱脈大者加附子以引陽入陰此雖胎前常病火爆而至是陽氣欲脫不得仍照火爆治法四物湯加黑薑亦是從陰引陽之法皆可審用一

血證論六卷

抱兒癆

五九

喘促為氣脫之候參附湯加五味沉香治之一血崩為血脫之候歸脾湯加血餘灰樓灰海鯨魚膠治之亦有怒動肝大而血崩者歸脾湯加柴胡山梔治之此三危證正產有之病抱兒癆者在所必有醫家病家皆宜預防

夫胎前屬實熱產後屬虛寒平人大抵然也至於病抱兒癆者胎前之病無一非熱至於產後則不盡虛寒蓋胎前已病陰虛而產後去血過多其陰愈虛發熱發欬尤屬痿燥之極若徒守產後宜溫補之說鮮不促命宜左歸飲加阿膠花粉百部人參寸冬玉竹五味治之骨蒸欬逆者團魚丸治之陰虛火動挾水

飲而上干者四物湯合二陳湯再加柴胡枯苓薑汁竹瀝竹黃膽星金箔牛黃治之其餘雜證均照產科治法自無不愈茲所論者乃抱兒癆產後之治法與正產畧異然亦第舉其端尚待醫士擴而充之

一凡治抱兒癆必先熟吾書中經血胎血產血諸門而於各女科又有參酌庶克有濟

一凡抱兒癆須在初病時即行調治治或未愈而用藥不錯庶幾產後可以治愈如不知治法則產後必亡醫家病家兩宜慎之

血證論六卷

抱兒癆

六十

以上所論抱兒癆治法已具大畧而內中又或加外感則雖照血家感冒之法加減治之或加內傷則雖照血證飲食諸法加減治之或添怒氣而病增則宜照怒復條內所用諸藥治之或加房勞而病劇則宜照房勞復條內所用諸藥治之法外有法難以筆傳

血證論七卷

四川彭縣唐宗海容川氏著



仲景瀉心湯

大黃酒炒 黃連 黃芩等分

心為君火。化生血液。是血即火之魄。火即血之魂。火升故血升。火降即血降也。知血生於火。火主於心。則知瀉心即是瀉火。瀉火即是止血。得力大黃一味。逆折而下。兼能破瘀逐陳。使不為患。此味今人多不敢用。不知氣逆血升。得此猛降之藥。以損陽和陰。真聖藥也。且非徒下胃中之氣而已。即外而

血證論七卷

方解上

經脈肌膚。凡屬氣逆於血分之中者。大黃之性亦無不達。蓋其氣最盛。凡人身氣血凝聚。彼皆能以其藥氣克而治之。使氣之逆者不敢不順。今人不敢用。往往留邪為患。惜哉。方名瀉心。乃仲景探源之治。能從此悟得血生於心。心即是火之義。於血證思過半矣。

十灰散

大黃 小蘗 茅根 椴皮 側柏
大黃 丹皮 荷葉 茜草 山梔
右藥燒存性。為末。鋪地出火氣。童便酒水隨引。黑為水之色。

紅見黑即止。水勝火之義也。故燒灰取黑。得力全在山梔之

清。大黃之降火清氣。降而血自甯。餘藥皆行血之品。祇借以為嚮導耳。吹鼻止衄。刀傷止血。皆可用之。

獨參湯

人參二兩

濃煎。細咽。熟睡。取養胃之陰。安護其氣。氣不脫。則血不奔矣。世以人參補氣。便認為陽藥。不知人參柔潤甘寒。乃滋養中宮津液之藥。人之真氣生於腎中。全賴水陰。含之出。納於肺。又賴水津以濡之。故腎中水陰足。則氣足。而呼吸細。肺中之

血證論七卷

方解上

水津足。則氣足。而喘息平。人參滋補中宮之津液。上布於肺。下輸於腎。故肺腎之氣得所補。蓋世人不知氣為水之所化。而以氣屬陽。妄指參為陽藥。幸陳脩園力辨其証。然脩園謂壯火食氣。參瀉壯火。故補氣。其說猶有隔膜。尚未識氣即是水之理。吾於總論言之甚詳。須知氣即是水。而人參之真面乃見。

甘草乾薑湯

甘草三錢 乾薑二錢 炮 五味一錢
甘草炙過。純於補中。乾薑變黑。兼能止血。二藥辛甘合化。扶

陽氣以四達。血自運行而不滯矣。惟五味收斂肺氣。使不上逆。以止氣者。止血。凡陽虛脾不攝血者。應手取效。但血係陰汁。虧血即是虧陰。剛燥之劑。往往忌用。必審其脈證。果係虛寒者。始可投此方。

四物湯

當歸 四錢 生地 四錢 川芎 二錢 白芍 三錢

柯韻伯曰。心生血。肝藏血。故凡生血者。則究之於心。調血者。當求之於肝。也是方乃肝經調血之專劑。非心經生血之主方也。當歸和血。川芎活血。芍藥斂血。地黃補血。四物具生長

血證論七卷

方解上

三

收藏之用。故能使榮氣安行。經速若血虛。加參芪。血結加桃仁。紅花。血閉加大黃。芒硝。血寒加桂附。血熱加芩連。欲行血去芍。欲止血去芎。隨宜加減。則不拘於四物矣。如遇血崩血暈等證。四物不能驟補。而反助其滑脫。又當補氣生血。助陽生陰。長之理。蓋此方能補有形之血。於平時不能生無形之血。於倉卒能調陰中之血。而不能培真陰之本。韻伯此論。雖有不足於四物。然謂四物為肝經調血之專劑。則深知四物之長者矣。蓋肝主藏血。衝任血海均屬於肝。故調血者。舍四物不能為功。

白虎湯

石膏 一兩 知母 五錢 甘草 二錢 粳米 一撮

四藥甘寒。生胃陰。清胃火。陽明燥熱得此。如金甃夕。起暑酷全消。故以秋金白虎名湯。乃仲景傷寒陽明之正方。借治血症。脈洪大發熱口渴者。尤有捷效。

血證論七卷

方解上

四

大柴胡湯

柴胡 半夏 白芍 黃芩 枳壳

大黃 生薑 大棗

黃芩一味。清表裡之火。姜棗柴胡。使邪從表解。半夏白芍枳殼。大黃。使邪從裡解。乃表裡兩解之劑。而用裡藥較多。後之雙解散。通聖散。皆從此套出。借治血症。或加表藥。或加血藥。可以隨宜致用。

逍遙散加丹梔名丹梔逍遙散

柴胡 當歸 白芍 白朮 雲苓

甘草 薄荷 煨薑 丹皮 山梔

此治肝經血虛火旺鬱鬱不樂方用白朮茯苓助土德以升木當歸白芍益榮血以養肝薄荷解熱甘草緩中柴薑升發木鬱則達之遂其曲直之性故名之曰逍遙如火甚血不和者加丹皮山梔清理心包心包主火與血為肝之子為血之母治心包之血即是治肝之血瀉心包之火即是瀉肝火以子母同氣故也

當歸蘆薈湯

血證論七卷

方解上

五

當歸一兩 胆草一兩 蘆薈五錢 青黛五錢 山梔一兩 黃連一兩 黃柏一兩 黃芩一兩 大黃五錢 木香二錢 射香五分

舊用神曲糊丸薑湯送下借治血病用酒丸童便下尤佳人身惟火最橫每挾諸經之火相持為害方用青黛蘆薈膽草直折本經之火芩連梔柏大黃分瀉各經之火火盛則氣實故以二香以行氣火盛則血虛故君當歸以補血治肝火決裂者惟此方最有力量莫嫌其多瀉少補也

地黃湯

熟地一兩 山藥五錢 棗皮五錢 茯苓三錢 丹皮三錢

澤瀉三錢

陳修園謂人之既生以後天生先天全賴中宮輸精及腎而後腎得補益謂此方非補腎正藥然腎經水虛火旺者實不可離方取熟地以滋腎水而又恐肝木盜水之氣故用棗皮以養肝之陰補子正以實母也再用山藥補脾土啟水津以給腎用丹皮清心胞瀉火邪以安腎庶幾腎中之水得以充足特慮有形之水質不化則無形之水津亦不能生尤妙茯苓澤瀉化氣利水以瀉為補雖非生水之正藥而實滋水之要藥

血證論七卷

方解上

六

花蕊石散

花蕊石 煨為末

男用酒水調女用醋水服瘀血化水而下按此藥獨得一氣之偏神於化血他藥行血皆能傷氣此獨能使血自化而氣不傷真去瘀妙品

柏葉湯

側柏 炮薑 艾葉 馬通

熱氣藏伏於陰分逼血妄行不止用薑艾宣發其熱使行陽分則陰分之血無所逼而守其經矣柏葉屬金抑之使降馬

為火熹。同氣相求。導之使下。則餘燼之瘵。一概蠲去。此為熱伏陰分。從治之法。乃久吐不止。一切寒溫補瀉藥。幾用盡。因變一法。以從治之。凡遇熱症。用之須慎。若係寒凝血滯者。則無不宜。馬通汁。即馬糞泡。水無馬通。以童便代之。

人參瀉肺湯

- 人參 黃芩 炒梔 枳壳 甘草
- 連翹 杏仁 桔梗 桑皮 酒軍
- 薄荷

葶藶大棗瀉肺湯。是瀉肺中之水。此方是瀉肺中之火。肺體

血證論七卷

方解上

七

屬金不自生火。皆由心火剋之。胃火薰之也。故用梔子連翹以瀉心火。黃芩大黃以瀉胃火。肺為火鬱。則皮毛灑淅。用薄荷以發之。肺金不清。則水道不調。用桑皮以泄之。火盛即是氣盛。用枳桔杏仁以利之。而人參甘草。又補土生金。以主持之。補瀉兼行。調停盡善。實從葶藶大棗湯套出。變瀉水為瀉火之法。凡上焦血滯。痰凝。因火所致者。均可隨證加減。

甲己化土湯

- 白芍 甘草

楊西山失血大法。以此為主方。而亟贊其妙。其實芍藥入肝

洩脾之火。甘草入胃。緩脾之急。二藥微陰。為滋利脾土之輕劑。毋徒驚其妙。而失其實也。歸芎湯一名佛手散。

- 當歸 二兩 川芎 均酒炒 一兩

夫笑散

- 蒲黃 靈脂 均酒炒 等分

當歸補血。川芎行血。二藥相合。大具活血之功。血活則瘀停。自除。胎痛亦止。產難亦無。故又為女科要藥。至於夫笑散。人多用之。而罕明其義。宜乎用藥鮮當也。夫配合之妙。有正治

血證論七卷

方解上

八

有隔治血。乃心火所化。蒲黃稟水精之氣。能止血。能行血。其功實歸於涼血。此猶十灰散。紅見黑即止。皆是以水治火之義。惟鴉且是木禽。與肝同氣。其尿氣甚烈。直入肝經。通滯逐瘀。為治血正藥。試觀馬為火畜。故用馬通。以瀉血中之熱。則知鴉且為木禽。故用五靈脂。以行血中之滯。二藥合用。一涼一溫。一止一破。血不和者。得之一笑。而愈。或合兩方。為一方。隨證再加藥品。亦宜。

生化湯

- 當歸 川芎 桃仁 炮薑 炙草

歸芎桃仁善去舊血以生新血。佐黑薑炙草引三味入於肺。肝生血利氣為產後之聖藥。各書多改炙草為益母草。不知益母乃涼血利水之藥。此方取其化血即能生血。如益母草。焉有生血之功。與方名相左。吾以為治紅痢尿血或可用之。若此方斷不可用。

牛膝散

牛膝

川芎

蒲黃

丹皮

桂心

當歸

當歸川芎蒲黃丹皮四藥和血。桂枝辛溫以行之。牛膝下走

血證論七卷

方解上

九

以引之用治下焦瘀血。溫通經脈。無不應驗。方義亦淺而易見。

桃仁承氣湯

桃仁

大黃

芒硝

桂枝

桂枝稟肝經木火之氣。肝氣亢者見之即熾。肝氣結者遇之即行。故血證有宜有忌。此方取其辛散。合硝黃桃仁直入下焦。破利結血。瘀血去路不外二便。硝黃引從大便出。而桂枝兼化小水。此又是一層意義。

小調經湯

當歸 赤芍 沒藥 琥珀 桂枝
細辛 射香

當歸補血。赤芍行血。樹脂似人之血。沒藥為樹脂所結。故能治結血。琥珀乃樹脂所化。故能化死血。四藥專治瘀血。亦云備矣。而又恐不能內行外達也。故領以辛桂射香。使藥性無所不到。而內外上下自無伏留之瘀血。所以不循經常者。多是瘀血阻滯去瘀即是調經。

小柴胡湯

柴胡

黃芩

半夏

大棗

人參

血證論七卷

方解上

十

甘草

生薑

此方乃達表和裡升清降濁之活劑。人身之表。腠理實營衛之樞機。人身之裡。三焦膏臟腑之總管。惟少陽內主三焦外主腠理。論少陽之體則為相火之氣。根於膽腑。論少陽之用則為清陽之氣。寄在胃中。方取參棗甘草以培養其胃。而用黃芩半夏降其濁火。柴胡生薑升其清陽。是以其氣和暢而腠理三焦固不調治其有太陽之氣陷於胸前而不出者。亦用此方以能清裡和中升達其氣。則氣不結而外解矣。有肺經鬱火大小便不利亦用此者。以其宣通上焦則津液不結。

自能下行。肝經鬱火而亦用此。以能引肝氣使之上升。則木不鬱。且其中兼有清降之品。故餘火自除矣。其治熱入血室。諸病。則尤有深義。人身之血。乃中焦受氣。取汁變化而赤。即隨陽明所屬衝任兩脈。以下藏於肝。此方非肝膽臟腑中之藥。乃從胃中清達肝膽之氣者也。胃為生血之主。治胃中是治血海之上源。血為肝之所司。肝氣既得清達。則血分之鬱自解。是正治法。即是隔治法。其靈妙有如此者。

犀角地黃湯

犀角 生地 白芍 丹皮

血證論七卷

方解上

十一

犀牛土屬而秉水精。地黃土色而含水質。二物皆得水土之氣。能滋胃陰。清胃火。乃治胃經血熱之正藥。然君火之主在心。故用丹皮以清心。相火所寄在肝。故用白芍以平肝。使君相二火不湊集於胃。則胃自清而血安。

甘露飲

天冬 麥冬 生地 熟地 枯芩

枳亮 石斛 茵陳 甘草 枇杷葉

陳修園曰。胃為燥土。喜潤而惡燥。喜降而惡升。故用二地二冬。石斛甘草潤以補之。枳亮降以順之。若用連蘗之苦。

則增其燥。若用菖木之補。則慮其升。即有濕熱。用一味黃芩以折之。一味茵陳以滲之。足矣。蓋以陽明之治。重在養津液。方中地冬等藥。即猪苓湯用阿膠以育陰意也。茵陳芩枳。即猪苓湯用滑澤以除垢意也。

清燥救肺湯

人參一錢 甘草一錢 芝麻一錢 石膏二錢 阿膠一錢
杏仁一錢 麥冬二錢 枇杷葉三錢 桑葉三錢

喻嘉言曰。諸氣臃鬱之屬於肺者。屬於肺之燥也。而古今治氣鬱之方。用辛香行氣。絕無一方治肺之燥者。諸嘔喘痿之

血證論七卷

方解上

十二

屬於上亦屬於肺之燥也。而古今治法。以痿嘔屬胃經。以喘屬於肺。是則嘔與痿屬之中下。而惟喘屬上矣。所以亦無一方及於肺之燥也。即喘之屬於肺者。非行氣即泄氣。間有一二用潤劑者。又不得肯綮。今擬此方。名清燥救肺。大約以胃為主。胃土為肺金之母也。其天冬知母能清金滋水。以苦寒而不用至苦寒降火之藥。尤在所忌。蓋肺金自至於燥。所存陰氣不過一線。倘更以苦寒下其氣。傷其胃。尚有生理乎。誠仿此增損。以救肺燥。變生諸證。庶克有濟。

保和湯

甘草 阿膠 百合 五味 知母

貝母 天冬 麥冬 苡仁 桔梗

兜鈴 薄荷 飴糖

肺經之津足則痰火不生而氣冲和。若津不足則痰凝火鬱。痰火交作而氣失其和矣。方用飴糖甘草阿膠補胃以滋肺。津復加清火祛痰斂浮解鬱之品。凡以保護肺金使不失其和而已。葛可久此方雖不及救肺湯之清純。然彼以滋乾為主。此以清火降痰為主。各之用意不同。無相詆訾。

麥門冬湯

血證論七卷

方解上

十三

麥冬 二兩 半夏 六錢 人參 四錢 甘草 四錢 粳米 一盞

大棗 十二枚

參米甘棗四味。大建中氣。大生津液。胃津上輸於肺。肺清而火自平。肺調而氣自順。然未逆未上之火氣。此固足以安之而已。逆已上之火氣。又不可任其遲留也。故君麥冬以清火。佐半夏以利氣。火氣降則津液愈生津液生而火氣自降。又并行而不悖也。用治燥痰咳嗽。最為對症。以其潤利肺胃。故亦治隔食。又有衝氣上逆。挾痰血而干肺者。皆能治之。蓋衝脈起於胞中。下通肝腎。實則屬於陽明。以輸陽明之血。下入

胞中。陽明之氣順則衝氣亦順。胞中之血與水。皆返其宅而不上逆矣。此方與小柴胡合看更明。小柴胡是從胃中引衝氣上行使火不下鬱之法。此方是從胃中降衝氣下行使火不上干之法。或去粳米加蜜更滋潤。

四磨湯

人參 烏藥 檳榔 沉香

等分磨水煎服。治上氣喘急。取人參滋肺以補氣之母。取沉香入腎以納氣之根。而後以檳榔烏藥從而治之。瀉實補虛。洵為調納逆氣之妙法。蓋肺為陽而所以納氣下行者。全賴

血證論七卷

方解上

十四

陰津。故用人參以生津。腎為陰。而所以化氣上行。全賴真陽。故用沉香以回陽。為其沉水。故能直納水中之陽也。

桂苓五味甘草湯

桂苓 五味 甘草 雲苓

此治腎中水氣騰溢。陰火上衝。面赤咽痛。欬逆諸病。桂苓抑水下。行水行即是氣行。然逆氣非斂不降。故以五味之酸斂其氣。土厚則陰火自伏。故以甘草之甘補其中也。

蘇子降氣湯

蘇子 半夏 當歸 陳皮 前胡

厚樸 沉香 甘草 生薑

氣即水也。水凝則為痰。水泛則為飲。痰飲留滯。則氣阻而為喘。效蘇子生薑半夏前胡陳皮。宣除痰飲。痰飲去而氣自順矣。然氣以血為家。喘則流蕩而忘返。故用當歸以補血。喘則氣急。故用甘草以緩其急。出氣者肺也。納氣者腎也。故用沉香之納氣入腎。或肉桂之引火歸元為引導。

腎氣丸

熟地 棗皮 淮藥 雲苓 澤瀉
丹皮 附片 肉桂

血證論七卷

方解上

十五

腎為水藏。而其中一點真陽。便是呼吸之母。水足陽秘。則呼吸細而津液調。如真陽不秘。水泛火逆。則用苓澤以行水飲。用地黃以滋水陰。用淮藥入脾以輸水於腎。用丹皮入心以清火安腎。得六味以滋腎。而腎水足矣。然水中一點真陽。又恐其不能生化也。故用附子肉桂以補之。若加牛膝。便具引火歸元之功。若加知柏。又治上熱下寒之法。如去桂附加麥冬五味。則純於滋陰。兼治肺金。

辛字潤肺膏

羊肺 杏仁 柿霜 真酥 真粉

白蜜

為末。攪勻入肺中。炖熟食。真粉即上白花粉。真酥即上色羊乳。如無。以黑芝麻搗爛代之。方取肺與肺同氣。而用諸潤藥以滋補之。義最淺而易見。然方極有力可用。

瓊玉膏

生地一觔 白蜜一觔 高參八兩 雲苓十二兩

生地汁合白蜜入磁瓶內。雲苓人參為末和勻。投水中煮三晝夜。懸井中一晝夜。取起仍煮半日。白湯化服。為潤利肺經之妙劑。

血證論七卷

方解上

十六

生脈散

人參 麥冬 五味

人參生肺。津麥冬清肺火。五味斂肺氣。合之酸甘化陰。以清潤肺金。是清燥救肺湯之先聲。

保元湯

人參 黃芪 黑棗 炙草 煨薑

草與黑棗大補中土。再加煨薑以溫之。黃芪以鼓之。人參以滋之。總使土氣冲和。上生肺金。肺陽布護。陰翳自消。一切寒怯虛悸之症自除。此為溫補肺陽法。與上滋肺陰法。為一寒

一熱之對子。

六君子湯

人參 白朮 雲苓 甘草 陳皮 半夏

四君子補胃和中。加陳皮半夏以除痰氣。肺之所以有痰飲者。皆胃中之水不行。故爾沖逆。治胃中即是治肺。

天王補心丹

當歸 熟地 生地 天冬 寸冬 遠志 棗仁 柏仁 人參 丹參

血證論七卷

方解上

十七

元參 雲苓 桔梗 五味

陳修園曰。心字篆文。只是一倒火耳。火不欲炎上。故以生熟地補水。使水上交於心。以元參丹參二冬。使火下交於腎。又佐參苓以和心氣。當歸以生心血。棗仁以安心神。遠志以宣其滯。五味以收其散。更假桔梗之浮。為向導。心得所養。而何有健忘怔忡。津液乾枯。舌瘡秘結之苦哉。

硃砂安神丸

硃砂 黃連 生地 當歸 甘草

硃砂之重以鎮怯。黃連之苦以清熱。當歸之辛以噓血。更取

甘草之甘。以制黃連之太過。地黃之潤。以助當歸所不及。合之養血清火。安鎮心神。怔忡昏煩不昧之症。可以治之。

人參養榮湯

人參 炙芪 白朮 甘草 當歸 熟地 大棗 生薑 遠志 桂心 陳皮 五味 白芍 雲苓

此方即中焦取汁。奉心化赤。以為血之義。參芪米草大棗。大補中焦。中焦穀化。則汁益生。故加陳皮以化穀。中焦水停。則穀不化。故加薑苓以別水。水穀既化。中焦之汁自生矣。再用

血證論七卷

方解上

十八

歸地多汁。以引其汁。凡係婦人催乳。用此足矣。若必令其奉心化血。則宜加芍味。以斂之。使榮行脈中。而不外散。加桂心遠志。啟導心火。以助其化赤之令。補中者。開血之源也。導心者。化血之功也。飲脈者。成血之用也。此心火不足之治法。與炙甘草建中湯相近。

歸脾湯

白朮 黃芪 茯神 人參 遠志 木香 甘草 棗仁 當歸 龍眼

心主生血。脾主統血。養榮湯以治心為主。歸脾湯以治脾為

主。心血生於脾。故養榮湯補脾以益心。脾土生於火。故歸脾湯導心火以生脾。總使脾氣充足。能攝血而不滲也。

養真湯

人參 白朮 雲苓 甘草 山藥
蓮米 寸冬 五味 黃芪 白芍
煎去頭煎。只服二三煎。取燥氣盡去。遂成甘淡之味。蓋土本無味。無味即為淡。淡即土之正味也。此方取淡以養脾。深得其旨。

小建中湯

血證論七卷

方解上

十九

桂枝 二錢 白芍 四錢 甘草 二錢 棗子 三枚 生薑 三片 飴糖 一兩

虛勞裡急。諸不足者。五臟陰精陽氣俱不足也。故用薑桂辛溫以生陽。用芍飴酸甘以生陰。大棗甘草純甘以補中。使中宮建立。則陽氣化而上升。陰氣化而下降。細按此方。乃建胃滋脾以陽生陰之法。歸脾湯從此方重濁處套出。補中湯從此方輕清處套出。

正元湯

人參 附子 黃芪 川芎 山藥 乾姜 白朮 陳皮 雲苓 肉桂

甘草 六藥為末。鹽湯下。取火烈之品。治平和之藥。雄烈之味既去。誠為溫補少火之剋劑。

白鳳膏

黑嘴白鴨 一隻 大棗 一升 蒼朮 陳皮 厚樸 甘草 各三兩

右四味為末。納棗內。入鴨腹中。陳酒煮爛。食鴨肉。將棗陰乾。隨用參湯白湯化服。鴨乃血肉之品。其性滋陰。酒為五穀之精。其性和陽。合諸藥養脾胃。大收純和之效。

血證論七卷

方解上

二十

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝 甘草 龍骨 牡蠣

肝寒魂怯。用辛溫鎮補之品。以扶肝而斂魂。心陽上越。腎陽下泄。此方皆可用之。

滑氏補肝散

棗仁 熟地 白朮 當歸 棗皮

山藥 川芎 木瓜 五味 獨活

肝體陰而用陽。此以酸甘補肝體。以辛甘補肝用。加獨活者。假風藥以張其氣也。顧欲其氣之鼓盪者。則用獨活。欲其氣

之溫飲者則用巴戟。後其氣之清平者則用桑寄生。發其氣之疏達者則用柴胡。白頭翁諸藥皆治風之品。輕重不同。在人用之得宜。

炙甘草湯一名復脈湯

人參 二錢 地黃 二兩六錢 寸冬 八錢 阿膠 二錢 芝麻

炙草 四錢 大棗 三枚 桂枝 三錢 生薑 三錢 清酒

此方為補血之大劑。鄉先輩揚西山。此方亟戒加減。惜未能言明其義。余按此方。即中焦受氣取汁。變化而赤。是為血之義。薑棗參草中焦取汁。桂枝入心。化氣變化而赤。然桂性辛

血證論七卷

方解上

二十一

烈能傷血。故重使生地。寸冬。芝麻。以清潤之。使桂枝雄烈之氣。變為柔和。生血而不傷血。又得阿膠。潛伏血脈。使輸於血海。下藏於肝。合觀此方。生血之源。道血之流。真補血之第一方。未可輕議加減也。時方養榮湯。亦從此套出。第養榮湯較溫。此方多用生地。麥冬。則變為平劑。專滋生血脈。若催乳。則無須桂枝。若去桂。加棗。仁。遠志。則更不辛烈。若加丹皮。桃仁。則能清心。化血。加炒梔。又是清心涼血之劑。加五味。則兼斂肺金。此雖加減。而仍不失仲景遺意。又何不可。

大補陰丸

熟地 知母 黃柏 龜版

苦寒之品。能大伐生氣。亦能大培生氣。蓋陰虛火旺者。非此不足以瀉火滋陰。夫人之生氣。根於腎中。此氣全賴水陰。含之。若水陰不足。則陽氣亢烈。煩逆痿熱。方用知柏。折其亢。龜版。潛其陽。熟地。滋其陰。陰足陽秘。而生氣不洩矣。

左歸飲

熟地 山藥 枸杞 甘草 茯苓

棗皮

熟地。枸杞。棗皮。皆含水氣。以滋生腎水。然脾不輸津於腎。則

血證論七卷

方解上

二十二

腎水亦無自而生。故用甘草。山藥。從脾輸津。以啟腎水之源。而又慮有形之水。質不化。則無形之水。津亦無以生。故用茯苓。以有利有形之水。方雖平淺。亦有可用之時。勿過訾也。

柴胡清骨散

柴胡 青蒿 秦艽 白芍 丹皮

必甲 全皮 知母 枯苓 甘草

胡黃連 童便

肝為藏血之藏。又司相火。血足則火溫而不烈。遊行三焦。達於腠理。莫不得其溫養之功。若血虛火旺。內則煩渴。淋閉。外

則骨蒸汗出。皆肝經相火之為病也。方用全皮。知母。枯芩。胡黃連。童便。大清相火。而又恐外有所鬱。則火不能清也。故用柴胡。青蒿。秦艽。以達其鬱。又恐內有所結。則火不能清也。故用白芍。丹皮。必甲。以破其結。佐甘草一味。以和諸藥。務使肝經之鬱結解。而相火清。較逍遙散更優。

保命生地散

生地 熟地 枸杞 全皮 天冬
黃芪 白芍 甘草 黃芩

方取黃芪甘草入脾統血。餘藥清潤肺腎。以治血之源流。或

血證論七卷

方解上

二十三

血止後。用此調養亦宜。

猪苓湯

猪苓 澤瀉 雲苓 滑石 阿膠

此方專主滋陰利水。凡以月經陰虛。水泛為痰者。用之立效。取阿膠潤燥。滑石清熱。合諸藥皆滋降之品。以成其祛痰之功。痰之根原於腎。制肺者治其標。治腎者治其本。

導赤飲

生地 木通 草梢 竹葉心

李楚重曰。瀉心湯用黃連。所以治實邪。責木之有餘。瀉子以

清母也。導赤散用地黃。所以治虛邪。責水之不足。壯水以治火也。

麻黃人參芍藥湯

麻黃 桂枝 黃芪 人參 炙草
當歸 白芍 麥冬 五味

麻黃桂枝從外發表。黃芪草參從內托裡。使內犯之邪。皆從外出。自不至乘陰而吐衄矣。然既亂之血。又不可以不治也。故用當歸白芍以和之。麥冬五味以清之。又按麻桂力能發表。表解而血自止。是善用麻桂之功。非麻桂自能止血也。况

血證論七卷

方解上

二十四

仲景於吐血衄血。皆忌發汗。用此方者。須審其的。由外感非此不解。然後一投即應。設忌發汗而反汗之。又誤用麻桂之過。麻桂亦不任咎也。

止嗽散

桔梗 荆芥 紫苑 百部 白前
陳皮 甘草

普明子制此方。并論注其妙。而未明指藥之治法。余因即其注而增損之。曰。肺體屬金。畏火者也。遇熱則欬。用紫苑百部以清熱。金性剛燥。惡冷者也。遇寒則欬。用白前陳皮以治寒。

且肺為嬌藏。外主皮毛。最易受邪。不行表散。則邪氣流連而
不解。故用荊芥以散表。肺有二竅。一在鼻。一在喉。鼻竅貴開
而不貴閉。喉竅貴閉而不貴開。今鼻竅不通。則喉竅啟而為
欬。故用桔梗以開鼻竅。此方溫潤和平。不寒不熱。肺氣安甯。
千金麥門冬湯

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 麥冬 | 桔梗 | 桑皮 | 半夏 | 生地 |
| 紫苑 | 竹茹 | 麻黃 | 五味 | 生薑 |
| 甘草 | | | | |

風寒客於肺中。引痰生火。故用桔梗桑皮半夏生薑以利除

血證論七卷

方解上

二十五

痰飲用生地紫苑竹茹麥冬五味以清飲。火氣然陳寒不除。
則痰火旋去而旋生。故以麻黃一味搜剔陳寒。惟甘草則取
調諸藥而已。凡寒中包火。火中伏寒。皆能治之。

柴胡梅連散

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 柴胡 | 人參 | 黃芩 | 甘草 | 黃連 |
| 白芍 | 當歸 | | | |

柴胡湯逍遙散各半成方。而重在黃連一味。較二方尤擅清火
之功。心者肝之子。黃連瀉心實則瀉其子。
甘桔湯

甘草 桔梗
葶蘆大棗瀉肺湯

葶蘆 炒香 棗 大棗 擘破

先聖用藥瀉必兼補。故無弊。即如此兩方。桔梗以開達肺氣。
凡咽痛肺癰排膿皆主用之。而必君以甘草。以土生金。助其
開達之勢。葶蘆苦寒。力能降泄肺中之氣。火熱壅肺。水飲衝
肺。皆能隨其實而瀉之。而必君以大棗。使邪去而正不傷。得
此意者。可以知配合之義。

保和湯

血證論七卷

方解上

二十六

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 知母 | 貝母 | 天冬 | 款冬 | 花粉 |
| 苡仁 | 五味 | 甘草 | 羌活 | 紫苑 |
| 百合 | 阿膠 | 當歸 | 生地 | 紫蘇 |
| 薄荷 | 百部 | 飴糖 | 生薑 | |

此方藥味雖多。而實以潤肺清火為主。凡身虛勞。欬血。皆肺
中陰津不足。火熱乘之。使然。火壅於內。則皮毛固閉。洒淅而
惡寒。易招外感。火盛則水津凝滯。膠結為痰。而氣愈不得息。
痰欬所以不愈也。方用飴膠地歸百合百部甘草紫苑花粉
欬冬大生津液以潤肺。五味天冬知母以清肺火。猶恐外寒

閉之。則火鬱而不清。故佐以薑蘇薄荷。以疏解其鬱。痰飲滯之。則火阻而不降。故用貝母苡仁。以導利其滯。鬱解滯行。火清肺潤。咳嗽愈而痿燥除。無論寒久。變火火鬱。似寒諸症。皆能治之。十藥神書載此方。加減甚詳。余謂此方藥味已多。如再加減。便雜而無功。對證之方。甚夥。何須執此一方。苦苦加減。便欲醫盡諸病耶。

瀉肺丸

- 瓜霜 貝母 半夏 鬱金 葶蘆
- 杏仁 黃連 黃芩 大黃 甘草

血證論七卷

方解上

二十七

肺部痰火。血氣壅滯。不降。用此方解泄破下。力量最大。是從人參瀉肺湯。葶蘆大棗半夏瀉心小結胸等湯。割取而成。又加鬱金大破血分。藥雖猛峻。然果遇實證。非此不克。

消化丸

- 礞石_煨 明礬 牙皂 雲苓 陳皮
- 枳壳 枳實 南星_生 沉香 半夏_生
- 薄荷 枯芩 神曲 薑汁 飴糖

為末。神曲薑汁為丸。臥時飴糖拌吞。仰臥則藥流入肺。去痰除根。痰即水也。寒鬱之氣阻之。火凝之。是以膠粘潮溢而不

能去也。此方以燥降墜利去水為主。而用薄荷以散寒。用黃芩以清火。尤妙。明礬入濁水而能清。牙皂入汗垢而能去。二物合用。為滌除痰涎之妙品。諸藥猛峻。故用飴糖以緩之。葛可久法。服後即服太平丸以補之。可知瀉實亦宜顧虛。然遇實證。慎毋畏而不用也。

太平丸

- 天冬 寸冬 知母 欵冬 杏仁
- 當歸 熟地 生地 老連 膠珠
- 蒲黃 京墨 桔梗 薄荷 射香

血證論七卷

方解上

二十八

煉蜜為丸。彈子大。食後薄荷湯化下。一丸。義取潤肺清金。豁痰止血。諸藥顯而易見。惟黃連一味。是瀉心之藥。心者肺之賊。瀉心即是清肺。乃隔治之法。射香一味。是透竅之藥。肺者氣之竅。通竅即所以安肺。是從治法。仲景金匱亦有上焦得通。津液得下之語。蓋上焦通。則津液不凝為痰。下降而火亦隨降。葛可久製方。原未證諸仲景。而其義有可通。故引證之。第此方治肺。取滋利宣通。上焦虛枯滯澀者皆宜。若下焦陰虛。則大不宜。蓋下焦之病。宜斂藏。用宣通法。又其所忌。

二陳湯

半夏 陳皮 茯苓 甘草

此方為去痰除飲之通劑。痰之本水也。茯苓治水以治其本。痰之動濕也。茯苓滲濕以鎮其動。其餘半夏降逆。陳皮順氣。甘草調中。皆取之以為茯苓之佐使耳。故仲景書凡痰多者。俱加茯苓。嘔者俱加半夏。今人不窮古訓。以半夏為去痰專品。不知半夏非不去痰。而辛降之氣最甚。究屬降氣之主。故凡用藥不可失其真面也。

紫苑散

紫苑 人參 知母 貝母 桔梗

血證論七卷

方解上

二十九

茯苓 阿膠 五味 甘草

肺痿痰液。取參草膠苑以滋補肺陰。又用知母以清其火。五味以斂其氣。桔梗貝母茯苓以利其痰。火氣痰三者俱順。則肺愈受其益。此較保和湯救肺湯。又在不清不濁之間。用方者隨宜擇取。

礞石滾痰丸

礞石 黃芩 大黃 沉香

痰者水之所結也。肺胃火盛煎灼其水。則凝而為痰。與飲同主於水。而飲則動於寒。故清而不稠。痰則熱以火。故粘而難

下。王隱君制此方。用黃芩清肺中無形之火。用大黃瀉胃中實積之火。此治痰先清火。所以治其原也。然痰本水濕所成。故佐以礞石之悍燥。以除水。痰之所留氣即阻。而不利。故用沉香以速降之。二黃得礞石沉香。則能迅掃直攻。老痰巢穴。濁垢之處。而不少留。此滾痰之所由名也。為末水丸。薑湯下。仰臥忌飲食半日。若喉間粘壅。乃病藥相拒。少頃藥力到自愈。方雖猛峻。然頑痰變見諸怪證。非此不治。

旋覆代赭石湯

人參 甘草 半夏 生薑 大棗

血證論七卷

方解上

三十

旋覆花 赭石 煨

此方治噦呃。人皆知之。而不知呃有數端。胃絕而呃。不與馬一火呃。宜用承氣湯。一寒呃。宜理中湯。加丁香柿蒂。一瘀血滯呃。宜大柴胡加桃仁丹皮。此方乃治痰飲作呃之劑。與諸呃有異。不得見呃即用此湯也。方取參草大棗以補中。而生薑旋覆以去痰飲。用半夏赭石以鎮逆氣。中氣旺則痰飲自消。痰飲清則氣順。氣順則呃止。治病者貴求其本。斯方有效。不為古人所瞞。兼火者可加寸冬枯苓。兼寒者可加丁香柿蒂。痰多者一加茯苓。蓋既得其真面。然後可議加減。

溫膽湯

半夏 雲苓 陳皮 甘草 竹茹 枳壳

二陳湯為安胃祛痰之劑。加竹茹以清隔上之火。加枳壳以利陽上之氣。總求痰氣順利而膽自甯。溫之實清之也。用治痰氣嘔逆為宜。

真武湯

白朮 茯苓 白芍 生薑 附子炮

水飲者腎之所主也。腎陽化水則水下。行而不泛上。故用附

血證論七卷

方解上

三十一

子入腎補陽以為鎮管水氣之主。制水者土也。用苓朮以防之。白芍苦降。從其類以瀉之。生薑辛散。循其末而宣之。合之宣瀉防制。水有所宰而自不動矣。故取此方真武水神以名湯。

苓桂朮甘湯

茯苓 桂枝 白朮 甘草

甘草白朮填中宮以塞水。茯苓以利之。桂枝以化之。水不停而飲自除。治水氣陵心大效。蓋桂枝補心火使下交於腎。茯苓利腎水使不上陵心。其實茯苓是脾藥。土能治水。則水不

尅火也。桂枝是肝藥。化水者肝為腎之子。實則瀉其子。而肝

又主疏泄。故有化水氣之功。補心火者。虛則補其母。肝為心火之母。而桂又色赤入心也。發汗亦用桂枝。借木氣之溫以散布外達也。其降衝逆亦用桂枝者。以衝脈下屬於肝。內通於腎。桂枝溫肝氣以引之。化腎水以泄之。凡下焦寒水攻發衝陽上浮者。往往佐苓朮以收功。須知桂枝其色赤。其氣溫。純得水火之氣。助火化水。是其所長。如無寒水而用之。發熱動血。陽盛則斃。仲景已有明戒。不可不凜。失血之家尤宜慎用。或曰仲景炙甘草湯是補血藥。而亦未嘗忌用桂枝。何也。

血證論七卷

方解上

三十二

曰此正仲景慎於用桂枝處。方義以中焦取汁變赤為血。不得不用桂枝助心火以化赤。然即恐桂枝傷血。故用桂枝少。而用麥冬地黃極多。以柔濟剛。用桂而復能制桂。仲景如此之慎。可知失血家不可輕用桂也。

二加龍骨湯

龍骨 牡蠣 白薇 附片 白芍 甘草 大棗 生薑

此方乃清散上焦溫補下焦之藥。方用甘棗從中宮以運上下。薑薇清散使上焦之火不鬱。附芍龍牡溫斂使下焦之火

歸根合觀其方。以溫為正治。以清為反佐。寒假熱。虛陽上。浮為對證。陳修園極贊其妙。今人不察。往往誤用。惜哉。

團魚丸

尖貝 知母 前胡 柴胡 各五錢 團魚 重十二兩
同煮。先取肉汁食之。次將藥渣焙乾為末。魚骨煮汁。九梧子。大麥冬湯下。團魚乃甲蟲之長。能破肝之癥結肉。亦帶酸。入肝養陰。合清利痰。火疏理凝滯之品。凡肝經血鬱。氣鬱。火鬱。痰鬱。以致骨蒸。咳嗽者。此丸力能治之。蓋此丸以調肝者。利肺。金木交和。則血氣清甯。癆瘵不作。

血證論七卷

方解上

三十三

月華丸

天冬 寸冬 生地 山藥 百部
沙參 尖貝 阿膠 雲苓 三七
白菊 桑葉 獼猴肝

獼猴肝隨月變形。每月生一葉。正月則合為一葉。以其變化不測。而性又能殺蟲。凡癆蟲隱伏。幻怪者。亦以此幻怪之物治之。乃自古相傳之靈藥。方名月華。實以此藥命名。而蟲所由生。則由於瘀血所變。故用三七以化瘀。血之所以化蟲者。又由於疫熱所蒸。故用餘藥。潤利以清痰火。但取殺蟲。則獼猴肝

一味已足。但取消痰。則三七一味已足。而必多其品物者。攻補兼行。標本兼治。乃為全勝之師也。

止衄散

生地 白芍 黃芪 赤苓 當歸 阿膠
生地涼血。當歸和血。白芍降血。阿膠秉阿水。潛行地中之性。能潛伏血脈。此最易見者也。妙在黃芪運氣攝血。則血不外泄。赤苓滲水利氣。則引血下行。但黃芪一味。氣虛者得之。則鼓動充滿。而血得所統矣。設氣實者得之。以水濟水。以塗附

血證論七卷

方解上

三十四

塗氣益橫。決愈逼血妄行矣。此用方者。所以貴有加減。

生地黄散

生地 川芎 枯苓 桔梗 梔子
蒲黃 阿膠 丹皮 柏葉 茅根
白芍 甘草 童便 萊菔汁

此方以治肝為主。以肝主血故也。而亦兼用心肺之藥者。以心主火。治火必先治心。肺主氣。降氣必先清肺。為涼血止血之通劑。方義雖淺而易效。

地骨皮散

生地 當歸 川芎 白芍 丹皮

地骨

柯韻伯曰。陰虛者陽湊之。故熱。仲景言陰弱則發熱。陽氣陷入陰中。必發熱。然當分三陰而治之。陽邪陷入太陰脾部。當補中益氣湯以升舉之。清陽復位而火自熄也。若陷入少陰腎部。當六味地黃丸以對待之。壯水之主而火自平也。陷入厥陰肝部。當地骨皮飲以涼補之。血有所藏而火自安也。四物湯為肝家滋陰調血之劑。加地骨皮清志中之火以安腎。補其母也。加牡丹皮清神中之火以涼心。瀉其子也。二皮涼

血證論十卷

方解上

三十五

而不潤。但清肝火不傷脾胃。與四物加知柏之苦寒者不同。故逍遙散治肝火之鬱於本臟者也。木鬱達之順其性也。地骨皮飲治陽邪之陷於肝藏者也。客者除之勿縱寇以遺患也。二者皆肝家得力之劑。

血證論八卷

成都唐宗海容川氏著

玉女煎

熟地 石膏 知母 麥冬 牛膝

陳修園力闢此方之謬。然修園之所以短於血證者。即此可見。夫血之總司在於胞室。而胞室衝脈上屬陽明。平人則陽明中宮化汁。變血隨衝脈下輸胞室。吐血之人。胞室火動。氣逆上合陽明。血隨而溢。欬嗽不休。多是衝陽上合陽明。而成此亢逆之證。方用石膏冬母以清陽明之熱。用牛膝以折上

血證論八卷

方解下

逆之氣。熟地以滋胞宮之陰。使陽明之燥平。衝脈之氣息。亢逆之證乃愈矣。景岳制此方。曾未見及於此。修園又加敗斥。而王士雄以為可治陰虛胃火齒痛之證。皆不知此方之關衝脈。有如是之切妙也。麥門冬湯治衝逆。是降痰之劑。此方治衝逆。是降火之劑。

聖愈湯

即四物湯加黃芪人參

參蘇飲

人參 蘇木

治吐衄產後跌打損傷瘀血干肺鼻起烟煤面目茄色蓋謂肺金氣足則制節下行血不獨不能犯肺臟而亦不能犯肺之氣分也。今不獨干犯氣分瘀血上行並真犯肺臟血者肝木所司金氣將絕木乃敢侮之肺氣已微血乃得乘之方取蘇木秉肝木之氣色赤味鹹以破血是治肝以去肺之賊而急用人參生津調肺以補氣使肺氣一旺則制節自行而血不得犯之矣。

參附湯

人參 附子

血證論八卷

方解下

二

人之元氣生於腎而出於肺。肺陰不能制節。腎陽不能歸根。則為喘脫之證。用附子入腎以補陽氣之根。用人參入肺以濟出氣之主。二藥相濟。大補元氣。氣為水之陽。水即氣之陰。人參是補氣之陰。附子是補水之陽。知此則知一切補氣之法。

通脾泄胃湯

黃伯 元參 防風 大黃 知母
炒梔 石膏 芫蔚

此方乃通治眼目外障之方。借治目衄亦宜。方取諸品清熱

瀉火。使火不上薰則目疾自除。而防風一味獨以去風者。治火動風生。去風則火勢自熄。芫蔚一味又以利濕者。清熱濕蒸熱過利濕則熱氣自消。

通竅活血湯

赤芍 川芎 桃仁 紅花 老葱
生薑 大棗 射香 黃酒

大棗薑葱散達升騰。使行血之品達於顛頂。徹於皮膚。而射香一味尤無所不到。以治顛頂胸背皮膚孔竅中瘀血。誠有可取。王清任醫林改錯論多相舛。而觀其一生所長。只善醫

血證論八卷

方解下

三

瘀血。此湯亦從小調經套來。故可採。

防風通聖散

大黃 芒硝 防風 荆芥 麻黃
炒梔 白芍 連翹 川芎 當歸
甘草 桔梗 石膏 滑石 薄荷
黃芩 白朮

吳鶴皋曰。防風麻黃解表藥也。風熱之在皮膚者得之由汗而泄。荆芥薄荷清上藥也。風熱之在顛頂者得之由鼻而泄。大黃芒硝通利藥也。風熱之在腸胃者得之由後而泄。滑石

梔子水道藥也。風熱之在決瀆者。得之由溺而泄。風注於膈。肺胃受邪。石膏桔梗清肺胃藥也。而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火。風之為患。肝木主之。川芎歸芍和肝血也。而甘草白朮所以和胃氣而建脾。此方除硝黃名雙解散。謂表裏兩解。衛管俱和也。本方名通聖散。極言功用之妙耳。余按此方治表裡實熱。外無汗。內便堅之症。無論何證。通治一切。亦不但治中風也。

千金葦莖湯

葦莖 苡仁 桃仁 瓜瓣 即冬瓜仁

血證論八卷

方解下

四

瓜蒂 赤豆 為末香豉湯下。上二方皆取破泄宜吐。虛人量服。

白散方

尖貝 巴豆 炒黑 桔槔

共為末服一字。在膈上則吐。在膈下則瀉。瀉進熱粥。瀉不止進冷粥。

人參清肺湯

人參 阿膠 全皮 知母 烏梅
炙草 桑皮 大棗 栗壳 杏仁

治肺虛欬喘急吐血下血等症。方取參草大棗補土生金。以保定其肺。阿膠知母佐其滋潤。骨皮桑皮瀉其火熱。肺為司氣之藏。肺中清潤。則氣自下降。而得其斂藏之性。痰血不得干之也。再用杏仁以利之。烏梅栗壳以收之。總使肺得其制節。斯無諸病矣。此與太平丸保和湯紫苑散人參瀉肺清燥救肺諸湯相為表裡。用者可以推類盡致。

甯肺桔梗湯

桔梗 貝母 當歸 瓜霜 黃芪
枳壳 甘草 桑皮 防己 百合

血證論八卷

方解下

五

苡仁 五味 骨皮 知母 杏仁
葶藶 生薑

治肺癆無論已潰未潰。及肺脹等症。補瀉兼行。使痰火血氣膿水俱從下泄。而肺以安甯。

丹皮湯

丹皮 瓜萋 桃仁 林硝 大黃

內癰乃熱毒結血而成。毒去其血熱亦隨去。瓜萋以解氣結。桃仁丹皮以破血結。硝黃兼下氣血之結。結除而癰自去矣。赤豆薏苡湯

赤豆芽 苡仁 防己 甘草
 膿者血化為水也。故排膿之法。總不外破血利水。赤豆芽入血分以疏利之。助其腐化。苡仁防己。即從水分排逐其膿。甘草調數藥。使得各奏其效。此為治癰膿大法門。方難盡載。從此可以類推。

人參固本湯

人參 熟地 生地 白芍 天冬
 五味 知母 陳皮 寸冬 炙草

此方滋養肺胃兼輸腎水。名曰固本。謂胃為肺之本。肺為腎

血證論八卷

方解下

六

之本。而腎又為生氣之本。三臟互相灌溉。則根本固而虛熱清。蒸熱效喘回食諸症自然不生。

當歸六黃湯

生地 熟地 黃連 黃芩 黃柏
 黃芪 當歸

陳修園曰。陰虛火擾之汗。得當歸地黃之滋陰。又得黃連黃芩之瀉火。則蒸汗之本治矣。此方之妙。全在苦寒寒能勝熱。而苦復能堅之。又恐過於苦寒傷其中氣。中者陰之守也。陰虛則火愈動。火愈動則汗愈出。尤妙在大苦大寒。隊中倍加。

黃芪領苦寒之性。盡達於表。以堅汗孔。不使留中為害。謹按修園此論。皆是惟言黃芪領苦寒之性。盡達於表。不使留中為害。則差毫釐。蓋藥之救病。原於偏寒偏熱。治偏寒偏熱之病。自必用偏寒偏熱之藥。此方大治內熱。豈寒涼之藥能盡走皮膚而不留中者乎。況黃芪是由中以托外之物。非若麻黃直透皮毛而不留中也。吾謂內熱而蒸為汗者。此為對症。如果外熱而內不利。寒涼藥者。則歸脾湯當歸補血湯加減可也。

涼血地黃湯

生地 當歸 甘草 老連 炒枳

血證論八卷

方解下

七

元參 枯苓
 此方純是涼心血者。心之所生涼心即是涼血。

田螺撚子

田螺 冰片 白砒 礞砂

搗和米糊為撚子。能化腐去瘀。肉枯血瘕。用處少。

仙方活命飲

山甲 皂刺 歸尾 草節 銀花
 赤芍 乳香 沒藥 花粉 防風
 貝母 白芷 陳皮 黃酒

此方純用行血之藥。加防風白芷使達於膚表。加山甲皂刺使透乎經脈。然血無氣不行。故以陳皮尖貝散利其氣。血因火而結。故以銀花花粉清解其火。為瘡症散腫之第一方。誠能窺及瘡由血結之所以。然其真方也。第其方乃平劑。再視瘡之陰陽。加寒熱之品。無不應手取效。

托裡消毒散

- 皂刺 銀花 甘草 桔梗 白芷
- 川芎 黃芪 當歸 白芍 白朮
- 人參 雲苓

血證論八卷

方解下

瘡之結腫。血凝也。瘡之潰膿。血化為才也。夫血與毒結而不散。故凝。凝則氣阻而為痛。欲去其凝。仍是以氣制之。使氣與血戰。以陽蒸陰。則陰血從陽化而為水。水即氣也。氣化則為水。此化膿之說也。是方四君黃芪大補中氣。而以解毒和血之品佐其變化。為助氣戰血之大劑。本此意以加減進退。則得之矣。

麥冬養榮湯

- 人參 麥冬 五味 當歸 白芍
- 生地 知母 陳皮 黃芪 甘草

壯火食氣則氣熱而血失所養。故用麥冬知母以清火。火清氣平則陽不乘陰。血於是安。故亦名養榮。人參養榮湯。所以用遠志桂枝者。助心火以化血。此湯所以用知母寸冬者。清胃火以寧血也。

黎洞丸

- 三七 大黃 阿魏 兒茶 竹黃
- 血竭 乳香 沒藥 雄黃 羊血心
- 冰片 寸香 牛黃 藤黃

消痰定痛降氣止血。各藥氣味形質。皆精氣所結。非尋常草木可比。故能建大功。

血證論八卷

方解下

九

當歸地黃湯

- 當歸 熟地 川芎 白芍 防風
- 白芷 蒿本 細辛

治風先治血。血行風自滅。無論熱風寒風。風總屬陽。天地之噫氣。常以肅殺而為心。犯人血分。則為痛。為腫。為強硬。血行則風在血分者隨之而行。故治風先治血也。方取四物湯補血。以為去邪之本。而加祛風之藥。以令邪外出。法淺而易效。頭目項脊諸風。可以治之。

防風芎歸湯

生地 當歸 川芎 甘草 防風

補血祛風藥無多而義易見加減得宜尤效

化腐生肌散

兒茶 乳香 沒藥 血結 三七

米片 寸香

去瘀血。即是化腐之法。乾水。即是提膿之法。活血。即是生肌之法。方主化腐去瘀。欲提膿者。加枯礬龍骨。欲生肌者。加珍珠人參。識透立方之意。則加減可以隨人。

血證論八卷

方解下

十一

當歸導滯湯

大黃 當歸 寸香 丹皮 桃仁

紅花 白芍 乳香 沒藥 生地

桂尖 柴胡 枯芩 枳壳 甘草

跌打損傷內外瘀血。以此湯行之。此通竅活血。桃仁承氣小

柴胡小調經諸湯之義。參看自明。不須贅說。

十味參蘇飲

人參 紫蘇 半夏 雲苓 陳皮

桔梗 前胡 粉葛 枳壳 甘草

生薑

肺之氣生於胃。故用甘草人參。補胃生津。以益肺。肺氣旺則能上行外達。內輸下降。而不鬱矣。故凡治肺之方。類以人參為主。然能補津生氣。而不能治氣之鬱也。風寒外束。則氣蘊於內。不能上行外達。故用紫蘇前胡粉葛生薑。以發散之。痰飲內停。則氣逆於上。不能內輸下降。故用夏苓桔枳陳皮。以滲降之。合計此方。乃疏散風寒。降利痰水之平劑。而歛血。血氣喘之症。及跌打血蘊。氣分皆借用之。亦借其疏利之功。使鬱滯去而血自不過。

血證論八卷

方解下

十一

玉燭散

生地 當歸 川芎 白芍 芒硝

大黃 生薑

治跌打瘀血。發渴身痛便閉。取四物以補調其血。而芒硝大黃。逐瘀去閉。妙在生薑一味。宣散其氣。使硝黃之性。不徒直下。而亦能橫達。俾在外在內之瘀。一并廓清。

竹葉石膏湯

竹葉 石膏 人參 甘草 寸冬

半夏 生薑 粳米

口之所以發渴者。胃中之火熱不降。津液不升故也。方取竹葉石膏寸冬以清熱。人參甘草粳米以生津。妙在半夏之降逆。俾熱氣隨之而伏。妙在生薑之升散。俾津液隨之而布。此二藥在口渴者。本屬忌藥。而在此方中。則轉能止渴。非二藥之功。乃善用二藥之功也。

黃土湯

壯心土 甘草 白朮 熟地 枯苓
阿膠 附子 炮

血者脾之所統也。先便後血。乃脾氣不攝。故便行氣下泄。而

血證論八卷

方解下

十二

血因隨之。以下方用灶土草木建補脾土。以為攝血之本。氣陷則陽陷。故用附子以振其陽。血傷則陰虛。火動。故用黃芩以清火。而阿膠熟地。又滋其既虛之血。合計此方。乃滋補氣血。而兼用溫清之品。以和之。為下血崩中之總方。古皆目為聖方。不敢加減。吾謂聖師立法。指示法門。實則變化。隨宜。故此方熱症可去。附子再加清藥。寒症可去。黃芩再加溫藥。

赤豆當歸散

赤豆芽 當歸

此治先血後便。即今所謂臟毒。與痔瘡相似。故用當歸以活

血。用赤豆色赤入血分。發芽則能疏利血中之結。使血解散。則不聚結。肛門赤豆芽又能化血成膿。皆取其疏利之功。瘡膿故多用之。俱用漿水服。

解毒湯

大黃 黃連 黃芩 黃柏 梔子 炒
赤芍 枳壳 連召 防風 甘草

解毒者。謂解除臟毒也。臟毒由火迫結在肛門。故用泄火之藥極多。其用白芍者。兼行其血。血行則火無所着。用枳壳者。兼行其氣。氣行則火自不聚。而火勢之熾。每扶風威。故以防

血證論八卷

方解下

十三

風去風。以熄火。且防風上行外達。使火升散。則不迫結。肛門。此即仲景白頭翁湯之意。

清胃湯

生地 當歸 丹皮 老連 升麻
甘草

方治臟毒。義取清火。而升麻一味。以升散為解除之法。使不下。迫且欲轉下注之熱。使逆挽而上。不復下注。目疾口舌之風火。亦可借其清火升散以解。升麻與葛根黃芩湯相仿。

槐角丸

槐角 地榆 黃連 黃芩 黃柏

生地 當歸 川芎 防風 荊芥

側柏 枳壳 烏梅 生薑汁

世謂腸風下血。問腸何以有風。則以外風由肺傷入大腸。內風由肝煽動血分。方用清火和血之藥。亦係通治血病之泛法。惟防風生薑以祛外來之風。烏梅荊芥以治內動之風。為腸風立法。本於仲景白頭翁及葛根諸湯之意。

葛根黃連黃芩湯

葛根 黃連 黃芩 甘草

血證論八卷

方解下

十四

治協熱下利便血等症。用芩連以清熱。用葛根升散。使下陷之邪。仍達於上。出於表。則不迫協於下矣。喻嘉言治痢心得。逆流挽舟之法。仲景此湯實該其意。能從此變化。而治痢思過半矣。

龍膽瀉肝湯

木通 澤瀉 柴胡 車前 生地

甘草 當歸 炒梔 膽草 枯芩

瀉青丸

膽草 炒梔 大黃 川芎 當歸

羌活 防風 作葉

濟生烏梅丸

僵蠶 烏梅 醋丸

臟連丸

熟地 棗皮 淮藥 雲苓 澤瀉

丹皮 黃連

入猪大臟腸內。同糯米蒸熟。去米。搗腸與藥為丸。淡鹽湯下。

斷紅丸

鹿茸 附子 當歸 續斷 黃芪

血證論八卷

方解下

十五

阿膠 側柏 醋丸

地榆散

地榆 當歸 白芍 枯芩 黃連

炒梔 犀角 薤白

地榆治下血。薤白治後重。通脹。餘藥乃涼血常品。

四逆散

柴胡 枳壳 白芍 甘草

四肢厥冷。謂之四逆。仲景四逆湯。皆用溫藥。乃以熱治寒之正法。至四逆散。則純用清疏平和之品。亦能治四肢厥冷者。

何也。蓋虛寒固有四逆症。亦有熱過於內。不得四達。而亦四逆者。實熱內伏。熱深厥亦深。非芩連大黃不克。虛熱內伏。非玉燭散。玉女煎不退。若是腠理不和。過其陽氣。則但用四逆散。枳殼甘草解中土之鬱。而白芍以調其內。柴胡以達於外。斯氣暢而四肢通。自不冷厥矣。此湯與小柴胡轉輸外達相似。又疏平肝氣和降胃氣之通劑。借用處尤多。

五苓散

白朮 雲苓 猪苓 澤夕 桂枝

仲景此方治胸滿發熱渴欲飲水小便不利而用桂枝入心

血證論八卷

方解下

十六

以化胸前之水結餘皆脾胃中洲之藥使中上之水得通於下。則小便利。散於上則口渴除。達於外則身熱解。今遇小便不利。便用五苓散。雖取桂入膀胱化氣。然桂實心肝之藥。火交於水。乃借治法。不似附子台烏。本係膀胱正藥也。且陰水可用而陽水絕不可用。

平胃散

厚樸 陳皮 蒼朮 甘草

石蓮湯

人參 黃苓 黃連 石蓮 即蓮米有黑壳者

胃火甚則拒格不納食。用芩連以清火。用人參石蓮以補胃。故治噤口不食。

大清涼散

木通 澤蘭 前仁 草稍 殭蠶 蟲退 全蝎 當歸 生地 銀花 老連 枯苓 炒枳 五味 知母 膽草 天冬 丹皮 寸冬 黃酒 蜂蜜 童便 澤瀉

諸藥清熱利水使瘟毒伏。微從小便去。妙三蟲引藥及酒達

血證論八卷

方解下

十七

於外使外邪俱豁然而解。是徹內徹外之方。

左歸飲

熟地 淮葯 枸杞 甘草 茯苓 棗皮

難經謂左腎屬水。右腎屬火。景岳此方取其滋腎水。故名左歸。方取棗皮酸以入肝。使子不盜母之氣。枸杞赤以入心。使火不為水之仇。使熟地一味滋腎之水。陰使茯苓一味利腎之水。質有形之。水質不去無形之水。陰亦不生也。然腎水實仰給於胃。故用甘草淮葯從中官以輸水於腎。景岳方多駁

雜而此亦可厚非。

而府逐瘀湯

當歸 生地 桃仁 紅花 枳壳

赤芍 柴胡 桔梗 川芎 牛膝

甘草

王清任著醫林改錯論多粗舛。惟治瘀血最長。所立三方。乃治瘀活套方也。一書中惟此湯歌訣血化下行。不作癆句。頗有見識。凡癆所由成。多是瘀血為害。吾於血症諸門。言之甚詳。並採此語以為印證。

血證論八卷

方解下

十八

膈下逐瘀湯

靈脂 當歸 川芎 桃仁 丹皮

赤芍 烏藥 元胡 甘草 香附

紅花 枳壳

王清任立。即當芎失笑散意。治中下焦瘀血可用。王清任極言瘀血之證最詳。而所用藥則仍淺近。然亦有可用云。

七瓜根湯

桂枝 白芍 土瓜 根 麩蟲

大黃甘遂湯

大黃 甘遂 阿膠
大黃下血。甘遂下水。君阿膠滋水與血以補之。瀉不傷正。水血交結者。須本此法治之。

代抵當湯

大黃 甲珠 莪朮 紅花 桃仁

丹皮 當歸 牛膝 夜明砂

山甲攻血。夜明砂是蚊被蝙蝠食後所化之糞。蚊食人血。蝙蝠食蚊。故糞能去血。嚼死血。餘藥破下。務使瘀血不留。

化滯丸

血證論八卷

方解下

十九

巴豆 三稜 莪朮 青皮 陳皮

黃連 半夏 木香 丁香

蜜丸攻一切寒熱氣滯之積

大黃蠱虫丸

大黃 苦參 甘草 桃仁 杏仁

白芍 乾漆 蟲蟲 水蛭 麩蟲

蟻螬 地黃

蜜丸酒服。治乾血癆。若血不去。則新血斷。不能生。乾血癆人。皆知其極虛。而不知其虛。正是助病。非治病也。必去其乾血。

而後新血得生乃望。春。乾血與尋常瘀血不同。瘀血尚可。以氣行之。乾血與氣相隔。故用啣血諸蟲以蝕之。

金蟾丸

乾蝦蟆 胡黃連 鶴蟲 雷丸 蘆薈

肉豆蔻 苦棟根 蕪荑 雄黃

治小兒疳虫。男子濕熱所生之癆蟲。以此殺之。夫癆蟲有二。血化之蟲。靈怪難治。必用籠甲。鱧魚。獺。豚。百部。射香。諸靈藥。而再加和血之品。以除其根。乃能克之。濕熱之蟲。蠢而易治。用此方即仿烏梅丸之意。而妙在乾蝦蟆。雄黃亦靈藥。故治。

血證論八卷

方解下

二十

蟲最效

移尸滅怪湯

人參 當歸 棗皮 蠹蟲 水蛭

晚蠶沙 乳香

蜜丸。日服三次。共重一兩。七日而傳尸之蟲滅迹。夫癆蟲者。瘀血所化也。死而傳染。家人亦染於血。分聚血為巢。生子蝕血。故蠹蟲水蛭下血。即能下蟲。此乃治蟲之根。而蠶沙乳香。棗皮。又以味殺之人參。當歸。則助正氣。以祛邪。為攻補兼施之法。辨症奇聞。論皆循末忘本。惟此丸能知血化為蟲之所。

以然而其自註。却未能及此。毋亦象因乃得元珠哉。

抵當湯

大黃 桃仁 蠹蟲 水蛭

琥珀湯

琥珀 三稜 義術 丹皮 官桂

延胡 烏藥 當歸 赤芍 生地

劉寄奴

方主行氣下血。使經通而石癥去。

葉氏養胃湯

血證論八卷

方解下

二十一

麥冬 扁豆 玉竹 甘草 沙參

桑葉

清平甘潤。滋養胃陰。在甘露飲救肺湯之間。

附子湯

附子 炮 人參 白朮 雲苓 白芍

此仲景溫腎之主劑。附子色黑大溫。能補腎中之陽。腎陽者。水中之陽。泄水之陽者。木也。故用白芍以平之。封水之陽者。土也。故用白朮以填之。水中之陽。恐水邪泛溢。則陽越。茯苓。利水。俾陽不因水而泛。陽斯秘矣。水中之陽。若無水津以養。

之。則陽不得其宅。故用人參以水津。使養陽氣。陽得所養。湯斯冲矣。六味左歸補腎陰。以養氣之法。都氣丸所以得名也。附子湯腎氣丸補腎陽。以生氣化氣之法。

甘麥大棗湯

大棗 甘草 小麥

三藥平和。養胃生津。化血津水。血液下達于臟。則臟不燥。而悲傷太息諸證自去。此與麥門冬湯滋胃陰以達胞室之法相似。亦與婦人乳少催乳之法相似。乳多即是化血之本。知催乳法。則知此湯生津潤燥之法。

血證論八卷

方解下

二十二

桃奴散

肉桂 靈脂 香附 砂仁 桃仁

延胡 桃奴 雄鼠屎

治血蠱消瘀血利腸胃

都氣丸

熟地 棗皮 淮葯 雲苓 丹皮

澤瀉 五味

全身呼吸之氣。司於肺。而實根於腎。此氣乃腎中一點真陽。而深賴腎中之水陰充足。涵陽氣而潛藏於下。故氣出口鼻。

則有津液。氣着於物。則如露水。以氣從水中。出水氣足。故氣亦帶水陰。而出其納入於腎也。有水封之。而氣靜秘。故腎水足者。其氣細。龍能蟄。龜能息。世傳仙術有五龍蟄。有龜息。皆是斂氣之法。即皆是保養腎水之法。氣者水之所化。吾故有氣即是水之論。此丸用六味地黃湯補水。以保其氣。利水以化其氣。加五味收斂。以涵蓄其氣。則氣自歸元。而不浮喘。名曰都氣。謂為氣之總持也。腎氣丸為陽不足者立法。此丸則為陰不足者立法。而皆以氣得名。蓋一是補陽以化氣。一是補陰以配氣。

血證論八卷

方解下

二十三

補中益氣湯

黃芪 人參 炙草 白朮 當歸

陳皮 升麻 柴胡 生薑 大棗

柯韻伯曰。陽氣下陷。陰中穀氣不盛。表症頗同。外感用補中之劑。得發表之品。而中益安。用益氣之劑。賴清氣之品。而氣益倍。此用藥相須之妙也。是方也。用以補脾。使地道卑而上行。亦可以補心肺。損其肺者益其氣。損其心者調其榮衛也。亦可以補肝。木鬱則達之也。惟不宜於腎。陰虛於下。不宜升。陽虛於下者。更不宜升也。

清燥養榮湯

知母 花粉 當歸 白芍 生地
陳皮 甘草 燈心

大槐湯

甘草 桂枝 茯苓 乾薑 人參 附子
火為陽而陽生於肝脾脾陷而肝木不生溫氣類取則陽無生化之原此方補之

豁痰丸

當歸 知母 花粉 白前 瓜霜

血證論八卷

方解下

二十四

寸冬 枳壳 杏仁 桔梗 寸干

雲苓 石斛 甘草 荊竹油

輕清潤降為治痰妙法。

三才湯

天冬 人參 地黃

清化湯合升降散

僵蠶 蟲退 薑黃 大黃 銀花

澤蘭 陳皮 元參 膽草 枯苓

老連 梔子 白芍 當歸 生地

柴胡 甘草

凡瘟疫裡熱等症。用此湯去伏熱清邪毒生津養血。

玉泉散

花粉 粉葛 寸冬 生地 五味

甘草

方取甘寒滋潤生胃津以止渴妙甚根升達使水津上布。

清心飲

當歸 生地 白芍 蓮心 麴心

茯神 尖貝 棗仁 草節 寸冬

血證論八卷

方解下

二十五

龍骨 竹葉心

心血虛有痰火不卧寐。用此藥清補之最妙。

黃連阿膠湯

黃連 黃芩 白芍 阿膠 雞子黃

煎成待溫。入雞子黃攪勻服。治心煩不寐。大清心火。生心中之陰液以安神。仲景之大劑也。

仁熟散

柏仁 熟地 枸杞 五味 棗皮

桂心 人參 茯神 菊花 枳壳

酒服治肝膽虛恐畏不敢獨卧。並補心以實其子。則肝膽益旺。而菊花散風以甯之。枳壳和胃以安之。又是閒中一子。清瘟敗毒散。

石膏 知母 生地 犀角 老連
 梔子 桔梗 黃芩 赤芍 元參
 連翹 丹皮 甘草 竹葉

甘草瀉心湯

甘草 黃芩 人參 乾薑 半夏
 老連 大棗

血證論八卷

方解下

二十六

胃虛不能調治。上下水寒上逆。火熱不得下降。結而為痞。用薑半以折水。用芩連以清火。而參棗甘草以從中和之。

生薑瀉心湯

生薑 半夏 甘草 人參 黃芩
 乾薑 老連 大棗

小陷胸湯

黃連 半夏 瓜蒌

大陷胸湯

大黃 芒硝 甘遂

苓桂朮甘湯

白朮 雲苓 桂枝 甘草
 地魄湯

甘草 半夏 寸冬 芍藥 五味 元參
 牡力

清君相之火降肺胃之逆。益水斂神而生津。此補陰法也。

葛根湯

葛根 麻黃 白芍 桂枝 甘草
 大棗 生薑

血證論八卷

方解下

二十七

風寒中太陽經。背項痛發瘧者。皆以此湯為主。蓋麻桂為太陽發表之通劑。加葛根則能理太陽筋脈之邪。

大秦朮湯

生地 熟地 川芎 當歸 白芍
 白朮 雲苓 甘草 秦朮 羌活

獨活 防風 白芷 細辛 黃芩

越鞠丸

蒼朮 香附 川芎 炒梔 神曲
 十棗湯

大戟 芫花 甘遂 大棗

共為末大棗十枚煎濃湯送下一字下水飲如神

金箔鎮心丹

膽星 硃砂 琥珀 竹黃 牛黃

珍珠 射香 金箔

蜜丸金箔為衣薄荷湯下治癲癩驚悸怔忡一切痰火之疾

黃芪五物湯

即桂枝湯加黃芪

五蒸湯

血證論八卷

方解下

二十八

人參 生地 石膏 粉葛 知母

黃芩 赤芍 甘草 竹葉 粳米

小麥

五蒸之名。一曰骨蒸。二曰脈蒸。三曰皮蒸。四曰外蒸。五日內蒸。統以此方治之。

益氣安神湯

當歸 茯苓 生地 麥冬 棗仁

遠志 人參 黃芪 膽星 甘草

老連 竹葉 生薑 大棗

醋黃散下瘀止血

大黃 玉京 降香 三七 當歸

牛膝均用醋炒為末酒童便沖服

小調經湯治瘀血流注

當歸 赤芍 琥珀 射香 細辛

桂心 沒藥

九氣丸通治氣不和作痛

薑黃 香附 甘草

香蘇引發表輕劑

血證論八卷

方解下

二十九

香附 紫蘇 陳皮 甘草 葱白

生薑

天靈蓋散

天靈蓋 檀香水洗 檳榔 阿魏 射香

安息香 甘遂 硃砂

右為末。用桃枝柳枝桑根皮榴根皮葱白薤白。童便煎湯送下三錢。忍吐待下。子時服。已時當下。癆虫更進一服。除根。如瀉不止。用龍骨黃連末。白湯下以止之。白粥補之。如不用天靈蓋。以虎頭骨代之。再加鱧魚骨。是尤理得心安。

黃連解毒湯


黃連 黃芩 黃柏 梔子

通治三焦之熱內外證加減隨宜

血證論八卷

方解下

三十



醫學一見能

光緒庚寅年刊

醫學一見能

五八九

醫學一見能敘

備豫不虞古之善教而不虞之備莫要於醫高堂則風竹瓦霜膝下則新雛弱筍外而戚友中則己身偶有疾苦均資乎醫誠重矣哉顧醫之難也非讀書識字則不能醫非格物窮理則不能醫非通權達變更不能醫一旦櫻非常之疾束手無策只得委任凡醫聽其措置為之醫者又復混亂陰陽顛倒寒熱投劑不中至於垂危明哲之士鑒前車思補救奮然求濟於方書而諸書率皆大海茫茫渺無涯涘深則摘要鉤元淺則捕風捉影倉皇檢閱兩俱無益病家既窮於醫又窮於書惟撫膺扼腕自

敬

恨其不能醫已耳噫醫固如是之難能已乎抑亦所見之書有未遽能者乎夫紀昌之射六載方工伯牙之琴三年未妙天下事安有一見而能者哉顧事之在所緩者不必求諸一見而事之在所急者要無取乎難能况不測之來危在頃刻非開卷了然之書何以供家俗急時之用余因感此集為是書即不知醫家臨證查對無不瞭如指掌且是書也雖非鉤元摘要之微亦匪捉影捕風之陋果能洞書中之言通言外之意將淺者見淺深者見深而吾一見能之裨於世用也詎有涯哉時

同治癸酉秋九四川彭縣容川唐宗海自題

凡例

一他書皆標證名是書原為不知醫者而設標出證名轉生迷眩故見某病苦即收入某門以便查閱
一書首句是病案次句是病情三句是病判有見某病案得某病情然後可判為某病者有見某病案不得某病情而亦可判為某病者文法自有輕重之分又有首句是情次句是案者文法之變也
一書雖簡畧然每遇一證必究其源審知陰陽分別臟腑即見病治病比時書却高一格

例

一丸湯飲散煮法服法以隘於筆楮不及備載大約行血用酒滋補用蜜攻散用水煎求速用湯散求緩用丸服在用者之自審焉
一書所用之方多有加減與古方往往不合然藥雖不合而理則相契與經方之法固不背也
一婦人小兒除胎產麻痘外悉如男子治法且各有專書閱者能得此書之意自可辨各書之得失而取用焉無容多贅也
一諸瘡刀傷子另著有外科說意一書茲不具錄

醫學一見能目錄

經氣

診法

望色

聞聲

問證

切脈

證治

頭骨

兩耳

眼目

唇口

鼻孔

牙齒

舌本

咽喉

胸前

大腹

小腹

脇肋

背上

腰中

手臂

脚腿

前陰

後陰

大便

小便

目錄

三

寒熱

嘔吐

欬嗽

喘動

失血

遺精

言語

心神

斑黃

出汗

腫脹

飲食

起居

倒仆

抽掣

蟲蠱

鬼祟

婦科

調經

安胎

保產

兒科

外證

內傷

醫學一見能全卷

四川彭縣容川唐宗海著



經氣

手足太陽膀胱經寒水之氣手從足化統稱寒水經行身之前

手足陽明胃經燥土之氣足從手化統稱燥金經行身之前

手足少陽三焦經相火之氣足從手化統稱相火經行身之側

手足太陰脾經溼土之氣手從足化統稱溼土分部於大腹

手足少陰心經君火之氣足從手化統稱君火分部於小腹

手足厥陰肝經風木之氣手從足化統稱風木分部於軟脇

醫學一見能

望色

聞聲

青色 風邪也 亦主脾寒 肝志怒 其聲呼

黃色 溼氣也 亦主食積 心志喜 其聲笑

赤色 火熱也 亦主假熱 脾志思 其聲歌

白色 虛寒也 亦主血脫 肺志憂 其聲哭

黑色 水氣也 亦主腎虛 腎志恐 其聲呻

問證

問病因 七情六欲風寒暑溼飲食起居損傷驚恐之類是

問病形 痛癢寒熱喘欬煩渴吐利脹滿便閉抽掣之類是

問病機 朝甚暮愈暮熱朝寒進退盛衰變證兼證之類是
問病情 惡寒惡熱苦嘔苦滿欲食不食心煩不寐之類是

切脈

| | | | |
|---|------|-----|--------|
| 浮 | 輕按即見 | 主表實 | 亦主裏氣內虛 |
| 沉 | 重按乃見 | 主裏實 | 亦主裏氣內虛 |
| 遲 | 一息三至 | 主虛寒 | 亦主在臟之病 |
| 數 | 一息六至 | 主實熱 | 亦主真寒假熱 |
| 虛 | 三部無力 | 主諸虛 | 亦主素稟不足 |
| 實 | 三部有力 | 主諸實 | 亦主素稟有餘 |

醫一見能

| | | | |
|---|------|-----|--------|
| 大 | 應指洪潤 | 主病進 | 亦主正氣內虛 |
| 緩 | 應指柔和 | 主病退 | 亦主胃氣有餘 |
| 長 | 過於三指 | 主氣盛 | 亦主陽盛陰虛 |
| 短 | 不滿三指 | 主氣損 | 亦主中有窒塞 |
| 滑 | 往來流利 | 主血走 | 亦主痰飲為病 |
| 澀 | 往來艱滯 | 主血虛 | 亦主瘀血凝積 |
| 洪 | 湧沸有力 | 主實熱 | 亦主內虛不足 |
| 緊 | 勁急無定 | 主寒實 | 亦主身體疼痛 |
| 細 | 窄小不粗 | 主冷氣 | 亦主血脈不足 |

| | | | |
|---|------|-----|--------|
| 微 | 模糊不顯 | 主陽虛 | 亦主元氣敗絕 |
| 芤 | 浮大中空 | 主血亡 | 亦主遺精小產 |
| 絃 | 端直中勁 | 主木旺 | 亦主痰飲內痛 |
| 草 | 浮極有力 | 主陰亡 | 亦主陽不入陰 |
| 牢 | 沉極有力 | 主寒實 | 亦主內有積聚 |
| 濡 | 浮細無力 | 主氣虛 | 亦主外受溼氣 |
| 弱 | 沉細無力 | 主血虛 | 亦主胃氣不盛 |
| 動 | 搖曳在關 | 主驚氣 | 亦主陰陽相搏 |
| 伏 | 沉潛着骨 | 主邪閉 | 亦主陰寒在內 |

醫學一見能

| | | | |
|---|------|-----|--------|
| 促 | 數中時止 | 主陽盛 | 亦主邪氣內陷 |
| 結 | 遲中時止 | 主氣鬱 | 亦主氣血漸衰 |
| 代 | 止有定候 | 主氣絕 | 亦主經隧有阻 |
| 散 | 去來繚亂 | 主氣散 | 亦主產婦之吉 |

浮沉分表裏。遲數定寒熱。虛實分盛衰。大緩辨進退。長有餘而短不足。滑流利而澀艱難。寒熱緊洪俱屬實。細微血氣總為虛。乾中空而血亡。故道弦中勁而木侮脾經。草則陽氣外越。牢則陰邪內固。濡氣虛弱。血虛虛各有別。動氣搏弱。氣閉氣總乖和。結陰促陽。辨遲與數。代亡散絕。有去無來。脈法多端。此為總索。

頭證

頭乃三陽所總司。藥分三面按經施。若還眩運分虛實泄實滋虛兩路馳。

頭痛在後或兼發熱惡寒者。太陽經傷寒也。宜加味敗毒散。

沙參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 桔梗

枳殼 雲苓 甘草 生薑 葱白 粉葛 大棗

頭痛在側或兼寒熱往來者。少陽經傷風也。宜加味柴胡湯。

柴胡 黃芩 半夏 黨參 川芎

白芍 荆芥 生薑 甘草 大棗

頭痛在前或兼發熱口渴者。陽明經傷熱也。宜加味升葛湯。

醫學一見能

四

升麻 粉葛 白芍 黃芩 白芷 花粉 甘草

雷頭風痛或偏在左在右者。陽虛中風寒也。宜艾炷鹽摩法。

艾草麝香作小粒灸痛處附子末和鹽摩之。

頭痛如碎。每遇陰雨更甚者。真陽不上頭也。宜加味白通湯。

乾薑 附子 葱白 白朮 甘草 黃芪 黨參

頭痛如破。兼見嘔吐漩沫者。肝寒邪上逆也。宜加味吳萸湯。

吳萸 黨參 大棗 生薑 桂尖

雲苓 白芍 甘草 細辛 半夏

頭暈鬱冒其人煩渴悶滿者。火挾痰上泛也。宜加味二陳湯。

陳皮 半夏 雲苓 甘草 枳殼 旋覆 黃芩 酒軍 柴胡 卜荷 杏仁 竹茹

頭暈飄搖其人兩額發赤者。腎經虛火動也。宜加味地黃湯。

熟地 東皮 淮藥 茯苓 丹皮 澤瀉 安桂

牛膝 附子 川芎 細辛 寸冬 元參 磁石

耳證

耳雖腎竅辨聲音繞耳游行是膽經。時輩不知清木火漫將滋腎謂高明。

耳鳴耳聾或兼口苦寒熱者。少陽經風熱也。宜仲景柴胡湯。

柴胡 人參 甘草 黃芩 半夏 生薑 大棗

醫學一見能

五

耳鳴耳聾或兼脇痛善怒者。肝經之火鬱也。宜龍膽瀉肝湯。

當歸 生地 柴胡 黃芩 梔子 木通

澤瀉 膽草 前仁 牡蠣 甘草 青皮

耳鳴耳聾並無障碍壅閉者。腎虛陰氣逆也。宜加味磁珠丸。

磁石 珠砂 熟地 東皮 五味

淮藥 雲苓 澤瀉 丹皮 菖蒲

目證

眼皮腫痛貴分觀按經清散自然安。若還雲霧暈花見補瀉隨宜屬腎肝。

大眼角腫或兼頭痛惡寒者。太陽經風熱也。宜加減敗毒散。

羌活 獨活 柴胡 前胡 赤芍 黃芩 蟬退
 玉竹 歸尾 木賊 花粉 甘草 連翹 銀花
 小眼角腫。或兼口苦耳鳴者。少陽經風火也。宜加減柴胡湯
 沙參 白 柴胡 黃芩 木賊 膽草 當歸
 蟬退 銀花 菊花 甘草 生薑 牡蠣 青皮
 下眼皮腫。以及繞眼紅鎖者。陽明經風熱也。宜加味升麻湯
 升麻 粉葛 白芍 甘草 黃芩 生地 大力
 銀花 白芷 花粉 蟬退 青箱 決明 石膏
 目內癢痛。以及赤白雲翳者。肝經風溼熱也。宜加減瀉肝湯

醫學一見能

六

當歸 生地 梔子 黃芩 膽草 蟬退 木賊
 木通 銀花 赤芍 澤瀉 柴胡 防風 荊芥
 前仁 青皮 枳殼 細辛 酒軍 紅花 甘藍
 目光晦澀。恍惚不能近視者。肝腎真陰虛也。宜杞菊地黃湯
 枸杞 杭菊 熟地 桑皮 淮藥
 雲苓 丹皮 澤瀉 決明 桑葉
 目光浮散。昏花不能遠視者。心腎真陽虛也。宜參朮磁硃丸
 人參 白朮 遠志 黃芪 磁石 硃砂
 當歸 炙仁 龍眼 益智 五味 甘草

口證

口內時含五臟和。偶然變味即為疴。須知脾竅原通胃。胃火為殃病最多。

口苦而渴。或兼咽乾日眩者。少陽經相火也。宜加減柴胡湯
 柴胡 黃芩 黨參 花粉 生薑 甘草
 口吐酸水。或兼腹滿頭痛者。肝木侮脾土也。宜加味吳萸湯
 吳萸 生薑 老連 黨參 大棗
 口甜而膩。或兼不思飲食者。脾虛傷厚味也。宜加味香砂湯
 白朮 雲苓 黨參 甘草 半夏 廣香 砂仁
 神麩 查肉 老連 藿香 生薑 檳榔 白芍

醫學一見能

七

口淡無味。兼見腹滿多唾者。脾虛中有寒也。宜仲景理中湯
 黨參 白朮 生薑 甘草
 口中腫痛。兼見發渴飲水者。胃中火上衝也。宜時方甘露飲
 天冬 麥冬 生地 熟地 黃芩 石斛
 茵陳 枳殼 甘草 枇杷葉
 口燥舌乾。或兼消渴引飲者。胃中陰液枯也。宜加減地黃湯
 熟地 淮藥 桑皮 寸冬 黨參
 五味 元參 澤瀉 花粉 粉葛
 口中腥臭。或兼吐血衄血者。胃中血燥故也。宜清陽甯血湯

黨參 寸冬 白芍 黃芩 黃連 當歸
生地 藕節 蒲黃 枳殼 酒軍 甘草

鼻證

肺氣通調鼻自安。只宜疎散肺風寒。却因挾孔陽明脈。惹出干清燥熱端。

鼻流清涕。如有窒塞不通者。肺經受風寒也。宜加味香薷引

香附 紫蘇 陳皮 甘草

薄荷 杏仁 辛夷 桔梗

鼻根紅赤。孔內乾燥結煤者。陽明經燥氣也。宜加味升葛湯

升麻 葛根 白芍 黃芩 生地

醫學一見能

甘草 花粉 白芷 銀花 連翹

鼻中流血。或兼頭暈口渴者。陽明經血燥也。宜加味甘露飲

生地 熟地 黃芩 寸冬 天冬 茵陳 石斛

枳殼 茅根 赤芍 蒲黃 銀花 藕節 甘草

齒證

胃主牙。牀腎主牙。補虛清熱各專家。倘因風化生蟲。抵穴採巢外治證。

牙齒疼痛。由於生蟲蝕剝者。風溼熱所化也。宜烏梅化蟲散

烏梅 川椒 乾薑 細辛 黃連

黃柏 明雄 鉛粉 枯礬 石膏

牙牀腫痛。或兼口舌皆痛者。胃經之風火也。宜清熱去風湯

枯芩 石膏 知母 枳殼 丹皮 白芍 牛膝

白芷 防風 銀花 大力 連翹 豆根 甘草

牙痛不腫。或腫不利涼藥者。腎中之虛火也。宜加減八味丸

熟地 淮藹 雲苓 澤瀉 丹皮 碎補

安桂 附子 桑皮 白芍 牛膝 寸冬

舌證

舌乃心苗。胃亦診。赤紅便作火來侵。有胎屬火分真假。枯潤之間仔細評。

舌尖赤痛。或生鉅齒紅點者。心經之遊火也。宜加減瀉心湯

醫學一見能

黃芩 黃連 連翹 大力 赤芍 丹皮

花粉 當歸 前仁 木通 生地 甘草

舌胎黃燥。兼見消渴引飲者。胃中有熱邪也。宜加味白虎湯

知母 石膏 花粉 枳殼 酒軍 甘草 生地

舌胎滑潤。兼見面赤身熱者。真寒而假熱也。宜加味益元湯

附片 乾薑 艾葉 五味 知母 黃連

黨參 白朮 吳萸 寸冬 童便 葱白

舌黑生刺。手足日晡潮熱者。胃中有燥屎也。宜調胃承氣湯

枳殼 厚朴 大黃 芒硝 甘草

舌黑生刺。心煩不得安臥者。心火之亢熱也。宜銀翹瀉心湯。

黃柏 炒梔 黃連 黃芩 白芍 燈心

花粉 銀花 連翹 生地 竹茹 草梢

喉證

最重咽喉出納關。邪禁邪氣壅其間。清心開肺還平胃。惟望醫師妙轉旋。

咽喉腫痛。其色多帶紅赤者。風火之壅塞也。宜加味甘桔湯。

桔梗 甘草 豆根 連翹 麝干 炒梔

荊芥 薄荷 貝母 杏仁 枯芩 枳殼

咽中生瘡。其聲嘶小不出者。火熱乘肺金也。宜滋腎百合湯。

醫學一見能

十

知母 黃柏 天冬 寸冬 蚊蛤

百合 紫苑 杏仁 生地 甘草

咽中疼痛。起黃白色小點者。溼熱之結氣也。宜清散薄荷湯。

薄荷 柴胡 荊芥 羌活 枳殼 連翹 射干

黃芩 知母 檳榔 草果 杏仁 薑蟻 蟬退

咽中生蛾。壅塞關隘不通者。心經火上逆也。宜加減導赤散。

生地 木通 甘草 竹葉 山甲 薄荷 酒軍

靈仙 知母 枳殼 大力 皂刺 羌活 老連

胸前

上焦心肺屬胸中。空洞無塵比太空。寒熱血痰相阻滯。開提升降具全功。

胸前脹滿。兼見口渴脇痛者。少陽氣不暢也。宜加減柴胡湯。

柴胡 半夏 人參 瓜霜 黃芩

生薑 大棗 甘草 枳殼 杏仁

胸前痺痛。兼見痛而徹背者。心肺之陽鬱也。宜瓜萸薤白湯。

桂枝 生薑 枳殼 瓜萸 薤白 清酒

胸前脹滿。飯後更覺痞滿者。胃虛而生痰也。宜香砂六君湯。

白朮 雲苓 黨參 半夏 廣香 陳皮 砂仁

醫學一見能

十一

甘草 生薑 大棗

胸前結痛。不可觸近按摩者。水火相搏結也。宜陷胸消息湯。

甘遂 少 大黃 少 芒硝 少

胸前脹滿。游走有聲而嘔者。膈上有痰水也。宜加味二陳湯。

桔梗 貝母 法夏 枳殼 雲苓 陳皮

甘草 白芥 蘇子 白朮 苡仁 生薑

胸前疼痛。徹骨徹心不止者。寒氣相攻衝也。宜烏頭赤丸方。

烏頭 蜀椒 乾薑 附子 赤石脂

胸前煩痛。口酸口苦悶鬱者。火氣之結滯也。宜肅清舒氣湯。

吳萸 老連 百合 丹參 苜蓿 前仁
桔梗 枳殼 尖貝 當歸 炒梔 雲苓

大腹

大腹中州總屬脾。虛寒實熱辨毫釐。
木邪水溼皆為寇。痰血蛔蟲亦易滋。

大腹絞痛。閉悶不得吐瀉者。脾實而熱閉也。宜金匱三物湯
枳殼 厚朴 大黃

腹中切痛。兼見吐瀉厥冷者。脾虛發藿亂也。宜仲景理中湯
人參 白朮 乾薑 甘草

腹中脹滿。飯後倦怠反飽者。脾虛少運化也。宜香砂六君湯

醫學一見能

十三

廣香 砂仁 白朮 人參 雲苓 甘草

陳皮 半夏 生薑 大棗 芡實 麥芽

腹中脹滿。兼見大便溏泄者。溼甚則濡泄也。宜時方胃苓湯

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 猪苓 大棗

澤瀉 雲苓 白朮 桂枝 生薑 白芍

腹中疼痛。有物自臍衝上者。腎氣之奔豚也。宜腎氣奔豚湯

桂枝 白朮 雲苓 甘草 大棗 附子 苡仁

腹中疼痛。有物自左衝上者。肝氣之奔豚也。宜肝氣奔豚湯

吳萸 老連 烏梅 牡蠣 香附 荔枝 雲苓

腹中大痛。有物突起拒摩者。虛寒現實象也。宜大建中原方
人參 蜀椒 乾薑 飴糖

腹痛喜按。舌上有白花點者。內有蛔蟲擾也。宜醋製烏梅丸

黨參 當歸 黃柏 黃連 細辛

附子 乾薑 花椒 桂枝 烏梅

腹中絞痛。串走兩脇。鳴痛者。痰飲之積聚也。宜加味二陳湯

陳皮 半夏 雲苓 甘草 白芥 前胡 蘇枝

腹中刺痛。脈澀痛如刀。錐者。瘀血之阻滯也。宜加減桃仁湯

桃仁 桂枝 芒硝 酒軍 歸尾 靈脂

醫學一見能

十三

腹中猝痛。由傷風邪而得者。肝氣侮脾土也。宜柴胡桂枝湯

柴胡 黃芩 半夏 人參 青皮

桂枝 白芍 甘草 大棗 生薑

腹中猝痛。由傷邪乘而得者。異氣亂正氣也。宜加減正氣散

蒼朮 陳皮 廣香 黨參 雲苓 桂心

天麻 麝香 半夏 大棗 生薑 龍骨

小腹

膀胱胞室與肝經。特輩猶知此數層。
獨於瘕氣和寒疝。此意從來少識人。

小腹滿痛。由於小便不通者。膀胱之水結也。宜加味五苓散

白朮 雲苓 桂枝 豬苓 澤瀉 白芍 杏仁
小腹滿痛。小便仍然通利者。胞宮之血結也。宜加減桃仁湯
方見大腹證

小腹絞痛。繞臍上下難忍者。下焦之寒疝也。宜烏頭羊肉湯
當歸 生薑 烏頭炮羊肉

小腹旁痛。以及軟肋俱痛者。厥陰血不和也。宜當歸四逆湯
當歸 桂枝 細辛 白芍 木通 生地 雲苓

香附 靈脂 甘草 橘葉 艾葉 川芎 台烏
小腹疼痛得屁腹鳴乃快者。小腸氣不和也。宜普明橘核丸

醫學一見能

古

橘核 吳萸 香附 棟子 查核 荔枝 小茴

脇 肋

側邊肝膽所分司。和暢陰陽兩得宜。
若係結疼宜破利。非痰即血莫遲疑。

兩脇下痛難於俯仰屈伸者。少陽氣不和也。宜加減小柴胡

黨參 柴胡 黃芩 半夏

青皮 牡蠣 生薑 甘草

兩脇下痛穿透游走有聲者。肝脾之痰飲也。宜加味二陳湯
方見大腹證

兩軟脇痛。以及小腹俱痛者。厥陰血不和也。宜當歸四逆湯

方見小腹證

脇下偏痛。痞結硬滿不去者。氣血痰三積也。宜三消去痞湯
附子 細辛 大黃 白芥 靈脂 香附

背 證

太陽與肺氣如天。統主諸陽背上旋。
實證最多。虛證少。無分虛實總驅寒。

背惡寒冷。由於外感發熱者。太陽經傷寒也。宜人參敗毒散
羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳殼 沙參

桔梗 杏仁 茯苓 甘草 生薑 大棗 粉葛

背惡寒冷。或兼手足清冷者。太陽經陽虛也。宜原方附子湯

醫學一見能

十五

附子 白朮 人參 白芍 雲苓

背痛連項。或兼發熱惡寒者。太陽經風寒也。宜人參敗毒散
方見上

背痛連肩。或兼吐痰咳嗽者。肺經有痰飲也。宜加減敗毒散

羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 大棗

雲苓 半夏 杏仁 蘇子 枯苓 生薑 竹茹

腰 證

腰為腎竅。宜補溫。溼着血瘀皆令疼。
亦有痛連肩背者。太陽經病討根源。

腰間沉痛。如帶五千錢。重者。腎經受寒溼也。宜時方腎着湯

乾薑 白朮 雲苓 甘草

腰痛難忍。如刀錐相刺割者。瘀血積腰際也。宜鹿角利腰湯

鹿角 歸尾 白芍 丹皮 紅花 牛膝 續斷

腰痛倦弱。或兼小便不利者。虛勞腎氣弱也。宜金匱腎氣丸

熟地 冬皮 淮藥 雲苓

附子 安桂 澤瀉 丹皮

腰痛連背。或兼寒熱頭疼者。風寒襲太陽也。宜人參敗毒散

方見背證

醫學一見能

十六

手證

手為四末屬脾經。掌中又屬少陰心。厥熱兩條須辨治。熱潮時節要分明。

手發厥冷。或兼泄利清穀者。脾腎之虛寒也。宜附子理中湯

乾薑 附子 黨參 白朮 甘草

手發潮熱。兼見譫語舌黑者。胃中有燥屎也。宜調胃承氣湯

枳殼 朴硝 大黃 厚朴 甘草

手心發熱。多在入夜以後者。瘀血在陰分也。宜四物加味湯

生地 當歸 川芎 白芍 丹皮 桃仁 桂尖

麥冬 桑葉 浮麥 竹葉 燈心 蒲黃 全皮

手心發熱。必在午飯以後者。脾胃停飲食也。宜加味平脾湯

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 神麩 酒軍 白芍

手痛麻木。通腕皆痛不仁者。風寒溼合痺也。宜五物逐痺湯

當歸 白芍 桂尖 秦艽 苡仁 桑皮 竹茹

防風 紅花 荆芥 續斷 生地 鈎藤 清酒

腳證

足居下部腎之分。又屬陽明灌大筋。寒熱腫疼。依法治。總於胃腎問原因。

腳冷厥逆。或兼下利清穀者。脾腎之虛寒也。宜經方四逆湯

乾薑 附片 甘草

醫學一見能

十七

腳發熱厥。夜睡不欲被覆者。腎中真陰虛也。宜六味地黃湯

熟地 冬皮 淮藥 茯苓 丹皮 澤瀉

腳跗腫大。青白如蠶明亮者。寒溼之氣注也。宜神仙雞鳴散

吳萸 蒼朮 紫蘇 生薑 苡仁

木瓜 陳皮 檳榔 桔梗 雲苓

腳跗赤腫。以及生瘡潰爛者。溼熱之下注也。宜蒼朮知母湯

蒼朮 知母 白朮 雲苓 枯苓 白芍 續斷

秦皮 茵陳 桑皮 全皮 桂枝 防已 甘草

婦人腳心疼痛。如刀錐刺者。少陰經瘀血也。宜仲景溫經湯

當歸 白芍 阿膠 川芎 桂枝 甘草
寸冬 半夏 吳萸 生薑 人參 丹皮

前陰

男女前陰總屬肝。肝經縈繞在其端。祇從此處求真訣。按法施方本已探。

前陰瘰癧。以及赤腫生瘡者。肝經之溼熱也。宜龍膽瀉肝湯

方見耳證

陰囊脹結。痛引小腹。以內者。肝經之疝氣也。宜茴香五苓散方

小茴 荔枝 橘核 棟核 歸尾 香附 白朮
台烏 豬苓 澤瀉 桂尖 檳榔 白芍 雲苓

醫學一見能

又十七

前陰暴縮。或兼轉筋入腹者。肝腎之虛寒也。宜加味四逆湯

乾薑 附子 烏頭 當歸 人參 雲苓 甘草

陰囊縮入。兼見舌捲心熱者。肝經之熱邪也。宜生犀瀉肝湯

生地 犀角 白芍 大黃 當歸 知母 菴蓉

陰莖蟲蝕。以及婦人陰蝕者。古之狐惑病也。宜外洗苦參湯

苦參煎洗亦可。內服龍膽瀉肝湯

後陰

後陰脫肛。乃為虛。以外俱將實証醫。大抵燥金多燥熱。即從燥氣定權輿。

後陰脫出。屎後良久乃入者。中氣下陷故也。宜補中益氣湯

黨參 白朮 黃芪 當歸 大棗
柴胡 升麻 生薑 甘草 陳皮

後陰瘰癧。一切腫痛諸苦者。陽明之血燥也。宜麻仁地榆湯

麻仁 地榆 當歸 白芍 杏仁 銀花
黃芩 黃連 槐實 桔梗 生地 大力

大便

大便無分結與溏。只將寒熱細評章。至於痢證尤難治。還望醫師妙主張。

大腸不通。口渴而小便黃者。陽明之燥結也。宜加味承氣湯

生地 花粉 大黃 芒硝 枳殼 厚朴 甘草

醫學一見能

十六

大便不通。口和而小便清者。脾寒氣凝結也。宜加味理中湯

當歸 白芍 人參 白朮 乾薑 甘草

大便溏泄。其色青白。完穀者。脾經寒溼氣也。宜胃苓加味湯

蒼朮 陳皮 甘草 茯苓 桂枝 附子 大棗

白朮 厚朴 豬苓 澤瀉 肉蓯 乾薑 白芍

大便溏瀉。其色濁垢膠膩者。腸中之溼熱也。宜清熱胃苓湯

蒼朮 滑石 木通 厚朴 雲苓 黃芩 梔子

陳皮 甘草 澤瀉 白朮 白芍 黃連 當歸

大便溏瀉。必在五更時分者。腎寒而侮脾也。宜加味四神丸

附子 肉叩 白朮 雲苓 大枣 甘草

吳萸 乾薑 人參 五味 生薑 粟殼

大便完穀。食入即刻利出者。肺熱而暴注也。宜瀉肺止利湯。

黃芩 知母 老連 大黃 石膏 桔梗

粉葛 桑皮 人參 生地 白芍 粟殼

便瀉赤白。下部逼脹難通者。溼熱之鬱利也。宜加減芍藥湯。

柴胡 當歸 白芍 甘草 檳榔 粉葛 杏仁

桔梗 木香 黃芩 黃連 綠豆 銀花 荷葉

便痢純赤。審係口渴屬熱者。熱結在血分也。宜地榆白頭湯。

醫學一見能

十九

黃連 黃芩 黃柏 秦皮 白頭翁

地榆 當歸 白芍 丹皮 銀花炭

便利禁口。其人飲食不納者。邪熱阻中氣也。宜人參開禁湯。

人參 老連 胡蓮 石解 知母 連翹 廣香

花粉 寸冬 桔梗 粉葛 銀花 大力 甘草

下痢純白。其人腹脹口和者。腸胃之鬱溼也。宜黃芩平胃散。

黃芩 蒼朮 厚朴 陳皮 豬苓 生薑

甘草 雲苓 澤瀉 木香 柴胡 芍藥

大便久痢。諸藥不能禁止者。寒熱之錯雜也。宜乾連四神丸。

乾薑 黃連 烏梅 白芍 甘草

小便

三焦決瀆為出路。肺主通調脾轉布。但治小腸與膀胱。世人那得知其故。

小便赤短。別無外證內傷者。小腸經火氣也。宜加味導赤散。

生地 木通 車梢 竹葉 滑石 山梔 黃芩

小便白濁。甚則盡如米飲者。脾經之溼氣也。宜華蘼分清飲。

華蘼 菖蒲 甘草 益智 烏藥 青鹽 神麩

小便短澀。每溺則澀而痛者。膀胱之熱淋也。宜車前五淋散。

當歸 白芍 赤苓 梔仁 甘草 燈心 前仁

醫學一見能

二十

小便不通。點滴俱不能出者。膀胱之熱結也。宜滋腎通關丸。

黃柏 多知母 多安桂 少

小便帶血。或紫莖中割痛者。熱動胞之血也。宜加味五淋散。

當歸 赤芍 甘草 牛膝 鬱金 生地 膽草

白芍 梔仁 燈心 桃仁 麝香 木通 前仁

小便不通。諸藥俱不效驗者。氣道迫塞故也。宜通氣麻杏湯。

麻黃 杏仁 甘草

小便過多。以及遺溺不禁者。膀胱與腎寒也。宜附子溫腎丸。

附子 安桂 熟地 桑皮 白朮 青鹽

寒熱

寒熱陰陽朕兆機互根互換理難知。或虛或實分真假。表理能明乃可醫。

發熱惡寒。皮毛灑淅無汗者。風寒閉膚表也。宜原方麻黃湯

麻黃 桂枝 杏仁 甘草

發熱惡風。翕翕然而自汗者。風寒襲腠裏也。宜原方桂枝湯

桂枝 芍藥 甘草 大棗 生薑

但熱不寒。口乾舌燥便黃者。陽明之燥熱也。宜原方白虎湯

石膏 知母 甘草 粳米

但寒不熱。並無燥渴等證者。少陰之陽虛也。宜長沙附子湯

醫學一見能

附子 白朮 人參 雲苓 甘草

皮膚發熱。夜晚潮熱更甚者。陰血不濡陽也。宜當歸補血湯

當歸 生地 黃芪 人參 枯苓 夜合葉

寒皮 百合 寸冬 黃柏 龜板 慈竹葉

子午發熱。睡後更覺盜熱者。虛勞骨蒸熱也。宜柴胡清蒸湯

柴胡 黃芩 當歸 芍藥 生地 丹皮 桃仁

蒲黃 鱉甲 膽草 雲苓 貝母 杏仁 甘草

寒熱往來。發作有定時候者。少陽經瘧疾也。宜草果黃芩湯

草果 黃芩 知母 柴胡 羌活 花粉 檳榔

厚朴 枳殼 杏仁 炒梔 石膏 卜荷 甘草

朝發寒冷。入夜則又發熱者。陽氣陷入陰也。宜補中益氣湯

方見後陰證

身熱面赤。下利清水完穀者。裏寒而外熱也。宜加味白通湯

乾薑 附子 蔥白 人尿 豬膽

身熱面赤。煩燥欲臥泥水者。陰甚而格陽也。宜益元艾附湯

人參 乾薑 附子 艾葉 寸冬 童便

黃連 甘草 知母 五味 故紙 葱白

春月發熱。氣喘而口乾渴者。感風熱之氣也。宜加減麻杏湯

醫學一見能

杏仁 麻黃 石膏 甘草 芍藥 薑蠶

花粉 連翹 銀花 大力 知母 蟬退

夏月發熱。口渴而心煩懊者。傷暑熱之氣也。宜加味六一散

炒梔 寸冬 滑石 甘草 黃芩 花粉 杏仁

香茹 石膏 厚朴 木通 荊芥 知母 銀花

嘔吐

寒熱陰陽細品評。總因氣逆嘔斯生。降衝安胃開邪拒。氣不奔騰嘔自平。

嘔吐不食。水飲不得入口者。火熱相拒隔也。宜人參乾薑湯

人參 黃連 黃芩 乾薑少

嘔吐能食。食入即時吐出者。兩熱相爭沖也。宜酒蒸大黃湯。

大黃 甘草

食久乃吐。兼見大腹脹滿者。脾經之火化也。宜薑附六君湯。

人參 白朮 雲苓 甘草

半夏 陳皮 乾薑 附子

食久乃吐。兼見胸前脹滿者。胃府之虛寒也。宜香砂養胃湯。

廣香 砂仁 白朮 雲苓 陳皮

半夏 甘草 人參 大棗 生薑

食久乃吐。吐出多帶水液者。腎部之虛寒也。宜仲景真武湯。

醫學一見能

廿三

白朮 雲苓 白芍 生薑 附子

食久乃吐。吐出多帶酸水者。肝部之虛寒也。宜吳茱萸原方。

吳茱萸 生薑 人參 大棗

單吐痰涎。或兼欬嗽頭痛者。胃中有痰飲也。宜加味二陳湯。

陳皮 半夏 雲苓 甘草 生薑 竹瀝

單吐酸水。或兼頭痛如破者。肝寒氣上逆也。宜加味左金丸。

吳茱萸 雅連 人參 雲苓 細辛 苡仁

嘔吐不止。兼見腹痛下利者。脾氣之虛脫也。宜附子理中湯。

附子 白朮 人參 乾薑 甘草

嘔吐發熱。或兼口苦胸滿者。少陽之逆氣也。宜原方柴胡湯。

黃苓 柴胡 人參 生薑

半夏 甘草 大棗

卒然嘔吐。兼見發悶惡心者。感瘴厲異氣也。宜藿香正氣散。

白朮 半夏 雲苓 白芷 腹毛 生薑 砂仁

厚朴 陳皮 桔梗 紫蘇 藿香 大棗 甘草

欬嗽

肺氣如鍾撞則鳴。或痰或血。治須分。再加和胃疏肝法。欬血之原。即此尋。

外感欬嗽。吐痰清白而凝者。傷寒而動水也。宜小青龍真方。

醫學一見能

廿四

桂枝 半夏 麻黃 甘草

乾薑 細辛 白芍 五味

外感欬嗽。吐痰黃色而凝者。傷風動火氣也。宜麥門冬新方。

麥冬 黃苓 桔梗 桑皮 瓜蒌 杏仁 貝母

柴胡 雲苓 紫苑 薄荷 花粉 枳殼 甘草

久欬上氣。痰涎多而聲易者。肺腎之陽虛也。宜加味真武湯。

白朮 雲苓 白芍 五味 附子 乾薑 細辛

久欬上氣。聲乾澀而痰凝者。肺腎之陰虛也。宜加味豬苓湯。

阿膠 白合 寸冬 貝母 澤瀉 滑石

五味 豬苓 雲苓 丹皮 海粉 生地

小兒欬嗽連哈數十餘聲者肝血之不和也宜加味道遙散

當歸 白芍 雲苓 柴胡 煨薑 薄荷 甘草

白朮 丹皮 五味 黃芩 半夏 香附 丹參

婦人乾欬由於經水不行者衝任之氣逆也宜變化柴胡湯

柴胡 香附 元胡 丹皮 當歸 雲苓 貝母

黃芩 寸冬 牛膝 桃仁 法夏 白芍 甘草

喘 齁

喘齁二證本多痰亦有虛時屬腎關開口便言中氣弱那知化氣水須捐

醫學一見能

廿五

氣喘而促審係呼出氣短者內有停水飲也宜二陳五苓散

半夏 五味 甘草 陳皮 白朮

豬苓 澤瀉 雲苓 桂尖 細辛

氣喘而促審係吸入氣短者腎中之氣虛也宜八味腎氣丸

方見腰證

齁齁有聲喉中漉漉不利者痰氣為寒阻也宜破痰麝干丸

射干 半夏 陳皮 百部 冬花 細辛 乾薑

五味 貝母 雲苓 郁李 阜角 枯苓 枳殼

氣緊喘促鼻塞聲音不利者風寒閉肺竅也宜蘇子降氣湯

蘇子 半夏 當歸 陳皮 生薑

厚朴 沉香 前胡 柴胡 甘草

喘逆上氣或兼噫氣乾欬者肺胃之火逆也宜清熱降逆湯

生地 白芍 石膏 知母 花粉

枯苓 枳殼 旋覆 杏仁 赭石

失 血

血隨氣布要循經氣上因而血沸騰降逆消瘀為妙訣莫施補劑致癆蒸

驟然吐血兼見頭痛寒熱者外感傷經脈也宜麻黃芍藥湯

藕節 枯苓 生地 川芎 白芍 當歸 麻黃

醫學一見能

廿六

丹皮 香附 寸冬 杏仁 蒲黃 枳殼 甘草

吐血口渴脈洪數而溺赤者火熱傷陰分也宜加味四生丸

生地 艾葉 柏葉 荷葉 丹皮 馬通

枯苓 酒軍 知母 花粉 茅根 牛膝

吐血口和脈絃微而溺赤者陽虛而陰脫也宜變化理中湯

黨參 黃芪 黑薑 甘草 白芍 馬通

白朮 五味 當歸 木香 側柏 醋艾

吐後口渴血帶黑而腹痛者瘀血積腹裏也宜加味四物湯

生地 當歸 川芎 白芍 桃仁

大黃 丹皮 香附 枳殼 降香

吐血之前必先大發惡心者。血潮而凌心也。宜乳香沒藥散

乳香 沒藥 生地 寸冬 牛膝 五味 丹皮

炒梔 當歸 白芍 硃砂 玉竹 棗仁 知母

先行欬嗽。然後得吐血證者。肺燥傷陰脈也。宜清燥和血湯

生地 寸冬 百合 五味 當歸 貝母 杏仁

續斷 藕節 荊芥 竹茹 蒲黃 紅花 降香

先行吐血。然後得欬嗽證者。陰陽不相附也。宜調陰和陽湯

當歸 白芍 生地 阿膠 五味 百合 貝母

醫學一見能

杏仁 沉香 牛膝 白薇 龍骨 牡蠣 降香

吐血之後。肌肉魚鱗甲錯者。腹中有乾血也。宜大黃廔蟲丸

大黃 桃仁 廔蟲 水蛭 甘草

廔蟲 蟻螬 阿膠 當歸 炒芥

大便下血。其下在糞之前者。腸風瘡痔類也。宜赤豆加味散

當歸 地榆 赤豆 銀花 防己 寸冬 大力

丹皮 白芍 槐角 棕灰 杏仁 黃柏 甘草

大便下血。其下在糞之後者。肝脾不統血也。宜仲景黃土湯

白朮 附子 甘草 生地 黃芩 阿膠 龜心土

通身汗血。甚則露衣盡赤者。火甚而血溢也。宜加味六黃湯

當歸 黃連 黃芩 黃柏 蟬退 酒軍 全皮

生地 黃芪 熟地 白芍 竹茹 杏仁 甘草

鼻中流血。以及齒縫出血者。胃中之燥熱也。宜清涼甘露飲

方見口證

遺精

夢中所見。乃肝魂。魂不清。兮夢不甯。若是陰精無夢泄。失於鎖鑰。責司門。

遺精有夢。或兼心煩善怒者。心肝之火邪也。宜龍瀉瀉肝湯

柴胡 木通 前仁 炒梔 當歸 牡蠣 遠志

醫學一見能

黃芩 澤瀉 生地 膽草 甘草 丹皮 燈心

遺精無夢。或兼陰頭寒冷者。腎元之陽虛也。宜古方天雄散

天雄 桂尖 牡蠣 龍骨

言語

言屬心聲。出肺關。心經痰火。語言愆。若還肺氣嘶塞。升散開提。病自安。

言語聲嘶。喉痺而咽生瘡者。肺金被火剋也。宜尖貝平肺散

尖貝 天冬 寸冬 百合 兒茶 百部

薄荷 知母 石膏 杏仁 冰糖 甘草

語言蹇滯。脣緩而流涎沫者。脾經中風證也。宜資壽解語湯

附子 安桂 防風 羌活 天麻

麥仁 甘草 羚羊 薑汁 竹汁

昏冒不語遺溺直視足廢者心腎經中風也宜地黃飲子方

安桂 茯苓 熟地 遠志 五味 巴戟 薄荷

附子 雲苓 寸冬 菖蒲 桑皮 石斛 枸杞

狂言見鬼舌黑而手足熱者胃中有實熱也宜三一承氣湯

大黃 芒硝 枳殼 厚朴 甘草

出言漫罵兼能棄衣登高者痰火迷心神也宜礞石滾痰丸

礞石火硝炒 黃芩 大黃 沉香

醫學一見能

九

出言顛倒其人痴不識人者痰入心而癩也宜硃砂丹礬丸

黃丹炒 白礬煨茶葉 硃砂 猪心血

卒倒不言牙關緊閉不開者外邪之聚中也宜吹鼻通關散

細辛 牙皂

卒倒作聲有如羊犬等狀者風痰發癩證也宜加味二陳湯

陳皮 半夏 雲苓 甘草 防風 竹茹

枳殼 生薑 前胡 枯苓 鬱金 當歸

心神

心主神兮肝主魂腎藏精氣外游行
此間治法猶難識况挾長沙百合名

心中大煩舌黑而不得臥者少陰之陽煩也宜黃連阿膠湯

黃連 黃芩 阿膠 白芍 雞子黃調下

心中大躁手足躁擾不安者少陰之陰躁也宜加味白通湯

乾薑 附子 葱白 童便 膽汁

心中怔忡跳動如春碓白者心胃之血虛也宜加味歸脾湯

白朮 寸冬 茯苓 黨參 遠志 粳仁 當歸

黃芪 白芍 五味 龍眼 甘草 乳香 沒藥

心悸而怯常欲叉手冒心者水氣凌心經也宜桂苓甘朮湯

桂朮 雲苓 甘草 大朮

醫學一見能

三十

心驚而惕神魂不能自主者心虛而氣浮也宜桂枝龍牡湯

桂枝 甘草 附子 龍骨 牡蠣

心神恍惚入夜則多煩夢者心血虛有火也宜原方安神丸

當歸 生地 黃連 硃砂 甘草

心神恍惚母事不能記憶者有火兼有痰也宜加味安神丸

龍骨 牡蠣 茯苓 菖蒲 粳仁 生地 黃連

硃砂 遠志 當歸 五味 甘草 貝母 寸冬

心神不定起居百般不安者百脈皆合病也宜加味百合湯

黨參 白芍 百合 生地 玉竹 茯苓

棗仁 寸冬 百部 五味 貝母 滑石

斑黃

陽明病氣陷脾鄉。挾濕因而外發黃。若但火邪傷血分。赤斑累累亢於陽。

發斑紅紫。身熱口中乾渴者。陽明經溼熱也。宜加減三黃湯

花粉 犀角 黃芩 黃柏 炒梔 蟬退

銀花 白芍 枳殼 杏仁 歸尾 石膏

發黃明亮兼見口渴溺赤者。脾經之溼熱也。宜茵陳梔子湯

炒梔 黃柏 茵陳 甘草

發黃黑暗兼見口和不渴者。脾經之寒溼也。宜茵陳五苓散

醫學一見能

三十一

桂枝 白朮 雲苓 豬苓 澤瀉 茵陳

出汗

古云盜汗屬陰虛。自汗陽虛。衛外疏。識得陰陽相附麗。互根當究五車書。

發熱出汗時見惡風灑灑者。傷風之外證也。宜古方桂枝湯

方見寒熱證

睡後出汗。醒時則汗仍收者。陰虛而盜汗也。宜當歸六黃湯

熟地 生地 當歸 黃芩 黃連 黃柏 黃芪

醒時汗出。睡後則汗仍收者。陽虛而自汗也。宜參芪朮附湯

人參 黃芪 白朮 附子

醫學一見能

腫脹

腫脹原由說的端。總因水氣竄皮間。無分表裏和虛實。泄水扶脾病自安。

先首腫起。以下及於手足者。傷於外之溼也。宜加味五皮飲

陳皮 令皮 腹皮 薑皮 桑皮

麻黃 桂尖 杏仁 甘草 大棗

先腳腫起。以上及於腹股者。內之水不行也。宜原方真武湯

白朮 白芍 雲苓 生薑 附子

腫脹溺赤。或兼口渴脈數者。陽分之水氣也。宜加味五皮飲

桑皮 苓皮 腹皮 薑皮 陳皮 木通

醫學一見能

三二

知母 防己 滑石

腫脹溺清。其口不渴脈沉者。陰分之水氣也。宜原方真武湯

方見上

單腹脹大。其人黃瘦少食者。脾虛而臌脹也。宜加味六君湯

白朮 雲苓 陳皮 半夏 吳萸

黨參 甘草 廣香 砂仁 生薑

飲食

胃司飲食命之根。欲惡之間得病情。單指積停一端說。非吾所謂個中人

以而思食。每食又不能多者。脾強而胃弱也。宜重訂助胃丸

六〇七

蒼朮 甘草 砂仁 陳皮 生薑 吳萸
大棗 白寇 半夏 檀香 黨參 雲苓
食而善飽。每飽又作反脹者。胃強而脾弱也。宜抑胃扶脾湯

寸冬 老連 黨參 白朮 乾薑
甘草 肉叩 廣香 麥牙 白芍

不善於食。而並不思飲食者。脾胃兩皆虛也。宜建中複理湯

桂枝 白芍 甘草 大棗

飴糖 黨參 白朮 乾薑

喜飲冷水。以及消渴不止者。胃中虛熱故也。宜原方甘露飲

醫學一見能

三三

方見口證

喜飲熱湯。或兼腹痛厥利者。脾部之虛寒也。宜附子理中湯

附子 白朮 人參 生薑 甘草

傷食腹痛。兼見吐酸噯腐者。宿食停不去也。宜加減平胃散

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 神麴 大黃 生薑

食入氣噎。因而哽噎不下者。肺氣不下降也。宜降脾平胃散

百合 阿膠 半夏 寸冬

細辛 五味 杏仁 枳殼

食必飲送。無飲即不下咽者。胃氣不下降也。宜甘蜜半夏湯

半夏 黨參 白蜜 甘瀾水

飲傷腹滿。兼見小便不利者。膀胱氣不化也。宜原方五苓散
白朮 雲苓 豬苓 澤瀉 桂枝

起居

脾主四肢。膽主樞。氣機通暢。體輕舒。若還運動難為力。按法施方。莫奸途。

轉側艱難。以及曲伸不利者。少陽之樞逆也。宜原方柴胡湯

方見頭證

身體沉重。四肢運動艱滯者。脾經有溼氣也。宜和脾利溼湯

白朮 防己 木通 雲苓 蒼朮 澤瀉

醫學一見能

三四

倒仆

危急無如猝倒形。驟然跌仆。舉家驚。不須問病從何起。閉脫分醫。立起生。

猝倒地下。其證手撒目閉者。中風虛脫證也。宜急救三生飲

附子 川烏 南星 麝香 黨參

猝倒地下。其象手握口噤者。中風實閉證也。宜吹鼻通關散

生半夏 牙皂末 細辛末

制掣動

筋脈從來貴潤柔。那堪風火兩相仇。相仇故爾相牽引。須向肝脾問厥由。

角弓反張。以及向後跌仆者。太陽經痙病也。宜防風竹茹湯

防風 生地 白芍 粉葛 荊芥 花粉 竹茹

頭低足縮以及向前跌仆者陽明經痙病也宜清陽已痙湯

生地 寸冬 玉竹 石膏 芒硝 酒軍 甘草

一邊手足牽引搐搦不用者少陽經痙病也宜加味柴胡湯

柴胡 枯苓 生薑 甘草 黨參

生地 羚羊 花粉 白芍 當歸

筋惕肉動振振然欲辟地者寒水之內動也宜仲景真武湯

方見腫脹證

四肢拘急以及焦痿不用者火甚筋灼枯也宜大劑補陰丸

醫學一見能

三五

黃柏 知母 熟地 龜板 羚羊

牛膝 白芍 木瓜 當歸 玉竹

四肢軟弱步履疲怠不收者溼甚筋縱弛也宜利溼燥經湯

苡仁 木瓜 防己 桂枝 甘草

虫 蠱

蟲因風化變而生仲景分經屬厥陰。千古醫師工殺毒祇原來歷欠分明。

吐蟲蟲痛但見舌起白花者皆風木所生也宜仲景烏梅丸

當歸 黨參 桂枝 花椒 黃柏

烏梅 乾薑 附子 細辛 黃連

醫學一見能

口内生蟲以及二陰生蟲者古名狐惑病也宜新製化蟲丹

椒子 雄黃 枯礬 沿粉 烏梅 老連 甘草

誤中蠱毒食白礬而反甜者邪變人臟氣也宜經驗吐利湯

升麻 鬱金

鬼 祟

脈無定準面無常夜睡流淚鬼祟傷。喻氏移精變氣說鑿開荒徑指津梁。

乍醒乍昏寒熱面色無定者鬼怪附人身也宜移精變氣散

虎骨 牡蠣 犀角 天麻 黃芪 桂枝

龍骨 羚羊 麝香 鹿角 人參 茯神

醫學一見能

三六

婦人調經

婦人經血屬於肝。肝血調和病自安。熱則於前寒縮後腹疼瘀血定相干。

經水先期其血紫黑而多者血分中有熱也宜加味四物湯

生地 當歸 白芍 川芎 丹皮

枯苓 香附 柴胡 全皮 竹茹

經水後期其血淡白而少者血分中有寒也宜當歸和血湯

當歸 白芍 桂枝 細辛 艾葉 阿膠 甘草

生地 木通 香附 大棗 法夏 雲苓 生薑

經水過多以及漏下不止者衝任之虛崩也宜千金膠薑湯

六〇九

生地 川芎 白芍 當歸 鹿霜 牡蠣

艾葉 阿膠 甘草 炮薑 附子 棕灰

經前腹痛以及行經不利者。血分有餘滯也。宜加味香蘇飲

當歸 白芍 陳皮 胡索 桃仁

香附 蘇梗 柴胡 丹皮 甘草

經後腹痛以及經水減少者。血虛而不足也。宜加味補血湯

黃芪 當歸 白朮 人參 香附 川芎 熟地

漏下白物有如米飲不絕者。脾溼生帶證也。宜加味六君湯

白朮 雲苓 半夏 菖蒲 澤瀉 烏藥 益智

醫學一見能

三七

前仁 甘草 陳皮 萹薢 豬苓 茵陳 防己

婦人安胎

安胎脾是大原頭。萬物生成土力優。腎主繫胞亦宜固。肝司胞血更當求。

胎中嘔吐。數次發惡不休者。脾胃氣阻滯也。宜香砂六君湯

方見胸前證

胎中心煩。兼見口渴頭暈者。心胃之虛火也。宜安胎清火湯

當歸 白芍 黃芩 白朮 沙參

澤瀉 知母 寸冬 雲苓 竹葉

胎中腰痛過甚。則恐墮胎者。帶脈之解弛也。宜加味固胎丸

杜仲 故紙 當歸 淮藥 續斷 白朮 人參

胎中腹痛。痛甚亦能墮胎者。胎氣之不和也。宜調氣安胎飲

當歸 白芍 厚朴 紫蘇 雲苓 生薑

胎胞下壓。小便不得下出者。胞繫之不舉也。宜八味腎氣丸

熟地 夷皮 山藥 雲苓 澤瀉

安桂 附片 丹皮 寸冬 玉竹

胎胞上逼。心中煩悶不安者。血虛而火迫也。宜養胃清降湯

人參 白朮 白芍 淮藥 當歸 阿膠

雲苓 寸冬 甘草 大棗 生地 夷仁

醫學一見能

三八

胎前水腫。以及腹中脹滿者。胞宮水不化也。宜加味防己湯

防己 澤瀉 腹皮 薑皮 桔梗

苓皮 桑皮 杏仁 草梢 當歸

胎前欬嗽。以及噎嘔不安者。子咳與子噎也。宜調肺平肝湯

桔梗 枳殼 杏仁 雲苓 前胡

當歸 生地 百合 寸冬 紫苑

保產

婦人新產。莫言虛。恐是瘀停內阻持。若是瘀行。商補劑。養陽不若養陰宜。

將產之期。預備滑胎催生者。必調和氣血也。宜保產無憂散

當歸 川芎 白芍 黃芪 兔絲 厚朴 艾葉

芥穗 枳殼 貝母 羌活 甘草 生薑 綠豆

新產之初腹痛暈煩等證者。瘀血相攻衝也。宜加味失笑散

當歸 川芎 靈脂 蒲黃 童便

產後瘀盡諸虛百損並見者。氣血大虧損也。宜十全大補湯

生地 白芍 川芎 黨參 白朮

雲苓 當歸 甘草 安桂 黃芪

小兒

小兒外證求太陽。三字方中明訓彰。究與大人同治法。不須科別擅偏長。

醫學一見能

三九

小兒發熱兼見惡寒頭痛者。太陽經傷寒也。宜人參敗毒散

方見頭證

小兒口噤手足抽掣痰潮者。傷風動痰火也。宜羌活息風湯

羌活 南星 竹瀝 半夏 生地 防風 薑豉

天麻 薑汁 枯芩 甘草 枳殼 犀角 羚羊

小兒內證

小兒內證求太陰。脩園有語特丁甯。集中所列無他證。他證皆當即此尋。

初生小兒屈腰嗝叫不休者。瘀血積腹內也。宜用下瘀湯方

桃仁 靈脂 大黃

醫學一見能 跋

小兒腹痛以及脹滿吐瀉者。總責太陰經也。宜香砂六君湯

方見胸前證

小兒食積手足熱腹中痛者。脾胃不運化也。宜加減平胃散

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 神麩

麥牙 山楂 老連 生薑 白芍

小兒黃瘦以及腹大潮熱者。脾胃之疴疾也。宜己疴胡連湯

枳殼 山楂 麥牙 蕪荑 胡黃連

白芍 生薑 甘草 腹毛 竹柴胡

此書不無脫畧。如婦人經產。小兒痘癩。以及瘡傷諸門

醫學一見能

四十一

皆未詳悉。然此為不知醫者。指陳大槩。於此既得指歸

一切方書。自不迷眩。且病無定情。證多兼見。守抹待免

未免膠粘。變化會通。一偶三反。見月忘指。則近道矣。

容川氏再跋

毘蠹燃犀錄

〔清〕燃犀道人撰

據上海圖書館藏清光緒十九年寶鏡山房刻本影印原書版
框高一六八毫米寬二三八毫米

毆蟲燃犀錄

光緒癸巳開雕
板藏寶鏡山房

毆蟲燃犀錄 自序

序

周官庶氏掌除毒蠱聖人所以重民命也其法一失於列國再湮於秦漢華佗治疾類多蠱證又故秘其術不輕授人而造蠱者遂盛行於世如漢季之張角明之唐賽兒徐鴻儒其尤著者也顧或謂張角諸人乃以妖術惑眾奚知其為蠱耶不知妖術惑眾毒蠱亦能惑眾也泛言之則為妖術切言之則為毒蠱也毒蠱隱形似鬼神變亂人之元氣妖術能外是乎是妖術即毒蠱也知妖術即毒蠱而治

毆蟲燃犀錄

序

一

法可施矣知治蠱之法即降妖之法而法愈無窮矣蓋毒蠱以害人為喜以盜財為能金蠶藥思天生之毒蠱也而妖人所造之蠱其種類尤繁後世人心愈漓為術愈巧始猶盛於南徼近則延及中華考之古今方書俱有附載而人多習焉而不察光緒丁丑有妖人剪楮為兵截人襟袖及髮或以五色印人肌肉南北喧傳咸以為異余謂此乃中毒耳遇病者投以試蠱之法輒驗遂按周官庶氏所掌施之無不立效而人猶未之深信也迨施治日久痊者漸

多遠邇之求方者益眾余恐力不暇給爰次其治法著於篇顏之以歐蠱燃犀錄子夏曰雖小道必有可觀此其小道之可觀者耶余雖為之而弗泥或不見異於君子即以是傳諸世人質諸博雅亦庶幾不謂無稽之言而諒余濟世之苦心也夫

光緒十九年仲秋之月燃犀道人書

歐蠱燃犀錄

序

二

歐蠱燃犀錄凡例

一醫本小道開卷引用經史以冀取信備者非敢妄為附會

一伏讀

御纂周易周禮諸書發明蠱字之義與治蠱之法極為精確敬錄

御案與經文並重一尊經一崇

聖也

歐蠱燃犀錄

凡例

一

一證治采自方書俚俗在所不免志存救世不徒工文識者諒之

一歐蠱隨方土所宜各有能者故不喜引用成方譬

之詩文錄舊即非佳作呪語亦然至於藥性針灸

諸穴自有專書茲不復衍

一此錄原為治病而作工巫術而不害人即可相安

區區之意只在救人非尋釁也

一術士專恃符籙往往不靈此則純用藥物人人可

1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001

解且經典煌煌無須秘之

一 目覩災黎不忍袖手摘奸發覆勢所必至妖人本

自理屈余遂不憚詞煩諒非察見淵魚之比

一 此錄注意在教匪之紙人紙馬卽是造蠱之術苦

心研究全從閱歷得來惜古人未有明言恐拘墟

者疑爲杜撰

一 醫案中字字皆實方能取信人勿疑爲弄筆炫奇

幸甚幸甚

歐蠱燃犀錄

凡例

一

一 說部中志奇志怪每有毒蠱而訛爲鬼狐卷末卽

人所習見者辨論數條采取未博不無挂漏

一 近時獠犬甚多實爲毒風所感經驗良方載之附

錄

歐蠱燃犀錄目錄

原蠱

避蠱

驗蠱

蠱證

蠱脈

治蠱

蠱案

歐蠱燃犀錄

目錄

一

論蠱

附錄

啟蠱燃犀錄

燃犀道人著

原蠱

三三三 巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

王弼註蠱者有事而待能之時也可以有為其在此時矣

孔穎達正義蠱者有為之時拔拯危難有事待能之時

啟蠱燃犀錄

原蠱

一

者物既蠱壞須有事營為所作之事非賢能不可

朱子本義蠱壞極而有事也蠱壞之極亂當復治

御纂周易述義卦自泰變乾變巽而弱坤變艮而止不能

事事故泰壞而成蠱今欲治之必反其道巽復乾艮綜震

故元亨用乾也健以起其弱也利涉大川用震也動以振

其止也先甲後甲兼用乾震也甲乾也乾納甲也先甲三

日先乾三卦也先乾三卦為震後乾三卦為艮艮陽終則

震陽始乾行不息也任天下之事者用其震動以符乾行

蠱變巽止之習則無蠱矣

敬按此論蠱卦之義與治蠱之道極為精確用其

震動以符乾行艮相以之治國良醫以之治病其

理同也

山下有風蠱君子以振民育德

朱子本義山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治己治人之道也

御纂周易述義風之在天上與地上水上者皆行而無阻

啟蠱燃犀錄

原蠱

二

山下有風則為山所阻旋轉而不暢蟲者風之族也故風

字從蟲風鬱則山木滯淫而蟲生蠱之象也飭蠱之君子

以之振起其民養育其德民不振則風俗皆窳而有蠱振

民者取風在下而振動山木之象德不育則人心惑亂而

有蠱育德者取山在上而涵育風氣之象夫蠱之時百度

未舉而獨先民德聖人施為氣象亦可見矣

蘇氏易傳云器久不用而蟲生之謂之蠱人久宴溺而

疾生之謂之蠱天下久安無為而弊生之謂之蠱序卦

曰蠱者事也夫蠱非事也以天下爲無事而不事事則後將不勝事矣此蠱之所以爲事也而昧者乃以事爲蠱則失之矣器欲常用體欲常勞天下欲常事事故曰巽而止蠱蠱之災非一日之故也必世而後見故爻皆以父子言之明父養其疾至子而發也君子見蠱之漸則涉川以救之及其成則不事王侯以遠之蠱之成也良醫不治

按此發明蠱卦之義尤爲盡致然則因病服藥幹蠱

歐蠱燃犀錄

原蠱

三

之方也諱疾忌醫裕蠱之道也蠱成不治悔無及矣

周禮秋官庶氏下士一人徒四人

正義鄭氏康成曰庶讀如藥煮之煮驅除毒蠱之言劉

氏彝曰毒蠱病人非一種僅下士主之者蓋掌其方書

治禁之法

御案害人之物其酷於猛獸故首冥氏以攫噬莫之能避

也蠱毒次之其發較遲而死傷則一也

庶氏掌除毒蠱以攻說禴之嘉草攻之

正義鄭氏康成曰毒蠱蠱物病害人者賊律曰敢蠱人及教令者棄市攻說祈名祈其神求去之也嘉草藥物攻之謂燻之鄭司農云禴除也賈氏公彥曰攻說禴之去其神嘉草攻之去其身鄭氏鏐曰左傳於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱皆謂其腐壞也毒物能腐壞人之心腑故謂之蠱大祝六祈有攻說皆以辭責神也此曰攻曰說又曰禴非六祈之所謂禴當讀如潰癰之潰謂以辭責之使其毒潰散

歐蠱燃犀錄

原蠱

四

凡歐蠱則令之比之

正義鄭氏康成曰使爲之又校次之劉氏彝曰凡歐蠱

者隨其方土之所宜各有能者人有病則令歐之己乃

比其優劣

御案此官僅下士一人故人有能歐蠱者則令之而比次

其術之高下

禮記月令大雩旁磔

註樑攘也厲鬼爲蠱將出害人旁磔於四方之門桂氏

曰風動蟲生故磔狗止風以禦蠱

左傳成公十一年晉侯夢大厲被髮及地搏膺而踊曰殺余孫不義余得請於帝矣壞大門及寢門而入公懼入於室又壞戶公覺召桑田巫言如夢公曰何如曰不食新矣公疾病求醫於秦秦伯使醫緩為之未至公夢疾為二豎子曰彼良醫也懼傷我焉逃之其一曰居盲之上膏之下若我何醫至曰疾不可為也在盲之上膏之下攻之不可達之不及藥不至焉不可為也

歐熹燃犀錄

原蠱

五

按晉侯夢見之鬼非必出於趙氏乃平素所為過當元氣既衰蠱鬼乘之託言趙氏所謂心虛生暗鬼也今世此證甚多十三鬼文皆其所伏不獨膏盲也

左傳昭公元年晉侯有疾求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱

按晉侯乃晦淫惑疾非中蠱也故曰如蠱余常謂中蠱則惑矣而惑於讒言惑於女色則心昏志亂倒行逆施如中蠱然故凡暗中害人曰下蠱損人利己曰

報蠱攝取財物曰蠱盜挑唆起事曰蠱動皆此義也中蠱則惑惑字亦有兩義其引為同類結為死黨亦可云惑初非害之迫至謀逆不成聚而殲旃則其被害更酷尙不如中蠱者之猶能施治也

史記封禪書秦德公作伏祠磔狗邑四門以禦蠱菑

按伏祠即取暑伏可以伏鬼之義

通鑑輯覽漢武帝征和二年巫蠱事起

是時方士及諸神巫多聚京師率皆左道惑眾變幻無

歐熹燃犀錄

原蠱

六

所不為帝嘗夢木人數千持杖欲擊帝帝驚寤因是體不平遂苦忽忽善忘

後漢書禮儀志仲夏之月以朱索連葦菜彌牟樸蠱鍾以桃印以施門戶先臘一日大儺逐疫黃門唱佞子和曰窮奇騰根共食蠱追惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者為糧

正字通郝敬曰彌牟禦止塗抹之義博雅樸大也粹也廣韻鍾當也

按葶菜卽大蒜能殺蠱今人猶混用之

說文蠱腹中蟲也臬桀死之鬼亦爲蠱

段氏曰中蟲皆讀去聲蠱食物也亦作蚱腹中蟲者謂腹內中蟲食之毒也臬當作鳥累之借字也桀者磔之古字也

後漢書華佗嘗行道見有病噎者因語之曰向來道隅有賣餅人萍蠶甚酸可取三升飲之病自當去卽如佗言立吐一蛇乃懸於車而候佗小兒戲於門中逆見自謂曰客

歐蠱燃犀錄

原蠱

七

車邊有物必是逢我翁也及客進顧視壁上懸蛇以十數乃知其奇

按萍水上浮萍也魏志及本草並作蒜蠶酸能伏蟲辛能殺蠱故皆治之

南史李道念病已五年丞相褚澄診之曰非冷非熱取蒜一升煮食吐出一物涎裏視之乃雞雛翅足俱全澄曰未盡也更吐之凡十二枚而愈

按此亦中毒蒜能吐蠱故效謂食白淪雞子所致恐

未確

魏書靈徵志太和元年五月有狐魅截人髮熙平二年自春京師有狐魅截人髮人相驚恐至六月靈太后召諸截髮者鞭之於千秋門外

按截髮卽蠱所爲捕之無踪故訛爲狐魅召而鞭之亂政也人生此時不幸甚矣隨園隨筆未解其故以隨園之博識而猶未解宜世人之有言不信也至謂有蠶蛾喫人百十乃正始二年事連類記之隨園偶

歐蠱燃犀錄

原蠱

八

悞耳

北齊書武平四年正月有狐媚多截人髮通鑑輯覽隋文帝十八年五月禁畜貓鬼蠱毒壓魅野道者

獨孤后之弟延州刺史隋有婢事貓鬼能使之殺人會后與楊素妻鄭氏俱有疾醫皆曰貓鬼疾也上意隋所爲令高穎等雜治之具得其實詔隋夫婦皆賜死后爲之請於是免隋死詔自今有犯者投囚裔

獨孤隨傳隨婢徐阿尼本從隨母家來常事猫鬼每以子日夜祀之言子者鼠也其猫鬼每殺人所死家財物潛移於畜猫鬼家隨嘗從家中索酒其妻曰無錢可酤隨因謂尼曰可令猫鬼向越公家使我足錢也阿尼便呪之居數日猫鬼向素家隨又於園中謂尼曰可令猫鬼向皇后所使多賜吾物阿尼復呪之遂入宮中楊遠乃於門下外省遣阿尼呼猫鬼於是夜中置香粥一盆以匙扣而呼之曰猫女可來無住宮中久之阿尼色正

歐蠱燃犀錄

原蠱

九

青若被牽曳者云猫鬼已至先是有人訟其母為人猫鬼所殺者上以為妖妄怒而遣之及隨得罪乃詔誅被訟行猫鬼家

隋書志江南數郡往往畜蠱而宜春偏甚其法以五月五日聚百種蠱大者至蛇小者至蝨合置罇中令自相啖餘一種存者留之蛇則曰蛇蠱蝨則曰蝨蠱行以殺人因食入人腹內食其五臟死則其產移入蠱主之家三年不殺他人則畜者自鍾其弊累世相傳不絕亦有隨女子嫁焉

平寶謂之為鬼自侯景亂後蠱家多絕既無主人故飛游道路中之則殞焉

楊慎云此俗移於滇中每遇亥夜則蟲飛出飲水其光如星鮑照詩所謂吹蠱痛行暉也嘗親見之

按畜蠱不獨江南亦不止移於滇中南省苗蠻皆畜之今北方亦有能者山左尤多

宋史太祖紀徙永州諸縣民之畜蠱者三百二十六家於縣之僻處不得復齒於鄉

歐蠱燃犀錄

原蠱

十

宋史寶貞固傳少時中蠱若贅在喉中常顛闕及為相因犬吐有物類蜥蜴落銀盤中

按此知蠱毒害人有速有遲不皆致死故可治也

宋史五行志建炎二年天雨紙錢於管中厚盈寸明日與金人戰城下敗績

按明史稿五行志從宋史例謂天雨紙錢為金之妖主旱主訛言不知妖人放蠱其術宜晴即用此以反風止雨故多旱民間驚恐故多訛言光緒三年亢旱

喧傳妖人剪髮每逢欲往往往落下紙錢即止或於
雨後拾得之大如車輪小如鷺眼遇病蠱者投以敗
鼓皮於亥時問之自云以紙錢為寶及擒獲紙人果
挾紙錢故知之

元史韓林兒樂城人也以白蓮教燒香惑眾其父名山童
與穎州劉福通杜遵道羅文素韓咬兒等謀起兵官捕山
童殺之子林兒逃入武安山中聚眾十餘萬據亳州國號
宋改元龍鳳元兵來伐敗走安豐明祖挾還金陵三年

歐蠱燃犀錄

原蠱

十一

按此則白蓮教之名元時已著與山童同時又有僧
瑩玉以妖術與徐壽輝鄒普勝倪文俊等作亂

通鑑明永樂十八年三月蒲臺妖婦唐賽兒作亂討平之
賽兒自稱佛母知成敗得石函中妖書寶劍役鬼神剪
紙作人馬相戰鬪衣食財物隨所須以術運致

按古今以妖術惑眾者每云知成敗能禍福人如置
盆照水即見人禍福事成敗之類皆詐也蓋謂人將
有禍即以蠱禍之禍果至謂已能轉禍為福即呼蠱

去禍果已謂人事有成即以蠱成之謂人事必敗即
以蠱敗之至於運致財物即蠱盜之術也役使鬼神
即隱形之法也嗚呼教匪以妖術愚人終歸於敗而
不知己為天下之至愚也吾願世人皆知其愚不為
脅從教匪且自悔其愚而不為禍首矣

明大事記嘉靖三十六年妖人馬祖剪楮為兵以駭眾民
間多懸籠籠籠籠四字以厭之

按此符已載字典

歐蠱燃犀錄

原蠱

十二

通鑑輯覽天啟二年五月山東白蓮教徐鴻儒作亂

鴻儒鉅野人遷鄆城萬曆末以白蓮教惑眾深州王森
云得狐傳以狐尾招人聞異香多歸附之號聞香教森
死其子好賢有異志結徐鴻儒鴻儒敗森走薊州又擊
家南走至揚州事露就擒

按蠱毒亦香王森自云得狐傳籌狐故智也嘗治初
中蠱者取出未及消化之毒丸聞有異香如鴉片烟
故知之

刑律凡造畜蠱毒堪以殺人及教令者斬造畜者財產入官妻子及同居家口雖不知情並流二千里安置若以蠱毒毒同居人其被毒之人父母妻妾子孫不知造蠱情者不坐告獲者官給賞銀二十兩

按蠱律甚嚴而世人不察宜乎蠱毒之盛行也律例輯註云蠱甚多有蛇蠱鴉蠱小兒蠱金蠶蠱等名以蠱毒人刻期必死有期在數年之後者惟金蠶最毒沈寃錄云蠱能隱形似鬼神其毒不一皆變亂元氣

歐蠱燃犀錄

原蠱

十三

金蠶一名食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉取其糞置飲食中毒人人即死蠶得所欲則日置他財使人暴富然遣之極難水火兵刃都不能害必倍其所致金銀錦物置蠶於中投之路旁人偶收之蠶隨以往謂之嫁金蠶又有藥思蠱狀似竈雞蟲如蠶豆大能變幻作小孩形遺嫁之法彷彿金蠶此外又有十二時蠱出南海如蜥蜴一日一夜隨十二時變其色乍赤乍黃傷人立死至於牛皮蠱犁頭蠱石

頭蠱席篋蠱針蠱鼠蠱蝦蟇蠱泥鰍蠱癩蠱腫蠱疔蠱以毒物合成之蠱種類尤繁難以枚舉或謂之放害神亦謂挑生毒蠱為鬼毒故或謂之蟲鬼苗人多能之故又謂之猫鬼干寶即謂之為鬼亦宜然則白蓮教之紙人紙馬實藉人之元氣以養成但目為妖術猶泛也直謂之紙人蠱焉可也

歐蠱燃犀錄

原蠱

十四

避蠱

山海經南山經青邱之山有獸如狐而九尾食者不蠱

註不蠱令人不逢妖邪之類或曰蠱蠱毒

按蠱亦妖邪也非兩義

尚谿纖志蠱崇有神夜出攝死者之魂光如曳筭流入人家當知防禦畜蠱之家其居必潔覺之爲女字坐則其蠱不靈

易簡方如入蠱鄉飲食潛於初下筮時收藏一片在手儘

歐蠱燃犀錄

避蠱

一

食無妨少頃却將所藏之物理於人行十字路下則蠱反回其家作鬧或食時讓主人先下筮或明問主人云莫有蠱否以筮築桌而後食則蠱不能爲害

按以筮築桌呪曰恭請神降臨唵嘛呢叭吽則蠱不爲害此呪並載瘟疫彙編極簡便畜蠱者多供瘟神避蠱與避瘟固無殊也

驗方新編將食時自帶大蒜食有蠱必當場吐出不吐則死主人畏累則不敢下蠱又葶薺不拘多少晒乾爲末每

歐蠱燃犀錄 避蠱

早空心白湯調下二錢入蠱家無害此神方也

按良醫治未病不治已病故備載避蠱諸方然此皆避飲食之蠱今之放蠱奇妙莫測古則人入蠱家方能爲害今則蠱入人家即能爲害但依古方無濟也或用庚蒿懸之庭戶或用朱砂雄黃預知子大劑佩之衣襟納之枕中或擇執日除日用避瘟丹於室內燻之惟帶薄荷油一瓶最爲捷便尤不如保養精神以固元氣爲避蠱要術也至於符呪本於攻說非誠

歐蠱燃犀錄

避蠱

二

不靈胡文忠公云思之思之金石可開鬼神可通此乃誠字真訣也然非人人所能且世間符呪傳抄多訛亦欠雅馴故不詳載

驗蠱

夏子益奇疾方云人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱也

按金蠶飛行有光凡蠱皆然即今世之紙人飛行亦往往放光

東醫寶鑑令病人朝起取井華水唾水中唾如在腳直下沈者是蠱浮者非蠱入蠱鄉見人家門限屋梁無灰塵蛛網者必畜蠱遇飲食以犀角攪之白沫竦起者是蠱也又

歐蠱燃犀錄

驗蠱

三

煮一雞卵去皮日夕含口中勿令破夜吐出着露中朝看色大青者是蠱也

按室中潔淨乃蠱死之鬼為之拂拭此驗畜蠱之法非所論於中蠱之家也

醫書滙參令病者含黑豆豆脹皮脫者是蠱食白礬不酸澁者是蠱

驗方新編一覺腹不快即以生黃豆或生綠豆食之入口不腥者中蠱也又以炙甘草一寸嚼之嚥汁若中蠱者隨

即吐出不出者非蠱或煮一雞蛋插銀器於內含入口約一時許取出蛋銀俱黑者即是蠱也

按中蠱頂心有紅髮疔毒有紅髮狗傷有紅髮亦一驗也宜拔去之凡驗法俱宜勿令病者知知則不應久病往往不應蓋由病者旁觀竊聽若為不知而實已知之也

歐蠱燃犀錄

驗蠱

四

蠱證

千金方凡中蠱心悶腹痛面目青黃或吐唾鮮血或下膿血或大便黑如漆或堅或薄或微赤病人所食之物皆化為蟲侵蝕臟腑盡則死急者倉猝緩者延引歲月死後病氣流注染着旁人謂之蠱症

東醫寶鑑中蠱者面色青黃是蛇蠱面色赤黃是蜥蜴蠱面色青白腹內脹滿吐出成科斗形者是蝦蟆蠱面色多青吐成成蟻螂形者是蟻螂蠱

敵蠱燃犀錄

蠱證

五

醫書滙參中蠱毒心腹絞痛如有物嚼或吐下血如爛肉或好臥暗室不欲光明或心性反常乍嘔乍喜或四肢沉重百節痠疼或乍寒乍熱身體習習如痺胸中滿悶或頭痛或吐逆不定或咽中如茅刺甚者十指俱黑

驗方新編凡中生蛇蠱腹痛吐瀉皮內有物堅實夜臥以手按之則腹內有物跳動心煩涎溢得食肉則止或移入脇下或跳心上時有時無年深作咬則通身發熱如有髮刺蟻咬夜間更甚其蛇無形亦無數此乃蠱家之外蛇從

風而至者也中陰蛇蠱吐瀉腹脹口腥一日常赤頭面上筋起如蟲行蚓行或耳鼻內如蟲行服解毒藥毒重則糞黑輕則糞藍兼癩蠱則人多昏慣兼腫蠱則一耳常塞一耳少厚中癩蠱心昏頭眩笑罵無常或飲酒毒發忿怒凶狠不可制中腫蠱腹大肚鳴未服藥如在臟外鳴服解藥則在臟內鳴疳蠱者匪人謂之放蛋又謂之放蜂端午日取各樣毒蟲頭髮等物研末其人常刻一小五瘟神即以毒末供之每借飲食害人亦有放在路上踏者則飛入人

敵蠱燃犀錄

蠱證

六

身粘於臟腑毒氣上衝則耳鼻內如有蟲行日久靜坐髮內如有蟻咬以手搓之則無或夜臥面上如蟲行口角如髮纏或肉忽跳動一手一足麻極未有不疑為風證者也蓋毒氣行於周身到處即如蟲咬非真蟲也毒入既深周身如蟲行頂心髮涼極如有蟲出入肉內此時蠱家所毒之冤魂與其陰蛇陰蠱隨而附之病者如聞飛集之聲旁人聞當風更甚周身如麻布通風或唇掀或手足指扯開加以問香則面起紫泡迨見白濁蟲生於內則真有蟲

矣中害神則額焦口腥神昏性燥目見邪鬼形耳聞邪鬼聲如犯大罪如見惡役持練來捕如有健卒持刀追趕常思自盡皆其證也

接近時人心愈薄為術愈巧則放蠱愈奇教匪剪紙為人即用以放蠱各帶毒物而羊毛席茂為最要飛行變化潛入人家乘虛為害或因人飲食隨其呼吸而入或從耳鼻入或從毛孔入不盡翦髮打印也既入人身據為巢穴一切毒物以類相聚教匪家之紙

歐蠱燃犀錄

蠱證

七

人亦相引而來或伏經絡或伏臟腑或伏膏盲問其所苦與中蠱一轍更多怪異或門窗無故自開或器皿無故自動或衣服無故翻轉或財物無故聚散或食少甚至三四十日不食以蠱鬼與之食也或食多一人兼數人之食以蠱鬼代其食也怪怪奇奇莫可殫述且各因病者性之所近變證百出不止時哭時笑一例瘋癲也毒既大發即不欲生或自戕或投井而自縊者尤多所以太平御覽蟲部有益女之名也

蠱脈

東醫寶鑑凡中蠱毒脈類釵股又脈浮洪而疾者生微細者死洪大而遲者生微細而數者死

驗方新編中蠱之脈多係陽分盛蓋蠱家毒物皆於端午日製之乘陽氣極盛之時以製蠱故中其毒者脈皆強旺所以利用涼清之劑也迨至六脈和平則愈矣

按此皆論其初病之脈日久則變故診蠱必察其平素之元氣盛衰當時之毒氣輕重中蠱之為時久暫

歐蠱燃犀錄

蠱脈

八

方為定論

治蠱

鐵圍山叢談金蠶毒始黔中及湖廣閩粵多有嘗見福清縣有訟金蠶毒者縣官治求不得蹤或獻謀取兩刺蝟人捕必獲矣蓋金蠶畏蝟蝟入其家則不敢動雖匿榻下牆罅必擒出之果然

本草綱目人中蠱毒欲知蠱主姓名取敗鼓皮焙焦爲末調服一錢酒引尤妙須臾病人自呼蠱主姓名令取蠱去卽愈又白蘘荷葉密安病人臥席下病者自呼蠱主姓名

歐蠱燃犀錄

治蠱

九

凡用此勿令病者知知之則不效

按敗鼓皮久服最妙不但能呼蠱主姓名韓文公云敗鼓之皮醫師之良也夫兩軍對壘一鼓作氣而援桴者之精神注於鼓皮皆合震動之義故爲歐蠱良藥柳州種白蘘荷詩云庶氏有嘉草攻禱事久恨炎帝垂靈編言此殊足珍本草云葉似甘蔗根似薑可以爲蘆南北皆有之並能治瘟余臆是俗名地瘤之類未敢自信徧詢無知者錄之以俟博識

尚谿織志有中蠱而臥病者燒病人所臥之贊則病者能自言下蠱爲何人

范石湖集蠱毒在上則服升麻以吐之在腹則服鬱金以下之或合升麻鬱金服之不吐則下

按此方治初病極效藥必用至兩許輕則無濟陳修園謂鬱金爲藥中惡劣下品庸醫每喜用之不知鬱金實爲治蠱要藥謂人爲庸適自形其庸已

驗方新編初中蠱在膈上者用歸魂散吐之白礬建茶各

歐蠱燃犀錄

治蠱

十

一兩爲細末每服五錢新汲水調下頓服一時久當吐出各色毒物用火焚之則反着放蠱之人死矣

按此說甚奇然多驗所謂害人如害己也

東坡雄黃丸治蠱毒雄黃明礬各等分端午合研細溶黃蠟和丸梧子大每服七丸默念藥王菩薩七遍或云藥王萬福白湯送下

按蠱爲熱毒不宜用熱藥巴豆尤不可用亦不宜輕用補藥惟以散毒殺蟲安神驅鬼爲要散毒如藥本

升麻紫蘇薄荷菊花白芷之類殺蟲如雄黃朱砂白礬鬱金菖蒲金銀花預知子訶子雷丸之類安神如黃精百合沙參茯苓神降香犀角之類驅鬼如庚青蒿山甲珠鬼箭鬼白之類初中毒宜吐如胡荽大蒜土常山馬兜鈴之類行旅倉卒頭垢吐蠱尤捷日久不愈或誤服他藥以致變證歧出則治藥非治蠱矣或元氣不支不得不加補藥以扶正除邪參芪歸芍勢在必須則善後之事也但此證最為纏綿難解前人

歐蠱燃犀錄

治蠱

十一

云蠱毒入心如油入麵終身擺脫不去不治固多死傷治之雖難或不至死人之壽夭各有定數妖人實不能操其算也常譬人如樹樹有空虛之處蟲蟻入而居之或去或留不過添一病處而於樹之生死無關也世人勿畏其難斯蠱可啟矣

光緒三年傳抄藥方彙本銀花朱砂訶子獨頭蒜

按此方用意極妙彙本能治百六十種鬼風毒症故以為君大蒜最能殺蠱故以為使不著分兩以備視

毒之輕重加減中毒重者藥必用至兩許方效惜世人用不過錢一杯水烏能救一車薪之火哉嘗製一方黃精百合菖蒲銀花鬱金白礬降香山甲庚青茯苓神預知子敗鼓皮朱砂雄黃訶子肉因證加減名之曰鎮心歐蠱湯施以吐下之後毒仍不淨服此最妙中蠱日久為痰血所裹鬼氣據為巢穴非山甲不能直達病所也方中惟預知子庚青蒿最為難得預知子一名聖知子出川中藥肆多未備青蒿到處有之

歐蠱燃犀錄

治蠱

十二

惟伏內庚日採者可以伏鬼肆中售者多雜蒿不堪用如無此藥去之亦可取效補藥中惟黃精能殺蟲仙家以為芝草之類華佗傳名為青薺別傳云一名地節一名黃芝其實即黃精也佗秘其術不輕示人故鮮知者宜其卒以賈禍也治蠱用雷火桃木針亦妙或按穴或隨其患處針之呪載景岳全書但易其百病消除萬病消滅為針蠱蠱死針鬼鬼絕即是切題佳文用蕪艾隔蒜灸之亦妙宜灸鬼哭穴及乳後

三寸肺俞三里均百壯而膏盲尤爲要穴孫真人云
醫緩未諳此穴故晉侯之病不治如得此穴隔蒜灸
之或百壯或五百壯二豎子不難毆也余仿此兼取
震以治蠱之義以絳囊尺餘實以雄黃築堅縛緊按
膏盲穴震之或隨其患處震之數計十萬時須年月
震動周身蠱不能居亦良法也針十三鬼穴亦妙但
鬼藏一穴男在會陰女在玉門頭爲溺孔之上端與
男不同故全穴施針最難余易以薄荷油點法較捷

歐蠱燃犀錄

治蠱

十三

且病家自能爲之薄荷油藥力猛烈最能殺蠱透入
肌膚無微不入故宜序點之取效極速隨其患處點
之亦可又不獨按穴乃神也灸灼成瘡點之更妙古
人用薄荷水遜此遠矣或用殺蠱諸藥加透骨草拌
麩和醋炒熟布包更換隨處熨之亦效又羊毛
瘟古無此證至明萬厯間始有之用蕎麥麵搓之羊
毛自落說見瘟疫彙編奇聞寄所寄伏讀

御纂醫宗金鑑中備載羊毛疔一證謂肺主皮毛風寒入內

鬱而爲熱清虛之府變爲穢濁之區而毛其生矣有
五色者有長至丈者治法投以五味消毒飲卽用青
布包雄黃末蘸熱燒酒擦前後心先擦大圈後擦小
圈擦前心則羊毛奔至後心擦後心則奔至前心反
覆擦之羊毛乃出掘坑埋之敬按此法屢試屢驗其
證頭痛發熱心煩欲吐昏迷不省人事甚至牙關緊
閉不必皆有紅黑斑點也且有擦出各色雜物者不
獨羊毛也蠱之性如蟻凡物皆拖入人身徧塞經絡

歐蠱燃犀錄

治蠱

十四

以及臟腑非治之不出也或云羊毛何以能奔不知
此奔字形容盡致蓋羊毛乃毒氣化生見藥知避奔
行最速引伸其義不獨奔前奔後卽上下左右無處
不奔而施治之法亦可無處不擦之也近世妖人合
成蠱毒多以羊毛裹之蓋羊毛有毒卽羊過水有人
隨之過者必中毒作癢可知也且凡毒物皆奔又不
獨羊毛也當此蠱毒盛行隨風變幻人感風邪毒以
類化非蠱而亦可以治蠱之法施之是蠱而亦可以

治羊毛疔之法施之也且無論內治外治必力足而後效如灸擦搓熨諸法病者云心煩卽是中病切勿遽止致令蠱覺再施不靈也

歐蠱燃犀錄

治蠱

五

蠱案

嘗治一人被剪髮一縷當時撲獲紙人側形持刀焚之仍覺煩悶求診囑令口含黑豆一粒少頃皮自迸脫卽以歸魂散吐之吐出羊毛爛紙等物兼有黑星子詳諦之乃蠱毒丸也或塊或片皆以羊毛團之復有麻繩寸許一頭結一頭散上粘乾蟲無數如小蛆因憶寶太史外科載造蠱一條云奸人於端午日取毒蟲精液合成針蠱針皆無孔卽其親屬有願養蠱

歐蠱燃犀錄

蠱案

一

者以毒入飲食中日久腹內生蟲居於心肺蝕其臟腑苦楚難堪惟飲百沸湯少安迨其人死蟲從七竅出死者心肺如蜂房入火不焚取蟲陰乾合成毒蠱行以害人蠱入人腹得血卽活蓋卽此也遂投以解毒之品加以養正之方調理得愈

一人身被藍印自以穢布拭之其色已落仍覺未快復來求診余曰毒未除也囑令嘗白礬味甜不澁嚼甘草煎汁有羊毛自喉間迎出遂以甘草三兩生薑

四兩濃煎服之外以避瘟丹燻之毒解神清而愈
一人被割衣襟一縷當時撲獲紙人一箇來求醫與
以胆礬二錢茶水冷服吐之吐出紙毬十餘枚拾置
新磚上俟半乾展視之皆紙人也蓋紙人飛則展開
落則團伏各帶羊毛席篋有挾紙錢者病仍未減至
晚爲灸鬼哭穴縛定病者兩手指去甲分許騎縫
隔蒜灸之病者欲哭終灼之卽頓醒覺耳中熱氣全
湧有物飛出直撲窗間幸窗間施以重簾塗以雄黃

歐蠱燃犀錄

蠱案

二

懸以庚蒿不得卽出撲獲之乃以血點紙僧高五寸
許血爲活色凡人之血點於紙上淡則黃濃則黑不
能如此鮮紅也另有紙劍一枚血點七星紙胡蘆兩
筒以髮繫之內有沙土一撮塵尾一柄以羊毛爲之
隨卽拘入瓶中鎮以雄黃蠟紙封口俟夜靜於十字
路口掘深坑埋之取車馬往來震以治蠱之義而病
仍未減余曰毒未盡也再灸乳後三寸穴百壯通身
大汗沙土羊毛隨之以出肋下又出爛紙一團隨見

紅紫斑點一片余曰毒深矣聞之紙人有雄有雌其
必有雌伏乎爲製敗鼓皮三錢以酒爲引夜間自呼
其名爲白蓮教某人之妻久挾妖術害人曾經官捕
無左證未離法網不幸敗死於此悔無及矣再治之
更獲一女象紙人而愈如其言密訪之果然

一小兒尙未留髮頭上似有燒痕一片卽覺昏迷來
求診余曰是亦中蠱也內服解藥外以苜蓿雄黃大
蒜重劑煎湯洗之身上迸出麻繩寸許者無數不卽

歐蠱燃犀錄

蠱案

三

毀之轉瞬遂杳此兒今已成入矣

一人被截髮求診與以解毒之方并囑以青布包雄
黃末加山甲皂角末蘸熱燒酒擦之擦出羊毛無數
耳目中皆有羊毛團迸出再灸乳後三寸穴卽有小
蟲彎環色如薑汁從毛孔出又有如鼻涕成條者乃
大蟲已死其皮殼從大便出其精液仍從毛孔出故
如鼻涕也蟲形彎環故知其毒中有金蠶糞蓋形以
類成也再爲灸之被截髮端出膿而愈

一人被剪髮家多怪異嘗見巨蛇卽之則杳因來求診囑令先服敗鼓皮一日病者臄上腫起如桃以薄荷油點之病者大言曰汝漢教甚是利害竟能制我復與雄黃酒擦法擦出火石碎塊無數守者以紙包之持求余驗行至滋河灘中遂隔紙飛去止留一塊其家求醫不誠無從深治至今其人無恙癡呆而已蓋毒蠱已結巢穴伏而不動故似無恙也

一人煩悶似中毒求診余曰可治病者忽大言曰汝

啟蠱燃犀錄

蠱案

四

不能制我余笑應之曰孽蠱何敢乃爾卽汝等教主我亦能制之余卽舉手作欲擊狀病者覺心中如有石墜霍然頓醒問及前言乃茫然囑令以薄荷油點十三鬼穴并點巨關乳後三寸肺俞膏肓諸穴點訖且加紅靈丹等物雜治之病者復昏不知人又大言曰我去我去汝不放我奈何又加點之從衣襟下獲一紙人而愈
一山西賈人十五六歲在北蘇鎮獨見一乞丐逼近

己身急趨避之趕至厨內強以羊毛塞口中遂病來求診囑令先服敗鼓皮至晚自呼爲晉州人其主人胆小因而不治

一人未經剪髮一日自來求診問所苦則常行入井不須人救昏迷之中仍出井外再問之則口中常吐麻團腹中覺有病塊余知其元氣未衰不至譁疾易治也與以解蠱之方十數劑而愈

一人被割鞵底初不知也病作求診詢其由乃知之

啟蠱燃犀錄

蠱案

五

與升麻一兩吐出磚瓦灰土碎塊無數再吐葱鬚一團因憶方書所載一人肋下腫起如桃服升麻瀉葱一株根鬚全具卽此類也復爲灸膏肓百壯條有一物飛撲窗隙礙簾而止獲之乃紙人其形短小精悍血點雙目甚工如法拘之至晚病者覺枕中有異折而視之搜得紙毬如豆二三枚展之皆紙人也夜間又覺有物飛起上觸承塵簌簌然至曉爲余訴之遂授以燻藥嚴閉門窗施以重簾燻久之啟扉搜檢於

一書... 2 反文內

鼠穴中得紙人無數皆死矣病者遂愈每獲紙人以
雄黃絳囊震之呪曰震天天開震地地裂震蠱蠱死
震鬼鬼絕吾奉太上老君急急如律令往往見血震
之無血故知其死

一人見門首有募化者云濟南僧施以米謂之曰近
來妖幻甚多汝等異服人宜遠避僧作指點而去歸
卽病作求余診投以解藥病者夢見紅鞵僧來乞食
隨閉戶以禦之醒言其異余曰元氣已固邪不能侵

歐蠱燃犀錄

蠱案

六

試搜之牀下得一紙僧血點雙足宛然如所夢按法
治之得痊故凡雲遊僧道醫卜星相來路不明之人
均宜嚴防作怪而詐稱逃荒者尤屬可惡是則爲民
上者之責也良醫不得過而問之

一人病蠱屢治屢效一夜忽大言曰我十八名高第
弟子盡敗於此特來相會病家急延余至此之曰汝
來亦無能爲也將擒汝矣條有一物將燈撲滅勢欲
遁觸窗櫺鏗然其聲甚厲適持燭至見一紙人高尺

餘倚窗而立血點雙睛眈眈視人如法拘之病者從
此遂安俗傳白蓮教剪紙爲人一寸變象一尺一尺
卽變一丈此物變象殊覺駭然

一秀才爲人訓蒙師適游學者出取茶飲之覺有沙
土入咽遂生煩悶其主人用我法以石榴皮煎濃湯
令頓服之得吐而愈追詢其主人見異物否曰吐一
毡片已棄之矣余笑曰非毡片乃紙人所挾羊毛也
其毒恐未淨後復詢之云一腿常腫按之作沙土聲

歐蠱燃犀錄

蠱案

七

囑以常服解毒之藥卽愈矣今未知何如
一小兒常見室中有烏覓之不得問於余囑令門窗
悉罩以網復以庚蒿燻之條有物飛起挂網而止乃
一紙烏斯紙作翅捻紙作頸紙尖作喙血點作目燈
烟作色以烈火焚之遂寂然蓋庚蒿可爲燻藥亦可
單服能療奇疾而於財無損最宜貧者

一人病蠱授以解藥服之日人夢見二豎子雄雌各
一旁一豎子稱之爲哥嫂云此處不可居矣盍歸乎

遂檢其家具以袋裝之將去其雌語病者曰居此人情頗洽今去盍相送病者許之行至外室畏余不敢從戶出擬從窗間出病者曰我不能其雌曰試爲之上攀窗櫺於袋中取刀一柄割窗紙如矩上下左右皆隔空爲之伸足卽出病者從之微覺窗櫺有刺傷脇下送至大門不敢出繞至別院始得出路遇村人往來皆識之至村口其雌曰請勿遠送宜速歸歸而遂醒脇下猶作痛也以爲異爲余述之余曰蠱眞去

歐蠱燃犀錄

蠱案

八

矣試驗之窗紙果有裂痕如矩式櫺果有芒刺櫺上紙且有瓜痕宛然如所夢詢之村人所見皆實次日病者聽屋上蹙然有足音訴於余曰須防之至晚病者復迷卽以薄荷油點之點至肋下病者作哀求狀曰我誤信伯父言學白蓮教害人已隨哥嫂去失一葫蘆寶物也不忍舍之來取竟被擒頭痛不可忍其死於此乎聆其音似冀州人兼京腔隨獲一紙人頭腦皆裂猶帶薄荷油味云

一人病蠱服敗鼓皮聞二豎子相語如在樓上下者一呼曰去去一答曰否否爲余訴之余曰藥力不及也加其劑適值雷作從病者上星震落一紙人帶一丸羊毛裹之嗅之有異香上星卽鬼信也蠱伏此穴往來與眾蠱報信至夜半病者恍惚中見一巨人背負一小兒曰去去病者心知其異遂強起力撲之果獲紙人如所見猶嘖嘖作聲弁如法毀之

歐蠱燃犀錄

蠱案

九

一人倏見一被髮人貌極凶惡覺不快求診授以燻劑果獲之乃紙人女象其被髮亦以紙縷爲之滿面血痕殊駭人目又見一小兒跳躍入病者耳中取出視之亦紙人病遂痊
一人病蠱內服解藥外用點法臑上忽然腫起欲成瘡余曰非瘡也再點之復以雷火針針之隨有物飛撲窗間旁一貓極肥壯躍而攫之獲一雀食之食訖復於窗隙爪探一物舉而嗅之奪視乃一紙毬展之入也血畫滿面象極凶悍乃悟貓能殺蠱故降之然

非壯不能此後病者仍覺心中蠕動囑以雄黃絳囊震其背迸出一巨蛹而愈按蛹能化蝶此證往往於室中見蝶如鬼祟卽此物也亦有以紙剪成者華陀外傳治出針碁黃雀等物明是毒蠱乃秘不肯言終於無後世人復尤而效之何也

一病蠱者服敗鼓皮等藥見二豎獲其一乃夾布人雌象側形極刁悍懷抱小兒以針綴之一手以針爲指以絳囊震之頭裂血出復震之胸裂心出審視乃

歐蠱燃犀錄

蠱案

十

以芝麻一粒爲之猶帶血也加其劑用黃酒引至夜靜問之自呼爲某處人某名自某年來甚悉又云在廟後住或在樓上余曰心爲神廟心包也樓髑髏也加引經藥再飲之次日病者覺有物入袖中刺脇下作痛取出之亦一夾布人雄象以針作指震之亦見血因憶三岡識略載明季南方有紙狐夜入人家抓小兒撲獲之乃以針爲爪亦此物也再加劑且灸之病者變聲大言曰我僕誤聽哥嫂言學白蓮教欲得

好處致困於此悔無及問居何處曰太陽經間帶何物曰點心一匣已食其半針一束以線穿之已失落數枚及獲之乃一藍葛布人通身血點碎蠶一包蠱所喜食也經人身真火煨煉置手中熱透手背有一針以紅線紉之并其餘針四十餘枚縛爲一束拘之瓶中埋之十字路口病者遂安

一人病蠱覺膝蓋內有物旋轉如風輪砭之觸撥有聲起針隨落席篋一根針眼宛然至晚喉痛作以薄

歐蠱燃犀錄

蠱案

十一

荷油點之隨落一物詳諦乃合于白小蛆結成一團潔白如水角狀喉痛立止少頃膝蓋內復動余曰此內針不易及藥不易達有物未可猝獲囑令以藥熨之藥氣燻蒸易透熨之久病者曰內又旋轉甚急但我力不能支恐不得生余爲診之六脉和平曰無妨試忍之倏落一物病者霍然檢視乃一麵人身有血畫如法拘之病遂已

一人病蠱其家人見有白貓紅目竄入室內尋之杳

然余聞之曰是卽所謂貓鬼也投以燻藥未獲次日病者恍惚中見一紅目白髮老者跳躍作吼聲驚以告余囑其家人多備藥物嚴閉門窗施以重簾塗以雄黃所備甫齊有物撲窗欲遁獲之乃以高粱稽去皮刻項作人形以大針爲兩臂上服白紙衫下服白布禪周身粘以極細白毛兩目皆赤急以絳囊震之血卽出病者曰又夢見一女子白云與人作妾夫已死當尋自盡持繩一條匆匆而去醒言其異余曰可

歐蠱燃犀錄

蠱案

三

於室內覓之門上插庚蒿一束似懸一物卽之乃藍葛布人以青絲一縷作一套縊死矣復加敗鼓皮重劑投之夜半自呼曰我是死者某人妻年同八十餘歲世傳白蓮教來此已久今果敗死不足惜也問曰汝何嫁一紅眼子曰我亦眇一目又問誰家一妾在此尋自盡驚曰勿怪不見他是我家小婆子竟先我死矣可嘆可嘆隨飛落一滑石猴食已過半乃小兒要物蠱盜之手者又一物飛出再覓之得一人亦以

束稽穰爲之以針作臂上服紙衫下服古銅色幕布緞希果眇一目周身圍以白毛亦於門懸庚蒿上以白髮一縷作套自縊矣庚蒿可以伏鬼蓋死於其所伏也急解下以絳囊震之微見淡血蓋氣猶未絕也俗傳白貓紅眼行踪如鬼者爲八狐子善搬運人家財物不知卽是此物夫畜蠱本爲搬運起見但有主之蠱卽爲畜蠱家置財無主之蠱亦爲病蠱家置財運衰則復搬去所謂蠱盜人家不安也前賢著錄多

歐蠱燃犀錄

蠱案

三

謂隱形者爲狐魅紙人爲妖術實皆造蠱法也惟千年老狐始能隱形通人性工妖術故教匪往往詐稱得狐傳今之蠱害數倍於昔如謂狐也安得如許多狐散布閭閻蔓延天下哉此說可爲老狐鳴冤一人病蠱家中多怪異且不和求法於余囑令合家忍耐勿忌諱勿忿爭復授以藥常服之間日以藥常燻之獲紙人千百竟平復此卽所謂邪不侵正和氣致祥也或謂邪不侵正之說未確不知此乃要終言

之自古正人受害千百世後其冤可白善家中蠱數十年後其毒可毆如謂善家必不中蠱將何解於小人之害君子也害正方為邪此理固明明可見矣

一人病蠱嘗見有異禽入室飛行變幻求余診曰是亦蠱也李士材謂傳尸蟲能變禽獸形妖人造蠱兼用尸蟲即謂之傳尸也亦可囑令以藥燻之有烏一雙飛撲窗間觸簾而止獲之乃血點紙鳧也一雄一雌再服毆蠱之劑從頂心飛出一真瓦雀見血少許

毆蠱燃犀錄

蠱案

十四

又獲一雄雞以夾紙為之內夾紅絨冠以餘絨垂之至末作尾震之血出無論物之真假紙人皆能挾之以入人身服藥力足加以燻之則邪氣漸衰設法可獲否則飛行最速變化最奇即複壁密室亦不能禁未易擒也

一人病蠱室中窗紙多孔詳諦之有出入痕囑令嚴防以藥鎮之乃知紙人紙鳥往來所經復燻之隨獲紙雞等物而愈

一人中蠱掌中嘗覺蠕動求余診密囑其家長者伴以戒尺責之指縫中打落紙毬數枚展之皆人也為灸鬼窟逾百壯覺手背作癢墜一物亦似紙團色微黑展之鰐形頭尾相接屈如環故知為金蠶毒所化此後凡蠕動處灸之即出不便灸者易以雷火針皆能取出貓喜食之

一人中蠱身上衣服無故翻轉且往往有火光余曰是易治也投以解藥隨獲紙人而愈

毆蠱燃犀錄

蠱案

十五

一人病蠱治已愈矣惟室中未淨復以藥燻之條有物飛起粘於窗隙摘而視之乃一紙包內有紙人皆雙髻并有紙錢紙瓶紙剪紙圈紙胡蘆紙腰子并羊毛梓炭各色雜物如法毀之室中遂安

一人坐牀上條若有人推之下問於余囑令燻之隨獲一紙人復於牀上懸帳折疊中獲一紙包內有羊毛梓炭等物遂寂然

一家患蠱其長者至夜不寐束衣執劍秉燭危坐更

深時屋上足音蹙然者三卽聞內室窗紙作裂帛聲急趨視之窗紙已破猶帶濕痕再聽寂然次日又聞夾壁內如飛鳥撲跌聲求法於余密囑多備燠藥隨以火盆入夾壁加藥於上將壁扉四圍封固中留一隙竊聽之內作往來趨走聲甚繁旋有一物推扉作響探頭出卽獲之乃紙人高尺餘血點耳目手足以法拘之囑令將壁扉中隙并封完固約三日後再啟之如期開扉細檢紙人死者甚多一磁壺聞之有尸

歐蠱燃犀錄

蠱案

六

臭揭而視之紙人爲藥氣所迫相偕遁壺中已盡化爲血水矣其家遂安至今子孫繁盛

一家突遇山東逃荒婦人頭裹藍巾持其家人之手以一手拍頂心誇曰好好卽去次日其家人忽仆問之似癲延余友診之友歸謂余曰是蠱也我不能治君盍招其父兄而授之法其父亦余好友也遂授以吐蠱法服藥至夜半大吐吐出紙團數十枚其父用草墩蓋之意至晨再毀比曉啟視已盡飛去至午病

者在院中乘涼忽來一紙人翦髮一縷騰空飛起眾人仰視皆束手至晚病者方食驚曰飯中有髮一縷已下咽矣來問方余授以雄黃酒擦法從前心擦出髮一縷卽原物也再授以敗鼓皮服之病者聞二豎子相語一山東音如在村外遙呼曰宜去矣一答曰卽去其兄爲余述之曰蠱易敗矣授以解藥重劑囑其兄守之必見異物詢有熱氣從耳鼻中全出卽其候也速擒之勿令逃遁時酷暑其兄畏熱未施重簾

歐蠱燃犀錄

蠱案

七

病者曰熱氣出矣一鳥從鼻中飛起穿窗而去病遂愈

一時喧傳妖人用五色印人家竈神殆遍余曰是卽所謂惑亂人心也有求方者授以燠法隨獲紙人各帶紙袋內裝紅綠各種顏料木刀一柄紙人卽以此刀蘸色印之旋復寂然
一婦人每覺寒噤頂心卽生紅髮一縷其色甚鮮拔落復出一日其母持紅髮來求診旁觀驚駭皆遠避

余卽授以攻藥狂發其母不能制遂囑令常服敗鼓皮後數年愈

一婦人其夫墜崖死因改嫁忽見其前夫來作鬧合家不安其後夫求法於余授以燻藥其前夫求去且索飲食其後夫以酒食送之村外爲余述之余曰未可信也後果復至又授以擦法病者自呼不可支矣燈忽滅其夫取燈復擦而病者已蘇語其夫曰勿徒費事恍惚中已見眾豎子共扶一物周身皆足從窗

歐蠱燃犀錄

蠱案

六

中出再擦亦無益也其夫遂止而病者仍覺不快余授以鬱金一兩方連服三劑下物如漆如靛如車轄脂中有紙包滑稽升許從此遂安

一中蠱嘗覺肩背如有物壓求診授以絳囊震之屢獲紙人猶未盡余曰世俗有抓病法姑試之遂從其肩背上用力抓之病者喜曰已抓出矣啟衣視之乃紙一張方尺餘遂愈

一時驚傳妖人截髮獲鹿縣有被災者當時捕獲一

偽僧背黃袱中有紙物送縣究治適某公署理到任仁人也研訊之不服刑之當堂呼其師曰許救我今遭難曷弗來次日復重刑之遂詈其師曰許救我今不來欺我乎痛罵之公曰此眞口供也月餘瘵死余嘗密稟某公十年內畿輔近地必有教匪滋事須預防之今復質之某公當謂余不謬也

一人從外村歸手執金魚一瓶路遇一人不相識詰之曰汝身上衣衫何在自顧之已脫尙未知也遠望

歐蠱燃犀錄

蠱案

九

之在前當路相距數十步後亦無恙因憶明季北略載都中人身上衣服往往被攝至西山頂掛樹杪卽此類也蓋人之中毒與否以元氣之盛衰爲準不關乎善惡又不關乎老幼也明被害而不受毒者有之未被害而受毒深者有之是中毒與否亦不關乎翦髮也此毒蠱惑人之妙用也

一病蠱年久一膝臃腫如鶴內常翻動醫者皆謂鶴膝風而藥多不效余曰是蠱也授以雄黃菖蒲大蒜

重劑加白芷銀花之類洗之而愈仍覺未快再授以
擦法熨法間用之其毒物如針如錢暨羊毛席篋線
頭布縷頭髮棗核之類悉遁入枕中盡搜毀之而終
未獲一紙人乃中毒日久結為巢穴紙人伏於穴內
治之中病即送出各物以塞責如流賊敗走之沿路
棄金帛也病家亦往往見獲異物遂驚為奇效而不
疑其毒未淨雖有良醫亦難強以再治故紙人終不
肯出

歐蠱燃犀錄

蠱案

干

一賈姓家有停柩俗忌犯七屆期請鄉鄰夜間擊鼓
鏡鈸齊鳴名為救七至曉門外牆上及亡者妻頭上
皆有血痕如潑來問余余曰汝村中數年前各家門
口有雞爪血印即血蠱也今已震破無妨矣因此益
知古人儻祭之禮為歐蠱之要
一家並無剪髮等異有女孩纔九歲四十日不食一
旦忽傷食大吐有肉片乾粉之類問之從何食此日
有兩婦人引我到外村赴席其家有樓閣富室也遍

訪鄉鄰日內並無作此食者其父士人也執劍叱之
曰是何妖魅有何冤仇迷亂我家小兒女四圍斫之
少息背後響聲甚厲如銅帽火復有磚瓦投至不傷人
其父為余述之且求方余授以諸法雜治之一日病
者言曰我去矣其父疑非實曰願焚香誓之如不去
者雷擊死此後病者遂復食

一人嘗閉氣且思自盡繩索往往無因而至余授以
擦法覺前心有芒刺擦出活蜘蛛一枚為余述之囑

歐蠱燃犀錄

蠱案

三

令再搜室內見異物即如法毀之其家人搜之無所
獲遂出留一守者憎室中暗揭去重簾甫見明一物
飛撲窗上守者急擒之乃一紙蝶巨如扇余索觀已
焚之矣今世病蠱死者往往見蝶飛去俗傳所謂傳
尸蛾者即此類也有真蝶乃巨蛹所化蓋飛潛動植
各物既入人身即能隨人之元氣變化生長就人之
飲食以為飲食如小兒科中蟲證或食土炭磚瓦碎
糞等物人不為怪而獨昧此何也

一鐵工在茶肆中倦臥條有一縷黑風猝至驚起到家卽病頭痛發熱咳嗽吐黑痰如風色醫家治以中風不效來求余診余曰此卽所謂鬼風毒症也投以湯劑以藁本爲君解毒諸藥佐之數劑而愈

一木工妻夢中產一小兒寤卽不見嘗於夢中乳之驗其乳如真病漸作爲余述之余曰是蠱作祟也與汝毆之授以解藥一劑而其兒瘳再劑而其兒死其妻猶哀憐之云遲數日其妻頭腫如瘟復爲治之病

歐蠱燃犀錄

蠱案

三

遂痊

一叟年六十餘歲其妻自縊死鄰村演劇往觀之傍晚歸路遇一女子年及弱冠一與偕行謂之曰苟愛我當從汝答曰貌誠佳何眇一目女曰汝村成先生針壞一目至今猶恨之也成先生者羅莊人性忠厚學博品端嘗得異書工符呪歐鬼狐已隔世矣女與叟紅鞋一鈎約寸許納之神中歸而玩之女卽至勸其自縊叟惑之每尋自盡其子孫遵守之一旦

其第三媳爲蠱被得紅鞵曰妖在是矣宜翁之欲死也以斧斫之投諸火傍晚入其室聲不祥其嫂趨視之見其姊伏牀上以帶紵其手束入肌裏猝不可解扶其首口中有物急探出之乃棉花繩抽一枚復有再抽之仍不能言詳諦之喉中仍有一繩探出之極長是兩枚并爲一接處絕無痕始能言問之云入室見其夫怒視之隨昏仆他不記憶詢其棉花繩在門後瓦礫中蓋石板揭視之則散一把少四枚口中抽

歐蠱燃犀錄

蠱案

三

出乃三枚其長者兩枚并一也轉瞬卽變幻如此非蠱毒不能次日其家人以車載其媳來求診余望之若呆診之脈數日因驚致疾無妨也遂授以歐蠱安神之劑囑令常以藥渣燻室內并可救其翁後果安其翁以善終因憶聊齋志異載蓮香一則亦此類也第文人弄筆潤色過當遂致失實耳

一士人嘗應童子試甫畢卽思自盡其父來求診曰此子乃繼母倚不測何以自解請爲治之余見其皮

膚穢疏毒易從表出授以外治諸法果治出各色毒物而愈旋赴郡試取第一遂入泮蓋瘦人腠理密毒易從裏出宜內治肥人腠理疏毒易從表出宜外治因是愈知毒蠱之不能禍福人也其家用一績麻者病咳每夜咳甚則室內無故拋磚擲瓦至晨常滿筐以手拾之輒麻木代求治并授以解藥而愈

一年老婦人倏覺有若貓者登牀上遂病每日恍惚中有人報信促其自縊來求診余曰是卽所謂病貓也

啟蠱燃犀錄 蠱案 三

鬼也投以解蠱之方稍安其家富而慳於藥資余聞之曰惑深矣恐乘間竊發終難救也適值其子赴郡試遂縊死

一家書館內嘗見怪異一日先生歸散館鎖門及返封鎖如故而書籍皆失意謂盜也置之旋於井中得書數本怪之後數年復於間室櫃中得之皆謂狐也余曰不然是蠱也試觀之又遲數年其學生已長父母俱存別無兄弟家道甚和忽於暗室挽繩作套伸

頸入套吐舌瞪目作自縊狀固未死也問之曰渠等教我如此余聞之語其姻家許以能治按其腹中有塊時上時下蓋卽蠱之巢穴也調治半年而愈

一婦人無故自縊已救還矣但不能言必作聲如唱而滴水不能下咽諸醫束手勢將斃矣求救於余曰是爲鬼氣所縛也授以解蠱之劑其夫曰滴水不下咽奚能服藥余曰歸試服之飲藥少許閉口卽下矣試之果然但腹中覺有病塊余曰蠱已入穴不易除

啟蠱燃犀錄 蠱案 三

也但見其性情變常卽投以解藥必不至縊死矣屢來求方至今無恙

一小兒登高一見在下以竹竿承之截傷其臀隔數日傷已無痕肋下忽腫起成瘡不出膿瘡內多布縷延女巫視之女巫不解乃詐曰前日某小兒以竹竿戳入者也其父母卽向前小兒家作鬧共質於余因述驗方新編奇疾中瘡內出瓜果烏雀雜物以狗糞之白而乾者燻之出盡自愈名爲鬼崇實蠱毒也授

以治法其爭遂息近世婦人中蠱自盡因而興訟者多夫家往往破產爲之上者皆能照洗冤錄各法驗之以釋其疑爭者自己其功德詎可量哉

一人爲長者壽而祝以哭其家人怪之求余診曰六脈微細不可爲也卽治亦不過爲後人除害耳治出蠱蟲以千百計一日以絳囊震之噴出火光一道追而視之乃枕中蕎麥皮也蓋人之靈氣通於枕中元氣旣衰則鬼氣來伏因而運入人身經眞火煅煉故

歐蠱燃犀錄

蠱案

美

震之有光也侍者復見異禽巨蝶而未能撲獲可知用藥治病必藉人之元氣乃靈元氣衰不能助藥猶之乎藥力微不能治病也

一婦人十九歲風顛不省人事其家人以牛車來求診六脈不遲不數浮沈皆得元氣充實也授以殺蠱重劑病遂已一日覺鼻中有物呼人視之乃蠅從鼻出又覺耳中有物乃蜂從耳出時固未敢螫也其家異之述於余復授以外治諸法一日覺目中蠕動出

一小虎以棉絨爲之跳躍而下捕之納玻璃瓶中又覺額上作癢跳下一小西洋狗黑白花頂繫金鈴捕之未獲又覺脇下如針刺擒得之乃紙人紙馬也并拘入瓶中呼鄉鄰聚而觀之非馬乃獅子象猶顛動如生云次日晚有巨蝶五從門隙飛入挾瓶欲遁家人共以帚撲之瓶落蝶乃飛去遂掘坑埋之此後寂然病良已

一婦人年六十餘歲嘗見牀上有小兒手足重疊以

歐蠱燃犀錄

蠱案

美

百數侍者亦往往見之來求診六脈皆實授以殺蠱重劑囑勿多服恐氣血衰不任攻伐也其甥觀其效擅取十餘帖服之竟愈

一婦人病顛其母家兄來省乃持刀作鬧其翁姑鎖之於室內少頃其遠鄰來呼曰快喚汝家風媳婦在我家作鬧多時矣封鎖如故不知其何以出也其家怪之以牛車載來求診六脈皆實遂以重劑投之得愈

一士人患鬼迷來求診日赤耳焦脉如釵股授以殺
蠱之劑其親友嚇之曰必治汝矣病者懼傍晚病者
欲臥已褪禪侍者進藥失病者徧覓不得跡至安平
相距二百餘里轉瞬至着一破禪問之云一老人與
以遮羞條不見家人欲面謝遍訪無知者歸而再求
診病者曰如強我服藥又去矣其家人懼而止因知
俗言鬼駕亦中蠱也

一時驚傳妖葛雞翎是仍剪髮故智也預以雄黃朱

歐蠱燃犀錄

蠱案

夫

砂拌五色雜糧飼之當免蓋雞羽燒灰揚之可召天
風黑狗皮燒灰揚之可止天風妖人或剪此以資呼
風之術歟

深澤縣某人路過賣剪者以錢四文易一鏡剪喜甚
歸而示其家人乃紙剪也余聞之曰徐觀其異其家
必有中蠱者隔年餘倏失一媳徧覓不得訪至舍下
囑令歸而求諸井必得之後果然

一士人家見逃荒者紛然入客庭談笑大作其家長

者急趨視之竟闖然訪之鄰佑並無見者急歸家而
鬼已入腹矣然心終不惑遍求治法嘗見多人往來
識其妖也力疾捕之後漸少聞余名來求診六脉如
釵股是眞中蠱而年逾五十不易治暫以薄荷油點
舌下其腹中有二豎相語一操蠻音曰汝出迎看如
何一操北音曰我已出迎被傷歸遂飲泣爲針諸蠱
穴撥針作響蓋蠱帶席篾等物伏於經絡針已及蠱
蠱不能脫而人之氣血往來衝動故作響也旁有一

歐蠱燃犀錄

蠱案

夫

厨夫素習符呪願施治病者許之及作法二豎乃大
言曰汝法尙不及我奈我何厨夫懼而退余復授以
解藥而去今聞病漸減爲人訓蒙師其病終將愈是
卽所謂邪不侵正者歟

一學生病瘟初愈元氣未復適聞余與江西黃姓妖
人爲敵出而觀之遇妖婦以指點之歸家病復作其
家未暇求診也迨妖人已伏逐出境隔數日矣始求
診余日中蠱矣何不早言令取去略爲施治怪異迭

見病者欲飲其祖母爲取涼水方置几上而水已翻滾其母瞥見牀下有黑犬病者卽呼逐犬覓之已無踪授以擦法擦出犬毛絲線等物納諸瓶中牙縫復出一蟲如海參狀有四足其祖持以視余未及入門轉瞬復飛去再診囑其家人曰元氣敗矣恐弗救一旦氣絕肋下猶出犬毛無數死之狀與洗冤錄所載悉符合家驚惶未暇埋其瓶棄水中至夜瓶仍還故處問計於余囑令燻之乃安

歐蠱燃犀錄

蠱案

手

近來蠱症甚多皆係舊病復發投以解藥無不效而巢穴既深根株難拔且病家類多柔懦不能自振現有一人睡至晨倏不見旋於隔鄰櫃中得之鄰不知也其象甚凶狠家人縛以求治授以吐下諸法約次日改方隔數日杳無音信聞其母不忍強令服藥蓋陰之爲性安無事而惡有爲故易爻以幹母之蠱爲難由此觀之溺愛者不能治其子之蠱懼內者不能治其妻之蠱均無足異也

光緒八年有妖人率眾詐稱逃荒衣服飲食皆奢侈無度偽造路票到各縣求用印信其男女頭目各帶小鏡一枚名曰卜財鏡到人家以傘笠遮人耳目以鏡照水卽知財物所在遂以遁法攝取以去人皆知其爲妖而失事者則閉目搖手諱匿不報官亦不能捕也一日余他往妖人適至聞卽速歸呼家人檢點失銀若干錢票若干妖人固未入室銀封未動錢票在匣亦未開也妖人速行勢將遁余呼家眾鄉鄰共

歐蠱燃犀錄

蠱案

三

追之不約而會者數千人擒還其僕從渾身刀瘢皆百戰餘孽詰以盜不服詰以放蠱卽服甘以原贓奉還其婦女口供沿路害人暗帶銅砲洋鎗等械有閉眼沙能迷人目以冷水灑之卽開弁有退兵法咸謂賊賊俱獲且有實供宜送案究治稟已具矣縣主諭以省事爲妙差飭出境縣主面稟府憲行知各縣不準給用印信百里內頗覺安靜稍遠則故智復萌矣余嘗論衣服襪履沿街行乞者真難民也糾眾同行

如僧道惡化以逃難為生意者非難民也身帶路票詐為大言直入人家不顧羞恥乃藉逃荒以放蠱者是亂民也古今來始以放蠱害人繼以妖術聚眾不即治之因而釀成逆案者多矣初起時兵勇為敵所駭猝不及防往往致敗曠日持久始得平之夫善用兵者平日登壇講授令兵勇曉然於妖術之不能成事紙兵之不能殺人呪禁鎗砲之不能持久一旦臨敵則嚴陣以待之出奇以撓之乘其懈以擊之賊勢

敵蠱燃犀錄

蠱案

三

雖張軍心已定即令呼風作霧走石揚沙暗有陰兵前有猛獸皆幻象也或用噴筒加藥以燻之或於營門磔狗以禦之主將身先士卒有進無退前隊如是後隊復然此知已知彼百戰百勝之道也善用藥者亦宜於平日講明敵蠱之義令世人曉然於蠱毒之不能必人生死一旦臨證初則吐之繼則下之病久則和解之或針之或灸之或擦之或搗之或震之或熨之勿詫其異勿畏其難且一切治法俱宜勿令病

人知所謂出其不意攻其不備也而蠱誠可毀矣然後知良將之用兵與良醫之用藥其理亦同也

此錄成已付手民時有一中蠱者病作投以湯劑授以針法乃一雌蠱力不能支遁去次日病復作云老師到決不畏針針之果無益遂投以敗鼓皮重劑復授以灸法蠱懼灸乳後三寸至四十壯乃泣逾五十壯乃大哭問其籍貫曰深州人某村某姓名傳習白蓮教材中同教共幾家雌者乃女弟子名某孀居年

敵蠱燃犀錄

蠱案

三

二十三歲不守貞節習此術因道力尚淺針之即敗歸而求援故隨之來問帶何物曰寶劍一枚灸至百壯加以震法即言腹痛欲裂腸已斷矣病者霍然云恍惚中見一人腹破腸出其雌納腸入腹負之以逃病遂痊

一人病蠱為灸諸鬼穴獲二紙人一二三頭相接狀甚奇一飛撲簾隙擒還視之書款一行字跡極劣云天不敢治大言無忌可笑也

1. 續修四庫全書 子部 醫家類 六四六

論蠱

明崇正時于公連斫紙人土木偶事蒲留仙但目爲妖術而不知卽是毒蠱近時此類甚多世人膽氣不及于公故弗獲耳卜者設法嚇人以神其術冀酬重謝未必能死之也刀落斷裾技止此耳至於矢能貫壁刀能斷石乃操觚者抑揚太過者願世人皆勿畏其猙獍而不敢毆之也執卜者付有司而殺之當矣明巡撫韓公失餉金事留仙以爲神意在儆貪而不

歐蠱燃犀錄

論蠱

一

知卽是蠱盜之術蓋韓公血氣既衰教匪之黠者因而玩弄之其中蠱則在愛姬剪髮時也至於卜瞽入山署中王者皆妖人之幻象殆如海市蜃樓矣不然貪婪勝韓公者不少烏得如此王者而盡搜之哉某縣某公有廉稱會給妖人路票鈐印未幾調署他邑民感公之廉以車送之甫半途車自覆行囊封誌如故而失數百金余聞之曰某公氣衰中蠱矣果以風顛卒此事與韓公相類故並論之

聊齋志異白蓮教某已經捕獲解都路遇巨人吞其全家蕭末作未了語是明知爲幻術矣爾時兵士拔劍逐之巨人當應手而仆惜乎其未也

劉海石歐逐之妖確是蠱鬼蓋中蠱拔出白毛則病減李士材治傳尸亦以紅巾覆手用乳香燒烟燻出白毛爲驗至謂海石爲仙敘述離奇絕不類蠱非傳聞之誤則留仙之用筆失之也

歐蠱燃犀錄

論蠱

二

嘗論滕縣趙旺惑於徐鴻儒以至族滅而其女小二乃以聰慧得脫至於紙鳶紙衛紙判皆白蓮故智特正用之故不覺其可憎耳吾願習白蓮教者勿羨趙旺之稱善人而以小二爲宗焉可也

魘媚之術不一或投以飲食則人迷罔相從而去俗名打絮巴江南謂之扯絮或謂之高駱騾于北方則曰拍花其在途也男女多至數百口托詞販賣俗名術拐間有免者問之曰被迷時覺天地昏暗兩旁皆虎豹或皆江河只中間一綫路遂不覺隨之走也今

則改稱逃荒不必拐騙而其被禍更酷因憶秋坪新語載某兵部侍郎葉公之婿於康熙甲午年出門送客忽狂奔入內城見道旁水掬入口即仆其僕追至以車載歸而辮髮已剪醒乃言曰初送客升車欲返見一人戴笠對之而笑心已無主渠復招手前行遂從之身兩旁皆肉紅色中只一綫路渴極瞥見道旁水飲之而仆其人來挽有一拄杖老人喝之遂不見據此兩旁皆虎豹或江河皆一類也剪髮甯有異術

歐蠱燃犀錄

論蠱

三

乎

陸雲士尚谿織志廣南苗民其婦人能變為羊夜出害人有能為幻術易人骨肉者明時有幕客被苗民易以木腿官究其事苗民懼各還其腿因憶袁子才記某軍門有裨將極驍勇倏失一腿懸榜募醫能治者賞千金一人以紙腿補之遂如初即此術也苗民善造蠱故能之

趙寄園云沅江土司善造蠱凡郡守蒞任例必設宴

迎風毒已入腹在任理事毒不即發但兩目變藍面色微黃類浮腫離任十月則闔門皆死宦遊南方者皆宜知此

又云緬人之蠱不用藥而用鬼世傳神呪能於四十日入腹復誦神呪則毒發腹脹而死土司中有楊招把者亦能誦神呪拔出蠱毒活漢人而殺緬人佛書所謂毒藥乃藥物還加於彼人也近時傳誦之呪亦

歐蠱燃犀錄

論蠱

四

是此意但心不誠則不靈耳

又云永平縣一老嫗號蕭歪嘴有異術能解蠱以藥取吐大吐二三日毒盡乃止年逾五十者不治以氣血既衰不任吐藥也按此嫗無他謬巧即吐蠱法耳萬歷丁亥金臺有婦人以羊毛徧鬻於市倏不見未幾瘟疫大作死者甚眾一道人授法以涼水和蕎麥麵周身搓之應手可愈或謂此婦為散瘟而不知實為放蠱今之感此證者則余所謂毒以類化也

滇中有留人洞其人善造蠱俗傳山左賈人留洞中忽思家洞人許其歸尅期必返否則死歸語其妻其妻曰見伊家何所畜曰多畜鼠其妻曰是矣家有一貓殺而食之下鼠數升而愈此生蠱也吐之亦效

袁子才云畜蠱能糞金銀獲重利此說恐未確蓋蠱能攝取金銀不必能糞金銀也放蠱有光如電則凡蠱皆然至於朱依仁之頂上蝦蟆卽生蠱也以金針刺之可愈他如蔣生以周易撲獲紙人李侍郎之子

歐蠱燃犀錄

蠱案

五

焦孝廉之妻鬼狐入腹備公子之儿上弓鞋張孝廉之婢入鼠穴皆蠱類也

紀文達從兄懋園有朱漆藤枕買多年矣常聞有聲剖之一蜂飛出枕四圍無針芥隙文達以爲理不可曉不知此卽蠱也余見蜂從耳出蛹從胸出一切雜物度其必不能入枕終從枕中搜出者多矣獨何異於此蜂乎如謂數旬不食何以存活則中蠱之人亦有數旬不食者矣又何異於此蜂乎

徐公景熹官福建鹽道時有清廉稱署中篋笥常見火自內發扇鑰如故又竊翦其侍姬之髮文達謂此公氣衰山鬼作祟不知其實爲毒蠱也世人每云邪不侵正觀此則敢於侵正者乃所以爲邪歟

文達又云鬼在腹中余所聞見凡三事一爲雲南李編修衣山與腹中魅相唱和所謂因其性之所近也正一眞人劾治弗能遣竟風顛終身一爲宛平張鶴友之幕賓史某客入腹中一爲平湖尼有鬼在腹談

歐蠱燃犀錄

蠱案

六

休咎此亦因其性之所近也或云狐媚或云夙冤不知皆中蠱也卽云狐也亦狐蠱也眞人劾以符呪故不效投以殺蠱重劑卽愈矣蓋用符譬如傳檄用藥譬如開仗賊勢盤踞未深主帥先聲奪人傳檄可定追賊勢已熾必須札硬寨打死仗方能成功然不免玉石俱焚之慮李編修工詩蠱亦工詩邪正混淆合而爲一第用虛喝終屬無濟攻之太猛蠱去而元氣必傷如云爲後人除害非病家主持不可良醫不得

專之故真人亦不能劫之也

紀文達之從身善鳥銃管見小旋風裏一物火光熒
熒舉銃中之乃禿筆一枝管上微有血漬明人小說
載牛天錫供狀事言凡物以庚申日得人血皆能成
魅余謂以點紙人之血點於筆管則為筆蠱故能乘
風放光也然則伏內庚日採取青蒿即能伏鬼理亦
相同歟

文達云有人患狐祟延術士禁呪狐去而術士需索

歐蠱燃犀錄

論蠱

七

無厭時遣木人紙虎之類作擾略之暫止隔旬復然
此亦造蠱法也以藥歐之當已

又云孺愛先生嘗見一蠅飛入人耳中為祟能作人
言惟病者聞之或云非蠅作魅乃魅化為蠅不知此
亦蠱也近時此證頗多按蠱治之無不立效又何疑
乎凡說部中諸如此類不可枚舉勿詫其異勿畏其
難而以藥歐之是在良醫之善悟耳

附錄

近時毒蠱盛行獠犬較多於昔其中毒亦不在咬傷
之輕重有傷極重而不中毒者有僅傷衣襟而中毒
深者頂心見有紅髮即拔去之其毒七日一翻頭痛
發熱神氣昏迷每翻加重不急治之過期必死經驗
良方詳錄於左

一方用枯礬四兩黃丹四兩胡椒男八女七十粒共研細

末以陳醋和藥作窩如釜隔紙七層覆肚臍上紙間

歐蠱燃犀錄

附錄

八

剪一小孔露臍病者男以左手女以右手覆之加被取汗汗透
即愈

一方用胡桃半枚挖作空殼以小兒糞填滿覆患處
隔薑一片灼艾灸之病者心慌即止次日再灸毒即
入心亦能拔出

一方用防風七錢浮萍七錢真鹿骨七錢傷頭用頭傷足用足

或加杏仁銀花庚蒿雄黃之類或風證加減或以打
死獠犬之棍頭作引尤妙此方可常服病愈乃止

一方用牛角一枚以麝七釐納入角尖以麵糊口於山炭火中燒灰存性取尖研細黃酒沖服汗透即愈一方用蕎麥麵加淡豆豉末以水和勻蘸香油環搓患處或搓周身搓出犬毛爲度日日搓之毒淨自愈以上諸方外治內治不妨並用治之得效亦無禁忌尋常犬傷以熟牛糞塗之極妙卽塗獶犬傷亦有愈者但不如汗灸服藥數方尤爲得力也

毆蠱燃犀錄

附錄

九

光緒丁丑民間有妖人剪髮之異燃犀道人直指爲蠱智者信之愚者昧焉燃犀素有膽識取法周官力除毒蠱閱歷既深集成著錄爲醫家別闢奇境其折服黃姓妖人事士林談及至今爲快前人未有謂紙兵爲蠱者茲經燃犀一言道破允足發千古未發之秘巨眼人當不以方書例之也三十六峯山人跋

毆蠱燃犀錄

跋

十

經效產寶

〔唐〕 咎 殷 撰

據上海辭書出版社圖書館藏清
光緒七年影宋刻本影印原書版
框高一八七毫米寬二五六毫米

景宋本經
效產寶
卷

仁蘇高邕



光緒七年
三月印行



經效產寶 跋

發源張君金城近購得日本所
印度隨軍督殷撰集經效產寶書版
隨以印本眎余余讀其書凡上中下三卷
後附續編一卷書中著預作著藥避
唐諱而不避宋諱漢改新唐書藝文志
有博士咎商著心鑑五卷或印斯人避殷
作商共為北宋本無疑日本邦人於醫家
產寶
舊籍考察最精近如北宋本千金方元大
德本千金方顯於滬上影宋本外臺秘
要購自粵東今得是書唐賢撰述豈可
寶貴余家雖習醫苦於蒐藏無多核就
所見書諸卷端玉善方藥之合宜在乎明
哲者取擇焉光緒七年春正月歸安凌德
書於尚素軒



經效產寶卷之上

節度隨軍外殺撰集
相國白幣家藏善本

○妊娠安胎方論第一 凡拾壹道
療妊娠三四月腹痛時時下血

續斷 捌分 艾葉 陸分 炒 當歸 陸分

竹筴 肆分 干地黄 陸分 阿膠 肆分 炙

雞蘇 肆分

右以水壹升煎取陸合去滓空心再服隔日更服

治妊娠六七月忽胎動下血腸痛不可忍

芎藭 捌分 桑寄生 肆分 當歸 拾貳分

右以水壹升半煎取捌合下清酒半升同煎取玖合分作叁服如人行五六里再溫服

治妊娠下血時時漏血血盡子死

生地黄 合 清酒 叁合

右相和煎三四沸空腹分溫溫服

治妊娠心頭妨蕙兩脇脹不下食

檳榔 叁个 人參 肆分 柴胡 伍分

枳殼 肆分 炙 肉豆蔻 貳分 生姜 貳分

桑寄生 肆分

右以水貳升煎取陸合分溫溫服

治妊娠身傷寒頭痛壯熱肢節煩痛

前胡 陸分 石膏 拾貳分 大青 肆分

子苓 伍分 知母 肆分 山柰 肆分

葱白 柒莖 甜竹如 叁分

右水貳升煎取捌合食後分溫三服

治妊娠胎動腰痛及下血安胎

當歸 肆分 芎藭 肆分 葱白 貳七莖

艾葉 貳分 茅根 陸分 鹿角膠 陸分 炙

右水貳升煎取捌合空心熱喫三服

治妊娠損動安胎

鯉魚 壹斤 粳米 壹升

右作臠食之佳

治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生芦根 拾分 橘皮 肆分 生姜 陸分

檳榔 貳分

右以水貳升煎取柒合空腹熱服

治妊娠腸滿腹脹心胃煩見衄即吐漸加羸瘦

赤茯苓 前胡 各肆分 小半夏 肆分 洗

生姜 叁分 白木 壹分 大腹子 伍个

麥門冬 陸分 檳榔 伍枚 紫蘇 肆分

右水貳升煎取捌合空心分溫溫服

治妊娠常苦煩悶此是子煩宜服此方

伏苓 捌分 防風 陸分 知母 陸分

竹瀝 溫參拾分 生門冬 拾貳分

右水貳升煎取柒合下竹瀝食後作兩服

治姙娠胎動不安煩悶

當歸 肆分 芩藎 叁分 阿膠 臠時分入

葱白 拾肆莖 豉 捌合 桑寄生 肆分

右水貳升煎取捌合下阿膠空腹分兩服

○姙娠食諸物忌方論第二 凡五道

食雞肉與糯米共食令子生白蟲

食鯉魚及鷄子令子多疳

食羊肝令子多厄

食鴨子令子倒生

食鬼肉犬肉令子缺唇無音聲

○益氣滑胎令易產方論第三 凡壹道

潤胎益氣令子易生訶子丸

檳榔 捌分 芩藎 貳分 吳茱萸 叁分

訶子皮 叁分 蒸

右為細末煉蜜為丸如綠豆大空心酒下十

九九二十九自七八個月服至分解

○姙娠惡菹嘔吐不食方論第四 凡四道

論曰夫菹病之候心中潰潰頭眩眼眩四肢沉

重懈怠惡聞食氣好喫酸鹹果實多卧少起三

月四月多嘔逆肢節不得自舉者以此治之

人參 捌分 厚朴 陸分 茯苓 拾叁分

葛根 捌分 白朮 拾貳分 橘皮 陸分

生薑 拾壹分切

右水柒升煮貳合分溫參服忌桃李醋等物

治姙娠三四月嘔吐惡聞食氣

橘皮 青竹如 生薑

伏苓 白朮 各貳兩

右水陸升煎貳升分溫參服忌同前

治姙娠菹病心中潰悶見食嘔吐憎聞食氣肢

節煩疼身躄沉重多卧嗜睡黃瘦方

人參 橘皮 各捌分 茯苓 拾貳分

生薑 拾貳分 甘草 拾貳分 大棗 拾貳枚

生麥門冬子 貳拾分

右水伍升煎取貳升分溫參服忌菸菜醋等

凡姙娠惡食者以所思食任意食之必愈

○胎動不安方論第五 凡十八道

論曰安胎有二法因母病以動胎但療母疾其

胎自安又緣胎有不堅故致動以病母但療胎

則母差其理甚效不可違也胎不動不知子死

生者但看母唇口青者兒死母活口中青沫出

者子母俱死口舌赤青沫者母死子活也

療胎數落而不結實或冷或熱

甘草 參兩

黃耆

人參

白朮

芩藎

乾地黄

吳茱萸 各貳兩

右為末空腹酒調貳錢忌菘菜醋等物

治胎動不安

好銀 煮取水

右着葱白作羹食之佳

治胎動下血心腹絞痛兒在腹死活未分服此

藥死即下活即安極妙

當歸 參兩

芩藎 陸兩

右水四升酒參升煮取參升為三服

治妊娠三二月及七八月胎動不安或腰肚痛

有血下

芩藎

當歸 各肆兩

艾葉 貳兩

甘草 壹兩

阿膠 貳兩 灸

右水五升煮取二升分溫三服 古方无艾葉

治妊娠搶心下血不止腰腹痛不可忍

上銀 壹斤 水壹斗 煎取柒升

芩藎 肆兩

生地黃 伍兩

當歸 肆兩

阿膠 參兩

生地黃 伍兩

右以前銀水煮取二升分三服

治妊娠无故胎動不安腹內絞痛

葱白 切壹升

阿膠 參兩 灸

當歸 四兩

川芎 四兩

桑寄生

右取銀水柒升煮藥取貳升半分三服

治妊娠五六月胎猶不安不常處

白朮 參兩

厚朴 貳兩

旋復花 壹兩

黃芩 貳兩

茯苓 參兩

生薑 貳兩

枳殼 貳兩

芍藥 貳兩 灸 令黃色

右以水柒升煮取貳升半食後分溫五服

治胎動不安

熟艾 貳兩

葱白 切壹升

阿膠 貳兩 灸

右水肆升煮取壹升半分溫兩服

又方

芩藎 貳兩

葱白 切壹升

右水柒升煮取貳升半分溫三服

治妊娠冷熱腹內不調致胎不安

當歸 參兩

乾姜 參兩

芩藎 肆兩

艾葉 貳兩

右水肆升煎取貳升分為四服

治妊娠經八九个月或胎動不安因用力勞乏

心腹痛面目青冷汗出氣息欲絕由勞動驚胎

之所致也

釣藤 貳兩

伏神

人參 各貳兩

| | | |
|-------------------|--------------------|---------------|
| 當歸 貳兩 | 桔梗 叁兩 | 寄生 壹兩 |
| 右水伍升煎取貳升分為三服忌猪肉菘菜 | 若煩熱加石膏伍兩臨月加桂心貳兩 | 治姙娠因夫所動困絕 |
| 右取竹瀝飲壹升立愈 | 療姙娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血 | 當歸 各捌分 |
| 人參 陸分 | 艾葉 肆分 | 阿膠 陸分炙 |
| 伏苓 拾分 | 大棗 拾貳枚 | |
| 右水肆升煮取貳升分為三服 | 治墮胎忽倒地舉動擊促損腹中不安及子死 | 腹中不出 |
| 芩藎 壹兩 | 右為末服寸匕須臾三服立出 | 治胎動衝心煩悶欲死安胎止痛 |
| 甘草 炙 | 當歸 | 芩藎 |
| 人參 | 阿膠 各貳兩 | 葱白 切壹升 |
| 右以水柒升煎取貳升分為三服 | 療姙娠忽黃汁下如膠或如小豆汁 | 粳米 伍升 |
| 黃耆 伍兩 | 右以水柒升煎取貳升分為四服 | 治姙娠胎動欲落肚痛不可忍 |

| | |
|-------------------|------------------|
| 上銀 壹斤 | 茅根 去黑皮切貳升 |
| 右以水九升煮銀取貳升入清酒壹升同煎 | 茅根取貳升分為三服立安 |
| 療姙娠腹內冷痛忽胎動 | 薤白 切壹升 |
| 當歸 四兩 | 右以水五升煎取貳升作三服 |
| ○姙娠漏胞下血方論第六 | 療漏胎下血不止胞干即死宜急治之 |
| 生地黃汁 壹升 | 酒 伍合 |
| 右同煎三五沸分三服頻喫瘥 | 治姙娠下血不止血盡子死 |
| 生干地黃 為細末 | 右酒服方寸匕日三服夜一服即愈 |
| 治姙娠下血不止及腹內冷者 | 生地黃 |
| 干姜 | 右兩味等分同煎服 |
| 治姙娠無故卒下血止不絕 | 阿膠 叁兩炙 |
| 右清酒壹升半煎取壹升頓服 | 又方 |
| 生地黃 捌兩 | 右搗碎以酒浸絞去滓分兩服以止為度 |

療妊娠下血如月信來若胞干則損子傷母

干地黄 伍兩 干姜 伍兩

右以水六升煎取二升下蜜少許更煎兩沸分二服

○妊娠心腹腰痛方論第七 凡十一道

治妊娠二三月腹痛腰痛

當歸 叁兩 阿膠 炙 甘草 各貳兩

葱白 切壹升

右水柒升煮取二升分三服忌猪肉菘菜醋等物

治妊娠三五月已來忽心腹絞痛

大棗 拾肆枚燒令焦

右取小便調服之

治妊娠心腹痛不可忍

鹽 壹斤燒令赤

右以兩指取一撮酒調服之

治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白朮 伍兩 黃芩 貳兩 芍藥 肆兩 炙

右以水六升煮取二升半為三服緣胎有水

致痛兼易產

治妊娠卒心痛氣欲絕

芫薺 當歸 伏苓 各叁兩

厚朴 叁兩 炙

右水陸升煎取貳升分為兩服忌食如前

治妊娠腰背痛反覆不得

鹿角 壹枚長五六寸燒令赤酒中碎

右取酒飲之作散服鹿角亦得

療妊娠先患冷氣忽衝心腹痛如刀刺

芫薺 人參 伏苓

吳茱萸 桔梗 當歸 各叁兩

厚朴 炙 芍藥 炙 各貳兩

右水玖升煎取叁升分三服氣下即瘥

治妊娠患腹痛并胎動不安

葱白 切壹升 人參 厚朴 炙

阿膠 炙 芫薺 各貳兩 當歸 叁兩

右水柒升煎取叁升分作三服

治妊娠疼痛不可忍或連胯痛 先服此散

杜仲 肆兩 五加皮 阿膠 炙

狗脊 防風 川芎

細辛 芍藥 各叁兩 葶藶 叁兩

杏仁 捌拾枚去尖

右水玖升煮取貳升去滓下膠作三服

治妊娠三兩月腰痛不可忍者 先服前散後服此散

續斷 杜仲 各拾分 芫薺 叁兩

獨活 參兩

狗脊

五加皮

革薺

芍藥

薯蕷

阿子 已上各捌兩

右為末蜜和為丸吾同子大空心酒下四十

九九日再服

治觸動胎以致腰痛背痛

杜仲

五加皮

當歸

芍藥 灸

芎藭

人參

葶藶 各參兩

右以水柒升煎取貳升半分溫三服

論曰非即之氣傷折妊婦熱毒之氣侵損胞胎

遂有墮胎漏血俱害子母之命

治妊傷寒骨節疼痛壯熱不急治則胎落

葱白 切壹升

前胡

葛根

石膏 各拾分

青黛 陸分

升麻 捌分

梔子仁 拾貳分

右以水柒升煮取貳升半分三服

治妊頭痛壯熱嘔吐不下食心煩熱

青竹如

葛根

知母 各參兩

芦根 壹升

生麥門冬 肆兩去心

右水柒升煎取參升分三服

右水柒升煎取參升分三服

治妊時氣頭痛腰背強壯熱

升麻

黃芩

山柘 各貳兩

葛根 參兩

石膏 捌分

右水五升煎取參升半分為三服

治妊傷寒六七月傷寒熱入腹大小便秘結不通蒸熱

前胡 拾分

大黃

石膏 各貳拾分

梔子仁 拾枚

知母

黃芩

伏苓

生薑 各捌分

右水捌升煎取貳升半後下大黃更煎三五

沸分作三服

治妊傷寒苦熱不止身上斑出忽赤忽黑小便如赤血氣欲絕胎欲落

梔子仁

升麻 各肆兩

代黃青 貳兩

石膏 捌兩碎

葱白 切壹升

生地黃 貳拾分

黃芩 參兩

右水玖升煎取參升作三服忌熱物

治妊患淋小便不和方論第九凡二道

治妊患淋小便澀不利小腹水道熱痛

冬葵子 壹升

芍藥 貳兩灸

黃芩

伏苓

車錢子 各三兩

經效產寶 卷上

六五九

右以水柒升煎取貳升分溫三服

○妊娠下痢黃水赤白方論第十 凡七道

論曰妊娠下痢皆因誤食生冷肥膩冷即色白熱即黃赤氣不和赤白相兼攪刺疼痛脾胃不調之所致也

治妊娠患痢膿血狀如魚髓小腹絞痛難忍

薤白 切壹升 地榆 醋榴皮

黃連 各叁兩 阿膠 貳兩炙

右水柒升煎取貳升半分三服忌生冷肥膩

治妊娠痢白膿腹內冷

乾姜 肆兩 赤石脂 陸兩 粳米 壹升炒

右水柒升煎取貳升分三服忌如前

療妊娠腹痛下痢不止

黃連 石榴皮 當歸 各叁兩

阿膠 貳兩炙 艾 壹兩半

右水陸升煎至貳升分爲三服忌如前

療妊娠下痢腹內痛膿血不止

黃連 捌分 厚朴 炙 阿膠 炙

當歸 各陸分 艾葉 黃蘗 各肆分

干姜 伍分

右爲末空心米飲調下壹匙日進三服

療妊娠膝下刺痛大便白晝夜三五十行

根黃 厚者塗蜜炙令焦

右大蒜去皮研如膏和根黃末爲負如梧桐

子大空心粥飲下三十負日進三服妙

療妊娠痢黃水不絕

厚朴 叁兩炙 黃連 貳兩 豆蔻 五枚連皮

右水貳升煮取壹升頓服忌如前

治妊娠忽被驚奔走墮胎下血不止兼痛

乾地黄 肆兩 當歸 艾葉 各貳兩

阿膠 炙 芎 各叁兩

右水柒升煮取貳升半分作三服痛加杜仲

五加皮各叁兩

○治妊娠水氣身腫腹脹方論第十一 凡四道

論曰臟氣本弱因產重虛土不尅水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便祕澀

治妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

茯苓 肆兩 杏仁 去尖 檳榔仁 叁兩

伏苓 肆兩 郁李仁 各壹兩

旋復花

右水陸升煮取貳升分溫溫服小便通即差

治妊娠四肢皮肉拘急及腫

桑白皮 切貳升 樟桂根 壹兩 赤小豆 貳升

右水壹斗貳升煮二味取柒升下小豆煮令

熟先食豆候渴即飲其汁小便利即差

治姙娠遍身洪腫方

亭藜子 拾分 白朮 貳拾分 伏苓 貳兩

桑白皮 貳兩 郁李仁 捌分

右水陸升煎取貳升作兩服小便利即差

又方

澤瀉 叁兩 亭藜子 叁兩 白朮 陸兩

枳殼 炙 伏苓 各陸兩

右制度服食如前

論曰夫婦人特將產至重者胞衣也凡胞衣不出者世謂之息胞由產時用力過度已產而躄

已瘦頰不能更用氣經停之間而外冷氣乘之則血溢逆否故令胞衣不出則不得斷臍浴沐冷氣傷兒則成病也

舊方胞衣不損兒者依法截臍而以物繫其帶一頭所有產時看生人不用意謹護而率挽胞

系斷其胞上掩心而天命也凡欲產時必先脫常所着衣裳以籠竈神驗

胞衣不出方

竈下土 壹大寸研碎

右用好醋調令相和內於臍中續取生甘草湯三四合服

又方

槐子 拾四枚 蒲黃 壹合

右酒煎溫服須臾未效更進一服

又方

生地黄汁 伍合 生姜汁 半大合

右煎三四沸頓服之

又方

槐子 槐枝切壹升最好 藶麥 捌分

牛膝 捌分 通草 拾貳分 白榆 切壹大升

冬麻仁 壹大升研

右水伍升煎貳大升去滓下麻仁分三服

小品顏服散令易產母疾病未生一月已前預服過三十日行步不覺兒生

甘草 捌分 粳米 壹合 大豆黃 炒

黃芩 乾姜 桂心

吳茱萸 冬麻仁 研如泥各貳分

右為末空腹煖酒服方寸匕忌生冷肥膩

又易產方

飛生鳥 壹隻燒 槐子 拾四枚 故箭羽 拾四片

右為末蜜為丸○大覺痛服三十九未產須臾再服之

○治產難諸疾方論第十三 凡十二道

易產方

榆白皮拾四分通草拾貳分葵子叁合

滑石各捌分

右水貳升煎取捌合分溫三服

又方

羚羊角壹枚燒刮取末

右以酒調方寸匕服

又方

滑石捌分葵子壹合榆皮拾貳分

牛膝陸分

右水壹升捌合煎取陸合再服

又方

含醋嚙面悶即嚙之

又方

吞槐子柒枚即下

又方

吞鷄子白兩枚即產

又方

兩手各把一石燕立產

又方

兔皮和毛燒灰研

右以酒調兩錢匕即產衣不下服之即下

又方

大麻根叁莖

右水壹升煎取半升頓服立產衣不下服之

即下

又方

弓弩絃燒灰

右為末酒調方寸匕服之即下

又方

銅弩牙

右燒赤投於醋三合內良久頓服立產

又方

麝香壹錢

右研水調服之立產

〇難產死生方論第十四 凡八道

療胎死腹中不出母氣欲絕

水銀貳兩

右頓吞之兒立出

治產橫倒不出

右令夫唾口中二七遍立出

療產經數日不出或子死腹

麝麥陸兩通草叁兩

桂心叁兩榆白皮切壹升

右水玖升煎取三升分三服

又方

蘆麥

右水煮取濃汁服之佳

療子死腹中不出

伏龍肝為末冬錢

右酒調服之土當兒頂上戴出妙

又方

朱砂壹兩

右水煎數沸然後取酒和服之

又方

水銀貳兩

右水煮二三十沸服之立產

滑胎易產

白蜜

苦酒

猪脂各壹升

右相和煎三四沸臨腹痛時以熱酒調下三四錢匕不過五六服即出

○難產令易產方論第十五凡七道

論曰夫產難者內宜用藥外宜用法蓋多門救療以取其安也
療產難坐草數日困乏不能生此為母先有病經絡俱閉所然

赤小豆貳升 膠叁升

右水玖升煎令熟去豆內膠洋令清服之須臾更一服

又方

右令夫從外含水吐着產婦口中即出

療難產疑胎在腹已死

當歸肆分 芎藭陸分

右水陸升煎取貳升分作兩服便安胎死即出酒煎亦得神驗

治難產困乏腹痛有所見兒及衣不出

蒺藜子肆兩 貝母肆兩

右為末每服壹匙酒調服之時再服以出為度熱水調下亦得

治難產

箭壹隻 燒為末

右以水調服之

又方

鼈甲燒為末

右服方寸匕立出未生更服

治療落胎腹痛

芍藥

當歸

牛膝

蘆麥各伍分

桂心

芒藟各肆分

右以水壹升柒合煎取捌合空心温服

○胎死胞衣不出方論第十六 凡十八道

療姙娠經五六月胎死腹中或胞衣不出

生地黄 伍兩 牛膝 朴消 各捌分

杜心 芩藎 大黃 各陸分

蒲黃 伍分

右水貳升煎取捌合入蒲黃空心作二服

療子死腹中不出

雄鷄糞 貳拾壹枚

右水貳升煎取伍合以米作粥食胎即出

治姙娠經六七月子死腹中不出

黑豆 叁合

右醋壹升煎取捌合空心分温三服

治子死腹中母悶絕

水銀 拾貳分

右取井底土如雞子黃水研服之

又方

赤小豆

右生吞七枚出若是女即二七枚出

經效理胎衣不出令爛

牛膝 各肆兩 滑石 研捌分

當歸 貳兩

通草 陸兩 葵子 壹升

右水伍升煎取貳升分三服温服

又方

竈突土 叁撮

右和暖水服之

崔氏治胎胞不出

大豆 壹升

右苦酒伍升煮取叁升分為三服

又方

右吞雞子兩三隻解髮刺喉中令嘔若因熱

以水煮螻蛄壹枚三四沸瀉口中汁下即出

又方

大麥 小麥 小豆

右等分相和煮取濃汁飲之出

又方

赤朱 壹兩

右研為粉以苦酒和服之即出

又方

皂夾

右為末着鼻中一兩度自出

療胞衣久不出腹滿即殺人服此方即爛

桂心 牛膝 通草 各叁兩

滑石 貳兩 葵子 壹升 嬰麥 肆兩

右水玖升煎取叁升分三服甚效
又方

藎麥 肆兩 桂參 兩 通草 叁兩

牛膝 伍兩 葵子 壹升

右水叁升煎取壹升半分為三服

又方

真珠 壹兩

右研細苦酒調服之

又方

洗兒水

右取半椀服之即出

治胞衣不出

牛膝 捌兩 葵子 貳升

右水柒升煮取叁升分三服

治衣半水半不出或子死腹中着脊不下數日

不產血氣上衝

牛膝 陸兩 葵子 壹升 榆白皮 肆兩

地黄汁 捌合

右水玖升煎取叁升分叁服即出

經效產寶卷之上

經效產寶卷之中

節度 隨軍 晉 毅 撰

相國 白 幣 家 藏 善本

○產後心驚中風方論第十七 凡七道

論曰產後心悶氣絕眼張口噤通身強直腰背

反偃狀如癘疾心忪驚悸言語錯亂皆是宿有

風毒因產心氣虛弱風因產發成風症

防風 當歸 伏苓

漢防已 麻黃 去節各 秦膠

人參 苦藟 獨活

白鮮皮 甘草 炙 白微 各陸分

石膏 拾貳分 竹瀝 貳升

右水柒升先煮麻黃掠去沫下諸藥入竹瀝

煎取貳升半去滓三服忌菘菜猪肉生冷

療產後狂語志意不定精神昏亂心氣虛風邪

所致

伏苓 乾地黃 各拾分 遠至 拾分

白微 龍齒 各拾分 甘草 炙

人參 防風 獨活 各捌分

右以銀壹大斤水壹斗伍升煎取柒升下諸

藥煎取叁升分温三服忌如前

療產後心虛忪悸不定亂語謬誤精神恍惚不

主當由心虛所致

人參

甘草

芍藥

當歸

生姜 各捌分

遠志

伏苓 各拾分

桂心 陸分

門冬 去心

大棗 各拾貳分

右水捌升煎取參升去滓分温三服

療產後心氣虛損卒驚強語或歌哭嗔笑性氣不定

上銀 壹斤

桂心

甘草 各陸分

細辛 肆分

人參

生姜

遠志

伏神 各捌分

生地黄 二十分

龍骨 壹分

大棗 壹枚

右水捌升煮銀取壹升半入諸藥煎分三服

温温進

療產後多虛弱羸瘦苦大汗痢皆至於死此重虛故若患中風謬語昏悶不知人者

人參

伏苓

羌活

桂心

大棗 各拾分

遠志 拾分

竹瀝 壹升半

右水陸升煮取參升下竹瀝更煎取貳升煎

為三服

療產後身忽瘥口噤面青手脚強急

右竹瀝貳升飲之最佳

療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中瘡生時時乾嘔困乏欲絕

人參

獨活

白鮮皮

葛根

防風

青竹茹

遠志 各陸分

伏神 捌分

白欬 拾分

玄參 拾貳分

竹瀝 貳升半

右銀壹斤水壹斗伍升煎取柒升下諸藥重煎取參升分温三服忌魚酒麵等物

論曰餘血奔心蓋是分解了不便與童子小便

并擗心下及卧太疾兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可

療產後心中虛熱煩悶氣欲絕

大棗 拾貳分

伏苓 拾貳分

生姜 捌分

甘草 伍分

竹瀝 壹升

人參 陸分發

粳米 加參合

生麥門冬 貳拾分

右水陸升煎取參升方入竹瀝更煎取兩分

療產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛

生地黄

芎藭 各參兩

枳殼 炙

芍藥 各參兩

右擣篩為末酒服方寸匕日進二服

又方

生藕 研汁

右飲貳升甚效

又方

清酒 壹升

生地黄汁 壹升

右相和煎一沸分為兩服

療產後腹內塊痛不止

芎藭

當歸

芍藥

乾姜 各貳兩

右擣羅為末酒調方寸匕日三服

療產後下血不盡腹內堅痛不可忍

寶中

甲

當歸

芍藥

桂心 各叁兩

桃仁 壹百貳拾枚

右水陸升煮取貳升分溫二服如未瘥加大

黃叁兩

療產後血結下不盡腹絞痛不止

大黃 別浸

當歸

乾地黄 各拾分

芎藭

芍藥

桂心 各捌分

甘草 炙

黃芩 各陸分

桃仁 肆拾玖枚

右水柒升煮取貳升半下大黃更煎三沸分

為三服

療先患冷氣因產後發腹痛

芎藭

桂心

當歸

茱萸

茯苓

芍藥

甘草 各陸分

桃仁 拾分去尖

右水柒升煮取貳升分叁服

治產後心腹切痛不能食乏氣忽熱

當歸

芎藭

黃芩

人參

甘草

芍藥

防風

生姜 各叁分

桃仁 捌拾枚

右水柒升煮取貳升下大黃更煎三沸分作

叁服

療產後血不盡腹中除痛無計

寶中

五

青木香

當歸

牛膝

芎

黃耆

芍藥 各捌分

大黃 拾叁分浸 芒硝 拾貳分

右水柒升煎取貳升後下大黃更煎三沸分

三服

療產後血下不止虛羸迫死

蒲黃 貳兩

右水貳升煎取捌合頓服

療產後血泄不止無禁度

乾黃末

右酒服匙頭日三四服

療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕

羊血

右以一盞頓服如不定更服立效

療氣痛欲死

槐雞 半兩

右為末用酒濃煎頓服立愈

療產後餘血作疼痛廉塊者

桂心 姜黃

右等分為末酒服方寸匕血下盡妙

○產後渴不止方論第十九 凡二道

療產後渴不止飲水小便數多

土瓜根 括婁根 人參

甘草 牡蠣粉 各貳兩 大棗 拾貳枚

右水玖升煮取參升分溫三服

療產後大渴不止

蘆根 切壹升 括婁 參兩 人參

甘草 伏苓 各參兩 大棗 拾貳枚

生麥門冬 肆兩

右水玖升煮取參升分為三服頓服四劑即

差忌菽菜

○產後淋病諸方論第二十 凡六道

論曰產後患淋因虛損後有熱氣客於胞中內虛則起數熱則小便澀痛故謂之淋又有因產損血氣血氣虛則挾熱搏於血血即流滲於胞中故血隨小便出為血淋者如雨之淋也

療產後淋病小便澀痛或血淋者

瞿麥 黃芩 冬葵子 各貳兩

右水柒升煮取貳升半分作兩服

療產後血淋

車前子 瞿麥 各四兩 黃芩 參兩

鬱金 壹兩末

右水陸升煮取貳升下鬱金末分三服

廣濟療產後卒患淋小便躁痛及血淋

冬葵子 參合 石葦 貳兩炙去毛 通草

黃芩 滑石 伏苓 各參兩

右水貳升煎取壹升下滑石空心服

集驗療產後患淋小便痛

石葦 炙去毛 黃芩 各貳兩 通草

芍藥 甘草 冬葵子 各參兩

榆白皮 伍合

右水貳升煎取壹升空心溫溫服

經效療產後氣淋熱淋

貝齒

兩枚燒
作末

葵子 貳兩

石膏 伍兩

陽石

未參兩

右水貳升煎取壹升下兩般末空心服

療產後淋小便痛及血淋

黃芩 伍兩

瞿麥 貳兩

車前子 貳兩

通草 參兩

冬葵子 貳合

鯉魚齒 壹百枚
為末

右水貳升煎取壹升入齒末空心分兩服

○產後虛羸下痢方論第二十一 凡三道

論曰產後本虛患痢更加羸弱飲食不進便痢

無常赤白不定蓋因飲食傷於生冷之所致

療產後虛羸下痢膿血腹痛

黃連

芍藥

甘草

當歸

乾姜

人參 各八兩

艾葉 參分

右水柒升煮取貳升分為三服忌猪鹿肉

療產後痢不禁止困乏氣欲絕無問赤白水穀

黃連

厚朴 各參兩

芍藥

黃芩 各貳兩

右水陸升煮取貳升分為貳服

療產後痢赤白心腹絞痛羸困

地榆

石榴皮

黃連 各參兩

當歸 貳兩

薤白 壹升

右水柒升煮取貳升半分為三服

○產後腰痛羸瘦補益玉門不閉方論廿二

療產後少氣困乏虛煩

人參 拾貳分

甘草

桂心

茯苓

芍藥 各捌分

生地黃

生麥門冬 各拾貳分

右水玖升煮取參升分溫三服

療產後喘乏氣羸腹內絞痛自汗出

黃耆

人參

茯苓

甘草

當歸

澤蘭葉

五味子

白朮 各捌分

橘皮 各陸分

呵子

麥門冬 各拾貳分

桂心

乾地黃 各拾貳分

右壽羅為散煉蜜和九如梧同子犬空心酒

下三十九日再服

療產後風虛羸弱勞瘦不生肌肉

黃耆

當歸

芍藥

人參 各貳兩

桂心

甘草 貳

芍藥

生薑 各捌分

大棗 拾貳枚

右水柒升煮取參升分溫三服

療產後虛勞骨節疼痛頭疼汗不出

當歸

人參

生薑 各貳分

黃耆 叁兩 政 伍合 粳米 叁合

豬腎 壹對切 菹白 切三合

右水壹斗伍升先煮豬腎取陸升後下諸藥煎至貳升分為三服

又方

猪腎 壹對

右入葱豉作臠如常食之

療產後大虛心腹急痛血氣上搶心氣息之補益方

黃耆 白朮 當歸

甘草 炙 人參 各貳兩 生姜 四兩

白羊肉

右水壹斗玖升煮肉取伍升後下諸藥更煎取叁升為三服

療產後陰腫下脫肉出玉門閉

石灰 壹斤炒令色黃

右水貳升投灰中停冷澄清重燒以浸玉門斯須平復如故

○產後中風方論第二十三 凡十五道

論曰產後中風由產傷動血氣勞損藏腹未平復起早勞動氣虛而風邪氣乘之故中風風邪冷氣客於皮膚經絡但疼痺羸乏不任少氣若

又筋脉挾寒則攣急啗僻挾溫則縱緩弱若入諸藏恍惚驚悸隨其所傷腑臟經絡而生病療產後中風口噤不任小大獨活湯

獨活 肆分 乾姜 陸分 甘草 貳分

生姜 陸分

右水貳大升煎取壹大升分為兩服

小品大豆湯主產後中風困篤或背強口噤或但煩躁或頭身皆重或身痒劇者嘔吐直視此皆虛冷中風宜餌此

大豆 叁升炒令極熟

右以銅器盛清酒伍升沃之密封良久去豆

分為三服服了覆衣取微汗身才潤即愈產後皆宜服一則防風二乃消血

張仲文療產後中風寒授遍身冷直口噤不識人等方

白朮 肆兩

右酒叁升煎取壹升頓服之效

千金雞糞酒療產後中風及男子諸中風并產後百疾神效方

烏雞糞 叁升 大豆 貳升

右先炒豆令聲絕次炒雞糞令黃以酒壹升先淋雞糞取汁淋大豆每服一升重者凡四

五日服之極妙

經效療產後風虛頭痛語言時僻

乾葛

防風

伏苓

麥門冬 各捌分

芍藥

黃芩 各陸分

犀角 肆分

甘草 叁兩炙

右水貳升煎取柒合分為兩服

療產後中風心忪悸或志意不定恍惚言語錯亂方

人參 陸分

伏神

麥門冬

羚羊角 各捌分

黃芩

白鮮皮

甘草 各肆兩

石膏 拾貳分

淡竹瀝 兩大合

右水貳大升煎取柒合下竹瀝分為

療產後中風身背拘急如束并渴

芍藥

芍藥

羌活

羚羊角

酸棗仁 各四兩

桑白皮 陸分

防風 伍分

右水肆升煎取貳升分溫三服

療產後中風四肢拘束筋節掣痛不得轉側如角弓張

麻黃 捌分去節

生姜

桂心

白朮 各四分

防風

芍藥 各陸分

芍藥 伍分

甜竹瀝 貳合

右水參升先煎麻黃掠去沫下諸藥煎取柒合方下竹瀝更煎三沸食後分三服取微汗為度

療產後中風血氣不散邪氣入藏狂言妄語精神錯亂腰痛骨疼

麻黃

伏神 各捌分

防風

白鮮皮 各陸分

杏仁

當歸

桂 各四分

芍藥

獨活 各伍分

右水貳升伍合煎取玖合空腹熱服

療產後中風身軀疼痛四肢羸弱不遂羌活湯

羌活

芍藥

黃耆 各陸分

乾葛

麻黃

乾地黃 各捌分

甘草

桂心 各四分

右水貳升先煎麻黃去沫後下諸藥取捌合食後熱服覆衣出汗愈

療產後中風煩渴

紅花子 伍合微熱研碎

右水壹升煎壹匙頭取柒合徐徐呷之

療產後中風口噤四肢頑痺不仁或如角弓張

羌活

防風 各叁兩

大豆 壹升炒

右酒伍升先浸兩味經宿將炒豆熱投酒中攪勻密封一日以湯煮瓶良久服捌合覆衣

取汗急速且以豆淋服羌活防風亦佳
療產後中風腰背強直時時反張名風疰

防風 葛根 芍藥

乾地黃 各捌分 麻黃 去節 甘草

桂心 獨活 漢防已 各陸兩

杏仁 伍枚去尖

右水捌升煮麻黃去沫後下諸藥煎取叁升
分温三服

療產後中風口噤潰悶不能言身躄疰直

羌活 防風 秦艽

桂心 甘草 葛根 各叁分

生姜 捌分 附子 壹隻炮 杏仁 捌拾枚去尖

麻黃 拾分去節

右水玖升先煮麻黃去沫後下諸藥取貳升
分為三服

療產後中風口噤拘急困篤腰背強直時及折

大豆 貳升炒令聲絕

右清酒陸升投之煮三四沸去滓飲之令微
醉如汗出差切勿觸風如已成風者加雞糞
白和豆炒同喫兼飲竹瀝佳

論曰夫產後血上捨心痛方論第二十四凡六道

搏於血則凝結不消氣逆上者則血隨上衝擊
而心痛也凡產後餘血不尽得冷則結与氣相
搏則痛困重過於寒血結尤甚

乾地黃 當歸 獨活

吳茱萸 芍藥 乾姜

甘草 各叁兩 細辛 壹兩

右水叁升煎取壹升空心分三服忌生冷
經效療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心

滿脹當歸湯

當歸 桂心 芍藥

橘皮 生姜 吳茱萸 各貳兩

芍藥 叁兩

右水叁升煮取壹升空心服

千金治產後內虛寒氣入腹腹中絞痛下赤白

痢妄經見鬼羊肉湯

甘草 炙 當歸 芍藥 各壹兩

肥羊肉 壹斤去脂

右水陸升先煮肉取貳升去肉入諸藥更煎
取壹升分作兩服

千金翼茱萸酒療心腹內外痛

吳茱萸 拾貳分

右酒貳大升煎取壹升空心分兩服

必效療腹中絞刺痛方

羌活 貳大兩

右酒貳升煎取壹升去滓分為兩服

千金治產後渴少氣

麥門冬

淡竹葉 各拾貳分

大棗 柒枚

生姜

甘草

人參 各陸分

小麥 伍合

右水貳升半煎取壹大升去滓分兩服

○產後汗不止方論第二十五 凡五道

論曰產後汗不止夫汗由陰虛而得氣加之衷虛表實陽氣發於外故汗出為陰虛是令汗出

為陰氣虛弱未平復也凡產後皆血氣虛故多

汗因遇風邪則變為疾也

千金治產後風虛汗出不止小便難四肢微急

難以屈伸

大棗 拾貳枚

附子

桂心 各肆兩

芍藥 捌分

生姜 陸分

右水三升煎取柒合空腹分為兩服忌猪肉

冷水生葱等物

經效療產後汗不止

黃耆 拾二分

白朮

牡蠣

茯苓

防風

乾地黄

麥門冬 各捌分 大棗 柒枚

右水貳升煎取柒合空心分為兩服

千金治產後餘疾腹中絞痛不下食瘦乏

當歸

黃耆

芍藥 各陸分

乾地黄

白朮 各捌分

桂心

甘草 各四分

大棗 拾四枚

右水貳升煎取捌合空心作兩大服忌生葱

○產後冷熱痢方論第二十六 凡二道

療產後驟血不止續命湯

白蜜 壹匙頭

生姜 壹片

右同煎候蜜色赤投童子小便壹升去姜更

煎兩沸分為三服頓服之

廣濟治產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微痢

茯苓

人參

當歸

甘草 各六分

生姜

陳橘皮 各四分

厚朴 捌分炙

右水貳升煎取柒合空心分為兩服忌如前

○產後虛羸方論第二十七 凡三道

論曰產後虛羸者因產損傷腑臟勞侵氣血輕者將養滿日即差重者日月雖滿氣血猶不調和故患虛羸也

廣濟治產後風虛冷氣腹肚不調補益悅澤

澤蘭 桂心 遠志

厚朴 炙 石斛 白止

續斷 防風 乾姜 各三分

芎 白朮 柏子仁

黃耆 各四分 甘草 當歸 各五分

赤石脂 乾地黃 各陸分 人參 參分

右擣羅為末煉蜜為丸如梧同子大空心酒下伍拾丸忌如前

桃仁煎療產後百病及諸氣補益悅澤

桃仁 壹斤 二枚 去皮 大炒 熟 研 如 膏

右酒壹斗伍升研濾三四遍如作麥粥法以

極細為佳內長須小瓶中密封頭內湯中煮

一日一夜使瓶口常出湯上勿令沒熟後以

酒服一合日再服

千金增減澤蘭丸療產後百病治血補虛勞

澤蘭 防風 甘草

當歸 芳藟 各柒分 乾姜

麥門冬 各捌分 附子 白朮

白止 桂心 細辛 各肆分

柏子仁 乾地黃 石斛 各陸分

人參 牛膝 各伍分 厚朴

藁本 各貳分

右為末蜜丸梧同子大空心酒下貳拾丸忌如前

○產後煩渴方論第二十八凡二道

論曰產後煩渴夫產水血俱下臟腑燥津液不足宿挾虛熱者燥甚故渴也

經效理產後血氣心煩渴

紫葛 三大兩

右水貳升煎取壹升去滓呷之效

集驗療產後心煩渴

瓜蒌根 人參 甘草 各六分

麥門冬 貳分 大棗 柒枚 生地黃 拾二分

右水貳大升煎取捌合食後分為兩服

○產後煩悶虛熱方論第二十九凡二道

論曰產後煩悶虛熱夫產即臟腑勞傷血氣傷

而風邪乘之搏於血使氣不宣而伍溢則生熱

或肢節煩疼口乾但因生熱其煩悶由產後血

氣虛弱未復而氣逆乘之故煩悶也其氣故令

脇滿妨不下食

生地黃汁 一升 當歸 一兩半 清酒 伍升

生姜汁 三合 童子小便 二升

右相和合煎三四沸分溫四服中間藥消進食食消更進藥

經效理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥

蒲黃

延胡索 各四分

當歸 陸分

荷葉帶 叁枚炙

右水貳升煎柒合後入蒲黃空心服兩服

又方

生藕

右取汁煎兩沸飲兩服效

集驗療產後血氣煩悶

酒 貳合

生地黄汁 壹升

右相和煎一兩沸分為兩服立效

千金療產後血氣喘心煩悶不解

淡竹葉

麥門冬

小麥

茯苓 各二分

甘草

生薑 各一兩

大棗 柒枚

心悸加人參 貳兩

食少加粳米 貳合

右水貳升煎取柒合食後分為兩服

療產後血下不盡煩悶腹痛

羚羊角

炭火上燒作膠二兩 古方燒作灰

芍藥 貳兩炒黃 枳殼 貳兩炒令焦黃色

右搗羅為散水調方寸匕服之

○產後血痕方論第三十 凡四道

論曰產後血斷由新產之後有血氣相搏謂之

痕痛者畜也謂其痛浮痕無定緣內宿有冷血

氣不治至產血下即少故成此疾

童子小便 奔 生藕汁 壹大升 生薑汁 壹升

生薑汁 三升

右先煎三味合三分減二次下姜汁燉火煎

如稀錫每取壹合煖酒調服

療血痕痛臍下脹不下食

當歸 捌分

桂心

芍藥

蒲黃

驢竭 各陸分

延胡索 肆分

右為散空心溫酒調下兩錢匕

千金療血痕

乾地黄 壹兩

烏賊魚骨 貳兩

右為散空腹溫酒下兩錢匕

又方

鐵秤錘 燒赤

右以酒壹升淬之分為兩服

○產後餘疾痢膿血方論第三十一 凡八道

論曰產後餘病由產勞傷臟腑不足日月未滿

起早勞動虛損不補為所傷冷氣力瘦乏若風

冷入於胃胃傷虛冷生血冷即變白膿膿血相

雜冷熱不調為滯痢也 深師方

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 黃連 <small>六兩</small> | 烏梅 <small>三兩</small> | 乾姜 <small>貳兩</small> |
| 右為末煉蜜為丸如梧同子大空心米飲下 | | |
| 三十九忌如前 | | |
| 廣濟療產後赤白痢臍腹絞痛 | | |
| 當歸 | 黃連 <small>各別兩</small> | 艾葉 |
| 地榆 | 甘草 <small>多</small> | 龍骨 |
| 厚朴 | 黃芩 | 乾姜 <small>各六兩</small> |
| 右水貳大升煎取柒合空心分兩服 | | |
| 經效療產後赤白痢臍下氣痛 | | |
| 厚朴 <small>八分</small> | 當歸 | 枳殼 |
| 訶子 <small>各六分</small> | 甘草 <small>伍分</small> | 肉豆蔻 <small>伍枚</small> |
| 右水壹升煎取玖合空心分為三服 | | |
| 張仲文療產後赤白痢腹中絞痛 | | |
| 黃連 | 阿膠 <small>炙</small> | 蒲黃 <small>各一兩</small> |
| 梔子仁 | 當歸 | 黃芩 |
| 右為散空腹米飲下方寸匕日兩服 | | |
| 救急療產後赤白痢腹中絞痛 | | |
| 芍藥 | 阿膠 | 艾葉 <small>各二兩</small> |
| 乾地黄 | 甘草 | 當歸 <small>各三兩</small> |
| 右水貳升煎取捌合空心分兩服 | | |
| 必效療產後赤白痢腹中絞痛不下食 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 當歸 | 石榴皮 | 地榆 <small>各貳兩</small> |
| 白藜荷 | 黃連 <small>各拾貳兩</small> | 黃檗 <small>壹分</small> |
| 犀角 <small>四兩</small> | 黃芩 | 枳殼 |
| 甘草 | 升麻 <small>各陸分</small> | 茜根 <small>捌分</small> |
| 粳米 <small>貳合</small> | 薤白 <small>切壹升</small> | |
| 右為末蜜丸如梧同大空心米飲下二十九 | | |
| 療產後血痢小便不通臍腹痛 | | |
| 生馬齒菜 | | |
| 右擣取汁參大合煎一沸下蜜壹合調頓服 | | |
| 千金療產後水痢霍亂下痢無度 | | |
| 白石脂 | 乾姜 <small>各拾貳分</small> | |
| 右為散麵糊為丸梧桐子大空心米飲下二十九 | | |
| 論曰產後小便赤方論第三十二凡兩道 | | |
| 發動冷氣入腹虛弱不能制其小便即數有遺 | | |
| 尿者由產用氣傷於膀胱而冷氣入於胞胞囊 | | |
| 決漏不禁小便故令遺失多因產難之所致 | | |
| 廣濟療產後小便不禁 | | |
| 鷄屎 <small>燒作灰</small> | | |
| 右研細空腹酒服方寸匕 | | |
| 千金翼療產後小便數及遺尿 | | |

一第1006 冊 黃多四庫全書第 4 反E寸

桑螵蛸各拾分

鹿茸各二兩

黃耆各二兩

赤石脂

厚朴各二兩

牡蠣各二兩

右擣羅為末空心米飲調下方寸匕忌冷茶毒等物

經效產寶卷之中

二十一

經效產寶卷之下

節度隨軍各散撰集

相國白帶家藏善本

○產後小便遺血方論第三十三凡四道

療產後大小便利血

車前子

黃芩

蒲黃

乾地黄

牡蠣

芍藥各陸分

右為散空心米飲服方寸匕忌麪蒜

崔氏療產後血氣滲入大小腸

車前草升壹升蜜壹大合

右相和煎取一沸分為兩服

又小便利血

乱髮燒灰研如粉

右米飲服方寸匕

古今經驗療產後勞傷熱大小便赤澁

雞蘇壹分

通草拾分

冬葵子叁合

芍藥

滑石

芒硝各捌分

生地黃拾貳分

右水參升煮取捌合下芒硝空心分三服

○產後大小便不通方論第三十四凡四道

論曰產後大小便不通腸胃本挾於熱因產大

小便血俱下津液竭燥腸胃痞澁熱氣結於腸

胃故不通也

集驗療產後津液竭燥大小便不通

芍藥 大黃 枳殼

麻仁 研各貳兩

右為末煉蜜和丸吾同子大空心熟水下貳

拾丸漸加之以利為度

經效療大便不通熱氣結於腸胃

大黃 貳兩 芒硝 壹兩

右水壹大升煎取陸合下芒硝空心作兩服

古今錄驗療產後大便不通

黃芩 芒硝 各陸分 大黃

室下

芍藥 杏仁 去皮尖研如膏各捌分

右為末蜜丸吾同子大空心煎水下拾伍丸

漸加以利為度

千金療產後熱結大便不通

蜜 伍合火煎令強以水投中良久取出

右拾如母拍大長貳寸內下部即通

○產後寒熱方論第三十五 凡肆道

論曰產後寒熱因產勞傷血氣使陰陽不和反

相乘尅陽勝則熱陰勝則寒陰陽相激故發寒

熱又產餘血亦令人寒熱其腹時痛則是也

療產後虛弱喘乏作寒熱狀如虛名為辱勞

猪腎 壹具切去膜 白梁 貳合

葱白 切壹升 人參 當歸 各壹兩

右水貳升煎取捌合分為兩服

經效療產後虛煩頭痛氣短欲死心乱不解

淡竹茹 乾葛 各捌分 甘草 陸分

麥門冬 子參各 小麥 貳合 石膏 拾貳分

右水貳升煎取捌合食後分為兩服

療產後虛熱煩痛

乾地黃 牡礪 伏苓 各捌分

芍藥 拾貳分 黃芩 桂心 各陸分

右水貳升煎取壹升分為兩服

○產後咳嗽方論第三十六 凡三道

論曰喘嗽肺臟微寒即成喘嗽又因產後氣虛

風寒傷於肺故令咳嗽

集驗療產後風傷寒咳嗽多疾唾粘

甘草 桔梗 各陸分 款冬花 肆分

生麥門冬 生地黃 各拾貳 葱白 壹握

豉 貳合 舊方不入葱白與豉

右水貳升煎取捌合食後良久兩服

經效療咳嗽多痰唾粘氣急

前胡 五味子 紫苑

貝母 各陸分 桑白皮 伏苓 各捌分

淡竹葉 貳拾分

右水貳升煎取捌合食後分為兩服

療產後咳嗽氣喘

百部根

桔梗 各陸分

桑白皮 拾貳分

乾百合

赤茯苓 各捌分

右水貳升煎取柒合食後分兩服

八〇產後氣痢方論第三十七 凡陸道

論曰妊娠之時脾胃氣挾於冷大腸氣虛因產後轉加虛損或悞食生冷酒麪便成痢疾赤白

氣不和赤黃胃熱或青色極冷也

療產後氣痢不止

室下

青木香 參分

訶子皮 捌分 酥炙令黃

右為散空心米飲調方寸匕服之

療產後赤白痢疾

黃連 捌分

阿膠 炙陸分

赤茯苓

當歸

黃檗 各四分

乾姜 參分

右為末蜜丸如梧桐子大空心粥飲二十九

療產後水痢

枳殼 肆分

厚朴 炙

茯苓

黃連 各陸分

當歸 參分

右水壹升煎取捌合空心分為三服

又方

黃連 陸分

烏梅肉 伍分

石榴皮

當歸

赤石脂 各四分

乾姜 參分

右為末蜜丸如梧桐子大空心米飲下三十九

療產後下痢赤白有血

赤石脂

黃連

地榆 各陸分

當歸 肆分

乾姜

甘草 各參分

厚朴 拾貳分

薤白 柒莖

右水貳升煎取捌合空心分兩服

療產後血痢不止

臭樗根 陸分

室下

黃二七個熱吞之

八〇產後血暈悶絕方論第三十八 凡十道

論曰產後血暈者其狀心煩氣欲絕是也亦有

用心過多而暈亦有下血極少亦暈若下血多

暈者但煩而已下血少而氣逆者則血隨氣上

撩心下滿急此二者難並為暈而狀候各異常

問其產婦血下多少即知須速投方藥若不急

療即危其命也凡暈者熱血氣乘虛奔逆上所

致也但才分解了燒秤錮江石令赤置器中向

產母床前帳裏投醋淬之得醋氣可除血暈之

法也十日內時時作此法不妨暈者如日月之

有暈也

經效產後虛悶汗出不識人

鷄子參个

右打破吞之便醒不醒者可灌童子小便入腹即醒若久不醒忽時時發者此為有風因產血氣暴風虛風行脉中若虛去血多者尤甚也

產後血氣暴虛汗出

淡竹葉

右煎湯參合微温服之須臾再服

又方

馬齒菜研取汁參大合如不用乾者亦得

右煎一沸投蜜壹匙令勻頓服

廣濟療產後血暈心悶不識人神言鬼語氣息欲絕

芍藥

丹參肆分

甘草各壹兩

生地黄汁壹升

右水貳升煎取捌合下地黃姜蜜汁分兩服

療產後惡露不多下腹絞痛

大黃捌分

牛膝陸分

芍藥

蒲黃各四分

牡丹皮

當歸各貳分

右為末空心煖酒服方寸匕

救急療產後血不盡疼悶心痛

荷葉炒令香

右為散煎水調方寸匕服

療初平安血氣煩悶

童子小便伍合

生地黄汁叁合

右煎三沸温再服

療產後血暈心悶

蒲黃肆分

紫葛

芍藥各捌分

紅藍花拾貳分

右水貳升煎取柒合入生地黄汁貳合更煎

三五沸每服三合

產後血暈心悶恍惚如見鬼

生益母草汁叁合根亦得

地黃汁貳合

小便壹合

鷄子參枚取清

右煎三四沸後入雞子清勻攪作一服

產後血暈狂語不識人狂乱

童子小便伍合

地黃汁壹合

赤馬通柒枚

紅雪捌分

右以上貳味浸馬通絞去滓下紅雪温兩服

○產後乳無汁方論第三十九凡五道

論曰氣血虛弱經絡不調所致也乳汁勿投於地虫蟻食之令乳無汁可沃東壁上佳

療產後乳無汁

土瓜根

通草各壹兩

甘草貳兩

通草肆兩

右水捌升煎取兩升分溫參服忌如常法

又方

土瓜根

右為末酒調兩錢七日進二三服效

又方

母猪蹄兩枚切通草陸兩

右以綿裹煮作羹食之最好

又方

漏蘆

通草

土瓜根各壹兩

甘草

桂心各壹兩

右為散飲服方寸匕日進參服

又方

括蔞末

右以井花水服方寸匕日兩服夜流出

○產後乳結癰方論第四十九道

論曰產後宜裂去乳汁不宜畜積不出惡汁內引於熱則結硬堅腫牽急疼痛或渴思飲其妳手近不得若成膿者名妬乳乃急於癰宜服連翹湯利下熱毒外以赤小豆末水調塗之便愈

忽數担去乳汁忽小兒手勻動之忽大人含水

啣之得汁吐之其汁狀如膿若產後不曾乳兒

畜積乳汁亦結成癰

療產後妬乳并癰

連翹子

升麻

芒硝各拾分

玄參

芍藥

白欬

漢防已

夜干各捌分

大黃拾貳分

甘草陸分

杏仁捌拾枚去尖

右水九升煎取參升下大黃次下硝分參服

又方

蒲黃草

右熟搗傅腫上日參度易之并葉煎汁飲之

亦佳食之亦得妬乳及癰並差

又方

地黃

右取汁塗熟即差

療乳腫

右以馬溺塗之立愈

療婦人發乳丈夫發背爛生膿血後虛成氣疾

黃耆

地黃

麥門冬

升麻

人參

茯苓各參兩

當歸

芍藥

遠志

甘草 各壹兩 大棗 拾枚

右水貳升煮取壹升分溫兩服

療乳頭裂破

右以丁香為末傅之立愈

療妬乳及癰

葵莖及子

右擣篩為散服方寸匕即愈

又方

雞屎

右為末服方寸匕須臾三服愈

又方

皂莢 拾條

右以酒壹升採取汁硝石半兩煎成膏傅之

療諸癰不散已成膿懼針令自決破下

右取白雞內翅及第一翎各壹莖燒末服之

即決

又方

取雄雀糞白者研塗上乾即易之

療乳癰初得令消

赤小豆 茵草

右等分為末苦酒和傅之愈

療發背乳癰四肢虛熱大渴

竹葉 切參升以水壹斗貳升煮取九升

生地黃 陸兩

人參

升麻

括婁 各參兩

右以竹葉汁煮取參升渴則飲之

療乳腫方

升麻

黃芩

右水貳升煎取壹升下硝分為兩服後以綿

緇藥帖腫上日夜勿停即差

又方

黃蘗 壹分末

鷄子白

右調和勻塗之乾則易立愈

又方

苧根

右擣傅之愈

又方

鹿角

右於石上磨取濁汁塗上乾即易之

又方

鹿角

右燒作灰以酒調塗之立愈

又方

粢米粉炒令黑

右以鷄子白和如泥以塗帛上貼之穿帛作

穴以泄毒氣易之效

八○產後乳汁自出方論第四十一凡三道

論曰產後乳汁自出蓋是身虛所致宜服補藥

以止之若乳多温滿急痛者温熨之

療乳癰始作

大黃

馬蹄各陸分

樗實各參兩

芍藥陸分

下

十二

經效產寶續編

八○周頌傳授濟急方論凡四道

頌嘗見人傳經效諸方自曾修合實有大功遂

編於卷末普用傳授以濟急難

治產後血暈血氣及滯血不散便成癥瘕兼瀉

面色黃腫嘔逆惡心頭痛目眩口吐清水四肢

羸弱五臟虛怯常日睡多喫食減少漸竟羸瘦

年久變為勞疾如此所患偏宜服餌勝金丸

澤蘭四兩

羌黃

乾姜

當歸

甘草

桂心各參分

芍藥

營蘗各陸分

石膏

桔梗

栝子仁

烏頭

南椒

蒲黃

白芷

青木香各壹分

細辛

防風

白微

金釵石斛

伏苓各參分

人參

茱萸

厚朴

枳殼

石領

白朮

藁本

右二十八味並州土分兩无差杵羅為末煉蜜為丸彈子大有所患熱酒研壹丸入口便愈大忌腥膩熱麵豉汁生葱冷水菓子等若死胎不下胎衣在腹並以炒鹽酒研服未退

再服

治產後諸疾聖散子

澤蘭 致分 石膏 搗分如粉 芎藭

當歸 羌黃 芍藥

甘草 各半分 乾姜 桂心 各伍分

細辛 卷柏 去土 栝子仁

茱萸 防風 去青頭 南椒 出汗

厚朴 姜汁炙 伏苓 各四分 白芷

白朮 人參 丹參

藁本 五味子 黃耆 各參分

烏頭 炮 白微 各貳分

右擣羅為散以新瓦器密封无令失氣每服以熱酒調下兩錢匕忌如常

神效治產後一切疾黑散子

鯉魚皮 炙兩 芍藥 蒲黃 各貳兩

當歸 沒藥 桂心

好墨 卷柏 青木香

麝香 各壹兩 銍墨 半兩 丈夫髮 灰半兩

右一十二味擣羅為散以新瓦器盛密封勿令失氣每產後以好酒調下壹錢匕如血暈衝心下血不盡臍下撓刺疼痛不可忍塊血癥疾甚日加兩服不拘時候服忌冷物果子

粘食

神效療妊娠十個月內不安至臨分解時並宜服此保生丸

金釵石斛 貝母 去心 黃芩

明淨石膏 細研如粉 桂心

烏頭卷 秦椒 去目炒 蜀椒 去目炒

甘草 炙 糯米 炒已上各貳兩

右並涇州上者如法修合為散煉蜜丸如彈子大或有妊娠諸疾喫食減少及氣喘疾痛面目萎黃身躄羸瘦四肢無力手脚浮腫胎臟不安並以棗湯研壹丸服氣痛酒研壹丸

空心服之忌腥膩果子粘食雜物冷肉等

○濮陽李師聖施郭替中論 二十一 證方十六道

第一論

熱病死胎腹中者如何

答曰母患熱疾至六七日以致藏府熱極蒸煮其胎是以致死緣兒死身冷不能自出但服黑神散暖其胎須臾胎氣溫暖兒即自出何以知其死看產婦舌色青者是其驗宜以黑神散主之

雄黑豆 小者炒去黑皮用貳兩 當歸

芍藥 甘草 炙 乾姜

蒲黃 用安石器內炒赤色 肉桂

熟地黃 溫水洗

右等分焙干為末每服貳錢空心溫酒調下若三十歲已上生產少者不用桂姜却以炒生薑紅花各貳兩

第二論

胎衣不下者如何

答曰母生子了血流入衣中為血所脹遂不能下若治之稍緩則滿腹中上衝心胃疼痛喘急難治但服奪命丹速去衣中血血散脹消胎衣自下而無所患矣奪命丹

附子 半兩炮

去皮

牡丹皮 壹兩

干漆 壹分研碎

炒令煙出

右為末用醞醋壹升大黃末壹兩熱成膏和藥丸如菉豆大溫酒送下五七丸不計時候

第三論

難產者如何

答曰胎側則成形塊者呼為兒枕子欲生時枕破敗血裹其子故難產但服勝金散治之逐其敗血兒即自生若橫生逆生皆治之

射香 壹錢

鹽豉 壹兩用舊布包煖火燒令

通紅急以乳搥研為細末

右為末取秤搥燒紅以酒淬之每服調壹錢

第四論

悶絕不知人事者如何

答曰產後血氣暴虛未得安靜血隨氣上攻迷亂心神眼前生花極甚者令人悶絕不知人事口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若如此治之必難愈宜服清寃散

澤蘭葉 壹分

人參 壹錢

荊芥穗 壹兩

芎 半兩

甘草 貳分炙

右為末每服壹錢熱湯半盞入溫酒半盞調勻急嚥之藥下便愈

第五論

口干痞悶者如何

答曰產宮胃太虛血氣未定食麪太早胃不能消化麪毒結聚於胃脘上薰胃中是以口干煩渴心下痞悶醫者不識認為胃膈壅滯以藥下之萬不能一但服眼兒現丸

姜黃

京三稜 炮

畢澄茄

人參

陳皮 去白

高良姜

蓬莪朮

右等分為末用細切蘿蔔煖火煮令爛研細將餘汁煮麪糊為丸菉豆大每服拾丸蘿蔔湯下不拘時候

第六論

產後下寒下熱如何

答曰陰陽不和敗血不散皆作下寒下熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則下寒陽勝則下熱陰陽相乘則或熱若因產勞傷藏府血弱不能寬越故敗血不散入肺即熱入脾即寒醫人若作寒瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜服增減四物湯敗血不散宜服奪命丹

又問二者何以別之

答曰時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增減四物湯

當歸

芍藥

芎

人參

干姜

炮裂各

甘草

四兩炙

右為末每服貳錢水壹盞薑五片同煎至陸分去滓微熱服不計時候

第七論

產後四肢虛腫者如何

答曰產後敗血乘虛停積於五藏循經流入四肢留滯入深回還不得腐壞如水故令四肢面目浮腫醫者不辨作氣治之凡水氣多用導水藥極虛之夫產後既虛又以藥虛之是重虛也但服調經散血行腫消則病自愈

沒藥

壹錢研

琥珀

壹錢研

桂

去麋皮半錢

芍藥 壹錢

當歸 壹錢

麝 半錢

細辛 半錢

右為末每服半錢生薑汁溫酒各少許調勻服之

第八論

產後不語者如何

答曰人心有七孔三毛產後血流氣弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉則舌亦強矣故令不語但服七珍散

人參

石菖蒲

川芎

熟地黃

各壹兩

細辛 壹錢

防風 半兩

朱砂 半兩研

右為末每服壹錢薄荷湯調下不拘時候

第九論

產後下見鬼神者如何

答曰心主身之血脉因產傷耗血脉心氣則虛血停積上干於心受獨激遂生煩燥坐卧不安下見鬼神言語顛錯醫者不識呼為風邪如此治之必不能愈但服調經散加生龍腦一捻得睡即安調經散方在第七論中

第十論

產後腹痛又瀉痢者如何

答曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風則寒邪乘虛進襲留於胃腹散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或下赤白腹脇填脹或走痛不定急服調中湯立愈醫者若以為積滯取之則禍不旋踵矣

高良姜

當歸

桂去皮

芍藥

附子炮去皮臍

川芎各壹兩

甘草半兩炙

右為粗末每服參錢水參錢煎至壹盞去滓

熱服

第十一論

產後遍身疼痛者如何

答曰產後百節開張血脉流走遇氣弱則經絡分肉之間血多留滯累日不散則骨節不利筋脉引急故腰背轉側不得手足搖動不得更身熱疼痛醫者以為傷寒治之若出汗則筋脉動惕手足厥冷變生他病但服越痛丸以墨塗之

牛膝

當歸

桂去皮

白朮

黃耆各半兩

薤白壹分

獨活半兩

生姜半兩

甘草壹錢炙

右為粗末每服半兩水五盞煎至貳盞去滓熱服壹盞

第十二論

產後大便秘澀者如何

答曰產卧水血俱下腸胃虛竭津液不足故大便秘澀若過五六日腹中悶痛者乃有燥糞在藏府以其乾澀不能出耳宜服麻仁丸更以津潤之若誤以為熱而投寒藥則陽消陰長變動百生性命危矣麻仁丸

麻仁研

枳殼炒

人參

喉中氣急喘者如何

答曰榮者血也衛者氣也榮行脈中衛行脈外相隨上下謂之榮衛因產後下血過多榮衛暴竭氣无所生獨聚於肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡露不快敗血停凝上薰於肺亦令喘急可服奪命丹方見前第二論中

第十七論

產後中風者如何

答曰產後五七日內強力下床或一月之內傷於房室或懷憂悲怒擾蕩洩和氣或因着灸驚場藏府得疾之初眼澁口噤肌肉相搖腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶尔中風所得也

第十八論

產後心痛者如何

答曰心者血脉之主人有挾宿寒因產大虛寒搏於血脉凝滯不得消散其氣逆上衝擊於心經故心痛宜以大崑蜜湯治寒則去血脉温則經絡通心痛自止若誤以為有所傷治之則虛極而寒益甚矣心絡寒甚傳心之正經則變成心痛者朝發則夕死是藥不可

賣

生姜 半兩

右為粗末水兩盞煎至壹盞去滓微熱服分為三服

第十五論

產後口鼻黑氣起及鼻衄如何

答曰陽明者經絡之海起於鼻交頰中還出俠口交人中左右是蓋因夫產後氣消血散榮衛不理散亂入諸經絡回還不得致令口鼻黑氣起及變鼻衄此緣產後諸虛熱變生此疾不可治也名曰脾絕肺散

第十六論

輕用也

乾地黄

當歸

獨活

吳茱萸

芍藥

乾姜炮

甘草炙各壹兩

細辛半兩

桂壹兩去麋皮

少草壹兩遠志兼是也

右為粗末每服半兩用水參大盞煎取壹盞去滓微熱

第十九論

產後熱悶氣上轉為脚氣者如何

答曰產後卧血虛生熱復因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以著成脚氣其狀熱

悶掣癢驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也服小

續命湯三兩劑必愈若誤以敗血藥攻之則血去而病益增矣

人參

黃芩

官桂去皮

白朮

防已

麻黃去節

川芎

芍藥

甘草各壹兩

生姜五兩

防風兩半

附子壹枚去皮

右為末每服半兩用水五盞煎去滓温服

第二十論

產後出汗多而變痙風如何

答曰產後血虛內理不密故多汗因遇風邪

搏之則變痙風也痙者口噤不開背強而直如發痙狀搖頭馬鳴身反折須臾十發息如絕宜速斡開口灌小續命湯稍暖即出汗如雨手拭不及者不治

第二十一論

產後下血過多虛極熱生風如何

答曰婦人以榮血為主因產血下太多氣无所主唇青肉冷汗出目瞑神昏命在須臾此皆虛熱非風也可服濟危上丹若以風藥治之則誤人矣

乳香研

石靈脂

留黃研

陳皮去白

桑寄生

真阿膠炙洋炒成米子

太陰玄精石研

右將上四件同研勻石器內微火上炒動勿

令焦着炒了再研細後入餘藥末用地黃汁

煮糊為丸菴豆大每服酒下二十九當歸酒

尤佳

○產後十八論 方凡九道

一曰產後因熱病胎死腹內者如何

答曰蓋因母患熱病經六七月間藏府熱遂煮其胎熱是致死故知之緣死即身熱痛只用沫出瓜甲拍黑四肢逆冷但服烏金散其

胎即下

二曰產難者如何

答曰蓋其胎以或成形為食實物後十月足日食有餘遂有成塊呼為兒枕欲生時塊破遂血裹其子故難產但服烏金散解其敗血即自生或橫生逆生不下並宜服之

三曰產後衣不下者如何

答曰母生子了產後血入衣中被血所脹故當難下但服烏金散去其衣中血即下如帶斷亦同

四曰血暈者如何

答曰產後三日起坐不得眼前生花即運走五臟流入汗血醫人不識呼為暗風但可服烏金散

五曰口乾心悶者如何

答曰產後七日已來血氣未盡蓋為母食麪結盛心上是以煩燥乾渴醫人不識將謂胃膈不利壅滯所致烏金散立效

六曰乍寒乍熱者如何

答曰產後虛羸敗血入於肺臟即熱即寒醫人不識呼為瘧疾誤矣宜服烏金散立效

七曰產後虛腫者如何

答曰血敗於五臟流入四肢即還不得遂成膿血醫人不識呼為水氣血氣何以知之若水氣喘而小腸澀血氣傷而四肢寒但服烏金散姜酒調下須臾服朱砂丸令瀉下毒物即愈

八曰乍見鬼神者如何

答曰敗血流入於心心不受觸遂被心熱極燥三兩日言語顛狂醫人不識呼為風邪太誤宜服烏金散療之

九曰產後月內不語如何

答曰人心有孔孔內有毛產後敗血閉毛故不語也宜服烏金散

十曰腹內疼痛兼瀉痢者如何

答曰產後未滿月飲冷水与血相聚大腸水穀不化或腹脹痛急服烏金散更加服氣藥止瀉藥

十一曰產後遍身疼痛者如何

答曰產後百節開張敗血走流諸處留停日久不散結聚成此疼痛宜服烏金散有效

十二曰產後血崩者如何

答曰產後敗血惡露自下未止間早先治之及食鹹酸之物遍躰无血色腹痛難治肝家

欲發寒熱作悶宜服烏金散須服朱砂元

十三日產後血氣不通咳嗽者如何

答曰產後咳嗽多以食熱麪壅納或熱病或有氣塊發時充心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩燥睡夢驚悸氣虛肢無力宜服烏金散

十四日產後乍寒乍熱心痛月候不來如何

答曰敗血充心痛遶臍腹面色无采縱然得效暫時痊安不過三兩日又發服烏金散大效

十五日產後腹脹滿嘔逆不定者如何

答曰敗血停於脾胃食充胃胃充氣既不安即吐逆充腹脹急服烏金散次服朱砂丸三兩日炒生姜錢醋湯下七丸立效

十六日產後口鼻黑氣及鼻衄者如何

答曰敗血入臟腑頭目却還不得口乾舌焦鼻黑起是產後變作此候名曰敗肺此不可治

治療

十七日產後喉中氣喘急者何如

答曰產後敗血不尽冷惡死血上衝心過於心即傳於喉喉中即喘醫人不識認作風涎十死不治

十八日產後中風者如何

答曰產後七日无故下床一月之內不傷房室或因着熱有驚臟腑風中之物眼遊腰疼似角弓之反張牙關閉急宜治之亦非風疾所致也

烏金散

乾地黄 熟水浸 肉桂 去皮

黑豆 炒足煙為炭秤貳兩 當歸 洗

甘草 炙 白姜 炮已上各壹兩

右為末空心日午夜中熱酒下兩錢匕忌生冷一切毒物

朱砂丸治產後

積結成諸疾

黑附子 炮去皮 肉桂 半兩 白姜 半兩炒

川巴豆 壹錢醋浸煮去皮研

右細研麪糊為丸麻子大每服三九至五九冷茶下服之取瀉為度

治產後胎衣不下

鷄子白 壹个 滑石末 兩錢

右攤頭急流水調下立出

治孕婦傷寒

柴胡 前胡 川芎
川當歸 地黃 人參



ZW 21101000784465

S

Z121.5

150(1006)

續修四庫全書 子部 醫家類

芍藥

粉草

右等分為末每服兩錢棗四枚姜錢三片同

煎服要出汗加葱

治孕婦傷寒涎嗽

知母

杏仁去皮尖炒

天門冬去心

桑白皮

右等分為粗末煎去滓服

治婦人帶下黃君正方

茅花壹握炒

椶櫚炭參寸

嫩蓮葉參个

甘草節

右為末

賣

十八