


《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇一三・子部・醫家類

新刊外科正宗四卷〔明〕陳實功撰……………一

新刊秘授外科百效全書六卷〔明〕龔居中撰……………二三七

洞天奧旨十六卷圖一卷〔清〕陳士鐸撰……………二九七

外科證治全生不分卷〔清〕王維德撰 附金瘡鐵扇散方一卷……………四六九

瘍醫大全四十卷（卷一至卷四）〔清〕顧世澄撰……………五一五

新刊外科正宗序

余自束髮以來善病醫書滿几上藥餌不離口本歲官金陵適有膏捧冬表之役至中途病甚舁而歸幾化為鼠肝蟲臂乃瀕危而更生者醫之力也後有流言謂余以不病病當事者罷余官今且杜門埽軌豁

外科正宗序

如也一日陳君外科正宗書成索余為之序弁諸首夫陳君療余病者也余素習其為人語曰醫者非仁愛不可託非聰明理達不可任非廉潔淳良不可信人不幸為二豎所侵六賊所苦方其危困皆衆方徐徐冀邀厚利而君之赴之也急于救焚且

於富貴人窶人並無二視不過督其金其投劑必察以九竅之變而參以五臟之動余親見其治一人疽疽有五管頤隱于齊肩高于頂似不可藥矣君以藥塗刀刺之血如瀑下衆皆掩面君獨喜謂其家人云三日可愈甫三日果愈蓋君弗醫則已醫

外科正宗序

則因不立效者然其平居深念則曰吾全活者崇川之人已耳自崇川而廣陵不能什之三四也自廣陵而海內又不能什之一二也可不刊為成書公之遠近故自內經靈樞玉函金櫃身夫桐君所錄雷公所記及近代劉朱數家所銓綜無不經羅而

苞孕焉或者傳海內垂來襁按方療病無不可全活者久猶吾全活之也陳君用意之厚固若此豈徒日處百方月為千軸而已者哉且君以醫致數千金不私橐中窺藥王廟于城河之南疊石為山引河水遠其旁上棟下宇肅如也自三皇以及扁鵲外科正宗亦

華陀之類采其方者輒祀其人所以報本亦一奇觀也蓋陳君於諸書無不窺深近似乎聞道者茲固其一班云 昔 萬曆丁巳夏日郡人顧懋賢題

新刊外科正宗目錄

卷之一

- 癰疽原委論第一
- 癰疽治法總論第二
- 癰疽瘍症歌第三
- 癰疽陰症歌第四
- 癰疽半陰半陽症歌第五
- 癰疽五善歌第六
- 癰疽七惡歌第七
- 治病則例歌第八
- 癰疽灸法禁灸瘡穴第九
- 論病生死法第十
- 察形色順逆第十一

外科正宗

目錄

病有三因受病主治不同論第十二

調理須知十三 雜忌須知十四

癰疽圖形十五 附癰疽諸症瘡各十律

卷之二

- 腦疽論十六
- 疔瘡論十七
- 脫疽論十八
- 療癰論十九
- 鬚疽論二十
- 咽喉論二十一
- 時毒論二十二
- 癰疽論二十三

肺癰論二十四

卷之三

流注論二十五

乳癰論二十六 附乳岩

附骨疽論二十七

附鶴膝風 腸癰論二十八

臟毒論二十九

痔瘡論三十

下疳論三十一

魚口便毒論三十二

囊癰論三十三

懸癰論三十四

腎癰論三十五

楊梅瘡論三十六

外科正宗 目錄

結毒論三十七

多骨疽論三十八

卷之四

陰瘡論三十九

傷寒發頤四十

疔發四十一

癰疽四十二

小腹癰四十三

鶴口疽四十四

龍泉疽虎鬚毒四十五

石榴疽四十六

穿骨疽四十七

大麻風四十八

翻花瘡四十九

腋癰五十

脇癰五十一

鼻痔五十二

骨槽風五十三

紫白癩風五十四

齒病五十五

腦漏五十六

破傷風五十七

跌撲五十八

金瘡五十九

杖瘡六十

湯澄火燒六十一

甲疽六十二

蘭唇六十三

痞癬六十四

天蛇毒六十五

頭痛六十六

外科正宗 目錄

合谷毒六十七

鼻出血六十八

牙縫出血六十九

血箭血痣七十

鵝掌風七十一

腎囊風七十二

疥瘡七十三

癩瘡七十四

血風瘡七十五

頑癬七十六

膿窠瘡七十七

凍瘡七十八

火丹七十九

天泡八十

肺風粉刺酒皰鼻八十一

雀斑八十二	油風八十三
白屑風八十四	耳病八十五
漆瘡八十六	竹木刺八十七
瘰癧瘡八十八	疔瘻八十九
痰包九十	癩風九十一
溼腫九十二	咬傷九十三
風犬瘡九十四	女人面生黧黑斑九十五
鈕叩風九十六	枯肋箭九十七
婦人脚丫作痒九十八	手足破裂九十九
眼丹一百	黑子一百一
眼胞菌毒一百二	體氣一百三
白禿瘡一百四	奶癬一百五
蟻拱頭一百六	小兒遺毒爛斑一百七
螻蛄串一百八	小兒痘風瘡一百九
小兒赤遊丹一百十	走馬疔一百十一
重舌一百十二	胎瘤一百十三

鴛口瘡一百十四	痘癰一百十五
痘疔一百十六	黃水瘡一百十七
大人口破一百十八	臭田螺一百十九
牛程躑一百二十	僵螂蛙一百二十一
田螺泡一百二十二	股痛一百二十三
陰虱一百二十四	葡萄疫一百二十五
百蟲入耳一百二十六	惡蟲叮咬一百二十七
人面瘡一百二十八	慢吞針鐵骨哽 <small>咽喉一百二十九</small>
外科正宗 目錄	五
中砒毒一百三十	落下類傘法一百三十一
救自刎斷喉法 <small>一百三十二</small>	陰毒一百二十三
失榮症一百三十四	試知百病死生法 <small>一百三十五</small>
造孽報病說 <small>一百三十六</small>	仙方活命飲 <small>冷古不同論一百三十七</small>
拾遺症一百三十八	唇風 <small>一百三十九</small>
細縛背瘡一百四十	癰疽肉肉不合 <small>一百四十一</small>
煉玄明粉法 <small>一百四十二</small>	取紅鉛法 <small>一百四十三</small>
煉金頂砒法 <small>一百四十四</small>	煉消石法 <small>一百四十五</small>

取藥酥法一百四十六製附子法一百四十七

昇白靈藥法一百四十八製寒食麵法一百四十九

逐日入神歌一百五十二時入神歌一百五十三

屍神歌訣一百五十二製炒諸藥一百五十三

醫家五戒一百五十四醫家十要一百五十五

披鍼喉鍼形一百五十六

汗斑補遺一百五十七

新刊外科正宗目錄終

新刊外科正宗卷之一

癰疽門

崇川 陳實功 毓仁 頤齋 著

癰疽原委論第一

癰疽發背為何生好好身軀出此形 凡人處世而無

降精秘血盈也養生篇曰毋搖爾精毋勞爾形心

此惟修身保命之士所能今人豈能及哉蓋謂靜則

由火而生火既生七情六慾皆隨應而入之既入之

後百病發焉發于內者為風勞虛膈痰喘內傷發于

外者成癰疽發背對口疔疥此皆言其大略也故成

癰者壅也為陽屬六腑毒騰于外其發暴而所患浮

淺因病原稟于陽分中蓋陽氣輕清浮而高起故易

腫易膿易腐易斂誠為不傷筋骨易治之症也疽者

疽也為陰屬五臟毒攻于內其發緩而所患深沉因

病原稟于陰分中蓋陰血重濁性質多沉故為傷筋

蝕骨難治之症也凡年壯氣血勝毒則順年老者

毒勝氣血則險治法裁于第二論中宜詳觀之內被

七情于臟腑憂愁思慮總關心 七情六慾者皆盜人

于此者無不多安多壽人若親于此者無不有損有

傷但人能味之者鮮矣蓋情慾之動作無所不好無

所不為故喜傷心怒傷肝憂傷肺思傷脾悲傷于魂

總恐傷腎驚傷膽此等七情皆耗人一身元氣之萌

貪滋味心惟大地意懼萬方此等六慾皆損人三世

鍾靈之真性也又所以為苦為疾為天為疼以及休

廢衰敗諸病諸瘡盡皆出于此等之情慾也醫者患

者亦宜慎察之外又六淫傷氣血風寒暑溼火相臨六淫者
 溼燥火是也風為四時不正浩蕩肅殺之氣發而最
 能中人寒乃節候不調疾風暴雨水雪嚴寒所傷或
 口食生冷之物暑因亢陽酷日燥火流金溼熱蒸
 而中溼從坐因久陰卑溼之地或身驟臨風雨潮氣
 所侵燥為陰虛內熱消燥津液不能滋潤臟腑以致
 皮膚枯槁便乾為燥火生于心緒煩擾酒膏粱房
 慾不閉所動此六淫者皆從外而入之體實之人遇
 而不中者有體弱之人感而隨發者多又有感之不
 發邪氣客于臟腑經絡關節之內積襲日久或待內
 傷或因外感邪氣觸而發之既發之後當察寒熱溫
 涼邪正勝之膏粱厚味多無忌勞傷房慾致虧陰者
 酒肥鮮炙燥之物也時人多以火炭烘薰或以油酥
 燻煮其味香燥其性鹹酸辛辣又至于塗葢厚
 久科正完 卷之一 二

料頓煮重湯以取其爽口快心不顧其消陰燥又
 得于寵妾滿前精神飛曠溫林厚被爐火圍匡每至
 于未飢先食未冷先綿快意從心色力太過稍有不
 及便去與陽惟取快意于一時不覺陰消于平日况
 所生是疾者不起于藜藿盡屬于膏粱誰識膏粱味
 短不及藜藿味長凡知命者當遠之避之擇而用之
 可故將五臟多乖變自然六腑不調勻五臟屬五行
 是也常欲相順相生所得木生火火生土土生金金
 生水水生木此五臟相合相生稟太和之氣其疾
 何以生焉是為疾者五臟必相反相尅所被木尅土
 土尅水水尅火火尅金金尅木此五臟相刑相尅理
 返互變之機其疾再無不作者所謂相生者昌相尅
 者亡此誠為萬物生尅一定之理豈止于疾病言哉
 又謂五臟不和則六腑不通六腑不通則九竅疲癯
 九竅疲癯則留結為癰蓋癰疽必出于臟腑手變關

竅不得宣通而發也治當寒邪而痛者以溫熱散之
 溼腫強痛者溼而導之燥痛者燥而潤之泄而
 痛者溫之寒而痛者通之虛而痛者補之實而痛者
 瀉之陰陽不和者調燮之經絡秘澁者沖和之膿脹
 而痛者開之惡肉侵蝕者去之勞而痛者逸之發於
 心者多危險五臟相干事可明五臟者心肝脾肺四
 臟獨居于下雖居于下其本臟精華津液元氣元
 神盡行灌溉榮注于上故四臟之火皆賴一臟之水
 以濟之所謂五臟根本皆係于背即此之意也凡發
 癰疽者未有不先傷五臟而後發之況背乃太陽膀胱
 之統脈所主太陽者六經之首領也督脈者十二經
 絡之主位豈容毒相犯之凡發於此故多心之已下
 成危險難治之症醫者不可不慎而察之心之已下
 外科正完 卷之一 三

多成順六腑之因亦許評凡養生於心之以下者除
 者足陽明胃經手太陽小腸經足太陽膀胱經手厥
 陰心包絡經手少陽三焦經足少陽膽經此六經其
 名屬腑其形在下其氣主表其病為癰故疾發於五
 臟者為重生于六腑者為輕此為表裏臟腑輕重之
 別也
 脾家積毒生肩脊發生於肩下脊上者乃因飲食
 根脚不週兩肩者為順先宜解毒散毒心為主宜內
 托清心為要間用蠟礬丸護心散防毒攻心如腫平
 堅硬漸大漸開攻注兩心經火毒對心臨對心發者
 肩胸項腫而不定者危心經火毒對心臨對心發者
 動熱極而發之也況心為主宰周身諸熱流會于此
 其結為患又稱毒刻君位最易傷人刑截督經非
 輕淺況此穴背脊多坑因難起發瘡形落陷腫不高
 尖治當大降心火急疎結熱用針通隨行拔法務

使毒氣內外疎通各從門出庶不內攻方為成守保
至十五日後內無變症得膿為解如是期變症漸生
但此症貴在乎早治十中可保其三也
雙生發肺肝積受不虛名
於左搭屬肝右搭屬肺俱生
可治古云左搭申右搭申左搭申右搭申左搭申右搭申
予每醫左右相申者未嘗見其死惟在治法得宜不
此症者先用萬靈丹發汗疎通內外次以清肝解鬱
湯柴胡清肝湯氣用四君子湯血用四物湯潰後入
珍湯俱兼六鬱湯參而調治誠為妥當但此症原起
於痰凝氣滯火鬱氣血不調所生正謂鬱者開之滯
者行之如候用瘡科解毒泄
氣候補候攻之藥必致多危
蓮子蜂窠防毒陷
蜂窠
或偏半肯重者形斜平塌兩脇俱傷孔似蜂窠突如
外科正宗 卷之一

蓮子瘡形雖畏常能多險多生老弱不堪反取常安
常穩大規只怕不純陽治法何妨瘡勢惡護心護膜
丸丹須要調停執藥執法存心
腰間腎俞發難生
發者生於兩腰內腎陷肉之間或正中亦發凡生於
此者最為險候蓋內腎乃為性命根本藏精氣
神又謂受命先夭者房勞過度氣竭精傷慾火消陰
之一竅也是為疾者房勞過度氣竭精傷慾火消陰
外陽煽惑以致真水真陰從此而耗散既散之後其
臟必虛所以諸火諸邪乘虛而入既入之後渾結為
瘡如木賊稍有不慎陰制火瘡形自可紅活高腫為膿
治以人參養榮湯加山萸五味子黃柏知母及加減
入味九以救其源也若瘡形色紫黑乾枯堅硬不作
膿者為真陰內敗再無可生之理必死在十五日前
後為
督脉經虛從項發俗名對口故相稱
於項後而

對前口者是也但有偏正之不同發於正者屬督脉
所主發於偏者乃太陽膀胱所司二者皆起於溼熱
上攻凝結而成也督脉者發瘡雖正而反為易治因
督脉起於下而貫脊行於上故毒氣得之反能冲突
高腫使邪毒不致下流低陷乃為外發故多易治勝
於內發者發瘡雖偏而每為難治蓋膀胱之脉起於巔頂
貫項兩旁順下而行乃與脊毒交會下流故瘡多平
塌又太陽膀胱主司寒水其質多冷多沉故瘡於此
多難起發形色多難紅活堅硬難潰又易流注兩肩
胸項作腫十五日外無膿者必難變黑歸陰故多不
治俗呼以正為重以偏為輕此皆庸說不得其消息
故也治以黃連消毒飲主之餘皆降火化痰解毒清
心托裏
何期耳後多生發天疽銳毒不非輕
耳後一
為要也
十三分致命之處誠為險惡之候又左為天疽右為
銳毒天者妖變之物也故屬肝木銳者鋒利之器也
外科正宗 卷之一

是屬肺金二者皆起於積想在心謀慮不決致火旺
而又鬱鬱而旺以成此疾也故形多堅硬頭多隱
伏未潰先黑未膿先腐臭穢易生元氣易敗常得此
者毒氣多致不得外發後必內攻而死但此症者初
生起于隱微令人多不知覺及其知覺毒又有脫疽
已入內矣如紅活高腫易膿易腐者無妨
生手足丹房補術孽根
脫疽之發脫者落也疽者
補藥房術秘法與陽滲精行幸不覺藥性暴烈或洗
或嚼或噙於口或藏臍下弱阻精道久戰不弱取藥
一時恣情戲謔毒積臍下弱阻精道久戰不弱取藥
必發此是根因發者難生多生手足發在骨筋初生
如粟色似棗形漸開漸大筋骨伶仃烏黑痛割
傷心殘敗敗身古人有法截割可生今
人命自喪其為各治法雖有詳在後文
慢腫難治
人誰肯割截為各治法雖有詳在後文

腫易總論中間法可憑 慢腫者肉腫瘡不腫是也

一決而定也瘡之初起理當升發潰膿之後不可用

內消宜用托藥如不應者乃毒勝氣血死在旬日或

已發出而不腐潰根脚堅硬或軟而散大者急投托

藥大補脾胃不應死在二旬若已潰而色不變紅活

亦不生肌收斂瘡口舉大腫痛不減胃氣不固急須

脾崩死在月餘諸瘡另自分門說豈許輕干紊此呈

癰疽發背恚生醫不論陰陽先灸之不痛灸至痛疼

灸不疼時 凡看癰疽腦項等發大瘡先要從容立定

外科正宗 卷之一 六

與日期可不相對相應則多吉不應則多險次看受

病之源發於何臟腑出於何部位但身體有上下部

位有險否形色辨順逆精神論有無再看年紀老壯

氣血盛衰發陰發陽毒深毒淺以陽為易治者多生

以陰為難治者多死方脈太過一二至已潰後又宜不

其終凡瘡未潰前脈要太過一二至已潰後又宜不

及二三分此為脈病相應首尾自不變生如其相反

恐防不測但看法全在日力精巧與心相應一參

明表裏透徹然後方定治法凡瘡七日以前形勢未

成元氣未弱不論陰陽表裏寒熱虛實俱先當灸輕

者使毒氣混火而散重者拔引鬱毒通微內外所得

火引毒氣混火而散重者拔引鬱毒通微內外所得

杖凡瘡初起七日之前或已灸之後未服他藥宜用

謂毒氣隨汗而散最為捷徑如二藥服後發汗不出

此乃表裏閉密之故毒亦不輕當神妙拔根方施治

神燈照法甚効亦不可用之太早如瘡四五日之間

形未聚毒未出若用之早恐留鬱而內毒反致難出

用須在八九日之後瘡勢已定毒氣已聚未成膿腐

之時用此照之已成者自高未成者自消不潰者自

潰不脫者自脫亦且解毒用膏貼頂上敷藥四邊圍

凡瘡最忌風寒所襲初起之時或已灸之後俱當用

太乙膏蓋貼頂上功効在於拔毒提頂提膿防禦風

寒不入如瘡痛高腫陽瘡七日已後瘡頭自有黃色

稠膿相粘膏上餘腫紅色光亮鮮明每日宜用慈湯

洗淨換膏貼之其正膿定在十一日前後出也此為

易治易安之症如七日之後瘡不大腫高四邊又不

外科正宗 卷之一 二

瘡痛瘡頭亦無膿意相粘此為陰陽相等之症宜用

化腐紫霞膏塗瘡頂上外以膏藥蓋之換至十日外

瘡頂漸腐餘腫漸高似有膿意之象其正膿只在十

五日之後後可出也此為以險成順之症至于二十日

已後無膿者乃純陰之症縱治亦無効矣又如瘡之

四邊根脚餘腫其功又在敷藥收束根本庶不開大

初起時宜用金黃散敷於四邊乃拔毒消腫止痛既

難腐難斂必當溫散散毒活血藥用之方

當也 氣盛兮頂自高而突起血盛兮根脚束而無疑

氣血者人之所原稟老者尚或有餘少者亦有不足

人之命脉全賴於此況百病生焉失此豈能無變獨

瘡科尤關係不淺但腫瘍時若無真正氣冲托則瘡頂

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能高腫亦不能嫩痛潰膿則無真陰相滋則瘡根

不能收束色亦不能紅活收斂比視瘡之頂高根活
不論老少定知氣血有餘故知老幼俱可無妨又宜
交會明白交會者瘡根與好肉交界之處高低自然
分別明白者瘡形與好形各無混雜自然分明也以
此觀之了高腫起者忌用攻利之藥以傷元氣平塌
然明白矣
漫者宜投補托之劑以益其虛凡瘡初發自然高起
內藏原無深毒亦且毒發於表便宜托裏以速其膿
忌用內消攻伐之藥以傷脾胃氣膿反難成多致不能
潰斂又瘡初起不高不赤不塌漫者此乃元氣本虛
急宜投托裏溫中健脾之藥務要催托毒氣在外庶
無變
內熱甚者量加消毒清劑便秘燥者必須通利
相宜使臟腑得宣通俾氣血自流利腫瘍時內熱口
乾脈寔煩躁便

外科正宗 卷之一 八

秘喜冷者此為邪毒在裏急與寒涼攻利宜內疎黃
連湯四順清涼飲內消沃雪湯俱可選用又兼有表
症者防風通聖散去麻黃或雙解散加桔梗天花粉
又或小便不利者兼入天水散五苓散俱可合用務
使二便通利以杜其源又有元氣素虛者恐不勝前
藥以托裏消毒散加蜜炒大黃或兼豬膽法亦得
通利為度首尾俱要閉而不結通而不泄得臟腑和
平表裏透徹方可便用托裏排膿內補之藥又如潰
瘍時雖有口乾便閉膿腫不和大小水不利等症此因
潰後膿水出多內亡津液氣血虛耗不能榮潤臟腑
所致其人必脈細而數口和而乾飲食減少好飲熱
湯此乃虛陽之火為病非前說有餘所比只宜養氣
和亦無變症常有悞行攻利多致不救者有矣十日
之間瘡尚堅必用披針當頭點破凡瘡十日已後自
當腐潰為膿如期

不作膿腐仍尚堅硬者此屬陰陽相半之症瘡根必
多深固若不將針當頭點入寸許開竅發泄使毒氣
無從而出必致內攻也倘內有膿又便易出此為開
戶逐賊之意也亦有十日外瘡雖不腐潰形尚紅活
嫩熱腫痛此雖膿遲後必有出此又不必針之蓋緣
元氣不能充足是或失用補托之藥又悞用寒涼或蓋
覆未暖多致膿遲有此症者宜用補中健脾大托補
藥以得膿為効又以十五日至二十一日為期過此
外者縱有稀膿但元氣被毒相拒日久必致托散難歸結也
半月之後膿亦少須
將藥筒對頂板提有膿血之交粘必腐肉之易脫如
半月後仍不腐潰不作膿者毒必內陷急用披針品
字樣當原頂寸許點開三孔隨瘡之深淺一寸二寸
皆可入之入針不痛再深入不妨隨將藥筒預先煮
熱對孔竅合之良久候溫取下如拔出之物血要紅

外科正宗 卷之一 九

而微紫膿要黃而帶鮮此為血氣營運活潑其人必
多活又謂膿血交粘用藥可全色鮮紅活腐肉易脫
如板出瘀血紫黑色敗氣穢稀水無膿者此為氣血
內敗死瘡所謂氣敗血衰神散此等之瘡難久
候其人必且如期時內有膿而不得外發者以針鈞
向正面鈞起頑肉用刀剪當原頂剪開寸餘使膿管
得流通瘡瘡頭無閉塞已用藥筒板膿之後外既有
發膿之候如尚膿少亦非自然得故瘡頭必有瘡
也須用針鈞鈞起瘡頂阻隔多致膿管不通自難出
寸餘頑硬之肉取之微痛亦自血出俱自不妨隨用
兩手輕重得宜從瘡根處漸漸擦至中間剪出膿
管處內有紫膿自然湧出以黃色稠厚為吉其膿日

漸多者為輕反此為慮此功務頻將湯洗切忌風吹
使塗未潰前或已用照藥後俱要煎慈艾湯每日淋
凡瘡上一次甚者早晚二次使氣血流通易於潰散
又已潰時及藥筒提按之後尤宜避風先去舊藥用
方監靠身下於定隨用猪蹄湯以軟絹淋湯而以上
併入孔內輕手捺淨內膿敗腐宿膿隨湯而出以
淨為度再以軟帛疊成七八重勿令大乾帶湯覆於
瘡上兩手輕盈旋按片時常溫再換如此洗按四五
次使血氣得疎患者自然爽快亦取痰滯得通毒氣
得散腐肉得脫疼痛得減此手功之要法大瘡不可
得乾於手心上捺化膿全患之新舊肉上外用太乙
膏益之四邊根脚已消處不必補藥每日如此用之
不敷日間膿腐盡脫新肉頻生更加內補調理得
宜瘡只一月餘大瘡不過七十日必完口而愈又
外科正宗 卷之一

關節在於斯時變生出於此候關節者陽瘡以十四
日為節此時務要出膿勢定不可過撥但膿出方自
腐脫腐脫方自肌生肌生方自收斂收斂方自瘡平
此為變生之關節亦由次序來也如期不得膿者後必
便有變生為一關節後必多順一關節後必多逆以
此觀之不治當大補得全收斂之功切忌寒涼致取
變生之局凡瘡潰膿之後五臟虧損氣血大虛外形
多生但見已潰時發熱惡寒膿多自汗作痛者便
進十全大補湯但見皮虛熱少睡飲食不甘者便進黃
芪人參湯但見四肢倦怠肌肉消瘦而黃短氣者便進
參養榮湯但見脾氣弱身涼脈細大便溏泄者便進聖
愈湯但見脾氣弱身涼脈細大便溏泄者便進聖

稟溫中湯但見飲食不甘惡心嘔吐者便進香砂之
君氣湯但見腎虛下陷食少虛熱間作者便進補中
益氣湯但見選用益托裏則氣血壯而脾胃盛使膿
入味尤酸此選用益托裏則氣血壯而脾胃盛使膿
口自飲若不務補托而快用寒涼謂之真氣虛而益
虛邪氣定而益定多致瘵毒內陷膿多臭穢
其則脈洪大渴而紅氣短此真氣虛而死矣蓋瘡全
賴脾土調理必妥端詳脾胃者脾為倉廩之官胃為
導一表一裏一納一消運行不息生化無窮至於周
身氣血遍體脈絡四肢百骸五臟六腑皆藉此以生
養又謂得土者昌失土者亡蓋脾胃弱者則多食而
易飢其人多肥氣血亦衰所以命賴以活病賴以安況外
科尤關緊要善養生者節飲食調寒暑戒喜怒省勞
外科正宗 卷之一

役此則不損其脾胃也如不然則精神氣血由此而
日虧臟腑脈絡由此而日損肌肉形體由此而日削
所謂調理一失百病生焉冬要溫牀暖室夏宜淨几
故知脾胃不可不端詳矣冬要溫牀暖室夏宜淨几
明憲則人之氣血喜暖而惡寒又謂遇寒則結遇熱
易散凡有瘡時冬要著紫炭之火旺旺暖氣逼盡餘
寒夏宜淨几明憲亦外風不入然後方可揭膏洗
貼膏上常見患瘡者夏月縱意當風取涼或睡臥陰溼
之處冬又見患瘡者夏月縱意當風取涼或睡臥陰溼
完口重則變為崩漏不膿不斂陰症飲食何須戒口
此常有也凡重命君子不可不慎慎哉飲食何須戒口
冷硬膩物休食飲食者人之所賴以生養必妥適其
痛傷胃氣諸味不喜直待潰後膿毒一出胃氣便回
方欲思食彼時但所喜者便可與之以接補脾胃如

所患之物不與此為逆其胃氣而反致不能食也切
要不可太過惟忌者生冷傷脾硬物難化肥膩滑腸
故禁之也 癰疽雖屬外科用藥即同內傷 科推為雜
病之尤蓋此傷人迅速開係不淺故特設於前也且
如癰疽腫痛其毒大矣形勢雖出於外而受病之源
實起於內也其所以治之者不可捨於內而治外乎所以
物湯氣宜用四君子脈虛足冷溫中脈定身熱涼
治法不可混於內理以致生變症 脈虛病虛首尾必
行補法表實裏實臨時暫用攻方 丹溪云凡瘡未破
藥所不可用凡瘡既破臟腑已虧一毫涼藥亦不可
用誠哉是言也 茲說又有不然且如初病未破時脈

外科正宗 卷之一 十一

得微沉緩瀟細數浮空外形又兼身涼自汗便利嘔
吐少食者滲形又不起發不瀉不痛無潰無膿此等
症者皆緣氣血虛弱之故若執前云未破毒攻臟腑
之說必投涼藥攻之復損元氣患者其生乎其死乎
予論治病不論首尾難拘日數但見脈症虛弱便與
滋補乃可為全如補不應木可安然虛弱甚者須用
參朮膏入饌糕陽虛自汗食少者單入參膏或六君
子湯加砂仁木香其加附子泄瀉腸鳴胃虛嘔逆者
參朮白朮散加蒼朮山藥木香柿蒂脾虛下陷泄瀉
及肛門墜重者補中益氣湯加山藥山萸五味子以
此選用又有表虛者身發熱無汗惡寒裏虛者脈
大身熱便燥口乾假如表症急者先用荆防敗毒散
以解其表裏症急者先用四順清涼飲以攻其裏表
裏相兼者宜防風通聖散表攻裏此隨其表裏先
後皆在活法暫時之用也於意受補者自無痰火內
實之相雜不受補者乃有陰火淫熱之兼攻又謂補

而應藥者多生虛 病要論久新要法枉於寬治猛治
而不受補者不治 且如人之病有新久勢有緩急如受病之初元氣未
弱治當隨症迎刃而解若懼行霸道猛劑定不能決
劫於危急時也但要用中病即已故謂藥不瞑眩厥疾
不瘳且如表症急者用萬靈丹大加表散裏症急者
以內疎黃連湯急與通行又加受病日久邪正相拒
其元氣未有不衰弱者縱有餘症雜症壞症俱當先
固其本而後調之和平之散之使病氣漸退元氣漸醒
飲食漸進根本漸實則餘患再無不愈之理所謂勢
孤則守本立道生常見治者不論病之新久本之盛
衰又不悟因虛致病因病致虛其中又有虛熱虛寒
之別一例妄行攻治如盲人騎藥必求標本功莫別
於先醫後醫若一槩之攻補恐兩途之悞用 凡物理
皆馬半夜臨深池豈不致危哉

外科正宗 卷之一 十二

本而身病之標本尤莫切焉且以天地運氣標本言
之以五運為本六氣為標此所以參天地之化育明
五行之生剋考節候之寒溫察民病之凶吉又主萬
物榮者皆榮疾者皆疾此所屬天地氣運之標本也
以身體標本言之以五臟為本六腑為標五臟主裏
主血六腑屬表屬氣此所以主臟腑氣血之盛衰稟
筋骨髓腦之強弱司疾病之淺深發生成之壽夭此
所屬身體陰陽之標本也以疾病標本言之先以初
病為主後以傳病為標又以元氣為本病氣為標此
所主寒熱表裏緩急之病應汗下補瀉和解之方凡
治病者必先治其本後治其標誠為妥當若先治其
標後治其本使邪氣滋甚其病益增又謂緩則治其
本急則治其標假如先得瘡疾而後得泄瀉嘔吐食
少等症此又宜捨本從標之法治之候瀉止嘔定食
進方再治瘡餘皆倣此若一槩攻補必 又說陽變為
兩途悞用此所屬疾病邪正之標本也

陰內外被寒涼尅伐

陰內外被寒涼尅伐 為本發於陽者為癰為熱為疔 者不覺以為小恙不早求治反又外受風寒內傷生 冷或再被醫者失於補托而致氣血凝滯胃傷敗使瘡 清之以合病家之意多致氣血凝滯胃傷敗使瘡 毒不得外發必致內攻凡此症往往不救者多矣如 瘡發在十日未出膿之前形勢與肉相平不疼 不熱軟慢相兼瘡孔止流清稀肥水更兼身體不熱 亦亦細微飲食厚食精神昏短有此症者瘡毒變入 其陰雖強投溫中健脾之劑不應有瘡毒變入 如瘡發在十五日之後已出膿時毒氣已將外發如 自調藥宜食冷物忽變為陰者急投托裏溫中 湯以散之須得瘡熱作痛膿出身溫脈起食進者為 吉但瘡原本於陽其 豈期陰變為陽首尾得辛熱扶 人故得多生者有矣

外科正宗

卷之一

一四

裝病分真似理究陰陽

裝病分真似理究陰陽 瘡本發於陰者為疽為冷為 者知覺欲其生而故將辛香酒煎大方熱藥以助之 醫者又欲患處高腫喉熱作膿敷以熱藥圖其起發 故瘡得藥性大熱而轉陰為湯其瘡雖得微腫微熱 微痛微膿但瘡形終不似真陽紅活亦不能得其真 厚黃膿如此者其瘡不久復歸陰矣但瘡原本於陰 其人故多死元直此症若患方寸不離托信於醫 而醫者又得機開透徹治法得宜內外融和偶偶中 節其中亦有可生者十中一二矣其要如救焚拯溺 可施者毋待少頃其切履水淵可禁者毋 妄絲毫如此而不得其生患者寔天命而已 工之異說豈無線藥之品詳 凡瘡毒既已成當用針 此舉世自然之良規也必當驗其生熟淺深上下而 針之假如腫高而軟者發於肌肉膿熱用針只針四

五分腫下而堅者發於筋脈膿熱用針只在六七分 腫平肉色不變者毒氣附於骨也膿熱用針必須入 深寸許方得見膿又輕按熱甚便痛者有膿且淺且 稠重按微熱方痛者有膿且深且稀按之皆硬而不 者膿未成按之軟而復起者膿已成按之硬而不 是膿即非是膿即非是膿即非是膿即非是膿即非 生而用針氣血反泄膿反難成若膿熱而不針腐潰 益深而針氣血反泄膿反難成若膿熱而不針腐潰 膿淺而針氣血反泄膿反難成若膿熱而不針腐潰 而後針其膿諸毒悉退又有氣瘻腫元氣虛者必先補 血瘦腫而內膿諸毒悉退又有氣瘻腫元氣虛者必先補 硬四邊紅絲纏繞者不可輕用針刀掘破若妄用之定 者已上四症俱不可輕用針刀掘破若妄用之定 然無所不知覺也至於瘻瘡癰疽諸毒諸漏疔毒堅硬

外科正宗

卷之一

一五

頭瘡此等症者若非線藥之功亦不能刻期取效夫

頭瘡此等症者若非線藥之功亦不能刻期取效夫 線藥乃有五種難以繁說與其各病相應者亦隨 症附例於各門以便選用故未 必中神聖工巧誠為學者機關 若波補津撲浪善於陸者穿山越嶺附葛藤奇偶 者鼓舞飛揚蹊徑者沉鑽鑿弱者守強者當敵 此為將得兵用兵之大法也如為醫者理皆做此 要在知人之強弱識病之內外究病之淺深察時之 順逆然後可汗可攻或吐或下或宜和或宜解或宜 又知某湯善汗某散善攻某丸善和某丹善補因其 病而用其方如矢發機投之必中中之必勝勝之則 病無不愈之理此為醫得方中之大法也又如望 問其聲而明其聖聞其由而得其工切其形而通其神

巧此四者誠為
初學之繩墨也
至於千方百症難將說盡短長
心契則靈症不在難意會則明方不心契症不意會
如疎淡之矣寡遊之地性情形勢不切何以便托用
哉故藥不應病病
不應藥即此據也
治枉活法貴在審詳
嘗言昔者承
所以動靜世務不同勞逸機關已異當原受病從外
而來今之受病從內而發又古者多寔設方宜散宜
宜故今者多虛治法宜微宜補若醫者不用之必得
識古知今一槩施與必多致其夭亡者也
其當醫斯可以稱良詞雖近於麤鄙可為後學提綱

癰疽陽症歌第三

癰疽不論上中下惟在陰陽二症推發背雖有正與

外科正宗

卷之一

一六

偏要取高低兩樣看純陽初起必焮腫更兼身熱有
微寒頂如尖字高突起腫似灣弓根有盤七日之間
多焮痛二七之期膿漸漫動息自寧食知味二便調
勻無瀉乾腫消膿潰精神爽脫腐生新氣血完五善
自然臻並至七惡全無半點手痛便隨膿減腫退自
肌寬新肉已生紅艷艷腐皮自斂白漫漫一身多爽
快五臟盡和歡此屬純陽俱易治百人百可保全安

癰疽陰症歌第四

純陰初起不知瘡粟米之形瘡瘡僵不紅不腫不知
痛少熱少焮少隄防七朝之後身體倦瘡根平大喜
澆湯頂不高兮根不活色不光兮腐不穰陷軟無膿
空結聚脉浮散大細飛颺飲食不食身戰戰嘗湯止
許意忙忙瘡上生衣如脫甲孔中結子似含芳膿多
臭穢身難便舉動恰惶韻不長瘡形成紫黑面色變
青黃精神昏憤多野睡言語無人自發揚口乾多舌
強痰喘定身亡此屬純陰俱不治百人百可到泉鄉

外科正宗

卷之一

一七

癰疽半陰半陽症歌第五

陰陽之症兩相交生死同兼事可招微熱微寒微赤
腫半昏半爽半平高脉來雖數多無力飲食雖食便
不消腫而不潰因脾弱潰而不斂為膿饒大便多溏
小便數上身有汗下身焦五善雖兼有七惡未全逃
口渴喜茶腸腹痛面浮屢飲足心高心煩不穩睡神
亂怕音焦投方應病方為妙陰轉為陽漸可調心真
造化爾命堅牢逢之佳是神僊手半死餘生定莫逃

癰疽五善歌第六

心善精神爽言清舌潤鮮瘡疼兼不渴睡醒得安然
肝善身輕便因煩自不煩指頭紅活色坐起覺平康
脾善唇滋潤衾幃蘭麝香凡食俱有味膿厚更肥黃
肺善聲音響無痰韻更長肌膚多滑潤大便自尋常
腎善誠為要水升火自降口和兼不渴小水得稀長

癰疽七惡歌第七

一惡神昏憤心煩舌上乾瘡形多紫黑言語自呢喃

外科正宗

卷之一

七

二惡腰身強目精邪視人瘡頭流血水驚悸是肝逆
三惡形消瘦膿清臭穢生瘡形多軟陷脾敗不知疼
四惡皮膚稿聲嘶韻不長痰多兼喘急鼻動肺將亡
五惡成消渴隨飲即隨乾形容多慘黑囊縮腎家端
六惡身浮腫腸鳴嘔餓頻太腸多滑泄臟腑並將傾
七惡瘡倒陷形如刺繭同四肢多冷逆汚水自流通

治病則例歌第八

外科之瘡有治例說與君家須切絕病端百出別根

因方法一囊豈同類熱與寒通曉消息知端

的通多不足秘多餘熱實寒虛治陽似陰陰似

陽似中妙理要推詳不分表裏一例治輕變重而重

變下醫者貴乎多應變不可偏執用其方且如表症

惡寒宜用荆防敗毒散裏症發熱可將內疎黃連湯

瘡勢已成托裏消毒散誠為正法內膿將潰十全大

補湯最得相當入參養榮湯治潰後虛熱發作木香

流氣飲散結腫寒溼為殃飲食不甘定用香砂開胃

外科正宗 卷之一 九

精神怯少須將參朮回陽陰虛陽虛須入珍最為要

領盜汗自汗得獨參一味可強潰後多疼乳香定痛

散功奇莫緩脾虛下陷補中益氣湯功效尤良口燥

謔言瀉實火須黃連解毒心煩衄血理虛陽必犀

角地黃湯古法治癰疽稱述仙方活命飲今時醫發

背還期神授衛生湯蟾酥丸在外科稱為獨品護心

散解內毒號曰無雙詎知蠟藥膜護心可羨淡

中有味還讚玉紅膏生肌生肌呈祥身涼

自汗腹痛腸鳴嘔逆豈逃與物難眠不寧虛陽發
 躁膿多定用聖愈湯生脉散接虛羸脉來微細歸脾
 湯除驚悸睡得安康竹葉石膏湯治虛煩身熱者何
 須疑慮麥冬清肺除膈熱有痰者毋待商量金鯉
 湯治肺癰吐膿氣急玄龜丹攻結毒臭腐頑瘡風熱
 生瘡通聖散瘡瘍狂躁破棺丹小柴胡湯除客邪往
 來潮熱大防風湯攻腿膝寒溼為殃咽腫咽疼定用
 清咽利膈散斑紅斑紫豈逃化斑解毒湯八味丸捐
 外科正宗 卷之一 三

口乾妙藥二神丸治脾泄奇方香連丸為臍膈瀉痢
 通用并露飲治口齒腐爛相當六和湯和脾止吐瀉
 雙解散解表理內傷遺遙散善治女人諸病保元湯
 常扶赤子多傷皮膚毛髮乾焦蘆薈丸効應甚捷咽
 喉口齒腫痛米礪散功實非常滋腎丸治下元腎虛
 不固涼膈散解上焦膈熱多煩九龍丹消魚口吞之
 滅跡二蛟散行溼腫服下安康呂祖一枝梅止痢定
 驚稱為仙藥真君妙貼飲消瘰癧疔神方痔漏

瘦瘠疔毒古誇三品錠癰疽流瀝諸風今羨萬靈丹
 柴胡清肝湯治鬚疽肝膽有効黃連消毒飲醫對口
 督脉尤良小兒口内生疔必用人中白散大人咽喉
 腫痛須將金鎖匙湯下疔新久珍珠散小便淋瀝木
 通湯玉真散破傷風効復元湯跌撲稱強提肩散治
 臍脾強直作痛拈痛湯除痛腿風溼相傷小便生疔
 龍膽瀉肝湯可美大頭腫痛普濟消毒飲何妨便毒
 懸癰內消散吞何足慮腎癰腿病芪柴湯下自無殃
 外科正宗 卷之一 三

又有女子陰瘡能腫能疼能至癢在人活法或消或
 補或蟲妨蓋男子之囊癰瀉肝經之溼熱小兒赤遊
 丹解毒兼破血凡治楊梅瘡戒薰為至切舌下發痰
 包利剪方能泄出如雞蛋清消痰是真訣結毒與頑
 疥紫金膏可設風瘡微骨癢雄黃散効絕疔瘡先刺
 血內毒宜汗泄禁灸不禁針怕綿綿者者不怕鐵鐵
 入針堅又有失榮腫堅硬如岩凸強陰失道症形狀
 要分別婦人之乳岩此中一例決未破肉增稜已潰

流臭血如此幾般症古今無治說瘡有數百種難以都陳曰惟在一點心何須三寸舌學者若精靈萬事皆通徹此為麗魁歌可譏亦可閱

癰疽灸法併禁灸瘡穴第九

凡瘡初起惟除項之以上餘皆並用艾火隨瘡勢之大小灸艾壯之多少用蒜切成薄片安於瘡頂上着艾炷蒜上點火三壯一換蒜片初灸覺痛以不痛似癢為止初灸不痛以知痛癢為佳如初灸全然不覺

外科正宗

卷之一

三

痛癢宜去蒜當明灸之又陰瘡日數多者艾炷不及其事以蒜搗爛鋪於瘡上以艾亦鋪蒜上點火灸之必知痛其為効此為火氣方得入裏知痛深處方是好肉蓋艾火拔引鬱毒透通瘡窠使內毒有路而外發誠為瘡科首節第一法也貴在乎早灸為佳又有禁灸數症亦以參詳頭乃諸陽之首純陽無陰之處凡生瘡腫俱是亢陽熱極所致如再加艾火使毒氣熾甚隨後反加大腫最能引動內痰發之必死而生

疔毒亦然又有腎俞一穴在於兩腰脊傍係內腎命根所係之處此穴發瘡多因房勞素虧腎水枯竭而成若再加艾灸火燥其源必致內外乾涸多成黑陷昏悶而死又有患者元氣素虛發瘡多不高腫其人體必倦怠精神必短而昏脉必浮散空虛數而不鼓此內無真氣抵擋火氣如灸之其人必致昏憤而死常謂艾火不虧人此言悞之多矣醫者亦宜詳察之

論病生死法第十

外科正宗

卷之一

三

初生如粟裏可容谷外面如麻裏面如瓜外面如錢裏可容拳起勢大終無害未老先白頭無膿軟陷休瘡從疔瘡起有膿生方許腫潰氣昂昂不治自安康根高頂又高八十壽還饒嫩腫易腐爛任大終無恙瘡高熱嫩疼雖苦必然生瘡軟無神氣應補方為益肉腫瘡不腫必竟生疑恐膿穢不進食泄瀉黃泉客瘡色猪肝紫無膿必定死綿潰不腐爛內怕葡萄嵌仰臥不知疼陰症命難生腐盡有敗氣笑裏終生淚

根散瘡平塌神仙無治法久病目露神必竟命難存
面忽似塗脂十日後分離敗中有紅肉雖重生門路
新肉如板片不食終須變手足皮枯槁血敗生難保
唇白眼無神腹脹瀉將傾噎氣不滯氣雖重多生意
眼目黑氣濃癰疽怕此逢房中香馥馥是病終爲福
瘡熱身微熱輕病何須說生死此中求片言一可決

察形色順逆第十一

凡看人病兼視其形色後與脉病相參誠識於始以

外科正宗

卷之一

三十一

決其終百無一失矣何以知之陰病見陽色腮頰紅
獻陽病見陰色指甲呈青此二者俱死又身熱脉細
唇吻反青目珠直視者死而如塗脂色若土黃油膩
黑氣塗抹者死唇舌乾焦鼻生煙煤眼神透露者死
形容憔悴精神昏短身形縮小者死喘麤氣短鼻掀
睛露語言謔妄者死循衣摸牀遺尿失禁撮空者死
頭低項軟眼視無神吸吸短氣者死皮破無血肉縱
爛斑麻木不知痛癢者死齒黃色如煮豆唇白反理

無紋耳黑枯焦不聽人中縮而坦平口張氣出無回

閉鼻煽相隨呼吸行汗出如珠不散痰若膠而堅凝

白血紅如肺色指甲灣而帶青神昏神浮神亂神離

縑衣生滿而黑氣慘天庭逢之都沒命法在此中評

病有三因受病主治不同論第十二

三因者內因外因不內外因此說從於先古其詞意

尚有發而未盡者內因者皆起於七情蘊結於內又

兼厚味膏粱薰蒸臟腑房慾勞傷虧損元氣乃五臟

外科正宗

卷之一

三十二

受之其病由此內發者但發之多在富貴人及肥胖
者十有八九其見症瘡多堅硬根蒂深固一便不調
飲食少進外軟內堅平陷無膿表實裏虛毒多難出
得此者卽病症之內傷也故曰內因外因者皆起於
六淫體虛之人夏秋露卧當風取涼坐眠溼地以致
風寒溼氣襲於經絡又有房事後得之其寒毒乘虛
深入骨髓與氣血相凝者尤重或外感風邪發散未
盡遂成腫痛此肌肉血脉筋骨受之其病由此外來

者發之多在不善調攝湯薄勞碌人十有八九見症多寒熱交作筋骨疼痛步履艱辛溼痰流毒以及諸風癱瘓口眼歪斜半身不遂風溼風温天行時毒等症得此者即疾病之外感也故曰外因又有不内外因内無七情干内外無六淫傷外何由來也其病得之於饑飽勞役喜怒不常飲食者冷熱不調動作者勤勞不惜以致臟腑不和榮衛不順脾胃受傷經絡凝滯故為疾者外無六經形症内無便溺阻隔其病

外科正宗

卷之一

三

多生於膜外肉裏肌膚之間似瘰癧痰注氣痞癭瘡之屬治法不必發表攻裏只當養氣血調經脉健脾和中行痰開鬱治之法為最善此是三因理之盡矣

調理須知第十三

凡人無病時不善調理而致生百病况既病之後若不加調攝而病豈能得愈乎其調治有法初起病時先看病者元氣虛實次者瘡之陰陽險否然後用藥調治當攻即攻可補便補不可因循就候以致變態

不虞也且患者又當安定心神相志諸念毋使陰慌乃保神氣不得變亂也再順天時假如夏熱坐卧不可當風忌置水於榻前牀下冬寒須避起居常要温和非柴火不可開窗看視常有寒侵致生多變又未潰之先毒氣内作倘有口乾渴症者涼物須當少少與之以滋蘊熱至膿潰之後生冷硬物一槩禁之不然傷脾胃膿必難成致瘡軟陷又難收斂飲食須常香燥甘甜粥飯隨其喜惡毋食過飽宜少宜熱宜

外科正宗

卷之一

三

濃方無停滯又得易化故也如大瘡潰後氣血兩虛脾胃並弱必製八僊糕早晚隨食數餅以接補真元培助根本再熬參朮膏如患者脾胃俱虛飲食減少胸膈不寬飲食無味者用白朮膏三匙人參膏三匙清米湯空心化服喜飲者酒化亦可若精神短少昏沉多睡自汗勞倦懶於動作者用人參膏三匙白朮膏二匙赤酒化服如肌膚癰澁面蒼不澤或大便血少虛秘以及皮乾髮稿者同地黃膏各二匙和服或

飲陽春酒更妙其功強健精神頓生氣血開胃助脾
潤肌榮骨此二藥功甚非小夫瘡不可缺之寶非草
藥之比病者常信用之乃無更變虛視者又多反復
不常故有易愈難愈之態實在乎得此失此之規也

雜忌須知第十四

凡病雖在於用藥調理而又要關於雜禁之法先要
灑掃患房潔淨冬必溫幃夏宜涼帳庶防蒼蠅蜈蚣
之屬侵之一切尼僧孝服經事見行婦女及遠客生

外科正宗 卷之一 三六

人開瘡時俱當忌見牛犬腥羶醃臘薰藏之物俱能
作渴生乾瓜菓梨柿菱棗生谷等類又能損胃傷脾
鷄鶩羊肉蚌蛤河豚蝦蟹海腥之物並能動風發癢
汕膩煎炒烹炙鹹酸厚味等件最能助火生痰赤豆
菴麵動氣發病惱怒急暴多坐瘡滿飲食太過必致
脾殃瘡愈之後勞役太早為癩疽入房太早後必
損壽不避風寒復生流毒不減其味後必瘡癢無度
夫瘡須忌半年小瘡當禁兩月此誠為知命君子事也

瘡瘍看法

初起頂高根活色赤發熱焮腫疼痛日漸高腫者順
已成焮痛皮薄光亮飲食如常二便調和身溫者順
已潰膿稠色鮮不臭腐肉自脫焮腫易消身輕者順
潰後膿厚稠黃新肉易生瘡口易斂飲食漸進者順
初起頂平根散色暗微腫不熱不疼身體倦怠者逆
已成腫堅色紫不作膿不腐潰惟口乾多煩躁者逆
已潰皮爛內堅不腐腫仍不消痛仍不減心煩者逆

外科正宗 卷之一 三九

腫瘍治法

潰後膿水清稀腐肉雖脫新肉不生色敗臭穢者死
初起知痛或不痛起發或不發毋論陰陽表裏自數
遠近但未見膿者俱宜灸之既灸不消痛癢明灸之
焮腫發熱疼痛有時脈來浮數無便秘者宜藥托之
身體拘急脈緊惡寒飲熱就暖者邪在表也宜汗之
腫硬痛深口乾便秘身熱脈實者邪在裏也宜下之
嗽痛勢甚煩燥飲冷舌乾口燥者火在上也宜清之

腫痛堅硬背如負石惡心乾嘔邪毒在內解毒拔之
腫痛日深內膿不出瘀肉塗塞瘡口者急宜開割之
軟慢不作膿及不腐潰者陽氣虛也壯脾胃助陽氣
身涼自汗手足並冷六脉虛細便泄腸脫也急溫之

癰疽治驗

一男子年五十餘背心生疽十三日矣湯水全然不
入堅硬背如負石煩悶不語請視之瘡勢雖重皮
色亦紫喜其根脚交會明白毒尚結局於此未經

外科正案

卷之一

三

入內故可治之須行拔法使毒氣外發不致內攻
為要隨煮藥筒提拔二次其毒惡血既許又麻實
便秘以內疎黃連湯及猪膽套法大便通利矣
使內外毒氣皆得通泄隨夜睡卧得寧背重失其
大半次用托裏排膿之藥外以桑葉灸法腫復漸
腐膿毒漸出換服十全大補湯加麥冬五味數服
腐肉自脫飲食漸進瘡口漸合調理兩月餘而愈
老婦年近七十旬背瘡已過半月形勢全然可畏彼

家俱置不治惶惶整備後事召子看童推瘡恙見
問其故舉家大小咸言待斃朝各予強借觀可
視之瘡形半背皆腫瘡雖不高亦不內陷以手按
之外實而內腐老年內虛膿毒中隔不得外發故
也雖飲食不食且喜根脚兩無混雜臟腑各無敗
色乃有生之症也病家故執不信文言籤龜命下
俱斷必死治豈生乎予嗟可惜也再三四日不治
內膜穿潰必死此命陷於無辜矣次日予心不服

外科正案

卷之一

三

自往討治喟然歎曰予非相強實見其有生不忍
捨其待死固欲強之醫後藥益分毫不取直待瘡
者果愈隨其酬補何如彼衆亦肯先用慈慈湯淋
洗瘡上外面俱是不腐頑肉隨用披針利剪並東
取去二寸頑肉及通膿管以垂輕重之間捺淨內
畜膿血交流不往約有盞碗傍視者無不點頭失
色待膿血稍盡仍換前湯洗淨用膏封貼肉用回
元大成湯三服以接補真氣後用天參養榮湯倍

參朮加香附早以八味丸入仙糕相兼調理欲其
脾胃健食進腐脫肌生况此婦謹慎調理並未更變
出百目瘡愈身健而安自後方信予言無謬也
蓋生年過五旬素有渴症身又肥胖之極生背疽
約有尺許至十二朝後請治視其瘡勢微腫色淡
微紅根脚半收半散此陰陽相等之症也况肥人
內虛瘡勢又大非補托瘡必難起毒必易陷恐後
不及事也初服便以托裏散固其內候至十五日

外科正宗

卷之一

三三

外用披針小小從頂放通三孔度使內膿肉毒有
路而出勢大不可過放走泄元氣恐膿難成內用
參芪內托散倍加人參黃芪各三錢服至二十日
大膿將發日至升許早以參朮膏午用十全湯加
參芪各四錢麥冬五味子各一錢服至月餘肉腐
通潰膿似湧泉間用聖愈湯入仙糕兼之調理保
胎脾胃增進飲食後恐前藥不勝其事藥中加熟
附一錢喜其脾胃健膿稠色黃而止至四廿日外瘡

勢方得微退時值仲夏天炎酷熱患者生煩悞飲
冷冰二碗至晚瘡隨下陷忽變為陰不痛無膿身
涼脉細腹痛足冷彼覺請視瘡形軟陷脉亦細微
此瘡因寒變之故也非辛熱不可回陽急用十二
味異功散倍人參熟附各三錢不應此藥力不勝
其寒也換用生附人參各五錢早晚二服方得身
溫脉起瘡高腹痛又二服膿似前流大膿出至一
月約有百碗餘竟不減少外皮紅退亦不腐爛此

外科正宗

卷之一

三三

肥人外實而內虛皮故不腐而內潰也又用玉紅
膏際於綿花片上推入患內膏蓋之其內腐漸脫
漸出又十日後出大腐一塊約有六兩自後腫消
身便膿少漸長生肌百日外方得平復人參服過
五斤外附子亦用十兩餘方得全安此症設用解
毒傷脾宜利等藥不用辛熱峻補豈有得生之理
一鄉官年踰七旬餘發瘡右背已經八日外視之瘡
雖微腫色淡不紅勢若龜形根漫不聳此老年氣

血衰弱之故也。診其脉帶微數而有力，此根本尚有蒂也。雖老可治。隨用排膿內托散，加皂刺以潰膿。托裏為要。服至十三日後，瘡漸腫高，色亦漸赤，便不能腐，潰為膿。此食少脾弱不能培養之故也。又用十全大補湯數服，膿亦漸出，不能快利。凡膿滯者，內膜中隔不通，故也不可借其老而候其大事。隨用披針當頭取開寸許，捺通膿管，果膿隨出，以猪蹄湯洗淨，膏蓋後，用照藥每日一次。外肉

外科正宗

卷之一

三

漸腐為膿，患者形色枯槁，不澤，更用人參養榮湯，倍加參芪，托裏腐肉將脫者，取之，新肉欲生者，培之。但老年氣血不能速効，又如服參朮膏早晚三次，以後新肉方生，飲食頓倍，調理七十五日而安。一瘡生年六十餘，患背疽，寸日外視其瘡形，堅硬色亦深紫，頭發甚多，會若螺子，豎長尺餘，根橫半背，且喜其弓腫光亮，發熱，嫩痛，脉得洪數而有力，此瘡得於膏粱醇酒，溼熱蒸鬱，故也。雖重不妨隨

用照藥三條相應，照畢其頭內，拾螺子盡，欲吐出亦用抵脚括去。又流惡血，鍾許，葱湯洗淨，捺止腐藥，用紙蓋貼周圍，根脚用吸毒散敷之，收其毒氣。庶不開大，次日仍照仍敷。三日後，外肉漸腐，內加托藥，培助脾胃，解毒為膿。早服八味丸，以滋腎水。換洗蹄湯，仍將膏貼候其腐盡，深入寸餘，隨用紅膏日漸日長，但此公素性好飲，雖在恙中不能相忌。兩月後，新肉雖平，嬌嫩不能結皮，完口因嫌戒

外科正宗

卷之一

三

飲復將浮嫩之肉盡行剪去，用膏貼數日，待肉老平，換用珍珠散，搽上數次，方結老蓋。八十日而安。一老年人患疽，半月其瘡貫脊，徧背皆腫，上至肩膊，下至腰脇，腫若瓜形，頭計數百，彼家以為勢重，不治。予診其脉微洪而不鼓，又兼腫嫩，外發詢問飲食知味，其年雖老而根本尚有餘也。雖老何慮，先用托裏消毒散二服，其勢稍定，外則藥水塗法，助方腐潰，根以鐵筒膏箍之，更服排膿內托散，候正

膿漸出但老年氣血外肉不能易腐視其肉色相變不能腐化者隨用針鈎利剪徐徐剪去其形腐四寸餘長低尺許凡見紅肉便用膏塗其新肉已生將半時值隆冬患家自行開瘡洗看失着柴炭之火又兼蓋護未暖外被寒侵次後瘡色淡白膿反清稀飲食減少氣體不舒請視之此不遵調法愛護乃被寒氣侵入也雖變不妨因瘡原稟於陽故能不失陽矣房中不着柴火烘薰暖氣逼盡餘

外科正宗

卷之一

三六

寒開瘡相看果應前言也隨用濃葱湯乘暖淋洗將紅膏烘化搽上外用膏貼以熱綿軟絹覆疊數層繡蓋甚密內用神功托裏散早晚連進二服次早復看其瘡自回陽矣已後遵法調理百日而安一老人年過六旬患背疽十二日矣視其瘡形半腫半紅微疼微熱其患發於背心之下腎俞之上高低平等廣闊八寸根脚泛腫色若水噴頂軟無神似腐非腐兼脈浮而大重按而虛此瘡利於腫

潰不利於收斂辭不可治彼家喟然而笑復請里中老醫視之見患者起居平和言語清利舉動如常飲食有味此爲五善俱具是安若泰山之症也何必相慮彼家得此欣躍萬態隨用其藥日漸有功膿潰腫退腐盡肌生彼此以爲萬安之象也予常對患家親族言此病不可待必死於收口至錢大時也衆若以予爲胡說後問收口只有錢許未合予曰不久居也急備後事恐不及矣不數日變

外科正宗

卷之一

三三

症一出不四朝而死後里人始信予之前言是矣一男人六旬有二發生右搭先用艾灸次漸形勢高腫堅硬不痛十五日後尚未潰膿日生煩悶恐其毒陷先用針通隨行拔法拔出惡血鍾許已後稍得輕便搽上化腐之藥膏蓋用至三日其瘡漸作腐潰至二十日亦出正膿壞肉漸脫新肉漸生此外治之法盡矣因病家與內科一醫平交甚切托彼用藥內服而不遵外科補托之法自執已見不

聽予言失於峻補每日人參不過二錢以為足用予曰不及法當五錢兼熟附二錢方為稱病不然必生變矣彼此不信後果肉色淡白瘡口散大膿水清稀飲食減少此敗症具矣後雖強投溫中健脾大補之藥終則不應至於形體消瘦膿水臭穢延至六十日歷盡氣血而亡然後方自懊悔殊不知凡大瘡每日膿出一碗用參必至三錢以此為則況本病出膿日有三碗用參三錢謂之大損小外科正宗 卷之一 三八

補豈不歸死又外科乃破漏之病最能走泄真氣如損補兩不相敵無以抵當往往至於不救者多矣此為不信於補而執俗見自取敗亡者也可惜一男子年近六旬時值仲夏背生熱癩二十餘處彼家邀請視孫瘡恙見彼坐於堂滿背皆瘡予略視之內有一瘡比瘡甚小其毒甚大予對曰此非瘡癩比也後發勢不可及彼笑而答之無恙也乃即送至門庭予又囑曰可急請他醫治之不可緩待

俱不聽信又至十日形勢稍發命里中一醫治之又曰是癩也又十日形勢內陷敗症齊出稍信前言方央親友邀予相視其人睡臥於堂帛覆瘡上登堂未進二三步即退人曰何也予曰敗氣滿前死期速矣何必視瘡急備後事再七日死後果如言不差時刻此為諱疾忌醫致其自敗者也可惜以上治法種種不能枚舉聊陳數條與同志者採訪觀之所謂得其要者一言而終不知其要者流散外科正宗 卷之一 三九

無窮但病不參透舉手錯亂醫理精明決斷自成 腫瘍主治方

神授衛生湯

神授衛生方並甲 皂翹歸尾銀花草

羌乳紅沉石洗明 大黃花粉効如神

治癰疽發背腦疽對口丹瘡瘰癧惡毒疥瘡溼

痰流注及外科一切瘡症但未成者即消已成

者即潰能宣熱散風行瘀活血解毒消腫疎通

臟腑且藥性平和功效甚速誠外科首用方也

羌活八分

防風

白芷

川山甲

土炒

沉香 紅花 連翹 石決明煨各六分

金銀花 皂角刺 歸尾 甘草節

花粉各一錢 乳香五分 大黃酒拌炒二錢脈

水二碗煎八分病在上部先服藥隨後飲酒一

杯病在下部先飲酒一杯隨後服藥以行藥勢

肉消沃雪湯內消沃雪膏陳皮乳沒翹針甲芷芪射干芍貝銀花粉木香甘草大黃歸

治發背併五臟內癰尻髻諸腫大小腸癰肛門

臟毒初起但未出膿堅硬疼痛不可忍者並服

外科正宗 卷之一 四

青皮 陳皮 乳香 沒藥

連翹 黃芪 當歸 甘草節

白芷 射干 天花粉 川山甲

貝母 白芍 金銀花 皂角刺各八分

木香四分 大黃二錢

水酒各一碗煎至八分量病上下食前後服之

內疎黃連湯內疎黃連湯木香梔歸苓芍薄荷郎桔梗甘草連翹等 大黃加倍効能強

治癰疽腫硬發熱作嘔大便秘澁煩躁飲冷嘔

啞心煩舌乾口苦六脉沉實有力此邪毒在臟

也急宜服此以內除之使邪氣不得傳變經絡

木香 黃連 山梔 當歸

黃芩 白芍 薄荷 檳榔

桔梗 連翹各一錢 甘草五分 大黃二錢

水二茶鍾煎八分食前服臨服加蜜二匙亦可

保安萬靈丹保安萬靈丹木蝎天麻歸解草考殊羌活荆防細辛等 麻雄黃三烏

治癰疽疔毒對口發頤風溼風温溼痰流注附

外科正宗 卷之一 四

骨陰疽霍膝風症左癱右瘓口眼喎斜半身不

遂氣血凝滯偏身走痛步履艱辛偏墜疝氣偏

正痛痛破傷風牙關緊閉截解風寒無不應効

茅朮八兩 全蝎 石斛 明天麻

當歸 甘草炙 川芎 羌活

荆芥 防風 麻黃 北細辛

川烏湯泡去皮 草烏湯泡去皮尖 何首烏各一兩 明雄黃六錢

右爲細末煉蜜丸彈子大每藥一兩分作四丸

一兩作六九一兩作九九三等做下以備年歲
 老壯病勢緩急取用預用硃砂六錢研細為衣
 磁礮收貯如惡瘡初起二三日之間或癰疽已
 成至十朝前後但未出膿者狀若傷寒頭疼煩
 渴拘急惡寒肢體疼痛惡心嘔吐四肢沉重恍
 惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱又治傷寒四時感
 冒傳變疫症但惡寒身熱表症未盡者俱宜服
 之用連翹大蔥白九枝煎湯一茶鍾將藥丸

外科正宗

卷之一

四三

乘熱化開通口服盡被蓋出汗為効如服後汗
 遲再用葱白湯催之後必汗如淋洗漸漸退下
 覆蓋衣物其汗自收自斂患者自然爽快其病
 如失但病未成者隨即消去已成者隨即高腫
 潰膿如諸疾無表症相兼不必發散者只用熱
 酒化服此方原載於諸風癰癩門予每用之發
 散瘡毒其功甚捷故移錄於此詳觀此方治腫
 瘍甚効者何也凡瘡皆起於榮衛不調氣血凝

滯乃生癰腫觀此藥性專發散又能順氣搜風
 通行經絡所謂結者開之況瘡毒又乃日積月
 累結聚所發苟非甘溫辛熱發泄以汗疎通安
 能得効所謂發散不遠熱正合此方之意無謬
 也服後避風當食稀粥忌冷物房事孕婦勿服
 雙解復生散雙解復生散 歸翹滑石銀花羌活 參木硝磺黃共得宜
 治癰疽發背諸般腫毒初起增寒發熱四肢拘
 急內熱口乾大小便秘宜此藥發表攻裏並効

外科正宗

卷之一

四三

荆芥 防風 川芎 白芍
 黃芪 麻黃 甘草五分 薄荷
 山梔 當歸 連翹 滑石
 金銀花 羌活 人參 白木各八分
 大黃 芒硝各二錢
 水二碗表症甚者薑三片葱頭一二莖裏症甚者
 臨服加生蜜三匙和服為發表攻裏雙解藥也
 內消散 內消散內用銀花 知貝天花白朮加 半夏川山併皂刺 乳香功效病無嗟

治癰疽發背對口疔瘡乳花百種無名腫毒一切疔瘡此藥能令內消化毒為黑水從小便而出勢大者雖未全愈亦可轉重就輕移深居淺

金銀花 知母 貝母 天花粉

白芨 半夏 川山甲 皂角針

乳香 各一錢

水酒各一碗煎八分隨病上下食前後服之留

藥渣搗爛加秋芙蓉葉細末一兩白蜜五匙同

外科正宗

卷之一

四

渣調敷瘡上一宿自消重者再用十服忌白勃

清熱消風散

清熱消風散芎藭 柴苓防草與紅花

歸粉銀花翹皂角 陳皮蒼朮茂無落

治癰疽諸毒瘡腫已成未成之間外不惡寒內

無便秘紅赤高腫有頭焮痛宜服此藥和解之

防風 川芎 當歸 黃芩

白芍 天花粉 金銀花 甘草 五分

連翹 紅花 柴胡 蒼米

陳皮 黃芪 角刺 各一錢

水二茶鍾煎八分食遠服婦人加香附童便炒

已上七方癰疽七日已前瘡勢未成形體壯實

表裏之症相合者宜服病退即已如過七日以

後形勢已成便宜用後托裏等藥催毒在外以

速其膿禁前表下之藥損傷元氣致生多變矣

內固清心散

內固清心散茯苓 甘草棗豆玄明粉

砂雄芫菹乳香稱 人參水片可清心

治癰疽發背對口疔瘡熱甚掀痛煩躁飲冷有

此症者可預防毒氣內攻當服此藥庶不變症

外科正宗

卷之一

五

茯苓 辰砂 人參 玄明粉

白豆蔻 甘草 乳香 明雄黃

水片 一錢 真荳粉 二兩

右為細末每服一錢五分蜜湯調下不拘時候

護心散

護心散中荳粉佳 每服二錢頻送下

乳香甘草共硃砂 敢交嘔吐自無他

治瘡毒內攻口乾煩燥惡心嘔吐者宜用此藥

真荳粉 一兩 乳香 三錢 硃砂 一錢 甘草 末一錢

共研極細每服二錢白滾湯調服早晚二次

琥珀蠟礬丸 琥珀 蠟 礬 雄黃 蜂蜜 九成就 明礬 黃蠟 血 硃砂

治癰疽發背已成未膿之際恐毒氣不能外出

必致內攻預服此丸護膜護心亦且散血解毒

白礬 一兩 雄黃 一錢 琥珀 一錢 硃砂 一錢 雄黃 一錢 琥珀 一錢 硃砂 一錢

雄黃 一錢 琥珀 一錢 硃砂 一錢 雄黃 一錢 琥珀 一錢 硃砂 一錢

右四味先碾研極細另將蜜蠟銅杓內溶化

離火片時候蠟四邊稍凝時方入上藥攪勻共

成一塊以一人將藥火上微烘衆手急丸小寒

外科正宗 卷之一 四六

豆大用硃砂為衣磁罐收貯每服二三十丸白

湯食後送下病甚者早晚日進二次其功最効

托裏消毒散 托裏消毒散 人參 芍藥 芩芩 薤白 歸木 茯苓 甘草 銀花 等 桔梗 甘草 効如神

治癰疽已成不得內消者宜服此藥以托之未

成者再消已成者即潰腐肉易去新肉易生此

時不可用內消泄氣寒涼等藥致傷脾胃為要

人參 川芎 白芍 黃芪 當歸 白朮 茯苓 金銀花 各一錢

白芷 甘草 皂角針 桔梗 各五分

水二鍾煎八分食遠服脾弱者去白芷倍人參

排膿內托散 排膿內托散 芍藥 甘草 桔梗 併肉桂 隨方加減在人為

治癰疽腦項諸發等瘡已潰流膿時宜服此藥

當歸 白朮 人參 各二錢 川芎

白芍 黃芪 陳皮 茯苓 各一錢

香附 肉桂 各八分 甘草 五分 白芷 項之上

桔梗 胸之上 牛膝 下部加

外科正宗 卷之一 四二

薑三片水二茶鍾煎八分食遠服

乳香黃芪散 乳香 黃芪 散 乳沒 粟壳 參 芪 甘草 撮 芍藥 白芍 與陳皮 加上熟地 疼即脫

治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍者或未成

者速散已成者速潰敗腐膿毒不假刀砭其惡

肉自然脫下及治打撲傷損筋骨疼痛並服之

乳香 沒藥 各五分 黃芪 粟壳 去筋膜 蜜炒

人參 甘草 川芎 歸身 白芍 陳皮 熟地黃 各一錢

水二鍾煎八分量病上下食前後服之

神功肉托散 神功肉托散 附子木香甘草 歸木陳皮白芍宜

治癰疽腦項諸發等瘡至十四日後當腐潰流

膿時不作腐潰更兼瘡不高腫脉細身涼者用

當歸 二錢 白木 黃芪 人參 各一錢

白芍 茯苓 陳皮 附子 各一錢

木香 甘草 各五分 川芎 一分 山甲 炒八分

煨薑三片大棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服

外科正宗 卷之一 四八

透膿散 透膿散內用黃芪 山甲 歸 總得宜 加上角針頭自破 何妨膿毒隔千皮

治癰疽諸毒內膿已成不穿破者宜服之即破

黃芪 四錢 山甲 炒末 一錢 川芎 三錢 當歸 二錢

皂角針 一錢 五分

水二鍾煎一半隨病前後服臨入酒一杯亦好

竹葉黃芪湯 竹葉黃芪湯 草 麥冬 生地 可回津 半夏 石膏 兼淡竹

治癰疽發背諸般疔腫表裏熱甚口乾大渴者

黃芪 甘草 黃芩 川芎

當歸 白芍 人參 半夏

石膏 淡竹葉 十片 麥冬 各八分 生地黃 一錢

水二鍾薑三片燈心二十根煎八分食遠溫服

回陽三建湯 回陽三建 附參 歸木 芍 苓 活 陳 桂 木 紅 甘 紫 草 陰 疽 危 症 劫 堪 推

治陰疽發背初起不疼不腫不熱不紅硬若牛

皮堅如頑石十日外脉細身涼肢體倦怠皮如

鱉甲色似土珠粟頂多生孔孔流血根脚平散

軟陷無膿又皮不作腐手熱足涼者俱急服之

外科正宗 卷之一 四九

附子 人參 黃芪 當歸

川芎 茯苓 枸杞 陳皮

黃肉 各一錢 木香 甘草 紫草

厚朴 蒼朮 紅花 獨活 各五分

煨薑三片皂角樹根上白皮二錢水二碗煎八

分入酒一杯隨病上下食前後服之用綿帛蓋

暖瘡上預不得大開瘡孔走泄元氣為要患按

凡背疽屬陰者皆由臟腑先壞而內毒不得發

越於外也舊有用雞冠剪而滴於疽上者有醋
 黃雄艾敷用者猪腦熱藥敷圍者神燈火氣灼
 照者此數法皆陰疽之用予雖常用未見其實
 但陰疽不起者如樹木之根壞強力培植枝葉
 而終無發生之理予常據理用藥固有得其生
 者予中三四譬如先要疎其嫁上通其地脉助
 其根本回其陽氣此四者缺一不可用蒼朮厚
 朴茯苓陳皮疎其土濕芎藭當歸紫草紅花通其
 外升正矣

脉人參黃芪枸杞山藥助其蒸附子木香甘草
 獨活回其陽如此藥之但根本內有出脉未絕
 之氣眼之俱可為其生又驗其手足溫暖瘡便
 發熱漸作焮腫復生疼痛色暗得活堅硬得腐
 胃氣得回此是藥之効驗必在三服中應之為
 吉外兼照法接助回陽此通治陰疽之大法也

黍米寸金丹 黍米寸金丹乳沒雄黃狗寶別糖味
輕粉珍珠密石下香狗寶別糖味
 二名返魂丹三名出骨丸四名追命丹五名延

壽丹六名來甦圓七名知命丸八名得道丸此
 方昔出異人所傳常有暴中急症忽然卒倒者
 幹開牙關研灌三丸其人即活又能治發背腦
 疽偏身壅腫附骨癰疽等症初起增寒壯熱四
 肢倦怠沉重者毋分表裏老幼輕重並宜服之

射香分五 乳香 沒藥 雄黃
 狗寶 輕粉 烏金石各錢二 蟾酥錢二
 粉霜水銀煉
白色者 黃蠟各三錢 硃砂錢二

外科正宗 卷之二 五

鯉魚胆陰乾
三箇 狗胆乾用
一箇 白丁香四十
九根
 金頭蜈蚣七條全者
酥炙黃色 頭胎男乳一
合
 右件為細末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同藥
 和丸菜荳大大入三九小兒用一九病重者五
 九冷病用葱湯熱病用新汲水送下衣被密蓋
 勿令透風汗出為度諸病如失後食白粥調理
 兼發背奇方 發背諸方此獨奇 誰期照藥罕人知
雄蝎射砂併沒藥 為燈一照脫箠難
 治發背初起七日前後未成者自消已成者自

潰不起發者即發不腐潰者即腐誠為良法也

雄黃 硃砂 血竭 沒藥 各二錢

麝香 四分

右五味研為細末每用三分綿紙裹藥為燃長約尺許以真麻油潤透灼火離瘡半寸許自外而內周圍徐徐照之火頭向上藥氣入內瘡毒隨火解散自不內侵臟腑初用三條漸加至四五條候瘡勢漸消漸減薰後隨用敷藥如已潰

外科正宗

卷之二

五三

大膿發泄時不必用此照敷只宜用膏藥蓋貼

敷藥方

薰後敷方有四般 車前草 蒼木 五龍草 金銀花 各五分 米粉 銀花 為糝和 敷之 百腫 自當安

車前草 蒼木 五龍草 金銀花 各五分

右四味鮮草藥一處搗爛加三年陳米粉即常用糝衣者初起仍加飛鹽末二三分共打為糊糊徧敷瘡上中留一頂以膏蓋貼避風自然拔出膿毒若冬月草無鮮者預採蓄下陰乾為末用陳米醋調敷亦如前法並効今恐前敷藥內

用五龍草隨地或有缺少不便合劑亦常薰後

頂以膏蓋周圍腫上以如意金黃散代敷亦効

如意金黃散 如意金黃散 大黃 姜黃 枳實 陳蒼 南星 厚朴 天花粉 敷之 百腫 自當安

治癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷濕痰流毒大

頭時腫漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾濕脚

氣婦女乳癰小兒丹毒凡外科一切諸般頑惡

腫毒隨手用之無不應効誠為瘡家良便方也

天花粉 上白 色重者 大黃 姜黃 各五分

外科正宗

卷之二

五三

白芷 五斤 紫厚朴 陳皮 甘草

蒼木 天南星 各二斤

以上共為咀片曬極乾燥用大驢磨連磨三次方用密絹羅厨篩出磁器收貯勿令泄氣凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者及夏月火令時俱用茶湯同蜜調敷如微熱微腫及大瘡已成欲作膿者俱用葱湯同蜜調敷如漫腫無頭皮色不變濕痰流毒附骨癰疽鶴膝風症等病俱用葱

酒煎調如風熱惡毒所生患必皮膚宛熱紅色光亮形狀游走不定者俱用蜜水調敷如天泡火丹赤遊丹黃水漆瘡惡血攻注等症俱用大藍根葉搗汁調敷加蜜亦可湯潑火燒皮膚破爛麻油調敷具此諸引理取寒熱溫涼製之又

四虎散 四虎散內用南星 草烏 半夏 通靈藥內再添狼毒力 癰疽頑腫即此散

治癰疽腫硬厚如牛領之皮不作膿腐者宜用

外科正宗 卷之一 五十四

南星 草烏 半夏 狼毒 各等分

右為細末用猪腦同搗徧敷瘡上留正頂出氣

真君妙貼散 真君妙貼散奇功 膏麵硫黃白麵同 諸般異症皆堪効 常取收功掌握中

治癰疽諸毒及異形異類頑硬大惡及瘡走散

不作膿者宜用此藥不痛者即痛痛甚者即止

明淨硫黃 計斤 為末 蕎麵 白麵 各五斤

共一處用清水微拌乾濕得宜木廂內曬成麵片單紙包裹風中陰乾收用臨時再研極細用

新汲水調敷如皮破血流濕爛疼苦等症麻油調搽天泡火丹肺風酒刺染布青汁調搽並効

回陽玉龍膏 回陽玉龍膏肉桂 白芷 軍姜 仍准位 草烏 赤芍 與南星 熱酒同調功更倍

治背疽陰病不腫高不焮痛不發熱不作膿及

寒濕流注鼓風久損冷痛痺風諸濕脚氣手足

頑麻筋骨疼痛及一切皮色不變漫腫無頭鶴

膝風等但無皮紅肌熱者一槩用之俱有功效

草烏 三兩 炒 軍姜 三兩 煨 赤芍 炒

外科正宗 卷之一 五十五

白芷 南星 煨各一兩 肉桂 五錢

右製畢共為細末熱酒調敷此藥有軍姜肉桂

熱血生血既生既熱恐不能散而為害故有草

烏南星可以破惡氣祛風毒活死肌除骨痛消

結塊回陽氣又有赤芍白芷足以散滯血住痛

苦加以酒行藥性攻通氣血雖十分冷症未有

不愈者誠為寒灰之焰枯木之春夫抵病冷則

肌肉陰爛不知痛痒其有痛者又多附骨之痛

設若不除則寒根透髓尋常之藥固莫能及矣

冲和膏

冲和膏內紫荆皮 獨活 菖蒲 赤芍 宜
白芷 隨方加減法 諸般百症 可堪醫

治癰疽發背陰陽不和冷熱不明者宜用此藥

紫荆皮 五兩 炒 獨活 三兩 炒 赤芍 二兩 炒

白芷 一兩 石菖蒲 一兩 半

右為細末葱湯熱酒俱可調敷藥中紫荆皮乃

木之精能破氣逐血消腫獨活土之精動蕩凝

滯血脉散骨中冷痛去麻痺濕石菖蒲水之精

外科正宗

卷之一

五六

善破堅硬生血止痛破風消腫白芷金之精能

去風生肌定痛赤芍藥火之精能生血活血散

瘀除痛蓋血生則肌肉不死血動則經絡流通

故肌活不致爛痛經通不致壅腫此為散風行

氣活血消腫祛冷軟堅之良藥也其中五行相

配用者再無不効之理又流毒骨疽冷症尤効

鐵桶膏

鐵桶膏中銅綠倍 胆礬輕粉 麝香
遠有管礬併白芷 醋調 極腫不開 脹

治發背將潰已潰時根脚走散不收束者用此

銅綠 五錢 明礬 四錢 胆礬 三錢 五倍子 微炒 兩

白芨 五錢 輕粉 鬱金 各二錢 麝香 三分

右為極細末用陳米醋一碗杓內慢火熬至一

小杯候起金色黃泡為度待溫用上藥一錢攪

入膏內每用頓溫用新筆塗膏瘡根上以綿紙

蓋其瘡根自生縐紋漸收漸緊再不開大為効

拔筒方

拔筒奇方 菖蒲 獨活 紫蘇 斬艾 石菖蒲
甘草 白芷 生葱 等 一筒 拔回 壽命 符

治發背已成將潰時膿毒不得外發必致內攻

外科正宗

卷之一

五二

乃生煩躁重如負石非此法拔提毒氣難出也

羌活 獨活 紫蘇 斬艾

鮮菖蒲 甘草 白芷 各五錢 連鬚葱 二兩

預用徑口一寸二三分新鮮嫩竹一段長七寸

一頭留節用刀割去外青留肉白一半約厚一

分許靠節鑽一小孔以柵木條塞緊將前藥放

入筒內筒口用葱塞之將筒橫放鍋內以物壓

勿得浮起用清清水十大碗泔筒煮數滾約肉藥

濃熟為度候用再用披針於瘡頂上一寸內品
 字放開三孔深入淺寸約筒圈內將藥筒連湯
 用大磁鉢盛貯患者俯前將筒藥倒出急用筒
 口乘熱對瘡合上以手捺緊其筒自然吸住約
 待片時藥筒已溫拔去塞孔木條其筒自脫將
 器倒出筒中物色看其何樣如有膿血相粘鮮
 明紅黃之色亦有一二杯許其病乃是活瘡治
 必終愈如拔出物色純是敗血氣穢紫黑稀水
 外科正宗 卷之一 五十一

而無膿意相粘者其病氣血內敗肌肉不活必
 是死瘡強治亦無功矣此法家傳屢經有驗如
 陽瘡易潰易膿之症不必用此以傷氣血此法
 陰瘡之用要在十五日前後堅硬不潰不膿者
 行之最當此法的有回天之効醫家不可缺也
 豬蹄湯 豬蹄湯內用羌活草 赤芍黃芩白芷歸 加上露蜂房更妙 諸藥一洗脫凡衣
 治癰疽諸毒已潰流膿時用此湯洗消毒氣去
 惡肉回死肌開瘡口又能散風消腫腐盡則已

羌活 甘草 赤芍 黃芩
 白芷 當歸 蜂房 各等分

右為粗末看疽瘡大小用藥多少先將瘡前
 蹄一隻用白水六碗煮蹄軟為度將汁濾清吹
 去汁上油花用藥一兩投於汁中再用微火煎
 十數沸密綉濾去藥渣候湯半熱將軟綉蘸湯
 淋於瘡上輕手搥去瘀膿腐肉其惡物隨湯而
 下洗訖以綉帛挹乾照前總論次第如式用藥
 外科正宗 卷之一 五十二

又洗藥方 洗藥方中歸獨活 葱頭白芷甘草 癰疽腐盡此淋之 生肌長肉常誇說
 當歸 獨活 白芷 甘草 各二錢
 葱頭 五箇

用水三碗煎至藥爛濾清以綉帛蘸湯挹淨瘡
 上隨搥貼紅黑二膏蓋之洗時切忌風寒為要
 常治背瘡輕易者以此代豬蹄湯用其功亦効
 加味太一膏 太一膏中桂枝歸 將軍木鱉兼輕粉 乳沒丹參地芍魏 血餘槐柳共稱奇
 治發背癰疽及一切惡瘡跌撲傷損濕痰流毒

風濕風溫偏身筋骨走注作痛內傷風鬱心腹
胸背攻刺作疼腿脚酸軟腰膝無力湯潑火燒
刀傷棒毒五損內癰七傷外症俱貼患處又男
子遺精婦人白帶俱貼臍下臍毒腸癰亦可丸
服諸般瘡癩血氣癩痒諸藥不止痛痒者並効

肉桂 白芷 當歸 玄參

赤芍 生地 大黃 土水鯨各二兩

真阿魏三錢 輕粉四錢 槐枝 柳枝各一兩

外科正宗 卷之一 六一

血餘兩 東丹四兩 乳香末五錢 沒藥末三錢

右上一味併槐柳枝用真麻油足稱五斤將藥
浸入油內春五夏三秋七冬十候日數已畢入
潔淨大鍋內慢火熬至藥枯浮起為度住火片
時用布袋濾淨藥渣將油稱准足數將鍋展淨
復用細舊絹將油又濾入鍋內要清淨為美將
血餘撒下慢火熬至血餘浮起以柳棒挑看似
膏溶化之象方筭熬熟淨油一斤將飛過黃丹

六兩五錢徐徐投入火加大些夏秋亢熱每油
一斤加丹五錢不住手攪候鍋內先發青烟後
至白烟叠叠旋起氣味香馥者其膏已成即便
住火將膏滴入水中試軟硬得中如老加熟油
若稀亦加炒丹每各少許漸漸加大務要冬夏
老嫩得所為佳候烟盡端下鍋來方下阿魏切
成薄片散於膏面上化盡次下乳沒輕粉攪均
傾入水內以柳棍搗成一塊再換冷水浸片時

外科正宗 卷之一 六一

乘溫每膏半斤扯拔百轉成塊又換冷水投浸
隨用時每取一塊銅杓內復化隨便攤貼至妙
生肌玉紅膏生肌玉紅膏更奇 其中淡味少人知 正草歸身輕粉 白占紫草効堪推
此膏專治癰疽發背諸般潰爛棒毒等瘡用在
已潰流膿時先用甘草湯甚者用猪蹄藥湯淋
洗患上軟給挹淨用抵脚挑膏於掌中捺化遍
捺新腐肉上外以太一膏蓋之火瘡早晚洗換
二次內兼服大補脾胃暖藥其腐肉易脫新肉

卽生瘡口自斂此乃外科收斂藥中之神藥也

白芷錢五 甘草二錢 歸身二兩 瓜兒血兩

輕粉錢各四 白占二兩 紫草二錢 麻油斤一

先用當歸甘草紫草白芷四味入油內浸三日

大杓內慢火熬藥微枯色細絹濾清將油復入

杓內煎滾下整血化盡次下白占微火亦化

先用茶鍾四枚預頓水中將膏分作四處傾入

鍾內候片時方下研極細輕粉每鍾內投和一

外科正宗 卷之一 六七一

錢攪肉候至一伏時取起不得加減致取不効

化腐紫霞膏化腐紫霞膏粉 芭荳芭荳 金頂金頂

治發背已成癩肉不腐及不作膿者又諸瘡內

有膿而外不穿潰者俱用此膏不腐爛者自腐

不穿潰者自破其功甚於烏金膏及碧霞錠子

輕粉 革麻研各 血研各 芭荳研白

朝腦錢一 金頂錢五 螺螄肉用肉 爲末二個

右各爲末共碾一處磁罐收貯臨用時旋用麻

油調搽頑硬肉上以綿紙蓋上或膏貼俱可至

頑者不過二次卽軟腐爛爲膿點諸瘡亦破

以上三十二方凡大瘡諸毒初起及已成時選用

潰瘍治法

膿熱不潰瘡不焮熱食少便溏者脾虛也補托溫中

膿清或多瘡口散大不生肌者裏虛欲變症峻補之

腐肉雖脫新肉生遲如凍色者肉冷肌寒大溫氣血

潰後食少心煩不睡發熱作渴脾弱陰虛補中益氣

外科正宗 卷之一 六三三

身涼脉細倦怠懶言食不知味者脾弱也醒脾助胃

風寒襲於瘡口皮白綻而不收斂者外照而內溫補

潰後而黃肌瘦膿水清稀瘡色淡白者當香燥助脾

脉大無力細濇微沉自汗身涼者氣血俱虛峻補之

出血或膿多五心煩熱燥甚不眠者亡陽也急補之

瘡口已合經犯房勞或值急暴復崩潰者仍助氣血

潰瘍主治方

十全大補湯 十全大補參芪芍 肉桂川芎熟地黃

歸木茯苓甘草 棗薑加上號全方

治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及徧身流注癰癤便毒諸瘡久不作膿或膿成不潰潰而不斂若氣血不足之人結腫未成膿者宜加陳皮香附半夏連翹服之自消

人參 黃芪 白芍 肉桂

川芎 熟地 當歸 白朮

茯苓 各一錢 甘草 灸五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

外科正宗

卷之一

三四

八珍湯

八珍湯擅理陰陽 芎芍當歸熟地黃 還要相兼四君子 何愁虛弱不榮昌

治潰瘍諸症調和榮衛順理陰陽滋養氣血進

美飲食和表裏退虛熱為氣血俱虛之大藥也

川芎 白芍 當歸 熟地黃

人參 白朮 茯苓 各一錢 甘草 灸五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

補中益氣湯 補中益氣湯甘草 柴胡升陳三味少 黃芪人參白朮歸 還兼薑棗効堪推

治瘡瘍元氣不足四肢倦怠自乾發熱飲食無

味或飲食失節或勞倦身熱脉洪大而無力或頭痛而惡寒或聲高而喘身熱而煩俱宜服此

黃芪 一錢 甘草 灸五分 人參 當歸

白朮 各一錢 升麻 柴胡 陳皮 各二分

麥門冬 六分 五味子 五分 炒

水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾空心熱服

人參養榮湯 人參養榮參朮歸 陳皮白芍桂心芪 甘草地黃併五味 茯苓遠志棗姜宜

治潰瘍發熱惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色

外科正宗

卷之一

三五

痿黃吸吸短氣飲食無味不能收斂或氣血原

不足不能收斂若大瘡愈後多服之不變他症

白芍 一錢 人參 陳皮 黃芪

桂心 當歸 白朮 甘草 各一錢

熟地黃 五味子 茯苓 各八分 遠志 五分

薑三片棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服

人參黃芪湯 人參黃芪湯平稀 麥冬二朮草陳皮 黃柏歸身五味子 升麻神麩棗姜隨

治潰瘍虛熱不睡少食或穢氣所觸作痛者効

黃芪 人參 白朮 麥冬

歸身 蒼朮 甘草 陳皮

升麻 神麴各五分 黃栢酒拌炒三分 五味子炒五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

內補黃芪湯內補黃芪湯桂芍 歸苓熟地草門冬 川芎遠志人參等 素姜加上起疲瘵

治癰疽發背諸瘡已破後虛弱無力體倦懶言

精神短少飲食無味自汗口乾永瀦不睡並効

黃芪 人參 茯苓 川芎

外科正宗 卷之一 六五六

歸身 白芍 熟地 肉桂

麥門冬 遠志各一分 甘草五分

水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾食遠服

托裏清中湯托裏清中湯茯苓 冬參五味木梗陳 柴姜半夏同甘草 瘵瘍咳嗽最能清

治癰疽脾胃虛弱咳嗽痰氣不清飲食少思者

人參 白朮 桔梗 陳皮

半夏 茯苓各一分 麥門冬 五味子

甘草各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

托裏和中湯托裏和中湯半夏 白朮參苓功不亞 陳皮甘草木香宜 煨姜効值千金價

治癰疽中氣虛弱飲食少思腫不消潰不斂者

半夏 白朮 人參 茯苓

陳皮 煨薑各一分 木香 甘草

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

托裏建中湯托裏建中湯炮姜 參苓白朮附子強 半夏還兼甘草炙 建中功效可回陽

治癰疽元氣素虛或因寒涼傷脾損胃飲食少

外科正宗 卷之一 六五七

思凡食無味或作嘔泄瀉等症急服以健中氣

人參 白朮 茯苓各二分 半夏

炮薑各一分 甘草五分 熟附子八分

水二鍾煨薑三片棗二枚煎八分不拘時服

托裏溫中湯托裏溫中湯益智 丁木沉香白朮是 參苓陳木炮乾姜 附子加之功全備

治癰疽陽弱陰寒脈虛身冷或瘡為寒變反致

不疼或膿水清稀心下痞滿腸鳴腹痛大便微

溇食則氣短嘔逆不得安臥時發昏憤者服之

白朮 茯苓 木香 丁香各五分

半夏 陳皮 羌活 益智

乾薑炮 人參 白朮 甘草各一錢

附子二錢

水二鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時服方與舊不同予製此嘗治癰疽陰症及雜症陽氣脫陷與寒氣逼陽於外者發熱煩躁口乾作渴投以薑附之類其津液頓生煩熱頓退其應如響

外科正宗 卷之一 六八

聖愈湯 聖愈湯憑熟地芪 芎歸生地等相宜 人參六品真堪羨 膠甚心煩此最奇

治潰瘍膿水出多氣血虛極脉細空而無力以致心煩不安眠睡不寧或五心煩躁等症並服

熟地 生地 川芎 人參各五錢

歸身 黃芪鹽水炒 各一錢

作一劑水二茶鍾煎八分食遠服

保元大成湯 保元大成湯接命 參苓歸朮芪陳定 木香芍附草砂莖 薑姜五味功奇應

治潰瘍元氣素虛精神怯弱或膿水出多神無

所主以致睡臥昏倦六脉虛細足冷身涼便溏

或秘胸膈或寬不寬舌雖潤而少津口雖食而

無味瘡弦不緊肉色微紅總由不足大補堪題

人參 白朮 黃芪蜜水拌炒 各二錢

茯苓 白芍 陳皮 歸身

甘草炙 附子 山萸肉 五味子各一錢

木香 砂仁各五分

水二鍾煨薑三片去皮大棗三枚煎八分食遠

外科正宗 卷之一 六九

服服至精神回手足暖脾胃醒肉色紅為度土

數症乃元氣虛脫已欲變壞之病非此不回也

獨參湯 人參一味獨稱強 濟因扶危立大綱 氣血兩亡併自汗 脉虛寒熱併皆嘗

治潰瘍膿水出多氣血虛極或惡寒或發熱或

自汗冷汗或手足指甲青冷或身涼脉細並宜

人參二兩 切片

作一劑水二鍾棗十枚煎一鍾徐徐服之若煎

至稠厚即為膏矣作三次用好溫酒化服亦可

香砂六君子湯

記得香砂六君子 參苓白朮陳皮枳 砂仁半夏藿香同 藿香甘草同煎藥

治潰瘍脾胃虛弱惡心嘔吐或飲食不思等症

人參 白朮 茯苓 陳皮

半夏各一錢 甘草 藿香 砂仁各五分

薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

清震湯

清震湯中益智仁 參苓枳芩甘草陳 香附附于澤半夏 藿香使逆効如神

治潰瘍脾胃虛弱或候傷生冷或氣惱勞役或

入房夢遺致火邪乘入中脘乃生飢逆急服之

外科正宗

卷之一

七十

益智仁 陳皮 半夏 茯苓

人參 甘草 香附各一錢 柿蒂二十箇

澤瀉三分 熟附手足冷者 用一錢

薑三片棗二枚燈心二十根水二鍾煎八分不

拘時服如身熱口乾便燥火飢者加黃連五分

醒脾益胃湯

醒脾湯用參山藥 二朮二苓陳半夏 麥芽澤瀉枳木香 山查蘇子同煎藥

治潰瘍脾胃虛弱過傷飲食生冷以致胃膈不

寬四肢而目浮腫及小水不利等症並宜服之

人參 陳皮 茯苓 半夏

山藥 白朮各一錢 蒼朮 厚朴

澤瀉 麥芽 木香 山查

蘇子 猪苓各五分 老黃米炒黃 一錢

水二鍾薑三片燈心二十根煎八分食前服

托裏定痛散 托裏定痛散當歸 乳沒川芎白芍隨 粟壳桂皮併熟地 瘡瘍疼痛効堪題

治癰疽潰後血虛疼痛不可忍者宜服之甚効

歸身 熟地 乳香 沒藥

外科正宗

卷之一

三十一

川芎 白芍 肉桂各一錢 粟壳泡去筋膜 蜜炒二錢

水二鍾煎八分隨病上下食前後服之

神應異功散 異功散中丁木香 桂苓歸朮附子強 半夏陳皮參肉菴 藜姜厚朴可回陽

治潰瘍陰盛陽虛發熱作渴手足並冷脉虛無

力大便自利至飲沸湯而不知其熱者必服之

木香 官桂 當歸 人參

茯苓 陳皮 白朮各一錢 半夏

丁香 肉荳蔻 附子 厚朴各五分

水二鍾薑五片棗三枚煎八分不拘時服此方

癰疽陰症凡雜症陽氣脫陷與寒氣逼陽於外

者發熱煩燥口乾作渴投以薑桂附子之類津

液頓生煩熱頓退其應如嚮人但不冒而察之

參朮膏 參朮膏中大補功 地黃三味劫堪雄 補氣補脾併補血 當堪委命在其中

治癰疽發背等症大膿後氣血大虛急宜用此

上好人參半斤 切片用水五大碗砂鍋內慢 火熬至三碗將渣再煎汁一

碗共稠厚磁碗內收貯聽川 雲片白朮六兩

外科正宗 卷之一 三三

淮慶熟地六兩 俱熬同上法

以上三膏各熬完畢各用磁碗盛之頓入水中

待冷取起蓋勿泄氣如患者精神短少懶於言

動短氣自汗者以人參膏三匙白朮膏二匙地

黃膏一匙俱用無灰好酒一杯頓熱化服如脾

氣虛弱飲食減少或食不知味或已食不化者

用白朮膏三匙人參膏二匙地黃膏一匙好熱

酒化服如患者腰膝酸軟腿脚無力皮膚手足

癰澀枯槁者用地黃膏三匙人參白朮膏各三

匙化服如氣血脾胃相等無偏勝負者三膏每

各二匙熱酒化服此膏用於清晨併臨睡時各

進一次自然強健精神頓生氣血新肉易生瘡

口易合任瘡危險勢大膿多者可保終無變症

夏炎天熱恐膏易變分作二次熬用亦好愈後

能服鬚髮變黑返老還童以上諸方功難及此

八仙糕 八仙糕為何因設 健脾胃養胃兼止泄 參苓山藥芡蓮 白糖米粉延生說

外科正宗 卷之一 三三

治癰疽脾胃虛弱精神短少飲食無味食不化

饑及平常無病久病但脾虛食少嘔泄者並妙

人參 山藥 茯苓 芡實

蓮肉 各六兩 糯米 三升 粳米 七升 白糖霜 二斤

白蜜 一斤

右將人參等五味各為細末又將糯粳米亦為

粉與上藥末和勻將白糖和蜜湯中頓化隨將

粉藥乘熱和勻攤鋪籠內切成條糕蒸熟火上

烘乾磁器密貯每日清早用白湯泡用數條或

乾用亦可但遇知覺饑時隨用數條甚便服至

百日輕身耐老壯助元陽培養脾胃妙難盡述

胃愛丸

胃愛丸中參茯苓 紫蘇山藥荳蔻陳 蓮肉甘草蜜丸靈 脾虛不食効如神

治潰瘍脾胃虛弱飲食諸味不喜用過開胃進

食之藥不効者此脾崩之象宜服之食進為吉

雲片白朮一兩

鮮白者米泔浸去澁水 切片晒乾同麥芽炒

懷慶山藥一兩

肥大上白者切片用男 乳拌濕候潤透晒微焙

外科正宗

卷之一

三四

上白茯苓一兩

切一分厚咀片用砂仁三錢用茯 苓合碗內飯上蒸熟只用茯苓

清河人參一兩

製畢晒乾 共為細末 白苳蔻三錢

陳皮

用陳老米先炒黃色方 入同炒微燥勿焦共錢

小紫蘇

蜜拌透晒乾微蒸片 時連梗葉切片五錢

蓮肉

去皮心切 片五錢

甘草三錢

右共為細末用老米二谷微焙碾粉泡荷葉湯

打糊丸梧子大每服八廿丸清米湯不拘時服

二神丸

二神丸來布大功 肉葉相兼破故紙

誰知二味氣雄雄 姜同藥煮起痰膠

治癰疽脾胃虛弱飲食不消大便溏泄必服之

破故紙

四兩微炒 肉葉肥大者二兩生用

用大棗四十九枚老生薑四兩切片水浸棗薑

煮至水乾為度取棗肉為丸梧子大每服七十

丸清米湯空心送下及治尋常腎虛脾泄俱効

加減八味丸

八味丸中丹皮桂 山藥山更兼五味 茯苓澤瀉地黃同 生津止渴如甘需

治癰疽已發未發口乾作渴舌乾黃硬者宜服

茯苓

山藥 丹皮各四兩 山萸肉五兩

外科正宗

卷之一

三十五

澤瀉

三兩 五味子兩 肉桂六錢 熟地搗膏酒

右共為末煉蜜丸如梧子大每服五錢空服

臨湯送下尋常酒服亦可此又滲濕潤燥藥也

紅鉛造化丹

紅鉛造化出大工 山藥參苓甘乳同 紫麵辰砂水片射 此方原自出仙宮

治癰疽元氣不足軟陷不起發或已發復彼風

寒內外所侵以致瘡毒下陷變為陰塌不痛者

急宜服此亦可轉陰為陽返出毒氣復腫為吉

紅鉛 二錢法 註未卷

人參

茯苓

山藥各一兩 甘草各五分 枯礬各五分 辰砂

寒食麵各七分 麝香八分 冰片六分

乳粉二錢用頭生男乳每盤內用一小鍾晒乾共收用之

右各研精細方爲一處共再細研用白蜜二兩再同頭生男乳一大杯慢火重湯內用磁碗頓蜜滴水不散爲度候稍溫入前藥軟硬得宜九龍眼核大金箔爲衣磁碗收用或以蠟固亦妙每用一九好熱酒一杯化藥食遠服之用厚

外科正宗

卷之一

三六

綿帛覆暖患上其熱如蒸瘡必復起作痛乃此丹之効也諸症嘔吐怔忡瀉痢屢藥不瘥異症並効大率心經之病石菖蒲肝經之病用遠志脾經之病用生薑肺經之病麥門冬腎經之病五味子各隨五經之症用五引煎湯化服其應如嚮修合時務要端午天醫黃道日爲佳製藥時忌婦人雞犬生人異物預晚齋戒誠意多靈以上二十四方治癰疽已潰至於收斂正病雜病

變症壞症此四者俱在其中選用毋得錯亂以保終吉若不遵此法妄設他說別以奇方秘法治之

終致多變但潰後氣血根本無有不虧傷者大抵補怯扶羸理勞績損皆不出於前方此外無法也

癰疽圖形第十五

癰疽等發三十圖

婦人等症四圖

嬰兒等症二圖


附外科諸症瘡名十律

外科正宗

卷之一

三六

蓮子發形如蓮子頭多突起者是也腫高消脹者生年塌陰陷者死



蜂窠形如蜂窠頭含螺子皮腐爛孔孔流膿紅活者生黑陷者死



外科正宗

卷之十一

七十一

井疽心火妄動發之焮赤高腫者生堅硬紫黑者死



玉枕疽膀胱濕熱凝滯而成紅腫者生紫陷者死

枕疽

對心發心火沸騰濕熱凝之腫高腐潰者生軟陷紫黑者死



外科正宗


卷之十一

七十二

天疽此陽火熾盛發之紅赤高腫者生紫黑陷者死



對口太陽熱結聚而成高腫易



外科正宗

卷之一

全


馬刀 氣癭 瘰癧



附骨疽初起大腿筋骨作痛久則漫腫出膿黃稠者生氣敗者死

附骨疽 疔

失榮症生於耳前後及項間初如痰核久則堅而斬大如石破後無膿惟流血水堅硬仍作腫痛異當乃百死生之症



疔 囊癰

疔發背

外科正宗

卷之一

全

耳後發



耳後發有頭高腫者生無膿軟陷者死

形如粟米色如紅粟者其也生此百入百不救



外科正宗

卷之一

八三

脚肚癰乃飲食多燥厚味釀成紅赤
高腫潰爛者生紫血疔塌陰陷者死



人面瘡癩積毒克朝得
此先宜修省後方醫治




外科正宗

卷之一

全

高腫為癰沉潰為疽
有膿者生無膿者死





外科正宗

卷之六

八四



胃口疔發在心胃之傍陽者有
顯陰者無頭乃飲食炙燥所致

外科正宗

卷之一

八五

瘰癧生唇上有頭腦起痰熱交作胃經積毒所致



流注起於寒熱不調氣血凝滯而生

外科正宗

卷之一

八六



外科正宗


卷之一

八七



魚肚疔

各疔名虎



外科正宗

卷之一

八六



外科正宗

卷之二

八九

二癰又名騎癰也



外科正宗

卷之一

九

硬腫腐爛臭穢者是也



外科正宗

卷之一

九

堅硬腐爛者是也



外科正宗

卷之一

乳疽



赤遊丹紅如雲形者是也

走馬疔牙根黑腐臭爛者是也



外科正宗

卷之一

疔毒

癰疽諸症瘡名十律

其一

背之左右謂疽癰

手膀肩臂亦相同

肺疽居右癰居左

蜂癰左右近喉嚨

耳後右為銳毒看

天疽左耳後相逢

左右兩肩各搭手

井疽止發在心中

其二

流注牽藤六七疔

發於心工止臍平

脇疽生在脇肌下 陰疽大體近箕門

穿踝疽穿姑撈下 脚氣原來脚底生

左為便毒右魚口 鶴膝風從膝眼成

其三

肩下臙癰腋下疽 喉嚨上下氣癰醫

當脉兌疽君可記 三寸相離穿骨基

紅絲疔從手上起 蛾子喉風口內隨

腎疽當腎生左右 三里穴發附陰疽

外科正宗

卷之一

九六

其四

離臍四寸為嚇癰 再高五寸號幽癰

腸癰還從臍突起 胸疽乳上心肺中

合谷一疔名虎口 蛇頭魚肚指頭逢

腦後一疽名玉枕 莫作如常一樣同

其五

肩疽樂疽居右手 石榴離肘上三分

左玄陰右襠疽發 咬骨陰包穴上生

淵疽腎上腿附骨 佛頂疽生腦頂門

人世毒瘡當切記 敢交患者即安生

其六

顛骨為疔唇上疽 鬚邊所發亦疽醫

眉中鳳眉傍侵腦 黑疔耳內不為奇

鼻內生疔當速療 透腦原來髮際基

眉尾癩疽能大毒 頰疔魚眼近腮齊

其七

馬刀癩癰氣瘦瘡 一氣生來在頸項

虎毒龍泉唇上下 對口原來髮下穢

牙根唇上癰莫異 牙下生之疽一行

頂牙縫突為疔治 休作人間容易瘡

其八

心肝脾肺腎癰疽 當看胸中穴道醫

更有黃頭并白泡 發無定處速如飛

左為坐馬右下馬 尾骨頭尖鶴口疑

外科正宗

卷之一

九六

此物殺人能致命 火急攻醫切莫遲

其九

婦人之乳有數種 高腫為癰堅硬疽

還有乳岩真惡症 腫如頑石破如墟

鈕叩之風生頸項 裙帶風瘡脚下需

又有溼臙瘡等疾 總生下腿上海居

其十

嬰兒走馬爛牙疳 黑腐沿開臭不堪

外科正宗 卷之二

赤遊丹毒渾身到 鵝口瘡皆滿口爛

風瘡奶癬多搔痒 血灌膿窠痛久安

還有心脾治熱症 口疳重舌一般看

六鬱湯 能解諸鬱結腫左右二搭相串者及溼痰

川芎 半夏 茯苓 香附

陳皮 山梔各一錢 蒼朮 砂仁

甘草各五分 薑三片水二鍾煎服此方補遺

新刊外科正宗卷之一

新刊外科正宗卷之二

上部疽毒門 崇川 陳實功 毓

腦疽論第十六

夫腦疽者俗稱對口是也但所發不同其源有二得

於溼熱交蒸從外感受者輕五臟蘊結從內發外

者重其理何也溼熱之為病天行氣候寒暑不調

節序溫涼陰陽失度凡有體虛者易於侵襲項後

雖屬督脉又主太陽寒水司行之道所有侵襲氣

外科正宗 卷之二

血必凝凝則後必為腫此從外感受者其患初起

有頭多生正穴三四日間多作焮痛始生寒熱口

和而乾色紅根活發勢漸高形不散大時止時疼

易膿易腐飲食知味起坐尋常外勢雖可畏而內

無七惡之症相于此屬陽症其由從外來矣故多

不治可愈所有五臟蘊結而成者重其源有五蓋

心主血故心緒煩擾煽動不寧以致火旺而沸騰

行於項間與寒水交滯而為腫者一也肝統筋故

惱怒傷肝項乃三陽統筋之所肝傷則血脈不潮筋無榮養凝結為腫故項緊急強痛不能轉側其患未潰前肉色紫暗堅硬漫腫破流血水木痛無膿此等之症皆肝氣受傷者二也脾主肌肉故思慮傷脾脾氣日損又或膏粱損胃胃汁乾枯以致中脘痞塞氣不運行逆於肉裏乃生壅腫其患外皮雖腐而內堅不潰口燥舌乾飲食不進根脚走散膿穢色敗此等之症皆脾氣受傷者三也肺主

外科正宗

卷之二

三

皮毛故憂鬱傷肺肺傷則毛竅閉塞腠理不通氣不舒暢縱橫經絡結而為腫其形瘡多平陷色淡不華皮腐脂流形如湯潑氣竅短促鼻微鼻掀碌碌生痰殷殷發嗽此等之症皆肺氣受傷者四也腎主骨髓故恣慾傷腎腎傷則真陰之氣敗矣真陰一敗相火自生此火最能自升自降或動或靜煎熬臟腑消燄津液更變形容改換聲音瘡形紫黑脈數垂度煩躁口乾隨飲隨渴此等之症皆腎

氣受傷者五也凡治此症必內分虛實外辨陰陽

體順天時察其病理七日以前瘡勢未成者當通竅以汗發之七日已後病勢已成治當兼補以托之此則毒不內攻外無變症如藥攻利太過元氣受傷毒多難出又敷圍涼藥氣血凝則肌肉多死反難腐潰予嘗治此及諸發背初起未成者用披針當頂點入知痛處出其惡血通其瘡竅隨挿蟾酥條直至瘡底外用膏葢內服萬靈丹或蟾酥

外科正宗

卷之二

三

丸發其大汗解散內蘊之毒次日患上或腫或不腫或痛或不痛仍挿仍貼直至患頂腫高根脚突起四圍列縫有膿方住挿藥輕淺者九日後吐出病根堅硬不化之物毒甚者不能頓然脫落亦可漸腐成膿為轉重就輕之良法外用玉紅膏長肉內服補托收斂其患不久自愈如陽症輕淺者候自腐潰不用前法針刺如不腫不疼灸亦不痛陰症尤當速用不必遲延此為移深居淺之大法也

腦疽看法

初起頂高根活色紅皮薄作疼焮熱腫不開散者順
 已成無論偏正瘡形獻起疼痛發熱易膿易腐者順
 已潰膿稠肉色紅活瘡腐易脫焮腫漸消痛減者順
 潰後腐脫新肉便生瘡口漸斂凝結痂膿作癢者順
 初生一點黃泡或似疔瘡不腫不疼自不知覺者逆
 已成不發高腫亦不焮痛瘡頂軟陷根脚平散者逆
 已潰膿清肉色紫黑外皮不腐内生臭穢不食者逆

外科正宗

卷之二

四

腐肉雖盡新肉不生瘡口散大軟陷無神色敗者逆

腦疽治法

初起有頭或無頭大痛或不痛俱隔蒜灸兼服解毒
 已成堅硬發熱焮痛口乾便秘者邪在內也宜泄之
 堅腫不痛發熱惡寒頭疼四肢拘急者兼發表攻裏
 腫硬日深形色紫黑外皮不腐肉膿不潰宜行拔法
 腫強頭面焮熱口燥惡心嘔吐者邪在上也宜清之
 焮熱腫痛紅色光亮瘡苦有時出膿脹痛者急開之

將潰不潰微熱微紅不作腐潰者脾胃虛也宜補之
 潰後腐肉不脫膿水清稀腫痛仍作者當大養氣血
 大便多溏小便短濇自汗食少脉細身涼温中健脾

腦疽治驗

一男人項疽十餘日視其瘡勢頗甚根連左右耳項
 並腫紅赤焮熱脉浮而數先用黃連消毒散二服
 退其大勢根脚稍定後用托裏消毒散數服不覺
 腐潰但脉浮無力詢知患者年過五旬久艱嗣

外科正宗

卷之二

五

息房中又有妾人多兼思慮勞慾太過損傷元氣
 故也又瘡形勢大止能起發不能培養為膿更用
 十全大補湯加桔梗白芷倍人參白朮各三錢外
 用桑木灸法早晚二次灸之又塗紫霞膏數日患
 者頭面俱腫雙目合縫形狀可畏然後腐潰並作
 膿出日至數升如此半月因前藥不勝其事內加
 煩躁不寧五心煩熱飲食漸少等症此謂膿水出
 多氣血走泄為虛火假症之故雖變不妨隨用聖

愈湯一服不應又進一服加熟附子三錢方應前
症悉退次以人參養榮湯加麥冬五味參米常倍
至三錢調理月餘後至腦骨腐肉連髮片片脫下
其狀狼狽不可觀瞻凡相視者無不點頭驚訝又
恐腐潰深大補不及事每日粥食中用人參三錢
凡食分入同煮食之以接補脾元後方元氣漸醒
調理四月方愈彼後一年反生其子以承後祀也
一監生項瘡初起請視瘡頭偏於右半不可輕待必

外科正宗

卷之二

六

用艾灸爲上隔蒜灸至十五壯知痛乃住後復視
爲小恙失用內藥又四日其瘡復作頸腫項強紅
紫木痛便秘脈實有力以內疎黃連湯加玄明粉
二錢通其大便次用消毒救苦湯二服腫勢仍甚
此內毒外發也不可再消之換服托裏消毒散至
逆二十日因患者肥甚外肉多緊不作腐潰予欲
行針開放彼家堅執強阻豈後變症一出煩悶昏
憤人事不醒彼方驚悔隨用拔針左右二邊併項

之中各開一竅內有膿腐處剪割寸許頑肉放出
內積瘀毒膿血不止碗許內服健脾胃養氣血托
膿補虛之藥其膿似泉流不歇每朝夕藥與食中
共參六七錢服至腐肉脫盡新肉已生又至四十
日外患者方得漸甦始知人事問其前由遲不知
其故也此患設若禁用針刀不加峻補豈有生乎
因其子在庠見識道理從信予言未百日而愈也
一男子項瘡五六日就肆看視頭便黃色根亦平散

外科正宗

卷之二

七

予曰此當急治方可彼面色不悅而去又請望中
一醫視之乃曰小恙也因喜其說用藥又至五日
外其瘡勢堅硬根脚開大毒氣已過兩肩流注前
項胸乳皆腫嘔吐惡心寒熱不食瘡勢形色俱覺
可畏始信前言復請予治其瘡形狀不可觀也此
非藥力可及先用慈艾湯洗淨舊藥連煮藥筒拔
提二處拔出瘀血碗餘隨用銀針斜斜插入根脚
透通患底數處以蟾酥條插入孔內此最解毒爲

膿總以膏蓋走散處以真君妙貼散敷之自漸日
消其毒收歸後項原處艾兼服內托降火化痰之
藥三四日候其大勢已退內膿已通換服十全大
補湯凡堅而不化者照之腐而不痛者取之新血
生遲者培之如此調理將近三月方得完口平復
此為患者諱疾忌醫之過幾乎至於喪命者多矣
一女人年過六旬係宦族素稟怯弱項間患疽初起
頭便如粟謂裏可容谷之病也喜其形體不肥雖

外科正宗

卷之二

八

發之後必易於腐潰此則不妨前說先用隔蒜灸
之次用蟾酥餅貼灸上四邊以吸毒散敷之收其
根脚不散內服托裏消毒散數服瘡勢堅硬疼痛
不止予曰到某日方止況今瘡不腐潰其脉細
數而無力此內虛之故不能解毒為膿以疼為要
豈可得止次換益氣養榮湯加角針白芷三服腫
亦漸起外用桑木灸法其堅漸軟膿出稠而不多
前方去肉針白芷加香附倍用參芪又數服方得

膿潰潰後痛亦不止予曰再三日午後痛可止也
至期腐肉將脫小半臨午用乳香定痛散一服午
後疼痛頓退安睡不醒患家欣悅予曰不然此在
用藥適其時也雖半月之言應於今刻惟信則不
失耳後當某日腐盡某日肌平某日完口此三者
患家以墨繩記候期日果實並無過與不及也此
法要在眼力精巧量病難易新腐遲速補助有無
用藥合式然後相量日數可決於前發之必中也

外科正宗

卷之二

九

一婦壯年項瘡三日其形徑對前項彼家相畏入牀
不當瘡發此穴也予視頂高脚活雖發不妨彼欲
內消之方安予曰藥消則不能針消則可取彼從
之用披針當頂針入六七分點差軟肉方往隨去
瘀血又以蟾酥條插入孔內服蟾酥丸得大汗而
解次日瘡上微膿出之漸消光恐內毒未盡又用
消毒清熱之藥數服不出其日而安矣抵凡欲消
瘡先斷根本次泄毒氣使毒自衰無得內攻為妙

一男子耳後生疽十餘日自謂小恙不治將近半月
根脚漸大瘡頭惟流血水稀惡污穢四邊紫黑軟
陷無膿面慘鼻揪手冷氣促脉胗散大無根此內
敗症也何必治之辭不用藥又延容醫治之因詢
無事患者恨予不治凡遇親友勉力支持厲聲自
囑決不甘死予曰心不服死也再五日必死果然
予嘗觀瘡但犯此症雖山岳之軀一敗無不傾倒
一婦人正對口四五日自灸廿餘壯運不知痛灸疤

外科正宗

卷之二

十一

焦黑平塌如故胗之脉微數而無力此內虛症也
若假藥力則悞其事用披針當頂刺入寸許不知
痛亦無血出此毒滯而未發揚者用蟾酥條插入
針孔每日一次膏蓋其上至七日後周圍裂縫出
膿內服純補之藥至十四日落出瘡根一塊指大
長寸餘後以玉紅膏平長肌肉又半月其口已平
以珍珠散搽上卽刻生皮而愈此症設若不用針
工專假藥力攻托雖不至死豈能得其速愈者哉

一婦人四旬肥甚項瘡五六日視之肉腫瘡不腫必
竟生疑恐又兼口燥心煩堅硬色紫根脚散平六
脉洪大此大過症也後必無膿相辭不治彼又請
醫視之有言外托者又言內消者有稱年壯不妨
又說脉大易治衆人紛紛不定仍各用藥又至七
八日前後胸項俱腫木悶堅硬仍復請視決之予
曰此不治者何也初起肉腫瘡不腫頂陷者一也
根脚平散真氣內敗不能收束毒氣二也口燥心

外科正宗

卷之二

十一

煩邪火內淫三也形色紫暗血死毒滯不作癰潰
者四也六脉洪大瘡毒大盛正氣受尅無以抵當
故瘡終變軟陷邪毒內攻而死者五也當備後事
爲要此終於二十七朝前後足矣後果至期而歿
觀此言正順理之病可歎時人何爲紛紛妄治也

腦疽主治方

黃連救苦湯

黃連救苦湯升葛柴芍苦歸麩梗苓
羌活防風銀其草腦疽煎服可安寧

治腦疽發鬚發頰及天行時毒初起增寒壯熱

頭面耳項俱腫服之未成者自消已成者自潰

黃連 升麻 葛根 柴胡

赤芍 川芎 歸尾 連翹

桔梗 黃芩 羌活 防風

金銀花 甘草節各一錢

水二碗煎八分臨服入酒一杯食後服

解毒天漿散解毒天漿石決明 姜忝山甲防風 連翹羌活乳香迎 銀花歸尾大黃行

治腦疽積毒日深堅腫木硬口燥舌乾惡心煩

外科正宗 卷之二

渴六脉沉實有力大便閉結不通者並宜服之

石決明生研 姜蠶 川山甲土炒 防風

連翹 羌活 乳香 甘草

金銀花 黃連 歸尾各一錢 大黃三錢

天花粉新鮮未晒者四兩石日內搗爛投水一碗攪勻絞去渣用

右花粉淨汁共碗半同藥煎至八分入酒一杯

空心熱服行過三次方用飲食忌食煎炒發物

內托千金散內托千金散內托千金散內托千金散

治腦疽發背諸毒惡瘡此藥不消者服之易潰

白芍 黃芪 川芎 當歸

防風 桔梗 天花粉 金銀花

人參各一錢 肉桂 白芷 甘草各五分

乳香 沒藥二味痛甚加入

右水二碗煎八分臨服入酒一小杯食遠服

迴毒銀花散迴毒銀花散最奇 癰疽陰毒總堪醫 借問君家何等藥 銀花甘草協黃芪

治腦疽及諸發陰瘡不起色變紫黑者急服之

外科正宗 卷之二

金銀花連枝葉二兩 黃芪四兩生切 甘草一兩切

用細酒二十兩同藥入小口砂罐內密封重湯

內煮盡三香為度取起濾清服之蓋暖患止其

瘡漸漸高腫此轉陰為陽吉矣後用托藥潰膿

如服後不痛不起瘡頭流出黑水此真陰不治

梅花五氣丹梅花五氣丹輕粉 乳沒派妙勝片研 還粉霜雄血 此方原自出仙都

治腦疽發背諸般疔腫初起寒熱交作筋骨疼

痛有似傷風惡心嘔吐但未成膿者並宜服之

梅花片五分 當門麝五分 輕粉五分 辰砂各六分

乳香 沒藥 瓜兒芎 明雄黃各一錢

真酥散 預於端午前尋之至午日取酥二錢用頭男乳調膏

右前藥各研極細對準分數於端午日辰時製

度候至午時將上藥九味和入蟾酥膏內向日

九之如茄子大一時內晒乾用川椒二十七粒

燈心二十七段同藥收於磁罐內養之以蠟封

口不泄藥氣為妙凡遇惡瘡大毒開器取出一

外科正宗 卷之二 一四

枚先用美饌食飽次用無根水漱淨口內再含

水一口少頃待溫用葱白五寸同冰嚼爛嚥下

隨將藥餅安放舌下睡於暖處以被覆蓋藥化

苦水徐徐嚥之瘡勢大者二三餅亦可藥盡其

汗即到如淋諸病若失如冬月天寒難汗陰後

將葱白湯催之亦妙凡治無有不効如暗疔人

所不知覺及知覺而失治者毒氣入裏人便昏

沉一中便倒不能依法服藥急用連鬚葱白七

個煎酒一盃研藥五餅灌下藥氣到心其功如

湯潑雪患者即便甦醒此為外科第一奇方也

小保安湯 小保安湯歸藿苓 黃芪半夏麥冬陳 此枯人參併白木 棗姜煎服作陽春

治腦疽諸發已潰流膿時平常服之痰不更變

當歸 茯苓 川芎 黃芪

麥門冬 陳皮 桔梗 人參

白朮各一錢 半夏 甘草 藿香各五分

姜三片棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服

外科正宗 卷之二 一五

大保安湯 大保安湯木附歸 參苓芍芎桂山萸 黃芪山藥丹皮草 麥冬五味地黃隨

治腦項諸發癰疽惡瘡大毒已潰之後膿冰出

多氣血虛弱精神短少飲食少思坐卧不寧煩

燥不眠晝則安靜夜則發熱及虛陽煩渴等症

白朮 當歸 人參 茯苓

川芎 白芍 山萸 黃芪

山藥 丹皮 熟地 五味子各一錢

肉桂 甘草 麥門冬 熟附子各五分

煨薑三片大棗二枚蓮肉七粒水煎食前後服

陽春酒

一盞陽春酒罕稀 天冬杞朮地黃隨 人參栝子歸遠志 百補方中讓此醫

治腦疽諸發已潰流膿腐盡時脾胃虛弱肌肉生遲或氣血原不足以致肉色淡白不能長發

收斂宜服此酒生長肌肉強健脾胃美悅顏色

滋潤皮膚凡大瘡後飲此不惟却病亦且延壽

人參切 白朮

熟地各五錢 當歸身切

天門冬 枸杞

各三錢 栝子仁 遠志各二錢五分

外科正宗

卷之二

二六

右上藥用絹袋寬貯以無灰好酒五斤磁罐內

浸至一伏時每早午晚各飲一杯熱服如夏月

天炎易壞不堪久服將藥分作五分每次用酒

一斤隨便浸服亦効如酒將完藥尚有味再添

酒浸飲之一次已後藥淡無味不必再浸用之

桑木灸法

治諸瘡毒堅而不潰潰而不腐新肉不生疼痛

不止用新桑木長七寸劈指大一頭燃着向患

上灸之火盡再換每次灸木五六條肉腐為度

神妙拔根方治腦疽發背陰症初起不腫高不熾熱

灸不疼其病將來難果必致壞人十日以前用

披針當頂插入知痛處方止隨用蟾酥條插至

孔底每日二條膏蓋三日後加添插藥其根高

腫作疼外用神燈照法助陰為陽插照七日其

瘡裂縫流膿至十三日其根自脫如日多根深

蒂固不能脫者披針取之內用玉紅膏不脫者

外科正宗

卷之二

二七

自脫不斂者自斂此法百人百活再無不愈者

腦疽應用方

隔蒜灸法

拔筒法

琥珀蠟礬丸

太乙膏

真君妙貼散

護心散 方俱見腫瘍門

蟾酥丸

蟾酥條 俱見疔瘡門

十全大補湯

人參養榮湯

乳香定痛散

聖愈湯 方俱見遺瘍門

疔瘡論第十七

入疔瘡者乃外科迅速之病也有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死一月半月而終死此在於毒中之淺深臟腑之乖逆節候之寒溫肅殺之瞬息畜類尸忤性情激變暴戾一時發生立判人之氣血虛者各隨臟腑而中之且如毒氣發於心經者生為火焰疔其患多生唇口手掌指節間其發初生一點紅黃小泡抓動癢痛非常左右肢體麻

外科正宗

卷之二

十八

木重則寒熱交作頭暈眼花心煩發燥言語昏憤此等出於心經之病也毒氣發於肝經者生為紫燕疔其患多生手足腰脇筋骨之間初生便作紫泡次日破流血水三日後串筋爛骨疼痛苦楚重則眼紅目昧指甲純青舌強神昏睡語驚惕此等出於肝經之病也毒氣發於脾經者生為黃鼓疔其發初生黃泡光亮明潤四邊紅色纏繞其患初生口角腮頰眼胞上下及太陽正面之處發之便

作麻癢絀急硬強重則惡心嘔吐肢體木痛寒熱交作煩渴乾噦此等出於脾經之病也毒氣發於肺經者生為白刃疔其發初生白泡頂硬根突破流脂水癢痛驟然易腐易陷重則腮損咽焦毛聳肌熱咳吐膿痰鼻掀氣急此等出於肺經之病也毒氣發於腎經者生為黑曆疔其患多生耳竅胸腹腰腎偏僻軟肉之間其發初生黑斑紫泡毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如疔痛徹骨髓重則手足青

外科正宗

卷之二

十九

紫驚悸沉困軟陷孔深目睛透露此等出於腎經之病也以上五疔相應五臟又紅絲疔起於手掌節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊令人多作寒熱甚則惡心嘔吐遲者紅絲至心常能壞人用針於紅絲盡處挑斷出血尋至初起瘡上挑破俱用蟾酥條插入膏蓋內服汗藥散之自愈凡治此症貴在乎早初起即治者十全十活稍遲者十全五六失治者十全一二初起項以上者三陽受

毒必用披針刺入瘡心四五分挑斷疔根令出惡血隨用回疔丹或蟾酥條插入孔內膏蓋之如項之以下者三陰受毒即當艾灸灸之不痛亦須針刺插藥方効隨後俱用蟾酥九冬月萬靈丹發其大汗毒方得解庶不稽留毒氣致生變症今人治法不論陰陽表裏部位上下凡見是瘡便加艾灸殊不知頭乃諸陽之首亢陽熱極所致其形雖小其惡甚大再加艾灸火益其勢逼毒內攻反為倒

外科正宗 卷之二

陷走黃之症作矣既作之後頭面耳項俱能發腫形如尸疔七惡頓起治雖有法百中難保一二外又有疔名數種形狀紛紛故有舊說未及重錄也

疔瘡看法

初起如疥形如粉刺或小泡或疔瘡結腫不散者順瘡腫不作寒熱亦不惡心飲食有味手足溫暖者順形已成瘡腫肉不腫四圍白色多痛少癢作膿者順已潰出膿瘡仍高腫肉色鮮明根內紅活漸平者順

初起似疔非疔軟慢灰色四邊瘡根平塌漫腫者凶未發前作寒熱如瘧惡心不食後出瘡如蚊跡豕斑或青紫黑泡軟陷無根腐爛深孔氣纏足冷者逆瘡形似魚臍頂凹灰白軟慢相兼脉細身冷者多逆已成肉腫瘡不腫根脚走散瘡頂空腐血水氣穢死凡疔項之以上針刺不疼項之以下灸之不痛俱死已經走散頭面耳項俱腫煩躁脉細痰動喘急者死日久原瘡無跡走散之處仍復作膿脉數唇焦終死

外科正宗 卷之二

病雖險惡歲運順者可活瘡雖微險歲運逆者常危

疔瘡治法

初生項之以上者必先針刺以去惡血庶毒不攻內初發項之以下者必先艾灸以殺其勢庶不侵良肉發熱惡寒身體拘急六脉緊數邪在表也宜汗散之身體發熱口燥咽乾脉實有力三便秘澀者宜下之針刺之後瘡不作腐邊腫不消仍加插藥內亦補托初起候灸致毒走黃未住者急當隨走處砭去惡血

發熱乾嘔心煩作渴悶亂神昏解毒清心托裏護膜
潰後氣血受傷神怯食少睡臥不寧助脾胃欽神氣
將愈後氣血漸復飲食當進仍作渴者急滋養腎水

疥瘡治驗

一監生右額下生疔三日形如魚目詢問起居但今
麻癢不常此即肺經受毒之症也用針刺入四五
分其硬如骨有聲隨用蟾酥條插至三日猶不腐
化此堅頑結聚之病也此藥力不及其事換用三

外科正宗

卷之二

三三

品一條鎗插至七日外用糊紙封蓋至十一日脫
出疔根一塊約有指許以長肉玉紅膏漸擦漸長
先服托裏消毒散加金銀花二錢白芷五分脫後
用八珍湯加天花粉麥門冬黃芪陳皮各一錢調
理月餘候瘡生肉已平用珍珠散膠上結皮而愈
一監生中年妻喪繼娶幼室乃嬌態人也自服補腎
助陽之藥以致腎水受傷不能上制心火左顛發
生一泡先紫後黑麻木不知痛痒凡累者腎經之

毒也其毒豈淺且喜瘡之四邊尚未走散此猶可
取隨用針刺疔上量別藥不濟其事用冰蠟散厚
糊作條插入患孔用糊紙密封勿令泄氣朝服加
減八味丸以滋腎水午服益氣養榮湯接補真氣
以滋不足晚用琥珀蠟礬丸護心解毒候至十一
日外疔根與藥結成一塊依期脫落次用生肌欽
口補助調理脾胃之劑二十日而愈後因此公不
慎調理失於保節幾及三年復成虛損勞瘵而歿

外科正宗

卷之二

三三

一婦人年近四旬夫主不利愁鬱種種抱懷不散時
值季夏歲荒之極腮發一疔六日後方延予視其
時疔毒已經走散頭目唇項俱腫形色紫赤予曰
肉腫瘡不腫乃疔毒走黃不治之症彼婦流涕歎
曰一家皆絕也予問曰何其如此婦又曰吾夫乃
不肖之人婦有一女二子俱未適配設若婦死寄
托於夫子女日後必為流蕩輩也故婦在一家生
婦逝一家死自然之理予時聞之沈吟不已如此

何以得生不忍棄治況此瘡勢大又非藥力可回思之當先僱一貧人以飯飽再用火酒數杯隨用針刺腫上十餘處令彼噙吸惡血數碗將溫湯洗淨用蟾酥錠磨濃塗之四圍敷金黃散早晚二次內以護心散蠟禁九清心護裏兼服降火化痰開鬱安神之藥調治庶保不變吸血之後餘腫稍退又至六日夫又對言何其不死彼婦相聞甚苦暴怒之極仍又復腫比前尤甚也復用針刺腫甚

外科正宗

卷之二

三四

上約十餘處出血三四碗針孔止小膏蓋貼餘腫仍敷其人出血多而其內必虛以人參養榮湯加香附貝母服數日後針口漸膿餘腫漸消原瘡處復得高腫仍用蟾酥條插化亦漸腐潰外用生肌斂口內服開鬱和中養血健脾等劑調理百日外方愈此病設若相論瘡勢形色者百無一生之理此功出於強勉行之亦得其生者此婦愈後二子一女俱以婚配其疾亦守其終見今已六旬半矣

一婦人二十二歲右耳垂向前一寸生疔三日請予視之形有豆大頂陷灰色此肺經感毒發為白刃疔也又驗其根脚綿軟毒不結聚為陷伏陰症也未及針刺伊舅曰何恙也予直告曰疔瘡症彼聽冷笑不信是言也予因辭不用藥隨其信否彼復請容醫治之視曰風熱疔瘡乃小恙也彼家告以某醫曾曰是疔瘡醫者點頭而笑曰此真胡說患家喜悅天下事大相懸絕醫用消風散藥二服毒

外科正宗

卷之二

三五

氣全收隨發昏憤喘急而即死後里中人詢問何速之甚彼初時因不信予言自悞其死真可惜也一年少婦額下生疔疔瘡作痒予欲針之彼家不信辭後自灸次日四邊漸腫瘡漸軟陷又三日頭面大腫復請治之予觀原瘡灸上已結黑靨乾陷無膿此毒氣內陷外肉已死又面目浮腫光亮發熱形狀不堪此正氣衰而邪氣實也雖治亦不効後必終死彼家方悔自悞之說後延半月果然歸寢

疔瘡主治方

蟾酥丸

蟾酥丸効獨稱雄乳沒砂礬輕粉同
銅綠蟾酥寒水腐蝸牛又有用蜈蚣

治疔瘡發背腦疽乳癰附骨醫腿等疽一切惡

症及瘡不痛或麻木或嘔吐病重者必多昏憤

此藥服之不起發者即發不痛者即痛痛甚者

即止昏憤者即甦嘔吐者即解未成者即消已

成者即潰真有回生之功乃惡症中至寶丹也

蟾酥二錢 輕粉五分 枯礬 寒水石煨

外科正宗

卷之二

三

銅綠 乳香 沒藥 膽礬

麝香各一錢 雄黃二錢 蝸牛二十個 硃砂三錢

以上各為末稱準於端午日午時在淨室中先

將蝸牛研爛再同蟾酥和研稠粘方入各藥共

搗極勻丸如菉豆大每服三丸用葱白五寸患

者自嚼爛吐於男左女右手心包藥在內用無

灰熱酒一茶鍾送下被蓋如人行五六里出汗

為効甚者再進一服修合時婦人雞犬等忌見

黃連解毒湯

黃連解毒湯黃柏山梔甘草共連翹
內熱口乾煩躁甚更加牛子寂然消

治疔毒入心內熱口乾煩悶恍惚脈實者宜用

黃連 黃芩 黃柏 山梔

連翹 甘草 牛旁子各等分

水二鍾燈心二十根煎八分不拘時服

立馬回疔丹

立馬回疔丹輕粉蟾酥蝸牛白丁香
雄乳硃砂金頂等化疔如雪去投湯

治疔瘡初起已用針刺後又或候灸失治以致

瘡毒走散不住乃疔走黃險惡症也急用此插

外科正宗

卷之二

三

蟾酥化酒 礬砂 輕粉 白丁香各一錢

蜈蚣一條 雄黃 硃砂各二錢 乳香六分

麝香一字 金頂砒五分註

共為細末糊成麥子大凡遇疔瘡針破用此一

粒插入孔內膏蓋之次後追出膿血疔根為効

疔毒復生湯

疔毒復生湯牡蠣山梔乳沒骨連翹
花粉銀花黃皂刺木通牛子不相饒

治疔毒走黃頭面發腫毒氣肉攻煩悶欲死者

牡蠣 山梔 銀花 木通

連翹 牛蒡子 乳香 沒藥

角刺 花粉 大黃 地骨皮 各八分

水酒各一茶鍾煎一半食遠服不能飲者水煎

臨服入酒一杯和服亦効脉實便秘者加朴硝

七星劍

疥癬最怕七星劍 野菊蒼耳蒼莖半麻黃地丁紫河車 斬斷諸疥及人面

治十三種疥瘡初起增寒作熱惡心嘔吐肢體

麻木癢痛非常心煩作躁甚者昏憤急宜服之

野菊頭 蒼耳頭 蒼莖草 半枝蓮

外科正宗

卷之二

三

地丁草 各三錢

麻黃 一錢 紫河車 二錢

用好酒一斤煎至一碗濾清熱服被益出汗為

度冬月無鮮草宜預採陰乾臨時煎服之亦効

鉛粉散

鉛粉散治疥疥疥 疥疥香松脂及黃丹輕粉黑鉛為黑粉 諸般陰爛可回陽

治冷疥生於脚上初起紫白泡疼痛徹骨漸至

腐爛深孔紫黑血水氣穢經久不瘥用此大効

黑鉛

此四兩鐵杓化開傾入水中取起再化如

松脂 一錢

黃丹 飛炒五分

麝香 一分

共研先用葱湯洗淨麻油調塗瘡口油紙蓋外

化疔內消散 化疔內消散山甲 知母天花粉半夏

治疔瘡初起或已針已灸之後服之能令內消

皂角針 金銀花 知母 貝母

天花粉 穿山甲 白芨 乳香

赤芍 半夏 甘草 紫河車 各一錢

水酒各一茶鍾煎一半量病上下食前後服之

東毒金箍散 東毒金箍散大黃 白芨白芨白芷當黃柏帶金輕荳粉 敷圍諸毒不開張

外科正宗

卷之二

三

治疔瘡針刺之後餘毒走散作腫宜此藥箍之

鬱金 蟬肚者 白芨 白蔞 白芷

大黃 各四兩 黃柏 二兩 輕粉 五錢 菜豆粉 一兩

共為細末酸米漿調箍四邊夏熱甚者蜜水調

解毒大青湯 解毒大青湯石膏 玄參知母麥冬饅麻梔木桔燒人糞 加上人中黃更高

治疔瘡候灸逼毒入裏致生煩躁謔語不定者

玄參 桔梗 知母 大青葉

升麻 石膏 山梔 人中黃

麥門冬 木通各一錢 大黃便秘加 燒人糞加

水二茶鍾淡竹葉燈心各二十件食遠服

消疔簡便方消疔簡便方容易 葱白原來共白 蒜

治疔瘡及諸惡毒初起但未成膿者服之即効

白礬末三錢 葱白七錢

右二味同搗極爛分作七塊每塊用熱酒一杯

送下服畢用厚被蓋之再喫葱白湯一鍾少頃

汗出如淋從容去其覆物其病若脫此雖味澁

外科正宗 卷之二

難服其効更妙凡居鄉村之處倘有緊病未及

請治只傳此方服之活人甚眾誠為良便方也

太乙紫金丹太乙紫金丹大戰 艾茹艾茹共千金

解諸毒療諸瘡利關竅通治百病此藥真能起

死回生製之濟人奇効不可盡述凡居家出入

與大工動大兵及問廣雲貴仕宦者不可無之

山茨菰洗去毛皮 川文蛤一名五格子

麝香者研淨三錢 赤金丹一名續隨子

紅芽大戟杭州紫大戟為上江南士大戟次

反傷元氣弱人服之有致吐血慎之勿用取

上品者去蘆根洗淨焙乾為末一兩五錢整

硃砂極細末三錢 雄黃鮮紅大塊者

以上之藥各擇精品於淨室中製畢候端午七

夕重陽或天月德天醫黃道上吉之辰凡入室

合藥之人三日前俱宜齋沐更換新潔衣帽臨

日方入室中淨手薰香預立藥王牌位主人率

眾焚香拜禱事畢各將前藥七味復等稱準入

於大乳鉢內再研數百轉方入細石臼中漸加

糯米濃飲調和軟硬得中方用杵搗千餘下極

至光潤為度每錠一錢每服一錠病勢重者連

服二錠以取通利後用溫粥補之修合時除合

藥潔淨之人餘諸忌見此藥惟在精誠潔淨為

効治一切飲食藥毒蟲毒瘴氣惡菌河豚中毒

自死牛馬猪羊六畜等類之肉人誤食之必昏

亂卒倒或生異形之症並用水磨灌服或吐或

外科正宗 卷之二

瀉其人必甦南方山巒瘴氣烟霧癘疫最能傷人感之纔覺意思不快惡寒惡熱欲嘔不嘔卽磨一錠服之得吐利便愈癰疽發背對口疔瘡天蛇無名腫毒蛙節紅絲等疔及楊梅瘡諸風癰疹新久痔瘡並川無灰淡酒磨服外用水磨塗搽瘡上日夜數次覺癢而消陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈塞滯邪毒未出瘟疫煩亂發狂喉閉喉風俱用薄荷湯待冷磨服赤白痢

外科正宗 卷之二

三三

疾肚腹瀉泄急痛霍亂絞腸沙及諸痰喘並用薑湯磨服男子婦人急中顛邪渴叫奔走鬼交鬼胎鬼氣鬼磨失心狂亂羊兒豬顛等風俱用石膏蒲煎湯磨服中風中氣口眼歪斜牙關緊急言語蹇澀筋脉攣縮骨節風腫遍身疼痛行步艱辛諸風諸癰並用酒磨頓熱服下自縊溺死驚死壓死鬼魅迷死但心頭微溫未冷者俱用生薑續斷酒煎磨服一切惡蛇風犬毒蝎溪

潤諸惡等蟲傷人隨卽發腫攻注遍身甚者毒氣入裏昏悶响叫命在須臾俱用酒磨灌下再喫葱湯一碗被蓋出汗立甦新久瘧疾臨發時東流水煎桃柳枝湯磨服小兒急慢驚風五疳五痢脾病黃腫癰疹瘡癤牙關緊閉並用薄荷浸水磨濃加蜜服之仍搽腫上年歲幼者每錠分作數服牙痛酒磨塗痛上仍含少許良久嚙下小兒父母遺毒生下百日內皮塌爛斑殺道

外科正宗 卷之二

三三

眼眶損爛者俱用清水磨塗打撲傷損松節無灰酒研服年深月近頭脹頭疼太陽痛極偏頭風及時瘡愈後毒氣攻注腦門作脹者俱用葱酒研服一錠仍磨塗太陽穴上婦女經水不通紅花湯下凡遇天行疫症延街及巷相傳遍染者用桃根湯磨濃搭入鼻孔次服少許任入病家再不傳染又治傳尸勞瘵諸藥不能禁忌一方士指家服此每早磨服一錠至三次後逐下

惡物尸蟲異形怪類後得脫利以此相傳活人

不計其數一女子久患癩瘡為屍蟲所噬磨服

一錠片時吐下小蟲十餘條後服蘇合香丸其

病頓失調理月餘而愈真濟世衛生之寶藥也

人參清神湯 人參清神湯木芪 歸苓甘草麥冬宜 柴陳遠志黃連等 功效堪同地骨皮

治疔瘡潰膿後餘毒未盡五心煩躁精神恍惚

不寧言語睡卧不清服之降火清心保扶元氣

人參 黃芪 當歸 白朮

外科正宗 卷之二

麥門冬 陳皮 茯苓 地骨皮

遠志 各一錢 甘草 柴胡 黃連 各五分

水二茶鍾糯米一撮煎八分食遠服

內托安神散 內托安神散木芪 茯苓酸棗志陳皮 麥冬五味菖蒲草 加上人參玄又奇

治疔瘡針後已出膿時元氣虛弱睡卧驚悸心

志不寧或毒未盡流入心竅致生健忘亦宜服

人參 茯苓 黃芪 白朮

麥門冬 玄參 陳皮 各一錢 酸棗仁

遠志 甘草 石菖蒲 五味子 各五分

水二鍾煎八分臨入硃砂末三分和勻食遠服

疔瘡應用方

蟾酥條 即前蟾酥丸作 條捏餅用之 琥珀蠟礬丸

玉紅膏 如意金黃散

護心散 托裏消毒散 見腫 瘍門

八珍湯 益氣養榮湯

加減八味丸 人參養榮湯 見潰 瘍門

外科正宗 卷之二

珍珠散 下疳 門 水蠅散 瘰癧 門

脫疽論第十八

夫脫疽者外腐而內壞也此因平昔厚味膏粱薰蒸

臟腑丹石補藥消燥腎水房勞過度氣竭精傷或

兼房術澀精弱道藥噙舌下化水直至丹田或納

臍中使熱徑投內腎為丸掌握作香鼻息塗抹陰

鼎或搽陽器圖使堅銅希求常濟多致陽精竭或

淫火猖狂其蘊蓄於臟腑者終成燥熱火症其毒

積於骨髓者終為疽毒陰瘡誠為巧人行拙誰防
禍起蕭牆智者多愚自謂喜從天降不顧後日也
骨枯髓涸臟敗腑亡方知今日罹殃有故解脫無
方凡患此者多生於手足故手足乃五臟枝幹瘡
之初生形如粟米頭便一點黃泡其皮猶如煮熟
紅棗黑氣侵漫相傳五指傳遍上至脚面其疼如
湯潑火燃其形則骨枯筋練其穢異香難解其命
仙方難活故謂血死心敗筋死肝敗肉死脾敗皮

外科正宗

卷之二

三

死肺敗骨死腎敗此五敗者雖有靈丹竟喪命而
已是生此疾者死生付於度外孫真人曰在肉則
割在指則切即此病也治之得早乘其未及延散
時用頭髮十餘根纏患指本節盡處透扎十餘轉
漸漸緊之毋得毒氣攻延良肉隨用蟾酥餅放原
起粟米頭上加艾灸至肉枯瘡死為度次日日本指
盡黑方用利刀尋至本節縫中將患指徐順取下
血流不住用金刀如聖散止之餘腫以妙貼散敷

之次日倘有黑氣未盡單用蟾酥餅研末搽之膏
蓋黑氣自退患上生膿照常法用玉紅膏等藥生
肉護骨完口此為吉兆內服滋腎水養氣血健脾
安神之劑若內無變症外無混雜此十中可保其
三四矣若割取之後黑色仍漫痛滯尤甚敗惡無
膿口乾舌硬精神不爽食不知味者終死凡治此
不可一已醫治必與高明眾議聽患者願情割取
況此症首尾吉凶變駁難定故不可輕易用之又

外科正宗

卷之二

三

有形似而來非穴真而受異詳註在後宜參觀之
脫疽看法

起瘡不渴口潤舌和性志尋常無妄暴急循禮為吉
初出形如麻子焮熱作痛一指皆腫根脚收束者吉
已成頭便作腐肉不紫黑疼痛有時膿出腫消者吉
已潰先膿後腐肉色紅活毒不走散氣不腥穢者吉
未瘡先渴喜冷無度昏瞢苦乾小便頻數陽痿者逆
初起形如粟米肉便紫色米腫刺疼黑氣延散者逆

已成瘡形枯鱗肉黑皮焦痛如刀刺毒傳好指者逆
已潰肉枯筋腐血水臭汗疼苦應心零付徹骨者逆

脫疽治法

脫疽多生足指少生手指初起水窠黃泡者即灸之
初生如粟裏可容谷皮色紫赤不作焮腫髮扎仍灸
已灸之後瘡受火氣發泡作膿外藥箍之內兼補托
毒勢已成瘡形稍陷但紫色未攻脚面者評議割取
既割取之後血水淋漓疼痛不減和氣血補脾胃已
外科正宗 卷之二

成飲食減少身體倦怠便數口乾滋津液壯腎水破
後氣血受傷脾胃虛弱自汗盜汗惡心乾嘔睡臥不
寧日晡發熱疼痛苦楚煩悶謔妄俱宜大補氣血富
貴及膏粱素饜色慾每於房術縱恣日久禁行割法

脫疽治驗

一男子年近五旬右足小指初生如粟米漸成白泡
三日始痛請治頭已腐爛一指紫腫此脫疽也隨
用艾火明灸十三壯始大痛乃止又用針刺灸頂

以蟾酥餅貼灸上膏蓋本指腫上用披針擊刺七
八處發泄毒血用蟾酥錠磨濃塗之腫外以真君
妙貼散敷護良肉庶不外侵其時患者脈數身發
寒熱惡心體倦先用人參敗毒散解其表症次用
黃連內疎湯通其大便而惡心煩熱亦止又以托
裏消毒散加金銀花牛膝數服早以八味丸晚用
蠟燭丸相兼服之喜其火疎毒氣隨又針刺並泄
其毒故不變作解毒為膿腫方不散後用十全大

外科正宗

卷之二

補湯加山萸五味麥冬等藥調理月餘而愈此疽
若不針灸發泄毒氣專假藥力敷圍再加峻藥攻
利必致傷其元氣豈能保固毒不侵犯得安之理
一客商右足次指生一紫泡癢痛異常次日指甲俱
紫欲黑視之乃肝腎二經之毒彼曰何別也予曰
甲乃肝之餘氣甲紫則肝受毒也骨乃腎之餘腎
傷則骨黑此理甚明彼又自何以致之予曰凡人
勞疲筋力傷於肝悞服熱藥傷於腎傍者曰情實

有此因彼久居客旅交結私妓情懷最密極力承奉但夜並服典陽細丸期許常至立交戲諱有此二年矣前言正中其病此勞力熱藥傷腎傷筋之實也其病尤險欲辭不治彼哀告客途欲得生返再三求治予又斟酌先取妓者頂髮十餘根撚線纏扎患指盡處隨將艾炷安於所扎上面紫色處排勻三處每灸七壯各放蟾酥餅膏蓋次後脹痛相忍不捨解去扎髮過夜一指皆黑相量筋骨皮

外科正宗

卷之二

四

肉俱死仍用利刀順節取脫患指乃冰冷惡物預煎甘草湯浸洗良久候瘀血稍盡以止血散揆之次日灸上紫色不退恐其上延又以神燈照法照之候血散皮縐旋合蟾酥丸料多加海羊研爛敷之早晚二次腫不復作紫色變紅紅色潰膿外用生肌止痛活血收斂之藥又熬參朮地黃膏朝服接補真元午服健脾藥以回胃氣晚用金液丹以解藥毒如此調理三月而愈後人問之用妓者頂

髮扎之何也予曰彼之頂髮乃心契之物也以髮靠肉雖疼而不疼彼又如在目前此釋情之意也一婦人中年肥胖生渴三載右手食指麻癢月餘後節間生一小泡隨後本指漸腫疼脹不堪視之原泡處已生黑斑半指已變紫黑此亢陽之極乃成脫疽胗之脈洪大數而有力此與肥人相反如再黑色上延壞人迅速詢問此婦先居富室無嗣每縱膏梁架烘爐炭又兼多服種子熱藥中年喪夫

外科正宗

卷之二

四

家業盡被嗣人侵費致久懷憂鬱後與寡母同棲身飢寂寞此先富後貧所願不得又為失榮症也辭不可治彼婦母子再三哀懇亦無之奈何乃遵孫真人治法在肉則割在指則切此外無他彼願從之先用人參養榮湯隨用軟絹條尺許纏裹黑色盡處好肉節上以漸收緊扎之度不通行血絡次用利刀放準依節切下將手隨浸甘草溫湯中片時其血不挾參其疼亦不夫甚患者曰惟心

之懼不知而下以神力之佑也予曰所嫌者切而不痛此爲氣血筋骨俱死此物雖脫其症未可得愈每以八味丸料加入參麥冬大劑煎服先救腎水次扶脾胃間用金液戊土丹以解藥毒後三日所扎指上漸漸放鬆以通血脉搽貼紅黑二膏生肉止痛次後手背手掌日漸發腫勢惡之甚惟不黑色此內毒已出之故仍用神燈照法兼以猪蹄湯淋洗後又腫上皆出鼓頭流去膿血不計其許

外科正宗

卷之二

四三

兩月外方得原腫稍退膿穢稍減又以參朮膏入參養榮湯兼服半年外方安其婦雖活五指失矣一男僕冬月嚴寒主使赤足履地不敢移隨後血水麻木次日十指俱紫又數日全變黑色麻木不痛請視之強用辛熱散寒活血薰洗等藥終至不應後必十指齊脫又延黑脚面骨節一段甚作疼痛彼主恐脫疽也予曰似是而非後必不妨令患若常用桑木火灸之取其溫暖活血又能解散鬱

毒其患漸腐漸脫自不走散內服健脾養血之藥調理外用生肌紅黑二膏培長肌肉百日外愈矣一侍女年十二歲容貌頗通新主嫌其脚大用脚布任意纏緊以線密縫其脚脹痛不堪訴主不聽至半月後流出臭水方解視之其雙足前半段盡皆黑腐請視之骨肉已死予曰此已壞者不能復活只救將來未壞者可也先煮參粥食之次煎葱湯令彼家侍婦將患足浸入湯內淋洗再換湯浸但

外科正宗

卷之二

四三

腐肉不痛者逐一剪割連續知痛者又以花蕊石散搽之保將患者復其生已壞者得其脫內服補中益氣湯接其勞外搽生肌玉紅膏長其肉後雖得愈但二者俱致疲疾終身此爲穴真而受異也一男人右足小指縫中初生一黑黃粟泡皮肉隨變紫色陰疼不腫常如刀刺視其形色真脫疽也診其脉又得細數無力此腎經傷敗症也但患者生平大飲內有正副三人此必精力已竭縱治無功

予強辭之後必延至脚面足底皆穿痛徹不已又飲食日少氣血日衰形體日削兩月後百苦而終

脫疽主治方

解毒濟生湯

解毒濟生湯草芎知相紅花併遠志

花粉柴芩歸茯苓犀角升麻牛膝同

治脫疽初起惡寒體倦發熱作渴或腫或紫或

麻或痛四肢倦怠心志恍惚不寧者並宜服之

川芎

當歸

黃柏

知母

天花粉

金銀花

麥門冬

遠志

外科正宗

卷之二

四

柴胡

黃芩

犀角

茯苓

甘草

紅花

升麻

牛膝

水二鐘煎八分臨服入童便一杯隨病上下服

陰陽二氣丹

陰陽二氣麥天冬澤瀉辰砂礬五味

片柏玄參青黛同人參甘草解煩癢

治脫疽久服丹石補藥致虧腎水多成口燥咽

乾至飲冰雪不知其冷此孤陽獨旺宜服此解

天門冬

天門冬

五味子

黃柏

人中白

小兒溺者

玄參

湯泡去麤皮

青黛色嬌嫩者 甘草

枯礬

辰砂為衣

澤瀉

各三錢

冰片

一錢

各為細末同玄參二冬膏子加煉蜜少許再搗

千餘下軟硬得中丸如桐子大每服六十九童

便乳汁各一鍾空心送下安睡一時其功如神

清神散

清神散內用硃砂

荳粉梅花冰片佳

治脫疽疔瘡發背毒積甚者腠理發越不盡多

致煩躁悶亂睡則謔言嘔吐不食者並宜服之

外科正宗

卷之二

四

甘草節

五錢

真豆粉

一兩

大硃砂

三錢

梅花片

五分

牛黃

三分

右為細末每服一錢淡竹葉燈心湯調服

雌雄霹靂火

雌雄霹靂火純陽

斬艾雙黃丁麝香

治脫疽及一切發背初起不疼痛者並宜灸之

艾茸

二錢

丁香

雌黃

雄黃

各二分

麝香

一錢

右下四味共研極細搗入艾中作安豆大丸放

於患上灸之毋論痛痒以肉焦為度如毒已經走散就紅暈盡處排炷灸之痛則至痒痒則至痛為妙灸後仍用提疔麥子貼上膏蓋次服蟾酥丸及解毒濟生湯兼治轉回活色有膿為妙

金液戊土丹

金液戊土丹五味砂雄硝石烏梅等

牛黃神志石菖蒲片射人中黃不殊

治脫疽及疔瘡發背縱食膏粱厚味法酒又或

丹石補藥勉力房勞多致積毒臟腑人則胃汁

中乾腎水枯竭不能上制心火以致消渴消中

外科正宗

卷之二

四六

消腎饒飲多乾能食多瘦九竅不通驚悸健忘此症若出後必發疽多難治療宜預服此亦可轉重就輕移深就淺又解五金八石之毒藥也

人中黃

法在末卷

烏梅肉 茯神

胡黃連

五味子 各一兩

石菖蒲

辰砂

雄黃

遠志

硝石 各三錢

牛黃

冰片 各一錢

金箔 二十為衣

各為淨末配準前數共入乳鉢內再研小轉於

端午七夕或二至二分吉辰在淨室中先將烏梅地黃二膏搗極爛和藥漸加煉蜜少許徐徐添搗軟硬得中每藥一兩分作十九金箔為衣每服一九用人乳童便共一大杯化藥隨病上下食前後服之此藥最解膏粱金石藥毒殺三尸除勞熱極有奇功又治煩顛主安神志辟瘧辟瘟及諸邪魅謔語妄情失心喪志者俱効修合之時服藥之際俱忌婦人僧尼孝服雞犬等

外科正宗

卷之二

四七

見之此藥用蠟封固收藏不泄藥味愈久愈効脫疽應用方

針刺法

蠟礬丸

蟾酥餅

蟾酥丸 見疔瘡門

神燈照法

太乙膏

真君妙貼散

內疎黃連湯

猪蹄湯

玉紅膏

托裏消毒散

見腫瘍門

十全大補湯

參木地黃膏

人參養榮湯

補中益氣湯

加減八味丸

桑木灸法

見醫門

人參敗毒散

見時傷門

花蕊石散

見金瘡門

瘰癧論第十九

夫瘰癧者有風毒熱毒氣毒之異又有瘰癧筋瘰痰癧之殊風毒者外受風寒縛於經絡其患先寒後熱結核浮腫熱毒者天時亢熱暑中三陽或內食

外科正宗

卷之二

四八

膏粱厚味釀結成患色紅微熱結核堅腫氣毒者四時殺厲之氣感冒而成其患耳項胸腋驟成腫塊令人寒熱頭眩項強作痛瘰癧者累累如貫珠連接三五枚此不足寒熱其患得於悞食蟲蟻鼠殘不潔之物又或汗液宿茶陳水混入而食其患先小後大初不覺疼久方知痛筋瘰者憂愁思慮暴怒傷肝益肝主筋故令筋縮結著成核生於項側筋間形如棋子堅硬大小不一或陷或突久則

虛羸多生寒熱勞怒則甚痰癧者飲食冷熱不調饑飽喜怒不常多致脾氣不能轉運遂成痰結初起如梅如李生及遍身久則微紅後必潰破易於收斂凡觀此症別其風毒者散其風除其溼如防風解毒湯之類是也熱毒者清其脾瀉其熱連翹消毒飲之類是也氣毒者調其血和其氣藿香正氣散之類是也瘰癧者散其堅和其血散腫潰堅湯之類是也筋瘰者清其肝解其鬱柴胡清肝湯

外科正宗

卷之二

四九

之類是也痰癧者豁其痰行其氣芩連陳湯之類是也又有寡婦尼僧離夫庶妾志不得發思系得遂積想在心過傷精力此勞中所得者往往有之最為難治有此先養心血次開鬱結益腎安神疎肝快膈如歸脾湯益氣養榮湯俱加香附青皮山梔貝母木香之類是也又男人蒸宜太陽青筋潮熱咳嗽自汗盜汗女人又忌服肉紅絲纏閉骨蒸五心煩熱男婦有此後必變為癆瘵難治之症

但此體實者初起可服散腫潰堅攻利之藥得効者十中三四有不察虛實盡劑追伐損傷元氣致成壞病者十有八九此非患者之命自出醫人之手予常治初起成核服前藥未効者用針刺核內深入三四分用冰蠅散擦成條子挿入核內糊紙封上待至二七後核子自然落出隨用紅黑二膏搽貼內服補劑不久便愈又常見斑毛牽牛巴霜大黃追蝕等用往往致其危亡者多矣切宜戒之

外科正宗

卷之二

瘰癧看法

初起核高腫痛色紅軟活微作寒熱肩項不強者易已成根不堅硬內無小核相叢脾健氣血不衰者易已潰膿稠肉色紅活核腫漸消肩項自便漸斂者順潰後易消易斂氣體平和胸膈寬利飲食知味者順未成形體消瘦寒熱往來結核頑硬痰嗽相兼者險已成核堅連續如珠大小不等項強筋急脉虛者險已潰膿米清稀肌肉消鑠自汗盜汗寒熱不睡者逆

潰後陰虛煩燥作渴泄秘男子骨蒸女人經閉俱逆

瘰癧治法

初起腫痛增寒壯熱四肢拘急項強頭眩者表散之腫硬發熱便秘口乾胃膈不利惡心脉實者宜利之膏梁厚味醇酒積熱濕痰凝結而成化痰降火清中憂思過度鬱怒傷肝筋縮結核者宜養血開鬱疎肝房慾勞傷陰虛肺熱自汗咳嗽形消瘦者滋腎健脾失利忘名懷抱鬱結積想在心所如不得乖隔陰陽虛嗽歲月所得此者精血俱傷先養正氣次治標病堅而不潰腐而潰之潰而不斂補而斂之皆活法也

瘰癧治驗

一男人項核腫痛拘急惡寒用荆防敗毒散二劑表症悉退餘核不消用散腫潰堅湯加川芎香附貝母十餘服其核漸消外以琥珀膏貼之月餘而安一男人仲冬渡江暴發霧氣又值驚恐次日寒熱交作頭面耳項俱腫先以藿香正氣散二服寒熱亦

外科正宗

卷之二

五十一

止面腫漸消惟項間堅腫不退紅嫩作痛此毒聚必欲作膿仍用正氣散加芫歸皂刺數服候膿熟針之腫痛頓退又以十全大補湯脾健肌生完口一婦人孀居六載子幼未立憂鬱成核半年又兼經水不調寒熱交作形體消瘦脉亦弦數此勞傷氣血肝火妄動而成斯疾也所謂損者益之不可用追蝕之藥損而復損先用逍遙散加香附牡丹皮貝母和其血脉和其肝氣使寒熱盡退次用益氣

外科正宗

卷之二

五三

養榮湯服至月餘氣血漸復經事漸調元氣漸醒外用火針核上點破四孔用黃線藥插入五六次候至孔大換用冰蠟散搽於核上封之至十三日外其核自落外搽紅膏生肌收斂內換人參養榮湯加香附木香三十餘服其口自完此婦慎起居同七情戒口味盡調理故可得愈否則必不能矣一室女年十七因父擇婿不遂就至巨初懷抱日久項生數核堅硬如石此肝經凝結筋縮之病也又

兼經水斷絕寒熱如瘧咳嗽脉數惟不顯紅此陰虛火動已成勞瘵症也非藥能愈視其形狀喜無收色予曰欲治此病先治其心猶可父問曰何藥治心予曰非藥也易云天地氤氳萬物化醇男女媾精萬物化生此天地男女生成化育之道也斯病獨起於孤陰寡陽不生不化所謂逆理之病此女大失配謂當至而不至漸成失度之疾其病不生而自生非已作也由時變也故藥不能挽回必

外科正宗

卷之二

五三

得陰陽和而雨澤降夫婦和而家道成斯時之後用藥方可彼父始悟隨即擇嫁三月後復請視之前症稍定先用逍遙散加香附青皮山梔丹皮貝母十餘劑開鬱疎肝寒熱漸止次以人參養榮湯加丹皮紅花通其血脉使心血易生容顏稍澤又用益氣養榮湯倍參朮培助脾胃增進飲食間用歸脾湯加麥冬五味遠志沙參收斂神氣寬慰性情又製參朮地黃膏服至半年精神頓復經事亦

通惟核不能全退用火針點破出核琥珀膏貼之
漸腐爲膿又兩月而得收斂餘腫三核漸針漸潰
漸斂首尾純用補脾開鬱藥調理一年始得全愈
一男子年近三十項生數核面白神勞皮癯脈數此
元氣受傷之症也先當補養氣血待根本壯實後
治其瘡隨用養榮健脾藥十餘劑未効彼以爲緩
又信方士所惑圖內消之自服斑猫巴麝之藥連
瀉十數行後致小便淋漓不已虛熱更增飲食減

外科正宗

卷之二

五十四

少又復請視形色內敗不堪調理辭而不治彼後
方悔雖請內醫強投扶助降火之藥終不應而死
一婦壯年性急夫蕩不爲家左項生核半載漸至雞
卵大堅硬如石皮外紅絲纏繞左右脈俱弦數弦
屬肝火妄動數乃脾熱之甚先用梔子清肝湯平
伐肝木五服後而脈始平又以清肝解鬱湯數服
散其鬱結次用益氣養榮湯調其氣血間服散腫
潰堅湯軟其堅腫外以琥珀膏貼之調理百日而

元氣乃復堅硬已消八九止存小核未盡彼以爲
愈止不服藥後又一載值夫賭訟未勝暴急驚恐
前腫復作兩手脈胗細而多數此陰血虧損陽火
乘之非前有餘症也又兼胸膈不利飲食無味經
水先期過多形容憔悴不澤此神傷於思慮則肉
脫意傷於憂愁則肢廢魂傷於悲表則筋掣魄傷
於喜樂則皮槁志傷於暴怒則腰脊不能俛仰以
上俱七情內損症也法當滋養氣血調和脾胃益

外科正宗

卷之二

五十五

腎清心開鬱散滯庶保無虞彼不肯信仍前欲服
散腫潰堅之藥欲灸腫上圖內消之予曰此非前
比今則不敢治也請客醫自製前藥亦灸患處併
灸肘尖此爲真氣虛而益虛邪氣實而益實後果
反加發熱自汗咳嗽頭強四肢不收灸瘡無膿血
水不絕腫亦熾盛此臟腑已損之候必不久居也
又月後傳爲氣急聲啞痰血交出而歿予嘗見庸
醫不辨虛實患者不信正理偏費服藥往往多致

不救者十有八九凡醫者患者俱當省而慎戒之

瘰癧主治方

防風解毒湯

防風解毒湯荆桔
薄荷枳殼芍蒼朮

牛子連翹草石膏
知母燈心共豈逃

治風毒瘰癧寒暑不調勞傷瘵多致手足少

陽分耳項結腫或外寒內熱痰凝氣滯者並効

防風 荆芥 桔梗 牛蒡子

連翹 甘草 石膏 薄荷

枳殼 川芎 蒼朮 知母各一錢

外科正宗

卷之二

五

水二鍾燈心二十根煎八分食後服

連翹消毒飲

連翹消毒飲陳皮
梔葛射干花粉等

牛蒡玄參芍歸
紅花連與大黃隨

治熱毒瘰癧過食炙博醇酒膏粱以致蘊熱臃

項成核或天行亢熱溼痰作腫不能轉側者効

連翹 陳皮 桔梗 玄參

黃芩 赤芍 當歸 山梔

葛根 射干 天花粉 紅花各一錢

甘草五分 大黃初起便燥者加之

水二鍾煎八分食後服有痰者加竹茹一錢

加味藿香散

加味藿香散甘桔
木苓白芷厚朴芎

青陳柴蘇半夏
夏枯草芎君當說

治氣毒瘰癧外受風邪內傷氣鬱以致頭項作

腫肩膊強痛四肢不舒寒熱如瘧及胸膈不利

藿香 甘草 桔梗 青皮

陳皮 柴胡 紫蘇 半夏

白朮 茯苓 白芷 厚朴

川芎 香附 夏枯草各等分

外科正宗

卷之二

五

薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

滋榮散堅湯

滋陰散堅四物湯
陳木升麻香附貝

甘桔參苓海粉當
紅花昆布共煎嘗

治一切瘰癧憂抑所傷氣血不足形體瘦弱潮

熱咳嗽堅硬腫痛毋分新久但未穿潰者並効

川芎 當歸 白芍 熟地

陳皮 茯苓 桔梗 白朮

香附各一錢 甘草 海粉 貝母

人參 昆布各五分 升麻 紅花各三分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服身熱加
柴胡黃芩自汗盜汗去升麻倍人參黃芪飲食
無味加藿香砂仁食而不化加山查麥芽胸膈
痞悶加澤瀉木香咳嗽痰氣不清加杏仁麥冬
口乾作渴加知母五味子睡卧不寧加黃柏遠
志棗仁驚悸健忘加茯神石菖蒲有汗惡寒加
薄荷半夏無汗惡寒加茅朮藿香女人經事不
調加玄胡索牡丹皮腹脹不寬加厚朴大腹皮

外科正宗

卷之二

五八

益氣養榮湯

益氣養榮湯木芪
芍药 桔 甘 熟地

參苓陳貝附歸宜
勞傷瘰癧大堪題

治抑鬱或勞傷氣血或四肢頸項筋縮結成累

累如貫珠者謂之筋癰此患皆由思慮太過神
氣受傷乃勞中所得者也其患或軟或硬或赤
不赤或痛不痛或日晡發熱或潰而不斂者是

人參

茯苓

陳皮

貝母

香附

當歸

川芎

黃芪

熟地

白芍

甘草

桔梗

各一
各五

白木

錢二

薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

如胸膈痞悶加枳殼木香

飲食不甘暫加厚朴蒼朮

往來寒熱加柴胡地骨皮

膿潰作渴倍參芪歸朮

膿多或清倍當歸川芎

脇下痛或痞加青皮木香

外科正宗

卷之二

五九

肌肉生遲加白蘇肉桂

痰多加半夏橘紅

口乾加麥門冬五味子

發熱加柴胡黃芩

渴不止加知母赤小豆

膿不止倍加人參黃芪當歸

潰後反痛加熟附子沉香

虛煩不睡者倍人參熟地黃遠志棗仁

苓連二陳湯 苓連二陳湯半夏 其枯連起花粉等

治痰癰生於少陽部分項側結核外皮漫腫色

紅微熱或至缺盆高骨上下發腫形長堅硬作

痛名曰馬刀初起並宜服此已成氣弱者不宜

黃芩 黃連 陳皮 茯苓

半夏 甘艸 桔梗 連翹

牛蒡子 花粉名一錢 木香分三 夏枯草錢一

薑三片水二鍾煎八分食後服渣再煎臨睡服

外科正宗 卷之二

散腫潰堅湯 散腫潰堅苓芍歸 升柴胆草葛根

治瘰癧馬刀瘰癧硬如石或在耳下或至缺盆

或在肩上或至脇下皆手足少陽經症又發於

下頰或至頰車堅而不潰或已破流膿又屬足

陽明症也此治有餘症而効多不足症而効少

黃芩八分 白芍 當歸 龍膽草

桔梗 知母酒炒 黃柏酒炒 昆布

天花粉各五分 連翹 葛根

炙甘草 黃連 三稜酒拌 廣木各三分

柴胡四分 升麻三分

水二鍾煎八分食後服臨服入酒一小杯亦効

此藥可為末煉蜜為丸桐子大每服八十九即

散腫潰堅丸治症同前臨睡食後俱白滾湯下

升麻散堅湯 升麻散堅湯甘草 莢木三稜陳桔連

治瘰癧遶頸或至頰車屬足陽明核深遠陷隱

曲肉底又屬足少陰俱作腫塊堅硬大小不

外科正宗 卷之二

升麻 甘草 莢木 三稜

陳皮 桔梗 黃連 龍膽草

葛根 川芎 白芍 夏枯草

連翹 黃芩 當歸各五分 天花粉有痰加

水二鍾煎八分食後熱服再用上藥加倍為末

蜜九菘豆大每百丸黃酒臨睡服頭不枕更妙

夏枯草湯 夏枯草湯歸木陳 桔甘生地貝母等

治瘰癧馬刀不問已潰未潰或已潰日久成漏

形體消瘦飲食不甘寒熱如瘧漸成勞瘵並効

夏枯草二錢 當歸三錢 白朮 茯苓

桔梗 陳皮 生地 柴胡

甘艸 貝母 香附 白芍各錢

白芷 紅花各三分

先用夏枯草水三碗煎至二碗濾清同藥煎至

八分食後服將藥渣同前夏枯草渣其再煎六

七分臨卧時入酒半小鍾和服宜食淡味物件

外科正宗

卷之二

三

活血化堅湯

活血化堅湯補正 芍歸貝母桔梗 花粉銀花陳皮草 乳香羌活此氏

治一切癰癤及癭瘤痰核初起未潰膿者並効

防風 赤芍 歸尾 天花粉

金銀花 貝母 川芎 皂角刺

桔梗各一錢 姜蚕 厚朴 五靈脂

陳皮 甘草 乳香 白芷稍各五分

水二鍾煎八分臨服用酒一小杯食後服

逍遙散

逍遙散當歸芍藥 白茯苓香附柴胡 牡丹皮薄荷山萸 雲片木女病思快

治婦人血虛五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心

神煩赤口燥咽乾發熱盜汗食少嗜卧及血熱

相搏月水不調臍腹作痛寒熱如瘧及治室女

血弱榮衛不調痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

當歸 白芍 茯苓 白朮

柴胡各一錢 香附八分 丹皮七分 甘草六分

薄荷 黃芩有熱加各五分

水二鍾煎八分食遠服有寒加姜三片棗二枚

外科正宗

卷之二

三

通治癰癤方

通治癰癤癰瘡陳木 柴胡芍歸白芍 苓芷藿香夏枯草 并草半夏附相

治癰癤不分新久表裏虛實及諸痰結核並効

陳皮 白朮 柴胡 桔梗

川芎 當歸 白芍 連翹

茯苓 香附醋炒 夏枯草 黃芩各一錢

藿香 半夏 白芷 甘草各五分

姜三片水二鍾煎八分入酒一小杯臨卧時服

芎歸養榮湯

芎歸養榮湯並米 參芍砂仁熟地黃 五味茯苓神丹蓮志 麥冬川芎共煎

治療癰流注及一切不足之症不作膿或不潰或已潰不斂或身體發熱惡寒肌肉消瘦飲食少思睡臥不寧盜汗自汗驚悸恍惚並皆治之

當歸身二錢 人參 黃芪 白朮

川芎 白芍 熟地各一錢 五味子

麥門冬 遠志 甘艸 茯苓各五分

牡丹皮 砂仁各三分

水二鍾姜三片棗二枚煎八分食遠服

外科正宗

卷之二

冰蠟散

冰蠟散內用田螺 龍腦 礞砂 爲細末 總將津拌患頭塗

治療癰日久堅核不消及服消藥不効者用此

點落癰核如馬刀根大而小及失榮等症忌用

大田螺五枚去壳日中線穿晒乾 白砒一錢二分

冰片一分 礞砂二分

用晒乾螺肉切片同煨熟白砒碾爲細末加礞

片再碾小罐密收凡用時先川艾炷灸核上七

壯次後灸瘡起泡以小針挑破將前藥一二層

津唾調成餅貼灸頂上用綿紙以厚糊封貼核

上勿動泄氣七日後四邊裂縫再七日其核自

落換搽玉紅膏內服補藥兼助完口此藥又治

癰癤患大蒂小及諸般高突異形難狀者並効

紫霞膏 紫霞膏品不多般 煎入麻油如紫漆 銅綠松香一處攪 百般頑症貼當安

治療癰初起未成者貼之自消已成未潰者貼

之自潰已潰核存者貼之自脫及治諸色頑瘡

癰瘡溼痰溼氣新久棒瘡疼痛不已者並用之

外科正宗

卷之二

明淨松香淨末一斤 銅綠淨末二兩

用麻油四兩銅鍋內先熬數滾滴水不散方不

松香熬化次下銅綠熬至白烟將盡其膏已成

候片時傾入磁罐凡用時湯內頓化旋攤旋貼

琥珀膏 琥珀膏內桂防歸 琥珀 松脂 硃砂 木鱉 丁木 二香 華麻子 木通 白芷 共相宜

治療癰及腋下初如梅子結腫硬強漸若連珠

不消不潰或潰膿水不絕經久不瘥漸成漏症

琥珀一兩 木通 桂心 當歸

白芷

防風

松脂

硃砂

木鱉

草麻

丁香

木香

麻油

黃丹

飛炒

四兩

先用琥珀丁香桂心硃砂木香為細末其餘為

咀浸油內七日入鍋內慢火熬至羣藥焦黃為

度絹濾淨油徐下黃丹以柳枝手攪候至膏成

滴入水中軟硬得中撥下鍋來以盆頓穩攪至

煙盡方下羣藥攪勻磁器盛之臨取少許攤貼

外科正宗

卷之二

六

大紅膏

大紅膏血 鈎銀珠 硃石 草水 硃不 硃

輕粉 南星 併石 鐵 乳香 貓骨 劫 墜

治療癰痰核結塊不分新久但未穿破者並効

南星

銀珠

血鈎

硃石

朝腦

輕粉

乳香

貓頭骨

石灰

一兩用大黃三錢切片

同炒石灰紅色去太黃

右其為細末陳米醋熬稠調藥敷核三日一換

敷後皮嫩微損者另換紫霞膏貼之其核自消

火針法

火針之法獨稱雄 破核消痰立大功

燈草桐油相協水 常頭一點破凡籠

治療癰痰核生於項間初起堅硬或如梅李結

聚不散宜用此法針之插藥易消用縫衣大針

二條將竹筋頭劈開以針雙夾縫內相離一分

許用線扎定先將桐油一盞用燈草六七根油

內排勻點着將針燒紅用手指將核捏起用針

當頂刺入四五分核大者再針數孔亦妙核內

或痰或血隨卽流出候盡以膏蓋之次日針孔

必漸作膿輕者用黃線藥插之核堅硬者用水

外科正宗

卷之二

五

蠅散糊打成條曬乾插核針孔內外以糊紙立

重封固次日其核發腫作痛不妨乃藥氣攻入

於內又至七日外自然核外裂開大縫再至七

日其核自落慈湯洗淨孔大換用玉紅膏搽入

外以膏蓋內服益氣養榮湯或十全大補湯加

香附兼戒勞動氣惱房事發物煎炒海腥等件

三品一條鎗

三品一條鎗 靈 唯 信 少 人 聞

上品錠子去十八種痔中品錠子去五漏棉花

瘦瘰氣核下品錠子治療癰疔瘡發背癰疽等症此為古之三品錠子但藥同而分兩不同治病故有分別今註一條鎗本方三品以下之症並皆用之俱各相應况又藥品簡易而不繁是曰三品一條鎗之說也凡同志者隨試而用之

明礬兩 白砒五錢 雄黃二錢 乳香一分

外科正宗

卷之二

三

頓地上一宿取出約有砒礬淨末一兩加前雄黃二錢四分乳香一錢二分共研極細厚糊調稠搓成如線條陰乾凡遇前症有孔者雜入孔內無孔者先用針放孔竅早晚插藥三次插至三日後孔大者每插十餘條插至七日患孔藥條滿足方住以後所患四邊自然裂開大縫共至十四日前後其疔核癰癤痔漏諸管自然落下隨用湯洗搽上玉紅膏虛者兼服健脾之藥

瘰癧酒藥方

治年久瘰癧結核串生滿項頑硬不穿破者服

雀鼠草半斤 忍冬藤六兩 野蓬蒿四兩 野菊花四兩

五爪龍三兩 馬鞭草一兩

上藥切碎用老酒十五斤袋貯藥懸於酒內封口煮三香為度取起水頓浸一伏時初服盡醉出汗為効已後隨便應之其酒一料病愈不發瘰癧應用方

外科正宗

卷之二

三

玉紅膏

太乙膏見腫瘍門

柴胡清肝湯

梔子清肝湯見癰疽門

荆防敗毒散見時毒門

十全大補湯見潰瘍門

歸脾湯見痔瘡門

鬚疽論第二十

夫鬚疽者乃手少陽三焦相火妄動又兼腎水不能生水或外受風熱所感但此經多氣少血肌肉相薄凡有患最難腐潰此皆起於情性急暴房慾血

虛火動肝氣凝結而成癰之初起寒熱交作頭眩
痛徹太陽甚則耳目連鬢通腫治法不可妄用針
灸必分陰陽表裏邪正虛實治之庶不有悞且如
初見瘡時多寒少熱口乾作渴好飲熱湯六脉虛
數無力又兼患上堅硬多不歇痛無潰無膿瘡根
流散此等之症乃真氣虛而邪氣實也治以托裏
為主消毒佐之如清肝養血湯托裏消毒散之類
是也又如見症時熱多寒少頭眩作痛口燥舌乾

外科正宗

卷之二

二

渴欲飲冷二便秘澁六脉沉實有力瘡亦厥腫疼
痛身體發熱易腐易膿根脚不開腫焮在外此乃
正氣實而邪氣虛也治以消毒為主托裏佐之如
梔子清肝湯鼠粘子湯之類是也大抵正氣勝則
實邪氣勝則虛必然一勝則一負邪正不並立欲
其虛而不待損而自虛矣又有未見瘡時先作渴
症或一年半載日久日重然後發為瘡疽其形色
多紫黑瘡多平陷堅硬無膿毒流耳項又兼氣味

不正形容不澤精神不明飲食不進者俱為不治

瘡疽看法

初起無口乾無寒熱飲食有味舉止尋常發瘡者順
已成瘡頭腫起根脚不散形色紅活掀痛潰膿者順
已潰膿稠色鮮紅活腫消痛止項便頭輕口和者順
潰後瘀肉易腐新肉易生瘡口易平飲食有味者順
初起瘡頭如粟頂軟不高色紫根散木痛食少者逆
已成瘡形紫黑軟陷無膿足冷身涼便利脉虛者逆

外科正宗

卷之二

三

已潰膿水清稀多生臭穢壞肉不腐新肉不生者逆
潰後飲食廢發身熱口乾不眠肉削皮腐者逆
瘡疽治法

初起掀腫堅硬內熱口乾脉數有力邪實也當利之
已成增寒壯熱四肢拘急脉浮者邪在表也宜散之
亦腫作痛血凝滯也散血清肝色黯漫腫升陽助胃
已潰堅腫不退脉細而數日晡發熱者宜滋陰健脾
肝膽怒火上攻心煩作燥腮顛紅熱者宜抑陰降火

已潰膿清腫痛尤甚虛煩食少者宜養氣血健脾胃
潰後氣血俱虛身涼脉細大便多澹者宜峻補温中
潰後不斂新肉生遲瘡口淡白膿水不止健中補脾
鬚疽治驗

一男子患此三日焮腫寒熱脉浮數以荆防敗毒散
一劑表症悉退腫痛仍作已欲作膿以托裏消毒
散膿潰又以益氣養榮湯加麥冬五味漸斂而愈
一男子患此五日頂高根若錢大形色紅活此肝經

外科正宗 卷之二

七五

溼熱為患用麻子大艾灸七壯以梔子清肝湯二
服腫勢稍止以蟾酥餅膏貼灸土更以柴胡清肝
湯加白芷黃芪天花粉數服膿潰腫消半月收斂
一男子渴疾三年寒熱半月自以為瘡鬚間忽生一
小瘡三四日外形如粟瘡平堅硬色暗不澤又兼
脉洪數而無力此水竭火旺之症也終難潰斂辭
不敢治復請醫視為易治用針刺腫上去紫血鍾
許內服解毒藥次日邊傍愈腫醫者謂腫高屬陽

易治彼家懼悅又三日膿現俱腫口禁不食用針
又刺腫上日加昏憤又復請視予曰死將及矣但
此症未病先作渴腎水已竭外形如粟裏可容谷
形色紫黑氣敗血衰脉洪無力元氣內敗如此干
涉豈有不死者彼家方信晚矣共二十一日而發
一男子腫焮五六日彼欲內消外敷涼藥內服大黃
泄氣等劑隨後焮腫雖退乃生寒熱惡心乾嘔肩
膊強強之脉數無力此內虛毒氣入裏涼藥之

外科正宗

卷之二

七五

過也東垣云瘡疽之發受之有內外之別治之有
寒温之異受之外者法當托裏以温劑攻用寒藥
攻利損傷脾胃多致內虛故外毒乘虛內襲受之
內者法當疎利以寒劑反用温劑托裏初病則寒
骨髓之毒候用温劑使毒生徹皮毛表裏通潰其
為一瘡助邪為毒若楚百倍輕則變重重則死矣
前症既出寒藥之過以托裏健中湯二服嘔吐全
止又以十全大補湯加白芷數服而原瘡漸起又

以八參養榮湯間服腐潰膿稠兩月餘瘡口收斂
 一婦人患此腫硬寒熱口乾喉痛脉洪大有力此表
 裏俱實也以防風通聖散一劑行二次前症稍退
 又一劑大行數次熱退渴止惟原瘡腫硬用銀針
 點破插入蟾酥條內服托裏消毒散漸潰膿而安
 一男子患此三四日頂高根活且無表裏之症此肝
 經溼熱為患用針挑破瘡頂以蟾酥餅蓋貼內服
 加味逍遙散加皂角針數服頭出微膿根腫亦消

外科正宗 卷之二

鬢疽主治方

柴胡清肝湯 柴胡清肝芍芍歸 黃芩梔子地黃附 防風牛子天花粉 甘草連翹一處宜

治鬢疽初起未成者毋論陰陽表裏俱可服之

川芎 當歸 白芍 生地黃

柴胡 黃芩 山梔 天花粉

防風 牛蒡子 連翹 甘草節 各一錢

水二鍾煎八分食遠服

鼠粘子湯 鼠粘子湯其粘歸 赤芍連翹地骨皮 玄參麥冬天花粉 敗風大黃不可道

治鬢疽初起熱多寒少頭疼作痛口燥咽乾渴
 常飲冷二便秘澀六脉沉實有力煩悶疼痛者

鼠粘子 桔梗 當歸 甘草梢

赤芍 連翹 玄參 地骨皮

防風 天花粉 木通 各一錢 大黃 炒二錢

水二鍾煎八分食前服渣再煎服

加味逍遙散 加味逍遙白木苓 紅花丹芍柴胡陳 當歸梔子天花粉 甘草羚羊妙更奇

治鬢疽七日以上根盤深硬色紫喉痛者宜服

外科正宗 卷之二

白朮 茯苓 牡丹皮 白芍

柴胡 陳皮 當歸 山梔

貝母 天花粉 各八分 甘草

紅花 羚羊角 各五分

水二鍾淡竹葉二十片煎八分食後服

梔子清肝湯 梔子清肝湯牛子 柴芩芍芍石當歸 黃連牛草丹皮等 用水同煎一處服

治少陽經虛肝火風熱上攻遂成鬢疽痛連額

項胸乳太陽等處或寒熱腫甚胸滿口苦舌乾

牛蒡子 柴胡 川芎 白芍

石膏 當歸 山梔 牡丹皮各一錢

黃芩 黃連 甘草各五分

水二鍾煎八分食後服

清肝解鬱湯 清肝解鬱湯歸芍 芩 木 梔 柴 貝 母 隨 人 參 半 夏 丹 皮 附 川 芎 熟 地 草 陳 皮

治暴怒傷肝憂思鬱結致肝火妄動發為贅疽

頭眩痛徹太陽胸膈痞連兩脇嘔酸水皆服之

當歸 白芍 茯苓 白朮

外科正宗 卷之二

貝母 熟地 山梔各一錢 半夏

人參 柴胡 丹皮 陳皮

香附 川芎各六分 甘草四分

水二鍾姜三片煎八分食遠服

參苓內托散 參苓內托散歸芪 芍 苓 陳 皮 白 朮 隨 山 藥 熟 地 仙 官 桂 附 子 甘 丹 地 骨 皮

治贅疽已成堅而不潰潰而不斂氣血俱虛身

涼脉細飲食少思口淡無味及形體消瘦者服

歸身 黃芪 川芎 白芍

陳皮 白朮 山藥 熟地

茯苓 人參各一錢 甘草 肉桂

熟附子 牡丹皮 地骨皮各五分

姜三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

保安萬靈丹 見 蘇 直 門

治贅疽初起增寒壯熱頭眩惡心四肢拘急者

贅疽應用方

托裏消毒散 見 腫 瘍 門 荆防敗毒散 見 時 疫 門

外科正宗 卷之二

蟾酥餅子 見 疔 瘡 門 人參養榮湯

托裏建中湯 益氣養榮湯

十全大補湯 俱 見 癰 疽 潰 瘍 門 防風通聖散 見 時 疫 門

咽喉論第二十一

夫咽喉雖屬於肺然所致有不同者自由虛火實火

之分緊喉慢喉之說又咽為心肺肝腎呼吸之門

飲食聲音吐納之道此關係一身害人迅速故曰

走馬看咽喉不待少頃也假如虛火者色淡微腫

脈亦細微小便清白大便自利此因思慮過多中
氣不足脾氣不能中護虛火易至上炎此恙先從
咽嗑乾燥飲食妨碍咳吐痰涎呼吸不利斑生苔
蘚壘若蝦皮有如茅艸常刺喉中又如硬物噎於
咽下嘔吐酸水噦出甜涎甚則舌上白胎唇生瘰
色聲音雌啞喘急多痰以上等症皆出於虛火元
氣不足中來治此不可悞投涼藥上午痛者屬氣
虛補中益氣湯加麥冬五味子牛子玄參午後痛
者屬陰虛四物湯加黃柏知母桔梗玄參如服不

外科正宗

卷之二

三六

効者必加姜附以爲引導之用亦爲佐治之法也
寔火者過飲醇酒縱食膏粱疊禱重衾舖食辛烈
多致熱積於中久則火動痰生發爲咽腫甚者風
痰上壅咽門閉塞少頃湯水不入聲音不出此爲
喉閉緊喉風是也用藥不及事先用針刺喉間發
泄毒血隨用桐油錢雞翎探吐稠痰務使痰毒出
盡咽門得鬆湯藥可入語聲得出乃止內服清咽

利膈湯疎利餘毒如牙開緊閉難入必當先刺少
商出血其閉自開如針刺探吐無痰聲如拽錐鼻
掀痰喘湯水不入語聲不出者真死候也又有喉
癰喉痺乳蛾上膈癰等症其患雖腫而咽門半塞
半開其病雖凶而喉道又寬又腫此皆標病雖重
無妨當用金鎖匙吐出痰涎利膈湯推動積熱膿
脹痛者開之損而痛者益之其患自安凡喉閉不
刺血喉風不倒痰喉癰不放膿喉痺乳蛾不針烙

外科正宗

卷之二

三七

此皆非法又有痰火勞瘵咳傷咽痛者無法可治
咽喉看法

初起紅色腫痛語聲清明亦無表裏之症相兼者輕
已成腫痛咽喉半閉半開咯吐痰涎飲食稍進者順
咽喉腫閉牙關緊急言語不清痰壅氣急聲小者險
咽喉驟閉痰涎壅塞口噤不開探吐不出聲喘者死
時瘡之後毒結咽間腫痛腐爛吐納不堪聲啞者重
久嗽痰火虛陽上攻咳傷咽痛但見聲嘶面紅者死

咽喉治法

初起腫痛寒熱交作頭疼拘急者邪在表也宜發散
 初起腫痛發熱脈有力而便秘者邪在內也宜下之
 腫痛寒熱口乾作渴脈洪大而有力者宜發表攻裏
 咽喉腫痛痰涎壅甚而紅口乾邪在上也宜探吐之
 痰閉痰涎壅塞氣急口噤難開先刺少商後行吐法
 已成脹痛咽喉塗塞湯水不入膿已成也宜急針之
 腫痛微紅脈虛無力午後痛者屬陰虛宜滋陰降火
 腫痛色白咯吐多涎上午痛者屬陽虛宜補中健脾

咽喉治驗

一男子咽喉腫痛發寒體倦脈弦有力此邪在表以
 荊防敗毒散加牛子玄參一劑表症已退腫痛仍
 作又以玄參解毒湯二劑腫痛減半又二劑而安
 一男子咽喉腫痛痰涎壅盛用金鎖匙先吐稠痰清
 咽利膈湯推蕩積熱腫痛稍減惟色紅甚此火熱
 也又以黃連解毒湯加桔梗二劑紅腫亦退而安

牙疳疔毒

卷之二

全一

一男子素飲火酒一時咽喉腫閉口噤舌強痰涎壅
 塞勢頗危急用針先刺少商二穴口噤方開以桐
 油餞雞翎探吐稠痰數碗語聲方出仍用針刺腫
 上出紫血鍾許溫湯漱淨冰硼散搽之以涼膈散
 加芒硝天花粉利去積熱又以連翹散二劑而安
 一婦人肥甚暑熱咽間腫痛痰涎上壅語聲不出甚
 危先用針刺毒血次以金鎖匙吐去稠痰五六碗
 以清咽利膈湯一服腫痛少減去硝黃又服而安
 一男子勞甚咽喉腫痛自服清咽利膈藥不應膠之
 脈細而虛此勞傷虛火之症朝以補中益氣湯加
 麥冬五味子桔梗玄參晚以四物湯加黃柏知母
 炒黑乾薑服加童便不數日腫痛亦消疲回咽愈
 一婦人咽痛微腫色白吐嚥不利脰之脈亦細微此
 中氣不足虛火假症也用理中湯三服其寒頓止
 又以補中益氣湯加炒黃柏知母數服再不復作
 一男子腫痛日甚服清咽利膈藥不應必欲作膿以

防風通聖散去硝黃二服喉膿脹痛而下針便愈

咽喉主治方

清咽利膈湯

清咽利膈湯翹苓北桔荆防梔薄荷銀大黃牛子黃連等

治積熱咽喉腫痛痰涎壅盛及乳蛾喉痺喉癰

重舌木舌或胸膈不利煩躁飲冷大便秘結等

連翹

黃芩

甘草

桔梗

荆芥

防風

山梔

薄荷

金銀花

黃連

牛蒡子

玄參

外科正宗

卷之二

全三

大黃

朴硝

各二錢

水二鍾煎八分食遠服

玄參解毒湯

玄參解毒湯梔子甘草黃芩桔梗葛根生地薄荷芥竹葉燈心共得宜

治咽喉腫痛已經吐下飲食不利及餘腫不清

玄參

山梔

甘草

黃芩

桔梗

葛根

生地

荆芥

各一錢

水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎八分食後服

連翹散

連翹散肉桂根芥門冬牛子併甘草

赤芍山梔桔梗升木通加上効如神

治積飲停痰蘊熱膈上以致咽喉腫痛胸膈不利咳吐痰涎舌乾口燥無表裏症相兼者服此

連翹

葛根

黃芩

赤芍

山梔

桔梗

升麻

麥門冬

牛蒡子

甘草

木通

各八分

水二鍾竹葉二十片煎八分食遠服

涼膈散

涼膈散中荆芥防薄荷粉桔連大黃玄參石膏牛蒡子貝母山梔總在藏

治咽喉腫痛痰涎壅甚膈間有火大便秘澁

外科正宗

卷之二

全三

防風

荆芥

桔梗

山梔

玄參

石膏

薄荷

黃連

天花粉

牛蒡子

貝母

大黃

各等分

水二鍾煎八分不拘時服

金鎖匙

金鎖匙中川焰硝姜蚕片蠟雄黃德加上礞砂効更高

治喉閉纏喉風痰涎壅塞口噤不開湯水不下

焰硝

一兩

礞砂

五錢

片腦

一分

白姜蠟

一錢

雄黃

二錢

各另研為末和勻以竹筒吹患處痰涎即出如

痰雖出腫痛仍不消急針患處去惡血服前藥

理中湯

理中湯內藥四般 甘草乾姜白朮攪
加上人參仔細看 虛陽之火立時安

治中氣不足虛火上攻以致咽間乾燥作痛吐

嚥妨礙及脾胃不健食少作嘔肚腹陰疼等症

人參

錢一分 甘草 錢八分 乾薑 錢五分 白朮 錢二分

水二鍾煎八分食遠服

桐油錢

桐油錢今桐油錢 治的喉風如神見
探吐頑痰日照霜 回生起死真堪羨

外科正宗

卷之二

治喉風喉閉其症先兩日胸膈氣急呼吸短促

驀然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治

先用溫湯半碗加入桐油三四匙攪勻用硬鷄

翎蘸油探入喉中連探四五次其痰壅出再探

再吐以人麩躑聲高為度後服清咽利膈之藥

治喉烏龍散

烏龍散只一品藥 十八喉風德堪憐
開關利膈効如神 虛火定火要斟酌

歌 十八喉風各有名 原來總是三根因

曰 子孫代代宜珍惜 誓不輕傳與世人

用猪牙皂角七條去皮弦為齋末水一鍾煎五

分人人乳三匙冷服即時非吐即瀉治咽喉腫

痛痰涎壅盛喉風喉癰乳蛾等症並効惟纏喉

風牙關緊閉者不可與恐痰上出而口不開壅

塞無路而出故也除此皆効又久病咽痛忌用

神効吹喉散

神効吹喉散薄荷 姜蚕青黛朴硝利
白礬火硝黃連多 加上硼砂病自痊

治纏喉風閉塞及乳蛾喉痺重舌木舌等症効

薄荷

姜蚕

青黛

朴硝

外科正宗

卷之二

白礬

火硝

黃連

硼砂

上藥各為細末臘月初一日取雄猪胆七八個

倒出胆汁用小半和上藥拌勻復灌胆殼以線

扎頭胆外用青缸紙包裹將地掘一孔濶深一

尺上用竹竿懸空橫吊上用板鋪用泥密蓋候

至立春日出取出挂風處陰乾去胆皮青紙礬確

密收每藥一兩加冰片三分同研極細吹患上

神効歌曰此法端的道神聖萬兩黃金方不傳

少陰甘桔湯

加味甘桔湯黃芩柴胡各一錢五分

治少陰咽痛頭眩脉沉細而身猶熱者宜服之

桔梗二錢 甘草一錢 陳皮 川芎

黃芩 柴胡 玄參各六分 羌活

升麻各四分

水二鍾葱白一根煎八分不拘時服

清音喻化丸

清音喻化丸阿膠知母生熟地烏梅人乳黃柏各一錢

治肺氣受傷聲音雌啞或久嗽咳傷聲啞亦宜

外科正宗

卷之二

公六

訶子 真阿膠 天門冬鹽水浸 知母各五錢

麥門冬去心 白茯苓 黃柏炙 當歸

生地 熟地各一兩 人參三錢 烏梅肉十五錢

人乳 牛乳 梨汁各一錢 蒸梨膏

共為細末和入前膏加煉蜜搗成丸如鷄頭實

大每用一九仰臥喻化日川三九如收作小丸

每服一錢訶子煎湯或蘿蔔湯送下亦可取効

治失音

暴失音方術按油再加白蜜兩相長慢火煎至稠食佳每日三匙不用藥

公猪板油一斤入鍋先煉成油濾去渣入白蜜

一斤再煉少頃絹濾淨磁器內冷定成膏不時

挑服一茶匙其音漸清無疾時亦可常服潤肺

喻化丸 喻化丸中用白礬胆礬棗肉丸成就吐嚔艱難第一方

治梅核氣乃痰氣結於喉中嚔之不下吐之不

出如毛草常刺作痒新則吐酸妨礙久成閉塞

膽礬 礬砂 明礬 牙皂

雄黃

外科正宗

卷之二

公三

各等分為末紅棗煮爛取肉為丸芡實大空心

喻化一九溫黃酒一杯過口內服蘇子降氣湯

蘇子降氣湯 蘇子降氣湯厚朴陳皮半夏共前胡官桂相兼甘草用生薑為引効甚

治虛陽上攻氣不升降致結患咽嗌痰涎壅塞

蘇子一錢五分 厚朴 陳皮 半夏

前胡 官桂各一錢 甘草五分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

水礬散 水礬散効實堪誇玄明粉再共礬砂水片相兼佐嗽喉口齒病無他

治咽喉口齒新久腫痛及久嗽痰火咽啞作痛

冰片五分 硃砂六分 玄明粉法注未卷 硼砂各五分

共研極細末吹搽患上甚日目搽五六次最効

咽喉應用方

防風通聖散

荆防敗毒散見時毒門

補中益氣湯

四物湯見癰疽潰瘍門

黃連解毒湯見疔瘡門

少商穴在手掌外側去爪甲角二分是穴後針刺血

時毒論第二十二

外科正宗

卷之二

八八

夫時毒者天行時氣之病也春當溫而反寒夏宜熱

而反涼秋當涼而反熱冬宜寒而反溫此四時不

正之氣感於人發成斯疾也自有陰陽表裏寒熱

虛實分治初起與風寒相類惟頭面耳項發腫為

真其患既得寒熱交作體強頭疼脈浮緊數者為

邪在表以荆防敗毒散或萬靈丹發汗以散之如

兩目鼻面漸次傳腫者乃正陽明受病其患掀腫

發熱便秘口乾多熱少寒脈數有力為邪在裏五

利大黃湯四順清涼飲下之又頭角兩耳前後結

腫者乃手少陽經受之其患耳鳴筋痛寒熱嘔吐

口苦咽乾煩躁時甚當以知母石膏湯小柴胡湯

和之通用防風通聖散加牛子玄參解毒攻裏勞

役凶荒沿門閭巷傳染者普濟消毒飲藿香正氣

散以安之表裏俱解腫尚不消宜砭去惡血腫熱

甚者如意金黃散敷之微熱不紅堅硬者冲和膏

選而用之自後仍不消者必欲作膿宜托裏消毒

外科正宗

卷之二

八八

散加白芷皂角針托之已潰體倦食少者補中益

氣湯膿穢脾虛食而嘔吐者香砂六君子湯潰而

不斂者十全大補湯又有毒中三陽自項之以上

俱發腫者光如水色雙目合縫唇似猪形口角流

涎腫不消潰聲音不出飲食不入咽喉腫閉牙關

難開破流臭水穢氣連綿不絕者犯此俱為不治

時毒看法

初起寒熱交作頭面一處作腫紅赤發熱疼痛者易

已成高腫發熱疼痛有時語聲清明湯藥易入者輕
已潰膿稠堅腫漸消疼痛漸減飲食漸進身溫者吉
潰後膿水漸止腫退肌寬神彩精寧睡臥安穩者順
初起多寒少熱頭面耳項俱腫光如水晶不熱者險
已成漫腫無頭牙關緊閉湯水不入聲音不出者逆
已潰膿水清稀氣味敗臭腫痛不除如尸發胖者死
潰後臭水淋漓腫不知痛手足多冷常出謔言者死

時毒治法

外科正宗

卷之二

九十一

寒熱交作頭眩體痛六脉浮緊邪在表也宜汗散之
頭面赤腫作痛口燥咽乾大便秘實邪在裏也下之
外有寒熱內亦口乾脉弦有力表裏俱實發表攻裏
表裏俱解腫痛仍不消者乃瘀血凝滯宜砭去惡血
砭血之後腫痛仍作不消者已欲作膿宜托膿健脾
腫痛日久而脹痛者已有膿急針之更兼補托脾胃
潰後腫痛不減膿清腥穢脾胃弱也更宜溫中健脾
仇年時毒流行傳染者忌用攻發當和解宜養正氣

時毒治驗

一男子耳項腫痛發寒熱脉浮數以荆防敗毒散一劑寒退熱存又以連翹消毒飲一劑便行三次內熱頓退餘腫不消本方去大黃加川芎數劑而愈
一男子先發寒熱次日頭面俱腫又二日口噤湯水不入脰之脉洪數而有力此表裏俱實也又咽喉妨礙湯藥難下先用針刺咽間去惡血鍾許牙關稍開以防風通聖散一劑徐徐服之便去三四次

外科正宗

卷之二

九十二

腫上砭去惡血以金黃散敷之次日腫勢稍退又以普濟消毒飲二劑面腫漸消惟兩耳下堅腫不退此必作膿又以托裏消毒散數服候膿熟而針之次以十全大補湯去肉桂加陳皮十餘劑而愈
一男子牙根腫痛次傳腮項俱腫頓生寒熱此陽明溼熱上攻用荆防敗毒散加石膏一劑寒熱頓退惟腮腫不消以針刺牙根腫上出毒血以冰硼散搽之外敷真君妙貼散內服牛蒡子湯數服而愈

一男子冬月耳面赤腫發熱口乾脉洪實而便秘此

三陽蘊熱症也必捨時從症治之以五利大黃湯

一劑便行二次赤腫稍退內熱稍疎又以升麻解

毒湯二服腫亦消而病愈此為用寒遠寒之意也

一婦人冬月面腫咽痛口噤難開脉脉洪數有力又

見房中煖氣如燠此因爐火盛也以黃連解毒湯

加玄參一劑次日腫消咽利又用二劑其疾痊愈

一男子勞甚鬢間腫硬肉色不變予曰勞傷氣血溼

外科正宗

卷之二

九三

痰凝滯之症與夫外感時毒不同又脉細數而

無力為內傷損病治當養氣血調經理勞續損

治之彼欲內消自服仙方活命飲二服腫不覺消

脾胃已損又請一醫乃行政利復損臟腑數日後

飲食不進便泄不止腫硬愈堅痰涎愈甚復請視

之辭不可治予曰凡瘡理病有主未治有權宜此

病初起肉色不變者血不足也堅硬不熱者脾胃

弱也脉細數而無力正氣衰也豈可用前存餘之

藥以攻不足之病後又強投溫中補劑不應而死

時毒主治方

荆防敗毒散 荆防敗毒散人參 羌獨前柴芎桔梗 茯苓枳殼同甘草 寒甚加蔥止得名

治時毒初起頭痠惡寒腮項腫痛脉浮者服之

荆芥 防風 羌活 獨活

前胡 柴胡 川芎 桔梗

茯苓 枳殼 甘草 人參 各五分

姜三片水二鍾煎八分食遠服寒甚加葱三枝

外科正宗

卷之二

九三

五利大黃湯 五利大黃湯黃芩 升麻梔子枳殼 時毒痲腫大便秘 服之敢取即安寧

治時毒痲腫赤痛煩渴便秘脉實有力者服之

大黃 黃芩 升麻 芒硝 各二錢

梔子 各二錢

水二鍾煎八分空心服未利者渣再煎服

連翹消毒飲 連翹消毒飲芎歸 赤芍牛蒡薄荷 黃芩花粉枳殼甘草 枳殼升麻其所位

治時毒表裏二症俱罷餘腫不消疼痛不退者

連翹 川芎 當歸 赤芍藥

牛蒡子 薄荷 黃芩 天花粉

甘草 枳殼 桔梗 升麻

水二鍾煎八分食後服使燥者加酒炒大黃

防風通聖散 防風通聖將軍方 薄荷 羌活 歸 草 朴 硝 桔梗 梔 朮 白 木 荆 芥 麻 黃 滑 石 羔

治時毒惡寒發熱煩躁口乾表裏脉症俱實者

防風 白芍 薄荷 川芎

桔梗 山梔 黃芩 白朮

當歸 連翹 荆芥 麻黃

外科正宗 卷之二 北

滑石 石膏 甘草 芒硝

大黃 酒炒 二錢

水二鍾煎八分空心温服

普濟消毒飲 普濟消毒飲 升麻 柴胡 黃芩 連翹 薄荷 梔 朮 白 朮 荆 芥 麻 黃 滑 石 羔

治時毒疫癘初覺增寒發熱肢體沉重次傳頭

面作腫或咽喉不利舌乾口燥煩渴不寧者服

黃芩 黃連 人參 陳皮

玄參 甘草 柴胡 桔梗

連翹 牛蒡子 馬勃 板藍根

升麻 姜蚕

水二鍾煎八分食後服如大便燥加酒煨大黃

一錢或二錢以利為度腫勢甚者宜砭去惡血

通氣散 通氣散內用玄胡 羊躑躅花與藜蘆 川芎 牙皂共為末 然於鼻內噴無危

治時毒焮腫疼痛咽喉不利語言不爽者用之

玄胡索 川芎 牙皂角

藜蘆 羊躑躅花

外科正宗 卷之二 九

為細末用紙捲蘸藥少許絛于鼻內取嚏為効

托裏消毒散 見腫 癰門

治時毒表裏俱解腫尚不退欲其作膿者服之

牛蒡子湯 牛蒡子湯用葛根 還將管仲共相呈 江西豆豉同甘草 煎嘗時毒可安寧

治時毒熱甚腫痛脉浮數而無力者宜服之

葛根 管仲 甘草 江西豆豉

牛蒡子 研各二錢

水二鍾煎八分食後服

十全大補湯 見潰瘍門

治時毒潰後膿水清稀形容消瘦脾胃虛弱飲食減少虛熱不睡自汗盜汗及不收斂者服之

時毒應用方

金黃散 見腫瘍門

黃連解毒湯 見疥癩門

冰硼散 見咽喉門

升麻解毒湯 見楊梅瘡門

真君妙貼散 見腫瘍門

瘦瘡論第二十三

外科正宗 卷之十一

九六

夫人生瘦瘡之症非陰陽正氣結腫乃五臟瘀血濁氣痰滯而成瘦者陽也色紅而高突或蒂小而下垂瘡者陰也色白而漫腫亦無痒痛人所不覺薛立齋分別甚詳肝統筋怒動肝火血燥筋攣曰筋痛心主血暴急太甚火旺逼血沸騰復被外邪所搏而腫曰血瘡脾主肌肉鬱結傷脾肌肉消薄土氣不行逆於肉裏而為腫曰肉瘡肺主氣勞傷元氣膜理不密外寒搏而為腫曰氣瘡腎主骨恣慾

傷腎腎火鬱遏骨無榮養而為腫曰骨瘡予曰筋

瘡者堅而色紫壘壘青筋盤曲甚者結若蚯蚓治

當清肝解鬱養血舒筋清肝蘆薈丸是也血痛者

微紫微紅軟硬間雜皮膚隱隱纏若紅絲擦破血

流禁之不佳治當養血涼血抑火滋陰安斂心神

調和血脉芩連二母丸是也肉瘡者軟若綿硬似

饅皮色不變不緊不寬終年只似癩肝然治當理

脾寬中疎通戊土開鬱行痰調理飲食加味歸脾

外科正宗 卷之二

九七

丸是也氣瘡者軟而不堅皮色如故或消或長無熱無寒治當清肺氣調經脈理勞傷和榮衛通氣散堅丸是也骨瘡者形色紫黑堅硬如石疙瘡高起推之不移昂昂堅貼於骨治當補腎氣養血行瘀散腫破堅利竅調元腎氣丸是也此瘡之五名治瘡之五法惟在此也又觀立齋云筋骨呈露曰筋瘡赤脉交結曰血瘡皮色不變曰肉瘡隨憂喜消長曰氣瘡堅硬不可移曰石瘡此瘡之五名也

通治癭瘤初起元氣實者海藻玉壺湯六軍丸久
而元氣虛者琥珀黑龍丹十全流氣飲選服此藥
自然縮小消磨切不可輕用針刀掘破出血不止
多致立危久則膿血崩潰滲漏不已終致傷人又
一種粉瘤紅粉色多生耳項前後亦有生於下體
者全是痰氣凝結而成宜披針破去脂粉以三品
一條鎗插入數次以淨內膜自愈又一種黑砂瘤
多生臂腿腫突大小不一以手攢起內有黑色是

外科正宗

卷之二

九六

也亦用針刺內出黑砂有聲軟硬不一又一種髮
瘤多生耳後髮下寸許軟小高突按之不痛亦針
之粉髮齊出又一種蛔虫瘡生於腋下又一種疽
瘡連生肩膊詳在後治驗中予觀古又有風瘡矣
但其形狀之異皆五臟溼熱邪火濁氣瘀血各感
而成此非正病也以上數瘡皆親手治驗非謬也
癭瘤看法

初起紅色光亮微熱微痛根脚浮淺不堅實者為易

已成紅赤高腫作熱焮痛頂破皮穿膿潰腫消者易
已潰膿稠色鮮根脚縮小內肉漸生外皮漸緊者順
潰後氣體平和飲食如故腫消痛止口平收斂者順
初起肉色不變寒熱漸生根脚散漫時或陰痛者險
已成堅硬如石舉動牽強咳嗽生痰皮寒食少者逆
已潰無膿惟流血水腫不消痛不止脾氣衰弱者逆
破後血水不止腫硬更增敗腐不脫凝氣惡心者死

癭瘤治法

外科正宗

卷之二

九七

初起自無表裏之症相兼但結成形者宜行散氣血
已成無痛無痒或軟或硬色白者痰聚也行痰順氣
已成色紅堅硬漸大微痒微疼者補腎氣活血散堅
形如茄蒂瘡大下垂者用藥點其蒂茄落生肌收斂
已被流膿不止瘡仍不消宜健脾胃為主佐以化堅
已潰出血不常瘡口開泛者宜養血涼血佐以清肝
潰後瘡腫漸消脾胃不能收斂者補腎氣兼助脾胃

癭瘤治驗

一男子臀瘡五年形如覆瓿按之隱隱黑色此黑粉瘡也以針破之按出黑砂兼黑粉共約碗許用三品一條鎗插入患內十餘日每次捺出黑膜其痛漸消內服十全大補湯健脾胃養氣血月餘而愈

一男子腮上生瘡半年形若覆桃皮色不變按之微紅此粉瘤也針破之捺去脂粉插前藥半月而愈

一義烏兵士肩膊下連生小瘡五枚三月餘漸發痒異狀以手捫之內則噲噲攻動予視之內動果如

外科正宗

卷之二

一百

蝦鞠此必有異虫以針破其一枚先出紅水其匙少頃攻出黑嘴粉紅虫一條形如蛆樣長六七分又破一枚依然如是其人漸覺昏暈此泄氣之過也餘瘡停止服補中益氣湯數劑外以膏蓋又五六日患者方健漸破之仍以補藥十餘服而愈

一婦人併一女子耳後髮際下一寸各生一瘡半年餘漸漸而大此乃粉瘤用針破之先出脂粉後出頭髮數根長約二尺餘齊根剪斷出血微許俱用

一婦人腰間生一肉瘡三年餘方漸微痛一日潰後出小蛔三條長約五寸置溫湯中遊動半時方息其時患者形體衰弱而黃肌瘦口乾發熱朝以八味丸午用人參養榮湯服至百日外元氣漸醒又百日其口方收予意度之其蛔乃經絡氣血所化

一婦人氣沖穴生瘡紅紫堅硬乃血瘡也請視之心肝二脉俱已洪數其患得之心氣鬱結肝氣受傷

外科正宗

卷之二

一百

之故辭不可治後請京師明公醫治其時頭已穿潰鎗強投補托化堅涼血等劑日潰日爛終至不應破經兩月一旦湧出紫血盆許隨即身亡後人問曰何以致此予曰心脉洪數心火旺也肝脉弦數肝氣傷也火旺逼血妄行肝氣傷不能藏血後破之必出血不止多致危亡預辭不治者此意也

瘦瘡主治方

清肝蘆薈丸 清肝蘆薈丸 芩芍 昆布 青連 皂地黃 海粉 還兼 甘 坤節 清 歸 加 上 共 成 方

治惱怒傷肝致肝氣鬱結為癥其堅硬色紫壘

壘青筋結若蚯蚓遇喜則安遇怒則痛者服之

川芎 當歸 白芍各二兩 生地酒浸搗膏三兩

青皮 蘆薈 昆布 海粉

甘艸節 牙皂 黃連各五錢

右為末神麩糊為丸如梧桐子大每服八十九

白滾湯量病上下食前後服之

芥連二母丸芥連二母丸芍藥 熟地當歸羚羊角 蒲黃生地與骨皮 甘草栢葉同丸服

外科正宗 卷之二 頁一

治心火妄動逼血沸騰外受寒涼結為血瘤其

患微紫微紅軟硬間雜皮膚隱隱纏如紅絲皮

破血流禁之不佳者宜服

黃連 黃芩 知母 貝母

川芎 當歸 白芍 生地

熟地 蒲黃 羚羊角 地骨皮各等分

甘草減半 右為末栢葉煎湯打寒食麩為丸如桐子大

每服七十九燈心湯送下或作煎劑服之亦効

順氣歸脾丸順氣歸脾湯貝母 烏附芪陳木茯苓 棗仁遠志人參等 木香甘草合散靈

治思慮傷脾致脾氣鬱結乃生肉癥軟如綿腫

似侵脾氣虛弱日久漸大或微疼或不疼者服

陳皮 貝母 香附 烏藥

當歸 白朮 茯苓 黃芪

酸棗仁 遠志 人參各一兩 木香

甘草炙各二錢

外科正宗 卷之二 頁三

右為末合歡樹根皮四兩煎湯煮老米糊丸如

桐子大每服六十九食遠白滾湯送下

通氣散堅丸通氣散堅丸半夏 陳貝芩歸粉草芥 香附栢萸參海藻 南星枳實共黃芩

治憂鬱傷肺致氣濁而不清聚結為癥色白不

赤軟而不堅由陰陽失度隨喜怒消長者宜服

陳皮 半夏 茯苓 甘草

石菖蒲 枳實炒 人參 膽南星

天花粉 桔梗 川芎 當歸

貝母 香附 海藻 黃芩 酒炒各等分

右為末荷葉煎湯跌為丸寒豆大每服一錢食

遠燈心二十根姜三片泡湯送下

調元腎氣丸 調元腎氣丸參地 山葉丹歸黃澤苓 麥冬龍骨香砂楮 骨皮知母効如神

治房慾勞傷憂恐損腎致腎氣弱而骨無榮養

遂生骨瘡其患堅硬如石形色或紫或不紫推

之不移堅貼於骨形體日漸衰瘦氣血不榮皮

膚枯槁甚者寒熱交作飲食無味舉動艱辛脚

外科正宗 卷之二 百五

膝無力者並服之

淮生地 酒煮搗膏四兩 山萸肉 山藥

牡丹皮 白苓 各二兩 人參 當歸身

澤瀉 麥門冬 各三錢 龍骨 地骨皮 各一兩

木香 砂仁 各三錢 黃柏 鹽水炒 知母 童便炒

右為末鹿角膠四兩老酒化稠加蜜四兩同煎

滴水成珠和藥為丸如桐子大每服八十九空

心溫酒送下忌白蘿蔔火酒房事

海藻玉壺湯 海藻玉壺湯青陳 薤貝芩歸昆布 半夏獨活併甘草 海帶煎來効有靈

治瘰癧初起或腫或硬或赤不赤但未破者服

海藻 貝母 陳皮 昆布

青皮 川芎 當歸 半夏

連翹 甘草節 獨活 各一錢 海帶 五分

水二鍾煎八分量病上下食前後服之凡服此

門藥餌先斷厚味大葷次宜絕慾虛心者為妙

活血散癭湯 活血散癭湯芍歸 青陳芩半地黃隨 參苓昆布丹皮草 紅花肉桂木香催

外科正宗 卷之二 百五

治瘰癧已成日久漸大無痛無痒氣血虛弱者

白芍 當歸 陳皮 川芎

半夏 熟地 人參 茯苓

丹皮 各一錢 紅花 昆布 木香

甘草 節各五分 青皮 肉桂 各三分

水二鍾煎八分量病上下服後飲酒一小杯

六軍丸 六軍丸內用蜈蚣 全蝎姜蚕蟬脫同 夜明砂與穿山甲 諸腫瘰癧可竟効

治瘰癧已成未潰者不論年月新久並宜服之

蜈蚣去頭 蟬脫 蝮蝎 姜蠶炒去絲

儀明砂 穿山甲

以上等分爲細末神麩糊爲丸粟米大硃砂爲

衣每服三分食遠酒下忌大葷煎炒日漸可消

枯瘤方

枯瘤方用白砒 黃丹 輕粉 雄黃 硃砂 乳香 沒藥 珊瑚 等 斑貓 田螺 米 粥 調

治瘤初起成形未破者及根蒂小而不散者用

白砒 硃砂 黃丹 輕粉

雄黃 乳香 沒藥 珊瑚各一錢

外科正宗

卷之二

頁八

斑貓二十個 田螺大者去壳三枚

共研極細糯米粥調安捏作小碁子樣曝乾先

灸瘤頂三炷以藥餅貼之上用黃栢末水調蓋

敷藥餅候十日外其瘤自然枯落次用欵口藥

秘傳欵口藥

秘傳欵口藥膏血 輕粉 龍骨 海螵蛸 象皮 乳香 各等分 雞子 熬油 一 處 調

治瘰癧枯藥落後用此搽貼自然生肌完口

血劔 輕粉 龍骨 海螵蛸

象皮 乳香各一錢 雞蛋十五枚煮熟用黃熬油一小鍾

以上各等細末共再研和入雞蛋油內攪勻每

日早晚甘草湯洗淨患上雞翎蘸塗膏藥蓋貼

琥珀黑龍丹琥珀黑龍丹 海帶 南星 血劔 五靈脂 海藻 木香 併 京墨 麝香 加上 芎藭 隨

治五癭六瘤不論新久但未穿破者並宜服之

琥珀兩 血劔兩 京墨 五靈脂炒

海帶 海藻 南星姜汁拌炒 各五錢

木香三錢 麝香一錢

以上各爲細末和勻再研煉蜜丸一錢重金箔

外科正宗

卷之二

頁八

爲衣晒乾密收每用一丸熱酒一杯量病上下

食前後化服如患在下部服後隨用美膳壓之

十全流氣飲十全流氣飲 陳皮 赤茯苓 皮 香附 隨 木香 烏藥 芎藭 芍 甘草 同煎 効 可 奇

治憂鬱傷肝思慮傷脾致脾氣不行逆於肉裏

乃生氣瘦肉瘤皮色不變日久漸大宜服此藥

陳皮 赤茯苓 烏藥 川芎

當歸 白芍各一錢 香附八分 青皮六分

甘草五分 木香三分

薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服
瘦瘠應用方

三品一條鎗 見痔瘡門

人參養榮湯 見瘰癧門

補中益氣湯

八味丸

十全大補湯 俱見瘰癧門

寒食麵 註末

肺癰論第二十四

夫肺癰者金受火刑之症也蓋肺為五臟華蓋其位至高其質至清內主乎氣中主聲音外司皮毛又

外科正宗 卷之二

頁

兼主乎貴賤壽夭金清而氣管深長者其音自清其韻自高其聲自洪此三者主壽主貴亦主通達如金濁而氣管短細者其音自焦其韻自低其聲自小此三者主夭主賤亦主塞滯故肺金獨旺於秋者應其輕清之候也倘有所尅其病自生致患肺癰者先因感受風寒未經發越停滯肺中初則其候毛聳惡風咳嗽聲重胸膈隱痛項強不能轉側者是其真候也久則鼻流清涕咳吐膿痰黃色

腥穢甚則胸膈脹滿呼吸不利飲食減少脉洪自汗法當清金甘桔湯主之麥冬清肺飲調之又久嗽勞傷咳吐痰血寒熱往來形體消瘦咯吐痰膿聲啞咽痛其候傳為肺痿如此者百死一生之病也治宜知母茯苓湯主之人參五味子湯調之又

外科正宗 卷之二

頁

有七情饑飽勞役損傷脾肺者麥冬平肺飲主之紫苑葶湯調之又有房慾勞傷丹石補藥消鑠腎水者宜腎氣丸主之金液戊土丹調之又勞力內傷迎風响叫外寒侵入未經解散致生肺癰者初起脉浮微數胸熱氣麓寒熱往來咳嗽生痰者當以小青龍湯主之麥冬清肺飲調之通用金鯉湯蠟礬丸太乙膏相間服之亦効如手掌皮麓六脉洪數氣急額紅汚膿白血嘔噦澆水鼻塌不食飲食者俱為不治此症以身涼脉細膿血交流痰色鮮明飲食知味膿血漸止者俱為無妨及此則死
肺癰看法

初起脉浮虛細身體不熱咳嗽有痰呼吸調勻者順
已成脉浮微數咳吐膿痰形色鮮明語聲清朗者吉
潰後咯吐膿痰間吐鮮血時發時止飲食知味者順
吐膿漸漸稀少胸脇不疼面色微微帶黃便調多穢
初起脉洪弦數身熱多寒胸疼氣喘面紅多汗損壽
已成咯吐膿痰氣味澆臭黃痰如膠粘固唇反終亾
咯吐再兼白血氣急多煩指甲紫而帶滯終歸冥路
手掌反如枯樹面艷額紅咽痛音如鴨聲鼻掀終死

外科正宗

卷之二

百一

肺癰治法

初起風寒相入頭疼惡寒咳嗽聲重者宜解散風邪
汗出惡風咳嗽氣急鼻塞項強胸膈隱痛實表清肺
日間多寒喜覆衣被夜間發熱多煩去被滋陰養肺
口乾喘滿咽啞而渴咳嗽身熱脉弦數者降火抑陰
胸滿喘急咳吐膿痰身熱氣喘不得安臥平肺排膿
熱退身涼脉來短濇精神減少自汗盜汗補肺健脾

肺癰治驗

一義官仲冬時督工河道不常迎風呼喚致肺受傷
後發此症初起寒熱交作咳嗽聲重氣急生痰請
內醫治之越治越重後予視診其脉浮而數面光
而澤此肺癰也視其痰果有膿意相粘以桔梗湯
二服咳嗽稍止以排膿散四服其膿漸多惟胸膈
疼痛不減脉亦帶芤此胸中有瘀血也以四順散
加紅花牡丹皮二服吐出紫血碗許隨後膈痛漸
止又以金鯉湯兼人參五味子湯間服月餘而愈

外科正宗

卷之二

百二

一男子久嗽不已咳吐膿痰面白神勞胸中隱痛診
之脉浮微數此屬肺氣不足火尚有餘以知母茯苓
苓湯數服其膿漸少又以清金寧肺丸服之而愈
一男子因勞傷咳嗽不止至夜身熱尤甚日久咯吐
膿血診之脉弦而數此虛火假症也先以童子小
便日飲三四次又服紫苑茸湯數劑至夜身熱不
發又間服金鯉湯月餘而漸瘳此非童便之功而
陰火豈能得退嘗治瘡瘍虛熱不退者用此極效

一男子鬱鬱不遂意患嗽半年時或咳吐膿血且形體衰弱飲食減少脉亦微數聲漸將離惟面不紅其病將成肺痿而尚可治以清金二母湯十餘服咳吐減半又以金鯉湯與人參五味子湯間服之又早飲人乳晚飲童便各一鍾調理百日外而安一男子生平好飲口乾作渴致肺壅熱成癰咳吐膿痰喘滿難臥以葶藶散二服而喘定易睡又以紫苑茸湯加乾葛天花粉十餘服而膿痰漸少早以

外科正宗 卷之二 五三

加減八味丸午用清金寧肺丸間服之兩月而愈一男子五十餘歲平素寵妾膏梁復生咳嗽發熱吐痰腥臭視之手掌枯澀面隱微紅痰中白血脉亦細微而數此肺癰所忌症也辨不治後醫強許其生而用藥終至不應乃死人問曰何以致之予曰手掌乾澀血枯土傷不能生其金也面色微紅相火已動痰中白血正肺受傷脉細而數真氣虛敗凡肺癰犯此豈有不死者乎以此言之後人乃服

肺癰主治方

麥冬平肺飲 麥冬平肺飲人參赤芍梗柳赤茯苓陳皮甘桔同成劑肺癰咳嗽可回春

治肺癰初起咳嗽氣急胸中隱痛嘔吐膿痰者

人參 麥門冬 赤芍 梗柳

赤茯苓 陳皮 桔梗 各一錢 甘草 五分

水二鍾煎入分食遠服

玄參清肺飲 玄參清肺飲柴陳并桔梗柳參茯苓麥冬骨皮意以仁生麥童便可安寧

治肺癰咳吐膿痰胸膈脹滿上氣喘急發熱者

外科正宗 卷之二 五三

玄參 八分 銀柴胡 陳皮 桔梗

茯苓 地骨皮 麥門冬 各一錢

薏苡仁 二錢 人參 葶草 各五分 檳榔 三錢

水二鍾薑一片煎八分臨入童便一杯食後服

寧肺桔梗湯 寧肺桔梗湯貝苳歸萎枳殼草桑皮防己百合葶五味杏仁知母地骨皮

治肺癰胸膈隱痛兩脇腫滿口燥咽乾煩悶多渴自汗盜汗脈臥不得時吐稠痰腥臭者服之

桔梗 貝母 當歸 瓜蒌仁

黃芪 枳壳 甘草節 桑白皮

防已 百合 苡仁 各八分 五味子

甜葶藶 地骨皮 知母 杏仁 各五分

水二鍾姜三片煎八分不拘時服咳甚加百合

身熱加柴胡黃芩大便不利加蜜炙大黃一錢

小便澀滯加燈心木通煩躁兼血加白茅根痛

甚加入參白芷

四順散 四順散內有奇功 枳梗紫苑貝母同 非草杏仁相協力 肺癆喘嗽永無踪

外科正宗 卷之二 百四

治肺癰吐膿五心煩悶咳嗽氣急不能言

貝母 紫苑 桔梗 各一錢五分

甘草 杏仁 各七分

水二鍾煎八分食遠服或為末白湯調服二錢

清金寧肺丸 清金寧肺貝母陳參桔歸苓地骨苓 銀柴天麥芩連芍 五味白木生熟憑

治肺癰咳嗽日久膿痰不盡身熱虛羸漸成勞

瘵者服之効

陳皮 茯苓 桔梗 貝母

人參 黃芩 各五錢 麥門冬 地骨皮

銀柴胡 川芎 白芍 胡黃連 各六錢

五味子 天門冬 生地 酒浸熟地 搗膏

歸身 白木 各一兩 甘艸 三錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服七十九食

遠白滾湯送下

人參五味湯 人參五味湯陳水 枳梗歸苓枳地黃 桑皮柴胡地骨草 肺癆虛乏可煎嘗

治氣血勞傷咳膿或咯血寒熱往來

外科正宗 卷之二 百五

羸瘦困乏一切虛損之症並効

人參 五味子 前胡 陳皮

白木 桔梗 當歸 茯苓

熟地 甘草 各一錢 黃芪 地骨皮

桑白皮 枳殼 柴胡 各五分

水二鍾薑三片煎八分食後服

紫苑茸湯 紫苑茸湯參犀角 冬花桑葉草半夏 杏仁百合與阿膠 貝母蒲黃姜莫却

治膏粱厚味飲食過度或煎炒法酒致傷肺氣

哮喘咽乾吐痰唾血喘急脇痛不得安卧並服

紫苑茸 犀角 炙甘草 人參各五分

桑葉用經霜者 欬冬花 百合 杏仁

阿膠 貝母 半夏 蒲黃生各七分

水二鍾薑三片煎八分入犀角末食後服

排膿散

排膿散內用黃芪 白芷 人參 五味子 宜每服三錢 案調下 肺癰痰吐劫堪奇

治肺癰已吐膿後宜服此藥排膿穢補肺氣

黃芪 白芷 五味子 人參各等分

外科正宗

卷之二

百六

右為細末每服三錢食後蜜湯調服

知母茯苓湯

知母 茯苓 湯 桔 枳 芍 芩 薄荷 五味子 人參 柴 牛 冬 花 芍 白 木 阿 膠 麥 冬 仔 細 煎

治肺痿喘嗽咳吐痰涎或自汗盜汗往來寒熱

茯苓 黃芩各一錢 知母 甘草

桔梗 薄荷 人參 五味子

柴胡 半夏 川芎 欬冬花

白朮 阿膠 麥門冬各六分

水二鍾薑三片煎八分加蜜使一杯食後溫服

滌痰湯

滌痰湯內二陳先 麥冬 枳實 枳殼 煎 人參 桔梗 黃連 煎 新 茹 加 上 病 安 然

治心火尅肺金久而不愈傳為肺痿咽乾難啞

胸膈痞悶嘔吐痰涎喘急難臥者並服之

陳皮 半夏 茯苓 甘草

麥門冬 胆南星 枳實 黃連

人參 桔梗各五分 竹茹一錢

水二鍾煎八分食後服

寧肺丸

寧肺丸中二般藥 烏梅 粟殼 去 筋 膜 每服二錢 功有靈 肺癰 肺痿 同 堪 嚼

外科正宗

卷之二

百七

治久嗽咯吐膿血胸膈不利咳嗽痰盛坐卧不

安言語不出甚則聲音啞啞者服之

烏梅蜜 拌 蒸 取 肉 粳粟殼去 膜 蜜 拌 炒

用烏梅膏加生蜜少許調作丸每服二錢烏梅

湯不拘時下

清金二母湯

清金二母湯 枳 枳 芍 芩 薄荷 五味子 人參 柴 牛 冬 花 芍 白 木 阿 膠 麥 冬 仔 細 煎

治肺痿多嗽少痰午後發熱口乾煩躁不寧者

知母 貝母 桔梗 茯苓

當歸 白朮 陳皮各一錢 桑皮

紫蘇 杏仁 柴胡 瓜蒌仁

黃芩 五味子 甘草 麥門冬五分

水二鍾煎八分入童便一杯食後服

梔子仁湯 梔子仁湯大青葉 石膏淡豉共黃芩 杏仁知母赤芍藥 升麻柴胡甘草行

治肺痿發熱潮熱或發狂亂煩躁面赤咽痛者

梔子仁 赤芍藥 大青葉 知母各七分

黃芩 石膏 杏仁 升麻各一分

外科正宗 卷之二 頁八

柴胡六分 甘草五分 淡豆豉百粒

水二鍾煎八分食遠服

加味理中湯 加味理中湯半夏 茯苓白朮共陳皮 乾姜細辛併甘草 人參五味同推

治肺胃俱虛咳嗽聲重發熱不已又兼脈浮數

而無力者服之

炙甘草 半夏 茯苓 乾姜炮

白朮 陳皮 細辛 五味子

人參各五分

水二鍾煎八分食遠服

金鯉湯 金鯉湯中効罕稀 獨將貝母効並涼 童子小便重湯頓 肺痿痰吐最堪醫

治肺癰已成未成胸中隱痛咯吐膿血者服之

金色活鯉魚一尾約四兩重 貝母一錢

先將鯉魚連鱗剖去肚腸勿經水氣用貝母細

末擦在魚肚內線扎之用上白童子小便半大

碗將魚浸童便內重湯燉煮魚眼突出為度少

頃取起去鱗骨取淨魚肉浸入童便內頓熱肉

外科正宗 卷之二 頁九

與童便作二三次一日食盡一枚其功效甚捷

葶藶散 葶藶散中葶藶仁 甘草桑皮用葶藶 瓜蒌升麻桔梗等 肺癰服下可日吞

治過食炙煖或飲酒過度致肺熱氣壅喘急不

卧及肺癰濁吐腥臭胸膈脹滿不食者並服之

甜葶藶 桔梗 瓜蒌仁 川升麻

薏苡仁 桑白皮 葛根各一錢 炙甘草五分

水二鍾姜三片煎八分食後服

腎氣丸

新刊外科正宗卷之三

下部癰毒門

崇川 陳實功 毓仁父纂著

流注論第二十五

夫流注者流者行也乃氣血之壯自無停息之機注者住也因氣血之衰是有凝滯之患故行者由其自然住者由其瘀壅其形漫腫無頭皮色不變所發毋論穴道隨處可生凡得此者多生於體虛之人勤勞之輩不慎調變夏秋露臥縱意取涼然體

當風圖身快爽或中風邪發散未盡或從陰虛外寒所侵又或惱怒傷肝鬱結傷脾榮氣不從逆於肉裏又或跌打損傷瘀血凝滯或產後惡露未盡流縮經絡此等種種皆成斯疾也既成之後當分表裏寒熱虛實邪正新久而治之初因風寒相中表症發散未盡者人參敗毒散散之房慾之後體虛寒氣外侵者五積散加附子溫之勞傷鬱怒思慮傷脾而成者歸脾湯加香附青皮散之跌撲

原缺

傷損瘀血凝滯而成者復元活血湯逐之產後惡露未盡流注經絡而成木香流氣飲導之此皆初起將成之法一服至三四服皆可外俱用琥珀膏敷貼其中亦有可消者十中五六如服前藥不得內消者法當大養氣血培助脾胃溫暖經絡通行關節木香流氣飲十全大補湯俱加熟附子香附培助根本此則未成者自消已成者自潰已潰者自斂而終無殘敗破漏不斂之症且如有膿宜急

外科正宗

卷之三

二

開之患者又當慎起居戒七情遠寒就溫俱可保全若誤用寒涼剋伐內消等藥終至不救者多矣

流注看法

初起漫腫皮色光亮微熱微疼筋骨不欠強者為順已成身體微熱飲食有味疼痛有時腫生紅色者順已潰膿稠而黃腫消痛止身體輕便起坐如常者順潰後內肉易生膿水易止精神易復膿口易合者順初起身體發熱脈細而數皮色微腫痛徹筋骨者險

已成飲食少思口乾作渴身體疼痛四肢沉重者險已潰膿水清稀腫仍不消虛熱不退疼痛不減者逆潰後膿穢不止肌膚瘦削飲食不食發熱皮龐者死

流注治法

初因風寒表散未盡而後復生腫痛者再宜和解之表邪已盡而後復生流注者宜清熱消腫行散氣血暴怒所傷抑鬱所致胸膈痞悶中氣不舒順氣寬中腫硬已成而不得內消者宜和氣血更兼補助脾胃

外科正宗

卷之三

三

跌撲閃肭瘀血凝滯為患者宜調和氣血通行經絡寒邪所襲筋攣骨痛及遍身疼痛者溫經絡行氣血產後敗血流注關節致生腫痛者當散敗瘀養氣血潰後膿水不止而形衰食少者宜滋氣血峻補脾胃

流注治驗

一男子風寒表散未盡兩腮腫痛微熱不退小柴胡湯加川芎天花粉桔梗連翹二服餘熱頓退又以二陳湯加桔梗黃芩牛蒡子連翹四服十日而安

一男子勞傷受寒背生三腫皮色不變寒熱交作至夜尤甚先以萬靈丹洗浴發汗寒熱頓退惟腫硬不消以琥珀膏敷之三次其腫消痛止漸漸而平一婦人因怒脇下結腫將近半年方痛此得之肝氣鬱結之症以木香流氣飲四服其腫漸紅此日久之病必欲作膿不可內消又以十全大補湯加木香香附青皮十餘服其腫漸高又以本方加皂角刺五服其膿乃潰且清且多此勞中所得者元氣

外科正宗

卷之三

四

已經虧損其膿故多而清以人參養榮湯加熟附子月餘膿稠且少又本方倍參芪歸朮兩月而愈一男子元氣素虛因暴怒脾生腫塊疼痛牽強寒熱往來飲食日減以補中益氣湯加香附貝母十餘服寒熱漸止又以益氣養榮湯月餘而腫潰間以八珍湯服之外用附子餅日灸二次脾胃健而安一婦人項間乳上各腫一塊將近一年漸大方痛診之脈細數而無力此思慮過傷之病也以歸脾湯

加桔梗香附十餘服其腫漸高外以琥珀膏敷之腫頂紅色欲其作膿又以十全大補湯加桔梗貝母服之半月膿熟針之後頭腐膿清虛熱復作食少不睡仍以歸脾湯間以逍遙散服之三月而愈一男子平素怯弱腰後微腫一塊飲食少思口乾發熱此得之腎傷之病也治當朝以附桂八味丸午用人參養榮湯扶植根本為要彼以口乾發熱內火之故欲投清涼之劑解之予辭不敢治請內醫

外科正宗

卷之三

五

視之以退熱為主正合病家之意投藥三劑腹痛作瀉又以猪苓澤瀉厚朴泄氣等藥大熱發作形體更變復請予治予曰死之速矣伊不知因虛致病法當滋補況是腰間腫塊內腎受傷口乾作渴腎水枯竭發熱不退陰虛血少今以有餘之藥而療不足之症豈有不死者始信前悞又半月而死

流注主治方

調和榮衛湯

調和榮衛湯甘草赤芍白芷併烏藥

陳獨芎歸芪大黃牛膝紅花相共隨

第... 冊... 卷... 頁...

治流注初起氣血凝聚結腫不散已成米成服

川芎 當歸 陳皮 獨活各一錢

赤芍 白芷 烏藥 大茴香

黃芪各八分 甘草各五分 紅花各五分 牛膝下部加

水二鍾煎八分入酒一杯量病上下服

木香流氣飲木香流氣飲芍歸蘇桔青陳烏澤芪枳殼枳芩防半夏腹皮牛芍膝其隨

治流注瘰癧及鬱結為腫或血氣凝滯遍身走

注作痛或心胸痞悶嗌咽不利脇腹膨脹嘔吐

外科正宗

卷之三

六

不食上氣喘急咳嗽痰盛或四肢面目浮腫者並服之

川芎 當歸 紫蘇 桔梗

青皮 陳皮 烏藥 黃芪

枳實 茯苓 防風 半夏

白芍各一錢 甘草節 大腹皮 木香

檳榔 澤瀉 枳殼各五分 牛膝下部加一錢

水三鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

附子八物湯附子八物湯芍芎熟地人參木茯苓甘草肉桂當歸等 木香姜棗効通神

治房慾後陰虛受寒致生腫塊又或遍身腿脚

疼痛不能步履

川芎 白芍 熟地 人參

白朮 茯苓 當歸 附子各一錢

肉桂五分 木香 甘草各三分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

瘡科流氣飲瘡科流氣飲芍歸蘇桔青陳烏澤芪枳殼枳芩防半夏腹皮牛芍膝其隨

外科正宗

卷之三

七

治流注及一切鬱怒凝滯氣血作腫疼痛或胸膈痞悶或風寒溼毒搏於經絡結成腫塊者服

當歸 甘草 紫蘇 人參

白芍 官桂 黃芪 防風

枳殼 烏藥 桔梗 厚朴各七分

檳榔 木香 川芎 白芷各五分

水二鍾煎八分食遠服

通經導滯湯通經導滯湯香附赤芍芍歸熟地隨陳皮丹皮蘇草節牛膝紅花獨活奇

治婦人產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛者

香附 赤芍 川芎 當歸

熟地 陳皮 紫蘇 牡丹皮

紅花 牛膝 枳殼 甘草節

獨活 各五分

水二鍾煎八分入酒一小杯食前服

香附餅 香附餅散散風寒 酒和調成患上安 熨底熱攻寒氣散 敢教苦楚即成歡

治風寒流注襲於經絡結成腫痛用香附為末

外科正宗 卷之三 八

酒和量瘡大小做餅覆患處熱熨斗熨藥上未

成者自消已成者自潰風寒溼毒宜薑汁作餅

醒脾湯 醒脾湯中白木芪 人參酸棗地骨皮 茯神遠志柴甘桔 香附木香共得宜

治懷抱鬱結思慮傷脾致脾氣不行逆於肉裏

乃生壅腫疼痛不眠心煩不安神氣不清等症

白朮 黃芪 人參 茯神 各一

酸棗仁 地骨皮 遠志 各七分 柴胡

甘草 桔梗 黃連 木香

香附 各五分 圓眼肉 七

水二鍾薑三片棗二枚煎八分不拘時服

調中大成湯 調中大成湯木附 苓歸芍藥黃芪 砂仁遠志丹皮草 肉桂煨薑黑棗隨

治流注潰後膿水清稀飲食減少不能生肌

白朮 茯苓 歸身 白芍

陳皮 山藥 黃芪 牡丹皮 各一

人參 藜香 砂仁 遠志

甘草 各五分 附子 肉桂 各八分

外科正宗 卷之三 九

水二鍾煨薑三片棗二枚煎八分食遠服

黃芪六一湯 黃芪六一湯甘草 加上人參三味奇 流注膿多併作湯 更兼煩燥劫堪推

治流注潰後膿水出多口乾作渴煩燥不寧

黃芪 六錢半生 甘草 一錢五分

人參 錢一

水二鍾煎八分食遠服

散血葛根湯 散血葛根湯半夏 等防羌葛芷升麻 甘草細辛併蘇藥 桔梗香附與紅花

治跌撲傷損瘀血凝滯結成流注身發寒熱者

乾葛 半夏 川芎 防風

羌活 升麻 桔梗各八分 白芷

甘草 細辛 蘇葉 香附

紅花各六分

水二鍾葱三根薑三片煎八分不拘時服

先大大造丸先天大造丸歸杞 熟地生苓兔肉黃

治風寒溼毒襲於經絡初起皮色不變漫腫無

頭或陰虛外寒侵入初起筋骨疼痛日久遂成

外科正宗

卷之三

十

腫痛潰後膿水清稀久而不愈漸成漏症者服

紫河車一具酒煮搗膏 熟地黃四兩酒煮搗膏

歸身 茯苓 人參 枸杞

兔絲子 肉苁蓉酒洗搗膏 黃精

白朮 何首烏去皮用黑豆同蒸搗膏 川牛膝

仙茅浸去赤汁蒸熟去皮搗膏各二兩 骨碎補去毛後炒

川巴戟去骨 破故紙炒 遠志去心炒

木香 青鹽各五錢 丁香三錢 黑棗肉二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七十九空心

溫酒送下此方非獨流注成漏者又補一切氣

血虛羸勞傷內損乃男婦久無嗣息並有奇功

琥珀膏琥珀膏中用大黃 南星白芷鬱金香 同蒜搗稠敷患處 官教流毒即安康

治一切皮色不變漫腫無頭氣血凝滯結成流

毒毋論身體上下年月新久但未成膿者並効

大黃二兩 鬱金 南星 白芷各兩

其為細末用大蒜頭去殼搗爛入上藥再搗稠

外科正宗

卷之三

入酒一盞是謂約過敷腫上紙蓋隨有熱痛交

有不痛俱待藥乾便効次日又有起泡又有不

起泡者如有起泡起挑去泡中黃水膏貼之消斂

流注應用方

十全大補湯 人參養榮湯

補中益氣湯 益氣養榮湯

八珍湯俱見癰疽潰瘍門 萬靈丹見癰疽腫門

小柴胡湯 二陳湯俱見癰疽腫門

乳癰論第二十六 附乳岩

夫乳病者乳房陽明胃經所司乳頭厥陰肝經所屬
乳子之母不能調養以致胃汁濁而壅滯為膿又
有憂鬱傷肝肝氣滯而結腫初起必煩渴嘔吐寒
熱交作腫痛甚宜牛蒡子湯主之厚味飲食暴
怒肝火妄動結腫者宜橘葉散散之又憂鬱傷肝
思慮傷脾積想在心所願不得志者致經絡痞澁
聚結成核初如豆大漸若棋子半年一年二載三

外科正宗

卷之三

三

載不疼不癢漸漸而大始坐疼痛則無解日後
腫如堆粟或如覆碗紫色氣穢漸漸潰爛深者如
岩穴凸者若泛蓮疼痛連心出血則臭其時五臟
俱衰四大不救名曰乳岩凡犯此者百人百必死
如此症知覺若早只可清肝解鬱湯或益氣養榮
湯患者再加清心靜養無辜無得服藥調理只可
苟延歲月若中年已後無夫之婦得此死更尤速
故曰夫乃婦之天也惟初生核時急用艾炙核頂

待次日起泡挑破用披針針入四分用水蠲散條
插入核內糊紙封蓋至十三日其核自落用玉紅
膏生肌斂口再當保養不發又男子乳節與婦人
微異女損肝胃男損肝腎蓋怒火房慾過度以此
肝虛血燥腎虛精怯血脈不得上行肝筋無以榮
養遂結腫痛治當八珍湯加山梔牡丹皮口乾作
渴者加減八味丸腎氣素虛者腎氣丸已潰作膿
者十全大補湯懷孕之婦乳疾白內吹因胎氣旺

外科正宗

卷之三

三

而上冲致陽明乳房作腫宜石膏散清之亦可消
散遲則遷延日久將產出膿乳汁亦從膿竅流出
其口難完有此者純用補托生肌其口亦易完矣
乳癰乳岩看法

初起紅赤腫痛身微寒熱無頭眩無口乾微疼者順
已成掀腫發熱疼痛有時一囊結腫不侵別囊者輕
已潰膿黃而稠腫消疼痛漸止四邊作痒生肌者順
潰後膿水自止腫痛自消新肉易生膿口易合者順

初起一乳通腫木痛不紅寒熱心煩嘔吐不食者逆
已成不熱不紅堅硬如石口乾不眠胸痞食少者逆
已潰無膿正頭腐爛腫勢愈高痛勢愈盛流血者死
潰後肉色紫黑痛苦連心宛氣日深形體日削者死

乳癰乳岩治法

初起發熱惡寒頭眩體倦六脉浮數邪在表宜散之
發熱無寒惡心嘔吐口乾作渴胸膈不利者宜清之
憂鬱傷肝思慮傷脾結腫堅硬微痛者宜疎肝行氣

外科正宗

卷之三

古

已成掀腫發熱疼痛有時已欲作膿者宜托裏消毒
膿已成而脹痛者宜急開之艾脾胃虛弱更兼補托
潰而不斂膿水清稀腫痛不消疼痛不止大補氣血
結核不知疼痛久而漸大破後惟流污水養血清肝

乳癰治驗

一婦人因怒左乳腫痛寒熱交作以人參敗毒散一
劑表症已退又以牛蒡子湯二服腫消漸漸而安
一婦人憂思過度久鬱成癆左乳結核如桃半年似

痛非痛咳嗽生痰身發潮熱形之脉微數而無力

此真氣雖弱而邪火尚有餘如用藥合理亦堪

調治先用逍遙散加香附貝母十餘服而咳嗽漸

止寒熱間作又以八珍湯加香附牡丹皮柴胡遠

志十餘服身熱去其八九又以益氣養榮湯加青

皮木香兩月餘其胸膈得利噯氣得舒飲食漸進

肌膚漸澤外腫以阿魏化瘡膏貼之半年餘而消

一婦人右乳疼痛腫如覆碗形之脉數有力此有餘

外科正宗

卷之三

五

症欲作膿也以托裏消毒散數服而脹痛即針之
出膿碗許又以十全大補湯加香附十餘服而安
一婦人暴怒左乳結腫疼痛自服仙方活命飲連服
疼痛稍止結腫不消仍服清涼敗毒之劑腫痛反
作形體日弱予診之脉浮數而無力此屬真氣虛
而邪氣實也非補不可以益氣養榮湯四五服其
腫始高寒熱亦退又中餘服而膿潰兼以十全大
補湯兩月而痊此非純補之功其疾豈能得愈

一男子年過五旬因妻喪子不成立憂鬱傷肝左乳結腫半年痛甚作腐肝脉弦數先以小柴胡湯加青皮山梔遠志貝母數服而肝脉稍平又以八珍湯仍加前藥十餘服其腫漸腐為膿更服益氣養榮湯庶保收斂彼為內醫所惑謂鬱怒傷肝肝經有火不必用補更服降火流氣寬中等劑致食少便秘發熱作渴復請予治肝脉復弦口乾作渴邪火內淫飲食減少脾土受傷便秘發熱陰血竭而

外科正宗

卷之三

一六

為燥為熱已上俱內損症也辭不治後月餘燥死一婦人左乳結核三年方生腫痛診之脉緊數而有力此陽有餘而陰不足也况結腫如石皮肉紫色不澤此乳岩症也辭不治又一婦人左乳結腫或大或軟或硬俱不為痛已半年餘方發腫如覆碗堅硬木痛近乳頭壘壘遍生疙瘩時痛時痒診之脉弦而數腫皮慘黑不澤此氣血已死辭不可治又一婦人遺腫如逆流血不禁辭後果俱死

乳癰主治方

牛蒡子湯

牛蒡子湯 瓜蒌仁 銀花 山梔 甘草 陳皮 黃芩 連翹 柴花粉 青皮 牛子 角針 平

治乳癰乳疽結腫疼痛毋論新久但未成膿服

陳皮 牛蒡子 山梔 金銀花

甘草 瓜蒌仁 黃芩 天花粉

連翹 角針 各一錢 柴胡 青皮 各五分

水二鍾煎八分入酒一杯和勻食遠服

橘葉散

橘葉散內有柴陳 川芎 山梔 青皮 迎石膏 黃芩 連翹 行 甘草 加之 効有靈

外科正宗

卷之三

一七

治婦人有孕胎熱為內吹有兒吃乳各外吹致

乳結成腫痛寒熱交作甚者惡心嘔吐並服之

柴胡 陳皮 川芎 山梔

青皮 石膏 黃芩 連翹 各一錢

甘草 五 橘葉 二十

水二鍾煎八分食遠服渣再煎服

清肝解鬱湯

清肝解鬱湯 陳芍 桔半 芎 歸 貝 茯 神 青皮 生 附 併 蘇 藥 通 草 山 梔 遠 志 許

治一切憂鬱氣滯乳結腫硬不疼不癢久漸作

疼或胸膈不利肢體倦怠面色萎黃飲食減少

陳皮 白芍 川芎 當歸

生地 半夏 香附各八分 青皮

遠志 茯神 貝母 蘇葉

桔梗各六分 甘草 山梔 木通各四分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

鹿角散

鹿角散効獨稱雄 清乳專於退火功 每服三錢酒調下 能殺腫痛永無踪

治乳癰新起結腫疼痛增寒發熱但未成俱効

外科正宗

卷之三

七

鹿角尖三寸用炭火內煨稍紅存性碾末每服

三錢食後熱酒一茶鍾調服甚者再一服必消

回乳四物湯

回乳四物湯最靈 考歸白芍熟地呈 加上麥芽能散乳 最消腫脹得和平

治產婦無兒喫乳致乳汁腫脹堅硬疼痛難忍

川芎 當歸 白芍 熟地各二錢

麥芽二兩炒 魚籠末

水二鍾煎八分食遠服用脚布束緊兩乳以手

按揉其腫自然消散甚者再用一服

灸乳腫妙方灸乳腫痛方來異 諸般腫痛寂然消

治氣惱勞傷或寒熱不調乳內忽生腫痛用碗

一隻內用麩燈草四根十字排勻碗內燈草頭

各露寸許再用平山麩紙裁成一寸五分潤紙

條用水溼紙貼蓋碗內燈草上紙與碗口相齊

將碗覆於腫乳上留燈草頭在外將艾大圓放

碗足底內點火灸之艾盡再添灸至碗口流出

水氣內痛覺止方住甚者次日再灸一次必消

外科正宗

卷之三

一

保安萬靈丹

見癰症 腫瘍門

治乳癰初起發熱惡寒頭眩肢體作痛者立効

益氣養榮湯

見瘰癧 瘰癧門

治鬱怒傷肝七情內結以致乳中生核不疼不

痒日久方痛甚者胸膈不利吞酸嘔吐頭目昏

眩四肢倦怠或已破潰膿水清稀不能收斂飲

食減少口淡無味自汗盜汗肢體羸瘦者並効

治乳便用方

治乳滿公英常說 同酒煎來乘熱吸 再加葱湯催汗泄 消腫猶如湯潑雪

治乳癰初起腫痛未成膿者用蒲公英春秋間

開黃花似菊取連根帶葉二兩搗爛用好酒半

斤同煎數沸存渣敷腫上用酒熱服蓋睡一時

許再用連鬚葱白湯一茶鍾催之得微汗而散

此方鄉村偏僻無藥之所用之極妙亦且簡便

下乳天漿散下乳天漿散四物 茯苓花粉麥門冬 王不留行併山甲 漏蘆甘草木通逢

治乳母元氣虛弱乳汁微少或生兒日久乳少

川芎 當歸 白芍 熟地

外科正宗 卷之三 三

茯苓 天花粉 甘草 王不留行 炒

麥門冬 漏蘆 川山甲 炒 通草 各一錢

用健豬前蹄一隻煮蹄爛取汁二碗同藥煎至

碗半二次頓熱食遠服之以熱木梳梳其乳房

其汁如泉湧而來

木香餅 木香餅同生地黃 二物和勻患上裝 氣滯腫疼併悶膈 用之一餅自無效

治一切氣滯結腫成核或痛或閃胸風寒所傷

並効

木香五錢 生地黄一兩 搗膏

右木香為末同地黄和勻量患處大小作餅置

腫上以熱熨斗熨之堅硬木痛者間日熨之妙

乳癰應用方

十全大補湯 八珍湯 見癰疽 潰瘍門

逍遙散 冰蠟散

小柴胡湯 見癰 癰門 托裏消毒散 見腫 癰門

阿魏化痞膏 見痞 疾門

外科正宗 卷之三 三一

附骨疽第二十七 附鶴膝風

夫附骨疽者乃陰寒入骨之病也但人之氣血生平

壯實雖遇寒冷則邪不入骨凡入者皆由體虛之

人夏秋露卧寒溼肉襲或房慾之後益覆單薄寒

氣乘虛入裏遂成斯疾也初起則寒熱交作稍似

風邪隨後醫腿筋骨作痛不熱不紅疼至徹骨甚

者曲伸不能轉側日久陰變為陽寒化為熱熱甚

而腐肉為膿此疽已成也凡治此症初起寒熱作

痛時便用五積散加牛膝紅花發汗散寒通行經絡或萬靈丹發汗亦可次以大防風湯行經活血
滲溼補虛又有生於尻腎部位漫腫作疼者內托羌活湯腿內近膝股漫腫木痛者內托羌柴湯腿
外側者內托酒煎湯初起通用人參敗毒散加水瓜牛膝蘇木紅花虛者十全大補湯加羌活防已
牛膝已成欲作膿者附子八珍湯膿成脹痛者即針之膿稠而黃體實者十全大補湯膿清色白體

外科正宗

卷之三

三三

虛者保元大成湯食少體倦者香砂六君子湯脾虛寒熱者補中益氣湯以此調理可也又有風溼相乘之症初起寒熱交作次傳腿腫作痛其形光亮微紅發熱腫痛按之如泥不使起者宜當歸拈痛湯或茯苓佐經湯間服萬靈丹和之以上之症皆由元氣不足中來不可誤用損脾泄氣敗毒等藥外禁寒涼等法如誤用之必致氣血凝滯肉腐日久化為汚米敗膿流而不禁者終死又有

房慾勞傷寒熱互變氣血乖違經脈橫解受病日深以成斯疾者其患大腿漸漸腫如冬瓜上過胫腹下連足底牽連漫腫皮色不紅日久潰膿色白腥穢腫仍不消痛仍不減元氣日衰身體縮小唇舌乾焦二便枯秘諸藥不効飲食不進者終為不治又有鶴膝風乃足三陰虧損之症初起寒熱交作時亦宜五積散加牛膝紅花或萬靈丹發汗俱可如汗後腫痛仍不消減此陰寒深伏以大防風

外科正宗

卷之三

三三

湯溫暖經絡重者兼灸膝眼二穴敷以琥珀膏亦可漸漸取効又如以上之法俱不効者終成痼疾不必強藥消之只宜先天大造丸史國公酒藥每常服之終年亦可轉重就輕移步行履尚可圖也
附骨疽看法

初起身微寒熱飲食如常結腫微紅疼不附骨者順已成舉動自便結腫成囊疼痛有時膿易成者為吉潰膿稠腫消痛減身體輕便醒睡穩不熱者吉

清後元氣易復飲食易進內肉易實膿水易乾者吉
初起身發寒熱漫腫色白肢體牽強疼痛附骨者陰
已成舉動不便通腿漫腫不熱不紅不作膿者為陰
已潰膿水清稀氣穢腥臭腫痛不消形體日削者死
潰後脾胃虛弱飲食無味口渴不止唇白皮枯者死

附骨疽治法

初起發熱惡寒身體拘急腿脚腫痛脉浮緊者散之
已成腿脚腫痛皮色不變上下通腫者散寒溫經絡

外科正宗

卷之三

三

寒熱作腫色白光亮按之如泥不起者宜健脾滲溼
身體無熱惡寒脉遲而濇腿腫不熱者養血溫經絡
暑中三陰脉洪而數腿脚掀腫口乾便燥者宜下之
已潰膿水清稀飲食減少形體消瘦者補中健脾胃
潰後腫痛不減膿水不止虛熱不退者溫中養氣血
愈後筋骨牽強曲伸不便者宜滋養氣血通利關節

附骨疽治驗

一男子中寒發散未盡大腿腫痛脉浮數而無力此

風寒未盡內虛故也以五積散去麻黃加牛膝二
服疼痛稍減又以內托黃芪酒煎湯四服通腫俱
消惟腿外側結腫一塊不退此瘀血凝滯欲作膿
也以托裏藥候膿熟針之更以十全大補湯而飲
一男子勞碌遇寒每發腿痛發則寒熱嘔吐胸痞不
食此因氣惱飲食不節脾胃受傷故脾氣有虧飲
食不能運化痰滯中腕溼熱動而下流注為脚氣
以開結導引丸二服行去停痰又以半夏佐經湯

外科正宗

卷之三

三

數服嘔止膈利更以附子六物湯數劑消而不發
一老人年六旬過慾腎虛致筋攣痺縮脚膝無力不
能步履外貼祛風逐溼膏內服三因勝駿丸而愈
一男子右腿腫痛兩月餘予曰膿已成久何不開之
彼曰二老醫同治俱稱內消無膿其膿不知真否
此當再請二老決之又曰此必無膿但患者昏沉
不醒命在危篤予強開之出膿盈許以獨參湯連
進二服而甦後以十全大補湯調理百日外而安

一男子房事後陰寒大腿無形作痛至夜尤甚不能步履醫以散寒除溼消痰止痛藥治之其疼益增脰之脉細濇而無力此氣血不足寒氣所乘之症當以大防風湯二劑疼頓減又四劑其疾痊安一男子暑月慾後當風睡臥致寒氣襲於左腿遂成腫痛寒熱交作胸痞不食以保安萬靈丹葱湯化服洗浴發汗以散骨髓寒毒後以大防風湯去羌活加紅花破故紙溫腎經通行經絡腫痛漸消

外科正宗 卷之三 三

血脉漸和後以三因勝駿丸間服調理兩月而愈一監生似前慾後受寒致成腿痛予以暖腎氣溫經絡散寒邪藥治之彼以為緩請內醫甘服表散之劑外邪雖散其內必虛又以小柴胡湯等藥調理致虛熱發作口燥咽乾煩渴不已又以知母石膏湯清其上防風木瓜威靈仙等劑攻其下眾議紛紛雜藥妄進致病愈劇仍復請治其時患腿愈腫其形縮小此必死症也況此症原從腎經受寒非

附子破故紙不能通達關節非羌活防風牛膝不能通行閉滯非人參白朮炙甘草不能使脾氣行達四肢非川芎當歸白芍熟地紅花不能養血活血凡病從虛而入者先補其虛後攻其病況治此症不加溫補而反用發散解肌以正風寒有餘之法治之不死何愈後果死醫者眾悞始信而服之

五積散 五積散桂芍歸桔 蒼牛麻陳芍茯苓枳殼乾姜併厚朴 白芷甘草共姜行

外科正宗 卷之三 三七

治風寒溼毒客於經絡致筋攣骨痛或腰脚酸疼或遍身拘急或發熱惡寒頭痛者並宜服之
 蒼朮二錢 陳皮 桔梗 川芎
 當歸 白芍各一錢 麻黃 枳殼
 桂心 乾薑 厚朴各六分 白芷
 半夏 甘草 茯苓各四分
 薑三片水二鍾煎八分不拘時服頭痛惡寒者加連鬚葱頭三根益汗為効下部加木瓜牛膝

內托羌活湯 內托羌活湯蒼栢 防桂連翹藥本芪 歸尾陳皮兼甘草 紅花加上効堪推

治尻臀患癱堅硬腫痛兩尺脉緊數按之無力

羌活 黃栢 防風 歸尾

藥本 肉桂 各一錢 黃芪 五分 連翹

其草 蒼木 陳皮 各六分 紅花 五分

水酒各一茶鍾煎八分食前服

當歸拈痛湯 當歸拈痛湯二木 羌活防芩澤瀉苓 升麻茵陳甘草節 人參知母要調勻

治溼熱下注腿脚生瘡赤腫作痛或腰脚酸痛

外科正宗 卷之三 三八

或四肢遍身重痛或下部頑麻作痒或成血風

羌活 當歸 防風 茵陳

蒼木 各一錢 苦參 升麻 白木 各七分

葛根 甘草 黃芩 知母

澤瀉 猪苓 人參 各五分 黃栢 三分

水二鍾煎八分食前服

內托黃芪湯 內托黃芪湯黃栢 羌活當歸生地黃 柴胡肉桂連翹等 木瓜加上効非常

治溼熱腿內近膝股患癱或附骨癱初起腫痛

此太陰厥陰之分也脉細而弦按之洪緩有力

黃芪 鹽水拌炒 當歸 柴胡 木瓜

連翹 各一錢 羌活 肉桂 生地黃

黃栢 各五分

水酒各一鍾煎一半空心熱服

內托酒煎湯 內托酒煎湯桂芪 柴胡連翹黃栢宜 其草升麻大力子 煎同水酒効堪推

治寒溼發於腿外側少陽經分患癱或附骨癱

堅硬漫腫作痛或流至足陽明經作腫亦治之

外科正宗 卷之三 三九

黃芪 當歸 各二錢 柴胡 一錢五分 連翹

肉桂 大力子 各一錢 升麻

黃栢 甘草 各五分

水酒各一茶鍾煎一半食前服

茯苓佐經湯 茯苓佐經湯半夏 二木陳皮草葛根 藿香澤瀉柴胡等 木瓜厚朴共同行

治足少陽經為四氣所乘以致腰腿發熱疼痛

頭目昏眩嘔吐不食胸膈不利心煩熱悶等症

茯苓 陳皮 半夏 白朮

蒼朮各一錢 藿香 澤瀉 甘草

葛根 柴胡 厚朴 木瓜各五分

水二鍾姜三片煎八分食前服

附子六物湯附子六物湯甘草 防已白朮桂枝芍藥

治四氣流注於足太陰經骨節煩痛四肢拘急

自汗短氣小便不利手足或時浮腫並皆服之

附子 甘草各一錢 防已 白朮

茯苓各八分 桂枝五分

外科正宗 卷之三 三

水二鍾薑三片煎八分食遠服

麻黃左經湯麻黃左經湯葛根 羌活防風蒼朮芍藥

治風寒暑溼流注足太陽經腰足攣痺關節重

痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛等症

麻黃 葛根 羌活 防風

蒼朮 茯苓 防已各一錢 桂心

細辛 甘草各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

小續命湯小續命湯芍藥白朮 防風防已共人參

治寒溼之氣中於三陽致身不熱所患煩疼或

脚轉筋或腫或不腫或膝腿頑痺或時緩縱不

隨或遍身百節攣痛或小腸疝氣攻冲並服之

川芎 白朮 防風 人參

防已 附子生用 麻黃有汁去之 桂心

黃芩 白芍各一錢五分 甘草五分

水二鍾煎八分入薑汁一匙和勻食前服又暑

外科正宗 卷之三 三

中三陰所患必熱去附子減桂枝一半

大防風湯大防風湯木附歸 參芍川芎杜仲葛

治三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛久則膝

愈大而腿愈細因名曰鶴膝風乃敗症也非此

方不能治又治附骨疽皮色不變大腿通腫疼

痛無奈及痂後脚痛緩弱不能行或腿膝腫痛

人參二錢 防風 白朮 附子

當歸 白芍 川芎 杜仲

黃芪 羌活 牛膝 甘草
熟地各一錢

水二鍾薑三片煎八分食前服

檳蘇散

檳蘇散內用木瓜 香附陳皮大腹加 羌活木香姜作引 敢教風溼疾無他

治風溼流注脚脛酸痛或麻痺不仁嘔吐不食

檳榔 紫蘇 木瓜 香附

陳皮 大腹皮各一錢 木香三分

羌活五分

外科正宗 卷之三

水二鍾薑三片葱白三莖煎一鍾空心服

獨活寄生湯

獨活寄生湯茯苓 芍歸防芍細辛參 桂心杜仲秦朮 熟地甘草共相平

治肝腎虛弱風溼內攻足脛緩縱或膝痺攣重

獨活二錢 茯苓 川芎 當歸

防風 白芍 細辛 人參

桂心 杜仲 秦朮 牛膝

熟地 桑寄生真者各一錢 甘草五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

神應養真丹神應養真丹木瓜 當歸芍共天麻 羌活熟地兔絲子 蜜丸酒服効堪誇

治厥陰經為四氣所襲脚膝無力左癱右瘓半

身不遂手足頑麻言語蹇澁氣血凝滯遍身疼

痛者並服

當歸 川芎 白芍 天麻

羌活 熟地搗膏 木瓜 兔絲子各等分

右為細末入地黃膏加蜜丸如桐子大每服百

九空心溫酒鹽湯任下

外科正宗 卷之三

三因勝駿丸

三因勝駿丸附歸 防麻棗熟木槿隨 射乳戟甘羌沒解 蒼蠅從蓉故紙空

治元氣不足真氣虛弱及諸虛被寒溼氣侵襲

手足拳攣脚指連脚面拘急走注疼痛筋脉不

伸行步不隨常服益真氣壯筋骨黑髮滑皮

膚一切足弱鶴膝風症膝愈大而腿愈細並治

附子一枚一兩 之外製之 當歸 明天麻

牛膝 酸棗仁 熟地搗膏 防風各二

木瓜四兩 蛤蜊淨身一兩 麝香錢一 乳香

木香 沒藥 羌活 甘草各五錢

檳榔 川草薺 肉蓯蓉 破故紙

巴戟去心 蒼朮各一兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服七十九空心淡

鹽湯溫酒任下病近者七日年深者半月見効

健步丸 健步丸中川苦參 防風防已澤柴呈 羌活滑石瓜蒌等 甘草川烏肉桂詳

治生平好飲食燒酒多傷於脾肺膝中無力伸

不能屈屈不能伸膝脊腿脚沉重行步艱難者

外科正宗 卷之三 三四

苦參酒洗 防已酒浸 羌活 柴胡

滑石炒 瓜蒌根 甘草各五錢 防風

肉桂各三錢 澤瀉一兩 川烏泡二錢

右為細末酒糊為丸如桐子大每服三十九空

心溫酒送下

大腹子散 大腹子散蘇木瓜 羌荆赤芍木通加 獨活桑皮併枳殼 甘草青皮

治風毒脚氣上攻寒熱交作肢節煩疼心神

大腹子 紫蘇 木瓜 羌活

荆芥 赤芍 木通 獨活

桑白皮 青皮各五分 枳殼一錢 甘草三分

水二鍾薑五片葱白三莖煎八分空心服

加味敗毒散 加味敗毒散人參 羌獨前柴芎桔梗 茯苓枳殼同甘草 木瓜蒼朮此為能

治足三陽經溼熱毒氣流注脚踝焮赤腫痛寒

熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒或惡聞飲食者

人參 羌活 獨活 前胡

柴胡 川芎 桔梗 茯苓

外科正宗 卷之三 三五

枳殼 甘草 木瓜 蒼朮各八分

水二鍾薑三片煎八分食前服便秘加炒大黃

千里健步散 千里健步散奇功 細辛防風白芷 加上草烏為細末 長安瞬息即時通

治遠行兩脚腫痛若用之可行千里輕便甚妙

細辛 防風 白芷 草烏

右等分為末搽在鞋底內如底乾即以水微溼

過搽藥着脚行走自不吃力再不作腫

雷火神鍼 雷火神針効罕稀 丁香新艾麝香隨 風寒溼毒難病 針之患上効甚推

治風寒溼毒襲於經絡為患漫腫無頭皮色不變筋骨疼痛起坐艱難不得安臥者用此針之

新艾錢三分 丁香五分 麝香二分

藥與新艾搽和先將夾紙作筒如指麤大用艾藥發實收用臨用以肖山紙七層平放患上將

針點着一頭對患向紙捺實待不痛方起針病甚者再復一次七日後火瘡大發自取功效矣

道風逐溼膏逐溼膏中川草烏 麻藤星桂半草國 羌辛芷木歸蒼發 大黃獨活共相扶

外科正宗 卷之三 三六

治風寒暑溼相傷以致骨節疼痛筋攣不能步履或麻木溼痺等症並効

蒼發草 麻黃 川烏 草烏

風藤 半夏 南星 羌活

草麻子打碎 桂枝各三兩 獨活 細辛

當歸 白芷 蒼朮 大黃各二兩

以上藥各切咀片用葱汁薑汁各二碗拌藥先浸一宿次日用香油半斤同藥入鍋內慢火煎

至葱薑二汁將乾不報時油方與藥相煎渣枯

為度細絹濾清每油一斤下飛過炒丹十兩為

准配用再將前油入鍋內煎滾以油滴水成珠

不散方下黃丹徐徐攪入其膏已成再下碾淨

松香淨末一斤四兩再同熬化取下鍋來以盆

頓穩再下乳香木香胡椒輕粉各末二兩白芥

子細末四兩漸入攪勻傾入鉢內盛貯漸用熱

湯頓化綾段攤貼七日後諸病可痊百發百中

外科正宗 卷之三 三七

附骨疽應用方

保安萬靈丹見癰疽腫疽門 十全大補湯見潰瘍門

小柴胡湯見癰疽腫疽門

腸癰論第二十八

夫腸癰者皆溼熱瘀血流入小腸而成也又由來有

三一男子暴急奔走以致腸胃傳送不能舒利敗

血濁氣壅過而成者一也二婦人產後體虛多卧

未經起坐又或坐草艱難用力太過育後失逐敗

痰以致敗血停積腸胃結滯而成者二也三饑飽勞傷擔負重物致傷腸胃又或醉飽房勞過傷精力或坐冷並進以致氣血乖違溼動痰生多致腸胃痞塞運化不通氣血凝滯而成者三也總之初起外症發熱惡寒脉芤而數皮毛錯縱腹急漸腫按之急痛大便墜重小便澀滯若淋甚者臍突腹脹轉側水聲此等並見則內癰已成也初起未成時小腹殷殷作痛儼似奔豚小便淋瀝者當大黃

外科正宗

卷之三

三六

湯下之瘀血去盡自安體虛脉細不敢下者活血散瘀湯和利之已成腹中疼痛脹滿不食便淋刺痛者薏苡仁湯主之腹濡而痛小腹急脹時時下膿者毒未解也用牡丹皮湯治之如膿從臍出腹脹不除飲食減少面白神勞此皆氣血俱虛宜八珍湯加牡丹皮肉桂黃芪五味子斂而補之如積襲日久因循不識此症悞作脹病治之以致毒攻內臟腸胃受傷或致陰器攻爛腐爛黑斑色敗無

膿每流汚水腹連陰痛煩躁不止身熱口乾衾幃多臭卧房難進者凡犯之俱為不治證宜斟酌之

腸癰看法

初起小腹疼痛小便不利六脉微緩不作寒熱者輕已成小腹腫而堅硬小便數而不利六脉洪數者險已潰時時下膿裏急後重日夜無度疼痛不減者重潰後膿腥臭穢或流敗水濁瘀虛熱更增不食者死

腸癰治法

外科正宗

卷之三

三七

初起小腹疼痛或軟或硬脉芤數者瘀血也宜下之小腹作痛有塊大便秘澀小便如淋者宜和而利之已潰時時下膿復痛不止飲食無味者宜托而補之產婦惡露不盡流注小腸作痛脉數者宜和而導之腹脹日久臍高突出轉側嚮如水聲膿內蓄急針之

腸癰治驗

一男子小腹脹痛裏急後重時時下膿醫作痢疾治之愈重診之脉芤而數此小腸癰也以薏苡仁湯一

服下膿升許隨不墜重更以牡丹皮散六服而安
一幼婦產後月餘腹中漸痛腫脹如蠱內醫紛紛認
為蠱病又月餘沉重昏憤彼家已棄不治請予視
童稚瘡恙偶言此予討診之彼時人雖昏憤不甦
診之其脉細數有力此內癰膿病也猶似不妨彼
家曰無生之理予曰腹腫上見而按之一決其生
何如隨視腫皮緊急光亮臍下大熱此內癰不妨
乃萬無一失之病彼家歡悅分付先備淨桶用滾

外科正宗

卷之三

四

湯半桶蓋之聽用先以薏苡仁湯加酒炒大黃二
錢徐徐灌服待腹中覺痛搭起患者坐桶上熱氣
薰蒸其膿下如湧泉連湯與膿約共滿桶其患即
甦更服八珍湯加牡丹皮五味子調理月餘而安
一婦人小腹腫痛小便如淋診之脉緩而芤此得之
行經時快食生冷又兼惱怒肝火急駁瘀血而成
內癰膿尚未成也以大黃湯下之瘀血出盡而安
一婦人小產瘀血未盡勞動之早小腹內外腫痛月

餘大便秘燥小便澀滯口燥咽乾煩悶不睡內醫
調理其病日重偶見問之予曰恐內癰也請視脉
數寔而有力此腸癰已成用薏苡仁湯加大黃一
服下膿數碗脹痛頓退外腫堅硬不散仍熯作痛
此欲潰膿從外泄也以十全大補湯三服膿脹痛
而針之更服八珍湯加牡丹皮五味子月餘而歛
一婦人腹脹如鼓臍突寸許小水澀滯轉側腹有水
聲此內膿已成用針刺臍上突頂出膿盆許以牡

外科正宗

卷之三

四

丹皮散五六劑其膿漸少朝以八味丸暮以八珍
湯加澤瀉牡丹皮黃芪破故紙服之月餘而愈矣

腸癰主治方

大黃湯

大黃湯中用朴硝
加上桃仁病即消

丹皮白芥不相饒
腸癰腹痛自然消

治腸癰小腹堅硬如掌而熱按之則痛肉色如

故或焮赤微腫小便頻數汗出增寒脉緊實而

有力日淺未成膿者宜服之

大黃炒

朴硝各一錢

牡丹皮

白芥子

桃仁去皮尖各二錢

水二鍾煎八分食前或空心溫服

活血散瘀湯活血散瘀湯赤芍瓜蒌枳殼桃仁等 芍歸蘇木與丹皮

治產後惡露不盡或經後瘀血作痛或暴急奔

走或男子杖後瘀血流注腸胃作痛漸成內癰

及腹痛大便燥者並宜服之

川芎 歸尾 赤芍 蘇木

牡丹皮 枳殼 瓜蒌仁去皮尖 桃仁各一錢

外科正宗 卷之三 三

檳榔六分 大黃酒炒二錢

水二鍾煎八分空心服渣再煎服

牡丹皮散牡丹皮散芍參芪 茯苓薏苡牡丹皮 甘草白芷芍歸等 桃仁官桂木香宜

治腸癰腹濡而痛以手重按則止或時時下膿

人參 牡丹皮 白芍 茯苓

黃芪 薏苡仁 桃仁 白芷

當歸 川芎各一錢 甘草 官桂各五分

木香三分

水二鍾煎八分食前服

七賢散七賢散內參山藥 黃肉丹皮熟地黃 茯苓還有黃芪輩 姜棗同煎理內傷

治腸癰潰後疼痛淋瀝不已或精神減少飲食

無味面色痿黃四肢無力自汗盜汗睡卧不寧

茯苓 山藥 牡丹皮 山茱萸

熟地黃 人參各一錢 黃芪二錢

水二鍾煨薑三片大棗二枚煎八分食前服

失笑散失笑散用五靈丹 還有蒲黃和更隨 心腹諸疼併疝痛 吞之即可樂嘻嘻

外科正宗 卷之三 三

治產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不省人事

及尋常腹內瘀血或積血作痛又婦人血氣為

病作痛之聖藥也及治男子諸疝疼痛不已者

五靈脂 蒲黃俱炒等分

右為細末每服三錢醋一合調稠熬數滾入水

一鍾煎七分食前連藥服用醋為丸每服二錢

淡醋湯下治前症亦妙

排膿散排膿散內用黃芪 白芷芍歸山甲宜 銀花再兼瓜蒌等 枳殼加上効推推

治腸癰小腹脹痛脉滑數裏急後重時時下膿

黃芪 當歸 金銀花 白芷

川山甲 防風 川芎 瓜蒌仁各一錢

水二鍾煎八分食前服或為末每服二三錢食

遠蜜湯調下亦可

瓜蒌子湯

瓜蒌子湯 薏苡仁 桃仁 丹皮 共此呈 產後惡露併瘀血 腸胃停未用此清

治產後惡露不盡或經後瘀血停滯腸胃作痛

縱非是癰服之亦効

外科正宗

卷之三

四

薏苡仁四錢 桃仁 牡丹皮 瓜蒌仁各二錢

水二鍾煎八分食前併空心服

薏苡仁湯

薏苡仁湯功效奇 腸癰腹痛最堪醫 桃仁加上瓜蒌子 白芍丹皮在後隨

治腸癰腹中疼痛或脹滿不食小便澀滯婦人

產後多有此病縱非癰服之尤効

薏苡仁 瓜蒌仁各三錢 牡丹皮

桃仁去皮尖 各二錢 白芍錢一

水二鍾煎八分空心服

應用方

八珍湯 十全大補湯

八味丸俱見貴 傷門

臟毒論第二十九

夫臟毒者醇酒厚味勤勞辛苦蘊毒流注肛門結成

腫塊其病有內外之別虛實之殊發於外者多實

多熱脉數有力肛門突腫大便秘結肚腹不寬小

水不利甚者肛門肉泛如繭孔頭緊閉此為外發

外科正宗

卷之三

四

屬陽易治宜四順清涼飲內消沃雪湯通利大小

二便痛甚者珍珠散人中白散搽之膿脹痛者針

之發於內者屬陰虛溼熱滲入肛門內臟結腫刺

痛如錐小便淋瀝大便虛秘咳嗽生痰脉數虛細

寒熱往來遇夜尤甚此為內發屬陰難治宜四物

湯加黃柏知母天花粉甘草兼以六味地黃丸調

治候內臟膿出則安又有生平情性暴急縱食膏

粱或兼補術蘊毒結於臟腑火熱流注肛門結而

為腫其患痛連小腹肛門墜重三便乖違或瀉或秘肛門內蝕串爛經絡污水流通大孔無奈飲食不食作渴之甚凡犯此未得見其有生又有虛勞久嗽痰火結腫肛門如粟者破必成漏歷盡氣血必亡此二症乃內傷之故非藥可療不可勉治也

臟毒看法

初起腫痛紅色光亮疼痛有時肛門不墜便和者易已成痲赤腫痛發熱不渴小便不數展轉自便者順

外科正宗

卷之三

吳

已潰膿稠色鮮不臭痲腫消疼痛漸減能食者順潰後膿水漸止新肉易生不疼多痒瘡口易乾者順初起堅硬漫腫為臟閉痛小便頻數大便秘結者險已成疼痛日甚連小腹泄門閉緊下氣不通者重已潰臭水淋漓疼痛不減腫仍不消身熱唇焦者逆

臟毒治法

初起寒熱交作大便秘墜痛脈浮數者宜用輕劑解散已成內熱口乾大便秘結脈沉實而有力者當下之

肛門腫痛常欲便而下墜作痛者導溼熱兼瀉邪火肛門焮腫疼痛小便澀滯小腹急脹者清肝利小便出膿腥臭疼痛不減身熱者養血健脾胃更兼滲溼膿水清稀脾胃虛弱不能收斂者滋腎氣急補脾胃

臟毒治驗

一男子肛門腫突紅紫痛甚以內消沃雪湯二服大便已通數次疼痛稍減外腫上以珍珠散清蜜調搽早晚二次其腫漸消更以涼血地黃湯而痊愈

外科正宗

卷之三

吳

一婦人產後用力太過肛門墜腫疼苦之甚先以枳殼紫蘇煎湯薰洗後以珍珠散加水片猪春髓調搽內以四物湯加升麻蒼朮丹皮枳殼服之而消一男子夏月好飲火酒熱毒流入肛門結腫堅硬形色紫黑墜痛便秘以黃連解毒湯加大黃枳殼二劑便通疼痛稍止又以四物湯合前湯數劑其腫漸消存堅腫粟大不散以臟連丸服至月餘而愈一婦人肛門腫突堅硬痛極用攻利解毒藥俱不應

以神燈照法照之早晚二次其疼方減以蟾酥錠磨濃塗之堅硬漸腐為膿仍服內消沃雪湯二劑便通疼苦減其大半又以四物湯加黃柏知母厚朴蒼朮外以珍珠散加水片猪髓調搽月餘而平男子素有痔便血常欲脫肛一朝肛門墜重不收腫痛突起光亮紫色此溼熱流注結腫固難收入以黃連除溼湯二劑外用珍珠散加水片清毒調塗其腫痛漸減後以補中益氣湯加生地黃連

外科正宗

卷之三

四

蒼朮天花粉牡丹皮服之數劑其腫痛漸減而平一監生素性急暴每縱膏梁因積毒流於大腸內如針刺外肛不腫常欲後重便則秘結脰之脉空數而無力此真氣不足邪火有餘內臟虧損症也後必難痊辭不可治後請別醫用藥月餘肛門內腐敗水無禁復請視之予曰決不可療也脉來虛數邪勝正也手掌不澤脾氣敗也至夜發熱陰虛火旺敗水無禁幽門已壞面若塗脂元氣走散鼻如

烟煤肺氣將絕口乾舌燥腎水已竭犯此豈有不死之理患者不服強用解毒滋陰藥餌不効而死臟毒主治方

黃連除溼湯

黃連除溼湯 防風 甘草 硝黃等

蒼朮 陳歸 枳殼 翹

治臟毒初起溼熱流注肛門結腫疼痛小水不利大便秘結身熱口乾脉數有力或裏急後重

黃連

黃芩

川芎

當歸

防風

蒼朮

厚朴

枳殼

外科正宗

卷之三

四

連翹

各一錢

葶草

五分

大黃

朴硝

各二錢

水二鍾煎八分空心服

涼血地黃湯

涼血地黃湯 連翹 人參 花粉 茯苓 芍藥

生地 芍藥 枳殼 木地 榆 山梔 加上 効應 手

治臟毒已成未成或腫不腫肛門疼痛大便墜重或泄或秘常時便血頭暈眼花腰膝無力者

川芎

當歸

白芍

生地

白朮

茯苓

各一錢

黃連

地榆

人參

山梔

天花粉

甘草

各五分

水二鍾煎八分食前服

內托黃芪散

內托黃芪散芍歸
角針白木栝榔等

川芎山甲其陳皮
臙毒將成此藥醫

治臙毒已成紅色光亮已欲作膿不必內消宜

服此藥潰膿

川芎

當歸

陳皮

白木

黃芪

白芍

穿山甲

角針各一錢

栝榔三分

水二鍾煎八分食前服

外科正宗

卷之三

五

黃連解毒湯

見癰疽
腫瘍門

治好飲法酒縱食膏粱積熱流入大腸致肛門

結成腫痛疼刺如錐堅硬如石宜服

金液戊土膏

見癰疽
疽門

治臙毒出於驕奢情性慣於急暴烈火猖狂思

不如願水已枯竭火不發泄旺而又鬱鬱而又

旺以致肛門結腫毒攻內臟痛如芒刺熾如火

坑臭水淋漓生命難望宜服此藥免生惆悵也

珍珠散

見一
癰疽門

治肛門腫泛如箍紅紫急脹堅硬痛極本方加

冰片研極細猪脊髓調塗患上早晚日用二次

應用方

六味地黃丸

見肺
癰門

四順清涼飲

見湯液
火燒門

內消沃雪湯

神燈照法

蟾酥錠

俱見腫
瘍門

四物湯

補中益氣湯

俱見潰
瘍門

人中白散

外科正宗

卷之三

五

珍珠散

俱見下
癰疽門

臙連丸

見痔
瘡門

痔瘡論第三十

夫痔者乃素積溼熱過食炙博或因久坐而血脉不

行又因七情而過傷生冷以及擔輕負重竭力遠

行氣血縱橫經絡交錯又或酒色過度腸胃受傷

以致濁氣瘀血流注肛門俱能發痔此患不論老

幼男婦皆然蓋有生於肛內之因又突於肛外之

傍治分內外各自隄防大者若蓮花蜂巢翻花雞

冠菱角珊瑚等狀小者如櫻珠鼠尾牛奶雞心核
桃覬肉之形故積毒深者其形異而頑惡毒淺者
其形正而平常久則崩潰成漏新則墜腫刺疼甚
者糞從孔出血從竅流氣血日有所傷形容漸有
所削若不早治終至傷人因常治法多用針刀砒
啣線墜等法患者受之苦楚聞此因循都不醫治
予療此症藥味數品從火煨煉性即純和百試百
驗此方法由來異矣凡療內痔者先用通利藥湯

外科正宗

卷之三

五三

滌臟腑然後用喚痔散塗入肛門片時內痔自然
泛出即用葱湯洗淨搽枯痔散早午晚每日三次
次次溫湯洗淨搽藥輕者七日重者十一日其痔
自然枯黑乾硬停止枯藥其時痔邊裂縫流膿換
用起痔湯日洗一次待痔落之後換搽生肌散或
鳳雛膏等藥生肌斂口虛者兼服補藥其口半月
自可完矣外痔者用消毒散煎洗隨用枯痔散照
內痔搽法用之首尾至終無異完日百日入房乃

古又至於穿腸久漏者此則另有二方亦具於後
以致深患者服之又不用針刀掛線効如拾芥耳
痔瘡看法

初起形如牛奶不腫不紅無焮無痛行走不覺者輕
已成腫痛有時遇勞而發或軟或硬頭出黃水者輕
久如雞冠蜂巢蓮花翻花等狀流膿出血不止者重
久漏竅通臀腿膿水淋漓疼痛不已糞從孔出者逆
痔瘡治法

外科正宗

卷之三

五三

初起及已成漸漸大而便澁作痛者宜潤燥及滋陰
肛門下墜大便去血時或疼痛堅硬者宜清火滲溼
紫色疼痛大便虛秘兼作痒者涼血祛風疎利溼熱
腫痛堅硬後重墜刺便去難者外宜薰洗內當宣利
內痔去血登廁脫肛而難上收者當健脾升舉中氣
便前便後下血面色痿黃心忪耳鳴者宜養血健脾
諸痔欲斷其根必須枯藥當完其竅必杜房勞乃愈
痔瘡治驗

一男子患痔六年每遇酒色勞役痔則發腫堅硬疼
 苦十餘日方得稍可彼欲斷其根以枯痔散上至
 七目外其痔漸黑裂縫至十六日痔枯脫落孔若
 雞心以生肌散逐日用之內補養血健脾藥而愈
 一男子患痔焮腫作痛大便結燥脉數有力以內疎
 黃連湯二服便行痛止又以四物湯加芩連枳殼
 天花粉數劑而腫消更以臟連丸一料而不復發
 一男子患痔凡遇勞發腫作痛以枳殼湯薰洗內服
 外科正宗 卷之三 五十四

防風秦艽湯數服腫痛俱減令彼常洗前湯每月
 五六次內與六味地黃丸加黃柏知母服之不發
 一男子好飲多慾內痔虛墜下血以四物湯加芩連
 升麻葛根數服虛墜乃止又以當歸郁李仁湯二
 劑痔腫亦消更服臟連丸月餘便血亦止又月餘
 兼節酒色不發大抵醉飽入房經脉橫解或精氣
 泄脉絡必虛酒食之毒乘虛流結或淫極強固
 精氣以致收精濁血遂傳大腸或飲食厚味燥

淫流注俱成斯疾所患病者燥氣也為病者淫氣
 也初宜瀉火和血潤燥疎風久宜養血滋陰健脾
 滲溼治之自愈若不節酒色不慎起居不戒口味
 破必成漏久則穿腸串臀穢從孔出臭水淋漓晝
 夜無禁凡得此者雖不傷生每苦瘡汚可歎息哉
 一男子患痔十餘年頭已穿潰未及通腸每發疼苦
 以三品一條鎗插至七日痔變黑色瘡邊漸漸裂
 縫至十五日脫落以鳳雛膏搽至半月口欵而平
 外科正宗 卷之三 五十五

一男子怯弱內痔便血面色痿黃自服涼血止血藥
 不應脰之脾脉虛而無力此中氣不足不能統血
 以補中益氣湯十餘服精神頓倍便血亦少又以
 加味四君子湯兼前湯間服月餘不發大抵此症
 所致之由不同當究其因治之如元氣有餘形黑
 氣盛先糞而後紫血者更兼脉實有力此屬有餘
 法當涼血止血藥應自効至若形體瘦弱面色痿
 黃先鮮血而後糞者更兼脉虛無力此屬不足豈

可反用涼藥止之致傷脾胃此症若不溫中健脾
升舉中氣其血不得歸原故藥難効遠其根本也
痔瘡主治方

防風秦艽湯 防風秦艽湯芍歸 芍草草地地黃隨 枳翹根角山柅殼 白芷還兼蒼木宜

治痔瘡不論新久肛門便血墜重作疼者並効

防風 秦艽 當歸 川芎

生地 白芍 赤茯苓 連翹 各一錢

枳殼 甘草 梔子 地榆

外科正宗 卷之三

枳殼 槐角 白芷 蒼木 各六分

水二鍾煎八分食前服便秘者加大黃二錢

提肛散 提肛散內用芍歸 參木芪陳甘草隨 升麻柴芩併白芷 加上黃連効可奇

治氣虛肛門下墜及脫肛便血脾胃虛弱等症

川芎 歸身 白朮 人參

黃芪 陳皮 甘草 各一錢 升麻

柴胡 條芩 黃連 白芷 各五分

水二鍾煎八分食遠服渣再煎服

加味四君子湯 加味四君子湯木 茯苓扁豆 黃芪甘草姜棗等 痔瘡脾倦効如神

治痔瘡痔漏下血不止面色痿黃心松耳鳴脚

弱氣乏及一切脾虛口淡食不知味又治中氣

虛不能攝血致便血不禁者並効

人參 白朮 茯苓 白扁豆

黃芪 炙 甘草 炙各一錢

水二鍾薑一片棗二枚煎八分食前服

當歸郁李湯 當歸郁李湯生地 大黃澤瀉共秦艽 麻仁枳殼併蒼木 皂子相兼用莫逃

外科正宗 卷之三

治痔大便結燥大腸下墜出血苦痛不能忍

當歸 郁李仁 澤瀉 生地黃

大黃 枳實 蒼木 秦艽 各一錢

麻子仁 研一錢五分 皂角 一錢

水二鍾煎八分空心服

芎歸湯 芎歸湯內用芍歸 失血虛羸大得宜 婦人產後虛煩熱 煎等頃刻脫肛

治便血或失血過多兼婦人產後血虛煩熱頭

眩昏暈盜汗等症並効

川芎三錢 當歸酒拌五錢

水二鍾煎八分食前服自汗手足冷者加入參二錢

三黃二地湯三黃二地湯蒼朮厚朴陳皮白朮歸身

治腸風諸痔便血不止及面色痿黃四肢無力

生地黃各一錢半 熟地各一錢半 蒼朮 厚朴

陳皮 黃連 黃柏 黃芩

歸身 白朮 人參各一錢 甘草

外科正宗 卷之三 五八

防風 澤瀉 地榆各六分 烏梅二個

水二鍾煎八分食前服

粟殼散粟殼散內用歸身生熟地黃蒼朮厚朴

治諸痔作疼及腸風下血諸藥不止者宜服之

粟殼溫湯泡去內穢去蒂切絲蜜水拌炒土錢 當歸

陳皮 秦艽 黃芪 生地黃

熟地各一錢 黃柏 黃芩 人參

蒼朮 厚朴 升麻各六分 荷葉蒂七個

甘草五分 地骨皮一錢二分

水一鍾煎八分食前服或為細末每服二錢空

心溫酒調服

洗痔枳殼湯洗痔枳殼湯損痛癩蝦蟆草相成其用此煎湯洗痔瘡諸般疼苦隨時送

治痔瘡腫痛肛門下墜毋論新久洗之腫自消

枳殼二兩 癩蝦蟆草一名荔枝草四季常有而青背白麻紋墨墨者

是二兩

河水三歌同上二味煎數滾洗薰後洗良久湯

外科正宗 卷之三 五九

留再熱薰洗甚者三次即消洗淨當搽後藥

五倍子散五倍子散蝦蟆草加上輕粉水片好痔瘡腫痛及腫疼男之搽上如同掃

治諸痔舉發堅硬疼痛難忍或膿毒肛門流出

腫硬不收亦効五倍子大者敲一小孔用陰乾

癩蝦蟆草搽碎填塞五倍子內用紙塞孔濕紙

包煨片時許取出待冷去紙碾為細末每有一

錢加輕粉三分水片五厘共研極細待前湯洗

後用此乾搽痔上即腫勿動其腫痛即除凡外

痔。用二方搽洗。亦可除根。永不復發。極効極効。

田螺水

田螺水治痔瘡。木片加之効罕聞。脫肛諸痔雖難愈。將來一掃効如神。

治痔瘡堅硬作痛。及脫肛腫泛不收者。並用之。

以大田螺一枚。川大冰片五厘。研末。川尖刀挑

起螺蓋。將冰片入內。平放。片時。待螺滲出漿水。

用雞翎蘸搽患處。勤勤掃之。其腫痛自然消散。

喚痔散

喚痔散中刺蝟皮。草烏鹽射共能醫。枯藥冰片同研末。津唾調搽痔出齊。

凡醫內痔不得出。用此藥填入肛門。其痔即出。

草烏

生用一錢。刺蝟皮一錢。燒存性。

枯藥五錢。

食鹽炒三錢。麝香五分。冰片二分。

右碾細末。先用溫湯洗淨肛門。隨用津唾調藥

三錢。填入肛門。片時。痔即當出。去藥。上護痔膏。

護痔膏

護痔膏中用石膏。黃連。冰片。射香。麝。還加白芨。同為末。蛋白相調。効豈淺。

用喚痔散。痔出之後。先用此藥。圍護四邊好肉。

白芨

石膏

黃連

冰片

麝香

各分

共碾細末。雞蛋清調成膏。護住四邊好肉。方上

枯痔散

枯痔散

枯痔散內用白礬。蟾酥。輕粉。共研良。再加童子天靈蓋。枯痔方中効豈凡。

凡痔瘡泛出。即用此藥塗之。年淺者五七日。年

深者八九日。待痔乾黑後。不用此藥。每日用落

痔湯洗之。

白礬

蟾酥

輕粉

砒霜

天靈蓋

四錢。用青線木浸以天靈蓋。蓋紙紅水內浸。煨七次。

外科正宗

卷之三

痔

共研極細末。入小新鐵鍋內。上用瓦磁碗密蓋

鹽泥封固。炭火煨至二炷。京香待冷。取開將藥

研末。搽痔上。每日辰午申三時。用溫湯洗淨。上

藥三次。上至七八日。其痔枯黑。堅硬。住藥。裂縫

待其自落。換洗起痔湯。

起痔湯

起痔湯中。芍藥。連。防風。甘草。山柰。等。朴硝。槐角。共煎。煎

治諸痔。上枯藥之後。黑色堅硬。裂縫。宜此藥洗

黃連

黃柏

黃芩

大黃

防風 荊芥 槐芽 槐角

苦參 甘草各一兩 朴硝五錢

已上藥分作三次用水煎洗待痔落之後換搽

生肌散

生肌散乳香沒藥 海螵蛸龍骨黃丹 赤石脂輕粉熊胆 珍珠冰片須參

治痔上枯藥之後脫落孔竅不收者宜用此搽

乳香 沒藥各一兩 海螵蛸水煮五錢

黃丹飛炒四錢 赤石脂煨七錢 龍骨煨四錢

外科正宗 卷之三 李

血鈞三錢 熊膽四錢 輕粉五錢 冰片一錢

麝香八錢 珍珠煨二錢

共研極細末磁罐收貯早晚日搽二次蓋膏漸

歛而平

洗痔腫痛方 洗痔腫痛方朴硝 魚腥草棟不相饒 還有瓦花馬齒莧 煎湯薰洗痔瘡消

魚腥草 苦棟根 朴硝 馬齒莧

瓦楞花各一兩

水十碗煎七八碗先薰後洗諸痔腫痛可消

人中白散見口痔門

治諸痔腫痛堅硬墜重脫肛等症先用溫湯洗淨隨後搽藥患上即卧勿動其腫痛漸減此藥常有便於痔故附錄而用之

三品一條鎗見瘰癧門

治十八種痔漏凡用藥線插入痔孔內早晚二次初時每次插藥三條四日後每次插藥五六條上至七八日藥力滿足痔變紫黑方住插藥

外科正宗 卷之三 李

候痔四邊裂縫流膿至十四日期滿痔落用甘

草湯洗淨換搽鳳雛膏或玉紅膏俱可塗肌收

欽虛弱者兼服養血健脾之藥最為穩當大抵醫人能取痔者皆此方也不可輕其藥而棄之

生肌鳳雛膏 生肌雞卵鳳雛膏 乳香輕粉不相饒 血鈞再加白龍骨 生肌長肉發生苗

用雞蛋煮熟去白用黃十餘個銅杓內熬油傾

入盞內約油三錢加輕粉細末一錢乳香血鈞

龍骨各末五分共入油內和勻每日早午晚雞

翎蘸塗患孔內膏蓋避風深者半月可以完口

煮線方

煮線方中用壁錢 先花二味共相煎 白線扣線將同煮 諸痔瘻瘡用此搨

治諸痔及五癭六瘡凡蒂小而頭面大者宜用此線繫其患根自効

先花 錢五 壁錢 錢二

用白色細扣線三錢同上二味用水一碗盛貯小磁罐內慢火煮至湯乾為度取線陰乾凡遇前患用線一根患大者二根雙扣繫于根蒂兩

外科正宗

卷之三

李四

頭留線日漸緊之其患自然紫黑米冷不熱為度輕者七日重者十五日後必枯落後用珍珠散收口至妙

臙連丸

臙連丸本是黃連 借臙將來灌煮煎 同搗為丸溫酒服 敢教諸痔不纏綿

治痔無論新久但舉發便血作痛肛門墜重者黃連淨末八兩用公術大臙盡頭一段長一尺二寸溫湯洗淨將連末灌入臙內兩頭以線扎緊用時酒二斤半砂鍋內煮酒將乾為度取起

臙藥共搗如泥如藥爛再晒一時許復搗丸如

桐子大每服七十九空心溫酒送下久服除根

胡連追毒丸

胡連追毒丸求異 痔漏通腸効罕稀 麝香刺蝟皮丸服 排盡瘀膿換好肌

治痔漏不拘遠年近日有漏通腸汚從孔出者

先用此丸追盡膿毒服後丸藥自然取効最穩

胡黃連

一兩切片 姜汁拌炒 刺蝟皮 一兩炙切片 再炒黃為末

麝香

軟飯為丸麻子大每服一錢食前酒下服藥後

外科正宗

卷之三

李五

膿水反多是藥力到也勿懼之

黃連閉管丸

胡連閉管丸類易 得此之功難上難 決明山甲槐花等 服下憂容換笑顏

胡黃連

淨末 穿山甲 麻油內 煮黃色 石決明 煨

槐花

微炒各 末五錢

煉蜜丸如麻子大每服一錢空心清米湯送下早晚日進二服至重者四十日而愈此方不用針刀挂線不受苦楚誠起痼疾之良方也如漏之四邊有硬肉突起者加蚕繭二十個炒末和

入藥中此及遍身諸漏皆効

痔瘡應用方

內疎黃連湯

見腫瘍門

補中益氣湯

四物湯

俱見潰瘍門

六味地黄丸

見肺癰門

下疳論第三十一

下疳者邪淫慾火鬱滯而成其來有三一由男子慾念萌動陽物與舉淫火猖狂而未經發泄者以致敗精濁血流滯中途結而為腫者一也二由婦人

外科正宗

卷之三

六六

陰器瘀精濁氣未淨接與交媾以致淫精傳襲而成者二也三由房術熱藥塗抹玉莖洗搽陰器與助陽火煽動陰精僥倖不衰久頓不泄多致火鬱未發而成者三也男子萌念火鬱之症初起先必澀淋小便溺痛次流黃濁敗精陽物漸損甚則腫痛腐爛法當疎利肝腎邪火如八正散清肝導滯湯之類是也婦人陰器不潔初起先從皮腫光亮甚如水晶皮破流水腫痛日生痒麻時發治當解

毒消風如龍膽瀉肝湯兼平胃散合而用之男婦房術所傷蘊毒所致初起陽物痒痛堅硬紫色疙瘡漸生腐爛漸作血水淋漓不時與舉治當瀉火解毒如黃連解毒湯蘆薈丸之類是也外以銀粉散珍珠散人中白散選用又有先發時瘡誤用薰條擦藥結毒於此者詳註結毒門不在此類推之

下疳看法

初起不紅不腫睡不舉陽玉莖微損小水自利者輕

外科正宗

卷之三

六六

已成微熱微腫皮色光亮小便赤色更兼白濁者平已損肉色紅活焮無堅腫小便不疼大便不秘者可初起小便淋漓次損陽物堅硬作疼腐爛漸開者險已成腐潰內攻傷損玉莖色紫無膿疼如針刺者重

下疳治法

初起腫痛發熱小水澀滯肝經溼熱也宜瀉肝滲溼腫痛堅硬焮發寒熱口燥咽乾大便秘者通利二便玉莖腫痛小便如淋自汗盜汗時或尿血清心滋腎

莖竅作痒時出白濁發熱口乾津液少者益腎清心
潰後腫痛小便赤澀日則安靜夜則疼甚滋陰瀉火
潰爛不已腫硬又作疼痛日深穢氣不回清肝解毒

下疳治驗

一童子十五歲玉莖腫痛外皮浮腫比常龐大一倍
他醫治之以解毒清肝等藥愈腫愈痛予視之亦
用瀉火清熱滲溼等劑俱不見効胗之脉細數而
無力此中氣不足脾經溼水乘虛流注停聚不散

外科正宗

卷之三

六六

當行從治法也以四物湯合平胃散加水香熟附
子人參各五分一服腫痛頓退又四五服而全消
一男子腫痛發寒熱以荆防敗毒散二服而退又以
龍胆瀉肝湯腫痛亦減用四物加黃柏知母而消
一男子年四十色慾過度小便澀痛出如白漿結凍
成塊此腎傷溼熱為患朝以八味九午用八珍湯
加山萸牡丹皮黃柏知母服之月餘而澀腫亦退
小便漸清但竅中常有滑精不時滲出久致腰灣

脚膝無力偶以三因勝駿丸服至月餘前症悉愈

一男子莖頭腐爛小水澀痛外以珍珠散內服木通

湯四服澀痛亦止更服四物湯加黃柏花粉而痊

一男子初婚玉莖傷損出血疼甚先以慈湯浸洗良

久隨用珍珠散加水片摻之腐皮漸乾痛亦漸止

內服四物湯加水通山梔四服其腫痛漸止而愈

一男子皮腫光亮發熱疼甚外敷如意金黃散內服

龍膽瀉肝湯加大黃便痛稍愈去大黃又服而消

外科正宗

卷之三

六七

下疳主治方

清肝導滯湯 清肝導滯湯瞿麥 滑石 甘草 併扁蓄
大便秘之加大黃 燈心為引空心服

治肝經溼熱玉莖腫痛小水澀滯作疼者服之

扁蓄 四錢 瞿麥 三錢 滑石 二錢 甘草 一錢

大黃 二錢 秘加

水二鍾燈心二十根煎八分空心服

龍膽瀉肝湯 龍膽瀉肝湯地黃 車前 澤瀉 麥冬 當
黃 梔子 甘草 等 溼用黃連 秘大黃

治肝經溼熱玉莖患瘡或便毒懸癰小便赤澀

或久潰爛不愈又治陰囊腫痛紅熱甚者並効

龍膽草 連翹 生地黃 澤瀉各一錢

車前子 木通 歸尾 山梔

甘草 黃連 黃芩各五分 大黃二錢便秘加

水二鍾煎八分食前服

清肝滲溼湯清肝參瀝湯二木 山梔澤瀉川芎等 苓朴昆陳粉木通 當歸甘草木香同

治陰囊玉莖溼腫如猪肚小水不利墜重作痛

蒼朮 白朮 茯苓 山梔

外科正宗 卷之三

厚朴 澤瀉 陳皮 木通

天花粉 昆布各一錢 甘草五分 木香三分

川芎 當歸各六分

作熱紅色加黃連龍膽草各七分

水二鍾煎八分空心服

清心蓮子飲清心蓮子飲黃芩 赤茯苓人參地骨皮 黃芩甘草併澤瀉 麥冬加上勁堆題

治心經蘊熱小便赤澀玉莖腫痛或莖竅作疼

及上盛下虚心火炎上口苦咽乾煩躁作渴

治虛陽口乾小便白濁夜則安靜晝則發熱者

石蓮肉 黃芪 黃芩 赤茯苓

人參名一錢 炙甘草 澤瀉 麥門冬

地骨皮各五分

水二鍾煎八分空心併食前服

八正散入正散中用木通 車前瞿麥大黃同 扁蓄山梔併滑石 加之甘草効無窮

治肝經積熱小便淋閉不通及一切淋病俱効

大黃 車前子 瞿麥 扁蓄

外科正宗 卷之三

山梔 木通 甘草各一錢 滑石二錢

水二鍾煎八分食前服

解毒木通湯解毒木通湯栝連 膽草山梔蘆薈全 瞿麥滑石併甘草 還用燈心作引煎

治男婦房術熱藥所傷致玉莖陰戶痒痛小水

澀滯白濁滑精至夜陽物與舉不得眠者服之

木通 黃連 龍膽草 瞿麥

滑石 山梔 黃柏 知母各一錢

蒼蘆 甘草各五分

水二鍾燈心二十根煎八分食前服

蘆薈丸

蘆薈丸中用二連 蘆薈鶴虱共雷九 青皮麝木香同等 餅糊丸來共此全

治下疳潰爛作痛又治婦人陰蝕瘡作痒及小

兒肝積發熱口鼻生瘡牙齦蝕爛等症

胡黃連 黃連 蘆薈 白蕪荑

青皮 白雷丸 鶴虱草 各一兩

麝香一錢 木香三錢

右為末蒸餅糊丸如麻子大每服一錢空心清

外科正宗

卷之三

三

米湯送下

銀粉散

銀粉散効真罕稀 錫炒硃砂効不微 輕粉水銀併煨粉 下疳結毒敢相違

治下疳毋論新久但腐爛作痛及楊梅瘡薰後

結毒玉莖腐爛或陽物半傷半全者並宜用之

好錫六錢化開水硃砂末二錢攪炒砂枯去砂

留錫再化開按水銀一兩和勻傾出聽用杭粉

一兩研細鋪夾紙平山土捲成一條一頭點火

煨至紙盡為度吹去灰用粉同前未錫加真輕

粉一兩共成一家研細凡遇前患先用甘草湯

淋洗挹乾隨用此藥搽止止痛生肌收斂極妙

珍珠散

珍珠散効實堪誇 輕粉還兼紅丁花 諸腫諸瘡諸痛疾 用之一搽自無他

治下疳皮損腐爛痛極難忍及諸瘡新肉已滿

不能生皮又湯潑火燒皮損肉爛疼痛不止者

青缸花

五分如無用頭刀說花輕虛色 翠者代之終不及缸花為妙

珍珠

一錢不論大小以新白為上入豆 腐內煮數滾研為極細無聲方用

真輕粉一兩

外科正宗

卷之三

三

右三味共研干轉細如飛麵方入確收凡下疳

初起皮損搽之即愈腐爛疼痛者甘草湯洗淨

猪脊髓調搽如諸瘡不生皮者用此乾搽即可

生皮又婦人陰蝕瘡或新嫁內傷痛甚者亦可

此搽極効湯潑火燒痛甚者用玉紅膏調搽之

疔瘡簡便方

用油透羅段舊帽沿燒灰杭粉瓦上煨黃色各

等分共研極細磁確收貯先用紅棗十五個其

草三錢煎湯溫洗患上挹乾搽藥即効

太乙膏 見腫瘍門

治玉莖皮損疼痛不止者用此貼之其疼即止

應用方

四物湯

八味丸

八珍湯 俱見潰瘍門

三因勝駿丸 見附骨疽門

魚口便毒論第三十二

夫魚便者左為魚口右為便毒總皆精血交錯生於

外科正宗

卷之三

三十四

兩胯合縫之間結腫是也近之生於小腹之下陰

毛之傍結腫名曰橫痃又名外疝是也得之入房

恐精強固不洩或慾念已萌停而不遂以致精血

走動凝滯結而為腫治當散滯行瘀通利大小二

便九龍丹山甲內消散是也七日已後服之根本

堅固恐其作膿宜用火針法刺之亦妙已出膿者

十全大補湯服之易收斂遲則恐生別症難愈

魚口便毒看法

初起結腫不紅微熱行走稍便無寒熱交作者為輕

已成紅赤腫痛發熱焮疼舉動艱辛至夜尤甚者易

已潰膿稠肉色紅活腫消痛止新肉易生作痒者順

初起結腫堅硬如石牽強刺疼起坐不便寒熱者重

已潰腐爛腫痛不減膿水清稀孔深口大不斂者險

魚口便毒治法

初起漫漫結腫疼痛兩胯牽強身發寒熱宜散表邪

已成堅硬發熱疼痛內熱口乾大小便秘宜通利之

外科正宗

卷之三

三十五

發散疎利之後腫痛仍作欲其作膿宜用托裏消毒

焮腫發熱疼痛日久急脹甚甚內膿已成宜急開之

已潰之後膿水不乾新肉生遲不斂健脾胃補氣血

魚口便毒治驗

一男子左胯腫痛身發寒熱脈弦而數以人參敗毒

散一劑表症悉退次以山甲內消散三劑而痊消

一男子橫痃腫痛堅硬二便澀滯以九龍丹一服通

利大便秘腫痛稍減間日又用一服三便通利而消

一男子患此十餘日形勢已成腫痛日甚因公事急出不能行走以火針法針之出紫血鍾許外用膏貼拔出微膿服托裏消毒散而便可行亦且速愈

一男子潰而口大不斂此先泄藥之過也以未金大補湯加澤瀉丹皮十餘劑外搽玉紅膏月餘而斂

一男子先出疔瘡久之不愈後發橫痃十餘日始生腫痛予欲托裏潰膿以泄毒氣彼欲內消自服槐花酒蜈蚣全蝎等藥腫未得消元氣已損轉致筋

外科正宗

卷之三

七六

骨疼痛舉動艱辛仍復請治形體瘦弱脈虛而數此真元受傷邪氣從之雖當補養後必欲發時瘡方愈彼不為信自仍服敗毒消風等藥元氣愈虛飲食不進筋骨疼甚徹夜不睡又復請治先用補中益氣湯倍參芪六服元氣稍醒又以八珍湯加麥門冬五味子遠志酸棗仁牡丹皮十餘服夜間方睡惟疼痛不能大減此內虛瘡毒下陷故難取効朝以六味丸午服十全大補湯又十餘服遍身

方發紅點此瘡毒欲出仍服前藥紅點漸高始成瘡樣彼時瘡毒一出疼痛頓減元氣漸復更服八珍湯加米仁銀花土茯苓服至半年其瘡方得漸漸而痊彼悔執方治病之尤始信因病用藥之妙

魚口便毒主治方

山甲內消散

山甲內消散大黃木鱉牽牛同協力

加上姜蚕甘草當魚口便毒自無妨

治魚口便毒騎馬癰橫痃等症初起未成膿者

當歸稍

甘草節

大黃

各三錢

穿山甲

外科正宗

卷之三

三七

姜蚕

黑牽牛

各一錢

土水鱉

三錢

水酒各一碗煎八分空心服渣再煎服大便秘三四次方吃稀粥淡味飲食為妙

九龍丹

九龍丹藥真堪羨木香巴豆等分同

魚便橫痃立消見

治魚口便毒騎馬癰橫痃初起未成膿者服之

兒茶

血蚶

乳香

沒藥

巴荳

不去油

木香

右各等分為末生蜜調成餅磁盒盛之臨時

旋丸寒豆大每服九九空心熱酒一杯送下行

四五次方喫稀粥腫甚者間日再用一服自消

紅花散瘀湯 紅花散瘀湯蘇木 麴貝姜蚕乳決明 歸尾大黃角針等 牽牛山甲酒煎行

治入房忍精強固不泄以致瘀精濁血凝結兩

脰或小腹之傍結成腫痛小水澁滯者並服之

當歸尾 皂角針 紅花 蘇木

姜蠶 連翹 石決明 穿山甲

乳香 貝母 各一錢 大黃 二錢 牽牛 二錢

外科正宗 卷之三 三八

水酒各一碗煎八分空心服行五六次方吃稀

粥補之

黃芪內托散 黃芪內托散芍歸 白朮銀花澤瀉 花粉角針與甘草 魚口便毒此能醫

治魚口便毒橫痃等症已成不得肉消者服之

川芎 當歸 黃芪 各三錢 白朮

金銀花 天花粉 皂角針 各一錢

甘草 澤瀉 各五分

水二鍾煎八分食前服

玉紅膏 見潰瘍門

治魚口便毒橫痃癩潰口不合者用此搽之効

火針法 火針之法由來異 勝如服藥併奇治 將針一點破皮裏 腫消痛止隨遊戲

治魚口便毒橫痃等症用行藥不得肉消者用

麴線針二條將竹筋一頭劈開將針離分半許

夾在筋頭內以線扎緊用桐油燈盞內貯之燈

草五根排入油內點着用針蘸油燒紅向患頂

重手刺入五六分隨出或血或膿以膏蓋貼即

外科正宗 卷之三 三九

得輕便以後漸愈虛者兼服十全大補湯

應用方

托裏消毒散 見腫瘍門 十全大補湯

補中益氣湯 八珍湯 俱見潰瘍門

六味地黃丸 見肺癰門

囊癰論第三十三

夫囊癰者乃陰虛溼熱流注於囊結而為腫至潰後

罌丸懸挂者猶不傷人以其毒從外發治當補陰

清利溼熱取効者十有八九近時人誤用疝家熱藥多致熱甚為膿慮難收斂初宜龍膽瀉肝湯稍久滋陰內托散外敷如意金黃散俱可內消又一種水疝皮色光亮無熱無紅腫痛有時內有聚水宜用針從便處引去水氣則安如腫痛日久內膿已成脹痛者可即針之內服十全大補湯加山茱萸牡丹皮澤瀉治之間以六味地黃丸服之亦愈

囊癰看法

外科正宗 卷之三

八

初起不紅微腫腎子引痛不作寒熱起坐自便者輕已成紅腫發熱形色光亮疼痛有時飲食有味者順已潰膿稠腫消痛止新肉漸生不痛作痒收斂者吉潰後腐爛囊皮脫落甚者罌九突出能食不痛者可初起堅硬紫色日夜痛甚小便不利大便秘泄者重已成堅而不潰頭腐無膿疼痛無時常流血水者重潰後膿口開張腫痛不減身發寒熱睡臥不寧者重

囊癰治法

初起寒熱交作腎子腫痛疼連小腹者宜發散寒邪已成紅腫發熱口乾焮痛小便不利大便秘者利之已潰疼痛不減膿水清稀朝寒暮熱者宜滋陰內托潰後不能收斂日晡發熱飲食減少者宜養血健脾潰後罌九懸挂不能收斂者當外用生肌內加補托

囊癰治驗

一男子風寒未經發散寒中腎囊作腫痛甚以萬靈丹一服洗浴發汗寒邪頓退又以四物湯加澤瀉

外科正宗 卷之三

全

蒼朮山梔天花粉外敷如意金黃散數次而痊消一男子囊腫甚大不熱脹疼按之軟而即起此濕水流注聚而不散以披針導去黃水碗許以導水消腎丸服月餘而腫消又以木香補腎丸服之不作一男子患此十餘日腫甚脹痛內膿已成針之出膿碗許以十全大補湯加澤瀉丹皮十餘劑而收斂一老年人素有疝氣因怒傷肝舉發疼痛自服盤慈散熱藥腫痛益甚視之腎囊半邊堅硬皮損紫黑

此欲腐爛見等九候也彼不為信尚欲內消請別醫治之內服龍膽瀉肝湯外敷四黃散寒涼等藥堅硬果腐飲食少進虛熱不睡痛甚昏憤又復請治予曰凡病有主末治有權宜初起以藥治疔非疔也凡疔為患小腹作疼牽引腎子多寒少熱好飲熱湯此症乃惱怒傷肝陰虛溼熱為患其囊紅腫發熱小便赤澁內熱口乾墜重作痛此為囊癰之候初宜清利溼熱而後用疔家熱藥已成宜用

外科正宗

卷之三

全三

補陰況又用瀉肝涼劑此年老氣血有虧攻補機關已悞其疾豈有不致危亡者即當養氣血固根本為主而佐以安神定痛之藥接補元氣死生在進退之間尚可轉也隨以八珍湯加麥冬五味子遠志牡丹皮外以甘草湯淋洗腐上將已壞黑肉盡行剪落其舉九已露數日後其患得於補方前症漸退飲食漸進外腐已盡腎子已突大半搽玉紅膏外以膏蓋長肌漸收調理半年外而得始安

一男子腫痛十餘日堅硬無膿囊頭腫上紫色作爛此欲外腐以蟾酥錠為末搽上膏蓋三日腐肉脫下搽玉紅膏太乙膏掩之內服補陰滋腎藥而安一男子慾後受寒致陰囊牽引小腹作痛惡寒發熱脰之脈緊數而無力以五積散一服寒熱乃退痛亦稍止更以八珍湯加肉桂丹皮澤瀉數服而愈

囊癰主治方

清肝摻溼湯 清肝摻溼湯歸地 芍芍柴通澤瀉山梔胆草天花粉 燈心甘草効如神

外科正宗

卷之三

全三

治囊癰肝經溼熱結腫小水不利發熱癩痛者

川芎 當歸 白芍 生地

柴胡 龍膽草 山梔 天花粉

黃芩 各一錢 澤瀉 木通 甘草 各五分

水二鍾燈心二十根煎八分食前服

滋陰內托散 滋陰內托散芍歸 白芍還兼熟地芪角針澤瀉併山甲 囊癰日久服和宜

治囊癰已成腫痛發熱服之有膿即可穿潰也

當歸 川芎 白芍 熟地

黃芪 各一錢半 皂角針 澤瀉 穿山甲 各五分

水二鍾煎八分食前服

導水消腎丸 導水消腎丸功捷 更加肉桂老米等 打糊丸成建大功

治囊癰內傷生冷外受風寒以致寒溼侵入囊

中小者如升大者若斗皮膚頑厚腸物短縮小

水不利不痛多冷俗稱沙痞是也宜服此藥引

導水氣日久漸消終身不為癆疾也此方常驗

茅山蒼朮 一斤米泔水 浸切片炒黃 木通 半斤

外科正宗 卷之三 八四

肉桂 一兩刮去麋皮 牽牛 二兩微炒 木香 兩

共為細末陳米粉打糊丸如桐子大每服百丸

空心白滾湯濟米湯任下忌生冷麵食此囊雖

夏月炎天亦以衣被覆之為妙

灸偏墜法 偏墜灸法最多靈 晴日將末仰臥身 木腎盡頭為灸穴 安來七壯自然平

候取天晴不犯人神日患者平身仰臥取木腎

子根下硬根盡處以墨點記用安豆大艾炷三

年之內灸七壯年久者灸九壯十一壯為止內

服木香補腎丸戒食生冷兼忌房事百日為妙

木香補腎丸 木香補腎丸精地黃 藜蘆 杜仲 歸 丁香 茴香 枸杞 杜仲 人參 青鹽 杜仲 杜仲

治偏墜一名木腎不疼不痒漸漸而大最為頑

疾有妨行動多致不便但灸後宜服此藥俱可

內消此藥功效不獨治疝中後宜服之益壽

延年黑髮壯筋填髓明目聰耳補腎助元陽調

飲食其功不可盡述婦人服之顏如童女肌膚

瑩潔如玉又精寒血冷久無嗣息者服之更妙

外科正宗 卷之三 八五

淮慶生地 四兩酒 煮搗膏 兔絲子 肉蓯蓉

黃精 黑棗肉 牛膝 蛇床子 微炒

茯苓 遠志 各一兩 二錢 當歸身 四兩

丁香 三錢 大茴香 木香 各一兩 枸杞子 五兩

巴戟 杜仲 各一兩 青鹽 五錢 人參 五錢

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服六七十九

空心溫酒送下又諸病不常舉發者服之亦宜

如意金黃散 見腫 瘡門

治癰癤初起紅赤腫痛發熱墜重者用慈湯同
密調敷夏月溼熱紅甚者溫茶湯同密調敷妙
應用方

萬靈丹

蟾酥錠

太乙膏

玉紅膏

俱見腫瘍門

十全大補湯

四物湯

俱見潰瘍門

五積散

見附骨並門

龍膽瀉肝湯

見下疳門

懸癰論第三十四

外科正宗

卷之三

六六

夫懸癰者乃三陰虧損溼熱結聚而成此穴在於谷道之前陰器之後又謂海底穴也初生狀如蓮子少痒多痛日久漸如桃李赤腫焮痛欲潰為膿破後輕則成漏重則瀝盡氣血變為癆瘵不起者多矣初起時元氣壯實宜用九龍丹瀉去病根稍虛者內消沃雪湯利去溼熱亦有可消者十中三四如十餘日後腫勢已成不得內消宜托裏消毒散加山甲皂角刺服之自破如腫高光亮膿熟不破

頭者用針急破之穢膿一出其患易安如膿出之後朝以六味地黃丸午以十全大補湯加牡丹皮澤瀉溫補滋陰又有厚味膏梁氣體壯實者初服龍膽瀉肝湯潰服滋陰八物湯以清蘊熱體瘦房勞氣血虛弱者初服八珍湯加澤瀉製甘草潰後十全大補湯加牡丹皮熟附子脾弱者補中益氣湯以滋化源日久成漏者國老膏化湯吞服蠟礬丸首尾候服寒涼損胃傷脾冰凝氣血以致患孔

外科正宗

卷之三

七七

漸開穢膿不止者亦定變成虛癰癆瘵終為難愈
懸癰看法
初起如松子漸大若梅李紅赤腫痛光亮發熱者輕已成高腫作痛根脚不散皮薄易破膿成脹痛者易已潰膿稠而黃氣味不臭焮腫易消痛止作痒者順初起色紫堅硬根脚漫腫痛連醫膝二便不利者重已成腫如黃瓜紫斑腐爛穢水無膿痛甚氣息者難已潰穢膿不絕瘡口開張肉不紅活虛熱食少者逆

懸癰治法

初起寒熱如瘧喜覆衣被口乾好飲熱湯宜當發散已成痲熱作痛內熱口乾喜冷大便秘澀者微利之日久內膿已成不破頭而脹痛者急針之法當補托潰後膿水清稀虛熱不退腫痛不消者宜滋陰健脾瘡口不斂飲食減少餘腫不消新肉不生峻補脾胃

懸癰治驗

一男子結腫四日作痒微痛以九龍丹一服利五六

外科正宗

卷之三

六八

次其腫漸消又以四物湯加花粉黃柏知母而愈

一男子患此十餘日痲腫作痛至晚發熱尤甚又兼

小水不利以龍膽瀉肝湯二服小水稍通微痛不

止此欲作膿以托裏消毒散加穿山甲皂角刺澤

瀉二服而膿出又以十全大補湯服之月餘而斂

一男子患此腫甚脹痛此內膿已成即針之出臭膿

碗許疼痛頓減以十全大補湯十餘服而飲食漸

進痲痛亦消惟瘡口原潰之甚不易完合間用製

甘草吞蠟礬丸外以附子餅灸之調理三月而愈

一男子素有痰火久服降下之藥致此結腫疼痛脉

細而數此陰虛溼熱流注而成潰後必難收斂辭

不治後果出臭膿不禁日漸開大發熱不止飲食

不進強以温中健脾補托氣血藥終至不應而歿

懸癰主治方

滋陰八物湯

滋陰八物湯生地 赤芍丹皮花粉歸 甘草川芎澤瀉等 燈心為引効堪推

治懸癰初起狀如蓮子紅赤漸腫悠悠作痛者

外科正宗

卷之三

六八

川芎

當歸

赤芍

生地

牡丹皮

天花粉

甘草節

澤瀉

分

大黃

便秘加一錢蜜炒

水二鍾燈心二十根煎八分食前服

炙甘草膏

炙甘草膏藥二般 製度熬膏好酒服 當歸其草効常甚 懸癰腫痛盡成惟

治懸癰已成服藥不得內消者服之未成者即

消已成者即潰既潰者即斂此治懸癰良藥也

大粉障四兩用髮流米燻透炭灰上炙乾再浸

再炙如此三度切片甘草三兩當歸身三兩水

三碗慢火煎至稠膏去渣再煎稠厚為度每日

三錢無灰好熱酒一大杯化膏空心服之最妙

選元保真湯選元保真湯四物
甘草黃芪枸杞同
附子肉桂澤瀉入

治懸癰已潰瘡口開張膿水淋漓不能收斂者

當歸 川芎 白芍 熟地

白朮 茯苓 人參 黃芪各一錢

牡丹皮 枸杞子各八分 甘草多

外科正宗 卷之三 五

熟附子各五分 肉桂 澤瀉各三分

水二鍾煨薑三片大棗二枚煎八分食前服

滋陰九寶飲滋陰九寶飲
花粉知母併黃柏
白芍黃連生地隨
大黃煎服効堪題

治懸癰厚味膏梁蘊熱結腫小水澀滯大便秘

結內熱口乾煩渴飲冷及六脉沉寔有力者服

川芎 當歸 白芍 生地

黃連 天花粉 知母 黃柏

大黃蜜水拌
炒二錢

水二鍾煎八分空心服

應用方

托裏消毒散見腫瘍門 腎氣丸見肺門

十全大補湯 八珍湯

補中益氣湯 四物湯俱見潰瘍門

內中沃雪湯 蠟礬丸見腫瘍門

九龍丹見魚口門 龍胆瀉肝湯見下疳門

附子餅見附骨疽門

外科正宗 卷之三 五

腎癰論第三十五

腎癰生於小腹之後位遠僻與氣亦罕到血亦少來

凡生此者溼熱凝滯結聚乃成得此毒必外發庶

不內攻初起毒從五臟蘊積者患必有頭紅熱墜

重如石內必口乾發熱宜內消沃雪湯通利積熱

外以膏貼瘡頂四邊以如意金黃散敷之拔出瘀

膿紫血內兼托藥自愈常有不知內服敗毒寒劑

外敷涼藥氣血冰凝毒氣不得外發反致內攻其

瘡頭軟陷無膿根脚平散不痛內熱口乾煩躁謔語痰喘氣奄恍惚不寧者俱為不治但此多從毒積於內自裏至表者十有八九而從風寒暑溼自外至裏者百中一二既出而復入裏者終為死候

腎癰看法

初起有頭紅赤腫痛頂高發熱根脚高聳者為易治已成焮熱發腫疼痛有時皮薄光亮色紅易膿為順已潰膿稠而黃色如猪腦腫消痛止起坐自便者易

外科正宗

卷之三

九三

初起粟米形或黃泡點平塌作痒根脚散漫者重已成色紫堅硬腎腿俱腫小便澀滯日久無膿者險潰後無稠膿頂空根軟塌手按不知疼神昏無治法

腎癰治法

初起惡寒體倦喜覆衣被脉浮緊而在表者微散之已成內熱口乾好飲冷物小便澀而大便秘者通之頂高色赤焮痛發熱疼痛有時者宜托裏更兼解毒腫已高而作疼膿已熟而不破脹痛難忍宜即針之

潰後堅硬不消膿水不止飲食無味者宜補虛健脾

腎癰治驗

一男子患此四五日始生疼痛至晚作寒六脉浮而帶數以人參敗毒散二劑寒熱頓退疼痛稍止彼值公務相關欲出乃用針點入患頂五六分流去紫血用蟾酥條插入膏蓋以活血散瘀湯二服次日流出紫血隨便可行更服托裏藥五六服而安一男子患此六七日焮痛發熱口乾便燥以托裏消

外科正宗

卷之三

九三

毒散加花粉大黃二服便通渴止仍用前湯加角針山甲數服而膿潰又以十全大補湯半月而斂一男子患此堅硬不潰此先寒涼之過也以十全大補湯加角針蒼朮丹皮四劑堅硬漸軟又以透膿散二服膿熟針之以前湯倍參芪歸朮月餘而斂一男子暑月患此自為內毒外用老鴉藤搗爛敷之每日續飲涼水十餘碗如此三日瘡毒內陷患上平塌冰冷口噤不言六脉虛細如絲辭不可治至

夜而死又一人冬月患此外用四黃散涼水調敷
 內服敗毒涼藥毒亦內陷煩躁口乾鼻掀氣急患
 上平塌原頭存一空孔無水無膿予曰瘡毒已陷
 定不可治復請別醫俱曰無事予曰腎居小腹之
 後肌肉頑厚毒既到此必須內托為膿潰後最易
 收斂今已內外寒涼毒既內入豈能再出眾醫強
 投內消解毒定燥除煩之藥終至不應半月而死
 腎癰主治方

外科正宗

卷之三

九

活血散瘀湯 活血散瘀湯枳殼 芎歸蘇木角紅花 連翹花粉防風等 大黃赤芍一齊加

治腎癰初起紅赤腫痛墜重如石及大便秘澀

川芎 當歸 防風 赤芍

蘇木 連翹 天花粉 皂角針

紅花 黃芩 枳殼 各一錢 大黃 二錢

水二鍾煎八分食前服便通者去大黃加乳香

黃芪內托散 黃芪內托散堪諒 山甲芎歸皂刺加 金銀花與甘草節 痔瘡諸腫樂無涯

治腎癰已成服前藥勢定者欲其潰膿宜服之

黃芪 二錢 當歸 川芎 金銀花
 皂角針 穿山甲 甘草節 各一錢
 水二鍾煎八分入酒一杯食前服

應用方 內消沃雪湯 如意金黃散

人參敗毒散 托裏消毒散

透膿散 俱見腫瘍門 蟾酥條 見疔瘡門

十全大補湯 見瘡門

外科正宗

卷之三

九

楊梅瘡論第三十六

夫楊梅瘡者以其形似楊梅又名時瘡因時氣乖變
 邪氣湊襲又名綿花瘡自期綿綿難絕有此三者
 之稱總由溼熱邪火之化但氣化傳染者輕精化
 慾染者重故氣化乃脾肺受毒其患先從上部見
 之皮膚作痒筋骨不疼其形小而且乾精化乃肝
 腎受毒其患先從下部見之筋骨多疼小水澀淋
 其形大而且硬如氣化者毒在皮膚未經入裏宜

服萬靈丹洗浴發汗解散皮膚之毒精化者毒在骨髓未透肌膚宜服九龍丹通利大小二便以瀉骨中之毒甚者二服皆可散之後體寔者升麻解毒湯體弱者歸靈內托散服至筋骨不疼瘡根淡白內毒已解方用點藥輕者半年重則一載始方得愈如患者不遵此法欲其速愈妄用薰條擦藥哈吸等法往往致成後患者多矣患者熟思之

楊梅瘡看法

外科正宗

卷之三

九六

初起無頭疼筋骨不作痛小水無澁淋瘡乾細者輕已生頭面稀少口角無瘡項下胸背雖多殺道無可初生瘡發下疳次生魚口復作筋骨疼痛瘡發非樣瘡生紅紫堅硬手足多生形如湯潑泡生害非輕淺

楊梅瘡治法

初起先從澁淋次傳筋骨作疼後發其瘡亦宜攻利生此外無疔瘡內無筋骨作痛時氣所感者微散之瘡從交媾不潔乃生下疳亦澁滯不通當行導利

上部作痒瘡多消風清熱下部作疼痒甚瀉溼為先紅紫毒盛瘡高涼血解毒淡白毒輕瘡薄攻補兼行手足皮膚枯槁勢掌風生栢葉二器煎湯薰洗即好頭髮眉毛脫油風何須說神應養真丹早服稀疎脫點點楊花癬片片癩風瘡宜服換肌丸効應如同掃

楊梅瘡治驗

一男子患此兩月餘自服敗毒涼劑不應筋骨疼痛尚在此表裏寒涼毒沉難出必以辛熱發之用萬

外科正宗

卷之三

九七

靈丹葱酒煎服洗浴蓋之先出冷汗如兩次出熱汗疼痛減其大半以歸靈湯服至月餘瘡勢始定又以葶薈湯兼補中益氣湯又兩月餘而始痊愈一男子小便白濁作痛次出疔瘡發腫作爛筋骨微痛予曰欲發時瘡彼不為信請他醫以薰藥照之雖然疔瘡稍愈而筋骨更疼頭脹欲破又復請治其時紅點滿面此火氣鬱遏難出先用黃連解毒湯二服瀉其火毒次以蟾酥丸發汗使毒透山肌

表已後紅點漸漸為瘡筋骨頭疼從此漸減以加味遺糧湯服至兩月瘡始出盡骨疼方止又以解毒天漿散相兼服至百日其瘡始退又百日而平一女人丈夫生瘡所襲筋骨至疼過晚寒甚以人參敗毒散四劑其寒乃退疼尚不止又以萬靈丹發汗二次方出點如豆大頭面及背肉無餘隙此毒之盛也以防風通聖散二劑通利大小二便去硝黃加皂角針金銀花又十餘劑其瘡漸大小者如

外科正宗

卷之三

五八

錢大者若杯氣穢作爛起坐不堪外以石珍散擦爛上結疤又爛又摻內服加味遺糧湯兩月餘瘡始漸乾輕者收斂而脫重者又半年方得痊愈矣一痒生患此月餘乃求速愈予曰此患非他恙所比若速愈必遺毒於後日辭不敢治更醫對曰半月全愈後亦無患因喜不勝用水銀膽礬等藥搽擦手足二心半月內其瘡果愈隨後骨疼諸藥不應半年後內毒方出作爛疼不堪言遍腿相串並無

一空又二年腿脚曲而不直痿成痲疾終身又兼耳聾全不相聽又一人嫖妓生瘡筋骨疼痛予曰升發方可彼欲內消請他醫以丸藥七圓每用一圓置炭上燃着以口吸烟至三圓鼻流鮮血至夜而死又一妓者患此欲其速愈以照藥薰之三日後吐鮮血數盆亦死此求速愈自取危亡者無怨楊梅瘡主治方

加味遺糧湯

加味遺糧湯木瓜 芎歸防朮銀花 瘰癧皮皂子靈仙等 木通甘草共參誇

外科正宗

卷之三

五九

治楊梅瘡初起筋骨疼痛及已成數月延綿不已并楊梅風毒誤服輕粉癰瘰骨疼不能動履

川芎 當歸 防風 薏苡仁

木瓜 金銀花 木通 白癩皮

蒼朮 威靈仙 甘草

皂莢子 五個切 片微炒 仙遺糧 二人參 虛者加

水二碗煎八分量病上下食前後服腿脚之下加牛膝一錢病淺者一月可退病深者百日可

疥忌牛肉燒酒海腥煎炒此瘡發時多先起於

下疳若以此方預服之可以止其不發梅毒也

解毒天漿散 解毒天漿散角針 防風防已藤風藤 芫歸翅粉銀花草 木瓜蟬脫薏苡仁

治楊梅瘡不問新久遍身潰爛及筋骨作疼者

一 天花粉 防風 防已 皂角針

白癬皮 連翹 川芎 當歸

風藤 木瓜 金銀花 蟬脫

薏苡仁 各一錢 甘草 五分 土茯苓 二兩

外科正宗 卷之三 一百

牛膝 下部加 水二鍾煎八分臨服入酒一杯量病上下服之

升麻解毒湯 升麻解毒湯傳易 去病應知却難 同煎皂刺加油服 那怕多牽結毒頑

治楊梅瘡筋骨疼痛久而不愈及治遠年近日

流注結毒皮肉破爛咽喉損破者並宜服之

升麻新鮮皂角針各四錢上白土茯苓一斤頂

之以上加白芷咽肉加桔梗胸腹加白芍肩背

加羌活下部加牛膝各一錢用水八碗煎至四

碗作四次一日服盡每次頓熱加麻油三茶匙

和勻量病上下食前後服之瘡甚者不過十服

歸靈湯 歸靈湯中四物宜 木瓜防已白癬皮 米仁參朮銀花粉 甘草白芷牛膝隨

治楊梅瘡不問新久但元氣虛弱者宜服此藥

川芎 當歸 白芍 熟地

米仁 木瓜 防已 天花粉

金銀花 白癬皮 人參 白朮 各一錢

甘草 五分 威靈仙 六分 牛膝 下部加五分

外科正宗 卷之三 一百

土茯苓 二兩 水三鍾煎二鍾二次量病上下食前後服之渣

再煎八分服

防風必効散 防風必効散荆防 槐木翹藤薏苡當 角針木通番白草 銀花花粉木瓜商

治楊梅瘡溼熱太盛瘡高稠密元氣素實者服

防風 防已 荆芥 白癬皮

連翹 槐花 蒼朮 皂角針

風藤 木通 白芷 天花粉

木瓜

金銀花 蕃白草 各一錢

甘草 五分

土茯苓 兩 大黃 三錢 初起加

水三碗煎二碗二次服渣再煎一碗服後飲酒

一大杯即靜睡一時許更妙

金蟾脫甲酒

治楊梅瘡不拘新久輕重皆効好酒五斤用大

蝦蟆一個浸酒封瓶口煮香二枝取起待次日

隨量之大小以醉為度冬夏蒸暖出汗為効存

外科正宗

卷之三

百一

酒次日只服量之一半酒盡瘡愈又治楊梅結

毒筋骨疼痛諸藥不効者更妙服酒七日後不

許見風為要忌口及房事百日絕根矣

翠雲散

翠雲散中用銅絲 磨粉輕粉石膏加 濕用胆調乾未摻 梅瘡一點便生疔

治楊梅瘡已服內藥根脚不紅瘡勢已退者用

銅綠

輕粉

石膏 煨各一兩

共研極細磁確收貯溼瘡乾摻乾瘡公猪膽汁

調點三日點三次其瘡自乾而愈

又點藥方

點藥方中用杏仁 雄黃輕粉均相稱 猪胆汁調瘡上點 敢教三日自承平

杏仁 四十九粒 去皮尖

雄黃 一錢 輕粉 二錢

先將杏仁搗細加雄黃輕粉細末再研勻猪膽

調點

鵝黃散

鵝黃散用真輕粉 石膏黃柏要稱準 等分為末摻爛瘡 楊梅腐痛最安穩

治楊梅瘡潰爛成片膿穢多而疼甚者宜用之

石膏 煨 輕粉 黃柏 炒

以上各等分為極細末乾摻爛上即可生疤再

外科正宗

卷之三

百二

爛再摻毒盡乃愈此解毒止痛收乾之効藥也

應用方

萬靈丹

黃連解毒湯 見腫

人參敗毒散

防風通聖散 見時

蟾酥丸 見疔

補中益氣湯 見潰

九龍丹 見魚

神應養真丹 見鶴膝

祛風換肌散 見風

栢葉二檠湯 見毒掌

結毒論第三十七

結毒者薰火收過於毒而沉於骨髓也又有未經薰
 擦見苗未久服藥不多內毒未盡便用點藥收斂
 毒過毒氣者亦能致之發則先從筋骨疼痛日後
 漸漸腫起發無定處隨便可生發在關節中則損
 筋傷骨縱愈曲直不便發於口鼻則崩梁缺唇雖
 痊破形更相發於咽喉者更變聲音發在手足者
 妨於行走原來苦楚一生毒遺數代情關一錯禍
 起百端初起筋骨冷痛金蟾脫甲酒發汗自愈虛
 外科正宗 卷之主 百四

弱者芎歸二米湯頭疼欲破者天麻餅子餅吹鼻
 碧雲散年餘流串筋骨不愈者五寶散虛弱潰爛
 疼痛不斂者十全大補湯同土茯苓煎服初起筋
 骨痛甚者雷火針法已潰腐爛者解毒紫金膏依
 法施治年遠毒盛者玄武丹兼外搽靈藥年近毒
 淺者只在百日自然可愈毋得再薰為禍傷人耳
 已下看法治法俱照本論醫治自有條款未及重錄
 結毒治驗

一男子薰藥之過六年後兩腿骨痛半年始腫以雷
 火針腫小者一處腫大者三處針之七日後作膿
 腐潰內服仙遺根湯兩月餘其疼漸止腫亦漸消
 又兩月方得腐盡肌生更十全大補湯三月而斂
 一男子玉莖患此半年陽物已損七八週一方士以
 薰藥照之患上流血不止人似鬼形予曰毒發已
 傷元氣再加薰火一逼血得熱而妄行故去益許
 此有限之物也恐其難保先以四物湯兼黃連解
 外科正宗 卷之三 百五

毒湯合而服之三劑其血乃止更以珍湯加麥冬
 五味子黃柏知母十餘服元氣乃定外以甘草湯
 浴洗患上以銀粉散搽之如此月餘氣血漸醒紅
 肉漸生陽物復長大半仍用前湯加土茯苓二兩
 煎服此不捨其根本其約有四月之餘其疾乃愈
 一男子患此頭疼欲破至夜尤甚苦楚不睡自以解
 毒藥治之俱不相應診之寸關脈細數而無力此
 虛陽之火上攻以補中益氣湯加土茯苓一兩服

145 1217 2 2

至三劑其疼漸止又十餘劑其疾全安而不再發

一男子患此自膝以下腐爛無空伏枕半年內以藥

歸二木湯外以甘草白芷歸尾葱白煎洗三日一

度以解毒紫金膏搽之如此三月餘漸漸而安惟

足不能步履以史國公酒藥加土茯苓一斤浸煮

又服半年其足方能步履又一料行步亦然如舊

一婦人患此頭疼手腕俱痛診之脈滑而弦此痰毒

相兼之病也以天麻餅子服之半月頭痛痊安又

外科正宗 卷之三 頁六

以二陳兼四物加紅花升麻黃芩服至月餘而愈

一男子頭額腐爛外搽解毒紫金膏內以葶藶湯兩

月餘而飲又一人小腿患之年餘仍以前藥而愈

一八咽間損壞半年湯藥難下幾死服結毒紫金

丹外吹結毒靈藥一月內其疾痊安又一女人手

膊頭背腫痛六七年不潰諸藥不應仍服前藥而

一男子咽喉腐爛予以遺糧湯內服外用解毒生肌

藥治之彼以為緩仍用薰藥將之口爛幾死大便

純去黑血及遍身浮腫飲食不進肌破三月而死

結毒主治方

仙遺糧湯 仙遺糧湯荆芷防 銀花花粉葛芩當 蒺藜靈仙搥膝草 苓連翹共水煎

治楊梅結毒初起筋骨疼痛已被肌肉潰爛者

仙遺糧 即俗稱土 茯苓四兩 防風 荆芥

川芎 當歸 天花粉 金銀花

白蒺藜 薏苡仁 威靈仙 各一錢

山梔 黃連 連翹 乾葛

外科正宗 卷之三 頁七

白芷 甘草 黃芩 各六分 牛膝 下部

水三碗煎二碗量病上下食前後服渣再煎一

碗服後飲酒一杯忌牛肉火酒房事等件更妙

芩歸二木湯 芩歸二木湯防朴 獨活參苓薏苡仁 木瓜皂刺精猪肉 草甲銀通上茯苓

治楊梅結毒已成未成筋骨疼痛步履艱辛及

潰後腐肉臭敗不能生肌收斂者宜服之並効

白朮 蒼朮 川芎 當歸

人參 茯苓 薏苡仁 皂角針

厚朴 防風 木灰 木通

穿山甲炒 獨活各一錢 金銀花三錢 甘草

精猪肉二兩 土茯苓

水三碗煎一半量病上下服之渣再煎服

消風脫甲散消風脫甲散紅花 番白靈仙 蛇蛻 風子 薄荷 銀皂刺 翹通 蒼朮 草薢 齊加

治楊梅結毒筋骨疼痛腐爛作臭氣血壯實者

歌 十年十五年五 二十年來三十補

曰 縱然臭爛不堪聞 管教逢人再不吐

外科正宗 卷之三 百八

番白草 紅花 井草 威靈仙

山柰 蟾蜍 連翹 皂角針

大風子肉 薄荷 風藤 金銀花

冬瓜皮 木通 蒼朮各一錢 土茯苓四兩

水三碗煎二碗二次服用好酒一大杯過口渣

再煎服

薰洗結毒方薰洗結毒方堪効 蒼朮 川椒 共水煎 任是腐疼多微帶 將來一洗即時消

蒼朮一兩 點紅川椒三錢 水五碗煎至四碗入

確內將患上對確口以熱氣薰之半熱傾藥盆

內淋洗患上以潔淨布挹乾搽後解毒紫金膏

解毒紫金膏解毒紫金膏最易 取功奏効 誠應難 蓉紅只與松香等 去腐生新 解笑顏

治楊梅結毒腐爛作臭膿水淋漓諸藥不効者

細塊礬紅明淨松香各一斤共碾極細末麻油

調稠先將患上用前湯薰洗潔淨搽上此藥油

紙蓋上以軟布條要扎至緊毋令血行三日一

換如無前湯薰洗只煎葱艾甘草等湯俱可洗

外科正宗 卷之三 百九

換又治諸毒頑癩等瘡神効愈後忌發物煎炒

神仙碧玉膏神仙碧玉膏朝腦 輕粉 杭粉 豈可饒 乳香 沒藥 併白占 猪油 調漆 腐爛好

治結毒潰爛臭穢疼痛不斂及風腫等瘡俱効

輕粉兩一 杭粉兩一 白占五錢 乳香

沒藥各三錢 章冰二錢

用公猪淨熟油五兩同白占熬化傾入碗內入

上藥和勻水內頓一時取起臨用搽脚挑膏手

心中捺化攤油紙上用葱湯洗淨瘡對患貼之

五寶散

五寶散內用硃砂 琥珀珍珠冰片加 飛羅麪同滴乳石 俱圍煎和効堪誇

治結毒筋骨疼痛腐爛口鼻諸藥不効者服之

滴乳石

如乳頭下垂敲破易碎克 似蜻蜓翅者方真四錢

琥珀

珍珠

硃砂各二錢 冰片一錢

右各研極細對準共為一處再研數百轉磁罐

密收用藥二錢加飛羅麪八錢再研和勻每用

土茯苓一斤水八碗煎至五碗濾清作五次每

次加五寶散一分和勻量病上下服一日服完

外科正宗

卷之三

五

十服自愈如鼻子腐爛每日土茯苓內加辛黃

三錢煎服引藥上下忌食海腥煎炒房事等件

結毒紫金丹

結毒紫金丹罕稀 此方原不欲入知 決明龜板硃砂等 米飯為丸脫苦難

治遠年近日楊梅結毒筋骨疼痛日久腐爛臭

敗不堪聞者或咽喉唇鼻破壞諸藥不効者妙

龜板

放炭火上炙焦用新安酒漿濃筆蘸藥 塗上反復炙三次以焦黃為末二兩

石決明

川孔大者煨紅硃砂明亮者各 童便內漬之一次硃砂末二錢

共再碾極細爛米飯為丸麻子大每服一錢量

病上下食前後筋骨疼痛酒下腐爛者土茯苓

湯下至重者四十日而愈此功力勝於五寶散

結毒靈藥方

結毒靈藥方水銀 硃砂雄黃硫黃稱 加上輕粉共研成 搽於腐上効如神

治楊梅結毒腐爛作臭或咽喉唇鼻腐壞日甚

者並効

水銀

硃砂

雄黃

硫黃各三錢

共碾細入陽城罐內泥固鐵蓋梁堯固緊封口

點三香為度用水擦蓋內火畢次日取出蓋底

外科正宗

卷之三

五

靈藥約有一兩五六錢治尋常腐爛之症靈藥

五錢輕粉五錢和勻碾細小罐盛貯紙封罐口

臨用甘草湯洗淨患上將確倒懸紗眼內篩藥

患上用後單油膏藥蓋之一日一換自効男子

婦人咽爛者靈藥一錢加入中白二分研細吹

之日用三次內服不二散其疼即止隨可飲食

硫黃不二散

硫黃不二散功奇 止痛除危効不宜 加上旋花研細末 服之猶自遇神醫

治楊梅結毒發於咽內腐爛疼痛湯水難入者

硫黃錢一 旋花分一

共為細末涼水一大酒杯調服其疼即止飲食

可用

鉛回散

鉛回散內藥蹊蹶 筋骨多疼功不能
加上硫黃為末服 敢毅苦楚寂然消

治楊梅結毒筋骨疼痛朝輕夜重喜熱手按揉

者用鉛半斤銅杓內化開傾入水內將鉛取起

再化再傾如此百遍鉛盡為度候半日待水澄

清傾去用鉢底內沉下鉛灰傾在三重紙上下

外科正宗

卷之三

百三

用灰收乾水氣取起晒乾與硫黃等分研細確

收每服一錢溫酒調服至重者不過三次即效

單油膏

單油膏藥用麻油 杭粉將來漸漸投
熬化成膏傾水內 護肌護藥不開流

貼結毒藥上用麻油二斤熬滴水成珠續下

杭粉十三兩攪勻成膏傾水內片時取起攤用

草薺湯

草薺湯蒲芷栝蒼 靈仙龜板草紅當
胡麻羌活川椒等 結毒筋疼皆可嘗

治結毒筋骨疼痛頭脹欲破及已潰腐爛並効

川草薺錢二 苦參

防風

何首烏各五錢

威靈仙 當歸 白芷 蒼朮

胡麻 石菖蒲 黃柏各六分 羌活

川椒各四分 龜板一錢五分 紅花三分 甘草五分

水二鍾煎八分臨服入酒一杯量病上下服之

碧雲散

吹鼻碧雲散川芎 驚不食草一般同
青黛共研為細末 吹之鼻內有神功

治結毒入於顛頂以致頭疼脹痛如破者吹之

驚不食草一兩

川芎一兩 青黛一錢

共為細末患者口噙涼水以蘆筒吹藥瘞之左

外科正宗

卷之三

百三

右鼻內取嚏為効

應用方

十全大補湯

補中益氣湯

四物湯

八珍湯俱見瘡門

金蟾脫甲酒

見楊梅瘡門

天麻餅子見頭門

雷火神針

見附骨瘡門

史國公酒藥見風門

二陳湯

見瘰癧門

黃連解毒湯見疔瘡門

銀粉散

見疔瘡門

多骨疽論第三十八

多骨疽者由瘡潰久不收口乃氣血不能運行至此骨無榮養所致細骨由毒氣結聚化成大骨由受胎時精血交錯而結日後必成此疽也但腎主骨宜服腎氣丸十全大補湯先補脾胃次用艾附餅灸之令溫暖腐毒朽骨自然脫盡生肌斂口而愈

多骨疽治驗

一男子上脘腫痛月餘以散風清熱藥俱已不効又

外科正宗

卷之三

百四

兩月破流血水百日外方出細骨大小三十餘塊以十全大補湯併吹生肌散兩月餘而斂中存一小孔簪脚大通鼻透氣致難全斂為愈而不愈也
一男子左手上膊結腫年餘方出爛斑破流稀膿延至半年方出多骨一條如鷲膊骨一同長約四寸內服養血健脾藥外搽玉紅膏膏益又月餘而斂
一男子小腿正面膝骨腫痛二年諸藥不應此多骨瘡也後破出骨一塊肌肉腐爛元氣虛弱以十全

大補湯加山茱萸牛膝木瓜根至兩月餘不斂每日以神燈照法將火氣助之又出朽骨一塊上有蛇眼數十孔以二骨炭火煨紅為末入生肌藥中用之收斂問曰用骨者何此骨原廩氣血結成故用之復還元氣也後人聞之知理合天然之數矣
一女人左口上牙根突腫如栗堅硬如石不痛此多骨疽也藥亦不効後三年始痛破流臭膿後出多骨形如小鷲腫仍不退此骨未盡稍久又出小骨

外科正宗

卷之三

百五

二塊枯色穢穢其腫方退以四君子湯加升麻陳皮外以甘草煎滲漉口以生肌散日搽三次而收斂
多骨疽主治方

固本養榮湯

固本養榮湯四物

山藥人參併白朮

治骨疽已成骨不吐出或既出不能收斂由氣

血之虛脾胃弱也宜服之骨不出者自出不收斂者自斂

川芎

當歸

白芍

熟地

白朮 山藥 人參 牡丹皮

山萸肉 黃芪各一錢 甘草 肉桂

五味子各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

生肌散

生肌散內石膏丹 龍骨再加朝腦和 用之完口不須難

治腐骨脫出肌肉生遲不能收斂者用此搽之

石膏 輕粉 赤石脂各一兩

黃丹飛二錢 龍骨 血飴 乳香

外科正宗

卷之三

百六

朝腦各三錢

右爲細木先用甘草當歸白芷各一錢煎湯洗

淨患上用此乾摻軟油紙蓋扎二日一洗一換

應用方

神燈照法

玉紅膏俱見腫瘍門

十全大補湯

四君子湯俱見瀉門

腎氣丸見肺癰門

新刊外科正宗卷之三 終

新刻外科正宗卷之四

雜瘡毒門

陰瘡論第三十九

婦人陰瘡乃七情鬱火傷損

形固多不一總由邪火所化也陰中有如挺出一

條蛇形尺許墜重流水溺澀者乃脾氣下陷肝火

從之朝服補中益氣湯晚服龍膽瀉肝湯外塗

黃藜蘆散其患漸收陰中突出如詩子如雞冠四

外科正宗

卷之四

一

邊腫痛者乃肝鬱脾虛所致先以補中益氣湯加

山梔茯苓青皮清肝補脾兼升中氣更以歸脾湯

加山梔川芎茯苓神香附陳皮調理陰戶忽然腫突

作痛因勞傷血分濕火下流宜四物湯加丹皮澤

瀉花粉柴胡治之陰中生蟲惡如小蛆者乃心氣

鬱而邪火所化宜四物加黃連膽草木通石菖蒲

以通散心竅鬱滯外以銀杏散納入陰中陰器外

生疣瘡內生細蟲作痒不可忍者此蟲食人臟腑

印死令人多發寒熱與癆瘵相似有此症之婦人
畏羞都不肯說因循日久面黃肌瘦身發寒熱咳
嗽生痰往往不治者多矣如有此症急與逍遙散
吞蘆薈丸早晚二服外用銀杏散綿裹塞入陰中
殺蟲止痒半月漸愈陰戶開而不閉者憂思過也
逍遙散歸脾湯俱加柴胡山梔白芍丹皮間服交
接出血者肝虛有火不能藏血四物湯加膽草黃
芩山梔柴胡新交房事傷而腫痛者珍珠散猪脊

外科正宗 卷之四

髓調搽又婦人久居寒室淫火妄而又鬱鬱而又
寒邪火久注多致陰中作痒生蟲此蟲食入內臟
陰中腐爛攻刺疼痛臭水淋漓口乾發熱形削不
食有此症者非藥能愈終歸於死又名失合症也

陰瘡治驗

一婦人陰器腫痛小水澀滯遇晚寒熱交作此肝經
濕熱為患以龍膽瀉肝湯二服小水通利又以四
物湯兼小柴胡加天花粉木通炒山梔服之而愈

一婦人無辜發熱月餘忽陰中突出一物如雞冠一
片此肝鬱脾虛所致以補中益氣湯加青皮山梔
柴胡黃芩外以甘草白芷蒼朮紫蘇煎湯每日薰
洗十餘日其患漸小仍用前湯倍參朮月餘而安
一婦人陰中作痒遇夜五心煩熱作渴不睡此思慮
太過致心腎不交以四物湯加龍膽草山梔黃連
知母外以銀杏散納入陰中二日其痒漸止又朝
以八味丸午用歸脾湯加銀柴胡茵陳月餘而愈

外科正宗 卷之四

一婦人陰器半邊腫痛身發寒熱口乾便秘脉定有
力以內疎黃連湯一劑大便通利口乾乃止惟腫
痛尤甚此濕毒結聚欲為膿也以四物湯加角針
澤瀉二劑膿熟脹痛又以透膿散一服出臭膿鍾
許疼痛頓止以八珍湯加丹皮澤瀉十餘劑而安
一婦人肝經風濕下流陰器浮腫痒甚致抓出血不
痛以消風散加苦參膽草澤瀉木通山梔外以蛇
床子湯薰洗搽擦銀杏散十餘日痒止腫消而愈

一婦人婦居十餘載陰器作痒生蟲舍忍不說後陰器食爛已食內臟人形消瘦發熱作渴脉洪浮數方請醫治詢問間痒痛日久陰器黑腐小水不禁內臟已壞不可用藥彼苦求治予曰痒者蟲也痛者損也先用鯽魚數枚以香料摻炙魚熟以絲綿薄裹納入陰中夾之良久取出紅蟲長者一寸短者五六分細如絲線約有二十餘條置溫水中搖擺片時方死彼家歡悅以為可治予曰非也再取

再生生化無窮強投養血清肝藥終至不痊而死

陰瘡主治方

清肝滲濕湯

清肝滲濕湯四物 澤瀉 連翹 龍膽草 梔木通 滑石 銀柴等 甘草 防風 蘆薈 宜

治肝經鬱滯邪火流行致陰腫痛或風熱作痒

川芎 當歸 白芍 生地

山梔 黃連 連翹 龍膽草 各一錢

銀柴胡 澤瀉 木通 各六分 滑石 二錢

蘆薈 五分 甘草 三分 防風 八分

水二鍾淡竹葉燈心各三十件煎八分食前服

涼藥清火湯

涼藥清火湯黃芩 四物 山梔 知母 全柴胡 木通 茵陳 草 麥冬 龍膽 犬黃 煎

治婦人懷抱憂鬱不清致生肉熱小水澀滯太

便秘結及陰中火鬱作痛亦如澀淋宜此瀉之

川芎 當歸 白芍 生地

黃芩 黃連 山梔 木通

柴胡 茵陳 膽草 知母

麥門冬 各一錢 甘草 五分 大黃 酒炒 二錢

外科三六

卷之四

五

水二鍾煎八分空心服便利去大黃

銀杏散

銀杏散內用杏仁 水銀 輕粉 雄黃 稱棗肉為丸 綿裹成 陰中作痒 功效靈

治婦人濕熱下注陰中作痒及內外生瘡並用

杏仁 去皮 尖研 輕粉 水銀 錫製 雄黃 各一錢

右各為細末共和一處每用五分棗肉一枚和

丸用絲綿包裹留一綿條擦線在外用塌痒湯

煎洗藥裹安入陰內留線在外恐小便取出再

入一日一換重者只四五枚痊愈仍兼服前藥

塌痒湯

塌痒湯中有苦參 狼毒靈仙床子真 歸尾鶴虱同煎洗 搔痒之人笑服生

治症同上以此薰洗之

苦參

威靈仙

蛇床子

當歸尾

狼毒

各五錢

鶴虱草

一兩

用河水十碗煎數滾濾清貯盆內乘熱先薰待

溫後洗臨洗和入公猪膽汁二三枚同洗更妙

雄黃藜蘆散

雄黃藜蘆散煎頭 輕粉水片共相求 芩歸湯沸乘溫洗 蛇菌雞冠不久留

治婦人陰中突出如蛇或似雞冠菌樣者並治

卜科正宗

卷之四

六

雄黃

一錢

葱管藜蘆

二錢碾細如面

輕粉

蟹頭

煨黃色 各一錢

水片

二分

已上各研極細末和勻再研磁確收貯先用芩

歸湯煎洗隨後搽藥早晚二次其患漸收

芩歸湯

芩歸湯洗陰中痒 蛇菌雞冠並此求 白芷甘草併煎草 薰洗餘殃盡掃頭

治症同上以此洗之

川芎

當歸

白芷

甘草

膽草

右各等分每用五錢煎湯浴洗患上隨後搽藥

應用方

內疎黃連湯

透膿散

俱見腫傷門

補中益氣湯

八珍湯

四物湯

八味丸

俱見潰瘍門

逍遙散

小柴胡湯

俱見瘰癧門

龍膽瀉肝湯

珍珠散

俱見下疳門

歸脾湯

見痔瘡門

消風散

見風疹門

外科正宗

卷之四

七

蛇床子湯

見腎囊風門

蘆薈丸

見下疳門

傷寒發頤第四十

傷寒發頤亦名汗毒此因原受風寒用藥發散未盡

日久傳化為熱不散以致項之前後結腫疼痛初

起身熱口渴者用柴胡葛根湯清熱解毒患上紅

色熱甚者如意金黃散敷之初起身涼不渴者牛

勞甘桔湯散之患上微熱不紅疼痛者冲和膏和

之腫深不退欲作膿者托裏消毒散已潰氣血虛

弱食少者補中益氣湯以此治之未成者消已成者潰已潰者斂亦為平常黃道之法也用之最穩

柴胡葛根湯 柴胡葛根湯花粉 甘草連翹牛子苓石膏桔梗升麻等 傷寒願毒効多靈

治願毒表散未盡身熱不解紅腫堅硬作痛者

柴胡 天花粉 乾葛 黃芩

桔梗 連翹 牛蒡子 石膏 各一錢

甘草 五分 升麻 三分

水二鍾煎八分不拘時服

外科正宗 卷之四 八

牛蒡甘桔湯 牛蒡日枯湯赤芍 花粉黃連蘇木陳加川上川芍為効藥 傷寒願毒盡承平

治願毒表邪已盡耳項結腫微熱不紅疼痛者

牛蒡子 桔梗 陳皮 天花粉

黃連 川芎 赤芍 甘草

蘇木 各一錢

水二鍾煎八分食後服

如意金黃散 俱見腫瘍門

補中益氣湯 見潰瘍門 托裏消毒散 腫瘍門

痲發第四十一

痲發乃天時不正之氣感而發之非毒內作也此患

多生於手足掌心或腰腿臂下紳縮之處漫腫無

頭增寒發熱四肢沉重煩渴為甚初起宜服萬靈

丹發汗解表腫仍不消者必欲作膿托裏消毒散

兼蠟礬丸間服後法俱照癰疽潰瘍法推治為當

萬靈丹 托裏消毒散

蠟礬丸 俱見腫瘍門

外科正宗 卷之四 九

癰疽第四十二

癰疽一名蛇瘡川廣烟瘴地面有之初出先作紅點

次變黑色腐爛筋骨小者如粟如豆大者如梅如

李發無定處初用蟾酥餅膏貼患上寒熱交作者

黍米寸金丹或飛龍奪命丹亦可紅腫遊走不定

者真君妙貼散加雄黃敷之自然截住破後脾胃

虛弱食少乾嘔者補中益氣湯加黃連麥冬補而

不應腫高疼甚惟出清水穢汁者俱為不治之症

飛龍奪命丹 即蟾酥丸加金頭蜈蚣二條 黍米寸金丹

真君妙貼散 凡腫瘍門 補中益氣湯 凡清瘍門

小腹癰第四十三

小腹癰乃七情火鬱以致脾虛氣滯而成其患小腹

漫腫堅硬肉色不變有熱漸紅者屬陽易治無熱

不紅者屬陰難治初起七日以前用艾當腫頂灸

七壯膏蓋首尾內服壯脾胃養氣血行經補托之

劑可保終如誤用剋伐攻利涼藥者敗症必出

外科正宗 卷之四 十

十全大補湯倍加參芪薑附以救之內腐深陷者

玉紅膏長肌收斂又補托不應者終久縱愈成漏

十全大補湯 玉紅膏 俱見清瘍門

鶴口疽第四十四

鶴口疽乃三陰虧損督脈之經濁氣濕痰流結而成

其患發在尾間之穴高骨頭尖初起形似魚脰久

則突如鶴嘴朝寒暮熱日輕夜重潰後稀膿出而

無禁又或鮮血出而不停凡發此者壯年猶可老

年為慮初起宜滋陰除濕湯和之已成未潰者和

氣養榮湯托之潰而不斂者滋腎保元湯補之久

而成漏者琥珀蠟礬九兼先天大造丸服之甚妙

滋陰除濕湯 滋陰除濕湯知母 白芍芍歸熟地 芍 柴陳貝母兼澤瀉 骨皮甘草効多靈

治鶴口疽初起朝寒暮熱日輕夜重如瘡等症

川芎 當歸 白芍 熟地 各錢

柴胡 黃芩 陳皮 知母

貝母 各八分 澤瀉 地骨皮 甘草 各五分

外科正宗 卷之四 十一

水二鍾薑三片煎八分食前服

和氣養榮湯 和氣養榮湯木芪 參苓熟地共陳皮 丹皮甘草沉香等 還有當歸在後隨

治前症已成不得內消者宜此藥托之

人參 陳皮 白朮 黃芪

茯苓 丹皮 當歸 熟地 各一錢

沉香 甘草 各五分

水二鍾煎八分食前服

滋腎保元湯 滋腎保元湯杜仲 參芪木附桂丹皮 歸苓芎肉苁茸草 藥姜熟地要相隨

治前症元氣虛弱膿水淋漓久而不斂者服之

人參 黃芪 白朮 茯苓

歸身 杜仲 山萸肉 牡丹皮

熟地各一錢 附子 肉桂 甘草各五分

水二鍾薑三片棗二枚蓮肉七枚食前煎服

琥珀蠟礬丸見腫瘍門 先天大造丸見流注門

龍泉疽虎鬚毒第四十五

此二毒乃腎督二脉分合行佈驟被外邪所搏而成

外科正宗 卷之四

龍泉疽發在人中之間虎鬚毒生於地角之上初

起疙瘩次生腫痛漸發寒熱甚者惡心乾嘔腮項

俱腫此穴忌灸初起宜線針挑破患頂以蟾酥餅

放上膏蓋使毒有門而泄四邊焮腫上如意金黃

散敷之內有表症者荆防敗毒散加芩連牛子裏

症內疎黃連湯已成欲其作膿芩歸內托散膿成

脹痛者針之即愈潰膿後只宜膏藥換貼其口易

完此症多生於元氣壯實者故多不必服藥自愈

芩歸內托散芩歸內托散陳皮 桔梗花粉茯苓

川芎 當歸 陳皮 茯苓

天花粉 桔梗 銀花 黃芪各一錢

甘草五分

水二鍾煎八分食後服

如意金黃散 內疎黃連湯

荆防敗毒散見時毒門

石榴疽第四十六

外科正宗 卷之四

石榴疽者乃少陽相火與外濕煎搏而成其患生在

肘尖上一寸是也初起一點黃粟小泡根便開大

色紅堅硬腫如覆碗皮破流出蚤如棉子令人寒

戰猶如重瘡初起即灸九壯內服蟾酥丸發汗以

解蘊毒灸頂上蟾酥餅貼之膏蓋焮腫處金黃散

敷之內服菊花清燥湯琥珀蠟礬丸煩躁甚者

護心散金液戊土丹九日後患上作膿稠黃疼苦

稍減表裏症退飲食微進者可保無虞反此為逆

潰後元氣虛弱雜症相兼者照癰疽調理法治之

菊花清燥湯

菊花清燥湯生地 知母川歸熟地皮 柴苓甘草升麻等 犀角附冬白芍宜

甘菊二錢 川芎

當歸 知母

貝母 白芍

生地 麥門冬

地骨皮各一錢

升麻 犀角

甘草 柴胡

黃芩各五分

水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎八分食後服

蟾酥丸

見方 泰門

琥珀蠟礬丸

外科正宗

卷之四

十四

護心散

如意金黃散俱見腫瘍門

金液戊土丹

見脫症門

穿踝疽第四十七

穿踝疽乃足三陰濕熱下流停滯而成初起內踝腫

痛疼徹骨底舉動艱辛甚則串及外踝通腫有頭

者屬陽易破無頭者屬陰難潰此二者初起必寒

熱交作宜荆防敗毒散加牛膝散之日久膿成脹

痛者針之腐而不斂孔夫者玉紅膏培之形體虛

弱者補之此症若不早治因循致成廢疾也有矣

荆芥敗毒散

見腫瘍門

玉紅膏

見腫瘍門

大麻風第四十八

大麻風症乃天地間異症也但感受不同有體虛之

人因驟被陰陽暴曬露風雨之氣所侵感之不

覺未經發泄凝滯肌膚積久必作又有房慾後體

虛為風邪所襲或露卧當風睡眠濕地或洗浴乘

涼稀圖快意或風水所招世代留襲此等相感俱

外科正宗

卷之四

十五

能致之其患先從麻木不仁次發紅斑久則破爛

浮腫無膿又謂皮死麻木不仁肉死刀割不痛血

死破爛流水筋死指節脫落骨死鼻梁崩塌有此

五症俱為不治又曰心受之先損於目肝受之面

發紫泡脾受之偏身如癱肺受之眉毛先脫腎受

之足底先穿又為五敗症也總皆風濕相乘氣血

凝滯表裏不和臟腑痞塞陽火所變此其根蒂也

初起麻木不仁肌肉未死者宜萬靈丹洗浴發汗

以散凝滯之風後服神應養真丹加白花蛇等
久服自愈年久肌破肉死者先用必勝散疎通
腑次服萬靈丹每日酒化一丸通活血脈服至一
月換服苦參丸輕者半年重者一載漸愈或兼服
酒藥忌戒房事厚味動風等件可保終年不發矣

萬靈丹 見癰疽腫瘍門

治大麻風初起麻木不仁或既久皮膚破裂手足
足拳攣肢體不便但未指脫足穿者並宜服之

外科正宗

卷之四

十六

必勝散

必勝散中用大黃 白丑 檳榔 共粉霜 姜汁 砂糖 調末 服 骨 發 患 者 漸 安 康

治大麻風血熱秘結臟腑不通宜用此藥利之

大黃 檳榔 白牽牛 各一錢 粉霜五分

右各為細末年壯者作五服中年久虛者作七

服用生薑四兩搗汁赤砂糖三錢加水一大杯

三味和勻臨睡時腹中稍空頓溫通口服之即

睡至三更遍身麻木如針刺頭目齒縫俱痛此

藥尋病之功已達行出大小二便或青白黑黃

或紅蟲之類此乃病根也一月內服藥三次

漱藥方 漱藥方中有二般 貫衆黃連一處攪 水煎加入些些片 止血何愁甚不安

漱藥方

貫衆黃連各三錢水二鍾煎一半入冰片少許

每日陸續漱之其血自止兼忌動風油膩之物

苦參丸

苦參丸內藥多般 品味難將一一刊 新久麻風諸壞症 將來久服自能安

治大麻風毋分新久穿破潰爛老幼俱可服之

苦參 一斤 大風子 肉六兩 荊芥 十六兩

外科正宗

卷之四

十七

防風

白芷 各六兩 全蝎 何首烏

白附子

枸杞子 威靈仙 當歸

大胡麻

川芎 蒺藜 大皂角

川牛膝

牛旁子 獨活 各五兩 蔓荆子

風藤

羌活 蓮翹 蒼朮

天麻

杜仲 草烏 泡去皮尖 甘草 各三兩

人參

砂仁 二兩 白花蛇 二兩切 片炙黃

右藥共為細末醋打老米糊為丸梧桐子大每

第一冊 續修四庫全書 子部 醫家類 2 頁 5

服三四十九温酒食前後任下避風忌口爲妙

麻風藥酒方

麻風酒膝木防歸 苦杞姜秦虎節隨 羌活草麻併鱉甲 茅根加上効堪推

防風

當歸

虎骨

秦艽

羌活

苦參

牛膝

姜蠶

松節

鱉甲

蒼朮

枸杞子

白茅根

各二兩

草麻子仁

一兩

用好雪酒二十五斤用藥袋盛浸酒內封壘口 煑香二枝取起水內浸一伏時取服數杯自效

外科正宗

卷之四

一八

雄硫散

雄硫散內鳳凰皮 山甲相兼滑石隨 桃肉共和猪胆汁 眉毛脫落擦之宜

治大麻風眉毛鬚髮脫落作痒者宜此藥擦之

雄黃

硫黃

鳳凰皮

卽雜雞殼燒黃 存性各五錢

川山甲

片 炒黃

滑石

一兩

右各爲細末用半油核桃肉一兩搗爛同公猪 膽汁一箇同煎藥和勻用青紗包藥擦之日用 三次其髮漸生如舊

又擦麻風病而生紫塊疔瘡方用川山甲灰炒川椒

爲末各二錢生薑汁土大黃根二汁調稠絹包擦

患上如久藥乾加水調擦亦効忌動風發物等件

翻花瘡第四十九

翻花者乃頭大而蒂小小者如豆大者若菌無苦無

疼指損每流鮮血久亦虛人以津調水螞散遍擦

正面上用軟油紙包裹根蒂細處用線連紙扎緊

十日後其患自落換珍珠散摻之收口又有根蒂

不小如鱉棋子樣難扎以前藥擦上用麵糊綿紙

外科正宗

卷之四

一七

封上二重用心勿動亦以十日外落之摻珍珠散

冰螞散

見瘰癧門

珍珠散

見下疳門

腋癰第五十

腋癰俗稱夾癰此肝脾二經爲患肝經血滯脾經氣

凝其結爲腫初起皮色不變漫腫無頭日久方疼

乃生寒熱此患難消終必作膿未破者柴胡清肝

湯已破者十全大補湯去肉桂加香附陳皮軟腫

脹痛者針之膏貼但此症首尾溫補忌用寒涼也

柴胡清肝湯 見髮 疔門

十全大補湯 見潰 疔門

脇癰第五十一

脇癰多從鬱怒肝火者發之肥胖內實者鮮此症初

起宜梔子清肝湯柴胡清肝湯解鬱瀉火已成者

托裏消毒散加青皮香附膿已成者即針之勿傷

內膜已被後八珍湯加丹皮山萸澤瀉兼滋腎水

又虛勞所得者破流臭敗稀膿補托不應者必死

托裏消毒散 見腫 疔門

梔子清肝湯

外科正宗 卷之四

柴胡清肝湯 俱見髮 疔門

八珍湯

鼻痔第五十二

鼻痔者由肺氣不清風濕鬱滯而成鼻內瘰肉結如

榴子漸大下垂閉塞孔竅使氣不得宣通內服辛

夷清肺飲外以礪砂散逐日點之漸化為水乃愈

兼節飲食斷厚味戒急暴省房慾愈後庶不再發

之清肺飲 辛夷清肺飲黃芩 百合山梔知母稱 麥冬甘草石膏等 升麻批葉一同論

治肺熱鼻內瘰肉初如榴子日後漸大閉塞孔

竅氣不宜通者服之

辛夷 六分

黃芩

山梔

麥門冬

百合

石膏

知母 各一錢

甘草 五分

枇杷葉 三片 去毛

升麻 三分

右水二鍾煎八分食後服

礪砂散

礪砂散內用雄黃 粉霜水片在其藏 為末將來患上點 能消瘰肉自然光

治鼻生瘰肉初如榴子漸大下垂名為鼻痔也

礪砂 一錢

輕粉 三分

水片 五厘

雄黃 三分

外科正宗 卷之四

右共為末用草桔咬毛蘸藥勤點痔上日用五

六次自然漸化為水而愈

取鼻痔秘法先用回香草散連吹三次次用細銅筋

二根筋頭鑽一小孔用絲線穿孔內二筋相離五

分許以二筋頭直入鼻痔根處將筋線絞緊向下

一拔其痔自然拔落置水中觀其大小預用胎髮

燒灰同象牙末等分吹鼻內其血自止戒口不發

回香草散

回香草散奇功 加上良姜二味同 為末共吹於鼻痔 尤如拾芥在其中

回香草高良姜晒乾等分爲末用此先吹鼻痔
上二次片時許隨後方行取法其痔自然易脫

骨槽風第五十三

骨槽風初起生於耳前連及腮項痛隱筋骨久則漸
漸漫腫寒熱如瘡牙關緊閉不能進食此得於鬱
怒傷肝致筋骨緊急思慮傷脾致肌肉腐爛膏梁
厚味致膿多臭穢初則堅硬難消久則瘡口難合
初宜艾灸腫項及耳垂下五分各灸七壯膏貼以

外科正宗

卷之四

三二

泄內毒真君妙貼散敷腫上牙關內腫用線針刺
去惡血水礪散搽之使內外毒氣得解宜服降火
化痰消熱消腫之劑潰後當托裏藥中加麥冬五
味外腐者玉紅膏使水昇火降脾健金清乃愈又
有外腐不合虛熱不退堅腫不消形焦體削者死
清陽散火湯 清陽散火湯翹苓 石膏甘草荆防等 白芷升麻牛子迎
治牙根盡處結腫連及耳項作痛名骨槽風也

升麻

白芷

黃芩

牛蒡子

連翹

石膏

防風

當歸

荆芥

白蒺藜各一

甘草五分

水二鍾煎八分食後服

中和湯

中和湯芍药升麻歸 桔梗肉桂防風等

甘草參芪白芷宜 藿香姜棗効堪題

治前症已經穿潰流膿臭穢疼痛不止者服之

人參

黃芪

白木

白芷

川芎

當歸

甘草

桔梗

白芍各一

肉桂

麥冬

藿香各五

水二鍾薑三片棗一枚臨服入酒一杯食後服

應用方

真君妙貼散

玉紅膏 俱見腫 瘍門

水礪散 見咽 喉門

紫白癩風第五十四

紫白癩風乃一體二種紫因血滯白因氣滯總由熱
體風濕所侵凝滯毛孔氣血不行所致此皆從外
來矣初起毛竅閉而體強者宜萬靈丹以汗散之

次以胡麻丸常服外用蜜陀僧散搽擦亦可得愈

胡麻丸

胡麻丸內用防風 白附威靈甘草同 苦參獨活菖蒲等 瘰癧風赤白効神功

治瘰癧風初起皮膚作痒後發瘰癧風漸生開大者

大胡麻

四兩

防風

威靈仙

石菖蒲

苦參

各二兩

白附子

獨活

各一兩 廿草五錢

右為細末新安酒漿跌成丸子每服二錢形瘦

者一錢五分食後臨臥白滾湯送下忌動風發

物海腥煎炒雞鵝羊肉火酒等件愈後戒百日

外科正宗

卷之四

三

雌雄四黃散

雌雄散用石硫黃 川樅皮同白附當 還有雌黃饒不得 香發瘰癧一時者

治紫白瘰癧風皮膚作痒日漸開大宜用此搽之

石黃

雄黃

硫黃

白附子

雌黃

川樅皮

各等分

右為細末紫瘰醋調用豎樅木毛頭蘸藥擦患

上白瘰用薑切開蘸藥擦之擦後三日忌下湯

水戒食雞鵝牛羊煎炒海腥火酒等件不復發

又方

白瘰紫瘰一般風

雄黃硃砂等分同

茄蒂端來擦患處

不消三日有神功

白加蛇殼同來擦

晉教前患永無踪

肥皂方

瘰癧風酒刺雀班方 皂角甘松山柰藏 附子豆粉獐水等 白芷陀僧楮實詳

皂角

甘松

山柰

白芷

各二錢

蜜陀僧

白附子

朝腦

楮實子

蒙荳粉

各三錢

右為細末用去淨皮弦肥皂一筋搥勻洗擦患

外科正宗

卷之四

三五

上日久自効

蜜陀僧散

見汗班門

齒病第五十五

齒病者有風有火亦有陽明濕熱俱能致之風痛者

遇風發作浮腫隨後生痛以消風散治之火痛者

則齒根必掉扯腮顫陣陣作痛時發時止以冰礪

散擦之出涎自愈陽明經濕熱作痛者其患腮顫

浮腫甚者牽引太陽疼連頰項口中熱氣大便結

燥當宜涼膈散加石膏治之又腫高軟者內必有

膿用針刺破出膿自愈有齒齲腐爛出血不止者

內服犀角地黄湯外搽人中白散又小兒鑲齒疔

牙根尖穿出齒根肉外芒刺嘴脣作痛用拔針挑

破牙面好肉以手取去本牙出血不止以濕紙換

貼二三次其血自止必兼戒厚味其牙復生如舊

涼膈散

涼膈散中用石膏 山梔薄荷共連翹 黃芩甘草淡竹葉 還有大黃豈可逃

治陽明經濕熱上攻致牙根腮項作腫多痛者

連翹

山梔

黃芩

薄荷

各一錢

外科正宗

卷之四

三六

甘草

五分

大黃

二錢

朴硝

一錢五分

石膏

一錢五分

淡竹葉

三十片

右水二鍾煎八分入蜜三匙和勻食遠服

清中散

清中散內牡丹皮 生地黃連甘草歸 升麻還與山梔子 胃經積熱効堪推

治胃經積熱牙齒或牙齲腫痛或牽引頭腦作

痛或面熱耳紅並皆治之

當歸

黃連

生地

山梔

各一錢

牡丹皮

六分

升麻

八分

甘草

五分

右水二鍾煎八分食遠服

華撥散

華撥散中真阿魏 麝香冰片共相依 牙風痛皆堪點 管教時刻樂喜喜

治風濕疔牙作腫疼痛如陽明內熱作疼勿用

華撥

真阿魏

各二錢

冰片

麝香

各一分

右為細末每用半豆許擦放牙根痛縫中吐去

熱涎溫湯漱之再搽即愈

又牙疼方

牙疼方中君華撥 蟾酥必定與川椒 飛鹽加入同來點 諸般牙痛即時消

華撥

蟾酥

二分

川椒

五分

飛鹽

三分

外科正宗

卷之四

三二

右共為末用草桔咬毛蘸藥搽點痛牙根上妙

犀角地黄湯

犀角地黃湯芍藥 更兼一味牡丹皮 陽明積熱皆堪服 止血還須用此醫

治陽明積熱牙齲腐爛出血不止及諸吐血衄

血嘔血通治之

犀角

生地

白芍

牡丹皮

各等

每五錢水二鍾煎八分不拘時服面色痿黃大

便黑者更宜服之又牙縫中無辜出血者亦妙

止血四生湯

止血四生湯荷葉 生艾柏枝地黃列 用水同煎飲一鍾 諸般血症登時列

生荷葉 生艾 生柏葉 生地黄各二錢

水二鍾煎一鍾食後溫服臨入童便一杯更妙

人中白散見口疳門 消風散見疥瘡門

腦漏第五十六

腦漏者又名鼻淵總因風寒凝入腦戶與太陽濕熱

交蒸乃成其患鼻流濁涕或流黃水點點滴滴長

濕無乾久則頭眩虛暈不已治以藿香湯主之天

麻餅子調之亦可漸愈如日久虛眩不已內服補

外科正宗 卷之四 十八

中益氣湯六味地黄丸相間服之以滋化原始愈

奇受藿香湯元來奇授藿香湯 猪胆同功效莫量

治鼻淵黃水濁涕長流致腦戶虛眩不已用藿

香連枝帶葉者五錢水一碗煎七分加公猪膽

汁一枚和勻食後通口服之至重者不過三服

如此藥苦甚不堪服用藿香末一兩公猪胆汁

熬稠膏為丸每服二錢食後白滾湯送下亦効

應用方

補中益氣湯 六味地黄丸化見瀆湯門

天麻餅子見頭痛門

破傷風第五十七

破傷風因皮肉損破復被外風襲入經絡漸傳入裏

其患寒熱交作口禁咬牙角弓反張口吐涎沫入

陰則身涼自汗傷處反為平陷如故其毒內收矣

常用萬靈丹發汗冷風邪反出次以玉真散患上

貼之得膿為効如汗後前症不退傷處不高漸醒

外科正宗 卷之四 十九

漸昏時發時止口禁不開語聲不出者終為死候

玉真散玉真散內用南星 白芷防風羌活靈

治破傷風牙關緊急角弓反張甚則咬牙縮舌

南星 防風 白芷 天麻

羌活 白附子各等分

右為末每服二錢熱酒一鍾調服更敷傷處若

牙關緊急腰背反張者每服三錢用熱童便調

服雖內有瘀血亦愈至於昏死心腹尚溫者連

進二服亦可保全若治風犬咬傷更用漱口水

洗淨搽傷處亦効

萬靈丹 見腫瘍門

治破傷風牙關緊急角弓反張時昏時止者服

鎮風散 鎮風散用鰾膠礬 杭粉 硃砂在此間 每服二錢和熱酒 破傷風症自回還

治破傷風諸藥不効事在危急者用之必應也

鰾膠 切段 微焙 杭粉 煨 皂礬 各一兩 炒紅色

硃砂 三錢 另研

外科正宗 卷之四

右為細末每服二錢無灰熱酒調服如一切猪

羊等風發之昏倒不醒人事者每服三錢二服

即愈不發外灸傷處七壯知疼痛者乃為吉兆

跌撲第五十八

跌撲者有已破未破之分亡血瘀血之故且如從高

墜墮而未經損破皮肉者必有瘀血注臟腑人

必昏沉不醒二便必難當以大成湯通利二便其

人自甦不醒者獨參湯救之尋常墜墮輕者以復

元活血湯調之又如損傷骨節筋斷血流不止者

獨勝散止之次用花蓋石散搽之又有跌斷骨節

大損等症此則另有專門接骨扎縛未及詳註也

大成湯 大成湯內 朴硝 黃 蘇木 當歸 甘草 良 陳皮 厚朴 紅花 等 木通 枳殼 共煎嘗

治跌撲傷損或從高墜下以致瘀血流入臟腑

昏沉不醒大小便秘及木杖後瘀血內攻肚腹

膨脹結胸不食惡心乾嘔大便燥結者並服之

陳皮 當歸 蘇木 木通

外科正宗 卷之四

紅花 厚朴 甘草 各一錢 枳殼 二錢

大黃 三錢 朴硝 二錢

右水一碗煎八分不拘時服服後二時不行渣

再煎臨臥服入蜜三匙亦妙

調中二陳湯 調中二陳湯 枳殼 陳皮 厚朴 蘇木 當歸 甘草 良 青皮 紫蘇 防風 實 桔紅 蘇米 腹 橫 震

治前症已服行藥之後當進此藥三三服調之

陳皮 半夏 茯苓 甘草

枳殼 大腹皮 紅花 川芎

當歸 白芍各八分 防風 檳榔

黃芪 桔梗 青皮 烏藥

蘇木 枳實 黃芩 紫蘇各六分

木香三分

右水二鍾薑三片棗二枚煎八分不拘時服

獨參湯 獨參湯力最專功 跌撲金瘡出血多 昏沉不醒人事者 灌之入腹起痰瀉

治跌撲損傷或金瘡出血過多昏沉不醒者服

人參一兩切片水二碗煎一半不拘時通口服

外科正宗 卷之四 三三

之渣再煎服其人自甦再用渣加川米一合煎

湯溫服

花蓋石散 花蓋石散麝檀香 乳沒辛蘇烏芥薑 羌龍白芷蛇含石 木降香南星粉霜

治跌撲傷損及金瘡刀箭兵刃所傷斷筋損骨

疼痛不止新肉不生者並効

乳香 沒藥 羌活 紫蘇

細辛 草烏 乾金石便燥 三冬

厚朴 白芷 降香 備備

蘇木 檀香 龍骨 南星

輕粉各二錢 麝香三分 花蓋石童便煨七次五錢

右共研極細磁收聽用葱湯洗淨用此摻之軟

綿紙蓋扎一日一換神効此藥一時未備可用

多骨疽門生肌散代之暫用亦可取効危急也

玉紅膏見腫 癆門

治跌撲損傷或金瘡斷損筋骨已經血止疼痛

作膿宜用此膏葱湯洗淨日搽傷處黑膏蓋之

外科正宗 卷之四 三三

金瘡第五十九

金瘡乃刀刃所傷或有磁鋒割損淺者皮破血流而

已深者筋斷血飛不住皮破者桃花散摻之其血

自止筋斷者如聖金刀散摻扎止復又流者此症

急用玉紅膏塗傷處膏蓋長肉蓋筋骨肉方斷斯

人面色必黃外避風寒內忌冷物終保無妨有失

血過多者獨參湯八珍湯補助為要此無外法矣

如聖金刀散 如聖金刀散二錢 松香細末共加茶 刀傷損破肌流血 搽上應神効不難

治刀刃所傷皮破筋斷飛血不止者用松香淨

末七兩枯礬生礬各一兩五錢共為極細末確

密收摻傷處紙蓋絹扎止後三四日後必熈痛

作膿換摻生肌散三日三次其疼即止以後日

用葱湯洗之換搽玉紅膏長肉生肌避風為要

桃花散

桃花散最治金瘡 止血消瘀効莫量 大黃同與石灰炒 將來一摻即無妨

治金瘡出血不止用石灰半升同大黃一兩五

錢切片同炒石灰變紅色為度去大黃篩細摻

外科正宗

卷之四

三

損上紙蓋絹扎止血後用葱湯洗淨換搽玉紅

膏長肌收斂兼戒口味房事為要

獨參湯

見跌撲門

八珍湯

見潰瘍門

杖瘡第六十

杖瘡乃良肉受傷之患有已破未破之分正刑酷刑

之說已破肌肉者隨杖後以清涼拈痛膏敷之疼

腫即消未破瘀血內攻者用針放出內蓄瘀血再

以大成湯下之便通自愈如傷處瘀腐已作疼痛

者王紅膏搽之自然腐化生新而愈至於辱刑重

刑難受之時宜預服鐵布衫丸方得保身全命也

鐵布衫丸

鐵布衫丸乳沒歸 地龍蘇木自然隨 木鱉再加無名異 救盡人間苦杖危

治情不由已事出不虞受害一身重刑難免當

預服之受刑不痛亦且保命

自然銅

煨紅醋 浸七次

當歸

酒洗 搗膏 無名異 浮土

木鱉子

香油搽殼上 灰焙用肉

乳香

沒藥

地龍

去土 曬乾

外科正宗

卷之四

三

右八味各等分為細末煉蜜丸如雞頭實大每

服三丸預用白湯送下縱非刑辱拷可保無虞

散瘀拈痛膏

散瘀拈痛膏罕稀 加上樟水金黃散

麻油石灰水共齊 杖瘡敷上笑嗜嗜

治杖後皮肉損破紅紫青班焮腫疼痛重墜者

用腫瘍門如意金黃散一兩加樟水三錢碾勻

以白石灰一升用水二碗和勻候一時許用灰

土面清水傾入碗內加麻油對分和水以竹筋

攪百轉自成稠膏調前藥稀稠得所聽用杖後

帶血不用湯洗將藥通便敷之紙蓋布扎夏月一日冬月二日方用葱湯淋洗乾淨仍再敷之痛止腫消青紫即退傷重者另搽玉紅膏完口

又方

杖刑之後肉不破 瘀血攻疼沒門路

將針點破膿血流 管致患者隨行步

大成湯 見跌撲門

治杖後瘀血內攻肚腹膨脹惡心便秘者服之

外科正宗

卷之四

三六

珍珠散 見下疳門

治杖瘡已經長肉平滿惟不生皮用此搽即愈

湯潑火燒第六十一

湯潑火燒此患原無內症皆從外來也有湯火熱極

通毒內攻又有外傷寒涼極毒入裏外皮損爛者

以清涼膏粟殼膏塗之毒氣入裏煩躁口乾二便

秘澀者四順清涼飲下之泡破珍珠散搽之自愈

四順清涼飲 四順清涼飲赤芍 防風羌活共連翹 當歸 芫花 山梔等 大黃加上熱俱消

治湯潑火燒熱極通毒入裏或外被涼水所激

火毒內攻致生煩躁內熱口乾大便秘實者服

連翹 赤芍 羌活 防風

當歸 山梔 甘草 各一錢 大黃 炒二錢

右水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

嬰粟膏 嬰粟膏醫湯火燒 麻油白蠟共煎熬 將凝加上真輕粉 塗於患上痛隨消

治湯潑火燒皮 損爛疼苦嫩熱起泡流水者

麻油四兩嬰粟花十五朵無花以殼代之浸油

外科正宗

卷之四

三七

內煎枯濾清將油再入杓內下白占三錢熬化

傾入確內待四邊將凝時下真輕粉細末二錢

攪勻水內頓冷取起臨用將泡挑破用抵脚挑

膏手心中捺化搽患上軟綿紙蓋扎日換二次

其瘡即止次日將軟帛挹淨腐皮再搽之自愈

珍珠散 見下疳門

治湯潑火燒腐皮已盡疼痛已止用此搽即愈

前杖瘡門中石灰水調麻油成膏即清涼膏也

搽湯擦火燒亦効

甲疽第六十二

甲疽者或因甲長侵肌又因修甲損傷良肉靴鞋窄

小俱易生之其患齧肉裹上指甲腫痛異常難施

步履初宜三品一條鎗貼齧肉上化盡自愈日久

齧肉堅硬須水蠅散化之後用珍珠散搽上必瘥

三品一條鎗見痔瘡門

珍珠散見下疳門

繭唇第六十三

外科正宗 卷之四

三八

繭唇乃陽明胃經症也因食煎炒過食炙燥又兼思

慮暴急痰隨火行留注於唇初結似豆漸大若蠶

繭突腫堅硬甚則作痛飲食妨碍或破血流久則

變為消渴消中難治之症初起及已成無內症者

用麻子大艾炷灸三壯貼蟾酥餅膏蓋日久漸消

內症作渴者早服加減八味丸午服清涼甘露飲

以滋化源日久流血不止形體瘦弱虛熱痰生面

色黧黑腮頰紅現口乾渴甚者俱為不治之症也

清涼甘露飲清涼甘露飲柴苓 麥冬犀角共煎

治頸脣膏梁所釀暴怒所結遂成斯疾高突堅

硬或損破流血或虛熱生痰或渴症久作並治

犀角 銀柴胡 茵陳 石斛

枳殼 麥門冬 甘草 生地

黃芩 知母 枇杷葉各一錢

水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎八分食後服

加減八味丸見瘡門

蟾酥餅見疔瘡門

外科正宗 卷之四

三九

瘡癰第六十四

瘡癰皆緣內傷過度氣血橫逆結聚而生初起腹中

覺有小塊舉動擗引作疼久則漸大成形甚者翕

翕內動斯時必氣血衰弱飲食減少內服阿魏化

瘡散外貼乾坤一氣膏祛邪養正氣攻補自全安

阿魏化瘡散阿魏化瘡散 藜蘆 白木 紅花 赤茯苓 隨 藜蘆 大黃 併煎 甲 空心 蓮用 酒調宜

川芎 當歸 白朮 赤茯苓

紅花 阿魏 鱉甲尖酥炙研 各一錢

大黃酒炒八錢 蕎麥麪一兩微炒

右共為末每服三錢空心好酒一茶鍾調稀服

三日後腹痛便出膿血為驗忌生冷腥暈等件

乾坤一氣膏一氣膏歸芷附稜 巴菴蓬甲續靈成赤白芍玄生熟地 桂阿乳沒鱉香能

此膏專治瘡疾母論新久立効又治諸風癱瘓濕

痰流注各樣惡瘡百般怪症男子夜夢遺精婦人

赤白帶下又男女精寒血冷久無嗣息者並貼之

當歸 白附子 赤芍 白芍

外科正宗

卷之四

四

白芷 生地 熟地 川山甲

木鱉肉 巴豆仁 革麻仁 三稜

蓬朮 五靈脂 續斷 肉桂

玄參各一兩 乳香 沒藥各一兩

麝香三錢 真阿魏二兩切薄

右咀片用香油五觔存下四味餘皆入油浸春三

夏五秋七冬十期畢桑柴火熬至藥枯細絹濾清

每淨油一觔入飛丹三兩將油入鍋內下丹槐

枝攪攪其膏候成端下鍋來川木盆坐穩漸下阿

魏片泛化已盡方下乳沒麝香再攪勻乘熱傾入

磁罐內分三處盛之臨用湯中頓化瘡病紅暈攤

貼餘病綾絹俱可攤之有腫者對患貼之男子遺

精婦人白帶俱貼丹田諸風癱瘓癩貼腎俞穴並効

天蛇毒第六十五

天蛇毒一名蛇頭疔也乃心火旺動攻注而成其患

指大腫若蛇頭赤腫焮痛疼及連心甚者寒熱交

外科正宗

卷之四

四

作腫痛延上腫頂上小艾灸五壯以雄黃散塗之

內服蟾酥丸發汗解毒輕者漸消腫者潰膿甚則

腐爛破後腫仍不消者以蟾酥條插入孔內膏蓋

自効腐爛者玉紅膏搽之虛而不斂者兼服補劑

雄黃散雄黃散內用蟾酥 水煎還將輕粉和四味同來為細末 水調患處日三塗

治天蛇毒初起紅腫發熱疼痛徹心者宜用之

雄黃明亮者二錢 蟾酥二分 冰片一分 輕粉五分

共為細末新汲水調塗紙蓋日三次極効

蟾酥丸 見疥瘡門

玉紅膏 見瘡門

頭痛第六十六

頭痛者風火濕痰四者皆能致之又楊梅瘡毒上攻

亦有此症或婦人產後梳洗當風大早亦致之名

曰頭風宜用後方母論病之新久受之真似並効

大麻餅子 大麻餅子草川烏 薄荷細辛松白附 雄黃全蝎一相途

治頭痛因風火濕痰上攻及楊梅瘡毒所致兼治

頭目昏眩項背拘急肢體煩痛肌肉蠕動耳哨蟬

外科正宗

卷之四

四二

鳴鼻塞多嚏皮膚頑麻癢痒癰疹又治婦人頭風
作痛眉稜骨疼牙齒腫痛痰逆惡心者並皆治之

天麻 草烏 湯泡去皮 川芎 細辛

蒼朮 甘草 川烏 湯泡去皮 薄荷

甘松 防風 白芷 白附子 去皮各五錢

雄黃 全蝎 各三錢

右為細末寒食麵打糊搗稠如寒豆大捻作餅

子每服二十二餅食後細嚼送下屬火

熱痰痛者茶湯下甚者日進二服忌諸般發物

三聖散 三聖散用開楊花 樅樹紅花總一家 二味再加風子肉 頭風偏正樂無涯

治男婦頭痛不論偏正新久但夏月欲重綿包

裹者並効

鬧楊花 淨末一錢 樅樹花 淨末一錢 大風子 白肉去油五分

共研每服六分葱酒調服洗浴發汗自愈

合谷毒第六十七

合谷疔俗稱虎口百子也此患多有疔瘡泡起亦有

外科正宗

卷之四

四三

紅絲走上故有疔名之稱此手陽明胃經濕毒攻
注作痒或熱癢初起挑破貼蟾酥餅膏蓋金黃

散敷之三日後腫聚必欲作膿換膏貼之軟腫脹

痛者膿已成針之即愈腫甚寒熱者必內外消托

金黃散 見腫瘍門 蟾酥餅 見疥瘡門

鼻出血第六十八

鼻中出血乃肺經火旺逼血妄行而從鼻竅出也外

用紫土散敷顛頂上內服羚羊清肺湯亦可自止

羚羊清肺湯 羚羊清肺湯柴胡 羌活連蘆薈白茅宜

治鼻中無故出血不止及尋常吐血咳血並効

羚羊角 鎊 黃連 銀柴胡 玄參

石膏 川芎 當歸身 白芍

生地 蒲黃 地骨皮 山梔 各一錢

蘆薈 甘草 各五分 藕節 三箇 白茅根 四兩

川水一碗 和絞去查

用茅根汁一大碗煎七分入童便一杯食後服

外科正宗

卷之四

四

紫土散

紫土散須從治法 更兼火酒要謂將藥敷於顛頂土 自然血止不相流

治鼻中無辜出血不止用傾銀紫土新碾碾細

以火酒調敷顛門上其血自止此從治之法也

牙縫出血第六十九

牙縫血出陽明胃經實火上攻而出也又有胃虛火

動腐爛牙齦以致淡血常常滲流不已實火清胃

散棟果表塞之虛火蘆薈丸人中白散服搽自愈

清胃散

清胃散中用石膏 蒼連生地不相饒 丹皮加上升麻好 陽明胃熱即消

治胃經有熱牙齒或牙齦作腫出血不止並効

黃芩 黃連 生地 丹皮

升麻 石膏 各一錢

水二鍾煎八分食後服

棟果表治陽明胃經實火上攻血從牙縫流出用棟

樹果二箇連肉核搗爛絲綿包裹先用溫湯漱淨

瘀血塞於牙縫內其血自止

蘆薈丸

人中白散 見口疳門

外科正宗

卷之四

四

血箭血痣第七十

血箭出於心經火盛逼血從毛竅出也血痣由於肝

經怒火鬱結其形初起色紅如痣漸大如豆指之

血流活血箭以桃花散凉水調敷或金墨塗搽自

止血痣須用冰蠟散枯去本痣以珍珠散搽之生

皮乃愈血甚者內服涼血地黃湯兼戒口味始痊

涼血地黃湯

涼血地黃湯黃連 當歸甘草山梔全 加上玄參芎更添 無辜出血即安然

治血箭血痣內熱甚而逼血妄行出血如飛者

黃連 當歸 生地 山梔

玄參 甘草各等分

水二鍾煎八分量病上下服之

桃花散見跌撲門 水蠟散見瘰癧門

珍珠散見疔瘡門

鵝掌風第七十一

鵝掌風由手陽明胃經火熱血燥外受寒涼所凝致皮枯槁又或時瘡餘毒未盡亦能致此初起紫斑

外科正宗 卷之四 四六

白點久則皮膚枯厚破裂不已二替湯薰洗即愈

二替湯二替湯中白皂礬 兒茶推葉在其間 先薰後洗和州照 鵝掌風頑愈不難

治鵝掌風皮膚枯厚破裂作痛宜用此湯薰洗

輕則不宜越重越効

白礬 皂礬各四兩 孩兒茶五錢 栢葉半兩

用水十碗同上藥四味煎數滾候用先用桐油搽抹患上以桐油蘸紙撚點着以烟焰向患上薰之片時方將前湯乘滾貯淨桶內手架上用

布蓋以湯氣薰之勿令泄氣待微熱傾入盆內

蘸洗良久一次可愈七日忌下湯水永不再發

腎囊風第七十二

腎囊風乃肝經風溼而成其患作痒喜浴熱海甚者

疔瘡頑麻破流脂水宜蛇床子湯薰洗二次即愈

蛇床子湯蛇床子湯當歸尾 苦參畢竟用靈仙 河水同煎薰患處 腎囊風痒得安然

治腎囊風濕熱為患疔瘡作痒搔之作疼宜洗

蛇床子 當歸尾 威靈仙 苦參各五錢

外科正宗 卷之四 四七

水五碗煎數滾入盆內先薰待溫浸洗二次愈

狼毒膏狼毒膏中風子肉 栢榔五倍子相同 川椒床子硫猪胆 油沸投確共此求

治症同前

狼毒 栢榔 硫黃 五倍子

川椒 風子肉 蛇床子各三錢

右為末用香油一大杯煎滾入皮硝三錢再煎滾次下公猪膽汁一個和勻調前藥搽擦患上此藥諸痒瘡用之並効

疥瘡論第七十三

夫疥者微若之疾也發之令人搔手不閑但不知其何以生者疥曰吾不根而生無母而成乃稟陰陽氣育溼熱化形常列於王侯掌上何妨士庶之身可使文人怕筆繡女停針毋分貴賤一例施行醫問曰不生於身獨攻於手者又何也疥曰手掌乃太陰溼土所主手心又少陽相火所司土能生我火能化我此生皆賴溼土陽火所化故生者必自外科正宗 卷之四 四

出於手掌醫曰然哉但其形知動而不知靜能進而不能退自非清氣所化也又脾主消納胃主傳化人之飲食未有不從厚味者厚味之中溼熱並化致生此瘡又清氣隨脉循行濁氣留滯不散停留肌膚積日不解隨後生熱發痒故痒熱之中溼火混化爲蟲形隨溼化動隨火化此無情而之情也既化之後潛隱皮膚展轉攻行發痒鑽刺化化生生傳遍肢體近則變爲疥癬久則變成頑風

多致皮膚枯槁浸淫血脉搔痒無度得湯方解外以綉毬丸搽擦堪爲止痒殺蟲內服消風散亦可散風涼血必得兼戒口味辛熱莫啜忌洗熱湯其煩自脫此爲小恙不當陳說閑中之言隨筆而曰

消風散

消風散內歸生地 胡麻知母牛蒡等

蟬脫荆防蒼苔參 石膏甘草木通行

治風溼浸淫血脉致生疥疥搔痒不絕及大人小兒風熱癩疹遍身雲片斑點乍有乍無並効

當歸

生地

防風

蟬脫

外科正宗

卷之四

四

知母

苦參

胡麻

荆芥

蒼朮

牛蒡子

石膏

各一錢 甘草

木通

各五分

水二鍾煎八分食遠服

當歸飲子

當歸飲子芍藥芪 甘草何首烏荆芥

生地防風白蒺藜 諸風疥癬服相宜

治血燥皮膚作痒及風熱瘡疥癩痒或作疼痛

當歸

川芎

白芍

生地

防風

白蒺藜

荆芥

何首烏

各一錢

黃芪 甘草 各五

水二鍾煎八分食遠服

綉毬丸

綉毬丸內用雄水 輕粉川椒其水銀 諸瘡疥癩安寧

治一切乾淫疥瘡及膿窠爛瘡癢無度者效

樟冰 輕粉 川椒 枯礬

水銀 雄黃 各二 風子肉 另碾

以上共為細末同大風子肉再碾和勻加相油

一兩化開和藥攪勻作丸圓眼大於瘡上擦之

外科正宗

卷之四

五

諸瘡一掃光

諸瘡一掃光 硫栢 未蓋床板枯白礬 水銀風子肉樟冰等 此藥參用膠共參

此藥凡治疥瘡不論新久及身上下或乾或溼

異類殊形但多痒少痛者並宜用之俱各有効

苦參 黃栢 各一 烟膠 升 木鱉肉

蛇床子 點紅椒 明礬 枯礬

硫黃 風子肉 樟冰 水銀

輕粉 各二 白礬 五

其為細末熟猪油二斤四兩化開入藥攪勻能

九龍眼大磁瓶收貯用時搽擦患上二次即愈

洗疥瘡方

洗疥瘡方只二般 苦參猪膽共相攪 河水煎湯頻浴洗 晉教諸痒即當安

苦參半斤切片用河水三四瓢煎藥數滾參水

二瓢住火片時濾去渣臨洗和公猪膽汁四五

枚攪勻淋洗痒上三日一洗三次亦可痊愈矣

廉瘡論第七十四

廉瘡者風熱溼毒相聚而成有新久之別內外之殊

新者只用三香膏乳香法紙貼之自愈稍久紫黑

外科正宗

卷之四

五

者以解毒紫金膏搽扎漸可又年久頑廉皮肉烏

黑下陷臭穢不堪者用蜈蚣餞法去風毒化癩腐

方可得愈外廉多服四生丸內廉多服腎氣丸妙

三香膏

三香膏內乳松香 輕粉油調紙內藏 先洗慈湯方貼扎 何妨新久爛廉瘡

治廉瘡初起多疼少痒未經受風紫黑者宜用

乳香 松香 輕粉 各等

右為細末香油調稠用夾紙一面以針密刺細

孔將藥夾搽紙內先以慈湯洗淨將紙有孔一

面對瘡貼之三日一換自効忌房事煎炒等件

乳香法紙

乳香法紙有奇功 疼痛腫瘡欲此逢功在粉霜相協力 三朝一換笑顏濃

治癩瘡作痛不愈先用乳香碾細末一兩聽用

以呈文油紙四張每紙一張攤平篩乳香末二

錢五分勻篩紙上雙折捲一寸闊將捲紙復作

三折兩頭以線扎之用甘草一兩二錢水三碗

將捲過藥紙浸入甘草湯內上用重物壓之煮

數滾取起紙來解去扎線將紙攤開桌上每張

外科正宗

卷之四

五三

用輕粉三錢摻乳香上用棕糊刷排刷相勻提

起藥紙帶溼以無藥一面對板壁上貼之陰乾

收用臨時隨患大小剪紙多少先用溫湯洗瘡

隨將紙有藥一面對瘡貼之絹扎三日一換自

然止痛生肌如貼後內無水出不必換貼自愈

蜈蚣錢

蜈蚣錢治久頑癩 獨活桐油白芷煎 井草加上同煎煮 傾入瘡中黑腐獨

治癩瘡多年黑腐臭爛作疼諸藥不効者用桐

油二兩獨活白芷甘草蜈蚣各一錢入油內煎

滾先將癩上洗淨用白麩水調作團圍在瘡之

四邊毋令泄氣走油將脚放平以茶匙挑油漸

漸乘熱以滿待油溫取去已後腐肉風毒自然

脫下用解毒紫金膏搽上紙蓋絹扎三日一換

解毒紫金膏

見結毒門

治癩瘡毋論新久及頑瘡年久不愈者並用之

四生丸

四生丸療久癩瘡 骨節多疼舉動妨 地龍白附姜蚕等 草烏靈脂莫相忘

治外癩血風頑瘡骨節疼痛不能舉動或行步

外科正宗

卷之四

五三

不前或渾身瘙痒或麻痺不仁或坐墜疹並効

地龍

去土

姜蚕

炒去絲

白附子

五靈脂

草烏

去皮尖泡 各等分

右為細末米糊丸桐子大每服三四十九食前

茶酒任下

腎氣丸

見肺癰門

血風瘡第七十五

血風瘡乃風熱溼熱血熱三者交感而生發則搔痒

無度破流脂水口漸沿開甚者內服消風散加牛膝黃柏外搽解毒雄黃散或如意金黃散俱可敷之如年久紫黑堅硬氣血不行者用針砭去黑血以神燈照法薰之以解鬱毒次以前藥敷之方効解毒雄黃散

治風溼流注腿脚致生血風頑瘡紫黑癢痒者

雄黃四兩 硫黃八兩

右二味共碾細末栢油調搽紙蓋之三日一換

外科正宗

卷之四

五十四

如意金黃散

見腫瘍門

治症同前用公猪膽汁調稠敷患上油紙蓋托

勿動待其自脫脫後色紅再敷之以色白為度

神燈照法

見腫瘍門

治年久紫黑血風頑瘡流水作痒不絕先用葱

湯洗淨患上點火以燈焰薰之每薰二燃為度

涼血消風散

見疥癬門

頑癬第七十六

頑癬乃風熱溼蟲四者為患發之大小圓斜不一乾

濕新久之殊風癬如雲朶皮膚嬌嫩搽之則起白

屑濕癬如蟲形癢之則有汁出頑癬搽之則全然

不痛牛皮癬如牛項之皮頑硬且堅抓之如朽木

馬皮癬微痒白點相連狗皮癬白斑相簇此等總

皆血燥風毒剋於脾肺二經初起用消風散加浮

萍一兩葱豉作引取汗發散久者服首烏丸蠟礬

丸外搽土大黃膏用椶皮散選而用之亦可漸効

外科正宗

卷之四

五十五

土大黃膏

土大黃膏用白礬川椒三味研成末

硫黃八兩共加參頑癬搽之不費難

治乾溼頑癬不論新久但皮膚頑厚串走不定

惟痒不痛者

硫黃八兩

生礬四兩

點紅川椒二兩

右各為末用土大黃根搗汁和前藥調成膏碗

貯新癬抓損擦之多年頑癬加醋和擦如日久

藥乾以醋調搽牛皮癬用穿山甲抓損擦之妙

頑癬必効方

頑癬必効川椶皮斑貓大黃百藥煎

輕份雄黃巴豆宜陰陽水和海桐皮

治多年頑癬諸藥薰擦搽洗不効者用之即愈

川槿皮四兩 輕粉四兩 雄黃各四錢 百藥煎四餅

斑猫全川一錢 巴豆去油一分 大黃二兩 海桐皮二兩

右為極細末用陰陽水調抓損敷藥必待自落

又頑癬方 頑癬方中川槿皮 斑猫輕粉各相宜 再加七個風子肉 新筆塗將患處醫

川槿皮二錢 輕粉五分 斑蟊七個 大風子七個

河井水共一鍾煎一半露一宿筆蘸塗之

頑癬浮萍丸 浮萍丸內蒼耳草 蒼木黃芩共苦參 姜蚕鈎藤伊蒞菴 酒丸服下可回春

外科正宗 卷之四 五十六

紫背浮萍 蒼木 蒼耳草各二兩

苦參四兩 黃芩 姜蚕各一兩 鈎藤一兩

蒺藜草二兩 酒蒸

共為末酒糊丸白滾湯每服二錢隨病上下服

膿窠瘡第七十七

膿窠瘡乃肺經有熱脾經有溼二氣交感其患先從

水泡作痒後變膿泡作疹所成膿窠瘡也甚者清

熱散風涼血除溼治之涼血消風散是也外以蛇

床子散或諸瘡一掃光搽之亦効兼戒口味自愈

蛇床子散 蛇床子散用黃丹 輕粉枯礬風肉良 大黃不少松香末 麻油調許治膿瘡

治膿窠瘡生於手足遍身根硬作脹痒痛非常

蛇床子 大風子肉 松香 枯礬各一兩

黃丹 大黃各五錢 輕粉三錢

右為細末麻油調搽溼爛者乾搽之

膿窠又方 膿窠方中用石膏 黃栢黃丹輕粉 還有枯礬能燥溼 搽之痛痒即時止

黃栢一兩 以公猪膽汁搽之火上炙三錢 石膏煨一兩

外科正宗 卷之四 五十七

輕粉二錢 黃丹 枯礬各三錢

右為末麻油調搽溼者乾搽

應用方

涼血消風散 諸瘡一掃光俱見疥瘡門

凍風第七十八

凍風者肌肉寒極氣血不行謂肌死患也初起紫斑

久則變黑腐爛作膿者以碧玉膏主之生肌欬口

碧玉膏 見結毒門

治凍風皮肉損爛膿水淋漓疼痛不止者用之
獨勝膏
獨勝膏來最散寒 來風凍耳一般安
六月每逢三六日 搽之冬凍不相干

治凍風凍跟凍耳每遇冬寒則發六月初六十

六二十六日用獨蒜搗膏日中晒熱在於遇冬

所發之處擦之忌下湯水一日共擦三次不發

又每常凍風用茄楷同葱煎湯浸洗再不重發

火丹第七十九

火丹者心火妄動三焦風熱乘之故發於肌膚之表

外科正宗

卷之四

五八

有乾溼不同紅白之異乾者色紅形如雲片上起

風粟作痒發熱此屬心肝二經之火治以涼心瀉

肝化斑解毒湯是也溼者色多黃白大小不等流

水作爛又且多疼此屬脾肺二經溼熱宜清肺瀉

脾除溼腎苓湯是也腰脇生之肝火妄動名曰纏

腰丹柴胡清肝湯外以柏葉散如意金黃散敷之

化斑解毒湯

化斑解毒湯石膏 玄參知母共連翹
黃連升麻薄荷子等 甘草人中黃更高

治三焦風熱上攻致生火丹延及遍身痒痛者

玄參

知母

石膏

人中黃

黃連

升麻

連翹

牛蒡子

各等分

甘草

五分

水二鍾淡竹二十片煎八分不拘時服

除溼胃苓湯

除溼胃苓湯草朴
防風滑石山梔等

陳皮二木澤猪苓
木通薄桂赤苓各

治脾肺二經溼熱壅遏致生火丹作爛疼痛者

防風

蒼朮

白朮

赤茯苓

陳皮

厚朴

猪苓

山梔

外科正宗

卷之四

五九

木通

澤瀉

滑石

各一錢

甘草

薄桂

各三分

水二鍾燈心二十根煎八分食前服

柏葉散

柏葉散中蚯蚓糞
加上黃柏輕粉霜

赤豆大黃君莫混
水調敷上何須問

治三焦火甚致生火丹作痒或作痛延及遍身

側柏葉

炒黃芩
末五錢

蚯蚓糞

韭菜田
內者佳

黃柏

大黃

各五錢

赤豆

輕粉

各三錢

右為細末新汲水調搽

續履火丹方用寶鈔一張燒化存性研為細末用水

醋調稀鷄翎蘸塗患上一日三次即愈忌食發物

如意金黃散 見腫瘍門

治火丹不論新久痒痛用新汲水調敷靛汁好亦

天泡第八十

天泡者乃心火妄動脾溼隨之有身體上下不同寒

熱天時微異上體者風熱多於溼熱宜涼血散風

下體者溼熱多於風熱宜滲溼為先用胡粉散

外科正宗 卷之四

石珍散搽之自愈此不早治變為頑風紫癩難痊

解毒瀉心湯 解毒瀉心湯芩連 荆防牛子石膏全

治心經火旺酷暑時臨致生天泡發及遍身者

黃連 防風 荆芥 山梔

黃芩 牛蒡子 滑石 玄參

知母 石膏 各一錢 甘草 木通 各五分

水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

清脾甘露飲 清脾甘露飲 陳 赤心 麥冬 澤瀉 蒼朮 玄明粉 草 共燈心

治脾經溼熱鬱遏乃生天泡下體多而疼痛者

白朮 赤茯苓 山梔 茵陳

麥門冬 生地 黃芩 枳殼

蒼朮 澤瀉 連翹 甘草

玄明粉 各等分

水二鍾竹葉燈心各二十件煎八分食前服

胡粉散 胡粉散治天泡瘡 杭粉輕粉石膏當 蛤粉共將研細末 絲瓜汁和効無雙

治天泡紅腫發熱急脹疼痛用針挑破搽此藥

外科正宗 卷之四

杭粉 一兩 輕粉 石膏 煨 蛤粉 各三錢

共研極細挹乾患上用此搽之或用絲瓜葉搗

汁調搽亦好如冬月無此用染布青缸汁調搽

石珍散 石珍散中煨石膏 還兼輕粉不相僥 青黛再添黃精末 將來一搽疾然消

治天泡日久作爛疼痛不已膿水淋漓者宜用

石膏 煨 輕粉 各一兩 青黛 黃栢末 各三錢

右共研細甘草湯洗淨以此藥搽之其疼即止

肺風粉刺酒皰鼻第八十一

肺風粉刺酒皰鼻三名同種粉刺屬肺皰鼻屬脾總
皆血熱鬱滯不散所謂有諸內形諸外宜真君妙

貼散加白附子敷之內服枇杷葉丸黃芩清肺飲

枇杷葉丸 枇杷葉九天花粉 甘草黃芩酒跌丸
肺風粉刺併敷鼻 三症吞之俱可安

治肺風粉刺鼻皰初起紅色久則肉匏發腫者

枇杷葉 去毛刺 八兩 黃芩 酒炒 四兩

甘草 一兩 天花粉 四兩

其為末新安酒跌丸桐子大每服一錢五分食

外科正宗 卷之四 三

後併臨睡白滾湯茶湯俱可送下忌火酒煎炒

黃芩清肺飲 黃芩清肺飲 芩歸 赤芍防風生地 連翹乾葛天花粉 薄荷紅花共此為

治症同前

川芎 當歸 赤芍 防風

生地 乾葛 天花粉 連翹

紅花 各一錢 黃芩 二錢 薄荷 五分

水二鍾煎八分食後服用酒一杯過口

真君妙貼散 見腫 痧門

治肺風粉刺皰鼻紅赤紫腫早晚用涼水調敷
雀斑第八十二

雀斑乃腎水不能榮華於上火滯結而為斑當以六

味地黃丸以滋化源外以玉容丸早晚搽洗漸愈

玉容丸 玉容丸 羌活獨活 荆芥辛奈芷麻風
艾蘇椒檀香蘇本 陀僧紅棗菊花蓬

治男婦雀斑酒刺及身體皮膚麤糙並用此洗

其松 山柰 細辛 白芷

白蘇 白芨 防風 荆芥

外科正宗 卷之四 三

姜蚕 山柰 藜本 天麻

羌活 獨活 陀僧 枯礬

檀香 川椒 菊花 各一錢 紅棗肉 七枚

以上其為細末用去淨弦膜肥皂一斤同槌作

丸如秋冬加生蜜五錢如皮膚皴槁加牛骨髓

三錢早晚洗之肌膚自然潔潔如玉溫潤細膩

玉肌散 玉肌散用生藥豆 滑石白芷同成就
礬末還兼白附子 肺風酒刺真不謬

一切風溼雀斑酒刺白屑風皮膚作痒者並勸

菘豆半斤 滑石 白芷 白附子各二錢
共為細末每用三匙早晚洗面時湯調洗患上

六味地黃丸見肺癰門

油風第八十三

油風乃血虛不能隨氣榮養肌膚故毛髮根空脫落
成片皮膚光亮痒如虫行此皆風熱乘虛攻注而

然治當神應養真丹服之外以海艾湯薰洗並効

海艾湯

海艾湯中并菊花 防風薄荷藿香加
井粉蒙本蔓荆子 荆芥同煎効可誇

外科正宗

卷之四

六

治油風血虛風熱所致皮膚光亮眉髮脫落者

海艾 菊花 薄荷 防風

蒙本 藿香 甘松 蔓荆子

荆芥穗各二錢

用水五六碗同藥煎數滾連渣共入厥口鉢內

先將熱氣薰面候湯溫蘸洗之留藥照前再洗

神應養真丹見鶴膝風門

治風寒者溼襲於三陽部分以致血脉不能榮

迎肌膚虛痒發生眉髮脫落皮膚光亮者服之
白屑風第八十四

白屑風多生於頭面耳項髮中初起微痒久則漸生

白屑叠叠飛起脫之又生此皆起於熱體當風風

熱所化治當消風散面以玉肌散擦洗次以當歸

膏潤之髮中作痒有屑水者宜翠雲散搽之自愈

祛風換肌丸

祛風換肌丸蒼木 首烏牛膝石菖蒲
苦參甘草靈仙等 芫歸花粉共相和

治白屑風及紫白癜風頑風頑癬溼熱瘡疥一

外科正宗

卷之四

六

切諸瘡搔痒無度日久不絕愈之又發宜服之

威靈仙 石菖蒲 何首烏 苦參

牛膝 蒼木 大胡麻 天花粉各等分

甘草 川芎 當歸減半

右為末新安酒跌丸菘豆大每服二錢白湯送

下忌牛肉火酒雞鷺羊等發物

消風散

見疥瘡門

翠雲散見楊梅瘡門

玉肌散

見雀斑門

潤肌散見白脫瘡門

耳病第八十五

耳病乃三焦肝風妄動而成大人由虛火實火之分

小兒有胎熱胎風之別虛火者耳內蟬鳴或兼重

聽出水作痒外無焮腫此屬虛火妄動之症也四

物湯加牡丹皮石菖蒲及腎氣丸主之實火者耳

根耳竅俱腫甚則寒熱交作疼痛無時宜柴胡清

肝湯治之又有耳挺結於竅內氣脉不通疼痛不

止以梔子清肝湯為治外用黃線藥插入挺肉縫

外科正宗

卷之四

二十六

仿化盡乃愈小兒胎熱或浴洗水灌竅中亦致耳

竅作痛生膿初起月間不必搽藥治早項內生腫

候毒盡自愈如月外不瘥以紅綿散治之則安矣

紅綿散

紅綿散內用枯礬麝香胭脂在其間小兒耳內流膿痰一搽將來換笑顏

治耳內流膿腫痛已消膿尚不止方用此搽之

枯礬

上白三錢 乾胭脂二錢 麝香一分 五釐

共研極細末磁罐收貯先用綿裘絞盡耳內膿

溼綿裘滾藥送入耳底自愈

聰耳蘆薈丸

聰耳蘆薈丸木香 荅歸胆草與大黃山梔青黛南星等 柴胡青皮其此良

治肝膽有火耳內蟬鳴漸至重聽不聞聲息者

蘆薈

大黃

青黛

柴胡

龍膽

當歸

山梔

青皮

黃芩

各一兩 木香

南星

麝香

右為末神麵糊為丸菉豆大每服二十一丸食

後薑湯送下日服三次漸効

柴胡清肝湯

梔子清肝湯 俱見贅疽門

外科正宗

卷之四

二十七

四物湯

見清瘍門

腎氣丸

見肺癰門

漆瘡第八十六

漆瘡由來自異有感而弗感也俗稱木生人感之非

也但漆乃辛熱火象有毒之物人之皮毛腠理不

密故感其毒先發為痒抓之漸似癢疹出現皮膚

傳遍肢體皮破爛斑流水作痛甚者寒熱交作宜

並菜汁調三白散塗之服化斑解毒湯忌浴熱水

兼戒口味不然變為頑風癬癩愈而又發者多矣

三白散

三白散中用石膏 杭粉輕粉不相

調搽必用生薑汁 漆瘡敷上即時消

各為末菲菜汁調敷紙蓋如無菜汁涼水調敷

化斑解毒湯 見火丹門

竹木刺第八十七

竹木刺外入之患有軟硬之分淺深之異軟淺者以

針頭撥見刺形拔出則愈硬深難出者用螻蛄搗

爛塗刺上一時許其刺自然吐出取去之則愈矣

外科正宗

卷之四

本八

花蕊石散 見跌撲門

治竹木刺傷腫痛流膿以慈湯洗淨用此搽之

瘰癧瘡第八十八

瘰癧者密如撒粟尖如芒刺痒痛非常渾身草刺此

因熱體見風毛竅所閉宜服消風散洗用苦參湯

甚者皮損匝匝成瘡以鵝黃散軟絹帛蘸藥撲之

苦參湯

苦參湯用大蓴蒲 河水煎來患上磨 臨洗再加猪胆汁 可教諸痒自然除

治瘰癧瘡作痒抓之又疼坐如糠穩難以安睡

用苦參四兩大蓴蒲二兩河水五瓢同煎數滾

添水二瓢蓋片時臨洗和入公猪膽汁四五枚

淋洗患上不二三全愈後避風忌食發物

鵝黃散

鵝黃散中真豆粉 黃栢滑石輕粉稱 四味將來研細末 止痛收乾遂吾心

治瘰癧瘡作痒抓之皮損隨後又疼用此撲之

菜豆粉一兩 滑石五錢 黃栢三錢 輕粉二錢

右為細末以軟絹帛蘸藥撲於患上止痛收乾

消風散 見疥瘡門

外科正宗

卷之四

本九

疥癩第八十九

疥癩乃風熱溼痰所生有冬溫後天時不正感發傳

染者多兩腮腫痛初發寒熱以柴胡葛根湯散之

外敷如意金黃散在裏肉熱口乾二便不利者四

順清涼飲利之表裏俱解腫仍不消必欲作膿托

裏消毒散膿成者即針之體虛人兼服補托自愈

柴胡葛根湯

見傷寒 柴胡葛根湯 四順清涼飲 見湯

痰包第九十

痰包乃痰飲乘火流行凝注舌下結而飽腫綿軟不

硬有妨言語作痛不安用利剪刃備包剪破流出

黃痰若蛋清稠粘難斷捺盡以冰硼散捺之肉服

二陳湯加黃芩黃連薄荷數服忌煎炒火酒等件

加味二陳湯加味二陳湯半夏茯苓甘草共陳皮

治痰飲流注舌下發腫作痛針刺已破者服之

陳皮 半夏 茯苓 甘草

黃芩各八分 黃連 薄荷各五分

外科正宗

卷之四

辛

水二鍾薑三片煎八分食前服

冰硼散見咽喉門

癰風第九十一

癰風乃陽明溼熱沸騰於肌表或外受風寒侵襲而

成其患初起水泡作瘡成瘡破流脂水痒至微骨

久則成片傳及遍身好浴熱湯形如風癩初起上

體多者防風通聖散去硝黃加葱頭三莖發汗以

散外毒下體多者去麻黃以攻內毒以服祛風換

肌九初服消風清燥湯外成諸瘡一掃光成片流

水者真君妙貼散皮膚頑厚有蟲者麥餞散捺之

消風清燥湯消風清燥湯生地芍芍防歸茶共連

川芎 當歸 白芍 生地

防風 黃芩 黃連 天花粉

蟬蛻 苦參 靈仙各一錢 甘草五分

水二鍾煎八分食遠服

應用方

外科正宗

卷之四

辛

防風通聖散見時毒門 祛風換肌丸見白屑風門

真君妙貼散見腫瘍門 諸瘡一掃光見疥瘡門

溼腫第九十二

溼腫者皆脾氣受傷之病或飲食後驟受風寒所侵

或飢渴時悞食生冷所滯寒積於中食不化其

患胸膈不寬小水不利面目浮腫漸至遍身此土

傷不能生化之故也宜用二蛟散疎通稼土溫養

脾元其小水自利浮腫自消此方百發百中之妙

二蛟散

二蛟散內焙皮硝 陳米三年要炒焦 淫腫糖湯調服下 如蛟行水自然消

治生冷惱怒傷脾致胸膈不寬小水不利面目

四肢浮腫諸藥不効用三年老黃米炒焦黃色

為末提淨芒硝三兩鍋內溶化炒乾為末每用

一平杯和勻再碾極細大人壯實者每服三錢

小兒十歲上下者一錢二分俱用赤砂糖三茶

匙和白滾湯半茶鍾空心調服至午大便一次

至晚再便一次其疾先從眼胞消起日久元氣

外科正宗

卷之四

七三

虛者與加味胃苓湯間服至重者不過五服愈

加味胃苓湯

加味胃苓湯米苓 參查芍半藿香陳 澤瀉猪苓 餅厚朴 甘草香附効如神

治脾胃受傷胸膈不寬兩脇膨脹小水不利面

目四肢浮腫者服之

陳皮

茯苓

白朮

白芍

各一錢

藿香

人參

厚朴

山楂

澤瀉

半夏

各五分

甘草

猪苓

各三分

香附

女人加一錢

姜三片燈心二十根水二鍾煎八分食前服

咬傷第九十三

人咬為患良肉受傷但齒乃陽明胃經有餘臟腑多

火多熱生穴於此凡食經此無不燐爛下咽又飲

食炙燐之毒無不侵襲故傷人發腫其痛異常臭

膿腐爛痛徹連心是感牙之毒也初咬時一日內

眾撒熱小便浸傷處洗淨牙黃瘀血咬孔上蟾酥

餅貼之膏蓋後出微膿漸愈如咬時未經此法致

外科正宗

卷之四

七三

腫痛發疔疼甚者亦與童便浸洗挹乾用籠紙撚

蘸麻油點火用烟焰薰腫痛上良久方住以解牙

毒仍以蟾酥條插入孔內膏蓋候腫消時換玉紅

膏搽之長肉完口如有雜症相兼者亦隨症而治

蟾酥餅條

見疔瘡門

玉紅膏

見腫瘍門

葱白甘草湯

葱白甘草湯容易

每日常將頻洗之

消痰散腫功全備

咬傷疼痛兼臭穢

治咬傷

腫痛膿血淋漓臭穢腐爛者用葱

白二兩粉草五錢水三碗煎至二碗每日洗淨

傷處瘀腐膿血方用玉紅膏搽之黑膏蓋漸愈

風犬傷第九十四

風犬乃朝夕露卧非時不正之氣所感故心受之其舌外出肝受之其目昏蒙脾受之其涎自流肺受之其音不出腎受之其尾下拖此五臟受毒成爲風犬乃稟陰陽肅殺之氣故經此必致傷人隨咬卽服救生散小便中行出血片忌諸口味麻物赤豆等俱不可見百日乃安治之遲者毒大而小便

外科正宗

卷之四

五十四

難出必攻臟腑久則成形腹脹攻急人聲若犬眼神露白者俱爲不治有愈後復犯前禁觸之仍死

救生散

救生散用七斑黃 惟用全身翹足饒 杭粉一錢同作末 空心酒服効功高

治風犬咬傷用生斑黃七個去頭翅足杭粉一

錢同研空心溫黃酒調服一時許小便行出血

片白脂乃惡物也如便疹煎甘草湯飲之自利

如毒未盡次早再一服以小便清白方爲毒盡

又方治風犬咬有効其人頂中必有紅髮一根急須

拔去以追風如聖散敷傷處抽毒氣服救生散

追風如聖散

追風如聖散防風 川草烏 芩薄荷同 白芷細辛蒼木等 雄黃加上効無窮

治風犬咬傷隨用敷之其毒卽可拔出

細辛

防風

川烏

薄荷

草烏

川芎

白芷

蒼木各一兩

雄黃四錢

共爲末溫酒調敷傷處以紙蓋扎早晚換二次

風犬傷之要靜居

諸麻赤豆大葷祛

外科正宗

卷之四

五十五

百日之中都忌見

敢教患者樂年餘

女人面生蠶黑斑第九十五

蠶黑斑者水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥

結成斑黑色枯不澤朝服腎氣丸以滋化源早晚

以玉容丸洗面斑上日久漸退兼戒憂思動火勞

傷等件但此生於夫主不利疑事不決者常有之

腎氣丸

見肺 癰門

玉容丸

見雀 斑門

鈕叩風第九十六

鈕扣風皆原風溼凝聚生齋久則搔痒如癬不治則

沿漫項背當以水硫散擦之甚者服消風散亦妙

水硫散

水硫散內用川椒 朝腦生慈豈可饒 蘿蔔內藏煨熟藥 還將猪脂共相調

硫黃

一兩

獐冰

川椒

生礬

共為末先用白蘿蔔一個摳空其內將藥填滿

復將原皮蓋之溼紙包三四層灰火內煨半時

許待冷取開用藥同熟猪油調稠搽患上自愈

消風散

見赤 瘡門

外科正宗

卷之四

五

枯筋箭第九十七

枯筋箭乃憂鬱傷肝肝無榮養以致筋氣外發初起

如赤豆大枯點微高日久破裂趨出筋頭縫鬆枯

槁多生胸乳間宜用絲藥線齊根繫緊七日後其

患自落以珍珠散搽之其疤自收兼戒口味不發

絲藥線

見瘦 瘡門

珍珠散

見下 瘡門

婦人脚丫作痒第九十八

婦人脚丫作痒乃從三陽風溼下流凝結不散故先

作痒而後生溼爛又或足底灣曲之處痒溼皆然

枯礬散

枯礬散中煨石膏 黃丹輕粉不相饒 四味將來為末搽 脚丫溼痒即時消

枯礬

五錢

石膏

煨

輕粉

黃丹

右為末溫湯洗淨搽藥即愈

手足破裂第九十九

手足破裂破裂者乾枯之象氣血不能榮養故也因

熱肌驟被風寒所逼凝滯血脉以致皮膚漸枯漸

痛乃生破裂日襲於風風熱相乘故多作痛以玉

外科正宗

卷之四

五

肌散洗擦潤肌膏潤之甚者兼服當歸飲子為妙

玉肌散

見雀 斑門

潤肌膏

見白 瘡門

當歸飲子

見赤 瘡門

眼丹第一百

眼丹脾經有風胃經多熱共結為腫風多者則浮腫

易消熱甚者則堅腫難散初起宜用金黃散敷之

有表症者荆防敗毒散裏症者清胃散加大黃利

之如後不散必欲作膿宜換膏貼之膿成者即針

遲則眼頭自破此乃睛明穴內空難欵成漏者多

荆防敗毒散 見時毒門

清胃散 見牙縫出血門

金黃散 見腫瘍門

黑子第一百

黑子瘡名也此腎中濁氣混滯於陽陽氣收束結成

黑子堅而不散凡人生此終為不吉面部不善者

去之宜細銅管將瘡套入孔內撚六七轉令瘡入

管一拔便去有瘡浮淺不能拔者用針挑損瘡上

外科正宗

卷之四

五八

搽水蠅散少許糊紙蓋之三日自脫或灰米膏點

之亦可落後珍珠散乾摻生皮而愈忌醬醋無斑

灰米膏用成塊火灰減水調稠將白川米插入灰內

留半米在外片時許候米熟用米點瘡上可落矣

水蠅散 見瘡癰門

珍珠散 見下疳門

眼胞菌毒第一百二

菌毒者乃脾經蘊熱凝結而成其患眼胞內生出如

菌頭大蒂小漸長垂出甚者眼翻流淚亦致昏蒙

治宜用軟綿紙蘸水蘸之眼施上少頃用左手大

指甲佃於患根右手以披針尖頭齊根切下血出

不妨隨用翠雲靛磨濃塗之其血自止內服涼膈

清脾飲二服仍忌海腥煎炒椒薑火酒等件不發

涼膈清脾飲

涼膈清脾飲薄荷黃芩赤芍連翹等

荆防生地石膏圖

防風

荆芥

黃芩

石膏

山柰

薄荷

赤芍

連翹

生地

錢各一分

甘草

五分

外科正宗

卷之四

五九

水二鍾燈心二十根煎八分食後服

翠雲靛治眼胞菌毒用針割後塗之杭粉五兩銅綠

末一兩輕粉一錢共研極細用黃連一兩同川

米百粒水一碗煎一半再熬折去二分和藥作

錠陰乾臨用清水少許淨硯上磨濃雞翎蘸搽

患上又治爛弦風眼或暴赤腫痛者搽搽更効

體氣第一百三

體氣一名胡氣此因父母有所傳染者又有胡胎而

受生者故不脫本來氣質凡此腋下多有棕紋數孔出此氣味常以五香散擦之內用蒜汁時常作饌食之亦可解其氣味可漸而退此法常取効也

五香散

五香散內用沉檀 還有零零併木香 加上麝香功更捷 敢教體氣不相妨

沉香

檀香

木香

零零香

各三錢

麝香

共為細末每用五釐津調擦擦兩腋下三日一次或用香末二錢絹袋盛貯掛於腋下亦効

外科正宗

卷之四

全

蒜肚方用公猪肚一具入大蒜囊四十九枚去殼入

肚內以線扎口水煮極爛用鹽醋蘸肚隨便食之

氣味甚者用癩蝦蟆一個入內同煮肚爛去蝦蟆

大蒜用熱酒食之洗浴發汗避風三日其氣頓改

白禿瘡第一百四

白禿瘡因剃髮膜理司開外風襲入結聚不散致氣

血不潮皮肉乾枯發為白禿久則髮落根無榮養

如禿斑光潤不痒內血已潮以薑蘸潤肌膏常擦

其髮漸生禿斑乾枯作痒者內必有虫宜用麥饑散擦之虫死風散髮生可愈後忌動風發物等件

麥饑散

見痘風瘡門

治禿瘡頭毛脫落白斑如癬瘡茄壘壘叠起痒

甚猶若虫行葱湯洗淨瘡茄潔淨用麻油調搽

以毡帽戴之隨後作疼發腫忍之三日後其痴

漸漸而脫愈之後不復作其髮亦生戒諸發物

諸瘡一掃光

見疥瘡門

外科正宗

卷之四

全

治禿瘡髮脫作痒本藥一錢加倒挂塵二分加

燈窩宿油調搽自愈

潤肌膏

潤肌膏內用麻油

紫草當歸一處投能搽禿瘡枯槁色加之黃蠟勑應收

治禿瘡乾枯白斑作痒髮脫用麻油四兩當歸

五錢紫草一錢同熬藥枯濾清將油再熬加黃

蠟五錢化盡傾入碗內頓冷搽擦患上漸愈矣

奶癬第一百五

奶癬兒在胎中母食五辛炙食炙燻遺熱與兒生後

頭面遍身發為奶癬流脂成片睡卧不安搔痒不

絕以蚊蛤散治之或解毒雄黃散甚則翠雲散妙

蚊蛤散

蚊蛤散用點胡椒 二味將來同炒焦 加上輕粉香油和 嬰兒奶癬即時消

蚊蛤 兩 點紅川椒 兩 輕粉 錢五

先將蚊蛤打成細塊鍋內炒黃色次下川椒同

炒黑色烟起為度入罐內封口存性次日入輕

粉碾為細末確收貯香油調搽奶母戒口為妙

解毒雄黃散

見血風 瘡門 翠雲散 青紅汁調搽 見楊梅瘡門

外科正宗

卷之四

全三

蟾拱頭第一百六

蟾拱頭俗名猶猪是也患小而稟受悠遠皆父精母

血蓄毒而成生後受毒者只發一次其患腫高破

之又腫皆稟受時原有衣膜相裹毒雖出而膜未

除故愈又發腫甚膿熟者用針刺破以三品一條

鎗插入孔內化盡內膜自愈又有不腫而不收口

者此必風襲患口宜收銅散搽之兼戒口味自愈

收銅散

收銅散効為何因 銅錫鉛調搽化皮 性熱亦能收淨水 一乾而不復回性

治蟾拱頭已破後膿水不乾愈之又發久不收

口用化銅舊確為末洗淨患上香油調搽忌口

三品一條鎗

見痔 毒門

小兒遺毒爛斑第一百七

遺毒乃未生前在於胞胎稟受因父母楊梅瘡後餘

毒未盡精血孕成故既生之後熱湯洗浴烘薰衣

物外熱觸動內毒必發於肌膚之表先出紅點次

成爛斑甚者口角發道眼眶鼻面皮肉俱壞多妨

外科正宗

卷之四

全三

乳哺啼叫不安初治宜早內與土茯苓湯調入中

黃末每日數次共飲四五分外用解毒紫金丹磨

塗患上効者可保十中三四遲延毒甚爛斑遍身

不乳者百中難活一二此由根蒂受毒之深故也

人中黃治小兒諸胎毒痘疹黑陷內收唇焦口乾風

熱斑疹赤遊丹毒兼治大人傷寒陽症發狂或諸

惡瘡毒氣入裏口燥咽乾煩渴悶亂中諸砒草河

蛇等毒諸般急病無有不効用毛竹一段兩頭留

節一頭鑽一小孔用粉草磨為細末從孔灌滿以木條塞緊孔取用磚扎之沉入大糞池內半年取

起長流水浸一日帶竹風乾磁罐收貯大人每服

二錢小兒每服三四分涼水調服小兒胎毒爛斑

土茯苓湯調服尋常熱病入應病藥中調服即効

真君妙貼散 見腫瘍門

治小兒胎毒皮肉腐爛疼痛不安用此數即効

解毒紫金丹 見疥瘡門

外科正宗 卷之四

全四

蜈蚣串第一百八

蜈蚣串者乃得於思慮傷脾脾氣鬱結所生是疾氣

血澆薄者多蓋四肢屬脾土其患多生於兩手初

起骨中作疼漸生漫腫堅硬不熱不紅手背及內

關前後連腫數塊不能轉側日久出如豆腐漿汁

串通諸竅日夜相流腫痛仍在患者而黃肌瘦飲

食減少久則寒熱交作內症並出首尾俱宜益氣

養榮湯加味道遙散調和氣血扶助脾胃其中可

生者十有二三矣補而不應氣血滯盡而亡者多

益氣養榮湯

加味道遙散 見瘰癧門

小兒痘風瘡第一百九

痘風瘡因痧痘後毒發未盡留熱肌膚復被外風侵

入其患先從細疹作痒次漸沿開成片脂水生痴

搔之無度因用麥餞散搽之兼戒口味避風自愈

麥餞散

麥餞散治痘風瘡 硫黃人信要相當 川椒生熟枯礬等 麻油調搽自然光

治小兒痘風作癢登登成片甚則頑麻不知痛

外科正宗 卷之四

全五

用小麥一升炒枯黃色乘熱入鉢內和硫黃四

兩白砒一兩細末攪勻待冷取起加烟膠半斤

川椒三兩生枯礬各二兩共碾細末臨用葱湯

洗淨用麻油調搽油紙蓋扎三日一換三次愈

小兒赤遊丹第一百十

赤遊丹受毒於未生前發病於有生後蓋身在胞胎

皆賴父精母血藉以生養父母不能節其慾多致

淫火猖熾胎必侵受又不能戒諸厚味以及炭火

烘薰重衾叠褥往往受熱子無弗有及致生後熱
 湯洗浴烘薰衣物觸動內毒而欲發之時先發身
 熱啼叫驚搐次生紅腫光亮發熱瞬息遊走發無
 定處先從頭額起者名天奪丹以升麻葛根湯母
 子同服餘皆起於胸背流入四肢者輕起於四肢
 流入胸腹者重有此總皆先砭惡血為要砭血之
 後先用精猪肉縫片貼之一時許換如意金黃散
 用水芭蕉根搗汁調敷甚者日換二次內以大連
 外科正宗 卷之四 全六

翹飲消毒犀角飲五福化毒丹毒氣入裏腹脹堅
 硬不乳者紫雪散下之三日後身漸微涼死血之
 處肉便軟活聲清腹軟乳哺如常者順反此為逆
 升麻葛根湯 升麻葛根湯為藥 柴胡梔子共連翹
木通甘草同煎服 丹毒遊行効最高
 治丹毒身體發熱面紅氣急啼叫驚搐等症服
 升麻 乾葛 白芍 柴胡
 黃芩 山梔 各錢 木通 甘草 各五分
 水二鍾煎八分不拘時母子同服

大連翹飲 大連翹飲梔子歸 車前滑石石膏隨
荆防并麥柴芩等 蟬蛻木通牛子宜
 治小兒丹毒發熱痰涎壅盛一切諸瘡痧疹頸
 項生核或傷風傷寒時行發熱等症並宜服之
 連翹 瞿麥 滑石 車前子
 牛蒡子 赤芍 山梔 木通
 當歸 防風 黃芩 柴胡
 甘草 荆芥 蟬蛻 石膏 各五分
 水二鍾燈心二十根煎八分母子同服
 外科正宗 卷之四 全六

消毒犀角飲 消毒犀角飲防風 加生黃連甘草同
還用燈心為引使 痰遊丹腫効神功
 治小兒丹毒身熱氣急啼叫驚搐不乳等症服
 犀角 鎊 防風 各一錢 甘草 五分 黃連 三分
 右水二鍾燈心二十根煎四分徐徐服之
 紫雪散 紫雪散於羊犀角同 片麻寒水石膏隨
玄參泥木香并藥 硝片味砂金箔從
 治小兒赤遊丹毒甚者毒氣入裏肚腹膨脹氣
 急不乳即宜此藥救之來治傷寒熱燥發狂及
 外科一切毒毒在內煩躁口乾恍惚不寧等症

升麻 寒水石 石膏 犀角

羚羊角各一兩 玄參二兩 沉香

木香各五錢 甘草八錢

水五碗同藥煎至一碗濾清再煎滾投提淨朴

硝三兩六錢微火漫煎水氣將盡欲凝結之時

傾入碗內下硃砂米片各二錢金箔一百張各

預研細和勻碗頓水內候冷凝成雪也大人每

用一錢小兒二分十歲者五分徐徐嚥之即效

外科正宗

卷之四

六

病重者加一錢亦可或用淡竹葉燈心湯化服

針砭法

針砭法米針砭法 披針頭向患中插筋頭復向針上敲 敲出血來以筋刮

治小兒赤遊丹毒紅赤焮腫遊走不定須砭之

用披針鋒尖向患上以烏木重筋在針上而擊

之密砭去血多者為妙血紅者輕紫者重黑者

死砭畢溫湯洗淨用乾精猪肉經大片貼砭處

一時許方換如意金黃散水芭蕉根搗汁調敷

如意金黃散見腫瘍門

治小兒赤遊丹毒紅如硃熱如火走如雲散及

遍身不定者用水芭蕉根搗汁調敷加蜜亦可

五福化毒丹見胎毒門

走馬疳第一百十一

走馬疳言患迅速不可遲延故也其患多在痧痘餘

毒所中又有雜病熱甚而成者其患牙根作爛隨

便黑腐作臭甚者牙齦脫落根柯黑朽不數日間

以致穿腮破唇誠為不治初起宜用蘆薈消疳飲

外科正宗

卷之四

六

外用人中白散或冰硼散二藥搽之取去黑腐肉

見紅肉血流者為吉如取時頑肉不脫腐爛漸開

焮腫外散臭味不止更兼身熱不退者俱為不治

蘆薈消疳飲蘆薈消疳飲薄荷 玄參甘草其柴胡 升麻牛子於羊角 梔子黃連竹葉扶

治小兒走馬牙疳身熱氣齋牙齦腐爛氣味作

臭以及穿腮破唇者並服之

蘆薈 銀柴胡 胡黃連 川黃連

牛蒡子 玄參 桔梗 山梔

石膏 薄荷 羚羊角各五分

甘草 升麻各三分

水二鍾淡竹葉十片煎六分食後服

人中白散 人中白散功奇絕 黃柏兒茶青黛列薄荷水片要精研 口疳搽上湯沃雪

治小兒口疳走馬疳及牙齦腐爛黑臭者極效

人中白 研壺者佳 煨紅二兩 孩兒茶一兩 黃柏

薄荷 青黛各末六錢 冰片五分

共再研極細先用溫湯漱淨吹藥疳上日用六

外科正宗 卷之四 九十一

七次吹藥涎從外流為吉內收涎毒入裏為凶

牙疳五不治

口臭涎穢者一不治 黑腐不脫者二不治

牙落無血者三不治 穿腮破唇者四不治

用藥不效者五不治

水礪散 見咽喉門

重舌第一百十二

大人小兒重舌乃心火妄動發之當以線針點刺患

上令出惡血內服解毒瀉心湯外以冰礪散搽之

又有紫舌木舌亦由心火而發用飛鹽加冰片少

許勤搽出涎自愈又有痰氣結於舌上成核作痛

硬強者用線針點破出血用冰礪散搽之服後藥

黃連瀉心湯 黃連瀉心湯芩連 薄荷甘草連翹等 木通加上効如括

治大人小兒心火妄動結成重舌木舌紫舌脹

腫堅硬語言不利者並宜服之

黃連 山梔 荊芥 黃芩

外科正宗 卷之四 九十二

連翹 木通 薄荷 牛蒡子各一錢

甘草五分

水二鍾燈心二十根煎八分食後服

針刺法治重舌木舌紫舌脹等疾腫脹疼痛硬強不

語又兼舌根併兩齒合縫盡處作腫瘀肉塗塞口

禁難開俱用此法刺之用龍線針扎在筋頭上在

患處點刺出血紅紫毒輕紫黑毒重患甚者數十

點皆可血盡溫湯漱之甚者金鎖匙蘸者冰礪散

搽患上流去熱涎內服涼膈散清涼飲俱可選用

金鎖匙

水礪散

涼膈散

四順清涼飲俱見咽喉門

胎瘤第一百十三

胎瘤者初生小兒頭上胸乳間腫起大者如偃小似

梅李此皆胎中瘀血凝滯而成雖候兒滿月外方

可用針刺破內如赤豆汁則安內服五福化毒丹

五福化毒丹

五福化毒丹連桔 青黛人參赤茯苓 玄參胆草牙硝片 甘草硃砂金箔呈

外科正宗

卷之四

卷二

治小兒蘊積胎毒以及諸瘡癰疹傷風斑症口

舌生瘡疹涎壅盛譫言煩躁夜睡不寧者並効

玄參

桔梗

赤茯苓

各二兩 人參三錢

黃連

龍膽草

青黛

牙硝各一兩

甘草

五錢

冰片

五分

硃砂

三錢

金箔

二十張 爲衣

右爲末煉蜜丸芡實大每服一九薄荷燈心湯

化服及治瘡疹後餘毒上攻口齒涎血臭穢以

生地黄汁化下如無地黃竹葉燈心湯亦可用

驚口瘡第一百十四

驚口瘡皆心脾二經胎熱生致致滿口皆生白斑雪

片甚則咽間疊疊腫起致難乳哺多生啼叫以青

紗一條裹筋頭上蘸新汲水搽去白胎以淨爲度

重手出血不妨隨以水礪散搽之內服涼膈之藥

水礪散

見咽喉門

涼膈散

見病門

痘癰第一百十五

痘癰乃原痘滯滲不足毒流於脾肺二經致手脚胸

外科正宗

卷之四

卷三

背結成漫腫大如桃李此多發在收靨之後身涼

不渴者爲吉有此不必內消宜太乙膏貼上候膿

熟針之元氣虛弱者兼服保元湯助脾健胃爲要

保元湯

保元湯力効無窮 救用扶危立大功 甘草參芪兼白朮 棗姜加上起痰癰

治痘癰出膿之後脾胃虛弱膿清不斂者服之

人參

黃芪

白朮

各一錢 甘草三分

薑一片棗二枚水三鍾煎八分食遠服

痘疔第一百十六

痘疔乃痘毒升發不盡留痘心肝二經者發之初生紫點次日變黑毒淺者浮高而潤毒甚者深陷而焦其發多山於七朝上下將磨之際又生於臀腿手足身温疤潤音清者吉發在肚腹腰腎身熱色枯聲啞者凶凡見此者急用針刺疔根挿入蟾酥條候四邊裂縫疔搖動者用刀割去搽玉紅膏生肌完口如針無血挿藥乾枯不變膿者終為不治但此症屬有餘首尾俱宜加減鼠粘子湯為要也

外科正宗

卷之四

九

加減鼠粘子湯

加減鼠粘子湯 荊芥山梔甘草

花粉知母其蕪 燈心竹葉難忘

鼠粘子

天花粉

知母

荊芥

山梔

各六分 甘草三分

水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎服

身熱加柴胡黃芩

有痰加麥冬貝母

咽啞加玄參桔梗

咬牙加薄荷石膏

便秘加蜂蜜玄明粉

昏憤加黃連硃砂

痂枯加當歸生地

戀疔加蟬蛻川芎

八珍湯

見潰瘍門

治痘疔落後氣血虛弱膿水出多不能生肌收斂宜服之

欵宜服之

蟾酥條

見疔瘡門

玉紅膏

見腫瘍門

黃水瘡第一百十七

黃水瘡於頭面耳項忽生黃色破流脂水頃刻沿開多生痛痒此因日晒風吹暴感溼熱或因內食溼熱之物風動火生者有之治宜蛤粉散搽之必愈

外科正宗

卷之四

九

蛤粉散

蛤粉散治黃水瘡 石膏黃柏併輕粉

膿水沿開痒痛當水調敷上即時光

蛤粉

石膏

各一兩 輕粉

黃柏

生曬各五錢

共為細末涼水調搽冬月麻油調亦好

真君妙貼散

見腫瘍門

治黃水瘡痒痛脂水亦効

大人破第一百十八

口破者有虛火實火之分色淡色紅之別虛火者色淡而白斑細點甚者陷露龜紋脉虛不渴此因思煩大甚多醒少睡虛火動而發之四物湯加黃柏

知母丹皮肉桂以為引導從治法也外以柳花散

搽之實火者色紅而滿口爛斑甚者腮舌俱腫脉

實口乾此因膏梁厚味醇酒炙燂心火妄動發之

宜涼膈散外搽赴筵散吐涎則愈如口舌生瘡舌

乾黃硬作渴者加減八味丸以滋化源俱禁水漱

柳花散

柳花散內君黃栢 青黛肉桂栢兼續
水片加之為末吹 虛陽口破功奇速

黃栢

淨末 一兩 青黛 錢三 肉桂 錢一 冰片 分二

各為細末共再研磁礮收貯每用少許吹之

外科正宗 卷之四 九六

赴筵散

赴筵散內栢苓連 梔子乾薑一處攪
細辛加之各等分 吹搽口破即安然

黃連

黃栢 黃芩 梔子

乾薑

細辛 各等分 為末吹患上

四物湯

見癩 癩門 涼膈散 見咽 喉門

加減八味丸

癩疽潰瘍門

臭田螺第一百十九

臭田螺乃足陽明胃經溼火攻注而成此患多生足
指脚丫隨起白班作爛先痒後痛破流臭水形似

螺磨甚者脚面俱腫惡寒發熱先宜甘草湯洗淨

貼蟾酥餅三日三枚後用珍珠散猪脊髓調搽膏

蓋煨腫上真君妙貼散敷之其腫漸消戒便步履

蟾酥餅

見疔 瘡門 珍珠散 見下 癩門

牛程躑躅第一百二十

牛程躑躅途奔急熱脚下水見風以致氣滯血枯結

成頑硬皮肉榮衛不滋漸生腫痛腫高突起支脚

外科正宗 卷之四 九七

難行久則破裂膿水相流每日溫湯淨洗搽牛角

散又有內膿攻注皮頑難破者以大線針眠頭挑

破出膿乃寬硬皮敲破者剪而去之肉不生者玉

紅膏長之肉滿不生皮者珍珠散搽上生皮乃愈

牛角散

牛角散中牛角燒 松香輕粉不相饒
本方加上水龍骨 丑隨相兼好和調

牛角尖

燒 水龍骨 松香 輕粉 各等分

共為末牛骨髓調搽虛弱者兼服十全大補湯

玉紅膏

見癩 癩門 珍珠散 見下 癩門

僵脚蛙第一百二十一

僵脚蛙多生手指節中不紅不熱腫如蟬腹乃手少陰痰氣凝滯而生初起不疼日久方痛痛久方腐腫仍不消蟾酥餅膏貼漸作稀膿近者一載遠者三年此屬體弱者有之內兼補劑免變癆瘵之病
蟾酥餅見疥瘡門

田螺泡第一百二十二

田螺泡多生手足忽如火燃隨生紫白黃泡此脾經
外科正宗 卷之四 九八

風溼攻注不久漸大脹痛不安線針挑破泄去毒

水太乙膏蓋挑破又生者內服解毒瀉脾湯可愈

解毒瀉脾湯解毒瀉脾湯牛子 防風蒼朮共山梔石膏甘草黃芩等 木通燈草劫堪推

防風 牛子 山梔 石膏

黃芩 蒼朮 甘草 木通各一錢

水二鍾燈心二十根煎八分量病食前後服之

太乙膏見腫瘍門 蟾酥條見疥瘡門

玉紅膏見腫瘍門

脫痛第一百二十三

脫者皆起於手足乃風寒氣鬱於皮毛致血不榮於肌表謂皮槁則多痛似無皮之狀是脫苦生焉將患上慈湯浸洗良久隨以潤肌膏擦之就暖勿見風冷自愈又每久逢冬即發者須三伏時晒搗爛大蒜間擦三次不再發謂寒因熱治其理甚明矣
陰風第一百二十四

陰風又名八脚虫也乃肝腎二經濁氣而成生此不
外科正宗 卷之四 九八

為清吉銀杏散津調擦之內服六味地黃丸每斤

加蜜炒黃柏一兩蘆薈五錢以清化源愈後不發

銀杏無憂散銀杏無憂散麝香 水銀乾粉杏仁良雄黃狼毒併蘆薈 一擦何須不笑顏

水銀鎔製 杏仁去皮 輕粉 雄黃

狼毒 蘆薈各一錢 麝香一分

除水銀杏仁膏餘藥共碾篩細入上二味再研勻先用土苧蒲煎湯洗之川針挑去虱孔隨用津唾調擦使藥氣入內愈不復生切忌牛犬肉

六味地黃丸 見脾胃門

葡萄疫第一百二十五

葡萄疫其患多生小兒感受四時不正之氣鬱於皮膚不散結成大小青紫斑點色若葡萄發在徧體頭面乃為腑症自無表裏邪毒傳胃牙根出血久則虛人斑漸方退初起宜服羚羊散清熱涼血久則胃脾湯滋益其內又有牙根腐爛者人中白散

羚羊角散

羚羊角散同知母甘草麥冬淡竹葉黃芩牛子共玄參止血消斑功最靈

外科正宗 卷之四

一百

羚羊角 防風

麥冬

玄參

知母

黃芩

牛子

各入二分

水二鍾淡竹葉十片煎六分食遠服

胃脾湯

胃脾湯內甘草陳麥冬五味共沙參扶神白木併遠志脈虛自汗服安寧

白木

扶神

陳皮

遠志

麥冬

沙參

各六分

五味子

甘草

各五分

水二鍾煎六分食遠服虛弱自汗者去沙參加

人參黃芪各五分

人中白散 見口疳門

百蟲入耳第一百二十六

百蟲入耳乃偶然誤入之如蠅蚊細蟲入耳以麻油數點滴入竅中蟲亦自死取出如蜈蚣蜜蜂等大蟲入者以肉炙香安耳邊其蟲聞香自出有蟲夜間暗入者切勿驚慌响叫逼蟲內攻宜正坐點燈光向耳竅其蟲見光自出對面有人見其蟲不出惡蟲叮咬第一百二十七

外科正宗 卷之四

百一

惡蟲乃各稟陰陽毒種而生見之者勿觸其惡且如

蜈蚣用鉗蝎蜂用尾惡蛇以舌螫人自出有意附

毒害人必自知其惡也凡有所傷各尋類而推治

蜈蚣咬傷疼腫驟發用蟾酥餅磨濃塗傷處用麤紙

擦蘸麻油點少用烟焰薰之疼腫自消又方用雄

雞糞搗水塗之又方用頭垢搽傷處以擦焰薰之

蝎有雌雄二種雄者螫人痛在一處雌者痛牽徧體

用井底泥敷痛處乾則易之一時無泥取新汲水

以青布隨痛處搭之溫則再易又方五月五日用黃蠟二兩溶化將凝時投雄黃硃砂細末各三錢和勻捏成餅窩仍用貓兒眼草白汁端午時滴入窩內陰乾愈久愈佳復捏成塊密收臨用一米許刺針尖上以燈焰化開滴正螫之處其疼即止矣蛇毒傷人用雄黃末蘭葉搗汁調敷腫上內用半枝蓮搗爛取汁二兩熱酒四兩和汁服之蓋汗為効仍用渣敷傷處亦妙又方隨傷即用端午收採蒼

外科正宗

卷之四

百一

耳草末五錢水煎一鍾熱服蓋汗即安如無端午收採者使用常日採取陰乾煎服一兩發汗亦効七寸蛇青色扁形尖尾短足紅口者毒輕青口者毒重以舌螫人其毒最惡初螫時用雄黃末一錢生礬二錢杓內溶化將筋頭點藥傷處冷則易之連點七次遂愈毒氣入裏者解毒紫金丹酒磨服一錢蓋汗即愈遲延毒走腫痛者麻油焰薰之亦瘥河鮑毒血毒中人舌麻心悶自紫根搗汁冷飲子毒

中人昏悶腹脹口禁難言金汁解之非此不能也

人面瘡第一百二十八

人面瘡古言有生者近世之罕聞矣其生病異而受之必異瘡象全似人面眼鼻俱全多生膝上亦有臂患者據方書皆云積冤所致先須清心懺悔改過自新然後方服十六味流氣飲外用貝母為末敷之乃聚眉閉口次用生肌飲口藥亦可得愈矣十六味流氣飲見流注門

外科正宗

卷之四

百三

誤吞針鐵骨哽咽喉第一百二十九

誤吞針刺哽咽喉疼痛者用亂麻筋十團搓龍眼大以線穿繫留線頭在外湯溼急吞下咽頃刻扯出其針頭必刺入麻中同出如不中節再吞再扯以出為度誤吞銅物者多食葶薺化堅為軟若吞鐵骨之物腸中不能轉送覺墜者多食青菜猪脂自然送入大腸從糞同出諸骨哽喉用玉簪花根八錢各隨所犯之肉為引煎湯服之轉出為愈又諸骨

哽於咽下不能外出者烏龍針推之骨下則安矣
烏龍針治骨哽於咽下難出者用細鐵線燒軟雙頭
處用黃蠟作丸龍眼大裹鐵線頭止外用絲綿裹
之推入咽內哽骨處其骨自然順下矣不下再推
又方治諸骨哽喉玉簪花根切片煎湯漱之徐徐吐
出其骨自軟再用乾飯嚥之自下

中砒毒第一百四十

砒毒者陽精大毒之物服之令人臟腑乾涸皮膚紫

外科正宗

卷之四

百四

黑氣血乖逆敗絕則死初服知覺早者大蘭根葉
搗汁灌之輕則可解無蘭處以生菜豆同水研爛
以水灌之多則為効如不解者以金汁灌之必甦
甦後如顛不語者每日以菘豆水飲之毒盡則愈
取金汁法用大毛竹一連二節用刀劈去外青一半
用磚扎節中沉入大糞池內一年後取起以長流
水浸一日取起鑽開節孔內蓄毒清磁罐收貯凡
遇有中砒毒河鮑傷寒陽毒發狂疥瘡痧症毒氣

入裏煩躁口乾渴欲飲水脈大有力者並宜此藥
落下頰拿法第一百三十一

落下頰者氣虛之故不能收束閉竅也患者平身正
坐以兩手托住下頰左右大指入口內納槽牙上
端緊下頰用力往肩下捺開閉竅向腦後送上即
投閉竅隨用絹條兜頰於頂上半時許去之即愈
救自勿斷喉法第一百三十二

自刎者乃迅速之變須救在早遲則頰冷氣絕必難

外科正宗

卷之四

百五

救矣初刎時氣未絕身未冷急用絲線縫合刀口
搽上桃花散多搽為要急以綿紙四五層蓋刀口
藥上以女人舊布裹腳將頭擡起周圍纏繞五六
轉扎之患者仰臥以高枕枕在腦後使項鬱而不
直刀口不開冬夏避風衣被覆暖待患者氣從口
鼻通出以姜五片人參二錢川米一合煎湯或稀
粥每日隨便食之接補元氣三日後急手解去前
藥用棉花散搽刀口上仍急纏扎三日急用濃

慈湯軟絹蘸洗傷處搥乾用抵脚挑玉紅膏放手
心上捺化捺於傷口處再用舊綿花薄片蓋之外
用長黑膏貼裏周圍交扎不脫近喉刀口兩傍再
用黑膏長四寸濶二寸豎貼膏上兩頭粘貼好肉
庶不脫落外再用絹條圍裏三轉針線縫頭冬月
三日夏月二日每用慈湯洗搥換藥自然再不疼
痛其肉漸從兩頭長合內服八珍湯調理月餘如
大便結燥用猪胆套法不可利藥利之雙額俱斷

外科正宗

卷之四

夏

者百日單斷者四十日必收功完口此法曾治強
盜郭忠皂隸沙萬家人顧與俱雙額齊斷將危者
用之全活單額傷斷者十餘人治之俱保無虞矣

桃花散

見跌撲門

玉紅膏

見腫瘍門

如聖金刀散

見金瘡門

八珍湯

見潰瘍門

陰毒第一百三十三

陰毒乃純陰無陽被天時寒冷肅殺之氣侵入肌膚
沉於骨髓致氣不能升血不能行凝滯經絡疼痛

切骨初起不腫不熱朝輕暮重久則作腫漸紅爛
斑黑腐臭水淋漓穢氣薰蒸腐爛漸開終久必死
一人年三十歲冬月隔溝與隣婦私交房事方畢
忽婦夫回慌忙隔溝赴水而走熱身受寒五日後
小腹大腎陰痛不腫日夜响叫至一月後谷道傍
生一爛斑黑腐倒陷諸藥不効至半月大腎連黑
腐爛作臭乾腐無膿十日大臟俱壞黑敗而死也
又一人年四十歲夏月好飲火酒至夜赤身露卧

外科正宗

卷之四

夏

手膊連背陰疼難忍一月後肩發爛斑一塊周圍
微硬色如紅棗日漸延開半月後手膊半背共成
黑腐臭穢不堪一月不食而死一人中年肥胖亦
冬夏好飲火酒飲後隨喫涼水方卧一日頸項作
疼微腫堅硬如石二月外項大如頭石硬不熱此
陰毒也辭不可治後請別醫治之項同身大乃異
症不食而死又一人夜夢城隍拘見責打二十喊
叶其妻喚醒隨後受刑處厥腫作疼青紫急脹視

之真棒莖也用針刺破流瘀血疏許外肉腐爛作
疼調理兩月而安此亦陰毒故附記之後人可閱

失榮症第一百三十四

失榮者先得後失始富終貧亦有雖居富貴其心或
因六欲不遂損傷中氣鬱火相凝隧痰失道停結
而成其患多生肩之已上初起微腫皮色不變日
久漸大堅硬如石推之不移按之不動半載一年
方生陰痛氣血漸衰形容瘦削破爛紫斑滲流血

外科正宗

四

頁

水或腫泛如蓮穢氣薰蒸晝夜不歇平生疙瘡愈
久愈大越潰越堅犯此俱為不治予立二方曾治
數人雖不獲全愈而不夭札速死者誠緩命藥也

和榮散堅丸

和榮散堅歸地參
丹酸遠栢併龍齒

菴陳木附貝南星
蘆蒼珠砂與角沉

治失榮症堅硬如石不熱不紅漸腫漸大者服

歸身

熟地

茯神

香附

人參

白朮

橘紅

貝母

南星

酸棗仁

遠志

楮子仁

丹皮

各一兩

龍齒

一對煨無龍齒鹿
角尖二兩煨代之

蘆薈

角沉

各八錢

硃砂

六錢
爲衣

右爲細末煉蜜丸桐子大每服八十九食後用
合歡樹根皮煎湯送下患者若改往從新澹薄
甘命其中有得愈者十中一二否則難脫然也
飛龍阿魏化堅膏

治失榮症及瘦瘤乳岩瘰癧結毒初起堅硬如
石皮色不紅日久漸大或疼不疼但未破者俱

外科正宗

四

頁

用此貼用蟾酥丸藥末一料加金頭蜈蚣五條
炙黃去頭足研末同入蒸就乾坤一氣膏二十
四兩化開攪和重湯內頓化紅段攤貼半月一
換輕者漸消重者亦可停止常貼保後無愈矣
試知百病死生法第一百三十五

死生非神聖不能洞其機關疾病無明醫亦不能決
其凶吉匪則使人疑或決斷不常于異授呂祖一
枝梅真仙方也不敢秘一例刊註以傳槩世云

呂祖一枝梅堪美呂祖一枝梅 芭荳芭荳草仁靈脂隨

治大人男婦小兒新久諸病生死難定之間用

藥芙蓉大一餅貼印堂之中點官香一枝香盡

去藥已後一時許藥處有紅斑暈色腫氣飛散

謂紅霞捧日病雖危篤其人不死如貼藥處一

時後無腫無紅皮肉照舊不變謂白雪漫野病

雖輕淺終歸冥路一兒急慢驚風一切老幼痢

疾俱貼之紅腫即愈此方用之可預知生死也

外科正宗

四

百一

硃砂錢三 銀硃錢一 五靈脂錢三 麝香錢三

草麻仁分五 雄黃 芭荳仁各五錢

右各研細於端午日淨室中午時共研加油臙

脂為膏磁盒收藏勿經婦女人手臨用荳大一

圓捏餅貼印堂中其功立見川過餅送入河中

造孽報病說第一百三十六

惟症出於非端事必因乎有據感應篇曰若開如是

花便結如是果一黃冊書手每至甲首家務要親

雞一隻先食頭尾一歲二熟下鄉殺雞不計其數

一朝數盡口中生出如菌大小六枚填塞滿口湯

水難下視之乃孽疾也辭不可治又請一醫用刀

割去次日又生如舊延至六十日肌膚盡削存骨

如柴而死○一竿鎗戶傷殘生身假如每日十命

一歲共計三千六百盡屬死於無辜況其雞子不

得生者多矣彼生子三人俱至六七歲遍身先發

紅點痒痛異常數日後點如鑽越腐爛流血口稱

外科正宗

四

百一

百鳥相啄令人趕打不去至月外氣血瀝盡俱亡

予後勸解燒毀竿矢合族持齋六十二歲生一子

方得長成而立○一人五十餘歲家眾養雞十餘

隻一朝眾雞齊叫彼怒之將眾雞兩脚齊肘安檻

上剝斷其雞亂命飛跳血盡而俱死一年後足生

脫疽筋骨伶仃流血不止令妾將刀割去脚骨瀝

盡氣血而亡○一富家窩訪兼養鷹犬五十後方

生一子二歲左右頭角生孔二處俱已露骨視之

乃孽病也不敢言其不治奉上藥方修合用之無効請眾醫治之強投藥餌延至三歲而歿其人後遭橫事死於非命○一莊家獵事為樂五十後遍身生塊破後腐爛見骨素知彼養鷹之報予曰欲治其病先當杜養鷹犬然後施治則可彼從之內服益氣養榮之藥外用甘草當歸煎洗仍搽玉紅膏長肌完口三月餘而愈二年後復養鷹犬又一年六月內得患陰症而歿次子十歲赴水而死已

外科正宗

一四

五二

上數條係乎的實皆出於不仁慘戮生靈之報也
一訟師作中興訟破眾家私傷殘骨肉不計其數
一日大腿腫痛堅硬如石疼苦異常常欲以繩繫足高懸梁上其疼乃止如放下疼即如砍予知孽報辭不可治似此兩月自至午時親友四人相看忽聞腿內大響一聲其腫即歸大髀腫如巴斗其腿即消髀腫痛不着席將布兜懸挂其疼方可又兩月百苦而終又一年其妻遍身發腫如癩作痒

非常破流脂水其時十月孟冬常欲赤身相露其痒稍止如着衣被其痒即生如蟲攻刺予知孽報亦辭之後至隆冬赤身流水而死此異常之報也所謂逆天害理雖由已古往今來放過誰無漏矣
仙方活命飲今古不同論第一百三十七

古人朴質其七情干涉者少而從風寒暑溼外感凝滯者多故設仙方活命飲攻散所滯之腫服此得効者十常八九乃患者五臟不虛耳今人穿鑿大

外科正宗

四

五三

過七情煩攪之甚而內臟無有不傷每見此症曾服過此藥其瘡必不起發脾胃再無不損若瘡不起發脾胃傷敗患者豈有得生至此自于天命今之治法不論首尾標本先必固脾胃次行托藥謂本立而道生病無不活予見如此幸同道者察焉
拾遺症第一百三十八

拾遺者因條款分門遺失未及細詳但本病立門以正病為主而從病故有失焉今查補註以便觀治

之鼻疔生於鼻內痛引腦門不能運氣脹塞鼻竅甚者唇腮俱腫○牙疔生於牙縫之中頂高突起痛連腮項破則流血○黑疔生於耳竅之內黑硬腐爛破流血水疼及腮顙以上之症俱先針刺次行發汗仍照疔類調治○喉癰生於咽外正中腫痛妨礙飲食紅腫發熱必欲潰膿軟而脹痛者針之內服補托之藥玉紅膏搽貼長肌完口又有腐潰內通湯水隨孔出者曾治數人俱亦無妨○臍

外科正宗

四

四

疽生在膊上連肩通腫長堅而硬○兌疽生在當手動脈之處腫痛寒熱痛徹手膊舉動不便○鳳眉疽發在兩目之間形長皮赤痛引腦戶二目合縫光腫發熱○透腦疽發在額上髮際之間多發寒熱頭疼如斫不可忍耐先用萬靈丹發汗解散風邪次宜清托○附陰疽生在內踝上三寸初生小泡漸生赤腫破流血水痛亦徹骨不能步履○咬骨疽發在大腿內股不腫不紅痛徹骨髓初宜

雷火針針之內服萬靈丹酒調服効○陰疽生於右腿夾縫之下三寸痛連陰子小腹亦疼○玄疽生於左腿夾縫之下三寸漫腫連陰疼及大腿○淵疽發在脇下初起不紅堅硬久則破潰有聲如嬰兒啼狀膏蓋無聲去膏仍有異哉難治晒不能也○玉枕疽生在腦後枕骨中堅而難潰痛引肩項鼻塞氣癢此太陽膀胱溼熱凝滯而成大抵以上之症有名而生者鮮矣初起有表症者便宜解

外科正宗

四

五

表有裏症者即與通利潰後宜補托久則宜收斂此為一定治法不可混亂妄投藥餌致其危亡也
唇風第一百三十九

唇風陽明胃火上攻其患下唇發痒作腫破裂流水

不疼難愈宜銅粉丸泡洗內服六味地黃丸自愈

銅粉丸

銅粉丸中官粉紫輕粉銅青與射香黃連膏子同水片爛眼唇風並不難

銅青

錢五分 官粉三錢 明礬五分 輕粉一錢

麝香

一分 冰片一分 黃連二兩切片

右共為細末黃連膏丸如芡實太每用一九湯
泡紙蓋每洗頭熱上面清水勤洗之其患自愈
繃縛背瘡第一百四十

至於發背對口大瘡等疾已潰流膿時冬夏宜繃帛
四五層放貼膏藥外用綿布見方八寸四角用
蛇皮細帶紮之安蓋繃上以帶扎在前胸繃實瘡
上庶使瘡中暖氣不泄易於腐潰洗瘡時預備二
繃更換務要患內暖氣烘烘此法最善故亦補之

外科正宗

四

五

癰疽內肉不合法第一百四十一

癰疽對口大瘡內外腐肉已盡惟結痂膿時內肉不
粘連者用軟綿帛七八層放患上以絹扎緊將患
處睡實數次內外之肉自然粘連一片如長生成
之肉矣有患口未完處再搽玉紅膏其肉自平矣
煉玄明粉法第一百四十二

冬至後用潔淨朴硝十斤用水一斗五升白蘿蔔五
斤打碎同硝入鍋內煮化候湯滾足撈去蘿蔔將

竹絲箕以綿紙三層攤鋪箕內架在新缸上以硝
湯徐入箕內候折再添以湯濾盡為度將缸搭在
天井露三日其硝結在缸邊傾去餘水瀝乾為止
將硝取下再用砂鍋頓炭爐上將硝一碗化開煎
滾以銅匙鏟攪將成凝結時鏟入小魚酢罐內上
空寸許再下硝煉如此已畢每一罐下用王丁品
字樣釘入土地上留寸半在外將罐浮頓釘頭上
用瓦片蓋口周圍用段磚砌百眼爐圍遶離罐寸

外科正宗

四

五

半許將着炭火入鑪內四圍底火頂火一槩相護
候罐硝紅為度次日取出硝來預用大綿紙攤在
潔淨陰土地上將硝碾細用絹篩篩在紙上一錢
厚再不許多將門榻俱已關閉不許與人見之三
日後其硝自然復活色白如粉輕虛成片將鉢盛
收紙蓋之上再用亂紙寸許以收潮氣庶不凝結
此品最能降火化痰清利臟腑怪症服之可獨狂
燥用之即愈搜除百病安欽心神況此服之不傷

元氣惟久病者不宜大人每服三四錢小兒五分至一錢皆可俱用白滾湯或葱湯空心化服候行二三次隨飲稀粥自然爽健精神調和臟腑津液頓生百病如失又煨過硝石六兩加硃砂三錢青黛一錢水片一錢五分共碾細末照前篩紙上再用紙蓋一層四邊以戒尺壓緊勿令走氣候三日外取起密收又名陽春紫雪最治失心忘志顛癇健忘小兒急驚大人異症每服五分至一錢

外科正宗

卷四

百八

俱用淡竹葉燈心湯化服屢有奇効不可盡述玄明粉乃神仙保命服食每一斤加生熟甘草末一兩葱湯化服二三錢令人悅澤容顏輕身耐老矣

取紅鉛法第一百四十三

女子十四歲而天癸至此陰中之真陽氣血之元稟遇此將行時兩顛先若桃花之狀陽獻陰藏其經只在半月之裏必來預用白綿綉一尺五寸洗淨時常用綿帶一條束臍下綿綉兩尖頭前後繫帶

上中間常兜陰器小便解一頭便罷卽繫之經至盡染綉上取初至紅鉛一顆大如魚眼紅色明亮如珠此爲接命至寶隨與好酒一杯和服一時後如醉不醒只以人乳飲之一日後自甦已後能絕房事者延壽一紀餘經換綉兜取陰乾侵上白童便內片時其經自然脫下取置磁盤內陰乾聽用如不昇煉者謂之空紅鉛亦可補益虛勞接續命脉如次經已後但未破身者俱可取聚陰乾磁蓋

外科正宗

卷四

百九

昇煉色如紫霜一般合入三元丹內人乳服之接命長年却除百病此方神秘不宜輕泄故不可傳但取紅鉛之女生平愛惜飽暖適時無拘束爲上

煉金頂砒法第一百四十五

用鉛一斤小罐內炭火煨化投白砒二兩於化洋鉛上煉烟盡爲度取起冷定打開金頂砒結在鉛而上取下聽用

煉消石法第一百四十五

用潔淨朴硝半觔確內炭火鎔化煎乾煨紅佳火冷定取出即成硝石確收聽用利實火不利虛火也

取蟾酥法第一百四十六

用蟾不拘大小其酥俱有用潤銅鑷鑷蟾肩稜高肉上微緊拔出酥來凝聚鑷裏多則括下陰乾聽用其取過之蟾避風二日仍送青草園中自然不傷其生如取之便見風下水俱成破傷風顛狽而死製附子法第一百四十七

外科正宗

卷之四

三

大附子一兩之外方用鹽數幾枚以童便浸滄三寸每日換便浸至夏三冬五再換童便煮盡二香為度去皮臍線穿陰乾或日中晒硬亦可收藏聽用昇白靈藥法第一百四十八

水銀二兩用鉛一兩化開投入水銀聽用火硝二兩綠礬二兩明礬二兩共碾為末投入鍋內化開炒乾同水銀碾細入泥護陽成確內上用鐵蓋蓋之以鐵梁鐵堯左右用燒熟軟鐵線上下紮紫用紫

土鹽泥如法固口要烘十分乾燥為要架三釘上砌百眼爐中先加底火二寸點香一枝中火點香一枝頂火點香一枝隨用小確安滾湯在傍以筆蘸湯擦擦蓋內常溼勿乾候三香已畢去火確待次日取起開出藥來如粉凝結蓋底上刮下靈藥收藏聽用凡瘡久不收口用此研細摻上少許其口易完若入於一槩收欽藥中用之其功奇甚捷製寒食麵法第一百四十九

外科正宗


卷之四

三

用白麵一觔外再以麵半觔調稠厚捍成薄片二塊將前麵包合於中周圍捏緊合口於清明正日蒸熟掛透風處陰乾用麵包藏勿經女手越久越効逐日人神歌第一百五十

初一十一二十一 大拇鼻柱手小指初二十二 十二外踝髮際外踝位初三十三二十三股內牙齒足股肝初四十四二十四腰間胃脘陽明手初五十五二十五口舌遍身陽明足初六十六二十

六手掌胸前又在胸初七十七二十七內踝氣冲
 及在膝初八十八二十八手腕股內併在陰初九
 十九二十九在尻在足膝脛後初二十三三十日
 腰背內踝足跌覓此為太古相傳針灸莫犯為吉
 十二時人神歌第一百五十一
 子踝丑腰寅在目 卯面辰頭巳手熟
 午胸未腹申在心 酉背戌頭亥股續
 尻神歌訣第一百五十二



此神農所置一歲起坤
 二歲震逐年順飛九宮
 週而復始行年到處則
 所主敗切忌針灸慎勿
 犯之否則變生他病慎

外科正宗

卷之四

百三

右九宮尻神歌

尻神所在有根由 坤內外踝聖人留
 震宮牙齦分明記 巽位還居乳口頭
 中宮肩骨連尻骨 面目還從乾上遊
 手膊兌宮難砭灸 艮宮腰項也須休
 離宮膝脇針難下 坎肘還連肚脚求
 為醫精曉尻神訣 萬病無干禁忌憂
 十干日不宜用針犯之病多反覆

外科正宗

卷之四

百三

申不治頭乙耳喉 丙肩丁背與心求
 戊巳腹脾庚腰肺 辛膝壬當腎脛收
 癸日不宜針手足 十干不犯則無憂
 製炒諸藥第一百五十三

前方諸藥未註炮炙今開於後凡藥必遵雷公炮炙
 入藥乃効如未製生藥入煎不為治病反為無益譬
 如人食餚饌不用烹炮生食者豈不害人當熟思之

人參 潤色明亮堅實 為主 斃 斃 不堪

天門冬 湯泡 去心 麥門冬 去心

生地黃	酒浸熟地黃	酒蒸	白朮	米泔炒	蒼朮	米泔炒
黃芪	蜜水拌炒	甘草	消毒生用	酸棗仁	炒	研
遠志	湯泡去心	微炒	五味子	炒	肉從蓉	酒洗
牛膝	酒洗	破故紙	炒	當歸	酒洗	白芍
白蒺藜	刺去根	玄參	童便炒	香附	童便炒	柴胡
黃芩	酒炒	黃連	解毒生用	止	龍膽草	酒炒
知母	鹽水拌炒	瓜蒌仁	去油	貝母	去心	陳皮
桔梗	微炒	防風	去蘆	乾薑	黑炒	附子
外科正宗 卷之四						
半夏	姜汁水煮	川烏	湯泡去皮	草烏	湯泡去皮	巴戟
南星	煨有為末	入	威靈仙	去根	仙茅	米泔浸
三稜	湯泡	澤瀉	蒸	大黃	實人生用	人參
海藻	酒洗	昆布	酒洗	牡丹皮	去心	王不留行
牛蒡子	炒	連翹	去梗	金銀花	去梗	牽牛
地骨皮	去梗	肉桂	去心	茯苓	去心	枸杞子
琥珀	布包	同碾	如麵	細	山梔	焦炒
山菜莢	去核	杜仲	鹽水拌炒	桑皮	蜜水炒	辛夷

乳香	去油	沒藥	去油	枳殼	麩炒	厚朴	姜汁炒
巴豆	去油	皂莢	去油	五倍子	去心	蓮肉	皮去
山查	去核	桃仁	皮去	杏仁	皮去	芒硝	湯煮
石膏	煨	雄黃	透紅	硫黃	去脚	礞石	淨明
礞石	白色	砒霜	白色	煨	兩用	自然銅	醋煨
黃丹	水飛	龍骨	生用	牛黃	輕虛	麝香	去毛
犀角	末	羚羊角	末	龍齒	煨存	蜂蜜	煉去
蟬蛻	土去	斑蝥	川米炒	姜蠶	去絲	全蝎	酒洗
外科正宗 卷之四							
蜈蚣	炙去	蚯蚓	翻去	田螺	去殼	牡蠣	煨
石決明	煨	珍珠	豆腐內	煨	淡布包	人中末	煨
紅鉛	法註	末	卷				
以上藥品凡本書內應用製炒泡炙者錄之不泡炙者未錄							
醫家五戒第一百五十四							
一戒凡病家大小貧富人等請視者便可往之勿得							
遲延厭棄欲往而不往不為平易藥金毋論輕重							

有無當盡力一例施與自然生意日增毋傷方寸
 二戒凡視婦女及媼婦尼僧人等必候侍者在傍然後入房診視倘傍無伴不可自看假有不便之患更宜真誠窺視雖對內人不可談此因閨閫故也
 三戒不得出脫病家珠珀珍貴等送家合藥以虛存假換如果該用令彼自製入之倘服不効自無疑謗亦不得稱讚彼家物色之好凡此等非君子也
 四戒凡爲醫者不可行樂登山携酒遊玩又不可片
 外科正宗 卷之四 四

時離去店中凡有抱病至者必當親視用意發藥又要依經寫出藥帖必不可杜撰藥方受人駁問
 五戒凡娼妓及私窺家請看亦當正已視如良家子女不可他意兒戲以取不正視必便回貧窘者藥金可璧病回只可與藥不可再去以圖邪淫之報
 醫家十要第一百五十五

一要先知儒理然後方知醫業或內或外勤讀先古明醫確論之書須旦夕手不釋卷一一參明融化

機變印之在心慧之於目凡臨症時自無差謬矣
 二要選買藥品必遵雷公炮炙藥有依方修合者又有因病隨時加減者湯散宜近備丸丹須預製膏藥愈久愈靈線藥越陳越異藥不吝珍終久必濟
 三要凡鄉井同道之士不可輕侮傲慢與人切要謙和謹慎年尊者恭敬之有學者師事之驕傲者遜讓之不及者薦援之如此自無謗怨信和爲貴也
 四要治家與治病同人之不惜元氣斷喪太過百病
 外科正宗 卷之四 四

生焉輕則支離身體重則喪命治家若不固根本而奢華費用太過流蕩日生輕則無積重則貧窘
 五要人之受命於天不可負天之命凡欲進取當知彼心願否體認天道順逆凡順取人緣相慶逆取子孫不吉爲人何不輕利遠害以防還報之業也
 六要凡里中親友人情除婚喪疾病慶賀外其餘家務至於饋送來往之禮不可求奇好勝凡食只可一魚一菜一則省費二則惜祿謂廣求不如儉用

七要貧窮之家及遊食僧道衙門差役人等凡來看病不可要他藥錢只當奉藥再遇貧難者當量力微贈方為仁術不然有藥而無火食者其命亦難入要凡有所蓄隨其大小便當置買產業以為根本不可收買玩器及不緊物件浪費錢財又不可做人銀會酒會有妨生意必當一例禁之自絕謗怨九要凡店中所用各樣物具俱要精備齊整不得臨時缺少又言今前賢書籍及近時各公新刊醫理

外科正宗

卷之四

其

詞說必尋參閱以進學問此誠為醫家之本務也十要凡奉官衙所請必當速去毋得怠緩要誠意恭敬告明病源開具方藥病愈之後不得圖求匾禮亦不得言說民情致生罪戾不近公自當守法以上五戒十要乃保身保家守成之法故直言而不支當置於座右朝夕一覽若有賢能子孫倘遵而行之則可以成家立業若不聽信必有飢寒不足之憂凡人何不預聽直待臨時追悔進退兩難將何及矣

開割披針喉針形第一百五十六
披針古之多用馬脚鐵為之此性軟不鋒利用之多難入肉今以鋼鐵選善火候鐵工造之長二寸濶二分半圓梗扁身劍脊鋒尖兩邊芒利用之藏手不覺入肉深淺自不難也如膿深欲其口大直針進而斜針出割開外肉口則大矣喉針長六寸細桔扁頭鋒尖刺喉膿血者皆善補遺汗斑方

外科正宗

其

蜜陀僧散

硫黃

雄黃

蛇床子

各二錢

石黃

蜜陀僧

各一錢

輕粉

為末醋調搽患上

歸脾湯

補遺

其

五

三

外科正宗卷之四

終

太醫院龔其居中編

外科百効全書

外科百効全書紀目

卷之一
癰疽疔毒
貼膏藥法

癰疽疔毒
敷洗煙割

癰疽疔毒
去污化毒

癰疽疔毒
生肌斂口

切要方括
諸般神膏

卷之二
腦前腦後
腦後枕突

腦後枕突
腦心惡發

腦心惡發
髮際六發

髮際六發
紅餅胎疔

紅餅胎疔
大頭腫風

對口天疔
而壁及發

而壁及發
耳肉出膿

耳肉出膿
耳肉出膿

耳肉出膿
耳濕耳疔

耳濕耳疔
蒼蠅入耳

合架瘋症
皮株干風

皮株干風
雜物入耳

雜物入耳
水入耳中

水入耳中
黃豆入耳

黃豆入耳
舌脹出外

走馬牙疔
口舌生瘡

口舌生瘡
舌止腫硬

舌止腫硬
舌長過寸

舌長過寸
舌脹出外

舌脹出外

水茶
香茶餅

香茶餅
水舌風

水舌風
擦食風

擦食風
癰疽疔

癰疽疔
包牙疔

取牙疔方
牙疔疔

牙疔疔
擦牙疔

擦牙疔
癰疽疔

癰疽疔
穿領瘋

穿領瘋
牙疔疔

魚腮瘋
猪領瘋

猪領瘋
面生瘋毒

面生瘋毒
疥癩瘋

疥癩瘋
穿領瘋

穿領瘋
穿領瘋

王容丸
香肌皂

香肌皂
雙燕子風

雙燕子風
雙單鴉

雙單鴉
雙單鴉

雙單鴉
雙單鴉

單松子風
雙燕子風

雙燕子風
雙單鴉

雙單鴉
雙單鴉

雙單鴉
雙單鴉

雙單鴉
雙單鴉

帶中風
落架風

落架風
雙單鴉

雙單鴉
雙單鴉

雙單鴉
雙單鴉

雙單鴉
雙單鴉

卷之三
乳癰乳疔

乳癰乳疔
乳癰乳疔

乳癰乳疔
乳癰乳疔

乳癰乳疔
乳癰乳疔

乳癰乳疔
乳癰乳疔

乳癰乳疔
乳癰乳疔

乳癰乳疔
乳癰乳疔

乳癰乳疔
乳癰乳疔

乳癰乳疔
乳癰乳疔

乳癰乳疔
乳癰乳疔

心癰胃癰 腸癰瘰癧 臍癰肚痛

○背癰

○臍癰

○左搭肩癰

○下背癰

○臂腿癰

○臂癰

○穀道中癰

○陰伏生癰

○陰腫癰

○陰門濕癰

○婦人陰癰

○後疽石疽

○月効全書

○手足疽

○手背癰

○手癰

○肩疽

○膝頭腫痛

○內外癰瘡

○螺螄癰

○脚指丫癰

○脚癰有孔

○遠行腫痛

○遍身癰

○流注作毒

右脾蓮癰

左脾癰

府中瘋癰

右搭肩癰

便難便毒

諸痔九漏

陰囊紅腫

下疳瘡

陰內腫痛

婦人陰冷

兩腿腫痛

瘡氣騎馬

蕪癰瘰癧

玉莖腫痛

頸癰癰

陰腫如石

陰腫臭甚

路岐過檔

紫膏癰

陰頭結毒

婦陰生瘡

時亮風

交接出血

懸癰肛爛

外腎腫大

婦精瘡

陰中生虫

茄子病

附骨疽症

卷之五

○方癰

○走皮瘡癰

○五疔五癰

○雜治部

○湯泡火燒

○破傷中風

○崩疔癰

○漆瘡

○益腎強角

○急救部

○救瀕死

○救東死

○救夾暑死

○救墜石

○中毒部

○解信石毒

○解諸毒毒

○解六畜毒

○解中全毒

○誤吞部

○誤吞碗瓦

○誤吞蜈蚣

○王獸傷部

○治犬咬

○治鼠咬

○治八脚咬

○減引仙法

冬骨疽

侵淫癰

紫白癰風

杖瘡打傷

神除汗斑

寒凍成瘡

竹木刺傷

香方

救瀕死

救東死

救夾暑死

救墜石

細花癰

刃傷癰

血風癰症

折傷接骨

法去刺字

手足扒裂

針折在

張

救瀕死

救東死

救夾暑死

救墜石

暢癰

白蛇癰

黃痧瘡

金鎗重傷

取毒神法

手足開破

針灸有傷

馬鬚黑髮

救瀕死

救東死

救夾暑死

救墜石

走皮風

蛇皮癰

熱中瘡

熱後生瘡

暑熱成瘡

洗瘡

烏鬚黑髮

救瀕死

救東死

救夾暑死

救墜石

甲疽蛇指

紅絲瘡

鶴膝風

瘋痰脚疾

疔瘡癰

脚癰

脚癰癰

脚癰癰

脚癰癰

脚癰癰

脚癰癰

梭壯丫口

手足腫毒

兩足虛腫

鼓椎風

向前脚癰

脚癰

脚癰

脚癰

脚癰

天蛇頭

雞爪牛頭

合膝風

八而瘡

脚癰腫痛

嵌甲

脚癰作痛

脚癰

脚癰

鵝掌風癬

疥瘡狐臭

過膝風

腎臟風癢

脚癰瘡

甲生肉刺

脚癰癰毒

遠行打包

梅瘡癰毒

火瘡癰毒

通經水黃不飲由于肌肉不生肌肉不生由于腸肉不去腸肉不去由于

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

非其濕參其晴亦之類以生心肝之血決不能悉若熱大

凡瘧瘧時或愈後口鼻吐衄牙宣齒路皆因瘧毒出血虛火動而

錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩

燥黃熱等症勿論其脈急用參人參湯補之經云血生于氣者

酒調此治虛寒人病癰疽純陰毒症及已成未成者但痛甚...
 乳沒倍當歸病在足加木瓜此方兼諸毒內消丸服...
 加味流氣飲赤芍歸桂黃芪芷防手木香赤芍烏梅...
 三治陰毒在手足甚者...
 清毒散防手刺毒白芷苦參羌活同獨活黃芩黃柏好...
 此方兼諸毒內消丸服善治純陽毒症如痛甚加乳香沒藥...
 諸毒內消丸散般白芷大黃黑沉香木香乳香并沒藥龍衣...
 丸葉甚良 右方白芷大黃細餘各等不問陰陽毒...
 內疎黃連湯太黃翹苓施薄南木香檳榔白芍當歸...
 治純陽陽症腫硬發熱嘔吐大便便秘結脈洪而實...
 托裏消毒散參芪當歸白芍廣陳皮白朮茯苓連翹...
 治牛陰半陽症腫痛慢而不赤者宜...
 秘傳萬金內托白芍銀花赤葛根天冬桑皮赤小豆...
 南... 切要方括...
 稍括梗牛夏杏仁乳沒葉羌活連翹黃芩蕪麻黃白朮...
 皮防半柴胡焉省虎黃芪蒼耳子荆芥歸枳芍草全烏...
 咸用連翹薑全全煎...
 右傾出加好酒一盃開服 治諸般背發惡瘡不問陰毒陽毒...
 俱宜消毒散黑丑當歸銀花貝母連翹芷乳沒大黃甘草...
 山甲姜由桂...
 治背發甚効百毒亦好但頭毒加細辛手毒加木通脚毒加木...
 瓜牛及乳瀉加瀉蘆已成者加黃芪右共為細末酒調八錢如...
 不通再服八錢以通為度...
 三奇湯銀花姜虫赤芍甘草節蜈蚣山甲疾利連翹完歸尾大黃...
 皂刺充治癩疥癬毒便毒四服其毒即化為膿從大便瀉出并...
 治諸般腫毒初起亦妙每味川仁大黃倍下以酒...
 預防敗毒散按其草防刺毒枳壳前胡羌活...
 預防敗毒散按其草防刺毒枳壳前胡羌活...

治一切風毒丹毒風疹風推風腫及大頭病等症如內熱加...
 連口濕如二花粉...
 凡九內只一般黃蜡二兩溶化良待溫入明凡三兩...
 治諸核癰毒痔湯便毒諸瘡極能退血收膿生肌歛口每日...
 服酒下三不飲酒者熱水下肺癰客湯下...
 竹黃湯黃芪生黃芩歸芍草芍石羔人參麥門冬半下...
 葉性 治諸般發毒癩湯者...
 止痛散當歸時蕪人參芍藥及官杜甘草生地各二錢...
 治諸毒山... 言...
 內固清心散 砂參參雄黃腦子麝白...
 治惡瘡... 瘡痛依渴燥燥每用密湯送下一錢...
 透膿散... 一般出天蛾見蚕繭良一個燒灰酒調服...
 治諸般癰毒及貼骨各瘻不破者不用針刀一服不移時而自...
 百効全書卷之一 切要方括...
 透髮試有驗但此藥用一個只是一個瘡口若用兩三個則瘡...
 口多切不可輕用...
 護心散乳香一錢菜豆粉用四錢兼其草湯調時七...
 治諸背疔腫曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐喘嗽泄瀉而痛...
 舌生瘡名曰... 絕初起直服此藥最能交出毒氣不致內陷...
 後亦可開照加山机杞皮為末二錢又可外敷止痛...
 散血疎風湯... 牛蒡烏藥其草隨防丰金銀花羌活血紅瘡...
 腫痛區白芷升麻能止痛黃柏散血及涼皮祖傳地黃全合...
 加八插酒具神...
 治血風黃痲諸瘡腫熱痛瘁俱宜屢試有神効...
 防風通聖散歸芍赤芍大黃麻黃同荷荷確羔滑茶梗...
 治耳目口鼻唇舌咽喉風熱風痰及瘡癩發斑打傷諸症...
 灸鐵熨法

羌活 獨活 歸尾 牙皂 葱白 茶脚 蒼耳子 荷葉

右水煎洗燻後溫冷洗至乾淨絹衣抹干用清油硬調攪風膏

之類敷之如無膿不再留口一日一換如有膿可留口出毒未

膿才用藥完更以黑布蓋絹帶緊縛如外腫瘡三日一換

肉湯洗法 治一切瘡疔有口

用公猪蹄爪肉一斤煮汁分二次去油花肉渣方入白芷羌活

洗惡血隨洗而下

艾煙方 臭桐放水熏 或猪根醋放燻 或五倍醋放燻 或

野山查根醋放燻 或山虎濃醋放燻

百効全書卷之一 敷洗燻劑 九

代制方 蝟牛蜈蚣推重 漢各焙切為末麻油抹毒癰上癩不破

方蜘蛛打爛毒上即破 毒毒及喉風腫痛不用針方 只以新生鵝卵壳燒灰存性為末

醋敷腫處立時即破出血 去污化毒 點玄丹 明凡一兩金脚 信五錢火煨存性為極細末善去惡毒

五紅散 明凡煨過與雄 黃各等分為極細末攪但汚肉多宜各

下凡汚肉少宜多下雄 黃 化毒丹 煨石羔一兩粉五分為極細末 凡惡瘡作痒者用此甚宜或入別藥內亦好 金華散 錦文大黃炒斷烟為極細末 凡惡毒惡瘡作熱作痛用此甚宜或入他藥內亦妙 白堊入 即點玄丹變為堊或為條又一方不用人言雄黃

黃樟入 用人言破砂燻 酥等分麵糊成條或為丸

住痛散 乳香末各三錢寒水石煨過五錢滑石五錢水片

分其為頭細末攪之 生肌散 主 散一象牙末一錢赤白胎三錢天靈蓋五分為極細末

銀 石膏八兩並調黃泥作一餅子將石羔放內火煨過每

兩 飛過黃丹五錢亦能生肌 寶生肌散 龍骨 石乳 沒藥 黃丹 鱗息茶

礞石 砂 上各一錢 粉三分皮帶炒珍珠三分射香半分水

片一分甚加瑪瑙象皮 血衰氣弱者不宜用水片 白砂散 用上好雪白磁器為極細末

欵口稀錦散 用稀發草 乾為極細末攪或用雞內錦為極細

末但每先宜麻油抹毒方撒此日足肉滿宜用 百効全書卷之一 生肌散 十

諸瘡合口散 山 鯁黃泥包煨熱後去泥為末麻油調搽或單夏

母為未攪之 背癢及諸毒不合口神方 用桑條撓蜘蛛網如綿紗縲于大將

灯火煨之即將鴨毛制下灰以帚乘頻頻頻制下收灰每遇水

合口者先將麻油及水各一盞火煎過將鴨毛醃水洗淨取

方將灰撒之 諸般神膏 萬應膏 龔九單 凡傳 防非 荆芥 何首烏 草烏 各八錢 獨活 木別 紅

內消白芨白飲考窮歸尾白芷稍杏仁乾白頭翁各五錢 黃芩 黃柏 大黃 南星 各一兩 威靈仙 蒲黃 胡麻 仁 苦參 各三錢 川山 甲 七 片 江 子 十 個 草 麻 子 三 十 個 蜈 蚣 一 條 油 髮 少 許 用 麻 油 二 升 浸 過 前 藥 一 夜 次 日 溫 棗 火 煎 至 八 分 俟 藥 清 熱 乾 淨 起 叻 棕 櫚 去 渣 方 以 飛 過 黃 丹 一 斤 水 粉 三 兩 逐 時 煮 水 油 內 兩 兩

第一口藥柴燒用文武火將第一下二下其草與香油先熬
 大沸又下第三天門冬十九味粗末熬至各味藥粘焦黑用細
 密絹巾濾去渣却下第四松香膏丹以槐樹條一把不住手攪
 藥滴成珠不散為度方第五硫黃等細末攪勻住火又下第七
 射香第細末攪勻再滴水成珠膏藥好了却又下第八黃蠟再
 攪勻盛磁器內用油盆裝浸并水中四五日出火毒用此能
 鎮玉液存精不泄危旺不死通血脈強身壯及老還童髮服
 黑固真精善御器雖數次不泄去膏方洩七則有孕此藥百無
 所忌且能滋皮膚治腰膝疼痛下元虛損四肢麻木牛身不遂
 五勞七傷冷氣攻刺及去小腸膀胱氣二三十年勞瘵遠年近
 日風濕等症筋骨酸痛陽事不舉每用藥三四錢攤絳絹上貼
 腰眼二穴一個可賣銀五錢切莫輕視
 上此膏一個可賣銀五錢切莫輕視
 日效全書卷之一
 諸般神膏 十三
 瘋損膏 三角楓珍珠藤墨斗草各三斤水胡椒草十斤共洗淨
 搗爛取自然汁同姜汁半斤好醋二碗鮮米泔二碗黃丹末
 僧末一兩同煎成膏任用其神
 干提膏 松香八兩乳香沒藥七錢銅青一兩草麻子一百五
 個杏仁去皮尖一百五十個同提成膏不要見火或硬用滾湯
 的熱水撈開但推膏必須藍布
 治諸般癰毒惡瘡疔毒疔毒及治軟腳癩癧疔毒骨有諸損如
 神若腹中疝塊及疔疾貼大推及身推凡尤效
 玉露膏 黃丹半斤水粉四兩研勻用麻油一斤煎至滴水成珠
 方下乳香龍骨血竭兒茶輕粉各末二錢攪勻磁器收貯
 治癰疽癩癧生肌斂口止痛如貼熱瘡及艾炙火瘡不瀆下乳
 香沒藥等丹用水粉黃丹二味
 玉容膏 蘇合香油二兩黃臘一兩二味火化開八黃丹末一錢

寒水石火煨一兩為細末溶化膏丹搗貼患處
 治發背癰疽潰爛用此生肌止痛外護如神
 五油隔膏 九事見傳香油松瀝油木油猪油雞子油調勻用
 如諸瘡作痒內八金華散五錢明肌散一兩調貼患處如諸瘡
 虛痛不作痒內八金華散一兩乳香沒藥末各三錢貼患處如
 陽希白玉膏如瘡傳先用雄猪油二兩熬去渣隨以黃蠟白蠟各
 二兩同熬化听用再將單麻仁二兩搗如泥入鉛粉四兩麻油
 四兩雞子油二兩和勻候冷入乳香末三錢輕粉五錢水片五
 分攪勻磁確收之每用時以胭脂或緇片上藥貼在患處
 金花隔膏 先以黃蜡二兩麻油四兩油頭髮少許同煎後髮
 焦便將大黃一兩黃連黃芩黃柏各五錢俱炒黑為末及乳沒
 各五分同攪入干肉作膏
 能貼內外癩瘡熱毒惡瘡水泡火瘡癩癧等症甚效
 百効全書卷之一
 諸般神膏 十四
 四應膏 應製先以桐油二兩黃蜡比變化入煨過石羔七錢生
 大黃七錢攪勻開膏
 治癩瘡瘡福杖瘡松皮爛等瘡但每用此膏一日一換不用水
 洗不見風處貼如膿水乾及肉滿再不必換藥上用原膏貼老
 度若四破作痒用生薑自然汁或搽痒處或入膏末如癩瘡用
 姜葱煎湯洗後方貼仍服劑防敗毒散四貼十全大補湯四貼
 屢瘡不痒如痛用大附子肉桂為末少許塗瘡口上貼膏藥如
 多年肉爛內外癩瘡先以蘿蔔一斤切片葱四兩同煮熱以湯
 洗以葡萄乾搗爛敷一日一洗一換油隔隔紮五日方貼膏
 不換神仙膏 此進主傳專治男婦小兒不分遠年近日五癆七
 傷咳嗽痰喘氣急左癱右瘓手足麻木遍身筋骨疼痛脚軟
 弱偏正頭風心氣於痛小腸疝氣偏墜跌打傷損寒濕脚氣癩
 癧走氣癰塊男子遺精即濁婦人赤白帶下月經不調血崩

治無名腫毒癰瘰瘡楊梅頑瘡誤服輕粉致傷筋骨疼痛不能
 爲惡毒癰爛成瘻大如盤或流黃水或流膿血遍身臭爛不能
 動履者即此膏藥除根永不發

川芎 白芷 生黃 熟黃 當歸 白朮 蒼朮 陳皮
 香附 枳殼 烏藥 半夏 青皮 白蘇 細辛 知母
 貝母 杏仁 黃連 黃芩 黃柏 梔子 大黃 桑白皮
 柴胡 薄荷 赤芍 木通 桃仁 玄參 朱苓 澤瀉
 桔梗 前胡 升麻 麻黃 牛膝 杜仲 山藥 遠志
 續斷 良姜 甘草 連翹 蘇木 兩陳 地榆 防風
 荆芥 羌活 獨活 苦參 姜蚕 天麻 南星 川烏
 草烏 芫花 巴豆 何首烏 金銀花 白蘇皮 蒼耳頭
 側五加皮 青風藤 益母草 兩頭尖 五倍子 大楓子
 川山甲 威靈仙 蜈蚣 桃柳榆槐桑楸楮枝 各三十

右藥共七十二味每一味用五錢各要切爲粗片用真芝麻油
 十二斤浸藥在內夏浸二日冬浸半月方可煎藥黑枯色爲度
 用麻布一片濾去渣將油再秤如有十數斤加飛過黃丹五斤
 如油有八斤加黃丹四斤依數下丹決無差矣將油再下鍋熬
 黃丹徐七的投下手中用槐柳棍不住的攪火先文後武髮成
 滴在水中成珠不散春夏硬秋冬軟此是口訣磁器內貯之臨
 用時細藥 乳香 沒藥 血竭 輕粉 朝陽砂 樟片 腦
 麝香 龍骨 游標硝 赤石脂 右細藥十味共爲細末磁
 器內收貯臨用時將膏藥上此項生肌止痛調血氣去風濕甚妙
 五勞七傷遍身筋骨疼痛腰脚軟弱兩膏育穴兩腎愈穴兩
 裡痰喘氣急咳嗽貼肺俞穴華蓋穴膻中穴 左癱右瘓手足
 麻木貼兩肩井穴兩曲池穴 男子遺精白濁婦人赤白帶下
 月經不調血出崩漏貼兩陰交穴 關元穴 赤口疔瘡貼丹

田穴瘡疾男子貼左臂女子貼右臂即止 腰疼貼命門穴
 如小腸氣痛氣貼膀胱穴 偏正頭風貼風門穴 心氣疼痛
 貼中脘穴 走氣貼兩章門穴 寒濕脚氣貼兩三里穴
 一切無名腫毒癰瘰瘡楊梅頑瘡及跌撲傷損瘡塊不必尋
 穴皆本病所患之處貼之即愈



百効全書卷之一 膏藥方法 一六
 貼膏藥法 如瘡有膿血不淨癰癧開破用藥水洗淨拭乾候
 水氣乾却用膏貼上後有黃水膿血流出用棉紙從側畔出一
 日一換黃水膿血止兩日三日一換貼至愈凡洗拭換膏必須
 預備即貼之新肉惡風故也
 取久疽久漏中朽骨法 烏骨雞胫骨以信石實之蓋泥固濟火
 煨通紅地上出火清取骨爲末較丸如粟米大以皮昏熬送八
 竅內外用膏藥封之其骨自出

柳



蜂窠

蠟



天疔

百効全書卷之二

腦後頭腫圖

腦後頭後頂必發且熱上蒸于腦也

大凡頭腦上生癰疔

天惟初起隔蒜灸之

加降火化痰消腫托裏之藥不可輕易針

膏陰陽散之類若熱

連頭而穿口必主穿喉而絕若服藥色

癰疽生手腦前者名腦

又各癰冠發若生于腦後枕處者名枕

發但宜用千金托裏散

○于金托裏散 紅內消

內補散六貼方能合 ○內補散 好一參 附子 小黃芪 秦歸身 大川芎 川厚朴 厚肉桂 防風肉 甘草 即 白芷頭 各等分水煎服如四邊紅不退加紅內消山慈姑去肉桂如膿濃閉毒倍加川芎如膿水清不乾倍加黃芪日久口不合再服三貼外用烏枚燒灰存性敷口上 又方 治潰破者內服前十宜散外用鹽茶洗麻油抹白珠砂散厚攤王容膏貼之如有汚肉亦如前治法總要化毒生肌斂口治之

癰疽生于腦後對口者名曰天疽 又名對口發其狀大而色紫黑若不急治熱入淵液前傷任脈內熱肝肺十餘日死急用內托千金散或千金托裏散外以白珠砂散麻油調敷毒上中間點其口內托千金散 人參 黃芪 歸尾 白芷稍 白芍 官桂 小等 防風 桔梗 銀花 瓜蒌 甘草 水煎酒間服

癰疽生于腦心者四邊嫩赤腫硬連于耳項寒熱痰痛若不急治百効全書卷之二

癰疽入于血肉多腐膿水從頭中而出血逆痰起不治

癰疽生于頸後者瘡頭向上滄尾向下肉多腐核形如蜂窠乃反症也其各遂即曰蜂窠發癰腫者易療如痰發或流人兩肩者不治但按腫起者急宜用前方括散內十壞附子并麻赤芍

如痛腦癰癩腫作痛煩渴好飲冷水宜除痰火濕熱之劑用活命飲或黃連消毒散加天花粉選用

黃連消毒散 黃連 羌活 獨活 川芎 黃芪 紅黃芩 黃柏 防風 紅芍 本紅 甘草 人參 羌活 獨活 花粉 紅芍 梗 知母 煨 宅舍 蘇葉 陳皮

活命飲 白芍 白芷 川芎 當歸 貝母 陳皮 天麻 金銀花 乳香 沒藥 大昔 甘草 皂刺 角 川山 酒 麩 如腫毒口乾作渴好飲熱湯為腎虛火熾身前方括括內括裏消毒散或托裏益氣湯選用之

托裏益氣湯 人參 茯苓 白朮 歸身 熟地 桔梗 甘草 水煎服
 如因膏痰熱鬱成癰疽者宜用 當歸 黃連 黃芩 酒炒
 黃柏 連翹 防風 羌活 山茱 甘草 各一 獨活 別澤瀉
 本壯水浸良久入酒半盞同煎熱服日二次三日六服
 却將藥清汁調下木香 檳榔末各三錢
 乘擦瘋 腦枕後痛浮腫者可針先服大頭腫內開散久服
 喉內地黃散 頭瘡
 頭上生瘡 用黃連 五倍子 蛇床 二各五倍子 一各輕粉 五分為末
 香油調搽但先宜刺芥葱煎水洗
 頭瘡濕爛良方 用燕窠土細搗為末乾抄或單用石羔半生白
 凡火服為末乾搗
 頭上生瘡生虱 用銀硃一錢打爛艾葉及火帛捲筒點灼放搗
 百效全書卷之二 頭瘡方 三
 為以烟薰之但要布蓋定頭莫使烟出久七重次日瘡漸平
 頭上生瘡如梅花點 用生鯉魚一個去骨錐不見生水以生薑
 末一錢入言三分入魚肉茶油浸焙乾為末乾抄之五六日即
 脫去但先宜花椒茶洗淨
 疔頭 用羊舌根草白礬火煨搗爛敷神效
 又疔頭方 用烏魚頭一個花椒一撮麻油一大鍾秀釘磨油半
 鍾四味將鐵杓盛置火上煎七得魚枯去魚骨探之
 梅花疔 用金頭蜈蚣一條紫草不拘多少麻油煎成膏搽患處
 但先要用茶洗淨加小兒肥瘡去蜈蚣
 小兒疔瘡用木油一兩肥皂八錢同煎撈去肥皂以油抹
 小兒頭瘡爛成塊久不愈者以花椒末新猪油煎膏調塗三五日
 小兒頭瘡用舊細巾燒灰為末麻油調搽
 小兒頭上黃水瘡用雄黃硃砂硫磺寒水石枯凡蛇床子等藥

未麻油調搽濕者干搽
 小兒頭生紅餅瘡名胎毒先用生艾白芷大伏皮葱白煎湯洗淨
 拭干次用生薑葉入蜜熬膏敷之
 大頭腫
 大頭腫以名雷頭風症乃混在高巔之上故頭而痛腫疔瘡其
 邪固監堵寒毒入最速冬溫後多病此症有似湯寒上熱身痛治
 宜分表裏三陽
 病六頭腫如脉浮表症多者宜清震湯或方括散內荆防敗毒散
 治之清震湯 升麻 蒼朮 各一兩 蔓荊 一皮 木煎服
 脉流裏表見者宜羌活湯為主 羌活湯 羌活 酒炒 黃芩 酒
 炒 大黃 酒炒 如連兩日鼻面腫者陽明也宜羌黃湯加葛升麻
 如腦後項下腫起者太陽也宜羌黃湯加瓜蒌仁牛蒡子
 如腦後項下腫起者太陽也宜羌黃湯加瓜蒌仁牛蒡子
 功效全書卷之二 六頭腫類 四
 服之取大便邪氣去則止甚者加荊硝
 如咽喉腫痛者姜由一兩大黃二兩宜丸彈子大井水化服
 如表裏俱解腫不消者磁鋒去血外用開關散細辛牙皂梛羊
 及菴蘆少許搗鼻噴以泄其毒
 如久不愈欲作膿者內服方括內歌托裏消毒散
 如瘡後腫赤不消膿清白者宜大君子湯加桔梗芍藥
 六君子湯 陳皮 半夏 人參 白朮 茯苓 甘草
 如氣素弱脉微者用人參白朮對丹川芎陳皮柴胡升麻甘草等
 分以升舉陽氣用生勞子玄參連翹桔梗減半以解熱毒要知
 腫赤便屬純陽脉微便屬陰慎之慎之
 頭風神方 翠鳥舌一個以桐油浸曬乾復浸如此不計其數要
 舌硬如三稜針一般方往遇頭風癢將鳥舌于頭上亂針即愈
 不過三五次即愈

邊頭痛風 一辺頭痛如破可針先用開門散次用咽喉內地黃

散合紫證散服后補藥

開關散 川芎 白芷 北辛 法 鱗 薄荷 葉 紅 爲末 每服二錢 食

一絲用葱湯或熱茶或水調下後服用茶葱煎熱水下

巽疔

癰疽之症乃肝胆怒火或風熱腎虛血燥脾勞所致也方宜隨症

治之如怒火風熱宜柴胡清肝湯腫痛甚者晚腦癰內活命飲

○柴胡清肝湯 柴胡 山梔 白芍 黃芩 人參 連翹

一枯梗 如腎水不能生木以致肝胆火盛血燥髮及消目腫痛

者或曰肺熱宜用甘州川芎白芍熟地柴胡枯梗煎服

○因勞役腫痛寒熱喘滿自汗者耳補中益氣湯去升麻柴胡加

五味麥門冬炮姜煎服

○補中益氣湯 人參 黃芪 甘草 白朮 柴胡 當歸 芍

藥 升麻 陳皮 半夏 黃發單 方用頭髮灰香油調搽

耳瘡

耳瘡之症乃三焦肝風熱或血虛腎虛火動所致不可不隨症而

治也耳瘡癢熱癢痛屬三焦厥陰風熱宜髮疽內柴胡清肝湯

內熱津痛出膿寒熱傷數牽引胸脇脹痛屬肝火血虛宜八味湯

○逾散 當歸 白芍 茯苓 才平 車前 胡椒 甘草

耳中有膿乃腎經氣寒熱上冲耳逐使津液壅滯爲膿或小兒沐

浴水入耳中停蓄搏于氣血醞釀成膿治宜黃龍散枯丸能骨

而黃丹飛 一 胭脂 射香 麝 爲末 先以綿枝子展去耳中膿

方以葉參入內日日用之勿令風入

耳內出膿熱痛用鹽飽草洗淨入鹽少許共搗末絹帛蘸汁

滴入耳內後用粘白布未將盡管吹入其中二三次乃効

耳內下赤爛濕痒用黃丹煨赤色白丸飛過桑豆粉各一錢

細末若髮上或腫調深亦可

耳內忽大痛如有虫在內奔走或有血水或乾痛不可忍者其

蛇退皮燒存性爲末以鴨管推入耳中

耳間疼痛如刀割出血流膿久不乾者鳩屎夜明砂吹入內有神

耳濕用陳皮燒灰入耳中數次神効

耳底用桑葉研一個慢火炙八分熱存性入射一分爲末每用半

分搽耳內如有膿先用綿擦去膿方搽

聾耳神方 用蒼朮削尖入耳孔內將艾火置蒼朮頭上線六七

合架風 兩耳下生一舌核紅腫牙關緊閉口不得開剪刀撥開

以竹窠入內雜地黃散合紫証散右方俱見咽喉腫

皮株子風 兩耳浮腫生核者老人多有此病宜服咽喉內紫証

散地黃散及大頭腫內開關散

百虫入耳 用阿刀于耳邊磨處作破即出或用麻油滋之

百虫全書卷之二

又方用桃葉柳碎塞耳口出 又方用慈沸湯耳中虫自出或

閉塞諸瘻自出

蠅入耳 用猪屎灌耳立出 取猫屎用盆盛猫以生薑擦牙

蒼蠅入耳 用皂角子研爛用生鮮魚血灌耳中即出

蟻子入耳 用猪精肉一指大炙令香置耳孔邊即出

蜈蚣入耳 用生薑汁或韭汁灌耳自出或以熟雞肉一塊煎

雜物入耳中不得出 以麻繩剪一頭散落牛膠在上按入耳中

使其物粘之徐引出効

水入耳中用薄荷汁點之効 黃豆入耳中用鴨翎管長一二

寸許去其中蕈晉少許於一頭以有膜之頭入耳用口氣吸

內瘻

內瘻之症生干口上癆廼初發加蓮花根蒂小而垂廼大大最是

虛勞元氣滿也

方治法 以刀決其根 烙以止其血次以雄黃輕粉打
霜白芷白欬為末敷之以槐枝作枕支其牙頰間毋使口含一
二時許瘡癰定合口自便次日出膿以生肌散之

牙疳 用紅棗一個去核包信少許以濕昏異定火內燒并
黃蘗其為末貼牙上

小兒口中生瘡 用薄荷荆芥各一錢柏葉三分半甘草二分共
為末入井硝青黛硼砂各二分和勻以絹帛拭去口中白腐前
葉少許點舌或密調珠如泄瀉用乳調更妙

口舌瘡

夫口舌為病或為糜爛生瘡或為重舌木舌原其所因未有不因
七情煩擾五味過傷之所致也

口瘡用綠袍散黃柏法 鹹黃蘗 二錢右為末搽患處嚙之吐出涎
即愈或單生白凡口含一二出涎效亦如神

口舌瘡類

又方 用黃連黃柏黃芩枝子 細辛乾姜各五分為細末先用
米泔水漱口後搽藥于患處 此藥不拘神效

膈癰疽舌上生瘡咽喉腫痛 用升麻赤芍人參桔梗干葛各錢
半甘草七分水煎徐徐服

口爛出涎用噲化丸兒茶薄荷寒水石各三分粉草炙落硝各錢
白凡煨過二分塗丸噲化

口舌痛生瘡用上清丸薄荷葉三兩硼砂五錢天花粉一兩天竺
黃五錢風化硝百葉防非 兔茶甘草各一兩括梗七錢

右為細末煉蜜為丸加彈子大每用一丸噲化

氣口乾口舌生瘡宜硼砂二片腦射香各分馬牙硝風化細末
水石一兩右為末以厚草膏為丸如麻子大不拘時含一丸

凡口瘡用涼藥不愈者乃中氣虛相火旺無制用于姜入參白朮
等服從治之即愈甚者加附子或用官桂末參之或用乾薑

連等分為末搽之涎出立効

舌上腫硬 用百草霜研極細末并花水調敷

又方 用蒲黃末類搽舌上內以黃連一味煎湯服之以瀉心
舌長過寸 古用冰片敷之即收

舌無故出血如泉以槐花為末 珍之即止

舌上忽脹出口外俗云是蜈蚣 毒用雄雞血一小鍾浸之即縮入
色舌蓮花腐乃舌下浮腫生毒 可針兩邊尖片切葉針中央先用
地黃散次用紫雪散後用三味靈藥或用角藥石方俱見咽喉

非舌風 舌尖角生毒難以轉 移紅腫破用針次用地黃散噴喉
掩食風 飲食中忽生血泡在 唇及舌根左右隨食脹塞不能
用芒針七破內服地黃散合 紫雪散方見咽喉

喉風 下唇腫痛可針可 先宜地黃散次紫雪散開散其
地黃散紫雪散方見咽喉 具開散散見大腫腫內

口舌瘡類

唇裂裂生瘡 宜撒覽燒灰 不拘多少猪油和敷患處

口唇乾裂破成瘡 用蘆花石 紅火煨文蛤黃柏兩錢
甘草三味同炒赤色其研細 八片腦三分研用蠟油調敷唇
水茶南京傳 用上品細茶去梗 一斤用甘草煎取汁調兒茶末
六兩冰片一錢拌透細茶 晚次日晒乾 香口膈妙不可

香茶餅南京傳 用孩兒茶四兩 桂花二兩薄荷一兩硼砂五錢水
比二分為末用甘草煎汁 煎作餅噲化咽下能消上化痰噴
牙齒

夫齒者腎之標骨之餘也足陽 明胃之脈貫絡于齒上觀手陽明
天腸之脈貫絡于齒下觀其 間有腫痛臭爛者皆山陽明有風
邪或濕熱而生虫也惟痛而 動搖者多屬腎元虛耳治宜瀉陽明
之濕熱更以擦牙及誅虫之 劑投之

上下牙齒疼痛不可忍 牽齶痛滿而發熱大痛此是過食辛熱之

齒如神更簡易不甚疾木以便製費

○○痰腫 龜壳同

癰腫之症通風熱把其胃初治亦宜分表裏

外因風熱通痛在表寒熱者宜升麻雷風湯

○升麻雷風湯 乾葛 白芷 蒼朮 柴胡 葛根 黃芩 芍藥 甘草 麻黃 姜豉煎服

○四順清涼飲 丹身 白芍 地黃 甘草 柴胡 黃芩

如表裏俱解則腫痛又不消欲作膿者宜用助散內托裏

○二連湯 黃連 連翹 升麻 牛蒡子 白芷 等分水煎

如連耳上太陽部分腫痛風熱宜二連湯加羌活助手

如連耳後少陰部分腫痛相火宜二連湯加知母黃柏

百効全書卷之二 牙痛風類

頭面牙齒俱腫內熱口乾者治宜犀角升麻湯

○犀角升麻湯 白芷 防手 川芎 白附子 羌活 鱉板

牙齒唇口俱腫出血者治宜消胃散加石膏

○清胃散 丹身 生地 黃連 牡丹皮 各三升麻 桑下

如內傷生冷涼藥不能消潰食小體倦者治宜髮疽內補中

如內傷氣血俱虛者治宜八物湯加麥門冬五味子

○八物湯 當丹 川芎 白芷 熟黃 人參 白朮 枳殼

如內傷七情有寒熱者治宜八味湯加散煎服力見痛者內

○八味丸 熟地黃 杜用皮 石朮肉 白茯苓 淮山藥

如傷色欲腫痛及癰腫者治宜八物湯加黃芪肉桂或八味丸選

用慎毋悞移風運之劑

床懸外治單方 用赤豆為末以雞清調塗

瘡癤風良方 升麻 牡丹皮 黃芩 石羔 土生地 當

疔尾 防手 赤芍 刺刑水煎熱服屢効

穿胎瘋 兩腮生痲毒日久透八口內初起二個至八九個者不

治先用角葉針重服地黃散紫澄散方其見咽喉

原腫瘋 兩腮浮腫痛者用藥可針可燻用地黃散紫澄散金

鎖鑰只一辺生者不同治亦相同方無見咽喉

面瘡 男婦小兒面上生無名腫毒治宜用防步 荆芥 連翹 皂次

姜虫 紅花 苦參 虫退水煎食後服但先一貼倍用升麻

外用莖菜地內蚯蚓屎壁上土蜂窠其為未香油調搽

面上細瘡常出黃水用桃花散乾為末熟水調服外用杏花煎湯

洗之或官粉煨乳香等分脂調搽

面上生五色瘡宜用鹽湯綿紗擦上日五六易之

百効全書卷之二 面癩類

如項發苦豆梅瘡而多汁延蔓而耳內外濕爛各走皮膚癩瘡先

用桑寄生根皮各一握白芷黃芩冬小許煎湯以綿蘸洗候惡

血出盡拭乾次用皂莢為末根俱燒存性黃柏黃連樟葉白芷

各等分為末麻油調搽忌醋

人面卒得赤黑丹如疥狀不急治至遍身有即死

○面癩生孔出膿臭爛各遊面癩治用陳沙糖調酒服每日三次

谷嘴瘡 用芙蓉花或葉煎水淋洗

面皮裏痛用何首烏末姜汁調敷以布蓋炙熱鞋底對之

面上皮汗斑用白附子為末鹽卧先以水洗面後以白蜜塗

唇上貼之漸次自落

面上雀卵色用棧羊胆一枚酒一確煮三沸塗搽之日行三度

無故瓜破面皮速將生薑汁調輕粉末搽面上患處立時無痕

粟房風 面上浮腫 瘰癧者可用大頭腫內開散次用烟燻肉

一第1012 升黃參日事人書第 7 反文小

藥洗但針要自下針上以便流出膿血

猪類風 兩頰一邊浮腫者各用搭類兩邊赤腫者各隻搭類可
針服咽喉內地黃散紫澄散但各要者牙腫腫不腫如牙腫不
腫不是搭類不針亦可只服前藥

羊鬚瘡痒不可當治宜灰麵松油麻油煎過調搽或羊油燒柑
洗面藥 皂角形升麻 胡椒 空罌粟豆 白芨 白芷 花粉 各

彈子大量用洗面去垢潤肌治生野七又或生小瘡或生癩瘰
粉刺皮膚燥痒

玉容丸 鉛粉三兩 白芨 白銀各五 乾胭脂 共研為細末
子白調九如肥皂大日日洗面容自嫩

香肥皂 南京程風格傳排草 四兩 廣草二兩 丁香二兩 檀香二兩
百效全書卷之二 洗面丸類 十三

喉嚨一身之總與胃相連呼吸之所胃隔之間蘊精熱毒至生風
痰壅滯不散發為咽喉之疾其症雖繁同于火蓋火者痰之本

痰者火之標故言喉痰在中矣言咽喉則牙舌亦包在內矣但咽
瘡忌汗最不誤人者惟砭針出血也出多愈當知此症治不宜緩

若胸中氣急心脇如刀刺二便閉結乃危症也原有方欲云大小
二便俱閉結紫澄地黃散最切痰多須用金鎖匙服後腹中除却

熱非人勿授珍重之此是神仙真口訣
雙鵝瘋 咽喉間生兩枚痂毒于兩邊不可針先用角葉與磨風
膏打和此子用鵝毛挑入毒上令病人閉口嚼良久滿口痰吐
出如未破用煙藥三味散去金毛狗香加江子肉七粒打碎法

夷如法燻之如破後服地黃散紫 散及針合谷風池少烟地

角葉 即雀糞或生
庫風膏 川烏尖 灯心 灰不拘多少為末每用些角葉和勻
吹于喉內取痰如神若取出痰毒不盡綠者不治

燻藥三味散 紅內消 同如前法二兩金毛狗香五斤為粗
末每用三錢及好醋同入小瓦瓶內以厚棉包縛口以火內煨

極熱取一袋對痛腫處燻
地黃散 紅內消去細仙女喬根藥赤芍 牡丹皮 黃連各五
土生地黃汁 下共為末每二錢茶熟水調服

紫證散 紫金皮法破荆芥五斤防風一兩比辛一系薄荷五斤
宅書五斤共為末每二錢茶湯調服

單鵝瘋 是咽喉間只生痂毒在一邊如蓮子樣若未起尖者只
用煙藥三味散出痰後服紫證散針注同前

百效全書卷之二 喉嚨瘰癧類 十四
銅鎖題 即偏竹根或八菜內同煎服或用好酒醋吹噴不
者各埠纏喉俱用藥吐痰次用硼砂散及前地黃散

末或吹或薄荷煎水吞下
松子瘋 喉頭逆生毒形如松子治法同前
魚鱗瘋 舌根逆生腫上舌者治法亦同前

斗底瘋 喉頭生紅黃瘡亦如松子樣日久但起白鱗此症十無
青白散吐痰出痰後用煎硼砂散如病極過水漿不可燻只用
痛氣急胸腫赤如吐痰不得者不可治醫用前煙藥三味散

青白散 胆凡 白凡生何青黛一水片各一總八猪胆內陰
乾隨時取用但先以醋浸兩遍洗之洗後以藥擦如

喉癆風 喉生瘡或滿或紅或白宜用煎地黃散兼金鎖匙

瘡痛甚用 芶砂牙疳各四分神砂五分青黛三分黃連薄荷各

三分片腦半分為末竹管吹入喉中有瘡處

金鎖匙 川烏去彼淮地 祛彼薄荷葉一承 右為末每食後淡

茶調下錢能疎風腫川烏 肥麻人忌冷水如麻只服生薑汁解

腫癆風 上脘風腫生瘡 腐爛先用前青白散吐痰及用前地

黃散紫澄散或前鎖匙搽之 如或出膿者久以八七孔相穿之

所腐爛不一者可用前熏洗法外搽金鎖匙內服地黃散

帝中風 帝中紅腫大生毒疼痛不能飲食先用角藥次用地黃

散若帝中黑色爛不可治 切勿不可針又云帝中腫者亦思針但

宜蛇床子于瓶中燒烟令病人吸八喉中立念如上脘瘡珠忽

長一寸以筋頭蘸鹽點數次即收

浴架風 因飲食後或大寒或可欠落下脘不能合架此是氣血

不順所以筋不收宜針頸車下閃將手托上內服防風荆芥羌

活細辛丹尾白芷稍姜虫甘草節

又方 先用車前草煎水洗口復含隨以兩手移下即拍上如神

曰蟻瘡 生于咽喉及鼻孔 俱爛者是也治宜枯凡一錢白霜梅

一存性一個雄黃川山甲炒 成珠取五分為末將竹管吹入喉

中寒喉閉吞吐不利用附子 切片蜜炙黃 每令一匙嚥汁未

盡再投一片 喉間生肉骨上相益漸上腫起不多日乃有

瘡子臭氣自出遂退飲食 用臭橘葉煎水服

返魂漿 藥廣圓與 治喉癆 不拘淺卑鵝瘋諸症臨危可救如神

于牛膝 煎洗淨搗爛 八濃糯米泔三茶匙同取出汁來再

將茶子仁搗爛入婦人乳 二茶匙同取出汁求調和右喉癆吹

入准左鼻左喉癆吹右鼻 雙鵝風兩鼻俱准三五次畢竟吐痰

而愈後切忌熱毒物 用土牛膝與奶乳同汁灌鼻亦妙

喉癆風 喉生瘡或滿或紅或白宜用煎地黃散兼金鎖匙

末火上焙乾再研再焙 乾方八片腦二分吹入喉中內用防

半通至散加射香一分 調八服之以利為度方見方枯歌內

二虎丹 虎骨兄傳 治喉風 神效

川椒全一 巴豆肉一 半生一半用猪油煎成炭候人嚼之吹

吹喉散 川椒全一 巴豆肉一 半生一半用猪油煎成炭候人嚼之吹

開用牙宅細研 芶砂青黛各一錢玄參山豆根各五分

共為末男左女右吹入鼻中即開

○銀鎖匙 善治痛喉瘋心煩口燒作渴 天花粉 薄荷葉各

兩為末每食後并花水調服 二錢熱甚西瓜汁調服

○銀鎖匙 治牙關緊及開口 不得手常不可用

喉癆風 喉生瘡或滿或紅或白宜用煎地黃散兼金鎖匙

皇角一個去核每肉八 巴豆一粒黃泥固濟燒灰存性為末

射香少許要薄荷淡茶調下

○牛旁子 知母結一薄荷葉社水煎從容嚥下

○清咽丸 父傳用薄荷葉 身枯梗 柿霜 甘草略四明砂

兒茶各三永片仁其為末 煉蜜為丸彈子大不拘時嚥如神

梅核氣 此疾因積熱生痰後喉結如核在喉中吞之則下不吞

則在喉但可以用進水不可以進飲食庸醫不知多候作翻胃症

治相傳先用逐痰丸次用藥磨湯 活絡散

○逐痰丸 陳皮去白半下 七水 南星 炮 香附子 去毛各

用白礬一兩熱水消化煮前四味後用牙皂一兩煎水打米糊

為丸每半空心姜湯不拘多少送下

○藥磨湯 川厚朴 白茯苓 大半夏 聚蘇葉 絡 姜 七

香二枚水一盞煎至六分將熟藥水傾少許入粗碗內磨碎
五味射干一塊檳榔一次鴛鴦一塊沉香一塊枳壳半個
次八葉碗內用刀各順磨五十下仍入前藥和勻食遠服之
重者六七劑而愈上後一十曰再服舌結散

○舌結散 真立明粉一分 貝母二分 先用糯米泔洗入陳皮
五分 用海粉一分 海粉一分 共研末每飯後以舌結少
許鳴下少脰片時取效

天癩癰之症生頸前項側結核如大豆如銀杏或在耳后連級
至缺盆皆為癩癰若生胸脇腋下堅硬如石形如馬刀更曰馬刀
瘡乃多氣少血之病 總皆手足少陽所主其癩癰則尖而小熱癰
血癰則燥腫赤色癩癰則推動滑軟氣癰則圓而動燥癩癰則大
小不一治者先辨辨審可內消者即內消之不可內消即用外治

癩癰瘡類

百効全書卷之二
頻不詳經絡血氣多少脈症受病之異內用牽牛橫及流蘇
敗十宣五香之類勿妄施針灸鏡子血氣必傷而寔七虛七之禍
苦指諸掌自當知此症成潰爛而不流降火滋腎水且病人久不
清心戒口則潮汗咳嗽惡症蜂起其可生乎但視其自內赤味黃
腫人有几條則知其几年死而面色微自金龍木味洪大為元氣虛
極俱多不治故曰症必瀕虛者可慮
臭繼泉傳云治此疾 未對效者先發表春以冬用香蘇散夏用
二香散次服山龍札消百癩湯王燭散外用三神太乙膏視疾
○山龍丸 蚰蛇根 百部 配牙皂 兩入參 川苦 丹尾
菊花根 天麻 白附子 醋乙母草 人米飯為丸 附根湯
○內消百癩湯 牛下 天麻 川芎 金銀花 丹尾 白芷
皂刺 苦節 防手 陳皮 天花粉 人參 白朮 貝母
乳香 煨草 二赤芍 西兩 大米飯為丸 酒下

○王燭 半日 川芎 赤芍 生地 天黃 朴硝 黃芩

○二仙丹 白凡 黃丹 雄黃 名等
右為末刺核出血擦之以太平膏貼之

○太平膏 片腦 輕粉 乳香 沒藥 各二分 射五分
右為細末用香油十一兩葱七根入鍋內熬黃色如蜜黃
八黃丹五兩用柳枝攪不住手煎成膏方入前藥

翼加虛秘授治癩癰 痰核流注神方未破者單用消癰散酒調服
已破者用加味五海飲散貼酒煎調消癰散全服

○消癰散 牛膠 所珠 川山甲 炒所 土 大黃 礞石 煎丸
兵力末每用酒調二三錢服之

○加味五海飲 海藻 海粉 海布 海石 海帶 和風柳
防風肉 明貝母 沉香 磁石 酒煎每貼八消癰散二三錢

百効全書卷之二
癩癰瘡類
楊淵默得治癩癰瘡 外用巴豆十四個雄黃一錢四分將鯉魚一
面刺去腸屎以前藥入十魚內黃泥固濟火煨令干切為末香油
調搽○內用黃芪商 犀角 芥白 苧白 苧芳 穿山 尾 甘草 煎服○次
用木別出并地黃知 母貝母 川山甲 甘草 煎服○後用訶梨 各
分地龍火煨過研 血竭 礞石 共為末攪生肌散

九華傳治鼠瘻妙方 先用全蝎貝母六黃兩星半夏黑丑金銀花
木別子牙皂角安 香地蜈蚣 全煎六貼服○後用黑豆
九齒 登 藤 六兩 裏 枯草 三兩 南蛇根 二兩 共煎酒二瓶上用
火煎七重包上面及糯米几粒後用箬葉包扎大碗蓋必要糯

米成飯方好停一朝每日食後三服

癩癰疏胸膈者治 宜青皮陳皮桔梗貝母白芷皂角一個連齋
五乳香沒藥黑牽牛 各半兩 共為末用新薄荷汁熬成膏八
箭末為丸梧子大 每以連齋湯送下五十九

新刊秘授外科百效全書 卷二

癰疽痛不可忍用黃連黃柏等金毛腦珠研粉香沒藥白芷比其

其為細末以泉調作錠子陰于插八孔中痛即止

癰疽除消酒皂刺五土茯苓一兩半煎即八手地茄根七手鴉不

立根和風椰根可皮頭酒三瓶并雞蛋每早先服酒及蜜

林甲醫傳治癰疽神方 生犀角蛇一條 研碎黃泥做匣盛貯以

白凡末五錢放上仍做泥匣蓋倒如棺木樣封固用火燒煨取

出篋虎不用每晚好酒只送下凡末半分

癰疽仙方 休圓弟傳不拘已破未破俱効

常月 防風 羌活 獨活 具母 金銀花 皂角刺 炒

比柴胡 海石 絡乙 白芨 白欒 五南星 瓜夏 枯草 紅

少陽部頭頂則有核堅而不潰身無力者 治宜柴胡 丹桂

草黃芩 附片 三稜 枳殼 黃連 紅花 煎服

雲林傳散腫潰堅湯 治馬刀瘡結硬如石或在耳下連結益如

或在肩下或于脇下皆于足少陽經中及癰疽漏流胸脇結核

者而不生在足陽明經所出或二瘡已破乃流膿八並治或生

於耳後及頰項下頰者俱宜治之

○散腫潰堅湯

升麻 葛根 白芍 二 歸尾 五 連翹 黃連 黃芩 消 酒 洗

牛黃 柏 五 知 母 五 枳 殼 五 龍 胆 草 酒 浸 四 昆 布 五 石 勒

三 枝 二 天 菰 朮 三 天 海 藻 五 封 草 天 花 粉 五 石 勒

每 一 兩 用 水 一 盞 先 浸 半 日 煎 至 一 盞 去 渣 熱 服 于 臥 處 俾

足 在 高 處 頭 微 低 每 嚥 一 口 作 十 次 嚥 至 服 畢 依 常 睡 臥 使

藥 在 胸 中 停 滯 也 另 搗 半 料 依 細 末 煉 蜜 為 丸 如 藥 豆 大 每

服 百 九 或 一 百 五 十 九 此 藥 湯 番 一 口 送 下

○天花散 治癰疽爛疔

○代食散 治癰疽潰爛其不可聞者不能愈

○桑世膏丸 瘰癧皮生夏秋發時用桑世膏丸

○升麻調經湯 治經閉不通

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

天花粉 穿山甲 赤芍 白芷 乳香 沒藥 雄黃 銀朱 射香 石硫磺 硫磺 雄黃 銀朱 射香 石硫磺

○代食散 治癰疽潰爛其不可聞者不能愈

○桑世膏丸 瘰癧皮生夏秋發時用桑世膏丸

○升麻調經湯 治經閉不通

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

○癰疽疔毒 治癰疽疔毒

疫毒散

巴豆肉二粒八言三分生白丸服凡幼雄黃三錢
牛十個共為末將口涎調搽核上以萬應靈藥之二日一換
過再將玉膏貼一日一換

沈氏痰核內消方 側柏子錢一連香法心五雄黃五手皂角
紅山蘇茹天門冬五手金畏花五手和風柳兩貝母兩痛
如乳香沒藥各五手如核不痛不動加射香粉已上俱畧炒過
其為粗末每酒一罇用藥末四兩以布袋包裹藥熱去滓酒
每月不拘時服但念後斷根要在兩手曲池穴灸三五丸
單方用紫背天葵草初酒飯後服

如虛秘傳核氣神方 宜以川山申一兩金銀花白芷稍
蚕 蝉退 大黃 丹尾 連翹 上心各一草一酒共為末
入鴨蛋內重者十四個輕者六七個將蛋去白一半入藥攪勻
蒸熟酒下每白只服一飽服完蛋後再腫可灸之後服丸藥

百効全書卷之二 痰核兩類 二二

口九葉 川山甲 皂刺 漏芦 防丰 滑石 赤小豆 夏
枯草 右各等分共為細末酒打米粉為丸每酒下三十九

痰核搽藥 用鷄蛋白內嫩皮燒灰將鷄蛋白調搽極妙

痰核方用人參 丹尾 蕪黃 胆草 黃芪 黃連
梳炭 知母 黃芩 桔梗 海布 柴胡 三稜 莪朮
連翹 干葛 天花粉各二末為末酒調服

應圓製項下或手足起核神方 用桔梗 枳壳 青皮 赤芍
連翹 半夏 陳皮 赤苓 防丰 丹尾 天花粉 煎
胡 川活 玄參 十服即散口或蟻丸丸亦効

頸下核物疼痛 川烏 一兩 一味用生酒全煎食下去產服醉臥
床上患左側則左右如之把手按核上腫醒方起

癭瘤 癭瘤皆因血氣凝滯結而成之且因喜怒所生多致于結而成

破去脂粉則愈或有妨垂下根其小者生明藥其蒂以酒洗用
生者以乾者為末調你膏先將小刺端上令氣透則無
癭瘡單方 用山羊角 米煎黃芩均台為丸服神効
如虛傳治癭氣大塊初用三海湯次用消癭丸多服神効

三海湯 海藻 海帶 海布 金櫻子 川練子 木通
通草水煎木香研開服散劑

消癭丸 海藻 海帶 海布 略一兩海蛤 螺硝
海香 各三兩木香 五手連翹 角回略一川木通
次枳壳 絡七 如冷者加干姜右諸藥俱搗爛用酒調服

男婦小兒頭上或腋下生無名癩毒治宜羌活 防丰 川山甲
紅內消 枳朮 川厚朴 白芷稍 黃芪 歸身

百効全書卷之二 癭毒癩類 二二

小芳 粉草 桔梗 升麻 貝母 苦粉生薑 二劑下
如頭上生毒大而根白乃血少氣衰治宜防丰 白芷 當歸
川芎 茯苓 黃芪 肉桂 厚朴 羌活 細辛 白芍

小參 貝母 甘草 山慈 紅內消 川山甲 煎服神
頸上生瘡作癩出水乃肺經有熱毒治宜青蘆海藻 鹽礬 姜
重 蕪荊 升麻 白水煎半空心服四五貼再用大黃七拍

黃芩 蕪荊 疾疔 斷皮 苦參 共合四貼外用烏桕根
半斗左纏一把同於熱酒入盆內功皮硝配泡化入洗神効

癭核毒方 用蓮壳煨灰酒調初服三分後服五分
癭瘰癧 癭項腫治宜用角藥用針先服紫證後服地黃散
石方限見明喉

外科百効全書卷之二 終

外科百病全書卷之三

豫章儒醫吳居中應圖父頌著

乳癰

○酒腹即



乳癰之症有孕日內不養子者口外吹酒婦人飲食厚味忿怒憂鬱以致胃火上蒸乳妨化爲濁腫肝經氣滯乳頭發塞不通致令結核不散病不可忍

乳癰辨論

百病全書卷之三

大凡乳土瘰癧硬腫作疔宜以葱餅熨之其法用個爛口瓶以炭火入瓶內上以熱灰填滿瓶口用葱葉及葱白從瓶口通裏瓶口用手帕裹瓶口將瓶口向腫處任意輕七熨之切莫亂施針刀以傷其房結或初起隔蒜灸亦可

乳癰內吹初起單方鹿角膠酒多服外吹初起單方用百齒霜麝香丸雄黃衣服七九出汗就愈不出可再服七九神效

乳癰傳秘方治乳癰用漏芦川山甲金銀花白芷稍連需貝母末京赤芍甘草節各等分白水煎服方人大黃煎一二沸取起

頃服被蓋出汗次日膿血盡從大便出神效下余北藥散

聖愈園製治乳癰神方口外用鐵鑊散敷內即服助手連香

姜蚕陳皮青皮貝母漏芦烏藥薄荷銀花羌活甘草煎湯如

不消再用土烏藥水洗三次果勢甚即服助手連香

皮青皮貝母姜蚕漏芦川山甲乳香沒藥人參煎肉桂

惟內吹者不可用桂恐掛動胎也如潰爛外用化毒丹搽後用白珠砂散或生肌散之如有乳久不愈口用黃連陳皮各等分將絲條梓麻油曬藥未透入如許薄久不出膿則生肌散

核久內服作疔疔腫堅硬手不可近謂之乳癰未潰者宜服瓜蒌湯將渣兩乳開出黑頭瘡頂下作黑眼者宜服內托升麻湯已潰者宜服方括散內上宜散及髮痘內補中益氣湯之類

○瓜蒌湯 瓜蒌二箇當歸 甘草五 乳香 沒藥各一錢

○內托升麻湯升麻 葛根 連翹 黃芪 當歸 鼠粘子

又有鬱怒傷肝脾結核如蠶子大不痛不痒五七年後外腫紫黑內漸潰爛各日乳癰滴盡氣血方死急用痰核內十六味流氣飲及單青皮湯兼服如虛者只專潰肝解鬱湯更加清心淨

養庶可荷延歲月以後必于乳下潰一穴出膿

○清肝解毒湯 當歸 川芎 白芍 熟黃 柴胡 白朮

人參 陳皮 炒梔 茯苓 牡丹皮 貝母 水煎服

婦人乳頭裂治宜秋後茄花陰乾清油酒敷或秋後茄子裂開者

陰乾焙灰存性爲末水調敷

乳癰腫見心者用豬兒腹下毛乾鍋內煨存性爲末干搽或入

輕粉少許清油調搽

乳中癰起痛用川黃連大黃各二兩水煎服

乳癰先以粉草煎水搽後以油搽搽効

乳後乳如石硬不軟用陳皮一斤水煎水大半下生薑

共爲丸青黛爲衣每將姜香花散米送下三四十九或酒吞

乳中香花石榴發此症者少不治者多亦宜生肌之藥內吃外

敷而不生肌必死

方子乳癰治婦人微與蓋怒火存認過度以致肝虛血燥腎虛

精法不得上行痰凝滯亦能結核大槩男子兩乳腫者用痰核內十六味流氣飲左乳者足三陰虛弱怒所致用痰核內八物湯加山枝牡丹皮或前清肝解鬱湯火盛風熱者更加炒黑子湯加芍歸柴胡山梔

如潰爛作痛者宜用痰核內八物湯加黃芪肉桂腎虛再加椒並如因勞怒則痛併發寒熱者宜用痰核內補中益氣湯加炒黑山梔子不可輕用清熱散毒之劑

臟腑癰疽圖



自刊全書卷之三

每穴內隱七痛七為疽肉上微起者為癰假如中府隱痛者肺癰也余各穴做此宜流氣飲或托裏散加當歸山枝黃芩杏仁

疔



肺癰肺癰

是症經年久咳甚葉焦而為癰癰草木亢甚則枝葉痿落也火燥甚則腐脹為膿血成癰病因汗吐下後亡津或腎虛火炎或厚味煎蒸而成其候惡風咳嗽鼻流涕項強不能轉側皮膚不潤淨胸膈服滿呼吸不利吐痰血腥穢若豕溺真假將黃豆根研水服七得者真服不得者不是肺癰也

肺癰肺癰而寒咳多痰熱自汗宜知母黃芩湯去門冬

○知母 天冬 湯 知母 茯苓 黃芩 五味 半夏 柴胡 白朮 人參 桔梗 薄荷 川芎 阿膠 甘草 欬藥

如咯血將交癰者紫地散全銀花

○紫地散 紫地 知母 貝母 人參 茯苓 桔梗 五味 阿膠 甘草 生薑煎服 火盛首人參平肺散等丸含化

○人參平肺散 桑皮 倍入參 知母 地骨皮 五味子 青皮 輔皮 茯苓 黃芩 麥門冬 各等分 為末 子大

喘急面浮鼻寒胸脹及喘不眠者宜用平肺散三兩為末大煎三十以水三升煮取二升再煮或煎至七合頓服服盡三日一劑或單以葶藶散炒為末水煎服是

○葶藶散 葶藶 桑白皮 黃芩 桑白皮 黃芩 桑白皮 黃芩 桑白皮 黃芩

但傳肺癰之症始則易治膿成難愈膿微聚而數未成膿也肺緊而數已成膿也男子以氣為主十救一二女子以血為主十全

自刊全書卷之三

肺癰癰類

六七八九初起口燥咽乾胸膈隱痛咳唾膿血氣息腥臭治宜桔梗砂三甘草蘇一門冬去心煎服或加味敗毒散調之

○加味敗毒散 薄荷 瓜蒌 白芷 烏梅 生黃 黃芩 歸尾 半下 桑白皮 葶藶 貝母

如有膿腥氣上衝喉而嗽及吐膿者俱宜消膿飲或用生地黃湯

○消膿飲 貝母 知母 生薑 阿膠 桑皮 防手 天門冬 桔梗 薄荷 蘇子 白欬 南星 半下 川芎

如咽痛者用桔梗湯使秘者前太乙膏為丸白湯下

又有胸膈開一痰口中所咳膿血與痰相應而出者宜大補氣血七冬者梅豆湯冷熱不調者前雲母膏為丸并桔湯下

梅豆湯 黑豆 烏梅 葱以仁水煎服以阿膠醋煎入肺之

如腎水不足虛火上炎咳吐膿血喘而短氣發熱作渴小便不調

治宜參芪補肺湯加皮鹿少食加升麻桔梗去山藥助肺熱

參芪補肺湯 人參 黃芪 白朮 茯苓 陳皮 當歸

山藥 熟地 甘草 五熟地黃 錢 五此丹皮 麥冬 煎

藥面赤當補脾胃而白當補肺蓋補脾以生肺金補脾以生腎

也如除火發熱面赤咳吐膿血痰如糯米粥脈浮大者火剋金

也不治如脈浮虛瀆可治以其有本脈也

心癰 心癰之症生兩乳中間狀如豆大三四日起不早治八千腹十日

死又云外發可治內發難治

如病此症小便澀者宜黃連耳草桔梗 白芷天花粉瞿麥淮

不通或清心散如大便秘者用前方括帶內 固清心散或黃芩黃

連封草桔梗白芷生地天花粉大黃

○清心散 遠志 赤芍 赤芍 生地 麥冬 知母 甘草

生薑 連子 同煎服

如生于胸乳上些有孔者亦名蜂窠癰發乃心火劫盛治宜急

以疏導心火之藥稍遲則熱極難治

如心頭有孔常出氣水謂之心漏治宜鹿茸去麩附子鮑去藍花

共為末蒸肉二兩搗為丸空心酒下

子治一人病并疔已潰內虛托裏清心之劑外用敷洗燻則生肌

飲口如法治之一月全愈

一 敢清熱托裏兼滋腎本

胃癰之症多因飲食七情火燥發被外感寒氣所隔使濁熱之氣

壅塞胃脘胃中清氣下陷故胃脘沉澀惟寒氣所隔故人迎緊盛

有此二味者胃癰也

外症寒熱如瘧胃濁則肺金失養故身皮錯綻或咳或嘔或嗽

而俱宜大射干湯主之

○大射干湯 射干 赤芍 赤芍 白朮 枝子 升麻 煎

水煎入蜜生地黃汁同服

如痰壅者其結湯如大便秘不利者前太乙膏為丸服

如小便不利者及腹滿不食宜三仁湯

○三仁湯 冬瓜仁 薏以仁 桃仁 牡丹皮 白朮煎服

如腹出食少者宜補中益氣湯升提胃氣或佐以前藥調之不可

專治其瘡

腸癰之症濕熱積成癰小腹疼痛小便澀似淋大便澀難也若

腹脹大轉側聞有水聲或透脘生瘡出膿大便澀下膿血者不恰

此症脈遲緊若未有膿也用大射干湯下之或用射干香乳香丁香沉

香木香連翹大黃通草獨活扁竹甘草下之

○大射干湯 大黃 枳實 牡丹皮 瓜蒌 射干 香乳 香丁 香沉

若脈孔滿者 宜用當歸 川芎 白芍 玄胡索 地黃 桃

仁 紅花 木香

如脈洪數者已有膿也宜前胃癰內三仁湯

或乳瀉內瓜蒌湯

如脈數外無潮熱內無積聚身皮用錯腹急

如腫按之却軟乃肉

虛陰冷凝痰成癰宜射干或十宣散之類

○牡丹散 人參 黃芪 天麻 白朮


白芷 川芎 木香

左脾發又曰左時發



此名左脾發生于左臍之間初起灯心點破內服後疔瘡均能
疥湯汗之即愈

脊中蜂窠發




百効全書卷之三

脊脊發圖

九

此名脊中蜂窠發生在正當脊心形如蜂窠但有私在上者
是反病不耳治亦以前方括內托裏散加菊花生肌定痛妨毒
攻心八膜難療

右搭肩串發




此名右搭肩串發生在右搭肩骨上以動之處可治若串左肩唯
治宜服前方括內托裏散加升麻桔梗外用玉紅散或綿絮燒
灰雞黃皮焙干為末搽之干者麻油調搽

左搭肩發



此名左搭肩發生在左搭肩骨上以動之處可治若串右肩治
此難矣

對心發



此名對心發生在對心處是症極重乃因心火盛而熱氣會生
百効全書卷之三

肩心發圖

十

于此其毒尤盛走暴急用疎導心火之藥解之然後用生肌藥

龜背發



此名龜背發生于脊上頭尾俱尖四邊散大如龜之形乃因飲
食不致而氣食相閉合陰虛而成之氣虛而散者所以開口而
潤以托裏補藥治之

走流注發




○此名散走... 定熱治之... 味流氣飲... 發熱... 祖傳云真指... 發熱... 惡症始起... 痛灸之不... 破火筒及... 以斷法... 海姜汁調... 不伏根水... 川山甲炒... 黃當歸白... 汁調... 或炒雄黃... 張指揮傳治... 沒藥... 歸... 原... 先服大參... 銀花甘草... 白芷紅川...


蓋背山勝... 勞以致水... 祖傳云真指... 發熱... 惡症始起... 痛灸之不... 破火筒及... 以斷法... 海姜汁調... 不伏根水... 川山甲炒... 黃當歸白... 汁調... 或炒雄黃... 張指揮傳治... 沒藥... 歸... 原... 先服大參... 銀花甘草... 白芷紅川...

○此名散... 研為極細... 未空... 次為度... 諸凡... 發百中... 如慮兒... 外用厚... 紐其為... 川山甲... 天花粉... 黃連... 生肌... 如法

○此名散... 研為極細... 未空... 次為度... 諸凡... 發百中... 如慮兒... 外用厚... 紐其為... 川山甲... 天花粉... 黃連... 生肌... 如法



腎俞發



下腎俞發

○此名散... 研為極細... 未空... 次為度... 諸凡... 發百中... 如慮兒... 外用厚... 紐其為... 川山甲... 天花粉... 黃連... 生肌... 如法

○此名腎下双俞亦由濕熱房勞鬱結過度故兩腎俞俱生瘡
治詳後

腎俞發

腎俞發症原因受濕并怒氣飲酒傷工腎內流毒在腎俞生瘡
若下腎俞發更加房勞鬱結過度所致也又有腎俞一發脾腎
上一發肩腹上又生一發亦各發但此三症陽發于外者勿治
陰發痰發傷腎腹及膿稀者死

此症核起軟腫發熱疼痛色赤作渴脈數有力先宜服腦疽內
活命飲後用方括內托裏消毒散

如腫腫不熱微痛色黯作渴脈數無力及自虛也宜方括內托裏散
如發熱陰虛者宜四物湯加入參白朮

惡寒熱四逆甚大者陽氣虛也宜單八參湯或八物湯加芪桂
如初起食少者邪盛脾虧急用補中益氣湯救之

百効全書卷之三 腎俞發症 十三


相傳治腎俞總方 內服用方括內托裏散如車前木通淡竹葉
牽牛何首烏脚連復用內消散及生肌定痛散敷之及膏藥貼

更以痰核內十六味流氣飲加減服

大疔癰腫氣血勝毒者易治慢腫服托裏散不應者乃毒勝氣血死
在旬口或已發出而不腐潰者急用托裏散兼補脾胃不應者
死在二旬若已潰而色不紅活者用托裏散加入參黃芪肉桂
及補脾之藥如不能生肌瘡口難斂上八面不斂乃脾崩也

腎腿部

腎癰



便毒

腎癰

腎癰之症乃陰虛血熱所致當知腎居小腹之後部位僻與雖日
多血既氣既罕到血亦罕來尤忌此誠不可慮

此症初起未成膿者隔蒜灸之再用葱熨灸法
如欲作膿者內托裏活湯如痛甚者前括內活命飲

○內括活湯 酒黃柏 黃芪 防朮 當歸 稿朮 蓮菴
甘草 蒼朮 陳皮 肉桂 牛膝 酒煎

如腫硬者宜方括內托裏消毒散或托裏散
百効全書卷之三 腎癰發症 十四

如脚虛不能消散或食小不作膿者或從右臂腿者宜大頭風內
六君子湯加苴歸黃芪

如脾虛誤服消導藥以致氣陷下腫痛者宜補中益氣湯或八
物湯加芪桂潰後亦宜進此二藥以固其裏兼節酒色戒燥暴

乃可萬全如內傷房室兩臂腫硬二伍不通者宜八物加芪桂
車全牛夕故苴小茴之類

會一人近肛門處作一毒如碗大各曰臨毒已作成膿用艾依法
灸一二壯次日將麵粉作一團糰上又將槐樹皮為一圓

片蓋麵粉圈上將大艾為罌槐皮中吹出黃水為度其槐皮
要將粗皮在下嫩皮在上如此治之即愈

腎疽瘰 即腎癰
方用硫黃末鋪帛上捲筒為條將麻油浸透倒提點灼滴出藥
油俟冷頻探



一方田核桃肉七箇人桐子肉一个硫黃四水銀分共為餅餅

便癰俗云便毒實血病也生于腰脇小腹之間近陰土廵乃厥陰

肝經及衝任督三脉隨道精氣出入之路也或入房忍精或思色

不遂或泄不泄敗精凝滯為於腫痛在腰腹之間

江氏傳先用蘇葉 陳皮 香附 麻黃 平菊 升麻 赤芍

羌活 一貼煎服 後以川山甲 牡白姜 皂角 五靈脂

亦妙 體虛者用 人參 放熱再入大黃 同收 暑熱取服

劫起及久欲成漏者俱宜嚼丸九神効

應員制 治便毒用 姜虫 檳榔 牽牛 貝母 白芷 通

大黃 川山甲 猪仁 同煎炮皮消紅生磨大黃 四子 空心服通四

五次以弼止之外用倍子白丸醋調敷如要腫破用烏豆去皮

百効全書卷之三 諸便毒煩 十五

生搗爛鴨清調敷過一夜即破出膿

癰氣 是症凡便毒下些近陰下廵治宜大黃 紐川山甲 牡黃 柏

黃芩 姜虫 白芷 絡三 白水煎生酒服服被汗出為度或

黑牽牛 七子 大黃 五子 牛蒡子 貝母 各三子 羌活 獨活 浴

豕耳 早一子好酒投空心熱服四貼

騎馬 是症即便毒左右而遺俱發或先有疔瘡而發或卒然起

核疼 痛而發治法同便毒但潰後亦如總要敷洗化毒生肌

路岐 俗名瘰癧些小瘡疔此疔小兒患之多因食積痰滯

相傳用 牽牛 雄黃 川練子 化粉 枳壳 貝母 甘草 等分 為末 南酒 調

服三五劑出膿即消

如痛不可忍者用細辛 黃連 川山甲 乳香 沒藥 連翹 喬母 尾大黃 枝

子 銀花 牡礪 車前子 防手 朝核 桃去油 酒 煎 五更 服

如腫不消用生黃連 黃柏 輕粉 為末 搽之 盪湯 洗之內 以 毒

生毒 疔爛 癰熱 酒服之 汗出 為度 淨用 敷瘡

過 川山 宜山 茹貝 母川 山甲 大黃 芒硝 棋榔 我木 煎服 或大黃

懸癰之 症乃足 三陰虧損 生谷 道則陰 囊之間 初發 其痒 狀如松

子或如 連子 日久如 桃李如 以赤腫 若破則 大小便 從此中 而出

不可救 也輕則 滴盡血 而重則 內潰而 亡

此症初 起濕熱 滯滯作 痛燥腫 者治宜 腦疽內 活命飲 去大黃 如

蒼木并 如不成 膿不潰 者入物 湯或腫 脹已成 者急針 之膿 焮

如血虛 首宜 歸芎為 黃人參 白木氣 虛者參 木苓等 歸耳草

如脾虛 者補中 益氣湯 如久成 漏者入 物湯加 芪桂或 蠟丸九 此

一病當 服國老 膏雖患 亦輕雖 潰亦淺 若誤用 涼寒必 不可救

國老膏 粉草帶 節用山 潤水一 碗浸三 時令透 以慢火 炙

百効全書卷之三 疔門毒癰 十六

干仍投水浸透再炙至水干為度酒三盞煎至八分并渣

心服二日一服

谷道中 生瘡 治宜水 中何葉 卷筒綿 裹納下 部日三 次即愈

肛門爛 出水作 痛或痒 或出血 用石硫 黃五子 冰片一 子為末 搽

但先 每用銀 花新艾 花椒柳 花水洗

肛門腫 痛熱毒 用柳葉 刺槐角 黃連各 乙兩陳 冬瓜皮 二兩右 為

末空心 酒調服

瘡毒 論男婦 小兒俱 有何也 經曰富 因酒色 財氣病 緣負重 擔

輕婦人 因經後 受冷月 後傷風 小兒多 因受乳 後積血 結

臍腑虛 而血脈 未貫風 濕犯而 食毒胃 因七情 鬱結聚 聚交戰 於

是血氣 下墜聚 聚肛門 宿滯不 散而衝 突為此 症也然 症分二 十

四原有 歌誌云 痔漏分 二八通 者行細 有穿腸 井鼠尾 酒色兩 類

子莫言胡花忍澤菜亦不寬... 怪勾腸瘵... 安瀾... 治日久有... 運在核... 三陰... 相合... 若濕多也

如酒痔飲酒則發用干姜... 豆白梅一箇... 如角痔... 〇黑玉丹... 前頭髮... 出入乳香... 五九日... 及谷道... 如雞冠痔... 寄生蓮房... 如牛奶痔... 竹筒內... 如翻花痔...

如酒痔飲酒則發用干姜... 豆白梅一箇... 如角痔... 〇黑玉丹... 前頭髮... 出入乳香... 五九日... 及谷道... 如雞冠痔... 寄生蓮房... 如牛奶痔... 竹筒內... 如翻花痔...

如酒痔飲酒則發用干姜... 豆白梅一箇... 如角痔... 〇黑玉丹... 前頭髮... 出入乳香... 五九日... 及谷道... 如雞冠痔... 寄生蓮房... 如牛奶痔... 竹筒內... 如翻花痔...

如酒痔飲酒則發用干姜... 豆白梅一箇... 如角痔... 〇黑玉丹... 前頭髮... 出入乳香... 五九日... 及谷道... 如雞冠痔... 寄生蓮房... 如牛奶痔... 竹筒內... 如翻花痔...

如酒痔飲酒則發用干姜... 豆白梅一箇... 如角痔... 〇黑玉丹... 前頭髮... 出入乳香... 五九日... 及谷道... 如雞冠痔... 寄生蓮房... 如牛奶痔... 竹筒內... 如翻花痔...

如酒痔飲酒則發用干姜... 豆白梅一箇... 如角痔... 〇黑玉丹... 前頭髮... 出入乳香... 五九日... 及谷道... 如雞冠痔... 寄生蓮房... 如牛奶痔... 竹筒內... 如翻花痔...

諸腦少些水調敷... 如湯肝痔用花板... 後可以防... 如梅毒用... 公猪脚... 如虛兒傳... 子孫一... 李仁白... 如牛奶... 火上焙... 陳進士... 用麩... 諸痔... 扶苓湯... 湯下如... 治痔漏... 黃氏傳... 甲枝子... 二碗服... 放腸法... 生小兒... 即出用... 蛛... 茶洗切... 如內痔... 性... 黃... 黑... 白... 紅...

諸腦少些水調敷... 如湯肝痔用花板... 後可以防... 如梅毒用... 公猪脚... 如虛兒傳... 子孫一... 李仁白... 如牛奶... 火上焙... 陳進士... 用麩... 諸痔... 扶苓湯... 湯下如... 治痔漏... 黃氏傳... 甲枝子... 二碗服... 放腸法... 生小兒... 即出用... 蛛... 茶洗切... 如內痔... 性... 黃... 黑... 白... 紅...

諸腦少些水調敷... 如湯肝痔用花板... 後可以防... 如梅毒用... 公猪脚... 如虛兒傳... 子孫一... 李仁白... 如牛奶... 火上焙... 陳進士... 用麩... 諸痔... 扶苓湯... 湯下如... 治痔漏... 黃氏傳... 甲枝子... 二碗服... 放腸法... 生小兒... 即出用... 蛛... 茶洗切... 如內痔... 性... 黃... 黑... 白... 紅...

諸腦少些水調敷... 如湯肝痔用花板... 後可以防... 如梅毒用... 公猪脚... 如虛兒傳... 子孫一... 李仁白... 如牛奶... 火上焙... 陳進士... 用麩... 諸痔... 扶苓湯... 湯下如... 治痔漏... 黃氏傳... 甲枝子... 二碗服... 放腸法... 生小兒... 即出用... 蛛... 茶洗切... 如內痔... 性... 黃... 黑... 白... 紅...

諸腦少些水調敷... 如湯肝痔用花板... 後可以防... 如梅毒用... 公猪脚... 如虛兒傳... 子孫一... 李仁白... 如牛奶... 火上焙... 陳進士... 用麩... 諸痔... 扶苓湯... 湯下如... 治痔漏... 黃氏傳... 甲枝子... 二碗服... 放腸法... 生小兒... 即出用... 蛛... 茶洗切... 如內痔... 性... 黃... 黑... 白... 紅...

諸腦少些水調敷... 如湯肝痔用花板... 後可以防... 如梅毒用... 公猪脚... 如虛兒傳... 子孫一... 李仁白... 如牛奶... 火上焙... 陳進士... 用麩... 諸痔... 扶苓湯... 湯下如... 治痔漏... 黃氏傳... 甲枝子... 二碗服... 放腸法... 生小兒... 即出用... 蛛... 茶洗切... 如內痔... 性... 黃... 黑... 白... 紅...

諸腦少些水調敷... 如湯肝痔用花板... 後可以防... 如梅毒用... 公猪脚... 如虛兒傳... 子孫一... 李仁白... 如牛奶... 火上焙... 陳進士... 用麩... 諸痔... 扶苓湯... 湯下如... 治痔漏... 黃氏傳... 甲枝子... 二碗服... 放腸法... 生小兒... 即出用... 蛛... 茶洗切... 如內痔... 性... 黃... 黑... 白... 紅...

諸腦少些水調敷... 如湯肝痔用花板... 後可以防... 如梅毒用... 公猪脚... 如虛兒傳... 子孫一... 李仁白... 如牛奶... 火上焙... 陳進士... 用麩... 諸痔... 扶苓湯... 湯下如... 治痔漏... 黃氏傳... 甲枝子... 二碗服... 放腸法... 生小兒... 即出用... 蛛... 茶洗切... 如內痔... 性... 黃... 黑... 白... 紅...

諸腦少些水調敷... 如湯肝痔用花板... 後可以防... 如梅毒用... 公猪脚... 如虛兒傳... 子孫一... 李仁白... 如牛奶... 火上焙... 陳進士... 用麩... 諸痔... 扶苓湯... 湯下如... 治痔漏... 黃氏傳... 甲枝子... 二碗服... 放腸法... 生小兒... 即出用... 蛛... 茶洗切... 如內痔... 性... 黃... 黑... 白... 紅...

諸腦少些水調敷... 如湯肝痔用花板... 後可以防... 如梅毒用... 公猪脚... 如虛兒傳... 子孫一... 李仁白... 如牛奶... 火上焙... 陳進士... 用麩... 諸痔... 扶苓湯... 湯下如... 治痔漏... 黃氏傳... 甲枝子... 二碗服... 放腸法... 生小兒... 即出用... 蛛... 茶洗切... 如內痔... 性... 黃... 黑... 白... 紅...

糊九如梧子大每五十空心服酒下服二三次為止

如小便不通用葱一握煎湯洗小腹則通

如大小便不通用澤瀉朱苓赤苓白朮益腎仁

皮枳壳車全木通給一小荷五分草炬灯心煎空

如血不止用烏梅艾葉狂井花水煎服或五倍兩生清孔極

芟茶二兩煎水洗肛其血自止

如痛甚者用前服米片乳香沒藥為末水調搽

如疔不收者用蠟皮一個確內燒焦黃存性磁石礬石肉桂三

醬布煨三為末米飲調服炙熱底托上

如大腸結硬下墜多血痛不能忍用歸尾澤瀉生地黃只克大

郁李仁蒼朮蕪皂角仁研成膏麻子仁一錢半水煎空心服

祖傳秘方不問男婦遠年近日二十四種痔漏不用刀針

○枯痔藥 白硫黃粉白凡紅絲二味八錢杓內先用白凡末

百効全書卷之三 諸痔藥類 十九

又放砒正帳又放白凡蓋面將慢火熬至烟淨出火毒入後

葉兒茶和血竭瓦蛇含石炭粉麻花分磁砂瓦雄黃 礬砂

絡一乳香 沒藥各五錢 神粉初若其石藥右十二味

共同一處為極細末合五分之一用液津調開搽作薄餅子

如此大藥餅又放些膏脚大用陰干聽用大凡既痔之法首用

喚痔散當先喚出痔來纔好下手枯痔藥

○喚痔散車用生胡椒為極細末空心用生酒一瓶隨量大小

送下待半上午其痔即番出來方用津液調前枯痔藥如稀

糊樣過圍搽上枯藥谷道中納一葉餅痔孔內插上管脚樣

約棍子一枚後用白帛封固但上葉之後疼痛難禁則不必

憂心書云若葉不睡眩厥疾不瘳故曰惡病还用惡也但

是上葉之後血即隨手而止疾則刻日而安每三洗二換新

藥若是大便堅硬須用大黃酒蒸透煖為極細末每白川

調股一錢以稀糞為膏間服蠟皮散

○蠟皮散 治二十四種痔瘡出血裏急疼痛

槐花艾葉藥炒枳壳 地榆 當歸 川芎 黃芪 白芍

白凡枳實象 綢皮象 蛤頭象 三子皂角 煨法猪後

蹄重甲多十枚 右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九

煎米湯下換藥敷至六七口看痔瘡變黑色堅乾枯不痛

方用浸洗之藥搽去病根若是痔瘡未乾乾枯過脚不要

藥凡朝以乾枯堅硬為度

○浸洗脫痔根方 用生艾葉 白頭翁 素羅草冬青菓

左癢藤 綿花子及各樣疎風散血之藥煎出水來將痔瘡

熏洗待藥水溫七之時坐在脚盆之內日日洗浸五七次待

其痔瘡浸洗至五七日之內其痔根自然脫下以落盡為度

總不用浸洗待落痔根隨用生肌散搽在痔瘡之內每日

百効全書卷之三 諸痔方類 二十

又用新葶之藥頻洗次上生肌散首尾前後半月之內可以

除根脫胎而復舊也

○生肌散 嫩老鼠子干 鹿胎內金 三乳香 沒藥絡一兒

茶紅粉一井石以細粉雄黃一破絲網巾搥破血竭一

皂骨暖脈粉陀生秋一絲黃柏末一六黃末一右為細末一

日一次洗換新藥自脫生肌平復矣吳曼試神効

漏症

凡瘡久則宿膿肉停蓄其間穿口必透風冷外侵消也膿

流出如釘窠之有漏孔九漏肝主狼漏胃主鼠漏大腸主豬漏

腸主轉筋漏原因氣血滯滯染膿而動含毒之毒而各其因治

一也在痔則有穿腸穿者陰者又有無痔肛門左右別生竅

出膿血名為草漏瘻在皮膚者易愈藏腑者難治

如漏症初起淡紅微腫不核宜涼血清熱濕用加味槐角丸

明如精白外如黑... 宜收發殺虫濕而用前...

○加味槐角丸 槐角 生地 酪二 葛膠 川芎 枳 五 當歸 黃

芩 黃芪 黃連 藜朮 防手 只完 地榆 升麻

連喬略一白芷極 共為末蜜丸或酒糊丸梧子大每五十漸

至七八十溫酒送下

又有初起因風冷者久則虛而按濕熱者丹溪用參朮黃芪芍藥

為君佐以蠟皮蛇退 牛角腮蜂房之類服之外用津唾調耐子

未作餅如錢厚放庵 上漏大沖大艾漏小片小艾發令微熱不

可令痛乾則易新餅 再灸如倦暫止次日又灸宜至肉平為度

外用雲母膏貼之畏 灸者內生肌丸最妙凡燥燥之味...

祖傳治濕症 用人言 明凡而乳香 沒藥 朱砂...

含石 兩以知先將 人言為末入沙鍋內火煨待烟起將明乳

百効全書卷之三 諸痔漏類 二一

蓋人言上有烟起 處以凡未填之漸以用凡未蓋為度候丸

乾白色待冷去上面 凡未取人言為末八前蓋其為細末將一

半麵糊作針一半綿 皮作條蘸麵糊拖去其乾用真綿纏凡

遇漏先將藥針入漏 內漏深八深漏淺八法符三日毒盡却用

帛條八痛處漏深八 深漏淺八淺日漸抽出其帛條即生肉

凡遇穿腸痔漏用好細 絲線八蝦蛇含石醋內煮過要從裏秋月

內收取蜘蛛漏過網 絲一相共合絲線穿入漏孔內其法先將

野灯心草破開些穿 入透出却將藥線入于野灯心破開處透

出如無野灯心草將 嫩布線而掛繫銀絲上穿入却將長線入

糞門內接出去銀線 却將絲線八一根于布線內抽過絲線再

將原絲線頭八第一 根布線內抽過絲線來却不是來去兩轉

收緊結一莖待明日 解開莖又收緊莖仍縛一莖莫令寬日日

如此線落後以生肌 台口

○煮線法 羌活根大戟根金項玉梅花五... 龍鵝糞共八水內

煮汁去滓將後微 煎線入汁內煮一二沸取線風乾聽用

如痔漏不脫綿者用 百草霜草烏尖絡一為末并花水調筆點膠

如脫線不生肉用 枯凡五倍子為末搽之即生

如穿線不收口用 參附皮為極細末生肌甚快涼藥煮過苦甘石

次之如痔漏痛不 可忍用黃連黃柏蘇金珠砂水片乳香沒藥白

芷等分為末水調 作錠子陰干挿入孔中

如痔漏血不止用 陳棕葉葉根定絡砂灰歸尾炒斷甲或蜂房猪

主懸蹄蟻黃柏槐 角共為末米糊為丸梧子大每米湯下

如原有痔漏肛門 別生三塊作膿就在痔孔出者乃食積注下也

宜連魏散

○連魏散 黃連 烏龍 山查 神曲 桃仁 槐角 連翹

皂角等分為末以 少許置掌上時七詆之津吞下

百効全書卷之三 諸痔漏類 二二

子尊治一人肛門 外陡生一毒其勢如核久而破出膿其臭遂將

指肉湯鴨毛刷洗 以貝母末搽即安後復成一孔出水子以為

漏用白雷丸如 補皮硝將公猪大腸一頭線扎將皮硝藥入

一層雷丸藥八一 層如此藥凡層而頭蘇扎將皮硝藥火焙乾

用如吃下取出 雷丸同石乳香五真沒藥五苦楝粉醋刺蠟皮

一焙切共為細末 酒調服

龔 團製透漏丹 治漏如神

藥牙末 黃蜂窠 姜萎 蠟去 虫退 懸 廣木香 出乳香

沒藥 血竭 絡石 右八 味為末次用黃蠟八兩 銅銼化熬白色

離火八前藥末 搗勻 成汁傾入水中取起為丸此一料藥分作

百丸臨睡時服一 丸早晨空心一丸俱白湯下又服後方枯丸

再鹿角末 兩芝麻 兩蜜丸如倍子大溫酒下三十 塞瘻去瘻

角加米牙 兩黃蠟 為丸常服漸根

如虛兒傳如味蠟丸九 善治腸癰痔漏瘰癧等症日夜疼痛
水不乾用黃蠟一斤 白凡一兩 研末 雄黃 陀僧粉 一各
為末先將黃蠟入銅鑊內 鎔化再入蜂窠五錢 同鎔隨入四味
末末藥攪勻待冷為丸如梧 寔大每服二十或酒或白湯送下病
在上飯後服病在下空心服

癰癧疔毒之症屬肝腎經都 統而腫掀熱如小兒因啼叫怒氣積
聚或虫咬風吹治者每宜詳 因而施治之
腎囊初紅腫小便澀滯者用 正散主之
○八正散 車前 瞿麥 扁荷 滑石 山枝仁 犬黃 木
通 甘草

如全因入房囊腫大如斗許 小腹脹悶便澀發熱日乾痰壅命在
一友宜宜腎氣丸料加車前二牛膝煎吞滋腎丸後仍腫痛者宜
補陰托裏再候膿而針之
若膿成而便閉者熱毒壅滯也 以方括內托裏治毒散或又不愈
若熱毒未解也宜清肝益榮湯膿已成者用腦疔內活命散

○清肝益榮湯 當歸 川芎 白芍 柴胡 炒枝 炒車前
茯苓 木瓜 胆草 熟地
如膿潰皮脫幸九懸掛或內見筋一條不消除毒悉腐玉莖下而
貼膿者亦腐如半邊筆管只宜方括內托裏散加故芷黃連三
味克承或兼服補中益氣湯倍參芪歸木大補氣血脾胃外陰
白蠟骨蒸莖旬日可愈雖曾囊九府爛亦無妨以白脂膏貼
如腎囊下有五六孔出膿宜以當歸 川芎 白芍 熟地 生
地 白苓 巴戟 川續 肉桂 大附子 煨炮 煨磁 煨胎 煨

百効全書卷之三
癰癧疔毒類 二二

四益智仁 防風 金銀花 皂角炭或加升麻土茯苓并貼
用猪胰子油四兩或肉同炊空心酒下如孔爛出膿用欠寔肉
配青鹽生牛黃分射香麝 膠蒸肉為丸服外四化毒丹 七日
狀後以生風散搗之

陰囊玉莖癰爛甚者用防羊肉 白蔞荊白附子粉和為末以猪
腰一個用刀破開將末藥 酒濕昏包浸濕裹以有殺火烟熟空
心服下不効再服屢試有驗 陰囊氣瘡用蒼朮紫蘇煎水洗
囊癢抓破流水用黃連細茶 鳳凰衣為末木油調搽或蒼朮荊
皮荜荊厚朴杜林草三味煎湯洗
腎囊生瘡作癢或癢後流水作痛治宜用川椒蛇沐細茶槐柳條
茄根煎水燻洗七後用村硝 搽之

陰囊兩傍生瘡濕癢甚者用 杜研黃丹粉一粘凡二兩為末搽一
紫福楓即陽物紅紫癢不可 當用山椒枳殼莫及規音茶葉二
百効全書卷之三 癰癧疔毒類 二二

味注酒吃其澤用火土略 烘熟煎藥上冷了又煎熟煎上紅餅
子居南京見一人陽物上生 白芽一二根如菜豆芽脚樣其痛如
針刺難忍用艾置芽下貼 四處一灸即倒痛上全愈如神
小兒外腎腫大陽物透明用 左顧牡蠣三錢乾地龍一錢為
末津液調敷外腎即消腫 若難干清調敷痛處

小兒內怒氣積聚陰腫用桃 仁五枚牛蒡子炒去官桂 牡丹
皮 大黃粉三錢為末蜜丸 如莖豆大每用青木香葱白鹽少許
煎水送下五七丸 小兒 癰腫痛用蚯蚓糞草汁調塗
小兒外腎腫赤腫痛不日退 皮如赤亮愈而復作用老松皮燒灰
臘粉香油調搽
小兒坐地為風吹或虫咬而 腫外用蟬退銀煎水洗再溫再洗內
用米苓澤瀉茯苓白朮其 中肉心煎服
小兒陰伏生瘡用黃丹黃連 青黛等分以末泥餅煎肝油調搽

凡人小兒陰伏痛不可忍用金砂酒調服神功
小兒大人陰囊併玉莖紅腫大疼用 塩炒熟令病人坐定將藥
中洗紗流包明糞玉莖即消

凡陰頭玉莖腫痛生瘡乃腎衝三脉之屬腎脉屬陽任脉屬陰
衝脉屬厥陰夫陽賦主氣陰脉主血皆以氣血大熱有毒有蟲
故字此疾也玉莖紅腫痛爛流膿出汙日交不乾其草水煩洗
後用羊角燒灰存性為末每老酒調服三錢

玉莖挺長腫硬皮塌癢股難行兩脇走氣逆以柴胡人參黃芩黃
連黃柏煎服其腫漸收中右移未消以青皮為君少佐風藥
未服之外以絲瓜子五倍子末敷之
陰頭出膿莖下痛之痛用柴胡赤芍升麻米芩澤瀉木通車前遠
志山枝瞿麥牛夕生薑灯心酒煎空心服

玉莖腫痛出膿日難行步夜耐難痛先服蠶羅內八正散如故後
服導水丸加挑仁苦硝三五次腫消痛減即安
玉莖腫爛流水先將芭蕉艾葉白凡川椒煎水先燻後洗再用
海標二錢輕粉二分枯凡一分水片一厘共為末搽

或因熱毒陰頭結毒或脫衣磨破用蠟上節霜刮下一處即愈
或白螺螄一筒灌粉八內火通再入片三厘為末搽之如神
如由腎虛風濕相搏氣成之痿癢成瘡浸淫汁出狀如疥癬各
濕陰瘡宜黃柏磁石刮下末同蛤粉等分搽之

如因久噴房室思色動慾以致敗精流入莖內初發如粟赤腫貴
一爛作白瘡疥妨嗣名如精瘡先宜用地骨皮蛇床子煎水燻洗
洗後用黃連欵冬花等分為末津調敷
如因婦人子宮有敗精帶濁或月水未淨與之交合後又未洗男
子腎虛邪穢滯氣遂令陰莖連舉九腫痛小便如淋名陰蝕瘡

冷宜外用鳳凰衣煨黃連等分輕粉片臘炒為末乾搽或鴨子
清調敷內用婦尾赤芍生地防非黃連黃柏知母澤瀉小茴其
草煎服 如陰毛間生虫作痒者搽硫仁泥塗之

辛中痒出白津多因脾土軟弱不能運主金水以致肝經血虛火
燥宜用紫菀內補中益氣湯與清心蓮子飲同服
清心蓮子飲 黃芩 蓮前 茯苓 麥門冬 地骨皮 黃蘗
玉莖痛不可忍用石乳香一錢葱汁調搽

下疳瘻管因所欲不遂 交接不潔以致邪毒浸成瘻管七日
久不愈或成便毒或疔爛陽物多致危篤故俗云疔瘻瘻疔
周居白先生傳一方用細茶濃煎入搽少許洗七後用木通
如虛兒傳用杏仁五粒粉分水煎分水片其研細末干搽之
麻槓燒水洗七後用年久白螺螄一筒燒灰片研為末搽

應圓製治疔瘻神方內用防風 荆芥 連喬 獨活 黃連
百効全書卷之三 疔瘻方類 二六

黃芩 知母 黃柏 蒼朮 赤芍 木通 胆草 柴胡
甘草 灯心 蘇合 心服十餘貼外用文蛤二分半黃 水片香
粉珍珠仁輕粉分煎相和用汁煎分煎共研為細末干搽之
如男婦疔瘻旋用五倍子研細粉三分水片分搽未搽之
若女人先用五倍子研細粉小罐煨至糜爛置桶內令婦人以陰
門端坐于桶上上燻至水冷為度又將此藥水傾出煨換為末

祖傳治疔瘻極甚者內以真荆子晒乳香為末菜豆粉為丸每白
水送下紅赤一日二服外以地骨皮煎水燻洗
湯洗一日二次後以白螺螄壳研粉內金三筒乳香沒藥
象牙末絡一珍珠 龍骨粉一雄黃一黃連絡一其為末
燒燭燻一症腫爛如蠟燭瀉形初起若腫爛不消宜用地骨皮
收水燻洗或用松葉 樟葉烏藥葉楓葉桐葉俱取表煎水燻洗

外用温子片燒灰片齒灰各共為末攪或磨布燒灰攪患處
內服黃連解毒湯

一 牙痛 金銀花碎杏仁細末土茯苓仁牙皂子仁十精指

肉一俱分作四火貼煎服肉映皂子仁皆要吃下用上好

老薑厚水久浸消鹽不洗用乳香沒藥與黃 兒茶 血

蟬 輕粉 海標粉 白芷粉一水庄一海巴子一為末攪如

水不乾者用海標粉指甲扶落成粉米泔浸一宿火培乾每

一 八輕粉一分為極細末搗之

又方不開年深日久出汁流膿日夜疼痛不止或病去一边或病

去一截服之神効但用煙油一條去入熱酒內自跌成水服之

一日一次不過三服即乾水止痛任膿矣甚妙

婦陰瘡

婦人陰中生疾多因七情鬱火傷損肝經濕熱下注也

如陰次發出一條尺許如蛇痛墜出水必痛者鬚髮疽內補中益

氣湯晚服龍胆瀉肝湯外塗黃蘗膏

如陰中突出如菌如雞冠四圍腫痛者乃憂鬱脾虛下陷先以補

中益氣湯加山枝黃芩車前青皮以清肝火兼升脾氣漸愈更

以瘦瘻內歸皮湯加山梳茯苓川芎調理外亦塗聚蘗膏

陰中生細虫瘻不可忍食人膿腑即死令人發熱七與勞症相似

先以蛇床子煎湯洗後用梓樹皮焙乾為末人枯凡四分之一

射香少許敷之

又方治陰痒搗爛神效納人或雞用煮熱盛熱人陰中或用大黃

微炒黃芩黃芪多煎赤芍玄參丹參小茺黃蛇床子各五子為

末空心温酒調二代服

陰內或癢或痛用女蛤皮硝煎水燻一內服藥瀝內八正散次用

一 膏 歸川芍芍藥地黃荆芥荜薊煎服

陰門濕痒先用茄花根髮枯草煎水燻洗次日用雞子一隻炙牛

熱快在陰門上過一夜取出虫物復用茄花煎水洗効

陰部濕淹瘡用文蛤粉白凡銅青洛一輕粉行乳香紐為末搽

陰內腫痛二便時皆痛大便有血以芙蓉葉燒灰置桶內坐燻內

服朱芩澤瀉白朮茯苓黃連黃柏黃芩方手金銀花木通之類

陰內腫痛小便欲去不去或痒相兼用茄花湯加水通車前牛

枝子七八貼煎服

陰腫如石硬痛不可忍二便不利欲死者用枳殼陳皮略四炒全

香熱以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處緩止製之冷則又

換直至喉中竟起是氣則痛止腫消便利矣

如時常陰痛者用四物湯加稿本防牛

時發風用防風歸尾全蝎蕤荊倍下虫退姜或蒼朮黃連其草服

百効全書卷之三 婦陰瘡類 二七

五 六 助 每 二 貼 煎 洗

茄病內用酸車前配白馬骨茄根茄花絲一搗搗肉晒全收服

外用地茄根木通鹽參確收置桶中插一孔半燻待温洗三

婦人陰痒用草烏純爛 煎丸確盛入米醋煎熟將糖帶紅

婦人陰冷用吳萸入牛胆內令滿陰乾每取二十粒嚼碎中即

如陰燥臭甚用柴胡歸尾澤瀉木通胆草生地車前水煎服每食

煎之陰內生瘡或出蛆虫用黃芩川芎當歸黃連大黃川椒細辛

煎水燻洗婦人及接出血乃房室有傷肝肝虛不藏血宜瘻內

補中益氣煎煎服外用艾葉有人陰中或用亂髮青皮燒灰敷

之若出血過多見雜症者調補肝脾自愈

一 友丸 災患仍以為 獄法熨之若膿已成即用大針使毒不得

內漬常生用亦無妨 且痛又易斂口

乳傳用 奪命散 八 參 桂 木 香 一 當 歸 一 雄 黃 乳 香 沒 藥

一 益 母 草 一 珠 砂 一 松 柳 一 疎 木 撓 麵 糊 微 餅 中 夾 穿 眼 候

乾 香 灰 灰 為 衣 好 熱 酒 調 服 久 不 治 用 蜈 蚣 製 過 入 藥 內 同 煎

服 攻 之 或 用 黃 蠟 出 膿 出 膿 如 不 愈 用 昏 醋 王 紅 散 燧 灰 燧

煎 藥 雞 魚 潰 膿 深 針 出 膿 出 膿 如 不 愈 用 昏 醋 王 紅 散 燧 灰 燧

緩 疔 迺 寒 氣 伏 于 骨 髓 其 腫 與 皮 肉 相 似 疼 痛 堅 硬 如 石 二 者 初

起 便 宜 溫 熱 托 裏 補 虛 乃 隨 證 調 治

如 外 感 因 露 針 風 冷 寒 濕 襲 深 者 初 起 痛 不 能 轉 寒 熱 無 汗 盜 汗

寒 鬱 便 秘 者 漏 苦 飲 主 之

漏 苦 飲 子 黃 芩 白 蠟 麻 黃 枳 寔 升 麻 芍 藥 枳 殼

一 分 一 分 大 黃 一 分 一 分 三 分 煎 服

百 効 全 書 卷 之 三 附 骨 疔 類 三 九

如 不 敢 下 者 須 分 經 內 托 汗 散 但 在 况 警 者 用 警 疔 內 類 托 羌 活

湯 在 腿 內 近 膝 股 漫 腫 木 硬 者 內 托 羌 活 湯 在 腿 外 者 內 托 酒

煎 湯 在 左 腿 外 側 漫 腫 長 闊 行 步 作 痛 以 手 按 至 骨 大 痛 者 宜

腦 疔 內 黃 連 消 毒 散 通 用 鶴 膝 瘋 類 瘋 毒 散

內 托 羌 活 湯 黃 芩 柴 胡 當 歸 黃 連 羌 活 肉 桂

生 地 工 瓜 萎 黃 芩 半 木 牛 酒 煎 服

內 托 酒 煎 湯 黃 芩 柴 胡 當 歸 黃 連 肉 桂 升 麻

白 芷 大 力 兒 黃 柏 甘 草 半 水 牛 酒 煎

內 傷 厚 味 及 勞 役 與 酒 後 乘 涼 浴 水 邪 入 脾 樞 環 跳 穴 左 右 積 痰

疼 血 轉 成 宜 青 草 蒼 柏 湯 微 汗 服 此 下 愈 恐 疔 將 成 者 急 掘 地

坑 用 火 燒 紅 沃 以 小 便 令 患 者 赤 尿 坐 其 上 以 被 席 圍 抱 下 載

使 熱 氣 燻 蒸 膝 理 開 氣 血 暢 而 愈

內 傷 生 冷 飲 食 寒 涼 菜 物 丘 疑 于 肉 飲 食 加 常 宜 臍 疔 類 疔 命

如 食 少 淋 淫 者 用 大 頭 風 類 大 君 子 湯 加 當 歸 香 薷

如 因 勞 役 傷 食 宜 腿 偏 腫 者 用 吳 茱 內 一 兩 中 益 氣 湯

內 傷 鬱 怒 腫 痛 如 錐 赤 暈 散 漫 光 用 腦 疔 類 疔 命 飲 次 用 疔 癰 類

八 物 湯 加 柴 胡 杜 丹 皮 山 枝

內 傷 勞 瘁 而 腿 腫 痛 寒 熱 食 少 此 溫 痰 下 注 也 亦 宜 長 疽 類 補 中

益 氣 湯 加 牛 黃 菴 苓 芍 藥


兩 腿 膿 血 澹 甚 用 苦 參 皮 硝 豬 五 皮 水 洗 數 次 後 用 烟 猪 肉 油 擦

擦 極 効

腿 上 一 切 寒 熱 瘡 用 鴿 子 糞 煨 過 為 末 參 加 燥 痛 加 黃 丹 少 許

桐 油 調 敷

三 卷 三 十 終



新刊秘授外科百效全書卷之四

手足疔



手足疔 附肩疽

手足疔各手皆發此症傷肝胆小腸經患于手背及指間或如黃豆
天或如聚粟或如熱櫻拔之則線長三四寸要知不赤黑者其
狀黑者死凡人病手發如風熱血燥筋急者宜耳牽內加味
如因怒火而疾者川芎煎內柴胡清肝湯煎服

如丁者厚桂麻宜腎氣丸之類 忌寒涼降火之藥及艾炙等
症若犯之則輕者及劇重者大潰腫痛熱出血而死悔之晚
一氏治手背發 用痰核內十六味流氣飲煎膏生肌之藥

甲疽

甲疽之症乃毒氣攻于手足指肉上指甲疼痛出血瘡中有
更或因別甲傷肌或因甲長侵肌遂成腫痛

右症俱用綠凡五兩盤鉢極上以炭火烘之吹令火熾其凡即
溶流出黑汁者是頂候流汁盡去火待冷取為末色似黃丹取
之先以盪湯洗拭後用綠凡為君入射香少許敷之重者用綠
凡五錢蘆薈一錢射香一字為末以絹袋盛藥納所患指于袋
中線上記以疔為度

指 指頭先腫煖熱痛麻然以爪申邊結膜其者爪甲俱
冷宜先用芷醋煎湯洗拭後用烏梅核中仁為末米醋調

入治潰之自愈或用猪脂和蚯蚓搗爛敷之
覆肚了口治宜天南星五倍子白芨草烏大黃酒麴酒糟搗爛
交方初起用野茅查塊煨或酒糟牛查曲果四個紅豆炒
醋半盞其搗爛之

天蛇頭

蛇頭瘡生手指上或足指上瘡傍二塊開口腫痛是也治宜用
蜜一個蛋搗碎一宿如指頭大將人言雄黃粉五八子蛋內
後以患指入于其中浸一宿次早更以蜈蚣燒爛種病指一
次即消

如痛甚流血不止用雄黃蜈蚣全場為末搽瘡頭上却以麻油
吊上托之

文方 山砒霜醋煨或先將麻油煎雜蛋搗手指一夜次日
猪胆一個將雄黃末三錢人言末三錢射 分八指內將

住一日疼痛極甚一日後去毒胆即好
頭臭爛久不愈用杏霜為末麻油調搽
藥掌風癬 治用川烏草烏何首烏天花粉赤芍藥荆芥蒼朮
羊肉地丁各一兩艾葉四兩煎水燻洗

一方用杏仁去皮尖輕粉等分為末猪胆汁調搽患處炭火上
三三三次將麥粒大的艾在扣指蓋處灸三壯水遠不發
如多年不愈者先用磁鉢磨碎次以草麻子一兩枯凡二錢為末
桐油調搽火烘極熱再以肉三兩水銀五錢枯凡三錢搗爛
如泥每日擦手于餘下次以肥皂酒糟洗淨十次神效更灸
宮或內開一火斷根神效

又方黃蘗晒乾并麻子研火上燻之二炷香為度
手癩疥 癩如豆梅痒濕如豆疥爛如浸淫瘡之狀治宜以
神丸輕粉黃柏黃連為末麻油調搽

紅絲瘡

紅絲瘡乃因喜怒不常血氣逆行而生于手足間有黃肉其中紫黑色即有一條紅絲通血上而生若至心腹則使人昏倒不救或有生面三條紅絲者 治宜急以針橫截紅絲所到之處刺之令其出血以管菜貼或嚼蒜葉敷之立愈

手足腫毒 治宜芙蓉葉青烏絲三天南星五香大黃七怕猪酒三箇及頭酒糟調醋調敷上

雞心瘋 手足不能屈伸不能拿物者走地也宜乾姜肉桂各三

五加皮海桐皮各一川烏麩麩八牡丹皮用芍赤芍各五右為

細末每缸水一盞將占錢一文八滴油為膏貼入此錢同煎如

婦人病此症用艾火在陰戶尖處 離一分灸一丸即好

下勒瘋 是近手旁紅腫痛不能屈伸有似牛勒樣

治宜用四五枚布針罽藥老虎藥針之即安若滑而膿出仍服

辛効全書卷之四 狐臭方類

十宜散之類外燻沈化毒生肌

厥隻 是症受寒痰所積脾下核腫如雞子大

治宜防羊當歸入參小蘇土烏藥大茯苓肉木香川芎枳梗枳

壳枳草乳香沒藥白芷羌活白芍蘇葉薄荷服如行潮加連

荷無潮加官桂或用腦疽肉于金托裏散洗妙

狐臭 耳內多濕治宜密佈借紅欄粉白凡紅辰砂硫磺

青白附子各一其為細末用皂刺煎液汁調末搽兩腋下夜靜

時先用皂刺煎水洗淨然後搽藥至一七又將大甘草一兩煎

濃汁服之外用耳遂末細猪油調搽腋下日夜按出鼻內臭

物再將枯凡一兩蛤粉行神腦紅為末搽之少許末去病根

一方黑鉛二錢溶化八水銀二錢搗勻白凡淋鏡銅青紅共為末

先將黃荆子洗患處後搽七次又一方用他僧一兩射香牛分

粘丸一錢輕粉一分細末五分共為末用口涎塗擦三日一

天方每次用嫩黃荆表七個擦上後以小便洗七後用嫩松枝搗爛投腋下每日換以小便頻洗至一七日又用田螺殼一個米泔洗去泥水方入射八厘朋砂一分人言三厘于內用碗盛之坐晚放在屋上連露三四晚用螺螄水手蘸搽四五日即効

脚背癢



辛効全書卷之四

脚背癢類

膝癢



鶴膝癩

鶴膝癩乃足三陰虧損風邪乘之以致內排炒食肌瘦肢體疼痛久則膝愈大而腿愈細有如鶴之膝然

初起宜用葱熨法以消滄之寒熱者五積散加散加烏藥姜黃

如已潰者法活寄生丸膠筋肌肉不生者用慈惠八物湯

膝癩單方 用左纏藤三十餘斤銅內煮成膏以酒調開入

應真製治腫毒神方
 用黃蠟兩兩開化入黃丹一錢粉攪勻
 作隔指膏貼片紫乳三日一換每先以鹽茶洗之如貼膏
 白將愈則以黃丹粉為極細末一搗即乾水結益神效
 又腫瘡作痛者宜用諸般神膏類金華膏或四應膏神效
 瘡作痛者宜用五油隔指膏
 頭腫久不收日或爛痛具搽法當貼隔指白正膏內照蠟丸丸之
 類且翹足揣坐勿多行復庶可全

裙襖瘡
 裙襖瘡生于脚脛或因打撲而成其瘡口狹皮肉極潤皮薄如
 竹膜極痒痛終日黃水淋漓憂而生甚者數十年不愈又易染火
 患者宜忌房室則易愈初起用地內久浸過茶葉貼敷數次不效
 可用黃蠟二錢麻油一兩半火熬後入飛過黃丹二兩細火熬
 成膏隨瘡口大小搽膏如銅錢厚貼之或用四應膏亦效

百効全書卷之四 諸脚瘡類
 婦人裙襖瘡用紅花子枯凡五倍共為末搗
 向前瘡 治宜黃連五錢牡蝨入水煎為末并水調敷或用松香黃
 蠟溶化為膏貼以絹巾繫其瘡茶洗一日一換七日全愈
 脚肚上瘡 初如粟粒大抓搔不已成片黃水流出不忍忍先
 用黃泥煎湯淋洗後用百藥煎為末津唾調敷自外而入
 脚邊腫痛作痒抓破流血或封撲成瘡宜猪尿火煎栲樹結五
 片腦分花椒龍骨等藥有膿水加乾粉如濕則搽乾則麻油類

脚眼瘡
 脚眼瘡症起皆脈發源腎經過脈內因飲食起居虧損足三陰所
 致或被火死所咬而成也
 是症慢腫少食者且難疽類補中益氣湯咳嗽吐痰者宜疥癩
 類八物湯加其桂或人味丸外治視病而施若久不愈即清毒
 藥瘡發 初起者宜用石蠟打爛搗或以用小田螺燒灰一兩水

黃一兩硫黃末五錢 輕粉三錢乳香各五五分將黃蠟三兩
 養化調前藥作隔指膏貼或以萬應膏久貼後生肌生肌
 服痰核內十六味流氣散加減煎服
 脚骨腫痛不可忍者 外用生薑葱白醋搗爛敷患處內以當歸
 川芎上烏藥木瓜極 即海桐皮蒸其獨活中杜若水威靈仙黃
 柏生姜蘇葉煎服
 螺螄因跌破成毒紅痛 照爛用細茶嚼爛併將沙麻川椒爛如
 此二次內白藤麻茶 白草霜煎水洗或麻油茶百草煎水搽
 蹠上走一孔約深半寸 至下半日疼痛與者此濕毒成漏也
 人中白或人中黃炙 出水滴入瘡口

脚發之症 生足掌或指 縫間色赤腫痛膜稠者為足三陰濕熱下
 注易活微腫脹清者 為足三陰虧損難治若黑暗不腫滿不潰
 百効全書卷之四 脚發類

脚發類
 脚發熱作癢小便淋瀝 濕者除取末傳惡症不治
 治宜海熱下注者先 用隔指法及曬煎類不命飲以解蘊毒
 一次用髮疽類補中益 氣湯加小茴故芷以補精氣如三陰虛者
 初起用方括內托裏 消毒散或托裏散加牛夕栲樹杜仲煎後
 用鶴膝風內大防妻 湯或戒癩類八物湯加其桂明靈心排者用
 常川芎白芍大黃 知母黃柏之類

脚背瘡
 是症又名脫疽其原因 一房室損傷脾腎或先病後發或先
 症者色赤作痛自潰 加先用隔指法內服隔指類活命飲或
 敗毒散加銀花白芷 黃如痛止用托裏散扶氣者用痰核內
 下六味流氣飲下虛 用八味丸或八物湯加其桂
 重者色黯不痛先用 隔蒜灸更服補藥國內則更肉不致上長
 庶可保生矣

又有外塗生肌膏藥內服結骨散房室則患處不潰不痛色
上延亦多致廢重者不用利刀解去其筋則筋骨由而毒得泄
艾甚在指則斬去其指在肉則割去其肉外治用桐油及無名
異煎一沸入花椒一勺看瘡大小剪花在内同煎浸一七後
以此藥貼瘡土即安

嵌甲

天候用之症多因亂家研損爪甲論入四邊腫放黃水流出浸淫
相染五指溫爛漸引上脚疾清渠四起如湯燄火燒日夜倍
增不能行動治宜以陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手
剪去肉中瓜甲外用蛇退一條煨灰雄黃四錢為末乾修乾者
香調敷與川直條赤治
甲生肉刺 是症手足甲忽狀長刺生肉刺如錐痛不可忍治宜
用塚菜多吃自愈

百効全書卷之四

諸脚症類

九

脚打成泡 治宜以井水調生麪粉貼過夜即于不可穿破或用
水浸過新松樹嫩皮貼

脚指牙疼爛濕 治宜以枯凡三錢黃丹五分為末搽之或鷄掌
黃皮燒灰搽之。一入病梅後脚指了生瘡濕爛臭穢子用
象皮浸毒枯凡胆凡步 黃丹為末搽數次而愈

經搨痒成瘡血出不止 治宜以多年糞桶篋煨灰敷之
指上及指縫中沙瘡爛者 治宜先以益茶洗七後用燕窩泥厚
炒和黃柏為末香油調敷痛者加乳香

脚上松皮爛方 治宜用黃柏黃芩黃丹各一 大黃四兩羊乳
石南藤腦茄凡松香水粉雄黃各四錢木油搽油調敷

脚瘡似松皮爛痒出水用桐葉水煮將葉葉脚葉乾又換
脚瘡似松皮爛痒痛不痒流水不乾用山上經過久霜露牛糞
灰麻油調搽

脚上即時自落
脚汗 用白凡子葛煎湯頻洗

脚瘡作痛 治宜以乳香沒藥松脂二錢茶瓦片研碎水銀
共為末用蜡同清油少許溶化調搽如瘡口大紅痛先宜用
一臭桐枝水洗後擺前藥

脚生瘡甚者 治宜用蜈蚣油一斤以川黃連配同放酒空心
服外貼五油膏或先以楊帶龜金良花嫩楓葉苦參煎水洗後
用黃連二錢黃柏和黃丹大黃蟾蜍蛤粉米片分共為末搽

脚上瘋癩癬毒 治宜以防羊 當歸 白芷 黃芪 独活
一茶朮 牛夕 防已 川烏 草烏 蜂核 木瓜 威靈仙
石南藤 五加皮 何首烏 一亩木香 生研大甘草 漢防己
脚瘡有孔出水 治宜用只母一錢白凡子雄黃各為末木油調塗或隔
每以苦茶先洗

遠年爛脚 治宜用老松樹皮燻牛皮燒鳳凰窠黃竹箬
硫黃蛇 脚烏桕根蛇床子雄黃各為末木油調塗或隔

脚因不礙破成瘡 治宜用青龍糞瓦煨乾為極細末桐油調
脚毒 是症人脚走長路破石子脚底墜腫不能行走痛不
治宜用舊草鞋浸尿桶內一夕或半日外用新磚燒紅將草
鞋放磚上以脚脚踏定火逼尿氣入裏即消如走長路脚腫痛
者用此方亦妙

遠行脚上打損用雜草燒錢和飯粘研成膏貼之用帛封上若
打泡用油線穿過而頭剪斷亦用錢錢粘貼之

遠行脚心腫痛用蚯蚓敷腫處高閣起脚一夕即愈
脚疔俗云雞眼男婦俱有之但用福州水浸蜈蚣末調搽
眼上即時自落

脚汗 用白凡子葛煎湯頻洗

脚上即時自落

脚汗 用白凡子葛煎湯頻洗

脚上即時自落

脚汗 用白凡子葛煎湯頻洗

脚上即時自落

脚汗 用白凡子葛煎湯頻洗

通身流注



治宜直毒行血用瓜蒌根酒煎入乳香沒藥五靈脂皂刺等分
以下其毒次用清心行血之劑如係蛇毒并足蜈蚣等毒妙藥黃
白芷次之或蠟凡九令酒入射香透下外用荆芥白芷川椒蘇
白煎湯入鹽俟湯溫白手臂上盪下一日三次其標通毒氣去
腫所至處宜緊繫之自手發者毒走至心自足發者毒走至臂
不救各有小紅筋尋其筋之住處灸三疔即瘻經云在指則截
在肉則割恐毒氣入心入腹令人煩燥喉噎昏悶或瘡由清水
橫汗者皆極虛也死人至速此瘡極虛引風癰疽開一十則一
百効全書卷之四

凡瘡氣血相搏有頭有面風邪內作無頭無面若癰無頭無面
裏開瘡低貼肌肉走注牽連生於手足或掌心或腰腿或臂不伸
縮之處初起身熱手足不遂增與頭痛虛渴多汗逆逆四肢
沉重較之諸瘡煩渴為甚或腫毒已平數月後復於他處大發但
作肉色微帶淡紅終不能收大要培養肉氣以防滑瀉如瘡出未
潰者必死 治與癰疽類推

癰毒之疾多內因飲食熱毒外感寒氣暑氣而成亦宜詳因
而施藥毒內消治宜以當歸尾 赤芍稍 白芷稍 防牛肉
石乳香 虎沒藥 川山甲 連面西 照那 藥在上

升麻或以黃柏一蠟五倍子其為未甜調敷

流注 流注者行也注者生也或結塊或漫腫皆因素有痰火或外感風寒
邪氣流行至其痰注之處而發或內傷鬱怒以致痰火聚於內傷
房室陰陽陽氣逆於肉理而成或內傷勞役飲食不節動而流
或跌撲閃挫不時逆血凝而成或產後惡露水盡後破感傷凝注
多生四肢或胸腹腰背閉節之處

初起宜用慈散法寒者用痰核內十六味流氣飲虛者大頭風
內六君子湯加芎歸或養血內補中益氣湯加木香 枳殼選用
令其自消自消若久不愈者論有表邪只托裏為主以飛龍
內八味丸入物湯加芪桂或腦痛類托裏益氣湯更 佐以豆
餅散散寒和補技湯 膿成以火針破之內有膿管 以赤
應圍製治流注初起者但毒在土以升麻為主毒在下 以羌活生
百効全書卷之四

是症癰疽地面多有之先作點而後露肉四畔若牛痘 黑硬小者
如粟如豆劇者如切如李發無定處或臂或背或口齒 或肚脘多
見手足指間赤黑毒白色變不常根深八肌走醫遊 毒血流注
貫串筋絡爛肉見骨出血極多令人痛狂言痛八手 心即死矣
出於外腎亦死原因感惡風入於脉理或烟瘴地面 傷寒瘴後
及感觸蛇毒所致二十已後四十以前皆積傷之毒八 胃壅聚而
成四十以後六十以前乃血閉不運積積而得之

如癰毒生于脚腿肚上俱有者宜荆芥牛夕 蒼朮 川羌活
川厚朴 枳白芷 尖換柳 官桂 蒼朮 枳殼 陳香
一 硬 南木香 大甘草 酒煎服七八貼而愈

如暑日男婦小兒活頭生癩 治宜用香茹 扁豆 白芷

厚朴 黃連 羌活 防非 連翹煎服 貼或外用

如癩毒痛腫不用刀針 只以新搗生的卵壳燒灰存性

如癩毒膿欲出不出 宜以敷益柴根老鴉蘭二味放水煙口

出膿 如癩毒膿不干 宜用雞萊打爛同蜂窩調四散敷

如癩毒外治總方 用芙蓉葉白馬尿白芷山批細葉松木皮

用陳早古谷存性為極細末 有水乾搗無水麻油調搽

過五六次即愈

一方 用鯢魚牙齒燒灰 蒜油調搽或獨子肥皂去子

二方 用節過石灰 赤赤與枯凡及糯米飯搗爛搽上

如多年不愈者 用猪頭上毛 猪頸上毛 各一握 唾存性 鼠尿一粒

輕粉少許 共為末 兩調敷

百効全書卷之四 癩毒方類

癩瘋 即癩瘋 又名大麻瘋 是亦受天地間毒氣 酷烈暴悍 最為可畏

因風毒或汗山 毒衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

染衣入水或酒後當風 二因濕毒或生計濕地或冒雨

戒一半只服後藥

防羊肉 荆芥 淨連翹 白炭菴 金銀花 海桐皮

白鮮皮 何首烏 百病藤 夏荆子 威靈仙 皂角刺

石首蒲 上牛久 宜木瓜 慈以仁 大楓子 川續斷

上苦參 胡麻仁 當歸尾 白芷稍 川黃連 赤芍稍

川獨活 比柴胡 人甘草 湯加天花粉 其草少下余均合

不記貼敷 每黍醇酒同放 多服切忌 鹽併各毒物 若有瘡口用

茶布荷葉同為末 塗上自愈

如虛兒傳治 厲風症 肩毛脫落 鼻裂 倒場 遍身生癩者 宜

聖化丹 防手 荆芥 羌活 獨活 胡麻 金毛狗 祛

苦參 祛牙 皂角 當歸 羌活 獨活 胡麻 金毛狗 祛

何首烏 祛牙 皂角 當歸 羌活 獨活 胡麻 金毛狗 祛

祛癩如泥 同藥和 可將陳米飯打粉 為丸 如棉塞大 每服四

百効全書卷之四 癩瘋方類

至五十九 如病人 身上骨腫 有上痒 不止 或是風氣 按時手足

拘牽 先服此藥 一料 將青茶 送下 口進 四服 或婦人 齒脫 麻痺

手若刺痛 腿膝生瘡 先服奪命 一料 後服此 聖化丹 照藥後十

日 再鋒 面上 放血 次干 脾上 放血 後干 腿脚上 放血 而過 天氣

清明 五六日 放一次 量病 輕重 不可 亂放 血若 婦人多 破血 癩

祖傳 用大 別子 炒泡 草烏 少老 公蟻 炒川 烏池 細草 青木 香 夫

黃肉 桂略 一當 蒲酒 研雄 黃紅 蜈蚣 一條 以青 竹筒 一 條 共

為細末 酒打 糊為 丸 如桐 定大 每服 五十九 白湯 送下

王氏 傳用 川芎 王地 當歸 赤芍 白芷 羌活 姜黃

羌活 獨活 天麻 黃柏 烏藥 荆芥 防手 羌黃

胡麻子 炒威 天麻 川山 甲 石首 蒲 金銀 花 五靈 脂 烙

錢川 烏 威 天麻 川山 甲 石首 蒲 金銀 花 五靈 脂 烙

絡一 白花 蛇 酒 錢 川 烏 威 天麻 川山 甲 石首 蒲 金銀 花 五靈 脂 烙

吳氏換肌散 治癩瘋 年深不愈以致眉髮脫落鼻梁崩損重者
 方可服之 烏梢蛇 鱧白蛇 鱧地龍 略一天麻 細辛 白芷
 芒刺 當歸 苦參 其菊 荆芥 威靈仙 川椒
 朱賊 紫參 沙參 甘草 川芎 赤芍藥 胡麻 石炭
 木通 天門冬 蒼朮 木別 定風草 何首烏 紫苑 茯苓
 石菖蒲 草烏 各一兩 其各製過為末 每以五錢 溫酒調服

楊梅瘡之症 由肝腎脾 內風濕熱之毒 間有天行濕毒傳染 但形
 如楊梅 嫩紅濕爛 痒痛 屬心火多生 乳筋形如刺 釘黃豆者 屬脾多
 生 筋面 謂之大風豆形 如綿花 屬肺多生 毛髮形如紫葡萄 按之
 緊痛者 屬用腎多生 脈管及筋骨之處 如發髮 髮額 日鼻 鼻道
 邊者 屬陽明及少陽太陽 陽如發于足脛 陰莖 脇肋者 屬肝腎經 癩
 陰 大抵上先見者 氣分受病 上先見者 血分受病 下先
 百效全書卷之四 楊梅瘡類 十五

必多上下俱見者 氣血俱病 初起即服方括內 防風通聖散一
 貼 去麻黃用硝黃以去內毒 待胃氣稍定 再以一貼 去硝黃用
 麻黃發汗 以去外毒 已後用慈以仁 歸尾 小荷 牙皂
 制芥 銀花 木通 牛夕 蘇皮 羌活 獨活 木瓜
 防丰 甘草 各五分 上茯苓 分作六大貼 酒水全煎 服外用
 輕粉 三錢 內油 煎久收 置銀珠 一錢 油 煎久收 置銀珠 一錢
 內煨至黃色 胆九 分杏仁 二十箇 去皮 火昏 搗去油 其為末
 或麻油 或猪油 煎擦 用

應製治梅瘡神效 用 紅花 防風 天花粉 金銀花 每貼土茯苓
 四兩 全煎 空心 服外用 杏仁 牛夏 各一錢 輕粉 仁 為末 諸胆
 汗 調擦 如生在 玉莖 上爛 而痛者 仍先服 下葉 二貼 後服 川草
 蘇 三金 銀花 錢 山慈 姑 紅花 紫草 各一錢 烏梅 四箇 共分 煎
 四貼 每貼 用灯心 全煎 服外用 杏仁 去殼 龍牙 即龍牙 即龍牙

粉一水 庄 其為 未濕 則攪乾 則用 猪脚 上火 筒骨 髓 調
 如瘡似 靴釘 及掩蓋 厚者 用人言 錢 為末 以小紅 束去 核 搗
 包入 言八 炭火 內 煨 過 為末 借胆 調擦
 如虛 兒傳 木火 丹 牙 倘 青 凡 白 凡 准 鹽 歸 一 水 銀 五 錢
 硃砂 研 砂 硃 各 一 米 片 舂 共 研 加 泥 不 見 水 銀 星 為 度 用 硃 舖 沙
 膏 一 筒 燒 紅 八 前 葉 溶 化 起 泡 望 開 待 冷 用 粗 大 碗 一 筒 將 砂
 膏 覆 于 碗 內 以 火 帚 作 條 塞 四 圍 用 瓦 打 破 取 三 角 曰 圓 掛 佈
 周 密 以 炭 火 四 圍 堆 過 砂 鍋 又 用 脚 盆 注 水 將 大 碗 置 盆 內 水
 淺 大 碗 半 寸 許 即 發 火 扇 紅 俟 盆 內 水 熱 住 火 候 砂 膏 冷 取 起
 砂 膏 起 大 碗 上 丹 砂 收 貯 每 用 三 分 搗 飯 為 丸 七 粒 每 日 一 九
 姜 湯 送 下 外 仍 用 此 藥 濃 細 茶 調 擦 治 梅 瘡 神 效

如梅瘡爛成窟者 用兒茶 小兒骨 芙蓉葉 各五 赤石脂 三 分
 硃砂 分 輕 粉 乳香 沒藥 各 二 蜈蚣 搗 碎 共 為 細 末 但 每
 百效全書卷之四 梅瘡類 十六

先宜苦參 荆芥 花椒 煎水洗
 如生梅瘡 服藥 百餘劑 還有 二三枚 不愈者 用 好膏 菜 一 兩 搗 碎
 入 銅 青 胆 凡 兒 茶 朱 砂 各 一 錢 為 細 末 搗 勻 抹 厚 皮 搗 貼 之
 如病梅瘡 膿上 衣 苓 大 便 緊閉者 用 川椒 貴公 猪大腸 內線 扎 兩
 頭 收 熟 去 椒 服 湯 腸
 如梅瘡 經絡 作 筋 骨 疼 痛 用 川 芎 當歸 熟黃 白芷 木通
 牛膝 各 一 白 木 銀 皂 角 厚 桂 拱 柳 各 五 土 茯 苓 全 煎
 上午 服 三 碗 下午 服 三 碗 服 至 二 十 日 自 愈
 但瘡愈時 若 體 厚 是 者 用 防 風 通 聖 散 加 減 調 理 若 體 薄 虛 者 用

當歸 白芷 肉桂 木通 荆芥 蘇皮 乾姜 蒼朮 各 八 川 芎
 厚朴 牛膝 麻黃 皂角 仁 歸 五 粉 草 銀 姜 煎 分 作 數 貼
 服 以 此 調 理 斷 根

楊毒

楊梅毒症乃因失治入則風毒深八經絡或決人而成頑癬或無血虛敗而成癩或誤服燥粉水誤不遵藥戒而成風腫腫爛流膿出汁謂之癰瘡至於此亦有銀傷眼鼻腐爛玉莖與無異也

山傳楊毒結毒用 當歸 牛膝 正北龍骨 骨節 地黃 牙皂 防手 荆芥 醋 一金銀 比二兩 沉香 燒七 土茯苓 右切片分作十八貼服三貼又服後遠服九貼服二貼開三日每貼用水四碗煎二碗分作四處服之但先宜花柳茶苦參煎水洗之藥完全愈妙不可

如虛兄傳五寶散 治梅毒如神 用珍珠琥珀水片 西鍾乳粉 一匙朱砂 先將土茯苓 碎成極細汁及炒過飛起一匙 再放調前未藥 疔瘡在下空 疔瘡在上飯後服外用五倍皮 確煎水洗七後換解毒生肌之藥貼太乙膏

百効全書卷之四 楊毒類 十七

應圓製治梅毒風濕筋骨疼痛遠年不愈用冷飯團仁白蘇皮 防風 荆芥 五加皮 威靈仙 木瓜 白芷 當歸 川芎 白芍 生地 地骨皮 好風麻 牛夕 甘草 黃連 白茯苓 槐花 砂路 杜仲 細辛 皂角 仁白 奉牛 十分作十貼每以水一鍾酒半鍾煎至半樣痛在上飯上服在下食前服每日一服如初服三五貼其癰腫疔瘡是托出其毒輕者十貼重者二十貼仍以藥渣煎水洗面洗切忌房事生於亥時破黃氏傳楊毒癰瘡頭胸爛成大孔用青魚一尾五月五日午時破去腹尿將茶葉草子放滿腹外以水數升同入鍋煮熟去皮食之連服三五次即愈

妙皇傳拈痛散 治毒年近日生過棉花楊梅毒等瘡結毒五年十年爛見骨者起泡成痂行步艱難用 防手 荆芥 連翹 皂角 麻黃 生地 熟地 牙痛

新刊秘授外科百效全書 卷四

共傷細末用土茯苓二兩半每日服二貼服至七日見効

汪氏傳梅毒治方用白砒研水銀子老姜反偏老鴨肫時新山藥 研斷三味共研取汁先播爛 祖同水銀入汁內用瓦罐張道 鐵釘蓋蓋口用鐵線縛緊將泥 裝文武火昇以一炷香盡為 度后用原藥為丸白砒半分之 林七分辰砂三分雄黃四分百 草霜紅靈藥各藥共為末煉 為丸做成十四箇每服二丸 白易送下神効無比

應圓弟傳治遠年梅毒風症神方 生地黃 當歸 白芍 威靈仙 石南藤 山果 身枸杞 仙活 羌活 水通略 五劑芥 白芷 天麻 絡石 黃芪 胡麻仁 直木瓜 連翹 慧以仁 土牛夕 各一兩 全銀花 土五加皮 防風 醋一麻黃 白芍皮 小芳 并草 錢條 牙皂 每共為末 勿日用藥末五錢及土其 百効全書卷之四 楊毒類 十八

傷癬外用生白果肉杏仁食糖 搗爛別破癩癬或乳香沒藥 龍骨全蝎粉人言雄黃巴豆為末搽 如楊梅毒及誤服輕粉以致 癰瘡肉疼痛不能動履或壞肌 傷骨者宜仙遺根湯

○仙遺根湯 土茯苓二兩 木瓜 防風 木通 蒼以仁 白 瘡皮各五分 金銀花 六分 皂子 四分 共合一大劑煎服七半月 有効如氣虛者加參芪血虛者加芎歸熟地牛夕肺熱去土茯苓 加酒加意以仁金銀花

如病梅毒後腫塊成癰宜仙遺根湯

○仙遺根丸 茯苓一斤 防風 木通 蒼以仁 防已 白茯苓 金銀花 木槿皮 鮮皮 皂刺 五白芥子 四子 當歸 身為末蜜丸或浸酒服切忌生 陰 雞煎炒茶酒房室一用

王氏傳一掃光專治梅毒瘡風癩男婦疥癩神方

白硫一錢 硫黃一錢 俱碾為末 用生豬膏拌勻 將扇捲定 以油灯上燃着 取油調後 藥末輕粉一錢 水銀一錢 斑貓法 藜芦一錢 檳榔一錢 磨製 水銀白附一錢 如法搽上 即愈

天庖

天庖瘡疔內多白水按之不

如魚泡乃出風濕熱毒所致小

克亦多患之

治宜以防風通聖散加減服外以馬錢子白及青木香研水搽或

蚯蚓糞略炒為末香油調搽或白果搗爛搽神效

十九

新刻秘授外科百效全書卷之五

豫章儒醫葉君中應圖父輯

疔瘡

夫疔瘡者皆由臟腑積受熱毒和氣相搏於經絡之間以致血氣凝滯注於毛孔手足頭面各隨五臟部分而發也其形如粟米或痛或痒以致遍身麻木頭眩寒熱時生嘔逆甚則四肢沉重心驚眼花蓋疔腫初發熱突起如疔蓋故謂之疔七瘡含蓄毒氣突出寸許痛痒異常一日間害人甚速內經以曰疔發於右鼻赤疔發於舌根黃疔發於口唇黑疔發於耳前青疔發於耳下蓋取五色以應五臟各有所屬部位而已狀或肩或腰或足宛無定處如在肉而成此症其形有十三腫皆以形而各之耳一曰麻子疔始末極詳忌麻子油犯之多不救二曰石疔三曰雄疔四曰雞疔五曰火

疔瘡辨論

疔六曰爛疔七曰三十六疔八曰蛇眼疔九曰益膚疔十曰水洗疔十一曰刀鑿疔十二浮腫疔十三口牛狗疔惟三十六疔最為可畏其狀頭黑浮起形如黑豆四畔大赤色今日生一明日生二後日生三乃至十數尤為可治若滿三十六則不可治矣又有所謂紅絲疔魚疔之類其甚多其紅絲疔者或生手足間有紅線一條急宜用針刺斷不狀其絲入心必難治矣魚疔者狀如魚睛也 凡療疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘下令去惡血乃以藥敷之仍服蟾酥丸之類發汗諸疔各目雖多其治法畧同如身冷自汗嘔逆燥喘狂鳴妄語宜視者皆可治也 程傳飛龍奪命丹 治疔瘡發腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒 惡瘡服之便有頭不痛服之便痛已成者服之立愈此乃惡症 藥中至至危者服之立安一雄黃一錢朱砂一錢輕粉一錢血竭一錢乳香一錢沒藥一錢蟾酥一錢銅絲一錢胆一錢寒水石一錢射香五分

左勝五蜈蚣一條去頭尾

右為末先將蝸牛連殼研如泥和為丸如棗豆大如丸不就入酒打麩為丸之每服二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐于男左女右手心將藥裝在葱白內用無灰燒酒三四盃送下于避風處以衣蓋覆之約人行五里之久再用熱酒數盃以助藥力發熱大汗為度如重者無汗再進二丸汗出即効如疥癩走黃過心者并出冷汗者准治病人不能嚼葱蒜爛裹之瘡在下食前服瘡在上食後服忌冷水王瓜茄子油膩雞狗肉不可食一切外治輕者單蟾酥為末以白麵和黃丹搜作丸如黍米大用針挑破錢頭以一粒納入神効重者養金丹危篤者用撲疥錢子養金丹 明丸融溶化入金丹銀釵鏡之慢火熬令紫色先以針週迴挑破用津液調敷數度無令瘡乾其疔即潰而不潰入信一錢雄黃礬砂各五分貼之治一十三種瘡如神

百効全書卷之五

○提疔法 用雄黃朱砂 礬砂三青藍硫霜白疔者輕粉班備各研五蟾酥射香酪一草麻 其右為末用黃蠟溶化和丸搗寔大捻作錢子將針刺破疔頭放一箇于疔上又刺四邊令血出水粉膏貼之

凡暴死者多是疔毒急用灯焰遍身若有小瘡宜急灸之并服前飛龍奪命丹亦有服醒者如偏僻之處藥難運達惟灸有回生之功若專味利表散者危

多骨疽

夫多骨疽症由瘡久潰氣血不能營慮處久則腐爛骨脫出肉外治宜補脾胃壯元氣以疔瘡類八物湯加芪桂外以附子餅炙或葱熨法祛散寒邪補接氣則骨自脫瘡自斂若有氣虧損其骨漸腫在背或月潰膿出骨亦當用葱熨法若投以毒去則真氣益虛邪氣益甚其詳不有誤

翻花瘡

翻花瘡症因瘡將斂原氣虛弱肝火血燥生風翻一肉突如菌大小長短不一治宜內服疔瘡類八物湯倍參其竭尤出血乃肝不能藏脾不能約宜發痘類補中益氣湯加五味麥門冬有怒火者宜耳類八味逍遙散若用風藥速其亡也汗多必狀發瘡危哉外治宜紫芩一味為末清油調塗週日一易須候元氣漸復膿毒將盡塗之則肉自白八不狀雖入復出若候用針刀火炙其勢益甚或出血如注寒熱瘡疔等症急補脾胃為善若似蛇形長數寸者用雄黃禾敷之

蝸瘡

夫蝸瘡之症手足間相對如新葉莖庠痛折裂擦則黃汁淋漓有孔如蝸久而生虫

百効全書卷之五

治宜杏仁乳香酪三硫黃乾粉粉為末用麻油三錢入黃蠟五錢溶化八前末煎攪成膏去火毒磁器收用又方用燕窠取抱子處土為末乾摻每先用白芷大腹皮湯洗淨狀後敷藥

走皮風

夫走皮風症面忽爛紅而出水延至胸手俱生紅點如豆疹治宜先以老鼠屎根刮皮成酒服以消其紅如而上爛處只將生地黃汁搗毛刷上再內多服防風荆芥連翹蒺藜黃連玄參牛蒡子金銀花端尾赤芍白芷粉草

走皮瘡

夫走皮瘡瘡之症生滿頰頰如豆梅洋而多汗延蔓兩耳外疔濕爛 治宜先以桑寄生桑根皮各一握白芷黃連各少許煎湯以綿蘸洗候血出盡拭乾次用皂莢麻竹葉俱燒灰存性

黃柏黃連樟葉白芷各等分爲末麻油調搽忌醋

侵淫瘡

夫侵淫瘡初生甚小先痒後痛汗出侵淫濕爛肌肉延至遍身

且從口發出流散四肢首面從門肢發生然後入口者重

治宜每先以苦參大腹皮煎湯洗次用苦練根晒乾燒存性爲

末者清調敷濕則乾疹

月蝕瘡

夫月蝕瘡在兩口盛衰生耳鼻面間及下部諸竅宜枯九輕粉搽

白蛇瘡

是症有星尾殿似蛇形或前胸生至後背兒也

初起宜隔蒜於七寸上炙之仍用雄黃爲末酒調服之再以雄

黃爲末醋調敷或內服三黃丸外用蜈蚣燒灰麻油調搽

蛇皮瘡 治宜以松香二兩白桐子六箇搗爛搽甚妙

百効全書卷之五

侵淫瘡類

四

五疥

夫五疥者乾疥瘡疥皮枯屑起淫疥胃腫作痛久則水流如黑豆

汗砂疥如砂子細筒或痒或痛孤之有心嗽赤虫疥痒不知痛延

便易於傳染膿瘡疥疥瘡瘡膿色厚按痛皆由五臟結毒而發屬

足三陰者尤多但疥有遍身難分經絡必憑外症以斷虛實如癩

腫依痛便秘發熱者爲風毒濕熱如慢腫痛痒肺熱或時寒熱

體陰少食便順利者爲血虛風熱

治此五疥更宜分上下肥瘦如上身多兼風熱下身多兼風濕

肥人多風濕瘦人多血熱瘦弱虛損腎枯火炎縱有便秘發熱

作渴等症只宜滋陰降火器以秦瓦茶耳連喬之類決不可純

以風藥涼血傷胃而壞臟腑內服通風方括內散血疎風湯或

連歸湯氣虛合四君子湯血虛合四物湯風合消毒飲淫合平

胃散外治搽藥通用合掌

瘡瘡有便異散洗藥辨其相類

各等分煎湯加蛇床子椒通如道首

威靈仙 蔓京子 何首烏 荆芥 苦參 右各等分爲末

未每二錢食前酒調服日進三服忌食風物

洗疥藥 秦朮 皮硝 花椒 苦參 水煎洗

煙疥藥 艾葉 雄黃 人言抄 核桃壳爲末捲作筒燒烟吐之

一掃散 治各色疥瘡神効

大楓子肉錢枯几錢蒺藜 花椒 一倍子 雄黃 雄黃

青儿 水銀略一人言其爲細木水油調搽

便易散 風真治乾疥諸瘡甚神更不廢本以便製黃 花柳

香附 伴檳榔 兩蛇床 兩白九 共爲細末枝桃油或木

合掌散如虛傳治乾疥諸瘡黃泡坐板痔瘡俱効

樟腦 水銀 蛇床 白芷 花椒 白兒 大楓子 一子

百効全書卷之五 諸疥瘡類

五 共爲細末油核桃肉爲丸置手掌摩擦鼻嗅之

磨風膏 治瘡疥風癩諸濕痒瘡及婦人除蝨瘡火丹諸般惡瘡

神効 蛇床子 錢大楓子 杏仁 枯儿 樟腦 二川椒

輕粉 水銀 雄黃 硫磺 共爲末水油三同研爲丸

彈子大磁器收貯每用少許溫酒調搽

五癬 五癬之症乃血分熱燥以致風毒起於皮膚發則肌肉意疹或

或問或如苦梅走散風癬即乾癬搔之則有白屑濕癬如虫行搔

之則有汗出百癬全狀不知痒痒牛癬加牛頸上皮膚厚且堅馬癬

癬痒白點相連 治宜通風前方括內防牛通聖散去積毒加

神皂刺水煎服久年不愈休感若燕赤頭癬九休慮者不可安

用風藥有虫者間服前方括內蠟九丸白癬癬併梳癬宜貼

頭癬九 浮萍 茶木 蒼耳 一若赤牛 黃兒 紅浮附

口頭癬九 浮萍 茶木 蒼耳 一若赤牛 黃兒 紅浮附

口頭癬九 浮萍 茶木 蒼耳 一若赤牛 黃兒 紅浮附

口頭癬九 浮萍 茶木 蒼耳 一若赤牛 黃兒 紅浮附

口頭癬九 浮萍 茶木 蒼耳 一若赤牛 黃兒 紅浮附

平酒糊為丸白湯送下

立應湯 蔓京 防牛 荆芥 苦參 蒼耳 黃荆子

勞子 胡麻仁 甘枸杞 余良石 白芷梢 蒼朮 連

土扶苓 羌活 獨活 三兩 同煎早空心服

治乾癬 用生薑一兩 切片內夾鹽及鹽梅火帛包定燒灰為

末再入人言末仁擦甚效古方用復毒草烏格二錢班猫七枚

生為末津唾調搽

癬 用枯九黃連各五胡粉黃丹水銀銻二為末猪脂油配夾

研令水銀星散盡磁器收貯搽之或用必効散川木槿皮兩班

雄硫研細共合一處以井水一碗河水一碗浸晒三日露三夜

將藥水用鴨翎掃癬上百發百中

生癬 用牙硝胆凡白狀銅克銀花乳香及銀銅青為末生稠

油調搽或用烏梅剉破蘇雄密復入輕粉搽之古方用舊皮鞋

底燒灰存性人輕粉少許為末麻油調敷

馬癬 併疔頭用羊舌頭根將竹打定起漏漏加明九枚又搗以

好醋調勻將夏布兜擦用濕癬內必効散亦妙

棉花癬 用蠟陀僧末擦用水能膏燒烟煙道以桐葉煎湯洗之

我掌風癬 有虫吃開用黃丹輕粉各三錢猪腦頭燒油調搽之

通用洗藥 用紫蘇樟腦蒼耳浮萍煎湯洗之或用骨奴睡錢

如女手兩股間濕癬長四五寸時極痒一定極痛乃以利針

二痒時在癬上刺百餘下其血出盡盪湯洗之如此三四次方除

盪濕淫于內其血不可不針後服浮萍散出丹

浮萍散 治諸風疥癩癩瘡

浮萍 荆芥 川芎 赤芍 荆芥 蘇黃 甘草

石刺 刺葱白 二根豆豉 五六十酒煎至八分煎服此

兒諸瘡癬 宜用蛇床刺荊草無夷仁能牙草陳末黃名

分為末先用甜藤煎水煎水洗後用黃蠟煎南油調搽

瘰癧 治宜內用嚼魚散或金櫻丸外治三黃散

白癩癩 露蜂房仁將生坊藥滿諸孔服火燒存性去鹽後用

胆九天花粉神退各等分俱為細末均分用帛包三分將活

魚一對同酒煮熟無風處細為連刺飲酒後痒自上而下

金櫻丸 何首烏 胡麻仁 黃荊子 刺牛蒡子 酒炒白

荊刺 兩錢 耳子 兩錢 床子 兩錢 兒絲子 兩錢 肉從容 兩錢 牛夕 兩錢

子大每至七十九溫酒送下

三黃散 雄黃 硫黃 黃丹 天南星 各二錢 陀生 枯凡

百効全書卷之五 紫癩風類 七

諸瘡 治宜用官粉五錢硫黃三錢為末雞子清調搽服藥

血風瘡 瘡乃三陰經風熱毒火血燥所致瘡痒不常抓破成瘡

水淋瀝內疔腫熱益汗惡寒少食體倦所以不敢忌用風藥

治宜通用內服掃尾川芎淮生地赤芍浮萍等分或方括內活

血疎風湯其者紫雲風丸外治用簡易散大馬齒膏或五疥內

厚風膏

五加皮 何首烏 兩錢 黃荊子 兩錢 刺牛蒡子 兩錢 酒炒白

正歸身 羌活 獨活 細辛 防己 生地黃 白芷

黃連 赤芍 蟬退 防辛 荆芥 蒼朮 各一錢 為末蜜丸

下火溫酒水飲在下

瘰癧散 煨石膏 兩錢 黃荊子 兩錢 共為細末猪油調搽

馬齒莧 馬齒莧 黃柏 枯凡 皂莢 杏仁
輕粉 桐油 糯米油 帶上葱椒煎水洗

如因飲酒後過身發而風癩抓至出血又痛者用蟬退薄荷等分
為末每二錢水酒調服即愈

黃芩 黃連 黃芩 煇尾 甘草 柴枯子 外用槐
花煎濃水洗洗後用枳殼碎黃磨槽油搽或用枯九神曲川椒

極黃水銀各一錢為末香油調搽
加遍身四肢俱生黃泡癩有膿汁而痛者宜用防丰 白芷 木

瓜 七厘 阜刺 何首烏 風靈仙 金銀花 當歸身
甘草 連喬 黃芪 輕者八則重者一二十則外用硫黃一

錢 明凡 錢五分 牛枯羌活 土分 川椒 半錢 皂莢 枝
子 錢大黃 枝俱存性為末水油調搽或用簡具散俱妙

諸毒瘡痛不可忍宜用 白芷 當歸 乳香 沒藥 川山甲
金銀花 各等分為末每服一錢 薑湯送下

疥虫血風癩癢痛不可忍或有時痒而難當者用胡麻油白凡
牙硝 錢大楓子 兩蛇床子 兩硫黃 錢人言 錢為末 或 雄黃 錢共

遍身作痒 搽即出水作爛如癩先宜用蒼朮花柳各等 雄黃 錢共
為末 搽爛葉葉捲筒燻上 後內服防丰 黃芪 煇尾 干葛 苦參 兩

麻仁 何首烏 甘草 四五味
毒瘡水不乾者用黃丹 輕粉 代價 等分 搽或用猪胆調搽

瘡後遍身生瘡內宜用黃連 枝子 大黃 猪油 四兩 煎酒 服外 搽
凡入去燥 遍身生瘡者乃血虛也宜用當歸 猪油 生酒 十

餘斤 封固 火煨 一二 時候 油 溶化 退火 氣 每日 隨量 飲之
口 難治 部

湯火傷

凡遇湯火所傷先以鹽末和米醋調和瘡上以醋泥塗之
醋塗不絕暫救痛苦一面急指生地黄醋調敷瘡上直候痛止通

厚至數不妨慎勿以冷水冷物冷泥熨之使熱不能出爛人筋
又方 用陳壁土真豆粉粉麻油并水各半調敷或用舊杉木炭

桶板燒灰研并水以包頭由蓋患處以水刷上立効或用水銀
二分津制瓦用鮮猪油二兩取油去渣同水銀連攪勻放水

退冷人水斤半分輕粉乳香見茶硼砂各五分為末搽
李氏以清烟膏用雞子清磨京墨塗患處上用三層濕帛蓋則不

起泡冷如冰効
鋪細傳湯火神方用真鉛粉鴨蛋白調搽外用獨見肚下中
毛細七剪舖上即愈

子曾治一人因炒硝黃被火傷遍身外用陳杜黃金烏桕嫩反夏
草霜為細末攤麻油林內用煎毒湯煎服七日全愈

百鍊全書卷之五 湯火傷類 九
治之六 呪云 龍樹王如來 授吾行持 此方 壬癸 焚火 大法
龍王如來 吾是 北方 壬癸 亦收 斬天下 火星 辰千里 火星 神必

降急 七如 祥令 呪畢 即揮 真武 訣 呪之 即用 少許 水洗 雖火 燒
手足 成瘡 以 療 矣

杖瘡 杖瘡之症宜先破瘀止痛後宜定心補益如杖瘡乾毒攻腹內
恍惚煩悶吐者難治

一杖畢即愈童便和酒不可吃茶免血攻心外用熱豆腐鋪
在杖處其氣如茶其腐即紫復再易熱豆腐鋪之以紫肉散盡

紅淡為度或用蜜性僧濃研醋開麻油雞毛刷乾則又刷神効
或用菜豆 微炒 雞子 清調 制。或 水粉 一兩 赤石 脂水 銀

為末 麻油 調成 膏 拿 棉 條 縛 如 肉 陷 用 此 膏 填 滿 尤 妙
又法 打傷 皮 不 破 肉 損 者 用 薑 蒜 搗 爛 卷 之

杖瘡

內用只壳 木仁 大黃 歸尾 黃芩 枝子 枯梗
 枳 木通 車前 甘草 忌葷三四日 薄者去大黃若體
 薄者痞 寒熱 惡心 少食 宜歸尾 桃仁 赤芍 烏藥 香附 蘇木 肉
 桂 柴胡 羌活 水 煎氣 酌加 木香 心腹 脹痛 加 童便 心下 脹滿
 氣不通 暢加 香 宜 枳 榔
 如極甚者 外貼膏 藥 用 白 凡 一 兩 秋 冬 用 白 凡 一 兩 公 羊 油 半 斤
 水 一 盞 同 煎 取 油 與 蠟 成 膏 俟 暑 溫 入 片 腦 滿 腦 筋 五 財 二 列
 砂 一 水 銀 鈺 輕 粉 全 銀 箔 各 一 百 同 攪 勻 或 搽 或 貼 內 服 乳
 香 當 歸 白 木 白 芷 沒 藥 羌 活 甘 草
 為 未 酒 調 服 隨 以 熱 酒 盡 量 而 飲 虛 者 後 宜 補 氣 血 脾 胃
 雲 林 傳 退 血 止 痛 散 一 治 杖 後 腫 痛 瘀 血 不 散 氣 血 以 心 或 胃 寒
 壯 熱 歸 尾 赤 芍 生 地 白 芷 防 風 荆 芥 羌 活
 連 荷 黃 芩 黃 連 黃 柏 大 黃 枝 子 薄 荷 枳 壳 桔
 百 効 全 書 卷 之 五 女 科 論 類
 槓 知 母 石 羔 車 前 甘 草 水 煎 服
 劉 文 庵 傳 金 蒲 散 治 杖 打 極 重 痛 不 可 忍 昏 悶 欲 死 者
 白 蠟 生 乳 香 錢 沒 藥 紅 金 箔 銀 箔 右 為 末 每 一 錢 酒 煎
 林 待 即 傳 敷 杖 散 專 治 杖 打 重 傷 成 坑 日 久 不 愈 神 効
 用 太 桐 子 葉 取 茂 盛 者 不 拘 多 少 以 米 醋 煮 至 爛 熟 陰 乾 臨 時
 隨 大 小 剪 貼
 如 虛 兒 傳 補 氣 生 血 湯 治 杖 後 潰 爛 久 不 愈 者
 人 參 白 木 茯苓 當 歸 芍 藥 熟 黃 陳 皮 香 附
 貝 母 結 梗 甘 草 往 來 寒 熱 加 柴 胡 地 骨 皮 口 乾 加 五
 味 子 麥 門 冬 膿 清 加 黃 芪 膿 多 加 甲 子 肌 肉 遲 生 加 歸 身
 內 府 秘 傳 二 黃 膏 專 治 杖 打 成 坑 肉 皆 朽 腐 者 神 効
 黃 柏 枝 子 連 荷 黃 連 大 黃 苦 參 荆 芥 薄 荷
 牛 蒡 比 利 威 靈 仙 慶 京 子 右 為 散 各 時 分 將 精 熟

慢 入 藥 渣 黑 去 渣 不 用 將 仙 菸 定 後 人 將 碗 一 百 白 蟻 子
 溶 傾 入 磁 器 內 後 乘 熱 入 細 蕪 在 內 龍 骨 燻 血 竭 兒 茶
 輕 粉 乳 香 沒 藥 白 芷 大 黃 雄 黃 樟 腦 水 銀
 銀 珠 射 香 各 等 分 入 內 攪 勻 收 貯 取 用
 鬼 代 丹 乳 香 沒 藥 自 然 銅 鐵 搥 木 別 子 夫 克 無 名 畏
 地 骨 能 祛 壯 名 右 為 末 煉 蜜 丸 如 彈 子 大 每 服 一 九 溫 酒 下 任
 打 着 不 痛
 竹 杖 散 斲 方 用 白 塊 細 止 切 爛 滾 酒 淨 入 碗 內 服 之 打 着 不 痛
 折 傷
 大 打 跌 損 傷 者 此 血 氣 在 身 不 能 流 行 因 此 或 成 疔 疔 或 血 死 不
 通 者 或 昏 悶 不 醒 人 事 或 寒 熱 往 來 或 日 輕 夜 重 變 作 多 端 致 令
 血 氣 不 調 作 癩 疥 也 醫 者 不 需 原 因 發 後 藥 劑 好 者 多 矣 誠 可
 惜 之 高 時 當 下 貴 得 其 宜 或 受 傷 至 半 月 終 不 痊 者 死 血 已 固 不 能
 百 効 全 書 卷 之 五 折 傷 論 類
 通 水 道 既 表 後 再 不 可 復 表 但 有 仔 細 輕 重 吃 藥 必 藥 後 受 傷 處
 源 頭 青 腫 紅 色 者 此 血 活 將 愈 如 傷 重 復 藥 將 愈 月 餘 後 服
 十 金 不 查 散 浸 酒 服 盡 之 後 庶 得 全 愈 如 病 人 攻 更 牙 關 緊 急 將
 石 者 宜 煎 開 牙 關 將 返 魂 奪 命 丹 隨 用 正 藥 方 內 加 羌 活 防 風 手 刑
 芥 胡 黃 連 煎 既 已 人 藥 不 死 一 不 納 者 不 治 切 忌 當 風 處 及 地 下
 坐 卧 井 忌 一 切 冷 水 冷 茶 冷 酒 之 類 油 膩 毒 食 之 物 如 遇 傷 重 者
 先 令 人 解 開 病 人 衣 服 通 身 冷 酒 之 類 油 膩 毒 食 之 物 如 遇 傷 重 者
 不 看 有 脈 調 和 否 如 逆 脈 不 至 者 死 沉 細 者 生 山 根 浮 除 囊 肉 尚
 有 子 可 治 如 腎 子 在 小 腹 內 夫 即 將 莫 區 又 用 神 妙 佛 手 散 如 病
 及 口 內 入 藥 不 進 可 將 太 鰻 魚 煮 熟 取 腦 子 和 眼 睛 睛 下 藥 末 入
 藥 渣 醒 可 放 再 用 鳳 仙 子 匙 沉 首 水 吞 下 〇 從 助 食 胃 斷
 醫 治 用 桑 白 皮 取 絲 羅 密 却 煎 雜 藥 破 開 夫 食 取 膜 七 走 患 處 斷
 醫 治 藥 後 之 後 服 藥 可 愈 此 從 助 氣 管 斷 即 不 治 頂 門 氣

破者不可治 食飽受傷 三日不死者可治 頂門既破
 骨斷入者不治 腦後受傷者不治 若心前喉痛青色未變
 可歸心受傷可治 心前喉痛紅既變心乃心口受傷不治
 下胸乳受傷可治 婦人兩乳受傷不治 正受傷重自來
 者立死不治 小用受傷上重吐者不治 氣出不收眼閉不
 治 小腹受傷木傷壯者可治 卒小腹受傷犯胎不治 腎
 子受傷入小腹者立死不治 腎子受傷皮破者腎子未上小腹
 可治 如眼未直須藥何害 脈太面緩酒四至不治 口如魚
 口腥風不治 顛門出髓即死 兩眼有傷可治正心口青腫一
 七內即死 兩乳有傷宜當急救兩脚有傷可治夾脊斷者不治
 小腸有傷不分陰陽在 頂門有傷難治 兩臂有傷怕血
 五膝兩腿有傷須脫無事後必有損方具于後
 ○百效全書卷之五 專治跌撲打傷牙關緊閉心腹痛悶不醒人事
 將筋竿開灌入碗即愈
 銀絲草一兩 仙鶴草一兩 桑葉一兩 雞子一個 爛不期 不二味
 共研爛如泥 熱酒刺起布 濾過調小兒骨末 服即愈 神效後
 服被殺散 ○被殺散專治 跌撲打傷 遍身疼痛 不能幸止者 神
 三棱 兩枚 朮 兩枚 赤芍 兩枚 西香 兩枚 玄胡 兩枚 黃柏 兩枚 枳殼 兩枚
 青皮 兩枚 羌活 兩枚 防風 兩枚 大腹皮 兩枚 大黃 兩枚 芒硝 兩枚 黃連 三錢
 桔梗 二錢 荆芥 二錢 柴胡 二錢 陳皮 二錢 蘇合 二錢 牛黃 二錢 子馬
 再煎 凡用 右法製法 如等分 羌活 五片 葱白 五根 桑白皮 半水
 牛黃 便前 空心 挑服 十分 汗大 除此 葱白 只用 一根 如要 和
 用 大黃 泥 確有 痰用 牛黃 如孕 母受 傷除 三棱 莪朮 如血 出
 甚 亦除 之及 葱白 加常 吐滿 黃用 水煎 服偏 心受 傷者 加紅
 花 二分 煎 額門 受傷 三棱 葱白 加血 多就 用止 血金 絲丹
 如 手傷 斷用 手推 正用 心火 昏捲 定要 厚寔 停富 針刺 諸

皮押定進接骨回生丹再用小畏脚緊七孔定杉皮乃無毒
 不愈但攻下之藥多加乳香沒藥痛重加西香二錢赤芍
 胡素乳香沒藥或有咳乃肺氣旺加乾葛杏仁勿用牛夏
 貝母如重傷心痛加石菖蒲如原處痛今結痞痒加乾葛
 芍甘草桔梗防丰荆芥連齋每用原湯子煎帶熱服隨癢加
 ○通經活血止痛散 專治跌撲打傷敗血冲心胸緊痛者神效
 三棱 莪朮 赤芍 黃柏 黃連 青皮 紫蘇 野馬
 香附 北胡 乳香 初起不下此藥十分重者方下肉加
 紅花蘇木石菖蒲
 ○仙傳火龍行氣法 生薑醃食鹽醃麻油醃瑞香葉醃大黃醃
 頭酒糟醃京芥醃澤蘭醃生地醃牙硝醃其一處研爛以麻
 油炒熟帶熱敷上七八次冷了又炒熱頻七熨止自狀安愈
 後進千金不奪散及佛手散神效
 ○百效全書卷之五 折傷方類 十三
 ○千金不奪散 防丰 京芥 生地 勾藤 角回 木瓜
 芎勞 紫金皮 五加皮 白芷 枳殼 木香 羌活
 獨活 歸尾 天台烏 威灵仙 杜仲 芍藥 牛夕
 乳香 沒藥 菖蒲 五灵脂 石南藤 自狀銅人熱者
 加黃連赤芍為散各等分每用頭酒一埕用絹袋兜宜浸五
 七日取出隨量不拘時常熱服忌紅酒鹽鹹油膩等物如孕
 婦服除牛膝赤芍加歸身比艾服此藥七日見功不問諸虛
 百損遍身疼痛無不全効此方珍之
 ○神妙佛手散 專治筋骨斷折金鎗重傷將死者總用此藥本
 有奇功子孫宜珍室之
 鹿茸 當歸 從容 禹餘糧 鬼蘇子 熟地 白芍
 川芎 乾姜 琥珀 此艾 藥盆子 桑漂補 杜瀉
 白朮 紫石英 五味子 酸棗仁 右為散依法製法各

分姜三片蒸一枚煎換勿輕用

同春再造散一專治手足及筋骨斷折者神效無比

銅錢紅文爛木香錢一自狀銅射香分爲細末每服無

灰酒送下令病人先嚼丁香一粒乳香一粒方進此藥神

效傷在上食上服傷在下空心服如即日未安次日再服此

方如未斷折骨者慎勿輕用此方專能接骨別無奇妙

同生續命丹專治筋骨斷折損傷疼痛不止者神效

川烏兩草烏兩五艾脂木別子骨碎補威靈仙

金毛狗自然銅爛地龍去土烏藥青皮陳皮酥

同香酌乳香礞石紅外子末藥射香半分牽牛蠶馬餘

根醋研石爲末酒調服一錢神效後服再生活血止痛散

再生活血止痛散治症如前大黃錢柴胡當歸桃仁

仁紅花五天花粉川山甲甘草紫牛半酒煎空心帶

百効全書卷之五 折傷方類 十四

茲榮雙解散一專治打傷之後榮虛弱外受風寒內傷經絡

沒藥當歸白芷石連肉玄胡索川烏白狀銅

萬金不換乳香尋痛散專治遠年近日諸般傷損遍身疼痛

者辦乳香沒藥通血竭五南木香五沉香當歸川

芎白芷略甘草天粉木瓜肉桂略七抽活羌活

路去西香茴香路五草烏去蠟麻右爲細末每服四錢酒

同生再造散專治男婦跌打損傷遍身疼痛昏悶將危者辦

川芎當歸羌活抽活木瓜略一角回穿山甲

小商路五肉桂甘草路入川烏砂川烏錢虎骨錢五白然

銅五錢氣喘加沉香木香傷頭加肉桂前胡天麻肉桂從容夜

卧驚恐加雄胆亂語恍惚失主加人參砂金箔銀箔遠志

右各依製法于內未曾抄用半酒半童便煎服神効

傷骨碎接骨奇方用高麗白芷絡三草烏各生爲末酒

酒調服仁一覺身麻揣正斷骨端坐隨用糯米粥調壯研末塗

傷處或用活生雞打爛貼外用杉木皮夾定繩縛毋令移動即

服乳香沒藥白芍川芎當歸川椒各五白狀銅火煨過紅共爲

末用黃蠟二兩溶開入前末于內攪勻作丸如彈子大以好酒

煎開熱服隨痛處側卧少時數進幾次大效如覺破傷風腫宜

用南星防丰爲末溫酒調入姜汁一匙服仍用酒餅敷貼患處

金瘡

八騎馬跌打被所佩鎖匙傷破陰囊二丸脫落得筋膜懸繫未

斷痛苦無任諸醫措手或以線縫其囊外加敷貼生肌痛不三五

線爛而復脫矣子思常泊刀傷出血但敷壁錢而効蓋此亦

傷破之類也是以令人慢上托上多取壁錢敷貼其傷破之處日

漸安其囊如故

百効全書卷之五 金瘡方類 十五

應員製金鎗神方用女帶血勒馬片燒灰攪或松香白丸寺

分爲未攪或牛夏六子白蠟四錢爲未攪或生好石灰篩

過將韭菜汁作成清餅貼于曠壁土俟乾爲末攪或礮石灰

大黃切碎同炒七次以桃紅色爲度研末攪

金鎗丹周梅江傳住痛止血生血

嫩老鼠小多者韭菜根與老鼠一般多石槽搗爛入嫩石灰

未干內摻乾作餅爲度陰乾用時以刀刮藥末敷傷處立愈

金鎗迎刀散專治金鎗傷重出血不止者神効

白芍甘草水龍骨兩右爲末銅內文武火炒赤旋入大黃

未三兩鳳凰退而以焦爲度復用嫩葉葉葉取自狀汁調

前藥陰乾後入杉漆一兩血竭一兩片腦三分牛胆南星二兩

野羊五錢遇傷處搽上一字立愈

全書卷之五終

新刻秘授外科百效全書卷之六

豫草備醫藥居申應圖

破傷風

內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而治能為害也若夫破傷風症乃因事擊破皮肉柱上視為尋常不察風邪乘虛而容襲之漸而變為惡候又諸瘡久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或着艾炷灸其湯人之毒氣亦與破傷風邪無異其為症也皆能傳諸經絡燥煉毒氣是以寒熱間作甚則口噤日利身體強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀憫法當同傷寒處治因其有在表在裏半表半裏三者之不同故不詳汗下和三法也是故在表者汗之在裏者下之在半表半裏之間者宜和解之又不可過其法也

○如聖散 川烏 草烏 各三錢 蒼朮 細辛 川芎 白芷 一兩 煎服之 傷破風類 一

○防丰各藥共為末每服五七分酒調服忌油膩腥膻類如願狗咬加兩頭尖紅娘子各一錢○中風身麻木或走癱酒調下○風旋頭暈酒調下○頭風茶調下○偏頭風口噤水搗真○傷風熱茶調下出汗○風牙疳痛擦患處流涎○金瘡血不止乾疹之○惡瘡久不愈口噤水洗綿拭乾搽之○大咬蛇傷蝎螫口噤搽水洗之仍搽上○癰疽疔毒魚睛紅絲癰皆腦疽疔瘡時新汲水調塗帛封再用酒調服○湯火傷皮新汲水調雞翎刷上○杖瘡破血乾敷之○瘰癧口噤水洗搽之○乾濕疥癬香油調搽

以重便灌下二錢并進三服○癩狗咬破先噲將水洗淨用毒我乾貼藥更不再發無膿大有功效

○一字散 治破防風搗獨角弓反張 蜈蚣去毒 全蝎炒

○羌活防干湯 治破傷風初傳在表

當歸 川芎 白芍 防丰 羌活 稿本 細辛 地榆 甘草 熟石到一劑水煎服○若大便閉加大黃○熱者用杏仁去皮細研飛白麵各等分

○水調膏 治初破傷風熱紅腫風邪欲將傳諸經絡而未入深者用杏仁去皮細研飛白麵各等分

右和勻用新汲水調如膏付傷處腫消熱退

汪班 宜用密陀僧一兩 硫黃一錢 礞石二錢 川椒七個 共為細末將絹巾攤住候洗滌後即篩于上二七見效或用雄黃硫黃全蠍差重白附子密陀僧各五分射香二分右為不離生薑于

○患處搽之五日除根決効

去而臂刺字 宜用川山甲一片以糯米蒸如泥照依有字處搽帕包一夜次早不見

取誌神方 用雪白礬灰全前銀丹內常在坐砂窩處久熱七更蓋調借彼銀氣以去黑也二味各等分隨意膠用水調成劑候成砂窩樣上一個下一个如盒子樣中入雪白糯米救十粒上下蓋定其令走氣腰間再用原石灰及灰灰剩者封固放地下一過一宿取起壁開取出裡而糯米聽用臨時用布針拱破出血將製過糯米如糊樣點在疔上即時紅腫過一晚即去矣過三五日即合肉色

又方 用糯米心灯火燒成珠以針搽破疔入內即去或用巴豆油點疔上尤妙

夏暑心神益燥熱通滯瀆成瘡通身或出膿血赤爛如火

石宜南星 生夏 黃連 黃柏格一五告子 黃丹路

未乾慘如痒枯九雄黃常服黃連阿膠凡以清其心

汗浸漬成瘡痒痛不止 治宜黃芪 當歸 防丰 京芥

地骨皮 木通絡二白九疔 共為末每菜一兩水三碗煎五六

分濾去渣消熱林先患處拭乾避風少時立効輕者只用蠟

水和蛤粉敷之

癩瘡 因汗出見濕而生輕者狀如散粟前高煎湯洗之或

葉亦好重者挾汗浸漬匝七成瘡葉豆滑石磨五為末線藤

之摩破成瘡加黃柏葉各五錢片腦少許

冬月下虛身觸寒熱血溢生瘡頑滯不知痛痒 治宜內服升

和氣飲去大黃外用木香 檳榔 硫黃 吳萸 姜黃 射

香為末麻油調搽

凍瘡 是症先痒後痛狀後腫破出血黃水六止治宜用

百効全書卷之六 云班莊類 三

雄黃雞腦一按搗爛黃蠟各等分清油減半同于慢火上熬成

膏去渣塗之永不愈者亦効 又方附子為末麵調塗之或白

及不拘多少為末調敷

寒瘰手足折裂作痛 治宜清油五錢慢火熬沸入黃蠟一塊再

煎溶入鉛粉五倍子末各少許紫紫色為度先以熱水泡手足

火上烘乾後用藥敷以紙貼之其痛立止入水亦不落或桐油

膏塗之亦妙

又方 每遇寒凍之時將石榴子內取汁塗其耳面手足自狀潤

澤如女子齒取石榴子汁調粉搽面更加艷色

手足皸 治宜先以百沸湯泡洗皮軟乾狀後用燥油二兩黃

蠟一兩其漿勻敷之或用五倍子為末牛骨髓調磁罐收貯埋

地中七日取出填較中即愈或桐油調蜜使僧塗之九効

瘡瘡 是症因見生瘡中毒而痒而腫連眼微赤痒處搽之隨起

瘡症重者通身如豆如杏膿瘡作痛

治宜生薑取黃隨瘡大小遍敷之或臘茶為末麻油調搽或柳

葉煎湯洗之或磨鐵槽中泥塗之

竹木刺入肉不出 治宜霜梅陳煨肉佈乾研分搗爛搽或牛

根嚼爛塗之或頭垢或蟻蟻出搗爛敷如出後肉爛以象牙

針刺折在肉內瓜蒌搗爛敷一日換三次自出或用土內新南星

一個野芋三個雄磁石一錢同搗爛搽傷處自出神効

針灸致傷經絡出膿不止 治宜猪骨燒灰存性象牙珍珠血

各等分為末將蠟作一條將一頭蘸藥末入窩內剪斷外截

灸火瘡水出不止 治宜炒黃連一兩石乳五錢為末搗

火瘡瀉血 用舊貼過好膏藥燒灰敷 李先保

百効全書卷之六 被刺方類 四

南京金文斗秘授黑髮烏鬚益腎延年強色久戰奇方

黑豆五升揀去扁破用一大砂窩將烏骨老雞一隻母的煮湯

二大碗無灰老酒二大碗何首烏兩斤新用竹刀切碎陳者用

木槌打碎陳米兩早蓮草兩桑椹兩生地黄兩歸身兩故芷兩

俱為咬咀拌豆以酒湯為水砂窩大依一料砂窩小作二料用

文火煮豆以乾為度去菜存豆取出掠去潮氣以磁罐盛之空

心用淡鹽湯食豆一小合以其曾用雞湯煮過早晚宜慎于益

藏以防蜈蚣也食完再製但自此後永不再食雞肝服至半載髮

鬚從內黑出目明如少且又能磨戰極妙

應員製烏鬚神方 用麻油烟 鋸核桃補配射香一為末大小竹

一筒盛埋冬青樹下七日化成水將水搽髮上即黑

醫家兄傳烏鬚方 用五倍子打碎去灰用銅鍋炒成豆豉

黑髮將青皮一六片濃茶打濕先放地土將倍子包裏

餅要着火色莫炒過了拜過了錢紅銅末上好醋炒七次以爲度餅過細末三分沒石子二分明凡一分食塩二分上下分俱爲極細末用極濃好細茶調煎如梅面樣方好每用敷此以皮帶包過一夕後用核桃油染之

春方各通官春鴉片二錢蟾酥一錢丁香一錢珠砂五錢射干一分右爲末以律調二三厘塗玉莖如晚行事必受未時調塗至地臨行事時切要溫水洗去久戰不泄妙不可言

長恩丹 公土狗屎一个火焙天龍即馬食虫地龍一條脚乾人龍一條脚乾朝腦安金頭蜈蚣其爲末將蟾酥和丸如粟豆大每用一丸施于玉莖上自臥堅大令美女長思

黑髮香油 用何首烏 墨斗草 白芷 細辛 甘松 三奈 排草 生地黃 桑椹 側柏葉 紅豆 良姜 一黑髮核桃肉 香油久浸極妙或芭蕉葉同膠束蒸油擦

百效全書卷之六 急救諸方 救逆死 自且至暮但心下微溫雖一日以上可活急抱起死人將繩寬解不可割斷極頑按定其心却擦正喉喉放倒同令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其兩耳一人急牽其髮不成手及極伸其手足摩其少活即以湯欲與之此法救人神效又法 男用雌雞女用雄雞冠刺血滴口中即活或細辛研香確黃等分吹入鼻中痰出即醒

鴉片 先以刀拔開口放筋一根脚住使可出水然後解去其一服以艾炙脐中令兩人以掌管吹其耳即活或以生人到喉人即自持走吐水即活外用綿裹鼻角木納喉道中水出

活肉以鴨血灌之 喉凍死 其症四肢強直口禁聲有微氣者且慢向火急用布盛熱灰放在心頭冷即換熱待眼開却用溫酒或米飲灌之冬月墮水凍死亦宜

救逆死 自且至暮但心下微溫雖一日以上可活急抱起死人將繩寬解不可割斷極頑按定其心却擦正喉喉放倒同令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其兩耳一人急牽其髮不成手及極伸其手足摩其少活即以湯欲與之此法救人神效又法 男用雌雞女用雄雞冠刺血滴口中即活或細辛研香確黃等分吹入鼻中痰出即醒

鴉片 先以刀拔開口放筋一根脚住使可出水然後解去其一服以艾炙脐中令兩人以掌管吹其耳即活或以生人到喉人即自持走吐水即活外用綿裹鼻角木納喉道中水出

喉凍死 其症四肢強直口禁聲有微氣者且慢向火急用布盛熱灰放在心頭冷即換熱待眼開却用溫酒或米飲灌之冬月墮水凍死亦宜

救逆死 自且至暮但心下微溫雖一日以上可活急抱起死人將繩寬解不可割斷極頑按定其心却擦正喉喉放倒同令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其兩耳一人急牽其髮不成手及極伸其手足摩其少活即以湯欲與之此法救人神效又法 男用雌雞女用雄雞冠刺血滴口中即活或細辛研香確黃等分吹入鼻中痰出即醒

鴉片 先以刀拔開口放筋一根脚住使可出水然後解去其一服以艾炙脐中令兩人以掌管吹其耳即活或以生人到喉人即自持走吐水即活外用綿裹鼻角木納喉道中水出

百效全書卷之六 急救諸方 救逆死 自且至暮但心下微溫雖一日以上可活急抱起死人將繩寬解不可割斷極頑按定其心却擦正喉喉放倒同令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其兩耳一人急牽其髮不成手及極伸其手足摩其少活即以湯欲與之此法救人神效又法 男用雌雞女用雄雞冠刺血滴口中即活或細辛研香確黃等分吹入鼻中痰出即醒

鴉片 先以刀拔開口放筋一根脚住使可出水然後解去其一服以艾炙脐中令兩人以掌管吹其耳即活或以生人到喉人即自持走吐水即活外用綿裹鼻角木納喉道中水出

百效全書卷之六 急救諸方 救逆死 自且至暮但心下微溫雖一日以上可活急抱起死人將繩寬解不可割斷極頑按定其心却擦正喉喉放倒同令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其兩耳一人急牽其髮不成手及極伸其手足摩其少活即以湯欲與之此法救人神效又法 男用雌雞女用雄雞冠刺血滴口中即活或細辛研香確黃等分吹入鼻中痰出即醒

鴉片 先以刀拔開口放筋一根脚住使可出水然後解去其一服以艾炙脐中令兩人以掌管吹其耳即活或以生人到喉人即自持走吐水即活外用綿裹鼻角木納喉道中水出

百效全書卷之六 急救諸方 救逆死 自且至暮但心下微溫雖一日以上可活急抱起死人將繩寬解不可割斷極頑按定其心却擦正喉喉放倒同令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其兩耳一人急牽其髮不成手及極伸其手足摩其少活即以湯欲與之此法救人神效又法 男用雌雞女用雄雞冠刺血滴口中即活或細辛研香確黃等分吹入鼻中痰出即醒

鴉片 先以刀拔開口放筋一根脚住使可出水然後解去其一服以艾炙脐中令兩人以掌管吹其耳即活或以生人到喉人即自持走吐水即活外用綿裹鼻角木納喉道中水出

解水粉毒 治宜肥皂去子搗爛煮豆粉為丸如糖子大滾水

六七箇吐即愈或并草菴豆粉各生明凡以爲末每水送下

又在碗內將黃連末拌勻復入胆內線症口透風處陰乾不可見

日遇症急取胆內藥一錢并水調下兼收懸梁起水氣未絕者

解川烏附子毒心煩燥悶甚則頭暈七狀 遍身皆黑勢危必死煎

茶豆或黑豆冷飲或防非甘草煎湯冷服一切藥毒極難治

心間燥者不妨朱子全集云緊急無藥令多汲新水噙口

解巴豆毒 令人大瀉或吐煩渴發熱急用黃連黃柏煎湯冷服

更以冷水浸手足掌息食熱湯熱性藥物或黃連大豆燻餅

解諸毒草毒 治按食毒草并百物毒救人以必死板藍根四兩煎

衆青綠生甘草各一兩爲末蒸餅丸梧子大另用青黛爲衣如

查精神恍惚惡心即是誤中諸毒急取十五九嚼爛新水服

百効全書卷之六 解毒方類 七

如牛夏毒以生姜解之

解豆腐毒 過食令人生瘡瘦氣遺精白濁用生蘿蔔煎湯服

干煎湯亦可

解諸菌毒 掘新地取真黃土以冷水於內搗之令濁澁少頃取

飲之可解亦治掘木菌食之令人笑不止 又用生芫花爲末

每一錢新汲水下以利爲度菌之毒者蓋因蛇虫毒氣蒸所致

解諸毒草 用南桐葉研水吃其草研水吃灵芝研水吃生薑

搗汁一碗吃或絲瓜葉汁服或藜蘆搗水服

解鼠毒 用大黑豆煮汁服之如欲拭其驗先刈鼠莽苗葉以

汁澆其根從敗爛不復生發矣

解鴉片毒 即孔雀毛并胆也用干葛爲末水調服 食鴉片

每以糯米湯溫服即消

六畜肉毒 用犀角煎濃汁一碗服之 如食牛馬肉生毒

在根一兩黃豆 合葱頭一兩生酒三碗煎服汗出即愈

食自死六畜毒 相末一二錢服不解再服

解河豚魚毒 一時困怠殺人急用清油吐出或服槐花末龍腦

末皆可至室丹丸妙諸魚毒極難解之如服河豚子作那用

內藥水灌之或芦根水尤妙

解鱈鱉蝦蟆毒 用生豆豉一合新汲水半碗浸汁頻服即愈

三物令小便閉臍下酸痛有致死者

解斑蝥毒 其症吐逆不止急用茶豆或烏豆或糯米煎湯服一

方用澤蘭葉搗汁服或乾者爲末白湯下

解中金蠶毒 絳竟中毒宜先吮白凡味母而不瘥次嚼黑豆

不瘥者是也用石櫛根皮煎濃汁飲之即吐出活虫無不愈者

解石蟹中毒 紫蘇濃煮汁飲三盃

解中諸物毒 白凡細茶等分爲末每三錢新汲水調服得吐即

百効全書卷之六 解毒方類 八

勿不吐再服或萬病解毒丹丸下之

誤吞諸物 誤吞銅鐵碗瓦 萬病解毒丹丸大黃大戟 連喬寒水石略二白五

簪白芷黃芩茯苓石滑石天花粉略三封草薄荷干葛略四

山慈姑附貫眾仁一兩青無烟爲末草豆粉糊爲丸彈子大每服

一九薄荷磨下 治一切中毒能化銅鐵碗瓦同嚼化爲粉碎

此其驗也抑論中毒之症辨其被毒何物之中當其遠近久

則不救治法上宜吐之以鴉鴉探吐急以桐油灌吐之下以解

毒丸龍葵利之中毒手足面青過時者不救緊急只以玄明粉

煎甘草利之亦可

誤吞鐵針 用蚕豆煮熟同韭菜汁吞下針與菜從大便而出

用熟艾煮汁濃飲便解

誤吞銅錢 不能化者用砂仁煎濃汁飲之其銅自下或用

研爛服之其銅自化或用堅炭為末米飲調服于大便中過

如烏枚狀或桑柴炭細研米飲調下二錢

誤吞金銀等物 飴糖一片漸口食盡遂出或用石灰一杏核

硫黃一皂角子大同研末酒調服

誤吞禾芒刺喉 治宜搗口涎灌之

誤吞蜈蚣一用生清血令病人吃須更生清油灌口中惡心其蜈

蚣滾在血中吐出繼以雄黃末水調服一人醉酒困地蜈蚣入

喉用生雄雞血調冷水灌入立時吐出

誤吞水蠅 入服經久必生小蛙能食人肝血腹痛不可忍面目

黃瘦全不進食若不早治能令人死用田中乾泥一小塊小死

魚三四箇將豬脂擦淨用巴豆十枚研爛入泥內為丸菜菜

大用口中冷水吞下十丸小兒三五丸須更大小水送下時

下却以四物湯加黃芪煎服生血補脾

誤吞田螺 嘔喉不下死在須更用鴈乙隻以水灌入口中沙

將鴨倒懸令吐出涎水與患人服之其螺即化

神仙為骨丹行通鹿傳其骨自隨藥帶下或出如神

朱砂歲丁香與血竭 磁石能骨能各共為末黃蠟為丸

朱砂為衣每服一九香油煎好醋吞下如要吐用矮荷煎好醋

吃後用濃茶任服如無矮荷桐油代之 又方 用八指甲燒

存性吹入喉中立刻一力用礪砂一塊嚼之骨自下 方用

金鳳花子研爛嚼下無子用根亦可

沿雞魚等骨插入喉中仙方 用斬蛇劍刺喉喉痛

飲下或從大小便出或吐出毒即愈以傷處去三寸 灰之三

求不再發

諸骨瘦神符 但已下字俱不用勻

此碗化為東洋大海咽喉化為萬丈龍潭九龍歸洞 吾等

天上老君急如律令勒 吸東方生炁三口吹入碗中每行

法面朝東用淨水大半碗放桌上左手執拳在胸前右手執

法于碗上書前符字號假如魚骨瘦就書上龜字除 龜字

勿書可書下八符錄皆做此

凡春寒初交大多發狂但見其尾直下不捲口中流涎 舌黑者

是癲狗若被所傷不可視為泛常乃九死一生之患急用針刺去

血以小便洗刮令淨以核桃殼牛邊以人糞填滿掩其窟孔着

于殼上灰之殼焦盡乾則易之灰至百壯次日又灰白壯灰至三

五百壯為佳灰後用生南星防非等分為末再口嚼漿水洗

傷處用細拭乾搽之更不作膿其內須服後藥以徹其毒可也

只就咬處牙跡上灰之一日灰三壯灰至二百二十日乃止

食炙韭菜永不復發亦良法也

班貓七箇去頭翅足為末溫酒調服于小便桶內見衣珠似

形為効如無再瀆七次無狗形亦不再發後用益元散一兩

煎服解之忌飲酒食猪肉雞魚油臘百日終身忌食 大肉凡

此患依前針洗艾炙更服此藥無不愈者

扶危散 治癲狗咬

七箇 治癲狗咬

飲下或從大小便出或吐出毒即愈以傷處去三寸 灰之三

求不再發

應真製癲狗咬傷神効 用糯米一勺瓊貓七箇炒出

應真製癲狗咬傷神効 用糯米一勺瓊貓七箇炒出

應真製癲狗咬傷神効 用糯米一勺瓊貓七箇炒出

應真製癲狗咬傷神効 用糯米一勺瓊貓七箇炒出

應真製癲狗咬傷神効 用糯米一勺瓊貓七箇炒出

去斑貓只用湯藥未以膏油凡點同調冷水吃以利出毒為難

不利再服若毒八腹中作痛以黃連煎湯維苦為未調服

如虛兄傳常大傷方每宜水洗去血用刀刮着熱上錫按口止

或葛汁滴咬處或馬全子磨乳劑神効

治狗咬神法用微墨濃磨筆蘸書吾勅令二尾火虎從此阻

九字念三遍馬三遍于咬處即愈

治蛇咬宜急用麻繩或頭髮繫縛在上面莫令毒氣奔上則

勉強飽食隨用雞蛋破些白放咬處引出毒氣其毒白隨黑若

再不愈又換心至蛋白不黑方止又用土烏藥葉生搗酒溫蒸

醉服又用嫩葉搗爛酒炒吃以醉為度其渣以貼患處若

一二口毒傳經結用新艾鋪咬處灸之俟其痛止再無後患

同生酒用前江傳治毒蛇所傷致死

狂板歸骨如神少其毒四五生至九月身腫即散葉

治用典生酒調服隨量飲之用渣貼患處立愈始若火

治瓜根洗淨搗研生酒吃一醉立愈又方用半邊蓮研酒服

治蛇傷神法一進門論云本師在前祖師在後三元將軍不離

左右五員將軍不離前後又化為西天羅漢唯恐頭足不足頭

二下頓開一十八重地獄一禁蛇頭二禁蛇嘴三禁蛇尾四禁蛇

西天羅漢獅子在前一閉獅子在前二閉獅子在前三閉獅子

新刊秘授外科百效全書 卷六

雄黃 蟾酥 胆礬 半夏 冬等分 射香 少許

右為未用蒲兒草搗汁和為瓦用口啞痛處令淨用丸藥拍

治蝎毒法 每年除夜左手搜起前額右手執三根長棍向門指

上敲三下念呪云蝎七蟹七不向梁上走却來這裏敲上

次即已遇有蝎螫以手摩之即不痛可用一年法為否則不効

治虎咬 先以清油一碗次用油洗痛處或白丸為末納傷處痛

止立効或用砂糖水調塗併服一二碗或二角楓紅肉消忍之

藤嫩搗葉鵝掌葉嫩松毛七狗脊臭桐葉碎罨葉嫩水燻後洗

治馬咬 及踏傷人用艾炙合井腫處或用人尿或馬屎燒灰為

末皆可敷之

治鼠咬 貓毛燒灰人射香少許津液調敷或貓糞咬處

治蜈蚣咬 用雞屎塗之 一方用蜘蛛吸去其毒待蜘蛛醉

死用野雞蘇葉擦或雄黃酒吞內服外敷

治蜘蛛咬 用醋磨鐵汁或桑白皮汁塗之亦治蜈蚣咬或

油燈吹滅以余烟燻之或山豆根和醋塗之

治壁虎咬 毒人必死用桑柴燒灰以水煎三四沸瀝清汁調白

治黃蜂毒 用熱油洗之清油抹之亦可或用頭垢敷或用鹽搽

治八脚虫傷 其虫隱于壁間以屎射人遍身生瘡加湯火燻

二九五

許按上流亦取服之 一方用葶子雞汁服之

治蛇蝎毒 用雞屎塗之 又方急煎薑湯洗浸腫處即消或蟬脫四肢

箇煎水法再用荖利短過為末口涎調敷

人咬傷 用龜板或蟹甲燒灰為末用香油調塗

夏月諸般損傷蛆蠅極盛臭惡難當 外用塞水石末敷神效青黛

洛五分 蛇退一兩燒 華陰細辛一分 共為末每黃酒送下三錢蚰皆

水化而出蠅亦不近其效如神

藏身仙法 水一碗將自己生年月用劍減招寫入水碗內口念言不

言月不月此是玉真真口訣後書三字號益水碗上 誦 雷霹

寫七適用金脚決蓋上此水碗置家靜處 八病門時口暗念 吾

身不是非九身吾是托方鎮天真武披髮伏劍脚踏龜蛇黑雲顯七

百病全書卷之六 諸百毒類 一三


蓋吾身神不見吾身鬼不見吾形若見吾形宝刀寸斬不可停急如

祖師律令勅 念完將祖師敕放下或將真阿那一塊藏身中或用

雄黃塞鼻中亦可

新刻大醫院百效全書六卷終

洞 吳六



醫不窮理不可談醫藥不執方不可用藥以醫藥之難精也鐸性青勿主然而獲效者半每致晚於無師也康熙丁卯秋遇

岐伯天師於燕市譚醫者五閱月凡腔腑經絡陰陽色脈氣血順逆邪正虛實寒熱異同罔不盡言無陳序一

隱且逾傳方術試之多奇驗鐸信師之深退而著述以素問若靈樞若六經新編等辨證錄俱已告竣計八千餘有奇亦可謂書之富也癸亥冬再遊燕市所遇者皆瘡瘍壞症鐸執方療之病家懷物棄而不用反信任世醫刀鍼割裂後出此書

細經劑救援卒至死

不悟鐸痛恨久之因再著茲編名曰洞天奧旨漢醫用藥無此本諸洞天之傳也又慮證多方累附祖父家傳探古今驗方列於後急證不備學方示神摠示忍又千百世人因瘡瘍而天喪也或曰子著述甚富靈素外書窮理甚晰又傳外科母乃太多難執中鐸謝之曰靈素之徒瘍瘡僅

陳序二

論營氣未調耳未嘗遍傳方法也且瘡瘍之論能一二言可罄其證實多至夜寧異而其禍實大病已成之後藥之必非輕劑之藥也藥已成而後治之必死固循古法可治也今世治瘡瘍者不姑息養癰必齒莽嘗試害相等也而其咎皆本步不學然而學亦非易天下讀外科

者此也。然用之敗績，因傳書術之未可師也。鐸之書術，傳諸洞天之師，其理淵微，其方秘奧，即間採家傳，考得之方，日試百驗，可信可師。傳之千百世，而無悞者，也。或又曰：古人治瘡瘍者，多用刀，鐵成名者，子醫精窮理藥，善執方，何獨刀鐵累之，恐子有師，而世師也。嗟，鐸字鐸，字鐸。

陳序三

師者，或瘡瘍之有刀鐵者，古人不待以用之，蓋瘡瘍宜急治，而不可少緩，宜重治，而不可過輕，治之早且重，則毒且盡，散毒散則肌肉頓生，何及尚刀鐵乎。凡用刀鐵者，以救敗之法也。天師所家忌，故方中無傳鐸，誠以未備，揮前代名醫，用力鐵之法，入之以佐諸方，之不速也。

割肉損皮，無神方以輔之，未有不顛覆者，也是刀鐵可以救敗，而不可以成功，何也。專用驗方，轉敗尤速，而取勝更神。萬無一失，之為白，幸然則鐸之窮理執方，乃善于得師也。書成，因弁之首。

山陰陳士鐸字敬之號遠公別號朱華子題于燕市時

陳序四

康熙甲戌仲冬 望後三日也



洞天奧旨



人身不天地也莫不轉之之然而知
之長解矣夫風日晴和雨暘時寒
星得宜而安不作天之常也日月
星傳但雷電晦冥強霜害稼旱澇
頻仍春夏而行秋之令天之害也
地之害也五穀盡枯庶物莫保

陶序一

川涇不見堤唯乘舟長是也地之安
則山崩以竭海佛陸沉禾苗枯槁
瘡痍後日長是也然則天地之害
莫入孰能知之知者其惟聖人矣
人身不具不天地常公耳聰目明
手持足履飲食起居不榮於人卑
仰視目之無有疾痛之累安矣

內而氣血外而臟腑應運百病叢生
予亦為物外而癰疽瘰癧毒輕重不
齊血氣腐洞寒熱交逆見人身之
常變予天地之常變等而求其死
回生轉敗存功必適曰回天之手固非
庸常之術所能也第內科日趨向
難雖靈樞素問代古以著書也

陶序二

等如五車之不同有窺見一斑而
驚名逐利者故好學功不已不致
為多於命良足深恨也至於外科世業
原不在內科之什一是在其與內科
涉而考其於外科業則科長以為不
關臟腑而止其診視與脈之要實害
辨此症之陰陽而執膠用刀鍼安施

改毒收伐之劑致為弱在轉委在重
症或至危而不可收拾乃至于死伊
誰之咎也更有肝陰受邪之徒委
心不良意機射利奔屬輕症而故作
危言以眩赫病者勒券索謝然後用
苦寒殊不知疽毒之世以發生不測幸免
膏手而延接運誤至不能施其伎倆

陶序三

枉是毒之病原深重以却其邪此身之
受天德鬼責其初必不能免也惟必先
聖先賢其書之使以垂妙法也必為
正者高真位流仙果其在天際俯視
下土養養生之曰惟實甚患而莫之拯
溺寧不陰惻于衷而致現身說法
以度世者乎哉

去友陳處之先生至講怪悞黃惻為
心讀書格意不得行吟者而若遊莊市
旅舍凄其古道莫逢村店故澤有同
窮人憐其抑鬱笑寥寥初與行心知
至異鄉首覬望以為嘆身計如日時
際艱難冒家以書囊之術問世乎遠不
致謝不取謂同所願也願其師指

陶序四

接思不能自行也餘以人之性命如掌
中人不我信也人日子為有志者為
不新所溫予是相與共數晨夕在
法由講亦討論是修與秘法當別
幸始以共姓氏百五黃帝師政但必
百五得武財張仲景也陳天鶴
怪不持殊悔詢向之晚而公臨莫可

授美善身師

市里法者如真善人固道不塵其
宜居於度人之心可度人亦莫之復陳
君風松深厚為氣測源故得與心靈
相與耳提面命得為千古音孫是
正聖真於托以援救之人之函及
故不悔涸跡市塵而以身位任也

陶序五

遠第易及世苦書禱之仙真口授秘
已以八子修德業也付梓以都門美
品更煥外科之昭保子惠其寶以步
解特甚同天真身之字如之仙秘密
真傳迥異於時醫之治法夫癱瘓
之患雖在膏肉之間然莫不由臟腑不
和受病于內而形於外也余再四展讀

此或攻補並施或純用補劑置刀鍼

而不用藥之狂寇其竊者踞陰負隅皆
由機實所迫亦有善良被脅者是移
癱瘓之氣血內虛所致也必攻破其
寨柵毒搗其巢穴既已殲厥渠魁肩
任即宜周旋善必盡隨其解孽寧保
至玉石俱焚之弊寇雖蕩平而地方

陶序六

妄醜類矣是猶癱瘓既漢而後以攻
火燔毒必至元氣頹敗而身命與俱
歿也必仍屬陰症皆由臟腑內遺九死
不生之宜大補真之度可速救于垂
危解之之黃河天塹已漏唯當填以
補塞庶保無虞倘妄施針錘則立
見崩決矣至醫用力鍼即如寇初聚

上良可飲酒，謀布多而慰撫之，以難
使快解散，地方仍歸，易諸事，程動良
兵則必挺而走，臨招集，游曼，依附
強寇，而成大敵，善良受蹂躪之害，美
是，程癰疽初發，奉之，所消乃以力滅
傷，其筋絡肌理，致好肉，而後潰腐，局
力不能，以多著，補救久而不能，收口，玉仁

陶序七

冠羸而成壞，症以時也，遠公乃夙之者
師，故曰遇仙，真指點，而後傳，其真訣
秘人，之，痰，及，弟，世，之，最，航，也，余，垂，垂，鬢
暮，道，千里，信，師，身，執，酒，掃，事，可
出，山，招，對，霞，叩，位，扁，特，以，之，帛，帛，望
子，以，切，後，涉，毋，孫，石，字，濫，叨，仕，以，藉，遂
矣，故，五，姓，夢，寐，依，之，移，不，忘，慕，之，道，也

此子去，今，余，學，深，重，仙，真，莫，道，若，於
陳，君，有，不，勝，扼，腕，感，慨，而，健，羨，其，也
因，茲，有，之，序，也

庚子戊寅菊月，穀旦

賜進士出身，翰林，郎，廣，西，道

監察御史，年，六，十，春，弟，陶，式

玉，執，手，好，談

陶序八



洞天奧旨跋

曾祖遠公自少習舉業以數奇屢試輒蹙已而出遊京師復不得志遂究心於醫學焉一日夜深獨坐忽有二老者扣扉而進衣冠整肅所與談皆青囊之術情意真切指示詳明盤桓兩月餘臨別時謂公曰子跋

可出而救世矣言訖不見公始識其為仙子也由是閉戶著書闡發醫理二十餘種所著素靈本草傷寒六氣外經微言石室秘錄辨證錄臟腑精鑿脈訣圖微辨症玉函等書付梓行世已歷有年所矣弟前所刊者俱係內科而外科不與焉不知瘡瘍

洞天奧旨 跋

之症其險更甚於內科嘗見世之患瘡瘍而不救者何可勝數要其所以不救之故皆由於症候不明治之不得其法耳今本集所載其辨症也備而晰其用法也妙而神毋論奇名怪症處萬死一生之候按法治之無不可轉死為生屢試屢驗誠為有

跋

二

濟於民生有功於後世矣故特付諸剞劂以公海內庶二仙秘術得以不朽而先大人著書苦心亦不虛歟

皆

乾隆庚戌花朝曾孫鳳輝謹跋

洞天奧旨

凡例

一 鐸遇 天師岐伯首講靈素二書俱載有癰疽之篇論之甚詳鐸憫近今人患瘡瘍者參加意訊質天師妮妮言之鐸記憶不敢忘今彙成全書云

一 天師傳方甚富試之罔不奇效鐸不敢秘盡傳無隱以廣師仁

一 先大父安期公生平頗好方術遊蜀遇峨嵋山羽士傳有秘方效驗如響亦登此編

洞天奧旨

凡例

一 大雅堂

一 外科諸家皆執方治病經絡未明陰陽未識往往貽誤變出非常是編辨晰甚精凡我同人幸細覽用藥庶不致再錯也

一 鐸著辨證奇聞曾將各瘡癰施治成效先論列問世然畧而不詳不若茲編之備也

一 鐸自遇 聖師已歷年所著醫書約八千餘紙頗倦命筆伏思 聖師傳我異術秘而失宜難逃罪譴而救濟心懷故振興情氣再肆文瀾續成茲編云

一 外科方刻諸書祿而不純鐸採其論之至正方之最

驗者各附于 天師傳方之後以脩臨症之採擇也

一 外科專尚刀鍼用之當則免養癰潰敗之害然 天師惟主內消不喜外刺故編中方法內消居多實遵

師訓非怯用利器也

一 外科灸法素稱神奇然自頸以上萬不可輕灸灸之多致死亡願我 仝人各宜遵守勿謂艾炷細小即可灸也

一 瘡瘍成于火毒自宜用攻瀉之藥然而一味攻瀉則氣血大傷未潰者火毒難于消化已潰者肌肉艱于

斂收必用補為 主而在之攻瀉之味則轉易奏功故

天師所傳之方 補多于攻即鄙人所採之方亦攻輕

于補云

一 外科瘡瘍貴在 急治蓋正氣未傷邪氣易散 天師與諸真所傳皆 急治良方也萬勿因循畏怯反致敗

壞

一 瘡瘍外發皆由 臟腑內虛也故各門經絡脩載無遺亦使人察外知 內也

一 癰疽疔毒非亦 癰可比世人於初起之時慢不經心

洞天奧旨

凡例

二 大雅堂

往往變出非常甚可畏也故無論小瘡細癩俱當慎
重治之

一陰癰陰疽多生于驕恣鬱怒之人或縱酒貪花之子
與頻服熱藥燔灸之客故治法必須大劑化毒細小
湯丸不中病情醫家病家各宜知之

一外科治病貴識陰陽陰陽既明則變陰變陽之異何
難辨別故篇中各論辨陰陽頗精勿謂其言之太激
也

一 天師惡用刀鍼然瘡勢大橫潰爛於肉不急用刀

洞天奧旨

凡例

三

大雅堂

鍼刺割則惡毒衝潰又反害肌肉恐成敗壞採探前
賢善用刀鍼良法附諸篇後佐 天師之未逮也非
過街奇

大雅堂主人遠公識

洞天奧旨目錄

卷一 首載經絡圖穴

瘡瘍標本論

瘡瘍辨脈論

瘡瘍陰陽論

瘡瘍善惡論

瘡瘍經絡論

瘡瘍內外論

瘡瘍火毒論

瘡瘍腫潰虛實論

瘡瘍順逆論

卷二

瘡瘍生死論

瘡瘍嘔吐論

洞天奧旨

目錄

大雅堂

瘡瘍口渴論

瘡瘍秘結論

瘡瘍痛癢麻木論

瘡瘍寒熱論

瘡瘍辨膿血論

瘡瘍險地論

瘡瘍死肉論

卷三

瘡瘍生于富貴論

疔瘡形症論

瘡瘍陰陽真假論


妊娠瘡瘍論

瘡瘍肥瘦人不同論

瘡瘍隨證用藥論

瘡瘍開任論

瘡瘍火炎論



瘡瘍刀鍼論

卷四

瘡瘍敷藥論

瘡瘍治法論

瘡瘍調護論

舍癰從症論

舍脈從癰論

舍時從癰論

瘡瘍用金銀花論

瘡瘍不可委鬼神論

產婦生瘡瘍宜用補陰論

瘡瘍不必隨經絡用藥論

卷五

洞天奧旨

目錄

二

大雅堂

背發

泥丸發

腦後發

耳後耳下發

耳前發

鬚發

臉發

對口發

目銳眥下發

頤發

唇發

肩膈發

腎俞發

腰下發

卷六

胸乳上發

胸發

額發

兩脇發

流注發

環項發

腎陰發

對臍發

尻發

手背發 附手心發

足背發 附足跟疔

肺癰肺痿

腸癰

鬚癰

卷七

骨癰

腰癰

臂癰

膝癰

洞天奧旨

目錄

三

大雅堂

腋癰 附馬刀扶移

乳癰

箕門癰

眉癰

蠱疽

手足指瘡 附脫疽

筋疽勞疽疔疽

中庭疽井疽

合陽疽

卷八

疔瘡

骨蒸瘡

骨毒帶瘡

骨痿瘡

陳疔瘡

赤炎瘡

血風瘡	天炮瘡
瘰癧瘡	內外腫瘡
人面瘡	血風瘡
卷九	
杖瘡	禿瘡
魚臍瘡	陰包毒瘡
燕窩瘡羊鬚瘡	胎毒瘡戀眉瘡
肺風瘡鱗鼻瘡	粉花瘡裙邊瘡
臟毒痔漏瘡	陰囊漏水瘡胞漏瘡
洞天奧旨	目錄
雌雄狐刺瘡	水流麻根瘡
肥粘瘡	干口瘡
時毒暑癩	齒疔
白殼瘡	
卷十	
鼻癭鼻痔	嵌指
鵝掌風	疥瘡 附膿窠瘡
坐板瘡	喉閉雙蛾瘡
大麻瘋	蛇窠瘡
	四
	大雅堂

蜘蛛瘡	陰陽濕痰瘡 附脫肉
楊梅疔瘡	楊梅圈瘡
楊梅結毒	翻花楊梅瘡
陰陽楊梅瘡	楊梅癬瘡
楊梅痘子	齒窟瘡
胎濕皮瘡	
卷十一	
風熱瘡	黃水瘡
傷守瘡	手足了毒瘡
洞天奧旨	目錄
胎審瘡	濕毒瘡
火丹瘡 附赤白遊風	內丹
飛灶丹	吉灶丹
鬼火丹	天火丹
天灶丹	水激丹
胡次丹	野火丹
烟火丹	胡漏丹
粉癭癩	筋癆骨癆石癩
氣癩	血癩贅
	五
	大雅堂

肉癰瘡

卷十二

走馬牙疳

鼻疔

月蝕疔

袖手疔

陰疔

無辜疔傷瘡

落疔瘡

洞天奧旨

金刃瘡

湯盪瘡

皴裂瘡

凍瘡

卷十三

跌打損傷瘡

虎咬瘡

鼠咬瘡

火斑瘡

口疔

喉疔

鑱指疔

腋疔

妬精疔

淫尻瘡

臍漏瘡

火燒瘡

含腮瘡

漆瘡

箭毒瘡

日曬瘡

犬咬瘡

馬汗瘡

灸火瘡

目錄

六 大雅堂

日漸瘡

竹木發破傷水瘡

蜈蚣叮瘡

蜂咬瘡

蠅蝮尿瘡

砒霜瘡

偷針眼瘡

手足麻裂瘡

卷十四 奇方上

洞天奧旨

救命丹

人參敗毒散

加味十宣散

消散湯

廻瘡金銀花散

神效湯

黃金飲

英花湯

金銀六君湯

樹骨瘡

蛇咬瘡

蝎傷瘡

刺蟲傷瘡

人咬傷瘡

水漬手足爛瘡

眼丹胞

金銀補益湯

極驗溶膠湯

花藤辟荔湯

柞木飲子

神效托裏散

金銀花酒

金銀五香湯

金銀解毒湯

消毒神聖丹

目錄

七 大雅堂

治癰疽各瘡
陰症陽症

治諸瘡癰疽疔毒
物毒到神效有奇者

治瘡癰疽外敷
回氣血虛損神效

治瘡癰疽初起
去時消腫

治瘡癰疽甚
色變紫黑

治瘡癰疽初起
治瘡癰疽初起

治瘡癰疽初起
治瘡癰疽初起

治瘡癰疽初起
治瘡癰疽初起

治瘡癰疽初起
治瘡癰疽初起

治瘡癰疽元氣虛
倦口乾發熱

治瘡癰疽是為
功活人最多不可輕忽

治瘡癰疽初起
治瘡癰疽初起

治瘡癰疽未成
小証候可以倚仗

治瘡癰疽發背
疔毒初起

治瘡癰疽初起
治瘡癰疽初起

治瘡癰疽初起
治瘡癰疽初起

治瘡癰疽初起
治瘡癰疽初起

治瘡癰疽初起
治瘡癰疽初起

散寒救陰至聖丹 治癰疽疔毒 一切惡疽疔毒 凡生何處 本效即消

通氣散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

內外復煎散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

八仙散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

托裏散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

護膜養蠟丸 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

托裏溫中湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

黃芪六一湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

獨參湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

洞天奧旨 目錄

加味聖愈湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

內托散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

補中益氣湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

八珍湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

加味養榮湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

內消神丹 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

飛龍奪命丹 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

內造蟾酥丸 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

廻陽玉龍膏 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

換毒散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

鐵井欄 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

千金方 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

香蟾膏 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

東離散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

卷十五 奇方中

養鍼散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

替鍼散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

碧落神膏 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

洞天奧旨 目錄

神膏方 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

陰疽末藥方 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

陰陽至聖膏 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

生肌散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

補爛丹 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

仙方救命湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

花丁散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

扶桑清肺丹 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

千金煮肺湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

水澄膏 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

清涼膏 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

烏龍掃毒膏 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

烏龍膏 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

收毒散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

代針散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

鍼頭散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

吸毒仙膏 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

陽疽末藥方 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

定痛淨膿生肌膏 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

末藥方 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

生肌散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

生肌散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

生肌散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

生肌散 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

紫菊湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

神效桔梗湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

起痰延生丹 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

犀歸湯 治癰疽疔毒 凡生何處 本效即消

兩間湯	治大腸疝	玉公湯	治小腸疝
龍葱散	治乳吹	救乳化毒湯	治乳癰乳吹初起神效
英藤湯	治乳癰初起	參芪瓜蒌散	治乳癰乳吹已成化膿為水者即消如毒重更效
伯高太師方	治乳癰初起	末類方	治乳癰初腫
葛真君湯	治癰瘰	夏枯草膏	治癰瘰馬刀不消已潰未潰或日久成漏
昆花湯	治項下腫核卒難收口或膿忌口常服尤驗	文武膏	治癰瘰神效
蝸牛散	治癰瘰潰與未潰	夏枯草湯	治癰瘰馬刀不消已潰未潰或日久成漏飲食不甘寒熱均瘰癧瘰癧神效
癰癰神膏	治各種癰瘰	神秘湯	治癰瘰
木通湯	治癰瘰	敗毒散癰湯	治四種癰瘰
天與旨	目錄	木雅堂	
膏藥方	治癰瘰不破者	通治癰瘰方	不分虛實新久未裂及諸瘰癧皆效
癰癰酒藥方	治癰瘰結核生滿頭項破不穿者甚效	擡頭草膏	治癰瘰已破者
六神全蝎丸	治多年癰瘰百治百愈服此七日全愈	黃白殭蠶散	治癰瘰瘰癧久不收口
廉滄膏藥方	治癰瘰內外	杏霜丹	治癰瘰經年累月不愈者
斂瘡丹	治癰瘰不斂	化癰仙丹	治溫熱變化癰風即大瘰也
三白膏	治內外癰瘰	紅潮散	治濕毒癰瘰
止癢散	治癰瘰癢癢	隔紙膏	治久遠癰瘰頑瘰瘰癧
潮腦膏	治血風癰一宿見效三五全好	貝母散	治活人面癰
雄黃散	治癰瘰有虫作瘡痛者神	戊油膏	治多年不好癰瘰如神

三黃膏	治疥癬神效	衛心仙丹	治受風毒患血赤心
白蠟膏	專貼疥癬神效	活血紅花湯	疥癬瘰癧
又蓋體湯	治疥癬神效	護心仙丹	外治疥癬青點之
膠粉散	治疥癬瘰癧	膠粉散	治羊鬍子瘰
又方		鬼代丹	專繩主打着不痛
冰硫散	治疥癬和風	膠香散	治胎毒瘰
草牛散	治癰頭胎毒	膠髓膏	治癰瘰瘰癧
臘脂膏	治癰瘰瘰癧	杏黃散	治赤鼻酒癩粉疵
二粉散	治婦女面生粉花瘰	裙邊瘡方	
潤末藥膏	目錄	木雅堂	
大風膏	治福邊瘰一名禱口風瘰	痔漏驗方	治痔漏多年不愈及痔漏服此風下血者皆驗
世傳方	治痔漏	護漏湯	治痔漏生管用此膏條用即通管生肌矣
補漏丹	治痔漏	青苔散	治濕熱成痔作漏
全生丸	治多年痔漏如神	洗痔方	即太倉公方洗七日全愈陰囊濕與腿濕此方洗之俱效
無花湯	洗痔效	乳香膏	專貼痔漏如神
南陽張真人方	治痔漏	護痔散	護痔外好肉
槐角丸	治痔漏下血	槐萸散	治腸風痔漏下血有驗
水沉膏	治痔毒香瘰	藥線方	治商路如神
癬方		頑癬方	即張真君痔

牛皮癬方 即天師傳方
吡僧散 治汗斑如神

丁香散 治臭癩神驗
化癰丹 治臭癩臭痔

粉香生肌散 治跌指甲傷
槐花湯 治驚悸風

又方
硫糕丸 治濃瘰癧甚效食後則苦
湯送下五六十丸

洗疥方
歸防湯 治表消瘡瘡毒神效

蒼水磨 治小兒黃水瘡濕結于皮上也

卷十六 奇方下

雄黃燈 治坐板瘡
苧蘿散 治坐板瘡甚驗

又方
坐板瘡方

洞天奧旨 目錄 三 大雅堂

大麻瘋方
白鹿洞方 治麻風毛脫落手足拳曲
清烟唇翻眼紅口歪身麻

秘傳漆黃蟾酥丹 治大麻風瘡
洗火風方

生眉散 治大風生眉毛
片根散 治喉閉乳蛾

太倉公蜂房散 治喉痺腫痛
倉公壁錢散 治喉生乳蛾

救喉湯 治喉蛾大作痛不可忍
喉少使乃纏喉也
啓關散 吹喉首先服救喉湯再用啓關散吹

化癰神丹 治喉生癰瘡先毒後痛
倉公喉癰方

潤喉湯
蛇頭瘡方 即高天師傳方治癰毒天蛇頭

雄黃解毒散 治天蛇毒疔初起紅腫
熱痛惡心
解蛇油 治蛇窠瘡生于皮毛作痛
並治諸惡瘡

治蜘蛛瘡
楊梅瘋毒丸

劉氏經驗方 治楊梅毒瘡
楊梅瘡洗法

全陽方 治首陰爛落
土茯苓湯 治楊梅毒結毒林中木傳

末藥方
楊梅瘡方

風藤散 治結毒
結毒方 治結毒臭柱將落主可全之

不疼點藥
治楊梅毒瘡方

黃床散 治腎臟風瘰不可當
五根湯

疔瘡摻方 即張真君方
疔瘡方 即秦真方

玉莖爛方 即伯高祖師方
勝金散 治下疳潰爛疼痛

齒齩瘡方 治齒齩有傷風瘰作痛
玉粉散 治胎毒漏風瘰

洞天奧旨 目錄 三 大雅堂

雜與湯 治楊梅毒瘡
劉寄奴散 治便毒

又方 治便毒初起
消毒散 治便毒初起三四日可消

化魚湯 治結成便毒魚口
化毒救生丹 治頭面無故生瘡第一口頭
面重如紫日即用法可救

蝸膏水 治頭上生瘡作癩或胎毒成
癩頭
黃水瘡方 又方

栝葉散 治三疔火毒及生火丹作瘡
或作痛癢及遍身
栝瘡方 治瘡初起成形未破者及根蒂
小而散者

秘傳欬瘡膏
陰尸疔方 治陰尸作瘡作痛生瘡生虫

護陰丹 治陰外中生瘡
止瘡殺蟲湯 治婦人陰中生瘡長蟲
痛難受

完體續命湯 救瘡傷而氣不絕或成瘡
或成癰或成疔或成毒
補血救亡湯 救瘡傷危亡諸症

菱膏散 濟急方治刀斧傷損
治刀傷損骨止有皮連者

金刀傷方

又方

金瘡方

又傳方

赤類鈴方

火燒瘡方

蚌津方

湯火方

湯火傷方

凍瘡方

又方

箭鏃瘡方

又方

張真君六神散

骨傷折痛方

跌仆瘀血痛方

定痛散

跌傷方

河天良旨

目錄

一四

大雅堂

岐天師全體神膏

止血散

逐瘀至神丹

接骨至神丹

治破傷風方

倉公消破傷風方

楠根散

斑猫散

青苔散

治鼠咬瘡方

麝香錠子

治毛蟲咬

中蜘蛛毒咬瘡方

誤吞麥芒鯁喉瘡方

誤吞針鈎有線者

治面上惡瘡五色方

治蚯蚓毒

治諸瘡努肉如蛇出數寸

治纏脚生瘡

普濟方

談堃翁試驗方

馬咬瘡方

千金方

聖惠方

肘後方

掃癩丹

摘玄方

鵝掌油

魚脂膏

荳根散

半夏散

綠雲散

去苦散

輕粉散

勸醫

後跋

河天良旨

目錄

手少陰心經



洞天奧旨

手太陽小腸經



三


大雅堂

足少陰腎經



洞天奧旨


足太陽膀胱經



四


大雅堂

任脈經



洞天奧旨

任脈經



七

大雅堂

洞天奧旨卷之一

山陰陳士鐸敬之甫號遠公著 曾孫陳鳳
會稽陶式玉尚白甫號存齋評 玄孫增方溯回民校



瘡瘍標本論

凡病皆有標本之異而瘡瘍亦宜知之苟不知標本輕妄施藥不中病情往往生變是標本不可不辨也二者之中本重于標知本而標無難治也世人皆謂瘡瘍生于肌膚何必問其臟腑誰知外生瘡瘍皆臟腑內毒蘊結于中而洞天奧旨 卷之一 瘡瘍標本論 一 大雅堂 發越于外也苟不治內而惟事外攻則內毒未散外毒安能化乎故必先看其生瘡于何處係何經部位如生在頭額則是太陽之病生在脇肋則是厥陰之疾所謂本也次察其痛癢痛則陽症癢則陰疴所謂標也標本分明自然用藥無悞生在陽經而作痛此純病于陽也內外俱用瀉味自易成功倘生于陽而作癢此陽虛而病陰也補陰以化毒而不可損陽以耗氣也生在陰經而作癢此純病于陰也內外俱用補劑無難奏效倘生于陰而作痛此陰虛而病陽也補陽以化毒而不可損陰以虧血也蓋耗陽之

氣虧陰之血俱能損傷營氣夫營氣最忌損傷瘡瘍之生原因營氣之逆也營氣之逆者又因于胃氣之逆也人生以胃氣爲本烏可使之逆乎胃氣逆于前而經絡不通臟腑塞以致結成癰疽倘再逆于後又何以化毒哉是胃氣之斷不可逆也而胃氣之所以逆者何故乎損之甚者逆之甚傷之至者逆之至也故治瘡瘍者總以顧胃氣爲主有胃氣則本病陰而能生無胃氣則標病陽而亦死治瘡瘍者辨明標本而加意于胃氣何患術之不神哉

薛新甫曰若病急而元氣實者先治其標病緩而元氣

虛者先治其本若病急而元氣又虛者必先治本而兼以治標大約痲高焮痛膿水稠粘元氣未損也治之則易漫癰微痛膿水清稀者元氣虛弱也治之則難不瘡不痛或漫癰黧黑不潰者元氣虛甚治之尤難者也愚意薛氏所言元氣者即胃氣也

瘡瘍辨脈論

診脈所以治內病也若瘡瘍則辨症而不必辨脈以瘡瘍之病在外也雖然有諸中必現于外安在診其裡不可以知其表哉况瘡瘍之毒皆出諸臟腑乎既是臟腑內病烏

可徒辨症而不辨脈乎惟是瘡瘍之變症多端而瘡瘍之變脈亦不一狀吾又何能盡示之乎然不可盡示之中而實有簡要之法在大約瘡瘍未潰之先脈欲其有餘而瘡瘍已潰之後脈欲其不足有餘者火毒旺也不足者正氣虛也未潰而現有餘之脈乃宜盛而盛順之象也已潰而現不足之脈乃宜虛而虛亦順之象也倘已潰而現有餘不宜盛而盛也未潰而現不足不宜衰而衰也不宜盛而盛乃火毒之大熾不宜衰而衰乃火毒之甚深皆逆之象也順吉而逆凶又何疑哉而有餘不足之脈何分順逆乎

洞天奧旨

卷之一

瘡瘍辨脈論

三

大雅堂

夫浮也乳也滑也實也弦緊也洪長也大散數也皆有餘之脈微也沉也縵也澀遲也伏軟也弱結細也皆不足之脈也有餘之脈宜現于未潰之先而不宜現于已潰之後不足之脈宜現于已潰之後而不宜現于未潰之先治之法未潰而現不足宜補陽以發其毒而人參黃芪不可緩用也已潰而現有餘宜補陰以化其毒而熟地當歸所當亟投也更有秘訣者毋論有餘不足各脈倘無變續之形皆可用大補之味而佐之消毒之品同羣共用亦能轉危爲安反敗爲福亦可以脈之不順即棄之而不治也

瘡瘍陰陽論

瘡瘍最要分別陰陽陰陽不分動手即錯或謂陰陽者分于氣血也不知氣血亦分陰陽之一端而不可執之以槩定陰陽也蓋瘡瘍有陰症有陽症有陰熱陰寒有陽熱陽寒有陰滯陽滯有陰陷陽陷有先陰變陽有先陽變陰各不同也病不同而何以辨之陽症必熱陰症必寒陽症必實陰症必虛陽症之形必高突而腫起陰症之形必低平而陷下陽症之色必純紅陰症之色必帶黑陽症之初起必疼陰症之初起必癢陽症之潰爛必多其膿陰症之潰爛必多其血陽症之收口身必輕爽陰症之收口身必沉重陰熱者夜重而日輕陽熱者夜輕而晝重陰寒者飲溫湯而作嘔陽寒者飲冷水而欲吐陰滯者色紫黑而不變也陽滯者色微紅而不化也陰陷者色黯黑而不起也陽陷者色紅黃而不起也先陽變陰者始突而不平初害痛而後害癢也先陰後陽者初平而潰始患熱而後惡寒也陽中之陰者似熱而非熱雖腫實虛若黑而非澹欲痛而無膿既浮而復消外盛而內腐也陰中之陽者似冷而非冷雖虛而氣腫雖淡而似赤若燥而寒痛既平而實突

洞天奧旨

卷之一

瘡瘍陰陽論

四

大雅堂

外淺而內橫也陽變陰者其人多肥陰變陽者其人多瘦陽變陰者服涼藥之過也陰變陽者服熱藥之驟也然陽變陰者多死陰變陽者多生以此消息之萬不失一苟以氣血分陰陽或以癰為陽疽為陰未為通論蓋癰疽各有陰陽必氣血兼補而佐之消毒始能奏功甚速倘執陽病是氣而不敢用補氣之藥毋論未潰之前火毒不能遽散即已潰之後肌肉何能驟生單一味補血無濟于事也必補氣以生血則氣血兩旺氣得血而流通亦血得氣而充足何懼火毒之不星散哉倘執陰病是血而不敢用補氣之味尤為不可揜之氣血不可失治而瘡瘍必當兼用之也惟是陰陽之症不可不分知是陽症可少用金銀花化毒之品而輕佐之補血補氣之味知是陰症可多用金銀花化毒之品而重佐之補氣補血之味自然陰變為陽而無陷滯之虞陽不變陰而有生化之妙也更有以陰陽分寒熱者移人必多矣夫病分寒熱是人素虛之偏豈可以陽為熱陰為寒耶故浮洪弦數本陽脈也然陽乃氣虛而非熱沉細弱澀本陰脈也然陰乃血虛而非寒辨其陰陽而不可分為寒熱以瘡瘍之陰陽無非正虛邪實故氣血

洞天奧旨

卷之一

瘡瘍陰陽論

五

大雅堂

可以共補也

瘡瘍善惡論

瘡瘍不論大小專論善惡蓋大者有生之機小者有死之兆也惟是大小易見而善惡難知不知善惡者安知吉凶乎故善惡必須辨也大約善有五惡有七吾先言其善者起居安適無躁動之狀一善也大小便如常無諸痛苦二善也凡服藥餌隨手奏効腫易平復無膿血之多三善也神清氣爽言語响亮四善也飲食健旺易于消化口不大渴五善也有此五善雖瘡瘍形大而病實輕吉之徵也吾

洞天奧旨

卷之一

瘡瘍善惡論

六

大雅堂

再言其惡者口大渴呼飲煩躁不常腹中時痛口中時咳大便作瀉小便成淋此惡之一也膿少血多不腫而痛皮肉腐壞臭氣難聞瘡口低陷沿開廣濶此惡之二也喘粗氣短不足以息恍恍惚惚如見鬼祟此惡之三也黑睛緊小白睛青赤長多斜視上視此惡之四也手足無措神氣昏閉面目炭色此惡之五也見食厭惡服藥嘔吐不能飲食此惡之六也聲啞面腫鼻黑唇青此惡之七也有此七惡雖瘡瘍形小而病實重凶之徵也凶者多死吉者多生雖然生死何常之有往往吉變為凶生變為死大約皆酒

色害之也夫吉兆既可變為凶豈凶徵獨不能變為吉生兆既可變為死豈死徵獨不可變為生要在人善于悔悟而調理又得其宜亦可挽回于萬一也夫調理者慎勞絕慾居其半節食擇藥亦居其半也倘病人心自悔悟而藥餌亂投恐非轉凶起死之法大約瘡瘍惡症脈無止歇而有胃氣者必可救援故一現惡徵急用參芪以救之則胃氣不亡可變凶為吉轉死為生也惟是惡徵之現皆胃氣欲絕也吾欲使絕者不絕參芪必宜多用斷不可畏首畏尾而些少用之也

洞天奧旨

卷之一

瘡瘍善惡論

七

大雅堂

瘡瘍經絡論

五臟七腑各有經絡臟腑之氣血不行則臟腑之經絡即閉塞不通而外之皮肉即生瘡瘍矣然經絡隱皮肉之內何從知之然內有經絡外有部位部位者經絡之外應也如瘡瘍生于頭頂即屬足太陽經之病蓋頭頂乃膀胱之部位也生于面即屬足陽明經之病面乃胃之部位也生于頸項即屬足厥陰經之病蓋頸項乃肝之部位也生于肋即屬足少陽之病蓋肋乃膽之部位也生于手足心即屬手少陰經之病蓋手足心乃心之部位也生于背為諸

陽生于腹為諸陰孽膊即手之三陰三陽經之所行股脛即足之三陰三陽經所屬七竅者五臟之竅也生于目乃肝經病也生于耳乃腎經病也生于鼻乃肺經病也生于舌乃心經病也生于口乃脾經病也不可據之外部位以知內之經絡臟腑乎雖若傷因氣血之凝滯而生原無定位然凝滯于何經即生于何經之部位安可不即治于是經乎或曰跌仆刀傷蟲獸爪損亦能成瘡豈皆經絡之凝滯耶然既傷損於是經別治他經恐難奏效何如專治是經之為親切乎獨是經絡有氣血多少之異氣血多者易河天具旨 卷之一 瘡瘍經絡論 八 大雅堂

于成功氣血少者難于建績又當分別之也若三焦若心經若肺經若膽經若腎經若脾經此六經皆氣多而血少非補血則未潰不能化已潰不能消也若包絡若小腸若膀胱若肝經此四經皆血多氣少非補氣則未潰不能散已潰不能生也若胃經則氣血俱多初可用消而終亦必在之以補氣血則收功自速矣部位既明經絡無錯自然用藥得宜無憂猛浪之悞治也

瘡瘍內外論

瘡瘍之生內經雖言營衛之氣血不行也然而營衛之氣

血不行實有其故有外傷而氣血不行者有內傷而氣血不行者有不內不外之傷而氣血因之不行者亦不可不辨也夫外傷者傷于風寒暑濕燥火之六氣內傷者傷于喜怒憂思驚恐悲之七情也一有所傷則臟腑之氣血不從逆于肉理變生癰腫矣但天地之六氣無歲不有人身之七情何時不發乃有病有不病者何也蓋氣血旺而外邪不能感氣血衰而內正不能拒此所以六氣之傷傷于氣血之虧而七情之傷亦傷于氣血之乏也然而傷于外者輕傷于內者重輕者其勢反重重者其勢反輕疑似之河天具旨 卷之一 瘡瘍內外論 九 大雅堂

問最難辨識吾何從而辨之乎吾一辨之于脈輕而反重者陽症也右手寸脈必浮大而洪數重而反輕者陰症也左手寸脈必沉實而細數吾再辨于形輕而反重者表症也其瘡口必掀突于外重而反輕者裏症也其瘡口必平陷于內似乎陽與表易治而陰與裏難治也然而瘡瘍總宜急散散之急則陽陰表裏皆能速愈也至于不內不外之傷較六氣之傷七情之傷為少差等耳宜乎不藥有喜然而世人之氣血未必皆有餘者也况加之損殘其肌膚戕賊其肢體則已傷復傷矣吾恐損者不易續而缺者不

易全矣必須補其氣血使營衛之調和滋其臟腑俾經絡之安逸即有毒氣自然消化于烏有矣

瘡瘍火毒論

瘡瘍之症皆火毒症也但火有陽火陰火之不同而毒有陰毒陽毒之各異夫既曰火則火勢燎原救之烏可緩乎惟是陽火驟而烈陰火緩而酷夫火雖有驟緩而至于炎燒其禍則一也故救焚俱不可遲一見人生瘡瘍無論足陽是陰當速為撲滅則隨手奏功無奈世人視為平常因循懈怠以至輕變為重陽變為陰往往潰壞決裂而不可

洞天奧旨

卷之一

瘡瘍火毒論

一

大雅堂

救療或曰陽火驟似乎難遏陰火緩似乎易圖何其酷烈反勝于陽火乎蓋天下陽毒易防而陰毒難防瘡瘍火毒又何獨不然且亦知瘡瘍之火毒為何毒乎乃龍雷之火鬱而出于木中也夫龍雷之火藏于地中天氣鬱勃火不能藏往往發越于外然而龍雷之火又藏于木中非破木焚林而火不得外泄其所出之處有焚燒屋廬者有殛死人物者苟攫其鋒多成灰炭其毒為何如乎人之生瘡瘍者雖因氣血之不和而不和者乃氣血之鬱也五臟六腑之氣血皆能成鬱而生瘡瘍其實無不因肝腎二經之鬱

以成之也肝腎二經屬陰皆有龍雷之火火鬱之極必變蘊而為毒火為陰火則毒亦陰毒也陰毒不發則已發則沖擊禍害有不可勝言者此毒之所以酷烈也夫陽毒尚有養癰之患而陰毒尤禁養癰者以其潰壞決裂有百倍于陽毒也可見陰陽瘡瘍俱宜急早治之但治法不同又不可不分而治之也大約治陽毒之瘡瘍宜散重而補輕治陰毒之瘡瘍宜散輕而補重摠之陰陽火毒非補則火不肯滅而毒不易消也但分輕重以用藥而萬不可單用散劑以治瘡瘍苟不辨別其陽火陰火與陽毒陰毒而止

洞天奧旨

卷之一

瘡瘍火毒論

二

大雅堂

用攻堅表邪之味吾恐火未必退而氣先失毒未必化而血先涸矣安得不天人性命哉

瘡瘍腫潰虛實論

夫瘡瘍宜分虛實未可漫然用藥也雖治瘡瘍之法俱宜用補然不知虛實而浪治之亦難速效故必審其虛實之重輕以酌量其補瀉之多少始為上工也惟虛實何以辨之乎亦于初腫已潰時而辨之也初腫之時腫而高突焮赤作痛是陽邪毒盛病在表實也如腫而堅硬深痛亦陽邪毒盛病在裏實也表實可散裏實可攻攻散之中畧兼

用補則在表者不至入裏而在裏者必易發表矣倘腫不甚高突雖焮赤作痛而少衰此陽邪毒衰病在表虛也如腫雖堅硬痛不甚深此陽邪毒衰病在裏虛也表虛不可純散裏虛不可純攻攻散之中重于用補則表虛者力能托外裏虛者力能出內矣若已潰之後猶然腫硬焮痛發熱煩躁大便秘結瘡口堅實此陽毒未化乃邪實也尚宜補而兼散倘膿大出而反痛瘡口久而不斂發熱口乾膿水清稀腫下輒慢此陽毒已盡乃正虛也切戒散而必補以上治法猶論陽症之瘡瘍也若陰症之瘡瘍毋論未潰

洞天奧旨

卷之一

瘡瘍腫潰虛實

三

大雅堂

之前與已潰之後皆宜用補豈特必宜用補尤宜大補為急而不可用些小之補藥也蓋陰症瘡瘍其毒最深其火最烈非用大補之劑則火不肯遽滅而毒不易驟消也或曰毒深火烈反用大補不助熱以增橫乎不知瘡瘍之火毒因虛而成者也不比他症之火毒得補而添其炎惟瘡瘍陰火愈補而愈衰瘡瘍陰毒愈補而愈化也或曰然則竟不消其火毒乎曰是又不然藥品之中有補味而兼攻者吾採而用之名為補而仍是攻散之也又何懼哉

瘡瘍順逆論

瘡瘍最宜知者陰陽也其次宜知順逆大約陽症多順陰症多逆順者生逆者亡故知順逆即知陰陽知陰陽即知生死矣然而順逆不易知也其順逆之中有順而實逆有逆而反順此即陽症似陰陰症似陽之說也苟不知順逆之真何知順逆之假乎余有辨順逆之真法如瘡毒之初起頂高根活色赤發熱焮腫疼痛日漸突起腫不潰散者順也若頂平根散色暗微腫不熱不疼身體倦怠者非逆而何如瘡瘍之已成瘡形巖起焮痛皮薄光亮易膿易腐飲食知味二便調和身溫者順也若腫堅色紫不作膿不

洞天奧旨

卷之一

瘡瘍順逆論

三

大雅堂

洞天奧旨卷之一終

洞天奧旨卷之二

山陰陳士鐸啟之甫號遠公著 曾孫陳鳳輝初儀甫梓

會稽陶式玉尚自甫號存齋評 玄孫增方湖洄氏校

瘡瘍生死論

出生入死半是瘡瘍生死不知終難治療知其死而早為
謝絕固失好生之心不知生而浪為醫治亦非起死之法
所貴生死瞭然于胸中而後因症用藥即或功不能成命
不可奪亦可告無罪于病人求免禍于上帝也然而瘡瘍

洞天奧旨

卷之二 瘡瘍生死論

大雅堂

生死最難分曉我舉其大槩言之陰病見陽色腮頰紅獻
者死兆也陽病見陰色指甲呈青者死兆也身熱脈細唇
吻反青目珠直視者死兆也面如塗脂色若黃土油膩黑
氣塗抹者死兆也唇舌焦乾鼻生烟煤眼神透露者死兆
也形容憔悴精神昏短身形縮小者死兆也喘粗氣短鼻
掀睛露睛言謔妄者死兆也循衣摸牀遺尿失禁撮空者
死兆也頭低項軟眼視無神吸短氣者死兆也皮破無
血肉綻爛斑痲木不知痛癢者死兆也齒黃色如灰齒唇
白反理無紋耳黑焦枯不聽人中縮而坦平口張氣出無

同閉鼻煽相隨呼吸行汗出如珠不散痰若膠而望凝白
血紅如肺色指甲灣而帶青神昏神浮神亂神離縞衣生
清面黑氣慘天庭以上皆死兆也死症外見斷無生理於
必死之中而求其再生之法舍人參芪木當熟金銀花附
子河無怨丹也至于可生之症若何腫高勢大而易爛易
腐此生之機也奇疼奇痛而有神氣此生之機也膿臭而
能進食敗中而有紅肉此生之機也有生機者用補藥而
漸能奏功無生機者用補藥而終難建續然亦有大用補
氣補血之藥而益之化毒之品亦能奪命于頃刻又不可
洞天奧旨 卷之二 瘡瘍生死論 大雅堂

洞天奧旨

卷之二 瘡瘍生死論

大雅堂

委而棄之使瘡鬼泣于夜臺怨醫士之失救也
又曰瘡疔別死有數症其一在伏兔其二在臍臍即足
肚也其三在五臟之俞穴其四在頂其五在膈其六在
陰其七在耳之虛處其八在玉枕其九在舌本其十在
垂膺即喉管也此十處最忌其餘或生或死未可必也

瘡瘍嘔吐論

凡治瘡瘍皆宜顧其胃氣蓋有胃氣則死症能生無胃氣
則瘡症變重重則與死為近矣可不急顧其胃氣乎惟是
瘡瘍之生多傷胃氣其故何也蓋火毒侵犯之也夫火毒

起胃何以胃氣即傷以胃乃心與包絡之子也火毒外不
得遽發往往內攻于心而包絡為心之相臣護衛甚力不
許火毒之內侵未免號召五臟六腑同來救應胃乃心與
包絡之子見君父有難奮不顧身首先勒王火毒甚熾其

鋒難犯自然受創而敗而火毒乃舍包絡而直入于胃矣
胃入火毒胃不自安乃上越而作嘔甚即大吐皆火毒祛
之也夫同是火毒之相祛何以有嘔吐之別蓋嘔者有聲
無物乃火毒之傷胃氣也吐者有物有聲乃火毒之傷胃
血也雖嘔吐分氣血摠之皆傷胃氣耳胃氣既傷自宜補

洞天奧旨

卷之二

瘡瘍吐論

三

大雅堂

胃矣然又不可純補胃也當觀其喜惡何如而佐之解毒
之味則萬不失一也如嘔吐而大便閉結喜冷飲者宜降
火清中喜熱飲而惡寒便利如常者宜養其胃如嘔而腸
鳴腹痛作泄者宜托裏溫中如嘔吐後飲食頓進者宜大
補氣血如瘡瘍未潰作嘔及惡心者乃毒氣內攻而胃氣
素虛竟補胃而不必散邪如瘡瘍已潰而作嘔及惡心者
或不食痞滿腸鳴腹痛大便利而作嘔及噦聲不絕不得
安然宜托裏溫中是皆治嘔吐之樞機治瘡瘍者不可不
細心而審問之也以上分別治法無非顧其胃氣也胃氣

安寧服藥自然奏效何患變症之生哉彼陽變陰生變死
者多是損傷胃氣耳夫火毒原能傷胃况加敗毒之藥一
味呆攻禁已虛而重虛乎毋怪敗壞決裂竟至于不可救
已也謂非醫殺之乎是可深痛也

瘡瘍口渴論

夫口渴之症未有不是火之作祟也而瘡瘍口渴尤是火
毒無疑但火有陽火陰火陽火可以外水止之而陰火不
可用外水也蓋愈飲外水其渴愈甚然而瘡瘍之症口渴
甚多大約陽火居其七陰火居其三陽火之口渴必不甚

洞天奧旨

卷之二

瘡瘍口渴論

四

大雅堂

以陽火之症內有陰水以濟之也若陰火口渴既無內水
之滋惟有內火之燥故其渴更甚于陽火夫火非水不制
何以飲外水而渴甚豈水不可以制火乎不知真水可以
制邪火外水非真水也安得不加橫乎所以陽火宜用寒
涼以少止其口渴陰火宜用溫補以止其口渴也而陰症
口渴何以辨之大約陽症口渴者其脈必洪大而數實陰
症口渴者其脈必細數即或洪大按之必無力然而不可
拘也吾又辨其舌之燥滑也陽症舌必燥陰症舌必滑也
燥用寒涼以瀉火滑用溫補以解毒又何疑乎然更須外

已潰未潰而治之未潰而作渴者多是火毒之盛已潰而作渴者蓋是氣血之虛故未潰之前可用瀉于補之中而已潰之後但可補而不可瀉也雖古人治法止論已潰未潰皆用加減八味丸治之大效然此乃治陰癰之法也倘是陽症其中有肉桂在內吾恐反濟其火矣雖六味丸多是補水之味水足自能制火然而星星之火能燒萬頃之山萬一火盛水不足以濟之未必不轉助其焰而動其禍也是加減八味丸以治癰疽之初發尚非法之善也蓋陰症可用熱劑而陽症斷不宜遽用熱劑又在人臨症以變劑天與旨

卷之二 瘡瘍口舌論

五

大雅堂

瘡瘍秘結論

瘡瘍之發發于火也火發必犯于心火即移其熱于大腸而閉結之病生矣夫心與小腸為表裏宜移其熱于小腸何故移熱于大腸乎不知大腸雖不與心為表裏而實與肺為表裏也心得火毒木有不轉移于肺者也則肺即刑大腸矣况火毒最烈肺自難受自分其煩與大腸而大腸屬金最長者火也且火又甚酷其燥金也必甚則乾燥可立而待矣或曰瘡瘍之火既分陰陽陽火宜刑大腸矣若

陰火之瘡瘍宜無犯于大腸而何以偏多閉結耶夫陰火者虛火也虛火者半出腎肝肝腎之火乃雷火也雷火最能燥水試看濃陰大雨之時一聞雷震而雲收雨止正燥水之明驗故雷火不動即已動則引心包之火而沸騰引陽明之火而震蕩火多則水潤水潤而大腸何能潤澤乎惟是瘡瘍之陰火乃邪火也何腎肝之雷火助之乎不知邪火出于肝腎則雷火與邪火相合竟不能分孰為邪火孰為雷火矣但火有陰陽之分而成閉結則一治法亦可相同乎而不可同也大約陽火閉結可用攻以通之陰火

洞天奧旨

卷之二 瘡瘍秘結論

六

大雅堂

閉結可用補以潤之也陽火未潰之前於攻之中而顧其脫陽火已潰之後于補之內即防其通陰火未潰之前不妨化毒以潤腸陰火已潰之後切戒攻毒以傷胃蓋老幼之虛實不等少不謹慎便至死亡烏可妄用驅逐峻利之藥哉

瘡瘍痛癢麻抹論

經云諸痛為實諸癢為虛實者邪實也虛者正虛也邪實多是陽症正虛多是陰疔凡瘡瘍之生腫而大痛者陽邪之大實也腫而微痛者陽邪之差實也小痛而大癢者陽

中之陰大虛也大痛而微癢者陽中之陰少虛也大癢而不痛者陰大虛而無陽也微癢而不痛者陰微虛而無陽也更有疥疥而不知痛癢為陰虛而不能通于陽陽虛而不能運于陰也論其輕重似乎痛重于癢與疥疥也而孰不然蓋瘡瘍最重者莫過于癢其次則在疥疥凡陰癢初發多起于癢人見皮膚之癢手爬搔之為快往往癢變為痛遂至敗壞決裂而不可治蓋痛乃陽毒而癢乃陰毒也夫同是火毒胡為陰毒烈于陽毒大約陰癢之生半成于鬼祟之纏人祟憑人身未敢驟侵先以癢試之故初發之時每每作癢及至人自爬搔鬼無所畏乃大肆其侵凌故大癢而轉變為痛矣治之法宜于大癢之時即用大補之藥而佐之化毒之品重劑以治之則火毒隨手而散萬不可待其大痛而後治之也以陰癢之生雖成于鬼祟之纏身然必正氣大虛邪始得而入之也設正氣不虛邪將安入故救大癢之陰癢必須大補氣血為主蓋陽毒可用攻毒之劑而陰毒必須用補正之藥也或曰瘡瘍初起雖發大癢而所癢之部位不大未必皆鬼祟之纏身何必以補氣補血之大劑治之然古人云外大如蠶肉內大如拳外大

洞天奧旨

卷之二

瘡瘍寒熱論

大雅堂

如拳肉大如盤未必單言背癢也吾以為凡生瘡瘍而大癢者皆當作是想豈可以所癢之部位甚小而輕視之乎至于疥疥則非大癢可比不妨緩緩治之然亦宜分已未潰也未潰之先而疥疥者邪毒壅于經絡已潰之後而疥疥者正氣耗于肌膚無難審量而用藥也

瘡瘍寒熱論

洞天奧旨

卷之二

瘡瘍寒熱論

八

大雅堂

之前者重惡寒于已潰之後者輕蓋火毒發越邪正交戰陰弱則生熱陽微則惡寒似乎未潰發熱乃陰血之衰其陽氣正旺也陽旺則火毒必熾而吾以為輕者以陽旺不至于變陰耳未潰惡寒乃陽氣之虛其陰血正勝也陰勝則瘡肉易生而吾以為重者以陰勝必至于耗陽耳已潰發熱或疑陰變陽也誰知乃陰虛而不能濟陽乎故病重已潰惡寒或疑陽變陰也誰知是陽虛而不能濟陰乎故病輕也既知寒熱之重輕見其寒而補其陽見其熱而補其陰何瘡瘍之難治乎然而寒熱無常有晝寒而夜熱有晝熱而夜寒有日夜惡寒而不發熱有日夜發熱而不惡

寒又將何法以治之哉嗟乎惡寒者非寒也惡熱者非熱也見其寒峻補其陽氣而不必泄其陰見其熱峻補其陰血而不必泄其陽自然熱者不熱而寒者不寒也或曰瘡瘍之生皆火毒也不消火毒而但補其陰陽母乃不可乎詎識正旺而邪自退也死補陽之味未嘗無消毒之味也補陰之品未嘗無散火之品也不則于補氣補血之中而寓之消毒散火之劑又未為不可耳惟是常症易治變症難治倘發熱而痛惡寒而躁又不可謂熱用補陰寒用補陽之法恐有寒盛格陽熱盛拒陰之症別當用從治之藥

洞天奧旨

卷之二

瘡癰寒熱論

九

太雅堂

寒因熱用熱因寒用之為得也

瘡癰辨膿血論

瘡瘍治法斷不可因循失治致養成膿往往火毒勢大爛成如盆之大而不可救療所貴于未成膿之先而急內消之也然既已成膿烏可無辨之法乎辨法奈何瘡有生熟膿有深淺多少按其瘡頭之痛與不痛軟與不軟而知之也微按之而輒痛者膿淺也大按之而痛者膿深也按之堅厚不甚熱痛者未成膿也按之軟薄而即起者有膿也不復起者無膿也有膿可鍼無膿不可鍼也膿深者可深

刺膿淺者宜淺刺豈可一概刺乎近世外科醫工動謂火毒在內若不開刀侵潰好肉如肘膝樞紐關切之所筋骨敗壞必成廢人斷須外泄毋論可刺不可刺輕用刀鍼每有無膿之癰一開瘡口鮮血逆流立時厥去皆不審其膿之有無耳夫瘡癰有陰陽之異陽症可以刀刺陰症切戒輕易動刀益陽症之毒淺陰症之毒深毒淺一舉刀而毒易泄必走于外毒深一舉刀而毒難出反攻于內矣及至攻于內而爛筋壞肉則內外兩敗艱于收拾卒至死亡醫者病家皆嘆癰癤之橫也詎知禍成于輕易之動鍼乎吾

洞天奧旨

卷之三

瘡癰辨膿血論

十

太雅堂

非禁人之用刺法也刺之當則死症可以變生刺之不當則輕病必至變重余親見數人皆因刺而危幾至不救後用參芪金銀花之類大劑煎飲始得收功故引此為戒也鐸又曰辨膿之法既已盡知而辨血之法又不可不知也無膿而流血者皆五臟之氣不充也五臟之氣不充則陰虛而火動矣安得無血乎虛火動者瘡必流血當審其經以救之故肝虛而火動者血必妄行也心虛而火動者血必無主也脾虛而火動者血必難統也肺虛而火動者血必上行也腎虛而火動者血必浮遊也此

虛氣之虛火如此若六腑虛火之動何獨不然然治其
臟而腑亦安補其臟而腑亦戢然安腑不能安臟補臟
必能補腑故補氣即是補血補血難以補氣蓋氣補即
是血補氣安即是血安也

瘡瘍險地論

經言五臟不調致生疽六腑不和致生癰有二三日即殺
人者有十餘日殺人者有一月殺人者有數月殺人者蓋
火毒輕則殺人緩火毒重則殺人急也大約殺人之瘡瘍
皆生于險地夫癰疽之生原無定位生于平地雖大而無

洞天異旨

卷之二

瘡瘍險地論

七

大雅堂

危生于險地雖小而必死險地者一在腦戶一在舌本一
在懸雍一在喉節一在胡脈一在五臟命穴一在五臟繫
脈一在兩乳一在心鳩尾一在兩手魚一在腸屈之間一
在小道之後一在九孔一在兩膈腸一在神主之舍一伏
兔一在兩鬢一在兩頤一在股胛一在兩脇一在于尻一
在兩腋此皆至險之處也生此部位十人九死然初發之
時急用補氣補血之味而佐之散火消毒之品亦可立時
而愈轉禍為祥無如世人初發之時皆不以爲急往往養
成大患卒至于不可救也夫天下何人不以性命爲重安

于因循而失治者亦有其故蓋癰瘡發于險地者初小痛
而不甚大痛每大瘻而不甚小瘻或發如米粒之泡或起
如疥瘡之頭其狀似微小而不足介意詎知乃至凶至惡
之兆乎古人云見有小異即須大驚正言險地之瘡瘍也
吾願世人險地初生凶惡之兆忙急早治即服補氣補血
瀉火敗毒之劑未必不救然亦須懺悔絕慾始能崇去身
安否則正未可知也

瘡瘍死肉論

洞天異旨

卷之二 瘡瘍死肉論

七

大雅堂

夫瘡瘍治法無非護其生肉不至于同死也然未死之肉
可以護之不死未聞已死之肉可以養之重生豈特不可
重生且當使之速去蓋死肉不在而後生肉可長也如癰
疽各瘍如楊梅結毒癰瘡便毒疔腫潰爛等瘡其中多有
死肉存蝕好肉苦痛難禁以致新肉不長徒用生肌之藥
彼此兩停不勝臭腐之侵愈加敗爛母論斷者不可復續
譬毒如狼虎蛇蝎豈可共處一室自然畏避之而不敢法
况敢和合而復聚乎無怪其久而不生肉也必須用刀針
割去死肉後以生肌之散藥助之以補氣補血之藥
不必又用敗毒散火之湯自然死肉去而新肉易生外毒

而內易補世人不知惟以敷貼膏藥為神奇全不曉存
留敗腐為凶惡為可嘆息也更有瘡瘍潰後不加謹慎動
生氣雖死肉已無而忽長贅肉亦宜用刀割去不可謂
是新肉而戒用刀鍼也蓋贅肉脹滿高形突其狀難觀
倘生于面目手足之間亦甚醜態故必須去之也或疑憎
怒不戒何便至脹生贅肉蓋怒氣傷肝肝傷必至剋脾脾
主肌肉脾傷則瘡口肉脹倘畏用刀鍼瘡口平復必有高
突之象或用烏梅燒灰少加輕粉一上即平且無痕跡又
治法之巧者也

洞天奧旨

瘡瘍死肉論

三

洞天奧旨卷之三

山陰陳士鏗敬之甫號遠公著

曾孫陳鳳



會稽陶式玉尚白甫號存齋評

玄孫增方校

瘡瘍生于富貴論

瘡瘍之生無分富貴貧賤然而貧賤之人往往易治富貴
之家每每難治其故何也蓋富貴之家所食者燔熬烹炙
之物也居處安逸姬妾衆多未免逸則思樂樂則思淫淫
則泄精必甚泄精既甚則腎水虧涸水去而火必動火動
而水更衰必至陰陽兩虧臨鑪不振于是服熱藥以助之
又嫌藥力之微也復修合金石等藥以博其久戰之歡然
而金石之藥止可助火而不能助氣夫助氣之藥舍人參
無他味也惟是富貴之人貪歡者多而吝惜者正復不少
用熱藥以助火非多加人參不足以駕馭其猛烈之威無
奈人參價高方士勸多用人參富貴人必有難色乃遷就
而改用他味未免力薄勢衰火旺無制而腎火沸騰矣火
勝則外勢堅舉而不肯倒自必多入房以快慾愈戰愈酣
火益熾而水益乾水乾則難以伏火而熱乃化毒結于腸

胃矣久之水涸火炎陽易舉而亦易泄心甚貪歡或有忍
精強戰之時火毒乃變為膿血每于不可思慮之處而生
癰生疽也故貧賤之人所生者半是陽毒而富貴之人所
生者盡是陰瘡以其結毒在于陰處故所發亦在陰之部
位陽毒易消陰毒難化又何疑乎雖然陰陽之毒總貴早
治治若早皆可速愈但陽宜清補以消毒陰宜溫補以化
毒也

疔瘡形症論

疔瘡之症其形多端近人有分三十四種者亦象形而名

洞天奧旨 卷之三 疔瘡形症論 大雅堂

之也其實分五色以配五臟庶足以包之不必多立名色
也如疔生于心經其色赤其形生于心臟之俞募經井之
端或手之小指身熱心煩睡臥不安口乾燥其痛應心小
便短赤面紅紫舌上有裂紋或有珠子如疔生于肝經其
色青其形生于肝臟之部位或在脇肋或在足之大指之
端其症寒熱頭項痛眼中發火光口苦膈痛小便難而青
如疔生于脾經其色黃其形多生脾臟之部位其症不食
多嘔吐如疔生于肺經其色白其形多生肺臟之部位經
絡或生于手之大指其症發熱咳嗽如疔生于腎經其色

黑其形多生于腎臟經絡部位足之小指湧泉等穴其症
寒熱面色黧此五臟之疔也凡見色黑者即治其腎凡見
色白者即治其肺凡見色黃者即治其脾凡見色青者則
治其肝凡見色紅者即治其心而佐之解毒托裏之藥何
疔之不盡愈乎况因其形色而察其經絡尤百不失一也
此古人所以止言五疔而不多其名目者誠得其要也然
吾更有兼治之法一見諸般疔毒除頭項之上開手即用
艾火灸之痛者灸至不痛不痛者灸至痛而止隨用金銀
花三兩紫花地丁一兩白礬三錢生甘草三錢當歸一兩

洞天奧旨 卷之三 疔瘡形症論 大雅堂

水煎服之則各疔無不盡愈倘人畏灸即單以此方煎服
二劑亦無不盡愈者也雖有緩急之分生死之異皆不必
問惟色慾則斷斷宜忌犯之不可救療非吾方之不神也
癰瘍疽疔但有陰陽內外虛實之分無大小之別外科
精要之書乃謂二寸至五寸為癰五寸至一寸為疽者
謬以小者為疔尤謬之謬也灸法上頭項禁灸餘疔無
不可灸也但服前方實救死之法人宜知之
瘡瘍陰陽真假論
經曰諸瘍痛癢皆屬心火似乎瘡瘍癰疽無非陽火也誰

知陽能變陰難濟陽無有一定之規乎夫陽火之旺乃陰水之虧也本是陽症亦宜補陰以濟之况原是陰症反用消耗之藥必至損陽而更潤其陰安得不變生偏勝之禍哉如瘡毒初起筋掣骨痛此寒氣之腫八風之變也非陰症似陽乎不用溫散而妄用寒涼或食生冷之物使瘡毒內陷遂至陰極似火甚而煩悶之症生苟不用溫煖之藥則陰不能退而陽不能回也如瘡毒初起色紫皮赤腫突作痛惡寒喜煖非陽症似陰乎不用寒散而妄用辛熱或食燔炙之味使瘡毒外腐遂知陽極似水甚而昏憤之

洞天奧旨

卷之三

論瘡毒陰陽真假

四

大雅堂

淨也詎知是陰虛而不能濟陽乎夫獨陰不生而孤陽亦不長也瘡瘍致膿血已淨則陰必大虛止補其陽則陽旺陰虛陽雖有濟陰之心而陰實無濟陽之力所以愈補陽而陰愈虛陰愈虛而瘡口愈難合也倘錯疑毒之未淨用敗毒之劑則已虛益虛不特損陰而兼損陽矣助陽尚難補陰况攻毒又安能濟陽哉此皆不識陰陽之真假母怪施治之誤也大約未潰之前多有陰症似陽之病若已潰之後雖陽症亦作陰症治之故俱宜用補而不可用散此實不傳之秘訣也

洞天奧旨

卷之三

論瘡毒陰陽真假

五

大雅堂

妊娠瘡瘍論

孕婦亦往往有生瘡瘍者不可與無孕婦人一概輕治之也蓋婦人懷孕宜護其胎一有損傷其胎立墮輕則殺子重則并其母而亦亡矣可不慎哉或曰孕婦既生瘡毒豈可以不治治之不知婦女既已懷孕其氣血半已蔭胎若再用敗毒之藥重傷氣血安得不墮胎乎雖有故無損畧消化其毒亦正無害然亦宜于補氣補血之中而少佐之以瀉火敗毒之味則在腹之胎無損而在膚之瘡亦易散也至于已產之後母論瀉火敗毒萬不可施即少少內托

亦宜禁絕蓋產後亡血過多血室空虛止存游氣一用消
耗之藥輒有頭暈眼花之症况禁消耗之乎如奪命返魂
諸丹其名則美其實則惡恐有砒礪硝黃巴射等味在內
其性暴悍安禁其攻擊乎每每有下喉而輒亡者治之法
惟大補其氣血而不必兼治瘡瘍蓋產婦生瘡盡是陰瘍
而非陽瘍也陰瘍在常人尚純用補劑產婦陰虛更無疑
也不補其陰又將何補哉惟是產婦陰寒補陰恐不能濟
陽也必須補陽以生陰而補陽之中更宜用溫煖之味使
榮衛通行氣血流轉則毒氣不必攻而自散矣否則恐致
洞天奧旨 卷之三 妊娠瘡瘍論 六 大雅堂
虛損成瘡甚或瘡口不斂卒至敗壞而不可救也

瘡瘍肥瘦人不同論

古人云肥人多濕瘦人多火濕多則痰盛而氣虛火多則
液乾而血少倘生癰疽瘡毒亦可同治之乎論理氣虛者
補氣以消火毒血虛者補血以消火毒似乎深得病機也
然而氣非血以相養則氣虛不能運旺也血非氣以相生
則血虛不能驟盛也蓋肥瘦之人分火多濕多則可分氣
虛血少則不可夫氣虛之人豈即血之旺乎血少之人豈
即氣之盛乎愚意氣血必須兼補當畧分輕重如肥人而

生瘡瘍也補陽氣之虛消痰化毒而不可耗其血如瘦人
而生瘡瘍也補陰血之虧消火敗毒而不可散其氣如是
則血足以助氣氣旺而火毒易發自發于表而不至遁入
于裏有陽或變陰之禍氣足以生血血旺而火毒易消既
消于裏而不至留滯于表有陰難濟陽之憂倘肥人但攻
其毒補陽而不補陰瘦人但攻火毒補陰而不補陽皆非
治法之善也必氣虛者重補其氣而輕補其血血虛者重
補其血而輕補其氣則陰陽兩平而肥人瘦人之瘡瘍無
難速效也

瘡瘍隨症用藥論

瘡瘍之症有陰有陽大約痛者為陽癢者為陰也未潰之
前多是陽症間有陰症未有不先癢者陽症初起其痛萬
常其形高突常用內疎之藥使陽火之毒外散而不遁入
于裏也陽症已成其皮必紅其頭必軟當用內托之藥使
陽火之毒內潰而盡出于表也陽症已潰其肉必腐其膿
必多當用大補之藥使毒散而不斷火泄而不陷長肉生
肌而和活其表裏也若陰症則不然陰症初起便虛即當
用大補之藥不比陽症因膿潰而始虛也故內疎亦必大

洞天奧旨

卷之三

瘡瘍肥瘦人不同論

七

大雅堂

補以疎之內托亦必大補以托之不必待其膿血已潰而後補之也然而陽症之變甚多而陰症尤甚既有變症豈可無變法以治之乎夫變症蜂起每在已潰之後而不在初起之時如潰後頭疼托裡方中不妨加川芎蔓荊子潰後驚悸必宜加人參茯神砂寒熱往來加柴胡地骨皮口渴不止加花粉玄參大便秘結加大黃麻仁小便不通加茯苓琥珀木通車前心虛煩悶加天冬遠志四肢厥冷加附子乾薑或嘔或吐加生薑半夏膿多者加川芎當歸血多者倍人參芪朮日不收者加白欬白芨皮肉陷者加

洞夫真旨

卷之三

瘡瘍開任論

八

大雅堂

肉桂甚附風癢痛者加防風天麻肌肉死者加獨活官桂疼痛極者加沒藥乳香此皆治陽症之變法也若陰癆變症惟有大人參芪朮多加金銀花肉桂附子之類庶可定變于非常萬不可執陽症治法以治陰變之瘍也

瘡瘍開任論

瘡瘍陽症其成膿之後必決竅而出或刀開其頭膿血逆流皆火一泄而即住必不走開沿爛無底止也有一等瘡

不大突嫩腫痛疼或重或輕輕者麻木而不知倘生于背

上如山之重重者宛如刀割刺織五七日後或一頭從上

開發或兩頭開發或左右上下開發侵展不住雖內經謂不善調養乃七情之擾房勞之變穢氣所撞惡氣所襲也然而所言亦言其陽症而非兼指陰症也大約開發不住陰症居多非大補氣血之劑以托于內非至妙收斂之藥以敷于外則內必冲突而外多腐爛也肌肉腐爛則氣血倍傷將來收口自然艱難而目前膿血何以止遏勢必潰壞而不可救矣故瘡口不開則毒必留中恐有奔心入臟之懼然瘡口大開則毒又沿外恐有爛膚壞肉之虞夫奔心入臟與爛膚壞肉相較似乎少間誰知爛膚壞肉一發

洞夫真旨

卷之三

瘡瘍開任論

九

大雅堂

而不住者皆毒氣奔心之變也所以用大補以衛其臟腑兼用收斂以護其肌膚蓋兩相顧而兩相治也或曰專補其內則氣血流動何畏腐壞乎不知火毒正熾其冲決之勢甚橫而且烈所到之處生肉即變為痰肉矣肉既變痰安能不開發而外出乎故必預內補而外敷則生肉有保守之資可恃無恐而火毒內難存留自然盡發于外并作一竅而出斷不至再為開發也

瘡瘍火灸論

近人治瘡瘍動尚艾灸誰知瘡瘍亦有宜灸不宜灸之分

乎大約陽瘡之癰疽不宜灸而陰症之癰疽必宜灸也蓋陽症之癰疽發于外也若用灸法則毒入于內而不出反多變症之生陰症之癰疽陷于內也若不用灸法則毒難發外而居中自多喪亡之禍而灸法若何先用白紙一張口含水漿濕鋪于瘡面之上看其何處先白即瘡癰之總口也以墨筆點定其穴用大蒜切片如一分之厚貼于穴上隔蒜灸之世有用附子片者有用生薑片者皆可用總不若蒜片之更勝初灸即痛必灸至不痛始止初灸不痛必灸至痛始止自一痛至數十痛或至數百痛不可半塗

洞天奧旨 卷之三 瘡瘍灸論 大雅堂

即撤也若初灸麻癢者亦必灸至痛而止蓋毒隨火化自然內之火毒隨外之艾火而宣散也實至奇至神之法不可視為尋常而輕忽之然而陰症之癰疽亦有不可灸者又宜知之陰症癰疽在頸以下者無不可灸而生在頸以上者即是陰症斷斷忌灸蓋頸之上頭面也六陽之首而頂通于腦一用火攻則火毒無內藏之處必遁入于泥丸而不能出轉成不可救之症矣世人誤認灸法神奇毋論可灸不可灸一槩用艾火灸之灸之不效歸咎于瘡癰之拙也而不知是誤灸之故也更有腎俞一穴在兩腰脊旁

係內腎命根此處亦斷不可灸蓋因水虧火動故爾發瘡若再加火灸愈添火熾其水益涸必致瘡口黑陷昏悶而死可不戒與大約陰虛之人毋論生疽在首在腰俱不可灸往往有因灸而犯虛虛之禁世人競尚灸法余特著此篇與瘡家共商之云

瘡瘍刀鍼論

瘡瘍之發發于臟腑非發于肌肉皮膚也善治者五日之內原可內消因內消難施以致發越于外五日內急用內治尚可消化于無形也不意仍復因循八九日遂成高突

洞天奧旨 卷之三 瘡瘍刀鍼論 大雅堂

之勢疼痛作屢不得不用刀鍼去其膿而瀉其火敗其毒而全其肉也若疔惡之症發于致命之所禱在反掌不得不刺故砭石鏡鍼刀鋒之類皆古人所制為決瘡毒之器也古人豈好為忍心誠有所不得已耳然則刀鍼之類古人不得已而用之今人不論可刺不可刺動用鍼以去膿動用刀以割肉往往有無膿而迸血割肉以損肌瘡瘍不愈而變症蜂起歸咎于刀鍼豈不冤哉我今商一用刀鍼之法見有屢急用鍼而不可緩否則寧少遲也見瘡肉急用刀而不宜徐否則寧少延也何至于誤用乎或人畏用

刀鍼而瘡口已軟膿血已多急宜割刺又有代鍼代刀之藥服之頃刻皮破而膿潰敷之頃與肉化而肌生亦仁心神術也願醫工留意而亟施之也萬勿歸咎于不肯割刺而不可救迷坐以待斃也變通之法原在乎人救療之方豈止一術亦貴臨症者善用耳

或曰瘡瘍既可內消何必又尚刀鍼不知進用內消之藥則火毒內攻暗燥肌肉外口雖小其內之窟正寬廣也譬如賊居深山之中無官兵攻散巢居穴處將關土自王而外邊關隘過作細小彼惟恐人知聊以掩飾耳

洞天奧旨 卷之三 瘡瘍刀鍼論 主 木雅堂

倘不破其關隘則其勢日張延蔓無已罔所顧忌呼朋引黨勢必民化為盜而好肉變為腐肉矣故必須用刀鍼刺其外邊瘡口之皮夾其內中滿腫之勢則內無隱藏毒可星散然後外用膏藥末藥呼其膿而護肌內復用湯劑散其毒而還元此刺撫並施之妙法也倘專尚刀鍼而畧去膏末湯劑亦未為十全耳

又曰人有畏用刀鍼有用蜈蚣針者亦變法也法用筆一個入蜈蚣一條以管口對瘡頭使蜈蚣吮瘡之膿血其毒即散如瘡大須換三四條若吮正穴蜈蚣必死矣累效

之法也但可施于血實毒淺之症而不可施于陰症毒重之人徒竭其血于外面而內實無益也
又曰人身有太乙人神在各穴中最宜忌之如逐年尻神逐日人神之類查歷木書之頗詳偶一犯忌禁其瘡瘍難愈

洞天奧旨卷之三終

瘡瘍刀鍼論 主 木雅堂

洞天奧旨卷之四

以陰陳士鐸收之前號遠公著 曾孫陳鳳輝刻儀甫梓

會稽陶式玉尚自甫號存齋評 玄孫增方湖洞民校

瘡瘍救藥論

瘡瘍內散第一善法也至瘡口已潰內不能散必須外治之矣外治之法最多大約敷法為佳敷者化也散也乃化散其毒使不壅滯耳然瘡瘍之緩急不同火毒之冷熱亦異必須敷得宜而後效驗始速如赤腫焮痛此陽火之

洞天奧旨

卷之四

瘡瘍救藥論

木雅堂

毒也宜用寒性化毒敗火之藥敷之如不變色而腫勢深暗者此陰火之毒也宜用溫性化毒敗火之藥敷之如不熱不涼此半陰半陽之火毒也宜用和解化毒敗火之藥敷之自然肌肉不壞而毒隨藥散火隨藥消膿易熟而肉不收也倘宜寒而用熱愈增其外炎倘宜熱而用寒益添其內陷倘宜和解而用攻擊自至于敗壞而不止也總之瘡瘍貴內外兼治而敷藥亦不可猛浪輕忽要貴用得宜耳

又曰瘡瘍既以陰陽辨之矣而陰陽之中俱用敷藥貼

之如陽症用寒藥貼之期其必散也後用熱藥散之不可竟用寒藥也如陰瘡初起即用熱藥後不必又用寒藥也如半陰半陽以敷藥和之雜用溫藥散之不可先用寒後用熱也故不必論其皮之厚薄或先或後或乾或濕或生或死或香或臭惟以三者消息之斷不爽也

瘡瘍治法論

瘡瘍治法甚多鍼灸之外有用湯浴之法者有用燻灸之法者有用點照之法者有用追蝕之法者有用蒸之法者有用吸之法者有用烙之法者用之得宜皆可奏功用之

洞天奧旨

卷之四

瘡瘍治法論

木雅堂

失宜皆能敗積余所以一槩棄而不用也古人創造諸法未嘗不效故留法以示人而無如後人不善用之反至取敗耳夫有效有不效尚非萬全之法况無功而有敗又何取哉余近得異人之傳皆以內治收功並不見有收壞之時聞有收壞之症多是乖成別用以上外治之法而變遷之也故余益信湯浴燻灸點照追蝕蒸烙盡非良法也守術之大 何敢謂諸法盡可廢棄豈別有仙傳制度得宜奏效如响亦未可知而錄實未遇之也以上諸法之內追蝕而用水蛭以吮血吸治而用蟾蜍以收火無害有益

似可用之餘則未敢信其皆善也總之爭先之法莫妙於
內治為良內治必須急早治之蓋治之早則必散之速治
之緩則必散之遲何苦因循懈怠必俟成膿出毒後用諸
法之紛紛哉

瘡瘍調護論

瘡瘍火毒亦甚大矣哉而世人往往輕視自以性命為兒
戲也大癰惡疔至危至險出生入死多在呼吸之際必宜
謹慎即小瘡細癩亦不可輕忽蓋七情犯之十惡冲之或
食異禽野獸之味未潰者忽變為深陷已潰者倏易為黑

洞天奧旨

卷之四

瘡瘍調護論

三

大雅堂

紫終年累月醫療不轉可不慎乎無如世人偏易相犯其
間諸忌之中尤宜慎者惱怒與色慾耳然而犯惱怒者不
過瘡口有疼痛開裂之虞若一犯色慾則瘡肉有冰凍之
苦新肉有流水之害然此猶陽症之瘡瘍也苟是陰症一
犯色慾多至暴亡非大用人參芪朮歸熟而重加金銀花
桂附之品以急救之斷無生理萬不可仍治其毒而天
性命也世人何苦貪片刻之歡愉受長夜之疼痛乎或謂
瘡口開裂流水畢竟有火毒留于其中恐純用大補終非
救療之法不知瘡瘍已潰之後原作陰虛治瘡况已結痂

而復碎况已止血而流水又有何火何毒可已慮而重虛
乎毋怪頃刻之驟亡也吾願行醫者時將危語陳說于病
人之前庶幾少知畏懼不至輕蹈色慾之戒乎說知故犯
罪在病人自取速亡與醫者何尤哉或曰先生既云犯色
慾之禁者必用大補乃用金銀花獨非瀉毒之物乎何所
取而用之不知金銀花雖曰化毒實亦補氣血之品也誠
恐餘毒猶存故爾用之取其補而能飲非取其瀉而去火
也倘真信其無毒而單用補劑尤治療之神藥又何敢議
哉

洞天奧旨

卷之四

瘡瘍調護論

四

大雅堂

又曰瘡瘍飲食之間最宜細慎如食驢馬駝驢猪狗魚
蝦蟹鱉自死之屬如鴉鴨鴻雁鷓鴣雀鴛鴦鴉鴉雞雉能
言之類如獐鹿狐兔虎豹熊豺毒死之輩如黃瓜茄子
胡荽生薑蓼芥葱蒜薤韭之物如桃李棗栗梨梅櫻柿
未熟之品如饅首蒸餅餛飩及燻蒸煎炙油膩飽食均
宜忌之惟羊肉蔓蘿葡與黃白米糧可用

舍癰從症論

瘡瘍之症變怪百端然皆因火毒之盛也但火毒在未潰
之前其勢甚凶其禍少緩而火毒當已潰之後其勢大衰

其禍更速夫勢凶則禍速宜也何故勢衰而禍轉不幾乎
 不知癰疽與各惡瘡當膿血崩泄之餘其邪火熱毒盡行
 外越所存餘血盡化為膿且隨之而回敗惟一口正氣爾
 懸于驅殺之中又有何實之有譬如強賊久居村莊一旦
 變亂劫人貨財擄人妻女將各家金錢盡行席卷驅少壯
 良民皆為盜黨而去而城市空虛所存父老子弟非孱弱
 幼小即膏肓殺傷之輩自救不遑安能重擊戈矛再鬪爭
 戰乎且寇盜雖去而無衣無食何以度日自然枵腹難熬
 變生疾病養生之不暇又烏能修我牆垣戢理茅舍乎其
 洞末奧旨 舍脈從癰論 五 大雅堂

捉襟露肘之苦有不可言語形容者于足痛定思痛窘迫
 之狀百倍于強梁現在之日往往民欲不從而不可得者
 故瘡瘍已潰之禍較未潰之前而更速也所以未潰之前
 變止在于攻尖之內而已潰之後變每出于敗壞之餘實
 有意想之所不到者當觀其所變以治症而不可執其經
 以治病也倘執經以治變未有不速之死者矣然則治變
 之法奈何大補其胃氣而不必問其火毒之存與不存者
 此舍癰治症之法即定變救癰之法也名為舍癰正所以
 療癰耳願與同人共商之焉

舍脈從癰論

瘡瘍之脈未有不緊數洪大者或浮而弦或細而數或滑
 而緊或滑而洪種種不同必須辨其陰陽大約細滑者陰
 也緊數洪大浮滑皆陽也然陰陽之脈更須分別已未潰
 觀之未潰之時脈見緊數洪大浮滑皆實者乃順之脈也
 若見細滑等脈則逆矣已潰之時脈見浮沉遲細軟弱滑
 乃順之脈也若見洪大等脈則逆矣然而順逆不常虛實
 宜別脈可執而不可盡執也脈既不可盡執而癰則可見
 矣往往有未潰之前脈現洪大而得生已潰之後脈現細
 洞末奧旨 舍脈從癰論 六 大雅堂

滑而反死蓋攻補之異也大約癰瘍各症未潰宜補以用
 攻已潰宜補而不可散而脈之或洪大或細滑可不論也
 鮮又曰癰瘍有變換之時脈隨癰瘍之變換而遷改也
 故瘡可據之以辨陰陽而脈不可據之以辨虛實以可
 據者可信脈而不可據者豈可信脈哉余素信脈者也
 但人生癰瘍者有時脈不可全信所以從癰瘍而舍脈
 也非脈不可信而全不信有如此人亦宜善看癰瘍矣
 酌于二者之間而已

舍時從癰論

凡四時之際多發瘡瘍非因時而發乎然瘡瘍之發多緣于火熱夏天之時正火熱時也瘡瘍生于夏天謂非火熱之極乎然夏天瘡瘍是火熱也若秋冬之時其火已散其熱已解火散熱解其毒已消不比春天之鬱正熾也故瘡瘍生于四時不可與夏天同論以時有不同也是以瘡瘍生于夏日與生于四時有異蓋夏日可據時以論症而四時不可因症以論病以夏日有火熱而四時無火熱也夫夏日之火熱隨外而動四時之火熱隨內而生內無火熱則外之火熱何以引之苟外不必引而內之火熱自動者洞天奧旨 卷之四 合時從流論 七 大雅堂

以內之火熱自甚也故瘡瘍生于夏日者內之火熱因于外之火熱相逼也瘡瘍生于四時者內之火熱不因于外之火熱相逼也所以生于四時者較夏日而更重合時從癰又何疑哉然則腫赤煩燥發熱飲冷便秘作渴脈洪數而實雖在嚴寒之時皆火熱也必用苦寒之藥瀉其陽而救其陰則火熱自散烏可因時冷而用熱藥哉若脈細皮寒瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足逆冷雖在盛暑之時皆寒冷也必用辛熱之劑散其陰而回其陽則火熱自解烏可因時熱而用寒藥哉誠以夏日不可與春日並斷

而尤不可與秋冬並論也四時五虛五實之不同而瘡瘍不可拘也若泥而執之則誤之甚矣

又曰五實之症如腫赤煩燥發熱引冷便閉作渴脈洪數者是也雖生于嚴寒必用大苦寒之藥瀉其陽以救陰也五虛之症如脈細皮寒瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足逆冷者是也雖生于盛暑必用大辛熱之劑散其陰以回陽也若寒時治寒熱時治熱鮮不誤矣

瘡瘍用金銀花論

瘡瘍必用金銀花者以金銀花可以消火毒也然毒實不洞天奧旨 卷之四 瘡瘍用金銀花論 八 大雅堂

同有陰毒陽毒之分其毒之至者皆火熱之極也金銀花最能消火熱之毒而又不耗氣血故消火毒之藥必用金銀花也以金銀花可以奪命不分陰陽皆可治之蓋此藥為純補之味而又善消火毒無奈世人以其消毒去火而不肯多用遂至無功而且輕變重而重變死也若能多用何不可奪命于頃刻哉誠以金銀花少用則力單多用則力厚而功巨也故瘡瘍一門舍此味無第三品也所以瘡瘍初起必用金銀花可以止痛瘡瘍潰膿必用金銀花可以去眩瘡瘍收口必用金銀花可以起陷然

此猶補陽症之瘡瘍也若陰症初生背必如山之重服金銀花而背輕矣陰症潰膿心如火焚必服金銀花而心涼矣陰症收口瘡如刀割必服金銀花而皮養矣然此猶陰症而無大變也苟痛癢之未知昏憤之罔察內可洞其肺肝外可窺其皮骨飲之而不欲食之而不知惟金銀花與同人參大劑治之亦可以奪命而返魂也誰謂金銀花豈小補之物哉而世人棄之者因識其小而忘其大是以他藥可以少用而金銀花必須多用也知金銀花之功力若此又何患哉

洞天奧旨

卷之四

瘡瘍用金銀花論

九

大雅堂

瘡瘍不可純委鬼神論

瘡瘍昏憤多是虛症其見神見鬼者人謂是前愆夙債耳夫前愆可以曉蓋夙債可以今償每用銀錢以買命棄珠玉以續怨亦有得生者世遂謂有鬼神可以誠求可以哀告耳而孰知不然蓋瘡瘍之鬼神因虛而自作不補其虛而惟求鬼神之解結鬼神其肯去乎况鬼神之現必非無由因虛自召非真有鬼神也故補虛而鬼神自絕不補其虛虛且難回鬼神何以去乎苟能察其自虛而大用金銀花之類佐之參芪歸朮則鬼神自去正歸而邪自散也及

至瘡瘍漸愈而鬼神暗失始信前非謂是無鬼無神之論而仍不信者謂之何哉

鐸又曰世有生瘡瘍而召鬼神者亦有不生瘡瘍而多集鬼神者是鬼神不因瘡瘍而有也余醫瘡瘍者有年往往見危困之時每遇鬼神痛哭呼號暗擊重責而已者是瘡瘍確有鬼神也及至大用參芪之後漸復其元而佐之消毒去火之劑健脾和胃之品正氣日旺邪氣日退不必逐鬼而鬼自走不必祛神而神自歸豈藥可祛逐鬼神乎可見人虛自召補虛正祛鬼神之法非

洞天奧旨

卷之四

瘡瘍鬼神論

十

大雅堂

鬼神之果無也

鐸又曰言鬼而神在其中尼山云敬鬼神而遠之遠之者敬之也非無鬼無神之論補虛者正遠鬼神也人能常敬鬼神斷不戕賊身體致生瘡瘍以召鬼神暗擊重責耳

產婦生瘡瘍宜用補陰論

古人云產後必大補氣血為主其他俱從末治可見產婦末有不虛者虛則必用補氣補血之味氣不補則氣衰血不補則血少氣血衰少者陰不足故耳故產婦必以補陰

爲先以亡血過多必至失陰耳或謂陰不可以驟生必先補氣以氣能生血氣旺則血旺血旺則氣益旺矣不知產婦之生瘡瘍者不可徒補氣也補氣必至生血血旺而瘡瘍同旺者奈何况瘡瘍之生皆血虧耳血虧則陰愈虧補陰而瘡瘍自失蓋陰能制夫陽也陽受制則陰日旺矣陰旺而瘡瘍之間有血以潤腸胃有血以養筋骨又何火毒之不盡散乎若補其陽有不增瘡瘍之勢哉故補陰于產婦勝補陽于產婦也是以補陰于陽中不若補陰于陰中也大約補陽者四補陰者六陰無陽旺而陰消矣

洞天奧旨

卷之四

產婦生瘡瘍宜用補陰

上

大雅堂

鐸又曰產婦生瘡瘍當分別生產與未生產未生產之前胎不崩墮血未虧也止補陽以生氣不必補陰以生血少佐之消毒敗火之藥則得矣已生產之後血大虧也惟補陰以生血氣且補陽以生氣而消毒敗火之劑不必佐之也若慮瘡瘍之害而不顧產婦之虛怯一味消毒敗火鮮不悞矣

瘡瘍不必隨經絡用藥論

瘡瘍之生宜分經絡既有經絡烏可不分哉吾以爲不必分者以瘡瘍貴去其火毒不必逐經逐絡而用藥也以瘡

瘍之生有經絡之分而用藥之妙單以消火毒爲主以火毒去而瘡瘍自失經絡不必分而自分也試思解火毒之藥不外金銀花與蒲公英之類若必隨經絡而分之亦繁之甚矣用藥胡可雜哉

鐸又曰瘡瘍之生不在一處若不分別經絡則五臟七腑何以清頭面手足何以辨不識不知何所據以治痛癢哉雖金銀花蒲公英之類皆可散消火毒然無佐使之藥引之以達于患處亦不能隨經而入之是經絡之藥不可不用亦不可竟用之耳

洞天奧旨

卷之四

瘡瘍不必隨經絡用

上

大雅堂

洞天奧旨卷之五



山陰陳士鏗校之甫號道公著 曾孫陳鳳 會稽陶式玉尚白甫號存齋評 立孫增方湖河氏校

背發

諸癰瘍發于背者無非危症不可謂背屬陽信是陽症而輕視之也然背之穴道甚多苟不言之則經絡舛錯未必能直中病情也如生于大柱陶道身柱之穴是發于脊之上也生于神道靈臺至陽之穴者是發于脊之正中也

洞天奧旨

卷之五 背發

大雅堂

生于脊中之穴者是發于脊之中下也皆屬督脈之經絡生于肺俞厥陰俞心俞膈俞肝俞之穴者是發于背中之兩旁也生于鬲關陽綱包脊秩邊之穴者乃發于背後之兩旁也皆屬足太陽膀胱之經絡夫既是膀胱之經絡似與督脈無甚相干然而背脊乃河車之正路正路之氣不通則邊旁岐路盡行秘塞勢必至水火無既濟之歡臟腑有各顧之苦則周身前後筋脈拘急其害有不可勝言者故治太陽之經必須兼治督脈以督脈之氣可順而不可逆也凡氣皆自上而下行惟任督之氣自下而上自下而

上者為順自上而下者為逆矣且督脈陽脈之海也足太陽之經原為督脈之所統領通足太陽之氣正通督脈之氣也然而督脈氣通而足太陽之氣亦通矣故治之必須兼也以上諸瘍有頭向上者有頭向下者有上下各有頭而開發者或如蓮子或如蜂窠蓮子言其頭少不過一二十也蜂窠言其頭多不止五六十也此等癰瘍陽症少而陰症多總貴擁護心君不可使火毒內攻無奈背近于心最易腐肉穿膜及至穿膜百不救一必須于五日之前急早治之以大劑酣飲庶可奪命于垂危返魂于將死也凡

洞天奧旨

卷之五 背發

大雅堂

瘡頭開展止過不住不論向上向下向左右亟宜用收毒等藥敷而圍之自不冲突也如此救療胃氣大開斷不至死

急消湯 岐天師傳治背心之關先發細熨後漸漸

紅腫高突大痛

忍冬藤 二錢 茜草 三錢 紫花地丁 一兩 貝母 三錢

甘菊花 三錢 黃柏 一錢 天花粉 三錢 桔梗 三錢 水煎服

一劑輕二劑又輕三劑全消

神散陽離湯 伯高太師傳治背疽陽離初起

天花粉 五錢 生甘草 五錢 茯苓 五錢 車前子 五錢

骨節 五錢 羌活 二錢 黃芩 三錢 紫苑 三錢

生地 一兩 柴胡 一錢 一劑水煎服即消大半二劑

全消若已潰後不可用矣

變陽湯 岐天師傳治背心初發小泡癢甚已而背

重如山隱隱發紅暈如盤之大謔語胡言斷陰疽陰

癰也以此方救之

人參 二兩 黃芪 二兩 金銀花 半斤 附子 一錢

荆芥 炒黑 三錢 柴胡 二錢 白芍 一兩 天花粉 五錢

洞天奧旨 卷之五 大雅堂

生甘草 五錢 水十餘碗煎汁二碗先服一碗後再服

一碗服後陰必變陽而作痛再用一劑而痛亦消

再服數劑全愈

錦底湯 伯高太師傳治陰癰初起

黃芪 三兩 肉桂 三錢 生甘草 一兩 荆芥 炒三錢

天花粉 三錢 貝母 二錢 錦地羅 五錢 茯苓 一兩 水煎服

一劑即散大半三劑全消

轉收湯 岐天師傳治背癰潰爛洞見肺腑瘡口不

收百藥敷之絕無一驗此方治之神效

麥冬 一兩 熟地 二兩 山茱肉 一兩 人參 五錢

肉桂 一錢 當歸 一兩 忍冬藤 一兩 白朮 五錢 水煎服

五劑全愈

收肌飲 伯高太師傳治同前

熟地 二兩 白朮 二兩 山茱萸 一兩 人參 一兩

當歸 一兩 生甘草 三錢 甘菊花 三錢 肉桂 三錢

天花粉 二錢 水煎服一連四劑瘡口自合必瀕節守

房事一月否則無功

定變回生湯 岐天師傳治背疽長肉瘡口已平偶

洞天奧旨 卷之五 大雅堂

犯色慾惱怒開裂流水色變紫黑肉變敗壞

人參 四兩 黃芪 三兩 當歸 二兩 北五味子 二錢

麥冬 二兩 肉桂 三錢 白朮 二兩 山茱萸 五錢

忍冬藤 二兩 茯苓 一兩 水煎服四劑平復或疑藥料

太重然變出非常不如此多用補劑萬難救死也

倘愈後再犯色慾萬無生機

補經飲 伯高太師傳治背癰愈後開裂

人參 二兩 白芍 五錢 當歸 一兩 白朮 炒二兩

麥冬 一兩 肉桂 一錢 附子 一錢 熟地 二兩

北五味 三錢 山藥 五錢 水煎服十劑可安

助陽消毒湯 岐天師傳治夏生背癱瘡口不起脈

大無力發熱作渴自汗盜汗用參芪補劑益加手足

逆冷大便不實喘促嘔吐陰虛似陽此方主之

人參 半斤 黃芪 一斤 當歸 四兩 白朮 四兩

陳皮 一兩 附子 五錢 水煎膏作二服連服數劑乃

愈此舍癱從症之法蓋症出非常不可以平常細

小之藥以從癱也

起陷神丹 伯高太師傳治症同前

洞天奧旨 卷之五 背發 五 大雅堂

人參 二兩 白芍 五錢 當歸 一兩 麥冬 一兩

白朮 二兩 肉桂 二錢 附子 一錢 熟地 二兩

北五味 三錢 山藥 五錢 水煎服十劑可安

歸花湯 秦真人傳治癱疽發背初起

金銀花 半斤 水十碗 當歸 二兩 同煎 一氣服之一日

即散絕神方也世人亦有用此者不能多耳不拘

陰陽之毒飲之立愈但過四五日則減半效然亦

無性命之憂對口與無名腫毒亦可用或畧小其

劑可也

泥丸發

泥丸宮在頭頂之上癱瘡發于此處九死一生其狀如火
療聚炮大如錢形色似葡萄之紫其瘡口不一或如碎粟
倘四圍堅硬瘡頂色紅赤不黑尚可醫療乃陽癱而非陰
也倘色紫而黑黯無光神情悶亂不知人事者乃陰癱而
必死也蓋泥丸宮屬足太陽膀胱之經近于玉枕乃督脈
之路也腎經之氣由督脈而上透玉枕入于泥丸而化精
乃從額而下降于玉樓若腎精不足而泥丸內涸無精以
養乃化爲火毒此無陰水以制陰火也腦既無陰又加生

洞天奧旨 卷之五 泥丸發 六 大雅堂

癱腦海煎熬其精愈竭又何以救乎故往往有更變形容
改換聲音煩躁口乾隨飲隨渴甚至腦骨俱腐片片脫下
而亡人生此癱得于房術者居多與陽溢精盡是丹石燥
烈之品或洗或嚼或喚于舌或封于臍斷阻精道久戰博
歡真精枯竭髓盡火發遂發于頂而不可救爲可痛也必
須于五日之前以大劑煎飲尚有生機倘五日後救之則
生死未可定也

五聖湯 岐天師傳治腦癱生于頭頂之上者若對
口偏口俱非腦癱也急以此方救之

金銀花 八兩 玄參 三兩 黃芪 四兩 麥冬 三兩

人參 二兩 先用水十大碗將金銀花煎湯六碗再

煎前藥至二碗一日服二次連服四日用四劑其

癰漸愈改用十全大補湯重四兩與之又服四劑

又改用八味地黃湯然其甜飲可獲全愈此等治

法乃九死一生之法也然舍此法惟蔓花湯平

蔓花湯 伯高太師傳治腦疔初發

川芎 一兩 玄參 二兩 金銀花 二兩 山茱萸 一兩

麥冬 一兩 貝母 三錢 蔓荊子 二錢 水三大碗煎服之

洞天奧旨 卷之五 七 太雅堂

即消如尚未消者二劑全愈萬勿候其潰敗而始

救之也蓋潰敗之時則不可救矣

腦後發

腦後乃玉枕風府之穴道也玉枕為督脈之關蓋督脈有

三關玉枕其一也督脈由命門而上至玉枕乃河車之路

也透過玉枕始達泥丸若玉枕風府生癰如何能達腎氣

至泥丸而化精乎雖泥丸為髓海內原有髓在也然腎氣

無一日不上通泥丸者也腎氣因生癰而不能上達則泥

丸之髓源斷矣何能化精以分布于各臟腑乎此處生癰

雖少輕于頂然是陰非陽則與頂發無殊故治療亦可通

用如五聖散蔓化湯大劑吞服無不可救不比頂發于泥

丸者十死而一生也或曰玉枕風府係足太陽膀胱之經

且陽維之脈所繞未必不是陽症誰知膀胱火毒發動由

于腎火之先動也况陽維之脈隨督脈而上行是陰非陽

又何疑哉故可以治頂發者同治之也

三星湯 岐天師傳治陽症對口其形高突紅腫服

之即消

金銀花 二兩 蒲公英 一兩 生甘草 三錢 水三碗煎八分服

洞天奧旨 卷之五 八 太雅堂

二服即消陽症已破者必三服膿盡肉生

聖神湯 岐天師傳治陰症對口或生于偏旁無數

小瘡先瘻後痛隨至潰爛腫不甚高突色必黑黧身

體沉重困倦欲臥呻吟無力此方救之

人參 一兩 生黃芪 一兩 當歸 一兩 金銀花 二兩

白芥子 三錢 肉桂 一錢 白朮 炒 一兩 水煎服一劑血止

二劑肉生三劑口小四劑皮合又二劑全愈

三花湯 伯高太師傳治對口初起神效

當歸 二兩 川芎 一兩 生甘草 五錢 天花粉 三錢

紫花地丁一兩 甘菊花五錢 水煎服二劑全消

耳後耳下發

耳後發者發于左右耳畔乃孫顯息二穴之上下也發則耳聾噤腫項痛手之小指肩肘俱因之而疼蓋手少陽三焦經之火毒也三焦經多氣少血是經生瘡最難奏効况又生于耳後未免耳聾腎經單治三焦而不兼補夫腎則水不足以濟火其火毒未必不更熾也雖消風抑火內疎內托隨症施治俱是良法而不大補其血與重填其精恐未易速愈也又有發于耳下者乃腎風痰脈之穴也名謂未與骨

謂未與骨

卷之五

耳後耳下發

九

大雅堂

曰首疽亦係三焦之經實係致命之所尤宜早治然早治而不大補氣血徒用化毒散火之劑少少輕療治陽症尚有變陰之害况原是陰虛火發之症又何以濟哉凡生此疽多增寒壯熱七八日可刺膿水黃白色可治以其屬陽也如黑色稀水乃陰症也大惡若發渴者即死以上數症皆起于積想在心謀慮不決鬱怒不已致火旺蘊結日久乃發也故形多堅硬頭多隱伏未潰先黑未膿先腐不得外發內攻而死也

護耳散毒湯 巫真君傳治左右耳後陰陽疽癰

金銀花二兩 當歸一兩 麥冬一兩 蒲公英三錢

甘草三錢 桔梗二錢 半夏二錢 川芎五錢 水煎服

二劑輕六劑全愈未潰者三劑全散如是陰虛色

紫黑者加人參五錢 生黃芪二兩 一劑即散已潰者

十劑全愈

耳前發

耳前發者發于兩耳之前乃懸釐客主人之穴也雖曰耳發實生于耳之外非生于耳之中按二穴屬足少陽膽經是經多氣少血且二穴又在面之旁尤少血之處故生癰最難愈且穴雖屬少陽而地近于耳豈有耳不速及之理况耳為腎之竅懸釐客主人乃膽之經而膽乃腎之子也子為火毒所燒腎母寧忍坐視必求相援而膽子畏火毒之逼必遁入母經絡以避其害未必不遺禍于母家也故治之法瀉膽之火毒尤宜補腎之精水餉唇口高突乃陽火陽毒盡發于外也不必憂慮設五六日後漸長漸大形如蜂窩皮紫炮黑痛如火炙十日內刺之有膿者尚可望生或刺之無膿惟有純血流而不已本少血而又傷其血則木必尅土脾胃大壞不思飲食或食而不知其味此入

謂未與骨

卷之五

耳前發

十

大雅堂

陰之兆也二十四日之後恐不能保其生也此症或發于左或發于右其危險同之能于初發時急救之皆可慶生也

顧耳湯 巫彭真君傳治耳前初發惡疽

柴胡 二錢 白芍 二兩 金銀花 二兩 熟地 二兩

當歸 一兩 天花粉 五錢 生甘草 三錢 水數碗煎一碗半

飢服一連二劑全散若十日之後此方救之亦可生然脾胃一壞恐難救矣

鬚發

洞天奧旨

卷之五

大雅堂

鬚發者發于左右之兩鬚乃頭維下關之穴也鬚疽屬手少陽三焦相火薛新甫云是肝膽之火或風熱也不可為訓但忌用灸尤忌見膿查頭維下關之穴本屬足陽明胃經之穴初起之時大如瘡子次後漸大四圍高突頭面眼鼻俱浮此陽症也且兩鬚又近于太陽乃陽之位也似宜作陽症治之但雖是陽症往往有變為陰症者所以治陽又宜加入陰分之藥以豫防其變若已潰破爛更須陰藥倍多于陽藥則陰之正旺自然陽之邪難變也倘腫中恍惚或吐逆不止此陽症變陰亦死症耳不可謂胃經是多

氣多血之腑而輕用散劑也

理鬚湯 岐天師傳治兩鬚生疽無論已未潰爛皆可治之

金銀花 二兩 白芷 二錢 川芎 一兩 當歸 一兩

夏枯草 三錢 水煎服未潰者二劑即消已潰者四劑

全愈

蒿草飲 伯高太師傳治鬚疽

青蒿 一兩 玄參 一兩 生地 一兩 川芎 一兩

夏枯草 一兩 細辛 一錢 蔓荊子 一錢 水煎服一劑輕二劑愈

洞天奧旨

卷之五

大雅堂

臉發

臉發者發于面上左右四白巨膠之穴也有生于鼻柱上者雖屬于肺亦風熱也按四白巨膠在淚堂之下鼻之兩旁此二穴雖屬足陽明之部位然陽明之經最易動火使無陰相濟則其火一發多有不能止遏之時往往變生不測故此二穴生癰亦大可畏倘初起之時色似葡萄其形漸大或生子母之瘡八九日即有亡者可見此瘡亦宜急治補陰以濟陽內托而兼化毒實善治之法也

護顏湯 巫彭真君傳治臉旁鼻外生疔

玄參 一兩 當歸 一兩 金銀花 二兩 瓜蒌 半個

生地 一兩 石膏 三錢 白芷 二錢 半夏 二錢

黃芩 一錢 水六碗煎一碗服五日內即散

對口發

對口發者發于風府喉門之穴也正對于前唇口故以對口名之乃督脈之火毒也夫督脈何以有火毒乎蓋督脈起于尻骨過命門夾脊而上透于玉枕玉枕之穴近于泥丸泥丸之穴最惡腎火之燒最喜腎水之潤也玉枕之穴

洞天奧旨

卷之五

對口發

三

大雅堂

與泥丸性正相同乃唇齒之穴也玉枕知泥丸喜水而不喜火遇水則引而上昇遇火則閉而不納腎火至玉枕而不納勢必停留于玉枕之外而風府喉門正其穴也故久而不散遂結成火毒而生癰矣此症之生本是凶症然而生于對口者猶輕生于偏旁髮際天柱穴間者為更重初發之時急宜救之蓋天柱屬足太陽膀胱之經雖多血少氣然其地上近于腦不可作陽毒治之況此處生癰多現無數小瘡口以感世人不知從何處覓頭急宜消之若少遲恐毒入于腦邪熱上攻不可救矣夫陰陽二毒俱可

何可遷延等待令其皮破腫潰而後治之乎迨于瘡口赤腫或變為紫黑發寒發熱毒勢大橫動刀而無慮用鍼而流血道喉落首道悔不亦遲乎故吾願人于二三日前而早用大劑於補血補氣之中益之散毒散火之藥以急治之也

加味三星湯 巫彭真君加治陽疽

金銀花 二兩 蒲公英 一兩 生甘草 三錢 玄參 一兩 水數碗

煎八分服二服即消陽疽已破者三服膿盡生肉

加減聖神湯 巫彭真君加治陰疽

洞天奧旨

卷之五

對口發

四

大雅堂

人參 一兩 生黃芪 一兩 當歸 五錢 金銀花 三兩

白芥子 三錢 附子 一錢 一二劑止血生肉六劑全愈

加味三花湯 巫彭真君加治對口初起

當歸 二兩 川芎 一兩 天花粉 三錢 紫花地丁 一兩

甘菊花 五錢 水煎服二劑全消

或用生甜菜一把 加酒釀少許同煎瘡口乾即

易之亦頗效然可治陽疽也若陰疽難痊吾以為

甜菜非四時之物不若前三方可頻得也世有奇

方非余所知

目銳皆下發

目銳皆下發者發于瞳子膠左右之穴也瞳子膠屈足少陽膽經下循聽會上關上抵于頭角乃膽經之盡穴也膽經氣多血少生癰本難速愈况逼近于銳皆未有毒久不上熾于目者况目乃肝之竅也膽與肝為表裏膽病則肝亦病肝病則目有不病者乎目病則肝益病矣膽肝兩病非陰陽皆病乎倘是陽非陰則唇口必赤腫有膿而痛倘不痛而作瘻口中大渴心中悶亂唇口雖破有血無膿顏色青黑瘻作蛙孔狀血出不止此陰疔也陽主生而陰主死然早治之亦可救也

洞天奧旨

卷之五

目銳皆下發

五

木雅堂

巫真君傳二甘散治瞳子膠穴生陽疽

黃連 二錢 龍膽 三錢 葶藶 二錢 白芍 五錢

天麻 二錢 荆芥 二錢 甘菊花 三錢 甘草 三錢

忍冬 一兩 水煎服食後服二劑急治可散

巫真君傳葶藶金銀散治目銳皆下生陰疽

葶藶 三兩 芍藥 二兩 當歸 一兩 金銀花 二兩

人參 五錢 肉桂 一錢 玄參 五錢 麥冬 五錢

車前子 三錢 熟地 一兩 水數碗煎一碗急服早治則

危可變為生

頤發

頤發者發于頰車大迎之穴也或發于右邊或發于左邊或左右兩邊同發單發似輕雙發似重然而雙發而軟者雖重而反輕單發而硬者雖輕而反重蓋軟則尚可飲食硬則牙關緊閉食物難進也論頰車大迎之穴乃足陽明胃經之穴也人生以胃氣為本凡病有胃氣者俱可望生况原是胃經之病而胃可自病乎胃不自病則夾車大迎之指斷不生癰因其胃中之火過盛而毒不自安于下乃上騰于面而生瘡及至生癰生瘡而腑內之火少息則胃氣有生發之機尚不至于殞滅也否則火不息而毒益熾見食則惡或得食則嘔皆死兆也倘腫破無膿牙關硬如石難于進食瘡口狀似蜂窠消涓惟流黃水則十無一生以其胃氣之絕也

洞天奧旨

卷之五

頤發

五

木雅堂

巫真君傳連翹野菊散治頤生癰初起

連翹 五錢 野菊 三錢 枳殼 一錢 石膏 三錢

地榆 三錢 當歸 五錢 甘草 二錢 玄參 一兩

金銀花 二兩 水煎服

唇發

唇發者唇上生瘡毒也或生于口角之考或生于上下唇之際不必問其大小總皆脾胃之火毒也治宜急而不宜緩治之早則易散治之遲則難痊以毒久熾炎兩唇腫大艱于進食往往有腐爛而亡故治之必須急也然急瀉火毒而不附之健脾胃之藥則脾胃損傷雖散毒而毒轉不散也此護吻湯之神以其散毒消火而仍不損傷脾胃之氣故建功特奇至于齒唇治法少輕其形似齒然亦脾之病也經云脾氣開于口脾之榮在唇乾燥開裂白皮皴揭宛如蠶繭始起小瘡如豆大隨消隨生漸漸腫大合而為一原有寸許或如楊梅或如芝菌雖本于七情六氣摠因腎火枯而脾火熾也用歸脾養榮治于內以金銀烙于外亦易愈也此症婦人多生之用四物湯逍遙散合治為佳外先以莧茶散搽之後以生肌散搽之自癒

汗方 準繩治唇瘡

以飢上滴下汗傳之累效如神

又方

以白荷花瓣貼之神効如開裂出血者即止

護吻散 治唇吻生瘡毒

紫花地丁一兩 麥冬一兩 玄參一兩 夏枯草一兩

生甘草三錢 水煎服一劑輕二劑愈

歸脾養榮湯 世傳治齒唇

當歸 川芎 白芍 生地

茯苓 陳皮 柴胡 甘草

麥冬 升麻 山梔子 桔梗

黃芪 白朮 防風 牡丹皮

黃柏 知母加 婦女澤蘭 香附

清大東市 卷之五 唇發 木雅堂

玄胡索水煎服

莧茶散 外治唇齒先用烙鉄艾火內燃燒通氣盡

患處五六次後敷此藥

莧菜陰乾燒 銅青二錢 枯礬一錢 輕粉一錢

雄黃一錢 雞內金二錢 麝香二分 孩兒茶二錢 為細末

麻油調搽明日再用甘草煎湯洗淨再烙以平為

度後用生肌散用烙鉄時要擇吉日不犯鬼神避

畢隨藥搽之不再生除根矣

生肌散

花蕊石 醋散 孩兒茶 二錢 雞金 二錢 飛丹 一錢 散水飛
 乳香 二錢 血竭 二錢 紅絨灰 一錢 黃連 一錢 爲細末
 加水片一分 乾即搽之

百腦發

肩腦發者發于肺俞魄戶之間靈樞曰疵疽俗名之搭肩也此處屬手足太陽之經有瘡無串者易治有串者難治蓋發于左者多串發于右亦有無串而左右同發者與發于背之正中者不相上下也當觀善惡以定吉凶與發背治法相同亦須分陰陽而用托裏疎下之法倘是陰症以

洞天奧旨

卷之五

肩腦發

元

大雅堂

治陰之法治之不可慢也要在臨症之時辨別之明而用藥之斷也

紅消散 巫彭真君傳肩腦生陽癰

紅內消 三錢 素凡 二錢 蒼耳子 三錢 紫花地丁 五錢

石葦 二錢 天花粉 三錢 天門冬 三錢 羌活 二錢

炙甘草 三錢 當歸 一兩 水煎服初發者二劑即消已

潰者不可服

治陰散毒湯 巫公傅治肩腦生癰已潰陰症

生黃芪 一兩 當歸 一兩 熟地 二兩 金銀花 三兩

生甘草 三錢 附子 一錢 水煎服連用數劑餓口健思
 食夜臥能安即生否則死也

腎俞發

腎俞發者發于腰之上命門之旁乃膀胱之經穴也然其穴逼近腎堂雖膀胱之部位實即腎之部位也此處斷不可生癰而癰之生者無不由于多服金石熱藥及膏粱厚味又不忍輕易泄精遂忍耐而戰及至精欲下走之時或提氣縮龜不使其速泄腎不得出于精管欲仍回舊宮而腎不受乃壅于皮膚變爲毒而成癰也凡癰俱不可輕用

洞天奧旨

卷之五

腎俞發

辛

大雅堂

攻劑况腎有補而無瀉更宜用補蓋腎得補而氣壯氣旺則火毒難留而易散也設于補之中而益之托裏解表之味誰謂腎癰即不可治哉惟因色而成癰復成癰而犯色未有不死者矣至于氣懷亦須同忌以肝爲腎之子肝有怒氣必耗腎水腎虛復耗必難痊然終不及犯色慾之凶爲更烈也

補腎祛毒散 巫真君傳治腎俞生癰

忍冬藤 四兩 熟地 三兩 稀荻 三錢 天花粉 二錢

草烏頭 二錢 肉桂 二錢 水煎汁一碗空腹服未破者

二服即消已潰者即去黑爛十服乃愈

腰下發

腰下發者發于兩腰之下乃膀胱中脊之俞穴也初起時發熱痲痛百節疼痛昏沉不知人蓋膀胱與腎有別毒發于膀胱與毒發于腎經其輕重必異然膀胱之氣一經腎之氣而行膀胱中脊之俞穴生瘡必腎中先自有大毒也火之有餘必水之不足邪之甚旺必正之大虧水不能濟火正不能祛邪恐有倒陷之禍倘有膿無血此症足以敵邪水足以濟火也無難治療如無膿出血水流而不收口

洞末與旨

卷之五

腰下發

三

大雅堂

者此無陰之兆也必大補其精而內托之始有生機否則

難治

九靈湯 伯高太師傳治腰眼生疽疼痛

熟地 二兩 山茱萸 一兩 白朮 二兩 防己 一錢

紫花地丁 一兩 荆芥 三錢 生地 五錢 丹皮 五錢

生甘草 三錢 水數碗煎一碗服一劑輕四劑全愈

兩治散 岐伯天師傳治腰下發痲昏沉疼痛

白朮 一兩 杜仲 一兩 當歸 一兩 金銀花 三兩

防己 一錢 稀莖草 三錢 水數碗煎服一劑輕二劑痛

止五六劑全愈若已潰甚者多服自愈

洞天與旨卷之五終

洞天與旨

卷之五


腰下發

三

大雅堂

洞天奧旨卷之六

山陰陳士鐸敬之甫號遠公者
會稽陶式玉尚自甫號存齋
蘇州方湖潤長校



胸乳上發

胸乳上發者發于或中神藏靈虛等穴也其穴俱屬足少陰腎經其症多心懸若飢飢不欲食舌乾咽腫乃心熱而不能下交于腎以致腎經之氣遏抑于外故生癰瘍于胸乳之上偏也有生于左者有生于右者甚則左右俱生皆謂大泉也

洞天奧旨 卷之六 胸乳發上 木雅堂

十州散 巫真君傳治胸乳上生癰

人參 二錢 熟地 二兩 山茱萸 三錢 生甘草 二錢

遠志 二錢 麥冬 一兩 金銀花 一兩 茯神 三錢

黃連 一錢 蒲公英 四錢 水五碗煎服八分連服數劑

自散

柑仁散 治婦人裡外吹乳

柑子核一歲一粒陰陽瓦
焙乾枯為末 陳酒熱送下即蓋被出汗而愈

胸發

胸發者發于玉堂膺中中庭鳩尾之四穴也又有發于胸者名曰井疽此症初起如豆肉色不變必須早治若不早治下入于腹必至死矣屬任脉之經絡四穴在心之外郭凡邪不可犯心一犯心輒死夫臟腑邪遠苟若犯心尚有下堂之走豈四穴逼近心君而反得逍遙無慮乎自然直入臟中亦勢之甚便而甚利也即曰經絡專屬任脈然任脈名陰脈之海周流諸陰循環無已一有癰毒則陰不能行况未生癰之前亦因陰脈不行而火毒乃結聚不散以致成癰矧既已生癰又何望其周流諸陰而無滯耶自然滯者益滯而結者益結矣苟不速為星散則火毒歸心死亡頃刻

洞天奧旨 卷之六 胸發 木雅堂

救心敗邪湯 巫彭真君傳治正胸生疽

人參 一兩 茯苓 五錢 麥冬 五錢 熟地 一兩

山藥 一兩 芡實 一兩 甘菊花 五錢 芍藥 五錢

忍冬藤 二兩 遠志 三錢 天花粉 二錢 王不留行 三錢 水數

碗煎一碗一氣飲之火毒不結而散矣二劑必愈
倘已潰爛必須多服始愈

額發

額發者發于額上攢竹之穴也夫曲差攢竹雖屬太陽之
經然近于督脈之旁亦陰陽雙合之處也初發之時必然
頭痛憎寒惡熱項似板腰如折正顯太陽之症然太陽勝
眚與少陰腎經為表裏之臟腑也發太陽之火即顧少陰
之水則膀胱不燥內有滋潤自易發汗汗出而火毒隨之
而盡散于表矣否則單以托表為事倘陰虛之人禁再發

洞天真旨

卷之六

癩發

三

大雅堂

其汗乎吾恐因汗而愈虛反不肯遽消其火毒耳

藤葛散

巫彭真君傳治額上生癩

忍冬藤 二錢 麻黃 一錢 扶神 三錢 香附子 二錢

白芷 二錢 當歸 一兩 川芎 一兩 蒲公英 五錢

乾葛 三錢 天花粉 三錢 水敷碗煎一碗食後服初發

者二劑即散如陰虛之人此方不可用另用轉敗

湯

兩脇發

脇發者發于期門章門之穴也古名收疵謂是女之疾其

實男女皆有之或發于左或發于右此足厥陰肝經之部
位也然亦有上至淵液輻筋之穴者雖二穴屬足少陽膽
經然肝膽為表裏肝病必及膽故不可舍肝而治膽也夫
膽多氣少血肝多血少氣總宜氣血雙補決不可猛浪用
熱劑也天下人惱怒居多一有拂抑便即動氣兩脇脹滿
因而成癰癰生于皮外者猶癰之輕者也更有生于脇之
內者夫脇內生癰古人未談世多不信誰知脇痛而手不
可按者肝葉生癰也肝之生癰半成于氣惱半成于憂鬱
憂鬱而得之者其病緩氣惱而得之者其病驟憂鬱氣惱

洞天真旨

卷之六

兩脇癰發

四

大雅堂

皆能燥乾肝血肝血既乾則肝血大燥無血養肝而憂鬱
氣惱之無已欲不蘊結憤恨而成癰烏可得乎但癰生于
內不可見也而外則可徵其脇之外必現紅紫之色而痛
亦必在左而不在右其舌必現青色世有脇痛數日輒死
者正因生癰毒敗而死治之法以平肝為主而佐之瀉火
去毒之味萬勿因循時日令其內潰而始救之卒至于無
功也有脇下生疽者在于京門帶脈之穴間痛癢微心如
針刺之痛漸潰至臍者死初腫脇不能轉動而手足節骨
痛痛則連心又名傳心疽治法亦照治脇癰治之

化肝消毒湯 岐公傳治兩脇脹滿發寒發熱痛極生癰

白芍 三兩 當歸 三兩 炒梔子 五錢 生甘草 二錢

金銀花 五兩 水煎服十劑愈

錦草湯 伯高太師傳治脇上生癰并治肝癰

白芍 一兩 當歸 一兩 炒梔子 三錢 生甘草 五錢

錦地羅 一兩 水煎服數劑愈

宣鬱化毒湯 岐公傳治脾鬱生癰癰

柴胡 二錢 白芍 一兩 香附 二錢 薄荷 二錢

洞天奧旨 卷之六 兩脇發癰 五 大推堂

當歸 一兩 陳皮 一錢 枳殼 一錢 天花粉 二錢

生甘草 三錢 金銀花 一兩 水煎服十劑愈

金銀平怒散 伯高真君傳治脇痛生癰

金銀花 二兩 白芍 五錢 當歸 一兩 柴胡 一錢

白芥子 三錢 生甘草 三錢 炒梔子 三錢 丹皮 三錢 水煎服

一劑即消二劑全痊

流注發

流注發者即子母之發也先發于背後流串散走于四肢或來或去無有一定之部位此等瘡瘍多是陽症蓋風熱

之毒也如母之生子輾轉靡已本是大陽風熱所生倘能直攻太陽用夫風去火之劑而兼散其毒何至流串于四肢乎惟其因循失治或治之不得法使餘毒未淨邪氣逆傳于脾流于臂臂手足遂成不可療也

攻邪退流湯 巫彭真君傳治子母流注瘡毒

升麻 一錢 當歸 五錢 黃芩 二錢 栝蒌 二錢

金銀花 一兩 炙甘草 二錢 連翹 三錢 秦艽 二錢

蒼耳 一錢 馬齒根 一兩 牽牛 一錢 水三碗

煎八分半服數劑自愈

洞天奧旨 卷之六 流注發 六 大推堂

環項發

環項發者發于頸也環頸項無一空隙地完膚甚則癰大赤黑俗名落頭癰靈樞所言天疽也必須急瀉其火蓋頭頸乃手足少陽經穴而又足陽明之經穴也不急瀉三經之火則火束于頸項咽喉之間其熱不能急散則熱毒必下走淵液將從外以入內也及至入內則前傷任督內熏肺肝發熱發寒拘倦悶亂恐怖不食有至十餘日而即死者可不慎乎故必須及早治之也

釋項飲 巫彭真君傳治環項生癰瘡

白芷 一錢 葛根 一錢 柴胡 一錢 川芎 三錢

桔梗 三錢 生甘草 二錢 山豆根 一錢 麥冬 三錢

天冬 三錢 紫蘇 一錢 紫花地丁 五分 天花粉 三錢

蒲公英 五錢 水數碗煎一碗服初發者用數劑即散

必須此方早治為妙

腎陰發

腎陰發者發于腎囊乃生于囊之下糞門谷道之前乃任督脈所起之處也俗名囊癰若生于陰囊左右橫骨陰廉之穴者則名便毒便毒易治而囊癰最難治也以囊之下

洞天奧旨

卷之六

腎陰發

七

大雅堂

皮肉與他處迥別蓋他處皮肉或橫生或直行俱易生肌惟懸癰之處橫肉中有直理也直理中有橫紋也最艱合口一有損傷不易收功此處生癰雖因濕熱然皆貪色好酒以成之也夫貪酒好色亦人之常也節飲戒色安在不可收功乎不知腎囊乃衝任脈所會之處又諸筋所聚之處也其囊空虛最易凝聚氣血故易腫易大所以艱于收功耳症重者多胞腐有腐爛而止存辜丸亦有俱腐落而不死者以用藥調理之善也方用逐邪至神丹最奇已未潰俱可用若八仙丹雖亦神奇然止可用之于囊癰未潰

之前而不可施之已潰之後也

逐邪至神丹 治便毒初起或左或右并治囊癰

金銀花 四兩 蒲公英 二兩 人參 一兩 當歸 二兩

生甘草 一兩 大黃 五錢 天花粉 二錢 水煎服一劑即消

二劑全愈

八仙丹 治囊癰

大黃 二錢 金銀花 四兩 當歸尾 一兩 玄參 二兩

柴胡 三錢 炒梔子 三錢 黃柏 三錢 貝母 三錢 水煎服

一劑輕二劑全愈若已出毒此方不可用矣

洞天奧旨

卷之六

腎陰發

八

大雅堂

張真人傳治便毒方

大黃 一兩 當歸 一兩 金銀花 二兩 蒲公英 一兩 水五碗

煎八分空腹服一劑即消

鬼真君傳治疔馬癰初起神效

金銀花 八兩 煎水 大黃 一兩 車前子 五錢

當歸 一兩 牛膝 三錢 地榆 五錢 生甘草 五錢 煎半碗

空腹服之服即睡醒病如失不睡熱亦不妨過

一日微瀉而愈奇法也忌房事一月

對膈發

對臍發者終于背下命門之穴也命門之穴正與臍對夫命門為十二經之主宰主宰不明則十二官危矣况生癰疽則命門之中無非邪火又安有生機哉不知命門之中原發真火真火衰而後邪火之毒始得留于內矣然真火喜居穴中而邪火喜發穴外命門之外生癰疽正邪火外出也治之得法轉有生機不比腎俞之生毒也雖然邪火雖出于外而真火非水以養之則正火益虛邪火未必不出于外者仍入于內况邪火熾盛亦須以水折之非大補真水則邪火不散邪火不散則毒亦難消况命門之穴又

洞天奧旨

卷之六 對臍發

九 大雅堂

督脈之經也督脈亦非得腎水則河車路斷不通真火反助邪火矣亦看五善七惡審症而照前論以治之也倘出血流清水心神恍惚睡中見鬼語語大發渴者俱無真水之惡症也難于治療耳

散火援命湯 巫彭真君傳治命門生疽

金銀花 五錢 熟地 一兩 白朮 一兩
 黃柏 三錢 車前子 三錢 水十碗先煎金銀花取水四碗先將二碗汁煎前藥一碗空腹飲之少頃再將前汁二碗又煎藥渣煎水一碗再服一連二服如

洞天奧旨 卷六

治初發之疽即毒散而愈倘已潰敗流清水此方不可復用改煎

援命救絕湯 巫彭真君傳治命門潰癰

人參 三兩 白朮 四兩 肉桂 三錢 附子 一錢
 山茱萸 一兩 北五味 三錢 金銀花 三錢 水十碗
 煎汁一碗服之變善則生變惡則死

尻發

尻發者靈樞名曰銳疽其狀赤堅發于尾間之間也此穴乃督脈之經穴夫尻乃足太陽之部分夫腎與膀胱為水臟水府腎為陰而主骨腑為陽而太陽之氣主于膚表此處生疽雖是太陽膀胱之火毒起發于外亦緣少陰水氣虛耗不能制之于內也不能制火而督脈之路乾燥故火昇于尾間而水不能由尾間而上漑故生銳疽銳者言其火毒之甚猛也痛最難忍艱于得膿正無水之驗也宜大補腎水而加托裡之藥少益之乳香沒藥以排膿止痛庶幾有瘳乎至于氣惱色慾尤宜戒絕苟一犯之輕則成漏重則喪亡可不慎哉

洞天奧旨

卷之六 尻發

十 大雅堂

制穴潤尻散 巫彭真君傳治尻上銳疽

三五七

金銀花 二兩 玄參 二兩 苦參 五錢 生甘草 三錢

熟地 八錢 山茱萸 三錢 白芥子 三錢 茯苓 三錢

乳香 一錢 沒藥 一錢 水煎服

手背發 附手心發

手背發者發于中渚液門之二穴也二穴乃手少陽三焦經之脈三焦無腑之形而經脈實有形也其脈起于關冲而中渚液門即關冲之第二穴與第三穴也是三焦既無腑而脈即其府也此處生疽即近于腑之謂也故亦至重况手少陽又多氣少血之府無血以化膿往往陽變為陰

洞天奧旨

卷之六

手背發附手心

木雅堂

初起之時令人憎寒發熱及變陰時或作嘔吐則可危矣須審五善七惡以定吉凶治法詳照篇中之論治之至發于手心者乃發于勞宮之間也其經屬包絡初發時紅腫高突變成一疽疼痛非常晝夜無間俗名擊疽也多是冤孽相尋然亦因素有火熱蘊毒于中乘機而竊發也然火盛由于水衰不大料滋水惟小劑滅火未易救療用釋擊湯蕊珠湯重劑煎飲則未潰者自消已潰者自生肌而愈

蕊珠湯 伯高太師傳治手背生疽

熟地 兩 生地 兩 麥冬 一兩 甘菊花 一兩

金銀花 兩 四碗水煎一碗服連服四劑未潰者自消已潰者亦生肌而愈

釋擊湯 岐伯天師傳治手心生擊疽

玄參 二兩 生地 一兩 金銀花 二兩 當歸 一兩

紫花地丁 五錢 貝母 二錢 水數碗煎八分服渣再煎服

一劑輕二劑痛止已潰者再服四劑未潰者再服一劑無不全愈

足背發 附足心發

足背發者發于衝陽陷谷內廷之間乃足陽明胃經之穴

洞天奧旨

卷之六

足背發

三

木雅堂

也論胃經乃多氣多血之府疽生胃經似乎少輕然衝陽陷谷內廷乃足陽明經穴發仍之始其氣血尚未旺也况穴又在足之下面尚未升于身之上府為氣血之多而經穴中之氣血未可以多言也故此處生疽不可以多氣多血論而任用敗毒攻火之藥也初發之時令人發熱作嘔痛癢麻木俱宜照前論治之大約于補之中以行其散之功則得耳又云足背者即足跗也足跟生疽又名鬼囓屬足太陽車脈陰陽二蹻發源之所皆由臟腑積熱也又足心發毒者名穿枚疽由于腎虛以補腎為要

青紫飲 巫彭真君傳治足背生癰疽疼痛高突

牛膝 三錢 青蒿 三錢 紫花地丁 一兩 玄參 五錢

薔薇根 五錢 當歸 五錢 炙甘草 二錢 茯苓 二錢 水三碗

煎一碗空腹連服數劑必消此方初起已潰俱效

肺癰肺痿

肺癰者癰生于肺葉也其初起之時胸膈必痛咳嗽之時更加痛極手按之處更增氣急其脈緊數此肺癰將潰也咽喉之間先自聞腥臭之氣隨吐膿血其脈但數而不緊此肺癰已潰也夫未潰者易消已潰者難療然治之得法

洞天奧旨

卷之六

肺癰肺痿

三

大雅堂

亦有生者大約肺之生癰由于肺中有火而火成于肺氣之虛也治之法烏可舍補肺而別求方法乎然肺乃嬌藏藥食之所不受者也肺不能直補其氣補胃土之氣則肺金之氣自旺雖火盛則毒生火盛則毒亦盛似未可竟置瀉火瀉毒之味然不補肺氣則肺金氣怯而火毒更不易散也於補氣之中而行其攻散之法則正氣無傷而火毒自難存留也方用全肺湯內消不令其毒結此治未潰前之良法也用完肺散補胃以益肺而急救其敗壞此治已潰後之神方也至于消風散太乙膏皆可同治然總不若

全肺完肺二藥之更神也

更有久嗽之後肺管損傷皮膚黃瘦毛悴色焦咽隘雌啞自汗盜汗眠臥不得口吐稠痰腥臭難聞必忍氣瀆臾輕輕吐出倘少重必大痛不已氣息奄奄全無振興之氣此肺痿生瘡非同肺癰也肺癰生于火毒治宜速肺痿生于勞傷治宜緩火毒宜補中用瀉勞傷宜補中帶清故治肺癰宜大劑治肺痿宜小劑如養肺湯延生湯最妙可選擇而用之也外有生疽于胸之上者乃紫宮玉堂之穴也屬于任脈不比生于肺內然陽症易治陰症亦有死者治法

洞天奧旨

卷之六

肺癰

四

大雅堂

又不可單治肺經當合腎與肺共治之蓋任脈非腎水相滋則火不肯散而毒不易消也肺癰生于肺之上多不可救按吐痰必疼痛欲死胃癰亦不可救按但吐痰轉覺少寬惟重服散火解毒湯可救也

全肺湯 岐天師傳治肺癰

玄參 三兩 生甘草 五錢 金銀花 五兩 天花粉 三錢

茯苓 三錢 白芍 三錢 麥冬 二兩 水煎服一劑痛減

再劑內消

完肺散 岐天師傳

人參 一兩 玄參 二兩 蒲公英 五錢 金銀花 二兩

天花粉 三錢 生甘草 三錢 桔梗 三錢 黃芩 一錢 一劑膿

必多二劑後膿少十劑膿血止又六劑全愈

地羅甘桔玄冬湯 伯高太師傳治肺癰胸膈作痛

咳嗽尤痛手按氣急

玄參 二兩 麥冬 二兩 錦地羅 一兩 生甘草 一兩

桔梗 五錢 貝母 五錢 水煎服一劑消半二三劑全愈

愈

養肺去痰丹 岐天師傳治肺痿久嗽皮膚黃瘦毛

洞天奧旨

卷之六

主

大雅堂

悴色焦鬲上作痛氣息奄奄

金銀花 三錢 生甘草 五錢 生地 二錢 麥冬 三錢

紫苑 五分 百部 五分 百合 二錢 欬冬花 三分

貝母 三分 白微 三分 水煎服二十劑而膈上痛

少輕者便有生機再服二十劑更輕服五十劑全愈

愈

清金消毒湯 岐天師傳治肺經癰瘍

玄參 一兩 生甘草 一兩 金銀花 八兩 當歸 二兩

麥冬 一兩 白芍 三錢 水煎服二劑愈

玄天散 南陽張真君傳治同前

玄參 八兩 天門冬 四兩 桔梗 二兩 炙甘草 一兩 水十五

碗煎二碗再用蒲公英 五錢 金銀花 五錢 飽食後

服之初起者即消日久者即化毒生肌凡人肺

癰者初起之時咳而兩脇疼痛者是即宜速用此

方神效

腸癰

腸癰者癰生于大小腸也其症口渴小便如淋時時汗出

小腹痛一定而不移手皆不可按惡寒身皮錯腹皮急如

洞天奧旨

卷之六

腸癰

主

大雅堂

腫此癰生于大小腸所同然也吾何以辨之乎屈右足者

大腸癰也屈左足者小腸癰也世謂大腸之癰易治小腸

之癰難醫然而大腸之癰可瀉其火從糟粕而出小腸之

癰可瀉其火從溲溺而泄也雖然大小腸生癰亦有不屈

足者蓋生于腸內者必屈其足而生于腸外者皆不屈足

也痛在左而左中不移小腸生癰也痛在右而右不移大

腸生癰也以此辨症斷斷不爽惟是腸內生癰可聽其潰

破而腸外生癰必不可使之潰破者以腸外無可出之路

一潰破出膿膿將何往毒留腹無不死者故治法必須

急清之不可因循失治至潰破而始治之以喪人性命

清腸湯 治大腸生癰手不可按右足屈而不伸

金銀花 三兩 當歸 二兩 地榆 一兩 麥冬 一兩

玄參 一兩 生甘草 三錢 薏仁 五錢 黃芩 二錢 水煎服

四劑全消

開胃救亡湯 治大腸生癰右足不伸腹痛便膿血

肛門如刀之割此腸潰也

人參 一兩 金銀花 二兩 山藥 一兩 生甘草 三錢

洞天奧旨

卷之六

腸癰

七

大雅堂

薏仁 一兩 玄參 一兩 白朮 一兩 山羊血 一兩 研末 水煎

調服十劑愈

泄毒至神湯 治小腸生癰左足不伸痛不可忍

金銀花 一兩 茯苓 一兩 薏仁 一兩 生甘草 三錢

車前子 三錢 劉寄奴 三錢 澤瀉 三錢 肉桂 一分 水煎服

六劑愈

丙化丹 治小腸生癰足不屈而痛在左不可手按

金銀花 四兩 當歸 二兩 車前子 五錢 生甘草 三錢

茯苓 一兩 薏仁 一兩 水煎服十劑愈

三真湯 仲景張真君傳治大小腸癰俱神效

地榆 一斤 水十碗煎三碗再用生甘草 二兩

金銀花 一兩 同煎一碗服一劑服完則消不瀆兩服

也

救勝敗毒至聖丹 岐天師傳治大小腸癰

金銀花 八兩 煎水二碗當歸 三兩 地榆 一兩

薏仁 五錢 水十餘碗煎二碗同金銀花分作二服

上午一服臨睡一服二劑愈腸癰必瀆內消而火

邪甚急而甚大非杯水可救必須大劑始效然大

洞天奧旨

卷之六

腸癰

六

大雅堂

劑敗毒恐傷元氣惟金銀花敗毒而又補陰故可

重用也若少少用之反無效矣

花草湯 雷真君傳治癰疽初起

生甘草 五錢 金銀花 三兩 當歸 一兩 玄參 五錢

天花粉 三錢 白礬 一錢 附子 一片 水煎服初起者一

劑即消腫起者二劑即消

又方 孫真君方治背癰初起兼治各癰

白礬 一兩 金銀花 三兩 水煎服一劑即消

醫癰

醫之上乃足太陽膀胱之所屬也本經多血少氣而醫上尤氣之難周到者也故不生癱則已一生癱則肉必大疼以氣少不及運動耳故初起即宜用補氣以生血而佐之化毒去火之品癱自易散倘不補其氣而專攻火毒則氣虛而血耗火毒雖去而肌肉內空轉難收口也倘癱少向勝骨之間近于蹠趾承扶之穴者又足少陽之部位也足少陽為少血多氣之府似與足太陽相反然補中用攻則二經相同兼補氣血而佐之化毒去火未嘗不共建奇功也

洞天奧旨

卷之六

癱瘓

九

大雅堂

木連散癱湯 巫真君傳治癱瘓神效

生黃芪 五錢 當歸 五錢 木連 三錢 蘇茶 一錢

蒼耳子 一錢 紫花地丁 五錢 生地 三錢 芍藥 三錢

牽牛 一錢 柴胡 一錢 赤芍 二錢 水煎服服二劑即

散如已潰者此方不可嚴照背癩方法治之

洞天奧旨卷之六終

洞天奧旨卷之七

山陰陳士鐸啟之前號遊公著 會孫陳鳳輝羽儀甫梓 會稽謝式玉尚白甫號存齋評 玄孫增芳溯泗民校

骨癱

癱生之後其口不收腐爛之中忽長一骨疼痛難熬俗以為多骨癱也誰知乃濕熱之毒所化乎夫多骨之癱隨處能生不止長強之穴也其先起于過食水果生冷之物其終成于因循失治使濕蒸而添熱熱盛而化骨往往有一

洞天奧旨

卷之七

骨癱

一

大雅堂

二年而不愈常落骨一片或一細骨或有蛀蝕之眼或三五片落骨一片以鉄鉄取出而口仍不生肉已而又生骨終朝呼號望其痊可杳無期也此其故何歟蓋徒知外治而不知內治也外治難化而內治易化者以多骨之癱疽無形之所化也非肉中真有骨在乃似骨而非骨耳真骨非內治可化似骨而非骨內治又何難化乎內用五神湯或九轉神丹利其濕熱而又不耗其氣血不必化骨而骨自化倘必欲奏功甚速外用飛過密陀僧桐油調膏攤貼亦相得益彰而取效尤捷也

五神湯 統治多骨癱

茯苓 一兩 車前子 兩 金銀花 三兩 牛膝 五錢

紫花地丁 一兩 水煎服六劑骨消再服十劑愈

九轉神丹 治多骨癱

白礬 二錢 茯苓 一兩 車前子 五錢 黃柏 三錢

紫花地丁 五錢 連翹 三錢 牛蒡子 三錢 穿山甲 片

葶藶 五錢 水煎服四劑骨消再用加四君子湯調

理

加味四君子湯

洞天奧旨 卷之七 腰癱 二 大雅堂

人參 五錢 茯苓 一兩 生甘草 二錢 金銀花 一兩

牛膝 五錢 炒白朮 一兩 水煎服以瘡口生滿日為度

腰癱

腰癱者發于軟肋下近腰帶脈乃玉樞維道之穴也屬足少陽之經初發之時疼痛呼號似乎陽症然而腰腎乃至陰之地未可作陽症治之此症本生于過忍其精欲泄不泄以釀成火毒似乎純陰之症也但火發毒成則陰中有陽矣未可以純陰法治之法宜陰陽並治為佳倘不補陰而單治火毒則腎氣愈傷而火毒難化即補陰而不補陽

則陰無陽不生火毒且深藏于腎宮而不得外泄矣惟合補陰陽庶免偏勝之虞而有解紛之妙也

兩治湯 治腰腿生疽疼痛呼號母論陽症陰症俱

神效

白朮 一兩 杜仲 一兩 當歸 一兩 金銀花 三兩

防已 一錢 菴荻草 三錢 水煎服

九靈湯 治腦癱

熟地 二兩 山茱萸 一兩 白朮 二兩 防已 一錢

紫花地丁 兩 荆芥 炒 黑生地 五錢 丹皮 五錢

洞天奧旨 卷之七 腰癱 三 大雅堂

生甘草 三錢 水煎服一劑輕四劑全愈

特癱

兩臂生癱乃肩貞臑俞之穴也其經屬手太陽小腸似非陰之部位較頸對口背上少輕然治之不得法亦能殺人故亦宜辨其陰陽也痛而高突者陽也癢而平頗者陰也陽用三星湯陰用消癰還陽湯不可謂手足非腹心之疾但有陽症而無陰症也手足動動處而生陰症則動變為靜矣動變為靜即陽趨于陰矣陽趨于陰非生近于死乎雖內經云汗之則瘡止手臂生癱似可發汗使毒從汗出

而散也然陽癰可以汗散而陰癰必須補散也故吾特表而出之

消癰還陽丹 治兩臂生癰變成陰疽

人參 三錢 白朮 一兩 甘草 三錢 天花粉 三錢

生黃芪 一兩 金銀花 二兩 肉桂 一錢 當歸 五錢

乳香末 一錢 水煎調服 一劑癰變痛二劑痛如失三劑全消

轉功湯 治臂癰

黃芪 二兩 當歸 一兩 生甘草 三錢 肉桂 二錢

白朮 一兩 遠志 五錢 紫花地丁 五錢 貝母 三錢 水煎服

洞天奧旨 卷之七 癰疽 四 大雅堂

一劑而瘡口反痛二劑而痛輕三劑長肉又用二劑全愈

癰癰

膝之上不能生癰膝癰者生于膝之內也膝之內外經

穴各別膝外生癰者乃陽關陽陵泉之穴也是足少陽膽

經之部位名曰托疽膝內生癰者乃血海陰陵泉之穴也

是足太陰脾經之部位也二經雖分而多氣少血則彼此

同之總以補血為主而佐之補氣以敗毒則血旺而毒易

散也倘一味瀉火反傷氣血何能建功收口乎蓋膝乃至

動之處又骨節之樞紐也氣血旺而後能行動可置氣血于不治乎吾所以慙慙致戒也大約腫焮作痛半月有膿黃白者可治不痛或出鮮血者死出膿青黑及長出頭漸多者或無定處者不治

全生散 治癰癰不論內外神效

生黃芪 四錢 當歸 一兩 金銀花 一兩 茯苓 三錢

薏仁 五錢 牛膝 三錢 地榆 一錢 白朮 三錢

萸蘇 三錢 天南星 一錢 生地黃 五錢 水數碗煎一碗空

洞天奧旨 卷之七 癰疽 五 大雅堂

腹服之不論已潰未潰俱效倘是陰症本方加肉桂 一錢 去地榆多加熟地

腋癰 附馬刀挾纏

腋癰者發于腋下天池之穴也天池屬手厥陰心包絡是

經多血少氣此處發生癰疽令人寒熱大痛掌熱臂急而

赤俗名挾癰以手臂挾癰毒而稱之也靈樞謂堅赤者名

曰米疽可淺刺之使火毒之外泄也以其火毒之氣不深

在于皮膚之間故可外刺之而瘥也若因循養癰其勢日

大恐火毒入臟必至難治入臟者入于肝脾之二經也肝

脾

經血滯脾經氣凝非稍氣血而佐之內疎外托之味未易奏功耳若堅而不潰者為馬刀扶纓亦須急治則毒能消化否則年深日久一發而不可療也

金錢鼠粘湯 巫彭真君傳治腋癰瘰癧效甚

黍粘子 一錢 黃連 二錢 當歸 一兩 生甘草 三錢

天花粉 三錢 柴胡 一錢 連翹 二錢 紅花 一錢

玄參 三錢 白芍 三錢 金銀花 一兩 水煎服初起之時

二劑全消無令其日久潰敗也若已潰敗此方不可服當看陰陽治之

洞天奧旨 卷之七 腋癰 六 大雅堂

消堅湯 巫彭真君傳治馬刀扶纓瘡

當歸 五錢 白芍 五錢 金銀花 五錢 蒲公英 五錢

柴胡 二錢 天花粉 三錢 炙甘草 一錢 全蠍 三個 研末

桔梗 一錢 鼠粘子 一錢 水煎汁一碗調全蠍末服

十劑自消如尚未破四服可消如日久未破本方

加附子 三分 連服數劑亦消

乳癰

乳腫最大者名曰乳發腫而差小者名曰乳癰初發之時即有瘡頭名曰乳疔以上三症皆令人增寒壯熱惡心作

洞天奧旨 卷七

嘔者也受孕未產而腫痛者名曰乳吹已產兒而乳腫痛者名曰奶吹二症皆宜急散遲則必至出膿轉難愈也老婦鬱結乳中有核不消天陰作痛名曰乳核因循失治破

而內潰膿水淋漓日久不愈名曰乳漏婦人無子愛養螟蛉強將雙乳與兒吮嘔久則成瘡腐爛乳頭狀似蓮蓬名曰乳疔無故雙乳堅硬如石數月不潰時常疼痛名曰乳

岩乳上赤腫圓圓無頭名曰乳癰以上乳症約有十種大抵皆陽症也不比他癰有陰有陽不必別分陰陽以定治

法但當別先後為虛實耳蓋乳癰初起多邪實久經潰爛為正虛然補中散邪實乃萬全之道也按乳房屬足陽明

洞天奧旨 卷之七 乳癰 七 大雅堂

胃經乳頭屬足厥陰肝經况生乳癰則陽明之經未必能

多氣多血厥陰之經未必不少氣血也不補二經之氣血

乳癰斷不能痊不可謂是陽而非陰一味止消火毒致肌不能生筋不能續耳

和乳湯 治乳上生癰初起發寒熱先痛後腫

貝母 三錢 天花粉 三錢 蒲公英 一兩 當歸 一兩

生甘草 一錢 穿山甲 一片 煎服一劑即消

消化湯 治乳房作痛生癰

三六五

金銀花 二兩 紫貝 天葵 錢五 天花粉 錢三 當歸 一兩

生甘草 三錢 通草 一錢 水煎服一劑即消

化岩湯 治乳癰已愈因不慎房事復行潰爛變成

乳岩現成無數小瘡口似管非管如漏非漏狀若蜂

窠肉向外生等症

人參 一兩 白朮 二兩 黃芪 一兩 當歸 一兩

忍冬藤 一兩 茜根 二錢 白芥子 二錢 茯苓 三錢 水煎服

四劑肉生膿盡十劑全愈

箕門癰

匯天與旨

卷之七

孔癰

八

大雅堂

箕門癰生在大腿股內衝門穴之下血海穴之上也此處

屬足太陰脾經乃濕熱之毒所生是經多氣少血宜內托

黃芪柴胡湯加蒼朮防已等味治之外宜敷貼隨症施治

無難奏功若不慎疾一犯房勞則變為陰毒便宜溫補法

瘰之耳若生于箕門穴之上乃衝門穴也名曰勇疽赤腫

作硬入目得潰可刺如膿黃白色者乃陽疽也可治其瘡

孔如雞子大者俗稱魚口有單有雙年久不收口是陽變

陰矣非大補不可

諸柴飲 聖真君傳治箕門癰勇疽神效

柴胡 二錢 丹皮 三錢 蒼朮 二錢 茯苓 三錢

白朮 五錢 白芍藥 五錢 蒲公英 五錢 天花粉 三錢

遠志 一錢 黃芩 一錢 水煎服三劑即消若已潰者

去黃芩加黃芪 五錢 當歸 五錢 治之亦神效

眉疽

眉疽生于眉間在陽白二穴之分從眉至額赤腫焮高陽

白本屬膽經然膽與肝為表裏膽病而肝亦病未有膽癰

火毒而不遺害于肝者也膽經多氣少血肝經多血少氣

二經有火毒必燥乾氣血故宜氣血兼治也堅硬如石者

匯天與旨

卷之七

九

大雅堂

可刺刺之無膿黃水自出痛甚悶亂吐逆者陽毒兼陰也

治之漸減者生甚者死女子七日即死男子二十四日死

又曰眉疽或生于兩眉左右或生于眉心即攻入眼或下

入太陽屬足太陽膀胱之經然專屬肝膽為是最忌無膿

吐逆也

肝膽兩摠湯 聖真君傳治眉疽神效

龍膽草 二錢 柴胡 一錢 當歸 五錢 金銀花 一兩

炙甘草 二錢 甘菊 二錢 半夏 一錢 白芍 五錢

丹皮 三錢 黃芪花 五錢 白蒺藜 二錢 水煎服一生

肩疽速治數劑即消久則無效矣

蠱疽

蠱疽者疽生于缺盆之穴也缺盆屬足陽明胃經也胃乃多血多氣之府缺盆生疽陽症居多苟不慎疾不戒惱怒不斷房勞必變陰症不可信為陽症而妄用消火敗毒之藥也俗名歷發疽十日可刺刺之有膿者陽疽也刺之無膿者陰疽也俗稱之曰石疽言其如石之堅刺之不應也更有一頭未已再生四五頭子母大小不等又名歷瘡其勢雖輕其毒更重生至心者死倘有白膿赤腫瘡不黑陷洞天奧旨 卷之七 毒疽 十 大雅堂 飲食知味者生治法總不外補以化毒也

消蠱湯 巫彭真君傳治蠱疽

金銀花 一錢 蒲公英 五錢 人參 一錢 生甘草 三錢

玄參 五錢 青蒿 五錢 天花粉 三錢 葛根 一錢

生地 三錢 水煎一碗服起者二劑即消斷宜斷

慾成怒否則禍生不測

手足指瘡 附脫疽

手足指生瘡有生于指尖之旁也名曰教疽有生于手足指上者名曰伏鼠疽大約高腫而痛乃陽症平腫而癢

乃陰症也陽症必有膿陰症必無膿也有膿者刺之而愈

無膿者刺之而轉重也無膿而色紅者生無膿而黑色者

死正不必黑過節也有一種黑過節者生在手足之指上

名曰脫疽言必須去其指也此症多得之膏梁之客而又

用丹石毒術之藥或噙舌下或納臍中或塗陰戶或搽陽

器淫火猖狂燥乾骨髓日積月累乃發為此疽夫脚乃四

餘之末宜毒之所不至誰知毒所不到之處而毒聚不散

出于指甲之間其毒更凶較尋常之處尤甚十倍也然則

治之法必以割去其指為上平而亦不盡然也人身氣血

洞夫奧旨 卷之七 手足指瘡附脫疽 十 大雅堂

周流于全身則毒氣斷不聚結于一處火毒聚于一處者

亦乘氣血之虧也脫疽之生蓋四餘之末氣血不能周到

也非虛而何大補氣血益之瀉毒之品往往奏功如响何

必割指始能存活乎諸方既無痛楚之傷而又獲生全之

妙願人信心用之耳

消滋散火湯 巫彭真君傳治教疽鼠伏疽陽症神

效

生甘草 二錢 地榆 二錢 茯苓 三錢 藍汁 二錢如

青黛 二錢 馬齒莧 三錢 紅花 二錢 蒲公英 五錢

白木 三錢 天花粉 三錢 車前子 三錢 薏仁 五錢 水煎汁 一碗 服即消陰疽陽疽俱可治

頤步湯 岐天師傳治脫疽脚指頭忽先發癢已而

作痛指甲現黑第二三日連脚俱青黑者黑至脚上

過脛即死急服此方可救

牛膝 一兩 金釵石斛 一兩 金銀花 三兩

人參 三錢 黃芪 一兩 常歸 一兩 水數碗煎服一劑

而黑包解二劑而疼痛止三劑全愈若已潰爛多

膿數劑亦可救

天與旨 卷之七 筋疽癆疽疔瘡 大雅堂

六丁飲 伯高太師真君傳治脚趾生疽

紫花地丁 一兩 甘菊花 一兩 生甘草 五錢

牛膝 二兩 天花粉 三錢 水煎服二劑全愈若已破

爛多服為妙

筋疽癆疽疔瘡

筋疽生于兩足後跟乃崑崙之穴也癆疽生于足小指後

乃京骨金門之穴也生于崑崙之後又名足疽皆屬足太

陽膀胱之經是經多血少氣癆疽五六日得潰有膿黃白

色不多者安如黑色癢甚者難治以其變陰也筋疽初起

三五日如蟲蝕過久則生蟲經年不癒一名曲疽又名冷疽皆陰瘡也川大補氣血之藥益之去濕化毒之品亦有生者然不能責其近功也足疽又名嘴疽如初起赤腫有頭可刺乃陽症也刺之有膿黃白者易癒如初起便破黑爛即是陰症最重久則足墮落急宜治之否則不能生也

二紫蒲公湯 巫彭真君傳治筋疽癆疽足疽之陽症者神效

茯苓 三錢 薏仁 一兩 紫花地丁 五錢 牛膝 三錢

蒲公英 五錢 貝母 二錢 紫貝天葵 三錢 當歸 五錢

天與旨 卷之七 筋疽癆疽疔瘡 大雅堂

生甘草 二錢 水煎服初起者三劑即愈

菝葜金銀散 巫彭真君傳治筋疽癆疽足疽之陰症黑爛者

黃芪 五錢 當歸 五錢 金銀花 一兩 稀荻 草 三錢

草薢 五錢 茯苓 三錢 肉桂 一錢 水煎急服之亦能

生

中庭疽并疽

中庭疽生于乳之中央在臍中之下也并疽生于鳩尾之

穴又在中庭之下也二穴皆屬任脈之經任脈乃奇經八

脈

脈之一也任脈發于會陰而二穴又逼近心與包絡此心與包絡之火炎燒而腎水不足以濟之故久而生疽也狀如大豆亟宜內托三四日間若不早治十日必死外發出者易痊內發入者傷膜主死

薛荔散 巫彭真君傳治中庭疽并疽神效

人參 二錢 茯苓 四錢 白朮 十個 蒲公英 五錢

薛荔藤 一兩 天花粉 三錢 山藥 四錢 黑芝 蘇 三錢

生甘草 二錢 連翹 二錢 水數碗煎一碗服二疽必潰

急服則易散毒輕者二劑即散重者四劑始散也

洞天奧旨 卷之七 中庭疽并疽 西 大雅堂

合陽疽

合陽疽生于膈內委中之下承筋之上乃合陽之穴也合陽屬足太陽膀胱之經因感濕熱蘊結成毒久而生疽也初宜托裏除濕清熱以發其汗使毒從汗出也若已成形發汗又非所宜當排膿止痛以生新肉也

二金瀉熱湯 巫彭真君傳治膈上生疽

金釵石斛 三錢 茯苓 五錢 澤瀉 二錢 白朮 二錢

車前子 三錢 牛膝 一錢 金銀花 二錢 黃柏 二錢

生甘草 二錢 貝母 二錢 防已 五分 水數碗煎一碗空

腫脹敷劑金

洞天奧旨卷之八



山陰陳士鏞敬之甫號寒谷著 蘇州府 蘇州府 蘇州府

會稽陶式玉尚自甫號存齋評 立孫增方湖泗氏校

疥瘡

疥瘡之生膏梁人居其半皆因營衛過滯火毒外發也非獨節候寒溫之失令肅殺瞬息之違和得之故所生之處無一定之部位其症頗多古今稱名不一孫真人分一十五種李東垣分二十三種申啟玄分三十四種其實華元

洞天奧旨

卷之八

疥瘡

一

大雅堂

化分五種盡之矣五種者分五臟也稱名多者乃象形而名之也名多反無一定治法不若遵元化五疔為要大凡疔形色赤者心疔也色白者肺疔也色青紫者肝疔也色黃者脾疔也色黑者腎疔也以五色辨五臟以五臟別五疔以五疔分治療又何誤乎雖然各疔之形色病狀亦不可不細晰之也如心疔者俗名火疔疔生于心臟之俞募經井之端或生于唇口手之小指掌中初生一點紅黃小泡振動癢痛非常左右肢體麻木重則發寒發熱心煩意亂頭暈眼花睡臥不安言語昏憤小便短少面紅口渴舌

上有珠此乃發于心經之病也如肝疔者俗名紫燕疔生于肝臟部位足大指之端脇肋之次筋骨之間初生便作青紫之泡次日破流血水三日後串筋爛骨疼痛苦楚重則眼紅目昧指甲純青寒熱交作頭項皆痛口苦脇疼小便艱澀舌強神昏睡語驚惕此乃發于肝經之病也如脾疔者俗名黃鼓疔生于脾臟之部位或生于口角腮觀眼胞上下及太陽正面之處初生黃泡光亮明潤四邊紅赤纏繞不散或麻或癢癢急便強其症不食寒熱交作重則惡心嘔吐肢體木痛煩悶乾噁此乃發于脾經之病也如

洞天奧旨

卷之八

疥瘡

二

大雅堂

肺疔者俗名白刃疔生于肺之部位經絡手之大指初生白泡頂硬根突破流脂水癢痛難熬易腐易陷其疔發熱咳嗽重則腮損咽焦毛聾肌熱口吐濃痰鼻揪氣急此乃發于肺經之病也如腎疔者俗名黑鷹疔多生于腎經部絡或耳竅胸腹腰腎偏僻之間或生于足之小指湧泉等穴初生黑斑紫泡毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如石痛入骨髓其症寒熱不常日輕夜重面色黧黑重則手足青紫驚悸沉困軟爛孔深目睛透露此乃發于腎經之病也故見色之黑者即知為腎疔治腎而加解毒去火之味見色之

黃者即知為脾疔治脾而加解毒去火之味見色之白者
即知為肺疔治肺而加解毒去火之味見色之青紫者即
知為肝疔治肝而加解毒去火之味見色之紅赤者即知
為心疔治心而加解毒去火之味何疔之不易散哉猶慮
五疔之色未可盡據更將各疔之名開列于後以便世人
之辨症云

麻子疔其狀肉起頭如黍麥之多色稍黑四邊微赤多癢
此亦腎疔也

石疔其狀皮肉相堅色如黑莖甚硬刺之不入微痛忌鹹

洞天奧旨 卷之八 疔毒 三 大雅堂

疔亦腎疔也

雄疔其狀施黑四畔仰飽漿起有水出色黃大如錢孔形

項高尖亦腎疔也

雌疔其狀稍黃向裡盤亦似灸瘡四面飽漿起心凹色赤

如錢孔之形此脾疔也

火疔其形如湯火燒盪瘡頭黑靨四邊有烟漿又如赤粟

米狀忌灸烙此心疔也

爛疔其形色稍黑有白斑瘡潰流膿有大小如匙面此亦

腎疔也

蛇頭疔又名蛇眼疔其形頭如蛇頭有二目似蛇眼大痛
苦甚多生手足指頭上宜取去其根系而後上藥亦腎
疔也

鹽膚疔其狀如匙面四邊皆赤有黑粟粒忌食鹽此心疔
也

水洗疔其狀如錢形有孔瘡頭白裡黑靨汁出中間硬忌
飲水及水洗此肺疔也

刀瘡疔其狀潤狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒烙忌
針刺刀割宜藥治之此亦腎疔也

洞天奧旨 卷之八 疔毒 四 大雅堂

浮濕疔其狀曲圓少許不合長而狹如薤葉大肉黑外黃

黑處刺之不痛黃處則痛此亦腎疔也

牛拘疔其狀肉色飽起指不破無忌縱不治亦不殺人此

乃脾疔也乃疔之最輕者

猪疔其形圓而小瘡口內有油忌食猪肉此肝疔也

牛疔其形圓瘡口內無油飽起指之不破發寒發熱忌食

牛肉此肺疔也

狗疔其形長而帶火色赤發寒熱忌食大肉此心疔也

羊疔其形長而色白有寒熱忌羊肉此肺疔也

驢馬疥其形三月頂上有黑點根脚赤色凸頂有寒熱忌食驢馬肉此亦腎疥也

瓜藤疥不計其數其形圓長如瓜形因食瓜毒而生忌食瓜亦腎疥也

苛腐疥其狀白皰三日內頂陷因食豈腐內有人汗所生麵筋亦然此肺疥也

氣疥其形或大或小皰白如有氣于內因感怒悲之氣而生忌氣怒此亦肺疥蓋肺中有毒以制肝木也

鬼疥其形亦大小不一色青因中邪毒之氣而生異于諸洞天與旨 卷之八 疥瘡 五 木雅堂

疥此氣疥夜甚令人言如見鬼狀此肝疥也

紅絲疥其形縷縷如絲線週身纏擾如手足上則入心即死宜松鐵刺去血忌食熱物此心疥也

內疥言其疥生于內臟腑上脛裡面喉口內與外疥更不同尤為利害此五臟之疥也

蒲桃疥其形黑而兼紫如水晶光亮故名之皰內黑血毒水宜去之此亦腎疥也

楊梅疥其形黑紫如蕪梅狀如遍體有梅瘡內有一二疥疥則遍身梅瘡皆不發矣頂針刺其毒外泄而梅瘡始

不陷內此亦腎疥也

魚臍疥其形如魚肚臍之狀多生臍臍肚小腿肚上乃手足太陽經分此肺疥也

痘疥有大小之不同出痘之時忽生此小疥則遍身痘瘡皆不起發看其色之何如以分五臟之疥也

蜈蚣疥其形長如蜈蚣亦有頭足發寒發熱雖因食蜈蚣所遊之饌而得之亦火毒在肺之故耳治肺而加解毒

去火之味外用雄黃定子或蜈蚣塗之則自安然矣 滿天星疥其形黑浮起如黑豆四畔起赤色今日生一類

洞天與旨 卷之八 疥瘡 六 木雅堂 明日生二顆一日增至三十六不再生此亦腎疥也其毒最橫其疥最凶必須早治若生至三十六數雖有仙丹亦無可如何也

以上各疥皆忌房事倘一犯之輕變重重變死矣

拔疥散 岐天師傳統治諸疥

紫花地丁 一兩 甘菊花 一兩 水煎服六劑全愈

慈菇湯 巫彭真君傳統治諸疥神效

山慈菇 二錢 蒼耳子 三錢 當歸 一兩 白芷 二錢

王不留行 三錢 天花粉 三錢 水二碗煎水一碗加酒一

孟再煎共一盃服之必出汗而愈

散疔湯 伯高太師傳治諸樣疔瘡

紫花地丁一兩連翹三錢夏枯草一兩水煎服一劑即消

二劑全愈

仙菊飲 巫彭真君傳治疔瘡甚無論各疔治之

皆驗

菊花根葉共用二兩生甘草為末將菊花根葉三錢取白布絞汁再用滾水冲在菊花根內仍用布瀝

出汁調生甘草末飲之入口即愈

洞天奧旨

卷之八 疔瘡

七 大雅堂

桑花飲 巫彭真君傳治各疔神效

乾桑葉五錢生甘草三錢瓜蒌二錢當歸五錢

榆樹皮二錢荆芥二錢紫花地丁五錢水煎汁一碗飢

服後飲酒微醉即散

二仙散 管勾傳外治一切疔腫惡瘡

生礬 黃丹等分臨時以三稜針刺血待盡傳

之不過三上決愈

山海丹 太谷公傳專治疔瘡惡瘡

海馬一對酒穿山甲三錢水銀一錢雄黃三錢

兒茶三錢麝香一分黃柏五錢為末同水銀再研

不見水銀星為度遇瘡生處將藥并水調塗即出

毒神效

秋葉散 岐天師傳治疔毒初起

絲瓜葉十片明礬二錢雄黃二錢先將絲瓜葉搗極爛

取汁調二味藥末以鴨翎敷疔瘡上隨乾隨潤一

日即消

葱蒜丸 衛生寶鑑治各疔腫毒

雪白礬石取末葱白煨熟搗和當歸五錢

洞天奧旨

卷之八 疔瘡

八 大雅堂

乾菊花五錢煎湯送丸五錢即愈孕婦不可服

掖回散 專治疔毒起死回生

乳香一錢生研膽礬一錢兒茶一錢冰片一錢射香一錢

龍骨一錢共為細末磁器盛之遇疔瘡初起挑破

頭將末入些酒即解

防丁散 治疔瘡勢不甚橫者即消

防風一錢生甘草五分金銀花一錢連翹一錢紫花地

丁五分天花粉一錢生地二錢玄參一錢赤芍五分

水二碗煎八分溫服

化疔湯

生薺芫三兩 生甘草三錢 水煎服一碗頓服之三劑全愈

集簡方 治丁癩腫毒

端午 薺茶草日乾 每服半兩熱酒調下汗出即愈 極有效驗

又方 治疔腫初起

王不留行子為末 蟾酥三分 水丸如黍米大每三五錢 九酒下汗出即愈

洞天奧旨

卷之八 疔毒

九 大雅堂

蒺藜散 治一切疔毒

蒺藜子一升 以醋和封頭上拔根載外臺秘要

骨蒸瘡

骨蒸瘡生于神堂二穴或膈關兩命之穴上也雖穴屬太陽膀胱之經似乎陽經之病然而此瘡不發則已發則未有不瘡者也夫瘡之疔乃毒發于陽瘡之瘡乃毒發于陰也瘡之極陰之極矣骨蒸瘡之瘡正患其瘡之極也瘡極則不可忍必抓搔而少已而無如愈搔而愈瘡愈搔而愈瘡抓搔不已必至皮肉損破久而抓搔乃見骨矣此瘡

雖是陰虛而生亦生于崇也崇之來也原非無故大約乃冤家債主耳急為祈禱庶幾易救但既已祈禱而無神方治之恐亦難痊也我有傳傳之方不忍秘隱公傳萬世以救之也

救祟湯 巫彭真君傳治骨蒸陰瘡

人參 五錢 黃芪 一兩 當歸 一兩 金銀花 二兩

茯苓 三錢 貝母 三錢 草烏 一錢 水數碗煎一碗半

飢服數劑即不瘡而漸愈

骨毒帶瘡

洞天奧旨

卷之八 骨蒸瘡

十 大雅堂

骨毒帶瘡生于兩腿之內箕門之穴也腿上箕門之穴原屬足太陰脾經也脾旺則氣血流通雖有火毒必然易散即或不散而生瘡亦必輕而易愈大約輕者必痛重者必癢如生瘡不痛而發癢必難治也一名癩發十二日可刺如膿黃赤色可治青稀腐臭者不治其瘡赤白色是毒發于骨本是難治之症倘毒發于外十日之內未膿必死

完足湯 巫彭真君傳治骨毒帶瘡

白朮 一兩 當歸 一兩 金銀花 二兩 牛膝 九錢

貝母 三錢 水數碗煎一碗服連服數劑無膿有膿

可以不死

骨痿瘡

骨痿瘡生于兩膀骨之上乃環跳之間也先小後大筋骨俱疼瘡開流水水盡則死如瘡相對並有瘡腫者十無一生勿謂瘡不若癰即可輕視之也此處生瘡左右俱難側卧用大馬屁勃墊睡不令磨着內服補中益氣藥治之

補中益氣湯 祖傳治骨痿瘡生于腿上脰骨間

人參 五錢 白朮 一兩 生黃芪 一兩 當歸 五錢

柴胡 一錢 升麻 五分 陳皮 一錢 生甘草 二錢

洞天奧旨

卷之八

骨痿瘡

主

大雅堂

半夏 二錢 茯苓 三錢 水煎服數劑愈

加味參芪湯 祖傳治脚腿生疔或忽然腫起一塊

不痛者并治各瘡

黃芪 一兩 人參 五錢 荆芥 三錢 當歸 五錢

天花粉 三錢 附子 三分 生甘草 一錢 牛膝 三錢

金銀花 一兩 水煎服多服自愈

陳肝瘡

陳肝瘡即蚤疽也生于左右臂上三五處如癩疥腫痛痛不可忍擦按難忍如有頭二七可刺刺之有膿者生刺面

無膿身熱虛硬面赤者二八日便有歸陰者瘡甚者一月後死然大補氣血亦有變死為生者矣未可信是死症而聽其必死也

加味參芪湯 祖傳治兩臂生陳肝瘡神效

黃芪 一兩 人參 五錢 荆芥 三錢 當歸 五錢

天花粉 三錢 附子 三分 牛膝 三錢 金銀花 一兩

白芍藥 五錢 白朮 五錢 水煎服數劑亦不至死

赤炎瘡

赤炎瘡遍身有赤點子乃手太陰肺經受風熱而生者也

洞天奧旨

卷之八

赤炎瘡

主

大雅堂

肺主皮毛肺經氣有餘而血不足風熱在肺難于抒泄無血以潤之故留戀于皮毛而不散矣又名赤炎風因肺熱而心火又侵則火以助火血愈耗矣血耗則肺氣更熱此赤點所以更現或有或無久而不愈變為癩風者有之故治法必須清風退熱而瘡自愈也

潤肺化痰湯 巫彭真君傳治赤炎風瘡

桔梗 三錢 桑白皮 三錢 炙甘草 二錢 黃芩 二錢

玄參 五錢 麥冬 三錢 天門冬 三錢 貝母 二錢

陳皮 五分 生地 三錢 升麻 一錢 水二碗煎八分食

後服數劑自消倘左寸脈旺大乃心火也本方去黃芩換黃連一錢可也亦服數劑自愈

血亂瘡

血亂瘡生脇肋淵腋之間也此處本是足少陽膽經所屬膽經屬木木氣若舒何至生此瘡乎膽木之氣不舒則木難據泄多生此瘡論理婦女鬱多男子鬱少男之鬱易解女之鬱難開故男生此瘡易于散女生此瘡難于瘡往往有結成癩癧數年不化忽至腫突崩潰流血而死矣所以此瘡必須將憂愁頓釋後服藥餌為妙蓋瘡雖成于膽

洞天奧旨

卷之八

血亂瘡

三

大雅堂

經之鬱然膽鬱則肝亦鬱矣肝膽同鬱則肝膽同病也夫肝之氣最宜通達而不宜閉塞肝氣閉塞則肝血必至騰越腫突崩潰非氣之通達乃血之潰壞也是以治此瘡必當先用舒膽舒肝之藥而佐之生血生氣之品則肝膽相宜而鬱結自散瘡亦愈矣苟不知治法而妄用敗毒之劑則瘡必現于肉中隱然作痛或忽長大至胸發于期門而成腋癩矣可不慎哉

解鬱散毒湯

巫彭真君傳治血亂瘡腋癩神效

白芍 四錢

白芥子 三錢

香附 二錢

鬱金 二錢

柴胡 一錢 五分 茯苓 二錢 蒲公英 三錢 陳皮 五分 生甘草 一錢 白礬 一錢 當歸 三錢 野菊花根 二錢 薏苡仁 三錢 乳香末 一錢 水數碗煎一碗連服八劑自化如已潰者本方倍加當歸少加附子 二分 去鬱

金野菊花白礬加黃芪 三錢 白朮 五錢 多服自愈

天胞瘡

天胞瘡生于頭面遍身手足之間乃毒結于皮毛而不入于營衛論理尚輕然治之不得法疼痛難忍不啻如火烙炎燒矣此瘡乃肺氣虛而火毒結于肺本是暑熱濕蒸之

洞天奧旨

卷之八

天胞瘡

古

大雅堂

氣因肺氣虛而犯之也其症燎漿白胞皮破赤沾小兒生于夏日居多故治法必用解暑散火之藥然單散火而不補肺則火不能去而氣益虛瘡難速愈矣補氣而佐之解暑則火毒自消而瘡亦易愈外用絲瓜葉搗爛調定粉敷之尤易奏功也

香薷補氣飲 內治天胞瘡

香薷 一錢 天花粉 一錢 生黃芪 一錢 白朮 二錢

炙甘草 一錢 黃芩 一錢 茯苓 二錢 人參 五分

厚朴 五分 麥冬 二錢 陳皮 三分 桔梗 一錢 水煎服

數劑愈

定粉散

定粉

五錢火煨為末

絲瓜葉

搗汁半茶鍾

輕粉

五分為末

雄黃

三錢

將定粉雄黃輕粉共研細末將絲汁調

搽瘡上即效應如嚮

仙爐脂 治小兒天苑瘡

香爐蓋

上烟脂三錢

黃連

二錢

青黛

二錢

冰片

二分各

為細末鷄子清調或猪汁調敷甚妙

瘰癧瘡

洞天奧旨

卷之八

瘰癧瘡

五

大雅堂

瘰癧之病甚多名狀不一大約得病有九一因怒而得一因鬱而得一因食鼠食之物而得一因食螻蛄蟻所傷之物而得一因食蜂蜜之物而得一因食蜈蚣所遊之物而得一因大喜飽食果品而得一因縱慾傷腎飽食血物而得一因驚恐失枕氣不順而得初生之時每現于項腋之間或牽蔓于胸脇之處其形之大小宛如梅核或動或靜或長或圓或連或斷及至潰爛或流水流膿流血之各異未破之先易于醫療已破之後難于收功蓋未破雖虛而不至于五臟之損已潰漸虧而難救夫七臟之傷故必

損補其虛而救其傷始為妙法也然病雖有九而治法止

有三也其一治在肝膽其二治在脾胃其三治在心腎治

肝膽者其左關之脈必滿而右關之脈必滑者也蓋肝膽

之鬱不開必下尅脾胃之土土氣受制難化水穀必至生

痰以助結而瘰癧不化矣治其肝膽而消化其痰涎則瘰

癧易化矣治脾胃者其右關之脈必浮而無力或滑而有

力也明是脾胃之中無非痰氣之昇騰土氣之蕭索不健

脾則痰不能消不健胃則涎不能化痰涎日盛瘰癧難開

何能治乎故必大補脾胃以消化痰涎然後佐之敗毒之

洞天奧旨

卷之八

瘰癧瘡

六

大雅堂

味則病去如掃矣治心腎者切其左寸之脈必滑右尺之脈必滿者也明是心腎兩開不能既濟而肝膽脾胃各不相應故痰壅不消瘰癧更甚補其心腎則陰陽和合而少佐之去毒破堅之味則取效益速矣倘不明三治之法而妄用刀針愈虧其根本安得濟事乎必至與死為隣不重可惜哉

開鬱散 巫彭真君傳治肝膽鬱結之瘰癧神效

白芍

五錢

當歸

二錢

白芥子

三錢

柴胡

一錢

炙甘草

八分

全蝎

三個

白朮

三錢

茯苓

三錢

參金二錢 香附三錢 天葵草三錢 水煎服連服十劑
自愈

培土化毒丹 巫彭真君傳治脾胃多痰痰難消

治之神效

人參 二兩 白朮 十兩 茯苓 六兩 炙甘草 一兩

紫蘇 八錢 半夏 二兩 僵蠶 二兩 陳皮 六錢

白芷 七錢 木通 一兩 金銀花 十兩 天花粉 三兩 各為末

蜜為丸飯後吞服三錢早晚各一服一料全愈然

必須斷色慾三月

洞天奧旨

卷之八

療癩瘡

七

大雅堂

神龜散 巫彭真君傳治心腎不交癩瘡久不愈者

神效

大龜 二個 遠志 一兩 麥冬 三兩 山茱萸 四兩

肉桂 一兩 白朮 炒五兩 蒼朮 二兩 熟地 十兩

玄參 十兩 茯苓 四兩 何首烏 十兩 桑椹 四兩

紫花地丁 四兩 夏枯草 五兩 各為細末將大龜飯鍋蒸

熟火焙乾為粉同用蜜為丸每日早晚白滾水各

干飯後送吞三錢一料必全愈

治癩癧腫硬疼痛久不瘥

貓頭蹄骨 一具 酥炙 昆布 一兩 海藻 一兩 五錢 味酒洗去鹽
水曬 連翹 一兩 黃芩 一兩 金銀花 一兩

川山甲 一兩 皂角 五錢 枳殼 一兩 香附 一兩 用為細

末將玄參 煎膏 為丸如桐子大每服七八十九一

日三服以薑汁 三匙調入好酒下能收全功

消愁破結釀 岐天師傳治癩癧

僵蠶 炒五錢 全蝎 五個 不去頭尾 白芷 一兩 白芥子 炒一兩

白朮 二兩 附子 二兩 紫貝 天葵根 八兩 先將前六味各

為末將天葵 煮汁 一碗同入在黃酒內用酒二十

洞天奧旨

卷之八

療癩瘡

六

大雅堂

斤煮三炷香三日後日服三杯以面紅為妙

樟腦丹 活法機要治癩瘡潰爛牽至胸前兩腋塊

如茄子大或牽至兩肩上下四五年不能瘥者皆治之

其效如神

樟腦 三錢 雄黃 三錢 先用荊芥根下一段 剪碎煎

溫洗良久看爛破處紫黑以鍼一刺去血再洗三

四次然後用樟腦雄黃末麻油調掃上出水次日

再洗再掃以愈為度專忌酒色

葛真君湯 治癩癧載在末卷十五卷內

內外腫瘡

腫瘡有內外之殊內腫屬足厥陰肝經之部位外腫屬足陽明胃經之部位也似乎外腫輕于內腫以胃為多氣多血之腑以肝為多血少氣之腑耳然而腫瘡雖分內外而臟府無濕毒則左右內外俱不生也惟是腫瘡自感濕氣因而生瘡者居多亦有因打撲抓磕或遇毒蟲惡犬咬破損傷遂至成瘡苟非覺肝原有濕毒未必日久而不愈也故治法活血以去濕未必骨腐無如世人不知禁忌久占房事以致皮黑肉爛臭穢難當若夫婦人女子經期血散亦往往肉黑肌壞故經年累月而不愈也所以男婦苟生內外腫瘡必當節慾慎房始易奏功耳內用補中解毒之劑外用隔紙神膏貼之不須數個便可速愈矣

補中益氣加味散 祖傳治內外腫瘡神效

人參 二錢 白朮 三錢 茯苓 三錢 生甘草 一錢

當歸 三錢 生黃芪 三錢 金銀花 五錢 陳皮 五分

柴胡 一錢 升麻 五分 半夏 一錢 水煎服連用四劑

外用葱 二條 將瘡口洗淨之後再用水同煎藥渣

煎好洗瘡日一次日川隔紙膏貼一個日日如此

洞天奧旨 卷之八 內外腫瘡 七 大雅堂

不過數個全愈然必須絕慾一月不再發

疔瘡膏藥 治內外腫瘡

隔紙膏

杏霜丹

斂瘡丹

俱載在十五卷

治一切腫瘡膏方將膏藥用溫水浸捏成爲并如

瘡口大用帶扎緊不可行走一晝一夜如前換之

黃蠟 二兩五錢 陳松香 一兩水 人參 六分

洞天奧旨 卷之八 內外腫瘡 三 大雅堂

銅青 五錢 赤石脂 五錢 黃連 一錢 紅花 三錢

飛礬 一錢 龍骨 五錢 先將黃蠟松香煎熟後將前

藥研末齊下不住手攪以滴水成珠就好如若太

老再加麻油少許一煎可用要忌鴉糞發物

人面瘡

人面瘡非生膝上即生于肘上也瘡形頗象人面重者有

口有鼻有眼多是鬼物憑之然口鼻眼雖具多不能言未

嘗不能動也動者狀似愁苦口中與之以肉食則實能化

古人謂其能食信不誣也有一種口眼皆不能動似非鬼

物憑之但既非鬼物何瘡中生有口眼乎不知人面之瘡原有生死二種生者能食能動死者則不能動不能食也其實二種皆有祟也非天譴之罰即冤孽自到耳必須省察禱謝而後用藥治之始能愈也

輕雷丸 岐伯天師傳治生死人面瘡神效

雷丸 三錢 輕粉 一錢 白茯苓 一錢 各為絕細末研勻

敷上即消蓋雷丸最能去毒而逐邪輕粉深入骨

髓邪將何隱茯苓不過去其水濕之氣共成奇功

耳倘更加懺悔祈禱尤為善後之福也

洞天奧旨 卷之八 人面瘡 大雅堂

血風瘡

血風瘡多生在兩腿裡外之膝上至膝下至踝骨前人謂是血受風邪而生也誰知皆好飲之徒過飲于酒以至濕滯于下腿而不散血氣一衰而瘡漸生矣其瘡初生之時必小小而癢久則大癢非手抓搔則癢不可止然過于抓搔則肌皮必傷而縱飲如故則癢又加甚皮破難于收酒濕難于散爛皮膚肉終無已日久之而肉中帶濕則必生蟲多則更癢矣治之法必須斷酒然後用內藥補其氣血而兼消風濕外用膏藥敷貼則水去蟲死自愈

補氣分濕湯 巫彭真君傳治血風瘡

白朮 五錢 茯苓 三錢 當歸 五錢 黃芪 一兩

柞木枝 五錢 薏仁 五錢 生甘草 二錢 葶藶 二錢

肉桂 一錢 紅花 一錢 澤瀉 二錢 水煎服多服為妙

外用十神膏貼之

十神膏 治血風瘡

蚯蚓糞 一兩 血竭 三錢 馬齒莧 一兩 黃柏 五錢

輕粉 一錢 烏相根 三錢 銀絲 四錢 胡粉 三錢

潮腦 二錢 麝香 三分 各為末同猪油調為膏貼在

洞天奧旨 卷之八 血風瘡 大雅堂

油紙上照瘡之大小貼之另用布包好縛定聽其

出水連用數個則水乾矣換膏藥時用金銀花

煎湯溫洗瘡口再另貼此膏若無水流出不必頻

換再用數個必然奏功然不飲酒不必為彼

治之也

洞天奧旨卷之八終

洞天奧旨卷之九

山陰陳士鏗敬之甫號遠翁著 會孫陳鳳輝羽儀南梓

會稽陶式玉尚白甫號存齋評 一 立孫增方溯泗氏校

杖瘡

杖瘡受官刑而成瘡也氣血有餘易于生合氣血不足難于化消倘受刑少者血不凝滯受刑多者血必穢淤受刑輕者氣不蕭索受刑重者氣必敗殘蓋刑輕刑少忍痛而斷不叫號刑重刑多悲傷而自多涕泣此氣血所以愈虧也倘受刑之先身體原弱而不強則惡血奔心往往有死者必須活其血而補其氣敗其毒而消其火然後外用膏藥貼之或末藥敷之不至死亡也

洞天奧旨

卷之九 杖瘡

大雅堂

湖中化淤湯 巫彭真君傳內治杖瘡神效服之無性命之憂

當歸 五錢 生地 五錢 三七根末 三錢 丹皮 二錢

白芍 三錢 生黃芪 三錢 生甘草 一錢 大黃 一錢

枳殼 三分 虛極者加人參 三錢 水一碗童便一碗

同煎服二劑淤血即散外用末藥膏藥貼之即愈

仙花散 外治杖瘡

鳳仙花葉 搗汁 馬齒莧 搗汁 黃蠟 二兩

葱白 搗汁 松香 二兩 五倍子 為末 一兩 乳香 二錢 將鳳仙

葱莖先搗取汁二碗將黃松香 熬膏 入倍子末攤

膏貼之自愈

禿瘡

禿瘡乃足太陽膀胱督脈二經受濕熱故生蟲作癢其實亦因父母生兒之前不節色慾或服熱藥浪戰頻頻泄精以致胎中受毒不能即散而小兒之首受之毒輕者瘡輕

洞天奧旨

卷之九 禿瘡

大雅堂

毒重者瘡重既生之後小兒或食煎炒之味或多殮水菓或多受暑風而頭上禿瘡因而生蟲痂高堆起白屑滿盈終年累月而不愈矣瘡輕者外治即痊瘡重者必須內外兼治庶易愈也世人多不急治所以多累竟至蟲蝕髮盡成爲禿子耳

蝸蜂丹 外治禿瘡

蝸牛 十個 黃蜂窠 二錢 生甘草 一錢 白礬 一錢 將蝸牛

搗爛塗禿遍透後將下三味研爲細末猪油調敷

如用熊油調搽更妙

清首湯 內治禿瘡

玄參 三錢 生甘草 一錢 茯苓 二錢 白芷 一錢

山荳根 五分 紫草 一錢 黃柏 一錢 蔓荊子 一錢

白蒺藜 一錢 半夏 五分 水煎服四劑後以前方外治

無後患也此方以十歲為準年小減之

魚臍瘡

魚臍瘡生于肘肚乃手少陰心經也此處屬少海靈道之

穴生于小腿肚者乃足太陽膀胱經也此處屬承山飛揚

之穴上下二處之瘡其疼痛皆甚初起一二日先用灸法

洞天奧旨 卷之九 魚臍瘡 三 大雅堂

最易解散心經多氣少血膀胱經多血少氣少血者宜補

血以消毒少氣者宜補氣以消毒然氣血雙補而佐之消

毒之藥更佐以引經之品何瘡之不速愈乎俗名魚臍疔

治法正同耳

化魚湯 巫彭真君傳治魚臍瘡疔不論肘腿俱效

金銀花 一兩 當歸 五錢 生甘草 二錢 青黛 二錢

地榆 二錢 白礬 一錢 生黃芪 五錢 水煎服

陰包毒瘡

陰包瘡生于大腿內脈之上乃足肝經風熱之毒也肝本

多血少氣之經若生此瘡必然疼痛治法必須補氣以解

風熱則已潰未潰尤易散也外用膏藥貼之更效如神

黃芪散陰湯 治腿內外股瘡毒疽癰

生黃芪 五錢 柴胡 一錢 白芍 五錢 炒梔子 一錢

大力子 一錢 甘草 二錢 連翹 一錢 金銀花 一兩

肉桂 三分 薏仁 五錢 半夏 一錢 水煎服

燕窩瘡羊鬚瘡

燕窩瘡生于腦後項之窩乃足太陽兼督脈之經也羊鬚

瘡生于下唇下吧骨之處乃任脈之經承漿地閣穴道也

洞天奧旨 卷之九 燕窩瘡羊鬚瘡 四 大雅堂

兩處生瘡多是感犯濕氣濕久則熱熱久則毒難化矣于

是氣血不通濕熱不散而瘡有經月不愈者在小兒尤多

倘內服除濕清熱之味以消太陽任督之毒外用藥摻之

或搽之則瘡即結靨而愈矣

除濕清熱散 家傳內治燕窩瘡羊鬚瘡神妙

茯苓 二錢 炙甘草 一錢 白朮 一錢 白芷 五分

蒲公英 二錢 澤瀉 一錢 猪苓 一錢 蒼朮 一錢

羌活 五分 天花粉 一錢 水煎服

神異丹 巫彭真君傳外治燕窩羊鬚瘡最妙

輕粉 一錢 兒茶 三錢 黃丹 二錢 炒黃柏 三錢

枯礬 五分 冰片 三分 各為末濕則乾搽乾則用麻

油調敷數日即愈

胎毒瘡癩眉瘡

瘡生于頭上眉上終年終月而不愈皆受母胎之毒也似

與禿瘡相同然而禿瘡止生于頭而不生于眉也今頭與

眉俱生尤胎毒之重者也故禿瘡可以外治而癩眉之瘡

必頂內外兼治倘瘡止生頭上用清首湯妙矣或兒畏湯

劑不肯吞服亦可止用蟬蛻丹外治無不愈者若頭眉俱

洞天奧旨 卷之九 胎毒瘡癩眉瘡 五 大雅堂

生必頂先服清首湯另用釋眉丹外搽不至曉纏歲月也

清首湯 治胎毒瘡

截禿瘡門

釋眉丹 治癩眉瘡

黃連 五分 油調塗眉 皂礬 一分 輕粉 一分

冰片 半分 麻油少許再調塗之數次全愈或用膠

髓膏亦神效載在奇驗方門

肺風瘡癩鼻瘡

肺風瘡鼻瘡生于鼻面之間乃肺經之病也夫肺開竅于

鼻肺氣不清而鼻乃受害矣鼻既受害遂沿及于面世人

不知肺經有病或冷水洗面使熱血凝滯因結于面而生

瘡矣治之法必頂清肺氣而兼清其風活肺血而再祛其

火然後用搽藥外治未有不速痊者也

加味甘桔湯 治肺風瘡鼻瘡

桔梗 三錢 甘草 一錢 甘菊 二錢 青黛 二錢

茯苓 三錢 白附子 八分 天花粉 二錢 白芷 五分 水煎服

杏黃散 載後

粉花瘡裙邊瘡

洞天奧旨 卷之九 肺風瘡癩鼻瘡 六 大雅堂

粉花瘡生于人面稟賦生癢乃肺受風熱也此瘡婦女居

多蓋絞面感冒寒風以致血熱不活遂生粉刺濕熱兩停

也裙邊瘡者亦婦女生于內外足踝之骨或裙短而不能

遮風又不慎房帷乃致是寒而濕熱不行凝滯而生瘡也

粉花瘡輕于裙邊以上濕易散上熱易化而下之濕熱未

易消也故粉花瘡止消外治若裙邊瘡必兼內治始妙也

二松散 載後

大風膏 載後

五色湯 巫彭真君傳內治裙邊瘡

茯苓 三錢 薏仁 三錢 黃柏 一錢 黃芪 三錢
 荆芥 一錢 紅花 一錢 烏柏根 三錢 白礬 一錢 水煎服
 服數劑外用大風膏調搽自愈

臟毒痔漏瘡

痔瘡生于谷道肛門之邊乃五臟七腑受濕熱之毒而生者也故瘡亦甚多形亦不一有狀似菱角者有狀似蓮花者有狀似穿腸者有狀似鼠奶者有狀似花瓣者有狀似蜂巢者有狀似懸珠者有狀似鈎腸者有狀似核桃者有狀似栗子者有狀似雞冠者有狀似珊瑚者有狀似擔腸洞天與旨 卷之九 臟毒痔漏瘡 七 大雅堂

者有狀似垂珠者有狀似雞心者有狀似牛姝者有狀似羊姝者有狀似串鬚者有狀似翻花者有狀似氣突者有狀似血射者更有外無形而內苦者有內外俱無形而齊若者摠之初生之時形小久則形大矣初有形之時痛尚可忍久則痛不可忍矣雖痔之形狀甚多而犯濕熱則一也夫濕熱亦易消之病何愈消而愈痛乎皆因不守禁忌貪色慾而不止饕食味而無窮遂至痔變爲漏矣痔易治而漏難治也蓋痔有諸形之異而各無孔竅之破服藥尚無漏厄之虞一至成漏服飲食則泄氣矣吞藥餌則損血

矣血損氣泄何能成功哉况好色者多斷慾者少欲奏異績實非易事且肛門糞口上通大小之腸前達任脈後達督脈其皮肉橫中有直正中有斜一經破損難于生合且成漏厄損傷皮肉尾閭不閉其何能合乎人肯節慾則漏猶未甚而無如明知故犯者又甚多乎所以漏病之輕重專分于慾事之多寡大約漏病有八一日氣漏二日風漏三日陰漏四日冷漏五日色漏俗名痔漏六日血漏俗名熱漏七日偏漏俗名瘻瘡漏八日瘻漏俗名瘻腮漏氣漏者時腫時消疼脹難忍也風漏者孔竅作癢也陰漏者男婦陰內疼痛出水也冷漏者孔內出白膿也色漏者犯色流膿流精也血漏者時流鮮血也偏漏者肛門之外生孔竅出膿血也瘻漏者瘡口黑爛出黃黑水也世人治法多用刀鍼掛線益增疼痛反耗氣血若不節食斷色未有能生之者或用薰洗點搽之藥多有愈者然內無藥餌療之亦虛歲月矣人能絕嗜慾慎氣惱澹滋味內服丸散外用洗敷雖老人尚易奏績矧中年者哉漏瘡多生于肛門谷道然亦有生于身上面上手足之上者此皆生他疽他毒久已收口不慎色慾泄精以傷化氣血一泄不已又泄又

洞天與旨

卷之九

臟毒痔漏瘡

八

大雅堂

不已至于三世而瘡乃成管終年流水流膿變成漏矣此等漏瘡較谷道肛門者少輕惟生于胸膈者頗重必須大補氣血斷慾半載加之補漏神丹服之則愈

榆羊丸 仲景張真君傳治痔瘡各痔無不神效

地榆 二兩 當歸 三兩 羊蹄後壳 三副 共為末飯為

丸日三服于未飲食飯前服之每服三錢一月即愈不再發地榆出臟之濕熱也當歸補新血也羊蹄殼直達于直腸故用此為使且此物亦去濕熱故相濟成功

洞天奧旨 卷之九 大雅堂

精苦散 秦真人傳治痔漏久不愈者神效不測

綠苔 要牆上生者刮下五錢 羊爪殼 五副 用後蹄

炒白木 二兩 扶苓 二兩 槐花 五錢 白芷 一兩 共為細末

末米飯為丸每日臨臥先服一錢後壓之美膳一月即內消管化烏有矣

參龜丸 鬼真君傳治各痔漏神效

人參 一兩 瓦菘 三錢 此物最不肯乾佩身半月即乾妙在取人之氣扶苓 五兩 活龜 一個 將前藥各為末以綿紙同龜包之十餘層則龜不能出微火

焙之龜死則用武火焙之龜死則將藥末取出另包惟焙龜乾搗碎再焙乾全身用之同藥蜜為丸每日只消服三十九不必服一料半料而漏管俱消而愈此方至神至聖但服此方至酒忌房事三月鵝肉則終身忌之犯則痛生急以瓦菘數條加皮硝數錢煎湯熱熏溫洗可救前方不可妄自加減一加減則不效矣用紙包龜者取龜聞藥而死也尤善消痔漏也否則功減半矣

補漏神丹 南陽張真君傳治胸膈漏瘡并頭面手足漏瘡俱神效

人參 五兩 白木 三兩 炙黃芪 八兩 金銀花 四兩 當歸 二兩 人指甲 三錢 各為細末蜜為丸每日服三

次每服五錢一料必愈忌鵝肉一載房事三月如面漏加白芷 四錢 頭上加川芎 一兩

重塗法 醫方摘要治痔瘡腫痛 皂角 三挺 火燒烟先熏之後以鵝膽汁調白芷末塗之即消用鬱金末水調塗亦消也 墨汁散 保壽堂方治痔漏瘡發

旱蓮草 一把長須洗淨以極熱酒一盞衝入取汁
用石臼搗如泥 飲之滓敷患處重者不過三服即安

傳家秘方 治腸風痔漏

草薢貫衆 去上 為末每服三錢溫酒空心服之

四聖丹 治痔漏如神

蜂房 一個淨全用去蟲將食益填于孔內陰陽瓦
焙乾為末

地龍 去泥淨陰陽瓦 取米頭者佳陰陽瓦
焙乾為末五錢 蠅螂 火焙乾為末三錢

廣木香末 三錢 象牙 三錢 乳香 去油三錢

瓜兒血竭 淨末五錢 飛禁末 三錢 槐子 炒黃為
末三錢

洞天奧旨 卷之九 療毒痔漏瘡 土 大雅堂
沒藥 三錢 提淨黃蠟 八兩 滾化 入前藥和勻為丸

每日清晨酒服三錢如不能飲清湯下

狗腸丸 治漏瘡神效

黑狗腸 一兩 象牙末 四兩 細茶末 四兩

倍子末 四兩 連腸為末如梧子每服淡鹽湯飢服

三錢如不能丸少加煎蜜為丸一料必愈忌煎炒

熱物才忌房事狗腸乃直也象牙磨管也

陰囊破裂漏水瘡胞漏瘡

陰囊之外被裂漏水此非痔漏之漏也乃楊梅毒氣未散

結于囊中也然而楊梅瘡生于身上既已全愈何外囊獨
留毒乎蓋服敗毒之藥過多必傷元氣則膀胱之氣難化
而毒尚存于囊中矣所以破裂漏水也治之法必須補氣
以健膀胱益之分消之藥為妙斷不可更服祛毒之味重
傷元氣也胞漏者囊中起窠子作瘡乃搔抓破損而水遂
外滴尚不至破裂而漏水此乃肝經濕熱非膀胱受毒也
分消肝經之濕熱亦易奏功耳

土茯苓散 家傳內治陰囊破裂漏瘡

土茯苓 一兩 白茯苓 三錢 薏仁 五錢 肉桂 三分

洞天奧旨 卷之九 陰囊破裂漏水 土 大雅堂

金銀花 一兩 人參 二錢 白木 二錢 車前子 二錢 水煎服

數劑外用炒黃柏 一錢 輕粉 三分 兒茶 三錢

水片 一分 各為末摻之即愈

逐濕湯 治胞漏

牽牛 一錢 大黃 一錢 木通 一錢 黃柏 一錢

芍藥 五錢 牛勞子 一錢 茯苓 三錢 茵陳 一錢 水煎服

二劑漸愈再用前末摻之即痊

雌雄狐刺瘡

狐刺瘡生于手上有雄有雌雄者單而雌者偶前人謂雌

者止生一個雌者生有五七個誤也瘡內生有亂絲瘡外
生有小刺雌雄無異正不必過分也大約生雌雄瘡者無
不疼痛無非受竹木簽傷破皮破肉而成之也治法先用
生甘草枸杞根等物煎湯洗之後用桑粉丹敷之即愈

桑粉丹 治雄雌狐刺瘡神效

桑條燒灰存性三錢 輕粉 一錢 雄黃 一錢 貝母 一錢 各為末

先以甘草枸杞各三錢煎湯一碗洗瘡口淨多浸

一會後以此四味研入米醋少許調稀入瘡口滿

頻頻換之待刺去自生肌矣

洞天奧旨 卷之九 狐刺瘡 三 大雅堂

水流麻根瘡

麻根瘡生于足後跟之下色赤皮爛內有肉絲縷狀似
麻根故以麻根名之足跟本屬足太陽之經多血少氣而
人又好色者多節慾者少必至氣亦傷矣不止血之不足
也况房事不節則精既耗散血不更損乎是氣血兩虧尤
難醫療也治法必須用十全大補湯補其陰陽更用腎氣
丸以填其精髓則氣血齊足而瘡毒易散然後用外治末
藥敷之始得奏功更宜絕慾為妙否則毒不能去肌不能
生亦可畏也

十全大補湯 載後

腎氣丸

輕粉 三分 生甘草 五分 黃柏 一錢 銅綠 三分

乳香 五分 冰片 一分 黃丹 五分 沒藥 三分 各研絕

細末先用苧麻根一把 苦參 二錢 煎湯一碗洗瘡

臭腐後用此方藥末搽之而愈

肥粘瘡

肥粘瘡多生于小兒頂上俗名肥瘡頭上乃太陽經也身
感風熱不散而毒乃浮于頂上遂生此瘡初生之時多黃

洞天奧旨 卷之九 肥粘瘡 四 大雅堂

膿暴出流粘髮根與禿瘡無異然禿瘡乃胎毒而肥粘非

胎毒也以小兒好食水菓濕氣留中一週風熱聚而外用

或油手抓頭或剃刀傳染初生一二久則遍頭皆是蓋濕

熱生蟲也治法先用槐條煎湯洗淨後用末藥外治不數

日即愈也

菊粉散 巫真君傳治肥粘瘡

黃菊花 五錢 煙膠 二錢 輕粉 一錢 枯礬 一錢

黃丹 二錢 各為末濕則乾潔乾則用猪油熬熱搽

之神效

千日瘡

千日瘡生于人之手足上一名疣瘡一名癩子一名悔氣瘡狀如魚鱗排集層叠不已不痛不癢生于千日自落故又以千日瘡名之或用雞脛皮擦之自愈初生時艾灸第一個即落不再生或用蜘蛛絲採來纏于根下不數日亦落也

齒垢散 治疔子神效

用人齒上垢不拘多少先用手將疔子抓損後以人齒上垢敷之日數次數日自落

洞天奧旨

卷之九 千日瘡

大雅堂

時毒暑瘡

身生瘡毒乃夏天感暑熱之氣而又多飲凉水冷湯或好食生菓寒物以致氣不流通血不疏泄乃生毒癩矣雖癩瘡瘡癩多是相同而感生瘡癩則少輕也小兒多生此瘡然重者身必發寒發熱作膿而痛盡是陽瘡半發于頭上則發于身體手足不若癩瘡之症有七惡之險內用清暑解毒火外用活血生肌膏藥末藥審而治之何難速效哉

解毒敗毒飲

香茹 二錢 蒲公英 二錢 青蒿 二錢 茯苓 二錢

甘草 一錢 歸尾 一錢 黃芩 五分 黃連 五分 大黃 八分 天花粉 一錢 水煎服十歲小兒如此大人增半小兒五歲者減半服後用膏藥可也

齒疔

齒疔者齒斷上長出如雞足疔長一二寸者有之初生之時微痛後則痛漸重矣往往有爛之而痛難忍者夫齒之上斷本屬足陽明胃經也胃經有毒故長齒斷也齒之下斷又手陽明大腸經也倘斷下長出屬大腸經矣總用芫花二錢煮絲線繫之二日即落更用分經之藥以泄其毒

洞天奧旨

卷之九 齒疔

大雅堂

則踞落不再長也

白殼瘡

白殼瘡生于兩手臂居多或有生于身上者亦頑癬之類也如風癬花癬牛皮癬楊梅癬皆因毛竅受風濕之邪而皮膚無氣血之潤毒乃附之而生癬矣此等之瘡非一二劑補氣補血可以速愈也故必須外治為妙更有一種小兒食母之濕乳流落唇吻積于兩頰間亦生癬瘡名曰濕奶癬與前瘡少異蓋風花牛皮楊梅癬多是風燥之瘡而奶癬瘡實濕症也惟瘡皆白殼無他異耳故皆以白殼名

千金方 治鼻中息肉

明礬一兩 蓖麻仁七箇 鹽梅肉五箇 麝香一錢 杵丸綿

裹塞之化水自下也 聖濟總錄用青蒿石灰石各

等分淋汁熬膏點之亦效

嵌指

嵌指者雖生脚指甲上此蓋因踢感傷損或靴鞋短窄屈其甲而不得伸以致蹉跎不安致甲長于肉內內無可容

破而流水未免步履更艱已傷益傷而作痛甚至不可忍也百治不痊者誤認指疔妄用敗毒之藥反耗氣血而

不能愈耳須令侍脚人輕輕脩去肉內之甲然後以生肌散敷之未有不愈者矣

肘後方 治足趾甲入肉作瘡不可履靴

礬石燒灰細細割去甲用礬石末傳之蝕惡肉

生好肉旬日即愈神效

二黃黎香散 醫方摘要治婦人趾甲生瘡惡肉突

出久不愈

皂礬日曬夜露每以一兩煎湯浸洗仍以礬末一

兩加雄黃二錢 硫黃一錢 乳香沒藥各一錢 研勻

搽之

鵝掌風

鵝掌風生于手掌之上古書云人生楊梅瘡時食食鵝肉因生鵝掌之風然亦有不慎房事泄精之後或手洗凉水或足犯雨露皆能感生此瘡不獨犯于手掌而兼能患于

足面白屑堆起皮破血出或疼或癢者有之乃心腎二經

乘虛而受毒也內治用六味地黃湯加柴胡麥冬白芍苜

蒲之類治其心腎最神外用熊脂膏塗而烘之不一二次

即愈

洞天泉旨 卷之十 鵝掌風 三 大雅堂

加味地黃湯 祖傳內治鵝掌風足癬

熟地 八兩 山茱萸 四兩 山藥 四兩 丹皮 三兩

澤瀉 三兩 柴胡 一兩 麥冬 三兩 當歸 三兩

白芍 三兩 肉桂 一兩 菖蒲 五錢 茯苓 三兩 各為末

蜜為丸每日早晚空腹滾水送下各五錢 一料即

愈

熊脂膏 治數十年鵝掌風

熊油 一兩 五枚 三錢 輕粉 一錢 樟腦 一錢 各為末

先以甘草 三錢 桂枝 二錢 煎湯洗之烘乾以熊油

調各末搽而烘之一日三次一連三日即愈

疥瘡 附膿窠瘡

疥與膿窠瘡多生于兩手兩足然亦有遍身俱生者膿窠瘡養多于痛若疥瘡但癢而不痛者也故疥之病輕而膿窠之病重大約疥瘡風熱也膿窠血熱也風熱者濕少血熱者濕多二症俱有濕故皆有蟲也使氣血兩旺斷不生蟲故治此等之瘡必須補氣補血佐之去風去濕則蟲且自亡安能作崇乎正不必妄用薰洗之藥也洗法尚無大害倘氣血大衰之人輕用薰藥必傷肺矣外瘡雖愈而火洞天奧旨 卷之十 疥瘡 四 大雅堂 毒內攻往往有生肺癰者不可不慎也

加減八珍湯 治疥瘡膿窠

人參 一錢 當歸 三錢 白芍 二錢 生甘草 一錢

茯苓 三錢 白朮 五錢 黃芪 三錢 熟地 五錢

生地 五錢 柴胡 一錢 川芎 八分 天花粉 二錢 水煎服

先用六劑去柴胡加北五味子十粒再服六劑無不盡愈如有火者加黃芩二錢

輕桃丸 岐天師傳治疥瘡

輕粉 一錢 白微 一錢 防風 一錢 蘇葉 一錢 各為細

末用油胡桃肉 三錢 搗碎研絕細同猪板油再搗成圓彈子大擦瘡處一二日即愈

坐板瘡

坐板瘡生于兩髀之上髀乃脾經之所屬也脾屬至陰而醫又至陰之地脾經血少血少則易生熱矣血少而熱又加濕氣侵之則濕熱兩停鬱久不宜醫乃生瘡矣此瘡最癢而兼痛治宜健脾以生氣使氣旺則血易生氣血漸生則濕自下行從膀胱而分散水濕既利而熱又何存毒又何在乎外用藥治之奏效更速倘氣血不甚虛者不須內洞末奧旨 卷之十 坐板瘡 五 大雅堂 治惟外治可也

加味五苓散 內治坐板瘡

白朮 五錢 茯苓 三錢 澤瀉 二錢 猪苓 一錢

肉桂 二分 黃柏 一錢 水煎服

濕熱兩治散 外治坐板瘡

蘿藦種 一兩 火煨存性為末敷于新瓦上煨微熱坐于其上 數次自愈或以灰煎燒為末搽于瘡上

數天即愈

松黃散 治坐板瘡

松香 五錢 研細雄黃 一錢 研細濕蘘加蒼朮 三錢
各為末綿紙撚成條蠟猪油浸透燒取油搽上立
愈

喉閉蛾瘡

此生于咽之上也 其瘡有二一雙蛾一單蛾也 雙蛾單蛾
之症亦有二一陰症一陽症也 二症雖異而火則一也 然
而火有陽火陰火之分 陽火者實火也 陰火者虛火也 咽
喉乃至命之關 此處生蛾瘡俱是危症 然陽火勢若重而
實輕 陰火勢少輕而反重 蓋實火可以寒散而虛火必瀉
洞天奧旨 卷之十 喉閉蛾瘡 六 大雅堂

破隘湯 治陽症雙蛾單蛾喉痺等症如神

桔梗 三錢 甘草 二錢 柴胡 一錢 白芍 五錢

玄參 三錢 麻黃 一錢 天花粉 三錢 山豆根 一錢 水煎服

一劑咽喉寬再劑盡消

引火湯 治陰症雙蛾單蛾喉痺等症

熟地 三兩 巴戟天 一兩 茯苓 五錢 麥冬 一兩

北味 五錢 水煎服 一劑火下歸二劑全愈 二方已

破未破俱可用不必用針吹藥點治之也

兩地湯 伯高太師真君傳治喉腫大作吐痰如湧
口渴求水雙蛾纏喉風瘡

熟地 一兩 生地 一兩 玄參 一兩 肉桂 三分

黃連 三錢 天花粉 三錢 水煎服下喉即愈

再生丹 治雙蛾單蛾初起久患以及喉痺等症

桔梗 一分 硼砂 一分 山豆根 一分 生甘草 一分

牛黃 一分 荆芥 一分 研絕細末用鴉翎蘸藥五厘

吹入蛾處日六次痰涎出淨即愈神方也

治單蛾雙蛾

洞天奧旨 卷之十 喉閉蛾瘡 七 大雅堂

雄黃明礬各等分研絕細末吹入喉中俟痰涎流

淨不必吹藥矣

大麻風

大麻風感受火毒殺物之風氣而結成之者也 初生之時
頭面身體先見紅點後變紅斑漸漸皮破汁流而成瘡矣
鬚眉盡落手足指脫眼暗鼻崩毛豎身紫遍體腐爛流膿
流血臭穢難聞最可憐之病也 此病南粵最多以地近炎
荒蛇蟲蟻結濕熱之毒一犯則裝結于皮膚濕蒸之氣一
侵則藏于肌骨終年不散內外交迫遂生麻風之瘡然

而此瘡亦有不在南而北而生者別感火邪酒濕之毒然而
又勞事不慎則毛髮無開易于侵犯治之不得法皆與麻
風症相同可見麻風之病南北俱有必以解毒為先然而
近人元氣虛者甚衆其毒而不兼補氣血則毒敗而
真精隨耗何能全活乎倘惟事補正而不急敗其毒又恐
引邪入內致崩臟腑亦可畏也故當補正散邪兼而治之
始易奏功

掃癩丹 岐天師傳治頭面身體先見紅點斑文流
水成瘡髮眉墮落遍身腐爛臭穢

洞天奧旨 卷之八 大雅堂

蒼朮 三錢 熟地 一兩 玄參 一兩 蒼耳子 三錢

車前子 二錢 金銀花 二兩 薏仁 五錢 水煎服二十劑必
愈

黃金湯 伯高太師傳治初起大麻風

大黃 五錢 金銀花 一斤 水煎汁三碗分作三次一日
服完必然大瀉惡毒後單用金銀花 三兩 連服十
日全愈

解癩仙丹 治酒濕感毒而生大麻風神效

茯苓 三錢 白朮 五錢 薏仁 五錢 黃連 一錢

玄參 一兩 金銀花 三兩 柞木枝 三錢 水煎服連服二十
劑已爛未爛俱愈

漆甲散

川山甲 一副 全明雄黃 四兩 為末真生漆和勻刷

在甲上微炙微刷以盡為度將川甲分記上中下
左右共作六碗各另研細末用四年陳醋冬米飯
為丸每服 五錢 白滾湯送下患左用左患右用右
上服上中服中下服酒記分白如在通身一起製
服神效

洞天奧旨 卷之十 蛇窠瘡 大雅堂

蛇窠瘡

蛇窠瘡生于身體臍腹之上下左右本無定處其形象宛
如蛇也重者爛深輕者腐淺亦有皮肉蠕蠕暗動欲行而
不可得也此瘡或穿著衣服棄于地上為蛇所遊或飲食
之中蛇涎沾染其毒未散因人氣血尚壯不傷臟腑乃發
于皮膚耳重者毒重而痛甚輕者痛稍可受治法不必問
其重輕總以解毒為神也前人用松針刺其初起之瘡頭
尚非治之善者大約以蜈蚣浸油頻搽以雄黃白芷佐治
實得法也

蜈蚣油 巫彭真君傳治蛇窠瘡兼治蛇咬傷成瘡俱神

蜈蚣十條為末不可經火白芷 三錢 為末白者佳

雄黃 三錢 為末生甘草末 三錢 香血 二兩 將三味

浸之三日或隨浸調搽皆能建功也

蜘蛛瘡

蜘蛛瘡生于皮膚之上如水窠髮鬚其色淡紅微痛三三

兩兩或羣攢聚宛似蜘蛛故以蜘蛛名之此瘡雖輕然生

于皮膚終年不愈亦可憎之瘡也或謂需濡蜘蛛之尿而

洞天奧旨 卷之十 蜘蛛瘡 十一 大雅堂

生者其說非是大約皆皮膚之血少而偶露毒氣濕氣遂

生此瘡耳方用苧麻在瘡上搽搓使其瘡破水出後用藥

搽之自易愈也

解蛛丹 治蜘蛛瘡

苧麻根灰 三錢 水片 二分 輕粉 五分 抱出雞蛋殼

燒灰 一錢 燈草灰 二分 白明礬 三分 共研細搽瘡

上即痊然必須用苧麻揉搽皮破搽藥效之神也

陰陽濕痰破瘡

陰陽濕痰瘡皆傷寒失汗寒熱鬱而生痰痰不能驟消于

臟腑留而不散久之結于肌肉遂成痰塊塊久則腫腫久

則痛痛久則潰潰則成瘡矣但其瘡有陰陽之分陽瘡多

生于兩手陰瘡多生于兩足陽瘡則熱陰瘡則寒熱者病

在陽腑寒者病在陰腑也故治手上之瘡者宜治其陽之

熱經而佐之去濕化痰之品治足上之瘡者治其陰之寒

經而佐之去濕化痰之味無不收功也前人專用艾火灸

之尚非正治耳

通陽消毒湯 巫彭真君傳治陽濕痰破瘡在手者

茯苓 三錢 神麩 一錢 硝砂 一錢 甘草 一錢

洞天奧旨 卷之十 陰陽濕痰破瘡 十二 大雅堂

麻黃 五分 白朮 三錢 黃柏 一錢 天花粉 三錢

黃芪 五錢 蒲公 英 三錢 水煎服如已潰者用冲和膏

貼瘡口自愈

治陰化濕湯 巫彭真君傳治陰濕痰破瘡在足者

白朮 五錢 茯苓 五錢 肉桂 二錢 附子 一錢

黃芪 一兩 半夏 三錢 水煎服如已潰破者用玉龍

膏外敷之內外兼治則易愈也

傷寒有大渴之症貧家無力買藥或富家慢用藥餌惟以

飲水止渴為事雖火為水折胸膈之炎熱少除而水多難

化未免爾滯下焦停積成淤而兩足之氣不通濕熱生瘡久則破爛筋弛肉腐而兩足墮落矣此等之瘡非尋常藥味些小分兩可以保全者

全活湯 巫彭真君傳治傷寒愈後兩足生瘡流水

流膿神效

白朮 三兩 蒼朮 二兩 肉桂 一錢 薏仁 二兩

車前子 五錢 人參 一兩 如貧家用黃芪 二兩 水煎服

一連服十日不特兩足之爛可除而餘生亦可全

活

洞天奧旨 卷之十 楊梅瘡 三 大雅堂

楊梅瘡

楊梅瘡瘡生于龜頭之上者多生于穀道玉莖上者少生于鼻內者更少皆熱毒之氣也風流子弟何忽生此瘡平日所食者肥甘所衣者輕煖何傷此熱毒乎蓋得之于嫖妓與有毒之女兩相酣戰而中毒也妓女何毒重如此亦遇毒感毒耳泄精之時自覺馬口之間如針刺痛此毒氣來犯矣重則生魚口輕則生疔瘡疔瘡乃楊梅先兆也當酣戰之時本難中毒然而鼓勇而闖內火沸騰及至泄精元氣虧損毒氣即乘虛而入內火與毒氣之火兩相和合

而不化故生疔瘡不補虛而惟事敗毒則已虛益虛無異下石未有不滿身生瘡者矣治法內用二生湯外用保身散治之即愈苟或不然變出非常非玉莖爛落即鼻柱塌陷破壞面目可畏哉

二生湯 岐天師傳治初生疔瘡

生黃芪 三兩 土茯苓 三兩 生甘草 三錢 水煎服外用藥敷

之

保身散 巫彭真君傳外治疔瘡

輕粉 一錢 黃柏 五錢 乳香 一錢 水粉 三分

洞天奧旨 卷之十 楊梅瘡 三 大雅堂

孩兒茶 三錢 百草霜 一錢 冰片 三分 各為末猪膽調搽

楊梅瘡

楊梅瘡瘡此楊梅瘡發已久將要結痂而復犯房事以致作痛生瘡此等治法必須大補氣血氣血足而精生精生則臟腑還元而瘡自結痂矣不可悞認毒之未淨而仍用敗毒之劑也一用敗毒更傷損氣血終無奏功之日矣惟內用大補之藥外用調搽之末便易收斂且慶安全也 加味十全大補湯 祖傳方內治楊梅瘡 人參 二錢 當歸 三錢 白朮 三錢 茯苓 二錢

生甘草^{二錢} 黃芪^{三錢} 肉桂^{三錢} 川芎^{一錢}
熟地^{五錢} 柴胡^{五分} 土茯苓^{五錢} 水煎服十劑虛甚
者多服為妙

粉霜神丹 外治楊梅瘡

粉霜^{一錢} 人參^{一錢} 生甘草^{一錢} 水片^{三分}

輕粉^{一錢} 丹砂^{一錢} 石膏^{二錢} 槐米^{一錢} 各研細末猪膽

調搽愈

楊梅結毒

楊梅之瘡多生于嫖妓聞人毒氣而生者其毒即發不生
洞天奧旨 卷之十 楊梅結毒 西 大雅堂

于玉莖馬口之間也惟嫖妓而得之必從玉莖始以毒自
此入則瘡亦自此興倘初生下疳即用福德湯大劑吞服
不特瘡頓愈而楊梅之瘡亦必不生即生亦輕少斷無
結毒之禍無奈世醫不知此方之妙妄用藥餌惟識敗毒
不難用補氣補血之味以致難于收功而風流子弟厭惡
生瘡且歸咎醫生或請收斂醫生貪圖厚謝不補氣以祛
邪不補血以化毒竟用輕粉之類以收斂之毒入骨髓不
敢外發一時瘡淨亦為可喜子弟甘謝而無怨言醫生樂
酬而生德色苟仍補其氣血而加之暗消之品終年累月

而服之則元精既足元氣自旺毒難內存猶能外泄無如
子弟既苦于服藥而醫生亦倦于防危彼此相忘竟置之
不論不議之天誰知收斂之後不知保守縱慾如故而毒
難久留或半年或二三年乘何臟腑之虛乃突而外攻矣
大約毒結臟腑之虛俱是難救之瘡而結于鼻與玉莖者
尤為難救

福德湯 伯高太師傳治下疳楊梅

當歸^{二兩} 白朮^{二兩} 生甘草^{五錢} 土茯苓^{一兩}

金銀花^{四兩} 天花粉^{三錢} 水煎服連服十劑而遍身之

洞天奧旨 卷之十 楊梅結毒 西 大雅堂

瘡如掃矣

寒水再造丹 伯高太師傳治結毒至鼻爛莖爛者

皆效

麥冬^{三兩} 生甘草^{一兩} 桔梗^{三錢} 黃芩^{三錢}

連翹^{三錢} 貝母^{三錢} 土茯苓^{二兩} 寒水石研細末^{三錢}

夏枯草^{二兩} 水煎汁二碗調寒水石末服倘鼻尚未

落一劑不爛落也如已爛落一劑不再爛也二劑

全愈倘結毒生于他處減半多服無不奏效

翻花楊梅

此瘡亦感淫毒之氣也視其瘡勢若重其毒反輕蓋毒欲盡情出外也古人云是濕熱表虛表虛則有之不可全歸于濕熱也總皆毒氣外發因表虛而反熾誰知因熾而補其表則表實而毒難藏轉易收功也惟是表虛不可再貪色慾不獨傳其毒而害人且虛其虛而自害故必須節飲食戒惱怒而斷房帷斷無意外之虞外用點藥敷之自奏功如神矣

黃芪外托散 家傳治翻花楊梅瘡

黃芪 一兩 當歸 三錢 人參 三錢 茯苓 五錢

洞天奧旨

卷之十

大雅堂

土茯苓 二兩 白芍 五錢 生甘草 三錢 白礬 二錢 水煎服

四劑重者十劑外用藥調搽即愈

地龍粉霜丹 祖傳方外治翻花楊梅瘡

粉霜 一錢 蚯蚓糞 一火焙乾 百草霜 三錢

輕粉 二錢 黃丹 三錢 飛越 生甘草 二錢

水片 二錢 黃柏炒 二錢 胡粉 二錢 各為細末點搽自愈

陰陽楊梅瘡

楊梅瘡有陰陽之分古人以陽為氣虛而感毒陰為血虛

而感毒實為有見非無稽之語也陽必高突陰必低陷陽必痛陰必癢而其色皆紅也故陽宜用補氣之藥而佐之化毒之味陰宜用補血之藥而輔之消毒之品然後外以末藥調搽豈難速愈乎

六君加味湯 治陽楊梅色紅作痛而高突者神效

人參 五錢 白朮 五錢 半夏 一錢 生甘草 三錢

茯苓 三錢 陳皮 五分 土茯苓 兩 金銀花 兩 水煎服

十劑愈

加味四物湯 治陰楊梅色紅不起不破作癢者神效

洞天奧旨

卷之十

大雅堂

效

熟地 五錢 川芎 二錢 當歸 五錢 白芍 一錢

白茯苓 二錢 生甘草 二錢 金銀花 一兩 天花粉 二錢

土茯苓 一兩 水煎服二十劑愈

丹砂斂毒丹 外治陰陽楊梅瘡兼治疔瘡

丹砂 一錢 雄黃 二錢 粉霜 一錢 孩兒茶 三錢

露蜂房燒灰 五分 水片 三分 生甘草 一錢

輕粉 一錢 各為細末豬膽調搽自愈

楊梅瘡

此乃女子感染男子餘毒而生者也或前已生瘡用藥既痊偶食牛肉或洗浴當風抓癢或行房事以虛其皮膚毒結不散乃生癬矣或血乾而起白屑或肉碎而流紅水以致淋漓臭穢者有之用蝸牛栢霜散原易奏功然內不服藥以補虛則氣血雙虧外難即愈必須內外兼治否則日久不痊必生出蝕反難速瘥也

雙補化毒湯 岐天師傳內治楊梅癬

天花粉 二錢 當歸 五錢 黃芪 五錢 柴胡 一錢

生地 三錢 麥冬 三錢 天冬 三錢 荆芥 一錢

洞天眞旨 卷之十 楊梅癬 九 大雅堂

威靈仙 二錢 白蘚皮 一錢 胡麻 二錢 槐屑 二錢

乳香末 一錢 生甘草 二錢 水煎十劑外用末藥搽之必

愈

蝸牛栢霜散 岐天師傳外治楊梅癬

黃柏 三錢 沒藥 一錢 輕粉 一錢 粉霜 一錢

雄黃 二錢 冰片 三分 丹砂 五分 孩兒茶 三錢

枯礬 一錢 蝸牛十個各爲末猪膽調搽日數次搽

三日漸愈神效

楊梅瘡子

其瘡細小亦是淫毒與大者相較其毒尚輕蓋其人氣體壯實感毒不重故瘡亦不惡也急用內托之藥十數劑則毒易散而痘亦易回倘恃強而仍然漁色則氣血雙耗必至輕變爲重矣輕既可以變重安在重而不可以變危乎搥之楊梅之瘡毋論輕重必須速治加之絕慾則病去如掃無如世人好色甚多服藥甚倦遂至變生不測也鐸有神方因載手後聽世採取耳

早奪湯 岐天師傳治初出楊梅瘡痘神效

人參 一兩 生黃芪 一兩 茯苓 一兩 當歸 一兩

洞天眞旨 卷之十 楊梅瘡子 九 大雅堂

遠志 三錢 生甘草 三錢 金銀花 一兩 大黃 一兩

石膏 一兩 柴胡 二錢 白朮 一兩 天花粉 三錢

水煎服一劑大瀉惡物臭穢不堪再服二劑毒盡

去矣去大黃石膏加土茯苓 二兩 同前藥再服四

劑必有瘡影發于滿身在皮之內而出于皮之外

也再服二劑全愈

外表湯 治楊梅瘡子

黃芪 一兩 當歸 五錢 麥冬 五錢 金銀花 一兩

天花粉 三錢 木通 一錢 澤瀉 二錢 柴胡 二錢

黃芩 二錢 生甘草 二錢 水煎服

齒窟瘡

齒窟瘡因傷損齒牙其齒墮落而成者也蓋人齒最深其窟甚大氣血盛而易于長滿氣血虛而艱于生合其症高年老人尤多夫齒雖有臟腑之分而根實出于腎也高年老人腎精耗竭無不虛者所用飲食止可生氣生血不能生精精少則腎氣不生而腎血又何易生乎此齒窟之更難填實也况兼貪饕或用硬物磕破少合而重傷畧滿而再損疼痛切骨連心者往往然也內用加味地黃丸以填洞天與旨 卷之十 齒窟瘡 大雅堂

加味地黃丸 內治齒傷成窟

熟地 五錢 山藥 三錢 山茱萸 二錢 茯苓 二錢

骨碎補 二錢 補骨脂 二錢 丹皮 二錢 當歸 五錢

麥冬 三錢 澤瀉 一錢 氣虛甚者加人參 五錢 水煎

服以齒滿為期

填齒散 外治齒窟

人參 一錢 骨碎補 一錢 三七末 一錢 同川羨藜 二錢

乳香 一錢 鼠脊骨末 一錢 各為末用黃蠟化開

成丸如齒窟大填入隙數日即愈如蠟化頻填自愈

胎漏皮瘡

胎漏皮瘡初生嬰兒所長之瘡也有肉無皮視之可痛蓋母食五辛之味或餐燔熬炙博等物或父母有瘡而坐孕往往生無皮之子然而傷熱而生之者其病輕受毒而生之者其病重重者母子必須同服化毒之藥則皮生而兒無死亡之禍否則無不夭者若因食熱物而生者雖半體洞天與旨 卷之十 胎漏皮瘡 大雅堂

空蝸生皮散 岐天師傳治父母生瘡因產胎漏皮瘡之子者此方主之

全蝎 一兩 生黃芪 四兩 金銀花 八兩 生甘草 一兩

麥冬 四兩 各為末蜜為丸每日服五錢子服三九

一料全愈

白芨雄黃散 岐天師傳治食五辛熱物子生漏皮瘡神效

白芨 兩 雄黃末 三錢 各為末摻之自然生皮且又不痛最神

洞天奧旨卷之十一

崑崙士錄敬之甫號遠翁

會稽陶式玉道甫號存齋評

玄孫曾之湖泗校



風熱瘡

風熱瘡多生于四肢胸脇初起如疔瘡癢而難忍爬之少快多爬久搔未有不成就者甚則鮮血淋漓似疥非疥乃肺經內熱而外感風寒熱相激而皮毛受之故成此症也世人以防風通聖散治之亦有愈者然鐸更有治其外洞天奧旨 卷之十一 風熱瘡 一 大雅堂 而自愈紀之以便不願服藥之男婦也

三聖地膚湯 岐天師方

地膚子 一兩 防風 二錢 黃芩 三錢 煎湯一大碗加

豬膽二個取汁和藥同煎以鴨翎掃之即止癢瘡

止而瘡亦盡愈

黃水瘡

黃水瘡又名滴膿瘡言其膿水流到之處即便生瘡故名之也此瘡生在皮毛之外不在肌肉之內雖是脾經濕熱亦由肺經乾燥脾來顧母本以濕氣潤母也誰知此濕有

一第 1013 丹 賣 參 日 畫 三 書 寫 6 人 臣 內

熱熱得濕而生蟲欲救母而反害母之皮膚也治法內服
除濕清熱之藥而佐之涼血之味血涼而熱退熱退而水
更清亦易行也濕熱兩除何蟲不死又得外治以解其鬱
毒又何能長存乎故隨洗而隨愈也

安體散 岐天師方內治黃水瘡

扶苓 三錢 蒼朮 二錢 荆芥 二錢 防風 一錢

黃芩 一錢 當歸 五錢 蒲公英 二錢 半夏 一錢 水煎服

四劑

舒解丹 岐天師傳外治黃水瘡神效

洞天奧旨

卷之十一 黃水瘡

大雅堂

雄黃 五錢 防風 五錢 荆芥 三錢 苦參 三錢 水煎湯

取二碗洗瘡即愈

粉黃膏 章雲樵傳治黃水瘡

蛤粉 一兩 石膏 五錢 輕粉 五錢 黃柏 五錢 共為細

末暑天用無根水秋冬用麻油調敷

傷守瘡

傷守瘡者言不守禁忌也凡生瘡毒必須堅守房帷無論
大小皆宜如此大瘡毒而不守禁忌必致喪亡小瘡毒而
不守禁忌必至痛苦今名傷守者猶言小瘡痛也醫生錯

云傷手豈搔抓能害之乎凡犯色慾其瘡口必黑黯痛如
刀割腐爛必深非大補精血神氣萬難奏效內服加味補
中氣湯或加味十全大補湯以補之外用末藥敷之始可
轉危為安變死為生也

補中益氣加金銀花湯 祖傳治不愼色慾

人參 五錢 黃芪 一兩 柴胡 一錢 升麻 五分

生甘草 一錢 當歸 五錢 陳皮 五分 白朮 五錢

金銀花 兩 加棗 二枚 水煎服如虛極者倍加

歸木寒虛者加附子肉桂各一錢 餘不必加

洞天奧旨

卷之十一 傷守瘡

大雅堂

加味十全大補湯 祖傳治傷守瘡

熟地 一兩 川芎 二錢 當歸 五錢 生黃芪 兩

白朮 五錢 扶苓 二錢 甘草 一錢 肉桂 一錢

白芍 二錢 人參 二錢 金銀花 兩 水煎服

救敗丹 岐天師傳外治傷守

人參 二錢 三七根末 三錢 孩兒茶 三錢 乳香 一錢

白僵蠶 二錢 輕粉 一錢 髮灰 二錢 各為細末漆于膏

藥內貼之若不用膏藥者乾漆妙猪油調搽亦
手足了瘡

手足了毒瘡雖生于手足名同而了宜辨也生于手了屬手經生于足了者屬足經然手足亦宜辨也生于手足之背了者是三陽經生于手足之掌了者是三陰經看其何經而用何經之藥托裡調中更加引經之味則計日可以奏效矣倘內既服藥而外復加敷藥以蠶其毒則毒不走散一出膿而即安尤治法之神也手足了毒近于丹穴最宜早治萬勿因循至輕變為重也

全消飲 岐天師傳治手足了毒瘡

當歸 三錢 生黃芪 三錢 紅花 二錢 生地 三錢

洞天奧旨 卷之十一 手足了毒瘡 四 大雅堂

荆芥葉 一錢 貝母 一錢 茯苓 二錢 黃柏 二錢

地骨皮 三錢 菊花根 一錢 水煎一碗急服數劑無不內

消若失治一至潰爛多費時日矣然肯服此方亦

不大潰

蠶毒神丹 岐天師傳外治手足了毒瘡

地榆 二錢 天花粉 一錢 菊花根 一錢 生甘草 一錢 芙蓉

葉 十四葉 蒲公英鮮者 一錢 將乾研末搗鮮藥取汁

調之敷上則毒不走開內自化矣

胎毒瘡

胎毒瘡乃初生小兒背上或有一二孔也此等小兒明是臟腑不足少氣少血以長皮肉也倘雖有孔窠而肉膜遮護猶有生機急用氣血竣補湯大劑與母吞服兒食其乳尚有生機再嚼人參三七之片數分填于孔窠之內則氣血壯旺生皮亦速也苟孔窠之中無有脂膜洞見臟腑數日即死救之亦無益也總補母之氣血一時填隙而兒之先天大缺僅可延數年之日月不能享百歲之光陰也

氣血竣補湯 治兒生胎毒瘡

黃芪 一兩 當歸 一兩 白朮 五錢 川芎 五錢

洞天奧旨 卷之十一 胎毒瘡 五 大雅堂

紅花 五分 益母草 一錢 水煎服二十劑至月餘後可

服補中益氣湯數十劑

濕毒瘡

濕毒之瘡多生于兩足非在足脛即在足踝非在足背即在足跟其故何也蓋濕從下受而兩足親于地故先受之也夫水濕之氣寒冷者多而一入人身之內則人氣熏蒸必變為熱濕熱相合內必生蟲故初起之時微癢者正蟲之作祟非止氣血之不和也治之法必須去濕為主而少加殺蟲之味則愈病甚速轉不必解其熱也蓋濕解而熱

自散况生瘡既久流膿流水氣血必虛安在熱存乎此除濕之所以神也

除濕解毒湯 祖傳治濕毒足瘡

白朮 五錢 山藥 五錢 薏仁 五錢 金銀花 兩

肉桂 三分 澤瀉 二錢 烏柏根 一把 水煎服十劑自

愈如未愈者再用龍馬丹傳之妙

龍馬丹 岐天師傳統治濕毒瘡

馬齒莧 二錢 黃柏 五錢 陳年石灰 二錢 輕粉 一錢

地龍糞 三錢 伏龍肝 二錢 黃丹 三錢 赤石脂 三錢 各為細

洞天奧旨

卷之十一

濕毒瘡

六

大雅堂

末蜜調敷之一二次即愈

火丹瘡 附赤白遊風

火丹瘡遍身俱現紅紫與發斑相同然斑隨現隨消不若

火丹一身盡紅且生瘡也發斑熱鬱于內而發于外火丹

熱鬱于外而趨于內發于外者有日散之機趨于內者有

日深之勢故發斑輕而火丹重然而火丹有二種一赤火

丹一白火丹也赤色皮乾白色皮濕似乎各異而熱鬱于

皮毛之外由外而入內則赤白無異也大約赤者純是肺

經之火熱若色帶白乃是脾經之火熱也故赤者竟解肺

經之熱補水之不足以散火之有餘此消丹飲之為妙也

白者解脾經之熱利水濕之氣從膀胱而下走不必又去

外逐皮毛蓋濕氣之盛在脾而不在肺耳此桑白分解散

之所以妙也更有一種赤白遊風往來不定小兒最多此

症有似發斑但發斑有一定之根而赤白遊風無一定之

色此胃火鬱熱不解故亦結瘡而不愈治之法必須清熱

而清熱又必須涼血蓋血寒則凝滯不行雖火得血而可

止終不能散火此清火消丹所以妙也三症分而治之自

有奇驗正不可混耳

洞天奧旨

卷之十一

火丹瘡

七

大雅堂

消丹飲 岐天師傳統治紅紫火丹

玄參 三兩 升麻 二錢 麥冬 一兩 桔梗 二錢

生甘草 一錢 水煎服一劑丹化為無矣小兒減藥之

半

桑白分解散 伯高太師傳治白火丹

薏仁 二兩 澤瀉 三錢 升麻 一錢 天花粉 三錢

桑白皮 三錢 神麴 三錢 水煎服小兒減藥之半

清火消丹湯 岐天師傳治赤白遊風丹

生地 一兩 丹皮 三錢 甘草 一錢 玄參 三錢

牛膝 二錢 赤芍 三錢 天花粉 一錢 水煎服二劑消半

四劑全消小兒減半赤遊丹又可外治用積年胞

衣所化之水和金汁塗之即消神效

經驗方 外治小兒丹毒皮膚熱赤

寒水石 五錢 白土 一分 爲末米醋調塗之

內丹

內丹者生赤色于皮毛之內而外不十分顯出也點燈照之若用紗裹硃砂而透明故以內丹呼之此等之丹得于胎熱其母受胎之後不忌熱物信口貪食或感夏天風熱

或好色浪戰皆能助火火邪內攻胎受其毒而傳氣于小兒乃發爲丹毒也此火欲出而不得遂出隱隱外突于皮

毛倘發于腰臍而作痛或大小便閉結不通皆死症也時

生于淵液京門等穴或左或右尚非死症以熱在膽經而

不在腎經也方用荆芥祛風湯實可救治然救之亦必頂

早蓋內丹不早治亦必死耳

荆芥祛風湯 伯高太師傳治內丹

荆芥 二錢 甘草 一錢 半夏 五分 麥冬 五錢

當歸 三錢 白芍 三錢 水煎服數劑愈

散丹湯 岐天師傳治火丹

當歸 三錢 生甘草 一錢 赤芍藥 三錢 大黃 一錢

丹皮 二錢 柴胡 八分 黃芩 一錢 水煎服二劑愈

飛龍丹

小兒丹毒有十種一飛龍二吉龍三鬼火四天火五天龍

六水激七胡次八野火九烟火十胡漏也皆父母胎毒所

成治症必須辨明不可混治丹症原是難治之病况又辨

之不明妄用藥餌安得十全且各丹不依症早治攻入腸

胃十無一生可不慎乎飛龍丹者從頭頂上紅腫起此火

毒在泥丸也本是難救然急用葱白搗自然汁調白芨炒

黃栢塗之即消及不可不知也

芨栢散

白芨 三錢 黃栢 三錢 炒各爲細末急用葱白搗爛

取自然汁塗在泥丸頂上一晝夜即消

吉龍丹

吉龍丹從頭上向腦後紅腫者是亦有腫而作疼者尤爲

可畏是足太陽膀胱風熱故作痛也更有渾身作熱者內

宜服防風通聖散加減治之外宜用紫荊散調搽自愈

防風通聖散 世傳方

防風 荆芥 連翹 麻黃

薄荷 川芎 當歸 白芍

白木 山梔子 大黃 芒硝

黃芩 石膏 桔梗 甘草

滑石 等分 水煎服

紫劑散

紫劑皮 一錢 赤小豆 一錢 荆芥 一錢 地榆 一錢 各等分

為細末以雞子清調塗神效

洞天奧旨

卷之十一

鬼火丹

十

大雅堂

鬼火丹

鬼火丹先面上赤腫後漸漸由頭而下至身亦赤腫也是

手足陽明經內風熱治宜用白虎湯以瀉胃熱加防風劑

芥薄荷桑白皮葛根以散其風引其從皮毛而外散也然

大腸亦熱何故不瀉大腸之火不知胃之火甚于大腸胃

火散而大腸火亦散不必又治之也但外用伏龍散末以

雞子清調搽尤妙

白虎加味湯 世傳方內治鬼火丹

石膏 二錢 知母 一錢 麥冬 三錢 半夏 一錢

防風 五分 荆芥 二錢 薄荷 一錢 甘草 一錢

桑白皮 二錢 葛根 一錢 竹葉三十片水煎服二劑

伏龍散 家傳外治鬼火丹

伏龍肝末 三錢 炒黃柏 三錢 為末雞子清調搽神效

天火丹

天火丹從春背先起赤點後則漸漸赤腫成一片是腎督

脈中熱毒兼足太陽經風熱宜治腎而并治膀胱為是不

可純用防風通聖也外用桑榆散外敷則得之矣

解毒散 岐天師傳內治天火丹

洞天奧旨

卷之十一

天火丹

二

大雅堂

玄參 五錢 生地 五錢 羌活 一錢 黃柏 二錢

白茯苓 三錢 升麻 五分 丹皮 三錢 水煎服四劑自散

桑榆散 家傳外治天火丹

地榆 二錢 桑白皮 二錢 羌活 一錢 玄參 三錢 各為細

末羊脂溶化調塗

天竈丹

天竈丹從兩臂起赤腫少黃色或此一臂見之皆手陽明

經風熱內服解毒之藥外用柳枝燒灰為末水調塗之亦

易愈也蓋天竈丹乃丹毒之最輕者故亦可輕治之耳

輕解散 岐天師傳內治天靈丹

防風 五分 麥冬 三錢 生地 三錢 桑白皮 二錢

黃芩 一錢 柴胡 八分 白芍 三錢 天花粉 五分 水煎服

二劑

柳灰散 家傳外治天靈丹

柳枝燒灰 五錢 荆芥炒末 二錢 滑石 三錢

生甘草 二錢 爲末水調塗之即愈

水激丹

水激丹初生于兩脇虛腫紅熱乃足少陽膽經風火也此

丹亦熱之輕者治膽經之火而去其風可計日而痊也方

用加味小柴胡湯治之最神外更以敷藥塗搽又何患乎

加味小柴胡湯

柴胡 一錢 半夏 五分 甘草 五分 黃芩 一錢

陳皮 三分 白芍 二錢 防風 五分 荆芥 一錢 水煎服

數劑丹消

缺唇散

生缺唇 二錢 母猪糞燒灰 二錢 和蠟水調塗妙

胡次丹

胡次丹

胡次丹先從臍上起黃腫是任經濕熱也去其濕熱而丹毒自散古人用二黃解毒湯未免過峻恐小兒氣虛難受鐸受異人之傳另用化濕飲方治之尤覺安穩更用栝榔外治萬無一失也

化濕飲 岐天師傳內治胡次丹

白朮 十個 白朮 一錢 黃柏 二錢 山藥 二錢

茯苓 三錢 澤瀉 一錢 木通 一錢 赤芍 二錢

荆芥 一錢 天花粉 一錢 水煎服

檳榔散

檳榔爲末 二錢 生甘草 一錢 米醋調搽 自愈

野火丹

野火丹從兩腿上起赤腫痛甚如火之燒乃足陽明胃經

風熱也內服涼膈散加減外以羊脂調末藥塗搽自易愈

也此丹雖火盛極不可信是胃經熱熾竟用石膏湯與濕

黃散也恐小兒脾胃久實不禁大瀉反恐胃氣損傷轉難

救耳

救耳

涼膈散 世傳內治野火丹

連翹 二錢 大黃 一錢 芒硝 五分 甘草 一錢

梔子 二錢 黃芩 二錢 薄荷 一錢 芥 一錢 水煎服

二劑

消腫散 岐天師傳外治野火丹

乳香 一錢 白芨 一錢 火丹草 一錢 各為末羊脂調

塗妙

烟火丹

烟火丹有從兩足跗起赤色腫痛乃足三陽經風熱也亦有從足底心起乃足少陰腎經大熱也內宜服滋陰抑火

之藥使水旺足以制火也外以末藥兼治為妙

洞天奧旨 卷之十一 野火丹 大雅堂

抑火制陽丹 岐天師傳內治烟火丹

玄參 五錢 菴荻草 二錢 黃柏 一錢 生地 三錢

熟地 一兩 丹皮 三錢 細甘草 一錢 沙參 二錢

牛膝 一錢 金釵石 二錢 水煎服

栢土散 家傳外治烟火丹

栢槽下土黃栢末蜜調塗之自愈

胡漏丹

胡漏丹從陰上起黃腫皆厥陰肝經虛火發于外也內宜

服補陰清火散風之藥外用末藥調搽可愈倘用當歸龍

蒼丸與瀉青散皆不能成功耳以上丹症小兒百日內發

者不論是何丹皆胎毒也三日內治之皆可救遲則無及

矣倘百日之外生丹者遲尚不至于死亡然亦必須急治

不可令其入腹一入腹亦難救故腹脹不飲乳者必死無

疑蓋丹症能食乳者皆可治療以其胃氣之未絕也更有

一種紅線痛者尤難救援以父服熱藥遺熱在胎非藥所

能解耳

清散湯 岐天師傳內治胡漏丹

白朮 一錢 茯苓 一錢 甘草 五分 當歸 二錢

洞天奧旨 卷之十一 胡漏丹 大雅堂

炒梔子 一錢 荆芥 一錢 防風 三分 生地 二錢

麥冬 二錢 黃柏 一錢 水煎服

屋土散 岐天師傳外治胡漏丹

瓦上陳土炒黃栢生甘草各研細末蜜與醋同調

塗即消

粉瘰癧

瘰癧與瘰癧雖俱生于肌上而瘰癧生于頸下瘰癧則不止生于頸

也瘰癧則不破瘰癧則久而破者多矣瘰癧感沙水之氣皮寬不

急搥搥然也古云瘰癧有三種一血瘰一肉瘰一氣瘰血可

破肉可割氣可針其實三種俱宜內消不宜外治惟痛則可外治也然亦有宜有不宜者大約粉癩宜用外治蓋粉癩大而必軟久則加大似乎有膿而非膿也乃是粉漿藏于其內擠出宛如線香焚後之滓又受水濕之狀如已破矣必擠淨後用生肌藥搽之不再生否則仍復長也初生此癩必須治之如不治日必大甚亦被其累當用艾灸十數壯即以醋磨雄黃塗紙上剪如蠟蠟蓋大貼灸處外用膏藥貼一二日一換擠出其膿必愈妙法也

消癭散 岐天師傳統治各癭

洞天奧旨 卷之十一 粉癩癭 去 木雅堂

海藻 一錢 龍膽草 一錢 昆布 五分 土抓根 二錢

半夏 一錢 小麥麵 一錢 甘草 一錢 乾薑 五分

附子 一片 水煎十劑必散

化癭丹 仲景夫子傳治諸癭

海藻 三錢 桔梗 三錢 生甘草 一錢 陳皮 一錢

半夏 三錢 茯苓 五錢 水煎服

筋癭骨癭石癭

筋癭者乃筋結成于體上也初起之時必然細小按之乃筋也筋畜則屈久成癭而漸大矣然雖漸大亦不甚大

也固是筋癭亦無大害竟可以不治置之若至大時妄用刀鍼往往傷筋反至死亡故筋癭忌割也必要割去亦宜于初生之日以芫花煮細細線繫之日久自落因線繫而筋不能長大或可用利刀割斷輒用止血生肌之藥敷之可慶安全倘初生根大難用線繫萬不可輕試利刀割斷也至于竹癭石癭亦生皮膚之上按之如有一骨生于其中或如石之堅按之不疼者是也皆不可外治或用陷腫散內治則可

陷腫散 千金方岐天師加減治骨癭石癭

洞天奧旨 卷之十一 筋癭骨癭石癭 去 大雅堂

烏頭魚骨 一錢 白石英 二分 石硫黃 二分 鍾乳 三分 紫石 二分

乾薑 一錢 丹參 八分 琥珀末 一錢 大黃 一錢

附子 三分 朝燕屎 一錢 石礬 一錢 水煎服十劑全消

消癭丹 仲景公傳可消諸癭

白朮 三兩 茯苓 十兩 人參 三兩 陳皮 三錢

生甘草 一兩 薏仁 五兩 芡實 五兩 澤瀉 五兩

半夏 五兩 各為末米飯為丸常服自消

氣癭

癭何名之曰氣蓋有時小有時大乃隨氣之消長也斷宜

內散不宜外治既隨氣消長亦可隨氣治之其症不痛不紅皮色與痛處同也其發則軟而不硬氣旺則小氣衰反大氣舒則寬氣鬱則急故治法必須補其正氣開其鬱氣則氣痛自散矣古人有用枳殼扣其外以艾火在外灸之似亦近理然終非妙法也不若純用補氣之味而佐之開鬱散滯之品即不全消亦必不添增其火也

沉香化氣丸 岐天師傳治氣痛

沉香 一兩 木香 二兩 白芍 四兩 白木 八兩

黃芪 八兩 枳殼 一兩 檳榔 一兩

洞天奧旨 卷之十一 氣痛 末 大雅堂

茯苓 一兩 香附 二兩 附子 五錢 天花粉 四兩 各為細末

末蜜為丸每日服三錢一料全消

外治 仲景張公密傳統治各痛神效但不可治日久之痛也小痛根細最效

水銀 一錢 兒茶 二錢 共研至無星為度加入水片二分

再加入麝香 五厘 再研又入礞砂 五厘 再研

不見水銀始可用此藥敷于痛處肉痛血痛粉痛

氣痛俱化為水約三日必消盡然後服消痛丹每

用 一兩 滾水吞服不拘時如筋骨之痛內外二法

俱不必用蓋二痛無害于人不必治亦不必治也

血痛贅

血痛而贅生于皮外者乃臟腑之血瘀而又有濕氣入于血中故生于外也初生之時亦有細于髮者久之而大矣小者如膽大者如茄以利刃割斷即用銀烙匙燒紅一烙即止血且不潰不再生也否則復出血痛一月如舊鐸于腋中曾生此痛甚小如細指也偶爾發癢友人給生八角虱余心疑而更癢自思虱遇水銀則死而書齋之中無水銀也曾為人治下疳方中用水銀乃取而擦腋下甚重至痛而止夜臥則忘其痛矣早起見蕭上有血筋一條取觀之乃腋下所生血痛已墮落矣余嗜之不能斷始知前方能去痛也因商酌載之治初起之痛頗多驗

銀銹散 家傳治初起血痛

水銀 一錢 冰片 三分 輕粉 一錢 兒茶 三錢

黃柏 二錢 朝腦 一錢 鏡銹 一錢 貝母 一錢 各為末

搽擦即墮落

肉痛贅

肉痛乃于皮上生一瘤宛如肉也初生如桃如栗漸漸加

大如拳其根皆潤大非若血瘤之根細小也不疼不癢不紅不潰不軟不硬不冷不熱其形可醜而病則不苦也此等之癩皆犯神道之忌故生于四體以紀罪愆不妨順受倘必欲治之用刀割傷用火燒灸不特無功轉添痛楚矣

內托外消散 治肉瘤血瘤粉瘤 張仲景真人傳

蓋濕熱生耳

水銀 一兩 兒茶 二兩 共研至無星為度水片 一錢

輕粉 三錢 麝香 五分 又入硼砂 五分 不見水銀始

可用以此藥敷于瘡處肉瘤粉瘤俱化為水約三

洞天奧旨 卷之十一 肉瘤瘡 三 大雅堂

日必消盡然後再服湯藥用人參 二錢 白朮 三錢

茯苓 三錢 陳皮 五分 生甘草 五分 柴胡 八分 白芍

三錢 水煎服十劑未斷根矣如筋痛難治然亦不

必治也骨痛亦不必治終身大如杏也

治肉瘤或男婦生在面上頸上手上即可去之

白芷 五分 人參 五分 煎湯生半夏 十粒 泡于白芷

人參之內數日將半夏切平頻擦患處效如手取

但不可治痰血之瘤也恐難收口錢又選傳

洞天奧旨卷之十一終

洞天奧旨卷之十二

山陰陳士鏞啟之齋號遠公著 會稽陳士鏞

會稽蘭式玉尚自出號存齋評 一 袁增方洲河校

走馬牙疳

走馬牙疳小兒之病也小兒多食肥甘腸胃難化積而不

散其次上炎且小兒又是純陽原多火也火多必瀆水解

小兒食既不化何生水平水既不生則胃火益熾齒牙又

胃之部位也故火結而成疳矣牙已生疳而兒又索食所

洞天奧旨 卷之十二 走馬牙疳 一 大雅堂

喜者必水菓居多本欲得水菓以解渴也誰知胃已有熱

又加水濕則濕熱相合而疳病更重矣走馬牙疳者言其

勢如走馬之急也火重則急火輕則緩若不早治則火燥

津液牙斷齒斷齒多脫落而死者有矣治之得法往往有

響應者大約內服清胃之藥外用白綠丹無不神效也

清胃消疳湯 岐天師傳內治走馬牙疳

石膏 一錢 人參 三分 蘆薈 一錢 黃柏 五分

茯苓 一錢 炙甘草 三分 生地 一錢 天花粉 一錢 水煎服

數劑必輕

白綠丹 外治走馬牙疳

人中白 一錢 銅綠 三分 麝香 一分 蚯蚓 二條

葱白汁浸火炙為末各為細末傳之立愈

口疳

口生疳瘡皮破涎流重者每每血出甚而唇吻腮頰俱爛此乃胃中有熱又食生冷水菓重添其濕濕熱相兼因其生疳而至爛內生細蟲以蝕皮蝕肉也夫胃中濕熱何上發于口蓋口乃脾之竅也胃本無竅而脾乃胃之妻也况脾胃為表裡脾之竅即胃之竅也而胃之經絡又左右而繞唇口且熱乃火也火性上炎濕借火而上沸故口上應之也治法內服瀉胃之熱導脾之濕外用欖核散搽之可計日而愈矣

瀉導湯 治口生疳瘡

石膏 一錢 茯苓 二錢 滑石 二錢 澤瀉 一錢 五分

甘草 五分 黃柏 一錢 貝母 一錢 水煎服小兒減半

二劑即用擦藥

欖核散 外治口瘡

嫩欖乾 一錢 兒茶 一錢 冰片 五厘 白微 三分

生甘草 三分 百部 二分 各為細末日日搽之每日搽五

次數日即愈

鼻疳

鼻內生瘡癢時難忍欲嚏而不能欲忍而不得言語糊塗聲音閉塞此鼻疳也夫鼻之竅乃肺之竅也肺病而氣難宣則鼻乃生瘡矣故鼻疳雖是鼻之病其實肺之病也夫肺病宜肺內生癰乃不生于肺中而生于鼻之內者以熱而兼濕也熱乃火也濕乃水也水能制火故火在肺而不致生癰火炎于鼻而水不能上升鼻之竅細小然不能散火也故成疳而不成癰矣雖不成癰而疳之毒亦不易化去其濕熱則水下行而火上散然後以外藥吹之則氣通而毒消矣

化散湯 岐天師傳內治鼻疳

青黛 二錢 桔梗 二錢 白芷 八分 百部 一錢

茯苓 三錢 木通 一錢 黃芩 二錢 天冬 三錢

玄參 二錢 甘草 一錢 辛夷 五分 水煎服四劑

通氣丹 家傳外治鼻疳

兒茶 三錢 燕葉 一錢 雄黃 一錢 輕粉 五分

冰片 一分 錫麟烟 五分 細辛 三分 各研為細末吹入

鼻孔中日三次數日即愈

綠白散 外治鼻疳且治腎疳頭瘡耳瘡俱效

石綠 一錢 白芷 一錢 黃栢 一錢 為末先以甘草水

洗瘡試淨敷之一日即愈

喉疳

喉疳之瘡即雙蛾之症也有陰有陽陰乃少陰之君火陽乃少陽之相火也二症最急若不早治一二日間死生係之輕緩而重急也陰火虛用八味地黃湯神效陽火虛內

洞天奧旨

卷之十二

四

大雅堂

服解火之劑外用吹藥亦效應如响總不可緩治之也

八味地黃湯 仲景張真君方治陰症喉疳

熟地 一兩 山藥 四錢 山茱萸 四錢 茯苓 二錢

丹皮 二錢 澤瀉 二錢 附子 一錢 肉桂 一錢 水煎一

碗探冷服一連數劑全愈

牛黃至寶丹 岐天師傳治陽火喉疳

牛黃 一分 膽礬 二分 皂角末 一分 麝香 三厘

冰片 一分 兒茶 五分 百草霜 一錢 共為末和勻吹入

喉中 五厘 必大吐痰而愈後用煎劑救喉湯

救急湯 岐天師傳治陰陽二火喉疳

青黛 二錢 山豆根 二錢 玄參 五錢 麥冬 五錢

甘草 一錢 天花粉 三錢 生地 五錢 水煎服數劑不再

發

耳疳疔

耳疳疔者多生于耳邊或耳之下也此瘡小兒生俱多然足陽明胃經無濕熱與足少陽膽經無鬱氣則不生此疳也然此乃小瘡耳不必內治倘其瘡大而腫不止者必宜內治為佳內治之法瀉胃與小腸之濕熱而外用末藥調

洞天奧旨

卷之十二

五

大雅堂

搽斷不久延也設或瘡腫不大是濕熱不熾何必用內治之法哉

龍化丹 岐天師傳治耳疳疔

黃丹 一錢 赤枯礬 一錢 蚯蚓糞 三錢 冰片 一分

輕粉 三分 烟膠 一錢 爐甘石 一錢 各為末研細用香

油調搽數日即愈

粉灰散 岐天師傳治小兒耳爛生瘡

輕粉 一錢 煅子 一錢 煅灰 一錢 煅蜆 一錢 煅蚌 一錢

生甘草 五分 各研末油調搽即愈

鑱指疔

疔瘡生于手足最不易治以十二經丹穴多起于手足也
井穴既有十二經之分則疔生于少商宜治肺生于少衝
宜治心生于大敦宜治隱白生于湧泉宜治腎矣生于中
衝宜治心包絡生于商陽宜治大腸生于少澤宜治小腸
生于竅陰宜治膽生于厲兌宜治胃生于至陰宜治膀胱
生于關衝宜治三焦矣然而手足者四肢也四肢屬脾之
部位故疔雖生于十二經之井邊而治法斷不可單治井
經也蓋疔之生也本于脾臟之濕熱也濕熱善癢諸物長
洞天奧旨 卷之十二 鑱指疔 六 大雅堂
夏正濕熱盛之時也不見萬物之俱腐乎故治法必須治
脾之濕熱為主治脾而胃亦不可置之也脾胃表裡治則
同治耳或見疔生于井穴少分各井而佐之何井之藥尤
治之神也

加味五苓散 祖傳治手足鑱指疔

白木 二錢 蒼木 二錢 金銀花 五錢 猪苓 一錢

澤瀉 一錢 肉桂 二分 龍膽草 二錢 茯苓 三錢

天花粉 三錢 水煎服四劑後以外治治之

六星丹 岐天師傳外治鑱指疔神效

兒茶 五錢 雄黃 一錢 冰片 二分 輕粉 三分

滑石 二錢 血竭 五分 各為絕細末先以炙甘草 三錢

苦參 五錢 煎湯洗之後搽之

袖手疔

袖手疔者生龜頭之頸上皮包于內而外不顯也凡龜頭
生瘡瘡多是淫毒所感因嫖妓而得也然而因嫖而生者
不止生于龜之頸今止生于龜頭而外又皮裂之乃腫于
皮肉之內也非淫毒實熱瘡也內用瀉火祛毒之藥數劑
然後以外藥小浸之自必收功

洞天奧旨 卷之十二 袖手疔 七 大雅堂

暗治飲 治袖手疔

黃柏 三錢 茯苓 五錢 蒲公英 三錢 柴胡 一錢

白芍 五錢 生甘草 一錢 龍膽草 一錢 豬苓草 二錢 水煎服

服數劑

外護丹

猪膽 二個取汁 龍膽草 三錢煎汁 蚯蚓 五條搗爛

用二汁淋洗去蚯蚓加入冰片末 三分 入雞蛋殼

內套在龜頭上浸之漸愈

膿疔

腺疔生于玉莖之上亦楊梅之先兆也然梅瘡甚多得之于妓女龍陽之子倘未交二種止于妻妾之中得之此自已本有濕熱或加惱怒而強暴動淫亦能生瘡瘡名腺疔以肝性主腺故疔亦以腺名之也內用平肝之劑外用六星丹搽之無不痊也

化淫消毒湯

白芍 一兩 當歸 五錢 炒梔子 三錢 蒼朮 三錢

生甘草 一錢 金銀花 一兩 青黛 三錢 生地 三錢

土茯苓 五錢 水煎服四劑愈

洞天奧旨

卷之十二 陰疔

八

大雅堂

陰疔

陰疔者生瘡于陰戶之內也時痛時癢往往有不可忍之狀其氣腥臊作臭無物可以解癢倘愈交接則愈痛矣最可憐之症也此瘡多因于慾火之動而又有濕感之火炎水流兩相牽制而閉結乃化而生瘡久則生蟲也此蟲雖生于陰戶然實化于肝腎或思男子而不可得火以成之也或交男子而感其精毒以長之也總無濕不生蟲亦無濕不生瘡也當細察其由來治之內治之後仍以外治同施鮮不即痊矣

加味逍遙散 家傳方內治陰疔

柴胡 二錢 白朮 五錢 茯苓 三錢 甘草 一錢

白芍 五錢 陳皮 一錢 當歸 二錢 炒梔子 三錢

荆芥 一錢 防風 五分 龍膽草 二錢 天花粉 二錢

玄參 五錢 水煎服八劑

桃仁散 岐天師方外治陰疔

桃仁 二十一粒 雄黃末 二錢 白微末 二錢 炙甘草 五分 各研

細末蘸雞肝內納陰戶中日三易之先用針刺雞

肝無效孔納之

洞天奧旨

卷之十二 精疔

九

大雅堂

精疔

精疔乃生于玉莖亦腺疔袖手疔之類也人生最妬而精亦妬精妬症有二種一妬不潔之精一妬太潔之精也不潔之精必有毒氣太潔之精必有火氣故玉莖不交敗精之陰戶斷不生疔陰戶蓄精尚未流出一旦重接鮮不生瘡矣此等之疔其症尚輕外用五根湯洗之再用首經散搽抹則愈矣不必又用敗毒湯劑而內治之也

首經散 岐天師傳治精疔瘡并治諸疔

室女首經抹布燒灰加輕粉 二分 冰片 一分 各研

細末搽之立效

無辜疔傷瘡

無辜疔瘡乃鳥糞或羽毛從天下降于人身感而生疔瘡也蓋各鳥所食多是蛇蝎蜈蚣之類其糞最毒而羽毛亦未嘗不毒也小兒不知其故或逢落或見糞墮羽可珍手搗口啣其毒因之而入于臟腑久則發出于皮膚乃生瘡生疔矣或生于腦後或生于項邊結核如彈丸推之則動軟而不疼歲久失治癩瘦壯熱便膿便血頭骨縫開肢體生瘡而潰爛矣治法亦須消毒為主小兒得此尤宜早治

洞天奧旨

卷之十二

無辜疔傷瘡

大雅堂

消毒湯 岐天師傳方治無辜疔瘡

天花粉 一錢 貝母 一錢 薔薇根 三錢 杏仁 十四粒

桔槿 一錢 黃芩 五分 白茯苓 一錢 烏梅 一個

檀榔 五分 烏柏根 二錢 白芍 二錢 人參 五分 水煎服

十劑可消大人倍之

溼尻瘡

溼尻瘡生于新生之兒或在頤下項邊或在頰肢窩內或在兩腿丫中皆濕熱之氣溼爛而成瘡也夫小兒新生何遽多濕熱雖遺尿小便未易即乾然下身或多潮氣不宜

上身而亦沾染也蓋因乳母綳縛手足看顧不到適逢天

氣炎熱蒸裹太甚因而溼爛身中本無濕熱何必又治濕

熱之多事乎將伏龍肝一味不拘多少搗極細末佐之滑

石末少許不可太多溻在患處用紙革之即愈

龍石散 治溼尻瘡

伏龍肝不拘多少為細末滑石少許各為極細末

和勻溻在瘡上外用草紙革之數日即愈

落臍瘡

落臍瘡乃小兒之症也小兒自落臍帶之後何便生瘡夫

洞天奧旨

卷之十二

溼尻瘡

十一

大雅堂

臍人之命根也此處生瘡多變風症風症一成命根將絕

去生便遠可不亟治之乎不知臍落生瘡亦感染水濕而

成之也必因乳母失于照管落臍之時臍汁未乾或加溺

以傷之或洗浴而不加拭指遂致濕以加濕而瘡口遂至

于不合也治宜去濕為主而少加生肌之藥則臍復完固

無濕而瘡自愈也

去濕生肌散 岐天師傳方治落臍後生瘡

茯苓 一錢 貝母 三分 枯礬 三分 草紙灰 五分

雄黃 二分 三七 三分 共為末入在臍內用紙包之

即愈

臍漏瘡

臍中生瘡時時流膿血名臍漏瘡皆不慎慾縱色或因氣惱而故借房憚以怡情消忿遂至生瘡成漏也若但治漏瘡而不絕慾戒氣斷有死亡之禍必須內治為佳縱色者用補中益氣加熟地山藥以治之動怒者亦用前方加白芍當歸丹皮熟地以治外更用艾灸臍上加生肌散填滿臍口一日一換始可奏功也

加味補中益氣湯 祖傳方內治臍漏瘡

洞天奧旨

卷之十二

臍漏瘡

主

大雅堂

人參 三錢 黃芪 五錢 白朮 一兩 當歸 三錢

柴胡 八分 升麻 四分 生甘草 一錢 陳皮 一錢

金銀花 兩 水煎服縱色者加熟地一兩山藥黃 四錢

動怒者加白芍藥 一兩 當歸 二錢 丹皮 三錢 熟地 五錢

生肌散 外治臍漏瘡 方載後卷

金及瘡 自列

金及瘡乃刀傷之瘡也誤傷者心不動而失血其症輕自刻者心大動而失血其症重或自割其皮自切其肉倘無

激忿而傷之其症昏在輕重之間惟涕泣而勿頭鬱怒而斷指其症皆重也蓋破傷血失則止有一線之氣相養使五臟平和尚可補氣以生血活血以生肌也苟或求死不得而傷心更甚補氣必至添噴活血必至開裂安能服藥以收功乎必直勸其解怒以平肝消愁以養脾寬懷以安心然後用補氣補血之藥而佐之止痛生肌之味始可奏效否則瘡不能愈而命不可奪也

加味補血湯 祖傳治金及自傷將死者俱可救若

傷輕者減半救之

洞天奧旨

卷之十二

金及瘡

主

大雅堂

生黃芪 兩 至 三 當歸 五錢 至 一 三七末 五錢

沒藥末 二錢 白芨 三錢 至 一 白芍 五錢 水煎服數

劑斷無性命之憂

完膚丹 岐天師傳外治金及傷血出最神效

三七末 兩 乳香末 二錢 陳年石灰 兩 血竭 三錢

婦人禪襠末 一錢 人參 二錢 各為細末滲上即止血生

肌如金瘡作痛先用牛膝搗敷立止梅師方也

火燒瘡

火燒瘡遍身燒如黑包者難救或燒輕而不至身黑者瘡

可療也然而皮焦肉捲疼痛難熬有百計千方用之而不
驗者以火毒內攻而治之不得法也故治火燒之症必瀕
內外同治則火毒易解也

救焚湯 岐天師傳內治火燒瘡

當歸 五錢 丹皮 三錢 生地 五錢 甘草 二錢

苦參 二錢 生蘿蔔 一大個 槐花 三錢 黃連 一錢 同煎服

服數劑外以末藥敷搽自愈

六仙散 岐天師傳外治火燒如神

黃葵 化 一兩 乾 為 末 大黃 兩 滑石 兩 劉寄奴 三錢

洞天奧旨 卷之十二 湯瀝瘡 西 大雅堂

井中 錢 身 佩 為 末 絲瓜葉 廿片 曬 乾 為 末 以蜜調敷不痛且

易生合又不爛也神效平日修合臨時恐不能成

湯瀝瘡

湯瀝瘡乃百沸湯滾熱油與滾粥等物忽然猝傷因而遭

害遂至一時皮湯內爛成瘡也此等之瘡正所謂意外之

變非氣血內損也輕則害在皮膚重則害在肌肉尤甚者

害在臟腑害在臟腑者多至殺人然內治得法亦可救也

內用托藥則火毒不愁內攻外以蚌津散汁敷搽之即應

驗如响如瘡赤潰爛用歸蠟膏按毒止痛尤易生肌

祛火外消湯 岐天師傳外治湯瀝油燒等症神驗

地榆 五錢 白芨 三錢 栝葉 三錢 炒 梔子 二錢

白芍 五錢 當歸 五錢 生甘草 一錢 水煎服二劑傷輕

者藥減半

蚌津散 外治湯瀝油炮等症 方載後

二黃散 傳世方

大黃 炒 黃柏 炒 各為細末以雞子清調之搽上最

妙衛生寶鑑用苦參末香油調敷亦效

毛粉散 穆中淳傳治湯火傷神效

洞天奧旨 卷之十二 湯瀝瘡 圭 大雅堂

猪毛 研細末加輕粉白礬砂少許麻油調和

敷之立效無疤痕

歸蠟膏 治湯火傷瘡瘰赤潰爛用此生肌拔熱止

痛

當歸 一兩 黃蠟 一兩 麻油 四兩 以油煎當歸 焦黃 去滓

納蠟攪成膏出火毒攤貼最效出和劑局方

又方

王不留行 焙乾 為末麻油調敷或絲瓜葉為末如

前調亦妙

貫嬰研末油調塗即愈

又方神效

荷葉 一片 煎湯一二碗少溫洗之即愈

凍瘡

凍瘡犯寒風冷氣而生者也貧賤人多生于手足富貴人多犯于耳面先腫後痛瘡久則破而成瘡北地嚴寒尤多此症更有冷極而得者手足十指尚有墮落者以犬糞經霜而白者燒灰芝麻油搽調最妙倘氣虛者必須補氣血虛者必須補血外用附子末練樹子肉搗搽自愈倘用甘

洞天奧旨

卷之十二

凍瘡

犬

大雅堂

狗糞散 外治手足凍裂

乾狗糞為細末用白糞為妙燒灰存性以絕細為度麻

油調敷數次即愈用西瓜皮拍油等藥俱不效此

方特奇

箭毒瘡

箭毒瘡因箭頭鐵鏃用毒藥煮過而人身中傷必疼痛欲

死也近人用箭未必皆用毒藥矣倘若中毒必須解毒為

妙有箭頭在肉不出者若無毒不必用刀割之必用脫久

豬腿骨頭以火炙一盪必有油髓流下以器盛之俟其流

下取油搽其箭傷之處必然發癢再輕輕搽久則箭頭

自外透出矣如有毒而沒入者必用刀割肉取出大約有

毒者內外皮肉必黑但紅黃不變黑者乃無毒之箭傷也

凡毒箭傷而去其鏃頭者必須覓婦人月水洗之方解其

毒耳

山羊酒 岐天師傳治箭頭不出併可治跌打損傷

洞天奧旨

卷之十二

箭毒瘡

犬

大雅堂

山羊血 一錢 三七 三錢 黑糖 五錢 薑便 一合

酒 一碗 調勻飲之不必大醉久則傷氣必獲箭後

漸出近皮一拔即出以三七末敷之

洞天奧旨卷之十二終

洞天奧旨卷之十三

山陰陳士鏗敬之市號遠翁著 曾孫陳鳳翔羽儀甫梓

會稽陶式玉尚自甫號存齋 孫孫增方湖溇民校

跌打損傷瘡 附破傷風

跌打損傷瘡皆瘀血在內而不散也血不活則瘀不能去
瘀不去則折不能續初傷之時必須內服活血止痛之藥
外用三七研末加酒調爛敷之痛即止血則散瘡上如沾
三七末乾燥再不潰矣如不沾有頻用三七末滲之多用

洞天奧旨

卷之十三

跌打損傷瘡

大雅堂

三七藥末調服尤妙倘不效用前藥不效者此日久瘀
血留中非草木之味所能獨散也必須加入水蛭三錢當
歸大黃白芍治之速用三劑瘀血無不即散而痛亦止矣
三劑之外斷不可多服仍單服三七末有不愈者矣如破
傷風頭痛寒熱用弓反張如症狀用蠶盤散最妙

散瘡至神湯 岐天師傳方治跌打損傷至重者

三七 三錢 當歸 五錢 白芍 五錢 大黃 三錢

丹皮 三錢 枳殼 一錢 桃仁 十四粒 生地 五錢

大小蘗 三錢 紅花 一錢 水酒各半煎八分服如日久

疼痛或皮肉不破而疼痛加水蛭切碎如米大烈
火炒黑研碎煎前藥煎好加入水蛭末吞服三劑
則不痛矣其水蛭必須炒黑萬不可半生則反害
人矣

蠶盤散 傳世方治破傷風瘡

川芎 一錢 當歸 一錢 紅花 四分 羌活 六分
防風 八分 白僵蠶 一錢 土鱉蟲 七個 搗碎

穿山甲 三大片 柴胡 七分 生甘草 四分 水酒各半煎

八分服下部加牛膝 一錢

洞天奧旨

卷之十三

日曬瘡

二

大雅堂

日曬瘡乃夏天酷烈之日曝而成者也必先疼後破乃外
熱所傷非內熱所損也大約皆奔走勞役之人與耕田胼
胝之農夫居多若安閒之客安得生此瘡乎故止瀆消暑
熱之藥如青蒿一味飲之外用末藥敷之即安

青蒿飲 祖傳治日曬瘡

青蒿 一兩 搗碎 以冷水沖之取汁飲之將渣敷瘡上數

日即愈如不愈另用栝蠶散敷之

栝蠶散 祖傳外治日曬瘡并治火瘡瘡

黃栢二錢 青黛二錢 各研末以蘇油調搽即愈

虎噬瘡

虎噬瘡乃遇虎咬傷之瘡也虎之捕人如貓之捕鼠有毒涎惡氣噴人之面人輒驚喪一時昏憤失神即自褫其衣以謝虎而虎不知其悔罪而吞噬矣故凡人遇虎不必自解其衣若不解衣者虎不敢食即有所傷必可救也以人非虎食耳然而人被虎傷者血必大出其傷處之口立時潰爛其疼不可當以虎之爪牙最毒一有傷損則毒侵肌膚未有不爛者矣急用猪油貼之無猪油則用猪肉亦可

洞天奧旨

卷之十三

虎噬瘡

三

木雅堂

隨貼隨化隨化隨易則疼漸少緩急用榆根散滲之隨滲隨濕隨濕隨滲血必止矣一止血而命可奪也世有一遇虎損以香油灌一二碗以祛毒仍用香油以洗瘡亦佳然終不若吾法之奇也倘內服安神益氣之藥外用玉真散生肌等藥尤妙

榆根散 治虎噬瘡末卷

又方

地榆二兩 飲并為末敷之亦可為末白湯調服一兩作三次飲忌飲酒

犬咬瘡

犬咬瘡多在人身兩足併腿上也間有咬傷兩手者急用生甘草煎湯洗之則毒散而不結貴用玉真散或搽或服皆可無恙也惟瘋犬傷人其毒最甚急打散頭髮頂內細看有紅髮如銅鍼者即拔去次以地骨皮一把約一兩煎湯洗去黃肉亦服之次用地龍糞為末將咬傷處封好口出犬毛即無虞矣倘人已發狂如狗狀大小便俱閉外勢急痛腹脹甚者前方又不能解亟用活命仙丹解其熱毒斷不死亡也

洞天奧旨

卷之十三

犬咬瘡

四

木雅堂

活命仙丹 岐天師傳治瘋狗咬傷

木鱉子 三個切片 斑貓 七個去頭足 陳土炒 米一撮炒 大黃 五錢

劉寄奴 五錢 茯苓 五錢 麝香 一分 各研細和勻黃酒

調服三錢一服而毒氣熱氣全解重者二服必愈咬七日內者皆能建功過七日外必須多服數劑無不可救

千金方 家傳治犬咬傷

紫蘇葉 三片 薄荷葉 十片 嚼傳之自愈

經驗方 治犬咬

舊屋瓦上刮下青苔屑按之即止

鼠囓瘡

鼠囓瘡或因捕鼠被傷而得者也鼠膽最怯豈敢咬人因人捉擊甚急不得已咬傷人皮肉以冀脫逃是奪命心急故咬傷亦重也夫鼠技有限何足害乎不知鼠齒細長嚙肉必傷筋骨况鼠涎原有毒也肌肉既破必透入鼠涎故往往爛穿筋骨矣宜用猫尿搽其傷處其毒隨散後以末藥敷之數日即愈也

禁鼠丹 岐天師傳治鼠傷瘡

洞天奧旨

卷之十三

鼠囓瘡

五

大雅堂

猫糞 一錢

輕粉 一錢

三七根 五錢

各焙乾研細爲末

填滿瘡口即結靨而愈

馬汗瘡

馬汗瘡沾馬汗而爛者也馬汗沾無瘡之人何能生瘡惟原生瘡之人最忌馬汗入于瘡內蓋馬性最動瘡沾其汗欲收口者不收欲生肌者不生矣生者不生收者不收必有變動難愈之苦或癢腫或疼痛者有之治法以冬瓜皮絲瓜葉煎湯洗之另用末藥搽自愈

靜寧散 岐天師傳治馬汗瘡

輕粉 三分 五倍子 一錢 古石灰 絲瓜根 錢 冰片 一分 麝香 炒 一錢 搽之即愈如瘡乾痛加生甘草五分以蜜搽之

靈苑方 治馬汗入瘡腫痛急療之遲則毒深

生烏頭爲末敷瘡口良久有黃水出即愈

火癩瘡

火癩瘡乃天氣嚴寒向火烘手炙傷皮膚因而成斑變成痛瘡者也此瘡貧窮之人居半卑弱之人居半也氣血內虧火燥外逼當時不知炎威久則天溫有汗氣血回和因用栢葉散搽之無不速痊

洞天奧旨

卷之十三

火癩瘡

木

大雅堂

荷芥湯 外治火癩瘡

薄荷 二錢

荆芥 二錢

苦參 二錢

煎湯一碗洗之即愈

亦如被用栢葉散搽之

灸火瘡

灸火瘡用艾火灸穴治病而成者也灸穴不發不可然過發亦不可過發必至疼痛宜用太乙膏貼之如無太乙膏春月用柳絮夏月用竹膜秋月用新棉冬月用壁上錢貼

之亦能止疼也如灸瘡血出不止者莫妙用黃芩為末酒調服二錢無不止者此李按怪證奇方也然用之實驗甚

濟生秘覽方 治灸瘡不斂神效并可斂惡瘡

瓦松陰乾 為末先以槐枝葱白湯洗後搽之立效

汗浙瘡

汗浙瘡乃肥人多汗久不洗浴滲漸肌膚因而成瘡者也亦有皮破血出而作痛者古人以真蛤粉滑石末搽之自愈實妙法也

蛤粉散 治汗浙成瘡

洞天奧旨

卷之十三

灸火瘡

七

大雅堂

真蛤粉 五錢 滑石末 錢 二味搽瘡上即愈

獨骨瘡

獨骨瘡生于頤頰之下大人小兒皆有之而小兒居多乃口津下流積滯之故也如是大人乃任脈虧損宜用內治如小兒外治易愈不須用內消之藥但少食瓜果則得矣

燥津丹 岐天師傳治大人獨骨瘡

茯苓 三錢 白朮 三錢 薏仁 五錢 山藥 五錢

白朮 十個 甘草 一錢 黃柏 二錢 陳皮 五分

天花粉 一錢 水煎服以愈為止

制津丹 世傳治小兒獨骨瘡

百合 一兩 黃蘗 一兩 白芨 三分 草薢子 五十粒

輕粉 五分 右為細末搽之如乾者以朴硝水和餅

貼之

竹木發破傷水生瘡

傷水瘡者因誤被竹木發破皮膚又生水洗之潰而疼痛或魚刺諸骨破傷久而不愈同用黃丹蛤粉文蛤等分同炒變色搽瘡口上漸次而愈如刺已入肉搗鼠腦同鹿角末同塗傷上即出如骨刺入肉用象牙刮末厚敷其刺自

洞天奧旨

卷之十三

獨骨瘡

八

大雅堂

軟即出也

梅師方 治竹木鍼刺在肉中不出疼痛

王不留行 為末調熱水方寸七以根敷即出

蛇咬瘡

蛇咬瘡最毒不止 虺蛇也或在足上或在頭面或在身腹之間疼痛異常重者必至足腫如斗面腫如盤腹腫如箕五日不救毒氣內攻于心而人死矣蓋蛇乃陰毒陰毒以陽藥解之其毒益熾必須用陰分之藥順其性而解之為妙外治之法最神者取半邊蓮草搽而擦之頃刻即安隨

用祛毒散飲之三劑即全愈外治之方如蜈蚣散亦神皆可用也若蛇誤入人孔竅之內即以針刺其尾則自出不過二三針也北直田野間一婦人小遺蛇入陰戶竟不知用針刺尾之法卒至暴亡可憫也余故特誌之以傳世云

祛毒散 岐天師方內治蛇咬毒

白芷 一兩 生甘草 五錢 夏枯草 二兩 蒲公英 一兩

紫花地丁 一兩 白礬 三錢 水煎服三劑全愈

蜈蚣散 伯高太師傳外治蛇咬

白芷 一兩 取雄黃 五錢 蜈蚣 三條 樟腦 三錢 各為極細末以香油調搽麻處隨乾隨掃蛇毒盡出而愈

洞天奧旨 卷之十三 蜈蚣可瘡 九 大雅堂

蜈蚣可瘡

蜈蚣叮人雖不成瘡然痛亦苦楚蜈蚣有二種一赤足一黃足黃足者叮人痛轉而不久赤足者叮人甚久而痛重以赤足之毒勝于黃足也倘為所咬以蝸牛之涎搽之其痛即止如北地無蝸牛用雞冠血塗之有雄黃末熬香油紙條點火燻其傷處立刻止痛或以山菜萸一粒口嚼敷之亦妙更有人誤食蜈蚣遊過之物腹痛者以紫金錠研碎薑湯調飲半錠嘔吐而愈

蝸牛散 治蜈蚣咬傷作疼

雄黃末 一錢 蝸牛 一條 搗爛敷患處即平口嚼山菜萸

一粒敷患處即止痛取蜒蚰塗上即止痛神驗

蝸傷瘡

蝸傷最毒以蝸得至陰之惡氣也凡一螫人痛至雞鳴乃止即以冷水漬指并手即不痛水微煖便痛即易凉水再漬以青布搗之實驗蝸有雄雌雄者痛在一處雌者痛牽

諸處以山菜萸一粒嚼以封之立愈取人參嚼敷尤妙

千金方 治蝸蟻叮瘡

洞天奧旨 卷之十三 蝸傷瘡 十 大雅堂

水調礪砂塗之立愈

蜂咬瘡

蜂之咬人有毒刺入肉內即須挑去以尿泥塗之即止痛

肘後方

青蒿嚼碎封之即安

蝸蟲傷痛

蝸蟲傷人其毒在毛而不在口如楊蝸瓦蝸之類凡有蟲而帶毛者皆須忌之勿使之刺人肌膚也若一犯之則皮膚腫痛如火之燎矣以淡荳豉搗敷之但有毛外皆不

痛

痛如毛未出仍痛再擦之須得毛出始安如無葶鼓或醋或鹽酒芝麻油洗之皆效

蠅蝮尿瘡

蠅蝮尿瘡乃蜘蛛之尿瀉于人身頭上而生瘡也瘡如粟粒累累似刺蟻螫痛或發熱惡寒此重者也有生瘡而人不知疼痛者此毒不重而輕者也磨犀角塗之最效或以葶麻縛搓去瘡汁再加黃金散敷上即安或取燕窠中土和醃醋塗之大良

直指方 仁齋治蜘蛛咬毒

洞天奧旨

卷之十三

蠅蝮尿瘡

十一

木雅堂

縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服五錢至醉良

久酒化為水待瘡口出水盡仍寒瘡甚妙

人咬傷瘡

人咬成瘡皮破血流往往有潰爛者以人咬人何如是之重乎不知兩人厮打至以口咬人其忿怒之氣亦甚不平矣心既憤激口齒安得無毒哉此所以潰爛耳故身體一破咬傷血流之時即為施治則毒氣尚未深入自然易痊方用醋洗其傷破之口隨用敗龜板燒灰為末香油調搽無龜甲即用鱉甲亦妙萬勿聽其潰爛至于毒氣之深入

反難速愈也

砒霜藥瘡

人服砒霜其火熱大毒內攻臟腑而四肢身體必外生紫粟之斑與生瘡無異此火熱之毒攻突內外也其勢最急古人急挖地一大坑以井水滿之令攪渾濁取水一碗與飲之少刻又與之待渾身紫粟俱散一吐即甦甚妙然單用地漿釋猶以未善也釋受異人傳方加入苦參二兩煎湯入于地漿中飲之更神別有數方無不神異服之皆可救因備載之

洞天奧旨

卷之十三

砒霜藥瘡

十一

木雅堂

苦參湯 治服砒霜藥瘡

苦參 二兩 煎湯一碗同地漿飲之即大吐而愈

救死丹 治中砒毒藥成瘡死亡頃刻

生甘草 二兩 瓜蒂 七個 玄參 二兩 地榆 五錢 水煎服

一下喉即吐再煎渣服又吐即毒解而愈

瀉毒神丹 治中砒毒發紫藥用前藥不吐急用此

方瀉之

大黃 二兩 生甘草 二兩 白礬 一兩 當歸 三兩 水煎服

數碗飲之立時大瀉即生否則死矣

水漬手足了爛瘡

手足乃四末也屬脾而最惡濕以脾為濕土以濕投濕安得不助濕乎濕以加濕此濕瘡之所以生也况勞苦之人以其手足日浸漬于水漿之中烏能保皮膚之堅硬乎手足十指未免開裂而腐爛矣幸其氣血尚健不必內治但用外治而可愈外治用密陀僧煨赤置地上去火性碾細末先以礬水洗足拭乾然後以前藥敷之次日即能行動矣倘氣血衰憊用補中益氣湯多治當歸加之尤效也

陀僧散 世傳治脚了濕爛

洞天奧旨

卷之十三

手足麻裂瘡

大雅堂

密陀一兩

輕粉一錢

熟石膏二錢

枯礬二錢

為末濕

則乾敷乾則桐油調搽一方用栝子油一兩明雄

黃末五錢調搽亦效

試驗方 談野翁治肺縫出水

好黃丹三錢

花蕊石一錢

研絕細末搽之即止水

手足麻裂瘡

麻裂瘡生于手足與皴裂瘡相同然皴裂瘡生于四季而麻裂瘡生于冬時也雖俱是貧寒之人不顧風雨以致手足之開裂然亦天氣嚴寒過于血燥血不能潤膚遂至于

開裂而成瘡也故治法畧宜少異外以蘿蔔汁煎洗之次以臘月羊脂燃油滴入裂口即愈如無羊脂以白芨研細末熱水調稠滴入裂口亦效倘血不足者用四物湯加減飲之尤妙

加味四物湯 內治手足麻裂瘡

熟地 五錢

川芎 二錢

當歸 五錢

白芍 三錢

荆芥 炒二錢

白芨末二錢

水煎調服四劑

眼丹胞

眼胞為肉輪屬脾胃乃土之象也人肉輪上生胞紅腫而

洞天奧旨

卷之十三

眼丹胞

古

大雅堂

作膿名曰眼丹又名眼孤雅此胃火沸騰而上熾于目也宜用三黃湯加減治之外用水淨膏塗之可愈

加減三黃湯

祖傳內治眼丹胞

石膏 三錢

黃芩 一錢

黃連 一錢

黃柏 一錢

炒梔子 一錢

柴胡 一錢

夏枯草 五錢

天花粉 二錢

赤芍 三錢

水煎服四劑漸消

偷鍼眼

眼角上生小瘡癩腫起乃心膽小腸之火也火重則生火衰則輕毋論大人小兒往往皆生此瘡凡生此瘡者必須

胸背之上覓別有小瘡否如或有之瘡窠上壘紫者宜用
針刺出其血眼疔瘡白愈矣倘若未愈宜診其脈看何經
火盛用藥微瀉之必愈

洞天奧旨卷之十四

山陰陳士鏗敬之甫號遠公著 曾孫陳鳳
會稽南式玉尚白甫號存齋評 玄孫增方湖涸民校



瘡瘍腫潰諸方

救命丹 仙傳治癰疽各瘡陰症陽症無不神效

川山甲 三大片同蛤粉 甘草節 二錢 乳香 一錢

天花粉 二錢 赤芍 三錢 皂角刺 五分 貝母 二錢

沒藥 五分 當歸 一兩 陳皮 一錢 金銀花 一兩

洞天奧旨 卷之十四 救命丹 一 大雅堂

防風 七分 白芷 一錢 白礬 一錢 生地 三錢 酒水各

數碗煎八分瘡在上食後服瘡在下食前服能飲

酒者外再多飲數盃忌酸酒鐵器服畢宜側臥少

煖有汗覺痛減大半有起死回生之功效難盡述

一癰疽發背在頭及腦後背脊加羌活一錢角刺

倍之此太陽經藥也

一在脇脅少陽經部位者加柴胡一錢瓜蒌仁二

錢

一在腹膈太陰者加陳皮五分赤芍三錢白芷一

錢

一生在手臂膊加桂枝三分

一生在腿膝加牛膝二錢防已五分黃柏一錢歸

尾三錢如腫硬加連翹二錢木鱉仁五分倘是疔

瘡方中加紫河車三錢蒼耳子二錢如人虛弱不

潰不起加人參三錢甘草一錢如人壯實加大黃

二錢麻黃一錢連根節用

金銀補益湯 家傳治瘡瘍元氣虛倦口乾發熱

洞天奧旨

金銀花 二兩 生黃芪 三錢 甘草 一錢 人參 三錢

白朮 二錢 陳皮 一錢 升麻 五分 柴胡 一錢

當歸 三錢 右水煎服

人參敗毒散 世傳治諸瘡瘍痲痛發熱拘急頭痛

脈數而有力者 人參 羌活 前胡 獨活 川芎 甘草

柴胡 桔梗 枳殼 茯苓 各等分

右水煎服如嘔吐加生薑陳皮半夏如脈細而無

力加大力子半分

極驗消癰湯 世傳治諸癰疽惡毒大患保全有大

功活人最多不可輕忽

穿山甲 四片 如瘡在背即用背上甲在手用前足

上山甲五分如在足用後腿上甲五分炙酥為末

真牛皮膠 四兩 炒 水酒各一碗調勻前二味煎數

沸服之以醉為度

加味十宣散 家傳治瘡瘍因外感風寒內因氣血

虛損經云百病乘虛而入是宜服此 人參 一錢 當歸 二錢 黃芪 三錢 甘草 一錢

白芷 一錢 川芎 一錢 桔梗 一錢 厚朴 薑製 五分

洞天奧旨

防風 三分 肉桂 三分 忍冬藤 五錢 水煎服如脈緩滑

而微加黃芪人參白朮如脈弦身倦加當歸白芍

麥冬如脈緊細加桂枝生地防風如脈洪大而虛

加黃芪黃連

花藤薜荔湯 岐天師傳治發背諸瘡癰初起

薜荔 二兩 金銀花 三兩 生黃芪 一兩 生甘草 二錢 水數碗

煎一碗渣再煎一劑即消

消散湯 長桑公傳治瘡瘍初起立時消散

金銀花 三兩 生甘草 三錢 蒲公英 三錢 天花粉 三錢

當歸一兩 酒水各一碗煎服此方散邪解毒全不損傷正氣而奏效獨捷若遇陰症瘡瘍加人參五錢附子一錢尤妙若湯症瘡瘍萬不可加

柞木飲子 精要治癰疽未成自消已潰自乾輕小証候可以倚伏

乾柞葉四兩 乾荷葉帶 乾萱花根 甘草節 地榆各一兩 共為末每服五錢水二碗煎一碗作二次早晚分服

迴瘡金銀花散 準繩治瘡瘍痛甚色變紫黑

洞天奧旨 卷之十四 林不學 准繩金銀花散 大雅堂 金銀花二兩 黃芪四兩 甘草一兩 右用酒一升同入

茶瓶內閉口重湯煮三時辰取出去滓頓服之神效托裏散 家傳治癰疽腫毒發背腸癰乳癰時毒增寒壯熱不論老幼虛實俱效

黃芪五錢 金銀花一兩 當歸五錢 生粉草三錢 水酒各一鍾煎服渣搗敷患處或俱為末酒調服之更效

神散湯 世傳治癰疽初起

金銀花八兩 水十碗煎二碗再入當歸二兩同煎一氣服之不拘陰陽癰疽初起者散毒尤速如已四

五日者則減之半效然斷無性命之憂 金銀花酒 世傳治一切惡瘡癰疽不問發在何處或肺癰腸癰初起便服之奇效

金銀花五兩 甘草一兩 水二碗煎一碗再入酒一碗畧煎分三服一日一夜服盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到外以鮮者搗爛酒調敷患處

彌佳 黃金飲 家傳治瘡生腿外側或因寒濕得附骨癰于足少陽經分微受足陽明經堅硬漫腫行步作痛

洞天奧旨 卷之十四 金銀花酒 黃金飲 大雅堂 或不能行並皆治之

柴胡五錢 金銀花一兩 大力子一錢 肉桂一錢 黃芪五錢 歸尾三錢 黃柏七分 炙甘五分 水酒各半煎食前服

金銀五香湯 家傳治諸瘡一二日發寒熱厥逆咽

喉閉

金銀花一兩 乳香二錢 木通二錢 大黃二錢 連翹一錢 沉香一錢 木香一錢 丁香一錢

茴香一錢 獨活一錢 射干一錢 升麻一錢

甘草一錢 桑寄生一錢 右咀水二鐘薑三片煎服不拘時

英花湯 世傳治癰疽未潰

金銀花一斤 蒲公英八兩 綿黃芪六兩 生甘草一兩

川貝母三錢 水煎作三次服完全愈

金銀解毒湯 祖傳治積熱瘡瘍痲腫作痛煩躁飲

冷脈洪數大實口舌生瘡疫毒發狂

黃芩一錢 黃柏一錢 黃連一錢 炒梔子一錢

金銀花一兩 水煎熱服

洞天奧旨

卷之十四

癰疽

六

大雅堂

金銀六君湯 祖傳治瘡瘍作嘔不思飲食面黃嫩

脹四肢倦怠大便溏利

人參一錢 白朮一錢 土炒茯苓一錢 半夏一錢 薑製

陳皮一錢 炙甘草五分 金銀花二錢 薑三片 棗二枚

水煎服如過食冷物致傷脾胃本方加藿香砂仁

消毒神聖丹 仙傳治背癰或胃腹頭面手足之疽

五日內服之即散

金銀花四兩 蒲公英二兩 生甘草二兩 當歸二兩

天花粉一錢 水煎服一劑即消二劑全愈

散寒救陰至聖丹 仙傳治癰疽瘡色黑暗痛亦不甚但覺沉沉身重瘡口不突起現無數小瘡口以敷世人此方服之甚效

附子三錢 人參三兩 生黃芪三兩 當歸一兩

金銀花三兩 白芥子二錢 水煎服外貼至聖膏生肌末

藥五錢貼之一日兩換始可蓋陰症瘡瘍多生于

富貴膏梁之客功名失志之人心腎不交陰陽俱

耗又加憂愁拂鬱嗔怒呼號其氣不散乃結成大

毒母論在背在頤在腹在脇在手在足俱是危症

洞天奧旨

卷之十四

癰疽

七

大雅堂

若用此方又用至聖膏藥無不全生蓋陽症可以

涼解而陰症必須溫散也

立消湯 仙傳治癰疽發背或生頭項或生手足臂

腿腰膺之間前陰糞門之際母論陰毒陽毒未潰即

消已潰即斂

蒲公英一兩 金銀花四兩 當歸二兩 玄參一兩 水煎飢

服此方既善攻散諸毒又不耗損真氣可多服久

服俱無碍也即治肺癰大小腸癰無不神效

通氣散 啓玄治一切癰疽發背流注折傷能救敗

壞痞症活死肌彌患于未萌之前拔根于既愈之後
此劑之功妙不可言

生首烏五錢 當歸三錢 赤芍二錢 白芷二錢

茴香一錢 烏藥炒一錢 枳殼炒一錢 木通一錢

甘草二錢 忍冬藤一兩 水酒煎服

一騰疽對口去木通加羌活藥本如虛弱加人參

黃芪

內疎黃連湯 易水治嘔吐心逆發熱而煩脈沉而

實腫癰瘡湯

洞天奧旨

卷之十四

內疎黃連湯 內外

木雅堂

黃連一兩 赤芍一兩 當歸一兩 枳殼一兩

木香一兩 黃芩一兩 梔子一兩 薄荷一兩

桔梗一兩 甘草一兩 連翹二兩 右共為末每服一

兩大便秘流加大黃一錢

內外復煎散 易水治腫癰于外根盤不深形症在

表

地骨皮二兩 黃芪二兩 防風二兩 赤芍一兩

黃芩一兩 白朮一兩 茯苓一兩 人參一兩

甘草一兩 防已一兩 當歸一兩 桂枝五錢

先用蒼朮一斤煎至三升去蒼朮入前藥再煎作
三四次終日服之此除濕熱之劑也如或未已仍
服

當歸黃芪湯 易水治瘡瘍臟腑已行而痛不可忍

者

當歸一錢 黃芪一錢 生地一錢 地骨皮一錢

赤芍一錢 水煎服如發熱加黃芩如煩躁加梔子

如嘔乃濕氣侵胃倍加白朮此準繩首載三方也

八仙散毒湯 祖傳治一切惡瘡初覺時連進三服

洞天奧旨

卷之十四

八仙散毒湯 中和

木雅堂

如失

當歸五錢 熟地五錢 甘草二錢 黃芪一兩

白芍二錢 天花粉三錢 金銀花一兩 生地二錢 水二碗

煎八分半飢服

中和湯 準繩治瘡瘍屬半陽半陰似潰非潰似腫

非腫此因元氣虛弱失于補托所致

人參一錢 陳皮一錢 黃芪一錢 白朮一錢

當歸一錢 白芷一錢 茯苓一錢 川芎一錢

皂角刺一錢 乳香一錢 沒藥一錢 金銀花一錢

甘草節一錢 水酒各半煎服

托裏散 世傳治一切惡瘡發背疔瘡便毒始發脈

弦數洪實腫甚欲作膿者此實熱堅滿之症故可下

之

金銀花一兩 當歸一兩 大黃三錢 朴硝三錢

天花粉三錢 連翹三錢 牡蠣三錢 皂角刺三錢

赤芍一錢 黃芩一錢 水酒煎服

回毒金銀花湯 世傳治瘡瘍色變紫黑

金銀花二兩 甘草一兩 芩芪四兩 酒一升重湯煮服

洞天奧旨 卷之十四 托裏神奇散 大雅堂

獲膜蠟丸 仲仁傳獲膜防毒內攻未破即消已

破即合一日之中服至百粒始有效驗服過半斤必

萬全也

白礬二兩 黃蠟一兩 燻化少冷 以蜜丸如梧子大

硃砂為衣每服二三十九酒吞服

托裏黃芪湯 世傳治瘡瘍潰後膿多內虛

黃芪 人參 桂心 遠志

麥冬 五味 每服五錢食遠服

托裏溫中湯 世傳治瘡瘍寒變內陷膿出清稀皮

膚涼心下痞滿腸鳴腹痛大便微溏食則嘔逆氣短

呃逆不得安臥時發昏憤

附子製四錢 炮姜三錢 羌活三錢 木香一錢

茴香一錢 丁香一錢 沉香一錢 益智仁一錢

陳皮一錢 炙甘草一錢 生薑五片 水煎服

托裏神奇散 家傳諸瘡發背疔瘡

黃芪五錢 厚朴一錢 防風一錢 桔梗二錢

連翹二錢 木香五分 沒藥去油一錢 乳香去油一錢

當歸五錢 川芎八分 白芷一錢 金銀花一兩

洞天奧旨 卷之十四 托裏神奇散 大雅堂

芍藥一錢 官桂三分 人參二錢 甘草三錢

水酒煎服

黃芪六一湯 世傳治癰疽潰後作渴及人無故作

渴或肺脈洪數必發癰疽服此除之

綿黃芪六兩 蜜水炒一升 甘草一兩半 每服一兩

水煎食遠服

參花湯 家傳治潰瘍氣血俱虛熱惡寒失血等

症

金銀花一兩 人參一兩 薑棗煎服

獨參湯 世傳治瘡瘍潰後氣血虛極令人發熱惡

寒失血之症

人參一二兩 棗十枚薑十片水煎徐徐服之

加減八味丸 世傳治瘡瘍將痊未痊作渴甚則舌

上生黃乃腎水虧極不能上潤令心火炎炎不能既

濟故心煩躁渴小便頻數白濁陰痿飲食少肌膚損

腿腫脚弱此方滋陰降火則無口舌瘡患矣

山藥四兩 桂心一兩 山茱萸酒浸四兩 白茯苓三澤瀉兩三兩

五味子兩 牡丹皮三兩 熟地八兩 右為末蜜丸如桐

洞天奧旨 卷之十四 加減八味丸 加味聖愈湯 世傳治瘡瘍潰後氣血虛極令人發熱惡寒失血之症 大雅堂

子大每服六七十丸空心送下

加味聖愈湯 世傳治瘡瘍膿水出多或金刀瘡血

出多不安不得眠五心煩熱

熟地五錢 生地五錢 川芎五錢 人參五錢

金銀花一兩 當歸三錢 黃芪三錢 水煎食遠服

十味托裏散 世傳治發背癰疽疔毒乳癰脚痛未

成即散已成即潰敗膿自出惡毒自消痛疼頓減非

常之驗

人參二錢 當歸五錢 官桂一錢 川芎八分

防風一錢 白芷一錢 桔梗二錢 黃芪五錢

甘草一錢 厚朴一錢 水煎服

內托散 準繩治各瘡腫毒

大黃五錢 牡蠣五錢 瓜蒌二枚 甘草三錢

右剉末每服三錢水煎溫服

止痛當歸湯 世傳治背疽腦疽穿潰疼痛

當歸 生地 芍藥 黃芪

人參 甘草 官桂各等分 水煎服

補中益氣湯 世傳治瘡瘍倦怠口乾發熱飲食無

洞天奧旨 卷之十四 補中益氣湯 世傳治瘡瘍潰後氣血虛極令人發熱惡寒失血之症 大雅堂

味或不食勞倦脈洪大無力或頭身痛惡寒自汗氣

高而喘虛煩

炙黃芪一錢 炙甘草一錢 人參一錢 炒白朮一錢

升麻三分 柴胡三分 當歸一錢 金銀花一兩 薑棗水

煎空心午前服

十全大補湯 世傳

人參二錢 桂枝二錢 熟地二錢 川芎二錢

茯苓二錢 白朮二錢 白芍二錢 黃芪二錢

當歸二錢 甘草一錢 薑棗水煎服如虛弱極加熟

附子三分如未成膿者加枳殼香附連翹木鱉仁
數分如氣虛倍參芪如血虛倍芍歸加薑炭

八珍湯 世傳治瘡瘍脾胃傷損惡寒發熱煩躁作

渴或潰後氣血虧損膿水清稀久不能愈

人參 二錢 白朮 三錢 茯苓 一錢 甘草 一錢

當歸 三錢 川芎 八分 芍藥 一錢 熟地 一兩 薑棗水

煎食遠熱服

人參養榮湯 世傳治潰瘍脾胃虧損氣血俱虛發

熱惡寒四肢倦怠肌瘦面黃汲汲短氣食少作渴及

洞天奧旨

卷之二

八珍湯人參養榮湯
加味養榮湯

十四

大雅堂

瘡不收口

人參 一錢 白朮 一錢 黃芪 一錢 桂心 一錢

當歸 一錢 甘草 一錢 白芍 一錢 熟地 三錢

茯苓 二錢 五味子 七分 遠志 五分 薑棗水煎服

加味養榮湯 家傳

人參 三錢 白朮 三錢 白芍 二錢 黃芪 五錢

桂心 一錢 當歸 三錢 甘草 一錢 熟地 一兩

茯苓 二錢 五味子 七分 遠志 一錢 銀花 一兩 薑棗水

煎服

治魂丹 世傳治癰疽惡瘡疔毒等類大有神效

乳香 一錢 沒藥 一錢 銅綠 一錢 枯礬 一錢

黃丹 一錢 穿山甲 一錢 輕粉 五分 煅酥 五分

麝香 少許 共為細末蝸牛研為丸如菘荳大每服

一九至重者服二九葱白搗裹熱酒送下取汗透

為妙

內消神丹 家傳治各癰惡瘡

殭蠶 二錢 乳香 三錢 沒藥 三錢 枯礬 三錢

炙山甲 三錢 銅綠 三錢 黃丹 三錢 全蝎 四錢

輕粉 一錢 蟾酥 一錢 麝香 二分 各為末蝸牛研為

丸每用一九葱白搗裹熱酒送下汗透為佳

梅花點舌丹 內府傳治一切諸般無名腫毒十三

種紅絲等疔喉閉並傳寒等症神驗

硃砂 二錢 雄黃 二錢 白礬 二錢 血竭 二錢

乳香 二錢 沒藥 二錢 蟾酥 一錢 牛黃 一錢

苦葶藶 二錢 冰片 一錢 沉香 一錢 麝香 六分

珍珠 六分 熊膽 六分 共為細末將人乳浸透蟾酥

研入諸藥調勻和丸如梧桐子大金箔為衣凡遇

瘡毒用藥一丸壓舌根底含化隨津嚥下藥盡用酒葱白隨量飲之蓋被臥之出汗為度刻有效驗合藥宜秘之忌發物三七日更妙

飛龍奪命丹 啓玄專治癰疽疔毒無名惡瘡渾身憎寒惡心已成未成或黑陷毒氣內卷乃穿筋透骨之劑無經不通故能宣泄汗吐三法俱備及中一切毒禽惡獸肉毒所致成瘡及脈沉緊細數蘊毒在裏并濕毒用之神效

硼砂 一錢 硃砂 二錢 黃丹 一錢 斑蝥 三錢

洞天奧旨

卷之十四

飛龍奪命丹

末

大雅堂

蟾酥 三錢 血竭 一錢 乳香 三錢 沒藥 三錢

麝香 五分 人言 一錢 巴菝 去油 半夏 五分

硝砂 一錢 共為細末用頭生小兒乳汁搗蝸牛為

丸如菜菔大每五七丸各隨症引送下亦分上下前後服之

一疔瘡初發渾身憎寒惡心先嚙化一丸如覺身

麻木用三五丸水吞下

一發背癰疽初起作湯用水吞三五丸

一乳蛾喉閉用一丸嚙化下

一下疔瘡用一丸

奪命丹 準繩

蟾酥 五分 輕粉 五分 硃砂 三錢 枯礬 一錢

寒水石 一錢 銅綠 一錢 乳香 一錢 沒藥 一錢

蝸牛 二十個 各為末蝸牛搗為丸加酒少許如菜菔

大每服一丸嚙生葱三五蒸爛吐于手心包藥在

內熱服汗出為效重者再服一丸

內造蟾酥丸 專治一切諸般惡毒發背癰疽魚口

對口喉閉喉癰喉癭疔三十六種住節紅絲等疔

洞天奧旨

卷之十四

奪命丹

末

大雅堂

并蛇傷虎咬瘋犬惡舌所傷諸般大毒一并治之若

瘡不痛或麻木或嘔吐痛未止病重者多昏憤此藥

服之不起發者即發不痛者即痛痛甚者即止昏憤

者即惺醒吐者即改未成即消已成即潰真有回生

之功乃惡瘡之至寶也

蟾酥 三錢 輕粉 五分 枯礬 一錢 寒水石 一錢

銅綠 一錢 乳香 一錢 麝香 一錢

雄黃 二錢 蝸牛 二十個 硃砂 三錢 各為細末合藥於

端午日午時在淨室中先將蝸牛研爛再同蟾酥

和研調勻方入各藥共搗極勻丸如菘荳大硃砂
為衣每服三九引用葱白五寸患者白嚼爛吐于
男左女右手心包葉在內用無灰熱酒一鍾送下
蓋被出汗如人行五六里出汗為度甚者再進一
服脩合時忌婦人雞犬見之經驗如神百發百中
冲和膏 啓玄治癰疽發背流注折傷損痛流注痰
塊癰疽軟疔及冷熱不明等瘡葱酒隨症敷之

紫荆皮炒五兩 獨活炒三兩 石菖蒲二兩 赤芍藥炒二兩

白芷一兩 共為細末

洞天奧旨

卷之十四

冲和膏

六

大雅堂

凡諸瘡瘍莫不因氣血凝滯之所生也紫荆皮係
木之精能破氣逐血獨活是土之精能引氣活血
援骨中冷毒去肌肉中濕痺更與石菖蒲破石腫
硬如神赤芍是火之精能止痛活血生血去風石
菖蒲乃水之精能消腫止痛散血白芷是金之精
能去風生肌止痛肌生則肉不死血活則經絡通
肉不死則瘡不臭爛血活則瘡不焮腫故云風消
血自散氣通硬可除蓋人之五體皮肉筋骨血也
得五行之精而病除矣

一瘡勢熱極不用酒調可用葱泡湯調乘熱敷上
最妙如熱減亦用酒蓋酒能生血行血也
一瘡有黑暈瘡口無血色者是人曾用涼藥太過
宜加肉桂當歸是喚起死血則黑暈自退也如血
回只以正方用之
一痛不止加乳香沒藥酒化溶于火銚內後將此
酒調藥熱敷痛處
一流注筋不能伸者用乳香沒藥照前酒調敷最
能止痛

洞天奧旨

卷之十四

冲和膏

九

大雅堂

一瘡口有齖肉突出者其症有三一曰着水二曰
着風三曰着怒皆有齖肉突出宜用此膏少加南
星末以去其風用薑汁酒調敷週圍如不消者必
是俗人誤以手着力擠出膿核太重又或以涼藥
冷了瘡口以致如此若投以熱藥則愈
一瘡勢熱盛不可驟用涼藥恐涼逼住血凝作痛
痛令瘡敗故宜溫冷相半使血得中和則瘡易愈
宜此方相對停洪寶膏用葱湯調塗貼之自效
一發背癰疽流注皆賴此方終始收功最穩妙在

通變活法取效在于掌握更無變壞等症况肯癱
乃生死相關輕重皆能保守能知此藥兼陰陽而
奪化之樞機真神矣哉

廻陽玉龍膏 啓玄治諸陰發背流注鼓椎風久損
痛冷痺風濕諸脚氣冷腫無紅赤色痛不可忍者及
足頑麻婦人冷血風等症蓋此藥性溫熱故治諸陰
最妙

草烏 三兩 南星 炒一兩 軍薑 煨二兩 香白芷 一兩

赤芍 炒一兩 肉桂 五錢 共爲末熱酒調敷

洞天奧旨

卷之十四

廻陽玉龍膏

三

大雅堂

夫人之血氣週流一身周而復始無有間斷苟
腑虧虛則風寒暑濕外邪得而襲之矣七情交感
痰涎滯經絡不通寒熱交作兼之血脈凝泣
道閉阻而成瘡瘍者多也故瘡瘍之症有虛有實
有寒有熱實熱易治虛寒難療必細識其經絡部
位辨明其寒熱虛實則萬不失一也此方內有軍
薑肉桂足以禦寒能生血熱血草烏南星能破惡
除堅祛風化毒活死肌除骨痛消結塊赤芍白芷
能散滯血止痛生肌加酒行藥性雖有十分冷症

未有不愈者如發寒灰之焰枯木之春也大抵冷
症則肌肉陰爛不知痛癢有知痛者多附於骨痛
久則侵入骨髓非尋常藥力所能及矣此方祛陰
毒廻陽氣拔骨中痛如神當減當加活法開後

一治陰發背滿瘡面黑爛四圍好肉用洪寶膏把
住中間以此膏敷之一夜陽氣自回黑處皆紅當
察其紅活已透即止此藥却以冲和膏收功如欲
作膿又以南星草烏爲末加于冲和膏內用之如
陽已回黑已紅惟中間一點黑而不能紅者蓋血

洞天奧旨

卷之十四

廻陽玉龍膏

三

大雅堂

已死也可用什碎明礬末又方白丁香砂乳香
末唾調勻點于黑紅交處一圍上以冲和膏蓋之
次早去藥黑死肉如割去甘草水洗淨方可上生
肌合口藥收功如黑肉未淨瀆去爲妙
一冷流注多附骨硬不消骨寒而痛筋縮不能伸
屈庸俗誤用刀鍼又無膿血只有屋漏清汁或有
瘀黑血宜此方敷之如稍緩加軍薑白芷肉桂草
烏等分熱酒調敷則骨寒除而痛自止氣溫和而
筋自伸肉亦軟而腫即消亦不可無木臘以其性

能破堅腫亦不可多多解別藥性故也

一治乳吹乳癰等初發切不可用涼藥恐凝住其血不能化乳宜此方中加南星薑汁酒勻調熱敷即消欲急消加草烏未能破惡除寒如已成癰則用冲和膏治之或加草烏兩星二味最妙如破後當觀其源若原于冷用冲和收功原于熱用洪寶膏退熱生肌瀆加乳香沒藥止痛內服神效瓜蔓散治之

一宿疾失道癰腫無膿者用此藥點頭病必旁出

洞天奧旨

卷之十四

寒陽玉龍膏

三

大雅堂

再作為佳不然則元陽耗為敗症如遇敗症當用玉龍膏敷之拔毒成膿內服通神散加桔梗半夏當歸肉桂等藥如病紅活熱驟則用冲和膏為佳切不可用涼藥此藥能拔毒成膿有膿即止亦不可過

一治肚癰一症十有九死蓋人之脾胃屬坤土為陰血氣潮聚趨熱避寒故多為內癰不能外現間有微影欲出或又被冷水所觸及服涼藥雖有仙丹莫能施治可不慎乎凡有此症初覺腰痛且手

按之痛苦走閃移動則為氣塊若推根不動外面微有紅腫則為內癰急以此方拔出毒氣作成外癰則用冲和膏收功內服通神散加忍冬藤治法如前若癰自能外現不可用此方只用冲和膏為妙當頂用玉龍膏貼之有頭自現自破若流膿不快依法用洪寶膏三分薑汁七分茶調敷之膿出皆盡內服十宣平補生肌外則用冲和膏收功此症陰多陽少最能損人如將安之際大服補氣血藥則易愈

洞天奧旨

卷之十四

洪寶膏 搗毒散

三

大雅堂

洪寶膏 啓玄治諸熱癰疽等毒十分勢熱宜用此藥相兼用之蓋此藥性涼能化血又能破腫止痛若遇陰症陰痞能助痛凝血死肌爛肉不可用也冲和膏性溫玉龍膏性熱洪寶膏性寒三膏當參詳臨症施治在于活法加減也

天花粉 三兩 赤芍藥 二兩 薑黃 一兩 白芷 一兩 共為細末茶酒蜜湯乘熱塗之

搗毒散 準繩治瘡癰腫毒疼痛

大黃 三兩 白芨 二兩 杆梢 四兩 共為末井水調搽

如乾再搽若瘡口嫩腫宜用之若腫而不痛乃陰症也斷不宜用

水澄膏 郭氏

白芨 四錢 白礬 四錢 鬱金 一對 大黃 七錢 五分

黃柏 七錢 黃藥子 七錢 榆皮 七錢 乳香 五錢

沒藥 五錢 雄黃 五錢 共為細末用新汲水一碗將藥澄下水內藥定去水數千處上用白紙封之

用雞翎涼水潤濕

鐵井欄 準繩

洞天奧旨

卷之十四

大雅堂

芙蓉葉重陽前收研末 蒼耳子端午前收燒灰

存性同所細末蜜水調敷

清涼膏 家傳治初患癰腫瘡癤熱熾大痛

大黃 芙蓉葉 共為細末米醋調敷之

千金方 治石癰堅硬不作膿者

葇荑子 為末醋和敷瘡頭根即拔出

烏龍掃毒膏 啓玄治一切癰疽發背腫毒已潰未潰並皆治之

文蛤 八兩 多年浮粉 一筋 曬乾入米醋浸一夜再炒

蜒蚰 三十條 同搗一處再曬再搗成末再炒至黑色

為細末入磁罐收貯凡遇瘡疽用醋調敷患處

頭出毒氣綿紙蓋之乾再用醋掃潤之如背癰疽

發憤時痛不可忍用熟豬腦子去皮淨一個搗爛

調此成膏毒上敷之留頭出毒氣紙蓋之如瘡紅

紫熱毒勢甚痛用蜂蜜調敷更效

香蟾膏 祖傳治發背疔毒

活蝦蟆 一個 麝香 五厘 共搗如膏敷在患處留頭

如無頭都敷上一二日搗去倘未全愈再搗敷

洞天奧旨

卷之十四

大雅堂

烏龍膏 世傳治陰發背黑凹不知痛者

老生薑 半斤切 為末畧攤土地上出火毒少頃即

用猪膽汁明礬末調入薑末如糊敷在患處周圍

用紙蓋之乾用熱水潤之知痛時黑水自出為妙

如不知疼出黑水難治

東籬散 孫氏集效治癰疽疔腫無名惡毒

野菊花 一把 搗爛酒煎熱服取渣以外傳之即愈

愈

收毒散 啓玄治發背一兩頭開發不住勢在危急

即以此藥貼之甚效

搽霜梅_個山皂角_{一挺不}二味同燒灰存性共為

細末如發熱者米醋調塗四圍及開處厚些即不

走開或薑汁同醋調尤妙如發熱者蜜同醋調或

茶滴調塗之立愈

洞天奧旨卷之十五

山陰陳士繹啟之甫號遠公著一曾孫陳鳳
會稽陶式玉尚自甫號存齋評一玄孫增方湖河氏校



奇方_中

瘡瘍刀鍼法

鐵刀鋒長一寸濶三分兩邊鋒利厚半分柄長二
刀式

鐵鍼頭細長一寸五分鋒尾長一寸五分粗而圓
用_法 宋之十五 大雅堂

鍼式

用刀時手執堅牢眼看明白心中注定一刀橫畫一
刀直畫不可太深約入半寸人必發厥少頃即安不
必憂危驚懼膿血出後即用膏藥貼瘡口內服湯劑
調理若用鍼止刺入而不必用積直之法也亦溷內
外兼治

賽鍼散 啓玄治癰疽有頭不破及疔腫時毒或生
四肢其勢微緩長針者先以醋調藥塗在瘡頂上內
服托裏等藥

巴荳 五分 輕粉 一錢 硃砂 一錢 白丁香 一錢 共爲

細末醋調塗之余近用醋塗入厚白綿紙上臨用

剪塊子貼瘡上自然腐破

代針散 啓玄一名透膿散一名射膿散不拘癰疽

石毒不破者及畏針不開恐遲則毒氣侵蝕好肉內

卷只此 服不移時自透出膿甚驗

懸繭子 個一出了蛾厚的加附子一片燒灰爲末熱

酒調服即透切勿不可用三個恐頭多口亦多也忌

之

洞天奧旨

卷之一五

替鍼散

十一

木雅堂

替鍼散 準繩治癰疽已潰未破或破後膿出不快

者

白丁香 礪砂 沒藥 乳香 各等 石灰餅

內種糯米十四粒其法用灰炭五升燼炭三升以

水五升淋取清汁入大鍋內熬汁至二升瓦器盛

之用時以小青盞盛取半盞濃汁用皮紙貼盞中

濃汁面上安定然後取糯米十四粒種子其上

宿卽是右爲細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒

未破用藥貼瘡頭薄處卽破膿滯不快用一粒納

瘡口內使膿易出好肉易生

鍼頭散 治一切頑瘡內有瘀肉癰核不化瘡口不

合此藥腐之

赤石脂 五錢 乳香 三錢 白丁香 三錢 信石 一錢

黃丹 一錢 輕粉 五分 麝香 五分 蜈蚣 一條 灸 各爲

末搽瘡 肉上其肉自腐若瘡口小或痔瘡用糊和

作條子陰乾維之凡瘡久不合者內有膿管用此

腐內服托裏之劑

碧落神膏 治各癆癰疽疔瘡腫毒神效

洞天奧旨

卷之十五

鍼頭散

木雅堂

吸鐵石 兩 金銀花 一斤 生甘草 兩 蒲公英 兩

當歸 兩 炙黃芪 兩 香油 五觔 熬至滴水成珠去

渣入黃丹二觔再熬軟硬得中卽成膏矣再加細

藥末參于膏上輕粉 三錢 麝香 一錢 冰片 三錢

赤石脂 兩 兒茶 五錢 黃柏 三錢 乳香 三錢

沒藥 三錢 各研細末臨時酌瘡之輕重用之大約

初起不必用細藥出毒後必宜加之

吸毒仙膏 岐天師傳治諸般癰疽已破貼之最效

吸鐵石 五錢 忍冬藤 兩 當歸 三兩 天花粉 一兩

夏枯草 八兩 香油五筋熬成膏加黃丹二筋收之渣
口一破即用此膏貼之既能呼毒又能吸膿兼易
生肌神效

神膏方 仙傳專貼發背諸惡瘍

金銀花 八兩 蒲公英 八兩 木連藤 八兩 真蘇油 三兩
煎至黑濾去粗入黃丹 十二兩 乳香 三錢 沒藥 三錢
松香 三兩 去火毒攤貼神效此膏不論陰陽惡毒
皆可貼之再加後細末藥方妙

陽疽末藥方

洞天奧旨 卷之十五 神膏方 陽疽末藥方 四 木雅堂

冰片 一錢 麝香 二分 黃柏 三錢 白芷 三錢
五靈脂 二錢 三七根 五錢 各為末摻入膏藥
貼之

陰疽末藥方

肉桂 三錢 冰片 三分 人參 一錢 丹砂 三錢

紫石英 三錢 兒茶 三錢 五靈脂 二錢 各為末摻於膏內

定痛淨膿生肌膏 仙傳專治各瘡疽惡毒

當歸 一兩 黃芪 一兩 生甘草 五錢 熟地 一兩
玄參 一兩 銀花 四兩 錦地羅 二兩 麥冬 一兩

人參 一兩 蒲公英 三兩 白芷 三錢 白芍 五錢

花粉 五錢 黃柏 五錢 白朮 二錢 生地 三錢

牛膝 二錢 連翹 三錢 丹皮 三錢 沙參 三錢

柴胡 三錢 防己 一錢 蒼耳子 四錢 黃連 一錢

葛根 三錢 蒼朮 五錢 大黃 三錢 紅花 五錢

桃仁 二錢 地榆 三錢 夏枯草 五兩 白朮 五錢

蘇油 六斤 熬數沸去粗再熬滴水成珠入黃丹二

收之另加細末藥 麝香 一錢 冰片 二錢

人參 五錢 雄黃 三錢 輕粉 二錢 兒茶 三錢

洞天奧旨 卷之十五 定痛淨膿生肌膏 五 木雅堂

象皮 三錢 海螵蛸 三錢 乳香 三錢 沒藥 三錢

血竭 三錢 三七根 五錢 龍骨 三錢 赤石脂 五錢 各為絕

細末摻膏內貼之奇效

陰陽至聖膏 石室仙傳治陰陽癰疽用刀去其口

邊腐肉即以此膏貼之即止痛敗膿盡出

金銀花 一斤 生地 八兩 當歸 三兩 川芎 二兩 黃芪 三兩

生甘草 兩 牛膝 一兩 丹皮 一兩 荆芥 一兩

防風 五錢 茜根 五錢 人參 五錢 玄參 五兩

蘇油 五斤 熬至藥黑去渣再熬至滴水成珠入黃

丹二勛 廣木香 一兩 沒藥 一兩 乳香 一兩

血竭 一兩 象皮 五錢 麝香 一錢 各為細末入油中

少煎好戴磁碟內每膏一個約重一兩再加後末

藥

末藥方

人參 三錢 冰片 一錢 乳香 三錢 血竭 五錢

三七末 一兩 兒茶 一兩 川楝子 一兩 藤黃 三錢

貝母 二錢 輕粉 一錢 各為極細末此膏與末約共

用神奇無比

洞天奧旨

卷之十五

末藥方 生肌散 補爛丹

六

大雅堂

生肌散 準繩治諸瘡生肌

寒水石 一兩 碎滑石 一兩 烏賊骨 一兩 龍骨 一兩

定粉 五錢 密陀僧 五錢 枯礬 五錢 乾臙脂 五錢 各為細

末乾摻之

生肌散

真輕粉 一兩 鉛粉 一兩 冰片 二分 辰砂 四分 飛

珍珠 一錢 共為末磁瓶收貯

補爛丹

枯礬 三錢 乳香 五分 沒藥 五分 輕粉 三分

珍珠 三分 黃丹 五分 共為細末摻濕處如乾用猪

油調敷

生肌散 治瘡口不合

木香 二錢 黃丹 五錢 枯礬 五錢 輕粉 二錢 共為末

猪膽汁拌勻曬乾再研細敷患處

薛立齋云按此方乃解毒搜膿去腐之劑非竟自生

肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血

竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生

反增潰爛耳若此方誠有見也亦有氣血俱虛不能

洞天奧旨

卷之一

生肌散 仙方救命湯 紫菊湯

七 大雅堂

之

仙方救命湯 治疔瘡走了黃打滾將死眼見火光

危症

大黃 一錢 梔子 二錢 牡蠣 一錢 金銀花 一兩

連翹 一錢 木香 一錢 乳香 一錢 牛旁子 一錢

沒藥 一錢 瓜蒌 二錢 角刺 五分 地骨皮 二錢 水酒各

半煎服一劑而愈

紫菊湯 廣華記治疔疔疔毒

生甘菊 連根 地丁 三錢 牛旁子 一錢

銀花 五錢 花粉 二錢 貝母 三錢 白芷 一錢

生地 三錢 白芨 三錢 連翹 二錢 茜草 五錢

先用夏枯草 兩 河水六碗煎三碗去渣不拘時服

加菴水炒黃芪 五錢 麥冬 五錢 五味子 一錢

花丁散 準繩治疔瘡毒氣

地丁 一兩 蟬蛻 一兩 貫仲 一兩 丁香 二錢

乳香 二錢 各為末每服二錢空心酒下

神效桔梗湯 家傳治咳而胸膈隱痛兩脇腫痛咽

洞天奧旨 卷之十五 花丁散 神效桔梗湯 扶桑清肺丹 大雅堂

乾口燥煩悶多渴肺癆時出濁唾醒臭

桔梗 二錢 貝母 一錢 桑白皮 一錢 當歸 一錢

炒瓜蒌 一錢 百合 一錢 杏仁 一錢 地骨皮 一錢

枳殼 一錢 玄參 一錢 青黛 一錢 紫苑 一錢

麥門冬 一錢 甘草 六分 水二鍾薑皮五分煎七分不

拘時食後服如喘加蘇子萊服子肺虛咳加入人參

阿膠熱燥加黃芩梔子有膿血加合歡皮茅根便

閉加酒煮大黃心煩咳痛加硃砂咳引咽隘倍加

桔梗

扶桑清肺丹 伯高太師真君傳治貪酒生肺癆已

成 桑葉 五錢 紫苑 二錢 犀角屑 五分 生甘草 二錢

人參 三錢 欵冬花 一錢 百合 三錢 杏仁 七粒

阿膠 三錢 貝母 三錢 金銀花 一兩 熟地 一兩

水煎調犀角末服數劑奏功如响

起痿延生丹 伯高太師傳治肺痿損傷焦瘦氣促

麥冬 五錢 百部 五分 欵冬花 五分 白微 五分

生甘草 一錢 天門冬 一錢 生地 一錢 天花粉 一錢

洞天奧旨 卷之十五 起痿延生丹 千金 大雅堂

桔梗 一錢 玄參 三錢 山豆根 二錢 水煎服漸輕則生

否則不效

千金煮肺湯 啓玄治肺痿咳吐膿血或自汗嘔吐

清濁大小便不利等症

豬肺一具不用吹的洗淨血燥入藥扎定

青黛即福建靛花末 二錢 川芎 三錢 紅棗 九枚 共入肺

內扎定下鍋煮熱患者自己食之二三以盡為

度至重不過一二具肺痿自安

犀歸湯 祖傳治腸癰腹濡內隱隱朽痛大小便秘

澁

犀角真的鎊末 一錢煎好後入 大黃 酒炒一錢二分

牡丹皮 二錢 梅仁 二錢 去皮火 冬瓜仁 二錢 薏苡仁 五錢

芒硝 七分 金銀花 一兩 當歸 五錢 右阻一劑水煎空

心服

兩間湯 岐天師傳治大腸癰

薏仁 二兩 生甘草 一兩 當歸 二兩 錦地羅 一兩

紫花地丁 五錢 槐米 三錢 天花粉 三錢 水煎服一劑足

可伸二劑全愈

洞天奧旨

卷之十五 兩間湯 王公湯 伯高太師傳治小腸癰

大雅堂

王公湯 伯高太師傳治小腸癰

王不留行 一兩 生甘草 五錢 蒲公英 一兩 車前子 三錢 水煎

服一劑即愈

龍葱散 治乳吹

韭菜地中蚯蚓糞 二錢 葱子 一錢 共研細末醋調敷

上乾即易之三次即愈

救乳化毒湯 治乳癰乳吹初起神效

金銀花 五錢 蒲公英 五錢 當歸 一兩 水煎服二劑即愈

乳吹亦可用且尤易效加酒更妙

芙蓉湯 治乳癰初起

蒲公英 一兩 忍冬藤 二兩 生甘草 二錢 水二鍾煎一鍾食

前服二劑全消

參芪瓜蒌散 治乳癰乳疽已成者化膿為水未成

者即消散如癰癰更效

瓜蒌 一個 甘草 二錢 當歸 五錢 沒藥 一錢

乳香 一錢 另研大力子 五錢 人參 三錢 黃芪 五錢 水酒各

半煎服二劑即消

伯高太師方 治乳癰初起

洞天奧旨

卷之十五 伯高太師方 治乳癰初起

大雅堂

白芷 二錢 貝母 二錢 蒲公英 三錢 連翹 一錢

金銀花 一兩 水煎服一劑即消

末類方 治乳癰初腫

射干 即扁竹根 同萱草根為末蜜調傳之神效

葛真君湯 治癰癰

白芍 五兩 白芥子 五兩 香附 五兩 茯苓 五兩

陳皮 一兩 附子 三分 桔梗 五兩 甘草 一兩 各為末

水打成丸酒送下五錢一料全愈

夏枯草膏 薛已治癰癰馬刀不問已潰未潰或日

久成漏

夏枯草六兩水二鍾煎七分食遠溫服虛甚者則煎

汁熬膏服并冷患處兼以十全大補湯加香附貝

母遠志尤善此物生血乃治瘰癧之聖藥也其草

易得其功甚多

昆花湯 章雲樵傳治項下腫核乃痰氣不清鬱結

而成日久破壞以致氣血虧短卒難收口且連痺不

已又名瘰癧此症最難斷根害人非淺此方萬試萬

應戒慎忌口常服必驗

洞天奧旨

卷之十五 昆花湯 文武膏

大雅堂

南夏枯草三錢浙貝母二錢山慈姑一錢玄參一錢

連翹一錢牛蒡子一錢橘紅一錢金銀花一錢

海藻一錢川芎一錢當歸一錢香附一錢

白芷一錢甘草五分昆布三錢水三碗煎一碗空

心服如破爛日久不收口者加黃芪白朮各一錢

茯苓八分升麻柴胡各五分

文武膏 岐天師傳治瘰癧神效

用桑椹黑者二斗以布袋絞取汁夏枯草十斤取

汁二味石器中熬成膏子白湯化下二匙日三服

一月即愈忌酒色鷄肉

蝸牛散 三因治瘰癧潰與未潰

蝸牛不拘多少以竹簽穿瓦上曬乾燒存性為末

入輕粉少許研骨髓調用紙花量磨大小貼之

夏枯草湯 治瘰癧馬刀不問已潰未潰或已潰成

漏形瘦飲食不甘寒熱如瘧漸成勞瘵並效

夏枯草二錢當歸三錢白朮三錢茯苓三錢

桔梗三錢陳皮三錢生地三錢柴胡三錢

甘草三錢貝母三錢香附三錢白芍三錢

洞天奧旨

卷之十五 夏枯草湯 瘰癧膏

大雅堂

白芷三分紅花三分先煎夏枯草取汁三碗後煎

藥七分臥時入酒半小鍾和服 準繩云草用夏

枯草六兩水二鍾煎至七分去渣食遠服一月即

愈後服十全大補湯加香附貝母遠志尤善

瘰癧神膏 祖傳治各種瘰癧

大當歸五兩大穿山甲五兩陳皮三兩肉桂一兩

木鱉子肉兩大蜈蚣十條象皮一兩黃栢五兩

黃芩五兩川連一兩白花蛇一兩斷艾一兩

金銀花四兩香油三斤浸半月夏五日春秋十日火

熬至黑色去渣再熬滴水成珠加飛過黃丹十兩
攪勻再熬又下乳香沒藥兒茶血竭蜜陀僧俱為
末各一兩攪勻候溫入麝香一錢再攪入水中一
日去火氣攤貼甚效忌一切發物并房事

神祕湯 治癩癧

橘皮 一錢 紫蘇 一錢 人參 二錢 桔梗 三錢

桑皮 一錢 生薑 五分 五味子 三分 水煎服

木通湯 治癩癧

木通 一錢 車前子 二錢 猪苓 二錢 澤瀉 二錢

洞天奧旨

卷之十五

大雅堂

連翹 一錢 花粉 二錢 金銀花 兩 瓜蒌子 二錢 水二鍾

竹葉燈心煎服忌醋猪頭肉腸肝驢馬羊肉及房

事氣怒

敗毒散藥湯 治四種癩癧

人參 一錢 當歸 二錢 厚朴 一錢 桔梗 二錢

白芷 一錢 肉桂 五分 防風 五分 黃芪 三錢

粉草 一錢 水酒各半煎服

膏藥方 治癩癧不破者

沉香 麝香 輕粉 銀硃

荔枝肉 各等分 入熟魚膠搗成膏貼之專治硬核
不消不破甚效

通治癩癧方 不分新久表裏虛實及諸痰結核交
效

陳皮 一錢 白朮 一錢 柴胡 一錢 桔梗 一錢

川芎 一錢 當歸 一錢 連翹 一錢 茯苓 一錢

香附 一錢 夏枯草 一錢 黃芩 一錢 菴香 五分

半夏 五分 白芷 五分 甘草 五分 薑三片水二鍾煎

八分入酒一小杯臨睡時服

洞天奧旨

卷之十五

大雅堂

癩癧酒藥方 治年久癩癧結核串生滿頭頑硬不
穿者甚效

鶴虱草 八兩 忍冬藤 六兩 野蓬蒿 四兩 野菊花 四兩

五爪龍 三兩 馬鞭草 一兩 川老酒 十五斤 袋貯藥懸

于酒內封口煮三炷香為度取起水頓一伏時初

服盡醉出汗為效後隨便飲一料病愈不發

搽頭草膏 治癩癧已破者

五搽頭草不拘多少清水煮爛去草止用汁熬成

膏去火毒每膏一個加麝香二厘貼上一個不必

再換其核自出而愈

六神全蝎丸 治多年瘰癧百治不愈服此藥七日全愈

全蝎 三兩焙乾 白朮 炒三兩 半夏 一兩 白芍 四兩 去足勾

茯苓 四兩 炙甘草 五錢 共為末油核桃肉搗為丸

荳大每日二服清晨服一錢五分晚服一錢五分

火酒送下看人大小加減服之甚妙

黃白瘰癧散 治瘰癧瘡破久不收口

人參 三錢 黃芪 五錢 當歸 三錢 厚朴 一錢

河天奧旨

卷之十五

大雅堂

桔梗 一錢 白芷 一錢 雄雞 一錢 水煎服

瘰癧膏藥方 治內外瘰癧

白蠟 一兩 松香 一兩 銅錢 五分 豬油 二兩

乳香 一錢 輕粉 一錢 為末 先將豬油熬去筋入松香乳

香搗為膏隔紙藥先將油紙照瘡口畧大以鍼刺

數百孔後攤膏藥將紙背貼在瘡口上不須一日

即愈其瘡先用葱一株煎湯洗淨膿血後貼膏可

也一日換一個神驗

杏霜丹 治瘰癧經年累月不愈者

杏仁 去皮尖紙壓去 輕粉 五分 黃柏 炒末 一錢 將豬脊

髓搗和勻先取黃柏數錢煎水洗瘡口乾淨然後

將藥敷上外以絹包之三四日瘡即愈

歛瘡丹 岐天師傳治瘰癧不歛

馬屁勃 一兩 輕粉 一錢 三七根末 三錢 各為細末先用

葱鹽湯洗淨拭乾以前藥末傳之即愈

化癩仙丹 仲景公傳治濕熱變化癩風即大癩也

玄參 三兩 蒼朮 三兩 蒼耳子 一兩 蒲公英 一兩

桔梗 三錢 金銀花 二兩 水煎服每日作一服飲之不

河天奧旨

卷之十五

大雅堂

消一月而愈

三白膏 治內外瘰癧

白芷 六錢 白歛 六錢 白芨 六錢 當歸 六錢

黃連 六錢 黃柏 六錢 厚朴 六錢 五倍子 六錢

雄黃 六錢 沒藥 六錢 血竭 六錢 海螵蛸 六錢

黃丹 飛六錢 乳香 二錢 輕粉 一錢 已上各為末香油

熬熟調成膏貼之外用布包定有膿水去之常洗

藥水內加鹽洗之效

紅潮散 治濕毒瘰癧

紅蓮 一個 真輕粉 三錢 湖腦 一錢 共搗爛填滿瘡內

外用布包定七日開看瘡平而愈

止癢散 治有蟲癢癩瘡

活蝦蟆一個剝去皮乘熱貼之連換二三次其蟲

自出 仙方加麝香三厘擦在皮上貼之

隔紙膏 治久遠癩瘡頑瘡結毒

龍骨 二錢 血竭 五分 輕粉 五分 冰片 一分

阿膠 一分 乳香 一錢 沒藥 一錢 麝香 一分

黃丹 水飛 一兩 生芝蔴 搗末 一個 香油 兩 先將丹油芝蔴熬

湖天奧旨 卷之十五 大雅堂

數沸從下細藥隨起方下冰片麝香攪勻用甘草

煮油紙兩面扎孔貼之效

潮腦膏 治血風瘡一宿見效三月全好

黃連 一兩 白芷 五錢 輕粉 三錢 川椒 三錢

湖腦 二錢 共為細末用熟菜子油稠攤在一個大

碗底上倒合將瓦高支用艾四兩揉作十團燒熏

碗底上藥如油乾再添油拌再熏必待艾盡乘熱

搽在患處外用油紙草紙包之次日即消不過三

日神效

貝母散 治活人面瘡

貝母 五錢 為末 醋調稀填入人面瘡口內令滿塞

之次日即愈如少愈再填不過三次全愈

更有死人面瘡雖有口眼人面俱全奈不能動不

能食物故名死人面瘡待人家有死人裝棺材定

釘時定一下將瘡用手指按一下男用女按女用

男按如按二下問患人一聲瘡好了患人即答應

一聲好了好了待釘定聲止則止即愈

雄黃散 治禿瘡有蟲作癢痛者如神

湖天奧旨 卷之十五 大雅堂

雄黃 一錢 水銀 一錢 輕粉 五分 烟膠 五錢

枯礬 五分 右為細末用隔年臘月猪脂油調搽或

馬脂油更妙

皮油膏 治多年不好禿瘡如神

番木鱉子不拘多少用油煎枯去木鱉子加真輕

粉一錢枯礬三分一上即愈

三黃膏 治枝瘡神效

生大黃 三兩 為末 樟腦 一兩 五錢 黃丹 三兩 水

黃香 三兩 生猪油 兩 將猪油熬熟入餘藥化為膏

一大個貼於瘡上外用布纏緊神效

衛心仙丹 岐天師傳治受屈棒惡血奔心

大黃 三錢 當歸 一兩 紅花 三錢 桃仁 三十粒

生地 一兩 丹皮 三錢 木耳 三錢 白芥子 二錢 水煎服

一劑即惡血散

白蠟膏 專貼杖瘡神效

真白蠟 一兩 豬骨髓 五錢 潮腦 三錢 共入銚內熬成膏

用甘草煮油紙攤貼神效

活血紅花湯 棒瘡煎藥

洞天真旨

卷之十五

白蠟膏 活血紅花湯

大雅堂

紅花 一錢 蕪木 一錢 山梔子 一錢 黃柏 一錢

白芷 一錢 黃芩 一錢 桂皮 三錢 芍藥 三錢

川芎 二錢 甘草 一錢 桃仁 十四粒 當歸 五錢

乳香 一錢 沒藥 一錢 研細用酒二大鍾煎熱次入

童便一鍾再煎數沸次入乳香沒藥一滾就起就

服神效

又蓋體湯 仙傳治杖瘡神效

木耳 二兩 丹皮 一兩 蕪木 五錢 小蘗 五錢 水煎服

護心仙丹 仙傳外治作膏貼之

大黃 一兩 沒藥 三錢 白蠟 一兩 松香 五錢 乳香 三錢

骨碎補 五錢 當歸 一兩 三七根 三錢 敗龜板 一兩

麝香 五分 各為細末豬板油一兩將白蠟松香同

豬油在銅鍋內化開將各末拌勻為膏貼之油紙

布包輕者一個重者二膏足矣夾棍不須四膏神

效

膠粉散 治燕窩瘡

烟膠 一兩 燕窩土 三錢 輕粉 一錢 枯礬 五分 共為末

熟油調搽患處神效

洞天真旨

卷之十五

膠粉散 燕窩土

大雅堂

膠粉散 治羊鬍子瘡

烟膠 五錢 羊鬍鬚 一錢 輕粉 一錢 共為末濕則乾搽

乾則油調搽上即愈

又方

膽礬 二錢 瓜萋殼 燒灰 一錢 兒茶 一兩 末五分 共為細

末放上收口神效

鬼代丹 准繩主打着不痛

無名異 沒藥 乳香 谷研 地龍 去土

自然銅 醋粹 木鱉子 去壳 右為末蜜丸如彈大溫

酒下一丸打不痛

永硫散 治鈕扣風

硫黃 一兩 樟冰 二錢 川椒 二錢 生礬 二錢 共為末

先用白蘿蔔一個挖空其內將藥填滿後將原皮蓋之濕紙包三四層灰火煨半時許待冷取開同熱猪油調搽之愈

膠香散 治胎毒瘡

輕粉 一錢 白膠香 三錢 大風子肉 十五個 烟膠 二錢 右

為末用煎雞蛋黃調搽上即瘻加枯礬五分其效

洞天奧旨

卷之十五

大雅堂

草牛散 治癩頭胎毒

蝸牛 十枚 生甘草末 五錢 同搗火焙乾麻油調敷頭

上三日即全愈

膠髓膏 治癩眉瘡

輕粉 一錢 川椒末 五錢 烟膠 一錢 右為末將猪髓入

銚內煎熟末調搽上即愈

臘脂膏 治肺風瘡

大風子肉 二十個 木鱉肉 二十個 輕粉 五分

枯礬 五分 水銀 一錢 右研末用臘肉猪脂調搽于

面上一夜即愈

杏黃散 治赤鼻酒齶粉疵

硫黃 五錢 杏仁 去皮及雙仁者 輕粉 一錢 各研勻

臨臥時用蘿蔔汁調敷赤處七日愈貼粉疵一夜次早洗去一日即愈

二粉散 治婦女面生粉花瘡

定粉 五錢 輕粉 五分 枯礬 三分 為末用菜油調溶

于大磁碗底內勻開次用蕪艾一兩于炭火上燒

烟薰于碗內粉待艾盡為度覆地上出火毒逐早

洞天奧旨

卷之十五

大雅堂

搽面即愈

裙邊瘡即臙瘡也 仲景夫子傳

白蠟 三錢 松香 五錢 輕粉 三分 黃丹 五錢

銅綠 五分 猪板油 一兩 冰片 一分 各為細末同猪油

搗干下為膏先用油紙如瘡口大針刺眼孔數百

攤紙上將無藥一邊貼瘡口上以箬包之一日一

換未貼前葱一條煎湯洗之連用五個即愈虛用

八珍湯

大風膏 治裙邊瘡一名褲口風瘡

大風子一百 枯礬五分 川椒末一錢

輕粉一錢 用真桐油調搽即愈

痔漏驗方 治痔漏多年不愈及痔漏脹服風下血

者皆驗

龜板四兩 蘇甲四兩 酥兩 川山甲一兩 土炒

刺蝟皮一兩 白茯苓兩 地榆皮兩 金銀花兩

歸尾一兩 槐花一兩 黃牛角一兩 酥兩 酥油兩

牡蠣一兩 馬兜鈴兩 五倍子一兩 象牙末五錢

白木五錢 炙甘草錢 健豬前蹄嫩肉兩

洞天奧旨 卷之十五 痔漏方 世傳之 大雅堂

枳實一兩 推車七兩 黃連一兩 各為細末

用饅二條重一斤煮爛去骨加白麵少許同搗為

丸每日早中晚服三四錢忌房事椒蒜一切發物

重者一料全愈

世傳方 治痔漏

水片一分 麝香五厘 蝸牛一個 連壳搗碎入前藥

加熊膽一分 用井水化開三味入木內用雞翎拂痔

上數次即止疼忌生冷魚腥煎炒陰漏不治

護漏湯 林天紫傳

用屎蟻螂一個 焙為末 以飯粘展成條先將猪棕探管

之淺深然後將此藥條條入管內其管即退生肌

矣神驗

補漏丹 長桑公仙人傳治痔漏

大龜一個 茯苓八兩 羊後蹄爪一對 蘇甲一兩

槐米二兩 薏仁三兩 瓦礫一兩 白木土炒

神麩三兩 先將各藥為末將龜用綿紙同各末包

好一日則龜必死矣如未死又將藥末同包好以

死為度取出火炙為末同藥末為丸每日臨時白

洞天奧旨 卷之十五 補漏丹 青苔散 全生丸 大雅堂

滾水送下三錢不必半料全愈水濕去而毒氣自

散漏瘡自愈何用刀針掛線哉

青苔散 仲景夫子傳治濕熱成痔作漏

青苔三錢 羊後爪壳三兩 白木三兩

茯苓三兩 白芷二兩 槐米一兩 米飯為丸每日服

一錢二月即消管

全生丸 祖傳 治多年痔漏如神

白芷四兩 槐子四兩 川山甲陳壁土炒 蘇甲炒

蜈蚣二條 全蝎去足勾炒 黃陳米煮飯搗為丸每

日服三錢白滾水下服完漏管自消不用刀針掛
線之多事真神奇也忌房慾鷄肉茄地上終身不
可行走

太倉公方 治痔

皮硝 三錢 瓦葱 三條 青苔 一錢 煎湯洗之一連洗

七日至愈陰囊濕與腿濕俱以此方洗之神效

無花湯 洗痔效

無花菜葉煎湯燻洗止痛甚效

乳香膏 專貼痔漏如神

洞天奧旨

卷之十五

大雅堂

大雅堂

茱萸 二錢 白芨 二錢 白欬 二錢 黃連 二錢

黃柏 二錢 當歸 二錢 黃丹 二錢 乳香 一錢

輕粉 三分 冰片 少許 香油 四兩 用柳枝煎枯入藥

煎枯濾淨再數沸入黃丹次乳香輕粉攪勻次入

冰片用磁礮收貯用薄油紙甘草煮之揉攪攤貼

先洗次貼生肌長肉止痛甚妙

南陽張真人方 治痔漏

人指甲 瓦上炒 槐花 炒黃 人腳指甲 瓦上炒

牛腳踏 一付用 蟬退 炒乾 壁虎 三條 瓦對合炒兩

乾川山甲 一兩 蜈蚣 七條 地榆 六錢 防風 一錢

枳殼 一兩 黃柏 四錢 甘草 四錢 俱為細末每早

三錢午刻二錢夜二錢五分俱用生酒送下忌椒

薑牛雞鵝肝腸酒糟燒酒尤忌房事

護痔散 護痔外好肉

白芨 大黃 黃柏 苦參

寒水石 葶苈粉 各等分 為細末熟調塗好肉上

妙

槐角丸 治痔漏下血

洞天奧旨

卷之十五

大雅堂

大雅堂

槐角 二兩 當歸 一兩 防風 一兩 枳殼 一兩

黃芩 一兩 酒地榆 五錢 右為末酒糊丸桐子大每

服五六十丸空心酒或白湯送下效

槐蓼散 治腸風痔漏下血有驗

槐蓼 炒六分 生地黃 酒拌蒸 青皮 六分 白朮 六分

炒荆芥 六分 川芎 四分 升麻 一錢 當歸 酒浸 一錢 各為末每

服三錢空心米飲送下煎服亦妙

水沉膏 治痔毒著痛

白芨不拘多少為細末用水沉底去水將藥敷在

瘡週圍紙蓋如乾再水潤之

藥線方 治齒路如神

用芫花皮作線繫根一二日自落如未落以刀去之以銀熱烙之其血即止最妙

張真君傳 異方治頑癬

蝦蟆 一個口內入雄黃一錢外用芫

冰片 三分 輕粉 一錢 好茶葉 三錢再研為細末油搽

調上覺少疼即腫起無懼三日平復如故而頑癬

脫落矣遍身不可一時並搽愈了一處可也

洞天奧旨 卷之十五 藥線方 張真君傳 大雅堂

頑癬方 治白殼瘡即頑癬

羊蹄根枯白礬搗汁入米醋少許調搽之一二次

效

岐天師傳方 治牛皮癬

杜大黃根 鮮者一兩搗碎日日用水片三

麝香 三分 練樹根 一錢 蝸牛 十八 白礬 二錢

生甘草 一錢 蚯蚓糞 五錢 各為細末搗蝸牛內敷之一

月即全愈至神之至

陀僧散 治汗斑如神

蜜陀僧 細末 白砒 一錢 枯礬 五錢 硫黃 一分 羊蹄根

汁對半調搽一次即黑二次即愈

丁香散 治鼻瘰神驗

苦丁香 七個 枯礬 五分 輕粉 五分 將鼻中瘰肉鉞破

用此藥末點搽即愈

化瘰丹 治鼻瘰鼻痔

雄黃 五分 枯礬 五分 苦丁香 三錢 鮮的取汁 右末調

稀搽在患處妙一方加輕粉細辛大膽調

粉香生肌散 治瘰指印傷

洞天奧旨 卷之十五 陀僧散 大雅堂

輕粉 一錢 乳香 一錢 沒藥 一錢 黃丹 二錢

赤石脂 五錢 寒水石 三錢 各為末濕則乾搽乾則油

調最妙

槐花湯 治鵝掌風

槐枝花熬煎湯以手薰之及熱後將瓦礬搽之過

一會以水洗之又薰又搽每日三五次不過三二

日全愈神速瓦礬無有用瓦草亦效

又方

研硝末 三錢 桐油調勻塗入患處火烘之不二次妙

硫糕丸 疥瘡多年治不效一家數口俱害多致瘦

弱不必搽藥止服此藥甚效

硫黃精明的一兩 爲細末用米糕爲丸桐子大共三兩

重上體疥多食後荆芥湯送下五六十九下體疥

多食前下一人要服硫至一兩必效

伯高太師方 治疥瘡

茵陳蒿兩 苦參一兩 煎水一銅畧冷洗之立瘥

歸防湯 世傳治表消疥瘡煎藥神效

當歸一錢 防風一錢 蒼朮一錢 川芎一錢

洞天奧旨

卷之十五

補種丸 伯高太師方

三

大雅堂

生地一錢五分 荆芥一錢 苦參一錢 甘草三分

赤芍一錢 連翹一錢 白芷八分 清水煎十服爲度

蒼水瘡 治小兒黃水瘡濕熱結于皮上也 仲景

公傳

石膏一兩 雄黃一兩 各研細末砂鍋煎湯候冷洗

之一日即愈神方也以五苓散內治亦佳

洞天奧旨卷之十五終

洞天奧旨卷之十六

山陰陳志鏗教之甫號煥者 曾孫陳鳳 曾孫陳維 曾孫陳維 曾孫陳維

會稽陶式玉尚自前號存齋評 立孫增方 湖涸民校

雄黃燈 治坐板瘡

用舊青布一條如以雄黃末一錢油調入布內爲

拈子燈上點着吹滅以火頭熱觸于瘡頭瘡處不

過一二次即愈

苧蘿散 治坐板瘡甚驗

洞天奧旨

卷之十六

雄黃燈 苧蘿散

大雅堂

馬齒莧一把即 蘿種一枝 各爲末搽患處立愈并

治諸瘡出水敷之俱妙

又方

用磚一塊 硫黃末一錢 舖于磚上以好醋沃之以布

一方墊之令坐于瘡上烙之更妙

世傳 治坐板瘡方

輕粉二錢 石膏飛過 共爲細末燈油調上一二次

即愈

張真君方 治大麻風

蒼朮一斤 蒼耳子三兩 各為末米飯為丸如梧子大
日三服每服二錢服一月即全愈無忌止忌房事
三月犯則不可救矣

白鹿洞方 治大麻風眉毛脫落手足拳攣皮肉潰爛唇翻眼紋口歪身麻肉不痛癢面生紅紫之斑並治如神

大風子肉四兩 明天麻四兩 川防風去蘆四兩

漢防已四兩 大何首烏四兩 忌鐵好苦參淨四兩

川當歸淨六兩 赤芍藥六兩 白菊花四兩

洞天奧旨

卷之十六

秘傳養真蘇丹

二

大雅堂

香白芷四兩 大川芎二兩 獨活二兩 山梔仁二兩

連翹淨二兩 白蘇二兩 蘇薄荷二兩 金頭蜈蚣炙去頭足二兩

全蝎三兩 洗 蠶蠶炙去足六兩 蟬蛻去足六兩 川山甲二兩

斷蛇八兩 酒 狗脊四兩 去 共為末酒糊為丸桐子

大每服七八十九空心好酒送下臨臥再一服忌

氣怒房事酒膩煎炒雞魚蝦蟹芋頭山藥精魚肉

鷄生冷春酸食冬冷物然冬月亦不可烘火止宜

綳煖淨室坐定保守性命節飲食斷妄想如服藥

時宜仰卧令藥力通行有功如不守禁忌徒勞心

力亦無效也服此藥止宜食鴨鰾牛肉俱當淡食
秘傳漆黃蟾酥丹 治大麻風瘡

鮮蟬斤四斤 真生漆一斤 真蟾酥二兩 真雄黃二兩 先將磁

罈裝蟬次入漆封口埋在土中二七日足方取開

看二物俱化成水去滓淨將水入鍋慢慢火煮乾

焙為細末方入雄黃蟾酥二味末攪勻磁罈收之

每日空心臨臥各一服好酒送下一二錢不過一

月其瘡全好除根妙不可言治大風如手取之妙

况所費不多莫輕忽修合亦勿妄傳非人秘之

洞天奧旨

卷之十六

治大風方

三

大雅堂

洗大風方

用蒼耳草煎湯少加朴硝浴之更妙

生眉散 治大風生眉毛

皂角針焙乾 新鹿角性 各等分為細末薑汁調

塗一日搽一二次不數日眉即生矣

片根散 治喉閉乳蛾

冰片二分 雄黃一錢 山荳根一錢 見茶一錢

青礪五分 枯礬五分 共為細末吹之如神

太倉公蜂房散 治喉癰腫痛

露蜂房燒灰 一分 冰片 二厘 白僵蠶一條 乳香二 爲細末

吹喉即安

倉公壁錢散 治喉生乳蛾

壁錢 七個 白礬 三分 水片 一分 兒茶 三分 各爲末

包禁燒灰爲細末竹管吹入喉立愈

救喉湯 岐伯天師傳治雙蛾喉大作痛口渴求水

下喉少快已而又熱呼水此乃纏喉風也乃陰陽二

火並熾上冲作祟

射干 一錢 山豆根 二錢 玄參 一兩 麥冬 五錢

洞天奧旨 卷之十六 大雅堂

甘草 一錢 天花粉 三錢 水煎服倘服之而藥不能下

喉者刺少商穴尚欠親切用刀直刺其喉腫之處

一分則喉腫必少消急用吹藥開之吹藥方名啓

關散

啓關散

麝香 一分 牛黃 一分 皂角 燒灰末 麝香 三厘

水片 一分 爲絕細末和勻吹入喉中必大吐痰而

快可用湯藥矣

化癰神丹 治喉生癰瘡先癢後痛久不愈者

玄參 一兩 麥冬 一兩 五味子 三錢

甘草 一錢 鼠黏子 一錢 百部 三錢 紫苑 二錢

白芥子 二錢 水煎服先服六劑再服潤喉湯全愈

倉公 治喉癰方

百部 一兩 款冬花 一兩 麥冬 二兩 桔梗 三錢 各爲細

末蜜煉爲丸如芡實大啣化日三九一月蟲死癰

愈

潤喉湯

熟地 一兩 山萸 四錢 麥冬 一兩 生地 三錢

洞天奧旨 卷之十六 大雅堂

桑白皮 三錢 甘草 一錢 貝母 一錢 薏仁 五錢 水煎多

服數十劑必愈久則加肉桂一錢更爲善後妙法

伯高太師傳方 治指上生天蛇頭瘡

蜈蚣 一條 麝香 半分 白芷 三錢 共爲末燒烟熏之

即愈

雄黃解毒散 治天蛇毒疔初起紅腫發熱疼痛至

心

雄黃 二錢 蟾酥 二分 水片 一分 輕粉 五分 爲末新

汲水調塗紙蓋日用三次極效

解蛇油 治蛇窠瘡生于皮毛作痛并治諸惡瘡

用蜈蚣不拘多少入真香油磁瓶收貯搽之不二

次即愈

治蜘蛛瘡

先用苧麻絲搓瘡上令水出次以雄黃枯礬等分

末乾搽之妙

泰公傳方 治楊梅風毒

土茯苓三斤生黃芪一斤當歸八兩先用水三十碗將

土茯苓煎湯二碗取黃芪當歸拌勻微炒乾磨為

洞夫與旨

卷之十六

治蜘蛛瘡泰公傳方

六

大雅堂

末塞為丸每日白滾水送下三錢一料即全愈新

病二料全愈不再發

劉氏經驗方 綱目治楊梅毒瘡

膽礬 白礬 水銀研不見星為度等分入香油津

唾各少許和勻坐帳內取藥塗兩足心以兩手心

對足心摩擦良久再塗再擦盡即臥汗出或大便

去垢出穢涎為驗每次強者用四錢弱者二錢

連用三日外服疎風散并潔洗

世傳 治楊梅毒瘡

皂角刺 七根杏仁 七個 肥皂子 去殼取肉七個

廬蘇 七個 蟬蛻 七個 紅花 五錢 當歸尾 一兩

土茯苓 八兩 磁瓦刮去皮土木器槌碎以上共一處

用砂鍋一個井河水各三碗煎至三碗早中晚各

服一碗服二十劑全愈永無後患忌茶葉酸鹹

全陽方 治前陰爛落

金銀花 半斤 黃柏 一兩 肉桂 二錢 當歸 三兩

熟地 二兩 山茱萸 錢三 北五味 錢一 土茯苓 四兩 水五大

碗同浸乾為末每日滾水調服一兩服完前陽不

洞夫與旨

卷之十六

全陽方土茯苓湯

七

大雅堂

爛如爛 去半截者重生

土茯苓湯 治楊梅毒結毒林中丞傳

土茯苓 二斤 雄豬油 四兩 銅沒藥 二錢 初次水

七碗煮四碗二次水四碗煮二碗三次水二碗煮

一碗共七碗去渣并油將湯共盛磁鉢內露一宿

次日作三次溫服忌茶酒油蠶醬醋雞魚鴨海

味等物只吃大米飯蒸糕滾水下餘物一切不可

用三七日全愈

末藥方

防風 五錢 荆芥 五錢 何首烏 五錢 苦參 五錢

花粉 五錢 肥皂子白肉 二兩 五錢 右為細末用煎開

土茯苓猪油加末藥二錢同煮

鬼真君傳方 治楊梅瘡

黃芪 五兩 生甘草 一兩 土茯苓 四兩 茯苓 五兩

白朮 五兩 當歸 五兩 大黃 八錢 石膏 五錢 水十碗

煎二碗分作三次服二劑毒自從大便出倘疔瘡

已出而楊梅未生急加入大柴胡三錢同上藥煎

服二劑亦愈蓋瘡因虛而得自當治其虛而加之

洞天奧旨 卷之十六 鬼真君傳方 風癩 八 大雅堂

去毒之品自然奏功如神奈世人以敗毒劫之而

忘其補法所以天人性命也

風藤散 治結毒

人參 當歸 赤芍 甬刺

木瓜 木通 甘草 白芷

生地 皂子 花粉 金銀花

白蘇皮 薏苡仁 青風藤 各等分 每劑五錢加

巴焦根四兩土茯苓四兩水四碗煎至三碗一日

二次服之重者只三劑而愈如神不拘新舊俱妙

張真君方 治結毒鼻柱將落主可全之

人參 一兩 麥冬 三兩 金銀花 三兩 蘇葉 五錢

桔梗 一兩 生甘草 一兩 水五碗煎一碗一劑即聞香

臭而不落矣蓋楊梅之毒雖是毒氣結成然亦因

虛極致之故用人參麥冬諸補氣血之藥于散邪

解毒之內所以奏功如神也

不疼點藥

真輕粉 一錢 杏仁皮 一錢 冰片 三分 共為

末鵝膽汁調搽即愈

洞天奧旨 卷之十六 不疼點藥 治楊梅瘡 九 大雅堂

治楊梅瘡方

真輕粉 三分 冰片 二分 兒茶 五分 黃柏末 二錢 右

口鼻用川椒湯漱洗搽之在下用五根湯洗燻畢

搽之如神

黃床散 準繩治腎臟風癢不可當

吳茱萸蛇床子等分煎湯洗之神效

五根湯

葱根 一兩 韭菜根 一兩 槐根 一兩 地骨 一兩

土茯苓 一兩 煎水先燻後洗畢點煎藥效

張真君方 治疔瘡

見茶 珍珠 鏡粉 各二錢 輕粉 五分

牛黃 三分 血竭 三分 水片 二分 各為細末先水洗

淨後浸藥 神效

秦真人方 治疔瘡

見茶 一錢 黃柏 炒一錢 水銀 半錢 輕粉 一分

生梔子 五分 水片 三分 各為細末以不見水銀為度

敷在患處 數次即愈再用後藥

金銀花 一兩 當歸 五錢 蒲公英 五錢 生甘草 二錢 水煎空

洞天奧旨 卷之十六 伯高祖師方 勝金散 大雅堂

服內外合 治尤易愈也

伯高祖師方 傳治玉莖瘡爛

絲瓜連子 搗汁和五倍子末蚯蚓糞焙乾香油調

搽之神驗

勝金散 準 繩治下疳潰爛疼痛

黃連 五分 黃柏 五分 輕粉 五分 銀珠 五分

見茶 五分 水片 一分 為細末香油調搽

齒痛瘡方 齒時有傷成瘡作痛

用生肌散 將舊棉花托一二分入瘡內過夜即愈

或搗飯內塞之亦妙生肌方載在前

玉粉散 治胎毒濕皮膚瘡

滑石 桂府粉包 一兩 水飛過 甘草 三錢 水片 二分 共為細

末搽之瘡上即愈

雜與湯 鄧筆峯傳治楊梅瘡

冷飯團 二兩 五加皮 三錢 皂角子 三錢 苦參 三錢

金銀花 一兩 兩世錯用一錢 今好酒煎日一服一月

全愈忌鐵器

劉寄奴散 準 繩治便毒

洞天奧旨 卷之一 劉寄奴王 不隔行大黃金銀花木鱉子右等分酒

水煎露宿 一夜五更服

又方 治便毒初起

射干 二寸 生薑如指大搗細右取順流水煎微沸

服之以瀉為度

消毒散 準 繩治便毒初發三四日可消

皂角針 金銀花 防風 常歸

大黃 甘草節 瓜蒌仁 各等分 右咬咀水酒

各半煎食 前服頻提掣頂中髮立效

化魚湯 仲景真人傳治結成便毒魚口

大黃 一兩 金銀花 五兩 蒲公英 五錢 歸尾 一兩

荆芥 三錢 水二碗煎一碗服二劑即消

化毒救生丹 張真人傳治頭面無故生瘡第一日

頭面重如山 二日即青紫三日身亦青紫服春藥而

毒發于陽者 第一日即用此方可救

生甘草 五錢 金銀花 八兩 玄參 三兩 蒲公英 三兩

天花粉 三錢 水十餘碗煎四碗口三次服可救否則

一身盡青而死

洞天奧旨

卷之一六

化魚湯 生瘡毒丹

三

大雅堂

蝟膏水 仲景夫子傳治頭上生瘡作癩或胎毒成

癩頭

蝟牛 十條 生甘草 三錢 冰片 三錢 白礬 一錢 盛在磁

碗內露一宿蝟牛化為水鴨翎掃頭上三日愈

黃水瘡方 仲景夫子傳方更妙

蘆艾 一兩 燒灰存性為末瘡加枯礬五分搽上即

愈

又方

雄黃末二錢砂礮內熬水洗之即愈神效

栢葉散 治三焦火盛致生火丹作癢或作痛延及

遍身

側栢葉 炒黃為末五錢 蚯蚓糞 五錢 黃栢 五錢 大黃 五錢

赤苳 三錢 輕粉 三錢 共為細末新汲水調搽

枯癩方 治癩初起成形未破者及根蒂小而不散

者

白砒 一錢 礮砂 一錢 黃丹 一錢 輕粉 一錢

雄黃 一錢 乳香 一錢 沒藥 一錢 礮砂 一錢

班貓 二十個 田螺大者去殼三枚曬乾切片共研極

洞天奧旨

卷之十六

栢葉散 枯癩方

三

大雅堂

細糯米粥調安捏作小棋子樣曬乾先灸癩頂三

炷以藥餅貼之上用黃栢末水調蓋敷藥餅候十

日外其癩自然枯落次用歛口藥

秘傳 歛癩膏

血竭 一錢 輕粉 一錢 龍骨 一錢 海螵蛸 一錢

象皮 一錢 乳香 一錢 雞蛋 十五枚煮熟用 黃熬油 一小鍾 以上各

為細末共再研和入雞蛋油內攪勻每日早晚甘

草湯洗淨患上然後雞翎蘸塗膏藥蓋貼

陰尸疔方 治陰尸作癢作痛生疔生蟲

猪肝一具切長條 雄黃一錢 枯礬五錢分 輕粉一錢

將肝條水滾一二滾取出藥均入陰尸內一二時再換不三五次蟲出即愈

護陰丹 治陰外中生瘡

桃仁三兩搗爛 蛇床子為末一兩絹綾做一長袋如勢

大泡濕將藥裝入袋中納入陰尸內神效

止癢殺蟲湯 仲景夫子傳治婦人陰中生瘡長蟲痛癢難受

蛇床子一兩 苦參一兩 甘草五錢 白薇五錢 水五碗

洞天奧旨

卷之十六

護陰丹 止癢殺蟲湯 治 六桂堂

煎三碗將陰尸內外洗之另用綫一尺縫如勢一條將藥渣貯于中乘濕納于陰之內三時辰蟲盡

死矣內用小柴胡湯加梔子三錢苦棟根三錢茯苓五錢煎服不服亦得

完體續命湯 岐天師傳救殺傷而氣未絕或皮破

而血大流或肉綻而腸已出或箭頭入膚或刀斷臂指死生頃刻

生地三兩 當歸三兩 麥冬三兩 玄參三兩

入參二兩 生甘草三錢 三七根末五錢 續斷五錢

地榆一兩 乳香末三錢 沒藥末三錢 劉寄奴三錢

花堇石末二錢 白朮五錢 水煎調末服一劑口渴止二劑瘡口閉三劑縫生四劑全愈矣真神奇之至

補血救亡湯 伯高太師傳救殺傷危亡諸症

玄參二兩 生地四兩 黃芪四兩 當歸二兩

地榆四錢 荆芥炒黑木耳二兩 敗龜板二兩

水二十碗煎汁五六碗恣其酣飲蓋刀刃之傷必大流血無不渴者飲水有立刻亡者若飲此湯則渴止而瘡口亦閉又無性命之憂真神方也

洞天奧旨

卷之十六

補血救亡湯 治刀傷損 大雅堂

芡膏散 濟急方治刀斧傷損

白芨一兩 石膏煨一兩 為細末搽之亦可收口 治刀傷損骨止有皮連者

生明礬一錢 生老松香一錢 各等分研極細放于布包止以藥裹即止痛生肌錢又選傳勿令水風犯之

金刀傷方 用小猪歛出來子腸一條陳石灰二兩苧葉一兩

龍骨三錢共搗爛作餅乾為末搽之即止血合口 又方

端午日採百草搗爛取汁拌古石灰內藏之乾則

研為細末搽傷處即止血止痛生肌且無癢痕

岐伯天師傳方 治金瘡

陳年石灰四兩三七根二兩各為末敷上即止血

生肌

又傳方 治金瘡出血又可治脚縫出水

花蕊石研末三七根末硫黃末各等分和勻再研

敷上即合仍不作膿又止痛止血如神

末類鈴方 治金瘡出血不止

洞天奧旨

卷之十六

又方 治金瘡出血不止

去

大雅堂

紫蘇葉桑葉同搗貼之自止

火燒瘡方

黃蜀葵花不拘多少去蒂心淨不用手取恐手汗

汚之真香油浸之令勻雖數年更妙逐年油少添

油花少添花搽上立止痛生肌水涼自在任他結

痂不可揭動就火藥燒壞亦可救內服泄火毒藥

更效亦治湯瀝如神

蚌津散 治湯泡火燒甚效

取水中大蚌置大碗中任其口開用水片二三分

當門麝二三分研末挑入蚌口內即漿水流入碗

內再加水麝少許用雞翎掃傷處先外而內遍掃

隨乾隨掃涼入心脾便不痛而愈如所掃之處不

肯乾必潰爛將蚌殼燒灰存性為末入水磨少許

搽之妙

太倉公方 治湯火神效

井中青苔研爛敷湯火傷灼瘡上立止痛而愈

秦真人方 治湯火傷

大黃一斤 古石灰 八兩 滑石 四兩 各為細末麻油

洞天奧旨

卷之十六

又方 治湯火傷

大雅堂

調敷患處即止痛生肌且無癢記

凍瘡方 治凍瘡破爛

不拘手足面上凍瘡成瘡癢痛不一者如神用麻

雀腦子塗之立瘡瘡腦子加熱酒洗更妙

又方

乾狗糞白者燒灰存性為絕細末麻油調敷數次

即愈

箭鏃瘡方 治毒箭及箭鏃入骨不能得出即不可

按動恐其骨傷

用巴豆一粒炮去殼勿焦活蟻螂一個同研爛塗在傷處須更痛定微癢極難忍之時方可拔動取出鐵立瘡

又方
取數年陳腌臘猪腿肉骨頭火炙取骨內之油雞翎將骨油掃在箭傷之處必瘡不可當少頃其箭頭必透出

張真君六神散 治折傷最驗

當歸 五錢 續斷 五錢 骨碎補 五錢 牛膝 五錢

桃仁 五錢 金銀花 五錢 黃酒 二碗煎一碗空心服不

洞天奧旨

卷之十六

大雅堂

拘輕重服數劑永無後患

倉公方 治骨傷折痛

用葱 一斤 入乳香 兩 同搗勻厚封傷處立止痛

太倉公傳方 治跌扑經月瘀血作痛

水蛭 炒黑研 當歸 兩 桃仁 十四粒 赤芍 五錢 水煎服

一劑即止痛

定痛散 治跌打損傷骨折疼痛等症

麻黃 燒存性 一兩 頭髮灰 一兩 乳香 五錢 共為細末每三錢

溫酒調服立瘥

葛真君傳方 稚川治跌傷神效

灼過敗龜 一個 大黃 一錢 生地 五錢 桃仁 廿個

紅花 一錢 歸尾 三錢 一服即止痛

岐天師全體神膏 治接骨神效

當歸 二兩 生地 二兩 紅花 二兩 續斷 一兩

牛膝 一兩 地榆 一兩 萹草 一兩 小薊 一兩

木瓜 一兩 人參 一兩 川芎 一兩 劉寄奴 一兩

白木 一兩 黃芪 一兩 甘草 五錢 杏仁 三錢

柴胡 三錢 荆芥 三錢 皂角 二錢 麻油 三斤 熬數沸

洞天奧旨

卷之十六

大雅堂

瀝去渣再煎滴水成珠加入飛過黃丹末一斤四

兩收為膏不可太老再用乳香 三錢 沒藥 三錢

自然銅 醋煅燒七次 三錢 花蕊石 三錢 血竭 五錢

白蠟 一兩 海螵蛸 三兩 為細末乘膏藥未冷投入收

勻盛之攤膏須重一兩再用勝金丹

麝香 三錢 血竭 三兩 古石灰 二兩 海螵蛸 一兩

自然銅末 一錢 如前製 乳香 一兩 沒藥 一兩

樟腦 一兩 人參 一兩 兒茶 一兩 三七 一兩

木耳灰 一兩 花蕊石 三錢 象皮 三錢 冰片 一錢

地風一錢 土鱉一錢 琥珀一錢 紫石英二兩

土狗十個 生甘草末五錢 和勻以瓦罐盛之每膏一

個用末三錢摻在上貼之重者二個輕者一個即

痊更奇絕

止血散 凡刀瘡口破裂血出不止用此搥之血即

止

血竭二錢 沒藥五錢 龍骨五錢 燈心一

蘇木二錢 桔梗五分 降真香四錢 當歸三

雞一隻連毛尿煮醋熟爛搗作團外以黃泥固濟

洞天奧旨 卷之十六 接骨至神丹 大雅堂

以文武火煨乾為末入後藥紅花要馬頭者二錢

焙為末共為細末每用乾搥瘡口以止其血候乾

少將熟油瘡上效

逐瘀至神丹 岐伯天師傳治跌仆斷傷受困

當歸五錢 大黃二錢 生地三錢 赤芍藥三

桃仁一錢 紅花一錢 丹皮一錢 敗龜板一錢 水一

碗酒一碗煎服一劑即可去病倘手足斷折以杉

板夾住手足扶正湊合妥當再用折骨至神丹為

妙方中再加枳殼一二錢尤佳

接骨至神丹 岐伯天師傳治接骨如神

羊躑躅三錢 炒黃大黃三錢 當歸三錢 芍藥三

丹皮二錢 生地五錢 土狗十個 土虱三十個

紅花三錢 自然銅末先將前藥酒煎然後入自然

銅末調服一錢連湯吞之一夜生台神奇之至不

必再服二劑止服三劑可也必骨中瑟瑟有聲蓋

彼此合縫實有神輸鬼運之巧

治破傷風方

用糞堆內蟻蟻蟲一個將手捏住脊背待他口中

洞天奧旨 卷之十六 治破傷風方 大雅堂

吐出水來塗在瘡口上即覺渾身麻木汗出即活

此神方也

倉公治破傷風方

蜈蚣研末 麝香半分 擦牙吐去口涎即瘥

榆根散 雷公真君方治虎咬傷血大出潰爛疼痛

地榆一斤為末 三七根末三兩 苦參末四兩 和勻凡虎咬

傷急用猪肉貼之隨貼隨化連地榆等三味末摻

之隨濕隨摻即止而痛即定奏功實神

班貓散 治風犬咬傷效如神

班貓炒去足翅同米熟雄黃各等分共為細末濕酒調送神效去紅髮說在前

青苔散 伯高真君傳犬咬

地上青苔以手抓之按于犬咬處即止痛

治鼠咬瘡方

用猫尿洗之瘡取猫尿以生薑搗爛一撮敷在猫鼻子上即出

麝香錠子 治蜈蚣二十七般毒蟲咬瘡腫痛不已

神效

洞天奧旨

卷之十六

治諸瘡毒

三

大雅堂

麝香 二錢 雄黃 二錢 乳香 二錢 硃砂 二錢

土蜂窩 一個 露蜂窩 一個 燒灰存性右為細末米醋糊

為錠子如遇此等傷瘡磨塗之即瘡如有惡瘡疼

痛不已亦以此塗之更妙

治毛蟲咬

以蒲公英根莖白汁傳之立瘡

中蜘蛛毒咬瘡方 用大藍汁麝香雄黃和之隨愈

人一身生蛛絲不知人事者以艾烟薰之以羊乳

灌之立瘡

治毒芒刺喉瘡方

先以亂絲或絨扎于如意骨上如無則以柳條刮淨以火逼彎如意樣以絲絨扎上入喉中上下攪之待取出芒為妙後以青黛吹之效

誤吞針鈎有線者

即以汗衫竹節子穿在線上推的竹節只抵鈎子根以線硬倒往裡推其鈎即出為妙

治面上惡瘡五色方 藥性論

用鹽湯浸解搗瘡上五六度即瘡

洞天奧旨

卷之十六

治諸瘡毒

三

大雅堂

治蚯蚓毒 經驗方 形如大風扇唇皆落或身如蚯蚓鳴

濃煎鹽湯浸身數遍即愈

治諸瘡瘻肉如蛇出數寸 聖惠

硫黃 一兩 同土薄之即縮

治纏脚生瘡 摘玄方

荆芥 燒灰葱汁調傳先以甘草湯洗之

普濟方 治一切疥瘡

荆芥 一兩 生地黃 半斤 煎汁熬膏和九椰子大每服

生地黃 半斤 煎汁熬膏和九椰子大每服

三十五九茶酒任下一料服完自愈

談楚翁試驗方 治婦人面生粉花瘡

定粉 五錢 菜子油調泥盤內用艾一二團燒烟薰

之候烟盡覆地上一夜取出調搽永無癩痕亦易

生肉

孫真人方 治馬咬成瘡

益母草切細和醋炒塗之

千金方 治毒攻手足腫痛欲斷

蒼耳葉搗汁漬之以渣傅之立效春用心夏用葉

洞天奧旨

卷之十六

治毒攻手足腫痛欲斷

大雅堂

秋冬用子

聖惠方 治頭風白屑

王不留行香白芷等分爲末乾糝一夜篋去

肘後方 治惡瘡痂後癢痛

扁竹 即蒿 搗封痂落即瘥

掃癩丹 千金方治惡瘡似癩十年不愈者

葇荍子 三錢 燒研細末傅之即愈

摘立方 治唇裂生瘡

瓦花生薑入搗少許搗塗

鵝掌油 準繩治脚縫爛瘡

鵝掌皮 燒灰 爲末傅之以桐油塗亦妙

魚脂膏 準繩治白駝

用銀鱗魚脂擦駝上微痛以魚脂塗之一上即愈

又方

用蛇蛻 燒末 醋調敷上神效

豈根散 治癬瘡

用山豈根末數月猪脂調塗之

半夏散 但準繩治一切癬

洞天奧旨

卷之一

治癬瘡

大雅堂

右以半夏 三兩 搗爲末以陳醬汁調和如糊塗之

兩三度即瘥云用生半夏更妙

綠雲散 準繩治灸瘡止痛

柏葉茅茶葉 端午午時採不拘多少陰乾右爲

細末每遇灸瘡作疼水調紙上貼之養膿止痛

去毒散 準繩治蛇傷解蟲毒神效

五靈脂 兩 雄黃 五錢 爲末塗患處良久後灌二錢

神效

輕粉散 仲景公傳治豚瘡痛癢流水流血

序

明劉誠意伯言藥不對證狂死者多余會祖若谷公秘集云癰疽無一死證而諸書所載患生何處病屬何經故治乳岳而用養羊犀角治橫痃而用生地防己治癩癧惡核而用夏枯連翹藥不論陰虛陽實唯憑經施治以致乳岳橫痃成功不救癩癧惡核潰久成怯全不悔憑經之誤夫紅癰乃陽實之證氣血熱而毒滯白疽乃陰虛之證氣血寒而毒凝二者以開膿裏為要膿裏一開紅癰毒平痛止白疽寒化血行彼憑經而失證治者初以為藥之對經而實背證也世之患陰疽而斃命者豈乏人乎如以陰虛陽實分別治之癰疽斷無死證矣余會祖留心此道以臨危救活之方太忠初起立消之藥一一筆之於書為傳家珍寶余幼讀之與世諸書治法迥別歷證四十餘年百治百靈從無一失因思癰疽癩癧施治久編天下分別陰陽兩治唯余一家特以祖遺之秘自己臨證並藥到病瘳之方精製藥石之法和盛托出盡登是集並序而梓之以質諸世之留心救人者依方修合依法泡製依證用藥庶免枉死使天下後世知癰疽果無死證云爾乾隆五年歲在庚申仲春朔日林屋王維德洪緒氏書

外科證治全生序

一

凡例

一癰與疽之治截然兩途世人以癰疽連呼並治夫癰疽二字之連呼即夫妻二字之連呼也若以癰藥治疽猶以安胎之藥服其夫矣是集以癰疽分別兩治皆對證施方之治法如照法泡製照證用藥救人之功余不敢分害人罪余當獨認情願薄劫披毛甘受屠家誅戮

一輯是集專論陰虛陽實認定初起紅白兩色是癰是疽治即全瘳所載諸方皆藥到病瘳切勿增減逐證治法開卷了然不必授師人人可精此道

外科證治全生凡例

二

一諸書惟馮氏錦囊內附陰疽論與余家遺秘相符獨無消疽之方惟以溫補兼托為法且疽初起如即平塌安可用托托則成功余家志治以消為貴以托為畏即流注癰癧惡核倘有潰者仍不敢托托則潰者雖斂增出者又如何耶故以消為貴

一醫可寄生死閻坊刻外科妄稱正宗載云證現七惡即死又載以桐油燒紅衣針針入痰塊半寸用降藥為條插入針孔七日塊自開裂再以條插七日其核自落又稱毒在皮裏肉內刀割深要寸許方能洩毒殊不知毒在皮裏膜外或應開刀尚忌深過三分恐傷內膜若深入寸許傷透內腑病人何能堪此極刑七惡之現頃刻世之宗其法者盡屬創徒此集唯疔用刺此外藥不輕用刀針並禁用升降二丹令人痛爛

一足書無論背項腰腹色白者言疽以疽藥瘡之紅腫者言癰以癰藥瘡之坊刻書稱以某藥與服不應再易某藥豈非以人試藥乎倘患生要緊穴道安可遭醫幾試望高明詳之

一世無爛久之癰唯疽初起失消或遭降灸針割以致年久不斂治之方詳載集中

一外科藥證外另有雜證五十方俱一服即效者附梓集中茲無以人試藥之誤望有力者照方合就遇病施送如鈔方傳人註明製法

一此集所到之處見信者自然藥至病除更願處處翻刻速徧海內使瘡毒無枉死之人余願始遂余年七十有二矣治病歷四十餘年用藥從無一誤或疑藥味香散猛烈畏而不服則是養癰貽患非余之咎也

外科證治全生 凡例

三

外科證治全生目錄

論證

癰疽總論

陰疽論名

部位論名

治法

爛潰不斂治法

患孔毒根治法

翻花起肛治法

毒氣攻心治法

癰瘡治法

陰疽治法

石疽治法

惡核治法

流注治法

疔毒治法

紅絲疔治法

刀鏃疔治法

走黃治法

諸瘡治法

瘡鼓治法

楊梅結毒治法

痘毒治法

赤遊治法

漆瘡治法

火珠治法

湯火治法

凍瘡治法

禁用干槌膏鱖魚膏

上部治法

癰疽頭及髮疽治法

頭面肥瘡治法

蛙髮癰治法

蠟藥瘡治法

喉閉治法

咽喉治法

喉痺治法

喉閉治法

乳蛾治法

喉癰治法

喉珠治法

鎖喉治法

纏喉風治法

牙癰辨治

骨槽風治法

瘰癧治法

遮頤發頤治法

耳後銳毒治法

走馬牙疳治法

鵝掌風治法

鵝爪風治法

天蛇頭治法

甲疽治法

脫骨疽治法

井泉疽治法

肺疽治法

發背治法

乳岩治法

乳癰治法

乳懸治法

下部治法

橫痃治法

小腸疽治法

懸癰治法

外科證治全生目錄

十一

子癱治法	囊脫治法	痔漏治法
鶴膝風治法	貼膏疽治法	魚肚癰治法
腫瘡治法	噙眼治法	牛程蹇治法
流火治法	醫方	
陽和湯	陽和丸	醒消丸
犀黃丸	小金丹	子龍丸
觀音救苦丹	洞天救苦丹	大棗丸
回疔散	拔疔散	奪命湯
聖靈丹	三黃丸	五通丸
蟾酥丸	梅花點舌丹	紫金錠
勝金散	五音錠	一筆消
咬頭膏	代刀散	紫藥
山蓮散	象皮散	六和散
推車散	五寶散	拔毒散
合掌散	二美散	五美散
金銀散	神仙散	紅棗丸
金霜散	平安餅	枯痔藥
退管方	消管丸	陽和解凝膏
洞天鮮草膏	白玉夾紙膏	化核膏
白花膏	紫微膏	腐蘇膏
聾耳散	消管方	癩酒方
鯨魚膏	喉證方	壁錢散
真珠散	赤霜散	又方
南星散	骨鯁散	刻軟丸又名過街笑
固齒散	取齒丹	舌上出血或鼻衄方

小兒口疳方	口舌藥方	楊梅瘡敷藥
千金內托散	二陳湯	四物保元湯
又保元湯	加味四物湯	十全大補湯
六味地黃湯	龍膽瀉肝湯	敗毒湯
雜證		
調經種子方	求嗣得嗣法	黎洞丸
祛風逐溼散	化痞膏	三日大瘡方
瘰癧瘰	黃疽立效方	紅白痢及疝息痢方
癩癩證方	吐血立瘰方	痰中有血方
瀕血頭痛如裂方	偏身癢痛方	手足骨節癢痛方
箭風痛方	雷頭風方	偏正頭風方
疔膨食積方	又方	閃頸促腰方
赤眼淹纏方	胃脘痛方	又方
夢遺方	白濁方	欬嗽神效方
天絲入目方	塵屑入目方	跌打骨斷方
冷痺方	腸紅方	胃寒嘔吐黃水方
翻胃初起方	烏痧瘰方	水瀉立瘰方
大麻風方	狗咬方	小兒冷疔方
小兒蟲證方	夜啼兒方	砂雪丸
啞驚丹方	小兒目疾方	又方
小便閉方	老年便燥方	小兒浮腫方
製藥		
銅青	鉛粉	黃丹
密陀僧	鐵鏽	丹砂
水銀	輕粉	銀硃
雄黃	滑石	礞石

元精石	寒水石	礪砂
硫黃	白礬	綠礬
伏龍肝	甘草	黃芪
人參	沙蔞	桔梗
知母	白朮	蒼朮
元蔞	地榆	丹蔞
白芨	三七	黃連
黃芩	秦艽	天麻
柴胡	前胡	防風
獨活羌活	升麻	苦蔞
延胡索	紅花	水紅花子
貝母	茅根	龍膽草
細辛	當歸	芎藭
白芷	白芍	赤芍
丹皮	木香	高良薑
縮砂仁	香附	藿香
澤蘭	荊芥	薄荷
紫蘇	白甘藷	陳艾
茵陳	青蒿	夏枯草
牛蒡子	續斷	蒼耳子
益母草	麻黃	燈心
地黃	牛膝	麥蘗
淡竹葉	葛藜	車前子
馬鞭草	連翹	紫花地丁
大黃	蒟蒻	大戟
甘遂	蓖麻子	常山

川附子	川烏	草烏
半夏	蚤休	五味子
黑白牽牛仁	番木鱧	天花粉
天葵子	土茯苓	白斂
木通	防己	金銀花
藤黃	澤瀉	海藻昆布
仙人對坐草	穀芽	浮麥
麥芽	大麻仁	薏苡仁
小黑豆	白豆豉	神麩
紅麩	白芥子	生薑
蒲公英	紅棗	杏仁
松子仁	烏梅	楊梅
橙子	陳皮	青皮
山槿	檳榔	檳榔
吳茱萸	甘蔗	蓮鬚
芡實	山藥	柏子仁
松香	肉桂	官桂
沉香	丁香	樟腦
白膠香	冰片	乳香
沒藥	血竭	阿魏
厚樸	金鈴子	杜仲
棟樹根	皂角刺	巴豆
桑白皮	柘樹	枳實枳殼
枸橘	山梔炭	莢肉
白茯苓	赤茯苓	茯神
琥珀	天竹黃	蜂房

土蜂窠	五桶子	殭蠶
蜘蛛	蟬蛻	蠟子
推車蟲	癩團 <small>即癩</small>	蜈蚣
蚯蚓	蚯蚓糞	龍骨
穿山甲	蛇蛻	白花蛇
石首魚	朱蠃	牡蠣
眞珠	田麻	雞裏金
白丁香	五靈脂	山羊血
山羊矢	線膠	皮脂 <small>即烟膠</small>
象皮	麝香	貓矢
鼠矢	頭髮	指甲
人中黃	人中白	
醫案		

外科證治全生
六九

喉證醫案
痰核醫案
發背醫案
橫痃及楊梅瘡醫案
瘡毒醫案
湯傷醫案

髮疔醫案
惡核醫案
腰疽醫案
起疔醫案
陰腫醫案

癰癤醫案
乳岩醫案
流注醫案

外科證治全生 論證

外科證治全生 林屋王維德

癰疽總論

癰疽二毒由於心生心主血而行氣氣血凝滯而發毒患盤踞徑寸者紅腫稱癰癰發六腑若其形止數分乃言小癰按之陷而不即高頂雖溫而不甚熱者膿尚未成按之隨指而起頂已硬而熱甚者膿已滿足無膿宜消散有膿當攻托醒消一品立能消腫止癰爲療癰之聖藥白陷稱疽疽發五臟故疽根深而癰毒淺根紅散漫者氣虛不能拘血緊附也紅活光潤者氣血拘毒出外也外紅裏黑者毒滯於內也紫黯不明者氣血不充不能化毒成膿也膿色濃厚者氣血旺也膿色清淡者氣血衰也未出膿前癰有膿裏火毒之滯疽有膿裏寒痰之凝既出膿後癰有熱毒未盡宜托疽有寒凝未解宜溫既患寒疽酷暑仍宜溫暖如生熱毒嚴冬尤喜寒涼然陰虛陽實之治迥別古書未詳因立其旨備覽焉諸疽白陷者乃氣血虛寒凝滯所致其初起毒陷陰分非陽和通膿何能解其寒凝已潰而陰血乾枯非滋陰溫暢何能厚其膿漿蓋氣以成形血以華色故諸疽平塌不能化毒者陽和一轉則陰分凝結之毒自能化解血虛不能化毒者尤宜溫補排膿故當潰膿毒氣未盡之時通其膿裏之藥仍不可緩一容一縱毒即逗遛一解一逐毒即消散開膿裏而不兼溫補氣血虛寒何以成膿猶無米之炊也滋補而不兼開膿僅可補其虛弱則寒凝之毒何能覓路行消且毒盛者則反受其助猶車粟以助盜糧矣滋補不兼溫暖則血凝氣滯孰作醞膿之具猶之造酒不暖何以成漿造飯無火何以得熟世人

但知一槩清火以解毒殊不知毒即是寒解寒而毒自化清火而毒愈凝然毒之化必由膿膿之來必由氣血氣血之化必由溫也豈可涼乎况清涼之劑僅可施於紅腫癰癤若遇陰寒險穴之疽溫補尚虞不服安可妄行清解反傷胃氣甚至陽和不振難潰難消毒攻內腑可不畏歟蓋脾胃有關生死故首貴止痛次宜健脾痛止則惡氣自化脾健則肌肉自生陽和轉感紅潤肌生當投補養氣血之劑若犀角羚羊連翹等性寒之藥咸宜禁服

陰疽論名

陰毒之證皆皮色不異然有腫與不腫者有痛與不痛者有堅硬難移有柔軟如棉者不可不為之辨腫而不堅痛而難忍者流注也腫而堅硬微痛者貼骨鶴膝橫痃骨槽等類也不腫而痛骨節麻木手足不仁者風溼也堅硬如

外科證治全書

核初起不痛者乳昂癰癤也不痛而堅形大如拳者惡核失榮馬刀也不痛不堅硬而漸大者癰癤也不痛而堅堅如金石形大如升斗者石疽也此等證候盡屬陰虛無論平塌大小毒發五臟皆曰陰疽如其初起癰痛者易消重按不痛而堅者毒根深固消之不易治之之法集有一定不易之方在焉

部位論名

毒生頭頂有髮疽之名頸項有落頭對口腦疽之號鴨卵因毒夾於腋中魚肚緣患生於腿肚失榮獨在項間夾疽雙發喉側夾根原因腳骨潰有驢眼之稱牛程毒匿腳皮正有湧泉為號腹癰指腹箭袋云偏臭田麻大母指之爛名扁擔怪肩穴中之癰毒鬚前疽耳後發腿曰腿癰下稱跨馬白謂冬瓜手發背脚又疽偷糞老鼠又號懸癰漏種

海底指說蛇頭甲疽癰蓋腫云鶴膝腎子癰云子癰馬刀癰於臉上骨槽風於牙牀井泉疽患登心口貼骨疽毒踞環跳腎尖毒則曰腎疽臂上癰乃云臂毒諸名由部位以推治法務憑紅白初起未潰當觀現在之形已潰潰久須問初起之色初起色紅仍施癰藥初發色白當用疽丹奏效如響凡大癰潰後世人多投炙莖炙草或用半炙半生殊不知托裏散內用人參者並非以參補虛不過以參助芪添其托毒之力卻無補毒之害炙莖止補氣而不能托毒炙草止補中而不能解毒癰毒氣未盡誤投炙莖炙草或用保元十全等湯致毒反得補助毒攻內腑則如何之何凡遇初潰大癰宜止其痛痛息則毒散其腫亦退色轉紅活體虛年老者投參莖草皆多也如體旺家貧者無參亦易收功

外科證治全書

治法

爛潰不斂治法

如爛潰不堪之患以洞天救苦丹三服每服三錢陳酒送服醉蓋取汗隔兩日又送一服再隔兩日再送一服所空隔之兩日以醒消丸每日一服服後毒水流盡七日後再服醒消丸兩次接服大棗丸每日早晚各進五錢最危險者可奏奇效

患孔毒根治法

爛孔有惡肉凸起名曰毒根往往有用降藥爛去者此乃殺之欲速也獨不知弱體豈可增痛况爛去仍又長出安可再爛耶唯平安餅專貼毒根外以陽和解疑膏貼掩一日一易輕者二三日重者六七日不癢不癢毒根自落貼餅時日服托毒散俟毒根落後當服保元四物二湯收功

翻花起肛治法

年久不斂定翻花起肛堅硬取老蟾破腹連肚雜以蟾身刺數孔蓋貼患口輕者日易一次重者日易兩次貼蟾之日日服醒消丸止其癰痛三日後毒盡再服醒消丸每服三錢陳酒送服消其翻花梗其硬肛功效不凡也如大患初潰者亦如前法毒從蟾孔而出儻肛口硬患孔深取活牛芩草根枝葉或取紫花地丁嫩草搗爛塗入肛內皆拔毒平肛牛芩草即大力子草俗呼氣殺醫生草

毒氣攻心治法

凡受降藥毒定致神昏嘔吐此係毒氣攻心急用護心散綠豆粉一兩乳香末五錢燈芯炭三錢研和生甘草一兩煎濃汁調末令病者時刻呷嚙嚙至大半自然止嘔神氣清爽然後接服醒消丸以平其勢

癰癤治法

凡患色紅腫癰痛根盤寸餘者是癰毒發三四日尚未作膿以嫩膏圍外內以醒消丸熱陳酒送服三錢即止其痛夜間得睡次日患皮起皺再服全消如過四五日患將作膿亦以醒消丸與服消其四圍腫硬痛息毒散患平此以大變小之法有膿之患頂用咬頭膏貼加以代刀散三錢酒服穿之或以刀點分許穿之以洞天膏貼不幾口收功如患盤數寸者或居背心膈後腰腹肚腋陰囊等處險穴用五通丸醒消丸早晚以敗毒湯輪送一次皮皺痛息再服至瘰癧潰即用托毒散醒消丸亦早晚輪服如患盤不滿一寸亦紅腫者是癰癰酥丸梅花點舌丹皆消腫止痛

陰疽治法

初起之形潤大平塌根盤散漫不腫不痛色不明亮此疽

中最險之證儻誤服寒涼其色變如隔宿豬肝毒攻內腑神昏即死夫色之不明而散漫者乃氣血兩虛也患之痛而平塌者毒痰凝結也治之之法非麻黃不能開其腠裏非肉桂炮薑不能解其凝結此三味酷暑不可缺一也膿裏一開凝結一解氣血能行行則凝結之毒隨消矣治疽之方悉列於後照方治無不瘳如增減定無功效

石疽治法

此疽初起如惡核漸大如拳急以陽和湯犀黃丸每日輪服可消如遲至大如升斗者仍如石硬不痛又日久患現紅筋則不治再久患生斑片自潰在卽之證也潰卽放血三日而斃加現青筋者可治內服陽和湯外以活蔞蔞根搗爛加食鹽少許敷塗數日作癢半月皺皮日敷日轉而有膿袋下以銀鍼穿之常用千金托裏散加熟地生芪各一兩煎湯煎藥服十劑後以陽和解凝膏貼滿患上空出鍼穿之眼使其外皮活血因皮膜中似成膿須用布捲膏外綁緊使皮膜相連內服大補保元等湯發其忌炙服至收功如其毒氣未盡忌投補劑

惡核治法

大者名惡核小者名痰核與石疽初起相同然其寒凝甚結毒根最深卻不易潰未潰之前忌貼涼膏忌服涼藥內服陽和丸犀黃丸可消亦有以大田麻搗爛敷塗消之者大忌開刀開則翻花起肛口用大蟾破腹刺數孔連雜蓋患處拔毒極肛內服溫補托毒消痰之劑犀黃丸儘可收功丸內有麝香孕婦勿服

流注治法

流注色白腫痛者是也毒發陰分蓋因痰塞清道氣血虛

寒凝結一曰寒痰一曰氣毒其初起皮色不異唯腫唯癢雖身體發熱內未作膿以二陳湯加陽和丸同煎數服全消消後接服小金丹七丸杜其續發如皮色稍變極痛難忍者須服陽和湯以止其痛消其未成膿之毒氣使已成膿者至不痛而潰此乃以大疽變小之法如患頂軟即為穿之膿多白色以陽和膏貼但此證潰後定增毒痰流走患生不一故初潰之後五日內仍服小金丹十九以杜後患接用犀黃丸陽和湯每日早晚輪服使毒痰消盡不補可必收功儻幼孩不能服煎劑者初起以小金丹化服至消乃止但成膿者亦日服以消其餘硬使患不痛自穿俟其毒氣去盡用保元湯甚草宜生忌炙加入肉桂五分日服收功如孕婦患之當同懷胎月數條未滿六個月犀黃丸有麝香不可服服防墮胎當以陽和湯療之癒後再

外科證治全生治法

六十五

服三四劑以代小金丹杜其流走

疔毒治法

疔毒其害最速生而耳目鼻之間顯而易見生肩足衣遮之處隱而不知知覺早者晨醫夕癒遲者枉死甚多故婦女而患疔者誤認傷寒致毒攻心走黃不救如頭而唇鼻肩臂手足等處生一胞或紫紅或黃黑者疔也初起刺擠惡血見好血而止取拔疔散插入以膏掩之次日疔毒化膿而癒

紅絲疔治法

手小臂足小腿生如紅線一條者名曰紅絲疔要在紅絲始末兩頭刺破毒隨血出而癒遲則毒入腸胃不救凡屬疔毒宜服奪命湯

刀鏢疔治法

疔形闊如韭菜長有寸餘肉色紫黑者名曰刀鏢疔忌行鍼刺以生碧三錢葱白七根共搗爛作七塊葱湯送下下蓋汗如無汗再飲葱湯催之汗出為度取爛雞矢塗患立癒遲治毒歸心肺致命

走黃治法

疔毒發腫神昏謂走黃如在將昏之間急取回疔散二錢白湯送服少刻大痛痛則許救毒化黃水痛止命活

諸瘡治法

夫瘡疥之生本由於溼故南方卑下之地患者最多諸書皆言溼熱所致方中皆用生地涼血未見瘡者或以熏菴為法熏瘡雖瘡致毒歸腹定成瘡鼓此患諸瘡宜戒沐浴浴則溼氣愈重難以速痊瘡後再戒月餘庶免復發忌食雞羊鰕蟹一應發毒新鮮等物及房事其名有膿窠癩疥

外科證治全生治法

六十六

綉毬風猴猴疥濕風頑癬蛙髮癬小兒疔肥瘡蠟梨火珠凍瘡癩瘡爛腿漆瘡諸證後列之方皆瘡諸證

瘡鼓治法

其證當以紅棗丸治之儻遇瘡鼓危甚不及待藥與服富頁大蟹四五隻約重斤餘令其自湯煮食飲酒蓋暖睡不兩時身上發瘡更甚於前而鼓全消仍以瘡治至瘡夫瘡鼓危證也至瘡則易癒

楊梅結毒治法

楊梅瘡又謂棉花廣豆廣瘡因形而名然其感毒無二以化毒為貴熏菴為忌審定復發難治初發以三黃丸每日五鼓取四錢熱陳酒送服醉蓋取汗或以瀉肝湯每日早晚輪服昔書所載升藥為九雄黃為衣粥飲送服或點藥條一根口含冷水之法萬不可因此不費藥資害人性命

自召天誅如有因服升藥並藥條薰器復發在五日之前
口服三黃丸再取忍冬藤牛蒡草紫花地丁白甘菊煎湯
當茶時飲如潰以渣煎湯日洗兩度接服聖靈丹可祛毒
盡色轉紅活用洞天膏貼收功如下疔癰爛笑等毒總不
離此前治諸法儼癰痛難忍以聖靈丹五分數服奏功如
爛潰俟毒退痛止色轉紅活當以藥撒生肌如陽物硬而
不痿白精流出此乃妙精用破故紙韭菜子各一兩為末
每服六錢水一椀煎半服如見瘡宜以藥刺儼毒重服聖
靈丹無不全瘡

痘毒治法

幼孩出痘多服涼藥血寒氣滯乘流發毒故其色皆白醫
家每以痘後火毒治致流走患生不一久則生管成漏並
內生多骨害人不少應以流注法治以小金丹消之

赤遊風治法

初生幼孩因胎中受毒腿上患色紅腫成片身熱名曰赤
遊遊者遊走也遊走徧身而死取哺退雞子內臭水拂上
一二次全瘡或有幼孩口內生疔或頸內生一紅塊名曰
螻蛄子皆胎毒也用生地五錢大黃一錢陳酒浸取出共
搗爛塗兒腳心男左女右用絹縛好乾即易瘡乃止洞天
嫩膏塗亦效

漆瘡治法

取杉木屑煎湯溫洗接以蟹黃滑石二末白蜜調敷

火珠治法

用生蘿蔔搗爛好醋浸敷遲治妨命

湯火治法

地榆磨細香油浸敷破損者就末撒敷爛潰不斂者取龜

心土炭火燒紅水飛曬乾再加研細人乳調敷今之治坊
浸油一缸以備不虞拂上立刻止痛多則二次全瘡乃湯
火傷之聖藥也

凍瘡治法

以陽和解凝膏貼一夜可瘡潰者貼三張收功

禁用干捶膏鱈魚膏

凡患一切大小白色等疽忌用洞天膏貼嫩膏敷敷則寒
凝愈結最忌用干捶膏鱈魚膏貼以此二膏內皆有巴豆
麻肉貼則提拔成害每見橫疔乳品貼至致命孕婦貼
則墮胎凡諸疽潰後宜貼陽和解凝膏

上部治法

癰疽頭及髮疽治法

孩童頭髮內患白色腫塊初起多有認是跌腫至高大作

癩方始延醫醫以頭為首陽唯用寒涼解毒是以潰者內

膿復生增出者不一殊未知此患色白乃陰寒虛弱之證
用小金丹初起三服而消潰服七九而瘡外貼陽和解凝
膏大人患之名曰髮疽以陽和湯瘡之夏秋頭面生紅癰
名曰石癩初起取洞天膏貼周時全消潰者貼之亦瘡用
連翹花粉赤芍銀花甘草葶前滑石澤瀉煎俟溫服即無
熱毒之男婦逢酷暑宜服

蛙髮癩治法

取生木髓片浸數日入鍋煮透取湯將髮髻去用湯洗洗
後預備取活蜈蚣三條浸菜油內三四日以油搽頭至瘡
方止或取草烏切片炙脆研粉醋調日塗三次數日瘡

蠟梨瘡治法

取獨核肥皂分開去核以洋糖填實糖內入巴豆仁每斤

兩粒半仍將肥皂合好外用線紮鹽泥包固火煨存性去泥研極細末加入輕粉檳榔末各八分再加力研香油調膩鬚頭後煎滾灰湯溫洗洗後以藥敷敷後不用再洗日以藥敷至瘡乃止

頭面肥瘡治法

白明礬研粉取棉紙捲作長條打成結子幾十個入菜油內浸透取鐵篩放油結子用火燒結內油仍滴於所浸梳內燒至枯以諸結研粉加製松香末約一半共調油內日以拂瘡早晚兩度五六日瘡戒食豬肉蝦蟹等發毒之物並煎炒煎油食則延開難瘡

咽喉治法

咽喉之地尤為急證頃刻而痛難忍實係寒生婉轉而痛方騰乃為熱病譬之雷電之火倏因陰生燎原之火熾由漸著也內經云驟起非火緩起非寒虛寒實熱識透者獲濟是在明達之士知所區別乃隨所投而無誤耳視證有訣○咽喉證有七形若筋頭蛾無蛾喉欲閉鎖喉證亦異纏喉熱結內麻癢腫繞外日前氣短促厥冷喉閉礙喉痺

鎖喉治法

新痰響肺絕須治快喉癰因虛鬱微作癢癢態不腫又不閉淹纏最作怪喉懸一粒珠刀點命頃害藥從鼻裏吹珠破病即退

喉痺治法

痺者不仁也驟起也危急之證痰在喉中作響響如打崩舌色白而不腫諸書皆稱肺絕不救蓋緣誤服寒涼以致死耳如服桂薑湯立瘳桂薑湯專治頃刻而起前無毫恙者此虛寒陰火之證肉桂炮薑甘草各五分共歸碗內取滾水衝入仍將碗頓於滾水掉藥口許漫以照下立瘳或

以生川附切片塗白蜜火炙透黑收貯臨用取如細粉一粒口含嚥津亦立刻全瘳

喉閉治法

喉閉兩三日以前氣急短促手足厥冷忽然痰壅氣閉命懸頃刻者是利服蘇子前胡等藥

乳蛾治法

其形圓如筋頭生於咽喉關上者輕生於關下者重或左有右無曰單左右皆有曰雙雙者輕單者重以土苧藤絞汁含口漫嚥

喉癰治法

體虛多鬱者患之喉中不閉不腫氣出如常微微癢癢飲食不遂者是此係虛火淹纏難瘳忌刺畏補 冰片牛黃各一分膽礬三倍入雄精白梅三枚去其核雄等礪茶山

喉珠治法

豆根七味藥粉三錢七入梅共搗作丸喻為九十箇含十日喉癰方中獨此尊虛火不宜補與刺總然醫瘳不除根

鎖喉治法

係腦門生一紅線如髮懸一黑胞大如櫻珠挂至咽門如用刀點即死取土苧藤活根搗汁以好醋二三滴和勻滴入鼻中三四次絲斷珠破吐出瘀血立效

纏喉風治法

喉內無蛾形痰聲不響而喉欲閉者是後有藥訣
喉內熱結喉外腫繞且癢且麻者是 喉內之痰塞滿舌有痰護此痰不出牙齒作響如鼾唯喉痺誤服涼藥有此證也如再遲痰塞鼻內氣無出入即死儘遇此危急之證取鷄毛一根黏薑許桐油入喉一捲痰隨油吐以桂薑湯

瘰之如其道路無人店之處藥未備在者遇有喉證取銀刺其兩指少商穴無藥即瘰

牙癰辨治

牙根肉紅腫痛甚者是刺出毒血取真珠散吹之內服瀉肝湯而瘰牙骨及腮內癰痛不腫不紅痛連臉骨者是骨槽風也僅以癰治則害之矣

骨槽風治法

患在腮內牙根形同貼骨疽者是初起往往有誤認牙癰多服生地石羔以致成功爛至牙根延爛咽喉不救當用二陳湯加陽和丸煎服或陽和湯消之僅遇潰者以陽和湯犀黃丸每日早晚輪服如有多骨以推車散吹入隔一夜其骨不痛自行退出吹至次日無骨退出以生肌散吹入內服保元湯加肉桂當歸芍藥生黃芪生甘草收功而

止

瘰癧治法

瘰癧生於項間初起一小塊不覺癢癢在皮裏膜外漸大如桃核旁增不一皮色不異者以子龍丸每服三分淡薑湯每日送服三次至消乃止儻幼孩不善服丸取小金丹每日一丸用布包放石上隔布敲細入杯取冷陳酒三四匙浸化用銀物研碎臥以熱陳酒衝服醉蓋暖取汗服消乃止數年內忌食香橙食則復患凡瘰癧內有潰爛開有成膿未潰者亦有未成膿者須服犀黃丸止其已潰之痛鬆其成膿未潰之痕消其未成膿之核已成膿者用咬頭膏穿之日服溫補祛痰通脈活血壯氣之劑外貼陽和解凝膏而瘰其瘰癧延爛至肩胸膈下不堪之極者須用洞天救苦丹三服犀黃丸六服服有規法載前服完九日後

皮色變白孔內紅腫接服大棗丸肌肉漸長用生肌散日敷收功又瘰癧爛至咽喉如飲熱湯外覺熱痛者乃危險至極儻稍遲則爛穿咽喉不救急取柴心一根量本人中指量其三指共積一錢隨其長短男左女右就手之左右即在手下突出之骨正中骨頂之處定準一直量上盡頭以墨記取艾團連灸三壯膏掩可保咽喉不穿收功之法前已列明敷藥有訣陳左未成膿者灸則可消爛潰者可飲赤貧人用之 瘰癧爛潰不堪言爛至胸腰連耳肩并根煎溫復洗瘡中紫塊莫鍼穿犀黃丸神效日服日洗日敷痊瘰癧腰黃等細粉麻油調搽肉新鮮

遮顛發頤治法

患生於顛有日遮顛者有日發顛者當宜別治顛內瘦痛者遮顛也取嫩膏敷上次日全瘰癧病後兩頤發腫不作

外科證治全生

瘰癧者乃是發頤宜服表風散毒之劑當用白芷天麻防風荆芥各一錢陳酒煎半碗送服醒消丸三錢自瘰

耳後鏡毒治法

患發耳後又名耳後發宜別陽實陰虛治無一錯患色白者以陽和丸與二陳湯同煎服或以小金丹服消色如紅者醒消丸服消諸書不拘紅白槩以元薑牛蒡連翹歸尾赤芍銀花等七味治之色紅者尚服不消僅色白者服遭其害矣

走馬牙疳治法

用生香附生半夏等分為末雞子白調作如餅貼男左女右湧泉穴一周時瘰癧如小兒口內生毒塊不能食乳俗名雙蝦子用生地酒浸搗爛塗男左女右腳心自瘰

鵝掌風治法

鵝掌風患於手足掌指皮上硬而癢燥烈者是用麻油一兩紅礮一錢敲細如粉入油煎至礮枯煙絕為度去礮留油有風之處日以火烘油擦二三次至瘡止

鵝爪風治法

卽油灰指甲日取白鳳仙花搗塗指甲上下包好日易鳳仙過時灰甲換好

天蛇頭治法

患生指上形似蛇頭而名紅痛者取白蘿蔔一段穿孔入雄黃三分蒸半熟套指或取烏梅仁嚼爛塗指嫩膏塗之皆消如患色白小金丹服瘡

甲疽治法

凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒一兩黃芪二兩醋浸一宿入豬脂五兩微火上煎取二兩絞

外科證治全書

去渣退火氣以封疽口日易三度毒消口斂

脫骨疽治法

凡手足之無名指患色白而痛甚者脫骨疽也諸書載云急用翦去其指可保其命遲則腫延手足之背救無術矣殊不知此亦疽也大人以陽和湯幼孩以小金丹最狠者以犀黃丸皆可消之色紅者以熱癩蛇頭等法治之

甲部治法

井泉疽治法

此疽生於心口又名慢心鏡毒初起若心口內有塊漸大心口發高毒陷卽死此醫皆縮手之證諸書亦無藥治之法唯以本人兩手十指以線量其長短共積其線在喉管正中處雙環至背脊之中看兩線頭盡處為中穴又以本人中指之中一節用柴心量準作一寸中穴之左右各邊

一寸各以墨記分立三穴如小者每穴用艾三大壯一齊火灸灸畢全瘡

肺疽治法

諸患易識獨肺中患毒難覺兩腳骨癢痛者或腳骨不痛而舌下生如細豆一粒者再心口之上內作微痛及欬嗽口乾咽燥此皆肺中生毒之證也卽用甘草桔梗各三錢煎服服下如覺稍安肺之患毒無疑矣以犀黃丸十服服完全瘡此是預識預治百無一死之法世人但知腳痛醫腳欬嗽醫嗽舌下一粒便以刀刺且此一粒患未成膿定色淡患瘡亦消患篤其色紫黑如用刀刺立害諸書皆載云口吐臭痰胸中發腥作痛者肺癰也又稱證有三不治時吐臭痰久如硬米飯者不治嘔膿不止者不治白而變赤者不治唯嘔而膿自出者易治治之之藥唯地黃保生

外科證治全書

歸脾等湯輪服而已並無預知早治之法直至吐臭痰發腥始知肺癰猶小舟飄入大洋也每見此證吐膿膿色皆白故稱肺疽用犀黃丸治無不效有赤貧者患之以陳年醃芥菜滴每晨取半杯滾豆腐漿衝服則胸中一塊塞上塞下塞至數次方能吐出連吐惡膿日服至瘡凡患此證者終身戒食鴨卵白蒸紅蘿蔔石首魚着甲魚食則復發難生

發背治法

發背乃癰疽中大患緣其患位對心對肺對臍耳偏曰搭手因手可搭而名紅腫痛甚者應稱背癰治法已列治癰法內如患色白腫痛者當以流注法治如平塌不痛者當以陰疽法治此皆陰發背也如誤敷涼藥誤貼涼膏定毒攻內腑不救

乳出治法

初起乳中生一小塊不痛不癢證與癰癤惡核相若是陰寒結痰此因哀哭憂愁患難驚恐所致其初起以犀黃丸每服三錢酒送十服全瘥或以陽和湯加土黃五錢煎服數日可消儻誤以膏貼藥敷定主日漸腫大內作一抽之痛已覺遲治儻皮色變異難以挽回勉以陽和湯口服或以犀黃丸日服或二藥每日早晚輪服服至自潰而痛者外用大蟻六隻每日早晚取蟻破腹連雜以蟻身刺孔貼於患口連貼三日內服千金托裏散三日後接服犀黃丸可救十中三四潰後不痛而癢極者無一毫挽回大忌開刀開則翻花最慘萬無一活男女皆有此證

乳癰治法

婦人被兒鼻風吹入乳孔以致閉結名曰如乳內生一塊

紅腫作痛者大而言癰小而言瘤以紫河車草薺黃各三錢為末黃糖拌陳酒服醉蓋取汗或用炒白芷乳香沒藥各製淨折黃歸身等分為末每服五錢酒送專治乳癰乳癰一服全消如潰以醒消丸酒送一服以止其痛外貼洞天膏自瘥如患色白者應以流注法治儻爛潰不堪者以洞天救苦丹按法與服七日後接以大棗丸日服收功

乳懸治法

此怪證也世間亦偶有之蓋產後兩乳伸長形細如雞腸垂過小腹痛難刻忍急用芎藭當歸各一斤內取各四兩切片水煎時服以所餘斤半切大塊產婦面前放一棹下放火鑪將芎歸入鑪慢燒令婦伏於棹上口鼻及乳吸烟如藥盡未痊再如前法煎服熏吸便可編上儻不能復舊取麻子一粒冷水磨塗頭頂見縮復舊即時洗去乃瘥

瘡後儻日後再產必復發不救故膏藥不可以麻麻煎入儻貼孕婦下身瘡癰即小產產後尚不覺膏故再貼致命可見麻麻巴豆之害如此

下部治法

橫痃治法

橫痃生於小腹兩旁大腿界中形如腰子皮色不異硬如結核按之微痛者是也日取皂角刺六錢為末布袋同糯米二合煮粥時飲三四日全消或以子龍丸每服三分淡薑湯日送三次全瘥乃止大忌開刀開則刀口無膿惟出白膩漿三百日內而死自潰者亦然

小腸疝治法

患在小腹之內按之如掌堅硬而熱微痛小便頻數汗出悽寒腹色如故或現微腫脈緊實有力者是也以犀黃丸瘥之

懸癰治法

患生肛門前陰莖後兩相交界之處初起細粒漸如蓮子數日如桃李樣俗呼偷糞老鼠鼠潰經走洩創成漏生管漏从成怯如怯諸人患此乃催命鬼也諸漏宜醫獨此不可治治則漏管愈大致成海底漏不救在於未成膿時用生甘草熟軍各三錢酒煎空心服一劑即瘥如成膿以醒消丸瘥之儻患色白者小金丹瘥之

子癰治法

如腎子作痛而不升上者外現紅色子癰也遲則成功潰爛致命其未成膿時用枸橘全箇川棟素芫陳皮赤芍甘草防風澤瀉等分錢半一服即瘥

囊脫治法

腎囊生毒爛破腎子落出外用紫蘇湯日洗取紫蘇葉槌為末日敷用青荷葉包裹內服煎劑黃連六分歸尾連翹黃芩各一錢五分甘草木通各一錢

痔漏治法

痔漏即腸癖凡人九竅中有小肉突起即如大澤中有小山突出也不獨於肛門一處言痔故有鼻眼牙痔等名痔分五種狀亦不一曰牡曰牝曰腸曰氣未破者曰痔已破者曰漏肛門邊生出數瘡腫而突出膿潰即散者牝痔肛門邊露肉如珠狀如鼠奶懸血流膿者牡痔腸口顆顆發癢且痛且癢血出淋漓者蠟痔肛門內結核有血發寒熱登廁即脫肛者腸痔肛門腫痛遇怒即發怒息即安者氣痔酒醉即腫痛流血者酒痔色痔相同每大便有血注不止者血痔患外痔用蘇合油一兩狸膽冰片各五錢

槐花粉一兩研和加入洞天嫩膏一兩五錢再研和固貼

勿使洩氣臨用取塗痛息日塗兩次至瘡乃止內服杜痔丸地骨皮生地各三兩黃芩丹皮各兩半槐花二兩甘草焦黃蘗各五錢焦蒼朮二兩各磨細粉白蜜為丸每早晚各服五錢患內痔候登廁翻出肛外用溫水洗淨側臥其痔盡出勿使收入亦有痔自翻出大如茶杯形如一菌從從菌心而出痛極上而如盆四邊高中心陷下如菌根葉後用鮮枸杞根搗爛煎汁熱熏溫洗洗淨以洞天膏攤如菜碗大中剪一孔以一邊翦開通孔烘鎔柳於菌根貼於糞門四邊圍護好肉誠恐上藥藥汁滴於好肉耳每取藥一二分入杯津調筆蘸拂菌之外面四旁日夜各拂一次菌之中心通連糞門大忌拂藥儘有流入大痛難當拂一兩日毒水流出血形漸縮而頓再拂一兩日漸硬而黑

邊日有脫下用藥一錢內再增硃砂一分如前津調日夜照拂菌縮小黑硬更拂拂至菌根自落全瘡方藥列後

鶴膝風治法

鶴膝風之初起漆蓋骨內作痛如風氣一樣久則日腫日粗而大腿日細者是也因形似鶴膝而名專治之法取新鮮白芷用酒煎至成膏收貯瓷瓶每日取膏二錢陳酒送下再取二三錢塗患至消乃止否則用陽和湯日服外以白芥子為粉白酒釀調塗亦消

貼骨疽治法

貼骨疽患在環跳穴又名縮脚疽皮色不異腫硬作痛者是外用白芥子搗粉白酒釀調塗或以大戟甘遂二末白蜜調敷內服陽和湯每日一劑四五服可消消後或服子龍丸或小金丹以杜後患大忌開刀開則定成縮脚損疾

魚肚癰治法

患生小腿腿肚此因肉緊筋橫在一身用力之處最痛難忍外以紫藥紫上內以五通丸醒消丸每日早晚輪服初起立消切忌開刀宜以藥咬穿庶不傷筋而無縮脚之損色白者應以疽治忌用紫藥孕婦忌紫藥則胎墮

癰瘡治法

生於小腿男人謂之爛腿女人謂之裙邊瘡因氣滯血凝經年累月臭爛僧人初起或腿上搔破或生小瘡因經熱湯湯氣或食毒物或用瘡膏貼爛成一孔以烏金膏治之烏金膏用烏鉛一斤入礮三錢鎔化次日鉛而刮下者名金頂礮再以鉛鎔澆薄如紙片照患孔大小剪如膏藥一方鍼刺二三十眼取光面貼孔日煎紫花地丁湯洗孔並洗膏二次三日內毒水流盡色變紅活以水飛伏龍

撒土仍用前膏貼外戒多立行走房事食毒物凡婦人須待月信之後貼起

驢眼治法

患主腳骨俗呼夾棍疽未潰色白以疽治紅腫以癰治如爛潰日久形如驢眼者莫以麻瘡治當問初起紅白以疽癰別治

牛程蹇治法

腳底皮內生一炮痛難步履略去老皮以生草烏酒磨塗上速愈如患生脚底之心名湧泉疽當別紅白色治

流火治法

患生小腿紅腫熱痛不潰不爛世之醫家惟以刀鐮血出或以鱈魚血塗總無全瘥之日時常發作復鐮復塗而已須以礬灰化於缸水內次日水面上定結一層如薄冰者

小兒痘疹全生治法

取起以桐油對調膩厚每日拂上二三次三四日全瘥後不復發醫時忌食豬肉

醫方

陽和湯

熟地黃一兩麻黃五分鹿角膠三錢白芥子二錢炒研肉桂一錢生甘草一錢炮薑炭五分不用引此方主治骨槽風流注陰疽腫骨疽鶴膝風乳岩結核石疽疔骨疽及漫腫無頭平塌白陷一切陰凝等證麻黃得熟地不發表熟地得麻黃不凝滯神用在此

陽和丸

肉桂一兩麻黃五錢炮薑炭五錢共研細末灑水為丸

醒消丸

乳香沒藥末各一兩麝香一錢五分雄精五錢共研和取黃米飯一兩擣爛入末再擣為丸如蘿蔔子大曬乾忌烘每服三錢熱酒送服醉蓋取汗酒醒癰消痛息

小兒痘疹全生治法

犀黃丸

醒消丸內除去雄精加西牛黃三分如前法用飯一兩為丸凡患乳岩瘰癧癰核橫痃流注肺癰小腸癰等毒每服三錢熱酒送下患生上部臥服下部空心服

小金丹

白膠香草烏五靈脂地龍木鼈各製末一兩五錢沒藥歸身乳香各淨末七錢五分麝香三錢墨炭一錢二分以糯米粉一兩二錢為厚糊和入諸末擣千捶為丸如芡實大此一料約為二百五十九丸曬乾忌烘固藏臨用取一丸布包放平石上隔布敲細入杯內取好酒幾匙浸藥用小杯合蓋約浸一二時以銀物加研熱酒送服醉蓋取汗如流注初起及一應痰核瘰癧乳岩橫痃初起服消乃止幼孩不能服煎劑及九子者服之甚妙如流注等證成功

潰潰久者當以十九作五日早晚服服則以杜流走患不
增出但內有五靈脂與人變相反不可與有變之藥同日
而服墨炭係陳年箋子
墨略燒存性研用

子龍丸

甘遂大戟必要按法精細法製為粉白芥子炒磨為末各
等分煉蜜為丸日服三次每服淡蘆湯送服三分忌與甘
草之藥同日而服

觀音救苦丹

硫黃三錢硃砂二錢共研入銅器鎔化離火入麝香一錢
調和預以油紙鋪地以藥澆紙上取為米粒遇小癩取一
粒於患頂火點即然立刻燒過膏掩次日瘡

洞天救苦丹

取露天有子蜂窠鼠矢尖者青皮棟樹子立冬後者佳互

外科搜治全生醫方

二

上炙存性為末等分配準研和每取三錢陳酒送服服後

要隔兩日再服

大棗丸

用山羊矢曬乾入鍋炒炭存性悶磨粉收藏每遇久爛
不堪將見內腫者以大棗去皮核先搗爛如泥然後入前
粉捶至成丸每服四錢黑棗湯送服

回疔散

土蜂窠有子者一兩蛇蛻一條泥裹火煨存性為末研和
聽用

拔疔散

硼砂白丁香輕粉乳香蜈蚣各一錢血竭麝香各二錢金
頂礮六分均製為末取蟻蛸一錢酒化和搗為丸如芥子
大宜帶長以便插入疔孔

奪命湯

銀花草河車赤芍細辛蟬蛻黃連殭蠶防風澤蘭羌活獨
活青皮甘草等分

聖靈丹

真珠西牛黃冰片各一錢琥珀四錢硃砂三錢石鍾乳二
錢各製研粉入飛麪四兩研和每服取末五分煎土茯苓
湯調含再以湯送服服無不瘳但石鍾乳真珠牛黃三物
價皆貴重不可輕減分兩

三黃丸

熟大黃三兩乳香沒藥末各一兩雄精五錢麝香一錢五
分西牛黃三分以熟大黃酒浸透入椀隔湯蒸軟擣爛然
後以乳沒雄麝西五末和入再擣千捶為丸如梧子大每
服五錢此丸專治懸癰紅腫熱毒瘰癧大瘰楊梅瘡疔結

外科搜治全生醫方

三

毒火毒等證連服十次甚險全瘳

五通丸

廣木香五靈脂麻黃沒藥乳香各淨末等分用飯搗爛入
末再擣為丸如梧子大另以芎歸赤芍連翹甘草等藥煎
湯送丸五錢凡大癰生於要緊穴道將在發威之際服此
甚效如與三黃開服更妙

蟾酥丸

寒水石三錢血竭沒藥膽礬乳香雄精銅青穿山甲殭蠶
全蠟酒炒各一錢硃砂枯礬皂角刺冰片輕粉紅礮各三
分蜈蚣去足三錢各製為末用蝸牛二十一箇蟾酥三錢
酒化共擣為丸如綠豆大金箔為衣每用葱白裹一九敲
碎酒服醉蓋取汗小癰初起服即全消白疔忌用
梅花點舌丹

沒藥 礪砂 蘇黃 熊膽 乳香 血竭 樟腦 大冰片 沈香 各一錢
蟾酥 麝香 各二錢 破大珠子 三錢 硃砂 牛黃 各二錢 各製
爲末 搗出 蠟酥 以人乳化開 入末 和搗 爲五百九 如綠豆
大金 鎊 爲衣 凡紅腫 癰癩 初起 取一九 入葱白 內打碎 酒
吞 蓋暖 取汗 三箇時 毒消 而癒

紫金錠

山慈姑 去皮 淨文蛤 去末 淨各三兩 麝香 一兩 二錢 千金
子 去油 淨大戟 洗淨 焙各一兩 共爲細末 研極細 爲度 以
老米糊 和勻 入日中 杵干 捶成膏 作錠 醋磨 塗毒 消癰 化
服 通節 竅 消熱 痰

勝金散

人參 三七 磨粉 米醋 調塗 患消 痛息 潰者 乾敷 之 瘡 刀斧
傷

五寶錠

雄黃 熊膽 京墨 硃砂 各一錢 麝香 五分 牛黃 一分 先將京
墨 研粉 用酒 少許 化之 再入 熊膽 研膩 後入 諸末 共研 作
錠 凡遇 紅腫 惡毒 水磨 以新 筆蘸 藥 圍患 中空 毒頂 乾再
圍 圈 至全 消 初起 者無 不神 效 白疽 忌此

一筆消

大黃 二兩 藤黃 一兩 明礬 蟾酥 五錢 麝香 乳香 沒藥 各二
錢 用蝸牛 搗爛 作錠 小瘡 空山 糝頂 取錠 醋磨 新筆 蘸藥
圍 圈 乾再 圍 圈 至痛 消方 止

咳頭膏

銅青 松香 乳香 沒藥 杏仁 生木 髓粉 鹿麻 仁等 分 巴豆 不
去油 加倍 搗成 膏 每兩 膏內 加入 白礬 一分 再搗 勻 臨用
取 綠豆 大一 粒 放患 頂 用膏 掩潰 卽揭 下洗 淨 換膏 貼胎

前產後忌用

代刀散

皂角 刺 蘇黃 芪 各一兩 炒生 甘草 乳香 各末 五錢 每服 三
錢 酒服 立潰

紫藥

麻仁 搗爛 如泥 鋪絹 上絹 照患 大又 取一 絹蓋 上然後
隔 絹 紮 上能 拔其 毒能 止其 痛惟 紅痛 非常 者不 得已 用
之 如胎 前產 後婦 人及 患色 白者 忌用 此卽 如干 捶膏 內
有 麻仁 鯽魚 膏有 巴豆 二物 提拔 之力 甚狠 如孕 婦紮
卽墮 胎白 疽紮 則成 功惟 無孕 婦人 及男子 可紮 痛止 卽
去

山蓮散

大活 鯽魚 一尾 破腹 去雜 以山 羊矢 塞實 魚腹 放瓦 上浸
火 炙乾 存性 研末 加麝 香一 錢固 貯如 爛潰 不堪 與內 腫
止 隔一 膜者 用此 撒 上奇 功立 見

象皮散

豬身 前蹠 扇骨 殷炭 研粉 十兩 加入 象皮 炙炭 存性 一兩
共 爲極 細末 凡遇 爛孔 如掌 之大 者以 此撒 上至 孔收 小
後 用六 和散 敷此 藥能 瘡刀 傷跌 損出 血

六和散

海螵 蛸 龍齒 水飛 象皮 炙存 性研 極細 血竭 乳香 輕粉 各
等 分加 研極 細或 乾撒 或蒸 雞子 油調 拂

推車散

推車 蟲卽 羌蝦 炙研 細末 每一 錢入 乾薑 末五 分研 極細
專 治多 骨用 吹孔 內內 有骨 次日 不痛 自出 吹過 周時 無
骨 出則 知內 無多 骨也

五寶散

人指甲五錢用紅棗去核逐枚包甲以長髮五錢細紫棗同象皮薄片五錢入瓦上炭火炙鎔成團存性取出研粉加麝香一錢冰片三分固則生肌速效

拔毒散

巴豆霜一錢雄黃一錢冰片五分麝香一錢共為細粉取撒膏上貼則拔盡毒氣使無後患胎前產後之婦忌用

合掌散

硫黃一兩鐵鏽一錢紅礬六分共研極細如麪取葱汁調和塗入大碗內勿使厚薄以碗覆於瓦上取艾置碗下熏藥藥得熏乾敲藥碗聲同空碗無異為度取藥再研極細每遇滿身癩疥及腎囊瘻用藥一錢可敷數次全瘡臨用以右手中指羅紋黏滿香油再在包內黏藥塗入左手心

外科證治全書方

合掌散磨止有藥氣不見藥形將兩掌擦瘡每日早晚擦三次三日掃光再擦三四日不發

二美散

吳茱萸焙硫黃等分各研極細如麪專治膿疥雜開者照前法蘸入手心合掌磨擦每日二次瘡後再擦三四日

五美散

皮脂一兩黃丹一兩炒透硫黃雄精各三錢輕粉一錢共為極細末入洞天嫩膏調敷膿窠坐板溼毒狗獾疔外以懸紙掩綁不可動搗五日後揭下再敷一二次全瘡如溼毒瘡極先以金銀散敷上以膏加敷

金銀散

硫黃二兩入銅器鎔化加銀朱五錢攪和離火倒油紙上冷取研細醋調敷治惡瘡極瘡如破爛爛孔瘡極者白蜜

調敷

神仙膏

紅棗二斤銀花歸身各一兩甘草三錢白殭蠶白芷乳香末五楠子黃芪各五錢水六碗煎半渣如前煎共湯六碗去渣當水煮棗治患瘡日久體虛瘡最重者外敷內服四五日喫完全瘡

紅棗丸

白殭蠶紅棗各四兩先用水煮紅棗一二滾取棗湯洗殭蠶棄湯以棗去皮核搗爛殭蠶曬乾為末二兩同棗搗和為丸四兩仍用紅棗湯送服專治瘡鼓服完全瘡

金霜散

杏仁去皮尖三錢雄黃錢半輕粉一錢研末豬苦膽調敷不癢惡瘡

外科證治全書方

平安餅

烏梅肉一錢輕粉五分研和不見粉亮為度如硬用津少許不可用水研至成膏照患口大小作薄餅幾筒以貼毒根外用膏掩日易一次俟毒根不痛落下方止

枯痔藥

用明礬一斤紅白礬三錢共入陽乘罐內外圍炭火燒至礬鎔有煙起煙即礬毒入立下風忌開俟煙盡礬枯去炭次日取出研如細粉每取一錢加入飛過硃砂一分研和聽用

退管方

黃荆條所結之子取炙燥為末每服五錢黑糖拌空心陳酒送服專治痔漏之管服至管自退出方止

消管丸

苦菱四兩川連二兩酒炒當歸槐花畢澄茄各一兩五橫
五錢各爲細末用馬蹶髓兩箇約重八九兩柿餅四兩以
水共煮去盡骨搗爛入前末搗和爲丸空心每服四錢白
湯送下其管自出

陽和解凝膏

每香油十斤取新鮮大力子根葉梗三斤活白鳳仙梗四
兩入油煎枯去渣次日以川附桂枝大黃當歸肉桂官桂
草烏川烏地龍蠶蠶赤芍白芷白蘇白芩各二兩川芎四
兩續斷防風荆芥五靈脂木香香圓陳皮各一兩再煎藥
枯瀝渣隔宿油冷見過斤兩每油一斤加炒透黃丹七兩
攪和文火慢熬至滴水成珠不黏指爲度即以溼粗紙
罽火以油鍋移放冷甕上取乳香沒藥末各二兩蘇合油
四兩麝香一兩研細入膏攪和半月後攤貼一應爛潰陰

疔瘰瘡貼一夜全消潰者三張全瘰瘡疾貼背心

洞天鮮草膏

先用壯年頭髮一斤菜油三斤入鍋熬髮枯浮去渣藥用
以活牛蒡甘藷蒼耳根葉金銀藤馬鞭草仙人對坐草各
鮮草一斤入菜油十斤蒸至草枯瀝出再以白芷甘草五
靈脂當歸各半斤入鍋蒸至藥枯出渣俟油冷將前頭髮
熬過之油併入共見過斤兩每油一斤用當日炒透黃丹
七兩入於油內攪勻再熬至滴水成珠以兩指取膏爲
丸而丸不黏指爲度離火俟退火氣以油紙攤膏用貼一
應熱毒瘡癰如做嫩膏者每斤油內入黃丹四兩熬黑收
起攤用

白玉夾紙膏

麻油四兩熬至滴水成珠爲度離火加製松香五錢白蠟

黃蠟各二錢半再熬去煙沫用絹瀝清一加輕粉一兩二
加冰片三分三加麝香三分隨攪隨加加攪勻極增雞子
白一箇再攪勻貯瓷瓶以蠟封口聽用如貼兩月則藥乾
無用專治夾棍杖傷及刀斧槍棍傷損爲效甚速用油紙
校傷處長闊一倍以膏攤一面餘一面刺眼折來蓋膏以
有眼一面向貼患處用絹布綁縛

化核膏

菜油四斤壁虎十四條蜘蛛二十八箇蝸牛三十六枚入
鍋熬至枯浮油面取出再入各新鮮首烏藤葉甘菊根薄
荷牛蒡蒼耳等草各半斤武火熬至草枯出渣俟油冷再
入連翹元菱苦蘗白蘇白芥子殭蠶水紅子仁各搗碎大
黃荆芥防風各四兩浸一宿熬至黑枯以油瀝清見過斤
兩加製木髓油半斤配炒黃丹慢入攪攪勻文火再熬

至滴水成珠膏不黏指爲度再加入丁香油麝香各二
錢蘇合油一兩攪勻退火攤貼凡瘰癧結核惡核此膏貼
卽暗消但毒根不除必以子龍丸日服三次外用膏貼左
可除根以杜後發

白花膏

香油一斤青槐枝百段陸續入油熬枯油至滴水不散取
出枯枝入黃蠟兩半鉛粉兩半離火溫時再下製淨乳香
兒茶沒藥白花蛇各三錢樟腦一兩麝香一錢同油攪勻
成膏浸水內一宿專治瘰癧極見骨者

紫微膏

香油四兩燭油兩半黃蠟兩半熬至滴水不散入炒鉛粉
三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥各五錢兒茶六錢雄黃龍
骨真珠各五錢攪勻遠火入麝香五錢成膏聽用生肌散

麝蘇膏

麝香五靈脂沒藥雄黃乳香各一兩蟾蜍五錢蘇合香油二兩洞天嫩膏八兩共攪勻入瓷瓶固藏週大瘡空出患頂取此塗圍如乾以雞毛黏酒拂上神效內服醒消丸立癒

聾耳散

凡耳內有膿作痛取新鮮白蒸魚腦中枕骨入火燒紅取出俟冷每兩加冰片一錢共研用蘇花捲乾耳膿吹藥二三次即癒

消管方

皂角刺尖和樹膜炙淨末各五錢紅腹金錢龜炙淨末三錢榆癩真蟾蜍各一錢和入加工研細固藏聽用每遇漏管先以豬鬃探通料其淺深然後以紙捲藥為條塞入口易日塞至癒乃止

癩酒方

用本地白椶皮南星檳榔各一兩樟腦生木髓各五錢斑蝥三十箇蟾蜍三錢共浸滴花燒酒一斤內聽用週癩三日一鬚一拂至癒乃止

鮮角膏方

五月初旬取新鮮皂角煎數斤擣爛水煮熟汁滌出易水再煮二三次出渣以汁共歸一鍋浸火煎至成膏如治橫痃每日取二錢同糯米煮粥日食而癒如治頑癬用皂角煎醋熬成膏髮後塗敷日鬚日敷毒水盡再敷數次全癒

喉證方

喉證方

蘇子前胡赤芍各二錢甘草桔梗各二錢元菱通翹浙貝各一錢半治風火喉閉鎖喉風○實火用川連一錢桔梗牛蒡元菱赤芍荆芥各一錢半連翹黃芩花粉射干各錢半防風一錢半連翹黃芩防風荆芥射干各一錢銀花錢半薄荷八分川連甘草各五分

壁錢散

六七月取有子壁錢七箇老蟾子兩箇髮紫好用明礬七分鎔化以紫好之壁錢入鎔礬黏足燈火炙透研粉凡熱痛喉證用吹最效

真珠散

礪砂雄精川連兒茶人中白冰片薄荷黃蘗各等分大破珠減半各為極細末拾牙疳牙根紅腫口喉刀點以散吹赤霜散

紅棗

紅棗一枚去核入紅碗如黃豆一粒紫好瓦上炭火炙至炭上起白色煙盡為度蓋煇俟冷加入冰片一分研專治走馬牙疳延腫穿腮危險不堪之証吹之效速如神久用之孔生肌亦速

又方

白馬前躡修下腳皮炭炙存性為末入冰片少許吹患處立癒

南星散

南星一枚空入雄黃一塊麥麩包裹火燒俟雄鎔以杯合定遠火俟冷去麩研末加麝香專治牙蝕因患骨槽風以致牙蝕透骨穿腮拂之數日癒

骨鯁方

縮砂草果威靈仙清水沙餅共煎連服三四碗骨化為涎

刻徽丸又名過街笑

蟾酥一錢陳酒化透入五靈脂麝香各一錢研和為丸二
白粒新零網包絲線紮固藏瓷瓶每取一九咬於痛牙九
化全瘡

固齒散

取老鼠頭骨牙同鹽煨存性研細以擦動牙牙即收上不
搖

取齒丹

活鯽魚一條每重十兩以白礬一錢入腹放無風無貓犬
處七日魚身發白毛用雞毛拂下以少許膏藥收之每遇
病牙取些些膏藥貼齒片刻牙即落下

舌上出血或鼻衄方

茅柴根車前子血餘三物為末吹擦即止以煎服治瀉血

鼻衄龍骨末吹入立止

小兒口疳方

生香附生半夏等分為末雞子白調作如餅貼男左女右
湧泉穴一周時瘡如小兒口內生毒塊不能食乳俗名噤
帳子用生地酒浸搗爛塗男左女右脚心自瘡

口舌藥方

荆芥梔子仁黃連黃芩連翹大力子薄荷通草各一錢燈
芯一撮甘草四分蒲黃一錢為末擦上即瘡又天葵冬麥
蘗冬去心元菱等分為丸彈子大日取一九喻化又舌鞭
生衣用犀黃硃砂各一分元精石二兩研末刺出舌尖黑
紫血用藥撒須臾舌軟

楊梅瘡敷藥

人指甲頭髮瓦上炙存性研粉每一兩加麝香一錢再研

和日敷

千金內托散
人蘗黃芪防風官桂白芷厚朴川芎桔梗甘草不用引
二陳湯

橘紅五錢半夏二錢茯苓一錢甘草加白芥子二錢炒研

四物保元湯

川芎當歸白芍熟地人蘗黃芪炙草

又保元湯

肉桂生黃芪生甘草

加味四物湯

川芎當歸白芍熟地黃生甘草炒白芷茯苓五味子人蘗

肉桂

十全大補湯

人蘗白朮漂淨土炒焦茯苓炙甘草熟地白芍川芎當歸

黃芪肉桂

六味地黃湯

熟地山藥澤瀉山萸肉茯苓丹皮

龍膽瀉肝湯

龍膽草當歸尾各二錢銀花花粉黃芩連翹各錢半知母

甘草丹皮防風木通各一錢

敗毒湯

連翹赤芍銀花歸尾黃芩花粉各二錢甘草節一錢煎湯

送醒消丸唯疔毒忌酒此外藥內不可缺酒水各一椀煎

半服小孩減半煎化丸服

雜證

外科之治法並藥方業已和盤托出尚有雜證亦藥到病除萬無一失者盡列於左

調經種子方

當歸身川芎吳茱萸各一錢熟地香附各一錢五分白芍茯苓丹皮各八分延胡索廣陳皮各七分若經水先期者必色紫加條芩八分過期者必色淡加官桂乾薑熟艾各五分不論先期落後每服加生薑三片水一椀半煎八分俟經水至日空心服起渣再煎臨臥服一日一劑服至經止兩三日交媾即孕經期準而不孕者照後方服四劑下期再服而孕續斷沙變杜仲當歸益母各二錢川芎一錢砂仁炒研五分香附二錢橘紅一錢紅花三分凡痛經不受胎者取丹麥曬乾磨粉日以二錢溫陳酒送服兩月內即孕無有不靈

求嗣得嗣法

昔褚澄言男精洩於先而女精後至則陰衰陽主男孕如女精洩於先而男精後至則陽衰陰主女孕又言月信初盡其濁氣未清而交接即女務待經止兩足日則女體虛而濁氣盡再男人保養月餘陽勝於陰定成男孕又論子宮左右如男精洩於婦人之左生男右則生女此男清女濁男左女右陽壯陰衰之至論也凡疾風暴雨或醉飽或服春藥而受胎者多天必俟天氣晴明日暖風和明星朗月而受胎者多富貴儻時令不正或迷霧氣怒而受胎者多愚蠢貧賤或雷電之後而受胎者定生怪狀一物凡求嗣者須知

黎洞丸

牛黃冰片各二錢阿魏雄黃各一兩大黃乳香沒藥兒茶天竺黃菱三七血竭各二兩山羊血五錢前藥各為末取山羊血拌曬乾再磨為末加藤黃二兩隔湯煮十餘滾去淨浮膩入末為丸如芡實大儻藥乾少加熟蜜可也丸宜陰乾以黃蠟包裹珍藏臨用破蠟取丸陳酒化服專治腫毒跌打危重之證內服外敷皆效

祛風逐溼散

番木鱉甲尾各精製淨末二兩川附一兩共為末專治手足不仁骨節麻木每服七分用好陳酒五鼓送下醉盡取汗服至痛處更痛麻處更麻頭眩背汗昏沉四五刻即定定則全瘳如服後不覺痛麻必要日服至知覺方止

化痞膏

凡患痞癰之處肌膚定無毫毛須看準以筆圈記用香油一斤密陀僧六兩阿魏五錢羌活一兩水紅花子麝香各三錢熬膏退火攤貼近取一膏可消年久兩張而瘳內服尅堅酒用水紅花子研末三錢浸火酒二斤時刻呷至瘳乃止

三日大瘳方

瘳未至之先用陽和解凝膏布攤貼背心用常山雲苓官桂甘草檳榔各三錢小黑豆四十九粒酒水各二椀煎至二椀當晚先服一椀蓋暖而睡兩一椀次日約瘳至兩箇時前頓熱服蓋暖臥待瘳至亦輕亦有當日而瘳瘳後忌房事戒食生冷勞碌風霜忌食雞羊牛肉雞子鴨卵白藕豆半月永截不發

愈瘳棗

紅棗三斤豬板油一斤陳酒三斤共入沙鍋內煮乾加水

三斤煮至一半不時取食食完瘡瘡如暑天分作五六次
煮食

黃疸立效方

凡患黃疸者眼白黃小便赤身體軟倦取黃豆生嚼不惡
心者是用蒼耳子薄荷木通蘇茵陳各三錢夏用無毫水
之陳酒一斤煎一椀術炒砂仁末三錢服小便赤如血者
加川連一錢同煎屢用瘡人有口癰癩黃疽皆淫證應忌
酒殊不知酒木溼也今做緝淫捕善識淫穴領藥戰淫非
酒不可如經滴水不效者何也酒被木解捕猶賊阻也

紅白痢及瘧息痢方

凡痢不拘紅白忌服川連服則倒胃不生腹痛而痢者後
方一服立瘳儻增減定不效車前草炒研二錢檳榔厚朴
山楂陳皮滑石甘草各一錢紅麴三錢炒淨瀉枳實各一
錢燈心一撮同煎另以木香六分酒磨衝藥而服有等腹
不作痛惟痢膿血兼流黃漿此係平素愛食冷茶水酒乃
滑腸麻息痢積溼之證取活鱖魚去腸雜切段放瓦上炙
炭研粉每服三錢黃糖拌熱陳酒送下數服全瘳不拘老
幼滑腸久痢者神效忌食水果水酒生冷海參海蛇等性
寒之菜

癩癩證方

凡患癩癩或羊頭風等證緣心竅中痰迷所致取橄欖十
斤敲損入沙鍋煮數滾去核入石臼搗爛仍入原湯煎膩
出汁易水再煎至無味去渣以汁共歸一鍋煎濃成膏
用白明礬八錢研粉入膏攪和每日早晚各取膏三錢開
水送服或初起輕者取橄欖咬損一頭蘸礬末入口嚼嚥
橄欖之味更美至瘳乃止

吐血立瘳方

凡吐血多者覓三四兩重大當歸一隻全用切細取好陳
酒一斤漫火煎至一滿椀頓於鍋中以溫為妙候將要吐
尚未吐口中有血含住取藥一口連血嚥下即此一劑而
瘳後不再發每有醫家阻云吐血尚要戒酒豈可酒者當
歸而服服則血噴不止如之何殊不知當歸二字之解當
者當其時歸者引血歸經也全用定血此方乃余家世傳
活人多多從無一誤

痰中有血方

活雄鴨一百隻每日清晨空腹時以一隻殺血碗內即取
唧嚥忌加鹽百日而食百鴨之血不可隔斷食完全瘳

湯血頭痛如裂方

當歸一兩酒一斤煎成一椀一服即瘳

偏身癢痛方

當歸肉桂延胡索天麻等分爲末酒送五服瘳

手足骨節癢痛方

熟地四兩搗爛浸入滴花燒酒二斤隔湯頓熱以竹筴攪
勻候冷隨量日飲至瘳取所浸熟地過酒

箭風痛方

延胡索桂心五靈脂木香白芷防風各一錢酒煎食遠服
三日三服瘳

雷頭風方

諸藥不瘳之證惟用山羊矢炒炭研粉酒送二錢立效

偏正頭風方

白芷三錢天麻一錢磨細防風荆芥錢半煎水衝服

疔膨食積方

雞裏金三十箇忌經木瓦上炙無臭氣成炭存性磨粉車
前子四兩炒磨粉二物和勻以米糖銘化與食食完全瘡
忌食炒豆熬油結硬等物遲治傷目

又方

田雞白水煮熟薑末少許淡食至瘡乃止

閃頸促腰方

礪砂研粉以骨簪蘸津黏粉點兩目淚出稍鬆點三次
立時全瘡

赤眼流膿方

杜仲厚朴桑白皮檳榔各一錢取雄雞肝一箇忌經水去
紅筋入白酒釀六兩隔湯頓熟去渣以湯肝食下隔兩日
再服三次全瘡

胃脘痛方

外科證治全生雜論

五

活乳汁草即蒲公英放瓦上炙枯黑存性研末每取五分
燒酒調丸口含再以燒酒送照痛息接服五日全瘡戒食
生冷

又方

紅坊內好紅花四分棗頭十枚水二椀煎至棗熟去花食
湯棗連服二十日永遠除根

夢遺方

六味地黃湯減去澤瀉增龍骨三錢生研水飛蓮鬚一兩
芡實二兩線膠四兩用牡蠣熱粉炒膠成珠去蠟磨粉同
前藥蜜丸每日早晚各取四錢鹿含草煎湯送服

白濁方

牛舌頭草根即野甜菜又名秃菜根近水池處最多煎湯
當茶飲或以湯煮粥喫至瘡乃止

效嗽神效方

杏仁一兩泡去皮尖內有雙仁者棄之買新乳鉢新研捶
將杏仁搗爛如泥分為三服每內加冰糖三錢共入蓋梳
用泉水煎滾衝入蓋片刻俟溫連杏仁末服下早晚各一
次三服而瘡如以杏仁同煎無效

天絲入目方

捉肥蝨二十餘將蝨用鍼戳破令人仰臥捏蝨血滴入眼
內少刻天絲灰抱蝨血而出

塵屑入目方

吐津於石硯上以人指甲磨濃汁用骨簪蘸點眼內不
刻一抹而出

跌打骨斷方

綠礬一斤煎湯粗紙浸透裏傷處手執燈心然火不住紙
上炙紙溫即易火炮換然再炙二者相際效速斷骨處用
竹片綁紮七日全瘡

外科證治全生雜論

六

冷哮方

淡豆豉一兩白礮一錢皆為末用飯三錢研爛入末為丸
如蘿蔔子大每取七粒白湯送下童子服可除根有年者
經寒即發服可把定不哮

腸紅方

取花椒子炒磨粉每服三錢用黃糖拌白湯送下服至瘡
止

胃寒嘔吐黃水方

生薑一斤擣取汁梳許入廣膠乳香沒藥末各五錢同煎
膠化離火取藥攤作三四大膏令貼胃脘痛處以絹縛縛
三箇時然後取周歲孩鞋兩隻鑪上烘極熱輪敷至膏

硬再易膏貼再紉三時取至瘡而止後服慰胃丸○厚朴三斤切片薑二斤薑帶原皮五升水煮去薑留朴焙乾生甘草二兩乾薑四兩依前再煮乾去草留薑朴炒燥共為細粉黑棗薑湯煮取棗搗為丸曬乾服

翻胃初起方

陳皮土炒黃皮起胞為粉每空心服三錢

烏沙瘡方

丁香雄精蒼朮硃砂各等分為末取蟻蛛亦等分切片酒浸研漿和末搗為丸如芥子細曬乾藏貯每取七粒溫茶送嚥立甦

水瀉立瘡方

焦白朮蒼朮各二錢山楂厚朴廣陳皮土炒黃芩各一錢車前二錢焙搗同煎

大麻風方

用粗如酒杯之蛇一條竹刀破腹去雜切寸段取瓦放於炭火上以蛇段豎放瓦上蛇段跌倒者無毒棄之其不倒者有毒用炙存性磨粉拌入飯內食通身白毛鴨一隻與食次日鴨毛盡脫殺鴨石鍋內煮爛勻作四五日食凡食鴨第一頓其腫者更腫第二三頓收小食完而瘡潰爛不堪及初起未爛者治法同效

狗咬方

番木鱉切片瓦上炙炭存性研末撒上一二三日可以收功如爛潰日久者半月收功

小兒冷疔方

小兒面黃腹大名曰冷疔證多不瀉食多吐用丁香七枚研末乳蒸三四次薑湯頓服若吐瀉相兼者橘紅分等蜜

九如黃豆大米湯下不瀉僅吐者半夏薑湯浸者曬乾磨粉對丁香橘紅末薑汁糊丸薑湯送下吐立止

小兒蟲證方

檳榔六兩黑牽牛仁二兩白牽牛仁二兩為末用烏梅兩枚花椒三十粒煮湯吞服二錢如腸鳴久瀉用青皮棟樹根肉蒸透曬乾再蒸白饅并每服一錢

夜嘔兒方

因穿蓋過暖竝父母同牀熱極所致諺云若嬰小兒安常帶三分飢與寒取雞矢塗兒臍中男雌女雄最妙或用真屍黃飛硃砂各五釐研和塗舌上立止

砂雪丸

急漫驚風用青蒿節開蟲狀如小蠶七月內有久亦成蛾將蟲七箇搗和硃砂輕粉各五分九粟粒大一歲一九乳

汁調服詩云一半硃砂一半雪其功全在青蒿節任教死

去也還魂服時須用親娘血

啞驚丹方

天竺黃二錢麝香犀黃各四分雄黃一錢琥珀六分殭蠶一錢陳膽星四錢各為末用甘草鈞藤鈞煎膏為丸硃砂一錢為衣外加赤金每料勻作四十九每服研一九用燈心炭四錢薄荷湯送下神效又方用大蜘蛛一箇炙粉調豬乳灌之立刻音出

小兒目疾方

黃連一錢人乳調塗湧泉穴男左女右紅赤白無

又方

痘後眼內有星翳取杭州臘脂泡水鋪紙水上以新筆在紙上蘸水一日拂三次三日瘡遲治帶疾

小便閉方

此證乃氣閉非大小便不分也往往醫家用澤瀉木通車前豬苓等藥全無一效以歸身一兩川芎五錢柴胡升麻各二錢半水二碗煎八分一服即通曾救多人或孕婦及老年之人加入蔓一錢

老年便燥方

老年人或患癰毒大便燥結取杏仁松子仁火麻子仁柏子仁各三錢搗爛滾水衝蓋片刻當茶即便如熱甚者加甘蔗汁半杯衝服

小兒浮腫方

一童十一歲手足臂腿及指頭面偏身浮腫數日後口增沉重以致氣喘不能眠一客令食黃皮柑子一枚同酒釀二斤煎至將乾去柑內核取柑連酒釀食食二次全瘳

外科證治全書

九 五五

製藥

用藥如用兵也兵有勇猛藥有燥烈烈藥經製則純勇兵經練則精兵精破賊不難烈藥治病易瘳苟於製不妥猶勇兵之武藝未備也今人不精於製而視性之烈燥者畏如蛇蠍諺之曰一效難求余初讀藥性繼攻炮製然藥之性古今之議未遠炮製之法卻有不同余留心四十餘年深得製度烈藥之法用之功靈效速萬無一失方悉烈藥之力如勇兵製藥猶如演武也因古書獨於烈藥之處未詳是以錄登是集為炮製之補遺云爾

銅青

酸平微毒治惡瘡疔瘡殺蟲吐風痰

鉛粉

酸冷無毒消中風痰止驚吐逆

外科證治全書

黃丹

臨用炒紫色篩入膏內生肌療溼殺疥癬蟲

蜜陀僧

研水浸煮澄去水日乾入膏消痞殺蟲

鐵鏽

殺疥蟲

丹砂

研粉水飛養神安魄除中惡腹痛驚癩胎毒

水銀

應依方製用有微毒治惡瘡白禿下死胎

輕粉

有毒除爛孔毒根驚癩癢惡瘡癩癬

銀朱

九 五五

有微毒療疥癬殺蟲止癢殺蟲

雄黃

名腰黃透明者佳水飛治惡瘡死肌消癰毒化腹中瘀血

滑石

丹皮對分煮透取石研水飛通九竅利六腑生津液分水道行積滯逐凝血降心火解暑熱

礞石

經製無毒不傷人畜同鉛入器內礞放鉛底火鎔煙盡爲度鉛上刮下者名金頂礞取香油一兩生礞一錢研入油煎沫盡煙絕擦鴨掌風取紅棗去核以礞代核髮紫入炭火煨至煙盡取研細粉名赤霜治走馬牙疳久潰不斂者撒上數次收功生者可療冷哮不傷人畜

元精石

鹹溫無毒治小兒驚癇硬舌

寒水石

性寒火煨用治潮熱中暑牙瘡

硼砂

性暖止咳療喉去翳口齒諸瘡津蒸點目立瘰閃頸促腰

硫黃

敲細粒以蘿蔔搗爛絞汁煮再換紫背浮萍湯煮再煎煎菴湯飛過去盡毒臭日乾研粉色白取豬臟淡煮爛熟每日早晚各取一段蘸粉分餘食治久痢滑瀉命門不足虛損洩精壯陽道補筋骨殺臟蟲長肌肉治陰蝕生用殺瘡

白礬

透明者佳蝕惡肉固齒以橄欖蘸食味佳瘰癧證解腸由

外科證治全生 製藥

毒治癰痔頑痰

綠礬卽皂礬

療疔黃肝燥脾溼化痰

伏龍肝

卽竈心土再燒紅研水飛日乾乳調立療湯火爛孔

甘草

切三寸一段水浸透放炭火鐵篩漫炙炙至汁將出卽取離火暫冷再炙炙至草熟去皮切片熟者健脾和中甘平之品乃九土之精生者化百毒和藥性潤肺解瘡疽胎毒利咽喉

黃芪

去心蜜水潤炙如入補腎藥以鹽水潤炙切片炙爲補氣藥生有托毒功

人參

補氣獨入肺經肺主諸氣蓋肺旺則四臟皆旺特自生而形自盛補中益氣一切虛證

沙參

清肺火益心治久嗽肺痿消癰排膿

桔梗

去頭枝浮皮泔水浸一宿切片微炒職稱肺經消痰理欬清上焦熱治咽喉排膿口鼻諸證

知母

去尾切片上行酒潤焙下行鹽水潤焙瀉有餘之相火多服令人洩

白朮

浸一宿切片土拌蒸透去土勿炒於朮浸刮飯上蒸曬如

棗黑黄土炒於朮功勝白朮乃中宮和氣補脾之藥

蒼朮

泔水浸去粗皮切片日乾土炒炭治脾胃寒溼消痰逐水不伏水土止瀉痢霍亂久服延年

元蓂

蒸曬忌銅器消癰滋陰降火利咽喉通小便

地榆

水洗去骨切曬磨粉療惡肉湯火膿血犬傷

丹菱

色赤酒潤炒血分藥也補心血養神志生新血安生胎落死胎爲胎前產後要藥每晚酒送末二錢連服四十日可療痛經即孕

白芨

療瘡嚼塗手足燥裂

三七

止血定痛癰腫蛇傷

黃連

大寒治實火凡痢疾目疾非實火誤服致命爲倒胃之藥唯驚能療解巴豆輕粉之毒胡黃連性同

黃芩

苦寒風痰骨蒸喉膈癰毒養陰退陽

秦艽

去毛浸一宿曬乾切片搜肝膽伏風養血榮筋理肢節痠麻不遂大便滑泄者忌用

天麻

酒浸透以粗紙黏餘酒裏煨切片焙用治風溼四肢拘攣

助陽通血脈利腰膝強筋頭眩暈

柴胡

去皮切忌經火苦寒行兩脇入膽經暢氣血肩背痛銀柴胡亦同勞瘵者尤宜根上升梢下行

前胡

去淨皮鬚入竹漚內浸潤日乾切用微寒肝膽中風痰非此不療柴胡主升前胡主降散風祛熱消痰下氣開胃化食止嘔喘嗽安胎治小兒夜啼

防風

甘溫走膀胱瀉肺實火頭風眼淚祛溼而黃芪得之其功愈大乃相畏而相使也

薔落羌活

去皮焙用治一切痛風散癰毒惡血腎閉邪風

升麻

內白外黑者佳治脫肛遺溺小便閉塞用此提氣下元虛者忌用

苦菱

泔水浸蒸切曬乾主風熱蟲證腸風血精下痢治大麻風虛弱忌服

延胡索

破血利氣通經止痛

紅花

酒洗焙少用通經活血多用破血去瘀血

水紅花子

研損用剋堅消痞痰積惡滯

黃母

去心糯米炒黃治肺家燥痰敷惡瘡浙黃去心炒專消癰疽毒痰

茅根

甘寒入胃治內熱煩渴利小便止喘黃疸

龍膽草

去頭鬚切細甘草湯拌曬味滴大寒相火寄在肝膽瀉肝膽膀胱之熱火療咽喉

細辛

去頭爪水浸一宿切曬治牙癢頭風通疔竅

當歸

酒浸曬乾切用上部用頭中部用身下部用梢頭身活血梢破血全用定血引血歸經除頭痛和血補血潤腸胃筋骨皮膚排膿止痛

芎藭

不油者佳忌獨用主一身氣血閉鬱去瘀血調經種子排膿生肌頭風目淚多涕去溼

白芷

水浸去灰切炒消癰蝕膿頭風中風解穢毒

白芍

外科用酒炒固腠收斂

赤芍

消癰腫破堅積惡血下氣生肌止痛

丹皮

酒拌蒸產後要藥治骨蒸麪裏煨熟厚大腸

木香

下降療腫毒止吐痢消積止腹痛統理氣分

高良薑

土炒療寒邪疝瘕瘧瘧宿積

縮砂仁

順氣開鬱結炒研安胎產後停惡露小腹作痛生研六錢滾水衝蓋溫服立療

香附

去皮童便浸水洗曬搗醋鹽水拌炒解鬱消癰積聚痰飲調經

藿香

治腫毒去惡氣止霍亂溫中快氣吐逆

澤蘭

治癰疔通九竅利關節破宿血生肌利小腸

荆芥

散風熱清頭目風利咽喉瘡腫賊風

薄荷

治賊風發汗利咽喉口齒瘰癧結核

紫蘇

葉發汗梗安胎子消痰喘葉梗為末治囊脫

白甘藷

治目風熱梗枝葉解癰疔毒煎湯洗結毒

陳艾

用粉糊漿透日乾杵去粉并葉屑則成白絨謂之熟艾調經加硫黃少許作團灸百病

茵陳

治黃疸溼熱通關節去滯熱利小便

青蒿

七月中節內生紅蟲取出共輕粉硃砂和入持為丸如粟粒大每丸裹以金薄每歲一粒乳汁送服療治急慢驚風

夏枯草

性寒以治療癰從無一效久服則成癰癆

牛蒡子

酒拌焙乾研損達肺利咽消痘疹毒根莖葉苦寒無毒泥名氣殺醫生草生搗塗消一切癰毒塗喉一切堅肛入爛孔拔毒生肌入膏煎貼癰癩煎湯洗楊梅等毒

續斷

酒浸炒性微溫入肝家續筋骨助血氣消血結胎產跌撲行血止血

蒼耳子

去毛敲損治黃疽脾瘰

外科諸症全生 續集

八

益母草

女科諸證皆良活血破血調經止痛下水消腫

麻黃

連根發表用梗不表甘溫開腠理凝滯閉塞

燈心

利小便清心火取活竹一段兩頭留節中開一眼以心塞實外以原刻下竹仍填原眼外加泥裹入糠火內煨至竹成一炭取出去泥俟冷去竹炭內是燈心炭也治骨鯁懸陰疝入護心散

地黃

生用性寒涼血滋陰解熱水煮至中心透黑然後每斤入滾陳酒半斤炒砂仁末一錢再煮煮至汁盡瀝起曬乾仍入收盡原汁再曬乾忌經鐵器補陰壯真氣生肌填髓同

肉桂引火歸元療陰分虛虧

芋藤

酒拌蒸則補生用下行補腎強四肢腰膝莖痛

麥冬

去心酒浸則補湯泡則微寒祛熱毒浮腫洩肺中伏火安臟心腹

淡竹葉

解煩熱利竅治中風口瘡目痛胸痰熱毒藥店有賣葉如竹葉甚薄梗如柴心甚細七寸長者是今醫家以閉綠花草誤用可歎

葛葉

根水煎服可愈白帶花一兩搗爛麝香五分水一大碗煎服可愈二便閉無花時根亦可子催生落胎花末酒服可

外科諸症全生 續集

九

下橫生倒產

車前子

酒拌炒研損分理陰陽利小便止暑溼瀉痢益精養肝肺強陰止痛

馬鞭草

苦微寒熬膏空心酒服半杯治癩疥殺蟲逆經活血塗癰癩煎湯熏洗陰腫洗楊梅惡毒

連翹

瀉心火脾胃溼熱結熱腫毒心家客熱通經

紫花地丁

療癰疔輭堅肛疳麥芒黏咽喉爛喉下即安

大黃

每斤用陳酒五斤煮爛日乾名熟軍治燥結熱毒清實大

下宿積化停食生熱功同熟者純

蒟蒻

有毒忌鐵器搗敷石疽消溺便通二便疏洩水腫衝掛山倒岳之力腰腹背忌敷貼

大戟

苦寒有毒去附枝水煮透去骨切曬消頸腋痰癧瘰癧結下痞墜胎治鼓瘕利二便

甘遂

每斤用甘草四兩煎湯浸三日湯黑去湯河水淘洗取清水日淘日浸每日換水數次三日後去心再淘浸四五日取一撮入白瓷盆內隔一宿次日盆中水無異色乃爰再淘三四次瀝乾以麪裹如團入糖火煨至麪團四面皆黃內藥熟透取出曬乾入鍋炒透磨粉其苦寒之毒經製

外科證治全生

十一

則淨不苦而甜不寒而溫專消堅結痰塊毒核

蓖麻子

辛熱有毒研粉去淨油方爰拔毒孕婦忌用

常山

生用損神喪氣切薄片曬乾每一斤用陳酒對浸浸透取瀝曬乾收盡斤酒曬透炒至焦脆瘡癩非此不消爰甘草對分截瘡聖藥

川附子

昔產深山有毒今民家栽種無毒用木浸一二宿日易水浸去鹹麪裏火煨切片日乾補腎肝陰虛治中風癱瘓陰陽疝氣

川烏

功同附子性緩助陽補命門不足癰積冷痺

草烏

有烈毒去皮取白肉每斤用綠豆半升同煮豆開花去豆取烏切曬磨粉治風痰手足拘攣逐凝結追筋絡寒痰開膜理以黑皮炙研醋調治蛙髮癬

半夏

選肥者生薑明礬湯浸透者透切片日乾消痰墜胎生研細末立療刀斧跌破止血

蚤休即紫河車草

去皮毛切焙微寒治乳癰疔毒

五味子

鹽水拌蒸滋腎水不足強陰固精主收斂

黑白牽牛仁

酒拌曬除溼熱壅結通大腸閉殺蟲祛積

外科證治全生

十二

番木髓

水浸半月入鍋煮數滾再浸熱湯中數日刮去皮心入香油鍋中煮至油沫盡再煮百滾透心黑脆以鐵絲篩撈出卽入當日炒透土其細粉內拌拌至土粉有油氣入粗篩篩去油土再換炒紅土粉拌一時再篩去土如此三次油淨以木髓同細土鍋內再炒入盆中拌卷一夜取髓去土磨粉入藥獨有木髓之功而無一毫之害能搜筋骨入髓之風溼祛皮裏膜外凝結之痰毒煎木髓之油俟熬化核膏入用

天花粉

治癰熱唇乾口燥瘰癧排膿

天葵子

去心酒潤治陽物不起潤五臟欬嗽消痰降火去風熱煩

悶中風

土茯苓

清熱泄瀉骨蒸利關節若云治楊梅毒謠語也未見用療

一人

白朮

苦平無毒生肌止痛解癩毒蟲毒

木通

微寒開未閉之月經通閉塞之經水和血脈利小便清伏

防己

寒酒潤治膀胱苦熱利二便療下部紅癰

金銀花

消癰毒取活藤煎膏以花拌入收曬其解毒之功勝花百

倍暑天日取錢許滾湯衝當茶

藤黃

酸澆有毒蛙齒點之便落忌喫菸

澤瀉

通利小便走腎膀胱有洩濁者忌用

海藻昆布

性寒稱治癩癧聖藥卻謬當禁用

仙人對坐草

四季梗葉長青臨冬不衰毒蛇咬搗汁飲以渣塗之療

穀芽

啟脾進食寬中消食

浮麥

止虛汗盜汗虛熱

麥芽

開胃消食和中

大麻仁

利大腸熱燥大便熱結

薏苡仁

補肺益脾去溼消水腫理腳氣

小黑豆

同甘草除癰胃中脾熱臍中結積

白豆豉

解穰毒除痰欬同生礬為丸療冷哮

神麴

消食健脾暖胃止瀉吐破堅結

紅麴

炒消食活血健脾胃療痢酒服除產後惡血

白芥子

炒研皮裏膜外陰寒之痰非此不消

生薑

溫中去穢除風邪暖胃消寒痰解食萊毒乾用止嗽嘔炒成炭性純陽如誤服寒劑非此不解

蒲公英

又名乳汁草甘平無毒書載療乳癰結核皆說炙脆存性火酒送服療胃脘痛

紅棗

解烏頭附子天雄毒和陰陽調榮衛生津液

杏仁

去皮尖除肺熱氣送潤大腸氣閉

松子仁

潤肺治燥結欬嗽同柏子仁治虛閉

烏梅

酸瀉斂肺安三蟲拔毒根

楊梅

患痲病者忌食燒酒同食致斃

橙子

患惡核癰癤痰證者食之成功瘡後復發

陳皮

治脾不化穀膀胱熱利小便殺寸白蟲去白名橘紅消痰

止洩教開胃治吐清水腸閉解大毒

青皮

順逆氣開鬱解疔毒

外科證治全生製藥

法

山楂

浸透去淨其核日乾炒炭除產後惡血消肉積積滯宿食

椒橙

形尖入心經清心火解魚鼈毒生津止渴離明礬食味佳

豁痰

檳榔

健脾破結癩痢裏急後重截瘧

吳茱萸

浸熱湯七次去淨苦烈治瘡生炒研用

甘蔗

甜寒絞汁可療小兒衣多暑熱之病

蓮鬚

固精烏髮悅色益血止血

芡實

炒治遺精濁帶益精開胃助氣明目

山藥

開矇補精血健脾胃

柏子仁

甘平無毒興陽道益壽元潤腸甯神

松香

先取胡葱煎湯去葱以湯分三次煮香每俟湯溫在湯內

手扯洗其油去盡冷凝磨粉專療溼風治白禿生入膏生

肌

肉桂

純陽引火歸元解陰寒凝結去皮日桂心更純桂枝性橫

走手臂發表

外科證治全生製藥

法

官桂

理陰分解凝結瘰癧疾行血分通毛竅

沉香

乾研末或酒磨以煎劑衝服治腫毒心腹痛調中補臟益

精神壯腸

丁香

辛溫治霍亂痞塊吹鼻瘰癧疔反胃開膈關腹中腫毒鼻

中息肉乳頭裂破

樟腦

每兩用椀對合溼紙封口火升半時則成樟冰治中邪腹

痛風痰加花椒同升殺牙蟲止牙癢

芸香即白膠香

水煮三度俟湯溫手扯油淨冷即硬磨粉解疽毒止痛輕

粉對研豬油調敷爛孔

冰片

苦寒治舌口咽喉火毒研水調吞治難產

乳香

每斤用燈心四兩同炒炒至圓脆可粉為度扇去燈心磨粉用消癰止痛託裏護心治遺精產難

沒藥

製法與乳香同破堅敗惡血消腫生肌墮胎去翳

血竭

散滯血止諸痛生肌

阿魏

酒拌曬研殺蟲解臭消痞解死獸肉毒肉積

厚朴

外科證治全生製藥

七

去皮切片每斤取帶皮薑四兩切片同煮汁乾炒透去薑溫中消痰厚腸胃除積冷宿血宿食

金鈴子即川棟子

酒拌透蒸去皮入丸用核搥細不用肉入煎用肉不用核苦寒有小毒產於川者佳本地者細以入火燒存性能託毒水治久潰爛孔

杜仲

去皮每斤用蜜三兩塗炙蜜盡為度肝經藥也補中益腎補肝虛堅筋強志

棟樹根

去皮取白肉殺腹內諸蟲皮赤者忌用

皂角刺名天丁

五月初取嫩者搗爛醋煎成膏療癬生用穿癰無醋者可

療橫痃

巴豆仁

研壓數次油盡如粉名巴霜拔毒孕婦忌用

桑白皮

取白肉切焙瀉肝火降大小腸氣散惡血

栝樹

取皮裏白肉甘溫無毒治血結補損虛

枳實枳殼

即細皮香圓六月摘者實八月摘者殼陳蛙者佳並去穢核以麩炒實寒消食積開胸結殼亦寒健脾胃止吐消痰除裏急後重

柯楠

陳者佳全用療子癰炙存性研陳酒送服療疝氣核治腸

外科證治全生製藥

七

風下血方中楠核即此往往以爛楠核誤用蘇城醫家尚未認得柯楠

山梔炭

苦寒無毒熱厥頭痛疝氣湯火

黃肉

選淨補精益腎

白茯苓

蒸透切逐水暖脾生津止洩除虛熱開膝裏

赤茯苓

破結氣瀉心小腸膀胱溼熱行竅行水

茯神

安魂魄養心血治心神不安

琥珀

用側柏子末入瓦鍋煮有異光取出入燈心對分研粉清肺利小腸安五臟定魂魄消痰血明目

天竹黃

治小兒驚痰每二錢加雄黃半末各一錢研勻麪和九粟米大每服五丸薄荷湯送下治失音不語

蜂房

露天有蜂子在內者佳炙研能托毒療久潰止痛同頭髮蛇蛻燒灰日以酒送錢許治臟腑惡毒疔毒以炙存性酒拌服治失禁遺溺煎湯洗毒孔無蜂者不效

土蜂窠

在嚴凍大雪中以布袋袋之能取取入蒸桶蒸死連窠炙研以醋調塗癰瘡即消以蛇蛻同煨治疔毒走黃乳調服療小兒吐瀉

外科證治全生製藥

六十九

五倍子

斂肺生津消酒毒收溼療瘡脫肛

殭蠶

糯米泔水洗淨炒研治中風喉痺散風痰消癰癧風瘡陰癢療驚癇疔痔

蜘蛛

炙研粉豬乳調治啞驚

蟬蛻

滾湯洗去泥翅足曬乾治目昏翳障痘疹疔腫

噉子

水洗三次去鹹炙研用治驚中風

推車蟲即蛻螂

五月晴日有蟲捕人糞一團如推車者是火炙研粉和乾

應末敷出多骨忌經水生搗為丸塞糞門引痔蟲出盡示

癩團即癩蝦蟇

大者佳生用填爛孔拔深毒頓年久毒疔取酥捉老蟾仰天以其頭入等散內取等稱上蟾之腦中放出白漿是去蟾以等散曬乾刮下配藥消癰拔疔止牙癢絞腸痧瘰

蜈蚣

取活者香油浸死蛙髮癬搗爛塗足指雞眼一宿脫落瘰而不發

蚯蚓

藥鋪有賣破腹去泥以酒洗曬乾每四兩配糯米花椒各一兩同炒炒至米黃透為度去椒米磨粉治歷節風痛手足不仁疔毒腎囊腫

外科證治全生製藥

七十

蚯蚓糞

入火煨紅每兩入輕粉一錢研至粉內無星為度取活紫花地丁搗爛絞汁調塗爛腿日洗口塗數日瘡以甘草煎汁調塗小孩腎囊腫痛

龍骨

白淨黏舌者佳捉燕子破腹棄腸以骨填腹懸井內離水尺許候準一周時取出生研水飛曬乾用蓋龍有病食燕而瘡得水而騰忌經火生肌斂瘡治鼻紅

穿山甲

尾上細甲良同土炒至鬆肥研通經絡殺蟲消癰逐邪風祛積溼瘡痔

蛇蛻

豎蛇不經地者佳泥裹火煨去泥研粉治疔腫以蛇蛻不

煨煎汁敷白點風洗惡瘡

白花蛇即斷蛇

鼻向上有方勝花紋去頭尾酒浸除皮骨炙則不蛀治溼瘡

石首魚即白鱖

開胃益氣首中腦石燒研入冰片治害耳膜出患肺疽者終身戒食

朱髓

大如錢腹赤如血又名金錢髓出深山石洞中廣德州最多甘無毒炙存性研粉能消漏管

牡蠣

童便浸七日硫黃末醋調塗黃土裏煨止夢遺赤白濁補腎安神除盜汗消痰塊

外科證治全書

三

真珠

入豆腐煮一炷香取出與燈心同研極細去心除翳障安魂魄療驚逐痰止遺精白濁解痘疔毒下死胎胞衣生肌肉

田麻

搗爛塗結硬痰核塗命門通小便入冰片瘡疔如入膏內煎必預敲碎其殼以杜油暴暴則近人受湯黏衣

雞裏金

炙透磨粉消久停宿食療疔瘡

白丁香

麻雀矢雀身細頭圓翅長者乃雄入籠取矢冬月佳甘草湯冷浸一宿焙研咬癩頭拔疔毒

五靈脂

研末酒飛日乾止經水過多赤帶不絕男女一應療血疑齒痛

山羊血

解鮮菌河鮑毒傷損惡血

山羊矢

曬乾炒成炭存性入壘悶熄磨粉療潰爛生肌酒送二錢療雷頭風水粉各一升浸一夜絞汁頓熟每午刻服疔疔欲死者三服全瘥

線膠

剪細同牡蠣粉炒如珠去蠟為粉性溫補腎益精止遺精白濁

皮脂即烟膠

硝皮鋪刮下諸皮之膜入鍋炒炭磨粉生肌肉療溼風膜

外科證治全書

三

稟溼爛等瘡

象皮 炙成糊存性研粉生肌肉

麝香

定神療驚解果毒消癰疽開經絡竅墮胎

貓矢

在屋上曬白者多收以土裏火煨研粉黃僂拌食治童子癆傳尸癆真仙丹曾療多人

鼠矢

尖者佳要揀淨恐有蛇蟲毒矢和內炒透研粉治易證瘰癧孔追毒水

頭髮

壯年人者佳以皂角煎湯洗淨曬乾同油煮成餅浮起枯

色爲度入膏生肌長肉止血

指甲

瓦上土炒成炭存性研粉吹止鼻紅加冰片吹治咽喉塵屑入目以津磨甲膩點睛立瘥

人中黃

臘月取孩結糞陰乾泥裏煨炭治熱狂痘毒脚麻至小腹而死或頭麻至心口而死者一日死甦幾次取末三錢豆腐調服立瘥

人中白

係夫婦之精入馬桶歸坑凝於底者是俗名坑凝蘇松常鎖以釘作坑廣產僧寡家者不爰入火煨煙盡悶熄研用治咽喉口齒瘡疔諸瘻出血血汗

外科證治全生醫案

七十五

醫案

諺云千學不如一見是以從師習醫必經師率視證見廣識多遇證始無疑惑余以四十餘年之臨證摘其一二奇險危篤者錄之於左以備詳察不必拘拘於師率視證云

喉證醫案

一壯年新婚百日妻往母家滿月方回時值酷暑因交接後貪涼五鼓時喉痛氣逆寒熱交作余問之則曰三日前喉開略有微痛今早五鼓腫痛更甚視其小舌腫如拇指知係心腎虛火交接後經風風火兩閉之恙若用發表虛上加虛若投寒劑風火被卷卽用前胡蘇子連翹元蔓赤芍浙黃甘桔入味煎服立瘥

外科證治全生醫案

七十六

余問始知驟起況服涼藥增險此陰寒無疑但痰壅一口萬難進藥卽取鴨毛蕪桐油蘆許入喉一捲痰隨毛出吐有升許以肉桂炮薑生甘草各五分入碗內以滾水衝浸以椀仍頓湯中用匙取藥連呷三四口卽瘥

南濠一匠半夜請治喉證問之不能回答旁人云昨喫夜飯睡著後忽喉痛而醒余以炙附如細糲一粒放其舌上嚙津數口全瘥

髮疽醫案

興邑路姓七歲童頂門寸許竝患三疽潰久不斂孔如芥子大淺而無膿乾而色灰人倦無神因服涼劑過多飲食不進余曰色似香灰乃氣血兩喪無膿乾枯精神已絕兼不能食難以醫治次日而天

瘰癧醫案

楓鎮閔姓年十七頸患瘰癧爛成一片延爛耳腋及腰如
手掌大者數處瘦弱成怯初以洞天救苦丹與服毒水大
流十日後以陽和湯醒消丸每日早晚各服一次十日頂
能舒轉飲食日增外賜陽和膏內服大棗丸並用荆芥湯
洗以山蓮散敷九十日收功因未服子龍小金二九其毒
根未除後腋生惡核仍以子龍丸消之杜患

王姓媳頸內瘰癧數箇兩腋惡核三箇又大腿患一毒不
作瘰癧百餘日後日漸發大其形如斗按之如石皮現青
筋常作抽痛經治數人皆稱日痛余曰瘰癧疔硬此石疔
也初起時可消日久發大上現筋紋雖按之如石然其根
下已成膿矣如偶作一抽之痛乃是有膿之證也上現青
筋者其內已作黃漿可治如上現小塊高低如石凸者不
治三百日後主發大痛不潰而死如現紅筋者其內已通

外科證治全生醫案

七十五

血海不治僥生斑點即自潰之證潰即放血三日內斃今
所患現青筋能醫至輒為半功潰後膿變濃厚可冀收功
也外以活蔞蔞搗塗內服陽和湯十日則止一抽之痛十
三劑裏外作瘰十六劑頂輒十八劑通患輒其頸項之瘰
塊兩腋之惡核盡行消散一無形踪止剩石疔高起內膿
袋下令服菱一錢因在筋絡之處先以銀鍼刺穿後以刀
開其口以紙釘塞入孔內次日兩次流水斗許大劑滋補
托裏刪去人蔘倍增生芪連進十劑相安已極適有伊戚
亦行外科道者令其芪草換災服不三四日四圍發腫內作
瘰癧復延余治余令其照前方服又服二十餘劑外以陽
和膏隨其根盤貼滿獨留患孔加以布細綁人問因何用
膏貼又加細綁答曰凡屬陰疽外皮活內膜生故開刀傷
膜膜爛則死所出之膿在皮裏膜外僅似空術又不能以

生肌藥放入故內服溫補滋陰活血之劑外貼活血溫暖
膏藥加之以細使其皮膜相連易於膿盡且又易於連接
生肌果後數日內膿甚厚加菱服兩月收功

痰核醫案

婦項痰核三處年久生管延治以拔管藥插入日易半月
瘰兩惟有一管淺如一精不意伊夫遠歸兩日管深如舊
余曰此刻治定無功效容日商治伊母問余余曰俟令婿
出外半月亦可收功數日後接女歸延治而瘰又壯年臂
有二管問伊可有暗疾日有夢遺以六味丸刪去澤蔞增
線膠龍骨艾實蓮鬚為丸鹿含草煎湯晨夕各送三錢服
半料而夢遺瘰瘰後即以拔管藥治之仍服前丸服完二
管皆痊

惡核醫案

洞庭秦卜年項腋惡核十二處服連翹昆布等藥病重又
被刺破爛經三載始來就醫以陽和湯屢黃丸輪服半月
十中瘰入喜甚帶藥而回路見涼粉買食至家又食冷水
油虧次日二便皆閉第五日死此病者自不惜命故記以
為病者之戒

外科證治全生醫案

七十六

南濠客葉南高之弟耳下竝患惡核一被醫穿生管後大
如杯以陽和湯小金丹輪服未潰者全消彼問管可易瘰
否余曰消管甚易管消即斂儘將斂一經走洩管即復生
瘰期難訂其弟真誠果即斂

乳疔醫案

婦乳患一白疽寒熱痛甚余以陽和丸同二陳湯煎服得
腫痛息連進三服全瘰又婦患者相若伊婦弟亦習外科
以夏枯花粉連翹橘葉等藥連服五劑號痛不絕延余治

因向白色今變微紅以全消即書肉桂炮薑麻黃加二陳湯令伊煎服今晚痛止能睡明月數皮縮小服下果然連進數劑患頂不痛而潰貼陽和解凝膏收功

一婦兩乳皆患乳岩兩載如桂則大從未經醫因于死悲哭發威形大如杯以五通九犀黃丸每日早晚輪服九日全消又男子患乳岩先用鯽魚膏貼上兩日發大如拳其色赤紅始來就醫令其揭下與服陽和湯四劑儘色轉白可救色若仍紅無救矣四日患色仍紅哀懇求治以犀黃丸陽和湯輪服至十六日四餘皆消獨患頂潰用蟾拔毒三口半月收功

發背醫案

山塘姚姓媳年二十九小產月餘左肩手搭處先發一毒周有尺五患後半月背脊添出一毒自上至下計長一尺

外科證治全生醫案

四 七十七

三寸上闊下尖皆白陷十日後始請余治其勢甚篤連服陽和湯三劑人能坐起五劑自能大小便十二劑其續發者全消先發之搭手餘地皆消止剩患頂有膿者如蒼子大膿足不痛而穿四日收功後言背上如負一板舒轉不快以小金丹十九每日二進漸漸不板神色復元木漬鎮談姓婦背患如梳初起色白近已轉紅痛甚時值三伏余以陽和湯書畢旁人云此暑天緣何用麻黃發表桂薑之熱劑余曰此陰證也彼云患色轉紅陰已變陽余因其說立令煎服服後不一時痛息接服四劑患平七分有膿之三分不痛而潰五日收功

腰疽醫案

開門羹姓腰患一疽根盤圍闊二尺餘前連腹後接背不紅不腫不痛不輒接之如木初延余治以肉桂炮薑書於

方首別後另延蘇城內外三四名家眾視余方皆曰醜醫安可用此熱劑以余為非議用攻托清涼連治五日病者神昏無味復延余治患仍不痛色如隔宿豬肝言語不清飲食不進余日能過今晚再商是夜即斃然其至死不痛不久伊戚亦患此證延余治以陽和湯服下次日覺鬆又服疽消小半繼以犀黃丸與陽和湯逐日早晚輪服第五日全瘡後有背患相若者照治而瘡

流注醫案

程姓母年七十膝下患一陰毒流注潰經數月患下及旁又起硬腫二塊與舊患相連延一醫以新發之毒認為舊患旁腫不識流注竟以托毒之劑與服服二劑致新發者被托發痛始延余治余以陽和湯與服三劑新發之二毒皆消接服小金丹十九後進滋陰潤補以杏仁散敷半月

外科證治全生醫案

五 七十八

膿厚令服保元湯加肉桂十餘劑瘡宜與徐三梧之子繼歲太陽一毒背上一心膈對處二毒頭後口對處一毒腰腹二毒兩腿五毒共患十一毒皆皮色無異其大腿二腿已經伊處醫者開刀問余至請治以小金丹令日服二次第五日消其九毒消後又以小金丹日服一次因孩小令伊添一乳母十日後二乳皆紅潤以保元湯芪草皆生加肉桂三分煎杯許令水煎葢六分服半月後以芪草易我服瘡一月收功

橫痃及楊梅瘡醫案

常熟趙太元長君患橫痃被醫家開刀延余往治余問其開刀幾日彼云已有半月余日此患破則難治還有九月之毒即辭別別後三百日伊戚在蘇來云已死月餘福建客滿身廣豆又患橫痃余想橫痃乃陰虛之證藥利

滋補廣豆係火毒之證藥利涼解二證相背既利於毒定禍於疽必使二證皆宜之藥除犀黃丸外無他法令其每日空心時酒送三錢十服二證全瘳後一人毒重倍服而瘳

起肛醫案

宜興馮悠也右足背連小腿轉灣處初起不過湯毒而成爛腿三十餘年四起硬肛小腿足腫如斗爛孔可容大拳有時出血所流臭漿滿室難聞自以布包如軀一塊以填孔內否則空痛時年七十有四雍正六年延余治以老蟻破腹蟻身刺數孔以肚雜代包填入孔內蟻身覆蓋孔外每日煎葱椒湯候溫早晚各洗一次以蟻易貼內服醒消丸亦早晚二服三日後取地丁大力鮮草搗爛填孔外蓋烏金膏仍以醒消口服其肛口外四起硬塊內有皮中滲

外科證治全生醫案

六

痘毒醫案

洞庭錢永泰之子患痘毒醫用清火解毒之劑以一毒醫增六七再醫毒生二十醫至第二年孔皆有管日流臭漿右足縮不能行坐臥三載始來就治以陽和湯小金丹犀黃丸等藥與服內用化管藥半月瘳半一月管化有多骨者亦出彼欲領子回家繼以生肌散並調和氣血之丸與同証伊任子恣意飲食不洗卽止不敷卽停日以酸橙石

橋木果消閒嚴冬復臭難聞余曰臭則爛香生肌寒疽未斂日食酸醞領回三月患管復舊乃父母害之也

囊脫醫案

宜興一舟子腎囊形大如斗被走方人穿之不數日爛見腎子如鷲卵大旁有一筋六七寸長形若雞腸雙環隨腎子落出臭氣難聞令以紫蘇煎湯洗淨其筋爛下問其腎子莖物小肚可痛否彼曰皆不痛余曰此三處作痛則難治今不痛者可治日以紫蘇湯洗洗後以蘇爲末撒上用青荷葉包之內服黃連歸尾黃芩甘草木通等藥十劑五日後腎子收上爛孔收小此非患毒乃是損傷口既收小肌色紅活內服地黃湯外敷生肌散而瘳

陰腫醫案

一鄰友余家飲酒二鼓而別次早伊僕云莖物腫痛難小便遣來索藥度其醉歸行房妻以前用未洗之絹抹之此絹必經毒蟲咬過卽取仙人對坐草以解蛇毒割人藤以解蜈蚣毒二草搗爛取汁調雄黃末塗上立刻痛止腫消下午全瘳

外科證治全生醫案

七

湯傷醫案

一婦小腿經湯被醫者用冰片研入雪水敷之不一刻腿腫如斗痛極難忍請余治婦曰只求止痛死亦甘心余曰幸在小腿下身硬地儻湯腰腹用此一罈火毒入腹難以挽回以地榆研細調油拂上半刻痛止令伊自拂一二次全瘳一使女炭火湯足背爛一孔以伏龍散乳調敷不三日而瘳又鄰家一孩罐上滾湯澆腹因痛自手抓破腹皮油拂上一次痛息以地榆末乾撒於破處次日肌生未破者全瘳

外科證治全生醫案

同治九年庚午春金陵方氏原刻

金瘡鐵扇散方

光緒三十四年戊申夏揚州務本堂重刊

板存務本堂 需藥者即赴務本堂請給

金瘡鐵扇散原序

乾隆丙子歲十月幾望陽曲縣民張成
李登雲左耳根深八分餘又傷項頸橫長三寸
血湧仆地氣絕邑令楊驗畢將去或曰胃微溫
令乃顧眾曰誰能為予救治者時有韓士勇曰
能但治法與人異敷藥後必扇之邑令乃憶太
谷縣民有刺腹腸出數寸者醫士盧福堯治而
愈其法亦如之乃問曰汝藥得非盧醫所傳否
士勇曰然遂令敷藥扇之須臾血止俄而蘇呻

鐵扇散方

吟有聲越日痂結霍然愈余聞之喜甚因念小
民鬪很裂膚事所時有若療以良藥則所全實
多是以

欽頒洗冤錄載有良方仰見

聖主矜恤民命無微不至余膺

簡命職在撫綏凡可登民衽席者敢弗仰體

聖慈多方補救今盧醫方藥起死回生屢效於世則
流播豈容或緩因招之喻以故渠以托業於此
靳弗與余曰苟可拯民之厄雖酬爾多金不惜

也伊乃喜諾且日雍正年間得之塞外神僧年來救治良多因令照方修製遇傷輒試皆效爰厚贈盧醫刊其方以廣救濟云

乾隆二十一年仲冬穀旦山西巡撫兼管提督兵部右侍郎都察院右副都御史明德識

鐵扇散方

金瘡鐵扇散藥方

象皮五錢切薄片用小鍋焙黃

研老材香一兩山陝等省無漆民間棺內數十年後有惡葬者棺朽另易新棺其朽棺內之香蠟即謂之老材香東兩代香數百年陳石灰一兩代寸柏香一兩香即之其效驗與老材香同色者松香一兩與寸柏香一同鑲化攪飛一兩將白礬入鍋內熬透便是

以上六味共為細末儲磁罐中遇有刀石破傷者用藥敷傷口以扇向傷處扇之立愈忌臥熱

處如傷處發腫煎黃連水用翎毛蘸塗之即消

撫晉使者長白明德再識

金瘡鐵扇散跋

余於庚辰歲秉泉金城每見愚氓忘身逞忿自蹈法網迨至對簿之時莫不追悔靡及余惻然憐之嘗謂人當受傷危急之頃若得良藥救治則所全實多會

明大中丞駐節蘭泉及出其鐵扇散授余并言效驗之奇惟藥中有老材香者產於晉頗不易

鐵扇散方

得歲壬午

明大中丞重撫三晉而余亦奉

命屏翰此邦勤宣

德化之餘每製良藥以備不時救濟而老材香終不

易購也癸未秋有紹協把總沈大潤字雨蒼者

探親至山右自言昔年因公來晉於

明大中丞署得此方并藥以歸適餘杭有爭鬪

勿傷者治之輒愈於是款門求藥者踵相接未

一年前藥用盡而求者日眾雨蒼無以應欲照

方重製而浙省苦無老材香不得已試以數百年陳石灰代之而奏效神速竟與老材香相埒實能起死回生數年來救之不下數百人皆歷歷可指余復詰以傷處皆忌冒風而此方獨用扇搨傷口人不能無疑焉雨蒼云前人雖未聞明然醫者意也當傷口初破熱血逆流勢若泉湧始不可遏苟敷藥而不扇必隨血流湧即無以見藥之功故必藉扇力使血稍涼乃能凝結譬之治河之橫決者必先殺其水勢乃可於決

鐵扇散方

四

口壅土使水循故道不致沖刷復決也余躋之試以問老醫所論亦同爰令舉述已驗醫案數則附刻於後以爲治法指掌而

明大中丞仰體

聖慈購求方藥濟世之心愈以垂之不朽矣哉

乾隆二十八年七月穀旦三晉旬宣使者長白文綬識

金瘡鐵扇散醫案

餘杭沈大潤雨蒼氏述

乾隆二十二年五月間沈雨蒼至晉得金瘡鐵扇散旋浙適有仁和縣民蔣姓因角口用刀自刎傷長二寸餘食喉半斷傷口冒血痛甚在地滾跌不能敷藥因縛其手足令臥涼地用枕墊其首使傷口漸合即敷藥扇之少頃血凝半日後湯飲如常三日後全愈

鐵扇散方

五

又於六月間有錢塘民因角口忿激用剃刀自刎食喉半斷喘氣傷口俱有血泡蓋喉間之氣已通於傷口也用藥敷之扇少頃血即凝兩日全愈

又於十月內杭州城守營兵沈姓因操演被藤牌兵用腰刀悞戳鼻梁山根俱斷斜傷眼角深入寸餘痛暈臥地敷藥扇之血凝兩日而愈

乾隆二十三年四月內杭城義烏寺僧人以巨斧砍柴悞劈脚背深入寸餘傷長三寸足背幾若兩半分裂其師夜半款門求藥敷之三日而愈

又於五月間有山西僧人孤身朝天臺山行至岷縣中途有賊尾至山僻持石擊其腦後僧人轉身回拒賊復擊其額角面顛頭顛等處骨亦有損者昏暈半日後漸醒赴縣喊稟因距被傷之時已經一日傷處冒風頭面腫大如斗雨蒼趨往救治先用黃連煎水洗去血迹以藥敷之因不流血未曾用扇兩日傷口結痂全愈

以上俱係老材香所製之藥救治全愈至乾隆二十三年五月前藥用完而求者口

鐵扇散方

六

眾浙省素無老材香因即以數百年陳石灰代老材香配藥試之其效亦同所有應驗醫案附列於後

乾隆二十三年七月有紹協右營兵丁因操演馬驚被踢下頰其齒牙半脫并於頰下能見齒骨暈絕臥地見者以為必死雨蒼將藥敷後扇之血凝兩日而愈

又於十月間有杭城鳳山門門軍計姓向雨蒼求藥自言六月間墮城跌石上割開左腿已爛百

餘日視其傷口長三寸餘深寸餘潰爛有膿血即用黃連煎湯洗去膿血用藥敷之因不流血未曾用扇其時天氣漸寒收效尤速一日而愈乾隆二十四年九月杭城羊市街有孀婦因角口用磁碗鋒自割其面傷十餘條長俱四五寸流血發腫因即以黃連煎水洗去血迹用藥敷之一日而愈

乾隆二十五年七月間紹協把總王九齡因救火悞踏椽木上長釘穿過靴底從腳心透出腳背

鐵扇散方

七

傷甚重其時雨蒼同在救火即用藥敷之一日而愈

乾隆二十六年五月杭城大街名世坊前有楊姓劉馬草悞斷左手食指因甫經切下斷指尚溫即令將斷指接連四面敷藥扇之少頃傷口血凝兩日後屈伸如舊

乾隆二十七年六月杭城有王姓者因爭鬪被人將刀刺面從左頰透出右頰血湧不止敷藥扇之血凝一日而愈

乾隆二十八年正月間路經大街見有十三四歲
幼孩從高堦失足墮地將自佩煙筒悞戳入左
腹深五寸許死地下雨蒼一手按傷口一手拔
出煙筒卽以藥敷之血卽凝一日而愈

乾隆二十八年二月間杭城名世坊項姓因修屋
倒塌被壓者十九人內頭面手足破傷者十二
人時雨蒼將有山右之行罄瓶與之一日俱愈
以上雖治法略有不同而其大旨則傷處
喜涼惡熱夏月宜臥涼地冬月忌臥熱處


鐵扇散方

八

傷口不必用布包裹以致過煖難於結痂
并忌飲酒以致血熱妄行設遇傷處發腫
總以雞鵝翎毛醮黃連水塗之可以立愈
至於敷藥之時若血流乃用扇扇之倘不
流血卽不必扇矣其餘效驗醫案甚多不
能殫述卽此以例其餘

甘泉蔣氏依法修送

金陵方氏依法修送



蕪湖顧練江纂輯

瘍醫大全

達安堂藏板

序

昔蘓文忠公云藥雖進於醫方多傳於古人粵自軒岐而降代有傳人博覽羣書方稱國手或謂望而知其病者謂之神聞而知

序一

之者謂之聖問而知之者謂之工至按脈淺深呼吸至數而後能療治者得巧之道焉夫如是則臨症施治宣通補瀉豈徒按古

人成方遂可畢乃事哉故

神明變化運用之妙存乎
一心而規矩準繩則又不
能舍方書而私心自用也
顧若鍊江鳩江儒士三世
業醫今僑寓廣陵四十餘
年丹荔青芝起顛連而躋

序上

仁壽者指不勝屈因念張
劉朱李諸書以及時賢立
論著述咸於內症闡發無
遺而外科六間施治有方
終未能得窺全豹不憚歲
月殫精竭神搜括古今確

論都成一集名曰瘍醫大
全下問於予，披覽數過
深嘆顧若之學問淵深而
用心良厚也夫世之庸工
不明臟腑不按經絡臨症
製方滅烈古人之成法而

序下

私心自用則於外科為尤
甚及偶得一經驗之方輒
珍為已有秘不示人殊不
知古聖賢創設成規筆之
於書原示後人以矩範徒
以秘而不宣者煽巧矜能

自謂為專家獨步何見之
小耶顧若則不然首述內
經次詳脈絡以及分門別
類無一非先哲名言珍方
秘旨悉皆脛載其底蘊淵
深亦滋可知矣夫良醫之

序四

後必有達人顧若是書一
出將與杏林橘井媲美爭
先吾願世之習是科者咸
奉一冊以為標準則於古
人施濟之意庶幾得之予
不敏樂援筆而為之序云

乾隆癸巳仲冬長至前三
日新安健堂汪立德撰



序五

人之所病，疾多而醫之
所病，道少操少道應多
疾以瘡為劇以生為死拙
者失理恬而不怪故易曰
勿藥有喜禮曰醫不三世
不服其藥誠慎之也善乎

序一

銅鞮杜氏之言醫不專於
藥而舍藥無以全醫藥不
必於方而舍方無以為藥
考漢書藝文志經方十一
家秦始皇帝扁鵲俞拊方
二十三卷始皇不聞善醫

蓋敕集俞扁二家方以成
書若聖惠方惠民和劑局
方所由昉而太史公傳淳
于意遂為後人醫案之祖
范史因之以傳華元化併
人滄藝亦充方藥惜其出

序二

書一卷自言此可活人吏
不敢受至於索火燒之其
術則神而其心抑已隘矣
余嘗歆仿諸病源候論濟
生拔萃方例採自元明以
來方家醫案為發明其議

症處方之故以證合乎黃
帝扁鵲仲景東垣之書以
與王氏準繩薛氏醫案張
氏類經孫氏元珠相表裏
一行作史此事遂廢昨歲
司藩豫省偶以一劑愈相

序三

國地公宿疾今年春膺撫
黔之

命恭逢

翠華南幸請

訓行在仰承

天語哀及知醫于時危從諸鉅

公咸就診脈而蕪湖顧君
練江出所著瘍醫大全四
十卷請弁其端按用禮醫
師之職統於天官冢宰而
瘍醫所掌凡療瘍以五毒
攻之以五氣養之以五藥

序四

療之以五味節之以凡藥以
酸養骨以辛養筋以醎養
脈以苦養肉以滑養竅自
非明乎炊湯脈神之術者
其可易而為之哉且古之
人診頭痛而決其將嘔膿

脉面赤而知其為肉疽魚
能並擅方辨名家顧君傳
醫三卅精通內外兩科其
活人甚多其為書也自靈
素診候運氣經絡以及癰
疽明論治法元、本、痿

序五

析條分舉生平所得力父
祖之秘方盡出而公之於
世由頂玉踵一症一圖幾
於盡見五藏癥結其新增
婦人肺氣門殆越人帶下
醫之意歟其痘疹秘書殆

越人小兒醫之意歟至其
寒門五法則又仲景之功
臣也讀是書者不虞道少
不患疾多矣近有以善醫
蒙

徵者所撰方案輒以摺片進

序六

呈

御覽人以為榮今顧君術仁術
心仁心盡璋特達余於是
書手卜之因題左方以為
卷云

乾隆二十七年歲在元默敦輝

中呂月

賜進士出身


誥授資政大夫巡撫貴州提督

川貴軍務兼兵部侍郎加

四級紀錄十二次年家眷

弟喬光烈拜撰

序七



自序

澄生逢堯舜之世身為太平之民每念

應天

子宵肝勤勞唯恐四海臣民有纖芥之苦

御極

之始即

自序

下詔徵方彙輯

御纂

醫宗金鑑頒發中外使窮

鄉僻壤凡有疾痛皆得檢

方施治沈疴立歿而各省

上憲又復仰體

聖慈每歲自捐俸俾開設藥局以

濟貧病其愛民如子可謂至
周極備矣澄本一介布衣賦
性迂拙聖賢之書讀而未竟
業醫自賒碌無閑因思身
體髮膚受之父母安居樂業
志出

自序

二

皇仁而君父之恩無由報稱是以診
視之暇不憚精神勞瘁搜
括古今名醫確論首標內經
義旨宣明脉法元微詳分經
絡穴道彙集內景證形上自
巔頂下至湧泉凡涉外證者

繪圖立說按症立方諸如湯
火刃傷刺杖跌撲獸傷蟲咬
悞吞藥石毒物五絕解救之
法自今古成方之外又益以先
祖寧華公先父青巖公家藏
經驗諸方別類分門計四十卷名

自序

三

之曰瘍醫大全俾患者咸知瘍
必有名醫必有法按圖施治
經絡分明初起期其必消已成
必其易潰已潰速其易斂使
人間無破漏之危更可免釀
癰之患况所備諸方悉俱養

正驅邪調衛和榮雖云小益
利濟匪枉斯書纂輯閱三
十寒暑曰囊橐空懸未獲
授梓今緣兩淮同人慨為捐
資始付棗梨以成此志爰述
綴輯原委弁之簡端以見成

自序

四

之尤非偶然云

乾

隆二十五年歲次庚辰孟夏
靜齋顧澄練江書



瘍醫大全

凡例

一首重內經發明立與瘡瘍雖曰外症必先受於
內然後發於外故不得不宣明靈素闡發機微
况內經如奉行之律律有萬無可易之旨而張
李劉朱以及歷朝諸家醫集有前人發所未發
之論拯救呼吸危亡復生之案如今所引之例
其中多死中得活之條所以司醫者平時宜多
讀書則見識廣如臨萬難醫治之症色脉相參

瘍醫大全

卷一 凡例

顧氏秘書

其症尚有一綫可生之機便須竭其心力旁求
可生之法救之庶不負上天好生之德與前賢
立說之心是以內經列之於首

一論診候形狀以別表裏虛實以決順逆死生近
來瘍科只仗膏丹不習脉理遇一大症便令病
家另延內科服藥殊不知專司方脉兼諸外症
者少每至內外兩科彼此相左當表散而反補
當內托而反清當峻補而反瀉貽悞匪輕茲編
彙集脉法俾司瘍科者留心脉理若能內外一

手則病者更受其益矣但脉理至微不特三部九候即浮沉遲數四脉情形憑何指示父不能傳之子師不能傳之徒其故何也所謂得之於心應之於手必須資質明敏臨症時心平氣和呼吸調勻時刻留心譬夫診視寒門診脉時細加體會原來表症見是脉半表半裏見是脉傳裏見是脉三陰見是脉臨症既多經歷漸久日久精進始能得脉息之情形察虛實存亡之至理若漫不經心雖終身亦不知脉為何物得心理應手豈易言哉脉經務須熟讀而後用心調息診之自得矣

傷醫大全 卷一 凡例 二 顧氏秘書

- 一論五運六氣以明歲氣盛衰
- 一遵銅人圖經絡穴道鍼鋒較對便知所患部位屬於何經其經氣血多寡庶攻補不致妄施
- 一輯諸家癰疽明論字字可師
- 一輯諸家癰疽治法可為後學準繩
- 一論癰疽兼現寒熱煩渴秘結泄瀉諸證以別陰陽虛實不致攻補失當

一列癰疽初起內消敷圍鍼灸湯洗內托砭石刀鍼潰後補托生肌斂口三十八法

一列癰疽名目逐類分門上自巔頂下至湧泉每末議補前人所未載續篇簡之未備每症除以前代古方載入以為遵守規模繼入各家經驗奇方以備臨時採擇其中諸同志所贈良方刊入俱標姓氏不敢泯其所自澄世傳秘方今俱備入惟求濟世活人不敢私留隻字

傷醫大全 卷一 凡例 三 顧氏秘書

- 一江左婦女脚氣非秦漢男婦五痺濕熱脚氣一類治法不同故特增入
- 一幼科痘疹古名天瘡澄家有邵氏秘書兒科罕見今特以清江聶九吾先生喜泰順先生痘科秘本朱純椒先生痘疹定論四家彙輯增入痘科保嬰壽世凡司痘疹者留心斯卷用意討尋則保全寰宇嬰孩性命其功溥矣
- 一列凡水火金刃跌打急救五絕中毒等症經驗治法

一列一切虎犬蛇蠍蟲蟄咬傷治法

一載古今奇病治法以廣學識

一冬月傷寒最為酷裂六經不明每多混治差之

臺釐失之千里攻表倒施危亡立待特附卷末

誠乃寒門捷徑

澄

本布衣三指謀生家口既多負累甚重黎明而

起昏夜方眠應接之暇思欲編著一書誠非易

事所幸平生從不敢粗心浮氣妄施攻補復不

敢乘人之危誑人肥己因不負人故心地寧不

瘍醫大全

卷一 凡例

四

顧氏秘書

妄求故魂夢安惟知守分安貧以仁為念專心

採輯今始告成惟是一人所著見聞不廣遺漏

必多全希 諸同志先生鑒原更正是幸

瘍醫大全目錄

卷一

內經纂要

上古天真論篇

生氣通天論篇

陰陽應象大論篇

陰陽別論篇

六節藏象論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

四氣調神大論篇

金匱真言論篇

陰陽離合論篇

靈蘭秘典論篇

五藏生成篇

移精變氣論篇

診要經終論篇

平人氣象論篇

三部九候論篇

藏氣法時論篇

寶命全形論篇

離合真邪論篇

太陰陽明論篇

評熱病論篇

舉痛論篇

痺論篇

厥論篇

奇病論篇

刺志論篇

骨空論篇

內經纂要

上古天真論篇

生氣通天論篇

陰陽應象大論篇

陰陽別論篇

六節藏象論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

五藏別論篇

傷醫大全

卷一 內經

二

顧氏秘書

內守病安從來邪乘虛入是謂虛邪竊害中和謂
人虛乃邪勝之也恬澹虛無法道清是以志閒而
靜精氣內持故其虛邪不能為害是以志閒而
少欲心安而不懼形勞而不倦內機息故少欲外
皆適也氣從以順各從其欲皆得所願志不貪故
心易足故所願必從不異求故無難得也是以嗜
老子曰知足不辱知止不殆可以長久是以嗜
欲不能勞其目淫邪不能惑其心老子曰不見可
曰聖人為目所以能年皆度百歲而動作不衰者以
其德全不危也莊子曰執道者德全德全者女子
七歲腎氣盛齒更髮長老陽之數極於九少陽之
數次於七女子為少陰之

傷醫大全

卷一 內經

三

顧氏秘書

白所以衰者婦人有餘於氣不七七任脉虛太衝
足於血以其經月數泄脫之故七七任脉虛太衝
脉衰少天癸竭地道不通故形壞而無子也絕水
是為地道不通衝任丈夫八歲腎氣實髮長齒更
衰微故形壞無子丈夫八歲腎氣實髮長齒更
老陰之數極於十少陰之數次於八男子為少陽
之氣故以少陰數合之易繫辭曰天九地十則其
數二入腎氣盛天癸至精氣溢寫陰陽和故能有
子男女有陰陽之質不同天癸則精血之形亦異
故能有子易繫辭曰三八腎氣平均筋骨勁強故
男女媾精萬物化生三八腎氣平均筋骨勁強故
真牙生而長極四入筋骨隆盛肌肉滿壯丈夫天
而終年居四八五入腎氣衰髮墮齒槁腎主骨齒
亦材力之半也五入腎氣衰髮墮齒槁為骨餘腎

天壽過度氣脉常通而腎氣有餘也稟天真之此氣有餘也

雖有子男不過盡入八女不過盡七七而天地之

精氣皆竭矣雖老而生子子壽亦不能過天癸之數

四氣調神大論曰春三月此謂發陳春陽上升氣潛發育庶物陳其

姿容故天地俱生萬物以榮天氣溫地氣發溫夜

卧早起廣步於庭溫氣生寒氣散夜被髮緩形以

使志生春氣發生於萬物之首故生而勿殺予而

勿奪賞而勿罰此春氣之應養生之道也春陽布

謹奉天時也逆之則傷肝夏為寒變奉長者少

湯醫大全 卷一 內經 四 顧氏秘書

反行秋令肝象木王於春行秋令則肝氣傷夏火

王而木廢故病於夏春生夏長逆春傷肝故少氣

以奉於夏夏三月此謂蕃秀陽自春生至夏洪盛

蕃茂盛也天地氣交萬物華實夏至四十五日陰

秀華美也陰氣結成化也夜卧早起無厭於日使志無怒

合故萬物華實也夜卧早起無厭於日使志無怒

使華英成秀使氣得泄若所愛在外緩陽氣則物

氣泄物化則華英成秀氣泄則膚腠宣通此夏氣

時令發陽故所愛亦惟順陽而在外也

之應養長之道也逆之則傷心秋為痠癢奉收者

少冬至重病逆謂反行冬令痠癢之墟心象火

火廢故病於秋秋收冬藏逆夏傷心故少氣以奉

秋三月此謂容平萬物夏長華實已成天氣以意

地氣以明天氣以意地氣以明物色變也早卧早起與雞俱

興欲使安寧故早卧早起使志安寧以緩秋刑志躁不

助助秋刑急順殺伐也收斂神氣使秋氣平則欲

欲欲熾則傷和氣和氣既傷則秋氣無外其志使

不平調也故收斂神氣使秋氣平

肺氣清此順秋氣此秋氣之應養收之道也逆之

則傷肺冬為殄泄奉藏者少逆謂反行夏令則肺

故病發於冬逆秋傷肺故冬三月此謂閉藏草木

少氣以奉於冬藏之令也冬三月此謂閉藏

塞陽氣伏藏水水地坼無擾乎陽陽氣下沉水

不欲煩早卧晚起必待日光避於使志若伏若匿

若有私意若已有得謂不欲妄出於去寒就溫無

泄皮膚使氣亟奪去寒就溫言居深室也冬日在

膚謂勿汗也汗則陽氣此冬氣之應養藏之道也

逆之則傷腎春為痿厥奉生者少逆謂反行夏令

行夏令則腎氣傷春木王而水廢故病發於天氣

春逆冬傷腎故少氣以奉於春生之令也

清靜光明者也言天明不竭以清靜致之人壽延

也藏德不止故不下也形言是藏德也德隱則應

用不屈故不下也老子曰上德不德是以有德言

天至尊高德猶見隱也况全生之道而不順天乎

湯醫大全 卷一 內經 五 顧氏秘書

天明則日月不明邪害空竅

天所以藏德者為其欲隱大明故大明見

則小則明滅故大明之德不可不藏天若自明則日月之明隱矣言人之真氣亦不可泄露當清淨法

道以保天真苟離於四時陰陽者萬物之根本也

道則虛邪入於空竅

時序運行陰陽變化天地合氣聖人春夏養陽秋

冬養陰以從其根陽氣根於陰陰氣根於陽無陰

全陰則陽氣不極全陽則陰氣不窮滋苗者必固

其根伐下者必枯其上故以斯調節從順其根

故與萬物浮沉於生長之門聖人所以身無奇病

也逆其根則伐其本壞其真矣故陰陽四時者萬

物之終始也死生之本也逆之則災害生從之則

苟疾不起是謂得道重也聖人不治已病治未病

不治已亂治未亂此之謂也病已成而後藥之亂

已成而後治之譬猶渴而穿井鬪而鑄兵不亦晚

乎

生氣通天論曰陽氣者若天與日失其所則折壽而

不彰人之有陽若天之有日天失其所則日故天

運當以日光明是故陽因而上衛外者也此以明

行部分輔衛陽氣者精則養神柔則養筋此以明

人身之正用也陽氣者精則養神柔則養筋此以明

而主外身行二十五度平旦人氣生日中而陽

氣降日西而陽氣已虛氣門乃閉隆高也盛也夫

少而之壯積暖以成炎炎極又涼物之理也故陽

也發泄經脈榮衛是故暮而收拒無擾筋骨無見

之氣故謂氣門

霧露反此三時形乃困薄皆所以順陽氣也陽出

於內行陰分故宜收斂以拒虛邪擾筋骨則逆陽

精耗見霧露則寒濕俱侵故順此三時乃天眞久

也陰者藏精而起亟也陽者衛外而為固也言在

用陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂而急數也并

謂盛實也狂謂狂走也陽并於四肢則狂四肢諸

陽之本也陽盛則四肢實實則登高而歌熱盛於

身故棄衣欲走也如是陽不勝其陰則五藏氣爭

者皆為陰不勝其陽也

九竅不通官五藏氣爭則九竅不通是以聖人陳

陰陽筋脈和同骨髓堅固氣血皆從如是則內外

調和邪不能害耳目聰明氣立如故邪氣不尅故

如陽強不能密陰氣乃絕陰泄瀉而精氣竭絕矣

陰平陽秘精神乃治則陰氣和平陽氣閉密陰陽

決精氣乃絕陰不和則精氣不化乃絕流通也因

於露風乃生寒熱因於露體觸風邪風氣外侵

是以春傷於風邪氣留連乃為洞泄肝木王木勝

脾土故洞 夏傷於暑秋為痲瘧 夏熱已甚秋陽復

瀉生也 亦曰瘦也 秋傷於濕上逆而欬 復王水來乘肺

故欬逆 發為痲厥 濕氣內攻則欬逆 冬傷於寒春

必溫病 陽佛於中寒拂相持故為溫病 四時之氣

更傷五藏 時之氣更傷五藏之四

金匱真言論曰春氣者病在頭 應也 夏氣者病在藏

心之 秋氣者病在肩背 應也 冬氣者病在四肢 成

氣少寒毒善傷隨 夫精者身之本也故藏於精者

春不病溫 冬則精氣伏藏陽不平且至日中天之

傷醫大全 卷一 內經 八 顧氏秘書

陽陽中之陽也日中至黃昏天之陽陽中之陰也

日中陽盛故曰陽中之陽黃昏陰盛故曰陽中之

陰陽氣主晝故平旦至黃昏皆為天之陽而中復

有陰陽 合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也雞鳴至

平旦天之陰陰中之陽也 雞鳴陽氣未出故曰天

日陰中 故人亦應之夫言人之陰陽則外為陽內

為陰言人身之陰陽則背為陽腹為陰言人身之

藏府中陰陽則藏者為陰府者為陽 藏謂五神藏

肝心脾肺腎五藏皆為陰膽胃大腸小腸膀胱三

焦六府皆為陽故背為陽陽中之陽心也 心為陽

上焦以陽居陽故謂陽中之背為陽陽中之陰肺

也 肺為陰藏位處上焦以陰居陽故謂 腹為陰陰

中之陰腎也 腎為陰藏位處下焦以陰居陰故謂

腹為陰陰中之陽肝也 肝為陽藏位處中焦以陽

居陰為陰也 腹為陰陰中之至陰脾也 脾為陰藏位

居陰為陰也 此皆陰陽表裏內外雌

雄相輸應也故以應天之陰陽也 故能上應於天

陰陽應象大論曰陰陽者天地之道也 謂變化生萬

物之綱紀 滋生之用也陽與之正氣以生陰為

湯醫大全 卷一 內經 九 顧氏秘書

化之父母 異類之用也何者鷹化為鳩田鼠化為

水為蜃如此皆異類 生殺之本始 寒暑之用也萬

因變化而成物也 生殺之本始 物假陽氣而

生因陰氣寒而死故生殺 神明之府也 言所以生

本始是陰陽之所運為也 神明之府也 殺變化之

多端者以神 治病必求於本 陰陽與萬類生殺變

明居其中也 治病必求於本 化在於人身同相參

合故治病之 故積陽為天積陰為地陰靜陽躁陽

生陰長陽殺陰藏 明前天地生殺之殊用也神農

藏坤者陰也位西南隅時在六月七月之交萬物

之所盛長也安謂陰無長之理乾者陽也位戌亥

之分時在九月十月之交萬物之所收殺也孰謂

陽無殺之理以是明之陰長陽殺之理可見矣 陽化氣陰成形寒極生熱熱極生寒寒氣生濁熱

氣生清氣在下則生飧泄濁氣在上則生臌脹

此陰陽反作病之逆從也故清陽為天濁陰為地

地氣上為雲天氣下為雨雨出地氣雲出天氣

上結則合以成雲陽散下流則注而為雨雨從雲

以施化故言雨出地雲憑氣以交合故言雲出天

身清濁亦如是也故清陽出上竅濁陰出下竅

也上天者親上氣本乎地者親下各從其類

清陽發於上濁陰走五藏

發散五藏為包藏之所故清陽可以

走之清陽實四肢濁陰歸六府

四肢外動故清陽歸六府內化故

濁陰水為陰火為陽

水寒而靜故為陰火熱而燥故為陽

陽為氣陰為味

氣惟散布故陽為之味歸形形歸氣氣歸精

精歸化精食氣故味歸形氣養形故形歸氣

氣形食味氣化則精生味和則化生精氣生形

之液惟血化而成形質之有資味傷形氣傷精

節精化為氣氣傷於味精承化養則食氣精若化

也穢腐攻胃則五味傷然不得入也陰味出下竅

陽氣出上竅氣無形故上出於呼吸之門味厚者

為陰薄為陰之陽氣厚者為陽薄為陽之陰氣

傷醫大全

卷一 內經

顧氏秘書

泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱

炎上故氣厚則發熱味薄為陰少故通

泄氣薄為陽少故汗出發泄謂汗出也

壯火之氣壯火之少者壯已必衰

衰少火之氣壯火之少者壯已必衰

壯火食氣壯火散氣少火生氣

食少火壯火散氣少火生氣壯火散氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

壯火散氣少火壯火散氣少火生氣

傷醫大全

卷一 內經

顧氏秘書

先腫而後痛者形傷氣也

先氣證而病形故曰氣

傷形先形證而病氣故

曰形風勝則動

風勝則動底物動熱勝則腫

熱勝則腫氣內鬱故

於肉理聚為疔膿之腫燥勝則乾

燥勝則乾濕勝則濡瀉

濕勝則濡瀉寒勝則浮

寒勝則浮府寒勝則陰氣結於立

府立濕勝則濡瀉水穀不分

水穀不分故大腸傳道而注瀉也

故喜怒傷氣寒暑傷形

暑傷形喜怒傷形於形故云

寒暑傷形細而

言寒傷於形於形故云

寒暑傷形細而

言寒傷於形於形故云

寒暑傷形細而

言寒傷於形於形故云

寒暑傷形細而

言寒傷於形於形故云

需樞經曰智者之養生也必順四時而適寒暑和
喜怒而安居處若喜怒不常寒暑過度天正之氣
何可故重陰必陽重陽必陰言傷寒傷暑亦如是天地者萬
物之上下也觀其覆載而萬物之上下可知矣陰陽者血氣之男

女也陰主血陽主氣左右者陰陽之道路也陰陽
左右循環故左右為陰陽之間氣道也陰氣右行陽氣左行水火者陰陽之徵兆
也觀水火之氣則陰陽之徵兆可知矣陰陽者萬物之能始也故曰

陰在內陽之守也陽在外陰之使也陰靜故為陽
故為陰之役使年四十而陰氣自半也起居衰矣人年四
始疎榮華稍落髮班十年五十體重耳目不聰明矣十

傷醫大全

卷一

內經

十一

顧氏秘書

衰之漸也年六十陰痿氣大衰九竅不利下虛上實涕
泣俱出矣衰之甚也故曰知之則強不知則老七知謂知
益全形保生之道也愚者不足智者有餘有餘則耳目聰明
身體輕強老者復壯壯者益治是以聖人為無為
之事樂恬憺之能從欲快志於虛無之守故壽命
無窮與天地終此聖人之治身也聖人不為無益
害性而順性故壽命長遠與天地終○天不足西北故西方陰也
而人右耳目不如左明也在上故地不滿東南故
東南方陽也而人左手足不如右強也在下故東

方陽也陽者其精并於上并於上則上明而下虛
故使耳目聰明而手足不便也西方陰也陰者其
精并於下并於下則下盛而上虛故其耳目不聰
明而手足便也俱感於邪其在上則右甚在下則

左甚此天地陰陽所不能全也故邪居之陰陽之
猶水之在器器圓則水圓器曲則水曲人應天地
之血氣亦如是故隨不足則邪氣留居之故天有
精地有形天有八紀地有五理陽為天降精氣以

氣以成形五行為生育之井里八風為變化之
綱紀八紀為八歲之紀五理謂五行化育之理故
能為萬物之父母陽天化氣陰地成形五理運行

傷醫大全

卷一

內經

十一

顧氏秘書

故能為萬物變化之父母也清陽上天濁陰歸地天地之動靜
神明為之綱紀清陽上天濁陰歸地然其天氣通
於肺以納至清之地氣通於嗑以納水穀之風氣
通於肝以納生雷氣通於心雷象火之谷氣通於脾
谷空虛脾受納故雨氣通於腎腎注六經為用流注不
胃為海以皆受九竅為水注之氣清明者象水之
水之流注以天地為之陰陽指人事配象則近陽之汗
以天地之雨名之發泄雨然其取類於天地之間
則雲騰雨降而相似也陽之氣以天地之疾風名之發疾風

飛揚故暴風象雷逆氣象陽故治不法天之紀不

以應之理則災害至矣背天之紀違地之理則六

傷災害之○故天之邪氣感則害人五藏八風發

至可知矣經風觸五藏邪氣發病故水穀之寒熱感則害於

天之邪氣感則害人五藏六府熱傷胃及膀胱

濕氣勝則榮衛之脈不行故因其輕而揚之輕者

故感則害於皮肉筋脈則邪因其重而滅之重者則

去邪因其重而滅之因其衰而彰之因衰

攻令邪去則直氣形不足者溫之以氣精不足者

堅固血色則直氣形不足者溫之以氣精不足者

補之以味開胃故衛氣溫則形分足矣腎者主水

受五藏六府之情而藏之故五藏盛乃其高者因

能寫而此則精不足者補五藏之味也其高者因

而越之越謂越也其下者引而竭之引謂泄中滿者

寫之於內內謂腹內其有邪者瀆形以為汗邪謂風邪

於表則汗其在皮者汗而發之在外故汗其慄悍

者按而收之慄疾也悍利也收候其實者散而寫

之陽實則發散審其陰陽以別柔剛陰曰柔陽病

治陰陰病治陽所謂從陰引陽從陽引陰定其血

氣各守其鄉血實宜決之決謂決氣虛宜掣引之

掣讀為導導引則氣行條暢

瘍醫大全

卷一 內經

五

顧氏秘書

陰陽離合篇曰東方青色入通於肝開竅於目藏精

於肝南方赤色入通於心開竅於耳藏精於心中

央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾西方白色

入通於肺開竅於鼻藏精於肺北方黑色入通於

腎開竅於二陰藏精於腎天覆地載萬物方生未

出地者命曰陰處名曰陰中之陰陰處形未動出

亦是為陰以陰居則出地者命曰陰中之陽形動

是則為陽以陽居陽予之正陰為之主陽施正氣

陰故曰陰中之陽陰形乃立故生因春長因夏收因秋藏因冬失常

羣形乃立則天地四塞失其常道則四時之氣閉

陰陽別論曰脈有陰陽知陽者知陰知陰者知陽深

謂備識凡陽有五五二十五陽凡陽經有五正

其變易凡陽有五五二十五陽由此推之則所

一藏之中包藏五藏之脈亦五五有五有二十五陰所

謂陰者真藏也見則為敗敗必死也所謂陰者五

真藏來現其藏已收敗者必至所謂陽者胃腕之

於死也故曰真藏脈見者死所謂陽者胃腕之

陽也胃腕之陽謂人迎之氣也察其氣脈動靜大

手其脈之動常左小而右大左小常以候藏右大

常以候府蓋胃為五藏六府之人主雖有五五二

十五陽之異而實不外乎胃脈之見耳別於陽者

瘍醫大全

卷一 內經

五

顧氏秘書

知病處也別於陰者知死生之期陽者衛外而為固然外邪所中

別於陽則知病處陰者藏神而內守若考三陽在

頭三陰在手所謂一也頭謂人迎手謂氣口兩者

大齊等者各日平人故言所謂一也氣口在手魚

際之後一寸人迎在結喉兩傍一寸五分皆可以

候藏府所謂陰陽者去者為陰至者為陽靜者為

陰動者為陽遲者為陰數者為陽此言脈體分陰

去至而陰陽分脈有動靜即動靜而所謂生陽死

陰者肝之心謂之生陽得陽則生失陽則死故曰

木生火得之生氣是謂心之肺謂之死陰心傳肺

生陽不過四日而愈心之肺謂之死陰者為火

尅金故謂死陰肺之腎謂之重陰

不過三日死肺金腎水雖曰

水俱病則重腎之脾謂之辟陰死不治而土本制水

陰而陽絕矣脾是謂辟陰辟

陰者放僻也

靈蘭秘典論曰十二藏之相使貴賤何如心者君主

之官也神明出焉任治於物故為君主之官

相傳之官治節出焉清靜棲靈故曰神明出焉

將軍之官謀慮出焉勇而能斷故曰將軍

中正之官決斷出焉直而不疑故決斷出焉

者臣使之官喜樂出焉膻中者在胃中兩乳間為

氣之海心主為君以脈宣

膻中

教令膻中主氣以氣布陰陽氣和志適脾胃者倉

則喜樂由生分布陰陽故官為臣使也脾胃者倉

廩之官五味出焉營養四傍故云五味出焉

者傳道之官變化出焉謂變化物之不潔之道變化

之官變小腸者受盛之官化物出焉承奉胃司受

化出焉小腸者受盛之官化物出焉

復化傳入大腸故云腎者作強之官伎巧出焉

受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉

作用故曰作強造化形容故云伎巧三焦者決瀆

在女則當其技巧在男則正曰作強三焦者決瀆

之官水道出焉引導陰陽開通閉塞故

都之官津液藏焉氣化則能出矣位當孤府故謂

津液若得氣海之氣施化則溲凡此十二官者不

便注泄故曰氣化則能出矣凡此十二官者不

得相失也失則災害至

則壽主不明則十二官危使道閉塞而不通形乃

大傷以此養生則殃

六節藏象論曰天以六六之節以成一歲人以九九

制會計人亦有三百六十五節以為天地久矣六

制會計人亦有三百六十五節以為天地久矣六

傷醫大全 卷一 內經 七 顧氏秘書

傷醫大全 卷一 內經 七 顧氏秘書

日而終兼之小月日又不足其數矣是以六十四
 氣而常置閏焉何者以其積差分故也天地之生
 育本陞於陰陽人神之運為始終於九氣然九之
 為用豈不大哉律書曰黃鍾之律管長九寸冬至
 之日氣應灰飛由此則萬物之生成因於九氣矣
 古之九寸即今之七寸三分大小不同以其先
 黍之制而天度者所以制日月之行也氣數者所
 有異也
 以紀化生之用也制謂準度紀謂綱紀準日月之
 也紀化生之為用者所以彰氣至而斯應也氣應
 無差則生成之理不替遲速以度大小之月生焉
 故曰異長短月移寒暑天為陽地為陰日為陽月
 收藏生長無失時宜也
 為陰行有分紀周有道理日行一度月行十三度
 而有奇故大小月三百六十五日而成歲積氣餘
 而盈閏矣日行遲故晝夜行天之一度而三百六
 行速故晝夜行天之十三度餘而二十九日一
 天也言有奇者謂十三度外復行九分度之七
 故云月行十三度而有奇也禮義及漢律歷志云
 二十八宿及諸星皆從東而循天西行日月及五
 星皆從西而循天東行今太史說云竝循天而東
 行從東而西轉也諸歷家說月一日至四日行
 最疾日夜行十四度餘自九日至十九日行次疾日
 夜行十三度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 十二度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 十三度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 十四度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 十五度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 十六度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 十七度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 十八度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 十九度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 二十度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 二十一度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 二十二度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 二十三度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 二十四度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 二十五度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 二十六度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 二十七度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 二十八度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 二十九度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 三十度餘自九日至十九日行次疾日夜行
 月行三百六十七度少七度而不及日也至二十九度

日日復遷計率至十三分日之八月方及日矣此
 大盡之月也其計率至十三分日之半者亦
 大盡法也其計率至十三分日之五而及日
 者小盡之月也故云大小月三百六十五日而
 歲也正言之者三百六十五日四分日之一乃一
 歲法以奇不成者故舉六以言之若通以六為
 法則一歲止有三百五十四日故從閏後三十二
 取月所少之辰加歲外餘之日故從閏後三十二
 日而盈閏焉尚書曰期三百有六旬有六日以閏
 月定四時成歲則其義也積餘盈閏者盡以月之
 大小不盡立端於始表正於中推餘於終而天度
 天度故也立端於始表正於中推餘於終而天度
 畢矣立端於始言先王之正時也履端於始以冬
 餘於終月有餘日則歸之於終天以六六為節地
 積而為閏故能令天度畢焉
 以九九制會天有十日日六竟而周甲甲六復而
 終歲三百六十日法也辛壬癸之日也十者天地
 之至數也易繫辭曰天九地十則其義也六十日
 而周甲子之數甲子六周而復始則終一歲之日
 是三百六十日也夫自古通天者生之本本於陰陽其
 氣九州九竅皆通乎天氣元氣即天也形假地
 氣通繫於天稟於陰陽而為根本也故曰人生於
 地懸命於天天地合氣命之曰人地列九州人施
 九竅精神往天天地合氣命之曰人地列九州人施
 復氣與參同故其生五其氣三而運用徵其本始
 從三氣以生成故云三而成天三而成地三而成
 其生五其氣三也三而成天三而成地三而成
 人非惟人獨由三氣以生天地之道亦三而三之
 如是矣故易乾坤諸卦皆必三矣三而三之
 合則為九九分為九野九野為九藏九野者應九
 藏而為義也

已上為格陽也陽明胃脈也少陽膽脈也太陽膀胱脈

在手少陽二盛而躁在手太陽三盛而躁在手陽明大腸脈

一盛者謂人迎之脈大於寸口一倍也餘盛同法

論曰格已上陽盛之極故格拒而食不得入也正理

則吐也寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛

病在太陰四盛已上為關陰也厥陰肝脈

脾脈也露經曰一盛而躁在手厥陰二盛而躁

在手少陰心脈也手太陰肺脈也盛法同陽四倍已

上陰盛之極故關閉而澀不得通也正理論曰閉

則不得溺人迎與寸口俱盛四倍已上為關格關

格之脈羸不能極於天地之精氣則死矣俱

謂俱大於平常之脈四倍也物不可以久盛極則

衰敗故不能極於天地之精氣則死矣露經曰

陰陽俱盛不得相營故曰關

格關格者不得盡期而死矣

五藏生成篇曰諸脈者皆屬於目

於目諸髓者皆屬於腦腦為髓海故諸筋者皆屬

於筋筋氣之堅結者皆屬於骨節之問諸血者皆

屬於心血居脈內屬於心也血氣者人之神然諸

氣者皆屬於肺肺藏主故入肝血歸於肝心行之

人動則血運於諸經人靜則血歸於肝藏何者肝

傷醫大全 卷一 內經 圭 顧氏秘書

步掌受血而能握以當把指受血而能攝以當攝

也血氣者人之神故所以受血者皆能運用

五藏別論篇曰腦髓骨脈膽女子胞此六者地氣之

所生也皆藏於陰而象於地故藏而不寫名曰奇

恒之府腦髓骨脈雖名為府不正與神藏為表裏

納則受納精氣出則化出形容形容之出謂化極

而自然出納之用有殊於六府藏而不寫其藏為

奇有恒不變名也夫胃大腸小腸三焦膀胱此五者

天氣之所生也其氣象天故寫而不藏此受五藏

濁氣名曰傳化之府此不能久留輸寫者也魄門

亦為五藏使水穀不得久藏魄門者即肛門也以

名謂五藏者藏精氣而不寫也故滿而不能實精

為滿水穀為實但藏精氣故滿而不能實六府者傳化物而不藏故實

而不能滿以其不藏精氣所以然者水穀入口則

胃實而腸虛以下也食下則腸實而胃虛以下也故曰

實而不滿滿而不實也○氣口何以獨為五藏主

氣口則寸口也亦謂脈口以寸口可候氣之

盛衰故云氣口可以切脈之動靜故云脈口胃者

水穀之海六府之大源也其有四海水穀之海則

衛以其當運化之源五味入口藏於胃以養五藏

傷醫大全 卷一 內經 圭 顧氏秘書

氣氣口亦太陰也氣口之所候脈動者是手太陰脈氣所行故言氣口亦太陰也

五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為之不利也

此明氣口之脈獨為五藏主氣口者右手之寸口脈即手太陰肺經太淵穴也

去魚際僅一寸也其左手寸部則內經諸篇皆謂

氣口而實本之於脾胃也胃者足陽明也脾者足

太陰也足陽明為六府之先足太陰為五藏之本

胃主納受凡水穀以是為化致五藏之氣無

不藉之以資養則脾以胃氣為之運化致五藏之氣無

行於氣口故云變見於氣口也下機直藏論云五

藏者皆稟氣於脾胃者五藏之本也藏氣者不能

自致於手太陰必因於胃氣乃致於手太陰也蓋

於五藏而脾可知矣五味入口入於府五氣入鼻入

脾有病而鼻為之不利矣然則

移精變氣論曰變化相移以觀其妙以知其要欲知

其要則色脉是矣

相移所以知四時五行之氣變化

色以應日脉以應月常求其要則其要也

日者占候之期準也常求色脉

之差忒是則平人之診要也

攻故病未已新病復起

之要極無失色脉用之不惑治之大則

傷醫大全

卷一

內經

書

顧氏秘書

也言色脉之應昭然不欺但順用而得神者昌失

不亂紀綱則治病審當之大法也

此詳言治法以色脉為要之極而其要之神者亡

唯在於得神而已神者病者之神氣也

湯液醪醴論曰精神不進志意不治故病不可愈

於道耗散

精壞神去榮衛不可復收何者嗜欲無

窮而憂患不止精神弛壞榮泣衛除故神去之而

病不愈也

精神者生之源營衛者氣之主氣主

其有不從毫毛生而五藏陽以竭也津液充郭其

魄獨居孤精於內氣耗於外形不可與衣相保此

四極急而動中是氣拒於內而形施於外治之奈

何

不從毫毛言生於內也陰氣內盛陽氣竭絕不

得入於腹中故言五藏陽以竭也津液者水也

充滿也郭皮也陰精於中水氣脹滿上攻於肺

氣孤危鼻者肺神腎為水害子不救母故云其魄

獨居也夫陰精損削於內陽氣耗減於外則三焦

閉溢水道不通水滿皮膚身體否腫故云形不可

與衣相保也凡此之類皆四肢脈數急而內鼓動

傷醫大全

卷一

內經

書

顧氏秘書

於權衡去宛陳莖是以微動四極温衣繆刺其處

以復其形開鬼門潔淨府精以時服五陽已布疎

滌五藏故精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平

權衡察脉之輕重浮沉宛積也陳莖陳草也邪氣

氣大氣也正氣也脈浮在表宜汗沉在裏宜泄如去莞積之陳草又微動曰肢以導引之溫暖其衣以流通之繆刺其處以復其形體蓋經脈滿則絡脈溢繆刺之以調其經脈開鬼門以發其汗潔淨府以利其水使五藏之精漸以時復五藏之陽漸以宣布疎滌五藏邪氣去而精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平

診要經終論曰正月二月天氣始方地氣始發人氣

在肝三月四月天氣正方地氣正發人氣在脾五

月六月天氣盛地氣高人氣在頭七月八月陰氣

始殺人氣在肺九月十月陰氣始冰地氣始閉人

氣在心十一月十二月冰復地氣合人氣在腎舉

傷醫大全

卷一 內經

美

顧氏秘書

天氣地氣人氣而言之見人氣所在乃診家之至要也診視驗也診之為義所該者廣有自診脈言者有自診病言者善診者察色按脈不止於脈而已方正也殺病言者善診者察色按脈不止於脈而木治東方天氣始正二月者寅卯月也月建屬木東南方天氣正火地氣始發三月者辰巳月也月建屬火南方天氣正土又生火也五六月者午未月也月建屬土南方天氣正金地氣始閉七月者申酉月也月建屬金西方天氣正水又生金也七八月者戌亥月也月建屬水陰氣始冰地氣始閉九月者戌亥月也月建屬水陰氣始冰地氣始閉十月者亥子月也月建屬水陰氣始冰地氣始閉十一月者子丑月也月建屬水陰氣始冰地氣始閉十二月者丑寅月也月建屬水陰氣始冰地氣始閉

白絕汗乃出出則死矣此先以太陽之脈起於目內

抵腰中其支別者下循足至小指外側手太陽之

脈起於手小指之端循臂上肩入缺盆其支別者

從缺盆循頰上頰至目外眦故太陽之終也戴眼

謂睛不轉而仰視也反折瘕瘕謂手足體反張

而或急為瘕或緩為瘕其色則白足太陽之水主

黑手太陽之火主赤其二色不見而色止白也絕

汗乃出謂汗暴出如珠而不復滲入也蓋至於絕

汗出而少陽終者耳聾百節皆縱目環絕系絕系

一日半死其死也色先青白乃死矣此舉少陽之

足少陽之脈起於目銳眥上抵頭角下耳後其支

別者從耳後入耳中出走耳前少陽之脈其支

別者從耳後入耳中出走耳前少陽之脈其支

主筋故終則百節皆縱其目環之系則絕蓋至於

善驚妄言色黃其上下經盛不仁則終矣此舉陽

者言之也足陽明之脈起於鼻交頰中下循鼻外

上入齒中俠口環唇循頰頰上耳前循髮際至額

頤其支別者從頤起於頰下頰下頰下頰下頰下

頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下

頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下

頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下

頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下頰下

傷醫大全

卷一 內經

美

顧氏秘書

系絕而一日半則死且其死陽明終者口目動作也色必青白以金木相薄也

足少陰氣絕則骨不奕骨不奕則斷上宣故齒長而積垢手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸足少陰之脈從腎上貫肝膈入肺太陰終者中故其終則腹脹閉而上下不通也

腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通不通則面黑皮毛焦而終矣

此舉太陰之終

者言之也足太陰之脈從股內前廉入腹屬脾絡胃上膈手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺惟其從脾絡胃故腹脹閉不得息為噫為嘔且嘔則氣逆而上行故面色赤不嘔則不逆不逆則上下通下又復閉則上下不通心氣外燔故皮毛焦而終矣何者足太陰脈支別者從胃別上膈注厥陰終者中熱嗑乾善溺心煩甚則舌心中也

卷卵上縮而終矣此十二經之所敗也

此舉厥陰之終者言

之也足厥陰之絡循脛上畢結於莖其正經入毛中過陰氣上抵少腹俠胃循喉嚨之後上入頰頰

手厥陰之脈起於胃中出屬心包故終則中熱噦乾善溺心煩也

若此者十二經皆至於敗其死也宜矣

脈要精微論曰診法常以平且陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調勻氣血未亂乃可診

有過之脈皆會於寸口故診脈以平且為常陰氣正平而未動陽氣將盛而未散飲食未進虛實易明經脈未盛絡脈調勻氣血未因動作而擾亂乃可診有過之脈夫脈者血之府也少皆聚見於經脈

脈過者病也

血實脈虛血虛長則氣治短則氣病數則煩心大

血實脈虛血虛長則氣治短則氣病數則煩心大

血實脈虛血虛長則氣治短則氣病數則煩心大

血實脈虛血虛長則氣治短則氣病數則煩心大

血實脈虛血虛長則氣治短則氣病數則煩心大

血實脈虛血虛長則氣治短則氣病數則煩心大

血實脈虛血虛長則氣治短則氣病數則煩心大

血實脈虛血虛長則氣治短則氣病數則煩心大

傷醫大全

卷一 內經

素

顧氏秘書

則病進夫脈長為氣和故治短為不足故病數急來長短脈者往來短數脈者上盛則氣高下盛則往來急速大脈者往來滿大

氣脹代則氣衰細則氣少濇則心痛上謂寸口下

動如莠蓬濇脈者往來時不利而濇濇也

至如湧泉病進而色弊綿綿其去如弦絕死

氣濁亂也革至者謂脈來弦而大實而長也如湧

泉者言脈汨汨但出而不返也綿綿言微微似有

而不甚應手也如弦絕者言脈卒斷

如弦之絕去也如此之脈皆必死也

○夫五藏者身之強也

藏安則神守神守則頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣背者胸中之府背曲肩隨府

將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋

之府屈伸不能行則僂俯筋將憊矣骨者髓之府

不能久立行則振掉骨將憊矣

強則生失強則死

強謂中氣強固以鎮守也此言五藏為身之強而失強則死也

○是知陰盛則夢涉大水恐懼陰陽俱盛則夢相殺

則夢大火燔灼

陽為火故夢陰陽俱盛則夢相殺

毀傷亦類交

上盛則夢飛下盛則夢墮

下則夢甚飽則夢子

下故墮甚飽則夢子

盛則夢怒

盛則夢怒

則夢聚眾內多短蟲長蟲多則夢相繫毀傷長蟲
內不安神躁擾故夢是矣

平人氣象論曰人一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸

定息脉五動閏以太息命曰平人平人者不病也

經脉一周於身凡長十六丈二尺呼吸脉各再動

定息脉又一周於身凡長十六丈二尺呼吸脉各再動

環周然盡五十營以一萬三千五百定息則氣都

行八百一十丈如是則應天常度脉氣無不及太

過氣象平調常以不病調病人醫不病故為病人

故曰平人平息以調之為法此言一息五至之脉為無病也

而定息總為一息言醫人一出氣曰呼入氣曰吸呼吸

而彼脉遂再動呼吸定息脉遂五動猶歲之有閏

場醫大全 卷一 內經 三 顧氏秘書

是閏以太息之脉乃所謂一息五至也如此者名

曰平人平人者不病也蓋醫人一息則無病之人

亦一息所以知其脉之五動為不病也當以不病

之人調彼有息之息以調候者自已不病故因彼病

人身之脉總計一息以調候者自已不病故因彼病

吸脉行三寸一息以調候者自已不病故因彼病

七十息行三寸一息以調候者自已不病故因彼病

三周即一息行三寸一息以調候者自已不病故因彼病

動一吸脉一動曰少氣之半計二百七十息平人

行八丈一尺以三萬三千五百定息都行四百五

氣自平脉之理從此可知此言一息二至之脉為少

不及者言之人一呼脉三動一吸脉三動而躁尺

熱曰病温尺不熱脉滑曰病風脉濇曰痺呼吸脉

各三動

準過平人之半計二百七十息氣行凡三十四丈

三尺病生之兆由斯著矣夫尺者陰分位也寸者

陽分位也然陰陽俱熱是則為陰陽獨躁盛則風

中陽也脉要精微論曰中惡風者陽氣受也滑為

陽盛故病為風濇為無血故為痛痺也此言平人

息六至之脉為諸病平脉太過者言之也平人

之常氣稟於胃胃者平人之常氣也常平之氣胃

穀入於胃人無胃氣曰逆逆者死脉以胃氣為本

脉道乃行胃氣曰逆逆者死脉以胃氣為本

者吞胃微弦曰平言微似弦不謂微而弦也夏胃

微鉤曰平長夏胃微稟弱曰平秋胃微毛曰平冬

胃微石曰平藏皆以胃氣為本脉從陰陽病易已

脉逆陰陽病難已之逆此言脉當與病而相順也

場醫大全 卷一 內經 三 顧氏秘書

脉得四時之順曰病無他脉反四時及不間藏曰

難已春得秋脉夏得冬脉秋得夏脉冬得四季脉

當傳之於脾乃不傳之於脾而傳之於心則間其

所勝之藏而傳之於所生之藏矣難經所謂間藏

者生是也及無間藏之脉皆謂之入以水穀為本

故人絕水穀則死脉無胃氣亦死所謂無胃氣者

但得真藏脉不得胃氣也所謂脉不得胃氣者肝

不弦腎不石也不弦不石皆謂不微似也○婦人手少陰脉動

甚者任子也而應手者岐伯曰其外經病而藏

謂動脈也動脈者大如豆厥厥動搖也正理論曰

脈陰陽相薄
名曰動也

玉機真藏論曰見真藏曰死何也岐伯曰五藏者皆

稟氣於胃胃者五藏之本也胃為水穀之海藏氣

者不能自致於手太陰必因於胃氣乃至於手太

陰也人稟氣於胃藏氣者平人之常氣故五藏各

以其時自為而至於手太陰也自為其狀也故邪

氣勝者精氣衰也故病甚者胃氣不能與之俱至

於手太陰故真藏之氣獨見獨見者病勝藏也故

曰死是所謂脈無胃氣也形氣相得謂之可治氣盛形盛氣

傷醫大全 卷一 內經 三 顧氏秘書

也色澤以浮謂相易已氣色浮潤血氣相營故易已脈從四時

謂之可治營謂順四時從順也脈弱以滑是有胃

氣命曰易治取之以時舉萬全當以四時血氣所

在而為形氣相失謂之難已形盛氣虛氣盛色天

不澤謂之難已天謂不明而晦形虛者相失也色天

勝脈實以堅是邪脈逆四時謂不可治以氣逆五

實死五虛死五實謂五臟實五虛謂五臟虛脈盛皮熱腹脹前後

不通悶脊此謂五實熱肺也腹脹脾也前後不通

腎也悶脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入此謂

腎也悶脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入此謂

五虛虛謂真氣不足也脈細心也皮寒肺也氣其

時有生者何也漿粥入胃泄注止則虛者活身汗

得後利則實者活此其候也飲粥得入於胃胃氣

得實虛者得活言實者得汗和調其利漸止胃氣

外通後得便利自然調平

三部九候論曰有下部有中部有上部部各有三候

三候者有天有地有人也上部天兩額之動脈在

兩傍動脈應於手足上部地兩頰之動脈兩傍近於

巨髀之分動脈應於手上部人耳前之動脈在耳前

足陽明脈氣之所行中部天手太陰也謂肺脈也在

脈氣之所行也中部地手陽明也謂大腸脈也在手大

是謂經渠中部人手少陰也謂心脈也在掌後銳

之分動脈應於手中部地足少陰謂腎脈也在足少陰

於手也下部天足厥陰也謂肝脈也在足厥陰

應於手也下部地足少陰謂腎脈也在足少陰

也謂腎脈也在足少陰謂腎脈也在足少陰

也謂腎脈也在足少陰謂腎脈也在足少陰

也謂腎脈也在足少陰謂腎脈也在足少陰

也謂腎脈也在足少陰謂腎脈也在足少陰

也謂腎脈也在足少陰謂腎脈也在足少陰

也謂腎脈也在足少陰謂腎脈也在足少陰

傷醫大全 卷一 內經 三 顧氏秘書

肺手太陰脉地以候胸中之氣手陽明脉當其處故以候人以候心當其處也上部以何候之亦有天亦有地亦有人天以候頭角之氣位在頭角之分故以候頭角之地以候口齒之氣位近口齒人以候耳目之氣以位當耳前脉抵於三部者各有天各有地各有人三而成天詳三而成天三而成地三而成人三而三之合則為九九分為九野九野為九藏神藏五也故神藏五形藏四合為九藏神藏者肝之神脾藏意肺藏魄腎藏志也以其皆神氣居之故云神藏五也形藏者如器外張虛而不屈合藏於

物故云形藏也一頭角二五藏已敗其色必天天耳目三口齒四胃中也五藏已敗其色必天天必死矣天謂死色異常之候也色者神之旗藏者神之舍故神去則藏敗藏敗則色見異常之也形盛脉細少氣不足以息者危形氣相得謂候也形盛脉細少氣不足以息者危形氣相得謂候也氣不足形盛有餘形瘦脉大胸中多氣者死是則證不相扶故危也形瘦脉大胸中多氣者死是則已傷故死也凡如是類皆形氣不相得也形氣相得者生參伍不調者病類參伍不調謂類伍參校常則三部九候皆相失者死失謂氣候不相類也病也三部九候皆相失者死相失之候診凡有七如七診之狀上下左右之脉相應如參春者病甚上下左右相失不可數者死三部九候上下左右凡十八診也參春者謂大

傷醫大全

卷一 內經

壽

顧氏秘書

數而鼓如參春梓之上下也大則病進故中部之病甚也不可數者謂一息十至已上也死中部之候雖獨調與眾藏相失者死中部之候相減者死中部左右凡六診也上部下部已不相應中部獨調則非其久減於上下是亦氣衰故皆死也偏少目內陷者死太陽之脉起於目內眥目內陷者太陽主諸陽形肉已脫九候雖調猶死氣不謂形之氣故獨言之形肉已脫九候雖調猶死氣不謂形也脫則經云脉氣有餘形氣不足生蓋不足未至脫雖平調猶察九候獨小者病獨大者病獨疾者病必死也獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨陷下者病診凡有七者此也伏脉見七診謂參伍不調隨其獨異以言其病兩此言九候之中有七診之法也

脫肉身不去者死穀氣外衰則肉脫盡天真內竭矣去猶九候之脉皆沉細懸絕者為陰主冬故以行去也九候之脉皆沉細懸絕者為陰主冬故以夜半死盛躁喘數者為陽主夏故以日中死位無物極則反也乾坤之義陰極則龍戰於野陽極則亢能有悔是以陰陽極脉死於夜半日中也寒熱病者以平旦死亦物極則變也平曉木王木氣熱中及熱病者以日中死陽之病風者以日夕死卯酉病水者以夜半死水王之脉乍疎乍遲乍疾者日乘四季死辰戌丑未土寄王之脾氣內言諸病死期也

傷醫大全

卷一 內經

壽

顧氏秘書

經脉別論曰人之居處動靜勇怯脉亦為之變乎凡

人之驚恐悲勞動靜皆為變也變謂變易常候是以夜行

則喘出於腎腎主於交氣合幽冥故夜淫氣病肺

夜行腎勞因而喘息有所墮恐喘出於肝恐生於

筋血因而奔喘淫氣害脾肝木妄淫有所驚恐喘

出於肺驚則心無所依神無所歸淫氣傷心驚則

故氣淫反度水跌仆喘出於腎與骨濕氣通腎骨

傷心也謂足跌仆謂身倒也當是之時勇者氣行則已

怯者則著而為病壯氣有強弱神有故曰診病之道

湯醫大全 卷一 內經 美 顧氏秘書

觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以為診法也通達

得其情狀乃為深飲食飽甚汗出於胃飽甚胃滿

識診契物宜也驚而奪精汗出於心驚奪心精神氣浮越陽內

持重遠行汗出於腎骨勞氣越腎復過疲故疾走

恐懼汗出於肝暴役於筋肝氣罷極故搖體勞苦

汗出於脾搖體勞苦則動作用力則殺精四布脾化水穀故汗

出於食氣入胃散精於肝淫氣於筋散穀精之氣

入於肝則浸淫食氣入胃濁氣歸心淫精於脉

滋養於筋絡矣穀氣入胃濁氣歸心淫精於脉

穀氣也心居胃上故穀氣歸心淫精於脉

溢精微入於脉也何者心主脉故脉氣流經經氣

歸於肺肺朝百脉輸精於皮毛經氣流運乃為大

於肺肺為華蓋位復居高治節山之故毛脉合精

受百脉朝會乃布化精氣輸於皮毛也毛脉合精

行氣於府府謂氣之所聚處也是謂氣府精神明

留於四藏氣歸於權衡膻中之布氣者分為三

於息道宗氣留於海積於胃中命曰氣海也如是

分化乃四藏安定三焦平均中外上下各得其

權衡以平氣口成寸以决死生寸為寸關尺之分

故中外高下氣結均平則氣口之脉而分寸也氣

口者脉之大要會也百脉盡朝故以其分寸决死生

也飲入於胃遊溢精氣上輸於脾中焦水化精微

於脾上焦如霧中焦如沤脾氣散精上歸於肺通

調水道下輸膀胱水土合化上滋肺金金氣通腎

乃為溲矣下焦水精四布五經並行合於四時五

藏陰陽揆度以為常也水精布經氣行筋骨成血

五藏陰陽揆度氣順配合四時寒暑證符

藏氣法時論曰夫邪氣之客於身也以勝相加邪者

之目風寒暑濕至其所生而愈謂至已至其所不

勝而甚謂至已至於所生而持謂至生已自得

其位而起居所主處謂肝病者兩脇下痛引少腹

令人善怒肝厥陰脉自足而上環陰器抵少腹

湯醫大全 卷一 內經 美 顧氏秘書

其氣實虛則目眩眩無所見耳無所聞善恐如人
將捕之肝厥陰脈自脅肋循喉嚨入頰頰連目系
至目銳眇皆後故病如是心病者胸中痛脇支滿脇
也恐謂恐懼魂不安也心痛者胸中痛脇支滿脇
下痛膺背肩甲間痛兩臂內痛心少陰脈支別者
主厥陰之脈起於胃中其支別者亦循胃出脅下
按三寸上抵掖下循膈內行太陰少陰之脈直入
肘中下循臂行兩筋之間又心少陰之脈直入
復從心系却上肺上出掖下循膈內後廉行太
陰心主之後下肘內循臂內後廉抵掌後銳骨之
端又小腸太陽之脈自臂膈上繞肩甲交肩後
是病如虛則胸腹大脇下與腰相引而痛陰之脈
胃中出屬心包下高歷絡三焦其支別者循胃出
脅心少陰之脈自心系下高絡小腸故病如是

傷醫大全

卷一 內經

素

顧氏秘書

脾病者身重善肌肉痿足不收行善癢脚下痛
兒病脾象土而主肉故身重肉痿也脾太陰之脈
起於足大指之端循指內側上內踝前廉上膈內
腎少陰之脈起於足小指之下斜趨足心上膈
內出膈內廉故病則足不收行善癢脚下痛也
則腹滿腸鳴飧泄食不化脾太陰脈從股內前廉
入腹屬脾絡胃故病如
是霧樞經曰中氣不足則肺病者喘欬逆氣肩背
腹為之善滿腸為之善鳴肺病者喘欬逆氣肩背
痛汗出尻陰股膝脾膈脘足皆痛肺藏氣而主喘
故病則喘欬逆氣也背為胃中之府肩接近之故
肩背痛也肺養皮毛邪盛則心液外泄故汗出也
腎少陰之脈從足下上循膈內出膈內廉上股內
後廉貫脊屬腎絡膀胱今肺病則腎脈受邪故尻
陰股膝脾膈脘足皆痛虛則少氣不能報息耳聾
虛則少氣不能報息耳聾

不足以報息也肺太陰之絡會於耳中故聾也腎
少陰之脈從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠古本
今肺虛則腎氣不足以腎病者腹大脰腫喘欬身
上潤於嗌故喘乾也腎病者腹大脰腫喘欬身
重寢汗出憎風腎少陰脈起於足而上循膈復從
故腹大脰腫而喘欬也腎病則骨不能行而身重
也腎邪攻肺心氣內微心液為汗故寢汗出也脰
腫上焦內熱外泄陰凝玄府陽虛則胸中痛大腹
小腹痛清厥意不樂中腎氣既虛心無所制心氣
熏肺故痛聚胃中也足太陽脈從項下行而至足
腎虛則太陽之氣不能盛行於足故足冷而氣逆
也清謂氣冷厥謂氣逆也神躁擾故不樂也
大腹小腹痛志不足則神躁擾故不樂也
宣明五氣篇曰五氣所病心為噫象火炎上烟隨烟
出肺為欬象金堅勁扣之有聲肝為語象木枝條
之肺為欬邪擊於肺故為欬也肝為語而形支別
語宜委曲脾為吞象土包容物歸於內腎為欠為
故出於肝脾為吞象土包容物歸於內腎為欠為
噫象水下流上生雲霧氣鬱於胃故欠生焉胃為
太陽之氣和利而滿於心出於鼻則生噫胃為
氣逆為噦為恐胃利則氣逆而上升也包容水穀
性喜受寒寒穀相薄故為噦也寒盛則噦起熱
盛則恐生何者胃熱則腎氣微弱故為恐也
腸小腸為泄下焦溢為水大腸為傳道之府受盛之氣
既虛傳道之司不禁故為泄利也下焦膀胱不利
為分注之所氣室不寫則溢而為水膀胱不利
為癃不約為遺溺膀胱為津液之府水注出之然
不得小便足三焦脈虛膽為怒中正決斷無私無
不約下焦則遺溺也膽為怒偏其性剛決故為

傷醫大全

卷一 內經

素

顧氏秘書

寒無刺血凝泣而天溫無疑月生無寫月滿無補

月郭空無治言刺法必○八正者所以候八風之

虛邪以時至者也八正謂八節之正氣也八風者

剛風北方大剛風東方嬰風南方大弱風西方

方謀風西北方折風也虛邪謂乘人之虛而為病

者也以時至謂天應太一移居以四時者所以分

八節之前後風朝中宮而至者也

避之勿犯也四時之氣所在者謂春氣在經脈夏

也觸胃虛邪動傷直氣避而勿犯乃不病以身之

虛而逢天之虛兩虛相感其氣至骨入則傷五藏

傷醫大全

卷一 內經

聖 顧氏秘書

以虛感虛同工候救之弗能傷也候知而止故

日天忌不可不知也人忌於天故云天忌犯虛邪

者入正之虛邪氣也入正之虛邪謂入節之虛邪

為病故謂之正邪者身形若用力汗出腠理開逢

虛風其中人也微故莫知其情莫見其形正邪者

之鄉來也以中人微故莫上工救其萌芽必先見

知其情意莫見其形狀三部九候之氣盡調不敗而救之故日上工下工

救其已成救其已敗救其已成者言不知三部九

候之相失因病而敗之也○故養神者必知形之

肥瘦榮衛血氣之盛衰血氣者人之神不可不謹

養神安則壽延神去則形弊不可不謹養○此俱解鍼經之義也

離合真邪論曰天地溫和則經水安靜天寒地凍則

經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經

水波涌而隴起夫邪之入於脉也寒則血凝泣暑

則氣淖澤虛邪因而入客亦如經水之得風也○

誅罰無過命曰大惑反亂大經真不可復用實為

虛以邪為真用鍼無義反為氣賊奪人正氣以從

為逆榮衛散亂真氣已失邪獨內著絕人長命予

傷醫大全

卷一 內經

聖 顧氏秘書

人天殺不知三部九候故不能久長識非精辨學

大經又為氣賊動因不知合之四時五行因加相

為殘害安可久乎勝釋邪攻正絕人長命非惟味三部九候之為弊

亦足損絕邪之新客來也未有定處推之則前引

之則止遂而寫之其病立已此亦解鍼經

通評虛實論曰何謂虛實邪氣盛則實精氣奪則虛

奪謂精氣減○孔子而病熱脉懸小者何如懸謂

少如奪去也動也手足溫則生寒則死乳子中風熱喘鳴肩息

者脉何如喘鳴肩息者脉實大也緩則生急則死

四藏各十八日寄治不得獨主於時也脾藏者常
著胃土之精也土者生萬物而法天地故上下至
頭足足太陰者三陰也故太陰爲之行氣於三陰
陽明者表也五藏六府之海也亦爲之行氣於三
陽藏府各因其經而受氣於陽明

陽明脉解篇曰足陽明之脉病惡人與火聞木音則
惕然而驚胃熱內鬱故惡人惡火病甚則棄衣而
走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上之處
皆非其素所能也病反能者何也四支者諸陽之

瘍醫大全

卷一 內經

果

顧氏秘書

本也陽盛則四支實實則能登高也

陽受氣於四支故四支爲

諸陽之本熱盛於身故棄衣欲走也陽盛則使人妄言

罵詈不避親疎而不欲食故妄走也

言胃病所以能登高而歌

棄衣而走妄言而罵者皆以其邪氣之盛也邪盛

故熱盛熱盛故陽盛陽盛則三者之證由於此矣

評熱病論曰有病温者汗出輒復熱而脉躁疾不爲

汗衰狂言不能食病名爲何岐伯曰病名陰陽交

交者死也

交謂交合陰陽之氣不分別也

人所以汗出者皆生於穀穀生於精

言穀氣化爲精精氣勝乃爲汗今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也言初精勝則當能食

而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而
輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也無俾言無可使
爲汗也穀不化則精不生精不化流故無可使病而留者其壽可立而傾
也如是者其人壽命立致傾危也汗出而脉尚躁盛者死汗後脉當遲靜
而反躁急以盛滿者是眞氣竭而邪盛故知必死也今脉不與汗相應此不
勝其病也其死明矣脉不靜而躁狂言者是失志
失志者死志舍於精今精無可使是志無所居志不留居則失志也今見三死
不見一生雖愈必死也汗出脉躁盛一死不勝其病二死狂言失志者三死也

瘍醫大全

卷一 內經

聖

顧氏秘書

逆調論曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也

言病有熱而煩

滿者陰氣少

陽氣少陰氣多故身寒如從水中出

言病有寒從中生者

○不得卧而息有音者是陽

明之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音

也陽明者胃脉也六府之海水穀其氣亦下行陽

明逆不得從其道故不得卧也胃不和則卧不安

此之謂也夫起居如故而息有音者此肺之絡脉

逆也絡脉不得隨經上下故留經而不行絡脉之

病人也微故起居如故而息有音也夫不得卧卧

則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水藏主津液主卧與喘也

舉痛論曰百病生於氣也氣之為用虛實逆順緩急皆能為病故發此問怒

則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收

矣則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不

同何病之生怒則氣逆甚則嘔血及殮泄故氣上

矣怒則陽氣逆上肝氣乘脾喜則氣和志達榮衛

通利故氣緩矣氣脈和調故志達暢榮衛通利故氣徐緩悲則心系急

肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣

傷醫大全 卷一 內經 吳 顧氏秘書

消矣悲則損於心心系急則動於肺恐則精却却

則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣恐

陽精却上而不下流故却則上焦閉也上焦既閉

氣不行流下焦陰氣亦還迴不散而聚為脹然上

焦回禁下焦氣還各寒則腠理閉氣不行故氣收

矣身寒則衛氣沉故皮膚文理及滲泄之處皆閉

矣則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄矣熱則膚腠

大通津液外驚則心無所倚神無所歸慮無所定

故氣亂矣氣奔越故勞則喘且汗出外內皆越故

氣耗矣疲力役則氣奔速故喘息氣奔速則陽外

故氣耗思則心有所存神有所歸正氣留而不行

損也故氣結矣以九氣為問而言之也

腹中論曰何以知懷子之且生也伯曰身有病而無

邪脉也言懷子之將生者身雖經閉而脉則無病

和勻也凡婦人懷妊三月則陰陽之精尚未變化

三月則精氣正變其氣熏蒸衝胃而為惡阻三四

月則惡阻少止脉甚滑疾蓋男女正成形質其氣

未定也五六月已後則形質已定男女既分及八

九月十月其脉平和如無娠然非醫工深明脉理病

家肯明言者難以診而知也脉訣云滑疾不散胎

然亦有始終洪數不變者其氣甚盛不可以一例

傷醫大全 卷一 內經 吳 顧氏秘書

痺論篇曰痺其時有死者或疼久者或易已者其故

何也伯曰其入藏者死其留連筋骨間者疼久其

留皮膚間者易已入藏者死以神去也筋骨疼久

由斯深淺榮者水穀之精氣也和調於五藏灑陳

於六府乃能入於脉也正理論曰穀入於胃脉道

故循脉上下貫五藏絡六府也榮行脉內故衛者

水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入於脉也悍

謂浮盛之氣也以其浮盛之氣故循皮膚之中分

故慄疾滑利不能入於脉中也皮膚之中分肉之間

肉之間熏於膏膜散於胸腹謂脉外也膏膜謂五

藏之間高中膜也以其浮盛故能布散於胃逆其

腹之中空虛之處熏其膏膜令氣宣通也

氣則病從其氣則愈不與風寒濕氣合故不為痺

夫營衛之所行者如此必逆營衛之氣則病而順

營衛之氣則愈則此營衛者乃氣也非筋骨肌皮

脈與五藏六府之有形者也不與風寒濕痺或痛

或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也痛

者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入

深營衛之行滯經絡時疎故不痛皮膚不營故為

不仁不知有皮也其寒者陽氣少陰氣多與病相

益故寒也病本生於風寒濕其熱者陽氣多陰氣

傷醫大全 卷一 內經 李 顧氏秘書

少病氣勝陽遭陰故為痺熱陰氣不勝其多汗而

濡者此其逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故

汗出而濡也言痺之所以痛者以其寒氣多也

也痺之所以痛者以其寒氣多也

之行滯經絡之脈有時而疎故亦不為痛也

之所以不仁者以其皮膚之中少氣血以為之營

運故皮頑不動而為不仁也痺之所以體寒者

以衛氣少營氣多惟營氣多則與病氣相益故寒

冷也勝則風氣為陽與營氣相遭而陰氣不能勝

之故為痺熱也痺之所以濕者以其遇濕甚也

所以燥者雖未之言而即濕者以反觀之則衛氣

多營氣少遇熱太甚兩陽夫痺之為病不痛何也

痺在於骨則重在於脈則血凝而不流在於筋則

屈不伸在於肉則不仁在皮則寒故具此五者則

不痛也凡痺之類逢寒則蠱逢熱則縱如蠱行縱

謂縱緩不相就

痿論篇曰五藏使人痿何也痿謂痿弱無力以運動

皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜肺主身之

脾主身之肌肉腎主身之骨髓亦各歸其所主故

肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生痿躄也

足不得伸以行也肺心氣熱則下脈厥而上上則

熱則腎受熱氣故爾

傷醫大全 卷一 內經 李 顧氏秘書

下脈虛虛則生脈痿樞折挈脛縱而不任地也

盛則火獨光炎上腎之脈常下行今火盛上炎用

事故腎脈亦隨火炎燥而逆上行也陰氣厥逆火

復內燔陰上隔陽下不守位心氣通脈故生痿

地肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而

攣發為筋痿膽泄故口苦也肝主筋膜熱則筋膜

乾而攣急脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉

痿脾與胃以膜相連脾氣熱則胃液滲泄故乾而

腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿

又腎脈上股內貫脊屬腎故腎氣熱則腰脊

不舉腎主骨髓熱則骨枯而髓減發為骨痿

者獨取陽明何也陽明者五藏六府之海

水穀主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

背腹上頭項故云宗筋主束骨而利機關也

同屈伸故曰機關衝脈者經脈之海也

經之海主滲灌谿谷與陽明合於宗筋

而宗筋正宗筋也衝脈循腹俠齊傍各同身寸之五

分而上宗筋明脈亦俠齊傍各同身寸之一寸五分

十二經海故主滲灌谿谷也肉之大會為谷小會

為陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明為之長皆

屬於帶脈而絡於督脈從上而下故云陰陽總宗

筋之會也宗筋俠齊下合于橫骨陽明輔其外衝

脈居其中故云會于齊街而陽明為之長氣街陰

髦兩傍脈動處也帶脈者起於季脅圍身一周而

絡於督脈也督脈起於關元上下循腹故云皆

屬於帶脈而絡於督脈也督脈任脈衝脈

三者同起而異行故經文或參差引之故陽明

虛則宗筋縱帶脈不引故足痿不用也

厥論篇曰厥之寒熱者何也陽氣衰於下則為寒厥

陰氣衰於下則為熱厥

厥病之分寒熱者以足之

足下者何也陽主外而厥

陰脈者集於足下而聚於足心故陽氣勝則足下

熱也

指及大指之端並循足陽而上肝脾腎脈集于足

下聚于足心陰弱故足下熱也此言熱厥之熱在

陽勝陰也

者何也陰主內而厥

下而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其

寒也不從外皆從內也

大指之端三毛中足少陰脈起于足小指之下斜

趣足心並循足陰而上循股陰入腹故云集于膝

下而聚于膝之上也此言寒厥

令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何

也陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛於

上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則

不知人也

病能論曰人有卧而有所不安者何也伯曰藏有所

傷及精有所之寄則安故人不能懸其病也

其精藏有所傷而精耗者卧不安也必精有所寄

傷醫大全

卷一 內經

顧氏秘書

傷醫大全

卷一 內經

顧氏秘書

傷醫大全

卷一 內經

書 顧氏秘書

下氣疾也

取金平肝也

奇病論曰人有重身九月而瘖此為何也

懷妊者也瘖謂不言語也胞之絡脉絕也

流通而不能言非胞絡者繫於腎少陰之脉貫腎

天眞之氣斷絕也

繫舌本故不能言

少陰腎脉也氣不能言無治也當十月復

成其疹

數歲不已此安得之名為何病

而問當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主

傷醫大全

卷一 內經

書 顧氏秘書

乾中滿則陳氣有餘有餘則脾氣

上溢故曰其氣上溢轉為消渴也

氣也

陵泉口苦者病名為何何以得之病名曰膽瘴

苦故口苦

使肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷

而口為之苦治之以膽募俞

期門下同身寸之五分俞在脊第十有癢者一日

數十漫此不足也身熱如炭頸膺如格人迎躁盛

遊故令頭痛齒亦痛

病名曰厥逆

各為何何以得之此五氣之溢也名曰脾瘴

為之行其精氣津液在脾故令人口甘也

也此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘

者令人中滿故其氣上溢轉為消渴

外泄故肥令人內熱甘者性氣和緩而發散逆故

令人中滿然內熱則陽氣炎上炎上則欲飲而噉

氣故口甘津液在脾是脾之濕

此肥美之所發

在脾胃穀化餘精氣隨溢口迎脾

此肥美之所發

此肥美之所發

此肥美之所發

此肥美之所發

此肥美之所發

此肥美之所發

此肥美之所發

喘息氣逆此有餘也是陽氣太盛於外陰氣不足故有餘也 太陰脉

細微如髮者此不足也其病安在名為何病便小

得也溲小便也 頸膈如格言頸與膈膈如相格拒

不順應也人迎躁盛謂結喉兩傍脉動盛滿急數

非常躁速也胃脉也太陰脉細緩如髮者謂手大

指後同身寸之一寸骨高脉動處脉則肺脉也此

正手太陰脉氣之所病在太陰其盛在胃頰在肺

流可以候五藏也

病名曰厥死不治病瘵數溲身熱如炭頸膈如格

而數今太陰脉反微細如髮者是病與脉相反也

何以致之肺氣逆陵于胃上使人迎躁盛故曰病

在太陰其盛在胃也以喘息氣逆故云頰亦在肺

也病因氣逆證不相應故病名曰厥死不治也

此所謂得五有餘二不足也所謂五有餘者五病

之氣有餘也二不足者亦病氣之不足也今外得

五有餘內得二不足此其身不表不裏亦正死明

矣外五有餘者一身熱如炭二頸膈如格三人迎

數十溲二太陰脉微細如髮在表則內有二不足

在裏則外得五有餘表裏既不可憑補寫固難為

法故曰此其身不表 人生而有病巔疾者病名曰

何安所得之百病皆生於風雨寒暑陰陽喜怒然

傷巔謂上巔 病名為胎病此得之在母腹中時其

母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發為

巔疾也精氣謂陽之精氣也言人初生有頂巔之

疾者胎中之病也在腹之時母有大驚氣

瘍醫大全 卷一 內經 素 顧氏秘書

上而不下精氣并居 於上令子發為巔疾

刺禁論曰藏有要害不可不察肝生於左肝象木王

發生故肺藏於右肺象金王於秋秋陰收殺故藏

生於左肺為少陰陰心部於表陽氣主外腎治於裏

藏之初故曰藏心部於表心象火也 腎治於裏

主內腎象水也心為五藏部主故脾謂之使營動

稱部腎間動氣內治五藏故曰治脾謂之使營動

糟粕水穀胃為之市水穀所歸五味皆 膏肓之上

故使者也 胃為之市入如市故為市也 膏肓之上

中有父母膏肓之上氣海居中之氣者生之原生者

下兩上為膏肓心為陽父也肺為陰母也又云心

主于氣心主于血其榮衛於身故為父母 七節之

傍中有小心小心謂真心神滿之宮室脊有三七

二一節腎在下七節之傍腎神曰

志五藏之靈皆名為神神之從之有福逆之有咎

所以得名為志者心之神也從之有福逆之有咎

入者人之所以生形之所以成順之則福延無刺

逆之則咎至此陳禁刺藏府之有定次也 無刺

大醉令人氣亂無刺大怒令人氣逆無刺大勞人

經氣越也 無刺新飽人氣盛也 無刺大飢人氣不足也 無刺大

渴人血脈也 無刺大驚人神蕩越也 此舉不可輕

刺志論曰氣實形實氣虛形虛此其常也反此者病

形歸氣故虛實同焉形氣相 穀盛氣盛穀虛氣虛

反故病生氣脈氣形身形 穀盛氣盛穀虛氣虛

此其常也反此者病營氣之道內穀為實穀入於

故穀氣虛實占必同焉胃氣傳於肺精者上行經隧

候不相應則為病也 脉實血實脉虛血虛此其

瘍醫大全 卷一 內經 素 顧氏秘書

常也反此者病焉反不相應則為病也如何而反

氣虛身熱此謂反也氣虛為陽氣不足陽氣不足

脈不盛而身熱證不相符故謂反也甲穀入多而

乙經云氣盛身寒氣虛身熱此謂反也穀入多而

氣少此謂反也穀入于胃脈道乃行今穀入多而

不入而氣多此謂反也胃氣外散脈盛血少此謂

反也脈少血多此謂反也

相合故氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷

暑傷謂觸冒也寒傷形故氣盛身熱傷氣故氣虛身熱

皮部論曰百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠

理開開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而

不去傳入於府廩於腸胃廩積也邪之始入於皮

也沂然起毫毛開腠理沂然惡寒也起謂毛起豎

其入於絡也則絡脈盛色變盛謂盛滿變其入客

於經也則感虛乃陷下經虛邪入故曰感虛其留

於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消

肉燥腠破毛直而敗筋急也弛緩也消燦也寒則

勝焉氣消咽者肉之標故肉消則腠破毛直而敗也

骨空論曰任脈者起於中極之下以上毛際循腹裏

傷醫大全 卷一 內經 素 顧氏秘書

上關元至咽喉上頤循面入目言任脈之所起所

脈之一也中極者臍下四寸起於中極之下始於

會陰穴也兩陰間任由會陰而行腹督由會陰而

寸陷中動脈應手上曲骨之毛際橫骨上中極下一

下腕中腕上腕巨關膈中至廉前承漿以衝脈者

上咽喉中其脈至上頤循面而入于目也

起於氣街並少陰之經俠齊上行至胸中而散言

脈之所起所止也衝脈亦奇經入脈之一也任脈

當臍中而上行衝脈俠齊兩傍而上行起于氣街

並足少陰腎經俠臍上行至胃中而散也氣街者

穴名也在毛際兩傍鼠鼯上同身寸之一寸也而

衝脈起於氣街者亦從少腹之內與任脈並行而

至於是乃循腹也又曰衝脈任脈者皆起于胞中

於咽喉別而絡唇口由此言之則任脈衝脈從少

腹之內上行並由中極

任脈為病男子內結七疝

女子帶下瘕聚言任脈之為病也內者腹也腹之

疝各篇有狐疝風疝肺疝脾疝心疝風疝心疝腎

疝氣且管總計其數乃五藏疝及狐疝疝疝疝其

大義俱見各篇後丹溪七疝寒水筋血氣狐疝疝

珍方七疝厥後寒氣盤附似丹溪合于經旨雖

名色各異豈出內經範圍耶然世但知男子有疝豈知

婦人亦有疝蓋皆不考內經故耳疝聚者即積聚

傷醫大全 卷一 內經 素 顧氏秘書 五五五

則裏者其所行之脈絡也病則氣逆而不能上何
以至胃中而散也氣聚腹中而不能散何以能上何
裏之督脈為病脊強反折督脈亦奇經也任脈衝
急也故經或謂衝脈為督脈也何以明之今甲乙及古
經脈流註圖經以任脈循背者謂之督脈自少腹
直上者謂之任脈亦謂之督脈是則以背腹陰陽
別為名目任脈自胞中過帶脈貫齊而上故男子
為病內結七疝女子為病則帶下疲聚衝脈俠齊
而上並少陰之經上至胃中故衝脈為病則逆氣
裏急也以督脈上循脊裏故督脈者起於少腹以
督脈為病則脊強反折也

傷醫大全

卷一

內經

本

顧氏秘書

此溺孔之上端也而督脈其絡循陰器合纂間繞
自骨圍中央則至於足其絡循陰器合纂間繞
纂後乃合纂間也所謂問者謂前陰後陰之兩間
也自兩間之後復分別繞腎至少陰與巨陽中絡
而行繞纂之後也
者合少陰上股內後廉貫脊屬腎別謂別絡分而
陰之絡者自股內後廉貫脊屬腎足太陽絡之外
行者循髀樞絡股陽而下其中行者下貫腎至臍
中與外行絡合故言至少陰與巨陽中與太陽起
絡合少陰上股內後廉貫脊屬腎也
於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩
膊內俠脊抵腰中入循脊絡腎上行也其男子
循莖下至纂與女子等其少腹直上者貫齊中央

上貫心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央
起於目內眥上循脊裏而至于人中也自其少腹直
行者自尻上循脊裏而至于人中也自其少腹直
上至兩目之下中央前而任脈之行而云是督脈所
繫由此言之則任脈衝脈督脈各異而同一體也
此生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝此
生疝正是任脈經云為衝疝者其女子不孕癥痔
遺溺隘乾亦以衝脈任脈並自少腹上至于咽喉
腎故不孕癥痔遺溺隘乾也謂之任脈者女子得
之任脈也故經云此病其女子不孕也謂之衝
脈者以其氣上衝也故經云此病其女子不孕也
心而痛也謂之督脈者以其督脈經云此病其
由會陰而行背任由會陰而行腹衝由氣衝而行

傷醫大全

卷一

內經

本

顧氏秘書

足少陰惟督脈由會陰而起而會陰在少腹之下
橫骨之中中央女子入繫廷孔循陰器合纂間又自
兩間之後又別絡者分而行之繞其腎內廉貫
脊屬腎彼足太陽膀胱經之絡從外行者循髀樞
絡股陽而下其中行者下貫腎至臍中與外行絡
合是少陰腎經自股內後廉貫脊屬腎又與足太
陽起于目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項
循脊膊內俠脊抵腰中入循脊絡腎一如足太陽
經脈之所行也然而督脈任脈各名色雖異而氣脈
不殊其督脈所行者一如任脈之行故自少腹直
上者貫臍中央上貫心入喉上頤環唇上繫兩目
之中中央其督脈為病者一如任脈之病從少腹上
衝心而痛不得前後為衝疝其女子不孕之病
一如任脈之病故其脈相交引病亦互名耳
水熱穴論曰少陰何以主腎腎何以主水腎者至陰
也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故

其本在腎其末在肺皆積水也

陰者謂寒也冬月至寒腎氣合應故

云腎者至陰也水王於冬故云至陰者盛水也腎少陰脈從腎上貫肝膈入肺中故云其本在腎其末在肺也腎氣上逆則水氣

客于肺中故云皆積水也 腎何以能聚水而生

病腎者胃之關也關閉不利故聚水而從其類也

關者所以司出入也腎主下焦膀胱為府主其分注關竅二陰故腎氣化則二陰通二陰閉則胃膈

滿故云腎者胃之關也關閉則水積水積則氣停水積氣溢氣水同類故云關閉不利聚水而從其

也 上下溢於皮膚故為附腫附腫者聚水而生病也

傷醫大全

卷一

內經

奎

顧氏秘書

腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎

汗出逢於風內不得入於藏府外不得越於皮膚

客於玄府行於皮裏傳於附腫本之於腎名曰風

水勇而勞甚謂力房也勞勇汗出則玄府開汗出逢風則玄府復閉則汗未出內伏皮膚專

化為水從風而所謂玄府者汗空也汗液色玄從水故名風水

聚於裏故謂之玄府此言風水 水俞五十七處者

是何主也腎俞五十七穴積陰之所聚也水所從

出入也尻上五行行五者此腎俞

背脊之俞凡有五行當其中者腎脈氣所發次兩傍 故水病下為附腫大腹上為

喘呼

水入於肺則喘息賁急而大呼也 不則因者

標本俱病

是肺腎俱水為病也 分爲相輸俱受

者水氣之所留也

應本其俱受病氣則皆水所留也

也 伏菟上各二行行五者此腎之街也

街謂道也凡有五者此腎之街也

凡有五者此腎之街也 則伏菟三陰之所交結於脚也

者此腎脈之下行也名曰大衝凡五十七穴者皆

藏之陰絡水之所客也

經所謂五十七者尻上計有五行每行計有五穴此

傷醫大全

卷一

內經

奎

顧氏秘書

腎之俞也其中行係督脈一經旁四行係足太陽

旁衝脈也且足經三陰之所交者必結于脚內

上三寸有穴名三陰交腎肝脾三經之所交也其

衝其穴在內踝之上凡此五十七穴者皆陰藏之

陰絡水之所客處也故 標本病傳論曰有其在本而求之於標有其在本而

求之於本有其在本而求之於標有其在本而求

之於本故治有取標而得者有取本而得者有逆

取而得者有從取而得者

得病之情知治大體則逆從皆可施必中焉 故知逆與從正行無問知標本者萬舉萬當

既深明則無問 不知標本是謂妄行 識猶備淺

於人正行皆當 夫陰陽逆從標本之為道也小而大言

故言一而知 少而多淺而博可以言一而知百也

百病之害 則小爭其所利則大以斯明著

知遠言標與本易而勿及 雖事極深玄人非咫尺

標本之道雖易可為言 畧以淺近而悉貫之朕

而世人識見無能及者 病發而有餘本而標之先

治其本後治其標病發而不足標而本之先治其

標後治其本 本而標之謂有先病復有後病也以

傷醫大全

卷一 內經

畜

顧氏秘書

而本之謂先發輕微緩者後發重大急 謹察間甚

者以其不足故先治其標後治其本也 謹察間甚

以意調之 易少謂少形證而重難審量標本不足

調之也 問者并行甚者獨行先小大不利而後

生病者治其本 并謂他脈共受邪氣而合病也獨

甚則相傳傳急則亦死 此 論病有標本刺有逆從也

天元紀大論曰天有五行御五位以生寒暑燥濕風

人有五藏化五氣以生喜怒思憂恐 御猶臨御化

象雖殊參應一也 論言五運相襲而皆治之終

期之日周而復始已知之矣其與三陰三陽之候

奈何今之 五運各周三百六十五日而為紀者也

故曰終始之日周而復始也 對曰五運陰陽者

天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本

始神明之府也可不通乎 道謂化生之道綱紀謂

也父母謂萬物形之先也本始謂生殺皆因而有

之有也所以造化不極能為萬物生 故物生謂之

化物極謂之變陰陽不測謂之神神用無方謂之

聖 謂化變聖神之道也化施化也變散易也神無

日極無期稟候故曰神無思測量故曰聖由化與

變故萬物無能逃五運陰陽由聖與神故衆妙無

窮 在人為道 術政化非道不成 在地為化 化生

物者地土氣孕 化生五味 金石草木根葉華實酸

生隨時 道生智 智通妙用 立生神 立遠幽深故生

觸遇玄通契物 惟道所生 立生神 立遠幽深故生

化無不通也 神在天為風 風者天之號令也 在

地為木 東方在天為熱 應火 在地為火 南方在天

為濕 應土 在地為土 中央在天為燥 應金 在地為

金 西方在天為寒 應水 在地為水 北方之化神之

資土為濕所全 蓋因而成 立也 雖初因之以化

資土為濕所全 蓋因而成 立也 雖初因之以化

資土為濕所全 蓋因而成 立也 雖初因之以化

傷醫大全

卷一 內經

畜

顧氏秘書

氣布而蕃育氣終而象變其致一也在天為玄其
 而道之所生者為神在化為萬物而化之
 所生者為五味惟生神而為風為熱為濕為燥
 為寒此乃三陰三陽之氣也故風之氣為木熱之
 氣為火濕之氣為土燥之氣為金寒之氣為水而
 成五運之形由是天地之氣與在地之形相感而
 化生萬物也然天地者萬物之上下五運行大論
 曰所謂上者歲天也者萬物之上下五運行大論
 陰陽之道路五運行大論曰左右者諸上見厥陰
 少陽右少陰見太陽左少陰見太陽右厥陰見太陽
 少陽右少陰見太陽左少陰見太陽右厥陰見太陽
 其位言其見也帝曰何謂下岐伯曰厥陰在北而命
 左太陽在下左陽明右太陽左少陰在下左厥陰右
 陽明少陽在上則厥陰在下左少陰右太陽在上則
 陽明少陽在下左陽明右太陽左少陰在下左厥陰
 在上則少陰在下左太陽右厥陰太陽在上則太陽
 陽明少陽在下左陽明右太陽左少陰在下左厥陰
 在上則少陰在下左太陽右厥陰太陽在上則太陽

傷醫大全 卷一 內經 索 顧氏秘書

陰在下左少陽右少陰所謂面南而命其位言其
 見也王註云面北者面南而命其位言其
 北也左右在下者位在北故南而言其左右也上
 其位也下地也此在天地三陰三陽之氣右西也
 左右也此在天地三陰三陽之氣右西也
 地也水運之形左轉於內以臨天也旋於外以加
 在地五運之形左轉於內以臨天也旋於外以加
 多衰之形相召而損益彰以爲物極之變也其氣
 盛衰之形相召而損益彰以爲物極之變也其氣
 與形之衰相召者損益彰以爲物極之變也其氣
 者天地之常氣在五運曰平氣在六氣曰常化也
 物極之變者天地之變氣在五運曰平氣在六氣曰
 六氣曰淫勝反勝也其變之虛者則五運之不及
 太過六氣之淫勝反勝也其變之虛者則五運之
 六氣之反勝相勝也凡此五運六氣所謂變化盛
 虛本經後篇千言萬語皆所以發明此四者學

當潛心以究之也五運氣行各終期日非獨主時
 者言木火土金水治政各終一歲之期日不獨治
 歲內六步帝曰何謂氣有多少形有盛衰區曰陰
 陽之氣各有多少故曰三陰三陽也山氣有多少
 分爲二別也陰陽之三也何謂太陰爲正陰太陽
 爲正陽次少者爲少陰次少者爲少陽又次爲陽
 明又次爲厥陰形有盛衰謂五行之治各有太過不及也
 爲厥陰形有盛衰謂五行之治各有太過不及也
 氣至不足太過迎之氣至太過不足隨之故其始
 天地之氣虧盈如此故云形有盛衰也故其始
 也有餘而往不足隨之不足而往有餘從之知迎
 知隨氣可與期言虧盈無常應天爲天符承歲爲
 歲直三合爲治應天謂木運之歲上見厥陰火運
 之歲上見少陽少陰上見厥陰火運

傷醫大全 卷一 內經 索 顧氏秘書

見太陰金運之歲上見陽明水運之歲上見太陽
 此五者天氣下降如合符運故曰應天爲天符也
 承歲謂木運之歲當庚戌未金運之歲當巳酉水
 土運之歲當申子此五者歲之所直故曰承歲爲
 運之歲也三合謂火運之歲上見少陰年辰臨午上
 運之歲上見太陰年辰臨丑未金運之歲上見陽
 明年辰臨酉此三者天氣運氣與年辰俱會故云
 三合爲治也歲直亦曰歲位三合亦爲天符六微
 行大論曰天符歲會曰太一天符謂天運與歲俱
 會也此承上文而明氣有多少形有盛衰之義不
 外乎天氣地氣運氣而巳陰陽之氣合有多少者
 謂三陰三陽之氣各分多少陰多者爲太陰正陰
 次少者爲少陰而次者爲厥陰多者爲陽多者爲太
 陽正陽次少者爲少陽而次者爲陽明多者爲太
 盛衰謂五行之治各有太過不及者爲陽明也形有
 各有所盛衰土有少宮金有少商水有少羽
 木有少角火有少徵而太者太商水有少羽

也始謂甲子歲也六微旨大論曰天氣始於甲地
氣始於子子甲相合命曰歲立運氣全書曰運有
盛衰氣有虛實更相迎隨以司歲也陽盛陰衰如
土運甲陽而已陰虛陽實如六氣子實而丑虛
迎隨如六十甲子一陽一陰盛衰虛實遞相接送
以司歲次而推之以終六甲故有餘已則不足隨
不足已則有餘從亦有歲運非有餘已則不足者蓋
以同天地之化也若餘已復餘少已復少則天地
之道變常而災害苛疾至矣知其來而迎○寒暑
之知其往而隨之則歲氣自可與期也

燥濕風火天之陰陽也三陰三陽上奉之
為暑陽明為燥太陰為濕厥陰為風少
陰為火皆其元在天故曰天之陰陽也木金土金
水火地之陰陽也生長化收藏下應之
木初氣也火二氣也
相火三氣也土四氣也金五氣也水終氣也以其
在地應天故云下應也氣在地故曰地之陰陽也

傷醫大全

卷一 內經

三

顧氏秘書

天以陽生陰長地以陽殺陰藏
主生故以陽生陰長地陰主殺故以陽殺陰
藏天地雖高下不同而有陰陽之運用也天有
陰陽地亦有陰陽上騰是以各有陰陽也陰陽交
泰故化變木火土金水火地之陰陽也生長化收
藏故陽中有陰陰中有陽各兼之陽中兼陰陰中
兼陽易之卦離中虛所以欲知天地之陰陽者應
坎中滿此其義象也
天之氣動而不息故五歲而右遷應地之氣靜而
守位故六期而環會
天有六氣地有五氣天以六
氣臨地地以五位承天蓋以
天氣不加君火故也以六加五則五歲而餘一氣
故遷一位若以五承六則常六歲乃備盡天元之

氣故六年而環會所謂周而復始也地氣左行往
而不返天氣東轉常自火運數五歲已其次氣正
當君火之上法不加臨則右遷君火氣上以臨相
火之上故曰五歲而右遷也由斯動靜上下相臨
而天地萬物之情動靜相召上下相臨陰陽相錯
變化之機可見矣動靜相召上下相臨陰陽相錯
而變由生也天地之道變化之微其由是也孔子
也上下相違寒暑相臨氣相得則和不相得則病
又云上者右行下者左行左右周天餘而復會

天以六為節地以五為制周天氣者六期為一備
終地紀者五歲為一周
六節謂六氣之分五制謂
一年故五歲為一周六年為一備備謂備歷天氣
周謂周行地位所以地位六而言五者天氣不臨
故也君火以名相火以位各于君位不立歲氣故
天之以氣不偶其氣以行君火之正守位而奉天
之命以宣行火令爾以名奉天故曰君火以名守
位稟命故曰五六相合而七百二十氣為一紀凡
三十歲千四百四十氣凡六十歲而為一周不及
太過斯皆見矣
歷法一氣十五日因而乘之積七
百二十氣即三十年積千四百四十
十氣即六十年也經云有餘而往不足隨之不足
而往有餘從之故六十年中不及太過斯皆見矣
此承上文論上下相召之義而合之以周紀之數
也上者天也下者地也上下相召者天右旋之陰
陽加於地也地左轉之陰陽臨于天也而相召以
治歲治步也天之陰陽風熱燥濕寒又增火為六
數者在天之熱分為暑火二氣故三陰三陽各上
奉之也地之陰陽木火土金水亦增火為六數者
在地之火分為君相二形故生長化收藏各下應
之也生長者天之道藏殺者地之道天陽主生陽

傷醫大全

卷一 內經

三

顧氏秘書

中有陰故以陽生陰長地陰主殺陰中有陽故以陽殺陰藏天地雖高下不同而各有陰陽之運用天惟有陰故能下降地惟有陽故能上升是以謂之各有陰陽也即如木火土金水地之陰陽也生長化收藏故陽中有陰陰中有陽所以欲知天地之陰陽者天之陰陽下加地氣共治歲也則應天之氣動而不息蓋地之治歲君火不主運惟五運循環故天之六氣加之常五歲右餘一歲與地遷移一位而動不息也地之陰陽上臨天氣共治步也則應地之氣靜而守位蓋地之治步其木君相土金水無殊皆各主一步以終期故其上臨天之六氣共治也常六期齊周復于始治之步環會而靜守位也故治歲動者與治步靜者相召外旋上者與內運下者相臨則陰陽相錯而損益盈虛之變所由生也天以六為節地以五為制者上下相召之數也蓋天之六氣各治一歲故六期一備地之六位其君火以名相火以位故五歲一周五六相合凡三十歲為一紀六十歲為一周其間相

攝醫大全 卷一 內經 圭 顧氏秘書

錯之陰陽或氣類同多而益為太過之盛者或氣類異少而損為不及之虛者斯皆可見其變也
五運行大論曰臣覽太始天元冊文丹天之氣經于牛女戌分齡天之氣經于心尾巳分蒼天之氣經于危室柳鬼素天之氣經于亢氏昂畢玄天之氣經于張翼婁胃所謂戊巳分者奎璧角軫則天地之門戶也戊土屬乾巳土屬巽六戊為天門六巳為地戶夫候之所始道之所生不可不通也其五天之象所經星宿分野之支位者蓋干之與支即根本之與枝葉經言干則支在其中矣故其化皆干與支之同屬者運位齊化是根本與枝葉同化者也夫五氣之至各有五色經于分野氣太過則先天而至氣不及則後

天而至嘗以寅卯前候之自然可見故所謂上下者歲上下見陰陽之所在也左右者諸上見厥陰左少陰右太陽見少陰左太陽右厥陰見太陰左少陽右少陰見少陽左陽明右太陰見陽明左太陽右少陽見太陽左厥陰右陽明所謂面北而命其位言其見也面北而命其位也何謂下厥陰在上則少陽在下左陽明右太陰少陰在上則陽明在下左太陽右少陽太陰在上則太陽在下左厥陰右陽明少陽在上則厥陰在下左少陰

攝醫大全 卷一 內經 圭 顧氏秘書

命其位言其見也主歲者位在南故面北而言其左右在下者位在北故面南而言其左右也右太陽陽明在上則少陰在下左太陰右厥陰太陽在上則太陰在下左少陽右少陰所謂面南而命其位言其見也左右在下者位在北故面南而言其左右也上下相違寒暑相臨氣相得則和不相得則病水火相臨金木相臨水土相臨水火相臨金木相臨水土相臨也上臨下為順下臨上為逆亦謂抑氣相得而病者何也以下臨上不當位也六位相臨假令土臨臨金臨土皆為以下臨上不當位也父子動靜之義子為下父為上以子臨父不亦逆乎

何如言天地之左右也上者右行下者左行左右周天餘

而復會也上天也下地也周天謂天周地五行之

回地承天而右轉木運之後天氣常餘餘氣不加

于君火却退一步加臨相火之上是以每五歲已

退一位而右遷故曰左右周天餘而復會會週也

合也言天地之道常五歲畢則以餘氣遷加復與

五行座位再相會合而為歲法也周夫變化之用

天謂天周地位非周天之六氣也

生成之形類也虛者所以列應天之精氣也形精

之動猶根本之與枝葉也仰觀其象雖遠可知也

觀五星之東轉則地體地為人之下太虛之中者

左行之理昭然可知

也言人之所居可謂下矣徵其至理則是太虛之

中一物爾易曰坤厚載物德合元疆此之謂也

大氣舉之也以太虛不化之氣任持太虛者也所

之氣任持之也氣化而變不任持之則太虛之器

亦敗壞矣凡有形處地之上皆有生化之氣任持

之也然器有大小不同壞有遲速之燥以乾之暑

異及至氣不任持則大小之壞一也

以蒸之風以動之濕以潤之寒以堅之火以溫之

故風寒在下燥熱在上濕氣在中火遊行其間寒

暑六入故令虛而化生也

地體之中凡有六入一

曰濕五日寒六日火受燥故乾性生焉受暑故蒸

性生焉受風故動性生焉受濕故潤性生焉受寒

故堅性生焉受火故溫故燥勝則地乾暑勝則地

性生焉此天之六氣也

傷醫大全

卷一 內經

志 顧氏秘書

熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂火勝則

地固矣六氣之用此言天右旋於外而寒暑六入

生人物于天之中也天地萬物之上下謂在左右

之道路者天右旋六節之位也上下謂在左右

天之位在左在下者之位也左右謂在左右

司天左間右間之位也左右謂在左右

間之位也故天之三陰三陽于其六位右旋如已

亥歲上見厥陰而左間少陰右間厥陰逐歲自旋降

于右也而左命其位言其見者謂司天之位在右

而而北命其左右則西南為左間之位東南為右

間之位而南命其左右則西北為左間之位東北為

見者謂地之位也北而南命其左右則西北為左

左間之位而南命其左右則西北為左間之位東北為

也自天地萬物之上下至此獨論天右旋之位陰陽

上下相違寒暑相臨氣相得則和不相得則病者

言天之右旋速地方位而其氣與地方位氣相違

相臨其速同類相生之氣則和不同類相制之氣

則病也或氣雖同類相得亦病者惟相火臨于君

火為不當位故也君位臣則順臣位君則逆逆則

病近害速者是也動靜何如者帝謂天動能降于

地地靜不能降天而難上下相違寒暑相臨之語

伯言上者右行下者左行則知天常于上自右降

東南而旋廻以臨地地常于下自左升東北而循

顯明木君相土金水之位循環臨天而皆動也故

左右應動各皆周天週則復相會也應地者靜天

地之體動靜雖殊而其用之變化在地則五行麗

地而載生成之形類運於內在天則七曜緯虛而

列應天之精氣運于外其形類與精氣之相隨運

動猶根本之與枝葉同乎一氣而不殊故但仰觀

七曜之象周旋雖

遠可知其動也

天地之氣何以候之天地之氣

勝復之作不形于診也脉法曰天地之變無以脉

傷醫大全

卷一 內經

志 顧氏秘書

診此之謂也 言天地平氣及勝復皆以形證觀察不以診知也 間氣何如
 惟問氣偏治一位故可隨 其所在期于尺寸左右也 隨氣所在期於左右左
 右尺寸四部分位承之以 知應與不應過與不及也 從其氣則和違其氣則
 病 謂當沉不沉當浮不浮當瀉不瀉當 不當其位
 者病 見于他 迭移其位者病 謂左見右脈 失守其
 位者危 已見于他鄉本宮見 尺寸反者死 子午卯酉四歲
 有之反謂歲當陰在寸而脈反見于尺歲當陽在
 尺而脈反見于寸尺寸俱乃謂反也若尺獨然或在
 寸獨然是不 陰陽交者死 寅申亥巳丑未辰戌八
 應氣非反也 陰陽交者死 年有之交謂歲當陰在
 右脈反見左歲當陽在左脈反見右左右交見
 是謂交若左獨然或右獨然是不應氣非交也先

湯醫大全 卷一 內經 美 顧氏秘書

立其年以知其氣左右應見然後乃可以言死生
 之逆順 此言天地之氣可隨其所期于尺寸
 少陰君火為尊故甲巳土運為尊六氣以
 令其餘四運為北政以臣事之則面北而受命者
 也又以其少陰為君主凡脈之司天在泉而尺寸不
 應者皆以少陰論之其脈主于沉也其脈不應
 之法陽之所在其脈應之其脈主于沉也其脈不應
 北政之歲人脈在左寸北尺南地左間之氣在
 右寸右間之氣在左寸左尺南地左間之氣在
 之氣在右寸右尺南地左間之氣在左寸左尺南地
 陰而兩寸之脈俱不應厥陰在泉則左間少陰右
 間太陽而少陰在左其右寸之脈不應左間少陰右
 左間少陽而少陰在左其右寸之脈不應左間少陰右
 應故曰北政之歲三陰在下則寸不應者此也少
 陰司天則左間太陽右間厥陰而兩尺之脈俱不
 應厥陰司天則左間少陰右間太陽而兩尺之脈俱不

其左尺之脈不應太陰司天則左間少陽右間少
 陰而少陰在右其右尺之脈不應故曰北政之歲
 三陰在上則尺不應者此也南政之歲人脈而南
 而寸南尺北天左問之氣在右寸右間之氣在左
 寸地左間之氣在左尺右間之氣在右尺所以左
 陰司天則左間太陽右間厥陰而兩寸之脈俱不
 應厥陰司天則左間少陰右間太陽而兩寸之脈俱不
 應其右寸之脈不應左間少陰右間太陽而兩寸之脈俱不
 陰而少陰在右其左寸之脈不應故曰南政之歲
 三陰在天則寸不應者此也少陰在泉則左間太
 陰右間厥陰而兩尺之脈俱不應厥陰在泉則左
 間少陰右間太陽而兩寸之脈俱不應左尺之脈不
 太陰在泉則左間少陽右間少陰在左其左尺之脈不
 右尺之脈不應也故曰南政之歲三陰在泉則尺
 不應者此也從其氣則和者陰陽各當其尺寸本位
 也違其氣則病者即所謂陰陽不當其位或迭
 移其位或失守其位或寸尺反或陰陽交也
 北二政內行運法甲巳為南政餘四運為北政南

湯醫大全 卷一 內經 美 顧氏秘書

政司天在泉皆行土運其餘北政皆以在泉行運
 如北政巳亥厥陰司天則行在泉少陽火運又如
 寅申少陽司天則行在泉厥陰木運餘倣此惟北
 北政辰戌年太陽司天當行在泉太陰土運緣北
 政以臣不敢行君之命故行金運
 是土之子以足木火金水四運焉
 五常政大論曰天不足西北左寒而右涼地不滿東
 南右熱而左溫其故何也 言也 陰陽之氣高下之
 理大小之異也 高下謂地形大小謂陰陽之氣盛
 方下西方涼北方 寒之異中原地形西北方高東南
 寒東方溫南方 熱 東南方陽也陽者其精降於下
 故右熱而左溫 陽精下降故地氣以溫而和之于
 方溫而南方熱 下矣 陽氣生于東而盛于南故東
 氣之多少明矣 西北方陰也陰者其精奉於上故

左寒而右涼陰精奉上故地以寒而和之于上矣

北方寒君面而西而盛于北故西方涼而

言臣面乾而對也是以地有高下氣有溫涼高者

氣寒下者氣熱六元正紀論云至高之地冬陰精

所奉其人壽陽精所降其人天陰精所奉高之地

地也陰方之地陽不妄泄寒氣外持邪不數中正

氣堅守故壽延陽方之地陽氣耗散發泄無度風

濕數中直氣傾竭故天折今中原之境西北方

人多壽東南方人多夭其中猶各有微甚爾

北之氣散而寒之東南之氣收而溫之所謂同病

異治也西方北方人皮膚閉腠理密人皆食熱故

皆食冷故宜收宜溫散謂溫浴使

中外條達收謂溫中不解表也根於中者命曰

神機神去則機息根於外者命曰氣立氣止則化

絕凡稟乎天者以神為主稟乎地者以氣為主諸

氣為機發之主其所為也物莫之知是以神捨去

則機發動用之道息矣又以其生氣之根本乃發

自形之中故曰根中也其根于外者生源繫地

故其所生長化成收藏皆為造化之氣所成其

道絕滅矣其木火土金水燥濕液堅柔雖常性不

易及乎外物去生氣離根化絕止則氣始而生化

氣散而有形氣布而蕃育氣終而象變始動而生

有形布化而成結終氣反者病在上取之下病在

湯醫大全

卷一 內經

素 顧氏秘書

於上則溫下以調之上取謂寒積于下溫之不去

陽藏不足則補其陽也傍取謂氣并于左則藥熨

于右氣并于右則○有毒無毒服有約乎病有久

新方有大小有毒無毒因宜常制矣有毒治病十

去其六下品藥毒之大也常毒治病十去其七中品藥毒

小毒治病十去其八上品藥毒無毒治病十去其

九上品中品下品無殺肉果菜食養盡之無使過

之傷其正也大毒之性烈其為傷也多小毒之性

性一等加小毒之性一等所傷可知也故至約必

止之故十去其或六或七或八而即已然無毒之

藥性雖平和平而久之則氣有偏勝則有偏絕不

可長也故十去其九而止服至約已則以五殺五

湯醫大全 卷一 內經 素 顧氏秘書

肉五果五菜隨五 不盡行復如法法謂前四約也

藏宜者食養盡之必先歲氣無伐天和無盛盛無

約而止必無過也虛虛而遺人天殃不察虛實但思攻擊盛者轉盛

虛氣口消病勢日侵殃咎無致邪無失正絕人長

命所謂伐天和也攻虛謂實是則致邪不識夫經

絡以通血氣以從復其不足與眾齊同養之和之

靜以待時謹守其氣無使傾移其形迺彰生氣以

長病去而瘠者其經絡已通血氣已順當復其不

自彰而

六元正紀大論曰數之始起於上而終於下歲半之

前天氣主之歲半之後地氣主之歲半謂立上下

交互氣交主之歲紀畢矣上下交互則三四氣之

此則一歲之紀畢矣春氣西行夏氣北行秋氣東行冬氣南

行觀萬物生長收藏如斯言故春氣始於下秋氣始於上夏氣

始於中冬氣始於標春氣始於左秋氣始於右冬

氣始於後夏氣始於前此四時正化之常察物以

也故至高之地冬氣常在至下之地春氣常在明之可

之巔盛夏水雪汚下川澤嚴冬草生常在之義足

明矣春夏之氣本主東南而其氣則降于西北秋

冬之氣本主西北而其氣則升于東南故春氣者

始於往年在下之氣所升秋氣者由于今年在上

之氣所降夏氣者始必謹察之○厥陰所至為裏

急筋纏縮少陰所至為瘍疹身熱火氣太陰所至

為積飲否隔也土氣少陽所至為噎嘔為瘡瘍火氣

陽明所至為浮虛浮虛薄腫按太陽所至為屈伸

不利病之常也厥陰所至為支痛支性少陰所至

為驚惑惡寒戰慄譫妄譫亂太陰所至為穢滿少

陽所至為驚躁瞽昧暴病陽明所至為鼯尻陰股

膝脾膈胛足病太陽所至為腰痛病之常也厥陰

所至為纏及少陰所至為悲妄血也太陰所

至為中滿霍亂吐下少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌

通謂溢食陽明所至為脇痛絞揭身皮太陽所至

為寢汗瘧寢汗謂睡中汗發于胃盜汗病之常也厥

陰所至為脇痛嘔泄泄謂少陰所至為語笑太陰

所至為重附腫附腫謂肉泥少陽所至為暴注

瘧暴死陽明所至為鼯噎太陽所至為流泄禁止

病之常也凡此十二變者報德以德報化以化報

政以政報令以令氣高則高氣下則下氣後則後

傷醫大全 卷一 內經 全 顧氏秘書

氣前則前氣中則中氣外則外位之常也氣報德

天地氣也高下前後中外謂生病所也手之陰陽

其氣高足之陰陽其氣下足太陽氣在身中足少陽

明氣在身中足少陽太陰厥陰氣在身中足少陽

陰少陰太陰等語俱主歲言而人病則合于歲也

凡此十二變者言前德化政令病變十二節之候

若不當歲步主客正位而至者則屬變氣而為勝

復也凡勝復之候至其勝氣變德則報復以德變

化則報復以化變政令則報復以政令而其氣之

往復不能相移也所變之氣居高則報復亦高居

下則報復亦下居後則報復亦後居前則報復亦

前居中則報復亦中居外則報復亦外而其位之

下風寒暑濕燥火之變常不能同也故風勝則動

不寧熱勝則腫熱勝氣則為丹燥勝血則為癰

腫勝骨肉則為附腫按之不起

勝則乾乾于外則皮膚皴揭乾于內則精血枯

勝則浮浮謂浮起按濕勝則濡泄甚則水閉附腫

變耳○天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之

運居其中而常先也運謂木火土金水各主歲者

降則歲運下降上升下也地氣勝則歲運上升天氣

歸從而生其病也非其位則變生故上勝則天氣

降而下下勝則地氣遷而上勝謂多也上多則自

之常也勝多少而差其分多則遷降多少則遷降

也相移氣勝多少而差其分多少之應有微有甚

之異微者小差甚者大差甚則位易氣交易則大

變生而病作矣大要曰甚紀五分微紀七分其差

可見此之謂也以其五分七分之所以

熱寒無犯寒奈何發表不遠熱攻裏不遠寒汗泄

熱不遠熱下利故用寒不遠時必順之犯者治以

寒皆謂不獲已而用之也春宜涼夏宜寒秋宜溫冬宜熱此時之宜用

勝也不可不順然犯熱治以寒犯寒治以熱犯春

宜用涼犯秋宜○婦人重身毒之何如有故無殞

亦無殞也謂有大堅癥痲痛甚不堪則治以破積

其大也上無殞言母必全愈痛之藥是謂不救必乃盡死救之存

亦無殞言子亦不死也大積大聚其可犯也衰

傷醫大全

卷一

內經

全

顧氏秘書

其大半而止過者死衰其大半不足以害生故衰

毒氣內餘無病可攻以當毒○木鬱達之火鬱發

之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之然調其氣達謂

令其條達也發謂汗之令其疎散也奪謂下之令

無壅礙也泄謂滲泄解表利小便也折謂抑之制

其衝逆也通是五法乃氣可過者折之以其畏也

所謂寫之過太過也太過者以味寫之鹹寫腎酸

故謂寫寫肝辛寫肺甘寫脾苦寫心過者畏寫

為畏也至真要大論曰陰之所在寸口何如

南北可知之矣北政之歲三陰在泉則寸口不應

木火金水四運面北受氣凡氣之在泉者脈息不

見惟其左右之氣脈可見之在泉之氣善則不見

惡者可見病以氣及客主淫厥陰在泉則右不應

少陰在太陰在泉則左不應左故南政之歲少

陰司天則寸口不應土運之歲面南行合故少陰

厥陰司天則右不應太陰司天則左不應亦左右

諸不應者反其診則見矣不應皆為脈沉脈沉下

沉為浮細帝曰尺候何如伯曰北政之歲三陰在

為大也下則寸不應三陰在上則尺不應司天日上下南政

之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺不應左

傷醫大全

卷一

內經

全

顧氏秘書

右同尺不應寸左右悉同此言南北二政之天地

之氣內淫而病何如歲厥陰在泉風淫所勝則地

氣不明平野昧草迺早秀民病灑灑振寒善呻數

欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下高咽不通食則

嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重

中歲也灑灑振寒善呻數欠為胃病食則嘔腹脹

善噫得後與氣則快然如衰身體皆重為脾病飲

食不下高咽不通邪在胃脘也蓋厥陰 歲少陰在

泉熱淫所勝則煩浮川澤陰處反明民病腹中常

鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛目瞋齒痛

頤腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大蟄蟲不藏

西歲也齒痛頤腫為大腸病腹中雷鳴氣上衝胸

喘不能久立邪在大腸也蓋少陰在泉之歲火剋

腸病也 歲太陰在泉草乃早榮濕淫所勝則埃昏

巖谷黃反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾

渾焯焯噤腫喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便

病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以回關

如結臑如別 謂辰戌歲也太陰為土色見應黃于

見故曰至陰之交合其氣色也衝頭痛謂腦後骨

間痛也腦謂膝後曲膈之中也腦所後軟肉處也

耳聾渾焯焯噤腫喉痺為三焦病衝頭痛目似

脫項似拔腰似折髀不可以回關如結臑如別為

勝臑足太陽病又少腹腫痛不得小便是在三歲

焦蓋太陰在泉之歲土王剋太陽故病如是也

少陽在泉火淫所勝則暄明郊野寒熱更至民病

注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候

也處寒之時熱更其氣熱氣既往寒氣

後來故云更至也餘候與少陰在泉同 歲陽明在

泉燥淫所勝則霧霧清暄民病喜噫噎有苦善太

息心脇痛不能反側甚則盛乾而塵身無膏澤足

外反熱 謂子午歲也霧謂霧暗不分似霧也清

心脇痛謂心之傍脅中痛也而塵謂面上如有觸

目塵上之色也噎有苦善太息心脅痛不能反側

其則面塵身無膏澤是外反熱為膽病盛乾而塵

為肝病蓋陽明在泉之歲金王剋木故病如是

歲太陽在泉寒淫所勝則凝肅慘慄民病少腹控

引腰脊上衝心痛血見噤痛頤腫

謂丑未歲也

謂空疑而不動萬物靜肅其儀形也慘慄寒甚也

控引也畢陰九也頤頰車前牙之下也噤痛頤腫

為小腸病又少腹控引腰上衝心肺邪在諸氣

小腸也蓋太陽在泉之歲水剋火故病如是

在泉風淫於內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以

辛散之熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之

以苦發之濕淫于內治以苦熱佐以酸淡以苦燥

之以淡泄之火淫于內治以鹹冷佐以苦辛以酸

收之以苦發之燥淫于內治以苦溫佐以甘辛以

傷醫大全

卷一 內經

顧氏秘書

傷醫大全

卷一 內經

顧氏秘書

苦下之寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之

以辛潤之以苦堅之此言六氣之在泉淫勝為天

氣之變何如厥陰司天風淫所勝則太虛埃昏雲

物以擾寒生春氣流水不冰民病胃腕當心而痛

上支南脅鬲咽不通飲食不下舌本強食則嘔冷

泄腹脹溇泄瘦水閉蟄蟲不出病本于脾謂已亥

歲民病集于中也風自天行故太虛埃起風動飄

蕩故雲物擾也埃青塵也不分遠物是為埃昏土

之為病其善泄利若病水則小便閉而不下若大

泄利則經水亦多閉絕也舌本強食則嘔腹脹溇

痛上支兩脅鬲咽不通飲食不下蓋厥陰司天之

傷醫大全

卷一

內經

全

顧氏秘書

歲木勝土衝陽絕死不治衝陽在足趾上動脈應

故病如是則食飲減少絕則藥食不入亦下嗝還出也攻

之不入養之不生邪氣日強氣內絕故死少

陰司天熱淫所勝佛熱至火行其政民病胸中煩

熱嗝乾右肘滿皮膚痛寒熱欬喘大雨且至唾血

血泄熱衄噓嘔溺色變甚則瘡瘍疔腫肩背臂臑

及缺盆中痛心痛肺脹腹大滿膨脹而喘欬病本

於肺謂子午歲也佛熱至是火行其政乃兩是歲

故曰病本于肺也蓋以少陰司尺澤絕死不治尺澤

天之歲火剋金故病如是尺澤絕死不治在肺

內廉大紋中動脈應手肺之氣也火燥太陰司天

濕淫所勝則沈陰且布雨變枯槁疔腫骨痛陰痺

陰痺者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣

不用飢不欲食欬唾則有血心如懸病本于腎謂

未歲也沈久也腎氣受邪水無能潤下焦枯涸故

大便難也飢不欲食欬唾則有血心懸如飢狀為

腎病又邪在腎則骨痛陰痺痺者按之而不得

腹脹腰痛太便難有背頸項強痛時眩蓋太陰司

天之歲土剋大谿絕死不治大谿在足內踝後跟

水故病如是而腎氣內絕少陽司天火淫所勝則溫氣流行

金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛

色變黃赤傳而為水身面腫腹滿仰息泄注赤

傷醫大全

卷一

內經

全

顧氏秘書

白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱甚則鼽衄病本乎肺

謂寅申歲也火來用事則金氣受邪故曰金政不

平也火炎于上金肺受邪客熱內燔水無能救蓋

少陽司天之氣火天府絕死不治天府在肘後內

寸之二寸動脈應手肺之陽明司天燥淫所勝則

木迺晚榮草迺晚生筋骨內變民病左肘脅痛寒

清于中感而瘧大涼革候欬腹中鳴注瀉鶩溇名

木斂生宛于下草焦上首心脇暴痛不可反側嗝

乾而塵腰痛丈夫癩疔婦人少腹痛目昧背瘍瘡

瘰癧蟄蟲來見病本于肝謂卯酉歲也金勝故草

木晚榮也配于人身則

筋骨內應而不用也大涼之氣變易時候則人寒
通之今肺氣內注泄則無濡勝之疾也大涼居右肺氣
也其茂民自注泄則無濡勝之疾也大涼居右肺氣
大涼且甚陽氣不行故木容收斂草容悉晚生氣
已升陽不布故行積生氣而穡于下也在人之
應則少腹之內痛氣居之瘡瘍痲癢腰痠痛不可
倦仰丈夫癩疝婦人少腹痛甚則墜乾而虛胃滿
洞泄為肝病又心癭痛不能反側目兌皆痛缺盆
中腫痛腋腫馬刀振寒瘰癧為臍病蓋陽明司天
之歲金尅木 太衝絕死不治 太衝在足大指本節
故病如是 太衝絕死不治 後二寸脈動應手肝
內絕真不勝邪故死 太陽司天寒淫所勝則寒
氣反至水且冰血變於中發為癰瘍民病厥心痛
嘔血血泄衄血善悲時眩仆運火炎烈雨暴迺電

傷醫大全

卷一 內經

全 顧氏秘書

胸腹滿手熱肘攣掖腫心澹澹大動胸脇胃皖不

安面赤日黃善噫嗝乾甚則色始渴而欲飲病本

于 謂辰戌歲也太陽司天寒氣布化故水且水

火運而火炎烈與水交戰故暴雨半珠形也若乘

歲民病集于心中也陽氣內鬱溫氣下蒸故

心厥痛而嘔血泄也陽氣內鬱溫氣下蒸故

擊按腫而乾甚則寒氣勝陽水行凌火火氣內鬱

故渴而欲飲也病始心為陰凌犯故云病本

于 心也蓋太陽司天之歲水尅火故病如是 神

門絕死不治 神門在手之掌後銳骨之端動脈應

神氣已亡 所謂動氣知其藏也 所以診視而知死

經脈動氣知神 司天之氣風淫所勝平以辛涼佐

藏之存亡爾

以苦甘以甘緩之以酸瀉之熱淫所勝平以鹹寒
佐以苦甘以酸收之濕淫所勝平以苦熱佐以酸
辛以苦燥之以淡泄之濕上其而熱治以苦溫佐
以甘辛以汗為故而止火淫所勝平以酸冷佐以
苦甘以酸收之以苦發之以酸復之熱淫同燥淫
所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之寒淫所勝平
以辛熱佐以苦甘以鹹瀉之 此言六氣之司天淫
之法 治諸勝復寒者熱之熱者寒之溫者清之清
者溫之散者收之抑者散之燥者潤之急者緩之

傷醫大全

卷一 內經

全 顧氏秘書

聖者奠之脆者堅之衰者補之強者瀉之各安其

氣必清必靜則病氣衰去歸其所宗此治之大體

也 太陽氣寒少陰少陽氣熱厥陰氣溫陽明氣清

平也宗屬也調不失理則各倍其氣以調之故可使

之氣自安其所居勝復衰已則各補養而平定之

必清必靜無妄撓之則六氣循環五神安泰若運

氣之寒熱治之平之亦各歸司天地氣也 此總

結言治勝復 ○身半以上其氣三矣天之分也天

氣主之身半以下其氣三矣地之分也地氣主之

以名命氣以氣命處而言其病半所謂天樞也 身

半正謂齊中也或以腰為身半當伸臂指天舒足

指地以繩量之中正當齊也故又曰半所謂天樞

也

李東垣七方圖

大君一臣三佐九制之大也 遠而奇偶制
 大其服也 大則數少少則二之 腎肝位
 遠服湯散不 小君一臣二制之小也 近而
 厥類而多 奇偶制小其服也小則數多
 多則九之 心肺位近 緩補上治上制以緩
 服湯散不 厥類而少 緩則氣味薄 治
 主以緩緩 補下治下制以急急則氣味
 則治其本 急厚 治客以急急則治其標 奇
 君一臣二奇之制也 君二 偶 君二臣四偶之
 臣三奇之制也 陽數奇 偶 制也 君二臣六
 偶之制也 復 奇之不去則偶
 陰數偶 復 之是為重方也

是故百病之起有生於本者有生于標者有生于
 中氣者有取本而得者有取標而得者有取中氣

瘍醫大全

卷一

內經

奎

顧氏秘書

而得者有取標本而得者有逆取而得者有從取

而得者反佐取之是為逆取奇偶取之是為從取

也 逆正順也若順逆也寒盛格陽治熱以熱是為逆取從順

謂之逆外雖用逆中乃順也此逆乃正順也若寒

格陽而治以寒熱拒寒而治以熱外則雖順中氣

乃逆故方若 故曰知標與本用之不殆明知逆順

正行無問不知是者不足以言診足以亂經籠工

嘻嘻以為可知言熱未已寒病復殆同氣異形迷

診亂經六氣之用籠之與工得其半也厥陰之化

其乃是寒由此參互用失其道故其學問識用不

達工之道半矣夫一經之標本寒熱既殊言未當

究其標論標合等其本言氣不窮其標本論病夫

未辨其陰陽心迷正理治益亂經呼口籠工

標本之道要而博小而大可以言一而知百病之

害言標與本易而勿損察本與標氣可令調明知

勝復為萬民式此言六氣各有所從之標○願聞

病機何如諸風掉眩皆屬于肝風性動木諸寒收

引皆屬于腎收謂斂也引謂急也諸氣贖皆屬

于肺高秋氣涼露氣稠集涼至則氣熱復甚則氣

也氣之為用 諸濕腫滿皆屬于脾土薄則水淺土

則乾土高則濕濕 諸熱瘡癥皆屬于火火象諸痛

瘡瘡皆屬于心心寂則病微心躁則痛甚百端之

諸厥固泄皆屬于下下謂下為肝腎氣也夫守司

之氣也故諸厥固泄皆屬于下也厥為氣逆固謂禁

固諸有氣逆上行及固不禁出入無度燥濕不恒

皆由下焦 諸痿喘嘔皆屬于上上謂上焦心肺氣

之主守也 諸痿喘嘔皆屬于上 也炎熱薄燥心之

氣也承熱分化肺之氣也熱鬱化上故病屬 諸禁

上焦○此皆五藏之疾病機由于內動者也 諸禁

鼓慄如喪神守皆屬于火內作諸瘕疝強皆屬于

濕太陽諸逆衝上皆屬于火炎上之諸脹腹大皆

屬于熱熱鬱于內諸躁狂越皆屬于火熱盛于胃

諸暴強直皆屬于風陽內搏而諸病有聲鼓之如

瘍醫大全

卷一

內經

奎

顧氏秘書

鼓皆屬于熱謂有聲也諸病附腫疼酸驚駭皆屬于火

諸氣多也諸轉反戾水液渾濁皆屬于熱反戾筋轉也水液小便便也

諸病水液澄澈清冷皆屬于寒上下所出及諸嘔吐出溺出也此皆

吐酸暴注下迫皆屬于熱酸酸水及沫也此皆十二經絡之邪病機由

于外入故大要曰謹守病機各司其屬有者求之

無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疎其血

氣令其調達而致和平此之謂也深乎聖人之言有無求之虛盛

責之如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去

晝見夜伏夜發晝止時節而動是無火也當助其

火又如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止

倏忽往來時動時止是無水也當助其水內格嘔

瘍醫大全

卷一 內經

齒

顧氏秘書

逆食不得入是有火也病嘔而吐食入反出是無

火也夫寒之不寒責其無水熱之不熱責其無火

熱之不久責心之虛寒之不久責腎之少有者瀉

之無者補之虛者補之盛者瀉之令上下無碍氣

血通調則寒熱自和陰陽調達矣此願言其

言病機計有十九而有善治之法也願言其

制君一臣二制之小也君一臣三佐五制之中也

君一臣三佐九制之大也寒者熱之熱者寒之微

者逆之甚者從之夫病之微小者猶人火也遇草

水波以逆其性氣以折之攻之病之大甚者猶龍

火也得濕而燄遇水而燄不知其性以水濕折之

適足以光燄請天物窮方止矣識其性者反常之

以寒攻熱以熱攻寒從之者謂攻以寒熱從其性

其事也堅者削之客者除之勞者溫之結者散之

者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者益之

逸者行之驚者平之上之下之摩之浴之薄之劫

之開之發之適事為故量病證候適事用之帝曰何謂逆從

伯曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也逆言

者正治也從者反治也逆病氣而正治則以帝曰

寒攻熱以熱攻寒雖從順病氣乃反治法也帝曰

反治何謂伯曰熱因寒用寒因熱用塞因塞用通

因通用必伏其所主而先其所因其始則同其終

則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已因熱

瘍醫大全

卷一 內經

奎

顧氏秘書

寒用熱物冷服下嗝之後冷體既消熱性便發寒

因熱用冷物熱服也中滿下虛乃疎散其中峻補

于下少服則資壅多服則宜通由是而中滿自除

下虛斯實此則塞因塞用也又大熱內結注泄不

止熱宜寒療結復須除以寒下之結散利止此則

通因通用也投寒以熱涼而行之投熱以寒溫而

行之始同終逆之從之逆而從之從而逆之疎氣

與斯之謂也逆謂逆病氣以正治從謂從病氣

令調則其道也而反療逆其氣以正治使其從順

疎其氣令道路開通則氣感寒熱而為變病之

中外何如從內之外者調其內從外之內者治其

外各絕從內之外而盛於外者先調其內而後治

其外從外之內而盛於內者先治其外而後調其

內皆謂先除其根 中外不相及則治主病 中外不相及自

各一病也○此言治表裏之病有 治寒以熱治熱

以寒而方士不能廢繩墨而更其道也有病熱者

寒之而熱有病寒者熱之而寒二者皆在新病復

起奈何治 謂治之而病不退反因藥寒 伯曰諸寒

之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其

屬也 言益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光

起熱起而中寒尚在寒生而外熱不除欲攻寒則

畏熱不前欲療熱則思寒又止進退交戰危亟已

傷醫大全

卷一 內經

素

顧氏秘書

不必齊以熱取腎者不必齊以寒但益心之陽寒

亦通行強腎之陰熱之猶可或治熱以熱治寒以

寒萬舉 帝曰服寒而反熱服熱而反寒其故何也

伯曰治其王氣是以反也 物體有寒熱氣性有陰

也夫肝氣溫和心氣暑熱肺氣清涼腎氣寒冽脾

氣兼并之故也春以清治肝而反溫夏以冷治心

而反熱秋以溫治肺而反清冬以熱治腎而反寒

蓋由補益王氣太甚也補王太甚則藏之寒熱氣

自多 夫五味入胃各歸所喜攻酸先入肝苦先入

心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化

之常也氣增而久天之用也 夫入肝為溫入心為

寒入脾為至陰而四氣兼之皆為增其味而益其

熱者此其類也餘味皆然但人意疎忽不能辨候

耳故曰久而增氣物化之常也氣增不已蒸氣偏

勝藏有偏絕則有暴天者故口氣增而久天之久

也是以醫者曰藥不具五味不備四氣而久服之

雖且獲勝蓋久必致暴天此之謂也絕粒服餌則

不暴亡斯何由哉無五穀味資助故也復令食穀

其亦調氣之方必別陰陽定其中外各守其經

者內治外者外治微者調之其次平之盛者奪之

汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利治有

表裏在內者以內治法和在表者以外治法

之其次大者以平氣法平之盛其不已則奪其氣

合其衰也假如小寒之氣溫以和之大寒之氣熱

以取之甚寒之氣則下奪之奪之不已則逆折之

折之不盡則求其屬以衰之小熱之氣涼以和之

大熱之氣寒以取之甚熱之氣則汗發之發之不

傷醫大全

卷一 內經

素

顧氏秘書

盡則逆制之不盡則求其屬以衰之故曰汗之

下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利攸所也 謹

道如法萬舉萬全氣血正平長有天命 守道以行

故能驅役草石召遣神靈血氣 保平和之候天真無耗竭之由

疎五過論曰凡未診病者必問嘗貴後賤雖不中邪

病從內生名曰脫營 神屈故也貴之尊榮賤之屈

中邪病從內生血 營富後貧名曰失精五氣留連

脈虛滅故曰脫營 富而從欲貧奪財內結憂煎外悲故

病有所并 物則心從想慕神隨往計營衛之道

以運留氣血不 身體曰減氣虛無情 氣血相迫形

行而積并為病 體日減氣歸精食氣今 病深無氣灑灑然時驚

氣虛不化精無所滋故也

151013 丹黃參日車全書第 8 卷之內

病氣深穀氣盡陽氣內薄 病深者以其外耗于衛
 故惡寒而驚瀝瀝寒貌 內奪于榮 血為憂煎氣隨悲減故外耗于衛內
 工所失不知病情此亦治之一過也 欲診病者必問飲食居處
 欲診病者必問飲食居處 飲食居處五方 暴樂暴
 若如樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀沮 喜則
 悲則氣消悲哀動中者竭絕而失生 愚醫治之不
 知補瀉不知病情精華日脫邪氣迺并此治之二
 過也 不知喜怒哀樂之殊情藥為補瀉而同其則
 五藏精華之氣日脫邪氣薄饒而乃并于正
 氣矣 善為脈者必以比類奇恒從容知之為工而

不知道此診之不足貴此治之三過也 奇恒謂氣
 相常之候也從容謂分別藏氣虛實脈見上下幾
 相似也示從容論曰脾虛浮似肺腎小浮似脾肝
 急沉散似腎此皆工之所 診有三常必問貴賤封
 君敗傷及欲侯王 貴則形樂志樂賤則形苦志苦
 降君之位封公卿也及欲侯王 故貴脫勢雖不中
 謂情慕富貴而妄為不已也 邪精神內傷身必敗亡 憂惶煎迫
 傷邪皮焦筋屈痿瘳為瘳 以五藏氣留連病醫不
 能嚴不能動神外為柔弱亂至失常病不能移則
 醫事不行此治之四過也 嚴謂戒所以禁非也所
 以令從命也外為柔弱

言委隨而順從也然戒不足以禁非動不足以
 從令委隨任物亂失天常病且不移何醫之有凡
 診者必知終始有知餘緒切脈問名當合男女始
 謂氣色也知外者終而始之明知五色氣象終而
 復始也餘緒謂病發端之餘緒也切謂以指按脈
 也問名謂問病診之名也男子陽氣多而左脈大
 為順女子陰氣多而右脈大為順故宜先合之也
 離絕堯結憂恐喜怒五藏空虛血氣離守工不能
 知何術之語 離謂離間親愛絕謂絕念所懷堯謂
 魂遊絕所懷者意喪積所慮者神勞結餘怨者志
 苦憂愁者閉塞而不行恐懼者蕩憚而失守盛怒
 者迷惑而不治喜樂者憚散而不藏由是入者此
 故五藏空虛血氣離守工不思曉又何言哉 此
 治之五過也

徵四失論曰診不知陰陽逆從之理此治之一失矣
 受師不卒妄作雜術謬言為道更名自功妄用砭
 石後遺身咎此治之二失也不適貧富貴賤之居
 坐之薄厚形之寒溫不適飲食之宜不別人之勇
 怯不知比類足以自亂不足以自明此治之三失
 也診病不問其始憂患飲食之失節起居之過度
 或傷于毒不先言此卒持寸口何病能中妄言作
 名為僮所窮此治之四失也 第一失者不知陰陽
 順之理非止一端左手人迎為陽春夏洪大為順
 沉細為逆右手氣口為陰秋冬沉細為順洪大為

逆男子左手脈大為順女子右手脈大為順外感陽病見陽脈為順陰脈為逆陰病見陽脈為順陰脈為逆內傷陽病見陽脈為逆陰脈為逆陰脈為順陽脈為逆又色見上下左右各在其要上為逆下為從女子右為逆左為從男子左為逆右為從第二失者不受師術之正妄效雜術之邪以非為是荷用硬石也第三失者不適病人之情不明比類之義也第四失者不究始時致病之由妄持寸口之脈不中病情偽指病名也

陰陽類論篇曰三陽為經二陽為維一陽為游部此

知五藏終始三陽為表二陽為裏一陰至絕作朔

晦却具合以正其理此言六經為人身之表裏以太陽勝於經也從目內眥上頭分為四道下項并正別脈上下六道以行于背為人身之大經二陽

傷醫木全

卷一 內經

黃

顧氏秘書

者足陽明胃經也從鼻起下過分為四道并正別脈六道上下行腹為人身之維繫一陽者足少陽膽經也起自外眥絡頭分為四道下缺盆并正別脈六道上下為人身之遊行諸部者也曰經曰維曰遊部此可以知五藏終始賴此三經以為之表也故三陽為之表則二陰為之裏二陰者足少陰腎經也二陽為之表則三陰為之裏三陰者足太陰脾經也一陽為之表則一陰為之裏一陰者足厥陰肝經也太陰為正陰而少陰為少陰又次為厥陰太陽為正陽而少陽為少陽又次為陽明以其氣有少異用故各有三者之分耳然少太之義易知而陽明厥陰之義難釋足之十二經合十二月未則為右足之少陽皆兩足第四指脈氣所行也二月建卯主左足之少陽皆兩足第三指脈氣所行也三月建辰主右足之陽明四月建巳上脈氣所行也三月皆兩足次指已上脈氣所行也然正二五六月為

少陽太陽而三四為辰巳月居于其中則後再湯合明于其前故曰陽明也七月建申主陰之生也右足之少陰而十二月建丑則為左足之少陰皆南足心以上脈氣所行也八月建酉主右足之太陰而十一月建子則為左足之太陰皆南足心以上脈氣所行也九月建戌主右足之厥陰而十月建亥則為左足之厥陰皆南足心以上脈氣所行也然七八十一十二月為少陰太陰而九十月為戌亥月則為兩足之陰已盡故曰厥陰也厥者盡也而應之者戌亥則一陰幾于絕矣豈知一陰至絕而有復作之理朔晦相生之妙却具于其中蓋陰盡為晦陰生為朔氣盡為晦氣生為朔既見其晦又見其朔厥陰之絕而復作合當以彼晦朔之妙而正此厥陰之理也正者證也

三陽為父二陽為衛一陽為紀三陰為母二陰為

雌一陰為獨使三陽者即太陽也太陽為表之經覆庇羣生也二陽者即陽

傷醫木全

卷一 內經

黃

顧氏秘書

明也陽明為表之維繫也所以為衛也一陽者即少陽也少陽為表之維繫也所以為紀也三陰者即太陰也太陰為裏之維繫也所以為尊猶母也二陰者即少陰也少陰為裏之維繫也所以為始所以為雌也一陰者即厥陰也厥陰為裏之游部將軍謀慮所以為獨使也方盛衰論曰形弱氣虛死中外俱形氣有餘脈氣不足死藏衰故脈脈氣有餘形氣不足生藏盛故脈是以診有大方坐起有常故診之方法必先出入有行以轉神明言所以貴坐起有常者何以必清必靜上觀下觀司入正邪別五中部按脈動靜上觀謂氣色也下觀謂形氣也入正謂入節靜正候五中謂五藏之部分然後按寸尺之動靜

而定死
生矣

瘍醫寶鑑卷一終

瘍醫大全

卷一 內經

軍

顧氏秘書

瘍醫大全目錄

卷二

論診候入式法

左手表裏脈圖

右手表裏脈圖

詳症脈照圖

輸經絡孫圖

左手經絡圖

右手經絡圖

瘍醫大全

卷二 目錄

顧氏秘書

論持手訣消息法

論榮衛色脈參應之法

黃輜兮先生脈確

論三部脈所主雜病法訣

論三因脈證歌

論脈證名狀二十六種所主病證

論三部脈所主證候

論三部所主臟腑病

五臟六腑脈病虛實例

論定死脉形候歌

論診雜病生死脉歌

論診暴病脉歌

論五臟六腑氣絕證候

扁鵲華陀察聲辨色秘訣

湯醫大全

卷二 目錄

二

顧氏秘書

湯醫大全卷二

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽 全校
男 柳燮用和

論診候入式法

夫醫者人之司命也脉者醫之大業也蓋醫家苟不明脉則如冥行索途動致顛覆矣夫大方脉婦人小兒風科必先診脉後對症處藥獨瘡科之流多有不診其脉候專於治外或有症候疑難別召方脉診察於瘡科之輩甘當淺漏之名噫其小哉如

湯醫大全

卷二 診候

一


顧氏秘書

是原夫瘡腫之生皆由陰陽不和氣血凝滯若不診候何以知陰陽勇怯血氣聚散耶由是觀之則須信原瘡腫於診候之道不可闕也歷觀古人治療瘡腫方書甚多其間診候之法畧而未詳皆夫諸科甚有滅裂愚雖不才輒取黃帝素問難經靈樞甲乙及叔和仲景扁鵲華陀千金外臺聖惠總錄古今名醫諸家方論之中診候瘡腫之說簡編類次貫成篇帙首載診候入式之法次論血氣色脉參應之原後明脉之名脉所主證候及瘡腫逆

從之方庶使爲瘡腫科者覽此則判然可曉了無疑滯於胃次一朝臨疾診候至此則察逆從決成敗若黑白之易分耳

左手表裏脈圖

右手表裏脈圖




寸表手太陽小腸經裏足少陰心經
關表足少陽膽經裏足厥陰肝經
尺表足太陽膀胱經裏足少陰腎經

尺表手少陰心經裏足太陽脾經
關表足陽明胃經裏足太陰脾經
寸表手陽明大腸經裏足太陰肺經

詳症脉照圖

假如經脉者若十二月也絡脉者若三百六十日也

孫脉者若四千三百二十時也人亦如一
小天地於此則可見矣




傷醫大全 卷二 脉圖 四 顧氏秘書

輸經絡孫圖


經孫直

輸絡橫



左手經絡圖

內胸




外背

傷醫大全 卷二 脉圖 五 顧氏秘書

右手經絡圖

後背至足

前頭至腹下



論持手訣消息法

夫診候之脉法常以平且爲紀陰氣未散陽氣未動飲食未進血氣未亂經脉未隆絡脉調勻故乃可診有疾之脉若遇倉卒病患不拘此論內經所謂持脉有道以虛靜爲寶但可澄神靜慮調息凝心視精明察五色聽聲音問所苦方始按寸尺別浮沉以此參照決死生之分矣復觀患人身形長短肥瘦老少男女性情緩急各不同故曰形氣相得者生三五不調者病謂如室女尼冠脉當濡而

傷醫大全

卷二 持手訣

六

顧氏秘書

診得三部之中浮沉滑澁遲疾不調何病所主外觀形色內察脉候參詳處治以忠告之不可輕言談笑亂說是非左右瞻望舉正忽畧此庸醫也皇極經云人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也一脉三部寸關尺也一部三候浮中沉也所以應之九數也可謂脉之理亦微矣人有四時之正脉有平生之常脉有內傷之變脉有外感之邪脉有重陰之脉有重陽之脉有陽虛而陰乘之脉有陰虛而陽乘之脉有陽極而陰生之脉有陰極而陽生之脉有獨見之脉有兼見之脉有初病之脉有將愈之脉有可治之脉有不治之脉有左右上下表裏之間有餘不足惟在乎分別陰陽能分別陰陽斯可以識脉之體劉復真曰昔王叔和以七表八裏脉訣人之生死然又文理浩繁莫若撮其樞要以浮沉遲數四脉爲宗知風氣冷熱主病且浮而有力者爲風浮而無力爲虛沉而有力爲積沉而無力爲氣遲而有力爲痛遲而無力爲冷數而有力爲熱數而無力爲瘡更分三部

傷醫大全

卷二 持手訣

七

顧氏秘書

在何部得之若在寸部主上焦頭面胸膈之疾關
部主中焦肚腹脾胃之疾尺部主下焦小腹腰足
之疾診其五臟何臟得之六腑亦然學者又當以
意會而加精別庶不致按寸握尺之誚云

瘦醫大全

卷二

持手訣

入

顧氏秘書

論榮衛色脉參應之法

夫天地之道曰陰與陽陰陽在人曰血與氣蓋血者
榮也氣者衛也榮者榮於中衛者衛於外所以榮
行脉中衛行脉外脉者血氣之先也血非脉則焉
能榮於中氣非脉則焉能衛於外二者相資而行
內則通於五臟六腑十二經絡外則濡於九竅四
肢百節萬毛晝夜循行如環無端以成其度會於
寸口變見於脉故氣血者人之神也脉者氣血之
神也所以治病之始五決為紀蓋五決者五臟之
色脉也脉應於內色應於外其色之於脉當相參
應故曰能合色脉可以萬全也凡為醫先須調明
色脉況為瘡科若於此不精雖聰慧辯博亦不足
委也

瘡醫大全

卷二

色脉

九

顧氏秘書

黃韞兮先生脉確

內經切脉圖



傷寒大全

卷二 脉確

顧氏秘書

脉押作爲歌便誦習也其以浮沉至數辨及不以浮
 至數辨者各從其類欲其易分別也浮沉等脉
 則用浮沉等字之韻欲其不混淆也脉之應病以
 內經爲主內經未詳者以脉經補之脉經未詳者
 歷代明醫之說補之欲其簡而該也有是脉即
 重是病之由復逐句箋釋於其下欲其明且暢
 後前人脉賦脉詩頗有勝處有志醫學者由此
 而雖曰捷徑實爲正路矣
 脉以輕取辨者曰浮輕手便得如木浮水上 其以

浮辨者曰洪浮大來有力去無力 曰虛浮大按
 之無力 曰散浮大無力至數不齊渙漫不收 曰微浮細
 無力按之如欲絕若有若無 凡六脉

浮 內經謂之毛

浮脉輕手得如木水中浮 浮秋脉也春夏冬見之則
 來急去散則爲平脉若中央堅兩邊虛 有力表邪
 此謂太過細而微此謂不及亦病脉也

清涕嗽惡寒發熱令人愁 風邪自皮毛入皮毛合
 金寒則生水故鼻流清涕風邪迫肺則氣逆故嗽

肺主衛風邪入則皮毛閉固衛氣不能溫外故惡
 寒肺與心皆在上肺邪傳心則心火鬱心主營營
 行血脉故一身發熱仲景謂冬月寒傷營則發熱

傷醫大全

卷二 脉確

顧氏秘書

惡寒無汗風傷衛則發熱惡風有汗此固然矣然
 四時感冒者亦發熱惡寒必用表藥而愈蓋表藥
 其味皆辛辛開毛孔散火鬱毛孔開則衛氣外達
 火鬱散則營血內安榮衛調和則汗出而寒熱解
 矣寸主頭疼關腹滿尺可瘕閉好推求寸主之諸
 陽經起於頭風邪自皮毛深入則歸經故頭痛肝
 脾與腎其脉常沉今脉浮乃陽之乘陰也陽盛則
 熱木之性寒則潤熱則旺肝木旺則尅脾土脾虛
 則不欲食而腹滿腎竅於二陰其性惡燥熱勝則
 血燥而大腸不潤故閉氣燥而勝 浮緊傷寒浮虛
 脫不化故瘕瘕者小便不利也 浮緩風濕自宜搜
 暑寒傷營營行脉中寒氣勁 浮緩風濕自宜搜
 濡滯故脉緩凡頭重身重腿膝痛 浮滑風痰浮數
 浮腫大便洩小便黃者風濕症也 浮滑風痰浮數

熱滑主痰帶浮則為風痰無力須將血弱謀
數主熱帶浮則為風熱無力須將血弱謀
浮陰虛故無力遇此
等脈不宜輕用表藥

洪 內經謂之鈞
又謂之大

應指雖浮大來盛去衰便曰洪 洪夏脈也春秋冬見
來盛去衰如鈞則為平脈若來盛去亦盛此為太
過來不盛去反盛此為不及亦病脈也如鈞者浮
候之來盛下垂曲如鈞狀去
衰則又柔和矣故為平脈 真陰不足邪氣相攻
人之正氣陰陽相配者也陰陽和則無病陰不足
則陽盛陽盛則生火火者偏勝之氣也偏勝之氣
為邪氣邪 寸洪身熱兼膚痛欬唾煩心亦可窮
氣印邪火 寸洪身熱兼膚痛欬唾煩心亦可窮
傷身熱火不得洩故膚痛火 嘔與脹察關中
傷肺故欬唾心惡熱故煩 嘔與脹察關中

傷醫大全

卷二 脈確

圭 顧氏秘書

而惡熱嘔者火上炎 尺虛宜壯水泄痢不宜逢尺
也火樽而不散也 尺虛宜壯水泄痢不宜逢尺
洪相火旺也宜壯水以制陽
光若泄痢尺脈洪者難治

李瀕湖謂洪脈非夏升陽散火宜愚按新病身強
及洪見寸關者升陽散火可也若久病身弱及洪
見兩尺者又宜以
滋陰降火為是

虛 瀕湖引內經云氣來虛微為不及病在內愚
按虛脈浮大無力微脈浮細無力大中不能
見細則虛不可兼言微矣今考內經謂氣來
不實而微為不及不實者細無力之謂也故
可言微瀕湖硬以不實改作虛字誤

虛來浮大奕無力夏月逢之暑病居 暑病發熱有汗
益氣若發熱惡寒無汗脈浮 寸虛自汗多驚悸
數而不虛者宜清暑解表

主氣血虛正氣虛則邪氣實邪氣實便是火火食
氣則表虛汗者心之液也血所化表既虛則營亦
不固血隨火化外洩於表為自汗心藏神血虛
則神失所養故多驚火氣衝心故跳動而多悸
主中宮脹不舒 血虛肝鬱則脹脾胃 潮熱骨蒸痿
候尺 陽氣終已陰氣始午陰虛則交午時陰分而
陽氣并之陽勝則外越為肌膚熱內燥為骨
髓熱熱在骨謂之骨蒸日如潮水之應時而
至謂之潮熱骨枯髓竭足不任身謂之骨痿却憐
久病定亡軀

乳 草

於此脈經謂乳脈浮大而奕按之中央
空兩邊實謂前為兩邊亦不是有力謂
李士材以浮沉為兩邊亦不是有力謂
之實浮中沉相去無幾豈有浮候實沉
候實而中候獨見其空者乎據內經論

傷醫大全

卷二 脈確

圭 顧氏秘書

浮脈云其氣來毛中央堅兩傍虛此謂
太過由是推之則兩傍指兩傍也蓋乳
脈浮大而奕按之兩傍實而中央獨陷
下此血不充之象故主失血諸症

輕手取之浮大奕重按中空邊實乳 乳草名中空如
血者其脈中空 寸關吐衄腸癰病尺部崩淋便血
故以乳比之 寸關吐衄腸癰病尺部崩淋便血

流 吐血衄血腸癰血崩血淋大便下血等症皆陽
盛陰虛也惟陽盛故其脈浮大惟陰虛故其脈
空中

散

有表無裏大而散至數不齊楊花無定空中泛左寸
怔忡右寸自汗 散主氣實血虛心主血血虛則心
神恍惚不寧曰怔忡氣實也邪氣

實也邪氣實則熱左關溢飲兮陰虛生內熱胃熱熱則氣洩故自汗則津液耗而發湯渴多飲滲入肌膚腸右關食痺疝腫亦堪斷胃熱胃之外謂之溢飲和不和則不消穀因而病問曰食痺疝足尺為血脈也陽明胃經下循脛外廉胃熱故疝腫大虛兩尺如斯終壽算經以腎脈散為血少戴同皆不可治也父曰腎脈散諸病脈代散

微

重手按之如欲絕若有若無極其微微屬陰陽虛弱惟陰陽皆虛故其脈見若惡寒發熱汗霏霏候有若無之象而名之曰微則生寒陰虛則生熱陽不寸微衄血驚兼喘關主外固陰不內守則多汗

傷醫大全

卷二 脈確 西 顧氏秘書

中寒拘急危氣血虛則中寒寒則心尺中厥逆元陽損陽火生於陰精陰精虛則陽火弱陽火弱則女子崩中帶下虧

脈以重取辨者曰沉沉重按始得其以沉辨者曰伏重按之着骨乃得凡二脈

沉內經謂之石牢牢即沉脈長大弦而有力者又謂之管主寒主痛與沉同今附於此按始有則為沉沉冬脈也春夏秋見之則病脈也然如彈石者此謂太過其去如寸沉胸脇痛水氣膈數者此謂不及亦病脈也問停若居關與尺腹背及腰疼沉主陰陰盛則尅伐元氣故三部得

沉者皆主痛宜溫之沉緩寒濕沉數熱沉滑當知有水氣者宜利之痰食直沉如無力氣虛甚明沉有力為實邪故主虛也寒主積沉無力則氣崔紫虛四言舉要云沉牢痲冷沉實熱極愚按牢脈沉而長大有力實脈沉取亦長大有力同一沉取長大有力何以辨其為痲冷熱極乎

伏

何以謂之伏推筋按至骨傷寒欲汗陽邪解厥逆臍疼溫藥服瀕湖曰傷寒一手伏曰單伏兩手伏曰雙伏不可以陽症見陰為診及火邪內鬱不得發越陽極似陰故脈伏必有汗而解不可發表又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復感寒

傷醫大全

卷二 脈確 五 顧氏秘書

陰盛陽衰四肢厥逆六脈俱伏須投薑附及炙關元脈乃復出若太谿衝陽皆無脈者必死寸司嘔吐關司痛尺部痲瘦利水穀霍亂嘔吐腹痛聚痛甚者其脈多伏暴泄者脈亦多伏

脈以浮沉合辨者曰實大而長浮沉皆得凡一脈實

實脈大而長浮沉皆有力風熱蘊蓄深譎語發狂疾邪氣盛則實浮有力表實也沉有力裏實也所以然者由風邪滲入鬱而變熱熱甚則喪其神守故諸語更甚則發狂所謂重陽者狂也左手寸實嘔脈實者宜發之右手脈實腹滿者宜下之吐頻心胸苦氣逆積聚腹痛候在關大便不通候

在尺

瀕湖曰脈訣言尺實小便不禁與脈經尺實小腹
痛小便難之說何反黎古不知其謬藥用蓋附愈
謬矣思按脈訣所言亦出脈經脈經云尺脈實小
腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩按用大
黃則脈經以尺實為熱明矣黎古用蓋附可謂大
誤但虛寒不足之症火不能攝水則小便不禁此
係實熱而脈經何以亦有小便不禁之言意者熱
渴飲多大便閉塞水獨歸膀胱則小便數小便數
則不及溺之即自出亦謂為小便不禁耶

脈以至數辨者曰遲一息三至 曰緩一息四至

曰數一息六至 曰結緩時一止 曰促數時一

止 曰代止有常數還入尺中良久方來 凡六脈

瘍醫大全

卷二 脈確

去 顧氏秘書

遲

一息三至號之曰遲浮遲寒在表沉遲作裏醫有力

無力皆寒症抑陰扶陽不用疑寸遲心痛吐酸水

寒氣攻心故痛胃虛而寒氣客之則水入於胃不
輸於脾停於胃腕水得寒氣薰蒸變而為酸此是
寒症故脈經治以附子湯茱萸湯然此症亦有熱
者肝移熱於胃土受木制不能勝水水得木味蘊
而成酸經所謂諸嘔吐酸皆屬於熱是 關尺寒疼
也當清熱燥濕此以脈之滑數辨之 脈可知
脈可知至陰盛則從足五指遲瀋微結 遲瀋則血
寒則凝滯不遲滑脹宜 滑主氣虛主食積氣虛則
行漸成癥結 遲滑脹宜 寒寒則氣收故脹寒飲食
積於腸胃 亦作脹

緩

緩脈均均來四至貴無偏勝奕而和 緩主脾胃又主

月不大不小浮沉同等奕而和者平也若三部不

齊則為偏勝或又兼他脈者病脈也不在四季之

月他脈中帶緩者胃氣 肌肉不仁緩在寸傷人多

也若獨見緩者病脈也 主血脈肺主皮毛風邪 關知

在上寸部心脾也 間不知痛癢曰不仁 關知

入容血脈故肌肉之間 脾胃食難磨 風氣通肝氣移之於脾胃脾 尺為

脚弱下身腫 濕積下焦蘊而成熱濕熱壅滯則勝 浮

而餘瀝多 濕積下焦蘊而成熱濕熱壅滯則勝 浮

緩為風沉緩濕若逢緩滑熱為疴 熱中李士材以

瘍醫大全 卷二 脈確 七 顧氏秘書

濕痰誤 緩瀋營虛緩細痺 風寒濕三氣皆能為痺

痺濕勝為著痺脈 推詳三部自無訛

數 一息六至稱為數只有兒童獨安樂 兒童以六至為

火浮沉實數散且清 浮數有力為實火在表宜散

無力為虛宜補藥 數而無力為虛火也宜 寸為喉舌

疼嘔吐嗽煩渴 胃口當心亦寸主之胃有火故嘔

渴 關中消穀易於饑 消穀善饑 尺部惡寒氣淋作

脈經謂尺脈數惡寒小便黃赤又曰少陰脈數男

子氣淋蓋腎為陰屬水陰虛而陽奏之內熱故外

惡寒火伏水中故小便黃赤甚則勝
膀胱之氣不化小便不利痛而為淋

結脈經載扁鵲之言曰脈有表無裏者死經名
曰結何謂結脈在指下如麻子動搖按如麻
子動搖者輕取之則散亂無紀重按之則不
可得故有表無裏乃腎絕也與緩時一正之
結不同

緩時止謂之結陰盛陽衰凝氣血氣溫血行血者也
氣虛不能溫血則

血寒氣虛不能行血則血滯血浮為痛積在外攻
寒而滯則結血結氣亦結矣

沉為痛積內相迫

促

數時一止何其促陽有餘陰不足痰火煎熬或為喘

傷醫大全

卷二 脈確

六

顧氏秘書

嗽或斑毒

內上紅紫或片者斑也
黑斑難治癰疽皆毒也

代

動而中止不能還止有常數斯名代不是傷寒心悸

多即有腹疼泄痢害久病固為凶 扁鵲曰脈五至

或七來一止不復增 平人亦臟敗 靈樞曰一日一

減者經名曰代死 五臟之精所謂五十營者持其脈口數其至也五

十動而不一代者五臟皆受氣四十動一代者一

臟無氣三十動一代者二臟無氣二十動一代者一

三臟無氣十動一代者五臟無氣予之短期據脈

經謂四十動一止四歲死三十動一止三歲死二

十動一止二歲死十動一止歲內死五動一止五

日死此亦概言 女胎三月餘見之不為礙 舊謂胎

之也不必泥 三月其

脈代按胎脈有五月七月亦代者當於兩尺候之
如脈來或九至或十至一止良久方來又九至或
十至一止良久方來此所謂有常數也再求或九
至或十至不止又於十二至或十五至一止但有
常數皆是代脈代之止有常數乃信也土主信此
脾胃之氣至也土為萬物之生氣脾胃乃五臟之
生氣生氣至故有胎也且天一生水次生火木金
土而五行備胎之初結乃天一之水也次生火木
金土而五臟之氣全五臟之氣全故脈代也代又
何以為死脈以生數論五臟之氣全應天五生土
之數故其脈代以成數論有形之後則榮衛之氣
與天地之晝夜周流而無一息之止者也五臟無
氣獨胃氣尚存故其脈亦代然此胃氣乃由盡之
燈故不久必死

脈不以浮沉至數辨而以形辨者曰弦直而長如按

弓弦 曰緊往來有力左右彈人手如轉索無常

傷醫大全

卷二 脈確

五

顧氏秘書

曰長迢迢自若如揭長竿末稍 曰短不能滿

部兩頭縮縮 曰細直而爽應指如絲線 曰滑

細而往來難應指如輕刀刮竹 曰澀往來前却

流利如珠 曰動大如豆厥厥搖動 凡八脈

弦脈經謂弦脈舉之無有按瘠脈有浮弦者未

嘗舉之無有也經曰瘠皆生於風惟生於風

故其脈浮弦且頭疼如破也即脈經傷寒條

中亦有陽明中風脈弦浮之語則所謂弦脈

舉之無有疑其誤也

挺然在指下端直似弓弦 病脈也然在春夏弱而滑

平脈也若實而強此謂太過不 夏秋則主瘧相纏

實而微此謂不及亦病脈也

風寒暑濕之氣皆為瘧其脈皆弦惟
夏秋患瘧者其冬春亦間有之 弦數熱弦遲
寒寸弦頭痛多痰 弦主痰痰隨厥 關苦癢瘵胃
氣逆 血凝氣滯久而堅硬在臍旁曰 尺當癩疝脚
拘攣 瘵疝者舉九腫痛上連小腹也蓋肝脈絡陰
分臨症以脈之遲按強弱辨之肝主筋腎主骨筋
束骨者也寒則筋急故拘攣者屈伸不利也
緊 內經謂
之急

左右彈手其力強狀如轉索名為緊 緊主寒浮緊表
人迎主傷寒還把風癩診 左手寸關之間曰人迎
寒發熱風氣通肝木得風則動搖故身癢癢肝火
鼓動心火炎神越故卒不知人吐涎沫曰風癩
瘵醫大全 卷二 脈確 顧氏秘書

氣口主傷食喘嗽亦宜審 右手寸關之間曰氣口
滿肺惡寒寒則氣逆故為喘與欬脈 關尺見緊時
經曰緊為實已上皆實邪故其脈緊 關尺見緊時
痺痲極其准 經謂青脈之至也長而左右彈人手
寒濕與 疝

長

迢迢自若指間長倘帶搏堅便失常 長脈在春乃肝
長竿末梢日肝平實而滑如循長竿日肝病按揚
長則氣治若應指搏堅而不更弱則氣不治矣傷
寒傳變陽明可詳 傷寒二三日脈長目痛 左寸足
疼舌卷縮 經曰寸口脈長日足脛痛按左寸心為
陽主血脈長主有餘之病上有餘則下

不及血脈不通故足脛痛腎脈挾舌本舌為心苗
心火盛則水急水急則舌本縮而舌卷不能言矣
右寸分明唾血傷 腎主唾其脈入肺中循 關中少
氣髀如折 長本肝脈木邪剋土故脾虛中氣不足
折又脾有邪其 尺則腰痛不可當 火盛則水衰腰
氣亦留於兩髀 尺則腰痛不可當 為腎府腎虛則
痛

短

本位不能及縮縮其形短 短則氣病若秋時肺 滑短
酒傷浮短嗽寸主頭疼尺腹滿 短主不及之病酒
也上不及則頭痛 傷與嗽則氣不及
下不及則腹滿也

瘵醫大全 卷二 脈確 顧氏秘書

細 內經謂濡同 脈經以浮細為更沉細為弱
不沉侯之乎而內經何以有沉細之說也且
經曰脈弱以滑是有胃氣滑者流利如珠之
謂若以沉細為弱則沉細如絲之中不能見
滑矣且脈經既以沉細為弱而論肺痿何以
又有浮弱之言乎今據內經以弦脈更弱為
肝之平脈則所謂更弱者無力之謂不得以
浮細為更沉細為弱矣况更弱所主之病大
槩與細同今附於此

直爽如絲細勞傷損血氣 細主氣身汗來心慌至浮
屬陰虛多盜汗沉細屬陽 血兩虛身汗來心慌至浮
虛多自汗汗多心虛故慌 寸須嘔吐關須脹 脾胃
上則嘔吐 尺屬骨蒸痲與痺 骨蒸久病皆屬腎虛
下則腹滿 故脈細痺為寒濕之
陰邪故 脈亦細

澇

往來難細短澇輕刀刮竹形容切血少氣有餘寸澇

心疼神亦怯胃屬陽明多血多氣其上口當心血

陽明又主驚驚關中脇脹胃虛嘔肝藏血屬厥陰

氣歸心故神怯則逆燥則血枯逆則氣上故不納水穀而嘔吐也

尺部腸枯五心熱血虛則腸枯溢血虛而相火動

熱上移之於子則心熱腎之脈起於婦人當為經

不通或為胎病宜區別血養胎

崔紫虛謂澇主自汗瀕湖士材皆宗之愚按內經

傷醫大全

卷二

脈確

圭

顧氏秘書

經言為是

滑

流利如珠便是滑多汗陰有餘風痰更可察經曰滑

有餘也陰氣有餘為多汗寸滑吞酸欬嘔

身寒滑脈主風又主痰胃中濕氣與熱氣薰蒸蘊而成酸停吐當關積熱

胃腕故吞酸濕熱生痰故欬嘔及嘔吐掌中發皆熱包絡之脈入掌中肺脈行其前心脈

行其後故掌中亦熱經所痢疾瘡癰尺部看

謂掌中熱者腹中熱是也食積成痼者九腫大痛連小腹也女子或

為經閉熱脈不通經謂尺脈滑女子經脈不利按滑為

也不然則

動仲景傷寒論曰數脈見於關上上下無頭尾

如豆大厥脈動搖者名曰動愚按兩上字其

一乃後人誤添者當是數脈見於關上下經

心是寸有動脈矣又曰陰虛陽搏謂之崩腎

之陰虛陽搏之故見崩症是尺有動脈矣王

叔和著脈經不知兩上字其一乃衍字因曰

動脈見於關上遂令後之論脈者皆曰動脈

只見於關與經不合矣

傷醫大全

卷二

脈確

圭

顧氏秘書

木聲惕然而驚此驚之生於外者也由是觀之則

於心也陰陽相搏陰動發熱兮血崩為重

故發熱陽邪勝胎脈

尺脈滑疾心脈動來三部浮沉脈相等五十不止確

為胎疾而按散兮其胎三月但疾不散兮五月可

猜沉則為男浮則女陰陽推測貫三才女子以血

脈膏滑然滑屬血陰也疾屬氣陽也滑而疾是陽

之交陰也女子心脈膏沉今陰陽相搏而其脈動

是陰之交陽也陰陽相交而三部之脈無偏浮偏

胎其形未實故其脈按之而散五月之胎其形漸實故其脈按之不散而其疾如故者蓋疾為陽氣萬物得天地之陽氣以生成胎必得母之陽氣以長養也沉陰脈何以反為男浮陽脈何以反為女蓋男胎得陽氣多胎得陽氣多則母之陽不足陰有餘矣陰有餘陽不足故其脈沉女胎得陰氣多胎得陰氣多則母之陰不足陽有餘矣陽有餘陰不足故其脈浮亦猶坎為男陰多干陽且陰外而陽內也離為女陽多干陰且陽外而陰內也疾與滑何以不主病蓋疾而不滑則為陰虛火盛滑而疾則非病矣尺既滑而疾則寸之動亦非病矣脈經辨男女法左手沉實為男右手浮大為女左右手俱沉實生二男俱浮大生二女又左尺脈偏大為男右尺脈偏大為女左右俱大生二子

湯醫大全

卷二

脈確

壽

顧氏秘書

論三部脈所主雜病法訣

夫三部之中俱見一脈所主雜病畧而言之脈經曰陽邪來見浮洪陰邪來見微細水穀之邪來見實堅寒滯之邪來見弦小又曰浮而滑者宿食也短而滑者酒病也遲而滑者脹滿也洪而大者傷寒也浮而數者傷風也浮而急者飲食不消脾不磨也沉而弦者寒氣結而陰痛也浮而緩者皮膚不仁也滑而散者癱瘓也遲而緩者寒癥也浮而濇者霍亂也弱而濇者反胃也緊而滑者吐逆也短而數者心痛也弦而數者為瘧也緊而急者尸遁也實小而堅者病在內而冷也浮滑而緊者病在外而熱也短而急者病在上也長而緩者病在下也長而弦者病在肝也滑而洪者病在心也微而軟者病在脾也浮而濇者病在肺也沉而緊者病在腎也又訣曰諸浮為風或為虛也諸緊為痛或為積也諸濇為痺諸弦為飲諸數為熱諸遲為寒

其則為失血軟則為虛若脈沉沉澤澤四肢不仁者亡祟也或大而懶懶社祟也若脈來乍大乍小

湯醫大全

卷二

雜病

壽

顧氏秘書

乍短乍長者鬼祟也

寸部主上焦頭面之疾凡診脈按至骨而見者謂之有力按至骨而無者謂之無力餘皆做此

浮而有力主風無力主虛主頭面眼目虛浮體重風寒齒痛

口眼喎斜

沉而有力主積無力主氣主胸膈痞滿咳嗽氣急膈氣翻胃

胸滿不食

遲而有力主痛無力主冷主嘔吐痞滿不入水穀虛汗拘急

疼痛不已

傷醫大全

卷二 雜病

美

顧氏秘書

數而有力主熱無力主瘡主上焦煩燥口苦咽乾客熱煩渴

頭痛口瘡

關部主中焦胸腹之疾

浮而有力主風無力主虛主兩脇拘攣不能舉運背脊筋疼

身體麻木

沉而有力主積無力主氣主膨脹虛鳴心腹疼痛上下關格

不思飲食

遲而有力主痛無力主冷主疝瘕腹痛遊走不定上下攻刺

翻胃吐食

數而有力主熱無力主瘡主口熱作渴嘔吐霍亂怔忡煩躁

寒熱交爭

尺部主下焦腰足之疾

浮而有力主風無力主虛主寒邪腰痛腿膝麻木陰莖腫痛

二便不利

沉而有力主積無力主氣主臍下腫痛脚膝酸痛下虛盜汗

小便頻數

遲而有力主痛無力主冷主小腹急痛外腎偏墜小便頻數

大便泄瀉

傷醫大全

卷二 雜病

老

顧氏秘書

數而有力主熱無力主瘡主小便不通大便閉塞或作腎癰

煩渴不止

五臟見浮脈主風虛之病

心脈浮 主心虛觸事易驚神不守舍舌強不語

語言錯亂

肝脈浮 主中風癱瘓筋脈攣搐面腫牙疼腸風

下血

脾脈浮 主脾虛作膨飲食不進上氣喘急嘔逆

泄瀉

肺脉浮 主咳嗽氣急大便風秘面浮面瘡吐血

唾膿

腎脉浮 主腰疼牙痛小腹氣痛腿足生瘡足膝

無力

五臟見沉脉主積氣之病

心脉沉 主小便淋瀝咯血尿血小便不通寤而

不寐心驚

肝脉沉 主怒氣傷肝脇痛肥氣眼目昏痛肚腹

脹滿

湯醫大全 卷二 雜病 夫 顧氏秘書

脾脉沉 主中滿不食痞氣色黃手足不仁嘔吐

泄瀉貪睡

肺脉沉 主咳嗽多痰上氣喘急嘔血失音息音

肺癰

腎脉沉 主風滯腰痛小便不利陰癩作脹奔脉

腹滿

五臟見遲脉主冷痛之病

心脉遲 主小便頻數心疼嘔水怔忡多悸伏梁

臍痛

肝脉遲 主筋攣骨痛日昏多淚觸事易驚轉筋

麻木

脾脉遲 主咳嗽泄瀉腹中有蟲痰涎多壅飲食

不化

肺脉遲 主寒嗽喘滿大便溏瀉皮膚燥澁夢涉

大水

腎脉遲 主小便頻數滑精不禁膝脛酸疼陰濕

盜汗

五臟見數脉主瘡熱之病

湯醫大全 卷二 雜病 夫 顧氏秘書

心脉數 主煩躁狂言舌上生瘡小便赤澀眼目

昏花

肝脉數 主眼痛翳膜目昏多淚頭風眩暈婦人

血熱骨蒸及中風

脾脉數 主口臭胃翻齒痛牙齦多食不飽四肢

不舉

肺脉數 主咳嗽唾血喉腥目赤大便閉結面生

痱瘰

腎脉數 主消渴不止小便血淋下疳生瘡陰囊

濕癢

龔雲林論七表八裏總歸四脉

浮脉屬陽主表舉指輕按而得之曰浮

浮而有力為洪 浮而無力為芤

浮而長大為實

沉脉屬陰主裏舉指重按而得之曰沉

沉而有力為滑 沉而無力為弱

沉而似有似無為微 沉而至骨為伏

遲脉屬陰在臟舉指半重按之在內再按乃見一息

傷醫大全 卷二 雜病 羊 顧氏秘書

三至曰遲

遲而有力為濇 遲而無力為濡

遲而似有似無為緩

數脉屬陽在腑舉指輕按而極急一息六至曰數

數而有力為弦 數而無力為緊

論五臟見四脉應病詩

左寸心部 浮數頭痛熱夢驚浮遲腹冷胃虛真沉

數狂言併舌強沉遲氣短力難成主氣不相接續

左關肝部 浮數患風筋脉抽浮遲冷眼淚難收沉

數背瘡常怒氣沉遲不睡損雙眸

左尺腎部 浮數勞熱小便赤浮遲陰腫濁來侵沉

數腰疼生赤濁沉遲白濁耳虛鳴

右寸肺部 浮數中風喉熱閉浮遲冷氣瀉難禁沉

數風痰併氣喘沉遲氣弱冷涎停

右關脾部 浮數齟宜併盜汗浮遲胃冷氣虛膨沉

數熱多兼口臭沉遲腹滿脹堅生

右尺命門 浮數泄精三焦熱浮遲冷氣濁時臨沉

數渴來小便數沉遲虛冷小便頻

傷醫大全 卷二 雜病 羊 顧氏秘書

論三因脉證歌

內因脉 喜怒憂思悲恐驚內應氣口

喜怒傷心脉必虛思傷脾脉結中居因憂傷肺脉

必濇怒氣傷肝脉便濡恐傷於腎脉沉是緣驚傷

膽動相須脉緊因悲傷胞絡七情氣口內因之

外因脉 風寒暑濕燥火內應人迎

緊則傷寒腎不移虛因傷暑向胞推濇緣傷燥須

觀肺細緩傷濕要觀脾浮則傷風肝部應弱為傷

火察心之六邪合脉須當審免使將寒作熱醫

傷醫大全 卷二 三因脉 筆 顧氏秘書

不內不外因脉

勞神役慮定傷心虛濇之中仔細尋勞役陰陽傷

腎部忽然緊脉必相侵房帷任意傷心絡微濇之

中宜忖度疲極筋力便傷肝指下尋之脉弱飲

食饑飽定傷脾未可輕將一例推饑則緩疝當別

議若然滑實飽無疑叫呼損氣因傷氣燥弱脉中

宜熟記能通不內外中因生死吉凶都在是

論脉證名狀二十六種所主病證

夫脉之大體二十六種此診候之紀綱也細而論之

毫釐少差舉治必遠總而言之逆從虛實陰陽而

已兩者議之以要其中謹於諸家脉法中撮其機

要剪去繁蕪載其精義

浮脉之診浮於指下按之不足舉之有餘再再尋之

狀如太過管管然見於皮毛間其主表證或為風

或為虛浮而大散者心也浮而短濇者肺也浮而

數者熱也浮數之脉應發熱其不發熱而反惡寒

者瘡疽之謂也 傷醫大全 卷二 脉狀 筆 顧氏秘書

者瘡疽之謂也

洪脉之診似浮而大按舉之則泛泛然滿三部其狀

如水之洪流波之湧起其主血實積熱瘡腫論曰

脉洪大瘡疽之病進也如瘡疽結膿未成者宜下

之膿潰之後脉見洪大則難治若自利者不可救

治也

滑脉之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然

滑也其主或為熱或為虛此陽脉也瘡疽之病膿

未潰者宜內消也膿潰之後宜托裏也所謂始為

熱而繼爲虛也

數脈之診按之則呼吸之間動及六至其狀似滑而數也若浮而數則表熱也沉而數則裏熱也又曰諸數爲熱仲景曰脈數不時見則生惡瘡也又曰肺脈洪數則生瘡也診諸瘡洪數者裏欲有膿結也

散脈之診似浮而數按之則散而欲去舉之則大而無力其主氣實而血虛有表有裏瘡腫膿潰之後而煩痛尚未痊愈者診其脈洪滑粗散難治也以

瘍醫大全

卷二 脈狀

毒

顧氏秘書

其正氣虛而邪氣實也又曰肌體沉重肺脈大而斃謂浮散者也

芤脈之診似浮而輒按之中央空兩邊實其主血虛或爲失血瘡腫之病診得芤脈膿潰後易治以其脈病相應也

長脈之診按之得洪大而長出於本位其主陽氣有餘也傷寒得之欲汗出自解也長而緩者胃脈也百病皆愈謂之長則氣治也

牢脈之診按之則實大而弦且沉且浮而有牢堅之

意若瘰癧結腫診得牢脈者不可內消也

實脈之診按舉有力而類結曰實經曰邪氣甚則實久病則虛人得此最忌瘡疽之人得此宜急下之以其邪氣與臟腑俱實故也

弦脈之診按之則緊而弦其似緊者爲弦如按弦而不移緊如內繩而轉動以此爲異春脈浮弦而平不時見則爲飲爲痛主寒主虛瘡疽論曰弦洪相搏外緊內熱欲發瘡疽也

瘍醫大全

卷二 脈狀

毒

顧氏秘書

積癖也瘡腫得之氣血沉澹也亦主痛也

澹脈之診按之則散而復來舉之則細而不足脈澹則氣澹也亦主血虛瘡腫潰後得之無妨也

短脈之診按舉則不及本位內經曰短則氣病以其無胃氣也諸病脈短皆難治也瘡腫脈短眞氣短也

細脈之診按之則縈縈如蜘蛛之絲而欲絕舉之如無而似有細而微其主亡陽衰瘡腫之病脈來細而沉時直者裏虛而欲變症也

微脉之診按之則軟小而極微其主虛也真氣復者生邪氣勝者危瘡腫之病潰後脉微而勻舉自差也

遲脈之診按舉來遲呼吸定息方得三至其狀似緩而稍遲痼疾得之則善新疾得之則正氣虛憊瘡腫得之潰後自痊

緩脉之診按舉似遲而稍駛於遲仲景曰陽脉浮大而濡陰脉浮大而濇陰陽同等謂之緩脉見長緩百疾自瘳凡諸瘡腫潰後其脉濇遲緩者皆易愈

瘍醫大全 卷二 脉狀 美 顧氏秘書

以其脉候相應是有胃氣也

沉脉之診舉之不足按之方見如爛綿其主邪氣在臟也水氣得之則逆此陰脉也瘡腫得之邪氣深也

伏脉之診比沉而伏舉之則無按之至骨方得與沉相類而邪氣益深矣

虛脉之診按之不足遲大而輒輕舉指下豁然而空經曰脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脉虛宜托裏和氣養血也

軟脉之診按之如帛在水中極輒而沉細亦謂之濡其主胃氣弱瘡腫得之補虛排膿托裏

弱脉之診似軟而極微來遲而似有仲景曰微弱之脉綿綿如瀉漆之絕其主血氣俱虛形精不足大抵瘡家沉遲濡弱皆宜托裏

促脉之診按之則去數來時一止而復來仲景曰陽盛則促主熱蓄於裏也下之則和瘡腫脉促亦急下之

結脉之診按之則往來遲緩時一止而復來仲景曰陰盛則結經曰促結則生代則死

瘍醫大全 卷二 脉狀 老 顧氏秘書

代脉之診按之則往來動則中止不能自還因而復動者曰代脉也因其止有常數而不忒如十動一止雖數十次皆見於十動之後如二十動一止雖數十次皆見於二十動之後代者氣衰也諸病見之不祥大凡瘡腫之病脉促結者難治而沉見代

脉乎

動脉之診見於關上無頭尾如豆大厥厥然而動搖者是也脉經曰陰陽相搏故謂之動動於陽則陽

氣虛而發厥動於陰則陰氣虛而發熱是陽生於尺而動於寸陰生於寸而動於尺不可不辨也
脉訣曰氣血沉瀉脉來緊身有痛處即發瘡疽之兆
身應發熱脉浮數人反惡寒即為瘡疽之萌
張仲景曰脉數不時見則生惡瘡

又曰肺脉俱數則生瘡

又曰脉實大洪大初起為病進已潰為邪氣未退

又曰脉沉實沉伏初起主邪氣深伏難痊潰為餘毒

又曰脉扎瀉遲緩潰後為脉證相應無妨若短細則

瘍醫大全 卷二 脉狀 表 顧氏秘書

將變症此六脉宜於潰後不利於初起

又曰脉浮大浮數初起為邪正相搏有餘若促結則

非吉兆此六脉宜於初起不利於潰後

未丹溪曰脉數熱也多兼實陽症之所由生若兼虛

後必陷為陰脉遲寒也多兼陰症之所由生若兼

實後必返為陽

王肯堂曰脉沉實發熱煩躁外無焮赤痛其邪深在

裏宜先疎通以絕其源 浮大數焮腫在外當先

托裏恐邪入內 脉不沉不浮內外證無知其

經當和榮衛 脉數身無熱內有癰膿 脉數應

當發熱而反惡寒若有痛處當發癰 若數脉不

時見當生惡瘡 浮腫瘍為虛為風潰瘍為虛宜

補 洪腫瘍為虛為熱盛宜宣熱拔毒年壯形實

宜下潰瘍為邪氣盛服藥久不退者難治 滑腫

瘍為熱潰瘍為熱為虛為邪氣未退 數腫瘍為

病退為熱數而洪者為欲膿潰瘍為難愈數甚者

難治 散腫瘍為氣不收斂潰瘍為痛未退洪滑

大散難治 扎腫瘍為血虛潰瘍為脉病相應

瘍醫大全 卷二 脉狀 表 顧氏秘書

長腫瘍宜消退之法潰瘍為易愈謂長則氣治也

半腫瘍為邪盛為欲膿潰瘍為邪氣不退 實

腫瘍為邪氣太盛潰瘍為邪不退為實緩豁大者

為虛 弦腫瘍為痛為欲膿弦洪相搏外緊內熱

為疽發也潰瘍為血虛為痛 緊腫瘍浮而緊發

熱惡寒或有痛處是為癰疽潰瘍主氣血沉瀉為

痛為有外寒 瀉腫瘍為氣實為氣滯潰瘍為血

虛為脉病相應 短腫瘍為元氣不足潰瘍為大

虛宜補 微腫瘍為虛服藥漸充者佳潰瘍為虛

若微而勻者為脈病相應 遲腫瘍為寒為虛尺
遲為血少潰瘍為虛為氣血不能滋榮於瘡為有
外寒 緩腫瘍為可治大而緩為虛潰瘍緩而濇
者愈以其病脈相應及胃氣充也 沉腫瘍為邪
氣深潰瘍為遺毒在內寸沉為胸有痰 伏腫瘍
為陰中伏陽邪潰瘍為陽伏陰中為內蝕為流注
浸淫難治 虛腫瘍便宜補而內托潰瘍膿既泄
宜大補血氣 弱腫瘍為元氣不足宜內補托裏
結腫瘍為邪氣結潰瘍漸勻則愈不調則危

瘍醫大全

卷二 脈狀

罕

顧氏秘書

促腫瘍為熱為病進潰瘍為熱不減漸進則死漸
退則生 代腫瘍為氣血敗壞元氣損傷潰瘍為
元氣竭絕

薛立齋曰謹按脈者人身之造化病機之外見醫家
之準繩不可不精究而熟察至於太谿衝陽又為
診法之要生死之機也故十二經脈皆係於生氣
氣乃人之根本寸口脈平而死者生氣獨絕於內
也難經云上部有脈下部無脈其人當吐不吐者
死上部無脈下部有脈雖困無能為害是脈有根

本人有元氣也夫人受氣於穀乃傳於臟腑清者
為榮濁者為衛榮行脈中衛行脈外陰陽相貫如
環無端周流一身晝夜各有常度其不相應者病
也病至於甚脈道乃乖抑嘗治雀啄屋漏之類若
因藥餌剋伐所致急用參芪歸朮姜附之劑多有
復生者不可遂棄而不治也
又曰癰疽未潰而脈先弱者何以收斂

瘍醫大全

卷二 脈狀

罕

顧氏秘書

論三部脉所主證候

夫寸關尺者脉之位也浮沉滑濇者脉之體也奠位體指又語證者診脉之要道也脉經曰大凡診候兩手三部脉滑而遲不浮不沉不長不短去來齊等者無病也

可口脉浮者傷風也緊者傷寒也弦者傷食也浮而緩者中風也浮而數者頭痛也浮而緊者膈上寒勝下飲冷也沉而緊者心下寒而積痛也沉而弱者虛損也緩而遲者虛寒也微弱者血氣俱虛也

傷醫大全

卷二 主證

望 顧氏秘書

弦者頭痛心下有水也雙弦者兩脇下痛也偏絕者不遂也俱絕者不治也濇濇如羹上肥者陽氣微也連連如蜘蛛絲者陽氣衰也

關主中焦胃腹中事去來徐而緩者無病也浮者腹滿而不欲食胃虛脹也滑者客熱在內也數者熱結中焦也沉伏者中焦水氣或嘔逆而吞酸也弱者胃氣虛也雖有虛熱不可大攻須防熱去則生寒也牢而實者腹滿嚮嚮噎塞而不通或腹大痛澁者氣逆也芤則瀉血濇堅大實按之不減而有

力者中焦實有結伏在胃也微浮者積熱不消虵動心悸也

尺主下焦腰腎膝脛足中事也尺脉浮也風熱小便難也沉者腰背痛而神氣不足數者臍下熱痛小便赤色而惡寒也遲者下焦寒而陰虛也緊者臍下小腹急痛也緩者脚弱下腫而痿痺也弱者下冷而腎氣衰也軟者脚不收而風痺小便難也伏者小腹痛而疝瘕穀不化也細者溇泄而下冷也芤者小便澁血而下虛也牢而小者足膝寒痺脚

傷醫大全

卷二 主證

望 顧氏秘書

下隱隱疼痛也細而急者筋攣不能行也來而斷絕者男子小腹有滯氣也婦人月水不利也

論三部所主臟腑病

夫診候之道醫者之難精也若非燈下辛苦勤於記誦參師訪友晝夜不遑造次顛沛寤寐俯仰存心於此安能知聖神之妙哉古人曰按其脉知其疾命曰神以悟其探賾索隱之妙又曰切其脉治其病謂之巧以明其指別之功也蓋三指相去毫釐之近主病若千里之遠觀夫指別之功世人固以為難命曰神豈容易可至哉常考於經脉有三部寸關尺也從魚際至高骨却行一寸曰寸從寸上

傷醫大全 卷二 主病 顧氏秘書

一分曰魚際從寸至尺曰尺澤寸後尺前為關關前為陽即寸口也關後為陰即尺脉也陽出陰入以關為界寸主上焦頭手皮毛關主中焦腹及腰尺主下焦小腹及足此三部所主大畧也又有左右兩手三部為之六脉也又有人迎氣口神門所主又各不同蓋左手關前曰人迎右手關前曰氣口兩關之後一分即曰神門故脉法讚曰肝心主左肺脾主右腎為命門俱出尺部魂魄毅神皆見寸口所謂左手關前心之部也其經手少陰與手

太陽為表裏小腸合為腑左手關上肝之部也其經足厥陰與足少陽為表裏胆合為腑左手關後腎之部也其經足少陰與足太陽為表裏膀胱合為腑右手關前肺之部也其經手太陰與手陽明為表裏大腸合為腑右手關上脾之部也其經足太陰與足陽明為表裏胃合為腑右手關後命之部也其經手厥陰與手少陽為表裏三焦合為腑此謂六部所主臟腑十二經之義也又脉要精微論曰尺內兩旁則季脇也尺外以候腎尺裏以候

傷醫大全 卷二 主病 顧氏秘書

腹中附上左外以候肝內以候膈右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胃中左外以候心內以候胃中前以候前後以候後上竟上者胃候中事也下竟下者小腹腰股膝脛足中事也粗大者陰不足陽有餘為熱中也來疾去徐上實下虛為厥顛疾來徐去疾上虛下實為惡風也故中風者陽氣受也有脉俱沉細數者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者為恂僕諸浮而數者皆在陽為熱其有躁者在手諸細而沉者皆在陰

則爲骨痛其有靜者在足數動一代者病在陽之
脉也洩及便膿血諸過者切之清者陽氣有餘也
滑者陰氣有餘也陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有
餘爲多汗身寒陰陽有餘則無汗身寒推而外之
內而不外者有心腹積也推而內之外而不內者
身有熱也推而上之上而不下者腰足痛也推而
下之下而不上者頭項痛也按之至骨脉氣少者
腰脊痛而身有痺也以上諸疾若非指明心了焉
可得而妙也又平人氣象論曰一呼脉再動一吸

湯醫大全

卷二

主病

吳

顧氏秘書

脉亦再動呼吸定息脉行五動爲以大息不大不
小不長不短不滑不澁不浮不沉不遲不數命曰
平人平人者不病也蓋平人之常氣稟乎胃胃氣
者平人之常氣也所以人常稟氣於胃故脉以胃
氣爲本也正理論曰穀入於胃脉道乃行合靈樞
經曰胃爲水穀之海也又曰脉應四時曰平四時
之脉皆以胃氣爲本謂春弦夏洪秋毛冬石春之
胃脉微弦曰平餘皆倣此逆四時則病矣若胎婦
人之脉妊身則慎勿亂投湯散其婦人之脉胎得

少陰脉動甚則有子也又曰陰搏陽動則有子也又
曰身汗而無脉者卽有妊也蓋重身者問其月事
觀其體貌然主治不可忽也又經曰察色按脉先
別陰陽蓋陰陽者天地之道也是以治病者必求
其本本於陰陽寒暑四時五臟之根也以脉言之
則浮沉也以部言之則尺寸也故經云脉者陰陽
之法以應五臟是謂呼出心與肺吸入腎與肝呼
吸之間脾受穀味其味在中也以浮沉論之則曰
浮者陽也沉者陰也應在臟腑則浮而大散者心

湯醫大全

卷二

主病

吳

顧氏秘書

浮而短滑者肺也所以心肺俱浮也半而長者肝
也按之而大舉指來實者腎也所以肝腎俱沉也
遲緩而長者脾也脾爲中州所以脉在中也仲景
曰大浮數動滑皆陽也沉滑弱弦微皆陰也陽者
熱也陰者寒也所以寒則脉來沉而遲熱則脉來
浮而數故曰諸數爲熱諸遲爲寒無如此驗也脉
經曰諸浮爲風諸緊爲痛諸伏爲聚諸弦爲飲芤
者失血長則氣治短則氣病滑則煩心大則病進
浮爲在表沉爲在裏遲爲在臟數爲在腑又形壯

脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胃中氣多斃形氣相得者生三五不調者病三部九候皆相失者死此先聖診脉之大法也故曰凡治病則察其形氣色澤治之無候其時也所以形氣相得者生色澤以浮者病易已脉從四時者可治脉弱似滑者是有胃氣此皆易治也若形氣相失或色天不澤及脉逆四時或脉益堅皆不可治經所謂必察四難而明告之又若病熱脉靜泄而脉大脫血脉實汗後脉躁此皆難治也若瘡疽之人膿血大泄

傷醫大全

卷二 主病

果 顧氏秘書

五臟六腑脉病虛實例

肝臟脉證虛實○肝象木王於春其脉弦其神魂其候目其華在爪其充在筋其聲呼其臭臊其味酸其液泣其色青其藏血足厥陰其經也與膽合為腑而主表肝為臟而主裏肝氣盛為血有餘則病目赤兩脇下痛引小腹善怒氣逆則頭眩耳聾不聰額腫是肝氣之實也則宜瀉之肝氣不足則病目不明兩脇拘急筋攣不得太息爪甲枯而青善怒恐如人將捕之是肝氣之虛也則宜補之禁當

傷醫大全

卷二 虛實

果 顧氏秘書

風肝部在左手關上是也關部脉來綽綽如按琴瑟之弦如揭長竿春以胃氣為本春肝木旺其脉弦細而長是平脉也反得微濇而短者是肺之乘肝金之剋木謂之賊也大逆不治反得浮大而洪者是心乘肝子之乘母為實邪雖病當愈反得沉濡而滑者是腎乘肝母之剋子為虛邪雖病當愈反得緩而大者是脾之乘肝為土之凌木為微邪雖病不死肝脉來盈實而滑如循長竿曰平病肝脉來急益勁如新張弓弦曰肝死直肝脉至中外

急如循刀刃責責然如新張弓弦色青白不澤毛折乃死

心臟脉病虛實○心象火王於夏其脉如鉤而洪大其候舌其聲音其臭焦其味苦其液汗其養血其色赤其藏神手少陰其經也與小腸為腑而主表心氣盛主神有餘則病胸內痛脇支滿脇下痛膺背膊髀間痛兩臂內痛喜笑不休是心氣之實也則宜瀉之心氣不足則胸腹大脇下與腰背相引痛驚悸恍惚少顏色舌木強善憂悲是心氣之虛

傷醫大全

卷二

虛實

辛

顧氏秘書

也則宜補之禁温衣熱食心部在左手寸口是也寸口脉來纍纍如連珠如循瑯玕曰平心以胃氣為本夏心火王其脉浮洪大而散名曰平脉也反得沉濡而滑者腎之乘心水之尅火大逆不治反得弦而長是肝乘心母之尅子雖病當愈反得緩而大是脾乘心子之乘母雖病當愈反得微濇而短是肺之乘心金之凌火為微邪雖病不死心脉來湍湍連屬其中微曲曰心病死心脉前曲後倨如操帶鉤曰心死真心脉至牢而搏如循薏苡纍

纍然其色赤黑不澤毛折乃死

脾臟脉病虛實○脾象土旺於長夏其脉緩其候口其聲歌其臭香其味甘其液涎其養形肉其色黃其藏意足太陰其經也與胃合為腑主表脾為臟主裏脾氣盛為形有餘則病腹脹瘦不利身重若饑足痿不收行善痺脚下痛是為脾氣之實也則宜瀉之脾氣不足則四肢不用後泄食不化嘔逆腹脹腸鳴是為脾氣之虛也則宜補之禁温食飽食濕地濡衣脾部在右手關上是也六月脾土旺

傷醫大全

卷二

虛實

辛

顧氏秘書

其脉大阿阿而緩名曰平脉也長夏以胃氣為本反得弦而急是肝之乘脾木之尅土為大逆不治反得微濇而短是肺之乘脾子之乘母不治自愈反得浮而洪者是心之乘脾母之歸子當瘥不死反得沉濡而滑者是腎之尅脾水之凌土為微邪當瘥脾長而弱來疎去數再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰命盡六至曰死病脾脉來實而盛數如雞舉足曰脾病死脾脉來堅銳如鳥之啄如鳥距如屋之漏如水之溜曰脾絕其脾脉弱

而乍數乍疎然其色不澤毛折乃死

肺臟脉病虛實○肺象金王於秋其脉如毛而浮其候鼻其聲哭其臭腥其味辛其液涕其養皮毛其藏氣其色白其神魄手太陰其經也與大腸合大腸為腑主表肺為臟主裏肺氣盛為氣有餘則病喘咳上氣肩背痛汗出尻陰股膝踠脛足皆痛是為肺氣之實也則宜瀉之肺氣不足則少氣不能報息耳聾噤乾是為肺氣之虛也則宜補之禁寒飲食寒衣肺欲收急食酸以收之用辛瀉之肺部

傷醫大全

卷二 虛實

三

顧氏秘書

在右手關前寸口是也肺脉微短濇如毛名曰平脉秋以胃氣為本脉來上下如循鷄羽曰病肺脉其色白身體但寒無熱時欲欬其脉微遲為可治秋金肺王其脉浮濇而短是曰平脉也反得浮大而洪者是心之乘肺火之尅金為大逆不治反得沉濡而滑者是腎之乘肺子之乘母不治自愈反得緩大而長阿阿者是脾之乘肺母之歸子雖病當愈反得弦而長者是肝之乘肺木之凌金為微邪雖病當愈肺脉來汎汎而輕如微風吹鳥背

上毛再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命盡肺脉來如物之浮如風吹毛曰肺死秋胃微毛曰平胃氣少毛多曰肺病但如毛無胃氣曰死毛有弦曰春病甚曰金病真肺脉至大而虛如毛羽中人膚然其色青白不澤毛折乃死

腎臟脉病虛實○腎象水王於冬其脉如石而沉其候耳其聲呻其臭腐其味鹹其液唾其養骨其色黑其神志足少陰其經也與膀胱合膀胱為腑主

傷醫大全

卷二 虛實

三

顧氏秘書

表腎為臟主裏腎氣盛為腎有餘則病腹脹殭泄體腫喘欬汗出憎風面目黑小便黃是為腎氣實也則宜瀉之腎氣不足則厥腰背冷胸內痛耳鳴苦聾是為腎氣之虛也則宜補之母犯塵垢母衣炙衣腎欲堅急食苦以堅之鹹以泄之苦以補之膏部在左手關後尺中是也腎脉來如引葛按之益堅曰腎病腎屬水其脉大緊身無痛形不瘦不能食善驚悸以心萎者死冬腎水王其脉沉濡而滑名曰平脉也反得浮大而緩者是脾之乘腎土

之尅水爲大逆不治反得浮濇而短者是肺之乘
腎母之歸子爲虛邪雖病可治反得弦細而長者
是肝之乘腎子之乘母爲實邪雖病自愈反得浮
大而洪者是心之乘腎火之凌水雖病不死腎死
脉來發而奪索辟辟如彈石曰腎死冬胃微石曰
平胃少石多曰腎病但石無胃氣者死石而有鈎
曰夏病鈎甚曰今病藏真下於腎藏骨髓之氣真
腎脉至搏而絕如彈石辟辟然其色黃黑不澤毛
死。諸真藏見者皆不治

瘍醫大全

卷二 虛實

書

顧氏秘書

膽經虛實病候。膽象木王於春足少陽其經也肝
之腑也謀慮出焉諸腑臟皆取決斷於膽其氣盛
爲有餘則病腹內胃胃不安身軀習習是爲膽氣
之實也則宜瀉之膽氣不足其氣上嗌而口苦善
太息嘔宿汁心下澹澹如人將捕之嗌中介介數
垂是爲膽氣之虛也則宜補之

小腸虛實病候。小腸象火王於夏手太陽其經也
心之腑也水液之下行爲溲便者流於小腸其氣
盛爲有餘則病小腸熱焦竭乾澹小腹脹是爲

小腸之氣實也則宜瀉之小腸不足則寒氣客之
腸病驚跳不言乍來乍去是爲小腸氣之虛也則
宜補之

胃經虛實病候。胃象土王於長夏足陽明其經也
脾之腑也爲水穀之海諸臟腑皆受水穀之氣於
胃胃氣盛爲有餘則病腹脹氣滿是爲胃氣之
實也則宜瀉之胃虛不足則饑而不受水穀殞泄
嘔逆是爲胃氣虛也則宜補之胃脉實則脹虛則
泄關脉沉胃中有寒脉滑爲實氣滿不欲食關脉
浮積熱在胃內

瘍醫大全

卷二 虛實

書

顧氏秘書

大腸虛實病候。大腸象金王於秋手陽明其經也
肺之腑也爲傳道之官變化糟粕出焉氣盛爲有
餘則病腸內切痛如錐刀刺無休息腰背寒痺攣
急是爲大腸之氣實也則宜瀉之大腸氣不足則
寒氣客之善泄是大腸之氣虛也則宜補之診其
右手寸口脉手陽明經也脉浮則爲陽陽實者大
腸實也

膀胱經虛實病候。膀胱象水王於冬足太陽其經

也腎之腑也五穀五味之津液悉歸於膀胱氣化
分入血脈以成骨髓也而津液之餘者入胞則為
小便其氣盛為有餘則病熱胞濇小便不通小腹
偏腫痛是為膀胱氣之實也則宜瀉之膀胱氣不
足則寒氣客之胞滑小便數而多也面色黑是膀
胱之氣虛也則宜補之

三焦虛實病候○三焦者上焦中焦下焦是也上焦
之氣出於上口並咽以貫鬲布胸內走腋循太陰
之分而行上至舌下至足陽明當與榮衛俱行主

瘍醫大全 卷二 虛實 素 顧氏秘書

納而不出也○中焦之氣亦並於胃口出上焦之
後此受氣者必糟粕承津液化為精微上注於肺
脈乃化而為血主不上不下也○下焦之氣別迴
腸注於膀胱而滲入焉主出而不納故水穀常併
居於胃成糟粕而俱下於大腸也謂此三氣焦乾
水穀分別清濁故名三焦三焦為水穀之道路氣
之所終始也三焦氣盛為有餘則脹氣滿於皮膚
內輕輕然而不牢或小便濇或大便難是為三焦
之實也則宜瀉之三焦之氣不足則寒氣客之病

遺尿或瀉利或胸滿或食不消是三焦之氣虛也
則宜補之診其寸口脈遲上焦有寒尺脈遲下焦
有寒尺脈浮者客陽在下焦

瘍醫大全 卷二 虛實 素 顧氏秘書

論定死脉形候歌

指下如湯沸湧時且占夕死定無疑尾掉搖搖頭不
動魚翔腎絕亦如期去疾來遲勢劈劈命絕脉來
如彈石三陽穀氣久虛空胃氣分明屋漏滴散亂
還同解索形髓竭骨枯見兩尺蝦遊狀如蝦蟆遊
魂去行屍定生憂雀啄連連來數急脾無穀氣定
難留欲知心絕並榮絕如刀壓刀細推求更有肺
枯併胃乏如蘇戚促至無休指下渾然如轉豆三
光正氣已漂流

傷醫大全

卷二 定死脉

表

顧氏秘書

洞虛子曰蝦遊雀啄代止之脉故名死症須知痰氣
關格者時復有之若非諳練數歷未免依經斷病
不無貽笑大方也蓋病勢消鑠殆盡者其氣不能
相續如蝦遊水動屋漏滴點而無至者死脉也其
或痰凝氣滯關格不通則其脉固有不動者有三
兩路亂動時有時無者或尺寸一有一無者有關
脉絕骨不見者或時動而大小不常者有平居之
人忽然而然者有素稟痰病而不時而然者有僵
仆卒中而然者皆非死脉也學者當細心參探

論診雜病生死脉歌

五十不止身無病數內有止皆知定
止猶代脉也脉來五十動而不見一止者無病也
五十配天地造化之數易繫辭曰大衍之數五十
五十乃備一乃數之始十乃數之極人之脉息晝
夜循環五臟脉一動循環一臟五動循環五臟通
五十動是十次五數循環通則數皆極處而不見
止者五臟皆平故無病也
四十一止一臟絕却後四年多沒命三十一止即三
年二十一止二年應十五一止一年殂已下有止看
暴病

傷醫大全

卷二 生死脉

表

顧氏秘書

四十動而見一止者是一臟欠動脉之極數故知
一臟絕也先絕腎經所以言之夫天一生水腎屬
水生木木生火火生土土生金金生水
生肝木木生心火命門火生脾土土生肺金所以
先絕腎期應四年而死三十動而見止者兩臟欠
動脉之極數是短腎與肝二經無氣期應三年而
死二十動而止者三臟欠動脉之極數是腎肝心
三臟無氣期應二年而死十五動而一止者知腎
肝心脾四臟皆無氣期一年而絕也
新註云上言脉之動止未可知診切何部而取據謹
按素問難經云每於平旦寅時日未出飲食未進
血氣未亂脈者可以存神定意心無外馳診於指
下右手寸口脈數脈息至以獨為五臟主岐伯曰
子氣口也內經曰氣口何以獨為五臟主岐伯曰
胃者水穀之海六腑之大源也五味入口藏於胃
變現於氣口又曰脉會大瀾寸口是人淵穴也是
知寸口為脉大會之處故能決五臟六腑生死
吉凶矣

論診暴病脉歌

兩動一止或三四三動一止六七死四動一止即入朝以此推排但依次

也氏曰暴病者喜怒驚恐其氣暴逆致風寒暑濕所侵病生之暴損動胃氣而絕即死不過十日也脉兩動而一止乃胃氣將絕猶得三四日方死三動一止而胃氣將盡猶得六七日方死穀氣絕盡方死倣此而推若至十五動而一止乃死期在於一年矣

又歌曰寸平無病何謂死尺澤原來脉不存君知此理是何物猶如草木已無根

人之有尺猶樹之有根枝葉雖枯槁根本將自生病人兩尺有根雖病不死若診得兩尺無根有病

傷醫大全 卷二 暴病脉 李 顧氏秘書 必死無病之人亦主暴亡

論五臟六腑氣絕證候

病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人汗一作泣出如水不止一日二日死

病人膽絕七日死何以知之眉為之傾

病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青呼罵不休一日八日死

病人心絕一日死何以知之肩息回視立死一日目死

病人腸絕一日小腸絕六日死何以知之髮直如乾蘇不

得屈伸自汗不止

病人脾絕十一日死何以知之口冷足腫腹熱臃脹

泄利不覺出無時度一日五日死

病人胃絕五日死何以知之脊痛腰中重不可反覆一日脾腸平九日死

病人肉絕六日死何以知之乾舌皆腫溺血大便赤

泄一日足腫九日死

病人肺絕三日死何以知之口張但氣出而不收一日鼻口虛張短氣

傷醫大全 卷二 絕脉 李 顧氏秘書

病人大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

病人腎絕四日死何以知之齒為暴枯面為正黑目

中黃色腰中欲折自汗出如流水

一曰人中平七日死

病人骨絕齒黃落十日死諸浮脉無根者皆死已上

五藏六腑為根也

傷醫大全

卷二 絕脉

奎 顧氏秘書

扁鵲華陀察聲辨色秘訣

病人五臟已奪神明失守聲嘶者死

病人陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死

病人八陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人面黃目青者不死青如草滋者死

病人面黃目白者不死白如枯骨者死

病人面目俱等者不死

病人面青目白者死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

傷醫大全

卷二 辨聲色

奎 顧氏秘書

病人面赤目黃者不死赤如衄者死

病人面黃目黑者不死黑如煤者死

病人面黑目青者不死

病人面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日必死

此謂亂經飲酒當風邪入胃經胆氣妄泄目則

為青雖有天

為不可復生
病人面赤目白者十日死憂恚思慮心氣內索面色

反好急求棺槨

病人面白目黑者死

此謂榮華已去血脉空索

病人面黑目白者八日死腎氣內傷病因留積

病人面青目黃者五日死

病人循衣縫謔語者不可治

病人妄語錯亂及不能語者不治熱病者可治

病人着床心痛氣短脾竭內傷百病難愈能起復得因坐於地

其立倚床能治此者可謂神良

病人面無精彩若土氣不受飲食者四日死

病人目無精光及牙齒黑色者不治

病人口張者三日死

瘍醫太半

卷二

辨聲色

毒

顧氏秘書

病人耳目及額頰赤者死在五口中

病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩額上者死在五口中

五口中

病人及健人黑色若白色起入目及口鼻者死在三

口中

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者

死

病人面黑目直視惡風者死

病人面黑唇青者死

病人面青唇黑者死

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死

病人目不回直視肩息者一日死

病人陰結陽絕目精脫恍惚者死

病人陰陽竭絕目眶陷者死

病人眉系傾者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不返者死

病人耳目口鼻有黑色起入於口者必死

病人唇青人中反者三日死

瘍醫太半

卷二

辨聲色

毒

顧氏秘書

病人唇反人中滿者死

病人唇口忽乾者不治

病人唇腫齒焦者死

病人齒忽變黑者十三日死

病人舌卷卵縮者必死

病人汗出不流舌卷黑者死

病人髮直者十五日死

病人髮如乾棘善怒者死

病人髮與眉衝起者死

病人爪甲青者死

病人爪甲白者不治

病人手足爪甲下肉黑者八日死

病人榮衛竭絕面浮腫者死

病人卒腫其面蒼黑者死

病人手掌腫無紋者死

病人臍腫反出者死

病人陰囊莖俱腫者死

病人脉絕口張足腫者五日死

傷寒木半

卷二 辨聲色

李

顧氏秘書

病人足或腫嘔吐頭重者死

病人足跌上腫兩膝大如斗者十日死

病人卧床遺尿不覺者死

病人尸臭者不可治

心病目黑腎之日壬癸死

肝病皮白肺之日庚辛死

脾病唇青肝之日甲乙死

肺病頰赤口腫心之日丙丁死

腎病面腫唇黃脾之日戊己死

青欲如蒼壁之澤不欲如藍

赤欲如帛裹朱不欲如赭

白欲如鷲羽不欲如鹽

黑欲如重漆不欲如炭

黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土

傷寒大全

卷二 辨聲色

李

顧氏秘書

瘍醫大全目錄

卷三

內景全圖

臟腑正面全圖

臟腑背面全圖

心經圖說

小腸圖說

肝經圖說

膽經圖說

脾經圖說

胃經圖說

肺經圖說

大腸經圖說

瘍醫大全

卷三

目錄

一

續氏校書

瘍醫大全卷三

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽

男 櫟燮用和

全校

內景圖說

心

小腸

肝

胆

脾

胃

肺

大腸


瘍醫大全

卷三

內景


續氏校書

內景全圖



圖全面

背腑臟




瘍醫

卷三 內景

十一 顧氏秘書


圖全面

正腑臟



圖全面

背腑臟




瘍醫大全


卷三 內景

十一 顧氏秘書

圖全面

正腑臟





傷醫大全

卷三 心

三

顧氏秘書

心

經曰心者君主之官神明出焉

又曰心者惺也言心氣旺則惺惺而運其神明也

危言曰心深也言深居高拱相火代之行事也

又曰其合脉也其榮色也開竅於舌

難經曰心重十二兩中有七孔三毛盛精汁三合主

藏神

又曰心象尖圓形如蓮蕊其中有竅多寡不同以導

引天真之氣下無透竅上通乎舌共有四系以通

四藏心外有赤黃裹脂是為心包絡心下有膈膜與脊脇周迴相着遮蔽濁氣使不得上薰心肺也

經曰手少陰經心

又曰其經常少血多氣

又曰午時氣血注於心

黃庭經曰人身神名曰心神丹元字守靈

靈樞曰舌者心之官也心病者舌卷短顫赤

又曰心居肺下肝上

又曰心者在天之熱在地為火在人為心在時為夏

傷醫大全

卷三 心

四

顧氏秘書

在方為南在色為赤通竅於舌經曰南方火也萬

物所以盛長也又曰藏真通於心心藏血脉之氣

也肝木為母脾土為子小腸為腑尅金主血若久

視則傷血司藏神其類火其畜羊一作馬其卦離其

性禮其華面其應四時上為熒惑星其病在脉其

音徵徵者止也物盛則止也其數七其臭焦其聲

言其氣呵其充血其液汗其味苦外應掌色赤然

赤如帛裹朱不欲如赭靈樞曰心應脉皮厚者脉

厚脉厚者小腸厚更心主熱熱則傷心病主驚熱

痘主紅斑若憂愁思慮則傷心寒氣勝則病其病
候面赤喜笑心煩掌熱而口乾開目妄語臍上動
氣若心實則上竄咬牙口乾喜笑身熱汗血而肋
脇膈背痛滿或叫哭而搐若心虛則恍惚多驚憂
煩少色咳嗽舌強腰背酸疼若心絕則搖頭直視
形如烟薰然心絕者一日死平脉則夏旺七十二
日而脉洪緩洪者浮大而散來疾去遲其賊脉則
沉濡而微與面黑亦逆其危脉鈎如操帶鈎

又曰心主夏其日丙丁南方生熱熱生火火生苦苦

傷醫大全 卷三 心 五 顧氏秘書

生心心者生之本也神之變也為陽中之太陽通
於夏氣

又曰在變動為憂在聲為笑在重為羽在果為杏在

菜為薤

仙經曰丹田有三腦為髓海上丹田心為絳宮中丹

田臍下三寸為下丹田下丹田藏精之府也中丹

田藏神之府也上丹田藏氣之府也

太乙真人曰少思慮養心氣薄滋味養血氣

真誥曰面者神之庭髮者腦之華心憂則面戚腦藏

則髮白

回春日心者一身之主清淨之府外有包絡以羅之
其中精華之聚萃者各之曰神通陰陽察纖毫無
所紊亂

邵子曰神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神
主乎其中三才之道也

內經曰太上養神其次養形故養神者必知形之肥
瘦榮衛血氣之盛衰血氣者人之神不可不謹養

也 註云神安則壽延神去則
形弊故不可不謹養也

傷醫大全 卷三 心 六 顧氏秘書

又曰天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於
心肺上使五色修明音聲能彰五味入口藏於腸
胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃
自生

耀仙曰心者神明之舍中虛不過徑寸而神明居焉
事物之滑如理亂棼如涉驚浸或怵惕或懲創或
喜怒若思慮一日之間一時之頃徑寸之地炎如
火矣若嗜慾一萌卽不善也歸而勿納是與良心
競也凡七情六慾之生於心皆然故曰心靜可以

通乎神明事未至而先知是不出戶知天下不窺
瞻見天道也蓋心如水之撓久而澄清洞見其底
是謂靈明宜乎靜可以固元氣則萬病不生故能
長久若一念既萌神馳於外氣散於內血隨氣行
榮衛昏亂百病相攻皆因心而生也大槩恬養天
君疾病不作此治心之法也

內經曰心藏神神有餘則笑不休神不足則悲註云
悲實則笑不休也

皇甫士安曰心虛則悲悲則憂心實則笑笑則喜
傷醫大全 卷三 心 七 顧氏秘書

經曰神者精氣之化成也

又曰五臟藏七神心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎
藏志又曰脾藏意與智腎藏精與

志是謂
七神

又曰心在志為喜喜傷心恐勝喜

又曰暴喜傷陽

又曰喜怒傷氣

又曰喜怒不節寒暑過度生乃不固

又曰喜則氣緩蓋喜則氣和志達榮
衛通利故氣緩矣

皇甫謐曰喜發於心而成於肺故過節則二藏俱傷

靈樞曰喜樂者神蕩散而不藏

丹溪曰喜傷心者以恐勝之以怒解之

經曰得神者昌失神者亡失神者謂失精
神而昏亂者也

靈樞曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣五藏常
內閱於

上七
竅也

又曰五藏不和則七竅七
作九不通六府不和則留結

為癰

岐伯曰愁憂恐懼則傷心

難經曰憂愁思慮則傷心

傷醫大全 卷三 心 八 顧氏秘書

又曰邪客使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於

心心氣虛者其人多畏合目欲眠夢遠行而精神

離散魂魄妄行陰氣衰者為癲陽氣衰者為狂

仲景曰心傷者其人勞倦則頭面赤而下重心中痛

而自煩發熱臍上跳其脉弦此為心藏傷所至也

靈樞曰邪在心則病心痛喜悲時眩仆

又曰心實則胃中痛脇支滿脇下痛膺背肩胛間痛

兩臂內痛心虛則胃腹大脇下與腰相引而痛

又曰腎傳之心病筋脉相引而急名曰癆

經曰心熱者色赤而絡脉溢也

難經曰外證面赤口乾善笑內證臍上有動氣按之

牢若痛其病煩心心痛掌中熱而腕有是者心也

無是者非也

入門曰健忘失記驚悸不安心內懊懣不樂皆心血

少也

內經曰大骨枯槁大肉陷下胃中氣滿喘息不便內

痛引肩項一月死直藏見乃與之期日註曰此心之藏也期

後三十日內死

傷醫大全

卷三 心

九 顧氏秘書

又曰病在心愈在長夏長夏不愈甚於冬冬不死持

於春起於夏

又曰心病者愈在戊巳戊巳不愈加於壬癸壬癸不

死持於甲乙起於丙丁

又曰病者日中慧夜半甚平旦靜

黃帝曰手少陰之脉獨無輸何也岐伯曰少陰者心

脉也心者五藏六府之大主也為帝主精神之所

舍其藏堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去

神去則死矣故諸邪在於心者皆在心之包絡包

絡者心主之脉也故少陰無輸也帝曰少陰無輸

心不病乎岐伯曰其外經病而藏不病故獨取其

經於掌後銳骨之端即神門穴也

直指曰邪客於陰神不守舍故心有所感夢而後泄

也其候有三少年氣盛鰥曠矜持強制情慾不自

知覺此泄如瓶之滿而溢者人或有之勿藥可也

心家氣不能主宰或心受熱邪陽氣不取此泄如

瓶之側而出者人多有之其病猶輕合用和平之

劑藏府積弱真元久虧心不攝念腎不攝精此泄

傷醫大全

卷三 心

十 顧氏秘書

如藏之罅而出者人少有之其病最重須當大作

補湯

入門曰蓋交感之精常有一點白膜裹藏於腎而元

精以為此精之本者實在乎心日有所思夜夢而

失之矣宜黃連清心飲

經曰無故而瘖脉不至不治自已謂氣暴逆也氣復

則已

皇甫謐曰思雖發於脾而成於心過節則二藏俱傷

經曰怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流淫而不止

又曰血併於陰氣併於陽故為驚狂

又曰悸者心跳動也

綱目曰驚者心卒動而不寧也悸者心跳動而怕驚也

三因曰驚悸因事有所大驚而成者名曰心驚膽懾病在心膽經其脉大動

又曰五飲停蓄閉於中脘最使人驚悸屬飲家

仲景曰心悸者火懼水也惟腎欺心故為悸傷寒飲水多必心下悸

傷醫大全

卷三

心

顧氏秘書

又曰食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣

丹溪曰驚悸者有時而作大槩屬血虛與痰瘦人多

是血虛肥人多是痰飲時覺心跳者亦是血虛

入門曰驚悸因思慮過度及大驚恐而作甚則心跳

欲厥時作時止者乃痰因火動

又曰心膽虛怯觸事易驚涎與氣搏變生諸證

直指曰血虛心虛多驚

正傳曰憂愁思慮傷心令人惕然心跳動驚悸不安

醫鑑曰憂愁思慮傷心或勤政勞心以致心神不足

驚悸少睡宜養心湯

又曰勞心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短驚悸煩熱宜清心補血湯

綱目曰怔忡心動而不寧也

戴氏曰怔忡者心中躁動不安惕惕然如人將捕者

是也多因汲汲富貴戚戚貧賤不遂所願而成也

直指曰心虛而痰鬱則耳聞大聲目擊異物遇險臨

危觸事喪志使人有惕惕之狀是為驚悸心虛而

停水則胃中滲漉怏怏之狀是為怔忡

傷醫大全

卷三

心

顧氏秘書

正傳曰怔忡者心中惕惕然動搖而不得安靜無時

而作者是也

入門曰怔忡因驚悸久而成也痰在下火在上

湯加川連梔子當歸貝母

加味温膽

直指曰心下有水氣怔忡水飲為證頭眩心悸

濟生曰思慮過度耗傷心血怔忡恍惚宜益榮湯

得效曰痰飲蓄於心胃怔忡不已宜茯苓飲子

又曰虛人停飲怔忡宜姜朮湯

回春曰心中無血如魚無水怔忡跳動宜四物安神

湯

入門曰心神不定恍惚健忘火不下降時復振跳宜

朱雀丸

怔忡亦曰怔忡與驚悸同看

靈樞曰黃帝問人之善忘者何氣使然岐伯對曰上

氣不足下氣有餘腸胃實而心肺虛虛則榮衛留

於下久之不以時上故善忘也

內經曰血併與下氣併於上亂而喜忘

丹溪曰健忘之證精神短少者多亦有痰者

傷醫大全

卷三 心

幸

顧氏秘書

戴氏曰健忘者為事有始無終言談不知首尾此以

為病之名非生成之愚頑不知人事者

入門曰怔忡久則健忘由心脾血少神虧引神歸舍

丹主之

胆星珠砂附子猪心血為丸梧子大萱草根煎湯送下五十九

又曰如所稟陰魄不足善忘者宜定志丸開心散

醫鑑曰健忘陟然而忘其事盡心力思量不來也主

心脾二經蓋心之官則思脾之官亦主思此由思

慮過多心傷則血耗散神不守舍脾傷則胃氣衰

憊而慮愈深二者皆令人事卒然而忘治法必先

養其心血培其脾土以凝神定智之劑調理之亦

當以幽閑之處安樂之中使其絕於憂慮遠其六

淫七情如此則日漸以安矣

綱目曰心澹澹動者因痰動也謂不怕驚而心自動

也驚恐亦曰心中澹澹謂怕驚而亦動也

舌血謂之舌衄汗孔出血謂之肌衄屬心與肝也

凡驚而動血者屬心

血吐水碗如半沉半浮者是心血

腫脹水腫有十種之分如氣短不得卧為心水

傷醫大全

卷三 心

西

顧氏秘書

經曰背為陽陽中之陽心也心為牡藏牡者陽也

金匱直言論曰夏氣病在藏心之應也

經曰喜笑皆屬心火蓋火得風而焰笑之象也

又曰諸血者皆屬於心

又曰頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣

又曰諸痛癢瘡皆屬於心

又曰諸躁狂越皆屬於火

又曰諸病附腫疼酸驚駭皆屬於火

又曰諸熱瞽瘵皆屬於火

又曰諸逆衝上皆屬於火

又曰諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火

黃帝問曰人生而有病癲疾者病名曰何安所得之

岐伯對曰病為胎病此得之在母腹中時其母有

所大驚氣上而不下精氣併居故令子發為癲疾

也

又曰厥成爲癲疾

又曰邪搏陽則爲癲疾

資生日風眩之病起於心氣不足胃上蓄熱實痰熱

癲醫大全 卷三 心 五 顧氏秘書

相感而動風風心相亂則昏瞶故謂之風眩

又曰痰在膈間則眩微不仆痰溢膈上則眩甚仆倒

於地而不知人名曰癲癇

又曰仆倒不省皆由邪氣逆上陽分而亂於頭中也

癲癇者痰邪逆上也痰邪逆上則頭中氣亂頭中

氣亂則脉道閉塞孔竅不通故耳不聞聲目不識

人而昏眩倒仆也以其病在頭巔故曰癲疾

綱目曰癲有五心曰馬癲肝曰雞癲脾曰牛癲肺曰

羊癲腎曰猪癲以病名狀偶類故爲名其實痰與

火與驚三者而已

又曰癲者異常也平日能言癲則沉默平日不言癲

則呻吟甚則僵仆直視心常不樂言語無倫如醉

如癡癇則卒然昏倒咬牙作聲吐涎沫不省人事

隨後漸醒身熱脉浮爲陽癇身涼脉沉爲陰癇

正傳曰凡癲癇仆時口中作聲將省事時吐涎沫省

後又復發時作時止而不休息中風中寒中暑尸

厥之類則仆時無聲省時無涎後不再發

入門曰大率多因痰結於心胃間宜開痰鎮心神若

癲醫大全 卷三 心 六 顧氏秘書

神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清

心除熱如痰迷心竅當去痰寧心宜大吐大下而

愈

大人曰癲小兒曰癇其實一也

內經曰黃帝問曰有病怒狂者此病安生岐伯對曰

生於陽也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因

暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝曰治之奈

何岐伯曰奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故

奪其食即已使之服以生鐵洛爲飲夫生鐵洛者

下氣疾也

又曰多喜曰癡多怒曰狂又曰陰不勝其陽則脉流薄疾并乃狂又曰衣被不飲言語善惡不避親疎此神明之亂也帝曰陽明病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實則能登高也帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱甚於身故棄衣欲走也帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食故妄言也

癆醫大全

卷三 心

七

顧氏秘書

又曰邪入於陽則狂

難經曰重陽者狂重陰者癡

又曰狂之始發少卧而多起自高賢也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休是也癡疾始發意不樂直視僵仆其脉三部陰陽俱盛者是也

百要曰癡者異常也精神癡呆言語失倫狂者囚狂也輕則自高自是好歌好舞甚則棄衣走而踰垣

上屋又甚則披頭大叫不避水火且欲殺人此痰火壅盛而然

又曰陽虛陰實則癡陰虛陽實則狂

又曰陽盛狂狂者欲奔走叫呼陰盛則癡癡者眩倒不省

綱目曰狂謂妄言妄走也癡謂僵仆不省也經有言狂癡疾者又言癡疾為狂者是癡狂兼病也

內經曰嘗貴後賤名曰脫營嘗富後貧名曰失精雖不中邪病從內生身體日減氣虛無精病深無氣

癆醫大全

卷三 心

七

顧氏秘書

酒洒然時驚病深者以其外耗於衛內奪於榮血為憂煎氣隨悲滅故外耗於衛內奪於榮是症令人飲食無味神倦

肌瘦

靈樞曰癡疾嘔多沃沫氣下泄不治

又曰癡癇之病乍作乍醒者甦不食癡迷者死

又曰凡癡狂之病若神脫而目瞪如愚癡者不可治

又曰癡疾者疾發如狂死不治

醫鑑曰人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所肇端也驚者恐怖之謂悸者

怔忡之謂驚者與之豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑

直指曰健忘者心脾二藏血少神虧故也宜養血安神以調之

正傳曰狂為痰火實盛癲為心血不足多為求望高遠不得志者有之癲病獨主乎痰因火動之所作也治法癲宜乎吐狂宜乎下癲則宜乎安神養血兼降痰火

河間曰五志過極皆為火也蓋氣為陽而主輕微諸病醫大全 卷三 心 九 顧氏秘書

所動亂勞傷皆為陽化之火神狂氣亂而為病熱者多矣

子和曰河間治五志獨得言外之意凡見喜怒哀思恐之證皆以平心火為主至於勞者傷於動動便屬陽驚者駭於心心便屬火二者亦皆以平心火為主也 丹心

靈樞曰心小則易傷以憂心大則憂不能傷心高則滿於肺悅而善忘難開以言心下則易傷於寒易恐以言心堅則藏安守固心脆則善病消瘴熱中

心端正則和利難傷心偏傾則操持不一無守司也

又曰心病禁溫食熱衣

經曰手少陰氣絕則脈不通故血不流血不流則色不澤故其黑如漆柴者血先死壬日為癸日死

仲景曰形體如烟煤直視搖頭者此為心絕經曰心絕一日死何以知之肩息回視立死

脈經曰心絕二日死

靈樞曰五藏皆小者苦焦心多憂愁五藏皆大者緩病醫大全 卷三 心 十 顧氏秘書

於事難使以憂五臟皆高者好高舉措五藏皆下者好出人下五藏皆堅者無病五藏皆脆者不離於病五藏皆端正者和利得人心五藏皆偏傾者邪心而善盜不可以為人平反覆言語也

又曰心為血之主而肝又為血之藏是以血出之於心而納之於肝也

經曰主明則下安以此養生則壽主不明則十二官危以此養生則死

又曰心以膻中為府

經曰十二官皆聽命於心故主不明則十二官危使
道閉塞而不通形乃大傷

又曰火王於夏相於春廢於季夏囚於秋死於冬其

壬癸死時半夜

壬癸死時半夜

又曰心俞在脊第五椎傍募在腹上巨關

又曰南方赤色入通於心開竅於耳火精之氣其竅

當言於舌舌用非竅故云耳也蓋
手少陰之絡會於耳中故也

又曰心色赤而中虛離之象也

傷醫大全

卷三 心

三

顧氏秘書

又曰心氣通於舌舌和則知五味矣

又曰雷氣通於心

又曰背為陽陽中之陽心也

又曰精氣併於心則喜

又曰心惡熱

又曰血病無多食鹹

又曰久視傷血勞傷心也

又曰損其心者調其榮衛

又曰心熱病頰先赤

又曰心熱病先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶

善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬

癸死刺手少陰太陽

又曰心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱

刺手少陰神門

又曰肝移寒於心在膈中肝移熱於心則死

又曰心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀介音甚

則咽腫喉痺

又曰心風之狀多汗惡風焦絕善怒嚇下音赤色病甚

傷醫大全

卷三 心

三

顧氏秘書

則不可言快脗在口其色赤

又曰心痺者脉不通煩則心下鼓暴上氣而喘嗑乾

善噫厥氣上則恐

又曰心氣熱則下脉厥而上上則下脉虛虛則主脉

痿樞柝音托挈脛縱而不任地也

又曰心病煩悶少氣大熱熱上盪心嘔吐欬逆狂語

汗出如珠多厥其脉當浮今反沉而滑其色當赤

而反黑者死此水尅火也

脉經曰夏心脉欲洪大而散脾脉欲洪而遲緩肺脉

欲洪而浮濇腎脉欲洪而沉滑命門與腎同肝脉欲洪而弦長

又曰心脉搏堅而長當病舌卷不能言其奕而散者當消渴白已

華佗云肺下右側可見心系系於脊髓下通於腎其心系有二一則上與肺通一則自心入肺兩大葉間曲折向後並脊脊細絡相連貫通脉髓而與腎系相通愚謂四藏之系皆通於心心則通於四藏之系也交相運輸其血氣滲灌骨髓故五藏有病

傷醫大全

卷三 心

三 顧氏秘書

先于於心其系上連於肺其別自肺兩葉向後貫脊下腎又自腎而之膀胱與膀胱膜絡並行之於澁溺處也肺之系者上通氣喉其中與心系相通脾之系者自膈中微近左脇居胃之上並胃胞絡及胃脘相連貫膈與心肺相通與膈膜相綴也肝之系自膈下着右脇肋上貫膈入肺中與膈膜相連腎之系貼脊脊脂膜中兩腎二系相通而下行其上與心系通也

綴音

經曰是動病則益乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主

心

又曰所生病者目黃脇痛臍臂內後廉痛厥掌中熱痛盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

又曰苦先入心

又曰心宜食酸

又曰心虛以炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃

心之母以生薑補肝如無他證用安神丸主之

又曰心實以甘草瀉之如無他證用瀉心湯

傷醫大全

卷三 心

三 顧氏秘書

又曰凡心藏得病必先調其肝腎二藏腎者心之鬼肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣乏故心病先求於肝是澄源也五藏有病必先傳其所勝水能制火則腎邪必傳於心故先制其腎逐其邪診其肝腎俱和而心自疾則隨其本經虛實而治之

手少陰心引經藥歌 午心麻 黃桂心獨 活山梔黃

芩生地 當歸黃連代 赭石紫 石英更有細辛并半

夏熟地 北五味澤 瀉同成

針經曰心脉起足少陰少衝穴在小指內端

又曰赤如雞冠者生赤如衄血者死

又曰實則夢憂驚恐怖虛則夢烟火焰明

又曰心苦緩急食酸以收之註曰心苦緩是心氣虛也心欲更急

食鹹以更之用酸補之甘瀉之

補 棗仁 遠志 天竺黃 山藥 當歸 麥門冬

瀉 貝母 川黃連 木香 玄胡索


溫 藿香 茵陳

涼 牛黃 犀角 連翹 硃砂 竹葉

引經報使 獨活 細辛

傷醫大全 卷三 心 姜 顧氏秘書

小腸上 口即胃之下口



小腸下口 即大腸上口 口名蘭門

小腸

傷醫大全 卷三 小腸 姜 顧氏秘書

經曰小腸者受盛之官化物出焉

又曰後附於脊前附於臍上左迴疊積十六曲大二寸半徑八分分之少半長三丈二尺受穀二斗四

升水六升三合之大半

又曰小腸上口在臍上二寸近脊水穀由此而入復

下一寸外附於臍為水分穴當小腸下口至是而

沁別清濁水液滲入膀胱浮穢流入大腸

難經曰重二筋十四兩

難經曰重二筋十四兩

經曰小腸為赤腸

又曰小腸若寒甚獨肩上熱及手小指次指之間熱若脉陷者此其候也

又曰小腸有寒則下重便膿血有熱必痔

又曰小腸有宿食常暮發熱明日復止

又曰小腸脹者小腸臘滿臘音噴張起也引腹而痛

又曰膀胱移熱於小腸鬲腸不便上為口糜

又曰心欬不已小腸受之其狀欬而失氣氣與欬俱失

傷醫大全

卷三 小腸

壬 顧氏秘書

又曰厥氣客於小腸則夢聚邑街衢

又曰是動病則嗌痛頰腫不可回顧肩似拔膈似折是主液

又曰所生病者耳聾目黃頰腫頸頰肩膈肘臂外後廉痛盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

又曰小腸熱脹生口瘡小腸熱結滿不通小腸虛寒痛下赤白腸滑小腸冷氣非時刺痛小腸酒後飲冷氣褻熱結伏臍下結硬塊不通連外腎俱腫

經曰手太陽小腸經

又曰是經多血少氣

又曰未時氣血注於小腸

入門曰凡胃中腐熟水穀其滓穢自胃之下口傳入

於小腸上口自小腸下口泌別清濁水液入膀胱

上口滓穢入大腸上口難經曰小腸大腸會謂之

闕門言由闕闕分隔也

靈樞曰唇厚人中長以候小腸

又曰心應脉皮厚者脉厚脉厚者小腸厚皮薄者脉

傷醫大全

卷三 小腸

壬 顧氏秘書

薄脉薄者小腸薄皮緩者脉緩脉緩者小腸大而

長皮薄而脉衝小者小腸小而短諸陽經脉皆多

紆屈小腸結也

又曰中氣不足腸為之苦鳴

又曰小腸病者小腹痛腰脊控舉而痛舉陰丸也時窘之

候當耳前熱

又曰小腸控舉引腰脊上衝心邪在小腸也

內經曰小腸為泄

入門曰小腸有氣則小腹痛小腸有血則小便澀小

腸有熱則莖中痛

又曰小腸者心之府也有病宜通利用導赤散赤茯苓湯

脉經曰小腸絕六日死何以知之髮直如乾麻不得

屈伸自汗不止

溺血屬小腸膀胱經

腫脹水腫有十種之分小腹急滿為小腸水

補 牡蠣 石斛

瀉 菝葜 木通 荔枝核

傷醫大全


卷三 小腸

羌 顧氏秘書

溫 大茴香 小茴香 烏藥

涼 黃芩 天花粉

引經報使 羌活 藁本 上行 黃柏 下行



傷醫大全

卷三 肝

辛 顧氏秘書

肝

經曰肝者將軍之官謀慮出焉

又曰肝者干也其性多動而少靜好干犯他藏者也

又曰肝居膈下並胃着脊之九椎

又曰其合筋也其榮爪也主藏魂開竅於目其系上

絡心肺下亦無竅也

難經曰肝重四筋四兩左三葉右四葉凡七葉

滑伯仁曰肝之為藏其治在左其藏在左脇左腎之

前並胃着脊之第九椎也

經曰足厥陰經肝

又曰是經多血少氣

又曰丑時氣血注於肝

黃庭經曰人身神名曰肝神龍烟字含明

靈樞曰目者肝之官也肝病者皆青

經曰肝者在天之風在地為木在人為肝通竅於眼

在時為春在方為東在色為青經曰東方木也萬

物所以始生也又曰藏血散於肝肝藏筋膜之氣

也腎水為母心火為子與膽為腑剋土養筋故久

瘍醫大全

卷三 肝

三

顧氏秘書

行則傷筋司藏魂其類草木其畜雞一作犬其蟲為

毛其果為李其菜為韭其卦震生數三成數其性

仁其充筋其華瓜其穀麥一作麻其應四時上為歲

星是以春氣在頭也其音角角者觸也象陽氣觸

動而生也其數八其病在筋其臭臊其聲呼在變

動為握其氣噓其液淚其味酸有餘怒不足悲外

應瓜甲色青然欲如青玉光澤不欲如藍靈樞曰

瓜厚者膽亦厚更肝主風風喜傷肝病主驚風疔

主水泡若恚怒氣逆則傷肝氣若燥氣盛則病其

病候面青筋急多怒眼痛目閉不欲見人或兩目

連劄臍左動氣若肝實則直視大叫呵欠項急頓

悶目赤多怒頭眩痛引兩脇小腹之下若虛則目

昏胸痛咬牙吹氣筋縮拘拳恐懼如人將捕若絕

則唇腮反青四肢多汗然肝絕者八日死平脉則

春旺七十二日脉弦緩而長然春弦者端直之狀

細弱而長其賊脉則浮濇而短與夫面白亦逆其

危脉弦如張弓弦

又曰肝生於左

瘍醫大全

卷三 肝

三

顧氏秘書

又曰肝主春其日甲乙東方生風風生木木生酸酸

生肝肝為陰中之少陽通於春氣

靈樞曰肝者主為將使之候外欲短堅固視目大小

又曰肝小則藏安無脇下之病肝大則通胃迫咽

苦膈中且脇下痛肝高則上支貫切脇悞為息貫

肝下則通胃脇下空易受邪肝堅則藏安難傷肝

脆則善病消瘴易傷肝端正則和利難傷肝偏傾

則脇下痛

又曰有所墜墮惡血留內有所大怒氣上不下積於

脇下則傷肝

又曰大怒氣逆則傷肝

又曰邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內

又曰肝藏血血舍魂肝氣虛則恐實則怒肝實則兩

脇下痛引小腹善怒虛則目眦眦無所見耳無所

聞善恐如人將捕狀

難經曰志怒氣逆上而不下則傷肝

又曰外證善潔面青善怒內證臍左有動氣按之牢

苦痛其病四肢滿閉淋瀝便難轉筋有是者肝也

傷醫大全

卷三 肝

三

顧氏秘書

無是者非也

內經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒肺傳之

肝病名曰肝癰一名曰厥脇痛出食肝熱者色蒼

而瓜枯

又曰肝藏血血有餘則怒不足則恐

又曰大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿腹內痛心中不

便肩項身熱破腠脫肉目眦陷且藏見日不見人

立死其見人者至其所不勝之時則死註曰此肝

不勝之時謂庚辛之月也

入門曰人動則血運於諸經靜則血歸於肝藏肝主血海故也

經曰病在肝愈於夏夏不愈甚於秋秋不死持於冬起於春

又曰肝病者愈在丙丁丙丁不愈加於庚辛庚辛不死持於壬癸起於甲乙

又曰肝病者平朝慧下晡甚夜半靜

又曰肝苦急急食甘以緩之甘草宜食粳米牛肉棗

葵註曰肝苦急是其氣有餘也肝欲散急食辛以

傷醫大全

卷三 肝

三

顧氏秘書

散之川芎肝虛以生姜陳皮之類補之

肝絕候靈樞曰足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脉也

肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本也故

脉不榮則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌卷卵

縮則筋先死庚日萬辛日死

又曰厥陰終者中熱澀乾善尿心煩甚則舌卷卵上

縮而終矣

仲景曰唇吻反青四肢厥冷仲縮也汗出者此為肝絕

也

脉經曰肝絕八日死何以知之而青但欲伏眠而不見人汗出如水不止

怒而動血者屬肝

白兩脇逆上吐血者屬肝

血吐水碗中沉者是肝血

經曰腹為陰陰中之陽肝也肝為牡藏牡者陽也

又曰膝者筋之府屈伸不能行則僂俯筋將憊矣

又曰諸風掉眩皆屬於肝

太乙真人曰莫嗔怒養肝氣

傷醫大全

卷三 肝

三

顧氏秘書

經曰肝在志為怒怒傷肝悲勝怒

丹溪曰怒傷肝者以憂一作悲勝之以恐解之

靈樞曰兩精相薄謂之神隨神往來謂之魂

經曰暴怒傷陰

又曰大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥

又曰血并於上氣并於下心煩惋善怒

又曰怒則氣上

又曰怒則氣逆甚則嘔血及殮泄矣

註云怒則陽氣逆上而肝木乘

脾故嘔血及殮泄也

經曰肝者罷極之本魂之居也

又曰肝青象木肝得水而沉木得水而浮何也然肝

者非為純木也乙角也庚之柔大言陰與陽小言

夫與婦釋其微陽而吸其微陰之氣其意樂金又

行陰道多故令肝得水而沉也肝熟而復浮故知

乙當歸甲也

又曰木王於春相於冬廢於夏囚於季夏死於秋其

王日甲乙王時平旦日出其困日戊巳困時食時

日昃其死日庚辛死時晡時日入晡音逋申時

傷醫大全

卷三 肝

三

顧氏秘書

又曰病發驚駭

又曰風氣通於肝

又曰精氣并於肝則憂

又曰肝惡風

又曰久行傷筋勞傷肝也

又曰損其肝者緩其中

又曰肝俞在脊九椎傍募在乳下期門

又曰肝熱病者左頰先赤

又曰肝氣虛則恐實則怒

又曰肝熱病小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言
及驚脇滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗
氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽

又曰邪在肝則兩脇痛中寒中惡血在內脈善痠節
肘腫痠音記 狂也

又曰肝脹者脇下滿而痛引小腹

又曰肝水者腹大不能自轉側兩脇下腹中痛時時
津液微生小便續通

又曰肝著者其病人常欲蹈其胸上先未若時但欲

湯醫大全

卷三 肝

著

顧氏秘書

飲熱著本病也若時指病時也

又曰肝癯者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足
厥陰見血

又曰脾移寒於肝癰腫筋攣

又曰脾移熱於肝則為驚衄

又曰肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則

兩胘下滿

又曰肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼嗑乾善怒時
增女子診在目下其色青

又曰肝痺者夜臥則驚多飲數小便上引小腹如懷
姪狀

又曰肝病主胸中喘怒罵其脈沉胸中窒欲令推按
之有熱鼻窒推盪也 擠也

又曰凡有所墜墮惡血留內若有所大怒氣上而不
下積於左脇下則傷肝肝傷者其人脫肉不臥口
欲得張時時手足青目膜瞳人痛

又曰肝氣虛則夢園苑生花草盛則夢怒厥氣客於

肝則夢山林樹木

湯醫大全

卷三 肝

著

顧氏秘書

又曰肝脈搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇

下脇音挾又音掖左 右脇下脇子骨令人喘逆其爽而散色澤者

當病溢飲溢飲者渴暴多飲而溢入肌皮腸胃之
外也

又曰肝脈急甚為惡言微急為肥氣在脇下

又曰肝病胸滿脇脹善悲怒叫呼身體有熱而腹惡

寒四肢不舉面目白身清清冷也其脈當弦長而急

今反短濇其色當青而反白者此金尅木十死不
治

又曰是動病則腰痛不可以俯仰丈夫癩疝婦人小腹腫甚則噎乾面塵脫色是主肝

又曰所生病者胸滿嘔逆洞洩孤疝遺溺癰閉盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足厥陰肝引經藥歌 丑肝龍膽草吳茱萸肉山萸

瞿麥阿膠甘草扶代赭石紫石英當歸白朮青皮

羌活蔓荊子都

又曰肝實以白芍藥瀉之

又曰肝主風自病則風搖拘急急食甘以緩之佐以

瀉醫大全 卷三 肝 堯 顧氏秘書

酸苦以辛散之實搖力大瀉青丸虛搖力小地黃

丸

又曰心乘肝實邪壯熱而搖

又曰肺乘肝賊邪氣盛則前伸呵欠微搖法當瀉肺

先補木藏肝地黃丸後瀉肺瀉白散

又曰脾乘肝微邪多睡體重搖先當定搖瀉青丸搖

止再見後證則別法治之

又曰腎乘肝虛邪憎寒呵欠而搖羌活膏

又曰凡肝經得病必先察其肺腎兩藏原其起病然

後復審肝經之虛實然腎者肝之母金者木之賊

今肝得病若非腎水不能相生必是肺金鬼來相

攻故須審其來在肺先治肺攻其鬼也其來在腎

滋其根也方審本臟虛實而用寒溫之劑以治之

若肺尅肝既受病先診肺脈若洪宜杏蘇芫桔

扁鵲曰脈長而弦病出於肝脈大而洪病出於心脈

下堅上虛病出於脾脈濇而浮病出於肺脈小而

緊病出於腎

喻嘉言曰肝至春月之榮不自春月始也始於秋冬

瀉醫大全 卷三 肝 卑 顧氏秘書

收藏之固設冬月水臟所儲者少春月木即欲發

榮共如泉竭不足以溉苞稂何蟄蟲尚知閉戶豈

君子可無居室之功耶

厄言曰肝者幹也屬木象木枝幹也

脈經曰春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃

曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰今病

經曰風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸

又曰酸走筋筋病毋多食酸

又曰多食辛則筋攣急而爪枯

又曰陰出之陽則怒

丹心曰七情傷人惟怒為甚蓋怒則肝木便尅脾土

脾傷則四臟俱傷矣治怒方香附甘草各一兩和研細每服三錢白湯調下

延壽書柳公度曰但平生未嘗以元氣佐喜怒使氣

海常溫耳

先賢詩曰怒來劇炎火焚和徒自傷觸來勿與競事

過心清涼

靈樞曰悲哀動中則傷魂

經曰肝虛而肺氣并之則為悲

傷醫大全

卷三 肝

望

顧氏秘書

又曰悲則氣消

子和曰肝藏血血不足則恐蓋肝膽實則怒而勇敢

虛則善恐而不敢也

靈樞曰肝氣通於目肝和則能辨五色矣

經曰諸暴強直皆屬於風

又曰諸脉者皆屬於目

又曰諸筋者皆屬於節

又曰故人卧血歸於肝目受血而能視足受血而能

步掌受血而能握指受血而能攝

金匱真言論曰春氣者病在頭肝之應也

真誥曰眼者身之鏡耳者體之牖視多則鏡昏聽衆

則牖閉

又曰腫脹水腫有十種之分兩脇緊痛為肝水

經曰青如翠羽者生青如草色者死

又曰實則夢山林大樹虛則夢細草苔蘚

補 木瓜 棗仁 薏苡仁

瀉 阿膠 柴胡 青黛

溫 芍藥 青黛 吳茱萸 肉桂

傷醫大全

卷三 肝

望

顧氏秘書

涼 胡黃連 車前子 龍膽草 甘菊花

引經報使 柴胡本經 川芎上行 青皮下行



瘍醫大全

卷三 膽

聖

顧氏秘書

膽

經曰膽者中正之官決斷出焉

六節藏象論曰凡十一藏皆取決於膽也

經曰膽者擔也猶人之正直無私有力量善能擔當

者也厄言曰膽者澹也清淨之府無所受輸淡淡

然者也華元化曰膽者中清之府號曰將軍

又曰主藏而不寫

難經曰膽在肝之短葉間重三兩三銖長三寸盛精

汁三合水色金精無出入竅不同六腑傳化而為

清淨之府受水之氣與坎同位悲則淚出者水得
火而煎陰必從陽也

又曰足少陽經膽

又曰是經多血少氣

又曰子時氣血注於膽

黃庭經人身神名曰膽神龍曜字威明

經曰膽為怒肝膽之病實則為怒

脈訣曰肝之餘氣溢入於膽聚而成精由是內藏精

而不泄外視物而得明為清淨之府能通眼目

瘍醫大全

卷三 膽

聖

顧氏秘書

經曰膽主決斷

入門曰膽生於金主武故為中正之官決斷出焉

人稟剛正果斷直而無疑無私者膽之氣正也

靈樞曰目下果大其膽乃橫

又曰肝應瓜瓜厚色黃者膽厚瓜薄色紅者膽薄瓜

堅色青者膽急瓜濡色赤者膽緩瓜直色白無約

者膽直瓜惡色黑多紋者膽結也

經曰膽者敢也驚怕則膽傷矣

子和曰面青脫色膽受怖也

經曰膽爲青腸

又曰清淨之府有入而無出

又曰候在足少陽之本末其脉陷下者灸之其寒熱

刺陽陵泉善嘔苦汁長太息心澹澹善悲恐如人

將捕之邪在膽逆在胃膽溢則口苦胃逆則嘔苦

汁刺三里以下胃氣逆刺足少陽血絡以閉膽

又曰膽脹者脇下痛脹口苦太息

又曰脾胃氣虛不能飲食由膽氣不升所以東垣有

用升麻柴胡左遷少陽甲膽之氣

傷醫大全

卷三 膽

聖

顧氏秘書

又曰胃移熱於膽則爲食休

又曰勇士則膽滿而傍怯士則膽不滿而縱

又曰厥氣客於膽則夢闔訟

又曰所生病者頭角領痛目銳背痛缺盆中腫痛腋

下腫馬刀挾癭汗出振寒瘧胸脇助髀膝外至脛

絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者人

迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足少陽膽引經藥歌 子膽柴胡半夏宜草龍膽劑

更爲奇柴胡又走青皮下向導功多不必疑

靈樞曰膽病者善太息口苦嘔有苦汁心中澹澹恐

如人將捕之噉中哢哢然數唾

又曰手厥陰之脉是動則心中澹澹大動

經曰膽虛則恐畏不能獨卧膽實則怒

又曰膽實則怒而勇敢膽虛則善恐而不敢也

入門曰膽虛則不眠膽實則多睡

又曰痛悶左邊五肋之中血瘀生癭馬刀

又曰膽候咽門故熱壅則生瘡腫痛

又曰膽病多寒熱

傷醫大全

卷三 膽

聖

顧氏秘書

又曰膽虛宜仁熟散膽實宜半夏湯

又曰小柴胡湯治寒熱往來乃少陽經主藥也水煎

澄清溫服則能入膽

靈樞曰膽爲足少陽其終者耳聾百節皆縱目蒙

直視如 驚貌 絕系絕系者一日半死矣其死也色先青

白乃死矣

脉經曰膽絕七日死何以知之者爲之傾

又曰腫脹水腫有十種之分口苦咽乾爲膽水

補

木通 龍膽草

瀉 柴胡 青皮 半夏 生薑 黃連 竹茹
引經報使 柴胡本經 青皮下行 川芎上行

湯醫大全

卷三 臍

臍

顧氏秘書

脾者卑也在胃之下裨助胃氣以化穀也脾胃屬土俱從田字胃居正中田字亦中脾處於右田亦偏右



湯醫大全

卷三 脾

脾

顧氏秘書

脾

經曰脾者倉廩之官五味出焉

遺篇刺法論曰脾為諫議之官知周出焉

滑氏曰掩乎太倉

華元化曰脾主消磨養於四傍

經曰形如刀鑷與胃同膜而附其上之左俞當十一

椎下聞聲則動動則磨胃而主運化其合肉也其

榮屑也關竅於口

難經曰脾重二筋三兩廣扁三寸長五寸有散膏半

筋主聚血溫五藏主藏意與智

經口足太陰脾經

又曰是經多氣少血

又曰已時氣血注於脾

黃庭經人身神名曰脾神常在字魂停

又曰脾藏意意者記而不忘者也

內經曰脾在志為思

又曰思則氣結

註云繫心不散故氣亦停留而結也

皇甫謐曰思發於脾而成於心過節則二藏俱傷

傷醫大全

卷三 脾

完

顧氏秘書

靈樞曰因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮

又曰怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流瀼而不止

又曰心有所憶謂之意意之所存謂之志因慮而處

物謂之智也

又曰脾氣通於口脾和則能知五穀矣

又曰口唇者脾之官也脾病者唇黃

岐伯曰有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾

難經曰飲食勞倦則傷脾

入門曰脾居中脘一寸二分上去心三寸六分下去

心三寸六分中間一寸二分名曰黃庭脾居一身之中故曰黃庭

經曰脾者在天之濕在地之土在人為脾在時為四

季在方為中央在色為黃通竅唇口經口脾脉者

土也孤臟以灌四傍者也又曰藏真濡於脾藏肌

肉之氣也心火為母肺金為子與胃為腑尅腎水

主養肌肉若久坐則傷肉司藏意智其類土其畜

牛其卦坤其性信其華在唇四白其穀稷其虫螺

其菓棗其菜葵其應四時上為鎮星其病在肉其

傷醫木全

卷三 脾

辛

顧氏秘書

音宮宮者中也土位居中為五行建極也其數五

其臭香其聲歌其氣呼其液涎其味甘外應四肢

面色黃然黃欲如羅裏雄黃不欲如土靈樞曰脾

應肉肉肥肥肉分理也堅大者胃厚更脾主濕然濕則

傷脾風氣勝則病其病之候則必面黃善思善嗜

體重卵痛四肢不收而怠惰脾實則肢體重着而

不舉腹脹便秘而善饑昏睡身熱而飲水脾虛則

少氣吐瀉生風或乳食不消腫脹腸鳴四肢無力

脾絕則臍突唇反環口鰓黑柔汗發黃然脾絕者

十二日死平脉則寄旺於四季之水各十八日其脉温厚蓋因氣行臟腑之間故和平不得見其衰乃形焉賊脉則弦長而緊與夫面青皆逆危脉則狀如雞雀啄止而復來

經曰脾主長夏中央巳土中央生濕濕生土土生甘甘生脾

又曰脾變動為噦

靈樞曰脾者主為衛使之廻糧視唇舌好惡以知吉凶黃色小理者脾小龕理者脾大揭唇者脾高唇

瘍醫大全

卷三 脾

至

顧氏秘書

下者脾下唇堅者脾堅唇大而不堅者脾脆唇上下好者脾端正唇偏舉者脾偏傾也脾小則藏安難傷於邪脾大則苦溲眇而痛不能仰行脾高則眇引季脇而痛脾下則下加於大腸藏苦受邪脾堅則藏安難傷脾脆則善病消瘴脾端正則和利難傷脾偏傾則善滿善脹也

又曰腹為陰陰中之至陰脾也脾為牝藏牝者陰也入門曰脾為諫議大夫蓋飲食人之大慾心所欲食而脾不能化則不敢食故名為諫議也

巳脾土辰胃土位居中央謂之孤藏其形如馬蹄內包胃腕象土形也諸經之氣交歸於中以營運直靈之氣意之舍也又云脾為陰藏位處中焦主養四藏故呼吸以受穀氣以其上有心肺下有腎肝故曰在中

又曰土寄王於四季尤王於長夏六月也相於夏廢於

秋囚於冬死於春其王日戊巳王時食時日昃時

侵晨至食時也也日仄也困日壬癸困時人定夜半死日甲乙

死時平日日出皆本時也跌音跌

瘍醫大全

卷三 脾

至

顧氏秘書

經曰脾胃大小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而出入者也其華在唇四白其充在肌此至陰之類通於土氣

又曰中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾故病在舌本

又曰穀氣通於脾

又曰精氣並於脾則畏

又曰脾惡濕

又曰甘走肉肉病無多食甘

又曰久坐傷肉勞於脾也

又曰脾為萬物之母胃為水穀之海

帝曰脾病而四肢不用何也岐伯曰四肢皆稟氣於

胃而不得徑至必因於脾乃得稟也今脾病不能

為胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脉

道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用也

帝曰脾不主時何也曰脾者土也治中央常以四時

長四藏各十八日寄治不得獨主於時也脾藏者

土之精也土者生萬物而法天地故

上不至頭下不至足不得主時也

傷醫大全

卷三

脾

聖

顧氏秘書

帝曰脾與胃以膜相連耳而能為之行其津液何也

答曰足太陰者三陰也其脉貫胃屬脾絡嗌故太

陰為之行氣於三陽藏府各因其經而受氣於陽

明

又曰脾俞在背十一椎傍募在腹傍章門

又曰黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土

又曰如縞裹括蕪實者生

又曰脾熱病鼻先赤

又曰脾熱病者先頭重頰痛煩心欲嘔身熱熱爭則

腰痛不可俯仰腹滿泄兩頰痛甲乙甚戊己大汗

氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

又曰脉來實而盈數如雞舉足曰脾病

又曰脉來堅銳如烏之喙如鳥之距如屋之漏如水

之流曰脾死

又曰脾氣盛則體重肢不舉

又曰厥氣客於脾則夢邱陵大澤壞屋風雨

又曰脾弱病下利白腸垢大便堅不更衣汗出不止

或五液注下五色不更衣不大便也貴

傷醫大全

卷三

脾

聖

顧氏秘書

又曰脾脹者善噦四肢急體重不能勝之噦苑臥不

安

又曰脾水者腹大四肢重津液不生但苦少氣小便

難

又曰脾約者大便堅小便利而反不渴

又曰脾瘧者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出

刺足太陰

又曰腎移熱於脾傳為虛腸澼死不可治

又曰脾欬之狀欬則右肱下痛陰陰引肩背甚則不

可以動動則欬劇劇音極

又曰脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色

薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃診色診

又曰脾痺者四肢懈惰發欬嘔汁上為大塞

又曰脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿

帝曰四時之序逆從之變異也然脾脉獨何主岐伯

曰脾脉者土也孤藏以灌四傍者也帝曰然則脾

善惡可得見之乎曰善者不可得見惡者可見曰

惡者何如可見曰其來如水之流者此謂太過病

湯醫大全 卷三 脾 聖 顧氏秘書

在外如鳥之喙者喙音誨此謂不及病在中太過

則令人四肢不舉不及則令人九竅不通名曰重

強

又曰食管乃胃管上原

內景云脾長一尺掩太倉而靈樞云脾長五寸何不

伴也

脉經曰脾脉急甚為癉痲音訟微急為臍滿不食

又曰緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不收

又曰太甚為擊仆微大為痞氣脹大膿血在腸胃之

外

又曰心乃脾之母以炒鹽補之

又曰脾實以枳實瀉之如無他證以黃連瀉之

又曰脾主濕自病則泄瀉多睡體重倦怠急以苦燥

之

又曰實則瀉赤黃睡不露睛瀉黃散

又曰虛則泄瀉白色睡則露睛白朮散

又曰肝乘脾賊邪風勝瀉而嘔茯苓半夏湯

又曰心乘脾虛邪壯熱體重而瀉羌活黃芩蒼朮甘

湯醫大全 卷三 脾 聖 顧氏秘書

草湯

又曰肺乘脾實邪能食不大便而嘔噎煎積椰大黃

湯下葶藶丸

又曰腎乘脾微邪惡寒而泄理中丸

又曰凡脾之得病必先察其肝心兩藏之虛實原其

所始而療之蓋肝為脾鬼心是脾母肝氣盛則鬼

勝心氣虧則脾之生氣不足盛者抑之則退虧者

益之則平故有抑肝益心二藥診其脉肝心二藏

俱和是脾自生疾矣須察本經虛實而治之此即貴法

又曰小甚為寒熱微小為消痺

又曰滑甚為頽瘞頽下也微滑為蟲毒腸鳴熱

又曰瀉甚為腸積積音積微瀉為內積多下膿血也

經曰是動則舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後

與氣則快然如衰身體皆重是主脾氣音屁

又曰所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心

下急痛寒瘧澹瘕泄水閉黃疸不能臥強立肢膝

內腫厥厥發也足大指不用盛者寸口大三倍於人

迎虛者寸口反小於人迎也

傷醫大全 卷三 脾 妻 顧氏秘書

足太陰脾引經藥歌 已脾音歸歸縮 砂仁 黃芪 防風

益智仁 代赭 石異 萊萸 赤茯苓 木白 木白 荳蔻

甘草 麻黃 飴糖 半夏 元胡音索 白芍 縮砂行音赤

經曰脾受肝熱邪多吐逆受肝冷邪多殞泄

又曰甘走肉肉病無多食甘

又曰穀氣通於脾

又曰久坐傷肉勞於脾也

又曰精氣并於脾則畏

又曰損其脾者調其飲食適其寒溫

經曰濕勝則濡瀉濕勝則內攻於脾胃脾胃受濕則水穀不分故大腸傳道而注瀉也

又曰得穀者昌失穀者亡

又曰諸濕腫滿皆屬於脾

又曰脾實則身重善饑肉痿足不收行善噫脚下痛

虛則腹滿腸鳴殞泄食不化脾有餘則腹脹溼洩

不利不足則四肢不用

靈樞曰邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足

則熱中善饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹

痛

傷醫大全 卷三 脾 妻 顧氏秘書

又曰脾藏營營舍意脾氣虛則四肢不用五藏不安

實則腹脹溼洩不利註曰溼大便也

難經曰外證面黃善噫善思善味內證當臍有動氣

按之半苦痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰

嗜卧四肢不收有是者脾也無是者非也

經曰大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛

引肩項身熱脫肉破胭血藏見十月之內死註曰此脾

之藏也期三百日內死

又曰肝傳之脾病名曰脾風發痺腹中熱煩心出黃

脾熱者色黃而肉蠕動

又曰病在脾愈在秋秋不愈甚於春春不死持於夏

起於長夏

凡病以五藏時日占病愈甚極準錢仲陽深得其理學者宜究心焉綱目

又曰脾病者愈在庚辛庚辛不愈加於甲乙甲乙不

死持於丙丁起於戊己

又曰脾病者日昃慧日出甚下晡靜

又曰脾在志為思思傷脾怒勝思

丹溪曰思傷脾者以怒勝之以喜解之

五志之火鬱而成痰為癲

正宜以人事制之所謂五志相勝為治也婦女思想氣結之證惟不食困卧如癡無他病多向裏床

瘍醫大全

卷三 脾

堯

顧氏秘書

坐蓋脾主思過思則脾氣結而不食怒屬肝木怒則木氣升發而衝開脾氣也故怒勝之夫醫貴有才無才則何以應變無窮

經曰藏氣絕則神見於外

一士人喜觀書忘食一日有紫衣人立於前曰公不

可苦思思則我死矣問其何人曰我穀神也於是絕思而食如故矣

經曰脾苦濕急食苦以燥之脾欲緩急食甘以緩之

脾苦濕是有餘宜白朮脾欲緩是不足宜甘草以

甘補之人參以苦瀉之黃連脾虛以甘草大棗之

類補之脾實以枳實瀉之

靈樞曰足太陰氣絕則脉不榮肌肉唇舌者肌肉之

本也脉不榮則肌肉軟肌肉軟則舌痿人中滿人

中滿則唇反唇反者肉先死甲日篤乙日死

靈樞曰愁憂不解則傷意意為脾神也

思而動血者屬脾

腫脹水腫有十種之分四肢苦重為脾水總而論之

腎虛不能行水脾虛不能制水凡腫先起於腹而

散於四肢者可治自四肢而歸於腹者難療

經曰黃如蟹膏者生黃如枳實者死

又曰實則夢歡歌快樂虛則夢飲食相爭

瘍醫大全

卷三 脾

卒

顧氏秘書

又曰太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通上下不通則面黑皮毛

焦而終矣

脉經曰脾絕十二日死

一云五日死

何以知之口冷足腫

腹熱臃脹泄利不覺出時無度

仲景曰環口黧黑柔汗發黃者此為脾絕

補

人參 黃芪 甘草 蓮子 扁豆 蒼朮 白朮 茯苓 山藥 芡實 陳皮

瀉

枳實 石膏

溫

丁香 藿香 胡椒 吳茱萸 附子 肉桂 良姜

涼 玄明粉
滑石
引經報使 升麻
白芍

瘍醫大全

卷三 脾


空

顧氏秘書



胃之上口名
曰賁門飲食
之精氣從此
上輸於脾肺
宜播於諸脉

當上腕曰賁門



胃之下口即小腸
上口名曰幽門

瘍醫大全

卷三 胃

空

顧氏秘書

經曰胃者倉廩之官五味出焉

又曰胃者彙也號為都市五味彙聚何所不容萬物
歸土之義也

又曰胃大一尺五寸徑五寸長二尺六寸橫屈受水
穀三斗五升其中之穀常留二斗水一斗五升而
滿

難經曰胃重二觔一兩
經曰足陽明胃經

又曰是經常多氣多血

又曰辰時氣血注於胃

又曰胃為水穀之海

靈樞曰人之所受氣者穀也穀之所注者胃也胃者

水穀氣血之海也海之所行雲氣者天下也胃之

所出氣血者經隧也經隧者五藏六府之大絡也

又曰胃者五藏六府之海也水穀皆入於胃藏府皆

稟氣於胃五味各走其所喜酸先走肝苦先走心

甘先走脾辛先走肺鹹先走腎穀氣津液已行榮

傷醫大全

卷三 胃

三

顧氏秘書

衛大通乃化糟粕以次傳下

又曰飲食入胃則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛

胃滿則腸虛腸滿則胃虛更虛更實故氣得上下

而無病矣

入門曰胃為水穀之海脾為消化之器水入於經其

血乃成穀入於胃脈道乃行血不可不養衛不可

不溫血溫衛和得盡天年

靈樞曰髑髑以下至天樞長八寸過則胃大不及則

胃小

又曰胃為之海廣骸大頸張胸五穀乃容

又曰脾應肉肉腠堅大者胃厚肉腠磨者胃薄肉腠

小而磨者胃不堅肉腠不稱身者胃下胃下者下

腕約不利也肉腠不堅者胃緩肉腠無小裸累者

胃急肉腠多少裸累者胃結者上腕約不利也

肘腋後肉如塊者

又曰胃病者腹膈脹胃腕當心而痛上支兩脇膈噎

不通飲食不下

又曰飲食不下膈塞不通邪在胃腕也

傷醫大全

卷三 胃

三

顧氏秘書

又曰胃中寒則手魚際之絡脈多青胃中熱則手魚

際之絡脈多赤

又曰面熱者足陽明病兩跗之上脈豎堅者足陽明

病此胃脈也

經曰飲食自倍腸胃乃傷

東垣曰胃傷之證不思飲食胃腹脹痛嘔噦惡心噫

氣吞酸面黃肌瘦怠惰嗜卧常多自利

又曰胃中元氣盛則能食而不傷過時而不饑脾胃

俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少

食而肥雖肥而四肢不舉

又曰胃病治法調其飲食適其寒溫澄心息慮從容以待真氣之復常也

經曰胃脈實則脹虛則泄

又曰胃為足陽明其終者口目動作善驚妄言色黃其上下經盛不仁則終矣

又曰嘔吐血成盆成碗者屬胃經

又曰牙宣出血屬胃腎虛火

丹心曰人無根本水食為命蓋脾胃屬土主納水穀

瘍醫大全

卷三 胃

奎

顧氏秘書

人之根本也

回春曰五味淡薄令人神爽氣清

必用曰胃實宜平胃散胃虛宜補中益氣湯不進飲

食宜養胃進食湯

蒼朮白朮人參各一錢陳皮厚朴白茯苓炙甘草各七分神曲

麥芽各五分姜棗引或蜜丸米飲下二錢

脈經曰胃絕五日死何以知之脊痛腰中重不可反

覆

太乙真人曰美飲食養胃氣

吐出多者為吐血

又曰胃者倉廩之官布養四藏故五藏皆稟氣於胃

乃五藏之本故食氣入胃散精於肝流氣於筋食

氣入胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經經氣歸於

肺肺朝百脈輸精於皮毛毛脈合精行氣於府府

精神明留於四藏氣歸於權衡權衡以平氣口成

寸以決死生

東垣治內傷主於脾胃其謂脾司轉運之職胃為受

氣營養於身是平人也若飲食失節脾胃乃傷脾

傷則不能運化胃傷則不能容納而諸病生矣

瘍醫大全

卷三 胃

奎

顧氏秘書

丹溪云百病先觀胃氣何如

經曰厥氣容於胃則夢飲食

又曰胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨於食大便難

又曰胃瘧者令人疢病也善饑而不能食食而支滿

腹大刺足陽明太陰橫脈出血

又曰胃風之狀頸多汗惡風食飲不下鬲塞不通腹

善滿失衣則腫脹食寒則泄脈形瘦而腹大也

孫真人曰新食竟取風為胃風

經曰穀入於胃脈道乃行

又曰大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食飭音積

又曰人以水穀為本故人絕水穀則死脈無胃氣亦

死所謂無胃氣者但得直藏脈不得胃氣也

又曰胃者水穀之海主稟四時皆以胃氣為本是謂

四時之變病死生之要會也

又曰胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其

動應衣脈宗氣也

又曰胃為之市水穀所歸五味所入如市之雜也

太素曰胃者大倉也胃之五竅謂咽胃大腸小腸膀胱也閭里門

腸醫大全 卷三 胃 衞氏秘書

戶也

經曰脾之大絡名曰大包其系自膈下正中微着左

脇於胃之上與胃包絡相附矣其胃之包在脾之

上與胃相並結絡周回漫脂遍布上下有二系上

者貫膈入肺中與肺系相並而在肺系之後其上

即咽門也咽下胃脘也胃脘下即胃上口賁門是

也水穀自此而入以胃出穀氣傳之於肺肺在膈

上因曰賁門其門處膈膜相貼之間亦漫脂相包

若胃中腐熱水穀則自幽門而傳入小腸故曰太

倉之下口為幽門其位幽隱故名之也系音係

脈經曰胃脈搏堅而長其色赤當病折髀音陞其裏而

散者當病食痺

又曰跌音夫陽脈浮者胃氣虛也數者胃有熱即消穀

引食滯者胃中有寒水穀不化粗而浮者其病難

治浮遲其久病

又曰胃脈若沉滯者氣逆氣逆者人迎甚盛人迎者

胃脈也逆則盛而熱聚於胃口而不行故胃脘為

癰也

腸醫大全 卷三 胃 衞氏秘書

又曰是動則洒洒然振寒善伸數欠顏黑病至則惡

人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶牖而

處甚則欲上高而歌棄衣而走賁嚮腹脹是為肝

厥是主血肝音幹脛骨也

又曰所生病者狂瘧濕淫汗出鼽衄口喎唇脣音疹唇瘡

頸腫喉痺大腹水腫膝膕腫痛循膈乳氣街股伏

兔筋外廉足跗上背痛中指不用氣盛則身以前

皆熱其有餘於胃則消穀善饑溺色黃氣不足則

身以前皆寒慄胃中寒則脹滿盛者人迎左大二

倍於寸口右虛者人迎反小於寸口也喘音歪

足陽明胃引經藥歌 辰胃丁香防風砂仁荳蔻白

朮半夏知母葱白葛根神麴蒼朮烏藥石膏白芷

升麻檀香木香香下治相沿效不辜

經曰胃脉實則脹虛則泄

帝口見重臟脉者死何也岐伯曰五臟皆稟氣於胃

胃者五臟之本也藏氣者不能自致於手太陰必

因於胃氣乃至於手太陰也故五藏各以其時自

爲而至於手太陰也故邪氣勝者精氣衰也故病

瘍醫大全 卷三 胃 充 顧氏秘書

甚者胃氣不能俱至於太陰故重臟之氣獨見病

勝臟故曰死

又曰胃實不眠

又曰臥寐不寧乃胃中之津液乾枯不能內榮其魂

魄也

凡飲食減而大便轉覺艱澀者胃病而運化之機遲

也肌肉消瘦者胃主肌肉也形體困憊者胃病而

約束之機關不利也

陽明邪實惡人與火聞木陽明正虛故喜火喜日月

腫脹水腫有十種之分小便閉澀爲胃水

經曰得穀者昌失穀者亡

馮魯瞻曰脾胃尤爲後天元氣之本化源生發之機

五藏六府之大源氣血精微莫不賴之以長養也

補 白朮 黃芪 芡實 陳皮 扁豆

瀉 枳實 朴硝 山藥 半夏 蒼朮 百合

溫 藿香 厚朴 良薑 益智 胡椒

涼 生薑 吳茱萸 肉豆蔻 白豆蔻 木香 乾薑 草薺

滑石 石膏 山梔 黃連 竹茹 玄明粉


連翹 石斛 升麻 天花粉

葛根 黃芩 升麻 葛根上行 石膏下行

引經報使 白芷 石膏下行

瘍醫大全 卷三 胃 丰 顧氏秘書

肺者市也百
脉朝會之所
也凡飲食入
胃不敢自專
地道卑而上
行朝于肺肺
乃天道下濟
而光明



傷醫大全

卷三 肺

主 顧氏秘書

肺

經曰肺者相傳之官治節出焉為生氣之源其形四
垂附着於脊之第三椎中有二十四空行列分布
以行諸藏之氣為藏之長為心之蓋

又曰是經多氣少血其合皮也其榮毛也開竅於鼻
難經曰肺重三筋三兩六葉兩耳凡八葉主藏魄肺
葉白瑩謂為華蓋以覆諸藏虛如蜂窠下無透竅
吸之則滿呼之則虛一呼一吸消息自然司清濁
之運化為人身之橐籥

又曰寅時氣血注於肺

經曰肺者在天之燥在地為金在人為肺在時為秋
在方為西在色為白通竅於鼻經曰西方金也萬
物所以收成也又曰藏真高於肺以行榮衛陰陽
也脾土為母腎水為子大腸為腑尅木主氣若久
卧則傷氣司藏魄其類金其畜馬其卦乾其性義
其華毛其候鼻其穀稻其應四時上為太白星其
病在皮毛其音商商者強也象金性之堅強也其
數九其臭腥其聲哭其氣咽其液涕其味辛外應

傷醫大全

卷三 肺

主 顧氏秘書

皮毛而色白然貴如白玉光澤不欲如堊靈樞曰
肺應皮皮厚者大腸厚更肺主燥然燥則傷肺病
則為嗽痘主膿泡若熱氣勝則病其病之候則面
白悲哭手捏眉目鼻面嚏涕吐血喘咳寒熱腸有
動氣肺虛則歎息呼吸少氣鼻涕咽乾喘乏欬血
而唇白肺實則悶亂喘促咳嗽上氣鼻塞脛股肩
痛而胸滿肺絕則汗出髮潤喘而不休毛髮氣出
然肺絕者三日死平脉則秋旺七十二日而脉浮
毛毛者稀軟之狀輕虛似浮其賊脉浮大而牢與

夫面赤皆逆危脉則毛如風吹

華元化曰肺乃生氣之原五藏之華蓋

經曰肺屬辛金為陰中之太陰通於秋氣肺配胸中

與大腸為表裏其母脾土其子腎水其尅肝木其

賊心火主藏魄其色白其味辛其臭羶其華毛其

候鼻其充皮其液涕其聲哭其氣咽其不足則太

息其有餘則喘嗽其平脉浮短其賊脉洪手太陰

氣絕則皮毛焦皮毛焦則津液去皮節傷皮節傷

則皮枯毛折毛折者則毛先死丙日萬丁日死肺

瘍醫大全

卷三 肺

圭

顧氏秘書

絕三日死肺至懸絕十二日死白如豕膏者生白

如枯骨者死實則夢兵戈兢擾虛則夢田野平原

憂傷肺喜勝憂以酸補之以辛瀉之以苦泄之

岐伯曰形寒飲冷則傷肺飲冷以其兩寒相感中外

皆傷故氣逆而上行

金匱真言論曰秋氣者病在肩背肺之應也

又曰肺變動為咳

脉論云脉來厭厭聶聶如落榆莢錢曰肺平脉來不

上不下如循鷄羽浮曰肺病脉來如物輕飄如風

吹毛曰肺死真肺脉至大而虛如以毛羽中人肌
膚之狀

經曰肺之見證也善噫悲愁欲哭洒淅寒熱缺盆中

痛肩背痛臍右少腹脹痛小便數溇泄皮膚痛及

麻木喘少氣頰上氣見

經曰肺主氣

又曰諸氣者皆屬於肺

又曰肺藏氣氣有餘則喘咳上氣氣不足則息利少

氣

瘍醫大全

卷三 肺

圭

顧氏秘書

靈樞曰膻中為之氣海膻中者肺室也有餘則胸面

俱赤不足則少氣力不多言

丹溪曰冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎

上之化有升無降熏蒸清道甚而轉成劇病局方

例用辛香燥熱之劑是以火濟火也

張子和曰諸病皆生於氣諸痛皆因於氣

四春云風傷氣者為疼痛寒傷氣者為戰慄暑傷氣

者為熱悶濕傷氣者為腫滿燥傷氣者為閉結

入門曰逸則氣滯亦令氣結輕者行動自愈重者橘

皮一物湯 橘皮一兩洗淨
新汲水煎服

直指云七氣者喜怒哀思憂驚恐或以為寒熱恚怒
喜憂愁皆通也

經曰背為陽陽中之陰肺也肺為牝藏牝者陰也

又曰諸氣贖鬱皆屬於肺

人有七情病生七氣氣結則生痰痰盛則氣愈結故
調氣必先豁痰如七情湯以半夏主治而官桂佐
之蓋良法也

太乙直人曰少言語養內氣

傷醫大全 卷三 肺

五 顧氏秘書

象川翁曰精能生氣氣能生神榮衛一身莫大於此

黃帝問曰余知百病生於氣也怒則氣上喜則氣緩

悲則氣消恐則氣下寒則氣收炆則氣泄驚則氣

亂勞則氣耗思則氣結九氣不同何病之生

岐伯對曰怒則氣逆甚則嘔血及殮泄故氣上矣

喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急

肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣

消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦

脹故氣不行矣寒則腠理閉氣不行故氣收矣炆

則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄矣驚則心無所

倚神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出

內外皆越故氣耗矣思則心有所存神有所歸正

氣留而不行故氣結矣

經曰氣為精神之根蒂 李東垣曰氣者神之祖精乃
氣之子氣者精神之根蒂也

又曰久卧傷氣

西山記曰近穢氣觸真氣近死氣亂生氣

正傳曰男子屬陽得氣易散女人屬陰遇氣多鬱是

以男子之氣病常少女人之氣病常多故治法曰

傷醫大全 卷三 肺

五 顧氏秘書

女人宜調其血以耗其氣男子宜調其氣以養其

血

氣生於穀 靈樞曰人受氣於穀穀入胃以傳與肺五
藏六府皆以受氣其清者為榮濁者為衛

榮在脈中衛在脈外管周不休五十度而復大會

陰陽相貫如環無端又曰上焦開發宣五穀味熏

膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣又曰氣為衛衛

於外正理曰日啖飲食之精熟者益氣此氣生於

穀故氣

上氣 靈樞曰邪在肺則寒熱上氣上氣者呼多吸
少氣息促急內經曰氣有餘則喘咳上氣

下氣 綱目曰下氣屬心經曰夏脈者心也心脈不及
下為氣泄是也又曰癰癩勞瘵者若氣下泄不
止者必死此血氣竭絕腸胃腠理閉塞穀氣不能
宣通於腸胃之外故從腸胃中泄出也河間曰腸

胃轉結穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故善噫而或下氣也仲景曰傷寒陽明病胃中有燥屎者必轉矢氣下泄也

短氣 明理曰短氣者氣短而不能相續者是已若有氣上衝而實非氣上衝也呼吸雖數而不能相續似喘而不搖肩似呻吟而無痛實為難辨之證要識其直者氣急而短促是也仲景曰平人寒熱短氣不足以息者實也又曰短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣丸主之入門曰氣短者呼吸不相接續是也

短者有風濕相搏者有素弱氣虛者大抵心腹脹滿者為實為邪在裏心腹濡滿者為虛為邪在表東垣曰氣短小便利者四君子湯去茯苓加黃芪補之入門曰氣散則中虛倦怠無力短氣不足以息宜調中益氣湯人參養榮湯脈經曰寸口脈沉胃中短

少氣 綱目曰少氣者氣少不足以言也靈樞曰肺藏氣氣不足則息微少氣又曰肺虛則少氣不能報息又曰腎生氣腎虛則少氣力言吸少氣不足情不能動又曰膈中為氣之海不足則少氣消索以言內經曰怯然少氣者是水道不行形氣消索也言而微終日乃復言者奪氣也宜生脈散易老

東垣曰內傷脾胃致中氣虛少宜補中益氣湯益胃升陽湯活人心法曰氣虛發熱百脈搖動有如重行相火自足上升心常煩悸頭重腦悶黃芪二錢人參甘草各一錢當歸五分五味子九粒煎服各黃芪湯乃清和調勻鎮定之劑也

氣痛 入門曰人身元氣與血循環被橫行藏府之間而為疼痛積聚症瘕逆胃臆之上而為痞滿刺痛等證多因七情飲食鬱為痰飲初起宜辛溫開鬱行氣豁痰消積久則宜辛寒降火除根氣滯上焦為心胃痞痛宜枳橘湯氣滯中焦為腹脹痛宜木香破氣散氣滯下焦為腰痛疝瘕宜四磨

傷醫大全 卷三 肺 主 顧氏秘書

湯氣滯於外則周身刺痛或浮腫宜木香流氣飲

氣逆 陰濁氣在陽榮氣順脈衝氣逆行清濁相干亂於胃中是為太惋與胸悶全故氣亂於心則煩心於腸胃則為霍亂於肺則為喘咳於頭則為昏厥逆頭重眩仆入門曰氣逆者氣自腹中特上衝也丹溪曰病人自言冷氣從下而上者此上升之氣自肝而出中挾相火其熱為甚自覺其冷非虛冷也又曰氣之上逆屬陽無寒之理惡寒者乃火極似水也入門曰散火之法必先破氣氣降則火自降矣

氣鬱 丹溪曰氣之初病其端甚微或因七情或感六積或因飲食以致津液不行清濁相干自氣成積自積成痰氣為之鬱或痞或痛正傳曰氣鬱而濕滯濕滯而成熱故氣鬱之病多兼浮腫脹滿入

門曰鬱者病結不散也交感丹治諸氣鬱滯一切公私拂情名利失志抑鬱煩惱七情所傷不思飲食面黃形羸胃膈痞悶諸症神效大能升降水火香附子一觔長流水浸三日取炒茯苓神四兩搗末蜜丸彈子大每一丸

細嚼以二陳湯送下

氣不足生病 靈樞曰邪之所在皆為不足故上氣不傾目為之眩中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足乃為痿蹙心悅又曰上氣不足推而揚之陰陽皆虛火自當之

入門曰七情總發於一心七氣總隸於一氣氣陽也動則為火故以降火化痰消積分治之大槩氣虛四君子湯氣實小烏沉湯火多合黃連解毒湯痰

傷醫大全 卷三 肺 主 顧氏秘書

動則為火故以降火化痰消積分治之大槩氣虛四君子湯氣實小烏沉湯火多合黃連解毒湯痰

多合二陳湯積多合平胃散

丹溪曰久患氣證氣不歸元久服藥無效者破故紙

為君 破故紙炒一兩 荷香炒乳香各五錢 為末 蜜丸 梧桐子大 空心白湯下 五十九

方氏曰氣病用氣藥而不效者氣之所藏無以收也

蓋肺主氣腎藏氣青木香圓木香順氣丸皆用破

故紙所以使氣升降而歸於腎藏也

入門曰氣病通用二陳湯 上焦氣滯加枳殼桔梗香 附砂仁中焦氣滯加厚朴

枳實三稜蓬朮下焦氣滯加青皮木香檳榔氣 痛加枳殼氣實加烏藥香附氣虛加參朮木香

丹溪曰治上升之氣用芩連梔子香附又曰氣無補

瘍醫大全 卷三 肺 壬 顧氏秘書

法世俗之言也不思正氣虛者不能運行邪氣着

而為病經曰壯者氣行則愈怯者着而成病苟或

氣怯不用補法氣何由行又曰氣鬱須用川芎香

附梔子芩連又曰木香行中下香附快滯陳皮泄

氣 紫蘇散表厚朴泄衛 枳榔泄至高 藿香上行 沉

香 升降腦麝散真 凡此皆泄氣之標不能治氣之

本

痰中帶血絲者此陰虛火動勞傷肺臟也

凡吐血吐於水碗中辨之浮於水上者肺血也

內景曰肺之為氣三焦起

又曰會厭聲音之門戶

又曰下漑喉嚨神明通

又曰璇璣玉衡色蘭玕

又曰重中樓閣十二環

中景曰下念喉嚨十二環自下通流兩乳間

外景曰絳官重樓十二級

人鏡經曰會厭綴於舌本之下正應乎氣管之上氣

管即喉嚨也居於前主持呼吸為聲音之門戶又

瘍醫大全 卷三 肺 壬 顧氏秘書

曰吸門十二節上三節微小下九節微大第四節

乃結喉也結喉可容得上三節於內如進飲食則

結喉即起套於上三節之外直抵於會厭之下而

揜之令水穀不得而漏入焉一或誤投之即發噎

而不已矣

又曰肺白象金肺得水而浮金得水而沉何也然肺

者非為純金也辛商也丙之柔大言陰與陽小言

夫與婦釋其微陰婚而就火其意樂火又行陽道

多故令肺得水而浮也肺熱而復沉是辛歸庚也

始由從化
終則歸元

又曰五臟俱等而心肺獨在膈上者何也然心者血
肺者氣血為榮氣為衛相隨上下謂之榮衛通行

經絡榮周於身故令心肺在膈上也

內景曰肺部之宮似華蓋

又曰過華蓋下清且涼

又曰還過華下動腎精

又曰肺之為氣三焦起開通百脉血液始

又曰津液醴泉通六府

傷醫大全

卷三 肺

全

顧氏秘書

又曰肺屬金律應黃鐘象金石之有聲也

經曰金王於秋相於季夏廢於冬困於春死於夏其

王日庚辛王時日哺困日甲乙困時平旦其死日

丙丁死時禺中

哺音通申時也

禺中日中也禺音魚日在巳口禺中

又曰肺者氣之本魄之處也

又曰五氣入鼻藏於肺肺有病鼻為之不利

又曰脾胃一虛肺氣先絕

又曰肺熱病右頰先赤

又曰損其肺者益其氣

又曰肺俞在背第三椎募在胸旁中府俞為陽石鶴傳作輸猶委

輸之輸經氣由此而輸於彼也募為陰猶募結之募經氣聚於此也

又曰肺氣虛則鼻息不利少氣實則喘喝音胸盈仰

息

又曰肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身

熱熱爭則喘欬痛走胸膺背不得太息頭痛不堪

汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手

太陰陽明出血如大豆立已

浙音昔酒浙也厥冷也邪氣也即傷寒傷

風類

傷醫大全

卷三 肺

全

顧氏秘書

又曰肺瘧者令人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見

者刺手太陰陽明

列缺穴

又曰心移熱於肺傳為鬲消

又曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血肺欬不已

則大腸受之大腸欬而遺矢

矢屎也

又曰肺風之狀多汗惡風餅然白時欬短氣晝日則

瘥暮則甚診在眉上其色白

又曰肺脹者虛而滿喘欬倚息目如脫狀

又曰肺水者身重而小便難時澹泄

又曰肺中寒者吐濁涕

又曰肺痺者煩滿喘而嘔

又曰肺熱葉焦發為痿躄躄音壁 跟也

又曰右寸肺大腸脉所出浮短而瀉肺也 浮短而疾大腸也

又曰肺脉其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病

在外則令人逆氣而背痛愠愠然其氣來毛而微

此謂不及病在中則令人喘呼吸少氣而欬上氣

見血下聞病音

又曰肺病身有熱欬嗽短氣吐出膿血其脉當短濇

傷醫大全 卷三 肺 全 顧氏秘書

今反浮大色當白而反赤死是火尅金也

又曰肺脉搏堅而長當病吐血其栗而散者當病灌

汗至今不復散發也血汗者禁再汗至令謂至盛 暑之令也

又曰肺氣盛寸口右大三倍於人迎虛者寸口反小

於人迎也

又曰肺為嬌臟

又曰肺形如人肩二布大葉四垂如蓋附着於脊之

第三椎中有二十零四孔以分布諸臟清濁之氣

椎音迤 顛同

又曰所生病者欬嗽上氣喘喝煩心胸滿膈臂內前

廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風小

便數而欠虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色黃

卒遺矢無度

手太陰肺引經藥歌 寅肺升麻南星欬 冬花桔 梗

元參檀香山藥麥門冬天門冬阿膠茯苓味干葱

白桑白皮枇杷 杏仁麻黃豆蔻同梔子 縮砂仁

黃芩知母桔梗藿香石葶藶木瓜芍枳殼紫

蘇木通

傷醫大全 卷三 肺 全 顧氏秘書

經曰鼻如烟煤肺氣已絕當汗出大喘若身熱無汗 乃大腸燥結

之微尚 可生也

厄言曰肺者茂也茂茂然居乎上為五臟之華蓋醫

首緒餘曰肺者勃也言其氣勃鬱也

經曰熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦勝辛

又曰辛走氣氣病母多食辛

又曰多食苦則皮膚槁而毛拔

又曰白色見於鼻準及正面如枯骨如擦殘汗粉者

為肺氣絕若如膩粉梅花白綿者是肺邪虛中寒

鼻衄出血咳嗽有血屬肺經

憂而動血者屬肺

氣絕候靈樞曰五陰氣俱絕則目系轉轉則目運目運者為志先死志先死則遠一日半死矣六陽氣俱絕則陰與陽相離離則腠理發泄絕汗乃出故氣絕於外者上氣脚縮五臟氣絕於內者下利不禁甚者手足不仁又曰若陽氣前絕陰氣後竭者其人死身色必青陰氣先絕陽氣後竭者其人死身色必黃腋下温心下熱也

傷醫大全

卷三 肺

全

顧氏秘書

黃庭經人身神名曰肺神皓華字虛成

七神註云魄者精氣之匡佐也

靈樞曰並精出入謂之魄

又曰喜樂無極則傷魄魄為肺神也

皇甫謐曰脾胃一敗肺氣先絕

經曰肺在志為憂肺之志為悲

又曰憂則氣沉

又曰愁憂者氣閉塞而不行蓋憂則隔塞否閉氣脉斷絕而上下不通也氣固於內則大小便道偏不

得通泄也

經曰精氣并於肺則悲

又曰肝虛而肺氣并之則為悲

又曰悲則氣消

又曰肺主殺故其志為悲

又曰肺在志為憂憂傷肺喜勝憂

丹溪曰憂傷肺者以喜勝之以怒解之

靈樞曰肺色通於鼻肺和則鼻能知香臭矣

又曰鼻者肺之官也肺病則喘息鼻張

傷醫大全

卷三 肺

全

顧氏秘書

經曰肺主秋西方辛金西方生燥燥生金金生辛辛

生肺其畜為雞一作馬其色為介其菓為李其菜為

韭其經為手太陰肺

又曰肺藏於右

靈樞曰五藏六府肺為之蓋白色小理者肺小龕理

者肺大巨肩反膺陷喉者肺高合液張脇者肺下

好肩背厚者肺堅肩背薄者肺脆背膺厚者肺端

正脇偏疎者肺偏傾也肺小則少飲不病喘渴肺

大則多飲善病胃痺喉痺逆氣肺高則上氣肩息

咳肺下則氣賁迫肝善脇下痛肺堅則不病咳上氣肺脆則苦消痺易傷肺端正則和利難傷肺偏傾則胸偏痛也

脉經曰肺傷者其人勞倦則咳唾血其脉細緊浮數皆吐血此為躁擾噴怒得之肺傷氣壅所致

仲景曰熱在上焦因咳為肺痿其人咳口中反有濁唾涎沫寸口脉數此為肺痿也若口中辟辟燥咳咳則胸中隱隱痛脉反滑數此為肺癰也

靈樞曰邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出咳動

瘍醫大全 卷三 肺 全 顧氏秘書

肩背

經曰風寒入舍於肺名曰肺痺發咳上氣

又曰肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀膕跗足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗑乾

又曰肺熱者色白而毛敗

又曰肺實則令人逆氣而背痛愠愠然虛則令人喘呼吸少氣而咳上氣見血下聞病音

又曰大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便其氣動形期六月死真臟脉見乃予之期日此肺之藏

也一百八十日內死

難經曰外證面白善嚏悲愁不樂欲吳內證臍右有

動氣按之牢若痛其病喘咳洒新寒熱

肺苦氣上逆急食苦以泄之註曰肺氣上逆是其氣有餘也肺欲收

急食酸以收之用酸補之辛瀉之

又曰肺病禁寒飲食寒衣

經曰病在肺愈在冬冬不愈甚於夏夏不死持於長夏

起於秋

又曰肺病者愈在壬癸壬癸不愈加於丙丁丙丁不死

瘍醫大全 卷三 肺 全 顧氏秘書

持於戊己起於庚辛

又曰肺病者下晡慧日中甚夜半靜

又曰肺受氣於腎傳之所肝氣舍於脾至心而死此

皆逆死也一日一夜五分之此所以占死者之早暮也

也

又曰悲哀動中者竭絕而失主

又曰肺絕三日死何以知之口張一云口鼻氣出而不返

仲景曰汗出髮潤喘而不休者此為肺絕

血隨咳出或帶痰中為咳血

腫脹水腫有十種之分大便驚澀為肺水

肺為氣之主而腎又為氣之藏是以氣出之於肺而

納之於腎也

補 人參 山藥 百部 五味子 阿膠

瀉 防風 紫菀 茯苓 麥門冬


濕 枳殼 蘇子 桑白皮 白豆蔻

涼 沙參 黃芩 桔梗 馬兜鈴 瓜蒌仁

引經報使 白芷 貝母 天門冬 人溺

傷醫大全 卷三 肺 全 顧氏秘書

大腸 上口 印小口 下



傷醫大全 卷三 大腸 全 顧氏秘書

大腸

經曰大腸者傳道之官變化出焉上受胃家之糟粕

下輸於廣腸舊穀出而新穀可進故字從肉從易

又暢也通暢水穀之道也手陽明經大腸

又曰迴腸當臍右迴十六曲大四寸徑一寸半長二

丈一尺受穀一斗水七升半

又曰廣腸傳脊以受迴腸乃出滓穢之路大八寸徑

二寸寸之大半長二尺八寸受穀九升三合八分

合之一

又曰大腸一名迴腸以其回屈而受小腸之穀故名之也

又曰大腸臍右迴三十六曲

又曰大腸俞在脊十六椎傍募在臍傍天樞俞為陽在背募為陰在腹

又曰大腸為白腸

又曰厥氣客大腸則夢田野

又曰大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀

又曰水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿

傷醫大全 卷三 大腸 全 顧氏秘書

又曰小腸移熱於大腸為瘧瘕為沉瘕即伏字瘕音假

又曰廣腸一名肛門言其處如車釭形故曰肛門即廣腸也

又名直腸受大腸之穀而道出焉

又曰魄門亦為五臟使水穀不得久藏

又曰是動病則齒痛頰腫是主津液頰音抽

手陽明大腸引經藥歌 卯大腸有升麻 白芷薤白

火麻仁肉豆蔻阿膠白石脂石膏砂仁石斛使將

軍即大麻葛根枳殼升麻連翹

又曰是經多氣多血

難經曰大腸二筋十二兩肛門重十二兩按迴腸者以其迴疊也廣腸即迴腸之更大者直腸又廣腸之末節也下連肛門是為穀道後陰一名魄門總皆大腸也

又曰上接小腸下口下接直腸肛門

又曰卯時氣血注於大腸

本臟篇云皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹理

大者大腸大而長皮急者大腸急而短皮滑者大

腸直皮肉不相離者大腸結

大腸之見證也大指次指難用耳聾輝輝焯焯耳鳴

嘈嘈耳後肩臑肘臂外皆痛氣滿皮膚堅而不痛

經曰鼻隧以長以候大腸

靈樞曰天樞以下至橫骨長六寸半過則迴腸廣大

不滿則狹短

又曰大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒

即泄當臍而痛不能久立

又曰腹痛腸鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸也

又曰腸中寒則鳴殭泄腸中熱則出黃如糜

經曰大腸小腸為泄

又曰大腸乃肺之腑也

又曰腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發殭泄

仲景曰大腸有寒者多驚漉有熱者便腸垢

入門曰腸虛則鳴又寒氣相搏則為腸鳴

靈樞曰黃帝問曰胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷而

喜熱兩者不和何以調之岐伯對曰調此者飲食

衣服亦欲適寒溫寒無淅滄暑無出汗飲食熱無

瘍醫大全

卷三

大腸

李

顧氏秘書

灼灼寒無滄滄寒溫中適故氣將持乃不致邪僻

也

大腸熱宜瀉白湯大腸寒宜實腸散

脉經曰大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

補

杜蠟

粟殼

五倍子

肉豆蔻

瀉

蓮子

龍骨

訶黎勒

石斛

溫

枳殼

桃仁

麻仁

石斛

涼

乾姜

肉桂

吳茱萸

引經報使

葛根

升麻

白芷

石膏

下血屬大腸經

腫脹水腫有十種之分乍虛乍實為大腸水

瘍醫大全

卷三

大腸

李

顧氏秘書

湯醫大全目錄

卷四

腎經圖說

膀胱經圖說

心包絡經圖說

三焦經圖說

臟腑經絡穴道部位銅人圖

湯醫大全

卷四 目錄

顧氏秘書

湯醫大全卷四

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

腎錢之栢東陽
男 柳燮用和 全枝

內景圖說

腎 膀胱 心包絡 三焦

臟腑經絡穴道部位銅人圖

心經 小腸經

肝經 膽經

脾經 胃經

湯醫大全

卷四 內景

顧氏秘書

肺經 大腸經


腎經 膀胱經

心包經 三焦經

督脉經 任脉經

衝脉經 陽蹻脉

陰蹻脉 陽維陰維脉



腎

經曰腎者作強之官伎巧出焉

又曰腎者任也主骨而任周身之事故強弱係之

甲乙經曰腎者引也能引氣通於骨髓

厄言曰腎者神也妙萬物而言也

經曰腎附於脊之十四椎下其合骨也其榮髮也開

竅於二陰

難經曰腎有兩枚重一觔二兩藏精與志

華元化曰腎者精神之舍性命之根

腎有兩枚形如豇豆相並而曲附於脊之兩傍相去各一寸五分外有黃脂包裹各有帶二條上條繫於心下條趨脊下大骨在脊骨之端如半手許中有兩穴是腎經帶過處上行脊髓至腦中連於髓海

又曰命處於中兩腎左右開闔正如門中棖闔故曰命門一陽處二陰之間所以成坎也靜而闔涵養乎一陰之真水動而開鼓舞乎龍雷之相火靜為陽本陰為陽基也

又曰足少陰經腎

又曰是經常少血多氣

又曰酉時氣血注於腎

黃庭經人身神名曰腎神玄冥字育嬰

靈樞曰耳者腎之官也腎病者顛與顏黑耳枯焦

象川翁曰精生於穀然醴郁之味不能生精惟恬憺之味乃能補精生氣氣自生神

經曰精不足者補之以味

黃庭經曰急守精室勿妄泄閉而寶之可長活

經曰腎者主水受五藏六府之精而藏之原註腎為都會關司

之所非腎一
藏獨有精也

真詮曰五藏各有藏精並無停泊於其所蓋人未交
感精涵於血中未有形狀交感之後慾火動極而
周身流行之血至命門而變為精以泄焉故以人
所泄之精貯於器拌少鹽酒露一宿則復為血矣
經曰腎者在天之寒在地為水在人為腎在時為冬
在方為北在色為黑通竅於耳經曰北方水也萬
物所以合藏也又曰藏直下於腎腎藏骨髓之氣
也肺金為母肝木為子膀胱為腑心火主骨若久

傷醫大全

卷四 腎

四 顧氏秘書

立則傷骨司藏與志其類水其畜統其卦坎其性
智其華在髮其穀豆其應四時上為辰星其病在
骨其音羽羽者舒也陽氣將復萬物舒生也其數
六其臭腐其聲呻其氣吹其液唾在變動為慄其
味鹹其重鱗其果栗其菜藿下應腰腎而色黑然
黑欲如重漆光澤不欲如炭靈樞曰腎應骨密理
厚皮者三焦膀胱厚更腎主寒然寒則傷腎病主
為疝痘主黑陷若淫慾過度則傷腎濕氣勝則病
其病之候則面黑恐欠足寒逆氣腹痛殄泄而後

重膈下動氣腎實則腹膨脹而體重少氣不言骨
疼殄泄并小便少腎虛則欲墜下縮身面青皓白
顛顛開解下窻畏明心懸如饑胸痛引脊厥逆漫
冬而耳鳴腎絕則反目直視狂言遺尿腰折骨枯
然腎絕者四日死平脉則冬旺七十二日而脉沉
濡石石者沉濡而滑舉指來疾其賊脉則緩而大
并面大黃皆逆其危脉則石如轉索去如彈石

又曰腎又為氣之藏主納

又曰其日壬癸北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎腎

傷醫大全

卷四 腎

五 顧氏秘書

為陰中之少陰通於冬氣

入門曰腎主受水穀之精而至靜惟子時濁氣一動
而已

又曰腎與臍相對與腰相應腰者腎之外候

又曰腹為陰陰中之陰腎也腎為牝者陰也

又曰腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣

又曰骨者髓之府不能久立行則振掉骨將憊矣

又曰諸寒收引皆屬於腎

靈樞曰腎者主為外使之遠聽視耳好惡以知其性

又曰黑色小理者腎小虛理者腎大耳高者腎高耳後陷者腎下耳堅者腎堅耳薄不堅者腎脆耳好前居牙車者腎端正耳偏高者腎偏傾也

又曰腎小則藏安難傷腎大則善病腰痛易傷於邪腎高則苦背脊痛不可以俛仰腎下則腰尻痛或為狐疝腎堅則不病腰痛腎脆則善病消瘴腎端正則和利難傷腎偏傾則苦腰尻痛也

又曰呼出心與肺吸入腎與肝度汗出浴水則傷腎難經曰久坐濕地強力入水則傷腎

傷醫大全 卷四 腎 木 顧氏秘書

又曰藏各有一腎獨有兩者何也然腎兩者非皆腎也其左為腎其右為命門命門者精神之所舍元氣之所係也男子以藏精女子以繫胞故知腎有二也

入門曰命門非正藏三焦非正府也

靈樞曰邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩

經曰腎熱者色黑而齒枯

又曰脾傳之腎病名曰疝瘕少腹寬熱痛出白一名

蠱 註曰出白謂澀出白液也

又曰大骨枯槁大肉陷下肩髓內消動作益衰真藏來見期一歲死見其真藏乃予之期日註曰此腎之藏也期三百六十五日內死

難經曰外證面黑善恐數欠內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣小腹急痛泄如下重足脛寒而逆

靈樞曰腎氣虛則厥實則脹

又曰腎實則腹大脛腫喘咳身重寢汗出憎風虛則胸中痛大腹小腹痛清厥意不樂

入門曰腎虛則心懸如饑善恐

太乙真人曰戒色慾養精氣嚙津液養藏氣

無名子曰天一生水在人曰精地二生火在人曰神

經曰腎藏精與志志者專意而不移者也

又曰藏氣絕則神見於外無錫游氏子以酒色得疾常見兩女子衣服鮮麗冉冉至腰而沒醫者曰此腎神也腎絕則神不守舍故見於外也

靈樞曰恐懼而不解則傷精精傷則骨痠瘦厥精時自下

經曰其精管自兩腎脊骨間發來繞大腸之右從溺管下同出前陰而泄精

又曰水旺於冬相於秋廢於春囚於夏死於季夏其

王日壬癸王時人定夜半困日丙丁困時禺中死

日戊巳死時日昧昧乃日昃也

又曰腎俞在十四椎旁募在京門腰間季脇

又曰腎者主蟄封藏之本精之處也

又曰北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎二陰

前陰後陰

湯醫大全 卷四 腎 八 顧氏秘書

又曰腎也者其榮在髮髮無潤澤者骨先死

又曰雨氣通於腎

又曰精氣并於腎則恐

又曰腎惡燥

又曰鹹走血血病無多食鹹

又曰久立傷骨勞於腎也

又曰損其腎者益其精

又曰腎色黑欲如重漆色不欲如地蒼

又曰黑如烏羽者生如始者死始音皆

又曰腎熱者頤先赤

又曰腎熱病者先腰痛脛痠苦渴數飲身熱熱爭則

項痛而強筋寒且瘦足下熱不欲言其逆則項痛

貢貢澹澹然貢貢謂似急也澹澹謂似欲不足也戊巳甚壬癸大汗

氣逆則戊巳死刺足少陰太陽瘦音酸

又曰腎開竅於二陰實則脹滿

又曰腎著之病其人從腰以下冷腰重如帶五千錢

又曰腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛

又曰腎水者腹大臍腫腰重痛不得溺陰下濕如牛

湯醫大全 卷四 腎 九 顧氏秘書

鼻頭汗其人足逆寒大便皮堅

又曰腎病者色黑氣弱吸吸少氣兩耳苦聾腰痛時

時失精食減膝以下清其脉沉遲為可治宜補清冷

也

又曰腎瘡者令人灑灑腰脊痛宛轉大便難日胸胸

然手足寒刺足太陽少陰胸音胸目動也

又曰肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣容

於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿治主於肺肺移

熱於腎傳為柔痙痙音次惡也

又曰精脫者耳聾

仙經曰背後有三關腦後曰玉枕關夾脊曰龍膓關

水火之際曰尾閭關皆精氣往來之道路也若得

斗柄之機斡運則上下循環如天河之流轉也

謙甫曰夫腎藏天一以慳為事志意內治則精全而

澁若思想外淫房室太甚則固有淫佚不守輒隨

洩尿而下然本於筋痿者以宗筋弛縱也

經曰其不御女漏者或聞淫事或見美色思想無窮

所願不得或入房太甚宗筋弛縱發為筋痿而精

瘍醫大全

卷四 腎

十一 顧氏秘書

自出者謂之白淫宜乎滲漏而不止也

丹溪曰精滑專主濕熱宜知栢蠟蛤

經曰思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋

弛縱發為筋痿及為白淫

入門曰少時慾過陽脫而遺泄者宜金鎖正元丹

又曰慾心一動精隨念去凝滯久則莖中疼痛常如

欲小便然或小便而出或不從便出而自流者謂

之遺精比之夢遺尤甚

綱目曰一人虛而泄精脈
甚大用五倍子一兩白茯苓
苓二兩為丸服之良愈
遺脫之功效於龍蠟

又曰不因夢而自泄者謂之精滑皆相火所動也

東垣曰面色白而不澤悲愁欲哭脈按之空虛是為

脫精脫神宜峻補肝腎收斂補氣補益元陽

醫鑒曰童男陽盛情動於中志有所慕而不得遂成

夜夢而遺精慎不可補宜清心定志

張子和曰莖中作痛痛極則癢或陰莖挺縱不收或

出白物如精隨洩而下得之於房室勞傷及邪術

所使謂之白淫宜以降心火之劑下之

直誥曰精者人之神明者身之寶勞多則精散營統

瘍醫大全

卷四 腎

十一 顧氏秘書

則明消

經曰心火旺盛腎水不足心有所欲速於感動疾於

施泄

又曰腎在志為恐

又曰胃為恐 註曰胃熱則腎
氣微弱故為恐

又曰精氣并於腎則恐由心虛而腎氣并之故為恐

靈樞曰足少陰之脈病善恐

又曰恐懼而解則傷精

又曰恐懼者神蕩散而不收

又曰恐則氣下註曰上焦回禁下焦氣還故氣不行矣

子和曰肝藏血血不足則恐

綱目曰恐與驚相似然驚者為自不知也恐者為自知也蓋驚者聞響乃驚恐者自知如人將捕之狀及不能獨自坐卧必須人為伴侶方不恐或夜必用燈燭亦恐懼者是也

靈樞曰腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言經曰腎在志為恐恐傷腎思勝恐

丹溪曰恐傷腎者以思勝之以憂解之

傷醫大全

卷四 腎

三 顧氏秘書

經曰主閉藏者腎也司疎泄者肝也二藏皆有相火而其系上屬於心心君火也為物所感則易動則相火亦動動則精自走相火翁然而起雖不交會亦暗流而疎泄矣所以聖人只是教人收心養心其旨微矣

直指曰精之主宰在心精之藏制在腎氣虛不能管攝因小便而出者曰尿精因見聞而出者曰漏精入門曰初因君火不寧久則相火擅權精元一於走而不固甚則夜失連連日亦滑流不已宜坎離丸

知栢用童便九蒸九晒九露地黃煎膏先煎湯下又曰夢遺不可作虛冷亦有經絡熱而得之

脈經曰男子脈微弱而澀為無子精氣清冷也

又曰瀆脈為精竭血枯

又曰瀆為精竭血枯

脈訣曰遺精白濁當驗與尺結扎動緊二證之的

醫鑑曰微瀆傷精

戴氏曰夢遺精滑皆相火所動久則有虛而無寒也

又曰夢遺日久氣下陷宜升提腎氣以歸原

傷醫大全

卷四 腎

三 顧氏秘書

本事曰腎氣閉即泄精

素問曰腎者作強之官伎巧出焉又曰腎藏精蓋腎能攝精氣以生育人倫者也或育或散皆主於腎今腎氣衰則一身之精氣無所管攝故妄行而出不時

綱目曰夢遺屬鬱滯者居大半庸醫不知其鬱但用瀉劑固脫殊不知愈澀愈鬱其病反甚

仲景曰失精家小腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛

芤遲為清穀亡血失精男子失精女子夢交

經曰腎氣通於耳腎和則能聞五音矣

靈樞曰有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷

腎

經曰病在腎愈在春春不愈甚於長夏長夏不死持

於秋起於冬

又曰腎病者愈在甲乙甲乙不愈甚於戊巳戊巳不

死持於庚辛起於壬癸

又曰腎病夜半慧四季甚下晡靜

又曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也

傷醫大全

卷四 腎

丙

顧氏秘書

腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之

又曰腎病禁犯焯煖熱食温炙衣

綱目曰腎本無實不可瀉

錢氏曰只有補腎地黃元無瀉腎之藥

綱目曰左腎屬水水不足則陰虛宜六味地黃丸右

腎屬火火不足則陽虛宜八味丸加減八味丸

又曰六味地黃丸血虛陰衰熟地黃為君精滑山茱

萸為君小便若多或少或赤或白茯苓為君小便

淋澀澤瀉為君心氣不足丹皮為君皮膚乾澀山

藥為君

入門曰小便清利脉沉遲是冷氣歸腎小便赤澀脉

沉數是熱氣歸命門是腎與命門脉同者謂其所

受之病同歸於膀胱一府也

經曰少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉塞上下不通

而終矣

金匱真言論曰冬氣者病在四肢腎之應也

靈樞曰足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而

濡骨髓者也故骨不濡則肉不能着也骨肉不相

傷醫大全

卷四 腎

壬

顧氏秘書

親則肉軟却肉軟却故齒長而垢髮無澤髮無澤

者骨先死戊日篤巳日死

仲景曰溲便遺失狂言目反直視者此為腎絕也脉

浮而洪身汗如雨喘而不休水漿不下形體不仁

乍靜乍亂者此為命門絕也

脉經曰腎絕四日死何以知之齒為暴枯面為正黑

目中黃色腹中欲折自汗如流水一云人中平十

日死

夢與鬼交而泄精名曰夢遺專主於熱

又曰腎欬之狀則腰背相引而痛甚則欬涎逆氣也

又曰腎風之狀多汗惡風面疾然浮腫痲音非 豐厚貌脊痛

不能正立其色始隱曲不利診在肌上其色黑

又曰腎痺者善服尻以代踵脊以代頭如人垂首向地尋物貌

又曰腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬虛則夢見舟船

溺人厥氣客於腎則夢臨淵没居水中

又曰是動病則饑不欲食面黑如地色咳唾則有血

喝喝而喘坐而欲起目眩眩如無所見心如懸病

饑狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是謂骨

傷醫大全

卷四 腎

七

顧氏秘書

厥是主腎

又曰所生病者口熱舌乾咽腫上氣隘乾及痛煩心

心痛黃疸腸癰脊臂股內後廉痛痿厥嗜臥足下

熱而痛盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小

於人迎也

又曰腎主寒自病則足脛寒而逆人之五藏惟腎無

實小兒痘瘡變黑陷是腎水尅退心火多不治也

又曰心乘腎微邪內熱不惡寒桂枝丸

又曰肺乘腎虛邪喘嗽皮澁而寒白部丸

又曰肝乘腎實邪拘急氣搖身寒理中丸

又曰脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸

人鏡經曰五行之間惟腎之一臟母盛而子反受邪

是物之性有不可一槩論者肺腎是也何則肺屬

金應乎皮毛所主者氣腎屬水主乎骨髓所藏者

精氣之輕浮能上而不能下精之沉重能下而不

能上此物性之自然今肺盛乃熱作也氣得熱而

上蒸則肺不能下生於腎則腎受邪矣急以涼藥

解之使藏氣溫和自能下生於腎此腎病必先求

傷醫大全

卷四 腎

七

顧氏秘書

之於肺若肺和而腎忽受病不過脾濕相刑所以

有解肺熱去脾邪二藥若脾肺俱和而腎自病亦

當察其本臟虛實而治之

足少陰腎引經藥歌 酉腎猪膚猪苓白茯苓牡丹

皮澤瀉肉桂阿魏丁香山黃肉吳茱萸黃蘗砂仁

烏藥敗醬天門冬牡蠣停豆豉桔梗五味子元參

并獨活益智仁檀香甘草地骨皮或殊砂行下行

知母附子地黃地榆蒼木右腎沉香黃芪益附稱

難經曰冬脉石

經曰勞而動血者屬腎

又曰若喉中常有血腥一咯血即出或鮮或紫或細

屑者為咯血或鮮紅隨唾而出為唾血唾中帶血

咯出有血或血絲皆出於腎

又曰腫脹水腫有十種之分腰痛足冷為腎水總而

論之腎虛不能行水脾虛不能制水

又曰諸髓者皆屬於腦

又曰黑如烏羽者生黑如煤炭者死

又曰腎則夢腰脊解軟虛則夢涉水恐懼

傷醫大全

卷四 腎

本 顧氏秘書

又曰聲啞不出寒厥不回二便閉不能通泄不能禁

者腎臟氣絕不治證

又曰耳聾絕無聞骨痛之極者腎之經病危證

補 地黃 山茱肉 芡實 山藥
枸杞 桑螵蛸 牡蠣 杜仲

牛膝 龍骨 瑣陽

瀉 知母 龜板


黃柏 鹿茸 破故紙

溫 附子 沉香 膩膈

涼 知母 牡丹皮 地骨皮

引經報使 獨活 肉桂

下聯前陰溺之所出



傷醫大全

卷四 膀胱

本 顧氏秘書

膀胱

經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣

又曰膀胱者言其橫於前陰之旁以通水也膀胱者言其

質之薄而明也合而言之以其由虛而實旁通水

道通身虛鬆可以畜水漸漬而滲入胞中胞滿而

溺出也

又曰膀胱當十九椎居腎之下大腸之前有下口無

上口當臍上一寸水分穴處為小腸下口乃膀胱

上際水液由此別迴腸隨氣泌滲而入其出其入

皆由氣化入氣不化則水歸大腸而為泄瀉出氣不化則閉塞下竅而為癰腫後世諸書有言其有上口無下口有言上下俱有口者皆非

難經曰膀胱重九兩二銖縱廣九寸盛溺九升九合

口廣二寸半

又曰足太陽經膀胱

又曰是經多血少氣

又曰申時氣血注於膀胱

靈樞曰膀胱在小腹之內

傷醫大全

卷四 膀胱

辛 顧氏秘書

又曰鼻孔在外膀胱漏泄

難經曰膀胱以虛受水為津液之府有上口而無下

口得氣海之氣施化則溲便注瀉氣海之氣不足

則秘澁不通

經曰水液自小腸泌別汁滲入膀胱之中胞氣化之

而為尿以泄出也

東垣曰膀胱雖為津液之府至於受盛津液則又有

胞而居膀胱之中

類纂曰膀胱者胞之室也

經曰水泉不止者膀胱不藏也得守者生失守者死甲乙經曰膀胱者橫也膀胱者廣也言其體橫廣而短也經曰膀胱脹者小腹滿而氣癢

又曰厥氣客於膀胱則夢遊行

又曰膀胱有熱則淋閉膀胱不約為遺溺溺音尿謂睡中遺尿也

又曰膀胱津液之府水注出之然足三焦脉實約下

焦而不通足三焦脉虛不約下焦則遺溺也膀胱

又名足三焦也

傷醫大全

卷四 膀胱

辛 顧氏秘書

又曰是動病則衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折

脾不可以曲脘如結膈如裂是為蹠厥是主筋

又曰所生病者痔瘡狂顛疾頭顛項痛目黃淚出軌

鯁項背腰尻脛膈脚背痛小指不用盛者人迎大

再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足太陽膀胱引經藥歌 申勝澤瀉滑石茵陳肉桂

猪苓白茯苓羌活麻黃黃蘗荊子親行下大黃

并白木澤藜本羌防已藥同因

膀胱實熱小便赤澀虛寒小便數或漏精精冷厚稠如米泔

靈樞曰腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚麗理薄皮者三焦膀胱薄疎腠理者三焦膀胱緩皮急而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而麗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也

又曰膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不得肩熱若脉陷及足小指外廉脛踝後皆熱

入門曰膀胱病者熱結下焦小腹苦滿胞轉小便不利令人發狂冷則濕痰上溢而為多唾小便淋漓

瘍醫大全 卷四 膀胱 幸 顧氏秘書

或遺尿

又曰膀胱虛則小便不禁宜既濟丸加減八味丸倍

山萸加烏藥益智故紙實則小便不通宜益元散

葵子湯葵子赤茯苓枳實木通黃芩甘草五苓散猪苓車前子瞿麥滑石姜引

膀胱主藥也

內經曰膀胱不利為癃不約為遺尿

又曰遺尿狂言目反直視為膀胱絕也

又曰膀胱之脉為足太陽其終也戴眼反折瘈瘲其色白絕汗乃出絕汗出則死矣

經曰太陽司天寒淫所勝則病心澹澹大動是寒傷心也

又曰腫脹水腫有十種之分腹急肢瘦為膀胱水

補 橘核 龍骨 益智仁


瀉 芒硝 澤瀉 車前子

溫 烏藥 芍藥

涼 生地 甘草梢

引經報使 藜蘆 羌活 上行 黃柏 下行

瘍醫大全 卷四 膀胱 幸 顧氏秘書



傷醫大全

卷四 心包

手

顧氏秘書

心包絡

經曰包絡者護衛心主不使濁氣干之正猶君主有宮城也

又曰心包絡一經難經言其無形

滑伯仁曰心包絡一名手心主以藏象校之在心下

橫膜之上豎膜之下其與橫膜相粘而黃脂裹者

心也脂膜之外有細筋膜如絲與心肺相連者心

包也此說為是言無形者非

又按靈蘭秘典論十二官獨少心包一官而多膻中

者臣使之官喜樂出焉一段今攷心包藏居膈上經始胸中正值膻中之所位居相火代君行事實臣使也此一官即心包無疑矣

又曰手厥陰經心包絡

又曰是經多血少氣

又曰戌時氣血注於心包絡

補 地黃

瀉

溫

枳殼 烏藥 肉桂

傷醫大全

卷四 心包

手

顧氏秘書

涼 梔子

引經報使 柴胡 青皮 川芎

靈樞曰十二原以心包經大陵穴為心之原明真心不受邪故知手心主代君火也


又曰是動病則手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支

滿心中澹澹大動面赤喜笑不休目黃是主心包

手厥陰心包絡引藥歌 戊包敗醬柴胡 白朮 牡丹

皮熟地與沙參更有下行經絡藥青 皮 柴胡 熟地

可相親



傷醫大全 卷四 三焦 三焦 顧氏秘書

三焦

經曰三焦者決瀆之官水道出焉

中藏經曰三焦者人之三元之氣也主升降出入總領五藏六府營衛經絡內外左右上下之氣三焦通則內外左右上下皆通其於周身灌體和內調外營左養右導上宣下號曰中清之府莫大於此也形色最赤總護諸陽非無狀而空有名者也

經曰手少陽經三焦

又曰是經少血多氣

又曰亥時氣血注於三焦

靈樞曰上焦如霧中焦如瀝下焦如瀆

入門曰上焦主出陽氣溫於皮膚分肉之間若霧露之漑焉故曰上焦如霧中焦主變化水穀之味其精微上注於肺化而爲血行於經隧以榮五藏身身故曰中焦如瀝下焦主通利溲便以時傳下出而不納開通秘塞故曰下焦如瀆

又曰心肺若無上焦何以宗主榮衛脾胃若無中焦何以腐熟水穀肝腎若無下焦何以疎決津液無

傷醫大全 卷四 三焦 三焦 顧氏秘書

形而有用主持諸氣三焦者水穀之道路氣之所終始也

正傳曰三焦指腔子而言包含乎腸胃之總司也胃中育膜之上曰上焦育膜之下臍之上曰中焦臍之下曰下焦總名曰三焦

東垣曰上中下三焦通爲一氣衛於身也三焦非正府也無形而有用

入門曰三焦爲丙火之府故其發也爲無根之相火經曰下焦溢爲水

經曰手少陽三焦經與手厥陰為表裏三焦者水穀
之道路氣之所終始也上焦者在心下下兩主內
而不出其治在膻中直兩乳陷者是中焦者在胃
中脘當臍上四寸不上不下主腐熟水穀其治在
臍傍下焦者在臍下當膀胱際也主分別清濁出
而不內以傳道也其治在臍下一寸焦原也三焦
者三原之氣也內音納 上焦主出陽氣溫於皮
膚分肉之間若霧露之溉焉中焦
主變化水穀之味為血以榮五藏六府下焦主通
利溲以時傳下故曰出而不內 溲音蓐
九墟云中焦亦並於胃中出上焦之後此腎受氣以

傷醫大全

卷四 三焦

未

顧氏秘書

別糟粕蒸津液化其精微上注於肺脉乃化而為
血以奉生身故得獨行於經隧命曰榮氣故言中
焦如漚也仲景曰下焦不和清便重下大便數難
臍腹築痛故曰三焦者寄與胸中
脉訣云三焦無狀空有名愚謂三焦者三原之氣也
實非無形但不專主一臟耳既為元氣別使又為
傳化之腑由十二經始於中焦常與衛氣俱行故
扁鵲指為水穀之道路氣之所終始也上焦出於
胃上口並咽以上貫膈布胸走腋而至太陰之分

中焦亦並胃中出上焦之後下焦別迴腸注於膀
胱而滲入焉手厥陰心包乃其合也布絡三焦而
三焦之經則又散絡心包苟無其形將何所憑而
包絡從何所附以傳化焉三元參贊云其體有一
脂膜如掌狀與膀胱相對有白脉自其中出夾脊
而上貫腦竊謂如霧如漚喻其明之薄處如瀆云
者則又指夫滲入膀胱處也一名外府一名虛臟
信然晞范曰此三焦有名無形正臟腑有餘不盡
之義苟止心肝脾肺腎而無三焦所寄之腑是人

傷醫大全

卷四 三焦

未

顧氏秘書

身與天地為二矣
又曰藏府俱五者謂手心主非藏三焦非府也以臟
腑俱六者合手心主與三焦也難經曰臟惟有五
腑獨有六者何也所謂腑有六者謂三焦也有原
氣之別焉主持諸氣有名而無形其經屬手少陽
此外腑也故言府有六
又云十二經五藏六府十一耳其一經者何等經也
然一經者手少陰與心主別脉也心主與三焦為
表裏俱有名而無形故言經有十二也緣不專主

一臟故言有名無形正理論云三焦者有名無形
上合於手心主下合於右腎遂有命門三焦表裏
之說殊不知包絡相火附名右腎夫人之臟腑一
陰一陽自有定耦豈得一經而兩配之理所謂上
合手心主正言其為表裏下合右腎者正言其與
包絡相火相合又以三焦為原氣之別使也知此
則知命門與腎通三焦無兩配矣

脈訣曰右尺脈浮則風邪客於下焦大便熱秘浮而
虛元氣不足沉則水病腰脚痛沉細下痢臍寒痛
傷醫大全 卷四 三焦 圭 顧氏秘書

遍遲則寒瀉小腹冷腰脚重數則小便赤大便秘
浮數表熱沉數裏熱滑則相火炎盛夢泄陰虛婦
人和滑則為有孕澇則大便澁津液衰其餘診法
與腎脈同

又曰是動病則耳聾渾渾焯焯噎腫喉痺是主氣
手少陽三焦引經藥歌 亥焦地骨皮川芎黃芩白
木附子毒皮柴胡熟地逢白虎細辛皆在內青柴
下走共川芎

又曰一切治法倣心經用

海藏曰上焦如霧霧不散則為喘滿此出而不納也
中焦如漚漚不利則為留飲留飲不散久為中滿
此上不能納下不能出也下焦如瀆瀆不利則為
腫滿此上納而下不出也

靈樞曰鼻柱中央起三焦乃約
又曰三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢
則水留即為脹

又曰小腹痛腫不得小便邪在三焦約也
經曰三焦為上中下水穀之道路其病通利大小便
傷醫大全 卷四 三焦 圭 顧氏秘書

為主

補 黃芪 甘草

瀉 澤瀉

溫 附子

涼 石膏

引經報使 柴胡 青皮 川芎

論臟腑經絡穴道部位始知瘡瘍何經受病


凡視瘡瘍當知部位屬於何臟何腑然後醫治用藥自無錯悞矣謹照銅人腧穴針灸圖經繪圖詳註俾學者留心參攷施治有當耳

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之岐伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處雷公問曰禁服之言凡刺之理經脈為始願聞經脈之始生帝荅曰經脈者所以決死生處百病調虛實不可不通矣

傷醫大全 卷四 穴道 三 顧氏秘書

足少陰心經

左右各九穴



傷醫大全 卷四 穴道 三 顧氏秘書

歌曰

手少陰屬心經少衝少府與神門陰都通里近靈道少海青靈肘內尋極泉腋下筋間動九穴雙雙須認真

手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上俠咽系目其直者復從心系却上肺出腋腋下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌內廉循小指之內出其端是動則病噤乾心痛渴而欲飲是

謂臂厥是主心所生病者目黃脇痛臍臂內後廉痛厥掌中熱也

少衝二穴 一名經始在手小指內

少府二穴 在手小指本節

神門二穴 一名兌衝一名中

陰郄二穴 在掌後兌骨端

通里二穴 在腕後

靈道二穴 在掌後一寸五分

少海二穴 一名曲節在肘

傷醫大全 卷四 穴道 頤氏秘書

青靈二穴 在肘上

極泉二穴 在臂內腋筋

手太陽小腸經



左右各十九穴

傷醫大全 卷四 穴道 頤氏秘書

歌曰

手太陽小腸十九穴路從少澤步前谷後谿之隆道
遊腕骨觀陽谷養老之宗得支正於小海逐肩貞
以相從值臑膈兮遇天宗乘乘風兮曲垣中肩外
俞兮肩中俞啓天窗兮見天容匪由觀膠曷造聽
宮

手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中
直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外
候廉出肩解繞肩胛交肩入缺盆向腋絡心循

咽下膈抵胃屬小腸其支別者從缺盆循頸上頰
至目銳眦部入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目
內眦斜絡於額是動則病噎痛頰腫不可回顧肩
似拔膈似折主腋所主病者耳聾目黃頰頰腫肩
膈肘臂外後廉痛也

少澤二穴 一名少吉在小指之端去爪甲下一分

前谷二穴 在手小指外側在節前陷中

後谿二穴 在手小指外側本節後陷中

腕骨二穴 在手外側腕前起骨下陷中

湯醫大全

卷四 穴道

美 顧氏秘書

陽谷二穴 在手外側腕中兌骨下陷中

養老二穴 在後一寸陷中在後骨上一空

支正二穴 在腕後五分別走少陰

小海二穴 在肘內大骨外去肘端五分陷中

肩貞二穴 在肩曲胛下兩骨解間

臑腧二穴 在俠肩後大骨下胛上廉陷中

天宗二穴 在乘風後大骨下胛中

秉風二穴 在天膠外肩上小網後舉臂有空

曲垣二穴 在肩中央曲胛陷中

肩外俞二穴 在肩胛上廉去脊三寸

肩中俞二穴 在肩胛內廉去脊三寸

天窓二穴 一名窓龍在頸大筋前曲頰下扶突後動脈陷中

天容二穴 在耳下曲頰後

額膠二穴 在面頰骨下廉

聽宮二穴 在耳中珠子大如小豆是

湯醫大全

卷四 穴道

美 顧氏秘書

足厥陰肝經



左右各十三穴

傷醫大全

卷四 穴道

表 顧氏秘書

歌曰

足厥陰一十三穴終起大敦於行間循太衝於中封
 蠡溝中都之會膝間曲泉之宮襲陰包於五里陰
 廉乃發尋半矢於章門期門可攻

足厥陰之脉起於大指聚毛之上循足跗上廉去內
 踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膈內廉循股
 入陰毛中環陰器抵小腹俠胃屬肝絡膽上貫膈
 布脅肋循喉嚨之後上入頰頰連日系上出額與
 督脉會於巔其支者從日系下頰裏環唇內其支

者復從肝別貫膈上注肺是動則病腰痛不可俛
 仰丈夫癢疝婦人小腹脹甚則盛乾面脫色是主
 肝所生病者胃滿嘔逆洞泄狐疝遺溺癰閉

大敦二穴 在足大指端去

行間二穴 在足大指間

太衝二穴 在足大指本節後二寸或一寸半動脈中

中封二穴 在足內踝前一寸仰足而取之

蠡溝二穴 在內踝上五寸

中都二穴 在內踝上七寸筋骨中

膝關二穴 在犢鼻下二寸陷中

曲泉二穴 在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝得之在膝橫紋頭是

陰包二穴 在膝上四寸股內廉兩筋間

五里二穴 在氣衝下三寸陰股中動脈

陰廉二穴 在羊矢下去氣衝二寸

章門二穴 一名長平一名脊膠在大橫外直臍端

期門二穴 在不容傍一寸五分直乳第二肋端

傷醫大全

卷四 穴道

表 顧氏秘書

臨泣二穴	在足小指次指本節後
邱墟二穴	在足外踝下如
懸鐘二穴	在外踝上三寸
陽輔二穴	在外踝上四寸輔骨
光明二穴	在外踝上五寸
外邱二穴	在外踝上七寸
陽交二穴	一名別陽在
陽陵泉二穴	在膝下一寸
陽關二穴	在陽陵泉上三寸
中瀆二穴	在髌骨外
環跳二穴	在髌中
居膠二穴	在章門下
維道二穴	在章門下
五樞二穴	在帶脉下三寸水
帶脉二穴	在季肋下
京門二穴	一名氣府一名氣膈在
日月二穴	在期門下五分
輒筋二穴	在腋下一寸著竹

淵腋二穴	在腋下一寸宛宛中
肩井二穴	在肩前上陷解中缺盆上大
風池二穴	在顛頤後
腦空二穴	一名顛頤在承靈後一寸
承靈二穴	在正營後
正營二穴	在正營後一寸
目窓二穴	一名至榮在
臨泣二穴	當目上一寸
陽白二穴	在肩上一寸
本神二穴	在曲差傍一寸
完骨二穴	在耳後入
竅陰二穴	在完骨上
浮白二穴	在耳後一寸
天衝二穴	在耳後二寸
率谷二穴	在耳上入
曲鬢二穴	在耳上髮際曲
懸釐二穴	在曲周上
懸顛二穴	在曲周上

頷厭二穴 在曲周下
 客主人二穴 一名上廉 關在耳前上
 聽會二穴 在耳前陷中
 瞳子膠二穴 在目外眥五分

傷醫大全


卷四 穴道

畢

頤氏秘書

足太陰脾經

左右各二十一穴



傷醫大全

卷四 穴道

畢

頤氏秘書

歌曰

足太陰脾中州二十一穴隱白遊起大都兮瞻太白
 訪公孫兮至商邱越三陰之交而漏谷地機可即
 步陰陵之泉而血海箕門是求入衝門兮府舍軒
 豁解腹結兮大橫優游腹哀食竇兮接天谿而同
 派胸鄉周榮兮綴大包而如鈎
 足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過覈
 骨後上內踝前廉上腓內循胫骨後交出厥陰之
 前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈俠咽連

舌本散舌下其支別者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則吐胃腕痛腹脹善噫得後出餘氣則快然而衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧瘡瘰洩水下黃疸不能卧強欠股膝內腫厥足大指不用也

隱白二穴

在足大指內側端去爪甲角如韭葉

大都二穴

在足大指本節後陷中

太白二穴

在足內側核骨下陷中

傷醫大全

卷四 穴道

吳 顧氏秘書

公孫二穴

在足大指本節之後一寸

商邱二穴

在足內踝下微前陷中

三陰交二穴

在內踝上三寸骨下陷中

漏谷二穴

在內踝上六寸骨下陷中

地機二穴

一名脾舍在別走上寸空膝下五寸

陰陵泉二穴

在膝下內側輔骨下陷中

血海二穴

在膝膕上內廉白肉際二寸

箕門二穴

在魚腹上越筋間陰股內動脈

衝門二穴

去大橫五寸在府舍下橫骨端

府舍二穴

在腹結下三寸

腹結二穴

一名腸瘕在大橫下三分

大橫二穴

在腹哀下三寸五分

腹哀二穴

在日月下三寸五分

食竇二穴

在天谿下一寸六分

天谿二穴

在胃鄉下一寸六分

胃鄉二穴

在周榮下一寸六分

周榮二穴

在中府下一寸六分陷中

大包二穴

在淵腋下三寸九肋間


傷醫大全

卷四 穴道

吳 顧氏秘書

左右各四十五穴

足陽明胃經



瘍醫大全

卷四 穴道

完

顧氏秘書

歌曰

足陽明四十五厲兌內庭陷谷通衝陽解谿與豐隆
 下巨條口各不同上巨三里犢鼻中梁邱陰市伏
 兔叢髀關與氣衝歸來水道重大巨外陵別有容
 天樞滑肉太乙宮關門梁門承滿充不容乳根與
 乳中膺窻屋翳庫房洪氣戶缺盆氣舍冲水突人
 迎大迎逢地倉乃交會之宮巨髀四白鼻目從承
 泣頰車下關中額角髮際頭維終
 足陽明之脉起於鼻交頰中下循鼻外入上齒中還

出俠口環唇下交承漿却循頰後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顛其支別者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直行者從缺盆下耳內廉下俠臍入氣衝中其支者起胃下口循腹裏下至氣衝中而合以下髀關抵伏兔下入膝膕中下循胫外廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端是動則病悽悽然振寒善伸數欠顏黑病主惡人與火聞木音則

瘍醫大全

卷四 穴道

完

顧氏秘書

惕然而驚心欲動獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走責嚮腹脹是為肝厥是主血所生病者狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎唇腫頸腫喉痺腹水腫膝膕腫痛循膺乳衝股伏兔胫外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善饑溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿盛也

厲兌二穴

在足大指次指端去爪甲如韭葉

內庭二穴

在足大指次指外間陷中

陷谷二穴 在足大指次指之間本

衝陽二穴 一名會宗在足趺上五寸

解谿二穴 在衝陽後一寸

豐隆二穴 在外踝上八寸下廉

下巨虛二穴 一名下廉在

條口二穴 在上廉

上巨虛二穴 一名上廉在

三里二穴 在膝下三寸胫骨

犢鼻二穴 在膝下胫骨

梁丘二穴 在膝上二寸

陰市二穴 一名陰鼎在膝

伏兔二穴 在膝上六寸

髀關二穴 在膝上伏兔

氣衝二穴 在歸來下鼠蹊

歸來二穴 在水道

水道二穴 在大巨

大巨二穴 在外陵

外陵二穴 在天樞

傷醫大全

卷四 穴道

幸

顧氏秘書

天樞二穴 一名長谿一名谷門在背

滑肉門二穴 在太

太乙二穴 在關門

關門二穴 在梁門

梁門二穴 在承滿

承滿二穴 在不容

不容二穴 在幽門傍相去各

乳根二穴 在乳中下一寸四

乳中二穴 常乳

膺窻二穴 在屋翳下

屋翳二穴 在庫房下一

庫房二穴 在氣戶下一

氣戶二穴 在巨骨下膺兩傍相

缺盆二穴 一名天蓋在肩

氣舍二穴 在頸直人迎下

水突二穴 一名水門在頸大筋

人迎二穴 一名五會在頸大筋動應手俠

大迎二穴 在曲頰前一寸五分以候五臟氣

傷醫大全

卷四 穴道

幸

顧氏秘書

地倉二穴 一名胃維俠口吻傍四

巨膠二穴 俠鼻傍八分

四白二穴 在目一寸

承泣二穴 在目下七分

頰車二穴 在耳下曲

下關二穴 在上關下

頭維二穴 在額角髮際本

傷醫大全

卷四 穴道

華 顧氏秘書

手太陰肺經

左右各十一穴



傷醫大全

卷四 穴道

華 顧氏秘書

歌曰

手太陰肺十一穴 少商魚際指端論 太淵經渠并列

欽孔最尺澤腕肘行 俠白天府與雲門 此中玄妙

理中府最堪尋

手太陰之脈起於中焦 下絡大腸還循胃口 上膈屬

肺從肺系橫出腋 下循臑內行少陰心主之前

下肘中循臂內上骨 下廉入寸口上魚循魚際出

大指之端其支者 從腕後直出次指內廉出其端

是動則病肺脹滿 膨膨而喘欬 欬益中痛甚則交

兩手而督是為臂厥主肺所生病者咳嗽上氣喘
 渴煩心胃滿膈臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則
 肩背痛風汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛
 寒少氣不足以息溺色變凡十二經之病盛則瀉
 之虛則補之熱則疾之寒則留之陷則灸之不盛
 不虛以經取之其十二經皆倣此也

少商二穴 在手大指端內側

魚際二穴 在手大指本節後內側散腕中

太淵二穴 在掌後陷中

傷醫大全

卷四 穴道

書

顧氏秘書

經渠二穴 在寸口脈中

列缺二穴 在腕後一寸五分

孔最二穴 在腕上七寸

尺澤二穴 在肘約紋中

俠白二穴 在天府下五分

天府二穴 在腋內廉一寸

雲門二穴 在巨骨下俠氣戶傍各三寸陷中動脈應手舉臂取得之

中府二穴 在雲門下一寸乳上三肘間動脈應手

左右各二十穴

手陽明大腸經



傷醫大全

卷四 穴道

書

顧氏秘書

歌曰

手陽明大腸二十穴循商陽二間三間而行歷合谷
 陽谿之俞過偏歷溫溜之濱下廉上廉三里而近
 曲池肘髎五里之程臂臑肩髃上於巨骨天鼎紆
 手扶突禾髎唇連迎香鼻迫

手陽明之脈起於大指次指之端循指上廉出合谷
 兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉循
 臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上
 下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支別者從缺盆上

頸貫頰下入齒縫中還出俠口交人中左之右右
之左上俠鼻孔是動則病齒痛頰腫主津所生病
者目黃口乾齟齬喉痺肩前臑痛大指次指痛不
用也

商陽二穴 一名絕陽在手大指次指

二間二穴 一名間谷在手大指次指

三間二穴 一名少谷在手大指次指

合谷二穴 一名虎口在

陽谿二穴 一名中魁在腕中

傷醫大全 卷四 穴道 美 顧氏秘書

偏歷二穴 在腕中

溫留二穴 在腕後小土

下廉二穴 在輔骨下去

上廉二穴 在三里

三里二穴 在曲池

曲池二穴 在肘外輔骨屈

肘髎二穴 在肘大骨

五里二穴 在肘上三

臂臑二穴 在肘上

肩髃二穴 在肩端

巨骨二穴 在肩端上行

天鼎二穴 在頸缺盆直

扶突二穴 在氣舍後

禾髎二穴 一名長頰直鼻孔

迎香二穴 一名衝陽在禾

傷醫大全 卷四 穴道 美 顧氏秘書

足少陰腎經

左右二十七穴

湯醫大全

卷四 穴道

素 顧氏秘書



足少陰兮二十七湧泉流於然谷太谿大鍾兮水泉
 緣照海復溜兮交信續從築賓兮上陰谷掩橫骨
 兮大赫麓氣穴四滿乎中注育俞上通乎商曲守
 石關兮陰都寧閉通谷兮幽門肅步郎神封而靈
 墟存神藏或中而膺府足
 足少陰之脉起於小指之下斜趨足心出然谷之下
 循內踝之後別入眼中上膈內出膈內廉上股內
 後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入

肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胸中
 是動則病饑不欲食面黑如漆柴欬唾則有血噦
 喝而喘坐而欲起目眩暈如無所見心如懸若饑
 氣不足則善恐心惕惕如人將捕是為骨厥是主
 腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣噤乾及痛煩心
 心痛黃疸腸澼春臂股內後廉痛痿厥嗜卧足下
 熱而痛也

涌泉二穴

一名地衝在足心陷
 中屈足卷指宛宛中

然谷二穴

一名龍淵在足踝
 前大骨下陷中

湯醫大全

卷四 穴道

素 顧氏秘書

太谿二穴

在足內踝後跟
 骨上動脈陷中

大鍾二穴

在足中

照海二穴

在足內踝下
 陰驕脈所生

水泉二穴

去太谿下一
 寸在內踝下

復溜二穴

一名伏白一名昌陽
 在足內踝上二寸

交信二穴

在內踝上二寸
 少陰前太陰後

築賓二穴

在內踝上膈分
 中陰維之却

陰谷二穴

在膝內輔骨後
 大筋下小筋上

橫骨二穴

在大赫
 下一寸

大杼在兩旁天柱玉枕各相當絡却通天方承光
五處曲差攢竹處睛明五脉會三陽

足太陽之脉起於目內眥上額交巔上其支別者從

巔至耳上角其直行者從巔入絡腦還出別下項

循肩膊內俠脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱其支

別者從腰中下貫臀入膕中其支別者從膕內左

右別下貫脾俠脊內過髀樞循髀外後廉下合膕

中下貫膕內出外踝之後循京骨至小指外側端

是動則病頭痛似脫項似拔脊痛腰似折髀不可

湯醫大全 卷四 穴道 李 顧氏秘書

回轉膕如結膕如裂是為踝厥是主筋所生病者

痔瘡癩疾頭項痛目黃淚出眇衄項背腰尻膕膕

脚皆痛小指不用也

至陰二穴 在足小指外側去

通谷二穴 在足小指外側

束骨二穴 在足小指外側

京骨二穴 在足外側大骨

金門二穴 在足外側

申脉二穴 在足外側下陷中

僕參二穴 一名安邪在

崑崙二穴 在足外踝後

跗陽二穴 在足外踝中

飛陽二穴 一名厥陽在

承山二穴 一名魚腹一名傷山一名

承筋二穴 一名膕腸在膕

合陽二穴 在膝約中

委中二穴 在膕中約

委陽二穴 在承扶下六

湯醫大全 卷四 穴道 李 顧氏秘書

浮郄二穴 在委陽

殷門二穴 在肉郄

承扶二穴 一名肉郄一名陰關一名皮部

秩邊二穴 在第三十一椎下

胞肓二穴 在第十九椎下

志室二穴 在第十四椎下

育門二穴 在第十三椎下

胃倉二穴 在第十二椎下

意舍二穴 在第十一椎下

陽綱二穴	在第十椎下兩傍各三寸
魂門二穴	在第九椎下兩傍各三寸
膈關二穴	在第七椎下兩傍各三寸
諛諛二穴	在肩胛內廉俠脊第六椎下兩傍各三寸
神堂二穴	在第五椎下兩傍各三寸
膏盲二穴	在第四椎下近五椎下兩傍各三寸
魄戶二穴	在第三椎下兩傍各三寸
附分二穴	在第五椎下兩傍各三寸
會陽二穴	在陰尾尻骨間兩傍督脈所發
上髎二穴	在第一空腰際下夾脊陷中
次髎二穴	在第二空夾脊陷中
中髎二穴	在第三空夾脊陷中
下髎二穴	在第四空夾脊陷中
白環二穴	在二十一椎下兩傍相去各一寸五分
中膂內膂二穴	在二十一椎下兩傍相去各一寸五分
膀胱膂二穴	在十九椎下兩傍相去各一寸五分
大腸膂二穴	在十六椎下兩傍相去各一寸五分
小腸膂二穴	在十八椎下兩傍相去各一寸五分

傷醫大全

卷四 穴道

李四 顧氏秘書

腎膂二穴	在第十四椎下兩傍相去脊中各一寸五分
三焦膂二穴	在第十三椎下兩傍相去脊中各一寸五分
胃膂二穴	在第十二椎下兩傍相去脊中各一寸五分
脾膂二穴	在第十一椎下兩傍相去脊中各一寸五分
膽膂二穴	在第十椎下兩傍相去脊中各一寸五分
肝膂二穴	在第九椎下兩傍相去脊中各一寸五分
膈膂二穴	在第七椎下兩傍相去脊中各一寸五分
心膂二穴	在第五椎下兩傍相去脊中各一寸五分
厥陰膂二穴	在第四椎下兩傍相去脊中各一寸五分
肺膂二穴	在第三椎下各俠脊相去一寸五分
風門二穴	在第一熱府在第二椎下兩傍各一寸五分
大杼二穴	在第一椎下兩傍各一寸五分
天柱二穴	在頸大筋外廉俠項髮陷中
玉枕二穴	在絡却後一寸五分俠腦戶傍一寸三分
絡却二穴	在通天一寸五分一名強陽一名腦蓋
通天二穴	在通天一寸五分一名天伯在承光後一寸五分
承光二穴	在五處後二寸
五處二穴	在土星傍一寸五分

傷醫大全

卷四 穴道

李四 顧氏秘書

晴明二穴 在日內背手足太陽少陽陽明五脉之會

瘍醫大全

卷四

穴道

李 顧氏秘書

曲差二穴 依神庭傍一寸五分入髮際

贊竹二穴 一名員柱一名帶光一名光明在兩眉陷中

晴明二穴 在日內背手足太陽少陽陽明五脉之會

大令 卷四 穴道

李 顧氏秘書

手厥陰心包經



左右各九穴

湯醫大全

卷四 穴道

李 頤氏秘書

歌曰

手厥陰心包之絡計有九穴之奇中衝勞宮與太陵

內關間使郄門竅曲澤天泉各二門天池與天會

總是一般名

手厥陰之脉起於胷中出屬心包下膈歷絡三焦其

支者循胷出脇下腋三寸上抵腋下下循膈內行

太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中

循中指出其端其支別者從掌中循小指次指出

其端是動則病手心熱臂肘癢急腋腫甚則胸脇

支滿心中澹澹大動面赤善笑不休目黃是主心包脉所生病者煩心心痛掌中熱也

中衝二穴 在手中指之端

勞宮二穴 在掌中央屈

太陵二穴 在掌中後兩

內關二穴 在掌後去

間使二穴 在掌後三寸

郄門二穴 在掌後去

曲澤二穴 在肘內廉陷

湯醫大全

卷四 穴道

李 頤氏秘書

天泉二穴 一名天濕在曲腋下

天池二穴 一名天會 在腋下乳後

膈會二穴 在肩前廉去
 肩膠二穴 在肩端臑上
 天膠二穴 在肩缺盆中上
 天關二穴 在頸大筋外缺盆上
 翳風二穴 在耳後尖
 瘼脉二穴 在耳本雜
 顛息二穴 在耳後
 角孫二穴 在耳郭中間
 絲竹空二穴 在耳中
 和膠二穴 在耳前兌
 耳門二穴 在耳前起肉
 湯醫大全 卷四 穴道
 手 顛氏秘書

凡二十七穴



湯醫大全 卷四 穴道
 主 顛氏秘書

歌曰

督脉在背之中行二十七穴督脉下極之膈兮上巔
 循素膠水溝兮兌端在於鼻唇斷交神庭兮通於
 上星顛會兮前頂百會兮後頂強問腦戶風府瘧
 門大傾陶道身柱須論神道靈臺兮至陽之經筋
 縮脊中兮懸樞命門陽關與腰膈長強脊中
 行二十七乾道海中行
 督脉起於下極之膈竝于脊裏上至風府入膈上巔
 循額至鼻柱屬陽脉之海其見症也脊強而腰厥

督者都也行背部中為陽脉之都綱乃奇經脉也

鼻柱下

素膠一穴

在鼻柱上

水溝一穴

一名人中在鼻柱下人中督脉

兌端一穴

在唇上

斷交一穴

在唇內齒上督脉二脉之會

額上行

神庭一穴

直鼻上入髮際五分督脉

上星一穴

在神庭後入髮際一寸

湯醫大全

卷四 穴道

三 顧氏秘書

顛會一穴

在上星後一寸五分

前項一穴

在顛會後一寸五分

百會一穴

一名三陽五會在前項後一寸五分頂中央旋毛中陷容豆督脉足太陽

會之交

頂後至頂

後頂一穴

一名交衝在百會後一寸五分

強間一穴

一名大羽在後頂後一寸五分

腦戶一穴

一名匣風一名合顛在枕骨上強間後一寸五分督脉是太陽之會

風府一穴

一名舌本八項大筋內宛宛中後一寸五分

背脊下

瘧門一穴

在風府後五分入髮際五分入系舌本陽維之會仰頭取之

大傾一穴

在第三頸上陷中

陶道一穴

在項大傾節下間督脉

身柱一穴

在第三頸節下

神道一穴

在第五頸節下

靈臺一穴

在第六頸節下

至陽一穴

在第七頸節下

筋縮一穴

在第九頸節下

湯醫大全

卷四 穴道

三 顧氏秘書

脊中一穴

在第十一椎節下間俯而取之禁不可灸令人偃僕

懸樞一穴

在第十三椎節下

命門一穴

在第十四椎節下

陽關一穴

在第十六椎節下

腰膂一穴

在第二十一椎節下

長強一穴

在脊端

中行

任脉



凡二十四穴

傷書大全

卷四 穴道

顧氏秘書

歌曰

任脉二十四穴任脉起中樞循腹上關元承漿與廉
泉天突璇璣轉華蓋與紫宮玉堂不可緩膻中名
元兒中庭膻中纂鳩尾巨闕由上脘中脘建里又
下脘水分到神闕陰交氣海須不舛石門與關元
中極曲骨亦不遠循腹而中行會陰兩陰顯
任脉起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至喉
嚨屬陰脉之海其見症也苦內結男子為七疝女
子為瘕聚

任者妊也行腹部中為生養之本乃奇經脉也

頤前

承漿一穴 一名天池在頤前唇下脣中足陽明之會

頤下

廉泉一穴 在頤下結喉上舌本仰而取之陰維任脉之會

膻中

天突一穴 一名五戶在項結喉下四寸宛宛中

璇璣一穴 在天突下一寸陷中

華蓋一穴 在璇璣上二寸

傷書大全

卷四 穴道

顧氏秘書

紫宮一穴 在華蓋下一寸六分

玉堂一穴 一名玉英在紫宮下一寸六分

膻中一穴 一名元兒在玉堂下一寸六分兩乳間

中庭一穴 在膻中下一寸六分

腹中行

鳩尾一穴 在蔽骨之端言其骨垂下如鳩形故各臆前蔽骨下五分人無蔽骨者從岐骨之際下行一寸是也

巨闕一穴 在鳩尾下一寸五分去蔽骨三寸任脉手太陽足陽明之會也

上脘一穴 在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸任脉手太陽足陽明之會也

寸任脉手太陽足陽明之會也

中腕一穴 在臍上四寸胃絡也三陽任脈之會謂上紀也

建里一穴 在中腕下一寸

下腕一穴 在建里下一寸足太陰任脈之會為幽門

水分一穴 在下腕下一寸

神關一穴 在臍中

陰交一穴 在臍下一寸

氣海一穴 一名臍映一名下育在陰交下五分

石門一穴 在臍下二寸三分照肅女子焚灸

關元一穴 在臍下三寸小腸募謂下紀也三陰任脈之會

傷寒大全

卷四 穴道

美 顧氏秘書

中極一穴 在臍下四寸一名氣原一名玉泉足三陰之會

曲骨一穴 一名回骨在橫骨之上陷毛際中動脈應手任脈足厥陰之會

會陰一穴 在大便前小便後一名屏翳兩陰間是也

衝脈

衝者通也言上至頭下至足通十二經之氣血其脈起於氣沖並陽明經夾臍上行至胃中而散即臍之動氣脈也其見症也氣逆而裡急

帶脈

帶者束也總束諸經之脈也其脈起於季脇迴身一周其見症也苦腹滿腰溶溶如坐水中

按季脇在肋下接橈骨之間是也又曰即脇下助骨之盡處短骨間是也

陽蹻脈

傷寒大全 卷四 穴道

美 顧氏秘書

蹻者健也是人動足之所由也其脈起於跟中循外踝上行入風池穴而止其見症也陰緩而陽急陽蹻得之太陽之別

兩足蹻脈者有陰有陽猶聖人圖設溝渠以備水潦斯無泛濫之患故人身之有經絡猶天地之有河道血脈之運行經絡猶源泉之傳流河道河道壅塞則水勢之泛濫無拘源泉枯涸則地道之脈氣閉塞人身血氣之於經絡亦然也



ZW 21101000784505

S
2121.5
150(0/3)

續修四庫全書 子部 醫家類

陰蹻脉

義與陽蹻同其脉亦起於跟中循內踝上行至咽喉
交貫衝脉而止其見症也陽緩而陰急陰蹻本諸
少陰之別

陽維陰維脉

維者維持之義為諸脉之綱維陽維之脉起於諸陽
之會陰維之脉起於諸陰之交二經之見症也悵
然失志溶溶不能自持驚則癡愚喜亡恍惚

傷寒大全

卷四

穴道

夫

顧氏校書