

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇一四・子部・醫家類

瘍醫大全四十卷（卷五至卷二十一）

〔清〕顧世澄撰

.....

一

瘍醫大全目錄

卷五

論五運六氣

大極圖說

陽水陰水相火真水命門圖說

治法指南

癰疽論

論病有木不治

功過格

瘍醫大全

一編氏秘書

醫家不費錢功德

瘍醫大全卷五

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

男 樞燮用和

全校

論五運六氣

太極肇分而有天地陰陽陰陽不測謂之神天有陰

陽地亦有陰陽天以陽生陰長地以陽殺陰藏人

在氣交之中所以具五臟六腑以應五運六氣之

數也五運者金木水火土也六氣者風寒暑濕燥

火也天干取運地支取氣天干有十配合則為五

瘍醫大全

卷五

論五

一編氏秘書

運地支十二對冲則為六氣天氣始於甲地氣始

於子天地相合則為甲子天氣終於癸地氣終於

亥天地相合則為癸亥陰陽相間剛柔相須是以

甲子之後乙丑繼之壬戌之後癸亥繼之三十年

為一紀六十年為一週有主運焉有客運焉有主

氣焉有客氣焉主運主氣萬古而不易客運客氣

每歲而迭遷自天地兄弟次序而言之甲乙東方

木也丙丁南方火也戊己中央土也庚辛西方金

也壬癸北方水也詩曰大寒水運始行初清明前

三火運居芒種後三土運是立秋後六金運推立
冬後九水運伏週而復始萬年如此主運也自其
夫婦配合而言之甲與己合而化土乙與庚合而

化金丙與辛合而化水丁與壬合而化火此客運

也甲己之歲正月建丙寅丙火生土故土運統之
乙庚之歲正月建戊寅戊土生金故金運統之
丙辛之歲正月建庚寅庚金生水故水運統之
丁壬之歲正月建壬寅壬水生木故木運統之
戊癸之歲正月建甲寅甲木生火故火運統之

甲己之年甲為土運初之運
乙庚之年庚為金運初之運
丙辛之年辛為水運初之運
丁壬之年壬為木運初之運
戊癸之年癸為火運初之運

一運各主七十二日零五刻此天干在上為陽所
印土也土生金二之運印金也五行倣此相生每

湯醫大全 卷五 氣運 二 顧氏祕書

以主乎運也又以地支循環次序而言之寅卯屬

春木也巳午屬夏火也辰戌丑未屬四季土也申

酉屬秋金也亥子屬冬水也木化風主於春故風

為初之氣火化熱主於夏初春末故火為二之氣

相火化暑主於炎夏故暑為三之氣炎暑大行金

化清燥土居中焉主乎四季之末故濕為四之氣

金為丙婦帶火之氣所以燥也主乎秋故燥為五

之氣水化寒嚴冽乃行主於冬故寒為六之氣此

主氣也自其對冲定位而言之子午少陰君火天

陽明燥金應在泉丑未太陰濕土上太陽寒水雨
連綿寅申少陽相火旺厥陰風木地相聯卯酉却
與子午反辰戌巳亥亦皆然

湯醫大全 卷五 氣運 三 顧氏祕書

子午二年客氣定局熱化之圖



傷醫大全


卷五 氣運

四

顧氏秘書

子午二年乃少陰君火司天陽明燥金在泉司天主上半年六個月在泉主下半年六個月餘做此子午二年初氣太陽二氣厥陰三氣少陰四氣太陰五氣少陽六氣陽明此客氣定局也
主氣每歲俱從厥陰風木起

丑未二年客氣定局濕化之圖



傷醫大全

卷五 氣運

五

顧氏秘書

丑未二年乃太陰濕土司天太陽寒水在泉初氣厥陰二氣少陰三氣太陰四氣少陽五氣陽明六氣太陽

寅申 二年 客氣 定局 火化 之圖




傷醫大全

卷五 氣運

六 顧氏秘書

寅申二年乃少陽相火司天厥陰風木在泉初氣
少陰二氣太陰三氣少陽四氣陽明五氣太陽六
氣厥陰

卯酉 二年 客氣 定局 燥化 之圖



傷醫大全

卷五 氣運

七 顧氏秘書

卯酉二年乃陽明燥金司天少陰君火在泉初氣
太陰二氣少陽三氣陽明四氣太陽五氣厥陰六
氣少陰

辰戌
二年
客氣
定局
寒化
之圖



湯醫大全

卷五 氣運

八

顧氏秘書

辰戌二年乃太陽寒水司天太陰濕土在泉初氣
 少陽二氣陽明三氣太陽四氣厥陰五氣少陰六
 氣太陰

巳亥
二年
客氣
定局
風化
之圖



湯醫大全

卷五 氣運

九

顧氏秘書

巳亥二年乃厥陰風木司天少陽相火在泉初氣
 陽明二氣太陽三氣厥陰四氣少陰五氣太陰六
 氣少陽

前圖乃客氣也每一氣主旺六十日八十七刻半有奇此地支在下為陰所以主乎氣也然客運之流行也有太過焉有不及焉太過之年甲丙戊庚壬五陽干也不及之年乙丁己辛癸五陰干也太過其至先大寒前十三日交名曰先天不及其至後大寒後十三日交名曰後天平氣之年正大寒日交名曰齊天客氣之升降也有正化焉有對化焉正化之歲謂午未寅酉辰亥之年也對化之歲謂子丑申卯戌巳之年也正化者令之實從本其數

湯醫大全 卷五 氣運 十一 顧氏秘書

生對化者令之虛從標其數庶一莽之中主運以位而相次於下客運以氣而周流於上此客氣加於主運之上主氣臨於客氣之下天時所以不齊民病之所由生也辰戌年初之客氣少陽相火加燥金加主氣少陰君火三之客氣太陽寒水加主氣少陽相火四之客氣厥陰風木二之客氣陽明土五之客氣少陰君火加主氣太陽寒水六之客氣太陰濕土加主氣太陽寒水已上皆客氣加於主運之上舉此二年為例也抑論主氣春溫夏暑秋涼冬寒風以動之火以溫之暑以蒸之濕以潤之燥以乾之寒以堅之皆天地正氣之運行惟客加於主乃有逆從淫勝然後春有凄風夏有伏陰秋有苦雨冬有愆陽所以氣候不齊而六甲年厲疾時降已上皆主氣臨於客氣之下也

土運太過則雨濕流行濕病乃生腎水受邪治當除濕以補腎六巳之年土運不及則木氣乘旺反見風化風病乃行治當益脾以平木六丙之年水運太過則寒氣大行寒病乃生心火受邪治當逐寒以補心六辛之年木運不及則土氣乘旺反見濕化濕病乃行治當補腎以除濕六戊之年火運太過則熱氣大行熱病乃生肺金受邪治當降火以補肺六癸之年火運不及則水氣乘旺反見寒化寒病乃行治當補心以逐寒六庚之年金運太過則燥氣流行燥病乃生肝木受邪治當清燥以補肝六乙之年金運不及則火氣乘旺反見熱化熱病乃行治當平木以補脾六壬之年木運太過則風氣大行風病乃生脾土受邪治當平木以補脾六丁之年木運不及則金氣乘旺反見燥化燥病乃行治當補肝以清燥此客運之治法也太陽寒水治以辛熱陽明燥金治以溫苦少陽相火治以鹹寒太陰濕土治以苦熱少陰君火治以苦寒厥陰風木治以辛涼此六氣之治法也然運氣之

湯醫大全 卷五 氣運 十一 顧氏秘書

過則燥氣流行燥病乃生肝木受邪治當清燥以補肝六乙之年金運不及則火氣乘旺反見熱化熱病乃行治當平木以補脾六壬之年木運太過則風氣大行風病乃生脾土受邪治當平木以補脾六丁之年木運不及則金氣乘旺反見燥化燥病乃行治當補肝以清燥此客運之治法也太陽寒水治以辛熱陽明燥金治以溫苦少陽相火治以鹹寒太陰濕土治以苦熱少陰君火治以苦寒厥陰風木治以辛涼此六氣之治法也然運氣之

所以有變者以相得則和不相得則病又有相得而病者以下臨上位不當也五行相生為相得相尅為不相得上臨下為順下臨上為逆運氣相同名曰天符司天者司之為言直也直行天令上之位也歲運者運之為言動也主天地之間人物化生之氣中之位也在泉者主地之化行乎地中下之位也當年之中司天之氣與中氣運相同者中氣運指歲曰天符戊子戊午戊寅戊申四年皆火丙運而言曰天符辰丙戌皆水己丑己未皆土乙卯乙酉皆金丁巳丁亥皆木六十年中有此十二年天符也天氣生運曰順化甲如

子年正月建丙寅丙火生土子常一陽初復亦帶火意俱能生土五行相生做此六十年中有此十二年順天氣尅運曰天刑如庚子年正月建戊寅戌土生金不為君火火化也下尅金五行相尅做此六十年中有此十二年如壬子年正月建壬寅壬水生子為君火是木上生火在於理論如子臨父位未當也六十年中有此十二年運尅天氣曰不和如丙子年正月建庚寅庚金生水子又水位丙小逆也火少故水土乘旺而來尅火六運臨本氣之位曰十年中有此十二年不和也

歲會當年十干建運與年辰十二律律者支也五行相會曰歲會丙子戊午丁卯乙酉水火木金之運臨之土無定位寄旺於四季之末各旺十八日有奇

甲辰甲戌己丑己未是也土運臨之已上八年乃云歲會外又有四年壬寅皆木庚申皆金是二陽年癸巳皆火辛亥皆水是二陰年亦是運與年辰相會而不為歲會者謂不當四年正中月之故也除二陽年則二陰年雖不名歲會亦在上下五行相佐皆為平氣之歲天符歲會相合名曰太乙天符如戊午年正月建甲寅甲木生火午居離位而少陰司天豈非天符與歲會相合乎六十年中歲會居八年太過之運加地氣曰同天符庚子庚太乙有四年同司地燥金壬寅壬申年運同司地風木甲辰甲戌年運同司地濕土六十年中有此六年同天符

陽不及之運加地氣曰同歲會辛丑辛未年運同也酉年運同司地君火癸巳癸亥年運同司地經曰先立其年以明其氣每年先立氣運審其太過不及然後以地之主氣為本天之客氣加臨於上為標以求六化之變如氣之勝也微者隨之甚者制之氣之復也和者平之暴者奪之皆隨勝氣安其屈伏以平為期明堂詩曰甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾鄉庚屬大腸辛屬肺壬屬膀胱癸腎藏三焦亦向壬宮寄胞絡同歸入癸方此言人秉天干

之氣而生也又曰肺寅大卯胃辰宮脾巳心午小
未申中勝酉腎心胞戌亥三子膽丑肝通此言地
支通注氣血以時也觀此二詩則天地之氣無時
不流通於人身矣故一氣不通不能生化天有六
氣人以三陰三陽而上奉之地有五行人以五臟
六腑而下應之臟為陰而其數奇以應五運蓋五
行質具於地而氣則行於天也腑為陽而其數偶
以應六氣蓋六淫雖降於天而勢必充於地也子
午為天地之中正君火位焉手少陰心經午足少

湯醫大全

卷五 氣運

西

顧氏秘書

陰腎經子居之辰戌為七政之魁罡寒水位焉手
太陽小腸經戌足太陽膀胱經辰居之然火從水
化水隨腎至故少陰為藏位與太陽隔而氣相合
為腑也丑未為歸藏之標本濕土位焉手太陰肺
經丑足太陰脾經未居之卯酉為日月之道路燥
金位焉手陽明大腸經卯足陽明胃經酉居之然
子隨母居士旺金盛故太陰為藏位與陽明隔而
氣相合為腑也已亥為天地之門戶風木位焉卯
木之正分為陽明燥金所居巳
然木生在亥而對化於巳也手厥陰心胞絡經巳

足厥陰肝經亥居之寅申握生化之始終相火位
焉足少陽膽經寅手少陽三焦經申居之然相火
寄於肝腎膽者肝之腑心胞絡者腎之配故厥陰
為藏位與少陽隔而氣相合為腑也南政三陰司
天則皆寸不應三陰在泉則皆尺不應北政三陰
司天則皆尺不應三陰在泉則皆寸不應不應者
則皆沉脉也凡脉之司天在泉不應者皆以少陰
而論之故北政之歲人氣面北而寸北尺南地左
間之氣在右寸地右間之氣在左寸天左間之氣

湯醫大全

卷五 氣運

志

顧氏秘書

在右尺天右間之氣在左尺要訣云每年退二支便是客鄉如子年司
天後二支是戌太陽寒水為初氣亥厥陰風木為
二氣子少陰君火為三氣丑太陰濕土為四氣寅
少陽相火為五氣卯陽明燥金為六氣此經曰必
言六氣以君火為尊五行以濕土為重也經曰必
先歲氣毋伐天和又曰不知年之所加氣之盛衰
不可以為工學者合而觀之更精於脉證乃自得
之噫儒之道博約而已醫之道運氣而已學者豈
可忽忽而不精究歟

夜周流於五藏六府之間滯則病息則死矣人生男女交媾之時先有火會而後精聚故曰火在水之先人生先生命門火此褚齊賢發前人之所未發世謂父精母血非也男女俱以火為先男女俱有精但男子陽中有陰以火為主女子陰中有陽以精為主謂陰精陽氣則可男女合此氣交聚然後成形俱屬後天矣後天百骸俱備若無一點先天火氣盡屬死灰矣然元陽君主之所以為應事接物之用者皆從心上起經綸故以心為主

湯醫大全

卷五 命門

六 顧氏秘書

至於棲真養息而為生生化化之根者獨藏於兩腎之中故尤重於腎其實非腎亦非心也 馮氏

李時珍曰命門為藏精繫胞之物其體非脂非肉白膜裹之在脊骨第七節兩腎中央系著於脊下通二腎上通心肺貫腦為生命之原相火之主精氣之府人物皆有之生人生物皆由此出男女媾精皆稟此命火以結胎人之窮通壽夭皆根於此

治法指南

經曰汗之則瘡已

高腫者毒在表故汗之則瘡已若誤下之則誅伐無過反傷元氣

李東垣曰夫癰疽之病治療多方總而論之各有所宜補瀉淋瀝及敷掃貼熳鍼灸烙用之不同蓋知其道也舉治必效昧於理者利害不無嘗見以寒療熱以熱療寒古今之通論也又有檢方療病妄製加減以意裁之自以為可殊不知病有逆從治有緩急法有正權方有奇偶用有輕重夫醫者意也得其意然後能變通也達其變通者悟其道而省其理也則左右逢其源矣愚雖不才畧陳萬一嘗見以寒治熱而寒彌甚治熱以寒而熱彌熾者何也蓋不知五臟有陰陽之性其可因其類而取之也假如心實生熱者當益其腎腎水滋熱將自除腎水虛生寒當補心心火既降寒當自除此所謂寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽也又寒因熱用熱因寒用要通其理類而已又聞微者逆之甚者從之何謂也蓋治寒以熱必涼而行之治熱以寒必溫而行之此亦欲其調和也其間

湯醫大全

卷五 指南

七 顧氏秘書

有正有權者何也蓋病有微有甚微者逆治理之正也甚者從治理之權也然為瘡科於補瀉汗下標本逆從正權之理烏可闕而不知也大凡治療瘡疽之要法曰初覺熱毒發熱鬱結而作瘡疽一二日宜蕩滌邪氣疎通臟腑令內消也古今湯法謂切剉咬咀如麻豆大以猛火急煎無令過熟欲其速利也次用丸散宣導血脈漸次消磨令緩散也助以淋湯調和榮衛行經絡也更當膏潤溫養兼磨敷四畔貼熖之藥順其陰陽也追蝕托裡汗

瘍醫大全

卷五

指南

年

顧氏秘書

下調補臨時製宜深淺緩急自有等差如男女貴賤亦當別論晉尚書褚澄曰寡婦尼僧異於妻妾雖無房室之勞而有憂思之苦此深達其情者也又仲景云物性剛柔餐居亦異治之不同也所以黃帝興四方之問岐伯舉四治之能况病之新舊形志樂苦豈可執方無權以求其愈疾哉亦有瘡疽腫痛初生一二日便覺脈沉細煩悶臟腑弱而皮寒邪毒猛暴恍惚不寧外證深沉者亦宜即當用托裏溫熱之劑以從治之

十書

又曰夫瘡疽丹腫結核癰癰初覺有之即用內消之法經久不除氣血漸衰肌寒肉冷膿汁清稀毒不出瘡口不合或聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生氣血虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之治使瘡無變壞之症凡為瘡醫不可一日無托裏之藥然而寒熱溫涼煩渴利嘔臨症宜審其緩急耳

瘍醫大全

卷五

指南

年

顧氏秘書

又曰夫癰疽膿潰腫毒侵裏證候危惡者須辨虛實况夫虛者難補實者易瀉補瀉之法不可輕用若或少差利害甚大然而虛實證端不可不辨有瘡之虛實有臟腑氣血上下真邪各有虛實故不同也分而言之則腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下輒慢膿稀者瘡疽之虛也瀉痢腸鳴飲食不入嘔吐無時手足並冷脈弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便秘小便澀飲食如故腸滿膨脹胃腸痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脈大精神

昏塞者悉臟腑之實也凡諸瘡疽膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭疼鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩躁飲冷睡語咬牙者上實也精滑不固大便自利腰脚沉重睡卧而不寧者下虛也肩項不便四肢沉重目視不正晴不了了食不知味音嘶色敗四肢浮腫者真氣之虛也腫焮尤甚痛不可近積日不潰寒熱往來大便秘澀小便如

癆醫大全

卷五 指南

圭

顧氏秘書

淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也又曰真氣奪則虛邪氣勝則實又曰諸痛為實癢為虛也又曰診其脉洪大而數者實也微細而軟者虛也虛則補之和其氣托裏也實則瀉之疎利而自導其氣內經謂血實則決之氣虛則掣引之

又曰治瘡瘍治表不云發汗而曰托裏治裏不云攻下而曰疎通治經絡不云疎通而曰和榮衛蓋欲保全元氣為主而不專攻於瘡也今之醫者以速愈為高汗下峻攻溫毒漫治毒或速散不知元氣

傷而天年天矣可不慎哉

又曰古人用藥因病制宜治不執方隨病增損療積聚補益可用丸藥以從舊不改方增損蓋瘡瘍危要之際證候多種安有執方之論固可臨時加減以從其法只如發背腦疽惡疔腫膿潰前後虛而頭痛者於托裏藥內加五味子恍惚不寧加人參茯苓虛而發熱者加地黃瓜蒌往來寒熱者潮熱者加地骨柴胡渴不止加知母赤小豆大便不通者加木通燈草虛煩者加枸杞子天門冬自利者

癆醫大全

卷五

指南

圭

顧氏秘書

加厚朴四肢厥逆者加附子生薑嘔逆者加藿香丁香多痰者加半夏陳皮膿多者加當歸川芎甚痛者加芍藥乳香肌肉遲生者加白蘇官桂有風邪者加獨活防風心驚怯者加丹砂口目瞶動者加羌活細辛愚雖不才自幼及老凡治瘡疽常依此法加減用藥取効如神後之學者宜細詳焉又曰九竅不利皆不可下瘡瘍醫冒俗呼昏迷是不可下汗之則愈又曰癰疽之發其受之有內外之別治之有寒溫之

異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥則是皮毛始受之邪引入骨髓受之內者法當踈利以寒劑反用溫劑托裏則是骨髓之病上徹皮毛表裏通潰共爲一瘡助邪爲毒苦楚百倍輕則危殆重則死矣予聞潔古云瘡瘍之生也表裏不同或攻或發少有差舛變證隨能殺人甚於傷寒也針灸施治各隨其宜所用之藥又當明入五臟君臣是其法也

又曰大抵癰腫之證不可專泥於火爲患况稟有虛

瘍醫大全

卷五 指南

顧氏秘書

實及老弱不同豈可槩用寒涼之藥設若毒始聚勢不盛者庶可消散尤當推其病因別其虛實若槩用涼藥必致誤事如膿將成邪盛氣實者用消毒之劑先殺其毒雖作膿不爲大苦潰亦不甚若就用托裏必益其勢如膿將成不成及不潰者方用托裏膿成勢盛者針之膿一出諸證悉退

又曰瘡熱奮然高起結硬而痛色赫赤微帶黯色其邪在血脉之上皮膚之間急發其汗則毒隨汗散矣大法宜荆防敗毒散冬月萬靈丹脈虛者四妙

湯內托復煎湯

張仲景云瘡家雖身疼痛不可發汗汗之則瘵發汗爲大汗出非謂托裏之藥輕輕表散也

薛立齋曰夫瘡瘍之作皆膏粱厚味醇酒炙博房勞過度七情鬱火陰虛陽轉精虛氣節命門火衰不能生土榮衛虛弱外邪所襲氣血受傷而爲患當審其經絡受證標本緩急以治之若病急而元氣實者先治其標病緩而元氣虛者先治其本或病急而元氣又虛者必先於治本而兼以治標大要

瘍醫大全

卷五 指南

書

顧氏秘書

腫高焮痛膿水稠粘者元氣未損也治之則易漫腫微痛膿水清稀者元氣虛弱也治之則難不腫不痛或漫腫黯黑不潰者元氣虛甚治之猶難者也主治之法若腫高焮痛者先用仙人活命飲解之後用托毒消毒散漫腫微痛者用托裏散如不應加薑桂若膿出而反痛氣血虛也八珍湯不作膿不腐潰陽氣虛也四君加當芪肉桂不生肌不收斂脾氣虛也四君加芍藥木香惡寒憎熱陽氣虛也十全大補加薑桂脯熱內熱陰血虛也四物

加參朮欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑自汗盜汗五臟虛也六味丸料加五味子食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏喘促咳嗽脾肺虛也前湯加麥冬五味欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理中湯小腹痞足脛腫脾腎虛也十全大補湯加山藥山萸肉桂泄瀉足冷脾腎虛寒也前藥加桂附熱渴淋秘腎虛陰火也加減八味丸咳嗽淋秘肺腎虛火也補中益氣湯加減八味丸大凡怯弱之人不必分其腫瘍惟當先補胃氣或疑參芪滿中間有用者又加發散敗毒所補不償所損又有泥於氣填素實或有痰不服補劑者多致有悞殊不知瘡瘍之作緣陰陽虧損其膿既泄氣血愈虛豈有不宜補者哉故丹溪云但見腫痛癢之脉症虛弱便滋與補氣血無虧可保終吉

又曰大抵膿血大泄當大補氣血為先雖有他證以末治之瘡口雖合尤當補益

又曰按張仲景先生治傷寒有汗吐下三法東垣先

瘍醫大全

卷五 指南

五

顧氏秘書

生治瘡瘍有疎通托裏和榮衛三法用之得宜厥疾瘳矣假如瘡瘍腫硬木悶煩熱便秘脉沉而實其邪在內當先疎其內以下之焮腫作痛便利調和脉浮而洪其邪在表當先托其裏以汗之元戎云榮衛充滿抑遏而為癰者當泄之以奪盛熱之氣榮衛虛弱壅滯而為癰者當補之以接虛怯之氣又東垣先生云瘡瘍雖面赤伏熱不得攻裏裏虛則下利仲景先生云瘡家雖身體疼痛不可發汗汗之則發瘧苟不詳審妄為汗下以致血氣虧損反延陷少壯者難以潰飲老弱者多致不救朱丹溪曰癰疽因積毒在臟腑非一朝一夕今發於外宜以標本為治當先助氣壯胃使根本堅固而以行經活血為佐參以經絡時令使毒氣外發此正仲景解表用麻黃桂枝之意施治之早可以內消此乃內托之本意也

又曰山樅黃芩苦參犀角佐輔人參固可解食毒之熱若寒月與虛人寧無加減乎內經謂膏粱之變足生大疔此言瘡疽之因也禁戒厚味恐其引其

瘍醫大全

卷五 指南

五

顧氏秘書

宿火之熱此誠富貴養口腹者所當謹若素貧者大不然也予治一人背癰徑尺穴深而黑家貧得此急作參芪歸朮膏多肉餽飽與之而安多肉餽飽補氣之有益者也

朱丹溪曰排膿內補十宣散若用之於些小癰疽與冬月儘可助內托之功若於冬月腫瘍用之亦可轉重就輕移深為淺若潰瘍與夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗比見世人用此方者不分癰疽冬夏無經絡無先

瘍醫大全

卷五 指南

美

顧氏秘書

後如盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉

又曰內補十宣散瀉衛燥血藥太多止可用於輕小證候虛之甚者恐難倚仗

又曰精要云大黃治癰疽之要藥以其宣熱拔毒又云瘡始作皆須以大黃等湯極轉利之且排日不廢繼又自言患癰疽者每有泄瀉皆是惡候此是不能無疑者也借曰前用大黃恐因病體實而大腑秘結有積熱沉痼之積者發也止可破結導滯推令轉動而已豈可謂極轉利之而且排日不廢

乎若下利之後又與利藥恐非防微旅漸之意瘡之始作即周禮腫瘍之時也腫在肌肉若非大滿大實堅之證自當行仲景發表之法借五香湯為例散之於外何必遽以峻下之藥以奪其裏自取其禍乎

又云內托散即護心丹此散菘豆解丹毒又治石毒味甘入陽明胃性寒能補為君乳香去惡腫入少陰性溫善竄為佐甘草性緩解五金八石及百藥毒為使此方專為服丹石而發疽者設若不因丹石而

瘍醫大全

卷五 指南

美

顧氏秘書

發疽恐非必用之劑

又曰獨勝散即香附去毛淨以姜汁浸一宿焙研治氣鬱血滯而諸瘡愈後常服半年尤妙此皆施於體實氣鬱之人每思香附經不言有補惟不老湯一方乃言於老人有益用片子姜黃香附甘草三味而以不老為名且引錢翁先生與劉君為證夫豈無其故哉蓋於行氣中有補之之理耳天之所以為天者健而有常也因其不息所以生生無窮正如菟蔚子活血行氣有補陰之妙故名益母胎前產後所恃者氣

血耳胎前無滯產後無虛以其行中有補也夏枯草治療癰亦然

精要云大凡癰疽不可捨五香湯此又不能無言者也開卷便於第一論中詳言之吾不知良甫之時有許多大腑堅秘病氣鬱塞若是之頑厚可以驟散而大下者若果有之亦當開陳時之先後證之可否庶乎後人不敢孟浪殺人也或曰癰疽用大黃走泄以去毒自孫真人行千金方已言之矣良甫祖述其說何吾了病之深也曰大黃除諸實熱

瘍醫大全

卷五

指南

辛

顧氏秘書

而性峻急孫以盛行奇術於公卿間時在晚宋民不知兵交游於富貴之家肉食之輩固皆捷效今良甫不分貧富苦樂勞逸一槩用之寧無孟浪之患乎况有房勞而虛者憂怒而虛者極意貪求而虛者強力動勞而虛者大醉過飽而虛者皆因氣弱而瀉血少而濁生疽固是難治之病者大腑秘而稍安穀食肯守戒律甘心澹味者猶為可治但費補工夫耳苟因旬日半月大便秘實不知其氣不降也便以為實而行大黃些少寒熱不知其氣

血不和也便以為有外感而行表散如此害人甚速

精要云內托散一日至三日之內進十數服治毒氣攻衝臟腑名護心散此方專為丹石而發疽者若不因丹石而發恐非必用之劑若夫年老者病深者證憊者體重者菘豆雖補將有不勝重任之患矣

機要云治瘡大要須明惟有托裏疎通和榮衛三法毒邪在內則痛深脉必沉實外症發熱煩躁大便

瘍醫大全

卷五

指南

辛

顧氏秘書

秘瘡腫木痛不焮赤宜用內疎黃連湯疎通臟腑毒邪在皮膚則痛淺脉必浮數外症焮腫作痛二便調勻或寒熱拘急頭痛恐邪氣外極而內行必先托裏之劑以散之毒邪在經絡中外無焮惡之氣內亦二便調和食如常口知味不惡風寒止於熱燥其脉不浮不沉乃邪在經絡中也宜調和榮衛
元戎云素問寒癰疽例經云腎移寒於脾發為癰腫少氣脾移寒於肝發為癰腫拘攣又云諸寒癰腫

此皆安生岐伯曰生於八風之所變也又云地之濕氣感則害人皮肉筋脉聖濟云衣服過厚表易着寒所得之源大抵如此或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則然後變色疼痛漸爽而成膿如泔而稀久不能差瘡口不合變為疔漏敗壞肌肉侵損骨髓以致痿痺宜以骨碎補丸主之方用補骨脂熟地當歸川續斷石楠葉黃芪石斛牛膝杜仲草薢各二兩附子一兩白芍川芎虎骨絲餅沙參羌活防風獨活天麻各一兩五錢蜜丸空心鹽湯下

瘍醫大全

卷五 指南

五 顧氏秘書

而難化脾胃虛寒也肌體瘦弱皮色痿黃胆氣不行也非參芪歸朮之類不能補非附子不能助其功今飲食進少且難消化屬脾胃虛寒蓋脾胃屬土乃命門火虛不能生土而然不宜直補脾胃當服八味丸補火以生土也

又曰氣無補法俗論也以其為病痞滿壅塞似難於補不知正氣虛而不能運行則邪氣滯而為病經云壯者氣行則愈怯者弱者則著而為病苟不用補氣何由而行乎

王肯堂曰瘡漏不可遽合結毒實重所為準繩

張景岳曰瘡瘍之治有宜瀉者有宜補者有宜發散者有宜調榮解毒者因證用藥各有所主經曰形氣有餘病氣有餘當瀉不當補形氣不足病氣不足當補不當瀉此其大綱也故凡察病之法若其脉見滑實洪數而焮腫痛甚煩熱痞結內外俱壅者方是大實之證此其毒在臟腑非用硝黃猛峻等劑蕩而逐之則毒終不解故不得不下然非有重實重滯者不可下此下之不可輕用也其有脉

瘍醫大全

卷五 指南

五 顧氏秘書

見微細血氣素弱或腫而不潰潰而不斂或飲食不加精神疲倦或嘔吐泄瀉手足常冷膿水清稀是皆大虛之候此當全用溫補固無疑矣然不獨此也即凡見脉無洪數外無煩熱內無壅滯而毒有可慮者此雖非大虛之證然察其但無實邪便當托裏養榮預顧元氣何也蓋恐困苦日久或膿潰之後不待損而自虛矣及其危敗臨期能及救故丹溪云癰疽因積毒在臟腑宜先助胃壯氣以固其本夫然則氣血凝結者自散膿瘀已成者自

潰肌肉欲死者自生肌肉已死者自腐肌肉已潰者自斂若獨攻其瘡則脾胃一虛七惡蜂起其不
 死者幸矣卽此謂也其有脉見緊數發熱憎寒或
 頭痛或身痛或四肢拘急無汗是必時氣之不正
 外閉皮毛風熱壅盛而爲癰腫此表邪之宜散者
 也如無表證則不宜妄用發散以致亡陽損衛故
 仲景曰瘡家不可汗此之謂也其有榮衛失調氣
 血留滯而偶生癰腫但元氣無損飲食如常脉無
 凶候證無七惡此其在腑不在臟在表不在裏有
 湯醫大全 卷五 指南 書 顧氏秘書

熱者清其熱有毒者解其毒有滯者行其氣所當
 調榮和衛而從平治者也大都瘡瘍一證得陽證
 而病氣形氣俱有餘者輕得陰證而形氣病氣俱
 不足者重若正氣不足而邪毒有餘補之不可攻
 之又不可者危若毒雖盡去而脾胃已敗血氣難
 復者總皆不治之證故臨證者當詳察虛實審邪
 正辨表裏明權衡倘舉措畧乖必遺人大害斯任
 非輕不可苟也

又曰槐花治濕退熱之功最爲神速大抵腫毒非用

蒜灸及槐花酒先去其勢雖用托裏諸藥其效未
 必甚速惟胃寒之人不可過用

又曰忍冬酒治癰疽發背初發時便當服此不問疽
 發何處或婦人乳癰皆有奇效如或處鄉落貧家
 服此亦便且效仍兼以麥飯石膏及神異膏貼之
 甚效

又曰愚意前論腫瘍有云忌補宜下者有云禁用大
 黃者此其爲說若異而亦以證有不同耳蓋忌補
 者忌邪之實也畏攻者畏氣之虛也卽如腫瘍多
 湯醫大全 卷五 指南 書 顧氏秘書

實潰瘍多虛此其常也然腫瘍亦有不足則有宜
 補不宜瀉者潰瘍亦或有餘則有宜瀉不宜補者
 此其變也或宜補或宜瀉總在虛實二字最多疑
 似貴有定見如火盛者宜清者也氣滯者宜行者
 也既熱且壅宜下者也無滯無壅則不宜妄用攻
 下此用攻之宜禁者也至若用補之法亦但察此
 二者凡氣道壅滯者不宜補火邪熾盛者不宜溫
 若氣道無滯火邪不甚或飲食二便清利如常而
 患有危險可畏者此雖未見虛證或腫瘍未潰亦

宜卽從托補何也蓋恐困苦日久無損自虛若能預固元氣則膿必易化膿必易潰口必易斂卽大羸大潰猶可望生者必待虛證盡出或旣潰不能收斂而後勉力支持則輕者必重重者必危能無晚乎此腫瘍之有不足也所係非細不可不察

又曰潰瘍有餘之證其辨有四蓋一以元氣本強火邪本盛雖膿潰之後而內熱猶未盡除或大便堅實而能食脉滑者此其形氣病氣俱有餘乃宜清利不宜溫補火退自愈亦善證也一以直陰內虧

瘍醫大全

卷五 指南

素 顧氏秘書

水不制火膿既泄而熱反甚脉反躁者欲清之則正氣已虛欲補之則邪氣愈甚此正不勝邪窮敗之證不可治也一以毒深而潰淺者其肌腠之膿已潰而根盤之毒未動此乃假頭非直潰也不得遽認爲潰瘍而槩施托補若誤用之則反增其害當詳辨之又有一種元氣已虛極似宜補然其稟質滯濁肌肉堅厚色黑而氣道多壅者畧施培補反加滯悶若此輩者真虛旣不可補假實又不可攻最難調理極易招怨是亦不治之證也總之潰

瘍有餘者十之一二故潰瘍宜清者少腫瘍不足者十常四五故腫瘍宜補者多此亦以癰疽之危險有關生死者爲言故貴防其未然也至若經絡浮淺之毒不過腫則必潰潰則必收又何必卷卷以補瀉爲辨也觀者審之

張潔古曰有裏者下之

蔣示吉曰司命者用藥但有一可補之機則補之有不可不攻之勢則攻之庶幾得古人好生之意者哉

瘍醫大全

卷五 指南

素 顧氏秘書

又曰夫瘡瘍旣潰肉腐膿流血散氣消其虛之必補也宜矣用十全大補湯爲潰後諸症之總司又曰悞服尅伐之劑或膿血大泄或因吐瀉或悞入房或勞損元氣或夢遺泄精或外邪感觸以致發熱頭痛小便淋瀝或滑數便血脉濡頰喘氣短頭暈體倦熱渴意欲投水身熱惡衣揚手擲足腰背反張此陽氣脫陷之假熱症也又有畏寒頭痛咳逆嘔吐耳聾目矇小便自遺瀉痢腸鳴裏急腹痛陰莖短縮牙齒浮痛肢體麻痺或厥冷身痛或咬

牙齧唇此陽氣脫陷之真寒症也如遇以上假熱
真寒勿論其脉勿論其症若見一二急以十全大
補湯加附子溫補之藥庶有復生之理

又曰凡肉黯陽虛屬寒十全湯加附子肉赤血虛兼
熱四物湯加梔子

又曰凡死不潰是脾虛十全倍參木肉白肉不斂為
陽孤十全加薑附

又曰凡寒涼非生肌所喜發散非潰後所宜

又曰七日以前火毒方熾辛熱溫劑休嗜七日以後

瘍醫大全

卷五

指南

美

顧氏秘書

膿血將成寒涼敷藥莫遏

又曰精為陰人之水也氣為陽人之火也水中不可

無火無火則陰勝而寒病生火中不可無水無水

則陽勝而熱病起水虧者大補真陰火虛者大補

元陽

又曰凡真陽之衰敗必由於真陰之虧損

又曰藥能治病補虛不能移情易性病入素性乖張

最難調治

又曰膿流毒泄氣血俱虧

又曰金匱腎氣丸治命門火衰以致脾土虛寒不能

消潰收斂或飲食少思不化臍腹痛夜溺多口乾

喜熱飲腎水虛而上泛為痰脾虛不能攝涎而為

痰非此不收誠為引火歸原回陽返本之妙劑也

又曰初起之瘍皮肉未破一團實邪熱毒甚熾不可

輕投辛熱之藥潰後之症膿血出多正氣已虧元

氣未復不可擅用寒涼之劑

又曰據東垣之意瘡瘍面赤雖伏火熱鬱不得攻裏

為陽氣怫鬱邪氣在經宜發表以去之雖大便秘

瘍醫大全

卷五

指南

美

顧氏秘書

日不見亦宜多攻其表發散陽氣少加潤燥藥以

潤之薛立齋云腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為

主如用大黃寧無孟浪之非若此則大黃之難用

也明矣而丹溪又云大黃治癰症之要藥豈諸名

家亦相矛盾乎蓋癰疽初起有六經表症者大便

如常者脉浮緊浮數者邪氣在表斷不可下若表

症不現大便燥結口渴引飲脉浮沉實沉數痞頭

堅硬不起若不用大黃將何以宣通臟腑耶初虞

世云癰疽初作須以大黃等藥急轉利之勿以困

苦為念此亦一偏之說不辨表裏胡可為訓總之
真知其實而瀉利真知其虛而補益浮露而淺者
則外消載伏而深者則內托庶無弊也

又曰按仲景云瘡家雖身疼體痛不可發汗汗之則
發瘡此為瘡家潰後復傷寒者說也若瘡初起七
日之內惡寒發熱頭痛身疼瘡高腫身無汗二便
如常脈來浮緊浮數表症俱多非汗不愈若汗藥
悞投之於已潰之後或表邪俱去之時其禍亦不
止發瘡而已也

瘍醫大全

卷五 指南

畢 顧氏秘書

又曰凡癰七日以後瘡頭見黃色竟以白降丹點上
升頭拔毒上以膏藥蓋之以防風邪外入每日用
菝艾湯洗淨再換膏藥大約在十一朝前後膿出
痛定是陽瘡之順候也內服四妙湯托之若八九
日痛而不潰瘡勢已定毒氣已聚尙未成膿須用
神燈照法
又曰潰後遍身作癢乃外風乘虛而入宜內托解之
又曰膿少色赤不斂乃血虛也若穢氣觸而亦然當
以乳香沒藥之類和之

又曰餘毒未盡四妙湯加白芷防風花粉連翹
又曰寒邪凝滯十全湯加防風桂枝外用菝艾湯洗
又曰陽虛則惡寒陰虛則生熱

又曰午前熱主於補氣午後熱主於補血
又曰潰後痛疼膿色敗臭者胃虛有火十全湯加麥
冬五味子

又曰喘粗氣短恍惚嗜卧者脾肺弱也補中益氣湯
加麥冬五味子

又曰脾腎已損則肩背不便而沉重補中益氣湯加
山萸肉山藥北五味子

又曰脾肺氣脫肢體腫面色敗而聲嘶唇鼻青赤而
目俱浮者六君子湯加炮薑不應十全湯加炮薑

熟附子
又曰寒氣內搖腹痛吐瀉手足冷而人昏憤或咳嗽
呃逆腹鳴不食陽氣虛之惡症宜托裏溫中湯後
用六君子湯

汪省之曰潰後血氣耗散內外皆虛便宜參芪接補
元氣用寒涼固非所宜用香燥亦蹈虛虛之禍可

瘍醫大全

卷五 指南

畢 顧氏秘書

不慎歟 理例

陳文治曰脉沉實發熱煩燥外不厥腫赤痛乃邪氣深伏在裏宜先疎通宜衛生湯熱結甚者內疎黃連湯

陳實功曰大便秘燥通利相宜

馮魯瞻曰人動輒疑人參熟地泥膈填中殊不知脾能健運腎能閉藏則祖氣有根而不拔元氣深藏而有源何有為脹為滿之患哉

又曰內外證最忌標實而本虛瀉之不可補之無功

傷醫大全 卷五 指南 聖 顧氏秘書

極為危險全在杜微防漸標本得宜使脾腎之元陽生發而陰邪之凝滯釋然矣

又曰肺氣既虛不可復行其氣腎水已衰不可重利其水

又曰內經塞因塞用之法少用則滋壅於上多服則峻補於下蓋中州虛乏壅滯必賴大補而流通其氣故參朮宜多用也

又曰治不足之法治有餘則可治有餘之法治不足則不可

又曰寒之不寒是無水也熱之不熱是無火也無水者壯水之主以鎮陽光無火者益火之原以消陰翳此達至理於繩墨之外也

又曰金匱腎氣丸補而不滯通而不泄誠治腫之神丹

又曰標症雖似有餘本症實由不足當以脉辨之

又曰凡癰疽瘡癤輕重緩急大有不同治之之法總宜察其虛實冷熱或重或輕對症發藥無失先後

次序治法當分初中末異初宜散熱解毒通經為

傷醫大全 卷五 指南 聖 顧氏秘書

主以圖消去中宜排托為主以圖散去餘毒末宜補宜托宜溫以圖易於收功此大法也

又曰一癰疽初作便宜灼艾及用藥外塗四圍中留口出毒如瘡小通敷之既潰以膏貼之以手探腫上熱者有膿不熱者無膿也

又曰凡肌肉傷而瘡口不斂者用六君子湯以補脾胃為主若氣虛惡寒而瘡口不斂者用補中益氣湯以補脾肺若血虛發熱而瘡口不斂者用四物湯以滋肝脾若膿多而瘡口不斂者用八珍湯

或十全大補湯以養血氣經曰脾主肌肉如前藥未應但用四君歸芪以補脾胃若更不應乃下元陽虛急用八味丸以壯火生土若脈數發渴者難治此直氣虛而邪氣實也

又曰按一切癰疽初起則邪毒未曾達表臟腑壅熱一毫熱藥不可用若既出膿後則毒氣外洩氣血皆虛胃氣自弱一毫涼藥不可用此古人之成法也然亦有氣血虛寒初起毒陷陰分者非陽和托裏何能升達在表既潰而陰血乾枯若非滋陰充

瘍醫大全

卷五

指南

醫

顧氏秘書

暢何能接續膿漿外則瘡毒枯焦內則口乾煩躁故全在以脈消息蓋氣主煦之血主濡之氣以成形血以華色故諸癰疽平塌不易高聳者乃陽氣虛弱不能逐毒以出陰分即爲陰毒也根紅散漫者亦氣虛不能拘血緊附也紅活光潤者氣血拘毒出外也外紅裏黑者毒滯於內也紫黯不明者氣血不充不能化毒成膿也膿色膿厚者氣血旺也膿色清淡者氣血衰也未出膿前或有有餘之熱既出膿後盡從不足之治但毒氣一分未盡不

瘍醫大全

卷五

指南

醫

顧氏秘書

可姑縱容留以致蔓延便成大患猶之養虎久必噬人氣虛不能逐毒者溫藉兼托陽和一轉陰分凝泣之滯自能冰解血虛不能化毒者尤宜滋補排膿故當潰膿毒氣未盡之時其托裏之功刻不可緩一容一縱毒即逗留一解一清毒即冰伏托裏不兼滋補氣血虛者何以成膿猶無米而使之炊飯也滋補不兼托裏僅可調和氣血何能直達潰所成功且毒氣盛者則反受其助猶裹粟以資盜糧矣滋補不兼溫煖則血凝氣滯孰作膿之具猶之造酒不煖何以成漿造飯無火何以得熟世人但知以毒爲火清火以解毒殊不知毒即火毒化而火亦清毒凝而火愈盛然毒之化必由膿膿之來必由氣血氣血之化必由火也火可清乎以清涼之法僅可施於瘡疥小毒耳若遇通經達絡之疽攻托尚虞不暇豈可復行清涼反傷胃氣以致陽氣不振難潰難長甚則肉以臙臙可不畏歟迨至毒既去盡紅潤肌生則和平補養氣血之中仍可佐以銀花國老以解有餘不盡之毒至如

連翹花粉亦能解毒傷胃氣便當禁用

程山齡曰凡癰疽服藥宜照顧脾胃為主不得已而用清涼但期中病切勿過劑初起時設有挾風寒者宜先用芫芫香蘇散一劑或萬靈丹蟾酥丸以散之散後而腫未消隨用銀花甘草湯四妙湯以和解之若腫勢熾痛大便閉結內熱極盛者則清藥中須兼補托之劑透膿散主之若膿水已潰必須托補元氣為主參芪內托散主之如元氣虛寒則補托藥中須加辛熱以佐之脾虛者理中湯參

癰醫大全

卷五 指南

巽

顧氏秘書

芪白朮散氣虛下陷者補中益氣湯胃經受寒飲食停滯者藿香正氣散氣血兩虛者十全大補湯加附子鹿茸間亦有虛而挾熱者即去附子肉桂加麥冬銀花丹皮以收功不可不知也大抵有陽毒有半陰半陽宜細辨之陽毒者瘡勢紅腫瘡頂尖聳根脚不散飲食如常口渴便秘五心煩熱脈洪數陰毒者瘡勢灰白平塌頂麻少痛根脚走散食少便澀手足厥冷口鼻氣冷脈沉遲半陰半陽者瘡雖紅腫不甚尖聳飲食差減大便不結寒熱

往來微渴喜熱脈虛軟此三者必須細辨俾用藥寒溫得宜方為合法治陽者清涼解毒治陰者溫中回陽半陰半陽之法清不傷胃溫不助邪如斯而已矣 十法

胡公弼曰癰疽最忌發汗恐表虛不能成膿後必難治 無愧青囊

又曰敗膿不出者用白芷不可用白朮蓋白朮能化毒生膿

經曰無陽則陰無以生無陰則陽無以化

癰醫大全

卷五 指南

巽

顧氏秘書

張景岳曰陰根於陽陽根於陰凡病有不可正治者當從陽以引陰從陰以引陽各求其屬而衰之如求汗於血生氣於精從陽引陰也又如引火歸源納氣歸腎從陰引陽也此即水中取火火中取水之義

又曰陰之病也來亦緩而去亦緩陽之病也來亦速而去亦速陽生於熱熱則舒緩陰生於寒寒則急

又曰寒邪中於下熱邪中於上飲食之邪中於中

又曰考之中藏經曰陽病則且靜陰病則夜寧陽虛則暮亂陰虛則朝爭蓋陽虛喜陽助所以朝輕而暮重陰虛喜陰助所以朝重而暮輕此言陰陽之虛也若實邪之候則與此相反凡陽邪盛者必朝重暮輕陰邪盛者必朝輕暮重此陽逢陽王陰得陰強也其有或晝或夜時作時止不時而動者以正氣不能主持則陰陽勝負交相錯亂當以培養正氣為主則陰陽將自和矣但或水或火宜因虛實以求之

傷醫大全

卷五 指南

吳

顧氏秘書

又曰病有六變者表裏寒熱虛實也是即醫中之關鍵明此六者萬病皆指諸掌矣以表言之則風寒暑濕火燥感於外者是也以裏言之則七情勞慾飲食傷於內者是也寒者陰之類也或為內寒或為外寒寒者多虛熱者陽之類也或為內熱或為外熱熱者多實虛者正氣不足也內出之病多不足實者邪氣有餘也外入之病多有餘又曰病必自表而入者方得謂之表證若由內以及外便非表證矣經曰從內之外者調其內從外之

內者治其外從內之外而盛於外者先治其內而後治其外從外之內而盛於內者先治其外而後調其內此內外先後之不可不知也

又曰熱在表者為發熱頭痛為丹腫斑黃為揭去衣被為諸痛瘡瘍○熱在裏者為脊悶脹滿為煩渴喘結或氣急叫吼或躁擾狂越○熱在上者為頭痛日赤為喉瘡牙痛為諸逆衝上為喜冷舌黑○熱在下者為腰足腫痛為二便秘澀或熱痛遺精或溲渾便赤

傷醫大全

卷五 指南

吳

顧氏秘書

又曰寒在表者為憎寒為身冷為浮腫為容顏青慘為四肢寒厥○寒在裏者為冷嘔腸鳴為惡心嘔吐為心腹疼痛為惡寒喜熱○寒在上者為吞酸為膈噎為飲食不化為噎腐脹噎○寒在下者為清濁不分為驚溇痛泄為陽痿為遺尿為膝寒足冷

又曰氣寒之脈必遲弱無神直熱之脈必滑實有力又曰陽臟之人多熱陰臟之人多寒陽臟者必平生喜冷畏熱即朝夕食冷一無所病此其陽之有餘

也陰臟者一犯寒涼則脾腎必傷此其陽之不足也第陽強者少十惟二三陽弱者多十常五六然恃強者多反病畏弱者多安寧

又曰假寒誤服熱藥假熱誤服寒藥等證但以冷水少試之假熱者必不喜水即有喜者或服後見嘔便當以溫熱藥解之假寒者必多喜水或服反快而無所逆者便當以寒涼藥解之

又曰今人病虛證者極多非補不可但用補之法不宜造次欲察其可補不可補之幾則全在先察胸

瘍醫大全 卷五 指南 李 顧氏秘書

腹之寬否何如然後以漸而進如未及病再為放膽用之庶無所得此用補之大法也

又曰凡勢在危急難容少緩亦必先問其胸寬者乃可驟進若元氣真虛而胸腹又脹是必虛不受補之證若強進補劑非惟無益適足以招謗耳

又曰制方用藥氣味有陰陽陰者降陽者升陰者靜陽者動陰者柔陽者剛陰者怯陽者勇陰主精陽主氣其於善惡喜惡皆有妙用

又曰氣味之升降升者浮而散降者沉而利宜升者

勿降宜降者勿升

又曰氣味之動靜靜者守而動者走走者可守者可安

又曰氣味剛柔柔者純而緩剛者躁而急純者可和躁者可劫非剛不足以去暴非柔不足以濟剛

又曰氣味之勇怯勇者直達病所可賴出奇怯者用以周全藉其平妥

又曰氣味之主氣者有能為精之母主精者有能為氣之根或陰中之陽者能動血中之氣或陽中之陰者能顧氣中之精

瘍醫大全 卷五 指南 李 顧氏秘書

又曰氣味有善惡善者賦性馴良儘堪擇用惡者氣味殘狠何必近之

又曰氣味有善惡有素性之喜惡有一時之喜惡者相宜取效尤易惡者見忌不必強投

又曰治病用藥本貴精專尤宜勇敢凡久遠之病則當要其終始治從乎緩此宜然也若新暴之病虛實既得其真即當以峻劑直攻其本拔之甚易若逗遛畏縮養成深固之勢則死生係之誰其罪也

故凡真見裏實則以涼膈承氣真見裏虛則以理中十全表虛則芪朮建中表實則麻黃柴桂之類但用一味爲君二三味爲佐使大劑進之多多益善夫用多之道何在在乎必賴其力而料無害者卽放胆用之性緩者可用數兩而性急者亦可數錢若三五七分說亦不過點名具數兒戲而已解分治劇之才舉動固如是乎

又曰治病之則當知邪正當權重輕凡治實者譬如耘禾禾中生稗禾之賊也有一去一有二去二耘

傷醫大全

卷五 指南

奎

顧氏秘書

之善者也若有一去二傷一禾矣有二去四傷二禾矣若識禾不的俱認爲稗而計圖盡之則無禾矣此用攻之法貴乎察得其宜不可過也凡治虛者譬之給餉一人一升十人一斗日餉足矣若百人一斗千人一斛而三軍之衆又豈担石之糧所能活哉一餉不繼將并前餉而棄之而况於從中尅減乎此用補之法貴乎輕重有度難從簡也又曰虛實之治大抵實能受寒虛能受熱所以補必兼溫瀉必兼涼者蓋涼爲秋氣陰主殺也萬物逢

之便無生長欲補元氣故非所宜涼且不利於補

寒者益可知矣卽有火盛氣虛宜補以涼者亦不

過因火暫用火去卽止終非治虛之法也又或有

以苦寒之物謂其能補陰者則內經有曰形不足

者溫之以氣精不足者補之以味夫氣味之相宜

於人者謂之曰補可也未聞以味苦氣劣而不相

宜於人者亦可謂之補也雖內經有曰水位之主

其瀉以鹹其補以苦等論然此特以五行歲氣之

味據理而言耳矧其又云麥羊肉杏薤皆苦之類

傷醫大全

卷五 指南

奎

顧氏秘書

是則苦而補者也豈若大黃黃柏之類氣味苦劣

若此而謂之能補無是理也嘗聞之王應震曰一

點真陽寄坎宮固根須用味甘溫甘溫有益寒無

補堪笑庸醫錯用功此一言蔽之也不可不察

又曰補瀉之法補亦治病瀉亦治病但當知其要也

如以新暴之病而少壯者乃可攻之瀉之攻但可

用於暫未有衰久之病而屢攻可以無害者故攻

不可以收緩功延久之病而虛弱者理宜溫之補

之補乃可用於常未有根本既傷而舍補可以復

元者故補不可以求速效然猶有其要則凡臨證治病不必論其有虛證無虛證但無實證可據而為病者便當兼補以調榮衛精血之氣亦不必論其有火證無火證但無熱證可據而為病者便當兼溫以培命門脾胃之氣此補瀉要領苟不知此未有不至決裂敗事者

又曰治法有逆從以寒熱有假真也此內經之旨也經曰逆者正治從者反治夫以寒治熱以熱治寒此正治也正即逆也以熱治熱以寒治寒此反治

也反即從也如以熱藥治寒病而寒不去者是無火也當治命門以參熟桂附之類此王太僕所謂

益火之源以消陰翳是亦正治之法也又如熱藥治寒病而寒不退反用寒涼而愈者此正假寒之病以寒從治之法也○又如以寒藥治熱病而熱不除者是無水也治當在腎以六味丸之類此王太僕所謂壯水之主以鎮陽光是亦正治之法也又有寒藥治熱病而熱不愈反用參茸桂附八味丸之屬而愈者此即假熱之病以熱從治之法也

傷醫大全 卷五 指南 書 顧氏秘書

亦所謂甘溫除大熱也第今人之虛者多實者少故真寒假熱之病為極多而真熱假寒之病則僅見耳

又曰探病之法不可不知如當局臨證或虛實有難明寒熱有難辨病在疑似之間補瀉之意未定者即當先用此法若疑其為虛意欲用補而未決則以輕淡消導之劑純用數味先以探之消而不投即知為真虛矣疑其為實意欲用攻而未決則以甘溫純補之劑輕用數味先以探之補而覺滯即

知有實邪也假寒者暑溫之必見躁煩假熱者暑寒之必加嘔惡探得其情意自定矣經曰有者求之無者求之又曰假者反之此之謂也但用探之法極宜精簡不可雜亂精簡則真偽立辨雜亂則是非難憑此疑似中之活法必不得已而用之可也

華元化曰大凡治療脈不緊數則勿發其汗脈不實數不可以下心胸不閉尺脈微弱不可以吐關節不急營衛不壅不可以鍼陰氣不盛陽氣不衰勿

傷醫大全 卷五 指南 書 顧氏秘書

灸內無客邪勿導引外無活氣勿按摩皮膚不痺
勿蒸燂肌肉不寒勿煖洗神不凝迷勿愉悅氣不
奔急勿和緩順此者生逆此者死耳
論曰汗家不可發汗陽虛不得重發汗萬靈丹發汗
藥不可投

湯醫大全

卷五

指南

素

顧氏秘書

癰疽論

生氣通天論曰膏粱之變足生大疔受如持虛

癰疽篇黃帝曰血氣已調形氣乃持余已知血氣之
平與不平未知癰疽之所從生成敗之時死生之
期有遠近何以度之可得聞乎岐伯曰經脈流行
不止與天同度與地合紀故天宿失度日月薄蝕
地經失紀水道流溢草莖不成五穀不殖徑路不
通民不往來巷聚邑居則別離異處猶然請言其
故夫血脈營衛周流不休上應星宿下應經數寒

湯醫大全

卷五

癰疽論

素

顧氏秘書

邪客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛
氣歸之不得復反故癰腫寒氣化為熱熱勝則腐
肉肉腐則為膿膿不寫則爛筋筋爛則傷骨骨傷
則髓消不當骨空不得泄寫血枯空虛則筋骨肌
肉不相榮經脈敗漏薰於五藏藏傷故死矣 黃
帝曰願盡聞癰疽之形與忌曰名岐伯曰癰發於
嗑中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不寫塞咽半
日死其化為膿者寫則合豕膏冷食三日已 發
於頸名曰天疽其癰大以赤黑不急治則熱氣下

入淵腋前傷任脉內薰肝肺薰肝肺十餘日而死矣 陽氣大發消腦留項名曰腦爍其色不樂項痛而如刺以針煩心者死不可治 發於肩及臑名曰疵癰其狀赤黑急治之此令人汗出至足不害五臟癰發四五日逞熇之 發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疎砭之塗以豕膏六日已勿裏之其癰堅而不潰者為馬刀挾纒急治之 發於胸名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治下入腹不治七日死矣 發於膺名曰

癰醫大全 卷五 癰疽論 素 顧氏秘書

治十日而當死 發於膝名曰疵癰其狀大癰色不變寒熱如堅石勿石石之者死須其柔乃石之生 諸癰疽之發於節而相應者不可治也發於陽者百日死發於陰者三十日死 發於脛名曰兔齧其狀赤至骨急治之不治害人也 發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變數石其輪而止其寒熱不死 發於足上下名曰四淫其狀大癰急治之百日死 發於足傍名曰厲癰其狀不大初如小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死 發於足指名脫癰其狀赤黑死不治不赤黑不死不衰急斬之不則死矣

玉版篇黃帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣有餘營氣不行乃發為癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化為膿小鍼能取之乎岐伯曰以小治小者其功小以大治大者多害故其已成膿血者其唯砭石鉞鋒之所取也黃帝曰多害者其不可全乎岐伯曰其在逆順焉以為傷者其白眼青黑眼小是一逆也內藥而嘔者是二逆也腹痛

癰醫大全 卷五 癰疽論 素 顧氏秘書

渴甚是三逆也肩項中不便是四逆也音嘶色脫是五逆也除此五者為順矣

寒熱病篇曰五藏身有五部伏兔一腓二腓者背三

五臟之論在背 膈四項五此五部有癰疽者死 凡刺之

害中而不去則精泄不中而去則致氣精泄則病甚而恆致氣則生為癰疽也

生氣通天論曰汗出見濕乃生痲痺陷脈為癰留連

肉腠 因而飽食筋脈橫解腸澀為痔

陰陽別論曰三陽為病發寒熱下為癰腫

傷醫大全

卷五 癰疽論

顧氏秘書

氣穴論曰肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間

谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉

敗榮衛不行必將為膿內消骨髓外破大腸留於

節湊必將為敗積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋肋

肘不得伸內為骨痺外為不仁命曰不足大寒留

於谿谷也

刺節真邪論曰虛邪之中人也洒淅動形起毫毛而

發腠理其入深內搏於骨則為骨痺搏於筋則為

筋攣搏於脈中則為血閉不通則為癰 虛邪之

人於身也深寒與熱相搏久留而內著寒勝其熱

則骨疼內枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿肉傷骨

內傷骨為骨蝕 有所疾前筋筋屈而不得伸邪

氣居其間而不反發為筋溜 有所結氣歸之衛

氣留之不得反津液久留合而為腸溜 久者數

歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液留之

邪氣中之凝結日以易甚連以聚居為昔瘤 以

手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣并日

以益大則為骨疽 有所結中於肉宗氣歸之邪

留不去有熱則化為膿無熱則為肉疽 凡此數

氣者其發無常處而有常名也

氣交變大論曰歲火太過民病身熱骨痛而為浸淫

歲金太過民病兩脇下少腹痛目赤痛背癆耳

無所聞 歲木不及復則炎暑流火濕性燥病寒

熱瘡瘍癰疹癰疽 歲金不及復為寒雨暴至民

病口瘡 歲水不及民病寒癆流水

五常政大論篇曰委和之紀其病支廢癰腫瘡瘍

卑監之紀其動瘍涌分潰癰腫 赫羲之紀其病

癰腫

笑瘡瘡瘍 堅成之紀其動暴折瘍症 少陽司
天火氣下臨鼻塞瘡瘍 太陽司天寒氣下臨甚
則肘腫身後癰 少陰司天熱氣下臨甚則瘡瘍
地有高下氣有溫涼高者氣寒下者氣熱故適
寒涼者脹適溫熱者瘡下之則脹已汗之則瘡已
經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火

經曰諸癰腫筋管痛者此寒氣之腫八風之變也
經曰邪之所湊其正必虛着而不去其病為實又曰
榮氣不從逆於肉裡乃生癰腫營逆則血鬱氣鬱
則熱聚為膿故為

癰腫癰腫 熱之所過則亦癰腫熱勝則陽氣內鬱故浮
腫暴作榮氣亦逆於肉

也癰腫 熱之所過則亦癰腫熱勝則陽氣內鬱故浮
腫暴作榮氣亦逆於肉
裏聚為癰 又曰寒傷形熱傷氣氣傷痛形傷腫熱
膿之腫矣

傷氣則熱結於肉分而故痛寒之傷形
則寒薄於皮腠所以堅凝而腫斯作也 先痛而後
腫者氣先受傷而形亦受傷也先腫而後痛者形
先受傷而氣亦受傷也故有形不痛者陽傷無形
有痛者陰傷更有汗方發泄寒水浴之以致熱鬱
皮裡濕邪凝結甚為痙癰輕為痲瘡亦有陽氣不
固邪氣入於陷脉陷脉者謂寒邪陷缺其脉積寒
於中經血稽凝久瘀內攻積於肉裡發為鼠瘻又

曰膏梁之變足生大疔又曰五臟不和九竅不通
六腑不和留結為癰凡瘡腫高而軟者發於血脉
下而堅者發於筋脉肉色不變者發於骨髓故分
氣血虛實熱毒深淺為要切不可一見其腫便謂
熱毒實熱輒投下劑意謂毒從瀉出殊不知陽者
紅腫焮起陰者青白而陷疽者附筋骨而生皆賴
血氣為主經所謂氣主煦之血主濡之倘元氣受
傷而不能煦濡則下陷不膿能禁其不內攻乎

經曰天空西北左寒而右涼地不滿東南右溫而左

濕東南方陽也陽精降於下故右熱而左濕西北

方陰也陰精奉於上故左寒而右涼適寒涼者脹
而濕熱者瘡下之則脹已汗之則瘡已夫東南二
方在人則丙小腸熱甲膽風皆俱下性炎上其瘡
外有六經形證內無便溺阻隔飲食如故小便自
調知不在裡非疽也癰癩小為癰大為癰其邪受
風濕地氣自外而來侵內經云榮氣不從逆於肉
理乃生癰腫諸瘡痛癢皆屬心火此瘡自外而入
是丙小腸左遷入膽作痛而非癢此二方皆主血

為病為痛此元氣不足榮氣逆行其初出未有傳變在於肌肉之上皮膚之間只於風熱六經所行經絡地分出也宜瀉風濕熱醫者只知陰復其陽則宜汗此宜汗者乃濕熱鬱手足少陽致血脈凝逆榮衛不能週身元氣消弱也其風濕熱滯於下故面赤腫微黯風水惟上衝顏色多怒其瘡色腫微黯瘡熱高起結硬作痛其脈止在左手左屬表左寸外洪緩而陰是客邪在血脈之上皮膚之間宜急發汗通榮衛則邪去矣宜內托榮衛湯

瘍醫大全

卷五 癰疽論

李 顧氏秘書

經曰脈細皮寒瀉痢前後飲食不進此為五虛瘡瘍最忌

張仲景曰癰疽最難治外尚未現直形內已先潰大穴古人云外大如豆內大如拳外大如拳內大如盤信不爽也

劉河間曰人近火者微熱則癢熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也或癢痛如針輕刺者猶飛迸火星灼之然也或疑瘡瘍皆屬火熱而反腐出膿水者何也猶穀肉菓菜熱極則腐爛而潰為污水

大熱過極反兼水化也

李東垣曰疽初生如黍米大癢痛有異候觸破之即焮展四畔赤腫沉悶牽引脇肋疼痛數日之後漸覺肌膚壯熱惡寒煩渴腫暈侵展癩漿汁出積日不潰抑之則流血者謂之發背疽也發於腦者為腦疽發於鬢眉髻者以類呼也又有其狀無頭腫潤三四寸始覺注悶疼痛因循數日皮光微軟者甚則亦令人惡寒發熱頭痛煩渴者謂之發背癰也又有初生一頭色浮赤而無根腫見於皮膚之間大小一二寸者癰也三者惟疽最重此疾皆因滋味與厚衣衣服厚暖則表易招寒滋味過多則五臟生熱臟腑積熱則血脈不流而毒氣凝滯邪氣伏留熱搏於血血聚則肉潰成瘡淺則為癰實則為癰深則為疽矣亦有因服金石發動而成亦有平生不服金石藥而患者乃由父母曾服餌者其毒氣流傳子孫此病初起認是疽則宜速療之

瘍醫大全

卷五 癰疽論

李 顧氏秘書

又曰夫瘡腫之患莫大乎癰疽然而癰疽何以別之

經所謂榮衛稽留於筋脉之中則澁不行血脉不行則陽氣鬱遏而不通故生寒熱穢毒之氣騰出於外蓄結為癰久而不散熱氣乘之腐化為膿然而骨髓不焦枯臟腑不傷敗可治而愈也何為疽五臟風毒積熱毒熱熾甚下陷肌膚骨髓將枯血氣涸竭其腫色天堅如牛領之皮故命曰疽癰者其腫皮薄以澤此其候也癰疽之生有內有外內生胸腹臟腑之中外生膚肉筋骨之表凡此二毒發無定處而有常名夫鬱滯之本始於喜怒哀樂不特飲食居處不節或金石草藥之發動寒暑燥濕之不調使陰陽之不平而蘊結於外使榮衛凝澀而腐潰輕者起於六腑浮達而為癰氣行經絡而浮也重者發於五臟沉澁而為疽氣行經絡而沉也明乎二者腫毒丹疹可以類推矣

又曰夫瘡候多端欲辨深淺直須得法若不素知方論而妄生穿鑿者如大匠捨其繩墨以意度量安能中於規矩哉嘗聞古人有言曰多則惑少則得簡而論之則瘡疽槩舉有三種高而軟者發於血

瘍醫大全 卷五 瘡疽論 李 顧氏秘書

脉腫下而堅者發於筋骨肉皮色不相辨者發於骨髓又曰凡瘡瘡疽以手按搖瘡腫根牢而大者深也根小而浮者淺也又驗其人初生瘡之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩燥飲冷者其患瘡疽必深也若人雖患瘡疽起居和平飲食如常其疾浮淺也惡瘡初生其頭如米粟微似有痛癢誤觸破之即焮展覺有深意速服犀角湯及漏蘆湯通氣丸等取通利踈暢兼用浴毒湯塌浸之類若浮淺者粘貼膏求差以此推之淺深之辨始

終之次者也

又曰夫熱發於皮毛之間是以浮腫根小至大不過二三寸者癰也六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚腫皮光軟侵展廣大者癰也五臟風積熱攻焮於肌骨風毒猛暴初生一頭如痞癰白焦枯觸之應心者疽也蓋癰發於六腑若燎原之火外潰膚肉疽生五臟沉澁難療若陶室之燧內銷骨髓癰則易療惟難將息而遲瘡疽則難療易得痊復夫瘡與瘡初生並宜灸之謂其氣本浮達以導

瘍醫大全 卷五 瘡疽論 李 顧氏秘書

其熱令速暢也疽則烙不宜灸謂其根本深沉須
達其原也凡瘡疽生於外皆由熱毒蘊於內明乎
三者其餘可以類推矣蓋皮膚微高起而肌厚或
痛或癢移走無常者謂之腫有因風而得之者有
因風熱相搏而得之者久久而不消熱勝於風若
不即治血不流通與氣乘之以成膿也又曰風多
則癢熱多則痛此為驗也

又曰夫患癰疽之人慎勿着惱若觸着多致膿成敗
潰

癰醫大全 卷五 癰疽論 朱 顧氏秘書

朱丹溪曰癰疽乃陰陽相滯而生氣陽也血陰也血
行脉中氣行脉外相並周流寒與濕相搏則凝滯
行遲為不及熱與火搏之則沸騰行速為太過氣
得邪而鬱津液稠粘為痰為飲積久滲入脉中血
為之濁此陰滯於陽也血得邪而鬱隧道阻滯或
溢或結積久滲出脉外氣為之亂此陽滯於陰也
百病皆由於此不止癰疽而已故癰腫初起便熨
痛腫大者可治不痛熱腫大而陷者不治也

又曰衣厚仍寒孤陰無濟衣薄仍熱孤陽獨存陽虛

極宜補陽陰虛極當益腎

又曰腰背反張頸項強直為變瘞之兆口噤作冷寒
戰咬牙斯絕命之期

竇太師曰發背之生積毒於臟腑正氣盛淹留停緩
元氣虛則朝輕夕重如發弓矢外小內大內托則
生敗毒則斃治法以參芪為主一定之論也百世
不易凡癰發於背廣一尺深可一寸雖潰至骨不
穿膜不死 經驗全書

孫思邈曰瘡之要害處近虛處怯薄處當細心醫治
也

癰醫大全 卷五 癰疽論 朱 顧氏秘書

喻嘉言曰夫瘡毒已潰治當大補氣血
又曰膿出反痛虛之過膿多不斂弱之因
王肯堂曰方書叙癰疽之源有五一天行時氣二七
情內鬱三體虛外感四身熱搏於風冷五食炙燔
飲法酒服丹石等熱毒總之不出於三因也 外
因者運氣癰疽有四一火熱助心為瘡經云少陰
所至為瘡疹又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從
甚則瘡瘍又云少陰司天之政初之氣寒乃始陽

氣鬱炎暑將起中外瘡瘍又云少陽所至為瘡瘍
 又云少陽司天之政風熱參布太陰橫流寒乃時
 至民病寒中外發瘡瘍初之氣候乃大溫其病膚
 腠中瘡二之氣火反鬱其病熱鬱於上瘡發於中
 三之氣炎暑至民病膿瘡又云太陽司天之政初
 之氣氣乃大溫肌腠瘡瘍此皆常化病之淺也又
 云少陰司天熱淫所勝甚則瘡瘍又云少陰司天
 客勝甚則瘡瘍又曰少陰之復病痲疹瘡疽癰瘰
 痔又云火太過曰赫羲其病瘡疽血流又云火鬱
 之發民病瘡瘍癰腫此是邪變病之甚也 二曰
 寒邪傷心為瘡瘍經云太陽司天之政三之氣寒
 氣民病寒反熱中癰疽注下又云太陽司天寒淫
 所勝血變於中發為癰瘍病本於心又云陽明司
 天之政四之氣寒雨降民病癰腫瘡瘍是也 三
 曰燥邪傷肝為瘡瘍經云木不及曰委和上商與
 正商同其病支發癰腫瘡瘍邪傷肝也又云陽明
 司天燥淫所勝民病瘡瘍瘰癧病本於肝是也
 四曰濕邪瘡瘍經云太陰司天濕氣變物甚則身

瘍醫大全

卷五

癰疽論

三

顧氏秘書

後癰又云太陰之勝火氣內鬱瘡瘍於中流散於
 外是也此四條所謂天行時氣者也 素問脉要
 精微論帝曰諸癰腫筋攣骨痛此皆安生岐伯曰
 此寒氣之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰
 此四時之病以其勝治之愈也 靈樞經癰疽篇
 云血脉榮衛周流不休上應星宿下應經數寒邪
 客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣
 歸之不得復反故癰腫寒氣化為熱熱甚則腐肉
 腐肉則為膿膿不泄則爛筋筋爛則傷骨骨傷則
 髓消不當骨空不得泄瀉血枯空虛則筋骨肌肉
 不相榮經脉敗漏熏於五臟臟傷故死矣 生氣
 通天論云勞汗當風寒薄為皴鬱乃瘰又云陽氣
 者開闔不得寒氣從之乃生大瘰榮氣不從逆於
 肉裏乃生癰腫是亦邪從勞汗之隙及陽氣開闔
 不得其理之隙久客之為癰腫也所謂體虛外感
 及身熱搏於風冷者也治法則精要十宣散五香
 湯藥古蒼朮復煎散等發表之劑是也 內因者
 陳無擇云癰疽癰瘰不問虛實寒熱皆出氣鬱而

瘍醫大全

卷五

癰疽論

三

顧氏秘書

成經云氣宿於經絡與血俱滯而不行壅結為癰疽不言熱之所作而後成癰者此乃喜怒哀思有所鬱而成也治之以遠志酒獨勝散兼以五志相勝之理如怒勝思之類是也 不內外因者經所謂膏粱之變足生大疔更如持虛又東方之域委鹽之地其民食委嗜鹹安其處美其食委熱中鹹勝血故其民黑色踈理其病為癰疽又有服丹石法酒而致者亦膏粱之類也李東垣曰膏粱之變亦是滋味過度榮氣下從逆於肉裏榮氣者胃氣也飲食入胃先輸於脾而朝於肺肺朝百脉次及皮毛先行陽道下歸五臟六腑而氣口成寸矣今富貴之人不知其節法酒肥羊雜以厚味積久太過其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走空竅而先行陽道乃反行陰道則濕氣大勝子令母實火乃大旺熱濕既盛必來尅腎若不慎房事損其真水水乏則從濕氣之化而上行其瘡多出背上及腦此為大疔之最重者若毒氣出肺或脾胃之部分毒之次也若出於他經又其次也濕熱之毒所

癰醫大全 卷五 癰疽論 顧氏秘書

止處無不潰爛故經言膏粱之變足生大疔更如持虛者如持虛器以受物則無不受矣治大疔之法必當瀉其榮氣以標本言之先受病為本非苦寒之劑為主為君不能除其苦楚痛疼也如東垣治元好問丹溪治老婦腦疽皆因好酒故以三黃大黃酒製治之又如排膿散當歸散之類是也又有盡力房室精虛氣節之所致者亦屬不內外因當以補虛內托為主亦忌用五香之藥耗真陰而助邪熱治之之藥如內固黃芪湯神效托裏散之類也 經云五臟菹熱癰發六腑又云六腑不和留結為癰又云諸痛癢瘡皆屬於心肺乘肝則為癰腎移寒於肝癰腫少氣脾移寒於肝癰腫筋攣此皆臟腑之變亦屬內因者也 東垣曰生氣通天論云榮氣不從逆於肉裏乃生癰腫又云膏粱之變足生大疔受如持虛陰陽應象論云地之濕氣感則害人皮肉筋脉是言濕氣外傷則榮氣不行營衛者皆營氣之所經營也榮氣者胃氣也運氣也榮氣為本本逆不行為濕氣所壞而為瘡瘍

癰醫大全 卷五 癰疽論 顧氏秘書

也音梁之變亦是言厚滋味過度而使榮氣逆行
 疑於經絡為瘡瘍也此邪不在表亦不在裏唯在
 其經中道病也以上內經所說俱言因榮氣逆而
 作也徧看諸瘡瘍論中多言二熱相搏熱化為膿
 者有只言熱化為膿者有言濕氣生瘡寒化為熱
 而為膿者此皆癰疽之源也宜於所見部分用引
 經藥並兼見證中分陰證陽證先瀉營氣是其本
 本逆助火濕熱相合敗壞肌肉而為膿血者此治
 次也宜遠取諸物以比一歲之中大熱無過夏當
 傷醫大全 卷五 癰疽論 顧氏秘書

是時諸物皆不壞爛壞爛者交秋濕令大行之際
 也近取諸身熱病在身止顯熱而不敗壞肌肉此
 理明矣標本不得邪氣不服言一而知百者可以
 為上工矣 癰醫準繩
 又曰靈樞經云榮衛稽留於經脈之中則血泣而不
 行不行則衛氣從之而不通壅遏而不得行故熱
 大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能陷肌
 膚骨髓不為焦枯五臟不為傷故命曰癰 熱氣
 淳盛下陷肌膚筋髓枯內連五臟血氣竭當其癰

下筋骨良肉皆無餘故命曰疽 疽者上之皮天
 以堅上如牛領之皮 癰者其皮上薄以澤此其
 候也 鬼遺方云癰之痛只在皮膚之上其發如
 火焚茅初如黍米大三兩日如掌面大五七日如
 椀面大即易治如腫冷發渴發逆治之難愈 疽
 發或如小癰觸則徹心痛四邊微起如橘皮孔色
 紅赤不全變膿水不甚出至七八日疼悶喘急不
 止若始發腫高五七日忽平陷者此內攻之候也
 又云癰疽有三等毒氣浮淺屬腑毒氣深沉屬
 傷醫大全 卷五 癰疽論 顧氏秘書

臟毒氣猛裂而行經絡或淺或深無定五臟六腑
 皆受之毒難為調理唯宜急切於癰發諸處不問
 虛實高腫起盛光澤疼痛只在皮膚之上熱急脹
 滿或有癢疼別無惡候初用溫藥平氣次用排膿
 發穴 治癰所謂平氣者犀角飲之類其方用犀角
 連翹漏蘆甘草當歸肉桂皆發表之藥也所
 謂發穴者乃棘針之類用皂角刺為君甘草川芎
 乳香為佐使亦托裏之藥也然不若尋常東垣諸
 方發表托裏為穩當
 又曰疽發諸處不拘大小惟起在背廣一尺二尺三
 尺皮厚而紫黑高腫不常內疼如錐刺攻擊滿悶

應四肢重疼前心亦痛餘處發猶可唯虛處及近筋骨處若膿毒未潰卽傷爛筋骨肉損爲疽者屬五臟毒氣深沉多氣伏硬堅實而不宜緩慢治之須內實五臟外透皮膚令軟勻和卽膿透宜用內托實臟氣之藥排膿勻氣乃可不比癰之毒氣浮淺也母作一類治之

又曰凡一切瘡腫始覺患起高腫五七日忽平陷者此是內攻之候也急以內托散及內補湯藥補填臟腑令實最怕透膜穿十無一生矣

瘍醫大全

卷五

癰疽論

美

顧氏秘書

婁全善曰癰之邪淺其稽留壅遏獨在經絡之中而專攻於外故初發時自表便發熱患處便如碗如盆高腫而痛甚者縱欲下陷得正氣內固不肯受故或便秘或發渴發逆以拒之是以骨髓終不焦枯五臟終不傷也疽之邪深其稽留壅遏內連五臟而不專攻於外故身體無熱患處或不腫痛甚者聲嘶氣脫眼黑眼小十指腫黑如墨多死也治之之法癰之初發當以紫古法爲主表者散之裏者下之火以灸之藥以敷之膿未成者必消膿已

成者速潰也疽之初發當以鬼遺乃爲主補填臟腑令實勿令下陷之邪蔓延外以火灸引邪透出使有穴歸着而不亂則可轉死回生變凶爲吉今世外科不分癰疽一例宜熱拔毒外以五香耗其氣內以大黃竭其血終不能自悟其用藥之非惜哉

紫古云瘡瘍者火之屬須分內外若其脉沉實當先疎其內以絕其源也其脉浮大當先托裡恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至甚過絕經絡故發

瘍醫大全

卷五

癰疽論

美

顧氏秘書

癰腫經曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫此因失托裡及失疎通又失和榮衛也治瘡之大要須明托裡疎通行榮衛三法托裡者治其外之內疎通者治其內之外行榮衛者治其中也內之外者其脉沉實發熱煩躁外無焮赤痛甚邪氣深於內也故先疎通臟腑以絕其源內疎黃外之內者其脉連湯浮數焮腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏以防其干也內托復煎散內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宜通知其在經當和榮衛也當歸黃芪

湯 用此三法之後雖未瘥必無變證亦可使邪氣
峻減而易痊也

三因云癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經
曰氣宿於經絡與血俱滯而不行壅結為癰疽不
言熱之所作而後成癰者此乃因喜怒憂思有所
鬱而成也

精要云瘡疽憤鬱不遂志欲之人多犯此疾

張景岳曰凡瘡瘍之患所因雖多其要惟內外二字
證候雖多其要惟陰陽二字知此四者則盡之矣

瘍醫大全

卷五 癰疽論

朱 顧氏秘書

然內有由臟者有由腑者外有在皮膚者有在筋
骨者此又其淺深之辨也至其為病則無非血氣
壅滯營衛稽留之所致蓋凡以鬱怒憂思或淫慾
丹毒之逆者其逆在肝脾肺腎此出於臟而為內
病之最甚者也凡以飲食厚味醇酒炙燂之壅者
其壅在胃此出於腑而為內病之稍次者也又如
以六氣之外襲寒暑之不調侵人經絡傷人榮衛
則凡寒滯之毒其來徐來徐者其入深多犯於筋
骨之間此表病之深者也風熱之毒其來暴來暴

者其入淺多犯於皮肉之間此表病之淺者也何
也蓋在臟在骨者多陰毒陰毒其甚也在腑在膚
者多陽毒陽毒其淺也所以凡察瘡瘍者當識癰
疽之辨癰者熱壅於外陽毒之氣也其腫高其色
赤其痛甚其皮薄而澤其膿易化其口易斂其來
速者其愈亦速此與臟腑無涉故易治而易愈也
疽者結陷於內陰毒之氣也其腫不高其痛不甚
其色沉黑或如牛領之皮其來不驟其愈最難或
全不知痛癢甚有瘡毒未形而精神先困七惡疊

瘍醫大全

卷五 癰疽論

朱 顧氏秘書

見者此其毒將發而內先敗大危之候也知其陰
陽內外則癰瘍之槩可類見矣然此以外見者言
之但癰瘍之發原無定所或在經絡或在臟腑無
不有陰陽之辨若元氣強則正勝邪正勝邪則毒
在腑在腑者便是陽毒故易發易收而易治元氣
弱則邪勝正邪勝正則毒在臟在臟者便是陰毒
故難起難收而難治此之難易全在虛實實者易
而虛者難也速者易而遲者難也所以凡察癰疽
者當先察元氣以辨吉凶故無論腫瘍潰瘍但覺

元氣不足必當先慮其何以收局而不得不預爲之地萬一見病治病且顧目前則鮮不致害也其有元氣本虧而邪盛不能容補者是必敗逆之證其有邪毒熾盛而脉證俱實者但當直攻其毒則不得誤補助邪所當詳辨也 全書

馬益卿癰疽論曰人有四肢五臟一覺一寐呼吸吐納精氣往來流而爲營衛暢而爲氣色發而爲聲音陽用其形陰用其精此人之常數所同也至其失也蒸則生熱否則生寒結則爲癰贅陷則爲癰

癰醫大全

卷五

癰疽論

全

顧氏秘書

疽

伍氏曰癰疽之疾有二十餘證曰燥發癰發石發岩發蜂窠發蓮子發椒眼發連珠發竟體發腸癰內發腦發背發眉發腮頰發肺癰瓜瓠發大率隨病淺深內外施治不可遲緩初發如傷寒脉浮而緊是其候也

又曰五臟六腑俞穴皆在背凡患瘡證有傷臟膜者多致不救腑氣浮行於表故癰腫浮高爲易治臟血沉寒主裡故疽腫內陷爲難治

又曰癰者節也癰者壅也疽者沮也一寸至二寸爲癰三寸至五寸爲癰一尺爲疽一尺至二尺爲竟體疽若脉洪數者難治脉微瀋者易治初覺宜清熱拔毒已潰則排膿止痛膿盡則長肌敷藥當酌輕重順逆而審治之

發揮曰大抵發背腦疽脫疽腫痛色赤者乃水衰火旺之色可治若黑若紫則火極似水之象乃其腎水已竭精氣枯涸也決不治又骨髓不枯臟腑不敗者可治若老弱患此瘡頭不起或腫硬色天堅如牛領之皮脉更瀋此精氣已絕矣不可治或不及待潰而死有潰後氣血不能培養者亦死

癰醫大全

卷五

癰疽論

全

顧氏秘書

後汗律歷志驚蟄晷長八尺二寸未當至而至多病癰疽脛腫

蔣示吉曰夫虛極傳變驚悸怔忡牙關緊閉而臥不寧或發熱惡寒作渴自汗盜汗手撒身熱脉洪大按之如無俱惡症也 說約

又曰根脚赤暈口不收此餘毒未盡之故
又曰膿少肉白肉不長此停住寒邪之過

又曰破傷風皆因風襲破傷濕亦為濕侵

又曰初起宜腫不宜癢潰後作癢是長肉潰後宜癢

不宜痛初起不痛是純陰

又曰不痛大痛非佳兆或麻或癢最難醫

又曰飲食不化脾虛飲食不思胃弱

陳寶功曰夫癱者壅也為陽屬六腑毒騰于外其發

暴而所患浮淺因病原于陽分中蓋陽氣輕清浮

而高起故易腫易膿易腐易斂誠為不傷筋骨易

治之症疽者沮也為陰屬五臟毒攻於內其發緩

瘍醫大全

卷五

癰疽論

全

顧氏秘傳

而所患深沉因病原稟於陰分中蓋陰血重濁性

質多沉故為傷筋蝕骨難治之症也凡年壯氣血

勝毒則順年老毒勝氣血則險七情六慾發則為

疽為痰核癭瘤之類七情者喜傷心怒傷肝憂傷

肺思傷脾悲傷於魂魄恐傷腎驚傷胆六慾者耳

聽聲音眼觀物色鼻聞香氣舌貪滋味心惟天地

意握萬方諸病諸瘡皆由於此等之情慾也六淫

之氣發則為癰為風癬疥癩之類六淫者風為四

時不正浩蕩肅殺之氣發而最能中人寒乃節候

不調疾風暴雨冰雪嚴寒所傷或口貪生冷之物

暑因亢陽酷日燠火流金濕熱薰蒸而中濕從坐

臥久陰卑濕之地或身驟臨風雨潮氣所侵燥為

陰虛內熱消燂津液不能滋潤臟腑以致皮膚枯

槁便乾為燥火生於心緒煩擾醇酒膏粱房慾不

閑所動邪氣客於臟腑經絡關節之內積蘖日久

或待內傷或因外感邪氣觸而發之也又有膏粱

厚味醇酒肥鮮炙博爽口快心不顧銷陰燂臟與

陽澁精取之快意於一時不覺陰銷平日大瘡惡

瘍醫大全

卷五

癰疽論

全

顧氏秘傳

毒多起於膏粱不生於蒸薰但凡患癰疽未有不

先傷五臟而後發之者當辨陰陽順逆治之總之

瘡瘍慢腫難治癩腫易愈慢腫者肉腫瘡不腫癩

腫者瘡腫肉不腫順症根脚鮮明險症四圍平塌

經曰氣盛兮頂自高而突起血盛兮根脚束而無

疑此之謂也

正宗

馮曾瞻曰癰疽之疾多生膏粱炙博嗜慾之人虛邪

熱毒煎熬氣血而成癰者壅也壅滯於陽絡也大

而高起屬於陽其脉浮數故多由於六腑疽者沮

也沮伏於陰經也平而內發屬乎陰其脉沉數故
多由於五臟癰者如錯痛之結著也瘡者毒之總
名也經曰諸痛癢瘡皆屬心火夫諸瘡之中惟背
疽疔瘡最為急症次莫如腦疽癰癤喉癰亦其急
者也 錦囊

又曰夫人之瘡腫因內熱外虛為風濕之所乘蓋肺
主皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開而風濕所乘且
脾氣而內熱即生瘡也腫者由寒熱之毒氣客于
經絡使血澁而不通壅結成腫風邪內作者無頭

瘍醫大全

卷五

癰疽論

全

顧氏秘書

無根氣血相搏者有頭有根壅結盛而熱勝血則
為膿矣其毒小者氣血自然能潰能收不必憂治
大而重者血氣恐難任之必假藥力佐助氣血以
為運行運毒之本

又曰夫癰疽皆由膏粱之家濕熱氣逆所結且多犯
肥白之人氣居於表中氣必虛者初起即以涼血
活血散結解毒大劑連進內外夾攻務使消散即
勢大毒盛一時不能散盡亦必十消七八以免後
來口舌生瘡內攻之患縱使潰膿保無大害若失

於救治則熱毒內陷其膜必壞多致凶危然書云
五發癰疽者謂發背發腦發鬚發眉發頤是也但
人之一身血氣稍有壅聚莫不隨所而至豈特此
五者而已發背者乃五臟風熱六腑邪毒貫於筋
骨之間發於經絡之內外雖如錢裡可着拳慎勿
忽畧若初起紅腫高起者則易陰塌平陷者則難
至於發腦發眉發鬚發頤地位不同總因伏
陽結滯邪毒上壅隨其經絡而發氣血旺者受毒
則輕氣血衰者每因致厄然云毒者即氣血不和
偏勝壅滯之謂也治者必須憑脉以救陰陽氣血
之偏則毒滯自散而危者可安若誤認毒為有迹
之物寒涼攻劑則陰滯之毒是必愈致其危即陽
盛之毒亦必難潰難長蓋由氣血不和而致病豈
可更令氣血不調而增病乎

瘍醫大全

卷五

癰疽論

全

顧氏秘書

又曰夫癰疽之生始於喜怒哀樂之不時飲食起居
之不慎或金石草藥之發動寒暑燥濕之不調陰
陽不平而蘊結榮衛凝滯而腐潰輕者起於六腑
浮達而為癰重者發於五臟沉滯而為疽淺者為

癰疽者為癰深則為疽矣發於外者為背疽腦疽
 鬚眉等疽發於內者為肝癰肺癰腸臍等癰外症
 易識內症難明太陽經虛從背而出少陽經虛從
 鬚而出陽明經虛從鬚而出督脈經虛從腦而出
 齊德之曰大凡生疽皆只如黍粟粒許大其狀至微
 人多不以為急此蘊大患宜速辨之不可自忽若
 能防之於未形理之於未成或朝覺而夕治求治
 於良醫則必無危困矣若因循慢忽詢於庸醫致
 令膿血結聚委之於命束手待斃不以去道遠乎

湯醫大全 卷五 癰疽論 全 顧氏秘書

以致筋骨敗遺穿通臟腑死者十有八九矣可不
 慎歟蓋瘡疽之人托命庸醫任意措置危殆立至
 若用良醫則可保痊愈不可不擇辨之何難若能
 飽讀經書久諳證候湯藥熟爛洞明色脈性情仁
 善孝義忠信臨事不惑處治有決方為良醫委用
 勿疑然後要在病人自克不可恚怒悲憂叫呼忿
 恨驕恣情性信任口腹馳騁勞役惟宜清靜恬澹
 耐煩為宜 精義

又曰腦疽頭項咽喉生疽古法多為不治濕熱上壅

者十之二三陰火上炎者十之八九調治得當庶
 可保全

岐天師曰人有背生癰疽或生於胸腹之間或生於
 頭面之上或生於手足之際皆是五日之內猶當
 內散五日之外必須動刀五日之內以消毒聖神
 丹一劑即消二劑全愈不必三劑倘五日之內不
 曾服過消毒聖神丹其瘡必致成膿奔潰外口必
 小而內宅自大譬如賊居深山關隘必窄而其中
 巢穴自必修廣若不直搗其堅則延蔓無已是必

湯醫大全 卷五 癰疽論 全 顧氏秘書

民化為盜故須用金刃去其口邊腐肉使內毒之
 氣不藏用三寸長刀潤止三分兩邊俱利其鋒厚
 半分少尖一邊手執定眼看定心注定一刀橫畫
 一刀直畫人必少厥不必驚慌少頃自定後以末
 藥敷上膏藥貼之大約一個膏藥敷末藥二錢貼
 上即止痛敗膿盡出一連三日即消盡矣內服托
 裡聖神丹二劑可以不須多服此治陽症瘡瘍之
 法也陽症瘡癰必然突起寸餘其色紅腫發光疼
 痛呼號者是若陰症癰疽內消之法與陽症同治

至於破潰之治法絕不相同大約陰症癰疽其色必黑暗痛亦不甚但覺沉沉身重昏悶其瘡口必不突起或現無數小瘡口以欺世人急用散寒救陰至聖丹總陰症宜用溫熱散之不可用寒涼解之也外用膏藥加生肌末藥五錢貼之一日兩換始可蓋陰症癰疽多生於富貴膏粱之客功名失志之人心腎不交陰陽俱耗又加憂愁抑鬱拂怒號呼其氣不散乃結成大毒無論在背在頭在腹在脇在手在足俱是危症若服吾藥又用吾陰陽

至聖膏無不生全蓋陽症可以涼解而陰症必須溫散也 秘錄

雷真君曰血燥肺乾而又生癰疽者多不可救恐無血以濟之也此等病多得之膏粱之人縱情房帷精血大耗又忍精而戰精不化而變為膿血乃陰毒非陽毒也若以治陽毒法治之則死矣當以化癰湯主之一劑而陰變為陽矣二劑而未潰者全消已潰者生肉三劑即愈四劑收功神效之極倘瘡口大潰大爛已成壞症者肯服此方亦斷無性

命之憂堅守長服斷必收功蓋此方消毒而不散氣尚補而不尙攻治陰毒之癰疽實有鬼神莫測之妙 秘錄

華真君曰夫癰疽之作皆五臟六腑蓄毒不流氣血壅滯而成病其發也有處其生也有歸假令發於喉舌者心之毒發於皮毛者肺之毒發於肌肉者脾之毒發於筋脉者肝之毒發於骨髓者腎之毒發於內者五臟之毒發於外者六腑之毒故在外曰潰在內曰壞在上曰從在下曰逆發於上得之

速發於下得之緩感於六腑則易治受於五臟則難療凡癰疽之近骨者多冷近膚者多熱近骨者久不愈則化血為虫近膚者久不愈則傳氣成漏成虫者則多癢少痛成漏者則多痛少癢內虛外實者則痛多而癢少外虛內實者毒易腫而易消血出不止者內多死膿膿清不厚者元陽不足瘡潰而嘔吐無度飲食少進者皆癰疽毒熾使然腫候症之多端務宜詳察施治 秘錄

汪省之曰瘡瘍雖火之屬須分內外以治其本經曰

膏梁之變足生大疔其源在裡發於表也受如持
虛言內結而發於外皆是從虛而出也假如太陽
經虛從髮而出陽明經虛從髭而發督脉經虛從
腦而發治當疎通以絕其源經曰地之濕氣感則
害人皮肉筋脉其源在外感則內行也治當托裡
以防邪氣內侵經曰營氣不從逆於肉裡乃生癰
腫此邪氣至盛過絕經絡故發癰腫是內外之中
者治當和榮衛為主 理例

瘍醫大全

卷五

癰疽論

七

顧氏秘書

又曰凡發背腦疽脫疽腫痛赤色乃水衰火旺之色
也尚可治若黑或紫火極似水為腎水已竭精氣
已涸決不治

寶夢麟曰發背內攻平塌用手按之如牛頸之皮上
有黃泡出腥水乃毒入於肺若不速治即死 經驗全書

周文采曰凡人年四十以上頂項鬚頤背脊腰脇或
筋骨之上所視不見之處稍有瘡癩便不可輕易
待之若視之怠慢以為常疾每見至微至著喪命
者多矣便宜速急治之庶幾得救譬之救火初起
則易救至於燎原之勢不可撲滅之 集驗

又曰夫五發癰疽者謂發背發腦發鬚發眉發頤是
也人之一身血氣周流而無間稍有壅聚莫不隨
所至而發焉又豈特五者哉俗以癰疽癩附於癰
疽之列以是為五發豈知癩與癰疽不過壅疽之
一物古書僅有所謂癩疽則癩亦同出而異名也
若癰與癩前所未聞合是為五發其可乎夫發背
者乃五臟風熱六腑邪毒灌於筋骨之間發於經
絡之內榮衛虛損氣血衰殘所致也其初發如粟
米大最不可輕忽後必大發也若初起紅腫高起
者後必不為害故曰外形如粟中可容谷外貌如
錢裏可着拳如惡毒深管寸長深滿膿血交黏用
藥可痊若膿臭穢無絲此血敗氣衰陽絕陰盛必
難療理

瘍醫大全

卷五

癰疽論

七

顧氏秘書

羅曰頭面赤腫耳前後尤甚脉浮緊按之洪緩此寒
覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫經云天寒
地凍則水冰人氣在中皮膚緻腠理閉汗不出血
氣強內堅瀆當是之善行水者不能注冰善穿地
者不能鑿凍善用針者亦不能取四厥必待天溫

冰釋凍解而水可行地可穿人脉亦猶是也又曰
冬月閉藏水冰地折故用藥多而少針石也宜以
苦溫之劑溫經散寒則已所謂寒微腠理以苦發
之以辛散之也宜以托裡溫經湯麻黃苦溫發之
者也防風辛溫散之者也升麻苦平葛根甘平解
肌專治陽明經中之邪故以為臣血流而不行者
則痛以香白芷當歸身辛溫以破血散滯濕熱則
腫蒼朮苦甘溫體輕浮力雖壯能泄皮膚腠間濕
熱人參甘草甘溫白芍藥酸微寒調中益氣使托
其裡也故以為佐各到如麻豆大用稱水煮餌之
以薄衣覆其手以厚被覆其身且臥於煖處則經
血溫腠理開寒乃散陽氣伸大汗出腫減八九再
服去麻黃防風加連翹牛旁子痛腫悉去經言汗
出則瘡已信哉

傷醫大全

卷五

癰疽論

三

顧氏秘書

陳良甫曰外面如麻裡可如爪外小如錢內可容拳
陳自明曰病有甚而致生有微而致死病證難辨死
生何從決乎答曰發背潰透內膜者死未潰內陷
面赤唇黑便汚者死煩悶者不治潰喉者不治陰
患入腹者不治入囊者不治鬢深寸許者不治頤
後一寸三分名銳毒亦不治無此者生流注雖多
療之必愈

集驗云癰疽之名雖有二十餘證而其要有二陰陽
而已發於陽者為癰為熱為實發於陰者為疽為
冷為虛故陽發則皮薄色赤腫高多有椒眼數十
而痛陰發則皮厚色淡腫硬狀如牛領之皮而不
痛又有陽中之陰似熱而非熱雖腫而實虛若赤
而不燥欲痛而無膿既浮而復消外盛而內腐陰
中之陽似冷而非冷不腫而實赤微而燥有膿而
痛外雖不盛而內實煩悶陽中之陰其人多肥肉
緊而內虛陰中之陽其人多瘦肉緩而內實又有
陽變為陰者草醫涼劑之過也陰變而為陽者大
方熱藥之驟也然陽變陰者其證多猶可返於陽

傷醫大全

卷五

癰疽論

三

顧氏秘書

故多生陰變為陽者其證少不能復為陰矣故多死然間有生者此醫偶合於法百中得一耳觀此則癰與疽但有陰陽深淺內外虛實之分而無大小之別精要乃謂二寸至五寸為癰五寸至一尺為疽者謬也

胡公弼曰凡癰疽發深而不知痛者乃胃氣大虛必死之症為肉死而不知痛也 青囊

蔣示吉曰六腑積熱發於肌膚之間高腫而痛如碗如盆曰癰五臟積熱攻注肌膚初發如粟或如荳

湯醫大全 卷五 癰疽論 全 顧氏秘書

許與內俱平而不高腫或作赤色時作癢痛曰疽 說約

心法曰已潰未潰忽咬牙寒戰係氣虛不能勝毒毒陷攻裏之兆

又曰潰後膿水忽多忽少瘡口如蟹吐沫者係內膜已透是為逆證

又曰腫瘍時若無止氣冲托則瘡頂不能高腫痛潰瘍時若無血陰相滋則瘡根不能收束紅活收斂凡視瘡之頂高根活不論老少定知氣血有餘

襲子才曰癰疽者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不調使五臟六腑之氣拂鬱於內以致陰陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久服丹石燥熱之藥熱毒結深而發也但此疾多生於膏粱富貴之人以其平昔所食肥膩炙煇安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也經曰諸痛痒瘡皆屬心火者蓋心主血而行氣若氣血凝滯夾心火之熱而主癰疽之類也然所感有淺深故所發有輕重大小之不同也六腑積熱騰出於外

湯醫大全 卷五 癰疽論 全 顧氏秘書

肌肉之間其發暴甚皮腫光軟侵展廣大者癰也五臟風毒積熱攻注於肌肉其發猛惡初生一頭如痔瘤白色焦枯觸之而痛應心者疽也熱於皮膚之間是以浮腫根小不過二三寸者瘡也夫癰生於六腑若燎原之火外潰肌肉疽生於五臟沉澁難療若陶室之燧內潰骨髓癰則易療惟難將息而遲瘥疽則難療而易痊復諸瘡之中惟背疽疔瘡最為急證其如莫如腦疽腸癰喉癰之類亦其急者也治癰疽之證須要察其是實是虛是冷

是熱或重或輕對症用藥無失先後次序凡人年四十已上頭頂鬢頤背脊腰脇或筋骨之上所視不見之處但稍有瘡癩便不可輕易待之若視之怠慢以爲常疾每見從微至險喪命者多矣便宜速急治之庶幾得救譬之救火初起則易救至於燎原之勢不可撲滅矣凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用若已破潰臟腑既虧飲食不進一毫冷藥亦不可用此是先後次第之要訣也

論病有六不治

扁鵲論醫病有六不治驕恣不論於理一不治也輕身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并藏氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也雲林子曰越人之論一三四五六是矣二則於予心有未適然者何也輕者彼輕也重者彼重也彼輕而我重之則彼之生可活矣不然彼以一吝而喪生固病者之不智子以一吝而不治亦醫者之不仁噫古之神醫如此意猶存則世醫可知矣

功過格 無名氏輯

醫士貧富一體細心審察定方療一輕疾不取酬功

療一關係性命重疾雖取酬功准十不取酬者准百

功 若待極貧人並能施藥不吝照錢數記功雖

劑藥不滿十功 倡募刻一濟人善書隨緣樂助易

文亦准一功 故特記五十功助者 為師成就一人學業品行

以施之多寡記功 兼全功准百 遇貧人危疾助醫藥錢米百錢准一

為之者雖十錢五 疫癘設局施醫施藥百錢准

錢與百錢同論 普施應病丸散膏藥百錢准 刻施經驗良方

醫家大全 卷五 功過格 李 顧氏秘書

百錢准 秘一經驗方二十 誤一門人五十

醫家不費錢功德 山左邢尚卿諱朝耀輯

診脈不輕率 用藥極慎重 雖貴藥勿減分兩遇

急病請到即行 不因錢少銀低遲滯 不因飲

酒譙樂推辭 不因嚴寒暑雨憚於遠赴 不因

錯認病症曲自迴護 認病不真實必令邀醫會

議 細心詢問病由不可以病試藥 不用霸道

藥求其速效 不用相反藥遲其痊愈疾本易治

以圖厚謝外科尤 甚造惡莫大焉 不因重病險瘡措勒厚謝

不與同道水火悞及病人犯此弊最宜痛戒 不

妄驚病家 不哄用假藥尤戒 不輕忽貧賤病

人 肯捐藥救治貧病 施效驗方 禁打胎藥

不先待藥資到手然後發藥 不定乘車驕費人

財物 不圖省便將藥同器浸製 不因行得高

擡聲價難人 不方秘不傳假方與人

醫家大全 卷五 功過格 李 顧氏秘書

瘍醫大全目錄

卷六

論辨純陽瘡瘍法

論辨純陰瘡瘍法

論辨半陰半陽瘡瘍法

論陽瘡毒似陰瘡

論陰瘡毒似陽瘡

論陰陽法

論瘡瘍分五方治法不同

瘍醫大全

卷六 目錄

論肥人瘡瘍

論瘦人瘡瘍

論嬰孩瘡瘍

論痘後瘡瘍

論妊娠瘡瘍

論產後瘡瘍

論師尼孀婦處女瘡瘍治法不同

論瘡瘍三因受病主治法不同

論醫者膽大心小

論分經絡部位氣血多寡

論諸經向導藥隨經引使

癰疽危陷部位

脾胃虛實傳變論

論瘡瘍虛實

論瘡瘍五善七惡救援法

論瘡瘍發熱惡寒煩躁頭痛

論瘡瘍痛癢麻木

論瘡瘍作渴

瘍醫大全

卷六 目錄

論瘡瘍欲嘔作嘔呃逆

論瘡瘍喘急

論瘡瘍大便瀉利

論瘡瘍大便秘結

導大便秘結法

論瘡瘍小便淋漓頻數不利

論瘡瘍無寐肉瞶筋惕

論瘡瘍出血

論瘡瘍類破傷風

論瘡瘍散走流注

論瘡瘍變急牽陰入腹

論瘡瘍目斜視上

論瘡瘍發瘕

論瘡瘍四肢逆冷

論瘡瘍胸痞

論瘡瘍陽氣脫陷

論瘡瘍僵肉

論瘡瘍瘡口黑暈瘡內無血色

瘍醫大全

卷六 目錄

三

顧氏私書

論瘡瘍瘡毒入內卷

論瘡瘍面赤不得攻下

論瘡瘍治法當分緩急

論瘡瘍補瀉不可倒施

論瘡瘍輕症用重劑

論瘡瘍寒熱逆從用藥法

論瘡瘍用汗下藥

論瘡瘍附子不可輕用

論瘡瘍當舍時從症

論瘡瘍用香散藥

論瘡瘍泥用止痛藥

論瘡瘍輕投十宣散等劑

論瘡瘍未潰不宜槩用敗毒之藥

論煎藥必得其法

論雜忌須知

論醫者宜避瘡毒侵襲

論藏指膿水穢紙法

瘍醫大全

卷六 目錄

四

顧氏私書

瘍醫大全卷六

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

壻錢之栢東
男 柳燮用和
全校

論辨純陽瘡瘍法

純陽初起必焮腫更兼身熱有微寒頂如尖字高凸起腫似灣弓根有盤七日之間多焮痛二七之期膿漸漫動息自寧食知味二便調勻無瀉乾腫消膿潰精神爽腐脫新生氣血完五善自然臻並至七惡全無半點干痛隨膿減腫退肌寬此屬純陽

瘍醫大全

卷六

論純陽

顧氏秘書

俱易治百人百可保全安 正宗

初起頂高根活色赤發熱焮腫疼痛日漸高腫者順已成焮痛皮薄光亮飲食如常二便調和身溫者順已潰膿稠色鮮不臭腐肉自脫焮腫易消身輕者順潰後膿厚稠黃新肉易生瘡口易斂飲食漸進者順

論辨純陰瘡瘍法

純陰初起不知瘡粟米之形疙痞僵不紅不腫不知痛少熱少焮少隄防七朝之後身體倦瘡根平大喜澆湯頂不高兮根不活色不光兮腐不穰軟陷無膿空結聚脉浮數大細飛颺飲食不食身戰戰嗜湯止許意茫茫瘡上生衣如脫甲孔中結子似含芳膿多臭穢身難便舉動惶惶韻不長瘡形成紫黑面色變青黃精神昏憤多舛睡言語無人自發揚口乾多舌強痰喘定身亡此屬純陰俱不治

瘍醫大全

卷六

論純陰

顧氏秘書

百人百可到泉鄉 正宗

初起頂平根散色暗微腫不熱不疼身體倦怠者險已成腫堅色紫不作膿不腐潰惟口乾多煩躁者逆已潰皮爛內堅不腐腫仍不消痛仍不減心煩者逆潰後膿水清稀腐肉雖脫新肉不生色敗臭穢者死

論辨半陰半陽瘡瘍法

陰陽之症兩相交生死相兼事可昭微熱微寒微赤
 腫半昏半爽半平高脉來雖數多無力飲食雖食
 便不調腫而不潰因脾弱潰而不飲為膿饒大便
 多澇小便數上身有汗下身焦五善雖兼有七惡
 未全迺口渴喜茶腸腹痛面浮厭飲足心高心煩
 不穩睡神亂怕音焦投方應病方為妙陰轉為陽
 漸可調逢之任是神 hands 半死餘生定莫迺 正宗
 澄曰癰疽之候純陽固多純陰原少惟半陽半陰之
 瘡醫大全 卷六 半陰半陽 五 顧氏秘書

證最多全在醫者留心不可忽畧蓋陰陽兼半之
 證若以辛溫之劑內服外敷則陰氣潛消轉為陽
 證若以清涼外敷或用冷蜜蛋清調藥塗敷內投
 苦寒敗毒之劑則陽氣冰伏變為純陰之證吉凶
 反掌醫家病家均宜警省

論陽瘡毒似陰瘡

經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火但亦有初起色紫赤而
 腫痛脉沉細數而惡寒喜煖非真寒也乃火極似
 水陽極生陰亢則害承乃制之理或平時富貴享
 用厚味服金石等藥致之故陽極似陰始熱終寒
 之變宜順其時而內服疎托瀉心等劑治之則愈
 矣

澄曰假寒者火極似水也凡瘡瘍初起熱甚失於汗
 解以致陽邪亢極鬱伏於內則邪自陽經傳入陰
 分故為身熱發厥神氣昏沉或是畏寒狀若陰證
 凡真寒本畏寒而假寒亦畏寒此熱深厥亦深熱
 極反兼寒化也大抵此證必聲壯氣粗形強有力
 或唇焦舌黑口渴飲冷小便赤澇大便秘結或因
 多飲藥水以致下利純清水而其中仍有燥糞及
 失氣極臭者察其六脉必皆沉滑有力此陽證也
 若雜證也假寒者亦或為畏寒或為戰慄此以熱
 極於內而寒侵於外則寒熱之氣兩不相投因而
 寒慄此皆寒在皮膚熱在骨髓所謂惡寒非寒則

瘡醫大全 卷六 陽似陰 四 顧氏秘書

是熱證但察其內證則或爲喜冷或爲便結或小水之熱瀆或口臭而躁煩察其脉必滑實有力凡見此證卽當以涼膈芩連之屬助其陰而清其火使內熱旣除則外寒自伏所謂水流濕者亦此義也故凡身寒厥冷其脉滑數按之鼓擊於指下者此陽極似陰卽非寒也

論陰瘡毒似陽瘡

夫瘡之始發於陰於陽豈有定規調護失宜致令陰陽偏勝卽有變生之患如毒之初起筋攣骨痛之時經曰此寒氣之腫八風之變當以表散之使邪易散而毒易消不知治此再以內踈之劑敷以寒涼或食冷物使瘡毒內陷陰極而方生陽氣漸回令人煩悶譫語微渴其脉沉細而數治宜補中益氣湯而加溫煖之藥治之斯爲上工矣

張景岳曰陰極反能躁熱乃內寒而外熱卽真寒假熱也假熱者水極似火也凡癰疽有因素稟虛寒偶感邪氣而然者有過於勞倦而致者有過於酒色而致者有過於七情而致者有原非火證因誤服寒涼而致者凡眞熱本發熱而假熱亦發熱其證則亦面赤躁煩亦爲大便不通小便赤澀或爲氣促咽喉腫痛或爲發熱脉見緊數等證昧者見之便認爲熱妄投寒涼下咽必斃不知身雖有熱而裏寒格陽或虛陽不飲者多有此證但其內證則口雖乾渴必不喜冷卽喜冷者飲亦不多或大

便不實或先鞭後溏或小水清頻或陰枯黃赤或氣短懶言或色黯神倦或起倒如狂而禁之則止自與登高罵詈者不同此虛狂也或斑如蚊迹而淺紅細碎自與紫赤熱極者不同此假斑也凡假熱之脉必沉細遲弱或雖浮大緊數而無力無神此乃熱在皮膚寒在臟腑所謂惡熱非熱實陰證也凡見此內頰內困等證而但知清涼攻邪敗毒則無有不死急當四逆八味回陽湯之類倍加附子填補真陽以引火歸源但使元氣漸復則熱必退藏而病自愈所謂火就燥者即此義也故凡見身熱脉數按之不鼓擊者此皆陰盛格陽即非熱也

東垣曰面赤目赤煩躁引飲脉七八至按之則散者此無根之火也以薑附湯加人參主之

仲景曰治少陰證面赤者以四逆湯加葱白主之外臺秘要曰陰盛發躁名曰陰躁欲坐井中宜以熱藥治之

傷醫大全

卷六

陰似陽

七

顧氏秘書

論陰陽法

凡診視癰疽施治必須先審陰陽乃為醫道之綱領陰陽無謬治焉有差醫道雖繁而可以一言蔽之者曰陰陽而已故證有陰陽脉有陰陽藥有陰陽以證而言則表為陽裏為陰熱為陽寒為陰上為陽下為陰氣為陽血為陰動為陽靜為陰高聳為陽平塌為陰焮腫為湯灰白為陰收束為陽散漫為陰疼痛為陽麻木為陰有膿為陽無膿為陰多言者為陽無聲者為陰喜明者為陽欲暗者為陰陽微者不能呼陰微者不能吸陽病者不能俯陰病者不能仰以脉而言則浮大滑數之類皆陽也沉微細澹之類皆陰也以藥而言則升散者為陽欲降者為陰辛熱者為陽苦寒者為陰行氣分者為陽行血分者為陰性動而走者為陽性靜而守者為陰此皆醫中之大法至於陰中復有陽陽中復有靜疑似之間須辨的確此而不識極易差訛是又最為緊要然總不離於前之數者但兩氣相兼則此少彼多其中便有變化一皆以理測之自

傷醫大全

卷六

陰陽

八

顧氏秘書

有顯然可見者若陽有餘而更施陽治則陽愈熾而陰愈消陽不足而更用陰方則陰愈盛而陽斯滅矣設能明徹陰陽則醫理雖玄思過半矣

道產陰陽原同一氣火爲水之主水卽火之源水火原不相離也何以見之如水爲陰火爲陽象分冰炭何謂同原蓋火性本熱使火中無水其熱必極熱極則亡陰而萬物焦枯矣水性本寒使水中無火其寒必極寒極必亡陽而萬物寂滅矣此水火之氣果可呼吸相離乎其在人身是卽元陰元陽所謂先天之元氣也欲得先天當思根柢命門爲受生之竅爲水火之家此卽先天之北闕也舍此他求如涉海問津矣學者宜識之

凡人之陰陽但知以氣血臟腑寒熱爲言此特後天有形之陰陽耳至若先天無形之陰陽則陽曰元陽陰曰元陰元陽者卽無形之火以生以化神機是也性命係之故亦曰元氣元陰者卽無形之水以長以立天癸是也強弱係之故亦曰元精元精元氣者卽化生精氣之元神也生氣通天惟賴乎

此經曰得神者昌失神者亡卽此之謂今之人多以後天勞慾戕及先天今之醫只知有形邪氣不知無形元氣夫有形者迹也盛衰昭著體認無難無形者神也變幻倏忽挽回非易故經曰粗守形上守神嗟乎又安得有通神明而見無形者與之共談斯道哉

天地陰陽之道本貴和平則氣令調而萬物生此造化生成之理也然陽爲生之本陰實死之基故道家曰分陰未盡則不仙分陽未盡則不死華元化

曰得其陽者生得其陰者死故凡欲保生重命者尤當愛惜陽氣此卽以生以化之元神不可忽也曩自劉河間出以暑火立論常用寒涼伐此陽氣其害已甚賴東垣先生論脾胃之火必須溫養然尙未能盡斥一偏之謬而丹溪復出又立陰虛火動之論製補陰大補等丸俱以知相爲君寒涼之弊又復盛行夫先受其害者既去而不返後習而用者猶迷而不悟嗟乎法高一尺魔高一丈若二子者謂非軒岐之魔乎非敢誹謗先輩實冀夫盡

洗積陋以蘇生民之厄耳

論瘡瘍分五方治法不同

經曰東西南北中五方人之土產厚薄居處高下風寒暑濕各地不同日用穀藥頗異所以黃帝舉五方之間岐伯進五治之功針砭湯淋灸之法乃五方得宜之用兼之年力衰壯稟賦厚薄五土之別學者當詳察之不可不備也

澄曰歷觀古人書集有專主辛溫者有專主寒涼者有專施攻伐者有純用補益者豈各成一家耶皆緣五方風土不齊西北方苦寒故多主辛溫東南

方炎熱多主寒涼地土強厚者堪以攻伐水土薄弱者固多補益是以聚覽羣書必須體會各家著書義旨以廣其用故醫者經歷其地必先察其風土厚薄並須留心四時氣候如春當溫而反寒夏當熱而反涼秋當涼而反熱冬當寒而反溫皆為四時不正之氣必多過鬱於中又當看天時久陰久亢及非時之雷霧乍寒乍熱有是氣必有是病臨病體察天時人事五方風土當溫當涼當攻當補自無不當矣

瘍醫大全

卷六 陰陽

十一 顧氏秘書

瘍醫大全

卷六 論五方

十一 顧氏秘書

論肥人瘡瘍

夫肥人多濕多痰多氣虛形體外實者外雖多肉其實內虛凡體豐氣虛之人瘡瘍故多癰癰者壅也屬陽在表氣虛即表虛故多浮腫於外皮薄色赤宜內托之使邪毒不內陷則易潰而易斂丹溪云肥人宜二陳湯加參芫歸木銀花連翹等類治之無出於此

又曰大凡體肥則肉澀於氣加之斷喪則真氣不足以維持平日語言氣短行動喘急一遇膿血出多

瘍醫大全

卷六

肥人

三

顧氏秘書

空火陡發精散神離每多暴脫

論瘦人瘡瘍

夫瘦人多火多血虛血虛即陰虛陰虛則火盛火盛則發熱筋骨瘦而不勝於寒蓋皮寬肉緩如生瘡瘡則多疽疽者沮也屬陰因榮血受邪凝注不從正是陰滯於陽血滯於氣則為疽也又云疽乃五臟之毒癰為六腑之毒故疽多附於骨肉色不變故難於潰潰而難斂治宜八珍湯中加金銀花連翹附子之類加減治之

瘍醫大全

卷六

瘦人

高

顧氏秘書

論嬰孩瘡瘍

嬰孩之輩乃氣血未充筋骨未堅脾胃尚脆凡有癩疽多是胎毒或母不慎調護致令血氣壅滯多生瘡腫只宜內托內疎湯劑和緩之藥不可用大猛峻之劑有傷胃氣外有無辜疔毒不同大人治法只宜消疔大補之劑即安

澄曰嬰孩皮肉嬌嫩不可輕用白降丹不但疼痛難經且易焮腫嚇人

又曰小兒瘡毒切勿妄用水銀輕粉硫黃收斂毒氣

傷醫大全 卷六 嬰孩 志 顧氏秘書

每致殺人

論痘後瘡瘍

或問小兒痘已出盡胎毒已化復生瘡疽疔毒是何氣使然荅曰胎毒雖化氣血已虧皆由失於調護致令陰陽壅塞經絡營氣不從逆於肉裡乃生癰腫疔毒變生異症亦皆有之何況瘡瘍乎故痘後不可不慎調護也

澄曰每見小兒痘後月餘忽發癰疽咸謂痘漿不足餘毒為害殊不知痘後氣血未復脾胃失調所致若妄用敗毒清涼之品內服外敷則鮮有不危者

傷醫大全 卷六 痘後 志 顧氏秘書

必須培補氣血扶脾內托可消自消即潰亦易於斂口

論妊娠瘡瘍

大凡婦人有孕忽生瘡疽疔毒始發當已潰未潰之時須知雙身而用藥豈比常人如砒礪巴麝等類有犯於胎禁及硝黃大下之藥焉可混用止宜調氣養血安胎托裡之劑可保無虞此乃攸關生死之大要不可不知也

澄曰凡看婦人瘡瘍須先問明月信如已懷孕不得妄用皂針山甲桃仁紅花冰麝大黃巴霜等味冀其消散設經水適至亦不得大發其汗

瘍醫大全

卷六

妊娠

志

顧氏秘書

論產後瘡瘍

大凡婦人生產之後氣血大虧之際而感受七情六淫致令榮衛不行逆於肉裡乃生癰腫况元氣不足豈可輕投巴礪慄悍之劑只宜大補氣血托裡八珍湯丸內少加溫煖藥使榮衛通行毒氣消散無不安矣不然反致虛損瘡亦敗壞潰而不斂多致不救

新產半月左右忽發癰瘡於四肢胸腹者是敗血不盡流滯經絡或氣血虛弱榮氣不從逆於肉裡也
如敗血瘀滯者則焮腫赤痛而脈弦洪有力當補血行血之中佐以導瘀疏氣為主如氣血虛弱榮澁衛逆者則平塌散漫而脈虛微無力當大補氣血為主如十全八珍之屬以固本元扶胃氣氣壯血和其毒自解若以毒治而用清涼解毒勢必不膿不潰變成壞症矣

瘍醫大全

卷六

產後

志

顧氏秘書

論師尼婦處女瘡瘍治法不同

此輩雖云化體豈異於妻妾乎雖無房室常有憂思之苦慾心蒙而不遂有失交歡氣血欠和陰陽乖戾凡有瘡瘍治法亦異雖內托補中必須調經舒鬱安神之藥隨症治之為當

澄曰此等人所患癰疽瘰癧失榮乳疔陰疔等症生於厥陰少陽部位者居多皆緣抑鬱不舒所求不遂群火沸騰真陰銷燬施治之法專主養血舒鬱寧神兼用托裡排膿之品庶可保無變證更有愆

瘍醫大全

卷六 師尼

九 顧氏秘書

期處女鬱結於中而成瘡瘍者又當勸其父兄早為完配俾天地和而雨澤降夫婦和而家道成畢如之後未潰者每多消散久不斂者亦易於收功矣

論瘡瘍三因受病主治不同

三因者內因外因不內外因此說從於先古其詞意尚有發而未盡者內因者皆起於七情蘊結於內又兼厚味膏粱薰蒸臟腑房慾勞傷虧損元氣乃五臟受之其病由此內發者但發之多在富貴人及肥胖者十有八九其見症瘡多堅硬根蒂深固二便不調飲食少進外軟內堅平陷無膿表實裏虛毒多難出得此者即病症之內傷也故曰內因外因者皆起於六淫體虛之人夏秋露臥當風取

瘍醫大全

卷六 三因

十 顧氏秘書

涼坐眠濕地以致風寒濕氣襲於經絡又有房事後得之其寒毒乘虛深入骨髓與氣血相凝者尤重或外感風寒發散未盡遂成腫痛此肌肉血脉筋骨受之其病由此外來者發之多在不善調攝湯薄勞碌人十有八九見證多寒熱交作筋骨疼痛步履艱辛濕痰流毒以及諸風癱瘓口眼歪斜半身不遂風濕風溫天行時毒等症得此者即疾病之外感也故曰外因又有不內外因內無七情干內外無六淫傷外何由來也其病得之於饑飽

勞役喜怒不常飲食者冷熱不調動作者勤勞不
惜以致臟腑不和榮衛不順脾胃受傷經絡凝滯
故爲疾者外無六經形證內無便溺阻隔其病多
生於膜外肉裏肌膚之間如癩癰痰注氣痞癭瘤
之屬治法不必發表攻裏只當養氣血調經脈健
脾和中行痰開鬱治之法爲最善此是三因理之
盡矣

論醫者膽大心小

薛立齋曰大抵病有淺深效有遲速亦有陰虛陽實
呼吸轉移醫者須要膽大心小膽欲大者有決斷
之才識見之能當刺則刺當攻則攻不宜攻刺者
止之則能知標本矣心欲小者有救義之心無苟
取之念富者辭之傷廉貧者取之傷惠須要見利
思義庶稱醫職

澄

白膽欲大者非不辨虛實陰陽不察穴道虛怯妄

施刀針溷投攻伐橫行放膽罔顧病人性命必須

臨症時先看初起時病者元氣虛實次看瘡之陰
陽險否然後用藥調治當攻即攻可補便補不可
因循耽悞致令變態不虞認得真確瞻量方可放
大若臨證不多妄用刀針亂施攻補則悞事不淺
矣

論分經絡部位氣血多寡

王肯堂曰人身之有經絡猶地理之有界分治病不知經絡猶捕賊不知界分其能無誅伐無過之咎乎况手足十二經絡有氣血多少之分如手少陽三焦足少陰腎足太陰脾多氣少血手厥陰心包絡手太陽小腸足太陽膀胱多血少氣手陽明大腸足陽明胃多氣少血此其大較也多血少氣者易愈多氣少血者難療氣多之經可行其氣血多之經可破其血不可執一也

傷醫大全

卷六 經絡部位

三

顧氏秘書

朱丹溪曰醫居小腹之後而又在其下此陰中之陰也其道遠其位僻雖曰太陰經多血少氣多血氣運不到氣既不到血亦罕來中年已後不可生癰纔有痛腫叅之脉證但見虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉若用尋常驅熱拔毒舒氣之藥虛虛之禍如指諸掌可不慎歟 心法

又曰諸經惟少陽厥陰經瘡瘍務宜預防以其氣多血少也其血本少肌肉難長少陽更有相火遽用破毒之劑以伐陰血禍不旋踵

劉厚宗曰凡瘡瘍不係膏梁丹毒火熱之變只因虛勞氣鬱所致止宜補形氣調經脉其瘡當自消散蓋不待汗之下之而已也其不詳脉證經絡受病之異者下之先犯病禁經禁故致失手如此

又曰且夫火熱為病亦有微甚所謂君火相火是也瘡瘍所發有癰疽癰癰輕重淺深不同或止發於一經或兼二經者止當求責於一二經不可干擾餘經也若東垣處方用藥是已

傷醫大全

卷六 經絡部位

三

顧氏秘書

申斗垣曰夫分經審位用藥當知氣血多少多則易愈少則難痊外科明此大理不致有犯禁忌頹敗壞逆之失也如手少陽三焦經手少陰心經手太陰肺經足少陽膽經足少陰腎經足太陰脾經此六經皆多氣少血凡有瘡瘍最難收口如手厥陰心胞絡經手太陽小腸經足太陽膀胱經足厥陰肝經此四經皆多血少氣凡有瘡瘍宜托裏足陽明胃經手陽明大腸經此二經氣血俱多初宜內消收功易得故特表而明之不可一槩而論治也 啟立

訣曰多血多氣君須記手經大腸足經胃多氣少血
有六經三焦膽腎心脾肺多血少氣心胞絡膀胱
小腸肝無異記此則知氣血多少之異矣

頭部

巔足太陽厥陰督脈 頭角直耳上中是 中行前直鼻

直鬚中上 第二行足太陽一寸五分各 第三

行足少陽

面部

額足少陽 鼻手足陽明太陽 人中督脈手

瘍醫大全

卷六 經絡部位 素 顧氏秘書

足陽明 唇內足厥陰 承漿足陽明 上齒足陽

下齒明手陽 舌足少陰 目內眥手足陽明

目眦眥手足太陽手 眉至額內眥而上督脈直目

目瞳子而上足少陽直 頰直目內眥而下足陽

明陽 頰車足少陽 耳手足少陽 目系手足少陰

頸項部

項中間督脈 拔項大筋中足太陽 當完骨下少

陽項大筋之後也 當耳下足少陽 當曲頰下手太

曲頰前一寸手陽 挾喉兩傍動脈足太陽 缺

盆中任脈 咽手足太陽少陰 喉嚨足少陰 喉嚨

肩部

前廉明手陽 後廉手太陽 上廉手足少陽

背部

中行督脈 第二行足太陽 第三行足太陽

膺輸部

中行任脈 第二行足少陰 第三行足陽明 第四

行足太陽

瘍醫大全

卷六 經絡部位 素 顧氏秘書

腹部

中間行任脈 第二行足少陰 第三行足陽明 第

四行足太陽

腋下

中間手厥陰 前手太陽 後手太陽

脇

腋直下髀樞足少陽

臑

前廉手陽明 後廉手太陽 外廉手太陽

內廉 手太陰 內前廉 手太陰 內後廉 手少陰

臂

上廉 手陽明 下廉 手太陰 外廉 手少陽

內廉 手厥陰 內上廉 手太陰 內下廉 手少陰

股脛

前廉 足陽明 後廉 足太陽 外廉 足少陽

內廉 足厥陰 內前廉 足太陰

蔣示吉曰頭為諸陽之首面為三陽之交

腦之正中 督脉 背之居中 督脉

湯醫大全 卷六 經絡部位 毛 顧氏秘書

項之居中 督脉 尾間居中 督脉

腦與背之兩傍 屬足太陽 頭頂 屬足太陽

面 屬足陽 頸項 屬足厥陰

鬢 屬手少陽 眉 屬手太陽 頤 屬手少陽

足少陽 頤 屬手太陽 頤 屬手少陽

腮 屬手太陽 頤 屬手少陽

耳為腎竅 屬足少陰 遠耳之傍 屬足少陰

唇為脾竅 屬足太陰 舌乃心苗 屬手少陰

鼻為肺竅 屬手太陰

目大小皆屬心又為火輪

黑珠屬肝又為血輪又為風輪

上胞下臉屬脾又為肉輪

白珠屬肺又為氣輪 瞳人屬腎又為水輪

胃通於乳乳房屬胃 乳外屬足少陽膽

乳頭乃足厥陰肝經所主

乳傍乃手三陰經所起 喉癰臍發穿襠 屬任脉

跨馬囊癰 屬足厥陰肝

從手背赤肉至臂走至面 屬手三陽

湯醫大全 卷六 經絡部位 毛 顧氏秘書

從胸走至手心白肉 屬手三陰

手背為陽 手心為陰

足之外跗為陽足之三陽從足走至頭

足之內跗為陰足之三陰從足走至腹

督脉通乎背脊居中是奇經督脉之道

脊背分五行 中間是奇經督脉兩傍四行

腹分七行 從前陰起由臍中上咽喉至承漿而止

臍傍左右一行各一寸屬足少陰腎

臍傍左右各二寸一行屬足陽明胃

臍傍左右各三寸一行屬足太陰脾

臍傍左右各四寸一行屬足厥陰肝

脇肋 足少陽膽行身之側

手足心 內應心經

背為諸陽 腹為諸陰

頭面背脊 陽維經

頤項胸腹肢股內脈 陰維經

傷醫大全

卷六

經絡部位

五

顧氏秘書

論諸經向導藥隨經引使

一切癰疽須分是何部位屬何經絡用何藥向導施

治庶易於奏效也

太陽 上羌活 下黃柏

陽明 上白芷升麻 下石膏

少陽 上柴胡 下青皮

太陰 上桔梗 下白芍

厥陰 上柴胡 下青皮

少陰 上獨活 下知母

傷醫大全

卷六

引使

五

顧氏秘書

蔣示吉曰用藥引經庶藥力直攻患處如太陽用防

風羌活陽明用白芷升麻少陽用柴胡太陰用白

芍升麻少陰用獨活厥陰用柴胡青皮佐之以桂

隨經者引經必要之藥也引者導引也引領也如將

之用兵不識其路縱兵強將勇不能取勝如賊入

無抵脚不能入其巢穴叩之箱簣此理也故用引

經藥不可不知太陽經瘡疽生於顛頂之上必用

羌活藁本麻黃在下黃柏少陽經耳前上用升麻

柴胡下用柴胡連翹陽明經面上用葛根白芷黃

芩下用花粉太陰經中府雲門尺澤上用條芩連翹下則箕門血海用蒼朮防已少陰經少冲少海上用細辛下湧泉照海用知母厥陰經中冲內澤上用川芎菖蒲下太敦曲泉柴胡之類上則言其手經下則言其足經當察其此

瘍醫大全

卷六 引使

三

顧氏秘書

癰疽危險部位

靈樞曰伏兔

一 腓二腓者臑也即足肚

背三

五臑俞

項五 此五部有癰疽者死

王海藏曰腦 頤 鬚 鬢 亦為癰疽必死之處也

鬼遺方云不可患癰疽者七處

眼後虛處 一

頤接骨處 二

耳門前後車骨接處 三

瘍醫大全

卷六 危險部位

三

顧氏秘書

陰根上毛間膀與尻骨接處 四

諸因小腹風水所成癰疽 五

頤骨下近耳後虛處 六

鼻骨中 七

並能害人但以諸法療之或有得瘥惟眼後虛處

最險

蔣示吉曰險惡傷生背上有九處 入髮際為玉枕

又為舌本 一

頸項節 二

第三椎為崇骨

第四大椎為五臟

第五椎脊骨兩傍肺俞

第六夾脊兩傍脾俞及肝俞

第七脊骨兩傍腎俞

第八後心對鳩尾

鳩尾即心蓋骨

鳩尾骨穴九

又曰正面有六處

喉骨為垂膺一

瘍醫大全

卷六 危險部位

毒

顧氏秘書

當胸為神舍二

心鳩尾

即心蓋骨

兩乳穴

四

臍中為神關五

臍下二寸為陽屈曲間六

又曰側面有三處

耳下近耳後牙車尖中為喉脉

當膊下為肩骨二

承山上三寸膈腸三

又曰忌生惡毒部位 腦 伏兔 髭 腓膈 髻
背 頤 項 迎香 瞳子膠 舌 五臟俞患
則多險

瘍醫大全

卷六 危險部位

毒

顧氏秘書

脾胃虛實傳變論

五臟別論篇曰胃大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故瀉而不藏此受五臟濁氣名曰傳化之腑此不能久留而輸瀉者也所謂五臟者藏精氣而不泄故滿而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不能滿所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也陰陽應象大論云穀氣通於脾六經為川腸胃為海九竅為水注之器九竅者五臟之

傷醫大全

卷六

脾胃虛實

素

顧氏秘書

官也皆得胃氣乃能通利通評虛實論云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也胃氣一虛耳目口鼻俱為之病經脈別論云食氣入胃散精于肝淫氣于筋食氣入胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經經氣歸肺肺朝百脈輸精於皮毛毛脈合精行氣於腑精神明留於四臟氣歸於權衡權衡以平氣口成寸以決生死飲入於胃遊溢精氣上輸於脾胃氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也又

云陰之所生本於五味陰之五官傷在五味至於五味口嗜而欲食之必自裁度勿使過焉過則傷其正也謹和五味骨正筋柔氣血以流腠理以密如是則骨氣以精謹道如法是有天命平人氣象論云人以水穀為本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死所謂無胃氣者非肝不弦腎不石也歷觀諸篇而參攷之則元氣之充足皆由脾胃之氣無所傷而後能滋養元氣若胃氣之本弱飲食自倍則脾胃之氣既傷而元氣亦不能充而諸病之所由

傷醫大全

卷六

脾胃虛實

素

顧氏秘書

生也內經之旨皎如日星猶恐後人有所未達故靈樞經中復申其說經云水穀入口其味有五各注其海津液各走其道胃者水穀之海其輪上在氣衝下至三里水穀之海有餘則腹滿水穀之海不足則饑不受穀食人之所受氣者穀也穀之所注者胃也胃者水穀氣血之海也海之所行雲氣者天下也胃之所出氣血者經隧也經隧者五臟六腑之大絡也又云五穀之入於胃也其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以

貫心肺而行呼吸焉榮氣者必其津液注之於脉
化而爲血以榮四末內注五臟六腑以應刻數焉
衛氣者出其悍氣之剽疾而行於四末分肉皮膚
之間而不休者也又云中焦之所出亦並胃中出
中焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化爲精微
注于肺脉乃化而爲血以奉生身莫貴於此聖人
諄復其辭而不憚煩者仁天下後世之心亦惓惓
矣故飲食失節寒温不適脾胃乃傷此因喜怒憂
恐損耗元氣資助心火與元氣不兩立火勝則

傷醫大全

卷六

脾胃虛實

七

顧氏秘譜

乘其上位所以病也調經篇云病生陰者得之飲
食居處陰陽喜怒又云陰虛則內熱有所勞倦形
氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱
氣薰胸中故爲內熱脾胃一傷五臟互作初病過
身壯熱頭痛目眩肢體沉重四肢不收怠惰嗜臥
爲熱所傷元氣不能運用故四肢困怠如此聖人
著之於經謂人以胃土爲本成文演義互相發明
不一而止粗工不解讀妄意施用本以活人反以
害人今舉經中言病從脾胃所生及養生當實元

氣者條陳之生氣通天論云蒼天之氣清淨則志
意治順之則陽氣固雖有賊邪勿能害也此因時
之序故聖人傳精神服天氣而通神明失之內閉
九竅外壅肌肉衛氣散解此謂自傷氣之削也陽
氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥目盲耳
閉憤憤乎若壞都故蒼天之氣貴清淨陽氣惡煩
勞病從脾胃生者一也五常正大論云陰精所奉
其人壽陽精所奉其人天陰精所奉謂脾胃既和
穀氣上升春夏令行故其人壽陽精所奉謂脾胃

傷醫大全

卷六

脾胃虛實

七

顧氏秘譜

不和穀氣下流收藏令行故其人天病從脾胃生
者二也六節藏象論云脾胃大腸小腸三焦膀胱
者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而
出入者也其華在唇四白其充在肌其味甘其色
黃此至陰之類通於土氣凡十一臟皆取決於膽
也膽者少陽春生之氣春氣升則萬化安故膽氣
春升則餘臟從之膽氣不升則餐泄腸澀不一而
起矣病從脾胃生者三也經云天食人以五氣地
食人以五味五氣入鼻藏於心肺上使五色修明

聲音能彰五味入口藏於腸胃中味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生謂之氣者上焦開發宣五穀味熏膚充身澤毛若霧露之既氣或垂錯人何以生病從脾胃生者四也豈特四者經又云天地之邪氣感則害人五臟六腑乃形氣俱虛乃受外邪不因脾胃虛弱賊邪不能獨傷人則病從脾胃而生者愈明矣聖人意旨重見疊出詳明如此且垂戒云法於陰陽和於術數飲食有節起居有常不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去由是言之則人之飲食起居之際可不慎哉

醫醫大全

卷六

脾胃虛實

五

顧氏秘書

論瘡瘍虛實

夫瘡疽膿潰腫毒浸淫證候危惡者須辨虛實况夫虛者難補實者易瀉補瀉之法不可輕用若或少差利害甚大然而虛實多端有瘡之虛實有臟腑虛實有血氣虛實又有上實下虛真虛邪實者不可不辯也夫腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟慢膿稀者瘡疽之虛也瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足並冷脉弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便硬小便澀飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脉大精神昏塞者悉臟腑之實也如膿水清稀瘡口不合聚腫不赤飢寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭疼鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也精滑不斂大便自利腰脚沉重睡臥不寧者下虛也肩項不便四肢沉重日視不正睛不了了食不知味音嘶聲敗

傷醫大全

卷六

虛實

四

顧氏秘書

四肢浮腫者真氣之虛也腫焮尤甚痛不可近積
日不潰寒熱往來大便秘澁小便如淋心神煩悶
恍惚不寧者邪氣之實也又曰真氣奪則虛邪氣
盛則實又曰諸痛爲實痿爲虛也又曰診其脈洪
大而數者實也微細而輒者虛也虛則補之和其
氣托裡也實則瀉之疎利而自導其氣也內經謂
血實則決之氣虛則掣引之元戎云若人氣血壅
盛榮衛充滿抑遏不行腐化而爲癰者當泄之以
奪盛熱之氣若人飲食少思精神衰弱榮衛短澹
癰醫大全 卷六 虛實 望 顧氏秘書

論瘡瘍五善七惡救法
程山齡曰或問癰疽五善七惡何謂也答曰五善者
飲食知味一也便溺調勻二也膿潰腫消膿水不
臭三也神氣清爽動息自寧四也脈息有神不違
時令五也七惡者大渴發熱泄瀉淋閉一也膿潰
仍腫膿水臭穢二也目睛無神語聲不亮三也食
少不化服藥作嘔四也恍惚嗜臥氣短乏力背如
負石五也唇青鼻黑面目浮腫六也脈息無神或
躁動不和七也古語云五善得三則吉七惡得四
則凶不待四矣然而急救之法正不容以不講大
抵熱渴淋閉喘急內熱皆真陰受傷宜用六味湯
加麥冬五味如不應入八珍湯加麥冬五味更不
應用十全大補湯兼服六味地黃丸此補陽生陰
之說也若氣促倦怠昏憤乏力飲食不化乃陽虛
之候宜用補中益氣湯若睡臥不寧宜用歸脾湯
若飲食減少面目浮腫宜用香砂六君子湯若兼
脾胃虛寒更用理中湯腎氣虛寒須用桂附八味
丸兼用十全大補湯加附子此溫補回陽之法也
癰醫大全 卷六 五善 望 顧氏秘書

若癰疽潰後膿血去多變為角弓反張手足搐搦
肢體振搖而發癰者急宜用參朮歸朮附子等藥
以救之如不應用十全大補湯間有可生者當此
時勢性命急如懸縷司命者宜叮嚀反復熟思而
審處之耳 十法

蔣示吉曰五善七惡方書俱載然亦不止於此也如
膿成不自出失導引者死膿成不針烙反敷藥者
死熱痛正甚失治則毒內攻者死毒內攻後不服
藥反針烙者死潰而至於透內膜者死潰喉者死

瘍醫大全 卷六 五善 壘 顧氏秘書

未潰而陷面青唇黑便污者死陰入腹入囊者死
高腫不托裡反用下藥者死漫腫不內托反用寒
涼攻利者死潰後悞用寒涼致瘡紫黑者死潰後
悞用辛散發瘡者死穿膜穿腮者死上蝕鼻梁下
穿咽喉者死故治者不可不早亦不可不審也 說
李東垣曰大抵證候瘡疽之後虛中見惡症者不可
救也實證無惡候者自愈大凡膿潰之後而煩疼
尚未痊者診其脉洪滑粗散者難療微濇遲緩者
易痊此善惡之症於診候之中亦可知矣發背腦

疽及諸惡瘡則有五逆之證者白睛青黑而眼小
服藥而嘔傷痛渴甚膊項中不便音嘶色敗者是
為五逆其餘熱渴痢嘔蓋毒氣入裡臟腑之傷也
當隨證以治之 十書

薛立齋曰夫瘡瘍之症有五善有七惡五善見三則
瘡七惡見四則危夫善者動息自寧飲食知味二
便調勻膿潰腫消膿鮮不臭神彩精明語聲清朗
體氣和平是也此屬腑症病微邪淺更能慎起居
節飲食勿藥自愈惡者乃五臟虧損之症多因元

瘍醫大全 卷六 五善 壘 顧氏秘書

氣虛弱或因膿水出多氣血虧損或因汗下失宜
榮衛消燼或因寒涼剋伐氣血不足或因峻厲之
劑胃氣受傷以致真氣虛而邪氣實外似有餘而
內實不足法當純補胃氣多有可生不可因其惡
遂棄而不治若大渴發熱或泄瀉淋閉者邪火內
淫一惡也竹葉黃芪湯氣血俱虛八珍湯加黃芪
麥冬五味山萸如不應佐以加減八味丸煎服膿
血既泄腫痛尤甚膿色敗臭者胃氣虛而火盛二
惡也人參黃芪湯如不應用十全大補湯加麥冬

五味目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視者
肝腎陰虛而目系急三惡也六味丸料再加炒山
梔麥冬五味如不應用八珍湯加炒山梔麥冬五
味喘粗短氣恍惚嗜臥者脾肺虛火四惡也六君
子加大棗生薑如不應用補中益氣湯加麥冬五
味心火刑剋肺金人參平肺散陰火傷肺六味丸
加五味煎服肩背不便四肢沉重者脾腎虧損五
惡也補中益氣湯加山藥山萸五味如不應用十
全大補湯加山萸黃山藥五味不能下食服藥而
嘔食不知味者胃氣虛六惡也六君子湯加木香
砂仁如不應急加附子聲嘶色敗唇鼻青赤面目
四肢浮腫者脾胃俱虛七惡也補中益氣湯加大
棗生薑如不應用六君子湯加炮薑更不應急加
附子或用十全大補湯加附子炮薑腹痛泄瀉咳
逆昏憤者陽氣虛寒氣內淫之惡症也急用托裡
溫中湯後用六君子湯加附子或加薑桂溫補此
七惡之治法也此外更有潰後發熱惡寒作渴或
怔忡驚悸寐不寧牙關緊急或頭目赤痛自汗

瘍醫大全

卷六

五善

聖

顧氏秘書

盜汗寒戰咬牙手撒身熱脉洪大按之如無或身
熱惡衣欲投於水其脉浮大按之微細衣厚仍寒
此氣血虛極傳變之惡症也若手足逆冷肚腹疼
痛泄利腸鳴飲食不入吃逆嘔吐此陽氣虛寒氣
所乘之惡症也若有汗而不惡寒或無汗而惡寒
口噤足冷腰背反張頸項勁強此血氣虛極變症
之惡候也急用參芪歸朮附子救之間有可生者
大抵虛中見惡症者難治實症無惡候者易治宋
時齊院令雖嘗纂其狀而未具其因陶節菴雖各
立一方亦簡而未悉余故補其缺云
胡公弼曰癰有證合七惡皮緊急而知善氣足而血
未附也疽有證合五善皮緩虛而知惡血附而氣
未克也

瘍醫大全

卷六

五善

聖

顧氏秘書

論瘡瘍發熱惡寒煩躁頭痛

夫瘡瘍初起未潰膿時有發熱惡寒者乃榮衛不行
經絡阻塞瘡毒熾發之所為也如已潰之後膿血
大泄未有不虛者也經曰陽微即惡寒陰弱還生
熱是也丹溪曰惡寒非寒是衛氣虛衰不能溫分
肌肉實於腠理而惡寒者又有上焦之邪隔絕榮
衛不能升降出於表而惡寒者東垣曰夜則惡寒
晝則安靜是陰血自旺於陰分也有日夜惡寒而
不發熱者是重陰無陽也當泄其陰而峻補其陽
湯醫大全 卷六 寒熱 聖 顧氏秘書

也又夜則安靜晝則惡寒是陰盛而上溢於陽分
也如晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也
晝則安靜夜則發熱是陽氣下陷入陰分也名曰
熱入血室如晝夜俱發熱煩躁是重陽而無陰也
當亟泄其陽而峻補其陰王註云病熱而脈數按
之不鼓動乃寒盛格陽而致之非熱也形症俱寒
而脈鼓擊於手下者此為熱甚拒陰而生病非寒
也如脈浮數而弱惡寒者陽氣虛也宜補氣如脈
沉而熱者血虛也宜補血又午前發熱宜補氣午

後發熱宜補血如脈浮數發熱而痛者邪在表宜
散之脈沉數發熱而痛者邪在裏宜下之又法候
之以手捫摸分輕重五法以輕手按之於皮毛間
熱者肺熱也微重於肌肉間熱者脾熱也再微少
重於血脉間熱者心熱也又重手按之於血脉之
下筋骨之間者肝熱也又至重按之於骨分其熱
蒸手如火其人骨蒸蘇如重食其骨困熱不任其
身亦不能起於牀者腎熱也又一法十二經候之
於十二時中發熱形症可推亦隨症施治無不驗

湯醫大全 卷六 寒熱 聖 顧氏秘書

耳

薛立齋曰夫瘡瘍發熱煩躁或出血過多潰膿大泄
或汗多亡陽或下多亡陰以致陰血耗散陽無所
依浮散於肌表之間而非火也若發熱無寐血虛
也用聖愈湯兼汗不止氣虛也急用獨參湯發熱
煩躁肉瞶筋惕氣血虛也用八珍湯大渴而赤脈
洪大而虛陰虛發熱也用當歸補血湯肢體微熱
煩躁而赤脈沉而微陰盛發躁也用四君子加薑
附東垣曰晝發熱而夜安靜是陰氣自旺於陽分

也晝安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰中也如晝
夜俱發熱者重陽無陰也當峻補其陰故王太僕
云如大寒而甚熱之不熱是無火也當治其心如
大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往
來時動時止是無水也當助其腎是心盛則生熱
腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內
又熱不勝寒是無火也寒不勝熱是無水也夫寒
之不寒責其無水熱之不熱責其無火熱之不久
責心之虛寒之不久責腎之弱治者當深味之

傷醫大全

卷六

寒熱

四九

顧氏秘書

汪省之曰凡瘡瘍膿血大泄當大補氣血為先雖有
他症當末治之故癰疽潰後發熱惡寒者皆屬氣
血虛甚若左手脉不足補血藥當多於補氣藥右
手脉不足者補氣藥當多於補血藥切不可發表
以犯虛虛之禍故東垣曰七情皆能動火各經之
熱不同宜分治之

戴院使曰未潰之際憎寒壯熱狂言妄語如見鬼神
膿去已多而大熱不休者似為難治蓋毒之得膿
猶傷寒表證之得汗汗已而反大熱則為壞傷寒

矣又云患癰毒人膿血已潰所去過多津液枯竭
多病於渴縱有發熱躁擾等證不可妄治宜用益
榮生津之劑若大熱不止者難療

李東垣曰癰疽發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲
近衣脉洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯
證也此血虛發躁宜當歸補血湯主之

張景岳曰用手摸熱有三法以輕手捫之則熱重按
之則不熱是熱在皮毛血脉也重按之至筋骨之
分則熱蒸手極甚輕手則不熱是邪在筋骨之間

傷醫大全

卷六

寒熱

五

顧氏秘書

也不輕不重按之而熱是熱在筋骨之上皮毛血
脉之下乃熱在肌肉也

張仲景曰脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也

又曰寸口脉微為陽不足陰氣上入陽中則酒漸惡
寒尺脉弱為陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也

又曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則
內寒

又曰陽氣有餘為身熱無汗此言表邪又曰陰氣有
餘為多汗身寒此言陽氣之虛也又曰發熱惡寒者發於

陽也無熱惡寒者發於陰也又曰極寒反汗出身必冷如冰此與經旨義相上下

經曰陰勝則陽病陽勝則陰病陽勝則熱陰勝則寒張仲景曰寒邪在表者必身熱無汗以邪閉皮毛也又曰寒邪客於經絡必身體疼痛或拘急而痠者以邪氣亂營氣血脈不利也

又曰寒邪在表而頭痛者有四經焉足太陽經脈最長挾於頭頂其痛居多足陽明脈上至頭維足少陽脈上行兩角三陰經無頭痛三陰至頸而還何

傷醫木全 卷六 寒熱 幸 顧氏秘書

得頭痛厥陰脈與督脈上會於顛頂都攝諸陽故有頭痛也惟太陰少陰皆無頭痛之證然厥陰頭痛亦不常見必嘔吐涎沫內無熱症乃直中也當溫之

又曰寒邪在表多惡寒者蓋傷於此者必惡此所謂傷食惡食傷寒惡寒也

又曰太陽經脈起自內眥上頂顛下項挾脊行腰膂故邪在太陽者必惡寒發熱而兼頭項痛腰脊強或膝膈痠痛也

又曰陽明經脈起目下循面鼻行胸腹故邪在陽明者必發熱微惡寒而兼目痛鼻乾不眠也

又曰少陽為半表半裏之經其脈繞耳前後由肩井下脇肋故邪在少陽者必發熱而兼耳聾脇痛口苦而嘔或往來寒熱也

又曰身雖微熱而濇濇汗出不止及無身體痠疼拘急而脈不緊數者此熱非在表也

又曰證似外感不惡寒反惡熱而絕無表證者此熱盛於內也

傷醫木全 卷六 寒熱 幸 顧氏秘書

又曰表實者或為發熱或為身痛或為惡熱掀衣或為惡寒鼓慄寒束於表者無汗火盛於表者有湯走注而紅痛者知營衛之有熱拘急而痠痛者知經絡之有寒

又曰陽實者多熱惡熱陰實者為痛結而寒氣實者氣必喘粗而聲色壯厲血實者血必凝聚而且痛且堅

又曰表虛者或為汗多或為肉戰或為怯寒或肢體多見麻木目暗羞明耳鳴眩暈

又曰陽虛者火虛也為神氣不足為眼黑頭眩或多
寒而畏寒陰虛者水虧也為亡血失血為戴陽為
骨蒸勞熱

又曰病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨
髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓
也若內熱之甚者亦每多畏寒此當以脈證參合
察之

又曰陽邪在表則表熱陰邪在表則表寒陽邪在裏
則裏熱陰邪在裏則裏寒邪在半表半裏之間而
無定處則往來寒熱

傷醫大全

卷六

寒熱

五

顧氏秘書

又曰邪氣在表發熱者表熱裏不熱也宜溫散之邪
氣在裏發熱者裏熱甚而達於外也宜清之

又曰陽不足則陰氣上入陽中而為惡寒陰勝則寒
也宜溫之陰不足則陽氣陷入陰中而為發熱陽
勝則熱也宜清之

又曰寒熱往來者陰陽相爭陰勝則寒陽勝則熱也
蓋熱為陽寒為陰表為陽裏為陰邪之客於表者
為寒邪與陽相爭則為寒慄邪之傳於裏者為熱

邪與陰相爭則為熱躁其邪在半表半裏之間者
外與陽爭則為寒內與陰爭則為熱或表或裏或
出或入是以寒熱往來也此半表半裏之證也故
凡寒勝者必多寒熱勝者必多熱但審其寒熱之
勢則可知邪氣之淺深也

經曰陽微則惡寒陰弱則發熱

仲景曰人身外為陽為表寒屬陰邪今表虛為寒所
乘名曰陰盛陽虛蓋陽不能溫其膚衛於外致令
空虛雖居密室亦引衣自蓋謂之惡寒陰盛陽虛

傷醫大全

卷六

寒熱

五

顧氏秘書

汗之自愈故惡寒屬表假熱在肌膚必裸體煩躁
是曰惡熱又焉得為惡寒若見惡寒知寒在肌膚
急投甘辛之劑可也

又曰寒鬱腠理則閉塞而發熱翕翕然烙手此熱止
在皮膚而內無熱名曰表病裡和內經諸症亦論
凡風寒客入使人毫毛畢直皮膚閉而為熱當汗
又云體若燔炭汗出而解又熱病論云人傷於寒
則為熱病若大汗其熱解矣以上各條皆為辨之
外感者當以此辨之

論瘡瘍痛癢麻木

經云諸痛癢瘡瘍者皆屬心火火之為物能消燦萬物殘敗百端故也蓋人之肌膚附近火灼則為瘡若肉近火則痛微遠則癢此火之用也或有癢痛如針尖輕刺者猶飛迸火星灼之然也然瘡瘍時灸之以火漬之以湯而癢轉甚者是微熱助之所使也有因而不癢者是熱令皮膚舒緩腠理開通陽氣得泄熱氣易散矣故不癢也有癢而用冷水沃之暫時少退良久復大癢者乃寒主收斂陽氣

瘍醫大全

卷六

痛癢麻木

七

顧氏秘書

鬱結不得散越沸熱內作故復癢轉甚也又癢得抓而解者抓主動動為陽陽屬火化故輕輕抓而能癢亦火之微也重重抓則癢去者是皮膚抓得辛辣而屬金化辛能散故金化見火力而解故不癢也經曰痛者為實癢者為虛非為虛寒之虛乃火熱微甚之意也又有瘡瘍麻木而不知痛癢者是氣虛而不運又兼瘡毒壅塞經絡不通致令麻木而不知有無也亦分輕重耳蓋麻者木之輕木者麻之重也假如人坐久之腿膝木而不知有無

少頃舒伸良久復踈則麻乃壅之少氣通血復行之意也大抵未潰之先有麻木者毒塞輕重之分也已潰之後而有麻木者乃肌肉腐爛血氣已虧是虛之輕重也

張景岳曰凡癰毒焮腫赤痛之甚者雖內治之法已具於前然煎劑功緩而痛急難當者必須外用敷藥既欲其止痛必欲其敗毒則無如降癰散之神妙也

又曰膿出反痛者虛也

瘍醫大全

卷六

痛癢麻木

七

顧氏秘書

李東垣曰夫瘡疽之證候不同寒熱虛實皆能為痛止痛之法殊非一端世人皆謂乳沒珍寶之藥可住痛疼殊不知臨病制宜自有方法蓋熱毒之痛者以寒涼之劑折其熱則痛自止也寒邪之痛以溫熱之藥熨其寒則痛自除矣因風而有痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之因膿鬱而閉者開之惡肉侵潰者引之陰陽不和者調之經絡秘澁者利之臨機應變方為上醫不可執方而

無權也 十書

澄曰癰疽疼痛有五種初起者氣凝血聚也宜活血行氣已成跳痛者此內腐作膿也宜內托排膿將潰悞敷涼藥痛者宜用芳香之藥淋濕之已潰膿出反痛者虛也宜補氣血潰後穢氣所觸而痛者宜乳沒解之其痛自止

瘍醫大全

卷六

癰癤麻木

季

顧氏秘書

論瘡瘍作渴

寶漢卿曰夫瘡瘍作渴若焮痛發熱便利調和者上焦熱也用竹葉石膏湯腫痛發熱大便秘澀者內臟熱也用四順清涼飲焮腫痛甚者熱毒蘊結也用仙方活命飲漫腫微痛者氣血虛壅也用補中益氣湯若因胃火消燦而津液短少者用竹葉黃芪湯若因胃氣虛而不能生津液者用補中益氣湯若因胃氣傷而內亡津液者用七味白朮散若因腎水乾涸作渴或口舌乾燥者用加減八味丸

瘍醫大全

卷六

作渴

季

顧氏秘書

最妙或先口乾作渴小便頻數而後患疽或疽愈後口渴飲水或舌黃乾硬小便數而疽生者尤其惡也苟能逆知其因預服加減八味丸補中益氣湯以滋化源可免是患疽安服此丸則渴止安而未渴者服此丸永不發渴或未疽而先渴者服此丸不惟渴止而疽亦不作

朱丹溪曰夫瘡瘍作渴不言食味起火怒氣生火房勞激火吾恐渴亦未易言止也

精要曰口渴與口乾不同不宜妄用丹藥鎮墜禍如

反掌惟取桑枝同五味子煎湯飲之以救陰水甚妙

馮魯瞻曰夫癰疽愈後忽發渴而不救者十有八九或先渴而患疽者尤為難治故宜多服八味丸非特杜絕渴疾抑亦大滋氣血生長肌肉

申斗垣曰夫渴者乃消燦津液因熱極生渴心火煎燔所致如瘡瘍未潰而作渴者是瘡毒熾盛其心

肺脈必洪數實大者宜降火清金芩連內疎之劑如尺脈洪大而無力者宜滋陰降火大補氣血等

湯醫大全 卷六 作渴 李 顧氏秘書

藥或獨參湯如潰後氣血大虛而生渴症者十有八九宜用黃芪六一湯加減八味丸但癰疽已發已潰未潰加減八味丸治之均有大效如無癰疽而肺脈洪數甚作渴者必發癰疽此其候也

伍氏云瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡物如利

後仍渴却用生津藥津液生氣血克渴自止

精要月嫩桑枝細切一升炒水煎日服五七劑更止大渴多服尤妙如治腎水枯涸口燥舌乾用五味子湯即其草六一湯生脈湯合用其效如神

張景岳曰凡內熱之甚則大渴喜冷冰水不絕而腹

堅便結脈實氣壯者此陽證也

又曰凡口雖渴而喜熱不喜冷者此非火證中寒可知既非火證何以作渴乃水虧故耳

又曰凡病人問其渴否則曰口渴問其欲湯水否則曰不欲蓋其內無邪火所以不欲湯水且陰內虧所以口無津液此口乾也非口渴也不可以乾作渴治

又曰凡陽邪雖盛而直陰又虛者不可因其火盛喜冷便云實熱蓋其內水不足欲得外水以濟水涸

湯醫大全 卷六 作渴 李 顧氏秘書

精虧直陰枯也必兼脈證細察之此而畧差死生

立判余嘗治垂危最重傷寒有如此者每以峻補之劑浸冷而服或以冰水人參熟附等劑相間迭

進活人多矣常人見之咸以為奇不知理當如是何奇之有然必其乾渴燥結之甚者乃可以參附

凉水並進若無實結不可與水如癰疽亦不可與凉水並進也

又曰裏熱薰灼臟腑必口渴便閉或下利腸垢而小水短赤

論瘡瘍欲嘔作嘔呃逆

薛立齋曰夫瘡瘍作嘔不可泥於毒氣內攻而概用
敗毒等藥如熱甚焮痛邪氣實也仙方活命飲解
之作膿焮痛胃氣虛也托裏消毒散膿熟脹痛氣
血虛也先用托裏散後用針以泄之焮痛便秘熱
蘊於內也內疎黃連湯導之若因寒藥傷胃而嘔
者托裏建中湯胃寒少食而嘔者托裏益中湯虛
寒淫而嘔者托裏溫中湯肝木乘脾而嘔者托裏
抑青湯胃脘停痰而嘔者托裏清中湯脾虛自病
而嘔者托裏益黃湯鬱結傷脾而嘔者托裏越鞠
湯若不得詳究其源而妄用攻毒之藥則腫者不
能潰潰者不能斂矣丹溪雖曰瘡瘍時嘔當作毒
氣攻心治之潰瘍時嘔當作陰虛補之殊不知此
大槩之言耳即內經諸痛癢瘡皆屬心火之意况
今之熱毒內攻而嘔者寡脾胃虛寒而嘔者多豈
可執前聖之言而藥今人之病歟

瘡醫大全 卷六 嘔呃 李 顧氏秘書

劉河間曰夫瘡瘍時嘔當作濕氣侵胃倍用白朮
朱丹溪曰諸逆上冲嘔噦皆屬於火然治嘔須分先

後腫瘍時當作毒氣上攻治之潰瘍後當作陰虛
補之

馮魯瞻曰夫癰疽嘔逆有二一因初起失於內托伏
熱在心一因脾氣不正伏熱在脾在心者則心煩
身熱焮腫作痛脾氣不正者則不煩熱但聞穢氣
便嘔故治癰疽多用香藥者蓋氣血聞香則行聞
臭則逆瘡瘍多因榮氣不從逆於內裏鬱結為膿
得香則氣血流行凡瘡本腥穢又聞臭觸則愈甚
若毒入胃則嘔噦古人用之可謂有理即如飲食
亦須調令香美以益脾土養其真元可保無虞矣
忠斗垣曰夫嘔者有聲無物謂之嘔是氣病也有物
無聲謂之吐是血病也凡瘡瘍腫痛之時即有嘔
聲或吐當診其脉如洪數實大或便秘不喜冷飲
者宜降火清中黃連解毒湯如喜熱飲而惡寒者
作嘔便利如常宜養胃調中湯如脉微細腸鳴腹
痛作泄而嘔者托裏溫中湯二神丸再以香砂六
君子湯治之飲食頓進十全大補湯亦可有患瘡
瘍未潰而作嘔及惡心者乃瘡毒之甚內攻胃氣

瘡醫大全 卷六 嘔呃 李 顧氏秘書

原虛故有此症宜六君子湯加香砂生薑治之如瘡瘍已潰而作嘔作惡心者或不食痞滿腸鳴腹痛大便利作嘔及噦聲不絕不得安眠昏憤時發宜托裏溫中湯治之內經曰寒淫於內治以辛溫佐以苦溫薑附能溫中外陽氣自裏之表故為君羌活苦辛溫能透關節耳

寶漢卿曰夫吃逆乃胃中虛冷之極宜香附丁沉

丹溪曰內托散性涼治嘔有降火之理即護心丹

精要云嘔逆有二證一證謂初發不曾服內托散伏

瘍醫大全 卷六 嘔呃 奎 顧氏秘書

熱在心宜內托一證謂氣虛脾氣不正宜嘉禾散

朱丹溪曰治嘔須分先後腫瘍時當作毒氣上攻治

之潰後當作陰虛治之若年老因疽潰後嘔逆不

食者宜參芪白朮膏峻補取效

薛立齋曰熱毒內攻而嘔者寡脾胃虛寒而嘔者多

當脈症辨之

楊氏曰鼻衄初愈不曾表汗毒在經絡則背發大疽

自肩下連腰脇腫硬如石其色紫黑以涼藥投之

終夜大嘔連進內托散嘔止

李東垣曰嘔吐無時手足厥冷臟腑之虛也

更全善治一男子腫瘍嘔諸藥不止用獨參湯一服

嘔即止

薛立齋曰喜熱惡寒而嘔者宜溫養胃氣喜寒惡熱

而嘔者宜降火

南院使戴元禮曰如惡心者無聲無物欲吐不吐欲

嘔不嘔雖曰惡心實非心經之病皆在胃口止宜

用生薑蓋能開胃豁痰也

張景岳曰予嘗飲食少思吞酸愛腐諸藥不應惟服

瘍醫大全 卷六 嘔呃 奎 顧氏秘書

理中湯及附子理中丸有效蓋此證皆因中氣虛

寒不能運化鬱滯所致故用溫補之劑使中氣溫

和自無此證矣

胡公弼曰若氣血兩虛發嘔而舌尖乾燥者必死

蔣示吉曰脾胃將傾則飲食作嘔宜六君子湯加木

香砂仁不應加附子說約

經曰諸吐嘔酸水及水液渾濁者皆屬熱諸嘔吐涎

澄徹清冷者皆屬寒如天寒則水清天熱則水濁

之義又有胃熱胃寒之分辨之以口渴與不渴耳

論瘡瘍喘急

王肯堂曰癰疽喘急恍惚嗜卧此心火刑肺金宜用人參平肺散面赤者不治準繩

瘡醫大全

卷六

喘急

奎

顧氏

論瘡瘍大便瀉利

夫瘡瘍大便泄瀉或因寒涼剋伐脾氣虧損或因脾氣虛弱食不剋化或因脾虛下陷不能升舉或因命門火衰不能生土或因腎經虛弱不能禁止或因脾腎虛寒不能司職所主之法若寒涼傷脾用六君子加木香砂仁送二神丸脾虛下陷用補中益氣送二神丸命門火衰用八味丸料送四神丸腎虛不禁用薑附湯加吳萸五味脾腎虛寒用參附湯送四神丸病機云脉沉而細身不動作睛不瞭瞭飲食不下鼻準氣息者薑附湯主之身重四肢不舉者參附湯主之仲景云下痢腸鳴當溫之脉遲緊痛未止當溫之太孔明當溫之心痛當救裏可與理中附子四逆輩精要云癰疽嘔瀉腎脉虛者不治此發內經之微旨也凡此實難治之症如按前法治之多有可生者

瘡醫大全

卷六

瀉利

奎

顧氏

論瘡瘍大便秘結

東垣云瘡瘍熱毒深固嘔哕心逆發熱而煩脉沉而實腫硬木悶大便秘結此毒在臟宜疎通之故曰疎通其內以絕其源又曰瘡瘍及諸病面赤雖伏火熱不得妄攻其裏而陽氣拂鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之凡大便不通飲食雖多肚腹不脹切不可通若腹痞脹而不通者乃直腸乾涸也宜用猪胆導之若腸胃氣虛血涸而不通者宜用十全大補湯培養之若瘡症屬陰或因

瘍醫大全

卷六 秘結

李

顧氏秘書

入房傷腎而不通者宜用前湯加薑附回陽多有得生者經云腎開竅於二陰藏精於腎津液潤則大便如常若潰瘍有此因氣血虧損腸胃乾涸當大補為善設若不審虛實而一於疎利者鮮有不誤

又曰凡病人大腸乾燥當用蜜導法或胆導法聽其在床隨便出之不可扶起若大腸乾燥脹掙則瘡口鮮血突出此肝不藏血故也

申斗垣曰大凡瘡瘍皆由五臟不和六腑壅滯則令

經絡不通而生焉瘡初起未潰之先腫焮大痛脉洪數實大欲作膿時大便秘結宜托裏倍加硝黃即發表攻裏之劑是也如已潰後脉微其數濇者乃膿血出多氣血衰弱宜入珍湯聖愈湯內加桃仁火麻仁當歸少加熟地以潤之如弱甚以胆汁導之更妙切不可用巴豆牽牛驅逐峻厲之藥復傷元氣致生變症

瘍醫大全

卷六 秘結

李

顧氏秘書

薛立齋曰若飲食雖多大便不通而肚腹不脹者此內火消燥切不可通之若肚腹痞脹而直腸乾涸不通者宜用猪胆汁導之若誤行疏利復傷元氣則不能潰斂

張景岳曰後陰乃大腸之門而其通與不通結與不結可察陽明之虛實凡大便熱結而腹中堅滿者方屬有餘通之可也若新近得解而不甚乾結或旬日不解而全無脹意者便非陽明實邪觀仲景曰大便先鞭後澇者不可攻可見後澇者雖有先鞭已非實熱矧夫純澇而連日得後者又可知也若非真有堅燥痞滿等證則原非實邪其不可攻

也明矣

又曰大便通水穀之海腸胃之門戶也小便通血氣之海衝任水道之門戶也二便皆主於腎本為元氣之閉必直見實邪方可議通議下否則最宜詳慎不可悞攻使非直實而妄逐之導去元氣則邪之在表者反乘虛而深陷病因內困者必由泄而愈虧所以凡病不足慎勿強通最喜者小便得氣而自化大便彌固者彌良營衛既調自將通達即大腸秘結旬餘何慮之有若滑泄不守乃非虛弱者所宜當首先為之防也

傷醫大全

卷六 秘結

堯

顧氏秘書

導大便秘結法

蜜導法

用白蜜四兩火上煎熬四五沸其色黃取出乾磁盆內待其凝急分四分每分手搓作棗子形狀長一寸其蜜導頭須要光滑恐傷肛門用油潤之徐徐塞入少頃再加一條旋增以去後為度

膽導法

用猪膽一枚膽口中放鷲毛管一根紮緊以一頭鷲毛管插入肛門逞勢一捻其胆汁衝入肛門大便即行矣

傷醫大全

卷六 導便法

圭

顧氏秘書

又方

生藥何首烏四兩石臼搗碎沖滾湯絞汁隔湯燉熱頓服即通

治五六十日大便秘結不通

用鮮蘆根一籬搗汁澄清煨多年老鴨喫湯即解

論瘡瘍小便淋漓頻數不利

寶漢卿曰夫瘡瘍小便淋漓或莖中瀉者腎經虧損之惡症也宜用加減六味丸以補陰足脛逆冷者宜用八味丸以補陽若小便頻而黃者宜用四物湯加參朮麥冬五味以滋肺腎若小便短而少者宜用補中益氣加山藥麥冬五味以補脾肺若熱結膀胱而不利者宜用五淋散以清熱若脾氣燥而不能化者宜用黃芩清肺飲以滋陰若膀胱陽虛陰無以化者宜用滋腎丸腎虛之患多傳此症

瘍醫大全

卷六 小便

三

顧氏秘書

兆也
又曰凡小便人但見其黃便謂是火而不知人逢勞倦小水即黃焦思多慮小水亦黃瀉痢無期小水亦黃酒色傷陰小水亦黃但非有或淋或痛熱證相兼不可因黃便謂之火余見通枯汁而斃人者多矣經曰中氣不足溲便為之變義可知也若小水清利者知裏邪之未甚而病亦不在氣分以津液由於氣化氣病則小水不利也小水漸利則氣化可知最為吉兆

瘍醫大全

卷六 小便

三

顧氏秘書

張景岳曰傷寒而小水利者以太陽之氣未劇即吉也

論瘡瘍無寐肉瞶筋惕

夫瘡瘍潰後無寐發熱煩躁血虛也聖愈湯自汗不止無寐氣虛也四君子加黃芪五味子發熱煩躁肉瞶筋惕血虛也八珍湯大渴面赤脉洪大而浮陰虛發熱也當歸補血湯肢體微熱煩躁面赤脉沉微陰盛發躁也四君子加薑附

瘍醫大全

卷六

無寐瞶惕

七

顧氏秘書

論瘡瘍出血

夫瘡瘍出血因五臟之氣虧損虛火動而錯經妄行也當求其經審其因而治之若肝熱而血妄行者四物加炒梔丹皮苓朮肝虛而不能藏血者六味地黃丸心虛而不能生血者四物加炒連丹皮苓朮脾虛熱而不能統血者四君加炒梔丹皮若脾經鬱結用歸脾湯加五味子脾肺氣虛用補中益氣加五味子氣血俱虛用十全大補陰火動用六味丸加五味子大凡失血過多見煩熱發渴等症

瘍醫大全

卷六

出血

七

顧氏秘書

勿論其脉急用獨參湯以補氣經曰血生於氣苟非參芪歸朮甘溫等劑以生心肝之血決不能愈若發熱脉大者不治凡患血症皆當以犀角地黃湯為主東垣曰形氣有餘病氣有餘當瀉不當補形氣不足病氣不足當補不當瀉

論瘡瘍類破傷風

大凡癰疽潰後筋肉爛膿血大泄陽隨陰散或筋脉拘急惡寒惕擗甚者舌強口噤項背反張痰涎壅盛便閉出汗不時發熱此氣血俱虛而傳變雖與破傷風相類而主治之法當大補氣血若果係風症亦須以大補氣血為本而兼以治風之藥若不審是非而妄藥之則誤矣

澄曰男婦小兒但是額顙眉顙耳項無論是瘡是癰潰後俱要用膏封貼不可經風露若不慎頭面必

瘍醫大全

卷六

類破傷風

七

顧氏秘書

發腫宜外用紅昇丹膏蓋提之內服荆防僵蠶天麻白芷等味散之自愈

論瘡瘍散走流注

大凡氣血不調經絡不通復感六氣七情故毒氣乘風熱而走是也此症因風盛而生熱之症熱極氣盛氣因熱之極而走於四散急宜疎風定熱則風自息若元氣盛初發者速以艾灸七壯四圍敷藥內服流氣飲無不愈者若流注於腿脚者死無疑矣

瘍醫大全

卷六

散走

七

顧氏秘書

論瘡瘍攣急牽陰入腹

圖經古方療惡瘡癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入
小腹不可忍者一宿則殺人用茴香苗葉搗取汁
一升服之日三四用其滓以貼上冬月根亦可用
此海外方永嘉以來用之起死神效 準繩

瘡醫大全 卷六 攣急 夫 顧氏秘書

論瘡瘍目斜視上

王肯堂曰癰疽目斜視上黑睛緊小白睛青赤此肝
挾火邪也 準繩
蔣示吉日宜六味地黄丸料加山梔麥冬北五味子
治之 說約

瘡醫大全 卷六 目斜 夫 顧氏秘書

論瘡瘍發瘕 瘕當作瘕

夫瘡瘍發瘕因氣血虧損外邪所搏或內虛鬱火所致其證牙關緊閉四肢勁強或腰背反張肢體抽搐其有汗而不惡寒者曰柔瘕風能散氣故有汗也其無汗而惡寒者曰剛瘕寒能滯血故無汗也皆由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多與潰瘍產後多患之乃敗症也若大補氣血多有復生者若作風治速其危矣

瘡醫大全

卷六

發瘕

十一

顧氏秘書

論瘡瘍四肢逆冷

王肯堂曰四肢逆冷乃腎氣虛寒也準繩
澄曰寒熱之厥辨在何處蓋寒厥四肢逆冷過乎肘際指甲青脈沉細無力有寒證見於外若熱極而厥者火極似水雖厥而指甲尚溫不似寒厥過乎肘際脈來沉實大而有力以此為辨寒厥瘡必灰白下陷熱厥瘡必紫黯乾枯

瘡醫大全

卷六

肢冷

十一

顧氏秘書

論瘡瘍胸痞

王肯堂曰忿怒胸痞肝氣滯也倦怠胸痞中氣虛也胸滿多痰脾氣虛也準繩

書曰凡胸痞身上半屬陽身下半屬陰胸前乃清陽之分非物也若腹滿者是有物而非邪氣也但痞氣亦脹滿胸前何以別之曰痞氣因邪在表誤用硝黃巴豆牽牛下之以致胸脹必問其人曾經下否若經下過卽是痞氣未經下而胸前脹滿者卽半表半裏症

瘍醫大全

卷六

胸痞

全

顧氏秘書

論瘡瘍陽氣脫陷

夫瘡瘍陽氣脫陷或因尅伐之劑或因膿血大泄或因吐瀉之後或因誤而入房若發熱頭疼小便淋瀝或滑數便血目赤煩喘自汗發熱氣短頭暈體倦熱渴意欲飲水投水惡寒增寒身熱惡衣揚手擲足汗出如水腰背反張鄭聲不絕此無根虛火之假熱症若畏寒頭痛咳逆嘔吐耳聾目眩小便遺難瀉利腸鳴裏急腹痛玉莖短縮冷汗時出齒牙浮腫肢體麻痺或厥冷身痛或咬牙噤唇舌根強硬此陽氣脫陷之真寒症皆勿論其脉勿論其瘡但見一二急用參附湯補之多有復生者大凡潰後勞碌元氣虧損或夢遺精脫或滑數便血或外邪乘之或誤用寒涼氣血脫陷而致斯症治以前藥亦有復生者

瘍醫大全

卷六

脫陷

全

顧氏秘書

論瘡瘍僵肉

梅氏曰凡治背瘡肉長疾嫩皮不及暴見風卽成僵肉速以寒水石燒研爲細末傳瘡上再用銅絲細末上之肉卽不作疆矣 準繩

瘡瘍大全

卷六 僵肉

全

顧氏秘書

論瘡瘍瘡口黑暈瘡內無血色

凡瘡口黑暈而無血色者乃涼藥太過宜用冲和膏加肉桂當歸温活死血則黑暈自退也如顏色未復原仍以冲和膏敷之

瘡瘍大全

卷六 黑暈

全

顧氏秘書

論瘡瘍瘡毒入內卷

夫瘡之始發肉色未辨經絡初滯之時宜表散以托裏之劑使經絡易通而毒氣亦散則毒氣引令外出為順內經云汗之則瘡已俾榮衛通行妙在斯矣有等庸俗之人不知斯理而自高強自內疎不知脈浮在表之理反使邪毒內卷如傷寒症當汗而誤下之義同以致外如麻而裏如瓜增寒壯熱邪已內攻惟有急以蒜灸以接其陽引毒外出更以托裏大劑治之或有可生者常見有瘡疥之人燻然子等藥亦令入內俱自取傷生之禍爾

瘍醫大全

卷六

內卷

全

顧氏秘書

論瘡瘍面赤不得攻下

夫瘡瘍面赤雖伏大熱禁不得攻裏為陽氣怫鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便秘結只宜多發其表以發散陽火少加潤燥之藥若見風脈風症只可用發表風藥便可以通利也若只乾燥秘潛只宜潤之亦不可下

瘍醫大全

卷六

慎攻下

全

顧氏秘書

論瘡瘍治法當分緩急

凡患瘡瘍或泄瀉或出汗或不進飲食或夜不寐宜先治內症內症一愈則外症易痊此乃急則治標之法膏圍二藥仍照舊用之勿缺

瘡 全 卷六 治分緩急 毛 顧氏

論瘡瘍補瀉不可倒施

東垣云夫癰疽得之有內外之別治之有寒濕之異受之外者法當托裏以溫若反用寒藥則是以皮毛之邪引入骨髓矣受之內者法當疎利以寒若反用溫劑托裏則是以骨髓之病上徹皮毛矣是必表裏通瀉共為一瘡助邪為毒苦楚百倍輕則令危重則死矣

瘡 全 卷六 補瀉 毛 顧氏

論瘡瘍輕症用重劑

夫人身氣血有虛實瘡瘍所發有輕重治療之法有攻補元戎云若人氣血壅盛榮衛充滿抑遏不行腐化而為癰者當泄之以奪盛熱之氣若人飲食少思精神衰弱榮衛短濇寒搏而為癰者當補之以接虛怯之氣丹溪云腫瘍內外皆虛宜以補接行散為主大抵用藥之法如執權衡當察病勢輕重邪蓄表裏瘡毒腫潰元氣虛實若不詳究其因率爾投治實實虛虛七惡之禍不能免矣治者審之

瘍醫大全

卷六

慎重劑

允

顧氏秘書

論瘡瘍寒熱逆從用藥法

嘗見治寒以熱而寒彌甚治熱以寒而熱彌熾何也假如心實生熱者當益其腎腎水滋熱自除腎虛生寒者補益其心心火降寒自退此所謂寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽也又寒因熱用熱因寒用要在通其理而已又聞微者逆之甚者從之蓋治寒以熱必涼藥以行之治熱以寒必溫藥以導之此亦欲其藥性之調和也其間有正有權者因病有微甚微者逆治理之正也甚者從治理之權也

瘍醫大全

卷六

逆從法

卒

顧氏秘書

論瘡瘍用汗下藥

仲景云治傷寒有汗吐下三法東垣云治瘡瘍有疎
通托裏和榮衛三法用之得宜厥疾瘳矣假如瘡
瘍腫硬木悶煩熱便秘脉沉而實其邪在內當先
疎其內以下之焮腫作痛便利調和脉浮而洪其
邪在表當先托其裏以汗之元戎云榮衛充滿抑
遏而為癰者當泄之以奪盛熱之氣榮衛虛弱壅
滯而為癰者當補之以接虛怯之氣東垣又云瘡
瘍雖面赤伏熱不得攻裏裏虛則下利仲景又云
瘡家雖身體疼痛不可發汗汗之則發瘧苟不審
詳妄為汗下以致血氣虛損毒反內陷少壯者難
以潰斂老弱者多致不救

瘍醫大全

卷六 汗下法

全 顧氏秘書

論瘡瘍附子不可輕用

夫附子味辛而甘氣温大熱有大毒製法以童便煮
而浸之再用文武火以烈其毒且可助下行之力
入鹽尤捷此佐使之藥通行諸經其性善走而不
守浮中沉無所不致陽中之陽故行而不止用之
得宜有奪旗斬將之功用之不宜有殺身殞命之
禍每人參一錢為君止可下附子一二分為使再
加甘草以解其毒內外之症遇嚴寒時候瘡口沉
塌四肢厥冷寒濕疼痛痲痺拘攣膝痛不能行步
腰脊風寒伏陰傷寒方可下附子不審陰陽虛實
一槩用之使人服後火鬱中焦氣鬱下焦咆哮喘
急頃刻而斃凡用附子者豈可不細審之乎
又曰解附子毒令多吸新水連飲數碗遂大嘔洩方
解其毒此又不可不知也

瘍醫大全

卷六 慎用附子

全 顧氏秘書

論瘡瘍當合時從症

薛立齋曰經云諸痛癢瘡瘍皆屬心火若腫赤煩躁發熱飲冷便秘作渴脉洪數實是其常也雖在嚴寒之時必用大苦寒之劑以瀉熱毒若脉細皮寒瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足逆冷是變常也雖在盛暑之時必用大辛溫之劑以助陽氣內經云用寒遠寒用熱遠熱有假者反之雖違其時必從其症

王肯堂曰如腫赤煩躁發熱引冷便秘作渴脉洪數

瘍醫大全

卷六 合時

七

顧氏秘書

實是為五實雖在嚴寒之時必用大苦寒之劑瀉其陽以救其陰若脉細皮寒瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足逆冷是為五虛雖在盛暑之時必用大辛熱之劑散其陰以回其陽若執泥常法則誤矣準繩

張景岳曰愚意羅先生以合時從證之法垂訓後人誠百世不磨之要道也但時之遷變本所難知而證之幽顯尤不易識何也蓋常人之所謂時者春夏秋冬之時也歲歲時常之主氣也誰不得而知

之而不知五六周環則長夏有寒淫之令三冬有炎暑之權此則雖若合時而實以從時味者固能知此乎又如察證之法則凡脉細皮寒泄瀉厥冷之類是皆已見之寒證也又誰不得而知之不知其來有源有甚有漸即諸證未見之前而本來已具此際便難錯認使必待焦頭爛額而後曲突徙薪則已晚矣此羅先生之所以明已然則余更為慮未然蓋恐人之見之遲而無及於事也雖然余常見今人之於已然者尙不能見而復欲其見未

瘍醫大全

卷六 合時

七

顧氏秘書

然誠哉迂矣然余慨然之念則不能不道其詳而深望於知者



論瘡瘍用香散藥

伍氏曰氣血聞香則行聞臭則逆大抵瘡瘍多因營氣不從逆於內理故特聚為膿得香散藥則氣流行故當多服五香連翹湯萬金散清心內固金粉散凡瘡本腥穢又聞臭觸則愈甚者若毒氣入胃則為咳逆古人用此可謂有理且如飲食調令香美則益脾土養真元保其無虞矣

曰脾喜馨香藥品香燥固能行氣散鬱若真陰不足虛火上炎素多痰火之人又所當禁

瘍醫大全 卷六 香散 李 顧氏秘書

又曰潰後瘡瘍生肌藥中務須少加水麝蓋水麝香竄多用則走泄直氣反令瘡口難斂

又曰潰後忌房內焚燒安息沉香燒則瘡口燥癢

又曰潰後忌佩香囊離宮錠等物不獨耗散直氣且恐引動相火遺洩

論瘡瘍泥用止痛藥

薛立齋曰夫瘡瘍之作由六淫七情所傷而痛也因氣血凝滯所致假如熱毒在內便秘而作痛者內疎黃連湯導之熱毒熾盛焮腫而作痛者黃連解毒散治之不應仙方活命飲解之瘀血凝滯而作痛者乳香定痛散和之作膿而痛者托裏消毒散排之膿脹而痛者針之膿潰而痛者補之若因氣虛而痛四君加歸芪血虛而痛四物加參芪腎虛而痛六味地黃丸口乾作渴小便頻數者加減八

瘍醫大全 卷六 止痛 李 顧氏秘書

味丸此皆止痛之法也丹溪云膿出而反痛此為虛也宜補之穢氣所觸者和解之風寒所逼者溫散之若泥用乳沒斯執方矣

李東垣曰夫瘡疽之證候不同寒熱虛實皆能為痛止痛之法殊非一端世人皆謂乳沒珍寶之藥可住疼痛殊不知臨病制宜自有方法蓋熱毒之痛

者以寒涼之劑折其熱則痛自止也寒邪之痛以

溫熱之藥熨其寒則痛自除矣因風而有痛者除

其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛

一第... 丹... 卷六

者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之因膿鬱而
閉者開之惡肉浸潰者引之陰陽不和者調之經
絡秘澀者利之歸機應變方為上醫不可執方而
無權也 十書

瘍醫大全

卷六 止痛

全

顧氏秘書

論瘡瘍輕投十宣散等劑

今人有瘡瘍不審元氣虛實病之表裡病者多喜內
消而醫者即用十宣散及敗毒飲流氣飲之類殊
不知十宣散雖有參芪然防風白芷厚朴桔梗皆
足以耗氣况不分經絡時令氣血多少而槩用之
乎敗毒散乃發表之藥果有表證亦止宜一二服
多則元氣反損其毒愈盛雖有人參其能補也况
非表證而用之乎流氣飲乃耗血之劑果氣結膈
滿亦止宜二三服多則血氣愈傷夫血氣凝滯多
由榮衛氣弱不能運行豈可復用流氣飲以益其
虛况諸經氣血多寡不同而流氣飲通行十二經
則諸經皆為所損反為敗證雖有著歸亦難倚仗
若服之過度則氣虛血耗何以成膿苟不察其由
而泛投剋伐之劑能無危乎此三方者其不可輕
用亦明矣河間云凡瘡止於一經或兼二經者止
當求責其經不可干擾餘經也

瘍醫大全

卷六 十宣

全

顧氏秘書

論瘡瘍未潰不宜槩用敗毒之藥

夫瘡瘍之症當察經之傳受病之表裏人之虛實而
攻補之假如腫痛熱渴大便秘結者邪在內也疎
通之癰焮作痛寒熱頭痛者邪在表也發散之焮
癰痛甚者邪在經絡也和解之微癰微痛而不作
膿者氣血虛也補托之漫癰不痛或不作膿或膿
成不潰者氣血虛甚也峻補之色黯而微腫痛或
膿成不出或腐肉不潰者陽氣虛寒也溫補之若
泥其未潰而槩用敗毒復損脾胃不惟腫者不能
成膿而潰者亦難收斂七惡之症蜂起多致不救
丹溪云腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主如欲
用大黃寧無孟浪之非潰瘍內外皆虛宜以托裏
補接為主如欲用香散未免虛虛之失治者審之

瘍醫大全

卷六

慎敗毒

九

顧氏秘書

論煎藥必得其法

凡煎藥必須擇親信誠謹老實之人洗淨新藥罐用
新汲甜水為上慢火煎熬紗絹濾渣取清汁服之
不可近燈火之下吃藥過口之物酸味過口則藥
味甘甜味過口則藥味轉苦又不宜服冷藥脾
喜熱冷則不能運行患在上不厭頻而少少服則
滋榮於上患在下不厭頓而多多服則峻補於下
病在頭面頸項臂膊者先食而後藥病在胸膈心
下肚腹膀胱者先藥而後食病在四肢者陽中之
陽須服藥於日病在骨髓陰中之陰須服藥於夜

瘍醫大全

卷六

煎藥

一

顧氏秘書

論雜忌須知

凡病時忌怒忌疑慮忌身體不潔人來看忌魚羊鷺肉燒酒麵食生冷瓜果醃臘等物瘡口斂百日後不作渴者方可入房

凡一切癰疽瘡腫毒症將欲好之時如往有喪人家弔孝并拜望等項其瘡腫即復發切忌

凡癰疽大證雖有姬妾不得艷裝相見每見癰疽潰後大肉已生姬妾往來雖無交接之事而慾念一

動精已離官每致虛陷喘急而亡者數人病者當

情身命不可不為拒絕也

瘍醫大全

卷六

雜忌

一頁

顧氏秘書

論醫者宜避瘡毒侵襲

凡視瘡瘍穢氣甚臭聞之則惡心難忍毒深者最能染人須先用綿紙塞鼻孔食薑蒜燒酒充飽之物以敵穢氣切不可空心視之吃蒜酒後不可口對瘡上恐穢氣觸瘡上令患者作痛

瘍醫大全

卷六

避瘡毒

一頁

顧氏秘書

論藏指膿水穢紙法

凡指膿水垢紙必須入一竹籃中掛透風處但腐肉
瘀膿皆人之氣血所干者日中晒之則瘡口痛放
在濕處則膿水不乾待平愈後用乾柴一束燒之

傷醫大全 卷六 藏膿紙 顧氏秘書

瘍醫大全目錄

卷七

論初起腫瘍

論內消法

癰疽腫瘍門主方

癰疽門丹散主方

癰疽門膏藥主方

瘍醫大全

卷之七 目錄

顧氏秘書

蕪 頤世澄練江氏纂輯

婿錢之栢東陽 全校
男 柳燮用和

論初起腫瘍

蓋

曰初起腫瘍者乃癰疽惡毒始發壅腫七日之內

未成膿者目曰腫瘍施治之儘可內消十日之內

七縱不能全消亦可移深居淺轉重就輕但不可

驟用寒涼敷藥冰凝肌肉更勿輕投苦寒丸劑凝

滯氣血逼鬱毒氣難消散若已入八九朝內膿已

瘍醫大全

卷七

論初起

五

醫氏秘書

成治無消法若勉強消之不獨不能消散反致氣

血受虧根脚散漫內膿不能外泄膿汁清稀所以

消腫瘍之法貴乎昇地

論內消法

王肯堂曰癰疽之證發無定處欲令內消於初起紅

腫結聚之際施行氣活血解毒消腫之藥是也當

審淺深大小經絡處所形脈虛實如發於腦背腰

項醫膈者乃太陽經也宜黃連羌活背連脇處為

近少陽宜柴胡並宜敗毒散仙方活命飲形實脈

實者宜漏蘆湯內東武連湯追毒丸疎利之氣虛

者參耆為主血虛者歸芎為主毒以消毒之藥隨

分野以引經藥行至病所六經分野止有癰疽其

瘍醫大全

卷七

論內消

二

醫氏秘書

五經各隨本經標本寒溫氣血多少以行補瀉惟

少陽經雖曰氣多血少而氣血皆不足也治與

氣虛血虛同法凡瓜蔓射干穿山甲金銀花夏枯

草蟾酥連翹地丁鼠粘子木鱉子之類為內消之

藥仙方活命飲內消丸柞木飲子牛膠飲子車螯

散返魂丹消毒飲為內消之方眾皆知之殊不知

補瀉虛實平治寒溫使氣血各得其常則可內消

也其外用紫葛湯淋洗及用散塗膏貼者亦使氣

血和平而腫消熱退也

李東垣曰夫癰疽丹腫之生皆由陰陽不調榮衛凝澀氣血不流之所生也古人有言曰陽滯於陰則生瘡陰滯於陽則生疽瘡疽之生有內有外內生於臟腑胸腹之中外生於膚肉筋骨之表發無定處夫鬱滯之本則因氣血不流蒸氣不能外達留滯而成內熱瘡疽所生焉若初覺氣血鬱滯皮肉結聚腫而不潰時可疎滌風熱通利臟腑一二行後徐用諸湯湯漬即得內消矣不然則治之稍慢毒熱不散反攻其內致令膿血之聚也內經謂湯醫大毒 卷比 論內消 主 顧氏秘傳

治病必求於本蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也其風邪寒氣所聚也治之宜溫熱之劑和血令內消也辨之有法須認風寒則腫硬色白熱毒則焮腫色赤以為異也如有氣已結聚不可用內消之法宜用排膿托毒之藥此皆先後之次也

又曰消者滅也滅其形症也經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火火者離卦也離者外陽而內陰內陰壅滯必然外攻治當內消使絕其源而清其內不令外發故云內消乃初起微覺之時即以湯液丸散內服

外敷疎其源絕其毒即時消散如形症已成不用此法也

程山齡曰內消者腫毒初起即用藥消散也凡病癰疽發背對口疔毒其初起憎寒壯熱有似傷寒而痛偏着一處飲食如常者蓄積有膿也當初起時膿尚未成不過氣血乖違逆於肉裏耳外敷遠志膏或金黃如意散鐵箍散或貼普救萬全膏內服銀花甘草湯或內消散即時消散若係疔瘡即宜刺破或艾灸腫處土搽鹽酥餅貼以萬全膏內服

湯醫大毒 卷比 論內消 主 顧氏秘傳

菊花甘草湯隨即平伏菊花連根帶葉皆治疔瘡之聖藥也其中亦有挾風寒而發者又宜先用荆防散或芎芷香蘇飲冬月萬靈丹以散之隨服銀花菊花等藥即可內消務須及早下手不可遲滯

十法

癰疽腫瘍門主方

內消散 正宗

金銀花

知母

穿山甲

半夏

大貝母

乳香 去油

天花粉

白芨

皂角針 各一錢

酒水全煎熱服取汗 搯加秋芙蓉葉二兩搗

敷患上留頂透氣

立消散

生地

龍膽草

柴胡

癰醫大全

卷七 腫瘍方

五 顧氏秘書

防風

荊芥穗 和

槐花

青木香 各等分

升麻 上

膝 下部

酒水全煎熱服取汗輕可立消重者二劑 如

已成將潰禁服

銀花甘草湯 十法

一切惡毒肺癰初起立消誠外科捷法

鮮金銀花 五兩

甘草節 一兩

作一劑入砂銚內水二碗煎一半加無灰酒一

大碗畧煎數沸分作三服一日夜服完重者二

劑服至大小便利則藥力到矣如下部加牛膝

外用生金銀花搗爛敷四圍中留一孔透氣

沈內翰云金銀花乾者終不及鮮者力大而效

速

四妙湯 即神效托裏散

此瘍科首用捷法功效立奏增減活法醫者臨

症酌用

生黃耆 五錢

大當歸

金銀花 各一兩

甘草節 二錢

癰醫大全

卷七 腫瘍方

六 顧氏秘書

亦煎晝夜服盡自可移深居淺轉重作輕如已

成氣血素虧不能穿潰者加白芷皂針山甲各

二錢一伏時自潰如已潰後即宜刪去皂針山

甲如初起焮痛口渴加天花粉此治癰疽發背

腸癰之神方也

澄自幼及今數十年來凡治一切癰疽皆賴此

方遇大症金銀花每加至六兩四兩黃芪加至

兩許當歸加至二兩甘草節加至三錢但見瘡

色不起膿水清稀即加肉桂轉陰為陽化毒成

膿如乳癰乳吹即加蒲公英一兩立消百發百中萬穩萬當

大毒惡瘡初起即消已成白潰

廣陳皮二錢五分 白芷 當歸尾

乳香去油 甘草節 沒藥去油

天花粉 防風 川貝母去心

赤芍 穿山甲 皂針各一錢

連翹 肉桂各八分

酒水全煎熱服取汗 忌犯鐵器 孕婦忌服

瘍醫大全 卷七 腫瘍方 七 顧氏秘書

槐花酒 彭辛菴用此方三十年無不見效

初起大毒焮腫服之內消

槐花四兩入砂鍋內炒黃乘熱入酒二碗煎十餘沸

瀝去渣熱服取汗如未消再服極效

活血調氣湯

專主消毒散瘀

荆芥 天花粉 防風

赤芍 陳皮各一錢二分 甘草節八分

川貝母去心 金銀花 白芷

當歸尾 各二錢

水煎服

背上及冬月加羌活 內熱及夏月加連翹

消腫加 牛蒡子 痛甚加 乳香

小便澀加 穿山甲 木通 泄瀉加 沒藥 蒼朮

消無名大毒

陳琉璃砥黃存性

研極細輕者三錢重者五錢無灰酒冲服取汗

忌風

瘍醫大全 卷七 腫瘍方 八 顧氏秘書

神授衛生湯正宗

解毒消腫清熱活血止痛

白芷 天花粉 連翹各八分

牛蒡子 荆芥 甘草節各一錢

乳香去油 沒藥去油 防風各五分

金銀花三錢 當歸尾 川貝母各一錢五分

水煎服 若大便秘結熱甚者加大黃酒炒一錢

芎芷香蘇散十法

凡毒初起多有挾風寒而發者宜先用此藥

川芎 紫蘇 赤芍

陳皮 荆芥 香附

秦艽 白芷 甘草

引加葱頭二寸水煎服

傷食加 山查肉 麥芽 蘿蔔子

真人活命飲

治初起癰疽發背一切腫毒疔瘡惡證

金銀花 白芷 天花粉

陳皮 穿山甲 防風

傷醫大全 卷七 腫瘍方 九 顧氏秘書

甘草節 當歸 皂角刺

赤芍 川貝母 五錢

其毒在背以皂角刺為君加紫花地丁

其毒在胸加瓜蒌仁三錢

其毒在腹以白芷為君

其毒在四肢以金銀花為君

如疔瘡加草紫河車

右咀片每服用無灰酒十茶鍾如毒小各減半

用有嘴瓶裝厚紙蓋口勿令洩氣煎至五鍾去

搗作三五服接連頻服搗再煎此藥宜無灰酒
不可用酸薄酒莫犯鐵器服後側卧睡一覺定
有回生之意神功浩大之至

內消大毒

蘇木槌碎煎酒服

內消

槐花 一兩炒 核 桃 十個連殼燒
深黑 黑去殼取肉

研細和酒服取汗自消

消毒聖神湯 岐天師

傷醫大全 卷七 腫瘍方 十 顧氏秘書

金銀花 四兩 天花粉 五錢 蒲公英

當歸 生甘草 各二錢

水煎服一劑即消二劑全愈不必三劑

蓋金銀花專能內消瘡毒然非多用則力輕難
以成功生甘草一味已足解毒况又用之於金
銀花內益足以散邪而衛正蒲公英陽明經藥
也且能散結逐邪而花粉消痰聖藥當歸活血
是以專功血不活所以生癰今血活而癰自愈
此方之所以奇而肆也

孫真人初起立消

金銀花 三兩 白礬 一兩

水煎服一劑即消發背亦然

雷公消癰疽

當歸 一兩 天花粉 三錢 附子 一片

生甘草 元參 各五錢 金銀花 三兩

白礬 一錢

水煎服初起一劑即消腫者二劑必消

華佗真君消癰疽

金銀花 三兩 當歸 一兩 天花粉 五錢

蒲公英 生甘草 各三錢

水煎服

瘍醫大全 卷七 腫瘍方 主 顧氏秘書

孫真人統治諸癰

金銀花 一兩 蒲公英 五錢 天花粉 三錢

甘草 一錢

水煎服一劑輕二劑全愈此方消毒實有奇功

內消方

金銀花 四兩 甘草 二兩 蒲公英 一兩

元參 五錢 當歸 一兩

水煎服一劑即消

華真君消頭面瘡疽

當歸 一兩 金銀花 二兩 黃芩 一錢

蒲公英 桔梗 各三錢 生甘草

川芎 各五錢

水煎服一劑輕二劑全消不必三劑

華真君消癰萬全湯

治身上手足之瘡疽

金銀花 三兩 當歸 一兩 牛蒡子 二錢

蒲公英 生甘草 各三錢 天花粉 五錢

芙蓉葉 七個無葉時用梗三錢

瘍醫大全 卷七 腫瘍方 主 顧氏秘書

水煎服一劑即消二劑全愈

岐天師消癰

消中部癰疽

當歸 金銀花 白芍

元參 各一兩 甘草 五錢 荆芥

梔子 各三錢 白芥子 白礬

連翹 各二錢

水煎服一服知二劑全消破潰者四劑愈如陰

疽去梔子加肉桂一錢

張仲景統治癰疽

當歸 蒲公英 甘草 各一兩

金銀花 二兩 乳香 去油 黃芩 各一錢

水五碗煎一碗調乳香末服之

化癰湯 雷真君

金銀花 五兩 元參 三兩 當歸 二兩

荆芥 白芥子 各三錢 肉桂 三分

水煎服

雷真君消癰方

癰疽發背或生於頭頂或生於胸腹或生於手足臂腿腰臍之間前陰糞門之際肺癰大小腸癰母論陰毒陽毒初起一服立消已潰者即斂

元參 各一兩

金銀花 四兩 當歸 二兩 蒲公英

水五碗煎八分饑服一劑盡化為無有矣切勿

嫌其藥料之重減去分兩則功亦減半矣此方

既善攻散諸毒又不耗損真氣可多服久服俱

無碍

傷醫大全 卷七 顧氏秘書

岐天師消癰湯

金銀花 當歸 蒲公英 各一兩

荆芥 連翹 各一錢 生甘草 三錢

水煎服一劑輕二劑消三劑愈

天下第一消發背方

紫花地丁 金銀花 雅連 酒製

黃花地丁 槐花 各一兩

分四劑水煎服隨用溫水洗四肢取微汗後毒

氣下行四肢生小瘡而發背自消矣

傷醫大全 卷七 腫瘍方 顧氏秘書

葦靈仙散

消初起腫毒惡瘡

貝母 葦靈仙 知母 炒各一

兩 蟬酥 五厘

研細酒調空心服參錢每日二服以消為度

二仙丹

消初起發背

穿山甲 七片 牛皮膠 四兩

全放新瓦上燒存性研細好酒調下任量飲醉

出汗為度

初起腫毒 錢青掄

全當歸 八錢 生黃耆

金銀花 各五錢

甘草節 一錢八分

水煎服立消

上部加白芷 中部加杜仲 下部加牛膝各一錢八分 乳癰加橘葉五十片

消壯盛人腫毒 李飛霄

穿山甲 土炒研 何首烏 各二兩 牛膝 一兩

作一劑酒水全煎服立消

傷醫大全 卷七 腫瘍方

癰疽發背歌訣 古方

真人妙訣世間稀一切癰疽皆可醫化血就如

湯潑雪消膿立效肉生肌任他發背腫瘡毒那

怕疔瘡癩癰兒假饒疥癩並風癬乳疽五背盡

消除

金銀花 在四肢倍加 白芷 在腹脇倍加 甘草節

防風 沒藥 去油 赤芍

陳皮 各三錢 當歸 一錢五分 乳香 去油

川貝母 沉香 各一錢 廣木香 八分

穿山甲 蛤粉炒 皂角刺 剉碎鉛粉八錢全

右藥將乳香穿山甲 另研細末分作四包 其餘藥分四劑

河水二鍾煎七分加好酒半鍾調乳香穿山甲

末上部飽服下部空心服

消大毒 周鶴仙

金銀花 二兩 廣膠 一兩 全當歸 一枝要一兩重者

木通 五錢 甘草節 二錢

用無灰酒不拘多少鍋內煎上部飽服下部空

心服服後儘量飲醉蓋煖取汗即消神速無比

傷醫大全 卷七 腫瘍方 未 顧氏秘書

初起立消 周鶴仙

大瓜萋 一個頂上切去一片將子挖盡裝入婦人

梳下油膩亂髮一大團再入明礬三錢以

滿為度仍將切下一片蓋口過身將黃泥

封裹新瓦上微火煨過去泥將存性瓜萋

研為細末 作一服黃酒調服未潰者必消將潰即出膿收

內消

蟹殼 患小用一殼患大用

臨睡時黃酒冲服

立馬消 劉秘

川斑猫 大者是川產者佳
去翅足糯米拌炒

全蝎尾 各一百
五十個

蜈蚣 三十條
乳香 去油

沒藥 去油各
四錢

真蟾酥 三錢
酒浸研膏冰片

麝香 各二錢

右為細末用麻黃四兩熬膏為丸如桐子大硃

砂為衣畧晒乾磁瓶密貯凡遇發背癰疽腫毒

每用一丸如勢大者用二三丸乳細摻於太乙

膏上如瘡未破貼上以熱手摸百餘下次日即

消如瘡已破先以薄綿紙蓋瘡上再貼奏功

瘍醫大全

卷七

腫瘍方

七

顧氏秘書

蒼龍丸 劉秘

消諸般大毒

蒼龍 三百條
硃砂

明礬

明雄 各三錢
蟾酥 酒化

硼砂 各一錢

乳細麵糊丸如桐子大每服七九九九十一丸

酒水任下取汗自消

追毒丸 方汝聖

青竹蛇

防風

穿山甲 炮

羌活

猪牙皂 各三錢

全蝎 二對

當門子

蟾酥 各三分
瓜兒竭

乳香 去油

孩兒茶

沒藥 去油

明雄黃

白砒 肉製

大硃砂

茜草

雷公藤 各五分
甘草

當歸尾 各八分

蜈蚣 三條

金銀花 五錢

共乳極細末凡一切癰疽大毒大人每服三分

至五分止小兒一分至二三分止無灰酒調服

令醉自消

消癰疽瘡毒並天泡楊梅等瘡

瘍醫大全

卷七

腫瘍方

末

顧氏秘書

香油一觔入水半鍾熬至油耗白烟起住火以磁

瓶收貯每早晚用熱油一鍾將無灰酒一鍾和勻

溫服七日除根

消毒湯 一名紫花地丁散

甘草 一錢

金銀花

紫花地丁 去蘆

大黃 酒浸炒

當歸

黃耆

赤芍 各五錢

一方加升麻為末作二劑酒煎服

內消沃雪湯 正宗

治發背並五臟內癰尻醫諸毒大小腸癰肛癰
臟毒初起但未出膿堅硬疼痛不可忍者並效

青皮 乳香 去油 陳皮

甘草節 穿山甲 金銀花

沒藥 去油 連翹 黃耆

天花粉 皂角刺 川貝母

當歸 白芍 射干

白芷 各八分 廣木香 四分

水酒各一碗煎至八分甚者加大黃二錢量病

湯醫大全 卷七 腫瘍方 七 顧氏秘書

上下食前後服

飛騰神駿膏 壽世保元

治癰疽發背癰癧專門之方初起至破潰時皆

可服捷如奔馬

杏仁 熱水泡去皮尖用砂鉢搗開再
又入水全搗澄去濁渣用清汁

地骨皮 去骨淨防風 去蘆淨甘草 各四兩

黑鉛 一塊 木鱉子 去殼十個 麻黃 二觔去節
取一觔淨

燈草 一大把 頭髮 一大把 濕水洗淨

右藥熬時不用柴燒用炭五十觔大鐵鍋一口

將藥入鍋內注清水二三桶煮至五六分看藥
水濃時濾去藥渣將汁另放缸注又將前渣入
鍋內再入水一二桶又蒸至五六分藥汁又注
前汁內如前法三次去渣將前二次汁併作一
鍋熬至乾去黑鉛頭髮燈草其味香甜磁罐收
貯五年不壞凡遇前症每服三錢熱酒調臨臥
服厚被蓋出大汗為度徐徐去被不可被風吹
汗後恐致虛人次早煨猪蹄以補之以復元氣
好酒調服隨人酒量以醉為度汗出立愈

湯醫大全 卷七 腫瘍方 七 顧氏秘書

國老膏

一切癰疽將發預期服之能消腫逐毒使毒氣

不內攻

大甘草有粉者二觔搥碎河水浸一宿揉令漿汁

濃去渣慢火熬成膏每服一二匙不拘時無灰酒

下

立效散 錦囊

治癰疽癰癧

皂角刺 半觔炒粉甘草 二兩 黃瓜萐 五個連皮研碎

乳香去油另研沒藥去油另研

每服一兩好酒煎服

神效瓜蒌散

癰疽乳癰瘰癧與立效散相間服

黃瓜蒌一枚杵碎沒藥去油另研一錢

當歸尾 甘草節 各五錢

酒三碗煎一碗分三次服未成即消已成即潰

神仙截法集驗

癰疽發背一切惡瘡預服毒不內攻可保無虞

瘍醫大全 卷七 腫瘍方 圭 顧氏秘書

豆麻油一觔銀器內煎數十沸傾出候冷入無灰

酒兩鍾約五大鍾重湯稍熱通口急服一日飲盡

為妙如患數日者亦宜急服之

此法傳之於吳安世云吾家三世用之無不奇驗又聞獵者云凡誤中藥箭急飲麻油則藥毒不行後果於西山親觀人被虎箭穿股者號叫不忍聞急以麻油灌之良久遂定又聞鄭學諭德甫云渠尊人曾用之有驗

如意酒 潘佩侯

一切癰疽瘡毒服之解毒消腫止痛

新鮮大如意草綱目名夜叉頭草又名犁尖草

每用一兩搗爛滾酒沖入少頃擠汁溫服搗敷

腫上縛住三服愈 如無新鮮者取葉陰乾為

末為丸服亦可

癰疽未成即消已成即潰已潰即斂凌秘

蛇蛻不拘多少用陰陽瓦煨存性

研細每早晚俱用米糕蘸食

保安萬靈丹正宗

癰疽疔毒對口發背發頤風濕風溫濕痰流注

附骨陰疽鶴膝風證左癱右瘓口眼喎斜半身

瘍醫大全 卷七 腫瘍方 圭 顧氏秘書

不遂氣血凝滯遍身走痛步履艱辛偏墜疝氣

偏正頭風頭痛破傷風牙關緊閉截解風寒無

不應驗

茅蒼朮半觔全蝎 何首烏

川烏泡去皮荆芥穗 草烏泡去皮

炙甘草 川芎 釵石斛

羌活 明天麻 麻黃

北細辛 防風 全當歸 各一兩

明雄六錢

右為細末煉蜜丸彈子大每藥一兩分作四九
 一兩作九九一兩作六九三樣做下以儻年歲
 老壯病勢緩急取用預用硃砂六錢乳細為衣
 磁罐收貯如惡瘡初起二三日之間或癰疽已
 成至十朝前後但未出膿者狀若傷寒頭痛煩
 渴拘急惡寒肢體疼痛惡心嘔吐四肢沉重恍
 惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱又治傷寒四時感
 冒傳變瘟疫但惡寒身熱表證未盡者俱宜用
 之用連鬚葱白九根煎湯一茶鍾將藥一九乘
 熱化開通口服盡被蓋出汗為效如服後汗遲
 再用葱白湯催之後必汗如淋洗漸漸褪下覆
 蓋衣物其汗自收自斂患者自然爽快其病如
 失但病未成時隨即消去已成者隨即高腫如
 潰膿諸疾無表證相兼不必發散者只用熱酒
 化服此方原載內科諸風癱瘓門中 陳實功
 先生用以發散瘡毒其功甚捷詳觀此方乃治
 腫瘍之神丹也
 澄按此方固乃發散腫瘍之神丹然藥性猛烈

瘍醫大全

卷七

腫瘍方

重

顧氏秘書

只宜於強壯藜藿之人凡無憎寒壯熱及平日
 表虛氣弱素多痰火並有孕婦人臨經女子均
 宜禁服

太乙紫金丹 卽紫金錠又名玉樞丹

解諸毒療瘡腫利關節通治百病立建奇功直
 能起死回生凡居家出入與大兵動大工不可
 無之

山茨菇 洗淨二兩 五倍子 搗碎洗淨 各一兩
 千金子 去殼去油

飛硃砂 明雄 當門子 各三錢

瘍醫大全

卷七

腫瘍方

重

顧氏秘書

紅芽大戟 去蘆根焙 一兩五錢

以上藥於淨室中各為細末候端午七夕或天
 德月德日合以糯米濃粥湯和勻杵干下凡合
 藥切忌婦人鷄犬見每錠一錢每服一錠或半
 錠開水磨服病在上者必吐在下者必利吐利
 後以溫粥補之

一治飲食藥毒菌毒河豚毒自死牛馬猪羊等
 毒肉誤食之必脹悶昏卧急用水磨一錠灌
 之或吐或瀉立甦
 一癰疽發背對口疔瘡天蛇毒楊梅瘡每用無
 灰清酒磨服外用水磨塗瘡上日夜數次覺
 膿自消

一治喉痺喉風喉疔乳蛾等證並用薄荷湯磨服一錠即見消散
 一治絞腸痧烏痧脹通腹攪痛非常用清水平磨服一錠
 一治婦人邪氣鬼胎用石菖蒲煎湯磨服一錠即消
 一治自縊溺水魘夢鬼魅迷人但心頭微溫者俱用薑汁磨服立甦
 一治惡蛇瘋犬毒蝎蜈蚣諸惡蟲傷人隨即發腫攻刺走痛或悶絕叫命在須臾急用清酒磨下一錠仍取他人口涎磨敷傷處再服
 一治天行時疫延門傳染用米湯磨濃塗鼻孔中仍以白湯磨服少許即不傳染
 一治傳屍癆瘵諸藥不效者每用一錠清水磨服三日即下惡物有女子患癆瘵方士教服此錠片時吐下小至十餘條後服藥合其病頓愈以此相傳活人不記其數此真濟世衛生之寶藥也
 萬病解毒丸 錦囊
 癰疽發背魚臍毒瘡藥毒草毒蛇毒獸毒諸惡瘡病解毒取功
 續隨子 取仁去油取霜 五倍子 全 蝎 各五錢
 山荳根 山茨菇 各一兩 硃砂
 雄黃 各二錢 麝香 一錢 紅芽大戟 七錢

先將五倍子全錫山荳根山茨菇大戟入木臼搗羅細末次研續隨子雄黃硃砂麝香和勻用

糯米糊丸分作三十五丸端午七夕重陽臘日淨室修合每服一丸生薑蜜水磨下井水浸研敷患處
 飛龍奪命丹 正宗
 治惡疽發背不痛或麻木或嘔吐昏憤
 蝸牛 二十個 蟾酥 乳香 去油
 銅綠 輕粉 膽礬
 沒藥 去油 血竭 硃砂 各一錢
 明礬 雄黃 各一錢 水片
 麝香 各三分
 研細將研爛蝸牛和丸如菘荳大如丸不就入些酒糊丸每服七丸或九丸或十一丸用葱白三五寸病人自嚼吐於男左女右掌中包藥在內用煖酒和葱送下如人行五里汗出為度無汗再用葱研爛裹藥服之此外科之聖藥也
 蟬酥丸
 諸惡瘡服之微汗即消
 雄黃 乳香 去油 各錢 蟾酥 一分

傷醫大全 卷七 腫瘍方 韋 顧氏秘書

用黃酒打麵糊丸菘荳大每服三九葱白湯下
不愈再一服

忍冬圓 集驗

療渴疾既愈之從須防發癰疽此圓大能止渴

消毒並治五痔癭瘤等證

金銀花

根莖花葉俱可用
不拘多少

入瓶內以無灰好酒浸用糠火煨一宿取出晒

乾入甘草少許研為細末以所浸酒打麩糊丸

如桐子大每服五十九至百九不拘時酒送下

傷醫大全

卷七

腫瘍方

幸

顧氏秘書

十寶丹 濟生

海

蚌 二十一

硃砂

輕粉

寒水石

煨

雄黃

銅綠

各二錢

血竭

蟬酥

膽礬

各一錢

麝香

五分

研極細酒丸桐子大硃砂為衣大人服七丸小

兒三丸先嚼葱白頭三根吐男左女右手心包

藥吞之黃酒送下盡醉被蓋出汗外用萬應靈

丹點之內服此丸諸毒無不內消此外科之至

寶也救諸苦難尤為便捷有志者宜共珍之
百效丸 金茂存

治一切大毒惡瘡無論已潰未潰

草烏頭

酒浸半日刮
去皮切片炒

馬前子

切薄片炒黃
色篩去毛淨

全當歸

切片酒拌
曬乾炒

麻黃

去節不見火
曬脆

直僵蠶

酒洗炒
去絲

穿山甲

沙炒去沙
各一兩

大甘草

不見火曬乾
研五錢

右研細葱汁熬湯水法為丸如芥子大晒乾磁

瓶密貯高年者五六分中年者七八分少年者

傷醫大全

卷七

腫瘍方

幸

顧氏秘書

三分孕婦忌服凡服俱用葱汁白湯送下務須

避風取汗如出汗後必須次日辰巳時方可起

床見風如不遵戒守汗出見風則手足堅硬凡

犯此者即用甘草末酒調服即解

神仙一醉忍冬湯

銀花藤

去油

蒲公英

各一兩

沒藥

去油

乳香

去油

雄黃

各二錢

右藥用酒一瓶封固煮干餘沸再加白蜜四兩

生葱七根再煮數沸去葱儘量飲醉以大蒜壓

之取汗即愈

五香追毒丸

治一切無名腫毒初起有餘之證疔瘡去毒定

痛內消妙法

乳香去油

血竭

巴荳霜

老君鬚

母丁香

連翹

沒藥去油

沉香

廣木香

苦丁香各一錢二分

右為末煉蜜丸如芡實大硃砂為衣每服一丸

傷醫大全

卷七

腫瘍方

羌

顧氏秘書

補之

小蟬酥丸

治一切疔瘡腫毒時毒初起發汗

蟬酥一分

明雄三分

蜈蚣一條

研細酒糊丸桐子大每服五丸葱酒送下熱處

發汗散之

發背腫毒

雄黃牛蹄殼洗淨火煨存性研細末酒調服五錢

次日服四錢酒調下重者三服全愈輕者或二錢

四錢神效

九流疽陰毒仙方

蜘蛛

壹個用銀川貝母五錢去

共乳細末分作二三服甜酒調服少刻週身作

戰次日依前再服一次其疽毒盡消人吉虛弱

其藥分三日服恐擔不起

初起發背無名腫毒疔瘡

桃

三月採

桑

三月採陰

鐵

銹

雄黃

蟬酥

酒浸化各一錢

研細搗丸如紅豆大每用一丸入五寸長葱頭

內濕紙包煨香細嚼熱酒送下出汗自消

舌化丹

治疔瘡無名腫毒

辰砂

血竭

礬砂

乳香去油

沒藥去油

雄黃

蟾酥人乳浸

輕粉

冰片

麝香各等分

共乳細末於淨室中至誠修合勿令婦人雞犬見用頭生乳搗和丸如小麥大每用三九舍舌下噙化嚙下出汗自消如無汗以熱酒催之

冷水金丹

腫毒惡瘡兼治痰痞老痰翻胃噎食傷寒發汗

海浮石

飛羅麩 各三兩 乳香 去油

沒藥 去油

牛蒡子 各一兩 冰片

麝香 各一錢

用蟾酥三錢七分五釐酒浸化為丸菉豆大以

癩醫大全

卷七 腫瘍方

三 顧氏秘書

飛過辰砂五錢為衣輕者冷水送下一丸重者

三丸牙痛只用一丸 忌雞魚小米一日戒怒

鬱憂悶氣惱費心力

神化丹 一名醉消散

癰疽疔毒一切無名腫毒初起服之立消雙解

表裏疎通經絡以毒攻毒削堅導滯如神

黑丑 頭末

母丁香

檳榔

何首烏

荆芥

荆三稜 醋炒

熟地

蓬莪朮 醋炒

巴豆

五靈脂

大黃

白荳蔻 去殼

桂枝

穿山甲

當歸

赤芍藥

川烏

小茴香

草烏

杏仁 炒

全蝎 去足

連翹

麻黃

甘草

桔梗

斑猫

雄黃

硃砂 各三錢

乳香 去油

沒藥 去油 各二錢

麝香 五分

大蜈蚣 一條

各乳細末稱準和勻水盪為丸如蘿蔔子大硃

癩醫大全

卷七 腫瘍方

三 顧氏秘書

砂為衣每服參分熱酒吞下盡醉為度被益出

汗孕婦忌服體虛禁用

梅花點舌丹

臨濟超真大和尚

白梅花 陰乾

錢二分 冰片

西牛黃

醃酥

熊膽 各一錢

珍珠

麝香 各六分

硃砂

硼砂

葶藶

乳香 去油

沒藥 去油

沉香

血竭

雄黃 各二錢

右乳細將人乳浸醃酥熊膽為丸每重三四厘

蟲牙川椒良薑湯下	火牙石膏湯下	青盲眼甘菊枸杞子湯下	傷風咳嗽生薑陳皮湯下	久嗽痰火石膏知母湯下	肺虛勞嗽人參麥冬五味子湯下	冷風哮喘紫蘇欬冬花湯下	遍身骨痛羌活獨活湯下	迎風流淚蔓荊子湯下	雲翳遮睛石決明湯下	赤目腫痛防風荊芥湯下	下元虛墜湯下	色癆石燕子湯下	脾癆當歸湯下	心癆遠志湯下	損癆乳香湯下	氣癆木香湯下	湯醫大全	卷七	腫瘍方	三	顧氏秘書
胞衣不下童便和酒下	跌打損傷紅花湯下	初起痞塊山查湯下	半身不遂左用桂枝羌活獨活全當歸紅花湯下	湯下右用附子當歸赤芍紅花湯下	下部腫痛牛膝苡仁木瓜湯下	肚痛砂仁木香湯下	心痛良薑砂仁湯下	鬱痛山梔貝母湯下	疝痛茴香川椒吳萸橘核湯下	脇痛乳香湯下	咽喉腫痛桔梗甘草牛蒡子湯下	眼目昏花熟地當歸湯下	血貫瞳人元參赤芍湯下	閃腰挫氣蘇木紅花湯下	小便不通滑石甘草湯下	吐血鼻血芍藥山梔犀角牡丹皮湯下	泄瀉米飲湯下				

疥肉侵睛密蒙花湯下	瘡疾桃酥枝楊柳各三錢湯下	脫肛人參升麻湯下	腸風下血槐花炒黑棕櫚灰湯下	因寒翻胃丁香乾薑湯下	因熱翻胃竹茹木瓜湯下	眼生星障木賊草決明子湯下	風眼防風荊芥蔓荊子湯下	火眼黃連枳殼湯下	沙淋白帶茯苓半夏生薑湯下	血山崩阿膠續斷湯下	血枯經閉四物湯下	大痲瘋麻黃葳靈仙防風苦參湯下夏月加黃連湯下	楊梅瘡黃連甘草山梔湯下	楊梅結毒土茯苓湯下	遍身生瘡金銀花若參湯下	無名腫毒貝母連翹銀花湯下	湯醫大全	卷七	腫瘍方	美	顧氏秘書
癰疽未潰皂角刺穿山甲湯下	痰核初起貝母生薑湯下	魚口便毒大黃湯下	濕痰流注貝母湯下	緊急疔瘡菊花根取汁和酒下	鷓鴣瘋牛膝葳靈仙湯下	倉卒不及脩引者俱白湯下	雙解金桂丸	治發背諸毒初起木悶堅硬便秘脉沉實者	生大黃一兩 白芷十兩	共為末水法盪丸每服三五錢五更時用連翹	大蔥三根黃酒煎吞服被益出汗過二三時辰										

俟大便行一二次為效

此宜通攻利之劑也濟之以葱酒力能發汗故云雙解弱者行後隨用四君子湯補之如老人虛人每服只用一錢人參生薑湯送下過一時再一服但能得睡上身得汗則已

發背對口初起

黃 著 當 歸 各五錢 川 芎 一錢

金銀花 一兩 遠志肉 五錢 桔 梗

甘 草 各三錢

水煎服

至寶丹

瘍醫大全

卷七 腫瘍方 妻 顧氏秘書

癰疽腫毒發背對口乳癰結毒危險諸證

白 硫 用荳腐一塊厚二寸中挖一孔納硫於孔中以荳腐蓋硫酒煮三個時辰

猪牙皂 去皮酥 乳 香 去油 熊 膽

銅 綠 水飛 荆芥穗 去梗 直殭蠶

穿山甲 炒 血 竭 膽 礬

川 烏 草 烏 全川烏酒浸剝去皮麪包煨熟取淨肉用

沒 藥 去油 全 蝎 石灰水洗去頭足尾瓦上焙乾

蟬 蛻 去頭足 雄 黃 各二錢 麝 香 七分

硃 砂 水飛三錢 蜈 蚣 大者五條酒蒸去錢五分 小者加倍

右藥以天醫吉日研極細末飛麵打糊為丸每

粒重四分再用硃砂三錢五分為衣黃蠟作殼

收藏臨用時用葱頭三寸生薑三片黃酒煎一

小鍾將藥化開服隨量飲醉被蓋出汗至重者

二三服

瘍醫大全 卷七 腫瘍方 妻 顧氏秘書

癰疽門丹散主方

紅昇丹

一切瘡瘍潰後拔毒去腐生新長肉瘡口堅硬肉黯紫黑用丹少許鷄翎掃上立刻紅活外科若無升降二丹焉能立刻奏效

水 銀一兩 火 硝四兩 白 礬二兩

皂 礬六錢 雄 黃 硃 砂各五錢

先將白礬皂礬火硝研碎入銅杓內加燒酒一杯燉化候一乾即起研極細末另將水銀硃砂

癰醫大全

卷七

丹散方

七

癰醫秘傳

雄黃共研細末以不見水銀星為度再將硝礬末一共和入研勻

取陽城罐一個用鹽滷練紙筋或鹽滷和罐子泥練極熟將泥塘罐子上約一指厚陰乾不可有裂縫如有縫以罐子泥補之務要極乾方可裝藥入罐內罐口用鐵燈蓋蓋定加鐵梁於蓋上用鐵甩鐵絲紮緊再用綿紙蘸蜜塞罐口縫間外用煨過石膏細末醋調多刷固蓋上加炭火二塊使蓋熱罐口封固易乾

再用大鐵釘三根釘地上將罐子架釘上罐底

置炭火堅大者數塊外砌百眼爐昇三炷香

第一炷香用底火如火大則承先飛上

第二炷香用大半罐火以筆蘸水時刻刷擦鐵

蓋

第三炷香火平罐口用扇搨用筆蘸水頻頻搨蓋勿使蓋乾如乾則承先飛上

三炷香盡去火冷定開看蓋上約有六七錢刮

下研極細磁瓶密貯

癰醫大全

卷七

丹散方

七

癰醫秘傳

另用鹽滷調罐子泥如稀糊式以鐵線繫筆頭在竹管上如陽城罐上有綠烟起即承走也急以筆蘸鹽泥多多刷在出烟之處封固為要昇出研細磁瓶收貯愈陳愈妙

一法收貯瓶內以蠟封口埋土內以去燥性

紅昇丹小毒用骨簪挑藥上瘡口上如癰疽口

面大者用小篩羅挑藥於內以手輕輕彈之勻

勻俱要上到如有管可用爛飯和紅昇丹搨成

細條陰乾量瘡深淺取用插入瘡管內以膏貼

之其管自化

陽城罐昇煉紅昇丹名曰大昇不比三仙丹小昇力單只可施於瘡癩若癰疽大證非大昇不能應手

紅昇丹不獨提膿且能生肌如瘡毒淌水者用之次日即轉稠膿此丹功效用之一面提膿一面長肉肌肉長平仍以此丹上之即可結疤取口首尾並用所以為神也

湯醫大全

卷七

丹散方

聖

顧氏秘書

一法毒已提盡將取口時用紅昇丹加珍珠散各等分乳勺名曰半提丹用之取功甚速

拔萃丹

提膿生肌化管如神

生鉛

水銀

火硝

白礬

青鹽各一兩

全研至水銀星不見為度入陽城罐內鐵蓋蓋定以鐵梁鐵線紮緊鹽泥固濟先文後武火昇三炷香冷定開看蓋內昇藥刮下研細加水片乳勺收貯火候俱全紅昇丹法則

凡昇藥罐底藥渣鏟下研細搽癬疥頗神

治發背疔瘡惡瘡如神起釘拔箭喉疔並效

白礬

飛過

焰

硝用雄猪膽三個取汁拌

雄黃

入錢五

硃

砂

一兩全雄黃研細合一處

水銀

一兩五錢

用小鐵鍋安定先將硝礬末堆鍋底中心用手指捺一窩再將硃雄末傾放硝礬窩中又以手指捺一窩再將水銀傾放硃雄窩中上用磁器

湯醫大全

卷七

丹散方

聖

顧氏秘書

平口碗一隻蓋定外以鹽泥週圍封固放炭火上先文後武昇三炷香足則藥上升矣離火冷定去泥開看如沉香色為佳研細磁瓶密貯每用時先將瘡頂上以乳汁或米湯點濕搽藥於上過一二時辰再搽一次即散

小昇丹 即三仙丹

水銀

壹兩

明礬

火

硝各一兩二錢

用鐵鍋一隻將硝礬汞研細入鍋內用平口官碗一隻先用生薑片擦碗內外則不炸蓋定碗口以潮皮紙擦

擠定鹽泥封口碗底俱泥固之用炭三觔爐內
 週圍砌緊勿令火氣出如碗上泥裂縫以鹽泥
 補之昇三炷線香為度冷定開看碗內藥刮下
 研細磁瓶取貯用之提膿長內小毒俱有功效
 一法鹽泥只封碗口不封鍋底鍋底上貼濕白
 紙一塊但看紙色轉黃鍋底上以鐵稱錘壓
 之

一法以潮皮紙撚擠定碗口外以研細石膏末
 按緊不用鹽泥只用鐵錘壓之

湯醫大全 卷七 丹散方 聖 顧氏秘書

萬應靈丹 濟生

一切癰疽發背諸毒有膿怕開刀者以針挑破
 浮皮用丹一厘醋調點患處即潰頭出膿或發
 背癰疽大毒每用一厘針挑破醋調點患處一
 日上三次藥性內攻深可寸餘毒氣有門而洩
 則毒易消如根盤大者用丹五厘川貝母末一
 錢濃茶油調敷週圍必起黃泡自有黃水流出
 其毒自消

水銀 青鹽 各伍錢 皂礬 一兩

生 鉛二錢五分與 生 礬一兩五
 水銀全研碎 火 硝一兩二分 礬 砂
 火 硝錢五分 白 礬 砂
 明 雄各一錢 五分

右研極細末入小瓦罐內頓炭火上熔化俟藥
 枯結住罐底用瓦盆一個將有藥罐倒置盆內
 正中罐口以鹽泥封固另用一大盆盛水將藥
 罐之盆安置水內罐口四圍以磚圍罐半截下
 襯冷灰然後磚上及罐底俱架炭火先從頂上
 着火從上而下先文後武三炷香為度冷定開

湯醫大全 卷七 丹散方 聖 顧氏秘書

看盆內丹藥刮下研細磁瓶密貯

白降丹

凡癰疽無名大毒每用少許瘡大者用六七厘
 小者用一二厘水調敷瘡頭上初起者立刻起
 泡消散成膿者腐肉即脫拔毒消腫誠乃奪命
 金丹也

水銀 食鹽 皂礬
 火硝 白礬 各二兩 礬砂
 雄黃 水飛各 礬砂 五錢
 三錢 一方用礬砂

先將硃雄礪研細再入鹽硝礬汞皂研至不見水銀星爲度

將陽城罐放微火上徐徐挑藥入罐化盡微火逼令極乾所謂陰昇之法全在此刻如火大則汞先飛走如不乾則藥必倒塌無用其難如此也

再用空陽城罐一個兩口合上以好綿紙裁寸許潤用罐子泥草鞋灰光粉三樣研細以鹽酒汁和練極熟兩罐口合緊一層泥一層紙糊五六層候乾

將地挖一小坑用宣法碗盛水放坑內將空陽城罐放水碗內用瓦緊靠坑口鋪滿四圍用炭蓋齊地面將有藥陽城罐露地上圍以炭火煨之不可使炭火有空處計燃三炷香完去火冷定開看空陽城罐內約有丹藥一兩刮下研細磁瓶密貯

臨煨時如有綠烟起處急用罐子泥固之降藥之神不假刀砭一伏時便見功效勝於刀

針之險多矣

上降藥法 癰疽初起堅硬未成膿者用水調

一二厘塗於瘡頂上不可貼膏藥少頃即起

一泡挑破出水自消 已成而內膿急脹按

之隨手而起者此膿已熟矣用水調一二厘

點正頂上以膏貼之一伏時大膿自洩不假

刀針 如陰疽根脚走散瘡頭平陷即用降

丹七八厘或分許水調掃於瘡頭堅硬處次

日即轉紅活便是吉兆 如瘡毒內膿已成

久不穿潰者只要出一小頭怕頭出大了可用綿紙一塊量瘡大小剪一孔以水潤貼瘡上然後調降藥點放紙孔內揭去紙以膏貼之則所降之頭不致過大若瘡小藥大反令痛傷胃口熾及良肉不可不知

鼻塞耳挺點之自落

點痣亦落

初生小兒及婦女頭面皮肉嬌嫩不可多用如用之不善不無漫腫反招怨尤

楊梅瘡將初現之瘡用白降丹點三五個毒俱
拔出

白降丹點在瘡毒上即追蝕毒氣有幾分深必
追至病根方止所以點後疼痛非常若內膿
已脹皮殼不厚點之便不十分痛楚有用麝
酥化汁調白降丹用其疼稍減

凡癰疽以紅昇丹提膿兼用珍珠散收口每見
升提過甚瘡口四邊起埂亦有瘡口新肉高
凸者不如用陳白降丹火氣退盡少許全珍珠散

楊梅木全

卷七

丹散方

聖

顧氏秘書

用之不但四邊瘡口平坦更且不留餘毒此
又外科不知之妙訣也

水煉降藥法 新煉出白降丹研細用元色緞
五寸將降藥篩勻緞上捲緊以麻線捆紮極
緊放瓦鉢內清水煮約一伏時內換水三次
將緞卷取起掛風處陰乾然後打開以鷄翎
掃下磁瓶收貯凡治癰疽用之並無痛楚

紫陽丹

提膿拔毒

水銀 銀硃 生鉛
百草霜 輕粉 硫粉
雄黃 各等分 麝香 宜少用

共研極細末每用少許搽之以膏貼之如治下
疳加兒茶

提毒丹 一名七星丹又名八仙丹

乳香 去油 沒藥 去油 各二錢 元參 瓦上焙

前胡 瓦上焙 血竭 麝香 各四分

生斑猫 八錢 去淨頭足 翅陰陽瓦焙

楊梅木全

卷七

丹散方

聖

顧氏秘書

右各乳極細末於端午正午時和勻磁瓶密貯
凡初起腫毒每用二三厘先看瘡勢大小即以
膏藥照瘡大小週圍用大蒜搗如泥敷膏藥上
中留一孔入藥於內次日即起小泡挑去水泡
即消如已潰者搽藥於瘡孔內亦能拔毒生肌
神驗

一方乳香沒藥 各一錢 血竭 六分 多水片 四分 餘者

分兩俱全端午虔心焚香修合每用一分全

大蒜搗如泥敷毒四圍將瘡頭挑破聽瘡口

流水外用膏藥中剪一孔貼之以俛瘡毒出其毒氣此神速癰疽疔瘡之聖藥也

陰陽至聖丹 岐天師

人參 廣三七 兒茶 水飛去砂

川梔子 各一兩 血竭 透明者五錢 騰黃

乳香 去油各三錢 輕粉 冰片 各一錢

川貝母 去心二錢

共研至無聲為度陽瘡每用二錢陰瘡每用五錢

錢摻於瘡上其餘瘡毒不消二次陰疽不消三

湯醫大全 卷七 丹散方 聖 顧氏秘傳

次全愈

馮氏援生膏

治諸般惡瘡及癩癧鼠癭纒起者點破即愈

雄黃 五錢 乳香 去油 沒藥 去油

血竭 各一錢 蟾酥 輕粉 各三錢

麝香 五分

右研細末用真炭灰一斗三升淋灰湯八九碗

用桑柴文武火煎作三碗取一碗收留二碗盛

磁器內候溫將藥入灰湯內用桑柳枝攪再以

好風化石灰一飯碗入藥湯內攪勻過宿候冷盛磁罐內凡遇惡瘡貼在當頭一日一次次日又一次瘡頭自然蝕破血水流去即愈如藥乾將前收留灰湯潤之

海浮散 十法

搽癰疽瘡毒腐去新生乃回生保命之寶丹也

乳香 沒藥 各等分

安箬葉上火炙去油乳細搽上以膏貼之此藥

未盡則提膿外出如毒已盡則收口其神妙處

湯醫大全 卷七 丹散方 顧氏秘傳

難以言喻

烏金膏 十法

去腐肉不傷新肉最為平善先用降香煎湯洗

瘡

巴豆 去殼新瓦上炒黑色

研爛磁瓶收貯多寡看瘡勢大小酌量用之

靈寶如意丹

發背疔疽大毒

人參 乳香 去油 沒藥 去油

辰砂 升草 兒茶 各一錢

琥珀 珍珠 各二分 阿膠

白芷 冰片 各一分 西牛黃

當門子 各五分

右乳細磁瓶密貯勿洩藥味 如用先將瘡用

金銀花甘草煎湯洗淨每日搽藥四五次用膏

蓋之膿水自然拔盡忌口味戒煩惱慎勞碌

發背對口潰爛不収口

三仙丹 方詳前 珍珠 一錢 乳香 去油

海醫大全 卷七 丹散方 聖 顏氏秘傳

沒藥 去油 血竭 各二錢

共乳極細先將溫湯洗瘡棉花搥乾將藥摻上

用竹紙蘸濕貼上一日一換

治背疽大潰僅存隔膜臨危者 錦囊

鯽魚去腸實以羯羊糞烘焦為末乾摻之瘡口自

収神效方也

抵金散 啟玄

治癰疽發背潰後爛開作痛

屎蟻螂 五月五日收採不拘多

研細磁瓶收貯凡用將末摻上

神功紫霞丹 太醫院

大蜈蚣 一條去頭尾 麝香 二分

研細磁瓶收貯每用少許摻瘡頂上以膏蓋之

其頭即潰並不疼痛

拔毒生肌

紅昇丹 輕粉 車麻 去油各

乳香 去油 黃丹 各二錢 石 一兩

琥珀 乳細一

海醫大全 卷七 丹散方 聖 顏氏秘傳

共乳細末摻上膏貼

諸瘡毒四邊紫黑不消瘡口不斂

紅昇丹 輕粉 雄黃

龍骨 各五錢 白 蘇 密陀僧

海驃峭 各一兩 麝香 一分

共乳極細摻上

金蟾化管丸 劉秘

治一切諸漏有管者雖灣曲之處皆能行到化

管如神

水 銀 三錢

明雄黃

一兩以二觔火酒漸煮漸添以酒盡為度

共乳細用紙包好取大蠶墓一個剖去腸只留肝肺將藥

包入於肚內以線縫好聽用

銀 硝

白 礬 各一兩

研勻入陽城罐內加水半茶鍾放火上熬令枯

於罐底取放地上再納罌墓於內鐵蓋蓋好鹽

泥固濟升文火二炷香中火一炷香武火一炷

香冷定開看蓋土靈藥刮下研細用醴酥乳化

為丸如芥子大陰乾 凡一切管一丸放膏

癆醫大全 卷七 顧氏秘書

藥上對管口自入到底方回嫩管自化老管自

褪七日見效如未全褪再用一丸無不除根

癰疽門膏藥主方

仙方膏 經驗

白 芷

紫荊皮

獨 活

石菖蒲

赤 芍

高良薑

蜈 蚣

刺 蝟皮

蛇 蛻

草蘇仁

鱉 甲

白殭蠶

甘 草

海風藤

連 翹

天花粉

白 芩

牛蒡子

大 黃

川黃連

白 薇

癆醫大全 卷七 膏藥方 顧氏秘書

當 歸

千金子

血 餘

金銀花

黃 栢

穿山甲

防 已

猪牙皂

柴 胡

川貝母

桃 仁

白附子

巴 菝

明天麻

苦 參

荆芥穗

紅 花

黃 耆

桔 梗

黃 芩

牛 膝

防 風

全 蝎

麻 黃

草 烏

肉 桂

烏 藥

羌活 半夏 大戟

蘇木 各五錢 桃枝 槐枝

桑枝 柳枝 各截一寸長 二十四段

用大磨真蘇油十三筋將上藥入油內泡七日

入銅鍋內熬至藥枯濾渣復將油仍入鍋內熬

至滴水成珠再撤淨藥脚下丹每油一筋下飛

過黃丹八兩為則藥已成功入有銷鐵缸內以

槐棍攪冷再入後末

血竭 四錢 乳香 去油 沒藥 去油各三錢三分

湯醫大全 卷七 膏藥方 顏氏必書

麝香 四錢五分

研細攪勻又入後藥

珍珠 冰片 各一錢 沉香 不見火四分

當門子 二錢 木香 不見火 松香 各五錢

檀香 不見火 雄黃 五錢五分 沉香 不見火四分

攪勻又入

潮腦 三錢

取功此膏專治癰疽發背一切外證並貼五勞

七傷筋骨疼痛跌打損傷婦人癥瘕帶下如神

神應萬驗膏

貼一切無名腫毒大瘡惡疽無論已破未破不

過二三張即可取功每張用過以冷水洗去膿

血仍可再貼每張量毒輕重用之俱有神效

桃枝 柳枝 杏枝

桑枝 槐枝 截作寸許 長各二兩

用真蘇油二十四兩小炭火熬滾將枝次第入

油熬枯成炭濾去渣再入

人頭髮 男女各半洗淨 油膩一兩五分

湯醫大全 卷七 膏藥方 顏氏必書

入油炸化再入

穿山甲 剪碎一兩五分

入油炸粘再入

象皮 剪碎五錢

入油炸化再入

大梔子 一百個逐個捻破入油內離火浸一炷香

取起冷定用夏布濾去渣再入淨鍋內稱準每

油二兩入炒過黃丹一兩熬至滴水成珠不散

離火一刻再入後藥

真礬砂透明白 血竭 兒茶 各二錢

乳細拌入膏內坐冷水中稍涼取起用水濕手
扯捻百下使各藥和勻埋土內五日去火毒用
時以井華涼水浸半日捻成片放布上熱湯熨
化貼

太乙膏 正宗

一切癰疽瘡瘍提膿生新神效

生地 土木鱉 元參

赤芍 大黃 白芷

傷醫大全 卷七 膏藥方 額氏秘傳

當歸 各五錢 乳香 沒藥 各三錢

阿魏 一錢 輕粉 一錢五分 血餘 一團

肉桂 二錢五分 黃丹 水飛六兩五分

先將草藥入麻油一觔浸春五日夏三日秋七
日冬十日傾入鍋內文武火熬至藥枯浮起為
度佳火片時用布袋濾淨藥渣將鍋展淨入油
鍋內下血餘再熬以柳枝挑看俟血餘熬枯浮
起方算熬熟每淨油一觔將炒過黃丹六兩五
錢徐徐投入不住手攪候鍋內先發青烟後起

白烟叠叠升起其膏已成將膏滴入水中試看
軟硬適中拿下鍋來方下阿魏散膏面上化過
次下乳沒輕粉末攪勻傾入水內以柳木棍攪
成一塊任攤貼 肺癰腸癰卽以此膏為丸服
之並效

神仙太乙膏

治癰疽及一切惡毒不問年月深淺已未成膿
蛇虎蜈蚣犬咬湯火刀斧砍傷皆可內服外貼
血氣不通溫酒送下赤白帶下當歸酒下喉痺

傷醫大全 卷七 膏藥方 額氏秘傳

纏喉風並用新綿裹膏藥置口中含化一切風
赤眼用膏捏作小餅貼太陽穴後以山梔子湯
送下跌打傷損外貼內服橘皮湯下腰膝痛者
外貼內服用鹽湯下唾血者桑白皮湯送下每
服一丸如櫻桃大蛤粉為衣其膏可取十年不
壞愈久愈神

元參 川大黃 白芷

肉桂 當歸 赤芍

生地 各一兩

右剉碎用蘇油二觔浸春五日夏三日秋七日
冬十日火熬黑色濾去渣入黃丹一觔青柳枝
不住手攪滴水成珠為度傾入磁器中掘窖埋
土中出火毒三日任用

新製加味太乙膏 錦囊

神治一切腫毒已潰未潰跌打損傷風濕氣痛
古方因內服外貼故未免其功不專今特定此
方專為外貼而設其拔毒外治之功較前更勝
也

瘍醫大全 卷七 膏藥方 顧氏秘書

亂髮 一大團以草蘇仁二百粒
黑潤者佳 搗碎

用真蘇油二十四兩煎滾入亂髮以柳桃枝不
住手攪令髮融化再入草蘇子煎至髮化草蘇
仁枯再入後藥慢火熬之

大黃 切片 黑元參 當歸 各三兩

生地黄 兩 肉桂 去淨粗皮 白芷

赤芍 各二兩

煎至藥色枯黑濾去渣慢火熬濃方入後四味
取之軟硬得宜滴水成珠為度夏月宜畧老些

冬天宜畧嫩些

明松香 一觔搗碎入大葱管內以線縛好放碗內
隔湯蒸化取出候冷去葱研細入兩先下

松香次

真黃丹 二十兩其色黃者為真用水飛晒乾炒
黑色十兩若色紅者乃東丹也勿用

滴乳香 真沒藥 俱箬上烘去油
研細各二兩

四味收入成膏藏磁器中旋用旋攤
秘傳太乙萬靈膏

治一切癰疽發背七十二般疔瘡三十六種疔
毒無名腫毒痰核癰瘰內損骨節外傷皮肉手

足麻木不仁流注疼痛膈前背後吊起刺痛等
證初起貼之腫消痛止已潰貼之膿乾肌生功
效如神

瘍醫大全 卷七 膏藥方 顧氏秘書

羌活 草蘇仁 蟬蛻

大蜂房 蜈蚣 敗龜版

苦參 猪皂角 元參

槐角子 青蒿 過山龍

甘草 半枝蓮 荊芥

蕪艾葉 黃芩 仙人掌

仙

川椒	蒲公英	白薇
龍膽草	防風	忍冬藤
白芨	生附子	大黃
石菖蒲	梔子	赤芍藥
獨活	何首烏	黃耆
蛇床子	桔梗	黑牽牛
漏蘆	木鱉子 <small>去殼</small>	肉桂
大楓子	巴豆 <small>去殼</small>	地骨皮
昆布	蒼耳子	黃栢
青木香	連翹	鼠粘子
桃仁	白殭蠶	血餘
穿山甲	黃連	當歸
牛膝	蒼朮	升麻
蛇蛻	檳榔	槐枝
柳枝	桃枝	各一兩

右六十二味咀片用真麻油十觔浸春五夏三秋四冬十日入大鐵鍋內燉至烟盡為度先去粗渣冷定用大皮紙以針戳眼濾去細渣復入

湯醫大全 卷七 膏藥方 顧氏秘傳

淨鍋內熬至黑色滴水成珠不散每油一觔入	淘過黃丹炒紫色者八兩	如無黃丹用水飛細	密陀僧末八兩代之	下丹之時以柳棍不住手攪勻離火再下				
白芷	天南星	草烏	北細辛	半夏	高良薑	川烏	各一兩	
右七味俱生研細末篩入膏內攪勻冷定再下	後開乳極細末	海蝶蛸	一兩	乳香	去油	百草霜		
湯醫大全 卷七 膏藥方 顧氏秘傳	沒藥	去油	雞肫皮	血竭	象牙末	雄黃	寒水石	
兒茶	白石脂	硃砂	赤石脂	輕粉	各五錢	青魚膽	熊膽	各三錢
甘松	三柰	潮腦	冰片	麝香	琥珀	珍珠	龍骨	
水銀	各二錢	細末篩入攪勻傾入冷水內扯拔換水浸三日						

湯醫大全 卷七 膏藥方 顧氏秘傳

松香 一百觔 棕皮 濾淨

百草霜 十觔 篩過

冬浸九宿 春秋浸七宿 夏浸五宿 分數次入鍋

文武火熬至藥枯 油黑 滴水成珠 爲度 濾去渣

稱明每藥油十二兩 下濾淨片子 松香四觔 全

熬至滴水不散 每鍋下百草霜細末六兩 勿住

手攪俟火候成則傾入水缸中 以棒攪和成塊

用兩人扯援數次 磁鉢收貯

一法治瘡疽用血丹 取膏更妙 每劑一觔 用血

傷醫大全 卷七 膏藥方 顧氏秘書

丹六兩

仙傳奪命膏 邵秘

治發背對口一切腫毒 卽日見效 揭下再貼一

人又能消去

驢蹄 一個 大鯽魚 商陸 各一觔

山羊角 三個 芫花 土木鱉

白芨 番木鱉 大戟

露蜂房 白蕊 紅花

元參 藕木 桃仁

蛇 各一兩 當歸尾 黃牛角腮

巴豆肉 乾蟾皮 猪懸蹄甲

南星 半夏 穿山甲 各二兩

大黃 三兩 草薢仁 蒼耳嫩頭 各四兩

金線吊蠻墓 一個

用麻油四觔 全藥熬枯 去渣 熬至滴水成珠 爲

度 每熟油一觔 入炒官粉八兩 收成膏 再下

乳香 去油 沒藥 去油 麝香

共香 輕粉 各三錢

傷醫大全 卷七 膏藥方 顧氏秘書

研細攪勻收貯

如貼腫毒未破者 用敷腫毒末藥 搽上貼

凡貼痞塊 用針刺患上三針 如品字樣 外用阿

魏蜈蚣穿山甲 麝香 各等分 研爲細末 只稱

一分 摻於針眼內 餘者摻膏上貼

凡貼瘋氣 用開羊花 五錢 燒酒 拌晒 乾 麝香 三

乳勻 摻膏上貼 三次 炒脆 爲末

車門一笑膏 邵秘

專貼寒濕諸瘋 疼痛 貼骨 癱疽

白芷 川草薢 防風

鴛粟殼 甘松 川羌活

三柰 川獨活 藁本

高良薑 官桂 大茴香

秦芫 小茴香 麻黃

葳靈仙 川椒各二兩 眞附子

草烏 天南星 乾薑

穿山甲 大黃 開楊花火酒拌

半夏各四兩 老葱 老薑各二觔

湯醫大全 卷七 膏藥方 顧氏秘書

右藥用麻油三觔桐油半觔入藥浸熬枯去渣

復入淨鍋內熬至滴水成珠入

製松香四觔 土硫黃 密陀僧各一觔

取之膏成冷定再下

廣木香五錢 乳香去油 沒藥去油各三錢

研細攪勻再下

潮腦一兩 麝香三錢

和勻收貯任攤用

陰陽至聖膏 岐天師

治陰陽癰疽大毒

金銀花一觔 人參 茜草根各五錢

生地八兩 牡丹皮 牛膝

生甘草 荆芥各一兩 元參五兩

當歸 麥門冬 黃耆各三兩

川芎二兩

用麻油五觔煎數沸將渣濾淨再熬至滴水成

珠入

廣木香 沒藥 乳香

湯醫大全 卷七 膏藥方 顧氏秘書

血竭各一兩 象皮五錢 麝香一錢

黃丹二觔 水飛去砂

各乳細先下黃丹再下細藥入油中少煎攪勻

藏磁罐內收之每發背用膏一兩攤一張其餘

量瘡大小用之

呂祖紫金奪命膏

貼一切多年久不収口惡瘡結毒癰癤冷癩瘡

塊跌打骨斷兩截者

川黃連 全蝎 穿山甲

黃芩

川黃柏

當歸

香白芷

各二兩

赤芍

番木鱉

切片

生地

各一兩

官桂

海藻

各四兩

以上諸藥用水煎汁去渣用麻油二十二兩將

藥汁入內熬盡水氣滴水成珠方下炒過飛淨

血丹十一兩攪勻成膏再下黃蠟七錢又下阿

魏六錢切片摻膏藥上令其自化候微冷又下

乳香

去油

沒藥

去油

輕粉

各六錢

麝香

血竭

硃砂

湯醫大全

卷七

膏藥方

顧氏秘書

雄黃

各二錢

雄鼠糞

一兩五錢

燕窩

當底泥

俱乳細末入膏攪勻收貯攤貼熬膏時擇黃

道吉日忌婦犬雞犬厭物焚香禮拜熬成不得

加減藥味分兩

呂祖奇靈膏

貼一切癰疽腫毒諸般疼痛腫瘡頑癬血瘋外

證

巴豆肉

血餘

草蘇仁

葱白

蒼耳子

穿山甲

炒各四兩

天南星

半夏

大川烏

當歸

肥草烏

生地

番木鱉

金銀花

各二兩

老生薑

十六片

蜈蚣

二十條

全蝎

四十九

乾蟾

一個

大鯽魚

一觔

腸切碎

肉桂

一兩

右用真蘇油五觔浸七日熬至滴水成珠去渣

入炒鉛粉收成膏攤貼又能生肌收口

一人口邊生僵風貼三五日全愈

紫霞膏

張乘六

湯醫大全

卷七

膏藥方

顧氏秘書

治癰疽發背對口疔毒歷試歷驗

製藥油法

每斤小磨蘇油一觔用象皮當歸赤芍各二兩

入油內春夏浸三日秋冬浸七日將油熬至藥

製松香法

每老嫩各半松香一百觔用葱一百觔生薑一

百觔搗爛取汁又將渣入水煮汁去渣濾淨將

嫩配搭鋪松毛上蒸化松香汁滴在鍋裡葱薑

放素淨地上數日聽用凡用取熬過松香一觔加嫩過藥油四兩

夏月

三兩入鍋內熬化看老嫩火候得法取起傾鉢內再入後藥

乳香去油淨沒藥去油淨血竭

龍骨煨各五錢

右各乳細入膏內用槐柳條攪勻再入

礪硃俱研至無聲為度各二兩

又攪均勻連鉢頭放在潮濕地上頓多日出火

毒任攤貼

發背膏楊廷陞

瘍醫大全 卷七 膏藥方 莊 顧氏秘書

乳香去油杭粉 血竭鮮紅者

白兒茶 沒藥去油黃丹炒一次淘一次九回

銀硃各四兩銅綠三錢

逐味另研無聲為度再合一處用時照證大小

取夾油連四紙一塊以銀針多戳小眼每張準

稱藥末五錢真蘇油調攤紙上再用油紙一塊

蓋之週圍用線縫好貼患處軟絹紮緊過三日

將膏揭開濃煎葱湯洗淨軟絹挹乾將膏翻過

用銀針照前多戳小孔貼之無火之人內服十

全大補湯有火之人減去肉桂薑棗服之兼以飲食滋補至重者用二張

發背對口膏楊廷陞 五金膏

初起自消已成即潰

番木鱉水浸刮去毛主木鱉去殼草蘇仁去殼各一兩四錢

用清油一觔浸春三日夏五日秋七日冬十日

文武火熬焦色濾清復入鍋內熬至滴水成珠

用密陀僧龍牙有金星起者六兩研細收膏再加金箔四十張

剔入膏內用柳枝攪勻稍待用磁器置水將膏

瘍醫大全 卷七 膏藥方 莊 顧氏秘書

傾入水內如用時盛杓內化開攤貼愈陳愈妙

鯽魚膏吳近宸

貼一切無名腫毒未成即散已成拔毒提膿並

治膿窠瘡癰

大蟹蟄 活烏背鯽魚各七個

草蘇仁十二兩

蘇油二觔全蟹蟄鯽魚草蘇子文武火熬枯濾

去渣熬至滴水成珠離火入

真輕粉四兩鉛粉十二兩

收藏臨用取膏攤貼

鯽魚膏

貼癰毒瘡癤

大鯽魚一尾 芭荳四兩 草麻仁六兩

甘草五錢

用菜油麻油各一觔先將鯽魚炸枯去渣再入

芭荳草麻甘草熬枯濾淨熬滾離火將鉛粉徐

徐投下攪勻成膏攤貼

碧玉膏

瘍醫大全

卷七 膏藥方

疔

顧氏秘傳

貼癰疽發背癰癰馬刀乳癰乳巖流火流注腫

塊風毒橫痃痔漏囊癰冬瓜癰貼骨疽一切腰

背髀腿毒癰多骨疽蟻拱頭脚隱漏蹄等證

草麻仁去皮尖 杏仁去皮搗爛各

銅綠二兩七錢用水一碗將銅綠

片松香五觔研細

用真麻油十二兩入鍋內熬滾次下草麻杏仁

熬至滴水成珠為度夏布濾去渣將油復入淨

鍋內用文武火熬滾徐徐投下松香末用桃槐

枝不住手攪勻傾入磁盆內候膏將凝然後入

銅綠水於膏內仍不住手攪勻然後加水浸之

用手揉扯以去火毒另用磁罐或銅杓盛貯數

月後用熱湯燉化攤貼此膏活血止痛拔毒消

腫欬毒透膿去腐生新

紫金膏

貼一切無名腫毒惡瘡兼治風濕流火小兒痘

毒宜端午七夕重陽天醫天德月德日配合

明松香

四兩夏用紅者冬用白者秋冬紅白各半以火熬滾入水內揉百十下研末若貼

瘍醫大全

卷七

膏藥方

疔

顧氏秘傳

痘毒松香用黃荳浸水入鍋內候煮化待溫照上批按研細末四兩

草麻仁二兩研細放細篩羅去上粗者去之

輕粉五錢 銀硃 銅綠各二錢

製畢用猪油去衣拌藥放青石上用鐵鎚搗數

干下盛磁瓶內用時攤油紙上貼 凡貼毒將

膏中剪一孔露頂透氣能貼多年痘毒若貼流

火竟貼頂上不必剪孔

極效膏

川烏 草烏 元參

大黃 生地 杏仁
當歸 赤芍 金銀花
白芷 各一兩

蘇油一觔四兩浸藥慢火熬加

桃枝 柳枝 槐枝

桑枝 榆枝 各十寸

熬枯去渣復熬至滴水成珠為度再加

銀硃一兩 銅綠八錢 水粉四兩

入油攪勻熬黑再加

瘍醫大全 卷七 膏藥 疔 疔 顧氏秘傳

黃蠟 白蠟 各一錢

化勻再加松香取之老嫩得宜入水扯拔出火

毒任攤貼

商陸膏

貼瘡毒

商陸 六兩 牛蒡子 防風

金銀花 荆芥 當歸尾

連翹 赤芍藥 紅花

茅蒼朮 甘草 各五錢

蘇油二觔熬枯去渣用密陀僧一觔取成膏用
紅玉膏 濟生

貼癰疽瘰癧乳癰等證

乳香 另研 沒藥 另研各二兩 草薢仁 四百粒

木鱉子 去殼二兩 當歸 四兩 血餘 五錢

兒茶 血竭 白蠟

黃蠟 各一錢 嫩楊枝 一兩打碎 黃丹 飛四兩

豆蔴油 八兩 芸香 白嫩者一觔

先將蘇油全楊柳枝當歸血餘熬數滾絞去渣

瘍醫大全 卷七 膏藥 疔 疔 顧氏秘傳

將油全芸香草蔴木鱉子熟絞去渣入黃白蠟

將成膏入黃丹離火下乳沒兒竭末攪勻成膏

育紅膏

腫毒瘡癰

老松香 四錢 潮腦 一錢 輕粉 八分

銀硃 七分 銅綠 冰片 各一分

麝香 一分 草薢仁 二錢夏月只用一錢六分

研細重湯燉化忌見火任攤貼

腫毒瘡癰膏

當歸 金銀花 防風

木鱉子 元參 生甘草

白芨 石菖蒲 連翹

生大黃 白芷 生地黄 各四錢

蘇油一觔四兩全入淨鍋內熬枯濾去渣復入

淨鍋熬至滴水成珠為度入飛過炒黃丹八兩

收成膏離火入白蠟黃蠟各二錢化盡再入

乳香 去油 沒藥 去油 輕粉 各二錢

研細末和入任攤貼

瘍醫大全 卷七 膏藥 七 顧氏秘書

救苦膏

貼癰疽初起即消已成即潰已潰即斂實有消

腫定痛之效須擇吉期虔誠修合

生薑 大蒜頭 槐枝 向陽者各一觔

葱白 半觔 花椒 去目二兩 黃丹 水飛淨二觔

蘇油四觔文武火熬枯濾去渣再熬以桃柳枝

不住手攪至滴水成珠再下飛丹攪勻候冷取

起攤貼

紅膏藥

貼左癱右瘋筋骨疼痛漏肩風跌打損傷

松香 五觔 月可將松香化傾入童便內取出又焙

化傾童便內如此九次再換水煮過用之

第一次 用葱十觔取汁三碗入鍋內將松香化

開入蘇油四兩攪勻傾入水盆內以手

第二次 用生薑十觔取汁三碗入鍋內將松香

化開入蘇油二兩攪勻傾入水盆內以

第三次 用菜豈一升煮汁三碗入鍋內將松香

化開入蘇油二兩攪勻傾入水盆內以

第四次 用火酒一觔入鍋內將松香化開入蘇

油二兩攪勻傾入水盆內以手扯拔取

第五次 用好醋一觔入鍋內將松香化開入蘇

油二兩攪勻傾入水盆內以手扯拔取

第六次 用蒼朮 開陽花 川烏 草烏

水二十碗煎汁五六碗入鍋內將松香

化開入蘇油四兩攪勻傾入水盆內以

第七次 復將松香入淨鍋內焙化俟各汁收乾

然後下自煨礬紅細末四兩攪勻成膏入鉢

封固攤貼

干槌膏

貼癰疽疔毒初起即消如治癰癰連根拔出小兒鱗拱頭膿久不收口

嫩松香 四兩 巴荳仁 五粒 草蘇仁 七錢

杏仁 去皮 乳香 去油 沒藥 去油

銅綠 各一錢

共入石臼內搗二千餘下即成膏矣取起浸清水中用時隨瘡大小用手捻成薄片貼瘡上以

湯審太全 卷七 膏藥 堯 顧氏秘書

絹蓋之

紫金膏

貼寒濕氣漏肩風諸般疼痛立止

白芷 六錢 關羊花 三 柰

大茴香 毒皮 草烏

川烏 葳靈仙 甘松

小茴香 大黃 獨活 各七錢

乾 蟾 一個 亂頭髮 三兩

麻油四十兩全藥入鍋熬至髮化滴水成珠再

下

密陀僧 研細十

收成膏再下

松香 葱汁 薑汁 鳳仙花汁 各煮一次研細

入膏化盡攪勻傾在鉢內重湯燉化再下

潮腦 七錢 膏 黛 桂皮 各六錢

丁香 雄 黃 各五錢 輕粉 四錢

血竭 乳香 去油 沒藥 去油

兒茶 各三錢 滑石 三錢 龍骨 二錢五分

湯審太全 卷七 膏藥 堯 顧氏秘書

麝香 水 片 各五分

攪入和勻收貯 攤宜攤厚些貼立刻止痛

瘡腫風濕筋痛膏藥

桐油 入兩 嫩松香 白者一西 硃 上好者

黃丹 飛炒各 葱汁 薑汁 各一茶

乳香 去油 藥 去油 研 百草霜 一升五

先煎桐油四五滾下松香又十數滾下葱薑汁

再三五滾下西硃再四五滾下黃丹離火再下

乳沒再下百草霜攪勻收藏任攤貼

萬應膏

貼內外諸證

好松香 十觔 葱汁 生薑汁 各二觔

黃栢 坐天黃 甘草

苦參 各二兩 蒼朮 一兩

全入鍋內熬至水氣升盡再入真麻油三觔熬至滴少許入水中約看凝片不散即是火候已到但須不時以竹片攪之免其巴底隨用麻布

一方過入水中水用大罇一隻貯水大半鋼蹄

湯膏未全 卷七 顧氏秘書

傾膏時將鋼週圍發濕免得膏滋粘鋼膏既入

鋼再取起捏去水頭復入淨鍋內熬化加

乳香 去油研 沒藥 去油研 黃蠟 八兩 各六兩

熬化撤去火再入

百草霜 篩細四 五兩

勺勻篩入攪勻另用麻布一方濾入水內扯捏

成團平日浸水內臨用時取起攤貼如火候太

老量加麻油少許可也

紅玉膏

拔毒去膿

蛇蛻 蜈蚣 各一條 頭髮 洗去油

黃蠟 各二兩 香油 四兩

全熬濾清用黃丹取膏再下黃蠟溶化攤貼

黃金膏

拔毒生肌

猪板油 四兩 乳香 去油 沒藥 去油 各

熬枯去渣加黃蠟白蠟各二兩溶化再下黃栢

細末五錢攪勻候冷加水片一錢成膏攤貼

湯膏未全 卷七 顧氏秘書

五枝膏

貼瘡毒兼治瘋氣痛

桃枝 柳枝 槐枝

桑枝 棗枝 各十寸 銀錢 四兩

麻油二十四兩將上藥熬枯濾清再熬至滴水

成珠為度以黃丹取之攤貼患處如作癢起泡

即可搗去 凡已潰者切不可貼

槐枝膏

貼瘡癰

槐枝 取二三十寸長 三百六十段

真麻油三觔入銅鍋內熬至枝枯黑為度用夏布濾去渣再入淨鍋內熬至滴水成珠入密陀

僧細末半盞攪勻再入

龍骨煨 象皮砂炒成血餘

乳香去油 沒藥去油 赤石脂各五錢

研細攪勻務須老嫩得宜收貯攤貼

肝張膏

腫毒已潰者貼之長肉

草麻仁八錢 大黃 紅花

白芷 木鱉仁 生地

當歸各三錢 黃柏 甘草

牡丹皮 赤芍藥 黃芩

全蝎 蟬蛻 防風

穿山甲 白僵蠶 獨活

乳香去油 沒藥去油 肉桂

川黃連 元參各二錢

共炒黑色用真麻油八兩浸三日入鍋內熬百

沸用大肝張紙放油內提透鋪地上出火毒隨

瘡大小剪貼 如楊梅瘡加活蝦蟇二條全熬

丹油膏 畢屬廷

真麻油一觔 桃枝 柳枝各四十

浸七日入鍋內熬至滴水成珠濾去渣淨入飛

過血丹八兩取成膏貼一切瘡癰

丹油膏

桐油一觔放鍋內畧滾片時不待白沫盡即下飛

過炒黃丹五兩細細篩下候黑色即成膏矣貼一

癩醫大全 卷七 膏藥方 三 顧氏秘書

切瘡毒

製黃丹法

黃丹炒紫色傾入鋼內用滾水一桶泡之再沒涼

水滿鋼浸一夜去水晒乾再炒如法再製一次務

令晒乾研極細收貯留為熬一切膏藥之用

大... 1... 月... 日...

瘍醫大全目錄

卷八

論神燈照法

火照門主方

論艾灸法

艾灸門主方

論針烙法

論刀針砭石法

神農所置九宮尻神

瘍醫大全 卷八 目錄 頤氏秘書

四季人神

十二部人神

逐月血忌日

人神所犯十二時辰

男女忌日

針灸吉日

針灸凶日

論瘡瘍用針灸勿忌尻神

論敷藥法

癰疽敷藥門主方

論瘡瘍忌圍寒涼之藥

論漏瀆法

漏瀆門主方

論薰消法

癰疽門薰藥主方

瘍醫大全 卷八 目錄 頤氏秘書

四季人神

十二部人神

逐月血忌日

人神所犯十二時辰

男女忌日

針灸吉日

針灸凶日

論瘡瘍用針灸勿忌尻神

論敷藥法

癰疽敷藥門主方

論瘡瘍忌圍寒涼之藥

論漏瀆法

瘍醫大全卷八

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

婿錢之栢

男 柳燦用和

論神燈照法

程山齡曰凡腫在頭面以上者不宜艾灸恐引火氣

上攻宜用神燈照法神乎其神用火照散安紙撚

中以麻油浸點每用神火三枝離毒半寸許照之

自外而內俾藥氣透入皮色紫滯者立轉紅活瘡

勢平塌者立轉高聳仍須不時照之則毒氣頓解

瘍醫大全

卷八

論神燈

一

顧氏秘書

轉陰為陽以收全功且此法不止施于頭面即如

發背等毒亦宜用之此癰疽門之寶筏宜互相參

攷以神其用也 十法

火照門主方

火照散 即神燈照法 正宗

硃砂 血竭 沒藥 各三錢 麝香 五分 明雄 三錢

共為細末用綿紙條長寸許每條裹藥三分直

麻油浸點自外而內周圍照之瘡毒隨藥氣解

散自不內侵臟腑初用三條漸加至五七條瘡

勢漸平又漸減之薰罷隨上紅升丹貼上膏藥

若腫勢漫延周圍用藥敷之如再薰須洗去末

藥其貼膏藥處藥油可不必洗

瘍醫大全

卷八

火照方

二

顧氏秘書

薰發背對口神方 盛旦明

此二種瘡初起先用絲瓜葉煎水洗之如無熱水

洗之後用

兒茶 血竭 乳香 去油

沒藥 去油各一錢

研勻捲入草紙內成條浸在麻油內浸透點着

照瘡頭薰之務將烟冲在瘡頭上愈久愈受用

其瘡之毒一點露水相似其毒自散如知覺遲

已腫不可當亦要薰過最效

論艾灸法

李東垣曰夫疽則宜灸不宜烙癰則宜烙不宜灸丹
瘤腫毒宜湯漬之腫皮光軟則針開之以洩其毒
治瘡之手法道不過此而各有所宜故聖惠方論
曰認是疽瘡便宜灸之一二百壯如菜豆許火灸
後覺似焮痛經一宿乃是火氣下徹腫內熱氣被
火導之隨火而出所以然也若其瘡癢宜隔鼓餅
子灸之其餅須以椒薑鹽葱相和搗爛捏作餅子
厚薄如折三錢為率當瘡頭或餅子上灸之若覺
太熱即擡起又安其上餅子若乾更換新者尤佳
若其瘡痛即須急灸壯數多為妙若其膿已成者
慎不可灸即便針開之即得瘡也若諸瘡經久不
瘡變成漏者宜用硫黃灸法灸之其法硫黃一塊
着瘡大小口上安之別取硫黃少許放火上燒用
釵尖挑起點硫黃令着三五遍取膿水乾差為度
若發背初生即宜上餅灸法灸之初覺背上有瘡
疼癢頗異認是發背即取淨土水和捻作餅子徑
一寸厚二分貼着瘡上以艾炷灸之一炷一易餅

瘍醫大全

卷八

論艾灸

三

顧氏秘書

子其瘡粟米大時可灸七七壯其瘡如錢許大日
夜不住灸以差為度已上數方並依本方一一親
驗所以載之愚謂瘡醫自幼至老凡所經驗必須
寫之嘗記疔瘻惡瘡諸醫不驗者取蟻螬剪去兩
頭安瘡口上以艾灸之七壯一易不過七枚無不
效者又法用乞火婆虫灸之同前法累驗之神效
人皆秘之往往父子不傳又法赤皮蒜搗爛焯作
餅子一如豆豉餅子灸法灸之彌佳十書精義

瘍醫大全

卷八

論艾灸

四

顧氏秘書

門逐賊法也說約

又曰試瘡頭在何處好於瘡頂灸法先以濕紙覆瘡
上立視其紙先乾處乃瘡結頭處也

又曰初起一二日灸可立愈三四日十愈六七若過
七日之關內膿將成則不可灸矣

程山巖曰隔蒜艾灸法勝於刀針書云不痛灸至
痛痛灸不痛時凡治癰疽疔毒流注及一切無名
腫毒以大蒜切片安瘡頂上用陳艾炷安蒜上香
點灸之其艾炷大小看瘡毒大小取裁若癰疽之

大者以蒜搗餅敷上必須不痛者灸至大痛而止
疼痛者灸至不知痛而後止若灸不透反能為害
若內已有膿則不須灸矣 十法

陳實功曰癰疽發背怎生醫不論陰陽先灸之不痛
灸至痛痛灸不痛時 正宗

又曰考之方書凡頭上瘡面疔毒腎俞發俱禁艾火
以頭為諸陽之首又乃純陽無陰之位生瘡俱是
亢陽熱極如再加艾火使毒氣熾甚隨後必加大
腫最能引動內痰發之必死又有面瘡為陽毒腎

湯醫大全 卷八 論灸灸 五 顧氏秘書

俞發多因房勞素虧腎水枯竭真陰銷燦若妄用
艾灸恐以火濟火火燥其源必致內外乾涸多成
黑陷昏悶而死又有病人元氣素虛肢體倦怠精
神昏憤瘡形平塌脈來微散空虛及素畏艾火者
俱不可灸灸之恐生昏暈且無真氣抵擋火力有
損無益誠至言也

又曰如陰瘡日數多者艾炷不及其事以蒜搗爛鋪
於瘡上再以艾又鋪蒜上點火灸之必知痛甚為
效此為火氣方得入裏知痛深處方是好肉蓋艾

火拔引毒透通瘡竅使內毒有路而外發誠為
瘡科首節第一法也貴在早灸為佳

陳文治曰疔毒藥力不能速到非艾火不解惟艾火
功效甚捷

周文采曰初起陰塌不起便可用艾多灸或隔蒜灸
之如痛灸至癢如癢灸至痛此最妙法也若疽瘡
已成亦可用火針烙開瘡口則易治也 集驗

又曰癰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫切如
錢放頂上頭小艾炷灸之五壯而止若形狀稍大

湯醫大全 卷八 論灸灸 六 顧氏秘書

以黃桿紙蘸酒全貼腫上先乾處為筋脚於先乾
處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯而止又法屈
指從四圍按之過痛處是根就是重按深入自覺
輕快即此灸之更於別處灸若或大腫即搗蒜為
餅焙乾蘸醋灸熱更換頻數或以熨斗火於蒜餅
上熨之更換熱餅頻熨如覺患處走散即以綿帛
蓋覆勿令氣泄俟少間敷藥凡癰疽展大如龜之
形且看頭向上下先灸其前兩脚次灸其尾或紅
筋走緊而長從盡處灸之須留頭並後兩脚勿灸

若盡灸之不惟火氣壅聚使毒無從解散又攻入裏也若辨認不明以香白芷三分漢椒桑白皮各一分連葉葱白十根新水煎湯入酸醋半盞淋洗少頃其筋自現可以辨驗頭尾

朱丹溪曰頭面患毒如純陰平塌頑麻非艾灸無功但艾炷宜小如麥粒樣式以神其用也

寶漢卿曰凡灸於患上頭聚處切蒜片如錢厚放患處置艾壯於上以火燃之若蒜皮枯焦再易之待將畢三五壯着貼肉上灸為佳至少者以二十一

癩醫大全

卷八

論艾灸

七

顧氏秘書

壯為期頭頂上五壯七壯為期艾炷只可如豆大但面心為陽中之陽禁灸其陽症不可灸者何恐火氣內侵勢益猖大以火濟火故戒之惟陰症可灸鬱氣濕熱積毒借火以拔之然以火濟水自有相生之妙臨灸畢用口吹火致滅其火功借氣得以入內其瘡易散設或灸不能即散者灸遲之故也雖不能全散大能解毒易潰膿易斂口功難盡述惟臟毒坐馬癰以蚯蚓泥作餅代蒜片艾灸之以熱為度易之如前共十四壯為期若附骨疽癰

毒入骨髓擇天氣清明和暖尻神不犯吉日午時灸至申時止徐問病者骨中熱否若果骨中熱方效凡灸不拘壯數忽然爆起者是病根脫矣即止之凡灸須飲食半飽並飲好酒以通經絡以和氣血再令善笑談者以亂其痛亦妙方也體虛者禁灸

經驗全書

薛立齋曰余按瘡瘍之症有諸內必形諸外在外者引而拔之在內者疎而下之苟或毒氣鬱結瘀血凝滯輕者藥可解散重者藥無全功是以灼艾之

癩醫大全

卷八

論艾灸

八

顧氏秘書

功為大凡灸法未潰則拔引鬱毒已潰則補接陽氣每治四肢患瘡氣血無虧者灸之皆愈頭乃諸陽之首及腎俞一穴在於兩腰脊傍並弱甚之人內無真氣抵擋火氣數症禁灸當慎察之

王肯堂曰灸乃從治之意惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少若少陽分野尤不可灸灸之多至不救亦有因灸而死者蓋虛甚孤陽將絕其脈必浮數而大且鼓精神必短而昏無以抵當火氣宜其危也汪省之曰夫瘡有膿水惡物漸潰根深者用麩硫黃

蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚三分安瘡上用艾炷灸二十一壯一壯一易矣後四五日用翠霞錠子紐入瘡內使及肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服補接之劑調理則瘡矣

元戎曰瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不內內出者接之而令外故經云陷者灸之灸而不痛痛而後止其灸而不痛者先及其潰所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而後止其灸而痛者先及其未潰所以痛

湯醫大全

卷八

論艾灸

九

顧氏秘書

而次及將潰所以不痛也

精要曰腦為諸陽所會頸項近咽喉腎命皆致命之所俱不可灼艾

劉河間灸刺法謂凡瘡瘍須分經絡部分血氣多少

腧穴遠近從背出者當從太陽五穴選用至陰

小指外側去爪通谷 在足小指外側 束骨 在足小指外側 非萊大 本節前陷者中 指外側

本節後 崑崙 在足外踝後 委中 在膈中央約 從髻 陷中 跟骨上陷中 紋中動脈

出者當從少陽五穴選用竅陰

夾溪 在足小指次指岐 臨泣 在足小指次指 骨間本節前陷中 本節後間陷中 陽輔

在外踝上四寸輔骨陽陵泉 在膝下一寸從髻出前絕骨端如前三分 者當從陽明五穴選用厲兌 在足大指次指 在足大指次指 指外間陷中 陷谷 在足大指次指 動脈去陷 解谷 在中陽後一寸 骨三寸 骨一穴 在外踝上三寸 詳見癰疽灸經

劉宗厚曰此謂癰疽初發宜灸之也然諸瘡患久成漏者常有膿水不絕其膿不臭內無及肉尤宜用附子浸透切作大片厚二三分於瘡上着艾灸之仍服內托之藥隔三二日再灸之不五七次自然

湯醫大全

卷八

論艾灸

十

顧氏秘書

肌肉長滿矣至有膿水惡物漸潰根深者郭氏治用白麩硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分於瘡上用艾炷灸二十一粒一灸一易後隔四五日方用翠霞錠子併信效錠子互換用之紐入瘡內及肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服應病之劑調理即瘡矣蓋不止宜灸於瘡之始發也大抵始發宜灸要汗下補養之藥對證至灸冷瘡亦須內托之藥切當設反逆不唯不愈恐致轉生他病之患也

經曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脉熱肉敗榮衛不行必將爲膿內銷骨髓外破大腸留於節湊必將爲敗積寒留舍榮衛不養肉縮筋助肘不得伸內爲骨痺外爲不仁命曰大寒留於谿谷也此用附子灸者蓋此義也 灸漏瘡論

李氏云治疽之法灼艾之功勝於用藥蓋使毒氣外泄譬諸盜入人家當開門逐之不然則入室爲害矣凡瘡初發一二日須用大顆獨蒜切片三分厚

瘡醫大全

卷八

論艾灸

十一

顧氏秘書

貼疽頂以艾隔蒜灸之每三壯一易蒜瘡潰則貼神異膏如此則瘡不開大肉不壞瘡口易斂一舉三得此法之妙人所罕知若頭頂見疽則不可用

此法

五府瘡觀碑載

伍氏曰凡用蒜餅灸者蓋蒜味辛溫有毒主散癰疽假火勢以行藥力也有只用艾炷灸者此可施於頑疽癩發之類凡赤腫紫黑毒甚者須以蒜艾同灸爲妙

張景岳曰癰疽爲患無非血氣壅滯留結不行之所

致凡大結大滯者最不易散必欲散之非藉火力不能速也所以極宜用灸然又有孫道人神仙薰照方其法尤精尤妙若毒邪稍緩邪深經遠而氣有不達灸之爲良若毒邪熾盛其勢猛急而垂危者則宜用薰照方更勝於灸也

馮魯瞻曰瘡毒潰後風寒侵襲作腫痛者用薤菜杵爛炙熱敷患上冷則易之或搗成餅放患上艾圓灸之使熱氣入內 錦囊

瘡醫大全

卷八

論艾灸

十二

顧氏秘書

張仲景曰凡人一見背有瘡口外現者不可小視之急用蒜切片一分厚貼在瘡口上用艾火燒之痛者燒之不痛不痛者燒之知痛而止切不可不痛而止也此法最妙世人不識而我特表而出之以治發背之初起者蓋一經灸之則毒隨火化以火攻火又何疑焉顧世醫留意

心法云灸乃開結破硬之法倘有一點白粒如粟米起四圍微腫如錢便當於米粒上着艾火十四五壯三日內灸者只成灸瘡而散三日外者其腫漸少宜多灸之或灸火着處則結熱可伸灸處先潰

則毒勢分戒庶免展開不致下陷及壞筋骨傷氣血也所謂灸至不痛者謂着皮肉未壞處則痛火至着毒處則不痛必令火氣至着毒處方止所謂灸至痛者謂初着毒處不痛至好肉則痛必令火氣至好肉方止畏灸者或用獨蒜瓣或豆豉餅或椒薑鹽爛搗捏作餅子如當三錢厚鋪艾灸之熱則易新餅亦可散也

卷八

論艾灸

三

顧氏秘書

艾灸門主方

陳艾圓

此法因瘡毒純陰平塌頑麻非艾灸無功每歲端午日蓄薪艾一二筋愈久愈良用時取葉為炷或加麝香末木香末雄黃末搗成圓安蒜上灸之

灸一切無名大毒

胡桃劈開去仁取殼用極乾人糞填滿合腫處以艾火灸之殼穿則易已成即流稠黃水未成即消散也

瘍醫大全

卷八

艾灸方

七

顧氏秘書

艾火灸成瘡作痛

春用柳絮夏用竹膜冬用壁蟻窩秋用新棉貼之

製艾法

胡公

須在伏天取真正蕪艾不拘多少檢淨以篩子中揉擦再將細篩又揉篩眼中漏下者方成艾茸或以粗布包搗亦可再於烈日中晒極乾收貯灸瘡最妙

騎竹馬灸法

進繩

治一切瘡瘍無有不愈令病人以肘凭几堅臂腕

要直用篾一條自臂腕中曲處橫紋男左女右貼肉量起直至中指尖盡處截斷為則不量指甲却用竹槓一條令病人脫衣正身騎定前後用兩人扛起令病者脚不着地又令二人扶之勿令偏側却將前所量管篾從竹槓坐處尾骶骨盡處直貼脊背量至篾盡處為則用墨筆點定此只是取中非灸穴也却用薄篾作則子量病人中指節相去兩橫紋為則男左女右截為一則就前所點記處兩邊各量一則盡處即是灸穴兩穴各灸五七壯

瘍醫大全

卷八

艾灸方

五

顧氏秘書

疽發於左則灸右疽發於右則灸左甚則左右皆灸蓋此二穴心脉所過之處凡癰疽皆心火留滯之毒灸此則心火流通而毒散矣起死回生之功屢試屢驗

豆豉餅 理例

此法專灸一切癰疽對口頑瘡惡毒腫硬不潰及潰而不斂用江西豆豉為末唾津和作餅如錢大厚如三文錢覆患處以艾鋪餅上灸之以患者寬快為度未成者即消已成者雖不全消其毒頓減

大有奇功

桃殼灸法 畢昇承集

大核桃劈開去肉殼背鑽一孔內填溏雞屎令滿將有屎一面合毒頂上孔外以艾灸之不論壯數惟取患者寬快殼熱另換一殼如法灸之其毒立好直奇方也

蠟灸法 秘方集驗

凡患發背對口一切無名腫毒及久近癰瘡先看所患腫處用生麵水調作圈依腫處大小圍之圈高寸餘實貼皮上勿令滲泄圈外密施布巾數重防火氣侵餘肉患者安身勿動圈內鋪極好黃蠟片屑上以炭火炙至黃蠟溶化毒淺者皮上覺熱痛不受炙便止毒深者全不覺熱痛再下蠟隨化隨添至圈滿仍前熱火炙至蠟沸初覺癢後覺痛久之不可忍乃去火以少水微澆滾蠟上俟冷揭去蠟近皮者俱帶青黑色此毒隨蠟拔去淺者一二灸便內消深者三四灸亦膿去腫消立愈灸畢外搽生肌玉紅膏此百治百驗法也

瘍醫大全

卷八

艾灸方

五

顧氏秘書

高寸餘實貼皮上勿令滲泄圈外密施布巾數重防火氣侵餘肉患者安身勿動圈內鋪極好黃蠟片屑上以炭火炙至黃蠟溶化毒淺者皮上覺熱痛不受炙便止毒深者全不覺熱痛再下蠟隨化隨添至圈滿仍前熱火炙至蠟沸初覺癢後覺痛久之不可忍乃去火以少水微澆滾蠟上俟冷揭去蠟近皮者俱帶青黑色此毒隨蠟拔去淺者一二灸便內消深者三四灸亦膿去腫消立愈灸畢外搽生肌玉紅膏此百治百驗法也

灸身上諸毒並癰串久不收口者 秘方纂要

獨蒜一個加雄黃不拘多少共搗成餅貼之將艾
放餅上灸一壯即愈

湯醫大全

卷八

艾灸方

七

論針烙法

李東垣曰夫瘡疽之候證候不一針烙之法實非小
端蓋有淺有深有遲有速宜與不宜不可不辯蓋
疽腫皮厚口小腫多膿水出不快者宜用針烙瘡
皮薄惟用針以決其膿血不可烙也如有未成膿
已前不可以諸藥貼熾湯漬救療以待自消久久
不消內潰成膿即當棄藥從其針烙當用火針如
似火筋磨令頭尖如棗核樣圓滿用燈焰燒須臾
作炬數盪油燒令赤於瘡頭近下烙之一烙不透
即須再烙令透要在膿水易出不假按抑近代良
醫倉卒之際但以金銀銕錠其樣如針者可通用
之實在洩其毒也或只以木炭熟火猛燒通赤蘸
油烙之尤妙烙後實者撚髮為絛虛者以紙為絛
上蘸藥絛之上以帛攤溫熱軟粘膏藥貼之常令
滋潤勿令燥也夫瘡疽既作毒熱聚攻蝕其膏膜
肌肉腐爛若不針烙毒氣無從而解膿瘀無從而
泄過時不烙反攻其內內既消散欲望其生豈可
得乎嗟乎此疾針烙取差實為當理然忌太早亦

湯醫大全

卷八

論針烙

六

顧氏秘書

忌稍遲嘗見粗工不審其證淺深妄施針烙之法
或瘡深針淺烙毒氣不得泄以致內潰或瘡淺烙
深傷良肉筋骨腐爛或抑擦掀動加益煩痛或
針之不當別處作頭或即時無膿經久方潰遂使
痛中加痛直氣轉傷詳其所由不遇良醫也以此
推之凡用醫者不可不擇縱常醫療之得痊者幸
矣 十書

蔣示吉曰又有烙法膿已成而皮厚肉深難潰若不

用針烙使腐肉挾毒熱之氣久留肉腠間將好肉

瘍醫大全

卷八

論針烙

七

顧氏秘書

亦化爲膿血此烙法所以有功於潰瘍也若根淺
而皮薄者又何必假此以賣弄乎由此觀之皮薄
者用白降丹皮稍厚者則用針皮極厚而毒附骨
者非烙不可其法看瘡頭最大者卽是膿竅用熟
鉄五六寸長大針下半截用竹箸劈開夾針在內
以意消息用半寸卽露針尖半寸於外用一寸卽
露針尖一寸於外以線紮緊庶深淺不致有悞也
將針於麻油燈火上燒令紅透量瘡深淺及所生
之處深淺虛實插入一寸或至二三寸若未有膿

暫時以紙撚紙入候次日取出膿色黃白卽愈赤
黑防出鮮血若在虛處及筋骨節縫處不得亂行
針烙針烙入肉猶宜稍斜恐透內膜也烙遲固爲
不佳太早亦生變症膿深針淺內膿不出外血反
洩瘡淺針深內膿雖出好肉受傷此用針烙之難
也 說約

申斗垣曰頑瘡瘡疔如其膿半載醫治不得愈者當
用烙法烙之易愈也

周文采曰夫頑瘡瘡疔如其膿半載整年不得愈者

瘍醫大全

卷八

論針烙

三

顧氏秘書

何也蓋於男婦不慎房慾多有小兒亦因吮
其慾乳更是一理也亦有因跌撞如其膿血未及
將愈又跌之故此成其頑瘡不能得愈百藥不效
當用銀錢銀匙燒赤於瘡上烙之不數日而瘡先
勿令知之此直良法也如無銀錢以銅錢物代之
亦可

胡公弼曰凡火烙針具如筋大如葦挺頭圓平長六
七寸一樣二枚蘸香油於炭火中燒紅看瘡頭形
處烙之宜斜入向軟處一烙不透再烙必得膿非

其時所出皆生血當其時所出黃膿瘀肉不假按抑仍以紙撚紐之勿令口合

又曰凡瘡毒發在虛處及筋脉骨節之處斷不可亂行針烙即用針烙法宜稍斜防透膜也

傷醫大全

卷八

論針烙

三

顧氏秘書

論刀針砭石法

素問曰夫癰氣之息者宜以針開除去之夫氣盛血聚者宜石而寫之此所謂同病異治也

通評虛實論曰所謂少鍼石者非癰疽之謂也癰疽不得填時回

靈樞曰鈹針者末如劍鋒以取大膿

李東垣曰夫上古制砭石大小者隨病所宜也內經

謂針石砭石鑱針其實一也今時用鑱者從聖濟總錄丹毒論曰法用鑱割出血明不可緩也合扁

傷醫大全

卷八

論刀針砭石

三 顧氏秘書

鵠云病在血脉者治之以砭石此舉素問血實宜決之又氣血形志論曰形樂志樂病生於內治之砭石蓋砭石者亦東方來為其東方之民其病多瘡瘍其法宜砭石砭石之用自有證候非止丹瘤也但見腫起色赤遊走不定宜急鑱之先以生油塗赤上以鑱鑱之要在決洩其毒然而此法不可輕用忌其太深內經所謂刺皮無傷肉以其九鍼之用而各有所宜也砭鑱之法雖治瘡疽不可輕用也 砭鑱論

周文采曰如針砭傷其經絡白膿赤汁逗流不止宜服內托黃芪圓生黃芪去蘆焙剉入兩當歸洗焙三兩木香沉香肉桂去粗皮不見火乳香別研各一兩諸香忌見火共爲細末用萊豆粉四兩生薑自然汁煮糊爲丸桐子大不拘時溫湯送下四五十九 集驗

又曰古人用砭石鑿鍼刀鎌乃決瘡毒之器械也所謂瘡毒之宜出血可急去之意不可延緩恐毒勢變走內經云病在血脉決之於鍼石也岐伯五治

瘍醫大全

卷八

論刀針砭石

顧氏秘書

論云砭針乃磁石鋒芒利快決毒甚便乃東方之民善於此用于瘡癰丹瘤塗之生油於赤腫之上砭之出血妙在合宜亦不可過之耳

薛立齋曰若元氣虛弱誤服剋伐患處不痛或肉將死急溫補脾胃亦有生者後須純補之藥庶可收斂若妄用刀針去肉出血則氣無所依附氣血愈虛元氣愈傷矣何以生肌收斂乎

陳實功曰凡瘡十日以後自當腐潰爲膿如期不作膿腐仍然堅硬者此屬陰陽相半之症瘡根必多

深固若不將針當頭點入寸許開竅發泄使毒氣無門而出必致內攻也倘內有膿又便易出此爲開戶逐賊之意如十日外瘡雖不腐潰形尚紅活焮熱腫痛此雖膿遲後必有出此又不必針之蓋由元氣不能充足或失用補托之藥又誤用寒涼或蓋覆未暖多致膿遲有此症者宜用補中健脾大托補藥以得膿爲效又以十五日至二十一日爲期過此外者縱有稀膿但元氣被毒相拒日久必致耗散誠難歸結也 正宗

瘍醫大全

卷八

論刀針砭石

顧氏秘書

又曰如瘡半月後仍不腐潰不作膿者毒必內陷急用披針品字樣當原頂寸許點開三孔隨瘡之深淺一寸二寸皆可入之入之不痛再深入不妨隨將藥筒預先煮熟對孔竅合之良久候溫取下如拔出之物血要紅而微紫膿要黃而帶鮮此爲血氣營運活瘡如拔出瘀血紫黑色敗氣穢稀水無膿者此爲氣血內敗死瘡

程山齡曰凡毒有脹痛緊急膿已成熟無暇待灼艾火照者卽宜用刀法開之但刀法須在的確膿熟

之時又須要深淺合度以左手按腫處先看膿之成否如按下軟而不痛隨手起者膿已成也按下硬而痛或凹陷不起者膿未成也已成膿者宜刺未成膿者宜姑待之若脾虛氣弱者宜托補之又須看其膿之深淺以手指按下軟肉深者其膿必深軟肉淺者其膿亦淺若膿淺刀深恐傷好肉膿深刀淺恐毒不出而內敗最宜斟酌更有伏骨之疽膿腐於內皮色不變宜以刀刺入深處放出瘀膿或灸開大口放出之不得姑息因循俾毒氣越

瘍醫大全 卷八 論刀針砭石 顧氏秘書

爛越深也其下刀須利及勿令病者見恐驚彼耳砭法施於頭面及耳之前後因其漫腫無頭急用此法以瀉其毒取上細磁鋒用竹箸夾定緊繫放出鋒約半分許對患處另以筋敲之偏刺腫處俾紫血多出者為善刺畢以精肉貼片時再用鷄蛋清調乳香末潤之蓋此地不宜成膿因頭內中空耳前後更多曲折提膿拔毒恒多未便故砭法斷宜早施 十法

薛立齋曰若患於背髀之間凡人背脊脊處并髀皮

裡有筋一層患此處者外皮雖破其筋難潰以致內膿不出令人脹痛苦楚氣血轉虛變證百出若待自潰多致不救必須開之引之兼以托裏常治此證以利刀剪之尚不能去似此堅物待其自潰不反甚乎此非氣血壯實者未見其能自潰也

又曰瘡瘍膿成而及時針之不數日即愈矣常見患者皆畏針痛而不肯用又有恐傷肉而不肯用殊不知瘡難發於肉薄之所若其膿成必腫高寸餘瘡皮又厚分許用針深不過二分若發於背必腫

瘍醫大全 卷八 論刀針砭石 顧氏秘書

高二三寸入針止於寸許况患處肉既已壞何痛之有何傷之慮凡怯弱之人或患附骨等疽待膿自通以致大潰不能收斂氣血瀝盡而已者多矣又曰凡瘡既成膿皮膚不得踈泄味者待其自穿殊不知少壯而充實者或能自解若老弱之人氣血枯槁或兼攻發太過不行針刺膿毒乘虛內攻穿腸腐膜鮮不誤事若毒結四肢砭刺少緩則腐潰深大亦難收斂毒結於頰項胸腹緊要之地不問壯弱急宜針刺否則難治大抵瘡瘍之證感有輕

重發有深淺淺者腫高而軟發於血脉深者腫下而堅發於筋骨然又有發於骨髓者則皮肉不變故古人制法淺宜砭而深宜刺使瘀血去於毒聚之始則易消若膿成之時氣血壯實者或自出怯弱者不行針刺鮮有不悞凡瘡瘍透膜十無一生雖以大補藥治之亦不能救此可爲待膿自出之戒也

心法曰上古有砭石之制內經有九針之別制雖不同而去病之意則一也其瘡瘍一科用針爲貴用湯醫大全 卷八 論刀針砭石 未 顧氏秘書 之之際雖云量其潰之淺深尤當隨其肉之厚薄若皮薄鍼深則反傷良肉益增其潰肉厚針淺則膿毒不出反益其痛用針者可不慎哉至於附骨疽氣毒流注及有經久不消內潰不痛者宜燔針開之若治咽喉之患當用三稜針若丹瘤及癰毒四畔焮赤疼痛如灼宜用砭石去血以泄其毒則重者減輕者消如洪氏室患腹癰脹悶脅以臥針刺出膿卽蘇一人患癰腫熱腫脹小便不利幾殆急針之膿水大泄氣通而愈大抵用針之法

迎而奪之順而取之所謂不治已成治未成正此意也今之患者或畏針而不用醫者又猶患者之意而不針遂至膿已成而不得潰或得潰而所傷已深矣卒之天枉者十常八九亦可悲矣

張景岳曰經云天溫日明則人血淖溢而衛氣浮故血易瀉氣易行天寒日陰則人血凝滯而衛氣沉是以因天時而調血脉也故凡遇天寒水冰或陰氣凝滯之時欲行針刺則先當溫衣覆蓋或以艾葉炒熱或熱鹽熱衣類先熨其處務令血脉溫和而後刺之則血瀉氣行其病立已若血寒脈滯遲爾用針則邪毒不瀉徒傷良肉反以益其病也薛立齋曰凡元氣虛弱者必當補助脾胃禁用刀針若妄用之而去肉去血使陽隨陰散是速其危也孫真人曰針灸血出不止用人尿燒灰敷上立止

湯醫大全

卷八

論刀針砭石

未

顧氏秘書

神農所置九宮尻神

坤 外踝

震 牙口

巽 頭 口 乳

中宮 肩 尻

乾 背 面 目

兌 手 膊

艮 腰 項

離 膝 助

坎 肚 脚 肘

傷醫大全 卷八 針灸宜忌

五

顧氏秘書

一歲起坤二歲震三歲巽四歲中宮五歲乾六歲兌七歲艮八歲離九歲坎十歲又是坤逐年順行週而復始如患人行年到處則忌針灸慎勿泛用免變他病

四季人神

春 左脇

夏 在臍

秋 右脇

冬 在腰

九部人神 一歲為始起於臍一年行一位週而復始

臍 一 心 二 肘 三 咽 四 口 五 頭 六

脊 七 腰 八 足 九

十二部人神始 一歲為始起於心一年行一位週而復

心 一 喉 二 頭 三 肩 四 背 五 腰 六

腹 七 項 八 足 九 膝 十 陰 十一 股 十二

十干日忌用針灸

甲 頭 乙 耳 喉

傷醫大全

卷八 針灸宜忌

辛

顧氏秘書

丙 肩 丁 背 心

戊 腹 脾 己 腹 脾

庚 腰 肺 辛 膝

壬 腎 足 脛 癸 手 足

十二支日人神所在忌針灸

子 日 丑 腰 耳

寅 胸 卯 脾 鼻

辰 腰 膝 巳 手

午 心 未 頭 手

申頭脊
酉背
戌面頭
亥頭項

逐月血忌日

正月丑 二月未 三月寅 四月申

五月卯 六月酉 七月辰 八月戌

九月巳 十月亥 十一月午 十二月子

逐日人神所犯忌用針灸

初十一二十一日 大拇指 鼻柱 手小拇指

初二二十二二十二日 外踝 髮際

瘍醫大全

卷八

針灸宜忌

三

顧氏秘書

初三十三二十三 肝 股內 牙齒 足 股

初四十四二十四 腰間 胃氣 手陽明

初五十五二十五 口 舌 遍身 足陽明

初六十六二十六 手掌 胸前

初七十七二十七 內踝 氣冲 膝

初八十八二十八 手腕 股內 陰

初九十九二十九 尻 足 膝 脛

初十二二十三至日 腰背 內踝 足跌

人神所犯十二時辰忌用針灸

子 腰
丑 腰

寅 面
卯 面

辰 頭
巳 手

午 胸
未 腹

申 心
酉 背

戌 頭
亥 股

男忌日

壬辰 甲辰 乙巳 丙午 丁未 辛未

除日

女忌日

甲寅 乙卯 乙酉 乙巳 丁巳 辛未

破日

男女忌日

白虎 黑道 血支 血忌 月厭 月殺

月害 月刑 獨火

針灸吉日

丁亥 丁卯 丁丑 甲辰 甲申 甲戌

丙子 丙午 丙申 丙辰 壬子 壬戌

瘍醫大全

卷八

針灸宜忌

三

顧氏秘書

壬午 庚午 辛巳 戊戌 戊申 己亥
己未

針灸內日

每月 初八 十五 十八 廿三 廿四
廿八 廿九

醫書大全

卷八 針灸宜忌

畫

顧氏秘書

論瘡瘍用針勿忌尻神

薛立齋曰夫針灸之法有太乙人神選身血忌逐年
尻神逐日人神而其穴有禁針禁灸之論犯之者
其病難瘳理固然也但瘡瘍氣血已傷肌肉已壞
宜迎而奪之順而取之非平人可比之此何忌之
有外科精義云瘡瘍之症毒氣無從而解膿瘀無
從而泄反攻於內內既消敗欲望其生豈可得乎
危惡之發於致命之所禍在反掌腹癰囊癰二便
不通胸腹脹悶唇疔喉痺咽喉腫塞其禍尤速患
瘡醫大全 卷八 勿忌尻神 畫 顧氏秘書
者審之

深暗者當用溫性藥敷之如不熱不涼者當以冲和膏敷之根脚走散者當用鉄箍鉄桶等膏敷之庶毒不走易於消散膿亦易熟也

將示吉曰敷藥止可圍瘡之四傍中空瘡頭用白降丹點上以拔其毒自無倒陷之悞說約

又曰潰後若根脚漸開紅腫不散惡症也宜用鉄箍膏箍之膿潰猶痛必有筋隔住內膿不得出用針挑引出之癰疽膿熟勢盈欲溢用白降丹點上半口自潰

瘍醫大全 卷八 論敷藥 圭 顧氏秘書

又曰製敷圍之藥第一要研的極細敷之則不痛調敷藥之法必須用抵脚攪至千餘下敷之方不脫臨敷之時敷藥必隔水頓温庶藥力易達敷時中留一孔透氣使毒氣易洩不可不知此法

又曰寒涼敷藥如芙蓉散大黃膏其患最大氣脈得寒則不行瘀血得寒則不散瘀肉得寒則不潰新肉得寒則不生

寶漢卿曰凡製圍藥宜絕細則不痛和圍藥多加工夫攪千餘下其藥自稠則粘輕手圍之留孔須如

鷄卵形狀敷藥之外須用薄紙貼之務要扯碎貼上免崩裂疼痛之苦待圍藥畧乾再用調藥餘汁潤之以助藥力况藥乾不能入肌肉借濕以通竅耳宜深詳之

齊馬嗣明治楊遵彥發背取白麥飯石即粗理黃石磨刀粗石用礮醋淬猛火煨赤淬之令屑落醋中者良爲末醋熬爲糊厚塗立愈本草曰大凡石類多主癰疽此石治發背神良

程山齡曰書云用膏藥貼頂敷藥四邊圍凡腫毒之瘍醫大全 卷八 論敷藥 圭 顧氏秘書

大者將已成膿用白降丹或烏金膏貼瘡頭上然後用萬全膏蓋之四傍以鉄箍鉄桶芙蓉等膏敷之貼膏處取其出膿敷藥處取其消散並能箍束根脚不令展開共作三層敷圍法第一層用白降丹或烏金膏貼瘡正頂若漫腫無頭以濕紙貼上先乾處是頭也第二層萬全膏貼之第三層以敷藥圍之桑皮紙扯碎蓋上如蜜調敷藥則頻以蜜水潤之如醋調敷藥則頻以醋汁潤之不特添助藥力亦不致乾憔悴于膏用萬全膏通覆

1 第 10 1 冊 第 2 頁

腫處連根脚一齊箍住其中消處自消潰中自潰
竟收全功可見此膏之妙也

集驗云癰疽無頭起者用神膏靈龜膏拔毒膏銖
箍散貼卽令消退潰膿者用靈龜膏貼之或用追
毒膏去膿或用筒子吸膿有頭疽瘡每於洗後視
赤暈濶狹用涼水調大銖箍散成膏隆冬用溫水
調如人肉溫貼之腫赤盛用生地黃自然汁調圍
貼之法從四畔紅暈處圍貼用皮紙掩上瘡有旋
生白粒散漫如米如豆者用銀篦尾撥去瘡眼用

瘍醫大全

卷八

論敷藥

弄

顧氏秘書

老皮散敷之再換新藥敷上凡熱多則赤焮腫散
熱甚則紫黑外寒鬱之亦紫血虛兼寒則青白大
銖箍散正銖箍散乃常用之藥或因風寒熱及穢
氣厭觸等症四時寒熱不同又宜從權設法熱者
宜三黃散熱甚宜三消散風者加羌活防風風氣
滯者加木香寒鬱加桂枝穢氣觸者宜加香藥薰之
腫處脆嫩者去白芨去敷藥時看毛下毳中當有
汗珠此則血脉疎通熱毒消散赤暈漸縮膿潰痛
止變逆爲順皮毛潤活要作良肉但疽頂有些少

腐開不用刀剪如藥下不生汗珠腐敗必濶必多
也膿後圍貼則收散漫遺毒盡隨膿出瘡口貼拔
毒膏藥如膿出不順用追毒膏惡肉不去用金寶
膏敗肉去後圍貼則氣活血活新肉易長瘡口用長
肉膏敷貼之藥與淋洗並行同功

郭氏法云如有頭瘡疽就便用朱砂脩急膏一丸
如黃豆大安於瘡頭上却用軟粘膏藥蓋護之其
瘡必破如瘡暈紫黑色外用宣毒散周圍敷住毒
氣如瘡暈赤紅色用水澄膏敷之次日用堅峻碧
雲錠子開了瘡口次用緊緩碧霞錠子去其歹肉
稍淨却用緩慢碧玉錠子生肌總名青金錠子不
拘日數直待歹肉去淨單用膏藥貼之候膿水盡
肌肉平方許貼生肌斂口之藥若依此法免教人
受刀剪針烙之苦如是無頭癰腫待膿成用針刺
破方依法收功也

瘍醫大全

卷八

論敷藥

早

顧氏秘書

癰疽敷藥門主方

鐵箍散 吳丹垣

陽瘡腫瘍根脚散漫

五倍子 壹兩 微炒 生大黃 四錢 秋芙蓉葉 六錢

醋一鍾入杓內熬滾投藥末攪勻敷患上留頂以紙蓋之乾則以醋掃之

一方照原方加寒食麵伍錢

陰疽以及皮色不變漫腫無頭者不可敷

如意金黃散 正宗

傷醫大全 卷八 敷藥方 望 顧氏秘書

癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷濕痰流注大頭

時腫漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾濕脚氣

婦女乳癰小兒丹毒凡外科一切諸般頑惡腫

毒隨手用之無不應效誠為瘡家良便方也

天花粉 上白 十觔 栢 色深 者 大黃 姜黃

白芷 各五 觔 陳皮 天南星 蒼木

紫厚朴 甘草 各二 觔

共為咀片晒極乾燥用大驢磨連磨三次方用

密絹羅厨篩出磁器收貯勿令泄氣凡遇紅赤

腫痛發熱未成膿者及夏月火令時俱用茶湯

同蜜調敷如微熱微腫及大瘡已成欲作膿者

俱用葱汁同蜜調敷如漫腫無頭皮色不變濕

痰流毒附骨癰疽鶴膝風症等病俱用葱酒調

敷如風熱惡毒所生患必皮膚亢熱紅色光亮

形狀遊走不定者俱用蜜水調敷如天泡火丹

赤遊丹黃水漆瘡惡血攻注等症俱用大藍根

葉或水芭蕉根葉搗汁調敷加蜜亦可湯潑火

燒皮膚破爛麻油調敷具此諸引理取寒熱溫

傷醫大全 卷八 敷藥方 望 顧氏秘書

涼製之又臨用之際順合天時洞窺病勢使

引為當也

四虎散 正宗

天南星 草烏 半夏 生用 狼毒 等分

右為細末猪腦同搗徧敷瘡上留正頂出氣

凡癰疽腫硬厚如牛領之皮不作膿腐者宜用

鐵桶膏 正宗

發背將潰已潰時根脚走散不收束者

五倍子 微炒 一兩 明礬 四錢 胆礬 三錢 銅綠

白 芨 各五錢 輕一粉 鬱 金 各二錢 麝 香 三分

右為極細末用陳米醋一碗杓內慢火熬至一小杯候起金色黃泡為度待溫用上藥一錢攪入膏內每用頓溫以新筆塗膏瘡根上以綿紙蓋其瘡根自生縐紋漸收漸緊再不開大為效凡敷藥宜極細若粗則作痛不可不知一切根脚走散不能收束者用之收根束毒功效非輕

治對口爛疽不必洗去舊藥逐日添藥恐動瘡

瘍醫大全 卷八 敷藥方 聖 顧氏秘書

口惹風也

芙蓉膏

陽瘡紅焮收根束毒

芙蓉葉 秋採六錢 榆 麩 二兩 生大黃 五錢 皮 硝 一兩

研細葱汁童便調敷留頂初起敷之可消不特收束根脚

敷大毒二法

茅厠垢厚敷四圍中空出氣自消

或用赤小豆紫蘇全研敷上立消

敷一切大毒結腫吸毒法

川貝母研末同白椶榔汁敷之有病之處即起白泡無病之處則起紅點如瘡

遠志膏 程山齡

凡一切癰疽腫毒初起之時隨用遠志肉二三兩去心清油煮搗爛如泥敷患處用油紙隔布裝越一宿其毒立消屢試屢驗其效如神

芙蓉菊花膏

赤小豆 芙蓉葉 香附 白芨

瘍醫大全 卷八 敷藥方 聖 顧氏秘書

菊花葉 各四兩

研細每末一兩加麝香一分米醋調塗圍住根脚或雞子清調亦可

敷藥方

紫花地丁 去筋搥碎一兩 白 糖 一撮 和米飯 一團

搗爛敷四圍留頂

又方

鮮鯽魚 一尾 山 藥 一段 明 礬 壹錢

搗爛敷留頂片時發癢癢定自消 一方無明礬

又方

乳香 沒藥 麝香各三分 大蟒蛇二條

搗敷患上留頭自消

又方

當歸 黃柏皮 羌活

研細以生金銀花汁調敷四向空中

又方

生大黃一兩 白芨三錢 穿山甲一錢 麝香一分

醋調敷露頂或黃蜜葱汁敷更妙此藥敷上馬

瘍醫大全 卷八 敷藥方 聖 顧氏秘書

能立時止痛

又方 正宗

車前草連根葉 稀莨草 五龍草

金銀花各等分

右四味鮮草一處搗爛加三年陳米粉即常用

糲衣小粉漿初起仍加飛鹽末二三分共打爲

稠糊徧敷瘡上中留一頂以膏蓋貼避風自然

拔出膿毒若冬月草無鮮者預採蓄下陰乾爲

末用陳米醋調敷亦如前法並效今恐前敷藥

又方

內用五龍草隨地或有缺少不便合用子常黃後頂以膏蓋周圍腫上以如意金黃散代敷之

蕎麥麩 硫黃末各二兩

研末并華水和作餅晒乾每用一餅水磨敷之

痛令不痛不痛自痛

又方

用活泥鰍以手捉定頭尾放歛赤癰疽根盤上大

則以數條圍之其鰍即吸緊換其毒氣

瘍醫大全 卷八 敷藥方 聖 顧氏秘書

又方

末香 乳香去油 榆皮麩各等分

滴醋熬稠調敷

直君妙貼散 正宗

治癰疽諸毒及異形異類頑硬大惡疔瘡走散

不作膿者宜用此藥不痛者即痛痛甚者即止

蕎麥麵 白麩各五 明淨硫黃十觔 研細

共一處用清水微拌乾濕得宜木廂內躡成麩

片單紙包裹風中陰乾收用臨時再研極細用

新汲水調敷如皮破血流濕爛疼苦等症麻油調搽天泡火丹肺風酒刺染布青汁調搽並效
同陽玉龍膏 正宗

背疽陰病不腫高不熾痛不發熱不作膿及寒濕流注鼓風久損冷痛痺風諸濕脚氣手足頑麻筋骨疼痛及一切皮色不變漫腫無頭鶴膝風但無皮紅肌熱者用之俱有功效 此方乃救陰疽外施良法

草烏炒 軍姜煨各三兩 赤芍炒 天南星煨
傷醫大全 卷八 敷藥方 顧氏秘書

製畢共為細末熱酒調敷此藥有軍姜肉桂熱血生血既生既熱恐不能散而為害故有草烏南星可以破惡氣祛風毒活死肌除骨痛消結塊回陽氣又有赤芍白芷足以散滯血住痛苦加以酒行藥性功通氣血雖十分冷症未有不愈者誠為寒灰之焰枯木之春大抵病冷則肌肉陰爛不知痛癢其有痛者又多附骨之痛設若不除則寒根透髓尋常之藥固莫能及矣

中和膏 正宗

癰疽發背陰陽不和冷熱不明

紫荊皮即紅內消炒五兩 獨活炒三兩 赤芍藥炒二兩
白芷一兩 石菖蒲即望見消又名陽春雪又名木蠟一兩五錢

右為細末葱湯熱酒俱可調敷藥中紫荊皮乃木之精能破氣逐血消腫獨活乃土之精能動蕩凝滯血脉散骨中冷痛去麻痺濕石菖蒲乃水之精善破堅硬生血止痛破風消腫白芷乃金之精能去風生肌定痛赤芍藥乃火之精能生血活血散瘀除痛蓋血生則肌肉不死血動則經絡流通故肌活不致潰爛經通不致壅腫此為散風行氣活血消腫祛冷軟堅之良藥也其中五行相配用者再無不效之理如流毒骨疽冷症用之尤效故云風消血自散氣通硬自除

本方加乳香沒藥治流注筋不能伸

神應丹 說約
治氣血不和壅遏為瘡高腫赤痛兼痰兼鬱兼

寒兼濕者並效

小雄鯽魚七尾 鮮山藥四兩 連鬚大蔥頭廿一個

共搗爛加千年陳石灰半觔 天南星半夏白芩

赤芍藥研末各一兩和勻陰乾再研細末臨用
以蜜調敷四圍外以皮紙蓋之

效瘡頭四者

蕎麥麩炒黃研細水和敷之

化腐紫霞膏正宗

癰疽發背瘰癧肉不腐並不作膿者又諸惡瘡內

瘍醫大全

卷八

敷藥方

完

顧氏秘書

有膿而外肉不穿潰者

草麻仁研

輕粉各三錢

巴豆仁五錢

螺螄肉

潮腦各一錢

金頂砒分五

血竭二錢

共為末磁瓶收貯臨時用麻油調搽頑硬肉上

至頑者不過二次即軟

秘傳敷毒法

獨核肥皂去核一個草麻仁二十九粒搗爛敷留

頂透氣已成自潰初起自消

鐵箍散

敷諸般腫毒

草烏 知母 天花粉 半夏

天南星 五倍子炒 芙蓉葉各等分

右為末蜜醋頓熱調敷四圍中留一孔透氣

烏龍膏

敷一切腫毒

臭小粉漿炒黑研細用滴醋調敷或加生大黃天

南星更妙

梧子散

瘍醫大全

卷八

敷藥方

辛

顧氏秘書

敷一切腫毒並乳癰初起

五梧子不拘多少打碎炒黑為末醋調敷或井水

調敷亦可

立消散

雄黃二錢 穿山甲三錢 生大黃紋錦者

芙蓉葉 倍子炒各五錢

共研極細末滴醋調敷中留一孔透氣如乾又

搽不過十次自消

清涼膏

山東東昌府聊縣南普寺僧神授方

敷癰疽發背腫毒

先用白麵調成團圈患外葱根搗泥平鋪瘡上用
猪膽汁一枚黃蜜二兩傾磁器內和勻茶匙挑服
汁於內一時即消

敷毒

大五倍子蜜炙九次研末醋調敷

敷毒

老桑虫屎研末醋調敷留頂三四次即消

毒瘡未出膿敷此即有頭

瘍醫大全

卷八

敷藥方

聖

顧氏秘書

牙皂 京墨 煨過乾 姜各等分

研末醋調敷

敷藥神功散

川烏炮 黃栢各等分

研細滴醋調無頭漫敷有頭敷四圍留頂

周氏日用唾津調成膏敷如乾用米泔水潤濕

聽其流膿不可手擠

敷發背

松香半觔將水煮一炷香葱五十根連根鬚研如

泥量瘡大小紅絹攤貼

敷毒並敷痘毒

紫花地丁草搗敷神效

回生丹

敷癰疽發背諸毒一切惡瘡等證敷之消散起

死回生神方

五倍子整個大者去一角入上好銀硃不拘多少

再用銀箔糊住角口放銅勺內微火慢慢焙之烟

絕為度研細末放地下出火氣用雄雞蛋尖頭取

瘍醫大全

卷八

敷藥方

聖

顧氏秘書

蛋清調末務要多攪勻濃其藥稍乾即以雞翎或

硬筆蘸藥敷瘡自腫處由外往裡週圍敷之留瘡

口一連三四次住疼消散如神破後敷之亦妙

敷發背如神

熟鐵銹刮為細末雞蛋清調濃用新筆圈紅暈腫

處自外向內漸漸圈盡一日三次其瘡自然收小

代針散

凡惡毒腫痛日久不出頭用此即穿

木鱉子 川烏

水磨以鷄翎掃刷瘡上留豆大一處出膿如藥水乾再刷上不過一時即穿

敷一切腫毒疔瘡

猪牙皂火煨再炒羌活 大黃 防風

白芷 天南星 白芨 白蘇

連翹各一錢乳香去油五分沒藥去油五分貝母三分

右研細用蛋清全蜜調敷患處未成形者即消已成出頭者其效亦速

敷一切大毒疔瘡

瘍醫大全

卷八

敷藥方

聖

顧氏秘書

五倍子微火焙白芷各四兩陳小粉十年者佳慢火炒黑黃色一觔

川烏 黃柏 草烏 狼毒

天南星 半夏 粉甘草各一兩

研細未破者用滴醋調敷四圍已潰者用蜜調敷俱放滾水內頓勻敷

奇驗金箍散 錦囊

五倍子 白芨 白蘇各四錢

生大黃六錢芙蓉葉白花者長陰乾不經霜者佳二兩

研細用蛋清些少同醋調敷如乾以葱頭酒潤

之已有頭者露出頭敷四圍

消毒圍藥

白糯米炒焦色研細末醋調敷患處無膿即消有

膿即潰

敷癰疽發背奇方 鎮江招隱寺浣塵和尚

先用陳金墨磨濃塗四圍紅暈處再以猪膽汁生姜自然汁各等分不得多寡和勻有頂露頂無頂一藥用雞翎掃上乾則又掃未成即消已成即潰

百發百中

瘍醫大全

卷八

敷藥方

聖

顧氏秘書

麥飯石膏一名鹿角膏

白麥飯石 此石當以舊磨麩磨子近齒處石代用此石當以舊磨麩磨子近齒處石代用

取其有麥性故也屢試得效此石鋪家有時無處買今欲用之但於溪中等麻石中有白石粒如豆如米大者即是也但其石大小不同或如拳如鵝卵如盤大畧如握聚一團麥飯焉用炭火煨紅以好米醋淬之如此煨煉十次研令極細二兩研得不極細塗之極痛若細而嫩大能止痛排膿收口

白蘇

鹿角 不用自脫者必取生帶腦骨者去腦骨燒灰截二三寸長炭火煨令烟盡研細

兩四

凡用時量藥末多寡用經年好米醋入銀石器
 內煎今魚眼沸却旋旋入前三味藥末在內用
 竹篦子不住手攪熬一二時久令稀稠合宜取
 出瓷盆內候冷以紙蓋固勿令着塵灰每用時
 先以豬蹄湯洗去癰疽膿血至淨以舊帛挹乾
 用鵝翎掃敷四圍凡有赤處盡塗之但留中心
 一口如錢大以出膿血使熱毒之氣隨出如瘡
 未潰能令內消如已潰則排膿如清水則逐日
 見瘡口收斂如患瘡久肌肉腐爛筋骨出露用
 舊布片塗藥以貼瘡上如內膜纒穿亦能取安
 洗瘡勿以手觸動嫩肉仍不可以口氣吹着瘡
 更忌有腋氣之人及行經婦女或有孕人見合
 藥亦宜禁忌外取好米醋一大盞收瓷器內候
 逐日用藥於瘡上久則其藥乾常用鵝翎蘸醋
 掃濕其藥勿令稠也初用一日一洗一換藥十
 日後兩日一換藥

水澄膏 集驗

敷熱毒腫痛紅赤神效皮膚白色者勿用

湯醫大全

卷八

敷藥方

聖

顧氏秘書

大黃 黃、栢 鬱金 白芨
 朴硝 天南星 黃蜀葵花 各一兩
 研細末每用新汲水一盞半稱藥末二錢攪調
 勻候澄底者去浮水敷於腫焮處貼之如乾燥
 唾津潤之

烏龍膏 集驗

敷腫毒癰疽收赤暈

木鱉子 去殼半 夏 各二 小粉漿 四兩 草 烏 五

共入鐵銚內慢火炒焦研細出火毒再研細用

湯醫大全

卷八

敷藥方

聖

顧氏秘書

水調敷四圍中留頂出毒氣或用醋調

宜毒散

敷初起及灸後腫消暈聚

露蜂房 炒焦三兩 天南星 赤小豆 各一

小 米 一合 生草烏 一錢 生白礬 五分

研細末淡醋調塗四畔乾即再上

清涼膏 啟玄

敷癰腫焮痛

生大黃研末醋調敷

金蟾膏 敬玄

敷發背疔毒

活蝦蟆一個去骨搗如膏敷患上留頭如無頭都敷上大有神效一二日揭去不過換敷二個全好

火龍膏 敬玄

敷陰發背黑凹不知痛

新火薑六月六日晒乾研末磁瓶收貯每用以鮮

豬膽汁調敷周圍皮紙遮蓋乾則熱水潤之知痛

時黑水自出為妙如不知痛雖出黑水難治

瘍醫大全

卷八

敷藥方

毒

顧氏秘書

隔皮取膿散 寶太師

驢蹄 細末

五倍子 各一兩

白鹽 五錢

草烏

去皮四錢

蕎麥麵 炒二兩

共研水調作餅慢火炙黃去火毒研細醋調成

膏攤貼其腫漸退

鐵箍散 青囊

芙蓉葉

生大黃

牛旁子

白芨

雄黃

各等分

共研細看瘡勢大小或稱三錢或五錢以雞翎

攪入雞蛋清內調敷四圍束毒不致走散開大

神草膏

專敷發背對口一切無名腫毒立時消散

蜈蚣節草一大把入鹽少許搗爛如膏敷患上

胡公彌曰按蜈蚣節草乃柔草也其色青白節節生細葉沿漫田埂如蜈蚣形二三月採取陰

乾備用恐夏時草深難采

寸金散

敷癰疽腫毒

天花粉 三兩

赤芍

白芷

瘍醫大全

卷八

敷藥方

毒

顧氏秘書

薑黃

白芨

芙蓉葉

各一兩

右研細每用姜汁三分涼茶七分未破敷頭已

破敷四傍留頂經驗神效

黃蓉散 胡言爵

敷手足腫毒已成未成並效

生大黃 五錢

芙蓉葉 一兩

研細苦茶調敷

蝸牛涎

敷癰疽解毒止痛

蝸牛一百個納瓶內入新汲水一盞浸之封至次
早將蝸牛放去其水如涎入蛤粉調稀雞翎掃瘡
上日十餘次

乳香止痛散

一切癰疽疔瘡痛搽之立止

乳香去油 沒藥去油各二錢 寒水石煨

滑石各四錢 冰片五厘

右為末以葱汁調搽其痛立即止矣

烏龍膏

瘍醫大全

卷八

敷藥方

堯

顧氏秘書

臭小粉

五倍子 各等分

全炒黑研細醋調敷乾則以醋潤之消毒甚效

止痛麻藥

川烏尖

草烏尖

生南星

生半夏

草撥

胡椒各五錢

蟬酥一錢五分

右為末用魚膠炸化入藥拌勻陰乾臨用水磨

塗於肉上藥力麻住則刀割不痛

赤小豆散

治一切無名大毒敷之初起則消已成立潰

赤小豆一斗畧焙磨細用黃蜜調敷或葱汁好醋

酒菊花根葉搗汁旋汁俱可調敷中留一孔透氣

敷一切無名大毒孫直君

生豬腦攤紙上貼之一日三換

癰疽提膿孫直君

飛麩以人乳調敷一宿膿出

發背初起孫直君

新鹿角燒灰研細醋調敷之一日四五次以消為

度

瘍醫大全

卷八

敷藥方

本

顧氏秘書

癰疽久不收口孫直君

老鼠皮燒灰敷口上即收

敷腫毒劉秘

鼻涕虫全銀硃搗敷留頂立消

一切白色陰毒以及對口初起者錢青榆

活鯽魚一尾

生山藥一段與魚一般長

白洋糖二錢

全搗極爛敷上立消即去更治癩癧如神如婦

人乳癰初起用臘糟全搗敷上立散

冬瓜癰及四肢癰毒腫滿

新石灰先以水一潤即用醋一碗化開敷上再加

醋甲敷上立消惟身上腫毒忌用

發背初起未成 醫林集效

用活蟾一隻繫放瘡上半日必昏憤 置水中再易

一隻必跟隨再易其蟾如舊則毒散矣屢試極效

又方 靈秘丹藥

凡患癰疽瘡毒者用土中大蚤蟻一個剝全身癩

皮蓋貼瘡口於蟆皮上以針將皮刺數孔以出毒

氣自覺安靜且能抓住瘡口不令長大又可免蜈

湯醫大全 卷八 敷藥方 李 頌氏秘書

蚣聞膿味來侵神妙

癰疽初起 申一齋

乾姜一兩 泡炒 紫色 研末醋調敷四圍留頭愈

腫毒 抄本

凡毒初起及經十日以上熱腫疼痛用鷄子一個

打開入新狗糞如蛋大攪勻微火熬令稀調得所

捻作餅子於腫頭上貼之以帛包抹時時看視覺

餅熱則易勿令轉動及歇氣經一宿自愈如日多

者一日一易至瘥乃止一切諸方皆不及此

鐵桶散 醫方解

一切初起腫毒敷之立消已成毒不走散未潰

有膿即潰已潰膿即追出

九月九日取芙蓉葉 陰乾 五桔子

白芨 白 蘇 薑 黃 各五錢

大黃一兩 陳小粉 炒黑二兩 鱗 殼 五個

研細末醋調敷

腫毒及指上癰腫 衛生備要

獨蒜一顆白合數瓣臘糟全搗爛敷

湯醫大全 卷八 敷藥方 李 頌氏秘書

定疼散 單方

山藥一兩 白糖霜 大黃 各四錢

搗爛敷上即止痛 或手搭發背破爛者只用

糖霜山藥搗爛塞入毒內不臭爛肉自去新肉

自生初時日換三次三日後一日換一次換時

以甘草煎湯或猪蹄湯洗用軟鵝毛數根紮之

洗去再敷待肉長滿方止

消毒神方 周惠南

凡初起一切腫毒用杏核半邊入乾人糞填滿合

瘡頂上裝之如毒盛其核即炸碎另換一核填蓋
合上至重不過易二三核自消

敷方

天南星 生大黃 各等分

研細燒酒調塗露頂即消

又方

尿缸底刮下研細濃敷四圍露頂乾則再敷再潤

即消極效

又方

瘍醫大全

卷八

敷藥方

奎

顧氏秘書

芙蓉葉或根皮或花或生搗或乾研和白蜜調敷

四圍中留一孔透氣乾則頻易初起者消已成者

膿出易飲加赤小豆末其效更速

又方

連鬚葱同白蜜搗極爛敷之露頂如重換敷二二三

次即消如已有膿將破不可用此法

又方

芥菜子研末同扁栢葉搗敷即消

一筆描 周鶴仙

治一切腫毒神效

四月間於田中收取蝌蚪數升濾乾水裝入瓦罐

內加入米片三四分緊封罐口再用泥糊勿令洩

氣埋於不見天日土內六十四天取出盡成水矣

凡遇無名腫毒之人以筆蘸水在於患處畫一大

圈圍之逐漸收小中間留頭其毒即散神驗

敷腫毒一切惡瘡 黃洞陽

糯米 稷米 秈米 各二升

五月五日午時將米入壘內用滾水沖入要瀝

瘍醫大全

卷八

敷藥方

奎

顧氏秘書

過米浸至次年六月六日磨成漿再將原水和

入晒乾收貯臨用時取粉一兩加明雄末二錢

和勻醋調如稀糊樣週圍敷掃中留一孔透氣

如乾以醋潤之每用藥不過一錢二三分為率

劉氏敷藥秘方

人中黃 煨乃多年糞坑內者是人土子 即無名

生大黃 白芨 五倍子 生研

榆皮麵 各四兩

右磨細用鷄蛋清或葱汁黃蜜醋調敷俱可

金箍散 丁振宇

膽礬 礪砂 水銀

明雄 黑鉛 各二錢

端午日修合敷一切大毒研為細末火酒調敷

如不粘加飛麵六錢

敷一切毒

五瓜龍筋熬稠膏敷之

又方 吳魯南

香肥皂 一元毒大用三元 全生山藥搗化敷上中留一孔

湯醫大全 卷八 敷藥方 奎 顧氏秘書

透氣未成即消已成自潰

治發背癰疽不問已潰未潰並杖瘡諸蛇傷

白鳳仙花連根莖葉搗爛聽用先以陳米醋洗淨

然後敷上一日一換如冬月無鮮的秋間採取陰

乾為末水調敷之立消止痛如神 瘡將好用桑

葉醋煮一滾即撈起貼瘡上便能生肌收口

水雲膏 關傳

治發背

皂角 去皮 五倍子 炒 川芎

乾薑 各一兩 乳香 兒茶

沒藥 各三錢 枯礬 槐花 各一錢

右研細末健豬膽汁調塗神效

敷癰疽

五倍子醋炙為末瘡在左用猪左腦瘡在右用猪

右腦全搗勻敷

芙蓉膏 張秀峯

發背癰疽痛如錐挖不可忍者立時止痛

芙蓉葉 黃荆子 各等分

湯醫大全 卷八 敷藥方 奎 顧氏秘書

研細末鷄子清調搽四圍留頂中間如烟霧起

立效用於未潰之先將潰之際並效

消腫止痛散

芙蓉葉 一兩 陳小粉 一兩五錢 五倍子

生南星 生半夏 生草烏 各三錢

共研末醋調敷

腫毒皮色不變敷上即時紅腫

陳米粉 四兩 葱白 一兩

全炒黑研末醋調敷

龍虎膏

敷一切無名癰疽大毒

陳小粉 一筋

土木鱉連殼整 炒二兩 川烏

草烏

乾薑

白芨

花椒 各五錢

共研細末凡瘡未成者漫頭敷已成者中留一

孔已潰爛者敷於四圍俱以醋調燉溫敷上外

用綿紙貼乾則溫醋鷄毛掃上

鐵箍丹 何龍泉

瘍醫大全

卷八

敷藥方

李

顧氏秘譜

敷一切腫毒

五倍子

炒枯黑 陳小粉 炒黃

紅小豆 炒各二

乳香

五錢

研細末醋調敷四圍

神仙驅毒一掃丹

專治大小男婦一切癰疽發背無名腫毒赤紫

丹瘤纏喉風症初起掃之即消已潰掃之即愈

雄黃

一硃

砂 各二錢

牛黃

麝香 各二分

共研極細用猪膽汁調敷毒上其毒自散疼痛

即止外用桐油紙燃點着近毒處照之須令冷

氣透出毒外自愈

神仙敷毒失笑餅

初起一切癰疽大毒

黃泥

一大塊

連鬚葱 一大把

蜂蜜 一鍾

雄黃

三分

共杵爛作一餅乘熱敷毒上如乾了再敷一二

次自愈

瘍醫大全

卷八

敷藥方

李

顧氏秘譜

鐵箍散

癰疽發背疔毒初起

雄黃

熊膽

硃砂 各二錢

京墨

麝香 三分

共研細醋調敷已成只用京墨磨汁調敷四圍

金箍散 吳近宸

敷一切火毒及無名腫毒癰疽初起者即消已

成者即輕

生大黃

三奈

生南星

姜黃 生半夏 各四兩 白芨

人中白 白芷 天花粉 各三兩

草河車 一兩

共為細末用黃蜜調敷如紅白色者用米醋調

敷

白敷藥 吳近宸

敷一切流痰濕痰寒痰喉痰腮癰腋癰及婦人

乳癰乳疽乳吹癰癰等症如神

陳小粉 白 蘇 生半夏

瘍醫大全 卷八 敷藥方 堯 顧氏秘書

白芷 生南星 白芨

五倍子 三 柰 人中白 各三兩

共為細末磁瓶密貯 火痰用黃蜜調 流痰

濕痰用雞蛋清調 癰癰腮癰腋癰喉痰用米

醋調 惟乳症用活鯽魚一尾搗爛去骨和藥

末搗敷

敷發背

車前草 菴葦草 巴山虎草

金銀花 各等分

共研細末陳小粉漿打糊調敷

鐵箍散

芙蓉葉 陰乾 薑黃 五倍子 炒去至

白 蘇 白芨 鱗 殼 各五錢

生大黃 陳小粉 各一兩

共研細末用熱米醋調如稀糊敷圍中留一孔

透氣

麻藥

此藥敷於毒上麻木任割不痛

瘍醫大全 卷八 敷藥方 丰 顧氏秘書

川烏尖 草烏尖 生半夏

生南星 各五錢 胡椒 一兩 蟾 酥 四錢

研細末燒酒調敷 一方加草菴五錢 一方加細辛一兩

瘡口冷難收口

乾 姜

研末摻之患處覺熱如烘生肌最速

消腫毒

土三七根搗爛醋調敷留頂出氣敷之立消如膿

已熟敷之立潰

一筆勾

蠅蝶虫 三四十條 冰片 四分

全入罐內即化為水入麻油半筋封口收藏勿令洩氣初起用筆圈塗毒外四圍頻頻圈之即消已成敷滿留頂透氣

敷腫毒未成即消已成即潰

黃狗下頷 一具 白薇 各一兩

研細末醋調敷留頂透氣

消對口

瘍醫大全 卷八 敷藥方 主 顧氏秘書

白牽牛莖葉 一把 生薑 三片

全搗敷留頂透氣

敷諸腫毒並癩癧棒瘡

川楝子 八兩炒黑色 川貝母 去心五錢

海粉 要綠色者四兩炒 生半夏

川烏 甘草煮過 生南星 草烏 各一錢

各研極細末和為一處凡用以熱蜜茶汁和勻貼患上油紙護之 癩癧初起以熱蜜茶汁調敷如久成硬核者單用陳米醋調敷亦消

論瘡瘍忌圍寒涼之藥

薛立齋曰內經云五臟不和九竅不通六腑不和留結為癰又云形傷痛氣傷腫此則臟腑不和瘡發於外也明矣塗貼寒涼豈能調和臟腑宣通氣血也設使腫痛熱渴脈滑數而有力屬純陽宜內用濟陰丹外用益陽散則熱毒自解瘀滯自散若似腫非腫似痛非痛似潰不潰似赤非赤脈洪數而無力屬半陽半陰宜內用中和丸外用陰陽散則氣血自和瘀滯自消若微腫微痛或色黯不痛或

瘍醫大全 卷八 忌圍寒涼 主 顧氏秘書

堅硬不潰脈洪大按之微細軟弱屬純陰宜內服回陽湯外敷抑陰散則脾胃自健陽氣自回丹溪云敷貼之劑應酌小熱症耳若不辨其陰症陽症之所由分而妄敷寒涼之劑迷塞腠理凝滯氣血毒反內攻而肉反死矣况運氣得寒而不健瘀血得寒而不散瘀肉得寒而不潰新肉得寒而不生治者審焉
李世英曰疽不熱不痛屬陰切不可用冷藥敷貼恐逼毒氣入內

澄
日冬月不拘葱汁黃蜜酒醋敷藥必須隔湯燉熱
然後敷圍不可冷敷若冷敷俟肌肉溫暖一時何
能且有水伏毒氣內攻之害不可草率悞事

醫方大全 卷八 忌圍寒涼 垂 顧氏秘書

論湯漬法

王肯堂曰腫瘍宜紫葛湯一日五七次洗之每洗後
拭乾視瘡頂上有白粒如米大者以五灰膏點破
之瘡眼敷老皮散次用水調大鉄箍散圍貼四邊
紅腫處用正鉄箍散水調貼瘡口再洗則先去舊
藥每一次洗換新藥如前潰瘍用猪蹄湯一日一
二次洗之仍用大鉄箍散如前圍貼瘡口上用追
毒拔毒等貼之敗肉去後間二三日一洗之可換
長肉膏貼之淋洗之功癰疽初發洗之則宜拔邪
氣可使消退已成洗之則疎導腠理調和血脉深
引熱毒從內達外易深為淺縮大為小紅腫蔓延
洗之則收斂紫黑點洗之紅活逐惡氣祛風邪除
舊生新如瘡口冷滯不收者濃煎北艾湯洗燒松
香兔毛薰之淋洗之藥可與鉄箍散並行同功
李東垣曰夫湯法者宣通行表發散邪氣使瘡內消
也蓋湯水有蕩滌之功古人有論瘡腫初生一二
日不退即須用湯水淋射之其在四肢者湯漬之
其在腰腹背者淋射之其在下部委曲者浴漬之

醫方大全 卷八 論湯漬 垂 顧氏秘書

此謂疎導腠理通調血脉使無凝滯也且如藥二兩用水二升為煎取一升半以淨帛或新綿蘸藥水稍熱湯其患處漸漸喜湯洗浴之稍涼則急令再換慎勿冷用夫血氣得寒則凝凝得熱則淖澤日用五七次痛甚者日夜不住或十數次腫消痛止為驗此治瘡腫神良之法也 十書

又曰凡治瘡腫初起一二日之間宜藥煎湯洗浴薰蒸不過取其開通腠理血脉調和使無凝滯之意免其痛苦亦消毒耳如已潰洗之令瘡淨而無膿

瘍醫大全

卷八

論湯漬

幸

顧氏秘書

隔畔疔疤作痛之意也杖瘡亦然近時楊梅瘡生於穀道各治不愈以五根煎湯入婦人淨桶內先薰後洗不數次而愈諸瘡更妙何但於梅毒乎

蔣示吉日瘡毒初生古人用藥湯淋射蓋氣血凝滯則為癰腫得熱則腠理通經絡暢誠至理也其法以藥煎濃湯瘡在四肢者則湯漬之在腰腹者則淋射之下部者則浴漬之仍以淨布蘸水濕其患處水涼再換必數易而熱始透也

湯清門主方

木香湯腫湯

治癰疽始發腫焮憎寒熱痛

地黃汁 五合如無用以生地黃五兩代之

犀角

木香 升麻 射干

梔子仁

大黃 黃柏 黃芩 黃連

白 蘇 炙甘草 朴硝 紫檀

羚羊角 各一兩

切碎和勻每用藥五兩水一斗煎七升入射香

瘍醫大全

卷八

湯漬方

幸

顧氏秘書

五分淨帛蘸藥熱湯腫上日兩三度冷即更換升麻湯腫湯

升麻 黃芪 防風

生地黃 川芎 細辛 各等分

咬咀用藥二兩水二升煎十沸稍熱淋湯內消如神

湯腫升麻湯 總錄

升麻 漏蘆 梔子仁

蒴藿 芒硝 黃芩 各等分

每用二兩水三升煎十沸帛蘸藥湯漬腫處
猪蹄湯 聖惠方

升麻 甘草 芍藥

蒟 藿 各等分

每用四兩水一斗猪蹄一對煮蹄軟取出次下
藥再煎十沸帛蘸淋濁之

溺腫湯

木香 犀角 升麻

大黃 黃芩 黃連

傷醫大全

卷八 溺漬方

卷八 顧氏

射干 黃柏 白藜

甘草 朴硝 檀香

山梔 生地 羚羊角 各等分

每用五兩以水一斗煎七升入麝香一錢淨綿

蘸藥熱溺腫上一日兩三度冷則再換

論薰消法

澄曰癰疽發背初起已成有用薰法可令未成即消
已成自潰潰而易斂秘而不傳留心訪求始獲其
方用之頗驗

卷八

論薰法

顧氏

癰疽門薰藥主方

千金神草薰藥方 袁聖伯

發背對口已成腫痛勢甚或未潰已潰

千金草一握按千金草六月間高二三尺葉似桃

葉頂上開紫花一叢如紫瑞香花一般

搗爛入小口砂鍋內熬滾將病人仰臥於有洞

板門上毒露洞中以砂鍋對洞薰之少頃瘡口

毒水如涎流出病人快意為度即將搯數患處

縛住次日另熬又薰三次毒水流盡自愈

神驗薰藥方 吳煒相

如意草即犁尖草 金銀花 各五錢 桑葉 三錢

三角峰又名爬壁蜈蚣係楓樹上藤其藤係三個

右入大砂鍋內入水煎滾紙封罐口以棉花將

病人好肉包蓋再取板門量毒大小上下開一

洞令病人仰臥把毒露在外將罐口紙亦開一

洞對毒薰之藥氣直透毒內自有惡水流必

多如此三薰毒散自愈如未愈再薰一次如已

潰爛亦宜此法薰之若攻出數頭以荻頭煎洗

有腐肉或瘡口燥用猪蹄湯洗之以膏蓋之此

乃奇效之法秘之

癰醫大全

八十

瘍醫大全目錄

卷九

論辨膿法

論開口除膿法

論吸膿法

論膿熟不宜開遲

論內托法

癰疽已成門主方

論補法

瘍醫大全 卷九 目錄

論桑木灸法

論神妙拔根法

論瘡瘍去腐肉法

論死肉當去

論湯洗法

癰疽湯洗門主方

癰疽潰瘍門主方

論生肌法

論收口法

癰疽門生肌丹散膏方

論背癰頭開不住

論癰疽內肉不合法

論繃縛背瘡法

論生齋肉

論驗透膜法

論瘡疽鎖口

論將息法

論培護法

瘍醫大全 卷九 目錄

論瘡久成癭

論九漏

試知百病生死法

夏月諸瘡傷碎蠅蛆門主方

碎瘡瘍惡穢法

二 續修四庫全書

瘍醫大全卷九

燕湖顧世澄練江氏纂輯

壻錢之栢東陽
男 櫟燮川和 全校

論辨膿法

李東垣曰夫瘡腫之疾毒氣已結者不可論內消之法即當辨膿生熟淺深不可妄開視之可否不至於危殆矣凡瘡疽腫大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也若按之即復者有膿也不復者無膿也非也必有水也

瘍醫大全

卷九

辨膿法

顧氏秘書

以手掩其上大熱者膿成而自輒也若其上薄皮剝起者膿淺也其腫不甚熱者膿未成也

經曰膿血交粘用藥可全色鮮紅活腐肉易脫氣敗血衰神仙歎哉

齊氏曰若發腫都輒而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣疔也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所為也留積經久極陰生陽寒化為熱以此潰者必多成瘻

伍氏曰瘡腫赤色按之色不變者此膿已成也按之

隨手赤色者其亦有膿也按之白色良久方赤者此遊毒已息可就赤白盡處灸斷赤腫自消凡以手按之若牢硬未有膿也若半軟半硬已有膿也又按腫上下不熱者為無膿熱甚者為有膿宜急破之

澄曰凡腫瘍按之軟陷隨手起者為有膿按之堅硬雖按之有凹不即隨手起者為膿尚未成不可輕易決破

又曰凡大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之處即復者有膿按之不復者可消若按之都牽強者未有膿也按之半軟者有膿也又以手按上下不熱者無膿若熱者有膿凡

覺有膿急當破之無膿但氣腫若有血慎之慎之不可針破也用諸拔毒之藥敷散四圍堅中間軟者此為有膿也一邊軟亦可有膿都堅硬者此為惡核或有氣也都軟者此為有血或血瘤也當審堅硬虛實為要若堅疽積久後若更變熱中有軟處當軟處切不可針破也軟疽者只溫暖裏衣置

瘍醫大全

卷九

辨膿法

顧氏秘書

之耳若針灸刺破不可療矣

湯醫大全

卷九

瘡癰法

顧氏秘

論開口除膿法

程山齡曰凡治癰疽口小膿多則膿不出或出而不盡或薄膿可出硬膿難出以致瘀不出而新不生延綿難愈法當爛開大口俾瘀膿多出為善其爛藥烏金散最佳瘀肉能去不傷新肉且不甚焮痛為至妙也若有膿管以綿紙撚裹藥紙入頻換數條即化祛耳亦有頑硬之極非烏金膏所能去者則用白降丹或化腐紫霞膏搽之然終不及烏金膏為至穩

湯醫大全

卷九

除膿法

四

顧氏秘書

李東垣曰夫瘡瘍生於外皆由積熱蘊於內內經謂血熱肉敗榮衛不行必將為膿留於節腠必將為敗蓋瘡疽膿爛之時頭小未破瘡口未開或毒氣不出疼痛難忍者所以立追蝕膿之方法使毒氣外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若其瘡紅之血出不止者則未可緝當於瘡上摻追蝕之藥待其熱可緝方緝若其瘡紅之痛應心根者亦不可強緝之悞觸其瘡其焮痛必倍變證不無不可不慎也若瘡癰膿成未破於上薄皮剝起者即當

用破頭代針之劑安其上以膏貼之膿出之後用
搜膿化毒之藥取效如神矣 十書

竇漢卿曰凡瘡瘍之起疼痛固屬於心火久而陽氣
升上蒸肉化而為膿若不三思原其膿之有無遽
而開刀則鮮血突出膿從何來致患者煎寒發熱
日夜疼痛無法可止必先將指頭按患上隨手而
起四畔悉軟觀其頭聚擇尻神不犯吉日將刀頭
向上開之方不致傷新肉取出刀再燃綿紙條潤
油度之使膿水齊會半日扯出則膿水易乾外貼
膏藥四圍敷藥 全書

瘡醫大全

卷九

除膿法

五

顧氏秘書

論吸膿法

陳寶功曰古之良醫有好生之德以口吮膿後世人
漸嫌膿每多重手強擠致患者狼狽不堪或因循
聽其自潰膿毒不得外發必致內攻乃生煩躁重
如負石非用藥筒拔提內蓄之膿毒氣終難外泄
也法預用徑口一寸二三分新鮮嫩竹一段長七
寸一頭留節用刀剗去外青留內白一半約厚一
分許靠節鑽一小孔以杉木條緊塞將羌活獨活
紫蘇蘆艾鮮菖蒲白芷甘草各五錢連鬚葱二兩
湯醫大全

卷九

吸膿法

六

顧氏秘書

灌入筒內筒口用葱塞之將筒橫放鍋內以物壓
住勿得浮起用清水十大碗滄筒煮數滾約內藥
濃熟為度候用再用披針於瘡頂上一寸內品字
放開三孔深入淺寸約在筒圈內將藥筒連湯用
大磁鉢盛貯患者榻前將筒藥倒出急用筒口乘
熱對瘡合上以手捺緊自然吸住約待片時藥筒
已溫拔去塞孔木條其筒自脫將器倒出筒中物
色看其何樣如有膿血相粘鮮明紅黃之色亦有
一二杯許此是活濟治必終愈如拔出物色純是

敗血氣穢紫黑稀水而無膿意相粘者其人氣血
內收肌肉不活必是死瘡強治亦無功矣此法家
傳屢經有驗如陽瘡易潰易膿之症不必用此以
傷氣血此法陰瘡之用要在十五日前後堅硬不
潰不膿者行之最當此法的有回天之效醫家不
可缺也 正宗

湯醫大全

卷九 按膿法

七

顧氏秘書

論膿熱不宜開遲

薛立齋曰凡瘡瘍有膿之際乃肉腐而為膿是毒氣
侵蝕而潰也若不速去之恐毒氣蓄而侵潰好肉
如肘膝樞紐關節之所筋骨壞廢疾成也有等畏
針之徒多致不救或密針之或以賽針散印透出
膿極妙

汪省之曰夫癰疽瘡癤皆由氣血壅滯而生當推虛
實表裡而早治之可以內消此內消之法宜早治
也若毒氣已結者勿泥內消之法當辨膿之有無

湯醫大全

卷九 辨膿熱

八

顧氏秘書

深淺急宜酌量刺之緩而不刺毒則內攻穿通臟
腑腐爛筋骨可不慎哉若脈緊數為膿未成緊去
但數為膿已成以手按之熱者有膿不熱無膿按
之牢硬未有膿按之半軟半硬已有膿大軟方是
膿成若大按之痛者膿深按之不甚痛者膿未成
按之即復痛者為有膿不復痛者無膿薄皮剝起
者膿淺皮色不變不高阜者膿深淺者宜砭深者
宜針手足指稍及乳上必候膿大軟方可開放若
夫麻痘之後餘毒未盡肢節有癢痛覺有膿便用

火破遲則成癰曲之疾矣 理例

傷醫大全

卷九

辨膿熱

九

論內托法

汗省之曰凡癰疽或已成氣血虛者邪氣深者邪氣散漫不能突起亦難潰膿或破後膿少或膿清稀或堅硬不軟或雖得膿而根脚紅腫開大皆氣血虛邪氣盛兼以六淫之邪變生諸症必用內托令其毒熱出於肌表則易愈也內托以補藥為主活血驅邪之藥為臣或以芳香之藥行其鬱滯或以溫熱之藥禦其風寒 理例

周文采曰夫托者起也上也癰毒之法外之內者邪毒醫大全 卷九 內托法 十 顧氏秘書

必攻內自然之理當用托裡湯液加升麻銀花使榮衛通行血脉調和瘡毒消散故云瘡家無一日不托裡也 啟玄

王肯堂曰癰疽已成大抵托裏消毒散托裏散小托裏散十宣散皆為要藥但用隨時加減耳如冬月並氣滯之人五香連翹湯虛弱人去大黃素不宜寒藥者小五香湯形脈膿色稠不可用補藥者忍冬丸之類大膿出敗肉去紅腫消當用人參黃芪當歸白朮大劑補之令氣血滋茂新肉易生也 準

薛新甫口有隨證加減用藥例以托裡消毒為主誠
內托之良法

湯醫大全

卷九 內托法

十一 顧氏秘書

癰疽已成門主方

七味活命飲 梅秘

一切癰疽氣血虛憊白塌下陷立可紅活

生黃耆 川芎 各三錢 金銀花

蒲公英 各一兩 當歸 八錢 穿山甲 炙

皂角針 各一錢 五分

作一劑水三觔砂鍋內煎一半熱服避風取汗

靜臥自潰

透膿散 正宗

湯醫大全

卷九 已成方

十二 顧氏秘書

潰頂排膿捷法

金銀花 當歸 各五錢 生黃耆 四錢

白芷 牛蒡子 川芎

穿山甲 皂針 各一錢

酒水全煎服瘡上宜覆煖

瓜蒌托裏湯 正宗

跌撲傷損腫痛積久欲潰或氣血鬱結痰停血

壅致成瘡瘍未成即消已成自潰生肌解毒

瓜蒌 一個 金銀花 一兩 蘇木 五錢

乳香去油 甘草節 沒藥去油

作一劑酒煎分三服一日服盡揄焙為末酒糊

丸彈子大當歸酒化下

開陽三建湯正宗

陰疽發背初起不痛不腫不熱不紅硬若牛皮

堅如頑石十日外脉細身涼肢體倦怠皮如鱗

甲色似土殊粟頂多生孔孔流血根脚平散軟

陷無膿又皮不作腐手熱足涼者俱急服之

人參 熟附子 川芎

瘍醫大全 卷九 已成方 顧氏秘書

白茯苓 當歸 枸杞子

陳皮 山萸肉 黃耆各一錢

廣木香 紫草 茅蒼朮

獨活 鮮紅花 厚樸

炙甘草各五分

煨薑三片皂角樹根上白皮二錢水二碗煎八

分入酒一杯隨病上下食前後服之川綿帛蓋

煖瘡上預先不得大開瘡孔走泄元氣為要

澄按背脊屬陰者皆山臟腑先壞而內毒不得

散寒救陰至聖丹 岐天師

生黃耆 人參 金銀花各三兩

當歸一兩 白芥子二錢 附子三錢

水煎服二劑即愈不須多服

牛膠飲

截險處癰疽惡瘡使毒不攻於內不傳惡證

上好牛皮膠四兩用酒一碗納膠重湯燉攪勻傾

出更浸酒隨意飲盡出汗若善飲者以醉為度此

法活人甚多

瘍醫大全 卷九 已成方 顧氏秘書

遠志酒 韓大夫家此方救人極衆

一切癰疽發背惡毒有死血陰毒在中則不痛

用之內服外敷則痛有憂怒等氣積而內攻則

痛不可近用之內服外敷則不痛或蘊熱在內

壯熱手不可近用之內服外敷即清涼或氣虛

血冷潰而不斂七情內鬱不問虛實並效

遠志 米泔浸洗去心

磨細密貯每月酒一盞調藥三錢連頂澄清飲

內托榮衛湯

黃耆 五錢 防風 連翹

柴胡 紅花 各二錢 羌活

甘草 人參 黃芩

蒼朮 各一錢 當歸 一錢五分 桂枝 八分

右剉分二服酒水各二盞煎八分溫服

二仙散 黃賓江

發背癰疽未成已成已潰未潰痛不可忍者

白芷 未潰用一兩 已潰用五錢 貝母 未潰用五錢 已潰用一兩

癰疽大全 卷九 已成方 五 顧氏秘書

作一劑水酒全煎服

琥珀蠟礬丸 正宗

癰疽已成未潰之際恐毒氣不能外出必致內

攻預服此丸護心護膜散血解毒

生明礬 一兩二錢 雄黃 硃砂 各一錢

琥珀 一錢全燈草 另研極細

研細用黃蠟一兩蜂蜜二錢銅杓內熔化離火

片時候蠟四邊稍凝時方入上藥攪勻共成一

塊用人將藥火上微烘衆手急丸小寒豆大以

硃砂為衣磁罐收時每服二三十丸白湯送下

送下病甚者早晚日進二次其功最效

有用黃蠟二兩明礬一兩為丸亦名蠟礬丸

如制子大每服五七丸食前酒下未破即消

已破即合有種遍身生瘡狀如蛇頭服之立效

毒定痛 秘授蠟礬丸 淮安楊秘

有定痛生肌化膿厚膜解毒去穢之功

黃蠟 白礬 各一錢 槐花 一條

銀硃 一錢 蛇蛻 一條 陰陽瓦 焙研

癰疽大全 卷九 已成方 六 顧氏秘書

先將蠟熔化入蜂蜜少許再下生礬蛇蛻銀硃

未攪勻將銅杓放滾水內急手丸如桐子大如

遇患者先令洗浴飲熱酒數杯初服二十一丸

儘量飲醉被蓋取汗初起即消已成疼痛不可

忍者服之可止一半已潰服之必出稠厚黃膿

看人虛實與服頭一日服二十一丸第二日只

服十九丸逐日遞減兩丸服至一九為止奇效

如神

透膿散

諸癰疽瘡及貼骨癰不破者不必用刀針以此

服之不移時其膿自透屢驗

蛾口繭子壹枚
燒存性研末

酒調服只用一枚不可多用如誤用二三枚即

出兩三個頭慎之

透膿法

黃蠟熔化乘熱熬如大麥樣兩頭俱要尖用酒或

白湯吞服一粒其頭自破

至驗金針散敬立

癩醫大全

卷九 已成方

七 顏氏秘書

治癰疽瘡腫已破未破用之直達潰所

春月取皂角針不拘多少半青半黑的灰火內炮

乾為末看瘡上下分食前後服之每服二三錢好

酒調服取汗為度 如瘡在頭頂者用樹稍上的

如背癰取樹身上向陽處的如便毒懸癰取樹杆

內的此取象之義即有所歸附焉

護心丹正宗

患井疽宜多用他證亦宜

菘苳粉二兩 乳香去油一 炙甘草五錢

辰砂水飛二錢

乳細白湯調服三錢

蔣示吉照本方加遠志肉甘草水炮炒為末一兩五錢亦名護心丹

護心丹李嗣立

凡癰疽三日內宜速進十服方免變證能使毒

氣外出稍遲內攻漸生嘔吐或鼻生瘡齒不食

則危矣五日後亦宜用

菘苳粉一兩 乳香去油燈心灰全研五錢

用生甘草濃煎湯調下一錢時時呷之若毒氣

癩醫大全

卷九 已成方

六 顏氏秘書

衝心有嘔吐之證大宜服此

澄按菘苳粉下氣消腫解毒乳香消諸癰腫毒服至一兩則香微瘡孔中直聖藥也

論補法

周文采曰經云虛者補之凡癰疽已成不分部位但

根脚散漫頂不高尖氣虛補氣血虛補血加銀花

甘草節白芷桂心等藥使頂自高尖根窠收束易

潰易膿如已潰之後膿血出多則當峻補氣血庶

易於收口也

論桑木灸法

陳實功曰凡瘡破已久膿血多出氣血衰敗不能得愈者十常八九又因色慾令瘡腐而多生反肉存而不長新肉以敗肉滑而時出清水亦有不得其治法雖數歲不能愈者內宜服補中益氣加托毒藥外以藥水洗淨而桑條晒乾一頭燒着火滅焰以火在於瘡口稍遠灸之勿令痛亦不可太遠遠則無益灸令熱而微癢為妙日灸數次亦不為多灸後少刻以長肉生肌膏貼方能取效神速也

正宗

瘍醫大全

卷九

桑木灸法

三

顧氏秘書

論神妙拔根法

陳實功曰凡腦疽發背陰症初起不腫高不焮熱灸不疼其病將來難治必致壞人十日以前用拔針當頂插入知痛處方止隨用蟾酥條插至孔底每日二條膏蓋三日後加添插藥其根高腫作疼外用神燈照法助陰為陽插照七日其瘡裂縫流膿至十三日其根自脫如日多根深蒂固不能脫者披針取之內用玉紅膏不脫者自脫不斂者自斂此法百人百活再無不愈者哉

正宗

瘍醫大全

卷九

拔根法

三

顧氏秘書

論瘡瘍去腐肉法

薛立齋曰夫瘡瘍之症膿成者當辨其生熟淺深肉死者當驗其腐潰連脫丹溪云癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣為主使根本堅固而行經活血佐之令其內消余常治脉症虛弱者用托裏之藥則氣血壯而肉不死脉證實熱者用清熱之劑則毒氣退而肉自生凡瘡聚於筋骨之間肌肉之內因氣血虛弱用十全大補湯壯其脾胃則未成自散已成自潰又何死肉之有若不大痛或木痛或不赤或內膿不潰或外肉不腐乃氣血虛弱宜用桑枝灸及十全大補加薑桂壯其陽氣則四畔即消瘡頭即腐其毒自解又何待於針割若脾胃虛弱飲食少思用六君倍加白朮壯其榮氣則肌肉受毒者自活已死者自潰已潰者自斂若初起或因尅伐或犯房事以致色黯而不痛者乃陽氣脫陷變為陰症急用參附湯溫補回湯亦有可生寶漢卿曰凡取腐肉先用猪蹄湯洗淨以去其垢方見新舊之肉看其果腐爛者用鉤摘定輕手徐徐

瘍醫大全

卷九 去腐法

顧氏秘書

治眼

忍臭氣割之切不可悞傷新肉以致鮮血淋漓切勿急驟多加工夫割取畢上靈藥外用膏貼明日如有未盡之腐仍照法去之 全書

症兼治漏睛瘻

煇甘石 三棟 梔白者 用 胆 煉 不 益 湯 煨 石 以 煇

甘石 蘇 左 慶 石 極 細

官 翳 二 分 珍珠 一 分 琥珀 半 分 熊 胆 半

升 序 半 用 煎 藥 汁 和 為 膏 搽 管 內

瘍醫大全

卷九 去腐法

顧氏秘書

論死肉當去

申斗垣曰凡癰疽杖毒及楊梅結毒癰瘡便毒疔瘡等內多有死肉停蝕好肉苦痛難禁若不早去愈加腐爛正謂之惡如狼虎毒似蛇蝎有傷性命恐致不救當視其緩急死肉大小或以針刀割去緩以腐肉錠子或末藥膏藥貼之以平為期後上生肌長肉等藥上之內服大補湯丸等劑而愈世多庸俗只知敷貼長肉生肌等藥為神殊不知有死肉為害反加腐爛是也如去不淨亦不能得愈宜

湯醫大全

卷九

去死肉

語

顧氏秘書

熟玩之 啟玄

論湯洗法

程山齡曰煎好猪蹄湯絹片搥去渣俟湯氣溫再用方盤盛湯安放瘡下隨以軟絹淋湯瘡上並入孔內輕手捺盡內膿庶敗腐宿膿隨湯而下以淨為度再以軟帛疊成七八重勿令太乾帶湯覆于瘡上以手輕盈旋按片時帛冷再換如此洗六七次自然痛減毒消洗時避風及人口氣 十法
馮魯瞻曰夫癰疽已潰日用猪蹄湯淋洗將愈之際三日一次 錦囊

湯醫大全

卷九

湯洗法

語

顧氏秘書

王肯堂曰潰瘍宜洗若非行補接之藥以實其內竊恐淋洗有一時之快少頃恐病體自覺疲憊愈有不耐煩之意非虛而何可不先議補接乎 準繩

又曰洗漏瘡當用乾艾作湯投白礬末二三錢洗瘡口蓋人血氣冷必假艾力以助陽而艾性亦能殺 重也 此瘡漏不可遽令結 毒實重所為之旨

陳良甫曰若癰久不合其肉白而膿少者此氣血俱虛不能潮運而瘡口冷澁也每日用艾葉一把煎湯避風熱洗及燒松香烟薰之或用猪蹄湯洗之

更以神異膏貼之必須守禁調理否則不效

唐元祐曰凡背瘡腐肉不去不用刀割用降香煎湯
不可用手洗將湯入酒壺內淋於瘡上以新羊毛
筆掃之拭乾再用巴豆炒黑搗成膏搽數次腐肉
自去新肉自生

瘍醫大全

卷九 湯洗法

羊 顧氏秘書

癰疽湯洗門主方

豬蹄湯 正宗

治癰疽已潰流膿時用此湯洗消毒氣去惡肉
開死肌潤瘡口又能散風消腫腐盡則已

羌活 當歸 赤芍

黃芩 白芷 甘草

露蜂房 各等分 豬前蹄 一隻

右為粗末看瘡疽大小用藥多少先將豬蹄用
白水六碗煮蹄軟為度將汁濾清吹去汁上油

瘍醫大全

卷九 湯洗方

羊 顧氏秘書

花用藥一兩投於汁中再用微火煎十數沸密
絹濾去藥渣候湯半熱將軟絹蘸湯淋於瘡上
輕手挹去瘀膿腐肉其惡物隨湯而下洗訖以
絹帛挹乾按法如式次第用藥

防風湯 十法

防風 白芷 甘草

赤芍 川芎 當歸尾 各二錢

連鬚葱 去尾 五根

先將雄豬前蹄煨十數沸吹去浮油濾取三大

碗入藥煎熟以絹片蘸湯淋洗其深曲處以新羊毛筆洗之軟絹拭乾再上丹藥

洗方 十法

當歸

狗活

白芷

甘草 各二錢

葱頭 五個

水三碗煎至藥爛濾清以絹帛蘸湯挹淨瘡上隨搽貼紅黑二膏洗時切忌風寒為要如背瘡輕淺易治者以此代猪蹄湯其功亦效

洗方

瘍醫大全

卷九

湯洗方

五

顧氏秘書

陳冬瓜穰子煎洗

洗藥神硝散 集驗

專治癰疽潰爛臭穢

蛇床子

二兩 研 樸 硝 一兩

和勻每用三錢水一盃煎二五沸通手洗之

瘡道潰爛門主方

參芪內托散 丹溪

金銀花 五錢

黃芪

酒炒三錢

遠志肉

甘草湯

炙甘草

各一錢

牡丹皮

一錢

川芎

陳皮

各五分

當歸

二錢

人參

聽用

大棗五枚水煎服 丹溪曰癰疽未潰以踈托解毒為主已潰以托補元氣為主此二語可為外科樞要

四君子湯

瘍醫大全

卷九

潰瘍方

五

顧氏秘書

治一切陽虛氣弱脾衰肺損面色枯白飲食少

思四肢無力體瘦面黃皮聚毛落脉來細軟

人參

白朮

土炒

白茯苓

各二錢

甘草

炙一錢

姜棗水煎服

脾者萬物之母也肺者氣之母也脾胃一虛肺氣先絕脾不健運故飲食減少則營衛無所資養脾主肌肉故體瘦面黃肺主皮毛故皮聚毛落脾肺皆虛故脉來細軟也是方以人參補五臟之元氣白朮補五臟之母氣茯苓致五臟之清氣甘草調五臟之乖氣四藥皆甘溫甘溫中之味溫得中之氣猶之不偏不倚之君子也展布德澤以行春之令經曰氣主煦之

四物湯

治一切血虛日晡發熱

生地黃

當歸

酒炒各三錢

白芍藥

二錢

川芎 一錢五分

水煎服

經曰血主濡之四物皆濡潤之品故為血分主藥地黃甘寒入心腎以沃血之源當歸辛溫入心脾而壯主血攝血之本芍藥酸寒入肝家而斂疎泄之血海川芎陰中之陽可上可下通足三陰而行血中之氣然吳氏曰失血太多者禁勿與之四物皆陰陰者天地閉塞之令非所以生萬物者也

傷醫大全

卷九 瀉湯方

辛

顧氏秘書

本方加牡丹皮山藥白茯苓麥門冬玉竹退虛熱至效

八珍湯

治氣血俱虛惡寒發熱煩燥作渴大便不實飲食不進小腹脹痛眩暈昏憤等證

人參

白茯苓

白朮

生地黃

川芎

白芍藥

當歸

炙甘草

姜棗水煎服

氣為衛屬陽營為血屬陰此人身中之兩儀也純用四物則獨陰不長純用四君子則孤陽不

生二方合用則氣血有調和之益而陰陽無偏勝之虞矣經曰氣血正平長有天命

十全大補湯

人參

白朮

土炒

黃芪

炙

熟生地

酒炒各二錢

白芍藥

炙甘草

川芎

各入分

當歸

一錢五分

肉桂

去皮五分

白茯苓

一錢

水煎服

丹溪曰實火可瀉芩連之屬虛火可補參芪之屬此二根本受傷虛火游行泄越於外若誤攻其熱變成危證多致難救此方以四物補血四君子補氣又加黃芪助陽固表肉桂導火歸原

湯醫大全

卷九 瀉湯方

辛

顧氏秘書

薛立齋曰飲食勞倦五臟虧損一切熱證皆是无根虛火但服此湯固其根本諸證悉退金匱曰虛者十補勿一瀉之此方是也此方乃扶危定傾之大藥為收功保命之金丹

六君子湯 治氣虛脾弱食少痰多

人參

白茯苓

白朮

土炒

廣陳皮

半

夏

製熟各二錢

炙甘草

一錢

姜棗水煎服

牛夏燥痰治痰之本陳皮利氣泄痰之標標本既得攻補互行補而不滯攻而不峻故曰六君子經曰壯者氣行則愈怯者着而為病六君子者壯其氣矣氣壯則升降自如清以奉上潤以

歸下尚有何物可停為滯耶本方加藿香砂仁
名香砂六君子湯其用稍峻矣

理脾化痰溫胃進食止嘔

人參 白朮 白茯苓

製半夏 廣陳皮 藿香

砂仁 炙甘草

姜棗水煎服

藿香正氣湯

散風寒消飲食止嘔吐定瀉痢

湯醫大全 卷九 瀉痢方 韋 顧氏秘書

白朮 陳皮 半夏

桔梗 砂仁 藿香

蘼葉 白芷 甘草

白茯苓 厚樸

姜水煎服

六味地黃丸

治腎經不足發熱作渴小便淋秘氣壅痰嗽頭

目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不固腰膝痠

軟自汗盜汗諸血失音水泛為痰血虛煩躁下

部瘡瘍足跟作痛等證

熟地黃 八兩 酒洗 山茱萸 酒洗 去核 乾山藥 炒 黃各

牡丹皮 酒洗 白茯苓 人乳製 澤 瀉 淡鹽酒拌

為末蜜丸如桐子大空心淡鹽湯下四錢

按腎惡燥脾惡濕補陰藥中多是濕藥只腎虛
而脾胃壯實者宜若脾胃兩虛則不可也惟此
六味丸入味九及入物腎氣丸專補腎虛兼理
脾胃不濕不燥於脾胃兩虛者甚得其宜矣
腎者水臟也水衰則龍雷之火無畏而亢上故
壯水之主以制陽光地黃味厚為陰中之陰補
腎填精以為君山茱萸味酸歸肝乙癸同治之義
且腎主閉藏而酸飲之性與之宜也山藥味甘
歸脾安水之仇故用為臣丹皮亦入肝其用主
宣通所以佐萊黃之流也茯苓亦入脾其用主

湯醫大全 卷九 瀉痢方 韋 顧氏秘書

通利所以佐山藥之滯也且色白屬金能培肺
部又有虛則補母之義至於澤瀉有三功焉一
曰利小便以清相火二曰行地黃之滯引諸藥
速達腎經三日有補有瀉無喜攻增氣之虞故
用為使此方為益腎之聖藥而味者薄其功緩
益用藥者有四失也一則地黃非懷慶則力淺
一則地黃非九蒸則不熟一則疑地黃之滯而
減之則君主弱一則惡澤瀉之滲而減之則使
者微弱是四失焉
望其藥之有功于

本方加黃柏知母各二兩名知柏八味丸治陰

虛火動骨痿髓枯王冰所謂壯水之主以制陽

光也尺脉旺者宜之

本方加五味子三兩名都氣丸治勞嗽

本方加五味子二兩麥門冬三兩名入仙長壽

丸再加紫河車一具並治虛損勞熱

本方加杜仲牛膝各二兩治腎虛腰膝酸痛

本方去澤瀉加益智仁三兩治小便頻數

七味地黃丸

治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡牙

齟潰爛咽喉作痛或形體憔悴寢汗發熱

即六味丸加 肉桂一兩臨用去皮

腎水不足虛陽僭上必用此方以引火歸原夫

湯醫大全

卷九

遺瘍方

毒

顧氏秘書

從其性而伏之肉桂性熱與火同性雜在下焦
壯木藥中能引無根虛火降而歸經且肉桂之
質在中半以下其性專走腎經本乎地者親下
之義况相火寄於甲乙之間肝木旺則風
動而烈火相明古人謂北方不可瀉瀉肝即所
以瀉腎本草曰木得桂而枯取其義也經曰熱
因熱用此之謂也或者畏其熱而遺之豈達造
化升降之微乎黃和知母治相火僅可施於壯
實若虛火而誤用之則腎因瀉而愈虛愈虛而
火愈熾矣

八味地黃丸

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少

思大便不實臍腹疼痛夜多漩溺或陰盛格陽

內直寒而外假熱等證

即七味丸加 熟附子一兩切片

腎有兩枚皆屬於水雖有左右之分初無水火
之別考之內經昭然可覽仙經曰兩個一般無
二樣中間一點是命門相火也命門乃穴名而
夫真精者明也即命門相火也命門乃穴名而
其穴在兩腎中間蓋一陽生於二陰之間所以
成乎坎而象天之北也經曰少火生氣人無此
火生化之源幾乎息矣非附子健悍不足以嘯
既稿之陽春王太僕曰益火之原以消陰翳此
方是也
馮魯瞻曰按脾胃虛寒之至者丹皮澤瀉甚非
所宜戒此二味加牛膝杜仲鹿茸五味子更佳
又曰六味地黃丸專補左尺腎水入味丸既補
左尺腎水兼補右腎相火少年水虧火旺宜服
六味丸老年水火俱虧宜服八味丸老年腎
臟虛水既虛邪水乘之而為濕熱以作腰痛足
痿痰唾消渴小便不禁淋閉等證非桂附之温
散而能治之乎味者畏其熱殊不知所補之火
乃直陽之元也直陽之元一得陰翳之火潛消
矣

湯醫大全

卷九

遺瘍方

毒

顧氏秘書

金匱腎氣丸

治脾腎大虛腰重脚重小便不利肚腹腫脹四

肢浮腫喘急痰盛已成蠱證其效如神

熟地黃 四兩

白茯苓 三兩

山茱萸 去核

乾山藥 炒

川牛膝 酒炒

車前子 微焙

牡丹皮 酒洗炒

澤瀉 炒

肉桂 去皮各

熟附子 五錢

為末蜜丸桐子大空心白湯下

土為萬物之母木為萬物之源身中所最重者也若脾虛則土不能制水腎虛則水不能安位故逆行而泛溢於皮膚妄加攻逐禍不旋踵八味丸脾腎要藥佐以車前泄太陰之水佐以牛膝開少陰之竅則小便行而脹自已且有益於重元也

八物腎氣丸

平補腎氣堅齒駐顏

熟地 八兩 山茱萸 山藥 各四兩

牡丹皮 澤瀉 白茯苓 各三兩

肉桂 去皮 五味子 各一兩

湯醫大全 卷九 遺瘍方 美 顧氏秘書

為末蜜丸每用六七十丸空心白湯下

逍遙散

治血虛煩熱肢體疼痛口乾盜汗嗜臥月水不

調寒熱如癰痰嗽骨蒸

白茯苓 白朮 土炒 當歸

白芍 酒炒 柴胡 各一錢 甘草 五分

薄荷 八分

煨姜煎服

本方加山梔牡丹皮名加味道遙散

肝虛則血病歸芍養血而飲陰木盛則土衰木草和而補土柴胡升陽散熱合芍藥以平肝使木得條達茯苓清熱利濕令心氣安寧煨姜煨胃祛痰能調中解鬱薄荷搜肝瀉肺理血消風諸證自已所以有逍遙之名

補中益氣湯

人參 白朮 炙黃芪

炙甘草 廣陳皮 升麻

柴胡 當歸身

姜棗引

歸脾湯

湯醫大全 卷九 遺瘍方 菲 顧氏秘書

治思慮傷脾不能攝血健忘怔忡驚悸不寐心

脾作痛嗜臥少食大便不調身痛盜汗月經不

調

人參 白朮 土炒 白茯苓

龍眼肉 去核 酸棗仁 炒各二錢 遠志 去骨

當歸身 各一錢 木香 生用 炙甘草 各五分

炙黃芪 一錢五分

薑水煎服

心藏神而生血脾藏意而統血思慮太過則兩臟受傷而血不歸經心血不足則健忘怔忡驚

博不寐脾血不足則嗜臥少食體倦或虛不能
統血送致妄行甚則氣鬱而心脾作痛在女人
則帶下而月經不調茲取參苓芪朮炙甘草溫
可以補脾龍眼棗仁歸身遠志濡潤可以養心
佐以木香者蓋思慮所傷三焦氣阻藉其宣暢
調氣舒脾則氣和而血和且平肝可以實脾而
血之散於外者悉歸中州而聽太陰所攝矣故
命之曰歸脾湯

理中湯

臟腑中寒四肢強直

人參

炮乾姜

炙甘草

白朮

各等分水煎服

傷醫大全

卷九

遺瘍方

三

顧氏秘書

附子理中湯

治脾胃虛寒飲食不化或手足厥冷腸鳴切痛

或痰氣不利口舌生瘡或嘔吐泄瀉等證

即人參理中湯加 熟附子

人有元陽命口真火此火一衰則不能生土而
資生之本大虛今以附子過少火乾姜燥中而
而參朮甘草為之補氣氣旺則火足而脾土自
能健運經日氣主煦之又曰寒淫所勝平以辛
熱即補火之謂也夫心上腎下肝左肺右而脾
獨於中氣虛四臟不能相生得稟矣故理中
之則萬物之母安而四臟皆得稟矣故理中
湯去參朮即名四逆湯為四臟者故也

生麻散

生津止渴治熱傷元氣氣短倦怠口乾出汗

人參一錢

麥門冬二錢

五味子八分

水煎服

火氣赫曦則金為所制而絕寒水生之源故
氣短倦怠出汗者皆手太陰本症也人參補氣
為君所謂損其肺者益其氣也五味子酸飲能
收肺家耗散之金麥門冬甘寒濡肺金燥枯之
液三者皆扶其不勝使火邪不能為害也司天
屬火之年時令燥熱之際尤為要藥

參苓白朮散

健脾養胃

人參

去蘆 廣陳皮

砂仁

各一兩

傷醫大全

卷九

遺瘍方

三

顧氏秘書

白茯苓

蒸二兩

白朮

土炒四兩

扁豆

山藥

薏苡仁

蓮子肉

各三兩

神麩

炙甘草

各五錢

磨細每服三錢白湯調服

乳香黃芪湯

治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍者或未成
者速散已成者速潰敗腐膿毒不假刀砭其惡
肉自然脫下並治跌打損傷筋骨疼痛

人參

白芍

沒藥

去油

當歸 乳香去油 黃芪

熟地 鴛粟殼蜜炙去筋 甘草

川芎 陳皮

白水煎單病上下分前後服

托裏定痛散

潰後血虛疼痛不可忍者

熟地 當歸 白芍

乳香去油 沒藥去油 鴛粟殼蜜炙去筋

川芎 肉桂

卷九 潰瘍方 顧氏秘書

白水煎

托裏內補散 馮氏

十全大補湯加金銀花白芷防風 各等分

水煎服

人參養榮湯 正宗

潰瘍發熱惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面目痿

黃吸吸短氣飲食無味不能收斂或氣血原不

足不能收斂大瘡愈後宜多服之不變他證

即十全大補湯去川芎加陳皮遠志五味子

聖愈湯

潰瘍膿水出多氣血虛極脈細空而無力以致
心煩不安睡臥不寧或五心煩躁等證

即四物湯加人參黃芪

保元大成湯

潰瘍元氣素虛精神怯弱或膿水出多神無所
主以致睡臥昏倦六脈虛細手冷身涼便溏或
秘胸膈或寬不寬舌雖潤而少津口雖食而無
味瘡弦不緊肉色微紅總由不足大補堪題

保醫大全

卷九 潰瘍方 顧氏秘書

人參 白朮 白茯苓

當歸 白芍 黃芪

熟附子 山萸肉 砂仁

北五味 陳皮 廣木香

炙甘草

姜棗引食遠服服至精神回手足煖脾胃醒肉
色紅為度凡見此等證候乃真氣虛脫已欲變

壞之病非此不回也

獨參湯

潰後膿水出多氣血虛極或惡寒或發熱或自

汗冷汗或手足指甲青冷或身凉脉細

人參二兩切片

作一劑水二鍾棗十枚煎一鍾徐徐服之若煎

至稠厚即為膏矣作三次用溫酒化服亦可

清震湯正宗

潰瘍脾胃虛弱或誤殮生冷或氣惱勞役或入

房夢遺致火邪乘入中脘乃生呃逆宜急服之

人參 陳皮 半夏

傷醫大全 卷九 潰瘍方 顧氏秘書

炙甘草 益智仁 香附

柿蒂 熟附子 澤瀉

姜棗燈心引如手足不冷去附子不用如口乾

便燥火呃者去附子加川連五分

托裏黃芪湯

治氣虛作渴

嫩黃芪錢六 甘草 天花粉各一錢

水二鍾煎八分頻服加人參一錢尤妙

黃芪六一湯

當服此藥終身可免癰疽之疾治渴補虛

綿黃芪去蘆六兩一半生焙一半益水潤飯上蒸三次焙乾到細

粉甘草一兩一半生到一半炙黃

水煎服亦可或為細末每服二錢早晨日午以

白湯調服初服酒調亦妙

止痛當歸湯

治腦疽背疽穿潰疼痛

當歸 生地 白芍

人參 炙甘草 官桂各等分

傷醫大全 卷九 潰瘍方 顧氏秘書

黃芪

水煎服

此足陽明厥陰藥也當歸生地活血涼血人參

黃芪益氣補中官桂解毒化膿毒化成膿則痛

則自痛滅矣正宗

癰疽發背等證大膿後氣血大虛急宜用此

上好人參半觔切片用水五大碗砂鍋內慢火熬至三碗將渣再煎汁一碗共用密絹濾

清復熬稠厚磁罐收貯聽用

雲片白木六兩熬全上法

懷慶地黃 六兩熬全上法

以上三膏各熬完畢各用磁盞碗盛之頓入水中待冷取起蓋勿泄氣如患者精神短少懶於言動短氣自汗者以人參膏三匙白朮膏二匙地黃膏一匙俱用無灰好酒一杯頓熱化服如脾氣虛弱飲食減少或食不知味或已食不化者用白朮膏三匙人參膏二匙地黃膏一匙好熱酒化服如患者腰膝酸軟腿脚無力皮膚手足粗澁枯槁者用地黃膏三匙人參白朮膏各三匙化服如氣血脾胃相等無偏勝者三膏各二匙熱酒化服此膏用於清晨併臨睡時各進一次自然強健精神頓生氣血新肉易生瘡口易合任瘡危險勢大膿多者可保終無變症如夏炎天熱恐膏易變分作二次熬用亦好愈後能服鬚髮變黑返老還童以上諸方功難盡述

八仙糕 正宗

癰疽脾胃虛弱精神短少飲食無味食不作儀及平常無病久病但脾胃虛食少嘔泄者並妙

湯醫大全

卷九

黃湯方

醫

顧氏秘書

人參 白茯苓 山藥

芡實 蓮子肉 各六兩 糯米 三升

梗米 七升 白蜜 一觔 白糖霜 二勛半

右將人參等五味各為細末又將糯粳米亦為粉與上藥末和勻將白糖和蜜湯中頓化隨將粉藥乘熱和勻攤鋪籠內切成條糕蒸熟火上烘乾磁器密貯每日清早用白湯泡食數條或乾喫亦可但遇知覺饑時隨用數條甚便服至百日輕身耐老壯助元陽培養脾胃妙難盡述

湯醫大全

卷九

黃湯方

醫

顧氏秘書

八仙糕 鄭氏秘方

治脾胃腎泄並遠年休息痢神效

兔絲子 焙 魚 膠 切片乾 炒 山藥 炒

芡實 炒 白茯苓 建蓮肉 去心炒

薏苡仁 炒 白扁豆 炒 各四 穀 茅 炒 八

糯米 炒 黃十 和 餅 餅 三十六

共磨細末每早用開水入白糖少許調服一二

兩屢建奇功

胃愛丸 正宗

治潰瘍脾胃虛弱飲食諸味不喜屢用開胃進食之藥不效者此脾崩之象宜服此丸進食為

吉

清河人參 一兩

雲片白朮

鮮白者米泔浸去澁水切片晒乾全麥芽拌炒一兩

懷慶山藥

肥大上白者切片用男乳拌濕候潤透晒乾微焙一兩

上白茯苓

咀一兩一分厚片用砂仁二錢全茯苓合碗內飯上蒸熟只用茯苓

甘草

炙三錢

白荳蔻仁

三錢

湯醫大全

卷九

果

顧氏秘書

直廣陳皮

用陳者米先炒黃色方下陳皮全炒微燥勿焦六錢

建蓮子肉

去心去皮切片五錢

重小紫蘇

蜜拌透晒乾微蒸片時連梗葉切片五錢

右為細末用老米二合微焙研粉泡荷葉湯打

糊丸梧子大每服八十九清米湯不拘時服

紅鉛造化丹

正宗

治癰疽元氣不足軟陷不起發或已發復被風

寒內外所侵以致瘡毒下陷變為陰塌不痛者

急宜服此亦可轉陰為陽返出毒氣復腫為吉

人參

白茯苓

山藥

各一兩

辰砂

寒食麵

各七錢五分

紅鉛

另有取法

枯礬

甘草

炙五錢

冰片

六分

麝香

入分

乳粉

二錢用頭生男乳每盤內用一小鍾晒乾刮取收之

右各研精細方為一處共研極細用白蜜二兩

頭生男乳一大杯慢火重湯內用磁碗頓蜜滴

水不散為度候稍溫加入前藥軟硬得宜丸如

龍眼核大金箔為衣磁確收貯或以蠟固亦妙

每用一丸好熱酒一杯化藥食遠服之用厚綿

湯醫大全

卷九

潰瘍方

果

顧氏秘書

帛覆煖患上其熱如蒸瘡必復起作痛乃此丹

之效也諸證嘔吐怔忡瀉痢屢藥不瘥異證前

效大率心經之病石菖蒲肝經之病遠志肉脾

經之病生姜肺經之病麥門冬腎經之病五味

子各隨五經之症用引煎湯化服其應如嚮修

合時務要端午天醫黃道日為佳製藥時忌婦

人鷄犬生人異物預期齋戒誠心多靈

取紅鉛法

女子十四歲而天癸至此陰中之真陽氣血之元氣過此將行時兩腮先若桃花之狀湯獻陰藏其經只在半月之裏必來預用白綿細一尺

五寸洗淨時常用棉帶一條束臍下細兩尖
頭前後繫帶上中間常帶一陰器小便時解一顆
便器即繫之經至盡染細上取初至紅鉛一顆
大如魚眼紅色明亮如珠此為接命至寶隨與
好酒一杯和服一時後如醉不醒只以人乳飲
之一日後自能已後能絕房事者延壽一紀餘
經換細兜取陰乾浸上白童便內片時其經自
然脫下取置磁盤內陰乾聽用如不昇煉者謂
之全紅鉛亦可補益虛勞接續命脈如次經已
後但未破身者俱可取聚陰乾磁蓋昇煉色如
紫霜一般合入三元丹內人乳服之接命長年
却除百病此方神秘不宜輕洩故不可傳但取
紅鉛之女生平愛惜飽煖適時無拘束者為上

人參黃耆湯

治潰瘍虛熱不睡少食或穢氣所觸作痛

湯醫大全

卷九

黃耆湯

人參

白木 主炒

黃耆 蜜炙

人參

白木

主炒

當歸身

蒼朮 炒

麥門冬

升麻

五味子 炒

神麴

廣陳皮

甘草 各五分

黃耆

栝 酒拌炒 三分

薑棗引煎服

內補黃耆湯

治癰疽發背潰後虛弱無力體倦懶言精神短
少飲食無味自汗口乾脉滑不睡

人參

白茯苓

黃耆

蜜炙

當歸身

肉桂

遠志肉 炒

川芎

麥門冬

熟地

白芍藥

各一錢

甘草

五分

薑棗引煎食遠服

托裏清中湯

癰疽脾胃虛弱咳嗽痰氣不清飲食少思

人參

白茯苓

白木

半夏

陳皮

桔梗

各一錢

麥門冬

五味子

甘草

各五分

湯醫大全

卷九

黃耆湯

人參

白木 主炒

薑棗引煎食遠服

托裏和中湯

癰疽中氣虛弱飲食少思腫不消潰不斂

人參

白茯苓

白木

陳皮

半夏

炮薑

各一錢

廣木香

甘草

各五分

薑棗引煎食遠服

托裏建中湯

癰疽元氣素虛或因寒涼損傷脾胃飲食少思

凡除無味或作嘔泄瀉急服以健中氣

人參 白朮 白茯苓 各二錢

半夏 炮 薑 各一錢 甘草 五分

熟附子 八分

煨薑三片棗二枚煎不拘時服

托裏溫中湯

癰疽陽弱陰寒脉虛身冷或瘡為寒變反致不
疼或膿水清稀心下痞滿腸鳴腹痛大便微溏
食則氣短嘔逆不得安臥時發昏憤

湯醫大全

卷九 潰瘍方

辛 顧氏秘書

白朮 廣木香 丁香 各五分

人參 益智仁 乾薑 炮

半夏 陳皮 羌活

白蔻仁 甘草 各一錢 熟附子 二錢

白茯苓

薑棗引煎不拘時服 此方與舊不同予製此
嘗治癰疽陰症及雜症陽氣脫陷與寒氣逼陽
於外者發熱煩躁口乾作渴投以薑附之類其
津液頓生煩熱頓退其應如響

醒脾益胃湯

潰瘍脾胃虛弱過傷飲食生冷以致胸膈不寬
四肢面目浮腫及小水不利

人參 白茯苓 白朮

山藥 廣皮 半夏

老黃米 炒 各一錢 蒼朮 厚樸

澤瀉 廣木香 麥芽

蘇子 猪苓 山查 各五分

薑三片燈心二十根煎食前服

湯醫大全

卷九 潰瘍方

辛 顧氏秘書

神應異功散

潰瘍陰盛陽虛發熱作渴手足並冷脉虛無力
大便自利至飲沸湯而不知其熱者必服之

人參 白朮 陳皮

白茯苓 當歸 廣木香

官桂 各一錢 半夏 丁香

肉豆蔻 厚樸 熟附子 各五分

薑棗引煎服

二神丸

癰疽脾胃虛弱飲食不消大便澹泄並治尋常

腎虛脾泄俱效

破故紙四兩微炒香色 肉 菓肥大者二兩生用

用大棗四十九枚老薑四兩切片水浸棗薑煮

至水乾為度取棗肉為丸桐子大每服七十九

清米湯空心送下

四神丸

脾胃虛寒大便不實飲食不思

肉 菓 麩包煨 五味子 各二兩 補骨脂 四兩

湯醫大全 卷九 潰瘍方 聖 顧氏秘書

吳茱萸 水浸炒 一兩

為末生薑八兩紅棗一百枚煮熟取棗肉去皮

和丸桐子大每服四錢空心米飲下

論生肌法

注省之曰夫肌肉脾之所主也潰後收斂遲速者乃氣血盛衰使然世人但知生肌用龍竭止痛用乳沒子謂不然生肌之法當先理脾胃助氣血為主則生肌自生豈假龍竭之屬設若膿未盡就生肌反生潰爛壯者輕者不過復潰或遲斂而已怯者重者必致內攻或潰爛不斂者多矣至於止痛之法熱者清之寒者溫之實者瀉之虛者補之膿鬱不出者開之惡肉侵蝕者去之如是則痛自止

湯醫大全 卷九 生肌法 聖 顧氏秘書

豈在乳沒然後痛止乎 理例

薛立齋曰夫肌肉者脾胃之所主收斂者氣血之所使但當純補脾胃不宜泛敷生肌之劑夫瘡不生肌而色赤甚者血熱也四物加山梔連翹色白而無神者氣虛也四君加歸芪補熱內熱陰血虛也四物加參朮膿水稀者氣血虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴飲食如雀腎火也竹葉黃芪湯不應竹葉石膏湯熱渴而小便頻數腎水虛也用加減八味丸料煎服若敗

血去後新肉微赤四沿白膜者此胃中生氣也用
四君子湯以培補之則不日而斂若妄用生肌之
藥餘毒未盡而反益甚耳殊不知瘡瘍之作由胃
氣不調瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之斂由胃氣
榮養東垣曰胃乃生發之源爲人身之本丹溪亦
謂治瘡瘍當助胃壯氣使根本堅固誠哉是言也
可不慎歟 經驗全書

馮魯瞻曰凡肌肉傷而瘡口不斂者用六君子湯以

補脾胃爲主若氣虛惡寒而瘡口不斂者用補中

瘡醫大全

卷九

生肌法

語

顧氏秘書

益氣湯以補脾肺若血虛發熱而瘡口不斂者用

四物參芪以滋肝脾若膿多而瘡口不斂者用八

珍湯或十全大補湯以養血氣經曰脾主肌肉如

前藥未應但用四君歸芪以補脾胃若更不應乃

下元陽虛急用八味丸以壯火生土若脉數發渴

者難治此直氣虛而邪氣實也 錦囊

又口若敗肉去後新肉微赤四沿白膜者此胃中生

氣也但用四君子湯以培補之則不日而斂蓋瘡

瘍之作由胃氣不調瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍

之斂由胃氣榮養

瘡醫大全

卷九

生肌法

語

顧氏秘書

論收口法

程山齡曰凡癰疽最難收口者皆由瘀肉夾雜瘀膿不盡所致庸工不識妄用補瀉之劑勉強收口恐他日內毒復發更甚於日前惟將海浮散玉螺散敷上堪稱至寶瘀肉自脫不必用刀新肉自生又不藏毒萬舉萬當大法先用防風湯洗之或猪蹄湯若是痔瘡用無花果葉煎湯洗之再上末藥洗時須避風為主書云頻將湯洗切忌風吹是以更有體虛不能收口者須內服補藥以助之十法

湯醫大全

卷九 收口法

藥

顧氏秘書

李東垣曰若膿血未盡便用生肌斂瘡之劑務其早愈殊不知惡肉不盡其瘡早合後必再發不可不慎十書

馮魯瞻曰癰疽將斂宜用膏貼如毒未盡不可遽用生肌等劑錦囊

又曰癰疽將安宜補氣血肌肉易生若進寒涼便難長滿

癰疽門生肌丹散膏方

生肌散錦囊

生肌長肉神效

珍珠生研 大冰片各二分 象皮切方塊瓦

上白蠟各一錢 乳香各五分 瓜兒竭

沒藥各五分 鉛粉各五分 輕粉直掃盆者

兒茶三分

共乳極細先用猪蹄湯或濃茶洗淨用少許摻之

湯醫大全

卷九 生肌方

藥

顧氏秘書

生肌散

人參 西牛黃 珍珠

琥珀 熊膽 乳香去油

沒藥去油各二錢 蘆甘石煨 海標蛸

龍骨 石膏煨 輕粉各五分

杭粉二兩

共乳極細入冰片五分再乳干下磁瓶密貯每用少許收口如神

八寶丹

珍珠 市已入荳腐內煮一次時研細 如治癩

頂十手指尖十足指尖龜頭此二十二處

非圓滾珍珠合藥不能包裹還原若治癩

西牛黃 五分 象皮 切片 琥珀 燈心全

龍骨 煨 輕粉 各一錢 冰片 三分

蘆甘石 銀罐內煨紅研細

共乳極細磁瓶密貯每用少許生肌長肉收口

如神

神妙生肌散 龔敏中

乳香 去油 赤石脂 兒茶

海蝶蛸 血竭 鱉甲

黑鉛 各一錢 礪砂 生肌全

輕粉 三分 初起加黃柏一錢 作癢加白芷一錢

先將黑鉛加水銀一錢全煎化再將前藥研細

入於鉛汞內研極細摻之

生肌散

紅昇丹 一錢 血竭 海蝶蛸

象皮 煨焦 黃丹 輕粉 各三錢

赤石脂 兒茶 紫河車 各五錢

乳香 去油 沒藥 去油 各

瘡口紅熱加珍珠二錢

瘡口寒白加肉桂二錢

瘡口虛陷加入參二錢

共乳極細摻上膏貼

珍珠十寶膏

治癰疽大毒及刀傷斧砍咬傷杖瘡生肌定痛

百發百中

珍珠 一錢 荳蔻 輕粉

潮腦 四錢 乳香 去油 沒藥 去油 各

白蠟 八錢 琥珀 八分 冰片 三分

先將猪板油四兩入鍋熬化去渣再入白蠟化

盡離火入研細珠輕杭乳沒五末將凝始下琥

珀冰片潮腦和勻冷定收貯用時以淨手心搥

脚蹠放掌心溶化塗之再貼膏藥

生肌玉紅膏 正宗

專治癰疽發背諸般潰爛棒瘡用在已潰流膿

時先用甘草湯甚者用猪蹄湯藥湯淋洗患上

軟絹挹淨用抵脚挑管於手掌中捺化遍搽新

腐肉上外以太乙膏蓋之大瘡早晚洗換二次
內兼服大補脾胃煖藥其腐肉易脫新肉即生
瘡口自斂此乃外科收斂藥中之神藥也

白蠟 當歸身 各二兩 白芷 五錢

瓜兒竭 輕粉 各四錢 紫草 二錢

甘草 一兩二錢 直藤油 一觔

先將白芷甘草當歸紫草四味入油內浸三日

大杓內慢火熬藥微枯色若熬太枯其油則黑細絹濾清

將油復入杓內煎滾下整塊血竭化盡次下白

瘡膏大全 卷九 顧氏秘書

蠟微火化盡先用茶鍾四隻預頓水中將膏分

作四處傾入鍾內候片時方下研細輕粉每鍾

投和一錢攪勻候至一伏時取起綿紙覆好勿

犯灰塵本方不得加減致取不效

太素膏 說約

凡瘡久不收口是元氣虛極急投大補湯劑內

托外用此法

輕粉 三錢 米片 五分

乳細用猪脊髓調勻攤絹帛貼上必效

猪腦膏 唐城黎醫士

公猪腦子一個放鍋內好陳醋泡透文武火煮成

膏藥樣取出細布攤隨瘡大小貼之先將小米泔

水洗淨瘡上貼膏二三日揭看內生肉芽再用小

米泔煎洗又貼三五日肌肉長平忌房勞怒氣發

物

玉容膏

諸惡瘡久不收口以及臙瘡

敗地板 一兩 胎髮 猪毛

瘡膏大全 卷九 顧氏秘書

羊毛 鷄毛 鴛毛 各四兩

牛油 猪板油 桐油 各二兩

飛黃丹 八兩 蘇油 一觔

全熬枯濾清以丹收之攤貼

白玉膏

雄猪油半觔入鍋內熬去渣復入鍋內熬滾投白

蠟黃蠟各二錢化盡再入鉛粉五錢輕粉兒茶各

一錢五分乳香沒藥去油各一錢攪勻攤貼

瘡久不收口諸瘡膏

猪板油一兩熬化入白蠟五錢黃蠟八錢化盡再入乳香沒藥輕粉末各一錢成膏搽之

玉液膏
發背癰疽潰爛用此生肌止痛

香油二兩黃蠟一兩化開入黃丹寒水石煨各一兩研細熔化為膏攤貼

當歸膏

生肌止痛補血續筋

當歸身 生地 各一兩 白蠟

瘍醫大全

卷九

生肌方

李

顧氏秘書

黃 蠟 各一錢 麻 油 六兩

入鍋內先將歸地熬枯去渣復熬投二蠟熔化待溫攪成膏

生肌散

多年朝東土牆上的白螺螄殼取來以清水浸透淘去泥沙務須潔淨放傾銀罐內炭火煨紅冷定研細如霜加冰片摻上膏貼收口

生肌散

輕 粉 一錢 血 竭 兒 茶 各一錢

白死螺螄連泥者十個煨

研極細加冰片一分收貯每用少許男用女乳

久不收口者

用人參淨口嚼爛掩瘡口上自斂

收口

鮮白荷花瓣夾在書頁內每日移夾一頁不然要爛凡癰疽

瘡上生肌藥將收口時以此貼之斂口甚速如凍瘡被爛貼之亦效

瘍醫大全

卷九

生肌方

李

顧氏秘書

生肌散

鮮鹿腿骨紙包灰火內煨至黃脆為度如焦黑則無用矣

研極細摻瘡上生肌甚速

諸瘡毒久不收口

生 鉛三分敲成薄片剪如香茶樣

每日用鉛一分全核桃肉細嚼好酒吞下三日

服完大便出毒物其口即收

論背癰頭閉不住

王肯堂曰癰疽發背皆營氣不從逆於肉裡之所生
既成之後焮腫疼甚五七日內或一頭從上開發
或兩頭開濶上下侵展不住帝曰何氣使然岐伯
曰不善於調養乃七情之擾房勞之變穢氣所撞
惡氣所襲皆令開而不住當以內托大補之劑內
加白蔘白芨等藥服之外以收斂之藥敷貼淋瀝
則聚而不開矣 準繩

醫大全

卷九

頭閉不住

毒

顧氏秘譜

論癰疽內肉不合法

陳實功曰夫癰疽對口大瘡內外腐肉已盡惟結痂
時內肉不粘連者用軟綿帛七八層放患上以絹
繫緊將患處睡實數次內外之肉自然粘連一片
長如生成之肉矣倘患口仍有未完處再搽玉紅
膏其肉自平矣 正宗

醫大全

卷九

肉不合法

毒

顧氏秘譜

繡縛背瘡法

陳實功曰夫發背對口大瘡等疾已潰流膿時冬夏宜絹帛四五層放所貼膏藥外再用棉布見方八寸四角用蛇皮細帶釘之安蓋絹上以帶繫在前胸繡實瘡上庶使瘡中暖氣不泄易於腐潰洗瘡時預備二繡更換務要患內暖氣烘此法最善正宗澄曰凡發背潰後口小內大大膿已泄內肉不合宜用鉛片如鏡中鑿一眼如錢狀四邊錐眼以針穿縫綿布襪上夏月則用兩層布襪襪上六面釘潤

湯醫大全

卷九

繡縛法

李

顧氏秘書

絹帶六條先將膏藥蓋好加以新棉將鉛片襪合瘡上先將左右二帶繫緊胸前再將左上角帶與右下角帶由左肩向右脇下斜繫右上角帶與左下角帶由右肩向左脇下斜繫則兩層新肉合成一塊矣倘左半邊虛處多右半邊實處多可將膏外襯棉左半邊墊厚些右半邊襯薄些如右半邊虛處多亦照此法總在看瘡取膿指洗時留心察其虛實自明

論生齧肉

申斗垣曰夫瘡瘍已潰愈加保護若不謹慎恐致敗壞倘七情內亂怒則傷肝肝為將軍之官肝主怒怒氣盛則刑脾脾主肉脾傷則瘡口內脹出名曰齧肉齧肉脹滿不能自消若不去之雖瘡愈後肉高梗積久亦痒痛倘生面目之端形容醜怪乃不知去此之過也宜用烏梅燒灰少加輕粉一上即平愈後亦無瘡疤也矣敬立

周文采曰一日着水二日着風三日着怒四乃庸俗

湯醫大全

卷九

論齧肉

李

顧氏秘書

醫生以手擠膿核時用力太重五乃妄用涼藥凉了瘡皮故生齧肉也集驗澄曰瘡口齧肉患者悞食生薑香蕈菌子及違犯房幃均易將良肉齧出更有肩脊生齧者乃挑輕負重掙出肘腕手指生齧者必是拿甚重物所致足跟足指生齧者必是奔走跳動而齧凡視瘡毒出膿後肩脊上膏外加以厚紙或鉛片壓住肘腕手足跟指等處膏外須用厚紙或繭殼襯護薄繭紫好則可免良肉齧出且易收功

論驗透膜法

張景岳曰凡背疽大潰欲驗穿透內膜者不可用皂角散嚏法但以紙封患處令病者用意呼吸如紙不動者未穿膜也倘用取嚏法鼓動內膜則反致穿透慎之慎之 全書

澄曰背疽潰爛但以草紙擦蘸麻油以火點著向瘡照之如燈光向外鼓動者裡膜已破矣

瘍醫大全

卷九

驗透膜

癩

顧氏秘書

論瘡疽鎖口

澄曰凡患瘡毒潰後不慎房慾以致瘡口漸高堅硬不斂此名鎖口又有悞食瓜子鷄蛋亦能鎖口須用銀針輕手四圍挑斷以木耳焙研極細麻油別搽印消

又曰瘡毒潰後已久風熱濕毒感受亦能鎖口

論將息法

程山齡曰凡病中設有挾風寒者即宜斷去葷腥油膩微服散藥俟外邪祛盡再用滋味調補大抵將息癰腫不可缺少滋味以血肉能生血肉也然又不宜過多使肉氣勝穀氣更忌生冷滯氣之物恐反傷脾胃耳並宜避風邪戒噴怒寡思慮少言語兢兢保養為貴至於病後將息毒大者三年內宜遠憚幙毒小者期年內宜遠憚幙犯之則成虛損或成偏枯或陰滅天年不可不慎也其他戒怒慎

瘍醫大全

卷九

將息法

十法

顧氏秘書

風亦須常作有病時想 十法

王肯堂曰保全胃氣厚味與生冷皆除勿冒風寒大熱與大寒當避多言多動不免真氣之有傷久坐久行皆致起居之不適寡思節慾尤戒恚怒悲憂湯粥適時更宜清虛恬靜 準繩

論培護法

程寶功曰冬月發背須穿有袖綿背搭一件服下不可縫合取其易於揭看也且要預生炭火使暖逼盡餘寒然後揭開用藥為妙 正宗

又曰如發背高腫須防撞傷須用細草照瘡大小作一圈子外用棉花絹片縫如串鈴樣四邊釘細帶四條安在瘡上護住瘡根以兩條帶子繫頸上以兩條帶子繫胸前則不致有撞傷之患矣

瘡醫大全

卷九

培護法

三

矣其欲生也得乎

經驗全書

李氏曰若背疽難於隱几宜用萊豆十斗作一袋隱伏其上以解毒涼心也 十書

論瘡久成癭

胡公弼曰夫瘡久不斂多成漏症常有膿水流而不絕其膿亦臭內無死肉須先服參芪歸朮芎大劑托裏再用附子製過者以童便浸透切作二三分厚片安瘡上着艾炙之仍服托裏之劑隔三日再灸不五七次則癭化肌生肉自長滿矣

論九漏

王肯堂曰瘡漏是孔竅出水不止者是也

氣漏或腫或消痛脹難忍者是也

風漏瘡孔內痒甚者是也

陰漏男女陰內痛而出水者是也

冷漏孔內出白膿黃水不止者是也

痔漏痔瘡日久不忌房事破而流膿不收口者是也

也

血漏時時下鮮血不止名熱漏也

瘡醫大全

卷九

論九漏

三

顧氏秘書

瘻疔漏是平肉上生孔竅出膿血者是也

瘻腮漏因瘡忽黑爛出黃黑水者是也

瘻口凡破漏之症多因氣血虧損潰後先膿後則清

稀流水久而不斂遂成漏管亦有因庸醫日以藥

線縫入將瘡內嫩肉磨成厚肉瘡口不能驟合初

則嫩管久則長成硬管漸生岔管者甚多亦有膿

血去多陰分受虧陽火亢盛夢泄遺精或不慎房

慾多成九漏之候最為難治必須內服補托謹戒

房勞外用化管之藥內服退管丸丹化去內管方

能取功

又曰凡瘡潰後忌葱以免生管

步醫大全

卷九

論九種

毒

預氏秘書

試知百病生死法

陳實功曰死生非神聖不能洞其機關疾病無明醫亦不能決其吉凶匪則使人疑惑決斷不常余吳

授呂祖一枝梅真仙方也 正宗

呂祖一枝梅

治大人男婦小兒新久諸病生死難定之間用

藥艾實大一餅貼印堂之中點官香一枝香盡

去藥已後一時許藥處有紅斑暈色腫氣飛散

謂紅霞捧日病雖危篤其人不死如貼藥處一

步醫大全 卷九 試生死法 預氏秘書

時後無腫無紅皮肉照舊不變謂白雪漫野病

雖輕淺終歸冥路一兒急慢驚風一切老幼病

疾俱貼之紅腫即愈此方用之可預知生死也

硃砂 三錢 銀 硃 乙錢五 五靈脂 三錢

麝香 三分 草麻子 五分 雄黃

芭荳仁 各五錢 不去油

右各研細末於端午日淨室中午時共研加油

臙脂為膏磁盒收藏勿經婦女人手臨用豆大

一圓捏餅貼印堂中其功立見用過餅送河中

夏月諸瘡傷碎蠅蛆門主方

蟬花散 東醫寶鑑

夏月諸般傷損潰爛蛆虫極盛臭不可近

蛇退 燒存性 蟬蛻 青黛 各五錢

細辛 二錢五分

右為末每三錢酒調下日二

夏月諸瘡臭爛

寒水石研細摻

傷醫大全 卷十 顧氏秘書

辟瘡瘍惡穢法

辟惡氣 張仲景

蒼木同猪蹄甲燒烟

又方

紅棗茶葉燒烟置房中

又方

荔枝殼燒烟解毒

傷醫大全目錄

卷十

正面頭面部

百會疽門主論 附方

頂門疽門主論

小兒顛腫門主論 附方

小兒顛陷門主論 附方

小兒解顛門主論 附方

鰓拱頭門主論 附方

傷醫大全 卷十 目錄

白屑風門主論 附方

額疽門主論

赤色疽門主論

太陽疽門主論

鬚疽門主論 附方

頭髮門主論 附方

眉毛門主論 附方

發眉疽門主論 附方

眉心疽門主論

顧氏秘書

戀眉瘡門主論 附方

眉風癬門主論 附方

眉眶骨痛門主論 附方

太陰發門主論

眼胞菌毒門主論 附方

眼胞痰核門主論

眼丹門主論 附方

漏睛瘡門主論 附方

眼疳崇症門主論 附方

瘍醫大全 卷十 目錄 十一 顧氏秘書

偷針眼門主論

雙目流血門主論 附方

痧痘後兩目腫門主論

痘風眼門主論 附方

痘毒攻目門主論 附方

小兒血眼門主論

瘍醫大全卷十

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽 全校
男 樞燮用和

正面頭面部

自巔頂起至髮鬢額角眉目止凡一切癰疽疔毒皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全 卷十 百會疽 十一 顧氏秘書

百會疽



百會疽門主論

王肯堂曰百會疽一名玉頂疽

百會穴一名三陽五會在前頂後一寸五分

分頂中央旋毛中陷容豆督脉足太陽之交會初發如麥米頓增痛楚寒

熱大作由陽虛浮泛宜鹽湯下入味丸引火歸源

若元氣素厚六陽經受風邪風火相煽臟腑熱毒

上攻而成者宜黃連消毒飲七日無膿者死準繩

申斗垣曰腦發生於巔頂之上泥丸宮穴乃足太陽

膀胱經兼督脉相並而作多血少氣狀如火燎漿

泡大如銅錢色如葡萄頭如米粒四圍堅硬赤色

瘍醫大全

卷十 百會疽

二

顧氏秘譜

可治悶亂神不定者死如入日有膿可刺者生啟

立

又曰前腦疽即腦癰俗云顛門蕩子發癰是也有生

於顛門有生於腦前腦後腦側者皆由當風睡卧

風寒入腦氣血凝滯遂生此症四五日可治半月

二旬以外毒氣深入腦內難治又有腎經虛熱壅

於腦戶伏結成毒但潰久成穴腦髓外流者不治

治與癰疽法同

胡公弼曰頂門乃三陽經脉聚會之所其穴名曰百

會穴此處前後生毒最易傷犯腦髓腦髓一陷最

不易治是陽經亢極熱氣不散氣血凝滯結聚巔

頂而成此疽係心經受症治之忌灸如有用灸者

艾炷宜小壯數宜少若火氣太過會合陽經毒流

頭面潰爛難治故曰不宜灸也青囊

蔣示吉日腦發疽生巔頂之上由督脉太陽經所主

受病在心乃陰陽不調熱氣上壅聚而不散而成

若不速治頂裂髓枯不可救矣

心法曰百會疽生頭頂中央自側面觀之正對耳尖

瘍醫大全

卷十 百會疽

三

顧氏秘譜

者是

又曰已潰開瘡看視務宜密室中揭膏拭膿收拾切

忌外風襲入以免漫腫抽搐之虞

澄日頭為諸陽之首巔乃腦髓之穴此處患毒非諸

陽蘊熱亢極即心事勞攘火炎或素有蓄熱醇酒

炙燔而成或過服升柴提動積熱而起初起如粟

根脚堅硬不紅不焮痛疼徹腦頭如頂石破後無

膿鼻流穢物者死如初起紅腫根脚分明潰後得

膿者吉但不可輕敷涼藥逼毒入腦施治之法悉

遵癰疽治法母庸分門立方

瘍醫大全

卷十

百會疽

四

顧氏秘書

百會疽門主方

立消散

敷百會疽

龍膽草

藁本

西牛黃

白芷

地骨皮

雄黃

金銀花藤

各等分

共研極細生酒調敷中留一孔透氣自消

瘍醫大全

卷十

百會疽方

五

顧氏秘書

頂門疽



瘍醫大全

卷十 頂門疽

六

顧氏秘書

頂門疽門主論

王肯堂曰頂門疽一名佛頂疽此屬太陽經風熱所

致穴名上星

在神庭後入髮際一寸

由臟腑陰陽不調熱毒

上壅而成脉大神昏二便閉結者不治準繩

申斗垣曰頂門疽又名佛頭疽乃心經受症陰陽不

和積熱上壅入於腦中遂成此症如根脚穿過腦

者不治啟玄

蔣示吉曰頂疽生巔頂上乃任脉所主六腑不調熱

壅上焦濕聚高巔而成說約

澄曰頂門疽有堅硬木痛者為疽均照癰疽門施治故不另立方法若紅腫如桃似李或上有黃頭膿血相雜小兒積暑熱癰多有類此者不可作頂門疽治之

瘍醫大全

卷十 頂門疽

七

顧氏秘書

小兒顛腫門主論

馮魯瞻曰顛腫者顛門腫起也脾主肌肉若乳哺不常饑飽無度或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調其氣上充為之腫脹顛突而高如物堆聚毛髮短黃骨蒸自汗者更有風熱傷肝木鬱思達所以令腫者更有肺熱生風肺主皮毛亦令顛腫毛焦者更有胎中受熱所致者然寒氣上衝而腫者牢斬堅硬熱氣上衝者柔軟紅色更有外因覆護過煖陽氣不得外出亦令赤腫寒者溫之熱者涼之外

瘍醫大全

卷十 顛腫

入

顧氏秘書

用封顛法可也 錦囊

澄曰小兒顛腫多由肝風脾熱上壅驚風慢脾之證多見之切不可輕用犀角磨塗涼藥外敷逼熱入腦多令危亡祇宜疏風平肝導熱其腫自消

小兒顛腫門主方

全生湯

感熱顛門忽腫

遠志肉

蟬蛻

明天麻

防風

羌活

各五分

川芎

桔梗

各四分

牛蒡子

炒三分

甘草一分

燈心水煎服

瘍醫大全

卷十

顛腫方

九

顧氏秘書

小兒顛陷門主論

馮魯瞻曰顛陷者有因臟腑有熱渴飲水漿致成瀉痢久則血氣虛弱不能上充髓腦故下陷如坑此乃胃虛脾弱之極宜急扶元若與枕骨並陷百難救一亦有父精有損母血虛衰稟元不足是以形容枯瘦陰陽兩虧無時溫熱而顛陷者有因蓄熱不除漸至身羸髮落脚縮手拳皮焦鶴膝血絕筋衰而顛陷者宜各隨症調治枕陷尤重於顛陷不獨小兒也蓋耳後方圓一寸皆屬於腎陷則腎元獨勝矣 錦囊

傷醫大全

卷十 顛陷

十

顛氏秘書

澄 曰顛陷乃病後元氣不振所以陷也惟內服異功散扶脾保元此為良策

小兒顛陷門主方

嬰寧湯

治吐瀉後感寒顛陷

人參 五分

白茯苓

木通 各七分

炙甘草 一分

川芎

酸棗仁 炒各四分

升麻 煨

製附子 各三分

姜引

烏附膏

治顛陷

傷醫大全

卷十 顛陷方

十

顛氏秘書

生附子 五錢

雄黃

綿川烏 生用各二錢

研末用連根葉生菽搗成膏空心貼顛上

小兒解顛門主論

馮魯瞻曰解顛者頭縫開解而顛不合也書曰母虛
羸瘦父虛解顛是由稟氣不足先天腎元大虧腎
主腦髓腎虧則腦氣不足故顛解開然人無腦髓
猶樹無根不過千日則成廢人有以父精不足則
解顛眼白睛多為論者有以屬母之血虛熱多而
論者其候多愁少喜目白睛多面眊白色若成於
病後者尤凶宜久服地黃丸外用封顛法可也亦
有因懷胎五月忽被大風大雨雷電驚胎以致顛
瘡醫大全 卷十 解顛 圭 顧氏秘書

補天元以圖萬一 錦囊

陸亭川曰六味地黃丸本滋肝養腎之仙丹用之於
初生嬰孩其功更大凡小兒百日外每早白湯化
服一丸此時小兒知識未開服之培補先天極有
神功蓋肝主筋腎主骨自幼服之不但無解顛之
患且強其筋骨膝蓋易滿行走亦快此發前人未
發之論故標之於此以為保嬰之一助也但小兒

服丸後隔一時再與乳喫如外感風暑內傷乳食
即暫停愈後再服

澄曰解顛乃先天稟受本虧乳食不調生而多病是
以頭顛分解惟六味地黃加紫河車為丸服之自
合用之屢效

瘡醫大全

卷十 解顛

圭

顧氏秘書

小兒解顛門主方

調元散

治稟受不足顛顛開解肌肉消瘦齒語行遲

山藥一錢 白茯神 人參

白茯苓 黃芪蜜炙 熟地黃

白朮 白芍藥各伍分 川芎

炙甘草各六分 石菖蒲四分

薑棗煎

人參地黃丸

瘍醫大全

卷十 解顛方

南

顧氏秘書

嬰孩顛顛開解此乃腎氣不成腎主骨髓腦為髓海腎氣不成所以腦髓不足故不合

人參二錢 熟地四錢 鹿茸酒焙

懷山藥 白茯苓 山萸肉去核

牡丹皮各三錢

為末蜜丸芡實大參湯調化食遠服神效

治解顛莊氏

山茵陳 百合 車前子各五錢

研末烏牛乳汁調塗兩足心及頭縫開處帛裹

三日一換

封顛法

驢頭骨不拘多少燒灰研細以清油調敷頭縫中

又法

狗頭骨炙黃為末鷄子清調塗

河車地黃丸

紫河車一具 熟地搗膏入 懷山藥炒四兩

丹皮 白茯苓 澤瀉鹽水炒

山萸肉去核酒炒四兩

瘍醫大全

卷十 解顛方

圭

顧氏秘書

右為末煉蜜為丸芡實大每早晚白湯調服一

丸

顛門不合頭瘡不乾

敗龜版煨灰搽之

鱧拱頭門主論

陳實功曰鱧拱頭俗名猶猪患小而稟受悠遠此皆父精母血蓄毒而成生後受毒只發一次其患腫高破之又腫皆由稟受時原有衣膜相裹毒雖出而膜未除故愈而又發膿熱腫甚者用針刺破又有風襲外口患雖不腫而不收口者敗銅散主之正宗

澄曰亦有小兒夜間以頭藏乳母懷中睡覺熱氣薰蒸而成亦有小兒不避烈日暑毒而成者初起

瘍醫大全

卷十

鱧拱頭

末

顧氏秘書

甘草熬膏敷之自消已成逐個須用圍住根脚庶不致相串難乾此不易之法也

又曰凡患鱧拱頭收功後當戒鱧魚否則次年必發心法曰鱧拱頭又名躑蛄癩俗名貉貓

鱧拱頭門主方

敗銅散

鱧拱頭破後膿水不乾愈後又發久不收口

化銅舊罐

研細

將毒洗淨香油調搽忌口

久不愈者

糞坑內磚上宿垢竹刀刮下煨存性研蘇油調搽

又方

蛇蛻一片唾沫潤貼瘡上即出膿收口

瘍醫大全

卷十

鱧拱頭方

七

顧氏秘書

又方

烏梅肉搗爛和黃蜜再搗如膏量瘡大小攤貼惡

肉即消並治諸瘡癩內突出贅肉

又方

芫貳兩生薑一兩松香肆兩全煮松香老嫩得宜

乘熱去芫薑只用松香熱箍鱧拱頭外留頭出膿

則不相通串矣貼膏上生肌藥收功神速

又方

用餅麵敷住四圍以膏貼頂上易於收功

又方

皮底舊鞋一隻去泥淨燒存性研末菜油調敷其
膿自出屢試有效

又方

屋內倒掛烟塵猪膽汁調敷

又方

磁器搥碎研如粉雞蛋清調敷

又方

百草霜研細菜油調圍立效

瘍醫大全

卷十

鱧拱頭方

六

顧氏秘書

又方

銅青一兩

松香五錢

草麻子六十粒

葱三根搗爛成膏青布攤貼

又方

生紅柿皮貼患上自乾

白屑風門主論

陳實功曰白屑風多生於頭面耳項髮中初起微癢
久則漸生白屑疊疊飛起脫之又生此皆起於熱
體當風風熱所化治當消風散玉肌散次以當歸
膏潤之髮中作癢有脂水者宜楊梅瘡門中翠雲
錠搽之 正宗

澄 曰白屑風用厚朴或桑葉煎湯洗之即愈

瘍醫大全

卷十

白屑風

九

顧氏秘書

白屑風門主方

頭生白屑乃肝經風盛也

山豆根浸油塗之或研細以乳汁調塗

又方

白芷

零陵香 各等分

研末浸香油塗之候三五日篋去不過二三次

永不再發

祛風換肌丸

正宗

治白屑風及紫白癩瘋頑風頑癬濕熱瘡疥一

瘍醫大全

卷十

白屑風方

手

顧氏秘書

切諸瘡搔癢無度日久不絕愈之又發者宜之

天花粉

何首烏 等分

威靈仙

苦參

蒼朮

牛膝

大胡麻

生甘草

石菖蒲

川芎

當歸

各減半

右為末新安酒疊九菜豆大每服二錢白湯送

下忌牛肉火酒雞鷺羊等發物

左額疽

右額疽



瘍醫大全

卷十

額疽

手

顧氏秘書

額疽門主論

鬼遺方云左額右額發赤疽不拘大小狀如桃李此

屬足陽明胃積熱而成急宜用藥貼破見膿無害

王肯堂曰右額角一處發毒疽及惡瘡為近太陽穴

如腫滿太陽即成虛損為近穴而難消不可破如

破後外傷風水即能害人亦宜用藥潰膿後速飲

瘡口如經冬月即成冷瘡緣此處近太陽穴上至

額角都為險處如過時潰爛腦髓出者死

準繩

申斗垣曰額發在曲差穴

挾神庭傍一寸五分入髮際

下攢竹二

穴一名員柱一名始光一俱足太陽膀胱經多血
各光明在兩眉陷中少氣初發頭痛增寒項似拔腰如折赤腫宜汗之
啟玄

陳實功曰透腦疽生在額上髮際之間多發寒熱頭
疼如斫不可忍耐先用萬靈丹發汗解散風邪次
宜清托之正宗

澄曰額疽之發乃骨多肉少之處潰後最忌襲風傷
水雖貼膏藥亦須遮護庶無破傷風濕之患治法
悉遵癰疽門治法加引經藥治之

傷醫大全 卷十 額疽 圭 顧氏秘書
又曰凡額疽治法悉如癰疽治法無庸分門立方



赤色疽

傷醫大全 卷十 赤色疽 圭 顧氏秘書

赤色疽門主論

鬼遺方曰赤色疽發頭額及腦前並手掌中十日不
穴者死七日可刺出血七口未有膿不可治也

太陽疽



瘍醫大全

卷十 太陽疽


毒 顧氏秘書

太陽疽門主論

鬼遺方云左右太陽穴或發疽癢及癰五七日不潰
毒氣流入眼眶攻眼眼合不開用藥貼破破後慎
外風水侵入即損其睛損傷眼臉而成大疾此名
勇疽亦名腦發疽屬足陽明胃經如流清稀黑血
及潰爛透腦者死

澄 曰治太陽疽法悉同癰疽治法故不另立主方

鬢疽



瘍醫大全

卷十 鬢疽

毒 顧氏秘書

鬢疽門主論

陳實功曰夫鬢疽者乃手少陽三焦相火妄動又兼
腎水不能生木或外受風寒但此經多氣少血肌
肉相薄最難腐潰此皆性情急暴房慾血虛火動
肝氣凝結而成疽也初起寒熱交作頭眩痛徹太
陽甚則耳目連鬢通腫治法不可妄用針灸如初
見瘡時寒多熱少口乾作渴好飲熱湯六脉虛數
無力又兼患上堅硬多不焮痛無潰無膿瘡根流
散此乃真氣虛而邪氣實也托裏為主消毒佐之

如初見瘡時多熱少寒頭眩作痛口燥舌乾渴欲飲冷二便秘澁六脉沉實有力瘡亦焮腫疼痛身體發熱易腐易膿根脚不開腫焮在外此乃正氣實而邪氣虛也消毒為主托裏佐之大抵正氣勝則邪氣虛正氣虛則邪氣實正氣勝則實邪氣勝則虛必然一勝則一負邪正不並立欲其虛而不待損而自虛矣 正宗

又曰又有未見瘡時先作渴證一年半載日久日重然後發為鬢疽其形色多紫黑瘡多平陷堅硬無膿毒流耳項又兼氣味不正形容不澤精神不明飲食不進者俱為不治

胡公弼曰鬢乃足陽明經所行之處由肺胃積熱上壅發毒者多其見證也寒熱往來嘔逆惡心目痛鼻乾等證若疽深寸餘者不治

陳遠公曰有鬢中忽生疽紅腫高突頭面目鼻俱浮異於平常此陽毒也蓋兩鬢近太陽乃陽位也陰氣不能至故作陽症治之然往往有變為陰症者所以陽藥中加入陰分之味以防其變若已潰爛

瘍醫大全

卷十

鬢疽

毛

顧氏秘書

尤須陰藥多于陽藥也擬用理鬢湯治之 水鑑
申斗垣曰鬢疽乃足陽明胃經多血多氣生於頭維穴初如癰子後漸大硬如石皮似猪皮棕眼睡中譫語恍惚吐逆鮮血流入四肢者萬死一生 啟玄
澄曰鬢疽宜養肝血托裏成膿不可輕用寒涼潰後避風初起粟窠作癢木痛切勿抓破如破即用膏蓋若一外風襲入漫腫頭目壅腫根脚必硬不可不慎

瘍醫大全

卷十

鬢疽

毛

顧氏秘書

鬚疽門主方

理鬚湯 辨證水鑑

治鬚疽已潰未潰無不收功

川芎 當歸 各一兩 金銀花 三兩

夏枯草 三錢 白芷 二錢

水煎服二劑即消已潰者四劑全愈

此方以金銀花夏枯草更得施其祛逐之功
又妙在芎歸補氣血陰陽雙益正氣足則邪
自難變安得不愈哉

柴胡清肝湯

瘍醫大全

卷十 鬚疽方

夫 顧氏秘書

治鬚疽初起毋論陰陽表裏

生地 天花粉 川芎

牛蒡子 白芍 甘草節

柴胡 當歸 防風

連翹 黃芩 山梔 各等分

白水煎食遠服

鼠粘子湯

治鬚疽初起寒少熱多頭眩作痛口燥咽乾渴
欲飲冷二便秘澁六脉沉實有力煩悶疼痛者

桔梗 鼠粘子 赤芍

地骨皮 當歸 天花粉

元參 甘草稍 木通

防風 連翹 各一錢 大黃 炒二錢

白水煎食前服

加味逍遙散

治鬚疽七日以上根盤深硬色紫焮痛

白朮 天花粉 柴胡

牡丹皮 貝母 白茯苓

瘍醫大全

卷十 鬚疽方

夫 顧氏秘書

當歸 白芍 陳皮

山梔 各八分 羚羊角 紅花

甘草 各五分

淡竹葉二十片全煎食後服

梔子清肝湯

治少陽經虛肝火風熱上攻遂成鬚疽痛連頸

項胸乳太陽等處或寒熱晡甚胸滿口苦舌乾

柴胡 川芎 當歸

牛蒡子 白芍 牡丹皮

石膏 山梔各一錢 黃芩

黃連 甘草各二錢

白水煎食後服

清肝解鬱湯

治暴怒傷肝憂思鬱結致肝火妄動發為鬢疽
頭眩痛徹太陽胸膈痞連兩脇嘔吐酸水

熟地 當歸 白芍

白朮 白茯苓 貝母

山梔各一錢 人參 半夏

瘍醫大全 卷十 鬢疽方 辛 顧氏秘書

柴胡 牡丹皮 陳皮

川芎 香附各六分 甘草四分

薑三片煎食遠服

參苓內托散

治鬢疽已成堅而不潰潰而不斂氣血俱虛身
涼脉細飲食少思口淡無味及形體消瘦

人參 白茯苓 川芎

當歸身 熟地 炙黃芪

山藥 白芍 白朮

陳皮各一錢 牡丹皮 肉桂

地骨皮 甘草 熟附子各五分

薑三片棗二枚全煎食遠服

瘍醫大全 卷十 鬢疽方 辛 顧氏秘書

頭髮門主論

馮魯瞻曰髮乃血之餘焦枯者血不足也忽然脫落
頭皮多癢鬚眉並落者乃血熱生風風木搖動之
象也病後瘡後產後髮落者精血耗損無以榮養
所致也當滋補精血為主

醫鑒云過服辛熱藥而眉髮脫落者乃肝血受傷而
火動非風也宜四物湯六味地黃丸以滋肝血生
腎水

經曰髮乃血苗

瘍醫大全

卷十 頭髮

筆

顧氏秘書

心相編曰瘦人髮黃主多貪奸殺

男女髮深必好色拳髮好色犯刑

髮黃者下流

頭髮門主方

黑髮散

烏鬚髮

官粉

密陀僧

研勻水調搽上俟乾水洗去藥用核桃油潤之

女人髮易落而不潤者

榧子三個

搗浸雪水梳髮則潤而不落

瘍醫大全

卷十 頭髮方

筆

顧氏秘書

長頭髮法

生薑切片擦落髮光皮上數日即長

髮落不長

川椒四兩用白酒釀浸七日早晚潤禿處其髮自

生

眉毛門主論

靈樞曰足太陽之上血氣盛則美眉眉有毫毛

馮魯瞻曰眉毛所生之地皆屬肝臟之精氣榮養若

其臟之精氣虧損則其地之毫毛不榮矣

澄曰眉毛自落乃肝虛血少無以榮養或風濕相搏

眉毛漸落即如樹木枯槁枝葉凋零也治當養血

滋肝為主

心相編曰眉毛開花主運不通

男人眉細主得陰人財帛

瘍醫大全

卷十 眉毛

書

顧氏秘書

眉生黑子招陰人口舌又主水厄

眉毛門主方

長眉法 岐天師

眉落用桑葉七片每日洗之一月重生如舊髮落

亦然

瘍醫大全

卷十 眉毛方

書

顧氏秘書

發眉



瘍醫大全

卷十

發眉疽

美

顧氏秘書

發眉疽門主論

鬼遺方云左右眉稜兩處發名爲發眉不拘在頭在尾宜防未穴已前毒氣攻擊在眉頭卽攻入眼損睛在眉尾卽攻入太陽並宜留意慎重此疽從眉至頭生瘡黑色漸漸腫漫滿面瘡頭堅硬如石刺之無膿惟出黃水痛不可忍悶亂嘔逆是也由臟腑積熱風毒上攻而然
申斗垣曰眉疽生於陽白二穴之分乃足少陽膽經多氣少血治之諸症漸減者生甚者死女人七日

男子二十四日死 啟玄

又曰眉風毒乃肺經受症但覺寒熱往來筋骨酸痛或作嘔吐卽眉風毒也

寶漢卿曰從眉至頭發疽色黑其腰漸漸腫氣浮滿面者死

心法曰鳳眉毒一名眉發生於眉稜無論左右皆膀胱小腸肝膽四經積熱所致形長如瓜疼痛引腦二目合腫堅硬色赤按之有根六日內刺之得膿爲吉無膿則險甚則十四朝不潰煩悶嘔逆不食

瘍醫大全

卷十

發眉疽

美

顧氏秘書

者凶

李東垣曰眉疽生於兩眉之間燦爛如人眼目甚可畏也小兒患此必死大人患此十痊五六乃手足少陽經所主宜用海馬崩毒法救之不然膿血浸眼兩目先壞矣
澄曰發眉其症極險類乎疔瘡第一提住瘡根不使根脚散漫內須托毒成膿勿投寒涼破氣傷脾之藥庶可保全性命

發眉疽門主方

海馬崩毒法

凡三發背對口手搭眉疽乳發初起時用熱水自肘後洗至手六經起端處止日洗數十遍以泄熱毒務洗至指甲皮穰不可住手直洗至瘡勢已衰方可住洗蓋三陽經俱屬督脉所領洗至指甲皮穰者俾熱從根本而解也此係秘傳慎勿輕忽


瘍醫大全

卷十

發眉疽方

彙

顧氏秘書



又名面風毒
又名風眉疽

瘍醫大全

卷十

眉心疽

彙

顧氏秘書

眉心疽門主論

王肯堂曰眉心疽一名面風毒屬足太陽膀胱經風熱壅結陰陽相滯而生若黑色痛甚或麻或癢寒熱併作者疔也 準繩

陳實功曰鳳眉疽發在兩目之間形長皮赤痛引腦

戶二目合縫光腫發熱 正宗

心法曰眉心疽一名印堂疽乃督脉經風熱蘊結氣滯而成初起色黯根平硬腫疼痛至二十一朝腐潰出稠膿者順無膿黑陷者逆如初起色赤浮腫

焮痛此名面風毒瘍七日得膿易治若色黑木痛
麻癢太過根硬如鐵釘之狀寒熱並作卽眉心疔
也

湯醫大全

卷十 眉心疽

單

顧氏秘書

懸眉瘡門主論

申斗垣曰兒在胎中母食五辛父殮炙博遺熱與兒
生後眉間如癬流脂成片癢癢不絕名曰懸眉瘡
又名鍊眉瘡 敬立

湯醫大全

卷十 懸眉瘡

單

顧氏秘書

戀眉瘡門主方

戀眉瘡 精義

百藥煎 五錢 生白礬 二錢

研細麻油旋調搽之

又方 啟玄

烟膠 輕粉 各一錢 川椒 五分

猪骨髓熬熟調搽

瘍醫大全

卷十 戀眉瘡方

望 顧氏秘書

眉風癬門主論

澄

曰眉風癬乃肝血枯燥風濕外襲初起作癢搔之
纍纍流脂延蔓額上眼胞者是也治當養血滋肝
不得妄用斑猫砒礪猛厲燥烈之藥搽擦祇宜紫
茸膏塗之自愈

瘍醫大全

卷十 眉風癬

望 顧氏秘書

眉風癬門主方

眉風癬

黃連三錢研末以麻油調塗碗內用蘄艾燒烟薰
黑入皂礬豆大一塊輕粉少許研勻塗之

小兒胎毒疥癬兩眉生瘡或延及遍身瘙癢或膿水
淋瀝經年不愈

松香二兩 真蛤粉五錢 青黛二錢五分

研細乾摻或陳蠟燭油調搽一方加輕粉枯礬
各三錢

瘍醫大全

卷十 眉風癬方

醫

顧氏秘書

紫茸膏

紫草 白芷 各二錢 歸身 五錢

甘草 一錢

麻油二兩全熬白芷黃色為度濾清加白蠟輕
粉各二錢收膏塗之

眉眶骨痛門主論

馮晉瞻曰眉眶骨痛有二俱屬肝經風熱與痰或作
風痰其治類痛風然腦為髓海而腎主骨多由腎
陰不能養骨髓少以致腦虛火起於中寒束於外
疼之所始也凡高骨之處及眉毛所生之地皆屬
本臟之精氣榮養若其臟之精氣虧損則其地之
毫毛骨肉不榮矣故靈樞曰足太陽之上血氣盛
則美眉眉有毫毛由是觀之眉稜骨痛者此肝血
既失其養而腎水亦不榮於骨矣故主三年之內
有大風疾至明其根本既拔而外邪乘襲也治之
者必宜滋補肝腎為主少佐風藥以使上達如不
知此徒以辛熱發散為事則陰道愈虧益增其害
矣 錦囊

瘍醫大全

卷十 眉眶痛

醫

顧氏秘書

眉眶骨痛門主方

祛風清上湯

治風熱上攻眉稜骨痛

黃芩 酒炒 白芷 各一錢 防風

柴胡 羌活 各一錢 荆芥 八分

川芎 一錢 甘草 五分

白水煎服

又方

羌活 二錢 黃芩 酒炒 一錢 五分

瘍醫大全

卷十

眉眶骨痛方

吳 顧氏秘書

白水煎服

太陰發



瘍醫大全

卷十

太陰發

吳

顧氏秘書

太陰發門主論

正宗曰太陰發乃足少陽膽經多氣少血發於眼稍

臉上瞳子穴 在目外 赤腫有膿知痛者生如大渴

悶亂血出不止及青黑色不痛作蛙孔血出盡則

死矣

眼胞菌毒門主論

陳寶功曰眼胞菌毒乃脾經蘊熱凝結而成也其患眼胞内生出如菌頭大蒂小漸長垂出甚者眼翻流淚亦致昏朦治法用軟綿紙蘸水磨之眼胞上少頃用左手大指甲墊於患根右手以披針尖頭齊根切下血出不妨隨用翠雲錠磨濃塗之其血自止 正宗

又曰宜內服涼膈散清脾飲

心法曰此症初如菌形頭大蒂小黃亮水胞亦有頭

瘍醫大全

卷十 眼胞菌毒

果 顧氏秘書

小蒂大者漸長垂出堅凝不痛有纏綿經年不愈者以致目病乃脾經素有濕熱思鬱氣結而成初起宜清涼圓洗即消

眼胞菌毒門主方

清涼圓

當歸尾

赤芍

石菖蒲

各二錢

羌活

五分

地膚子

川連

生杏仁

各一錢

膽礬

二分

共研粗末以大紅綢包紮如櫻桃大滾水浸泡乘熱蘸洗

瘍醫大全

卷十 眼胞菌毒

果 顧氏秘書

眼胞痰核門主論

心法曰眼胞痰核結於上下眼胞皮裡肉外其形大者如棗小者如荳推之移動皮色如常硬腫不疼由濕痰氣鬱而成外用生天南星蘸醋磨濃頻塗眼皮日數淺者即消日數深者雖不能即消常常塗之塗令皮薄微微剝損以手指甲擠出如白粉汁即消

瘍醫大全


卷十

眼胞痰核

五

顧氏秘書

上眼丹下眼丹



瘍醫大全

卷十

眼丹

五

顧氏秘書

眼丹門主論

陳寶功曰眼丹乃脾經有風胃經多熱共結為腫風多者則浮腫易消熱甚者則堅腫難散宜如意金黃散敷之膿成急以針針之遲則眼頭自破此乃睛明穴內空難斂成漏者多以致變為漏睛瘡久則損明 正宗

申斗垣曰眼胞屬脾胃謂之內輪如赤腫甚不作膿者名曰眼丹 啟玄

胡公弼曰上下眼丹雖外見脾胃部位其實心經受

毒熱傳脾胃熱毒升上血氣凝聚而成丹毒也青

李東垣曰凡眼丹赤腫作癢癢後作痛不治則成膜

血初起宜酒炒甘菊花或炒鹽隔紙熨之

心法曰眼丹若腫突下垂不能視物者偏於風盛也

浮腫易消若焮紅色紫堅硬者偏於熱盛也腫硬

難消

湯醫大全

卷十 眼丹

聖

顧氏秘書

眼丹門主方

驗方

水調銀硃敷之自消

又方 寶太師

皂 礬 五錢 大粉草 二兩

全熬濃膏加冰片少許用鴨毛蘸潤眼眶上

又方

精豬肉切片如指甲大用井水漂去其血貼患處

不時易之

湯醫大全

卷十 眼丹方

聖

顧氏秘書

漏睛瘡門主論

寶漢卿曰夫漏睛瘡者肝臟毒氣小腸邪風外攻腎端灌於瞳人初生疼痛漸成膿水其色如泔日久睛昏氣敗肝絕難救之證外用當歸地骨皮黃連煎湯溫洗

治方關要云惟補腎宣肝為主

心法曰此症生於目大皆由肝熱風濕病發於足太陽膀胱經

睛明穴其穴係藏淚之所初起如荳如棗

紅腫疼痛瘡熱雖小根源甚深潰後出黏白膿者

湯醫大全 卷十 漏睛瘡 晉 顧氏秘書

順出青黑膿者險若瘡口過出淚液以致目內乾

溢者収斂更遲若潰斷眼邊弦者不治

秘笈云此證皆因膀胱積熱深邪伏而不散積久必

潰病始外見目內皆穴屬膀胱開竅如針按之則

浸浸膿出視物微昏眊隱澁宜服神效黃芪湯

久病不愈者用烏金膏以米糕和為條晒乾插入

竅內每日換二次化去白管則肌肉自生膿自止

矣隨以黃芪湯為丸服之

漏睛瘡門主方

烏金膏

治諸狀外障風癢血縷癰瘡胥肉扳睛雞冠現肉漏睛瘡

晉 礬即明礬 米 醋自造紅香者

共入銅鍋內文武火熬乾如濕翻調焙乾取出

去火氣研細末用時不拘多少再研至無聲入

生蜜調勻盛磁罐內塗點患處久閉或五日七

日上下胞俱腫方可歇藥數日其紅腫盡消觀

湯醫大全 卷十 漏睛瘡方 晉 顧氏秘書

輕重再點如漏睛膿出用糕和勻作條晒乾量

穴深淺插入化去瘀肉白管則新肉自生而膿

自止矣

眼睛崇症門主論

岐天師曰有人眼內長肉二條長一寸如線香之粗觸出於眼外此乃崇症也雖是肝膽之火無崇則不能長此異肉法當外用去刺全目丹點之內服舒鬱全睛湯主之此方妙在舒肝膽之氣而又瀉其火與痰則本源已探其驪珠又何愁怪肉之重長耶 石室秘錄

瘍醫大全

卷十

眼睛崇症

美

顧氏秘書

眼睛崇症門主方

去刺全目丹 石室秘錄

治崇症

黃連 冰片 甘草各一分 礪砂五厘

共研無聲為度用人乳調少許點肉尖上覺眼珠火炮出一時收入而愈

舒鬱全睛湯

柴胡 陳皮 甘草各一錢 黑山梔

白朮 白芥子 白茯苓各三錢 白芍五錢

瘍醫大全

卷十

眼睛崇症方

美

顧氏秘書

水煎服

偷針眼門主論

申斗垣曰此心膽小腸之火壅盛也眼眥角上起窠
作腫久則潰膿凡有此瘡其人胸背上必有小瘡
窠繫但以針挑出血則眼角瘡不治自愈矣故名
曰偷針眼俗名偷針窠 啟玄

章氏曰偷針眼初起令患人自用針尖對患上輕輕
戳四十九下自消 經驗

王氏曰偷針眼初起翻過眼胞背內有一細眼用頭
髮一根刺入淚出自愈 集效

瘍醫大全 卷十 偷針眼 美 顧氏秘書

秘錄曰偷針眼其人背上膏盲穴有紅點但以針挑
破即愈

東垣曰偷針眼又名挑針毒乃肝脾積熱所致初起
用冷水以手拍腦後背膊百遍看有紅筋白泡起
用小針刺破其泡其腫自消

又曰偷針眼用糯稻七粒每粒在泡上輕輕撞之七
粒七下自消

心法曰偷針眼生於眼皮毛睫間由脾經風熱而成
形如荳粒有尖初起輕者宜金黃散鹽湯沖洗膿

未成即消矣如洗之不消候膿熟針之如破後冒
風浮腫用芎皮散外用枯礬末 煎蛋清調敷腫處

瘍醫大全 卷十 偷針眼 美 顧氏秘書

雙目流血門主論

澄曰雙目流血大人屬心肝二經火盛而成宜涼心清肝其血自止小兒乃胎火肝熱所致宜涼肝導赤兼與鯽魚煨湯喂之自效

雙目流血門主方

涼心清肝湯

生地 當歸 白芍

炒山梔 丹皮 丹參

扁栢葉 川連 生甘草

燈心十寸為引

涼肝導赤湯

生地 丹皮 澤瀉

赤茯苓 炒山梔 人中黃

傷醫大全

卷十 雙目流血方 李 顧氏秘書

赤芍 木通

燈心七寸為引

傷醫大全 卷十 雙目流血 李 顧氏秘書

痧痘後兩目腫主論

申斗垣曰夫痘後小兒兩目胞腫蓋下臉上寸許熱
淚相拚臉爛成瘡久治不痊只須泄去陽明胃經
濕熱則腫消淚止痛除宜黃連解毒湯三黃丸主
之散立

瘍醫大全

卷十

痧痘後目腫

全

顧氏秘書

痘風眼門主論

登曰痘風眼乃痘後封眼火微開眼過早外風乘虛
而襲作瘡揉搓而成

瘍醫大全

卷十

痘風眼

全

顧氏秘書

痘風眼門主方

痘風眼

生薑一塊上挖一洞將銅青填滿仍以挖下之薑合上外以粗紙打濕裹好慢火煨炙待紙乾取出銅青研細磁瓶密貯臨用以熱乳調點數次即愈

又方

初生小兒臍帶熱血乘熱點之

又方

白菓肉

鉛

粉

各一兩

銅

青

五錢

瘍醫大全

卷十

痘風眼方

杏

顧氏秘書

加入乳調勻塗瓦上用艾圓二十四個點着燻乾刮下為丸如芡實大每用一丸人乳浸化沖水洗眼不過七丸即愈

又方

川連

地骨皮

白

礬

各一錢

鮮槐條

五段

銅

青

五分

川

椒

七粒

用水一大碗煎滾取起少冷又煎如此三次去渣入磁罐收貯埋土內七日取出用雞翎掃眼角忌風十四日

迎風弔淚痘風眼年久者可治

枯礬

皂

礬

各一錢

花

椒

五分

每清晨用滾水沖於碗內上用綿紙隔着將銅錢一個壓於紙上待自來清水每日早午晚須緊閉雙目止溫洗眼皮每料可用三日洗的九次重者十料輕者三五料除根

痘風眼

蚶虫揉爛取汁搽眼邊上永不再發

瘍醫大全

卷十

痘風眼方

奎

顧氏秘書

痘毒攻目門主論

陳實功曰痘毒攻目皆因長漿時不會用藥攻漿致漿不充滿以致回水眼胞紅腫不能開放而毒火上炎攻注兩目此時宜急以清毒保目湯連服二三劑以解上攻之毒火不獨可免目患乃委而棄之曰眼中有痘非所能醫遂使毒火亢極翳膜遮蔽瞳人日夜啼叫痛苦異常雖性命苟延而雙目喪明不過成一廢人耳嗟嗟庸醫誤人莫此為甚善夫聶清江先生曰此非有形之痘乃無形之火

傷醫大全

卷十

痘毒攻目

李

顧氏秘書

陰德戒之戒之 正宗

秘笈云此緣痘疹之後餘熱未退毒氣上攻於目或因氣虛痘不起漿不來醫者服以參芪升托之劑痘雖得痊而熱毒遂攻目中致使瞳閉不開淚出腫痛羞明怕日或生蟹睛翳膜等證先服消毒化癰湯黃連當歸連翹白朮甘草紅花陳皮蘇木柴胡黃柏川芎防風生地升麻乾葛麻黃羌活黃芩藜蘆細辛蒼朮吳茱萸白朮煎服此方即稀痘丹凡立春立夏立秋立冬前一宿次日隔湯燉宿如天雨可將藥放屋簷下露一宿次日隔湯燉熱初生者只服三五匙週歲以外服半劑三四歲者服一劑但能服過四次可保永不或清涼散大出痘縱出亦稀此乃神應之方也

傷醫大全

卷十

痘毒攻目

李

顧氏秘書

便如常去硝黃或用敗毒散加連翹牛蒡子醫者妄用去翳剋伐之劑過多其翳反厚則難治矣若脾胃受傷肚腹不調者服補中益氣湯茯苓燥濕湯人參啟脾丸石斛夜光丸其患漸愈

痘毒攻目門主方

痘毒攻目神法

每清晨用兔糞八粒清水蟬蛻去頭二十四隻水

二大盃入磁罐內慢火熬滾令其性味俱出入公

猪肝或黑羊肝七尖四兩切薄片於湯內一刻即

熟先飲湯後食肝湯散兼治兩月之久翳膜可消

去一半百日之久湯散奏效自可痊愈戒暴躁惱

怒並戒煎炒辛熱等物凡遇此等險症必須細心

研究斟酌用意不可忽畧

湯醫木全

卷十 痘毒攻目方

顧氏秘書

清毒保目湯

痲落後忽然頭頂大痛者乃餘毒上攻兩目也

急宜服此以解上攻之毒火可免目患

柴胡一錢 蟬蛻二十一當歸

桔梗各八分 連翹 防風

牛旁子 川芎 荆芥穗

赤芍各七分 升麻 黃芩酒炒

薄荷各五分 山梔酒炒 甘草各三分

燈心五十寸全煎

清毒撥翳湯

痧痘翳膜神效

生地黃一錢五分 當歸一錢 柴胡八分 牛旁子

白蒺藜去土 天花粉酒蒸 白葛粉 薄荷

防風 川芎 密蒙花 穀精草

草決明 甘菊花各七分 梔子酒炒 羌活

木賊草各五分 川連酒炒

生姜一片煎食遠服若大便秘澁加酒炒大黃

一錢五分通利仍除之切忌寒涼並眼科點藥

湯醫木全

卷十 痘毒攻目方

顧氏秘書

痘瘡損目

輕粉 黃丹 各等分

研細左眼吹右耳右眼吹左耳

痘後眼不能開 寶氏

鱈魚血滴入眼內或芭蕉根汁溫洗並效

痘入眼

白蒺藜炒去刺 穀精草 防風 各等分

共為末每日食後米泔水調下二錢五分

痘瘡入目痛楚恐傷目者

萍萍陰乾研末三錢羊肝半個竹刀切碎搗爛共
汁和空心調下清茶過口傷目者數服自愈小兒
減半

痘入目或病後生翳

蟬 蛻 洗淨 白菊花 各等分

研末每服二錢密湯調數服愈

小兒痘後翳膜遮睛百日內者可治

兔 糞 瓦焙 鼓槌穀精草 去砂土淨 各一兩

共為細末不拘茶酒菜飯內摻入服之一料全

瘍醫大全 卷十 痘毒攻目方 主 顧氏秘書

愈

又方

穀精草 一兩 生蛤粉 二兩

為末用獷猪肝一兩去淨筋膜竹刀切片和藥

末一錢飯上蒸熟連肝食之

小兒飛痘入眼外用吹耳法

黃 丹 輕 粉 各五分

共研勻左目吹右耳右目吹左耳每日吹匝許

痘瘡癰疹入眼生翳障

白菊花 穀精草 菜豆皮 各等分

共為末每用一錢以柿餅一個粟米泔一盞同
煮候泔盡食柿日食三枚淺者五七日重者半

月全愈

又方

旋雞肫內黃皮焙末拌飯中或藥內與兒喫七日

自愈

痘疹入目眼生白翳

橄欖核磨水加輕粉一二厘調勻搽眼胞上藥氣

瘍醫大全 卷十 痘毒攻目方 主 顧氏秘書

入裡卽落

小兒血眼門主論

馮魯瞻曰小兒百日內嗽名爲乳嗽肺葉尤嬌最易傷損更須急治久則血脉貫瞳兩眶紫黑或眼白珠紅赤如血名曰血眼當用生地黑荳共研成膏掩於眼上則眶黑自消血隨淚出自愈

傷醫大全

卷十 血眼

主

顧氏秘書

傷醫大全目錄

卷十一

眼目部

五輪圖

十二經絡圖

八廓圖

內障門主論

附方

外障門主論

附方

爛弦風眼門主論

附方

傷醫大全

卷十一

目錄

十一

顧氏秘書

拳毛倒睫門主論

附方

雀目眼門主論

附方

熱錫爆竹湯火傷目門主方

風絲入目門主論

附方

沙塵入目門主方

烟渣入目門主方

麥芒入目門主方

目部望色辨症法


蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽
男 槐燮用和 全校

眼目部


凡屬金針眼科內障外障風火時眼一切風絲塵沙
入目皆彙於此部中以便檢閱參治

五輪圖




銳眇即小屬心與小腸
上下胞屬脾胃各肉輪
瞳人屬腎各水輪
黑珠屬肝各風輪
白珠屬肺各氣輪
大眇屬心各血輪

二十經絡圖



足少陽膽經
手少陽三焦經
手太陽小腸經
足陽明大腸經
足太陽胃經
足少陰腎經
足厥陰肝經
手太陰肺經
手少陰心經
手厥陰心包絡經
足太陰脾經
足少陽膀胱經

八廓圖



命門寄心經
兌 澤廓 津液
離 火廓 胞陽
巽 風廓 養化
坤 地廓 水穀
坎 水廓 會陰
乾 天廓 傳道
震 雷廓 關泉
艮 山廓 清淨
大腸寄肺經
三焦雖屬津液其經經在銳眇

內障門主論

秘笈曰夫瞳仁輕膜畏水照徹四方乃先天精液肇始之元靈人身之至寶如日月麗天著明而不可掩者也

心經屬火大小皆赤脉侵睛癢澁眵如針刺痛諸般候心家虛熱急須知若還小便赤與淋內多蘊熱醫休遲醫肉侵睛無別證膀胱陽睛邪在茲小皆有疾莫亂治三焦小腸二經全

肝經屬木應鳥珠淡紫色兮病全無黑乃本經受風

尅眼見花飛是肝虛昏暗酒色勞傷過紅多滯血

客熱聚眼珠疼痛並黃色肝血不足補乃愈

脾經屬土上下胞紅腫皆因風熱饒紫色滯血多凝

積羞明怕日濕熱招兩胞浮腫緣何病皆因脾胃

不調和內生斑瘡並覘肉兩經積熱血難消眉骨

眼眶酸與痛風痰作楚或房勞上胞腫澁能睜視

色慾傷神為阿嬌拳毛倒睫無他故脾肺虧兮急

早療

肺經屬金應白珠純淨光潔則無虞若還紅腫過高

起肺氣壅塞大便遲淡黃虛熱黃困濕鼻塞涕淚風受之

腎經屬水應瞳仁黑如椒子光有神散大膽腎虧損致驚恐卒然有此因黃翳遮睛昏且淚腎虛時見

黑花頻赤屬積熱暗酒色紫小精虧急養身

足太陽膀胱見證頭痛兩邊最甚眼淚淋漓時流睛

明穴潰膿病翳從內皆出來攀睛肉遮橫白睛積血凝滯赤脉多生眼中小便頻數不休癰疽陡

起熱盛上胞內皆紅腫偷針諸候皆應

足陽明胃經見證齒痛頭疼相併黃膜上冲睛瞳翳

下而上遮定覘肉時時嘔吐下胞紅腫為病

足少陽膽經見證口苦時多重聽銳皆赤脉翳生脇

痛皆由膽病

手太陽小腸見證銳皆赤脉為病翳自抵過上生白

睛血灌紅勝小便赤且澁兮急投湯散須慎

手陽明大腸見證白睛腫赤為病眵多又兼流淚便

結下之須迅

手少陽三焦見證銳皆赤脉牽定翳自客主斜下投

劑宜清應病

足太陰脾經見證九竅不通為病怠惰嗜卧兼之羞明怕日相應上胞浮腫堪嗟睫閉不開若瞶癍瘡風粟面黃發熱吐瀉無定倒睫拳毛內生幾般醫者當認

足厥陰肝經見證瞳仁散大多瞶腦脂直貫睛中時或眼跳無定黑珠突然高起不能正視珠痛淚出昏眩可嗟花陷皆由虛甚瞬眼或多雀盲黑花空中掩映目恙有一於此便是肝家之病

傷醫大全

卷十一

內障

五

顧氏秘書

昏如霧露見花飛瞳人緊小腎精虧或亦有人病散大神水混色光漸微冷淚腦脂直流下頭疼足冷虛極推膜入水輪諸證候足少陰腎經所歸手厥陰經心包絡神水緊小急投藥赤環如帶口且乾手心發熱病將作

翳自抵過而下生赤脉如絲直貫睛健忘更爾多驚悸眊燥緊急不分明痛如針刺時或癢血灌瞳仁防目盲諸般證候因何起手少陰心經所成不疼不痛自昏朦薄霧輕烟漸漸濃或見蠅頭飛亂

出或如懸禧在虛空此狀病證如何得肝臟停留熱毒風大叫大啼驚與恐腦脂流下黑睛中初時一眼先昏暗次第相牽與一同萬般苦楚空憔悴祇緣肝氣不相通日久雙眸全黑暗內障根深藥罔功內障上篇

內障圖形廿四般後學醫人貴得傳金針宜用與忌用認證糊塗怎得痊開針遠近須依法針形各異莫同焉病虛胎產兼懷孕遇此休針是要言不風不雨兼吉日清齋七日念須虔安心定氣耐煩守

傷醫大全

卷十一

內障

六

顧氏秘書

避風靜卧禁人喧冷熱調和虛共實寬懷忘慮色憂煎見血莫驚須下手裹封密室煖為先忽然撞起膜重上服藥三旬見朗然七日解封能視物花生水動莫疑猜還睛九子常常服百日功完復舊元內障中篇

內障金針下了時將息之方要備知嚴冬緊畏常溫煖夏日休將統扇施頭眠軟枕須安穩仰卧三朝莫厭遲封後忽然微有痛腦風牽動莫他疑或針或撥依經法痛極仍將艾熨之嘔吐鼓椒湯急服

定神安胃在良醫起動勞神俱謹戒顛翻倒卧莫
從伊七朝薄粥温温食振着牙關事不宜大小便
時須緩緩毋令自去要扶持高聲喊叫兼因氣驚
動睛輪見雪飛収心莫憶陰陽事夫婦恩情切斷
離一月不須淋洗臉針痕濕着痛微微調養五七
睛光復寡慾清心病自除 內障下篇

天有二曜人有兩目因酒色度過調攝失宜惱怒所
傷肝氣冲動腦脂流下其目系繫於腦帶於肝腦
中惡氣從目系而入於瞳仁面前久而脂堅凝結
成翳遮蔽瞳仁故此失明俗呼為瞳仁反背瞳仁
者非人之目乃仁德之仁也一名眸子無手足如
日月之形前後俱有明光豈有反背之理惟是腦
脂灌睛遮蔽瞳仁名為內障用金針撥開腦脂瞳
仁浮上腦脂沉下如雲開見口頃刻明矣

夫人之眼白睛如杏子烏珠如杏核瞳仁如杏仁所
謂眸子也白睛最堅屬肺金內藏護睛水如鷄子
清之稠濃瞳仁托在正中窠內烏珠屬肝外結一
層浮皮內含清氣包定瞳仁在內一泓一點之微

醫書大全 卷十一 內障 顧氏秘傳

者乃先天元氣結而成者也是皆生生自然之道
目乃肝之竅其形圓大上有一帶一系繫於腦內
連風府自夾脊而下貫通肝臟肝藏血血榮於目
年少之人水火既濟陰陽升降故光明明年老氣血
虧損故昏暗 瞳人根源論

李東垣曰五臟六腑十二經脉三百六十五絡其氣
血皆上於面而走空竅清陽之氣上散於目而為
睛走於耳而為聽因心煩事冗飲食失節勞役過
度以致脾胃虧弱心火盛心火者君火也主人之
神宜靜而安相火代君行令相火者心包絡也百
脉皆榮於目既勞役運動勢乃妄行百脉沸騰邪
害空竅瞳仁中神水既無滋養反受火熾則漸漸
昏耗而失明矣

內障青菜色者不針白如粉墻者不針黃心內障者
不針頭風內障者不針驚振內障者不針瞳仁散
大者不針瞳仁紫小者不針
內障陽看小陰看大者可針其障務宜收放若好若
不收放者不針障翳白色可針白帶微藍可針此


醫書大全 卷十一 內障 顧氏秘傳

二色多糙米色者可針藍色者可針其障嫩故也

金

針

式



凡金針之柄以紫檀花梨或犀角為之長二寸
入分如弓絃粗兩頭鑽眼深四分又用上好赤
金子抽粗絲長一寸用乾麩調生漆入眼中
外餘六分畧尖些不可太鋒利恐傷瞳仁平時
以鷲毛管套之藏於匣內臨時供於
佛前用之無有不驗者也此
龍樹王菩薩神針式也

傷醫大全

卷十

內障

九

顧氏秘書

各視救用針者念咒七遍書一道符封針
凡針內障逢朔望日對神對佛通鄉貫姓


用必先齋戒設供香燭之類又書符一道取太
陽神光接其眼光亦念咒大斗

救苦救難南海觀世音菩薩其針白轉令針者心
膽大開不驚世書後三光符下針宜用開成除
收日並天氣晴明忌用子日


清淨眼紫金燈酒水離黃沙滿藏經千眼千
手千龍王文殊大士騎獅子普賢菩薩騎象王
日神夜神雲膜內障盡消除強中強吉中吉波
羅會上殊利眼中一切得光明清淨不般若

開針三光符 畫符默念三句咒
取日光 接神光 明日光

開針三光符



封針符



神水封針

若針後疼痛急取生艾或乾艾同生葱一把
搗爛鍋內炒熱布袋盛熨太陽穴三五次即止

用水法 凡撥內障先汲井水以盆盛注於桌上令
病者以面就盆用針之人側坐以手蘸水於眼上
連眉骨淋洗使眼中腦脂得水乃凝以水洗透數
十次為度然後用針庶幾隨手而下不粘滯矣

傷醫大全

卷十一

內障

十

顧氏秘書

撥內障手法 醫者用金針撥眼必要知其八法然
六法易傳而二法巧妙在於醫者手眼祇可意會
不能言傳所以難傳難授眼如隔垣見物手如探
囊取物方能撥下翳來人之兩眼乃水之精如無
二法難以用針治之 凡用金針先令患者以冷
水洗眼如水使氣血不得流行為度先用左手大
指次指按定眼珠勿令轉動次用右手持三稜針
離黑珠米許針一穴白珠甚厚必要手準力完重
針則破然後用金針斜回針首入穴內觀看針首

至患處即止如過毫釐傷於心脉其人即嘔然後
用手法將針輕輕推壓其翳自然抱針方許撥下
送至白珠藏在護精水內盡處然後出針針不宜
出早若出早其翳即復則前功盡廢矣

- 一要用水洗灌得法
- 二要知氣血凝與不凝
- 三要知三稜針開鋒遠近
- 四要知進針手之輕重深淺
- 五要知用針推壓
- 六要知藏翳送至護精水底
- 七法入法巧妙出於人心應乎手眼難以筆墨相傳

癆醫大全

卷十一

內障

十一

顧氏秘書

封眼法 預取芙蓉半老綠葉晒乾為末井水調勻
以綿紙剪如茶鍾口大圓塊先將敷藥敷眼眉稜
上及下眶以紙一層封貼藥上又上藥一層蓋紙
一層封定候將乾以筆蘸水潤之日夜數次夏月
倍之一日一換仰面而卧或將針眼向上就枕防
脂泛上也凡起坐飯食及大小二便俱宜緩不可
驚動三日內只用稀粥熟爛餽饌不可振動牙齒
三日後開封視物服藥靜養為主
分別大小圓翳內障論 古人論內障有大圓翳小

圓翳人秉父母胎元瞳仁大小不一瞳仁大者其
翳大瞳仁小者其翳小腦脂流下經年凝結而成
翳也醫者用針自有淺深翳大針淺翳不能落翳
小針深豈不損精誤治者可不慎乎

凡鑱洗查逐日人神所在其經忌用刀針
翳障復起宜平肝順氣其障自落如不能落復針亦
可

凡針後忌用川芎恐行血作痛如痛用熟地當歸白
芍之類

癆醫大全

卷十一

內障

十一

顧氏秘書

瞳仁清白珠紅用桑白皮防風柴胡赤芍
瞳仁內有油氣不清當平肝氣用柴胡枳殼
若作惡心用藿香厚朴半夏淡豆豉
頭痛太陽痛用防風白芷羌活石膏
太陽痛甚用炒鹽熨之
白珠赤用柴胡紅花赤芍歸尾桃仁桑白皮
瞳仁散大用白芍茯神人參麥冬當歸棗仁北五味
凡受熱致瞳仁小者用當歸川芎黃連麥冬菖蔚子
柴胡山梔

大圓翳 按此證先由腎水虧弱後由惱怒傷肝蓋

眼屬臟腑而以肝腎為本腎乃水之源眼為水之

精色慾過度腎水衰弱不能生養肝木亦不能榮

養睛珠加以七情暴怒心胸熱氣上衝入腦腦脂

不固下注於目凝滯遮蓋於瞳仁前結成內障起

時眼前常見垂蟻飛蠅薄霧輕烟不疼不痛漸漸

失明先從一眼久後相傳其脂青白色所稟父母

胎元瞳仁大者其翳即大故曰大圓翳陰看則大

陽看則小初覺宜服冲和養胃湯柴胡當歸白芍
甘草葛根人參

傷醫大全 卷十一 內障 圭 顧氏秘書

黃芪白朮五味子羌活防風 石斛夜光丸 人參山
白茯苓口乾加黃連黃芩 兔絲子五味子麥門冬羚羊角肉苁蓉川芎生地
天門冬白蒺藜枸杞子青箱子草决明杏仁石斛
枳壳犀角熟地白茯苓 甘草防風黃連肉苁蓉年久宜用金針撥之

小圓翳 按此證與大圓翳受病相同俱因慾怒致

傷肝腎熱氣上衝腦脂下注結成青白翳遮蓋瞳

仁夫瞳仁神水通注於瞻臟腑平和氣血循環瞻

汁通流於上則能鑑照萬物肝腎既傷熱氣上衝

不散膽汁不能流通是以脂凝成障名曰小圓翳

者所稟父母胎元瞳仁小者脂即小故也雖見三

光不辨人物初起宜服冲和養胃湯石斛夜光丸

年久宜鼠尾金針撥之

浮翳內障 按此證初起由色慾過度耗竭腎水水

虧火旺攻翳於目視物即昏昧如霧露中全不疼

痛漸因七情鬱結縱慾傷肝以致熱氣上冲於腦

腦脂灌注睛內結成一塊光亮如銀箔色浮在瞳

仁上先從一眼久後相傳不見三光金針難撥初

起宜補腎平肝 治全上

沉翳內障 按此證皆因腎經虧損肝心火盛致目

傷醫大全 卷十一 內障 圭 顧氏秘書

視物昏昧眼前常見黑花腦中惡氣漸漸侵瞳二

三年外凝結成翳青白色如沉水中若見三光宜

針撥之 治全上

澀翳內障 按此證皆因淫慾傷腎縱怒傷肝肝腎

兩傷以失生化之源致令氣血虛弱不能榮養雙

眸日久邪熱炎上腦脂下流結成一塊遮蓋瞳仁

黃色而大凝滯無收吸故曰澀翳初患全前治久

後不宜針撥 按此證皆因肝腎皆虛致使腦脂灌注

珠內形如水銀珠子流動收吸不定不疼不癢祇因昏花而起日久相傳漸漸失明雖見三光不辨人物治全前如年久用蓮子金針撥之

散翳內障 按此證皆緣五臟虛勞酒色過度加之憂思暴怒肝氣上衝腦中惡氣流下凝滯瞳仁之前結而成翳或濃或淡厚薄不一其色黃白散大而無收吸雖見三光不宜針撥不能治也

水翳內障 按此證皆因肝腎虧損風火上炎攻衝痰動以致頭旋連臉眉骨額角偏痛眼中赤澁或

傷醫大全

卷十一

內障

五

顧氏秘傳

黃白黑色不定或夜見烟火久則結成內障其脂如欲解之冰又如碎磁之狀故曰冰翳初起宜驅風痰服半夏白朮天麻湯人參白朮半夏天麻乾薑陳皮神曲澤瀉蒼朮麥冬黃芪神效補肝散夏枯草香附各二兩甘草黃柏黃芩神效補肝散四錢為末每服三錢茶下不宜針撥

金星內障 按此證初患頭痛臉覺微腫目中赤色常見黑花撩亂瞳仁漸昏漸小內有腦脂如金箔色不宜針撥亦不能治皆因水衰火盛所致水本尅火水衰不能尅火反受火制故火愈熾而水愈

竭矣初覺以養血涼血補腎清火為主大抵此證最為難治

橫劍翳內障 按此證皆因肝腎虧敗房勞不節以致昏暗不痛不癢先從一眼久後相傳兩目俱損如劍橫於瞳仁之上雖見三光不宜針撥初起宜石斛夜光丸

棗花翳內障 按此證皆因肝腎不足水衰火盛頭痛腦旋見花飛黃黑不定瞳仁周圍如鋸齒故曰棗花翳初起微覺昏暗皆能視物宜服中和養胃

傷醫大全

卷十一

內障

五

顧氏秘傳

湯石斛夜光丸俱去五味子加菟蔚子為君服之可保如久後內有一點藍星則不能治亦不宜針撥

偃月翳內障 按此證乃肝虧腎損虛火上炎致使腦脂流下遮蔽瞳仁漸成白色如初十夜之月半薄半厚半明半偃先從一眼久後相傳瞳仁俱損不宜針撥

驚振翳內障 按此證皆因肝腎二經虛勞偶遇打撞驚動腦脂流下漸漸昏朦成翳久則白色亦有

自下而入肝經者亦有隨驚隨散者瞳仁無收吸雖見三光不宜針撥治全圖翳

雷頭風內障 按此證初患頭痛足冷惡心嘔吐腦

內如雷鳴致使瞳仁散大漸漸失明不覩三光皆

因暴怒傷肝體氣虛弱風寒之氣所侵逆於三焦

攻衝於頭因頭為諸陽之所會邪正相搏伏而不

散故發痛如雷鳴胃為寒氣所衝故惡心嘔吐瞳

仁神水乃氣之聚也氣為怒傷故散而不聚初起

急服附子猪苓湯人參白芍白茯苓羌活熟地猪苓熟附子香芎散川

傷醫大全 卷十一 內障 七 顧氏秘書

香附石膏白芷薄荷川石斛夜光丸倍加五以取

烏甘草為末每服二錢散大痛極不止用乳香定痛散吹鼻乳香沒藥雄

各五錢煇硝一分五厘研細久則不治

綠風內障 按此證初患頭額痛急兼半邊頭痛鼻

內如烟惡心嘔逆足冷眼內見紅黑皆因肝腎俱

虛氣血虧損瞳仁漸漸散大神水淡綠色大抵受

病與雷頭風相同但因頭痛暴怒過極熱氣上衝

腦中惡氣流於珠內與神水攪混而變成綠色故

謂綠風內障久則不覩三光則不能治初起先止

頭痛服附子猪苓湯候痛止服冲和湯加減夜光丸去肉菴蓉俱倍加五味子

黃風內障 按此證初患之時頭痛乃是肝腎虧虛

風毒相侵又兼脾肺壅熱白睛黃色先患綠風內

障嘔吐傷胃久則變為黃色此乃不治之證也

烏風內障 按此證皆因色慾過度以傷元氣元氣

一虛心火亢盛致眼前常見黑花眼睜鼻梁眉骨

俱酸疼白睛高起數粒色青如豆瞳仁漸漸緊小

視物不明瞳仁屬腎水水本剋火反受火制故昏

傷醫大全 卷十一 內障 七 顧氏秘書

暗緊小火剋肺金白睛屬肺火剋則護睛水滯結

隱起高低不平飛花酸痛等症乃火氣拂鬱血虛

挾風故也初起宜服神效補肝散選奇湯陳皮半

羌活白茯苓黃芩散風補血後服補中益氣湯石

斛夜光丸益氣滋陰不見三光不能治也

黑風內障 按此證皆因氣體虛弱肝腎不足兼以

七情鬱結邪火上盛逆衝於頭目以致頭旋腦痛

眼中昏澁常見黑花漸至瞳仁散大失明瞳仁實

氣聚而成火盛氣散故失明矣此不治之證也

五風變化內障 按此證皆因氣血兩虛臟腑俱勞
毒風上攻腦熱相侵頭旋腦痛嘔吐故此失明不
可治也

瞳仁散大內障 按此證皆因肝腎虧損况怒傷肝
恐傷腎肝腎受傷則瞳仁散大蓋瞳仁屬腎乃氣
之所聚也怒傷則氣散初起昏如霧露中行漸空
中有黑花靨一或二久則光不收遂為廢疾蓋神
水漸散終至盡散初宜冲和湯夜光丸去肉菴蓉
倍加五味子收之俟少有光兼服千金磁珠丸先

傷醫大全 卷十一 內障 九 顧氏秘書

磁石置火中醋淬七次晒乾另研極細末二兩辰
砂細末二兩生神麴三兩外以一兩水調作餅煮
浮為度搜入前藥和煉蜜為丸如桐子大每服十
丸加至三十丸空心米湯吞下 凡服此藥後俯
視不見仰視漸靨三光此其效也 此乃虛證鎮墜
之藥不宜服早恐墜元氣若氣為怒傷散而不聚
者服益陰腎氣丸 熟地山藥山萸肉生地白茯苓
牡丹皮澤瀉五味子當歸柴胡
煉蜜為丸辰砂為衣每服五七十丸空心淡鹽湯
下 此壯水之主以鎮陽光氣為怒傷散而不聚
之故也然必兼磁珠 又為物擊神水遂散此不治
丸服之庶為易效 之證也

瞳仁緊小內障 按此證因腎水虧弱相火強盛水

弱火盛則水受火制故瞳仁漸漸緊小瞳仁者腎
水也初起無痛癢眩淚之證但覺羞澁眵眊瞳仁
毛缺肝水青黃宜服還陰救苦湯 川芎甘草黃柏
羌活黃連知母黃芩紅花生地龍膽草當歸
歸尾連翹升麻細辛蒼朮蘆朮白朮煎服 禦抑相
火夜光丸補腎壯水 去五味子加荳蔻子
畏其酸有收之意 若日久
不節色慾不避勞苦忽加眉骨酸痛必致小如菜
子內凝腦脂或黃或白永不能治

小兒胎元內障 按此證皆因母懷孕時有暴怒驚
恐兼飲食乖違將息失度母食麵食五辛灸燻之

傷醫大全 卷十一 內障 十 顧氏秘書

物併服諸毒丹藥積熱在腹內攻小兒損目及生
二三歲後不言不笑都無盼視父母始覺及長成
方知內障內有翳青白色遮蓋瞳仁若辨三光有
用金針可撥者大抵小兒內障多難治療
經曰目者五臟六腑之華榮衛魂魄之精常營也又
曰諸脉者皆屬於目目得血而能視故臟腑精氣
皆上注於目而為之睛白睛屬肺黑睛屬肝瞳人
屬腎上下胞屬脾兩背屬心而內背又屬膽與三
焦上綱屬太陽膀胱小腸下綱屬陽明大腸五臟

五色各有所司心主赤赤甚者心實熱也赤微者
心虛熱也肝主青青甚者肝熱也淡青者肝虛也
脾主黃黃甚者脾熱也淡黃者脾虛也目無精光
及白睛多而黑睛少者肝腎俱不足也晝視通明
夜視罔見者稟受陽氣衰弱遇夜陰盛則陽愈衰
故不能視也赤脈從上而下者屬足太陽經從下
而上者屬足陽明經若上眼皮而下出黑白翳者
屬太陽寒水從外至內者屬少陽風熱從下至上
而綠色者屬足陽明及肺腎合病然翳膜者風熱
內蘊也邪氣未定謂之熱翳而浮於外邪氣既定
謂之水翳而沉於內邪氣若深謂之陷翳此宜升
發以消之更有疳眼者因肝火濕熱上衝脾氣有
虧不能上升清氣故生白翳睫閉不開眵淚如糊
久而膿流遂致損目雀目者上午能視臨晚失明
此因肝氣衰弱也蓋木生於子旺於卯絕於申所
以午上而能視至申酉而失明况目得血而能視
午後肝氣漸衰且陰虛則火必盛弱陰不能以勝
強火故夜轉劇天明以陽用事陽主動濁陰暫消

故稍明大要治疳養血兼理脾胃為主更有目閉
而不能開者有因過服寒涼之劑致使陽氣下陷
不能升舉而然有因胃氣虧損眼睫無力而然並
宜升陽益胃更有暴赤腫痛風火熾甚者有因多
淚羞明肝心積熱者一宜疎風散火一宜涼血清
肝若風沿爛眼者是膈有熱也若時時作癢者是
膿潰生蟲也若眼睫連劄者是肝經風熱也若初
生日黃壯熱二便秘結面赤眼閉者此胎熱也更
有痘後精血既虧餘毒上侵及斑瘡入眼者有視
物不明不腫不痛但見黑花而無精光者此皆肝
腎並虛也若外無翳膜內障如雲視物不見俗名
青盲者若非腎水枯涸則必久病成疳脈洪大者
養血爲先脈沉細者補陽爲主蓋如天無日色雖
有火鏡何能使晶光相射乎若吐瀉後而始生膜
障不能開舉及無精光者此精滋瀉脫元神已亡
也難治更有熱毒眼小積毒眼小者更有時氣流
行而腫赤者然治法總忌寒涼及單行發散蓋寒
則凝熱則行而風則燥耳况目病雖由火熱然多

因初感風寒，腠理閉密，火熱不得外泄，上走空竅而為病。若散其外感，則火熱泄而痛自止。兼之養血涼血，退翳諸劑，必兼風藥始能上達頭目。且火鬱則發之，以減其盛勢。若槩用寒涼，則邪愈凝滯，亦不可發汗。汗則津液耗而血亦燥，燥則其疾愈甚矣。更有目疾血瘀血熱而投以破血涼血之劑者，或投以寒涼損脾之劑者，皆為不可。蓋脾為至陰，歸明於目。況目得血而能視，血少則熱火愈動，而目愈昏。夫血者木之精脈也，精光者木之華葉也。

易醫大全

卷十一

內障

七

顧氏秘傳

也。脾胃者木之根本也，故莫若以上病治下之法，用引火藏源之方，服於食前，峻補其肝腎，則濁陰降而上熱自除，下陰足而目光自返，陷翳自浮，冰翳自化，倘翳膜過厚者，另以養榮藥中佐以消障疏風之味，服於食後，則標本俱得其功，上下咸受其益矣。錦囊

張蘊山曰：睜眼見黑花，宜服人參固本丸。主之。眼科秘覽
又曰：眼目昏花，視物不明，皆由陰虛火旺，宜用知柏地黃丸加甘菊花治之。

明目第一法，節省酒色，戒惱怒，夜勿看書，減思慮，專內視，簡外視，晨興遲夜眠，早少用辛燥物。

明目要訣：夜卧睡醒，開目轉睛四十九遍，常常左右轉之，永無目疾。

病目勿藥自愈法：夜卧小便時，用力將眼睜開，轉運瞳子，左右各十數遍，然後存想下邊不數日，火即下如點起小便更妙。尋常如用此法，能令火不上炎。

心法曰：皮翻證由胃經血壅氣滯而成。小兒多有之。
易醫大全 卷十一 內障 七

眼皮外翻如以舌舔唇之狀

又曰：患目昏者，不拘時候，靜坐閉息，以兩目輪左轉七遍，右轉七遍，緊閉少時，忽大睜開，久行勿間，則鬱火濁陰運出，清陽精氣獨光。

又曰：治翳當辨其起自何經及翳形何色，各加引經藥。如東垣治一婦，綠色自下而上，知其陽明來也，但綠非五臟正色，殆肺腎相合而為病也。乃就畫家以黑調膩粉合成色，諦視之，與翳同，則肺腎為病無疑矣。乃以瀉肺腎之邪為君，以陽明藥為使。

服之甚效他日復病者三其所從來之經與翳色各異因思必經脈不調以致目病不已詢之果然遂以養血滋陰藥作丸服之而永不發觀此則辨色分經詎可忽哉

又曰治眼有以三稜針刺出血而愈者卽內經血宜決之之義然必初起血盛而熱者宜之在太陽陽明二經方可蓋二經氣血俱多故耳他經出血其病轉劇故曰刺太陽陽明則目愈明刺少陽陽明則目愈昏

瘍醫大全

卷十一

內障

毒

顧氏秘摺

東垣治一人因用豬肉煎餅與蒜醋同食復大醉而卧熱炕次日瞳子散大視物不真諸方不應乃以酒炒芩連瀉熱爲君歸身生地養血涼血爲臣五味子酸収瞳神散大人參二冬地骨皮生甘草枳殼苦甘補中抑氣爲佐柴胡引經爲使服之頓愈丹溪治一壯年人早起忽視物不見就睡片時畧見而不明食減倦甚其脈緩大重則散而無力意其中濕所致詢之果卧濕地半月乃以白朮爲君黃芪陳皮爲臣附子十劑而愈皆治本之神見也

海藏治一女及笄而病目三年紅腫難開服散風清熱之藥反生翳從銳眥邊瞳神右目之翳從下而上其脈短而實潔古曰短爲有積經曰從內走外者少陽病從下上者陽明病乃少陽陽明有積滯於中抑遏臟腑以致清陽不升濁陰不降乃以去積之藥加黃連龍膽草每早化服一丸一日便下黑血塊如豆大而甚堅硬由是翳退目明矣

馮魯瞻曰予幼年讀書過勞而常目病今看書寫字畧多便易於舉發發時惟以八味丸加牛膝五味子者每日食前各進五六錢一日共有一兩五六錢矣外用黃連錢餘入銅青分許煎濃汁洗淨兩三次俟紅障少淡再入人參二三分於內溫和洗之則光還而能視物如故矣

瘍醫大全

卷十一

內障

毒

顧氏秘摺

澄曰凡治時眼七日內切勿就用當歸菊花若用早便難速愈此專門眼科秘法也

內障門主方

退翳

當歸身 蒼朮 蘇薄荷 甘草

川芎 白蒺藜 黃芩酒炒 穀精草

白芍藥 紅花 木賊草 桔梗

各等分水煎服

又方

柴胡 木賊草 防風 黑山梔

白蒺藜 紅花 穀精草 荆芥

傷醫大全

卷十一

內障方

老

顧氏秘書

菊花 蘇薄荷 赤芍藥 各等分

白水煎

又方

沙苑蒺藜 白菊花 穀精草 各二兩

真蘇薄荷 一兩

右為細末煉蜜為丸鹽湯送下三錢

又方

白菊花 玩月砂 草決明

菟藟子 白蒺藜 夜明砂 各等分

研細煉蜜為丸如彈子大白湯調服

真陰虧乏眼目昏花或雲翳遮睛

甘枸杞 一觔酒浸透分四處 一川椒全炒 一

白木 白茯苓 熟地黃 各一兩

製畢研細煉蜜為丸鹽湯送下三錢

翳障昏花

懷生地 半觔酒洗竹刀切片微火烘乾 烏犀角 一兩不見火

白蒺藜 炒去刺 杭白芍 酒炒 杜仲 去絲

玩月砂 微焙各四兩 當歸身 酒洗過 釵石斛 酒洗蒸一

傷醫大全

卷十一

內障方

老

顧氏秘書

白菊花 去心蒂 懷牛膝 酒洗焙 懷山藥 微炒各

防風 酒洗焙 川芎 各二兩 蟬蛻 去砂土頭

右為末煉蜜丸早晚白湯送下三錢

羊肝明目丸

羚羊角 白菊花 去葉蒂 北五味

青箱子 牡丹皮 各一兩 白蒺藜 炒去刺

密蒙花 嫩黃芪 蜜拌炒 遠志肉 甘草湯浸

天門冬 麥門冬 去心 白芍藥 酒炒

兎絲子 各一兩 酸棗仁 炒 杜仲 鹽水拌炒

一冊五十二頁 冊數多日厚以書寫 8 又三寸

白茯苓

乳拌三次

於白朮

東壁土炒

懷山藥

炒

人參

各二兩

黑羊肝

一具去淨膜

澤瀉

瀉八錢

當歸身

酒洗二兩

生地黄

用砂仁五錢全酒煮爛搗

香附

童便浸一宿晒乾用

醋拌炒

各四兩

黑羊肝用木賊草二兩全酒煮爛去木賊草將

肝全上藥磨細末煉蜜爲丸每早白湯送下三

錢每晚白酒送下二錢

幼年腎虛眼花

北五味

打匾焙

麥門冬

焙各二兩

甘枸杞

黑芝蘇全炒去芝麻

傷醫大全

卷十一

內障方

羌活

顧氏秘書

白蒺藜

隔紙炒

釵石斛

酒蒸焙

魚鱔

一觔切蛤粉炒成珠

研細蜜丸每早淡鹽湯送下三錢

中年眼目昏花

蔓荆子

煮熟炒晒乾

草决明

微炒各半

研細用沙苑蒺藜半觔熬膏杵丸食遠白湯送

下二錢

退翳障並治赤眼

熊膽少許淨水畧調開取去筋膜塵土入冰片一

二分如癢淚加生薑汁少許以銅筋蘸點

眼生外障視物昏黑

猪膽一個傾入銀器中微火熬膏加水片少許點

又方

猪膽外膜晒乾擦線煨灰加水片研細點之

眼珠上白星

東丹一分

輕粉

麝香各五厘

研極細左眼吹右鼻孔右眼吹左鼻孔

眼目生星暫時得者可退

白蒺藜三錢水煎洗之三日即無星

傷醫大全

卷十一

內障方

羊

顧氏秘書

外障翳膜昏爛眼藥

宣黃連

甘菊花

當歸

各一錢 黑山梔

黃芩

連翹

木賊草

黃栢

荆芥穗

防風

各五分

黃二錢

共入砂鍋內加童便七碗煎濃汁去渣作七分

以蘆甘石四兩研爲粗末入銅杓內炒熟入藥

汁一分滾乾又投汁一分滾乾如此七次已畢

研極細加硼砂燈心各一錢牛黃雄黃各三分

珍珠五分全研千餘下再加熊膽五分冰片麝

香各一分自然霜一錢又研無聲為度磁瓶密貯挑少許點大眼角一日二次連點七日

製自自然霜法 新磚一塊磨光以桑柴燒紅放半平處皮硝一升酒熱磚上待硝盡盡冷定用布一塊裹磚縫好投糞窖內三七日滿取出冷水洗淨用大綿紙包好放潔淨處候磚上生白霜以鴨翎掃收

翳障

人指甲刮末人乳調點

病後生翳大人小兒皆宜 救急方

白菊花蟬蛻等分為末入蜜少許水煎服

湯醫大全

卷十一 內障方 手 顧氏秘書

杏仁膏

藥匾杏仁一粒去皮尖細磁器內研細滴熱人乳

二三滴浸片時絞去渣點眼角內數次翳即去矣

鷺翎丹

諸種目疾屢試神效兼治眼漏亦效

粉盧甘石

三兩用川連二兩龍胆草二兩煎汁待甘石煨赤滓汁內以酥為度研如飛塵仍投前汁內晒乾

官硼砂 二錢

新珍珠 一錢

真血珀

片腦

熊膽 各五分

右各味研至無聲即入前汁內搓成如線細條眼乾以鷺翎管貯用時取一條夾眼角內自化沁入一條可治數人

點眼

莖

去淨油一兩用秦皮煎湯洒濕安平底碗內用艾圓三枚各包川椒一粒燃着薰之再放瓦上煨乾研極細入後藥

硃砂

飛一錢 硼砂 五錢 麝香 五分

共研極細點之閉目一炷香為度

點眼

湯醫大全

卷十一 內障方 手 顧氏秘書

蘆甘石 三錢

新珠子

硼砂 口含吐去濕水

琥珀 各七分

真蟬酥 烘去油

冰片 各一分

兒茶

烘去油 三分 麝香 二分

硃砂

磁粉

煨紅滓人乳黃連汁內七次 各五分

右各乳至無聲為度和勻點之

眼生蘿蔔花神方

取極大白蘿蔔一枚剉空入鷄子白一枚種土內

待其開花結子後取起取出鷄子白研細加蘆甘

石煨過一錢熊膽五分冰片一分五厘研絕細末

以蜜和點眼一日一次七日全好

退翳 駱肩山

夜明砂

無名異 煨

龍膽草

青蛤粉

穀精草 各三錢 蘆薈 一錢

各研末用牙豬肝一個不見水竹將藥末散入

肝內用線縫好放砂鍋內或蒸或煮以肝熟為

度食之忌生冷葱蒜椒薑發物

清心明目丸 濟生

補心養血清神長智潤肺利竅聰耳明目

傷醫大全

卷十一 內障方 葦 顧氏秘書

生地 酒洗 遠志 甘草湯 石菖蒲

川連 當歸身 酒洗 甘菊

麥冬 甘草 各一兩 五錢 甘枸杞 二兩

煉蜜丸如桐子大每服七八十九臨臥燈心湯

下

地黃丸

眼眶痛肝虛羞明

生地 釵石斛 熟地 元參

各等分煉蜜丸茶清食遠服二錢

明目奇方

此方乃東郊省充二公合議而成治頭風之藥以之治目纔能清上依方服之果獲神效至重

者不過四十貼全好

石膏 一錢五分 蔓荊子 研 羌活

防風 荆芥 當歸 各八分

青箱子 研 鷄冠子 研 草决明 研

連翹 各七分 龍膽草 木賊草 各六分

桔梗 白芷 北細辛 各五分

傷醫大全 卷十一 內障方 葦 顧氏秘書

藁本 四分 甘草 三分

白水煎食後服

血虛下淚羞明怕日雙目昏花

香附 一兩 夏枯草 五錢

研末淡茶調服三錢

又方

甘枸杞 六兩 甘菊花 一兩

煉蜜丸空心白湯送下三錢

冷淚

臘月不落桑葉煎水頻洗最效

紅絲絆睛

蘆甘石

整塊者火煨紅 淬車前草汁內九次 淬黃連湯內九次 淬黃芩湯內九次 淬黃柏湯內九次 淬童便內九次 五製已畢研細水飛晒乾又研綿紙篩加

熊膽

硃砂

梅片

再研千轉以無聲為度磁瓶密貯每用少許點

兩眼角內或用烏羊膽汁調收亦妙

七十二種眼症眼藥

宣黃連

家菊花

各四兩

當歸

三兩猪肉湯洗

湯醫大全

卷十一

內障方

素

顧氏秘書

用清水十碗煮濃汁濾去渣再入銅鍋入紋銀

一兩藉氣熬至砂糖色冷定加

蘆甘石

製過

燕

磨汁

水

片

四分

麝香

白蜜

一匙

羊肝

三錢

毛

成珠 一根炭火上燒

調勻搥成條收貯勿令洩氣每用少許乾點眼

角其藥自化不必水調

病後兩目昏視物不見

元眼核二枚剝去外面漆皮水磨濃汁塗兩眼胞

神效

疔疾眼生翳膜並肚大泄瀉面黃肌瘦神效

肉菓

麩包煨

史君子

去殼五

胡黃連

白蒺藜

炒去刺

蘆薈

各一錢

共為末鷄肝一具酒漿少許全搗爛去渣入前

藥末調勻蒸熟食之喫二三服立愈

疔疾並出痘壞目神方

青浦徐氏傳

蜜蒙花

酒洗淨

殺精草

蟬蛻

去翅足

望月砂

各一兩

共為末用雄猪肚一個竹刀剖開將藥末摻入

湯醫大全

卷十一

內障方

素

顧氏秘書

水煮熟飲汁食肚盡一料全愈

撥雲錠子 劉長隨從都中盤山得來

治一切眼疾又能開瞽復明神效

蘆甘石

將蘆甘石揀去隔石選潔白者先以紙包石用醋壘頭上泥入桶內以童便浸透鍊

熟少少糊在紙外又以火硝末滾在泥毯

上外再以厚泥包圓大約蘆甘石一筋可

分作四五個每包一筋為度成晒乾如

兩研細滾這四五個磚砌一大爐架火將

有縫以泥補之另以磚砌一火將完可將

起翻轉入爐添火加炭過夜不必守之隨

爐中炭火化完為度一爐可煉蘆甘石二

三筋每蘆甘石四兩用川黃連龍膽草各

澄清將蘆甘石煨紅傾入藥汁內取起又
再取乾藥水俱取入蘆甘石內為妙每料
只用製蘆甘石三錢再加

熊膽五分 冰片二分五 白礪砂三分

麝香五厘 硃砂分 水飛三分 活烏鴉翎二分

右為細末 用川芎當歸赤芍藥生地燕薄荷防
風防已川黃連甘菊花龍膽草各五

錢木賊草黃芩黃柏羌活大黃白芷各二錢河
水六碗浸一日夜炭火熬出汁來去渣澄清撤

淨再用文和煎藥末和勻搓成條子重二分用
火熬成膏

鷺毛管收藏黃蠟塞口 凡點眼時以清水或

人乳或津唾潤濕點眼閉目少刻神效臨臥點

湯醫大全 卷十一 內障方 羣 顧氏秘書

之更妙或用人乳化開塗眼胞上下揉入眼內

多塗過夜即日見效

羊肝退翳丸

治雀盲眼一切昏花老眼

懷生地 熟地黄 白茯苓 人乳拌

懷山藥 炒各三 甘枸杞 夜明砂 淘淨各

木賊草 蜜水拌 密蒙花 蜜拌炒 青箱子 各二兩

草決明 二兩五錢 提碎 川黃連 八錢 白酒浸一宿

黑羊肝 一具 去外膜 蒸熟

將前藥為粗末全羊肝搗勻再烘晒令乾再磨
為細末用煉蜜為丸如桐子大每服二三錢空

心淡鹽湯送下 忌蘿蔔胡椒雞鴨蛋

黑珠凹下蟹睛

鱈魚血晒乾研細以筆蘸點三次全愈

退翳

鮮鷺不食草 又名土 揉軟塞鼻退翳最速如無鮮
者陰乾揉塞亦可但初塞必噴涕不已不必疑懼

赤眼翳膜 葛仙翁

湯醫大全 卷十一 內障方 羣 顧氏秘書

大訶子一枚白蜜磨點

小兒疔翳未堅者不可混點眼藥

珊瑚研如粉每日少少點之自愈

退翳羊肝丸 張九臯

夜明砂 木賊草 白茯苓 炒去刺

蟬蛻 當歸 各二兩

共為細末用蒸熟黑羊肝二兩切片晒燥為末

水法疊丸每服三錢開水送下

退翳神方

木賊草 火煨 石决明 火煨 穀精草 火煨各一兩

黑羊肝 一具用銅刀切片放蒸籠內蒸熟以麻線串掛陰乾不可經鐵器

共為細末每早晚用紅糖湯調下

眼藥

蘆甘石 煨碎黃連 湯中七次 珍珠 各一錢 白礪砂

牛黃 琥珀 冰片

雄黃 熊膽 各五分 蘇薄荷藥

硃砂 各三分

共乳極細點之其筋膜即下重者漸落

海藥 洗淨泥砂刮去硬甲用黃連黃柏黃芩大黃各等分煎汁煮藥取起晒乾

眼藥

研細加水片點之

清肝補腎羚羊丸 陳尚書

治少年老年眼目視物不明者

羚羊角 一枝鎊研紙包縛有乳婦青 鹽二兩

犀角尖 五錢製全於百草霜飛細參

健豬肝一具煮熟搗萬下和丸每服二錢空心

白湯送下

老年眼昏 何龍泉

谷精草不拘多少切成段全黑羊肝一具切片入

銅小鍋內每早老人自己炒之其味入鼻眼昏自

亮

琥珀膏

點七十二眼症

麝 仁 去油膜 二兩 大珍珠 琥珀

象牙末 硃砂 水飛 白礪砂 各二錢

玄明粉 二錢 五麝香 冰片 各一分

共乳極細煉白蜜調膏點之

珊瑚膏

治二十年昏眼能見日光燈頭者可治

蘆甘石 火煨水 丹 水飛各 乳香

沒藥 海藥 水飛 礪砂 各一錢

青 鹽 水飛五 冰片 三分 麝香 二分

煉白蜜和膏點之

初起痘翳

白水牛虱子取血點翳上

琥珀散

治諸般外障紅赤羞明風熱火眼血縷癰瘡翳
膜眼弦赤爛生眵流淚

蘆甘石 煨一兩 琥 珀 細竹紙包水 片 三分

共乳極細點眼

推雲散

治諸般外障雲翳蟹睛血翳赤膜

石 蟹 澁水泡去夾石並砂土用竹 黃 連 去鬚

白丁香 各一錢 官 粉 金 錫 堅重有金 星研飛

海醫大全 卷十一 內障方 聖 願氏秘書

青 鹽 銅內水化開澄去 赤石脂

銅 綠 古錢上者刮下研細 礪 砂

乳 香 透明者箬包四五層銅鍋內 清水煮數沸換水煮去油

沒 藥 製全上 熊 膽 去皮膜 當門子

枯 礬 冰 片 各一分

共乳細用一秘方加 蛛黃一錢竹 蠟五十個

黃連膏

蘆甘石 煨二兩 石 蟹 二錢 琥 珀

珍 珠 熊 膽 各一錢 冰 片 二分

麝 香 三分

先將甘蔗二枝 去皮切 作薄片用 清水四五碗煮二碗

將渣搗汁濾清入川黃連二兩熬一碗去渣濾

淨加川蜜二兩又熬至大半碗入前藥共一處

研至無聲

秘精兔絲丸

治內障昏花翳障腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦

怠夜夢遺精

懷山藥 打糊 七分 白茯苓 石蓮肉 各二兩

海醫大全 卷十一 內障方 聖 願氏秘書

兔絲子 煮餅五

右用山藥糊加蜜丸空心臨臥俱用鹽湯送下

三錢

明目夜光丸 張中寰治眼奇方

生 地 酒洗 釵石斛 當 歸 酒洗

兔絲子 酒煮搗 青箱子 枸杞子 各二兩

人 參 山萸肉 去核 懷牛膝 酒洗

粉丹皮 元 參 各一兩 白茯苓

山 藥 各一兩 密蒙花 菊 花 各五錢

北五味 七錢

煉蜜丸空心開水送下三錢

神效眼藥

麩仁 止白者佳去淨油二錢

冰片 一分

硼砂 三錢 真牛黃

麝香 各五釐

共乳極細骨簪蘸點

昇靈藥法

水銀 一兩 枯礬

焰硝 各一兩六錢

先將硝礬共研細入兩耳小鐵鍋內鵝翎掃圓

易醫大全

卷十一 內障方 聖 顧氏秘傳

上以指按五指眼如梅花樣將水銀均分於內

上以粗碗蓋之週圍以綿紙擦濕水封口再加

研細軟石膏按緊於碗底上上以大鐵錘壓之

於風火爐上微火煨二炷香但見石膏上有氣

出即壓之再加武火一炷香取起冷定刮下研

收 昇黃靈藥加官粉 一兩六錢 昇紫靈藥加陀

僧 一兩六錢 火候宜小

昇白靈藥法

生鉛 水銀 各一兩 硼砂 三錢

先將鉛化開入水銀即取出為末再入硼砂共

研聽用

食鹽 火硝 枯礬 各五錢

先將鹽硝礬三味共研一處下鍋炒煉乾再研

細分作二股取羊城罐將一股裝在下將汞鉛

硼裝在中間再將一股裝在上面用鐵盞蓋罐

口上以鐵梁壓住鐵線紮定軟石膏細末醋調

封口陰乾爐中用鐵釘三根為三足置罐於上

先文後武煉三炷香取起冷定開看刮下研細

易醫大全

卷十一 內障方 聖 顧氏秘傳

用

煨時若罐口有烟出用新筆蘸水塗之

煨蘆甘石法

取潔白輕而有聲的蘆甘石搥黃荳大用竹紙包

四五層以線縛圓外用紫土入新綿搥勻包在內

約一指厚為圓毬陰三五日收靜處候乾將乾用

線絡掛簷前晒極乾透擇吉日用鐵線縛數道平

地上砌磚爐留門搗風爐中用大釘三根為足置

炭火將毬懸爐上炙一炷香方可下爐煨三炷香

先取童便一小缸入黃連黃芩黃柏各六錢浸半日濾清將毬徐徐入童便內浸一宿取出研細水飛再研聽用

靈光散

治外障癰瘡板睛肉現肉蟹睛俱宜點之

蘆甘石 煨一兩

靈藥一錢重者或二三錢

共研極細末必須調點患處少許將目閉久候痛止藥性散盡方可撥去用絹拭去令淨以熱水洗之 凡病重者連點七日眼胞發腫方可

傷醫大全

卷十一

內障方

聖

顧氏秘書

歇藥避風調理七日看患處有病再點 但此藥最痛若要除病須耐心方效癰瘡現肉重者點淨靈藥少許將目久閉性退之後化而為眵 虛弱者不可點

八寶散

治諸般外障翳膜花陷癰瘡並風眼癩眼紅澁羞明眩淚

蘆甘石

煨一兩

頭號藥

三錢

共研極細用

點翳方

用蘿蔔子一粒研細去殼以燈草蘸唾津調點翳上不過一二次即落

傷醫大全

內障方

聖

顧氏秘書

外障門主論

天行赤眼外障 按此證初患之時皆因天行時氣

受之者兩目赤腫眵緊澁羞明頭痛淚出鼻塞

眵多臙腑秘結宜芍藥清肝散 荆芥防風柴胡薄荷川芎赤芍羌活

炒梔知母甘草桔梗大黃 大便不秘者服羌活勝

風湯 羌活前胡荆芥枳殼防風白朮黃芩柴胡薄荷荷川芎桔梗甘草白芷獨活

赤眼生翳外障 按此證皆因患赤眼之時不避辛

苦外受風日內多房勞耗傷元氣以致纏延不愈

時常赤腫或癢或痛淚出難睜風熱伏積不散上

傷醫大全 卷十一 外障 畢 顧氏秘譜

胞凝血磨擦睛珠漸生翳膜宜鑱洗去上胞瘀血

暴風客熱外障 按此證皆由肺火壅塞熱氣上衝

以致白睛陡紅腫壅起烏珠內陷日夜腫脹疼痛

淚出難睜宜服清金桑皮散 桑皮元參赤芍防風菊花杏仁黃芩枳殼

桔梗旋覆花升麻葶藶子 又肺經火盛熱結白珠紅腫微覺脹

疼近黑珠邊起一二小泡大便乾結者宜瀉肺湯

黃芩羌活桔梗元參大黃芒硝地骨皮

兩背赤脈外障 按此證皆因心與小腸膀胱經蘊

熱或食五辛煎炒熱物致使亢陽上炎火氣熾盛

故大小背赤脈貫睛兼小便澀痛紅赤如淋服八

正散 瞿麥炒梔大黃甘草燈心

臉生斑瘡外障 按此證皆因脾胃二經停積風熱

作癢流淚用手搓揉或誤服寒涼之劑致使眼胞

內瘀血凝滯不散故生血縷後因勞役酒色過度

漸成堅硬疔瘡形如花椒相似內有白漿磨擦腫

仁卽生翳膜治法先宜鑱洗去瘀血輕者羌活勝

風湯重者防風散結湯 防風羌活前胡柴胡蒼朮黃芩黃連獨活白芍防已

紅花當歸尾甘草白茯苓蘇木此藥治上下胞內

傷醫大全 卷十一 內障 畢 顧氏秘譜

點烏金膏或靈光散俟病去大半服清熱消凝丸

治淫熱反尅風熱不散白睛如血貫有熱而血滯者川芎當歸荆芥薄荷羌活藜蘆本菊花滑石石膏

連翹山梔甘草黃芩白朮桔梗煉蜜爲丸每圓重一錢二分臨臥時清茶調服

臉生風粟外障 按此證皆因脾經受風致使血壅

熱積不散或爲病已久腫澁難睜亦與癩瘡相類

但只胞內生小窠如粟米堅硬白色磨擦睛珠淚

出澁痛漸生翳膜治法先用針刺出風粟白漿服

勝風湯 羚羊角散黃芩確黃芩桔梗防風

白翳花陷外障 按此證皆因七情五賊饑飽勞役

損傷脾胃兼之肝血不足以致睛疼如刺刺應太

陽眼睫無力常欲垂閉淚出羞明珠上即生白翳

陷下如粟米魚鱗之狀先服柴胡復生湯珠痛者

服當歸養榮湯熟地當歸白芍川芎羌活防風白芷應滋難開服當

歸活血湯當歸黃芪甘草升麻柴胡白芷防風蔓荊子元氣虛弱者服

補中益氣湯花陷不起者亦可服

蠅頭蟹睛外障 按此證皆因肝腎俱勞火邪炎熱

之極兼之七情鬱結以傷脾土脾土既病則失生

生之職不能含血上榮於目故睛珠疼極淚出難

翳或因暴怒烏珠上暴起藍黑翳如蠅頭蟹睛之

狀離瞳仁而起者名為離睛蟹眼當瞳仁而起者

名為蠅頭先服柴胡復生湯白芍川芎藁本柴胡蒼朮甘草白芷茯苓

羌活黃芩蔓荊子薄荷獨活桔梗五味子痛不止服當歸養榮湯次服

黃芪湯神效補肝散虛者冲和養胃湯後服石斛

夜光丸俱加五味子以斂之點推雲散八寶散此

證外點內服必要積以歲月其翳方能收復亦有

不能去者

黑翳如珠外障 按此證皆因腎虛肝熱子母俱虧

其病感受大抵與前證相倣睛珠疼痛淚出難睜

羞明怕日烏珠上邊生黑翳突起如黑豆先服黃

芪湯人參黃芪知母白茯苓育神夜光丸人參生地熟地

天門冬麥門冬欒斛牛膝當歸枳殼枸杞子地骨皮兔絲子菊花遠志煉蜜為丸白湯下

血翳包睛外障 按此證皆因脾受風熱更兼肝腎

虛勞上胞有病磨擦睛珠內因積熱外感風邪遂

使凝血不散漸生翳膜上有紅絲縱橫錯貫遮蔽

瞳仁難以視物治法先宜鑷洗去上胞瘀血先服

勝風湯兼當歸散當歸生地熟地黃連山梔赤芍桑白皮防已龍膽草後服

石斛夜光丸點烏金膏如有客熱風痰之證則宜

育神夜光丸

血灌瞳仁外障 按此證皆因肝心火盛載血上貫

目中心者君主之官神之舍也屬火宜靜或因大

驚傷心大怒傷肝心神散亂以致火性妄動載血

錯經妄行灌注於目遮蔽瞳仁紅色不分黑白疼

痛難睜驚狂罵詈如見鬼神目乃五臟六腑之精

華榮衛魂魄之所常營也亦神氣之所主也神亂

則魂魄散故言狂亂見矣治法宜急砭迎香穴在鼻

孔內即愈初病一二日紅色即可疔若日久如圓

兩傍紫黃色則不治矣疔法取粗茶葉篋上箬葉二片以中間硬梗為脊

剪成針長一寸四五分如劍形頭尖身闊取其至

鼻內小孔穴處即止不能往上也用時將針安放

然內向穴處餘八九分在外用手忽即令臥煖處

不可驚動久睡自醒其妙如神後服川芎行經散

加五靈脂散劑行其積血自愈

雞冠覘肉外障 按此證屬脾胃二經積熱外受風

邪致使血凝不散上胞內壅瘀血一塊軟而紫黑

色即雞冠下胞內生瘀肉一條軟而淡紅色即覘

肉宜鑱去瘀血服抽風散元參黃芩桔梗防風細辛車前大黃芒硝點

靈藥烏金膏

翳肉扳睛外障 按此證初患赤眼臨風不避辛苦

延久而成或因熱足下於冷水或因跣立行房致

傷陽蹻經絡者其脈起於足上行至頭面屬目內

眦此經既傷內眦即生赤脈如縷縷根生瘀肉瘀

肉生黃赤脂脂則橫侵黑睛漸蝕神水或兼銳眦

而病者合於太陽經也治法如未蝕黑珠者服勝

風湯加蔓荊子撥雲退翳丸川芎荊芥菊花甘草黃連蛇蛻當歸川椒

蟬蛻密蒙花蔓荊子地骨皮白蒺藜木賊草桃仁

薄荷天花粉煉蜜丸重八分每服一丸食遠清茶

調下有翳米泔水調下睛昏當歸有熱者兼服還

湯調下內障者用木香湯調下

陰救苦湯已蝕神水者另有割法詳載銀海拔萃

白膜侵睛外障 按此證皆因肺熱肝虛腎水虧弱

腎水不能生肝木故肝受肺之邪熱所尅烏珠週

圍漸生白色如翳日久漸遮瞳仁終有昏暗之患

先服瀉肺湯以瀉肺經之實熱後服育神夜光丸

加天冬麥冬滋陰補腎

膜入水輪外障 按此證皆因目病已久抑鬱不舒

更兼調理失宜房勞太過以致肝腎虧虛漸生翳

膜始而藍色若蠅翅日久則白厚矣宜沖和養胃

湯石斛夜光丸

黃膜上衝外障 按此證皆因胃經邪熱凝滯氣血

以致白睛下邊紅赤生翳黃色沖上黑珠澀痛淚

出羞明難睜脾胃屬土土色黃胃傷則土之正色

見也先服防風通聖散瀉去積熱後服通脾瀉胃

湯天門冬麥門冬菖蒲子點琥珀散元參知母黃芩大黃赤膜下垂外障 按此證皆因上胞脛經風熱血積

成癡目珠被其磨擦腫痛淚出差澁不睜熱壅不能疏洩血愈凝滯不行烏珠卽生赤膜目上垂下紅色漸遮瞳仁宜鑱洗去上胞瘀血散目中瘀血宜川芎行經散點八寶散推雲散

逆順生翳外障 按此證烏珠生翳自上而下者謂之順屬脾經從下而上者謂之逆屬胃經起自脾胃證見肝經日久漸遮神水皆因身體虛弱氣血不足以致諸經感受邪熱使血凝滯不行磨擦而生翳膜此翳最難去初宜服撥雲退翳丸兼育神

湯醫大全

卷十一

外障

聖

顧氏秘傳

夜光丸點八寶散推雲散若翳自下而上者服防風通聖散一二劑卽去

風吹出臉外障 按此證皆因脾胃二經感受風熱日積月累壅滯胞臉之間蓋臉受風則皮緊脾受風則肉壅皮緊肉壅故眼皮或上或下翻轉在外上生瘀肉紅紫色眵淚如膿治法先宜鑱洗去瘀血服勝風湯點烏金膏靈光散久則不可也

迎風流淚外障 按此證皆因腎肝虧損蓋肝虛則淚不收淚者肝之液目乃肝之竅液之道也肝木

生於腎水水衰不能生木母子兩虛邪火內燔於目外遇風吹肝木爲其搖動是以液道開而淚出不收初起無他證惟浸浸淚出拭去又流經冬病者多年久不分四季宜服四物補肝散育神夜光

丸若不早治兩眼俱黑色昏暗不明者生地熟地煉蜜丸每早晚淡鹽湯送下二三錢

癢極難當外障 按此證皆因心經火邪脾經風熱久伏不散攻衝目中忽遇風邪干觸遂作癢難禁用手揉擦亦不能止蓋癢非謂虛也乃火與風也

湯醫大全

卷十一

外障

聖

顧氏秘傳

風觸則火發風火相併故作癢耳久則兩臉赤爛羞澁難開眵淚若糊若胞內有瘀血宜鑱洗先服藥本疎風散川芎藜蘆本羌活防風蟬蛻細辛點八寶散

偏睛膿血外障 按此證皆因肝火心盛積熱壅毒烏珠內有膿自下灌上或珠高起如瘡樣流出膿水蓋肝臟生火藏血上榮烏珠火盛氣衝血脈凝滯不行陰陽相搏乃化爲膿發時苦頭痛珠疼外寒內熱涕淚交流食眠不得四肢倦困昏悶俱火之象也宜撒膿撤火服黃芪湯候膿淨次服柴胡

復生湯點琥珀散八寶散

鵝眼凝睛外障 按此證乃氣血不分混結而成初患無痛疼但上胞腫起如豆許漸漸長大內有紫斑大抵人身氣血不欲相混混則阻滯於皮膚之間遂成此病初治須擇人神所在不犯之日翻轉眼皮向外於紫斑處用眉尖刀刺破患處以犬指捻出黃脂後服防風散結湯如初起畧覺有礙用白酒煎消毒飲歸尾甘草白芷陳皮赤芍防風天花粉金銀花皂角刺數劑亦消夫名鵝眼凝睛者蓋鵝鳥之眼凝視不運此

傷醫大全 卷十一 外障 藥 顧氏秘書

病長大堅硬礙寒睛珠視物不能運動故以各之痛極憎寒外障 按此證皆因房勞思慮以傷心腎陰血勞役饑飽以傷胃腑陽氣氣血兩傷水火不能升降皮膚間無陽衛外護為風寒之氣乘虛以侵攻衝於頭伏而不散頭為諸陽之會邪正相搏故頭痛不可忍目珠紅腫流淚火邪上逆不降則陰氣觸併於下故足膝逆冷身憎寒戰治法宜補陰降火服附子猪苓湯

打撞傷損外障 按此證皆因被物打撞手拳打着

睛珠突出一二寸者登時急用手掌擦熱托定睛珠而珠系一得熱氣自然緊縮就上仍收眼眶中但不可就洗去血外即用熟地黃搗膏攤薄絹封貼眼上日換三次服除風益損湯川芎當歸白芍熟地蒙木前胡防風

打撞積血外障 按此證皆因被物打撞胞臉凝血腫痛難開白睛紅如血灌服川芎行經散川芎羌活獨活荆芥薄荷防風白芷柴胡枳殼桔梗當歸茯苓紅花甘草蔓荊

打刺生翳外障 按此證皆因被物打刺積血未散

傷醫大全 卷十一 外障 藥 顧氏秘書

或刺痕未痊久則珠上生白翳遮睛有膿血者服川芎行經散血虛者服除風益損湯翳膜者用八寶散推雲散緩點之

傷寒愈後外障 按此證皆因大病後清陽之氣不升餘邪上熾不休而走空竅其病癰澁赤脹生翳羞明頭腦骨痛宜服勝風湯升發清陽 又一證乃因用辛熱之劑發表太過以致氣虛身弱特病雖愈而瞳仁漸漸散大蓋辛主散熱則助火上乘於腦中故睛散經所謂壯火散氣耳先用勝風湯

重加五味子以收耗散之氣數劑之後兼服冲和

養胃湯後用石斛夜光丸倍加五味子自愈

痛如針刺外障 按此證皆因心經潛伏壅熱風毒

上攻故病白珠淡紅流淚癢澁難開內皆時時痛

如針刺宜服洗心散 黃連黃芩桔梗大黃知母元參荆芥赤芍當歸點琥

珀散

瞳仁乾缺外障 按此證皆因腎水虧損反受火制

故瞳仁小如芥子而且缺內有腦脂凝結或黃或

白此係內障因頭痛而起故列於外障初病頭痛

傷醫大全

卷十一

外障

毒

顧氏秘書

難忍坐臥不寧宜補腎清肝退火為主久則不見

三光不治也

停肉瘀血外障 按此證皆因連患時眼未愈不避

勞苦見風太早以致脾胃受風肝氣不和使瘀血

凝滯胞臉之間兩胞腫澁淚膠粘先用鑷洗服

勝風湯點琥珀散若不愈點烏金膏靈光散

羞明怕日外障 按此證皆因病日久延不愈鬱火

內炎邪風外客致使脾家感受積伏於胞臉之間

但胞臉屬脾蓋脾統血邪氣既盛則血無所歸故

見陽氣光明禁不能敵是以噫淚交作眊暎羞明

怕日難睜宜服瀉脾湯 黃芩桔梗蒼朮梅仁大黃車前甘草勝風湯

點琥珀散

肝經積熱外障 按此證皆因肝家勞苦蘊積風熱

兼以七情之氣鬱結不散衝於腦攻於目致目赤

色生翳或聚或散時發時好初覺頗輕年久漸重

宜勝風湯點琥珀散並八寶散

熱毒癰疽外障 按此證皆因過食五辛煎炒炙煨

之物或熱水洗浴太過熱毒上攻蒸氣入腦致生

傷醫大全

卷十一

外障

毒

顧氏秘書

癰疽其病自上胞內背起紅腫疼痛即服消毒飲

輕者可以內消重者可以外托或上胞或白睛出

膿者可保無虞但肝經黑珠出膿者則損目失明

若服消毒飲出膿之後身體虛弱者服補中益氣

湯加減用之可也

夜間珠痛外障 按此證皆因肝經血不足肝氣壅

塞兼以寒氣相乘以致血病不行夜間珠痛頭疼

淚出不止筋脉俱痛蓋目為血脉之宗又為肝經

之竅繫於腦帶於肝肝藏血氣順則血行循目系

上榮目中光彩而明氣逆而血病則目無所養邪併而痛况夜屬陰正寒氣旺盛之時肝氣既逆又遇寒陰乘之邪正相搏是以淚出疼痛治宜疏風活血服神效補肝散

回回頭痛外障 按此證乃回教之人以水洗浴從頭倒澆至足其濕髮漬於頭上冷氣侵入睛中以致頭痛目系凝滯瘀血眼弦緊急大抵頭為諸陽之會陽為火宜散而不宜伏目為氣血之宗宜煖而不宜寒既受冷濕所傷是成凝痛之病宜洗輪

傷醫大全 卷十一 外障 李 顧氏秘書

散 當歸白朮羌活山梔牛蒡甘草

旋螺突起外障 按此證皆因臟腑俱勞積伏毒熱以致攻衝於目睛珠忽然腫硬突出如癰如疽流膿流血俱已潰損不治之症只可消腫定痛而已 轉轉關外障 按此證皆因肝臟風熱邪毒兼以原患瘡毒餘毒未盡上攻於頭害走空竅目裏臟腑之精凝結而成毒攻其間不即發出自根抵底壅長瘀肉將珠托出眶外脹大如瘤掛於額上睛珠不能轉動瞳仁直視胞臉還自啟閉雖無疼痛

等證斷不能治日久加以七情鬱結毒邪攻急忽然痛腫破裂而已蓋直視者太陽經絕也不獨目不能治命亦隨之而傾

胞肉凝脂外障 按此證皆因脾胃二經感伏風熱淫邪凝血在內不散攻於上下胞紫黑浮腫閉不能開如膠粘膩先服祛風散 黃芪茯苓當歸元參蒼朮白芷防風羌活 菊花芫薺子 鑱洗瘀血服勝風散點烏金膏並靈光散

婦女經水過多外障 按此證皆因行經去血過多或山崩漏血產後下血過多以致肝脾虧損蓋肝

傷醫大全 卷十一 外障 李 顧氏秘書

藏血脾統血二經既傷則血少火盛遂有土炎之患攻衝頭目致令頭痛目暗珠疼淚流赤澁生翳如粟米魚鱗陷下先服芎歸補血湯 當歸川芎生地天冬熟地 白芍防風甘 四製香附丸 酒鹽童便醋四製香附草白朮牛膝當歸白芍熟地川芎人參黃柏白朮澤蘭葉益母草煉蜜丸每服三錢空心白湯送下一方少人參白朮 點琥珀散八寶散

婦人經血逆流外障 按此證皆因心脾傷損凡室女童子積想在心不得遂志思慮過度多致勞損

心神男子則神色敗女子則經水閉邪火上炎逼血錯經妄行逆注於目烏珠上下紅如血灌甚者烏睛週圍如贅肉生起若血翳包睛相似須服通經破血湯川芎生地黃連甘草連翹蘇木甘菊花歸尾赤芍黃芩羌活大黃紅花劉寄奴木賊草使翳膜自消而經血調順後點琥珀散並八寶散

小兒疳眼外障 按此證皆因過食生冷麵食兼之饑飽不勻以致脾胃傷損日積月累釀而成病膜理不密令目怕日羞明淚流膿珠痛生翳或陷

瘍醫大全

卷十一

外障

李

顧氏秘書

下或生蟹睛腮下癩瘰口疳好啼善食肌肉消瘦身熱發黃肚腹痛疼治當理脾胃平肝木切忌寒

涼通利之劑先服茯苓燥濕湯

人參白朮葛荆子羌活甘草白茯苓

防風前胡枳殼獨活柴胡

人參啟脾丸人參白朮茯苓山藥

川芎蒼朮澤瀉蘇薄荷茯苓山藥

蓮肉陳皮澤瀉甘草山查肉用荷葉煮老米糊丸如桐子大每服三五丸清米飲送下九味

蘆薈丸蘆薈燕麥當歸川芎白芍甘草胡黃連廣木香龍膽草煉蜜丸重一錢臨臥清米湯送

下若初起目睛無神睛縷如蠶腹腹大下痢紅白乃不治之候不久當殞

小兒胎元外障 按此證皆因其母懷孕過食五辛

熱毒之物或浴水過熱感受熱毒攻及小兒之目致生下時兒目即病或一二月而病或百日之外始病皆係胎毒未散其證疼痛淚出赤澁難睜羞明怕日烏睛生翳突起如黑豆甚則紅腫不開眵淚如糊宜服除熱飲甘菊花芫蔚子知母黃芩木賊草元參大黃防風竹葉土引片為燥濕湯亦有食乳母熱毒之乳而病者

小兒斜視外障

按此證皆因痘後痧後風邪入腦

致令目系帶轉故睛珠不能正視亦有驚振所傷

者宜服消風散防風通聖散

荆芥薄荷桔梗川芎白朮石膏甘草大黃

瘍醫大全

卷十一

外障

李

顧氏秘書

防風連翹黃芩當歸白芍滑石山梔芒硝水煎食後服大便不實者減硝黃 兼養血之劑

外障門主方

服礬法

如遇每年常患火眼之人傳服此法奇驗

每逢冬令交四九第一日起每早吞生明礬五七

分如此九日可保一年不患火眼 將礬打碎揀

去大塊掃去細末只取勻淨小塊約五七分開水

一鍾先喫一口嚥乾喉舌將礬置於手掌心內送

下喉間再用開水吞之倘有未曾嚥下之礬用水

漱吐出則不瀉矣

傷醫大全

卷十一

外障方

奎

顧氏秘書

又方

用生紅棗去核納皂礬少許捏緊入火煨存性泡

開水洗火眼如神

又方

川黃連一錢

生明礬八分

大黑棗一枚去核

水一鍾煎洗

又方

王瓜一條去穰納皂礬少許化水以水洗之

又方

防風

薄荷葉

當歸

杏仁

朴硝

川黃連

燒鹽

各等分

枯礬

銅青

硼砂

各少許

右為末每用三分井水浸洗

又方

大紅棗

二枚去核入明礬銅綠各三分川黃連三分

於內紮緊濕紙包煨存性打碎入絹包好水三鍾煎一半入冰片少許每日洗

三四次

傷醫大全

卷十一

外障方

奎

顧氏秘書

又方

花椒七粒

川黃連

膽礬各一分

桑葉七片滾湯泡汁待溫洗之

又方

紅棗一枚去核入青礬一分五厘於內以火煨紅

加古錢一枚同棗入水碗中露一宿燉溫洗之

洗眼明目日期

皮硝六錢煎水

正月 初五日

二月初一日

三月 初四日 五月 初一日

六月 初四日 七月 初二日

八月 初一日 九月 初三日

十月 初六日 十二月初五日

又方

生薑洗淨搗取自然汁磁盆貯烈日晒乾刮取磁瓶密貯每用少許點大眼角

又方

朴硝泡水頻洗一切風火濕眼可免眼角破爛

傷醫大全

卷十一 外障方 藥 顧氏秘書

又方

小茴香 一錢 冰糖 黑葡萄乾 各二錢

銅 綠 八分 明 礬 六分

天水一碗或雪水浸露一宿冷洗如有翳障加

海螵蛸 去甲 二錢

又方

防 風 荆 芥 各五分 杏 仁

桃 仁 各十粒 膽 礬 柏 礬 各一分

水一碗將藥投入隔水煮透取起洗之

又方

杏 仁 七粒去皮尖研甘 草 一錢

入水碗內紙蓋飯上蒸再入皂礬一錢罌煎先薰後洗立消

又方

凡風熱眼作痛作癢及天行害眼赤眼風淚眼用皮硝六錢新汲水一鍾煎七分入磁器內候冷定洗眼每日洗四五次眼須微開令水入目內用中指擦五遍如癢甚加明礬一二錢泡洗即止

傷醫大全

卷十一 外障方 藥 顧氏秘書

又方

川黃連 皂 礬 各三分

水浸一時搽數次腫痛自消

又方

胡黃連 白 蒺 藜 炒黃芩

石決明 蘇薄荷 當 歸

北細辛 家菊花 木賊草

黑山梔 粉甘草 連 翹

蟬 蛻 懷熟地 陳 皮

龍膽草

右各一錢水三碗煎一半臨臥溫服戒氣惱

又方 岐天師

洗實火眼紅腫如含桃淚出不止酸痛羞明多
眩

黃連一錢 明礬三分 荆芥五分

花 椒七粒 生薑一片

水煎半碗乘熱洗之一日洗七次明日即愈

又方 岐天師

瘍醫大全 卷十一 外障方 李 顧氏秘書

洗虛火眼紅而不痛不澀無淚無翳

人乳半鍾 生地黃二錢 明礬五厘

葳蕤仁五分去殼取
仁一分研碎

水半鍾同人乳煎取藥汁少許洗七次明日愈

又方 雷直君

柴胡 防風各二分 黃連三分

明礬一分 花椒三粒

水半鍾入藥飯上蒸洗眼如神一日洗三次二

日即止痛

又方 張仲景

人參 黃連 明礬各三分

大黑棗一個 人乳一合

水半鍾同煎二沸即取洗眼日七次三日愈此
方洗虛實眼神效

又方 馮魯瞻

真川連三錢 生粉草六分 杏仁去皮生

銅青三分 膽礬一分 大元棗一枚

右味稱準不得加減分厘頭煎與二煎和勻用

瘍醫大全 卷十一 外障方 李 顧氏秘書

新棉花收之乘熱擦眼以喉中作苦為度餘者

曬乾可藏數十年此料可治十數人不拘風火

眼類洗立效老眼昏花流淚者洗之如少年

又方 馮氏兒科

當歸 郁李仁打碎 防風各一錢

黃連七分 荆芥八分 膽礬

明礬各三分 杏仁去皮尖七粒

水煎溫和洗眼避風

又方

銅綠 生黃連 各五分 明礬 二分

朴硝 三分 防風 荆芥 各八分

當歸尾 七分 杏仁 七粒

滾湯泡透頻頻溫洗

勝風湯 何氏濟生

治風熱上攻白珠赤甚暴腫痛甚者立效

白朮 土炒五分 柴胡 七分 枳殼 炒

羌活 白芷 川芎

獨活 防風 前活

瘍醫大全 卷十一 外障方 堯 顧氏秘書

薄荷 桔梗 各四分 荆芥

甘草 各三分 黃芩 六分 杏仁 去皮尖 炒三分

水煎服 爛弦眼加蟬蛻 去足 僵蠶 炒各六分

赤腫作痛

生地酒浸搗爛厚塗眼上

又方

豆腐切片乘溫貼眼胞上

又方

雞蛋煮熟去殼剖兩開去黃乘熱合眼上

又方

臨睡以水濕透眼眶上下將眼合緊用篩過明礬末厚敷一宿腫痛自消

風火赤眼雲翳點藥 北京僧授

麩 仁 去心皮膜 砂 淨二分 冰 片 二厘

野苧薺 取粉五分 明礬 極細五厘 麝香 一厘

加金箔十張研極細磁瓶密貯點兩目背內

真人碧雪膏

治男婦冷淚常流並暴赤眼點之神效

瘍醫大全 卷十一 外障方 半 顧氏秘書

臘月內三辰日取羯羊膽十數個將蜜裝膽內綿

紙虛籠吊簷下一七日雞翎掃下膽上霜磁瓶密

貯以骨簪排點眼角內

諸般目疾

荆芥 甘菊花 白芷

蘇薄荷 防風 密蒙花

甘草 黑芝蔴 川芎 各等分

共磨細每日早中晚清茶調服二錢

點風火眼昏眼雲翳攀睛

葶藶粉

生

薑

取汁澄

透明礪砂

各一錢

右乳細加冰片二分又乳勻以人乳調點

目腫而痛多淚多眵紅而如有物似針觸者是實火
症 岐天師

柴胡

白蒺藜

半夏

黑山梔

甘草

水煎服此方之妙全在直散肝膽之鬱火火散則熱自退不攻之攻勝於攻不下之下勝於下也一劑奏功不必再服

又方

瘍醫大全

卷十一

外障方

圭

顧氏秘書

當歸 五錢

川黃連 去毛

枯

礪 各一錢

銅青 三分

燒酒浸洗其腫自消其痛自止每日可洗兩三次

次

眼腫不開

真三七磨汁塗眼眶一宿即愈

洗眼奇方

出道藏

張道人從道藏內檢來普濟十方不論瞽目雲霧風火昏花久洗自明

皮

硝 六錢

生桑白皮 一兩

白水煎每遇日期熱洗數次日期開後

正月 初五日

二月 初二日

三月 初三日

四月 初九日

五月 初五日

六月 初四日

七月 初三日

八月 初十日

九月 十二日

十月 十二日

十一月 初四日

十二月 初四日

閏月全本月 已上吉星日子乃通光明也其

瘍醫大全

卷十一

外障方

圭

顧氏秘書

方千金不易屢試屢驗

洗眼仙方

防風 五分

礪砂

膽

礪 各二厘

同煎湯洗

洗風火濕熱紅腫眼方

南京四聖堂道士湯松阿傳

苦參 切片

杏

仁 去皮尖研

膽

礪 八分

入碗內開水冲上以棉紙糊碗口紙上戳眼將

病眼薰之待溫去紙洗眼仍將棉紙糊好隔水

頓熱又薰又洗神驗

蕤仁膏 張氏眼科家秘

治一切風火眼遠年近日眼疾如神

蕤仁霜 一兩五錢 硃砂 水飛 黃丹 水飛

礪砂 各二錢 冰片 麝香 各五分

共乳極細用煉蜜調成膏密貯每用少許點大

小皆

洗眼仙水 阮氏秘方

膽礬 先研細 連翹 防風

荆芥 紅花 各三錢 銅綠

瘍醫大全 卷十一 外障方 葶 顧氏秘書

明礬 皮硝 當歸尾

甘菊花 赤芍藥 各五錢 杏仁 研

桃仁 各四十粉研

共入罇內用燒滾河水井水各五觔沖入藥內

重湯煮大半炷香將罇半段埋在土內蓋好每

次用藥水一酒盃以軟絹蘸洗一日即愈

火眼

北細辛 川牛膝 龍膽草

當歸尾 各二錢

作一劑白水煎服即愈

洗時眼 方于上

山梔子 十四個 桑白皮 二錢八分 明礬 七分

黑棗 七個

河水一碗煎半碗洗之

治風痰偏頭痛攻於眼目視物不明痛不可忍者

陳膽星 明天麻 濕草紙 製半夏

川貝母 川羌活 防風

黃栢 厚朴 北細辛

瘍醫大全 卷十一 外障方 葶 顧氏秘書

知母 元參 前胡

痛甚加蔓荊子 白水煎十劑見效三十劑全

愈 永忌猪肉要緊

洗風熱眼痛癢並天行害眼及風淚赤眼

皮硝六錢新汲涼水一甌煎七分入磁器內放陰

涼地上出火毒候冷洗眼日三五次將目漸開少

滲硝水入目用中指擦五遍眼紅瞳子內癢甚加

明礬一二錢同泡效尤速

風熱赤眼

冬青子不拘多少搗汁熬膏淨瓶收固埋地中七日每用點眼

又方

自己小便除去兩頭者抹洗

敷火眼痛眼風熱眼

天南星

赤小豆 各等分

研細生薑汁調敷太陽穴

火眼紅腫如桃

白川芎 五錢

川黃連

鷺不食草 陰乾各一兩

瘍醫大全

卷十一 外障方

圭 顧氏秘傳

共研細末磁餅密貯口中預含冷水取藥少許

吹入鼻竅吹後待口中水熱吐出即消

眼胞腫大痛不可忍

母生薑連皮搗取淨汁枯白礬三錢調成膏塗眼

胞上勿令入目立消

一切風赤眼眼皮癢癢赤爛久治不效

臘月猪油五錢先熬化漸入白蜜少許加入白蠟

三錢熔化入研細輕粉一錢冷定不時搽赤皮上

洗風毒赤眼翳膜

黃連 赤芍藥

當歸尾 各等分

煎水乘熱洗之日三五次

風淚眼每出則淚流盈頰

穀精草 為君

甘枸杞

白蒺藜 為佐

共磨細末羊肝蒸熟搗和為丸不終劑而愈

風淚不止

盧甘石

煨研本飛一錢

海螵蛸 五分

冰片 少許

共乳細點太眼皆角淚即收

爛弦風眼冷淚癢澀有虫

瘍醫大全

卷十一 外障方

圭 顧氏秘傳

母生薑一塊以銀簪插入即拔出點眼皆角

洗眼

大紅棗七八十枚去核每個入皂礬少許於內縛

住用陳米升半煮飯將棗放飯上蒸之約一時許

棗熟收藏聽用 每次用滾湯大半鍾取棗一枚

入湯泡化先閉眼用手指蘸抹五六回後開眼洗

抹二十回一棗水可留洗五六日每日頓溫洗五

六次但洗時稍痛却有奇功

風火眼

白芷

桑白皮

銅綠各四兩

皂礬

八兩

紅棗

去皮核生的四兩
煮熟的六兩搗膏

右研細全棗膏和丸如龍眼核大每用一九開

水泡洗

洗眼 錢竹冷

赤眼紅腫或疼或癢

當歸

一錢二分

白芍

八分

杏仁

或用
麩仁

黃連

各六分

銅青

三分

共入銅鍋內煎一二滾入人乳一酒盃乘熱洗

瘍醫大全

卷十一

外障方

表

顧氏秘書

火眼

川芎

二錢

猪牙皂

三錢

青黛

一錢

共乳極細末左眼患吹左鼻孔右眼吹右鼻孔

兩眼吹兩鼻孔

廣大重明湯

洗眼癢

防風

北細辛

甘草

龍膽草

菊花

各等分

水煎乘熱洗

洗肝湯

暴赤眼腫痛服一二劑後服清火藥

當歸

赤芍

羌活

生地

防風

各一錢
川芎

白芷

各八分

生大黃

二錢

薄荷

七分

水煎服

產婦月內眼痛

黃連研末水調搽足心或薑汁調白礬末搽足心

或天南星四錢生大黃六錢研細以醋調稠左眼

瘍醫大全

卷十一

外障方

表

顧氏秘書

痛塗右足心右眼痛塗左足心以口中有藥味為

效

洗風火時眼

明礬

銅綠

各三錢

研細用白菓肉烏梅肉杏仁各三十個研爛和

丸如芡實大用紗袋包裹線紮投滾水內泡出

綠水青布洗眼

眼藥

蘆甘石

傾銀罐內殿紅淬入
童便內七次三錢

白硼砂

海螵蛸 河水煮七次內外極淡為度各二錢 冰片 三分

龍膽草 二兩水洗淨入磁壺內水五鍾煮至二鍾濾過再熬成膏

用膏調勻搓如線香樣外以官粉為衣貯於蠶毛管內用時以骨簪蘸點

碧玉丹

治一切火眼並痘風赤爛弦風拳毛倒睫淚澁難開

黃連 杏仁霜 秦皮

蘇薄荷 各一兩 銅青 三錢 明礬 一錢五分

傷醫大全 卷十一 外障方 羌 顧氏秘書

川椒 五分 官粉 一錢

共研細末用烏梅肉五錢入井水少許浸爛加白菓肉三兩同搗如泥和前藥末為丸龍眼核大每用一丸入涼水五六匙浸化任點洗

緇眼藥

治遠年近日諸般赤腫眼疾火眼

官粉 四兩 銅青 五錢 白靈藥 四錢

麝香 冰片 各三分

共研極細用黃柏歸尾各四兩水七碗煎至半

碗去渣入廣膠三錢化開入前藥做長條陰乾用清水磨塗上下四圍三次待乾洗去

蔡仁膏 張仁寰

治赤腫火眼爛弦風眼並疼痛不忍一切等症

麩仁 去殼去皮去心去油 硃砂

礪砂 黃丹 各二錢 麝香

冰片 各七分

共研細用上好本地蜜入鍋內熬一滾去沫候溫入藥於乳鉢內共研成膏注磁罐內任用

傷醫大全 卷十一 外障方 半 顧氏秘書

火眼疼痛 錢仲林

生地黃不拘多少切薄片入火硝少許同白酒搗爛如泥丸如蛋大敷腦後枕骨風池處將帶子紮好片時即止

爛弦風眼門主論

秘笈云此證皆因脾胃壅熱兼受風濕更加勞役辛
苦犯色衝風日積月累外受風邪內伏積熱胞臉
之內變生風粟故上下眼弦潰爛赤痛淚出羞明
用手拂拭不離無分四季宜勝風散加殭蠶蟬蛻
或消風散川芎羌活防風陳皮甘草厚朴
藿香荆芥殭蠶蟬蛻白茯苓先以碧
玉丹洗之以琥珀散點之始可愈也

傷醫大全

卷十一

爛弦

全

顧氏秘書

爛弦風眼門主方

驗方

淨皮硝

當歸

杏仁

銅青

川黃連

各六分

右為末井水小半杯浸隔紙洗

爛弦風眼

一婦患此用覆盆子葉旋採以手揉軟入口中咀
嚼而留汁聚於小竹筒內外用舊皂紗蒙在患人
眼上用筆畫雙眸於紗上然後將藥汁滴漬眼下
弦轉盼間虫出紗外有虫數十條狀如絲色赤而
長復用前法滴上弦又出虫數十條兼服消風清
熱活血之劑而愈

傷醫大全

卷十一

爛弦方

全

顧氏秘書

爛弦赤眼痘風火眼百發百中

井水河水各半壘皂礬八兩銅青二兩埋地中用
時取水洗之日久者尤效

爛弦風及痘風眼

杏仁三粒去皮尖研爛加銅綠黃豆大一塊為末
和勻用新青生絹包此二味井水一酒杯浸岸時

待水中有綠色不時洗眼一日數次數日後即好
風赤倒睫爛弦眼

五倍子不拘多少為末蜜水調敷

紅眼邊

蛔虫洗淨放磁盤內竹刀劈開取蛔虫腹內水點
眼邊

又方

鳳仙花洗淨晾乾搗爛臨臥敷眼胞上下不過數
次即愈

瘍醫大全

卷十一

爛弦方

全

顧氏秘書

洗方

蘆甘石

川黃連

各五分

銅

綠

三分

共槌碎清水泡露一宿頻洗三日愈

爛弦迎風淚

川黃連

明礬

赤芍

銅

綠

防風

當歸

各五分

煎湯洗

痘風爛弦流淚

頭胎男子頭一次臍屎擦弦上

又方

防風

山梔

皮硝

枯礬

銅

綠

各五分

用蠶繭五枚入藥在內仍用線縫好以井水大
半碗浸之俟水現黃綠色將碗重湯燉熟洗三
五次永不發

又方

鉛粉二錢

銅綠一錢

水調濃塗碗內外用碗一個盛艾團燒着以有

瘍醫大全

卷十一

爛弦方

全

顧氏秘書

藥之碗蓋上俟艾烟燒盡將藥刮下每用新汲
水調濃臨臥時以新筆蘸塗弦上即愈

治殘風爛眼膏 愈陳久愈效

皮硝

潮腦

蘇薄荷葉 不研

明礬

各三錢

將薄荷疊數層於碗內前細末鋪上以小碗蓋
之用麵糊口將碗置灰火上升一炷香放地上
冷透開看將碗內升藥刮下如前再升再刮以
黃色不用為度加麝香冰片數厘蜜調成膏點

或將此膏加蘆甘石少許以人乳浸黃連取汁調點亦妙

瘍醫大全

卷十一

漏弦方

全

顧氏秘書

拳毛倒睫門主論

李東垣曰倒睫拳毛由皮鬆弦緊故拳毛倒入內刺睛珠礮澁難開眼胞赤爛癢而兼痛乃脾經積熱肝風合邪上壅所致

秘笈云此證皆脾肺虧弱又受心與小腸二經火剋肺屬金主一身之皮毛目之上下睫之外亦其屬也小腸屬火與心相為表裏分上下而目之睫亦其屬也陽火內盛致使上下眼皮內急外弛時常赤腫難開其睫毛皆倒向裏睛珠受刺漸生翳膜

瘍醫大全

卷十一

拳毛

全

顧氏秘書

羞明砂澁生眵流淚初服無比蔓荊子湯人參黃芩歸黃連柴胡乾葛蔓荊子防風細辛黃芪防風丸人參黃芪防風丸甘草蔓荊子煉蜜丸每服三錢空心白湯送下點八寶散琥珀散兼碧玉丹洗之如久病不能去用三灰膏點去拳毛後退翳膜但此膏極猛點之必得法方妙若誤着睛珠必致傷損不可輕施慎之

眼毛倒睫門主方

驗方

生木鬚子一個去殼研末絲綿裹好左眼塞右鼻孔右眼塞左鼻孔兩夜其毛自分上下

又方 神珍

石斛川芎各等分研末口中噙水隨左右眼吹鼻中日二次

秘方

捉大蠹子擠血點之即愈

湯醫大全

卷十一

拳毛方

全

顧氏秘書

倒睫拳毛

無名異研末捲紙作燃油潤點燈吹滅以烟薰之睫毛自起

又方

鯨膽塗之眼毛即順

雀目眼門主論

秘笈曰此證皆因腎水虧弱肝血不足乃憂思恐怒勞役饑飽過而不節皆傷脾胃脾胃受傷則陽氣下陷五臟不能相生陽衰不能抗陰故夜有燈月亦不能見也夫晝為陽夜為陰陽主氣而陰主血經曰目得血而能視今夜間血分當旺之時而反不能視何也難經曰血為榮氣為衛榮行脉中衛行脉外蓋言氣血相調無偏勝之理以偏為病今遇夜之陰氣盛陽氣衰則血雖旺而氣不足故陽氣不能上升而陰氣亦不能獨榮於目矣初起頭旋常見五色不定目中困倦時暗時明宜服中和養胃湯四物補肝散後服猪肝散石斛夜光丸又曰高風內障此證皆因臟腑熱極氣血兩虧肝腎虛勞致使日夜不能見物先因肝虛雀日久則不覩三光謂之青盲不治之證也

湯醫大全

卷十一

雀目

全

顧氏秘書

雀目眼門主方

煮肝方

石決明

個火煨研細黃蠟二兩

為丸用驢肝一葉或猪肝羊肝竹刀刮開將丸納肝內以線紮緊煮熟露一宿清晨燉熱食之

又方

石決明

一個煨研蒼朮一錢

猪肝一觔和藥末炒熟伏鍋上先薰眼然後食肝連服三次自效

瘍醫大全

卷十一 雀目方

全

顧氏秘書

大人小兒雀目

石決明

煨洗各二錢

研細用健猪肝一兩羊肝更好竹刀刮開入藥線縛入砂鍋內米泔水煮熟臨臥時肝汁並服

四物補肝湯

當歸

夏枯草

各一錢熟地

白芍

香

附各八分川芎七錢

甘艸

三分

水白煎食遠服

猪肝散

健猪肝尖

七個蒼朮三錢

米泔水浸清晨至晚入罐內煮至水乾為度露一宿空心服三四次即愈

瘍醫大全

卷十一 雀目方

全

顧氏秘書

熱錫爆竹湯火傷目門主方

秘方

治爆竹熱錫湯火傷目珠痛不可忍

蘆甘石煨一錢冰片三分

研細點上立刻止痛

湯醫大全

卷十一

火傷方

全

顧氏秘書

風絲入目門主論

秘笈云凡因偶被飛絲沙塵入眼粘貼不出眼皮疼
痛沙澁難開以致心躁火動重手揉擦遂令紅腫
疼痛流淚羞明治法急磨金墨塗於眼內閉少刻
翻轉眼皮以骨簪撥去塵灰風絲即愈若不諳此
法日久加之七情鬱結愈增火矣若患胞臉瘀血
凝積磨擦烏珠漸生翳膜先服車前散人參桔梗
元參茯苓
細辛赤芍五味子勝風湯點琥珀散可鑱洗去瘀血
子大黃車前子

湯醫大全

卷十一

風絲

全

顧氏秘書

風絲入目門主方

驗方

木梳垢為小丸放眼角邊其絲即出

又方

石菖蒲槌碎左目塞右鼻右目塞左鼻百發百中

又方

鮮薑汁少許點眼內飛絲自隨淚滾出腫即消

又方

桑樹漿點之即出

瘍醫大全

卷十一

風絲方

全

顧氏秘書

又方

新筆潤開眼內攪之

沙塵入目門主方

驗法

凡沙塵入目但閉目連吐唾噦幾口自出

又法 徐氏抄錄

取活蜣螂一枚持其斧於眼上影之即出

諸物入目

淨水磨京墨以筋頭點入目中即出

瘍醫大全

卷十一

沙塵方

全

顧氏秘書

烟渣入目門主方

驗法

凡小兒好喫烟者課犯如將別湯洗目愈洗愈疼必至眼瞎而後止須將亂頭髮或綵緩

纓緩擦之即愈

麥芒入目門主方

驗方

大麥煎湯洗之即出

目部望色辨症法

目赤唇焦舌黑者屬陽毒

目裏黃色暗者屬濕毒

目黃兼小便利大便黑小腹滿痛屬音血

目瞑者持欲衄血

目白睛黃不渴脉沉細者屬陰黃

兩皆黃者病欲愈

閉目不見人者屬陽

閉目不欲見人者屬陰

傷醫大全

卷十一 辨眼色

九十五

顧氏秘書

睛昏不識人目反上視睛小瞪目直視目邪視目

睛正圓戴眼反折眼胞陷下此入症皆死

目睛微定暫時稍轉動者屬瘕

目中不了了睛不和不明白者此因邪熱結實

在內不了了者謂見一半目不見一半目是也

眼眶黑者亦主內有瘕

直視喘滿下利者死

黑氣在魚尾相牽入太陽者死

傷醫大全目錄

卷十二

顛臉部

面部望色辨症門主論

面熱門主論附方

面寒門主論附方

面痛門主論

粉花瘡門主論附方

面疔風毒門主論附方

傷醫大全

卷十二

目錄

顧氏秘書

面上熱毒惡症門主論附方

疔風粉刺門主論附方

雀斑門主論附方

而生黑斑門主論附方

痣門主論附方

臉發門主論附方

顛癩門主論

顛骨肉疽門主論

疔疽門主論

托腮癰門主論

頤發門主論 附方

疔腮門主論 附方

大頭傷寒門主論

傷寒瘥後遺毒門主論

時毒門主論 附方

傷寒瘥後碗頭瘡門主論

鼻部望色辨症門主論

過梁疔門主論

傷醫大全 卷十二 目錄 二 顧氏秘書

鼻疽門主論

鼻疔門主論

鼻腫門主論

鼻瘡門主論 附方

鼻疔門主論 附方

鼻痔門主論 附方

鼻淵門主論 附方

赤鼻門主論 附方

鼻衄門主論 附方

鼻冷門主論

鼻崇症門主論

噴嚏門主論

傷醫大全 卷十二 目錄 三 顧氏秘書

瘍醫大全卷十二

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

塔錢之禎貞

男 櫟燮用和

今校

顴臉部

凡屬顴臉腮頰頤鼻一切癰疽瘡毒皆彙於此部中以便檢閱療治

瘍醫大全

卷十二

顧氏秘書

面部望色辨症門主論

面顴頰赤在午後此虛火上升不可作傷寒治

面赤脉數無力此伏陰病假熱也

面赤脉沉細此少陰病外熱內寒陰盛格陽宜溫誤

用寒涼者死

面赤脉弦數此少陽病宜小柴胡和解

面部通赤色此陽明表證未解宜解肌不可攻裏

面唇青是陰寒極

面青兼舌捲囊縮是陰寒

面青兼小腹疔痛是夾陰傷寒

面目身黃兼小水短澀是濕熱

面目身黃小腹脹滿硬痛小便利是畜血傷寒

面白而無神或汗多是脫血所致

面白人不宜大汗

面黑人在傷寒內涉虛不宜參朮大補益氣多實故也

瘍醫大全

卷十二

顧氏秘書

面熱門主論

靈樞曰手面與身形也天寒則裂地凌冰或手足懈
墮然而其面不衣何也曰十二經脉三百六十五
絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於
目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣上出於
鼻而為臭其濁氣出於胃走唇舌而為味其氣之
津液皆上燠於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒
不能勝之也

東垣曰飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生
瘍醫大全 卷十一 面熱 三 顧氏秘書

大熱有時而火上獨燎其面蓋陽明經多氣多血
又兼挾風熱上行諸陽皆會於頭而故令面熱如
醉治宜先為散其風熱或以調胃承氣湯加黃連
犀角疎下兩三行徹其本熱散其風熱以升麻湯
加黃連主之

馮魯瞻曰手足六陽之經皆上至於頭而惟陽明胃
脉起鼻交頰中入上齒中挾口環唇循頰車上耳
前過客主人故人之面部陽明之所屬也其或胃
中有熱有鬱火則面熱升麻湯加黃連若風熱內

甚而上攻令人面目浮腫或面鼻紫色或風刺癢
疹隨證治之

瘍醫大全 卷十一 面熱 四 顧氏秘書

面熱門主方

升麻加黃連湯

治面熱

升麻

葛根

各一錢

白芷

七分

炙甘草

白芍

生犀角

川芎

荆芥穗

薄荷

各五分

黃連

酒炒四分

水煎溫服

瘍醫大全

卷十二

面熱方

五

顧氏秘書

面寒門主論

馮魯瞻曰胃中有寒則面寒宜先以附子理中湯溫

其中氣次以升麻湯加附子主之

瘍醫大全

卷十二

面寒

六

顧氏秘書

面寒門主方

升麻加附子湯

治面寒

升麻

葛根

白芷

黃芪

熟附子 各七分

炙甘草

人參

草薺 各五分

益智仁 三分

連鬚葱頭二莖水煎温服

瘍醫大全

卷十二

面寒

七

顧氏秘書

面痛門主論

馮魯瞻曰面痛爲火蓋諸陽之彙皆在於面而火陽也心之華在面而心君火也然暴痛多由火質久痛多因血虛蓋胃主正面而以腸胃爲市因飲食之熱毒聚於中則發於外故爲痛更有過勞與饑則痛者此中氣不足也

瘍醫大全

卷十二

面痛

八

顧氏秘書

粉花瘡門主論

澄
曰粉花瘡多生於室女火浮於上面生粟癩或痛
或癢旋滅旋起亦有婦女好搽鉛粉鉛毒所致兼
有慾後汗出迎風揮扇而生

瘍醫大全

卷十二

粉花瘡

九

顧氏秘書

粉花瘡門主方

婦女面上粉花瘡

鉛粉五錢 輕粉五分 枯礬三分

研勻菜油調稠塗磁碗底內外用斬艾一兩放
炭火上燒烟薰碗內待艾盡為度覆地上出火
毒逐早搽面上瘡自愈

驗方

上淨桶出恭時用粗紙先從臉往下一指再搽恭
隨手擲淨桶內數次自消

瘍醫大全

卷十二

粉花瘡

十

顧氏秘書

又方

乾荷葉採碎每用五分每日沖滾湯服之久服之
自消

面遊風毒



瘍醫大全

卷十二

面遊風

七

顧氏秘書

面遊風毒門主論

王肯堂曰面遊風毒此積熱在內或多食辛辣厚味
或服金石剛劑太過以致熱壅上焦氣血沸騰而
作屬足陽明胃經初覺微癢如虫蟻行搔損則成
瘡痛楚難經準繩

心法曰此症生於面上初發面目浮腫癢若蟲行肌
膚乾燥時起白屑細如魚鱗次後極癢抓破濕熱
盛者津黃水風燥盛者津血痛楚難堪皆由平素
血燥過食辛辣厚味以致陽明胃經濕熱受風而

成癢甚者宜消風散痛甚者宜服黃連消毒飲外
搽摩風膏

瘍醫大全

卷十二

面遊風

七

顧氏秘書

面遊風毒門主方

摩風膏

麻黃 五錢

白檀香

白芨

當歸身 各一錢

升麻

防風 各二錢

羌活 一兩

香油五兩浸五日文火熬黃去渣加黃蠟五錢
熔化絹濾冷塗

瘍醫大全

卷十二 遊風方

五

顧氏秘書

面上熱毒惡瘡門主論

書曰面上熱毒惡瘡乃醇酒炙燂飲食熱毒聚於胃
腑故發於外宜栢連散主之

瘍醫大全

卷十二 面熱毒

五

顧氏秘書

面生熱毒惡瘡門主方

栢連散

胡粉

黃栢灸

黃連 各等分

研末豬脂調敷

肺風粉刺門主論

申斗垣曰肺氣不清受風而生或冷水洗面熱血凝結而成破玄

粉刺即粉疵乃肺熱而風吹之多成此疵雖無關人

累然書生嬌女各多此病亦欠丰緻治以滅癩丹

為之添容秘錄

馮魯瞻曰肺風是鼻生紫赤刺癢疹錦囊

陳實功曰肺風屬肺熱粉刺酒齧鼻酒刺屬脾經此

四名同類皆由血熱鬱滯不散又有好飲者胃中

瘍醫大全 卷十二 肺風 韋 顧氏秘書

糟粕之味薰蒸肺臟而成經所謂有諸內形諸外

當分受於何經以治之正宗

又曰酒刺俗名穀嘴瘡

又曰面上酒刺並酒齧切忌手搔手擠只用無灰好

鹽炒過如瘡即將炒鹽擦之如出血出水即將鹽

按在傷處立止久即除根

肺風粉刺門主方

面上粉刺 肘后方

搗兔絲子絞取汁塗之

滅癩丹 岐天師

輕粉 白附子 黃芩微火畧

白芷 防風各等分研細末

蜜丸於每日洗面之時多擦數次臨睡之時又

重洗面擦之不須三日自然消痕滅癩矣

肺風粉刺酒齧鼻鼻頭腫面赤

瘍醫大全 卷十二 肺風方 未 顧氏秘書

杏仁二十粒去皮瓦上焙勿焦 油核桃二枚連皮瓦上焙勿焦

大楓肉三粒 水銀三分唾津在手掌心內研成黑水

共研勻搽之二三次即愈

面部鼻臉生瘡赤風粉刺神方準繩

生硫黃 白芷 瓜萸仁

膩粉各五分 蟬蛻洗 芫青去翅足

全蝎各七枚

右研細聽用以麻油黃蠟火熬化離火入藥在

內每用少許塗面上勿沾眼內

清肺散

治穀嘴瘡

連翹 川芎 白芷

黃連 苦參 荆芥

山梔 黃芩 貝母

桑白皮 各一錢

河水煎服

面上酒刺

枯礬 一兩 白附子 硫黃 各二錢

傷醫大全 卷十二 肺風方 七 顧氏秘書

研細末臨晚以唾津調搽早上洗去

肺風酒刺赤鼻

大楓子仁 木鱉子仁 輕粉 各等分

研細夜以唾津調塗

酒刺粉刺面生黥點小瘡並能去垢潤肌

皂角 三觔 桃花瓣 一升 升麻 八兩

栝實子 五兩 白芷 天花粉

菘豆 白芨 各一兩 砂仁

白丁香 甘松 各五錢 三柰 三錢

共為細末糯米飯搗丸或加肥皂肉搗圓洗面時擦之如擦下部換用煉蜜搗成團擦洗

滿臉肺風酒刺

乳香 去油 沒藥 去油 杭粉 各三錢

花椒 五分 膠棗 一枚 白菓 三枚

共研細為圓清晨洗臉時擦

酒刺

榧子肉 一千個 甘菊花 二兩

水酒各一碗全煮乾再用微火烘脆每日嚼食

傷醫大全 卷十二 肺風方 六 顧氏秘書

食完自愈

顛倒散

硫黃 大黃 各等分

研末凉水調敷

肺風瘡

無灰酒於砂鉢內磨鹿角尖濃汁敷

雀斑門主論

陳實功曰雀斑乃腎水不能榮華於上火滯結而為

斑治當六味地黃丸以滋化源搽洗兼施 正宗

又曰面生黑斑乃水虧不能制火血弱不能華肉以

致火燥結成斑黑色枯不澤宜服腎氣丸以滋化

源用玉容丸早晚擦之

湯醫大全

卷十二 雀斑

丸

顧氏秘書

雀斑門主方

玉容丸

男婦雀斑酒刺及身體皮膚粗糙

甘松 明天麻 藜本

北細辛 白薇 白僵蚕

防風 山梔仁 川椒

香白芷 荆芥 密陀僧

山茶 枯白礬 白芨

檀香末 羌活 甘菊花

湯醫大全

卷十二 雀斑方

方

顧氏秘書

獨活 各一錢 紅棗肉 七枚

磨細末用去淨弦膜肥皂一觔全槌作丸如秋

冬加生蜜五錢如皮膚癢槁加牛骨髓三錢早

晚洗之肌膚自然瑩潔如玉溫潤細膩

玉肌散

一切風濕雀斑酒刺白屑風皮膚作癢

白附子 白芷 滑石 各二錢

加棗豆半升研細每用三匙早晚洗面

改容丸

大貝母 去心 白附子 菊花葉

防風 白芷 滑石 各五錢

共為細末用大肥皂十莖蒸熟去筋膜搗丸全藥作圓早晚擦面

又方

白丁香 五錢即鷹糞 羊蹄根 二兩
白附子 一兩 白蘇 八錢 白芨 七錢

共研末肥皂一筋去皮弦全藥搗丸擦面

又方

湯醫大全

卷十二 雀斑方

三

顧氏秘書

雄雀糞 瓦花 各等分

研細全菜油調搽一月即光

又方

霜梅肉 櫻桃枝 牙皂角 紫葶萍

共搗丸擦面

又方

草麻仁同肥皂搥擦

又方

白丁香 白蘇 白蠟蚕

白芷 白附子 白梅肉

夜明砂 皂角 白芨

甘松

共研細蜜搗作餅洗面時擦之

玉盤散

男婦面上雀斑粉刺

白牽牛 甘松 香附

天花粉 各一兩 藁本 白蘇

白芷 白附子 官粉

湯醫大全

卷十二 雀斑方

三

顧氏秘書

白芨 大黃 各五錢

肥皂一筋搥爛全藥和勻每日擦面有效

玉容肥皂

去白癩黑點白癬諸般瘡痕令人面色好

白芷 白附子 白蒺藜

白蠟蚕 白芨 白丁香

甘松 草烏 杏仁

菜豆粉 各一兩 兒茶 三錢 密陀僧

樟腦 各五錢 白蘇 三奈

猪牙皂 各四錢 肥 皂 去裏外皮筋並子 只取淨肉一茶盞

輕 粉 三錢

先將肥皂肉搗爛入雞子清和晒去氣息將各

藥末全肥皂雞子清和丸擦

澡豆方 濟生

雀印或面生瘡癩疤痕色變赤黑大效

密陀僧 另研 甘 松 杏 仁 生用

白 芷 蛇床子 各一兩 白菓肉 四十個

草麻仁 四十九粒 白蒺藜 杵去刺 白牽牛 酒浸各三兩

湯醫大全 卷十二 雀斑方 三 顧氏秘書

白殭蚕 二兩 肥 皂 去皮弦子 三筋搗細

全藥末為圓早晚擦面洗去

面生黑斑



湯醫大全 卷十二 面生黑斑 三 顧氏秘書

面生黑斑門主論

陳實功曰女子面生鰲黑斑此乃水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥結成黑斑色枯不澤婦人生此不利於夫主又疑事不決者多有之治當朝以腎氣丸以滋化源早晚玉容丸洗擦自退當戒憂思動火勞傷等事 正宗

古一人登廁被臭氣燻觸隱忍良久明日滿面皆黑色月餘不散相士云不出月必死一良醫令以沉檀香各一兩剉碎安爐中燒燻帳內以被蓋定令

病者瞑目端坐候香盡方可出帳門日引鑑照之
面上黑色漸散矣蓋臭腐屬水香屬土土勝水也

瘍醫大全

卷十二 生黑斑

玉

顧氏秘書

面生黑斑門主方

驗方

白僵蚕

黑牽牛

各二兩 北細辛 二兩

研細蜜丸彈子大日洗數次一月後其斑自退
並治雀斑面生黑點神效

玉容散

面上黑點雀斑

甘松

三柰

茅香 各五錢

白芷

白僵蠶

白芨

瘍醫大全

卷十二

生黑斑方

玉

顧氏秘書

白蔘

白附子

天花粉

菜豆粉

各一兩

肥皂

二箇

防風

藥本

零陵香

各三錢

為細末每洗面用之

痣門主論

陳實功曰痣名黑子此腎中濁氣混滯於陽陽氣收束結成黑子堅而不散凡人生此終為不吉面部不善者去之 正宗

又曰冰蠟散點之自落

心法曰痣乃孫絡之血滯於衛分陽氣束結所致

瘍醫大全

卷十二 痣

毛

顧氏秘書

痣門主方

點痣法

糯稻數粒去殼用銀爐灰少許入水拌勻以糯米插灰中將痣用針挑破將糯米點之任其自脫

又方

糯米七粒搗爛石灰和勻挑破點之即落

又方

用櫟炭灰半鍾以水調不乾不稀以手按實入糯米數粒按在灰中仍按實將碗覆於地上勿動俟

瘍醫大全

卷十二 痣方

毛

顧氏秘書

明早灰中流出白漿如飴用盞取下看痣大小點之聽其自落

又法

夏至或冬至用醉城全石灰搗勻水磨點之自落

又法

白降丹水調少許點之自落

臉發



易醫大全

卷十二

臉發

五

顧氏秘書

臉發門主論

中斗垣曰臉發乃足陽明胃經多氣少血其瘡發於

眼下臉上四白穴

在目一寸直目瞳子

巨髎穴

扶鼻傍入分直目瞳子

色似葡萄形漸大或生子母瘡者八日死在左用

內托藥加當歸兩倍右加三倍妙在斯也 啟玄

周文采曰氣血上壅結聚脾經故毒發於面名曰面

毒 集驗

竇漢卿曰面發毒多起於房勞太過乘虛風入經絡

陽明經虛發於面也或面生癰腫患者欲求速愈

易醫大全

卷十二

臉發

五

顧氏秘書

而庸醫或以毒藥敷點或以艾火灸之或以針刀刺之或犯屍神惡宿或被後房事不戒或受狂風霜雪寒露暴戾之氣或服金石草木諸部惡毒相攻相反之劑以致病症日劇殊不知面為諸陽之首禁火禁刀禁毒况耳目口鼻之官總係一處比四肢不同若不保重命亦難生何也面為陽火氣入之薰蒸肌肉刀針刺之即傷經絡毒藥點之暴剝皮肉轉轉為患繼之以風邪入之則頭面虛腫目鼻腫脹患處日腐其臭穢難聞脾胃日削寒熱交作痛楚萬狀難以盡言若有五善而無七惡外敷清涼拔毒之藥內服參朮內托之劑再合犀角鬱金散服之以拔積毒其命方可保也否則難生 全書

奎光曰面癰大抵屬鬱防內攻宜用碧丹 方載咽兼 服煎藥外敷三黃散

臉發門主方

犀角鬱金散 寶漢卿

治面發毒

犀角

鬱金

珍珠

西牛黃

粉甘草

乳香

真粉

辰砂

右為細末煉蜜為丸噙化

湯醫大全

卷十二

臉發方

三

顧氏秘書

顛癰門主論

心法曰顛癰初小漸大如榴者發陽分由風熱而生初起焮紅浮腫疼痛七日即潰為毒輕根淺易愈顛疽者發陰分由積熱而生色紫漫腫堅硬麻木疼痛三七方潰為毒重根深難愈俱發於顛骨尖處不論左右皆屬小腸經

澄曰治法悉同癰疽但不可妄用追蝕之藥蓋顛部骨多肉少妨其穿潰過深致令顛骨倒陷之患不可不慎

湯醫大全

卷十二

顛癰

三

顧氏秘書

顴骨肉疽



湯醫大全

卷十二

顴骨疽

三

顧氏秘書

顴骨肉疽門主論

王肯堂曰顴骨肉疽顴骨內卒然而痛經宿而痛甚

寒熱大作屬上焦與陽明經鬱火所致汗之可消

藥宜水酒全煎

準繩

靈樞經曰心病者顴赤腎病者顴與顏黑然則當察

其色赤者宜以黃連安神丸降心火補心丸養心

血黑者宜以地黃丸滋腎水未可專委之陽明鬱

火也

疔疽



湯醫大全

卷十二

疔疽

三

顧氏秘書

疔疽門主論

王肯堂曰兩腮及鼻下焮腫生瘡惡血淋漓此名疔

疽屬足陽明胃經三日口噤如痙角弓反張按之

如疔釘着骨痛不可忍者是也治之稍緩則毒攻

心嘔吐不食昏迷躁亂譫語者死

準繩

澄曰疔疽者乃醇酒炙博膏粱厚味或悞殮自死牛

馬宿茶陳菜食中汗毒而成不可妄用刀針當照

疔瘡門方法治之故毋庸另立主方

托腮癰門主論

奎光曰托腮癰生腮下乃飲食厚味醇酒熱毒所結而成

瘍醫大全

卷十二

托腮癰

論

顧氏秘書

腮頰發



瘍醫大全

卷十二

腮頰發

論

顧氏秘書

腮頰發門主論

王肯堂曰腮頰發生腮臉屬足陽明經風熱所致

又曰金腮瘡生於頰腮初如米粒漸大如豆久而不

治潰蝕透頰屬陽明經治不得法潰爛不斂口吐

臭痰喘急神昏者死

馮魯瞻曰腮癰乃胃家經絡也

又曰咽痛頰腫脈洪大面赤者羌活勝濕湯加黃芩

甘草桔梗各五分

朱丹溪治兩腮腫用細辛草烏等分爲末入蚌粉猪

脂調敷口含白梅置腮邊良久出涎腫退消時腫必先向下

古一人因驚駭後常用手指甲掐住兩頰遂致兩頰破損心懊懣不安脈數而實諸藥不愈用活幼方中牛黃清心涼膈丸數服而愈

曰腮頰發者其勢大即腮癰又名魚腮毒而金腮瘡者其勢小多生於嗜酒之人糟粕之味薰蒸胃腑是以腮頰結腫痲痛初起四妙湯主之寒熱加荆芥防風葛根赤芍已成加白芷將潰加穿山甲

易醫大全 卷十二 腮頰發 毛 顧氏秘書

皂角刺潰後四妙湯加白芷排膿二三劑膿盡速於生肌收口不得妄用追蝕提藥防其透膜此症全賴補托兼戒房事庶不致收口腮凹亦可免夫成魚腮漏終年淌水也均照癰疽門治法毋庸另立主方

頰發



易醫大全 卷十二 頰發 毛 顧氏秘書

頰發門主論

王肯堂曰頰發生於顴骨之下腮頰之上耳前一寸三分古云不治屬足陽明胃經熱毒上攻若治不得法延及咽隘潰爛穿口不食者死

準繩

又曰素問云腎熱者頰先赤故頰屬足少陰腎經也而今醫師以耳後一寸三分發銳毒者名曰發頰則是少陽分野而薛氏亦以為屬足少陰經當補腎水者何也蓋腎為相火之宅宅完且固而火得歸息焉則治腎正所以治少陽也此證傷寒汗出

不徹者多患之亦有雜症客熱久而不散而發於
頤者宜以藥速消散之失治成膿則費手矣倘誤
服尅伐之藥而不滋補其氣血者即穿口破唇而
死

申斗垣曰頤發乃足陽明胃經多氣少血在唇傍腮

上頰車穴

穴在耳下曲頰端陷中

大迎穴

穴在曲頰前一寸三分陷中動脈

上下左右相同雙發最凶如腫痛不可忍者八日

可刺膿汁出四畔軟者生如反硬牙關緊不能食

似蜂窠涓涓流黃水十無一生女子患此主四五

瘍醫大全

卷十二

頤發

素

顧氏秘書

日死 啟玄

贊漢卿曰發頤乃傷寒發汗未透而成在頭耳一寸

三分在心窩兩肋在身者可治在身後相連咽喉

恐毒氣內攻難進飲食藥餌鼻流清膿兩耳閉塞

者即死不治

陳實功曰發頤又名汗毒此症原因風寒用藥發表

未盡日久傳化爲熱不散以致項之前後結腫疼

痛初起身熱口渴當用柴葛湯清熱解毒如患上

紅腫熱痛者如意金黃散敷之 正宗

又曰如身涼不渴者宜牛蒡甘桔湯

馮魯瞻曰頭痛腫大如斗是天行時疫大頭病也夫

身半已上天之氣也身半以下地之氣也邪熱客

於心肺之間陽明少陽之火復熾且感天地四時

瘟疫之氣所以上焦壅熱不散干犯清道濕熱上

乘巔頂而爲腫木挾火邪而爲痛甚至潰裂膿血

復染他人所以謂之疫癘輕者名爲發頤腫在兩

耳前後有以承氣下之瀉胃中之實熱是誅伐太

過矣治法不宜藥速速則過其病所謂上熱未除

瘍醫大全

卷十二

頤發

單

顧氏秘書

中寒復生必傷人命宜用緩藥徐徐少與再視腫

勢在於何方隨經治之陽明爲邪首大腫少陽之

邪出於耳前後也大槩普濟消毒飲主之

順發門主方

牛蒡柑桔湯

順毒表邪已盡耳項結腫微熱不紅疼痛者

黃連 赤芍藥 桔梗

廣陳皮 蘇木 牛蒡子

川芎 天花粉 甘草

水煎服

汗順炸腮

平頭紅豆 即平常紅豆每升用生薑四兩取自然汁拌晒研為細末

湯醫大全

用雞蛋清調敷中留一孔透氣乾則以葱汁潤

之一日立消又且定痛

卷十二 順發方 聖 顧氏秘書

炸腮



湯醫大全

卷十二

炸腮

聖

顧氏秘書

炸腮門主論

陳實功曰炸腮乃風熱濕痰所生或冬溫後天時不正感發傳染兩腮腫痛初發寒熱以柴胡葛根湯散之外敷如意金黃散如在裡內熱口乾二便不利者四順清涼飲利之表裡俱解如腫仍不消必欲作膿者托裡為主膿熟者針之 正宗

馮魯瞻曰胸膈蘊積熱毒致生風痰上攻頭面壅滯不散發為炸腮重則磁鋒刺去惡血輕則或塗或點次投湯劑散風清熱解毒消痰自愈也 錦囊

王肯堂曰所患在肌肉浮而不着骨者名曰疔腮屬足陽明經風熱所致

心法曰疔腮一名髭發一名含腮瘡生於兩腮肌肉不着骨之處總發端於陽明胃熱也初起高腫色紅焮熱者係陽明風熱若平腫色淡不鮮者由胃經濕熱

瘍醫大全

卷十二

疔腮

聖

顧氏秘書

疔腮門主方

敷疔腮

染坊靛花頻敷自消

又方

肥皂全砂糖搗敷紙蓋留頂出氣

又方

黃栢鉛粉各等分研勻涼水調敷

又方

猪膽汁三個 生姜汁米醋各半 和勻磨京墨一敷

瘍醫大全

卷十二

疔腮方

聖

顧氏秘書

即消

腮腫

土茯苓二觔

天花粉

苦

參 各二兩

咀片分七劑每劑加皂角子七粒水煎露一宿

食後溫服並治療瘰

時行風熱腮腫

赤小豆搗細雞子清或米醋調敷立消

又方

霜後絲瓜煨存性猪膽汁調敷即消

父方

扁栢葉搗汁調蚯蚓泥搽上立消

朱氏集驗方

宋仁宗患疔腮道士黃寧用赤小豆七粒為末傅之立愈

腮毒

大黃末姜汁調敷中留一孔透氣自消

兩腮紅腫

白合 兩

貝母

山芝蔴根 去皮

瘍醫大全

卷十二 疔腮方

聖 顧氏秘書

元明粉 各一錢 銀 硃 七分 白 麩 少許

全搗敷

大頭傷寒門主論

發於鼻額紅腫以至兩目盛腫而不開額上面部皆赤而腫者屬陽明也或壯熱氣喘口乾舌燥咽喉腫痛不利脈來數大者用普濟消毒飲主之如內實熱盛者用通聖消毒飲若發於耳之上下前後并頭角紅腫此屬少陽也或肌熱日晡熱寒熱往來口苦咽乾目疼脇下滿宜小柴胡湯加花粉羌活荆芥連翹芩連主之若發於頭上并腦後項下及日後赤腫者此屬太陽也宜荆防敗毒散主之

瘍醫大全 卷十二 大頭症 聖 顧氏秘書

若三陽俱受邪併於頭面耳目鼻者以普濟消毒飲外用清涼救苦散敷之治法當先緩後急則邪伏也先緩者宜退熱消毒虛人兼扶元氣胃虛食少者宜助胃氣候其大便內結熱甚方以大黃下之拔其毒根此先緩後急之法也蓋此毒先腫於鼻額次腫於目又次腫於耳從耳至頭上絡後腦結塊則止若不散必成膿也俗云大頭天行親戚不相訪問染者多不救泰和間多有病此者醫以承氣加藍根下之稍緩翼日如故下之又緩終莫


能愈漸至危篤東垣視之曰夫身半以上天之氣也身半以下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭面爲腫盛以承氣瀉胃中之實熱是爲誅伐無過遂處普濟消毒飲子全活甚衆

傷寒瘥後遺毒門主論

傷寒汗下不徹餘邪結在耳後一寸二三分或兩耳下俱硬腫者名曰遺毒宜速消散緩必成膿以連翹敗毒散治之如項腫痛加威靈仙大便實加大黃穿山甲如發腫有膿不消或已破未破者但用內托消毒散加皂針升麻銀花甘草之類然古人方書之論如此但實多由於久熱傷陰蓋少陽少陰陰虧已極乃因虛火上衝所以腮頰耳後腫痛也經曰榮氣不從逆於肉裏乃生癰腫况耳後方

圓一寸皆屬於腎有何毒之謂歟治宜以滋陰化痰散鬱和肝而腫自愈如熟地麥冬土貝母白芍連翹甘桔之類畧佐青皮柴胡少許足已若尺脈甚弱者竟用上病療下之法投以引火歸源之藥則腫不治而自散若誤認以毒爲事而攻之不惟腫結愈固而愈甚必致變生別病而危矣當詳酌之

時毒



湯醫大全

卷十二

時毒

果

顧氏秘書

時毒門主論

陳實功曰天行時氣感之而發初起與風寒相類惟
頭面耳項為重寒熱體強頭眩脈浮緊數者為邪
在表宜荆防敗毒散萬靈丹發汗如兩目鼻面漸
次傳腫者乃正陽明受病其患焮腫發熱便秘多
熱少寒口乾脈數有力為邪在裏宜五利大黃湯
下之又頭角兩耳前後結腫者乃手少陽經受之
其患耳鳴筋痛寒熱嘔吐口苦咽乾煩躁時甚當
以知母石膏湯小柴胡湯和之如凶荒沿門傳染

者普濟消毒散藿香正氣散以安之表裡俱解腫
尚不消宜砭去惡血腫熱甚者如意金黃散敷之
自後仍不消者必欲作膿宜托裏消毒散加白芷
皂角針托之膿穢食嘔者香砂六君子湯又有毒
中三陽自項本以上俱發腫光如水色雙目合縫
唇似猪形口角流涎腫痛不消聲音不出飲食不
入咽喉腫閉牙關難開破流臭水穢氣連綿不絕
者犯此俱為不治 正宗

李東垣曰夫時毒者乃四時邪毒之氣而感之於人
湯醫大全 卷十二 時毒 辛 顧氏秘書

也其候發於鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有
根令人憎寒壯熱頭痛肢體作疼甚者恍惚不寧
咽喉閉塞人不識者將謂傷寒便服解藥一二日
腫氣增益方悟始召醫治原夫此疾古無方論世
俗通為丹瘤病家惡言時毒切恐傳染考之與經
曰人身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡
毒所為謂之丹瘤與夫時毒特不同耳蓋時毒者
感四時不正之氣初發狀如傷寒五七日之間乃
能殺人治之宜精辨之先診其脈滑數浮洪沉緊

弦濇皆其候也蓋浮數者邪氣在表也沉濇者邪氣深也認的時毒氣實者攻之下之有表者發之年高氣弱者連翹湯主之又於鼻內噤通氣散取十餘噓作效若噤藥無噓者不可治之如噓出膿血者治之必愈如左右看病之人日日用噤藥取噓必不傳染病人每日用噓藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裡黃芪散宜針鎌砭割出血泄其毒

瘍醫大全

卷十二 時毒

三

顧氏秘書

氣十日外不治自愈也此病若五日已前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面大腫食不知味者必死之候治之無功矣然此疾有陰有陽可汗可下切不可但云熱毒只用寒藥混治

精義

賈漢卿曰時毒乃凶荒勞役患之安裏爲主用普濟消毒飲最善然而此症有陰有陽有可汗有可下若誤認爲熱毒而用寒藥則誤矣

全書

心法曰時毒初起狀類傷寒或兼咽痛一二日間發於腮項頰頰作腫無頭漸紅赤疼痛或似結核

方有根漫腫色赤俱由感冒四時不正邪氣客於經絡釀結而成非發於病後之願毒也惟在醫者精察瘡色辨別虛實治法須宜疏解不可驟用寒涼致毒不得外發而內攻咽喉者則險矣

瘍醫大全

卷十二

三

顧氏秘書

時毒門主方

加味甘桔湯

甘草

桔梗

荆芥各三錢

牛蒡子

炒二錢

貝母

一分

薄荷

五分

水煎服

若兩頰腫盛者加丹皮三錢柴胡一

錢五分

普濟消毒飲

神治天行疫毒大頭諸病

牛蒡子

炒

連翹

桔梗

易醫大全

卷十二

時毒方

書

顧氏秘書

甘草

板藍根

馬屁勃

橘紅

玄參

柴胡

僵蠶

炒各二錢

黃芩

酒炒

黃連

酒炒各五錢

新升麻

七分

人參

三錢

為末湯調服之或蜜丸嚼化或有加當歸川芎

如便閉加酒炒大黃一錢利之腫熱甚者砭法

刺之一方有薄荷一錢無人參

此方黃連黃芩味苦瀉心肺熱以為君橘紅元參

苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以為臣連翹鼠粘薄

荷味苦辛平板藍根味甘寒馬屁勃僵蠶味苦平

散腫消毒以為佐升麻柴胡苦平行少陽陽明不

得伸之鬱氣桔梗味辛溫為舟楫不令下行如是

調治方可保全

耳邊腮腫

五倍子濕紙包燒存性研末雞子白調糊遍敷立

消

無風寒腮赤腫

安絲魚煨湯喫自消

易醫大全

卷十二

時毒方

書

顧氏秘書

敷法

如意金黃散用葱汁黃蜜調敷中留一孔透氣外

用桑皮紙扯碎貼之如乾紙外以蜜水潤之自消

時毒炸腮

治風寒鬱熱耳邊腮頰結腫惡寒發熱焮赤口

乾每年仲春小陽時令必多此症有只腫一邊

者有先腫一邊一二日又腫一邊亦有兩邊齊

腫者名曰時毒更有兩頰硬腫頰下腫者名曰

鼠蟄毒均宜疏寒散熱不得驟用寒涼冰伏

葛根 荆芥 防風

桔梗 甘草 白芷

赤芍 連翹 澤瀉

白水煎二三劑後加貝母牛蒡子玄參銀花夏

枯草丹皮山梔柴胡按症加減七日自消

頭疼耳邊發腫太陽疔腮俱疼不可忍 周鶴仙

生大黃一兩 青木香 薑黃

檳榔 各三錢

共為細末醋蜜調敷患處中留一孔出氣乾則

傷醫大全 卷十二 時疫方 畫 顧氏秘書

換敷二三次即愈

又方

生大黃末葱汁調敷四圍中露一頂自消

又方

醋調石灰敷之即消

又方

生大黃 黃栢 赤小荳

石膏 穿山甲 各等分

共研細末醋調敷

傷寒瘥後碗頭瘡門主論

馮魯瞻曰碗頭瘡者亦有汗下後餘毒不盡故瘥後

而發碗頭瘡也只以黃連甘草歸尾紅花防風苦

參荆芥連翹羌活白芷之類煎服外用芒硝赤小

豆青黛為末以雞子清和猪膽汁調敷瘡上最效

勿動其靨待其自脫

傷醫大全 卷十二 碗頭瘡 畫 顧氏秘書

鼻部望色辨症門主論

鼻色青主腹中痛若冷者死

鼻色微黑者有水氣

鼻色黃主小便難

鼻色白主氣虛

鼻色赤屬肺熱

鼻色鮮明者有留飲

鼻孔乾燥者必衄血

鼻色燥如烟煤者陽毒熱極

瘍醫大全

卷十二

望色辨

五

顧氏秘書

鼻孔冷滑色黑者陰毒冷極

鼻流濁涕者屬風熱

鼻流清涕者是肺寒

鼻孔癰脹者肺熱有風

黑氣入耳目鼻舌者死

過梁疔門主論

中斗垣曰過梁疔乃勞傷太甚憂慮傷於肺經致氣

血停滯熱毒內攻穿於心胸纏於四肢筋骨酸疼

六七日添惡心八九日腫過耳目至十一日命促

此疔生於眉心鼻上初起未見疔形最難識認五

六日頭破身寒若痛甚冷汗出者不治救治均同

疔瘡門施治

啟立

瘍醫大全

卷十一

過梁疔

五

顧氏秘書

鼻疽



瘍醫大全

卷十二 鼻疽

堯

顧氏秘書

鼻疽門主論

王肯堂曰鼻疽生於鼻柱屬手太陰肺經風熱及上

焦鬱火所致 準繩

證

曰鼻疽乃肺經蘊積熱邪或憂思損傷脾肺或過

飧五辛嗜飲炙燔而成初起鼻柱壅腫兩竅不通

喉痛難經因蘊熱嗜飲而成者當用銀花甘草湯

加麥冬花粉貝母赤芍當歸以清肺熱稍分其炎

燔之勢如憂思內傷而成者又當保固肺脾為主

敗毒清涼損氣傷脾之藥均不可濫施也治法於

癰疽門中採擇用之母庸另立主方

瘍醫大全

卷十二 鼻疽

本

顧氏秘書

鼻疔門主論

申斗垣曰鼻疔乃憂鬱太過勞傷太重臟腑毒氣傳於經脉而成二三日神思困倦筋骨酸痛四五日寒熱交作毒氣攻心頭面腫大八九日嘔逆昏迷痰升氣促十難救一醫者不可不察初起治法從疔瘡門施治啟玄

陳實功曰鼻疔生於鼻內痛引腦戶不能運氣脹塞

鼻竅甚者唇腮俱腫先宜針刺次照疔瘡治法正宗

澄曰鼻疔生於鼻竅之中乃憂鬱傷肺或房慾傳腎

傷醫大全 卷十二 鼻疔 李 顧氏秘書

火乘金位燔灼而成治當悉按疔瘡治法毋庸另立主方

鼻腫門主論

岐天師曰鼻腫者乃肺經火盛也用皂角末吹入打清嚏數十即愈蓋鼻因氣塞今打嚏則壅塞之氣盡開散故不用甘桔湯清肺而鼻腫自消也秘錄
又曰有人鼻大如拳痛疼欲死此乃肺經之火熱壅於鼻而不得泄法當清其肺中之邪去其鼻間之火可也以解壅湯主之此方全在擊入肺經以去其火邪又何壅腫之不消

傷醫大全 卷十二 鼻腫 李 顧氏秘書

鼻瘡門主論

澄曰鼻乃肺之竅肺有蘊熱或醇酒炙煇胃熱薰金
或肺火亢甚是以鼻竅生瘡燥裂作痛多起赤糜
當用石斛麥冬湯清之或六味地黃湯加麥冬治
之

陳實功曰鼻瘡乃肺經實火鬱熱故生瘡也 正宗

傷醫大全 卷十二 鼻瘡 李 顧氏秘書

鼻瘡門主方

解鬱湯 岐天師

桔梗 天門冬 各五錢 黃芩

麥門冬 甘草 天花粉 各三錢

紫菀 二錢 紫蘇葉 百部 各一錢

水煎服四劑鼻瘡全消

鼻瘡

官粉 血丹 松香 各一錢

艾葉 五錢

傷醫大全 卷十二 鼻瘡方 李 顧氏秘書

研細紙捲香油浸透火燃滴油擦鼻內神效

又方

杏仁研爛人乳和敷

又方

烏牛耳垢敷

鼻下生瘡

牛鼻中舊木卷煨研敷之

鼻頭紅腫破裂

皂礬和灰麩研勻水調貼之

鼻疳門主論

馮魯瞻曰風邪客於皮毛是以津液不收致流清涕

頭楚若鋸者名曰鼻鼈更有金不生水則六陽虛

火上升而成鼻乾者更有風濕之氣壅成內熱或

因氣疔故鼻下兩傍瘡濕癢爛是名鼻疔俗呼鼻

蠶瘡不甚痛汁所流處即成爛瘡 錦囊

又曰鼻下一道赤者名曰蠶以黃連末敷之

申斗垣曰鼻疔鼻乃肺竅鼻孔生疔乃肺中有積熱

若不早治蝕其鼻內開竅令人言語不明 啟玄

瘍醫大全

卷十二

鼻疔

李

顧氏秘書

鼻疔門主方

驗方 啟玄

兒茶 五錢

雄黃

輕粉 各一錢

冰片 一分

研細吹之 如臭加銅墨五分

又方

杏仁

不拘多少去皮尖搗碎取連四紙壓去油如白粉一樣只用二分 輕粉 一錢

吹患處三四次自愈

鼻疔爛通其孔者

瘍醫大全

卷十二

鼻疔

李

顧氏秘書

鹿角 剉碎焙

枯白礬 各一兩

頭髮 五錢

燈

上燒灰

共研極細末先用椒水洗淨疔孔然後搽之如不取口可用瓦松燒存性研末搽之

鼻痔門主論

陳實功曰肺氣不清風濕鬱滯而成鼻痔也如鼻生瘰肉結如榴子漸大下垂閉塞孔竅氣不宣通宜服辛夷清肺飲外用點藥漸化為水自愈正宗

馮魯瞻曰濕熱之氣外鬱皮毛內應太陰故三焦之火得以上炎為鼻生贅如竈火上炎而成煤也又有胃中食積熱痰流注是以上燎而鼻生瘰肉猶濕地得熱而生菌也治宜利膈去熱切勿因礙傷動否則變成鼻痔矣錦囊

瘍醫大全

卷十二

鼻痔方

李

顧氏秘書

又曰鼻為呼吸之門戶熱氣蒸於外則為肺風赤鼻不獨因於酒也熱氣壅於內則為瘰肉鼻瘡故瘰肉者上焦積熱鬱塞而生也

寶漢卿曰鼻居面中為一身之血運而鼻孔為肺之竅其氣上通於腦下行於肺肺氣壅盛一有阻滯諸病生焉故有鼻痔之患

又曰亦有熱伏於腦外寒侵襲鼻流鼻涕所謂腦寒腦漏鼻淵均由成此

鼻痔門主方

鼻痔鼻生瘰肉

礪砂五分 枯礬二錢

研細每用少許點鼻痔上即消

驗法

先用麻油掃鼻孔四圍再以白降丹少許清水調點其痔自落

又方

明礬一兩 甘草一錢火煨 白降丹二分或

瘍醫大全

卷十二

鼻痔方

李

顧氏秘書

明雄五分

共乳細吹痔上自愈

又方

明礬一兩 草薢仁七粒 鹽 梅五枚去核

麝香一分

共研成丸如棗核大綿包塞鼻內自化

又方

枯礬末和猪脂綿包塞數日自消

又方

藕節有毛處燒存性為末吹之

腦崩鼻瘕

甘草四兩煎湯用有嘴壺貯以鼻嗅之

鼻中瘕肉下垂

冰片點之

又方

黑牛耳垢敷之

又方

雄黃塞之十日自落

傷醫大全

卷十二 鼻痔方

本丸 顧氏秘書

又方

雄鷄腎塞之十日落

又方

黃連 白蒺藜

煎汁灌鼻中涕出瘕落

鼻漏鼻孔中長出一塊

辛夷

去毛

桑白皮

蜜炙各四兩

梔子

一兩

枳實

桔梗

白芷

各二兩

共為細末每服二錢淡蘿蔔湯調服

鼻淵門主論

馮魯瞻曰夫鼻為肺竅經曰天氣通於肺若腸胃無

痰火積熱則平常上升皆清氣也肺家有病則鼻

不利如傷熱之不散或傷寒之久鬱成熱皆能使

塞而不利若平人而多涕或黃或白或帶血如膿

狀者皆腎虛所致不可過用涼藥 錦囊

又曰鼻淵者謂其涕下不止如淌水泉故名之也經

曰是膽移熱於腦蓋膽脉起於目銳眥上抵頭角

入絡於腦然陽明之脉亦挾鼻絡目傍約太陽之

傷醫大全

卷十二 鼻淵

本 顧氏秘書

脉者也今因腦熱則足太陽逆與陽明之脉俱盛

泊於額中是以鼻額酸痛涕下不止矣

又曰更有寒邪未盡虛熱漸熾是以膿涕結聚香臭

不聞此名鼻齕

又曰更有熱血入面為寒所拂是以汚濁凝滯則成

鼻齕

又曰腦病有二若清水流出而不痛者為寒若流黃

臭水而痛者為熱久而不愈即名腦漏治當內服

清利膽熱外於顛會通天二穴灸之

又曰鼻流濁涕不止者名曰鼻淵乃風熱燥腦而液下滲或黃或白或帶血如膿狀此腎虛之證也經曰腦滲爲涕又曰膽移熱於腦原病式曰如以火燥金熱極則反化爲水然究其原必腎陰虛而不能納氣歸元故火無所畏上迫肺金由是津液之氣不得降下併於空竅轉濁爲涕津液爲之逆流矣於是腎肝愈虛有升無降有陽無陰陰虛則病陰絕則死此最宜戒怒以養陽絕慾以養陰斷燔炙遠酒麵以防作熱然後假之良醫滋腎清肺爲

瘍醫大全

卷十二

鼻淵

主

顧氏秘書

君開鬱順氣爲臣補陰養血爲佐俾火息金清降令腎行氣暢鬱分清竅無壅陽開陰闔相依相附臟腑各司乃職自慎以培其根藥餌以治其病間有可愈者苟或驕恣不慎或悞投涼藥雖倉扁不能使其長生矣

又曰久患鼻流濃涕極臭者卽名腦漏氣虛者補中益氣湯陰虛者麥味地黃湯主之

經曰肺和則能知香臭矣肺中壅遏不和故鼻竅窒塞不聞香臭矣

陳寶功曰鼻淵又名腦漏總由風寒凝入腦戶與太陽濕熱交蒸而成其患鼻流濁涕或流黃水點點滴滴長濕無乾久則頭眩虛暈不已治以藿香湯主之如日久虛眩內服補中益氣湯六味地黃丸以滋化源可也 正宗

陳遠公曰人有無端鼻流清水日久則流鼻涕又久則流黃濁之物如膿如髓腥臭難聞流至十年而死矣此得之飲酒太過臨風而臥風入膽中膽之酒毒不能外泄遂移熱於腦腦得熱毒之氣不能

瘍醫大全

卷十二

鼻淵

主

顧氏秘書

久藏從鼻竅出矣腦竅通於鼻而膽氣何以通於腦酒氣何以入於膽耶凡善飲者飲酒必先入膽膽不能受酒而能滲酒酒經膽滲則氣盡解倘飲多則膽不及滲矣膽不及滲則不勝酒既不及化酒則火毒存於中人臥則膽氣不行又加寒風之吹膽更不舒矣膽木最惡者寒風也內寒相侵則內熱益甚膽屬陽頭亦屬陽膽熱不能久藏膽中必移熱上走於頭矣腦在頭中頭無藏熱之處必遇穴卽入况膽腦原相通者乎腦之穴大過於膽

遂安居而不還於膽矣及居腦久動則思遷又尋竅而出乃順趨於鼻矣火毒淺則涕清深則涕濁愈久愈流愈重後則涕無可流並腦髓盡出欲不死不可得矣治法治其腦而仍治其膽者探淵之治也用取淵湯辛夷貳錢當歸黑山梔各三錢柴胡貝母各一錢元參一兩水煎服二劑涕減三劑全愈

辛夷入膽引當歸以補腦之氣引元參以解腦之火加柴梔舒膽之鬱則膽不來助火自受補氣之益也不止鼻之涕者清腦中之火益腦中之氣正所以止之也蓋鼻原無涕過上游出涕之源何必

癆醫大全

卷十二

鼻淵

辛

顧氏秘書

又截下流之水乎或疑當歸過於多用不知腦髓盡出若不補則腦氣不生辛夷耗散之物非可常用故乘其引導大用當歸補腦添精不必日後再用倘日後減去辛夷即重當歸無益矣此用藥先後之機也人疑當歸不可多用不過嫌其性滑有妨於脾耳誰知腦髓直流之人必隨不能化精者也精不化則必少矣精少則不能分布於大腸大腸必有乾燥之苦然則以當歸潤之正其所喜何患之有耶

又曰人有鼻流清涕經年不愈人以爲內熱成腦漏也誰知肺氣虛寒乎夫腦漏卽鼻淵也有寒熱二證不獨瞻熱而成之也何以別之蓋鼻涕濁而臭者熱也清而不臭者寒也熱屬實寒屬虛今流清

涕而不臭正虛寒也熱宜清涼之藥寒宜溫和之劑若槩用散而不用補則損肺氣而肺益寒愈流清涕矣用溫肺止流丹人參荆芥細辛各五分訶子甘草各一錢桔梗三錢水煎調石首魚腦骨五錢煨末服一劑卽止

此方氣味溫和自能煖肺性又帶散祛邪故奏功如神或謂石首魚腦骨古人以治內熱之鼻淵疑石首魚腦骨爲寒物何以用治寒症之鼻淵耶恐鼻淵皆屬熱而非寒乎不知鼻淵有寒熱二症而石首魚腦骨皆兼治之但熱病之涕通於腦寒症之涕出於肺所用之藥皆入肺無非溫和之味肺既寒涼得溫和自解又得石首魚腦骨截腦中之路則腦氣不下陷肺氣更閉矣所以一劑止流也

癆醫大全

卷十二

鼻淵

辛

顧氏秘書

又曰人有鼻塞不通濁涕稠粘已經數年人以爲鼻淵火結於腦也誰知乃肺之鬱火不宣而非鼻淵也夫鬱症五臟皆有不獨肺能鬱也內經曰諸風攢鬱皆屬於肺肺鬱則氣不通而鼻塞鼻乃肺之門戶故肺不通而鼻亦不通也難經曰肺熱甚則出涕肺本清虛之府最惡熱也肺熱則氣必粗液必上涕而結爲涕熱甚則涕黃熱極則涕濁敗濁之物豈容於清虛之府必從鼻之門戶出矣用加味逍遙散柴胡白朮白茯苓各二錢桔梗白芍當

歸各三錢黃芩半夏白芷甘草各一錢陳皮五分
水煎服二劑輕八劑全愈

此治肝鬱之方何以治肺鬱亦效不知此方善治
五鬱非獨治肝一經已也又佐以桔梗散肺之邪
黃芩瀉肺之熱且引眾味入肺
何鬱之不宜乎故塞通獨化也

李東垣曰鼻塞不聞香臭者俗謂肺寒而用解利辛
溫之藥不效殊不知多因肺經素有火邪故遇寒
便塞也治當清肺降火為主佐以通氣之劑如原
無鼻塞舊症但一時偶感風寒而致窒塞聲重或
流清涕者自作風寒治之然氣虛之人氣弱不能
湧醫大全 卷十二 鼻淵 三五 顧氏秘書

上升則鼻塞滯所謂九竅不通腸胃之所生也多

服補中益氣湯自通

朱丹溪曰肺開竅於鼻陽明胃脈亦挾鼻上行腦為
元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不
升則頭為之傾九竅為之不利經曰天氣通於肺
若腸胃無痰火積熱則平常之升皆清氣也故十
二經脈三百六十五絡其氣血皆上升於面而走
空竅其宗氣出於鼻而為臭謂陽氣宗氣者皆胃
中生發之氣也若因饑飽勞役損傷脾胃則生發

之氣弱而營運之氣不能上升乃邪塞空竅故鼻
不利而不聞香臭也治法宜養胃實營氣陽氣宗
氣上升則通矣然難經云心主五臭肺主諸氣鼻
者肺竅也反聞香臭者何也蓋以竅言之肺也以
用言之心也若因衛氣失守寒邪客於頭面鼻亦
受之不能為用是以不聞香臭矣經曰五氣入鼻
藏於心肺心肺有病鼻為之不利也視聰明而清
涼香臭辨而溫煖治法宜先散寒邪後補胃氣使
心肺之氣得以交通則鼻利而香臭聞矣

湧醫大全

卷十二 鼻淵

三五 顧氏秘書

鼻淵門主方

奇授藿香湯

鼻淵黃水濁涕長流致腦戶虛眩不已

藿香連枝帶葉者五錢水一碗煎七分加公猪膽

汁一枚和勻食後通口服之至重者不過三服如

此藥味苦不能服用藿香葉一兩公猪膽汁熬稠

膏為丸每服二錢食後白湯送下亦效

鼻流涕不止

白芷一兩 蒼耳子炒二錢五分 辛夷仁

傷醫大全 卷十二 鼻淵方 毛 顧氏秘書

薄荷 甘菊花 各五錢

研細每服二錢清茶食後調服

腦漏濟生

當歸頭酒洗五錢 辛夷仁 三錢 真川芎酒洗

羚羊角錢各二錢 石青水飛一分

研絕細和勻每服一錢臨臥時溫酒調下即睡

古拜散

荆芥穗為細末每服三錢生姜湯調下有火者用

陳茶調服

防風散

鼻淵腦熱滲下濁涕不止

人參 黃芩酒炒 麥門冬去心

防風各二兩 川芎 生甘草各一兩

右為細末每服二錢白湯調下

鼻流臭涕

百草霜研細空心冷水調服三錢五次可痊

腦漏

裝佛店中絞漆綿子煨灰研細蘆管吹鼻中三四

傷醫大全 卷十二 鼻淵方 毛 顧氏秘書

次

鼻淵 周鶴仙

辛夷 防風 白芷各八分

蒼耳子一錢二分 川芎五分 北細辛七分

甘草三分

白水煎連服四劑全愈忌牛肉

腦寒神方 江仍度

每用頭火燒酒一觔入小嘴砂壺內蓋旁四圍封

固將酒燉滾熱以鼻向壺嘴內聞酒味冷則又燉

又聞聞至酒淡無味又換一觔如法燉聞重者五
觔輕者不過三觔即可全愈

腦漏

白鷄冠花不拘新陳用酒一觔煎服

天羅散

治鼻中常流黃臭水名控腦砂

絲瓜籐

取根下三寸或五寸燒灰存性温酒調服數次即愈

鼻淵

陳香櫟

砂仁

扁栢葉

瘍醫大全

卷十二

鼻淵方

羌

顧氏秘書

川芎

廣木香 各等分

水煎服

鼻出臭氣

黃芩

石菖蒲

生地

遠志肉

藁本

黃連

赤芍

各八分

甘草

水浸炒三分

水煎服

腦寒

辛夷頭

黃芩

各二兩

白芷

八兩葱汁煮三次

共磨細末水法疊丸每服二錢白湯送下

瘍醫大全

卷十二

鼻淵方

顧氏秘書

赤鼻門主論

陳實功曰平素嗜飲胃經濕熱糟粕之氣上薰肺金故有赤鼻之證也 正宗

馮魯瞻曰赤鼻乃肺中積熱六陽上蒸而成 錦囊

又曰凡鼻頭白者血亡也赤者血熱也蓋面為陽中

之陽鼻居面中一身之血運至面鼻皆為至清至

精之血若血亡無以運則色白而不榮血熱而沸

騰則獨紅而且赤蓋肺之為臟其位高其體脆性

畏寒又惡熱故多酒之人酒氣薰蒸則為鼻齷準

傷醫大全 卷十二 赤鼻 全 顧氏秘書

赤得熱愈紅熱血得冷則凝污而不行故色紫黑

其治之法亡血者溫補之熱血者清利之寒凝者

化滯生新四物湯加酒芩酒紅花之類氣弱者更

加酒浸黃芪以運之其酒齷鼻治法亦然也

又曰鼻為呼吸之門戶熱氣蒸於外則為肺風赤鼻

不獨因於酒也熱氣壅於內則為癰肉鼻瘡故瘰

肉者上焦積熱鬱寒而生也

赤鼻門主方

驗方

金色密陀僧二兩研極細用人乳或白蜜調如薄糊樣每晚畧蒸將熟為度敷鼻上次早以漱口水洗去一月可痊

又方

核桃肉 連皮 枸杞子 元眼肉 各三筋

搗爛作點心不時食之其紅自落

又方

傷醫大全 卷十二 赤鼻方 全 顧氏秘書

食鹽擦牙漱口水淋洗久而自退

又方

生白菓嚼爛敷鼻上

赤鼻酒齷

黃 栢 苦 參 栢 椰 各等分

研末以猪脂調敷

血熱入肺而成酒齷鼻 秘方

當 歸 苦 參 各四兩

研末酒糊為丸桐子大食後熱茶送下八十九

藥盡自愈

赤鼻

硫黃

皮

硝 各等分

研如麵臨臥擦一月全愈

又方

牛黃

明雄

嫩色硫黃 各五分

白礬砂 一錢

明礬 一兩

乳極細末不時以津唾潤赤鼻上藥擦之臨

睡擦過夜尤效

瘍醫大全

卷十二

赤鼻方

全

顧氏秘書

赤鼻神方

血餘

三觔用米泔水洗淨再以長流水洗用黃芩一觔當歸白芍各八兩用無根水五大碗煎三碗渣再煎汁濾清分作三次煮血餘倘有餘汁又拌血餘日曬夜露以汁盡

為度

天門冬

去心

麥門冬

去心

熟地黃

白茯苓

各四兩

山梔

乾葛

桔梗

枳殼

甘草 各二兩

右藥連血餘共一處以棉紙包紮成毬外以熟

黃泥包裹約二寸厚成圓毬曬乾倘有裂縫須

添泥補固用桑柴火在八卦爐中煨至烟起白

烟一起即取出埋土內七日去土研末煉蜜為

丸桐子大每早晚食後白湯送下二錢或三錢

服至七日其紅即退矣

赤鼻年久諸藥不效

茶葉

天門冬 去心

側柏葉 各一兩

共研每日用一撮入罐內滾水泡勿泄氣用湯

當茶日飲五七次一月愈

酒醃赤鼻

瘍醫大全

卷十二

赤鼻方

全

顧氏秘書

新生白菓口嚼數枚夜敷七次如舊加酒糟塗

之亦可

又方

史君子肉以香油浸潤卧時嚼五枚久久自愈

又方

密陀僧末人乳調搽

又方

檳榔用茄汁浸拌曬乾為末津唾調搽

又方

苦參淨末四兩 歸淨末二兩

酒糊丸食遠熱茶送下二錢

赤鼻糟鼻

硫黃四兩

放砂銚內以燒酒三觔為率煮硫逐漸加添待乾為度取起每用少許將口唾放手心內化開搽之

醫方大成

卷十二

赤鼻方

全

顧氏秘書

鼻衄門主論

岐天師曰火氣鬱勃於上焦不能分散故上冲而為吐血衄血也七孔流血者乃腎虛熱也用六味地黃湯加麥冬五味子骨碎補治之秘錄

馮魯瞻曰鼻衄者或心或肺或胃蘊熱過極迫血妄行上千清道而衄也鼻氣通於腦血上溢於腦故從鼻而出名曰鼻衄若因風寒暑濕流傳經絡涌泄清道而致者皆外所因積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷腎暴喜傷心皆能動血隨氣上溢而致者皆內所因飲食過多炙博辛熱或墜車損撲而致者皆不外內因也原病式曰衄者陽熱拂鬱於足陽明經丹溪曰衄血出於肺言肺者以竅言也言陽明者以血海言也又有洗面而衄日以為常猶風行水動面熱而陽明之火上升血亦隨之也錦囊

又曰若產後口鼻有黑氣及鼻衄者名胃絕此證多不可治遇有此者急取緋線一條並產婦頂心髮兩條緊繫中指節即止如衄不止而頭汗者死

傷醫大全

卷十二

鼻衄

全

顧氏秘書

陳實功曰鼻中出血乃肺經火旺逼血妄行上從鼻竅而出也用紫土散敷額頂上內服羚羊清肺湯自止 正宗

東醫寶鑑云產後氣血散亂入於諸經不得還元故口鼻黑色起及傳變鼻衄名曰胃絕肺敗此證不可治宜用犀角地黃湯救之或急用荆芥散

胡景周曰上下失血過多氣息幾微心慌神困脉細如絲或惡寒發熱作渴煩躁急用人參一兩大棗十枚去核水煎服益血生於氣故血脫補氣陽生

傷醫大全 卷十二 鼻衄 全 顧氏秘書

陰長之義也

一女子因往後一跌鼻血長流止後一有所感其血即出諸醫不效後一醫以水和白麵包大附子一個在內火煨熟去附子只用麵燒存性爲末每用二錢白湯和服用此永不再發

傷寒論曰衄家不可發汗

張景岳曰雜病衄血責熱在裏傷寒衄血責熱在表又曰陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄蓋陽明之脉絡於口鼻今其漱水不欲嚥者以熱在經

而裏無熱故當鼻衄也

又曰有動陰血者又非衄血之謂論曰少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出故或從口鼻或從目出者是名下厥上竭此陰血也乃爲危證

澄 曰書以產後口鼻黑氣及見鼻衄爲不可治者何也蓋五臟之華皆上注於面凡色紅赤者陽熱之生氣也青黑者陰寒之絕氣也况口鼻爲陽明多血多氣之部而見陰寒慘殺之氣則胃中陽和之氣衰敗可知矣復至鼻衄則陽亡陰走也胃絕肺敗陰陽兩亡故不可治及產後舌紫黑者爲血先死不治蓋心主血少陰氣絕則血不上蔭耳

傷醫大全 卷十二 鼻衄 全 顧氏秘書

鼻衄門主方

神方 岐天師

生地 當歸 川芎 玄參

黃芩 三七根 荆芥穗炒 甘草

水煎服

茜根散 錦囊

治衄血不止

阿膠蛤粉炒 茜草根 黃芩

側柏葉 生地各一兩 炙甘草五錢

湯醫大全 卷十二 鼻衄方 李 顏氏秘書

水煎服

二神湯 保命集

耳鼻出血

生地 麥門冬各一兩

水煎服

鼻衄不止

生地 當歸酒洗各三錢 白芍酒炒二錢

辛夷五分 木通六分 茅花

荆芥穗酒炒黑炒存性各一錢

水煎濃服後即臥立止

水灰散

山梔仁香白芷各等分研細吹少許於鼻中立止

又方

大蒜搗泥隨左右貼足心

又方

左鼻衄以線裝左手中指右如之兩鼻衄者雙手

俱裝

又方

湯醫大全 卷十二 鼻衄方 李 顏氏秘書

干瓣紅石榴花晒乾研極細用少許吹鼻中即止

又方

血竭 蒲黃各等分

研極細用竹管吹鼻內即止

又方

人乳 童便 好酒各等分

碗盛重湯煮熱飲

又方

小兒胎髮燒灰吹鼻內

又方

胎髮燒灰存性為末用水調塗眉心其血立止急忙去藥畧遲則鼻塞矣

又方

人中白 髮 灰 各一錢 麝 香 一分 共為末吹鼻中少許

又方

刮湯器內人中白新瓦上焙乾以溫湯調服錢許

又方

將患人頂髮分調於百會穴上以新汲水滴之立止

傷醫大全 卷十二 鼻衄方 牛 顧氏秘書

又方

驢 糞 焙乾 髮 灰 各等分

研勻吹鼻

又方

五倍子為末吹鼻

又方

屏風上舊紙燒灰酒調一錢服

又方

茅花塞鼻中仍以茅花煎濃汁飲大能止血

又方

青苔放顛門蕩上頂之立止永不再發

又方

馬蘭頭 即本草馬蘭 草走肺經 揉熟塞鼻孔即止

鼻衄冷則主論

馮氏曰凡鼻衄冷與夫面黃面白乃陽氣大衰宜大劑參桂加附子主之

傷醫大全 卷十二 鼻衄方 牛 顧氏秘書

鼻崇症門主論

岐天師曰倘人鼻中生紅線一條長尺許少動
 之則痛欲死人以爲欲瀆之病也而余以爲不
 然亦崇也才用翎砂水并各一分研爲末以人
 乳調勻輕點在紅線中間忽然覺有人如
 將病人打一拳一般頃刻即奇絕之法也蓋
 翎砂亦是投崇之物也秘錄
 書云凡人喜食猪羊鹿血血分積熱壅盛鼻毛
 如繩痛不可忍氣塞不能呼吸用乳香硫砂各
 等八分飯九桐子丸每早晚送下冷水十五丸自
 然消落而愈

傷醫大全

卷十二 鼻崇

九十一 顧氏秘書

傷醫大全目錄

卷十三

正面耳頰門

耳癰門主論

耳發疽門主論

耳後疽門主論

耳疔門主論

耳疔門主論 附方

聾耳門主論 附方

傷醫大全

卷十三目錄

十一 顧氏秘書

震耳門主論

纏耳門主論

膿耳門主論 附方

耳風毒門主論

耳聾耳痔門主論

痛耳門主論

耳癢門主論 附方

耳爛門主方

耳聾門主論

黃耳類傷寒門主論

耳聾門主論 附方

耳鳴門主論 附方

耳根毒門主論

首疽門主論

杼疽門主論

月蝕疔瘡門主論 附方

髭鬚門主論 附方

龍泉疽虎鬚毒門主論

瘍醫大全

卷十三

顧氏秘書

羊鬚疔門主論

獨骨瘡門主論 附方

頰癰門主論

頰車癰門主論

瘍醫大全卷十三

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

男 櫛髮用和

培錢之栢東

正面耳頰部

自耳起至下頰髭鬚止凡一切癰疽疔毒皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷十三

耳癰

顧氏秘書

耳癰



耳癰門主論

王肯堂曰耳癰寒熱間作內外紅腫疼痛日增準編

馮魯瞻曰火壅上焦或作大痛或膿流於外或膿塞

脹痛有因縱怒縱酒濕熱相乘耳腫作痛者所主

宜平肝除熱疎風錦囊

澄曰耳癰之證癰者壅也與膿耳初起有間非醇酒

炙博即怒火過鬱更有色慾過甚真陰耗竭相火

亢盛或肝膽火逆是以耳竅壅腫耳根焮熱脹痛

初起俱宜梔子清肝湯加味逍遙散如內膿已成

瘍醫大全 卷十三 耳癰 二 顧氏秘書

用四妙湯去黃耆加白芷丹皮已潰出膿者用八

珍湯去川芎加銀花膿盡換用地黃湯加麥冬牛

膝自愈外治內已有膿用紅昇丹少少提之耳門

不可貼膏藥遮攔閉竅耳畔紅腫用黃敷藥敷之

自消

耳發疽門主論

王肯堂曰耳發疽生耳輪屬手少陽三焦經風熱所

致六七日漸腫如桃或如蜂房之狀或赤或紫熱

如火痛徹心是也十日刺出黃白膿者生刺之無

膿時出鮮血飲食不下神昏狂躁者死準編

申斗垣曰耳發疽乃足少陽膽經其經多氣少血其

疽發於鬢下耳傍近臉懸厘主客二穴上下五六

日漸長蜂窩皮紫焮熱如火灼痛十日內刺之有

膿者生無膿出血精神恍惚二十四朝必死不可

瘍醫大全 卷十三 耳發疽 三 顧氏秘書

救也救立

心法曰耳發生耳摺間連耳輪通腫甚則膿串耳竅

耳後疽門主論

心法曰耳後疽生耳上稍之後角孫穴開口有空陷下之處者是

瘍醫大全

卷十三

耳後疽

四

顧氏秘書

耳疔



瘍醫大全

卷十三

耳疔

五

顧氏秘書

耳疔門主論

王肯堂曰耳疔寒熱大作痛楚難禁者是也準繩

管漢卿曰耳疔以燒酒滴疔根上方得脫隨用苦茶

洗解去酒毒

陳實功曰黑疔生於耳竅之內黑硬腐爛破流血水

疼連腮顴宜針刺之照疔瘡門治法正宗

耳疔



瘍醫大全

卷十三 耳疔

六

顧氏秘書

耳疔門主論

王肯堂曰耳疔生瘡臭穢乃足少陰手少陽二經風

熱上壅而成準繩

馮魯瞻曰耳內汁臭謂之汩耳乃腎氣有餘積熱上

冲或風水起錦囊

李東垣曰小兒耳後生瘡名腎疔

耳疔門主方

耳生疔瘡

黃連

去毛鬚後數次

兒

茶

各等分

輕

粉

半匙

冰片

麝香

各少許

共乳細搽

耳後生瘡名腎疔

地骨皮研末粗者煎湯洗耳細者香油調搽

耳疔出膿

核桃仁研爛取油一錢入冰片三分每用少許滴

瘍醫大全

卷十三

耳疔方

七

顧氏秘書

聾耳



傷醫大全

卷十三

聾耳

八

顧氏秘書

聾耳門主論

王肯堂曰聾耳又曰耳濕常出黃膿

準繩

又曰乃足少陰手少陽二經風熱上壅而成

馮魯瞻曰實熱者即腎氣有餘積熱上冲津液壅結

故成聾耳聾耳之名更有五般常出黃膿者謂之

停耳常出紅膿者謂之膿耳耳內疔臭者謂之汩

耳白膿出者謂之纏耳耳內虛鳴時出青膿謂之

囊耳其名雖異總由積熱上壅或風水入耳所致

若不速治久則成聾治宜清火養血或去濕化毒

其患自愈 錦囊

傷醫大全

卷十三

聾耳

九

顧氏秘書

聾耳門主方

千金不換丹 秘方

水龍骨一錢 礪砂五分

研末吹入耳竅以綿塞之二次除根

痔耳不論已未出膿神效方 周鶴仙

頭髮在新瓦上燒灰存性為細末羅過每灰一錢

加真冰片七厘研勻吹少許入耳內極驗

驗方

燕脂燒灰為末加冰片少許吹之

傷醫大全 卷十三 聾耳 十一 顧氏秘書

驗方

醬茄子擠汁滴耳內即愈

震耳



傷醫大全 卷十三 震耳 十二 顧氏秘書

震耳門主論

王肯堂曰耳內虛鳴常出清膿名曰震耳乃足少陰

手少陽二經風熱上壅而成 準繩

馮粹瞻曰耳內虛鳴常出青膿名曰震耳乃腎氣有

餘積熱上壅或風水入耳所致法宜清火養血或

去濕化毒 錦囊

纏耳



瘍醫大全

卷十三

纏耳

主

顧氏秘書

纏耳門主論

王肯堂曰耳中常出白膿名曰纏耳乃足少陰手少

陽二經風熱上壅而成準繩

馮魯瞻曰白膿出者名曰纏耳乃腎氣有餘積熱上

冲或風水入耳所致錦囊

膿耳門主論

陳實功曰耳病乃三焦肝風妄動而成大人尚虛火

實火之分小兒有胎熱胎風之別虛火者耳內蟬

鳴出水作癢外無焮腫實火者耳根耳竅俱腫甚

則寒熱交作疼痛無時正宗

又曰初生小兒胎熱或洗浴水灌竅中亦令耳竅作

痛生膿切記不可吹藥若治早項內生腫莫若候

毒盡自愈如一月外不瘥以紅綿散治之自安

馮魯瞻曰耳者宗脈之所聚腎氣之所通也有小兒

瘍醫大全

卷十三

膿耳

主

顧氏秘書

腎經氣實其熱上衝於耳遂使津液壅而為膿或

為清汁然則厥陰之與足陽明手少陰之與足太

陽為證尤甚推其所致之由其原有七有實熱有

陰虛有因痰有因火有氣閉有肝風有胎元所發

而為病也證有五為鳴痛腫聾聵是也當分其所

因而治之錦囊

又曰常出紅膿謂之膿耳

又曰胎元而成者是因父母不謹故先天火毒攻衝

膿臭流處成瘡四傍腫赤時發時愈所主宜化毒

滋腎

陳遠公曰人有雙耳忽腫痛內流清水久則變膿血身發寒熱耳內如沸湯響或如蟬鳴此少陽膽氣不舒而風邪乘之火不得散故生此病法宜舒發膽氣佐以散風瀉火之味則愈矣然有不效者何也蓋膽受風火之邪燥乾膽汁徒用祛風瀉火則膽汁益乾膽火益熾風借火威愈焚灼也病益甚矣潤膽湯主之當歸白芍玄參各一兩黑梔子二錢柴胡一錢花粉三錢石菖蒲八分水煎服一劑

瘍醫大全

卷十三

膿耳

古

顧氏秘書

疼輕二劑腫消三劑膿血止四劑寒熱除十劑全可也此方歸芍不但入膽且入肝也膽病肝亦必痛所以舒膽也肝舒則血必旺而膽汁有不濡潤者乎膽汁既濡邪風邪火已有不治自散之機加天花粉逐痰則風火無黨以石菖蒲通耳中之竅玄參退浮游之焰自然風火漸祛上焦清涼耳病隨痊也水鑑

汪省之曰虛火治以四物湯加牡丹皮石菖蒲腎氣丸主之實火治以柴胡清肝湯主之 理例

膿耳門主方

紅棉散

耳內生瘡流膿乃肝經鬱火所結

枯白礬

三錢

臘

脂

壹錢 煨存性如能用乾抽臘脂更佳

研勻先用棉杖子攪去膿水另以柳杖子蘸藥摻入耳底自乾若時耳加麝香五厘

耳底流膿

枯礬

黃丹

龍骨

海標硝

麝香

瘍醫大全

卷十三

膿耳

古

顧氏秘書

乾燕脂研細吹之

又方

青黛

人中白

枯礬

雄黃

冰片

黃栢 各等分

研細吹

又方

橄欖核煨存性研細加冰片少許吹

又方

大紅千葉石榴花瓣研細吹

又方

枯礬入人乳內放炭火上頓滾變黑色研細吹

又方

蕙菜梗葉籜煨存性加水片少許研細吹

又方

陳皮煨灰一錢加麝香少許吹

又方

白鯊牙二個煨加水片研細吹

又方

瘍醫大全

卷十三

膿耳

共

顧氏秘書

水龍骨

即船底陳油

研

砂

二錢五分

共研極細每用少許吹

又方

黃丹

水飛

龍骨

煨

枯礬

香

少許

臙脂

各一錢

海螵蛸

五分

麝香

少許

研細以棉杖子搨去膿水用少許吹耳內每日

吹一次勿令風入

煎方

蔓荊子

升麻

前胡

桑白皮

甘草

麥門冬

赤茯苓

赤芍

耳內腫痛出膿出水

金絲荷葉

即虎耳草

採汁灌入耳內自愈

此味乃治耳病之妙藥如

有膿可加枯礬少許

又方

頭髮燒存性研細每用少許吹入

又方

五倍子一個畧挖破入生明礬於內紙包浸濕火

瘍醫大全

卷十三

膿耳

七

顧氏秘書

內燒存性研細每用少許吹入

又方

鮮白菓搗爛用棉裹絞汁入耳膿血自止

又方

蛇蛻捲條揷入耳內其膿吸盡自愈


又方

紅棗一枚去核入雄黃三分燒乾研末用管吹入

耳內

又方

柿蒂不拘多少煨存性研細吹



卷十三 膿耳

六



瘍醫大全

卷十三 耳風

九 顧氏秘書

耳風毒門主論

王肯堂曰耳風毒耳中常出紅膿此足少陰手少陽

二經風熱上壅而成 準繩

胡公弼曰耳風毒即耳門毒 青囊

又曰耳之上下前後皆屬少陽最不可破如毒一有

潰破便要仔細詳審不可輕忽

竇漢卿曰耳風毒受在心腎氣不流行壅在心經致

傷於耳

耳聾
耳痔



瘍醫大全

卷十三

耳聾

三

顧氏秘書

耳聾耳痔門主論

王肯堂曰耳聾耳痔則不作膿亦不作寒熱外無腫

腫但耳塞不通纏綿不已令人耳聾準繩

陳實功曰又有耳挺結於竅內氣脉不通疼痛不止

當用白降丹點之化盡乃愈正宗

寶漢卿曰耳痔耳聾先用針刺破用紅玉膏點之耳

脹痛用虎耳草汁滴入耳內痛即止

汪省之曰耳挺治以梔子清肝湯外以白降丹或綠

蘚藥插入挺肉縫內化盡自愈理例

痛耳門主論

易說卦坎為耳痛

王肯堂曰腦裏虛瘍虛瘍者即無名腫毒之謂耳中疼痛不可當

者準繩

馮氏曰耳痛耳鳴耳癢耳膿耳瘡亦當從少陰正竅

分寒熱虛實而治之不可專作火與外邪凡耳鳴

以手按之而不鳴或少減者真虛也手按之而愈

鳴者火實也昔王萬里時患耳痛魏文靖公勸以

服青鹽鹿茸煎雄附為劑且言此藥非為君虛損

瘍醫大全

卷十三

痛耳

三

顧氏秘書

服之曷不觀易之坎為耳痛坎水藏在腎開竅於

耳在志為恐恐則傷腎故耳痛氣陽運動常顯血

陰流行常幽血在形如水在天地之間故坎為血

卦是經中已著病證矣竟餌之而愈錦囊

痛耳門主方

立效散

耳內忽作大痛如有蟲在內奔走殊痛或出血或出水或乾痛不可忍者

蛇退火燒存性研末鷲管吹入立止 一方加水

片用蛇退者取蛇之善脫以解散鬱火也

耳疼不可忍者

磨刀鐵漿滴入耳中即愈

又方

場醫大全

卷十三

痛耳

圭

顧氏秘書

香木鱉子去殼磨水磨油滴入耳中自止

耳癢門主論

後汗律歷志春分晷長七尺二寸四分至不至多病耳癢

岐天師曰有耳中作癢以木刺之尚不足以安其癢必以鐵刀刺其底錚錚有聲始則快然否則癢極欲死此腎肝之火結成鐵底於耳中非湯藥可救宜救癢丹主之愈後服六味地黃丸三十觔可也
秘錄

場醫大全

卷十三

耳癢

圭

耳癢門主方

耳癢並治耳中有核或耳屎凝結難取

胡桃肉煨熱塞耳內食頃即通

耳癢或耳屎結於耳底

火酒滴入片時即止

救癢丹 岐天師

龍骨一錢 冰片三分 皂角刺一條燒灰存性

先將藥研細用雄鼠膽一枚水調勻加入乳再

調如厚糊盡抹入耳孔內必然癢不可當必須

瘍醫大全

卷十三

耳癢

毒

顧氏秘書

人執其兩手癢定則自愈矣

耳爛門主方

耳輪赤爛

桑棗槐柳桃嫩枝摘來煎湯日洗三次

又方

貝母輕粉研勻乾摻

瘍醫大全

卷十三

耳爛

毒

顧氏

耳聾門主論

馮魯瞻曰耳中出血少陰火動所致 錦囊

李東垣曰耳中無故出血名曰耳聾乃肝腎相火上逆迫血而聾

耳聾 卷十三 耳聾

耳聾門主方

驗方

白龍骨研細吹耳內

又方

人

牙煨存性 麝香少許

研細每用少許吹耳內即乾又治小兒痘瘡出

字服之 即出

耳聾 卷十三 耳聾 顧氏秘書

黃耳類傷寒門主論

凡耳中策策痛者是風入腎經也不治則變惡寒發熱脊強背直如痲之狀曰黃耳傷寒此不可作正傷寒治宜小續命湯去附子加殭蠶天麻羌獨次用荆防敗毒散加細辛白芷殭蠶黃芩赤芍紫荆皮

傷醫大全 卷十三 黃耳 素 顧氏秘書

耳聾門主論

馮魯瞻曰耳聾因於火者或暴怒之乍乘或情慾之自肆或因有餘之火或因不足之火故耳聾及痛者所主宜芩連歸芍之類 節囊
又曰耳聾因於氣閉者有因怒傷及肝痰因於火或一時卒中或久病氣虛故耳聾及鳴者所主宜舒鬱調血外用導引宣通之法
又曰更有風入於腦停滯於手太陽之脉則令氣塞耳聾

傷醫大全 卷十三 耳聾 素 顧氏秘書

又曰若大病後而耳聾者是血枯而氣弱也當服地黃丸然在病後則氣血俱虛必診兩手之脉孰勝而為之治若脉大無力或右手細小沉弱者陽氣大虛也宜甘溫之劑做陽生陰長之義少加血藥佐之若純視為陰虛而用滋陰降火之劑則陽氣愈弱非惟耳聾不痊反增惡心胸滿泄瀉之患矣
又曰耳聾皆屬於熱左耳聾者少陽火也龍蒼丸主之右耳聾者太陽火也六味丸主之左右耳俱聾者陽明之火也通聖散滾痰丸主之凡有所忿怒

過度則動少陽膽火從左起故使左耳聾也有所
色慾過度則動太陽膀胱相火從右起故使右耳
聾也有所醇酒厚味過度則動陽明胃火從中起
故使左右耳俱聾也婦人多左耳聾者以其多忿
怒也男子多右耳聾者以其多色慾也膏粱之家
多左右耳聾者以其多肥甘也

又曰經云耳聾少氣盛乾者肺也又云頭痛耳鳴九
竅不利腸胃之所生也腸胃不足故氣弱不克傷
寒及大病之後多有此證以補中益氣湯治之耳

湯醫大全 卷十三 耳聾 幸 顧氏秘書

聾多恐者肝虛也經云肝虛則目眩無所見耳
無所聞善恐治法用四物湯加羌活防風柴胡茯
神菖蒲主之

又曰新聾多熱少陽陽明火多故也舊聾多虛腎常
不足故也一宜清風散熱一宜滋腎通竅如大病
後又宜補陰降火

陳遠公曰人有耳中如針之觸痛者並無水出止有
水沸人以爲火邪作祟殊不知乃腎水耗也夫腎
開竅於耳腎氣不足則耳閉耳閉之前必非安然

即閉也必先痛而後閉何也腎火冲之也火冲不
出則火路塞不通是火不再走於耳而成聾也此
症宜速治否則成難治矣用益水平火湯主之
熟地生地麥冬玄參各一兩菖蒲一錢水煎服一

劑疼止二劑響息三劑全愈此良法也
此方補水之劑又能於水中瀉火且不損傷腎氣
腎水既足則腎火自降未成之聾不可不治也此
方治已聾者尚有奇功况治
未聾之耳有不取效之捷哉

又曰人有耳聾不聞雷聲又並不疼此大病後或年
老之人則有之乃腎火內閉而氣塞也最難取效

湯醫大全 卷十三 耳聾 幸 顧氏秘書

法當內外兼治必大補心腎雖耳屬腎而非心氣
相通則心腎不交反致阻塞故必補腎使腎液滋
心即用補心之劑使心氣降於腎火腎氣交自然
上升通於耳矣用啟竅丹主之熟地二兩山萸肉
麥冬各一兩遠志茯苓神栢子仁熟棗仁各三錢北
五味二錢石菖蒲一錢水煎服四劑耳中必作響
此欲開聾之兆也又服十劑外用龍骨一分雄鼠
膽汁一枚麝香一厘冰片三厘研末爲三九綿裹
塞耳中勿取出一晝夜即通矣神效之至再用前

方服一月後用六味丸為善後之計否則恐不能久也

經曰耳者腎之竅也腎主藏精者也故精脫者則頰黑而耳聾耳者宗脈之所聚也以竅言之水也以聲言之金也以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主也有從外而不能入者經也腎和則能聞五音矣

又曰有氣逆而聾者所屬有二凡手太陽氣厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也手少陽氣厥而耳聾者其候耳內渾渾痺痺此皆氣逆而聾也治法宜

傷醫大全

卷十三

耳聾

幸

顧氏秘書

四物湯加降火通氣之藥然臟氣逆而為厥聾必有眩昏之症風聾必有頭痛之症勞役傷其氣血色慾耗其精元昏昏曠曠是謂勞聾必有虛損之症其聲嘈嘈眼見黑花此乃虛聾症也

又曰凡耳聾因濕熱痰及氣實者並宜檳榔丸或神芎丸下之

又曰耳者雖足少陰之所主然人身十二經絡除足太陽手厥陰其餘十經絡皆入於耳惟腎開竅於

耳故治耳者以腎為主然心亦開竅於耳何也蓋

心竅本在舌以舌無孔竅因寄於耳腎為耳竅之主心為耳竅之客腎治內之陰心治外之陽清淨精明之氣上走空竅而聽斯聰矣若二經不調陰陽不和皆令暴聾然五臟開於五部分陰陽言之在腎肝居陰故耳曰二藏陰精主之在心脾肺居陽故口鼻舌三竅陽精主之是以五臟不和則七竅不通凡一經一絡有虛實之氣入於耳者皆足以亂其聰明此言暴病者也若夫久聾者於腎亦

傷醫大全

卷十三

耳聾

幸

顧氏秘書

有虛實之異左腎為陰主精右腎為陽主氣精不足氣有餘則聾為虛若瘦而色黑筋骨健壯此精氣俱有餘因藏閉塞是聾為實乃高壽之兆二者皆稟受所致也若耳聾頰黑者為脫精腎憊用安腎入味菴蓉等丸選而用之若腎經虛火而赤口乾痰盛內熱者六味丸主之此論陰虛者也至於陽虛者亦有耳聾經曰清陽出上竅胃氣者清氣元氣春升之氣同出而異名也今人飲食勞倦脾胃之氣一虛不能上升而下流於腎肝故陽氣閉

塞地氣胃味邪害空竅令人耳目不明此陽虛耳
聾須用東垣補中益氣湯主之有因心氣虛實不
調虛則不能治其陽下與陰交實則恃陽強而與
陰絕經曰至陰虛天氣絕是也宜以補心丸加減
主之更有地氣胃明者或憂愁不解陰氣閉塞不
與陽通或內外濕飲痞隔其氣不得升降而耳中
亦渾渾惛惛者宜以升陽除濕之劑主之然以陰
精陽氣而論則耳目二竅陰精主之陰精主之貴
清涼而惡煩熱陽氣主者貴溫煖而惡寒涼潔古
傷醫大全 卷十三 耳聾 書 顧氏秘書

老人嘗有是論信乎耳目之不可以溫補也仁齋
直指云腎通於耳所主者精精氣調和腎氣充足
則耳得聽斯聰矣故能調養得所氣血和平則其
聾漸輕若不知自節日就煩勞不禁慾不戒性不
戒酒及博炙厚味雖服藥無效也

耳聾門主方

驗方

鼠膽一枚 龍齒 硃砂

冰片 麝香各一分 乳香

潮腦各五厘

研細人乳和丸桐子大外用絲綿包裹塞入耳
底塞三日

又方

全蝎去毒為末酒調滴耳中聞水聲即聰

傷醫大全 卷十三 耳聾 書 顧氏秘書

又方

小蛇皮要頭尾全 麝香各三厘

共乳細鷺毛管吹耳內即通

加味地黃丸

六味地黃湯料加

枸杞子 當歸身 麥門冬各三兩

甘菊花 白芍藥各二兩 柴胡五錢

北五味三錢

煉蜜丸每早淡鹽湯送下三錢

通耳神丹 岐天師

鼠膽一枚但鼠膽最難得須覓一大鼠先以竹籠養之後以紙為匣子引其藏身內用果

品令其自食久之忽然用棒撻擊死立時取膽則膽在肝中否則再不可得乾者可

龍齒 冰片 麝香

硃砂 各一分 潮腦 乳香 各五厘

各研絕細末以人乳為丸如桐子六外用絲綿裹之不可太大塞入耳之深處至不可受而止

塞三口取出即耳聰永不再聾不必三九實耳

傷醫大全 卷十三 耳聾 美 顧氏秘譜

聾亦用此方神效

又方 孫真人

珍珠一粒外用龍骨細末一分密調裹在珠外又

以辰砂為衣綿裹塞耳中一月後取出再服六味

地黄丸一料不再聾

耳聾耳鳴

黃柏 鹽水炒 知母 去毛酒浸 肉桂 三錢

煉蜜為丸空心淡鹽湯送下三錢

耳聾

狗耳根骨一副陰陽瓦 當門子 一分

共乳細末每用分許裝入葱管尖內有藥一頭

用絲綿裹好插入耳竅內但鼻中聞見葱味其

耳即聰

耳卒聾閉

硫黃 雄黃 各等分

研勻綿裹耳數日即聞

又方

龜尿滴入耳中即聞

傷醫大全 卷十三 耳聾 美 顧氏秘譜

又方

大棗十五枚 去核 草麻子一百粒 去殼 同搗入葱

汁和作餅每用一餅塞之覺耳中熱為度一日一

易二十日愈

耳鳴而聾

松香 五錢 化 巴豆 二十粒 去殼

研勻葱汁為丸蓮子大絲綿裹好右聾塞左耳

左聾塞右耳如兩耳聾次第塞一日一易效如

神一方加椒目

又方

川黃柏去皮入兩乳拌晒乾
再用鹽水炒褐色

磨細末水糊丸桐子大每服百丸空心鹽湯下

氣道閉塞兩耳聾

甘遂削成棗核大綿裹塞耳却以甘草含口中嚥

汁數次即通

耳聾沈明

白蒺藜炒搗去刺為末蜜丸空心白湯送下三錢

耳聾灸法

傷醫大全 卷十三 耳聾 素 顧氏秘書

蒼朮一塊長七寸將一頭削平一頭削尖以尖頭

插入耳內在平頭上安筋頭大艾炷灸之輕者七

壯重者倍之覺耳中有熱氣為效

治腎虛耳聾十年者兩服可愈

小蠟四十九個生薑如蠟大四
十九片全炒姜乾為度

揀去生薑將蠟研末溫酒調服至一二更時再

進一服至醉不妨次日耳中如笙簧聲即效

或用全蠟去毒單研末酒服亦效

耳聾

生葱白塞兩耳內頓換

又方

生麻油日滴三五次候耳中塞出即愈

耳聾諸藥不效

惟靜坐閉氣一口捏住鼻頭若早晚如此一月氣

行即通

又方 葉天士

生甘草三分 連翹 牛蒡子

桔梗 羚羊角鎊 苦丁茶廣產梗如
荷梗有絲

傷醫大全 卷十三 耳聾 素 顧氏秘書

滑石飛各一錢 乾荷葉去心用邊要
當年者二錢

作一劑水煎食後服

固本聰耳丸

治心腎不足諸虛耳聾

熟地焙四兩 栢子仁焙去油 人參培

白茯苓人乳拌 遠志肉甘草製
各一兩 五味子七錢

山藥炒黃二兩 石菖蒲蜜酒拌
培五錢

為末蜜丸早晚食前食遠白湯各服三錢

通氣散

治暴怒氣閉腫脹

苗香 石菖蒲 人參

延胡索 陳皮 廣木香 各一錢

羌活 白殭蠶 川芎

蟬蛻 各五錢 甘草 一分 穿山甲 二錢

為末酒調服二錢

耳聾

青藤紫好做枕頭睡久而自聰

又方

瘍醫大全

卷十三

耳聾

單

顯氏秘書

籐枕或竹枕內放烏龜一箇於內夜間枕之久而

自聰

耳鳴門主論

馮魯瞻曰陰虛耳鳴其候手足心熱口渴腸燥兩尺

脉大時或作癢耳聾及鳴治當滋陰疏肝為主錦

又曰因痰耳鳴其候氣壅口燥不痛耳癢體重脉弦

耳鳴聾耳者是也所主在二陳竹瀝之類

陳寶功曰心腎不交心勞則火上炎氣結則不下降

蓋腎開竅於耳故心火乘之遂有耳鳴耳閉之患

矣 正宗

岐天師曰耳中聞蟬蟻戰鬪之聲者此非崇症乃腎

瘍醫大全

卷十三

耳鳴

單

顯氏秘書

水耗盡又加怒氣傷肝所致宜止喧丹主之方中

純是補腎平肝之聖藥飲之數日其戰鬪之聲漸

遠服一月即愈此乃奇病而以伯道之方治之也

秘錄

經曰腎開竅於耳夫腎之為藏水藏也天一生水故

有生之初先生二腎而一陰藏焉又有相火存乎

命門之中每挾君火之勢而侮所不勝經所謂一

水不能勝二火也况又嗜慾無節勞役過度或中

年之後大病之餘腎水枯涸陰火上炎故耳癢耳

鳴無日不作也經曰陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也是以鳴甚如蟬或左或右或時閉塞然有作腎虛治而不效者何也此有痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣凡遇此疾若平昔飲酒厚味上焦素有痰火者只作清痰降火治之多因先有痰火在上又感惱怒而得怒則氣上少陽之火客於耳也若是腎虛而鳴者亦是膀胱相火上升故鳴必不甚其人必多慾當兼見勞怯之症

馮氏曰人身有九竅陽竅七耳目口鼻是也陰竅二

傷醫大全 卷十三 耳鳴 聖 顧氏秘書

前後二陰是也陽氣走上竅若下入陰位則有瀉泄腹鳴之候陰氣走下竅若上入陽位則有壅塞耳鳴之候高年之人腎水已竭真火易露故腎中之氣易出難取浮越上竅竅內有聲如蛙鼓蚊蠅是以外入之聲與內聲相混聽之不清至年邁陰氣內竭不能上通而失聰斯聰矣非若少壯之人濁陰遮蔽其竅外聲不得內入故用射香菖蒲透氣導達為事也故治高年逆上之氣全以磁石為主取其重能達下性主下吸兼用地黃龜膠羣陰

之藥佐之更助五味子山萸之酸取之令陰氣自旺於本宮而不上觸於陽竅由是空曠無礙耳之受聲猶谷之受響故耳之妙用全在虛而能受也經曰耳黑枯燥者是腎憊 錦囊

陳遠公曰人有耳疼雖愈而耳鳴如故者人以為風火也仍用祛風散火而鳴益甚以手按耳則鳴少息此陽虛氣塞也法宜補陽為主兼理肝腎之虛用發陽通陰湯以治之人參白朮當歸白芥子各

二錢茯苓黃芪白芍各三錢熟地五錢柴胡一錢

傷醫大全 卷十三 耳鳴 聖 顧氏秘書

肉桂甘草各五分黑荆芥一錢水煎服一劑輕二劑愈十全大補也 冰鑑

又曰人有平居無事忽耳聞風雨鼓角之響人以為腎火盛也誰知心火亢極乎凡人心腎交始能上下清寧以司視聽心腎不交皆能使聽聞之亂然腎欲交心心必能受心欲交腎腎必能受始相安也倘腎火大旺心必畏腎之炎不敢下交於腎矣均能使兩耳之鳴但心不交於腎者耳鳴輕腎不交於心者耳鳴重今聞風雨鼓角風鳴之重也治

法欲腎氣之歸於心必使心氣仍歸於腎用兩歸
 湯主之麥冬熟地各一兩丹參茯苓各三錢生薑
 仁五錢黃連二錢水煎服二劑鳴止四劑不發也
 此涼心之劑心涼則腎不畏心之熱樂與來歸不
 必兩相引而合也全是益心滋腎之品不但心無
 過燥之虞而腎且有太潤之樂如未婦之同心有
 魚水之歡又何有乖離之戚也哉
 申斗垣曰蟬鳴乃肝膽之火也宜龍膽瀉肝湯主之
 破玄

傷醫大全 卷十三 耳鳴 聖 顧氏秘書

耳鳴門主方

耳鳴通氣法

猴薑汁 八錢 地黄汁 五錢 生薑汁 三匙

和勻隔湯煮滾四朝服完

又方

黃柏半觔乳浸晒乾炒褐色研細酒糊丸桐子大
 每早晚白湯送下三錢

止喧丹 岐天師

熟地 白芍藥 山茱萸 各三兩

傷醫大全 卷十三 耳鳴 聖 顧氏秘書

柴胡 黑山梔 白芥子 各三錢

麥門冬 去心一兩

水煎服

耳閉

石斛 五錢 荔枝 三十個連殼肉核

水煎服

又方

新荷葉為末裝枕枕之

又方

甘遂為末包塞耳內口含甘草靜臥自通

又方

生地黄水煎四兩 遠志肉甘草湯泡焙 石菖蒲焙各入錢

兔絲子揀淨炒 生白芍 白茯苓炒各二兩

益智仁鹽水拌炒五錢 酸棗仁炒三兩 當歸身酒炒一兩

乾姜炭江西者三錢

研細末煉蜜丸清晨淡鹽湯送下三錢

氣壅頭目不清耳常重聽

白蠟蠶炒 廣木香各五分 荆芥穗

瘍醫大全 卷十三 耳鳴 聖 顧氏秘書

防風各五錢 黃連炒 片黃芩酒炒各三錢

川芎 羌活各一錢 乾菊花

木通各七分 石菖蒲 甘草各一錢五分

右為末每服二錢食後茶清調服

耳根毒



瘍醫大全 卷十三 耳根 聖 顧氏秘書

耳根毒門主論

王肯堂曰耳根毒在耳根結核狀如痰核按之不動

而微痛屬足少陽膽經兼三焦風熱所致準繩

胡公弼曰耳根毒受在心腎怒氣傷心流滯肝經風

熱壅聚而成也青囊


馮魯瞻曰耳根及牙床腫痛者屬上焦風熱陽明少

陽二經受病也當用清胃辛涼而散之實熱甚者

酒蒸大黃微利之錦囊

心法曰耳根毒生耳垂後偏上縫中

首疽



瘍醫大全

卷十三

首疽

宋

顧氏秘書

首疽門主論

申斗垣曰首疽生於耳傍瘰脈壅風二穴乃手少陽
三焦經多氣少血憎寒壯熱發渴七八日可刺膿
水黃白色可治如黑稀水發渴及兩左右雙疽者
死此毒之甚者也 啟立

杼疽



瘍醫大全

卷十三

杼疽

宋

顧氏秘書

杼疽門主論

鬼遺方曰杼疽發髮中鬚內及兩耳不穴十五日死
可刺其膿色黑如豆豉或見血者死
王肯堂曰杼疽生頸上兩耳後初不甚腫但痛癢不
時而出清水漸漸長大如玳瑁斑點者是也亦名
化骨瘡若過時潰爛日久出骨者大惡之證此證
多生於積鬱之人七惡多見犯禁者不治 準絕
申斗垣曰杼疽乃手少陽三焦經多氣少血生於耳
下天膈壅風二穴之傍六七日可刺若對膈有瘡

初出不腫俱有燎紫泡漸長大蝕肉潰膿先從脚
後跟如玳瑁斑點名曰羨瘡又名化骨瘡有骨出
乃肺敗也甚惡 啟玄

湯醫大全


卷十三

疥癩

李

顧氏秘書

月蝕疔瘡



湯醫大全

卷十三

月蝕

李

顧氏秘書

月蝕疔瘡門主論

王肯堂曰月蝕疔瘡生小兒耳竅之傍雖曰指月而
生恐未必然大抵風濕熱毒成疔耳 準繩

馮魯瞻曰若風濕相搏則生耳瘡更有以手指月遂
使兩耳之後生瘡者名曰月蝕瘡及凍耳蟲傷撥
損之類外因者並從外治 錦囊

周文采曰月蝕瘡生於兩耳鼻面爛及下部諸竅浸
入筋絡月中則瘡盛月末則瘡衰以其隨月盈虧
故名 集驗

心法日月蝕瘡又名旋耳瘡生於耳後縫間延及耳
摺上下如刀裂之狀色紅時津黃水由臆脾濕熱
所致

瘍醫大全

卷十三 月蝕

筆

顧氏秘書

月蝕瘡門主方

耳躲後生瘡名日月蝕瘡

黃連 枯礬 胡粉

蛇床子

各等分研細乾搽

又方

黃丹 煨赤 枯礬 真粉 各一錢

冰片 五厘

研細乾搽或唾調搽

瘍醫大全

卷十三 月蝕

筆

顧氏秘書

又方

黃連 枯礬 研細乾搽或油調搽

耳內外惡瘡及頭瘡口邊肥瘡

乾馬齒莧 一兩 黃栢 五錢

共為細末每用小豆大許綿裹塞耳中外仍敷

之

耳邊生瘡

黃丹 一錢 松香 八分

研勻香油調搽

月蝕瘡

輕粉隔紙炒 穿山甲炙 黃丹

鉛粉各等分

研細香油調搽

瘍醫大全

卷十三 月蝕

書

顧氏秘書

鬚鬢門主論

馮曾瞻曰鬚屬腎稟水氣故下生陰虛陽盛則鬚白而有光髮屬心稟火氣故上生勞心過度則火上炎而血耗故髮白而早落所屬雖殊然烏鬚黑髮無出乎滋補精血二者而已錦囊

靈樞曰足陽明之脈血氣盛髯美長血少氣多則髯短氣少血多則髯少血氣皆少則無髯也

又曰衝脈任脈皆起於胞中為經絡之海別而絡於口血氣盛則充膚熱肉血獨盈則淡滲皮膚生毫

瘍醫大全

卷十三

鬚鬢

書

顧氏秘書

毛婦人有餘於氣不足於血以其數脫血也故衝任之脈不榮口唇而鬚不生宦者去其宗筋則傷其衝脈血寫不復皮膚內結唇口不榮故鬚不生其有天宦者天生陽氣不舉不能御婦未嘗被傷不脫於血然其鬚不生何也曰此天之所不足也其任衝不盛宗筋不成有氣無血唇口不榮故鬚亦不生由此觀之唇口不獨脾胃也

髭鬚門主方

黑髮散

烏鬚髮

官粉

真蛤粉

黃丹

密陀僧

石 灰 各等分

研勻水調搽上俟乾水洗去藥用核桃油潤之

烏鬚神方

好京墨

三錢研末 麝香 三分

生漆 一筋去渣

雌雄蟹

一對重八兩霜降後者佳對臍紫好

傷醫大全

卷十三 髮鬚 藥 顧氏秘書

先將京墨麝香入磁瓶內次將蟹投入又將生

漆傾入瓶內封固入人行處土中深埋尺許七

七四十九日取起麻布去渣取貯磁瓶中凡用

筆塗上將指頭套魚胞捏勻恐染指上難褪

又方

枯白礬

訶子皮

礪砂

細辛

各三分

五倍子

帶黑色青綿布包裏脚跟踏成餅子三錢

紅銅末

銀罐內煨成灰六分

各為細末對和一處次用石榴皮一個烏梅肉

三個細茶一撮水二盞煎七分去渣用磁盞盛

將前藥末汁納放鍋內重湯煮藥至皺面起為

度晚間用搵子蘸藥刷上次早溫水洗淨鬚髮

如漆

七仙丹

乃補心腎駐容顏黑髮之聖藥

天門冬

去心

麥門冬

去心

人參

去蘆

熟地黃

酒洗

生地黃

酒洗

小茴

炒黃色

白茯苓

去皮春夏用各二兩

何首烏

甜瓜瓣者九蒸九晒四兩

傷醫大全

卷十三 髮鬚 藥 顧氏秘書

為細末蜜丸彈子大每服一九嚼爛好黃酒送

下或鹽湯下或丸如桐子大每服五十九空心

酒送下忌三白葱蒜蘿蔔房事合時忌犯鐵器

烏鬚

一月兩烏永不見白

五倍子

炒過一兩

青鹽

炒

膽礬

礬

明礬

各一錢

青銅

二錢

飛麵

五分

右用粗六安茶煎濃調稠重湯燉至起泡倒鬚

上乾則洗去

烏髮汗巾

草澄茄 三兩 大黃 四兩 旱蓮草 二兩

透細辛 沒石子 黑蜀葵花 陰乾各一兩

黑鉛 半觔化開投水銀一兩待冷定

用白綾三尺將前藥併包一處好米醋五觔入

砂鍋內煮乾為度取出用青布包綾陰乾做成

汗巾或二三條常放袖中要沾人氣方妙不拘

時擦鬚半年一換其鬚永不自所煮之鉛打成

小梳梳鬚甚妙或用後方亦效

傷醫大全 卷十三 髮鬚 藥 顧氏秘書

五梧子不拘多少為末入銅鍋內炒青烟盡白烟

起用潮濕青布一塊鋪地上將炒梧子傾入包住

以脚踏成餅復研細每用末五錢銅末 入銅鍋炒

次一錢 白芨 六分 沒石子 青鹽 白礬 食鹽 各九分

合一處研細量鬚多少用燒酒調塗

又方

桑椹子 人家園內或空地土者 豎莖子 佳如噴上栽者不可用

桑椹十個豎莖子亦用十個彼此相等共入瓶

中埋土地下百日俱化為水入好京墨浸化搽

鬚

擦牙烏鬚

青鹽 破故紙 炒 槐角子

熟地 酒浸三 地骨皮 各一兩 百藥煎

沒石子 各一錢 北細辛 二錢

共研細每早擦牙嚙下不可一日間斷每月擦

時摘去白鬚再生必黑永不再白

烏鬚

蝦蟇烏不拘多少洗淨入小瓶內加麝香一分紫

傷醫大全 卷十三 髮鬚 藥 顧氏秘書

頭埋淨地下四十九日取出以手蘸水擦鬚稍其

黑自上

又方

上好墨以龜尿磨濃用小抵子將鬚掀起緩緩塗

之不可近肉亦不可用手捺捺則墨色入骨難褪



傷醫大全 卷十三 龍泉疽 本 顧氏秘書

龍泉疽虎鬚毒門主論

正宗曰龍泉疽生人中之中虎鬚毒生地角之上此

二毒乃腎督二脉分合行佈驟被外邪所搏而成

初起疙痞次生腫痛漸發寒熱甚者惡心乾嘔腮

項俱腫

又曰此症多生於元氣壯實者故多不必服藥自愈

又曰初起宜線針挑破患頂以蟾酥餅貼膏蓋使毒

有門而泄四邊焮腫如意金黃散敷之

又曰此穴忌灸

思遺方云鼻下一處人中兩處為發鬚此患多因摘

鬚外風侵入而結攻作不常寒熱併作此亦害人

王肯堂曰鬚毒癰生於地角屬足陽明風熱所致若

撼之有根肌肉不仁或麻或癢寒熱大作煩悶嘔

逆者鬚疔也 準繩

申斗垣曰鬚毒乃風邪積熱脾經受症鬚毒鬚毒皆

屬手陽明大腸經受症 啟玄

心法曰龍泉疽生水溝穴中 即人 虎鬚毒一名虎鬚毒

亦名頰癰腫痛嗽赤速潰易治又名承漿疽堅硬

傷醫大全 卷十三 龍泉 本 顧氏秘書

腫痛遲潰難治皆由過食炙博以致胃腎二經積

熱上攻任脉而成

羊鬚疔門主論

申斗垣曰羊鬚疔乃怒氣交感流注經絡心經受症
初起根深形如粟米小荳三四日面目浮腫五六
日寒熱交作七八日體倦頭痛加添嘔逆神昏氣
喘十無一活生於下頰鬚中是也初起同疔瘡門
施治 敢玄

傷醫大全 卷十三 羊鬚 李 顧氏秘書

獨骨瘡門主論

申斗垣曰大人小兒頤頰生瘡津滯不止名曰獨骨
瘡宜百合散治之 敢玄

傷醫大全 卷十三 獨骨 李 顧氏秘書

獨骨瘡門主方

百合散 散

百合

蕭

栢各一

白

芟三分

輕粉五分

草麻仁

五十粒

共為細末搽之如乾用朴硝水和作餅貼之

瘍醫大全

卷十三

獨骨

李

頤

日



頤癰

瘍醫大全

卷十三

頤癰

李

頤氏秘書

頤癰門主論

王肯堂曰頤癰又名承漿癰生地角下屬足陽明胃

經積熱所致 準繩

黃漢卿曰頤上癰不為風頤下癰要成漏不可輕視

全書

頰車癰門主論

申斗垣曰頰車穴在耳下三分下頰軸動之處便是其生癰也乃怒傷於心停滯於肝風熱壅盛聚於頰車而生久多成漏啟玄

又曰胘毒癰生於頰之下乃心腎經絡怒氣傷於心流滯血分風熱壅盛結聚而成頰上屬風熱頰下防成漏瘡不可輕忽

竇漢卿曰頰疽皆出於附骨亦名附骨疽若不速治漸判其骨久則成漏難愈全書

傷醫大全 卷十三 頰車 李氏秘書

傷醫大全目錄

卷十四

唇口部

唇口望色辨證法

辨口味察證法

唇病門主論

唇緊門主論 附方

唇瞶門主論 附方

唇風門主論

傷醫大全 卷十四 目錄 李氏秘書

唇疔門主論

唇瘡門主論 附方

唇口疽門主論

唇奇病門主論 附方

繭唇門主論 附方

狐惑瘡門主論 附方

補缺唇法

口眼喎斜門主論 附方

口噤門主論

小兒口水門主論 附方

口瘡門主論 附方

口疳門主論 附方

口糜門主論 附方

口臭門主論 附方

剪口瘡門主論 附方

鷺口瘡門主論 附方

口內肉毬門主論

口中飛瘍門主論

重勝門主論

上腭生瘡門主論

上腭癰門主論 附方

含腮瘡門主論

阿欠門主論

瘍醫大全卷十四

燕湖顧世澄練江氏纂輯

婿錢之栢東
男 樛焚用和

唇口部

凡一切唇口上腭風疽瘡毒皆彙於此部中以便檢

閱參治

瘍醫大全

卷十四

唇口望色辨證法

唇口焦紅者吉

唇紅者主煩躁渴飲也

唇燥裂者是脾熱

唇口俱腫赤者是熱極

唇口俱青黑者是寒極

唇白者主吐涎嘔逆諸失血症也

唇黃者主脾受積熱也

唇青者主血虛脾寒也

唇紅紫者主蟲齒積痛也

唇口舌胎有斷紋者難治

唇口焦黑者凶

唇青舌卷者死

唇青色青者死

環口鰲黑者死

口張氣直出者死

黑色自人中入口者死

人中平滿者為唇反唇反者肉先死

湯醫大全

卷十四

唇口

二

顧氏秘書

上唇生瘡蟲食其臟下唇生瘡蟲食其肛

此傷寒狐疝也

辨口味察證法

口甜是肝熱脾濕胃有痰滯

口淡是胃熱

口乾口燥是胃家熱極

口鹹是腎水上泛腎熱

口酸是肝熱

口乾是脾熱

口辛是肺熱

口臭是胃熱

湯醫大全

卷十四

辨口

三

顧氏秘書

口若是心熱或膽熱更有因謀慮不決肝移熱於膽

而口苦者蓋肝主謀慮膽主決斷倘事或膽不決則悲怒膽汁上溢而口苦

口酸有脾胃氣弱木乘土位而酸者

口糜有膀胱移熱於小腸而口糜潰爛者

唇病門主論

折衷云脾臟應腎通口氣脾胃為合足陽明胃之經其脉挾口環唇故脾胃受邪則唇為之病風則動寒則紫燥則乾熱則裂氣鬱則生瘡血少則澹而無血色然六腑之華亦在唇經云脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也其華在唇且肝脉督脉衝脉任脉皆絡於唇一有受邪則唇為病又曰喘而唇縮者死

又曰小兒唇紅如丹即發渴候紅甚焦黑則危

湯醫大全 卷十四 唇病門 四 顧氏秘書

馮魯瞻曰唇本脾之外候然足陽明脉亦起鼻而環於唇故凡停滯傷脾必氣粗唇堅而發腫名曰唇腫至有傷寒或發驚候是以眉稜骨痛厥熱眩悶氣穢頤浮或舌苔或齒擊或狂逆則又色白腫甚名曰蠶唇若至胃傷極而唇爛壯熱穢甚見痘者名曰胃爛唇鼻十救一二如憂愁勞極滿唇破裂者亦名曰口糜如風寒乍乘唇青帶白者宜溫胃驅風如吐後而唇白者治宜養胃調氣如怒氣上冲唇青者治宜順氣平肝和胃更有唇口蠕動者

脾虛不能收攝也

湯醫大全 卷十四 唇病 五

唇緊門主論

馮曾贈曰唇口緊小不能開飲食不得入者名曰唇緊 錦囊

折衷云脾胃受邪則唇為之病得寒則緊也

寶漢卿曰口緊一名月關瘡雁來風蟲蝕瘡此證急

用馬齒莧搗汁洗緊唇仍用黃薺汁灌去風痰米

片散吹之如毒氣歸心胸前脹滿上氣頻促下部

洞泄不止必死難治

胡景周曰唇緊濕爛乍好乍發經年累月又名唇瀰

湯醫大全 卷十四 唇緊 六 顧氏秘書

音慘 乃脾家濕熱也

唇緊門主方

口唇燥裂

橄欖泡湯服核中仁研爛敷患處

又方

廉脂敷

唇緊濕爛經年累月乍好乍發

葵根燒灰猪脂和塗

唇緊口小不能開

鱉甲鱉頭燒為末敷之

湯醫大全 卷十四 唇緊方 七 顧氏秘書

又方

馬齒莧煎汁洗之乾者亦可

唇緊難開灸法

承漿穴 在頤前唇下陷中足陽明之會一名天池 灸三壯

合谷穴 在大指岐骨間一名虎口 男左女右灸三壯

冬月唇乾血出

桃仁研爛猪油調塗

唇疔門主論

寶漢卿曰脾胃受風則唇疔動者揭矣

馮魯瞻曰如唇口蠕動者脾虛不能收攝也誤治為

痰則津液愈枯筋脉失養抽掣諸證作矣 錦囊

傷醫大全

卷十四

唇疔

顧天秋

唇疔門主方

唇口疔動

薏苡仁 赤小豆 防己

甘草

水煎服

傷醫大全

卷十四

唇疔方

九



瘍醫大全 卷十四 唇風 十 顧氏秘書

唇風門主論

陳實功曰陽明胃火上攻其患下唇發癢作腫破裂
流水不疼難愈宜銅粉丸泡洗內服地黃丸自愈
正宗

胡景周曰凡下唇腫痛或生瘡名驢嘴風上唇腫痛
生瘡名魚口風以井華水常潤之乃可搽藥以芒
硝塗之

唇疔門主論

申斗垣曰唇疔初起如粟或不痛或癢甚其形甚微
其毒極深其色或赤或白若唇口上下紫黑色者
根行甚急不一日間頭面腫大三四日內即死不
救醫者於初起時即用快刀割去此毒唇缺亦所
難顧再從容補唇誠為救命之捷徑也 啟玄

陳遠公曰有唇上生疔者或口角旁或上下唇不論
大小大約皆脾胃火毒也宜早散之否則毒氣熾
炎必且艱于飲食往往有腐爛死者疔毒以愈小
易醫大全 卷十四 唇疔 十一 顧氏秘書

而愈橫也治法急泄其火毒不可損傷脾胃之氣

毒易散矣救唇湯金銀花 一兩 紫花地丁 一兩白

果 二十個 桔梗 三錢 生甘草 三錢 知母 一錢 水煎

服一劑疼止二劑疔消三劑全愈已爛者又二劑

此方治頭面疔瘡亦効此以白果桔梗引銀花地

丁至生疔之處而盡去其毒也 水鑑

心法曰唇生疔毒細看腮灣中紫黑筋用長針刺破

血出即愈

唇瘡門主論

折衷云脾氣鬱則唇生瘡

馮魯瞻曰有胃傷極而唇糜壯熱穢甚見痘者名曰

胃爛唇鼻十救二三 錦囊

傷醫大全

卷十四

唇瘡

主

顧氏

唇瘡門主方

唇瘡 準繩

既上滴下汗敷之神效

唇生瘡連年不瘥 千金

八月藍葉一筋搗汁洗之不過三日

唇瘡 準繩

白荷花瓣貼之神效開裂出血者即止

嘴唇破

石蟹磨水搽之

傷醫大全

卷十四

唇瘡方

主

顧氏

又方

東壁土研細搽

又方

輕粉敷

又方

頭垢敷

唇瘡痛癢

黃柏末用野薔薇根取汁調塗

唇口疽門主論

蔣示吉日又有脫疽生手足或生口面命難存說約
胡公弼曰唇口疽卽脫疽初起如粟其色如褐或如
棗皮漸黑漸開漸大不知痛癢臭穢難聞小兒多
從積熱之毒大人多因過服辛溫燥劑古人雖有
割法大約六七日多死

湯醫大全

卷十四

唇口疽

兩

顧氏秘錄

唇奇病門主論

岐天師曰有人唇上生瘡久則潰口長牙齒於唇上
者此乃七情憂鬱火動生齒奇病也 秘錄

湯醫大全

卷十四

唇奇

五

顧氏秘錄

唇奇病門主方

煎方 岐天師

生地

當歸

白芍

柴胡

各三錢

天花粉 各二錢

黃連

黃芩

川芎

各一錢

白菓十枚煎服

摻藥

岐天師

冰片

直殭蠶

各一分

黃栢

炒三錢

研細末摻之齒自消矣

傷醫大全

卷十四

唇奇方

十六

顧氏秘書



繭唇

傷醫大全

卷十四

繭唇

十七

顧氏秘書

繭唇門主論

陳實功曰繭唇乃因過積煎炒炙烤又兼思慮暴急

痰隨火行留注於唇此陽明胃經之證初起結如

豆粒漸大如蠶繭突腫堅硬甚則作痛飲食妨碍

或破流血久則變為消渴消中難治之證 正宗

寶漢卿曰此證生於嘴唇經云脾氣通於口又云唇

本脾之外候又云脾之榮在唇故燥則乾熱則裂

風則咽寒則揭若腫起白皮皴裂如蠶繭故命名

曰繭唇也始起一小瘤如豆大或再生之漸漸腫

大合而為一約有寸厚或翻花如楊梅如疔瘡如
靈芝如菌形狀不一皆由六氣七情相感而成或
心思太過憂慮過深則心火焦熾傳受脾經或食
醇酒厚味積熱傷脾而腎水枯竭以致之須審其
病證之因惟補腎水生脾血則燥自潤火自除風
自息腫自消矣此亦異症所生者少人亦難曉若
久不愈急用金銀烙鐵在艾火內燒紅盪之內服
歸脾養榮湯庶易愈也若外用追蝕惡毒線結之
法反為所傷慎哉慎哉若婦人患此陰血衰少故
湯醫大全 卷十四 齒唇 六 顧氏秘書

烙鐵式



不拘金銀打成烙鐵每用艾火燃燒通紅乘熱
盪患上再燃再盪一日止可五六次恐傷元氣
須要擇上吉日不犯屍神盪
畢用藥搽之庶不再生矣

馮魯瞻曰驚證後齒擊狂逆唇白腫甚亦名齒唇

汪省之曰齒唇初起已成無內症者用麻子大艾炷

灸三壯蟾酥餅益日久漸消內症作渴者早服加

減八味丸午服清涼甘露飲以滋化源如日久流

血不止形體瘦弱虛熱痰生面色黧黑腮頰紅現

口乾渴甚俱為不治也 理例
奎光曰齒唇癰屬陽明胃經痰火流注於唇而成結
如豈大若蠶繭然突起堅硬甚者作痛飲食妨破
或破流血久則難治



湯醫大全 卷十四 齒唇 九 顧氏秘書

兩唇門主方

兩唇烙後敷藥方 寶漢卿

莧菜 陰乾燒 雞內金 銅青

兒茶 枯礬 各二錢 輕粉

雄黃 各一錢 麝香 二分
右為細末麻油調搽明日再用甘草湯洗淨再烙如前以平為度後用生肌散

生肌散

花蕊石 醋煨 兒茶 雞內金

瘍醫大全 卷十四 兩唇方 辛 顧氏秘書

血竭 各二錢 大紅絨 煨灰 黃連

飛丹 煨 乳香 各一錢
共為細末加冰片一分乾摻

甘露飲

犀角 生甘草 生地

銀柴胡 枳殼 麥門冬

知母 枇杷葉 黃芩

釵石斛 茵陳 各一錢

引用淡竹葉七片燈心十根煎服

狐惑瘡門主論

馬魯瞻曰傷寒狐惑上唇生瘡蟲食其臟下唇生瘡蟲食其肛若蝕肛透內者不治 錦囊

又曰又有久嗽不已餓則胸中大痛須視上唇有白點如蠅者此蟲蝕其肺也用百部膏一味加烏梅檳榔與服下其蟲則愈肺蟲其形如蠶令人咳嗽聲嘶也

又曰凡腹中熱腸胃虛蟲行求食上唇有瘡曰惑蟲食其臟下唇有瘡曰狐蟲食其肛得此疾者十無

瘍醫大全 卷十四 狐惑 辛 顧氏秘書

一生

又曰若腸頭作瘡者多因大腸濕熱生蟲而蝕肛門久則齒根無色舌上盡白四肢倦怠唾血如粟心內懊憹而成危證初起宜服化蠶丸

心法曰小兒肛門作瘡由蟲蝕也視其下唇內必有小白瘡或耳之前後結小核如串珠者是也宜內服蘆薈丸外用雄黃銅絲等分研細摻之

狐惑瘡門三方

蟲食下部肛盡腸牽者

長股青背蝦蟇一枚雞骨一錢燒灰和勻吹入下部令深入屢效

又方

生艾 川棟根

煎湯熏洗

全

卷十四

狐惑方

五

顧氏

補缺唇法

法用孩兒骨

一根放瓦鉢內將糠火煨過再研極細末止用一分松香五分

狗脊背上毛

不拘多少瓦上焙存性象皮一錢搗

酒泡浸瓦上

培研極細末止用一錢

塗缺唇上後以小鋒刀刺唇缺處皮以磁碟貯流

出之血調前藥即以繡花針穿絲釘住兩邊缺皮

然後捺上血調之藥三五日內不可哭泣及大笑

又怕胃風打噎每日只喫稀粥俟肌生肉滿去其

絲即合成一唇矣

醫醫大全

卷十四

補缺唇

五

顧氏秘書

口眼喎斜門主論

夫口眼喎斜皆血脉受病有筋病脉病之分多屬胃土也經曰足陽明與手太陽筋急則目為僻背急不能正視是胃土之筋病喎斜也又曰足陽明之脉挾口環唇是胃土之脉病喎斜也以口日常動故風生焉耳鼻常靜故風息焉然筋者血所養脉者血之府經云脉勿榮則筋急兼之邪乘虛襲中於寒則筋急引頰口喎目歪中於風熱則筋脉縱緩或燥槁牽引皆令喎僻然氣血無病則雖熱未

傷醫大全

卷十四

喎斜

毒

顧氏秘書

必緩雖寒未必急其寒其熱多由氣血之虛所致故不必以偏於左者為左寒右熱偏於右者為右寒左熱凡拘急之所即氣血所虧之處總之寒者病也熱者氣也氣所不及之處即為寒矣病矣豈有一經而寒熱之邪並中一病而寒熱之氣兩殊者耶明乎此則凡百病之客乎一人也雖有症候錯雜究其原則在一也

靈樞言足陽明之筋頰筋有寒則急引有熱則筋弛縱故左寒右熱則左急而右緩右寒左熱則右急

而左緩陽氣不得宣行故也經曰邪之所湊其氣必虛偏枯喎僻或左或右血脉不周而氣不勻也治宜補正氣行正氣疏風氣使氣勻則風順矣

傷醫大全

卷十四

喎斜

毒

顧氏秘書

口眼喎斜門王方

卒中風口喎

燒酒一勛入小口瓶內盪熱放巴豆仁三粒口向
左歪將病人右手掌捺在酒瓶口上看病人口一
端正即不必薰矣如口向右歪則以病人左手捺
瓶口上

又方

葦管長五寸以一頭挿耳竅中四畔以麪調塞密
一頭納大荳一顆大艾圓燒之令燃灸七壯即瘥

傷醫大全

卷十四

喎斜方

素

顧氏秘書

患左灸右患右灸左

口眼歪斜

草麻子去殼研爛歪左塗右手心歪右塗左手心
仍以熱水一盂安向手心須臾即正急洗去藥

又方

巴豆仁七粒去皮研爛歪左塗右手心歪右塗左
手心仍以熱水一盂安向手心須臾即正并頻以手
抽掣中指

又方

石灰水調歪左塗右邊歪右塗左邊正即洗去

又方

皂莢去皮剉研末陳醋和塗歪左塗右邊歪右塗
左邊乾則更塗之以正

又方

鱈魚一條裝入竹管內以針將尾上深刺出血攤
軟絹上左歪貼右右歪貼左即正 亦有以雙綿
線染鱈魚血乘熱左歪以血線搭右嘴角內沿腮
直牽至耳朶上繫之右歪即搭左嘴角內即正

傷醫大全

卷十四


喎斜方

素

顧氏秘書

又方

酒煮肉桂濃汁以故布湯之



口噤門主論

口噤者足陽明之病頰車穴主之蓋陽明經絡挾口環唇循頰車而諸陽筋脉皆上於頭三陽之筋並絡頰頰夾於口風寒乘虛而客其經則筋攣急牙閤緊而口噤又有風熱太甚痰涎滯膈風喜傷肝復能燥物是以筋燥勁迫而口噤此皆實邪之為病而中風之閉症也若在脫症則諸陽之氣脫去形骸管束無主故口開舌縱不收矣

傷醫大全

卷十四

口噤

未

顧氏秘書

駱潛庵曰兒生三日不哭不乳是云口噤此胎受火毒攻心傳肺故乳食不進啼哭無聲連服延壽丹少許即愈 推拿秘書

小兒口水門主論

小兒心胃火盛廉泉穴開則口中流水不絕又曰因大人與小兒嘻戲捏其腮頰則令小人淌口水

俗云孕婦思食酸甜不得則嬰兒多淌口水

傷醫大全

卷十四

口水

未

顧氏秘書

小兒口水門主方

驗方 急救

用熱水一盆入白礬一勺將兒兩足頻頻洗之立止

又方

鮎魚在小兒嘴上搽之

水全 卷十四 口水方 三

口瘡門主論

醫論選要曰夫口者脾之竅諸經多有會於口者蓋五味入口藏於脾胃為之運化津液以養五氣節宣微爽五臟之氣偏勝由是諸疾生焉故口瘡者乃脾氣凝滯加之風熱治當清胃瀉火
馮魯瞻曰口瘡者心脾蘊熱也小兒陰氣未生陽熱偏盛又因將養過溫心脾積熱薰蒸於上而成瘡治宜瀉心化毒清涼為主若月內諸病而口無涎沫者凶

傷醫大全 卷十四 口瘡 三 顧氏秘書

又曰凡口舌生瘡初起不可便用涼藥敷搽恐寒凝不散內潰奔走久而難愈必先用辛輕升散而後清涼使鬱火達外再視其所因而治之更有中氣不足脾胃虛衰不能斂納下焦陰火被逼上炎以致虛陽口瘡丹溪所謂勞役過度虛火上炎遊行無制舌破口瘡又當從理中湯加附子治之若作實熱誤投涼藥則害又不止口瘡
又曰口瘡者上焦實熱中焦虛寒下焦陰火各經傳變所致當分別治之如發熱作渴飲冷實火也輕

則用補中益氣重則用六君子湯飲食少思大便不實中氣虛也用人參理中湯手足逆冷肚腹作痛中氣虛寒用附子理中湯肺熱內熱不時而熱血虛也用八物加丹皮五味麥冬發熱作渴吐痰小便頻數腎水虛也用八味丸日晡發熱或熱從小腹起陰虛也用四物參朮五味麥冬不應則用加減八味丸若熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處或從脚起乃無根之火也亦用前丸及十全大補加麥冬五味更以附子末唾津調抹湧泉穴若槩用寒涼損傷生氣為害匪淺或問虛寒何以生口瘡而反用附子理中耶蓋因胃虛穀少則所勝者腎也水氣之逆而乘之反為中寒脾胃衰微之火被迫炎上作為口瘡經曰歲金不及炎火乃行復則寒雨暴至陰厥乃格陽反上行民病口瘡是也故用參朮甘草補其土蓋附散其寒火得所動則接引退舍矣

瘍醫大全

卷十四 口瘡

葦 顧氏秘書

口瘡門主方

口瘡

砂仁火煨存性為末摻上即愈

又方

硼砂一錢五分 寒水石一錢 黃栢

硃砂各七分 冰片五厘

研細先用苦茶漱淨再吹

小兒口瘡不能吮乳 蔡醫傳

密陀僧末醋調塗足心瘡愈洗去

又方

小兒臥時以醋調湯瓶內驗末書十字兩足心

一切口瘡 心法

雞內金燒灰敷之立愈

又方 湯液

黃栢 蜜炙赤青 黛一分

研末頻摻

口瘡並治喉癰喉閉塞

鳳凰衣 即哺雞蛋殼內 橄欖核 瓦上焙

衣微火焙黃

存性

孩兒茶 各等分

共乳細每藥一錢加水片五厘口瘡口疳搽患處喉症吹入即能進飲食

白口瘡

生明礬 一錢 硃砂 二分

共研末搽之

口瘡連年不愈者乃虛火也

天門冬 去心 麥門冬 去心 玄參 各等分

為末煉蜜丸彈子大每用一丸嚥

湯醫大全

卷十四 口瘡方

顧氏秘書

大人小兒口瘡久治不效

附子為末醋調男左女右貼腳心

小兒口瘡不能乳食

白礬湯浸脚上半日頓寬或以礬末水調攤紙上

貼脚心再以水濕之或用白礬如雞蛋大置好醋

一盞中頻塗兒足

千金方

口舌一切諸瘡

升麻 射干 各三兩 栝葉 一升

苦竹葉 五合 大黃 二兩 生蘆根

薔薇根白皮 各五兩

水四升全藥煎至一升去滓入生元參汁三合再煎再入生地黃汁五合再煎兩沸下蜜煎濃安舌上細嚥

湯醫大全

卷十四 口瘡方

顧氏秘書

口疳門主論

申斗垣曰口疳是濕熱在於胃口蓋口乃脾之竅若

不早治恐蝕其口唇腮頰則凶敬立

奎光曰糜疳令人滿口糜爛與小兒口疳同治

又曰口疳宜用絲綿攪洗忌用布

卷十四 口疳 美 顧氏秘書

口疳門主方

驗方 錦囊

人中白 煨二錢 銅 青 三錢五分 冰 片 二分

麝香 一分

右研極細冷濃茶淨口吹少許候痰涎流盡再

吹一二次即愈 甚者加西牛黃一分更好

又方 敬立

橄欖核 一兩 兒茶 五錢 冰 片 二分

研細搽之三次全愈

湯醫大全 卷十四 口疳方 美 顧氏秘書

口疳 簡便

甘蔗皮燒研搽甚效

腮腫及口疳難痊 急救

半夏 香 附 各等分

用雞子清共搗如泥左病貼右湧泉穴右病貼

左湧泉穴貼之即瘳

口疳

紅棗 十枚 燒 冰 片 二分

研吹患處

又方

縮砂仁殼煨研擦之

又方

活幼新書

雞脫皮麩存性敷之立效

小兒口疳大人疳瘡

好兒茶 一兩

五倍子

炒黃四

黃

栢

蜜炙五

冰片 二分

研細吹搽

醫書大全

卷十四

口疳方

五

顧氏秘書

口糜門主論

馬魯瞻曰滿口生瘡者名曰口糜若白細點子生於

上腭者名曰七星瘡也總不外乎心肺胃三經之

蘊熱隨所經而清利之間有泄瀉脾元衰弱不能

按納下焦陰火是以上乘為口瘡糜爛者不可悞

投涼劑宜用六君子理中湯之類 錦囊

又曰口者五臟六腑所貫通也為脾之竅藏府之氣

皆由此出入若門戶也藏府有偏勝之邪則口有

偏勝之症

醫書大全

卷十四

口糜

五

顧氏秘書

陳實功曰口破虛火色淡而白斑細點甚者陷露龜

紋脉虛不渴此因思煩太甚多醒少睡治以知栢

四物湯加丹皮肉桂實火者色紅而滿口爛斑甚

者腮舌俱腫脉實口乾此乃膏粱厚味醇酒炙烤

心火妄動治以涼膈散 正宗

又曰如口舌生瘡舌乾黃硬作渴者加減八味丸

又曰宜吹赴筵散吐涎則愈俱禁水漱

奎光曰凡腮口腫爛用筋縛絲綿蘸水輕攪如覺痛

易治不然係死肉多難治也

又曰傷寒口糜者因心脾受熱鬱火薰蒸治宜清理
心脾其脉則洪大有力而為實熱者也更有脾元
中氣不足不能按納下焦陰火以致口糜生瘡宜
展變乎理中湯者不可不知

傷醫大全 卷十四 口糜 四 顧氏秘書

口糜門主方

柳花散 正宗

黃 栢 一兩 肉 桂 一錢 青 黛 三錢

冰 片 二分

研極細每用少許吹之

赴筵散 正宗

黃 連 黃 栢 黃 芩

北細辛 山梔子 乾 姜 各等分

研細吹之

傷醫大全 卷十四 口糜方 四 顧氏秘書

口瘡糜爛 得效

生硫黃研末水調塗手足心效即洗去

又方 衛生

細辛末醋調貼臍上

又方 集簡

鐵鏽末水調敷患處

又方 簡便

葶藶燒存性研末摻之

又方 普濟

釜底墨研細搽

又方 肘後

黃葵花燒末敷之

又方 聖惠

葵根燒研敷效

口破 集驗

滑石一錢 辰砂三錢 冰片二分

研末擦患處

口爛喉腫舌乾

醫醫大全 卷十四 口糜方 聖 顧氏秘書

馬前子一兩麻油煎黑色取起去毛研細吹入喉中即涼妙甚

口臭門主論

昔有人年二十餘歲口臭如登廁醫者曰肺金本主腥金為火所乘火主臭而然也久則成腐腐者腎也亢極則反兼水化其病在上宜湧之如法果愈 錦囊

醫論選要曰口臭者乃臟腑燥腐之氣蘊積於胸膈之間而生熱冲發於口也

醫漢卿曰病人瘥後口中臭腹中絞痛者皆因熱毒積於脾家急用蘇子降氣湯服之 全書

醫醫大全 卷十四 口臭 聖 顧氏秘書

馮魯瞻曰蓋齒屬腎腎氣一虛則虛火壅於上焦故乃口臭名曰臭息

口臭門主方

驗方 朱丹溪

香薷治口臭如神煎濃湯含之

又方 內府

連翹為末糊丸如食韭菜後用茶吞二三錢口中

濁氣即化為清氣神效

口臭穢及齩齒腫痛

北細辛一兩煎濃汁熱漱冷即吐去

又方

瘍醫大全

卷十四 口臭方

留

顧氏秘書

川芎泡湯日漱五七次半月愈

口臭熱臭

乾甜瓜子去殼研細蜜少許調丸如棗核大食後

含化敷牙齒上

剪口瘡門主論

心法曰脾胃積熱口角生瘡

俗云小兒悞用剪刀剪飲食瓜果食之即生剪口瘡

胡公弼曰小兒口角生瘡名夾口瘡又名燕口瘡

澄曰剪口瘡又名夾口瘡脾熱者多患此亦有父母

遺毒小兒口角色白生瘡久而不愈又當以真蟾

酥磨汁調白降丹塗之自愈否則必發瘡毒又當

分別不可只以脾熱治之

瘍醫大全

卷十四 剪口

留

顧氏秘書

剪口瘡門主方

口角爛瘡

亂頭髮洗淨煨存性研細猪油調搽

又方

蒸籠上或鍋蓋上氣汗水塗之

小兒燕口瘡

青布燒灰塗之或用蜜調亦可

燕口瘡

頭髮燒灰存性米飲調服並敷

湯醫大全

卷十四 剪口方

果

顧氏秘書

鴛口瘡門主論

陳實功曰鴛口瘡乃心脾二經胎熱上攻所致其症

滿口皆生白斑雪片甚則咽間疊疊腫起致難乳

哺哺時必多啼叫急用青紗一條裹筋頭上蘸新

汲水揩去白苔以淨為度重手出血不妨隨以冰

硼散搽之 正宗

馮魯瞻曰鴛口者乃胎熱蘊蓄心脾上蒸於口舌上

遍生白屑如鴛之口 鋪囊

湯氏曰初生口內白屑滿舌上不能吮乳謂之鴛口

湯醫大全

卷十四 鴛口

聖

顧氏秘書

急以亂髮纏指頭蘸薄荷汁或井華水拭淨如不脫用四寶丹搽之

若初生百日內口中生白點無數拭之則去少刻復

有口角流涎日夜啼哭不乳又名鴛口白屑皆由

胎熱或母食嗜酒麵遺熱於兒用甘草黃連各一

錢煎濃以帛裹手指口中拭去再不用藥 赤水玄

奎光曰鴛口一名雪口先須搗去白衣用口疔藥方

吹頻攪頻吹內服犀角汁或犀角解毒丸

駱潛庵曰小兒胎火攻心上脣有白點狀如粟米名

日乳鷺或口內白沫滿口上腭或礙狀如鷺口開
而不合語聲不出乳食多艱皆由熱毒上攻也宜
延壽丹 推拿秘書

卷十四 鷺口

吳

顧氏

鷺口瘡門主方

青液散 錦囊

治鷺口瘡及舌瘡及舌菌重舌

青黛 樸 硝 各一錢 龍腦 一字

研細鷺翎挑少許掃上

又方 正傳

白楊樹枝燒取瀝塗之神效

四寶丹 湯氏

雄黃 三錢 硼砂 二錢 甘草 一錢

湯醫大全

卷十四

鷺口方

吳

顧氏

冰片 二分五厘

右為末蜜水調塗或乾摻

又方

黃丹研細竹瀝調塗口中洗之其白點即落一日

塗三次再用辰砂益元散燈心湯調下神效

驅腐丹 奎光秘方

五倍子 去蛙打碎 硼砂 各二錢

共研細末凡口糜鷺口畧吹少許不可過多

小兒心有客熱滿口生瘡

天南星末醋調敷脚心

又方

吳茱萸末米醋調塗足心

又方

鷺蘘泡湯拭洗口內即愈

續修四庫全書

卷十四 鷺口方

五

續修四庫全書

口內肉毬門主論

寶漢卿曰口內生肉毬有根線長五寸餘吐毬出方可飲食以手輕捻痛徹至心服涼血疎風瀉火煎藥再用麝香二錢分二次水調服吹麝香散根化而愈 全書

續修四庫全書

卷十四

肉毬

五

續修四庫全書

口內肉毬門主方

麝香散 寶氏

並麝香 二錢 梅花片 三分 真川連 一錢

研極細蘆管吹入一日夜五六次三日其根自化而愈

傷醫大全

卷十四 肉毬方

全

顧氏秘傳

口中飛瘍門主論

寶漢卿曰口中卒然有腫轉脹轉大此名飛瘍也漸

至殺人用小刀點出血鼠粘子解毒湯加紅花丹

皮惡心腹脹滿者難生 全書

傷醫大全

卷十四 飛瘍

全

顧氏秘傳

重勝門王論

馮魯瞻曰重勝者初生上腭有物脹起宛如懸癰者
是也是脾胃挾熱氣血不能收斂治法速宜綿纏
長針露鋒刺腫之處去其惡血則消若再生再刺
否則有妨乳食總緣小兒出胎之後血氣收斂成
血則口內舌上喉頰皆淨若血氣不斂胎毒上攻
則乃成矣 錦囊

又曰兒初生次日即看口中上腭如有白泡子即以
銀挖耳輕輕刮破其泡子須刮出勿令落入喉中

瘍醫大全

卷十四

重勝

書

顧氏秘書

仍以京墨搽之此泡一老非惟難刮且兒不乳變
生撮口諸證

初生下地即不啼哭不能吞乳奄奄如死者急看喉
間懸癰前腭上有一泡用指摘破以帛拭去惡血
勿令嚥下即能通聲吞乳 保生碎事

上腭生瘡門王論

寶夢麟曰上腭生瘡如黃粟口中腥臭外症手怕冷
脚怯寒此脾經積熱也上腭屬脾脾氣通於口故
脾經受熱則上腭生瘡也先用蚌水布蘸絞淨患
處宜服清脾降火湯再吹水片散無不效矣宜戒
酒色 全書

附取蚌水法

用蚌洗淨打碎取水另用濕棉布濾清若夏布夏
布孔遇水即疎滑倘蚌中螞蝗虫竟瀝在水碗中
矣偶入口中將何處之其棉布孔遇水即緊密則
螞蝗虫不能下故用之口喉之症屬太陽之火熱
蚌乃河中之物屬太陰之精故借水以濟火事

瘍醫大全

卷十四

瘡

書

顧氏秘書

又曰上腭生瘡其因乃上焦積熱脾之氣凝也然上
腭屬脾故脾經受熱則上腭生瘡也務須服清上
膈去風痰之藥

上腭癰門王論

王肯堂曰上腭癰狀如紫葡萄又名懸癰屬手太陰
手厥陰心包絡令人寒熱大作舌不能伸縮口不
能開闔惟欲仰面而臥鼻中時出紅涕乃手足少
陰經及三焦積熱所致過時不治飲食不下神昏
脉亂者死 準繩

陳實功曰上腭紅腫脹痛成膿為癰膿出自愈其病
雖凶却是標病無妨膿脹痛者開之損而痛者益
之其患自安 正宗

癰醫大全 卷十四 癰癰 葉 顧氏秘書

經曰不放膿非法也

馮魯瞻曰上腭癰即垂癰又名懸癰宛如蘆穉盛水
之狀治宜刺之令泄去青黃赤血盪湯洗拭蜜調
一字散少許敷之再生再刺可也 錦囊

醫論選要曰懸癰生於上腭雖不關於咽喉所以暴
腫者亦熱氣使然也不急療則殺人

實漢卿曰懸癰生於上腭形如紫李墜下抵舌其人
口不能言舌不能伸頭不能低仰面而立鼻中時
出紅涕若不速治毒入於腦即死用銅筋排開口

竹披針破癰頭用鹽湯攪淨血出盡用木片散吹
入患處閉口以待藥化自然糜下連吹三五次 全
奎光曰懸癰生口內上腭紫泡如荳大者是也

癰醫大全 卷十四 癰癰 葉 顧氏秘書

上腭癰門主方

上腭癰日久腫硬下垂不潰者

食鹽煨 枯 礬各等分

研細湯調以筋頭蘸點患上

大全 卷十四 癰疽方 素

含腮瘡門主論

申斗垣曰小兒初生時腮內如米豆大小瘡次日

漸大飽破腮頰故名含腮瘡若不早治破透難療

宜二金散 敬立

湯散方 卷十四 含腮 素 顧氏

1910年 丹黃 8

含腮瘡門主方

二金散 歌立

雞內金 鬱金

各等分研細先用鹽湯洗淨吹之

傷醫大全

卷十四 含腮方 本

呵欠門主論

呵欠者脾胃中氣不足精神勞倦所致也經曰足陽明之脈是動則病振寒善伸數欠欠者陽引而上陰引而下乃精與神不相依而陰與陽不相守也

傷醫大全

卷十四 呵欠 本 類氏必書

瘍醫大全目錄

卷十五

舌部

察舌胎辨證法

舌出不入門主論 附方

舌縮不出門主論 附方

弄舌舒舌門主論

舌瘖門主論

重舌門主論 附方

木舌門主論 附方

舌脹門主論 附方

舌痺門主論 附方

舌黃門主論

舌菌門主論

舌癰門主論

舌瘡門主論 附方

舌疔門主論 附方

連珠疔門主論

瘍醫大全 卷十五 目錄 一 顧氏必書

舌衄門主論 附方

白膜裹舌門主論 附方

舌疔門主論

舌上痰核門主論

舌上重膠門主論 附方

舌下痰包門主論

舌斷門主論 附方

瘍醫大全 卷十五 目錄 二 顧氏必書

瘍醫大全卷十五

燕湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之相東陽
男 櫟燮用和 全校

舌部

凡一切舌疽瘡痺皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷十五

辨舌胎

顧氏秘書

察舌胎辨證法

舌為心苗應南方火邪在表則未生胎

邪入裏津液搏結則生胎而滑

胎白者丹田有熱胸中有寒邪在半表半裡也

熱入漸深則燥而澁熱聚於胃矣宜承氣白虎

若熱病口乾舌黑乃腎水刑於心火熱益深而病篤

矣然有胎黑屬寒者必舌無芒刺口有津液也即

小便便之赤白口中之潤燥舌胎之滑澁亦皆因

平津液之榮枯未足憑以遠斷寒熱也故尤宜以

脈之有力無力細辨之總之醫家治病須隨機應

新病何能符合只可讀其書廣其義考其方得其
理潛心默究自得其神即羅氏醫之折舊料而改
新務必
工穩耳

白胎是熱聚丹田寒留胸膈濕氣熏蒸所致治宜燥

濕和中

滑白色者邪未入腑半表半裏也宜和解之熱入漸

深則燥而澁矣

黃胎者胃腑有邪熱也宜下之

舌上有黑胎生芒刺者其因有二非水來尅火為寒

極即火極似水為熱極以脈遲數無力有力辨之

瘍醫大全

卷十五

辨舌胎

顧氏秘書

一宜大承氣一宜理中湯然十有九死之症也

舌上黑胎生芒刺刮不去易生者死

舌捲囊縮瓜甲青黑不知人事面青作搐者肝絕也

舌出不入門主論

岐天師曰人舌吐出不肯收進乃陽火盛強之故錄

寶漢卿曰傷寒舌出寸餘連日不收用梅花冰片五

錢搽舌上即收全書

張仲景曰傷寒舌出者死

傷醫大全

卷十五

舌出

三

顧氏秘書

舌出不入門主方

舌出口數寸

冰片為末敷

人舌吐出不能收進乃陽火盛強之故冰片點過服

黃連 人參 白芍藥 各三錢

柴胡 石菖蒲 各一錢

水煎服二劑愈

又方

草麻子為末裝紙條內燒烟薰之鼻孔有涎流出

傷醫大全

卷十五

舌出方

四

顧氏秘書

即愈

舌縮不出門主論

岐天師曰人舌縮入喉嚨不能語言者乃寒氣結於

胸腹之故 秘錄

澄曰舌乃心苗氣虛與心脾積熱俱能令人舌短不
僅寒凝胸腹當詳辨之

傷醫大全

卷十五 舌縮

五

顧氏秘書

舌縮不出門主方

神方

治舌忽縮入喉嚨不能言語乃寒氣結於胸腹

人參 三錢 白朮 五錢 肉桂

乾薑 熟附子 各一錢

水煎服其舌自舒矣

氣虛舌短

人參煎湯服

心脾積熱舌短

傷醫大全

卷十五 舌縮

六

顧氏秘書

黃連石膏或只用一味或兼用煎湯服

弄舌舒舌門主論

經曰舌乃心苗又曰心開竅於舌心火亢盛腎陰不能上制所以舌往外舒肝火助熾風主動搖胃熱相煽舌難存放舌如蛇哂左右上下伸縮動搖謂之弄舌當清心胃之火則肝風自息矣

馮魯瞻曰弄舌者是脾藏小熱舌絡微緊時時舒舌治之勿過用涼藥即有飲水者亦脾虛津液不足耳若於大病之末而弄舌者凶

又曰凡出長而收緩者名曰舒微露即收舌乾腫澀者名曰弄舌

駱潛庵曰舌忽舒長舌忽捲縮舌忽腫滿皆屬風熱盛而妨乳食也 宜延壽丹

湯醫大全 卷十五 弄舌 七 顧氏秘書

弄舌舒舌門主方

清胃散

防風

天花粉

黃芩

熟石膏

厚樸

姜製

枳殼

黃連

陳皮

甘草

水煎服

又方

以西牛黃一厘塗舌上即止

湯醫大全 卷十五 弄舌方 八 顧氏秘書

舌瘖門王論

馮魯贈曰舌瘖者中風而舌不轉運舌強不能言是也經曰喉嚨者氣之所以上下會厭者聲音之戶舌者聲音之機唇者聲音之扇橫骨者神氣所使主發舌者也然心之本脉系於舌根脾之絡脉系於舌傍肝脉循陰器絡於舌本少陰之脉走喉嚨系舌本足四經之脉皆上於舌邪中其經則痰涎閉其脉道舌不能轉運而為之瘖矣有喉瘖者勞嗽失音即喉嚨聲啞是也故喉瘖者喉中之聲嘶而舌本能言舌瘖者舌本不能言而喉中之聲音如故中風而舌瘖者舌與喉俱病而音聲不能發於會厭也然有外感內傷之因外感者風寒火熱之邪也經曰諸熱暴瘖皆屬於火內傷者心肺腎三經致病亦多由痰火壅塞上竅氣血兩虛不能上榮則舌機不轉也有腎虛而氣不歸源內奪而胞絡內絕不能上接清陽之氣者有元氣不足肺無所資者有血衰而心失所養者蓋心為聲音之主肺為聲音之戶腎為聲音之根經曰三焦之氣

傷醫大全 卷十五 舌瘖 九 顧氏秘書

通於喉嚨氣弱則不能上通矣治者能於根本用力則丹田清陽之氣自能宣揚振作故古人每以獨參湯地黃飲子取效也然中風不語之症有六有失音不語者有舌強不語者有神昏不語者有口噤不語者有舌縱語澁不語者有舌麻語蹇不語者可不詳歟

傷醫大全 卷十五 舌瘖 十 顧氏秘書

重舌門主論

陳實功曰重舌乃心火妄動發之舌下又有一舌也當以線針點刺患上令出惡血內服黃連瀉心湯外用冰硼散搽之正宗

馮曾贍曰重舌者心脾有熱也蓋心候舌而主血然脾脉絡於舌下火土又子母也有熱即與血氣俱盛其狀附舌下而近舌根生形如舌而微短小色異亦宜針刺錦囊

寶漢卿曰重舌乃舌下生一小舌其舌鮮紅其外症湯醫大全卷十五 重舌 十一 顧氏秘書

頰下浮腫有硬核此心經受熱毒氣出於舌下先用紫雪摻之流出熱涎急服甘桔湯加薑燈心煎服全書

又曰蓮花重舌乃蘊熱乘風而發心火炎上之義

又曰蓮花舌乃舌下生三小舌其狀如蓮花之形但舌乃心之苗心火上炎或思慮太過或火氣所傷或酒後當風取涼以致風痰相搏而成此候急用清涼解毒湯加減服之再吹如腫不散須用小刀針出紫血為妙

又曰舌下生小舌名曰重舌蓋舌乃心苗心火上炎故生之用小刀點紫黑處吹冰片散服甘桔湯加山梔連翹之屬

又曰咽喉有腫復生重舌此兩經受病俱有邪也心邪發於舌下胃邪出於喉嚨蓋因喉間之邪觸起於心經之邪則其病俱發外症頭疼項強身發潮熱者是也探痰法同前再用紫雪冰片散治之

汪省之曰重舌大小男女俱生乃心火妄動當以線針點刺患上理例

湯醫大全卷十五 重舌 十二 顧氏秘書

駱潛庵曰脾之脉絡繫舌傍肝之脉絡繫舌本心之脉絡繫舌根三經受胎毒而上攻舌下又像有一舌也名曰重舌宜延壽丹推拿秘書

澄曰重舌蓮花重舌有男婦心緒過鬱憂思過度之人每生此證因循日久以致潰爛腐穢舌頭一爛外殼雖存其中如爛魚腸相似斷不可用升煉藥吹搽一用即血出如泉穿腮腐齧百不一生澄見數症俱因庸工妄治而亡不可不慎

重舌門主方

重舌涎出水漿不入 聖惠方

玄精石 二兩 牛黃 硃砂

冰片 各一分

研末以針舌上去血鹽湯漱摻末噉津效驗如

神

重舌木舌紫舌

黃連 連翹 山梔

黃芩 木通 荆芥

瘍醫大全 卷十五 重舌方 三 顧氏秘書

薄荷 各一錢 牛蒡子 一錢 甘草 五分

燈心十根煎服

當歸連翹湯

治心脾有熱重舌木舌

當歸尾 連翹 各三錢 川白芷 二錢

大黃 甘草 各一錢

水煎服

消毒犀角飲

治內蘊邪熱咽膈不利重舌木舌一切熱毒

犀角 微炒四錢 荆芥 黃芩
甘草 各一錢 防風 犀角 各五錢
水煎服

瘍醫大全 卷十五 重舌方 四 顧氏秘書

木舌門主論

陳實功曰木舌紫舌亦由心火而發用飛鹽加水片少許勤搽出涎自愈 正宗

馮魯瞻曰木舌者因臟腑壅熱心脾積熱其氣上衝是以舌腫尖大塞滿口中若不急治則致害人更不可用手去按按則舌根乃損長成語言不正如至啼叫無聲面色頻變而驚疼者不治然舌固屬心脾但肝脉亦絡舌本故傷寒邪傳厥陰則舌捲囊縮槩可見矣 錦囊

湯醫大全

卷十五 木舌

五 顧氏秘書

張憲伯曰舌忽脹大硬腫塞滿即時氣絕名曰嬰舌 開抄

寶漢卿曰木舌症硬如穿山甲見人舌做一拳外症增寒壯熱語言蹇澁此心經受熱心者舌之本因心而病治法以小刀點紫黑處煎藥內多加山梔山梔乃瀉火之要品也 全書

又曰木舌乳蛾此症為因心經熱毒或因酒後溫牀厚被以致熱氣攻於心經故生單蛾及舌脹而紫吐出風痰急用三稜針刺舌下金津玉液二穴及

刺乳蛾俱破出血痰却用膽硝丹吹入喉中仍服荆防敗毒散

又曰一婦人木舌脹滿口諸藥罔效以銚針砭之五次腫減三日方平血出盈斗服藥全前

又曰舌上有白胎結硬必作木舌用前法治之

又曰凡舌症白胎堅硬藥味不得入者揩拭潔淨用竹刀刮舌然後用藥

又曰舌捲大不得吞嚥皆由熱毒衝上急用紫雪加水麝搽舌上再用冰片散吹之

湯醫大全

卷十五 木舌

六 顧氏秘書

汪省之曰舌脹色紫如肝名曰紫舌凡舌轉掉不仁名曰木舌此乃心火而發 理例

壅光曰木舌者舌腫大如煮熟猪肝不能轉動又有一種生舌根下狀如白棗有青紫筋不能速愈初起不疼不發寒熱漸漸腫大速治可愈遲則難痊皆由憂鬱所致

又曰治口舌症吹藥後如舌上無涎或如乾橋核者不治

又曰凡遇口舌糜爛無血出者不治

又曰凡舌腫大用生石膏加冰片敷如出血者石膏炒用

又曰舌腫脹滿口吐舌在外難以納藥者用殭蠶牙

皂俱製過為極細末用少許吹鼻中口自開痰涎

自出用筋繞絲綿蘸甘草湯潤其舌用四味口疳

藥多加冰片頻吹

又曰木舌初則金丹碧丹全用方載咽喉門後則單用金

丹內服煎藥

張仲景曰傷寒舌腫者難治

傷醫大全 卷十五 木舌 七 顧氏秘書

駱潛庵曰舌腫如木名曰木舌乃風熱盛也宜延壽

丹

木舌門主方

治木舌口舌俱硬有衣不能開 秘方

薄荷 細茶 各等分

共煎露一宿青絹裹筋上蘸藥徐徐抹上自消

重舌木舌

黃連蜜炙二錢白殭蠶 一錢

共乳細摻舌上涎出即好

又方

生薑切片蘸硼砂末擦之

傷醫大全 卷十五 木舌方 六 顧氏秘書

重舌木舌紫舌及咽喉口齒新久腫痛並久嗽痰火

咽啞作痛

玄明粉 硼砂 各五錢 硃砂 六分

冰片 三分

共乳細每日吹五六次

舌脹門主論

奎光曰紫舌脹屬心火內必煩躁悶亂宜吹碧丹方載

咽喉內服加減犀角地黃湯

醫統曰七情所鬱及心經熱壅則舌腫滿不得息心

熱則舌裂而瘡肝熱則舌木而硬脾熱則舌澁而

胎肺熱則舌強熱甚則舌燥如鋸舌卷囊縮者不

治厥陰絕也

心法曰舌忽腫出口外是受蜈蚣毒宜用雄雞血一

小杯浸之即縮入

傷醫大全

卷十五

舌脹

九

顧氏秘書

舌脹門主方

娶舌

破棺而治無不立效並治重舌木舌

皂礬不拘多少新瓦上火煨變紅色放地上候冷

研細將病人用鐵鉗撬開牙關用此擦舌立愈

又方

直蒲黃篩細末頻刷舌上其腫自退若能嚥藥以

黃連酒煎細細嚥之瀉去心火尤妙

又方

傷醫大全

卷十五

舌脹方

三

顧氏秘書

舌腫脹口不能開草蓆仁研爛綿紙取油燃作紙

燃燈上點着吹滅將烟薰之良久自消

舌腫

黃栢以竹瀝浸一宿研末敷舌上

舌腫脹出口外

冬青葉煎濃汁浸之

舌腫塞喉

樸 硝

白 礬 等分

研細搽之立消

舌腫脹

百草霜

海

鹽

各等分

研末井華水調下

傷醫大全

卷十五

舌腫方

主

顧氏秘書

舌痺門主論

舌痺者強而麻也乃心緒煩擾憂思暴怒氣凝痰火而成

傷醫大全

卷十五

舌痺

主

顧氏秘書

舌痺門主方

驗方

荊芥穗

雄黃 各等分

研末木通煎湯調下一錢

痰壅舌麻

生礬研末摻之

又方

皂角末摻之

傷醫大全

卷十五

舌痺方

三

舌黃門主論

奎光曰舌黃乃舌上生黃腫痛亦屬心火

傷醫大全

卷十五

舌黃

三

顧氏

舌菌門主論

奎光曰舌菌屬心火多因氣鬱而生舌上或如木耳
或如菌狀其色紅紫

湯醫大全

卷十五

舌菌

五

顧氏秘書

舌癰門主論

奎光曰舌癰初起舌紅而腫大心經火盛地角亦紅
腫初起用金丹碧丹吹舌根方載咽喉門煎藥內加黃
連山梔犀角

湯醫大全

卷十五

舌癰

五

顧氏秘書

舌瘡門主論

經曰心開竅於舌

陳實功曰心火盛則口舌生瘡 正宗

岐天師曰舌乃心苗心火鬱熱故舌先見證 秘錄

馮魯瞻曰經曰舌乃心之苗又曰中央黃色入通於

脾開竅於口藏精於脾故病在舌又曰心脉繫舌

本脾脉絡舌傍繫舌下故發為病或生瘡或重舌

木舌諸證皆二經之所致也然肝脉亦絡舌本故

風寒則捲縮而不言七情所鬱則腫滿而不消心

瘡醫大全 卷十五 舌瘡 毛 顧氏秘書

熱則裂而瘡脾熱則滑而胎脾閉則白胎如雪肝

壅熱則血上壅若人無故舌痺者不可作風熱治

蓋由心血不足血虛火燥耳理中湯合四物湯治

之 錦囊

又曰昔有人舌上生瘡久餽成穴服京藥不效此下

元虛寒虛火不降投養正丹遂愈

岐天師曰倘人口中忽生瘡於舌上吐出在外寸餘

上結成黃屬難以食物人以為病在心也心熱故

生此瘡此亦近理之談而不知非也亦有崇以憑

之也方用冰片一分入在蚌口內立化為水乃以

鷺翎敷掃其上立刻收入其舌便可飲食矣蚌乃

至陰之物以至陰攻至陰之邪則邪自退走况又

加以冰片之辛溫逐邪不遺餘力自然手到功成

也

竇漢卿曰熱毒攻於舌則舌生瘡客風吹乾津液則

舌硬也王叔和云三部俱數心家熱舌上生瘡唇

破裂治法宜涼心清熱 全書

又曰咽喉有腫兼舌上生瘡此心經受熱也邪熱存

心日久則為喉閉餘毒於心則舌生瘡也須用水

片散元參升麻湯加減治之

寶夢麟曰口舌生瘡如黃粟外症怯寒而口張先用

蚌水或田螺水或茶漱淨然後搽藥

李時珍曰舌下有四竅兩竅通心氣兩竅通腎液心

氣流於舌下為神水腎液流於舌下為靈液道家

謂之金漿玉醴溢為醴泉聚為華池散為津液降

為甘露所以灌溉臟腑潤澤肢體是以修養家嚙

津納氣謂之清水灌靈根人能終日不唾則精氣

津納氣謂之清水灌靈根人能終日不唾則精氣

常留顏色不稿若久唾則損精氣成肺病皮膚枯
涸故曰遠唾不如近唾近唾不如不唾人若有病
則心腎不交腎水不上故津液乾而真氣耗也難
經曰腎主五液入肝為淚入肺為涕入脾為涎入
心為汗自入為唾也

瘍醫大全

卷十五

舌瘡

完

顧氏秘書

舌瘡門主方

舌瘡

吳茱萸研末酒調塗兩足心

口舌生瘡秘錄

黃栢

白僵蠶各一錢煨 殼煨 灰

山豆根

蘇薄荷 甘草各五分

水、片三厘

共為末一日搽三次第一日稍快次日全愈

又方

瘍醫大全

卷十五

舌瘡方

幸

顧氏秘書

黃連二錢

菖蒲一錢

水煎服

小兒舌瘡不能飲乳勿科良方

白礬和雞蛋置醋中塗兒足底二七日愈

舌症主方奎光

黃連

黑山梔

木通

犀角

連翹

生地

牡丹皮

甘草

麥門冬

赤芍

水煎服 如兼口唇必加熟石膏少瀉脾火
如有肺火兼有痰加川貝母 便秘
加玄明粉 火黃枳殼

小兒口舌生瘡

桑樹皮中白汁塗之即效

舌瘡驚口重舌

青黛 樸 硝 各一錢 龍腦 一字

為末鷺翎搽上少許

傷醫大全

卷十五 舌瘡方

三

顧氏秘書

舌疳門主論

心法曰舌疳者由心脾毒火所致其證最惡初如荳
次如菌頭大蒂小又名舌菌疼痛紅爛無皮朝輕
暮重急用北庭丹點之自然消縮而愈若失於調
治以致焮腫突如泛蓮或有狀如雞冠舌本短縮
不能伸舒妨礙飲食言語時津臭涎再因怒氣上
冲忽然崩裂血出不止久久延及項頰腫如結核
堅硬聾痛皮色如常頂輒一點色黯木紅破後時
津臭水腐如爛綿其證雖破堅硬腫痛仍前不退
此為綿潰甚至透舌穿腮湯水漏出是以又名瘰
癧風也蓋舌本屬心舌邊屬脾因心緒煩擾則生
火思慮傷脾則氣鬱鬱甚而成斯疾其證外勢頗
類喉風但喉風則咽喉常腫湯水不能下咽此證
咽喉不腫可以下燕湯水胃中亦思飲食因舌不
能轉運迭迭飲食故每食不能克足致令胃中空
虛而怯證悉添日漸衰敗頰下腫核初起宜用導
赤湯加黃連外用錦地羅蘸醋磨敷虛者歸脾湯
便溏者歸芍異功湯自古治法雖多然此一證百

傷醫大全

卷十五 舌疳

三

顧氏秘書

無一生縱施藥餌不過苟延歲月而已

傷醫大全

卷十五

舌疳

毒

顧氏

舌疳門主方

秘傳北庭丹 清溪

菴 礪

人中白 各五分

瓦上青苔

溘雞糞

瓦 松 各一錢

右用傾銀罐子二個將藥裝在罐內將口封固
外用鹽泥固濟以炭火煨紅俟三炷香為度候
冷開罐將藥取出入水片麝香各一分共研細
末用磁針刺破舌菌用丹少許點上再以蒲黃
蓋之

傷醫大全

卷十五

舌疳方

毒

顧氏秘書

連珠疳門主論

奎光曰連珠疳口風自舌下起一小泡初起一箇漸至五六箇連珠而起

湯醫大全

卷十五

連珠疳

三

顧氏秘書

舌衄門主論

馮魯瞻曰舌上出血名曰舌衄乃心脾熱證也 錦囊
又曰舌衄者舌上無故出血如線不止或如簪孔者
是也宜香薷汁一升日三服外以槐花炒研細末
乾摻之

岐天師曰人舌出血如泉者乃心火旺極血不藏經
也 秘錄

陳實功曰舌上無故出血如線是心胃火邪熾甚逼
血妄行此名舌衄 正宗

湯醫大全

卷十五

舌衄

三

顧氏秘書

舌衄門主方

舌上無故出血

槐花炒黃色研細擦之

舌上出血如泉者乃心火旺極血不藏經也

六味地黃湯加槐花三錢煎服立愈

舌上忽出血如簪孔

赤小豆一升杵碎水三碗和搗取汁每服一盞不

拘時服外用槐花末摻上

又方

瘍醫大全

卷十五

舌衄方

七

顧氏秘書

大小薊搗汁和酒飲

白膜裹舌門主論

初生小兒舌上白膜裹住若不刮去則發驚不可不知
保生碎事

瘍醫大全

卷十五

白膜

六

顧氏秘書

白膜裹舌門主方

驗方 保生碎事

先將舌上白膜刮出血以白礬少許搽之

湯醫大全

卷十五

白膜方

五

顧氏秘書

舌疔門主論

心法曰舌疔者乃心脾火毒舌生紫泡其形如豆堅硬寒熱疼痛應心而起宜用蟾酥丸含放舌下隨化隨嚥或再服三丸以解內毒甚者刺之服黃連解毒湯兼搽紫雪徐徐嚥之

湯醫大全

卷十五

舌疔

五

顧氏秘書

舌上痰核門主論

陳實功曰舌上痰核乃痰氣結於舌上成核作痛硬
強者用線針點破出血水礪散捺之 正宗

瘍醫大全

卷十五

痰核

望

顧氏秘書

舌上重腭門主論

寶漢卿曰舌上生一瘡其形如楊梅故謂之重腭外
症無寒熱但作事煩心先以甘桔湯多加山梔後
服黃連解毒湯再吹藥不宜用刀 全書

心法曰心脾熱極上腭生瘡形如梅子外無寒熱內
時作煩名曰重腭宜黃連解毒湯加桔梗不時以
紫雪嚙化

馮魯瞻曰其症生於頰裏及上腭者即名重腭

瘍醫大全

卷十五

重腭

望

顧氏秘書

舌上重腭門主方

天南星散

治重腭重齦

天南星 生去皮臍

研極細末用醋調塗男左女右脚心厚皮紙貼如乾再用醋潤

楊醫大全

卷十五 重腭方

聖 顧氏秘書

舌下痰包門主論

陳實功曰舌下痰包者乃痰飲乘火流行凝注舌下結成瓠腫綿軟不硬有妨言語作痛不安治當用利剪當包剪出黃痰若雞蛋清稠粘難斷捺盡以冰硼散搽之內服二陳湯加芩連薄荷 正宗

馮魯瞻曰小兒產下舌下有膜如石榴子樣連於舌根令兒言語不發不轉可以指甲摘破令血出即活用燒礬研細敷半葉豆許若血出無害不止燒髮灰摻之或全猪脂塗之 錦囊

楊醫大全

卷十五 痰包

聖 顧氏秘書

伍氏曰若不摘去其孩必啞

舌斷門主論

岐天師曰人有被人咬落舌尖或連根咬斷者或一日或二日或半月俱可接之速用狗舌一條觀其人舌之大小切正如人舌光景將病人舌根伸出病人坐在椅上仰面頭放在椅背上以自已手拿住喉龍則舌自伸出急將狗舌蘸接舌金丹藥末接在入舌上一接住永不落矣 秘錄

或問曰說咬落舌頭者以醋漱之可以重長師曰亂道肉逢酸則縮豈有反伸出之理要重生必用生

傷醫大全 卷十五 舌斷 聖 顧氏秘書 舌金丹

舌斷門主方

接舌金丹 岐天師

生地 人參 透明青龍 齒 透明者各三錢
象皮一錢 冰片三分 土 狗舌 三個

地風 個二十

先將人參各項俱研細後用土狗地風搗爛八前藥末內搗勻佩身上三日乾為末盛在瓶內遇有此等病醫皆可也此藥接骨最奇服下神效骨斷者服一錢即愈

傷醫大全 卷十五 舌斷 聖 顧氏秘書

生香仙丹 岐天師

人參 麥門冬 各一錢 龍齒 三分
土狗 一個 火水 片 二分 地 風 十個 火
血竭 三分

各研細末放土地上刻出火氣聽用先用人參一兩煎湯含漱半日以參湯漱完即以皂用舌蘸藥末含遍不可將舌縮入務須伸床面至不可忍然後縮入如此三次則舌自伸長矣此仙丹也

補舌唇法

鮮蟬蛻燒灰每二錢加去油乳香沒藥各二分五厘塗之即生肉

生舌法

活蟬蛻一個炙乾為末收貯如遇舌斷敷上口合即止

瘍醫大全

卷十五

四

瘍醫大全目錄

卷十六

齲齒部

牙莖望色辨證法

牙關緊急門主論附方

牙齒門主論

牙癱門主論

牙疔門主論

牙疔門主論

瘍醫大全

卷十六 目錄

一 顧氏秘書

牙齧門主論

牙菌門主論

牙漏門主論

牙宣門主論附方

馬牙門主論附方

走馬牙疳門主論附方

青腿牙疳門主論附方

鑽齒疳門主論

齒踞門主論

齒窟瘡門主論

骨槽風門主論附方

重齦門主論

齒遲門主論

長齒門主方

固齒門主方

瘍醫大全

卷十六 目錄二 顧氏祕書

瘍醫大全卷十六

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

婿錢之栢東
男權燮用和
全板

齦齒部

凡一切風火蟲牙牙癰牙疳槽風皆彙於此部
中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷十六 牙齒

顧氏祕書

牙齒望色辨證法

齒燥無津液者是陽明熱極

齒如熱者病難治

前板齒燥兼脈虛者是中暑

牙關緊急門主論

經曰陽明之脈循頰車入齒縫風寒中之輕則戰慄
鼓頰重則口噤不開

又曰凡卒中昏倒牙關緊急者此中風痰也

又曰風入頰頰之間則口喎而牙緊

又曰卒暴中風牙關緊急藥不得下用通關散細辛
薄荷

猪牙皂雄黃每用少許吹入鼻中俟噴嚏後然後

進藥如不嚏者不治牙關緊甚前藥中加麝香少

許或用烏梅或白梅去核以藥擦牙蓋酸先入筋

使牙關酸軟即開亦木能耐土之義因牙齦屬陽

明胃土也

又曰骨槽風頰車疽風熱太甚痰涎滯膈風喜傷肝

復能燥物是以筋燥勁迫而牙關拘緊此實邪耳

馮魯瞻曰口噤者足陽明之病頰車穴主之蓋陽明

經絡挾口環唇循頰車而諸陽筋脈皆上於頭三

陽之筋並絡頰頰夾於口風寒乘虛而客其經則

筋攣急牙關緊而口噤

筋攣急牙關緊而口噤

牙關緊急門主方

中風牙關緊急

烏梅肉指牙即開

小兒牙關不開

天南星煨熟乘熱紙裹不要透氣將紙剪焚實大

一竅透氣塞於兒鼻孔中牙關即開

凡患喉齒口不能張

猪牙皂

青黛

北細辛

僵蠶各一錢

山荳根 元參 各五分

共研細末吹男左女右鼻中即開

牙齒門主論

上四門牙屬心一云上二門牙下二門牙屬心包絡

門牙傍左右上下四牙屬肝再左右

上下四牙屬胃再左右上下四牙屬

脾再左右上下四牙屬肺再左右上

下之牙皆屬腎凡人齒多者貴治病

不論多少以前數分治之多效

下四門牙屬腎

上二側牙屬胃

下二側牙屬脾

上左盡牙屬膽

下左盡牙屬肝

上右盡牙屬肺

下右盡牙屬大腸

又有牙齦腫高軟者此名牙癰內必有膿當以針刺

出膿自愈如出血不止用草紙冷水浸貼二三次

自止 正宗

風牙痛者遇風發作浮腫隨後生痛

火牙痛者齒根必牽扯腮顴陣陣作痛時發時止

濕熱牙痛者乃足陽明胃經其患腮顴浮腫甚則牽引太陽疼連頰項口中熱氣大便結燥

傷醫大全 卷十六 牙齒 四 顧氏秘書

虫牙痛者因喜食甘香濕熱化虫攻痛頰痛

齲齒者乃風熱相搏忿怒勞頓牙根腫痛是手陽明

足太陽之脉繫於齒名齲齒 錦囊

又曰如牙痛不可忍牽引入腦喜寒惡熱脉洪數有

力者凉屬散倍加酒蒸大黃瀉之

又曰如驟發大痛者多屬龍火如疾風暴雷焚灼草

木最速最烈必用從治之法熱藥冷飲則火得其

源而歸之矣

竇漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用

小刀點破之搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無

不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽

明蓄血治好飲酒者多有此症桃仁承氣湯為末

蜜丸服之甚效

又曰牙得清涼而痛甚者為寒口吸凉風而痛止者

為熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落

名曰腐齲若跌撲所傷者或急疔所墜者則久落

傷醫大全 卷十六 牙齒 五 顧氏秘書

難生矣 錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號涕淚交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之捷然火有虛實實火起於腑虛火動於臟而實火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包火加黃連五分脾火加白朮一錢肺火加黃芩一錢肝火加丹皮一錢腎火加熟地一兩二劑火散四

瘍醫大全 卷十六 牙齒 顧氏秘書

劑全愈 冰鑑

按火有虛實何以一方均治不知火之有餘無非水之不足我滋其陰則陰陽之火無不相戢矣况元參尤能滄浮游之火生地止無根之焰又瀉中有補故虛實咸宜此治之巧而得其要者也又能辨各經之火加入各經之味有不取效盡神乎

又曰貪食肥甘齒牙破損作痛如行來行去者乃重積也夫齒乃骨何以藏虫乎不知過食肥甘則熱氣在胃胃火上冲口齒濕氣乘之則濕熱相搏而不散則生虫於牙矣初則只生一二虫久則蕃衍於是蝕損牙齒遂致墮落一齒既朽又蝕餘齒往

往有終身之苦者此症必須外治若用內治未必殺虫而臟腑先傷用五靈至聖散白薇五靈脂各三錢細辛骨碎補各五分研細末先以滾水漱牙至淨後以藥末五分滾水調如稀糊漱牙半日至氣急吐出如是者三疼止虫死矣斷不再發

蓋齒因虫痛靈脂白薇殺虫於無形細辛散火碎補透骨引藥入骨則無可藏虫則盡則痛自止

又曰牙疼日久牙床腐爛飲食不能用日夜呼號此胃火獨盛上升於牙也身中之火惟胃最烈火在何處即於所在之處受病火原易升而難降也火

瘍醫大全 卷十六 牙齒 顧氏秘書

升於齒牙齒牙非藏火之地於是焚燒兩頰牙床紅腫久則腐爛矣似可用治牙仙丹加石羔治之然其火蘊結可用前方以消弭於無形今既潰爛則前方又不可用以有形難於補救也宜加減竹葉石膏湯竹葉三百片石膏青蒿各五錢知母半夏各二錢麥冬茯苓葛根各三錢水煎服四劑火退腫消後用治牙仙丹以收功也
又曰牙疼至夜而甚呻吟不臥者此腎火上冲也然此乃虛火非實火人作火盛治之多不效即作虛

火治亦時有不效者何故蓋火盛當作有餘火衰當作不足乃是虛寒上現假熱也人腎中不寒則龍雷之火下安腎宮惟下寒甚而水又無多則腎火無可藏於是上冲咽喉而牙受之齒乃骨之餘同氣相招留戀不去夜分尤腎主事水不能養火火自遊於外乃至齒作崇矣急大補腎水益以補火之味引火歸源火自得水養不上越矣八味地黃湯加骨碎補服一劑痛止二劑不發也

六味補水桂附引火歸於命門何又加骨碎補不知補水引火之味必先入齒則痛根始除用之以

透於齒骨之中而後直入命門此本塞源妙法也

又曰牙疼難忍閉口稍輕開口更重人以爲陽明胃火也誰知乃風閉於陽明太陽乎此得之飲酒後開口向風而臥風入牙中不出初小疼而後大痛也論理去風自愈而風藥必耗元氣因虛入風又耗其氣其氣益虛風邪欺正氣之怯而不肯出疼難止也古人用灸法甚神灸肩尖近骨後縫中小舉臂取之當骨解陷中灸五壯即瘥但灸後必大痛良久乃定永不發也有畏灸者可用散風湯生

地麥冬各五錢當歸三錢石膏花粉各二錢胡桐淚乾葛細辛各一錢白芷升麻各三分水煎服二劑愈矣此方補重於散正風得補而易散也

又曰牙疼甚吸凉水暫止開口復作人以爲陽明火盛也誰知乃濕熱壅於上下之齒不散乎夫濕在下易散在上難祛蓋治濕不外利小便也水濕下行其勢順上行其勢逆且濕從下受易於行上感難於散故濕熱感於牙間散之尤難以飲食之水皆必齒牙經過不亦重其濕乎濕重不散火且更重矣所以經年月不止也治法必上祛其濕熱又不可單利小便也佐以風藥則濕得風而燥熱得風而涼濕熱解牙疼自愈矣

傷醫大全 卷十六 牙齒 九 顧氏秘書

醫論選要曰外板則爲牙內床則爲齒
汪省之曰重牙乃胃經風濕所致薰法甚捷 理例
經曰男子八歲腎氣實而齒更三八齒牙生五八則齒稿八八而齒去矣女子亦然以七爲數蓋腎主骨齒者骨之標髓之所養也凡齒屬腎上下斷屬陽明上斷痛喜寒飲而惡熱飲取足陽明胃下斷

痛喜熱飲而惡寒飲取手陽明大腸故病有惡寒惡熱之不同也凡動搖疼痛出血或不出血齒縫疎豁全具欲落之狀者皆屬腎也經曰腎熱者色黑而齒槁又曰少陰經病者面黑齒長而垢其蟲疳斷腫不動而潰爛痛穢者皆屬陽明或諸經錯雜之邪與外因為患俱分虛實而治腎經虛寒者安腎丸還少丹重則八味丸其冬月大寒犯腦連頭痛齒牙動搖疼痛者此太陽並少陰傷寒也仲景用麻黃附子細辛湯凡腎虛者多有之如齒痛搖動肢體倦怠飲食少患者脾胃虧損之症安腎丸補中益氣並服如喜寒惡熱者胃血傷也清胃湯惡寒喜熱者胃氣傷也補中益氣湯

又曰齒者骨之餘腎之標寄於齦養於氣血上齦屬足陽明胃下齦屬手陽明大腸然齒者骨也本乎乾元以資始齦者肉也本乎坤元以資生譬之木生於土藉土以為養也故齒之為病手陽明足陽明足少陰三經之所致蓋上下齦屬陽明金也齒屬少陰木也故陽明實則榮蔭其齒而堅牢陽明

傷醫大全

卷十六 牙齒

顧氏秘書

虛則齒失所養而浮豁故凡動搖脫落牙脆剝下齒縫漸稀畏冷畏熱浮豁不堅隱隱而痛乃腎之本虛以致標亦虛焉至於生蠹浮腫牙宣出血臭穢腐爛者乃腸胃濕熱壅盛所謂熱勝則肉腐也虛者補之濕熱者瀉之胃火壅者清之風寒外束者散之外以末藥擦之甚而斷爛齒落者猶土崩而木倒也其治在斷斷堅則齒自固矣

又曰牙床腫痛齒痛動搖或黑爛脫落者此屬陽明濕熱蓋齒雖屬腎而生於牙床上下乃屬陽明大腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚味以致濕熱上攻則牙床不清為腫為癰或出血或生蠹由是齒不得而安如地土不堅而樹木為之搖動矣此宜瀉陽明之濕熱則牙床清寧齒自安固如調理不退落齒一二箇者多死不洽

又曰凡齒痛遇勞即發及午後甚者或口渴面黃及遺精者皆脾胃虛熱用補中益氣及六味丸或十全大補湯

海藏云牙痛症有因傷胃而素有濕熱故上浮於牙

傷醫大全

卷十六 牙齒

顧氏秘書

齧之間遇風寒或冷飲所齧則濕熱不得外達故
 作痛也其病情有標本之分用藥有溫涼之異當
 以寒為標故外擦漱之藥宜用草撥細辛之類辛
 溫以散開鬱兼可拔散鬱熱也以熱為本故內服
 之藥宜用生地丹皮連翹薄荷之類辛涼以散熱
 清中如此內外交攻標本俱得豈有不愈者乎若
 驟聚大痛者多屬龍火如疾風暴雷焚灼草木最
 速最烈必用從治之法熱藥冷飲則火得其源而
 歸之矣若投正治妄用寒涼益增其病至若痛不
 可忍牽引入腦喜寒惡熱脈洪數有力者涼膈散
 倍加酒蒸大黃瀉之
 夷門廣牘曰齒乃血之餘耳乃腎之餘頂乃髓之餘
 瓜乃筋之餘語乃氣之餘
 筆談云沈存中苦腰重不能行有將佐曰此乃病齒
 數年用苦參擦齒其氣味入腎傷腎所致也後太
 常少卿舒昭亮亦用苦參擦齒歲久亦病腰痛自
 後不用之疾皆愈此方書所不載者

湯醫大全 卷十六 牙齒方 主 顧氏秘書

牙齒門主方

葛根湯

葛根 二錢 赤芍藥 一錢五分 赤苓 五分

甘草 五分

風勝加荆芥防風薄荷葉 火盛加連翹生地

丹皮牛蒡子煎服

止痛散 程山齡

牙硝 硃砂 各三錢 明雄 二錢

冰片 一分五厘 麝香 五厘

湯醫大全 卷十六 牙齒方 主 顧氏秘書

煎方 乳細擦牙出涎立愈

煎方

荆芥穗 防風 牡丹皮

生地 各七分 牛蒡子 青皮

生石膏 甘草 各三分

上四門牙屬心加 川黃連 三分

下四門牙屬腎加 麥門冬 五分

上二側牙屬胃加 知母 各六分

下二側牙屬脾加 白芷 五分

炒白芍 六分

上左盡牙屬膽加	龍膽草三分
下左盡牙屬肝加	羌活七分
上右盡牙屬脾加	柴胡六分
下右盡牙屬肺加	梔子五分
牙癰	黃芩六分
牙床腫	桔梗六分
	蒲公英八分
	貝母六分
	連翹八分
漱方	加 金銀花六分
蘇薄荷	射干
夏枯草	牛膝
山豆根	陳茶葉
湯醫大全	卷十六 牙齒方 十四 顧氏秘書
煎漱並治咽喉腫痛	
又方	
蒼耳子	北細辛
小麥	花
	椒各五錢
好醋一碗煎半碗漱之	
又方	
山豆根切三分長以滴醋浸一時噙於口中將苦	
汁嚥下久而又換一塊連換數次即愈	
又方	

火硝五錢	草菓一兩
研細擦之	浸一時炒乾
風火虫牙	
巴豆一粒燈上	花
燒去殼	椒三粒
搗丸含患處立止	
又方	
白芷	北細辛
乾茄子各等分	鶴虱
研細一擦即止	
湯醫大全	卷十六 牙齒方 十五 顧氏秘書
又方	
樟冰	雄黃各等分
研細擦	
又方	
火硝三錢	明雄七分
研細擦	冰片一分
麝香散	
直麝香二錢	黃連一錢
研勻每一伏時擦五六次	冰片二分

虛火牙痛

清晨以小便頻漱立止

牙痛

黃豆五粒 巴豆三粒

搥研九豆子大每用一丸含牙痛處出涎盡以
溫水漱四五次

又方

乳香去油 香白芷 沒藥去油

雄黃 川芎各二錢 火硝五錢

湯醫大全 卷十六 牙痛方 七 顧氏秘書

各研另裝瓶內臨時旋合令患者含水一口將
藥吹鼻孔內吐水即愈

又方

真輕粉 杭粉各一錢

研勻用大蒜搗勻填入白果殼內合魚際穴上
用絹帛縛之痛止即去遲則起泡

又方

牛膝炒 大黃炒 杜仲

青鹽各等分

研細擦痛處即止

虫牙

川烏 草烏 胡椒各等分

研細鋪草紙內作撚蘸麻油點着吹熄以烟噙
患處薰之

取牙法

白馬牙火煨存性 烏煨存性 紫玉簪花根竹刀切片

各等分研勻每用少許點牙齦上其牙自落

牙痛不可忍者

湯醫大全 卷十六 牙痛方 七 顧氏秘書

北細辛 高良姜 草烏

白芷 葶藶各等分

研勻每用少許搽之立止

風火虫牙

黃蠟一兩磁器重湯燉化離火將凝入有紋龍骨
生用不必炮製 杭粉各二錢五分麝香二分五厘研細攪

勻做成大小蠶細錠子如遇牙痛取紙條在煖壺
上熨熱攤藥紙上臨臥時剪一塊貼在痛牙上
早取下如墨染黑一般諸毒盡出其效如神

又方

明雄玄明粉各等分研細擦上立止

又方

五倍子防風青鹽各等分研末火煨存性擦之後以醋或鹽水漱去涎

虫牙

五倍子胡椒研末為丸塞虫蝕孔中即止

風火虫牙

鮮生薑切片噙在疼處流涎則住痛

瘍醫大全

卷十六

牙齒方

末

顧氏秘書

又方

三年陳醬茄蒂陰陽瓦焙存性加硼砂二厘水片一厘為末擦之立止

又方

陳茄子燒存性枇杷葉炙脆各等分為末加冰片少許擦上立止

又方

先以熱醋漱口再用海螵蛸末擦牙

四寶湯

當歸

生地黄

升麻

赤芍藥

各三錢水二鍾煎一鍾服一半留一半漱口吐去牙痛立止

又方

斷艾一兩大蜂窩一個全好醋煎濃漱口一日愈

又方

牛蒡子生研綿裹塞疼處流出苦水即愈

又方

瘍醫大全

卷十六

牙齒方

末

顧氏秘書

荔枝殼裝青鹽燒存性擦牙痛處極驗

錦囊新定頰腫齒疾神方

治尺脉無力虛火上攻寒束內熱頰腫齒痛

羌活

二錢

製附子

一錢

北細辛

八分

石膏

煨三錢

水三鍾煎一鍾食前服

牙痛不可忍腮頰牙齦皆腫者

荔枝七枚鑿一孔去肉入醋於內放燈頭上燒滾

漱之其腫立消其痛立止

貼牙去毒至老不痛 濟生

山梔煎濃汁黃栢煎濃汁真麝香五分

抗粉五錢龍骨五錢打如豆大塊子入梔栢汁內煮乾

研極細用明淨黃蠟一兩熔化入前藥和勻捏成錠攤絹上剪作細條臨臥時貼牙上明晨取下凡黑處俱有毒是作痛處也

又方

生半夏 兒茶各五厘 水片三厘

右研細末用壁上蟻蛛窠包藥少許撚在細柳

湯醫大全 卷十六 牙齒方 圭 顧氏秘書

枝上蘸油點着即吹滅乘熱刺痛處至重者三四次即愈

牙齦腫痛 集效

牙齦腫痛

山慈菇根莖煎湯漱吐

牙齦腫痛 備急

山豆根一片含於牙齦腫痛處

牙齦腫痛 摘玄

瓦松 白礬各等分

水煎漱立效

食蟹齧腫 禾類

朴硝敷之立消

食蟹齧腫肉努出者 普濟

生地黃汁一碗以猪牙皂角蘸炙汁盡為末敷之

風熱牙痛 集要

香白芷一錢 硃砂五分

研末蜜丸芡實大頰用擦牙絕勝他藥

又方 集要

白芷 吳茱萸 各等分

湯醫大全 卷十六 牙齒方 圭 顧氏秘書

浸水漱涎

又方 經驗

槐枝煎濃湯二碗入鹽二觔煮乾炒研日用楷牙

以漱水洗或用青鹽更佳

又方 普濟

蒼朮鹽水浸過燒存性末擦牙

又方 聖惠

荆芥根 烏柏根 葱根 各等分

煎湯頻含漱吐

又方 普濟

荔枝連殼燒存性研末擦牙即止乃治諸藥不效仙方也

又方 聖濟

百藥煎泡湯噀漱

又方 肘後

獨活煮酒熱漱

又方 普濟

千年石灰細辛各等分研搽即止

瘍醫大全

卷十六

牙齒方

圭

顧氏秘書

又方 集玄

旱蓮草入鹽少許於掌心揉擦即止

紫金散 家藏

治風熱積壅一切牙痛兼蠲口氣大有奇效

好大黃瓶內燒存性為末早晚擦漱

又方 秘錄

薏苡根四兩水煮含漱

又方 本事

馬齒莧一把嚼汁漬之即日腫消

又方 聖惠

生絲瓜一條擦鹽火燒存性研末頻擦涎盡即愈腮腫以水調敷之即便可消惟蛀牙不效

又方 集效

大荔枝一個開一孔填鹽滿殼煨研搽之牙腫痛連頭面俱腫十便

露蜂房燒存性研以酒少許調漱

又方 百一

高良姜 二寸 全 蝎 焙 一枚

瘍醫大全

卷十六

牙齒方

圭

顧氏秘書

研末摻之吐漱以鹽湯漱口

又方 濟生

香 附 炒存性 青 鹽 生 薑 各五錢

為末日擦能烏鬚止牙宣

風熱毒攻頭面齒齦腫痛不可忍 聖惠

牛蒡根一觔入鹽花一錢銀器中熬成膏每用塗

齒齦下重者不過三度

又方 聖濟

鵝不食草綿裹懷乾為末含水一口隨左右啗鼻

亦可接塞之

又方 濟世

薄荷 二錢 羌活 三錢 大黃 一錢

水二鍾煎一鍾去滓溫漱吐去

又方 濟世

老薑 川黃連 防風 各等分

研末擦之

又方 濟世

北細辛 猪牙皂 白芷 各一錢

瘍醫大全 卷十六 牙齒方 齒 顧氏秘書

防風 五分

研末用柳枝煎湯漱過擦之

又方 普濟

零陵香梗葉煎水含漱

風蟲牙痛 三丰

百年陳石灰為末四兩蜂蜜三兩拌勻鹽泥固濟

火煨一日研末擦之

又方 攝生

肥皂一個去瓢入山奈甘松各三分花椒食鹽不

拘冬少填滿麪包煨紅取研日擦漱去

又方 普濟

芭蕉根自然汁一碗煎熱含漱

又方 摘立

楊梅根皮韭菜根厨案上油泥等分搗勻貼於兩

腮上半時辰其重從眼角出也屢效

又方 衛生

鐵刺桃仁燈上燒烟出吹滅安痛齒上咬之不過

五六次愈杏仁亦可

瘍醫大全 卷十六 牙齒方 齒 顧氏秘書

又方 易簡

胡椒 華菱 各等分

研末蠟丸麻子大每用一丸塞蛀孔

又方 聖惠

乳香 枯礬 各等分

研末蠟丸塞之

又方 集簡

刮松樹上脂滾水泡化一漱即愈

又方 袖珍

草蜂房一枚鹽實孔內燒過研末擦之鹽湯漱去

或取一塊咬之

又方 類要

雄黃末和棗肉丸塞孔

又方 普濟

礦灰沙糖和塞孔中

又方 集簡

蛇床子煎湯熱漱數次立止

又方 濟急

湯醫大全

卷十六

牙齒方

素

顧氏秘傳

葦荑末擦之煎蒼耳湯漱去涎

又方 延年

鼠粘子炒煎水含漱吐去

又方 普濟

附子一兩燒 枯礬一分

研末擦之

又方 集簡

使君子煎湯漱

金針丸聖濟

骨碎補

乳香 各等分

研末糊丸塞孔

又方 急救

燒酒浸花椒頻頻漱之

又方 摘玄

黃茄種燒灰擦之

又方 集驗

松脂緝塞蛀孔須臾蟲從脂出

又方 普濟

湯醫大全

卷十六

牙齒方

素

顧氏秘傳

潮腦硃砂等分擦之

又方 仁存

茄蒂燒灰摻之或加細辛末等分日擦

又方 集驗

乳香 川椒 各等分

研末蠟丸塞孔

又方 普濟

露蜂房醋煎熱漱或加細辛或加乳香水煎漱之

又方 仁存

山查為末鋪紙上捲作筒燒燈吹滅乘熱和藥吹入鼻內即止痛

又方 普濟

化蠟少許攤紙上鋪艾以箸捲成筒燒烟隨左右

熏鼻吸令滿口呵氣即止

又方 救急

瓦片煨紅安韭子百粒清油數點待烟起以筒吸

引薰患處良久温水漱吐有小蟲出盡為度

痛連頭腦 傳信

瘍醫大全

卷十六 牙齒方 天 顧氏秘書

補骨脂 炒五錢 乳香 二錢五分

為末擦之或為丸塞孔內

齦常出血漸至崩落口臭極效 本事

大黃 米泔浸 生地黃

各旋切一片合定貼上一夜未愈再貼忌說話

恐引風

又方 簡便

魚腥草花椒菜子油等分搗勻入泥少許作小丸

如豆大隨牙左右塞耳內兩邊輪換不可齊塞恐

耳氣一日夜取看有細虫為效

又方 海方

露蜂房煎湯洗漱過以陳茄楷燒灰敷之或茄根

搗汁頻塗之

又方 食寮

鹽五錢皂莢兩挺同燒赤研夜用擦牙一月即瘥

又方 永類

薏苡仁 桔梗 各等分

生研為末水調服大小兒並治

瘍醫大全

卷十六 牙齒方 天 顧氏秘書

又方 經驗

川烏頭 生研 川附子 生研

麵糊丸小豆大每綿包一丸咬之

腎虛牙腫火痛 濟世

杜仲 青鹽 大黃 炒

牛膝 炒

右為細末擦之

又方 經驗

甘松硫黃等分為末泡湯漱之吐去神效

又方 靈苑

骨碎補二兩銅刀細判瓦鍋慢火炒黑為末擦牙

良久吐之嚥下亦可極能堅骨固齒去毒止疼

又方 奇效

仙靈脾為粗末煎湯頻漱大效

胃火牙疳腫痛 保壽堂

好軟石膏一兩火煨入淡酒內淬過為末加防風

荆芥細辛白芷各五分共研細日用擦牙

又方 集效

湯醫大全

卷十六 牙齒方 辛

顧氏秘書

升麻煎湯漱嚥之解毒或加生地黃

諸般牙痛 普濟

香附艾葉煎湯漱之又將香附炒黑為末擦去涎

又方 通變

川椒四兩煎汁拌青鹽二兩白鹽四兩炒乾擦牙

洗目甚妙

又方 普濟

皂莢濃漿同樸硝煎化淋於石上待成霜擦之

又方 聖濟

木香末入麝香少許擦牙鹽湯漱之

又方 直道

縮砂常嚼良

又方 集驗

地松晒乾為末用一捻湯泡少時以手蘸湯挹痛

處即定

又方 濟急

青蒿一握煎水漱之

又方 千金

湯醫大全

卷十六 牙齒方 辛

顧氏秘書

牛膝研末或燒灰擦漱

又方 海上

隔年糟茄燒灰頻頻乾擦立效

又方 高監

鶴虱煎米醋漱口或同防風煎水嚥漱仍研鶴虱

草塞之

又方 節齋

三葉酸漿草一把洗淨川椒四十九粒去目同搗

爛絹片裹定如筋大切成豆粒許每以一塊塞痛

處立止

又方 急救

黑豆煮酒頰漱

又方 集簡

蘿蔔子十四粒生研以人乳和之左疼點右鼻右

疼點左鼻

又方 普濟

老生薑瓦焙入枯礬末同擦有人日夜呻吟用之即愈

傷醫大全

卷十六

牙齒方

三

顧氏秘書

又方 御院

川薑炮川椒等分爲末摻之

又方 普濟

木耳荆芥等分煎湯頰漱

又方 海上

秋茄花旋燒研塗立止

又方 孟詵

吳茱萸煎酒含漱

又方 聖惠

枳殼浸酒含漱

又方 集簡

梅花冰片硃砂各少許爲末擦之立止

又方 經驗

青荷葉剪取錢蒂七個以濃米醋一盞煎半盞去

渣熬成膏頰頰抹之

又方 普濟

白殭蚕直者生姜同炒赤黃色去姜爲末以皂角水調擦立止

傷醫大全

卷十六

牙齒方

三

顧氏秘書

又方 急救

五靈脂一粒咬痛處一熱茶時凉水漱吐

又方 急救

當歸五靈脂細辛各等分水煎漱

齒搖動及打傷 御院

白蒺藜去角生研五錢淡漿水半碗入鹽調温漱

甚效或以根燒灰貼牙即牢固也

牙動欲脫 千金

生地黃綿裏唾令汁漬牙齦併嚙日五六次

又方 急救

五倍子取一孔以白礬填滿煨過為細末擦之能

烏鬚固齒動搖將落者即堅牢神效不能盡述

香鹽散 急救

香 附炒黑四 青 鹽 一兩

為末每日擦牙治一切牙症

齒挺長出分許 備急

常作生地黄良

齒黃 時珍

傷醫大全

卷十六

牙齒方

三

顧氏秘書

糯糠燒白灰擦之

痛牙欲取 鮑氏

茄科馬尿浸三日晒炒為末每用點牙即落神妙

牙痛 奇方

鮮菖蒲根搗汁左牙痛滴左耳內右牙痛滴右耳

中左右牙痛兩耳俱滴屢驗

又方

巴豆半粒塞牙縫立止

又方

防風川椒甘草浮麥煎湯漱

又方

粗碗一隻川椒鋪底潮腦蓋面覆碗一隻於上鹽

泥封固慢火煨一夜次早研細每用一厘擦牙根

又方

五倍子一個開一孔用鹽填滿炭火煨存性畧出

火氣研末以手指蘸擦牙漱津片時吐出數次即

止

取痛牙法

傷醫大全

卷十六

牙齒方

三

顧氏秘書

白馬尾燒灰存性點上即落但須認定痛牙點之

不可亂點恐好齒沾着亦落

取痛牙法 馬岐山

白龍骨 三錢 研

用大蒜一瓣搗爛入末一二分拌勻貼痛處半

枝香時即落

牙疼

明雄 牙 硝 硼 砂

銀 硃 各一錢 水 片 三分

共乳勻搽牙齦內外上下任其流涎自愈

又方

五倍子研細每用三錢火酒半飯碗和勻重湯燉一炷香漱患處立時定疼永遠不發

又方

北細辛 川草薺 各等分

滾水沖漱之立愈

失笑散 江仍度

治牙疼如神

傷醫大全 卷十六 牙齒方 牙齦 顧氏秘書

葦 菝 八分 北細辛 淨葉一錢 大冰片 二分五厘

共研極細擦牙痛處伏於桌邊流涎任其控去片時見效便能飲食

取痛牙法

白 砒 江 子 各五錢

共研細末以竹筒盛之封固埋於白馬糞內藏着春三夏四秋七冬十日取出懸於淨室中將患牙用凉水漱過將藥點在患牙根上效嗽一聲其牙即落並不疼痛

風火虫牙

升 麻 一錢 甘 草 五分 石 膏 春夏四錢 秋冬二錢

作一劑春夏用竹葉三十片為引秋冬用細茶葉二錢為引如臉腫加川芎

牙疼不可忍者

花 椒 焙 胡 椒 食 鹽 炒

枯 礬 明 礬 各五分

共研細每用少許擦吐涎

取牙

傷醫大全 卷十六 牙齒方 牙齦 顧氏秘書

白馬尿浸白茄根日晒夜露三日研細末每用少許點放牙齦即落

風火牙

粗碗一隻入潮腦一兩於碗底內上加蘇薄荷葉五錢以水將薄蓋潮腦上用綿紙糊碗口放灰火上煨兩炷香開看紙上升的潮腦每用少許擦牙

牙疼

北細辛 葦 菝 猪牙皂

荆 芥 食 鹽 各一錢 三 奈 麩 裹 煨 熟 二錢

水煎食後服 如惡熱甚者加黃連山梔
石膏湯 惡熱飲者加龍膽草

治胃有實熱牙痛或上牙腫痛

升麻 知母 各一錢 石膏 一錢五分

大黃 酒蒸二錢 山梔 薄荷

赤茯苓 連翹 各八分 朴硝 六分

甘草 五分

水煎食遠頻頻口噤即愈

牙痛

瘍醫大全 卷十六 牙痛方 聖 顏氏秘書

防風 羌活 青鹽

葶菝 細辛 川椒 各等分

研細擦噤

又方

用清涼藥轉痛者用從治之藥治之

葶菝 川椒 薄荷

荆芥 細辛 樟腦

青鹽

右為末擦牙拔出熱涎

驗方

素心蠟梅花一朵煎湯漱齒其痛立止但不可嚥下

瘍醫大全 卷十六 牙痛方 聖 顏氏秘書

牙癰門主論

奎光曰牙癰一名牙蟻風初起一小塊生於牙齦肉上或上或下或內或外其狀高腫紅焮寒熱疼痛者是也牙癰牙齦紅腫但口能開合若牙齦則牙關緊閉口不能開以此為辨如牙癰腫痛齦肉突出先用金丹碧丹方載咽吹入牙齦外用黃熟香削成鑿子樣從容放進牙關墊住則牙關漸開即將金丹吹入患處

又曰牙癰專用品疳藥最穩方載咽

瘍醫大全 卷十六 牙癰 聖 顧氏秘書

心法曰牙癰久不收口如過服寒涼者必生多骨候骨尖刺出搖則離動始可取出其口方歛

牙疔門主論

陳實功曰牙疔生於牙縫之中頂高突起痛連腮項破則流血先宜針刺照疔瘡門施治正宗

瘍醫大全 卷十六 牙疔 聖 顧氏秘書

牙蟪門主論

奎光曰牙蟪屬胃火發於牙齦如荳大或內或外發無定處治宜先用金丹碧丹吹牙消散後用口疔藥方俱載加薄荷冰片吹之煎藥內加石膏連翹

湯醫大全

卷十六

牙蟪

醫

顧氏秘書

牙齧門主論

奎光曰牙齧證生於牙齒盡齧中齒不能開牙關緊閉此症初起勢甚至夜尤甚形狀雖凶尙在可治宜先用金丹碧丹吹入牙齧外用黃熟香削塊墊牙俟齒閉時再吹金丹方俱載喉門

湯醫大全

卷十六

牙齧

醫

顧氏秘書

牙齒門主論

奎光曰牙齒生於牙齦其形狀紫黑色高低如菌此屬火盛血熱而兼氣鬱而生宜吹口疳藥方載咽喉門並服煎劑

湯醫大全

卷十六 牙齒

果

顧氏秘書

牙漏門主論

澄曰牙漏之患多起於心胃火鬱腎陰消涸或心事鬱遏多起於上門牙齦上或下門牙齦上初則高腫作痛久則上現黃泡破後出膿漸安雖然出膿其口難完細如針孔但遇操勞或心緒煩擾或煎炒烟酒過度發則腫痛時出穢膿更有串至左右齒根遂成牙漏雖不致命頗亦為累初起治宜升陽散火久則當用六味地黃湯加元參釵斛多服久服自可全愈初治切不可妄用苦寒之藥內服

湯醫大全

卷十六 牙漏

果

顧氏秘書

外搽致令心胃之火鬱而又鬱反使火毒根株愈深亦不可早用斂藥亦能使火毒內斂便有腐蝕脫齦落齒之害吹藥在牙疳口瘡門中選用

又曰潰後飲食後必須漱洗庶不致飲食塞其膿竅反令脹痛

又曰遠年近日牙漏穿蝕久不收功用鮮竹一椀鋸成一頭留節一頭無節數段將食鹽裝結實了放炭火上煨紅取出冷定去竹將鹽研細每日擦漏齒上久則收功經驗多人

牙宣門主論

岐天師曰牙宣又名齒齲齒乃骨之餘腎之所主也
腎火外越故齒出血治以六味地黃湯加骨碎補
一錢治之 秘錄

陳實功曰牙齲血出如線或鮮血時從外溢名曰牙

宣此乃心腎火邪逼血妄行之故治當涼心滋腎

為主如血出如線其湧如泉者危 正宗

馮魯瞻曰小兒二三歲後乳食互進或醉後房勞乳

兒致成腎疴疴時滿口皆血名曰宣露 錦囊

傷醫大全 卷十六 牙宣 果 顧氏秘書

又曰凡血從齒縫中或齒根出者謂之齒齲有風壅

有腎虛風壅者消風散外以祛風擦牙散腎虛者

以腎主骨齒者骨之餘虛火上炎服涼藥而愈甚

者此屬腎虛上盛下虛宜鹽湯下安腎丸仍用青

鹽炒香附黑色為末擦之然少陰氣多血少故其

血必點滴而出齒亦隱隱而痛多慾者犯之亦有

胃熱而齒齲出血者陽明氣血俱多火旺則血如

潮湧善飲者多犯此宜清其熱清胃散主之

又曰齒縫出血者以大劑六味地黃湯加骨碎補一

劑即瘥間有不瘥者腎中火衰也再加五味子肉
桂而愈

竇漢卿曰牙齲謂脾胃中熱湧而宣露也亦名曰齲

宣此候牙齒縫中出血上屬脾下屬胃吐血痰至

斗為難療者急宜速治遲則難生先用蚌水灌淨

然後吹藥 全書

汪省之曰牙宣乃陽明胃經實火上攻故血從牙縫

中出也血出不止者殺人 理例

又曰胃虛火動腐爛牙齲亦能有此但常常滲流淡

傷醫大全 卷十六 牙宣 果 顧氏秘書

血不止非同實火鮮血直出也實火以清胃石羔

湯為主虛火宜歸芍地黃湯為主如齒齲腐爛血

出不止者犀角地黃湯人中白散主之

奎光曰牙齲乃齒縫出血上屬脾下屬胃實火上攻

所致亦有胃虛火動腐爛牙齲以致淡血滲漏不

止內服扶脾清火之劑外用珍珠散吹

牙宣門主方

加味地黃湯

大熟地四錢 山萸肉 山藥各二錢 骨碎補三錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓各一錢

水煎服

止血四生湯

生荷葉 生栢葉

生地黃 生艾葉各三錢

水二鍾煎一鍾加童便一小杯和服

瘍醫大全 卷十六 牙宣方 辛 顧氏秘書

齒縫出血蘭室寶鑑

麥門冬煎湯漱

又方

人中白煨研細擦之

又方

陳糟茄子煨灰擦之

又方

香附米煨 石膏煨各一兩 側栢葉火焙黃

青鹽煨三錢

研細清晨擦牙漱口

齒衄

馬糞燒灰存性研細擦之立止

寶氏秘方

治牙齦並穿腮腫毒

鹿角灰二錢 牛黃 玄明粉

黃栢蜜炙 雞內金煨 珍珠

人中白煨 靛花 白礪砂

大紅絨燒灰各一錢 黃連一錢五分 水片

瘍醫大全 卷十六 牙宣方 辛 顧氏秘書

五倍子各三分 雄黃五分 麝香二分

各另研細和勻吹患處

齒衄固齒擦牙散

上好食鹽成塊者煨 骨碎補 生軟石膏各四兩

新鮮槐花二兩

搗爛為團晒乾再磨末擦牙甚妙且能固齒一

方多寒水石沒食子酒煮

齒根邊津流血不止

苦竹茹四兩醋煮含嗽吐之

齒血 醫旨緒餘

三製大黃 研末三錢

用枳殼煎湯加童便調下即止

珍珠散 奎光

治牙髓

烏賊骨 去殼

象牙皮 炙脆

降香節 忌鐵器

龍骨 煨

珍珠 各一錢

兒茶

沒藥

乳香

硃砂 各五分

廣三七 二錢

冰片 一分五厘

湯醫大全

卷十六

牙宣方

羣

顧氏秘書

共研細末取線花如指大捻成團蘸水再捺成

扁式方蘸藥塞患處以指按之勿動二三次即

愈

牙齦出血

草決明煎湯噙之即止

齒齩出血喫食不得

白龍骨

黃連

馬牙硝 各一兩

冰片 一錢

白礬 一分

共研細末每用少許敷牙齦下

滿口齒出血

枸杞子為末煎湯漱之然後吞下立止

湯醫大全

卷十六

牙宣方

羣

顧氏秘書

馬牙門主論

馮魯瞻曰小兒生下啼哭不乳宜看牙齦之上有白點如糝大者名爲馬牙急以銀針挑去即血出不妨磨京墨濃搽間日再看再生再挑即安否則脾元中氣敗絕面青口撮而死 錦囊
慈幼外編云凡兒生下每日夜將清湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內如齒邊有白點即以指甲或細針挑破便無驚風撮口之患

保生碎事云初生七日內面赤喘急啼聲不出即名

湯醫大全 卷十六 馬牙 毒 顧氏秘書

撮口臍風看齒齦上有小泡如粟米狀急以溫水蘸青軟帛髮指擦破即愈大約撮口症必先大便熱須用生犀角及真羚羊角磨汁和蜜飲之有效急則大黃甘草各二錢煎服

奎光曰馬牙者乃初生小兒胎內受熱毒見風而生但看牙齦上有白色如脆骨即是此症欲發矣出胎即發噴嚏含乳或吞或吐而不吮其病已深若不急治入腹即死切莫認作黃膽之類出胎便要看日日要挑破至三四日病即成重五六日堅硬

難治甚者有發而又發大約要滿月後方免此患先用溫水以青絹繞在竹筋上撥開牙關將銀簪挑破出血吹口疳藥方載咽喉門
駱潛庵曰初生小兒月內打嚏即是馬牙蓋因氣血薄弱不能伏制其毒以致心火上炎牙齦遍生白色用針刺破毛青布蘸水掠洗後用金墨搭不復長宜服延壽丹少許即愈 推拿秘書

湯醫大全 卷十六 馬牙 毒 顧氏秘書

馬牙門主方

馬牙驗方 慈幼外編

取桑樹內汁濾清塗之

又方 保生碎事

白僵蚕四枚炒研末蜜調敷唇內即好

瘍醫大全

卷十六

馬牙方

柔

顧氏秘書

走馬牙疳



瘍醫大全

卷十六

牙疳

柔

顧氏秘書

走馬牙疳門主論

心法曰走馬疳惟癖積攻牙成疳者愈後易發皆由積火時時上攻也惟在調理飲食得宜為要如山藥栗子鶯鷓甜辣等物俱當禁忌若稍有疎忽必致復發

李東垣曰走馬疳者熱毒上攻虛臟所受腎藏玉骨齒為骨餘上奔而潰勢如走馬故名之

壑光曰走馬牙疳或因胎毒或因痧痘後發毒攻蝕齒齦腐爛成疳殺人最速鼻梁上發紅點者不治

色如乾醬一日腐二分二日腐一寸故名走馬以喻其速也有齒者落盡而死小兒走馬疳大人牙槽風俱防齒落

訣曰凡看走馬疳無分老幼但上面左邊門牙為牙中之主此牙一落則餘齒盡落此牙不落餘牙雖落俱還可治

又曰崩砂疳口風自舌下牙齦上腫赤口內作痛如湯潑牙齦漸爛亦防齒落為虞

又曰走馬疳宜吹口疳藥方載咽喉門加牛黃倍珍珠龍

湯醫大全 卷十六 牙疳 藥 顧氏秘書

骨痧痘後不用龍骨加牛黃珍珠無不立效

陳實功曰牙疳必起於痧痘之後餘毒未盡或病後

內熱熾盛而成所患浮腫破爛流涎 正宗

又曰凡穢氣冲人者死 下蝕咽喉上蝕鼻梁者死

齒落無血者死 涎向內流者死 太肉已脫者

死 口臭涎穢者死 黑腐不脫者死 用藥不

效者死 身熱不退者死 穿腮透唇者死 鼻

梁黑黯者死 飲食不進者死

馮魯瞻曰走馬疳者多因氣虛受寒熱鬱在內或食

甜酸鹹滯之物積滯日久蘊熱上衝齒焦黑爛間出清血血聚成膿膿臭成虫侵蝕口齒甚則腮頰穿破乳食難進氣喘熱作而危矣治法宜內服清解先去積熱外用溫鹽水洗吹以去涎拔熱之藥切不可純以寒涼斂遏以致鬱熱無從發洩厥潰更深矣以走馬名之者蓋齒屬腎腎氣一虛則虛火邪熱直奔上焦勢如走馬耳 錦囊

又曰小兒腦熱肚痛寒熱往來滑泄頻頻口臭乾渴

耳內瘡膿外則身體壯熱足冷如冰面鰓爪黑瘡

湯醫大全 卷十六 牙疳 藥 顧氏秘書

瘰肌削齒斷口瘡俗名走馬虛火壅於上焦故乃

口臭名曰臭息繼此齒黑名曰崩砂更若斷爛名

曰潰槽如熱血逆出名曰宣露甚至牙為脫落名

曰腐根其根既腐病縱得痊齒不可再此乃急疳

之候急疳者腎疳也一名骨疳乃腎臟久受傷損

所致甚至飲水好鹹小便如乳牙焦牙黑骨枯者

死

走馬牙疳門方

人中白散

治小兒走馬牙疳口疳以及牙齦腐爛臭黑者

並搽痔瘡膿耳男婦腿上傷手腫瘡神效

人中白溺壺者佳 煨紅二兩 兒茶一兩 水片五分

黃栢 白珊瑚 蘇薄荷

真青黛各六錢 川連五錢

共研極細先用陳松蘿茶洗淨日吹五七次吹

後涎從外流為吉毒涎入裏為凶痔瘡用蒜油

傷醫大全 卷十六 牙疳方 李 顧氏秘書

調搽膿耳吹耳內傷手瘡乾疹

走馬牙疳洗藥 章壽祥

黑山梔 連翹 金銀花淨

黃芩 白芷稍 黃栢

玄參各五錢 生石膏三錢 胡黃連

桑白皮 桔梗 射干

銀柴胡各一錢 當歸尾 牡丹皮

茜草 赤芍各一錢 燈心三十根

煎湯頻洗

又方

紅棗浸桐油內陰乾又浸如此三遍煨存性加水

片少許吹之

又方 啟玄

人中白婦人淨桶內 煨一錢 銅綠水飛 麝香一分五厘

研細吹之或加水片

又方

馬前一兩入去核膠棗內火煨烟盡存性為末吹

之

傷醫大全 卷十六 牙疳方 李 顧氏秘書

又方

多年白螺螄殼煨研加兒茶少許乳細吹之

又方

紫貝即海 煨研吹之

又方

人中白煨 銅綠各二錢 水片

牛黃各一分 麝香一分五厘

研細吹之

又方

箬葉二十一片煨研加冰片少許吹之

又方

野地白狗糞放瓦上煨令烟盡加冰片研細吹

又方

人中白煨 川黃連 五倍子

黃丹飛淨炒 雄黃 血竭 各一錢

青黛澄清 硼砂 各三分 冰片

麝香 牛黃 各一分

研細洗淨吹之

瘍醫大全

卷十六 牙疳方

李

顧氏秘書

又方

川黃連 三錢 硼砂 一兩 牛黃

冰片 各一錢

研細吹之

又方

舊蛤子煨灰加冰片少許吹之

又方

取蠅虫一條洗淨陰陽瓦焙加冰片二分研細搽

一塊好一塊

又方

明雄雌黃各三錢入黑棗內紙包煨透全棗研吹

又方

鷲糞去兩頭留中段浸水澄清用絹蓋以新筆蘸

水洗疳上

神授丹

枯礬 五分 冰片 麝香 各一分

白珞灰 三分

研細吹之

瘍醫大全

卷十六 牙疳方

李

顧氏秘書

玉液丹

五倍子揀明淨者敲作小塊去淨虫網蛀屑用好

六安茶泡汁待溫浸洗濾去茶汁再用糟坊白藥

丸研篩拌勻放磁器內棉花覆緊放於煖處伺生

白毛為度用篩盛放風日中晒令極乾篩淨白毛

如篩不盡可用布將毛拭淨每五倍子十兩淨末

加兒茶生甘草各二兩蘇薄荷葉烏梅肉各一兩

研極細末梨汁為丸如元眼核大瞭乾收貯每用

一丸清茶調勻青絹蘸敷患上

又方

五倍子大者一棗核十個白砒三四厘

將棗核白砒裝在倍子內火煨去烟盡為度研極細吹牙齦患處

又方

人中白煨一兩兒茶二錢銅青

麝香 冰片各少許

研細吹上

又方

傷醫大全 卷十六 牙疳方 齋 顧氏秘書

青黛 白礬砂各三錢黃栢

川黃連 黃芩各一錢

研細用米泔水漱淨擦之

何氏濟生方

白礬砂五錢蒲黃 青黛

黃栢 人中白煨馬屁勃

兒茶各一錢白殭蚕五分甘草節八分

麝香 冰片各少許

合研如塵凡走馬牙疳齒落喉爛臭不可近者

水漱淨吹數次即愈

清香散 何氏濟生

紅拾子煨存性兒茶 乳香去油沒藥去油

海巴煨存性象牙 皮炙 珍珠 輕粉

各等分研極細吹之立刻生肌

痘後牙疳 啟玄

蠶繭出過蛾的一個入明礬一塊煨灰擦之

走馬牙疳

地虱即小草鞋重人中白煨三分

傷醫大全 卷十六 牙疳方 齋 顧氏秘書

研細擦之

靨疳蝕爛宜露臭敗 急救須知

胡黃連五分膽礬 孩兒茶各五厘

研細擦之

又方 普濟

零陵香洗炙葶藶炒各等分

研末搽之

又方 聖惠

細辛煮濃汁熱含冷吐

又方 衛生

桔梗 茴香 各等分

燒研敷之

又方 急救

芥菜桿燒存性研末頻敷

又方 時珍

瓦苔煎水入鹽漱口

又方 海上

絲瓜藤陰乾臨時火煨存性研搽即止

醫醫大全 卷十六 牙疳方 梨 顧氏秘書

又方 集簡

五倍子 炒黑一兩 枯礬 銅青 各一錢

研細先以米泔漱淨搽之

又方 惠生

絲瓜藤 一握 川椒 一撮 燈心 一大把

水煎濃汁漱吐其痛立止如神

走馬牙疳 簡便

北棗 一枚去核

將鴨嘴膽礬入內紙包煨赤出火毒研敷出涎

又方 經驗

雞內金 不落水者 五枚煨 枯礬 五錢

研搽

又方 便覽

五倍子 青黛 枯礬

黃栢 各等分

研末先以鹽湯漱淨搽之立愈

又方 保幼

楊花燒存性入麝香少許搽之

醫醫大全 卷十六 牙疳方 李 顧氏秘書

走馬疳蝕透骨穿腮 經驗

生南星一個當心刺空入雄黃一塊麝香燒候雄

黃作汁以蠶子合定出火毒法麝為末入麝香少

許拂瘡數日甚效

又方 試效

綠礬入銅杓炭火煨紅以醋拌勻如此三次為末

入麝香少許溫漿水漱淨搽之

小兒牙疳牙宣腫爛 簡便

白礬打碎裝入五倍子內燒存性為末搽之

小兒齒疳 活勿

鴨嘴膽礬一錢匙上煨紅麝香少許研勻敷齦上

又方 神效

乾姜 白礬 棗子

共燒存性為末搽之

又方

婦女戴蘊通草花不拘何處燒灰搽之

又方 錢氏

人中白煨研末搽之

瘍醫大全

卷十六

牙疳方

李

顧氏秘書

初起走馬牙疳

人中白

湯壺內者佳
火煨紅二兩

兒

茶

一兩

青

黛

薄荷葉

黃

栢

各六錢

冰

片

五分

各研細和勻先用溫湯漱淨吹藥疳上日用六

七次吹之涎從外流為吉涎毒內收為凶

煎方 周鶴仙

專治牙疳雖穿腮破唇神效

蘆 蒼

銀柴胡

玄 參

川黃連

升 麻

胡黃連

石 膏

羚羊角

桔 梗

黑山梔

甘 草

蘼薄荷

牛蒡子

各五分

淡竹葉

十片

煎六分食後服

走馬牙疳 家秘

鱸魚牙齒陰陽瓦煨存性研細末每一錢加冰片

一錢乳細搽之神效

煉毒丹 劉氏秘方

治走馬牙疳屢驗

瘍醫大全

卷十六

牙疳方

李

顧氏秘書

熟石膏 一兩

白 砒 二錢

同研末和勻用麵包好火煨烟盡為度又乳極

細每次用一錢以滾水沖用筷子急攪澄清候

溫取上面清水漱之先微痛再換第二次漱之

即生皮全愈

牙疳第一神方

端午收蟾一隻將煨過人中白一錢五分入肚

內吊到次年陰乾焙脆為末加

建青黛

血 餘

煨淨各一錢

枯

礬

一分

冰片 麝香 各五厘 竹葉上蘭蠶焙死數分

共乳細末每用一分吹患處立愈 如牙齦上

生黑肉加輕粉一錢

急疔蝕口鼻欲死

海中文蛤燒灰臘月猪脂和塗

牙疔潰爛穿唇破鼻並口瘡

胡黃連 五分 膽礬 兒茶 各五厘

研末搽

又方

湯醫大全 卷十六 牙疔方 辛 顧氏秘書

三四年陳醬茄子炙黃燒灰存性吹之

牙疔滿口牙齒潰爛動搖

川椒炒一錢 銅青 硼砂 各一錢

共乳細搽之立愈

走馬疔

大黑棗數枚去核入明雄填滿以苧麻紮好浸麻

油內在燈頭燒以蓋在燈下候滴下雄黃珠為細

末擦患處

齒鼻疔

拖尾糞蛆煨灰一錢 大紅玲衣片煨灰五分

和勻搽之

牙疔牙痛口瘡齒齦喉痺

生石膏 一兩 硼砂 七錢 冰片 三分

白蠶蚕一錢

研極細搽

走馬牙疔及口舌糜爛

銅綠醋製 杏仁 各等分 人中白 加倍

冰片 少許

湯醫大全 卷十六 牙疔方 辛 顧氏秘書

研極細搽古方有人中白七分枯礬三分全用者又有寒黃相與人中白同用者

皆可師之法

走馬牙疔速效神方

水銀一錢入錫五分 舊紅錫燒灰

五倍子燒焦各一錢二分

共乳細用真麻油調藥一二茶匙作兩次搽宜

少少用不可多用搽在牙齦患處有涎即張開

口流出不可嚥入肚內能去腐生肌立刻止痛

兩三日即收功外用冬青葉煎湯漱口

青腿牙疳門主論

醫宗經鑑云青腿牙疳此證自古方書罕載其名僅傳雍正年間北路隨營醫官陶起麟頗得其詳畧云軍中凡病腿腫色青者其上必發牙疳凡病牙疳腐血者其下必發青腿二者相因而至推其原皆因上為陽火炎熾下為陰寒閉鬱以至陰陽上下不交各自為寒為熱各為凝結而生此證也相近內地間亦有之邊外雖亦有不甚多惟內地人民初赴邊外得此證者十居八九蓋中國之人本不耐邊外苦寒風冷况坐臥濕地故寒濕之痰生於下致腿膝青腫其病形如雲片色似烏茄肉體頑硬所以步履艱難也又緣邊外缺少五穀多食牛羊等肉其肥膩腥羶滯於胃毒火上薰致生牙疳牙齦腐爛出血若穿腮破唇腐爛色黑即為危候邊外相傳有令服馬乳之法麟初到軍營診視青腿牙疳之證亦僅以馬乳閱歷既久因悟其馬腦之温不如易之馬乳為效倍速令患者服之是夜即能發出諸證滅矣蓋腦為諸陽之首其性

傷醫大全

卷十六

牙疳

主

顧氏秘書

温暖且能流通故耳兼服活絡流氣飲加味二妙湯宜其氣血通其經絡使毒不得凝結外用砭法令惡血流出以殺毒勢更以牛肉片貼敷以拔積毒不數日而愈蓋黑血出則陰氣外泄陽氣即隨陰氣而下降兩相交濟上下自安矣由是習為成法其中活者頗多因不敢自私著之於書以公於世

又曰形氣衰敗飲食不思者不治 牙齒俱落紫黑

血流腐潰穢臭者不治 腿大腫腐爛或細而乾

傷醫大全

卷十六

牙疳

主

顧氏秘書

枯者不治



青腿牙疳門主方

服馬乳法 陶起麟

治青腿牙疳

用青白馬乳如無青白馬即雜色馬亦可用每日早午晚隨擠隨

服甚效

服馬腦法

馬腦子一個用竹刀挑去筋膜放在盥內

用滾熱黃酒一觔或半觔沖服倘一次不能服完分作兩次沖服亦可

易醫大全

卷十六

青腿方

毒

顧氏秘書

活絡流氣飲

一名和中既濟湯

蒼木

乾薑

枳殼

生附子

黃栢

懷牛膝

山查

麻黃

羌活

宣木瓜

獨活

烏藥

檳榔

甘草

引加黑豆四十九粒生薑三片

如牙疳盛

減去胡連

乾薑生附子龍膽草

如牙疳輕而腮疼重加

肉桂

如寒熱已退減去麻黃羌活

加味二妙湯

蒼木

黃栢

檳榔

懷牛膝

澤瀉

宣木瓜

烏藥

當歸尾

引加黑豆四十九粒生薑三片煎服

砭法

用三稜扁針形如錐銜者向腿上一青黑處勿論穴道量黑之大小針一分深或十針二十針皆可務

易醫大全

卷十六

青腿方

毒

顧氏秘書

取黑血流出外以牛肉切薄片貼針眼並黑處次日再看如黑處微退仍針仍貼如無牛肉當頂刺被用罐拔法亦可

牛黃青黛散

西牛黃

青黛

各五分

硼砂

二錢

硃砂

人中白

龍骨

各一錢

水片二分

研細末用甘草湯漱淨吹

洗法

煮馬肉湯洗

又方

割羊肝片貼黑處

又方

芥菜子搗細燒酒調敷

湯醫大全

卷十六

清癰方

素

顧氏秘書

鑽齒疳門主論

陳寶功曰鑽齒疳乃小兒牙根尖穿出齒根肉外甚
刺嘴唇作痛用披針挑破牙傍好肉以手取出本
牙出血不止以凉水濕紙換貼二三次其血自止
必兼戒厚味其牙復生如舊 正宗

湯醫大全

卷十六

鑽齒疳

素

顧氏秘書

齒踞門主論

申斗垣曰齒斷上長出如雞足踞長一二寸不痛候
觸之則痛連心乃足陽明胃經之毒當用芫花線
繫之二日自落如斷下是手陽明大腸經亦用芫
花線繫用藥則當分經泄毒 啓玄

醫醫大全

卷十六

齒踞

末

顧氏秘書

齒窟瘡門主論

申斗垣曰凡人年老齒落其根最深其窟最大氣血
虛衰不能長合忽被硬物研破其痛切骨至心及
腦飲食不便瘡口最難合名曰齒窟瘡用生肌散
二三分舊棉花托入窟內或飯搗和塞之過夜亦
妙 啓玄

醫醫大全

卷十六

齒窟瘡

末

顧氏秘書



骨槽風門主論

王肯堂曰骨槽風又名穿腮毒牙齦腫痛寒熱大作腐爛不已由憂愁思慮驚恐悲傷所致初起生於耳下及頸項間隱隱皮膚之內略有小核漸大如胡桃日增紅腫或上或下或左或右牙關緊急不能進食先用鷺翎探吐風痰切不可用刀針準繩寶漢卿曰骨槽風一名穿珠一名附骨一名穿喉一名牙槽風一名穿腮此乃憂思驚慮太陽受症結於大腸之間邪毒交生灌於經絡之內初起生於

耳下及項間隱隱皮膚之內畧有小核漸長如李子之狀便覺紅腫或上或下或左或右牙關緊急口噤不開急用鷺毛攪出風痰卽服煎劑

陳實功曰骨槽風初起生於耳前連及腮項痛隱筋骨久則漸漸漫腫寒熱如瘧牙關緊閉不能進食此得於鬱怒傷肝致筋骨緊急思慮傷脾致肌肉腐爛膏梁厚味致膿多臭穢初則堅硬難消久則瘡口難合初宜艾灸腫項及耳垂下五分各七壯膏貼以泄內毒牙關內腫以線針刺去惡血水礪

散搽之使內外毒氣得解內服降火化痰清熱消腫之劑潰後補托藥中加麥冬五味如外腐不脫虛熱不退堅腫不消形焦體削者死正宗

將示吉曰治此必使水升火降脾健金清乃愈說約又曰牙槽風久而不愈齒縫中出白膿極難調治甚則齒落如上左邊門牙落者不治治用口疳藥方咽喉載加半黃倍珍珠兒茶初起五日用之紫色退至白色再五日長肉再五日自愈

又曰牙槽風久而不愈卽名牙漏吹同牙槽風法兼

服滋陰降火劑戒酒色發物

心法曰骨槽風一名牙疔發又名穿腮發乃手少陽三焦足陽明胃二經風火也起於耳前連及腮頰筋骨隱痛日久腐潰腮之裏外筋骨仍然漫腫硬痛牙關拘急皆由邪風深襲筋骨故也此證屬在筋骨陰分故初起腫硬難消潰後瘡口難合多致不救亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭非理中湯佐以附子不能回陽非殭蠶不能搜風如法治之諸證俱減惟牙關拘急不開宜用生薑片墊灸頰車穴穴在耳垂下五分陷中二七壯每日灸之兼用針刺口內牙盡處出血其牙關即開若寒熱不退形焦體削痰盛不食或口內腐爛甚則穿腮落齒者俱為逆證當腐爛之初治法全牙疔施救亦不過稍盡人事耳

骨槽風門至方

骨槽風牙疔奇方

古廟屋上多年乾猫屎白色者取來陰陽瓦焙存性每一錢加水片二分研細收貯每用濃松蘿茶洗淨然後吹之蝕爛處自生肌收口

馮醫大全

卷十六 骨槽風方

八十一 醫氏秘書

重齦門主論

馮魯瞻曰重齦者初生貼着齒齦有物脹起者是也此候乃脾胃挾熱氣血不能收斂治法速宜綿纏長針露鋒刺腫之處去其惡血則消若再生再刺否則有妨乳食總緣小兒出胎之後血氣收斂成血則口肉言上喉頰皆淨若血氣不斂胎毒上攻則乃成矣 錦囊

瘍醫大全

卷十六

重齦

全 顧氏秘書

齒運門主論

馮魯瞻曰男子八月而生齒八歲而齧女子七月而生齒七歲而齧有齒遲者乃稟受腎氣不足而髓不强齒為骨餘骨為腎餘骨之所絡而為髓不足故不能上充於齒而遲也若能調氣血固本復元則齒自生而骨力堅疑矣 錦囊

長齒門主方

長齒法 岐天師

雄鼠脊骨 全副餘骨不用尾亦不用頭亦不用肉亦不用新尾上焙乾不可燒焦留其生氣也

熟地黃

須親身用竹片挖取生地黃川瓦器煮熟身懷令乾為末三錢 如市賣地黃經鐵針穿孔者即不效矣

北細辛

榆樹皮 各三分 青 鹽 二錢

杜仲

當 歸 各一錢

齒運門主方

忌犯鐵器共研細末用一磁瓶盛之每日五更時不可出聲將此藥輕擦在無牙之處三十六

擦藥任其嚥下不可用水漱口一月如是日間午間擦之更佳亦如前數但經鐵器便不效矣

齒痛落去復生法

膽礬研細人乳和搽孔中日三四次俱用新汲水漱淨久之其齒復生

固齒門主方

擦牙散

藿香 北細辛 沉香

白芷 青鹽 廣木香

破故紙 各三錢 石膏 煨一劑

研細早晚擦

又方

香附 一劑去毛用青鹽 四兩煮乾炒黃色 饅首 四兩煨

生石膏 熟石膏 各八兩 三奈

易醫大全 卷十六 固齒方 全 顧氏秘書

甘松 各二兩

研細擦

又方

青藜 煨存性 旱蓮草 一劑青鹽 四兩用 淺水浸煮晒乾

研細擦

又方

臘肉骨 煨灰 石膏 煨 扁栢葉 焙

香附 枯白礬 青鹽 各等分

研細擦

又方

乾槐枝 端午向東南牙 鮮槐枝 煨香 白芷

皂角刺 猴 姜 煨去皮搗青 鹽 各等分

先將鹽入鍋內水 五盞化開人藥 煨黑色存香 細擦

熟地 酒浸 破故紙 青鹽

地骨皮 槐角 各兩 軟石膏

百藥煎 側栢葉 臘肉骨 煨各

香附 細辛 各二錢 沒食子 一錢

研細擦 固齒法 岐天師

雄鼠脊骨 一副 熟地 骨碎補

榆樹皮 麩 各三錢 杜仲 二錢 當歸

細辛 青鹽 各一錢

共為末 裹棉紙內成條 咬在牙床上 以味盡 度用一條 永不齒落 吳然亦不可犯 銹器犯 則不效 一牙有沒 石子少 杜仲骨碎補

至寶丹 為天祐方

雄鼠骨

用草紙包已七層厚用棉草包緊黃泥封固

用指練火煨熟取出全骨

北細辛

洗淨

真沉香

各一分

破故紙

青鹽水

白石膏

青鹽水

骨碎補

去淨毛

全常歸

酒炒

旱蓮草

油炒

各香白止

青鹽水

懷生地

酒炒

綠升麻

焙二錢

沒石子

雌雄一對

酒煮火烘

右為細末同鼠骨末合在一處拌勻用銀盒

鉛盒盛之每早擦牙救燕兒而不斷牙齒動搖

瘍醫大全

卷十六 固齒方

九

顧氏秘書

者仍可堅固不動者永不保動甚少年有

去牙一二在三年以內者竟可復生頰小而白又

則如故妙不可言

又牙保元

旱蓮草陰乾切碎半觔香附米四兩入砂鍋炒

黑存性為末擦牙固齒為驗

又牙急救

柳樵陰乾為末日用擦牙去風明目為驗固

齒久用不徹可咀金石

齒疎陷物集玄

盧甘石

煨

為末滑劑少許擦之忌用刷牙久則自齒

擦牙永不疼痛用鶴仙方

青鹽

二兩

硼砂

三錢

膽礬

三分

皂

南鹽

均者

共為細末檢九個五梧子七枚將藥末勻裝

五梧子內用火紙每個包過七次又共包七次將

黃泥包裹炭火煨煉去綠烟為止取出研細收

瘍醫大全

卷十六 固齒方

九

顧氏秘書

貯每早晨擦牙一次其功甚大此曉園驗方也

又牙

肥皂肉搗爛擦牙

又牙

生石膏

煨

生明礬

各等分

共研細末擦牙固齒如神

又法

凡大小便時將牙齒咬緊久久行持此法牙齒

到七不落不痛

牙齒搖動及外物所傷諸藥不效欲落者

川五倍 乾地龍各等分 微炒

研末用生薑指牙齦後以藥末敷之五日內
不得咬硬物如齒初折落時乘熱將齒敷齒
槽中安好敷藥齒之內外即牢如故

固齒將軍散

治牙傷胃火糜腫久用牢牙齒

青鹽四兩 杜仲炒半黑 錦文炒大黃炒微焦各十兩

為末清晨擦牙漱口火盛者蒸之亦可

傷醫大全 卷十六 固齒牙 九上 顧氏和書

瘍醫大全目錄

卷十七

咽喉部

咽痛門主論附方

喉痺門主論附方

喉風門主論附方

喉癰門主論附方

喉癩門主論附方

喉齒門主論

瘍醫大全 卷十七 目錄 顧氏和書

喉疔門主論附方

喉瘤門主論附方

喉節門主論

卓雙蛾門主論附方

天白蟻瘡門主論附方

鎖喉瘡門主論

結喉疔門主論

梅核氣門主論附方

小兒聾啞門主方

音啞門主論附方

傷寒喉腫門主論

病人瘧後喉中乾痛門主論附方

骨鯁門主門

食醋噎喉門主方

瘍醫大全

卷十七 目錄

顧氏秘書

瘍醫大全卷十七

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

壻錢之栢東陽
男 櫟燮用和 全校

咽喉部

凡一切咽喉癰疽風痺音啞皆彙於此部中以便檢閱參治

咽喉門主論

陳宗之曰咽喉雖屬於肺然所致各有不同有虛火實火之分緊喉慢喉之說咽為心肺肝腎呼吸之門飲食聲音出納之道此關係一身害人迅速虛火色淡微腫脉亦細微小便清白大便自利此乃思慮過多中氣不足脾氣不能中護虛火易於上炎咽隘乾燥飲食妨碍咳吐痰涎呼吸不利斑生苔蘚繫若蝦皮有如茅草常刺喉中又如硬物噎於咽下嘔吐酸水歲出甜涎甚則舌上白胎唇生

替色聲音雌啞喘急多痰以上現證皆出於虛火
 元氣不足中來治此不可誤用寒涼上午痛者屬
 氣虛補中益氣湯加麥冬五味牛蒡元參午後痛
 者屬陰虛四物湯加知母桔梗元參黃柏如服不
 效必加薑附以為引導即佐治之法也實火者醇
 酒辛烈熱積於中久則火動痰生發為咽腫甚則
 風痰上壅咽門閉塞少頃湯水不入聲音不出此
 為喉痺緊喉風是也用藥不及事先用針刺喉間
 發泄毒血隨用桐油餛飩探吐稠痰務使痰毒
 湯醫大全 卷十七 咽喉 顧氏秘書
 出盡咽門得鬆湯藥可入語聲得出乃止內服清
 咽利膈湯疎利餘毒如牙關緊閉難入必當先刺
 少商穴出血其閉自開如針刺探吐無痰聲如拽
 鋸鼻掀痰喘湯水不下語聲不出者真死候也難
 治正宗
 又曰虛火得者名慢喉風實火得者名緊喉風
 經曰凡喉閉不刺血喉風不吐痰喉癰不放膿喉痺
 喉蛾不針烙此皆非法
 岐天師曰如虛火沸騰於咽喉口齒間用寒涼之藥

入口稍快少頃又甚又用寒涼腹瀉肚痛而上熱
 益熾欲用熱藥涼飲而病人不信不肯輕治乃用
 外治之法引之而愈方用附子一箇為末米醋調
 成膏藥貼在湧泉穴上少頃火氣衰又少頃而熱
 止退變成水涼世界然後以六味地黃湯大劑與
 之則火不再沸騰矣蓋此火乃雷火也見水則愈
 酷烈子不見雷霆之震濃陰大雨之時愈加震動
 驚天轟地更作威勢一見太陽當空則雨歇聲消
 寂然不聞矣又不見冬令之天地耶嚴寒霜雪冰
 凍郊原雨雪霏霏陰風慘厲此天氣下行而地氣
 反上蓋下熱則上自寒也又不見夏日之天地乎
 酷日炎蒸蘊隆火熱爍木焚林燔湯沸水天氣上
 升地氣下降此上熱而下寒也人身虛火亦猶是
 也今既火騰於上則下身冰冷今以附子大熱之
 藥湧泉引之者蓋湧泉雖是水穴水之中實有火
 氣存焉火性炎上而穴中正寒忽然得火則水自
 沸溫水溫則火自降同氣相交必歸於窟宅之中
 矣火既歸於窟宅又何至沸騰於天上哉此咽喉

口齒之火忽然消除有不知其然而然之妙此引
治之巧又當知之者此即外施引火歸原之法也
秘錄

戴氏曰硬舌根而爛兩傍此名纏舌喉風須用羊毛
筆蘸甘草湯洗之然後再吹藥

馮魯瞻曰咽喉者一身之總要水穀之道路也若胸
膈之間蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發為咽喉
之疾或內生瘡狀如肉腐窒塞不通吐嚥不下如
單肉蛾雙肉蛾及疔腮腫脹甚者內外皆腫上攻

湯醫大全 卷十七 咽喉 顧氏秘書

頭面治宜先吐風痰以通咽喉然後解熱毒清肺
胃遲則不救 錦囊

又曰咽喉痛多屬虛熱血虛虛火游行無制客於
咽喉也虛者八味地黃湯加牛膝五味子煎與食
前冷服實者黃連荆芥薄荷薑汁稍蜜噙化喉痛
必用荆芥陰虛火炎上必用玄參有用茜草一兩
作一服者以其能降血中之火也

又曰喉與咽不同喉者肺院呼吸之門戶主出而不
納咽者胃腕水穀之道路主納而不出蓋咽喉司

呼吸主升降此一身之緊關橐籥也經曰足少陰

所生病者口渴舌乾咽腫上氣嗌乾及痛素問云
邪客於足少陰之絡令人咽痛不可納食又曰足
少陰之絡循喉嚨通舌本凡喉痛者皆少陰之病
但有寒熱虛實之分少陰之火直如奔馬逆衝於
上到此咽喉緊鎖處氣鬱結而不得舒故或腫或
痛也其證必內熱口乾面赤痰涎湧上尺脈必數
而無力蓋緣腎水虧損相火無制而然須用六味
地黃湯加麥冬五味子大劑作湯服之又有色慾

湯醫大全 卷十七 咽喉 五 顧氏秘書

過度元陽虧損無根之火游行無制客於咽喉者
須用八味腎氣丸大劑煎成冰冷與飲引火歸源
庶幾可救此論陰虛咽痛者如此治法正褚氏所
謂上病療下也

又曰陰氣大虛虛火無制孤陽飛越客於咽喉遂成
咽痛者脈必浮大重取必瀉去死則近宜人參一
味濃煎細細飲之如作實證用以清降之藥禍在
反掌愚用人參必同童便製附子同煎溫和食前
頓服則監制虛火下歸乃愈如單用人參細細飲

之恐浮火益熾亦非穩當奈世人但知熱咽痛不知有寒咽痛也經曰太陽在泉寒淫所勝民病咽痛頰腫陳藏器用附子去皮臍炮製切片以蜜塗炙令蜜入內嚼嚙其津甘味盡更易之仲景云下利清穀裏寒外熱脈微欲絕面赤咽痛以通脈四逆湯又曰冬月伏寒在於腎經發則咽痛下利附子湯溫其經則愈

又曰又有司天運氣其年鄉村相染若惡寒者多是暴寒折熱寒閉於外熱鬱於內切忌膽礬酸寒之湯醫大全 卷十七 咽痛 顧氏秘書

劑點喉反使陽鬱不伸又忌硝黃等寒劑下之反使陽陷入裏禍不旋踵須用表散若甘桔湯之類又曰有咽痛而諸藥不效者此非咽痛乃是鼻中生一條紅線如髮懸一黑泡大如櫻桃垂掛到咽門而止難以採取宜用土牛膝根即該獨條直而肥大者搗碎入好醋三五滴同研取濃汁滴入鼻中二三點即刻系斷珠破吐出瘀血即安

李東垣曰夏傷寒伏於腎少陰之經多咽痛者名腎傷寒也宜熱藥冷飲之

陳遠公曰咽喉乾燥久而疼痛人以為肺經之燥熱也孰知腎水涸竭乎夫肺金生腎水也肺氣清肅自下生水惟肺氣虛則肺液只可自養無如腎水大耗故欲救肺之乾燥必先救腎之涸也子母兩宜湯熟地三兩麥冬二兩水煎服一劑燥少止三劑痰少止十劑全愈 水鑑

又曰生長膏梁素耽於酒勞心過度以致咽喉臭痛人以為肺氣傷也誰知乃心火太盛移熱於肺乎夫飲酒傷胃胃熱薰蒸宜乎肺熱矣然胃火薰肺而胃上實生肺也故飲酒過度傷肺惟勞心過度則火起於心而肺受刑矣胃火助之則火旺炎上而咽喉成燔燒之路自然唾涕稠粘口舌乾燥氣味腥臭而痛矣蓋心主五臭入肺為腥臭矣解腥

湯甘草桔梗麥冬貝母各五錢桑白皮天冬生地丹皮各三錢枯芩一錢水煎連服三劑痛止又四劑臭除

此方治肺而兼治心又兼治胃者也因膏梁之人心肺之氣血原虛下滋二經之氣血但瀉其火則胃之氣血必傷反增火之焰矣妙在補肺以涼肺補心以涼心補胃以清胃火自退舍不止喉痛而

痛自止也

醫論選要曰夫咽喉者一身之總要氣與食出入之門戶也咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣通於地自其風邪客於喉間氣鬱而熱則壅遏而為咽疼自其熱氣生於肺胃風毒壅隆則腫結而為喉痺又有尸咽穀賊之症尸咽者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故令尸虫發動上蝕於喉或癢或痛如蠶之候也穀賊者稻芒強澁藏於米而誤食之滯於咽間不能傳化故風熱併

傷醫大全

卷十七

咽痛

八

顧氏秘書

聚與血氣搏遂令腫刺如咽隘之生穀刺也胃脘實熱薰蒸上焦發為白頭赤根固有咽瘡之候

寶漢卿曰呼者因陽出吸者隨陰入呼吸之間肺經主之喉嚨已下言五臟為手足之陰咽門已下言六腑為手足之陽蓋諸臟屬陰為裏諸腑屬陽為表以臟者藏也藏諸神流通也腑者府庫主出納水穀精粕轉輸之謂也自喉嚨已下五臟喉應天氣乃肺之系也以肺屬金乾為天乾金也故天氣之道其中空長可以通氣息但喉嚨與咽並行其

實兩異而人多惑之蓋喉嚨為息道咽中下水穀其喉下接肺之氣一云喉中三竅者非果喉中具三竅則穀與氣各從一竅而俱下肺中肺下無竅何由傳送水穀入於下焦全書

黃帝書云肺為諸臟之華蓋藏直高之氣於肺經也故清陽出上竅濁陰出下竅若世人不知保養六氣七情役胃非理百病生焉病瘍既成須尋所自若喉痺乳蛾纏喉風喉瘡喉痺風毒熱毒等症當刺則刺不可亂醫當吐則吐不可妄治此等症係

傷醫大全

卷十七

咽痛

九

顧氏秘書

性命之根本生死立見不識其標本而攻之失其法則禍不旋踵矣

丹溪曰咽喉者一身總要與胃相授呼吸之所從出若胞膈蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而為咽喉之病喉內生瘡或狀如肉赤肉為腫室塞不通吐嚔不下甚則生出重舌大法先去風痰以通咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝於上腭而生瘡謂之懸癰及腑寒亦能令人咽閉吞吐不利宜用解施法或曰治法視火微甚微則

正治甚則反治探痰出血隨所施治或於手大指少商穴出血行氣衝達於外者必外敷以藥于管以鷺翎蘸米醋繳喉中摘去痰涎蓋酸能收痰又能消積血乳蛾而不散者以小刀就蛾上出血皆用馬牙硝吹點咽喉以退火邪服射干青黛甘草桔梗黃芩山梔大黃白礬牛蒡之類隨症佐利為方以散上焦之熱外所敷藥如生地伏龍肝韭根皆可用若咽喉生瘡或白或赤者多血大率多是痰熱先以桐油吐之後用甘草湯解桐油之氣

傷醫大全 卷十七 咽痛 顧氏私書

寶夢麟曰咽喉一科昔先太師公立論於前矣予豈敢復言乎獨坐細思又不容已也咽喉之症司性命出納氣飲之所深為至重然飲食精氣之要路肺與大腸表裏之別臟腑上通咽喉下由大腸出入之門戶肺為華蓋發陰五臟死生之立門也入穀則昌絕穀則亡朝生暮死暮生朝死須臾之間變症不一惟肺主金生生不已循環無端順則五臟華敷百關通暢此所謂養身之道也陽明燥金以致火尅而生疾矣咽喉之症從熱而係乎太陽

之標故推而治之可以解熱除毒祛風順氣則自然平金也丹溪以米醋攪口中以出痰酸以收之之義也愚見以為太酸則燥先用黃薑汁加玄明粉少許灌喉中以弔其痰次用酸水仍前加玄明粉灌之後用蜜湯潤之漸漸探吐其痰則咽喉開利矣復以冰片散滋之無有不效若纏喉風用前三法不能探吐其痰宜用生桐油灌之鵝翎攪之再用蜜湯潤之急服牛黃清心丸或豁痰丸以墜其痰旋以二陳湯加減服之無不愈者若喉中聲

傷醫大全 卷十七 咽痛 顧氏私書

出如雷嗆食眼張天柱倒陷面黑唇焦鼻無氣息目睛突出汗出如珠盧扁復生不能生矣然既患咽喉口舌之症延及頸項頭面發腫紅如火光萬不可療急用磁鋒砭去惡血用雞子清調乳香末潤之立瘥再用芭蕉根汁潤之以解其毒若口舌腫大紫黑急用針點去血隨吹末藥甚效予久以此法行之頗活甚多故以此理論而發明之再俟高明校裁勿罪迂謬幸甚

又云傷寒病四五日發熱鼻乾口燥咽痛者陽明白

病也陽明屬胃汗多則胃汁乾故津液不能潮咽而乾痛者宜用人參敗毒散主之

又云傷寒三五日咽喉中有腫其色鮮紅痰涎自出頭痛項強須知屬太陽經邪氣入於經絡觸動心間但積熱之毒攻咽則咽喉腫痛宜甘桔湯內加牛蒡子玄參生川連三味吹藥全前

又云傷寒八九日已上身無潮熱腹痛自利而咽喉痛者此太陽經受病也傷寒得汗已不解轉入太陰腹滿時痛自利而咽喉腫痛其色微白此症可

湯醫大全

卷十七

咽痛

主

顧氏秘書

治用真武湯主之所謂真武者能補下元助陽正氣以手足和煖為妙經云但要口中紅活有痰可治宜隨症加減用藥若口中黑則血已枯乾聲啞目上視汗出者不能治矣切宜仔細看症

又云傷寒八九日已上得汗已不散喉嚨痛舌乾唇燥者此少陰經自病也太陰經受病得汗後未解傳入少陰經少陰屬腎汗多則腎汁乾其腎水不能潮潤咽喉故其病也如自利腹中痛手足厥冷咽中腫痛不可吞嚥如無涎唾及舌上乾者不治

又云病人八九日已上身微熱無他症但喉中痛而無腫聲啞者不治

又云傷寒十餘日已上得汗已病解無潮熱脈平靜而咽喉痛者此餘毒上攻也宜用粘子解毒湯

又云陰毒傷寒身體重背強眼痛不堪任小腹急痛青黑毒氣衝心四肢厥冷惡心吐逆咽喉不利脈沉細若能速灸臍輪下六日之內全愈否則難生又云若傷寒十餘日已上病後煩滿咽喉痛舌捲而卵縮者不治

湯醫大全

卷十七

咽痛

主

顧氏秘書

又云傷寒十餘日已上病不解傳變咽喉痛外症唇青舌捲者此屬厥陰經受病也難治

又云咽喉乾痛無痰不治

又云咽喉痛而唇捲不治

又云咽喉痛而頭汗出不治

又云鼻中塞者不治

又云口中黑者難治

又云口中乾夜間潮熱不得睡臥時發譫語舉足妄動者用十味人參散主之

又云若病人手足厥冷口唇搖動者宜用小續命湯
姜棗煎熱服

又云凡病傳咽喉右畔者乃餘毒未除急服牛蒡子
湯降氣湯加減治之

又云口中紅活吐得血又有痰涎息而清者不治

又云手足冷者不治

又云聲音不响喉中無腫乾痛者不治

又云手足冷不能自收頸低不能自舉眼暈暗者不
治

易醫大全

卷十七

咽喉

丙

顧氏秘書

又云虛陽上攻上下不升降水火不既濟腰冷不知
痛癢口中痰多唇黑者不治

又云喉中如雷聲或噎食不治

又云面赤目睛上視不治

又云心胸緊滿吐痰不出不治

又云面黑頭汗出不治

又云自利不治

又云潮熱往來時發諸語不治

又云自利而喘不治

又云胸腹脹急不治

又云手足厥冷不治

又云心促四肢厥冷不治

又云心中怔忡胸前紅甚舌捲面赤自上視者不治

又云婦人胎前咽喉痛而脉浮者不治

又云男婦法則一般惟女人喉中有腫而色紅者此
月經不調也經不能行則壅塞於上故咽腫痛也

蓋由榮衛不和但男子以氣為主女人以血為主

男婦各隨其氣血之分調治宜調榮湯可也如病

易醫大全

卷十七

咽喉

五

顧氏秘書

勢重其色微白脚者此虛陽上攻宜服降氣湯探

痰吹藥全前婦人有孕心頭痛者不治

又云婦人傷寒身發潮熱咽痛者此經行也活人書

云婦人傷寒經水適來晝則明明暮則謔語如見

鬼神狀此乃熱入血室無犯胃氣及上二焦不可

下也小柴胡湯主之今咽喉痛而潮熱往來面赤

唇紅者此熱邪上壅也不用小柴胡湯宜用竹葉

石膏湯清上膈除心煩所以為妙次用四物湯

又云喉中有瘡其色帶黃探痰同前用小刀點瘡上

出膿後卽吹冰片散宜用鼠粘子解毒湯

寶夢麟曰喉腫乃毒起於脾經因食煎燂油膩等物及飲酒太過而行房事以致毒氣不能流行聚結於喉根若不速治潰毒閉急卽死治法先用醋水盪汁攪去痰涎再吹藥

又曰咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起有孔出臭氣用臭狗橋葉煎服之而愈

汪省之曰虛陽上攻氣不升降致結患咽嗑痰涎壅塞治以蘇子降氣湯理例

湯醫大全 卷十七 咽喉 顧氏秘書

澄曰咽喉之病近世最多者有數症曰單乳蛾雙乳

蛾曰子舌脹木舌脹纏喉痺走馬喉痺其熱氣上行轉於喉之兩傍近外結腫以其形似是謂乳蛾

一為單二為雙也其比乳蛾差小者為喉痺熱結於舌下復生小舌名曰子舌脹熱結於舌中舌為

之腫名曰木舌脹木舌者強硬而不柔和也熱結於咽喉腫達於外且麻且癢腫而大者名曰纏喉

風痺暴發痰涎湧盛水漿不入然名雖不同其證總不外乎手少陰君火手少陽相火為病也二脉

併絡於喉氣熱則內結結甚則腫脹脹甚則痺痺

甚則不通而死矣其危者可以鹹軟之而大者以

辛散之如薄荷烏頭蠶白礬樸硝之類用之自

可消除至於走馬喉痺則非此等所療以其生死

只在反掌之間耳急救之法無如砭針出血血出

則病已此上策也後之患者萬勿畏針以自斃其

命後之君子萬勿執小方而曰吾藥不動臟腑又

妙於不用針砭出血在小疾幸而獲愈而大疾必

致死亡特為拈出以告病者醫者勿自悞以悞人

也

湯醫大全 卷十七 咽喉 顧氏秘書

又曰凡咽喉用針後有針創者宜搗薑塊和以熟白

湯時時呷之則創口易合

王奎光曰咽喉為人身飲食門戶呼吸關隘方寸之

地受病危險其症甚繁大約總歸於火蓋少陰少

陽君相二火其脉皆絡於咽喉故往往為火症之

所結聚君火勢緩則結而為疼為腫相火勢速則

腫甚不仁而為痺痺甚不通而痰塞以死經云二

陰一陽結謂之喉痺火者痰之本痰者火之標火

有虛實實火因過食煎炒炙博蘊結積毒其症煩渴二便秘塞風痰上壅將發喉痺必先胸膈不利脉弦而數治宜先去風痰後解熱毒虛火或因飲酒太過或因忿怒或因色慾火炎上攻咽喉乾燥必二便如常少陰脉微治宜補虛瀉火凡用藥不宜純用寒涼取效目前上熱未除中寒復起毒氣乘虛入腹胸前高腫上喘下瀉手足指甲青黑七日以後全不進食口如魚口者死且治咽喉最忌發汗針砭出血已寓出汗之意何堪更發其汗凡

傷醫大全

卷十七

咽痛

七

顧氏秘書

傷寒於腎及帝中名喉腫者斷不宜針至如內傷虛損咽喉失音無法可治

又曰喉症初起一日寒戰即生發者發後身凉口不碎又無重舌或二便俱利不可認作熱症皆因陰氣虛寒而發其痰不可弔盡此痰即身內之津液所化與熱症乳蛾腫舌之痰壅一處以流盡則毒愈者不同若亦流盡則精神竭而心斃先宜藥吹或用水換之法使喉一通即便服藥初劑發散和解第二劑即施溫補滋養之藥設三四日再發寒

戰或心疼骨痛脇疼等症皆屬難治

又曰發時牙關緊閉舌喉俱腫口碎而鼻或有重舌及舌上有黃屑者發後下午再發寒熱二便閉塞者即作熱症用石膏散毒散主之然亦易愈之症如漸起三四日後而寒熱者雖極凶亦不為害惟有症未減而牙關反不緊閉唇口不腫紋如好人者不治舌腫滿口者不治色如胡桃如茄子如砂紙者不治或連重舌發寒熱者猶可治也舌以筋按之若色雪白起筋即紫紅色者此身內血已死

傷醫大全

卷十七

咽痛

九

顧氏秘書

然口若臭猶或可生尤忌口渴氣急痰多而稠如桃膠者死期已速

又曰一頸俱紅腫者亦極危也面帶紅紫面青帶白神氣少者俱無救不語者死畧能語者尚有可生之機面色少神喜坐低處者亦難治帝中名喉也乃性命攸關舌繫下通於腎白腫不治傷之者死又曰凡喉症至五日即重三日重前症雖重尚未成膿藥能清散若至五六日患處多成膿隨便穿破後爛成窩為難愈如爛用口疔藥多加龍骨珍珠

又曰凡喉非急症者一二日未必發熱病尚輕緩若至第三日發熱症必加重須問其大小便通利與否如二便利症候雖加不過浮火上攻服解毒消風消火之藥即愈若二便不通利必內有實火非用降火解毒重劑及通利二便之藥火何從而出病何從而解亦須問其頭痛與否如頭痛即兼傷寒難治凡喉症必俟大便去後方可望痊若大便秘結未可輕許

又曰凡喉症初起大便秘結宜大黃玄明粉通之則

傷醫大全 卷十七 咽痛 辛 顧氏秘書

大便降而易痊若至五六日久而不食大便結用之立斃蓋病久元氣已虛豈宜再用硝黃當有善法以處之

又曰凡患喉症者無痰不治

又曰凡喉症先碎者先吹長肉藥後吹碧丹

又曰凡吹喉症須吹藥四五管方得痰出三次可以

全愈其出痰初吹宜多用金丹必直對帝中重吹之急提出管恐痰即嘔出也

又曰婦人喉症腫痛有因經閉致火上攻而成者宜

內服通經藥月事通則愈

又曰凡喉中無形紅腫者當用燈心

又曰凡喉症凶者面發腫白亮無光彩脉微沉無力

是神氣外泄無陽之症斷不治若面發紅腫脉來

洪大有力症雖極重是有元氣火氣盛治之易痊

又曰凡吹喉藥醫家吹時氣須和平用管周遍為妙

又曰凡初起吹藥須令患者低頭流出涎痰

又曰凡吹喉症欲出痰涎藥中用皂莢末少許

傷醫大全 卷十七 咽痛 辛 顧氏秘書

傷寒論曰咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕

又曰咽喉乾燥者不可發汗

咽痛門三方

寶氏新增一切咽喉口舌等症神效方

牛膽硝 生黃連 黑山梔

生黃芩 白礬砂 各三錢 青黛 搗曬乾

青梅乾 藏存性 人中白 煨各五錢 雞內金 即雞肫內

雄黃 各一錢 枯礬 二錢

各為細末和勻加直麝香三分直冰片六分再

研和入小罐內用烏金紙塞緊罐口每用蘆管

超藥吹入患上一日夜吹十餘次徐徐流出痰

癆醫大全 卷十七 咽痛方 圭 顧氏秘書

涎漸愈如有腐臭急用蚌水灌淨或用猪牙草

扁栝子和搗加水去渣灌淨前藥五錢加牛黃

二分銅青能膽珍珠各五分兒茶八分研吹近

世喉科每每勒財下藥者多凡有力之家宜修

合施人以積子孫

附製牛膽硝法

冬月入礬硝在黑牛膽內掛在風處一百二十

日去皮收之

附製青梅乾法

大青梅一筋去核入白礬食鹽各五錢拌和再

加蟒蜒不拘多少層層間之一日夜取梅曬乾

收盡汁再曬乾煨灰存性用時加入

夏月宜服冷香薷其灌口用雪裡紅搗汁灌之

冰片散 寶太師

直冰片 雞內金 燒存性 生甘草

枯礬 各一錢 黃連 玄明粉

黃栝 蜜炙 雄黃 各二錢 鹿角霜 一兩

礬砂 五錢 鈔 三張煨 靛花 二錢

癆醫大全 卷十七 咽痛方 圭 顧氏秘書

各研細和勻吹 口中氣臭加人中白 煨三分

青礬 煨不宜 太過五分

紫雪 寶太師

青礬 不拘多少火煨通紅取 礬砂

元明粉 冰片 麝香

研極細放舌下或喉間

雄黃化毒丸 寶太師

芭荳仁 三十五粒 雄黃 水飛 菜豆粉

甘草節 鬱 金 如無用蟬肚薑 黃代之各一錢

研末醋糊為丸黍大每服七九茶清下吐出痰涎立醒未吐再服七九如人死者心尚熱研末灌之

牛黃清心丸 寶太師

膽南星 一兩 防風 川黃連

雄黃 各二錢 五倍子 元參

天竺黃 桔梗 白茯苓

當歸 烏犀角 鎊 荆芥 各一錢

真冰片 珍珠 真麝香 各五分

湯醫大全 卷十七 咽痛方 詣 顧氏秘書

輕粉 三分

右為細末和勻甘草膏為丸如龍眼大辰砂為

衣日中晒乾入磁瓶內塞緊瓶口勿令出氣臨

服用薄荷湯磨服一丸

冰硼散

母論新久咽喉口齒腫毒及久嗽痰火咽啞作

痛

玄明粉 硼砂 各五錢 硃砂 一分

冰片 五分

研極細吹患上甚者日吹五六次

柳華散

治喉瘡及口舌生瘡走馬牙疳咽喉腫痛

蒲黃 炒 黃栢 炒 人中白 殿

青黛 各一兩 冰片 五分 硼砂 五錢

共為細末吹喉極效

漱藥

山豆根 夏枯草 松蘿茶 陳者

嫩菊葉 蘇薄荷 各等分

湯醫大全 卷十七 咽痛方 圭 顧氏秘書

煎湯頻漱

三黃解毒湯

黃連 二錢 黃芩 黑山梔

黃栢 各一錢 五分

水煎服

清胃湯

生地 二錢 升麻 連翹

牡丹皮 黃連

水煎服

引火湯 雷真君

熟地 元參 各一兩 白茯苓 五錢

白芥子 三錢 山茱萸 山藥 各四錢

北五味 二錢 肉桂 一錢

水煎服

生肌散

痧痘口瘡臭爛

黃連 土炒 地骨皮 黃柏

五倍子 生甘草 各等分

湯醫大全 卷十七 咽喉方 素 顧氏秘書

研細乾摻之若仍有作熱作膿而不即愈者乃

內毒未盡也仍用大連翹飲解之

二聖散

痧痘咽喉腫痛不拘初起回後

白僵蠶 二錢 苦參 三錢

研細吹入三四次即腫消痛止

敗毒散

疹後口臭口瘡唇爛咽喉疼痛

生地 一錢五分 桔梗 連翹

牛蒡子 天花粉 元參

金銀花 各八分 粉丹皮 柴胡 各七分

生甘草 三分 黃柏 蜜水炒 薄荷

赤芍藥 各五分 熟石膏 一錢

加淡竹葉一錢燈心五十寸全煎再加生犀角

磨汁和藥服每日常用米泔水洗十餘次若不頻

洗又不服藥內熱熾甚則變走馬牙疳矣

喉間腫長如瓜蒂者不可刺破則傷人

鹽煨過研細以雞翎蘸搽即消

湯醫大全 卷十七 咽喉方 素 顧氏秘書

喉下諸般腫

蝸牛飛麵研勻貼腫痛

紫袍散 周錫仙

治咽喉十八種症

石青 青黛 硃砂

白礬砂 各一兩 人中白 煨 元明粉

膽礬 山荳根 真冰片 三分

共乳極細末磁瓶密貯急時用二三厘吹咽喉

即愈

熱痛咽痛

童便三合含嚥

咽喉破爛

倒掛塵陰陽瓦明 礬三分

研細吹

回生救苦上清丹 徐峩峩

治咽喉十八種急症如神

白殭蠶焙存性一錢 生硝尖 煨硝尖

白礬砂各五分 明礬熟礬各二分

瘍醫大全 卷十七 咽痛方 三 顧氏秘書

海螵蛸三分 冰片一分

共研極細末磁瓶收貯每用少許吹上吐去痰

涎即愈

咽喉危症

野蕎麥春間初發紅嘴形類海棠六七月間可長四五尺其莖葉頗似海棠節有紅節葉大如掌

每採鮮葉搗汁入醋一匙以綿蘸掃涎出即活

奎光秘傳咽喉口齒合藥法

玉丹 此宜預先多製愈久愈神

將明礬指頭大塊者入罐內放桴炭火上焙化

以筋試看罐底無塊時隨投火硝如礬一兩下

礬砂每礬一兩下礬砂三錢為則 少頃又投明礬化盡又下

硝礬如前法逐層投完待罐口鋪地如饅頭樣

方用武火煉至乾枯用淨瓦覆罐口一時取起

將研細牛黃少許用水五六匙調和以匙挑滴

丹上將罐仍入火內烘乾即取起連礬覆淨地

上下以紙襯地上用瓦蓋七日收貯聽用

製黃栢法

瘍醫大全 卷十七 咽痛方 三 顧氏秘書

揀好黃栢切片用荆芥穗為君甘草佐之煎濃

汁浸軟攤瓦上緩緩炙黃不可令焦洒白蜜湯

晒乾研末聽用

製燈心灰法

取白色燈心先用水洒潮以厚筆管將燈心塞

令堅緊筆管兩頭用紙塞實入火緩緩燒過去

竹管塞紙開看如燒不過則生如燒太過則無

有矣製須得法為妙

製猪牙皂角法

取堅小不蛀猪牙皂角放瓦上火炙脆去兩頭
研末磁瓶密貯聽用

製硝法

入金丹用者火硝以溫湯蘸過綿紙拖乾包好
放甕上洞內五六日收其濕氣 入玉丹內不
必如此

合碧丹法

每用玉丹三分 配百草霜 半匙 研勻入燈心灰
一厘 甘草末 三匙 蘇薄荷葉末 三分 研極細然

瘍醫大全

卷十七

咽痛方

三

顧氏秘書

後入好冰片五厘多些更妙再研勻入小磁瓶內勿泄
氣 此丹宜臨用旋合不可出三日不可過陰
雨天 春夏宜多加蘇薄荷葉末其色青 秋
冬宜多加玉丹其色白 欲出痰加皂莢少許

合金丹法

每用提過硝一錢八分入生蒲黃羅細末四分共研細次
下蠟燭末一分猪牙皂角末一分和研成淡黃
色加冰片一分再研 此藥可以久留冰片臨
用時加

按金丹功主消腫出痰並牙齦腫舌穿牙疔毒
尚用此丹治之咽喉等症則兼用碧丹看症輕
重加減如症重者再加牛黃於本方內 如喉
腫症及喉風加蠟燭牙皂 輕症只用硝與蒲
黃 蓋碧丹消痰清熱解毒驅風固為良劑尚
屬平緩不如金丹消腫毒除風熱開喉閉出痰
涎最為神效但喉症初起金丹不宜多用因其
能直透入內且善走散初起若多用之恐輕症
不勝藥力反扞格難入也

瘍醫大全

卷十七

咽痛方

三

顧氏秘書

凡喉症及單雙蛾只用碧丹其他重症金碧兼
之須分先後多寡初起碧丹九金丹一吹五管
後碧丹八金丹二再吹碧丹七金丹三如症重
者碧丹金丹各半 用至三五次後痰涎必上湧
然後金丹六碧丹四將管直入喉中重吹一次
隨收出管即弔出痰竟用金丹八碧丹二亦可
膏滋藥法

蘇薄荷 為君 玉丹 為臣 川貝母 為佐 燈心灰百
草霜甘草冰片 為使 先將玉丹百草霜研和後

入燈心灰再研再入薄荷甘草貝母研極細方
入冰片研蜜調服凡喉癰喉菌須時時嚙嚥之
症重則兼煎藥及吹藥

喉症主方

牛蒡子 炒研 前胡 連翹 炒

桔梗 黑山梔 瓜蒌根

枯黃芩 元參 甘草

或加金銀花 發熱加柴胡 頭痛加熟石
膏 口渴加麥冬 知母 胸膈飽加枳殼
鬱熱加芍藥 貝母 水煎服

瘍醫大全 卷十七 咽痛方 三 顧氏秘書

三黃散方

生地 為君 蒲黃 為臣 牛黃 為佐 冰片 為使 共

為極細末用芭蕉根汁或扁柏葉汁和蜜調敷

此藥治頭癰面癰如腫硬不消因氣凝血滯或

痰塊結而不散則兼陰症矣宜用薑汁葱汁為

要兼治小兒丹毒

玉鎖匙方

巴豆壓油於紙上搵成條子點燈滅火以烟薰

入鼻中一時鼻若流涕其關即開

犀角解毒丸

犀角 鎊一錢 桔梗 一兩 赤茯苓

牛蒡子 生地 各五錢 元參

連翹 各六錢 朴硝 甘草

青黛 各二錢

共研極細末煉蜜為丸如龍眼大薄荷湯化
下挾驚者硃砂為衣 此通治小兒諸瘡毒

及痧痘後餘毒喉齒等症

口疳藥即兼長肉方

瘍醫大全 卷十七 咽痛方 三 顧氏秘書

每薄荷 三分 配兒茶 一分五厘 製黃柏 厘許 龍骨

二厘 白芷 二厘五毫如腫痛即川三四厘 甘草珍珠 各五厘 各研

細配合再研加冰片 三厘 再研勻入磁罐內凡

遇口碎及各種口疳用此若初腫起而熱甚者

多用薄荷若不腫不甚熱病久宜用長肉為主

本方多加兒茶珍珠龍骨如色成紫及一切喉

症碎者亦用此長肉如治走馬疳穿牙疔及重

舌口疳初生小兒胎毒口疳本方中加牛黃倍

珍珠無不奏效若黑而臭腐者不治小兒黃色

胎疔如乾橋獲者不治 如治痧痘後口疔去
黃栢龍骨加牛黃倍珍珠各五厘多 大抵遇極
凶症難效者或欲速愈見效加牛黃珍珠各五
厘多些更妙痘後疔非此不效餘症加之亦無
不神應

凡用碧丹看症凶險時冰片宜多加些將愈甘
草宜多加些

吹咽痛

壁蟾窩 二十個 橄欖核 三個

瘍醫大全

卷十七 咽痛方

毒

顧氏秘書

共於陰陽瓦上焙存性研細吹

冰梅

治咽喉百病

半熟大梅子 一百枚五月五日午時用食鹽朴硝
各四兩水三碗入壘內浸梅子其水
約過梅子三指浸一宿後

猪牙皂

如眉毛大者作
去核去弦

防風

甘草

白礬 各四兩 鮮南星 切片

鮮半夏 切片各三十
五枚

桔梗 二兩

研細拌入浸七日取梅晒乾又浸又晒以汁盡

梅上起白霜為度磁瓶收貯凡用取梅一枚絲
綿包嚙口內有水先嚙五六口後有痰涎吐盡
以口內無痰只有清水方去梅子可以食粥一
枚可治二病

赤麟丹 吳振華

治喉痺喉風喉蛾喉癰七十二症如神

用傾元寶罐一個入明礬二兩好血竭二錢於罐
內放巴豆仁二十一粒於礬內放炭火上煨令烟
盡冷定加白礬砂二錢水片一錢共研極細磁瓶

瘍醫大全

卷十七 咽痛方

毒

顧氏秘書

密貯每用少許吹之

喉痺門三論

陳實功曰喉痺咽喉腫痛半塞半開又寬又腫此乃標病雖重無妨用金鎖匙吐出痰涎利膈飲推蕩積熱 正宗

馮魯瞻曰喉痺者即纏喉風類是也其候面赤氣粗咽喉腫閉乃蓄熱生風積聚毒痰而作甚者內壅肉瘤一塊氣閉不通若至鼻面青黑塞噎頭低痰膠聲鋸者不治更有藏寒亦能令人咽閉而吞吐不利者蓋諸症下寒過極則上熱反盛不獨此也

傷醫大全 卷十七 喉痺 素 顧氏秘書

其候與蛾證相近而治法不能無異大抵無形腫閉者為痺有形腫痛者即是蛾耳先吐風痰者急則治其標也後解熱毒者緩則治其本也至於上熱下寒者用熱藥食前冷服之不可誤服涼藥也又曰經曰一陰一陽結謂之喉痺一陰君火也一陽少陽相火也手少陰心脉挾咽足少陰腎脉循喉嚨其人膈間素有痰涎或因飲酒過度或因忿怒失常或因房室不節蓋飲酒過度胃火動也富貴人多犯之忿怒失常肝火動也婦人多犯之房室

不節腎火動也男子多犯之火動痰上而痰熱燔灼壅塞咽噎之間痰者火之本火者痰之標火性急速所以內外腫痛木漿不入乃外證之最危者治癘之法急則治標緩則治本治標用丸散以吐痰散熱治本用湯藥以降火補虛奈何治者但云治脾肺火而未云降肝腎火也必須以內經從治之法切不可驟用寒涼益促其危耳故實火須用正治虛火須用從治須分明白不可少誤

傷醫大全 卷十七 喉痺 素 顧氏秘書

又曰咽與喉會厭與舌四者同在一門其用各異喉以納氣故喉氣通於天咽以納食故咽氣通於地會厭管乎上以主開闔掩其氣喉令水穀能進食喉而不錯四者交相為用闕一則飲食廢而死矣云喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而天氣閉塞也云咽痛及噎痛者謂咽喉不能納唾與食而地氣閉也云喉痺咽噎痛者謂咽喉諸病天地之氣並閉塞也 按咽之低處為噎

又曰咽在後主食喉在前主氣十二經中惟足太陽主表別下項餘經皆內循咽喉盡得以病之而統

在君相二火喉主天氣屬肺金變動為燥燥則清

而閉咽主地氣屬脾土變動為濕濕則腫而脹皆

火鬱上焦致痰涎氣血結聚咽喉腫達於外麻癢

且痛為纏喉風脈於兩傍為喉痺其單蛾雙蛾木

舌舌脹纏喉走馬喉風病同於火故不分也惟纏

喉走馬殺人最速

又曰喉痺多屬痰熱重者用桐油探吐纏喉風亦屬

痰熱謂其咽喉裏外皆腫者是也亦用桐油以鷺

翎探吐

又曰肺絕喉閉其脉浮散而微細其聲如鼾有如痰

在喉中響者此為肺絕之候宜速用人參湯調入

竹瀝薑汁服之若早治者十全七八次則十全三

四遲則十不救一

又曰喉痺用陳年霜梅入蛭蚰令化每患喉痺等證

用梅嚙於口中神效 錦囊

張子和曰治喉痺用針出血最為上策內經火鬱發

之發謂發汗出血者乃發汗之一端也

醫論選要曰臟腑停寒寒則氣縮如物窒碍於其間

固有喉痺之證

又曰陰症下虛令人喉痺又當治其下寒則痺自通

矣

又曰走馬喉痺者謂喉痺急甚其死又速藥緩不及

救也惟針出毒血病即時愈

寶漢卿曰或問風毒喉痺內外俱腫其故何也風毒

之氣結於喉間則壅塞喉間乃風毒與痰相搏故

也素問云無風則不動痰無痰則不受風風痰相

搏結塞咽喉其外症咽喉形如雞子其色微白外

面腮上有腫其形似瘡身發寒熱牙關緊強語聲

不出者是也先用薑汁加元明粉或蜜湯採取其

痰急服荆防消毒散牙間腫處紫黑用小刀點破

即用冰片散吹之無不效驗 全書

又云風熱喉閉內外俱腫者謂其人久積熱毒因而

感風風熱相搏發出外來則壅喉間其人面赤腮

腫身發寒熱喉中有塊如拳外血鮮紅先用玉字

藥蜜調點之次用荆防消毒加減治之

又云如牙關緊強不得開者此皆風痰相搏壅塞咽

傷寒全書 卷十七 喉痺 美 顧氏秘書

傷寒全書 卷十七 喉痺 美 顧氏秘書

喉先用木針排開或黃蘗菜汁或溫蜜湯或醋水俱入元明粉灌喉再用鵝翎攪之吐出痰涎幾碗外用五倍子醋調敷之急服荆防二陳湯吹冰片散

又云虛陽上攻由於久病元氣虛弱邪火上行咽喉腫痛上下不升降水火不既濟心火衝喉故腫痛而閉塞其形若何曰語聲不出牙關緊急痰涎滿口手足厥冷頭目昏眩者是也治法如前

又云或厥重不省人事目張直視可用吳茱萸研爛

傷醫大全

卷十七

喉痺

罕

顧氏秘書

醋調塗兩脚心然後用降氣湯治之氣喘加前胡烏藥氣短加沉香人參待手足溫飲薄粥以斂元氣入穀則昌絕穀則亡此之謂也

又云如腮頰浮腫外面赤者此必感於風毒急用紫蘇楓葉栢枝煎湯洗之外用荆防羌活湯以祛其風或十宣散

又云酒毒喉痺乃酒毒蒸於心脾二經則壅咽喉其人面赤而目睛上視者是也取痰法如前再用冰片散吹之清涼散飲之

又云酒毒喉痺其形若雞子其腫鮮紅其光如鏡外症發熱惡寒頭痛頸強此上焦積熱心脾受之蓋心脾二經主上焦宜服粘子解毒湯

又云風熱喉痺由於憂思勞碌太過或對風言語風入肺經作痰務多去痰為要其色鮮紅久而紫赤急用小銚刀點之或用蘆刀點之血微出火已瀉矣再服煎劑並冰片散吹之甚效凡紫赤色者變為淡紅色愈之漸也

又云氣癰喉痺此症為因聚毒塞於喉間痰涎稠實

傷醫大全

卷十七

喉痺

罕

顧氏秘書

發寒熱者仍分上中下三關毒在下關者難治上中二關用吹藥吹喉茶湯送下雄黃化毒丸七粒寶夢麟曰喉閉此症因外感寒邪內傷熱物或大寒後便入熱湯洗故將寒氣逼入脾經冷氣阻於中腕邪氣熱客於心經故生此疾急用三稜針刺手腕中紫筋上或少商穴出血却將雄黃化毒丸冷茶磨化灌之仍將冰片散吹入喉中待漱出風涎稠痰為愈

又云風毒喉痺外赤腫內腫微紅帶白色其形似蒸

餅連腮腫痛外症身惡寒而無熱腮頰浮腫牙關緊強此乃風痰相搏結寒喉間治法必以去痰為主吹藥吹之若外面腫紅用圍藥敷之中留一小孔再潤之以助藥力

又云風熱喉痺其腫紅而微紫其形如拳其人面青而目上視外症壯熱惡寒儼若傷寒此病人久積熱毒因而感風所致如病人聲音不響宜用潤肺之藥治之

又云酒毒喉痺其腫黃其血黑其形若臂其腫若坎

湯醫大全

卷十七

喉痺

聖

顧氏秘書

外症面赤目睛上視此乃熱毒傷於心脾氣通於口循環上下故咽喉痛治法先取其痰再吹藥鼠粘子湯多加乾姜花粉生黃連山梔枳殼連翹桔梗元參

又云陰毒喉痺腫如紫李現黑色其色光血紅可治陰毒血黑不治外症惡寒其身顫動振腰痛脚冷此乃冬月感陰濕火邪相干也其血微紅及腫處軟喉中有痰可治血紅黑甚腫硬喉乾難治先服五福化毒丹次以蘇子降氣湯再吹藥一月之內

戒酒

又云傷寒喉痺乃傷寒遺毒不散致八九日後喉痺皆因熱毒入於心脾二經吹冰片散

錢青掄曰喉閉必先兩日胸膈氣緊出氣短促驚然喉痛手足厥冷氣閉命懸頃刻速用雞翎或鷲毛蘸桐油喉間攪探吐痰立開切忌牛黃入口不救如無藥或有藥不進者急將兩臂以手勒數十次取油頭繩裝大拇指以針刺指甲邊即少血滴下其喉即通只刺男左女右重者兩手齊針單方全

湯醫大全

卷十七

喉痺

聖

顧氏秘書

丹溪曰喉痺屬痰屬風屬熱皆因鬱火而兼執毒腫甚不紅者乃咽喉之虛症

聖光曰傷寒後發喉痺乳蛾難治為氣閉不通無形無勢其症喉項強硬目睛上視故多不治

喉痺門三方

秘法

如初覺咽喉壅塞卽以紙撚取嚏或皂角末吹鼻中取嚏可散熱也

喉痺 錦囊

取山豆根汁含嚙卽開有藥不能進者急取病人兩臂捋數十次使血聚大指上以髮繩裝住拇指針刺指甲縫邊出血如放沙一般左右手皆然其喉卽寬

喉痺 大余

卷十七

喉痺方

器

顧氏秘書

蜜附子法 三因

治感寒咽閉不能嚙

大附子一枚生去皮臍切作大片蜜塗炙令黃每用一片口含嚙津候甘味盡再換一片含之以效爲度

喉痺

鳴嚙瞻碧研細醋調灌吐膠痰

喉痺 雙單蛾

地骨皮陰陽瓦焙研細末蘆管吹入卽吐痰涎

喉痺 乳蛾

蝦蟇衣

鳳尾草

插細入鹽霜梅肉酒煮各少許和勻研布包絞汁以鷺翎刷患上吐痰卽消

喉痺 喉蛾 急救方

烏梅肉包鼻涕重於內如元眼大絹包噙口內卽愈

喉痺

壁

錢

卽蟪蛛窩七個

新瓦上焙用

砂

五分

冰

片

一分

湯醫 大余

卷十七

喉痺方

器

顧氏秘書

研細密貯先用土牛膝草煎湯漱口吹少許

喉痺 雙單蛾

猪膽將糯米貫滿陰乾共搗爲末加水片乳極細吹三次吐痰愈

喉閉 周鶴仙

纏喉風急喉痺單雙蛾湯藥不下者

巴豆

七粒

以四粒燈頭

三粒生用再

明

雄

皂子大

一塊

鬱金

一個

如蟬

肚大者佳

共爲細末每用一半清茶調服如口咽塞用

竹管吹入喉中須臾吐痰即愈但能灌下無有不活者

凡患喉痺在窮鄉僻野藥石不便者

急將病人面朝上卧於地下令一人兩手探住頭髮兩脚踏其肩頭自散

又方

食鹽炒紅研末以竹管吹五六次吐出痰涎即安

治喉痺乳蛾咽喉腫痛湯水不入死在須臾

巴豆去殼研末八北細辛少許同研捲在紙中間

湯醫大全

卷十七 喉痺方 栗 顧氏秘書

成條剪斷用針穿一孔如患在左塞右鼻孔患在

右塞左鼻孔左右俱患塞兩鼻孔咽喉立通

又方

墻上壁錢七個內要活螳螂二個撚作一團再用

生明礬七分一塊傾銀罐內化開將壁錢入礬內

煨存性為末竹管吹入立時就好雖將死者亦能

復活 忌食熱物硬物

又方

真蟾酥為末用筋頭點入對嘴上即時消散

又方

白礬 黃連 猪牙皂角 各等分

全放新瓦上焙乾為末每用五分吹入喉中少頃膿血即出而愈

又方

青葙吹喉痺乳蛾如神

又方

膽 礬 二錢 冰 片 二厘

研勻吹上即消

湯醫大全

卷十七 喉痺方 栗 顧氏秘書

又方

生芝蔴油一合灌之

又方

韭菜地上挖取紅小蚯蚓全醋搗汁灌之即吐痰

血而愈

又方

枯白礬末吹入喉中急用燈盞內油脚灌之即消

又方

馬屁勃研末吹咽喉立效

又方

蟻蟪虫取汁點入得下即通

又方

洋牛角燒透為末每服二三錢酒調服

又方

馬蘭草葉入香油少許搗汁點上即消

又方

生韭菜搗敷頂上立效

又方

湯醫大全 卷十七 喉痺方 吳 顧氏秘書

硼砂含嚥大能瀉熱利膈消腫清咽化痰

喉痺及喉中熱痛口生瘡

好雪梨取汁頻飲多食亦可

二生散

治喉閉並吹乳癰腫惡瘡

生明礬

生雄黃 各等分

研為極細末 喉閉吹入吐出毒水日三次

瘡毒醋調或凉水調敷

喉痺喉風

兒茶 硼砂 膽礬 各等分

共入鐵杓內熔化枯冷定刮下研細吹

喉痺

青魚膽陰乾為末收好 錢焙 秧根上螺螄用尖

各等分研細吹之如吹三次不開關則無效矣

喉痺喉風壅腫

直殭蠶一兩葱一把煎湯洗項下風熱即散然後

吹藥

湯醫大全 卷十七 喉痺方 吳 顧氏秘書

喉風門主論

醫論選要曰纏喉風者熱結於喉腫遠於外且麻且癢腫而大也治療之法微者可以鹹軟之大者可以辛散之或去風痰或解熱毒如腫甚藥不能下者以藥灌鼻中令吐之外以拔毒之劑敷之熱退腫消為吉

晉漢卿曰夫纏喉風屬痰熱咽喉裏外皆腫者是也外面無腫者必身發熱面赤此乃熱毒之氣極也

易醫大全

卷十七

喉風

辛

顧氏秘書

不強外面不腫但喉中紅者曰暴感熱在心如左邊病退傳右邊此餘毒未盡故也咽喉有數症有積熱有風熱有客熱有病後餘毒未除變化雙乳蛾者且如病中喉間有腫紅色數片其光似鏡者此積熱也且如喉中有腫其色微白其形若筒者此風毒喉痺也此熱毒因而感風相搏而發故也或咽中有腫其色帶紫色者此乃客熱謂其人暴感熱毒之氣壅塞喉間須用木通元參生地黃芩黃連山梔仁瀉心經之火為要或有傳變木舌者

皆心熱蘊積於胸中故口中痰臭服劑以涼膈為要搽藥以冰片散佐之或用小靡刀點之以出紫血全書

又云纏喉風外症如蛇纏頸身發潮熱頭目大痛其症腫如紫糖色內症其腫紅線白色腫塞不見咽下吹藥內加雄黃水麝服荆防粘子二陳湯急用鷺毛蘸燈窩濁油攪去痰涎三四碗方活如痰不能去難生矣須要避風

易醫大全

卷十七

喉風

辛

顧氏秘書

又云啞瘴喉風乃風痰犯於咽膈之間因此口不能言牙關不開急用蟾酥磨水滴入鼻孔即開隨用桐油滴入喉中仍將鷺毛攪喉間風痰出盡再用甘草湯解桐油之氣吹藥更服荆防敗毒散如若面紫舌青唇黑鼻流冷涕爪甲俱青目中多淚俱不治

又云弄舌喉風此症啞不能言舌出常將手拿急將兩手大指側爪甲縫用三稜針每指刺三針有血可治無血不治若針少商穴亦妙用銅匙排開口用膽硝丹吹入喉中燈窩內油脚再用鷺翎蘸攪

出痰涎仍服雄黃化毒丸七九清茶送下後服疎風甘桔湯頻吹冰片散

寶夢麟曰纏喉風因腎經有熱內枯不能上潤致令心火強盛故發此症如喉間雷響者不可治切宜仔細

又曰噎食喉風此症因熱毒在於心經咽喉燥而無痰若噎食者不可治如久不治變為飛絲勞毒能傷人命

又曰脚根喉風此症脚根發起至於喉間或一年發

湯醫大全 卷十七 喉風 聖 顧氏秘書

一次半年發一次切忌熱物不得傷於怒氣其病一日行二穴至七日行七穴雖然不妨只是要發用吹喉藥仍服敗毒藥如腫惡發泡者死

一男子患纏喉風腫表裏皆作藥不能下余以疏風清熱藥灌六十餘次外以陽起石燒研全伏龍肝等分和勻新汲水調搗百遍三日熱始退腫始消胡景周曰如用桐油探吐或吹藥吐痰後而腫不消或人事不知者急用針刺患處以去惡血即甦奎光曰纏喉風因心中急躁而發先二日必胸膈氣

緊出氣短促忽然咽喉腫痛手足厥冷頸如攪轉熱結於內腫擾於外且麻且癢喉內紅絲纏繞手指甲白手心壯熱喉腫而大風痰壅盛聲如曳鋸是其候也最為急症初起一日夜目直視喉中如雷聲者不治燈火近患人口吹滅者不治若喘急額汗危在旦夕

又曰纏喉風者熱結於喉腫達於外且麻且癢也又曰纏者自頤纏繞赤色寒熱也

又曰纏喉風初起用金丹碧丹等分頻吹之內服

湯醫大全 卷十七 喉風 聖 顧氏秘書

煎劑下藥須兼牛黃 方載咽喉門

喉風門三方

纏喉風喉痺

此症胸膈氣急忽然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通

真鬱金一錢 明雄二錢 巴豆霜三分

研細水丸如芥菜子大每服十二丸用滾水些須送下如口噤喉塞用小竹管納藥入喉中須臾吐痰即活

急喉風喉痺

湯醫大全

卷十七

喉風方

毒

顧氏秘書

端午午時取蜻蜓百條放瓶內候化為水再用霜梅不拘多少浸在蜻蜓汁內三晝夜取梅晒乾復投汁內浸透又晒汁盡為度磁瓶收貯每用一梅患者噙之

鎖喉風

萬年青搗汁和滴醋含漱即愈

纏喉風

麻油調白礬末和雞子白灌之

緊喉風

燈高油和漿水灌之

又方

土牛膝根搗爛和醋灌之

又方

針刺紅腫之處發泄毒血自愈

鎖喉風喉痺不能吞物數年不愈者

土牛膝草不拘多 扁柏葉一把

用井水浸透搗取汁大半碗加牛乳一酒杯和勻含吞數口二三次即愈

湯醫大全

卷十七

喉風方

毒

顧氏秘書

纏喉風神方活人甚眾

白礬細末五分烏雞子一箇調勻灌喉中立效神效吹喉散

治纏喉風閉塞及乳蛾喉痺重舌木舌等症

蘇薄荷 淨葉

樸 硝

枯白礬

青黛

白殭蚕

火硝

白礬砂

黃連 各等分

共研細末臘月初一日取雄猪膽七八箇倒出膽汁以猪膽一箇拌上藥五錢為率復灌膽殼

內以線紮好膽外用青紅紙包裹將地掘一坑
潤深一尺上用竹竿懸空橫弔再用板鋪以泥
密蓋候至立春取出掛風處陰乾去青紙膽皮
磁罐密收每藥一兩加水片三分同研極細吹
患上神效

金鑰匙

纏喉風喉閉痰涎壅塞口際不開湯水不下

焰硝一兩五錢 雄黃二錢

白殭蚕一錢 冰片二分五厘

湯醫大全 卷十七 喉風方 藥 顧氏秘書

各另研和勻以竹管吹患處痰涎即出如痰已
出腫痛仍不消急針患處去惡血服煎劑

又方

多年溺壺垢半盞蜜五匙灌下愈

又方

牽牛鼻繩燒灰吹之

又方

臘月初一日取猪膽不拘大小五六枚

黃連 青黛 蘇薄荷

殭蠶 白礬 樸 硝 各五錢

研細裝入膽內青布包好將地掘一孔方深一
尺以竹橫懸此膽在內以物蓋定候立春日取
出待風吹去膽皮青布研末密收每吹少許
百靈丸 簡便

喉中結塊不通水食者

百草霜

研細煉蜜為丸芡實大水化一九灌下甚者不
過二丸

湯醫大全 卷十七 喉風方 藥 顧氏秘書

吹喉藥 秘方

硼砂二錢五錢 雄黃三錢 兒茶一錢

冰片三分 蘇薄荷 另研

和勻密貯不可泄氣用蘆管吹入少許或用茶
匙挑入舌上噙一刻嚥下日八九次若鎖喉風
口內乾枯者以井水調灌即能開關生津若脾
泄胃弱者不宜多用餘無禁忌

急鎖喉風

升麻四兩剉碎水四碗煎一碗灌服

又方

皂莢槌碎搗水灌服取吐即不吐亦安

又方

巴豆去殼取仁綿紙微裹隨左右塞鼻孔中立通

又方

鴨嘴膽礬一塊含口中其痰涎自壅出吐盡即愈

喉風口噤死在須臾

周鶴仙

膽礬

五分半生半熟熊

膽

木

香各三分

共為細末用番木鱉磨并華水調和以鷄翎蘸

湯醫大全

卷十七

喉風方

堯

顧氏秘書

掃患處如勢急口噤用筋攷齒搗下即消

事

時氣纏喉風咽喉閉塞水穀不下牙關緊急不省人

雄黃

枯礬

蔡

蘆

生用

猪牙皂

炙黃各等分

研細每用豈大許吹入鼻內吐痰自愈

纏喉風痰涎閉塞

蛇蛻採碎燒烟竹筒吸之即破

又方

人指甲煨灰冰片五厘全研吹

又方

雄黃一塊新汲水磨急灌得吐而愈

又方

朴硝一兩細細含嚥

又方

桐油或燈蓋油脚以鷄翎掃入喉中探吐再用遠

志研末水調敷項外

敷喉痺喉風湯飲不下

湯醫大全

卷十七

喉風方

堯

顧氏秘書

皂角陰陽瓦焙研細末滴醋調敷喉外即愈

奪命無憂散

治纏喉風咽喉疼痰涎壅盛口舌生瘡心腹

脹滿脾積癥塊小兒奶癖誤吞骨屑鯁塞不下

以及諸般藥毒熱盛喉閉涎滿氣急悶亂不省

人事並效

寒水石煨三兩 玄參

黃連

貫仲 山荳根

荆芥

甘草 硼砂

滑石

砂仁

白茯苓 各伍錢

共為極細末每用一錢乾摻舌上後以新汲水
嚥下不拘時服

白降雪丹

硼砂

一錢

熟石膏 一錢五分
焰硝

膽礬

各五分

元明粉 三分

冰片 二分

研細吹

喉風

番木鱉

一個

冰片 二分

湯醫大全

卷十七

喉風方

李

顧氏秘書

研細吹

又方

短頭髮 五錢

雄黃 五分

明礬 一錢

蟾蜍窩 三十個

共入罐內煨存性研細吹

又方

芭荳仁 三尖粒

明礬 三兩

全以大銀罐內煨枯冷定取粘巴荳的礬研細

吹

喉風急救方 程崙友

生艾葉搗汁灌下如喉中壅閉不能灌入即灌在
鼻孔內立刻開闔

又方

用蛇床子燒州薰喉中即流涎開闔如神

十八般喉痺喉風咽蛾

用黃脚公雞取不見水雞肫皮以布揩淨陰乾粗

紙包藏懷內俟乾燥乳細加冰片五厘吹之

湯醫大全

卷十七

喉風方

李

顧氏秘書

陳實功曰咽喉紅腫痰塞作痛此屬標病膿出自愈當以金鎖匙吐出痰涎推蕩積熱膿脹痛者開之損而痛者益之其患自安 正宗

經曰喉癰不放膿治皆非法

蔣示吉日喉癰生於咽外正中腫痛妨礙飲食紅腫發熱如必欲潰膿軟而脹痛者針之內服補托之劑玉紅膏搽貼其肌完口又有腐潰內通湯水隨孔出者曾治數人俱亦無妨 說約

寶漢卿曰積熱喉癰其腫如黃糖李微黃上面紅絲

瘍醫大全 卷十七 喉癰 李 顧氏秘書

喉癰門主論

王肯堂曰喉癰當結喉生又名猛疽以其毒勢猛烈可畏也屬任脉及手太陽手少陰經積熱憂憤所致若過時不治潰穿咽噎者死 準繩

靈樞云癰發於嗑中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不瀉塞咽半日死其化為膿者瀉則合豕膏冷食三日而已

朱丹溪曰喉癰生於結喉之間名曰海門第一關最為惡毒乃心肝火炎於脾肺毒氣攻喉切忌刀針

外症項上痛齒痛此胃經受熱胃氣通於喉嚨故患喉癰患痰法全吹藥加元明粉煎藥加當歸黃芪倍片芩 全書

又曰喉癰此毒因七情鬱結而成毒生喉間若不速治恐毒氣內攻喉骨若潰必致口內出膿雖不傷命即成冷癯終身之痼疾也

汪省之曰喉癰雖腫而咽門半塞半閉其病雖凶而喉道又寬又緊此皆凶症雖重無妨 理例

奎光曰喉癰因過食辛辣炙博厚味醇酒感熱而發

屬肺喉間無形但紅腫而痛虛者亦發熱四五日

可愈

又曰腫舌喉癰肥人感熱性躁者多患此凡舌下生
如小舌者為腫舌連喉腫痛即發癰大抵兼者勢
凶

又曰治喉癰用碧丹加金丹少許內服膏子藥煎藥
方載咽喉門

又曰凡患腫舌喉癰如大便秘煎藥內加元明粉大
黃小便不利內加六一散治之

瘍醫大全

卷十七

喉癰

齋

顧氏秘書

又曰腫舌喉癰用加減犀角地黃湯舌用金丹吹舌
根及兩傍莫間斷 喉用碧丹十金丹一頻頻吹
之

喉癰門主方

治喉癰喉癰口疳

鳳

蛭即抱雞蛋殼燒存性

兒茶

橄欖核

燒存性各等分

共研細每一錢加冰片三分吹

咽喉懸癰舌腫塞通

外科秘寶

五倍子

白殭蚕

甘草

各等分

研末用白梅去核搗丸如彈子大噙嚥其癰自

破

瘍醫大全

卷十七

喉癰方

全

顧氏秘書

喉癰門主論

書云喉癰即肺花瘡

馮魯瞻曰陰虛咳嗽久之喉中痛者必有瘡名曰肺

花瘡用坎離湯加元參桔梗甘草不可用冰片吹

藥恐辛散瘡轉潰也 銀囊

陳實功曰凡痰火勞嗽咳傷咽痛者無法可治 正宗

汪省之曰肺花瘡即俗謂喉生魚鱗刺也難救 理例

奎光曰喉刺多因先患癆病重症既多虛入上升榮

血已枯其喉上腭有紅點密密如蚊蚤咬者死勿

湯醫大全 卷十七 喉癰 李 顧氏秘書

治

陳遠公曰人有生喉癰於咽門之內以至喉痛其症

必先作癢面紅耳熱而不可忍後則嚙唾隨覺乾

燥必再加嚙唾而後快久則成形作疼變為楊梅

紅瘰或疼或癢而為癰矣夫癰必有虫在咽喉之

地此因腎水之耗以致腎火上衝而肺金又燥兼

治殺虫以治癰庶幾正固邪散虫可盡掃也化癰

神丹元參麥冬各一兩白蘊子白薇甘草紫苑鼠

粘子白芥子各一錢百部三錢水煎服二劑疼少

止又四劑癰虫盡死換用潤喉湯熟地麥冬各一

兩薏仁五錢桑白皮生地各三錢山萸肉四錢貝

母甘草各一錢水煎服十劑癢痛俱除矣方中再

加肉桂一錢饑服為善後之計萬舉萬全也 辨證

奎光曰喉癰乃虛火上炎肺金太旺致攻牙關生如

哥雀紋樣又如秋葉背後紅絲飲食阻礙喉痛雖

不至殞命久則咽喉失音而不救

又曰喉癰用碧丹吹不時服膏子藥再服煎劑加大

貝母下氣守戒一月愈 方載咽喉門

湯醫大全 卷十七 喉癰 李 顧氏秘書

喉癰門三方

喉癰秘方

頭胎黃牛尿以新瓦洗淨蓋尿周圍用文武火煨烟盡存性研末將蘆管徐吸入自愈

又方

西牛黃 水片各一分 大礪砂

兒茶 雄黃各八分 山荳根二錢

膽礬三分 陳白梅去核三個研搗

共研末將陳白梅肉入藥和勻丸如龍眼大臨

湯醫大全 卷十七 喉癰方 突 顧氏秘書

臥含口內過夜即消

喉菌門三論

聖光曰喉菌屬憂鬱血熱氣滯而生婦人多患之狀

如萍萍畧高而厚紫色生於喉傍輕則半月二十

日重者月餘要在治之得法患者守戒忌口

又曰喉困初用藥碧丹五金丹一後用金丹三碧丹

三吹之更須頻服膏子藥兼投煎劑

湯醫大全 卷十七 喉菌 突 顧氏秘書

喉疳門主論

申斗垣曰喉乃性命呼吸之門不可輕忽喉中起疳若不早治一二日間死生干係輕則緩重則急宜涼膈解毒 啟玄

李東垣曰凡喉間作痛潰爛久而不愈此必楊梅瘡毒須以草薢湯為主隨證佐以別藥

汪省之曰過橋疳生咽喉之下肺管之上看之不見吹藥不到飲食妨碍此楊梅結毒於肺胃也 理例

楊醫大全

卷十七

喉疳

主

顧氏秘書

喉疳門主方

喉疳 啟玄

百草霜一錢 兒茶五分 冰片一分

研極細每用五厘吹喉神效

喉爛 秘方

槐花三錢 兒茶 黃連

懷牛膝各一錢

右為末夏月西瓜水調服冬月生梨汁服或丸

如菜豆大每服三九

楊醫大全

卷十七

喉疳方

主

顧氏秘書

喉爛

球粉即輕粉之細 硃砂三分 冰片一分

乳勻吹之奇效異常又可作眼藥點眼又可做

生肌藥長肉

喉疳口疳牙疳

降香一錢 珍珠 琥珀

白芷各三分 沒藥去油 乳香去油

麝香 五倍子 血竭各五分

冰片 牛黃各一分

竹葉上吊掛蘭蠶連車收取陰乾為末

共乳細末吹之

咽喉結毒成疔久不收口

整蛇蛻一條剪去頭尾壁 錢七個 水片三分

將蛇蛻壁錢陰陽瓦煨存性研極細吹

傷醫大全 卷十七 喉疔方 幸 顧氏秘書

喉疔門主論

寶漢卿曰喉疔生於喉間兩傍或單或雙形如圓眼大血絲相叢如瘤故名之此乃肺經受熱多語損氣或怒中高喊或誦讀太急或多飲燒酒或多噉炙燻須要斂神晏息以藥攻之則此症脫落矣不可用刀點破全書

心法曰喉疔生於喉傍或單或雙亦有頂大蒂小者凡怒氣喊叫犯之則痛不犯不痛

傷醫大全 卷十七 喉疔 幸 顧氏秘書

喉瘤門主方

消瘤碧玉散

礪砂三錢 磨礬 冰片各三分

研細以飭蘸點

楊醫大全

卷十七

喉瘤方

毒

喉節門主論

寶漢卿曰喉節此候生於鳩尾之中初起如梅核在喉膈之間吐不出嚥不下至三日漸上喉節之間名曰喉節其疾須用刺破後用磨礬丹吹入喉中再用雄黃化毒丸吞下七粒 全書

楊醫大全

卷十七

喉節

毒

顧氏

單雙蛾門主論

陳實功曰單雙蛾皆標病也其患生於咽傍或單或雙其咽門雖腫半塞半開其病雖凶而喉道又寬又腫雖重無妨宜金鎖匙吐出痰涎推蕩積熱正經曰宜針烙

馮魯瞻曰單雙肉蛾可針即針有不可針者亦用吹藥劫藥吐去風痰以圖捷效次服煎劑蓋急證難於久待也錦囊

又曰腫於咽兩傍者為雙蛾易治腫於一邊者為單

瘍醫大全

卷十七 單雙蛾 老 顧氏秘書

蛾難治如有惡寒表症用荆防敗毒散散之不惡寒而無表症者惟有辛涼清利外用鵝翎蘸米醋攪喉中去盡痰涎復以鵝翎探吐之令著實一咯咯破蛾中紫血即潰或紫金錠磨下即安慎勿輕用刀針古方有用巴豆油染紙作撚子點火吹滅以烟薰鼻中即時口鼻流涎牙關自開再用此搗患處即愈

岐天師曰有病雙蛾者人以為熱也喉門腫痛痰如鋸拽不絕茶水一滴不能下嚥豈非熱症然而痛

雖甚至早少輕喉雖腫舌必不燥痰雖多必不黃而成塊此乃假熱之證也若以寒涼之藥急救之下喉非不暫快少頃而熱轉甚人以為涼藥之少也再加寒涼之品服之更甚急須刺其少商穴出血少許喉門必有一線之路開矣急以附子一錢熟地一兩山萸肉四錢白茯苓伍錢麥冬牛膝北五味各三錢煎服下喉一聲響亮其火勢熱證立時消散蓋少陰之火直如奔馬凡人腎水大耗者腎中元陽不能下藏蓋無水以養火而火必上越

瘍醫大全

卷十七 單雙蛾 老 顧氏秘書

也日日冲上而咽喉口小不能任其出入乃結成腫痛狀似雙蛾實非雙蛾也方中鈔在附子辛熱之藥引龍雷之火下藏於窟宅夫龍雷之火乃相火也喜水而不喜火故藥中熟地山茱萸之類純是補陰之味使火有所歸而不再沸此因其逆勢而引導之也喜水而不喜火喜水者喜其真陰之邪熱之火也而非寒涼之水不喜火者不喜其熱之火也

又曰日重夜輕治之尤易用山查根桔梗各三錢甘艸半夏各一錢治之一劑立愈

張仲景曰陰虛雙蛾之症用附子一錢鹽水炒成片用一片含在口中立時有路可以用湯藥矣後以八味地黃丸一兩白湯送下立時而愈

雷真君曰凡人有咽喉忽腫作痛生雙蛾者飲食不能下五日不食即死矣但此症實火易治而虛火難醫實火世人已有妙方芩連之類治之立消惟虛火乃腎火不藏於命門浮游於咽喉之間其症亦如實火惟夜重於日清晨反覺少輕若實火清晨反重夜間反輕實火口燥舌乾而開裂虛火口

瘍醫大全

卷十七

單雙蛾

末

顧氏秘書

不甚渴舌滑而不裂也以此斷之決不差錯此種虛痛若亦以治實火之法治之是人已下井而又益之石也故不特不可用寒涼併不可用發散蓋虛火必須補也然徒補腎水雖水能制火可以少差而火勢太盛未易制伏又宜於水中瀘火則引火歸原而火勢頓除有消亡於頃刻矣方用引火湯主之一劑而痰聲靜痛頓除虛亦盡消二劑全愈蓋熟地山萸五味之類純是補腎水聖藥茯苓山藥又益精而利水助肉桂之下行元參以消在

上之浮火白芥子以消壅塞之痰上焦既寬而下焦又得肉桂之熱則龍雷之火有不歸根於命門者乎一劑便生真有鬼神莫測之機又勝於八味地黃湯也倘喉腫閉塞勺水不能下咽雖有此神方將安施乎我更有法用附子一箇破故紙五錢各研末調如糊作膏布攤如膏藥大如茶鍾貼脚心中央以火烘之一時辰喉即寬而開一線路可以服藥矣又不可不知此妙法也

又曰陰蛾之症乃腎水虧乏火不能藏於下乃飛越

瘍醫大全

卷十七

單雙蛾

末

顧氏秘書

於上而喉中關狹火不得直泄乃結成蛾似蛾而非蛾也早晨痛輕下午痛重至黃昏而痛更甚得熱則快得涼則加其症之重者滴水不能下喉若作外感陽症治誤用山豆根芩連梔子之類則痛益甚而關不開有不盡命而死者也惟單補陰虛用引火歸源之法而痛頓失也治以化蛾湯主之此方大補腎之水不治蛾之痛壯水則火息引火則痛消可收全功誠奇絕之法也
活人錄

華真君曰雙蛾陰症最難治而最易治也不知其竅

則最難知其法則最易予常為人治此證用附子一枚鹽一合水煮透令其口含一片而火勢立止然後以六味地黃湯大劑飲之不再發神方也

陳遠公曰人有感冒風寒咽喉腫痛其勢甚急變成雙蛾者其症痰涎稠濁不時口渴索飲疼痛水不能入喉此陽火壅阻咽喉勢若重而病實輕也夫陽火太陽之火也膀胱之火也膀胱之火與腎火為表裏膀胱火動腎火即來相助故直衝咽喉而肺脾胃之火亦復相從上升於是借三經之痰涎

瘍醫大全

卷十七

單雙蛾

全

顧氏秘書

盡阻塞於咽喉結成火毒而不可解治法似宜統治敷經矣然其本實始於太陽泄膀胱之火則諸經之火自安但咽喉地近於肺太陽既假道於肺肺經險要之地即狹路之戰場也安有舍戰場要地不解其圍而先擣其本國乎貴有兼治之法也清燥湯桔梗元參花粉各三錢甘草二錢白芍五錢山豆根柴胡麻黃各一錢水煎服一劑喉寬二劑蛾盡消矣

水鑑

此方散太陽之邪者居四散各經之邪者居六尤加意於散肺邪者由近以及遠也

又曰人一時咽喉腫大作痛吐痰如涌口渴求水下喉少快已而又熱索水喉成雙蛾既大且赤其形宛如鷄冠此喉痺症即俗稱纏喉風也乃陰陽二火兼熾也一為少陽相火一為少陰君火今二火齊發其勢更暴喉管細小火難遠泄遂遏抑其間初作腫而後成蛾也蛾有二雙蛾單蛾也雙蛾生兩枚兩相壅擠中間反留一線之隙可通茶水藥食尚可下嚥若單蛾則獨形反塞住水穀之路往往有勺水不能入者藥物既不可嚥又從何路以

瘍醫大全

卷十七

單雙蛾

全

顧氏秘書

進藥哉法先用刺法一則刺少商等穴尚非捷徑惟用刀直刺喉腫之處一分則喉腫必少消可用吹藥開之吹藥方皂角燒灰燒膽礬牛黃冰片各一分麝香三釐為細末吹喉中必大吐痰而愈後用煎劑名救喉湯元參一兩麥冬五錢花粉三錢甘草山豆根射干各一錢水煎一服全愈若雙蛾不必用刺法用此方自效

元參為君足以瀉心腎君相之火佐以豆根射干花粉祛邪消痰則火自歸經咽喉之關隘肅清矣又曰咽喉腫痛日輕夜重長成喉蛾宛如陽症但不

甚疼咽喉自覺有一線乾燥之至飲水嚥入稍快
 至水入腹而又不安吐痰如水甚多將涎投入水
 中即化為水人以為喉痛生蛾投瀉火之方不特
 不驗反增其重亦有勺水不能入者何也蓋屬陰
 蛾也陰蛾則日輕夜重陽蛾則日重夜輕此乃少
 陰腎火下無可藏之地直上炎於喉也治法宜大
 補腎水加入補火之味引火歸源下熱則上自寒
 矣引火湯熟地三兩巴戟天冬麥冬各一兩茯苓
 五錢北五味二錢水煎服一劑火下喉腫全消二
 劑全愈

傷醫大全

卷十七

單雙蛾

全

顧氏秘書

此方以熟地為君大補腎水變冬五味重滋肺金
 入巴戟天之溫又是補水之藥則水既濟火自
 下而火不得隨之又加茯苓前導則水火同趨
 共安腎官如琴瑟之和矣何必用桂附大熱引火
 歸源乎然桂附為引火歸源之聖藥胡棄而不用
 不知此症因水之不足而火沸騰今用大熱雖引
 火於一時必耗水於日後所以只用巴戟天引火
 而又補水則腎無乾燥
 之虞喉有清肅之益也

醫論選要曰單蛾者其形圓小如筋頭生於咽喉關
 上或左或右雙蛾則兩邊俱生也若生於關下為
 難治

寶漢卿曰左咽軟主吞嚥右喉主出聲咽門分兩路
 其受病不同 全書

又曰咽喉左畔虛陽上攻其腫微紅者名單乳蛾若
 肺氣外症手足厥冷痰涎自出頭重目昏急用藜
 菜酸汁加玄明粉灌之旋去痰涎吹藥如厥重不
 省人事氣欲絕者急以吳茱萸研爛醋調塗脚心
 右畔虛陽上攻其色微黃其形若蠶蠶故謂之乳
 蛾其症亦手足厥冷

傷醫大全

卷十七

單雙蛾

全

顧氏秘書

又曰雙蛾風此症有兩枚在喉間兩邊如葶大急將
 黃蠶汁蜜少許加玄明粉漱出風痰吹冰片散
 壅光曰乳蛾有單有雙有連珠多因酒色鬱結而發
 單輕雙重初起一日痛二日紅腫三日有形如細
 白星發寒熱者四日勢定治之四五日可愈其
 症生於喉傍一邊生者單蛾左右生者雙蛾二白
 星上下相連如繆袋者連珠也

又曰治乳蛾先用碧丹五金丹一吹次用金丹二碧
 丹三全吹出痰兼用煎劑左加犀角黃連右加赤
 芍柴胡連珠兼用之大便秘加玄明粉大黃吹藥

詳載咽
喉門

心法曰乳蛾由肺經積熱受風凝結而成生咽喉傍
狀如蠶蛾有單有雙雙者輕單者重生於關前者
形多易見吹藥易到手法易施故易治生於關後
者難見形色吹藥不到手法難施故難治

又曰雙單蛾湯水不下看頭頂髮內有細窠挑破卽
刻開關

瘍醫大全

卷十七

單雙蛾

金

顧氏秘書

單雙蛾門主方

喉蛾

土牛膝即鼓取三四根搗汁加入乳和勻左邊蛾
滴右鼻孔中右邊蛾滴左鼻孔中雙蛾兩鼻孔俱
滴吐出痰涎其毒立解重者滴二三次

又方

土牛膝搗爛醋浸取汁不時漱口重者滴入鼻中
痰涎多者白礬研末飯丸每服一錢

又方

瘍醫大全

卷十七

單雙蛾

金

顧氏秘書

鮮菊花七朵煎漱

又方

青魚膽一箇納糯米七粒懸避陰處四十九日收
下單蛾用一粒雙蛾用二粒噙放舌下

又方

大游蜒不拘多少白鹽梅二箇冰片一分搗丸如
元眼核大噙口內化汁嚥下

又方

新艾葉絞汁和童便服

又方

醃白梅的瀉調綠礬點患上

又方

蛇床子瓶內燒酒薰之

又方

先從兩手臂捋起捋至脉門後將中指看中指下節有紫筋現出為度以線針挑去紫血即可進飲食矣

又方

傷醫大全

卷十七

單雙蛾

全

顧氏秘書

白鹽梅一小瓶入大罇蛭虫百十條任其滯久如遇此症取梅煨研吹之以梅肉貼小兒惡癩並效

又方

取公鵝一隻以鵝嘴開在患者口中得鵝氣自消乳蛾至危者

玉簪花根洗淨泥鬚搗化加白蜜少許和勻取汁挑三茶匙灌下忌見鐵器

雙單蛾

經過霜王瓜一條竹刀去蓋將瓢去淨用火硝明

礬各一兩裝滿蓋仍合上用竹簽扞緊懸放迎風背陰之所候王瓜外面生出白霜掃下加水片少許密貯每用少許擦之自消

喉蛾漫腫必須針去惡血湯水方可下咽可代刀針

楊樹上楊辣子虫窩焙研細末用骨簪蘸點蛾上立刻其泡自破膿血自泄即可進食但點時只可

點在泡上不可誤點他處亦不可多用

又方 胡學海

取大蜘蛛一箇入傾銀罐內上加生明礬三錢煨

傷醫大全

卷十七

單雙蛾

全

顧氏秘書

枯加水片一分研細吹之毒水勿嚥下咽

又方

壁上蟾蜍白窩取下用患者腦後髮一根纏定蟾蜍窩將銀簪刺在燈上燒之存性為末吹之

乳蛾急症也此方甚效有力者宜預製以救人

臘月八日雄猪膽一箇裝入白礬末陰乾之後研末再入臘八日猪膽內如此三四次如遇患者用

一二分吹之神驗

雙單乳蛾喉癰喉腫痛吐嚥不下命在須臾

周鶴仙

鳳凰衣微火焙黃 橄欖核瓦上火煨存性 孩兒茶各等分

研為細末每一錢加真冰片五厘吹之即能進
飲食極效無比

喉蛾

桔 梗 四錢 甘 草 一錢 金線吊蜚蠊

牛蒡子各三錢 玄 參 二錢

水二鍾煎一鍾食後服立愈

喉蛾兼治口疳阮氏秘方

杉木皮煨存性 人中白煨 粉兒茶各三錢

瘍醫大全 卷十七 單雙蛾 大 顧氏秘書

珍 珠 琥 珀 蘆甘石煨

青黛各一錢 大冰片 六分

研勻收貯吹喉疔喉蛾牙疔要吹至一錢立消

凡吹先用黃連甘草蘇薄荷松蘿茶各一錢煎

水漱淨再吹 如蛾可用鵝毛管剪成長條如

菊花瓣樣夾在破開筋子頭上紮住刺患上出

血水再吹藥 再看耳後左右如有紅筋以針

刺出血立愈

雙單蛾

火 硝一錢五分 礪 一砂 五分 冰 片 三厘

雄 黃一分不 用亦可

共乳極細每用三匙吹入喉中吐涎或從鼻孔

吹入亦可

又方

鳳仙花子連根搗水吞下神效

又方

人指甲不拘多少 明 礬 三錢 大蜘蛛 一箇

全入傾銀罐內煨研加水片一分吹之

瘍醫大全 卷十七 單雙蛾 全 顧氏秘書

乳蛾喉痺

蟾 酥 草烏尖 猪牙皂各等分

共研細水丸豆大每研一九點患上

乳蛾

將頭頂心髮上用生薑擦紅即好

西瓜霜

治咽喉口齒雙蛾喉痺命在須臾

用大黃泥鉢 筒將西瓜一箇照鉢大小鬆鬆裝

入鉢內將瓜切蓋以皮硝裝滿瓜內仍以瓜蓋蓋

竹簽扞定再以一樣大的黃泥鉢一箇合上外用皮紙條和泥將縫封固放陰處過數日鉢外即吐白霜以鵝毛掃下收好仍將鉢存陰處再吐再掃以鉢外無霜為度收好每用少許吹之

喉蛾

巴 荳 去油 遼細辛 各半

研細用綿包好左蛾塞右鼻孔右蛾塞左鼻孔

喉蛾喉痺喉風並治發背疔瘡

烏龍爪 即白花菜 取葉曬乾

瘍醫大全 卷十七 單雙蛾 李 顧氏秘書

每細末一錢加冰片三五厘研勻吹之 如發

背疔毒取葉搗爛敷上即消

天白蟻瘡門主論

盛錫朋曰咽喉內生瘡鼻孔俱爛此名天白蟻瘡此症方書不載多有不識常作喉風醫最為悞事此乃肺脾蘊毒而成宜用穿山甲散治之

瘍醫大全 卷十七 天白蟻 李 顧氏秘書

天白蟻瘡門主方

穿山甲散

白霜梅燒存性 一箇 枯 礬 一錢 穿山甲 炒

雄黃各五分

其研細末吹喉中立效

瘍醫大全

卷十七

全

鎖喉瘡門主論

實漢卿曰鎖喉瘡者乃心經毒氣小腸邪風發於聽
會之端注於懸膺之側初生如癰瘰不能飲食閉
塞難通漸次腫破化膿早治得生宜服當歸連翹
之類用冰片散蛭蟥不拘加水麝搗搽 全書

瘍醫大全

卷十七

全

結喉疽門主論

申斗垣曰喉氣通於天主氣息呼吸出入故肺氣得以宣通咽氣通於地主利水穀飲食得以容納內經曰一陰一陽結為喉痺一陰者手少陰君火主於心一陽者手少陽相火主於三焦皆主脈並絡於喉氣熱則內結結甚則腫脹為癰疽為喉痺矣

癰疽大全

卷十七

梅核氣

七

顧氏秘書

梅核氣門主論

陳實功曰梅核氣乃痰氣結於喉中嚥之不下吐之不出如茅艸常刺作癢初則吐酸妨礙久則閉塞不通即此候也

正宗

化丸錦

金匱曰婦人咽中有如炙轡半夏厚朴湯主之炙轡

乾肉也咽中貼貼如有炙肉吐之不出吞之不下

此病不因腸胃故不礙飲食二便不因表邪故無

癰疽大全

卷十七

梅核氣

七

顧氏秘書

骨疼寒熱乃為積寒所傷不與血和血中之氣溢

而浮於咽中得水濕之氣凝結難移男子亦間有

之藥用半夏厚朴湯乃二陳湯去陳皮甘草加厚

朴紫蘇生薑也專治婦人七情之氣鬱滯不散結

成痰涎或如梅核在咽咯嚥不下或中脘痞滿氣

不舒暢或痰飲中滯嘔逆惡心並可取效蓋半夏

降逆厚朴散結生薑茯苓宜至高之滯而下其濕

蘇葉味辛氣香色紫性溫能入陰和血則氣與血

和不復上浮也

梅核氣門主方

噙化丸

梅核氣服之神效

膽 礬 雄 黃 各等分 明 礬

牙 皂 雄 黃 各等分

右為細末紅棗煮爛取肉為丸如芡實大空心噙化一丸溫黃酒一杯過口內服蘇子降氣湯

驗方

玫瑰花去淨心蒂浸火酒飲愈陳愈妙

瘍醫大全 卷十七 梅核氣 類 顧氏秘書

噙化丸

痰結核在咽喉中不能出入

瓜 蒞 仁 杏 仁 海 石

桔 梗 連 翹 各一兩 朴 硝 四錢

為末薑汁和蜜丸如櫻桃大噙服之

小兒聲啞門主方

小兒聲啞不能言語當急治以此方如遲至十二三歲知識少開則難治矣

遠 志 石 菖 蒲 酸 棗 仁 炒

小 柴 胡 各一錢 草 麻 子 連 殼 每 一 歲 用 一 粒

右為細末用猪肝一箇竹刀剖作數層將藥摻入肝內紙包煨熟量兒大小白滾水服日服三五次至七日自能言語

小兒失音不語 經驗方

瘍醫大全 卷十七 聲啞 類 顧氏秘書

鼠 蟄 膽 點 舌 尖 上 立 效

音啞門主論

風火侵肺悞服寒涼生冷音雌者輕虛癆肺損音啞

難治

寶漢卿曰病人瘵後氣短及聲不出者皆肺氣不行

宜降氣湯多加前胡臨服加薑汁以佐之 全書

又曰病後聲啞不言此肺經受刑百無一生

馮魯瞻曰瘖謂有言而無聲故經曰不能言不能非

絕然不說之謂凡音出於喉嚨發於舌本因胎肥

大阻腎上行之經腎脉入肺循喉嚨繫舌本喉者

瘖醫大全

卷十七

音啞

宋

顧氏秘書

肺之部肺主聲音其人切切私語心雖有言而人

不能聽故曰瘖肺腎子母之臟故云不必治若大

全解作不語則為心病以心主發聲也與子瘖了

不相干若張子和有降心火之說馬玄臺有補心

腎之言如果腎之脉絡絕則其病不治豈有產後

自復之理乎故經云胞之絡脉絕此絕字當作阻

字解也

又曰經云婦人重身九月而瘖者胞之絡脉絕也無

治當十月復謂人之受孕一月肝經養胎二月膽

經養胎三月心經養胎四月小腸經養胎五月脾

經養胎六月胃經養胎七月肺經養胎八月大腸

經養胎九月腎經養胎十月膀胱經養胎先陰經

而後陽經始於木終於水以五行之相生言也然

以理推之十二經之脉晝夜流行無間無日無時

而不共養胎氣也必無分經養胎之理今日九月

而瘖時至九月兒體已長胞宮之絡脉繫於腎經

者阻絕不通故問有之蓋腎經之脉上繫舌本脉

道阻絕則不能言故十月分娩後而自能言不必

瘖醫大全

卷十七

音啞

宋

顧氏秘書

加治治之當補心腎

又曰傷寒失音之源不一有因痰壅氣閉有因失血

驚恐有因邪熱衝心心氣耗損有因火燥陰傷不

能宣布然咽喉音聲如故而舌不能轉運者為舌

瘖如舌能轉運言語而咽喉音聲則無者為喉瘖

舌瘖多因於心腎喉瘖多因於肺胃

丹溪云乾咳極難治此係火鬱之甚乃痰鬱火邪

在肺上以苦桔梗開之下用補陰降火藥不已即

成勞宜重補養蓋肺為華蓋五臟六腑火自內起

薰蒸焚灼水涸金傷若至久嗽聲啞是肺管破也
不治在初起者是寒包熱辛以散之

衍義云有婦人患熱久嗽身如炙肌瘦將成肺癆以
枇杷葉木通欬冬花紫苑杏仁桑皮各等分大黃
減半如常製蜜丸櫻桃大食後夜臥含化一丸未
終劑而愈又有久嗽不已饑則胸中大痛須視上
唇有白點如糶者此蟲嚙其肺也以百部膏一味
加烏梅檳榔與服下其蟲則愈肺蟲其形如蠶令
人咳嗽聲嘶也

傷醫大全

卷十七

音啞

音

顧氏秘書

有嗽而聲啞者蓋金實不鳴痰火鬱於中也金破亦
不鳴肺氣傷於內也實則清之破則補之皆治肺
之道也又須知少陰之絡入肺中循喉嚨挾舌本
肺爲之標本虛則標弱故聲亂咽嘶舌萎聲不能
前以救本爲主亦有喉燥失音者古方用猪脂二
觔熬油去渣入白蜜一觔再煉成膏一匙一匙挑
服潤之有大聲喊叫喉破失音者不可作火治而
用涼藥須大補八珍加甘桔倍參芪作傷損治然
足少陰脉挾舌本而足太陰脉絡舌傍手少陰脉

繫舌本若三脉虛則痰涎乘虛閉塞其筋道而舌
不能轉運言語也若三經血少不能營舌亦令人
瘖故久病失血後及誤汗下後心家氣血衰不能
鼓舌者並用獨參湯八物加減有痰加竹瀝

傷醫大全

卷十七

音啞

音

顧氏秘書

音啞門主方

清音噙化丸

久嗽咳傷肺氣聲音雌啞

黃栢蜜炙 麥門冬去心 當歸

白茯苓 熟地 生地黄各一兩

訶子 真阿膠 天門冬各一兩 拌炒

知母各五錢 烏梅肉十五 人參三錢

人乳 牛乳 梨汁各一碗 共熬稠膏

共為細末和膏加煉蜜搗丸如芡實大每用一

湯醫大全 卷十七 音啞 車 顧氏秘書

丸仰臥噙化日用三丸如改作小丸每服一錢

訶子煎湯或蘿蔔湯送下

暴失音

公猪板油一觔入鍋先熬成油濾去渣入白蜜一

觔再煉少頃絹濾淨磁瓶內冷定成膏不時挑一

茶匙服之其音自清無疾人亦可常服潤肺滑肌

無故咽喉聲音不出名曰失音

橘皮五兩水三升煮一升去渣頓服

又方

皂角一挺去皮子 白蘿蔔三筒切片

水一盞煎半盞服之不過三服

久失音啞者

人乳 白蜜 雪梨汁

香椿汁各四兩如無鮮香椿搗汁即

共熬成膏白湯冲服

音啞

礶砂一兩 元明粉 訶子肉

膽南星各二錢 冰片三分 百藥煎三筒

湯醫大全 卷十七 音啞 車 顧氏秘書

右乳細用烏梅肉一兩搗如泥丸如龍眼核大

每用一丸噙化

久嗽聲啞

青蒿不拘多少童便煮服

發聲湯

渴飲凉水忽瘖啞不出聲

貝母 桑白皮 麥冬各三錢

白茯苓 元參各五錢 枇杷葉五片

百部 紫蘇葉 甘草各一錢

水煎服三劑卽聲大出

傷醫大全

卷十七

音聲

真

顧氏

傷寒喉腫門主論

馮魯瞻曰喉腫者有陽毒有陰毒如面赤脉洪或吐膿血是火氣上衝心肺受熱是為陽毒如四肢冷而脉沉細是寒積於肺寒極生熱濕熱薰蒸此為陰毒治陽以清肺化熱治陰用引火歸源 錦囊

傷醫大全

卷十七

喉腫

真

顧氏

病人瘥後喉中乾痛門主論

寶漢卿曰病人瘥後喉中乾痛者何皆腎水枯涸心

火衝上耗散津液也 全書

濟世大全 卷十七 乾痛 稟 顧氏秘書

病人瘥後喉中乾痛門主方

驗方 寶漢卿

人參 麥門冬 北五味

天門冬 杏仁 桔梗

生地 天花粉 生地黄

生甘草

水煎服

雙清丸

蘇薄荷 杏仁 桔梗

傷醫大全 卷十七 乾痛 稟 顧氏秘書

砂仁 甘草 玄參

右為極細末煉蜜丸芡實大不時嚙化

骨鯁門主方

驗方

砂糖威靈仙同酒煎飲之自化

又方

赤芍藥管仲各三錢研末米糊丸放口內噙化嚥

下

雞魚骨鯁

葳靈仙 五錢 砂仁 三錢 甘草 二錢

水一鍾煎一半入口噙漱入喉阿氣即化

湯醫大全

卷十七 骨鯁 賁 顧氏秘書

又方

活鯁一條同飛麩搗敷喉下即消

又方

犬涎灌之其骨自化

又方

鳳仙花子即急性子 二十粒白湯送下立效

又方

白茯苓 貫仲 甘草 各等分

共磨細末米飲調服一錢

骨鯁門主方

化骨訣 祝由科

魚骨 靈 猪骨 靈

雞骨 靈 竹木棒 靈

左手三山訣持杯或茶或酒俱可右手劍訣向

東方看何骨刺即寫何字於靈內如魚書符於

杯內再換印訣書雪山童子速降六字於盃內

口中默念吾奉 太上老君急急如律令勅與

被骨刺人吞之即愈

湯醫大全

卷十七 骨鯁 東 顧氏秘書

又訣 祝由科

淨水一碗面東用食指於碗內書 靈靈靈靈靈

靈靈靈此字如猪骨加虎字魚骨加龍字雞骨加狸字呪曰水碗化為

東洋大海喉嚨化為萬丈龍潭九龍歸洞吾奉

太上老君急急如律令勅

又方

砂糖威靈仙同酒煎飲之自化

又方

赤芍藥管仲各三錢為末米糊丸放口內噙化嚥

又方

橄欖核磨汁嚥

又方

象牙磨水頻嚥

又方

燈草燒灰以米糖如指大蘸灰置喉中勿令粘住

待糖化骨即化下

又方

細茶五倍子等分為末吹之

又方

勿令四眼見即將筋倒轉隨便猪肉一塊急吞下

又方

大蒜一瓣切去大頭鯁在左塞右鼻孔鯁在右塞

左鼻孔

雞骨鯁

又方

霜梅肉搥成指頭大丸子再將棉裹用線穿在內

冷茶吞下扯住線頭在手一嘔即出

螺磨入喉

鴉涎化透如神

麥芒入喉

鵝涎灌之

飛絲八咽連痛倉血

雞骨鯁

生甘草葉嚼之愈

香油煎滾溫服之即吐出

骨刺芫芩鯁在喉中

多年舊雞骨竹洗淨截斷煎湯飲之即下

病醫大全

卷十七

骨鯁

顧氏秘書

竹刺入咽

王不留行此味生煎服再取糯米圓即下

骨鯁喉中危急者

蛇床子三錢焙研細末紅糖兩許開水沖和以

湯匙灌無下咽即化

秘傳骨鯁方

馬尾針山五靈脂三錢紅芽大戟

五梧子各二錢

其研細用鴉涎狗涎全和丸如元眼大如櫻

裏一條九頭十八尾問君喚何物專用此問水

連誦九遍全被鯁人飲之即愈

竹刺笔鬚鯁在喉中

多年舊雞包竹截斷煎湯飲之即下

骨鯁喉中危急者

蛇床子三錢焙研細末紅糖兩許開水沖和以湯

匙灌燕下咽即化

化諸魚骨及竹木刺

淨水一碗用濃墨畫寫發水化為龍行六字在

瘍醫大全

卷十七

骨鯁

一百五

顧氏秘書

水上一氣飲如末再寫一次服之必化

又方以淨手寫一龍字在喉龍上寫一龍字在水

碗內呷下即化

又方大蒜一瓣切去大頭細在左塞右鼻孔鯁在

右塞左鼻孔

竹刺八咽

王不留行此味性煎服再吞糯米圓即下

鯁用砂糖化服一丸即化

又牙白芍二寸三分長橫咬口中即出或切片細嚼燕

之即消

雞骨鯁

生苧根搗汁飲之立化

雞鵝骨魚骨鯁

山查根燒灰存性研細吹入喉中三四次即下

又牙家椿樹上結的白苔如牛乳一箇箇垂下

昔用七粒搗水服其骨即從大便中出

又牙

草菜醋炒

澤瀉

馬尾勃

瘍醫大全

卷十七

一百五

顧氏秘書

為末砂糖調服即化

魚鯁

多食青菓

又牙

又鯁時以自已筋子敲碗邊數下自愈

又牙

芫荽搗汁和滴醋燕立立出

化鯁

指甲燒灰存性吹入喉中

食醋噙喉門主方

甘膽丸

治食醋噙喉哮喘不止諸藥不效

甘草去皮二兩作二段用猪膽五箇浸三日取出火上炙乾

為末蜜丸每服四五十九臨臥茶清送下

傷寒大全

卷十七

噙喉

五

顧氏秘書

傷醫大全目錄

卷十八

頸項部

頸項痛門主論

夾疽門主論

氣頸門主論附方

頸癰門主論

環項發門主論

頸蝗門主論

傷醫大全

卷十八

目錄

顧氏秘書

風熱鎖喉毒門主論

無辜疔傷瘡門主論附方

瘦瘤門主論附方

瘰癧門主論附方

馬刀門主論

瘰癧癰門主論

蠱疽門主論

鈕扣風門主論附方

瘍醫大全卷十八

燕湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東



男 槐燮用和

全校

頸項部

自頸項至結喉止凡一切癰疽癭瘤瘰癧馬刀皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷十八

頸項部

一

顧氏秘書

頸項痛門主論

邪客三陽則痛寒搏則筋急風搏則筋弛左多屬血
右多屬痰丹溪治一人項強痛甚不可以回顧作
痰客太陽經治之用二陳湯加酒芩羌活紅花服
二劑而愈有挫閃及失枕而項強痛者皆由腎虛
不能榮筋也六味地黃湯加秦朮

夾疽門主論

王肯堂曰夾疽生喉之兩傍屬手少陰心經足太陰
脾經足厥陰肝火熱毒上攻而成內潰者難治虛
火上升痰壅飲食不進者死 準繩

瘍醫大全

卷十八

夾疽

二

顧氏秘書

氣頸



傷醫本全 卷十八 氣頸 三 顧氏秘書

氣頸門主論

汪省之曰氣頸乃七情抑鬱不伸肝脾氣鬱不舒結
喉之間氣結如胞隨喜怒消長甚則飲食監碍治
以四海舒鬱丸主之 理例

氣頸門主方

四海舒鬱丸

青木香 五錢

陳皮

海蛤粉 各三錢

海帶

海藻

昆布

海螵蛸

各二兩俱用
滾水泡去鹽

共研細每服三錢不俱酒水日服三次渣澄在
碗底內者敷氣頸上愈後用黃藥子四兩生酒
三大盞煮三炷香罨一七去火毒早晚任飲數
杯酒完永除根

傷醫本全 卷十八 氣頸 四 顧氏秘書

頸癰



瘍醫大全

卷十八

頸癰

五

顧氏秘書

頸癰門主論

王肯堂曰頸癰屬手少陽三焦經鬱火積憤驚惶所致初覺即隔蒜灸若潰後不飲煩躁脹滿小便如

淋嘔吐者死 準繩

靈樞云發於頸者名曰天疽其癰大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋前傷任脉內熏肝肺蒸肝肺十餘日而死矣

申斗垣曰頸左發為癰右發為疽皆由臟腑熱毒風氣伏結風府之間故毒發於頸之上下但內近咽

喉飲食氣道呼吸所關其見症也寒熱往來喉痛疼痛飲食妨礙亦惡候也 啓玄
壅光曰頸癰胸前紅腫形勢在外防其內攻甚則紅腫出膿


瘍醫大全

卷十八

六

顧氏秘書

環項發



傷醫大全

卷十八

環項發

七

顧氏秘書

環項發門主論

王肯堂曰環項發發於項之周圍故名又名落頭癰
先看何處腫起如從後天柱穴起是足太陽兼督
脉瘰癧門穴下作寒熱拘倦悶亂恐怖不食如連前
項俱腫乃毒流入足少陽連耳腫是流入陽明當
分經絡治之不應者死 華繩

頸癭



傷醫大全

卷十八

頸癭

八

顧氏秘書

頸癭門主論

汪省之曰頸癭其毒不紅其形堅硬無膿一年半載
長久如此不能穿潰兩尖鎖頸嗜人脂血食血一
飽病人即將危矣毒發之初先服益氣養榮湯十
餘劑即將兩患頭上用三稜針針任以艾炷灸七
壯或九壯次服神效瓜蔓散 方見乳自消理例

風熱鎖喉毒門主論

寶漢卿曰頸項間忽痛如失枕之狀名曰風熱鎖喉

毒久則紅色繞於肩背堅硬難治 全書

傷醫大全


卷十八

鎖喉毒

九

顧氏秘書

無辜疔傷瘡



傷醫大全

卷十八

無辜疔

十

顧氏秘書

無辜疔傷瘡門主論

申斗垣曰無辜疔傷瘡乃因小兒衣物洗濯晒晾誤被雌鳥糞及羽毛落於上有虫入於皮毛間致令小兒腦後項邊有核如彈丸在肉內推之則動軟而不痛久則虫化入於臟腑令兒羸瘦壯熱便膿血頭骨開縫肢體生瘡治宜消疔驚甲丸主之 厥馮魯瞻曰無辜疔者因浣衣夜露被無辜落羽所汚小兒服之令身體發熱日漸黃瘦便痢膿血是也心鑑曰腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不痛其

間有蟲如米粉如不速破而去之即蟲隨熱氣流散通體生瘡一入臟腑便痢膿血須以銀針刺破貼以膏藥可也

又曰更有疔蟲或如髮絲或如馬尾出於頭項腹背之間黃白及赤者生紫黑青者死

瘍醫大全 卷十八 無辜疔 十一 顧氏秘書

無辜疔傷瘡門主方

驚甲丸

夜明砂

淨微炒

驚

甲

醋煮令黃去册

枳

殼

黃

連

各二兩

雄全鷓

一個

訶

子

生一枚熟一枚

共為末入麝香少許蜜為丸如菜豆大每服五丸食後用米飲送下

瘍醫大全 卷十八 無辜疔 十二 顧氏秘書

瘦瘤



瘍醫大全

卷十八

瘦瘤

主

顧氏秘書

瘦瘤門主論

陳實功曰瘦瘤非陰陽正氣結腫乃五臟瘀血濁氣
 痰滯而成也瘦者陽也色紅而高突或蒂小而下
 垂瘤者陰也色白而漫腫亦無癢痛人所不覺正
 又曰筋骨呈露曰筋瘦屬肝赤脉交結曰血瘦屬心
 皮色不變曰肉瘦屬脾憂喜消長曰氣瘦屬肺堅
 硬不移曰石瘦屬腎治宜消散自然縮小切不可
 輕用刀針掘破出血不止多致危亡久則膿血崩
 潰滲漏不已終致傷人 正宗

又曰筋瘤堅而色紫纍纍青筋盤曲甚則結若蚯蚓
 此乃肝統筋怒動肝火血燥筋攣而成也治當清
 肝解鬱養血舒筋為主清肝蘆薈丸主之

又曰血瘤微紫微紅軟硬間雜皮膚隱隱纏若絲縷
 色紅擦破血流禁之不住此乃心主血暴急太甚
 火旺逼血沸騰復被外邪所搏而成也治當養血
 涼血抑火滋陰安斂心神調和血脉為主芩連二
 母丸主之

又曰肉瘤軟若綿硬似饅皮色不變不緊不寬終年

瘍醫大全

卷十八

瘦瘤

主

顧氏秘書

只似覆肝此乃脾主肌肉鬱結傷脾肌肉消薄土
 氣不行逆於肉裏而為腫也治當理脾寬中疏通
 戊土開鬱行痰調理飲食為主加味歸脾湯主之
 又曰氣瘤軟而帶堅皮色如故或消或長無熱無寒
 此乃肺主氣勞傷元氣腠理不密外寒搏而為腫
 也治當清肺氣調經脉理勞傷和榮衛為主通氣
 散堅丸主之

又曰骨瘤形色紫黑堅硬如石疙瘩高起推之不移
 昂昂堅貼於骨此乃腎主骨恣慾傷腎腎火鬱遏

骨無榮養而為腫也治當滋補腎氣養血行瘀散腫破堅利竅為主調元腎氣元主之

又曰粉瘤紅粉色多生耳項前後亦有生於下體者全是痰氣凝結而成宜用拔針破去脂粉以三品一條鎗插入數次化盡內膜自愈

又曰黑砂瘤多生髻腿腫突大小不一以手攝起內有黑色是也亦用拔針刺內出黑砂有聲軟硬不一

又曰髮瘤多生耳後髮下寸許軟小高突按之不痛

瘍醫大全 卷十八 癭瘤 五 顧氏秘書

針之粉髮齊出

又曰蛔虫瘤生於脇下

又曰蛆瘤生於肩膊

又曰風瘤破之虱出但諸瘤形狀之異皆由五臟濕熱邪火濁氣瘀血各感而成非正病耳

又曰小兒胎瘤初生頭上胸乳間腫起大者如饅小似梅李此乃胎中瘀血凝滯而成須候小兒滿月之後方可用針刺破內如赤豆汁則安內服五福化毒丹即愈

又曰治瘦之法初起元氣實者海藻玉壺湯六軍丸久而元氣虛者琥珀黑龍丹十全流氣飲選而治之

薛立齋曰癭瘤諸症祇宜服藥消磨切不可輕用刀針掘破血出不止多致立危醫家病家均當慎之萬勿猛浪

馮晉瞻曰癭則着於肩項痛則隨氣凝結戒食厚味忌妄破决五癭皆不可妄决破惟胎癭破而去其脂粉則愈 錦囊

瘍醫大全 卷十八 癭瘤 六 顧氏秘書

李東垣辯瘰法若發腫都輒而不痛者血瘤也發腫自漸增長而大不熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所為也留積經久極陰生陽寒化為熱以此潰必多成癭宜早服內塞散以排之諸癭瘤疣贅等至年衰皆自內潰理於年壯可無後憂 十書

百效全書曰夫癭瘤皆因氣血凝滯結而成之癭則喜怒所生多着於肩項皮寬不急垂垂而重者是也癭則隨留所住初如梅李之狀皮嫩而光漸如

杯卵者是也瘦雖有五瘤則類多不痛不癢切不
可决破恐膿血崩潰滲漏無已必致殺人惟肉瘤
更不可攻療如脂瘤氣瘤體氣克實者如海藻散
堅尤東垣散腫潰堅湯多服亦可消散如虛弱者
又宜斟酌不可純用化痰行氣破堅之藥

靈樞云虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而內
着寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌
為膿內傷骨內傷骨為骨蝕有所疾前筋疾前二
字衍文
也筋當
作結筋結不得伸邪氣居其間而不及發為筋

瘍醫大全 卷十八 瘦瘤 七 顧氏秘書

瘤有所結氣歸之衛氣留之不得反津液久留合
為腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣
居為昔瘤以手按之堅有所結日以易甚連以聚
歸之津液留之邪氣中之凝結深中骨氣因於骨
骨與氣併日以益大則為骨疽有所結中於肉宗
氣居之邪留而不去有熱則化而為膿無熱則為
肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名也刺節
篇○此皆虛邪中人為病弗去而
久留着故積歲累月而成疽瘤也
三因云瘦多着肩項瘤則隨氣凝結

岐天師曰瘦瘤不同瘦者連肉而生根大而身亦大
瘡者根小而身大也卽瘡之中又各不同有粉瘡
有肉瘡有筋瘡有物瘡筋瘡不可治亦不必治終
身十載不過大如核桃粉瘡則三年之後彼自然
而破出粉如線香末出盡自愈亦不必治也肉瘡

最易治用水銀礪砂各一錢血竭兒茶各三錢黃
栢五錢冰片麝香各三分共為細末將此藥擦於
瘡之根處隨擦隨落根小者無不落也物瘡則根
大最難治不時而動無故而鳴或如虫鳴或如鳥

瘍醫大全 卷十八 瘡瘡 六 顧氏秘書

啼必須用刀破其中孔則物自難居必然突圍而
出後用生肌神藥則瘡化為水平復如故矣秘錄
又曰物瘡乃不敬神鬼觸犯歲君而得病不可測非
理可談故內經不言然世未嘗無此病也
又曰瘦固不同形亦各異然皆濕熱之病也由小而
大出大而破由破而死矣初起之時卽宜用小刀
割破畧出白水以生肌散敷之立愈倘若失治漸
漸大來用藥一點點其陷處半日作疼出水其色
白者易愈如黃者紅者皆難愈

張仲景曰人有手臂生瘡變成大塊更有肚上生瘡
結成頑塊終年不去者或如拳頭大者必須用刀
割去人必暈絕不可學也止用小刀畧破其皮一
分後以化毒丹敷之即化為水此方神奇不可輕
視如足上生瘤如斗大者不必破碎治之止用針
輕輕刺一小針眼以化毒丹敷之必流水不止急
用煎方治之方用人參黃芪各三兩生甘草薏苡
仁各五兩白芥子三錢水煎服二劑即消盡其水
而人絕無憊色此內外雙治之法然此方之妙乃
補其本源之氣又利水而不走其氣刺其孔而出
水未免大損元氣今補其氣又何懼水之盡出哉
此方之所以奇也妙也

岐天師曰人有喉患大腫又非瘦瘡忽痛忽不痛外
現五色之紋中按之半空半實此乃痰病結成似
瘤非瘤似瘦非瘦也宜消痰湯主之此方乃消上
焦之痰聖藥也又有海藻昆布以去瘦瘤之外象
消其五色之奇紋妙在消痰而仍不損氣則胃氣
健而痰易化也一劑知二劑消大半三劑則全消

傷醫大全 卷十八 瘦瘤 九 顧氏秘書

四劑永不復發此方兼可治瘦症神效 秘錄

傷醫大全 卷十八 瘦瘤 三 顧氏秘書

瘦瘤門主方

清肝蘆薈丸 正宗

治惱怒傷肝肝氣鬱結而為癆堅硬色紫壘

青筋結若蚯蚓遇喜則安遇怒則痛者服之

生地黄 酒煮搗膏 當歸 白芍藥

川芎 各二兩 甘草節 昆布

川黃連 青皮 海蛤粉

牙皂 蘆薈 各五錢

共為細末神麩糊丸桐子大每服八十九白湯

瘍醫大全 卷十八 瘦瘤 主 顧氏秘書

量病上下食前後服之無不有效

通氣散堅丸

治憂鬱傷肺致氣濁而不清聚結為瘤色白不

赤軟而不堅由陰陽失度隨喜怒消長者宜服

黃芩 酒炒 石菖蒲 當歸

製半夏 陳皮 香附米

川芎 天花粉 海藻

白茯苓 甘草 陳枳殼

桔梗 川貝母 人參

膽南星 各等分

研細薄荷煎湯疊九寒豆大每服一錢食遠燈

心二十根姜三片泡湯送下

琥珀黑龍丹

治五癭六瘤不論新久但未穿破者並效

天南星 姜汁拌炒 京墨 五靈脂 炒

海帶 海藻 各五錢 血竭 二兩

琥珀 一兩 廣木香 三錢 麝香 一錢

各研細和勻煉蜜丸一錢重金箔為衣晒乾密

瘍醫大全 卷十八 瘦瘤 主 顧氏秘書

貯每服一丸熱酒一杯量病上下食前後化服

如患在下部服後用美物壓之

破結散 錦囊

治五癭極佳丹溪曰瘦氣先須斷厚味

麥麩 四分 松蘿 半夏

貝母 海藻 洗 龍膽草

海蛤 通草 昆布

枯礬 各三分

研末酒服一錢日三忌鯽魚猪肉五辛生菜毒

物二十日愈 一方加青皮

點瘤贅神驗方

凡瘤有六骨瘤脂瘤肉瘤膿瘤血瘤粉瘤膿瘤
卽膠瘤也惟粉瘤與膿瘤可決餘皆不可決潰
肉瘤尤不可治治則殺人

桑柴灰

棗木灰

黃荆灰

蕎麥灰

桐殼灰

各二升
五合

以沸湯淋汁三碗澄清入斑猫四十個穿山甲

五片乳香冰片不拘多少煎作二碗以磁器盛

瘍醫大全

卷十八 瘰癧

三

顧氏秘書

之臨用時入新石灰調成膏敷瘤上乾則以清
水潤之其效如神

枯瘤方

治瘤初起成形未崩者及根蒂小而不散者用
之

斑猫二十個 輕粉

白砒

礪砂 礪砂

雄黃

黃丹

沒藥 去油

乳香 去油各一錢

大田螺 三者去殼
切片晒乾

共研極細糯米粥調勻捏作小碁子樣晒乾先
炙痛頂三壯以藥餅貼之上用黃柏末水調敷
蓋藥餅候十日外其瘤自然枯落次用歛口藥
歛之

秘傳歛瘤膏

瘰癧枯藥枯落後用此搽貼自然生肌收口

血竭

海螵蛸

象皮

乳香 去油

輕粉

龍骨 各一錢

研極細用雞蛋十五枚煮熟去白將黃熬油一

瘍醫大全

卷十八 瘰癧

三

顧氏秘書

小杯將藥和勻每日早晚用甘草湯洗淨患上
雞翎塗之膏藥蓋貼

灸法

先將瘤上用麪包好然後照其大小用杏核或桃
核半個內填極乾人糞合瘤上以艾圓灸之知痛
卽止

秘方

用竹刺將瘤頂畧畧撥損油皮勿令見血入銅綠
細末少許膏蓋自消

又方

極細生鐵屑醋拌放銅杓內煨乾再拌再煨如此
三度研極細再以醋調敷上便覺瘡上不甚適意
過一宿剝去再敷以平為度

瘡生面上初起

鮮蒲公英摘斷以白漿點瘡上乾了又點數日全

消

丹瘤 朱丹溪

草麻子去殼研入麪一匙水調搽之甚效

瘡醫大全 卷十八 瘡癩 三 顧氏秘書

生肌神散 岐天師

治物瘤割破以此搽之

石 灰 千年者 三七根 麒麟竭 各三錢

人 參 象 皮 乳 香 去油

沒 藥 去油 木 香 各一錢 兒 茶 二錢

輕 粉 五分

各為絕細末研至無聲為度修合時須用端午

日不可使一人見之

點瘡法 岐天師

用此點在瘻之陷處半日作疼必然出水

水 銀 鷹 糞 綠 礬

鵝 糞 皂 礬 輕 粉

礪 砂 各一錢 潮 腦 冰 片 各五分

麝 香 三分

研為絕細末用針刺一小孔然後乘其出血之
時將藥點上即粘連矣約用一分以人乳調之

點上如雞頭子大一日點三次第二日必然流

水流水之時不可再點點則過疼轉難收口矣

瘡醫大全 卷十八 瘡癩 三 顧氏秘書

三日後必水流盡而皮寬如袋後用煎方自然

平復如故

煎方

黃 芪 薏 苡 仁 各一兩 人 參

山 藥 各三錢 白 芍 白 茯苓 各五錢

澤 瀉 二錢 猪 苓 生 甘 草

陳 皮 各一錢

水煎服十劑全消如故但忌房事一月餘無所

忌若犯房事必破不能收口終身成漏矣

消痰湯 岐天師

白茯苓 五錢 海藻 半夏

貝母 白芥子 天南星

人參 桔梗 各三錢 昆布

生甘草 各一錢 附子 一分

水煎服

化毒丹 張仲景

人參 三錢 甘草 一錢 礪砂

冰片 各一分 輕粉 五厘

瘍醫大全 卷十八 瘦瘤 夫 顧氏秘書

各為細末和勻搽上即化為水矣

灰漿膏 胡公弼

消瘤神效

天南星 半夏 各一兩 草烏 煨存性 五錢

三味煎濃汁去渣入木蓮蓬蒂上白漿一二兩

採時以蛤蚧殼在蒂上刮取 攪勻再用石灰 以竹片撥炒俟

為徐徐投下調成不稀不厚膏子入磁瓶收貯

黃蠟封口用時如乾以唾津潤開敷瘤上或木

蓮蓬漿潤敷尤妙二三日即愈

消瘤 程荊門

銀爐上飛灰一斗入水煎數十沸用棉布濾去渣

取清汁入川大黃八兩煎好濾去大黃不用 又

用礪石灰一筋放鉢頭內將灰汁傾入鉢內 再

入蟾酥生南星各三兩研為細末和入汁內收貯

看瘤大小用羊毛筆蘸汁掃瘤上一日掃十二三

次三日自枯其瘤落下如去皮石榴將白靈藥搽

之三日消盡又用紅升藥搽上生肌長皮再上鉛

白霜自然全愈

瘍醫大全 卷十八 瘦瘤 夫 顧氏秘書

消瘤法

俟人家入殮時釘棺斧聲敲一下以手按瘤一下

斧聲歇亦止其瘤自消

頸上瘦瘤不疼不痛俱是痰結

川黃柏 海藻 各一兩

研細收貯每用五分放手心上以舌舔之一日

三五次即消

消瘤

礪砂 阿魏 各等分 麝香 少許

研細末以大蒜搗爛看瘤大小敷之自消

禁瘤法

每年行此法一次其瘤即不長大凡遇死屍將死
人手在瘤上一摸可保一年不長次年又行此法
又保得一年不長終身行之則其瘤皆如初起時
也若空一年不用死人手摸其瘤即大

瘰癧



瘰癧門主論

寒熱篇帝曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使然岐
伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣也留於脉而不去者
也鼠瘻之本皆在於藏其末上出於頸腋之間其
浮於脉中而未內著於肌肉而外為膿血者易去
也帝曰去之奈何岐伯曰請從其本引其末可使
衰去而絕其寒熱按其道以予之徐徐徐來以去
之其小如麥者一刺知三刺而已帝曰決其死生
奈何岐伯曰反其目視之其中有赤脉上下貫瞳

子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死見赤脈不下貫瞳子可治也

外臺秘要曰肝腎虛熱則生癰

病機云癰癰不係膏梁丹毒火熱之變總因虛勞氣鬱所致止宜以益氣養榮之藥調而治之其瘡自消不待汗之下之而已也

朱丹溪曰癰癰必起於足少陽一經不守禁忌延及足陽明經食味之厚鬱氣之久曰毒曰風曰熱此癰醫大全 卷十八 癰癰 三 顧氏秘書

三端拓引變換須分虛實實者易治虛者可慮此經主決斷有相火且氣多血少婦人見此若月水不調寒熱變生稍久轉為潮熱自非斷慾食淡神醫不能療也

又曰灸癰癰法取肩尖肘尖骨縫交接處各一穴

陽明經肩臑曲池二穴也各灸七壯在左灸左在右灸右左右俱病者俱灸之余常用之甚效薛氏以曲池云附膠似未的也

薛立齋曰凡男子婦人若因恚怒傷肝氣血壅遏而不愈者宜灸此穴以疎通經絡如取此穴當以指

甲指兩肘兩肩四所患處覺有酸麻方是其穴此治療癰之秘法也

戴復庵曰癰癰之病皆氣血壅結根在臟腑多結於頸項之間繫繫大小無定發作寒熱膿血潰爛此沒而彼起

王肯堂曰單窠癰者生一個也發於頸項最難治或發於顛骨亦難治用毒藥療之勿令浸漬日久

又曰蓮子癰一胞裹十數枚生於項之左右以手觸則能轉動尚可用藥治療如堅硬挨不動者乃不

楊醫大全 卷十八 癰癰 三 顧氏秘書 可生憎寒發熱躁渴凡遇此證至難治雖神聖亦無如之何也已

又曰重臺癰生於頸項或左或右初則單窠結在上或在下重疊見之是名重臺癰此證藥不可療不可針灸若是毒行其腫痛發渴生痰百死一生害人極速初覺有之急用小犀角丸粉金散治之

又曰燕窠癰形似燕窠不可治

陳遠公曰有生痰塊于項堅硬如石久則變成癰癰流膿流血一塊未消一塊復長未幾又潰或耳下

或缺盆或肩膊下有串走之狀故名鼠瘡又名
 串瘡言如鼠之穿也人謂食鼠竊餘以成此症而
 不盡然也蓋此症多起于痰痰塊之生多起于鬱
 未有不鬱而生痰無痰而成瘰癧者也故治法必
 以開鬱為主然鬱久氣血必耗况流膿血則氣血
 更虧消痰而不解鬱解鬱而不化痰皆虛其虛也
 消串丹白芍 一兩 白木 一兩 柴胡 二錢 蒲公英 三
 錢 茯苓 五錢 陳皮 一錢 附子 一片 甘草 一錢 天花
 粉 三錢 紫貝天葵 五錢 水煎服八劑痰塊漸消又
 十劑盡化又一月全愈愈後服六君子湯為善後
 計不再發也此方妙在蒲莢天葵為消串神品然
 非佐以柴芍則肝木不平非助以苓朮則脾胃土
 不健又何能攻痰破塊哉惟有攻有補又得附子
 之力引各味直擣中堅所以能除夙痰于旦夕耳
 水鑑

傷醫大全

卷十八

瘰癧

筆

顧氏秘書

也夫此症初起宜解鬱為先佐之補虛以消其毒
 倘執尋常治法以祛痰收毒為事鮮不速之亡矣
 川轉敗丹人參 二兩 柴胡 二錢 白芍 三錢 金銀花
 三兩 當歸 二兩 半夏 五錢 白木 一兩 生甘草 三錢
 水煎服四劑痰塊在胸者盡消又四劑頸上潰爛
 亦愈將方減半再服十劑瘡口盡平不再發也此
 方補多于消而開鬱寓于中化痰存于內人從未
 有知此治法但一味攻毒所以愈壞也殺運無窮
 神方難信人見此方無不訕笑者誰知乃祛病之
 仙丹奪命之異藥哉余不勝掩卷嘆息也
 陳寶功曰夫瘰癧者有風毒熱毒氣毒之異瘰癧瘰
 癧筋癧之殊當察而治之風毒者乃外受風寒搏
 於經絡先寒後熱結核浮腫治當散其風除其濕
 熱毒者乃天時亢熱暑中三陽或內食膏粱厚味
 釀結而成色紅微熱結核堅硬治當清其脾瀉其
 熱氣毒者乃感冒四時殺厲之氣而成其患耳項
 胸腋驟成腫塊令人寒熱頭眩項強作痛治當調
 其血和其氣瘰癧者纍纍如貫珠連接三五枚其

傷醫大全

卷十八

瘰癧

書

顧氏秘書

患先小後大不作寒熱初不覺疼日久漸痛堅硬如碁子大小如梅李繞頸延腋得之於誤食虫蟻鼠殘之物又或汗液宿水陳茶混入而殮乃食毒鬱結之久病也最難消散治當散其堅和其血痰癰者初起如梅如李生及遍身久則微紅後必潰破易於收斂此乃飲食冷熱不調饑飽喜怒不常多致脾氣不能傳運遂成痰核治當豁其痰行其氣筋癰者生於項側筋間形如碁子堅硬大小不一或陷或突久則虛羸多生寒熱勞怒則甚此乃

癰醫大全 卷十八 癰癧 顧氏秘書

憂愁思慮暴怒傷肝故令筋縮結蓄成核治當清其肝解其鬱正宗

又曰如寡婦尼僧鰥夫庶妾志不得發思不得遂積想在心過傷精力此勞中所得者最難調治有此先養心血次開鬱結益腎安神疎肝快膈如歸脾湯益氣養榮湯俱加香附青皮山梔貝母木香之類是也

又曰男子不宜太陽青筋潮熱咳嗽白汗盜汗女人忌眼內紅絲經閉骨蒸煩熱後必變為癩瘡忌用

巴霜牽牛斑猫大黃追蝕等藥往往尅伐太過致其危亡者多矣切宜戒之慎之

又曰蛇蟠癰繞項起核者是

又曰耳項胸腋驟成腫核色紅微熱寒熱頭痛此乃風寒暑熱之暴病也此證易於消散宜用荆防敗毒散加貝母夏枯草不應再加軟堅開鬱之品

又曰瓜藤癰自頸項延及胸腋者是

馮魯瞻曰凡頸項眉頰結核久礙皆為氣血大虛切勿攻剋錦囊

癰醫大全 卷十八 癰癧 顧氏秘書

又曰癰癧者先賢名曰九漏是由其人陰虛火盛衝擊關津管束之處而又過食燔炙風痰熱毒相搏而結成頑核鬱滯不散久則內潰而為癰癧治宜養陰和肝理脾舒鬱化痰清利切勿徒事尅伐以損真元若夫嬰兒產下因胎毒而即患者此稟母之肝膽二經火鬱氣滯亦宜平肝滋腎化毒為主蓋癰癧之源雖由於肝實根於腎夫肝火之有餘乃腎陰之不足也故其本在臟其末上山頸腋之間若浮於脉中未著於肌肉而為膿血者易去也

若反其目而視之赤脉貫於瞳人如見一脉即一
歲死見一脉半即歲半死二脉三脉亦如之若赤
脉不見者庶可治也其始必止發一枚次必連生
大小十數纏繞項下先腫作膿穿破難乾故名漏
項若在胸傍或兩脇者此名馬刀至若其口深黑
內潰蝕爛穿透咽喉飲食不進目腫舌出耳出黃
膿者不治更有無故寒熱身體頸項結核如癰及
心胸腹背皆有堅核而不痛者此名為結風氣腫
也審其是風是火或虛或實治之

瘍醫大全

卷十八

癰癧

疔

顧氏秘書

又曰癰癧者手足少陽蘊熱結滯而致也二經多氣
少血所以結核堅而不潰延蔓串通若陽明經則
氣血多而潰矣即俗名爛癧惟少陽起者當從本
治俗醫不知槩以毒藥攻之如負薪救火為害更
甚元氣弱者反成癆瘵矣

又曰夏枯草能散結氣而有補養血脉之功能退寒
熱虛者儘可用之若實者佐以行散之藥外施艾
灸亦漸取效

又曰凡結核或在項或在臂或在身或在耳後或在

項門如腫毒不紅不痛不作膿者多是痰注氣滯
不散不外乎曰痰曰氣曰熱三者久而不已則成
癰癧宜早治之大抵因七情之氣鬱結或因飲食
之時觸犯惱怒遂成此疾婦人女子患此最多治
宜開鬱順氣利膈化痰清肺然未有不由陰虛火
旺而有癆瘵根脚者更宜兼乎補陰乃其治也
周文采曰癰生於頭項上交接名蛇蟠癰宜早治之
或立

瘍醫大全

卷十八

癰癧

疔

顧氏秘書

李東垣曰癰癧結核寒熱發渴經久不消者其人面
色痿黃潮熱上蒸已成膿也 十書

申斗垣曰九漏癰名曰狼漏其根在肝因所欲不遂
蓄怒而得曰鼠漏其根在胃因食鼠殮之物胃受
毒而捲於肝曰膿漏其根在膽因志不遂而得之
曰螻蛄漏其根在大腸因食螻蛄及蝎虎所傷之
物誤食之而得曰蜂漏其根在脾因食蜜物及蜂
毒得之曰蜈蚣漏其根在肺因食蜈蚣所遊之物
而得之曰蟻螬漏其根在心因喜之太過而得之
曰癰癧漏其根在腎因食血髮及諸腎得之曰轉

脉漏其根在小腸因驚恐失枕而得之故癩癧古
人稱為九漏此之謂也

晉漢卿曰獨形者為結核續連接結者為癩癧此證
原非膏梁之變乃虛勞氣鬱所致宜服益氣養榮
之劑忌用金石暴悍之法徒傷氣血

又曰潰後宜十全大補湯加貝母香附遠志
汪省之曰癩癧初起者用四稜鐵環按定針一孔以
紙撚紐之勿令合口以絕其源功效甚速 理例

胡公弼曰夫癩癧者乃頸項堅結之核也或在耳前
癩醫大全 卷十八 癩癧 五 顧氏秘書

或在耳後或在耳下皆屬手足少陽經多氣少血
之患也初如豆粒相似不覺疼痛及後長如桃榴
梅李之狀方見疼痛頭眩昏悶四肢作痛作脹寒
熱往來如瘧書云有痰核有氣瘰有風癭有筋癭
有血癭有串頸鼠尾癭頭未破時如彈丸相似或
一枚或三五枚或多不計其數纍纍連貫串沿
漫血脹皮薄而自破出膿者有之浸淫潰爛者有
之或醫家以刀針爛藥刺破者亦有之年深日久
竟不能痊者亦有之殊不知此證原是七情傷於

內血氣滯於外氣多血少痰多壅盛致傷於肝肝
主筋故此毒結於胸膈上焦之處結於耳前及頤
頰至缺盆者名曰癩癧此手少陽三焦經證也凡
看癩癧不宜過心過心者必死只問推之動與不
動不問大小枚數破與不破須察推之動者易治
不動者難醫辨明五善七惡不可一例混治大法
宜用火針針破其核將藥線插入六七次看瘡大
小大則多換小則少換量核淺深務潰其根或爛
斷血筋血流不止者速以百草霜搽之病人若血

癩醫大全 卷十八 癩癧 五 顧氏秘書

去多而量治當補血外用敷藥敷癧四圍其核自
脫脫後換用生肌藥長肉收功 青囊

劉河間曰結核者乃火氣熱甚則鬱結堅硬如菓中
核也不須潰發但熱氣散則自消

朱丹溪曰結核或在項在頸在臂在身皮裡膜外不
紅不腫不硬不痛多是痰注作核不散當問平日
好食何物吐下後用藥散核

又曰結核在頸項用白殭蚕炒大黃酒浸青黛膽南
星各等分蜜丸嚙化核在下頰用二陳湯加酒炒

大黃柴胡桔梗連翹核在臂二陳湯加連翹防風
川芎酒芩蒼朮皂角針白僵蚕麝香行太陰厥陰
之積痰使結核自消甚捷風熱結核用大連翹飲
加白僵蚕牛蒡子如風核以去風消核散常服消
之

又曰凡一切風核疼痛用大蕎麥根葫蘆根磨末半
泔半醋煖塗之

蔣示吉日如瘰癧證男子骨蒸女人經閉已成壞證
若專攻其瘰是速其斃也理宜調理脾胃補養氣
血使根本既固然後再理其瘡庶有可生之機也
說約

瘰癧大全

卷十八

瘰癧

聖

顧氏秘書

又曰瘰癧之作七情六慾痰飲鬱熱積久而成實非
一朝一夕之故也故當以益氣養榮為主而佐以
治瘰之品蓋恐榮衛一衰變症蜂起雖欲治瘰而
不可得矣

又曰凡遇瘰癧等症須察虛實不得盡劑追伐損傷
元氣致成壞病者十有八九此非患者之命自出
醫人之手不得不留心斟酌

聖濟總錄曰瘰癧在耳後頤項缺盆乃手少陽三焦
經主之

內經曰陷脈為癭留連肉腠即此病也

病機云癭癧不詳脈證經絡受病之異者下之則犯

經禁病禁虛虛之禍如指諸掌

劉河間曰瘰癧生於耳後及項間一名九子包又名
老鼠瘡其突起者名瘰癧也多起厥陰少陽二經
以其多氣少血故也由嗜慾太甚飲酒太過食味
太厚思想太窮所願不遂意滯於外內蘊七情中

瘰癧大全

卷十八

瘰癧

聖

顧氏秘書

傷六慾或傳染或誤治種類不同為害則一男子
患此潮熱頓生女子患此月經不調漸漸不治神
仙難救神方於初起或二三核時耳後項下有連
珠就於初起大核之上着艾炷灸之每核上各灸
六七壯或十餘壯更於肩井風池肺腧缺盆穴上
各灸三壯直起死回生之妙法可收全功今人不
行艾灸之法而聽下工敷貼鈎割多取喪亡之咎
治宜養血清神化痰散鬱更宜清心養性淡味節
食可保終吉以症生於富貴膏粱之人多費調理

以味厚慾深故也生於藜藿之人可保無虞以味淡慾少故也古云膏藿不同治正此義也

心法曰癩癧小者為癩大者為癧當分經絡如生項前屬陽明經名為痰癩項後屬太陽經名為濕癩項之左右兩側屬少陽經形軟遇怒即腫名曰氣癧堅硬筋縮者名為筋癧若連綿如貫珠者即為癧癧或形長如蛤色赤而堅痛如火烙腫勢甚猛名曰馬刀癧癧又有子母癧大小不一有重臺癧癧上堆巔三五枚盤疊成攢有繞項而生者名蛇

癧醫大全 卷十八 癧癧 聖 顧氏秘書

盤癧如黃荳結莢者又名鎖項癧生左耳根者名蜂窩癧生右耳根者名惠袋癧形小多癢者名風癧頷紅腫痛者名為燕窩癧近及胸腋者名瓜藤癧生乳傍軟肉等處者名瘰癧癧生於偏身漫腫而軟囊內含硬核者名流注癧獨生一個在顛門者名單窠癧一包生十數個者名蓮子癧堅硬如磚者名門門癧形如荔枝者名石癧形如鼠形者名鼠癧又名鼠瘡以上諸癧推之移動為無根屬陽外治宜因證用針灸敷貼蝕腐等法推之不移

動者為有根且深屬陰皆不治之證也切忌針砭及追蝕等藥如妄用之則難收斂癧癧形名各異受病雖不外痰濕風熱氣毒結聚而成然未有不兼恚怒食鬱滯謀慮不遂而成者也

癧醫大全 卷十八 癧癧 聖 顧氏秘書

療癰門主方

紫霞膏

治癰癧初起未成者貼之自消已成未潰者貼之自潰已潰核存者貼之自脫並治諸色頑瘡

明淨松香淨末一兩 銅綠淨末二兩

用麻油四兩銅鍋內先熬數滾滴水不散方下松香熬化次下銅綠熬至白烟將盡其膏已成

候片時傾入磁罐凡用時湯內燉化旋攤旋貼

癰醫大全 卷十八 癰癧 吳 顧氏秘書

癰癧初起已潰未潰並治

苦杏仁去皮尖 草麻仁去衣四十九粒 香研細末

先將杏仁搗至無白星為度再入草麻仁搗如

泥方下松香再搗千下攤貼

千槌膏

初起貼之自消將潰貼之毒從毛竅中出不致

穿潰

杏仁 草麻仁各四十粒 琥珀燈心全

冰片各三分 珍珠豆腐包 麒麟湯

當門子 乳香去油 沒藥去油

銅綠 黃丹 龍骨

輕粉各六分 水安息元眼肉

松香入鍋內小火化開用麻布濾去渣冷定用

豆腐水煮熟數次再用菜豆湯煮三次又用

先將杏仁草麻搗如泥次將前藥細末逐漸加

入槌千餘下用大紅緞攤貼忌見火若內覺有

膿未熟恐穿潰難於收功可加木鱉子去殼黑

鹽蹄研細五分於膏內即能隔皮取膿

癰醫大全 卷十八 癰癧 吳 顧氏秘書

又方

羌活 獨活 白芷 細辛

龜版 亂髮 防風 當歸

全蠲 蜈蚣各三錢

用麻油一觔浸一日煎時柳枝頻攪藥枯去渣

再熬至滴水成珠然後下東丹水飛炒白蠟兒

茶各二錢離火片時下麝香五分不可過多

琥珀膏

治癰癧及腋下初如梅李結腫硬強漸若連珠

不消不潰或潰膿水不絕經久不瘥漸成漏症

琥珀一兩 廣木香 丁香 香 各一錢

桂心 硃砂 松香 以上研細不入油熬

當歸 木通 防風

木鱉子 淨肉 草薢仁 白芷 各五錢

蘇油二觔二兩浸七日入鍋內慢火熬至焦黃

為度絹濾淨油徐下黃丹飛炒四兩以柳枝不住手

攪候至膏成滴入水中軟硬得中掇下鍋來以

盆頓穩攪至烟盡方下羣藥攪勻磁器盛之臨

瘍醫大全 卷十八 癰瘰 聖 顧氏秘書

用取少許攤貼

駢癭丸

駢癭虫不拘多少焙乾研末紅棗去衣去核共搗

為丸桐子大每清晨白湯送下三錢

鼠瘻馬刀

凡服此丸宜先服六味地黃湯加益母草三劑

再服此丸

大枳殼 七個切作十四片滾水泡軟去穢每兩片

內納班貓一個大黃九分兩片合緊用線紫好入砂鍋內放半砂鍋水煮至水乾為度去班貓大黃只取枳殼晒乾研細

煉蜜丸如菉豆大每日三服每服三分白湯下

鼠瘻土瓜丸 吳涓采

已潰未潰並效

土瓜根 白芨 澤蘭葉

漏蘆 胡桃肉 射干

夏枯草 沙參 各三兩 草連翹 去心六兩

磨細酒糊為丸桐子大每服三十九小兒減半

空心鹽酒下

消癭丸

瘍醫大全 卷十八 癰瘰 聖 顧氏秘書

此方奇效愈者不可勝計可刊方普送

玄參 蒸 川貝母 去心 牡蠣 火煨醋淬 各四兩

磨細煉蜜為丸每服三錢白湯下日二服

神效消癭丸

大熟地 三兩 澤瀉 白茯苓

山藥 山萸肉 各一兩 玄胡索

牡丹皮 牡蠣 各一兩 二錢

磨細煉蜜為丸桐子大每服三錢白湯送下

一方用玄參無玄胡索

消癰丸

夏枯草

連翹

草蘇仁各四兩

磨細裝入健猪大腸一段內兩頭紮紫酒浸蒸

爛搗丸如桐子大每服五十九酒下

癰癰未破者

大五楮子一個挖一孔入南蜈蚣一條切作數段

裝入楮子內以醋麩裹作一球用麩子半碗全炒

以麩焦為度剝去外面麵球取去內裏蜈蚣只用

楮子研細醋調敷

癰醫大全

卷十八

癰癰

聖

顧氏秘書

已潰

健猪膽汁三個傾入銅杓內慢火熬至滴水成珠

再加輕粉一錢冰片三分攪勻攤貼

癰串初起

豆腐店浸豆水濾清用砂銚慢火熬膏每早白湯

冲服數匙癰上亦以此膏敷貼

鼠癰初起

紫花地丁四兩

火酒一觔

浸七日飲之自愈

加味道遙散

治肝經鬱火致生癰癰並胸脇脹痛或作寒熱甚至肝熱生風眩運振搖或咬牙發瘧諸證經云木鬱達之是已

柴胡

薄荷葉

白朮

白茯苓

當歸

山梔仁

甘草

牡丹皮

白芍

水煎服

癰癰煎方

癰醫大全

卷十八

癰癰

聖

顧氏秘書

初起自消

大貝母一錢五分

夏

當歸尾

穿山甲炒

白茯苓

白附子

連翹

各一錢

桔梗

廣皮

枳殼

各八分

白僵蚕

一錢

甘草節五分

加燈心十根全煎服四劑換服海龍丸

海龍丸

海藻

酒洗

昆布

酒洗

白茯苓炒

穿山甲

炒各二兩

全蝎

一百個

龍膽草

酒洗炒一兩

當歸身

炒一兩

桃核

五十個

劈開去肉

將全蝎嵌在核內合紫煨存性

研細蕎麥麵打糊為丸桐子大每早晚白湯送下三錢酒下亦可

治癰奇方

全鷓七個 桃殼六個每殼裝鷓一個五個殼裝去五個鷓子仍有一殼裝兩個全鷓以麪包煨熟研末作六包用黃酒調服每日服一次將兩個鷓子這一服作個記號留為末服服完隔兩三日如未全愈可照此方再製一兩料服之自必全愈矣服此藥每日須肉食滋養

癩醫大全

卷十八

癩癰

聖

顧氏秘書

又方

真牛黃 二錢

全

鷓一百枚去淨頭尾脚用新瓦焙存性

研細以核桃肉搗丸如桐子大每服二十九空心白湯送下 如患處破皮便將取下鷓頭尾脚焙研細末搽上再以膏貼二十一日即愈永不復發 製藥須擇成間除日修合

藥酒方

摩羅藤

夏日用鮮者二觔陳木瓜酒五觔燒酒五觔冬

月用枯者四觔陳木瓜酒八觔燒酒二觔入小口瓦罈用濕麵糊罈口重湯煮一炷香為度每食後隨量飲之常服除根

除癰方

活鱒魚四五寸長者竹刀剖去鱗腸入獨核肥皂子七個以黃泥為匣入魚匣內上下用炭火燒煨無烟取出候冷研細每服三錢清晨木瓜酒下

又方

白亮松香研極細末以雄猪骨髓調搽即愈三五

癩醫大全

卷十八

癩癰

聖

顧氏秘書

年各藥不效者用此方俱效只在研調敷之手法要緊用左手即川左手到底用右手即川右手到底研藥調藥敷藥俱要認定一隻手忌陰人挈

夏枯草乃生血補虛消毒之聖藥或煎湯飲或浸

酒飲癰上單用夏枯草煎濃膏塗之

益氣養榮湯

治抑鬱勞傷思慮太過心神俱憊以致四肢顛項筋縮結成癰藥如貫珠或硬或軟或赤或白

或痛或不痛日晡發熱及潰而不斂者並效

人參 白茯苓 廣皮 白芍藥

熟地黄 香附 當歸身 川芎

白朮 嫩黃芪 貝母各二錢 桔梗

粉甘草各五分

生薑三片大棗二枚煎服

胸膈痞悶加 枳殼 木香

飲食不甘暫加 厚朴 蒼朮

寒熱往來加 柴胡 地骨皮

瘍醫大全 卷十八 瘰癧 聖 顧氏秘書

膿多或清倍加 當歸 川芎

膿潰作渴倍加 人參 黃芪 白朮 當歸

脇下痞痛加 青皮 木香

肌肉生遲加 白薇 肉桂

痰多加 橘紅 半夏

口乾加 麥冬 北五味子

發熱加 柴胡 黃芩

渴不止加 知母 赤小豆

膿不止加 人參 黃芪 當歸

潰後反痛加 熟附子 沉香

虛煩不眠倍加 人參 熟地 遠志 棗仁

桃竭散

治憂思鬱結痰留氣滯乃生瘰癧

大全喝二十一箇核桃二十一箇劈開去肉將竭

裝入裝緊火煨存性每用一枚研末臨臥陳酒下

孫真人治瘰癧初起並治潰爛久不收口

壁虎一條裹泥中火煨存性去泥研末臨臥陳酒

調下

瘍醫大全 卷十八 瘰癧 聖 顧氏秘書

治火鬱結核不拘男婦俱效

用交媾陰精塗搽如婦婦即以自已陰精塗之

大紅膏

治瘰癧痰核結塊不分新久但未穿破者並效

石 灰一兩用大黃三錢切片去油 滴乳香去油

輕粉各二錢 銀珠 血竭

潮腦 硝石各三兩 天南星二兩

右為細末陳米醋熬稠調藥敷核上三日一換

敷後皮嫩微損者另換紫霞膏貼之其核自消

氣瘰

北煤炭搗碎用生桐油脚調敷自消

瘰癧驗方 孫展鴻

多年點燈竹燈掛一個用火點着下置磁盤使油

滴入盤內放土地上出火氣三日以翳翎掃患處

不過數遍已潰者自斂初起者自消

敷項下痰核瘰塊內消法 明醫集

鮮山藥 一兩 草麻仁 四兩

共搗成膏敷上即消

瘰癧大全 卷十八 瘰癧 藥 顧氏秘書

冰礬散

治療瘰日久堅核不消及服消藥不效者用此

點落瘰核如馬刀根大面小及失榮等症忌用

大田螺肉 五枚 日中白 砒 一錢二分 麩 包煨熟

直番礬砂 二分 冰 片 一分

先將砒礬研細再將礬片研勻小罐密收凡用

時先將艾炷灸核上七壯次後灸瘡起泡以小

針挑破將前藥一二厘津唾調成餅貼灸頂上

用綿紙以厚糊封貼核上勿動泄氣七日後四

邊裂縫再七日其核自落換搽玉紅膏內服補藥培助完口此藥又治瘰癧患大帶小及諸般高突異形怪狀者並效

火針法

治療瘰癧痰核生於項間初起堅硬或如梅李結聚不散宜用此法針之搽藥易消也

用縫衣大針二條將竹筋頭劈開以針尖夾縫內相離一分許用線紮定先將桐油一盞用燈草六

七根油內排勻點着將針燒紅用手指將核捏起

瘰癧大全 卷十八 瘰癧 藥 顧氏秘書

用針當頂刺入四五分核大者再針數孔亦妙核內或痰或血隨即流出候盡以膏蓋之次日針孔

必漸作膿輕者用黃藥線搽之核堅硬者用冰礬

散糊打成條晒乾插核針孔內外以紙糊二重封

固次日其核發腫作痛不妨乃藥氣攻入於內候

至七日外自然核外裂開大縫再至七日其核自

落葱湯洗淨孔大換用玉紅膏搽入外以膏蓋內

服益氣養榮湯或十全大補湯加香附兼戒勞動

氣惱房事發物煎炒海腥等件

三品一條鎔

上品錠子去十八種痔中品錠子去五漏翻花
瘦瘡氣核下品錠子治瘰癧疔瘡發背腦疽等
症此為古之三品錠子但藥同而分兩不同治
病故有分別今註一條鎔本方三品以下之症
並皆用之俱各相應况又藥品簡易而不繁是
曰三品一條鎔之說也凡同志者隨試而用之

白 砒一兩五錢 明 礬二兩 乳 香一錢二分

雄 黃二錢四分

湯醫大全 卷十八 瘰癧 聖 顧氏秘書

砒礬二味共研細末入小罐內加炭火煨紅青
烟已盡旋起白烟片時約上下紅微住火取罐
頓地上一宿取出約有砒礬淨末一兩加雄黃
乳香共研極細厚糊調搗成如線條陰乾凡
遇前症有孔者維入孔內無孔者先用針旋孔
竅早晚插藥二次插至三日後孔大者每插十
餘條插至七日患孔藥滿足方住以後所患四
邊自然裂開大縫共至十四日前後其疔核瘰
癧痔漏諸管自然落下隨用湯洗搽上玉紅膏

虛者兼服健脾之藥

瘰癧痰核噎藥 寶太師

昆 布酒洗 海 藻酒洗 大 黃酒拌蒸

白 蠶姜汁拌炒 真青黛水飛 膽南星

連 翹各二兩 桔 梗 柴 胡

瓜 蒞仁 川黃連酒炒 片黃芩酒炒

橘 紅各一兩

研細煉蜜丸如芡實大不拘日夜噙之

二貝丸 蕭梅源

湯醫大全 卷十八 瘰癧 藥 顧氏秘書

專消痰癧

硃 砂七錢 大貝母 紫貝天葵各二兩

海 藻 海 粉 明 礬各一兩

共研細末用夏枯草二觔熬膏為丸桐子大臨

卧茶清送下三錢

人牙散

專消瘰癧各種腫毒

人 牙二兩 麝 香五分 羌 活酒洗六錢

研細煉蜜丸龍眼大白湯或酒磨服一九

海上仙方

消癩癰如神

斑 貓一歲用一紅娘子 一對 糯 米 一升

三味入鍋全炒候米黃色為度去斑貓紅娘子

不用只喫炒米米盡則癩消矣

三陽酒 陸公節

遠年近日癩癰母論已潰未潰

三陽草即蛇莓藤連藤葉紅菓採取二筋浸火酒

十筋煮三炷香出火氣埋土中十四日取出每飲

癩醫大全

卷十八

癩癰

癩

顧氏秘書

數杯酒盡患愈

白菓葉散

吳氏家秘

能搗諸癩不使漫生即能消散

珍珠 銀 粉 各二錢 雄 黃 一錢

白菓葉

去梗瓦上微火焙乾研末三錢

先將珍珠雄黃研末全蝦蟇心肝十副搗爛圍

住癩瘡四邊再將白菓葉末銀粉好醋調搽癩

瘡中心不過二次即消破爛者用醋浸白菓葉

一晝夜貼破癩上

連翹丸

治項間結核寒熱往來日久不愈若患在面臂

尤宜此丸

連 翹 防 風 黃 栢 肉 桂

淡 荳 豉 獨 活 秦 朮 桑 白 皮

牡 丹 皮 各五錢 海 藻 二錢五分

右為細末煉蜜丸棗豆大每服十九燈心湯下

內消癩癰

栢樹葉搗爛敷核上以炒鹽熨之一日三五次以

癩醫大全

卷十八

癩癰

癩

顧氏秘書

消為度

癩癰母論已潰未潰 濟生

夏枯草熬膏食遠滾湯調服兼服十全大補湯加

遠志肉貝母香附

又方

茜 根 一 兩 雞 蛋 十個畧煮去殼再全茜根全煮

每次一枚食後全酒煮食之

內消散 吳中書

治癩核不拘久近已破未破

天花粉

苦參各五錢

皂角刺四十個

土茯苓三觔

共煎湯當茶飲忌牛肉屢試屢驗奇異方也

治癰簡易方

枇杷葉一觔四兩去毛梗淨焙燥為末

冰糖一觔

和勻不拘時服白湯過口服完即愈

神效散 談莖翁試驗

未破用此即消已潰爛牽至兩肩胸腋茄子大

四五年不愈者其效如神

傷醫大全

卷十八

癰瘡

李

顧氏秘書

沉香五錢

芫花三錢

月季花即月月紅二錢

右剉碎取大鯉魚一尾放尿內遊死將藥入魚

腹中就以魚腸封固酒水各一盃煮熱服之即

愈

初起神效方 回春

穿山甲土炒

丁香

白丁香

苦丁香

紅小豆

磨刀泥

姜

蚕去頭足酒炒

班

猫去頭足酒炒各一錢

右為細末每服一錢五更時無根水調服至未

時打下毒物其形如鼠後用野菊花焙黃為末

陳醋調敷一日一換七日全好

乳癰潰爛已見臟腑抄本

土棟樹子經霜者佳川棟不用雄鼠屎即兩頭夫者露蜂房各三兩

俱煨存性為末每服三錢酒調服間三日一服

不數日膿盡自斂

癰瘡秘方

初起成塊未破者將麩捏成薄條照瘡大小畧離

患處作圈圍着再取槐樹根在土內掘出者白皮

傷醫大全

卷十八

癰瘡

李

顧氏秘書

數條照麩皮作圈放麩圈之上用艾作小丸放癰

子中心灸之肉上畧覺痛即拂去艾丸另取艾丸

再灸三遍其麩圈不動只換槐根白皮三次連灸

三日自消

一方

不拘已破未破

瀝

青好者一兩

草麻仁四十九粒

杏仁去皮尖十粒半

共搗千餘槌自然粘軟成膏攤貼癰上神應內

須服昆布海藻海帶貝母連翹甘草元參

消癰方 范令問

真象牙末乳極細每服三分清晨煮熱雞蛋一個去殼蘸象牙末食之自消

內消癰癰方 周鶴仙

鼠糞七錢 大楓子五錢 巴豆三錢

共搗勻入大鯽魚肚內用紙包縛再用黃泥封固如法煨煉俟烟盡取出冷定研為細末米糊為丸菘豆大每服二錢空心黃酒送下十日全

消神效

癰醫大全

卷十八

癰癰

李 顧氏秘書

癰癰奇方 周鶴仙

雞蛋一枚頭打一小孔採綠萼梅花將開者七朵入蛋內封好煮熟去花食蛋如此七枚全愈

癰癰秘方 何輪店驗過

雞蛋七枚將蛋打一孔取活蝙蝠七枚每蛋一個裝蝙蝠一個封口放鍋內蒸熟取放陰陽瓦上逐個煨存性研細無灰酒調服一日服一次七日服完即效

癰癰痰核三劑即消 王見宇

當歸尾 大黃 金銀花 各五錢

僵蠶 四錢 穿山甲 全蝎

夏枯草 連翹 皂角刺

生地 各三錢 赤芍藥 川芎

川貝母 白芷 各二錢 土木鱉 一錢

酒水各一碗煎一碗空心服渣再煎服 癰癰仙方 劉氏家秘

兼治癰疽發背無名腫毒

穿山甲 四足上者佳四兩分四製 一兩用紫草

癰醫大全 卷十八 癰癰 顧氏秘書

五錢煎煮甲片乾再晒 一兩用猪牙皂

五錢煎煮甲片乾再晒 一兩用蘇木

蜈蚣 十六條分為四製 四條用香油炙乾

四條用醋炙乾 四條用酒炙乾

每用穿山甲蜈蚣末各一錢再加

川歸尾 五錢 大黃 乳香 去油

全蝎 沒藥 去油 荆芥

桔梗 各二錢 蟬蛻 二十個 僵蠶 炒去絲

砂 另研 羌活 防風 各二錢

連翹

黃芩各三錢

廣膠土炒淨一兩

雄黃另研七分

蛇蛻焙五錢

共為細末好米醋打糊為丸每九重一錢二分

入麝香五分在罐內養之收貯凡遇此證每用

一丸研末溫酒調服未成內消已成催膿速效

如神

瘰癧劉氏家秘

斑蝥

去頭足翅同糯米炒香糯米炒黃色即揀去糯米只用斑蝥

黑牽牛

半生半熟

白木

郁李仁去皮

湯醫大全

卷十八 瘰癧

奎 顧氏秘書

甘草

密陀僧

檳榔

防風

各五錢

共為細末麵糊為丸如梧桐子大每服二十九

清晨檳榔甘草湯送下腹內作痛小便下毒如

魚目狀已破自斂未破自消如小便全無以燈

心煎湯利之如小便痛以芎茶煎湯解之服此

九宜夏枯草煎濃湯當茶

未被瘰癧

沉香

芫花

乾月月紅花各三錢

共為細末用大活鯽魚一尾放尿桶內浸死取

魚剖肚去腸刮鱗以前藥入內用線縫好煮熟

將好酒同食必要連藥喫下儘量飲醉服後聽

瀉白止忌房事並鮮發之物數日即愈

已破瘰癧

珍珠一錢

輕粉二錢

陳白螺螄殼火煨四錢

右乳極細末用猪脊髓調將瘡挑開出子一個

將藥補滿自然收功不必驚惶再服煎劑十貼

當歸

各八分

白茯苓

七分

白芍

四分

湯醫大全

卷十八 瘰癧

奎 顧氏秘書

三分陳皮

羌活

赤芍

甘草

各五分 食後服

二仙丹

治瘰癧

枳殼

一觔每兩切兩開去穢入斑貓去翅足七個仍將兩片合住以線十字紮緊用上好

醋浸七天足再以醋煮五炷香必要多加好醋煮透冷定解去線揀去斑貓只將枳殼切片

陰乾

紫背天葵

一觔如無以九頭獅子草代之

共磨細末將前煮枳殼多餘醋打糊為丸如梧

桐子大每服五十九酒水任下早晚各一服未

出頭者白消已出頭者用膏貼之自愈
瘰癧 劉長隨

當歸 蛇盤草 各二錢 燈籠果 七個

白茯苓 八分 皂角刺 苦參 各七分

昆布 六分 黑丑 五分 土茯苓 一兩 先煎湯

藥入土茯苓湯內煎食後臨卧服之 忌猪首

鷺羊魚蝦子鷄香葷蛋白菓栗子醬醋茶煎炒

一切動風動火之物均事 愈後用火酒十觔

金銀花半觔入湯內浸一七煮一炷香埋土內

瘰癧 黃君尚 七日取出早晚飲之永除根矣

瘰癧 黃君尚

壁虎不拘幾條捉來活放酒釀內浸至第二日將

陰陽瓦炙乾又浸如此九次再乳為細末每用壁

虎六錢透明雄黃四錢共成一兩每用三厘胖人

五厘好酒調下即長石榴子忌鹽三七二十一天

只用精猪肉煮熟以醋蘸喫 外面用貼過舊膏

藥貼之將收口用猪首上栗子肉燒灰敷上即收

口矣此丹未破者內消已破者即收口愈後再將

男左女右手腕處灸七壯永不再發

瘰癧膏

金線重樓 金線吊蜈蚣 草薺仁

商陸 各四兩 天南星 半夏

露蜂房 防風 蛇蛻 各二兩

大黃 土木鱉 穿山甲

香木鱉 射干 川烏

草烏 枳殼 當歸

紅花 白芷 僵蠶

瘰癧 黃君尚 卷十八 瘰癧 矣 顧氏秘書

紫花地丁 紫背天葵 各一兩 活雄鼠 大者

乾蟾 各一個 芫花 一兩 巴豆肉

急性子 各五錢 鯽魚 四尾

用麻油三觔浸七日熬枯去渣復入淨鍋內熬

至滴水成珠稱熟油一觔入銀珠八兩收之成

膏再下淨黃蠟八兩再下

乳香 去油 沒藥 去油 血竭

兒茶 各五錢 麝香 二錢 潮腦 二兩

乳細下之攪勻收貯 攤宜厚些速效如神

消癩癧方 江仁度

甘遂 一兩 熬膏 甘草 一兩 熬膏

先將甘遂膏塗癧上離一燈草遠將甘草膏籠之其核自縮洗去次日又用甘遂膏塗之仍離一燈草遠又以甘草膏籠之以消為度

又方 江仁度

鐵砂 四兩 用舊鍋鐵研碎 或在爆竹店買

鐵砂研末用滴醋煎成餅復打碎又用醋煎成餅又打碎再用醋煎如此七次乘鐵砂潮熱之

癩醫大全 卷十八 癩癧 禿 顧氏秘書

時敷癩癧上以消平為度

又方 胡景周

鼠屎三錢鹽水拌炒為末以一錢拌砂糖為糰以二錢和麵隨人大小多寡作餅七個包穰焙熟令一日喫盡隔兩日服一次不過三服愈如未除根再服

癩癧膏

川楝子 八兩 炒黑研末 只取四兩 烏 甘草 湯泡 生南星

草烏 半 夏 各一錢 川貝母 去心 五錢

綠色海粉 四兩 炒黑 只取二兩

各研細末共一處煉蜜茶汁和成膠貼患處油紙護之

地龍膏 李養榮

癩癧未破者立消

地龍糞 雄黃 小麥麵 各等分

研細醋調塗

專治癩癧有核成瘡者皆能速愈

花壁虎 一條 裝入雞蛋內封固放飯上蒸熟取起

癩醫大全 卷十八 癩癧 禿 顧氏秘書

去殼將壁虎全蛋搗爛為丸如菘葢大陰乾分二十日空心茶湯或米飲皆可送下服完百日內忌發物及生薑椒蒜雞鶩羊肉遺精房事為要

癩癧

蛇蛻一條白者佳鍋內炒脆研末臨卧食後酒調服在膈上取汗次早潰者膿少未潰者消其潰者一時難收口須用花椒湯洗再用黃連末搽之

消癩核 吳近宸

生半夏 生香附 各等分 生附子 少許

研細熬滴醋調敷核上自消
內消散 任中書

治療癰宜先服益氣養榮湯十多劑後再服

砂 血 竭 各一錢 生斑猫 去翅足三分

右為細末每服一分空心燒酒調服未破者三

五日立消已破者內服此藥外用金頭蜈蚣一

條研極細末用麻油一小鍾浸兩晝夜搽患處

其瘡即腫潰過一二日腫消可貼膏藥瘡勢大

者二十日痊小者十餘日平復

楊醫大全 卷十八 癰癧 圭 顧氏秘書

消癰癧 吳措斑

朝北據據籐陰乾煨存性研細米糊為丸桐子大

每服三錢白湯送下未成即消已成即潰

治療癰 楊氏家藏

荆 芥 白蠟 炒去絲 黑牽牛 各二錢

斑 猫 翅足全米炒

右為末臨卧時先將飛滑石末一錢用米湯調

服半夜時再將滑石調服一錢至五更時用溫

酒量人之強弱調前藥末一錢或二三錢服之

服後如小水內並無惡物行下次口早再用一

服倘仍不通利第三日五更時先喫白糯米粥

再服前藥一服更用燈心湯調琥珀末一錢服

之以小水內利去惡物為效 如尿管痛用青

黛一錢以甘草稍煎湯調服其痛立止此方治

悞食毒物致成癰癧其功甚速

內消癰癧丸

夏枯草 八兩 元參 青鹽 各五兩

海藻 川貝母 薄荷葉

楊醫大全 卷十八 癰癧 圭 顧氏秘書

天花粉 海粉 白蘇

連翹 去心 熟大黃 生甘草

生地 桔梗 枳殼

當歸 硝石 各一兩

共磨細酒糊丸桐子大臨臥白湯送下三錢

癰癧痰核

猫一隻煨熟數次食完自消

又方

如意草焙為末雞蛋清調敷

消核 黃漢升

健猪膽七個用銅鍋熬以朝北柳枝順手攪不可
反手攪熬至滴水成球為度傾磁器內放朝北地
上冷一伏時用緞子攤貼

槐條膏

治癩癧如神並貼瘡毒

嫩槐條 要採一枝有七個頭
者取四十九枝剉碎

麻油一筋浸三日用小火熬枯去渣入炒鉛粉
八兩收膏攤貼 宜春夏熬收

癩醫大全

卷十八

癩癧

三

顧氏秘書

癩癧串痰

人 信 四錢 黑 棗 七個
九分 去核

每棗入信七分陰陽瓦焙盡烟為度埋土內一
個月取出研細末柏油調搽以軟紙貼之如無
膿血流出即不必換藥自然長肉結疤

驗方

糯米肥皂

一筋去核水浸一宿去皮筋並石白搗
爛加上好米醋一筋再搗以新布攪汁
去渣入新砂鍋內熬如米湯色用柳枝
不住手攪再入白蠟一兩溶化成膏

出火氣油紙攤貼如已潰者效更速 熬時擇

淨室婦女雞犬忌見

癩癧丸

牡 蠣 煨 元 參 炒 各 五 兩 土 茯 苓 炒 二 兩

端午日共磨細用酒打麩糊為丸如棗荳大患
在上身每清晨酒下二錢五分晚下二錢患在
下身早服二錢晚服二錢五分自然漸消

消氣核癩癧 巴秘

全斑猫 二個 白殭蠶 二十個

火酒二筋全浸每日飲少許即消

癩醫大全

卷十八

癩癧

三

顧氏秘書

癩癧已潰未潰 巴秘

每歲用金頭蜈蚣一條陰陽瓦焙研取雞蛋一個
打一孔將藥裝入糊好飯上蒸熟每日一個服至
患者年歲若干為止未潰即消已潰自斂

癩癧

蛇頭菓子草四五月間生時採來焙乾浸酒飲之
儘醉發汗如此三次以後只飲酒不必取汗未潰
者消已潰者膏貼

癩癧潰爛垂危者

用苦丁草拾多勛洗淨熬膏攤貼初貼之時極痛
必須寧耐貼三四日即不痛矣雖爛見咽喉胸脇
者俱能全愈

湯醫大全

卷十八

毒

馬刀

馬刀



湯醫大全

卷十八

馬刀

毒

顧氏秘書

馬刀門主論

靈樞云腋下其癰赤堅而不潰者為馬刀挾癭急治
之

汪省之曰馬刀專屬肝膽二經其形頗長堅硬如石
或在耳下至缺盆或肩上海至脇下甚至胸前累
疊經年累月有作瘡而不破有破爛而膿血不止
者其證幾危矣 理例

馬魯瞻曰若在胸旁或兩脇結長核者此名馬刀 錦
周文采曰馬刀瘡生於項腋之間有類瘰癧但初起

其狀如馬刀赤色如火燒烙極痛此瘡甚猛宜急治之不然多成危殆也 集驗

胡公弼曰結於胸前及胸側連脇者名曰馬刀此足

少陽膽經候也初生小後必大若疼痛破爛出膿

膿孔受風決成漏症斷不易治惟年壯氣血盛者

治之易痊 青囊

陳寶功曰馬刀瘡形長如蛤者是生於項側耳下肩

上缺盆腋下 正宗

蔣示吉曰馬刀結核其硬如石乃手足少陽經起若

瘡醫大全 卷十八 馬刀 圭 顧氏秘書

失而不治不守禁忌漸延至陽明頰下頰車俱到

壯實者潰堅湯不足者滋陰散堅湯主之 說約

澄曰馬刀生於缺盆之上由胸腋而至脇本由痰核

癩癧時潮熱時作氣血已枯精神短少兼之醫治

不善釀至膿血大潰腫勢日堅更有潰流血水毫

無膿汁復有藥如巖穴脹而不痛外撐車頰內阻

咽喉飲食妨碍筋脉拘攣收引疼痛腿足牽扯甚

則怒火上衝迫血從毛竅溢出變而為馬刀矣馬

刀名之者何義謂之馬其行疾謂之刀其器利既

疾且利人將奚敵哉故靈樞經云馬刀拔癭宜急

治之雖然人雖垂死猶有可生之法若坐視不救

豈仁者之心哉外宜艾灸或可回生如有井肺膈

膈中風池百勞曲池穴各灸三壯內服益氣養榮

湯開鬱清痰和氣消核之劑首尾肝脾兼固氣血


雙扶灸後用萬靈膏調理一年恬淡靜養尚可保

全性命若妄治追蝕於外攻伐於內則死立待

矣

瘡醫大全 卷十八 馬刀 圭 顧氏秘書

瘰癧癰



瘰癧癰

卷十八

瘰癧癰


全

顧氏秘書

瘰癧癰門主論

王肯堂曰瘰癧癰生項腋兩乳旁結核或兩脰軟肉處腫塊屬手少陽三焦經其發緩慢是冷證非熱證也宜回陽玉龍膏敷貼 率繩
澄曰此證生於項脇形類結核發長緩慢漸增癩腫色紅乃心包絡寒痰脾氣鬱結而成治宜溫和舒鬱化堅

蠱疽



蠱疽

卷十八

蠱疽

全

顧氏秘書

蠱疽門主論

申斗垣曰蠱疽即發歷瘡乃足陽明胃經多氣多血生於缺盆二穴之分在肩下乳上如再生四五頭子母大小者又名歷瘡十日可刺如無膿者名曰石疽 啟立

鈕扣風門主論

陳實功曰鈕扣風乃風濕凝聚生瘡久則搔瘡如癬
不治則沿漫項背治以水硫散搽之 正宗

鈕扣風門主論

水硫散 正宗

樟冰

明礬

川椒各二

硫黃二

右為細末先用白蘿蔔一個挖空其內將藥填
滿復將原皮益之濕紙包之附層灰火內煨半
時許待冷取開用藥全熟猪油調搽患處自愈

湯醫大全目錄

卷十九

腋臂指掌部

腋癰門主論 附方

腫氣門主論 附方

內疝疽門主論

缺盆疽門主論

臈癰門主論

臈癰門主論

臂癰門主論

骨癰疽門主論

垂臂發門主論

鵝癰門主論

石榴疽門主論

冬瓜串門主論 附方

陳肝瘡門主論

螻蛄串門主論

肘後毒門主論

湯醫大全目錄 卷十九 目錄 一 賴氏親書

肘癰門主論

手足魚臍瘡門主論

腕癰門主論

兌疽門主論

癰瘡門主論 附方

筋疽門主論

豚骨疔門主論 附方

五指所屬臟腑穴道圖說

五指名目圖

五指穴道圖

陽掌臟腑圖

陰掌臟腑圖

肘腕穴道圖

看手指察病順逆圖

鑿指疔門主論 附方

代指門主論 附方

天蛇毒門主論 附方

蛇節疔門主論

蛇節疔門主論

易醫大全 卷十九 目錄

蛇眼疔門主論

蛇背疔門主論

蠅螂蛙門主論

鯁肚疔門主論

衝要節門主論

紅蘭疔門主論

癰疽門主論

手指怪症門主論

丫癰門主論

虎了毒門主論 附方

手心毒門主論

鷲掌瘋門主論 附方

馬蟻窩門主論 附方

酸痛門主論 附方

手足破裂門主論 附方

手發背門主論 附方

手汗門主方

手汗門主方

易醫大全 卷十九 目錄 主 顧氏秘書

瘍醫大全卷十九

燕湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽
男 權燮用和
全校

腋臂指掌部

自腋臂臑肘手指手背癰疽疔毒俱彙於此部中以
便檢閱參治

瘍醫大全

卷十九

腋臂部

顧氏秘書



腋癰

腋癰門主論

王肯堂曰腋癰卽夾肢癰生肩膊下隙內屬手少陰
心經手厥陰心包絡經風熱所致宜服內托黃芪
柴胡湯準繩

靈樞曰發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲
細而長疎砭之塗以豕膏六日已勿罌之

陳實功曰腋癰又名夾癰此起腋下皮色不變漫腫
無頭日久方痛乃生寒熱此乃肝經血滯脾經氣

凝共結爲腫此患難消終必作膿未破者柴胡清
瘍醫大全 卷十九 腋癰 顧氏秘書

肝湯已破十全大補湯去肉桂加香附陳皮急者
開之首尾温補切忌寒涼正宗

馮魯瞻曰腋癰者乃足少陽手少陰手厥陰三經也
此多得之於先天或肝火熾甚耳錦囊

心法曰腋疽一名米疽又名疔疽發於肱肢窩正中
初起之時其形如核由肝脾二經憂思恚怒氣凝
血滯而成腋癰又名夾肢癰發於腋際屬肝脾血
熱兼忿怒而成

腋癰門主方

驗方

葫蘆巴

焙研
三錢

木瓜酒調服

體氣門主論

陳寶功曰體氣一名胡氣俗呼狐騷氣又呼狐騷臭此因父母有所傳染者又有胡胎而受生者故不脫本來氣質凡有此者腋下多有棕紋數孔出此氣味當以五香散擦之以解其味 正宗

澄曰凡治腋臭用藥後必須穿新衣如穿舊衣務於日中將所着衣用灰水洗淨又泡去衣袖中臭味皆無氣味若洗不淨氣味在用其藥大槩藥無不驗多是衣服再作氣息所以不能斷根耳

傷醫大全

卷十九

體氣

四

顧氏秘傳

傷醫大全

卷十九

腋癰方

三

顧氏秘傳

體氣門主方

狐臭不可近身

大蜘蛛一枚用黃泥少加赤石脂並鹽杵熟作窩
放蜘蛛於內先以小火煨乾漸加猛火煨紅候冷
取出蜘蛛加輕粉一分研細和米醋調膏臨臥時
先將腋洗淨以膏搽之次早洗下黑汁惡物為效
即將此汁埋棄僻靜之所勿令染人萬不可穿舊
時衣慎之慎之

又方

瘍醫大全

卷十九

體氣方

三

顧氏秘書

大田螺一個以水養之伺其厝開以巴豆仁一粒
用針挑放螺內將螺拭乾仰放盞內俟螺化水取
擦腋下

無價散

水銀

蜜陀僧各二錢

枯礬四錢

共研干下以不見水銀星為度津唾調搽

又方

礪砂

密陀僧

銅青

白附子

辰砂

白明礬各等分

研細先以皂角水洗二三次後敷上不過三次
全好

又方

水銀

黃丹

礪砂

密陀僧

銅青

辰砂

明礬

白附子

白梅肉

共搗為丸擦之

腋臭鴉臭陰汗不能與人同行者

白礬

密陀僧

黃丹

各一錢五分

瘍醫大全

卷十九

體氣方

六

顧氏秘書

麝香五分

共乳如灰塵以醋在手心內調藥擦腋下經宿
兩時辰許再以香白芷煎湯洗之一日用一次

又方

枯礬二兩

密陀僧四兩

輕粉三錢

共乳細擦兩腋擦至數月見效半年全愈

又方

熟蒸餅一個劈作兩半摻密陀僧末一錢急挾在
腋下畧臥片時候冷棄之如一腋有病只用一個



傷醫大全

卷十九

內疚疽

七

顧氏秘書

內疚疽門主論

鬼遺方曰內疚疽發兩腋及臂並兩手掌中振寒熱
血噤乾飲多即嘔煩心惛惛脈盛六七八日診如
此可汗不汗死

缺盆疽



傷醫大全

卷十九

缺盆疽


八

顧氏秘書

缺盆疽門主論

王肯堂曰缺盆疽又名鎖骨疽生肩前陷中寒熱大
作飲食少進肩背拘急小水不利胸腹膨脹屬足
陽明胃經手少陽三焦經宜隔蒜灸若治之稍緩
必致潰爛是經少血多氣瘡口不合危篤者多矣
繩準
心法曰此疽又名蠹疽屬膽胃二經積熱而成

臍癰



傷醫大全

卷十九

臍癰

九

顧氏秘書

臍癰門主論

王肯堂曰臍癰俗名病藕包臍臂表裡俱腫赤色惟

肘節處差小故名藕包以內外分陰陽準繩

陳實功曰臍癰生在臍上連肩通腫長而堅硬者是

也正宗

薛氏曰臍癰在肩之下肘之上週匝漫腫色赤裏廉

外廉左右皆同由風溫或風火凝結而成初起狀

如粟米一撮亦有起一粒僵疙瘡者漸次焮腫紅

熱脊膿痛甚紅腫之外無暈者順有二暈者險三

四暈者逆

又曰藕包毒腫發臍內或臍外結腫一枚如桃如鷄

鴨卵者是也臍內屬手三陰經臍外屬手三陽經

宜加引經藥必效


傷醫大全

卷十九

臍癰

十一

顧氏秘書



脾癰

傷醫大全 卷十九 脾癰 士 顧氏秘書

脾癰門主論

申斗垣曰脾癰生肩真臍俞二穴乃手太陽小腸經
多血少氣乃脾受膏梁厚味所生也宜汗之經云
汗之則痞已 啟玄

李東垣曰脾癰又名膠疽在肩之後下腋之後外層
岐骨縫間左右同屬小腸經肩真穴由風火凝結
而成

又曰如生在肩前下腋前外之上骨縫開合空凹陷
中左右相同初起如椒子漸腫堅硬大如鷲卵按

之疼痛入骨屬心包絡經名曰樂疽乃血熱氣鬱
而成

傷醫大全 卷十九 脾癰 士 顧氏秘書



傷醫大全

卷十九

臂癱

五

顧氏秘書

臂癱門主論

玄機云在臂外為癱在臂內為魚肚發在臂上節腫連肩膈為臂風毒

王肯堂曰兩臂肘起至接骨下引手至小骨之上發癱痛此處雖實奈連大小筋骨舉動不便垂手多墜疼如膿深沉徹骨即傷筋脉拳縮不舒搗搗宜急用緩慢筋脉藥餌治之準繩

申斗垣曰臂癱毒乃心腎二經通於五指毒氣流走成串漏效立

心法曰魚肚發生於膈部之後垂肉處焮腫赤色屬心經青靈穴由火毒凝結而成

陳遠公曰人臂上忽然生瘡變成癱疽者亦陰癱也雖比頭面對口肩背稍輕然治不得法亦能殺人故須辨陰陽治之大約痛者陽症癢者陰症如陽症用三星湯一二劑便可立消若陰症此方又不可用必大補氣血佐以消痰化毒始可奏功勿以手足非心腹之疾不須補虛也夫陰主靜而手則至動者也至動生陰癱則動變靜矣反常之道也

傷醫大全

卷十九

臂癱

六

顧氏秘書

可不畏乎况動變靜又趨陰之道也陽趨於陰非生近於死乎欲陽返陰易欲陰返陽難誰謂手癱而小視之哉消癱還陽丹人參花粉生甘草各三錢白朮生黃芪各一兩肉桂乳香末各一錢金銀花二兩當歸五錢水煎服一劑癢變為疼矣二劑疼止三劑全消水鑑

按此方與七聖湯相同而意氣與所主各異也七聖湯治已潰之劑此湯乃治未潰之方蓋已潰者以生肉為先未潰者以護肌為主所以七聖湯中無乳香末天花粉二味此方用乳香末天花粉攻中有擁衛之功耳

胡公弼曰臂癱有因遠行涉水途路或冒風雨寒濕飲食不節亦能患此所受稍輕治以防風除濕丸主之 青囊

馮晉贍曰臂癱者前廉屬手陽明經後廉屬手太陽經外廉屬手少陽經內廉屬手厥陰經內之前廉屬手太陰經內之後廉屬手少陰經總緣經絡熱鬱風邪外干氣血有乖而生也當分經絡以用本經之藥為引行其氣血自愈 錦囊


李東垣曰臂 自肘至腕曰臂 外側屬三陽臂裏屬三陰俱由

傷醫大全 卷十九 臂癱 五 顧氏秘書

榮衛不週感受風邪逆於肉裏而成也已潰若拳縮而不能舒疼痛徹骨者乃潰深傷脉也屬逆

李東垣曰臂痛有六道各加引經藥乃驗以兩手伸直垂下大指居前小指居後而定之前廉痛者屬陽明以升麻乾葛白芷行之後廉痛者屬太陽以藜蘆羌活行之外廉痛者屬少陽以柴胡行之內廉痛者屬厥陰以柴胡青皮行之內前廉痛者屬太陰升麻白芷行之內後廉痛者屬少陰細辛獨活行之

骨蠱疽



傷醫大全 卷十九 骨蠱疽 六 顧氏秘書

骨蠱疽門主論

王肯堂曰骨蠱疽生手臂陽明經分生癰初如粟米漸大如赤豆痛不可忍旬日大如胡桃枯紫色若毒遊遍身拘急發搐嘔噦不食冷汗自出滑泄煩躁脉亂者死犯房勞怒氣者死此證乃七情不和積怒積憂積熱所致真元虛敗不能勝邪發之暴死之速乃陰虛極而火獨亢之故治當滋化源勿以揚湯止沸之法誤之 準繩

薛立齋曰骨蠱疽生臂外前廉大骨之後屬手陽明

大腸經由憂鬱暴怒凝結而成初如粟豆旬日大
如桃李腫硬疼痛若紫暈開大腐爛斑點串通肌
肉搗搦拘急多見七惡者逆

瘍醫大全


卷十九

疔瘰疽

七

顧氏

垂臂發



瘍醫大全

卷十九


垂臂發

六

顧氏秘書

垂臂發門主論

鬼遺方云垂臂發生於垂臂兩處發接骨下臂驚上
起如鷄鳴卵大皆由榮衛不調所致也喜患實處
而不透內亦宜急消或發穴早療



湯醫大全

卷十九


鵝癰

六

顧氏秘書

鵝癰門主論

寶漢卿曰生於臂撐上者名鵝癰紅腫作痛初起宜
灸若潰之必損命不可輕忽



湯醫大全

卷十九

石榴疽

三

顧氏秘書

石榴疽門主論

陳實功曰石榴疽生在肘尖上一寸是也此乃少陽
相火與濕熱並搏而成初起一點黃粟小泡根便
開大色紅堅硬腫如覆碗皮破泛出疊如椰子令
人寒戰儼同瘡疾初起即灸九壯內服蟾酥丸發
汗頂上以蟾酥餅貼之膏蓋腫處以金黃散敷之
九日後得膿為吉反此為凶均如癰疽調治 正宗

又曰此乃少陽相火與外濕煎搏而成也
薛立齋曰石榴疽生肘尖上一寸餘屬三焦天井穴

初起黃粟小炮根脚便覺開大色紅焮腫堅硬疼
痛腫如覆盆破翻如榴寒熱如瘡內三焦相火與
外濕相搏而成破後用菊花蕊煎湯洗之次以菊
花燒灰存性加輕粉少許兌勻敷之神效

傷醫大全

卷十九

石榴疽

三

顧氏秘書

冬爪串門主論

王肯堂曰冬爪串生兩臂膊間長二三寸紅赤高腫
疼痛而無處覓頭者是也照癰疽門施治準繩

傷醫大全

卷十九

冬爪串

三

顧氏秘書

冬瓜串門主方

驗方綱目

草蘇子搗膏貼之一夜自愈

又方 準繩

羊糞不拘多少蘇油全研敷

傷醫大全


卷十九

冬瓜串門方

三

顧氏

陳肝瘡



傷醫大全

卷十九

陳肝瘡

三

顧氏秘書

陳肝瘡門主論

申斗垣曰陳肝瘡乃手少陽三焦經生於左右臂上三五處如癩腫痛不可忍不可擦如有頭二七可刺無頭身熱虛硬面赤者二八日死又名蚤疽徹手生瘡變生於手三陰三陽經三年而死瘻甚者一月而死 啟玄

蠅蛄串



傷醫大全

卷十九

蠅蛄串

三

顧氏秘書

蠅蛄串門主論

陳實功曰此症得於思慮傷脾脾氣鬱結而成其患
 多生於兩手初起骨中作疼漸生漫腫堅硬不熱
 不紅手背及內關前後連腫數塊不能轉側日久
 出如豆腐漿汁串通諸竅日夜淋漓腫痛仍在患
 者必面黃肌瘦飲食減少惟調和氣血扶助脾胃
 其中可生者十有三如治之不善妄投寒涼尅
 伐損傷脾胃則活者鮮矣施治之法首尾宜用益
 氣養榮湯加味逍遙散主之 正宗

多生兩手

又曰是疾多生於氣血澆薄者蓋四肢屬脾土所以
 李東垣曰蠅蛄串所謂蠅蛄者重名也形似蜻蜓翅
 短而尾長善近風喜水故患此者不破則易已如
 潰不斷其膿水勢必貫串上延肩井下串臂肘一
 串二二則串三失治則膿水侵蝕筋骨慘痛此緣
 五臟受濕六腑蓄熱故外傷皮膚遂成斯毒

朱丹溪曰蠅蛄串生於臂內中廉屬包絡經由思慮

傷脾脾傷則運化遲故生濁液流於肌肉脾氣鬱

傷醫大全

卷十九

蠅蛄串

三

顧氏秘書

滯不舒凝結而成初起筋骨如中流矢疼痛漸增
 漫腫堅硬不紅不熱連腫數塊臂膊不能轉動日
 久其腫塊漸次潰破孔孔時流白漿內潰串通諸
 孔外勢腫硬不消膿水淋漓如漏虛證來添如面
 黃食少削瘦甚則午後寒熱交作而成敗症也初
 宜逍遙散次用人參養榮湯調和氣血扶助脾胃
 十中可保三四

肘後毒門主論

胡公弼曰肘後毒乃風毒流走氣血凝滯脈通五指
結成肘毒 青囊

易經大全

卷十九

毛 顧氏秘書

肘癰門主論

心法曰肘癰生於肘之圍遠由心肺風火凝結而成
形小為疔形大為癰

易經大全

卷十九

毛 顧氏秘書

手足魚臍瘡門主論

申斗垣曰魚臍瘡形似魚臍生於肘肘者是手少陰
心經多氣少血海靈道上是也生於小腿肚者是
足太陽膀胱經多血少氣承山飛揚二穴上下是
也 敬立

瘍醫大全

卷十九

魚臍瘡

三

顧氏秘書

腕癱



瘍醫大全

卷十九


腕癱

三

顧氏秘書

腕癱門主論

王肯堂曰腕癱生於手屈之處俗名手牛押屈此手
三陰經風熱聚毒之所致也 準繩
李東垣曰腕癱生於腕背而屬手三陽由風火凝結
而成乃皮肉澆薄之處若遷延日久不潰或漫腫
平塌既潰腐爛露骨者逆難於收功



瘍醫大全

卷十九

疔瘡

三

顧氏秘書

疔瘡門主論

陳實功曰疔瘡生於手之動脈處腫痛寒熱痛徹手

膊舉動不便者是 正宗

朱丹溪曰疔瘡生手腕裏面橫紋後前稍動脈之間

左右同乃肺經門戶若發疔或潰深則肺氣大泄

最為險候

癩瘡門主論

王肯堂曰癩瘡生於手足間相對如新茱萸癢痛折

裂搔破則黃水淋漓有孔如癩久而生虫 準絕

心法曰癩瘡生於指掌之中形似茱萸兩手相對而

生亦有成攢者初起黃白膿胞癢痛無時破流黃

汁時好時發極其疲頑由風濕客於膚腠而成宜

以潤肌膏搽之若日久內必生虫用藜蘆膏擦之

兼戒口味

瘍醫大全

卷十九

癩瘡

三

顧氏秘書

癩瘡門主方

藜蘆膏

苦參

藜蘆各一兩

猪油八兩熬枯去渣入松香一兩化開離火加
枯礬雄黃各一兩攪勻候溫塗之

傷醫大全

卷十九

癩瘡方

三

顧氏秘書

筋疽門主論

晉漢卿曰筋疽生臂之動脈間筋寄之上臂膊不能
屈伸若不速治潰爛筋脈必成廢疾

傷醫大全

卷十九

筋疽

三

顧氏秘書

脉骨疔門主論

申斗垣曰脉骨疔又名魚臍疔生在掌後橫紋陷中根行甚急亦有生肘臂間者紅者為疽黑者為疔有紅絲者是也宜用針先針斷紅絲後服追疔丸劑外敷絲瓜葉膏被玄王肯堂曰又名穿骨疽生於間使穴在掌後橫紋上三寸兩筋陷中屬包絡經蘊熱凝結而成又曰如潰穿骨縫從臂外側出膿者險

楊濟大全

卷十九

脉骨疔

五

顧氏秘書

脉骨疔門主方

絲瓜葉膏

絲瓜葉

韭菜葉

連鬚葱各等分

全入石臼內研如泥以熱酒沖和去渣服以搗病在左手敷左腋病在右手敷右腋脇下亦敷病在左足敷左膝病在右足敷右膝病在中敷心臍並用布縛候紅絲皆白為安如有潮熱亦用此法令人抱佳不可放手恐毒氣顛倒難救病人發顛跌倒亦難救

楊濟大全

卷十九

脉骨疔方

美

顧氏秘書

五指所屬臟腑穴道圖說

大拇指屬脾土脾氣通於口絡聯於大指通背右筋

天樞穴手列缺穴足三里穴

二拇指名曰食指屬肝肝氣通於目絡聯於食指通

於小天心穴足大谿穴

中拇指名曰將指屬心心氣通於舌絡聯於將指通

背左筋心俞穴手中冲穴足湧泉穴

四拇指名曰無名指屬肺肺氣通於鼻絡聯於無名

指通胸前膻中穴背後風門穴

小拇指屬腎腎氣通於耳絡聯於小指通目瞳人手

合谷穴足大敦穴

大腸筋在食指邊絡聯於虎口直到食指側巔

小腸筋在小指外邊絡聯於神門直至小腸側巔

穴在陽掌者

內牢穴在手心中

離宮在將指根下屬心火

坎宮緊與離宮對在小天心之上屬腎

陽池穴陰池穴在小天心兩傍

大橫紋在手掌下一道橫紋

浮心穴在大橫紋左邊

小天心在坎宮下中門

販門穴在大指下一塊其肉如板屬腎

腎經穴在大橫紋右邊 二人上馬穴在小指傍二四傍

水底穴在小指傍從指尖到乾宮外邊皆是屬腎

虎口穴在大食二指下處筋通三關處

四橫紋在小橫紋除去大指故名四

穴在指尖者

少商穴在大拇指尖

商陽穴在食指尖指根下一節橫紋是風關從掌上異宮來二橫紋是氣關三橫紋是命關

中冲穴在中將指尖 關冲穴在無名指尖

少冲穴在小指指尖 大腸穴在食指尖外邊

小腸穴在小指外邊

穴在陽膺者

總筋穴在大橫紋下指之脈絡皆總於此中四指脈總於此

內間史穴在總筋下寸許 天河穴在內間史下自一名內關候

曲池穴在手灣處一名洪池 經渠穴在浮心一邊內間史傍

列缺穴在天河傍下 魚脊穴在陽池傍邊一小窩處乃大指散脈處

三關穴在手膊上傍邊 六腑穴在手膊下傍邊

穴在陰掌者

外牢宮在手背正中

合谷穴在手背大指食指兩骨丫又相合之間

五指名目圖



傷醫大全

卷十九 手指穴


三

顧氏秘書

穴在陰膊者

威靈穴 在外牢宮右邊骨縫處
 一扇門 在食將二指下夾縫處威靈穴之上
 大陵位穴 在外牢宮下手背骨節處
 精靈穴 在外牢宮左邊骨縫處
 二扇門 在無名小指根兩夾縫中
 一窩風 在大陵位下手膊止與陽膊總筋下相對
 外間史穴 在一窩風下與內間史相對一名外間候
 斗肘穴 在手肘曲處高起圓骨處
 陽池穴 在外間史下
 肩井穴 在肩膊眼窩內

陽掌臟腑圖




傷醫大全

卷十九 手指穴


四

顧氏秘書


五指穴道圖



肘腕穴道圖



陰掌臟腑圖



傷醫大全

卷十九 手掌穴

聖

顧氏秘書

看手指察病順逆圖



傷醫大全

卷十九 手指穴

聖

顧氏秘書

鐵指疔門主論

申斗垣曰脾主四肢脾有濕熱則手足指腐爛成疔

是也如長夏六月間濕熱盛而諸物腐焉 啟玄

又曰宜服清脾胃利濕熱之劑

澄曰此症指頂如泡貫膿之後破爛流水當用燥濕

生肌散乾摻自效

湯醫大全

卷十九

鐵指疔

聖

顧氏秘書

鐵指疔門主方

驗方 啟玄

兒茶 五錢 雄黃 一錢 冰片 二分

研細米泔水洗淨搽之

湯醫大全

卷十九

鐵指疔

醫

顧氏秘書

代指



瘍醫大全

卷十九

代指

聖

顧氏秘書

代指門主論

王肯堂曰代指者先腫焮熱痛色不黯緣爪甲邊結

膿劇者爪皆脫落但得一物冷藥汁湯漬之佳爪

若筋之餘筋賴血養血熱甚注於指端故手指腫

熱結聚成膿甚則爪甲脫落此證類於指疽然無

蘊毒故色不黯雖久亦不殺人

準繩

陳實功曰手指忽腫痛者名為代指

正宗

薛立齋曰代指生指甲身之內三四日後甲面上透

一點黃色初起先腫焮熱疼痛應心宜用甘草朴

硝各五錢熬水浸洗卽瘥如甲面透黃卽係內膿
已成但無門得泄急用線針在指甲身就膿近處
挑一小孔膿方得出隨後輕手擠盡餘膿用黃連
膏貼之易愈若失治或敷涼藥以致肌肉冰凝膿
毒浸淫好肉爪甲潰空必然脫落宜用琥珀膏貼
之一兩月收功

瘍醫大全

卷十九

代指

聖

顧氏秘書

代指門主方

驗方

烏梅入醋浸研塗患處立瘥

又方

芒硝煎湯淋洗自潰

湯醫大全

卷十九

代指

聖 顧氏秘書

天蛇毒



湯醫大全

卷十九

天蛇毒

聖

顧氏秘書

天蛇毒門主論

王肯堂曰天蛇毒即天蛇頭不拘何指焮赤結毒腫痛有膿裂開有口唇如蛇頭狀是以名焉又名發指屬手厥陰心包絡經積熱所致雖黑色頑麻潰爛脫指者亦不死 準繩

陳寶功曰天蛇毒即蛇頭疔乃心火旺動攻注而成其指頭腫若蛇頭赤腫焮痛疼極速心甚者寒熱交作腫痛延上初起宜灸蟾酥餅膏蓋 正宗 馮魯瞻曰天蛇頭者手指毒瘡各隨經絡而生疼痛

殊甚宜審其經絡投以解毒和血加以引經之藥
治之 錦囊

寶漢卿曰此症如膿未熟不可刀開針撥不然則腐
肉起發難醫

胡公弼曰天蛇頭患久有出多骨者如初起紫黑者
必死須割去其指方可醫治治同脫疽 青囊

汪省之曰手三陰三陽經亦有氣血多少不同生於
手之十指名敦疽四五日潰膿可刺者生如不潰
無膿黑色過節者死不可治也 理例

傷醫大全 卷十九 天蛇毒 吳 顧氏秘書

王肯堂曰五指頭生疽名曰敦疽係臟腑積熱治不
可緩 準繩

又曰手大指疽發指頭小點如粟漸大如豆或如桃
李或青或紫乍黃乍白乍黑或癢或麻木不痛

大痛徹心此名調疽屬手太陰肺經積毒毒盛者
宜截去了四日刺得血膿者生得黑血者死毒氣

攻心嘔吐不食膨脹者死齒縫出血者死 準繩

朱丹溪曰蛇頭疔在手指頂堅硬有頭十指同自筋
骨發出根深毒重初起小炮色紫疼痛堅硬如疔

者是

王肯堂曰天蛇毒在手指頂悶腫無頭十指同自肌
肉發出其毒稍輕夫手指雖各有專經然俱兼脾
經火發而成但手指係皮肉澆薄之處不宜艾灸
亦不宜開早若候灸開早以致皮裂肉努翻出疼
痛倍增不能速愈慎之

又曰調疽生於手大指由肺經積熱而成初如粟茸
漸腫如李青紫麻木痛癢徹心六日刺破出稠膿
鮮血者吉出黑血者險若黑腐延蔓不痛者名斷

傷醫大全 卷十九 天蛇毒 李 顧氏秘書

指屬逆當如足部脫疽治法

澄 曰凡手指患天蛇毒如內膿已成脹痛者用針挑
放務須從下往上挑破切不可從上向下挑否則
毒傳下節潰爛俗謂戳了蛇頭蛇頭往下縮也

又曰凡指頭潰後切忌用力拿重如操作用力則腐

肉必出難以速愈足指潰後俱忌行走否則亦然

又曰凡傭工操作之人指皮粗厚每每膿已脹急不
能穿潰常見通手化膿凡遇此等人須用針向指
尖上挑破出膿不可向下破如誤向下破每每毒

流下節遂有脫指之患不可不知

又曰凡潰後須將老皮剪去免藏毒水浸傷良肉

又曰每見當砭不砭膿已脹過以致甲脫肉無惟存

筋骨用玉紅膏搽上生肌只有指尖難以長皮復

原如舊須於生肌散內加珍珠末搽上其皮即長

合矣脚尖不長皮亦照此法

澄 治手指足指潰後形如蟬殼者須用利剪剪去死

皮方可上藥不然皮中蓄有膿水難乾雖用珍珠

散異其收功何異隔靴抓癢決難速愈

瘍醫大全 卷十九 天蛇毒 至 顧氏秘書

天蛇毒門主方

蛇頭疔

輕粉 銀粉 銅綠各等

研細灌入猪膽內調勻將指套入膽內用線輕

又方

用艾炷隔蒜灸之以雄黃白芷各等分爲末全大

又方

蒜搗爛敷之

瘍醫大全 卷十九 天蛇毒 至 顧氏秘書

又方

生栗去殼去衣搗爛敷之

又方

黑黃牛糞做餅晒乾入罐內燒烟薰之極效

又方

白菓葉入燈窩油內浸透貼之腐盡肌生

又方

黑豆天南星研細滴醋調敷

又方

人糞雄黃全搗髮在患處即愈

又方

生雞蛋一個一頭打一洞入雄黃細末五錢將患指套入浸之拔去毒立止痛

又方

生雞蛋三個一頭打一洞每個入雄黃細末一錢和勻將痛指插入待熱換之立刻止痛

苦爪膏

陳伯迪

苦瓜即癩葡萄不拘多少搗爛以鹽酒浸收不可太稀

愈久愈好凡遇蛇頭毒取一匙敷患上外以絹縛

瘍醫大全

卷十九

天蛇毒

毒

顧氏秘書

過一夜痛止即愈

水蛇套

明醫集

治天蛇毒痛不可言

取活水蛇一條取中段去骨以蛇皮肉如指長敷患指上外用紙包頓覺半身涼快痛止腫消即愈數日後去皮指上蛇形宛然

雄黃散

治蛇頭疔初起紅腫發熱疼痛微心者宜用

明雄二錢

輕粉五分

蟾酥二分

微焙

冰片一分

共為末新汲水調塗紙蓋日用三次極效

蜈蚣散

大蜈蚣一條 全蠍七個 雄黃三錢

共為末用鷄子清調敷患處外以猪膽皮套上即愈一方無全蠍

又方

雄黃一錢 蟾酥一分

研細用蜈蚣一條共搗如泥敷患處空頂立愈

瘍醫大全

卷十九

天蛇毒

毒

顧氏秘書

又方

蜈蚣 雄黃各五分

研細裝入猪膽內套指上裝緊立愈

又方

白蘿蔔一段挖空入雄黃末三分蒸半熟套指上

愈

又方

雄黃研細猪膽汁調塗

又方

生鴨蛋二個 蜈蚣一條

分裝兩蛋內攪勻套指上候熱再換一個即消

雄黃散

蛇頭疔

明雄二錢 輕粉五分 蟾酥二分

冰片一分

研細新汲水調濃重湯燉溫敷上薄紙蓋之

雄蠟散

天蛇毒

瘍醫大全 卷十九 天蛇毒 五 顧氏秘書

牡蠣煨四錢 明雄二錢

研細蜜水調濃重湯燉溫塗患上止痛日用五

六次

蛇頭疔

蘇油脚一錢 酒麴 血竭各一錢

百草霜少許

和勻敷上以布護好



瘍醫大全 卷十九 蛇節疔 五 顧氏秘書

蛇節疔門主論

王肯堂曰手指節間結腫燉赤又名病繭又名蛇節

疔又名釘節天蛇又名病蛇節治與天蛇頭同

李東垣曰蛇節疔生手指中節骨節又名蛙節疔繞

指俱腫其色或黃或紫由火毒凝結而成

蛇眼疔門主論

朱丹溪曰蛇眼疔生於指甲傍尖角間形如豆粒色紫半含半露硬似鐵釘乃火毒凝結而成

瘍醫大全

卷十九

蛇眼疔

五

顧氏秘傳

蛇背疔門主論

王肯堂曰蛇背疔生指甲根後形如半瓊色赤胖腫乃火毒凝結而成

瘍醫大全

卷十九

蛇背疔

五

顧氏秘傳

蟻螂蛙門主論

陳實功曰體弱之人手指節中不紅不熱腫如蟬腹
口久方痛痛久方腐腫仍不消此乃手少陰痰氣
凝滯而成用蟾酥餅膏貼漸作稀膿近者一載遠
者三年內服補劑免變癆瘵之症正宗

瘍醫大全

卷十九

蟻螂蛙

堯

顧氏

鰍肚疔門主論

王肯堂曰鰍肚疔卽中節疔生中指中節絕骨之處
由辛熱風濕之毒上干心經故發此毒乃心經受
症也但中指通連五指疔色紫黑者其毒必惡易
於攻心指節裡面色青黃心一受毒其人昏迷必
死其指必落務用護心丹時時呷之以護其心再
服蠟礬丸護膜追疔奪命丹追疔爲主準繩

李東垣曰泥鰍疽生在手指一指通腫色紫形如泥
鰍焮熱痛連肘臂由火毒凝結而成

瘍醫大全

卷十九

鰍肚疔

李

顧氏秘書

又曰蛇腹疔生十指中節裏面形如魚肚色赤疼痛
乃火毒凝結而成

衝要節門主論

小指節近掌處腫痛焮赤名曰衝要節 正宗

瘍醫大全

卷十九

衝要節

全

顧氏

紅繭疔門主論

王肯堂曰紅繭疔因心火太盛傳於脾經故毒發於四末若水珠若水泡與血藏音城皮起也無異多生手足胸背之間今人不識偽稱火丹或認斑瘡養成大患初起紅色宜用針針去惡血內服清心敗毒黃連丸之類如紫色則危灰黑必死根行甚速宜針惡血以緩毒勢治同疔法準繩

瘍醫大全

卷十九

紅繭疔

全

顧氏

癩疽門主論

王肯堂曰癩疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟極者如梅李或赤或白或青或黑其狀不定有根不浮腫痛傷之應心根深至肌經久便四面悉腫炮煎熟紫黑色能爛筋骨若毒散逐脉入臟殺入南人名為揚着毒厚肉處即割去之亦燒欬烙之令焦如炭或炙百壯其病喜着十指故與代指相似人不識之呼為代指不急治之亦逐脉上入臟殺人南方人得之皆斬去其指初指頭先作黯

癩醫大全

卷十九

癩疽

奎

顧氏秘書

泡後始腫赤黑黯癢痛入心是也

準繩

陳實功曰癩疽又名蛇瘡凡川廣烟瘴地方多有之初出先作紅點次變黑色腐爛筋骨小者如粟如豆大者如梅如李發無定處初起蟻酥餅膏蓋如紅腫遊走不定用真君妙貼散加雄黃敷之自然截住破後如脾胃虛弱補托不應惟出清水穢汁者俱為不治

正宗

馮魯瞻曰癩疽者其發有數種小者如粟如豆大者如梅如李青黑赤白變易不常或臂或腎或口齒

或肚臍發無定處然大槩多見於手指之間根深入肌走臂遊腫毒血流注貫串筋脉爛肉見骨出血極多若至狂言煩躁悶亂者皆毒氣攻心之候也不治

錦囊

澄曰癩疽隨處可生川廣烟瘴地方有之疼痛徹心不止腐爛筋骨潰破膿如豈汁今日拭乾次日膿汁復滿愈而復發

癩醫大全

奎

顧氏秘書

癩疽門主方

準繩秘方

射干 甘草 枳實

升麻 乾地黃 黃芩各二兩

犀角陸分 前胡三分

水五升煎三升入大黃一錢一沸去滓入麝香二分分三服瘥止不限劑數神效

癩醫大全

卷十九

癩疽

奎

顧氏秘書

手指怪症門主論

浙有士人一指忽隱痛不可忍其中指甲間生一珊瑚高二寸血色氣縷成海市人士戰馬城廓戈矛人與自已皆見嗜飲燒酒醫謂火所吐幻景服以異法大黃稍減久服遂絕然火何得成此異法

癩醫大全

卷十九

手指怪症

奎

顧氏秘書

丫癱



楊醫大全

卷十九

丫癱

李

顧氏秘書

丫癱門主論

王肯堂曰五指丫處結毒焮腫者俗名鴉叉又名病
蟹叉 準繩

申斗垣曰手丫毒俱是手經手背丫是手三陽經手
掌心了是手三陰經受症當分何經加引經藥治
之 效玄

汪省之曰手三陰三陽經亦有氣血多少不同生於
指了當分經絡治之 理例

朱丹溪曰手丫發生於手丫岐骨縫間除大指合谷

穴名合谷疽其餘指丫生毒皆名手丫發初起如
粟色紅漸大如荳焮熱潰後疼痛不止者俟膿塞
提出其痛方止

楊醫大全

卷十九

丫癱

李

顧氏秘書

虎了毒



瘍醫大全

卷十九

虎了毒

究

顧氏秘書

虎了毒門主論

王肯堂曰虎口疽一名虎了毒又名合谷疽又名了

刺毒又名臂蟹毒又名手了發又名病蟹又此手

陽明大腸經風熱積毒之所致也 準繩

陳實功曰合谷疔俗名虎口百了是也此患多係疔

瘡泡起亦有紅絲走上故有疔名此手陽明胃經

濕毒攻注作癢初起挑破蟾酥餅膏蓋金黃散敷

之必須內外消托為主 正宗

胡公弼曰虎口毒即了刺毒最能爛手毒歸肝脾亦

致殺人 青囊

又曰赤焮熱痛更有虎口脹裂者

薛氏曰此患多生大指次指連界處忽生脈毒痛不

可忍若不早治必爛人手名曰拍蟹毒

朱丹溪曰虎口疽生 合谷穴 在手大指次指岐骨間屬

大腸經濕熱凝結而成一名了又毒初起如豈漫

腫色青木痛堅硬若初起黃粟小飽癢熱焮痛根

深有紅線上攻腋內即名合谷疔

瘍醫大全

卷十九

虎了毒

半

顧氏秘書

虎丫毒門主方

初起

鮮蟹搗爛敷之其毒可散



手心毒

瘍醫大全

卷十九

手心毒

三

顧氏醫書

手心毒門主論

王肯堂曰手心毒焮赤腫痛俗名病穿掌又名穿窟
天蛇又名貧子孟若偏於掌邊者名穿邊天蛇又
名穿埂天蛇亦名鵝癰此手厥陰心包絡經勞官
穴乃積熱所致 準繩

李氏曰手心毒一名擊珠毒

陳遠公曰有手心中忽紅腫高突變成一疽疼痛非
常日夜無間世所謂擊疽也此症多是冤家相尋
內外治療往往不能收功有流血至死者似乎不

必治也然有症無方安見吾道之大乎苟能懺悔
 怨艾安在不可救此疽雖是冤孽亦因病人有火
 熱之毒乘機竊發也消火熱之毒何不可奏功耶
 但火熱非起于一且而解毒難憑于小劑蓋毒成
 于熱熱起于火火之有餘終是水之不足不大料
 以滋水惟小劑以滅火安得取勝乎必大用補水
 之劑少佐解毒之味則自愈耳釋擊湯元參一兩
 金銀花二兩 生地一兩 當歸一兩 紫花地丁五錢
 貝母二錢 水煎二劑疼止已潰者又服四劑未潰
 者又服一劑無不全愈愈後仍須懺悔則無後患
 否則恐變生他症非方之過也此方滋水以治火
 補正以解毒自居于無過之地又何擬議哉 水鑑
 陳寶功曰手心毒一名穿板疔又名擎珠又名癩疽
 乃心火熱毒也是於五心痛不可忍其瘡如泡色
 如血赤外形雖小內有熱毒發於心掩者難治發
 於手足心者可療如在手掌心敷藥當從手腕敷
 起如在足心須從脚脛胫骨四圍敷住以截血路
 免毒上攻 正宗

瘍醫大全

卷十九

手心毒

三

顧氏秘書

胡公弼曰右手心毒乃太陽陽明二經受症氣流足
 厥陰經左手心毒乃少陰太陽二經受症氣流足
 太陰陽明經或因七情內傷氣血凝滯亦能患此
 青囊

瘍醫大全

卷十九

手心毒

三

顧氏秘書

鷺掌風門主論

陳實功曰鷺掌風乃手陽明胃經火熱血燥外受寒涼所凝以致皮膚枯槁初起紫斑白點久則手心皮膚枯厚破裂不已 正宗

又曰時瘡餘毒未盡亦能致此

申斗垣曰楊梅瘡食鷺肉亦生 敬立

心法曰此症手掌及指上層層剝皮血肉外露

瘍醫大全

卷十九

鷺掌風

毒

顧氏

鷺掌風門主方

二礬湯 正宗

白礬

皂礬

各四兩

孩兒茶 五錢

栝葉

八兩

用水十碗同上藥煎數滾候用先以桐油搽抹患上用桐油紙撚點着以烟焰向患上薰片時方將前湯乘滾貯淨桶內手架上以布蓋得湯氣薰之勿令泄氣待微熱傾入盆內蘸洗良久一次可愈七日手忌下湯水永不再發此方越

瘍醫大全

卷十九

鷺掌風方

毒 顧氏秘書

重越效如輕者不可用

又方 秘錄

川烏

何首烏

蒼朮

赤芍藥

草烏

地丁花

防風

天花粉

荆芥

各一兩

陳蘄艾

四兩

煎湯薰洗

膏藥 濟生

治鷺掌風指甲變厚及風癩頑癬死肌麻痺

鳳仙花 連根花 蒼耳葉 嫩頭各

血餘 三兩 鹿角屑 生剉 絡石

虎骨 百部 茜草

剪草 各二兩 人指甲 五錢 穿山甲

羌活 龍骨 麻黃

蕪艾 威靈仙 各一兩

右用麻油一筋全熬至滴水不散絞去渣離火

再下鉛粉四兩銀硃四兩黃蠟二兩乳香二兩

和勻磁器收貯臨用隔湯炖化攤貼

瘍醫大全 卷十九 驚掌風方 卷 顧氏秘書

又方

先以油核桃擦手足患處爐內焚常山薰之上用

青布蓋好薰常山一筋七日手不下水褪去老皮

永不再發

又方

灰條草搗汁擦十數次

又方

茄花帶露水摘下擦數次

又方

五倍子研末桐油調搽用炭火烘之二三次

又方

瓦花頭髮搗爛用手搓之

又方

鳳仙花 一椀 蒜蒼草 一兩 蟬蛻 三錢

煎湯薰洗

又方

白豌豆一升全棟樹子煎湯早中晚薰洗二七全

愈

瘍醫大全 卷十九 驚掌風方 夫 顧氏秘書

又方

鮮核桃外面青皮全鴿子屎煎水頻洗

又方

鮮嫩芭蕉葉煎洗十餘次

又方

硃砂 明雄黃 各一錢 輕粉 五分

共研細用桐油調塗患處以微火烘一炷香為

度年遠者五七次年近者二三次即愈屢試屢

驗

又方

斷艾四五兩水煎入大口瓶內上用麻布蓋之以
手心放瓶口薰之冷則再熱再薰數次即愈

又方

鉛彈子如胡桃大一個每日在手內搓弄搓熱將
鉛彈子握緊晝夜不歇如此十餘日即愈但不能
除根

鴛掌 並治四灣瘋 劉氏秘方

土木鱉 淨肉 苦 參 各一 白附子 五錢

湯醫大全 卷十九 鴛掌風方 羌 顧氏秘書

輕粉 三錢

各研細和勻生桐油調聽用 先用馬齒莧煎

濃湯先薰後洗仍將馬齒莧擦一二次 隨用

樟木屑絲瓜藤大蒜稽大皂焚燒灰薰之 薰

過用紅升丹川貝母末各一錢以筆管慢小篩

羅裝藥然後以桐油掃患處不可過多潤過即

將小篩羅內藥篩在患處即將前桐油調藥敷

上約一銅錢厚仍以前樟木屑等烟薰之令熱

如太熱則遠些薰藥將乾過一夜次日洗去不

過二次無不全愈

鴛掌風 鄧重光

大麥芒燒烟薰手掌七日不可見水即愈

又方

牡蠣 煨 密陀僧 各二錢

共研細桐油調搽炭火炙之

又方

豆腐沫熱洗

又方

湯醫大全 卷十九 鴛掌風方 全 顧氏秘書

生桐油搽以松毛燒烟薰

又方

川烏 白附子 草烏

僵蠶 銅綠 密陀僧

輕粉 膽 礬 各一 麝 香 三錢

共研細末先用生附子切厚片於鴛掌瘋上以

艾圓灸之再用葱汁調敷

又方

猪胰一具 去油勿 經水 花椒三錢用温酒同浸二三日

取膜不時擦手微火烘之

又方

白砒三錢打如豆粒用麻油一兩熬砒至黑去砒
用油擦手微火烘之不過二三次即愈

又方

葱五六根搗破花椒一把全入瓦罐內入醋一碗
再用滾水冲入薰洗數次即愈

又方

穀樹葉煎湯温洗以火烘乾隨用栢油擦之用火

瘍醫大全

卷十九

驚掌風

全

顧氏秘書

烘乾又洗又烘如此日行三次不過五日自愈

又方

大黃鱧一條去頭尾腸切一寸長以香油一兩入
鍋內將鱧魚豎起熬至魚枯去魚取油放磁蓋內
用穿山甲燒存性研末少許調搽患上以炭火炙
至手癢而痛又搽又炙三次自愈

馬蟻窩門主論

證曰馬蟻窩乃無意脚踹馬蟻而成或風濕結成多
生手足形似蟻窩儼如針眼奇癢入心破流脂水
宜用穿山甲外敷亦有手背手腕生者

瘍醫大全

卷十九

馬蟻窩

全

顧氏秘書

馬蟻窩門主方

錫灰膏 陳楚陽

治馬蟻窩血瘋麻瘡癢極不可忍者

錫 灰 飾取細者 二錢五分 輕粉 一錢五分 葱 白 一根

全生健猪油去皮膜搗膏用刷子脚搽瘡上外以三退紙封之三日全愈

三退紙

蟬 蛻 鳳凰衣 各三錢 密陀僧 六錢

桐油八兩熬成膏以刷蘸膏於連四紙上陰乾

瘍醫大全

卷十九 馬蟻窩方 顧氏秘書

用時照瘡大小剪貼三日一換換三次全愈如癢極搽錫灰膏收功

又方

密陀僧 三錢 百草霜 風化石灰 各五錢

徽酒麴 一兩 五錢

共為末先以松毛鬚搗爛煎湯洗透再用松毛鬚燒烟薰之任其流水拭乾再以桐油調敷頻用桐油潤之每日一換七日除根

又方

大黃

研末桐油調敷

又方

桐油篋蓋包患處數夜即效

馬蟻窩並癢極成片之瘡 吳越干

輕 粉 二錢 穿山甲 一兩新瓦上炙剪成 豆大再用土炒成珠

共研細以甘草湯洗淨用熟雞蛋黃炒出油調搽

指縫搔癢成瘡有竅出血不止

瘍醫大全

卷十九 馬蟻窩方 顧氏秘書

多年糞桶篋種燒灰敷之

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

股痛門主論

陳寶功曰股痛乃風寒氣鬱於皮毛致血不榮於肌
表謂皮槁則多痛手足似無皮之狀是股苦生焉
可將葱湯浸洗良久隨以潤肌膏擦之就煖勿見
風冷自愈如每逢冬時即發者須預於三伏時晒
搗爛大蒜間擦三次永不復發經曰寒因熱用其
理甚明 正宗

王肯堂曰股痛因暴寒侵襲肌膚之中寒鬱不行偶
觸衣物或以手捺疼痛連心儼如無皮之狀是也

瘍醫大全 卷十九 股痛 全 顧氏秘書

股痛門主方

潤肌膏

當歸身 二兩 粉甘草 一兩 白芷 八錢
血竭 六錢 紫草茸 五錢 白蠟 二兩
真麻油八兩先將當歸身白芷甘草熬深黃色
濾去渣再入血竭熬化又濾淨再入紫草白蠟
片畧沸十數滾即起火濾去紫草渣其色即鮮
明可愛若熬過則紫黑矣

驗方

胡椒四錢燒酒四兩共入磁盃內重湯燉煮以軟
綿蘸酒溫湯患處即愈

瘍醫大全 卷十九 股痛 全 顧氏秘書

手足破裂門主論

陳實功曰手足破裂乃乾枯之象氣血不能榮養故也此因熱體驟被風寒所逼凝滯血脈以致皮膚漸枯漸槁乃生破裂日襲於風風熱相乘故多作痛以玉肌散潤肌膏潤之內服當歸飲子 正宗

瘍醫大全

卷十九

手足破裂

全

顧氏秘譜

手足破裂門主方

手背皴裂

大楓子肉搗泥塗之

瘍醫大全

卷十九

手足破裂

全

顧氏秘譜

一第... 丹黃參日... 1 反文小

屬手少陽三焦經中渚穴在手小指次指陷中液門穴在手小指次指本節後間

手發背



瘍醫大全

卷十九

手發背

全

顧氏秘書

手發背門主論

王肯堂曰手發背初生如水刺無頭腦頑然滿手背腫滿後聚毒成瘡深入至骨是也準繩

鬼遺方曰俗名蜘蛛背

李氏曰手背腫毒乃三陽經風熱鬱滯而發十書

申斗垣曰手發背即手背毒乃心肝二經風熱相乘氣血壅聚而成初起增寒惡熱昏悶疼痛嘔逆先宜發表解毒啟玄

胡公弼曰大抵此症多由惱怒七情皆能動火各經

之火不同當分別治之青莖

又曰如潰後出血發熱語宜清心流氣飲不應乃熱入血室宜加減小柴胡湯血止而熱亦解矣

汪省之曰手發背發於手背中渚液門二穴乃手少陽三焦經多氣少血初起寒熱或作嘔或作癢痛理例

朱丹溪曰手發背由風火與濕凝滯而成初起形如芒刺漸覺疼痛高腫紅活焮熱潰速為膿者順若漫腫堅硬無紅無熱潰遲為疽其證形勢大小但

瘍醫大全

卷十九

手發背

全

顧氏秘書

潰深露筋骨者難全

王杏菴曰病蝦生於手背屬手三陽經積熱毒盛而成形勢如蝦高壘赤腫疼痛初宜黃連消毒飲外用食鹽酒糟香油全炒令香淬以滾湯淋洗患處即消

手發背門主方

紫桐散 李常山

專敷手足發背止痛消腫

梧桐葉

鮮的搗爛或初秋採取陰乾

紫花地丁 各等分

研細砂糖調敷

手發背 呂氏秘方

生甘草

炙甘草

大貝母 各五錢

皂角刺土炒

穿山甲炒黑

知母 各二錢

半夏 一錢五分

瘍醫大全

卷十九 手發背

九十

顧氏

姜引酒水同煎二劑全愈

瘍醫大全目錄

卷二十

胸膈膈腹部

甘疽門主論

狗脊門主論

肺疽門主論

腫中疽門主論

井疽門主論

心漏門主論

瘍醫大全

卷二十 目錄

一 顧氏

赤膈類傷寒門主論

小兒龜胸門主論

脾發疽門主論

胸前蜂窩發疽門主論

枯筋箭門主論

乳癰門主論 附牙

乳頭陷下門主論

乳頭破裂門主論 附牙

乳血門主論

乳汁自流不禁門主論 附方

乳疔門主論

乳疔門主論 附方

乳巖門主論 附方

乳少門主論 附方

乳汁閉塞脹痛門主方

回乳門主方

斷乳門主方

腕疽門主論

湯醫大全

目錄

二 顧氏秘書

血亂瘡門主論

傳心疽門主論

脇痛門主論 附方

脇疽門主論 附方

內發丹毒門主論

俠熒疽門主論

骨莖瘡門主論

黃瓜癰門主論

腰帶癰門主論 附方

幽癰門主論

中腕疽門主論

赫癰門主論

小兒臍汁不乾門主論 附方

小兒臍風門主論

臍突門主論 附方

爛臍門主論

臍中出血門主論

臍上疽門主論

湯醫大全

卷二十

目錄

主

顧氏秘書

臍癰門主論

臍漏門主論

肚皮青黑門主方

肚癰門主論 附方

小腹癰門主論

緩疽門主論

瘍醫大全卷二十

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東

男 權燮用和

全枝

胸膈臍腹部

自胸膈起至乳房臍腹脇肋止凡一切癰疽疔毒皆
彙於此部中以便檢閱參治

易醫大全

卷二十

胸膈部

顧氏秘書

甘疽



瘍醫大全

卷二十

甘疽

二

顧氏秘書


甘疽門主論

靈樞云甘疽發於膺膺胸兩傍高起亦謂之臆色青其狀如穀實

瓜藪常苦寒熱急治之去其寒熱不急治十日死

死後出膿

心法曰此疽生於乳上肉高聳處屬肺經中府穴之
下無論左右皆由憂思氣結而成



胸發門主論

申斗垣曰胸發發於玉堂

穴在紫宮下一寸 膈中一分 又各玉英

元兒穴在玉堂下

中庭穴在膈中下 鳩尾穴在蔽

一寸六分兩乳間 言其骨垂下如鳩形故名 臆前蔽骨下五分 人無蔽骨者從岐骨之際下行一寸是也 等穴

皆任脉之絡名陰脉之海乃人身之子午也急早

內托防毒歸心傷膜者死

敬立

注省之曰中庭疽在乳之中央任脉之經

理例

薛立齋曰胸發生於正胸堂去結喉三寸與心窩不遠乃手足六經交會之所其患最凶喪人性命宜

速治若三四日失治則皮開肉裂甚可畏也若使長大百不一救宜用牛黃熊膽研細香油調塗四邊茲上以免開花如痛用乳香沒藥為末鋪粗紙內外以青布片捲好蘸清油點著在瘡四圍照之痛自止矣內服清熱護心祛毒鎮心湯劑若開花穿穴神仙莫救

肺疽



湯醫大全

卷二十

肺疽


五

顧氏秘書

肺疽門主論

申斗垣曰肺疽即天火瘡乃任脉之經當胸而生在紫宮玉堂之穴十日可刺膿水黃白色者可治如無膿漸大傍攻上硬下虛自破流水不絕咳唾引痛者死 啟玄

膈中疽



湯醫大全

卷二十

膈中疽

六

顧氏秘書

膈中疽門主論

王肯堂曰膈中疽生心窩上兩乳中間屬任脉經膈中穴蓋膈中為氣之海氣所居焉能分布陰陽若臟腑陰陽不和七情不平則發此證稍遲則潰爛惡證多者難治 準繩



瘍醫大全 卷二十一 井疽 七 顧氏秘書

井疽門主論

靈樞云發於胸名曰井疽其狀大如豆三四日起不治下入腹不治七日死矣

王肯堂曰心窩生疽初起如黃豆肉色不變名曰井疽又名穿心冷癭若冷氣攻心精神恍惚嘔吐冷痰惡聞食臭毒氣內陷腹脹滿者不治若心躁如火肌熱如焚不時盜汗唇焦舌乾黃色渴飲冷水者是正候也 準繩

申斗垣曰井疽又名心漏疽又名穿心毒最為難治

有經年不愈者乃多食生冷死厭之物惡毒積久內犯心包絡故外發於心掩也乃心胃兩經受症治同癰疽法 啟玄

汪省之曰井疽乃任脉之經在鳩尾穴狀如大豆三四日間若不早治十日必死外發者生內陷者死 理例

瘍醫大全 卷二十一 井疽 六 顧氏秘書

心漏



易醫大全

卷二十

心漏

心漏門主論

陳遠公曰有胸間生瘡因不慎酒色致成漏竅生數
頭流血久則神形困憊腰痛難伸行同偃僕人以
爲心漏也誰知乃腎虛成漏乎夫心腎本相通也
心氣必得腎氣以相生腎氣必得心氣以相閉心
漏之成成於腎氣之泄也安可不急治腎氣之衰
乎然治腎而心氣不閉則補腎無益蓋有出氣而
無止氣耳或云漏瘡多成於濕熱今補腎而不閉
心竅則漏不愈閉心竅而不去濕熱只治心腎漏

亦不能愈也然漏亦不同漏在他處者可泄其濕

熱在胸間者不可泄濕熱也蓋漏既成於腎虛腎

虛則寒而非熱也腎虛者腎水虛而非邪水盛也

補直陰而邪水自消溫腎寒而濕熱自退耳用溫

腎丹鹿茸二具附子二枚人參青鹽各二兩瓦松

二枚紅棗四兩煮棗搗丸每空心酒下三十九服

半月腰疼少減服月餘而漏愈矣 水鑑

此方奇在鹿茸既能益腎中之水火更能補心中

之缺陷加以附子之辛熱則無經不達引鹿茸直

入心腎以與其空竅青鹽者鹹以軟堅也漏多孔

竅流血必多血得鹽則止也瓦松者消濕熱於無

易醫大全

卷二十

心漏

形心漏雖非濕熱然未可少有留存則孔竅難塞

故兼用之以防其變又恐氣虛不能運化加參以

生氣於心腎之間助茸附之

力通達上下尤易成功也

馮魯瞻曰胸前有一孔常出血水名曰心漏用嫩鹿

茸去毛酥炙附子炮去皮臍鹽花共爲細末棗肉

爲丸每服三十九空心酒下兼治腎虛腰痛如神

錦囊

赤膈類傷寒門主論

凡胸膈赤腫疼痛頭疼身痛發熱惡寒此名赤膈傷
寒宜荆防敗毒散加瓜蒌子黃連黃芩紫荆皮元
參赤芍升麻白芷如症有表復有裏胸膈赤腫疼
痛者防風通聖散加黃連瓜蒌子紫荆皮如表證
已退大便秘實胸膈腫痛者涼膈解毒加瓜蒌子
枳殼桔梗紫荆皮赤芍又宜稜針刺腫毒出血如
半表半裏胸膈腫痛者柴胡枳桔湯加瓜蒌子紫
荆皮赤芍

傷醫大全

卷二十

赤膈傷寒

十一

顧氏秘書

小兒龜胸門主論

龜胸者胸高脹滿形如覆掌多因乳母酒麪五辛無
度所傷或夏月煩燥熱乳宿乳與兒益肺氣最清
為諸臟華蓋水氣泛溢肺為之浮日久痰滯則生
風熱一觸諸辛肺氣昏亂是以唇紅面赤咳嗽喘
促澹瀉蒸熱由此而成疔由疔而成龜背矣如藥
後而復作傳變目睛直視痰涎壅上或發搐者難
治

傷醫大全

卷二十

小兒龜胸

十一

顧氏秘書



瘍醫大全

卷二十一

脾發疽


三

顧氏秘書

脾發疽門主論

王肯堂曰脾發疽生心窩下兩傍屬脾經食竇穴無論左右皆生由多食煎燻醉飽入房以致毒聚脾經而成稍遲則潰傷脾膜膿如蟹沫者死服藥而嘔飲食不進者死準編
心法曰此疽因過飲辛熱藥酒積火成毒亦生

胸前蜂窩發



瘍醫大全

卷二十一

蜂窠發

四

顧氏秘書

胸前蜂窠發門主論

申斗垣曰蜂窠發在胸乳間或左或右或雙發在或中穴在膺府下一寸六分陷中神藏穴在或中下一寸六分靈墟穴在神寸七三穴乃足少陰腎經所主心熱甚急宜內托踈心火其症心懸若饑饑不能食舌乾咽腫歸心則死啟立

枯筋箭門主論

陳寶功曰枯筋箭乃憂鬱傷肝肝無榮養以致筋氣外發初起如赤豆大枯點微高日久破裂攢出筋頭蓬鬆枯槁多生胸乳間者是也宜用藥絲線齊根繫緊七日後其患自落再換珍珠散其疤自收兼戒口味 正宗

傷醫大全

卷二十

枯筋箭

五

乳癰



傷醫大全

卷二十

乳癰

六

顧氏秘書

乳癰門主論

陳遠公曰有乳上生癰先疼後腫尋常發熱變成癆癰此症男婦皆有之而女人居多蓋女人乳兒之時偶爾貪睡兒以口氣吹之使乳內之氣閉塞不通以至作痛卽以解散藥治之隨手而愈若因循失治而乳癰成矣惟男子則不然乃胃火熾盛不上升於口舌而中壅于乳房乃生此症故乳癰乃陽症也不比他癰有陰有陽治法不必分陰陽但分先後爲虛實耳蓋乳癰初起爲實邪久經潰爛

為正虛然邪之有餘仍是正之不足于補中散邪

乃萬全之道不必先攻而後補也用和乳湯貝母花

各三錢當歸蒲公英各一兩生甘草二錢川山甲一片土炒為末水煎服一劑乳房通

腫消不二劑也此方以貝母花粉消胃中壅痰痰

壅而乳房不通今化其痰則胃火失勢後以公英

山甲解熱毒利其關竅不攻自散恐藥過于迅逐

加歸甘草補正和解正既無傷邪火毒不致變為

乳巖也 水鑑

陳實功曰婦人平日不善調養以致胃汁濁而壅滯

瘍醫大全 卷二十 乳癰 七 顧氏秘書

為膿名曰乳癰 正宗

又曰亦有憂鬱傷肝肝氣滯而結腫成癰者宜逍遙

散加橘葉散之

又曰亦有暴怒傷肝肝火妄動結腫者橘皮湯散之

馮魯瞻曰婦人之乳男子之腎皆性命之根也人之

氣血周行無間寅時始於手太陰肺經出於雲門

穴穴在乳上丑時歸於足厥陰肝經入於期門穴

穴在乳下出於上入於下肺領氣肝藏血乳正居

於其間也其足陽明之脈自缺盆下於乳又衝脈

者起於氣街並足陽明夾臍上行至胸中而散故

乳房屬足陽明胃經乳頭屬足厥陰肝經婦人不

知調養有傷衝任且忿怒所逆鬱悶所遏厚味所

釀以致厥陰之氣不行陽明之血熱甚或為風邪

所客則氣壅不散結聚乳間或硬或腫疼痛有核

乳汁不出名曰妒乳漸至皮膚焮腫寒熱往來謂

之乳癰風多則硬腫色白熱多則焮腫色赤不治

則血凝氣為壅滯而與乳內津液相搏腐化為膿

治之之法凡初起寒熱焮痛即發表散邪疏肝清

瘍醫大全 卷二十 乳癰 六 顧氏秘書

胃速下乳汁導其壅塞則病可愈若不散則最易

成膿宜用托裏若潰後肌肉不生膿水清稀宜補

脾胃若膿出反痛惡寒發熱宜調榮衛若晡熱焮

腫作痛宜補陰血若食少作嘔宜補胃氣切戒清

涼解毒反傷脾胃也 錦囊

又曰有因婦人所乳之子膈有滯痰口氣焮熱含乳

而睡熱氣吹入乳房凝滯不散遂生結核若初起

時忍痛揉軟吮去乳汁即可消散失此不治必成

癰腫亦有因小兒斷乳後不能回乳或婦人乳多

嬰兒少飲積滯凝結又或經候不調逆行失道又有邪氣內鬱結成癰腫初起時切勿用涼藥蓋乳本血化不能漏泄遂結實腫乳性清寒又加涼藥則陰爛宜也惟涼藥用之既破之後則佳如初發時宜用南星薑汁敷之可以內消更加草烏一味能破惡血逐塊遇冷即消遇熱即潰更加乳香沒藥以定痛內則用瓜蒞十宣散通氣散間服之然年四十已下者治之多瘥以氣血旺故也五十以上慎勿治之多死以天癸絕也不治自能終其天

易醫大全

卷二十一

乳癰

十九

顧氏秘書

年若欲加治惟調氣血為主

又曰若鬱怒肝火熾盛為腫為痛者自當疏肝散鬱兼以養血和血則肝陽不強而腫自退若鬱結彌甚血滯不舒更由乳汁壅積潰而成膿則為乳癰矣氣血大傷尤宜重為滋補少佐疏肝解毒若專事清解則潰者難膿而膿者難長矣

胡公弼曰婦人乳有十二穰始生乳癰祇患一穰膿血出盡又患一穰逐穰輪流傷至七穰即傳次乳次乳患遍則危而不救者多矣初起每早服元壽

丹可保餘穰不受傳毒青囊

又曰憂怒傷肝肝氣滯而結腫者初起必煩渴嘔吐寒熱交作腫痛疼甚者牛蒡子湯主之厚味飲食暴怒肝火結腫者橘葉湯主之

又曰男子乳頭屬肝乳房屬腎女子乳頭屬肝乳房屬胃

又曰不乳兒婦人患乳名曰害乾奶子

陳實功曰乳房屬陽明胃經所司乳頭屬厥陰肝經所主多血少氣有乳之婦名曰外吹懷孕之婦名

易醫大全

卷二十一

乳癰

二十六 顧氏秘書

曰內吹正宗

汪省之曰如懷孕八九個月患內吹乳雖膿出腐脫肌生必待分娩而後始能收口理例

申斗垣曰胎氣旺而上冲致陽明乳房作腫名曰內吹又名裡吹奶啟玄

馮魯瞻曰乳癰者俗呼曰吹乳吹者風也風熱結泊於乳房之間血脉凝泣焮痛脹潰稠膿湧出此屬膽胃熱毒氣血壅滯又名乳癰為易治用青皮疏厥陰之滯石膏清陽明之熱甘草節解毒而行汚

濁之血荆防散風而兼助藥達表瓜蒌沒藥青橘

葉皂刺銀花土貝母當歸及酒佐之無非疏肝和

血解毒而已加艾隔蒜灸二三十壯於痛處最效

切忌刀針傷筋潰脉為害不小 錦囊

澄曰更有寡婦並無兒女吮乳而乳房或腫焮痛者

此為蕩風呵奶當全乾奶治法

陳白明曰懷孕患乳曰內吹乃胎氣旺而上冲致陽

明乳房作腫宜石膏散清之亦可消散遲則遷延

日久將產出膿乳汁亦從膿竅流出其口難完精要

湯醫大全 卷二十 乳癰 三 顧氏秘書

心法曰內吹者懷胎六七月胸滿氣上乳房結腫疼

痛若色紅者因熱盛也如色不紅者既因氣鬱且

兼胎旺也外吹者乳母肝胃氣濁更兼兒吮乳睡

熱鼻孔涼氣薰入乳房與熱乳凝結腫痛令人寒

熱煩躁口渴又有內未懷胎外無哺乳而生腫痛

者係皮肉為患未傷乳房此肝胃濕熱凝結也

乳癰門主方

鹿角散

治乳癰初起結腫疼痛增寒發熱但未成膿者

鹿角尖三寸用炭火煨稍紅存性研末每服三錢

食後熱酒一茶鍾調服甚者再一服必消或以生

鹿角尖剉細末生酒冲服三錢立消

又方

馬齒莧一把洗淨全皮硝搗爛敷上即刻止痛如

無鮮者可於端午連根採收亦可

湯醫大全 卷二十 乳癰方 三 顧氏秘書

灸乳腫妙方 正宗

治氣惱勞傷或寒熱不調乳內忽生腫痛

用碗一隻內用麓燈草四根十字排勻碗內燈草

頭各露寸許再用平山麓紙裁成一寸五分潤紙

條用水濕貼蓋碗內燈草上紙與碗口相齊將碗

覆於腫乳上留燈草頭在外將艾大圓放碗足底

內點火灸之艾盡再添灸至碗口流出水氣內痛

覺止方住甚者次日再灸一次必消

錦囊新定消乳癰神效方 馮氏

金銀花 二兩 蒲公英 一兩 甘草節 三錢

沒藥 錢 去油二 當歸尾 六錢

水酒各三碗煎一碗食後服渣再煎絞汁服

又方 葛稚川

人牙齒燒存性研極細酥調敷

窵原五物湯 外科集驗

乳癰癰疽發背立止疼痛

瓜 蔓 一枚 研 皂角刺 燒帶生 沒藥 各五錢

乳香 甘草 各二錢 五分

瘍醫大全 卷二十 乳癰方 韋 顧氏秘書

酒三觔煎取二觔時時飲之

元壽丹 張涵谷

乳癰初起即消已潰可保餘瓣無恙

龜殼 去牆版不用止用 研細末熱酒調服三錢儘 量飲醉即愈

芙蓉膏

治乳癰發背癰疽拔根止痛飲口

芙蓉花搗如泥若無花取根用竹刀刮去粗皮只

用內嫩白皮搗如泥入蜜少許調勻如未穿即敷

四圍中留一孔透氣如已潰即填入瘡口其膿根 自然湧出俟膿盡再上乾膿散

乾膿散

凡毒膿汁久出不已者用此摻之乾膿飲口

海螵蛸 天竺黃 飛血丹 炒紫色

輕粉 各二錢 麝香 二分五厘 眞降香老節 三錢

共乳極細乾摻瘡口不數日膿即乾矣

乳癰初起 濟生

活鯽魚背脊肉和蒸飯搗如泥敷上即散

瘍醫大全 卷二十 乳癰方 韋 顧氏秘書

乳癰

穿山甲 炒二兩 青皮 三兩

研細末用熱酒調服三錢另飲酒儘量被蓋取

汗即消

乳癰初起但未成膿者皆消

用大碗盛醋半碗以白石蛋大一塊燒紅淬醋內

二三次以醋熱為度即將患乳浸入醋內冷則再

燒再淬再浸三次即消

乳癰爛見心者

貓腹下毛乾鍋內煨存性為末乾摻或清油調勻入輕粉少許搽之

乳癰潰爛兩三指大者

芫汁半酒盃牛皮膠一兩切片隔水頓一伏時以膠老為度乘熱納入潰處以桑皮紙貼之如內膿未盡自然脫下仍如法乘熱納入倘粘緊不脫即不須又換聽其自落則肉已長足收口矣寶之神效瓜萋散 外科集驗

治乳癰乳疽疔勞

瘍醫大全

卷二十一

乳癰方

五

顧氏秘書

川當歸

酒洗去蘆焙切

生甘草

各五錢

滴乳香

去油另研一錢

黃瓜萋

子多者一箇去皮焙為末如急用只須研爛

明沒藥

去油另研二錢五分

無灰酒三升全藥入銀石器中慢火熬取一升

清汁分為三服食後服之如疔勞便服此藥杜

絕病根如毒氣已成能化膿為黃水如毒未成

即內消甚者再服以退為度治乳之方甚多獨

此一方神驗萬無一失

消乳癰神方

大當歸 一枝洗去泥

生黃芪

三錢或五錢

蒲公英

四兩

金銀花 四兩

甘草節 五錢

酒水全煎三大碗搯再煎服以一日夜服盡自

消歷試歷驗

乳癰未成即散已成即潰立刻止痛神效無比名橘

香散

陳皮

去白淨麝

香

一分

研細酒調服二錢被蓋出汗

乳癰初起二三日立消天下第一仙方

活鯽魚一尾連頭骨生搯極爛香臘糟一小團再

瘍醫大全

卷二十一

乳癰方

五

顧氏秘書

研勻敷上一日待消小即取下不消再貼如神

乳癰 周鶴仙方

苦瓜萋

兩箇每箇入酥炙穿山甲一錢人弱者用五分

粉甘草

六錢裝入瓜內

用好酒二觔水二觔全煎至一大碗臨卧熱服

渣搯爛再用酒水各一觔煎服將搯乘熱敷滿

乳上用布捆住蓋被出汗無不立愈不論已破

未破只用一服神效無比

驗方

陳蓮蓬殼一個陰陽瓦焙存性研末無灰酒調服

醉自消以搯敷之自消

澤芟湯

澤蘭葉一兩 白芟三錢

水煎冲酒服取汗自消

又方

生半夏一箇研細葱白一寸連鬚搗丸如蓮子大

絲綿包裹左乳塞右鼻孔右乳塞左鼻孔睡自消

又方

兔耳一枝箭州出嶽煎酒服自消

瘍醫大全

卷二十 乳癰方 毛 顧氏秘書

又方

鮮蒲公英搗汁冲熱酒服取汗搯加酒糟搗敷乳

上自消

又方

舊芭蕉湯燒存性研末酒調自消

又方

生皂角子七粒熱酒吞下即消

又方

王峽如

治乳汁不通閉塞並成乳癰

瓜 蕪一箇搗碎穿山甲炒

乳 香 沒藥 甘草節 各一錢

酒水各半煎服如成乳癰即以渣敷乳上用長

布裹之經宿自消

又方

蒲公英五錢 當歸 王不留行

陳皮 甘草節 生黃耆 各二錢

金銀花三錢 防風 川貝母

白芷 天花粉各一錢二分 乳香

瘍醫大全

卷二十 乳癰方 末 顧氏秘書

沒藥各五分

加香橙葉十片水煎冲酒儘醉取汗自消

又方

金銀花 蒲公英 各一兩

酒水同煎服以搯乘熱敷腫上即思睡睡醒自

消並治蛇頭疔神效

又方

用葱一握連鬚搗爛作餅置患乳上以磁磬口茶

杯盛熱灰覆葱餅上覺熱氣入裏汗出自消

又方

兩頭尖即雄老鼠屎 七粒或十三粒研末冲酒服即消

又方

陳皮去白五錢 甘草 一錢

酒水全煎凡痛極不可忍者服之即止

又方

白芥子一兩炒黃研末 白酒冲服盡量飲自消

又方

海驪峭細末三錢酒煎儘量飲出汗自消

傷寒大全

卷二十

乳癰方

五

顧氏秘書

又方

赤小豆三合用酒研爛去渣温服留渣敷之自消

又方

生螞蟬脚尖陰陽瓦焙研三錢酒調儘量飲醉益

被取汗自消

又方

金銀花 當歸 各二錢 蒲公英 三錢

乾葛 一錢五分

酒水同煎食後服再以酒助取汗自消

又方

蒲公英 金銀花 鹿葱花根洗淨

防風 各三錢

酒水全煎空心服出汗自消

又方

生半夏 乳香去油各等分

研細左乳吹右鼻孔右乳吹左鼻孔自消

又方

辛角尖刀刮末每服一錢酒調服自消

傷寒大全

卷二十

乳癰方

五

顧氏秘書

又方

黃花菜金銀花各等分酒煎服自消

又方

青皮天花粉各五錢酒煎服自消

又方

皂莢刺燒灰 海蛤粉 各等分

研勻熱酒調服以手揉乳自消此方只治外吹

又方

黃瓜萐一二枚連皮穰子切碎酒煎頻服自消

又方

鮮蒲公英連根帶葉二兩搗爛酒半觔全煎數沸熱服渣敷腫上蓋睡一時許再用連鬚芩白煎湯一茶杯催之得微汗自散此方用之鄉村偏僻無藥之所極妙亦且簡便

又方

山查核研末每服三錢無灰酒調服初起不過一二服成餅者四五服自消

又方

瘍醫大全

卷二十

乳癰方

三

顧氏秘書

蒲公英

三棵

金銀花

二兩

酒水全煎熱服取微汗睡醒即消渣敷患上

又方

磅解去足燒灰存性研末每服二錢黃酒調服

又方

半枝蓮

柔細茸草春三月間生田埂上近水邊等之可得開紅花儼然半邊蓮花四五月草深難覓此草解熱清火消腫散毒最為捷徑宜多多採取

搗汁沖熱酒服渣敷患上神效

乳吹已成

瓜 萋 一箇 明乳香 二錢

酒煎服

香附餅

消乳吹並敷一切癰疽

香 附 一兩 麝 香 二分

研末以蒲公英二兩酒煎濃汁調敷

又方

玉簪花根加鹽少許共搗如泥初起敷上自消已成敷之除膿完口

瘍醫大全

卷二十

乳癰方

三

顧氏秘書

又方

生白朮入兩一半用酒研服一半研敷自消

吹乳紅腫

白芷一兩鬱金七錢研勻水調敷

又方

醋半杯頓滾入廣膠四錢熔化加銀硃二錢調敷

乳硬痛

當 歸

甘 草

沒 藥

去油各 三錢

水煎沖酒熱服

山居婦人吹乳

桑樹蛀屑飯搗成膏敷之

乳吹結核不能消散腫痛者神效並治乳巖外科集

百齒霜即梳齒上油垢圓如芡實大黃丹為衣每服一二

圓熱酒吞下如不飲酒白湯吞之不可化開亦不

可令病人知極有奇效

又方外科集驗

皂角刺燒帶生 天南星 生半夏 各二兩

白芷 直僵蚕焙 草烏 各一兩

瘍醫大全 卷二十 吹乳方 葶 顧氏秘書

研細芫汁黃蜜調敷

洗乳疼方寶氏

牡蠣煨一兩 五倍子 五錢 枯白礬一錢五分

水二碗煎洗

乳硬作痛

嫩桑葉左採者研細米飲調攤紙上貼之

吹乳

好醋半杯熬滾入牛皮膠五錢熬化敷上自消

吹乳

瑞香花二十一朵如無用葉二十一片全陳竈糖搗敷自消

乳吹

明礬研細一歲一厘用雞蛋一箇開一孔將礬裝

入蛋內飯上蒸熟去殼將蛋分作小塊無灰酒吞

下自消

乳吹

鴨蛋一箇去殼全燒酒攪勻蒸熟食之自消

又方

莖菜地上蚯蚓糞二錢 芫子一錢

瘍醫大全 卷二十 吹乳方 葶 顧氏秘書

研細醋調敷上乾則易之三次未有不愈者

又方

兩頭尖的老鼠糞十三粒全葱白搗爛熱黃酒冲

服蓋煖出汗即消已成膿將破者不效

驗方

小青皮一筋醋浸三次晒燥

磨細末水法為丸每服三錢木瓜酒送下自消

驗方

馬桶垢陰陽瓦煨研細末蜜丸桐子大每服一錢

木瓜酒送下雖多年乳核服半筋亦消

又方

葫蘆巴焙研每服三錢木瓜酒調即消

驗方

大樺皮一兩切片瓦上焙存性

研細作一服用皂莢子七粒木瓜酒煎一杯調服自消

敷方

鮮水仙花根不拘多少全馬桶垢搗爛敷即消

瘍醫大全

卷二十 乳癰方 三 顧氏秘書

消乳吹

皂角子七粒微焙研碎沖酒儘量飲醉出汗即消

消內吹乳

鯨魚鱗係雜貨店賣者其形兩頭尖切去尖

用水煨爛搗化攤青布上貼之

乳瘡腫痛

芝麻炒焦研細燈盞油調敷

又方

野茄根搗汁沖調服

乳癰劉涓子

大黃

伏龍肝

各二錢

小鯽魚

一尾連鱗腸搗如泥

醋調敷定痛消腫

患乳立消法

一切乳症初起之時先用連根青菜煎水洗乳再將蒸酥店內饅頭茶鍾大一塊置碗中隔水燉熟敷於浴過乳上再用糯米一合不用淘鍋內炒黃研細用無灰酒沖入與服被蒸取汗無論輕重立刻即消

瘍醫大全

卷二十 乳癰方 三 顧氏秘書

又方

鯽魚肚子瓦上炙脆研細沖無灰酒調服即消

又方

鹿角尖磨汁敷之乳吹妬乳腫痛欲作膿者自消



乳頭陷下門主方

兩乳頭陷頂

黃芪蜜炙三錢

當歸身

葛根

升麻

黃柏

連翹

各二錢

牛蒡子研

炙甘草各一錢

上肉桂五分

水二鍾酒半鍾煎一鍾食後服

湯醫大全

卷二十

乳陷方

三

顧氏秘書

乳頭破裂門主論

心法曰乳頭屬足厥陰肝經如暴怒或抑鬱肝經怒火不能施洩是以乳頭破裂痛如刀刺或楷之出血或流粘水或結黃脂治當以加味逍遙散主之

湯醫大全

卷二十

乳頭裂

素

顧氏秘書

乳頭破裂門主方

驗方

取秋後冷露茄子裂開者陰乾燒存性研細水調敷

又方

臘脂蛤粉研細敷之

湯醫大全

卷二十

乳頭裂方

三

顧氏秘書

乳衄門主論

婦女乳房並不堅腫結核惟乳竅常流鮮血此名乳衄乃屬憂思過度肝脾受傷肝不藏血脾不統血肝火亢盛血失統藏所以成衄也治當平肝散鬱養血扶脾為主 澄論

湯醫大全

卷二十

乳衄

四

顧氏秘書

乳汁自流不禁門主論

馮魯瞻曰其有乳汁自出者若胃氣虛而不能斂攝
津液者宜補胃氣以斂之若氣血大虛氣不衛外
血不榮裡而為妄泄者宜調補榮衛以止之若未
產而乳自出者謂之乳泣生子多不育若產婦勞
役乳汁湧下此陽氣虛而厥也獨參湯主之 錦囊

醫書大全

卷二十 乳流

欽定四庫全書

乳汁自流不禁門主方

十全大補湯

人參 於白木 甘草

白茯苓 當歸 白芍藥

川芎 熟地黃 肉桂

黃芪蜜炙

姜棗為引煎服

醫書大全

卷二十 乳流方

欽定四庫全書

乳疔



瘍醫大全

卷二十

乳疔

聖

顧氏秘書

乳疔門主論

申斗垣曰有養螟蛉之子為無乳強與吮之久而成瘡經年不愈或腐去半截似破蓮蓬樣苦楚難忍內中敗肉不去好肉不生乃陽明胃中濕熱而成名曰乳疔 破立

凡初生女孩必須於月子內大人以手齊其兩乳使乳頭長出若不知此長大其女必是一對瞎奶生育之後乳頭微露大半藏在乳房之內小兒吮乳每每吮破乳頭化去一半疼痛難忍若畏痛不與

小兒吮食必腫脹成乳癰矣務令產婦忍痛令兒吮之外搽玉紅膏珍珠散自愈 查曾看一小兒初生吐乳血膜與乳相間細詢產婦始知產婦是瞎奶被小兒吮破潰爛所以小兒吐出之物係乳中吮出之血膜也只治產婦之乳小兒不藥而愈

瘍醫大全

卷二十

乳疔

聖

顧氏秘書

乳痞



湯醫大全 卷二十一 乳痞 聖 顧氏秘書

乳痞門主論

陳遠公曰有左乳內忽大如桃又不疼色亦不赤身發熱體漸瘦損人以爲痰氣鬱結也誰知肝氣不舒乎夫乳屬陽明乳腫宜責陽明矣而余獨謂之肝不起世人之疑乎夫陽明胃土最畏肝木肝氣亦不舒矣蓋胃見木之鬱惟恐來剋畏首畏尾伏而不揚乳又近兩脇兩脇肝之位也與肝相遠尙退縮不敢舒今與肝爲鄰亦何敢吐氣哉氣不舒而腫滿之形成氣不敢舒而畏懼之色現不疼不

赤正見其畏懼也治法不必治胃但治肝而腫自消矣用加味逍遙散柴胡二錢白芍五錢陳皮五各三錢人參甘草川芎各一錢水煎服十劑內消矣去瓜萸又十劑不再發矣此方解肝之滯肝解而胃氣不解而自舒益以瓜萸半夏治胸中積痰痰去腫尤易消也 米鑑

陳實功曰乳癖乃乳中結核形如丸卵或墜重作痛或不痛皮色不變其核隨喜怒消長多由思慮傷脾惱怒傷肝鬱結而成也

湯醫大全 卷二十一 乳痞 聖 顧氏秘書

寶漢卿曰奶癭是十五六歲女子經脈將行或一月兩次或過月不行多生寡薄形體虛弱乳上只有一核可治若串成三四個難治宜調經開鬱治之多用夏枯草

又曰乳癖乃五六十歲老人多生此疾不成膿不可用涼藥敷服逼令毒入臟腑則危

馮魯瞻曰奶栗卽乳栗又名乳癖破者少有生須用參芪歸芍大補兼解毒外以丁香末敷之 錦囊

申斗垣曰如婦人年近五十以外氣血衰敗當時鬱

悶乳中結核天陰作痛名曰乳核久之一年半載
破而膿水淋漓日久不愈名曰乳漏岐立

岐天師曰男子乳房忽然壅腫如婦人之狀捫之疼
痛欲死經年累月不效者乃陽明之毒氣結於乳
房之間也然此毒非瘡毒乃痰毒也若瘡毒何能
經久必然外潰今經年累月壅腫如故非痰毒而
何法當消其痰通其瘀自然奏功如响矣以化聖
通滯湯主之此方妙在金銀花與蒲公英直入陽
明之經又得清痰通滯之藥為佐附子引經單刀

瘍醫大全

卷二十

乳疔

聖

顧氏秘書

直入無堅不破又何患痰結之不消或疑附子大
熱諸痛皆屬於火似不可用殊不知非附子不能
入於至堅之內况又有梔子芍藥之酸寒雖附子
大熱亦解其性之烈矣又何疑於過熱哉秘錄

乳疔門主方

軍門立效散

甘草節半寸長 川椒三十粒 天花粉五錢
皂角刺三錢

酒水全煎臨服入去油乳香末一錢冲服

又方

生麻黃八分 陳香櫞一枚 甘草

天花粉各八錢 瓜蒌一枚 金錢花六錢

黃芩三錢 棉花核黑色者五錢

瘍醫大全

卷二十

乳疔方

聖

顧氏秘書

生酒煎服出汗

化聖通滯湯岐天師

金銀花 蒲公英各一兩 天花粉

白芥子各五錢 白芍藥 通草

山梔仁炒 白茯苓各三錢 柴胡二錢

熟附子 木通各一錢

水煎服

消多年乳核

煤炭研細生蜜和九葉荳大每服五十丸蒲公英

煎湯下

消遠年近日乳核乳痞

八中白兩煨四

雄鼠糞九十粒

研細米湯為丸每服一錢無灰酒下以消為度

瘡醫大全

卷二十

乳痞方

乳巖



瘡醫大全

卷二十

乳巖

辛

顧氏秘書

乳巖門主論

陳遠公曰有生乳癰已經收口因不慎色以至復爛
變成乳巖現出無數小瘡口如管如孔如蜂窩狀
肉向外生經年累月不愈服敗毒之劑身益狼狽
瘡口更腐爛人以爲毒深結于乳房也誰知氣血
大虧乎凡人乳房內內外長而筋束于乳頭故傷
乳卽傷筋也此處生癰原宜急散遲恐有筋弛難
長之患况又泄精損傷元氣安得不變出非常乎
當失精後卽大用補精填髓之藥尚不至如此之

橫今既陰虛而成巖又因巖而敗毒不亦益虛其

虛乎治法必大補氣血以生其精不必泄毒以其

無毒可泄耳用化巖湯

人參黃芪忍冬藤當歸各一兩白朮二兩茜根白芥子各二錢茯苓

三錢水煎服 二劑生肉又二劑膿盡疼止又二

劑漏管重長又二劑全愈再二劑不再發也此方

全補氣血不去敗毒雖忍冬乃消毒之味其性亦

補况入于補藥亦純于補矣惟是失精以變巖似

宜補精今止補氣血何也蓋精不可速生而功又

緩不若大補氣血反易生精且乳房屬陽明既生

乳巖而陽明必無多氣多血矣今補氣血則陽明

經旺自生精液以灌乳房又何必生精以牽掣參

芪之功乎所以不用填精之味也 水鑑

陳寶功曰乳巖乃憂鬱傷肝思慮傷脾積想在心所

願不得志者以致經絡痞澁聚結成核初如豆大

漸若棋子半年一年三載五載不疼不癢漸長漸

大始生疼痛痛則無解日後腫如堆粟或如覆碗

紫色氣穢漸潰爛深者如巖穴凸者如泛蓮疼

痛連心出血則臭其時五臟俱衰四大不救名曰

湯醫大全 卷二十一 乳巖 五 顧氏秘書

乳巖凡犯此者百人百死如能清心靜養無望無

碍不必勉治尚可苟延當以益氣養榮湯主之 宗

又曰凡中年無夫之婦得此更易於死

又曰男子患此名曰乳節與婦女微異女損肝胃男

損肝腎蓋怒火房慾過度由此肝虛血燥腎虛精

怯氣脈不得上行肝經無以榮養遂結腫痛

又曰治當入珍湯加山梔丹皮口乾作渴宜加減入

味丸腎氣丸已潰十全大補湯則易於生肌完口

也

湯醫大全 卷二十一 乳巖 五 顧氏秘書

汪省之曰乳巖四十以下者可治五十以下者不可

治治之則死不治反得終天年 理例

馮魯瞻曰婦人有憂怒抑鬱朝夕積累脾氣消阻肝

氣橫逆氣血虧損筋失榮養鬱滯於痰結成隱核

不赤不痛積之漸發數年漸大內潰深爛名曰乳

巖以其瘡形似巖穴也慎不可治此乃七情所傷

肝經血氣枯槁之證治法焮痛寒熱初起即發表

散邪疎肝之中兼以補養氣血之藥如益氣養榮

湯加味逍遙散之類以風藥從其性氣藥行其滯

參芪歸芍補氣血烏藥木通疎積利壅柴防蘇葉
表散白芷腐膿通榮衛肉桂行血和脉輕者多服
自愈重者尚可苟延若以清涼行氣破血是速其
亡也 錦囊

寶漢卿曰女子已嫁未嫁俱生此候乃陰極陽衰虛
陽與血相積無陽積安能散故此血滲入心經而
成此疾也若未破可治已破即難治

胡公弼曰乳巖乃性情每多疑忌或不得志於翁姑
或不得意於夫子失於調理忿怒所釀憂鬱所積

癆醫大全

卷二十

乳巖

羣

顧氏秘書

厚味釀成以致厥陰之氣不行陽明之血騰沸孔
竅不通結成堅核形如棋子或五七年不發有十
餘年不發者或因歲運流行或因大怒觸動一發
起爛開如翻花石榴者名曰乳粟凡三十歲內血
氣旺者可治四十以外氣血衰敗者難治 青囊

乳巖門主方

內消乳巖乳癖奇方

將壁上活壁蟾用針扞住乘活以竹紙包如小毬
食後白湯吞下每日服一次不過數日乳內即癢
如蟾蛛走狀其核漸消

又方

生蠟殼砂鍋內炒脆磨極細末熱酒調服二錢或
打糊為丸每服三錢酒下不可間斷消盡為止

乳吹乳痞乳巖並一切無名大毒

癆醫大全

卷二十

乳巖方

羣

顧氏秘書

黃牛大角內嫩角火製存性一兩鹿角火焙黃色八錢
枯白礬 三錢

和研極細末熱酒調服三錢

乳中有小塊不消不痛不癢即名乳巖宜早治至六
七年後潰爛不救 錢青榆

川貝母 連翹 瓜蒌仁

當歸 炙甘草各二錢 柴胡

金銀花 白芨 何首烏

白芷 蒲公英 半夏各一錢五分

川黃連酒炒 漏蘆各一錢 金橘葉四十片

半枝蓮搗碎

先將夏枯草半觔和酒水五碗煎至三碗去渣
入前藥全煎就一大碗加去油乳香沒藥細末
各七分不拘時服外用五倍子焙乾為末醋調
敷

消乳巖丸方錢青榆

夏枯草 蒲公英各四兩 金銀花

漏蘆各二兩 山茨菰 雄鼠糞兩頭尖

傷醫大全 卷二十 乳巖方 羣 顧氏秘書

川貝母去心 連翹 金橘葉

白芷 甘菊花 沒藥去油

瓜蒌仁 乳香去油 茜草根

甘草 廣陳皮 紫花地丁各一兩五錢

右為細末煉蜜為丸每早晚食後送下二三錢

戒氣惱一方去瓜蒌仁加天花粉桔梗廣膠用

夏枯草熬膏為丸

乳巖初起錢青榆

青皮 甘草各等分

共研細末每服二錢用人參湯入生姜汁調細
細呷之一日夜五六次至消乃已神驗年壯者
不必用人參

傷醫大全 卷二十 乳巖方 羣 顧氏秘書

乳少門主論

馮魯瞻曰乳汁不行有二有氣血盛而壅閉不行有血氣虛而燥澁不行虛者補之如十全八珍之類是也盛者疏之如麥門冬瓜蓂仁葵子猪胰木通漏蘆猪蹄之類是也

錦囊

產婦衝任血旺脾胃氣壯飲食調勻則乳足而濃以生化之源旺也若脾胃氣弱飲食少進衝任素虧則乳少而薄所乳之子亦怯弱而多病其乳以濃白光彩入盞中上面瑩然如玉為上黃色清薄為

瘍醫大全

卷二十

乳少

卷

顧氏秘書

下不可哺兒乳母宜擇肥瘦適中無病經調善食者佳太肥則多痰太瘦則多火兒飲其乳亦復如是如一兒昏睡竟日不醒舉家驚惶求醫投藥罔效一高醫診之曰此兒中酒得母乳母曾痛飲乎詢之果然停藥而醒可見利害相關明矣然李時珍曰人乳無定性隨飲食性氣而變故飲食調攝乳母不可不慎也

乳少門主方

通脈湯

治乳少或無乳

生黃芪一兩

當歸

白芷

各五錢

七孔猪蹄一對煮湯吹去浮油煎藥一大碗服之覆面睡卽有乳或未效再一服無不通矣如新產無乳者不用猪蹄只用酒水各一半煎服體壯者加好紅花三五分以消惡露

乳少

瘍醫大全

卷二十

乳少方

卷

顧氏秘書

紅荳煮熟連湯喫乳如湧泉

下乳天漿飲

當歸

白芍藥

川芎

麥門冬

通草

穿山甲

炒

漏蘆

天花粉

甘草

白茯苓

熟地

王不留行

各一錢

白水煎

又方

通草煨猪前蹄連湯食之

又方

穿山甲

王不留行各等分

研細末熱酒調服三錢

催乳

穿山甲

煨赤色五錢 陳皮酒製三錢

研細末分三服米泔水調下一晝夜服完

產後乳脉不行身體壯熱宜玉露散良方

桔梗

川芎

白芷

赤芍

人參

赤茯苓

傷醫大全

卷二十

乳少方

李 顧氏秘書

當歸

甘草

水煎服

又方

萬苳子糯米各一半細研水一碗攪勻入甘草末

一錢煎頻頻呷服

催乳

當歸

生黃芪

通草

各二錢

木通

一錢 穿山甲炒研

瞿麥

各一錢五分

王不留行

一錢二分

雄猪七星蹄酒煮連湯飲

產後無乳

穿山甲

七片炒研

王不留行三錢

健猪蹄七星者一隻

同煮汁飲之其乳如泉

乳少

雄猪外腎一具陰陽瓦焙存性研末無灰酒冲服

乳汁必多

乳汁清稀

產婦初生三日用炭灰少許和粥內食之乳汁自

傷醫大全

卷二十

乳少方

李 顧氏秘書

下乳

下乳

萬苳五根煎湯服

下乳

穿山甲

五錢燒存性

研細末酒調服

乳汁閉塞脹痛門主方

驗法

用有嘴茶壺內貯滾湯半壺將腫乳塞住壺口使壺中熱氣薰乳再令一人口含壺嘴吸之其竅即通候水溫看水面所浮皆乳即其驗也

又法

用貓鬍子向乳竅內通之並不痛拔出貓鬍子乳汁自通

又法

用大兒頻吮自通

又法

殺樹葉全糟鹽煨熱縛乳上自通

瘍醫大全

卷二十

閉塞方

李

顧氏秘書

回乳門主方

薛立齋曰婦人氣血方盛乳房作脹或斷乳脹痛牽引胸脇服之自消

麥芽三兩炒

熱水煎服立消

麥芽取其消散精華以絕乳之源也麥芽耗散之力可見故本草謂其能消腎也

回乳四物湯

產婦無兒食乳以致乳汁腫脹堅硬疼痛難忍

熟地

當歸

白芍藥

瘍醫大全

卷二十

回乳方

李

顧氏秘書

川芎

各二錢

大麥芽

二兩炒為粗末

水二鍾煎八分食遠服用裹脚束緊兩乳以手揉按其腫自然消散甚者再用一服

又方

浮小麥煎濃汁服之自消

斷乳門主方

畫眉膏

斷小兒乳

梔

子三個燒

雄

黃

輕

粉

辰

砂各少許

為末香油調勻俟兒睡着濃沫兩眉醒來自不思乳未效再用

傷醫大全


卷二十

斷乳方

奎

顧氏秘書

腕疽



傷醫大全

卷二十

腕疽

奎


顧氏秘書

腕疽門主論

申斗垣曰腕疽乃足三陰三陽之所發於腋下近脇乃手厥陰心胞絡經多血少氣天池穴初起脇肋下及兩腿足生赤腫癢二十五日不潰者死九日刺膿赤者可治如內癢週圍赤乾瘡口內見脂膜黑者不治此症多因打撲而生

破立

血亂瘡



瘍醫大全

卷二十

血亂瘡


奎

顧氏秘書

血亂瘡門主論

申斗垣曰血亂瘡乃足少陽膽經多氣少血生於淵
腋脇肋傍赤色或有頭無頭如肥皂核大在肉中
如針刺痛忽長大至胸兼足厥陰肝經多血少氣
發於期門名曰腋癰女人患此走諸處二三年變
名結癰三五年出黑水死 敬立

傳心疽



瘍醫大全

卷二十

傳心疽

奎

顧氏秘書

傳心疽門主論

申斗垣曰傳心疽生於脇下京門帶脉二穴之次乃
足少陽膽經多氣少血痛癢徹心如針刺之痛漸
潰至臍者死 敬立

脇痛門主論

朱丹溪曰兩脇走痛是痰實者可用控涎丹 左脇

痛為肝經受邪宜柴胡疎肝湯 右脇痛為肝經

移病於肺宜推氣散 食積痛凡痛有一條扛起

者是也宜消積 氣弱人脇痛脉細緊而弦多從

勞役怒氣得者入物湯加木香青皮 肥白人氣

虛發寒熱而脇下痛用參芪補氣加柴胡木香青

皮調氣 瘦人發寒熱脇痛多怒者必有瘀血宜

桃仁紅花柴胡青皮大黃滑石 去滯氣必用青

傷醫大全

卷二十

脇痛

李

顧氏秘書

皮乃肝膽二經之藥若二經血不足者先當補血

少如青皮 痰飲停伏脇痛宜導痰湯 脇下痛

而大便秘結者木香檳榔丸 虛寒脇痛者必用

辛溫補劑加調氣藥

解痛以琥珀膏貼之或白芥子水研敷之或吳茱萸

醋研敷之韭菜炒熨亦可

澄 曰人有勞勞內傷脇下一點痛者名乾脇痛難愈

當大補氣血以養肝大滋腎水以補母 又曰左脇痛胃脘痛二症婦人多有之以其憂思忿

怒之氣素蓄於中發則上衝被濕痰死血阻滯其

氣而不得條達故清陽不升濁陰不降肝木之邪

得以乘機侵侮而為病也故治婦人諸痛諸疾必

以行氣開鬱為主破血散火兼之諺云香附縮砂

婦人之至寶山藥菴蓉男子之佳珍此之謂也

傷醫大全

卷二十

脇痛

李

顧氏秘書

脇痛門主方

脇痛 秘方

小 茴 炒一兩 枳 殼 五錢 麩炒

研末每服二錢鹽湯調服

脇痛紅及半身甚發水泡者 醫言縮餘

大瓜 萋 一個重一二錢 粉 甘草 二錢 紅 花 五分

一劑而愈真神方也

湯醫大全

卷二十 脇痛

李 頤氏秘書



湯醫大全

卷二十 脇疽

李 頤氏秘書

脇疽門主論

靈樞云發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其狀大癰膿其中乃有生肉大如赤小豆治之剉 陵藟草根各一升 甲乙經到陵草 赤松根各一升 以水一斗六升 煮之竭為取三升即強飲厚衣坐於釜上令汗至 足已

王肯堂曰脇疽屬手厥陰心包絡足厥陰肝火熱毒 怒氣相併而作宜速治不然潰爛不斂多致危 準 陳實功曰脇癰多從鬱怒肝火而發虛怯人多有之 繩

肥胖內實者無此證初起宜梔子清肝湯解鬱瀉火已成四妙湯加香附青皮膿成者即針之勿傷內膜潰後八珍湯加山萸肉牡丹皮澤瀉兼滋腎水若虛勞而得者破流臭敗稀膿補托不應者俱死 正宗

汪省之曰脇癰即穿脇癰左為癰右為疽乃風濕入於骨間日久不散漸覺皮麻骨痛發於腰脇氣虛胃弱之人切不可過與補陽之藥恐內受熱劑則虛熱愈盛盛則透傷內膜切宜慎之 理例

瘍醫大全 卷二十一 脇疽 主 顧氏秘書

又曰昔一人脇下生癰後成漏瘡狀如牛眼膿血不止治法以鹽少許納牛耳中然後取牛耳中垢敷漏上數次即瘥如不用鹽牛耳不瘥垢亦難取故取垢必需鹽也

胡公弼曰人之兩脇乃足厥陰肝經氣分出入之道路一有阻滯不得疏通鬱而為痛故血亦因之而凝聚矣是以脇之上下發毒皆屬肝經 青囊

王肯堂曰蜂窩兩脇雙發疽或發於左脇或發於右脇或兩脇雙發乃足厥陰肝經期門及章門穴是

經多血少氣如上至淵腋輻筋二穴屬足少陽膽經多氣少血因氣虛而得不可用熱劑恐傷骨膜 準繩

馮魯瞻曰脇癰者乃足厥陰少陽之經相火之司也苟或肝膽之氣不平則風火內搏榮逆血熱而鬱聚為膿矣 錦囊

心法曰脇疽生於輻肋肋有硬骨者為肋肋下輻肉處為季脇乃肝膽怒火凝結而成多生體虛之人初如梅李漸長如盃如盆

瘍醫大全 卷二十一 脇疽 主 顧氏秘書

脇疽門主方

脇癰

地榆

金銀花

各五錢

川貝母

當歸

各二錢

穿山甲

炮

赤芍

各三錢

皂角刺

連翹

白芷

各一錢五分

甘草節

一錢

夏枯草

一兩

煎入後藥

鼠粘子

一分五分

紫花地丁

一兩

煎汁再入

鮮菊花根一兩搗汁和服

易醫大全

卷二十

脇疽

三

顧氏秘書



內發丹毒

易醫大全

卷二十

內發丹毒

書

顧氏秘書

內發丹毒門主論

王肯堂曰內發丹毒脇下至腰膀間腫痛赤色如霞治之稍緩毒攻於內嘔噦昏迷胃腹脹者死二便不通遍身青紫者死急砭出惡血服防風通聖散去白木甘草紫金丹勝金丹汗之服汗劑得汗則生無汗則死嘔吐不食譫語者死準繩心法曰內發丹毒由肝脾二經熱極生風所致生於肋骨延及腰膀色赤如霞遊走如雲痛如火燎急向紅腫周圍砭出紫黑血以瘦牛肉或羊肉片貼

之其毒即可減去一半若嘔噦昏潰胸腹臌脹傷身青紫者則為毒氣內攻屬逆


傷醫大全

卷二十

內發丹毒

顧氏秘書

俠熒疽



傷醫大全

卷二十

俠熒疽

五

顧氏秘書

俠熒疽門主論

鬼遺方云俠熒疽腫起發肋及而肩肘頭二十日不穴死九日可刺發赤白相間膿多可治赤白全無者不治

又云兩肋起疽名為發肋初腫盛至十數日不穴攻即腫大如杯椀高如鍬背痛徹內腸絞刺左邊患應右邊痛右邊患應左邊痛惟有此處多是內毒却入攻而死者多人有斯患急以針刺出膿血則免內攻傷內矣

心法曰肋疽即俠熒疽生於肋條骨間由肝火鬱怒
結聚而成初如梅李漸大如盃色紫焮痛連及肩
肘患在左痛牽右肋患在右痛牽左肋二十一日
得稠膿為順屆期潰出清水者逆

湯醫大全

卷二十

俠熒疽

七

顧氏秘書

骨羨瘡



湯醫大全

卷二十

骨羨瘡

末

顧氏秘書

骨羨瘡門主論

申斗垣曰骨羨瘡乃足太陽膀胱經多血少氣生於
神堂二穴乃膈關膈俞穴初發作癢不可忍如燎
漿水炮抓破內見骨過十日如遍身作癢不可治
也 敬玄

黃瓜癰



瘍醫大全

卷二十

黃瓜癰


全

顧氏秘書

黃瓜癰門主論

申斗垣曰黃瓜癰生脇前長尺餘高起二寸上頭小者謂之逆毒難治下頭小者謂之順毒可治 啟玄

腰帶癰



瘍醫大全

卷二十

腰帶癰

全

顧氏秘書

腰帶癰門主論

汪省之曰腰帶癰生於脇下近腹束帶之處乃風熱留滯膀胱不能滲利壅於肌表而成也 理例

寶漢卿曰火腰帶毒乃心肝二經熱毒流滯於膀胱不行壅於皮膚此風毒也宜清肝為主忌外敷藥全書

薛立齋曰火腰帶生繫帶之處初起如桃漸漸紅腫宜用斷毒截腰法敷之否則漸生五六小毒沿腰如索纏繞先赤腫後潰爛寒熱交作疼痛難經其

色紫惡

易醫大全

卷二十

腰帶癰

全

顧氏秘書

腰帶癰門主方

斷毒截腰法

白 芨

雄

黃

各一兩

研細末雞蛋清調敷四圍六七重乾則易之敷五六日不再流則妙

易醫大全

卷二十

腰帶癰方全

顧氏秘書

幽癰門主論

心法曰幽癰生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛形如鶩卵甚則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味憂思氣結腸胃不通火鬱成毒自內而外發也

湯醫大全

卷二十

幽癰

全

顧氏秘書

中腕疽門主論

心法曰中腕疽一名胃疽發於心胸之下臍上四寸屬任脉經中腕穴隱痛日久向外生疽堅硬漫腫皮色無紅無熱由過食炙燂以致胃腑火毒而成人迎脉盛是毒氣攻裏作嘔不食咳吐膿痰者逆

湯醫大全

卷二十

中腕疽

全

顧氏秘書

赫癰門主論

心法曰赫癰由七情鬱火凝結而成生臍上三寸屬任脉經建里穴初如粟米瘡痛相兼其腫迅速寒熱往來甚則嘔噦牽引臍痛初腫微紅頂尖根束漸透赤色時痛時止十四朝得膿為吉

初醫大全

卷二十一

赫癰

八

顧氏秘書

小兒臍汁不乾門主論

馮魯瞻曰夫臍為根本風濕防護須嚴一有所失則臍腫不乾久而作搐入於經絡即成風癇並撮口臍風皆為惡候錦囊又曰若臍中不乾常出青黃水者此必初生有傷六腑耳宜藥摻之但此時僅如血塊不可用冰磨之膏貼之並忌大寒大熱之劑蓋肌肉未堅臍腑柔脆難以抵當耳

湯醫大全

卷二十一

臍汁不乾

八

顧氏秘書

臍汁不乾門主方

驗方 雷公

車前子炒焦為細末敷之即乾

又方 錦囊

大紅羊絨燒灰為末單敷

又方 啟玄

草紙灰加枯礬研細摻之用紙包裹勿令尿濕

又方 千金

亂髮燒灰敷之

瘍醫大全

卷二十 臍汁不乾方

全

顧氏秘書

又方

黃栢末敷之

又方 千金

枯礬 五錢

龍骨

黃丹 各一錢

麝香 少許

研細敷之

臍內潰爛出水不止垂危者

張綱如屢驗方

赤石脂研末敷上立愈

又方

白礬 煨

白龍骨 煨 各等分

研細摻上

又方

棉花子煨灰傳之

又方

明礬枯礬各等分研傳

秘方

海螵蛸研細末乾摻

瘍醫大全

卷二十

臍汁不乾方

全

顧氏秘書

小兒臍風門主論

駱潛庵曰兒生七日之內肚脹腹硬臍圍浮腫口撮眉攢牙關不開名曰臍風撮口症蓋因臍帶剪短或包縛不緊以致水濕浸臍客風乘虛而入傳之於心蘊蓄其邪復傳脾絡舌強唇青手足微搐喉中痰響是其候也服延壽丹少許即愈如神脫氣冷者不治

又曰口撮吐沫腹硬頭偏搐掣手攢拳臍翻哭無聲其源因剪臍受風小肚有一筋直上臍來此筋到

傷醫大全

卷二十一 小兒臍風 九 顧氏秘書

臍無救法臍翻者不治若筋未到臍急須用燈火

攔頭焯百會穴三下臍門上焯七下大指焯四下

湧泉焯七下如能攔住直筋不到臍則可救如臍

未翻在神門焯一下

推拿秘書

臍突門主論

馮魯瞻曰凡小兒落胎之時視其臍軟者無臍風也如臍硬直者定有臍風須看上膠如有白泡點子須用銀針輕輕拭破若有血出者可愈然最危候十難一二能過一臘方愈尤宜察色觀容不可鹵莽假如額赤知為心熱鼻紅知為肺熱左腮青知為肝有餘右腮白知為脾不足頰白知為腎虛

又曰熱在胸膛伸引弩氣亦令臍腫

雷公曰小兒肚臍突出半寸此氣旺不收也若不急

傷醫大全 卷二十一 臍突 九 顧氏秘書

安之往往變為角弓反張

臍突門主方

二豆散 錦囊

治臍突腫

天南星 去皮

白 蘇

赤小豆

淡豆豉 各一錢

研末用芭蕉自然汁調敷臍四傍得小便自下

即愈

又方 雷公

白茯苓

車前子 各一錢 陳 皮

瘍醫大全

卷二十

臍突方

李

顧氏秘書

通

草 各三分

甘 草 二分

水煎灌之一劑即安

臍腫

先用荆芥煎湯洗之隨以葱葉火上炙過放地上

出火氣以指甲刮薄搭放腫處次日即消

又方 普救

枯 礬

黃 栢

研摻臍上

爛臍門主論

臍乃腎經部位濕熱積過腎經故臍中作爛也亦由酒醉入房所致

瘍醫大全

卷二十

爛臍

李

顧氏秘書

爛臍門主方

龍骨散 錦囊

龍骨 煨

黃連 各一錢

白礬 煨

輕粉 各五分

研末乾摻臍中

臍中生瘡

東壁土敷

湯醫大全

卷二十

爛臍方

李

顧氏秘書

臍中出血門主論

臍中出血乃腎火外越也以六味地黃加骨碎補一錢飲之即愈六味湯滋其水則火自息煇矣骨碎補功能止竅補骨中之漏故加入相宜耳 秘錄

湯醫大全

卷二十

臍中出血

李

顧氏秘書



傷醫大全

卷二十

臍上疽

全

顧氏秘書

臍上疽門主論

王肯堂曰臍上疽臍上寸許此名衝疽又名中發疽
 一名壅腎瘡由心火熾盛流入腎經所致腫高膿
 稠色赤可治若平塌黑色膨脹惡心膿水清稀內
 腎寒病渴甚瀉利無度謔語直視者死潰久不斂
 者死凡此危證只是虛耳如能大補不死也準繩
 心法曰衝疽生於任脉臍上二寸下腕色赤黃腫應
 在二十一日潰後膿稠受補者順若平塌紫黑膿
 水清稀七惡證見者逆

臍癰



傷醫大全

卷二十

臍癰

全

顧氏秘書

臍癰門主論

王肯堂曰臍癰當臍生由心經積熱流於大小腸二
 經所致臍為任脉神闕穴禁針之所早消散之免
 使見膿為上準繩
 實漢卿曰臍癰生於臍中因食冷物油膩之物積聚
 於氣海之間聚結成癰若不速治即內潰臍內出
 膿四圍堅硬或出紫血水者即難治也無此則生
 宜多服蠟礬丸
 胡公弼曰臍癰乃心經受證流於小腸經毒發於臍

甚至臍中出糞 青囊

心法曰臍癰禁針腫大如瓜高突若鈴無紅無熱宜隔蒜灸之潰後得稠膿者吉時出污水臭穢者逆

湯醫大全

卷二十

臍癰

本

顧氏秘書

臍漏門主論

申斗垣曰一老人年將六十妻少而不自悟得漏臍瘡年半臭不可近百治不效自分必死其老母哭拜求余且曰君能存吾子以繼香烟則母子沒齒不忘大德余以補劑治之外以艾灸臍上次日則不臭矣余更以膏藥貼之後用生肌散填滿臍口又以補中益氣湯半月而安又有一老翁年七十有五因氣惱忽患臍漏三月餘自分必死余照前治之不半月而愈後至八十三歲而卒噫神哉方

湯醫大全

卷二十

臍漏

本

顧氏秘書

乎 敬立

肚皮青黑門主方

肚皮忽然青黑不急治須臾即死

胡粉酒調敷之

湯醫大全


卷二十

肚皮青黑

九

顧氏秘書

肚癰



湯醫大全

卷二十

肚癰

九

顧氏秘書

肚癰門主論

汪省之曰肚癰乃手陽明大腸手太陽小腸二經受
證熱結之毒發出於表壅聚成癰也 理例

竇漢卿曰肚癰乃脾經之毒因食煎燂油膩酒醉太
過入房以致毒不流通聚成此癰或生於內或生
於外若不速治潰透脾膜則死 全書

心法曰腹皮癰生於腹皮裏膜外無論左右隱痛日
久後發癰腫於皮外右關脉見沉數而腹痛甚者
是其候也由膏梁火鬱而成不可過服剋伐之藥

若希圖消散過傷胃氣則腫不能潰潰不能斂立見危亡矣

瘍醫大全

卷二十

肚癰

一

顧氏秘書

肚癰門主方

肚癰神效方

石榴樹嫩紅葉搗汁一茶鍾沖酒緩緩服之搗敷
癰上縛之五服全愈

瘍醫大全

卷二十

肚癰方

一

顧氏秘書



易醫大全

卷二十一

小腹痛

百二

顧氏秘書

小腹痛門主論

王肯堂曰小腹痛臍下一寸五分為氣海二寸為丹

田三寸為關元皆屬任脈由七情不和所致若潰

而低陷膿水清稀或潰爛久不斂者死準繩

見遺方云小腹痛疽又名衝疽發小腹疼痛而振寒熱

四日悄悄五日變色可刺不刺及導引出膿毒不

治五十餘日死

陳遠公曰有生癰小腹間者必無陽症以地屬陰部

位也陰生陰毒似乎至重然純陰無陽一用陽藥

立可成功無奈世人一見肚腹生癰多用陰藥消

毒反成不救為可憫也然余所謂陽藥者非散火

祛風之藥乃補氣溫火之味耳蓋陰成陰毒乃寒

虛之故寒因虛而不行毒因寒而凝結用熱藥以

祛寒自能解寒散毒也碎寒救腹丹白木三兩 茯

苓三錢 肉桂三錢 金銀花三兩 附子一錢 當歸二

兩 蛇床子五錢 水煎一服內消矣已潰者三劑膿

盡肉生四劑全愈此以白朮為君者以其耑利腰

臍之氣也腰臍利則下部盡利矣後以蛇床銀花

祛毒氣易消又恐寒極不能直入故加附桂斬關

而入惟是一派乾燥之味邪雖祛除未免耗血故

用當歸陽中之陰少制其橫則陰寒漸散又無陽

旺之患所以奏功也水鑑

陳實功曰小腹痛癰生小腹漫腫堅硬肉色不變有熱

漸紅者屬陽易治無熱不紅者屬陰難治此乃七

情火鬱以致脾虛氣滯而成也正宗

又曰初起七日以內者艾炙七壯膏蓋首尾內服壯

脾胃養氣血行經補托之劑可保無虞如慢用尅

易醫大全

卷二十一

小腹痛

百二

顧氏秘書

伐攻利涼藥敗症必出急用十全大補湯加參芪
薑附救之如補托不應者終久縱愈成漏

馮曾贍曰腹癰者患於臍下或傍二寸許是屬脾經
若近脇者是屬膽經是症多因脾家陰虛氣凝血
滯傷脾所致 錦囊

胡公弼曰小腹癰又名丹毒癰乃飲食不調寒熱伏
結於腸胃成毒多生於小腹之側 青囊

百效全書云腹癰生於皮...乃七情火鬱以致
脾虛氣滯而成小兒乃驚積虧損而致但此證不

湯醫大全

卷二十一

小腹癰

一頁

顧氏秘書

問初起已潰未潰宜壯胃氣而佐以行經活血之
劑若誤用尅伐及下和寒涼則腫不能潰潰不能
飲矣倘服下利降火破氣消瘀等藥急用大劑參
芪薑附或十全大補湯救之如瘡勢漫腫堅硬肉
色不變未有膿也四君子湯加川芎當歸白芷枳
殼如焮腫痛甚隔蒜灸五七壯以殺其毒內用托
裏之劑如腫起而軟色不赤者膿已成也膿成外
不潰者卧針刺之以洩其毒不可直針以傷其膜
內服托藥搽玉紅膏生肌收功

心法曰小腹癰由七情火鬱而生每發於氣海穴
下一寸 丹田穴 在臍下 關元穴 在臍下 皆屬任脉
五分 經此三穴或一穴發腫即為小腹癰高腫紅活疼
痛牽背易潰膿稠者易治若漫腫堅硬綿潰腐爛
膿稀如水者為疽難治

卷二十一

小腹癰

一頁

顧氏秘書

緩疽



瘍醫大全

卷二十一 緩疽

五

顧氏秘書

緩疽門主論

王肯堂曰緩疽生小腹之左數月堅硬如石寒熱間作
飲食減少漸至疝羸屬足太陰經積熱所致
心法曰緩疽乃脾經氣滯寒積而成生於少腹之傍
堅硬不紅不熱痛引腰腿數月不潰若兼食
少羸瘦者終屬敗證

瘍醫大全目錄

卷二十一

內癰部

內癰門主論

心癰門主論 附方

肝癰門主論 附方

脾疽門主論

肺癰肺痿門主論 附方

腎癰門主論

瘍醫大全

卷二十一 目錄

一 顧氏秘書

胃癰門主論

大腸癰門主論

小腸癰門主論 附方

三焦疽門主論

痞積癥瘕門主論 附方

心癰門主論

經曰巨闕隱隱痛者心疽其上肉微起者心癰巨闕穴在

鳩尾下一寸心之募也

王肯堂曰心癰始發巨闕穴必隱痛微腫令人寒熱身痛頭面色赤口渴隨飲隨乾由心火熾盛更兼酷飲嗜熱而成宜服涼血飲如酒毒為病宜升麻葛根湯治之但此證甚屬罕有而治法不可不備

瘍醫大全

卷二十一

心癰

三

顧氏秘書

心癰門主方

涼血飲

生地

麥門冬

連翹

天花粉

木通

赤芍

荆芥

車前子

瞿麥

白芷

甘草

薄荷

山梔各等分

燈心為引

潮熱加

淡竹葉

升麻葛根湯

瘍醫大全

卷二十一

心癰方

四

顧氏秘書

升麻

柴胡

黃芩

白芍

葛根

木通

山梔

黃連

甘草

水煎服

肝癰門主論

經曰期門隱隱痛者肝疽其上肉微起者肝癰期門

名肝募在乳傍一寸半再直上一寸半

素問曰肝癰兩脇滿臥則驚不得小便

華竑君曰肝癰不可用針刺須用內消內散 秘錄

陳遠公曰人素多惱怒容易動氣一旦兩脇脹滿發

寒發熱已而脇疼之至按之疼不可忍人以為肝

火盛也誰知肝葉生瘡乎人但知肺生癰不知肝

亦能生癰也且靈素論書亦未詳言得母創論以

傷醫大全 卷二十一 肝癰 五 顧氏秘書

驚俗乎余聞異人云脇疼手不可按者肝葉生癰

也靈素未詳者以肝癰世不常有所以畧之也凡

古今之氣運不同癰毒之生長不一肝能生癰烏

可缺而不論乎况肝之生癰未嘗無理也肝一惱

怒則葉開張肝氣即逆大怒之後肝葉空脹未易

平復設使時加惱怒是肝葉竟不得安且怒後必

然動火怒益多而火益盛盛必燥乾肝血血乾則

肝氣大燥無血養肝更易發怒欲不鬱結成癰烏

可得乎然癰生於內何從而見然外可辨也肝癰

生在左而不在右左脇之皮必見紅紫之色而舌

必見青色也此而辨之斷斷無差治必以平肝為

主佐以瀉火去毒萬不可因循令其潰爛而不可

救也化肝消毒湯白芍當歸各三兩金銀花五兩

黑山梔五錢生甘草三錢水煎三劑疼止又減半

服數服全愈 水鑑

此方以歸芍入肝以滋肝血則肝血驟生易平肝

血之燥又得甘草緩急梔子清火銀花解毒安得

不效哉惟是火毒大盛肝血大虧不如此大劑亦

自徒然倘執以肝火之旺非肝癰之症只用當芍

治脇痛必不效也

傷醫大全 卷二十一 肝癰 六 顧氏秘書

又曰有左脇大痛按之尤甚此肝癰耳非脇痛也肝

癰多得之惱怒前條已論之矣然而憂鬱亦能生

癰也惟惱怒得者其痛驟憂鬱得者其痛緩初痛

之時逍遙散大劑煎飲痛立止矣何至成癰也因

失於速治而肝中鬱氣苦不能宣而血因之結矣

血結不通遂化膿而成癰其勢似緩然肝性最急

癰成而毒發甚驟也有脇疼數日而死者正因生

癰毒敗而死非脇痛能死也可不急為治之乎宜

鬱化毒湯柴胡薄荷香附各二錢白芍當歸金銀

花各一兩生甘草天花粉各三錢陳皮枳殼各一錢水煎服四劑全愈重則六劑後用四物湯大劑調治不再發也此症世不常有前論已悉然肝癰少見而脇痛世所常有余特發明憂鬱之能成癰又如此人知急治何至成癰哉

朱丹溪曰肝癰始發期門穴必隱痛微腫令人兩脚脹滿脇痛側卧則驚便溺艱難由憤鬱氣逆而成初服復元通氣散次服柴胡清肝湯痛脹已止宜六味地黃丸脾虛食少佐以八珍湯滋腎補脾治

癩醫大全

卷二十一

肝癰

七

顧氏秘書

肝癰門主方

救肝敗毒至聖丹 岐天師

治肝癰

當歸

白芍

各三兩

黑山梔

生甘草 各三錢

金銀花

十兩水十碗煎汁四碗煎用

以金銀花汁二碗加水二碗全煎服搯又加水二碗全前存金銀花汁二碗煎一碗服二劑愈

癩醫大全

卷二十一

肝癰方

八

顧氏秘書

脾疽門主論

經曰章門隱隱痛者脾疽其上肉微起者脾癰章門穴又

名脾募在臍傍開六寸高上二寸

王肯堂曰脾癰始發章門穴必隱痛微腫由過飧生

冷兼濕熱或瘀血鬱滯脾經而成令人腹脹咽嗑

乾燥小水短澁宜大黃湯赤豆以仁湯二方合而

用之腹脹全消宜六君子扶脾調理

傷醫大全

卷二十一

脾疽

九

顧氏秘書

肺癰肺痿門主論

經曰中府隱隱痛者肺疽其上肉微起者肺癰中府穴在

雲門下一寸乳上三肘間動脈應指

素問曰肝滿腎滿肺滿皆實即為腫王注云滿謂脈氣滿實腫謂癰

腫肺之癰喘而兩胛滿

內經曰血熱則肉敗營衛不行必將為膿大凡肺瘡

當咳嗽短氣胸滿時唾膿血久久如粳米粥者難

治若嘔膿而不止者亦不可治其嘔膿而白止者

將自愈其脈短而濇者自痊浮洪而大者難治其

傷醫大全

卷二十一

肺癰

十

顧氏秘書

面色當白而反面赤者此火之剋金皆不可治全書

千金曰欬唾膿血其脈數實者為肺癰若口中欬即

胃中隱痛肺反滑數此肺癰也

張仲景曰肺癰吐膿如米粥咽燥振寒

又曰上氣面浮腫肩息其脈浮大不治又加利尤甚

問曰病者欬逆何以知其肺癰當以膿血吐之則死

其脈何如曰寸脈微而數微為風數為熱微則汗

出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱逼於榮吸氣

不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於衛其人則欬口

乾喘滿咽燥不渴多吐濁沫時時振寒熱之所過
血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則
死

問曰振寒發熱寸脈滑數其人飲食起居如故此為
癰腫醫反不知以傷寒治之不應何以知有膿膿
之所在何以別知其處師曰假令膿在胸中者為
肺癰其脈數欬吐有膿血設膿未成其脈自數緊
但數為膿已成矣

金匱方論曰熱在上焦者因欬為肺痿肺癰之病何
病醫大全 卷二十一 肺癰 二 顧氏秘書

從得之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數
或從便難又被快藥下利重亡津液故寸口脈數
其人欬口中反有濁唾涎沫者為肺痿之病若口
中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰
欬唾膿血脈數虛者為肺痿數實者為肺癰

王肯堂曰治吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜
消風散 荆芥川芎羌活人參茯苓防風薄荷入
琥各二錢厚朴陳皮各五錢為末是也
男子髮灰研細入和之清米飲下可除根只兩服
亦治吐血 準繩

又曰肺癰已破入風者不治

精要曰勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內盛於肺也
則汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強背脇脹滿久久
不瘥已成肺痿也

又曰起肺癰者由食啖辛熱炙博或酣飲熱酒燥熱
傷肺所致治之宜早

王氏曰患肺疽者項強蓋肺系在項肺傷則系傷故
牽引不能轉側肺者氣之本其華在毛其充在皮
故皮膚不澤

病醫大全 卷二十一 肺癰 三 顧氏秘書

張景岳曰此證初起邪結在肺者惟桔梗杏仁煎為
治此之第一方 全書

齊德之曰肺者五臟之華蓋也處於胸中主於氣候
於皮毛勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺
也故汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強胸脇脹滿久
久不瘥已成肺痿也

又曰肺痿之候久嗽不已汗出過度重亡津液便如
爛瓜下如豕膏小便數而不渴渴者自愈欲飲者
將瘥此由肺多唾涎而無膿者肺痿也

又曰肺瘡之候口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢微腫
欬唾膿血或腥臭濁沫胸中隱隱微痛者肺疽也
始萌則可救膿成則多死

馬益卿曰肺癰治法要畧先以小青龍湯一貼以解

其風寒邪氣然後以葶藶大棗瀉肺湯桔梗湯葶

莖湯見金匱要畧隨證用之以取膿此治腫瘍之例也

終以內補黃芪湯以補裏之陰氣此治潰瘍之例也

薛立齋曰凡勞傷血氣峻理不密外邪所乘內感於

傷醫大全 卷二十一 肺癰 主 顧氏秘書

肺或入房過度腎水虧損虛火上炎或醇酒炙博

辛辣厚味薰蒸於肺或欬唾痰涎汗下過度重亡

津液皆能致之

又曰大抵勞傷血氣則腠理不密風邪乘肺風熱相

搏蘊結不散必致欬嗽若誤用汗下過度則津液

重亡遂成斯證

又曰此證皆由脾土虧損不能生肺金肺金不能生

腎水故始成則可救膿成則多死苟能補脾肺滋

腎水庶有生者若專攻其瘡則脾胃益虛鮮有不

誤者矣

陳遠公曰人有胸膈間作痛咳嗽時更加痛手按之

更增氣急人以爲肺欬也誰知肺熱生癰乎夫肺

爲嬌臟藥食所不到者故治之甚難治法似宜瀉

火以救肺藥既不入肺而肺爲脾子脾經未嘗不

愛藥也補脾土則土能生金平肝木則金不尅木

清心火則火不刑金三經有益於肺無損於金則

肺氣得養後以消毒之品解肺之邪何癰不散乎

全肺湯元參三兩金銀花五兩麥冬二兩生甘草

傷醫大全 卷二十一 肺癰 主 顧氏秘書

五錢花粉茯苓白芍各三錢水煎服二劑痛減內

消矣 米鑑

按癰疽症必須內消不可令其出毒內消之法總

不外心肝脾三經而別無消癰之道也或曰肺之

子腎也獨不可治腎以消乎然肺癰雖或於火燥

肺金之液實因肺氣之自虛也補腎雖或能使肺

不來生腎但肺腎相通補腎之水恐肺氣下降而

火毒反不肯透散不若止治三經使肺氣得養自

化其毒不遺於腎爲妙也

又曰人有胸膈作痛咳嗽不止吐痰便覺疼甚按之

痛不可忍喉間腥臭之氣隨吐膿血此肺癰不

但已成而且已破矣未破者易消已破者難治以

膿血未能盡耳然得法亦無難也夫肺之生癰者因肺火不散也然肺火之來因肺氣之虛也肺虛而後火留於肺火盛而肺結為癰不補虛以散火而未成形者何以消已成者何以散既潰爛者又何以愈哉是虛宜補矣然補何臟乎若補肺虛而肺不能直補只補胃氣則肺氣自旺也今癰已破多吐膿血則肺氣尤虛雖毒氣尚存不可純瀉其毒於補氣之中而行攻散之法則毒易化而正氣無傷也完肺飲人參一兩元參金銀花各二兩蒲公英五錢花粉桔梗生甘草各三錢黃芩二錢水煎一服膿必多二劑漸少又三劑疼止膿血亦止六劑全愈

瘍醫大全

卷二十一

肺癰

五

顧氏秘書

此方補胃氣即為胃中之火旺胃氣而肺氣自不能衰瀉胃火而肺火自不能旺所以敗毒生肉也雖諸藥亦能入肺不單入胃然入胃者十之八入肺者十之二仍是治胃益肺之藥也或問肺癰已破病已入裏似不宜升提肺氣南呂喻嘉言謂宜引之入腸而先生仍用桔梗開提肺氣恐不可以為訓嗟乎余所用藥無非治胃之藥藥入於胃有不下引入腸者乎然肺氣困頓肅清之令不行用桔梗以清肺上氣通而下行更速然則上之開提正下行之迅速也

又曰人有久嗽後肺受損傷皮膚黃瘦咽喉啞自

汗盜汗不得卧吐稠痰腥臭毛悴色焦嗽時必忍氣須臾輕輕吐痰始覺膈上不疼否則大痛氣息奄奄人以爲肺癰也誰知肺痿生瘡乎本不可救然治之得法亦有生者夫肺癰與肺痿不同肺癰生於火毒治之宜速肺痿成於勞傷治之宜緩火毒宜補中用瀉勞傷宜補中帶清清與瀉不同而補則同也瀉中用補可用大劑清中用補只宜小劑勿伐勿助若有若無始奏功也養肺去痰湯金銀花麥冬各三錢生地百合各二錢紫菀百部各五分生甘草五錢款冬花貝母白薇各三分天冬一錢水煎服十劑膈疼少減便有生機矣又十劑更輕又十劑漸愈共六十劑始全愈也

瘍醫大全

卷二十一

肺癰

六

顧氏秘書

此方不寒不熱養肺氣於將危保肺葉於將痿實有奇功若圖效捷於一旦必至輕喪於須臾寧忍耐以全生勿欲速而送死

又曰有膏梁子弟多食燔熬厚味美醴香醪以至舌乾喉燥吐痰吐血喘急膈疼不得安臥人以爲肺經火熾誰知肺癰已成乎夫肺爲五臟華蓋喜清氣暢達惡燥氣炎蒸今所食無非辛熱則五臟之

中一團火氣火性炎上而肺獨受其害不能下生
腎水腎水無源則益加燥勢必取資於肺肺金又
病不益虛其虛而燥其燥乎况各經紛紛來逼火
烈金刑肺間生癰必至之勢也治法化毒之中益
以養肺降火之內濟之補腎庶已成者可痊未成
者可散也扶桑清肺丹桑葉五錢紫苑二錢貝母
生甘草百合阿膠人參各三錢犀角屑五分欬冬
花一錢杏仁七粒金銀花熟地各一兩水煎調犀
末服數劑可收功也

傷醫大全 卷二十一 肺癰 七 顧氏秘書

此方肺腎同治全不降火蓋五臟之火因飲食而
旺乃虛火也故補水而金氣堅虛火息况補中帶
散則非呆補火
毒又易解也

朱丹溪曰癰疽發於內者肺癰肝癰腎癰腸癰囊內
癰附骨癰惟肺癰須先解表今特表而出之

陳寶功曰夫肺癰者金受火刑之症也蓋肺為五臟
華蓋其位至高其氣至清內主乎氣中主聲音外
司皮毛故肺金獨旺於秋者應其輕清之候也倘
有所尅其病自生先因感受風寒未經發越停留
肺中初則其候毛聳惡風咳嗽聲重胸膈隱痛項

強不能轉側者是其重候也久則鼻流清涕咳吐
膿痰黃色腥穢甚則胸膈脹滿呼吸不利飲食減
少脉洪自汗法當清金甘桔湯主之麥冬清肺飲
調之亦有七情饑飽勞役損傷脾肺者亦有勞力
內傷迎風喊叫外寒侵入未經解散致生肺癰者
脉必浮而微數胸熱氣逆寒熱往來咳嗽痰生通
用金鯉湯蠟礬丸太乙膏相間服之亦效 正宗
又曰如手掌皮麗六脉洪數氣急額紅汚膿白血嘔
噦澁水鼻塌不殮飲食者俱為不治

傷醫大全 卷二十一 肺癰 六 顧氏秘書

又曰如身涼脉細膿血交流痰色鮮明飲食知味膿
血漸止者無妨反此則死

又曰如久嗽勞傷咳吐痰血寒熱往來形體消削咯
吐痰膿聲啞咽痛其候傳為肺癰百死一生之候
治宜知母茯苓湯主之參五味湯調之

岐伯曰凡人有病氣喘嘔咳者乃肺病也肺乃金臟
又嬌臟也居於心之上辨如蓮花色紅蒂紫咽管
之下即是肺經司氣之出入不容食物咽之上有
胃厭即小舌頭也胃厭遮住咽門飲食之類始能

直入食管而下通於胃倘人飲食之時多言胃厭不及遮蔽咽門設有米食之類入於氣管則必咳不已可見氣管不容一物可知藥亦不能直入也治肺之法正治甚難轉治以脾脾氣有養則土自生金喘咳自已故五臟之中除肺一經之外俱可正治獨肺經不可正治然則肺經生癰瘍何以治之耶清金消毒湯主之 秘錄

又曰蓋癰生胸腹之內無不生於火與邪若外用末藥調敷則相隔甚遙必須內消為得然癰勢甚大 癰醫大全 卷二十一 肺癰 丸 顧氏秘書

甚急一杯水何能救車薪之火故必大劑救肺消毒至聖丹煎飲而火邪自散而癰瘍自消倘日以敷藥調治於皮膚之外或以小劑而求散於湯餌之中吾見其必死而已矣

張仲景曰瘡瘍之疾發於火邪之盛其由來非一日矣欲消其火邪豈是尋常細小之藥所能去乎故必多用重藥以切治之然而散邪之藥俱耗其陰多用重用皆能取敗惟金銀花敗毒而又不傷氣去火而又能補陰故必須此品為君第此品性純

而正乃正人君子也譬如正人君子必同郡攻擊於羣小之中始不致僨事而召禍所以多至十兩或一筋始可取勝於眉睫然徒藉此一味又覺勢單力薄當以他藥相助成功各有妙理非泛然而用之者也或加麥冬以滋肺或加歸芍以潤肝或加地榆以涼大腸或加甘草以瀉火或加梔子以清熱或加薏苡仁以去濕惟在用者審之

馮魯瞻曰肺癰者勞傷氣血內有積熱外受風寒胃中滿急隱隱作痛咽乾口燥時出濁唾腥臭若吐膿如米粥者死脉滑數或實大凡患者右脇按之必痛須用肺癰神湯未成即消已成即潰已潰即愈屢用屢驗者也 錦囊

又曰夫人一身之氣全關於肺肺清則氣行肺濁則氣壅肺熱則津不行而肌肉甲錯 甲錯者肌不滑澤也 多生肺癰癰者壅也肺氣鬱熱久壅而成也蓋咳久傷肺元氣漸虛其人有寒熱往來自汗濺濺口中有濁唾涎沫或咳嗽唾中有紅線膿血或多唾涎沫而無膿寸口脉數而虛濇或虛洪者名曰肺痿熱

而無膿寸口脉數而虛濇或虛洪者名曰肺痿熱

在上焦故也如口中辟辟燥咳即胸中隱隱痛咽
燥喘渴四肢微腫先吐血而後吐膿胸中甲錯或
偏熱烙手喜偏側於右睡而不能左臥左卧則喘
急不安其痰似膿血腥臭以水驗之則沉而不浮
其脉數而有力者名曰肺癰因勞傷血氣腠理開
而受邪寒搏於血蘊結成癰積熱不散敗血為膿
咳傷肺葉而成按其右脇必痛者是也若已破入
風者不治吐膿如米粥者難治然痿為正氣虛癰
為邪氣實其肺痿治法在乎養血養氣養神清金
而治肺癰在於補養氣血而兼排膿也然肺痿亦
有寒者必頭眩吐涎沫而不咳不渴而遺尿此為
肺中冷而心中有濕液也古人用炙甘草乾姜治
之以補虛勞也

又曰古一婦人二十餘歲胸膈間一竅口中所咳膿
血與竅相應而出以人參歸芪補氣血之劑加退
熱排膿等藥而愈

婁全善曰肺痿屬熱如欬久肺傷聲啞聲嘶咯血此
屬陰虛火熱甚是本論治肺痿吐涎沫而不欬者

傷醫大全

卷二十一 肺癰

主

顧氏秘書

其人不渴必遺尿小便數以上虛不能制下故也
此為肺中冷必眩多涎唾用炙甘草乾薑此屬寒
也肺痿吐涎多心中溫液者用炙甘草湯以補虛
勞也亦與補陰虛火熱不同是皆宜分治之故肺
痿又有寒熱之異也

周文采曰其候應乳上下隱隱而痛者肺疽也若肉
微起者肺癰也初起俱可救若日久唾膿臭敗者
不可治也但診其脉微緊而數者未有膿也若緊
甚而數者已有膿也若膿如粳米粥及嘔膿不止

傷醫大全

卷二十一 肺癰

主

顧氏秘書

其脉浮大而面色赤者俱為難治若膿自止其脉
短而滿面色黃白者皆可治何以言之蓋脉浮大
面赤此心火剋肺金也故難治若脉短濇及面白
者此肺氣未損也故可治治法當補肺瀉火止嗽
定喘為主 集驗

聖惠曰中府 穴名在雲門下一寸六分乳 隱隱而微
痛者肺疽也上肉微起者肺癰也是以候始萌則

可救膿成則多死若欲知有膿者但診其脉若微
緊而數者未有膿也緊甚而數者已有膿也

申斗垣曰其症現於秋冬可救者何也肺旺於秋是也冬寒水旺子能救母母子相生故云可救為順是春夏木旺火勝之時肺金病再遇火旺之時燥石流金金受火尅此為逆故難治也 啓立

李東垣曰夫肺者五臟之華蓋處於胃中主於氣候於皮毛勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺也則汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強胃膈脹滿久久不瘥已成肺痿也肺痿之候久嗽不已汗出過度重亡津液便如爛瓜下如豕脂小便數而不渴

傷醫大全

卷二十一 肺癰

毒

顧氏秘書

渴者自愈欲飲者欲瘥此由肺多唾涎沫而無膿者肺痿也風中於衛呼氣不入熱至於榮則吸而不出所以風傷皮毛熱傷血脉風熱相搏氣血稽留蘊結於肺變為肺疽診其脉候寸口脉數而虛者肺痿也數而實者肺疽也其肺瘡之候口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢微腫咳嗽膿血或腥臭濁沫胸中隱隱微痛者肺疽也

葉居中日經曰肺傷善痿痿則火鬱邪壅致金燥裂肺氣虛不能升降以克百脉難則全體受傷肺葉

焦枯息亦不利則火邪無以泄鬱遏薰蒸致咯咳嗽血血滲妄行必中府雲門隱痛咳則喉腥脉洪數而虛久則腐化而出遂成肺癰不治之症若膿血自止脉來短濇者不治自愈以肺經本部之脉在也

馮魯瞻曰咳而膺乳痛即看痰色如何若濃濁如膿或黃或赤口中臭即從肺痿肺癰治以脉數而虛者為肺痿脉數而實者為肺癰

又曰肺痿咳吐咽燥欲飲水者自愈張口短氣者

傷醫大全

卷二十一 肺癰

毒

顧氏秘書

肺癰門主方

金鯉湯 正宗

肺癰已成未成胸中隱痛咯吐膿血者

金色活鯉魚一尾約肆兩重川貝母一錢去心

先將活鯉魚連鱗剖去肚腸勿經水氣以貝母

末摻在魚肚內線裝之用上白童子小便半大

碗將魚浸童便內重湯頓煮魚眼突出為度少

頃取起去鱗骨取淨魚肉浸入童便內頓熱魚

與童便作二三次一日食盡其功效甚捷

湯醫大全

卷三十一 肺癰方

葦 顧氏秘書

排膿散

肺癰口吐膿血之後宜服此藥排膿穢補肺氣

人參 黃芪 白芷 五味子等分

右研細末每服三錢食後蜜湯調服

又方

金銀花八兩 當歸 麥門冬各二兩 白芍

山梔各三錢 生甘草 玄參各一兩

水入碗煎一碗服揷用水四碗煎半碗服

又方

蒲公英 當歸 生甘草各一兩 金銀花二兩

乳香去油研細 黃芩各一錢

水五碗煎一碗入乳香末和服

清金消毒湯 秘錄

金銀花入兩 當歸二兩 玄參 麥門冬

生甘草各一兩

水煎服

岐天師曰此方數品中惟麥冬乃清肺火之品

餘俱入脾入肝入心之藥而用之者何也蓋入

湯醫大全

卷三十一

肺癰方

葦 顧氏秘書

矣入脾則脾土能生肺金而肺金又得養矣雖

乃治心治脾治肝之藥似乎隔一隔二隔三治

法其實乃正治肺金也

雷公曰我意方中加白芍三錢平肝火使心火

弱不來尅肺也

救肺敗毒至聖丹 岐天師

金銀花十兩 玄參 麥門冬各三兩 生甘草五錢

水十碗煎四碗服

肺癰神湯 錦囊

薏苡仁 五錢 黃芪 蜜炙 白芨 金銀花

桔梗 各一錢 川貝母 一分 甜葶藶 八分 陳皮

甘草節 各一分 薑水煎食後徐徐服 新起 加防風一錢 貴後加

參一 久不歛 加合歡皮一名夜 錢 合即權樹皮一錢

肺癰久不歛口者 馮氏錦囊

合歡樹皮白蘇煎服最佳

桔梗湯

治咳膿腥血肺癰

傷醫大全

卷二十一

肺癰方

去

顧氏秘書

桔梗 炒 貝母 知母 桑白皮 炙

枳殼 黃芪 炙 當歸 防己

地骨皮 各一錢 甜葶藶 炒 瓜蒌仁 杏仁 杵

薏苡仁 各五分 合炒 五味子 炒 杵 各一錢 五分

作三劑水煎服

歷驗方

陳芥菜瀉服之埋地下三年者每早用數匙沖開

水服或作醬油入菜喫一百二十天不可間斷

又方

陳芥菜煨灰白湯調下可許見效一半

又方

白芨研細末每服三錢入藕粉內調服不過三五

兩即愈或燉蛋糕或和粥中服之並效

又方

扁栢葉搗取自然汁半杯入麥芽糖貳兩隔水燉

化清晨沖開水服之三次自愈

葦宙獨行方

治心胸錯甲為肺癰黃昏湯主之

傷醫大全

卷二十一

肺癰方

去

顧氏秘書

夜合皮 夜合樹按本草 掌大一片水三升煮取二

升分再服

肺癰第一次服四劑 錢青榆

薏苡仁 條芩 苦絲瓜

甘草 各一錢 川貝母 赤芍

瓜蒌仁 桔梗 廣陳皮

升麻 牡丹皮 各一錢 二分 引加黑棗二箇生薑一片食後煎服 如大便

不通加火麻仁

第二次服四劑

川貝母 赤芍 天花粉

甘草 瓜蒌仁 杏仁

連翹 獨活 知母

桔梗 百合各等分 燈心十根

白菓肉七箇

食後煎服

第三次服四劑

川貝母 甘草 瓜蒌仁

瘍醫大全

卷二十一 肺癰方 圭 顧氏秘書

獨活 天花粉 桔梗

麥門冬 赤芍 知母

百合各等分 燈心十根 白菓肉七箇

照前服 以後白鯨紅蘿蔔鴨蛋終身不可食

食則後發不治大暈一年後方可喫茹齋更妙

又方

綠橘葉洗淨搗絞汁一盞服之吐出膿血即愈

奇驗方 周鶴仙

凡人肺癰初起時欬兩胸脇即疼者是也即宜

速服此方神效

玄參八兩 天門冬四兩 桔梗二兩

甘草一兩

水十碗煎至二碗再入

蒲公英 金銀花各五錢

再煎至一碗飯食後服之初起者即消日久者

即生肉真奇方也

又方

洋糖二觔半 牯猪肚一副 杉木炭一分

瘍醫大全

卷二十一 肺癰方 圭 顧氏秘書

肉桂一分 糯米七粒

將猪肚洗淨以上項藥裝入肚內線縫好鍋煮

一天乾每早割一塊水酒下暈只喫牯猪肉肚

肺鯽魚餘俱戒一百二十天全愈屢效每清晨

未洗面時用陳芥菜滷冲水飲一鍾洗面後再

喫製猪肚

又方

用日久齷齪竹燈掛子一箇連宿油垢燒灰存性

研末黃酒送下三錢即愈極奇神效方不可輕忽

肺癰神方

何繼充家寶曾救治多人直神方也

懷生地

酒炒二錢五分 麥門冬 二錢

薏苡仁 四錢

當歸

酒浸

棗仁 炒

大貝母

蘇子

桔梗

瓜蒌仁

百合

各一錢

牡丹皮

桑白皮

蜜炙各七分

白芨

入分

炙甘草 二分

漢防已

六分

黃芪

一錢二分

白水煎

加減法

若睡不寧用棗仁睡既寧即去棗仁加北五味子七粒如咳嗽氣促去桔梗加款冬花一錢咳嗽作惡心加土炒白朮一錢

楊醫大全

卷二十一

肺癰方

圭

顧氏秘書

滋陰清化丸

何繼充

天門冬

去心

甘枸杞

麥門冬

去心

知母

酒洗

當歸

酒洗

生地

酒洗

熟地

酒煮

川貝母

去心各二兩

北五味

七錢

粉丹皮

山萸肉

立參

各一兩

白茯苓

懷山藥

各一兩五錢

右為末煉蜜為丸空心白湯送下三錢

百合湯

肺癰主方

棗仁

懷生地

當歸

黃芪

漢防已

蘇子

瓜蒌仁

桑白皮

川貝母

百合

薏苡仁

牡丹皮

甘草

桔梗

白水煎

有嗽加款冬花

肺癰神方

真麻油浸三稜白朮收藏浸二年者須服五六枚浸三四年者只服二枚即愈

楊醫大全

卷二十一

肺癰方

圭

顧氏秘書

肺癰奇方

石膏

寒水石

鵝管石

井泉石

龜背石

火煨人乳內淬存性

川貝母

各一兩

炙甘草

三錢

款冬花

五錢焙

右乳極細末聽用臨臥用細芽茶漱口再將藥

稱一分裝在蘆柴管內按在喉嚨口用氣慢慢

吸進喉中仰臥片時再飲茶二三口吞下 至

五更時又如此吸一服

桔梗杏仁煎

張景岳

治欬嗽吐膿痰中帶血或胸膈隱痛將成肺癰者此方為第一 此桔梗湯之變方也

桔梗 杏仁 甘草 各一錢

金銀花 麥門冬 夏枯草

白合 阿膠 連翹 各二錢

紅藤 貝母 各三錢 枳殼 一錢五分

水二鍾煎八錢食遠服 如火盛兼渴者加天花粉二錢

皂莢丸

治肺癰多逆上氣時時唾濁但坐不眠

瘍醫大全 卷二十一 肺癰方 葶 顧氏秘書

皂莢 刮去皮 炙 蘇炙

為末蜜丸以棗膏和湯服三丸

喻嘉言曰火熱之毒結聚於肺表之理之溫之清之曾不少應堅而不可攻者令服此丸庶幾無堅不入韋成洗滌之功不可藥之微賤而少之也本方加蛤粉等分為末名皂蛤丸治婦人風邪客於乳房而成奶癰每服二錢酒下此藥能導其汗散其風邪汗出而病自愈矣

救肺癰垂危仙方

魚腥草

煎湯打鷄蛋喫不過數次即可回生

腎癰門主論

經曰京門隱隱痛者腎疽其上肉微起者腎癰 京門穴又

名腎募在身側腰中監骨下肋間

素問曰腎癰脚下至小腹滿 大奇論云脚下當作胫下

張仲景曰小腹痛而痞堅者腎癰也小便數而似淋者腸癰也

者腸癰也

王肯堂曰腎癰京門穴必隱痛微腫令人寒熱往來

面白不渴少腹及肋下臃脹塞滿由腎虛不足之

人房勞太過身形受寒邪氣自外乘之初宜五積

瘍醫大全 卷二十一 腎癰 葶 顧氏秘書

散加細辛寒盡痛止宜桂附地黃丸調理

胃癰門主論

經曰中腕隱隱痛者胃疽其上一肉微起者胃癰中腕穴又

名胃募在臍上四寸

又曰胃腕癰人迎脉逆而盛

素問帝曰人病胃腕癰者診當何如岐伯曰診此者

當候胃脉其脉當沉細沉細者氣逆甲乙經沉逆細作沉滿

者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脉也逆而盛則

熱聚於胃中而不行故胃腕為癰也病能篇

聖濟錄云胃腕癰由寒氣隔陽熱聚胃口寒熱不調

湯醫大全 卷二十一 胃癰 韋 顧氏秘書

故血肉腐壞以氣逆於胃故胃脉沉細以陽氣不

得上升故人迎熱盛令人寒熱如瘡身皮甲錯或

咳嗽或嘔膿唾血若脉洪數膿成也急排之脉遲

緊瘀血也急下之否則其毒內攻腐爛腸胃矣

李東垣曰臟腑腸胃內瘡內疽其疾隱而不見目既

不見手不能近所為至難可以診其脉而辨之亦

可知矣有胃腕癰者當候胃脉人迎者胃脉也其

脉沉細者氣逆逆則甚甚則熱聚胃口而不行胃

腕而為癰也若其脉洪數者膿已成也設脉遲緊

雖膿未就已有瘀血也宜急治之不爾則邪氣內攻腐爛腸胃不可救也十書

百效全書云胃腕居心穴之下其生癰也外症寒熱

如瘡胃濁則肺金失養或咳或嘔或唾膿血皮膚

錯縱多因飲食七情火鬱彼又外感寒氣使熱濁

之氣填塞胃腕胃中清氣下陷故右關脉來沉細

胃中又為寒氣所隔故人迎脉來緊盛有此二脉

胃癰始成宜大射干湯如痰氣上壅甘桔湯大便

不利太乙膏作丸服之小便赤澀腹滿不食三仁

湯醫大全 卷二十一 胃癰 美 顧氏秘書

湯膿出食少補中益氣湯

寶漢卿曰凡內癰予嘗以薏苡仁湯牡丹皮散太乙

膏治之亦效若吐膿血飲食少思宜助胃壯氣為

主而佐以前法不可專治其瘡全書

朱丹溪曰內疽者因飲食之毒七情之火相鬱而發

用射干湯主之

馮魯瞻曰胃癰者胃為水穀之海多氣多血多熱若

邪熱內泊則兩熱相合故結為癰而胃脉必沉細

人迎必甚盛蓋胃脉見於右關本宜洪大而反沉

細者足見胃氣之逆也人迎者胃經穴名在結喉兩傍亦有動脈應於其間見於左寸今若人迎甚盛而右關沉細則愈見熱壅聚於胃口而不行故不能充於脈耳人見人迎脈盛誤為傷寒禁其飲食則必死 錦囊

又曰胃脘癰者何以別之內經云人病胃脘癰者當論脈沉細細者氣逆逆者人迎反甚則熱聚於胃口而不行故胃脘為癰也治法與腸癰同初以疏利之藥導其滯次用排膿消毒托裏之藥調之

湯醫大全

卷二十一

胃癰

卷

顧氏秘書

此其六法也

張仲景曰胃癰初起中脘穴必隱痛微腫寒熱如瘧身皮甲錯並無欬嗽咯吐膿血由飲食之毒七情之火熱聚胃口而成癰也脈來沉數者清胃射干湯下之若脈瀉滯者瘀血也牡丹皮湯下之脈洪數者膿已成也赤豆苡仁湯排之體倦氣喘作渴小水頻數者肺氣虛也補中益氣湯加麥味補之

胃癰門主方

大射干湯

治胃癰始成

射干

升麻

白朮

赤芍藥

赤茯苓

山梔仁

水煎熟入蜜生地汁和服

甘桔湯

治胃癰痰氣上壅

甘草

桔梗

麥門冬各一兩

湯醫大全

卷二十一

胃癰方

卷

顧氏秘書

水煎服

三仁湯

治胃癰小便赤澀腹滿不食

薏苡仁

棗仁

冬瓜子仁

牡丹皮

水煎服

射干湯

射干

升麻

犀角

麥門冬

元參

大黃

黃芩各一錢 芒硝 梔子

竹葉各五錢

水煎服

赤豆苡仁湯

赤小豆 防己 薏苡仁

甘草各等分

水煎食遠服

湯醫大全

卷二十一 胃癰方

堯

顧氏秘書

大腸癰門主論

經曰天樞隱隱痛者大腸疽其上肉微起者大腸癰

天樞穴又名大腸募在臍傍開二寸

陳遠公曰人腹中疼甚手不可按右足屈而不伸人

以為腹中火盛而存食也誰知大腸生癰乎凡腹

痛足不能伸者俱腸癰也而大腸癰足猶不能伸

也但大腸生癰無不成於火火盛不散則鬱結成

癰矣然火之有餘本水之不足水衰則火旺火無

水制乃養成其毒耳治法不必治火壯水以制火

湯醫大全

卷二十一 大腸癰

卑

顧氏秘書

毒氣自消矣清腸飲金銀花三兩當歸二兩地榆

麥冬元參各一兩薏仁五錢生甘草三錢黃芩二

錢水煎服一劑痛少止二劑足可伸又二劑毒盡

此方活血解毒雖瀉火而實滋陰也相濟相成取效故神耳倘不益陰以潤腸惟攻毒以降火則大腸先損何能勝火毒凌燥哉無怪治之不效也水鑑

又曰大腸生癰右足不伸腹疼甚便出膿血肛門如

刀割此已潰爛也能食者生不能食者死然不能

食之中亦有非因火毒之熾而然者又不因其不

能食而棄之也凡生癰疽俱以有胃氣為佳無胃

氣無論陰毒陽毒多不可救故陰疽症必以扶胃氣為第一少加敗膿祛毒則正氣無傷火毒易散今大腸癰破而不思食則胃氣盡絕大危證也不急補胃而惟治癰必死之道矣開胃救亡湯人參山藥薏仁元參白朮各一兩金銀花二兩生甘草三錢山羊血一錢研水煎調服一劑胃開二劑膿少三劑癰止四劑全愈

此方救胃而敗膿祛毒已在其中妙在銀花治毒仍是滋陰之品為毒家奪命之將軍乃至仁至勇之師又得參朮補助其力則散毒猶神山羊血止血解渴且善通氣引各藥直入癰中以解散之合

瘍醫大全

卷二十一

大腸癰

望

顧氏秘書

而治之調合有人撫緩有人攻彰有人安得不勝乎自然胃氣開化精微而轉輸於大腸也倘胃氣未傷服之尤效切勿疑而不用以枉人性命耳

又曰大腸生癰小腹痛甚淋瀝不已精神衰少飲食無味面色痿黃四肢無力自汗盜汗夜不得臥人以爲火盛生癰也誰知水衰不能潤腸耳夫大腸不能傳導者全賴腎水灌注今因醉飽房勞過傷精力大泄其精以致火動水涸又加生冷兼進以致氣血乖違濕動痰生腸胃痞塞運化不通氣血凝滯而成癰也然則生癰之先本腎水之不足茲

癰潰之後又復流其水是虛其虛矣若作火毒治鮮不變為死證必須大補腎水並補脾胃之氣則脾胃化精生水更易枯涸之腸一旦得滂沱之潤自然沾足重蘇不治癰而癰已化氣血足而肌肉生也加味六味地黃湯以治之熟地二兩山藥山黃各八錢丹皮六錢澤瀉一錢白茯苓三錢人參麥冬各一兩黃芪五錢水煎服數劑癰止神健

按六味補腎水加參芪麥冬補脾胃之土土旺而肺自旺肺與大腸為表裏又為腎之母母子相需表裡相顧故奏功如神也

瘍醫大全

卷二十一

大腸癰

望

顧氏秘書

王肯堂曰大腸癰多大便秘腫初起發熱惡風自汗身皮甲錯按之腹內急痛

小腸癰門主論

經曰關元隱隱痛者小腸疽其上肉微起者小腸癰

關元穴又名小腸募在臍下三寸

千金曰腸癰之為病小腹腫強按則痛便數似淋

厥論曰少陽厥逆機關不利機關不利者腰不可以

行項不可以顧發腸癰不可治驚則死

王肯堂曰千金謂妄治必殺人腸癰為病小腹重而

強按之則痛便數似淋時時汗出復惡寒身皮甲

錯腹皮急如腫狀其脉數者小腸有膿也 準繩

傷醫大全 卷二十一 小腸癰 聖 顧氏秘書

陳無擇曰腸癰為病身甲錯腹皮急按之濡如腫狀

腹無聚積身無熱脉數此為腸內有膿久積陰冷

所成也故金匱有用附子溫之其脉遲緊者膿未

成可下之當有血洪數者膿已成不可下此以內

結熱所成也故金匱有用大黃利之

張仲景曰腸癰小腹痞堅蓋小腹痛而痞小便數而

似淋者腸癰即肺癰肝癰之屬

巢氏曰洪數者已有膿脉若遲緊者未有膿甚者腹

脹大轉側有水聲或透臍生瘡或膿自臍出或大

便出膿血

張景岳曰經言腸癰為病不可驚驚則腸斷而死故

患是者其坐臥轉側極宜徐緩時時少飲薄粥及

八珍湯固其元氣靜養調理庶可保其有生 全書

薛立齋曰此證因七情飲食所致

又曰若臍間出膿者不治

孫直人曰腸癰小腹重強按之則痛小便如淋時時

汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急加腫甚者腹脹大

轉側有水聲或繞臍生瘡膿從臍出或從大便下

傷醫大全 卷二十一 小腸癰 聖 顧氏秘書

乃七情飲食所致脉遲緊者未有膿也大黃湯下

之洪數者已有膿也蓋以湯排之小腹疼痛小便

不利膿壅滯也牡丹皮散主之

陳實功曰腸癰初起發熱惡寒脉扎而數皮毛錯縱

腹急漸腫按之急痛大便墜重小便澀滯若淋甚

者臍突腹脹轉側水聲皆由濕熱瘀血流入小腸

而成癰也 正宗

又曰男子暴急奔走以致腸胃傳送不能舒利敗血

濁氣壅遏而成婦人產後體虛多臥未經起坐而

成婦人坐草艱難用力太過而成婦人分娩後失
逐敗瘀以致敗血停積腸胃結滯而成饑飽勞傷
擔負重物致傷腸胃而成醉飽房勞過傷精力或
生冷並進以致氣血乖違濕動痰生多致腸胃病
塞運化不通氣血凝滯皆能致之

又曰初起未成小腹殷殷作痛儼似奔豚小便淋瀝
者當以大黃湯下之瘀血去盡自安體虛脉細不
敢下者活血散瘀湯和利之

又曰腹濡而痛小腹急脹時時下膿者毒未解也用

湯醫大全 卷二十一 小腸癰 聖 顧氏秘書

牡丹皮湯治之

又曰已成腹中疼痛脹滿不食便淋刺痛者薏苡仁
湯主之

又曰如膿從臍出腹脹不除飲食減少面白神疲此
乃氣血兩虧宜用八珍湯加牡丹皮肉桂黃芪北
五味飲而補之

又曰如積襲日久因循不識此症悞作脹病治之以
致毒攻內臟腸胃受傷或致陰器攻爛腐腐黑斑
色敗無膿時流污水腹連陰痛煩燥不止身熱口

乾衄幃多臭臥房難進者俱為不治

馮魯瞻曰小腸癰作痛者其身甲錯腹皮緊按之濡

如腫狀腹常痛或透臍生瘡急宜下之 錦囊

又曰一室女時患腹痛食少面黃肌瘦幼科治以退

熱消積女科治以通經行血大方以虛而議補俱

不效後有識者曰脉大而尺獨數肌膚甲錯

也此小腸有癰膿已成而將潰矣亟與葵根一兩

金銀花三錢甘草節一錢皂角刺陳皮各二錢再

劑而膿血大潰東以太乙膏同參芪治之一月始

湯醫大全 卷二十一 小腸癰 聖 顧氏秘書

安

又曰腸癰是膏梁積熱所致其候身皮甲錯腹皮急

按之濡如腫狀透臍生瘡小腹按之則痛澀數似

淋腹脹惡寒身熱自汗如脉沉緊而未有膿須急

解毒如脉洪數已有膿須急下膿若小腹痛而小

便閉者是膿壅滯也然腸癰為病切不可驚驚則

腸斷故坐臥轉側切須徐緩並飲薄粥及八珍湯

以固元氣靜養調理庶可保也

李東垣曰腸癰透臍生瘡膿從瘡出者有出臍中者

惟大便下膿血者自愈也 十書

中斗垣曰腸內生癰當驗症明白不可妄治妄則殺人其病小腹重按之痛小便如淋時時汗出惡寒身皮錯腹皮急遠臍生瘡或臍出膿或大便膿血如左腫甚者左寸洪數是小腸癰右腫甚者右寸洪數是大腸癰 敬立

朱丹溪曰肌膚甲錯腹皮緊小腹痛小便似淋時時汗出或引大腹痛按之濡若腫狀腹無積聚身不發熱脈來弦數此腸中有癰久積陰冷所致宜用

湯醫大全 卷二十一 小腸癰 署 顧氏秘書

溫熱之劑以溫發之故金匱有用附子溫之者

何氏曰凡腸癰男左女右脚曲不能伸者是若悞作陰疝與傷寒治之為禍不小 濟生

胡公弼曰按臍下一寸三分即腸之屈曲間大腸左盤小腸右曲其生癰也由冷毒積久腸厚而不能發越於外故生於內外視之無形重按之痛甚毒生於左則左足不能伸毒生於右則右足不能伸生毒之處肌膚微有縐紋細觀亦覺微腫此症當服牛膠酒吞太乙膏丸追膿解毒治一不著則難

救矣 青囊

寶漢卿曰膀胱有熱蓄毒不流結成此候以致臍中堅硬結核小便疼痛日夜下利無度是也外宜用連鬚葱十根搗爛罨臍上

又曰婦人腸癰與男子不同乃心經毒流小腸經發在臍中堅硬如石此是惡候也宜內托

又曰腸癰若大便或臍間出膿者不治

內經曰腸癰為病不可驚驚則腸斷而死故患是者

其坐臥轉側務宜徐緩時少飲薄粥及服八珍湯

湯醫大全 卷二十一 小腸癰 署 顧氏秘書

固其元氣靜養調理庶可保全其生 全書

千金方灸法曲兩肘正肘頭銳骨灸百壯下膿血而安

脈經問曰羽林婦病何以知腸有膿師曰脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干為敗濁小腹痞堅小便或澁或自汗出或復惡寒膿為已成設脈遲緊則為瘀血血下即安

陳遠公曰有腹疼口渴左足不伸伸則疼甚手按之

猶不可忍人以爲腸中生癰也然腸癰有大小腸之分屈右足者大腸生癰也屈左足者小腸生癰也今屈左足是小腸生癰矣但大腸癰易治小腸癰難醫以大腸可瀉小腸難瀉也然得法又何不可瀉哉蓋大腸瀉火從精粕而出小腸瀉火從溲溺而泄也泄毒至神湯銀花三兩茯苓薏苡各一兩甘草車前子劉寄奴澤瀉各三錢肉桂一分水煎服一劑水如注二劑疼大減三劑全愈此方俱利水之味只金銀花消毒何神奇至此蓋小腸之毒必須內消內消之藥舍金銀花無他味可代以他味消毒皆損正氣而小腸斷不可傷故以金銀花爲君也但此物不能入小腸今同茯苓車瀉之類引入小腸又少加肉桂引入膀胱從溲溺而化又恐火毒太旺各藥不能迅速加入寄奴之速祛甘草之緩調既無留滯之患又無峻烈之害火毒自從膀胱小腸出也 水鑑

湯醫大全

卷二十一

小腸癰

吳

類氏秘傳

足而今足不屈似非腸癰然癰生腸內者必屈其足在大腸內者屈右足而不伸在小腸內者屈左足而不伸若癰生腸外皆不屈足疼在左則小腸生癰疼在右則大腸生癰也至食積燥屎之痛時疼時止生癰之痛乃定而不移痛而不止也故疼在左乃小腸之外生癰也癰生二腸之內尚可破潰生於腸外不可使潰以腸外無可出之路皆死症也而小腸尤甚必早治之內化丹金銀花四兩車前子五錢白茯苓薏苡仁各一兩生甘草三錢水煎服三劑疼止四劑全愈

此即前方之變也前方利水之中行其敗毒之法此方入當歸二兩利水之中補血敗毒之法也蓋癰破利水則毒隨水出易於祛除癰未破不補血以利水則水泄而血虛難於消化同中之異不可不知總宜早治否則癰難愈而瘀血流於腸外必有終身腹痛之病也

又曰有腹疼驟甚小便流血左足不能伸人以爲小腸癰也誰知小腸火盛乎夫小腸生癰必屈左足今足不伸明是生癰而曰火盛者何故不知生癰必有其徵未有一旦驟生而卽流血者也癰日久而生膿膿欲盡而血出豈有不潰而先出血者然

湯醫大全

卷二十一

小腸癰

李

類氏秘傳

右足不伸何也蓋小腸與大腸不同小腸細而大腸寬寬者可以容邪細者難以容邪必然之理也小腸受火煎熬腸中逼迫腸不能舒而左足暫屈不若生癱者長屈而不伸也勿以足不伸即信是癱妄行解毒然何以辨之初病之時辨其小便中有血無血耳初痛而足屈小便無血乃是生癱初痛而足屈小便有血乃是火痛不可差也治法瀉其火邪不必化毒而痛止足伸矣小柴胡湯加味以治之柴胡半夏甘草各一錢人參二錢茯苓五

瘍醫大全

卷二十一

小腸癱

李

顧氏秘書

錢黃芩三錢水煎服一劑足伸二劑血痛俱止按小柴胡湯非治小腸之方也何以應效如此之捷夫小腸火盛者起於肝膽之鬱也木鬱則火生不敢犯心而犯小腸耳夫火性炎上今反下熾拂乃小腸之血為火所逼血恐為火燥乾越出小腸之外直走膀胱反使水道不行而流血也小柴胡舒肝膽之氣則火氣上炎其性既順又得茯苓清滲水氣水流而血自歸經此方之所以奇耳

腸癱門主方

救腸敗毒至聖丹 岐天師

金銀花

八兩煎

當歸

三兩

地榆

一兩

薏苡仁

伍錢

水十五碗煎二碗分作二服上午一服臨睡一

服二劑愈 初起宜服

牡丹皮散

千金

牡丹皮

五錢

瓜蒌仁

去油

桃仁

去皮尖研

二十粒

薏苡仁

一兩

瘍醫大全

卷二十一

腸癱方

李

顧氏秘書

白水煎服

按金匱要畧云牡丹皮散用冬瓜子仁非瓜蒌仁蓋冬瓜子仁主解毒護膜厚腸生肌之功

活腸散毒丹 華真君

治已成內必出毒用 以助其潰膿

當歸

各二兩

金銀花

各二兩

生甘草

三錢

地榆

牛膝

各一兩

水煎取汁一碗調乳香沒藥末各一錢五分飲之渣水再煎一碗又調乳香沒藥末各一錢五分飲之大約早服頭煎晚服二煎二劑全好

芭蕉散 孫欽武

芭蕉根切片焙乾為末將猪胰子煮爛蘸藥末食之二三次日即愈

腸内生癰 千金

瓜子三升搗碎以水三大碗煎至一大碗分三次服

小腸癰 濟生

當歸尾

白芥子

炒研末

尖檳榔

小者

瓜 蔓

打碎

蘓 木

各一錢

枳 殼

瘍醫大全

卷二十一

腸癰方

聖

類氏秘書

紅 花

各八分

薏苡仁

炒二錢

桃 仁

去皮尖打碎六分

白芍藥

一錢五分

水二鍾煎一鍾

先將黑白牽牛頭末各等分

以生蜜為丸虛人二錢實人三錢以前湯送下

腸癰 秘方

凡小腸堅硬如掌而熱按之則痛肉色如故或焮赤微腫小便頻數汗出憎寒脉緊實而有力

服此神效

大 黃

炒

朴 硝

各一錢

桃 仁

牡丹皮

白芥子 各二錢

空心煎服

肚癰大小腸癰冬瓜癰

抄本

白 芷

菘 豆

大 黃 各二錢

乳 香

沒 藥

各一錢

番木鱉

二枚去毛

當歸尾

一錢五分

研末每服二錢酒調服以平為度

腸癰肚癰神效奇方

木 瓜

白 芷

獨 活

瘍醫大全

卷二十一

腸癰方

聖

類氏秘書

甘草節

連 翹

金 銀 花

蒼 朮

川貝母

牛 膝

生 地

各二錢

當 歸

五錢

好酒二碗煎一碗空心服至重者四五服必效

忌發風動氣之物煎時忌見婦人雞犬 並治

一切無名腫毒一劑見效

腸癰胃癰肺癰腹癰神方

胡石臣

黃 芪

酒炒

黃 芩

各三錢

連 翹

白 芷

各一錢

穿山甲

炙二錢

露蜂房

陳醋浸數次二個

蜈蚣 酒浸炙 二十條

右為細末用水或米粥疊丸如菘豆大晒乾收貯 又用空大黃為末水疊丸如菘豆大晒乾另貯 如有前症年壯者兩宗丸藥各三錢或酒或開水送下虛弱人前丸用三錢大黃丸或二錢或一錢五分服之其毒氣膿血皆從大腸而出矣亦有從口內出者

腸癰秘方 張景岳

凡腸癰生於小肚角微腫而小腹隱痛不止者是

傷醫大全 卷二十一 腸癰方 藥 顧氏秘書

若毒氣不散漸大內攻而潰則成大患急宜以此

藥治之

先用紅藤一兩以好酒二碗煎一碗午前一服醉臥之

午後用紫花地丁一兩亦如前煎服服後痛必漸止為效然後服後末藥除根

大黃 瓦 龍 蟬 蛻

蠶 蠶 各二錢 石蟻 此草藥也 當 歸 各五錢

老蜘蛛 二個 捉放新瓦上以酒鍾蓋定外用炭火煨乾存性

右為末每空心用酒調服一錢許日逐漸服自消

傷醫大全 卷二十一 腸癰方 藥 顧氏秘書

三焦疽門主論

經曰丹田隱隱痛者三焦疽其上肉微起者三焦癰
王肯堂曰三焦癰石門穴又名三焦募在臍下二寸必隱痛微腫
令人寒熱往來二便秘澁由濕熱過寒凝結而成
治法與大小腸癰同

人全 卷二十一 三焦疽 三

痞積癥瘕門主論

書云積聚大小一轍但人大氣壯無積人小氣弱積
多故積論偏重啞科

夫不言痢瀉痞三者而僅言積治未病之源也更不
言六聚而先言五積從其難者而言之也聚與積
總因食物不化陰血凝聚源同而名異經曰積者
五臟所生聚者六腑所成氣之所積名曰積氣之
所聚名曰聚聚者陽氣也故陽浮而動其氣運轉
不定遇滯即止發無本根痛無常處氣旺漸消不

湯醫大全 卷二十一 痞積 顧氏秘書

治自己積者陰氣也故陰沉而伏蓄積一處而不
行發有常處其痛不離其部陰屬裏治之為難積
有常所有形之血也聚無定部無形之氣也積塊
者痰與食積死血也凡面黃浮腫腹脹虛鳴小便
如油毛髮焦黃下痢赤白目珠黃赤遍體虛腫當
腹倍熱遇食吐疼昏困多睡者皆是積候宜急治
之若至面白喘急或面黑眼直乾嘔不食瀉住又
瀉腹急如鼓項軟口噤手足俱細者並為不治然
有五臟為積之名癥瘕痞癖四症之別食乳氣三

積之分虛實驚諸積之異先舉五臟之積而詳之
肝之積名曰肥氣在左脇下形如覆杯有頭有足
如龜鱉狀心之積名曰伏梁起於臍上大如手臂
上至心下脾之積名曰痞氣在於胃腕覆大如盤
肺之積名曰息賁在右脇下覆如大杯腎之積名
曰奔豚發於少腹上至心下如豚奔走之狀或上
或下亦無定時此五積之候也癥者按之應手亦
如五積之不移瘕者假物成形如魚鱉石瘕之類
瘕者皮厚也在肌肉之間而可見者也癖者僻也

瘍醫大全

卷二十一

痞積

堯

顧氏秘書

內結於隱僻外不可見也乳積者吐瀉兼作氣息
酸臭因乳哺失調所致也食積者腹堅熱渴或瀉
或嘔腸鳴腹痛因飲食過餐而得也氣積者腹痛
啼叫痢如蟹激因物觸忤兒或食母氣乳而得也
虛積者乳食不化一身浮腫虛中受積也實積者
壯熱糞鞭身熱而渴嗜食善饑實熱蘊積也驚積
者因驚時與食口穢而黃當腹疼痛也治之之法
寒者溫之熱者清之實者行之虛者調之驚者和
之治積惟有揆積磨積消積化積而無迅下之理

丹溪曰凡積不可用下藥徒損真氣病亦不去况
積之成也正氣不足而後邪氣踞之如小人在朝
由君子之衰也正氣與邪勢不兩立一勝則一負
邪氣日昌正氣日削不攻去之危亡從及然攻之
太急正氣轉傷初中末之三法不可不明也初者
病邪初起正氣尚強邪氣尚淺則任受攻中者受
病漸久邪氣較深正氣較弱任受且攻且補末者
病魔經久邪氣侵凌正氣消殘則任受補蓋積之
爲義匪朝伊夕所以去之亦當有漸攻之愈亟則

瘍醫大全

卷二十一

痞積

李

顧氏秘書

傷正氣正傷則不能運化而邪愈固矣更宜審明
何經受病受傷何物從其因以治之
昔張子和動輒言下下之當也仲景三承氣審之詳
密可下不可下急下何積何藥分毫不爽寒積巴
菝感應丸熱積大黃承氣湯血積桃仁紅花下水
牽牛甘遂水中之血蟲蠱水蛭虫積檳榔雷丸今
人畏而不敢下者不明之罪無忌而妄用者殺人
之罪稍虛者當扶助正氣消息推蕩之慎勿孟浪
戕人天年

五積當從鬱論難經所謂因受勝已之邪傳於已之所勝適當旺時拒而不受因留為積此皆抑鬱不伸而受其邪故五積六聚治同鬱斷伏梁者心之鬱肥氣者木之鬱痞氣者土之鬱息賁者金之鬱奔豚者水之鬱鬱者氣不舒而抑鬱成積不獨聚可以氣言也故治積之法以理氣為先則津液流行積聚何由而成然更不可不兼以補也蓋壯者氣行則已快者着而成病故積之為積本於氣虛血弱之人故曰壯人無積虛則有之善治積者不

傷醫大全

卷二十一

痞積

李

顧氏秘書

必問其何經何臟必先調其中氣使能飲食氣血既旺積滯自消即壯實而宜消者亦當以補氣補血之藥兼服經曰大積大聚其可犯也衰其半而已故消積及半純與甘溫調養使脾土健運則餘積不攻自退所謂養正則邪自除猶滿座皆君子則一二小人自無容身之地若欲積盡而後止胃氣之存也無幾矣

積聚痞塊之證皆內為喜怒憂思悲恐驚七情所致若以五臟傳尅成積不亦求之太過乎蓋氣血榮

衛一身上下周流無時少息一旦七情感動五志之火火性炎上有升無降以致氣液水穀不能順序稽留為積也必矣丹溪曰氣不能成塊成聚夫塊乃有形之物乃痰與食積死血而成凡在中為痰飲在右為食積在左為血塊何以明之夫左關肝膽之位藏血液右關脾胃之位藏飲食所以左邊有積則為血塊右邊有積則為食積而其中間則為水穀出入之道路五志之火薰蒸水穀而為痰飲所以中間有積則為痰飲也治法因所因從其類以治之大抵積之初多屬寒而積之久則為熱矣宜知新久之異以分辛溫辛平辛涼三者之宜然人之積塊疝氣心腹等痛本多屬熱而方中又多用桂附熱藥却又不發藥毒者蓋因諸積諸痛喜溫而惡寒熱藥與病情相和况積久成鬱而火邪深矣若見寒愈逆見熱愈喜兩熱相從是即所謂亢則害承乃制從治法也世人見其投熱不為熱誤遂以是寒為屬沉寒痼冷恣投熱劑以致真氣被蝕陰血乾枯不可為矣抑嘗論之醫為病

傷醫大全

卷二十一

痞積

李

顧氏秘書

所困者惟陰虛之難補久積之難除故玉山自倒
陰虛之謂也養虎遺患久積之謂也人之懼此二
者須節慾以養性內觀以養神澹泊自如從容自
得然後委之於醫方能為爾保也

癥者是因飲食得之痛刺脇肋心胸煩悶飲食不下
吐逆惡心日久不治漸成癥結又曰食結其症屬
陰陰主靜故癥定於一處而不移

瘕者是因傷血得之其狀胸膈煩悶痛引少腹時或
攻築上搶心胸雖不阻食漸成瘕結又曰血結然

瘍醫大全

卷二十一

痞積

奎

顧氏秘書

此與癥總因榮衛俱虛風寒襲於外飲食滯於中
久而不化則邪併於陰而為瘕邪併於陽則為瘕
瘕者假物象形動而不息去來無常或兩脇間有
塊如石按之則痛不按則輕久而不已面黃肌瘦
肚鞭而脹腹現青筋晝涼夜熱食減殮泥成爲疝
積治宜調脾養胃磨積消疝非一日一夕可愈也
痞者是因傷氣得之其候心腹膨脹肚大脇滿痛刺
往來住在左肋面黃肌瘦倦怠無力久而不治漸
成痞塊痞者塞也結者實也凡熱氣蘊於胸膈之

間停飲聚於腹脇之內於是榮衛不得流行腑臟
不得宣通而乃成結也不可迅下否則邪反堅結
經所謂着而不去其病爲實矣惟宜安胃理脾佐
以順氣化滯若胸中氣不通泰而如痞者乃正氣
不運所致不可作有形攻治蓋胸爲受氣之所虛
則受而不能行實非物也故曰痞者否也

癖者是因積得之其症如腸癖之疾便利無度似痢
非痢似蟲非蟲或下鮮血肚腹乾痛心胸滿悶久
而不治則頑結不散有類痞狀蓋由乳哺失調停

瘍醫大全

卷二十一

痞積

奎

顧氏秘書

滯爲積久則血膜併聚脇傍結癖時時作痛或發
潮熱又有食癖乳癖疝癖驚癖虛癖痰癖之分其
傷氣血一也若至面色紫黑肚脹如鼓湊心刺痛
忽瀉鮮血唇舌皆黑乾嘔氣促皮焦斑紫吐瀉出
蟲腸鳴自利體虛發搐面青流涎手足心腫面黑
瀉黑者並皆不治

錢仲陽曰癖塊者僻於兩脇痞結者居於中脘此因
乳哺失調飲食停滯邪氣相搏而成醫者多用尅
伐脾胃必虛久而不愈必先以固胃氣爲主使養

正則積自除若欲直攻其結不惟不消抑亦損其

脾土脾土虧損必變症百出矣宜朝服補中益氣

湯夕服千金消癖丸間服治之獲效多矣幼科痞塊論

酒積甚者甘遂牽牛

氣積甚者枳實牽牛

血積甚者乾漆桃仁丹皮歸尾赤芍紅花

痰積甚者淡痰丸老痰海石瓦楞子皮裏膜外芥子

水積甚者商陸甘遂芫花

茶積甚者黃黃芝蔴

癆醫大全 卷二十一 痞積 奎 顧氏秘書

穀積甚者雞內金

肉積甚者礪砂硝石

蛋積甚者菴橘紅

魚鱉積甚者蘇橘紅木香薑汁

蟲積甚者黃錫灰檳榔雷丸蕪荑

狗肉積甚者杏仁

蟹積甚者紫蘇

痞積瘕瘕門主方

化痞膏

生大黃一兩 半夏 荆三稜

蘇木 穿山甲 陳皮

當歸尾 全蝎 番木鱉

紅花 陳枳殼 厚朴

蓬莪朮 血餘 大貝母

川烏 天南星 香附

赤芍藥 草烏 堅柝榔 各三錢

癆醫大全 卷二十一 痞積方 奎 顧氏秘書

蜈蚣十條 巴豆仁五十粒 大鱉一個切

桃枝 楊枝 桑枝

槐枝各十寸 葱十根 水紅花子五錢

白鳳仙根五根

用蘇油三觔全煎藥枯去渣再入東丹二十四

兩收之成膏取起冷定篩入後藥攪勻

阿魏 蘇合油各五錢 血竭

真沒藥去油 肉桂 孩兒茶

潮腦 滴乳香去油 虎骨煨

青黛 各三錢 水片 麝香
乾漆 各二錢 皮補 一兩 瓦楞子 煨三錢

共乳極細末篩入膏內攪勻攤貼

淨府湯

治小兒一切癩塊發熱口乾等症

柴胡 山查肉 猪苓

白茯苓 澤瀉 菝葜 醋炒

三稜 醋炒各一錢 黃芩 白朮 去蘆

半夏 薑汁炒 人參 各八分 胡黃連

瘍醫大全 卷二十一 痞積方 李 顧氏秘書

甘草 各三分

薑棗為引煎服

千金消癩丸

蘆會 陳皮 去白 厚朴 薑汁炒

青黛 廣木香 檳榔 各一錢

麥芽 炒 神麴 水紅花子 各四錢

史君子 去殼 胡黃連 香附 水浸

菝葜 木 醋炒 三稜 醋炒 山查肉

白茯苓 白朮 去蘆 人參 去蘆

甘草 炙一錢

右為末將阿魏一錢水和麵打糊為丸棗豆大 每服五十九米飲下

尅堅膏 回春

專治小兒癩塊發熱羸瘦者

木鱉子 川烏 穿山甲

甘遂 當歸 甘草 各八錢

直香油一筋入藥熬成黑色濾去渣再慢火熬

次下黃丹八兩熬至滴水成珠離火加

瘍醫大全 卷二十一 痞積方 李 顧氏秘書

礞砂 三錢 麝香 一錢 水紅花子

皮硝 礞砂 阿魏

蘆薈 各五錢

為末入內攪勻攤貼 先用皮硝水洗皮膚方 貼癩處二三日後覺肚內作痛四五日發癢糞

後有膿血之物是其驗也

抓癩膏 李滄溪

桃仁 四兩 白蠟 四錢 生豬腦子

血餘 香油 桐油

右俱下鍋內文武火熬至腦子盡濾去渣下次
黃丹十四兩熬成膏待溫再下

胡黃連 白芷 紅花

蘇木 三稜 莪木 各三錢

當歸尾 礶砂 各五錢 麝香 一分

各為細末入前膏內攪勻收貯勿令泄氣有塊
先用皮硝煎洗瘰癧處次用薑擦方用絹帛攤貼
後用鞋底炙熱熨之五七十遍覺內熱方可瘰

即消縮如神

瘰癧方 卷二十一 瘰癧方 突 顧氏秘書

消瘰驗方 懷德堂秘錄

每一歲用鱉甲 醋炙 一個 全蠍 三隻 去頭足 新瓦 雄黃

二 研細末用芝蔴一撮畧炒白糖霜拌五更時送

下十歲服十服二十歲服二十服即愈

又方 抄木

全 蝎 三個 去頭足 土鱉虫 二個 去足 大桑虫 二個

全焙乾用乾芝蔴一撮銅杓內炒燥為末用上

好建糖調五更服酒漿送下

瘰癧痞塊 無見和尚

阿魏 全 蝎 各二錢 金頭蜈蚣 全用一條

大黃 酒炒 一兩 皮硝 二兩

共研細末收貯 大人用五分小兒用三分裝
入雞蛋內飯上蒸熟火酒送下每晚喫一個七
晚喫七個不過十日半月改換顏色

化痞膏 劉長隨

當歸尾 紅花 金銀花

三稜 白芥子 莪木

葫蘆巴 昆布 生地黃

瘰癧方 卷二十一 瘰癧方 突 顧氏秘書

桃仁 亂頭髮 大黃

熟地黃 鱉甲 穿山甲 各一兩

海藻 兩頭尖 阿魏

草麻子 川烏 巴豆仁

黃連 天南星 漏蘆

大貝母 半夏 川草薺

大戟 胡黃連 甘遂

鳳仙子 芫花 海浮石

阿膠 葳靈仙 檳榔

直蠶蠶

全蝎

瓜兒竭

乳香 去油

粉甘草

金線重樓

沒藥 去油各三錢

土木鱉

番木鱉

獨蒜 各三個

蜈蚣 三十條

水紅花子 四兩

鮮商陸 八兩

活鯽魚 一個重半兩

蘇油 三兩

黃丹 飛晒炒 一兩

麝香 一錢

右藥除乳沒竭麝阿魏五味另研收貯臨攤時

摻膏藥上 群藥同油熬膏悉如熬膏法修合

化痞丸 劉長隨

瘍醫大全

卷二十一

痞積方

三

顧氏秘書

莪朮 醋炒

海浮石 煨

三稜 醋炒

瓦楞子 煨

乾漆

大茴香

山查

穿山甲

丁皮

五靈脂

白芷

陳皮

玄胡索

廣木香

牡丹皮

青皮

桔梗

枳殼

胡椒

神麴

蒲黃

香附

桃仁

紅花

川芎

當歸

厚朴

砂仁

鱉甲 醋炙

朴硝 各三錢

阿魏 五錢

小茴香

赤芍藥

史君子 淨肉

桂皮

鐵花粉 各四錢

水紅花子 四兩

右為末皂莢煎湯疊九桐子大每服三十九壯

實人可加至四五十九日三服俱酒下一料可

治二人

敷羸瘦不堪之痞塊不能用尅伐藥者

硃砂

銀硃

飛丹

瘍醫大全

卷二十一

痞積方

三

顧氏秘書

明雄

阿魏 各三錢

礪砂 一錢

鴿糞 炒五錢

麝香 五分

皮硝 明淨者研細一兩

共研勻用猪尿胞一個留小口做一漏斗插口

內將藥末徐徐裝入再用火酒一觔燉熱泡入

胞內將尿胞頭摺轉紮緊預將患處用皮硝四

兩白酒一觔煎數滾洗患處再將尿胞紮上用

布裏繫三日解去又換一個大建奇功屢驗

阿魏保生膏

專治痞塊積聚凡年高之人諸病不能服藥者

但將此膏貼心口上即開胃進食功難盡述
先用真麻油二十兩浸榆桑桃柳槐枝各二十一
段熬枯再下

草蘇仁 巴豆 各一百粒 大楓子 淨肉

土木鱉 番木鱉 各五十個 穿山甲 炙二片

白附子 當歸 白芷 各五錢

大黃 二兩 甘草 三錢 核桃肉 一觔

熬枯濾去渣復入淨鍋內熬至滴水成珠下飛
淨血丹八兩成膏再下

瘍醫大全 卷二十一 瘡積方 韋 顧氏秘書

乳香 去油 沒藥 去油 兒茶

血竭 阿魏 各五錢 冰片 一錢

麝香 三錢 水紅花 熬膏四兩

攪勻老嫩得宜收貯勿泄氣每用狗皮攤貼諸
證如神

瘡塊 德宗和尚治黃總兵

人參 白朮 阿魏

石斛 萊菔子 各五錢 水紅花子 一兩

胡黃連 蘆薈 柴胡

枳實 臭蕪荑 川芎 各三錢

川黃連 使君子 淨肉 青黛

青皮 木香 夜明沙

龍膽草 各三錢 豎墓皮 炒二張 沉香 二錢五分

三稜 醋拌 莪朮 醋拌 檳榔

蒼朮 各五錢 陳皮 三錢五分

麥芽 五錢全 巴豆肉 三錢炒去 巴豆 不用

共為細末用健猪肚煮爛搗丸如桐子大每服
三錢米湯送下

瘍醫大全 卷二十一 瘡積方 韋 顧氏秘書

化痞膏 徐聲士

活脚魚 五觔 莧菜 十觔

全入壘內蓋好俟脚魚莧菜化成臭水傾入淨
鍋內加麻油五觔穿山甲四兩熬枯濾清復入
淨鍋內熬至滴水成珠入陀僧細末收之老嫩
得宜收貯用紅布或緞攤貼

賽金丹 胡寧憲

巴荳霜 麝香 各五分 五靈脂 去砂

廣木香 各一兩 生川烏 重五六錢 母丁香 二錢

右研細末用大黑棗三十枚去皮核微曬搗膏和藥丸如指頂大每日臨臥時松蘿茶送下一丸服至四十日不可間斷輕者無影無形重者仍有微影自可除根不發每次日早膳勿食油膩午飯不忌惟麪食粘滯之物俱宜少進

痞塊 駱潛庵
大葶薺一百個古錢二十個花頭海蜇一片炒皮硝四兩燒酒三觔共一處浸七日後每日早上喫葶薺四個逐加至十個止即消

湯醫大全 卷二十一 痞積方 圭 顧氏秘書

大紅丸

治血塊血蟲一切大人小兒積痞

真血竭 乳香 各一
辰州箭頭硃砂 五錢
巴 荳 四錢

研極細末初研散開研至自潤成塊磁盒盛之看人大小虛實小兒蘇子大三粒大人荳子大三粒俱溫水送下行熱水作痛倘積重多年者先用史君子生熟各三箇上午食之下午方服前藥前晚不可夜飯置淨桶看藥與積俱下否

如藥未出積亦未出將溫酒一杯催之

七轉霧應丹

治新舊諸積諸氣婦人血瘦小兒疳積一切心痛諸般蠱積

白蕪荑 五錢取末四錢
牽牛 五兩取頭末三兩
檳榔 五兩取淨末三兩
大黃 五兩取淨末三兩
木香 五錢取淨末四錢
雷丸 四兩取淨末三兩
錫灰 一兩煨取淨末三錢

湯醫大全 卷二十一 痞積方 圭 顧氏秘書

共取各淨末一處拌勻芡白一觔煮沸湯露一宿為丸如黍米大每服三四錢老年幼弱減半俱用芡白湯露一宿早晨空心冷下取出病根如欲大便須在內房不可見風日晚用溫粥補之忌生冷硬物葷腥一月後用四君加減補助胃氣 一方有史君子一兩鶴虱五錢

一方

治酒積面黃黑色腹脹不消

甘遂一錢為末以猪槽頭肉一兩細切搗爛和末作一丸紙裹火煨令香熟取出臨臥細嚼酒嚥取

出病祗

消積丸

廣皮

三稜

莪朮

檳榔

青皮

枳實

蘿蔔子

麥芽

草薺寇各一兩

厚朴

山查肉

各一兩五錢

神麴二兩

廣木香

七錢

為末黑砂糖九重一錢空心白湯調服

消塊丸 即千金方硝石大黃丸須度虛實用

湯醫大全

卷二十一

痞積方

三

顧氏秘書

硝石

六兩

人參

甘草

各三兩

大黃

八兩

為末以三年米醋三升置磁器中火煎先納大

黃不住手攪使微沸一刻乃下餘藥又一刻微

火熬探可丸則取丸之如雞子中黃大每一丸

米飲下服後當下如爛肉或米泔赤黑等色下

後避風冷啖軟粥將息之

男子痞塊婦女血塊極妙藥性不猛而效速

阿魏

一兩

生漆

渣淨

木耳

為末各四兩

黃蜜六兩

錫罐一個盛藥封固放鍋內水煮三炷香取起

冷定每服二茶匙燒酒送下日進三服忌油膩

發氣物

治血塊丸

丹溪曰瓦礫子能消血塊

海粉

醋煮

三稜

莪朮

醋煮

紅花

減半

五靈脂

香附

各等分

石礮

減半

共為丸白木湯吞下三十九

湯醫大全

卷二十一

痞積方

三

顧氏秘書

脇間生毒如蟹形以鮮蝦羹食之即不痛者乃真蟹

瘰

白馬尿治之最妙

喜飲香油者乃誤吞人髮入胃血裏化為蟲

雄黃五錢水調服

肥兒丸

小兒脾疳痞積黃瘦肚大口臭食泥消蟲進食

神麴

炒

胡黃連

麥芽

炒各五錢

肉豆蔻

麩裏煨

檳榔

去臍

廣木香

一錢

史君子去殼 肉荳蔻麪裏煨去油

為末蒸餅丸黍米大米飲服

三聖膏

石 灰十兩篩過極細炒紅

好醋熬成膏入大黃末一兩官桂末五錢攪勻

瓦器封貯紙攤烘煖貼患處

傷醫大全

卷二

七