


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇〇八・子部・醫家類

婦科玉尺六卷〔清〕沈金鰲撰……………一

竹林寺女科秘傳一卷……………六七

達生編二卷〔清〕亟齋居士撰……………九九

胎產心法三卷〔清〕閻純璽撰……………一一七

增廣大生要旨五卷〔清〕唐千頃撰〔清〕葉灝增訂……………三二三

幼幼新書四十卷拾遺方一卷（卷一至卷十六）〔宋〕劉昉等編……………三九九

214862

尺者測分寸量短長取其準也尺而以玉為之分寸所刻堅久不
 磨尤準之準也余竊思短長之數必取準於尺於物然於病亦然
 于婦女之病更無不然何則婦女深居閨房則情不暢婦女見地
 拘局則氣不調婦女以事人則性多躁婦女以色悅人則心偏
 妬稍有不遂即為憂思憂思之至激為怒怒不知憂則氣結思則
 氣鬱怨則氣沮怒則氣上血隨氣行故氣逆而血亦逆血氣乖爭
 百疾於是乎作及其疾作又苦不自知或知之而幽私隱曲又
 不肯自達且多掩蔽于是其家一委之醫醫一憑之脈而此翁翁
 跳動之脈欲藉以測婦女幽私達婦女隱曲毫釐千里貽禍不小
 豈非妄意揣度而未知用玉尺以量之且用玉尺以求得其準乎
 昔者倉公診女子知其欲男子不得脈出魚際一寸是以玉尺量

婦科玉尺自敘

準者也古來如倉公之醫者不乏亦皆量以玉尺而能準者舉古
 人為法求得其準焉夫何幽私隱曲之不可達哉雖然言醫之書
 甚繁其不能讀者無論已有能讀者苟非識精見卓確有把持將
 此紛紛聚訟者何自援以為準余故不憚叅稽著為婦科六卷所
 言諸病必按脈切症要于的當不失幽私隱曲之所在摘錄前人
 之語及方悉皆至精至粹百用百效者以是而當尺之分寸庶幾
 如玉所刻堅久不磨取以量婦女病應無不得其準之準者歟
 乾隆甲午清明前一日無錫沈金齋自書

凡例

一婦女病倍多于男子其原不外經產崩帶數大端故是書篇目
 雖止有九而一切病皆統于是矣
 一每篇正文皆充類至盡似無遺症然病變無方或有未備者又
 當臨時裁度因勢酌方不可拘泥岳武穆云運用之妙存乎一
 心兵法也亦醫法也
 一婦科書本言婦女病若求嗣一款則兼言男女故列于首篇
 一崩漏雖屬血病然非專由經也前人往往雜于經病中非是余
 故次于產後病下
 一小產原是胎前之患不得以大產小產遞及今列于臨產前者
 明其病屬于胎前也
 一每篇正文後前人論說必擇至精且當歸于一是者然後採錄
 婦科玉尺 凡例

婦科玉尺 凡例

期免矛盾之謂
 一所採古方除試驗獲效外其餘必取方藥之性味按合所主之
 症再四考訂果屬針對不爽纔敢載筆稍覺阻碍即棄去雖分
 量多寡亦必籌較未敢輕心相掉貽誤將來也
 一方有與症相合本文及前論卻俱未引及者亦附錄備考不肯
 割愛云爾

婦科玉尺目錄

卷一

求嗣 月經

卷二

胎前

卷三

臨產 小產

卷四

產後

卷五

崩漏 帶下

卷六

婦女雜病

婦科玉尺 目錄

沈氏尊生書卷一

婦科玉尺

求嗣

沈金鰲撰

有夫婦則有父子。婚配之後，必求嗣續。固己而求嗣之術，不越男養精、女養血兩大關鍵。蓋男精女血，因感而會，精成其子，萬物資始於乾元也。血成其胞，萬物資生於坤元也。陰陽交媾，胎孕乃凝。理固然也。養精之法，有五：一、須寡慾；二、須節勞；三、須息怒；四、須戒酒；五、須慎味。蓋腎為精府，凡男女交接，腎氣必為震動。腎動則精隨以流，外雖未洩，精已離官，未能堅忍者，必有真精數點，隨陽之痿而溢出，故貴寡慾。精成于血，如目勞于視，則血于視耗；耳勞于聽，則血于聽耗；心勞于思，則血于思耗。吾隨事節之，則血得其養，故貴節勞。腎主閉藏，肝主疏洩，二臟皆有相火，而其系

婦科玉尺 求嗣

卷一

上屬於心，心君火也。怒則傷肝，而相火動，動則疏洩者，用事而閉藏，不得其職，雖不交易，亦暗流而潛耗，故貴息怒。酒能動血，人飲酒，則面赤手足紅，是擾其血而奔馳之也。血氣既衰之人，數月保養，精得稍厚，然使一夜大醉，精隨蕩矣。故貴戒酒。濃郁之味，不能生精，淡泊之味，乃能補精。蓋萬物皆有真味，調和勝則真味衰，不論腥素，但煮之得法，自有一段冲和恬淡之氣，蓋人腸胃能吸食穀味，最能養精，故貴慎味。此其大要也。至于煉精有法，服藥有方，宜五子衍宗丸、陽起石丸、續嗣丹、溫腎丸，則又當遵而行之。養血之法，莫先調經。其法方另詳經脈門。蓋經不調，則血氣乖爭，不能成孕。每見婦人之無子者，其經必或前或後，或氣虛而多，或血虛而少，且淡或虛而行，後作痛，或滯而將行作痛，及凝塊不散，或滯而挾熱挾寒，至色成紫黑，皆當斟酌用藥，直至積行滯去，虛回，方能受孕。婁全善治經

不調。只一味香附末醋丸服之。謂為百發百中之劑。以能調氣血也。然或子宮多冷。宜琥珀調經丸。媛宮衝任多傷。宜溫經湯加並九。孟斯丹。濟陰丹。味養榮丸。宜治之。若夫配合之強弱。男女之疾病。交會之禁忌。時日之協期。皆一一不可忽。

脉法 脉經曰。男子脉微弱而澁。為無子。精氣清冷也。婦人少腹冷。惡寒。少年者得之。為無子。年大者得之。為絕產。肥人脉細。胞有寒。故令少子。色黃者胸中有寒。

素問曰。督脉生病。其女子不孕。註曰。督與衝任並起於臍間也。龔信曰。求嗣之脉。專責于尺。右尺偏旺。火動好色。左尺偏旺。陰虛非福。惟沉滑勻。易為生息。微澁精清。兼遲冷極。若見微瀉。入房無力。女不好生。亦尺脉澁。陳氏士鐸曰。脉有十二經。不宜太過而數。數則熱。不宜不及而遲。遲則寒。不宜太無力而虛。

婦科玉尺 求嗣

卷一

乃正氣正血虛也。不宜太有力而實。乃正虛而火邪乘以實之也。亦有男女上熱下寒。表實裡寒。而未得孕者。宜睡時服涼膈藥。以清上。早服補藥。以溫下。暫進升散藥。以達表。久服厚味藥。以實裡。又有女人氣多血少。寒熱不調。月水先後。白帶頻下。而無子者。皆當診脉。而以活法治之。

進火有法 孫思邈曰。進火之時。當至陰節間而止。不爾。則過子宮矣。蓋深則少陰之分。肅殺之方。何以生化。淺則厥陰之分。融和之方。故能發生。所以受胎之處。在淺而不在深也。非月經往來後。皆不可用事。惟經後一日男。二日女。三日男。此外皆不成胎。大風雨。大寒暑。陰晦。日月蝕。皆不可交接。所生男女痴聾。四體不完。萬全曰。訣曰。玉湖須淺泛。重載卻成憂。陰血先參。聚陽精。向後流血。開包玉露。平步到瀛洲。淺泛者。即素女論所

謂九淺一深之法也。蓋男女交媾。淺則女美。深則女傷。故云重載即成憂。又曰。養生經云。交合之時。女有五傷之候。一者陰戶尚閉不開。不可強刺。刺則傷肺。二者女興已動。欲男。男或不從。興過始交。則傷心。心傷則經不調。三者少陰而遇老陽。玉莖不堅。舉而易軟。雖入不得搖動。則女傷其目。必至于盲。四者經水未盡。男強逼合。則傷其腎。五者男子飲酒大醉。與女交合。莖物堅硬。久刺不止。女情已過。陽興不休。則傷腹。五傷之候。安得有子。又曰。未交之時。男有三至。女有五至。男子三至者。謂陽道奮昂而振者。肝氣至也。壯大而熱者。心氣至也。堅勁而久者。腎氣至也。三至俱足。女心之所悅也。若痿而不舉。肝氣未至也。肝氣未至而強合。則傷其筋。其精流滴而不射矣。壯而不熱者。心氣未至也。心氣未至而強合。則傷其血。其精清冷而不煖矣。堅而

婦科玉尺 求嗣

卷一

不久者。腎氣未至也。腎氣未至而強合。則傷其骨。其精不出。雖出亦少矣。此男子求子所貴。清心寡慾。以養肝心腎之氣也。女子五至者。面上赤起。眉顰乍生。心氣至也。眼光涎澁。斜視送情。肝氣至也。低頭不語。鼻中涕出。肺氣至也。交頸相偎。其身自動。脾氣至也。玉戶開張。瓊液浸潤。腎氣至也。五氣俱至。男子方與之合。而行九淺一深之法。則情洽意美。其候亦有五也。嬌吟低語。心也。合目不開。肝也。咽乾氣喘。肺也。兩足或屈或伸。仰臥如屍。脾也。口鼻氣冷。陰戶滲出沾滯。腎也。有此五候。美快之極。男子識其情而採之。不惟有子。且有補益之助。

擇鼎有訣 萬全曰。骨肉瑩光。精神純實。有花堪用。五種不宜。一曰螺陰。戶外絞如螺螄。樣旋入內。二曰文陰。戶小如筋。頭只可通。難為交合。名曰石女。三曰鼓花。頭翹急似無孔。四曰角

花頭尖削似角。五日脉或經脉未及十四而先來。或十五六而始至。或不調。或全無。此五種無花之器。不能配合。焉能結成胎孕也哉。

男女情興 萬全曰。天地細縹。萬物化醇。男女媾精。萬物化生。誠哉是言也。男女胥悅。陰陽交通。而胚胎成矣。管觀周頌云。思媚其婦。有依其士。則夫婦親愛之情。雖在田野。未之忘也。故于衽席之間。體雖未合。神已先交。陽施陰受。血開精合。所以有子。苟夫媚其婦。而女心未愜。則玉體纒交。瓊漿先吐。陽精雖施。而陰不受矣。婦依其夫。而士志或異。則桃浪徒翻。玉露未滴。陰血雖開。而陽無入矣。陰陽乖離。成天地不交之否。如之何其能生化萬物哉。又曰。男女情動。彼此神交。然後行之。則陰陽和暢。精血合凝。有子之道也。若男情已至。而女情未動。則精早洩。謂之

婦科玉尺 求嗣 卷一 四

孤陽女情已至。而男情未動。則女興已過。謂之寡陰。玉函經云。孤陽寡陰。即不中。譬諸鰥夫及寡婦。謂不能生育也。細縹有時 袁了凡云。天地生物。必有細縹之時。萬物化生。必有樂育之時。猶犬至微。將受孕也。其雌必狂呼而奔跳。以細縹樂育之氣。觸之。而不能自止耳。此天地之節候。生化之真機也。丹經云。一月止有一日。一日止有一時。凡人一月經行一度。必有一日細縹之候。于一時辰間。氣蒸而熱昏。而悶有欲交接。不可忍之狀。此的候也。於此時逆而取之。則成丹。順而取之。則成胎。其曰。三日月出庚。又曰。溫溫鉛鼎。光透簾幃。皆言其景象也。當慾情濃動之時。子宮內有如蓮花蕊者。不拘經盡幾日。自然挺出陰中。如蓮蕊初開。內人洗下體。以指探之。自知也。但含羞不肯言耳。男子須預密告之。令其自言。則一舉即中矣。按此細縹之

時交合成胎。亦偶然耳。非若經盡受胎之期。為有準也。以其另成一法。故錄之以備用。

胎孕所由 孫思邈云。褚氏云。男女之合。二情交暢。陰血先至。陽精後衝。血開裏精。精入為骨。而男形成矣。陽精先入。陰血後參。精開裏血。血入為本。而女形成矣。陽氣聚面。故男子面重。溺死必伏。陰氣聚背。故女子背重。溺死必仰。陰陽均。為非男非女之身。精血散分。成駢胎。品胎之兆。父少母老。產女必羸。母壯父衰。生男必弱。古之良工。首察乎此。與之補之。補羸女則養血。壯脾。補弱男則壯脾。節慾。羸女宜及時而嫁。弱男宜待壯而婚。此疾外所務之本。不可不察也。按褚氏男女成形之說。最為精確。恐未當。故弗錄。萬全曰。男子以精為主。女子以血為主。陽精溢瀉而不竭。陰血時下而不愆。陰陽交暢。精血合凝。胚胎結而生育滋矣。不然。陽施不能下。應于陰。陰虧不能上。從乎陽。陰

婦科玉尺 求嗣 卷一 五

陽低。精血乖離。是以無子。昧者不知此方。且推生尅于五行。漸補養于藥餌。以偽勝真。以人奪天。雖孕而不育。育而不壽者。眾矣。又曰。求子者。男當益其精。而節其慾。使陽道之常健。女當養其血。而平其氣。使月事之時下。交相培養。有子之道也。又曰。婦人血經方絕。金水纒生。此時子宮正開。乃受精結胎之候。妙合太和之時。過此佳期。則子宮閉而不受胎矣。男女之分。各有要妙存焉。如月信方絕。一三五日交合者。成男。二四六日交會者。成女。過此不孕。按按過期則子宮閉而不受胎。非子宮之閉。子宮之氣閉也。煉精之法 保生書曰。煉精者。全在腎家。下手內腎一竅。名元關。外腎一竅。名北戶。真精未洩。乾體未破。則外腎陽氣。至于子時。而與人身之氣。與天地之氣。兩相相合。精洩體破。而吾身陽生之候。漸晚有丑而生者。有寅而生者。有卯而生者。有終不生者。

始與天地不相應矣。煉之之訣。須夜半子時。即披衣起坐。兩手搓極熱。以一手將外腎兜住。以一手掩臍。而凝神于內腎。久久習之。而精旺矣。

秦桂九辨 朱震亨曰。醫者昧于無子之起于何因。遂以秦桂丸之溫。謂可用。致受燔灼之禍。何者。陽精之施。陰血能攝。精成其子。血成其胞。胎孕乃成。今婦人無子。率由血少。不足以攝精也。血少固非一端。然必調補陰血。使無虧欠。乃可成胎。何乃徑用熱劑。煎熬臟腑。血氣沸騰。經來必轉紫黑。漸成衰少。始則飲食驟進。久則口苦而乾。病且蜂起。焉能成胎。縱然生子。亦多不壽。以秦桂丸能耗損天真之陰也。戒之慎之。又曰。婦人無子者。多由血少不能攝精。俗醫悉謂子宮虛冷。投以辛熱之藥。致禍不旋踵。或有服艾者。不知艾性至熱。入火灸則下行。入藥服則上行。多服則致毒。皆將謹按。

婦科玉尺 求嗣

卷一

七

無子之由 陳士鐸曰。凡男不能生子。有六病。女不能生子。有十病。六病。一精寒也。二氣衰也。三痰多也。四相火盛也。五精少也。六氣鬱也。精寒者。腎中之精寒。雖射入子宮。而女子胞胎不納。不一月而即墮矣。氣衰者。陽氣衰也。氣衰而不能久。以動女之歡心。男精已泄。而女精未交。何能生物乎。精少者。雖能入而精必衰薄。胞胎之口大張些少。何能屢足。故屢入而隨出矣。痰多者。多淫也。多淫則精不純矣。夾雜之精。縱然生子。必致天喪。相火甚者。過于久戰。女情已過。而男精未施。及男精施而女興衰。又安能生育哉。氣鬱者。肝氣鬱塞。不能生胞中之火。則懷抱憂愁。而陽事因之不振。或臨爐而興已闕。或對壘而戈忽倒。女子之春思正濃。而男子之浩歎頓起。柴米之心難

忘調笑之言絕少。又何能種玉藍田哉。故精寒者溫其火。氣衰者補其氣。痰多者消其痰。火盛者補其水。精少者益其精。氣鬱者舒其氣。則男之無子者。可以有子。不可徒補其相火也。十病。維何。一胞胎冷也。二脾胃寒也。三帶脈急也。四肝氣鬱也。五痰氣盛也。六相火旺也。七腎水虧也。八任督病也。九膀胱氣化不行也。十氣血虛而不能攝精也。胞胎之脈。所以受物者也。煖則生物。而冷則殺物。矣。縱男子精熱。而時入之。安能茹之。而不吐乎。脾胃虛寒。則帶脈之間。必然無力。精即射入胞胎。又安能勝任乎。帶脈宜遲不宜急。脈急者。由于腰膈不利也。腰膈不利。則胞胎無力。又安能載物乎。肝氣鬱。則心境不舒。何能為歡于床第。痰氣盛者。必肥婦也。毋論身肥。則下體過胖。子宮縮入。難以受精。即或男甚健。鼓勇而戰。精射直入。而溼由膀胱。必有泛濫之虞。相火旺者。過于焚燒。焦乾之地。又苦草木難生。腎水虧者。子宮燥涸。禾苗無雨露之濡。亦成萎黃。必有墮胎之患。任督之間。倘有痼疾之症。則物不能施。因外有所障也。膀胱與胞胎相近。倘氣化不行。則水溼之氣。必且滲入胞胎。而不能受孕。女子懷胎。必氣血足。而後能養。倘氣虛。則陽衰。血虛。則陰衰。氣血雙虛。則胞胎下墮。而不能升舉。小產之不免也。故胞胎冷者。溫之。脾胃寒者。煖之。帶脈急者。緩之。肝氣鬱者。開之。痰氣盛者。消之。相火旺者。平之。腎氣衰者。補之。任督病者。除之。膀胱氣化不行者。助其腎氣。氣血不能攝胎者。益其氣血。則女之無子者。亦可以有子。而不可徒治其胞胎為也。

婦科玉尺 求嗣

卷一

七

治男女求嗣方

五子衍宗丸 治男子無嗣。 杞子九兩 酒浸 兔絲子七兩 覆盆子五兩 車前子三兩 五味子一兩

蜜丸酒下九十九臨臥鹽湯下五十九
丙丁巳午夏戌巳辰戌丑未秋癸亥子冬甲乙
寅卯日并須上旬晴日修合忌僧尼穿婦孝服
六畜不淨之物 慎遺精者去車前以蓮子代
之

陽起石元

治丈夫精清精冷是以無子 陽起石煨另研
兔絲子酒製 鹿茸酒蒸焙乾另研 天雄
炮 韭子炒 酒菴容各一兩 覆盆子酒浸
桑寄生 石斛 沉香 原蚕蛾酒炙 五
味子各五錢 酒煮糯米糊丸空心鹽湯下

續嗣丹

丈夫無子宜服 黃肉 天冬 麥冬各二兩
半 補骨脂四兩 兔絲子 杞子 覆盆子
蛇床子 當歸 熟地各兩半 龍骨 牡
蠣 黃芪 當歸 續斷 山藥各一兩
參 杜仲 各七錢半 陳皮 白朮各五錢
黃狗外腎酥炙二對 為末用紫河車一具蒸
製同門冬地黃爛搗為丸每百丸早晚各以鹽
湯酒任下

溫腎丸

無子宜服 熟地 黃肉各三兩 巴戟二兩
當歸 兔絲子 鹿茸 益智仁 生地
杜仲 茯苓 山藥 遠志 續斷 蛇床子
各一兩 蜜丸酒下 精不固倍鹿茸加龍
婦科玉尺 求嗣

琥珀調經丸

治婦人胞冷無子能令經正 香附一斤童便
醋分浸九日和熟艾四兩再加醋五碗煮乾
川芎 當歸 白芍 熟地 艾醋湯下 沒藥各
二兩 琥珀一兩 醋糊丸 吳黃 茯苓
婦人無子 厚朴兩二錢半 石菖蒲 肉桂 人
參 沒藥各一兩 酒當歸 細辛 乳香
白芨 沒藥各一兩 蜜丸酒下 二十九 壬
子日修合一各壬子丸

濟陰丹

治數經墮胎胞冷無子皆衝任虛冷胞內宿挾
疾病經不調或崩帶三六疾致孕不育不成亦
治產後百病 蒼朮 人參 香附 熟地 澤
蘭各四兩 秦丸 退紙 甘草各二兩 當歸
蘇木 細辛 丹皮 川芎各兩半 肉桂
乾姜 細辛 丹皮 川芎各兩半 肉桂
茯苓 京墨 煨 桃核仁各一兩 川椒
藥各七錢半 糯米炒一升 大豆黃卷炒半
升 蜜丸每兩作六丸每丸細嚼酒或醋湯下

溫經湯

治衝任虛月不調或曾半產瘀血停留唇口乾
燥五心煩熱少腹冷痛久不受胎 炮附子

當歸 等分 每咀片三錢空心煎服

加味養榮丸

治經來前外崩內煩咳嗽食少頭昏目眩帶下
血風血氣久無子及一切痰火等症服之受孕
亦治胎動胎漏常服可保小產 熟地 當歸
白朮炒各二兩 貝母 川芎 黃芪 香
附各一兩半 陳皮 貝母 麥冬 茯苓 香
各一兩 阿膠七錢 甘草五錢 黑豆去皮
炒四十粒 蜜丸酒下忌猪血

附前人效方

大黃圓

治帶下百病無子 川芎五兩 大黃切炒黑
柴胡 朴硝 乾姜各一升 茯苓二兩
川椒半兩 蜜丸先食服七丸米飲下加至十
九以知為度五日微下十日下血二十日下長
虫及青黃汁三十日病除五十日肥白

紫石門冬丸

治風冷在子宮有子常墮或始為嫌便患心痛
仍成心疾月水都未會來服之肥充令人有子
紫石英 禹餘糧 天冬各三兩 蘇莢
烏頭 柏子仁 肉苁蓉 甘肅 石斛 五
子 兩 川椒 卷柏 桑寄生 遠志 杜仲 各
二兩 婦科玉尺 求嗣

資生順坤丸

治女子寒多熱少久無孕 四製香附一斤去
頭末取中末半斤 酒當歸 熟地 生地 各
川芎 白芍 益母草 熟地 生地 各
兩 醋糊丸 空腹淡醋湯下 食乾物壓之

蒼朮導痰丸

肥盛婦人無子 製蒼朮 便香附各二兩
南星 半夏 枳殼 川芎 神曲各一兩
飛餅石 四兩 陳皮 茯苓各兩半 姜汁
蒸餅丸

韓飛女金丹

治子宮虛寒不受孕 白朮 當歸 川芎
赤石脂 白朮 肉桂 丹皮 延胡索 人參 藥
本 右除石脂沒藥另研餘酒浸三日焙乾為
末足十五兩 香附 醋浸三日焙乾為末
雞未鳴下一丸以茶清漱喉後細收每取七丸
白湯下 孕物乾果壓之服至四十九丸為一劑以
經調受孕為度胎中三日一丸九日九丸

艾附煖宮丸

治同上 香附六兩醋五升煮一日夜打糊勿
作餅慢火焙乾 艾葉 當歸各三兩 川芎

烏雞丸

兩牛 吳黃 川芎 白芍 黃芪各二兩
生地一兩 官桂五錢 醋糊丸食遠淡醋湯
下壬子日合或天德合月德合生氣日皮製

金鳳啣珠

治月經不調赤白帶下經病腹痛小便白濁
陽事不舉遺精等症 蛇床子四錢 母丁香
肉桂 杏仁 白芨 煨黃 兔絲子
細辛 薏苡仁 砂仁 牡蠣 川椒各三錢
麝香少許 生蜜丸櫻桃大每用一丸入
柔存多待先動其情待藥性行方交一月後
有孕矣

抑氣丸

治婦人氣盛于血所以無子尋常目眩
滿體疼怔忡皆可服 香附 陳皮各二兩
扶神 炙草各一兩 每末三錢不拘時自服

婦科玉尺

求壽

卷一

月經

沈金鰲撰

經者常也。女子十四歲任脈通而天癸至。任與衝遂為經脈之海。外循經絡。內榮臟腑。氣血調和。運行不息。一月之間。衝任溢而行。月事以時下。此常經也。故曰經貴乎如期。若來時或前或後。或多或少。或月二三至。或數月一至。皆為不調。不調則病作。甚至積而不行。則病更作。昔人謂經至十年無男子合則不調。未至十年思男子合而不得。亦不調。不調則痰不去。新悞行。或漬而入骨。或變而成腫。故云室女憂思。積想在心。則經閉。而癆怯者多。然亦有因脾胃傷損者。不盡可作。血凝經閉。治也。只宜調養脾胃。脾氣旺則能生血。而經自通。亦有因飲食停滯。致傷脾胃者。宜消食健脾。若經來時飲冷受寒。或吃酸物。以致凝積。血因不流。當以辛溫活血行氣藥通之。此經閉也。精神壯盛。陰血有餘。偶感風寒。或食冷物。以致氣滯血凝而閉。宜以通氣活血藥導之。此氣滯也。先天不足。或病後產後。失于調理。以致真陰虧損。火熱煎熬。或陰虛火旺。肝不生血。或墮胎及產多而亡血。或因久患潮熱盜汗。耗血。乃將成癆瘵之候矣。宜以滋陰養血清火藥治之。此血枯也。故曰血凝之症。當有經閉。氣滯。血枯。三項因緣。未可概視。若專用攻伐。恐經不通。而血反涸也。至如痛經一症。乃將行經而少腹腰腿俱痛。此於血當于臨經時。血熱氣滯也。宜以通利活血藥調之。經病大端。不過如是。而其詳則有可舉者。如經水不調。所下淡色似水者。血虛也。宜四物湯加參芪香。下血色紫而成塊者。熱從火化。而熱血凝結也。或離經畜血所致。經水必下多。或作痛。宜四物加芍。婦人室女月不調。血積堅如石者。受寒也。宜和血。婦女經不調者。或由諸般氣滯也。宜艾經不調。先期而來者。血熱也。宜四物加參。連經行

婦科玉尺

月經

卷一

先期腰腹發熱者亦血熱也宜涼經水不調臨行時先腹痛者氣滯血實也宜開物加延胡索妙月行時口渴吃水多心痞喜嘔不進飲食者脾病也宜山婦人年二十餘月來不勻來時先呵欠腹痛隱痛血色紫食少無力者弱也宜黃連經來紫黑色一月二次或三次不思飲食口乾而苦發熱者血熱妄行也宜四君子湯加生白芍木香經來或不來腹痛喜食熱物者氣痛也宜半夏湯經來時心通甘草經來或不來腹痛喜食熱物者氣痛也宜首烏湯臨經時或食生冷酸澀神不寧四肢微熱虛勞者曾受驚也宜破飲臨經時或食生冷酸澀至膀胱小腹疼腹飽悶者血偶滯也宜破飲經水後期而行者血虛有寒也宜四物湯加黃芪陳皮或香附宜破飲經水過期色淡者痰也宜二當歸有痰佔住血海之地因而不來自必漸昏肥人多有之是痰碍經而不行也宜星經來十數日不止者血熱也宜止血藥中經水來而不止者氣虛不能攝血也宜補氣經水過多不止平日

婦科玉尺 月經 卷一 廿

肥壯不發熱者體虛寒也宜姜經水過多不止平日瘦弱常發熱者由火旺也宜龍經來不止及血崩者血溢也宜必婦人四十九歲經當止今每月卻行過多及五旬外月事比少時更多者血熱或血不歸經也宜芩心丸婦人室女經閉疼痛或成血瘦者淤積也宜通經閉或但不調血塊氣痞腹痛者氣血滯也宜調或煩熱肢疼體痛口乾盜汗嗜臥經不調寒熱如瘧瘵嗽骨蒸者血虛也宜道通散不愈瘦弱人經閉者血氣受傷或生育多也宜四加味道通散又瘦人經閉者或氣滯也宜通經湯經壅身熱發虛四肢無力潮熱骨疼者內有氣塊也宜香附丸經閉腹痛者內結腹痛也宜紅尾丸經事不來者血閉也宜調經閉不來或過月者血不調也宜花湯經行後作痛者氣血虛也宜八婦人室女七情傷感至于血併心腹作疼或連腹痛或引背膂上下攻刺痛血瘀作痛或經不調一切

血氣病也宜延胡有血氣發來似刀刮攪腸胃及心胸刺痛欲絕者血氣沖心也宜花散有遊走至腰脊俱痛者亦血氣痛也宜蓬上氣沖心變作乾血氣者血氣久而不行也宜瓜散有乾血癆者憂思積想所致也宜紅湯有婦人血黃者血瘀病也宜子散其總治經水不調或前或後或多或少及一切氣食等症則惟四製香附丸或丹參散為主經病之煩多若此然而有宜小心者婦人二三月經不行宜用驗胎法以驗之未可遽用攻伐通利之劑也如果驗之無胎斯可隨症而通之或至瘦弱身熱口乾唇頰紅色下午尤甚或先微寒乃血枯經閉陰虛發熱將成癆瘵也宜道婦人之病甚于男子不益可信哉

婦科玉尺 月經 卷一 廿

時有得之少時有所墜墮尺脈滑血氣實婦人經脈不利宜服大黃朴硝湯下去經血鹹開元瀉之少陰脈弱而微微則少血寸口脈浮而弱浮則為虛弱則無血脈來如琴弦少腹痛主月不利孔竅生瘡尺脈來而斷續者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆也經不通繞臍寒疝痛其脈沉緊此由寒氣客於血室血凝積血為氣所衝新血與故血相搏故痛腎脈微溢為不月李梈曰浮溢脇傷經不利浮絕精傷與經閉又曰經病前後脈軟如常寸關雖調尺絕痛腸沉緩下弱來多要防微虛不利問月何妨浮沉一止或微遲溢居經三月氣血不別三月上經閉難當心脾病發關伏寸浮心事不足左寸沉結又曰腎脈沉微氣虛也女子崩帶經脈不調月水不調 陳白明曰婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中

而傷衝任之脈。損手太陽少陰之經。蓋衝任之脈皆起胞中。為經血之海。與小腸心為表裡。乳汁下為月水。然月水乃經絡之餘。苟能調攝得宜。則經以時應矣。劉完素曰。月水不調。則風熱傷于經血。故血在內不通。或內受邪熱。脾胃虛損。不能飲食。榮衛凝澁。或大腸虛。變為下利。流入關元。致絕子嗣。李杲曰。經不調。右尺脈按之空虛。是氣血俱脫。大寒症。輕手其脈數疾。舉指弦緊。或澁。皆陽脫症。陰火亦亡。見熱症于口鼻眼。或渴此皆陰燥。陽欲去也。用升陽舉經湯。大升浮血氣。補命門之下脫也。戴思恭曰。月水或前後。或多少。或欲來先病。或來而斷續。皆曰不調。和氣飲加香附五分。經來或不來。皆腹痛。皆血不調也。欲調血先調氣。四物加吳黃五分。痛甚。延胡索湯。然又恐感外邪食積。宜詳審和氣飲。能兼治。李梴曰。以期言之。對期

婦科玉尺 月經

卷一 五

者。性和血足。易受孕。差一二日不為害。以色言之。心主血。陰從陽。故紅為正。雖不對期。而色正者。易調。或前後多少。或通月不至。或一月再至。當歸散。調經散。單丹參散。經前後痛。通用交加地黃丸。七製香附丸。萬全曰。經不調有三。一脾虛。二衝任損傷。三痰脂凝塞。胃為水穀之海。血氣之母也。惟憂愁思慮。心氣受傷。則脾氣失養。鬱結不通。腐化不行。飲食減少。斯有血枯血閉。及血少色淡。過期。或數月一行也。又脾為血海。衝任之系。或嫉怒褊急。以傷肝氣。致衝任失守。血氣妄行。或血未行而妄合。以動其血。或經未斷而即合。衝任內傷。血海不固。為崩為漏。有一月再行者矣。肥碩之人。膏脂充滿。元室之戶不開。或痰涎壅滯。血海之波不流。故有過期而經始行。或數月而經一行。及為濁。為帶。為經閉。為無子之病者矣。

月閉。陳自明曰。或醉飽入房。或勞役過度。或吐血失血。傷損肝脾。但滋其化源。其經自通。若小便不利。頭眩腰痛。足寒時痛。久而血結于內。變為癥瘕。若血水相併。脾胃虛弱。壅滯不通。變為水腫。若脾氣衰弱。不能制水。水浸肌肉。變為腫滿。當益津液。大補脾胃。方可保生。張從政曰。月不通者。經曰胞脈閉也。胞脈者。屬火。而絡于腑中。今氣上迫。肺心氣不得下通也。茶調散吐之。吐訖。玉燭散。三和湯。桂苓白朮散。量虛實選用。慎勿服峻熱藥。致變肺痿骨蒸。潮熱咳嗽。咯膿。嘔血喘逆。尿澀寢汗不已。漸至脈大形瘦。必不救。李杲曰。二陽之病。發心脾。女子不月。其傳為風消。為息。真死不治。婦人脾胃久虛。形羸氣血衰。致經不行。病中消。胃熱善食。漸瘦液枯。夫經者。血脈津液所化。為熱所燥。肌肉消瘦。時燥渴。血海枯竭。病名血枯。經絕。宜瀉胃之

婦科玉尺 月經

卷一 五

燥熱。補益氣血。經自行矣。此症或經適行而有子。子不安。為胎病者有矣。或心包脈洪數。躁作。時見大便秘澁。小便雖清不利。而經閉絕。此乃血海乾枯。宜調血脈。除包絡中火邪。而經自行。內經所謂小腸移熱于大腸。為癥瘕。為沉。脈澁不利。則月事沉滯而不利。故云為癥瘕。為沉也。或因勞心。心火上行。月事不來。安心和血。瀉火。經自行矣。故經云胞脈閉也。胞脈者。屬心而絡于胞中。今氣上迫。肺心氣不得下。故月不來也。又曰。凡婦女之病。經水適斷。俱作少陽治之。傷寒雜病。皆同。經云。身有病而有邪。經脈閉也。經脈閉者。尺中不至。胞脈閉者。生化源絕。二者皆血病也。厥陰主之。厥陰病。則少陽病矣。治法或實作大熱。或變成癆。脈有浮中沉之不同。故藥有表裡和之不一。察其在氣在血。定其行陰行陽。使大小得宜。輕重各當。則可萬全。此少陽一

治不可不知也。朱震亨曰：陰虛經脈久不通，尿澀體痛，四物加蒼朮牛膝陳皮甘草。又用蒼朮丸料加蒼耳酒芍藥為丸，就用前藥吞下，經候微少，漸漸不通，手足煩疼，漸瘦潮熱，脈微數，四物去芍地加澤蘭二倍甘草半分。王倫曰：經不行，有由脾胃損傷者，不可便為經閉死血，輕用攻破藥，須審脾胃如何，若因飲食勞倦，損傷脾胃，少食惡食，泄瀉疼痛，或因悞服汗下攻伐藥，傷其中氣，致血少不行，只宜用白朮為君，芍藥為臣，佐以黃芪甘草陳皮麥芽柴胡芎歸等，脾胃自能生血，而經自行，又有飲食積滯，致損脾胃，亦宜消積補脾，若脾胃無病，果有血結，方可行血通經。李梴曰：經行時餘血一點未盡，或外被風寒，淫冷暑熱，或內傷生冷，七情鬱結，為痰為瘀，曰血滯，或經止後，用力太過，入房太甚，及食燥熱，以致火動邪盛而精血衰，曰血

婦科玉尺 月經

卷一

法

枯經後，被驚血氣妄行，上逆則從口鼻出，逆于身則水血相搏，變為水腫，悲怒則氣血逆于腰腿，心腹背膈手足間重痛，經行則發過期則止，怒極傷肝，則有眩暈嘔血癩癧血風瘡瘍等病，加之經血滲漏於其間，遂成癸穴生瘡，淋瀝不斷，淫熱相搏，遂為崩帶，血結于內，變為癥瘕，凡此變症，百出，不過血滯血枯而已，但血滯血枯，俱有虛熱，故重則經閉不通，以滯枯分言之，輕則經不調，止言虛與熱而已，總而言之，經水不通，不出虛熱痰氣四症，不調亦相似，則飲食調和，自然血氣流通，更有凝滯，然後可用紅花當歸散，紫葳散，通經丸，導經丸之類，虛者只用當歸散，通後又須養血益陰，使津液流通，若以毒藥攻逐，必死，又曰：經閉腹大，僅一月間，便能動作，乃至過期不產，或腹痛，必是虫症，雄砂丸主之。李時珍曰：經閉有有餘不足二症，有餘者

血滯不足者，傷肝素問云：少時有所大脫血，或醉入房中，氣鬱肝傷，故月來衰少，或不來，治之以烏賊骨四逆茹，此正血閉不足之病也。萬全曰：經閉而骨蒸潮熱，脈虛，用增損八物柴胡湯，熱甚服此不平者，加乾姜灰神效。經閉發熱，咽燥唇乾，脈實者，四物涼膈散。張介賓曰：血枯血隔，本不同，蓋隔者，阻隔枯者，枯竭，阻隔者，邪氣隔滯，血有所逆也，枯竭者，衝任虧敗，源斷其流也，凡婦女病，損至旬月半載之間，未有不經閉者，正因陰竭，所以血枯，枯之為義，無血而然，故或羸弱，或因倦，或咳嗽，或血熱，或飲食減少，或亡血失血，及一切無脹無痛無阻無隔，而經有久不至者，皆血枯經閉之候，欲其不枯，無如養榮，欲以通之，無如充之，但使血行，則經脈自至，乃醫者不論有滯無滯，多兼開導之藥，其有甚者，則專以桃仁紅花之類，通利為事，

婦科玉尺 月經

卷一

法

知血滯者，可通血枯者，不可通乎，是宜知之矣。經血暴下，成無己曰：婦人年及五十以上，經血暴下者，婦人經血終于七七之數，數外暴下，內經曰：火主暴速，亦因暴喜，暴怒，憂結驚恐之致，切不可作冷病治，用峻熱藥，必死，止可用黃連解毒湯，以清于上，更用蓮壳灰棕灰以滲于下，然後用四物加延胡索散，涼血和經之藥是也。來止腹痛，張從政曰：經來腹痛，由風冷客于胞絡，衝任或傷手太陽少陰經，用溫經湯，桂枝桃仁湯，若憂思氣鬱而血滯，桂枝桃仁湯，地黃通經丸，若血結成塊，萬病丸。劉完素曰：氣衝經脈，月事頻併，膈下痛，芍藥六合湯，若經欲來，膈腹絞痛，八物湯。朱震亨曰：經候過而作痛者，乃虛中有熱也，經將來作疼者，血實也，四物加桃仁黃連香附，臨行腰疼腹痛，乃鬱滯有瘀

血。四物加紅花桃仁蓬朮香附發熱。加黃芩柴胡。紫色成塊者熱也。四物加黃連柴胡。經行微少。或脹或疼。四肢痛。四物加延胡沒藥白芷爲末。淡醋湯下。經不調。心腹疼痛。只用芎歸二味。名君臣散。經欲行。臍腹絞痛。四物加延胡楮榔苦棟。木香減半。又曰。月候不調之中。有兼疼痛者。或常時痛。或經前痛。血積也。或經後痛。血虛也。有兼發熱者。或常時熱積也。或經來時熱。血虛有熱也。王肯堂曰。仲景治帶下。月水不利。小腹滿痛。經一月再見者。土瓜根散主之。此散乃破堅下血之劑。觀此則經不及期。有因瘀血者矣。前論所未及也。然欲知瘀血。須以小腹滿痛爲憑。又曰。經水者。行氣血通陰陽。以榮于身者也。或外虧衛氣之充養。內乏榮血之灌溉。血氣不足。經候欲行。身體先痛也。張介賓曰。凡經期有氣逆作痛。全滯而不虛者。須

婦科玉尺 月經

順氣宜調。經飲甚者。排氣飲。氣血俱滯。失笑散。若寒滯于經。或因外寒所逆。或平日不慎。寒涼致凝。聚作痛。而無虛者。須祛寒。宜調經飲。加姜桂吳萸。或和胃飲。若血熱。血燥。滯澁。不行作痛。加味四物湯。或保險煎。去續斷加減。此上諸症。但察其有滯無虛。方是真實。若兼虛。不得任行。尅若痛在經後。多由血虛。八珍湯。然必察其寒熱。虛實。以爲佐使。自效。其有餘滯未行者。決津煎最妙。若但遇經期。則必作痛。或食則嘔吐。肢體困倦。或兼寒熱。是必素稟不足。八珍湯。虛而寒甚者。理陰煎。漸加培補。久必愈。有因帶濁多而虛痛者。大營煎。隨寒熱加佐使主之。

血色痛塊 朱震亨曰。經水陰血也。陰必從陽。故其色紅。稟火色也。血爲氣配。其成塊者。氣之凝也。將行而痛。氣之滯也。來後作痛。氣血俱虛也。色淡亦虛也。錯經妄行。氣亂也。紫者氣熱也。

黑者熱甚也。人但見紫黑痛塊。率爲風冷。而用溫熱。必敗。夫熱甚者。必兼水化。所以熱則紫。甚則黑也。李梴曰。色紫。風也。黑者。熱甚也。淡白。虛也。或挾痰停水。混之也。如烟塵水。如屋漏水。如豆汁。或帶黃混濁。模糊者。溼痰也。成塊作片。色不變。氣滯也。或風冷乘之也。色紫黑。血熱也。大概紫者。四物加白芷荊防。黑者。四物加香附芩連。淡白者。古芎歸湯加參芪白芍香附。有痰。二陳加芎歸。如烟塵。二陳加秦艽防風蒼朮。如豆汁。四物加芩連。成塊。四物加香附延胡陳皮只壳。通用琥珀調經丸。

熱入血室 李梴曰。晝則明了。夜則語。熱入血室。無犯胃氣。及上二焦。不治自愈。甚則四順飲子。桃仁承氣湯。症相似。當不妨用之。羅天益曰。熱入血室。而成結胸。由邪氣傳入。經絡與主氣相搏。上下流行。遇經適來。適斷。邪乘虛入于血室。血爲邪迫入于肝。經肝受邪。則語見鬼。復入膈中。則血結于胸。何則。婦人平日水養木。血養肝。未孕爲月水。既孕則養胎。既產則爲乳。皆血也。今邪逐血。併歸于肝。經聚于膈中。結于乳下。故手觸之則痛。非藥可及。故當刺期門也。李梴曰。婦女傷寒。寒熱似瘧。經水適斷者。亦名熱入血室。其血必結而不行。小柴胡湯。或黃龍湯。加丹皮桃仁。婦人此症最多。切忌汗下。若見喜忘。如在腹滿。泉清。當以淋血法治之。又不可拘于不下也。男女均有此。男由陽明而傳。女則隨經而入。武之望曰。邪入血分。則發在暮。且語。屬胃經者。多恐。悞犯之。故仲景云。無犯胃氣也。又曰。凡經行後。似瘧。語。便是熱入血室。又曰。經水適來。適斷。或有往來寒熱者。先服小柴胡。以去其寒熱。後以四物湯和之。又曰。潮熱有時。爲內傷。爲虛。無時。爲外感。爲實。虛者。大溫經湯熱。

婦科玉尺 月經

者四物加芩連骨蒸者大胡連丸五心潮者四物加黃連胡黃連經前潮熱血虛有滯逍遙散加丹皮桃仁延胡經後潮熱血虛有熱逍遙散去柴胡加生地地骨皮此方加減為退熱聖藥室女寡婦師尼李梈曰女子十四月至必近二十方可配陰氣不易成也或恣食鹹酸熱燥致氣血上壅不通紅花當歸散大黃膏紫葳散如逾年未下或年未及而思男思傷心血火炎脾虧肺燥腎枯而血閉成癆者難治四物加柴芩逍遙散加芩連山梈以養血涼血降火栝子仁丸亦妙因怒逆者四製香附丸加黃芩生地因驚者抱胆丸又曰寡婦鬱悶百端或想夫或門戶不支或望子孫心火頻熾加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩自汗肝脈弦長當抑肝之陰氣柴胡抑肝湯抑陰地黃丸越鞠丸貧苦食淡者四製香附丸每

婦科玉尺 月經 卷一 二十

日上午神思昏憤怕見明處惡聞人聲至午後方可及頭昏腹痛驚惕稍涉勞動及經來時尤劇此不得遂志也宜清神養榮四物湯加人參茯神陳皮柴胡羌活甘草香附 萬全曰愆期未嫁之女偏房失寵之妾寡居之婦菴院之尼欲動不能遂感憤不得言多有經閉之疾含羞強忍不欲人知致成癆瘵難治者宜四製香附丸參朮大補丸攻補兼行庶幾可瘳此七情之變難以法治者也 張介賓曰張氏云室女月不行切不可用青蒿等涼藥醫家多以室女為血熱故以涼藥解之殊不知血得熱則行冷則凝不可不知若經微少漸漸不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生癆熱其脈微數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火火逼水涸耗亡津液治當養血益陰毋以毒藥通之宜栝子仁丸澤蘭湯 羅天益曰宋楮澄療師尼寡婦別

製方者蓋有謂也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為癆瘵也 武之望曰師尼寡婦之癆專主肝經以相火寄於肝也男女之慾皆從此出觀天地之氣始於春則知慾火之動亦由于肝也鳥獸孽尾亦然故治此者當以柴胡湯為法

治月經病方

大黃朴硝湯

治經年水不行胞中有風冷所發宜下之

大黃 牛膝各五兩 代赭石一兩 朴硝

丹皮 甘草 紫苑各三兩 蠶虫 水蛭

桃仁 乾姜 細辛 芒硝各二兩 麻仁五

合水一斗五升煮五升去渣內硝分五服五

更爲首去一炊頃自下後將息見風

治婦人經病間用此加減 柴胡 黃芩 人

參 半夏 甘草 姜 棗

治女人經病有痰在中脘飲食少進 茯苓

陳皮 半夏各一錢 炙甘草五分

治氣血兩虛 人參 茯苓 白朮 炙草

八珍湯 川芎 當歸 白芍 熟地

婦科玉尺 月經 卷一 二十

調經湯 治痰積經閉 當歸 延胡索 白朮各二錢

香附 白芍 生地各一錢 川芎 陳皮

丹皮各八分 甘草六分 益母草三錢

經來日空心服

治血虛經閉 當歸 柴胡 白朮 白芍

茯苓 甘草

治血虛經病 逍遙散加山梈 丹皮

加味逍遙散 治婦人月經不調及崩漏不止 棕皮燒 木

必效散 賊炭去節各二兩 麝香一錢 另研每二錢

空心酒服

大溫經湯 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不

行或崩中去血過多或胎產瘀血停留小腹急

八物湯

治經事將行腹痛絞痛者氣滯血凝故也 當

和血通經湯 治因受寒而經不調或閉 當歸 三稜各五

錢 蓬朮四錢 木香 熟地 官桂各三錢

炒各一錢 木香 枳殼各五分 食前服

淡吳萸 川芎 丹皮 炙草各一錢 麥冬二錢

半夏二錢 姜五片 食前稍熱服

當歸散

治婦人久積疔痛小便刺痛四肢無力當歸散
酒赤芍劉寄奴枳殼延胡索沒藥
等分每末二錢熱酒調下不拘時

柏子仁丸

治血虛有火月經耗損漸至不通日漸羸瘦而
生潮熱兼治室女思慮成癆經閉切無以毒藥
通之宜此兼服澤蘭湯柏子仁炒另研牛
膝卷柏澤蘭川斷各二兩熟地三兩
搗泥加蜜丸

澤蘭湯

治同上澤蘭三兩酒當歸白芍各一兩
甘草五錢每咀片五錢煎
治婦人乾血氣大黃四兩為末醋熬膏成丸
芫子大每一丸酒化臨臥溫服大便一二行紅
脈自下是調經之仙藥也一方加歸頭一方
加香附二兩童便浸炒為末入膏丸桐子大酒
下四十九

單大黃膏

治同上澤蘭三兩酒當歸白芍各一兩
甘草五錢每咀片五錢煎
治婦人乾血氣大黃四兩為末醋熬膏成丸
芫子大每一丸酒化臨臥溫服大便一二行紅
脈自下是調經之仙藥也一方加歸頭一方
加香附二兩童便浸炒為末入膏丸桐子大酒
下四十九

抑陰地黃丸

治寡婦癆瘵土地二兩赤芍一兩柴胡
黃芩秦艽各五錢蜜丸烏梅湯下
亦治妊娠先患冷氣忽中心腹痛如刀人參
兩厚朴白芍各二兩水煎分三服

婦科玉尺

月經

卷一

一

和胃飲

兼治孕婦胃寒氣實胎氣上逼者厚朴陳
皮各錢半炮姜一二錢炙草一錢
治婦人臍寒忽嘔胎氣不安亦治產後脾氣虛
寒嘔吐食少腹痛又治產後陽虛中寒或外感
寒邪以致心腹痛嘔吐厥逆熟地三五錢
或一二兩炙草一二兩當歸二三錢或五
七錢乾姜炒黃一二錢煎熱服或加桂

理陰煎

兼治胎氣熱而不安亦治產婦淋瀝不止生
地熟地白芍各二錢山藥川斷黃
芩黃柏生草各一錢食遠溫服

保險煎

兼治產後及胎氣已動勢有難留當歸三五
錢或一兩澤蘭錢半牛膝二錢肉桂一
二錢烏藥一錢熟地二三錢或五七錢
如氣血虛弱不用烏藥

決津煎

兼治產後及胎氣已動勢有難留當歸三五
錢或一兩澤蘭錢半牛膝二錢肉桂一
二錢烏藥一錢熟地二三錢或五七錢
如氣血虛弱不用烏藥

驗胎法

驗胎之有無川芎二三錢炒為末艾湯下停
一二時小腹內微動者胎也如不動再一服又
不動則非胎矣

沈氏尊生書卷二

婦科玉尺

胎前

沈金齋撰

凡有胎者貴衝任脈旺元氣充足則飲食如常身體壯健色澤不
衰而無病患相侵血氣充實可保十月滿足分娩無虞母子堅牢
何疾之有若血氣不充衝任脈虛則經水愆期豈能受孕縱得孕
而胞門子戶虛寒亦受胎不實或衝任脈虛而協熱輕則胎動不
安重則三五七月即墮更加外感六淫內傷七情或飲食傷脾胃
或淫慾損真元皆致疾之由也故凡有胎者以安為要佐以養血
順氣蓋血有餘則子得血而易長故四物湯為要劑若氣得順則
中氣舒轉飲食加飡母氣旺子氣亦旺故須砂仁香附以順氣然
血虛者四物加香砂氣虛者即以四君加香砂古人治胎前每將

婦科玉尺 胎前

卷一

一

人參砂仁同用取其一補一順補則氣旺而無墮胎之患順則氣
血通和而無難產之憂良要法也今舉胎前之症而縷述之妊娠
三月以來心虛煩悶名曰惡阻宜人參橘皮湯亦有體困肢懶或
眩暈嗜臥惡心嘔吐漿粥不入甚至惡寒發熱者宜丁或體肥惡
阻痰必盛宜二陳湯加減體瘦惡阻火必多宜二陳湯加
古人以形病而脈不病別之余則謂惡阻者無不喜食酸物不若
以嗜酸別之為更明切亦有平日氣血調和臟腑榮暢不慮惡阻
雖患亦甚輕甚重者又不可不知妊娠三四月間忽然失音不語
名曰子瘖此非藥可愈待產子自愈以胎氣上侵肺系及喉雖瘖
而不為病也妊娠四五月來本君相二火養胎平素有火而胎熱
氣逆胎上瘖心不安胸膈脹滿名曰子懸宜子懸湯妊娠五六月
乃少陰君火以養精六七月乃少陽相火以養氣平素有火之人

內外之火相感。而作煩躁悶亂不安者。名曰子煩。宜安胎九。妊娠五六月以來。浮腫如水。氣者名曰子腫。俗呼琉璃胎。宜防。若面目腫如水。氣喘而短。虛也。宜白朮散。亦有胎前浮腫。專由脾虛者。宜芍藥湯。妊娠五六月間。腹大異常。胸膈脹滿。名曰胎水。此胎中畜水也。若不早治。生子手足必然軟短。形體殘疾。或水下即死。宜魚鱈。妊娠七八月。忽然卒倒僵仆。不省人事。頃刻即醒。名曰兒暈。宜葛根湯。亦有因氣血兩虛而卒暈者。宜八珍湯。妊娠七八月以來。胎氣漸粗。兩足浮腫。頭目不腫者。亦名子腫。與五六月間之腫各異。又名皺腳。宜健脾補氣。宜平胃散。若兩足腫。足指間出黃水。乃水氣腫滿之故。宜天仙散。妊娠八九月小便不通。蓋因氣弱。不能舉胎。胎壅膀胱。水不能出。名曰轉胞。忌服利水之品。宜人參湯。將臨月。兩目失明。不見燈火。頭痛眩暈。腮頰腫。不能轉側。此肝經熱毒上攻。由過食炙煇火酒辛辣等。

婦科玉尺 胎前 卷二

物。名曰胎熱。宜清風散。妊娠有三四月而墮者。有六七月而墮者。有屢孕屢墮者。由于氣血不充。名曰滑胎。宜固胎丸。以上皆按月可稽者也。其有妊娠經血不時而來者。名曰漏胎。當察其脈之何虛以治之。或氣虛。宜四君子湯。或血虛。宜四物湯。加芩、芍、歸、地。皆不可混。妊娠因酒色過度。內傷胞門。或飲食積熱。以至水道壅塞。小便淋瀝。而痛者。名曰子淋。宜安胎散。亦有兼內熱而淋者。宜五苓散。妊娠瘧疾。名曰子瘧。或熱多寒少。宜清脾散。或寒多熱少。宜人參養胃湯。或元氣虛弱。宜丹參。皆當分別。妊娠心痛。非心痛也。乃胎氣上升所致。亦名子懸。與因五月之子懸不同。須安胎養血。佐以順氣。而又有客熱犯胃而痛者。宜二陳湯。去半夏。又有客寒犯胃而痛者。宜火龍湯。妊娠咳嗽。各曰子嗽。此胎氣為病。產後自愈。不必服藥。然或因外感風寒。宜桔梗散。或因火盛乘金。宜兜鈴散。是又不可不治者。妊娠中風。頭項強直。

筋攣語澁。痰涎壅甚。昏不知人。名曰子癇。宜羚羊散。妊娠不守禁忌。縱恣口腹。過食生冷瓜果。及當風取涼。以致胎冷不安。胸腹脹痛。腸中虛鳴。四肢拘急。便泄欲絕。名曰胎寒。宜安胎和氣散。妊娠初時。即常患腹痛者。此由血熱之故。名曰痛胎。一時不易愈。止宜時服涼血藥。稍解之。宜梔子湯。以上皆妊娠病之有名可舉者也。外此如妊娠傷寒。其六經治例。與常人同。但專以清熱安胎為主。或汗或下。俱當隨其五臟表裡所見。脈症主治。切勿犯胎氣。故萬密齋治妊娠傷寒。在表發汗。用香蘇散。和解半表裡。用黃龍湯。在裡宜下。用三黃解毒湯。自謂家傳之秘。活人甚多。良有然也。如或妊婦稟受素弱。偏患傷寒。藥中必佐以四物。庶可無悞。半夏犯胎。最易取用。以古方用之者。多須留心檢點。宜羌活湯及萬病甚更須護胎。宜護胎。胎法。妊娠痢疾。若初起。腹痛裡急。後重。元氣尚實者。攻之。宜香連痢久花。

婦科玉尺 胎前 卷二

虛。日夜無度者。補之。宜胃湯。熱下迫。痛裡急者。解之。宜黃芩湯。其餘赤白膿血。一切等症。皆臨時酌治。總之胎前雜症。雖多。惟傷寒痢疾。最為惡候。不可不慮。妊娠有泄瀉。不渴。小便清白者。宜三白散。加木甘。有泄瀉。腸垢煩渴。內熱。小便赤澀者。宜黃芩湯。加白朮、通草。有泄瀉。喜飲。嘔逆。水穀不化。為協熱下利者。宜黃連丸。有泄瀉。或青或白。水穀不化。腹痛腸鳴。為洞泄者。宜五苓散。次用有泄瀉。黃水。有沫。腸鳴。腹痛。脈沉緊數者。宜戊己丸。其餘如傷脾。傷胃。風冷。暑溼。等傷。而致泄瀉者。皆隨症調治。妊娠二便不通。臟腑積熱。也大腸熱。則大便不通。宜四物湯。加枳殼、黃芩。亦或由大腸氣滯者。宜紫蘇飲。加小腸熱。則小便不通。宜冬葵子。大小腸俱熱。則二便不通。他如胃虛。宜六君子湯。氣血虛。宜朝用八珍湯。加桃仁、杏仁。心肝虛熱。宜加味逍。胎前肝脾積熱。瀉肝。宜加味逍遙散。皆能致二便之不通。

通妊娠有怔忡脉亂驚悸不安夜臥不寧恍惚氣觸者宜大有血
少神虛而心不寧者宜益榮湯有虛而心不定者宜定有火盛者宜安
妊娠冒暑或煩渴悶亂而不安宜香煩熱甚而多飲宜香黃芩飲宜
粉五味 妊娠傷食胸滿脇痛右關緊甚宜于消導如傷冷物而胸
膈劣悶欲吐者脉必遲宜丁香散如嘔加姜妊娠瘦癯肝風心火相熾也宜
蘇妊娠霍亂或邪在上胃脘則當心痛而吐多邪在下胃脘則當
臍痛而利多邪在中脘則腹中痛而吐利俱多吐多傷氣利多傷
血邪擊胎元命易殞氣血傷而無以養胎子命易傾此急症也
當急治宜香蘇散如轉筋加木瓜胎動 妊娠遺尿或脬中蘊熱宜
味散 或肝腎氣虛宜六或脾肺氣虛宜補中益氣或肝火血虛宜
味九合加 其因不一妊娠尿血乃勞傷經絡熱邪乘之侵及于血
味遺送散 宜加味遺送散 宜加味遺送散 宜加味遺送散
血得熱則流滲入于臍故也宜加味遺送散 宜加味遺送散 宜加味遺送散

婦科玉尺 胎前

婦人臍燥悲傷欲哭象如神靈數欠伸是也推其故或由肺有風
邪或由寒水攻心故無故而但欲自悲耳宜甘麥妊娠腹中見哭
蓋臍帶上疙瘡兒含口中因登高舉臂脫出兒口以故作有哭聲
只令妊婦曲腰就地如拾物則疙瘡仍入兒口哭自止或再服藥
宜補 其妊婦有腹內鐘鳴聲者亦同法妊娠胎不長必其宿有風
冷故致胎疲或將理失宜臟腑衰損氣血虛弱故不能長大或傷
動胎氣又兼衝任素虧無血養胎俱當益氣養血或兼治疾宜
胎白木丸 或脾氣不足面黃晡熱而胎不長宜八珍湯 或肝脾
鬱怒脇痛嘔吐寒熱往來而胎不長宜六君子湯 或柴胡
悉其因妊娠心痛風邪痰飲交結傷心支絡故乍安乍作而痛宜
龍亦或肝脾氣滯胸膈脹吞酸不食而痛宜二陳湯 加山查 妊
腹痛須辨寒熱虛實寒者脉遲宜理熱者脉數宜芍虛者脉無力

婦科玉尺 卷二

乃血少不能養胎宜四君子實者脉有力宜香便祕者脉兼實宜
芍厚林 又有腹中不時作痛或小腹重墜者名曰胎痛宜地
其心腹俱痛者或有冷積或新觸風寒邪正相擊而并于氣隨氣
上下衝心則心痛下攻腹則腹痛上下混攻則心腹俱痛若不
時差其痛衝擊胎絡必致動胎可不懼哉宜當歸有時腹但脹痛
抑猶輕已宜桑皮至如娠將屆期腹脇脹滿心胸刺痛宜壯氣
已月倍臨期三日前心腹脇肋疼痛宜安胎皆不可不藥妊娠小
腹痛大概由胞絡虛風寒相搏之故宜紫雖或致病多端而均以
川芎爲末酒調服或芎歸等分煎服無不解不然痛甚亦能動胎
也妊娠腰痛最爲緊要蓋以胞胎繫于腰故腰疼酸急胞欲脫腎
必將產也即不然或因勞傷損動其經宜小或因冷氣襲腹痛
引于腰背宜五或因挫閃氣滯宜通或因腎元虛損宜青或因

婦科玉尺 胎前

怒動肝火宜小柴胡湯加 或因肝脾氣鬱宜歸脾湯 或膀胱風
邪乘襲宜拔萃或因血熱血滯宜四物湯加乳沒宜雖由來不同若
其痛不止多動胎氣大抵治法總以固胎爲主宜保用千金 妊娠胎
動不安其由于本然者衝任經虛受胎不實也宜胎其餘則皆
外之所致如素有內熱以致內火旺盛故不安也宜安如多勞乏
氣血虛不能榮養故不安也宜四物湯如飲酒房勞過度或損動
故不安也宜安胎散如悞觸擊或因跌撲腰腹痛胎上搶心去血腹
痛故不安也宜阿膠如從高墜墮或爲重物所壓觸動胎氣腹痛
下血胃虛嘔逆此等之症皆能傷胎故不安也宜佛手散從
有喜怒氣宇不舒傷于心肝觸動血脉故不安也宜佛湯如平日膏
梁奉養太過氣不運動或身肥累墜故不安也宜瘦妊娠悞服毒
藥毒物故不安也宜黑豆湯或白扁豆 如因母病薰灼其胎故不

安也。宜十如遇內外熱病火熱侵胎故不安也。宜伏龍散如舌青黑腹冷指甲青脹悶甚口中糜臭此胎死腹中不但不安矣。宜平酒化服使胎化爲水以上皆胎前病之時有不可不意者。總之婦人月事一月不通六脉平和或見吞酸惡食或見微寒微熱懶于舉動胎也。若六脉中見有病脉便非若知已有胎而惡心嘔吐不思食惟宜養血安胎理氣健脾此爲要着。宜受娠和中湯倘或胎不安腹腹痛食不甘必當安之。胎宜安蓋胎之所以不安者除一切外因總由氣血虛不能榮養胎元所致故必用參補氣當歸補血亦或因內多邪熱氣血沸騰胎不寧養故用黃芩以涼之又胎係于脾脾虛蒂無所附以至墮落故用白朮炙草以培之至于陳皮香附蘇梗以理氣砂仁開胃理中杜仲治腰痛白芍和腹痛內熱口渴則去砂仁而加麥冬見紅則加生地地榆皆妊娠概治之法也。

婦科玉尺 胎前 卷二 六

間有所謂鬼胎者營衛虛損七情相干妖魘精鬼得入于臟竟似懷胎其狀卻顛預如抱一癭或寒熱面黃或少食體倦大約患此症者肝脾必致兩傷治法總以補元氣爲主而佐以行散之藥如雄黃丸芫花散之類至于保生易產之法尤不可不講蓋以生不可催只可調和氣血產乃無虞八九月後便當服保產達生散或至九月服便產方一劑臨產再服一劑自無產難之憂吾邑秦氏世傳妊婦逐月養胎方尤爲大妙誠屬百用百效凡服此者從未見有產厄真寶方也。

脉法 仲景曰寸口脉弦而大弦則爲減大則爲乳減則爲寒乳則爲虛寒虛相搏此名爲羸婦人則半產漏下旋覆花湯主之 王叔和曰尺中不絕胎脉方真太陰洪而女孕太陽大而男娠或遇俱洪而常雙產此法推之其驗如神月數斷之各依

其部假令中衝若動此乃將及九旬 孫思邈曰左尺浮大者男右尺沉細者女若來而斷絕者月水不利 陳自明曰寸微關滑尺帶數流利往來并雀啄小兒之脉已見形數月懷胎猶未覺左疾爲男右爲女流利相通速來去兩手關脉大相應胎已成形非漫語左脉帶縱兩個男右手帶橫一雙女左手脉逆生三男右手脉順還三女寸關尺部皆相應一男一女分形症有時子死母身存或即母亡存子命往來三部通流利滑數相參皆替替陰實陽虛脉得明過滿胸堂皆逆氣左手太陽浮大男右手太陰沉細女諸陽爲男諸陰女指下分明常記取三部沉正等無疑尺內不止眞胎婦夫乘妻兮縱氣霧妻乘夫兮橫氣助子乘母兮逆氣參母乘子兮順氣護小兒日足胎成聚身熱脉亂無所苦汗出不食吐逆時精神結備其中住滑疾不散

婦科玉尺 胎前 卷二 七

三月胎但疾不散五月母弦緊牢強滑利安沉細而微歸泉路惡阻 寶漢卿曰惡阻心下憤悶吐逆不食惡聞食氣頭眩四肢百節煩疼多臥少起旋覆半夏湯病醋心胸中冷腹痛吐逆不喜飲人參半夏湯胃虛氣逆嘔吐不食縮砂散 戴思恭曰惡阻俗謂之病兒蓋其人宿有痰飲血壅遏而不行故飲隨氣上停滯肝經肝之味酸則必喜酸物金能尅木以辛勝之小半夏茯苓湯甚者二陳湯有服熱藥攻膈悶熱成疾宜荷葉散李梈曰或大吐或時吐清水惡聞食臭由子宮經絡絡于胃口故逢食氣引動精氣衝上必食吐盡而後精氣乃安亦有候交合而子宮穢甚者過百日則愈

胎動不安 陳自明曰妊娠將養如法則氣血調和胎得其所而產亦易否則胎動氣逆臨產亦難至危矣此謂胎氣上逼也

又曰有驚胎者懷妊將滿胎神已具墜撲傷胎甚至下血不省若欲驗其子母安否當參胎動不安方論治之若鈞籐湯紫蘇飲歸脾湯佛手散隨症選用又曰胎動不安重者必致傷墜若面赤舌青是兒死也面青舌赤是母死也唇口色青兩邊沫出子母俱死也當察而治之 嚴用和曰兩三月胎動由于宮久虛易令墮胎宜預服杜仲圓以養胎若胎動腹痛易變漏胎宜如聖湯又曰心神忪悸睡中多驚兩脇膨脹腹滿連臍急痛坐臥不寧氣急逼迫皆由氣悶或為喧呼至令胎驚筋骨傷痛四肢不安急服大聖散 朱震亨曰產婦因火動胎逆上作喘急者急用條芩香附之類為末服之又曰漏胎屬氣虛有熱四物加阿膠白朮條芩香附砂仁糯米 李梴曰胎動因七情氣逆心腹脹滿疼痛紫蘇飲因外感發熱頭痛嘔逆胸脇脹滿安胎

婦科玉尺 胎前

卷二

素憤墮胎加杜仲素血虛加芎歸此安胎之聖藥也凡卒有所下急則一日三五服緩則五日十日一服常服安胎易產所生男女又無胎毒 胎漏 李梴曰心腹痛而下血者為胎動不安不痛而下血者為胎漏二者所由分也大抵漏胎由熱者下血必多內熱作湯者四物加芩連白朮益母草血黑成片三補丸加香附白芍血虛來少古膠艾湯或合四物湯氣虛四君子湯加黃芩阿膠因勞役感寒致氣虛下血欲墜芎歸補中湯或下血如月信以致胞乾子母俱損者用熟地炒乾姜各二錢為末米飲服惟犯房下血者乃真漏胎也八物湯加膠艾救之 妊娠傷寒 朱肱曰妊婦傷寒仲景無治法用藥宜有禁忌不可與尋常婦人一概治傷寒安胎宜阿膠散白朮散憎寒壯熱當發汗葱白湯或中時行洒浙作寒振慄而悸或加噦蘇木湯頭痛黑黑不欲飲食脇下痛嘔逆痰氣黃龍湯頭目旋疼壯熱心躁旋覆花湯壯熱頭疼嘔逆不思飲食胎不安麥門冬湯妊婦發斑變黑色梔子大青湯壯熱頭疼心煩嘔吐不下食蘆根湯傷寒頭疼壯熱梔子五物湯頭疼肢節疼壯熱前胡七物湯四日至六日以來加心腹脹上氣渴不止食飲不多腰疼體重枳實散妊七月傷寒壯熱赤斑變黑瀉血升麻六物湯發熱煩悶葛根一物湯熱病葱白豉湯傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢疼痛背項拘急唇口乾燥柴胡石膏湯 萬全曰妊娠傷寒專以清熱安胎為主或汗或下各隨臟腑表裡所見脈症主治勿犯胎氣故在表發汗香蘇散和解半表裡黃龍湯在裡宜下三黃解毒湯此吾家傳之秘活人甚多 陳士鐸曰妊娠臨月忽

婦科玉尺 胎前

卷二

感少陰經風邪惡寒踈臥手足冷者不治少陰腎也無論傳經至少陰與直中少陰多不能治蓋少陰腎經宜溫不宜寒今風寒入之則命門火微而腎宮無非寒氣勢必子宮亦寒手足冷者脾胃寒極之兆也其死必矣幸而胎未下急以散寒救胎湯溫之人參一兩白朮二兩肉桂乾姜炙草各一錢一劑不惡寒二劑手足溫不踈臥三劑全愈又妊娠臨月感少陰經症惡心腹痛手足厥逆者不治亦以寒入腎宮上侵于心不獨下侵于腹已也較上症更重夫腎水滋心何以反至尅心蓋腎之真水心藉以養腎之邪水心得之亡今腎感寒邪挾腎水上凌于心故心腹兩相作痛手足一齊厥逆至急至危非驅少陰之邪不可方用回陽救產湯人參當歸各一兩肉桂乾姜甘草各一錢白朮五錢此方妙在加當歸蓋少陰之邪敢上侵于心者欺

婦科玉尺

胎前

卷二

十

心中之無血也用當歸補血助入參之力以援心則心中得養而萎桂無非祛寒蕩邪之品況又有朮草之利腰膈而調心腹有不痛止逆除者乎又妊婦臨月忽感少陰症者急以參朮大劑溫之不應則死此仲景之文也似乎舍參朮無可救矣吾以為單用參朮尚非萬全苟用參朮不應急加附桂乾姜無不應也今定一方名全生救難湯人參白朮各一兩附子一錢甘草五分凡感少陰經之邪者用此神效
孕癰 陳自明曰治孕癰用烏藥五錢水一鍾煎七分入牛皮膠一兩化服或苡仁煮汁飲之註曰孕癰即是腹內患癰如前法不應宜牡丹皮散薏苡仁湯 王肯堂曰大凡孕婦患肚癰血尋常治法迥異內用紫蘇飲安胎勿輕與他藥若臨月則兒與膿俱下若尚遠則膿自大便出若初起只服藥可消若癰在

外而其症為熱只可用中和藥收功亦須審輕重用之恐有悞而難救也 萬全曰妊娠咽喉痛者以東垣涼膈散加牛蒡子一錢口舌生瘡同治乳癰托裡解毒湯背生瘡毒屬陽明經也本方去青皮加升麻葛根各一錢胸前兩頰生瘡毒此少陽經也本方去白芷加柴胡山梔龍胆草肩膊脇下生瘡毒太陰經也本方去青皮加陳皮天冬桔梗桑皮各一錢膀內陰旁生瘡毒厥陰經也本方去白芷倍青皮手足掌內生瘡毒少陰經也本方去白芷青皮花粉加黃連黃柏木通各一錢

產前白帶 陳士鐸曰產前無白帶也有則難產之兆即幸而順生產後亦有血運之虞方用黑豆三合煎湯二碗先用一碗入白果十個紅棗二十個熟地一兩山萸苡仁山藥各四錢茯苓三錢澤瀉丹皮各二錢加水二碗煎服一劑或二劑永不白帶亦通治婦人諸帶無不神效

婦科玉尺

胎前

卷二

預防難產 萬全曰生育者婦人之常非病則不必藥惟素有難產之苦不得不講求其方以為保生之計其束胎之方用各不同如枳壳瘦胎散及用滑石方氣實多痰者宜之達生散束胎丸氣虛少有熱者宜之若不審其虛實不若不服之為善也雙胎品胎鬼胎 朱震亨曰精氣有餘岐而分之血因分而攝之故成雙胎若夫男女同孕者剛日陰時柔日陽時陰陽混雜不屬左不屬右受氣于兩岐之間者也亦有三胎四胎者猶是而已 張介賓曰鬼胎者豈真鬼氣襲人胞宮而成形乎不過由本婦氣質弱或以邪思畜注血隨氣結而不散或以衝任滯逆脉道壅滯不行是固內因之病而必非外來之邪蓋即血癥氣瘕之類耳當即以癥瘕法治之如狐魅異類之遇則實有所

受而又非鬼胎之謂亦當于癥瘕類求法治之又曰治鬼胎當以補元爲主而繼以去積之藥然補中兼行者無如決津煎欲去滯而不猛峻者無如通瘀煎既加調補而欲直攻其病則奪命丹迴生丹皆可酌用或以當歸紅花膠煎湯送赤金豆亦妙胎前不治症 寶漢卿曰產前咽喉痛而脈浮者不治面赤而睛上視者不治面黑汗出者不治心胸緊滿吐痰不出者不治白利不止者不治氣促四肢厥冷者不治心中怔忡胸前紅甚舌捲面赤目上視者不治血氣攻心欲絕面紅者不治自利而喘者不治潮熱往來時發語者不治胸腹脹急者不治喉中或雷聲或噎食者不治

逐月養胎方 徐之才曰妊娠一月名胎胎飲食精熟酸美受御宜食大麥毋食腥辛是謂才正是月足厥陰脈養胎不可針

婦科玉尺 胎前

卷二 三

灸其經足厥陰屬肝主筋及血一月之時血行否澁不爲力事寢必安靜無令恐畏是月陰陽新合爲胎寒多爲痛熱多卒驚舉重腰痛腹痛胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯 烏雌雞一隻治如食法 茯苓 阿膠各二兩 吳萸一升 麥冬五合 人參 白芍 白朮各三兩 甘草 生姜各二兩 水二斗二升煮雞取汁六升煎藥取三升入酒三升并阿膠烱盡取三每服一升日三服

妊娠二月名始膏毋食辛燥居必靜處男子勿勞百節皆痛是爲胎始是月足少陽脈養胎不可針灸其經少陽屬胆主精二月之時兒精成于胞裡當慎護之勿驚動也是月始陰陽蹇經有寒多壞不成有熱即痿痺中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱宜艾葉湯 艾葉 丹參 當

歸 麻黃各二兩 生姜六兩 人參 阿膠各三兩 甘草

四錢 大棗十二枚 水一斗酒三升煎三升化膠分三服

妊娠三月名始胞此時未有定象見物而化欲生男者操弓矢

欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是

謂外象而內感者也是月手心主脈養胎不可針灸其經屬心

母悲哀思慮驚動是月爲定形有寒大便青有熱小便難赤

卽黃卒驚恐憂愁嘔怒喜仆動干經脈腹滿繞臍痛或腰背痛

卒有所下宜雄雞湯 雄雞一隻治如食法 白芍四兩 黃

芩 白朮 生姜各一兩 麥冬五合 大棗十二枚 甘草

茯苓 人參 阿膠各二兩 水一斗三升煮雞取汁減半

入藥煎半入酒三升并膠煎取三升分三服一日盡 一方無

姜芩有川芎當歸各二兩

婦科玉尺 胎前

卷二 三

妊娠四月始受水精以成血脈食宜稻宜魚是謂盛血氣以通

耳目而行經絡是月手少陽脈養胎不可針灸其經內輸三焦

此時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食是月有寒心下溫

溫欲嘔胸膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒

風寒項頸強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫

胸心煩不得安卒有所下宜菊花湯 菊花五錢 麥冬一升

大棗十二枚 人參兩半 當歸 甘草各二兩 麻黃

阿膠各三兩 半夏四兩 生姜五兩 水八升煮入膠并酒

三升煎三升分二服當汗以粉扑之護風寒四五日

妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣深其居處

厚其衣服食稻梁羹牛羊和菜菓調五味是謂養氣以定五臟

是月足太陰脈養胎不可針灸其經屬脾此時兒四肢皆成毋

太飢飽。母食乾燥炙熱。母太勞倦。是月有熱。苦頭眩。心亂嘔吐。有寒。苦腹滿痛。小便數。卒有怒怖。四肢疼寒。熱胎動無常處。腹痛。悶頓欲仆。卒有所下。宜阿膠湯。阿膠四兩。人參一兩。生姜六兩。當歸。白芍。甘草。黃芩各二兩。旋覆花二合。吳萸七合。麥冬二升。水九升。煎半入膠。并酒三升。煎三升。半分四服。日三夜一。先食服。

妊娠六月。始受金精。以成其筋。身欲小勞。毋逸。出遊于野。食鳥獸肉。是謂變腠理。紉筋以養其力。以堅背脊。是月足陽明。脈養胎。不可針灸其經。屬胃。主口目。此時兒口目皆成。調五味。食甘美。毋太飽。是月卒有所動不安。寒熱往來。腹脹滿。體腫。驚悸。卒有所下。腹痛如欲墜。手足煩疼。宜麥冬湯。麥冬二升。人參。甘草。黃芩各二兩。生地三兩。阿膠四兩。生姜六兩。

婦科玉尺 胎前

卷二

棗十五枚。水七升。煎半入膠。并酒三升。煎三升。分三服。中間進粥。

妊娠七月。始受木精。以成其骨。勞身搖肢。毋使安逸。動作屈伸。以運血氣。居燥處。飲食避寒。食稻粱。以密腠理。是謂養骨而堅齒。是月。手太陰。脈養胎。不可針灸其經。屬肺。主皮毛。此時兒皮毛已成。無多言哭。毋洗浴。毋薄衣。毋飲冷。是月。忽驚恐。搖動。腹痛。卒有所下。手足厥冷。脈若微寒。煩熱。腹滿。短氣。常苦頸項及腰背強。宜葱白湯。葱白長三四寸。十四莖。半夏。麥冬。各一升。旋覆花二合。黃芩一兩。人參兩半。甘草。蜜黃芪。當歸各三兩。阿膠四兩。生姜八兩。水七升。煎半入膠。并酒三升。煎四升。分四服。日三夜一。取汗。若無汗。加麻黃一兩。再服。秋後勿強汗。

妊娠八月。始受土精。以成膚革。和心靜息。無使氣極。是謂密腠理。而光澤顏色。是月。手陽明。脈養胎。不可針灸其經。屬大腸。主九竅。此時。兒九竅皆成。毋食燥物。毋大怒。是月中風寒。有所犯觸。身體盡痛。乍寒乍熱。胎動不安。常苦頭眩痛。繞臍下寒。時時小便白如米泔。或青或黃。或寒慄。腰背苦冷而痛。目眩。無見。宜芍藥湯。白芍四兩。生姜六兩。厚朴二兩。甘草。當歸。土白朮。人參各三兩。葱白切一升。水五升。酒四升。煎三升。分三服。日二夜一。

婦科玉尺 胎前

卷二

妊娠九月。始受石精。以成皮毛。六腑百節。莫不畢備。飲醴食甘。緩帶。是謂養毛髮。致才力。是月。足少陰。脈養胎。不可針灸其經。屬腎。主續縷。此時。兒脈絡續。縷皆成。毋處溼冷。無着灸衣。是月。若卒得下痢。腹滿。懸急。胎上冲心。腰背痛。不可轉側。短氣。宜半夏湯。半夏三兩。大棗二十枚。麥冬。吳萸。當歸。阿膠各二兩。乾姜一兩。水九升。煎三升。入蜜八合。分四服。痢即止。

妊娠十月。五臟俱備。六腑齊通。納天地氣于丹田。故使關節人神皆備。只俟時而生。是月。足太陽。脈養胎。不可針灸其經。屬膀胱。宜服滑胎藥。自一月至十月。惟手少陰。手太陽。無所專主。以君主之官。無為也。受胎保護。保產要錄曰。一受胎後。不宜食牛羊犬等肉。并鱉鼈。烏魚。無鱗魚。胡椒。姜。蒜。及辛辣之物。一受胎後。不可看戲。及鬼怪形像。一最戒暴怒。口不可出惡言。手不可用鞭撻。蓋怒傷氣血。不能養胎。多有因此動胎者。即幸不動胎。怒氣入胎。子生多疾。亦不可登高上梯。恐跌有損。亦不可伸手高處取物。恐傷。

胎而子鳴腹中子鳴亦有法但令鞠躬片時自安一受胎三五個月後常要緊束其身勿令胎放或六七月或七八個月胎忽亂動三兩日間或痛或止或有水下但腰不甚痛脈未離經名曰弄胎又有臨產一月前忽然腰痛卻又不產此是轉胎名曰試月胎水有無俱不妨但直身坐臥行立不可驚憂逼迫以致慢事二者俱非正產必因曲身觸犯致此齋按胎產書如達甚多然明白周詳細心切要語語可遵而行之者惟有保產要錄一書最妙余故于胎前小產臨產產後各門分錄其語俾妊孕家知有所法又恐人混視之特識于此以使閱者觸目驚心焉卷後但書青溪主人識五字惜不得其姓名

治胎前病方

白朮散

妊娠養胎 白朮 川芎各一兩 川椒去汗 七錢 杜蠟五錢 每末一錢酒下日三夜一 但苦痛加白芍 心下毒痛倍川芎 心煩 肚痛不能食飲加細辛一兩半大棗十枚服之 更服酸漿水服漿水不解飲小麥汁又渴者服 大麥粥病雖愈此粥亦可服

婦科玉尺

卷二

治前

旋覆花湯

治妊婦見草脈半產漏下 旋覆花三兩 葱 十四莖 新絳少許同煎

人參橘皮湯

治孕婦病兒 人參 橘皮 赤苓 白朮 麥冬 厚朴各一錢 竹茹 甘草各八分

人參木瓜湯

治同上 人參 木瓜 橘紅 枇杷葉 麥冬 藿香 竹茹

丁木湯

治同上 丁香 白朮 人參 甘草

防己湯

治妊娠脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利 防己 赤苓 桑皮 紫蘇各一錢 木香五分

白朮散

治孕婦面目虛浮四肢腫如木氣名曰子腫 白朮二錢半 茯苓皮錢半 陳皮 姜皮 桑皮 大腹皮各一錢 本方去白朮名五皮散

天仙藤散

治妊娠自三月成胎之後兩足自腳面漸腫至 膝膝行喘悶妨食狀似水氣甚至足指間有 黃水出者謂之子氣 天仙藤即青木香藤洗 畧炒 香附 陳皮 甘草 烏藥 木香 等分 每咀片五錢加姜三片紫蘇五葉煎日三 服腫消止藥 一方木香換木瓜 歸子煩 殊砂一兩 黃連一錢 生姜 當 歸 甘草各五分

安神丸

治子煩 殊砂一兩 黃連一錢 生姜 當 歸 甘草各五分

紫蘇飲

治妊娠失調胎氣不安上攻作痛名曰子懸或 臨產氣結不下等症 人參 甘草各五錢 大腹皮 川芎 紫蘇葉 白芍 陳皮 歸各一兩 每咀片一兩加葱薑煎 一方行 木香無人參 一方無川芎名七寶散 若脾 脾氣血虛而有火不安者宜四君芎歸湯 虛弱而不安者宜四君芎歸湯

子懸湯

治子懸 人參 蘇梗 砂仁 陳皮 歸身 白芍 丹參 黃芩 香附 麥冬 木通 滑石各三錢 人參 細辛各二錢 當歸 燈心 甘草各五錢

安榮散

治妊娠瘧疾寒少熱多或但熱不寒口苦舌乾 大便燥澀不進飲食脈弦數者 青皮 厚朴 白朮 草菓 炙甘草 柴胡 黃芩 茯苓 各八分 蒼朮一錢 藿香葉 草菓 茯苓 各五分 蒼朮一錢 藿香葉 草菓 茯苓 各五分 水煎服

人參養胃湯

治妊娠瘧疾寒多熱少或但寒不熱惡心頭疼 身痛面青白脈弦遲者 半夏 厚朴 橘紅 各八分 蒼朮一錢 藿香葉 草菓 茯苓 各五分 水煎服

婦科玉尺

卷二

治前

勝金丹

鯉魚湯

治子懸能使不墮 常山酒炒四錢 枳殼一 錢 醋糊丸菜豆大發前三更時酒下三九 治妊 鯉魚一錢 茯苓錢半 白朮二錢 當歸 紅五分 鯉魚一尾去鱗腸煮汁取蓋半入姜 三片煎一盞空心服胎水即下如未盡腹悶未 除再一服

葛根湯

火龍散

桔梗散

馬兜鈴散

百合散

治兒暈 葛根 桂枝 麻黃 白芍 甘草 治子懸心氣疼 川棟子 茴香各三錢 鹽 炒艾葉末錢半 煎不拘時服 治妊 桑皮 桔梗 紫蘇各五分 麻黃三 分 貝母 人參 炙甘草各二分 一方有杏 仁無貝母加姜 治妊 氣壅寒咳氣喘 馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母各五分 桑白 陳皮 大腹皮 紫蘇各一錢 五味子三分 方有枳壳無人參貝母桑皮 治妊 風痺咳嗽痰多喘滿 百合 紫苑茸 貝母 白芍 前胡 赤苓 炒桔梗各一 錢 炙甘草五分 姜五片

羚羊角散

治妊娠胃悶角弓反張名曰子癇風痙。羚羊角獨活 桑仁 防風 五加皮 苡仁 酒當歸 川芎 茯神 杏仁各五分 木香 甘草各二分

舉輕古拜散

治同上 荆芥穗炒為末湯下

安胎和氣飲

治胎冷腹痛引兩脇小便頻數大便虛滑。煨訶子 白朮各二錢 陳皮 炒良姜 木香 白芍 陳米 炙草各一錢 姜五片 忌食生冷

消風散

治胎熱 荆芥 甘草 羌活 川芎 人參 茯苓 姜蚕 防風 藿香葉 蠅退 陳皮 厚朴

天門冬飲

治同前 天冬 知母 茯苓 羌活 人參 防風 五味 羌蔚子 山梔 黃芩 當歸 元參 枳殼 蘇梗 廣皮 白芍 杜仲

梔苓湯

治胎時常腹痛名曰痛胎。山梔 黃芩 杜仲

人參升麻湯

治妊娠轉胎。人參 升麻各二錢

固胎丸

治滑胎 人參 黃芪 茯苓 白朮 杜仲 川斷 山萸肉 白芍 丹參 川芎 山藥 婦科玉尺 胎前 卷二

藥 當歸 生地 香附 砂仁 薄荷

香連化滯丸

治妊娠下痢赤白。青皮 陳皮 厚朴 枳實 黃芩 黃連 當歸 白芍 滑石 木香 甘草 樞榔 此方力頗大當臨時酌量

胃風湯

久痢 人參 茯苓 川芎 白朮 當歸 白芍各一錢 肉桂四分

黃連丸

治妊娠白痢。黃連 乾姜 砂仁 川芎 阿膠 白朮各一兩 枳殼五錢 乳香三錢 治妊娠泄瀉。白朮 茯苓各三錢 白芍二錢

三白散

治同上 黃芩二錢 白芍一錢 甘草五分

冬葵子湯

治妊娠身熱入臍一便不利此能除熱安胎。冬葵子 赤苓 治妊娠腰痛不可忍此方神效。補骨脂不拘多少瓦上炒為末空心先嚼胡桃肉一個酒調下

通氣散

治同上 補骨脂 杜仲各四兩 胡桃肉三十個研泥蜜丸酒下四錢

青娥丸

治損動胎氣腰痛去血胎動向下。生地 芎根各二兩 當歸 芍藥 阿膠 甘草各

千金保孕方

一兩 水二升煮二升入膠化分二服 常服固胎。糯米一升煮粥 杜仲八兩搗去 桑梓粥晒乾再拌再晒完為度炒研 川斷 六兩 將山藥四兩打糊為丸空心米湯下

芩芍湯

治胎動因熱。黃芩 白芍 白朮 肉桂 治胎動因實。香附 枳殼

大聖湯

治妊娠怔忡。川芎 黃芪 當歸 木香 人參 甘草 茯苓 麥冬 歸同上 桑仁 遠志 黃芪 柏子仁 當歸 人參 茯苓 白芍各一錢 紫石英 木香各八分 甘草三分

益榮湯

治同上 人參 遠志各一兩 蒲黃二兩 茯苓三兩

定志丸

此膏養胎臨月服之滑而易產。丹參半斤 當歸各二兩 川椒五合 右四味以酒拌壓 一夜以炭成膏四升微火煎膏色赤如血膏 成新布去渣每取素許入酒服之不可逆服必 至臨月乃可服 有熱者以火麻仁五合代椒

婦科玉尺 胎前

卷二

阿膠散

治妊娠或因傾仆胎動不安腰腹痛或有所下 或胎上沖心。熟地二兩 白芍 艾葉 歸 甘草 阿膠 黃芪各一兩 每粗末五 錢加姜三棗一煎 一方有川芎 治妊娠傷食。丁香 砂仁 白朮

丁香散

治胎動不安由于火旺。黃芩 白芍 白朮 當歸 川芎

安胎丸

治胎動不安由于火旺。黃芩 白芍 白朮 當歸 川芎

佛手散

治胎動不安由于火旺。黃芩 白芍 白朮 當歸 川芎

阿膠斷艾丸

治胎動不安由于火旺。黃芩 白芍 白朮 當歸 川芎

瘦胎散

治胎動不安由于火旺。黃芩 白芍 白朮 當歸 川芎

芎根湯

治胎動不安由于火旺。黃芩 白芍 白朮 當歸 川芎

黑豆湯

治便食毒物毒藥胎動。黑豆三合 淡竹葉二十片 甘草三錢

黃芪湯

治妊娠漏下黃水。黃芪一兩 川芎一錢 梗米一合

伏龍肝散

治妊娠熱病防胎傷墮。伏龍肝末和井泥調敷肚上

護胎方

治同前。白藥子不拘多少雞子白調塗臍下胎處如碗大上用棉帛蓋之乾則以水潤之

桑皮湯

治妊娠腹脹痛。桑皮 茯苓 橘紅 白朮 木瓜 秦艽

二香散

治胎動不安。藿香 香附 甘草 等分

安胎方

治同上。人參 砂仁 香附 黃芩 黃柏

安胎四物飲

治妊娠諸痛。四物湯加 肉桂 厚朴 枳殼

壯氣四物湯

治臨期腹痛脹滿。心刺刺痛。四物湯加 木香 青皮 陳皮 枳殼 甘草

安胎飲

治胎氣不安。人參 白芍 蘇梗 條芩 香附 砂仁

受娠中和湯

治初受娠養血安胎健脾胃理氣。砂仁 香附 白芍 茯苓 人參 當歸 蘇梗 香薷

釣藤湯

治八九月胎動不安。心腹疼痛。面目青冷。汗出氣欲絕。此由勞動用力有傷胎宮。急治之。枳殼 茯苓 桑寄生 五錢 釣藤 鈎藤 各五錢 人參 茯苓 各一兩 每咀片五錢 不拘時煎服

如聖湯

治胎動腹痛或胎漏。鯉魚皮 酒當歸 白芍 熟地 阿膠 酒川斷 川芎 炙甘草 等分 每咀末四錢 加芋根少許 姜五片

芎歸湯

治妊娠先患冷氣。忽中心腹痛如刀。川芎 人參 吳茱萸 茯苓 桔梗 當歸 各三兩 厚朴 白芍 各二兩 水九升 煮三升 分三服

安胎飲

治妊娠卒然腰痛。下血不已。四物湯加 阿膠 艾葉 黃芪 各一錢 地榆 炙甘草 各五分 加姜棗

白朮散

治妊娠氣不調和。飲食易傷。焦朮 紫蘇 各一兩 人參 白芷 各七錢五分 川芎 三錢 加姜棗

白朮散

治妊娠傷寒熱病。先以此安胎。但覺頭痛發熱。便可服。二三劑即差。若四肢厥逆。屬陰症者。不可服。黃芪 蒼朮 各二錢 白朮 等分 每咀末三錢 加姜棗

香蘇散

治妊娠傷寒。勿論日數。但覺惡寒。頭疼。以此主之。香附 紫蘇 各二錢 陳皮 一錢 甘草 五分 加姜棗

麥門冬湯

治妊娠心驚。胎動不安。麥冬 一錢 茯苓 一錢 砂仁 一錢 人參 一錢 炙甘草 一錢 加姜棗

杜仲圓

治兩三月胎動不安。腰痛。防其墮。宜預服之。杜仲 川斷 各二兩 棗肉 九

半夏茯苓湯

治妊娠脾胃虛弱。飲食不化。嘔吐不止。半夏 茯苓 各一錢 茯苓 二錢 甘草 五分 加姜棗

歸脾湯

治妊娠鬱結。傷脾。亦治發熱盜汗。健忘怔忡。驚悸。少寐。人參 白朮 茯苓 各一錢 黃芪 當歸 各五分 遠志 棗仁 各一錢 木香 當歸 各五分 加姜棗

半夏茯苓湯

治惡阻。嘔吐。心煩。頭暈。目眩。運惡。聞食氣。飲食不進。多臥。少起。百節煩疼。羸瘦。痰盛。半夏 茯苓 各一錢 茯苓 二錢 甘草 五分 加姜棗

理陰煎

治臟寒。惡嘔。胎氣不安。亦治產後脾氣虛寒。嘔吐。食少。腹痛。嘔吐。厥逆。熟地 三五錢 或一兩 當歸 二三錢 或五七錢 乾姜 炒黃 一二錢

赤金豆

治鬼胎。一名八仙丹。巴霜 錢半 皂角 炒散 焦二錢 附子 炒燥 硃砂 各二錢 輕粉

一錢 丁香 木香 天竺黃 各三錢 醋
蒸餅丸 煎子大 珠砂 爲衣 欲漸去者 每服五
丸 欲驟行者 每服一二口 卽止 蓋此藥得熱則
多 不止 可飲冷水 一二口 卽止 蓋此藥得熱則
行 得冷則止也

芎歸膠艾湯

治妊娠腹痛 胎漏 產後下血 不絕 及八
九月 內胎動 下血 芎歸 各三兩 阿膠 炙草 各二
兩 艾葉 炒 水五升 酒三升 煎三升 化膠 分二服
日三

黃芩湯

治胎孕不安 黃芩 白朮 當歸 各二錢
不拘時服 一方有砂仁

芎歸補中湯

治血氣虛弱 不能衛養 以致胎漏 每四五五月而
墮 各一錢 黃芪 川芎 阿膠 五味子 炮姜
牛人參 杜仲 木香 炙草 各五分 不
拘時煎服 一方無木香

加減五物湯

安胎消熱 葛根 柴胡 香茹 石膏 山
梔子 前胡 黃芩 葱白 陳皮 甘草 知
母

婦科玉尺 胎前 卷二 三

梔子大青湯

治妊娠熱病 發斑 變黑 黃芩 升麻 山梔
各一錢 大青 杏仁 各五分 葱白 三莖
枳殼 瘦胎散 孕婦八九月 胎氣壅滿 服之 滑胎 易產 平安
枳殼 五兩 甘草 一兩 香附 兩半 每末二
錢 湯下

束胎丸

能縮胎 易產 白朮 枳殼 等分水 浸燒 蒸
丸

蘆根湯

治妊娠嘔吐 不食 兼吐痰水 生蘆根 七分
橘紅 四分 生薑 六分 枳殼 二分 枇杷葉
三分 空心熱服

蘆根湯

治妊娠惡食 心中煩悶 熱悶 嘔吐 麥冬 竹
茹 各三兩 前胡 二兩 橘紅 去白 蘆根 各
一兩 如身熱 四肢煩熱 加地骨皮 一兩 水
煎 分二服

人參半夏湯

治惡阻 醋心 胸腹冷痛 吐逆 不食 人參 半
夏 乾姜 各五錢 以地黃汁 浸蒸 餅丸
治妊娠胃虛 氣逆 嘔吐 不食 每砂仁 末一錢
薑汁 調水 湯下

縮砂散

治胎上 過心 煩悶 亦治胎動 困篤 葱白 二七
莖 煮汁 飲之 若胎未死 卽安 已死 卽出 不效 再
服 此方 神效 脈滑 滑者 宜之 本草 云 葱白
通腸 氣安胎

葱白湯

黃龍湯

治妊娠傷寒 得之 三五日後 有惡寒 發熱 內有
煩渴 引飲 小便赤澀 之症 此邪在半表 半裡 也
此方 主之 柴胡 二錢 黃芩 一錢 芍藥 一錢 甘草 一錢
此方 主之 柴胡 二錢 黃芩 一錢 芍藥 一錢 甘草 一錢

理中湯

治妊娠 霍亂 腹中 絞痛 四肢 逆冷 汗出 脈虛 弱者
人參 白朮 炮姜 炙草 各一錢 粳米 一握 水 煎 服

三黃解毒湯

治妊娠 傷寒 五六日 後表邪 悉去 但煩燥 發熱
大渴 小便 赤澀 或利 下赤 水六 脈沉 實 此
爲 邪在 裡也 此方 主之 大黃 黃芩 黃連 各一錢
爲 邪在 裡也 此方 主之 大黃 黃芩 黃連 各一錢

芫花散

治小兒 在腹中 哭 黃連 濃煎 汁 母常 啞之 卽
止 治初 次產 育 產門 腫脹 或 痠痛 不閉 當歸
柴胡 薄荷 白朮 白芍 茯苓 各一錢 炙草 五
分 薄荷 七葉 此 道 遙 散 也 今 加 山 梔 生

補遺方

治小兒 在腹中 哭 黃連 濃煎 汁 母常 啞之 卽
止 治初 次產 育 產門 腫脹 或 痠痛 不閉 當歸
柴胡 薄荷 白朮 白芍 茯苓 各一錢 炙草 五
分 薄荷 七葉 此 道 遙 散 也 今 加 山 梔 生

加味逍遙散

治小兒 在腹中 哭 黃連 濃煎 汁 母常 啞之 卽
止 治初 次產 育 產門 腫脹 或 痠痛 不閉 當歸
柴胡 薄荷 白朮 白芍 茯苓 各一錢 炙草 五
分 薄荷 七葉 此 道 遙 散 也 今 加 山 梔 生

續斷湯

治小兒 在腹中 哭 黃連 濃煎 汁 母常 啞之 卽
止 治初 次產 育 產門 腫脹 或 痠痛 不閉 當歸
柴胡 薄荷 白朮 白芍 茯苓 各一錢 炙草 五
分 薄荷 七葉 此 道 遙 散 也 今 加 山 梔 生

甘麥大棗湯

治小兒 在腹中 哭 黃連 濃煎 汁 母常 啞之 卽
止 治初 次產 育 產門 腫脹 或 痠痛 不閉 當歸
柴胡 薄荷 白朮 白芍 茯苓 各一錢 炙草 五
分 薄荷 七葉 此 道 遙 散 也 今 加 山 梔 生

長胎白朮丸

治小兒 在腹中 哭 黃連 濃煎 汁 母常 啞之 卽
止 治初 次產 育 產門 腫脹 或 痠痛 不閉 當歸
柴胡 薄荷 白朮 白芍 茯苓 各一錢 炙草 五
分 薄荷 七葉 此 道 遙 散 也 今 加 山 梔 生

桂心散

治小兒 在腹中 哭 黃連 濃煎 汁 母常 啞之 卽
止 治初 次產 育 產門 腫脹 或 痠痛 不閉 當歸
柴胡 薄荷 白朮 白芍 茯苓 各一錢 炙草 五
分 薄荷 七葉 此 道 遙 散 也 今 加 山 梔 生

者不如下之免害妊婦則以此方主之然必確
審其果不能留方可下切勿造次慎之
若如此而行私妄用則更斷不可又方單
用牛膝一兩酒一鐘煎七分作二服又方麥
芽一升爲末和酒煮二升服之即下神效
出方取雞子一枚以三指撮鹽放雞子中服之立

千金神造方
治婦人陰陽俱盛。名曰雙龜。少陰微緊。首血
即凝。滯經。養不周。胎。偏。天。一。生。一。死。不。去。其
死。害。母。失。胎。此。方。主。之。東。流。水。一。斗。升。煎。三
兩。甘。草。二。兩。此。方。主。之。東。流。水。一。斗。升。煎。三
至。三。升。去。渣。化。膠。頓。服。之。不。能。分。再。服。

下胎方
治妊母因疾病胎不得安可下之。取七月七
日法。麵。四。兩。水。二。大。盞。煎。取。一。盞。三。分。去。渣。
分。溫。三。服。立。下。

秦氏世傳逐月養胎方
治有氣血不足胎氣始盛逆動
陳皮半夏湯 治有氣血不足胎氣始盛逆動
胃氣惡阻嘔吐 飲食少進 更詳加減法
皮去白鹽水炒 柴蘇各八分 炙草五分 酒黃
芩 麩 枳 殼 胎前 卷二 肥

婦科玉尺 胎前 卷二 肥
人用此必將半夏炒黃 加姜一片

柳青丸
妊三四月服 川黃連姜汁炒三次 兩米糊
九菜豆大每服三四五至七八分即起 前
前汁送下 此須未交三月前十日服起 按

安胎和氣散
治有覺倦臥不安或口苦頭痛
脚弱及腫急則服此 如無此等症則止藥
土白朮錢半 鹽麩皮一錢 鹽香附研二錢
茯苓八分 炒白芍一錢 鹽香附研二錢

養胎飲
治覺胎氣不和或漸痛脹胎動
洗歸身酒 黃芩白芍 楚枳殼 川芎各八分 炙
草四分 酒二錢 治覺胎氣不和或漸痛脹胎動
不安 當歸二錢 魚木一錢 煎酒各一錢

大胎如勝飲
治覺胎氣不和或漸痛脹胎動
酒白芍 炒砂仁 茯苓 煎酒各一錢
炙草五分 治覺胎氣不和或漸痛脹胎動
不安 當歸二錢 魚木一錢 煎酒各一錢

清胎萬全飲
治覺胎氣不和或漸痛脹胎動
熟地 酒服 水煎 六日 煎酒各一錢
芥各八分 煎酒各一錢 煎酒各一錢

和胎調氣飲
好娠八月服 治覺胎氣喘腫不問有無外感
炒陳皮二錢 酒黃芩一錢半 炙草三分
焦朮各一錢 麩枳殼八分 炙草三分

順胎飲
二服 七日進一服 雖無他症亦宜順氣和中安胃
便無難產之患 當歸二錢 蘇梗一錢 酒洗大
黃芩各八分 茯苓 蘇梗 酒洗大黃

滑胎飲
煨川芎 製香附 廣皮各一錢 蘇梗八分
煨川芎 製香附 廣皮各一錢 蘇梗八分
煨川芎 製香附 廣皮各一錢 蘇梗八分

便產神方
專治一切產症 懷孕不拘月數 偶傷胎氣 腰痠
腹痛 甚至或臨產交骨不開 兒死腹中 橫生 逆產
全愈 又或臨產交骨不開 兒死腹中 橫生 逆產
至六七日不產 命在須臾 者服此 無不神效 但
臨月預服三五劑 即無難產之患 真濟世神方
也 酒洗 蘇梗 炒白芍 各七分 當歸
一錢 川芎 各八分 兔絲子 酒炒 各七分 當歸
一錢 川芎 各八分 兔絲子 酒炒 各七分 當歸
一錢 川芎 各八分 兔絲子 酒炒 各七分 當歸

婦科玉尺 胎前 卷二 肥
宜真分量宜準 切不可增減 以自誤 預服者
宜清晨如臨產及胎動則隨時

沈氏尊生書卷三

婦科玉尺

小產

沈金齋撰

小產元氣虛損不能榮養乎胎而自墮昔人譬之以枝枯則果落
藤萎則花墜是也然或勞怒傷情內火發動亦能墮胎則猶風撼
其木人折其枝也夫火能消物造化自然說者乃謂風冷傷其子
臟此未得病情者也夫火抵屬虛屬熱當視其輕重而治之耳是知
正產者正如果中粟熟其殼自開兩無所損半產者則猶之採斫
新粟碎其膚殼損其皮膜然後取得其實以其胎臟傷損胞系斷
壞而後胎至墮落故小產後須十倍調治總以補血生肌養臟生
新去瘀為主世有一種恣情妄為偷生不正或多男女厭于養育
往往以草藥毒之每至敗血不下沖心悶亂喘汗交作而死者急

婦科玉尺

小產

卷三

一

須以解毒行血藥救之宜白扁豆散或有受孕至三五七陽月胎必墮
者宜未至應墮之期先清其熱宜芩木湯若氣不足預行補助宜
珍明醫雜著云凡小產多在三五七月若前次三個月墮則下胎
必如期復然故須于前次小產後多服養氣血固胎元之藥以補
其虛下次有胎必于兩個月半後即服清熱安胎藥數帖以防三
月之墮至四個月半再服數帖防過五月至六個月半再服數帖
以防七月之墮至九個月服達生散數帖則可保無虞矣宜千金
金匱當歸散芍歸補中湯五味安胎丸安榮湯和痛湯孰謂小產而可忽視哉凡小產後諸
病與產後參看

脈法

脈訣曰半產漏下革脈主之弱則血耗立見傾危脈

經曰陰脈浮而緊則胎前腹痛中痛半產而胎墮

內因而墮胎者若由跌扑挫
犯及快服毒藥則不得拘此

墮胎 陳自明曰凡妊婦腰痛多墮胎又妊未足月而痛如欲

產或應產而難或為子煩用知母一味蜜丸米湯下或蒲黃末

水調錢許亦效 朱震亨曰有賈氏婦但孕三月左右必墮診

其脈左手大而無力重取則澁知其少血也以其妙年只補中

氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯下黃芩末一錢三四

十帖遂得保全而愈 王綸曰有數墮胎胎元損甚者服藥須

多且久則可以留方用四物加人參白朮陳皮茯苓甘草艾葉

阿膠條芩多氣加砂仁香附有痰少加半夏麩黃芩為安胎聖

藥清熱故也暑月尤宜加用養胎全在脾胃故白朮補脾為安

胎君藥若因氣惱致胎不安宜川芎陳皮甘草茯苓多加砂仁

少佐木香以行氣 王肯堂曰袁了凡先生云受胎在腹七日

一變展轉相成各有相生今婦人墮胎在三五七月者多在二

婦科玉尺

小產

卷三

二

四六月者少臟陰而胎陽三月屬心五月屬脾七月屬肺當在
五臟之脈陰常易虧故多墮耳惟一月墮胎人皆不知有胎但
謂不孕不知其受而墮也一月屬肝怒則墮多洗下體則竅開
亦墮既墮一次則肝脈受傷他次亦墮今之無子者大半是一
月即墮非盡不孕也故凡初交之後最宜將息切無交接以擾
子宮勿怒勿勞勿舉動勿洗浴而又服養肝平氣之藥胎可固
矣 萬全曰孕而多墮者男子貪淫縱情女子好慾性偏又好
食辛熱暴損衝任故也其膏梁藜藿不同慾之多寡故也有等
婦人有胎似無胎痰氣疼痛發熱醫者不明醫理不知胎宜養
病宜攻妄施攻耗豈不悞歟故養胎者血也護胎者氣也或有
婦人小產太多至中年欲保全設法服藥但慾心不絕又百凡
上氣逆損衝任因而殞命者有之又曰脾胃傷則胎易墮寒熱

交雜子亦多痰。况多食酸傷肝。多食苦傷心。多食甘傷脾。多食辛傷肺。多食鹹傷腎。隨其食物。傷其臟氣。不但胎易墮。即不墮。子病亦多。又曰喜傷心。氣散怒傷肝。氣上思傷脾。氣鬱憂傷肺。氣結恐傷腎。氣下母氣既傷。子氣應之。母傷則胎易墮。子傷則臟氣不和。多盲聾瘡癩呆癲癩。又曰孕後行立坐臥若太久。則筋骨肌膚受傷。子在腹中。氣通于母。必有傷者。睡臥處要人護從。恐邪氣侵也。虛險處母往來。恐墮跌也。張介賓曰。凡墮胎者。或氣虛而提攝不固。或血虛而灌溉不周。故善保胎者。專顧血。虛以胎元。飲為主。次則芍藥芎歸湯。次則泰山磐石散。千金保孕丸。皆有奪天之功。又胎熱者。血易動。血動者。胎不安。故墮于內熱而虛者。正多。如脾氣虛而血熱者。四聖散。肝腎虛而血熱者。涼胎飲。肝脾虛而血熱者。固胎煎。此外凡有他症而胎不安者。當于安胎條中酌治。陳士鐸曰。小產非正產之症。亦可作產前治。蓋小產之氣血亦大傷。宜急補之。則日後坐胎。不至再有崩漏。用人參當歸白朮各五錢。茯苓三錢。熟地一兩。杜仲二錢。炮姜五分。此方乃補氣補血之聖方。胎動而下。必損帶脈。補其氣血。則帶脈損處。可以重生。他日受孕。不致有再損之虞。武之望曰。日月未足。胎氣未全。而產者。謂之半產。俗呼小產。由妊婦衝任氣虛。不能滋養于胎。胎氣不固。或擲撲閃墮。致氣血損動。或因熱病溫瘧之類。皆令半產。忌黑神散。恐犯熱藥。轉生他疾。宜玉燭散和經湯之類。薛氏云。小產重于大產。但人輕忽。致血者多。治法宜補。形氣生新血。去瘀血。若未足月痛而欲產。芎歸補中湯。倍加知母止之。產而血不止。人參黃芪湯。產而心腹痛。當歸川芎湯。胎氣弱而小產。八珍湯。血出過多而發

婦科玉尺 小產

卷三

熱聖愈湯汗不止。急用獨參湯發熱煩躁肉瞶筋惕八珍湯大渴面赤脈洪而虛。當歸補血湯身熱面赤脈沉而微。四君加姜附。東垣云。晝發熱而夜安靜。是陽氣自旺于陽分也。晝安靜而夜發熱。是陽氣下陷于陰分也。晝夜俱發熱。重陽無陰也。峻補其陰。王太僕云。如大寒而甚熱。之不熱。是無火也。熱來復去。晝見夜伏。夜發晝止。時節而動。是無火也。如大熱而甚寒。之不寒。是無水也。熱動復止。倏忽往來。時動時止。是無水也。陽氣自旺者。四物二連湯。陽氣陷于陰者。補中益氣湯。重陽無陰者。四物湯。無火者。八味丸。無水者。六味丸。

治小產病方

白扁豆散

治服打胎毒藥。白扁豆為末。新汲水下。三錢。即匙口藥者。快口灌之。

芩朮湯

清熱安胎。條芩。白朮。

婦科玉尺 小產

卷三

四

安胎丸

治同上。即將前方為丸。白湯下。

金匱當歸散

治同上。黃芩。白朮。當歸。川芎。白芍。各一兩。每末二錢。酒下。或酒糊丸。米湯下。亦可。按古人用此。燥淫。芩清熱。固已。而胎尤賴血。培養。此方加川芎。芍以清血。則胎自安。且易產。所生子。更無胎毒。痘症。亦稀也。素慎小產者。更宜服以清其源。

五味安胎丸

治同上。即前方用酒糊丸。此方白朮減半。

芎歸補血湯

治同上。當歸。黃芪。白朮。杜仲。白芍。各一錢。乾姜。阿膠。五味子。川芎。木香。人參。甘草。各五分。一方無木香。此兼治胎漏而墮。

安榮湯

治同上。熟地。白芍。川芎。桑寄生。當歸。阿膠。香附。白朮。砂仁。黃芩。各一錢。糯米百粒。

和痛湯

治小產心腹痛。四物各錢半。加延胡索一錢。澤蘭。香附。青皮。各八分。桃仁。紅花。各五分。加酒。童便。

千金保胎丸

此丸婦人三月小產者。雖氣血不足。乃中衝脈前傷。中衝脈即陽明胃經。供應胎孕。至此時必須

節飲食絕慾戒怒庶免小產之患服此可以保
全 姜汁炒熟地 土炒白朮 姜杜仲 益母
當歸 酒續斷 阿膠珠 四製香附 川芎各
一兩 砂仁五錢 陳皮 醋艾葉 川芎各
一兩 砂仁五錢 陳皮 醋艾葉 川芎各

泰山磐石散

治氣血兩虛或胎而不實或瘦而血熱或肝脾
素虛倦怠少食屢致墮胎 人參 黃芪 當
歸 川斷 黃芩各一錢 熟地 川芎 白
芍各八分 白朮二錢 炙甘草 砂仁各五分
糯米一撮 但覺有孕每三五日進一服至
四月後無慮矣

涼胎飲

治胎氣熱而不安 生地 白芍各二錢 當
歸 黃芩各一錢 茯苓 甘草七分 枳殼 石
斛各一錢 茯苓 一錢半 熱甚加黃柏一二
錢

胎元飲

治衝任失守胎元不安不固者隨症加減用之
或間日或二三日服一 人參 隨宜 當歸
杜仲 白芍各二錢 熟地 二錢 白朮
錢半 炙甘草一錢 陳皮 七分 無滯者不用
治漏胎下血 黃芩 白朮 阿膠 砂仁
等分 每末二錢 艾湯下 一方有芍藥無阿膠
此方若改湯劑砂仁減半

四聖散

婦科玉尺 小產

卷五

固胎煎

治肝脾多火多瀉而屢墮胎者 黃芪二錢 阿
膠各錢半 砂仁五分 當歸 白芍

四物二連湯

治血虛發熱或口舌生瘡或晝安夜熱者 四
物加胡黃連 宜黃連各一錢

臨產

沈金齋撰

夫胎前產後皆為易病之時皆為易病而難治之時尤不若臨產
時為更危險也蓋產之易者諸凡順當母子俱安產之難者生死
反掌必須救治方能起死回生稍不急救多致夭枉救不得法藥
不應手亦莫能全生可不懼哉蓋有少婦初生神氣怯弱子戶未
舒腰曲不伸展轉胎側兒不得出故難產者有中年婦人生育多
氣血虛而難產者須胎前服調理之藥乃易產有臨產努力太早
兒轉未速以致胎落于膝及兒欲出時母力已乏而難產者先以
獨參湯接力次服藥胎散有將產之際思慮穩婆不審其偏正每
腹痛努力催生以致橫生逆產者四物湯有體肥脂厚平素安適
而難產者有石矮婦人交骨不開而難產者蓋交骨不開乃元氣
虛弱胎前失于調養以致氣血不能運達而然也宜加味芎歸湯
交骨不開方

婦科玉尺 產

卷五

有破胞久漿水瀝盡產門風進產路乾澀而難產者俗名懸胞生
宜神效有血先下或胞漿先下子逆上衝者宜子逆湯有產不下橫
逆生而欲絕者宜加味芎歸湯有臨產腰腹酸疼見紅者宜催生有胎死
腹中不下者驗其舌色青黑腹冷是也宜二陳湯加朴硝五
錢即朴硝一味亦可若天
寒時須使胎得暖氣纔下急服藥宜官桂九此方暑天其死胎不
下反上沖心而欲絕者急服藥宜牛膝二兩砂仁丹參各二錢煎
有腹中積水腹大異常脈細而弱名曰胞水臨產必去水斗餘方
產者胎前產去血太多昏不知人產下即死曰血暈者宜芎
若產後虛脫兼防血暈宜人參鹿角膠蘇有火盛血奔上而昏暈
者宜清如不醒以韭汁和醋灌之或醋炭法熏之又不醒急招人
中提頂心頭髮姜汁童便灌之即活有失血過多虛熱太甚目暗
神昏手足冷者宜川芎當歸人參有穢產忽然噤口語言顛倒乍

見鬼神由敗血攻心者宜妙有臨盆用力太過氣血暈闕不省人事者宜膠有將產而痢不止者宜四君子湯加白芍杜仲赤石脂子下而胞不下由敗血灌入胞中者宜牛膝歸尾湯牛膝芒硝酒下或胞不下而臍腹堅疼脹急病更甚宜牛膝湯有兒腹下後膀胱落

婦科玉尺 臨產

白者難治先用薰洗法宜急以黃連狗脊五倍子水湯根枯各一二日急服藥宜補中益氣湯十全大補湯有子宮落下痛不可忍名曰痲疾者宜鐵粉散外用有氣血虛而產門不閉必須大補者宜加味芎歸湯一法用至臨產危症莫有如偏產倒產橫產碍產盤腸產悶膈產數大端最爲生死交關之候然亦非無法以處之者切不可驚皇擾亂致產母心怯然後依法治之無弗安然也其原由方治俱採前人之論詳錄于後以前人論極明當毋庸積

說也其有胞水先破不即產甚至延及兩三日四五日者此亦甚險急早調治或宜魚膠五錢煨存性酒下夫如是而臨產之病庶可免矣
脉法 脉經曰懷妊離經其脉浮設腹痛引腰脊爲今欲生也又曰懷妊六七月脉實大堅牢弦緊者生沉細者死又曰脉勻細易產大浮緩氣散難產 脉訣云欲產之婦脉離經沉細而滑也同名夜半覺痛應分誕來朝日午定知生又曰身重體熱寒又頻舌下之脉黑復青反舌上冷子當死腹中須遣母歸冥面赤舌青細尋看母活子死定應難唇口俱青沫又出母子俱死總教揀面青舌赤沫出類母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛陳看生死法 李挺曰臨產六至脉號離經或沉細滑如無即生浮大難產寒熱又頻此是凶候急于色微

面頰唇舌忌黑與青面赤母活子命必傾若胎在腹子母歸冥產難 嚴用和曰有欲產運悶者乃臨產時氣血忽然暈闕不省人事蓋因用力太過脉理衰微精神困倦心胸痞悶目眩口噤面青髮直命在須臾急用來麩散有胞肥難產者乃身居富貴口厭甘肥聚樂不常食物無度既飽便臥致令胞胎肥厚根蒂堅固行動氣急蓋緣不曾預服瘦胎之藥故至難生入月可服無憂散則易生 萬全曰凡臨產一二日間艱難者只以加減五苓散主之如過二三日人事強實飲食能進者此胞漿乾澀也加味四物湯調益元散主之如過二三日人事困頓飲食少者此中氣不足不能運動其胎也加味四君子湯主之如三四日不產或胎死腹中者奪命丹主之又曰凡兒逆生切不可用針刺足心及鹽塗之法兒痛上奔母命難存又曰凡患盤腸

婦科玉尺 臨產

生恐防再犯者宜于此後無孕時多服地黃九加五味子一兩肉桂一兩以固下元之關鍵及有孕時多服胡連丸加人參一兩以補氣又服三補丸以涼血如滑胎瘦胎之藥切勿輕服于入月之時再服八物湯加訶子瞿麥蜜炙粟殼服十餘劑庶可免矣 張介賓曰妊娠將產切不可占卜問神使巫覡妄言凶險恐嚇謀利禱神祈保產婦聞之致生疑懼夫憂慮則氣結滯而不順多致難產切戒又曰滑胎法惟欲易產耳然難產之由在血之盈虛不在藥之滑利蓋血多則潤而易產血虧則澀而難產故于未產前但宜以培養氣血爲主如滑胎煎五福飲小營前四物八珍之類即皆滑胎要藥若用過滑利或產期未近無火無滯而妄用清火行氣沉降等寒涼藥必能暗殘榮氣走泄真陰多致血虧氣陷反爲臨期大害若果肥盛氣實者紫蘇

飲保生無憂散滑胎枳殼散之類皆可選用

死胎 陳自明曰子死腹中多因驚動太早或觸犯禁忌其血
先下胎乾涸而然也須驗產母若青黑其胎死矣當下之用
平胃散一兩入朴硝五錢水酒煎妙又熱病至胎死亦用前方
效郭稽中云母本患熱病臟腑極熱熏蒸其胎致死而用黑神
散熱藥者兒死身冷不能出暖之即出也 劉完素曰兒死腹
中及血暴下胞乾不能產者半夏湯胞死不下三一承氣湯調
益元散五錢或須臾再用油漿調益元散溫服前後俱下而胎
下可活產母也夫難產死胎不一皆由風熱燥澁緊欬結滯產
戶不得自然開通故其症逆脈弦數而澁面赤或青或變五色
腹滿急痛喘悶胎已不動者是也手足溫而脈滑者只為難產
但宜滑胎催生慎不可下也 李梴曰雙胎一死一生者用蟹

婦科玉尺

臨產

卷三

九

瓜一盞甘草二兩東流水十盞煎三盞化阿膠三兩分三服則
死者出生者安又曰通下死胎用霹靂丹奪命丸外用如聖膏
塗足心仍用催生藥及通關散吹鼻即下

胞衣不下 郭稽中曰胞衣不下因氣力疲憊不能努出或血
入衣中脹大而不能下致心胸脹痛喘急速服奪命丹血散脹
消即下牛膝湯亦效亦有胎下力弱不能更用氣力產胞經停
遇風冷乘之血道閉澁故胞衣不下者急取黑豆一合炒熱入
醋一大盞煎三五沸分三次溫服 陳自明曰若腸出而氣虛
不能入補中益氣湯或蓖麻子一兩研塗母頭頂心即上急洗
之胞不下塗石足心一下即洗去緩則仍入益母丸亦效其血
流胞下者急用奪命丹失笑散以消瘀血緩則不救其元氣虛
不能送者腹中不脹痛用保生無憂散以補固元氣

催生法 王肯堂曰滑以流通滯澁苦以驅逐閉塞香以開竅
逐血氣滯者行氣胞漿先破疲困者固血 張介賓曰所謂催
生者不過助其氣血而利導之直待臨期乃可用脫花煎或滑
胎煎隨症加減主之或經日久產母困倦難生俱宜服滑胎煎
以助氣血令兒速生其有氣虛無力艱于傳送者獨參湯隨多
少接濟其力皆為催生要法若期未至而妄用行氣導血等劑
亦猶宋人之握苗耳

臨產斟酌 保產要錄曰一臨產時最戒用力太早脈訣云夜
半覺痛應分娩來朝日午定知生由此言之則身痛半日後恰
當產也但產之難易人各不同時亦有異有素易產素難產者
有先難後易先易後難者俱無一定如臨產腹痛不生非是難
生還是子未出胎產母切無懼怕即一二日至三五日無妨安

婦科玉尺

臨產

卷三

十

心定氣任其自然勉強忍痛進其飲食要坐則坐要行則行要
睡則睡莫聽穩婆逼迫用力太早自己亦勿求速旁人亦勿多
言驚慌恐懼以亂其心時至自然分娩一穩婆逼迫有二有不
知時候惟恐後時者有急完此家復往他家者極悞大事一未
產前幾個時辰子亦要出產戶轉身至手被母用力一逼即手
先出轉身至腳母力一逼即腳先出橫生倒生皆因錯于用力
其實無手足先出之理但于將產時穩婆以意推度產婦以意
審詳必是臍腹痛急腰間重痛眼中如火糞門迸急胞水或血
俱下此時子已出胎產母方用努力庶不悞事如數症未到即
半日一日不產切不可老幼驚惶求神許愿恐產母見之必生
憂慮一有憂慮自然胆怯力衰飲食難進亦不可憫其痛楚急
欲離身強之用力用力太早關係母子性命可不畏哉一有用

力太早致水衣先破被風所吹因而產戶腫脹乾澁狹小但從容俟之無妨又有穩婆無知或有意害人私指破水衣者極要關防一將產最戒曲身眠臥蓋產母畏痛多不肯直身行動以致胎元轉身不順兒將到產門被母曲腰遮閉再轉又轉閉則必無力而不能動決是難產人見其不動則為死胎其實因無力非死也此時任有良方妙藥不能令子有力而動只要產母心安氣和漸漸調理可保無虞又有胞水已下子忽不動停一二日三五日者調治之外切戒驚恐憂懼暴躁蓋驚則神散憂則氣結躁暴則氣不順血必妄行多至昏悶知此善調自然無思一將產時須戒喧鬧進飲食蓋進飲食則氣充胆壯不致虛乏無力戒喧鬧則專靜自安不致疑懼惶惑一臨產腹痛而腰不甚痛者產未急也須扶起直身而行若行不得則倚物而立

婦科玉尺 臨產

卷三

一產時以飲食為本有等婦人臨產不能飲食則精氣不壯以何用力必未產前預買人參二三錢將產煎服大助精力勝于肉食一交骨不開由元氣素弱胎前失于調攝也用加味芎歸湯立驗一天氣寒冷產母血氣凝滯兒不能速生故衣裳宜厚產室宜煖背心亦宜溫和庶兒易生一盛暑之月產母宜溫涼得宜熱甚則頭痛面赤昏暈若產室人多熱氣蒸逼亦致此患若夏月風涼陰雨亦當謹避一將產錯用努力手先出者名橫生俗為覓鹽生夫鹽主收斂緊縮且蜇人痛兒手得鹽且痛且縮自然轉身生下其法急令產母仰臥畧以鹽半分塗兒手心仍抹香油輕輕送入推上扶正直待兒身轉頭出然後服濟生方藥以助精力渴則以蜜牛小盞香油牛小盞入滾水化開飲之可以潤燥滑胎令其易產飢則食稀粥令其中氣不乏審是

兒欲來方扶挾起身用力一送兒即生矣如送手入後兒轉身快則不必服藥足先出者亦治如上法一手足先出之患其始因穩婆不知時候悞叫用力其繼穩婆無主張任其出而不知治法反叫用力而致傷命今後但見兒手足稍有出意即令產母仰臥輕輕送入莫令多出蓋出少則易入時未久則易入若出久則手足青硬而子必傷難以扶入且手足出非藥可入又切不可聽兒婦用刀斷兒手兒手一斷則必腹中亂攪而兩傷矣一產母危急時當看面舌面青母傷舌青子傷面舌俱赤子母無恙唇舌俱青子母難保凡產時子死腹中服回生丹三丸立下產母無恙若一時無此藥以平胃散一兩投朴硝五錢煎四五沸溫服其胎化水而出即不服藥人不慌忙逼迫亦遲遲生下而不傷母蓋人腹中極熱惟不忙迫產母安心飲食腹內

婦科玉尺 臨產

卷三

熱氣熏蒸胎自柔軟腐化或一二日三四日自然生下但所出穢氣令人難聞此可見死胎不必用力況活胎乎一見有怪胎人不驚慌亦自然生下但穩婆有見識者勿令產母見之更妙一產時門戶俱正兒已露頂而不下此因兒轉身臍帶絆其肩也名曰礙產治法令母仰臥輕輕推兒向上以手指輕按兒肩去其臍帶俟兒順正扶挾起身用力送下又有生路未正被母用力一逼令兒偏柱左右腿畔兒頭在產戶不下但云兒已露頂非頂也乃額角也名曰偏產治法亦令產母仰臥輕輕推兒近上審是偏左偏右以手扶其頭頂端正用力送下又有頭之後骨偏柱穀道兒乃露額名曰後治法于穀道外旁輕輕推兒頭令正然後用力送下或用膝頭令產母抵住亦可三產之難皆母曲腰坐臥用力太早致之二手法必歷練有分曉者不

可輕易一兒出口時人即以兩手輕抱產母胸前產母自亦以兩手緊抱肚臍令胎衣下墜如胎衣來遲只管斷臍洗兒但先用軟絹物繫住臍帶然後斷臍繫時宜輕巧牢固此帶極脆要用心拿定若血流入衣中血脹不下治之少緩脹滿以次上衝心胸疼痛喘急者難治但服奪命丹以速去衣中之血血散脹消即下回生丹最妙服至三九無不下者如無牛膝湯亦可濟生湯亦可用滾酒服失笑散亦可若腹痛手按稍緩此氣虛不能送出也用無憂散回生丹妙益母丸亦妙有用便捷方以草紙烟熏產母鼻令氣內納即下或以滾水一杯磨好墨一二匙沖服即下一盤腸生者未產腸先盤出其治法急將淨盆盛溫水寒天即熱水少入香油養潤待兒并胞衣下時產母畧仰臥自已吸氣上升穩婆香油塗手徐徐送入一法以磁石煎湯服

婦科玉尺 臨產 卷三 七

之即收上磁石須陰陽家用過有驗者又一法草麻仁四十九粒研塗產母頭頂腸收上急洗去遲則有害又一法半夏末搗鼻中腸自上又一法以麻油潤大紙燃點火吹滅以烟薰臍腸即上又一法腸出盛以潔淨水濃煎黃芪湯浸之腸即上此法最佳唯服大劑補中益氣湯更妙又有兒并胞衣下後膀胱壅出產戶者同前法送入此皆用力太早之故送入後宜服安內勝藥一悶臍生者兒糞門有一膜閉住兒氣故不能出聲以手微拍之則膜破而能哭矣如拍之不破須女人輕巧者以銀簪腳輕輕挑破甚便或不能挑急用燠衣緊包勿令散放以熱水浸其胞衣寒天則加火熱之久則熱氣內鼓其膜自破出聲而甦一產後產門不閉乃血氣虛也服加味芎歸湯總以補氣血為相宜

達生篇說 巫齋居士曰臨產有六字真言一曰睡二曰忍痛三曰慢臨盆又曰或問臨盆服藥有益無損否曰安得無損鼠兔二丸大耗氣而兼損血回生丹大破血而兼損氣蓋鼠兔例用香竇之藥產時百脉解散氣血虧虛服此散氣藥兒已出而香未消其損多矣且令毛竅開張招風入內禍不可言回生丹以大黃紅花為君其餘亦多消導之品血已耗而又大破之多致產後發熱等病遺患無窮都只謂產後失調誰復歸咎于藥按此數方古人稱為神靈奇寶者尚然如此其他可知或又問總無可用之藥乎曰有只須加味芎歸湯佛手散二方用之不盡矣蓋胎時全要血足血一足如舟之得水何患不行二方皆大用芎歸使宿血頓去新血驟生藥味隨地皆有且使身體壯健產後無病真正有益無損此皆先賢洞明陰陽之理製此神

婦科玉尺 臨產 卷三 八

方以利濟後世奈何人只求奇怪之藥不論損益豈不可歎臨產逐條要論

御纂醫宗金鑑坐草條曰凡產婦坐草最要及時不可太早若兒身未順寧可遲遲寬心以待又臨盆條曰凡兒之生自有其時時至則兒身轉順頭頂正當產門胞漿大來腰重腹痛較道挺送產母中指中節或本節跳動此方為正產之時方可臨盆用力送兒自順生矣又曰臨產之家必用收生婆須預擇老成歷練明白經事之人無故切勿令其先使手法如試水探漿等事但囑令寬心寧耐可也又驚生條曰產室之內不可多人人多則語聲喧嘩產母之心必驚驚則心氣虛怯至產時多致困乏號曰驚生有如此者須急急摒出只留服役一二人使寂靜而無嘈雜之聲則母心始安安則其心亦寧靜矣又產室條曰產室

之內四時俱要寒溫適中若大熱大寒均不相宜夏月必須清涼勿使炎熱致產母中暑暈迷冬月必須溫暖勿令寒冷以致血凝難產又曰妊娠月數未足時或腹中痛痛定如常者此名試胎宜養血以安其胎若月數未足腹痛或作或止腰不痛者此名弄胎不宜輕動二者均非正產之時切勿躁擾疑感惟宜寧靜以待其時

體元子借地法

東借十步 西借十步 南借十步 北借十步 上借十步 下借十步 壁方之中四十餘步安產借地或有穢污或有

東海神王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天符地軸入地十丈令地空閒產婦某氏安居無所妨碍無所畏忌諸神

婦科玉尺 臨產

卷三 七

擁護百邪速去急急如律令勒

此借地法于入月第一日硃書一幅貼產婦房內牆壁上更不須避忌諸神煞也

治臨產病方

加味芎歸湯 治一切橫生倒產憑藥生交骨不開子死腹中等症大劑連服即生神驗 當歸二錢半 川芎一錢 龜板一錢 蘇炙 生薑 頭髮瓦上炙 存性一錢 水煎服如人行五里許即生 一方當歸一兩 川芎七錢 龜板一個 頭髮一握 分量多少隨時酌量

佛手散

治一切橫生倒產子死腹中 當歸五錢 川芎三錢 水七分 酒三分 同煎七分服 一方遇橫生倒產死胎加馬料豆一合炒乘熱碎水中加童便一牛前服少刻再服 治臨產努力太早者 滑石一兩 冬葵子五錢 甘草一錢 酒下末二錢 枳殼 蜀葵子 催生四物湯 治橫生逆產 四物湯加 枳殼 蜀葵子 交骨不開方 治交骨不開 人參二錢 生地三錢 當歸

交骨不開方

錢半 牛膝錢六分

神應散

治懸胞生 生蜜 酒釀 菜油各半杯 煎數沸入童便調服易產

子逆湯

治子逆沖上 人參二錢 砂仁一錢 菜油煎一兩

黃葵子散

治同上 黃葵子七十粒炒研酒下

催生如意散

治臨產前不見紅 人參 乳香各一錢 辰砂五分 雞子清調姜湯下

平胃散

治死胎不下 指甲青舌青脹口中作尿臭 蒼朮 厚朴 陳皮各一錢 炙甘草五分 酒水煎好入朴硝五錢再煎三四沸溫服其胎化血水下 或只用朴硝五錢研細童便調溫服亦妙或用二錢順流水下

官桂丸

治同上 當歸 官桂 甘草 白芍 炮姜 生地各一兩 黑豆三兩 共為末酒下

清魂散

治產時血暈 澤蘭 荆芥 人參各一錢 川芎四錢 甘草三分 為末

牛膝歸尾湯

治胎衣不下 牛膝 歸尾 木通各三錢 滑石四錢 秋葵子 瞿麥各一錢半

牛膝芒硝湯

治同上 牛膝 芒硝 當歸 紅花 桃仁 酒煎

牛膝湯

治同上 延胡索五錢 牛膝 當歸各三錢 酒煎

婦科玉尺 臨產

卷三 七

妙香散

治敗血沖心 麝香一錢另研 辰砂三錢另研 木香二錢 半另研 姜山藥 遠志 茯苓 茯神各一兩 人參 桔梗 甘草各五錢 酒下二錢

二莖散

治茄病 吳茱萸 山萸 川棟子各一錢 八分 小茴 海藻 延胡索 桔梗 青皮各

跌粉散

治子宮不收 當歸 磁石各五錢 鐵粉三錢 共為末湯下

托藥

治同上 車藤葉有角者搗爛加枯礬末以帚片攤藥托之

摻藥

治同上 先用淡竹根煎湯洗淨次以五倍子白礬共為末

難產方

總治各難 川芎 當歸 梅皮 龜板 百草霜各一錢 前胡七分

勝金丹

治虛勞婦人臨產 人參 白芍 赤芍 兩半 當歸 白微 各四兩 薑本 牛膝 各二兩 藥合一處酒浸一日并水淘出焙末 四製 香附末一斤 熟地四兩 打和一處再入 赤石脂一斤 石脂各二兩 乳香 沒藥 各一兩 琥珀 珠砂 各五錢 蜜丸 金箔 為衣 一兩 下汗出愈 兼治子宮虛冷不育服二十九日

如聖膏

孕久治黃年手足麻痺身不遂又下死胎又治崩帶及治產後等疾不論遠近並宜服之

奪命丹

治難產及死胎不下十分危急者巴豆去壳十六粒蓖麻子去壳四十粒麝香二錢同打如泥攤絹帛貼臍上一時產下急急洗去

牛膝湯

治產後血入胞衣脹滿沖心日久不下危急者醋一升入大黃末一兩熬成膏和丸酒下五十九

奪命丸

治小產下血多子死腹中增寒手指唇口瓜甲青白面色黃黑胎上搶心悶絕欲死汗出喘滿不食或候服毒物草藥傷胎氣下血不止胎尚未損者服之可安已死可下若胎胸腹中危急者立可取出此方的係異人傳授至妙桂枝丹皮赤芍赤芍桃仁等分蜜丸茯苓丸但用淡醋湯下此即仲景桂枝茯苓丸臨產

蟹爪散

下胎極效妊婦有病欲去胎者宜此蟹爪二合桂心瞿麥各一兩牛膝二兩每末一錢空心酒服

滑胎煎

臨月宜常服數劑以便易生亦治胞衣不下當歸三五錢熟地三錢杜仲山藥各二錢川芎枳殼各七分食前溫服氣弱體虛加人參白朮隨宜用之

又方

治同上阿膠八兩滑石三兩車前子一升每末方寸七米飲下日二服至生月乃服此藥大利九竅切不可未至臨月先服或多服虛弱人亦不可服

保生無憂散

治胎氣逆臨難產酒浸當歸鹽枳殼川芎木香白芍炙草各錢半血餘炭另研乳香另研各五分水煎入二末不拘時服

半夏湯

治胎乾不能生產半夏兩半肉桂七分黃連五分桃仁各三十枚先服四物湯一二帖次服本方每服片一錢加姜三片煎一二錢食遠溫服

小營煎

治胎衣不下臨月服之亦易生炒白芍當歸山藥杞子各二錢炙草一錢熟地二三錢食遠溫服

脫花煎

凡臨盆將產者宜先服此藥能生最佳并治難產經日或死胎不下俱妙川芎二錢當歸七錢或一兩肉桂一二錢牛膝二錢車前子一錢半紅花一錢生不用亦可水二盞煎八分熱服或服後飲酒數杯亦妙若胎死堅滯不下者加朴硝三五錢即下

胡連丸

安胎聖藥條芩四兩砂仁畧炒炙草各一兩白朮條芩四兩砂仁畧炒炙草各一兩糊為丸米飲下

壽脾煎

一各攝營煎治心脾氣虛胎動不安白朮二錢當歸山藥各二錢東仁錢半炙草一錢遠志三五七分炮姜一二錢炒蓮肉二十粒人參一二錢急者隨症多加

五福飲

治氣血俱虛胎動不安人參隨宜熟地二三四錢當歸二三錢炙草一錢白朮錢半食遠溫服

紫蘇飲

治妊娠失調胎氣不安上攻作痛各曰子懸并臨產氣結不下等症人參甘草各五錢歸各一兩川芎紫蘇葉白芍陳皮一方無歸各一兩每粗末一兩加姜煎一方無氣血虛而有火不安者宜兼逍遙散若肝脾氣虛科玉尺臨產

滑胎枳殼散

弱而不安宜四君芎歸湯

來甦散

所服七八月宜常服此滑胎易產即湖陽公主所服方也枳殼二兩炙草一兩每末三錢干湯點服一方加當歸木香等分蜜丸所以佐枳殼之苦寒也名內補丸

加味四子湯

治嘔逆不止人參白朮茯苓炙草半夏陳皮藿香砂仁每粗末四錢加姜三棗二煎

油蜜煎

治難產滯漿胞乾胎不得下香油白蜜童便各一碗和勻慢火煎一二沸掠去沫入滑石末一兩或益母草末攪勻頓服外以油蜜于母腹臍上摩之一方止用油蜜童便能下難產

霹靂丹

治臨產忽然氣喘自翻口禁而黑唇青沫出子母俱損兩頰微紅子死母活蛇退一條瓦礫

內服 蚕退燒存性二錢 男髮灰一錢 黑鉛二錢半 製水銀七分半 千里馬即路上左脚草鞋一隻取與洗淨燒灰一錢 猪心血丸兩子大金箔為衣每二九倒流水灌下或入伏龍肝調下生着兒頭戴出

黑神散

一名催生如聖散治橫生逆產其功甚大並治胎前產後月水不止崩漏等症白芷不見火百草霜等分每末二錢以童便米醋和如膏加沸湯調下或童便酒煎進二服血得黑則止此方大能固血又免血涸甚妙一方加滑石末煎芎歸湯送下

附前人效方

三合濟生湯

治臨產艱難雖一日不下者服此自然轉動下當歸三錢 川芎 枳殼各一錢 香附 大腹皮各一錢半 蘇葉八分 甘草七分 水煎必待腰腹痛甚服之即產一方加白芷一錢此方乃以枳殼芎歸達生三方抽其精粹而成合此湯

產難方

治產難累日氣力之盡不得生此是宿有病者宜此方 阿膠二兩 赤小豆二升 水九升 煮豆令熟去豆化膠每服五合不覺更服不過三服即出

勝金丹

治難產神效 取免毫筆頭一枚燒灰研細生藕汁一盞下之立產若虛弱及素有冷疾者恐冷動氣即于銀器內重湯溫過服

婦科玉尺 臨產

卷三 九

沈氏尊生書卷四

婦科玉尺

產後

沈金鰲撰

上海圖書館藏

俗云胎前一團火產後一盆冰理固然也蓋以胎前每多邪熱易至氣血沸騰故如火產後真元大損氣血空虛其如冰也必矣故產後之疾先以大補氣血為主縱有他疾亦以未治之或欲祛邪必兼補益此大較也其間又當細分氣虛血虛血悶血脫症候之別以或補或洩之蓋氣虛者當補氣血虛者當補血血悶者嬰兒下盆之後血上冲心以致牙關緊閉面色赤脉洪數須問產時去血多少可以行瘀藥導之血脫者因兒下之時去血過多面色白唇舌色淡短氣不足以息脉來或沈或浮宜用人參即血脫補氣之說也然亦有血雖脫而瘀血未盡者其腹內痛必攻補兼施血

婦科玉尺 產後

卷四

脫者但骨節痛以此為辨耳夫產後氣血大虧固多虛症然有全虛者或有虛實兼者間又有全實者亦不可不辨概作虛治其說詳見于後張氏論中至月內產母切不可恃健不自保重或勞碌以損榮或多食以傷胃外感六淫之邪內傷七情之氣倘絲毫犯之甚至惡露未盡而作熱作瘵真元難復而為勞傷為瘵其為患有不可勝言者夫力壯易產者尙不免感疾況素虛弱而可不慎乎蓋產後病最重而難治者莫如蓐勞蓐勞之由有二一由內傷因產理不順調養失宜或憂勞思慮傷其臟腑榮衛不宣令人寒熱如瘧頭痛自汗痰咳氣逆虛羸喘乏體倦肢怠宜補一由外感不滿日月氣血虛耗風冷乘之與氣血相搏不能溫于肌膚令人發熱憔悴飲食不消肢體煩痛若風冷之邪感入于肺肺受微寒咳嗽口乾頭昏體痛榮衛受于風邪流注臟腑發眩盜汗寒熱如瘧

背膊煩痛肢體沈重此皆葶藶之所由成也宜白茯苓散加味佛手散人參隨甲散其或兼內傷飲食洩瀉與夫瘀血未盡者皆有之不可不別也產後又有三大病一病痙二病鬱冒三病大便難仲景云新產血虛多汗出喜中風故令病痙亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難是也余每臨症詳察病情三者常相因如新產胃虛不食往往昏目而神不清或厥是鬱冒也宜白茯苓散加味佛手散且多汗必液少而大便秘至五七日七八日之久宜養榮血宜歸脾湯腸自潤矣宜蘇產後血暈亦險症也宜立應芥炭五分童便調服可預防血暈之患其或血去過多而暈宜歸脾湯加入或為血閉血迷而暈宜血竭散皆宜詳究產後中風口噤牙關緊閉手足痙瘓者以氣血大損經絡空虛勞碌太早風邪從虛而入宜小續命湯故忽然口眼喎斜痰涎潮壅或角弓反張宜大豆

婦科玉尺 卷四 三

湯產後傷寒因氣血大虛雖有寒邪不可大發散宜芍藥湯加參即或大熱不止宜芍藥湯加黃連知母亦不可妄投峻劑以耗元氣苟非正傷寒不可絕其飲食二者皆產後重症不可輕視產後發熱多因血虛只宜養血其外感者十之一二即係外感不可大發散只宜和解或陰分不足憎寒壯熱日輕夜重宜四物湯加柴胡發熱而自汗心煩短氣宜人參或因乳蒸而發熱宜四物湯加黃芪花柳或因收束骨節而發熱此不必藥只多服益母草湯足已產後兒枕腹痛宜延胡或身體壯熱小腹有塊而痛亦名兒枕宜延胡索散或不發熱但腹痛或有塊時起時沒亦名兒枕宜延胡索散皆產後所常患幾于十人而八九調治之可也產後心腹痛則以敗血凝聚氣上冲心之故宜大蘇亦或七情相干血與氣併而心疼宜延胡亦或敗血攻刺心腹而疼宜當歸亦或寒氣相侵而腹

疼宜理中湯吐加姜小使不利常留滯于關節筋脈引急或手足拘攣不能屈伸故遍身疼痛走痛宜趁若瘀血不盡流于遍身則肢節作痛宜如由血虛所致者其症朝輕暮重時作時止雖亦太陽巔頂痛惟眉稜骨不痛不可作外感治若風寒頭痛則無時間止并眉稜骨痛耳然雖屬風寒亦宜以四物加減或手足搐搦咬牙頭痛而昏冒者尤宜急治宜先用四物湯加減有頭疼作嘔不食者乃血虛火炎也宜麥冬橘紅湯產後腹痛嘔吐山惡露下少敗血乘虛散入于脾而為脹滿胃受之則嘔吐也宜抵或腹脹嘔逆為胃不和宜抵或乾嘔不止不思食為胃弱不和宜和久而不進飲食此脾陰不足之候脾主四肢故病下體也宜石斛甚則連腰膝腿膀俱痛則又兼腎氣之不足矣宜補骨

婦科玉尺 產後 卷四 三

症患之者雖不若寒熱兒枕痛之多要皆為產後所常患者外此則有由內因者如產後不語因敗血上干于心心氣閉塞舌為心苗故舌強不語宜逐血亦或痰氣壅滯目閉不言宜白礬血攻心欲死而不語宜醋調服之產後浮腫有因敗血畜于五臟循經流入四肢而化為水因乘虛浮腫者宜調體浮者不可利水宜八有浮腫而有水氣當利者宜宜驚悸心虛耗也必睡不寧宜養心湯心氣虛耗亦然宜茯乍見鬼神由血虛之極敗血攻冲邪淫于心胡言亂語如見鬼祟非風邪也宜調經散產後氣喘急下血過多榮血暴竭氣無所主獨發于肺故令喘此孤陽絕陰難治若敗血停滯上朝于肺而亦作喘宜奪命丹氣滯亦作喘宜蘇若自汗不止飲湯即汗為氣虛亦作喘宜蘇木湯加不效宜補心心主血又汗為心液故血耗而

又內

病汗也。宜白芍藥仁。痰飲盛亦作喘。宜潤肺湯。產後驚悸聞聲欲死非

他人用力抱持則虛煩欲死由心肝脾三經虛也。宜石產後五六

朝狂亂胡言持刀欲殺人乃陰血暴崩肝火虛炎也。宜滋陰

虛血弱有煩悶者。宜知母湯。亦有因虛耗而血熱心煩口渴者。宜涼血

散產後失血或因去血過多兼腹痛身熱自汗。宜當歸或兼眩暈

宜芎藭或兼虛熱人參姜炭。或兼腹痛肉桂或兼寒熱往來盜汗

脈浮。宜和解或兼陰虛內熱而自汗心煩氣短。建中湯產後諸淋

根。宜芎或則敗血不止淋漓不斷。宜烏或則淋久不止四肢沈困無

力。宜牡或則小便閉而淋瀝小腹膨脹。宜湯產後口鼻黑而蛆由

產時氣消血敗榮衛不理散亂入于諸經不得還元故口鼻黑氣

而變衄血此乃產後虛熱成爲胃絕肺敗皆死症也。宜犀角。若產

後即見鼻蛆則由血溢妄行。宜必效。產後虛渴必口乾少氣足弱

婦科玉尺 產後 卷四 四

頭昏目暈。宜熟地。產後消渴飲水不止由于液枯火燥已極。宜止

湯產後小便不利。宜木通散。大便閉結。宜通潤。皆由火盛產後小便尿

血。宜牛膝。大便下血。宜黃連。皆由血虛而熱產後惡露不下有

結聚成塊。心胸煩悶。臍下堅痛者。宜當歸。有惡露不下兼受冷熱

勞碌腰脊骨煩疼者。宜丹。有惡露不下寒熱交攻心慌昏沈腹中

痛者。宜通。有惡露方下忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脉皆痛如錐

刺由冷熱不調或思慮動作氣所壅遏血畜經絡者。宜沒。產後惡

露不止小便急痛。宜磨塊。或血下過多漸至瘦弱。宜入珍湯。去甘

阿膠或下如豆汁紫黑過多。宜加味。或至月餘猶淋漓不止已爲

陷下。宜加味。或下不止至于數月及半載之久。宜干。或惡血不絕

崩血不可禁腹中絞痛氣息急。宜牛角。或惡露淋漓不斷心悶短

氣四肢乏弱頭目昏重五心煩熱面黃體瘦。宜壯。以上皆由于內

因者。又有由外因者。如產後下痢腹痛裡急後重。宜香連散。或痢

久不止。宜四君子湯。產後瘧疾治與胎前略同。卻宜以虛爲主。其

或寒熱往來或熱多于寒皆是也。宜草。產後泄瀉有挾寒腹痛腸

鳴小水清白口不渴者。宜君苓湯。加肉桂白芍。有熱泄腸垢口渴痛一陣

下一陣者。宜君苓湯。加黃。有淫勝水泄者。宜胃。產後霍亂或渴而

飲水。宜五。或寒多不渴。宜人參。或吐利厥冷。宜附子。或腹痛甚而

手足寒。宜高良。或轉筋。宜木瓜散。不止。產後偏正頭風有頭疼目

眩者。宜愈風。有風壅目眩。暈身疼痛者。宜湯。產後四肢麻痺皮

膚搔痒不仁。皆血虛風襲之。宜逐邪。產後大驚恐而發寒熱嘔吐

痰盛。嘔即汗出。宜八珍湯。加黃。產後閃傷腹痛血崩宜兼去瘀。宜

靈脂湯。或產時穩婆損其尿胞。每致日夜淋瀝。宜參。以上皆由

于外因者。而又有兼內外因者。如產後風痲。經云諸風痿弱筋攣

無力。血不足以養筋也。宜血。有血弱氣虛多汗風搏而成痲者。其

症口噤。脊強反張。若汗出不止者死。宜大聖湯。產後咳嗽。有因惡

露上攻。肺經受邪者。宜二。有感風咳嗽。由外邪惡風寒發熱者。宜

蘇。有產後血風感寒暑濕氣咳嗽喘滿壅甚者。宜旋。產後腳氣熱

悶氣上冲。若因平日感六淫之氣。今又因產後血氣不足。遂襲于

足經。因乘虛而發也。宜獨活。以上皆兼內外因者。也產後之病。其

繁瑣累重若此。丹溪謂寧治十男子。莫治一婦人。正以此也。至于

生子有乳。乃天地化生自然之理。所謂有是子。則有所以養是子

者。其或不行。皆由氣血虛弱。經絡不調所致。或產後乳脹疼痛。由

年少之人。初經產乳。內有風熱也。須服清利藥。則乳行。若累經產

而無乳。亡津液故也。須服滋陰藥。若雖有乳。卻苦其少。須服通經

藥。并引以羹臙。蓋乳資于衝脉。與胃經通也。此其大略也。其或產

後血氣盛實而乳汁不通宜通其或婦人肥盛氣脈壅滯而乳不通又經絡凝滯乳內脹痛欲作瘰癧宜漏蘆散其或乳汁不通或乳房結硬疼痛宜皂其或氣血虛而乳不通宜加味其或乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便澀滯宜玉其或氣脈不足經血衰弱而乳汁澀少宜通皆當隨症而各與以藥乃有乳汁自出者是胃氣虛所致宜止以補藥若乳多溢滿急痛溫帛熨之但以漏蘆散亦可有未產前而乳汁自出者謂之乳泣生子多不育此無藥可服至如乳上外症詳雜病中茲不重載

脈法 脈經曰診婦人新生乳子脈沈小滑者生實大堅弦急者死診婦人新生乳子因得熱病其脈懸小四肢溫者生寒者者死診婦人生產因中風傷寒熱病喘鳴而肩息實者浮緩者生小急者死診婦人生產之後寸口脈焱疾不調者死沈微附

婦科玉尺 產後

卷四 六

骨不絕者生 脈訣曰產後因得熱病脈細四肢暖者生脈大忽然肢逆冷須知其死不留停 陳自明曰新產之脈緩滑吉實大弦急死來侵若得沈重小者吉忽若堅牢命不停寸口澀疾不調死沈細附骨不絕生審看此後分明記長須念此向心經

產後脈症總論 仲景曰新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱胃三者大便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘕亡血復汗寒多故令鬱胃亡津液胃燥故大便難產婦鬱胃其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之又病解能食七八日更

發熱者此謂胃實大承氣湯主之又產後腹中疝痛當歸生薑羊肉湯主之又產後腹痛煩滿不得臥枳實芍藥散主之又產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈此為腹中有乾血着膈下瘀血湯主之又產後七八日無太陽症少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則詰語至夜即愈大承氣湯主之熱在裡結在膀胱也又產後風續續數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦症續在耳不可與陽旦湯又產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之又婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大圓主之又產後下利虛極白頭翁加甘草阿膠主之又婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此為水與血俱結在血室也大黃甘遂湯主之又婦人晝後臙燥喜悲傷欲哭象如神

婦科玉尺 產後

卷四 七

靈所作數欠伸甘麥大棗湯主之 劉完素曰產後經水適斷感于異症手足牽搐咬牙昏冒宜增損柴胡湯前症已去次服秦芫湯去其風邪又產後風氣在表面目四肢浮腫宜七聖丸以利為度如又喘嗽加木香枳榔倍之謂氣多也如又昏冒加羌活川芎謂多風也又產後虛勞雖日久而脈浮疾者三元湯日久虛勞微有寒熱脈沈面浮宜柴胡四物湯日久虛勞針灸小藥俱不效者三分散日久虛勞不能食十全散又產後諸積不可攻當養陰去熱其病自退芍藥湯又產後衝脹胸中有物狀如噎氣不降紫金丹又產後頭痛血虛痰癢寒厥皆令頭痛加減四物湯如有汗者是氣弱頭痛也加芍藥三兩桂一兩五錢生薑煎如痰癢頭痛加半夏三兩茯苓一兩半生薑煎如熱厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑煎又產後諸病但以雙

解散服之。通身中外血氣宣通。病皆除愈。然孕婦及產後月經過多。并世瀉者。勿與服之。又俗未知產後亡液損血。疼痛怖懼。以致神狂氣亂。則陰氣虛損。邪熱太甚。而為諸熱症。由不讀素問。不知造化。故不識症候。陰陽反妄。以為產後諸虛。百損便為虛冷。而無熱也。遂以熱藥溫補。或見煩渴者。不令飲水。本雖善心。為害多矣。但以臨時審其臟腑。六氣虛實。明其標本。如法治之。而已。朱木震亨曰。產後血虛。因虛火載血上行。漸漸運來。方用鹿角燒灰。出火毒。研極細。酒全童便。灌下一呷。即醒。行血極快。大凡產後有病。先固正氣。又產後泄瀉惡露不行。此餘血滲入大腸。為瀉洞洩。不禁下青白黑色。用荆芥穗炒黑。入麝研湯下。藥雖微。能治大病。方名的奇散。又產後纔見身熱。便不可發表。發熱惡寒。皆是氣血虛。左手脈不足。補血多于補氣藥。右手脈不足。補氣多于補血藥。惡寒發熱腹痛者。當去惡血。腹滿者。不是腹痛者。是又嘗見尿胞因穩婆不謹。破損而得淋瀝。遂為廢疾。因思肌肉尚可完補。胞雖在腹。亦可治。其症血氣必虛。必用大補。以參朮為君。芎歸為臣。桃仁陳皮茯苓黃芪為佐。而煎以猪羊胞。極飢時飲之。亦必多服。氣血自長。其胞自完。恐稍遲緩。殊難成功。李梴曰。產體質無病。不藥可也。但難產氣衰。瘀血停留。非藥不行。古法產後用古芎歸湯。加童便一半服之。如無童便。以淡醋磨墨。一小盞入煎湯藥亦好。又產後百病。皆血虛。大盛瘀血妄行而已。間有內傷飲食。外感風寒。然亦必先逐瘀補虛為主。又產後瘀消。方可行補。如左脈弱。加補血藥。右脈弱。加補氣藥。如不兼逐瘀。但服參芪停滯之劑。有瘀血攻心。即死者。食肉太早。亦然。又凡產母但覺小水短少。即是病生。便須

婦科玉尺 產後 卷四 八

服藥調理脾胃肝腎。如不愈者。必氣滯且逆。蓋婦人凡事多憂。思恚怒。憂思過。則氣結而血亦結。恚怒過。則氣逆而血亦逆。甚則乳鞭脇痛。煩熱要之。女病皆因氣血鬱結。所以古方多用行氣藥。薛己曰。產後發瘧。大補氣血。可保無虞。但攻風邪。死無疑矣。又產後寒熱。因氣血虛弱。或脾胃不足。經云。陰虛則發熱。陽虛則惡寒。若兼大便秘。尤屬氣血虛。切不可發表降火。若寸口脈微。陽不足。陰氣上入。陽中則惡寒。補中益氣湯。尺脈微。陰不足。陽氣下陷。陰中則發熱。六味地黃丸。大抵陰不足。陽往乘之。則陽內陷。而發熱。陽不足。陰往從之。則陰上入。而惡寒。此陰陽不歸其分。以致寒熱交爭。故惡寒。又發熱也。八珍湯。又婦人性情執着。不能寬解。多被七情所傷。遂遍身痛。肢節腫痛。或氣填胸滿。或如梅核塞喉。噎吐不出。或涎痰壅盛。上氣喘急。或嘔逆惡心。甚者渴悶欲絕。產婦多成此症。宜四七湯。先調滯氣。更用養血。若因憂思致小便白濁者。用此藥。吞青州白丸子。屢效。又血出過多。恆病睛珠痛。不能視。羞明隱澁。眼睫無力。眉骨太陽酸痛。當歸養榮湯。當歸補血湯。除風益損湯。選用。有熱。加黃芩。脾胃不和。惡心不進食。加生薑。產漏。加阿膠。復其血。使有所養。則愈。然要忌鹹物。經曰。鹹走血。血病無多食鹹。王肯堂曰。凡婦人患風氣。睛下虛冷。皆產後未滿百日會合之故。慎之。張介賓曰。凡產後氣血俱去。誠多虛症。然有虛者。有少虛者。有全實者。當隨人隨症。辨其虛實。以治。不得有成心。概行太補。以致助邪。又產婦虛症。素弱之人。多有之。或于產後。氣血俱去。而更弱者。亦有之。總當因人察脈。因脈察症。若脈氣形氣。病氣俱不足。此當以全虛治之。若形氣不足。病氣有餘。或兼火邪。或兼

婦科玉尺 產後 卷四 九

婦科玉尺 卷四

外邪或以飲食停滯此虛中有實不可不審此中委曲未能
 言盡惟明者悟之產後不虛症或因素日無病或以年少或以
 素耐辛苦貧勞之質此輩無不足一旦受孕乃于無病腹中參
 入于此物故致氣血壅塞為脹為嘔是皆添設有餘之病及其
 既產始見通快所留得去仍復故吾常人之產此類極多是何
 虛之有然或內傷或外感產後之病難保必無倘有所犯去之
 即愈若概行大補果能堪否即臨盆帶去血氣未免暫見耗損
 然以壅滯之餘不過皆護胎隨從之物去者當去生者旋生不
 出數日必已來復此生化自然之理何至是產皆虛也凡遇此
 類固當因症用治產後全實症有如外感風寒頭痛身熱便鞭
 中滿脈緊數洪大有力此表邪之實症也又火之盛者必熱渴
 躁煩或便結腹痛口臭舌焦黑醋喜冷飲眼眵尿管痛脈見洪

婦科玉尺 產後

卷四

十一

滑此內熱之實症也又鬱怒動肝胸膈脹痛大便不利脈弦而
 滑此氣逆之實症也又惡露未盡瘀血上衝心腹脹滿疼痛拒
 按大便難而小便利此血逆之實症也又凡富貴家保養太過
 或過用人參芪朮以致血壅盛過用糖酒炭火以致內熱或產
 本不虛而妄用大補之藥以致增病此調攝之實症也又或因
 產過食并其勞困固令勉強以至停畜不散此內傷之實症也
 夫既有表症則不得不解既有火邪則不得不清既有內傷停
 滯則不得不開通消導丹溪但補氣血之言豈可偏執又病機
 機要云治胎產之病當從厥陰症論之當無犯胃氣及上二焦
 是為三禁謂不可汗不可下不可利小便但使不犯三禁則營
 衛自和而寒熱自止凡治法如發渴則白虎氣弱則黃芪血虛
 則當歸腹痛則白芍大抵產病天行從加減柴胡雜症從增損

四物宜察脈症用之按此雖為產育之大法然病發不同倘有
 是症不得不用是藥所謂有病則病受之也但此經常之法固
 不可不知而應變之權亦不可執一又新產後有陽虛而寒從
 中生或寒由外入致心腹作痛嘔吐不食四肢厥冷者大慶蜜
 湯或理陰煎產後有脾虛腎虛而為腹痛者此不由產而由臟
 氣不足若脾氣虛寒為嘔吐為食少而兼腹痛者五君子煎六
 君子湯溫胃飲腎氣虛寒為瀉為痢而兼腹痛者胃關煎理陰
 煎若飲食停滯及氣逆作痛亦當因類而消去之排氣飲大和
 中飲按景岳一書多偏溫熱議亦駁雜無甚特識獨產後一
 門則特關精旨能發前人之所未發其酌方治亦至當不
 易誠婦科之寶錄也

虛極生風 陳自明曰產後生風因去血過多氣無所主以致
 唇青冷汗出目眩神昏命在須臾此但虛極生風也急服濟危

婦科玉尺 產後

卷四

十一

上丹若投風藥悞甚
 感冒風邪 陳士鐸曰產後太陽風風大喘大吐大嘔不治症
 也喘則元陽將絕況大喘乎吐則胃氣將亡況大吐乎嘔則脾
 氣將脫況大嘔乎方用人參麥冬白朮當歸川芎荆芥桂枝名
 轉氣救產湯大劑與之喘嘔止當有生機否則仍死若太陽症
 口吐膿血頭痛欲破心煩不止腹痛如死或作結胃小見症便
 難救若齊見必死方用佛手散多加人參佐以肉桂荆芥即見
 功矣產後少陽風風語煩躁更加驚悸者死蓋少陽胆經也
 胆無汁不能潤心心無血不能為養是以心中恍惚而語煩
 躁驚悸相因而生也夫胆木受邪不發表則血無以生然徒發
 表則血更耗散方以佛手散加人參棗仁麥冬竹茹砂熱地
 治之產後陽明風風而大喘大汗亦不治用麥冬人參元參桑

葉蘇子名補虛降火湯若陽明症發狂亡陽不救也狂症多實熱產後則虛熱實熱可瀉虛熱不可瀉然正惟兼亡陽雖實熱仍屬氣虛方用人參桑葉麥冬元參青蒿名收陽湯一帖汗止二帖狂定不得服三帖蓋此止可救亡陽急症不可據以治產後二帖後即單用人參麥冬當歸川芎五味調理自安產後忽感少陰症仲景法用參朮溫之吾以為倘不應宜加附子甘草治之凡感少陰之邪者神效若少陰症三四日至六七日忽然手足踈臥息高氣喘惡心腹痛不救此蓋少陰感寒邪而在內之真陽逼越于上焦上假熱而下真寒也方用人參麥冬肉桂白朮吳萸微冷頓服名平喘祛寒散若半月後將至滿月亦患前症又當用人參茯苓附子白朮當歸熟地山萸麥冬牛膝名護產湯若少陰症腎水上泛嘔吐下利真陽飛越亦死症以產後腎火衰微為寒所祛水亦隨寒而越也方用人參白朮熟地山萸茯苓附子肉桂車前名補火引水湯若產婦手足青一身黑不救此陰寒最重而毒氣之最酷者原無回生之法姑以人參白朮當歸附子肉桂大劑與之如青黑退庶有生機否則仍死名開青散黑湯若但足純青心下痛雖較上症少輕而寒毒之攻心則一亦致死以前方投之往往多效蓋此症由下而上散其下寒而上寒即解所以易于奏功至產後四五日忽感風寒發厥乃陽氣既虛而陰血又耗感寒邪以成之者也方用人參附子煎服名轉厥安產方產後厥陰感邪嘔吐兩膈脹滿者必便血不治方用當歸麥冬各一兩川芎五錢三七末一錢名平肝救血湯若厥陰症下利厥逆躁不得臥或厥不止俱是死症方用人參當歸荆芥名參歸湯

婦科玉尺 產後

卷四 十二

產後用藥 孫思邈曰婦人草薺中傷風四肢苦煩熱頭疼與小柴胡頭不疼但煩三物黃芩湯產後虛羸發熱飲食少腹脹等疾增損柴胡湯 張從政曰產後之疾皆是敗血惡物發作寒熱臍腹撮痛乳汁枯涸食飲少減醫者不察便謂氣血俱虛便用溫熱之劑養血補虛止作寒治舉世皆然競傳黑神散之屬能治產後一十八症非徒不愈而經脈澗閉前後淋閉嘔吐咳嗽凡百熱症生矣若此悞死不可勝計曷若四物湯與涼膈散停對下之利數行惡物俱盡後服淡甘之劑自愈又大產之後心火未降腎水未升如黑神散補之輕則危甚則死又備急丸以巴豆乾姜大黃三味蜜丸亦是下藥止可施于平素粗劣之人若產後脹悶用之不死則危 李杲曰婦人分娩及半產漏下昏冒不省瞑目無知蓋因血暴亡心神無所養心與胞絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火勝其肺瞑目不省是陰血暴去不能鎮撫也世醫多用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒能瀉氣中之熱今血虧瀉氣是陰虧瀉陽使二者俱傷反為不足虛勞之病也惟當補其血而升降之則得血而養神不昏矣血暴下是秋冬之令大旺今舉而升之以助其陽則目張神不昏迷矣其可悞用寒涼哉 朱震亨曰或曰初產之婦好血已虧瘀血尚留黑神散非要藥歟余曰初產之婦好血未必虧瘀血未必積臟腑未必寒何以藥為飲食起居勤加調護何病之有誠有汗血體怯而寒與之數帖亦自簡便或有他病當求病起何因病在何經氣病治氣血病治血寒者溫之熱者清之凝者行之虛者補之藥多者止之何用妄製藥方致令無病生病彼黑神散者用乾姜當歸之溫熱黑

婦科玉尺 產後

卷四 十三

婦科玉尺 卷四

豆之甘熟地之微寒以補血之虛佐以炒蒲黃之苦以防出血之多芍藥之酸寒有收有散以為四物之助官桂之大辛熱以行滯氣推凝血和以甘草之緩其為取用似乎精密然驅逐與補益似難同方施治設有性急者形瘦者本有怒火者夏月坐蓐者時屬火令姜桂皆為禁藥至于將護之法尤為悖理肉汁發陰經之火易成內傷之病胡為羊雞濃汁作糜而又常服當歸丸當歸建中湯四順理中丸雖是滋補悉犯桂附乾姜倍熱之劑臟腑無寒何處消受若夫兒之初生母腹煩冤便啖雞子且吃火鹽不思雞子難化火鹽發熱展轉為病醫者不識每指他病率爾用藥寧不悞人余每見產婦之無疾者必教以御去黑神散與夫雞子火鹽諸般肉食且與白粥將理間以此少石首煮令甘淡食之至半月後方與少肉彼富貴之家驕恣之

婦科玉尺 產後

卷四 十四

婦卒有白帶頭風氣痛膈滿痰逆口乾經水不調髮脫體熱皆是陽勝陰虛之病安知非此等謬妄啟之耶若五積散之治產後餘血作痛以蒼朮為君麻黃為臣厚朴枳殼為佐雖有芍藥當歸之補血僅及蒼朮三分之一且其方中言婦人血氣不調心腹撮痛閉而不行並宜服之何不思產後之婦有何寒耶血氣未充似難發汗借曰推陳致新藥性辛溫豈可妄用麻黃之散附以蒼朮枳殼虛而又虛禍不旋踵此段專辨黑神樓英曰續命湯大豆紫湯舉輕古拜散太陽厥陰藥也邪實脈浮弦有力者固宜產後血氣大虛之人不宜輕發其表但用防風當歸散治之為妙 虞搏曰產後禁用酸寒能伐生生之氣也先哲制四物以芍歸之溫佐以芎地之寒是以寒溫適中為婦人諸疾之妙劑也或用于產後必取白芍以酒重復製炒去其酸

寒之毒但存生血活血之能胡為其不可也 薛已曰腹痛發熱或脹滿不食水道滯澀產後多有此症慧苡仁湯藥品和平其功且速

產後要論

御纂醫宗金鑑曰產後發熱之故非止一端或飲食太過或外感風寒或瘀血停留或亡血陰虛或產後勞乏或三日乳蒸當詳其有餘不足或攻或補或用涼藥正治或用溫藥反治要在臨症細細參考也 凡產後頭疼惡寒而發熱者屬外感不當作傷寒治惟宜用四物加柴胡葱白服之 若陰血暴亡孤陽無附而外感發熱者急進參附湯遲則必大汗大喘是陽欲亡雖藥必無救矣 產後咳嗽若感冒風寒用旋覆花湯即荆芥穗前胡麻黃杏仁半夏茯苓赤芍五味子甘草旋覆花湯也若因陰

婦科玉尺 產後

卷四 十五

虛火炎上燥肺金而嗽者宜六味丸加麥冬五味子名麥味地黃湯滋其化源若因瘀血上冲入肺而嗽者宜佛手散加桃仁紅花川貝延胡索以破其瘀其嗽自愈 凡一應傷胎子死腹中者須當急下勿使上奔心膈然必驗其舌青面赤肚腹脹大腹冷如冰久之口中有穢氣出者方可議下然猶必審其人之虛實寒熱隨宜而施治之 產後當知 保產要錄曰一產後忌大喜大怒未可便上床伸足側卧令血不行宜用衣服靠住曲膝仰卧以手從小下輕輕按至臍日五七次則惡血盡下次日乃止不問有無病痛宜以益母草煎湯攪和童便日服數次可免血疾及弱虛重便須臨時取用亦須用清秀不吃韭菜者一乳汁乃血氣所成產後不可多食鹽鹽止血少乳且發嗽夏月忌貪涼用扇食冷物當

補骨四物湯 治產後腰痛。四物湯加 川烏 茜草 菖蒲

通潤四物湯 治產後液枯大便秘。四物湯加 火麻仁

立應四物湯 治血暈。四物湯加 五靈脂不拘多少半生

磨塊四物湯 治惡露不止。四物湯加 延胡索 桃仁

愈風四物湯 治產後頭風。四物湯加 荆芥 細辛 麻

瀉肝四物湯 治產後頭風。四物湯加 秦艽 連翹 防

逐邪四物湯 治產後四肢麻痺。四物湯加 白附子 羌

止渴四物湯 治產後液枯火盛消渴。四物湯加 知母

黃連四物湯 治產後大便秘結。四物湯加 黃連

加減四物湯 治產後頭痛血虛痰癢寒熱皆能令頭痛。川

婦科玉尺 產後 熱厥頭痛加白芷三兩石膏二兩知母一兩 寒厥頭痛加天麻三兩附子兩半生薑三片

增損四物湯 治產後亡血榮衛虛損乍寒乍熱。川芎 當

宣氣湯 治產後浮腫由于水氣者。白朮 郁李仁

人參當歸散 治產後去血過多陰虛內熱。人參 當歸

大聖湯 治產後風痰多汗。川芎 黃芪 當歸 木

血風湯 治風癢。秦艽 羌活 白朮 地黃 茯苓 各一錢 白芷 半夏 各八分

益榮湯 治產後血虧心失所養而怔忡。紫石英 當

茯苓湯 治產後心虛。人參 甘草 山藥 當歸

茯苓 性心 麥冬 遠志 大棗 生薑

舉輕古拜散 治產後中風不語手足攣攣。荆芥穗一味為

小續命湯 治產後汗多變症口噤項強或搐頭馬嘔不時

五分 肉桂心 防己 各七分 炮附子 杏仁 各

中風 加白朮 黃芪 中風 加葛根 中風 加附子 各

參半 夏 心 多 驚 中風 加 犀角 中風 加 羚羊 各

去 芩 獨 活 兩 半 五 錢 去 附 子 入 竹 瀝 盛 冬 初 春

症 治 產 後 風 虛 五 錢 去 附 子 入 竹 瀝 盛 冬 初 春

用 酒 浸 獨 活 兩 半 五 錢 去 附 子 入 竹 瀝 盛 冬 初 春

服 中 服 此 即 愈 一 以 消 血 結 如 汗 則 愈 日 夜 煎

酒 服 一 以 消 血 結 如 汗 則 愈 日 夜 煎

知母湯 治產後煩悶。新知母二錢 酒黃芩二錢

婦科玉尺 產後 桂心八分

調經散 治血氣虛損除虛發熱或病血停滯以致心腹

細辛二錢 桂心一錢 酒浸當歸 赤芍各一兩

妙香散 治產後心神顛倒語言錯亂如見鬼神恍惚

藥 茯苓 茯神 黃芪 遠志 各一兩 木香

用 生 地 當 歸 煎 湯 服 立 效

黃龍湯 治產後發熱不止兼治傷熱入胞中寒熱難

及 病 後 發 熱 不 止 兼 治 傷 熱 入 胞 中 寒 熱 難

汗 口 渴 加 葛 根 甘 草 各 一 錢 柴 胡 四 錢 入 分

浮 芩 吐 加 扶 芩 牛 白 芷 有 汗 口 渴 加 花 粉 白 朮

姜 浮 芩 吐 加 扶 芩 牛 白 芷 有 汗 口 渴 加 花 粉 白 朮

君苓湯 治產後泄瀉。人參 白朮 茯苓 甘草

延胡索湯

治產後瘀血心疼。延胡索、當歸、白芍、厚朴、川棟子、蓬朮、京三稜、木香、枳殼各一錢。桔梗錢二分。黃芩八分。甘草七分。

二母散

治產後咳嗽。知母、貝母、人參、茯苓各一錢。桃仁四十九粒。杏仁四十九粒。各去皮尖。

參蘇飲

治產後感風咳嗽。人參、蘇葉、半夏、葛根、前胡、桔梗、枳殼、陳皮、茯苓、甘草、木香、姜、棗。

高良姜散

治產後心腹痛甚。高良姜、當歸、草寇仁、木瓜、蘇葉五分、甘草三分、吳萸、茴香各一錢。

白微湯

治產後鬱冒。白微、當歸各三錢。人參錢半。甘草七分。

鉤藤湯

治產後發熱口燥。鉤藤、扶神、當歸、人參各一錢。桔梗一錢半。桑寄生五分。煩熱加石膏。

趁痛散

治產後氣弱血滯。經脈拘攣。當歸、木牛膝、黃芪、生薑、兩桂、蘇白、婦科玉尺、產後。

如神湯

治產後瘀血通身作痛。腰痛。當歸、延胡索、桂心、等分水煎服。

奪命散

治產後敗血冲心。胸滿上喘。命在須臾。赤治產後血暈。血入心。總語言顛倒。健忘。失志。及產後百病。蓋煎一二沸。調下。等分。每末二錢。童便酒各半。蓋煎一二沸。調下。黃柏、桑皮、楮白皮。

固血湯

治氣喘。蘇木、人參、麥冬。

潤肺湯

治痰喘。人參、厚朴、半夏、官桂、杏仁、川芎、當歸、白芍、生地。

秦朮湯

治產後頭痛。秦朮、石膏、各一錢。炙甘草、黃芩、白朮、熟地、茯苓、各五分。生地六分。白芷七分。細辛三分。冬加姜。春夏加知母。

烏金散

治產後淋瀝。當歸五錢。百草霜、乾薑、兩。天麻、木香、各二錢半。金墨、煨二錢。

祐元湯

治同上。甘草、滑石、瞿麥、車前子、木通、川芎、當歸、白芍、生地。

牡蠣散

治產後久淋不止。牡蠣、龍骨各二錢。川芎、生地、茯苓、當歸、人參、艾葉、地榆各一錢。炙甘草五分。

參朮膏

治產時候損尿胞。以致小便不禁。人參、白朮、等分。煎膏。每三匙湯下。

抵聖湯

治產後嘔吐。赤芍、半夏、澤蘭、陳皮、人參各一錢。

桔梗半夏湯

治產後胃氣不和。桔梗、陳皮各二錢。半夏八分。姜三片。

和胃湯

治乾嘔。丁香、半夏、枳實、白蔻仁、麥芽、川芎、當歸、白芍、地黃、姜、棗。

犀角地黃湯

治產後血。犀角、丹皮、白芍各一錢。生地四錢。

石斛牛膝湯

治產後腿痛。石斛、牛膝、木瓜、白芍、車前子、生地、杞子、茯苓、黃柏、甘草。

澤蘭湯

治產後出血太多。肝虛火炎。龍齒、扶神、生地、當歸、牛膝、遠志、秦仁、澤蘭。

石斛散

治產後血虛驚悸。人參、東仁、茯苓、遠志、白芍、石斛、麥冬、炙草、五味子、桂圓湯下。

熟地黃湯

治產後虛渴等症。人參四錢。花柳、熟地、炙草一錢。麥冬二錢。熟地五錢。姜、棗。

木通散

治產後小便不通。木通、滑石、葵子、茯苓、枳殼、甘草。

延胡索散

治產後兒枕腹痛。延胡索、當歸各一兩。赤芍五錢。肉桂三錢。琥珀另研。妙滿黃各二錢半。紅花二錢。每末二錢。食前童便酒服。

查蘇湯

治同上。山查一兩。蘇木三錢。

歸尾澤蘭湯

治同上。并惡露不下。歸尾、澤蘭、牛膝、紅花、延胡索、桃仁各一錢。

血竭破棺丹

治血暈。血竭、箭頭巴豆研為丸。冷酒下。

當歸血竭丸

治惡露停結。當歸、血竭、蓬朮、五靈脂。醋糊丸。酒下。

孤鳳散

治產後不語。明礬研末一錢。熱水下。

五靈脂湯

治產後閃傷。歸尾、陳皮、白朮各一錢。川芎、白芍、茯苓、人參各八分。炙草三分。五靈脂五分。加砂仁。

代赭石丸

治同上。丹皮、炮姜、髮灰、酒白芍、醋代赭石、醋地榆、酒生地。

小柴胡湯

治產後鬱冒便難。嘔不能食。汗多病瘥。及草蓐露風。四肢煩熱。頭疼等症。人參 黃芩 生薑 甘草 各三兩 柴胡 半斤 半夏 半升 大棗 十二枚 水一斗 二升 煮六升 去渣 再煎三升 溫服一升 日三

芍藥湯

治產後虛熱頭痛及腹中拘急。白芍 熱地 牡蠣 各五錢 桂心 三錢 日三服 治婦人在蓐得風。四肢煩熱。頭不痛。黃芩 生地 各二錢 分量加增至一二倍亦可

濟危上丹

治產後去血過多。氣無所主。以致唇青。肉冷。汗出。目眩。神昏。命在須臾。此虛極生風也。急服此丹。若以風藥治之。則悞矣。乳香 五靈脂 硫黃 元精石 另研極細 阿膠 蛤粉 炒 生卷柏 桑寄生 去白陳皮 等分 先將上四味末和入金石器內。微炒勿令焦。再研極細。再入餘藥末和勻。生地汁九。每二十九食前溫酒下

防風當歸散

治產後癰。防風 當歸 川芎 生地 各一兩 每服片一兩 水煎 治產後感異症。手足搐搦。延潮昏悶。柴胡 三錢 黃芩 二錢 人參 炙草 半夏 各錢 婦科玉尺 產後 卷四

秦朮湯

半 知母 一錢 石膏 二錢 黃芩 二錢 半 咀片分二服 加姜三棗二不拘時 增損柴胡湯。症已去。次服此方。去其風邪。秦朮 白芍 柴胡 各錢七分 黃芩 防風 各錢二分 炙草 錢三分 人參 半夏 各一錢 咀片分二帖 加姜三片 煎食遠服 治產後日久虛勞發熱。四物湯加 白朮 茯苓 黃芩 各一錢 柴胡 人參 各錢半 黃芩 半夏 甘草 各五分 姜三棗二食前服

胃關煎

治產後腎氣虛寒。瀉利腹痛。熱地 三五錢 或一兩 炙草 一二錢 山藥 白扁豆 炒 各二錢 炒焦乾姜 一二三錢 炮吳茱萸 五七分 白朮 一二三錢 食遠溫服 治產後氣逆食滯。脹痛等症。陳皮 藿香 枳殼 各錢半 厚朴 一錢 澤瀉 烏藥 香附 各二錢 木香 七分 至一錢 熱服

大和中飲

治同上。陳皮 一二錢 山梔 麥芽 各二錢 枳實 一錢 砂仁 五分 厚朴 澤瀉 各錢半 食遠溫服

大巖蜜湯

治素有宿疾。因產大虛。寒搏于血。虛疑不識。上冲心之絡。脈故作心痛。酒當歸 熱地 吳

紫金丹

治產後衝脹胸中。有物狀如噎氣。代赭石 胸 砂礬石 等分 醋糊丸。每二三十丸 酒下 中痛當歸湯下 久服治血癖

又方

治同上。代赭石 一兩 桃仁 泥炒 三錢 大黃 五錢 薄荷湯打糊丸 治產後風氣壅盛。面目四肢浮腫。涕唾稠粘。咽乾口燥。心膈脹滿。大便艱。小便赤。睡臥不寧。酒蒸大黃 川芎 桂心 枳實 木香 各五錢 後下 山嵐瘴地最宜服。量虛實加減。如浮腫。又頭痛昏冒。加川芎 羌活 謂風多也。如只浮腫。但用本方。

通瘀飲

治產後惡露不盡。心慌昏沈。寒熱交攻者。歸尾 大黃 各三錢 白朮 木通 各一錢 紅花 五分 桃仁 泥三十粒 水一碗 酒一小盞 煎三沸 入桃仁 再煎一沸 溫服 治惡血不絕。崩血不可禁。腹中絞痛。氣息欲絕。髮灰 一兩 阿膠 二兩 代赭石 乾姜 三兩 婦科玉尺 產後 卷四

牛角腮丸

治產後惡露不盡。或經月及半年者。升麻 三兩 五兩 蜜丸

加味四物湯

治產後血崩。如豆汁。紫黑過多者。四物湯加 蒲黃 阿膠 蘇根 白芷 治產後血餘。經血淋漓。不止。此陷下者。必舉之也。四物湯加 升麻 白芷 各一錢 血餘灰 另入五分

千金方

沒藥丸

治惡血不盡。或經月及半年者。升麻 三兩 清酒 五升 煮取 二升 分二服 治惡露方行。而忽然斷絕。驟作寒熱。腹痛百脈皆痛。如錐刺。非常。此由冷熱不調。或思慮動。心各五錢 桃仁 炒 沒藥 研各二錢 半 桂心 去翅 足 炒 水蛭 炒 焦 各二十枚 醋糊丸 梧子 大 淡 醋湯下 三九 產後服此。永無疾病。香附 一斤 醋童便 各 浸三日 將艾葉 同煮乾 取出 打為餅 曬乾 為細末 歸身 酒炒 熟地 各四兩 川芎 三兩 酒糊丸 湯下

產後主方

治同上。當歸 白朮 丹皮 各一錢 益母草 三錢 川芎 八分 紅花 七分 陳皮 五分 甘草 三分 查炭 一錢 身熱汗出。加黃芪 一兩 加肉桂 三分 查炭 一錢 身熱汗出。加黃芪 一

錢但身熱加茯苓三錢 汗出神虛加人參一錢
 心虛胆怯加遠志棗仁各一錢 脾胃痛加
 牛膝杜仲川斷各一錢 風寒發熱及停食惡
 心或泄瀉減食宜另斟酌
 斷產方附
 錢效不傷人 四物湯各五錢加 芸薹子二
 錢 經行後空心溫服
 又方 治同上 垂子故帛方圓一尺燒為末經後酒
 服終身不孕

婦科玉尺 產後

卷四 五

沈氏尊生書卷五

婦科玉尺

帶下

沈金鰲撰

帶下之因有四。一因氣虛脾精不能上升而下陷也。一因胃中溼熱及痰流注于帶脈溢于膀胱故下濁液也。一因傷于五臟故下五色之帶也。一因風寒入于胞門或中經脈流傳臟腑而下也。然有赤白之分者何也。赤者屬血屬熱熱入小腸而成。若實熱鬱結則為赤白兼下。白者屬氣屬寒寒入大腸而成。因血少復亡其陽故白滑之物下流。亦有溼痰流注下焦或肝腎陰溼之溼或絲驚恐而木乘土位濁液下流或色慾太甚腎經虧損之故或產多之婦傷血傷液皆能成帶下之疾。宜極用薤白杜仲續斷之輩大抵屬痰與熱者居多。以溼熱下注而化痰也。宜投止澁升提之品矣。

婦科玉尺 帶下

卷五

者十無一二宜投鹿角膠溫澁之品然總要健脾燥溼升提胃氣佐以補澁如茯苓白朮柴胡川芎之類。總之婦人多鬱鬱則傷肝肝傷則脾受尅溼土下陷脾精不守不能輸為營血而白物下流宜開鬱補脾若色如濃泔臭穢者溼熱甚也宜二朮芩柏半夏車前佐以升提下如雞子白狀脾腎虛也腰腿痠疼面目浮腫必脾腎雙補宜歸脾丸 婦人又多憂思恚怒傷損心脾肺臟之火時發血走不歸經而患赤白帶下白是脾虛蓋肝氣鬱則脾受傷脾傷則溼勝皆由風木鬱于地中使然耳宜開提肝氣助補脾元宜補氣湯加茯苓杏仁山藥蒼朮黃柏麥冬 若陰虛火盛則以滋陰清或六味大加杜仲牛膝海狗 火為要宜六味丸加五味子杞 昔人云崩中日久變為白帶漏下多時骨水枯竭何謂也蓋崩久氣血虛脫故白滑之物下流不止也必大補之赤帶多因心火時熾不已久而陰血漸虛中氣漸損

而下赤矣必養心和肝緩中涼血清氣之品若赤帶久不止必血虛矣宜膠艾四物湯加帶下之因不外乎此其詳更有可述者如白帶腥臭多悲不樂陽氣虛衰者大寒也宜桂枝湯脈息沈微赤白帶下腹中痛陰中亦痛經來愆期子宮虛冷不能成孕者寒甚也宜合湯白帶久不止臍腹冷痛陰中亦痛經水不止或因崩後脈弱無力而疲疼由于虛也宜東垣產後去血多經水不調白帶如傾淋瀝臭穢亦由虛也生湯內熱脈數赤白帶下不止由于熱也宜地子生內火盛陰虛煩熱而赤白帶下或七情所傷脈數而帶下亦由于熱也宜二黃三白丸白帶或散或益母草末酒服肥人白帶陰尸痛身黃皮緩體重陰中如水溼也宜升麻燥淫湯溼而挾熱大便或泄或閉小便塞脈溢而氣盛溼熱也宜十身畏冷帶下如雞子白脾腎虛憊也宜補骨佳漏血久冷赤白帶下月大不調面黃肢弱經水或多或少如梔

婦科玉尺 帶下

卷五 二

子汁如屋漏水血虛而寒也宜血虛白帶淫水不絕精神虛損也宜八珍湯加升麻南血氣不調溼熱白帶四肢倦怠五心煩熱痰鬱宜解帶散脈數而白帶不止七情所傷也宜側柏瘕瘕腹脹胸滿赤白帶下久患血氣虛弱痿黃無力乃由寒溼也宜大聖赤白帶下不止燥熱煩渴由溼熱鬱于下焦之分也宜導萬安散赤白帶下不節損傷脾胃以致陽氣下陷白帶久不止也宜補中益氣湯時時帶下由胃虛有痰飲食減少中氣不和也宜六君健忘怔忡驚悸不寐怠惰體困不思飲食時常白帶不止由思慮過傷心脾也宜歸脾下冷撮痛陰冷大寒而白帶時下也宜延胡勞傷血脈胞絡受寒小便白濁日夜無度臍腹疼痛腰膝無力也宜金鹿癩疝白帶下注脚氣腰以下冷尿數與白帶長流而不自禁固茸丸癩疝白帶下注脚氣腰以下冷尿數與白帶長流而不自禁固肌瘦身重面白目無見行步欹側腿膝枯細大便閉心下痞悶快

懷飲食不下背寒此上中下三陽真氣俱竭也故嘔嘔不止為胃寒已極脈沈緊而澁按之空虛為陰寒已竭宜酒淫不止日久淋瀝皆氣多血少虛寒力衰也宜老年白帶方千金室女帶下純白衝任虛寒也宜白寡婦師尼室女鬱火盛熾陰尸或痒或痛而成赤淋乃血熱也宜瀉膀胱之火宜赤其或白淋則氣虛也宜烏金丸如是治帶病寧有或遺哉

脈法 脈經曰診婦人漏血下赤白日下血數升脈急疾者死遲者生又曰診婦人漏下赤白不止脈小虛滑者生大緊寔數者死又曰婦人帶下脈浮惡寒者不治又曰婦人帶下六極之病脈浮則為腸鳴腹滿緊則為腹中痛數則為陰中痒痛生瘡弦則陰中掣痛 李梴曰腎脈浮遲主患帶濁

婦科玉尺 帶下

卷五 三

七害五傷三瘕不通是也何謂十二瘕是所下之物一曰狀如膏二曰如黑血三曰如紫汁四曰如赤肉五曰如膿痂六曰如豆汁七曰如葵羹八曰如凝血九曰如清血血似水十曰如米泔十一曰如月浣乍前乍卻十二曰經度不應期也何謂九痛一曰陰中傷痛二曰陰中淋瀝痛三曰小便即痛四曰寒冷痛五曰經來腹中痛六曰氣滿痛七曰汗出陰中如有虫嚼痛八曰脇下分痛九曰腰膝痛何謂七害一曰竅孔痛不利二曰中寒熱痛三曰小腹急墜痛四曰臟不仁五曰子門不端引背痛六曰月浣乍多乍少七曰害吐何謂五傷一曰兩腹支滿痛二曰心痛引脇三曰氣結不通四曰邪思洩利五曰前後痼寒何謂三瘕一曰羸瘦不生肌膚二曰絕產乳三曰經水閉塞病有異同方亦不一又曰三十六種疾皆由于臟冷熱勞損而下起

于陰內也。陳白明曰：帶下有五因。經行產後邪入胞門，傳于臟腑而致之。若傷足厥陰，肝經色如青泥，傷手少陰，心經色如紅津，傷手太陰，肺經形如鼻涕，傷足太陰，脾經色如爛瓜，傷足少陰，腎經黑如衄血。人有帶脈橫于腰間，如束帶之狀，病生于此，故名爲帶。成無己曰：東垣云：血崩久則亡陽，故白滑之物下流，未必全拘于帶脈，亦有溼痰流注下焦，或腎肝陰淫之溼勝，或因驚恐而木乘土位，或思慕爲筋痿，戴人以六脈滑大有力，用宣導之法，此瀉其寔也。東垣以脈微細沈緊，或洪大而虛，用補陽調經，乃兼責其虛也。丹溪用海石南星椿根皮之類，乃治其濕痰也。竊謂前症皆當壯脾胃，升陽氣爲主，佐以各經見症之藥，色青屬肝，小柴胡加山梔防風溼熱壅滯，小便赤澀，龍胆瀉肝湯，肝血不足，或燥熱風熱，六味丸，色赤屬心，小柴胡加

婦科玉尺 帶下

卷五

四

山梔當歸思慮過傷，妙香散，色白屬肺，補中益氣湯，加山梔，色黃屬脾，六君子，加山梔，柴胡不應歸脾湯，色黑屬腎，六味丸，氣血俱虛，八珍湯，氣血下陷，補中益氣湯，溼痰流注，前湯加茯苓，半夏蒼朮黃柏，氣虛痰飲，下注，四七湯，送六味丸，不可拘肥多痰，瘦多火，而以燥溼瀉火藥輕治之。張從政曰：聖惠方以帶下由風冷巢氏內篇，又以爲寒則多白，熱則多赤，二家之說皆非也。蓋以衝任督三脈皆統于箕戶，循陰氣行，廷孔溺孔之端，以帶脈束之，因諸經上下往來，遺熱于帶脈之間，熱者血也，血積多，日不流，火則從金之化而爲白，乘少腹間，宛熱，白物滑溢，隨溼而下，綿綿不絕，或有痛者，則因壅碍而成痛也。內經曰：少腹宛熱，溼出白液，宛者屈帶也，病非本經爲他經宛抑而成此疾也。猶之赤白痢，赤者新積，屬心，火白者舊積，從肺，金故赤白。

痢不可曲分寒熱，又如瘧癘，始赤血，次潰白膿，又豈爲寒哉。且赤白痢者是邪熱傳于大腸，下廣腸，出赤白也。帶下者，傳于小腸，入脬經，下赤白也。據此二症，皆可同治溼法以治之。先以導水丸禹功散瀉，訖次以淡劑降心火，益腎水下小溼，分水道，則自愈。然有此法，又不可偏執，更宜詳其虛實，而用之內經，惟腸澀便血，血溫身熱者，死。赤白帶下，白液白物，壅病，腎消，皆不能死。人有死者，藥之過也。室女同。戴思恭曰：赤白帶下，皆因七情內傷，或下元虛冷，感非一端。大率下白帶多，間有赤者，並宜順氣散吞震靈丹，仍佐艾附圓，或米飲調沙參末，帶下不止，成疝羸者，四物加煨牡蠣五分，吞固真圓，多服取效。有帶疾愈後，一二月或再發，半年一發，先血而後下帶，來不可遏，停育未幾，又復傾瀉，此名漏帶，最難治者也。下截之血，小腹主之，有因血

婦科玉尺 帶下

卷五

五

虛而虛熱，陷下小腸，致小便澀痛，色白如泔，或成沙粒，不可作淋治。用冷劑宜四物五苓各半貼和煎。李梴曰：瘦人多熱，脈數，外症潮熱，乃陰虛火盛也。冬柏栲皮丸，不止，用地骨皮一兩，生地五兩，酒十盞，煎三盞，分三服。肥人多溼，身黃，脈緩，陰戶如冰，或痛，白帶，升陽燥溼湯，溼痰流下，滲入膀胱，二陳加二朮升柴，因日久淋瀝不已，或崩中暴下，或產後去血過多，以致陰虧，陽竭，榮氣不升，經脈凝注，衛氣下陷，精氣累滯于下焦，蘊積而成，白滑如涕，下流腥臭者，黃芪建中湯，去桂，加當歸煎，香若棟丸，始因亡血，復亡其陽，陽氣虛極，帶下腥臭，多悲不樂，附桂湯，常用酒煮當歸丸，風邪入胞門，或中經脈，流傳臟腑，俱宜胃風湯，或單地榆散，平時陰陽過多，及產後亡血，下虛風邪乘虛入于胞絡，煖宮丸，加姜附吳萸，孕婦帶下，全是溼熱，芩朮栲皮丸。

室女經水初下一時驚悸或浴以冷水或當風取涼故經水止而即患帶下琥珀砂丸又有白淫一症如白精之狀不可誤作白帶過服熱藥王肯堂曰有淫痰而弱不禁攻者燥之熱淫宜涼燥寒淫宜溫燥帶下久而枯涸者濡之常以四物料蜜丸服以此療年高婦人白帶良驗為潤劑也有脈微食少及久病曾經攻下者俱非虛治有熱用涼補無熱用溫補有因腸間敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛卒無已期者治須排膿為先白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍枯礬各五錢蠟丸空心及飯前米湯下十九或十五丸候膿盡仍別以補藥補之 吳崑曰白芷性香而升舉黃荊是性辛而利氣瓦楞子性燥而勝淫炒焦則火可生土土可防水煨粉則燥可勝淫淫勝則無以下注而白帶止此古人于此三物有單用一物以止之也又曰葵花稟草木之陰涵天地之陽故能潤燥升陽使營衛上行不復陷于帶脉之下而為帶下故以之治帶病也又曰婦人無病容單下白帶者責之淫熱下注婦人久病赤白並責之氣血下陷多成瘵也又曰氣陷下焦則白帶血陷下焦則赤帶必溢藥止之將未盡之帶留而不去以利藥下之則既損其中又傷其下皆非治也千金用白馬毛散以白馬則得乾之剛可以利氣毛得血餘可以固血氣利則白愈血固則赤止此意也龜鼈牡蠣外剛內柔離之象也去其柔而用其剛故可以化癥而赤白之成帶者無復中留可使營衛之行不復陷下營不陷則無赤衛不陷則無白 武之望曰白淫謂曰物淫如白精之狀又有日夜津流如清米泔或如黏膠者謂之白崩與白淫大同多憂思過度所致用平補鎮心丹思傷脾胃者四七湯

婦科玉尺 帶下

卷五

下白丸子痞悶少食者沈香降氣湯勞傷腎氣心腎不交者金鎖正元丹

治帶下病方

膠艾四物湯

治婦人赤帶 四物湯加 阿膠 艾葉

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒 肉桂一錢 附子二錢 黃柏知母各五分 如食少常飽有時似腹脹加白芍五分 不思飲食加五味子二十粒 煩燥面上麻木如虫行乃胃中元氣極虛加黃芪二錢人參七分炙草三分升麻五分 此方乃補陽氣極虛用知柏為引用又升降陰陽藥也

元戎六合湯

又名元戎四物湯治赤白帶下 脈沈微腹痛或陰中痛 四物湯各一錢加 內桂 附子各五分 一方四物加茴香肉桂

東垣固真丸

治白帶大下不止臍腹寒痛如冰陰中亦然日溜火齒惡熱 白石脂煨 柴胡各一錢 酒龍骨飛二錢 酒洗當歸三錢 乾姜炮四錢 酒黃柏 白芍各五分 糊丸每三十九

婦科玉尺 帶下

卷五

衛生湯

空生沸湯下少頃以粥壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物 治帶下由于熱者 白芍 當歸 黃芪三錢 甘草一錢

二黃三白湯

治帶下由于熱者 酒扇柏 川連 黃柏各五錢 醋香附 白石脂 白木 白芍各一兩 椿白皮二兩

白芷散

治赤白帶下 白芷一兩 海螵蛸三錢 胎髮煨一錢 每末二錢酒下 杜仲 醋牡蠣

補骨脂丸

治年老久帶 補骨脂 杜仲 醋牡蠣 五味子各三兩 車前子二兩 艾葉一兩

老年白帶方

治同上 黃柏 杜仲 各三錢 醋香附 八錢 砂仁 補骨脂 杜仲 各三錢 醋香附 八錢 醋炒艾葉一錢 醋化阿膠五錢 芍六錢 鹿角膠九錢 益湯下

血虛帶下方

治帶下由于血虛者 四君四物二湯加 陳皮 杜仲 黃芪 香附 砂仁 黃柏 知母 蜜丸

烏金丸

治赤白帶下 烏頭 烏附 莢木 艾葉 共用醋煮爛搗如泥再以 熟地 當歸各四

烏艾丸

醋湯下。白芍 川芎各二兩為末和前藥泥丸淡
兩將艾浸醋中十數日再將香附後一日晒
乾共為末醋糊丸酒下

赤淋丸

治赤淋。茯苓 生地 知母 黃柏 續斷
杜仲 丹參 甘草 白芍 龜甲四兩
治帶下赤白。白馬毛二兩 龜甲四兩
下方寸匕日三加至七半 如白取白馬者

小柴胡湯

治肝經經症寒熱往來嘔吐酸食苦水皆
食或怒火口苦耳聾或泄利或吐酸食苦水皆
不能展側兩脇悶痛或泄利或吐酸食苦水皆
主之治帶下赤白間用此加減。柴胡二錢 黃
芩一錢 人參 半夏各七分 甘草五分

歸脾湯

治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能
攝血以致妄行或憂思傷脾血虛發熱或肢體
作痛大便不調或經候不準帶下暗熱內熱
人參 白朮 黃芪 茯苓 當歸 龍眼
藥仁 遠志各一錢 木香 甘草各五分

婦科玉尺

帶下

卷五

八

龍胆瀉肝湯

治肝經濕熱兩目腫痛或腹中疼痛或小便澀
滯等症用此加減。龍胆草 澤瀉 車前子 木通 酒當歸
一錢 酒生地 甘草各五分

妙香散

治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜汗等症亦
用此加減。炒山藥 茯苓 遠志 茯神
五錢 姜汁炒 砂另研三錢 麝香另研二
錢 煨木香二錢半 每末二錢溫酒下

四七湯

治七情鬱結成痰或如梅核梗於喉中或中脘
停痰氣痞或痰壅氣喘或痰飲逆惡心亦治
帶下白帶。半夏錢半 蘇葉 厚朴 茯苓
各一錢

導水丸

治赤白帶下。宜酌用。大黃 黃芩各二兩
黑牽牛頭末 滑石各四兩 水泛丸臨臥
水下

禹功散

治同上。黑牽牛頭末四兩 炒茴香一兩
或加木香一兩 每末一二錢臨臥姜汁下
芩柏樛皮丸 治瘦人多熱致成帶下。黃芩 樛皮 黃
柏 川芎 滑石 海浮石 青黛 當歸
白芍 醋糊丸

芩朮樛皮丸

治孕婦白帶。黃芩 白朮各三錢 黃柏錢
半 樛皮 白芍 山黃各二錢半 白芷
川連各二錢 酒糊丸溫酒下

琥珀珠砂丸

治室女帶下。琥珀 木香 當歸 沒藥各
四錢 乳香一錢 麝香 珠砂各二分半
水丸芩子大每一丸溫酒磨下

胃風湯

治風邪傳腎帶下。黑如血。人參 茯苓
川芎 當歸 白朮 白芍 肉桂各七分
粟米百粒

三補丸

治赤帶兼服此丸。黃芩 黃連 黃柏 等
分蜜丸湯下
一名紫金丹治婦人血氣不足崩漏虛損帶下
虛冷胎前無子。乳香另研 五靈脂另研
沒藥另研並去沙石各二兩 珠砂飛一兩
禹餘糧 石醋 澤瀉 得碎為度 代豬石同根石
製 紫石英 赤石脂 以上四味重作小塊
入鋼內焙乾用酒浸候乾用炭十斤煨通紅火盡
為度埋地二宿出火毒糯米粉打糊丸如芩子
大每丸空心醋湯送下 如有孕不可服
治赤白帶。苦棟碎酒浸 茴香炒 當歸
等分 酒糊丸每三五十九空心酒下 腰腿

苦棟丸

婦科玉尺

帶下

卷五

九

酒煮當歸丸

治癰瘤白帶下注。腳氣腰以下冷等症。當歸
一兩 茵香五錢 炮附子 良姜各七錢
右四味對如麻豆大酒一升半至酒盡為度焙
乾研細末入炒黃鹽 丁香各五錢 全蠍
三錢 柴胡二錢 升麻 木香各一錢
苦棟子 桑寄生 各五分 延胡索酒炒四錢
酒煮麩糊丸每二十九空心宿食消盡淡醋湯
下忌油膩酒麵生冷

解帶散

治淫熱痰鬱白帶。酒當歸 醋香附各錢半
陳皮 丹皮 各一錢 川芎 延胡索 蒼朮
炙草 四分 加姜二片 延胡索 各八分
治七情所傷白帶。椿根皮二兩 醋香附
白芍 白朮 各一兩 側柏葉 川連 黃柏
炒各五錢 白芷 灰三錢 粥丸

側柏樛皮丸

治寒淫帶下。白朮 木香 胡椒各二錢半
牛炒取頭末二兩 桑皮 木通 各五錢 白牽
頭再飲姜湯數口催之平明可行三五次取下
惡物以粥補之 服此藥忌食量酒晚飯

大聖萬安散

治寒淫帶下。白朮 木香 胡椒各二錢半
牛炒取頭末二兩 桑皮 木通 各五錢 白牽
頭再飲姜湯數口催之平明可行三五次取下
惡物以粥補之 服此藥忌食量酒晚飯

延胡苦棟湯 治大寒帶下。延胡索 苦棟子各二分 黃柏一分 附子 肉桂各三分 炙草五分 熟地一錢

白薇丸 治室女帶下。鹿茸二兩 白薇 狗脊製去毛各一兩 醋艾煎汁打糊丸

內金鹿茸丸 治勞傷帶濁。鹿茸 黃芪 五味 雞內金 肉菴容 遠志 牡蠣 桑螵蛸 龍骨 附子 等分蜜丸

金鎖正元丹 治真氣不足。呼吸短氣。四肢倦怠。脚膝痠軟。目暗耳鳴。盜汗遺精。及婦人白濁。淫等症。肉菴容 巴戟 葫蘆巴 各一斤 補骨脂 十兩 五倍子 八兩 茯苓 六兩 砂 三兩 龍骨 二兩 另研 酒丸 每二十九 鹽湯下

婦科玉尺 帶下 卷五 十

崩漏

大凡女子自天癸既通而後。氣血調和。則經水如期。不先不後。自無崩漏之患。若勞動過極。以致臟腑虧傷。而衝任二脉亦虛。不能約束其經。血使之如期而下。故或積久。或不須積久。忽然暴下。若山之崩。如器之漏。故曰崩漏。究其原則。有六。一由火熱。二由虛寒。三由勞傷。四由氣陷。五由血瘀。六由虛弱。何以見火熱之所由也。或脾胃傷損。下陷于腎。與相火相合。溼熱下迫。血色紫黑。臭如爛肉。中挾白帶。則寒作于中。脉必弦細。中挾赤帶。則全由熱作。脉必洪數。其症兼腰膝下痛。兩脇急縮。心煩悶。心下急。不眠。欲崩先發寒熱。平時臨行經。亦發寒熱。此必大補脾胃。而升降氣血。宜中益氣湯。與涼血地黃湯。或心氣不足。心火大熾。旺于血脉之中。又脾胃失調。而心火乘之。肌肉顏色如常。此為心病。經水不時下。亦暴下不止。治必大補氣血。脾胃少。加鎮墜。心火以治其心。補陰瀉陽。而崩自止矣。宜六味丸加。或肝經有熱。血得熱而下行。宜四物湯。或風熱鬱于肝經。血得風而妄行。宜加味。或怒動肝火。肝家木。血熱而沸騰。宜小柴胡湯加。或脾經鬱熱。血為熱迫而不歸經。宜脾湯加柴胡。山梔丹皮龍胆。或脾經鬱熱。血為熱迫而不歸經。宜山梔丹皮。或悲哀太過。損傷胞絡。令血下注。宜四君子湯加。或血為熱傷。脉象虛洪。所下皆紫黑色。宜河間生。或血室有熱。崩下不止。服溫藥不效。宜金。或天暑地熱。陽來乘陰。經血沸溢。宜簡易。以上皆火熱所統之病也。何以見虛寒之所由也。或心氣不足。又勞役飲食不節。其脉兩尺弦緊而洪。按之無力。其症臍下如冰。求厚衣被以禦寒。白帶白滑之物雖多。問下如屋漏水。下時有鮮血。不多。右尺脉時微洪。屋漏水多。暴下者。是急弦脉為寒。多而洪脉時見。乃熱少。合而言之。急弦者北方寒水多也。洪脉時出者命門。

婦科玉尺 崩漏 卷五 十一

包絡之火也。黑物多。赤物少。合成屋漏水之狀。宜丁香散艾湯
或經候過多。其色瘀黑。甚者崩下。呼吸少氣。臍腹冷極。則汗出
如雨。尺脈微小。由衝任虛衰。為風冷。客乘胞中。氣不能固。宜鹿或
氣血勞傷。衝任脈虛。如經云。非時忽然崩下。或如豆汁。或成血片
或五色相雜。或赤白相兼。臍腹冷痛。經久未止。令人黃瘦。口乾。飲
食減少。四肢無力。虛煩驚悸。宜伏龍或經血過下。過服寒涼之藥
等物。因愈崩漏。肚腹痞悶。飲食不入。發熱煩躁。脈洪大而虛。由脾
經氣血虛而發。躁。緩治則不救。宜八珍湯以上皆虛寒所統之病
也。何以見勞傷之所由也。或因勞役令脾胃虛弱。氣短氣逆。自汗
不止。身熱悶亂。惡見飲食。肢倦便洩。漏下不止。其色鮮明。宜當歸
此條亦或思慮傷脾。不能攝血。致令妄行。并健忘怔忡。驚悸不寐。
且心脾傷痛。怠惰少食。宜歸脾湯或憂思鬱結。勞傷心經。不能為血之

婦科玉尺 崩漏 卷五 十一

主遂令妄行。宜柏子仁湯或緣卒然大怒。有傷肝臟。而血暴下。宜養血
以上皆勞傷所統之病也。何以見氣陷之所由也。或經漏不止。鮮
血。頭筋急。腦痛。脊骨強痛。不思飲食。宜柴胡湯或露下惡血。月水不
調。或暴崩不止。多下水漿之物。皆由飲食不節。或勞傷形體。或素
有心氣不足。因飲食勞倦。致令心火乘脾。必怠惰嗜卧。四肢不收。
困倦乏力。無氣以動。氣短上衝。逆急上衝。其脈緩而弦急。按之洪
大。得之脾土受邪也。脾主滋榮周身者也。心主血。血主脈。二者受
邪。病皆在脈。脈者血之府也。脈者人之神也。心不主令。胞絡代之。
故曰心之脈主屬心。心系者胞絡命門之脈也。主月事。皆由脾
胃虛而心胞乘之。故漏下血水不調也。况脾胃為血氣陰陽之根
蒂。當除溼去熱益氣。氣上伸以勝其溼。又云火鬱則發之。宜調經
溼湯此條或衝任氣虛。經脈不調。崩中漏下。宜斷以上皆氣陷

婦科玉尺 卷五

所統之病也。何以見血瘀之所由也。或血大至。純下瘀色。成腐勢
不可止。甚則頭目昏暈。四肢厥冷。腹痛。宜膠艾湯或血崩不止。昏迷不
省。宜五靈散或瘀積血崩。所下皆成五色。宜香附或瘀積久而血崩
臍腹疼痛。宜立或室女二七之期。天癸未至而後至。亦有卒然暴
下。淋瀝不止。有若崩漏者。其失血必多。宜加減以上皆血瘀所統
之病也。何以見虛弱之所由也。或崩中不止。結作血片。如雞肝色
碎爛。宜小蘗或崩血無度。虛損羸瘦。宜鹿茸散或諸虛不足。久不受孕。
骨熱形羸。而崩中帶下。宜補或帶下漏血不止。及風寒冷熱。勞損
衝任。崩中暴下。腰重裡急。淋瀝不斷。宜芎以上皆虛弱所統之病
也。就此六者。而分類推之。以究其原。崩漏之病。寧有遺哉。然其治
之。亦必有道矣。方氏云。血屬陰。靜則循經榮內。動則錯經妄行。凡
人七情過極。則動五志之火。五志之火。亢甚。則經血暴下。久而不
止。謂之崩中。如風動木搖。火燃水沸之類。治崩次第。初用止血。以
塞其流。中用清熱涼血。以澄其源。末用補血。以還其舊。若止塞流
而不澄源。則滔天之熱。不可遏。若止澄源而不復舊。則孤子之陽
無以立。故本末不遺。前後不紊。方可言治。方氏此論。乃治崩要法。
醫者深悉乎六者之由。而逆之以塞流澄源復舊三法。則庶幾其
得之矣。

婦科玉尺 崩漏 卷五 十二

脈法 仲景曰。寸口脈弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。
芤則為虛。寒虛相搏。此名曰革。婦人則半產漏下。旋覆花湯主
之。脈經曰。問曰。五崩何等類。師曰。白崩者。形如涕。赤崩者。形
如絳。黃崩者。形如爛瓜。青崩者。形如藍。黑崩者。形如鮑魚
也。又曰。診婦人下赤白。日下血數升。脈急疾者。死。遲者。生。婦人
帶下。麻浮惡寒。漏下者。不治。又曰。尺脈急而弦。大風邪入少陰。

五五

之經女子漏白下赤又曰漏血下赤白不止脉小虛滑者生大緊是數者死 陳自明曰寸脉微遲為寒在上焦則吐血衄血尺脉微遲為寒在下焦則崩血便血大抵數小為順洪大為逆大法當調補脾胃為主又曰尺寸脉虛者漏血脉浮者俱不治 李梴曰脉微弱為少氣女子崩中漏下致面色焦枯心脉獨沈主氣鬱下流血崩去紅腎脉浮乳腎虛也女人則經漏後部彈手陰蹻脉也主裡急

崩漏原由症治 素問曰陰虛陽搏謂之崩又曰少陽司天初之氣風勝乃搖候乃大溫其病血崩 陳自明曰婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由心脾血虛也若小產去血過多而心痛甚者亦然用烏賊骨炒為末醋湯調下妙失笑散亦妙 嚴用和曰婦人平居經脉調適衝任二脉互相涵養陰陽二氣不

婦科玉尺 崩漏 卷五 十四

相偏勝則月事時下若將理失宜喜怒勞役過度傷肝肝為血庫傷之則不能藏血于宮宮不能傳血于海所以崩漏漏下者淋瀝不斷病之輕者也崩中者忽然暴下乃漏症之甚者也倘从不止面黃肌瘦虛煩口乾臍腹冷痛吐逆不食四肢虛困甚則為脹為腫者不治 李梴曰婦人脾胃虛損致命門脉沈細而數疾或沈弦而洪大有力寸關脉亦然皆由脾胃虧下隔于腎與相火收合溫熱下迫經漏不止其色紫黑而鼻中有白帶者脉必弦細寒作于中中有赤帶者其脉洪數疾其熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮兼見脾胃症如四肢困熱心煩不卧心下急宜以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣又曰婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也涼血地

黃湯 朱震亨曰東垣治法洵不容易但學者尤當尋思急則治標用白芷湯調百草霜末甚者用棕灰後用四物加炒乾姜調理因勞用參芪帶升補藥因寒用乾姜因熱用黃芩崩過多先用五靈脂末一服當分寒熱蓋五靈脂能行能止紫色成塊者熱也四物加黃連之類 李梴曰崩漏之由虛與熱而已治法多端隨症制宜如經行犯房勞役過度氣血俱虛忽然暴下者宜大補氣血氣虛四物加參芪血虛四物加膠艾炒乾姜虛寒臍腹冷痛伏龍肝散膏梁厚味致脾溼下流于胃與相火合為溼熱迫經下漏者解毒四物湯四物加離九飲食失節火乘脾胃下陷容顏似無病而外見脾氣困倦煩熱不卧者宜補陰瀉陽升陽調經湯升陽舉經湯子宮為四氣相搏血亦難停者風搏不換金正氣散加川芎官桂四物加荆芥寒搏及年老从

婦科玉尺 崩漏 卷五 十五

崩伏龍肝散加附子鹿茸阿膠蒲黃九暑搏單參心丸或益元散加百草霜溼搏升陽除溼湯悲哀甚而包絡絕包絡絕而陽氣內陷發則心下崩數洩血者脩金散四製香附丸 徐春甫曰崩漏最為大病年少之人火熾血熱房事過多經行交感俱致斯疾大都涼血固澁升氣益榮而可愈也中年以上人及高年寡婦多是憂慮過度氣血俱虛此為難治必須大補氣血養脾升胃固血庶保十之二三若不早治正如圮廈之難支也蓋血崩症有因虛有因熱虛則下陷熱則流溢視其緩急標本治之緩用四物加條參附子急用神效丸有因血虛虛冷宜四物加黃芩阿膠參芪東垣謂崩帶下久有属于寒不可一論 王肯堂曰冷者脉緊細手足寒紅而淡黑或五色當歸建中湯加龍骨血竭附子送下紫石英丸熱者脉洪四肢温心煩口苦燥

血沸而成黃芩湯清心蓮子飲加竹瀝生地甚者生地汁磨京墨百草霜冷服。虛者膠艾湯加麥冬鹿茸龍骨棗仁寔者腹中痛四物加香附心虛者恍惚多夢健忘舌強盜汗小便多而紅。柏子仁湯酸棗仁湯加龍骨京墨百草霜若崩中作麝香當歸香者心氣已散急服靈砂龍骨等。又曰血者心之色也血見黑即止腎水制心火故也。又曰凡血崩脈沈弦而洪或沈細而數或崩而又兼久瀉者皆胃氣下陷也故以升舉為要。萬全曰崩中多因中氣虛不能收斂其血加以積熱在裡迫血妄行故令暴崩崩久不止遂成下漏治法初病宜止血四物調十灰散以血止為度次則清熱用涼血地黃湯如血未盡再吞十灰丸血已盡止裡熱盡除然後補其虛宜加味補中益氣湯地黃丸參朮大補丸以平為度。武之望曰丹溪云凝鬱胸中清氣不升故經脈壅遏而降下非開滯不足以行氣非氣升則血不能歸隊道此論血泄之義甚明蓋開胸膈濁凝則清氣升清氣升則血歸隊道不崩矣故其症或腹滿如孕或臍腹疔痛或血結成片或血出則快止則悶或臍上動其治法宜開結痰行滯氣消瘀血余嘗謂丹溪先生善治瘀觀此另得一種見解不益信哉。按按痰鬱氣遏是崩漏中一症非必定如是也。

婦科玉尺 崩漏 卷五 去

升故經脈壅遏而降下非開滯不足以行氣非氣升則血不能歸隊道此論血泄之義甚明蓋開胸膈濁凝則清氣升清氣升則血歸隊道不崩矣故其症或腹滿如孕或臍腹疔痛或血結成片或血出則快止則悶或臍上動其治法宜開結痰行滯氣消瘀血余嘗謂丹溪先生善治瘀觀此另得一種見解不益信哉。按按痰鬱氣遏是崩漏中一症非必定如是也。

治崩漏病方

補中益氣湯 治脾胃虛損崩漏。人參 黃芪 白朮各一錢 炙甘草 當歸 陳皮各七分 升麻 柴胡各三分

涼血地黃湯 治同上。又治血崩由腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩者。生地 歸尾各五分 黃連 黃柏 知母 桑寄生 川芎 升麻 各二分 防風 羌活 黃芩 細辛 荆芥 各一分 炙甘草 蔓荊子各二分 紅花一分

歸脾湯 治思慮傷脾不能攝血妄行崩漏。人參 黃芪 白朮 茯苓 當歸 遠志 圓眼 棗仁 各二錢 木香 炙甘草各五分 姜三 棗 一 加柴胡 山梔 各加味歸脾湯 河間生地黃散 治脈虛洪血色紫黑。生地 熟地 白芍 黃芪 天冬 杞子 柴胡 地骨皮 便血 者加地榆

全華散 治血室有熱而崩漏。延胡索 瞿麥穗 當歸 丹皮 乾姜 各一兩 石膏 二兩 威靈仙 桂心 各七錢 蒲黃 五錢 每末三錢水煎空心溫服日二 簡易黃芩湯 治天暑地熱經血滯益。黃芩末三錢用秤鍾燒紅淬酒中各碎酒下 丁香膠艾湯 治漏下屋漏水之狀。當歸 錢二分 白芍 熟地 各三分 川芎 丁香 各四分 艾葉 一錢後入 炒阿膠 六分後入 空心服三服效

鹿茸丸 治風冷客乘胞中崩漏。鹿茸 蘇炙 赤石脂 煨 禹餘糧 煨 各一兩 炮附子 艾葉 柏葉 各五錢 當歸 熟地 川斷 各二兩 蜜丸酒下 伏龍肝散 治氣血勞傷衝任脈虛崩漏。川芎 三兩 伏龍肝 赤石脂 各一兩 艾葉 微炒 熟地 各二兩 婦科玉尺 崩漏 卷五 去

當歸芍藥湯 治勞傷傷脾胃崩漏。黃芪 錢半 白朮 蒼朮 歸身 白芍 各一錢 熟地 陳皮 各五分 生地 炙甘草 各三分 柴胡 二分

柏子仁湯 治勞傷心經崩漏。柏子仁 香附 川芎 鹿茸 茯神 當歸 各錢半 川斷 二錢 阿膠 遠志 各一錢 炙甘草 五分 姜三片

養血平肝散 治大怒血崩。當歸 白芍 香附 各二錢 醋青皮 柴胡 川芎 生地 各八分 甘草 五分

柴胡調經湯 治漏下鮮血。羌活 獨活 升麻 藜蘆 各五分 蒼朮 一錢 柴胡 七分 葛根 當歸 炙甘草 各三分 紅花 少許 稍熱服取發汗立止 調經升陽湯 治漏下惡血。黃芪 蒼朮 羌活 各錢半 防風 藜蘆 柴胡 升麻 炙甘草 各一錢 獨活 各五分 空心服少時以早磨搗之

五靈脂散

治血崩昏迷。五靈脂炒熟溫酒下末一錢

香附子散

治崩下五色。香附末每二錢米飲下

斷下湯

治衝任氣虛崩漏。及經不調并三十六種帶病。人參 熟地 醋艾葉各一兩 烏賊骨灰 酒當歸各二兩 阿膠 川芎各七錢 炮

立效散

乾姜五錢 治血崩腹痛。香附三兩 當歸一兩 赤芍 良姜 五靈脂各五錢 每末三錢酒一 盞童便少許煎

加減四物湯

治室女下血。四物湯四錢加 香附錢半 姜五片 如血色鮮去熟地加生地

小薊根湯

治陽傷于陰漏血。小薊莖葉搗汁 生地搗 汁各一盞 白木五錢 入水一盞煎半溫服

鹿茸散

治虛羸漏下。鹿茸一兩 龍骨 龜甲 熟地 白芍 白朮 續斷 烏賊骨各二兩 肉苁蓉兩半 每末二錢食前米湯下

補宮丸

治諸虛不足崩漏。白朮 牡蠣 白芍 鹿角霜 山藥 白木 白芷 茯苓 烏賊骨 等分 糊丸

芎藭湯

治四氣勞損衝任下血。川芎 吳茱萸 黃芪 白芍 生地 桑草各二兩 當歸 乾姜各一兩 水一斗煮三升分三服 若經後有赤白不止者去生地吳茱萸加入參杜仲各二兩

伏龍肝散

治崩中下赤白或如豆汁。伏龍肝如彈子大 七枚 生薑五兩 生地剉四升 甘草 艾葉 赤石脂 桂心各二兩 水一斗煮三升 分四服日三夜一

四物坎離丸

治脾溼下流于腎。與相火合為溼熱。延經下漏 紫黑臭腐。生地兩半 酒浸熟地搗膏 當歸身二兩 槐子 側柏葉各一兩同炒 連喬六 錢 蜜丸

升陽舉經湯

治飲食勞倦暴崩不止。或下水漿。怠惰嗜臥。四肢困倦。及帶下脫漏。肉桂 川芎 紅花各 五分 獨活 細辛 六分 人參 熟地 各一錢 附 子 獨活 甘草 各錢半 羌活 藜蘆 防 風 各二錢 白朮 當歸 黃芪 柴胡 各三 錢 桃仁 十枚 咀片分作四帖煎 夏月不 用桂

婦科玉尺 崩漏 卷五 六

不換金散

治風冷血崩。厚朴 陳皮 薑香 半夏 蒼朮各一錢 甘草五分 姜三片 棗一枚 升陽除溼湯

升陽除溼湯

治溼盛血崩。蒼朮一分 升麻 柴胡 防 風 神曲 澤瀉 猪苓各五分 陳皮 甘 草 麥芽各三分 姜 棗

平補鎮心丹

治白崩。茯苓 茯神 五味 車前子 肉 桂 麥冬各兩二錢半 遠志肉 山藥 天 冬 熟地各兩半 棗仁 二錢半 龍齒 二兩 半 人參 砂砂各五錢 蜜丸每二十九米 飲下

解毒四物湯

一名溫清飲。治崩漏面黃腹痛。四物湯各一 錢加 黃芩 黃連 黃柏 山梔 生地各 一錢 此四物湯與黃連解毒湯合劑也

脩金散

治血崩不止。香附四兩 歸尾兩二錢 五 靈脂炒一兩 每末三四五錢空心醋湯調 治足三陰虛損。經行數日不止及帶下無子。 熟地 山藥 蕪荑仁 白芍微炒 代赭石 各一兩 姜炒 炮乾姜 厚朴各三錢 蜜丸酒下日三

地黃丸

附錄前人效方

五灰散

治下血不止。成血崩。蓮蓬壳 百草藥 黃 絹 血餘 棕皮以上共燒存性 山梔 蒲 黃炒 血竭 京墨 每細末一二錢調服

十灰散

治下血不止。錦片 木賊 棕皮 柏葉 乾漆 艾葉 當歸 血餘 鯽魚鱗 鯉魚 鱗 以上各燒存性等分研末 入麝香少許 每末二錢空心酒下

十灰丸

治崩漏不止。綠灰 黃絹灰 馬尾灰 艾 葉灰 藕節灰 蓮房灰 油灰 未松皮 灰 棕灰 蒲黃灰 等分醋煮米糊丸每五 七十九丸至百九空米飲下

婦科玉尺

崩漏 卷五 六

婦科玉尺

婦女雜病

沈金鰲撰

婦女者陰之集常與溼居者也。男子之為道也以精。婦女之為道也以血。精為陽。此其所以成男子也。血為陰。此其所以為婦女也。蓋自十四衝任脉通而天癸至。血氣之存。外循經絡。內榮臟腑。不失其度。則月事以時下。而諸疾不生。如不然者。陰氣浮溢。百想經心。內傷五臟。外損姿容。月水去留。前後互異。痰血停滯。中道斷絕。其間傷損。不可具論。聖惠方云。婦女所以別立方者。以其氣血不調。胎妊產生。崩傷多異之故。旨哉言乎。可見婦女之不同于男子。婦女之病。難治于男子。數倍也。蓋以男子之病。多由傷精。婦女之病。多由傷血。然而婦女之慾。每甚于丈夫。故感病亦每易于丈夫。

婦科玉尺 雜病

卷六

又况嫉妬憂患。係戀愛憎人之深。着之固情。不自抑。不知解脫。由陰凝之氣。鬱結專滯。一時不得離散。非若陽氣之偶有所抑。畢竟易于發散。故其為病根深也。夫婦女之病。莫有如經。莫有如胎。莫有如產。前後莫有如崩。中帶下。此致大端。別自有論。此外有最易作而最難治者。一日癆瘵。一日積聚癥瘕。一日浮腫。其癆瘵之由。復有數種。或因先天氣血不足。乍寒乍熱。不思飲食。疴瀉無力。宜補九。或吐衄。咳唾血。發熱盜汗。痰嗽心憊。因虛勞而經水不調。宜黃九。甚或心肺俱損。血脈虛弱。皮聚毛落。亦因虛勞而致。經水不調。宜滋。其有先經水不調。而致癆瘵者。則五心煩熱。寒熱如瘧。或煩熱潮熱。盜汗痰嗽。宜逍遙散。加至如室女思慮傷心。經閉成癆。則名乾血癆。其候最難調治。只宜益陰。血制虛火。慎勿妄用通經破血之藥。宜柏子仁。或因產後早犯房事。勞役過度。將理失宜。皆

能致病。名曰產後癆。宜參朮散。或血氣既虧。為風冷所搏。則不能溫于肌膚。使人虛羸憔悴。飲食不消。又或風邪兩感于肺。肺受微寒。喘嗽口乾頭昏。百節痛。又或風邪侵于營衛。流及臟腑。寒熱如瘧。盜汗背膊煩悶。四肢沉重。名曰癆。俗總謂之產後癆。宜黃九。當與產後篇參看。精聚癥瘕者。本男女皆有之病。而婦人患此。大約皆胞胎生產。月水往來。血脈精氣不調。及飲食不節。脾胃虧損。邪正相侵。積于腹中之所生。準繩謂推之不動為癥。推之動為瘕。是也。試詳言之。瘕有二。一血瘕。由臟腑氣虛。風冷相侵。或飲食失節。與血氣相搏。適值月水往來。經絡痞塞。惡血不除。結聚成塊。漸至心腹兩脇痛。苦于飲食。肌膚瘦羸。宜桃仁五靈散。甘二食瘕。亦由月信往來。食生冷之物。而臟腑虛弱。不能消化。與氣搏結。聚而成塊。盤堅不移也。瘕有八。一黃瘕。內經來或大小

婦科玉尺 雜病

卷六

產後血氣未定。臟腑空虛。或當風便利。陰陽開闔。關節四邊。中于風溼邪。從下入于陰中。積留不去。所成其症。寒熱身重。淋露不食。左脇下有結氣。拒按。宜皂二青瘕。由新產起行。浣洗太早。陰陽虛。產門四邊解散。子戶未安。骨肉皆痛。手臂不舉。又犯風溼所成。其症苦寒。洒洒入腹。煩悶結熱不散。惡血不除。聚在兩脇下。藏于背脊。其後月水不通。或反不閉。宜青瘕。由月水未盡。或以夏暑。或以舉重汗出。卒以恚怒。致月水與氣相搏。反快涼飲。片水橫流。溢入他臟。有熱。成燥瘕。大如半杯。上下腹中痛。連兩脇。下上引心而煩。喜嘔吐。腰背重。足疲削。忽遺溺。月閉。宜瘕。由月事中止。飲食過度。五穀氣盛。溢入他臟。或大飢寒。呼吸未調。而自勞動。血下未定。左右走腸。胃間留絡。不去。內有寒熱。與月水合會而成。其症不可俯仰。橫骨下有積氣。堅如石。小腹急痛。背疼。腰

腹等陰中若生風冷。月水來止不常。宜療血癢。五脂癢。由月信初來。或生未滿月而交胞門傷。子戶失禁。關節散臟。腑津流陰。道動。百脉四解。子精與血氣相遇。不能成子。而成脂癢。其症少腹重。腰背如刺。四肢不舉。卧不安。左右走腹中痛。時少氣頭眩。身體解。你苦寒惡風。二便血。月事來止不常。宜療脂癢。六狐癢。由月來悲。憂。或風雨雷電驚恐。且受濕。心神恍惚。四肢振寒。體倦神散。邪入陰裡。不去而成。其症少腹滯。陰中腫。小便難。胸膈腰背痛。氣盛善食。多所思。如有身狀。宜療狐。七蛇癢。由月新止。陰陽未平。飲汚井之水。食不潔之物。悞吞蛇鼠之精。留臟不去而成。其症長成蛇形。在臍上下。或左右脇。不得吐氣。上蝕心肝。少腹熱。膀胱引陰中痛。腰痛。兩股脛間痛。時寒熱。月水或多或少。宜療蛇。八髓癢。由月水新至。其人作勞。適受風溼。恍惚覺悟。心向未平。復見所好。心為之開。

婦科玉尺 雜病

卷六 三

魂魄感動。五內消脫。或沐浴不以時出。而神不守。水氣與邪氣俱入。至三焦中。幕玉門先閉。津液妄行。留絡不去而成。其症形如小杯。小腹切痛。左右走上。下腹中痛。持之躍手。下引陰裡痛。腰背亦痛。不可以息。月事不通。宜療髓。由此推之。又有近臍左右各有一條筋脉急痛。大如臂。小如指。因氣而成。如弦之狀。名曰疝者。又有僻匿在兩脇間。時痛時止。名曰癰者。皆由陰陽乖經絡痞。飲食滯邪冷搏而成也。俱宜麝香丸。又有臟腑虛弱。氣血勞傷。風冷入腹。與血相結。留聚浮假而痛。推移則動。名曰疝癢者。乃由經產後。胞中有惡血復為邪結而成也。宜乾漆散。又有所謂腸單者。寒客大腸。與胃相搏。大腸為肺傳送。寒則濁氣凝結。日久便生瘕肉。始如雞卵。大如懷胎。按之堅。推之動。月則時下。此氣病而血未病也。宜歸露。陳湯加。又有所謂石瘕者。寒客下焦。血氣俱為所閉。寒口益大。亦

如懷子。但不得推移。且多墜小腹。與腸單相類。而寔異。宜見要之。婦人精聚之病。雖屢多端。而究其寔。皆血之所為。蓋婦人多鬱怒。鬱怒則肝傷。而肝藏血者也。婦人多憂思。憂思則心傷。而心主血者也。心肝既傷。其血無所主。則妄溢。不能藏。則橫行。迨至既溢。既行。離其部分。或遇六淫。或感七情。血逐痰滯。而隨其所留。臟腑所入。經絡于是而百疾作。有如前種種惡症矣。若夫月經偶閉。或產後惡露未盡。乘風取涼。為風冷所乘。便成瘀血。而此瘀在腹中。必至發熱面黃。食少體瘦。然此但為瘀血。而未成積聚等症者。不早圖之。堅結成形。亦難免矣。婦女浮腫之病。有先斷經而後致四肢浮腫。小便不通者。乃血化為水。古人謂之血分。宜椒仁丸。亦有先因小便不通。而後身面浮腫。竟至經水不通者。乃水化為血。古人謂之水分。宜葶丸。其原皆由外傷六淫。內傷七情。飲食失度。起居失

婦科玉尺 雜病

卷六 四

宜。漸至脾胃受傷。失生發統攝之節。氣與血俱乖。而後然也。蓋人身氣血本屬相須。血者氣之化。氣者水之母。非氣無以生血。非血無以養氣。若經水不通。則血病。血病而氣亦病矣。血不通而化水者。寔是氣壅不能化。血遂變為水也。至薛氏云。月水不通。凝結于內。久而變為血瘕。血水相搏。亦為水腫。夫血凝成瘕。因而致腫。亦屬于水。此症之故。則以血水相搏。既凝之血。亦從乎水者矣。當細思之。總之血分者。不可以水治水。分者。不可以血治。理固然也。以上皆最易作。而最難治之病也。其有不易作。而實難治者。婦女陰中之疾。是已如陰戶腫痛。不閉。寒熱。溺瀉。體倦。少食。宜補中益氣。入茯苓。陰戶不閉。小便淋瀝。腹中一物。攻動腹痛。宜通散。胡山。皆由肝脾有傷之故。嘗考石室秘錄曰。婦人羞隱之處。不便明言。然大約非寒即熱。今擬一方。先用歸芍各三錢。川芎一錢。熟地五

錢甘草柴胡白芥子各一錢黃芩炮姜各三分水煎服之後較前平善則是虛症隨用四物治之可也未好則是熱痛作崇方中加梔子三錢治之必奏效此誠可謂善于試之者矣至若陰瘡陰挺一切等症詳載雜病源流前陰條參考可也而婦女之疾關係最鉅者則莫如乳如乳巖乳癰乳吹等症亦詳雜病源流身形門茲不贅其有乳癰者女子十三四歲經脈將行或一月二次或過月不行致生此疾多生于寡薄虛弱之人每乳上止有一核可治若申成三四個即難療宜服敗毒散加生地再服黃芩丸通用逍遙調經湯其有乳癰者因厚味溼熱之痰停畜膈間與滯乳相搏而成又有滯乳因兒口氣吹噓而成又有拘怒氣激滯而生者煖石膏瓜蒌子青皮甘草節皆神效藥也然此病若早治之立消有月經時悉是輕病者到五六十歲無月經時不可作輕易看也其

婦科玉尺 雜病

卷六 五

有未產而乳自出者謂之乳泣生子多不育產後乳汁自出者乃胃氣虛宜服補藥止之或治以漏蘆散亦可以上皆不易作而難治之病也此外若婦女氣盛于血往往無子且變生諸症頭暈腦滿有所必至如氣散異香四神丸若血風體痛寒熱盜汗頰赤口乾胸滿痰嗽月水不調臍腹疔痛癩瘕成塊宜參若風虛夢與鬼交妄有所見言語錯亂宜茯苓神湯若經水不調血氣攻注遂至腹腸疼痛積聚成塊宜神仙聚寶丹若怒氣傷肝不能藏血血失常經以致肌膚手足間俱有血絲絡隱然可見宜橘則皆婦女之病所不可忽者至于尋常雜病與男子略同者已詳雜病源流中故可無贅惟此種種乃婦女所獨因不憚條載而縷述之焉

脈法 脈經曰婦人疝瘕積聚脈弦急者生虛弱者死又曰少陰脈浮而緊則疝瘕半產而墮傷浮則亡血惡寒絕產

虛勞原由症治 王肯堂曰勞倦所傷用補中益氣湯調治乃暴病也失治而有發熱潮熱盜汗咳嗽諸症出焉謂之虛勞又復失治而有皮聚毛落飲食不為肌膚骨髓中熱經閉不行諸症出焉謂之瘵骨蒸熱至于傳尸勞別自一種其原不起于勞倦其流至于滅門蓋按婦女虛勞多半由于經血即有由勞倦者亦必內傷脾胃及于衝任之故不與男子虛勞 大全曰婦人冷勞即無熱虛勞也由血氣不足臟腑虛寒以致臍腹冷痛手足時寒月經失常飲食不省或時嘔吐惡寒發熱骨節痠疼肌膚羸瘦面色痿黃也婦人熱勞即有熱虛勞也由心肺壅熱傷于氣血以致心神煩躁頰赤頭疼唇乾眼澁口舌生瘡神思困倦四肢壯熱飲食無味肢體痠疼心忪盜汗肌膚日瘦或寒熱往來當審其所因調補氣血其病自愈矣又曰婦人有瘵骨蒸熱多因經行胎產或飲食起居七情重傷

婦科玉尺 雜病

卷六 六

肝脾之所致又有失于調攝或過于攻伐而成與男子治法稍有不同故方亦專治婦人 薛己曰無熱虛勞有內外真寒有內外真熱有內真熱而外假寒有內真寒而外假熱者若飲食難化大便不寔飲食畏寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真寒之症也宜用附子理中湯以回陽八味丸以壯火若飲食如常大便堅寔胸腹痞脹飲食喜冷手足煩熱面赤嘔吐不

畏風寒此內外真熱之症也宜用黃連解毒湯以消陽六味丸以壯水若飲食如常大便堅寔胸腹痞脹飲食喜寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內真熱而外假寒也亦用解毒湯六味丸若飲食少思大便不寔吞酸噯氣胸腹痞滿手足逆冷面赤嘔吐畏見風寒此內真寒而外假熱也亦用理中湯八味丸當求其屬而治之經曰益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光

使不知真水火之不足。泛以寒熱藥治之。則舊疾未去。新病復生矣。夫所謂屬者。猶主也。謂心腎也。求其屬者。言水火不足而求之于心腎也。火之源者。陽氣之根。即心也。水之主者。陰氣之根。即腎是也。非謂火為心源。為肝。水為腎主。為肺也。又曰。有熱虛勞。乃壯火食氣。虛火煎熬。真陰之所致也。王太僕云。如大寒而甚。熱之不熱。是無火也。熱來復去。晝見夜伏。夜發晝止。是無火也。當治其心。如大熱而甚。寒之不寒。是無水也。熱動復止。倏忽往來。時動時止。是無水也。當助其腎。心盛則生熱。腎盛則生寒。腎虛則寒。動于中心。虛則熱。收于內竊。謂此症。若由肝脾血虛。用四物參朮。肝脾鬱怒。小柴胡合四物。脾胃氣虛。補中益氣湯。肝脾血虛。加味道逍遙散。肝經風熱。加味小柴胡湯。心經血虛。天王補心丹。肺經氣虛。人參補肺湯。肝經血虛。加味四物湯。大抵午前熱屬氣。分用清心蓮子飲。午後熱屬血。分四物加參朮。丹皮熱從左起。肝火也。寔則四物加龍胆山梔。虛則四物加參朮黃芪。熱從臍下起。陰火也。四物加參朮知柏酒拌炒。黑又五味麥冬肉桂。不應急用加減八味丸。不時而熱。或無定處。或從腳心起。此無根虛火也。加減八味丸及十全大補湯加麥冬五味。武之望曰。療骨蒸者。此主肺之病也。夫腎主骨。骨至于蒸。真陰竭矣。陽何以附。曰骨蒸者。由積熱附于骨。而然也。又曰。傳尸。殭屍。復連無辜。皆由脾胃虧損。所致。其形羸瘦。腹脹泄痢。肢體無力。傳于腎。則盜汗不止。腰膝冷痛。夢鬼交侵。小便赤黃。傳于心。則心神忪悸。喜怒不時。頰唇赤色。乍熱乍寒。傳于肺。則肺滿短氣。咳嗽吐痰。皮膚甲錯。傳于腎。則兩目昏暗。腦下妨痛。閉戶忿怒。五臟既病。則難治療。

婦科玉尺 雜病

卷六 七

室女勞瘵。寇宗奭曰。人以氣血為本。人之病。未有先傷氣血者。若室女童男。積想在心。思慮過度。多致勞損。男則神色消散。女則月水先閉。蓋憂愁思慮。則傷心。而血逆竭。神色先散。月水先閉。且心病則不能養脾。故不嗜食。脾虛則金虧。故發嗽。腎水絕。則水氣不榮。而四肢乾痿。故多怒。髮焦。筋骨痠。若五臟傳遍。則死。自能改易。心志。用法。用藥扶持。切不可用青蒿蠱虫等涼血行血之藥。薛已曰。經云。五穀入胃。其精粕精液。宗氣。分為三隊。故宗氣積于胸中。出于喉嚨。以貫心肺。而行呼吸。榮氣者。泌其精液。注之于脈。化為血。以榮四末。內養五臟六腑。若服苦寒之劑。復傷胃氣。必致不起。薛勞症治。薛已曰。產後薛勞。當扶養正氣。為主。六君子湯加當歸。若脾肺氣虛。而咳嗽口乾。補中益氣湯。加麥冬五味。若因中氣虛。而口乾頭暈。補中益氣。加蔓荊子。肝經血虛。而腹體作痛。四物加參朮。肝腎虛弱。而自汗盜汗。寒熱往來。六味丸加五味。脾虛血弱。肚腹作痛。月水不調。八珍湯倍白朮。脾虛血燥。皮膚搔痒。加味道逍遙散。大抵此症。多因脾胃虛弱。飲食減少。以致諸經疲憊。而作虛。補脾胃。飲食。一進。精氣生化。諸臟有所倚。其病自愈。仍參虛損發熱方論。主治。積聚癥瘕症治。薛已曰。婦人食癥。由形氣弱。須先調補脾胃。為主。而佐以消導。若形氣充足。當先疏導。而佐以補脾胃。若氣壅血滯。而不行。宜用烏藥蓬朮肉桂當歸桃仁青皮木香等。為末。每二錢。熱酒調下。名烏藥散。散而行之。如脾氣虛。而血不行。宜用四君子。補而行之。若氣鬱。而血不行。宜用歸脾湯。解而行之。若肝脾血燥。而不行。宜加味道逍遙散。清而行之。大抵食

婦科玉尺 雜病

卷六 七

<p>清心蓮子飲 治心煩發渴 車前子 地骨皮 麥冬 黃芩 茯苓 石蓮肉 各七分半 一方加遠志 菖蒲 各一錢</p>	<p>神仙聚寶丹 治積塊 琥珀另研 當歸各一兩 乳香 沒藥 俱另研 各二錢半 硃砂另研 木香另 研 麝香另研 各一錢 水丸 每兩作十五丸 每服一丸 酒磨溫酒下</p>	<p>扶神湯 治同上 茯苓 人參 菖蒲 各一錢 赤芍 五分 當歸 二兩 蜜丸 酒下</p>	<p>橘歸湯 治血線 橘紅 四兩 當歸 二兩 蜜丸 酒下</p>	<p>滋陰地黃丸 治同上 熟地 四兩 山萸 山藥 天冬 麥冬 生地 知母 貝母 當歸 香附 各二兩 茯苓 丹皮 澤瀉 各兩半 蜜丸</p>	<p>滋血湯 治同上 當歸 白芍 山藥 黃芪 炙 熟地 各錢半 人參 川芎 茯苓 各七分</p>	<p>加味逍遙散 治同上 柴胡 白芍 當歸 白朮 茯苓 枳殼 麥冬 知母 生地 地骨皮 山梔 黃柏 桔梗 各一錢</p>	<p>異香四神散 治同上 香附 四錢 陳皮 烏藥 各二錢 甘草 一錢 美 棗</p>	<p>人參丸 治經閉 黃芩 各半兩 甜葶 葶 歸 大黃 芩 各半兩 甜葶 葶 歸 大黃 芩 各半兩 甜葶 葶 歸 大黃 芩 各半兩</p>	<p>抑氣散 治氣盛于血 香附 四兩 陳皮 茯苓 甘草 各一兩</p>	<p>人參荆芥散 治婦女虛勞 人參 荆芥 生地 柴胡 枳殼 芍藥 各七分</p>	<p>婦科玉尺 雜病</p>
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------

附錄前人效方

益母草丸
治婦人骨蒸勞瘦 月候不通 心神煩熱 四肢疼痛 不能飲食 益母草 青蒿 各二斤 桃枝 各一握 長一尺 先到四味 用童便一斗 煎三升 去渣 熬成膏 再用 桃仁 泥 五兩 赤芍 各一兩 龍甲 二兩 桃仁 泥 五兩 天靈蓋 酥炙 微炒 亦 硃砂 木香 炙草 各二兩 麝香 五錢 用前膏 搗丸 每三十九丸 烏梅 甘草 湯下 不拘時

據中國科學院圖書館藏清
咸豐二年刻本影印原書版框
高一六六毫米寬二四四毫米

竹林寺女科秘傳

咸豐二年仲秋新鐫

竹林寺女科秘傳

板存豫省潁縣對門西張龍文齋刻字舖刷印每本價錢一百文

竹林寺女科秘傳 序

序

是書舊傳為仙授荒誕殆不足信顧如其方試之皆奇驗初惟竹林寺僧人有之秘而不以示人迺辯才蘭亭竟為蕭翼賺去母亦豐城龍劍神物不欲終藏也乎惜其中謬誤過多又第五十六症及八十二症但具標題鈔錄未完云被寺僧驚覺奪去不免猶有遺美然亦足見竊錄者用心為良苦而其得而錄之亦良不易易矣書之鈔本既少得者亦遂什襲藏之以視中郎枕中物不啻也歲甲午春余於友人處偶得是書如獲異寶

序

竭三刻之力亟錄一過繼乃念區區寫本不能如水火至足得給眾人昏暮之求且虞輪轉日久或萎或壞而私之則貽羊挂角終必無跡可尋久思捐貲刊行乃以囊流不果遲之者幾二十年頃 李刺史春帆先生見之深以是書為濟世良方遂慨然為已任分鶴料以付劉剛氏從此廣為散布俾人人各持一卷庶荒郵僻邑家有其書不復慮醫之難投而厥疾之不瘳也將是書之有功於人者良多而 先生之有功於人豈淺鮮哉咸豐二年八月浚儀常茂徠秋厓述於小有補齋

竹林寺女科秘傳計一百一十一

後附七十二

第一症

月經趕前 此症經來時色

青黑或紫黑

小腹俱疼痛面色黃瘦不思飲食乃血虧氣虛先用

黃芩散退其煩熱後用調經丸補其虧損次月即愈

黃芩散

黃芩 陸分 川芎 捌分 當歸 白芍 蒼朮各壹

知母 花粉各柒分 甘草 叁分 水煎服

調經丸

女科秘傳

三稜 莪朮 當歸 白芍 生地

熟地 元胡 白茯苓各壹兩 川芎 大茴香

小茴香 烏藥各捌錢

米糊為丸不拘時酒送下

第二症

月經趕後 此症經來如漏水頭目昏暗小腹作痛

小便時兼白帶喉中臭如魚腥惡心吐逆先服理經

四物湯後用內補當歸丸次月即愈

理經四物湯

當歸 川芎 生地 柴胡 白朮

香附 元胡各壹錢 白芍 黃芩 三稜各捌

水煎臨臥服

內補當歸丸

當歸 續斷 白芷 阿膠 厚朴

茯苓 茯苓 蒲黃 炒黑 黃肉各壹兩 川芎

熟地 各壹兩 製附子 叁錢 乾薑 甘草各伍

煉蜜為丸如桐子大空心酒下八十九丸

第三症

女科秘傳

月經或前或後 此症因脾土太弱不思飲食漸致

血衰經水或先或後不須理血只宜調脾脾土健則

血旺氣勻自然應期而至矣宜服紫金丸

紫金丸

陳皮 伍錢 良薑 莪朮 烏藥各捌錢 枳殼

砂仁 紫葳各陸分 三稜 壹兩

米糊為丸食後米湯送百丸

第四症

血虛發熱 此症因婦人性急或行經時房事觸傷腸

內結塊如雞子大左右兩脇作痛月水不行以致五
心發熱頭昏目暗咳嗽生痰先用逍遙散止其熱次
用紫菀湯止其嗽若遲久不治則成泄瀉百死無生矣
逍遙散

當歸 白朮炒 白芍炒 柴胡各壹錢 花粉八分

黃芩陸分 地骨皮 石蓮肉各壹錢 薄荷肆分 甘草伍分

水煎空心服

紫菀湯

杏仁去皮尖壹錢伍分 阿膠炒研沖服捌分 桑白皮蜜炙壹錢 五味子伍分

女科秘傳

主

知母壹錢 川貝母去心捌分 欬冬花去梗陸分 紫菀 桔梗

蘇子各捌分 水煎臨臥服

第五症

經閉發熱 此症或行經時或產後多食生冷及手

着冷水蓋血見冷則凝滯初起月餘乍寒乍熱五心

煩燥若遲延不治變作骨蒸午後潮熱肌膚憔悴泄

瀉不止百無一生矣如病重者用鴉片三釐甘草湯

服之有救死回生之妙逍遙散紫菀湯亦可用之二

方詳前第四症

第六症

行經氣虛作痛 此症經來一半血尙未盡腹中作
痛內外發熱須用紅花散破其餘血則熱退痛止矣

紅花散

枳壳陸分 紅花 牛膝 當歸 蘇木各壹錢

赤芍 三稜 莪朮各捌分 川芎伍分 水

煎空心服

第七症

經來不止 經來十餘日不止乃妄行也當審此婦

女科秘傳

四

會吃椒薑等一切熱物過度否是為實症須用金狗

散

金狗散

續斷 金毛狗脊炒 地榆 當歸 白芷

黃芩各壹錢 川芎 白芍各捌分 熟地貳錢

水煎空心服

第八症

經來如黃水 此是虛症用藥不可太涼務要煖經

補血用加味四物湯則血盛而愈矣

加味四物湯

當歸 川芎 烏藥 元胡各壹錢 白芍

小茴香各捌分 熟地貳錢

棗三枚 薑三片 水煎空心服

第九症

經來如綠水 此症全無血色乃氣虛太寒不可用涼藥須用烏雞丸服之不但病愈兼能受孕

烏雞丸

天雄附子叁錢 鹿茸 山藥 菴蓉 蒲黃

女科秘傳

炒黑肉桂 當歸 山萸 白芍各壹兩 川芎

壹兩 伍錢

烏雞肉去皮油酒蒸三兩米糊為丸空心黃酒

下一百丸即愈

第十症

經來全白水 此症五心煩熱小腹作痛面色青黃乃氣血虛弱亦用烏雞丸照前服之其效如神方詳

前第九症

第十一症

經來紫黑成塊又如葱白色頭目昏暗兼白帶亦虛症也急用內補當歸丸服之立效詳前第二症

第十二症

經來臭如夏月之腐 此乃血虧之症更兼多食熱物以致身衰體弱新舊之血不接譬如溝渠水涸天

久不雨則臭甚也宜用龍骨丸

龍骨丸

龍骨

海鯨蛸 牡蠣 生地各壹錢 當歸

川芎 白芍 茯苓各捌分 黃芩陸分

女科秘傳

蜜丸空心酒下百丸另服煎藥方開後

當歸 三稜 莪朮 赤芍 丹皮

白朮 香附 條芩 陳皮 木通各捌分

薑一片水煎服

第十三症

經來不止如魚腦腳疼不能走動乃下元虛冷兼風邪所攻宜和血行氣須用疎風止痛散

疎風止痛散

當歸 天麻 僵蠶 烏藥 牛膝

獨活 石南藤 乳香 紫椴花 骨碎補各
錢 川芎 伍分

薑三片葱白三寸水煎成加黃酒一杯空心服

第十四症

經來如牛膜皮 此症經來不止如下膜色一般昏
迷倒地乃血氣變結而成雖危無妨用硃砂丸立效

硃砂丸

硃砂 貳錢 白茯苓 壹兩

水為丸薑湯送五十粒

女科秘傳

七

第十五症

經來下血胞 經來不止或下血胞三四個如雞卵
子大假使絮刀割開內如石榴子狀其婦昏迷不知
人事雖危不妨宜用十全大補湯

十全大補湯

當歸 白朮 各壹錢 川芎 白芍 人參

茯苓 黃芪 生地 各捌分 肉桂 伍分 炙草 伍分

薑三片棗二枚水煎空心服三五劑立效

第十六症

經來小便痛如刀割 此乃血門不開可用八珍散
如不效者用牛膝湯立效

牛膝湯

上牛膝 叁錢 乳香 壹錢

水鍾半煎牛膝一鍾服時磨乳香麝香投入藥

內空心服之即愈如係大症可用硃砂丸詳前

第十四症

第十七症

經來時有筋掣吊陰痛不可忍 此症筋二條從陰

女科秘傳

八

吊起乳亦疼痛身上發熱宜服川棟湯

川棟湯

川棟子 楮苓 澤瀉 白朮 小茴香

大茴香 烏藥 元胡 乳香 各壹錢 木香 伍分

麻黃 陸分 檳榔 捌分

薑三片葱一科水煎服發汗二劑即愈

第十八症

經來未盡潮熱氣痛 此症經來一半忽覺口渴小
腹疼痛因食生冷血滯不行有瘀血在內不可用補

宜用清涼之劑熱退則經盡痛止矣莪朮散宜之

莪朮散

三稜 紅花 牛膝 蘇子 莪朮各壹錢

水煎空心服

第十九症

經來已盡作痛 此症手足麻木及腹內虛冷蓋氣血衰甚也宜服人參四物湯

人參四物湯

人參 歸身 白芍各壹錢 川芎捌分

女科秘傳

薑棗煎服

第二十症

經來小腹結成一塊如皂角一條橫脹痛不可忍不思飲食面色青黃急服元胡散

元胡散

元胡肆錢 髮灰叁錢

共為末酒調下服之半月其塊自消

第二十一症

經來脇氣疼 經來脇內一塊如杯大其血淡黃色

急宜治塊先用四物元胡湯

四物元胡湯

當歸 川芎 白芍 元胡各捌分 熟地壹錢伍分

薑三片酒煎加沉香叁分食後服再用當歸川

芎白芍元胡各四兩沉香叁錢分作四帖酒煎

服或為末用酒送下亦可

第二十二症

經來遍身疼痛 此症乃寒邪入骨或熱或不熱急宜解表須用烏藥順氣湯

女科秘傳

烏藥順氣湯

烏藥 礪蠶 白芷 陳皮 枳殼各捌分

乾薑 甘草各伍分 麻黃去節肆分

薑三片葱一科水煎服發汗即愈

第二十三症

觸經傷寒 經來悞食生冷遍身潮熱痰氣緊滿寒四肢厥冷急服五積散

五積散

厚朴 陳皮 桔梗 白芷 白茯苓

枳壳各捌分 半夏 香附各壹錢 蒼朮 柴胡各肆分

川芎 乾薑各伍分 青皮陸分 當歸 薑錢

薑三片葱一科水煎服

第二十四症

逆經上行 經從口鼻而出此因過食椒薑熱毒之

物其血亂行急服犀角黃連湯

犀角黃連湯

犀角 白芍 丹皮 枳實 生地各貳錢

百草霜 黃芩 橘紅 桔梗各捌分 甘草貳分

女科秘傳

水煎空心服數劑立效

第二十五症

經從口鼻出咳嗽氣緊不住五心煩熱宜推血下行

常用紅花散和血次用冬花散止嗽不須多服別藥

熱去自安

紅花散

紅花 黃芩 蘇木各捌分 花粉陸分

水煎空心服

冬花散

米壳壹錢 桔梗 枳實 蘇子 紫苑

知母 冬花各捌分 桑皮炒 杏仁 石膏各壹錢

水煎服

第二十六症

逐日經來 此症經來日有幾點則止過數日又來

幾點一月三四次面色青黃先用艾膠湯後服紫金

丸即愈

艾膠湯

川芎捌錢 熟地 阿膠炒各壹錢 艾葉叁錢

女科秘傳

薑三片棗一枚水煎空心服紫金丸詳第三症

第二十七症

經來狂言如見鬼神 此症經來或因怒氣觸阻逆

血攻心不知人事狂言鬼語先用麝香散安心定志

後服茯神丸即愈

麝香散

辰砂 麝香 甘草各叁分 木香伍分 人參

桔梗 柴胡 茯苓各捌分 遠志去心壹錢

水煎不拘時服

茯神丸

茯神 遠志 茯苓 硃砂各捌錢

猪心一個棗米糊為丸金器煮湯送下五十九

第二十八症

經來嘔吐不思飲食宜用丁香散

丁香散

丁香 乾薑各伍分 白朮貳錢

共為末每早米湯送下三茶匙

第二十九症

女科秘傳

三

經來飲食後即嘔吐 此症乃痰在胃中阻住水穀

不能入胃宜投烏梅散化去痰涎後用九仙奪命丹

烏梅散 一名烏梅丸

木香 雄黃各叁錢 草果 壹個 乳香 沒藥各貳錢

烏梅肉為丸如彈子大每早含化一丸

九仙奪命丹

草果 壹個 荳蔻 壹個 厚朴 茯苓各貳錢 蒼朮

枳殼 木香 山查 陳皮各壹錢

共為末薑湯下此方不拘婦女經症即男子患

噎膈水穀不下先服烏梅丸後用九仙奪命丹

其效無比

第三十症

經來遍身浮腫 此因脾虛不能尅水變而為腫宜

用木香調胃散

木香調胃散

木香 甘草各叁分 陳皮 紅花各伍分 莪朮

木通 山查 大腹皮各捌分 砂仁 蒼朮各陸分

薑三片水煎空心服

女科秘傳

西

第三十一症

經來泄瀉 經行之時五更泄瀉如乳兒屎此乃腎

胃虛寒不必治脾服三五劑調中湯即愈

調中湯

人參 白朮各捌分 五味子 甘草各叁分 乾薑 伍分

薑三片水煎空心服

第三十二症

經來大小便俱出 此名錯經因食物過多積久而

成須去其熱毒調其陰陽即安宜服分利五苓散

分利五苓散

猪苓 澤瀉 白朮各貳錢 阿膠 川芎

當歸各捌分 赤茯苓 壹錢 水煎空心服

第三十三症

婦人白帶 白槿花煎老酒服之即愈

第三十四症

經來常咳嗽 此病喉中出血乃肺金枯燥急止其嗽再除其根先服茯苓湯後用雞蘇丸

茯苓湯

女科秘傳

茯苓 川芎 蘇葉 前胡 半夏

桔槿 枳實 陳皮 乾薑各捌分 人參伍分

可少 桑皮 陸分 甘草 叁分

薑三片水煎空心服

雞蘇丸

蘿蔔子 伍錢 川貝母 肆兩

蜜丸梧子大空心白滾湯送五十九

第三十五症

經來服大如鼓 此壯月水不行二三月以至七八

月腹大如鼓人以為孕一日崩下血來其血泡有物如蝦蟆子病婦昏迷不知人事體瘦者不治體壯者只服十全大補湯詳前第十五症

第三十六症

經來小便如白蟲 此症經來時血內有白蟲如雞腸色滿腹疼痛推蟲於大便出之則無事矣宜用追蟲丸

追蟲丸

續隨子 枳榔 牽牛 大戟 麝香各

女科秘傳

分甘遂 芫花各壹錢

米糊丸酒下十九再服建中丸神效

建中丸

黃芪 蜜炙 肉桂 甘草各伍錢 白芍 壹兩

共為末白湯下

第三十七症

經來潮熱十日不思飲食 此胃氣不開之故也宜取老鴨頭頂上血調酒飲之立效須用雄鴨

第三十八症

室女經閉 女子月水初行或用冷水洗手足則凝滯不出血海面青黃遍身浮腫作水腫治不效宜用通經丸通其積血其腫自消

通經丸

三稜 莪朮 赤芍 川芎 當歸

紫苑 劉寄奴各捌分 穿山甲 壹片

米糊丸酒送下

第三十九症

血山崩 此症初起時宜用十灰丸若久崩者乃虛

女科秘傳

七

弱故也宜用雞子湯若小腹疼痛再用加味四物湯

十灰丸

阿膠 伍錢 側柏葉 棕櫚 蕪艾各壹錢 綿絹 壹團

苧根 百草霜各壹錢 白茅根 壹根 頭髮 壹團

各燒灰存性為末白湯送下

雞子湯

雞脊內的子慈參科薑壹兩共搗如泥用麻油入鍋內同炒去渣黃酒熱服加味四物湯詳第八症

第四十症

經來吐蛔蟲 此症經來時寒熱往來四肢厥冷大汗吐蟲痰氣喘滿百死無生

第四十一症

胎前惡阻 此症胎前吐逆不思飲食腹中作痛乃胎前氣不和之故宜用和氣散

和氣散

陳皮 桔梗 厚朴 小茴香 益智

藿香各捌分 丁香 甘草各叁分 木香 砂仁各伍分

蒼朮肆分 水煎服一劑即安

女科秘傳

六

第四十二症

胎前潮熱氣痛 此受熱毒之故宜用五苓散

五苓散

赤苓 猪苓 澤瀉 白朮各捌分

水煎服二三劑即愈

第四十三症

胎前寒熱往來是為瘧疾 小腹作痛口燥舌乾乃受熱過多又傷生冷陰陽不和宜用草菓飲

草菓飲

草菓壹個 青皮 柴胡 黃芩各別分 甘草叁分

水煎空心服即安

第四十四症

子在腹頂心不知人事 此過食椒薑雞肉熱毒等物所致或六月蓋綿被受熱而子高至心亂動不安

先用調中和氣散後服勝紅丸

調中和氣散

大黃 石膏各壹錢 檳榔 枳殼 知母各捌分

黃連陸分 柴胡叁分 黃柏伍分 水煎空心服

女科秘傳

勝紅丸

巴豆去壳油十粒 百草霜

米糊丸白湯送下七九子母俱安

第四十五症

胎前氣緊不得卧 此症過食生冷兼有風寒感冒肺金生痰先用紫蘓湯後服安胎散

紫蘓湯

蘓葉 桔梗 枳實 大腹皮 貝母

知母 當歸 桑皮各捌分 五味子 石膏

甘草各叁分 水煎服

安胎散

阿膠 茯苓 當歸 人參 生地各壹錢

小茴香 大茴香各捌分 川芎 甘草各伍分

水煎空心服

第四十六症

胎前咳嗽 此因多食生冷又食椒薑所傷胎熱火勝方作此疾用五虎湯立效

五虎湯

女科秘傳

杏仁 石膏 枳實各壹錢 蘇子 陳皮

知母 桔梗各捌分 麻黃肆分 甘草叁分

水煎溫服即安咳嗽即止

第四十七症

胎前衄血常從口鼻中來 此是傷熱血熱亂行冲傷胞絡宜用涼胎之藥不可用四物湯宜用衄血立效散

衄血立效散

丹皮 黃芩

白芍 側柏葉各捌分

米糊丸白湯下

第四十八症

胎前瀉痢 此食椒薑雞肉等物入脾大腸火燥變而成痢也初起三日用甘連湯立效如瀉久孕婦形瘦精神短少者子母兩亡不能治也

甘連湯

甘草 伍分 川連 貳錢 乾薑 壹錢

水煎服

第四十九症

胎前漏血 有孕紅來如經行應期一至此是胎漏

女科秘傳

主

宜用小烏金丸其效如神

小烏金丸

海金砂 叁錢 姜蠶

側柏葉 小茴香

百草霜

川芎 各伍錢 蒼朮 肆錢 防風

當歸 各捌錢

錢 厚朴 陸錢

棗米糊為丸白湯送下一百丸

第五十症

胎前白帶 此乃胎氣虛弱先用扁豆花微炒沖酒服之後用閉白丸

閉白丸

龍骨 海鱗硝 牡蠣 赤石脂 各伍錢

米糊丸酒下百丸

第五十一症

胎前赤帶 漏紅如猪血日夜不止精神短少急用側柏葉丸即止

側柏葉丸

側柏葉 黃芩 各肆兩

煉蜜為丸白滾湯下百丸

第五十二症

女科秘傳

主

胎前氣緊咳嗽 凡氣緊動紅久嗽不止其紅每月應期而來日午心熱氣緊人皆作癆治之不效先用逍遙散退熱後用紫苑湯止嗽二方詳前第四症

第五十三症

胎前動紅 此因飲食損傷惡血破來如水不止急用艾膠湯止血再用安胎散固胎體壯者三五劑即愈弱者不治

艾膠湯

川芎 捌分 熟地 阿膠 各壹錢 炒

艾葉貳錢 藜叁分

水煎空心服

安胎散詳前第四十五症

第五十四症

胎前小便不通 此症名為轉脾急用車前八珍散如不效再服八味丸即效

車前八珍散

車前壹錢 白朮土炒 白茯苓 當歸 川芎各錢 人參 白芍各壹錢 炙甘草 捌分 熟地壹錢

水煎服

女科秘傳

毒

八味丸

附子 山萸 丹皮 澤瀉各捌分 山藥壹錢 茯苓叁錢 肉桂伍分 甘草叁分

米湯為丸亦可接八味內少熟地

第五十五症

胎前小產 懷孕未足而生皆曰小產若不調治恐再孕復然須服益母丸方保無碍

益母丸

益母草 當歸各肆兩

煉蜜為丸空心白溫下

第五十六症

抄錄未完

第五十七症

胎前怔忡 心常恍惚遍身發熱乃血氣虛弱時受胎之故也宜用硃砂湯服之神效

硃砂湯

不落水猪心一個水煎湯一鍾研硃砂一錢調服

第五十八症

胎前服脹 此因氣血虛弱切忌通利之藥以致傷

女科秘傳

毒

胎宜用大腹湯

大腹湯

大腹皮 五加皮 青皮 薑皮 陳皮各壹錢

水煎服

第五十九症

胎前遍體酸困 此症面色黃瘦不能飲食精神疲倦形容憔悴因血少不勝難養胎元宜用四物湯立

效

四物湯

當歸

川芎各壹錢 熟地貳錢 白芍捌分

水煎服

第六十症

胎前陰門腫 此乃胎不運動而致宜用順氣散即

愈

順氣散

訶子壹個

水煎溫服

第六十一症

胎前下血動胎 婦人壯者三五日內急以安胎散

女科秘傳

妻

救之若形瘦而冷汗面色如灰四肢無力乃積久之

病神色已去不必治矣安胎散詳前第四十五症

第六十二症

胎前脚疼 此乃血氣虛弱下元更虛又兼風邪宜

用止血行氣之劑須用烏梅順氣散詳前第二十二

症

第六十三症

胎前中風 牙關緊閉痰氣壅盛不知人事此症因

食生冷兼坐風中而致先用黃蠟膏後服排風散

黃蠟膏

枯礬 黃蠟 麻黃

各等分爲末共鎔化擦牙

排風散

麻黃肆兩 白朮 防風 甘草 川芎

當歸 茯苓 白鮮皮 獨活各捌分

薑三片棗二枚水煎服

第六十四症

胎前癱瘓 此症手足不能動乃胃腕有痰凝住血

女科秘傳

妻

氣而致宜用烏藥順氣散詳前第二十二症

第六十五症

胎前腰疼 此乃血去廢胎不能養腎腎水不足所

致用猪腎丸神效

猪腎丸

猪腰貳個 青鹽肆錢

入腰子內蒸熟焙乾爲末蜜丸空心酒服

第六十六症

胎前頭疼 此乃寒邪入腦陽氣衰也宜用芎芷湯

三劑即愈

芎芷湯

川芎 菊花 白芷 石膏 白芍

藥本 茯苓各劑五分 甘草五分

蓋三片煎服如不止加細辛原有頭疾病不能

速效

第六十七症

胎前泄瀉 此症隨因時治之再宜藥料酌量宜

服平胃散夏秋冬可類推矣

女科秘傳

平胃散

茯苓 炙甘草 山藥 廣皮各等分

夏宜服六和湯秋宜服香薷氣湯冬宜服理

中湯

第六十八症

胎前心疼不可忍 此是胎氣不順宜用順氣散即

能止疼

順氣散

草菓壹個 元胡捌分 五靈脂壹錢 沒藥捌分

酒煎半飢時服

第六十九症

胎前忽然倒地 此孕婦精神短少承胎不住以致

目花眼昏一時倒地不須服藥只飲食補之可也

第七十症

胎前大便虛急 此症蓋脾土燥大腸澀只宜理脾

通大腸不可用稍黃下之宜服枳實湯即效

枳實湯

枳實貳兩 水二鍾煎七分不拘時服

女科秘傳

第七十一症

胎前遍體癢癢成風痺 此症有風不可服藥只用

樟腦酒洗之

第七十二症

胎前陰戶甚癢 此受孕後房事不節陽精留蓄因

而作癢用川椒白芷湯洗服即止

川椒白芷湯

川椒壹兩 白芷壹兩 水煎服渣再煎洗之

第七十三症

胎前乳腫 此症兩乳腫疼作寒作熱名曰內吹用皂角一條燒灰存性黃酒送下立消不再發矣

第七十四症

胎前喉疼 此乃寒攻下喉胃有痰涎宜去寒化痰為先用升麻桔梗湯二三劑即安

升麻桔梗湯

升麻 桔梗 甘草各捌分 防風 元參各壹分

水煎服

第七十五症

女科秘傳

无

胎前消渴 此乃血少三焦火熾而然宜用生四物湯加生地川黃柏或六味丸自愈

第七十六症

胎前耳鳴 此乃腎虛宜用猪腎丸詳前第六十五症

第七十七症

胎前不降生 臨產水乾孩子不下可用益母散生其水水至胎下若閉不生者死

益母散

麝香壹分 白芷 滑石各壹錢 肉桂捌分 益母草壹錢

水煎服

第七十八症

秘傳難產奇方 用高牆上蛇蛻一條要頭向下者佳瓦上焙乾為末壹錢加麝香叁分乳調為膏貼臍上即產速去切不可久貼

第七十九症

胎衣不下 此症多因身弱血少水乾而然宜用川歸湯衣在胸膈者難治在小腹者用破靈丹即愈若婦

女科秘傳

三

人面色青黃口舌黑指甲青此子已死腹中當用朝爛散打下死胎急救其母若面色青黃指甲紅色其子猶生不可輕用

川歸湯

川芎貳錢 當歸壹錢 益母草貳錢

取汁和老酒煎服立下

破靈丹

紅花壹兩 蘇木伍錢 黃酒煎服

朝爛散

當歸伍錢 川芎肆錢 益母草陸錢 朴硝叁錢

水煎服

第八十症

產后血氣痛 此乃餘血不盡腹中作痛遍身發熱 惡滿在腹當去其血熱自退矣宜用紅花散詳前第

六症

第八十一症

產后惡露已盡腹仍作痛 此乃腹中虛痛若有潮 亦是虛潮宜用四物湯加烏藥小荷乳香沒藥五靈

女科秘傳

脂

三

第八十二症

產后惡寒發熱 此乃內傷外感之症此方因寺僧 驚覺奪去抄錄未全 此方用當歸黑芥穗 卽效且可隨時加減

第八十三症

產后咳嗽 此乃產后傷風變爲咳嗽宜用小青龍

丹卽愈

小青龍丹

甘草

乾薑各伍分 五味子叁分 杏仁錢伍分

半夏壹錢

薑三片水煎服

第八十四症

產后子宮突出 用鯉魚燒灰存性調清油擦之卽 愈

第八十五症

產后痕痕突出 先用連翹散後用黃蠟膏立效

連翹散

連翹

炙黃芪

花粉

防風

梔子各壹

錢甘草伍分

水煎服

女科秘傳

三

黃蠟膏詳前第六十三症

第八十六症

產后一月惡露重來不止昏迷倒地不知人事 此 乃生產一月夫婦交媾搖動骨節以致血崩急用金 狗散立效詳前第七症

第八十七症

產后氣急成泄瀉氣緊不止煩熱口渴 此乃內虛 外熱必死之症

第八十八症

外熱必死之症

產后舌黑如塵口乾絕無津液 此乃腎敗必死之症

第八十九症

產后譫語又水瀉 此乃惡血攻心上盛下虛必死之症

第九十症

產后弓陰 產后臍腫俱在調經門第十七症

第九十一症

產后脾腫 詳前第三十症

女科秘傳

第九十二症

難產丹方 用雄老鼠腎一對加麝香三分搗爛分作三丸上好硃砂為衣白湯送下一丸男左女右手
中捻出若死胎頭上頂出也屢試屢驗此丹清水洗淨倘用一次

第九十三症

產后血氣痛 益母草 壹兩 全當歸 伍錢 紅糖

水煎服凡產后服一劑永保無虞

第九十四症

難產方 伏龍肝 伍錢 削錫膽下之土塊用酒冲服

其胎立下不能飲酒以白滾水送之

第九十五症

難產及子死腹中 此方名龍虎散

龍虎散

敗龜板 壹個醋炙 蛇退 貳條頭尾俱全 蟬退 十八個

全新瓦 婦人亂髮 壹團皂角水洗 滑石 貳錢水 煅乾 去油火煨存性 飛過

共研細末磁罐收貯用黃蠟封固每服貳錢老

酒送下不飲酒者白滾湯送下立產用益母草

女科秘傳

煎湯更佳

第九十六症

產后百病仙方

熟地 肆錢 白芍 錢半 白朮 壹錢 白茯苓 半錢 麥冬 貳錢

去心杜仲 貳錢 續斷 錢半 益母草 捌分 牛膝 貳錢 薑灰

陸分 蓮子 拾粒 燈心壹團水煎服

第九十七症

難產或橫生或血海乾涸以致死孩不下急用皮硝

貳錢產婦壯者用叁錢如寒天加附子三五分用好

酒半鍾童便半鍾入硝煎一二沸溫服立下百發百

中

又方 歸尾 貳錢 苦參 貳錢 百草霜 錢半 牛膝 貳錢

細磁屑 叁分 水一鍾煎半鍾熱服亦可

第九十八症

產后惡露不盡或胎衣不下腹中血塊凝滯作痛急

用錦文大黃壹兩為末好錯三斤同熬成膏丸梧子

大每服五丸溫醋送下

第九十九症

女科秘傳

產后三日牙關緊閉二目直視四肢厥冷急用乾薑

伍錢炒黑水煎入童便溫服立效

第一百症

產后乳汁不通宜服湧泉湯即通

湧泉湯

當歸 捌錢 川芎 貳錢 木通 叁錢 通草 貳錢 穿山甲 錢

炒王不留行 壹兩 炒麥冬 去心 五花龍骨

瞿麥 穗各壹錢

共為細末每服壹錢熱黃酒調下再用猪前蹄

一二隻煮熟湯飲之並猪蹄亦可食之不宜用鹽

第一百一症

產后心悶不知人事 羚羊角燒灰以東流水調服

一匙即安

第一百二症

產后陰門腫痛 蛇麻子 貳兩 水煎煖洗腫消痛止

第一百三症

產后陰門痛極不可忍 桃花泡 去皮 炙極焦存性

研末塗之痛立止

女科秘傳

第一百四症

產后陰門癢極不可忍 花椒 食鹽 伍錢 生白礬

壹錢 共研末糝上癢即止

第一百五症

產后血枯陰門生瘡癢不可忍 雄猪肝 壹兩 白水煮

熟照陰門之大小濶狹切片糝杏仁末 壹分 花椒末

壹分 白礬末 壹分 用綿線一條串入猪肝內按入陰

戶過一宿其蟲死其瘡即愈

第一百六症

座后大便不通氣急坐臥不安 麥牙為末酒一鍾調服即通

第一百七症

座后大小便不通 急用熟地壹兩水煎服立通或

飲牛乳二三日亦通

第一百八症

座后口渴 蓮子心研末滾水調服貳錢即解

第一百九症

座后兒枕痛 乃惡血凝滯之故用山查壹錢煎湯

女科秘傳

入黑糖伍錢服之痛立止

第一百十症

婦人血崩方

熟地伍錢當歸壹錢白芍 阿膠蛤粉炒地榆各貳

荆芥穗壹錢川芎伍分

水一碗煎七分空心服

第一百十一症

座后血暈不省人事眼黑耳鳴口吐涎沫手足痠癢

當歸叁錢川芎貳錢荆芥穗壹錢水煎加童便一

茶鍾不拘時溫服即安

以前一百一十一症

以后七十二方

計開七十二方

保胎無憂散

兔絲子錢半川貝母錢半當歸錢半川芎貳錢白芍

冬日壹錢伍分陳荆芥穗 嫩黃芪各捌分紫厚朴

夏日壹錢貳分甘草 蕪艾葉柒分羌活伍分

生薑三片水煎服

女科秘傳

右方專治素有難產之患如懷孕至八月服一劑九月

再服一劑臨月先期又服二三劑令產時不疼不痛

易于生育如遇難產者照前藥煎服即下 又臨產

時令產婦口念語敬忘遺四字易生無死

本寂禪師催生方歌

四兩麻油一兩糖即鹽銀器煎湯產婦嘗如無銀器

用磁器入銀五錢煎便良更加一盃酒在內免碍子

母見閻王

難產方

酒釀 麻油 蜂蜜 童便各壹

和勻温服即生

橫生逆產方

知母

真茅山蒼朮

橫切生薑

順切不效 各貳錢伍分

俱要秤準白水煎服難產者服之快生逆者服

之順下其效如神

死胎不下方

猪板油

蜜酒

煎一碗熱服即下亦治胞衣不下

女科秘傳

彙

產后閉目不語方

生白礬爲末每服貳錢滾水和服

產后血氣痛方

取端午所收白蘿蔔煎湯和紅花熱服

產后大小便不通

服牛乳一日稍通三日即愈人乳尤妙

產后血塊疼痛精神恍惚方

大黃

參兩 晒乾

血竭

伍錢

桃仁

紅朮

各伍錢

酒糊爲丸辰砂爲衣空心下七十九

乳脹不回方

神麴

炒焦黃色

研細末酒服貳錢極效

調經丸

專治月水遲早不調臨經骨痛腰痛經後白

淋人弱無力服一二月即愈兼可受孕

大熟地

人乳九蒸九晒 如泥酒洗陸兩

白茯苓

人乳浸透 晒乾參兩

全當歸

切片

白川芎

酒洗切 片貳兩

四製香附

鹽水童便薑汁 老酒炒肆兩

魁白

參兩

芍

參兩

延胡索

貳兩

破故紙

鹽水炒 貳兩

陳莢肉

去支淨 參兩

川斷續肉

去支淨 參兩

嫩黃芪

蜜炙 貳兩

杜仲

鹽水炒 參兩

巨勝子

鹽水炒 貳兩

川斷續肉

去支淨 參兩

去支淨

焦於朮

土炒 貳兩

炮薑

炒成炭 伍錢

核桃肉

去油 肆兩

女科秘傳

單

共爲細末白蜜爲丸如桐子大每早用淡鹽湯

服參錢或伍錢如小肚覺冷且疼痛加小茴香

炒焦壹兩

調經湯藥方 專治行經肚痛腰痛經水遲早不調將

行經之時可服四劑

大生地

切片酒 炒伍錢

白歸身

參錢

川芎

壹錢 伍分

粉丹皮

貳錢

蘇丹參

參錢

製香附

參錢

元胡

貳錢

杜仲

鹽水炒 參錢

破故紙

鹽水炒 參錢

澤蘭葉

壹錢 伍分

赤芍

參錢

炮薑

伍分

荷葉壹錢爲引服藥用核桃肉過

安胎散、專治受孕三四月見紅漏胎及肚痛腰痛白
淋白帶人倦胃口不開惡心飽悶

大熟地人乳持九 大生地酒洗切 焦於土炒 白茯苓

神人乳浸晒 杜仲參兩 鹽水炒 川斷肉去芦 懷山參兩 藥

蓮鬚貳兩 炒梔子參兩 魁白芍參兩 嫩黃芪參兩 蜜炙

麥冬去心 亮砂仁炒帶壳研末 元參去芦 黃芩參兩

阿膠蛤粉炒成珠 淨棗仁炒焦 參兩

共為末白蜜為丸如桐子大每早晚用開水送
下參錢至伍錢為準

女科秘傳

聖

安胎煎藥方 此方一受孕可服每月服五劑永無小

產之患

大生地陸錢 焦于九 或錢條參 懷山參錢

杜仲炒參錢 川斷貳錢 蓮鬚參錢 梔子參錢 魁白芍參錢

嫩黃芪參錢 白茯苓參錢

引加藕節參枚用核桃肉過如受孕三四月內
內然心煩肚痛去炒梔子加真川連五分另煎
投服

順胎散 專治有孕足月恐有難產可先服二回則臨

產最易

大生地伍錢 赤芍參錢 香附參錢 元胡貳錢 丹參參錢

當歸參錢 川芎錢半 木通錢半 滑石貳錢 飛淨

引加芝蔴參錢 如若難產交骨不開可加覆盆

子參錢 皮硝壹錢 敗龜板壹個 服之即下若無

敗龜板藥舖內製板亦可

安胎四製香附散

香附末不拘多少初製以童便浸一日一夜連童便

傾入銅鍋內炒乾二製用濃鹽湯浸一日一夜連湯

女科秘傳

聖

入銅鍋內炒乾三製用薑汁浸一日一夜連汁入銅

鍋內炒乾四製用陳老酒浸一日一夜連酒入銅鍋

內炒乾存性以銅器研成細末收貯勿使泄氣如遇

胎動用紫蘇湯送藥參錢即安

胎動下血方

病痛搶心者用葱白煎濃汁飲之其胎未死即安已

死即出未效再服

漏胎下血方

用白茅草根洗淨煎濃汁服下即止

婦人血崩方

荆芥穗 小茴香

各等分新瓦焙黃為末每服叁錢溫黃酒下不

論遠近三服即愈

又方用多年屋上陳稻草壹把切斷鍋內炒燥用生

酒燒滾渣去服酒以汗出為度即止如初起時用割

人騰擣汁一杯和酒即愈

又方

當歸壹兩川芎壹兩升麻伍錢

水煎服

女科秘傳

調經方

男子以精固為安女人以經調為健女子自生日起

至五千四十八日而天癸至由是身中血脉周流如

地之水脉浸潤乃一月一經外應潮侯亦名月汛婦

人女子經脉不行多有脾胃損傷而經止者不可便

作經閉輕用破血之劑須察其脾胃或飲食損傷中

氣以致血少不行只宜理脾用白朮為君佐以黃芪廿

草芍橘歸並麥芽等藥以茯苓為臣使脾旺自然生

血而經行矣如脾胃無病果有血塊方宜行血女人

鬱氣最多其治女人諸病以烏藥稱神又香附乃開

鬱之聖劑故古人單開醋附丸調理女人極效如胎

前產後則益母草最佳安胎以砂仁極效大抵調理

女人以四物二陳兩方加減為主

回生丹 治產後諸病神效無比

錦文大黃壹斤為細末蘇木叁兩持碎河水五碗煎叁碗取汁紅花叁兩炒黃

色入好酒壹斤煎黑豆叁斤煮汁叁碗三五沸取汁用 黑豆叁斤煮汁叁碗

先將大黃末用好酒醋三四碗攪勻以文武火

熬膏如此三遍次下紅花汁蘇木湯黑豆汁攪

女科秘傳

勺入大黃膏內又熬成膏如有錫煨焙乾入後

藥內

當歸 川芎 熟地 白茯苓 蒼朮米泔

木浸 香附 烏藥 元胡 桃仁另研川牛

膝 蒲黃以上各壹兩白芍 酒炒 甘草 陳皮

木香 三稜 五靈脂 羌活各伍錢山萸肉

伍錢 人參 白朮 青皮 木瓜各伍錢良薑

肆錢 乳香去油沒藥去油各

共為細末以大黃膏丸如彈子大凡遇產後十

八症每用一丸以酒燉化熱服若產後頭痛身熱無汗謂之傷寒加麻黃末炙川山甲末黃連末各參分同入酒內燉服乳頭揉十餘下乳自湧泉而下此藥治娠婦勞後胎動或胎漏惡露時下臟腑虛寒久不成胎痿燥不長過期不產日月雖滿動作無力或致損墮或產時未至惡露先下胞絡枯燥致令難產或煩燥閉亂連日不產子死腹中身上未冷口唇青黃黑多出冷汗惡露上攻昏迷不醒喘促汗出及瘀血未盡

女科秘傳

聖

臍冷腹疼寒熱往來或因產勞虛損身羸面黃體瘦心怯盜汗飲食不進漸成痲疾每日常服補氣養胎臨產滋陰妙難盡述

婦人白帶方

紅棗 黑豆 白菓

三樣煮食每日空心任食十餘日即愈

婦人白帶男人白濁神方

硫黃不拘多少用豆腐一大塊中挖一孔將硫黃打成羅漢豆大填入腐內上仍蓋豆腐或砂鍋或銅鍋

煮豆腐絕無硫黃氣味方好去腐硫黃聽用南白芍不拘多少用濕紙包煨以上二味各研細末等分麵糊為丸如黃豆大前五日每日服伍錢后五日每日服壹錢清晨淡酒或好黃酒亦可服十日永不再發神效無比

中生瘡方

鱈魚胆塗之立效

蟲食陰戶方

輕則癢重則痛用蛇床子白礬煎湯淋洗即愈

女科秘傳

吳

陰腫痛方

葱白麝香搗和貼腫處乾菊花煎湯薰洗

婦人陰寒無子方

吳茱萸 川椒各壹升

為末煉蜜丸如彈子大綿裹納陰中一日兩換

使子宮開即受胎矣

治女子乾血癆唇紅腮白似桃花色骨瘦如柴啄木蟲壹個瓦焙存性為末上好酒每勺五分不過十日即愈

婦人乾血癆方

扁蓄貳錢 地黃錢半 胡椒壹錢 巴豆伍分 去油右四味搗

碎新綿貳層包緊札做壹團如棗子樣用新線叁根

捻成索子拴牢在藥包這頭拴在腰帶上令老婦人

將藥包入病人陰戶內三寸許病淺者臭穢出盡見

鮮血下即愈病深者五七日即下切忌房事足一百

日並猪肉蕎麥麵其下來之藥用水攪淨乾火炙存

性插末凡番胃隔者熱火酒調服即愈

幼科

女科秘傳

罕

小兒諸病對症發藥歌

幼小醫家另設科一時要用不知何驚風發熱兼痰

嗽保命丹投不必多未出痘花神異治驚連急慢紫

金磨腹痛吐瀉宜助胃唇口生瘡化毒和發熱變蒸

惺惺散風痰潮熱抱龍托諸疳蘆薈皆通用嘔吐燒

針丸對科痢疾木香清隔飲癆風匝口竭稍托散名

保命攻驚口即雪夜啼猪乳四君和

視嬰兒脉理歌

三五嬰孩脉未全只憑虎口指頭開原分左右現男

女寅卯關邊仔細看脉現寅關紋細短輕火易治不

為難寅關脉起連通卯病勢根深莫小看若透三關

辰位上縱是盧扁難萬全

育兒歌

養子須調護看承莫縱馳乳多終損胃食壅即傷脾

厚暖非為益衣單正所宜無風頻見日寒暑順天時

又云若要小兒安常帶三分飢與寒

保命丹 治小兒一切驚風發熱痰嗽

天麻錢半 防風 粉草 姜蠶炒去 白附子

女科秘傳

罕

硃砂 鬱金各壹錢 麝香少許 全蝎壹錢去 薄荷

青黛 南星

右為末煉蜜為丸如皂子大每服壹丸金銀燈

心湯送下

抱龍丸 治小兒痰嗽驚風時作寒熱

牛胆南星壹兩 天竺黃伍錢 雄黃 辰硃各貳錢

香附壹錢另研

右為末煉蜜丸如芡實大薄荷湯送下

惺惺散 治發熱發熱咳嗽痰湧鼻塞聲重

人參 白朮 甘草 桔梗 白茯苓

天花粉 白芍藥 細辛根各等

水壺鍾煎肆分服

蘆薈丸 治小兒脾胃積潮成疳疾

黃連 去鬚 龍胆草 蕪夷

蘆薈 去皮先炒黃色再與上二味同炒

右為末飯飲丸如黍米大小加減空心米湯下

大蘆薈丸 治小兒諸疳疾神效

蘆薈 蕪夷 木香 青黛 川黃連

女科秘傳 芎 芩

蟬退 未個 板柶各等 麝香 少許 胡黃連

右為末以雄黃猪胆汁浸作糊丸如麻子大每

服三二十九丸米湯送下

燒針丸 治小兒胸膈吐逆下注瀉不止者

黃丹 硃砂 枯礬 各等分

右為末以棗肉丸如豆大每服三四丸鐵針尖

上就清油燈焰上燒過研碎涼米泔水調服下

瀉者台前服

木香清腸飲 治小兒赤白痢

木香 人參 甘草 厚朴 陳皮

茯苓 杏仁 雞蘇 宿砂 麥冬

薑二片棗一枚煎服

蓮肉 白朮 茯苓 山藥 神麩

山查 人參 猪苓 澤瀉 藿香

木香 當歸 白芍藥 砂仁 肉蔻

陳皮 甘草 各等分

右為末任意多寡薑湯調服驚風復加辰砂滑

石各貳錢

女科秘傳 辛

保命散 治小兒雪口白屑滿口如鷺之白者心脾熱

也用髮纏指頭蘸薄荷自然汁或騰雪水拭淨

枯凡 硃砂 各伍分 馬牙硝 貳錢伍分

右為末每一次取白鷺糞搗水調塗舌上頰頰

內立效

蝎稍散 治一切胎風及百日內匝口臍風

全蝎 稍 肆拾玖個每個用薄荷捲定以棉

片腦 少許 麝香 少許

右為末用雄鷄肝貳片煎湯調服即止又法於

七月內患此者急看兒齒齲之上有小泡如果
子狀急以染青布裹手指蘸溫水輕輕擦破即
開口安妥不必用藥

指乳膏 治小兒半夜驚啼掣肘乃胎中受驚所致急
宜用此

琥珀 防風各壹硃砂伍分

右為末用指乳汁調一次抹兒口中極驗

四君子湯 治小兒下半夜驚啼不止乃腰曲內拘手

足抽掣皆虛寒所致也

女科秘傳

垂

人參 白朮 茯苓 山藥 扁豆 各壹分

右為末每挑少許於乳頭上令兒吮之如血熱

焦啼用當歸為末乳汁調一次抹乳與吮亦效

凡小兒生下不能啼者因難產冒寒所致急以棉

絮裹抱懷中未可遽斷臍帶且將胞衣置火灰

中煨之仍點大油紙粘於帶往來過燎使火氣

由帶而入臍內更以熱湯洗臍帶須臾氣回

啼哭如常方可浴洗然後割臍帶則易養無虞

也

又小兒初生穀道無孔者乃肺熱閉於肛門急用
金銀玉簪看其端的刺穿或用火針亦可然刺
不可深仍以油紙粘條套住如蜜導法內服四
順湯清涼飲免其再合

急救良方

治夢中魘歌

夢中魘死如何救原若無燈勿點燈急以竹筒吹
兩耳鹽湯灌鼻救如神或吹鼻內通關散或滴其
中韭汁靈兼治猝然來中惡即時起死待回生

女科秘傳

垂

救涼舍鬼迷歌

官房涼舍久無人偶睡其中被鬼侵口不能言
聲吃吃若無良藥便沉沉牛黃末子雄黃末再
入硃砂各伍分一半必煨牀榻下酒調一半灌
之靈

治跌傷瘀血冲心垂絕歌

瘀血冲心墜下時淹淹欲絕氣難支豆豉急取
濃煎服續命靈丹急得知或遇咬牙無氣息急
遺小便灌之宜人能記得仙方去到處施仁賽

國醫

治絞腸痧急痛歌

絞腸痧痛是何如手足如冰陰症虛定有遍身紅
點發燈心點火燎之除若然手足仍溫暖此是陽
沙另法祛十指甲邊針刺遍將將兩臂血漣汝

解諸般菌毒歌

諸般菌毒每傷人其哉令人笑不禁必是此蟲踏
踞處蒸薰毒氣結成根急將淨沙開深坎直見黃
泥抱水傾攪潤澄清吞一碗應知到口便安寧不

女科秘傳

垂

然更得芫花末水下錢方效益靈

解魚骨鯁喉歌

喉中骨鯁有方傳甘草砂仁共分研為末裏福含
咽久骨隨痰出便安然或將金鳳根和子咀嚼嚼
之骨是綿稍愈即將湯漱口慮其傷損牙齒根又
或將硼砂一兩和水噙化更如仙

紫金錠 治小兒驚風神效

人參 茯苓 茯神 辰砂 山藥

乳香 白朮各壹錢 金箔拾肆片另

上為末以糕壹兩為丸薄荷湯磨用
神異丹 治未出痘疹小兒一切驚風發熱痰嗽等
症

全蝎去尾 薄荷 天麻 防風 乾葛

姜蠶炒去絲 半夏姜汁炒 南星姜汁炒 荆芥穗

升麻 芍藥 甘草 川芎

右各等分為末煉蜜丸如皂角子大每付壹丸
白滾水送下

助胃丹 治小兒吐瀉腹痛

女科秘傳

垂

猪苓 澤瀉 茯苓 肉桂 白朮各

錢以上即 蒼朮 陳皮 厚朴 甘草各

錢以上平 肉豆蔻貳錢
胃散再加

右為末煉蜜為丸如芡實大米湯化下壹錢

五福化毒丹 治小兒唇口腫破生瘡

元參焙 桔梗 茯苓各貳兩 人參伍錢 青黛

牙硝各壹兩 甘草柒分 麝香錢半 金銀箔各肆拾片
為衣

右為末煉蜜丸如皂角子大用薄荷湯化下口

臭以生地黃調下

治小兒急漫驚風

硃砂伍厘研末 沒藥貳厘研末 烏梅連核燒灰存性研末叁厘

右三味共合成一分刺大人指血一點為丸

孩子口中用滾水澀下立愈 藥料每樣用小

瓶收貯臨用方合

治走馬牙疳

胡黃連 冰片 枯礬

各等分為末泔水洗淨搽上立效

治大人小兒耳膿水

女科秘傳

海螵蛸壹錢燒存性 枯礬壹錢 麝香少許 乾胭脂伍分

共為末吹入耳內即愈

治喉風舌大如脖即時不救必死

冰片壹分 火硝 胆礬 蜈蚣各貳分 姜糖伍分

硼砂叁分

共為末吹入口中即愈

舌腫神方

用皂礬不拘多少以新瓦火煨紅色地上放冷研

細搗上其舌即消

洗眼復明神方

桑白皮壹兩燒炭存性

水一鍾煎至八分去渣洗眼至一年勝如童子

此方神效無比宜廣傳與人

廊氣痛方

紫參伍錢 當歸 桂皮 木瓜 茵陳

桂花 燈草 牛膝 防風 荊芥

升麻 五加皮 甘草各壹錢

右藥用燒酒二斤水煮一個時辰埋土內七日

女科秘傳

每日空心服

腳氣衝心神效方

白礬叁兩煎水浸洗兩足良久即愈

治疥瘡膿瘻

雄黃 花椒 皂角末 黃瓜藤

五倍子 食松油 真菜油

右藥各等分研極細末抹瘡上三四次全愈

八厘散 治跌打損傷瘀血攻心將死之症灌藥即

醒

土龍去足貳個 生半夏 壹錢 乳香去油 沒藥去油

自然銅煨壹 血竭 歸尾 硼砂各壹

骨碎補焙去毛

右藥共研細末磁罐收貯每服八厘用好酒送

下

打傷將死神方 又治痛風如神

用白頭蚯蚓去泥洗淨焙乾為末每服貳錢薑葱

湯調服發汗即愈

白丸方 治一切胃痛 中暑 霍亂 吐瀉

女科秘傳

毛

絞腸沙 腹痛 紅白痢疾 中溫卒然昏昧

大鹽用砂鍋文武火炒胡椒揀去批小者 透明白

礬放小砂鍋內入大火中飛透

砂仁去壳淨用仁微炒秤准貳兩

右四味共為細末用蕎麥麵打糊為丸如桐子

大每服十叁丸或玖丸小兒量減減之用薑湯

送下如在途中用小便送下亦可忌生冷等物

為要

藥酒方

公丁香 肉菓 白豆蔻去壳 高良薑

薄荷各伍 紅麴貳兩 白糖半斤

原封燒酒十五斤用鍋隔水點火用活柳枝頻攪

火高半尺為度裝入瓶內隨時可飲

治痢奇妙方

痢為險惡之症生死所關不惟醫治者之多失宜

而古今治法亦多不得其道是以不能速效今立

方何以為奇不泥成法故奇也立論何以為妙不

謬成說故妙也然其藥品又不外乎常用而已有

女科秘傳

美

識者切不可更張遵而行之無不效驗也

痢疾初起煎方

川黃連去芦 條黃芩壹錢 白芍壹錢 陳枳完 枳殼去穢

山查肉壹錢 紫厚朴去皮薑汁 厚青皮去穢 枳榔

測分當歸 酒洗地榆伍分 紅花叁分 桃仁壹錢 研如泥

木香貳分 甘草伍分

右咀片如法炮製水貳碗煎壹碗空心服渣再

煎服此方或紅或白裡急后重身熱腹痛者俱

可服如單白者去地榆枳仁加枳殼紅蘇木香叁分

如滯澁甚者加大黃貳錢用酒拌炒服一二劑
仍除之若一劑滯已去者不必又用二劑矣大
黃于年勿衰弱之人又不可拘用貳錢也

右方用之三五日內神效旬日內亦效惟十日
半月外則當加減矣另詳于左

加減煎方

川黃連酒炒貳分條黃芩酒炒陸分大紅芍藥酒炒陸分
陸分生山查肉壹錢廣橘紅肆分厚青皮肆分
用肆分堅板榔肆分甘草生壹分當歸伍分地榆肆分桃仁泥

女科秘傳

貳分小香肆分紅花叁分

堯

右咀片如法炮製水貳碗煎壹碗空心服渣再
煎服延至月餘覺脾胃熱而虛滑者法當補理
方具于左

補理煎方

川黃連酒炒陸分條黃芩酒炒陸分白芍酒炒肆分廣橘紅陸分
當歸伍分人參伍分白朮各伍分炙甘草各伍分

右咀片如法炮製水煎服渣再煎服如婦人痢
疾有胎者去桃仁紅花

以上三方隨用即效其不效者必初時投參朮等
補藥太早補塞邪氣在內而正氣已虛邪氣益盛
纏綿不已欲補而勝之則助邪欲清而疏之則愈
清遂至不可救藥雖有奇方無如之何是初投溫
補殺之也


稀痘神驗方

大麻子去壳取油揀肥硃砂壹錢研細末須
白者叁拾陸粒透紅硃砂為妙
上真麝香伍厘

女科秘傳

卒

先將硃砂麝香二味共為細末然後入大麻子
共一處研極細成膏于端午午時搽小兒頭頂
心前後心兩手足心兩膀灣兩腿灣兩腋窩共
拾叁處俱要搽到勿使藥有餘剩搽如錢大搽
後不可洗動待其自落本年擦過一次出痘一
二粒至次年端午午時再搽一次痘永不出如
未過一生小兒子七月七日九月九日依法搽
之更妙傳方之家已十六代不出痘
誠保赤靈丹也



達生編

〔清〕 亟齋居士 撰

據上海圖書館藏清乾隆三十九年敬義堂刻本影印原書版框
高一六八毫米寬二四八毫米

乾隆甲午秋鐫

達生編

敬義堂藏板

達生編小引

胎產非患也。而難產則為人患。人患不殄。則歸之於天。天何尤乎。亦唯求之人事而已。此編專為難產而設。蓋區區一得之愚。亦即區區一點真誠之念。倘能熟看。謹行。皆可。先生如達。於是人患弭。而天德叶矣。然知之而不言。非也。聞之而不傳。亦非也。好生者見之。宜為廣布。有力者重刻通行。無力者手鈔數冊。口授數人。隨分所至。未必非吾儒同胞同與之一事。吾人利濟

達生編

敬義堂

為懷。原非求福。然積善餘慶。必有攸歸。達天德也。但此編揣摩印證。委係無疑。凡重刻手鈔時。不必改動。尤不必增入方藥。以相矛盾耳。 肯

康熙乙未天中節。亟齋居士記于南昌郡署之西堂

達生編大意

胎產一事。自產寶諸書以後。代有發明。其保胎臨產及產後調理之法。率皆至精至密。似無遺義。又何俟今之多言。但或專精方藥。而未及其所以然。或略一及之。而未竟其旨。倘非究心有素之人。未易明而用之也。倉卒之際。殊難得力。茲特倡明天德自然之說。不厭煩絮。重複以期於暢。使平日可以預防。臨時可以應急。從此天下後世。產母嬰兒。同登壽域。豈不快哉。然亦特

達生編

上卷

二

敬義堂

曲遵古人之意而條達之。非創為異說也。

一此編只是反覆以言其理。至於方藥。殊未之及。偶載一二。皆取先賢古方。極平極穩者。蓋極平常之事。須用極平常之藥。一切矜奇炫異之方。概置不錄。且保護得法。雖平常之藥。亦無所用之矣。倘必欲用。則他刻自有。原不相妨。

一凡胎前臨產產後調護之法。一一備載。不厭煩復。蓋原係家居日用。閨房瑣屑之事。一有不到。皆足致病。與其服藥于病後。曷若致謹于平時。

達生編

上卷

三

敬義堂

一此編言語俚俗。未免見笑大方。但原為婦人而設。識字者固不必言。不識字者。令人誦之。皆可通曉。然須平時講令。心中明白。臨時自有主張。不但產母宜知。一應老幼男婦。皆當知之。與其看戲文聽說書。不如此等有益也。

一此編雖其所當知。而富貴之家。尤宜熟講。蓋閨人平時嬌養。口厭肥甘。身安逸樂。體氣脆薄。且性情驕傲。不聽人言。到此時纔一知覺。即不能耐。點燈着火。上呼下應。房中擠簇多人。內外嚷

成一片。穩婆絡繹。各要爭功。脉未離經。胎未轉下。即便坐草。及至不順。奇方珍藥。紛紛亂投。以致母子兩悞者多矣。豈不惜哉。但能留意此編。自可平安清吉。

一胎產之書。可以汗牛。今此芟芟。特為難產而設。其胎前產後。特略載一二。以存其概而已。若口此編。尾以盡之。則重予過矣。

一開卷即載臨產者何。蓋臨時倉卒。不及細檢。因以切要者載之首篇。且令開門見山。人人熟習。

專意行持。自可無悞。若平時講說。原不妨從保胎順序看之也。

一試痛一篇。尤為緊要。蓋知試痛之悞。方知正生之易。正與臨產一篇。互相表裏。最宜細看。仍恐先賢格言之足。相發明者。數條載之。聊以徵予言之不謬。然嘗聞一變。亦足以知其概矣。

一語云。勿以善小而不為。此篇固小之小者。然誠有見于胎產為生人之始。隨時隨地。體驗而成。且身經目擊。口授耳聞。千試不爽。忘其猥陋。出

達生編

上卷

四

敬義堂

以語人。漏萬之譏。固所不免。

世之君子。原其心焉可矣。

西泠拙園何鍾台叅訂

達生編上

○原生

天地之大德曰生。生之德無往不在。要之莫大于生人。夫胎產固生人之始也。是以名之曰生。生也者。天地自然之理。如目視而耳聽。手持而足行。至平至易。不待勉強而無難者也。然今之世。往往以難產聞者。得無以人事之失。而損其天耶。夫天豈以生道殺人哉。必不然矣。因思人為至靈。何有于物。物之生也。莫或難之。故草木之甲以時。鳥獸之出以日。豈復有藥

達生編

上卷

五

敬義堂

之者哉。自然而不待勉強。于人何獨不然。有童子骨鯁于喉。百方不出。舉室徬徨。一嫗視之曰。無異也。令靜卧。飼以漿糜。三日自出。而無所苦。可以知其理矣。骨鯁者人事也。尚可以天勝之。而况天道之常與自然之極者乎。事本易也。而自難之事。本常也。而或異之。無惑乎其然矣。繼持此理。消息行之。百試之下。無一失者。而多不用藥。由此啟唇焦舌。以告同人。頗蒙相信。數年以來。一邑之間。產難者蓋寡矣。獨惜一隅不能遍及。茲漫述成帙。剖劂布之。夫豈能有補乎。

生之外哉。惟願順承天休。而母以人事撓之。以各遂其生而已。

○臨產

六字真言。一曰睡。二曰忍痛。三曰慢。臨盆。

初覺腹疼。先自家拿穩主意。要曉得此是人生必然之理。極容易之事。不必驚慌。但看疼一陣。不了。又疼一連五七陣。漸疼漸緊。此是要生。方可與人說。知以便伺候。若疼得慢。則是試疼。只骨安眠穩食。不可亂動。此處極要着意留心。乃是第一關頭。不

達生編

上卷

六

敬義堂

可忽略。若認作正產。胡亂臨盆。則錯到底矣。

此時第一要忍疼為主。不問是試疼。是生產。忍住疼。照常吃飯睡覺。疼得極熱。自然易生。且試疼與正產。亦要疼久。看其緊慢。方辨得清。千萬不可輕易臨盆。坐草揉腰擦肚。至囑至囑。再站時宜穩。站坐時宜正坐。不可將身左右擺扭。須知此處要自家作主。他人替不得。與自家性命相關。與別人毫無干涉。

到此時。必要養神。惜力為主。能上床安睡。閉目養神。

最好。若不能睡。暫時起來。或扶人緩行。或扶桌站立片時。疼若稍緩。又上床睡。總以睡為第一妙法。但宜仰睡。使腹中寬舒。小兒易于轉動。且大人睡下。小兒亦是睡下。轉身更不費力。蓋大人宜惜力。小兒亦宜惜力。以待臨時用之。切記切記。

無論遲早。切不可輕易臨盆。用力切不可聽穩婆說。孩兒頭已在此。以致臨盆早了。悞盡大事。此乃天地自然之理。若當其時。小兒自會鑽出。何須着急。因恐小兒力薄。其轉身時。用力已盡。及到產門。不

達生編

上卷

七

敬義堂

能得出。或亦有之。宜稍用力。一陣助之。則脫然而下。蓋此時瓜熟蒂落。氣血兩分。渾身骨節一時俱開。水到渠成。不假勉強。及至生下。即產母亦不知其所以然矣。

或曰大便時亦須用力。如何生產不用力。不知大便呆物必須人力。小兒自會轉動。必要待其自轉。但不必用力。正切忌用力。蓋小兒端坐腹中。及至生時。垂頭轉身向下。腹中窄狹。他人有力難助。要聽其自家慢慢轉身。到產門頭向下。脚向上。倒懸。

而出。若小兒未曾轉身。用力一逼。則脚先出。以爲
詫異。且贈之美名曰脚踏蓮花生。或轉身未定時。
用力一逼。則橫臥腹中。一手先出。又名之曰討墮。
生卽或轉身向下。略不條直。用力略早。或左或
右。偏頂腿骨。而不得出。不知此等弊病。皆是時候
未到。妄自用力之故。奉勸世人。萬萬不可用力。然
亦非全不用力。但當用力。只有一盞茶時耳。其餘
皆不可亂動者也。卽如大便未到其時。縱用力亦
不能出。而况于人乎。

達生編

上卷

八

敬義堂

或問何以知此一盞茶時而用力乎。曰此時自是不
同。若小兒果然逼到產門。則渾身骨節疎解。胸前
陷下。腰腹重墜。異常大小便一齊俱急。目中金花
爆濺。真其時矣。當于此時臨盆。用力一陣。母子分
張。何難之有。
或曰小兒會鑽出之說。到底未敢全信。不知古人言
言及否。曰古人立言。不過撮其大要。安能事事正
悉言之。只要後人能體會耳。觀瓜熟蒂落四字。卽
知小兒自會鑽出。觀握苗助長四字。卽知將試痛。

認作正生之弊矣。夫哺雞日足。自能啄穀而出。生
有催生之神藥。穩婆之妙手乎。古人謂有遲至三
四年而後生者。此是不肯鑽出耳。既自不肯鑽出。
誰能強之。自要鑽出。誰能禦之。

或曰早一時斷乎不可動矣。不知遲了一時。可不妨
否。曰不妨。若果當其時。必無不出之理。然或偶有
不出者。則是小兒力盡。不能得出。宜令上床安睡。
使小兒在腹中亦安睡。歇力少刻。自然生矣。

或曰倘或兒到產門。而大人睡下。豈不有礙。曰更好。

達生編

上卷

九

敬義堂

蓋小兒向下時。而大人坐立。則小兒倒懸矣。豈能
久待。今大人睡下。兒亦睡下。有何妨碍。又曰倘或
悶壞。奈何。曰他十箇月不悶。今乃悶乎。
或問忍疼過久。或亦不妙。曰最妙。從不聞婦人私產
而難產者。或謂有神護佑。非也。總因胎起于私。怕
人知覺。只得極力忍疼。疼到沒奈何時。自脫然而
出。其理甚明。有何疑慮。
或曰不宜用力。已聞教矣。不知先慢用力。已致橫生
倒產。有法治之否。曰急令安睡。用大劑加味芎歸。

湯服之。將手足緩緩托入。再睡一夜。自然生矣。不
曰托之不入。奈何。曰若肯睡。再無托不入之理。若
到此時。仍不許他睡。又或動手動脚。亂吃方藥。至
末如之何矣。

或問盤腸生。是何緣故。曰是用力之過。蓋因產母平
日氣虛。及到臨時。用力弩掙。渾身氣血下注。以致
腸隨兒下。一次如此。下次路熟。又復如此。若能等
待瓜熟蒂落之時。何得有此怪異。

或問有一痛便生。令人措手不及者。此又何也。曰此

達生編

上卷

十

敬義堂

乃正理。何足為異。蓋胎氣已足。母子兩分。兒自要
出。雖欲留之而不可得。人人皆是如此。皆各有此
一時。只要忍耐得住。等待此一時耳。

或曰穩婆不必用乎。曰既有此輩。亦不能不用。但要
我用他。不可他用我。全憑自家作主。不可聽命于
彼耳。大約此等人多愚蠢。不明道理。一進門來。不
問遲早。不問生熟。便令坐草。用力一定說孩兒頭
已在此。或令揉腰擦肚。或手入產門探摸。多致損
傷。總以見他功勞。不肯安靜。更有一等狡惡之婦。

借此居奇射利。禍不忍言矣。按吳越之間。謂之穩
婆。江淮間謂之收生。婆徽寧間謂之接生。婆按收
接二字之義。因其年老慣熟。令之接兒落地。收兒
上牀耳。原非要他動手動脚也。每見富貴之家。不
將穩婆留在家中。及到臨時。稍不快利。前門後戶
接到無數。紛紛攘攘。炒成一片。所謂天下本無事。
庸人自擾之。

或問臨時有經驗之藥。亦可用否。曰不用。從前奇方。
莫過鼠腎兔腦丸。今時盛行。莫過回生丹。非謂其

達生編

上卷

七

敬義堂

不效而不用也。總用不着耳。既不用力。又不動手。
又有睡法佐之。他自會生。何消用藥。縱有不順。睡
為上策。

或問服藥有益無損否。曰安得無損。鼠兔二丸。大耗
氣而兼損血。回生丹大破血而兼損氣。蓋鼠兔例
用香竄之藥。產時百脉解散。氣血虧虛。服此散氣
藥。兒已出而香未消。其損多矣。且令毛竅開張。招
風入內。禍不可言。回生丹以大黃紅花為君。其餘
亦多消導之品。血已耗而又大破之。多致產後發

熱等病。遺患無窮。都只謂產後失調。誰復歸咎于藥。按此數方。古今稱為神靈奇寶者。尚然如此。其他可知。送藥者本是善念。但知其利。不知其害。或問總無可用之藥乎。曰。有。只須加味芎歸湯。佛手散。二方用之不盡矣。蓋產時全要血足。血一足。如舟之得水。何患不行。惟恐產母血少。又或胞漿早破。以致乾澀耳。今二方皆大用芎歸。使宿血頓去。新血驟生。藥味易得。隨地皆有。且使身體壯健。產後無病。真正有益無損。此皆先賢洞明陰陽之理。

達生編

上卷

三

敬義堂

製此神丹。以利濟天下後世。奈世人貴耳賤目。以為平常而不用。必求奇怪之藥。而後用之。只要奇怪。不論損益。豈不可歎。

或問依此言。世間總無難產者耶。曰。偶亦有之。或因母體素虛。胎養不足。血氣不完。或母病傷寒之後。熱毒傷胎。又或夫婦同房太多。以致慾火傷胎。平日過食椒薑煎炒熱物。火毒傷胎。以及跌撲損傷。皆致難產。多令胎死腹中。除此之外。無難產者矣。又有嚴寒天氣。滴水成冰之時。貧家房中火氣微。

薄。以致血寒凝滯。亦令不出。然此亦因臨盆太早。去衣久坐之故耳。若令擁被安臥。待時而產。豈有此患。

凡生產艱難。或天寒。孩兒生下不哭。或已死者。急用衣物包裹。再用香油紙燃。將臍帶慢慢燒斷。煖氣入腹。漸漸作聲而活。倘或先剪斷臍帶。則無救矣。或問臨產時飲食如何。曰。此時心內憂疑。腹中疼痛。甚至精神疲倦。口中失味。全要好飲食調理。但不宜過于肥膩耳。倘不能食。只將鷄鴨湯肉湯之類。

達生編

上卷

三

敬義堂

吹去油澄清。頻頻飲之。亦能壯助精神。人以食為命。豈可一日闕乎。

○宜忌

臨產時宜老成安靜。二三人伺候。不必多。一切親族婦女。俱婉言謝却。勿令入房。夏月更不宜多人。在房。熱氣擁盛。能令產母煩躁發暈。其害非小。房中宜輕行輕語。不宜多話。令其得睡為妙。第一要勸其放心。安靜。忍痛歇息。切忌在房中大驚小怪。交頭接耳。咨嗟歎息。皆能令其憂疑擾亂。以

致悞事

房中宜安靜如常。不得當面求神許願。叫天叫地。

穩婆只宜一人入房。且令在傍靜坐。勿得混鬧。

飲食宜頻頻少與。或雞鴨肚肺等清湯更妙。

房中冬設火盆。以禦寒氣。夏月多貯井水。以收熱氣。

井水仍頻換之。

○試痛

或問試痛何故。曰兒到七八箇月。手足五官全備。已能動彈。或母腹中有火。或起居不時。令兒不安。以

達生編

上卷

古

敬義堂

此大動而痛。此等十胎而五不足為奇。只宜照常穩食安眠。一二日自然安靜。或痛之不止。用安胎藥一二服自止。此後近則數日。遠則月餘。甚至再過三四箇月。纔產人。多不知輕易。臨盆終日坐立。者方自知之不令睡倒。或抱腰擦肚。或用手拖。或用藥打。生將兒取出。母則九死一生。兒則十胎九死。慘不可言。世間難產。皆此故也。蓋胎養不足。氣血不全。如剖卵出。雛裂。繭出。蛹寧。可活乎。只說小兒難養。誰復根究到此。又有受寒及傷食而腹痛者。不可

不知

或問何以知其試痛。曰只看痛法。一陣緊。一陣者。正生也。一陣慢。一陣或乍緊乍慢。皆試痛也。

或問傷食與受寒。何以辨之。曰傷食者。當臍而痛。子

按之更痛。或臍傍有堅硬處。寒痛多在臍下。綿綿

而痛。不增不減。得熱物而稍緩是也。

或曰試痛亦有或未必多。曰甚多。曰何以見之。曰以

今之難產者多也。

或問將試痛認作正生。其害如此。倘將正生認作試

達生編

上卷

五

敬義堂

痛。以致過時。不亦有害乎。曰無害。果當其時。小兒自會鑽出。縱或過時。不過落在襁中。生在床上而已。有何大害。而如此諄諄乎。

○驗案

前太僕卿霍山張公三君葆華繼夫人。年輕體壯。孕

必八箇月而產。產必數日百苦而下。生女及週而

灰。再孕再產。再灰。皆同。予謂後當產。宜相聞。明年

又八箇月。坐草三日不下。忽憶予言。飛輿相召。中

途逢驅車者。云迎其父母。作承訣計。比至已夜。參

矣。診之脉未離經。人餘殘喘。穩婆在傍問之曰。頭已抵產門。不得出耳。予急令安卧。且戒勿擾。與安胎藥。明晨主人出笑而不言。問之曰。好了。予曰。昨日言兒頭已抵產門。今若何。曰。不見了。大笑而別。後此百二十日。計十一足月生男。謂余爲父。今八歲矣。始知前此皆生生取出。以體壯年輕。倖保母命耳。

在張宅日。邑庠程以學邀至其家。有寵人坐草二日而不生。亦與安胎藥。越十六日生女。

達生編 上卷 未 敬義堂

太學戴諱時濟與予比隣契好。先是令弟媳一產三男。母子俱隕。一猶在腹。今又婢孕。其腹膨脹。頗患之比。產先令安卧。與加味芎歸湯。每隔半日而產。積日半。三子俱生。康熙四十八年。安撫葉公具題。

陳氏妻。生產九日夜不下。一息尙存。聞余有鬼腦丸。踵門求藥。余問之。亦曰。頭逼產門。不得出。諭令安卧。再來取藥。強而後去。歸述予言。果依法上床。仰睡。繼與加味芎歸湯。明日生下。母子兩全。按此

皆產母非時用力。逼令橫在腹中耳。豈有人倒懸十日而尙得生者乎。

昔一婦產。兒手出不得入。穩婆礪以須。予見而惻然。急令安卧。與大劑芎歸湯。徐徐托之手入。明旦生下。母子皆安。右臂紫黑。數月而後消。

達生編 上卷 七 敬義堂

達生編 下

○保胎

保胎以絕慾為第一義。其次亦宜節慾。蓋慾寡則心清。胎氣寧謐。不特胎安且易生。易育少病而多壽。保胎又宜小勞。為妙。試看鄉間農婦。僕婢下人。墮胎甚少。以勞故也。蓋勞則氣血流通。筋骨堅固。胎在腹中。習以為常。以後雖有些微閃挫。不至壞事。倘安逸不動。則筋骨柔脆。氣血不行。略有閃挫。隨至墮落。然非胎後方勞。正謂平日不宜安逸耳。若平

達生編

下卷

十一

敬義堂

日安逸。及孕後方勞。適足損胎。何筋骨堅強之有。耶。夫敬姜百乘之家也。老而猶績。尋常富貴。年少力強。正宜勤事。豈可暇逸以自病乎。

孕已知覺。即宜用布一幅。六七寸濶。長視人肥瘦。約纏兩道。橫束腰間。直至臨盆之時。纔解去。若是試痛。仍不宜解。此有二妙。胎未長成。得此則腰脊有力。些須閃挫。不致動胎。其一常令腹中窄狹。及到解開。則腹中乍寬。轉身容易。此法吾鄉頗有知者。特為廣之。

有孕後。睡時須要兩邊換睡。不可常側一邊。要使小兒左右便利。手足慣熟。則產時中道而出不難矣。

○飲食

保胎藥餌。諸書皆載。不必再陳。但飲食一道。殊未之及。茲略言之。飲食宜淡泊。不宜肥濃。宜輕清。不宜重濁。宜甘平。不宜辛熱。青蔬白飯。亦能養人。即在貧家。頗為不乏。但富貴之人。平日肥甘厭足。抑令崇儉。勢所不堪。酌乎其中。臚列如左。

宜食諸物 猪肚用多肺 雞 鴨 鰱魚 淡鯊

達生編

下卷

二

敬義堂

海參 白菜 菠薐 笋少用麻油 腐衣二味多用

蓮子 熟藕 山藥 芡實

諸味總宜潔治。多用清湯。吹去浮油。飲之最佳。俱宜白煮。忌用油煎。此多為膏粱之人言之。耳。若藜藿之腹。正宜得肥甘而潤之。何淡泊之有。但六七箇月後。腐衣麻油二物。最宜多用。亦妨日日食之。麻油解毒。腐衣滑胎。且清且補。富皆宜。允為上品。積食一二百張。則首生如達矣。或以麻油拌食。更妙。但麻油不宜燉熟。

忌食諸物 椒 薑 煎炒 野味 異味 猪
肝 犬 驢 騾 馬 自死肉 猪血 鱉
脚魚 蝦蟇 鱗魚 勿多飲酒 勿亂服藥
又孕妊禁忌 一切宰殺兇惡之事不宜看 修造
興工動土不可看 龜 兎俱不可見

○小產
小產者謂胎已墮下之後一切調理並如產後法。
便產須知云小產不可輕視其將養須過于正產十
倍可也。

達生編

下卷

三

敬義堂

薛立齋先生云小產重于大產蓋大產如栗熟自脫
小產如生採破其皮殼斷其根蒂也。但人往往輕
忽死者多矣。
小產後數日忽然渾身大熱面紅眼赤口大渴欲飲
凉水晝夜不息此血虛之症宜用當歸補血湯以
補其血若認作傷寒而用石膏芩連等寒涼之藥
則必死矣。方見後

○產後

產後調理諸書論之詳矣茲不復贅但取一二吃緊

及所未言者存之以備採擇。
產後上床宜高枕靠墊勿令睡下膝宜豎起勿伸直
隨飲熱童便一盞只宜閉目靜養勿令熟睡恐
極熟睡血氣上壅因而眩暈然不宜高聲急叫以
致驚恐。

四壁宜遮風腹中不問有痛無痛俱用熱童便和熱
酒各半每次一杯一日進三五次三日而止酒亦
不宜多若無大病只是如此不必服藥。

產後宜用鉄秤錘或溪中白石子燒紅入醋令醋氣

達生編

下卷

四

敬義堂

入鼻以免血暈且收斂神氣又能解穢每日三四
次亦三日止。
或有惡血衝心血暈昏悶不省人事者用韭菜一把
切碎放有嘴壺瓶內以煎滾熱醋一大碗灌入密
札大口扶起產婦以壺嘴向鼻遠遠熏之
生男生女夫命所招蓋百世禋祀以夫家為主與婦
人何干倘或連胎生女此亦人事之常不可在
咨嗟歎息令其氣苦曾見有不明公姑愚蠢夫婿
將婦報怨每每致病傷生可笑可恨凡此只宜寬

慰為主。又有將女溺死者。忍心害理。後嗣不昌。產後各處風俗不同。或用紅砂糖。或用山查。或用吳茱萸。或用胡椒。煎水飲之。總莫妙于熱酒對童。或腹痛之甚。用生化湯一服。無不愈者。產後飲食各處不同。椒俗纔上床。即與肥雞乾飯。吳俗率與薑粥。甚至有彌月而後。茹葷者。皆不通可笑。蓋椒俗終年食粥。產後胃弱。驟與雞飯。殊不相宜。然其患猶小。吳中終年食飯。至產後腸胃空虛。正宜滋味調養。以生氣血。轉令食盡。食粥。習俗移。

達生編

下卷

五

敬義堂

人牢不可破。說亦不信。予意必有以此傷生者。習焉而不察耳。及至虛弱發熱咳嗽。此大虛也。血脫益氣。急宜大劑參芪。驟補猶可挽回。却又謂之產勞。且與滋陰降火。以至於死而不悟。良可歎也。或問必如何調理。而後可。曰。粥時吃粥。飯時吃飯。三日內。只用雞湯。吹去浮油。澄清飲之。未可食雞。十日內。不可食豬肉。一月內。不可食豬油。以其壅塞經絡。令血氣不通耳。其餘有何忌乎。雞子有去瘀生新之能。食之甚宜。但要煮極透。不妨。

從朝至暮。然後取起食之。有益。若糖心雞蛋。乃是生物。疑滯損人。斷不可吃。鴨子不可食。或問食物必要去油。取其清耶。曰。然。不但要清。且更要淡。蓋清淡之味。本乎天。能生精神。濁則否矣。或曰。何以驗之。曰。產婦宜飲淡酒。宜食淡味。若飲醇酒。食鹹味。皆令燒乾。無乳。此清濁之驗也。但不得如吳俗。令食薑粥。矯枉過直耳。○胎死腹中。死胎只宜佛手散。服之自下。或不下。再用平胃散一。

達生編

下卷

六

敬義堂

服加朴硝二三錢。能令化下極易耳。古人立法。各有精義。且經屢驗。不吾欺也。勿用奇方怪藥。以傷母命。或問何以知其胎死。曰。面赤舌青。母活子死。面青舌赤。子活母亡。面舌俱青。子母俱死。况死胎墜脹。痛亦與常產不同。○胞衣不下。或問胞衣不下。何故。曰。總是臨盆早之故。當產之時。骨節開張。壯者數日而合。怯者彌月方合。今不待。

其開而強出之。故胎出而骨眼隨閉。以致胞出不及耳。

又曰。聞此乃極惡之症。可以損命。有諸曰。不妨。不必服藥。亦不必驚慌。若胞衣不出。急用粗麻線。將臍帶繫住。又將臍帶雙折。再繫一道。以微物墜住。再將臍帶剪斷。過三五日。自痿縮乾小而下。累用有驗。只要與產母說知。放心不必驚恐。不可聽穩婆妄用手取。多有因此而傷生者。慎之慎之。

○乳少

達生編

下卷

七

敬義堂

乳少者。血虛之故。如產母去血過多。又或產前有病。以及貧儉之家。僕婢下人。產後失于調養。血脉枯槁。或年至四十。血氣漸衰。皆能無乳。但服通脉湯。自有乳。若亂用川山甲。王不晉行等物。往往不效。即或勉強打通。乳汁清薄。令兒不壽。且損傷氣血。產後多病。不久便乾。反為不美。

○格言

大全方曰。婦人懷孕。有七八箇月生者。有一二年。乃至四年而後生者。不可不知。

楊子建十產論。可謂詳悉之極。予之所論。多本于此。但惜稍冗。匆卒視之。安能得其要乎。謹錄傷胎三篇。亦足以盡之矣。

今有未產一月以前。忽然臍腹疼痛。有如欲產。仍却無事。是名試月。非正產也。但未有正產之候。切不可令人抱腰。產母亦不可妄亂用力。蓋兒身未順。收生之婦。却教產母虛亂用力。兒身方纔轉動。却被產母用力一逼。使兒錯路。或橫或倒。不能正生。皆因產母用力未當之所致。凡產母用力。須待

達生編

下卷

八

敬義堂

兒子順身。臨逼門戶。方始用力一送。令兒下生。此方是產母之用力當也。若未至正產之候。而用力傷早。并妄服藥餌。令兒下生。譬如握苗助長。無益而有害矣。此名傷產。

薛院使云。欲產之時。覺腹內轉動。即當正身仰睡。待兒轉身向下。時時作痛。試捏產母手中指節。或本節跳動。方與臨盆。即產矣。

大旨云。大凡生產。自有時候。未見時候。切不可強服催生藥。

又云。切不可坐早。及令穩婆亂動手。

朱丹溪先生云。催生只用佛手散。最穩當。又效捷。

又云。產後以大補氣血為主。雖有他症。以末治之。

○方藥

加味芎歸湯 百試百驗。萬叫萬靈。真神方也。

當歸一兩 川芎七錢 龜板手大一片 婦人頭髮如雞蛋

焙存 性 水二碗煎一碗服如人行五里即生 死胎

亦下薛云。交骨不開者。陰氣虛也。用此方如神。

又云上舍某之妻。產門不開。兩日未生。服此方

達生編

下卷

九 敬義堂

一劑。即時而產。上舍傳此方。用之者無不驗。

佛手散 治六七箇月後。因事跌磕傷胎。或子死腹

中疼痛不已。口噤昏悶。或心腹飽滿。血上衝心者。

服之。生胎即安。死胎即下。又治橫生倒產。及產後

腹疼發熱頭疼。逐敗血。生新血。能除諸疾。

當歸五錢 川芎一錢 水七分 酒三分 同煎七分

如橫生倒產。子死腹中者。加黑馬料豆一合。炒

熟。乘熱淬入水中。加童便一半。煎服。少刻再服。

平胃散

蒼朮三錢 米泔厚朴三錢 姜陳皮三錢 甘草一分

治胎死腹中。加朴硝二三錢。即能化下。

生化湯 治產後兒枕痛。及惡露不行。腹疼等症。

當歸六錢 川芎一錢 乾薑五分 桃仁五分 甘草五分

水一鍾。童便一鍾。煎服。若惡血已行。腹痛已止。減

安胎方

黃芪蜜炒 杜仲姜汁炒 茯苓各錢 黃芩一錢 白朮五分

阿膠珠一錢 甘草三分 續斷八分 加糯米百粒。酒二杯水

達生編

下卷

十 敬義堂

二杯煎服。腹痛用急火煎。如胸中脹滿。加紫蘇

八分。陳皮八分 下紅加艾葉一錢 地榆一錢 阿膠三四錢

安胎銀芎酒 治孕妊胎動欲墮。腹痛不可忍。及胎

漏下血。

芎根二錢 紋銀五兩 酒一 如無芎之處。用茅草

紫酒 治孕娠腰痛如折。

黑料豆二合 炒 白酒一大碗。煎至七分。空心服

當歸補血湯 治孕婦肌膚燥熱。目赤面紅。煩渴

飲。晝夜不息。六脈洪大而虛。重按全無。此脈虛血

虛也。若候服白虎湯必死。此方大補陰血。退血虛發熱如神。

黃芪蜜炙一兩。當歸錢三。水二碗煎一碗。一服立愈。不可分

華陀愈風散。治婦人產後中風。口噤手足抽掣。及

角弓反張。或產後血暈不省人事。四肢強直。或心頭倒築吐瀉欲死。

荆芥穗除梗不用。每服三錢。童便調。重湯頓溫服。

如口噤不能灌入。則不研末。只將荆芥穗以童便

達生編 下卷 十一 敬義堂

煎放微溫灌入鼻中。其效如神。

通脈湯。治乳少或無乳。

黃芪生用一兩。當歸錢五。白芷錢五。七孔猪蹄一對。煮湯吹

去浮油。煎藥一大碗。服之覆面睡。即有乳。或未效。

再一服。無不通矣。新產無乳者。不用猪蹄。只用水

一半酒一半煎服。體壯者。加好紅花三五分。以

惡露。

附錄

保胎救產神效奇方。專治一切產症。未產能安。產能催。倘有懷妊者。不拘月數。偶傷胎氣。腰疼腹痛。服之即止。其有血下勢欲小產者。危急之際。服即愈。再服全安。或十月正產。交骨不開。橫生逆下。以至六七日不產者。或嬰兒死于腹中。命在垂危者。切禁用穩婆手法。服此立刻即下。如臨月二三日。前覺行動不便。預服一二劑。可保萬全。每用亦不過二三劑即效。

達生編 附錄 下卷 一 敬義堂

全當歸分一錢。真川芎分一錢。生黃耆分八。

川羌活分五。兔絲子分一錢。荆芥穗分八。

紫厚朴分七。川貝母分一錢。煎好方入。

枳殼分六。蘄艾分七。白芍藥分一錢。

細甘草分五。加生薑三片。水二鍾煎八分。復

渣水一鍾半。煎六分。預服者空心服。臨產者隨

服。藥品須揀地道。炮製如法。分兩必要照方秤准。

此係仙授奇方。屢試屢驗。不可妄意增減。

嬰兒初生攻去胎毒

橄欖 煨研細 硃砂 水飛過 二味等分用生艾
蘇一小撮嚼爛和前末為丸塞小兒口內聽其應
乳嚥下藥至大腸即下黑糞去盡為度未盡再服
若未出痘小兒製服亦取去盡黑糞發痘必稀解
毒鎮驚孩提上藥也

小兒稀痘經驗方

羌活 五分 生地 五分 防風 五分 麻黃 五分 黃柏 五分
升麻 五分 黃連 三分 歸身 三分 生甘草 三分 川芎 三分

達生編附錄 下卷

敬義堂

藁本 二分 蒼朮 二分 黃芩 二分 柴胡 二分
乾葛 二分 紅花 一分 細辛 一分 蘇木 一分 白朮 一分
陳皮 一分 連翹 五分 吳茱萸 五分 右藥二十二味
合一劑每逢立春立夏立秋立冬前一日晚刻用
水二鍾煎至八分將細紗一方覆碗口露一宿天
陰露房簷下次早溫服一年服四劑更不必服如
服後腹泄則胎毒去服第二劑則不泄有初劑不
泄者則胎毒輕也有服而發熱者則胎毒重也服
過全四劑者可永不出痘一二劑者出痘必稀此

方屢用必效切弗加減

達生編附錄 下卷

三

敬義堂

達生一編專爲胎產而設。天地間無一日無胎產之時。無一家無胎產之事。宜其家喻戶曉。如日用飲食之不待講求。而往往多有難產者。良由婦人生長閨中。平時少調攝之方。臨期無鎮定之見。驚慌謬妄。以致生產不順者有之。此襄平亟齋朱公所爲俗情。闢以至理。人事導以天機。而取達生以名。是編之義也。顧是書施送者頗多。然或意取流通。校讐未審。又或間有竄易。稍紊原書之舊。余所見者。惟秀水汪氏刻本爲善。且附有何氏評點。使閱者一覽了然。更爲便捷。

達生編

版

一

樂善堂

捷。因仿其式重付歌。刷以傳。至便產稀痘諸方。雖集中不載。而屢試屢驗。信用勿疑者。採摭一二。但不欲混入原書。以失本來面目。另附錄于後。以廣好生之本指云。

皆

乾隆三十九年歲次甲午孟秋月復齋主人書於釣

灘書屋



胎產心法

〔清〕閻純璽撰

據中國科學院圖書館藏清雍正八年刻本影印原書版框高二〇〇毫米寬三〇〇毫米

胎產心法序

一介之士苟存心於利物於人必有
所濟矧更擇一藝以自居者其為
功於世可勝言哉卜氏有言曰雖
小道必有可觀論者謂如農圃醫
卜之屬曰者之中精其業勻足以
濟世然而農圃為聖人所弗道卜

筮之學君平而後鮮得其傳則
夫士大夫從博覽之餘一介其
聰明才力以寡其愛人利物之心
者要莫如醫之一途為雅馴而功
溥雖難言之矣蓋人稟陰陽
五行之氣以生命於天者既不無
厚薄之殊而更繼也或傷於寒

暑或繼於嗜慾或苦於抑鬱勞
瘁與夫一切戕生拂性之端種種
相攻求疾病之不起也得乎苟
非有挾岐黃之術者以調劑其
間則斯人質之亦大覺可哀故諸家
之中唯醫道為難而醫道之中惟
治胎產為更難也余同寅友

閻君文侯器宇宏深善氣而人且
於書無所不窺於藝無所不通
而尤留心醫學每謂婦人胎產所
關非小誠以受胎之後調養有法臨
產之際保護有方既產之時調理
有術稍一弗慎則存亡判於俄頃
生死關乎兩人嘗見庸醫多誤

輒為嗟嘆不置爰及諸名家所
論說而折衷之已意著為胎產
一書顏曰心法余於共事之暇得
閱其槩因取而讀之其於藥性
脈理辨析於毫芒微驗引據融
會乎古今裨業斯道者之津

序

三

梁也良由閻君居心仁慈常
懷利物故即一藝之微而亦
必筆之於書以覺世而訓俗今
方特膺

聖天子簡命監使西粵固將控
是心以措之經綸設施行見事

業爛然有以上報

聖主特達之知下慰寮友期望之
雅則其溥利蒼生正無窮也豈
特肘後丹方徒令人向 閻君多
種杏樹哉然是書亦急宜付之梨
棗以功業醫者後及幸寄一卷示

序

四

予勿相忘也是為序

賜進士出身楚竟陵年家眷同寅
弟龔健颺拜書於燕臺客舍嘗
雍正三年秋八月



予不敏少年未嘗學問雖於醫書多所涉臘亦知其大略而未究其精微何敢自矜一得以法當時而傳後世耶第念醫以寄死生其道固難而胎產一門宗嗣攸繫兩命所關尤為醫道之最

難者緣是博採方書日取先賢名論而探求真理考驗揣摩歷三十餘年似有以得其要領不為歧途所惑乃敢折衷先代之書叅以鄙見彙成一集分為上中下三卷顏曰胎產心法凡婦人受胎之

始有以固其根臨產之際有以防其變既產之後有以保其生始終常變曲折周詳不敢自私爰付剞劂願世之業醫者得是書而融會貫通神明變化固可以茂育羣生即不然依論擇方對症加減亦可以保

全子母後之善學胎產者當不以予言為河漢耳爰勒其槩於篇首以為之序

皆

雍正庚戌季菊月之中浣廣西左江觀察使上谷閻純璽誠

齋氏書於官署



三

胎產心法卷之上

各論目錄

脈法

脈訣歌

金匱解 方附本條

逐月養胎辨並慎擇醫藥論

受胎試驗法 附方

試男女胎法

三禁

胎產心法 卷上 各論目錄

教養宜忌論

飲食七情禁忌

妊娠藥忌歌

種子補益受胎壽子論


胎動安胎論

惡阻論

胞漏并小產論

諸痛論 附孕癰

胎逆上通脹滿子懸論



諸血證論

子腫子氣子滿論

子煩並五心煩熱及煩躁口乾論

子淋論

轉胞淋閉論

遺尿論

子嗽論

喘急論

泄瀉論

胎產心法

卷上 各論目錄

二

霍亂論

中惡中暑中濕中風論

子癇論

附破傷吐衄血類中風

痢論

瘧論

傷寒溫熱時疫論

謔語論

傷風論

傷食論

臟燥悲傷論

大便燥論

子瘖論

腹內兒哭鐘鳴論

胎不長養過期不產並枯胎論

鬼胎論

腸覃似孕並蓄血似孕論

妊娠出痘論

妊娠麻疹論

胎產心法

卷上 各論目錄

三

諸方目錄

補益門

種子丹

種子奇方

坎離丸

延嗣酒

補益大豆方

山精壽子丸

補陽益氣煎

益氣丸

濟陰壽子飲

濟陰大造丸

河車大造育麟丸

胎動安胎門

丹溪安胎飲

加味安胎飲

加減安胎飲

安胎萬全飲

杜仲丸 附千金保孕丸

胎產心法

卷上 諸方目錄

四

胡連丸

黑白安胎散

加味四物湯

四物湯 加減用法

芩朮安胎飲

紫蘊飲

保胎神效丸

惡阻門

加味參橘飲

止嘔安胎飲

歸原飲

參橘飲

青竹茹湯

橘皮湯

二香散

保生湯

半夏茯苓湯

小和中飲

胎產心法

卷上 諸方目錄

五

六味異功煎

理陰煎 附附子理陰煎○六味回陽飲

良方半夏茯苓湯

茯苓丸

苦柚單方

胞漏小產門

加味補中安胎飲

歸脾湯

附加味歸脾湯○濟生歸脾湯

尊生安胎飲

景岳胎元飲	泰山磐石散	安胎萬全神應散	鳳衣散	苧根湯	膠艾安胎散	增損八物湯	止漏絕神丹	諸痛門 附孕癰	胎產心法	卷上 諸方目錄	六
川芎茶調散	加味芎歸湯	藿香正氣散	尊生定痛延胡散	人參養胃湯	六君子湯	千金芩朮芍藥湯	補中益氣湯	平胃散			

膠艾湯	千金托裏散	八珍湯	二妙散	獨活寄生湯	膠艾芎歸湯	佛手散 一名芎歸湯又名當歸湯	阿膠散	捷徑方	胎產心法	卷上 諸方目錄	七
三物解毒湯	四烏湯	加味導赤湯	小柴胡湯	六味地黃湯 附六味地黃丸 〇桂附八味地黃丸 〇金匱腎氣丸 〇濟生腎氣丸	東垣涼膈散	香殼散	下瘀血湯	當歸活血湯			

胎逆上通脹滿子懸門

四君子湯

逍遙散 附八味逍遙散又名加味逍遙散

和氣安胎飲 附順氣安胎散

加參平胃散

尊生和氣飲

針灸方

諸血證門

加味清胃散

胎產心法

卷上

諸方目錄

八

黃芩清肺飲

冬味地黃湯

附冬味地黃丸又名八仙長壽丸

涼血地黃湯

子腫子氣子滿門

子滿即名胎水

全生白朮散

健脾利水湯

加味五皮湯

附五皮散

加味天仙籐散

茯苓湯

千金鯉魚湯

局方五皮湯

束胎飲

子煩並五心煩熱及煩躁口乾門

竹葉安胎飲

千金竹瀝湯

加味竹葉湯

二陳湯

加減參麥湯

胎產心法

卷上

諸方目錄

九

知母丸

一味黃連散

尊生加味安胎飲

子淋門

加減安榮散

轉胞淋閉門

二陳升提飲

遺尿門

白薇散

加減六味湯

子嗽門

寧肺止嗽散

蘇桔湯

喘急門

參蘇飲

平安散

泄瀉門

胃風湯

胎產心法

卷上

諸方目錄

十

加味理中湯

加味治中湯

四苓散

附五苓散

不換金正氣散

胃苓湯

加味六君子湯

壽齋加味四君子湯

人參白朮散

霍亂門

香蘇散

加味四味紫蘇和胎飲

六和湯

回生散

七味白朮散

中惡中暑中濕中風門

散滯湯

養艾方

清暑和胎飲

胎產心法

卷上

諸方目錄

十一

黃芩白朮湯

搜風安胎飲

子痛門

羚羊角散

鈎藤湯

清神湯

琥珀壽星丸

辨防安胎散

癩門

厚朴去乾薑湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

黃芩芍藥湯

香連丸

連理湯

千金三物膠艾湯 又名膠艾槿皮湯

駐車丸

白頭翁加甘草阿膠湯

當歸黃芩芍藥湯

胎產心法

卷上 諸方目錄

十二

黃連阿膠湯

一味阿膠飲

阿膠黃連飲 又名黃連阿膠湯

加味香連湯

瘧門

枳實理中湯 附理中湯○附子理中湯

承氣湯

黃連解毒湯

桂枝白虎湯 附白虎湯○人參白虎湯

散邪飲

截瘧湯

柴胡知母湯

七聖截瘧散

明砂止瘧丹

加減丹溪安胎飲

傷寒溫熱時行疫證門

葱白香豉湯

尊生香薷散

胎產心法

卷上 諸方目錄

十三

金花湯

濟陰香薷散

黃龍湯

三黃解毒湯

護胎法

又法

柴葛安胎飲

生津葛根湯

梔子葱豉湯

加味化班湯

千金石膏大青湯

石膏六合湯

升麻六合湯

謔語門

生地黄黃連湯

血證黑神散

臟燥悲傷門

甘草大棗湯

胎產心法

卷上

諸方目錄

十四

淡竹茹湯

大便燥門

潤燥湯

胎不長養過期不產並枯胎門

保元湯

十全大補湯

補血行滯湯

又名催生湯

鬼胎門

決津煎

通瘀煎

妊娠出痘門

黃芩湯

妊娠麻疹門

升麻葛根湯

固胎飲

胎產心法上卷目錄 畢

胎產心法

卷上

諸方目錄

十五

胎產心法卷之中

各論目錄

脉訣歌

保產論

胎殺方位

房中遊神方位

生子宜向方

安產藏衣方向宜忌

借地法

胎產心法

卷中 各論目錄

一

臨產須知

難產五因

催生論

子死腹中論

胞衣不下論

交骨不開論

諸方目錄

保產門 預服易產

達生散

密傳達生散

養胎散

神寢丸

保生無憂散

千金不換方

一名保產無憂散

保氣丸

滑胎煎

滑胎散

家傳胎產金丹

胎產心法

卷中 諸方目錄

二

臨產須知

救逆湯

三補丸

催生門

催生獨參湯

附論

催生萬全湯

附論

催生佛手散

油密飲

三合濟生湯

魚膠散

催生簡易方

催生如意散

催生芎歸湯 即佛手散

葱白益母湯

神柞飲

秘錄加味神柞飲 附論

乳硃丹

伏龍肝散

胎產心法

卷中 諸方目錄

三

二脫散

膠葵散

催生如神散

催生如聖散

手握丹 一名兔腦丸

琥珀黑龍丹

催生起痘神驗方

尊生救生湯

神應丹 又名萬全膏

子死腹中門

立候下胎散

烏金散 局方名黑神散○靈苑名肉桂散

脫花煎

香桂散 一名桂香散○附救苦散

牛膝丸

琥珀丸

新法下胎方

千金神造散

胎產心法

卷中 諸方目錄

四

扶羸小品方

仙傳保命丹 一名安穩丸○一名奪命丹

官桂散

黑神散

鷄熨下死胎法

下胎單方

千金榆皮湯

返魂丹

胞衣不下門

益母丸 一名返魂丹○附益母膏

良方奪命丹

失笑散

下胎衣單方

又方

血極膏 一名醋大黃丸

三柰下胎方

花蕊石散

良方牛膝散

胎產心法

卷中 諸方目錄

五

炙足小指法

千金牛膝湯

蛇蛻烏金丸

半夏散

交骨不開門

參便佛手散

加味芎歸湯

開骨膏

胎產心法中卷目錄 畢

胎產心法卷之下

各論目錄

脈訣論

產後大補須分虛不虛全實三證論

四物湯不宜產後論

生化湯論 附方

調攝論

產後禁忌論

產後藥誤須知

胎產心法

卷下 各論目錄

一

三衝論

產後不宜汗下利小便論

新產三審論

血塊論

暈厥論

血脫氣脫神脫三證論

血脫暴崩氣脫似喘神脫妄言妄見及譫語鄭聲發狂

惡露不止論

氣喘論

惡露不下論

脫汗亡陽及諸汗論

傷食論

忿怒氣逆論

頭痛論

心痛即胃脘痛論

腹痛論

小腹痛並兒枕論

腰痛論

脇肋痛論

胎產心法

卷下

各論目錄

二

手足身痛論

發熱論

大便燥秘論

類瘧及寒熱往來論

類中風痙瘓及語澁口噤不語筋攣瘳癱等證論

怔忡驚悸並虛煩煩燥論

麻督論

口乾渴兼小便不通或短少論

泄瀉及完穀不化並遺尿論

痢滯論

霍亂論

氣逆嘔吐不食論

呃逆論

即吃忒又名咳逆

腹脹滿悶論

浮腫論

咳嗽論

淋證論

小便數及遺尿不禁論

胎產心法

卷下

各論目錄

三

蓐勞骨蒸論

吐衄及口鼻黑氣起而衄並舌黑論

大小便血論

月水不通論

癰疽論

乳少無乳並乳汁自出論

妒乳吹乳乳癰論

乳巖論

乳懸論

前陰諸證論

諸方目錄

生化湯 附論

三衝門

來復丹

二味參蓯飲

新產三審門

殿胞煎

暈厥門

胎產心法

卷下

諸方目錄

四

急救暈法

從權急救生化湯

從權急救加參生化湯

加參生化湯

附大補回陽生化湯

參麥五味飲

附參麥飲又名生脉湯又名生脉散

滋榮益氣湯

血脫氣脫神脫門

血脫暴崩不止氣脫短促似喘神脫妄言妄見及譫語鄭聲發狂

荆芷治崩湯

加參生化止崩湯

滋榮益氣止崩湯

升舉大補湯

曾生升舉大補湯

千金伏龍肝湯

貞元飲

續氣養榮湯

寧神生化湯

寧神定魄茯神湯

芎歸瀉心湯

胎產心法

卷下

諸方目錄

五

千金遠志湯

龍齒清魂散

惡露不止門

蒲索四物湯

升陷固血湯

保險煎

清化飲

固陰煎

壽脾煎

大補元煎

薛氏加味四物湯

良方一味防風散

氣喘門

金水六君煎

六安煎

惡露不下門

加減八珍湯

四味散

胎產心法

卷下

諸方目錄

六

脫汗亡陽及諸汗門

麻黃根湯

黃耆建中湯

附小建中湯○內補建中湯

止汗散

人參養營湯

傷食門

生化消食湯

健脾消食湯

長生活命丹

忿怒氣逆門

木香生化湯

健脾化食理氣湯

頭痛門

產後芎歸湯

即佛手散此方因證加藥治法

參蘇芎歸湯

心痛即胃脘痛門

生化立效方

腹痛門

胎產心法

卷下

諸方目錄

七

加味生化湯

當歸建中湯

金匱當歸生薑羊肉湯

金鈴子散

五君子煎

胃關煎

四神丸

附二神丸

四神散

小腹痛並兒枕痛門

延胡生化湯

延胡索散

蠟礬丸

太乙膏

腰痛門

養榮壯腎湯

局方調經散

琥珀地黃丸

脇肋痛門

胎產心法

卷下

諸方目錄

八

芎歸瀉肝湯

當歸地黃湯

加減小柴胡湯

加減補中益氣湯

瀉白散

附加味瀉白散

歸芍清肝飲

手足身痛門

起痛散

補中益腎湯

發熱門

辛散生化湯

附辛散湯

當歸補血湯

大便燥秘門

養正通幽湯

潤腸粥

濟川煎

類瘧及寒熱往來門

滋榮益氣扶正湯

胎產心法

卷下

諸方目錄

九

加減養胃湯

參木膏

參歸湯

三陰煎

補陰益氣煎

類中風痙瘓及語澁口噤不語筋攣瘵痰門

滋榮活絡湯

天麻湯

加味生脉散

止汗生血飲

芎歸棗仁湯

七珍散

舒筋湯

參附湯

怔忡驚悸並虛煩煩燥門

加減歸脾湯

養心湯

安神丸

胎產心法

卷下

諸方目錄

十

人參丸

人參當歸湯

麻脊門

地黃飲子

口乾渴兼小便不通或短少門

生津止渴益水飲

生津益液湯

加味五苓散

泄瀉及完穀不化並遺尿門

蓮子生化湯

健脾利水生化湯

參苓木附湯

參苓生化湯

參苓蓮子飲

加味生化湯

參苓大補生化湯

參香散

加味六君子湯

胎產心法

卷下

諸方目錄

十一

痢滯門

香苓生化湯

歸芍連殼飲

五皮散

香連丸

伏龍肝湯丸

霍亂門

生化六和湯

溫中散

附子散

加味理中湯

氣逆嘔吐不食門

加減生化湯

溫胃丁香散

石蓮散

香砂生化湯

加味香砂生化湯

安胃行血湯

胎產心法

卷下

諸方目錄

十一

加減六和湯

和中湯

補中和胃湯

益黃散

抵聖湯

呃逆門 即吃忒又名咳逆

加味理中湯

羗附湯

腹脹滿悶門

治脹方

養生化滯湯

加減六君子湯

浮腫門

補中利水湯

小調經散

調經湯

加味五皮湯

咳嗽門

胎產心法

卷下

諸方目錄

十二

加味生化湯

桔梗湯

加味甘桔湯

桑貝苧歸清肺湯

異攻散

二母湯

淋證門

知柏導赤散

益元散

參朮湯

茅根湯

加減茅根湯

濟陰加味四物湯

小便數及遺尿不禁門

升陽調元湯

桑螵蛸散

人參螵蛸散

益心湯

胎產心法

卷下

諸方目錄

十四

還少丹

葶勞骨蒸門

參歸湯

白茯苓散

鱉甲湯

當歸羊肉湯

清骨散

保正湯

加味大造丸

增損柴胡湯

千金當歸芍藥湯

烏骨鷄丸

吐衄及口鼻黑氣起而衄並舌黑門

三味參蘘飲

大小便血門

小薊湯

乳少無乳乳汁自出門

行氣下乳湯

胎產心法

卷下

諸方目錄

十五

玉露散

漏蘆湯

猪蹄湯

又方

香砂四君子湯

通草猪蹄羹

湧泉散

加減一陰煎

獨參湯

妒乳吹乳乳癰門

瓜萋散

連翹金貝煎

橘葉散

清肝解鬱湯

曾生治吹乳初起一

曾生治吹乳身熱二

曾生治吹乳結腫三

人參敗毒散

又名敗毒散

胎產心法

卷下

諸方目錄

十六

神效瓜萋散

消毒飲

定痛消毒飲

槐艾洗法

瓜萋貝母散

乳巖門

益氣養榮湯

乳懸門

方附本論中

前陰諸證

硫黃湯

欬官方

硫黃散

熨陰洗陰法

當歸湯

龍胆瀉肝湯

收腸方

又收腸方

胎產心法

卷下

諸方目錄

十七

千金療蝕方

椒湯治法


肉汁治法

金銀散

殺蟲硫黃散

胎產心法下卷目錄

畢



胎產心法卷之上

脈法

經曰婦人手少陰動甚者。姪子也。○又曰陰搏陽別。謂之有子。○又云何以知懷子之且生也。曰身有病而無邪脈也。○又尺中之脈。按之不絕者。姪娠也。○滑伯仁曰三部脈。浮沉正等。無他病而不月者。姪也。○按婦人帶證。足少陰脈亦多滑利。頗似孕脈。然必與手少陰脈動相應。方為姪子。否則為帶也。○凡婦人懷孕。其血留氣聚。胞宮內實。

胎產心法


卷之上

脈法

故尺陰之脈必滑數。此必然之理也。然亦有中年受胎。及血氣羸弱之婦。脈見細小不數者。但於微弱之中。必有隱隱滑動之象。此即陰搏陽別之謂。乃姪娠之脈也。但胎孕之脈數。勞損之脈亦數。然損脈數中兼弦澁。胎孕數必兼和滑。此幾微中邪氣胃氣之異。一診便知。再加審之以證。則顯然而明。見者也。凡業醫者。不深究脈理。不細玩內經。往往誤認為陰虛勞損經閉之證。若非婦人之夫。明以告之。鮮有不誤治。反成半產漏下者矣。可不慎歟。

脈訣歌

上谷



胎產心法

卷之上

脈訣歌

二

肝為血兮肺為氣。血為榮兮氣為衛。陰陽配偶不參差。兩臟通和皆以類。血衰氣旺定無姪。血旺氣衰應有嗣。婦人經脈不見行。其脈微滑帶數意。身雖有病脈無邪。不澁不伏不弦勁。寸微關滑尺數形。流動往來雀啄利。兩手關脈大相應。胎已有形無差異。以上胎脈指下詳。數月懷身經脈閉。左疾為男右為女。帶縱帶橫雙生據。左手脈逆生三男。右手脈順生三女。人恐左右臟氣偏。不若陽男與陰女。寸滑為陽尺滑陰。兩寸滑實雙男取。兩尺滑實二女陰。此定男女分明語。右尺左寸滑見形。證別一男又一女。又云左寸浮大男。右寸沉細稱為女。屢經診驗不差訛。說與醫人為確據。小兒日足胎成聚。身熱脈亂無所苦。汗出不食吐逆時。精神結脩其中住。滑疾按散三月胎。但疾不散五月母。八九十月疾數無。亦有始終洪數婦。胎脈弦牢滑利安。沉細而微歸泉路。若脈沉細腹微疼。雖有形如懷抱甕。滿腹不動是為奇。獨冷臍下翕翕動。更兼早暮尺不同。大小浮沉無定論。或動或止或有無。此是鬼胎脈現證。連診數日皆如此。補氣活血何須問。更有夜叉胎作名。急如風雨脈情形。少停復來如初樣。否則關中雀啄成。又有指下

脉弦勁。再加大小不調勻。夜又脉候應如此。切莫安胎成話柄。編成胎証脉訣歌。熟讀自能通捷徑。

金匱解 方附本條

凡婦人脉無病。惟陰脉小弱。乃營氣不足。若感邪而營氣不足者。必惡寒發熱。今無寒熱。妨於食。是知妊娠矣。經水不行。至六十日。血聚氣搏。始凝成胎。營氣並於胎元。而胃氣不足。津液少布。故其人渴。不能食。宜桂枝湯和營益胃。如醫以他病治之。反加吐下者。此為惡阻。當絕止醫法。候其自安可耳。桂枝和營散邪。佐芍藥飲陰。甘草緩之。引以薑棗。辛甘性溫。行脾津液。而和榮衛。則渴止。

胎產心法

卷上 金匱解

三

凡婦人行經時遇冷。則餘血留而為癥。然癥病。婦人恒有之。或不碍子宮。則仍行經而受孕。雖得血聚成胎。胎成三月。而經始斷。斷未三月。而癥病復動。遂漏下不止。癥在下。迫其胎。故曰癥瘕害。所以臍上升動不安。詢為正胎無疑。若是鬼胎。即屬陰氣結聚。斷無動於陽位之理。今動於臍上。是胎已六月。知前三月經水雖利。而胎已成。後三月經斷。而血積成疝。是以血下不止。桂心茯苓圓主之。藥俱等分為丸。食前服一丸。不知。加至三丸。用桂心、茯苓、丹皮、桃仁。熬以散其疝。芍藥以護其營。則血方止。而胎得安。世本

作桂枝茯苓圓。乃傳寫之誤。詳桂枝氣味俱薄。僅堪走表。必取肉桂之心。方有去癥之功。安常所謂桂不傷胎。勿疑有碍于妊。觀下條子藏開。用附子湯。轉胞。用腎氣丸。俱用桂附。內經所謂有故無殞是也。

妊娠六七月。脉弦為虛寒。虛陽散外。而為發熱。陰寒內逆。而作胎脹腹痛惡寒者。其內無陽。子藏不能司閉藏之令。故陰中覺寒氣習習。少腹如扇也。用附子湯以溫其藏。則胎自安。仲景用附子安胎。非神而明之。莫敢輕試也。方缺。可以意擬。必薑桂之屬。

胎產心法

卷上 金匱解

四

行經與結胎。皆屬衝任。衝任雖持平陰陽交合。為肝腎之行事。然長養成胎。又資坤土。蓋陰陽抱負則不泄。坤土隄防則不漏。若宿有瘀濁客於衝任。則陰自結。不得與陽交合。故有時漏下。半產。下血不絕也。凡妊娠胎氣。陽精內成。陰血外養。今陰血自結。與胎阻隔。不得相和。獨陰在內。作腹中痛。下血。皆陰陽失於抱負。坤土失於隄防。膠艾湯主之。其方芍二兩。歸三兩。宣通陽血。芍四兩。乾地黃四兩。宣通陰血。阿膠二兩。血肉之質。同類以養之。安胎補血。塞其漏泄。甘草二兩。緩中解急。和陰陽。通血脉。艾葉二兩。專理

濕鬱帶漏之病。此方藥氣內入。開利陰血之結。而通於陽。調經止漏。安胎養血之妙用也。然加減又必從宜。若脈遲緩。陰勝於陽。則加乾薑。或見數大。陽勝於陰。則加黃芩。可不言而喻。

妊婦有因脾土為木邪所剋。穀氣不舉。濕淫下流。以滯陰血。而腹中疝痛。當歸芍藥散主之。此與胎阻痛者不同。故君以芍藥一觔。瀉肝利滯。佐以芎歸各三兩。補血止痛。茯苓四兩。澤瀉半觔。滲濕降於小便。白朮四兩。益脾燥濕。要知內外六淫。皆能傷胎成痛。不獨濕也。

胎產心法

卷上 金匱解

五

妊婦先因脾胃虛弱。津液留停。蓄為痰飲。至妊二月之後。濁陰上衝。中焦不勝其逆。痰飲遂湧。中寒乃起。嘔吐不止。乾薑人參半夏丸主之。此即世俗所謂惡阻病也。故用乾薑一兩。止寒。人參一兩。補虛。製半夏二兩。以治痰散逆。即以生薑汁和丸。飲服十九。日三服。

妊婦小便難者。膀胱熱鬱氣結成燥。病非中焦而在下焦。所以飲食如故。歸母苦參丸主之。每味藥各四兩。丸如小豆。飲服三丸。加至十九。此方當歸和血潤燥。貝母清肺開鬱。苦參長於治熱。利竅逐水。佐貝母並入膀胱。以除熱結。

結通。則水行矣。

妊婦小便不利。病在膀胱。膀胱者。內為胞室。主藏津液。氣化出溺。外利經脈。上行至頭。為諸陽之表。今膀胱氣不化。水溺不得出。外不利經脈。所以身重洒淅惡寒。起即頭眩。但利小便。則水去而經氣行。表病自愈。用葵子茯苓散主之。葵子一觔。直入膀胱。以利癰閉。佐茯苓三兩。以滲水道。小便利。則諸病愈。

凡妊娠之婦。精留血裏。尺搏而形於脈。動搏則生變化。若靜而不動。則不生不化。是以妊血不可以靜。靜則凝泣。泣

胎產心法

卷上 金匱解

六

則不生不化而虧少。虧少則虛。皆不能與化胎之火相合。要知胎孕生化。必脈動搏。故調之者。先和陰陽。利其氣血。常服養胎之藥。非惟安胎易產。且免產後諸病。宜常服當歸散。酒飲服。用芎歸芍藥各一觔。安胎補血。白朮半觔。去腰臍間之陳痰。而補胃養胎。其胎外之血。因寒濕滯者。皆解之。黃芩一觔。化壯火而反於少火。以生氣。故為常服之劑。然當以脈證遲數。虛實加減。有病則服。否則不必也。藥味偏而不正。不比米穀。豈宜無病久服。經曰。味之所入。各歸所喜攻。氣增而久。夭之由也。

凡妊娠血聚而後成胎。少遇邪。則所聚之血。將宿而不運。反類瘀惡。必生新開陳。然後胎可養也。養胎不惟在血。而胎係於腎。養之又在於胃。所以補腎調胃。補腎以固其精。調胃以和其中。白朮散主之。但白朮散方藥四味。本草皆云能去惡血。而養胎用之何也。蓋白朮三分。能調胃。蜀椒三分。出汗。一本秦椒。開痺痺開。則陽精至。牡蠣四分。治崩崩止。則陰精固。川芎三分。下入血海。運動胎血。破舊生新。如或陰血不利。肝木為害。在內抑屈而痛者。瀉以芍藥之酸寒。以通其陰。設直衝過而痛者。散以芫藟之辛溫。以通其陽。或挾瘀惡之氣。上逆於胃。而胃中吐煩不能食者。用細辛。溫中去痰下氣。半夏。治心下急痛。和胃進食。止吐逆。若嘔而不止者。由肝木妄動。用小麥飲。養其本氣以安之。且又平胃下氣止煩。一舉兩得。大麥主消渴益氣調中。故中氣不足而渴者用之。

逐月養胎並慎擇醫藥論

凡婦人有孕。則手足十二經脈。氣血週流。俱拱養胎元。豈有逐月某經養某胎之理。故不具載。如孕婦有疾。必擇專門明醫。平日相信而無錯誤者。方可用之。若未試之。醫有

胎產心法

卷上

金匱解

逐月養胎
慎擇醫藥

七

辨之藥。切勿輕用。以貽後悔。更不可輕用針灸。以致墮胎。

受胎試驗法

附方

婦人經水不行。過二三月。疑是兩身。却疑血滯。心煩寒熱恍惚。以佛手散。艾葉湯調驗之。用全當歸七分。生川芎一錢。共為末。濃煎艾葉湯。空心調下。或好酒調服亦可。待三兩時辰。覺臍腹間微動者。即孕也。否則是經滯。動罷即愈。安穩無虞。如不是胎。即不動。所滯惡物自行。經滯之病亦愈。○一方。驗經脈不行。已經三月者。用生川芎為細末。濃煎艾湯。空心調下二錢。覺腹內微動。則有胎也。否則經滯。

胎產心法

卷上

受胎試驗法

附方
八

○查古方。有探胎散。用皂角去皮。炙草各一錢。黃連少許。共末。酒調服。有孕則吐。無孕則不吐。但皂角探胎。未有不吐。恐胃弱之婦。即無胎。亦不免於吐耳。姑錄此方。用者慎之。此皆試之以藥也。若尺脈搏手。與寸脈滑動者為孕。脈此試之以脈也。凡婦人受孕。四十日外。必患惡阻。有不患者。在疑似之間。方用此試法。

試男女胎法

凡懷男孕。動在三月。陽性早也。婦臍必突。按之頗實。兩乳甚黑。男面背母。而懷背脊抵腹。其形圓如釜。母腹故硬。女

孕動在五月。陰性遲也。婦臍軟。乳頭雖黑。不甚。女而母腹而懷。足膝抵腹。下大上小。其形如箕。○又法。令孕婦抱未生齒兒女。是男孕。則所抱女兒瀉青糞。若男孕抱男兒。女孕抱女兒。則無恙。○又法。令孕婦前行。人忽從背後呼之。左回首者是男。右回首者是女。○又法。孕婦登廁時。夫從後呼之。男左回首。女右回首。蓋男受胎在左。則左重。女胎在右。則右重。故回首慎護重處而然也。推之於脉。其義亦然。胎在左。則血氣護胎而盛於左。故脉亦從之。而左脉現滑大疾數等形。為男脉矣。胎在右。當亦如之。再推之。經曰。

胎產心法

卷上

試男女胎法

九

陰搏陽別。謂之有子。蓋受胎處於臍腹之下。則血氣護胎而盛於下。故陰之尺脉鼓搏有力。而與陽之寸脉殊別也。又如癰節發上。則血氣從上而寸脉盛。發下。則氣血從下而尺脉盛。發左。則氣血從左而左脉盛。發右。則氣血從右而右脉盛也。丹溪以左大順男。右大順女。為醫人左右手。豈非智者之一失歟。但丹溪治產精微。恐無此失。大約以此診男女之病。而分順逆。原非診別男女也。

三禁

婦人年幼。天癸未行。屬少陰。天癸既行。屬厥陰。天癸既絕。

屬太陰。治胎產之病。從厥陰始。是祖氣生化之原也。治法無犯胃氣者。是後天生化之原也。所謂三禁。不可汗。不可下。不可利小便。恐亡其津液。而傷其生氣也。大抵產病天行。從增損柴胡。雜證。從增損四物。宜詳脉證而用之。

教養宜忌論

教養宜忌之道。世人不特未諳。即有知者。亦鮮能遵而行。之難免。半產產難之虞。胎毒夭殤之患。良可慨矣。今擇其緊要者言之。婦人妊娠三月。而形像始化。未有定儀。因感而變。口談正言。身行正事。生子端正莊嚴。欲生男者。聽古

胎產心法

卷上

三禁

教養宜忌論

十

文史鑑。執弓矢。欲生女者。觀鸞鳳牡丹。施環珮。欲子美好。佩白玉。欲子賢能。看詩書。欲轉女為男之法。有以絳紗囊。佩雄黃於左者。或潛以夫髮及手足甲。置蓆下者。或潛以雄鷄尾尖長毛三莖。置蓆下者。勿令本婦知。皆外象內感。屢試屢驗者也。古者婦人有孕。即居側室。令老嫗伴宿。不與夫接。勿亂服藥。勿過飲酒。勿信師巫。勿食邪味。勿聽淫詞野傳。勿去登高涉險。勿妄針灸。勿舉重物。立不蹕。坐不邊。口不可出惡言。手不可行鞭朴。勿看日月薄蝕。勿見鬼神怪戲。母哭泣。母嗔怒。母驚恐。母沐浴。時當炎夏。雖難免。

於澡洗。然須避其熱湯。若遇嚴冬。縱然寢被清寒。切勿迫以爐炭。若心有大驚。犯之難產。子必癩癩。如或勞力過傷。腎氣不足。生子鮮顛。自家及隣家修造動土。須宜遠避。若有衝犯。令子破形殞命。刀犯者。形必傷。泥犯者。竅必塞。打擊者。色青黯。擊縛者。相拘攣。坐不實其前陰。卧不從偏一側。若就坐嗜卧。氣血則為凝滯。常見富貴之家。厚養安逸。血滯氣凝。交骨堅閉。必難生育。雖曰勿勞。時須小役。四體氣血流行。胎息易於運動。即如貧賤之婦。因時常行走動。作。踈通筋骨。開豁骨眼。所以易產。其最甚者。不遵禁忌。縱

胎產心法 卷上 教養宜忌論 十二

情交接。以擾子宮。有觸動胎元一月而墮者。有三五月而小產半產者。有胎肥碩而難產者。有敗精凝暴而碍產者。有生子多疾痘瘡稠密者。皆由縱慾之故。其三五月之胎。墮人所共知。而一月之小產。人所不覺。可不慎歟。至孕婦腰腹漸粗。飲食不宜過飽。茶湯更須節省。大熱大涼。總非所宜。有毒之物。切宜禁食。即椒薑常用之品。亦須少嘗。其豕肉醇酒濕麪之類。縱不能屏絕。不食亦不可恣噉。歸精於胎。過於蕃長。致母臨蓐難產。而子在胞中。稟質肥脆。襁褓必多羸困。婦人孕懷甫交三月。即當滿裹其腹。胎氣漸

長。僅可微熱其束。切勿因其氣急滿悶而頓放之。致胎肥難產。俱當謹遵禁戒。隨時調護。可免諸患。此乃宗祧所重。人命所關。安可視為兒戲耶。

飲食七情禁忌論

子在腹中。資母之氣血而生。孕婦飲食。皆生子之氣血者也。故凡厭忌之物。所當屏戒。苟恣性偏嗜。不但能觸動胎氣。且臨蓐艱難。能令子殘母損。慎之。戒之。○食羊肉。子多白睛。且多病。○豆醬雀肉同食。子生點黯黑子。○食羊肝。子多厄。○食鰲肉。子項短。且能損胎。○食犬肉。子無聲音。

胎產心法 卷上 飲食七情禁忌論 十二

○食鯉鱸魚。及同鷄子食。子害疝。○食螃蟹。子橫生。○食野禽肉。子無耻。且多淫。○鷄蛋同桑椹食。倒生。○食薑椒。子氣促。且痘毒盛。○食田鷄鱔魚。子瘖啞。○多食薑。子生岐指。並主多瘡。○食驢馬肉。過月難產。○多飲燒酒。子禿頭。成瞽。○食兔肉。子缺唇。○鷄肉糯米同食。子生寸白虫。○多食鹽。子鮮顛。○食冰水。並冷物過多。胞衣遲下。○食茨菇。消胎氣。○豆醬同藿香食之。墮胎。○食一切無鱗魚。難產。○食諸般菌。生子驚風而夭。○食雀腦。令子雀目。○多食酸傷肝。○多食苦傷心。○多食甘傷脾。○多食辛傷

肺。○多食鹹傷腎。○過喜則傷心而氣散。○過怒則傷肝而氣上。○過思則傷脾而氣鬱。○過憂則傷肺而氣結。○過恐則傷腎而氣下。

妊娠藥忌歌

蚘蚘水瘞地蟾蟲。

烏頭附子及天雄。

蠲蠅野葛螻蛄類。

烏喙側子與蝨蟲。

牛黃水銀同巴豆。

大戟蛇脫及蜈蚣。

牛膝藜蘆和薏苡。

金銀錫粉黃雌雄。

牙硝芒硝牡丹桂。

蜥蜴飛生與麤蟲。

胎產心法

卷上

藥忌歌

十三

代赭蚱蟬胡粉麝。

芫花薇薺草三稜。

槐子牽牛並皂角。

躑躅桃核共茅根。

乾薑礞砂與乾漆。

茵草傷胎一樣同。

瞿麥蘆茹蟹甲瓜。

蝟皮赤箭赤豆紅。

馬刀石蟹衣魚鼈。

半夏南星通草同。

凡遇胎前除各味。

又能活潑號良工。

種子補益受胎壽子論

凡妊婦衝任經虛。血氣羸弱。此本來稟賦不足。若一受孕。氣血分而蔭胎。則虛證自然百出。或孕成墮。或胎不長。

養。必資藥力以助母安胎。壽子。是以虛人。屢產生子無氣。

及育而不壽者。皆父母元氣不足故也。若少男得壯盛之

婦為之配。又能愛精。如持寶計。落紅始盡。婦人雙歲。單月。

或單歲。雙月。必經盡後。一三五七日。合陽氣日時而施。

受焉。則一舉成男矣。即婦人雙月。雙歲。單月。單歲。若經期。

逢。單日而來。必逢。單日而止。仍以一三五七日。交合。亦成。

男。孕。所以往往依俗計算而不準者。此之謂也。此乃陰陽

至理。如精養俱足。所稟既厚。體滿骨堅。何病之有。何用藥

為。自然生子神足無病而有壽。若壯陽弱陰成孕。則母無

胎產心法

卷上

種子補益壽子論

十四

餘血以蔭胎。必借藥力滋補。生血培養。方能生子精神體

壯。如弱男衰翁。得壯盛婦女。必須異床寡慾。加以藥味填

補精血。等候經期盡而陽施陰受。方能成孕。生子神健易

長。若不遠帷幙。相火易動。則陽一舉。即未交合。而靈精數

點。隨痿而出。雖候經期。又何益哉。倘遇強陰氤氳之候。即

或感而成胎。亦必易墮。苟全足月。所生之子。骨少肉多。五

遲。五軟。勢所必然。又安望其長年耶。經云。陰平陽秘。精神

乃治。又曰。因而和之。是為聖度。焉得而不藉補益之藥力

以回天平。醫可通神。切勿漫視而忽之。

種子丹 治男子陽事不舉不能堅久精薄無子並治婦人下元虛弱不能受孕服此丹自能受孕又能安胎。

生地 酒洗擇頂大枝頭熟地 擇頂大枝頭者用無灰酒九蒸九晒

天冬 去心 麥冬 去心各三兩

黃柏 十二兩分作四分酒浸一分人乳浸一分童便浸一分鹽水浸一分各浸一宿俱炒褐色

鹿茸 一對重五六兩者

以上藥味俱忌鐵器為末煉蜜丸桐子大空心鹽湯或酒送服八十九○鹿茸須擇形如茄子色如瑪瑙者看胎產心法

卷上 種子補益壽子方 五

紫潤圓短者為上破之如朽木者良毛瘦枯縐尖長生岐者為下太嫩者血氣未足無力酥塗灼去毛微炙用不塗酥則傷茸但不可炙焦有傷氣血之性亦有用酒炙者炙後去頂骨用茸鹿茸不可嗅嗅之有蟲恐入鼻類鹿茸麋茸罕能辨別大抵其質粗壯腦骨堅厚毛蒼鬣而雜白毛者為麋茸其形差瘦腦骨差薄毛黃澤而無白者為鹿茸鹿茸補督脉之正陽麋茸補督脉陰中之陽不可不辨

種子奇方 此藥艱於子者服至百日後擇婦人單

歲雙月雙歲單月及經後陽日時與婦人交即能受孕兼胎固子壽且人服鬚髮不白顏色如童

當歸 歸分作四分以童便乳汁酒醋各浸一分浸一宿各晒乾用

魚膠 各一觔 生地 如當歸治法

枸杞 沙苑蒺藜

茯苓 各八兩 人參 四兩

右末煉蜜為丸桐子大每服八十九空心煮酒吞之坎離丸 烏鬚黑髮壯筋骨大有補益精壯則婦人感而受孕其子必壽

胎產心法 卷上 種子補益壽子方 六

黑豆 不拘多少用桑椹汁浸透蒸熟再浸再蒸共五遍右為末另用紅棗量足配豆末成丸之數蒸熟去皮核搗如泥和黑豆末為丸或印成餅隨便食

延嗣酒 大有補益早晚男婦各隨量飲三五杯婦人經不對者自正經正者即受胎矣

生地 酒洗 熟地 九蒸九晒

天冬 去心 麥冬 去心各四兩

仙靈皮 八兩飯上蒸 當歸 二兩酒洗

枸杞 一兩酒浸

俱切碎。絹袋盛入大罈酒內。重湯煮。自卯至酉爲度。埋土內七日。取起用。

補益大豆方 此方秘傳固精補腎。健脾降火。烏鬚

黑髮延年。服之既久。與婦人交感有孕。其胎自固而子多壽。

大黑豆 三升

何首烏 四兩。選大而赤者。

茯苓 三兩

青 鹽 八錢

茸 草 一兩

剉爲片。先晚以磁鉢一個。盛豆入水八碗。用絹包藥置

胎產心法

卷上

種子補益壽子方

十七

內。次日以砂鍋內煮。候水乾爲度。去藥不用。取豆畧晒。用磁瓶收貯。每早晚白滾湯不時服。

山精壽子丸 此丸能延已壽。而生子又壽。無論有

病者宜服。即無病服之猶妙。凡壯年之男。種玉無

成。幼歲之婦。從不受孕。或受胎而中懷墮落。或得

正產而又生女匪男。或生而不育。或育而夭殤。即

苟延性命。難免多疾病者。此皆由正陽不足之故。

均宜服此丸。

山

藥 二兩五錢。用心結實者。有蛀者勿用。○脾虛易泄。瀉者可加多用。

黃 精 五兩二錢。取正者。另杵膏待用。○若九蒸九晒乾。杵末用更好。

黑 棗 七兩五錢。擇肥大者。去皮核及腐爛者。另杵膏待

懷牛膝 一兩五錢。去蘆淨。酒拌蒸。或視何首烏蒸晒乾用。或竟以牛膝易石解亦可。然須加倍用。石解生六

安山中。形如蚌蚌。味其體粘方正。○如孕婦忌用牛膝。竟以石解三兩代之。

大何首烏 二兩五錢。或三兩亦可。用黑豆湯浸軟。木棒打

碎。置瓦器中。底注黑豆湯。務以豆湯拌濕。蒸一炷線香時。候冷取晒。俟水乾。又拌蒸。如是九次。夏月一日三四回蒸晒可也。晒極乾秤準。

川杜仲 二兩。炒。碾取淨末。秤準。

川續斷 二兩。酒潤。剝淨肉。剉晒乾。

大熟地 四兩。煮熟者。氣味皆失。不堪用。必須九蒸九晒爲

胎產心法

卷上

種子補益壽子方

六

草覆盆子 三兩五錢。俗名拍盤菜。又名麥泡菜。蔓生。藤葉

有刺。葉面青背白。有齒尖。開紫花。結子聚成。盆

盆樣子。端有芒。先綠後黃。老熟時紅紫。味其酸

可生食。四五月熟。取七八分熟者。去蒂。以酒拌

焙乾。研末用。○陽萎者多用。○有一種木覆盆

乃樹上結者。只解酒毒。不補陽。勿用。○有一種

蓬蘽。名稍黃莓。其莖粗高。結子大。八九月熟。色

紫黑。感秋陰所成者。亦補陰虛。陽虛不可用也。

○有一種蛇莓。係蔓生草。藤葉無刺。有白毛。結

沙苑蒺藜 二兩五錢。其形如猪腰子。半截米大。臭味似菜

川巴戟天 二兩。酒浸去骨。蒸熟晒乾用。○相火不足者。多

肉苁蓉 二兩。酒洗去泥甲。但不可過洗。盡滑膩。恐傷去肉。

遠 志 二兩。茸草湯浸去骨。仍以茸草湯拌炒乾用。取淨

免絲子 四兩擇色異而大者去淨以布袋盛之洗至水清

白茯苓 二兩選結白者出六英山中或雲南者佳各處市

山萸肉 二兩去核取淨肉稱準酒蒸杵爛晒乾○精滑者

遼五味子 二兩肝氣抑結肺有熱者少用

茸州枸杞 五兩去梗蒂淨

右藥共十八味除精棗二膏餘皆共為細末徐徐上于

精棗膏內杵和極勻加煉蜜為丸小豆大每早空心百

胎產心法 卷上 種子補益壽子方 十九

沸淡鹽湯順下三四錢久服愈好○高益謙曰補陽而

專事參附著硫磺驟補其火不惟壯火食氣難免陽長

陰消陰不敵陽而能壽能子又難此方藥性不寒不熱

類多平和補陽不致陰消久服長年無疾效過多人筆

難罄書

補陽益氣煎 此方益氣強陽服至十劑頓然改觀

矣再用後丸藥三料可補氣填精也

人參 枸杞 酒洗

白朮 越炒黃各一錢五分熟地 五錢可加至八錢九

蒸九晒

巴戟天 一錢可加至一錢五分肉苁蓉 酒洗去筋膜鱗甲

茯神 杜仲 鹽水炒斷絲各一錢

遠志肉 七分甘草水製 肉桂 五分

山萸肉 二錢酒洗 龍眼肉 四枚

用水一碗半煎至八分渣再煎服○弱衰之甚多服十

劑精濃氣足

補陽益氣丸 此丸大能填精補氣雖老年亦能舉

子兼別有妙益

人參 肉苁蓉 酒洗去鱗甲泥

胎產心法 卷上 種子補益壽子方 二十

白茯苓 白芍藥 酒洗

巴戟天 當歸身 酒洗

麥冬 去心各三兩 大熟地 八兩

山萸肉 蒸去核 白朮 土炒

淮山藥 炒各四兩 川附子 一個重一兩二三錢

鹿茸 一付乳酥炙 紫河車 一具首胎者佳火焙

肉桂 遠志肉 製

柏子仁 炒研去油 杜仲 鹽水炒斷絲

補骨脂 鹽水炒 五味子

棗仁 炒去殼

炙草各一兩

砂仁 五錢去殼炒

共為細末。煉蜜為丸。如桐子大。每日空心服五錢。淡鹽湯送下。

濟陰壽子飲 此方大益胎元。而分娩易。生子易育。

瘡痘稀。婦人孕成後。每月十五服。弱甚者。一日一服。抑有餘而補不足。加減附於方後。用者擇之。

人參 一錢弱者倍之

當歸身 土炒

熟地 擇頂大枝頭。無灰酒拌。九蒸九晒。白朮 土炒。各二錢。

胎產心法 卷上 種子補益壽子方 二

川芎 八分

紫蘓

陳皮

炙草 各四分

大棗一枚。水煎。不拘時食。遠溫服。渣再煎服。○如虛肥

人。陳皮 去白。加蜜炙黃芩 五分。○泄瀉。加去心蓮子 十

枚。帶皮砂仁 三分。減地黃。○多怒。加木香 二分。磨。○口

燥。加去心麥冬 一錢。○怔忡。加炒棗仁 一錢。益智仁 一

錢。龍眼肉 十枚。

濟陰大造丸 婦人孕成後。服濟陰壽子飲。兼服此

助胎猶妙。並治產後日久腎虛腰痛。

人參

熟地 各一兩五錢

當歸身 二兩五錢酒洗

麥冬 去心

天冬 去心

山藥 炒。各一兩

五味子 五錢

黃栢 八錢

右各為末。加頭胎壯盛紫河車 一具。水洗。挑去經絡污

血。淨。酒蒸。搗爛。入諸藥末。煉蜜為丸。如桐子大。每服三

錢。白水。桂元湯任下。早晚俱可服。○如脾胃患瀉。去黃

栢。減地黃。加土炒白朮一兩。

河車大造育麟丸 治婦人血氣不足。苦於小產。或

胎產心法 卷上 種子補益壽子方 三

生而難育。或產下草迷而死。皆氣血虛而胎不旺

也。宜服此丸甚妙。

熟地 四兩九蒸九晒

紫河車 一具。頭胎肥大者。洗淨蒸爛。

山藥 炒

白朮 土炒。各一兩五錢

茯神

茯苓

人參

棗仁 去殼炒研

麥冬 去心

阿膠 蛤粉炒成珠

續斷肉 酒蒸

杜仲 鹽水炒斷絲

沙參

黃芩 蜜炙

神 麩 炒 建蓮肉 炒

條 芩 酒炒 白芍藥 酒炒

丹 皮 各一兩 當歸身 一兩五錢 酒洗

五 味 三錢 炒研

如血不熱。去條芩、丹皮。加肉桂三五錢亦可。蜜丸。梧子大。早晚秋石、桂元湯任下。每服二三錢。

胎動安胎論

妊娠胎動。有傷仆忤觸動而不安者。人皆見證施治。故無差謬。若內傷而動。所因不同。治法亦異。人多錯誤。雖然。要

胎產心法 卷上 胎動安胎論 三

不外乎虛實寒熱四端。人能察其病之所由而調劑焉。自無不安者。所以安胎之方。不可執一。若泥定某經月數。按月用藥。猶膠柱鼓瑟。執滯而不通矣。考安胎之藥。方書多用清涼。然間有宜用溫補者。不可不知。如虛而不安者。或衝任不足。受胎不實。或脾胃氣虛不能提固。又或由色慾勞倦。飲食七情所傷。務須分別。在氣在血。虛熱虛寒。或假寒假熱。察其所由。隨其疾苦而調之。虛者補之。治無不效。仍加戒慎可也。如實而不安者。或由食滯氣滯。或由於鬱怒傷肝。鬱結傷脾。觸動血脉不安。須察其由而開之導之。

可也。如寒而不安者。或吐酸嘔惡。喜熱畏寒。下寒泄瀉。或慣於小產。虛寒滑脫。屢用清補安胎而不效。脉必現沉微細弱。此屬陽虛寒證。宜用溫中安胎可也。余內人屢患小產。即遠房婦。慎起居。擇專門女科調治。總皆罔效。余雖稍通醫理。奈因王事執掌。焉能如業醫者之臨證多而機神熟耶。爰專任於醫。乃屢安而屢墮。前後凡五次。比觀其方。不過清熱養胎。補氣血。滋滑脫而已。迨後復有孕。余自診視。其脉微弱。及時大補。至七十日。如期而仍下血。腰痠而腹不痛。此正合產書云。胎動胎漏。皆能下血。胎動腹痛。胎

胎產心法 卷上 胎動安胎論 四

漏腹不痛。胎動宜調氣。胎漏宜清熱。然前已用清熱罔效。余因而思及小產既多。陰血虛寒而滑脫。陽氣虛寒而不固。爰用溫中之法。以薑炭、桂炭。加於參、朮、歸、薯、地、續、膠、艾之中。又取紅見黑止之義。不數劑而血止胎安矣。因悟及古人之治惡阻。必用二陳、六君、生薑、半夏之屬而愈。則知胎亦有溫中而安者。槩可徵矣。若夫胎熱而不安者。或煩熱渴燥。或漏血溺血。或信用煖補之藥。反受其害。動而不安。須用清熱養血可也。此虛實寒熱之各異如此。但有因母病而胎動者。治其母病而胎自安。有因胎動而及母

病者當安其胎。則母病自愈矣。凡胎動而輕。轉動不安。或微見血。察其不甚者。速用安胎飲安之。若腹痛腰痠下墜。勢若難留者。用佛手散。胎未損。服之可安。已損服之可下。下後。隨證調補之。醫者當細心詳審。圓機活法。以施治。庶得保全八九。若漫執一偏之見。虛其虛而實其實。豈非欲留而反驅之。其能無慙於衾影耶。考之保產內有云。妊娠受胎兩三個月。胎動不安。蓋由子宮虛。血海虛。多令胎墜。其危同於風燭。非正產可比。若妊娠曾受此苦。可急用杜仲丸。預服以保胎元。余常遵丹溪先生定安胎飲。諸胎產心法。卷上。胎動安胎論。五。

丹溪安胎飲 治孕成後胎氣不安。腰腹作痛。飲食不美。孕至五六月後。並宜服之。

人參 一錢 白朮 土炒
 當歸 酒洗 熟地 各二錢
 川芎 條芩 各八分

砂仁 三分帶殼 陳皮
 紫蘓 炙草 各四分
 引加薑一片。棗二枚。水煎服。○一方無砂仁。有炒白芍。加味安胎飲 治孕婦元氣不足。或胎動不安。或身熱食減。並皆治之。

人參 當歸身 酒洗
 熟地 各二錢 麥冬 一錢去心。○如煩渴加用。
 條芩 八分 白朮 一錢五分土炒

陳皮 紫蘓
 胎產心法 卷上 安胎方 六
 炙草 各四分
 不用引。水煎服。

加減安胎飲 治孕婦腹中作痛。小腹重墜。血虛氣陷之證。

人參 一錢五分 熟地
 白朮 土炒 當歸身 酒洗各二錢
 川芎 八分 紫蘓
 陳皮 炙草 各四分
 薑一片。水煎服。○寒。加吳茱萸一錢。砂仁、乾薑、各五分

安胎萬全飲 如脾胃氣弱。不能管束其胎。血弱。不

能滋養其胎。不以日月多少而常墮者。此湯主之。

更兼服杜仲丸。胡連丸佳。

人參 白朮 土炒

當歸身 酒洗 生地

條芩 微炒 陳皮

白芍藥 酒炒各一錢 砂仁 帶殼搥碎

炙草 各五分

薑三片。棗二枚。水煎服。

胎產心法 卷上 安胎方 二七

杜仲丸 附千金保孕丸 治胎動不安。腰痠疼痛。須防

墮胎。宜服此丸。與胡連丸同日服。更妙。早空心服

杜仲丸。晚食前服胡連丸。

杜仲 薑汁炒去絲 川續斷肉 酒洗各二錢

共為末。煮棗肉杵和為丸。梧子大。每服三十九。米飲下。

○保孕丸內。杜仲再加 二兩。用糯米炒去絲。以山藥糊

丸。治妊婦腰痛。苦於小產。

胡連丸 安胎聖藥。與杜仲丸同日服。

條芩 四兩。沉水者 白朮 土炒

蓮肉 去心各二兩 砂仁 微炒

炙草 各一兩

共為末。山藥 五兩。作糊為丸。如菉豆大。米飲下五十九

黑白安胎散 治胎動不安。

白朮 土炒 懷熟地黃 九蒸九晒各一兩

水煎服。○此方妙在用白朮以利腰臍。熟地以固根本。

藥品少而用專。所以取效神也。○白朮用五錢亦可。

加味四物湯 治因房事過度。觸動胎氣不安者。

歸身 酒洗 熟地

胎產心法 卷上 安胎方 二八

阿膠 蛤粉炒珠各一錢 砂仁 炒

炙草 各五分 竹茹 一團

水煎。調男子視襠灰 一錢。服。更禁房事。

四物湯 治七情觸動胎氣不安者。以四物為主。按

證加入各藥。

生地 酒浸 歸身 酒洗

白芍藥 酒炒各一錢 川芎 八分

此四物湯本方。薑棗引。水煎。食前溫服。○如因怒傷肝

者。加炒黃芩 一錢五分。人參。柴胡。甘草 各一錢。○因憂

悲傷肺者。加炒黃芩、炒阿膠、蘇葉 各一錢。五味子 十三

粒。炙草 五分。○因恐傷腎者。加製續斷、炒黃柏、炒杜仲

各一錢。五味子 十五粒。改生地為熟地。○因思慮積久

不解傷脾者。加土炒白朮 一錢五分。人參、陳皮、製香附

各一錢。炙草 五分。○因喜樂太過傷心者。加條芩、黃連、

土炒白朮、去心麥冬 各一錢。炙草 五分。○因跌撲觸動

者。安胎飲主之。歸身、炒白芍 各一錢。土炒白朮、黃芩、蘇

葉 各一錢五分。炙草、砂仁 各五分。

芩朮安胎飲 妊娠安胎主方。加減法開後。

胎產心法 卷上 安胎方 二九

白朮 米泔水浸一宿。去蘆。切片。晒乾。黃土炒香。如脾脈

虛弱。細軟。緩大無力。外證飲食少進。惡心。嘔吐。泄

瀉等證。用一錢五分。或二錢。若氣體強壯。或氣鬱

壅滯。胸腹膨悶。脹滿作痛。或素有奔豚。積聚上攻

者。忌用。

條芩 如脈洪盛有力。素多內熱。用一錢五分。或二錢。如

氣體虛寒。脾肺脈弱。嘔噦泄瀉者。忌用。

當歸身 酒洗。一錢五分。或二錢。如嗽。有痰喘。嘔噦泄瀉者。

忌用。如止有泄瀉。而無別證。以黃土炒用。

帶殼砂仁 微炒。五分。或七分。內熱者。三四分。

生知母 一錢。素多內熱者。或用一錢五分。或二錢。如氣體

虛寒。嘔噦泄瀉者。忌用。

炙甘草 三分。或四分。

以上各稱準。水煎。食遠服。○如脈弱虛細。或緩大無力。

飲食減少。口不知味。溇薄泄瀉者。加人參 一錢。或一錢

五分。炒白朮 一錢。或一錢五分。或二錢。白茯苓 一錢。廣

皮 七八分。炒條芩 一錢。去知母。○如血虛內熱。肝腎脈

洪數無力。腰疼。腿膝痠軟無力者。加熟地 三五錢。或七

八錢。生地 二三錢。酒洗芍藥 一錢。或一錢五分。炒杜仲、

酒洗當歸 一錢。或一錢五分。炒續斷 一錢。○如肝腎脈

虛。細濡弱。腰疼。腿膝麻木冷痛。加熟地 三五錢。或七八

錢。川芎 八分。製續斷肉 一錢。鹽水炒杜仲 一錢五分。酒

洗歸身 一錢五分。或二錢。去知母。○如胸腹脹悶。加麩

胎產心法 卷上 安胎方 三

炒枳殼 七分。製大腹皮 八分。醋製香附米 七分。○如素

多鬱怒。加蘇梗 八分。或一錢。醋製香附米 八分。或一錢

小柴胡 七八分。酒洗撫芎 七分。○如嘔噦。加藿香 八分

或一錢。竹茹 六七分。製透半夏 八分。陳皮 八分。帶殼砂

仁 四五分。煨薑 三片。去知母。○胃寒嘔噦。去條芩。知母

竹茹。加製去黃水吳茱萸 三分。○如虛煩。加去心麥冬

一錢。竹茹 七分。○咳嗽。加去心麥冬 一錢。蜜炙桑白皮

八分。或一錢。去皮尖杏仁 八分。前胡 一錢。麩炒枳殼 八

分。○如小便淋瀝不通。加車前子 一錢。赤苓 一錢。木通

七分。甚者。加滑石一錢五分。或二錢。○如胎動下血。倍加生知母。紋銀一小錠。忌鐵器。

紫蘘飲 治妊娠臨月浮腫喘脹。並子懸證。胎不安。上疔作痛。或臨產氣結不下等證。

當歸 酒洗 紫蘘

川芎 芍藥 酒炒

陳皮 大腹皮 黑豆水煮熟淨各一錢

人參 炙草 各五分

引加生薑 三五片 葱白 七寸 水煎服。○一方有香附。無

胎產心法 卷上 安胎方 三

人參。○若肝脾氣血虛而有火不安。宜兼逍遙散。若脾氣虛弱不安。宜用四君芎歸。○感冒風寒。去腹皮。加香豉。○胎動不安。加炒黃芩。土炒白朮。○胎不運動。加木香。砂仁。○肥盛氣滯。加製半夏。製厚朴。○虛羸少氣。加土炒白朮。倍人參。

保胎神效丸方

白茯苓 二兩 條 芩 揀實心細條。酒拌炒

白朮 未泮浸一宿。去皮切 香附米 童便浸二日。炒熟

延胡索 陳米醋拌炒 紅花 隔紙烘燥

益母草 淨葉各一兩 沒藥 三錢。用新瓦上隔火焙去油

右各製度為末。蜜丸。桐子大。每日空心。白湯服七丸。○前藥不可因其丸小。加至七丸之外。凡孕婦胎不安者。一日可服四五次。安則照常。如遇腹痛腰痠。或作脹墜。宜即服之。如受胎三五月常墮者。須先一月製服。能保足月。甚至見紅將墮者。急服此丸。亦能保留。謹戒惱怒勞力。忌食煎炒。椒辣。發氣。閉氣。糟味。冷水。冷物。切忌房勞。每藥一料。可保數胎。

佛手散 見本卷諸痛門

胎產心法 卷上 安胎方 三

惡阻論

惡阻者。謂有胎氣。惡心阻其飲食也。妊娠稟受怯弱。中脘宿有痰飲。便有阻病。其證顏色如故。脈息平和。但覺多臥少起。肢體沉重。頭目昏眩。惡聞食氣。喜噉酸醎。或嗜一物。或大吐。或時吐痰與清水。甚者。或作寒熱。心中憤悶。嘔吐痰水。胸膈煩滿。恍惚不能支持。此皆胃氣弱。而兼痰與氣滯者也。亦有素本不虛。而一受胎孕。則衝任上壅。氣不下行。故嘔逆者。又有由經血既閉。水漬於藏。藏氣不宣通。故心煩憤悶。氣逆而嘔吐。及三月餘。而嘔吐漸止。蓋三月相

火化胎之候。未能上食於母。血氣未用。五味不化。中氣壅實。其為鬱滯痰火穢惡之氣。盡衝於胃。所以有惡阻等證。及三月後。胎元漸大。則臟氣僅供胎氣。不有鬱滯。自無暇上逆矣。亦有不拘強弱。間有不病者何也。凡婦人無病。不分強弱。俱能受孕。懷子病月。不在形之強弱。在於臟腑虛實。如中宮氣健。胃中宿無痰飲。清濁自能升降。不令穢氣上壅。自無惡阻等證。即俗謂胎氣好也。又婦人懷子。喜食酸鹹果實為何。蓋陰陽交合。受胎於腎。生化於肝。二臟皆供給於胎。則肝腎不足。故喜食酸鹹以自救也。以上諸證。

胎產心法

卷上 惡阻論

三三

輕者不須服藥。乃常病也。重者須少藥調之。宜用加味參橘飲。考之古人有用半夏茯苓湯。茯苓丸。專治惡阻。又有用白朮散。人參丁香散。人參橘皮湯。醒脾飲。其中不用半夏。恐胎初結。半夏性能動胎。慮其辛燥易散。但惡阻又非半夏不止。須薑汁炒。以製其毒。故仲景用人參半夏乾薑丸。羅謙甫用半夏茯苓湯。朱丹溪謂肥人多痰。瘦人多火。用二陳加減。治胎前惡阻。痰逆嘔吐。心煩頭眩。惡食俱效。經云有故無殞是也。立齋云。半夏乃健脾胃。氣化痰滯。主藥脾胃虛弱。嘔吐或痰涎壅滯。飲食少。胎不安。必用半夏。茯苓。

茶湯。倍加白朮。安胎健脾胃。常用甚驗也。惡阻兼腰痛者。防胎墮下。猶宜二陳四物。加條芩。白朮。和中理脾。為主。不可升舉。蓋嘔逆氣已上升。再用升藥。則犯有升無降。上更實而下。更虛。益促其墮矣。再若左脈弱而嘔。服諸藥不止者。當服理血歸原藥。則愈。經云無陰則嘔。是也。後選脩諸方。用者擇取可耳。

加味參橘飲 治孕成兩三月後。惡阻嘔逆。惡食。或頭眩暈倦急者。

人參 一錢

歸身 酒洗

胎產心法

卷上 惡阻論

三四

白朮 土炒各二錢

半夏 八分製

橘紅

藿香

炙草 各四分

砂仁 三分碎

竹茹 一團

加薑一片。水煎服。○肥人加竹瀝一盞。薑汁一匙。

止嘔安胎飲 治孕婦嘔吐。百藥不效。服此即愈。

人參

青皮 麩炒各五分

廣皮

半夏 製

白茯苓 各八分

吳茱萸 湯泡去黃水微炒

炙草 各三分

加煨薑三片。水煎徐徐溫服。

歸原散 治妊娠惡阻嘔吐不止。頭痛全不入食。服諸藥不止者。

人參 川芎

歸身 白芍

丁香 炙草 各五錢

茯苓 白朮 土炒

陳皮 各一兩五錢 半夏 一兩製

胎產心法 卷上 惡阻方 三五

桔梗 枳殼 麩炒各二錢五分

共為細末。引用薑五片。棗一枚。水煎調。每服三錢。○方內丁香不若易以砂仁或荳蔻為穩。如果胃寒之甚用者亦詳慎之。

自此以下諸方。出自濟陰綱目。擇錄以備採用。

參橘散 治妊娠惡阻吐逆痰水不食。心虛煩悶。

人參 橘皮 去白

茯苓 麥冬 去心

白朮 土炒 厚朴 薑汁製各一錢

炙草 五分 竹茹 一團

引加生薑三片。水煎服。

青竹茹湯 治妊娠惡阻嘔吐不食。此方清而不寒。竹茹 彈子大一團 橘皮

白茯苓 各一錢五分 半夏 製

生薑 各二錢

水煎溫服。忌羊肉、鷄、魚、麪食。○全書加粳米一撮。

橘皮湯 治妊娠嘔吐不下食。

人參 竹茹

胎產心法 卷上 惡阻方 三六

橘皮 白朮 土炒各二錢

生薑 一錢 厚朴 一錢五分製

水煎服。○惡阻惡食。責之脾虛嘔吐。責之有火。所謂諸逆衝上。皆屬于火也。此方竹茹能平少火。厚朴能下逆氣。橘皮生薑所以開胃。人參白朮所以益脾。開胃益脾。欲其安穀云爾。

二香散 治妊娠胎動不安。氣不升降。嘔吐酸水。起坐覺重。

香附子 一兩製

藿香葉

甘草 各二錢

右為細末。每服二錢。不拘時。沸湯調下。

保生湯 治妊娠惡阻。少食。嘔吐。或兼吐瀉。作渴。

人參 一錢 白朮 土炒

香附 製 橘紅

烏梅 一方作烏藥 炙草 各五分

加生薑。水煎服。○覺惡心嘔吐。加丁香。予謂不若易。砂仁。七粒。為穩。○吐瀉作渴。則效。在烏梅矣。作烏藥者。非。

半夏茯苓湯

胎產心法 卷上 惡阻方 三七

治妊娠惡阻。嘔吐。心煩。頭目眩暈。惡聞食氣。好食

酸醜。多卧少起。百節煩痛。羸瘦有痰。胎孕不牢。

人參 白朮 土炒

陳皮 各一錢 熟地 胸滿者去之

旋覆花 無痰涎不用 桔梗

半夏 湯泡七次。薑汁炒黃 白芍 酒炒

川芎 炙草 各五分

加生薑三片。水煎。空心服。○千金方。無旋覆花。有紫菀。葉細辛。○有熱。加炒黃芩。○有客熱。煩渴。口瘡。去橘皮。

細辛。加前胡。酒炒。知母 七分。○若腹冷下利。去地黃。加

炒桂心 五分。桂心炒用。即不墮胎。然非真腹冷下利者。

不宜。○若氣逆作脹者。加麩炒枳殼。蘓梗。製香附。

小和中飲 治妊婦胎氣滯滿。飲食停滯作脹。

陳皮 茯苓

厚朴 薑汁製。各一錢五分 山查

扁豆 炒各二錢 炙草 五分

水一鍾半。加生薑三五片煎服。○如嘔者。加製半夏一

二錢。○如脹滿氣不順者。加砂仁 七八分。○如火鬱於

胎產心法 卷上 惡阻方 三六

上者。加焦梔子 一二錢。○如婦人氣逆血滯者。加紫菀

梗。製香附之屬。

以下二方。出全書新方。錄之以備採擇。

六味異功煎 治妊婦胃虛兼寒。多嘔者。

人參 二三錢 白朮 土炒

茯苓 各二錢 乾薑 一二錢 炒黃

陳皮 炙草 各一錢

水一鍾半煎服。

理陰煎 附附子理陰煎。○六味回陽飲。治妊婦肝腎

陽虛作嘔者。此理中湯之變方也。

熟地 三五七錢。或一二兩。當歸 二三錢。或五七錢。

乾薑 一二三錢。炒黃。炙草 一二錢。

水二鍾。煎七八分。熱服。治雜證。此方內或加肉桂 一二

錢。○加製附子。即名附子理陰煎。○加人參。即名六味

回陽飲。治命門火衰。陰中無陽等證。

良方半夏茯苓湯 治妊娠脾胃虛弱。飲食不化。嘔

吐不止。

半夏 湯泡七次。薑汁炒黃。陳皮

胎產心法

卷上 惡阻方

三九

砂仁 炒各一錢。茯苓 二錢。

炙草 五分。

右用薑棗烏梅水煎服。○有煎服一二劑後。用茯苓丸。

茯苓丸 治妊娠煩悶頭暈。聞食吐逆。或胸腹痞悶。

人參 赤茯苓

桂心 橘紅

半夏 湯泡七次。薑汁炒黃。乾薑 炮。各一兩。

白朮 土炒。枳殼 熬炒。

炙草 各二兩。

右為末。煉蜜丸。梧子大。每服五十九。米飲空心下。日三

服。○必。脈。遲。證。寒。方。用。薑。桂。用。者。宜。詳。審。之。○右原方。

有葛根二兩。似非所宜。故不開入方中。○一方。加去心

麥冬。○肘後方。加北五味子。

苦柚皮 不拘多少。

右一味。濃煎湯。飲數盞。即愈。吐甚者。加薑汁。

胞漏並小產論

凡妊娠經水。壅之以養胎。畜之以為乳。其衝任氣虛。不能

胎產心法 卷上 胞漏小產論 罕

約制。故月水時下。名曰胞漏。血盡。子死。然亦有妊婦血盛。

月信常來。而胎不動。俗呼狗兒胎也。若以漏胎治之。則胎

必墮。若不。以漏胎治之。其胎未必墮。亦有脈見滑數。而別

無風熱病。經脈如常。但較前畧少。此因胎小。血盛有餘。而

然。俟遲至三四月外。兒大能飲。經脈自止。今常見懷胎七

八月而生子者。人但以血止為度。謂之不足月。然其受胎

於未止之前。至此而足。月人實不知也。又有壯盛孕婦。按

月去。血點。滴。若無。腰。痠。胎。動。不。須。服。藥。此。血。氣。強。盛。孕。至

四五月後。自然經止。如孕婦虛羸。腰常痠痛。並胎動。而按

胎動。而按

月。下。血。點。滴。或。下。血。不。止。此。非。血。有。餘。乃。胎。漏。也。宜。服。加。味。補。中。安。胎。飲。又。云。胎。漏。多。因。於。血。熱。然。亦。有。氣。虛。血。少。服。涼。藥。而。下。血。益。甚。食。少。體。倦。者。此。脾。氣。虛。而。不。能。攝。血。也。宜。歸。脾。等。方。加。減。當。以。脈。候。察。之。凡。墮。胎。之。病。多。在。三。五。七。月。如。前。次。三。月。曾。墮。後。必。如。期。乘。其。所。虛。而。亦。墮。必。預。服。尊。生。安。胎。飲。或。胎。元。飲。加。減。用。之。或。泰。山。磐。石。散。安。胎。萬。全。神。應。散。等。方。對。證。擇。用。以。預。防。之。須。常。服。過。七。月。可。無。患。矣。更。宜。戒。房。慾。氣。惱。勞。役。熇。灸。諸。食。又。有。受。孕。一。月。即。墮。者。人。皆。不。覺。止。知。其。為。按。月。經。行。不。知。暗。墮。于。中。胎。產。心。法

卷上 胞漏小產論

四

矣。凡人經盡初交得孕後最宜將息絕慾若再交接以擾子宮其胎或一月三五必墮試思驢馬有孕牡者近則踢之名曰護胎所以絕無小產之患人可不慎歟至若勞怒舉重亦墮洗下體則竅開亦墮今之無子者大半一月墮胎非盡不受孕也至於頓仆傷動胎氣宜服膠艾安胎散三四月前胎未成形名曰墮胎至五六月後胎已成形名曰半產俗人均曰小產總屬妊婦氣血虛弱胎元不固蓋氣虛則提攝不固血弱則灌溉不周多致小產况婦人腎以繫胞而腰為腎之府腰痛則墮不可不防凡治胎漏

者當預培其根宜用千金保孕丸又有止漏絕神丹治漏胎甚效大凡孕婦暴下水者其胎必墮若徐徐下水可用補氣安胎藥治之有胎漏黃漿或如豆汁胎動腹痛乃肝脾濕熱用升陽除濕湯大全治用黃耆一兩川芎一錢糯米一合煎服要知小產與大產不同大產如菓熟自脫小產如生採之破其皮殼斷其根蒂忽畧成病者不少因而致死者恒多然此證始因飲血以成胎繼因精血以長養終因精血不足而萎墮故瘀血甚少倘有腹痛成塊有形多屬血虛氣逆惟有用生湯去瘀生新為妙後須大胎產心法

卷上 胞漏小產論

四

加溫補若但知消瘀破滯則逆氣愈攻而愈升多致不救戒之戒之妊婦三月後尺脈或濇或微弱胎必不固惟脈洪盛者胎不墮耳所以脈訣內云胎脈弦牢滑利安沉細而微歸泉路正此之謂也雖半產皆氣血不足然有稟質偏陰偏陽或寒或熱之異自當憑脈調治如陰虛內熱而用艾附白朮砂仁溫暖之劑則陰道愈消如草木之無雨露自然枯萎如陽虛內寒而用芩芍涼血之劑則脾胃虛寒氣血亦弱猶菓實春夏易生秋冬少結也總之三月以前宜養脾胃四月以後宜壯腰腎補血順氣佐以清熱此

大法也。

加味補中安胎飲 凡孕婦元氣壯盛受胎後尚有經來幾點乃血氣盛故耳若不腰痛腿痠不必服藥如虛羸孕婦下血不止或按月去血點滴名曰胎漏多因勞而氣血兩虛或喜食煇炙熱物過多而致宜謹房事並服補藥以保全也。

人參 一錢 白朮 土炒

當歸 酒洗各二錢 川芎

黃芩 各八分 紫蘇

胎產心法 卷上 胞漏小產方 四三

陳皮 砂仁 碎

炙草 各四分

薑一片水煎服渣再煎。

歸脾湯 附加味歸脾湯○濟生歸脾湯 治心脾鬱結

經閉發熱并治脾虛不能攝血致血妄行及經帶胎漏等證由于勞傷心脾發熱體倦食少不眠怔忡驚悸等證。

人參 白朮 土炒

茯神 棗仁 炒

龍眼肉 各二錢 黃耆 一錢五分炙

歸身 酒洗 遠志肉 甘草水製各一錢

木香 炙草 各五分

薑棗引水煎服○加柴胡梔子名加味歸脾湯○柴胡易丹皮名濟生歸脾湯。

尊生安胎飲 治血虛有火曾三個月墮胎宜服此方並預防五月七月之墮亦治胎動胎漏。

歸身 酒洗 白芍 酒炒

熟地 生地

胎產心法 卷上 胞漏小產方 四四

砂仁 阿膠 炒珠各一錢

杜仲 鹽水炒去絲 白朮 土炒各二錢

條芩 一錢五分 續斷肉 八分酒製

川芎 陳皮

藕梗 各五分

水煎服○見血加炒地榆炒蒲黃各一錢○腹痛或下墜砂仁白芍熟地倍加各分兩服之○用棗肉為丸服亦可。

景岳胎元飲 治婦人衝任失守胎元不安不固隨

證加減。或間日。或二三日。服一二劑。

人參 隨宜 當歸 酒洗

杜仲 鹽水炒斷絲 白芍 酒炒 各二錢

熟地 二三錢 白朮 一錢五分 土炒

陳皮 七分 無滯者不必用 炙草 一錢

水二鍾。煎七分。食遠服。○如下元不固而多遺濁者。加

炒山藥。炒補骨脂。五味之類。○如氣分虛甚者。倍白朮。

加炙黃耆。但耆木氣浮。能滯胃口。倘胸膈有飽悶不快

者。須慎用之。○如虛而兼寒。多嘔者。加炮薑 七八分。或

胎產心法

卷上 胞漏小產方

四五

一二錢。○如虛而兼熱者。加酒炒黃芩 一錢五分。或加

生地 二錢。去杜仲。○如陰虛小腹作痛。加枸杞 二錢。○

如多怒氣逆者。加製香附無妨。或砂仁亦妙。○如有所

觸而動血者。加製續斷肉。炒阿膠 各一二錢。○如嘔吐

不止。加製半夏 一二錢。生薑 三五片。

泰山磐石散 治婦人血氣兩虛。或肥而不實。或瘦

而血熱。或肝脾素虛。倦怠少食。屢有墮胎之患。此

方平和。兼養脾胃氣血。覺有熱者。倍黃芩。少用砂

仁。覺胃弱者。多用砂仁。少加黃芩。更宜戒慾事惱

怒。遠酒醋辛熱之物。可永保無墮。

人參 黃耆 蜜炙

當歸 酒洗 川續斷 製

黃芩 各一錢 白朮 二錢 土炒

川芎 白芍 酒炒

熟地 各八分 砂仁

炙草 各五分 糯米 一撮

水一鍾半。煎七分。食遠服。但覺有孕。三五日。常用一服。

四月之後。方無虞也。如傷五七月胎。即服。過七月之後。

胎產心法

卷上 胞漏小產方

四六

方妙。○徐東臯曰。婦人凡懷胎二三個月。慣要墮落。名

曰小產。此由體虛。氣血兩弱。藏府火多。血分受熱。而然。

醫家又謂安胎。宜用艾附砂仁熱補。猶增禍患。而速其

墮矣。殊不知血氣清和。無火煎燥。則胎自安。而固。氣虛

則提。不住。血熱則溢。妄行。欲其不墮。得乎。香附雖云快

氣開鬱。多用則損。正氣砂仁快脾氣。多用亦耗。正氣。况

香燥之品。性傷氣血。求以安胎。適又損胎。而反墮也。今

惟泰山磐石散。千金保孕丸。二方能奪化。工之妙。百發

百效。萬無一失。故表出。以為好生君子共知也。

安胎萬全神應散 治孕婦三月前後。或經惱怒。或

行走失足。跌損傷胎。腹痛腰脹。一服即安。雖然見

血。一二月未離宮者。加一劑自安。倘先三四五月

內。已經半產過者。將及前月分。畧覺腰骨痠脹。忙

服一劑即安。萬全秘傳。驗過多人。

當歸 酒洗 白朮 土炒

條芩 酒炒各一錢 熟地 八分 薑汁再浸

白芍 炒 杜仲 鹽水炒去絲

阿膠 蛤粉炒成珠 茯苓

胎產心法 卷上 胞漏小產方 芎 芩

嫩黃耆 蜜炙各七分 川芎 六分

砂仁 五分 連殼碎 炙草 三分

酒水各一碗。煎八分。空心服。○如急痛。將銅鍋煎一鍾。

即服立止。○胸前作脹。加紫蘇。陳皮 各六分。○白帶。或

紅多。加蒲黃。炒阿膠。炒地榆 各一錢。艾葉 七分。○見紅。

加製續斷肉 一錢。糯米 一百粒。

鳳衣散 治三五月小產。

用頭生鷄子。抱出小鷄之蛋殼。陰陽瓦焙黃。研末。如前次

小產在何月分。至時。預先以無灰酒衝服。可免小產。

芎根湯 治孕婦受胎數月後。胎動漏胎。及子懸。或

野苧麻根。孕一月。用一寸。加金銀煎湯。服之立安。

膠艾安胎散 治孕婦頓撲動胎。下血不止。

人參 條芩

阿膠 蛤粉炒成珠各一錢 白朮 一錢五分 土炒

當歸 酒洗 熟地 各二錢

川芎 艾葉 各八分

陳皮 紫蘇

炙草 各四分

胎產心法 卷上 胞漏小產方 芎 芩

薑一片。大棗二枚。水煎服。

增損八物湯 治妊娠漏胎。氣血兩虛。胎中有熱。下

元不固者。

人參 白朮 土炒

歸身 酒洗 白芍

熟地 艾葉

條芩 黃柏

知母 阿膠 蒲黃炒成珠。去蒲黃

炙草 各等分

薑棗引。水煎食遠服。兼用杜仲丸。

止漏絕神丹 治胎漏下血。安胎更妙。

白木 五錢。土炒。熟地 一兩。

三七根末 三錢。

水煎服。此方妙在三七末。乃止血神品。故用之奏效。

千金保孕丸 見本卷安胎門附杜仲丸下

生化湯 見下卷生化湯論後

諸痛論 附孕癰

妊娠頭痛。多因血虛。有火。用四物湯加減。若宿有偏正頭

胎產心法 卷上 胞漏小產方 四九

風。宜川芎茶調散。若外感頭痛。加味芎歸湯。

妊娠心腹痛。或宿有冷痞痰飲結聚。或新觸風寒。邪正相

擊。並於氣。隨氣上下。上衝於心。則病心痛。下擊於腹。則病

腹痛。痛不已。則胎動不安。如傷心。正心痛。則旦發夕死。夕

發旦死。如傷心支絡。則乍安乍作。醫通用正氣散加減。會

生治心痛。用定痛延胡散。醫通又曰。胸腹膨滿。按之而痛。

乃飲食停滯。用人參養胃湯。按之不痛。乃脾胃受傷。以六

君補之。腹中滿痛。又心不得飲食。千金芩朮芍藥湯。如不

時腹痛。名曰胎痛。有血虛。有氣滯二因。然血虛居多。用熟

地 三錢。當歸 一錢。煎湯治之。不應。加參朮陳皮。丹溪用四

物。去川芎。倍加熟地。醫通用四物。加香附為末。紫蘇湯下。

若氣滯者。紫蘇飲治之。若痛而重墜。因中氣虛陷。用補中

益氣湯。

如胃口痛。多因脾虛。存食不消。宜養胃消食。綱目用平胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

散。加枳殼。山查。予謂平胃散。恐致損胎。非所宜也。宜養胃

濕熱脉緩。遇天陰。或久坐而痛。多下白物。二妙散加柴胡。防風。茯苓。半夏。有寒濕。腰重。如帶物而冷者。用紫蘇飲加減。易健脾溫燥藥。有氣血凝滯。脉澹。而日輕。夜重。不得卧。遍身拘急。不舒而痛。眼生黑花。紫蘇飲加枳殼。桔梗。有膀胱風邪。頸項強直。用獨活寄生湯。有閃倒。脉實。膠艾芎歸湯。或佛手散。或熬枯黑糖。衝童便酒調服。有因毒藥者。宜阿膠散。或捷徑方。或三物解毒湯。選用。有走注痛。敗血入經之證。四烏湯加薄桂。杜續。有臨產腰痛。如脫腎者。乃將產也。勿作尋常腰痛論。產下即平復矣。不必用藥治也。

胎產心法

卷上

諸痛論

胎下少腹孕痛

五一

妊娠背脊痛。氣滯也。紫蘇飲治之。

妊娠腰腹及背痛。夫腎主腰。勞損經虛。風冷乘之。則腰痛。乘虛入腹。則腹痛。故腰腹相引而痛。痛不止。恐墜胎。又有勞傷腰腹背痛。補中益氣加杜續。然多有因病淋證而痛者。宜體察之。止用加味導赤湯治淋。淋止痛除。如勞傷元氣。八珍加杜仲。砂仁。膠艾。如脾腎不足。再加白朮。補骨脂。如傷外邪。獨活寄生湯。若氣血鬱滯。紫蘇飲加枳。桔。如肝虛有火。小柴胡加白朮。枳殼。山梔。如肝脾鬱結。歸脾湯加柴胡。枳殼。

妊娠環跳穴痛。屬腎虛。宜六味地黃湯加杜續。或千金保孕丸。

妊娠目赤痛。咽喉痛。口鼻唇舌瘡痛。俱用涼膈散加減。

妊娠負重跌撲。凝血作痛。欲服活血藥。則恐傷胎。不服。則所傷之血。留而不去。治之者。當先辨胎之死生。如無別證。

只用黑糖熬枯。入陳酒。童便調服。細嚼連皮胡荽。過口。死者當下。生者其痛即止。若因怒跌撲。或手足抽搐者。紫蘇

飲加鉤藤。倘去血過多。八珍湯去茯苓。加阿膠。艾葉。黃

耆。如跌撲餘傷未盡。痛未止。用四烏湯加延胡。木香。如傷

去而胎氣未安。紫蘇飲加童便。砂仁。如傷重者。香殼散加

熟地。當歸。以護胎。若勢劇者。下瘀血湯加芎歸酒煎。以去

血。則胎自安。此藥峻厲。必須詳慎。若昏睡語言如狂。此血

迫心胞。當歸活血湯。如腹中重墜。按之冰冷。此胎氣已傷。

急用香桂散。加酒大黃。生附子下之。若口中覺穢氣者。急

用平胃散。加芒硝下逐之。予謂下胎。莫妙佛手散。即香桂

散。亦能下胎。又何用大黃。附子。以助之。然已上四烏。香殼

下瘀。當歸活血。香桂。平胃。等方。不可輕用。少可得已。只用

熬枯黑糖。酒便調服。為妥。或嚼連皮胡荽。助之。諸方錄後。

胎產心法

卷上

諸痛論

環跳痛目咽喉

五一

以備參考可耳。慎勿輕視佛手香桂而妄用猛峻傷生。娠遍身痛。或衝心欲死。不能飲食。緣胎有水致痛也。用白木五錢。黃芩二錢。白芍四錢。入活鯉魚約重半斤外一尾。煮湯。代水煎服。此即胎水證。當入本門。因有遍身痛證。故移錄於此。以備採取治痛也。

川芎茶調散 治久風化火頭痛。及偏正頭風。

川芎 白芷

羌活 防風

荊芥 薄荷

胎產心法 卷上 諸痛論 跌蹠痛遍身痛 五三

炙草 各一兩 香附 二兩 童便浸炒。

為散。食後茶清調服二錢。日三服。婦人產後。豆淋酒服。輕者三服。重者五七服效。

加味芎歸湯 因虛外感頭痛服此。

川芎 當歸 各一錢五分。

條芩 酒炒 白木 土炒 各一錢。

細芽茶 二錢。

水煎。食後服。

藿香正氣散 治孕婦心腹痛。多寒多食。加減用之。

白木 土炒 厚朴 去皮薑汁製。

陳皮 去白 藿香

紫蘓 半夏 製。

茯苓 白芷

桔梗 炙草

大腹皮 古方無大腹皮。有蒼木。

薑棗引。水煎服。○寒。加木香。炮薑。○食積發熱。加芩連。炮薑。○氣。加砂仁。香附。○痰。加橘紅。生薑。

尊生定痛延胡散

胎產心法 卷上 諸痛方 五四

延胡 三錢 醋炒 乳香 五分。

歸身 炙草 各一錢。

水煎。加鹽滷一滴。

人參養胃湯 治食滯痞滿。

人參 蒼木 米泔水浸去皮。麻油拌炒黃色。

陳皮 去白 藿香

半夏 厚朴 去皮薑汁炒。

茯苓 草菓

炙草

薑棗烏梅引水煎服。

六君子湯 治胃虛少食。痰嗽嘔泄。

人參

白朮 土炒黃。

茯苓

橘皮

半夏 製。

炙草

生薑引水煎服。

千金芩朮芍藥湯

治妊娠腹中滿痛。又手不得飲食。

白朮 六錢 土炒。

黃芩 二錢。

胎產心法

卷上

諸痛方

五

白芍 四錢。

右三味。水煎。分三服。半日令盡。微下水則易產。日飲一劑為善。

補中益氣湯 治煩勞內傷。脉洪大而虛。喘渴。陽虛

自汗。懶言惡食。氣虛不能攝血。一切清陽下陷。中

氣不足之證。

人參 一錢。

黃耆 一錢五分。蜜炙。

白朮 土炒。

陳皮

當歸 各五分。

升麻

柴胡 各三分。

炙草 八分。

薑三片。棗二枚。水煎服。

平胃散

治胃中宿食不化。藜藿之人宜之。

蒼朮

四兩。米泔水浸。去皮。厚朴 去皮。薑汁製。

陳皮

水泡去白。

炙草 各三兩。

右四味為散。每服四五錢。加生薑三片。水煎。溫服。

膠艾湯

治婦人漏下。或半產後下血不絕。或妊娠

下血腹痛。亦治損傷衝任。月水過多。淋漓不斷。

乾地黄 二錢。

芍藥 一錢五分。

胎產心法

卷上

諸痛方

五

阿膠 蒲黃炒成珠。

艾葉

當歸 各一錢。

川芎

甘草 各八分。

水煎服。

千金托裏散 治氣血虛寒。潰瘍不收。

人參

黃耆 炙。

川芎

當歸

肉桂

白芷

防風

桔梗

白芍

天冬去心

連翹去心

忍冬

炙草

生薑引水煎服。

八珍湯 氣血雙補之藥。

人參

白朮土炒

茯苓

熟地

歸身酒洗

川芎

白芍炒

炙草

胎產心法

卷上 諸痛方

五

水煎服。

二妙散 治身半已下濕熱疼重而腫。

厚黃柏 薑汁製數次

蒼朮 茅山者佳去皮切片麻油拌炒黃色

等分爲散薑汁調每日空心溫酒送二錢。

獨活寄生湯 治風痺腰脚疼重並治產後腹痛不

得轉動及腰脚痠痛不得屈伸痺弱者宜服此湯。

去細辛治產後足膝腫或痛。

人參

歸身

白芍

川芎

熟地

桑寄生

杜仲炒斷絲

牛膝蒸

細辛

秦艽

茯苓

桂心

防風各六分

獨活九分

甘草三分

薑煎服古今錄驗無寄生有續斷因續斷亦可代寄生。

○肘後無寄生人參甘草當歸有附子。

膠艾芎歸湯 治妊娠二三月上至八九月頓仆跌

胎產心法

卷上 諸痛方

六

傷胎動不安腰腹疼痛欲死已有所下。

阿膠

蛤粉或蒲黃炒珠

川芎

當歸

乾地黄

艾葉

水煎服。○一方有甘草無地黄。

佛手散

一名芍歸湯一名當歸湯治妊娠因事築磕胎動不安或

子死腹中惡露不下疼痛不已用此藥探之若不

損則痛止子母俱安若胎損立下此方催生甚妙。

當歸

三錢或五錢去蘆酒浸

川芎二錢

先用酒一鍾煎乾。再入水一鍾。煎二三沸。溫服。○若用下胎。當為末。以酒調服。○丹溪治胎死不下。並催生。用當歸一兩。川芎七錢。酒水煎服。

阿膠散 治妊娠或因傾仆。或因毒藥。胎動不安。腰腹疼痛。或有所下。

阿膠 蛤粉炒成珠 艾葉 炒

歸身 酒浸 川芎

白芍 熟地

黃耆 蜜炙 炙草

胎產心法 卷上 諸痛方 五

生薑五片。棗三枚。水煎空心服。

捷徑方 又名白扁豆散。治妊娠誤服諸般毒藥。毒物。

及用毒藥攻胎。藥毒衝心。外證牙關緊急。口不能言。兩手強直握拳。頭低自汗。身微熱。外證與中風相似。但其脉浮而軟。十死一生。醫多不識。若作中風治。必死無疑。

白扁豆 二兩。生用去皮。

為細末。新汲水調下即效。或米飲調服。或濃煎服亦可。

三物解毒湯 治誤服毒藥動胎。

甘草 黑豆

淡竹葉 各等分 用水煎濃服。

四烏湯 治血中氣滯。小腹急痛。

熟地 當歸 酒洗各二錢

川芎 八分 白芍 一錢五分 酒炒

烏藥 六分 香附 七分 製

炙草 五分

水煎服。

胎產心法 卷上 諸痛方 六

加味導赤湯 治孕婦小便少。又澀痛者。謂之子淋。

又治溺血。

人參 生地

條芩 木通

甘草稍 麥冬 去心

赤芍 各一錢 淡竹葉 十五片

燈心四十九寸。水煎空心服。

小柴胡湯 治少陽受邪。往來寒熱。脉弦。脇痛。而嘔。

柴胡 三錢 黃芩

人參 炙草 各一錢

半夏 二錢製

生薑五片。大棗四枚。水煎溫服。

六味地黃湯 附六味地黃丸。○八味地黃丸。各全。腎氣丸。○加味腎氣丸。○濟生腎氣丸。

熟地 四錢。九蒸九晒。丹皮

茯苓 各一錢五分。山萸 去核取淨肉。

山藥 各二錢。澤瀉 一錢。

水煎服。○如作丸用。熟地 八兩。丹皮 茯苓 各三兩。山萸

山藥 各四兩。澤瀉 一兩。右方用三兩。○加肉桂 一兩。製

胎產心法 卷上 諸痛方 二

附子 五錢。名桂附八味地黃丸。又名金匱腎氣丸。○一

方。桂附 有用各一兩者。○八味再加牛膝車前 各一兩。名加味

腎氣丸。○一方肉桂易桂枝。蓋因陰氣固結於中。勢必

分解於外。則腎氣得以流布周身之意耳。但僅存其方。

而世人少有從而易之者。予按醫方中。又濟生腎氣丸。

治腎氣不化。小便濇數。並治產後脚腫。或肚腫。或成鼓

腫。乃八味丸本方。用茯苓 三兩。熟地 四兩。山藥。山萸。丹

皮。澤瀉。肉桂。各一兩。附子 五錢。加牛膝車前 各一兩。此

本金匱腎氣方中諸藥。各減過半。惟桂。苓。二味。仍照原

方。為宣布五陽。開發陰邪之耑藥。更加牛膝車前。為太

陽。厥陰之嚮導。以肝為風木之臟。凡走是經之藥。性皆

上升。獨牛膝通津利竅。下走至陰。車前雖行津液之腑。

而不傷犯正氣。既用牛膝引入至陰。又須桂附蒸動三

焦。不特決瀆有權。膀胱亦得以化。所以倍用肉桂。暗藏

桂。苓。丸之妙。用愈於五。苓。十。倍。矣。但方中牛膝滑精。精

氣不固者勿用。產後精氣本自不固。用者審之。故雜證

小便不通。濟生腎氣丸為善也。今世人所用腎氣丸。分

兩。多從此。○再考後人不分八味。加味。濟生。分兩懸殊。

胎產心法 卷上 諸痛方 三

統以金匱腎氣名之。殊覺混人。今特拈出。

東垣涼膈散 孕婦有病熱。如目赤口舌瘡之類。各

隨其證。加減用之。

黃芩 酒炒。黃連 酒炒。

山梔仁 酒炒。連翹 去心。

桔梗 生草 各等分。

薄荷葉 少許。

目赤痛者。本方加當歸。川芎。羌活。防風。菊花 各一錢。竹

葉引。○咽喉痛者。本方加牛蒡子 一錢。炒。梓碎。○口舌

生瘡者。只依本方。薑引。

香殼散 治畜血暴起。胸脇小腹作痛。

香附 薑汁製 歸尾 各三錢

枳殼 二錢 麸炒 青皮 炒

陳皮 烏藥

赤芍 蓬朮 醋炒 各一錢

紅花 五分 生草 三分

炙草 二分

共為散。每服四錢。童便空心溫服。以核朮黑糖酒助之。

胎產心法 卷上 諸痛方 三

如不應。加延胡。穿山甲。○有外感風寒。加桂枝。羌活。

下瘀血湯 治婦人產後腹痛。有乾血著臍下。

大黃 一兩 酒浸 桃仁 二十粒 去皮尖

廔蟲 二十枚 熬去足

為末。煉蜜為四丸。以酒一升。煎一丸。取八合。服之。血下

如豚肝。

當歸活血湯 治挾瘀。如見祟狀。

當歸 三錢 赤芍 酒洗

生地 酒浸別搗爛 桂心 各一錢五分

薤仁 二十粒 研 茯苓

枳殼 柴胡 各八分

炮薑 四分 紅花 二分

甘草 五分

右除生地。水煎去渣。入地黃。再煎數沸。加陳酒服之。不

應。加穿山甲 五分。又不應。加附子 三分。有實熱難用附

子者。須與大黃錢許同用。

小建中湯 見下卷脫汗亡陽門

四物湯

胎產心法 卷上 諸痛方 四

紫蘊飲

安胎飲

千金保孕丸 俱見本卷安胎門

歸脾湯 見本卷胞漏小產門


香桂散 見本卷子死腹中門

胎產心法卷之上

胎產心法卷之上

胎逆上逼脹滿子懸論

上谷



妊娠胎逆上逼。重則脹滿疼痛。謂之子懸。紫蘓飲為必用之藥。蓋因紫蘓飲為治妊娠胎氣不和。濁氣舉胎上湊。胎熱氣逆。心胃脹滿之證。且此證挾氣者居多。宜疎氣舒鬱。非紫蘓腹皮。川芎。陳皮。無以流氣。非歸芍。無以養血。氣血既利而胎自降。然邪之所湊。其正必虛。故以人參。甘草。補之。如飲食不甘。加四君子。有熱加芩。梔。歸。芍。內熱。晡熱。或胎產心法 卷上 胎逆上逼子懸論 五

四君兼逍遙散。若常常多怒。時覺脹滿。服順氣藥不應。宜用和氣安胎飲。或加味道逍遙散。胎上攻而作痛。宜紫蘓飲。或順氣安胎散。若脾虛停滯脹滿。安胎飲力薄。宜用加參平胃散。存因鬱滯者。亦宜紫蘓飲。或加味歸脾湯。有因痰結聚者。紫蘓飲加芩。連。貝。母。有因暴怒者。左關必弦。洪。肝火內動。用小柴胡。加茯苓。枳殼。山梔。大抵胎氣上逆。皆屬火旺。急用芩。木。香。附。之類。不可服大寒之藥。反致他變。予每治孕婦。心胃脹滿。用尊生和氣飲。甚效。子懸證。有兩尺。脈絕。餘脈平和。不可錯認。死胎。且死胎有面青。舌青。可辨。

宜紫蘓飲。治之則胎歸原位。脹消。脈起矣。如臨月胎上逼。心嘔。噦欲死。急用童便灌之。即下。或烏梅肉十枚。研爛。入生薑三片。煎湯灌之。亦下。取酸以降。飲之。兼辛以散。火氣之逆也。又有因坐草太早。心懷恐懼。氣結不行。紫蘓飲一服。便產。○後附針灸一方。備用。

四君子湯 治胃氣虛弱。飲食不思。倦怠少食。

人參 一錢至三錢 白朮 一錢至二錢 土炒黃

茯苓 一錢至錢半 炙草 六分至一錢

水煎服。

胎產心法 卷上 胎逆上逼子懸論 六

逍遙散 附入味道逍遙散。又名加味道逍遙散。治血虛。肝

燥。骨蒸勞熱。往來寒熱。咳嗽潮熱。月經不調。口乾。便澁。

柴胡 當歸 酒拌

白芍 酒炒 白朮 土炒

茯苓 各一錢 炙草 五分

加煨薑。薄荷引。水煎服。○一方。無茯苓。薄荷。有茯神。生薑為引。治肝脾血虛。鬱怒傷肝。血少目暗。發熱。脇痛等證。○加丹皮。梔子 各七分。名八味道逍遙散。又名加味道

遙散。治小便帶血。或過勞。及多食炒炙。宜清膀胱之火。柴胡當歸加倍。白朮加五分。

和氣安胎飲 治孕婦多怒。胸中脹滿。若用烏藥香

附砂仁順氣等藥。反加滿悶。宜服此飲。

人參 白朮 土炒

當歸 酒洗各二錢 川芎

條芩 各八分 陳皮

紫蘓 炙草 各四分

木香 二分磨汁衝服

胎產心法 卷上 胎逆上逼子懸方 六

薑引煎服。○一方無木香。有砂仁 四分。名順氣安胎散。

治孕婦胎氣上攻心腹。脹滿作痛。子懸之證。有因氣惱

者。加木香 二分。磨衝服。

加參平胃散 治孕婦脾氣虛弱。飲食停滯。以致腹

脹嘔吐。安胎飲力緩。宜用此散。

人參 白朮 土炒各一錢

蒼朮 米泔浸製 厚朴 薑製七分

陳皮 炙草 各四分

薑一片。水煎服。

尊生和氣飲 治孕婦心胃脹滿。

人參 蘓梗

白芍 酒炒 川芎 各六分

當歸 一錢或六分酒洗 腹皮 五分製淨

木香 二分磨衝藥服 炙草 三分

水煎服。

附針灸方

妊娠六七個月。飲食絕然不進。胸膈脹。水與藥皆不能下。診脈平和。又非病脈。此乃隔氣不通。藥不能治。惟針

胎產心法 卷上 胎逆上逼子懸方 六

灸可通。宜灸內關穴。即能進飲食矣。其穴在手掌大紋

後二寸兩筋間。此穴可針。亦可灸。男左女右。重則雙手

同灸。輕者七壯。重加十數壯。艾如黍大。或如麥大。寸取

本人同身寸。以男左女右手。中指屈回。用草較所屈中

指中節內紋兩頭盡處。截斷。為準一寸也。

紫蘓飲 見本卷安胎門

小柴胡湯 見本卷諸痛門

加味歸脾湯 見本卷小產門附歸脾湯下

諸血證論

妊娠漏極。如同月水。胞乾胎死。母亦難保。其調治之方。已詳論於胎漏門中。茲不重論。

妊娠吐血。凡七情內傷。六淫外感。皆足致失血之患。一主

火熱者。以氣血壅養胎元。或有所感。則氣逆而火上乘。心

煩滿悶。血隨而溢。甚者。或致墮胎。但火有虛實。之。外實火

清熱養血。虛火滋陰。補水。則血安胎固。若泛用行血清血

之劑。胎必墮。而禍不旋踵矣。如肝經怒火。加味逍遙散。膏

梁積熱。加味清胃散。鬱結傷脾。加味歸脾湯。肺經有火。黃

芩清肺飲。因氣鬱滯。紫蘊飲。氣不攝血。補中益氣。去升麻。

胎產心法

卷上 諸血證論

充

加煨葛根。腎經虛火。冬味地黃湯。

鼻衄不止。東垣涼膈散。加當歸。生地各一錢。茅花一大團。

生薑引。

咳嗽咳血。宜涼血地黃湯。醫通云。咳嗽咯衄。胎前皆不宜。

見如面赤聲啞不治。又云。凡咯吐血。多致墮胎。胎賴血養。

不宜漏溢。宜紫蘊飲。加條芩。

尿血乃熱乘血分。流滲於脬。故令尿血自尿門而下。若胎

漏。則自人門下血。可辨。宜四物。加山梔。髮灰。或阿膠。熟地。

麥冬。五味之類。如怒動肝火。小柴胡。加山梔。脾氣下陷。及

勞動脾火。補中益氣。加茯苓車前。若厚味積熱。加味清胃

散。若肝脾血熱。加味逍遙散。

腸風臟毒下血者。平胃散。去蒼朮。加槐角。防風。當歸。烏梅

治之。

加味清胃散 治胃中蘊熱。斑疹。口舌生瘡。齒齲腐

爛出血。

生地四錢 丹皮五錢

當歸 川連酒蒸

連翹去心各三錢 升麻

胎產心法 卷上 諸血證方 七十

生草各一錢五分

為散。分三服。水煎。去滓。衝犀角磨汁三四分。入藥服之。

黃芩清肺飲 治渴而小便不利。

梔子炒黑 黃芩

各等分。煎服。○予謂此方。乃治雜證發渴而小便不利。

妙在熱服。探吐。以提。則肺氣立清。然胎前血證。探吐之

法。似非所宜。若服而不吐。不特綿延。不能刻應。縱或小

差。其苦寒之性。留薄於內。大傷氤氳之氣。治胎前之證

冬味地黃湯 附九方

熟地 四錢、山藥 二錢炒、

山萸 一錢、古方分兩加倍、丹皮

茯苓 澤瀉 各七分、

麥冬 一錢、或錢半、五味子 十粒、

水煎服。○此方藥味十倍之。煉蜜丸。即名冬味地黃丸。又名八仙長壽丸。

涼血地黃湯 治妊娠咳嗽吐血、咳血、

生地 三錢、麥冬 去心、

當歸 酒洗、各二錢、黃芩 一錢五分、

胎產心法 卷上 諸血證方 七一

紫苑 知母 鹽水炒、

白朮 土炒、天冬 去心、各一錢、

犀角 八分、陳皮

甘草 各四分、

水煎服。有喘。加瓜蒌仁 一錢。

加味逍遙散 見本卷子懸門附逍遙散下

加味歸脾湯 見本卷胎漏小產門附歸脾湯下

紫蘓飲 俱見本卷安胎門

四物湯 俱見本卷安胎門

補中益氣湯

東垣涼膈散

小柴胡湯

平胃散 俱見本卷諸痛門

子腫子氣子滿論 子滿證即俗呼胎水證也、

娠子腫與子氣相類。但子氣在下體。子腫在頭面。若子滿證。又名為胎水。則在五六月已後。比子氣子腫不同。蓋胎大則腹滿。遍身浮腫。凡子氣子腫子滿。由臟氣本弱。或因泄瀉下利。耗傷脾胃。或寒熱瘧疾。煩渴加飲。濕漬脾胃。

胎產心法 卷上 子腫子氣子滿論 七一

使頭面手足浮腫也。然水漬於胞。兒未成形。則胎多損壞。故初娠。即腫。急宜調治。水去脹消。仍用六君子調補。

所謂子腫者。娠面日虛浮。多因脾胃氣虛。或久瀉所致。宜健脾利水。全生白朮散主之。或用健脾利水湯。如未應。

用六君子湯。或加腹皮。車前。又專治肢體如水氣之證。亦有用加味五皮湯。治子腫之甚者。

所謂子氣者。娠自三月成胎之後。兩足面漸腫。至臍膝。或腰以下腫。行步艱難。以致喘悶不寧。飲食不美。似水氣。

狀。甚至脚指間有黃水出者。蓋脾主四肢。脾氣虛弱。不能。

制水而發腫。肺金少。母氣滋養而氣促滿悶。諸書名曰子氣。即水氣。俗名皺脚。治此病者。先服加味天仙藤散。如不效。則服茯苓湯。再不效。服補中益氣湯。加茯苓。若飲食失節。嘔吐泄瀉。六君子湯。或加炮薑、木香、香附。若脾肺氣滯。加味歸脾湯。佐以加味道遙散。或紫蘓飲。至孕婦八、九個月。脛腿俱腫。非水氣。比不可以水氣治之。反傷正氣。凡有此者。必易產。因胞臟中水血俱多。不致胎燥也。

所謂子滿者。妊娠至五、六個月。胸腹急脹。腹大異常。或遍身浮腫。胸脇不分。氣逆不安。小便艱澀。名曰子滿。又為胎胎產心法

卷上 子腫子氣子滿論 七三

水不利。若不早治。生子手足軟短。有疾甚。致胎死腹中。宜服千金鯉魚湯。治其水。如脾虛不運。清濁不分。佐以四君。五皮。亦有用束胎飲。以治子滿證。甚效。○曾有妊娠腹脹。服鯉魚湯三五劑。大小便皆下惡水。腫消脹去。遂下死胎。此證每因懷孕腹大。終不知胎水之患。即水漬損胎也。

全生白朮散 治妊娠面目虛浮。如水腫脹。

白朮 一兩。土炒。 生薑皮

大腹皮 豆汁製淨。 茯苓皮

陳皮 各五錢。

共為細末。每服二錢。不拘時。米飲調下。○此方較澹寮五皮散稍善。中間惟白朮、易桑皮。而功用懸殊。誠點鐵成金手也。○全書云。如未應。佐以人參、甘草。

健脾利水湯 治孕婦面目虛浮。多因脾胃氣虛。或人參 茯苓 各一錢。○一方用皮。 人參 各一錢。○一方用皮。

白朮 土炒。 當歸 酒洗。各二錢。

川芎 大腹皮 黑豆水製淨。

紫蘓 陳皮 各八分。

胎產心法 卷上 子腫子氣子滿方 七四

炙草 三分。

薑皮一片。水煎服。

加味五皮湯 治孕婦面目、身體、四肢浮腫者。此胎

水泛溢。謂之子腫。○澹寮五皮散。無白朮。有陳皮。治病後浮腫。小便不利。

大腹皮 黑豆水製淨。 桑白皮 炒。

生薑皮 茯苓皮 用赤。

白朮 土炒。 加紫蘓 連莖葉。各一錢。

棗二枚。去核。水煎服。服時。以木香磨濃汁三匙。入藥內。

加味天仙藤散 治孕婦腰脚腫。虛人多有此證。

天仙藤 即青木香藤洗畧炒 製香附

紫 蘓 各六分 陳皮 四分

烏 藥 五分 木 香 二分

薑皮 三片 ○虛人加人參 一錢 土炒白朮 二錢 酒洗當

歸 二錢 或兼服補中益氣湯。

茯苓湯 治孕婦六七個月以來兩足腫大行步艱

難脚指間有黃水出此名子氣人多有之生子之

後其腫自消甚者此湯主之。

白茯苓 土炒

胎產心法 卷上 子腫子氣子滿方 七五

陳皮 製香附

烏 藥 各一錢 紫 蘓 連莖葉

炙 草 各五分 木 瓜 三片

生薑皮引水煎空心服。

千金鯉魚湯 治孕婦胸腹脹滿或遍身浮腫小便

艱澁名曰子滿又為胎水不利或胞中漬水以致

胎死腹中。

白 朮 五錢土炒 白茯苓 四錢

當歸身 三錢酒洗 白 芍 二錢

鯉 魚 一尾重二觔要活的

將魚去鱗腸加橘皮少許或五分薑七片用水扣湯煮

取汁一盞半去魚入藥四味魚汁內煎七分空心溫服

渣再製如前○如脾胃氣虛當佐以四君五皮二湯合

煎服之。

局 五皮湯 治風濕客脾面目四肢浮腫兼治胎水

五加皮 地骨皮

大腹皮 黑豆水製淨 茯苓皮

生薑皮 各等分

胎產心法 卷上 子腫子氣子滿方 七六

水煎服每服三錢。

東胎飲 治孕婦至七八個月其胎長大腹大脹滿

逼迫子戶坐卧不安謂之子滿。

白 朮 土炒 黃 芩 酒炒

蘓 葉 各一錢五分 枳 殼 麩炒

大腹皮 黑豆水製淨各一錢 砂 仁 五分連殼畧炒

炙 草 三分

薑三片水煎空心服○予謂蘓葉當易莖炒。

六君子湯

補中益氣湯 俱見本卷諸痛門

加味歸脾湯 見本卷胞漏小產門附歸脾湯下

加味逍遙散 見本卷子懸門附逍遙散下

紫蘓飲 見本卷安胎門

四君子湯 見本卷子懸門

子煩並五心煩熱及煩躁口乾論

妊娠心驚胆怯。煩悶不安。名曰子煩。竹葉安胎飲主之。大抵皆由心肺虛熱。是以撩亂心煩。或積痰於胸。吐涎惡食。亦令心煩劇。則胎動不安。如心肺虛熱。或積痰於中。千金胎產心法 卷上 子煩並五心煩熱 七

竹瀝湯。若吐甚。胎動不安。煩悶口乾。不得眠。又吐涎過多。以致外雖不熱。而覺五心煩熱。或日間不覺。而夜覺熱者。並宜加味竹葉湯。氣虛。倍人參。氣滯。紫蘓飲。痰滯。二陳。加白朮。黃芩。枳殼。脇滿。寒熱。小柴胡。脾胃虛弱。六君子。加紫蘓。山梔。至於妊娠煩躁。口乾者。緣足太陰脾。其氣通於口。手少陰心。其氣通於舌。臟腑氣虛。熱乘心脾。津液枯燥。故心煩口乾。與子煩大同小異。宜用加減參麥湯。又有用知母丸而效者。如肝經火動。加味逍遙散。若腎經火動。宜地黃丸。隨證加味用之。如孕婦口乾不眠。一味黃連散。或用

尊生加味安胎飲。查方書有婦人暴渴。惟飲五味汁之證。蓋血欲凝成胎。脉息調和。非疾病也。因肺腎二經有火。火入肺則煩。入腎則躁。胎繫於腎。腎水養其胎元。則不足以滋腎中之火。火上燥肺。變為煩躁者。金虧水涸之候。法當滋化源。清金保肺。壯水滋腎為主。

竹葉安胎飲 治孕婦心驚胆怯。煩悶不安。名曰子煩證。

人參 生地

棗仁 去殼炒研 遠志 甘草水製去骨各一錢

胎產心法 卷上 子煩並五心煩熱 七

當歸 酒洗 白朮 土炒各二錢

麥冬 去心 條芩

川芎 各八分 陳皮

炙草 各四分 竹葉 十四片

薑一片。大棗二枚。水煎服。○渴加竹茹七分。

千金竹瀝湯 治妊娠子煩。

竹瀝 一盞 茯苓 四錢

麥冬 去心 防風

黃芩 各三錢

右藥四味。以水四升。合竹瀝煮取二升。分三服。不瘥。更作。○此乃古方分兩。宜易今法用之。

加味竹葉湯 治妊娠心煩不解。名曰子煩。並治五心煩熱。○原方竹葉湯。無人參。粳米。

人參 黃芩 各一錢

茯苓 一錢五分 麥冬 二錢五分。去心。

竹葉 五片 粳米 一撮

水煎。空心熱服。○肥人。加製半夏。生薑為引。○因血虛煩熱。宜原方。兼用四物湯。○因中氣虛弱。宜原方。兼用

胎產心法 卷上 好煩躁口乾。煩熱 充

四君子湯。○一方。照原方加當歸。防風。炒梔仁。亦名加味竹葉湯。

二陳湯 治痰積嘔惡。

陳皮 一錢 半夏 製

茯苓 各一錢五分 炙草 八分

水煎服。

加減參麥湯 治孕婦心神煩躁。壅熱口乾。

人參 知母

麥冬 去心 梔子 炒。各一錢

瓜蒌根 犀角 磨。各八分

條芩 炙草 各五分

棗一枚。水煎服。○夏。加竹瀝 八分。薑汁 少許。

知母丸 又名一母丸。治妊娠因服藥。致胎氣不安。有似虛煩不得眠。巢氏謂之子煩。醫者不知。作虛煩

治之。損動胎氣宜矣。

知母 二兩。酒焙

為細末。棗肉丸如彈子大。每服一九。煎人參湯化服。

一味黃連散 治孕婦口乾不卧。

胎產心法 卷上 好煩躁口乾。煩熱 充

黃連 一錢

右為末。粥飲湯調下。或用丹溪安胎飲。加麥冬。乾葛。服之。亦妙。

尊生加味安胎飲 治孕婦口乾。

歸身 酒浸 白芍 炒

熟地 生地

砂仁 阿膠 蛤粉炒成珠。各一錢

條芩 一錢五分 杜仲 鹽酒炒斷絲

白朮 土炒。各二錢 川芎

陳皮

蘓梗 各五分

續斷 炒取淨肉

麥冬 去心

乾葛

知母 酒焙

梔子 炒黑

花粉

犀角

竹瀝 各八分

水煎服。○考曾生安胎飲本方。自歸身起。至續斷止。共藥十三味。今此方名加味。又自麥冬至竹瀝。連前共二十味。如嫌藥味過多。臨證酌而減之可耳。

紫蘓飲

胎產心法

卷上 好難五欲類 八

四物湯

丹溪安胎飲 俱見本卷安胎門

小柴胡湯

六君子湯 俱見本卷諸痛門

加味逍遙散 見本卷子懸門附逍遙散下

地黃丸 見本卷諸痛門附六味地黃湯下

四君子湯 見本卷胎逆上逼門

子淋論

妊娠小便淋瀝澀少。由氣血聚養胎元。不及敷榮滲道。遂

使膀胱鬱熱。又云。妊娠胞系於腎。腎間虛熱。移於膀胱。而

成斯證。名曰子淋。加減安榮散主之。然古方安榮散內有

滑石。但石乃鎮重之劑。恐致墮胎。若臨月。猶可。如在七八

月之前。宜去。此味加石。斛山。梔。為穩。若日久。倦怠。右脈微

弱者。此氣虛下陷。而時墜下。氣弱腸虛。而難流通。大劑參

麥。飲補氣。滋化源。其便自易。亦有治小便澀少。用生料六

味丸。加麥冬。五味。車前。為丸服之。又治孕婦小便少。澀痛

者。加味導赤湯。兼治溺血。全書云。子淋證。用安榮散不應

兼服八珍湯。如腿足轉筋。而小便不利。急用八味丸。緩則

胎產心法

卷上 子淋論 子淋方 八

不救。

加減安榮散 治孕婦小便短澀。或成淋瀝。

人參

當歸 酒洗各二錢

麥冬

白朮 一錢土炒

通草

茯苓皮 各八分

生草 五分

燈心 五分 水煎服。○原方有細辛。滑石。無白朮。茯苓皮。

○如有痰。或怒動肝火。加酒炒枯黃芩 七分。以清肺金。

○此方人參補氣。當歸調血。麥冬清肺。以滋腎源。通草

燈心利便通鬱滯。

參麥飲 見下卷暈厥門附參麥五味飲下

六味丸 見本卷諸痛門附六味地黃湯下藥料俱生用為之生料。

加味導赤湯

八珍湯 俱見本卷諸痛門

八味丸 見本卷諸痛門附六味地黃湯下○予謂桂附犯胎忌用當是麥冬車前之八味丸也。

轉胞淋閉論

妊娠轉胞乃臍下急痛小便不通凡強忍小便或尿急疾走或飽食忍尿或忍尿入房使水氣上逆氣逼於胞故屈

胎產心法 卷上 轉胞淋閉論 三

戾不得舒張所致非小腸膀胱受病而利藥所能利也法當治其氣則愈凡婦人稟受弱憂悶多性躁急食厚味者恒有之因胞不自轉為胎所壓胎若舉起胞系自疏水道自通矣用二陳升提飲又有用補中益氣湯服後探吐以提其氣自通通後即用參耆大補恐胎墮也如藥力未至脹痛難忍令老嫗用香油塗手自產戶托起其胎溺自出而脹急解須以大劑參耆補之但子淋與轉胞相類小便頻數點滴而痛者為子淋膀胱小腸虛熱也虛則不能制水熱則不能通利故淋若頻數出少不痛者為轉胞間有

微痛終與子淋不同耳論中急痛乃急欲便而痛得便則止聞有微痛與子淋點滴痛不同

二陳升提飲 治孕婦臍腹作痛小便淋閉不通或

微痛與淋有別由氣虛胎壓尿胞。

人參一錢 白朮土炒

生地各一錢五分 當歸二錢

川芎八分 半夏六分製或油炒

柴胡 升麻

陳皮 炙草各四分

薑一片水煎服○或空心飲鹽湯探吐以升其氣則下

胎產心法 卷上 轉胞淋閉方 四

自行亦一法也○予謂探吐只可救急偶用還須通後服提補之藥

補中益氣湯 見本卷諸痛門

遺尿論

妊娠遺尿不覺胎滿故也。用白薇散主之。若臍中有熱加

味逍遙散。脾肺氣虛。補中益氣湯。加益智仁。肝腎陰虛。六

味丸。曾生云。遺尿證。虛人有此。立加減。六味湯。治之甚效。

有婦人孕後。水從陰戶出不止者。千金鯉魚湯。加肉桂。人

參治之。

白薇散 治妊娠尿出不知。

白薇

白芍藥 各等分

為末。每服三錢。食前溫酒調服。○考本草謂芍藥白補赤瀉。蓋金匱而火散。故子淋方中宜用赤。而遺尿方中則宜用白也。

加減六味湯 治遺尿。虛人多有此證。

熟地 四錢

丹皮 一錢五分

山萸 去核

淮山藥 炒各二錢

白薇

白芍藥

益智仁 各一錢

胎產心法

卷上

遺尿論

遺尿方

八五

不用引。水煎服。

加味道遙散

見本卷子懸門附道遙散下

補中益氣湯

見本卷諸痛門

六味地黃丸

見本卷諸痛門附六味地黃湯下

千金鯉魚湯

見本卷子腫門

子嗽論

妊娠咳嗽屬風寒。蓋肺臟內主氣。外司皮毛。皮毛不密。寒邪乘之。則咳嗽。久亦恐墮胎。寧肺止嗽散。加減用之。亦有用蘓桔湯散寒理肺。甚有久嗽不愈。多因脾土虛而不

能生肺氣。以致腠理不密。外邪復感。或因肺虛不能生水。以致陰火上炎。治法當用補中益氣湯。以培土金。六味丸

加五味以生腎水為善。

寧肺止嗽散 治孕婦風寒咳嗽。

麥冬 二錢 去心

知母 一錢

桔梗

紫蘓 各五分

杏仁 十粒 去皮尖

桑白皮 六分

甘草 四分

水煎服。○有痰加橘紅 四分。竹瀝薑汁。○火嗽加黃芩

胎產心法

卷上

子嗽論

子嗽方

八六

八分。○虛嗽加紫苑 一錢。款冬花 六分。○寒甚加麻黃。

○虛損加瓜蒌 一錢。竹瀝薑汁。○嗽而心胸不舒。加去

心貝母、百合 各一錢。紫苑 八分。○若嗽不止。胎不安。宜

服人參 一錢。甘草 五分。去皮尖杏仁 十四粒。桑皮 一錢

紫苑 一錢二分。去心天門冬 一錢二分。桔梗 八分。烏梅

一個。水煎服。

蘓桔湯 治孕婦風寒咳嗽。

天冬 六分 去心

桔梗 一錢五分

紫蘓

黃芩

貝母 去心各八分 杏仁 十粒去皮尖

陳皮 知母

甘草 各四分

水煎服。○火動作喘。桔梗宜減。

補中益氣湯 見本卷諸痛門

六味地黃丸 見本卷諸痛門附六味地黃湯下

喘急論

妊娠氣喘不得卧。有因乍感風寒。客邪為害者。宜發散自愈。參蘓飲主之。若脾虛四肢無力。肺虛不任風寒。腎虛腰

胎產心法

卷上 喘急論

八

瘦短氣不能行步。猝然氣喘不息。此脾肺素虧。母虛子亦虛。腎氣不歸元而上乘於肺也。生脉散補中益氣湯去升

柴主之。丹溪云。火動作喘。此胎前最多。予謂嗽門蘓桔湯。

可加減用之。獲效。至於毒藥傷胎病喘。世俗往往有之。不

可不察。昔有一婦。胎死於腹。病喘不得卧。診其脉。氣口盛

人迎一倍。左關弦動而疾。兩尺俱短而離經。因毒藥動血。

以致死胎不下。奔迫上衝。非風寒作喘也。大劑芎歸湯加

催生藥服之。在牛果下死胎而喘止。此婦乃為人妾。因正

室所嫉。故用藥去之。人所不知也。考濟陰綱目內有平安

散一方。治孕婦喘急。錄後以備採用耳。

參蘓飲

人參 紫蘓

乾葛 前胡

製半夏 茯苓

陳皮 各等分 枳殼 麸炒

桔梗 木香

甘草 各減半

薑棗煎

胎產心法

卷上 喘急方

九

平安散 治孕婦上氣喘急。大便不通。嘔吐不食。腹

脇脹滿。

川芎 木香

熟地 陳皮

炮薑 厚朴 製

甘草 各一錢

水二鍾。入燒鹽一捻。煎至一鍾。不拘時服。

生脉散 見下卷暈厥門附參麥五味飲下

補中益氣湯

芎歸湯 俱見本卷諸痛門

泄瀉論

妊娠泄瀉有風寒暑濕之外感飲食生冷之內傷病發一時察其所因如胃風加味理中加味治中四苓不換金正氣胃苓等方對證而治之即愈然又有由脾腎二臟虛者不可不知夫血統於脾血擁胎元則脾陰虛而食不運化脾主健運下焦壅滯而清氣難舒於是水穀難消而作瀉或因胎繫於腎胎竊其氣以擁護而腎氣既弱命門火衰不能上蒸脾土此皆妊娠泄瀉之由也如脾虛內傷用加胎產心法

卷上 泄瀉論

八九

味六君子湯隨所因而加之命門火衰加益智以助之至于妊娠久瀉元氣下陷發熱作渴肢體倦怠用補中益氣湯密齋治妊娠泄瀉以補中安胎為主用加味四君子湯如从瀉大渴者人參白朮散主之甚效。

胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃米穀不下泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血或下如魚腦日夜無度。

人參

白朮 土炒

茯苓

當歸

川芎

芍藥 炒

肉桂 各等分

入粟米一撮水煎服。○如腹痛加木香。○此方治瀉火氣血兩虛誠妙然肉桂非火虛臟冷者斷不可用其曰胃風取其益胃而升舉也方中肉桂犯胎忌用如不得已或炒用或易桂炭如胃苓湯中肉桂亦不可不審用加味理中湯 治妊娠臍下陰冷洞瀉。

人參

白朮 土炒

白芍

茯苓

胎產心法

卷上 泄瀉方

九

乾薑

黃連

木香

藿香葉

訶子肉

肉豆蔻 麩煨

甘草 各一錢

生薑三片大棗二枚水二鍾煎一鍾饑時服。

加味治中湯 治飲食過多脾胃之氣不足運化而作瀉。

人參

白朮 土炒

炮薑

甘草 各一錢

陳皮 青皮 各七分

砂仁 五分

水煎服。

四苓散 附五苓散 治伏暑煩渴瀉水。

白朮 土炒 猪苓

澤瀉 茯苓

各等分爲末。米飲調下。○此方加肉桂。卽五苓散。

不換金正氣散 治妊婦傷濕泄瀉。

蒼朮 厚朴 薑汁製

胎產心法 卷上 泄瀉方 九二

陳皮 藿香

製半夏 各一錢 甘草 五分

薑棗爲引。水煎服。

胃苓湯 治脾濕太過。胃氣不和。腹痛泄瀉。水穀不

化。陰陽不分。此平胃散與五苓散合方也。

蒼朮 厚朴 薑汁製

陳皮 白朮 土炒

茯苓 猪苓

澤瀉 各一錢 官桂

炙草 各五分

薑三片。棗二枚。水煎。食遠服。方中有桂。孕婦忌用。或

易服不換金正氣散更妥。

加味六君子湯

人參 隨宜 白朮 一錢或一錢五分 土炒

茯苓 一錢 陳皮 八分

製半夏 一錢 炙草 五分

生薑引。水煎服。○米食所傷。加穀芽。○麪食所傷。加麥

芽。○肉食所傷。加山查。○如肝木侮土。兼寒熱。作嘔。加

胎產心法 卷上 泄瀉方 九二

柴胡。生薑。○若兼嘔吐。腹痛。手足逆冷。乃寒水侮土。加

薑。桂。○若泄瀉黃色。乃脾土本色。加木香。煨肉果。○若

作嘔。不食。腹痛。惡寒。乃脾土虛寒。加木香。薑。桂。

密齋加味四君子湯 治妊婦泄瀉。補中安胎爲主。

人參 白朮 土炒

茯苓 各一錢 炙草 八分

水煎服。○妊娠泄瀉。加炒白芍 一錢。更分寒熱治之。如

發熱而渴者爲熱。加條芩 一錢。不渴者爲寒。加炒黑乾

薑 五分。並用烏梅一個爲引。水煎。食前服。○如渴瀉日

1851205 子部醫家類 3 頁之十

久不止者。加酒炒白芍。訶子肉。炒乾薑。烏梅。二個。去核。水煎。食前服。或服人參白朮散亦妙。

人參白朮散 治人瀉太渴者。

人參 白朮土炒

茯苓 炙草各一錢

藿香 木香

乾薑各五分

水煎。頻頻與之。以代湯水。效。

補中益氣湯 見本卷諸痛門

胎產心法 卷上 泄瀉方 九三

霍亂論

妊娠因甘肥過度。腐積成痰。或七情鬱結。氣盛為火。停蓄胃中。乍因寒熱之感。邪正交爭。陰陽相混。故令心腹絞痛。吐利並作。揮霍變亂。謂之霍亂。如邪在上。則當心痛。而吐多。邪在下。則當臍痛。而利多。邪在中。脘則腹中痛。吐利俱多。吐多傷氣。利多傷血。血氣受傷。不能護養其胎。邪氣鼓擊胎元。子母未有不殞者。此危證。不可不亟治也。宜香薷散。加藿香葉。或先服後探吐之。又加味四味紫蘓和胎飲。治心腹絞痛。上吐下瀉亦效。予治孕婦霍亂。用六和湯果

效。又有回生散。七味白朮散。錄後。以備臨證擇用。再考方書。單瀉用胃苓湯。飲食停滯。用平胃散。內傷飲食。外感風寒。用藿香正氣散。皆治霍亂之劑也。

香薷散 此方治霍亂。平正之至。

香附炒 紫蘓各二錢

陳皮一錢 藿香葉

縮砂 炙草各五分

水煎服。○如轉筋。加木瓜一錢。○胎動不安。加土炒白朮一錢五分。○如夏月得之。加黃芩一錢五分。炒黃連

胎產心法 卷上 霍亂論 霍亂方 六

一錢。香薷二錢。○如冬月得之。加人參土炒白朮各一錢。炮薑五分。

加味四味紫蘓和胎飲 治心腹絞痛。上吐下瀉。

紫蘓 黃芩

白朮土炒各一錢五分 炙草以上四味和胎飲本方

藿香葉 陳皮各一錢

砂仁五分 炒

薑棗引。水煎服。

六和湯 治霍亂吐瀉。心煩腹脹。

六和湯

治霍亂吐瀉。心煩腹脹。

陳皮 四分 製半夏 七分

杏仁 十粒 去皮尖 竹茹

木瓜 各一錢 扁豆 二錢

茯苓 八分 藿香

砂仁 研 甘草 各五分

薑一片。棗二枚。水煎服。如不愈。再服四味紫蘊和胎飲。

回生散 治中氣不和。霍亂吐瀉。但一點胃氣存者。

服之回生。

陳皮 去白 藿香 各五分

胎產心法 卷上 霍亂方 九五

右剉。水煎。溫服。

七味白朮散 治脾胃虛弱。吐瀉作渴。不食。

人參 白朮 土炒

茯苓 木香

藿香 炙草 各五錢

乾葛 一兩

右為末。沸湯調服二錢。吐甚者。加生薑汁類服。

胃苓湯 見本卷泄瀉門

平胃散

藿香正氣散 俱見本卷諸痛門

中惡中暑中濕中風論

妊娠忽然心腹刺痛。悶絕欲死者。謂之中惡。即俗謂疔腸。沙是也。蓋因血氣不和。精神衰弱。邪毒之氣。得以中之。孕婦病此。亦致損胎。薛氏云。此證當調補正氣為善。用金銀藤一味。煎湯飲之。或灶心土為末。每服二錢。井水調服。白湯亦可。濟陰綱目內用散滯湯治之。又煮艾方。治正中惡極妙。

妊娠盛暑時。中暑熱之毒。其證發熱而渴。自汗。精神昏憤。

胎產心法 卷上 中惡中風論 六

四肢倦怠。少氣。清暑和胎飲主之。

妊娠中濕。或因早行。感霧露之氣。或胃水。或久居下濕地。

或大汗出浴冷水。其證發熱。骨節煩痛。身體重着。頭痛鼻

塞。黃芩白朮湯主之。

妊娠中風。因體虛則中之。乃四時八方之氣為風。自衝方

來。中人即病。中其皮毛經絡者。則發寒熱。頭項身體皆痛。

或肌肉頑痺。中其筋骨者。則拘攣疆直。中其臟腑者。則卒

倒昏悶。口眼喎斜。手足癱瘓。口噤不語。孕婦得此。不可用。

常治風之法。以補虛安胎為本。兼用搜風之劑。搜風安胎

飲治之。但胎前正中風者少。子癇之證實多。與中風見證無異。醫者當審實是中風。方可用搜風安胎。否則子癇證治也。

散滯湯 專治觸惡胃氣。傷胎肚痛。手不可近。不思飲食。

青皮 三錢 黃芩

芍藥 各二錢 歸尾 一錢五分

川芎 一錢 木香 五分

炙草 少許

胎產心法 卷上 神機中 九七

右分二貼。水三盞。先煮芩根兩大片。至二盞。去芩根。入前藥同煎至一盞。熱服。

煮艾方 治妊娠中惡。心腹絞急切痛。如鬼擊之狀。不可按摩。或吐衄血者。

熟艾 如拳大

煮汁。頻服。

清暑和胎飲

黃耆 人參

白朮 土炒 黃芩

黃連 知母

麥冬 去心 炙草 各一錢

五味 十二粒

水煎服。

黃芩白朮湯

黃芩 白朮 土炒 各五錢

蘼葉 二錢五分

薑五片。水煎服。

搜風安胎飲

胎產心法 卷上 神機中 九

歸身 黃耆 蜜炙

羌活 黃芩

秦艽 防風

炙草 各一錢

薑棗引。水煎多服。以平為期。

子癇論 又名風瘧。一名子胃。亦各類中風。附因破傷失血。吐血。衄血。致類中風。

妊娠子癇。乃為惡候。若不早治。必致墮胎。其證或口禁。項強。手足攣縮。與瘓。言語蹇澁。痰涎壅盛。不省人事。或忽然眩暈卒倒。口不能言。狀如中風。實非中風之證。不可作中。

風治。卽或無痰。言語如常。但似風狀。多因血燥。血虛亦不可概。以風治而誤也。羚羊角散主之。馮氏云。孕婦忽然僵仆。痰涎壅盛。不省人事。乃是血虛而陰火炎上。鼓動其痰。左脉微數。右脉滑大者。名曰子癇。宜四物養血。酒芩清熱。二陳化痰理氣。治法仍以安胎為主。勿過用中風之藥。此由血虛生熱。熱盛生風。皆內起之風。火養血而風自滅。若心肝風熱。用鈎藤湯。肝脾血虛。加味逍遙散。肝脾鬱怒。加味歸脾湯。氣逆痰滯。紫蘇飲。脾鬱痰滯。二陳加竹瀝薑汁。密齋云。孕婦氣虛挾痰火證。狀如中風。卒倒卽醒。醒而復

胎產心法 卷上 子癇論 附破傷吐衄血類中風 九

發。清神湯主之。兼服壽星丸。予謂。妊婦子癇。至有目昏黑而厥者。胎前絕少。但一有此證。卽是見暈。屬氣與痰。故目昏黑。發厥。只服紫蘇飲。慎不可服蘇合丸。及烏藥順氣散等藥。至於破傷失血。或吐衄血。忽患口禁。項強。背直。類中風證。皆因失血所致。不可不知。用荆防安胎散治之。

羚羊角散 治孕婦口噤項強。手足攣縮。痰壅。不省人事。

羚羊角 去殼炒各一錢
苡仁米 當歸 二錢 酒洗

獨活 五加皮

茯神 各八分 川芎 七分

杏仁 十粒 去皮尖 防風 五分

木香 三分 甘草 四分

薑引。水煎服。○虛。加人參一錢。○痰。加竹瀝五分。○胃弱。加白朮一錢。

鈎藤湯 治孕婦手少陰。足厥陰。血虛風熱。

人參 當歸

茯神 桑寄生

胎產心法 卷上 子癇方 一百

鈎藤 各一錢 苦桔梗 一錢五分

水煎服。 清神湯 治孕婦忽然眩暈卒倒。口禁不能言。狀如

中風。須臾卽醒。醒而復發。乃氣虛挾痰火子癇證。

人參 白朮

茯苓 白芍

黃耆 蜜炙 麥冬 去心

歸身 炙草 各等分

薑棗引。水煎食遠服。兼服壽星丸。

薑棗引。水煎食遠服。兼服壽星丸。

琥珀壽星丸 寧神定志去風化痰。

天南星 一觔

掘地作坑。深二尺。用炭火二十觔。將坑燒紅。去炭掃淨。用好酒五升澆之。將南星趁熱放坑內。用瓦盆急蓋定。以黃泥封固。經一宿取出。焙乾為末。入琥珀末一兩。硃砂末五錢。和勻。以生薑自然汁。煮麪糊熟。再入豬心血三個。攪勻。和末為丸。硃砂為衣。每服五十九。人參湯下。日三服神效。

荆防安胎散 治孕婦或因破傷。患類風證。

胎產心法

卷上

子癩方附破傷吐瀉

百

人參

當歸 酒洗

白朮

土炒各三錢

生地

天麻

各二錢

麥冬 一錢去心

條芩

八分

荆芥

防風

各三分

陳皮

甘草

各四分

水煎服。

二陳湯

見本卷子煩門

加味逍遙散

見本卷子懸門附逍遙散下

加味歸脾湯 見本卷胎漏小產門附歸脾湯下

四物湯

紫蘗飲

俱見本卷安胎門

痢論

妊娠痢下。因飲食生冷。脾胃不能剋化。致令心腹疼痛。傷血則赤。傷氣則白。氣血俱傷。則赤白相雜。蓋血屬陰。陰傷則受熱居多。然又有陽氣傷。不能統陰血而痢赤。又不得從事於辛溫。故治血痢。猶當以色之顯晦。驗其虛實。寒熱。故凡積之。瘀晦不鮮。清稀不稠。皆虛寒之候。即陽不統

胎產心法

卷上

痢論

百二

陰之血。急投人參薑艾。或可保全。倘不審而悞服芩連。乃速其斃也。惟積之稠粘紫赤而光澤者。合用苦燥以堅腸胃之滑脫。又必當佐以調氣之藥。則陰邪解釋。非若白痢之不可雜以芩連芍藥等味。引領滯穢。襲傷陰血也。氣屬陽。陽傷則受冷居多。即有火注下迫。皆陽氣鬱遏。本寒標熱之證。不可純歸於熱。但當驗其積之稠粘如糊。色白如脂。方可暫與清熱治標。若汁沫如水。色晦如塵。急須溫理其氣。即有熱證。皆假象無疑。其虛實寒熱既分。而又有三禁。三善。五審。之不可不知也。一禁。滌蕩腸胃。恐陽氣下陷。

胎氣愈墜。二禁。滲利。膀胱恐陰津脫亡。胎失榮養。三禁。澀滯。氣恐濁氣愈滯。後重轉加。故善治妊娠之痢。惟以調氣為先。使已敗積沫。隨氣而下。未傷津液。統之而安。夫調氣有三善。一使胃氣有常。水穀輸運。二使腹滿。腹痛。後重。漸除。三使濁氣開發。不致侵犯胎元。所謂五審者。一審飲食之進與不進。夫痢乃腸胃受病。若痢勢雖甚。飲食無妨者。易已。故痢以禁口為最劇。在初起濁邪全盛之時。不足為慮。但要清理積滯。飲食自進矣。若七日已後。尚不能食。脈反數盛。此必初時失於清理之故。急需調氣理中。則積

胎產心法

卷上 痢論

百

沫漸下。飲食漸進矣。或初時能食。至一旬一氣後。反不能食。脈息不振。此必滌蕩太過。胃氣受傷所致。亦有過用苓連。樵朴。苦寒破氣。而致呃逆嘔噦者。胃氣大敗。最危之兆。惟峻與溫補。庶可挽回。若脈見數疾無倫。或翁翁虛大。或歇止不前。或弦細搏指者。皆胃氣告匱。百不一生矣。二審。澀之通與不通。下痢清濁不分。若痢雖頻。而水道順利。者胎必無虞。若月數將滿。胎壓尿管。每多澀便頻數。轉胞脹。闕之患。切禁利水傷津。急與開提自通。但須察其脈無過壯。過硬之形。便宜補中益氣。稍加澤瀉車前。以升清降濁。

投之。無不輒應。非特妊娠為然。即平人久痢。津液大傷。而澀滯不通者。亦宜此治法也。三審。腹之痛與不痛。下痢腹痛。必然之理。然間有濁濕下趨。而無鬱沸之火者。則不痛也。但此多見於肥白人之白痢。若血痢。與瘦人多火者。罕見也。治宜調氣運積。不用清火明矣。原其腹痛有寒熱之分。痛有止歇。痛則奔迫。下墜。至圍不及者。火也。痛自下而攻擊於上者。火也。痛而脹滿。不勝摩按。熱飲愈甚者。火也。實也。痛無止歇。常時痛而無絞刺者。寒也。痛自上而奔注於下者。寒也。痛而不滿。時喜溫。手摩按。飲熱漸緩。欲至圍

胎產心法

卷上 痢論

百

而可忍。須臾者。虛也。寒也。大約初痢。脹痛為熱。為實。久痢。疴痛為虛。為寒。即初因火。注切痛。痢久。傷氣。亦必變為虛寒也。故久痢。腹痛之脈。無論大小。遲數。但以按之。漸漸小者。並屬虛寒。急需溫補。慎勿利氣。惟急痛。脈實。久按不衰者。可稍用炮黑薑連和之。四審。後之重與不重。下痢後重。濁氣壅滯也。夫開通壅滯。必以調氣為本。在妊娠猶為切要。調氣則後重自除。而胎息自安。但初痢後重。首宜開提。其滯。若久痢後重。又當升舉其陽。陽氣升。則胃氣運。胃氣運。則周身中外之氣。皆調達。而無壅滯之患矣。故治孕婦

之後重。無問胎之大小。但脉見有餘。則宜調氣。脉見不足。便與升提。雖血痢亦宜陽藥。一切滋膩血藥。總無干預。以氣有統血之功。則血無妄行之慮也。五審身之熱。與不熱。下痢為裏氣受病。若見身熱。表裏俱困。元神將何所恃。而得祛邪之力哉。惟人迎之脉浮數。可先用和營透表之法。分解其勢。然後徐行清理。若初痢不發熱。數日半月後發熱。脉來漸小。或虛大少力者。此正陰內亡。虛陽發露於外。在平人。或可用辛溫峻補飲之。以歸其源。若妊娠。則桂附。又難輕用。惟藉參朮薑芎膠艾之屬。非大劑濃煎。峻投難胎產心法

卷上 痢論

頁

望其轉。日回天之勳也。或有痢久衛虛。起居不慎。而感冒虛風發熱者。但當察其左手三部。必顯浮數之象。又需理中湯加桂枝。合表裏而治之。以內氣久虛之邪。不得參朮助其中氣。則客邪不得解散也。又有病後瘧後。或本質虛羸之人。及秋冬天令寒冷時下痢。加以胎孕扼腕。豈可與平人之痢同日而語哉。其圓機活法。因人論證。因證立方。調治之法。在醫之神聖。工巧耳。考之醫通云。常用厚朴去乾薑湯。治妊娠能食腹脹後重。積穢稠粘之白痢。厚朴生薑甘草半夏人參湯。治妊娠腹脹後重。赤白相兼之痢。黃

芩芍藥湯。送香連丸。治妊娠能食後重。積穢稠粘之血痢。連理湯。合千金三物膠艾湯。治妊娠少腹疼重。瘀晦不鮮。或間有鮮血之痢。駐車丸。治妊娠發熱後重。陰虛畏食之血痢。白頭翁加甘草阿膠湯。治妊娠熱毒內攻。噤口不食。腹脹後重。膿血稠粘之痢。千金膠艾榴皮湯。治妊娠膿血清稀。胎動不安。久泄不止之痢。補中益氣湯。治妊娠先瘧後痢。及瘧痢齊作。元氣下陷。胎氣下墜。小便頻數。或轉胞不得溺之痢。以上諸方。並加砂仁以調其氣。烏梅以調其血。未嘗不隨手輒效也。又有用當歸黃芩芍藥湯者。黃連

胎產心法

卷上 痢論

頁

阿膠湯者。俱錄方於後。以備採用。予每用一味阿膠飲。或阿膠黃連飲。均治孕婦之痢。甚妥獲效。又用加味香連湯。亦屢驗。大全治妊娠下痢。赤白痢疾。絞刺疼痛。鷄子一枚。烏鷄者更良。破孔去清。留黃用。入黃丹一錢。攪勻。厚帛糊好。鹽泥固濟。火焙乾為細末。米飲服二錢。一服愈者是男。二服愈者是女。

厚朴去乾薑湯

厚朴

去皮薑汁炒

陳皮

泡去浮白

茯苓

炙草

各等分

煎服

厚朴生薑甘草半夏人參湯

治胃虛嘔逆。痞滿不

食之證。

人參 隨宜 厚朴 一錢五分 薑製

製半夏 二錢 炙草 八分

生薑引煎服。

黃芩芍藥湯 治伏氣發溫。太陽少陽合病自利。

黃芩 白芍 各三錢

炙草 二錢

大棗四枚 擘。水煎服。

香連丸 治下痢赤白相兼。白多於赤者。

胎產心法 卷上 痢方 頁

川黃連 六兩用吳茱萸、棘去閉口者取淨一兩同黃連炒去吳茱萸不用只用川連。

木香 一兩

共末。醋糊丸。每服五十九。米湯砂仁湯任下。

連理湯 治胃虛挾食。痞滿發熱。

人參 隨宜 白朮 一錢五分 土炒焦

炮薑 六分 黃連 八分

茯苓 一錢 炙草 六分

水煎服。

千金三物膠艾湯 又名膠艾 榴皮湯 治血痢。又痢下不止。

阿膠 艾葉

酸石榴皮

三味等分煎服。

駐車丸 治陰虛下痢發熱。膿血稠粘。及休息痢。

阿膠 三兩 黃連 炒黑

當歸 各五錢 炮薑 一兩

右四味。搗篩。醋煮阿膠為丸。梧子大。每服四五十丸。晝夜三服。米飲下。

白頭翁加甘草阿膠湯 治挾熱痢下膿血。及產後

胎產心法 卷上 痢方 頁

痢不止。

白頭翁 黃連 炒黑

黃栢 炒黑 秦皮

炙草 各一錢 阿膠 三錢

右六味。先煮上五味。去滓。內膠烺盡。溫分三服。

當歸黃芩芍藥湯 治妊娠病痢。清熱和胎。行氣養

血。凡虛坐努力者。防其損胎。此方主之。

當歸 黃芩 炒

芍藥 炒 黃連 炒

白木土炒

枳殼蘇炒

茯苓

陳皮

生地

生草各一錢

木香五分

烏梅一個

水煎。空心服。

黃連阿膠湯 治妊娠痢病。日久不止。

黃連炒

阿膠炒

人參

白木土炒

茯苓各一錢

木香七分

胎產心法

卷上 痢方

夏

乾薑炒

炙草各五分

烏梅三個

薑棗引。水煎食前服。

一味阿膠飲 治孕婦痢疾。

阿膠上好正者

不拘多少。酒化服。日數次。隨意飲之。白愈。

阿膠黃連飲 又名黃連阿膠湯 治孕婦痢疾。若安胎

則痢愈重。治痢則胎難全。宜服此飲。

阿膠 能止膿血之痢。且止腰痛。固胎。以之為君。黃連

芍藥

甘草皆以為佐

枳殼蘇炒。少加二三分。以寬其後重。

水煎服。一劑痛痢俱減。去枳殼再服。

加味香連湯 治孕婦痢證。

白芍

黃芩各二錢

黃連

陳皮各一錢

茯苓六分

木香五分

黃栢八分

乳香

沒藥各半分

胎產心法

卷上 痢方

夏

酒煎服。

千金膠艾檮皮湯 即本門三物膠艾湯

補中益氣湯 見本卷諸痛門

瘧論

妊娠患瘧。無論胎息月數多少。總以安胎為主。而世之所謂安胎。無過黃芩、白朮。不知黃芩乃治熱盛胎動不寧。白朮乃治脾虛胎氣不固。若氣虛下陷。誤用黃芩。氣滯壅逆。誤用白朮。為害何可勝言。予於前安胎方中。亦多有用芩朮。然亦有棄而不用者。總視其病之宜忌。及人之氣血所

謂可與意會。難與言傳。業醫之活法。在隨機應變耳。要知胎息安與不安。全在母氣之調與不調。故安胎先安母氣。未有母氣乖戾。而胎獨安之理。亦有因胎氣有故而致母病者。則先治胎。而母病自愈。如子死腹中之類是也。又安有不去其胎。而母得無恙乎。故善治胎產證者。必審孕婦形體之肥瘦。氣血之偏盛。若形色蒼。肌肉脞堅者。必多濕多痰。無論何疾。必顯濕熱本病。脉多滑實有力。絕無虛寒脉弱之候。可峻用豁痰理氣藥。治其本質。然後兼客邪見證而為製劑。治宜二陳湯。隨經加透表藥。或合小柴胡用

胎產心法

卷上 瘧論

五

之。蓋柴胡為瘧證之嚮導。故多用之。然有自汗過多。尺中微弱。或熱盛手足清。始不用柴胡。而用建中。桂芍收功者。或見煩渴脉實。大便六七日不通。陽明府實。又宜涼膈去硝黃。加鮮首烏調之。須知稟質堅固者。其氣多滯。內外壅遏。但有濕熱。絕無虛寒之患。如元氣本弱。或病後得之。必需理脾行氣。惟六君子湯為合劑。有痰食結滯。則加枳實。草菓。內有寒。加炮薑。外受風。加桂枝。胎動上逆不安。加子芩。胎下墜。加柴胡。倍人參。以參乃舉胎聖藥也。間有不應。又需補中益氣湯升舉之。若中有留滯。則枳實理中。加

桂枝柴胡。合表裏而治之。大抵病邪初發。元氣未耗。疏風滌痰。消導飲食。在所必需。然宜大劑白朮。培護中土。以脾胃為一身之津梁。土厚自能載物。其最可慮。在三四發至六七發。其勢最劇。若過半月。雖淹纏不止。邪熱漸衰。可無胎隕之虞矣。或有瘧久。氣血虛敗而小產者。此皆失於調治也。若六七發後不止。即當和營健脾。若稟質柔脆。雖有風邪。不得純用表藥。以風藥性升。能使胎氣上逆。而為嘔逆喘脹。膈塞痞滿之患。雖有實滯。不得過用降泄之味。能引邪氣下陷。致胎墜不安。而為泄利不食。小腹疼重之患。

胎產心法

卷上 瘧論

五

矣。若疫瘧毒盛勢劇。急與涼膈承氣。黃連解毒救之。瘧瘧昏昏不爽。煩熱大渴。或壯熱無寒。或先熱後寒者。當與桂枝白虎。人參白虎。撤其在裏之熱。不可與夏秋疴瘧比例而推也。蓋有是證。用是藥。有故無隕。惟在速祛邪毒。以救胎息之燔灼。若遲疑未決。下手稍軟。救無及矣。又有氣血虛損。其瘧由虛致。不因暑氣而作。如經云。陽微惡寒。陰弱發熱。或風寒因虛而乘之。若寒熱不已。重蒸其胎。胎亦受傷而墜。宜輕解表邪。兼大補氣血。以主之。更有患胎瘧者。一遇有胎。瘧病即發。此人素有肝火。遇孕則水養胎元。肝

虛血燥。寒熱往來。似瘧。非瘧也。以逍遙散清肝火。養肝血。兼六味丸以滋化源。寒熱自退。世醫治妊娠瘧初起。用散邪飲。不愈者。用截瘧湯截之。又有初用柴胡知母湯以平為期。瘧久不退。則用七聖散截之。然截藥內常山傷胎。萬不得已。須用白朮煎水。煮透用之。然亦宜少用。即尋常治瘧。再以白朮製之。方免嘔泄。又夜明砂單方。亦治孕瘧。予常用。加減丹溪安胎飲。治孕瘧甚覺穩妥。有效。從未用截藥。而孕瘧未嘗不愈也。

枳實理中湯 ○附理中湯 ○又附子理中湯 治胃虛胎產心法 卷上 瘧方 厚

挾食及結胸本虛不能受攻。

人參 一錢至三錢 白朮 一錢至二錢 土炒焦

炮薑 炙草 各五分

枳實 七八分 麸炒 茯苓 一錢

水煎服。○此方參朮薑草四味。方名理中湯。治胸痺。心胸痞氣。霍亂吐瀉不渴。一切脾胃虛寒。嘔吐清水。飲食不入。完穀不化。○理中湯內加熟附子。名附子理中湯。如方中人參用一錢。附子則宜用三分。

承氣湯 治少陽陽明府證。

大黃 四錢 生厚朴 六錢 製 枳實 三枚 此方胎產忌用。錄之以備參考。

黃連解毒湯 治熱邪內外俱盛。

黃連 黃芩

黃栢 山梔

等分煎服。

桂枝白虎湯 ○附白虎湯 ○人參白虎湯 治溫病感冒客邪而渴及溫瘧先熱後寒。

胎產心法 卷上 瘧方 厚

石膏 四錢 生用 碎 知母 一錢五分 生

炙草 五分 粳米 一撮

桂枝 七分 半

水煎服。○此方去桂枝。即白虎湯正方也。○去桂枝。加人參一錢。名人參白虎湯。治熱病大渴。發熱背寒。

散邪飲 治瘧初起。

羌活 柴胡

紫蘓 陳皮 各六分

蒼朮 米泔水製 厚朴 薑汁製

製半夏

青皮 各七分

水煎服。不愈者。服後截瘧湯截之。

截瘧湯

白朮 土炒

山查 並子

枳柳

常山 白酒煮乾。炒紫色。再用白朮煎水煮透更妙。各八分

草菓

神麩 各四分

水煎。遇發日五更服。

柴胡知母湯 治孕婦病瘧。不可輕用截藥。恐致損胎。此湯主之。

胎產心法

卷上 瘧方

頁五

柴胡 一錢五分

知母

人參

黃芩

白朮 土炒

歸身 各一錢

甘草 五分

薑棗引。水煎。多服。以平為期。

七聖截瘧散 如瘧久不退。轉甚者。宜用此散截之。

柴胡 一錢五分

黃芩

知母 各一錢

常山 八分。白酒煮乾。炒紫色。再用白朮煎水煮透更妙。

草菓仁 五分

烏梅 二枚

水酒各半煎。露一宿。臨發日。五更溫服。忌生冷鷄魚麪

食。○原方有炙甘草。予恐常山合之而作吐。故去之。

明砂止瘧丹

夜明砂 三錢

為末。茶清調。空心服。○予謂此藥能行血。且下死胎甚

速。非瘀血積聚成瘧。及久成瘧母者。不可輕用也。

加減丹溪安胎飲 治孕婦瘧疾。

白朮 土炒

當歸

熟地 各二錢

川芎

胎產心法

卷上 瘧方

頁六

條芩 各八分

製半夏 七分

人參 一錢

藿香 五分

草菓

青皮 各三分

紫蘊

廣皮

炙草 各四分

烏梅 二枚

薑一片。煎服。

二陳湯 見本卷子煩門

小柴胡湯

建中湯

涼膈散

六君子湯

補中益氣湯

俱見本卷諸痛門

人參白虎湯

見本門附桂枝白虎湯下

逍遙散

見本卷胎逆上通門

六味丸

見本卷諸痛門附六味地黃湯下

傷寒溫熱時疫論

娠傷寒時值冬令。為寒所傷。其輕者。浙浙惡寒。愈發熱。微嗽鼻塞。數日即愈。不藥亦可。或用葱白連鬚三五莖。

胎產心法

卷上

傷寒溫熱時疫論

頁七

生薑三片煎服。即解。如所感者重。以致頭疼。先寒後熱。久必傷胎。藥多避忌。務宜謹慎。不可與常婦概治。竟用發表。以致損胎。誤其母子性命。但服葱白香豉湯自愈。故千金治妊婦傷寒。用葱白生薑水煎熱服。取汗即安。是以葱白香豉湯。香蘼散。可解表邪。又可安胎。况葱白不惟性能解表。且善安生胎。下死胎。若感寒孕婦。胎傷未死。但用葱一把。水煑食之。汗出即安。如胎已死。須臾自出。不應。加生薑蘼葉。不可輕用。表藥。招尤。若妊娠邪在半表半裏。擇綱目內黃龍湯。即小柴胡湯變體用法。其加減亦可採擇而用。

如表證已愈。但發熱大渴。用香蘼散。加金花湯。便結者。加

入大黃。或用三黃解毒湯。所以凡胎前疫證。與傷寒陽明

府證。內實便秘。須急通大便。方不損胎。若大便自利。乃正

氣下泄。胎必難保。惟大小便如常。知裏無熱。則不傷胎氣。

故又有塗臍護胎之法。其或汗或下。各隨表裏脈證主治。

至娠熱證。亦須急治。恐致落胎。千金用葱白香豉湯。取

汗即愈。又有用柴葛安胎飲者。如嘔吐煩躁。用生津葛根

湯者。甚則班出黑色。用梔子葱豉湯者。密齋用加味化班

湯。此皆熱入於裏。陽明證之方藥也。醫通治孕婦溫熱時

胎產心法

卷上

傷寒溫熱時疫論

頁八

行。及傷寒邪氣內犯。熱毒逼胎。並宜千金石膏大青湯急

救。庶可保全。遲則不救。又有石膏六合湯。升麻六合湯。立

方甚穩。錄後以備採用。凡胎孕藥內。不得已而用大黃轉

藥。須用酒製薑桂附子。用黃連甘草製之。則無害矣。

葱白香豉湯 千金治時疫傷寒。三日已內。頭痛如

破。及溫病初起寒熱。

葱白 連鬚一握

香豉 三合

右二味。水煎。入童便一合。日三服。秋冬加生薑二兩。此

方藥味雖輕。功效最著。凡虛人風熱。伏氣發溫。及產後

感冒靡不隨手獲效。與產後痢後用伏龍肝湯丸不殊。既可探決死生。且免招尤取謗。正危證解圍良劑也。

尊生香薷散 治妊婦傷寒。勿論日數。但見惡寒頭疼。此方主之。

香附 炒黑 紫 蘓 各二錢

陳皮 一錢 甘草 五分

引加生薑三片。葱白五寸。煎服。○頭疼。加川芎 一錢。白芷 一錢。羌活 一錢。防風 一錢。○如表證愈。但發熱大渴。

加金花湯。○便結者。加製大黃 一錢。

胎產心法 卷上 傷寒溫熱時疫方 頁九

金花湯

黃連 黃芩

黃栢 梔子 各一錢

水煎服。

濟陰香薷散 與尊生方同。此則分五臟脉證加法。故重錄以備擇用。

香附 炒黑 紫 蘓 各二錢

陳皮 一錢 甘草 五分

生薑三片。葱白五寸。煎服。○頭痛。加川芎。白芷。各一錢。

名芎芷香薷飲。○如惡寒裏和。外證見面青善怒。得肝

脉浮弦。加羌活。防風。○如惡寒裏和。外證見面黃善噫。

得脾脉浮緩。加白朮。防已。各一錢。○如惡寒裏和。外證

見面白善噎悲。得肺脉浮瀄。加黃耆。防風。各一錢。○如

惡寒裏和。外證見面黑善恐。得腎脉浮濡。加吳茱萸。一

黃龍湯 治妊婦傷寒。得之三五日後。有惡寒發熱。

內有煩渴引飲。小便赤澀之證。此邪在半表半裏。宜此方主之。

柴胡 二錢 黃芩 一錢五分

人參 甘草 各一錢

胎產心法 卷上 傷寒溫熱時疫方 頁十

薑棗為引。水煎服。○如寒熱往來。無汗口乾。加葛根 二

去棗。入葱白 三根。○如頭疼不止。加川芎。白芷 各一錢

去棗。加葱白 三根。○如發熱有汗。口渴。加土炒白朮 一

錢半。括蕪根 一錢半。○如脉浮大有力。大熱大渴。人參

白虎湯去薑棗。○如心煩不得卧。加白茯苓。去心麥冬

各一錢。○如嘔噦。加製半夏。白茯苓。各一錢。去棗。○如

胸膈滿痛。加炒枳殼。炒黑香附。川芎。各一錢。○如大便

秘。初加製大黃 五分。得利則止。不利加 一錢。以利為度。

三黃解毒湯 治妊婦傷寒五六日後。表邪悉罷。並

無頭痛惡寒之證。止煩躁發熱大渴。小便赤。大便秘。或利下赤水。六脉沉實。此病邪在裏。此湯主之。

黃芩 黃連

黃栢 山梔

大黃 各等分

煎服。

護胎法 治妊娠傷寒熱病護胎。

白藥子 不拘多少

為末。以鷄蛋清調攤於帛上。如碗大。貼臍下胎存處。乾

胎產心法 卷上 傷寒溫熱時疫方 頁三

則以濕水潤之。

又法 治孕婦一切有熱。內外諸證。

伏龍肝 不拘多少

為末。用井底泥調敷心下。令胎不傷。

柴葛安胎飲 治孕婦熱病。骨節疼痛。如不急治。則

落胎。

柴胡 葛根

青黛 各八分 石膏 一錢五分

升麻 五分 梔子 一錢

知母 七分 葱白 三根

水煎服。○有痰。加竹瀝 一小盃。薑汁 二匙。

生津葛根湯 治孕婦熱病。嘔吐不食。胸中煩躁。

人參 葛根

蘆根 麥冬 去心

知母 炒 梔子 炒 各一錢

竹茹 一團 葱白 三寸

水煎服。

梔子葱豉湯 治孕婦熱病。班出赤黑色。小便如血。

胎產心法 卷上 傷寒溫熱時疫方 頁三

氣急欲絕胎落之證。

梔子 炒 黃芩

升麻 各一錢 生地 二錢

青黛 八分 豆豉 四十九粒

杏仁 十二粒 去皮尖 石膏 一錢五分 煨

葱白七寸為引。水煎服。

加味化斑湯 治孕婦傷寒熱病不解。遍身發斑。赤

如錦文者。

人參 知母

生地

黃芩

梔仁

甘草 各一錢

石膏 二錢

淡竹葉 二十片

豆豉 半合

水煎食遠服。

千金石膏大清湯 治妊娠傷寒。頭疼壯熱。肢節煩

痛。此方既可散邪。又能安胎。尤為孕婦傷寒溫熱

時行神方也。

石膏 二錢

大青

胎產心法

卷上

傷寒溫熱時疫方

五

黃芩 各八分

前胡

知母

梔仁 各一錢

葱白 一莖

水煎溫服。

石膏六合湯 治妊娠傷寒。身熱大渴而煩。

當歸

川芎

白芍

生地 各一錢

石膏 煨

知母 各五分

水鍾半煎一鍾溫服。

升麻六合湯 治妊娠傷寒下後。過經不愈。濕毒發

斑如錦紋者。

當歸

川芎

白芍

生地 各一錢

升麻

連翹 各七分

水煎溫服。

識語論

妊娠識語。為臟腑熱極之候。急宜童便時時灌之。不應。用

生地黃黃連湯。清其血中之火。庶胎得安。脈實者。加酒大

胎產心法

卷上

識語論

五

黃下之。下遲則傷胎也。亦有傷胎胎下而下血。心神無主

謔語。雖用峻補。亦難有效。其治法方藥。俱載產後妄言妄

見門。若孕婦證見舌青者。其子已死。腹中急。當下之。若雙

胎一生一死者。必腹中半邊冷。半邊熱。如母患熱證。臟腑

熱甚蒸其胎。兒因致死。但服黑神散。加生蒲黃以煖其胎。

則胎即出矣。胎未死。并泥塗臍。以護胎氣。多有保全者。

生地黃黃連湯 治失血後燥熱。瘵縱。脈數盛者。

生地 二錢

防風

川芎 各八分

當歸 一錢五分

黃連七分

黃芩炒

山梔炒黑各一錢

赤芍一錢

水煎服。

血證黑神散 治吐血衄血屢發不止。

炮薑

肉桂各一兩

熟地四兩

當歸

蒲黃篩淨炒黑各三兩

白芍酒製

炙草各二兩

右為散。每服四錢。用黑豆半合。微炒香。淋酒半盞。和水

胎產心法

卷上 讞語方

百五

半盞煎一半。入童便半杯和服。氣虛加人參三兩。炙黃

耆六兩。以固衛氣。庶無營脫之患。○一方。熟地、蒲黃、炮

薑、歸、芍、桂心、各二兩。炙草三錢。黑豆二合五勺。炒去皮。

共為末。每服二錢。童便和酒下。○世以豆去殼。同藥為

散。不知豆之功全在殼也。

傷風論

娠傷風。皆由於天氣寒暄不一。或暴寒。暴熱。人失防範。起君不慎。即鼻塞。流涕。微嗽。惡風。常作噴嚏。與傷寒之輕者相似。但傷寒惡寒。此則惡風。有問耳。宜香薷散。去香附。

加葱豉。咳嗽多痰。加桔梗。或紫蘇飲加葱豉。安胎為妙。嗽

兼瀉。氣口脈滑實有力。中有宿食者。胃苓湯去蒼朮。俟脾

胃調。方理其嗽。予謂傷風咳嗽。總不如濃煎葱頭湯。為上

蓋。風藥皆能墮胎。故嗽喘胎寒。多用連鬚葱湯。大能安胎。

散。氣胎始無虞。或加香豉。猶妙。若不喘者。紫蘇飲加砂仁。

童便

香薷散 見本卷霍亂門

紫蘇飲 見本卷安胎門

胃苓湯 見本卷泄瀉門

胎產心法

卷上 傷風論

百五

傷食論

娠傷食。多由脾胃中氣虛弱。不能運化。故東垣云。脾胃

之氣壯。則過時不饑。多食而不傷。蓋胃主司納。脾主消化。

凡素常脾胃虛弱。飲食難化。以白朮、陳皮等分為末。神麩

糊丸。常服。最善。枳朮丸。但可暫用。枳實、峻厲。能耗正氣。治

者。慎之。又經云。飲食自倍。腸胃乃傷。若飲食不節。生冷厚

味。恣性食噉。致傷脾胃。若投以峻劑。則脾胃復傷。而胎亦

損。且胎以脾胃為主。脾胃強。則胎系如懸鐘。而不墜。若傷

食不化。則脾困而胎不能固矣。故凡治消食導滯。皆先以

補脾健胃為主。兼推揚穀氣。則飲食自化。若徒事消尅。使脾傷。而又傷化源之機。告竭。胎元猶易於墮耳。予治傷食。用砂仁合四君子湯。或香砂四君合平胃散。屢獲有效。世有用平胃散本方。治孕婦傷食。此必少壯村婦。粗糲粘滯之食。填滯於中。肚腹作痛。不得不平其胃土。如富貴之家。皆美食恣啖。臟氣素嬌。未有不兼補而施治也。况平胃散。加以朴硝。即為下胎峻劑。用者可不慎乎。予再考方書有用六君子湯為主。分別肉麩。米魚腥。辛熱生冷所傷。而加以山查。麥芽。酒麴。陳皮。黃連。砂仁。木香。視其所因而加入。

胎產心法

卷上

傷食論

臟燥悲

頁七

甚為穩妥。如傷肉食。加山查於六君子湯內。餘以類推。

四君子湯

見本卷胎逆上逼門

平胃散

六君子湯

俱見本卷諸痛門

臟燥悲傷論

妊娠臟燥悲傷欲哭。象如神靈所憑。數欠伸。蓋肺志為悲。胎熱火炎。肺不自持。故悲。屬肺病燥也。胎前氣血壅養胎元。則津液不能克潤。而肺為之燥。當補母。仲景用甘草小麥大棗湯主之。因甘草大棗補脾。治以甘緩。佐以涼瀉。無

不愈矣。立齋用淡竹茹湯。佐八珍湯。其用八珍補養氣血。更發前人之所未發。又治臟燥悲哭。及自笑自哭。用紅棗燒存性。米飲調下。

甘草大棗湯 治婦人臟燥悲傷不止。

甘草 三兩

小麥 一升

大棗 十枚

右以水六升。煮取三升。溫分三服。○蓋此方甘能生濕。濕生又何燥焉。

淡竹茹湯 治妊婦心虛驚悸。臟燥悲傷不止。又治

胎產心法

卷上

臟燥悲

大便燥論

頁六

虛煩甚效。

麥冬 去心

小麥

製半夏 各一錢

人參

茯苓 各一錢

甘草 五分

右引加生薑三片。棗一枚。淡竹茹一團如指大。水煎服。

八珍湯 見本卷諸痛門

大便燥論

妊娠大便結燥。蓋因血養胎元。大腸血少。燥結難出。雖無大害。然便時甚苦。潤燥湯主之。

潤燥湯

阿膠 一錢五分

條芩

蘓梗

防風 各一錢

當歸

麻仁

芝 各二錢

水煎服。

子瘖論

經曰婦人重身。九月而瘖者。胞之絡脉絕也。無治。當十月復。蓋因孕至九月。兒體已長。胞繫於腎。少陰之脉。上繫舌

胎產心法

卷上

大便燥方

子瘖論

頁元

本。脉道阻絕不通。故不能言者。間有之。十月分。娩後而自能言。不必加治。若強以通聲開發治之。則誤矣。夫瘖者。有言。無聲。經曰。不能者。非絕。然不語之。謂凡音出於喉嚨。發於舌本。因胎氣肥大。阻腎上行之經。腎脉入肺。循喉嚨。繫舌本。喉者。肺之部。肺主聲。音其人。切切私語。心雖有言。而人不能聽。故曰瘖。肺腎子母之臟。故云不必治。若大全解作不語。則為心病。以心主發聲也。與子瘖了不相干。若張子和有降心火之說。馬元臺有補心腎之言。如果腎之脉絡絕。則其病不治。豈有產後自復之理乎。故經云。胞之絡

脉絕。此絕字當作阻字解。如富貴之家。及不明醫理。必欲

強治。惟有濃煎參麥五味飲。空心服地黃丸。助肺腎之氣。以養胎可耳。切不可謂痰閉心竅。而用化痰開竅通聲之

藥。致誤母子之性命也。

參麥五味飲

見下卷暈厥門

六味地黃丸

見本卷諸痛門附六味地黃湯下

腹內兒哭鐘鳴論

娠婦腹內兒哭。或鐘鳴者。因腹中臍帶上疔瘡。兒含口中。娠婦或登高舉臂。脫出兒口。以此作聲。令娠婦曲腰就地。

胎產心法

卷上

腹內兒哭鐘鳴論

頁三

如拾物狀。或令作男子拜揖狀。或令掃地。其疔瘡仍入兒口。即止。亦有胎熱不安而啼者。以黃連濃煎汁。娠婦時時呷之即止。

胎不長養過期不產並枯胎論

娠婦有按月行經。而胎日長者。名曰盛胎。其婦血氣克盛。養胎之外。血有餘故也。有數月之胎。而血大下。謂之漏胎。因事觸胎。動其任脉。故血下而不傷子宮也。然孕中失血。胎雖不墜。氣血亦虧。多致逾月不產。曾見有十二三月。或十七八月。或二十餘月而生者。俱是血氣不足。胚胎難長。

故耳。凡十月之後未產者。當大補氣血之藥。以倍養之。庶無分媿之患。所以胎氣本乎血氣而長。其胎不長者。亦惟氣血之不足。故有受胎之後而漏血不止。則血不歸胎者。有婦人中年血氣衰敗。泉源日涸者。有因脾胃病。倉廩薄。化源虧而衝任竅者。有多鬱怒。肝氣逆。血不調而胎失所養者。有血氣寒而不長。陽氣衰。生氣少者。有血熱而不長。火邪甚。正陰損者。種種不一。凡治此病。則宜補宜固宜溫宜清。因其病而隨機應之。胎氣漸克。自無不長。然又有姓母氣血自旺而胎不長者。此必父氣孱弱。又當大劑保元。

胎產心法

卷上

胎不長養過期不產並枯胎論

三

專補其氣。不得雜一味血藥助母。則子氣方得受益。總之胎之能長而旺者。全賴母之脾土輸氣於子。凡長養萬物。莫不由土。故胎之生發。雖主乎腎肝。而長養實關乎脾土。所以治胎氣不長。必用八珍十全歸脾補中之類。助其母氣。以長胎。免致多延日月。試觀瘠薄之土。雖莖不獲。得沃澤灌溉。便能成實。義可見矣。其過期不產。有屬氣虛者。當補其氣。有血虛氣滯者。用補血行滯湯。服之即產。復有胎氣因母舉動失調。或所稟怯弱。不能自固。致兒內失榮養。不能長發。仍不墮墜者。此與菓實乾萎在枝無異。名曰枯

胎。惟宜急早資母血氣。則胎自長。若失於早為滋養。以致萎燥既成。無能為矣。曾有孕婦。十七月不產。自五月以後。胎則不動。用丹參一味。日服七錢。兩旬餘。胎下已死而枯。又一婦十三月不產。脈來微結。用十全大補湯。二十餘劑。而下胎枯色白。如過期不產。而脈沉細。但當臍下悸動。此為瘀積化水。當作鬼胎治之。

保元湯 治營衛不足。

黃耆

三錢至六錢 蜜酒炙 人參 三錢至一兩

炙草

一錢

胎產心法

卷上

胎不長養過期不產並枯胎論

三

水煎服。

十全大補湯 治營衛俱虛。

人參

黃耆 蜜炙

白朮

土炒

茯苓

熟地

當歸 各一錢

川芎

白芍

炒 各八分

肉桂

炙草 各五分

薑棗引。水煎服。

補血行滯湯

又名催生湯

治過月不產。又能催生。

當歸 酒浸 川芎

白芍 炒 熟地

香附 製各一錢 菝仁 去皮尖

枳殼 炒 砂仁 碎

紫蘓 各七分

薑一片 棗二枚 水煎服。

歸脾湯 見本卷胞漏小產門

八珍湯

補中益氣湯 俱見本卷諸痛門

胎產心法 卷上 鬼胎論 百五

鬼胎論 又名夜叉胎

凡婦人氣血克實。臟腑調和。秉心正真。則無鬼胎證矣。若榮衛虛損。精神衰弱。邪思蓄注。衝任滯逆。脉道壅瘀不行。狀如懷娠。故曰鬼胎。然細究其理。鬼胎者。偽胎也。如人邪淫之念一起。則肝腎相火自動。有夢與鬼交者。非實有鬼神交接成胎也。即經所謂思想無窮。所願不遂。白淫白濁。流入子宮。結為鬼胎。乃本婦自己血液淫精。聚結成塊。血隨氣結而不散。以致胸腹脹滿。儼若胎孕耳。非偽胎而何。故鬼胎之脉。沉細弦澹。或有時虛浮。有時沉緊。忽大忽小。

胎產心法 卷上

皆陽氣不克之驗。其腹雖漸大而漫起重墜。終與好胎不同。當臍或臍下左傍。雖微動。亦與正胎迥別。所以一見經候。不調。就行調補。庶免此患。若停經瘀滯而得。即血瘀氣

瘕之類。則病已成。當調補元氣為主。而繼以去積之藥。乃

可。然欲於補中兼行。無如決津煎。欲去其滯而不猛峻。無

如通瘀煎。若由陽氣不足。或肝脾鬱怒所傷。不能生發。致

陰血不化而經閉為患。肚腹漸大。以加味歸脾湯。加味道

遙散。再加去白陳皮八分。如乾嗽。用蜜製治之自愈。此外

如狐魅異類之遇者。則實有所受。而又非鬼胎之謂。當於

胎產心法 卷上 鬼胎論 百五

瘕瘕類求法。下之。又常見婦人得孕經止。尺脉或澹。或微

弱而無他病。此子宮正氣不全。精血雖凝。而陽虛陰不能

化。終不成形。每至產時而下血塊血胞。必大劑溫補預調。

而後方能成孕也。

決津煎 治婦人血虛經滯。不能流暢而痛極者。以

水濟水。若江河一決。而積垢皆去。用此湯隨證加

減主之。此用補為瀉之神劑也。

當歸 三五錢或一兩 澤瀉 一錢五分

牛膝 二錢 肉桂 一二三錢

牛膝 二錢 肉桂 一二三錢

牛膝 二錢 肉桂 一二三錢

熟地 二三錢或五七錢或 烏藥 一錢如氣虛者不用

水二鍾煎七八分。食前服。○如嘔惡加焦薑 一二錢。

陰滯不行。非加附子不可。○如氣滯而痛脹加香附 一

二錢。或木香 七八分。○如血滯血澁加酒炒紅花 一二

錢。○如小腹不煖而痛極者加吳茱萸 七八分。○如大

便結澇加肉苁蓉 一二三錢。微者以山查代之。○如氣

虛少用香陳之類。甚者不用亦可。

通瘀煎 治婦人氣滯血積。經脈不利。痛極拒按。及

產後瘀血實痛。并男婦血逆血厥等證。

胎產心法

卷上 鬼胎方

百靈

歸尾 三五錢

山查

香附 製

紅花 新者炒黃各二錢

烏藥 一二錢

青皮

澤瀉 各一錢五分

木香 七分

水二鍾煎七分。加酒一二小鍾。食前服。○兼寒滯者加

肉桂 一錢。或吳茱萸 五分。○火盛內熱。血燥不行者加

炒梔子 一二錢。○微熱血虛者加芍藥 二錢。血虛澁滯

者加牛膝。○血瘀不行者加菴仁 二十粒。去皮尖。或加

蘓木。元胡之類。○瘀極而大便結燥者加大黃 一二錢。

加味歸脾湯 見本卷胞漏小產門附歸脾湯下

加味逍遙散 見本卷于懸門附逍遙散下

腸覃似孕並畜血似孕論

婦人腸覃似孕。乃寒氣客於腸外。與衛氣相搏。氣不得榮。

因有所繫。癢而內着。惡氣乃起。瘕肉乃生。其始生大如鷄

卵。稍以益大。狀如懷子。按之則堅。推之則移。月事以時下。

此結氣大。腸為氣病。而血不病。故月事不斷。當用散氣之

劑治之。其蓄血似孕。因多鬱怒。經閉不月。腹漸大。初時人

以為孕。至過月不產。諸證漸見。此蓄血。子門為血病。當破

胎產心法

卷上

腸覃似孕並畜血似孕論

真

血藥下之

孕婦出痘論

凡孕婦出痘。熱能動胎。胎落則氣血衰敗。而不能起發。灌

漿矣。故始終以安胎為主。外用細軟之帛。緊兜肚上。切不

可用。丁桂燥熱之品。及食牛鼠毒物之類。以致觸犯。其條

芩。白。木。艾。葉。砂。仁。之類。與痘相宜者。採而用之。其初發熱

則以參蘓飲發之。痘既出後。則多服安胎飲保之。渴者。則

用人參白朮散加減。瀉者。則用黃芩湯。合四君子湯。內加

訶子。血虛者。則以四物湯。加托藥。色灰白而起發較遲者。

則用十全大補湯。去桂服之。總之不問輕重。悉以清熱安。娠為主。更有孕婦出痘。正當盛時。忽臨正產者。勢必氣血俱虛。亦只以十全大補湯。大補氣血為主。虛寒者。少加熟附。若腹中微痛者。此惡露未盡也。宜四物湯。加乾薑。桂心。木香。黑豆。用熟地黃。而去芍藥。蓋恐寒涼。有傷生氣。然有當用者。酒炒用之。若寒戰咬牙。腹脹不渴。而足冷身熱者。此乃脾胃內虛。外作假熱也。宜參耆歸附。木香之類。一二劑而愈者吉。不愈者凶。若孕婦肥胖者。則氣居於表。而嫌於內也。人參可多。黃耆宜少。多加帶殼縮砂。切忌脫蒂菓。

胎產心法

卷上 孕婦出痘論

頁五

子之類。至有痘將收靨。忽作泄瀉。口渴飲水。小便短少。其痘胖壯紅潤者。此內熱也。宜用五苓散。內加黃芩。芍藥之類。若至滑瀉不止。食少腹脹而足冷。痘色灰白。脉細無力者。此犯五虛必死之證也。凡婦人方產之後。或半月左右。適逢出痘者。此無胎孕繫累。惟氣血尚虛。治宜大補榮衛為主。若痘出多者。則加連翹。粘子之類。大便自利者。則用肉菓。炮薑之類。餘即照常一例而治。不必多疑。反生他誤。至於孕婦出痘。在於初出之時。胎落者。則血氣雖為大虛。然熱毒亦因走泄兼之。未經起脹。灌漿。則血氣未曾外耗。

倘痘非險逆。加以大補托裏。每多得生。至於收靨之時。胎落者。則毒已出表。消散亦多。無事。但重虛而元氣易脫。倍宜補益耳。若正當起脹。灌漿而胎落者。則氣血衰敗。內外兩虛。既不能逐毒以外出。則毒心乘虛而內攻。其為不救者多矣。

黃芩湯 治熱利。

黃芩

炙草

芍藥 各等分。

大棗 五七枚。

水煎服。

胎產心法

卷上 孕婦出痘方

頁六

參蘓飲

見本卷喘急門

安胎飲

四物湯

俱見本卷安胎門

人參白朮散

見本卷泄瀉門

四君子湯

見本卷胎逆上逼門

十全大補湯

見本卷胎不長養門

五苓散

見本卷泄瀉門附四苓散下

妊娠麻疹論

妊娠出疹。當以四物加減。而加條芩。艾葉。以安胎清熱為

主。則胎不動。而麻疹自出矣。然熱毒蒸胎。胎多受傷。但胎雖傷。而母實無恙也。蓋疹與痘不同。痘宜內實。以痘當從外解。故胎落毒氣乘虛而內攻。其母亡。疹宜內虛。以疹當從內解。故胎落熱毒隨胎而下。其母存。雖然與其胎去而母存孰若子母兩全之為愈也。且古人徒知清熱以安胎。不思疹未出而即以清熱為事。則疹難出而內熱愈深。是欲保胎反足以傷胎也。宜輕揚表托。則疹出而熱自清。繼以滋陰清解。則於疹於胎兩不相碍。不安胎而胎自安矣。如疹出不快。宜白虎湯合用升麻葛根湯。倍加元參牛蒡。

胎產心法

卷上

妊娠麻疹論

夏

升麻葛根湯

葛根

升麻

白芍

甘草

各等分

水一盞。煎七分。溫服。此解表發散之方也。表熱壯盛。邪實於表。經曰。輕可去實。故用升麻葛根以疏表。所以然者。升麻能解疫毒。升陽於至陰之下。以助發生之氣。葛

根能解熱毒。兼疏榮衛。以導起發之機。二味之外。又加甘草佐之。以和在表之氣。芍藥佐之。以和在裏之榮。去其實邪。和其榮衛。風寒自解。麻疹自出。

固胎飲 止痛安胎。

地黃

川芎 各五分

歸身

人參

白芍

陳皮 各一錢

白朮

土炒

黃芩 各一錢五分

甘草

三分

黃連

胎產心法

卷上

妊娠麻疹方

夏

黃栢

各一分

桑上羊兒藤 七葉圓者

右細切。每服二三錢。入糯米二十粒。水一鍾。煎至七分。

溫服。○痛。加砂仁。○血虛。加阿膠。

白虎湯

見本卷瘧門附桂枝白虎湯下

四物湯

見本卷安胎門

胎產心法卷之上 畢

胎產心法卷之中

上谷

脉訣歌

欲產之婦脉離經。一息六至，一息三至，皆曰離經。又云，脉如歇止，亦謂之離經。沉細而

滑也同名。腎脉沉滑，與離經同。夜半覺痛應分娩。來朝日午定當生。

身重體熱寒又煩。舌下見脉黑且青。捲舌流涎腹覺冷。腹

中子女已歸陰。面赤舌青細尋看。母活子死是定斷。唇口

俱青沫又出。母子雙雙入鬼案。面青舌赤沫又頻。母死子

活定知正。新產婦脉緩滑吉。實大弦急死相侵。若得沉而

胎產心法

卷中 脉訣歌

小者昌。忽若堅牢命不長。寸口澁疾不調死。沉細附骨不

絕生。吉凶生死全憑脉。胎者須教指下明。

啟蒙曰。欲產之婦脉離經。離經之脉認分明。其來大小不

調勻。或如雀啄屋漏應。腰疼腹痛眼生花。產在須臾却非

病。○脉經云。脉勻細易產。大浮緩氣散難產。

保產論

凡妊娠之於分娩。母子性命懸於頃刻。調理失宜。安反成

危。將養有方。逆可使順。故凡胎前諸證。當隨證加減。保護

調理。甫及臨月。若婦女初產。原未慣經。不免驚畏失錯。雖

慣產之婦。然氣血亦傷。又安得恃為無虞也。是以保產之

方。斷不可廢。故達生散。宜用於八九月之時。而養胎神寢

等藥。當用於臨月之際。倘遇過月不產。則補血行氣之方。

不可稍緩。至於居處失宜。頓撲動胎。及身居安逸。食物不

節。憂樂不常。致胎氣難轉。或胞漿先破。惡水來多。胎乾不

下。則保生千金不換。萬全保氣滑胎等劑。猶宜按證選方

製服。予家傳胎產金丹。不特治胎前產後為第一奇藥。即

臨產服之。保生易產。且勝催生。諸藥更無產後諸患。若製

此藥。備用較勝。諸藥萬萬矣。至於神煞符咒。亦難謂盡妄。

胎產心法

卷中 保產論

如受胎之後。胎殺所在。不惟損胎。甚至損母。俱宜謹慎。而

臨月安產。產下藏衣。猶為緊要。不可不知。至所謂雷公招

搖。運兒力士。天狗等神。方向及生氣方之宜向。禍害月。絕

命方。八床方之宜避。昔人填入產圖。使人知所趨避。似屬

太瑣。若拘拘於圖。又不免避此觸彼之疑。不若體元子之

借地法。既可以避神煞。又可以消俗疑。因並錄之於後。

達生散 孕婦八九個月時。宜服數劑。

人參 陳皮

紫蘓 各五分 白芍 酒炒

白朮 土炒

當歸 酒洗各一錢

炙草 三分

大腹皮 一錢五分用黑豆汁洗晒

黃楊腦 三個即黃楊樹葉稍兒也

葱白 三根

水煎服。○春加防風五分。川芎五分。○夏加酒炒黃芩

五分。酒炒黃連五分。五味子十粒。○秋加澤瀉五分。○

冬加砂仁五分。○或通加炒枳殼砂仁。○胎動不安加

金銀箔此須野苧根一錢。生地黄一錢。○氣上逼心加

柴胡紫蘓。○多怒人加炒黃芩佐之。○食少者加砂仁

炒神麩。○口渴加去心麥冬。酒炒黃芩。○能食倍加黃

胎產心法

卷中 預服易產諸方 三

楊腦。此味瘦胎若胎瘦不用。○有痰加薑製半夏炒黃芩。○予按

連生散。即紫蘓飲方。去川芎加黃楊腦白朮。○又一方

無當歸白芍白朮。

密傳連生散 孕至八九個月服之。易產奇效。

大腹皮 三錢黑豆水洗淨

人參

紫蘓 連莖葉

陳皮

炙草

砂仁 各五分

白朮 土炒

白芍 酒炒

當歸 酒洗各一錢

枳殼 七分熬炒

青葱五根。水煎食前服。至十餘劑甚得力。○予謂前達生散不及此方穩妥有效。但大腹皮體輕。此方用三錢。似乎太過。不若依前方一錢五分。或加至二錢。則此方更覺全美矣。

養胎散 宜與神寢丸兼用。

當歸 酒洗 川芎

黃芩 陳皮

白朮 土炒 製香附 各一錢

白芷 甘草 各三分

胎產心法

卷中 預服易產諸方 四

人參 七分人虛者倍之

水煎去渣。調益元散服。○臨產小便多者不宜加益元散。

神寢丸 臨月服之易產。氣盛者可服。素虛者忌用。

乳香 一兩。透明者另研。枳殼 二兩。熬炒。

為末。煉蜜成丸。如梧子大。每早溫酒送下三十九。

保生無憂散 臨產服之。補其血。順其氣。自然易產。

當歸 酒洗 川芎

白芍 酒炒 枳殼 熬炒

乳香

木香

血餘

右等分。每服二三錢。水煎。日二服。神效。為末。服三錢亦可。○或胞肥厚。根蒂堅牢者。服之使其易產。○又治小產。瘀血腹痛。○如臨產胞衣既破。其血已涸。或元氣困憊。非此藥可治。急用八珍湯。酌許。水數碗。煎熟。時飲救之。亦有得生。

千金不換方 一名保產無憂散

當歸

酒浸

川芎

胎產心法

卷中

預服易產諸方

五

免絲子

各一錢五分

黃耆

八分 蜜炙

白芍

一錢二分 冬季用一錢

川貝母

一錢 去心

枳殼

六分 麸炒

厚朴

七分 薑汁炒

斷艾

羌活

各五分

荊芥穗

八分

生草

五分

加生薑二片。水二碗。煎八分。空心服。臨產不拘時服。製度分兩。不可加減。○如臨產一二日前。覺動履不安。服一劑。可保無憂。此方屢經試效。

保氣丸 治孕婦居處失宜。頓撲動胎。服此寬氣進

食。瘦胎易產。

製香附

木香

各四分

山藥

二兩

益智仁

五分

砂仁

粉草

各一兩

紫蘆葉

五分

為末。煉蜜成丸。如梧子大。每服二錢。滾水送下。

滑胎煎 胎氣臨月。宜常服。數劑。以便易生。

當歸

三五錢

熟地

三錢

杜仲

鹽水炒斷絲

山藥

炒各二錢

胎產心法

卷中

預服易產諸方

六

川芎

枳殼

麸炒各七分

水二鍾。煎八分。食前溫服。○如氣體虛弱者。加人參。土炒白木。隨宜用之。○如便實多滯者。加牛膝一二錢。

滑胎散 臨月服之易產。

人參

八分 如壯實不用

陳皮

七分

川芎

製香附

黃芩

紫蘆

大腹皮

各八分 黑豆水洗淨

白芍

炒

白木

土炒

當歸

酒洗各一錢

砂仁 五分 炙草 三分

加薑三片。葱頭一個。水二鍾。煎八分。溫服。○如冬月。加
麩炒枳殼一錢。○尊生書云。孕婦月足臨產。八珍湯。預
服十數劑。最易生育。再無難產之患。

家傳胎產金丹 治婦人經水不調。諸虛百損。種子
安胎。及胎前產後諸證。應效如神。

當歸 酒洗 丹皮 水洗。晒乾。勿見火。

斷艾 醋煮 延胡索 酒拌。炒乾。

川芎 益母草 取上頭半截。童便浸
晒乾。

胎產心法 卷中 預服易產諸方 七

青蒿 人多內熱者更宜。不
用亦可。 白薇 洗淨。人乳拌。

人參 赤石脂 火煨。水飛亦可。

白茯苓 川藜本 洗淨。

白朮 土炒。各二兩。 生地 酒洗。煮不犯鐵器。

鱉甲 醋炙。各四兩。 香附 共四兩。醋。酒。鹽。童便。
各浸製一兩。

桂心 沒藥 去油。

粉草 酒炒。各一兩二錢。 北五味 一兩。去梗。焙。

沉香 六錢。

以上共為細末。再用新鮮頭次男胎紫河車一具。長流

水浸半日。洗淨。黑鉛打成大鉛礮一個。將河車放在鉛
礮內。再將黃栢四兩。放在河車下。加白酒娘二觔。清水
二碗。灌滿鉛礮。仍以鉛化封口。再以鐵鍋盛水。將鉛礮
懸在鍋內。煮兩日夜為度。取出搗爛。和入藥內。拌勻晒
乾。再研為末。煉蜜丸。彈子大。每丸重三錢五分。水飛硃
砂為衣。再以黃蠟為皮。如蠟丸式收貯。治證開後。

一婦人臨產。米湯化服一丸。助精神氣力。分娩順利。

一產下。童便好酒服一丸。神清體健。再無崩暈之患。

一產後。每日服一丸。服過五日。氣血完固。自無他病。

胎產心法 卷中 預服易產諸方 八

一行經後。川芎當歸湯服一丸。服之三日。必然有孕。

一苦於小產者。胎動欲產。白滾湯服一丸。睡半日。其

胎自安。每月常服二三丸。保全足月。分娩無憂。

一產後。血崩。童便好酒服一丸。即止。

一產後。血暈者。當歸川芎湯服一丸。即醒。

一產後。驚風。防風湯服一丸。即解。

一兒枕痛者。山查黑砂糖湯服一丸。即止。

一胞衣不下。乾薑炒黑煎湯服一丸。即下。

一產後虛怯者。川芎當歸湯。每日服一丸。十九全愈。

一凡產後諸證。俱加好酒童便服。皆保命護身。回生起死。其功不能盡述。家有孕婦者。宜早備之。

催生萬全湯 見本卷催生門

益元散 見下卷淋證門

八珍湯 見上卷諸痛門

胎殺方位 孕婦宜避

正月在房床。 二月在窓戶。 三月在門堂。

四月在灶。 五月在身床。 六月在床倉。

七月在磨碓。 八月在側戶。 九月在門房。

胎產心法 卷中 胎殺方位 遊神方位 九

十月在床房。 十一月在爐灶。 十二月在房床。

子丑日在中堂。 寅卯辰酉日在灶。 巳午日在門。

戌亥日在房。 未申日在籬下。

房中遊神方位 忌安床換帳

甲辰、乙巳、丙午、丁未日、在房內東。

庚子、辛丑、壬寅日、在房內南。

六戊、六己日、在房內北。

生子宜向方

子午卯酉日、宜西南。

寅申巳亥日、宜西北。

辰戌丑未日、宜東南。

安產藏衣宜向方

正、三、五、七、九、十一月、壬日安產。丙位藏衣。其餘皆雙月。甲

位安產。庚位藏衣。○又云、藏衣忌太歲方。三殺方。宜用稍

大平穩磁瓶。將衣胞內安入五種菓子。如棗兒、蓮子、之類。

每樣數枚。宜單。取再生兒之意。並將胞埋深土。以防畜類

刨挖。安放平穩。令兒不驚。瓶器稍大。兒不吐乳。至於遊年

白虎殺神。安產藏衣俱忌。太歲退一位即是也。如子年在

胎產心法 卷中 安產藏衣宜向方 十

亥、丑年在子。餘以類推。

體元子借地法

凡孕婦臨月。擇天月二德吉日。令善書者。先期齋戒三日。

至日。汲新水研硃。於黃紙上。焚香書曰。東借十步。西借十

步。南借十步。北借十步。上借十步。下借十步。壁方之中。四

十餘步。安產借地。或有污穢。或有東海神王。或有西海神

王。或有南海神王。或有北海神王。或有日遊將軍。白虎夫

人。遠去十丈。軒轅招搖。舉高十丈。天符地軸。入地十丈。令

地空閒。產婦 某 氏安居。無所妨碍。無所畏忌。諸神擁護。百

邪速去。急急如律令。書畢。貼孕婦墻壁上。則不須避忌矣。

臨產須知十四則

一孕婦似產未產須知。凡胎孕臨月。胎忽亂動。而腹痛不甚。或作或止。或一二日。或三五日之後方生。名曰弄胎。不可孟浪坐草。須靜以待時。或胎水已來。腰不痠痛而不生者。亦曰弄胎。所以有瀝漿生。其漿流一二日不產。俟流漿漸少方生。倘漿來過多。恐胞乾難產。亦非所宜。須入珍時。服助其血氣。可望無慮。又有一月前。忽然腹痛。狀如即產。却不產者。名曰試月。又有腹雖痛而腰不痠痛。脉未離經。

胎產心法

卷中 臨產須知

十一

而不產者。又有腹雖痛而未下垂。胎雖轉而兒身未正。亦非當產時也。要知腹中痛陣。乃兒破衣轉身也。氣壯者。轉身自易。氣弱者。轉身較難。衣薄則破速。衣厚則破遲。所以有腹痛。一。二日方生。凡孕婦須當寬心。以待其自然之勢。切不可亂用氣力。強產以致枉命。至于自然當產之時。必有緊陣。如臍腹痛。急。腰痠。重痛。眼中如火。肛門進急等類。齊至。待兒身已正。頭到產門。用力一送。即下。然亦有腹覺微痛。或腹竟不痛。止覺腰痠。下墜。而產者。蓋腎候於腰。胞繫於腎。故也。古人云。時至自然分娩。譬如登廁。未急不能。

催時急不能止。此理雖俗。知此免患。

一臨產自有先兆。須知凡孕婦臨產。或半月數日前。胎腹必下垂。小便多頻數。至欲產時。脉先離經。拭捏產婦手中指中節。或本節跳動。方是臨盆時候。

一轉胎調攝須知。凡孕婦兒身轉動。其腹必痛。雖遲日不生。切勿驚怕。且令人扶持。在房中行走。或倚物而立。直其體腹。倘精神稍困。則以被褥壅墊脊背。仰臥少頃。又令行立。聽腹中慢慢轉身。雖遲無害。且宜稍寬裙帶。以便兒在腹中轉舒。有餘地也。若不禁痛苦。或僵僵屈曲。斜倚側靠。

胎產心法

卷中 臨產須知

十二

胎中不免為之擁擠。迷其出路。穩婆不解此理。但見生遲。頻頻試水。悞傷胎破。或風入產戶而成腫脹。或胎未至而胎水先乾。分娩愈難矣。遇此者。惟令產婦勉強飲食。調其氣息。或用活血滑胎之藥佐之。活血滑胎藥方。俱見催生門。候子逼門戶。方儘力一努。胎隨漿下矣。此乃瓜熟蒂落之理。切不可預使氣力。令精神失倦。臨期反致疲困。此產家最要緊處。曾見一婦。臨產畏痛。曲身坐臥。以致胎元轉動不順。兒出胞時。尋到產門。被母曲身遮閉。因不得出。少頃再轉。母又護痛再閉。如此兩三遭。則子無力而不能動。至於難生。人

又見子不動。則謂死胎。其實子無力非死也。隨令產母正其體腹。不時行動坐立。心安氣和。勉強飲食。俟兒少停氣。復再轉至產門。果順易生下。

一穩婆宜加選擇須知。凡孕婦臨產。當選年高有經識穩婆。及純謹婦女。二人扶持。倘誤用無知孟浪婦女收生。不審察是正產與轉胎。一見腹痛。亂將雙手摸孕婦腹上。夾腹兩邊重按。欲其直下。以免橫生。此第一悞人性命者。夫腹初痛。則胞衣未破而欲破之時也。兒將分娩。心中亦有靈性矣。見腹外揣摩。兒不知為何物。遽生驚恐。則縮不

胎產心法

卷中 臨產須知

三

敢動。胞衣又何時而得破乎。更有穩婆無知害人。私用手指搯破水衣者。極須防範。夫胞漿乃胞內養兒之水。兒既折破。自隨水而下。若過時不得分娩。是胞元無力。轉頭較遲。恐致漿盡血來。閉塞道路。令子無路可通。胎溢不行。用保生無憂散以固其血。如血已耗。八珍湯加益母草濃煎。時飲之。倘元氣困憊。急用上好人參兩許。當歸二錢。煎飲。飲盡。再煎服。助其氣血。最為得力。捨此而用催生。耗氣諸藥。總無一效也。或先服八珍補養氣血。次煎濃葱湯。令穩婆洗產戶。使氣上下通暢。更用酥油滑石塗產門。次服催

生萬全湯亦妙。

一臨產避忌須知。凡孕婦臨產之月。不可洗頭濯足。犯者胎多難產。若至臨盆之際。凡係門窗箱籠瓶甕之屬。俱宜鬆開。以及一切外來親戚。並孀婦閨女。喪孝尼姑。與穢污不潔。或月經適至。或原有體氣婦女。皆足以觸胎致殃。俱宜防備。避忌。俗忌多人知覺。蓋多一人入房。則多一時遲延。此雖俗論。却有至理。恐產婦心煩。以致難產也。

一臨產宜肅靜須知。凡孕婦臨盆房中。不得喧鬧。即有意外緊事。戶外不得叫喊。倘令產母恐懼驚心。則胎滯氣結。不行而難產。經云。驚則神散。憂則氣結。恐則氣怯。怯則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。氣乃不行矣。此氣結不行。以致難產。更有產母兩尺脈絕。他脈平和。此乃下焦脹。氣閉不行。難產之脈。急用紫蘇飲散。結行。氣而產矣。

胎產心法

卷中 臨產須知

四

一臨產飲湯須知。凡孕婦分娩之時。心下煩悶口渴。用白蜜半盃。溫湯化開飲之。如欲飲水。但可與清米湯飲之。蓋蜜能潤燥滑胎。米飲能助中氣也。有人臨產進飲食及服藥而皆吐出。吐後仍進飲食服藥。使其人不乏力。不乾澀。亦自立下。不必慮其吐出也。是以產母不可令其饑餓。饑

則中氣虛乏。無力送胎。須少用梗白米稀粥。或飲以母鷄
羹汁。但不可食肉。及堅硬食物。恐凝於上焦。氣不得下。不
惟難產。須防內傷。又不可太飽。常令稍饑為佳。蓋饑則氣
下。氣下則產速也。予謂口渴。不能食。及吐。須飲以獨參湯。
最妙。且能催生。

一孕婦產異。須知凡婦人常產之外。有異產者八。曰橫產。
逆產。坐產。碍產。偏產。脹後產。盤腸產。浪臍產。等名。皆由孕
婦氣血虧虛。或坐草探水。用力太早所致。凡遇此等異產。
須令產母仰臥。勿得驚懼。選其歷練有經驗穩婆料理。各

胎產心法

卷中 臨產須知

十五

產治法。列之於後。

如橫產。手先露者。世傳為覓鹽生。令產母安心仰臥。以鹽
塗兒手心。再以香油抹其所出之手。穩婆輕輕送入。或兒
手得鹽。肌肉醃贅。且痛且縮而收者。待兒轉身頭正。扶起
產母。用力一努。兒即出矣。

如逆產。足先露者。相傳為踏蓮花生。令產母仰臥。不必驚
憂。用鹽塗足心。亦用香油抹其所露之足。穩婆輕輕送入。
候兒轉身頭正。用力生下。凡遇橫逆之產。母子存亡在頃
刻。若無急救之方法。何以成醫之神聖歟。其胎產之所以

致橫逆者。或因兒身尚未轉順。方轉至手足。被產母用力
逼出。或因產母氣血素虧。其子無力轉身。而手足先出者。
俱速用塗鹽抹油法送入。其用力逼出手足者。送入猶易。
轉正。勿藥亦可。若素虛無力。轉身者。急煎救逆湯服之。助
其氣血。送入少頃。兒自有力。轉身。俟頭正。產門而生下矣。
但兒之手足。切不可任其久出。更不可令其多出。若見兒
手或足畧出時。則急以鹽塗法治之。若出多及時久。則手
足青硬。難以送入。而子必傷。切不可悞聽。克婦用刀。斷兒
手足。一動刀。刃子必腹中亂擾。而傷母矣。世有用針刺兒

胎產心法

卷中 臨產須知

十六

手足者。有治逆產。用手抓兒足心者。予謂恐兒驚縮。有傷
觸母心之虞。不若鹽塗為便也。

如坐產。醫先露者。世俗為坐醫生。令產母仰臥。亦如前法
抹油推入。候兒轉運扶正。然後用力送出。或於當高處。牢
繫手巾一條。令產母以手攀之。輕輕屈足舒伸。以開生路。
兒即順生。

如礙產。乃門戶俱正。兒亦露頂而不下者。此必臍帶絆住
兒肩。俗名背包生。亦令產母仰臥。穩婆輕輕推兒向上。以
手中指。輕按兒肩。摸去臍帶。扶正兒身。一努即生下。

如偏產。乃生路未正。被產母用力一逼。兒頭偏抵產戶不
下者。不知者。但云兒已露頂。非頂也。乃額角也。亦令產母
仰臥。輕輕推兒近上。以手正其頭。用力一送。卽下。

如脹後產。乃兒頭後骨偏柱。產母穀道不得下者。令穩婆
以棉衣炙煖裏手。急於穀道外傍。輕輕推頭令正。然後用
力卽生下矣。或用膝頭令產母抵住亦可。

如盤腸產。子腸先出者。世人莫不驚畏。然無妨碍。令產母
安心仰臥。急將淨盆盛溫水。冬則再加稍熱。加入香油養
潤。待兒並胞衣俱下。穩婆香油塗手。徐徐送入。令產母兩

胎產心法

卷中 臨產須知

十七

足夾緊穀道。腸自收上。有用醋和冷水。令人噴面。一噴一
收。以漸收之。又有神應丹貼法。然此噴貼之法。腸雖可收。
予恐誤事。不若皂角末吹鼻。嚏作自上。又有腸被外風吹
乾不收者。用磨刀水少許。火上溫過。以潤其腸。後用好磁
石煎湯一盞服之。其腸自收。又有兒並胞衣下後。膀胱卽尿
胞壅出產戶者。同前法送入。凡此子腸膀胱先出。皆平日
氣虛。因努脫出。並用力太早。內臟動搖。氣虛下元不固。關
鍵不牢之故。若此番經過。須防下次。此後無孕時。多服地
黃丸。加五味子。肉桂。各一兩。以固下元之關鍵。及有孕。多

服胡連丸。加人參。以補氣。又服三補丸。以涼血。如滑胎瘦
胎等劑。不可輕服。八個月時。宜服八珍。加訶子。瞿麥。粟殼。
蜜十餘劑。予意須預服。補中湯。升提之藥。於前庶臨盆可
免較之服胡連。三補。以及粟殼等藥。穩妥而不繁雜也。
如浪臍產。胞衣臍腸先出者。凡兒出胞時。頭必轉向產門。
自然正產。若無力轉運。脚踏胞衣臍腸先出。急令穩婆理
清推入。稍俟氣平。乘勢就其脚下。不可推轉久延。久則臍
腸復下。便難收拾矣。

胎產心法

卷中 臨產須知

十八

一臨產雙生須知。凡孕婦臨產。一兒已下。又見一兒。此係
雙胞。惟穩婆自知之。只云取胞。待生下方言。恐驚母成產
患也。
一候胞衣生下。須知。凡產母生子出戶時。人卽以兩手抱
產母胸前。產母亦自以手緊抱肚腹。令胎衣下墜。如胎衣
來遲。切勿慌忙。用草帚燒烟熏鼻卽下。如再遲。則急斷臍
帶洗兒。仍用軟帛物繫墜臍帶。此帶極脆。繫時猶宜輕巧
牢固。然後截斷。若不斷臍帶。恐血反潮入胞中。脹而不下。
攻心則傷。如穩婆諳事者。能以手指取下甚便。取法見後
胞衣不下門。

一悶臍生須知。凡兒產下即啼。此正理也。如兒下地。氣悶不啼。相傳寤生。呼父乳名。手拍兒股即啼者。此理亦未講明。蓋兒糞門有一膜。悶住兒氣。故不能出聲。拍之則膜破。而能叫哭矣。如拍之猶不破。須令女人中有輕巧者。以銀簪脚輕輕挑破甚便。或不能挑。急用棉絮煖衣。將兒緊包。抱於懷內。勿令散放。未可據斷臍帶。速用熱水浸其胞衣。寒天則置炭火中煨之。仍作大油紙。撚點燈於臍帶上。往來燎之。蓋帶連兒臍。久則熱氣內鼓。其膜自破。膜破則出聲而甦。方可斷帶洗浴。亦有用蘆艾為撚。香油浸潤薰臍。

胎產心法

卷中 臨產須知

十九

帶至焦。使熱氣內鼓破膜。又一法。用燈心顛門點爆數下。均治悶臍生法也。

一兒生即死須知。凡兒生下即死者。急看兒口中前上脣上有泡。以手指摘破。用帛拭血令淨。若血入喉即死。去血即生。其泡中白米。如針嘴尖。亦須括去。不可令其入喉也。一凍產須知。凡孕婦臨盆時。值冬月天寒。產母經血因冷則凝。致兒不能速下。務於房內四處設爐置火。常有煖氣。如春。且下部不可脫去棉衣。併不可坐卧冷處。使產母背身溫和。臍下腿膝間常煖。血得熱則行。兒自易生也。炭須

在房外燒紅。送進產房。否則生炭氣味。恐產婦發暈。一熱產須知。凡盛夏產婦。要溫涼得所。用冷水房內洒灑。或多放水盆。或遠設水塊。以解其鬱蒸之氣。若遇風涼陰雨。亦當謹避。不可貪涼。恐增疾病。房內不可人多。恐熱氣逼襲。令產母心煩熱。血沸騰。有鬱冒冲暈之患。

救逆湯 治產母氣血素虧。子無力轉頭。手足先出。人參 一兩 當歸 三兩

川芎 二兩 紅花 三錢

水煎速服。久之不順。再煎再服。

胎產心法

卷中 臨產須知門方

二十

三補丸 專治血熱。

黃芩 炒 黃連 炒

黃栢 炒 各等分為末。蜜丸。白湯下。

八珍湯 見上卷諸痛門

保產無憂散 見本卷預服易產諸方

催生萬全湯 見本卷催生門

紫蘇飲 見上卷安胎門

神應丹 見本卷催生門

六味地黃丸 見上卷諸痛門附六味地黃湯下

胡連丸 見上卷安胎門

補中益氣湯 見上卷諸痛門

難產有五因

一凡婦人懷孕。惟賴氣血養護。時常行動。則氣血週流。胞胎活動。骨縫關節處。亦常鬆動。臨產自易。如久坐久臥。氣不運行。血不流順。胎亦沉滯而不活動。骨節亦緊而不鬆。泛故令難產。常見田野勞苦婦人。忽然途中腹痛。立便生產可知。

胎產心法

卷中 難產五因

二

一胎之所以養。賴母之所嗜。因子母之氣。呼吸相通。是以胎之肥瘦。在母之素日奉養厚薄何如耳。如母平時恣食厚味。不知節減。多致胎肥。本厚而難產。常見糟糠之婦。容易生產可知。

一古者婦人有孕。即居側室。不共夫寢。恐慾火動中。氣血沸騰而消耗。胎繫胞中。全資氣血育養。一有所犯。五月以前。故多胎漏。小產。五月以後。每致胞厚難生。更且漏洩。胎元子多。不壽。瘡痘疹毒。子疾難醫。不然。但看馬牛犬豕。胎胎易。偶個存。何也。蓋因馬牛犬豕。一受孕後。絕不交合。而

人受孕。不能禁絕。矧有縱慾無度者乎。人畜不同。稟生則一。可不慎歟。

一凡新婦初產。神氣怯弱。未曾經慣。切不可與言產變之事。恐懷憂懼。心懸氣餒。原本易生。反成難產矣。况子戶未舒。更恐護痛。腰屈不伸展。轉傾側。擦亂多時。精神困乏。兒不得出。即中年婦人。生育既多。氣血虛少。均慮產時艱難。氣血虛少。精神困乏。俱宜獨參湯。催生甚妙。餘則參看臨產須知。併催生及交骨不開門。

一孕婦有素常虛弱。飲食減少。至臨產乏力者。或因兒未

胎產心法

卷中 催生論

三

欲出。用力太早。及兒欲出。母已無力。令兒停住。產戶乾澀。產亦艱難。用催生萬全湯最妙。或獨參湯。催生亦妙。有等婦人。臨產不能飲。食用人參三二錢。煎湯服之。大助精力。甚於肉食百倍。

催生論

經曰。一息不運。則織緘窮。一毫不續。則霄壤判。所謂氣血周流。循環一身。無有間斷也。是以姪子者。兒在腹中。母子一氣流通。全賴漿水滋養。十月數足。其子形神俱備。氣血完全。忽如夢覺。自然求路而出。兒既出胞。母子分體。呼吸

殊息。豈可久羈於內。而使氣血不運不續哉。所以產子。譬諸果熟蒂落。有自然分體之勢。豈可早用催藥。似逆其性。至於催藥。原為調扶。失宜致成難產。不得已而用也。如胎壯。則隨漿易產。何必用藥催生。若胎弱。則轉慢遲生。有致困之漿乾。瘀塞不下。橫逆子死。難產等類。治者滋其榮。益其氣。使子母精神接續。運行得力。溫其經。開其瘀。使道路通暢。子易轉舒。再得老成穩婆。在外細心接取。自獲大小平安。切勿用力太早。虛費精神。猛劑催生。反傷血氣。更不可妄信符水。况符水非得正傳。亦未必靈驗。且血得寒則

胎產心法

卷中 催生論

三

疑。血凝則胎亦滯矣。何能望其速生也。○夫產育一門。全仗氣血用事。無補精神之藥。焉圖胎產之功。徒傷氣血之和。反貽產後之疾。加獨參湯者。大補元氣。助精神而生津液。臨產服之易生。再如催生萬全湯。細心周匝。補接開導。升降溫行。產際用之催生。甚為有益。產後亦脩得其宜。是以名為萬全湯者矣。後開催生諸方。以備擇用。其內有治橫逆產者。當用臨產須知內手法。施治為上。但恐人又不善用手法。致產母經久困乏難生。不得不借藥力。助其氣血精神。使兒轉正速生也。丹溪用佛手散。治死胎不下。並

催生最效捷。予曾用胎產金丹催生。死胎亦下。再催生湯。催生甚穩而效。

獨參湯 附論 催生第一方。

人參 二三錢或四五錢

論曰。人參固為催生之妙品。然用之不得其法。往往有失誤之處。而人不知覺也。若生產之痛陣未來。兒先必轉胎腹痛。人未明此理。以為將生之時。即煎參湯與飲。助其氣力。未免失之過早。如產母平素氣血虧虛。則有益無害。若遇壯實婦人。並非因虛難產。致提固胎氣。上

胎產心法

卷中 催生方獨參湯論

二四

逼心胸。脹悶不下。反成難產矣。如生陣已來。腰痠腹痛。穀道進迫。目中流火。適值兒正出戶。方飲參湯。且一飲而盡。豈不失之過遲。而急及產下之後。正欲逐瘀之時。其參力方銳。瘀血受補凝滯不行。勢必上行奔心等患。且有有用至一二兩者。尤宜慎之。是以古人治產後。非急證。不用人參。且多以芎歸合用。其意深矣。予謂臨產之時。預備上好人參四五錢。如產婦少壯。臨盆安順。亦無需參湯以助其力。如中年產婦。育產過多。或平素瘦弱。或生產艱難。經日不下。或錯過生陣。或亂用氣力。以致

氣乏力倦。及至正產之時。反無力送胎。可用人參二錢。或三錢煎服。自然易產。至于尋常生育。恐臨期艱難。預用人參二三錢。煎就。用重湯溫着。俟漿胞破時。令產婦飲兩三口。以助氣力。少停再飲。二三口。頻與。漫服。不過助其氣力。以催生耳。生下即已。不必多參。盡飲以招尤也。或用上好人參一枝。含口內。生津助氣亦妙。至於橫逆等生。須用前論手法施治。再服參湯以助之。蓋人參能補氣升提。使產母不至倦乏。亦能令兒升舉。轉身為順。自易生矣。

胎產心法

卷中 催生方

三五

催生萬全湯 附論

人參

三錢至五錢。大補元氣以為君。

當歸

三錢。大補榮血以為臣。去蘆。

川芎

一錢。入肝以疎鬱滯。少寓升提之性。則降下之藥得力。

菝葜

十三粒。不去皮尖。搗碎。取苦可去舊。甘能生新。滑能潤下。

乾薑

一錢。溫能通行血分。炒焦黃色。焦則令其下降。而過其上升也。

炙草

六分。令其藥性少緩。中宮得受補益。不使即為下墜也。

牛膝稍

二錢。既能下行。腹走十二經絡。令其經絡無壅。則氣血效力。以為運行推出之勢。

紅花

三分。多則破血。少則活血。生新耳。酒炒。

肉桂

臨煎方去皮切碎。六分。冬天用八分。借此引經率。領諸藥直入血分。且溫可通行散瘀。則生產自易。

加膠棗一枚。水煎。食前溫服。如產婦壯實。及無力服人參者。去參用之。其催生之效。尚能倍於佛手散多多矣。論曰。婦人臨產。關係母子性命。實存亡頃刻之時。是以古人立方甚多。然產育乃大傷氣血者也。其難產。又多由氣血不足。產後諸疾。固屬氣血大虧。然產後諸虛。皆因產前所致。奈佛手散。免腦丸。及葵花。益母。諸方。無非活血順氣。滑胎破瘀。溫煖通竅。以圖運行推出之勢。全不管運行推出之源。產婦精力壯者。藉此開導。得以易生。倘氣血不足。則雖有催生開導之功。而無運行藥勢之力。抑何補哉。至於手握石燕。足貼草麻。設遇實證。順證。假此安心候時。如當氣血精神虧極。用此敷衍之方。神氣內竭。勢如隔靴搔癢。不調氣血。而強用催生。何以為運行之具。徒存虛名。而無實效。誤人性命於頃刻。豈不痛哉。惟達生散。立方平正。奈只可調理於產前。生化湯。用意甚深。又只可調理於產後。並非可濟危急。催生之用者。今萬全湯。乃體二方之意。合成一方。務取萬全。屢用甚驗。故以萬全名之。先以調補氣血。佐以散瘀下。

胎產心法

卷中 催生方

催生萬全湯論

三六

降溫中使氣血得力自能健用催生此不催之催也故用人參當歸為君培補氣血壯其主也少加杏仁川芎黑薑炙草酒紅花溫中而散其瘀也牛膝稍桂心溫行導下使無上逆衝心之患不惟催生神效產後更無瘀血凝滯百病不生補而兼溫則不滯溫而兼補則不寒升少降多則氣得提而易下降而兼升則瘀自去而新自歸補多瀉少邪去而元氣無傷苦少甘多瘀逐而中和仍在豈非萬全催生者乎

催生佛手散

胎產心法

卷中

催生方

七

全當歸 一兩

川芎 五錢

龜板 七錢 酥炙透

水煎服。○一方去龜板加益母草三五錢。

油蜜飲 治產難數日不下並瀝漿胞乾。

白蜂蜜 半碗

正麻油 半碗

共一碗煎一二沸掠去浮沫服。○一方加重便服。

三合濟生湯 治臨產艱難一二日不下服此自然

轉動下生。

當歸 三錢

川芎 二錢

枳殼 二錢 麸炒

紫蘓 八分

大腹皮 一錢五分 薑汁洗

甘草 七分

水煎服待腰痛甚服之即產。

魚膠散 治難產。

魚膠 五錢 同麪炒成珠去麪將膠研細末用熱酒衝服

催生簡易方

催生時藥不便就將本年大統曆日黃紙殼面刊有欽天

監奏准云並有印信在上者扯來不要人見用火燒為

灰將灰調酒一盃與產婦吞之即時產下又有請本地方

胎產心法

卷中

催生方

元

官或府州縣差籤一枝在籤上硃書某縣知縣某人要寫

名字在此立候催生將籤字倒豎於產房門檻內即刻產

下仍即將籤繳回本縣奇驗奇驗。

催生如意散 臨產腰痛方可服之。

人參 一錢

乳香 一錢

辰砂 五分

共為末臨產時用鷄子清一個調藥以生薑自然汁調

開和勻冷服如橫生倒產即時轉正子母全安。

催生芎歸湯

即佛手散但與佛手散煎服之法不同耳故又名催生芎歸湯治因事

觸胎。子死腹中。疼痛。口噤。用此探之。不損則痛止。子母俱安。損則立下。臨產催生。並治橫逆難產等證。

當歸 六錢 川芎 三錢

水二鍾半。煎欲乾時。入頭酒一鍾。煎沸。溫服。口噤。灌之。如人行五里再服。不過三服即生。○有一婦人。生產三日不下。用此方。加入益母草二兩。酒水各一碗。煎飲。服之即生。○曾有人止用本方。治橫生。倒產。類服順生。屢效。

胎產心法 卷中 催生方 五

葱白益母湯 治難產。

益母草 五錢 葱頭 三錢

用紋銀一錠。要重四兩。水二碗。煎一碗。服之即生。

神柞飲 催生甚速。○並治橫逆倒產。死胎在腹。

生柞樹刺枝 如小指大者一握。水洗淨。切碎。一葉一刺者。處處有之。

甘草 五錢。○一方五寸。新汲水 一碗半。

用新瓦鑊。入水與藥于內。以紙三層密封。文武火。煎八分。溫服。不煎渣。○凡覺腹疼。腰重。欲坐草時。即將此藥。溫服一盞。便覺心下開豁。如渴。又飲一盞。覺下重。便產。

更無難生橫逆之患。若遇橫生倒逆。不過三服即正。子死腹中。不過三服即下。能保母子兩全。最為神驗。曾有一婦橫產。兒手先出。至臍腫脹。欲截其手。不保其生。屢服催生藥不效。以此藥濃煎一碗與服。頃刻甦醒。再與一碗。困睡少時。忽云。我骨節都拆開了。快扶我起來。血水湧下。拔出死胎。全不費力。此方救人。百發百中。然據石室秘錄云。宜慎用。論見後加味神柞飲方中。秘錄加味神柞飲 附論 治兒頭已到門。久而不下。此交骨不開之故。

胎產心法 卷中 催生方 三

柞木枝 一兩或五錢 當歸 二兩

川芎 一兩 人參 一兩

煎湯服之。如兒頭到門。久而不下。服此。少頃。必然一聲响亮。兒即生矣。正至奇至神之方也。

論曰。倘兒頭不下。萬萬不可用柞木枝。蓋此味。能開交骨。兒未回頭。而兒門先開。亦死之道。故必須兒頭到門。而後可用此方也。予謂前方獨用柞木枝。治橫逆。及難產。且云。欲坐草時。即溫服一盞。須防太早有失。不若俟兒頭到門。久不下時。服之。為當。

乳硃丹 一名開骨膏 治難產并交骨不開。
乳香 不拘多少

或遇三月三日五月五日七月七日研細用猪心血為丸。梧子大。硃砂為衣。曬乾收藏。值難產者。以涼酒化下一丸。不產再服。或蓮葉蒂七個。水二鍾。煎一鍾。化服神效。

伏龍肝 治橫逆難產。

伏龍肝 即對灶心之土。多年紅者佳。

速研細末。溫酒調下一錢。兒頭即帶土而出矣。

胎產心法

卷中 催生方

三

二脫散 治橫逆難產。

蛇脫 全一條 蚕故紙 一張

二味。新瓦瓶內。鹽泥固濟。燒存性。為末。煎乳香湯。調下一錢。連三服神效。○綱目。煎榆白皮湯。調下一錢。○予謂。此方藥峻。宜慎用。

膠葵散 治橫逆難產。

阿膠 一兩。蛤粉炒成珠。黃葵子 一兩。

每服四錢。水煎服。

催如神散 一名黑神散 治橫逆產。並治月水不止。崩漏證。

百草霜 血得黑則止。胞水過白。芷 各等分。不見火。多。催生可用。

為末。每服二錢。以童便。醋。和如膏。加沸湯調。連進三服。能固血。又免血酒。○一方。加滑石。每服三錢。

催生如聖散 治胞水乾澀。兒在腹中不動。或漿血來。閉塞道路。難產之證。

黃葵花 二錢。焙乾。

為末。熱湯調下神效。或有漏血。胎臟乾澀。難產痛劇者。併進三服。良久腹中氣寬。胎滑即時產下。○如無花。以黃蜀葵子。為末二錢。酒服亦可。○如胎死不下。紅花煎

胎產心法

卷中 催生方

三

酒調下。○經驗方。用子四十九粒。或三十粒。歌曰。黃金丙子三十粒。細研酒調能備急。命若懸絲在須臾。即令眷屬不悲泣。

手握丹 即兔腦丸 治產婦生理不順。臨產艱難。

十二月兔腦髓 去皮膜。研成乳 香 一分。研細。○一方二錢。無麝香。

母丁香 一錢。研末。麝香 一字。研細。

將藥研勻。用兔兒腦髓和丸。如芡實大。陰乾。油紙封貯。每一丸。溫水送下。則男左女右手握出。

琥珀黑龍丹 治臨產難生。或胎衣不下。產後血暈。

不省人事。血崩。惡露腹中刺痛。血滯浮腫。血入心經。語言顛倒。血風相搏。身熱頭痛。胎前產後諸證。

五靈脂 酒研。澄去沙。當歸 酒洗。

乾地黄 川芎

良薑 各二兩

右入砂鍋內。紙筋鹽泥封固。煨紅。候冷取出研細。

百草霜 三錢。乳香

生硫黃 琥珀

花蕊石 煨。各二錢。

胎產心法 卷中 催生方 三

右五味。計一兩一錢。為末。同前研細之藥和勻。米醋煮麪糊為丸。如彈子大。每臨用。炭火煨藥通紅。投入生薑自然汁浸碎。以無灰酒童便相合頓服。予謂此藥峻厲。亦宜慎用。

催生起痘神驗方 治難產。並治痘瘡不長。不漿。

山芋血 七八分。或一錢

此血用酒化開服之。頃刻即產。且不傷人。又無產後瘀阻血暈之患。有云。此血仍聚兒頂而出。○又治小兒出痘。不起長。不貫漿。亦用此血。量兒大小。或幾厘。或一二

分。或三四分。加以酒娘化服。其痘不起長者。即起長。不貫漿者。即起漿。與用鷄冠血酒娘之意相同。然鷄冠血。不如山芋血多多矣。

尊生救生湯 治難產。并交骨不開。

全當歸 一兩。川芎 二錢。

龜板 一片。酥炙脆打碎。頭髮 一握。燒灰存性。

酒水煎服。○虛人。或產多力衰者。加人參 二三錢。如人行四五里即下。不下。急宜再服。其他催生藥皆受傷。○

予謂此方即加味芎歸湯。分兩雖殊。藥味則一。尊生用

胎產心法 卷中 催生方 三

之而驗。多在虛人加參之力耳。

神應丹 又名萬全膏。

草麻子 七粒。去殼。

將草麻研如泥。入麝一分。再研成膏。塗產母足心。胎下即洗去。遲則恐子腸出也。如子腸出。即移塗產婦頂心。腸即收上。速去之。此方催生下胎雖速。藥性猛峻。用者慎之。○一方草麻子四十九粒。去殼。研爛。治盤腸產。敷在產婦頂心。待腸收盡而急去之。

催生湯 見上卷胎不長養門。○又名補血行滯湯

胎產金丹

達生散

保產無憂散

滑胎散

救逆湯

紫蘇飲

脫花煎

丹溪佛手散

子死腹中論

胎產心法

卷中

催生方

三五

凡孕婦胞衣未下。急于胎之未生子。死腹中。急于胎之未下。蓋胞衣未下。子與母氣尚通。呼吸若子死腹中。則軀形已冷。胞臟氣寒。胎血凝。逆氣不升降。欲下死胎。若以至寒之藥用之。不惟無益。而害母命者多矣。所以古人有用附子湯。使胞臟溫。凝血流動。以附子能破寒氣。墮胎也。又有因患傷寒。熱病。溫瘧之類。胎受邪熱。毒氣內外交攻。因致胎死。留於胞臟。古人深慮胎受毒氣。必然脹大。故用朴硝、水銀、礞砂之藥。不惟使胎不脹。又能使胎形化爛。再副以行血順氣之藥。死胎即下。此古人立方之意。後人遵意

做而行之。所以有立候下胎散一方。然藥味俱多。峻厲。且有爛肉之能。即遇壯實村婦。予猶未敢輕用。又何敢施於富貴弱質之體哉。况予屢見死胎。人不慌迫。亦能遲遲生下。並不傷母。其故何也。蓋人腹中極熱。食物入內。俱化其胎。雖死。若產母不驚恐。能安心飲食。腹內熱氣薰蒸。胎自柔軟。腐化。亦生而不傷母。但所出穢氣。令人難聞耳。予每治胎死不下。用胎產金丹一粒。服下。頃刻即生。但子死在腹。其故多端。要不過急去其死胎。以安產母。如胎氣薄弱。不成而殞。如產母久病。胎萎而死。如胎肥氣滯。惡露已盡。胎產心法

卷中 子死腹中論 三五

致胎乾子死。身冷不能出。如臨產孕婦。護痛。兩足不開。夾住兒頭。以致子死。如閹閹忍耐。當直之人。不善扶持。緊抱其腰。傷胎而死。如生路不順。逆側等證。穩婆蠢厲。用手莽撞。傷子而死。如臍帶纏項。氣絕而死。如兒頭到門。交骨不開。久而不下。以致子死。如孕至五七個月。胎漏。跌仆。時證等類。傷胎而死。用烏金散。脫花煎。香桂散。牛膝。琥珀等丸。新法下胎。神柞飲類。擇其宜服者服之。死胎自下。又有雙軀。一死一生者。不可不知。但雙軀之脈。三陽俱盛。如少陰腎脈微緊。血即凝濁。經養不周。胎即偏夭。或因難產。一死

一生不去其死。害母失胎。千金神造散主之。但恐虛弱人下胎。或有貧富不等。醫藥一時未便。予故又擇諸書內九散及簡易單方。開載於後。以備選用。然下胎最宜謹慎。必先驗明產母。面赤舌青。腹中陰冷。重墜。口穢。氣喘的確。方可用下。若見紫黑血塊。血縷。猶為確候。亦必先固。姓婦本元。補氣養血。而後下之。予故重佛手散。香桂散。滑胎煎。為下死胎之王道藥也。倘孕婦遇有不安。醫者未能審詳。遽用峻厲攻伐。難免不測之禍。慎之。慎之。

立候下胎散 治臨產。或橫逆。或血海乾涸。或胎死胎產心法 卷中 子死腹中論 三七

不下。死在頃刻。

皮 硝一錢。少壯者。一錢五分。 大附子體弱者。加三五分。煨去皮。壯者不用。

如寒天。亦加附子三五分。 煨去皮。用黃酒半鍾。煎一二沸。溫服。立下。

烏金散 局方名黑神散。靈苑名肉桂散。 治產難。或熱病。胎死腹中。或

因顛仆。或從高墜下。或房室驚搐。或臨產驚動太早。觸犯禁忌。或產時未到。經行先下。惡露已盡。致胎乾。子死身冷。不能出。

熟地 酒焙乾 蒲黃

當歸 交趾桂

芍藥 軍薑 即炮薑。去皮。

粉草 各一兩。 小黑豆 二兩。炒。

百草霜 五錢。

右為末。每用二錢。米醋半合許。沸湯六七分。浸起溫服。

疑貳之際。且進佛手散。酒水合煎二三服。探之。若未死。

子母俱安。若胎已死。立便逐下。如的知其胎已死。進此

藥後。更進香桂散。須臾如手推下。常用催生。更加好滑

石末半兩。葵子五十粒。搥碎。黃柞葉七八皮。葱白二寸。

胎產心法 卷中 子死腹中方 三

順流水煎湯調下。蓋滑石能利小便。柞葉行氣逐血。葱

白能通陽氣。氣盛血行。即產矣。○查局方黑神散。無百

草霜。用童便酒各半。調服二錢。○良方黑神散。有炮附

子半兩。無蒲黃。○簡易方黑神散。止用百草霜一味。○

又有加乳沒血竭之黑神散。○綱目用熟地一觔。生薑

半觔。同炒乾。為末。烏梅湯下。錢一為治產後塊痛之黑神

散。俱各有證治。錄此以別黑神散之方不一。

脫花煎 凡將產者。宜先服此藥。催生最佳。并治產

難經日。或死胎不下。俱妙。

當歸 七八錢或一兩 肉桂心 一二錢或三錢

川芎 牛膝 各二錢

車前子 一錢五分 紅花 一錢 催生者不用此味亦可

水二鍾煎八分熱服或服後飲酒數盃亦妙○若胎死

腹中或堅滯不下者加朴硝 一二錢 卽下○若氣虛困

劇者加人參隨宜○若陰虛者加熱地 三五錢

香桂散 一名桂香散 治胎死腹中不下簡便而最效

桂心 三錢 麝香 三分○一方五分

為末葱湯調服死胎卽出溫童便酒調亦可○加生川

胎產心法 卷中 子死腹中方 完

烏 三錢 為下私胎猛劑○一方單用桂末 一錢 童便調

下各救苦散或童便酒調亦可

牛膝丸 下死胎 紫金籐 卽紫木香

杜牛膝 三兩 當歸 四錢

蜀葵根 各七錢 麝香 五分

肉桂 二錢 右為末米糊為丸如梧子大硃砂為衣每服五十九乳

香湯送下

琥珀丸 治婦人或老少或產前產後百病及療三

十六種諸病七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痺手足瘦疼乳中結核結毒懷胎驚動傷犯不安死胎不下

琥珀 硃砂 各另研

沉香 阿膠 炒珠

附子 製 川芎

肉桂 五味子

石斛 各五錢 牛膝 酒浸

當歸 肉苳蓉 酒洗去泥晒

胎產心法 卷中 子死腹中方 完

人參 熟地

續斷 木香

沒藥 各一兩

右煉蜜為丸彈子大每服一丸空心食前午後溫酒化

開服○一方有牛黃珍珠乳香元胡各一兩共二十一

味為丸脩服○凡服法或薑湯或米湯或酒或燈心湯

隨證用引○若傷寒中風角弓反張用麻黃湯送下○

孕婦臨月宜一日一服至產順利不覺疼痛○凡婦人

服至五服十服之後日倍飲食其功不能盡述服者當

自覺也。

新法下胎方

即平胃散之變局。此平胃散穩妥。

治胎死腹中。最妙。或

有用半劑者。

當歸 一兩

厚朴 三錢

陳皮 二錢

酒水各一鍾。煎至一鍾。入朴硝。或一錢。或二錢。再煎十餘沸。去粗。熱溫服。死胎自下。或化水而出。或止用脫花煎更妙。脫花煎方見前。或用佛手散。以酒調服亦妙。

千金神造散

如妊婦雙軀。一死一生。服此。生者安。

胎產心法

卷中 子死腹中方

四

死者出矣。

蟹爪 一升

阿膠 二兩

甘草 二錢

以流水先煮蟹爪。甘草去滓。內阿膠。烱化服之。血凝不下。加桂心三錢。此方用蟹爪以去其死。阿膠以安其生。

甘草和藥性。

扶羸小品方 虛弱人欲下胎。宜用此。

人參

粉草

川芎

肉桂

乾薑

桃仁

黃芩

蟹爪

右等分。每服一兩。水二鍾。煎八分。空心服。未動再服。

仙傳保命丹

一名安穩丸。又名奪命丹。

凡孕婦下血不止。或小產

下血。及子死腹中。其人憎寒。手指甲黑。唇青。面色

黃黑。胎上攻心。冷汗自出。悶絕欲死。或食惡物毒

藥。傷動胎氣。下血不止。胎尚未死。服之可安。胎若

已死。服之自下。此方得之仙傳。與黑龍丹媲美。皆

產科之聖藥也。

胎產心法

卷中 子死腹中方

四

丹皮

赤芍

桂心

桃仁

白茯苓

各等分

右為細末。蜜丸。彈子大。每服一九。細嚼。淡醋湯下。連進三丸。神效。

官桂散 治產婦面赤舌青。子死母活者。或面青。舌

赤。沫出。母死子活者。或唇舌俱青黑。沫出。子母俱

死者。此方下死胎如神。

官桂

五錢。去皮

丹皮

川芎

葵子 各一錢五分

為末。葱白煎湯調下三錢。

黑神散 凡臨產血多。胎為血裏。以致難產。宜棄子

救母。橫生逆產。子死腹中。以及胎衣不下。血迷心

竅。頭暈眼花。敗血乘虛流散。四肢浮腫。口渴舌燥。

乍寒乍熱。煩燥發狂。言語錯亂。其狀如顛。或月內

飲冷。敗血凝聚。大便艱難。小便閉澀。或血流小腸。

小便出血。或惡露未盡。悞食酸物收斂。因而崩漏。

或肺敗鼻中氣黑。或敗血衝心。喉口氣急。或血滯

胎產心法

卷中 子死腹中方

四

脾胃。心腹脹滿嘔吐。亦似番胃。服之神效。

當歸

熟地

白芍 炒

肉桂

炙草 各一兩

棕灰

蒲黃

沒藥

血竭 各五分

乳香 三錢

赤芍 八錢

為細末。每服二錢。溫酒調下。

鷄熨下死胎法

烏雞一隻

去毛。細切。水煎二三升。候湯通手。用木舂蘸摩腹中。胎自出。

下胎單方

牛糞 不拘多少

右牛糞炒極熱。入醋半盞。以青布包裹。于母臍上下熨之。立下。

千金榆皮湯 治胎死腹中。或母有疾。欲下胎。

榆白皮 一握

胎產心法

卷中 子死腹中方

四

右白皮煮汁服之。自下。

返魂丹 治生產諸證。并死胎惡血。胎衣不下。橫生。

逆產。產前清熱養血。產後推陳致新。

野天麻 一名益母草。四五月

採花葉子。陰乾半觔。赤芍 六錢

當歸 七錢

木香 五錢

為末。蜜丸彈子大。或童便酒。或薄荷湯。或米飲。或桂枝湯。或棗湯。或秦芫湯。隨證酌湯。化下一丸。

胎產金丹

滑胎煎 俱見本卷保產門易產方

神柞飲 見本卷催生門

佛手散 見上卷諸痛門

胞衣不下論

婦人一生莫重於生產。臨產莫急於催生。既產莫甚於胞衣不下。所以不下者。有因血少乾澁。或子宮空虛。吸貼而不下。有因氣血虛弱。產母力乏。氣不轉運。不能傳送。而停閣不下。其證但見無力。腹中不痛脹。治當補氣助血。速煎生化湯。大劑連進二三鍾。或兼進益母丸。使血旺氣和。而衣自下。或用保生無憂散以固元氣。至于萬密齋用五苓

胎產心法

卷中 胞衣不下論

四

散。予恐無助血之能。不敢遵而用之。不若景岳全書。決津煎。或滑胎煎。無憂散。局方黑神散之類。又有因惡露流入胞中。脹而不能出。蓋兒既生。胞帶必下墜。故胞在腹中。形如荷葉之仰。仰則盛聚血水而脹。難下。將兒抱定。不可斷臍帶。惟老成有識。見穩婆。以右手二指。緊跟臍帶而上。帶盡處。將指向上半寸餘。摸之。覺有血。便是胎衣。向下一捺。其血覆其衣。自下。或以手指頂其胎底。使其血散。或以指摸上口。攀開一角。使惡露傾瀉。則腹空自下矣。法甚簡明。當為下胞衣第一妙法。亦有人因衣遲不下。恐天寒不

便於子。急斷臍洗兒。用帛繫墜臍帶。其繫法。已見前候胞

衣生下。須知論中矣。但血滲胞中不下。又不能用手法下之。停蓄既久。漸克心胸。為脹痛。或喘急。非逐血破血不可。古人用良方奪命丹。或用失笑散。以熱酒調服。使血散脹消。衣下。緩則不救。又有下胎衣單方。擇錄以備鄉村無藥處。急迫之用。世俗有以本婦頭髮。令攪入喉中。使之作嘔。則氣升。血散。胞軟。亦自下矣。亦有用產婦鞋底。炙熱。熨小腹上下。即出。又有血極膏。三奈方。花蓋石散。良方牛膝散。神應丹。灸足小指法。牛膝湯。蛇脫烏金丸。半夏散。皆治胎

胎產心法

卷中 胞衣不下論

四

衣不下之方。予謂既有手法。下衣簡便。又不傷人。當以用手法為最。至於吐法。雖效。如不出。反逆上者。必死。至下胎衣。諸方中。用硝。滕。花。蓋。石。硫。黃。等藥。非惟不效。即使得下。胃氣大傷。況金石峻厲之品。恐非腸胃大虛者。所宜。後方錄之以備參考。耳。用者。慎之。况藥力未必如手法之速效。而無損于人也。如不能手法。必欲用藥。總不若以失笑散。或萬全湯去人參。並可取效為至當。其次亦惟決津煎為善。

益母丸

一名逐魂丹。○附益母膏

治婦人赤白帶。惡

露時下不止。及治胎前產後經中諸般奇痛。無所
不療。本草云。此草胎前無滯。產後無虛。故名益母。

益母草

一味。一名克蔚子。一名野天麻。方梗對節生葉。葉類大麻。四五月開紫花。是白花者非。

右于五月採取晒乾。連根莖葉。勿犯鐵器。磨為細末。煉

蜜丸。如彈子大。每服一九。用熱酒和童便化下。或隨證

用湯引送下。○一方以此為末。每服二錢。或酒或童便。

或隨證用引服之。○一方凡產時倉卒未合。只用生益

母草搗汁。入蜜少許服之。其效甚大。○一益母膏方。依

前採取搗爛。以布濾取濃汁。用砂鍋文武火熬成膏。如

胎產心法

卷中 胞衣不下方

四

黑砂糖色為度。入磁磑收貯。每服二三匙。酒便調下。或

于治血湯藥中。加一匙服之。猶妙。

良方奪命丹 治瘀血入胞。脹滿難下。急服此藥。血

即消。衣自下。○予謂此方藥峻。不可輕用。

附子

炮。五錢。

乾

漆。碎。炒。烟盡。

牡丹皮

當

歸。各一兩。

右為末。另用大黃末一兩。以好醋一升。同熬成膏。和前

藥丸。桐子大。溫酒吞五七丸。

失笑散 治婦人心痛氣刺不可忍。及產後兒枕畜

血。惡血上攻疼痛。并治小腸氣痛。更治胞衣由瘀
血脹滿不能出者。

五靈脂

生。酒研。澄去沙。

蒲

黃。生。篩淨。

為末。每服二三錢。葱湯調末服之。○一方用酒煎熱服。

○一方用好醋一杓熬成膏。再入水一鍾。煎至七分熟。

服。○一方用醋糊和丸。龍眼大。每服一九。以童便和水

各半鍾。煎七分溫服。○按此方如行血。各等分俱生用。

如止血。俱炒用。或五靈脂減半用。○若用以止痛。蒲黃

宜減半。又一方。蒲黃一半生。一半炒用。

胎產心法

卷中 胞衣不下方

四

下胎衣單方

治胞衣不下。

此方與前下死胎相同。但治法各別。故重錄之。

黑牛糞

不拘多少。

右畧焙。帶潤。以布裹之。束于腹上。即下。

又方 治胞衣不下。

芒

硝。三錢。

牛

膝。

當

歸。各五錢。

黃酒煎服。即下。○非壯實婦人。此方不可輕投。

血極膏

又名醋大黃丸。

治胞衣不下。惡血衝心。並腹

中血塊衝逆作痛。

錦紋大黃 一兩

右為末。以好醋半升。熬成膏。九桐子大。以酒化五丸服之。須臾即下。○又治女人乾血有熱。脉弦數者。臨臥。溫酒化服。大便利一二行。經脉自通。亦治經閉。通用。

三柰下胞方

三柰 一二片。含口內。有水嚥下。其胞自落。

花蕊石散 治胎衣不下。胎死腹中。並治產後敗血

不盡。惡血奔心。血暈等證。或至死而心頭尚熱。急

以童便調服一二錢。取下惡物如鷄肝片。終身不

胎產心法

卷中 胞衣不下方

咒

患血虛血暈。若膈上有血。化為黃水。即時吐出。或

從小便而下。並治諸血凝滯。氣絕欲死。凡血證人

弱。不能攻者。服之凝血皆化為水。

花蕊石 一兩

硫黃 四錢

為粗末。入瓦瓶內。鹽泥固濟。晒乾。以炭火叢堆。煅煉一日。候冷。取出。再研細。用一錢。童便調服。○此石藥也。不可輕用。姑錄之以備參考耳。因產後腸胃之虛。何堪當此也。

良方牛膝散 治胞衣不下。腹中脹痛。急服此藥腐

化而下。

牛膝

川芎

朴硝

蒲黃

當歸 一兩五錢

桂心 五錢

每服五錢。薑三片。加生地黃一錢。水煎服。

炙足小指法 治難產。及胞衣不下。

將產母右足小指尖上。炙三炷。炷如小麥粒大。即易產也。

此法。或可治村農不裹足婦人。若纏足者。則不便行之矣。

千金牛膝湯 治兒產。胞衣不下。

胎產心法

卷中

胞衣不下方

手

牛膝

瞿麥 各一兩

當歸

通草 各一兩五錢

滑石 二兩

葵子 半升

右六味。水煎分三服。○一方。無滑石。有桂心一兩。

蛇蛻烏金丸

胞衣不下。古法用蛇蛻一條。香油燈上燒研。入麝香為末。童便調服。或加蘄艾。阿膠。蘊木。各一錢。麥芽末打糊為丸。名烏金丸。遇有難產及死胎不出。俱童便服之。○亦有單用蛇蛻酥炙為末。童便調下一錢匙者。

半夏散 治產婦肥盛多痰。阻逆氣道而至產難。及子死胎乾。或子下而胞衣不出。
半夏製不拘多少。

右為散。童便服方寸匙。連進三服。并用吹鼻取嚏。以激動關竅大妙。

生化湯 見下卷生化湯論後

保生無憂散 見本卷保產門易產方

決津煎 見上卷鬼胎門

滑胎煎 見本卷保產門易產方

胎產心法 卷中 交骨不開論 五

局方黑神散 見本卷子死腹中門烏金散。即此方也。○治胎衣不下。用童便酒各半調服。

神應丹 俱見本卷催生門

保產萬全湯 俱見本卷催生門

交骨不開論 交骨不開者。陰血虛也。或年幼受胎。陰氣不足。陰不足。則氣不達。所以不開。或年大方嫁。脉絡長成。或元氣虛弱。胎前失調。皆有此證。用參。便佛手散。補而開之。或十全大補湯亦可。古法用加味芎歸湯。每見服此藥者。惡血凝滯。反

成不救。惟大劑人參童便入于芎歸劑中。助其氣血。開闔

之功立致也。證見咬牙昏暈。急以熱小便灌之。稍遲則無濟矣。若元氣不虛者。只用佛手散入小便服之。人參不必用也。又有用開骨膏。以參便佛手散煎湯送下。予謂又不如用加味神柞飲。開交骨如神也。○予曾治彭姓女。初次生產。經日不下。交骨不開。神柞飲並諸催生藥。服之無效。用人參三錢。煎服立下。

參便佛手散 治臨產交骨不開。其驗如神。

當歸 三錢 川芎 一錢

人參 三五錢。去血過多。加至一兩。

胎產心法 卷中 交骨不開方 五

水煎。臨服入童便半盞。續續進之。質壯氣實者。但加童便。其參不用可也。

加味芎歸湯 治交骨不開。並死胎不下。

川芎 當歸 各一兩

龜板 一個。自死者。酥炙。婦人髮性。五錢。曾生子者。燒存

右共為末。每服一兩。水煎服。

開骨膏 治交骨不開。○即催生方乳。神丹。彼兼治難產。此獨開交骨。

明乳香 一兩

五月五日研細。猪血為丸。如鷄豆大。硃砂為衣。涼酒化服。一丸

十全大補湯 見上卷胎不長養門

佛手散 見上卷諸痛門

加味神柞飲 見本卷子死腹中門

獨參湯催生 見本卷催生門

胎產心法卷之中 畢

胎產心法

卷中

交骨不開方

五

胎產心法卷之下

上谷

脉訣論

脉經云。產後之脉。寸口洪疾。不調者死。沉微。附骨不絕者。生。又曰。沉。小。緩。滑。者。吉。實。大。堅。弦。疾。者。凶。牢。革。結。代。及。瀯。滯。不。調。者。不。治。丹。溪。曰。胎。前。脉。當。洪。數。既。產。而。脉。仍。洪。數。者。死。又。曰。胎。前。脉。細。小。產。後。脉。洪。大。者。多。死。予。見。產。後。多。有。洪。數。而。生。者。要。知。血。虛。之。脉。浮。洪。而。數。者。居。多。產。後。血。虛。故。現。此。脉。若。不。明。以。告。醫。俗。醫。多。誤。認。為。外。感。虛。虛。之。胎。產。心。法。卷。下。脉。訣。論。一

禍。在。於。頃。刻。然。此。洪。數。之。中。自。有。和。滑。之。象。非。如。牢。疾。而。少。胃。氣。之。謂。故。多。死。也。產。經。曰。胎。前。之。病。其。脉。貴。實。產。後。之。病。其。脉。貴。虛。胎。前。則。順。氣。安。胎。產。後。則。補。虛。消。瘀。此。其。要。也。大。凡。孕。婦。臨。產。氣。血。動。盪。胞。胎。迸。裂。與。常。經。離。異。必。有。水。先。下。俗。謂。之。胞。漿。即。養。胎。之。液。也。水。下。則。胞。裂。而。產。既。產。則。氣。血。兩。虛。脉。宜。緩。滑。緩。則。舒。徐。不。因。氣。奪。而。急。促。滑。則。流。利。不。因。血。去。而。枯。濇。均。吉。兆。也。若。實。大。弦。牢。非。產。後。氣。血。兩。虛。所。宜。實。則。邪。實。大。為。邪。進。弦。為。陰。飲。宣。布。不。能。牢。為。堅。着。近。乎。無。胃。皆。相。逆。之。脉。故。凶。

產後大補須分虛不虛全實三證論

全書云。丹溪曰。產後當大補氣血。卽有雜證。以未治之。此其意。謂血氣隨胎而去。必屬大虛。故無論諸證。當以大補爲先。其他皆可緩也。今產科所宗。無非此法。但產後氣血俱去。誠多虛證。然有虛者。有不虛者。有全實者。當隨證隨人。辨其虛實治療。不得執有誠心。概行大補。以致助邪。此辨之不可不慎也。今予遵生化湯加減兼治之法。未常敢大補。而置諸證於緩治。觀暈厥總論中。塊痛未除。未可據加著木之語。槩可知矣。又云。產後虛證。無非隨人元氣。必

胎產心法

卷下

產後大補須分虛全實三證論

二

素弱之人多有之。或於產後血氣既去而更弱者亦有之。此當因人察脈。因脈察證。若脈氣形氣俱不足。此當以全虛治之。若形氣不足。病氣有餘。或兼火邪。或兼外感。或以飲食停滯。是亦虛中有實。不得不詳審而治。今予治全虛者。後立有加參。從權生化湯等方。治虛中有實。亦立有隨證加減。生化湯等方。隨其虛實。以投之。是皆重產而兼治者也。○又云。產後不虛證。或素日無病。或年少當時。或素耐辛苦。貧勞之質。此輩本無不足。及其一旦受孕。乃於腹中添入此物。故至氣血壅塞。爲脹。爲嘔。是皆添設有餘之

病。及其既產。始見通快。所留得去。仍復故吾。常人之產。此類極多。果何虛之有。或因內傷外感。難保必無。倘有所患。去之卽愈。若概行大補。果能堪否。卽臨盆帶去血氣。未免暫見耗損。然以壅滯之餘。不過皆護胎隨從之物。去者當去。生者旋生。不出數日。必已來復。此生化自然之理。何至是產皆虛也。若執云。產後必當大補。則實實之病。必所不免。致輕者甚。甚者危矣。予謂。少壯婦人。產後不虛。只用黑糖水湯。或少加以酒。去瘀可耳。原可不必服藥。卽服生化湯一二劑。亦非大補實實之藥。有益無損者也。倘有內傷

胎產心法

卷下

產後大補須分虛全實三證論

三

外感。生化湯。因證加減用之。○又云。產後全實證。如外感風寒。頭痛。身熱。便實。中滿。脈緊。實。洪。大。有力。此表邪之實證也。又火之盛者。必熱。渴。燥。煩。或便結。腹脹。口。鼻。舌。焦。黑。酷喜冷飲。眼。眵。尿管。痛。赤。脈。見。洪。滑。此內熱之實證也。又鬱怒動肝。胸。脇。脹。痛。大便不利。脈弦而滑。此氣逆之實證也。又惡露未盡。瘀血上衝。心。腹。脹。滿。疼痛。拒按。大便難而小便利。此血逆之實證也。又凡富貴之家。保護太過。或過用人參。著。木。以致氣壅。或過用糖酒。炭火。以致內熱。或產本不虛。而妄用大補之藥。以致增病。此調攝之實證也。又

或因產過食。恐其勞困。固令勉強。以致停蓄不散。此內傷之實證也。此上諸證。姑舉要者。以見其概。然既有表邪。不得不解。既有火邪。不得不清。既有內傷停滯。不得不開通消導也。今予治各證。後開生化湯中。俱有隨證加減。一以重產。一以兼治。所謂道並行而不相悖。可保萬全者矣。

四物湯不宜產後論

凡產後諸病。古方多用四物湯加減何也。以方中有芍歸之辛溫。佐以地芍之寒涼。溫寒適中。可謂無虞矣。不知四物乃女科雜證。諸疾妙劑。若用以產後。大非所宜。予考方胎產心法

卷下 四物湯不宜產後論 四

書之意。以為白芍用酒重復製炒。去其酸寒之性。但存生血活血之能。或再加黑薑辛熱佐之。有何不可。又謂芍藥性清微酸而收。最宜於陰氣散失之證。豈不為產後要藥。但觀其再製以酒炒。則他寒涼峻削之不宜用。藥可知矣。予思芍藥初產三五日。所當禁用。若產日已久。以酒製透。為他藥之佐。猶可。惟四物湯中生地更涼。直走血分。且傷脾胃為害愈甚。或云。易以熟地補益正陰。則稱為至當。獨不思熟地性滯。更使血滯不快。雖有芍歸反行牽制。而少行動。亦非新產者所宜。蓋新產之婦。血氣俱虛。但存秋冬

肅殺之氣。而鮮春夏生發之機。故最忌寒涼。大宜溫藥。以助資始資生之源也。是以丹溪先生謂芍藥伐生發之氣。禁而不用。良有深意矣。予歎世之槩以四物治產後者。胡不思乎。

生化湯論 附方

生化湯論曰。產後諸證。皆緣氣血驟下。元氣大虧。用藥不同常法。是以有虛極不能姑待者。則當峻補之中。加入溫行之藥。峻補則力大而可宣通。溫行則流暢而不凝滯。至於逐瘀之劑。即實證亦不可用。峻厲之藥。況產後大虛。恐

胎產心法 卷下 生化湯論 附方 五

血無主宰。一任藥力。便為崩而。不止。虛則易脫。勢如覆水難收矣。夫人遇大病之後。血氣兩虛。猶當調補。況產後脾胃血氣之虛衰。更有甚焉者乎。今之治產後者。亦云。元氣因產而虧。運行失度。不免瘀血停畱。致成諸疾。必以去瘀為先。瘀消方可行補。甚有用回生丹。攻血塊。下胞衣。殞人性命者。此蓋止知專攻舊瘀。而不知新血轉傷之害。豈知塊固當消。而新血猶當生也。蓋專消則新血不生。專生則舊血反滯。予考新產諸方。莫若生化湯。為產後第一妙方。其方芍歸桃仁。溫中行血。善去舊血。驟生新血。佐以炙黑

乾薑、炙草引三味入於肺肝行中有補化中有生故名生
化。蓋因功用而立名也。又有加入益母草一錢五分功效
亦同。此實治產之良方。保全產婦之聖藥也。故馮氏因此
方之妙。變化用於臨產。加人參、桂、牛膝、紅花。又為催生之
神劑矣。

生化湯方 凡孕婦臨月。即預備生化湯數劑。俟臨
產之時。即為預先煎就。產下。隨服二三道。以逐瘀
生新。再無產後諸證之患。無論正產、半產。雖少壯
產婦。俱宜服之。故此湯為產後七日內要藥。倘產

胎產心法

卷下

生化湯論附方

六

下之時。未及煎服。凡產後諸證。仍以此湯治之。

全當歸

八錢酒洗

川芎 四錢

乾薑

四分炙黑存性

赤芍 十粒去皮尖打碎

炙草

五分

水二鍾。煎七分。加酒小半鍾。如素日不能飲酒者。加六
七茶匙。稍熱服之。其藥渣。畱并後貼藥渣。合而再煎。兩
貼共三煎。在產下一二時辰內。未進飲食。先相繼煎服。
能速化舊血。而驟長新血。不特可免目前暈厥。汗崩。惡
露停滯等患。且諸病不生。精神百倍矣。如胎前素虛之

人產後又當再製兩貼煎服。以防倦怠。若產下已服一
二貼。而塊痛未除。仍當再進幾貼。塊痛自消矣。

調攝論

凡孕婦產畢。血氣未定。不宜睡倒。不宜側坐。須床頭厚鋪
褥褥。高倚。仰靠。宜。豎。膝。不宜伸足。並。遮。圍。四。壁。使。無。孔。隙。
免。致。賊。風。為。害。倘。閉。目。睡。倒。或。忿。怒。逆。氣。即。令。人。眩。暈。也。
再用醋塗鼻。房中或用醋炭。更燒以漆品。輕輕以手從心
按摩至臍。則惡露盡下。又何血暈血逆之有。常見人產畢。
即飲熱童便一盞。又有三日內。以童便和酒。溫服五七次。

胎產心法

卷下

調攝論

七

予謂酒雖能下惡露。行乳汁。產後臟氣方虛。即素日善飲
者。亦不可多飲。并不可產畢即飲。蓋恐引血入四肢。或引
上行。能令血暈。至於童便。味臊而性涼。如胃氣弱者。得臊
氣而嘔惡。裏無火者。得涼性而滯血。且能傷胃氣。均非所
宜。不若預煎生化湯。產畢即服。為妙。或用紅糖滾水。衝化
頻飲。以行其瘀。時食白米薄粥。煮石首魚。甘澹食之。如此
調攝。自無事矣。有人先於臨月時。用有毛淡菜十餘箇。紙
包。吊風處。二十餘日。陰乾。勿令人知。產下。即煎湯一鍾熱
服。產後再不生病。

生化湯 見本卷生化湯論後

產後禁忌論

凡生產既下。不必問是男是女。恐因言語而泄氣。或以愛憎而勞神。最忌大喜大怒。喜則氣散。或生紅汗。怒則氣逆。或生癥瘕。不可獨宿。恐致虛驚。不可刮舌。恐傷心氣。不可刷齒。恐致血逆。勿勤梳頭。恐頭皮作痛。須氣血平復。方可治事。犯時。微若秋毫。成病重如山嶽。

凡初產。其牛羊猪肉。鷄鴨肉。及蛋。併猪蹄。猪腎。菜豆。涼粉。蕎麥。麪食。等類。一切滯氣堅紮難化之物。及生冷膩滑。

胎產心法

卷下

產後禁忌論

八

皆不宜食。恐新產脾胃氣虛。難於運化。易致內傷也。

凡產逢暑月。切不可當風睡卧。最忌貪涼。用扇及洗足。澡浴。雖盛暑。不可用冷水洗手足。

凡新產驟虛。最忌着寒。寒則血氣凝滯。諸變冗生。每致飲食不化。腹痛作瀉。此時欲去其瘀。則正氣並脫。欲止其瀉。則瘀結不行。可不慎歟。治法見後泄瀉門。

凡產逢冬月。宜重棉兜護其腹。雖夏月。亦當複巾裹之。以免厥陰受寒。

凡產後百日内。不詈罵。少勞碌。禁淫慾。終身無病。而且多。

子。若未滿百日。交合。則虛羸百疾。從此而生。必患臍下虛冷。手足腰腿痠痛等證。名曰。羸勞。最難治療。

凡產後。勿用椒薑艾酒。雖血塊得熱流通。然新血為之。不寧耳。即砂仁湯。亦能動血。咸在禁忌。

產後乳汁。乃血氣所成。不可食鹹。鹹能止血。令無乳汁。且發嗽難治。

產後南北風土不同。江以南。新產後。即食鷄子。雖告之以利害。相沿成習。毫無疑懼。且竟多安然無事者。予亦只得隨俗。令其豁開淡煮而食之。尚有養胃却痰之功也。

胎產心法

卷下

產後藥誤須知

九

產後藥誤須知

產後勿輕用烏藥。香附。木香。及耗氣順氣等藥。用之反增滿悶。雖陳皮。用不可過五分。

產後勿輕用青皮。厚朴。山查。枳殼。陳皮。消食藥。多損胃減食。即枳殼。香砂等丸。亦多損氣血。

產後勿用青皮。枳實。蘇子。以下氣定喘。用之元氣必脫。產後浮麥。傷胃耗氣。五味。能阻惡露。棗仁。油滑。致瀉。均為禁忌之品。

產後身熱。誤用黃芩。黃連。黃柏。枝子。損胃增熱。致不進飲。

食且黃芩苦寒無論惡露淨與不淨皆非所宜。

產後四日內未服生化湯以消血塊勿先用人參蒼朮致塊不除。

產後勿輕用牛膝紅花蘇木枳殼等類以消塊猶忌多用。

獨用至於三稜莪朮山查等峻藥更不可用若誤用。

舊血驟下新血亦隨之而損禍不可測也予每見俗用山。

查一味煎汁以攻血塊致成危證頻服兩三貼必死。

產後勿輕用生地黃以滯血路。

產後不可用大黃芒硝以通大便反成膨脹。

胎產心法 卷下 產後誤藥須知 十

產後不可用五苓以通小便用之愈閉。

產時不可用濟坤丹以下胞胎。

不可信婦人良方及產保百問俗醫多有守此二書以治。

產用芎歸白芍生地誤人實甚餘可知矣。

凡人有疾病多有求卜以問吉凶並卜何方何姓人醫治。

可愈此蓋人不明醫理不知醫者孰良孰庸亦無可如何。

之計耳豈知竟有醫卜相通醫求卜薦許以分謝卜者貪。

利假神道以指引因卜而薦誤人性命比比然也產後之。

證吉凶在於頃刻不可不知而慎重也。

三衝論

產後危證莫如敗血三衝其人或歌舞談笑或怒罵坐臥。

甚者踰牆上屋口敲拳打山腔野調號佛名神此為敗血。

衝心多死醫通云花蕊石散最捷琥珀黑龍丹亦效如雖。

悶亂不致顛狂者失笑散加鬱金丹謂當於妄言妄見門。

參看治療。

若其人飽悶嘔惡腹滿脹痛者為之衝胃醫通云用平胃。

散加薑桂往往獲效不應送來復丹嘔逆腹脹血化為水。

者金匱下瘀血湯予謂當於飽脹嘔逆等門參看治療。

胎產心法 卷下 三衝論 十一

若其人面赤嘔逆欲死為之衝肺醫通云二味參蘓飲甚。

則加芒硝蕩滌之予謂當於口鼻黑衄門參看治療。

大抵衝心者十難救一衝胃者五死五生衝肺者十全一。

二其醫通所用金石及峻藥等治法亦無可如何之思與。

其視死不若救生之意耳予謂治此等證宜用生化失笑。

抵聖等類平穩藥當亦通神至來復黑龍等丹花蕊平胃。

等散及下瘀血湯均未敢輕用姑錄之以備參考耳。

來復丹 治上盛下虛裏寒外熱及伏暑泄瀉如水。

硫黃 同硝石為末銀石器內漫火炒柳木攪之不可猛火以傷藥力。

硝石

太陰元精石 水飛

青皮

去穢

陳皮

去白各一兩

五靈脂

二兩水飛去沙石澄定晒乾

右為末古法以醋和丸米飲下因醋易衝壞今改用米

飲糊丸如梧子大每服三十九空心醋湯下

二味參蘓飲 治惡露入胞脹大不能出及產後敗

血衝肺喘滿面赤幾死者

人參

二錢

蘓木 四錢碎

水煎服又有入童便熱服○一方人參一兩為末蘓木

胎產心法

卷下 三衝門方

十三

二兩槌碎水碗半煎蘓木水一碗去渣調人參末隨時

加減服○大便溏泄者禁用

花蓋石散

失笑散 俱見中卷胞衣不下門

琥珀黑龍丹 見中卷催生門

平胃散

金匱下瘀血湯 俱見上卷諸痛門

生化湯 見本卷生化湯論後

抵聖湯 見本卷氣逆嘔吐不食門

產後不宜汗下利小便論

產後陰血驟下陽無所附孤陽外越每多發熱此乃陰虛

生熱切勿作外感而表散生化湯善能退熱以其內有薑

草所謂甘溫能除大熱也故產後雖有表證一切風藥性

升不可用恐載血上行令人發暈且慮重竭其陽必至汗

脫而死即佛手散中川芎辛散能發汗走泄亦須臨時因

證審酌用之產後陰血既虧津液自少况臨產勞倦氣虛

虛則傳化自遲二腸枯燥勢所必然久則自復或用生化

湯養血兼生津助液亦可故產後雖二便暫有不甚通利

胎產心法

卷下 產後不宜汗下利小便論

十三

然於下利等藥必須禁用非特硝黃五苓難於輕試即四

物湯中生地芍藥純陰而伐生氣且作瀉而凝血五苓利

水傷陰愈通之而愈枯結若誤用而重亡其陰難免孤陽

無輔而走脫矣故機要有云胎產之病從厥陰無犯胃氣

及上下二焦不可汗不可下不可利小便也

生化湯

見本卷生化湯論後

新產三審論

凡治產後三審不可缺也一審少腹痛與不痛以徵惡露

之有無二審大便通與不通以徵津液之盛衰三審乳汁

行與不行。及飲食多少。以徵胃氣之克。餒審斯三者。以脉
參證。以證合脉。脉證相符。有疾治之。即愈。脉證相反。縱無
危候。必多變端。即如產後惡露。常以彌月為期。然間有六
七朝即淨者。又未可以概論也。此雖產母稟質不同。而因
胎之所稟亦異。如胎息壯盛。則氣血盡歸其子。瘀血自少。
胎息孱弱。則氣血涵養有餘。瘀血必多。亦有產時去多。產
後必少。產時去少。產後必多。勢使然也。大抵常產之婦。開
闔有權。產後子宮即閉。兒枕隨氣攻注。碎作小塊。續續而
下。所以延綿日期。又有由於艱產。過傷子宮。關闔廢弛。不

胎產心法

卷下

新產三審論

十四

能收斂。或下血塊。大小形色與茄無異。此名兒枕是也。全
塊頓出。自無淋瀝之患。即有餘血。盡歸洩便。如皂莢汁。少
腹畧無痛苦。切勿認爲產後瘀。尙未行。妄行攻下。誤人性
命。產後又有似乎兒枕痛者。摸之亦有塊。按之亦微拒手。
人皆指爲兒枕宿血。此大不然。夫胎胞俱去。血亦豈能獨
留。蓋子宮蓄子既久。忽爾相離。血海陡虛。所以作痛。胞門
受傷。必致壅腫。所以亦若有塊。而實非正塊。腫既未消。所
以亦頗拒按。治此者。當安養其臟。不久自愈。若有瘀服藥。
生化湯爲最。殿胞煎。或四神散亦可。若誤用蘓木。紅花。元

胡青皮之屬。反損臟氣。必增虛病。慎之慎之。予曾見孕婦
產後。少腹旁邊。以手按之。內有一條。形如小黃瓜。斜長而
硬。頗似瘀積。然無痛苦。產婦先以爲瘀滯。後以爲癥瘕。每
愁成病。予開導之云。無痛苦。不拒按。是虛非實。血足自消。
不須疑慮。遲數月。果漸消沒矣。

殿胞煎

治產後兒枕疼痛等證如神。

當歸 五錢

川芎 一錢

茯苓 一錢

炙草 一錢

肉桂 五分

胎產心法

卷下

三審門方

十五

水一鍾。煎八分。熱服。○如脉細而寒。或嘔者。加乾薑炒
黃色 一錢。○如血熱多火者。去肉桂。加酒炒芍藥 一錢。

○如脉弱陰虛者。加熟地 三錢。○如氣滯者。加製香附
一錢。○腰痛。加鹽水炒斷絲杜仲 一二錢。

生化湯 見本卷生化湯論後

四神散 見本卷腹痛門

血塊痛論

產後血塊。是孕成餘血之所積也。夫婦人血旺氣衰。二七
而天癸至。三旬一見。以象月盈則虧。行之有常。則曰經。有

孕則經水不行。其餘血注於胞中以護胎元。一月名胎胚。二月名始膏。三月始成形而名胎。方受母血之蔭庇。胎形尙小。雖食母血。而尙有餘汁。並前兩月之血。積於胞中。日久成塊。至產時。當隨兒下。或因產婦送兒。送胞勞倦無力。或調護失宜。腹欠溫煖。至血塊日久不散。疼痛拒按。並宜生化湯助血行。血外用熱衣煖腹可也。慎勿輕服峻劑。至崩脫不救。

生化湯 見本卷生化論後

暈厥論

胎產心法

卷下

血塊論

暈厥論

六

凡產後暈厥二證。皆由氣血並竭。苟非急補。何能挽其將絕之元神。無庸疑議者也。但暈在臨盆。證急猶甚於厥。用藥不及。急救法救之。如其人微。虛者則眼花頭眩。或心下滿悶。神昏口噤。不知人事。少頃即蘇。或因亡血過多。以致虛火乘虛泛上。而神不清。身無所主。其陰血暴亡。心神失養。心與胞絡。君相之火。得血則安。亡血則危。火上熾。故令人昏冒。火乘肺。故瞑目不省人事。是陰血暴亡。不能鎮撫也。經云。病氣不足。宜補不宜瀉。瞑目合眼。病悉屬陰。暴去有形之血。則火上熾。均宜類灌生化湯。或從權急救。生化

湯二三貼。先補血分之虧。則塊化血旺。神清而暈止。大虛者。其證面白。眼閉。口開。手冷。多汗。神昏。六脈微細之甚。是氣隨血脫。而欲絕。當大劑人參。方可回陽。恐勢急而補陰不及。須以氣藥兼之。此陽生陰長之理也。從權急救。加參生化湯。或加參生化湯最效。如製藥不及。速用獨參湯。兩許煎湯急救之。但得下。嚙即可望生。若少遲延。則無及矣。有人謂產後七日。方可用參。此愚昧訛傳。不知始自何人。萬不可信。但暈發頃刻。而急救外治之法。又不可緩。速宜輕輕扶坐。勿令卧倒。或燒紅炭。沃之以醋。或燒舊漆器。令胎產心法

卷下

暈厥論

七

烟氣透入口鼻。即甦。急捏人中。靜以待之。元氣漸復。不可亂動。致令神氣散亂。或用韭菜一握。切碎。入有嘴磁瓶內。將醋煎滾。澆入瓶內。急蓋瓶口。以瓶嘴向婦鼻孔。令氣透入鼻中。即蘇。但凡大病大虛之人。皆能作暈。產後之暈。因血去而名之曰血暈。實非因血而致暈也。若偏信古方。認暈證為惡血搶心。而輕用蘓木、牛膝、紅花等類。以及牡丹奪命等方。或認為痰火。而用無補消痰之方。誤之甚矣。俗治產婦。或因死胎。及胎衣惡血上逆。搐嘔昏暈。用小便乘熱灌之。但得一口下咽。即止。設遇胃氣壯盛之婦。不畏臊

氣獲效者有之。然童便非能止暈回元。蓋取其下行舊路。降火消瘀。考之方書內云。敗血流入肝經。眼生黑花。頭目昏暈。不省人事。此血熱乘虛逆上。湊心。故昏迷不省。氣閉欲絕也。服童便最好。此論。但照管敗血。全不顧產虛。且有氣閉欲絕四字。豈童便可挽回元氣欲絕乎。即有惡血上逆。血滯等證。亦莫若生化湯。溫而行之。去瘀止暈之妙也。予見江南產科。有用當歸二錢。益母草一錢。人參二錢。紅花六分。炮薑八分。煎熱。衝童便服之。以治暈。此方兼得之義。庶幾近之。如婦人有血暈之證者。不若於將產數日前。

胎產心法 卷下 暈厥論 六

預前擇服。八珍歸脾十全等類。調補氣血。臨產又用人參。催生補於未產。未虛之前。產後無虛。可乘無暈。可發矣。三干厥證。在分娩之後。因產時用力過多。勞倦傷脾。孤臟不能注於四傍。故手足逆冷。而發厥。經云。陽氣衰於下。則為寒厥。厥氣上行。滿脉去形。蓋逆氣上滿於經絡。則神氣浮越。去身而散也。宜大補回陽。生化湯連用二服。俟氣血旺而神復。厥證自止矣。又非偏補血分之可得而愈也。若服藥而口渴。另用參麥散。以代茶。助津以救臟燥也。又有四肢逆冷。泄痢。類傷寒陰證。不可用四逆湯。必生化湯倍參。

煎服。或加熟附子一片。則可以止逆回陽。而見參歸之功。矣。若血塊痛止而厥。滋榮益氣湯最效。凡暈厥。乃產後危急。二證。若新產塊痛未除。又未可據。加著木。故急加人參。從權以救之。俟暈止。厥回。再去參。以除塊痛。此要訣也。

急救暈法

凡兒方生下。母即昏暈不醒者。此時即有藥不能入口。遲則不救。其法。急以極軟舊衣。緊閉產戶。以知事婦女。用膝抵住。勿令下面氣洩。又令一人。一手挽住頭髮。一手捫住鼻口。勿令上面氣洩。俟稍轉畧有聲息。方用熱水接氣。急。

胎產心法 卷下 暈厥方 十九

服生化湯

從權急救生化湯 治三等血暈。兼化瘀生新。

川芎 三錢 當歸 六錢。或八錢。酒洗。

乾薑 四分。炙黑。 桃仁 十粒。去皮尖。

炙草 五分。 荆芥穗 四分。炒黑。○許多忌。

棗二枚。水煎服。○勞倦甚。及血崩。或汗多。形氣脫。而暈。

加人參 三錢。肉桂 四分。急服一二貼。其效如神。決不可。

疑。參為補。而緩之。○痰火乘虛泛上。而暈。加橘紅 四分。

虛甚。亦加用人參 八分。肥人。加竹瀝 數匙。薑汁 少許。

從權急救加參生化湯 治產後形色脫暈。

人參 三錢 川芎 二錢

當歸 四錢酒洗 乾薑 四分炙黑

桃仁 十粒去皮尖 炙草 五分

荆芥穗 四分炒黑○汗多忌用

棗二枚水煎服。○血塊痛甚。加肉桂七分。○渴。加去心

麥冬一錢。五味子十粒。○汗多加麻黃根一錢。如無塊

痛。加蜜炙黃耆一錢。以止汗。○傷麪食。加炒神麪八分。

炒麥芽五分。○傷肉食。加山查砂仁各六分。

胎產心法 卷下 暈厥方 二十

加參生化湯 附大補回陽生化湯

人參 二錢 川芎 四錢

當歸 八錢酒洗 乾薑 四分炙黑

炙草 五分 桃仁 十粒去皮尖

棗二枚水煎服。○此方產後諸危急證通用。一日夜須

服三四貼。方能接將絕之氣。如產後三日內。塊痛未除。

俟元氣稍復。已有生意。當去參。仍服生化原方。○虛脫。

厥逆。汗多。加人參三四錢。○脉與形俱脫。將絕。必用此。

方。類灌。○厥而兼汗。加去心麥冬一錢。○汗多渴甚。加

去心麥冬 三錢。○汗多痰喘。加竹瀝薑汁。去皮尖杏仁

十粒。○汗多喘嗽聲重。加桔梗。去皮尖杏仁各五分。○

無汗喘嗽氣短。加製半夏一錢。去皮尖杏仁十粒。桔梗

五分。○汗多身熱氣短。加人參。○左尺脉弱。亦加人參。

○汗不止。三四劑後。加蜜炙黃耆一錢。○一方川芎當

歸減半。各大補回陽生化湯。治新產厥證。棗引連煎二

服即效。○若厥證作渴。佐以生脉五味飲代茶。以救津

液。則渴減厥回。

參麥五味飲 ○去五味子各參麥飲。○又名生脉湯

胎產心法 卷下 暈厥方 三

人參 二錢○一方三錢 麥冬 二錢去心

五味子 七粒搗碎

煎湯。作茶。時時飲之。煎湯用銀器。或砂器為妙。

滋榮益氣湯 治血塊痛止而厥。

人參 當歸 各三錢

川芎 白朮 土炒 二錢

黃耆 蜜炙各一錢五分或熟地 二錢

麥冬 八分或一錢去心 炙草 四分

五味子 十粒 川附子 五六分或一錢製

水煎服。○汗多加麻黃根、炒棗仁、各一錢。○大便難，加酒洗肉苳蓉一錢五分。

生化湯 見本卷生化湯論後

八珍湯 見上卷諸痛門

歸脾湯 見上卷胞漏小產門

十全大補湯 見上卷胎不長養門

大補回陽生化湯 附本門加參生化湯下

血脫氣脫神脫三證論

產後暴崩為血脫，氣短似喘為氣脫，妄言妄見為神脫。三

胎產心法 卷下 血脫氣脫神脫三證論 三

證雖有氣、陽、血、陰之分，於精、散、神、促、無異。比前暈證，治可少緩，亦危證也。若非大藥急方，頻服失之者多矣。倘誤為氣實、痰火、妄治，鮮有不殞生者。若勢急，並宜用加參生化湯，補中寓行，免致血虛之失。其血脫、患崩一證，由衝任已傷，氣血未復，或因勞役驚恐，或因惡露未盡，固澁太速，以致停滯，一旦復行，然經血大來，當審血氣而辨血色之紅紫，視形色之虛實。如血多紫色有塊，乃當去之，敗血也。其少腹必脹滿，按之而痛，止之反能作痛，或致淋瀝，此不可言崩。只服生化湯幾貼，自愈。如鮮紅之血大來，乃驚傷心

不能主血，怒傷肝，不能藏血，勞傷脾，不能統血，血不歸經，血臟有傷，當以崩證治之。崩非經病，產婦得之，是為重虛，猶不可忽，故宜急治。用荆芷治崩湯，若有血塊痛，而形色

脫，或有汗，或氣促，宜服加參生化止崩湯，以益氣使陽生而陰血自旺，非十灰散之可止者。如血塊痛止，或產後半月外崩證者，又宜滋榮益氣止崩湯，或升舉大補湯，少佐黃連、墜火、寧血歸經，或用曾生升舉大補湯，亦妙。亦有少腹空痛，不可誤認有瘀，察其下血少而無紫塊者是也。當以崩治，宜重用熟地。若小腹滿痛不已，而脈實大緊數者，胎產心法 卷下 氣脫暴崩似喘論 三

此肝經已竭，肝氣隨敗矣，難治。醫通有治產後崩中去血，赤白相兼，或如豆汁，用千金伏龍肝湯治之。其氣脫短氣，似喘一證，因產所下過多，榮血暴竭，衛氣不能運行，獨聚於肺，肝腎不接，故令呼吸短促，語言不相接續，有似於喘，實非喘也。夫肺受脾氣散精，生脈而通水道呼吸，所以清肅上下，調和榮衛而為平人。若值產後，血亡氣窮，浮脫於上，孤陽絕陰，無根將脫之兆，最為危候，惟大進參附，或可得生。世有妄論痰火實證，反用散氣化痰之方，治之必死。有塊痛者，當用大補回陽生化湯，連二三服，世人多疑參

助喘不用。致不救者多矣。况同芎歸黑薑。不加蒼朮。萬無有失。要知人生於氣。氣壯則根本固。而藏源者。欲納於下。運行者。強健於中。何有為喘。為脹之虞。又有用人參。加陳皮。監制則盜洩元氣。反致耗散。只可消導藥中監之耳。考全書。貞元飲。亦治似喘。妙藥也。如無塊痛。當用續氣養榮湯。最妙。或倍參補中益氣湯。少佐熟附。助參以治氣脫。攝氣歸元亦可。如氣虛兼寒者。宜大補元煎。或理陰煎。主之。其神脫妄言妄見一證。因心肝脾三陰血少。而神魂無依也。然有謔語。鄭聲之分。甚至發狂等證。統歸於妄耳。其輕胎產心法

卷下 神脫妄言妄見論 附謔語鄭聲發狂 二四

者。睡中呢喃。重者不睡亦語。或言日用尋常之事。或如見鬼狀。昏不識人。語言不休。此謔語之謂也。若虛甚而聲轉無力。言語不能接續。有頭無尾。一兩句即止。或重言疊語。說過又說。或如造字出於喉中。若鄭聲之輕怯。此鄭聲之謂。其精氣衰奪更甚於謔語矣。夫人之心。藏神主血者也。而言乃心之聲。心有血而神存。則言不妄發。肝藏魂。藏血者也。目得血而司視。則瞳瞭而視正。若夫產後氣血暴竭。而心神失守。故言語無倫。肝魂無依。則瞳眊妄見。况心為五臟之主。目乃百脉之官。虛證見於心目。則十二官各失

其職可知矣。是以視聽言動。皆成虛妄。當論產期。塊痛有無。先後施治。方為得法。若分娩兒下之後。塊痛未止者。宜服寧神生化湯。確知瘀血不行。合失笑散同服。如痛止者。則服寧心定魄茯神湯。連進大補十數劑。生氣養血。安神定志。服至元足。其病始愈矣。或以生地。易熟地。而清心火。寧君主之官亦可。病家母求速效。勿信邪崇。若噴以法水。驚以法尺。多致不救。屢治此病。服八珍。加炮薑。十數劑。方效。丹溪云。虛病猶似邪崇也。又云。欲泄其邪。當補其虛。此古人之確論。但人不能體認其意。反言攻補難施。若必攻胎產心法

卷下 神脫妄言妄見論 附謔語鄭聲發狂 二五

邪盡。方可言補。則誤矣。不特醫家治產後虛證。即高年及虛弱人。妄言妄見等證。亦當如是。慎重也。產後間有敗血停積。上干於心。心不受觸。而有妄言妄語。如見鬼神者。此必心下脹悶。煩燥昏亂。臥起不安。誤作中風治。必殆。芎歸瀉心湯主之。醫通云。虛則四物湯換生地。加桂心。炮薑。生蒲黃。石菖蒲。實則四烏湯。加川連。煎成。入龍腦一捻。服後得睡即安。心悸恍惚。語言錯亂。千金遠志湯。如內虛。敗血攻心。狂言亂語者。龍齒清魂散主之。心脾血少。八珍加炮薑。馮氏云。產後陰血暴崩。肝虛火妄之極。而發狂者。宜澤

蘭歸地牛膝茯神遠志棗仁加童便主之。若因敗血停積。用調經散。予謂不若生化湯合失笑散。若心血虛。用柏子仁湯。予謂不若寧神定魄茯神湯。○余室人沈氏。於康熙癸巳冬至月。患產後神脫之證。為醫人妄用降氣消痰清火方藥。變為瘧證。仍不知峻補。猶以風痰為患。驅風化痰。余正奉

差大通橋。轉運軍糧。幾及百萬。督催歲內全米進倉。不遑歸視。直至病篤。僕人持方來云。服藥罔效。奈何。余閱之。非正治之方。悉促死之藥也。彼時心神昏亂。又未得親視其證。胎產心法 卷下 神脫妄言見論 附諸語 三

未敢定方。即大書速用人參救脫六字。令僕持歸。復慮醫者執產後不宜用人參之見。差人往問。果如所料。且知仍用蘓子降氣下痰。余情不能已。星速馳歸。時已初更。而其氣在呼吸間。已遷出外舍。余急用人參三錢。煎湯調胎產金丹一粒。下嚔時許。即復蘓。起坐而言矣。其時夜半。奈無參可繼。竊念既已少愈。不妨待旦市服。詎漏絕時。參力已竭。又復脫去。救無及矣。雖曰數也。命也。而清痰降火之誤。實有以致之矣。

荆芷治崩湯 治產後血崩。其色鮮紅。

川芎 一錢 當歸身 四錢

乾薑 二分 炙黑 荆芥穗 六分 炒黑

炙草 四分 白芷 五分

棗煎服。○十灰散不用。故不錄方。

加參生化止崩湯 治產後血塊痛。鮮血崩。形色脫。

或汗多。或氣促。

人參 二三錢 當歸身 四錢

川芎 二錢 乾薑 炒黑

炙草 各四分 白芷

胎產心法 卷下 血脫氣脫神脫方 三七

荆芥穗 炒黑各五分 薤仁 十粒 去皮尖

棗二枚 水煎服。

滋榮益氣止崩湯 治產後無塊痛。或半月外崩證。

人參 川芎

黃耆 蜜炙各一錢 白朮 土炒

生地 各二錢 當歸 四錢 酒洗

陳皮 黃連

白芷 荆芥 炒

升麻 炙草 各四分

棗二枚。水煎。入童便溫服。○如汗多。加麻黃根一錢。浮

小麥一撮。○大便難。加酒洗茯苓一錢。○有氣滯。加木

香二分。為末。衝服。○有痰。加竹瀝薑汁。去心貝母。○咳嗽。加去

皮尖杏仁。桔梗各八分。炒知母七分。○驚悸。加栝子仁一

錢。炒棗仁一錢。○傷飲食。加炒神麩八分。炒麥芽八分。

○傷肉食。加山查八分。砂仁五分。○身熱。倍加參著。去

黃連。

升舉大補湯 治產後日久。血崩不止。或崩如鷄蛋

大。或去血片。宜大補脾胃。升舉氣血。少加鎮墜心

胎產心法 卷下 血脫氣脫神脫方 元

火之劑。並治老壯婦人崩淋。

人參 二錢 黃 著 一錢。蜜炙。

熟地 二錢 白 木 土炒。

當歸 酒洗。各二三錢。防 風 三分。

荆芥 炒黑。羌 活

升 麻 白 芷

陳 皮 黃 連 炒。

黃 栢 炒褐色。炙 草 各四分。

棗二枚。水煎服。○口燥。加去心麥冬一錢。五味子十粒。

○泄瀉。去黃栢。加澤瀉五分。去心蓮子十粒。○有痰。加製半夏一錢。○白帶多。加製半夏。製蒼朮。各一錢。

曾生升舉大補湯 治產後血塊痛止。崩證。

人 參 當 歸

白 木 土炒。各二錢。川 芎

麥 冬 去心。黃 著 蜜炙。各一錢。

熟 地 三錢。陳 皮

炙 草 白 芷

荆芥穗 炒黑。升 麻

胎產心法 卷下 血脫氣脫神脫方 元

血餘灰 各四分。

棗二枚。水煎服。○汗多。加麻黃根。浮麥。○便難。加酒洗

茯苓一錢。○痰。加去心貝母六分。○咳嗽。加桔梗。去皮

尖杏仁各一錢。○不寐驚悸。加炒棗仁。栝子仁。各一錢。○

本方。少加黃連。三分。以墜。火亦妙。○凡遇崩證。有如此

等餘病。大忌峻利。

千金伏龍肝湯 治勞傷衝任。崩中去血。赤白相兼。

或如豆汁。臍腹冷痛。口乾食少。

伏龍肝 如彈子大。七枚。生 薑

生地 各一兩五錢 甘草

艾葉 赤石脂

桂心 各六錢

右七味。咬咀。以水一升。煮取三升。分四服。日三夜一。

貞元飲

熟地 七八錢。甚者一二兩。炙草 一二三錢。

當歸 二三錢。

水二鐘。煎八分。溫服。○此方治氣短似喘。呼吸促急。提不能升。嚙不能降。氣道噎塞。勢劇垂危者。常人但知為胎產心法

胎產心法

卷下 血脫氣脫神脫方 三十一

氣急。其病在上而不知元海。無根。虧損肝腎。此子午不交。氣脫證也。猶為婦人血海常虧者最多。此證宜急用。此飲以濟之。緩之。可稱神劑。凡診此證。脉必微細無神。若微而兼緊。猶為可畏。倘庸衆不知。妄云痰逆氣滯。用牛黃。蘓合。及青。陳。枳。殼。破氣等劑。則速其危矣。○如兼嘔惡。或惡寒者。加煨薑三五片。○如氣虛。脉微至極者。急加人參隨宜。○如肝腎陰虛。手足厥冷。加肉桂一錢。

續氣養榮湯 治產後氣短促。問無塊痛。宜用此方。

人參 二三錢 熟地 二錢

當歸 四錢。酒洗。川芎 一二錢。

黃耆 蜜炙。白朮 土炒。各一錢。

陳皮 乾薑 炙黑。

炙草 各四分。

棗二枚。水煎服。○如手足冷。加熟附 三五分。○汗多。加

麻黃根 一錢。浮麥 一撮。○渴。加去心麥冬 一錢。五味子

十粒。○大便不通。加酒洗菴蓉 二錢。芝蔴 一撮。○傷食。

或麪。加炒神麪 一錢。炒麥芽 五分。○傷肉食。加山查 五

個。或五分。砂仁 五分。○一方。無熟地黃。

胎產心法

卷下 血脫氣脫神脫方 三十二

寧神生化湯 治產後塊痛不止。妄言妄見。未可用

著木者。

人參 二錢 當歸 三錢。酒洗。

乾薑 炙黑。炙草 各四分。

茯神 栝子仁

川芎 各一錢 薤仁 十粒。去皮尖。

益智仁 八分。陳皮 三分。

棗二枚。龍眼肉五個。水煎服。○瘀血不行。合失笑散。

寧心定魄茯神湯 治產後塊痛已止。妄言妄見證。

人參

當歸 酒洗

熟地 各二錢

川芎

黃耆 蜜炙

白朮 土炒

棗仁 炒去殼

栢子仁

茯神

益智仁

麥冬 去心各一錢

陳皮 三分

五味子 十粒碎

炙草 四分

棗二枚。建蓮肉去心八枚。桂元肉八分。水煎服。

芎歸瀉心湯 治積血上干於心。脹悶昏亂。起卧不

胎產心法

卷下 血脫氣脫神脫方 三

安。以致妄言妄語。如見鬼神。

歸稍 酒洗

川芎

延胡索

蒲黃

牡丹皮 各一錢

桂心 七分

水煎。另研五靈脂末一錢。食後調服。

千金遠志湯 治產後心悸恍惚。語言錯亂。

人參

當歸

遠志肉 甘草水泡去骨

芍藥 炒

麥冬 去心

桂心

炙草 各一錢

茯苓 一錢五分

大棗四枚。生薑三片。水煎服。○心胸逆氣。加製半夏五七枚。

龍齒清魂散 治心虛挾血。振悸不寧。產後敗血衝

心。笑哭如狂。

人參

龍齒 醋煨

遠志 甘草水泡去骨

歸身 各五錢

茯神

麥冬 去心

桂心

炙草 各三錢

胎產心法

卷下 血脫氣脫神脫方 三

延胡索 一兩

細辛 一錢五分

為散。每服四五錢。薑三片。紅棗一枚。水煎調服。此即平

補正心丹。去棗仁。栢仁。菖蒲。生地。山藥。五味。硃砂。加延

胡。細辛。甘草。

加參生化湯 見本卷暈厥門

生化湯 見本卷生化湯論後

大補回陽生化湯 見本卷暈厥門附加參生化湯下

大補元煎 見本卷惡露不止門

理陰煎 見上卷惡阻門

蒲索四物湯 治產後惡露不止。

當歸 一錢五分 川芎 八分

熟地黃 二錢 白芍 酒炒

延胡索 醋炒各一錢 蒲黃 七分炒

乾薑 五分炒黑

產後忌芍藥。而此方用之。審惡露不止四字。則產日已久矣。故不忌也。

升陷固血湯 治產後月餘。經血不止。陷下者舉之。

當歸 川芎

胎產心法 卷下 惡露不止方 三五

熟地 白芷

升麻 血餘灰 各一錢

水煎服。

保險煎 治一切陰虛內熱。動血等證。

生地 熟地

芍藥 各二錢 山藥

川續斷 黃芩

黃柏 各一錢五分 生草 一錢

水二鍾。煎七分。食遠服。○如小水多熱。或兼怒火動血

原缺

者。加焦枝子 一二錢。○如夜熱身熱。加地骨皮 一錢五

分。○如肺熱多汗者。加去心麥冬、炒棗仁。○如血熱甚

者。加酒炒黃連 一錢五分。○如血虛血滯。筋骨腫痛者。

加當歸 二三錢。○如氣滯而痛。去熟地。加陳皮、青皮、丹

皮、香附之屬。○如血脫血滑。及便血久不止者。加地榆

一二錢。或烏梅 一二個。或百藥煎 一二錢。醋炒文蛤亦

可。○如少年。或血氣正盛者。不必用熟地、山藥。○如肢

節、筋骨疼痛。或腫者。加秦艽、丹皮。各一二錢。○此方芩、

連、枝、栝等類。當於產後日久。方可用之。

胎產心法

卷下

惡露不止方

三

清化飲

治婦人產後。因火發熱。及血熱妄行。陰虧

諸火不清等證。此方清涼。產後日久。可用之。

芍藥

麥冬 去心。各二錢。

丹皮

茯苓

黃芩

生地 各二三錢。

石斛 一錢。

水一鍾半。煎七分。食遠溫服。○如覺骨蒸多汗者。加地

骨皮 一錢五分。○熱甚而渴。或頭痛者。加煨石膏 一二

錢。○下熱便澀者。加木通 一二錢。或炒黃栢、炒枝子。皆

可隨證用之。○如兼外邪發熱。加柴胡 一二錢。

以上保陰、清化二方。蓋因產家。或過慎太煖。或因年力

方壯。而飲食藥餌太補過度。致火動病熱。下血日久不

止。此產後間有之實證。故錄是方以備用。

固陰煎 治陰虛滑泄。帶濁淋遺。及因虛不固。此方

專主肝腎。

人參 隨宜。

熟地 三五錢。

山藥 二錢炒。

山茱萸 一錢五分。去核。

遠志 七分。甘草水泡去骨。

炙草 一二錢。

胎產心法

卷下

惡露不止方

三七

五味子 十四粒。

兔絲子 二三錢。炒香。

水二鍾。煎七分。食遠溫服。○如虛滑遺甚者。加金櫻子

肉 二三錢。或醋炒文蛤 一錢。或烏梅 二個。○如陰虛微

熱。而經血不固者。加製川續斷肉 二錢。○如下焦陽氣

不足。而兼腹痛溇泄者。加補骨脂、吳茱萸之類。隨宜用

之。○如肝腎血虛。小腹痛。而血不歸經者。加當歸 二三

錢。○如脾虛多濕。或兼嘔惡者。加土炒白朮 一二錢。○

如氣陷不固者。加炒升麻 一錢。○如兼心虛不眠。或多

汗者。加炒棗仁 二錢。

壽脾煎 治脾虛不能攝血等證。及婦人無火崩淋。凡兼嘔惡。猶為危候。速宜用此救脾。則統血歸源矣。若再用寒涼。胃氣必脫。無不死者。

人參 隨宜。一二錢。急者用白朮 二三錢。

當歸 二錢。山藥 二錢。

棗仁 一錢五分。遠志 三五分。製。

乾薑 一二錢。炮黑。炙草 一錢。

蓮肉 二十粒。去心。炒。

水二鍾。煎服。○如血未止。加烏梅 二個。凡畏酸者。不可

胎產心法 卷下 惡露不止方 三

用。或加地榆 一錢五分。亦可。○滑脫不禁者。加醋炒文

蛤 一錢。下焦虛滑不禁。鹿角霜 二錢為末。攪入藥中服

之。氣虛甚者。加炙黃耆 二三錢。○氣陷而墜者。加炒升

麻 五七分。或白芷亦可。○兼溏泄者。加炒補骨脂 一錢

○陽虛畏寒者。加製附子 一二錢。○血去過多。陰虛氣

餒。心跳不寧者。加熟地 七八錢。或一二兩。

大補元煎 治男婦血氣大壞。精神失守。危據等證。

人參 一二錢。多則用一二兩。山藥 二錢。炒。

熟地 二三錢。多則用二三兩。杜仲 二錢。鹽水炒斷絲。

當歸 泄瀉者去之。枸杞 各二三錢。

山萸肉 如畏酸吞酸者去之。炙草 各一錢。

水二鍾。煎七分。食遠溫服。○如元陽不足。多寒者。加製

附子。肉桂。炮薑之類。隨宜用之。○如氣分偏虛者。加炙

黃耆。土炒白朮。若胃口多滯者。不必用。○如血滯者。加

川芎。去山茱萸。○滑瀉者。加五味。炒故紙之屬。

薛氏加味四物湯 養肝血。清肝火。

熟地 當歸 各三錢。

芍藥 二錢。川芎

胎產心法 卷下 惡露不止方 三

山枝 炒。柴胡

丹皮 各一錢。

水二鍾。煎服。

良方一味防風散 一名獨聖散。

防風 去蘆。

為末。每服二錢。空心。食前。用酒煮白麪清飲調下。治肝

經有風。以致血得風而流不歸經者極效。

十全大補湯 見上卷胎不長養門

氣喘論

凡產後。若因風寒外感。邪氣入肺而喘急者。必氣粗胸脹。或多或少咳嗽。自與氣短似喘。上下不接者。不同。治當踈散中兼補為主。宜金水六君煎。或六君子湯。若單以寒邪入肺。氣實氣壅。而本無虛者。宜六安煎。或二陳湯。加蘓葉之類。主之。又有瘀血入肺。必面黑發喘。與氣短似喘。大不相同。用二味參蘓飲治之。或有氣虛血痰泛上者。用六君子。調服失笑散亦效。

金水六君煎 治肺腎虛寒。水泛為痰。或年邁陰虛。

血氣不足。外受風寒。咳嗽。嘔惡。多痰。喘急等證。

胎產心法 卷下 氣喘論 早

當歸 半夏 製

茯苓 各二錢 熟地 三五錢

陳皮 一錢五分 炙草 一錢

水二鍾。生薑三五片。煎八分。食遠溫服。○如大便不實。而多濕者。去當歸。加山藥。○如痰甚。氣滯。胸脇不快者。加白芥子 七八分。○如陰寒甚。而嗽不愈者。加細辛 七分。○如兼表邪寒熱者。加柴胡 一二錢。

六安煎 治風寒咳嗽。及非風初感。痰滯。氣逆等證。

陳皮 一錢五分 半夏 二三錢 製

茯苓 二錢 杏仁 去皮尖。碎。 甘草 各一錢 白芥子 五七分。凡老年氣弱。及產後者。不用。

水一鍾半。加生薑三五片。煎七分。食遠服。○若氣虛猝倒。及氣平無痰者。不可用此劑。

六君子湯 見上卷諸痛門

二陳湯 見上卷子煩門

二味參蘓飲 見本卷三衝證門

失笑散 見中卷胞衣不下門

惡露不下論

胎產心法 卷下 氣喘方 四

凡產後。臟腑勞傷。氣血虛損。或胞絡挾於宿冷。或當風取涼。風冷乘虛。而搏於血。壅滯不宣。積蓄在內。故不下也。宜溫。煖活血。則血自行。此必小腹脹滿。刺痛無時。宜用血證黑神散。予每治此證。用生化湯。倍菴仁。調失笑散。生新行。痰。類。以黑沙糖。衝滾湯。少滴。無灰酒。服之。如素不飲。或恐發暈。即不加酒亦可。每每獲效。又或因脾胃素弱。中氣本虛。敗血亦少。氣乏血阻。不能盡下。其證乍痛乍止。痛亦不甚。不可用大黃等藥。攻之。反增別病。加減八珍湯。主之。或生化湯。多服數貼。亦效。薛氏止用失笑散治之。尊生錦囊。

均用四味散治效。○一產婦患前證。服峻厲之劑。惡露隨下。久而昏憤。以手護其腹。此脾氣復傷作痛。故用手護也。以人參理中湯加肉桂二劑。補之而愈。

加減八珍湯

人參 八分 或一錢

白朮 土炒

茯苓 各一錢

歸身 二錢

川芎

赤芍 各八分

熟地 一錢五分

延胡索 炒

製香附 各七八分

炙草 五分

胎產心法

卷下

惡露不下論 並方

四

薑棗引。水煎。食前服。

四味散 治瘀血不下。及療總分娩一切諸疾。

當歸

延胡

血竭

沒藥 各五分

為末。用熱童便半鍾調服。

血證黑神散 見上卷論語門

生化湯 見本卷生化湯論後

失笑散 見中卷胞衣不下門

脫汗亡陽及諸汗論

產婦分娩既已。亡血而又多汗。極危證也。蓋汗者心之液。榮於內。為血發於外。為汗。血液屬陰。陰亡陽亦隨之而走。故曰脫汗亡陽。其用藥與他證不同。但血塊作痛。著木又未可據加。如倦甚。澀澀汗出。形色又脫。速灌加參生化湯。倍參以救危急。母拘塊痛。俟汗止。再去參服之。經曰。陽氣者。精則養神。柔則養筋。多汗不止。必發柔痙。氣血俱虛。當用十全大補湯。不應加附子。予謂無塊痛者當用之。此證若服參著重劑。而汗多不止。及頭汗出。不至腰足難治。自汗不止。皆由勞傷心神。不能鎮守其液。治當健脾胃。散

胎產心法

卷下

脫汗亡陽及諸汗論

四

水穀之精。以歸肺。益其榮衛。而虛血歸源。灌溉四傍。不使妄行於外。而為汗也。亦用加參生化湯。或麻黃根湯。并間用黃耆五味煎湯。送六味丸。醫通云。因外感多汗者。黃耆建中湯治之。

盜汗者。睡中汗出。醒來即止。猶盜賊之瞰人睡而盜之。謂之盜汗。非自汗可比。此因亡血陰虛。陽氣偏盛。內經云。陽加於陰則發汗。治當兼用血分藥品。雜病雖有當歸六黃湯。然寒而膩膈。又不可治。產後之盜汗也。宜止汗散主之。頭汗者。或因濕熱。或因瘀血。當審虛實治之。

半身汗出。昔人用二陳合四物。治多不效。以血藥助陰。閉滯經絡也。此屬氣血不克。而有寒痰留滯。非大補氣血兼行。經豁痰不效。宜十全大補。人參養榮。加星半川烏。若肥人多加豁痰行氣藥。如瘦人乃氣血本枯。天之徵也。

麻黃根湯 治產後虛極。自汗不止。

人參 一錢或二錢 當歸 二錢

黃耆 一錢五分 蜜炙 麻黃根

牡蠣 煨 麥冬 去心

浮麥 各一錢 桂枝 五分

胎產心法 卷下 脫汗亡陽及諸汗方 四

炙草 四分

水煎服。○如無塊痛。加土炒白朮 一錢。熟地 三錢。○手足冷。加熟附子 一片。炮薑 四分。○渴。加去心麥冬 一錢。

五味子 十粒。○惡風寒。加防風 五分。○肥人。加竹瀝 一

小盞。生薑汁 半茶匙。以清痰火。并間服六味丸。七八十

丸。用炙黃耆、五味子煎湯送下。

黃耆建中湯 附小建中湯。○內補建中湯。

桂枝 三錢 白芍 六錢 炒

炙草 二錢 黃耆 一錢五分 蜜炙

膠飴 一合 生薑 五片 大棗 四枚 擘

右開乃古方分兩。後人多有減用者。桂枝 一錢。白芍 二

錢。炙草 七分。膠飴 三錢。薑 三片。棗 二枚。○千金多人參

二錢。○桂枝湯者。和營表藥也。倍芍藥。加膠飴。便能建

立中氣。故名小建中湯。以芍藥之酸。飲護營血。膠飴之

甘。培養中土。能治風木乘脾。寒熱腹痛。再更加炙黃耆。

即黃耆建中湯。治虛勞感寒。發熱自汗。以黃耆實衛氣。

使營衛藏府俱和。而受益多矣。○千金於小建中方。加

胎產心法 卷下 脫汗亡陽及諸汗方 四

入當歸。名曰內補建中。其調和中外之力可知。

止汗散 治產後盜汗。

人參 二錢 麻黃根 一錢五分

當歸 酒洗 熟地 各三錢 如有塊痛不

黃連 五分 炒 浮麥 一錢

水煎服。○一方用牡蠣末 五錢。炒小麥麩 八兩。二味兼

服三五錢。猪肉汁調服。

人參養榮湯 治心脾虛寒。榮血不足。寢汁發熱。

人參 黃耆 蜜酒炙

炙草

白木土炒

茯苓

陳皮

熟地

當歸酒拌各一錢

芍藥

肉桂八分

遠志

五分甘草水製去骨淨取肉

五味子七分炒搥碎

薑三片。棗二枚。水煎服。○二陳合四物名八物湯。因不用故不錄方。

加參生化湯

見本卷暈厥門

六味丸

見上卷諸痛門附六味地黃湯下

十全大補湯

見上卷胎不長養門

胎產心法

卷下

脫汗亡陽及諸汗方

四

傷食論

產後形體勞倦脾胃俱傷是以新產之後去膏粱遠厚味食粥茹蔬以為調攝不知者惟慮產後之虛以厚味為有補更有本不思食而強與之胃雖少納脾難轉運易至食停痞塞甚而傷食發熱切勿誤認為陰虛更有食滯腹痛又勿錯疑為血凝治斯證者體認正實如發熱而飲食調者方可補血若惡食噯酸者食滯之徵即當扶元為主補氣養血健脾助胃審傷何物佐以何藥消導則脾氣復而轉輸易滯物行而胃思穀矣如此補消兼治無有不安故

善治者治法有先後緩急論證因塊痛有無產後有日數

新久能重產虛之本而兼去停積之標攻補如法無不應

手而愈故有生化消食湯健脾消食湯之分別施治如誤

服峻藥過於消導致不思穀惟活命丹可救予每見治產

者但知速消食物反損正氣益加滿悶一劑不效又加峻

藥一醫無功又更一醫先後互異輕證反重以致命絕病

家自歸命數醫家以為盡技豈不惜哉

生化消食湯 治產後塊痛未止停食痞塞

川芎 二錢

當歸 五錢酒洗

胎產心法

卷下

傷食論

四七

乾薑

炙黑

炙草

各四分

杏仁

十粒去皮尖

神麩

炒

麥芽

炒各六分

水煎服。○傷肉食加山楂五分砂仁五分。○傷寒物加

吳茱萸一錢肉桂五分。○虛人加人參一錢或二錢。

健脾消食湯 治產後塊痛已除停食痞塞

人參 二錢

當歸 三錢酒洗

川芎

神麩 各一錢

白木 一錢五分土炒

山查

砂仁 各六分
炙草 各五分

麥芽

水煎服。○或停寒日久。脾胃弱甚。雖藥不能即運。須以手揉按。或炒麩熨法亦妙。

長生活命丹 治過服消導之藥。致令少食。或本思食之人。反令絕食。

人參 三錢

用新礮。或銀吊。水鍾半。煎七分。再用飯鍋焦研粉。先用此須。以參湯調送二三茶匙。引開胃口。後漸漸加多。漸

胎產心法

卷下

傷食方

逆論

四

加參湯。陸續調服。煎參不可用藥礮。恐聞藥發嘔。此方曾活數十餘命。神效。

忿怒氣逆論

產後忿怒氣逆。胸膈不舒。甚而作痛者。兼之血塊又痛。宜用木香生化湯。則自然血塊速化。怒氣易散。並治而不悖也。若輕產而重氣。偏用香附、烏藥、枳殼、香砂之類。以散氣行塊。而元氣反損。悶滿疼痛益增。非善治產者也。又如怒後即食。胃弱停悶。已無塊痛。宜用健脾化食理氣湯。再審何物所傷。則佐以何藥消之。痛悶即除。慎勿輕用檳榔丸。

流氣飲等方。以散氣化食。則虛弱產婦。重虛之禍。不可勝言矣。

木香生化湯 治產後塊痛未除。日受氣惱至效。

川芎 二錢

當歸 六錢 酒洗

乾薑 四分 炙黑

陳皮 三分

木香 二分 磨衝服

水煎服。○若怒後傷食。與傷食治同。審傷何物。以何藥消之。

健脾化食理氣湯 治產後無塊痛。而受氣傷食者。

胎產心法

卷下

忿怒氣逆方

四

人參

白朮 土炒

當歸 酒洗 各二錢

川芎 一錢

乾薑 炙黑

炙草 各四分

陳皮 三分

水煎服。○如傷麪。加炒神麪。炒麥芽。○傷肉。加山查。砂仁。○傷寒物。留滯脇間作痛。加桂枝、吳茱萸。亦有止加

桂枝 八分 亦可。

頭痛論

人身之中。氣為陽。血為陰。陰陽和暢。斯無病矣。夫頭者。諸

陽之會也。產後去血過多。陰氣已虧。而虛陽失守。上湊於頭。則令頭痛。但補其血。則陽氣得從而頭痛自止。間有敗血停留子宮。厥陰之位。其脉上貫巔頂。作巔頂痛者。雖有身熱惡寒之候。只宜生化湯加減。慎不可用羌獨等藥。蓋由正陽虧損。濁陰得以犯上。陷入髓海。為脹為痛。是非清陽升復。則濁陰不降。在裡內起之邪。為病非若外入之邪。可表而愈也。况生化湯中芎藭亦能散表邪。杏仁亦能逐瘀血。是又可兼治。再少為因證加入。又何用另方輕產而施治乎。○尊生治血虛頭痛。用芎歸湯。治感冒頭痛。參蘇胎產心法

胎產心法

卷下

頭痛論並方

手

芎歸湯。客齋治停瘀頭痛。用血證黑神散。○如正頭痛且發夕死不治。

產後芎歸湯 治產後血虛頭痛。

當歸

川芎

各二錢五分

水煎服。○有汗是氣虛。加人參 五七分。桂心 三分。○感寒。加天麻、白芷、羌活、各四分。

參蘇芎歸湯 治產後感冒。

人參

紫蘇

乾葛

各一錢

當歸

川芎 各二錢

薑一片煎服。

生化湯

見本卷生化湯論後

血證黑神散

見上卷諸語門

心痛即胃脘痛論

人之胃脘居於心下。產後或傷寒氣及冷物而作痛。因痛近於心。俗呼為心痛。殊不知心為君主之官。主血行氣。統馭臟腑。血氣盛則泰。然安寧。血不足則怔忡驚悸不安。耳豈可痛乎。若寒傷心經。為正心痛。與正頭痛證同。皆無藥

胎產心法

卷下

心痛即胃脘痛論

五

可救。手足甲見青黑色。且發夕死。諸書論之詳矣。凡胃口痛。當散胃中之冷物。生化立效方治之。無有不安。若獨用熱藥攻寒。其痛雖止。而血妄行。反虛產母。况寒者必挾虛而燥熱者必佐陰藥。方能制其僭越也。至於綿綿而痛。當問血塊盡。又可揉按而少止。是虛。當用補劑。大抵產後寒食。上攻於心則心痛。下攻於腹則腹痛。治心腹之痛。大約相同。馮氏云。產後陰血虧損。隨火上衝心絡。名曰心胞絡痛。宜歸脾湯主之。醫通用理中。加當歸治之。

生化立效方 治產後因傷冷物胃脘作痛。

川芎 二錢 當歸 四錢

杏仁 十粒 去皮尖 乾薑 炙黑

炙草 各五分 肉桂

吳茱萸 各四分

水煎服。○一方無杏仁。○傷肉食。加山查砂仁。○傷麪食。加炒神麪炒麥芽。○大便秘。加酒洗菴蓉。○尊生云。

如不止。蒲黃 二錢五分 五靈脂 一錢四分 木通 一錢 赤芍 一錢 沒藥 一錢 延胡 一錢五分 薑黃 一錢五分 鹽滷 一滴

此蓋因瘀作痛。服前藥痛仍不止而用也。

胎產心法 卷下 心痛即胃脘痛方 五

歸脾湯 見上卷胞漏小產門

理中湯 見上卷瘡門附枳實理中湯下

腹痛論

產後腹痛。先問血塊。如有血塊。只服生化湯。甚則調失笑散。其塊消而痛自止。尊生亦用生化湯。稍久始調失笑散。下延胡一錢。若風冷乘虛入腹。或內傷寒涼之物。作痛。得人按摩畧止。或熱物熨之畧止。宜加味生化湯。密齋用當歸建中湯治之。馮氏云。產後惡露。或因外感六淫。內傷七氣。致令斬然而止。瘀血壅滯。所下不盡。故令腹痛。當審因

治之。如產後數朝內。飲食如常。忽作腹痛。六脉沉伏。四肢厥冷。此惡血不盡。傷食裹血。而脉不起也。不可誤認氣血

兩虛。而用大補。須兼消導行血之藥。但產後惡露不盡。而

滯。作痛。亦常有之。然與虛痛不同。必其由漸。而甚。或大小

便不行。或小腹鞭實。作脹。痛極。不可近手。或自下上衝心

腹。或痛極。牙關緊急。有此實證。當速去之。近上者。宜失笑

散。近下者。宜通瘀煎。未效用。決津煎為善。又有腹痛定於

一邊。及小腹者。此是側臥。敗血留滯所致。醫通用四烏湯

加蓬朮。然亦不若決津煎為當也。金匱云。產後腹中疝痛。

胎產心法 卷下 腹痛論 五

當歸生薑羊肉湯主之。蓋疝痛者。緩緩痛也。屬客寒相阻

故以當歸通血分之滯。生薑行氣分之寒。君以羊肉者。所

謂形不足。補之以味。况羊肉又能補氣。疝痛屬氣弱。故宜

之。若婦人產當寒月。寒氣入產門。臍下脹痛。手不可犯。此

寒疝也。亦宜當歸生薑羊肉湯治之。密齋云。產時寒氣客

於子門。入於小腹。或坐臥不謹。使風冷之氣乘虛而入。此

寒疝。但不作脹。且無形影為異。治以金鈴子散。予考金匱

密齋之論寒疝不同。金匱云。臍下脹痛。手不可犯。蓋有寒

凝滯也。密齋云。但不作脹。且無形影。是無瘀滯也。又有

產後脾虛腎虛而為腹痛者。此不由產。而由臟氣不足。若脾氣虛寒。為嘔吐。為食少。而兼腹痛者。宜五君子煎。及六君子湯主之。若腎氣虛寒。為瀉。為痢。而兼腹痛者。宜胃關煎。或理陰煎主之。馮氏用六君子湯。送四神丸治之。若胸膈飽悶。或惡食吞酸。腹痛手不可按。此飲食所傷。治法見傷食門。若食既消。而仍痛。按之不痛。更加頭痛。煩熱。作渴。惡寒。欲嘔。等證。此是中氣被傷。宜溫補脾胃為主。若發熱。腹痛。按之痛甚。不惡食吞酸。此是瘀血停滯。失笑散消之。若止發熱。頭痛。腹痛。按之却不痛。此是血虛。初產。生化湯。

胎產心法

卷下

腹痛論

五

日久用四物加炮薑參朮以補之。若產後惡露既去。而腹仍痛。四神散調補之。不應。八珍湯治之。醫通云。若下焦虛寒。用六味丸加桂。

加味生化湯 治產後風冷。或傷寒物。腹痛。

川芎 二錢

當歸 四錢

炮薑 四分

赤石脂 十粒。去皮尖。

炙草 五分

桂枝 四五分

水煎服。○傷食。照生化立效方加法。○尊生於生化湯內。加炒白芍 五分。桂枝 五分。痛止減去。

當歸建中湯 治風冷乘虛入腹。或傷寒冷物腹痛。

當歸 酒洗

白芍 酒炒

桂心

炙草 各二錢

薑五片。棗三枚。水煎。入飴糖三匙。攪勻。熱服。

金匱當歸生薑羊肉湯 治產後腹中疝痛。及寒月

生產。寒氣入於子門。手不可犯。臍下脹滿。並治寒

疝。虛勞不足。及脇痛裏急者。

當歸 一兩

生薑 一兩五錢

羊肉 二觔。生

胎產心法

卷下

腹痛方

五

先煮羊肉。去滓。及沫。取清者。煮當歸生薑。溫分三服。亦有加入葱椒鹽。以適口者。○若寒多者。倍生薑。○痛多而嘔者。加橘皮。土炒白朮。○後人治產後腹中疝痛。用大劑人參。阿膠。生薑。煎服效。此即當歸生薑羊肉湯之變法。

金鈴子散 治產後寒氣入於小腹。而為寒疝。非若

血滯之作脹。而有形影者。

川棟子 去核

小茴香 炒

補骨脂

桂心 各一錢

薑引水煎。加木香一錢。水磨汁。和勻食前熱服。予謂木香磨汁。二三分衝服亦足矣。

五君子煎 治脾胃虛寒。嘔吐泄瀉而兼濕者。

人參 二三錢

白朮 土炒

茯苓 各二錢

乾薑 一二錢炒黃

炙甘草 一錢

水煎服。

胃關煎 治脾腎虛寒作瀉。或甚至久瀉。腹痛不止。

冷痢等證。

胎產心法

卷下

腹痛方

五

熟地 三五錢

山藥 炒

白扁豆 炒各二錢

吳茱萸 五七分製

焦乾薑 一錢

白朮 一二三錢土炒

炙甘草 一二錢

水煎服。○瀉甚者。加麩煨肉豆蔻 一二錢。或破故紙亦可。○氣虛勢甚者。加人參。隨宜用。○陽虛下脫不固者。

加製附子 一錢。○腹痛甚者。加木香 七分。或加製厚朴亦可。○滯痛不通者。加當歸 二三錢。○滑脫不禁者。加

烏梅 二個。或北五味 二十粒。○若肝邪侮脾者。加肉桂

一錢。

四神丸 治腎虛肝氣逆。不能消尅。腹脹泄瀉。並治

五更腎瀉神效。

補骨脂 四兩酒浸一宿炒

肉豆蔻 二兩麩裏煨去麩

吳茱萸 一兩鹽湯泡

五味子 三兩或二兩炒

為末。蒸餅丸。或薑煮棗。取棗肉去薑。搗為丸。梧子大。每

服二錢。米湯溫酒任下。○一方補骨脂肉豆蔻等分。吳

茱萸五味子減半。○止用補骨脂肉豆蔻二味。棗肉為

四神散 治產後血虛。或瘀血腹痛。

胎產心法

卷下

腹痛方

五

當歸 二錢

川芎

白芍 炒透各一錢

炮薑 五分

水煎服。○予謂白芍治血虛腹痛則可。若治瘀血作痛。

未必然也。今炒透而與炮薑合用。故血虛瘀痛兼治之。

生化湯 見本卷生化湯論後

失笑散 見中卷胞衣不下門

通瘀煎

決津煎 俱見上卷鬼胎門

四烏湯

六君子湯

八珍湯

六味丸

俱見上卷諸痛門

理陰煎

見上卷惡阻門

四物湯

見上卷安胎門

小腹痛並兒枕論

產後虛中感寒。及飲食冷物。下攻小腹作痛。前已論之矣。又有因血虛痛及小腹者。亦服生化湯妙。至血塊作痛。俗名兒枕痛者。亦用生化湯。不應用延胡生化湯。均可。馮氏

胎產心法

卷下

小腹痛並兒枕論

五

用芎歸益母山查香附陳皮煎服。甚者加炒五靈脂。密齋云。臍下胞胎所繫之處。血之所聚也。產後血去不盡。即成小腹痛證。刺痛無時。痛則有形。須臾痛止。又不見形。血證黑神散主之。然有產婦小腹作痛。服行氣破血藥不效。其脈洪數。此瘀血內潰為膿也。是因營衛不調。瘀血停滯。宜急治之。緩則腐化為膿。最難治療。若流注關節。則患骨疽。失治多為敗證。脈數而洪。已有膿。遲緊乃瘀血也。下之愈。若腹脹大。轉側作水聲。或膿從臍出。或從大便出。用蠟礬丸。太乙膏。下膿而愈。

延胡生化湯 治小腹兒枕塊痛。

川芎 二錢

當歸 四錢 酒洗

赤芍 十粒 去皮尖

炮薑

炙草 各四分

延胡 一錢

水煎服。○或用生化湯。送延胡索散一錢。治同。亦能治寒氣痛。○如無塊。但小腹痛。可按而止者。屬虛。以生化湯。加入延胡索散。再加入熟地 二錢。

延胡索散

肉桂

延胡

胎產心法

卷下

小腹痛並兒枕方

五

各等分。合為細末。聽用。

蠟礬丸 治一切瘡癰惡毒。先服此丸。護膜托裏。使

毒不攻心。或為毒蟲蛇犬所傷。並宜服之。

黃蠟 二兩

白礬 一兩

先將蠟溶化。候少冷。入礬和勻為丸。如小豕豆大。每服十九。或二十九。漸加至百丸。則有力。瘡愈後。服之亦佳。○一方。加雄黃。名雄礬丸。治蠱毒蛇犬蟲毒。○黃蠟甘溫。白礬酸澁。並能固膜護心。解毒定痛。托裏排膿。使毒氣不致內攻。故外科諸證之所必用也。

太乙膏 治內外一切癰瘍。

黑參 白芷

歸身 肉桂

大黃 赤芍

生地 各二兩

右切為片。麻油二觔。浸。春五。夏三。秋七。冬十日。煎熬去滓。搥淨。再熬。徐下黃丹。不住手攪。滴水不散為度。內癰可丸服之。

生化湯 見本卷生化湯論後

胎產心法 卷下 腰痛論 卒

血證黑神散 見上卷諸語門

腰痛論

產後腰痛者。由腎位繫胞。腰為腎府。產則勞傷腎氣。損動胞絡。或虛未平復。而風冷乘之。二者皆致腰痛。若寒冷邪氣。連滯背脊。痛久未已。後忽有孕。必致損動。宜養榮壯腎湯主之。如產後日久腰痛。濟陰大造丸治之。如惡露方行。忽斷絕不來。腰中重痛。下注兩股。痛如錐刺入骨。此血滯經絡。不即通之。必作癰疽。醫通用調經散。加陵鯉甲。或琥珀地黃丸亦宜。切勿誤用。五積散等辛溫之藥。蓋五積之

治瘀血作痛。以蒼朮為君。麻黃為臣。厚朴。枳殼。為使。雖有

歸芍之補血。僅及蒼朮三分之一。不思產後之婦。即有寒

邪。血氣未克。似難發汗。不過借藥性溫和。可以推陳致新。

豈可用麻黃之悍。蒼朮之燥。散虛而又虛。禍不旋踵矣。

養榮壯腎湯 治產後腰痛。屬勞傷。或風寒所乘。

當歸 二錢 獨活

桂心 川芎

杜仲 鹽水製斷絲 續斷 製取淨肉

桑寄生 各八分。取正桑樹上 防風 四分

胎產心法 卷下 腰痛方 六

生薑三片煎服。○如服二貼後。疼痛不止。腎虛也。加熟

地三錢再服。○失血過多者。加當歸二錢。蜜炙黃耆酒

炒白芍。各一錢五分。

局方調經散 治產後敗血。乘虛停積於五臟。循經

流入於四肢。留滯日深。腐壞如水。漸致身體面目

浮腫。或因產敗血上干於心。心不受觸。致心煩躁。

卧起不安。如見鬼神。言語顛倒。並宜服之。

赤芍 沒藥 別研

琥珀 別研 桂心

當歸 各一錢

細辛 去苗

麝香 別研各五分

右為末。和勻。每服一錢。溫酒入生薑少許服。○一方。每服五分。以痛止為度。

琥珀地黃丸 治產後惡露未淨。胸腹痛。小便不利。

琥珀 別研 延胡 同糯米炒。去米。

當歸 各一兩 蒲黃 四兩。生牛炒半。

乾生地 八兩 生薑 一觔

右將地黃咀碎酒浸。生薑切片。各搗取汁。留滓。無油杓

胎產心法

卷下 腰痛方

三

中。用薑汁炒地黃滓。地黃汁炒薑滓。各乾為末。忌犯鐵器。煉白蜜為丸。彈子大。每服一丸。空心當歸煎湯調服。

濟陰大造丸 見上卷補益門

脇肋痛論

產後脇痛。乃敗血流入肝經。其厥陰之脈。循行脇肋。故作痛。此證有虛實。宜分治之。不可誤也。如脇下脹。手不可按。是瘀血也。宜去其血。芎歸瀉肝湯主之。如脇下痛。喜人按。其氣閃動。肋骨狀若奔豚者。此去血太多。肝藏虛也。當歸地黃湯主之。醫通云。脇痛宜分左右。蓋左屬血。血藏於肝。

肝傷。有死血。故痛。加減小柴胡湯。右屬脾。脾有痰積。則痛。

加減補中益氣湯。左右俱痛者。屬虛。補中益氣湯。加桂。下

六味丸。然痰氣亦有流於左脇。必與血相持而痛。血積亦

有傷於右脇。然必因脾氣衰而致。又左有怒氣傷肝。右有

氣鬱傷脾。不因血與痰而痛。其間治法。善雜證者。可默悟

矣。馮氏云。產後脇痛。若肝經血瘀。延胡索散。若肝經氣虛。

四君子。加柴胡。薄荷。桂。若肝經血虛。四物。加參。朮。柴胡。若腎

水不足。不能生肝。六味丸。若肺金勢盛。尅制肝木。瀉白散。

然若不用薑桂辛溫。助脾肺以行藥力。不惟無以施功。反

胎產心法

卷下 脇肋痛論

三

添其脹矣。尊生云。肋痛屬氣滯。歸芍清肝飲治之。蓋肋與脇。部位不同。不可認而為一。腋之下有骨處為肋。肋之下

無骨處為脇。

芎歸瀉肝湯 治產後瘀血脇痛。手不可按。

歸尾 一錢 川芎

香附 童便製各八分 青皮

枳殼 蘇炒各六分 枳仁 八粒。去皮尖。

紅花 四五分

水煎熟。去滓。入酒。童便服。○瘀甚。藥分兩或可加倍。

當歸地黃湯 治產後肝血去多。脇虛而痛。

人參 當歸 酒洗

白芍 酒炒 熟地 各一錢五分

陳皮 炙草

桂心 各一錢

薑棗引。水煎服。

加減小柴胡湯 治產後左脇痛。

小柴胡湯 見上卷 諸痛門 去黃芩。加丹皮、製香附、薄荷、當歸、童便。

加減補中益氣湯 治產後右脇痛。

胎產心法 卷下 脇肋痛方 六

補中益氣湯 見上卷 諸痛門 去升麻。加葛根、製半夏、茯苓、麩炒枳

殼。生薑引。

瀉白散 ○附加味瀉白散 治肺火喘嗽氣急。手足心

發熱。

桑白皮 薑汁和蜜炙 地骨皮 各一兩

炙草 五錢 粳米 百粒

為散。每服四五錢。○一方。米不為散。用米並竹葉為引。水煎服。○加橘紅、桔梗。各加味瀉白散。

歸芍清肝飲 治產後氣滯、肋痛。

當歸 一錢五分 白芍

桔梗 各六分 檳榔

枳殼 麩炒各三分 桂心

青木香 柴胡 各二分五厘

水煎服。

補中益氣湯 見上卷諸痛門

六味丸 見上卷諸痛門附六味地黃湯下

延胡索散 見本卷小腹痛門

四君子湯 見上卷胎逆上逼門

胎產心法 卷下 手足身痛論 七

四物湯 見上卷安胎門

手足身痛論

產後遍身疼痛者。因產百節開張。血脉流散。氣弱不克。則經絡間。血多凝滯不散。筋脉急引。骨節不利。故有腰背不能轉側。手足不能伸屈。或身熱頭痛者。起痛散主之。若誤作傷寒。發表汗出。則筋脉。腫動。手足厥冷。變為痙證。又當十全大補湯也。若指節疼痛。補中益氣湯。足膝腫或痛。獨活寄生湯。醫通云。產後敗血。或流於腰膝。或流入脾股。痛不可耐。痛處熱腫。流注日深。漸至身面浮腫。調經散。或琥

珀地黃丸最當。若虛風所侵。以致肢體沉重不利。筋脉急引。發熱頭痛。四神散加桂枝薑棗和營止痛最捷。勿誤為傷寒治也。以手按而痛亦甚。是瘀滯按而痛少。緩是血虛。以此別虛實。庶無差謬。馮氏云。產後手足身痛。是血虛不能榮也。手足走痛者。是氣血不能榮養四末而濁氣流於四肢。則腫。陰火遊行。四旁則痛也。不出養榮加黑薑主之。起痛散。治產後遍身疼痛。由氣血虛有滯。不可誤作傷寒施治。

當歸 二錢酒浸 黃耆 一錢蜜炙

胎產心法 卷下 手足身痛方 空

白木 土炒 淮牛膝 蒸

獨活 肉桂

韭白 各八分 甘草 三分

薑三片。水煎熱服。○曾生方無黃耆。韭白止五分。

補中益腎湯 專治產後虛勞。指節疼痛。頭疼汗出。

人參 黃耆 蜜炙

淡豆豉 各一錢 當歸 二錢酒浸

韭白 五分 生薑 三片

豬腎 一付

先將豬腎煎熟。取汁二盞。煎藥八分。溫服。

十全大補湯 見上卷胎不長養門

獨活寄生湯 見上卷諸痛門

調經散

琥珀地黃丸 俱見本卷腰痛門

四神散 見本卷腹痛門

養榮湯 見本卷脫汗亡陽門

發熱論

產後七日內外發熱。其證多端。除傷食發熱。已論見傷食

胎產心法 卷下 發熱論 空

門矣。然又有發熱惡寒頭痛似太陽證。或寒熱頭痛脇痛

似少陽證。皆由氣血兩虛。陰陽不和。其狀頗類傷寒。治者

慎勿輕產而執偏門。以麻黃湯治類太陽證。以柴胡湯治

類少陽證。蓋產後大血空虛。一經發汗。重則亡陽。輕則筋

傷。肉暈。或鬱胃昏迷。或搐搦便秘。變證百出矣。昔仲景云

亡血家不可發汗。丹溪云。產後切不可發表。二先生非謂

產後無傷寒之證也。非謂柴胡麻黃湯之不為對證也。誠

恐後學執偏門而輕產。泥成方而發表耳。雖明知感有外

邪。其生化湯內芫薑亦能散之。否則辛散生化湯亦可何

用發表以犯不可汗之禁。平產時傷力發熱去血過多發熱惡露不快發熱三日蒸乳發熱早於起床勞動發熱多因血虛陽無所依浮散於外而為熱只服生化湯二三劑去惡生新陽生陰長其諸熱悉能退之。尊生用丹溪法以四君子湯加芎歸黃耆炮薑治產後發熱亦甘溫除大熱意也。又云大熱面赤大渴脈洪大而虛者黃耆當歸等分煎服此做當歸補血湯也。馮氏用四物為君去川芎生地換熟地加軟苗柴胡人參炮薑治熱最效此亦取炮薑收其浮散之熱而兼芍藥飲陰之意。予謂當分塊痛有無如胎產心法

胎產心法 卷下 發熱論 六

七日內尚有塊痛及初產時發熱自宜生化湯為妙其參耆柴木地芍尚須緩用若無塊痛產日已久尊生馮氏之方亦合經旨也。養葵云如胎前原有陰虛火證產後去血過多必大熱煩躁汗出等證若大補氣血其證必甚當用逍遙散以清肝火養肝血因其去血既多肝虛血燥之故不可泥於氣血兩虛而治。予謂此以肝虛有火立論當以脈候參詳可耳。薛立齋又云新產婦人陰血暴亡陽無所附而外熱宜四物加炮薑補陰以配陽若係誤用寒涼剋劑之劑而外熱者此為寒氣格陽於外宜四君子加薑桂

不應急加附子若肌膚發熱面赤大渴引飲者此血脫發燥也當歸補血湯又曰產後虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛故惡寒發熱若誤作火證投以寒涼誤作表證輕用表散禍在反掌。予謂立齋之論及治法深得產後之要。但四物加炮薑一方不若易生化湯則全美矣。

辛散生化湯 ○附辛散湯 治產後感冒風寒惡寒發熱頭痛。

川芎 一錢五分 當歸 三錢

炙草 乾薑 炙黑

胎產心法 卷下 發熱方 六

羌活 防風 各四分

秦仁 十粒去皮尖

水煎服。○若頭疼身熱不除加白芷 八分 細辛 三分。○

頭疼如破加連鬚葱頭 五根。○虛加人參 二三錢。○一

方用生化湯加白芷 八分 羌活 細辛 各四分 葱頭 五根。

不用防風通治之。虛亦加人參。各辛散湯。○予謂產後

七日前當用生化湯。七日後可用此方。

當歸補血湯 治血虛至夜發熱煩渴引飲其脈洪

大而虛重按全無者。

黃 著 六錢 蜜酒炙 歸身 二錢

水煎服。

生化湯 見本卷生化湯論後

四君子湯

逍遙散 俱見上卷胎逆上逼門

四物湯 見上卷安胎門

大便燥秘論

產後大便燥秘。由於去血過多。胃中枯燥。精微不及。下輸。以至糟粕壅滯不通。况大腸主津。產婦內亡津液。則乾涸。

胎產心法

卷下 大便燥秘論

辛

失其傳導變化之權。故令便難。多服生化湯。則血旺氣順。自潤而通。或服養正通幽湯。亦可。倘不大便。而無所苦。即勿藥。亦可。所以產後每至三五日之久。甚至八九日。而大便始通者。皆其常也。即有似傷寒三陰證。潮熱汗出。或口燥腹滿。或謔語便秘。燥糞宜下等證。乃氣血枯竭。虛證類實。慎勿執偏門而輕產。妄議三承氣湯。以下之。或有血虛火燥不便者。不可計其日數。必待腹滿覺脹。欲自去而不能。此乃結在直腸。用潤腸粥潤之自通。全書用濟川煎主之。慎不可用導法。倘潤之不通。勢急有無可如何者。用蜜

胎產心法

卷下 大便燥秘論

七

煎導之。將蜜煎褐色。成膏。入水。捏成棗樣。納入肛門。其結糞自化而出。或削醬瓜。醬蓋。如蜜棗導法。此亦權宜之計耳。惟猪膽汁。導切。記。茶。用。以其苦寒。誤用。每至發呃。倘服苦寒藥攻通。反傷中焦元氣。或愈結難通。或通泄不止。斯成敗證矣。醫通云。血虛火燥。用四物湯。加何首烏。潤下之。立齋云。若去血過多。十全大補湯。氣血俱虛。用八珍湯。如數日不通。飲食如常。腹中如故者。八珍。加菴仁。杏仁。治之。馮氏云。大便難。惟宜調中。養血。切不可單用麻仁。枳殼。徒耗腸胃。中生養之氣。而無功也。有治大便日久不通。大料惡露不行。方論俱見惡露不下門。

養正通幽湯 治產後大便燥秘。

川 芎 一錢 或一錢五分 或當歸 四錢 或六錢

菴 仁 十粒 去皮尖 炙 草 五分

陳 皮 四分 麻 仁 一錢 或一錢五分 炒

肉 荜 蓉 一錢 或二錢 酒洗去泥用

水煎服。○一方無荜蓉。○如有血塊痛。加肉桂。炒延胡索。各五分。不用荜蓉。○如氣虛多汗。加蜜炙黃耆 一錢

人參 一二錢。一方再加麻黃根 一錢。○燥渴加去心麥

冬 一錢五分。人參 一二錢。一方再加五味子 七粒。○腹

滿便實。加去心麥冬 一錢。麩炒枳殼 六分。○汗出譫語

便實。乃氣血並竭神衰。心主失守。宜養氣安神。加茯神

炒棗仁、製遠志肉、炙黃耆、栝仁、茯苓 各一錢。人參、土炒

白朮 各二錢。更須與妄言妄見門參治。

潤腸粥 治產後日久便秘不通。

芝 蘇 一升。

研為末。和粳米二合煮食。腸潤即通。

胎產心法 卷下 大便燥秘方 七

濟川煎 凡病涉虛損。而大便閉結不通。其攻擊等

藥。萬不可用。若勢有不得不用通者。此方主之。此

用通於補之劑也。最妙。

當 歸 三五錢 牛 膝 二錢 蒸

肉 蓯 蓉 二三錢 酒洗去酒 澤 瀉 一錢 五分

升 麻 五七分 枳 殼 一錢 麩炒 虛甚者不

水一鍾半。煎七分。食前服。○如氣虛。但加人參無碍。○

如有火。加酒炒黃芩。○如腎虛。加熟地。

生化湯 見本卷生化湯論後

十全大補湯 見上卷胎不長養門

四物湯 見上卷安胎門

八珍湯 見上卷諸痛門

類瘧及寒熱往來論

產後痞瘧。在初產時絕少。即胎前久瘧淹纏。產後裏氣通

達。無不霍然。即有半月內外。寒熱往來。每日應期而發。或

一日二三度。其證類瘧。皆由產後。氣血虛損。陽虛作寒。陰

虛發熱。或晝輕夜重。或日晡發熱。或有汗。或頭有汗而不

及身足。此乃元氣虛弱。孤陽絕陰之證。俱宜滋榮益氣扶

胎產心法 卷下 類瘧及寒熱往來論 七

正湯。間服六味丸。以退寒熱。如寒熱往來。頭痛無汗。加減

養胃湯治之。若寒熱已久。無汗者。兼煎參朮膏。以助養胃

湯藥力。慎不可作瘧治。而用柴胡湯及芩連枝栝。以退熱

草。菓。檳。常以絕瘧而誤人也。至於陰陽不和。乍寒乍熱。參

歸湯治之。全書云。陰勝寒多。理陰煎。陽勝熱多。三陰煎。陽

氣陷入陰中。補陰益氣煎。陰陽俱虛。八珍十全。敗血不散。

流入陰中。而作寒熱。決津煎。殿胞煎。

滋榮益氣扶正湯 治產後寒熱往來。有汗。每午後

應期而發。

人參

熟地 各二錢

川芎

黃耆 蜜炙

麥冬

去心各一錢

當歸 三錢

白朮

一錢五分土炒

陳皮 四分

炙草

五分

水煎服。間服六味丸。○或加柴胡 八分。青皮 三分。烏梅

二個。○汗多加麻黃根 一錢。一方引加浮小麥一撮。不

加麻黃根。

加減養胃湯 治產後已及一月類瘧。並治寒熱往

胎產心法

卷下

類瘧及寒熱往來方

七四

來。頭痛無汗。

人參

一錢五分

川芎

茯苓

蒼朮

米泔水製炒各一錢

當歸

三錢酒浸

藿香

炙草

橘紅 各四分

半夏

八分製

薑一片。棗二枚。水煎服。○有痰加竹瀝薑汁。一方無製半夏。有痰方加入。○久類瘧無汗。兼服參朮膏助之。

參朮膏

人參

白朮 土炒各四兩

水六碗。各煎取汁三碗。如法再煎三次。取汁共九碗。再

共熬至一碗。每日服半酒鍾。白滾水化下。

參歸湯

治產後陰陽不和。乍寒乍熱。

當歸

酒洗

炮薑 一錢

人參

白芍 炒

川芎

炙草 各八分

水煎服。

三陰煎 治肝脾虛損。精血不足。及營虛失血等病。

胎產心法

卷下

類瘧及寒熱往來方

七五

凡中風血不養筋。及瘧證汗多。邪散而寒熱猶不

止者。

人參

隨宜

當歸 二三錢

熟地

三五錢

芍藥 酒炒

棗仁

各二錢

炙草 一錢

水二鍾。煎七分。食遠服。○如嘔惡。加生薑 三片。○汗多。

煩燥。加五味子 十四粒。○汗多氣虛。加蜜炙黃耆 一二

錢。○小腹隱痛。加枸杞 二三錢。○如有脹悶。加陳皮 一

錢。○如腰膝筋骨無力。加炒杜仲。蒸淮牛膝 各一錢。

補陰益氣煎

人參 一二錢

當歸

山藥 酒炒各二三錢

熟地 三五錢

陳皮

炙草 各一錢

升麻

三五分若火浮於上者去此不用

柴胡

一二錢如無外邪不

薑三片煎服。○此補中益氣湯之變方。治勞倦傷陰。精

不化氣。陰虛外感。瘧瘧。並便結不通。凡屬陰氣不足。而

虛邪外侵者。用此升散。無不神效。

六味丸

見上卷諸痛門附六味湯下

胎產心法

卷下

類瘧及寒熱往來方

七

理陰煎

見上卷惡阻門

八珍湯

見上卷諸痛門

十全大補湯

見上卷胎不長養門

決津煎

見上卷鬼胎門

殿胞煎

見本卷三審門

胎產心法卷之下

胎產心法卷之下

上谷

類中風痙瘓及語澀口噤不語筋攣痙瘓等證論

凡婦人衝脈為血脈之海。若血脈充足。流暢無滯。氣血衝

和。則關節清利。而無病矣。至於產後勞損。臟腑氣血暴竭。

百骸少血。濡養多有。陰虛內熱。熱極生風。雖外證如風實。

內臟。陰血不足。氣無所主。卒爾口噤。牙緊。唇青。肉冷。汗出。

或唇口喎僻。手足筋脈攣搐。諸證類於中風者。或因血氣。

耗損。腠理不密。汗出過多。神無所主。致角弓反張。此乃厥。

胎產心法

卷下

類中風痙瘓及語澀口噤不語筋攣痙瘓等證論

七

陰虛極。類痙瘓者在。傷寒之家。雖有剛柔之分。而產後無。

非血燥。血枯之證。總宜養陰補血。血長而虛風自滅。任其。

痰火乘虛。泛上。皆當以未治之。毋執偏門。而用治風消痰。

之方。以重虛產婦也。治初產。當服生化湯。以生旺新血。如。

見危證。三貼後。即用人參益氣以救之。如有痰。有火。或少。

佐橘紅竹瀝薑汁。其黃連芩栢不可並用。胆心蘓子尤不。

宜。加慎之。慎之。如產已數日。腹無塊痛。即用滋榮活絡湯。

如語澀四肢不利。宜天麻湯。密齋治語言蹇澀。加味生麥。

散。治汗多口噤。背反氣微。類瘧用止汗生血飲。治無汗筋。

學用芎歸棗仁湯。諸書所用悉皆參附十全理陰大補元煎之類。溫養而竣。補之。從未有以風痰治之者。昔立齋用十全大補治口噤。空開口灌之。如不得下。令側其面出之。仍灌熱者。又冷。又灌。數次。即能下而甦矣。醫通云。口噤則扶齒灌之。斷噤。則灌入鼻中。即蘇。此古人救急灌法。不可不知。至於治口噤。不能為語。竣補之中。少兼通心氣之藥。治之。故密齋尊生。俱用七珍散。以通心氣也。馮氏治產後癱瘓。用八珍。加丹皮。鈎藤。以生陰血。不應用四君子。芎歸。丹皮。鈎藤。補脾土。蓋血生於至陰。至陰者。脾土也。且氣有胎產心法

胎產心法

卷下

類中風癱瘓及語謇口噤等證論

六

生血之功耳。再此證。如傷寒誤汗亡液。誤下亡陰。潰瘍膿血大下之後。小兒吐瀉之後。悉多患之。故在產後。亦惟去血過多。或大汗。大瀉。而然。其為元氣虧極。血液枯敗。可知。若肢體惡寒。脈微細者。此為正狀。若脈浮大。發熱煩渴。此為假象。惟當固本為善。若至於無力抽搐。戴眼反折。汗出如珠。兩手撮空者。不治。尊生治產久拘攣。不宜補者。用舒筋湯治之。

昔余奉

差督運。亡室因胎前過月不生。忽患子痛證。誤為醫人認傷

寒胎死。用承氣調天水散下之。及產後惡露即停止不行。此原非瓜熟自落。乃惡露隨胎為藥所逐。則一時盡下。非有瘀滯不行也。所以腹無塊痛。醫者不明此理。不問塊痛有無。用牡丹皮。澤蘭等藥。以致有形之血不生。無形之氣更傷。是以隨變神脫。妄言妄見。虛火引痰上升。治者猶不知此孤陽浮越之候。復不辨脈證。仍進逐瘀退熱之劑。病勢愈深。豈知產後大虛。再經辛散消尅。則神愈亡。而血愈竭。是以心血竭。而妄言愈甚。肝血竭。而內虛生風。成搐。肺氣竭。而發喘。鼻孔黑如烟煤。脾氣竭。而四肢不為所用。胃胎產心法

胎產心法

卷下

類中風癱瘓及語謇口噤等證論

七

中元氣告匱。不能散精。痰壅愈甚。治之者。仍不識為虛證。反用胆星。蘓子。以化痰降氣。梨汁以清痰降火。殭蠶。柴胡。天麻。以止搐。諸如此等藥類。雜進交功。罔知顧本。遂致殞命。良可慟也。

滋榮活絡湯 治產後口噤。項強。筋搐。類中風證。

人參 二錢或三錢

川芎

茯神 各一錢

當歸 三錢酒浸

黃耆 一二錢蜜炙

麥冬 一錢二分或一錢去心

天麻 八分或一錢

熟地 二錢

陳皮

荆芥

防風

羌活

炙草 各四分

黃連 三分薑汁炒

水煎服。○有痰加半夏七分。製竹瀝七分。薑汁少許。○

有肉食加山查砂仁麩食加神麩麥芽。○大便秘加肉

菘蓉一錢五分。酒洗去泥。○渴加麥冬乾葛各八分。○

汗加麻黃根八分。○驚悸加酸棗仁一錢去殼。

天麻湯 治產後中風恍惚語澁四肢不利。

人參

棗仁 炒

胎產心法

卷下

類中風產後及諸虛方 八

茯神

遠志 淨肉製

山藥

栢子仁

麥冬 去心各一錢

當歸 一二錢

石菖蒲

半夏麩

南星麩 各八分

川芎

羌活 各七分

天麻

防風 各五分

細辛 四分

或煉蜜爲丸。硃砂爲衣。淡薑湯送。

加味生脉散 治產後去血太多。心血虛弱。不能上

榮於舌。語言不清。含糊寒澁。

人參

麥冬 去心

歸身

生地

炙草

石菖蒲 各一錢

五味子 十三粒。搗碎。

獾猪心一個。劈開。水二盞。煎至一盞半。去心。入藥。煎七

分。食後服。○此方治怔忡甚效。

止汗生血飲 治產後汗出多。而口噤不開。背強而

直。氣息欲絕。類瘧證。宜速治也。

胎產心法

卷下

類中風產後及諸虛方 八

當歸 二錢酒浸

川芎

麻黃根 各一錢

桂枝

羌活

防風

羚羊角

天麻 各六分

附子 製

炙草 各四分

水煎服。○一方有人參一錢。

芎歸棗仁湯 治產後無汗。筋脉拘攣。類瘧證。

當歸 二錢酒洗

川芎

防風 各一錢

棗仁 五分去殼炒研

水煎服。○一方有羌活 七分。

七珍散 治產後敗血停積。閉於心竅。神志不明。蓋心氣通於舌。心氣閉。則舌強不語。

人參 石菖蒲 各一錢、為散、各一兩

川芎 一錢、為散、七錢五分 生地 一錢、為散、易炙甘草三錢

細辛 二分、為散、二錢五分 薄荷 一分、為散、無此味

防風 五分、一方四分、辰砂 五分、研細水飛、為散、三錢

尊生合生化湯服。○一方為散。薄荷湯調服三錢。

舒筋湯 治產後日久拘攣。不宜用補劑者。

胎產心法 卷下 胎中風症及諸症方 三

羌活 薑黃

炙草 各二錢、海桐皮

當歸 赤芍 各一錢、

白朮 一錢、土炒、沉香 少許、

薑煎參證治。

參附湯

人參 當歸 酒浸、各二三錢、

肉桂 八分或一錢、黃耆 壹炙、

白朮 土炒、各一錢五分、熟地 二錢、

製附子 四分或六分、炙草 四分、

生化湯 見本卷生化湯論後

加參生化湯 見本卷暈厥門

十全大補湯 見上卷胎不長養門

理陰煎 見上卷惡阻門

大補元煎 見本卷惡露不止門

八珍湯 見上卷諸痛門

四君子湯 見上卷胎逆上逼門

怔忡驚悸並虛煩煩燥論

胎產心法 卷下 怔忡驚悸燥論 三

產婦憂驚勞倦。去血過多。則心中燥動不寧。謂之怔忡。若

惕然而驚。心中怯怯。如人將捕之狀。謂之驚悸。治此二證。

惟調和脾胃。補養心血。俾志寧神定。氣舒心安。而病愈矣。

如分娩後。血塊未消。宜服生化湯。以補血行塊。連服數劑。

則血旺而怔忡驚悸自平。不必加定志安神之品。如塊痛

已止。服加減歸脾湯。如心中驚悸。目睛不轉。而不能動。診

其脈動而弱者。宜養血。佐以安神藥。養心湯主之。素壯火

盛者。兼服安神丸。如虛煩不眠。亦心虛所致。加減歸脾湯

並治之。孫正人用人參丸。治驚悸不眠亦效。至於煩燥不

寧亦宜分塊痛有無如塊痛未除有瘀血也生化湯調失笑散如塊痛已止是虛或有熱人參當歸湯治之。

加減歸脾湯 治產後血塊痛止怔忡驚悸。

人參 茯苓

棗仁炒 麥冬去心

黃耆蜜炙 白朮土炒各一錢

當歸二錢酒浸 川芎八分

遠志肉六分製 陳皮

炙草各四分 龍眼肉八枚

胎產心法 卷下 衄血驚悸 合

薑一片水煎服。○虛煩加竹茹一團。○有痰加竹瀝薑

汁或更加栝子仁。○一方茯苓易茯神無川芎陳皮有

木香二分。

養心湯 治產後心血不寧驚悸不安。

人參一錢五分 當歸身二錢酒浸

黃耆蜜炙 麥冬去心

棗仁炒 栝子仁各一錢

茯神 川芎

遠志肉製各八分 五味子十粒

炙草四分

水煎服。

安神丸 治產後怔忡驚悸素壯火盛者。

歸身酒浸 生地各三錢

黃連二錢炒 甘草五分炙用生用俱可

以上四味共為末蒸餅丸如菉豆大以硃砂為衣每服四十九。

人參丸 治產後大虛心悸志意不安恍惚恐畏虛

煩不眠少氣。

胎產心法 卷下 怔忡驚悸 合

人參 茯苓

麥冬去心 著蕢各二兩

澤瀉 苜蒲

乾薑 桂心

甘草各一兩

共為末白蜜和棗膏丸如梧子大空心酒服二三十丸早晚服。

人參當歸湯 治產後塊痛已止或虛或虛而有熱

煩燥不寧。

人參

當歸 酒浸

熟地

麥冬 去心各二錢

肉桂 四分

白芍 一錢 酒炒

生地 八分

竹葉 十片

水煎服。

生化湯

見本卷生化湯論後

失笑散

見中卷胞衣不下門

麻督論

產後麻督皆因氣虛血少不能克溢乎過身也。即如人曲

胎產心法

卷下

麻督論

六

眩而枕。稍久即麻木。不為我用。其非氣血不週遍之明徵

歟。目得血而能視。得清氣之升而能用。血虛氣弱。不能升

清。故濁不降而督宜生。血補氣十全大補湯主之。至於去

血過多。手足發麻。小腹大痛。則遍體麻暈欲死。此非惡露

凝滯。乃虛中挾痰。六君子加炮薑香附當歸。曾治一婦。產

後右半身麻督而昏暈。不省人事。發即胸膈痞悶。下體重

着。或時心神蕩搖。若無心肺之狀。頃則周身冷汗如澆。大

吐痰涎而蕪。此產後經脉空虛。痰飲乘虛襲入之故。因與

六君子加歸著肉桂。隨手而效。復有一婦。產後左半身麻

督昏暈。不省人事。發則周身大痛。筋脉痠癢。肌肉瞤動。或

時頭面赤熱。或時腿上振振動搖。頃則蒸蒸汗出而蕪。此

產後營血大虧。虛風襲入之故。用十全大補湯治之。諸證

悉平。但麻督不止。後與地黃飲子而安。

地黃飲子 治腎氣上交於心。舌瘡足痹。

熟地 三兩

巴戟天 酒浸去骨

附子 炮

山茱萸 去核

肉苁蓉

酒浸去腐切焙

石斛

白茯苓

石菖蒲

胎產心法

卷下

麻督方

七

遠志

甘草湯泡去骨取肉

甜肉桂

麥冬

去心各一兩

五味子 五錢

共為粗末。每服五錢。生薑五片。大棗一枚。薄荷七葉。水

煎。日二服。服無時。○方中桂附巴戟。原為驅逐濁陰痰

涎而設。不可執已見而輕去之。

十全大補湯

見上卷胎不長養門

六君子湯

見上卷諸痛門

口乾渴兼小便不通或短少論

凡產後舌燥咽乾而渴兼小便不利。由產後亡血或汗多

所致。內亡津液也。夫日用水穀。胃納而脾運。肺散至精。至清之氣。為津為液。清肅下行。膀胱而為小便。其氣通心。受火色化為榮身之血。值產亡血。而又汗多。加之產後氣虛。不能為胃行其津液。則是化生之氣不運。滲泄之令不行。所以上無津液。流通而有咽燥乾渴之證。下氣不升。而有小便不通。雖通而亦短少之候。勿作淋秘。輕用滲利。使氣益虛。病益甚。治法必當助脾益肺。升舉氣血。則氣化流行。陰升陽降。斯水入經而為血。為津。穀入胃而長氣行。脈自然。津液克而便利。調勻矣。初產生化湯多服數劑。如汗多。

胎產心法

卷下

和乾渴兼少腹

六

亡津液。須加人參於內。使血生而津足。若無塊痛。六君子倍參著。或服生津止渴益水飲。渴甚兼服參麥飲。如產後口乾少力。宜生津益液湯。有用四君子湯。加車前一錢。桂心五分。若認咽乾口燥為火。而用芩連枝栢以降之。認小便便秘。澁為水滯。而用五苓等劑以通之。不特非其治法。更患愈通。愈竭。變生他證矣。尊生云。小便不通。金匱腎氣丸。可加減用之。予謂當用加味腎氣丸為是。若兼口渴。用生津止渴益水飲。渴甚兼生脈飲。密齋云。如惡露不來。敗血閉澁水瀆。小便不通。其證則小腹脹滿刺痛。乍寒乍熱。煩

悶不寧。用加味五苓主之。予謂初產。自當用生化湯。則瘀行便利矣。可無事乎。五苓也。如產過五七日。而惡露亦自宜漸少而止矣。又何必事乎。五苓也。况產後最禁發汗。利水。予焉敢輕產。而用五苓以竭其陰乎。世有治小便不通。用炒鹽加麝少許。填臍中外。用葱白十餘莖。作一束。切如半指厚。置鹽麝上。將艾炙之。覺熱氣入腹。難忍方止。小便即通。此惟氣閉者宜之。若產後氣虛源涸。與夫熱結膀胱者。皆不可用。

生津止渴益水飲

治產後口渴。小便不利。

胎產心法

卷下

和乾渴兼少腹

六

人參 生地
 麥冬 去心各二錢 黃耆 一錢五分 蜜炙
 五味子 十粒 當歸 三錢 酒浸
 茯苓 八分 升麻
 炙草 各四分 葛根 一錢
 水煎服。○如汗多加麻黃根 一錢 炒棗仁 一錢 浮小麥 一撮。○大便日久不通。加酒洗菴蓉 一錢五分。○渴甚。用參麥飲代茶飲之。不可疑而不用。凡一切降火利便藥。斷不可用。

生津益液湯 治產後口乾少力。

人參 隨宜 麥冬 一錢二分去心

茯苓 瓜蒞根 各一錢

甘草 八分 小麥 一撮

竹葉 十片

棗二枚。水煎服。○如大渴加蘆根。

加味五苓散 治產後惡露不行小便不通。

猪苓 澤瀉

白朮 土炒 茯苓

胎產心法 卷下 和藹或燥炒 芎

桂心 各〇錢 菴仁 去皮尖

紅花 各二錢

水煎服。○此方予未敢用。姑錄之以備參考耳。

生化湯 見本卷生化湯論後

六君子湯 見上卷諸痛門

參麥飲 見本卷暈厥門

四君子湯 見上卷胎逆上逼門

加味腎氣丸 見上卷諸痛門附六味地黃湯下

泄瀉及完穀不化並遺尿論

產後泄瀉不可與雜證同治。大率中氣虛弱。傳化失職。所

致氣虛食積與濕也。氣虛宜補。食積宜消。濕宜燥。之。然惡

露未除。又難以驟補。峻消。急燥。當先用蓮子生化湯三劑。

化舊生新。方中且有蓮子。茯苓。補脾利水。兼治其瀉。候舊

化新生。然後用健脾利水生化湯。或補氣。或消食。或化積。

或燥濕分利。因證加入對證之藥。始無滯澁虛虛之失。至

產後旬日。外方可與雜證同論。然猶宜量人虛實而治也。

如痛下清水。腹鳴。米飲不化者。以寒瀉溫之。如糞色黃。肛

門痛。以熱瀉清之。如飲食過多傷脾。噯氣味如敗卵。以食

胎產心法 卷下 泄瀉完穀不化 九一

積消之。如飲食減少。食下腹鳴。腹急。盡下所食之物。方覺

暢快。以脾虛食積補而消之。丹溪云。如產後虛瀉。眼昏不

識人危證。用參苓朮附湯救之。又有胎前久瀉。產後不止。

以致虛脫。須從權服參苓生化湯以扶虛。仍分塊痛。不痛。

加減而治。凡瀉兼熱。切勿用芩。連。枝。栝。兼痰。切勿用半夏。

生薑。如瀉。瀉。參。麥。飲。以回津液。如產後脾瀉。不止。參。苓。連。

子。飲。妙。夫完穀不化者。因產時勞倦傷脾。而轉輸稽遲也。

夫水穀入胃。遊溢精氣。散歸於脾。脾氣散精。上歸於肺。而

調通水道。乃能致氣滋臟以養人。今因產勞倦脾傷。以致

衝和之氣不能化而物完出焉。病名食泄。又飲食太過。脾胃受傷。亦致完穀不化。俗呼為水穀痢也。然產方三日內。血塊未散。患此脾敗胃弱之證。未可遽加著木。且服加味生化湯。內有益智砂仁。少溫其氣。俟塊消散。服參苓大補。生。化。湯。如胃氣虛瀉利黃色。用補中益氣湯加木香治之。若久瀉痢虛者。參香散。如久瀉元氣下陷。大便不禁。肛門如脫。宜加味六君子湯。若見完穀不化。色白如糜。此脾胃大虛。元氣虛脫之候。十有九死。惟猛進溫補之劑。庶可挽回。即有煩燥發熱。面赤。脈來數大。皆虛火上炎之故。當並胎產心法。

胎產心法 卷下 泄瀉並完穀不化方 三

進桂附人參甘草乾薑芩木之類。伏龍肝煎湯代水煎服。仍得收功。若小便混濁如泔。或大便中有白沫。如腸垢者。乃元氣下陷之故。並宜補中益氣。加桂苓炮薑升舉之。或瀉臭水不止。加蘄艾香附吳茱萸。若兼瘀結不通。腹脹喘急。雖神丹亦無濟也。如大便不知為遺尿。補中益氣湯加肉蓯蓉故帟。

蓮子生化湯 治產後血塊未消泄瀉。

川芎 茯苓 各二錢

當歸 四錢 一方一錢 黃土炮 薑 四分

杏仁 十枚 去皮尖 炙草 五分 蓮肉 十枚 去心 水煎服。○一方無桃仁。

健脾利水生化湯 當歸 黃土炮 各一錢

川芎 白木 二錢 土炒 澤瀉 八分

乾薑 四分 炮 陳皮 炙草 各五分

肉蓯 一枚 煨 人參 三錢 茯苓 一錢 五分

胎產心法 卷下 泄瀉並完穀不化方 三

○一方無茯苓。○寒瀉加砂仁 八分。炮乾薑 八分。○熱瀉加炒黃連 五分。○瀉水腹痛。米飲不化。加砂仁 六分。

山查麥芽。○瀉有酸噯臭氣。係食積。加神麴 八分。砂仁 八分。山查麥芽。少食不安。瀉即覺安快者。亦以食積論。

○脾氣虛久瀉。加升麻。○瀉水多而腹不痛者。有濕。加製蒼朮 一錢。以燥之。○諸瀉方中。須加蓮子十枚。

參苓木附湯 丹溪治產後虛瀉。眼昏不識人。危證。用此方救之。

人參 七錢 白木 三錢 土炒

茯苓 附子 製各一錢

水煎服。

參苓生化湯 治胎前久瀉。產後不止。

人參 當歸 各二錢

乾薑 炮 炙草 各五分

訶子皮 川芎

山藥 炒各一錢 肉菓 一個麩裏煨

茯苓 一錢五分 蓮子 七粒

糯米 一大撮

胎產心法 卷下 泄瀉並完穀不化方 杏

水煎服。○虛甚。加人參 三四錢。○如七日內外。塊痛不

止。減參、肉菓、訶子，以除痛。○血塊不痛。加土炒白朮 二

錢。陳皮 三分。

參苓蓮子飲 治產後脾泄不止。并治年久不止脾

泄之證。

人參 白朮 土炒各二錢

白芍 八分炒 當歸 一錢五分

白茯苓 山藥 各一錢

升麻 陳皮 各三分

炙草 四分 蓮子 十二粒去心

薑二片。水三鍾煎服。取藥內蓮子送藥。○甚者腹疼。加

炒黑乾薑 五分。○虛甚。加人參 三四錢。

加味生化湯 治產後脾虛。三日內血塊未消。完穀

不化。胎前素弱。非胃苓能治。此方主之。

川芎 益智仁

砂仁 各一錢 當歸 四錢土炒

炮薑 四分 炙草 五分

茯苓 一錢五分 菴仁 十粒去皮尖

胎產心法 卷下 泄瀉並完穀不化方 奎

水煎服。

參苓大補生化湯 治產後血塊痛止。可服此以補

之。完穀自化矣。

人參 白朮 土炒各二錢

川芎 當歸

益智仁 白芍 炒

茯苓 各一錢 乾薑 四分炮

肉菓 一個麩裏煨 炙草 五分

蓮子 八枚去心

用熱則血愈行。倘血痢日久不止者。血虛也。宜四物湯加
荆芥、人參。或用人參五錢、香連丸一錢。同為末下。凡諸證
兼嘔吐。皆宜加藿香五分、痰加製半夏八分。兼小便短澀。
引加燈心三十寸。且燈心利水而不傷陰。況產後津液已
虧。兼之瀉痢傷陰。復傷津液。小便理宜短少。故止用燈心
足矣。不可用利水傷陰之藥也。如胎前下痢。產後不止。伏
龍肝湯丸治之。又有白頭翁加甘草阿膠湯。治產後痢不
止。○馮氏云。產後腹痛瀉痢。若非外因所傷。乃屬腎氣虧
損。陽虛不能生土。陰虛不能閉藏耳。必用四神、八味補腎。

胎產心法

卷下 痢滯論

九

倘誤投分利導水之劑。是益其虛。但瀉痢之證。非脾即腎。
如病在腎。所謂補脾不如補腎。如病在脾。自又補腎不如
補脾也。圓機活法。在臨證定之耳。

香芥生化湯 治產後七日內患赤白痢。

川芎 二錢

當歸 五錢

炙草 五分

菖仁 十粒。去皮尖

茯苓 一錢

陳皮 四分

木香 一分

水煎服。○如紅痢腹痛。加砂仁三分。○七日外。可加白

芍、黃連、炒蓮肉、製厚朴。各五分。

歸芍連殼飲 治產後半月外患赤痢後重。

川芎 一錢五分

當歸 三錢

白芍 酒炒

茯苓 各一錢

黃連 六分薑汁炒

枳殼 五分麸炒

甘草 四分

木香 三分

水煎服。

五皮散 治產後風濕傷脾。氣血凝滯。以致面目虛

浮。四肢腫脹氣喘。

胎產心法

卷下 痢滯方

九

陳皮

桑皮

薑皮

茯苓皮

大腹皮 黑豆水製淨。各一錢

水煎服。

香連丸 治下痢赤白。膿血相雜。裏急後重。

黃連 二十兩。吳萸十兩。同木香 四兩八錢。不見火。

醋糊丸。米飲下。○一方。等分蜜丸。○一方。加甘草八兩

黃連用蜜水炒。蒸晒九次。入木香為丸。

伏龍肝湯丸 治胎前下痢。產後不止。及元氣大虛。

瘀積小腹結痛。不勝攻擊者。

山查肉 一兩炮黑

黑糖 二兩熬枯

二味一半為丸。一半為末。用伏龍肝二兩煎湯代水煎。

前末二錢。送前丸二錢。日三夜二服。一晝夜令盡。○氣

虛。加人參二三錢。駕馭之。○虛熱。加炮薑、肉桂、茯苓、炙

甘草。○兼感風寒。加葱白、香豉。○膈氣不舒。磨沉香數

匙調服。

生化湯 見本卷生化湯論後

六君子湯

胎產心法

卷下 痢滯方

百

補中益氣湯 俱見上卷諸痛門

加味六君子湯 見本卷泄瀉門

四物湯 見上卷安胎門

白頭翁加甘草阿膠湯 見上卷痢門

四神丸 見上卷腹痛門

八味丸 見上卷諸痛門附六味地黃湯下

霍亂論

霍亂者。反覆不寧。而揮霍撩亂之謂也。邪干於上則吐。邪干於下則瀉。邪注中焦。不能容受。或冷熱不調。邪正相搏。

則上吐下瀉。此邪字。雖有寒濕及水土氣。合或乍寒乍熱。

外邪之浸。然因於飲食停滯。或傷過飽。食不能化。而致者。

十之六七。常人尚多如此。而況產後。血去氣損。脾胃愈虛。

飲食易傷。風冷易乘。一旦不及運化。或稍失調理。則陰陽

升降不順。清濁亂於腸胃。即有心腹絞痛。手足逆冷。吐瀉

交作。霍亂之證矣。如塊痛未除。宜服生化六和湯。塊痛已

除。宜溫中散。無塊痛而手足厥冷者。宜附子散。密齋用加

味理中湯。治產後霍亂。若用於塊痛已除之後。亦可。

生化六和湯 治產後塊痛未除。氣血虛損傷食。感

胎產心法

卷下 霍亂論

百

寒而霍亂吐瀉。

川芎 二錢

當歸 四錢

茯苓 一錢

砂仁 六分

乾薑

陳皮

藿香

炙草 各四分

薑一片。水煎服。

溫中散

人參 隨宜

白朮 一錢五分土炒

當歸 二錢

厚朴 八分薑製

乾薑 四分
草豆蔻 六分

茯苓 一錢

薑一片。水煎服。

附子散 治產後無塊痛。霍亂吐瀉。手足厥冷。

人參

白朮 土炒各一錢

當歸 二錢

陳皮

丁香

乾薑 各四分

附子 五分製

為末。用二錢。粥飲調下。

胎產心法

卷下 霍亂方

五

加味理中湯

人參 隨宜

白朮 一錢土炒

乾薑

陳皮 各四分

藿香

厚朴 薑製各八分

炙草 二分

生薑五片。水煎溫服。

氣逆嘔吐不食論

人之胃腑。為水穀之海。而水穀之精。化為血氣。榮潤臟腑。產後勞傷。臟腑寒邪。易乘入於腸胃。則氣逆嘔吐而不食。

也。初產宜加減生化湯。七日外宜溫胃丁香散。如咳嗽嘔逆。怔忡目眩。用石蓮散。秘書云。產後胃氣不和。嘔吐不止。全不納穀。初產香砂生化湯。塊痛止。加味香砂生化湯。又云。當分二證。立三方。如七日內。塊痛未除。當重塊。安胃行血湯。佐以溫胃藥。如七日內。曾服生化湯三四貼。血塊不痛。嘔不納穀。當服加減六和湯。又和中湯。此二方選用。如產後嘔止。或服三方。而胃和嘔止。痛止。但血氣不足。食少。宜補中和胃湯。馮氏做立齋治法云。飲食過多。六君子。加查。兼勞役。補中湯。飲食停滯。人參養胃湯。脾胃氣虛。六

胎產心法

卷下 氣逆嘔吐不食論

五

君子。胃氣虛寒。加炮薑。煨木香。寒水侮土。益黃散。肝木侮土。六君子。加升。柴。嘔吐泄瀉。手足俱冷。肚腹作痛。乃陽氣虛寒。急用附子理中湯。此內有命門火衰。不能生土而嘔吐。用八味丸一論。恐非救急之務。故摘出。密齋遵郭稽中治云。有敗血散於脾胃。脾受。則不能運化津液而成腹脹。胃受。則不能受水穀而生嘔逆。若以尋常治脹嘔之劑。則藥不對證。反增其病。用抵聖湯。若產後傷食。嘔吐脹滿。用六君子湯為主。加隨證藥治之。予謂馮氏偏於補氣。密齋用抵聖一論。泥於敗血。臨證者。似宜斟酌。○一產婦朝吐

痰夜發熱。晝夜無寐。或用清痰降火。肌體日瘦。飲食日少。前證愈甚。蓋早間吐痰。脾氣虛也。夜間發熱。肝血虛也。晝夜無寐。脾血耗也。遂用六君子湯。加味逍遙散。加味歸脾湯。以次調理而痊。

加減生化湯 治產後嘔逆不食。

川芎 一錢 當歸 四錢

炮薑 砂仁 各四分

炙草 五分

薑一片。水煎服。

胎產心法 卷下 氣逆嘔吐不食方 百四

溫胃丁香散 治產後七日外。患嘔逆不食。

人參 一錢 當歸

白朮 土炒各二錢 藿香

前胡 炮薑

丁香 陳皮

炙草 各四分

薑一片。水煎服。

石蓮散 治產後咳嗽嘔逆。怔忡目眩。

石蓮子 一兩五錢去殼 茯苓 一兩

丁香 五錢 共為細末。米飲調送。每服三錢。

香砂生化湯 治產後塊痛未除。氣逆嘔吐。

當歸 四錢 川芎 一錢

製半夏 八分 枳實 十粒。去皮尖。

炙薑 藿香

砂仁 各四分 陳皮 三分

炙草 五分

生薑一片。水煎服。

胎產心法 卷下 氣逆嘔吐不食方 百五

加味香砂生化湯 治產後塊痛已除。嘔逆不止。

當歸 二錢 川芎

白朮 土炒各一錢 製夏 八分

陳皮 三分 前胡

砂仁 藿香

炮薑 各四分 炙草 五分

生薑一片。水煎服。

安胃行血湯 治產後七日內。塊痛未除。嘔吐不止。

全不納穀。

人參 川芎 各一錢

當歸 四錢酒洗 薤仁 十粒去皮尖

砂仁 藿香

炙草 各四分

生薑一片水煎服。○一方無薤仁。○有汗不可用薑。

加減六和湯 治產後七日內曾服生化湯三四貼。

今血塊不痛但嘔不止不納穀。

人參 川芎

茯苓 各一錢 當歸 二錢

胎產心法 卷下 氣逆嘔吐不食方 芎

山藥 一錢五分炒 藿香

陳皮 各三分 白豆蔻

炙草 各四分

薑一片水煎服。○嘔止減豆蔻。○一方有炮薑 四分。

和中湯

人參 當歸

茯苓 各一錢 白朮 一錢五分土炒

扁豆 二錢 丁香

藿香 陳皮 各三分

炙草 四分

薑一片水煎服。○嘔吐止去丁香。○受寒加吳萸 一二

補中和胃湯 治產後嘔吐服前三方而胃和嘔止

塊痛止但氣血不足食少者。

人參 白朮 土炒

當歸 扁豆 各二錢

茯苓 一錢 山藥 一錢五分

炮薑 陳皮

炙草 各四分

胎產心法 卷下 氣逆嘔吐不食方 芎

水煎服。

益黃散○治脾胃虛寒水反來侮以致嘔吐不食或

肚腹作痛或大便不實手足逆冷等證。

陳皮 一兩 青皮

訶子肉 煨 炙草 各五錢

丁香 二錢

右為散每服二三錢水煎服或黑糖調服一錢。○益黃

不用補益中州反用青皮二橘辟除陳氣其旨最微此

方原為嬰兒久瀉連綿不已乳食積滯於內故需二皮

專理肝脾宿蔭。卽兼訶子。以兜瀉下脫。丁香。以溫理中。州。甘草。以和脾氣。深得瀉中寓補之法。非洞達斯義。難與言至治也。

抵聖湯 治產後敗血積於脾胃。腹脹。嘔逆。

人參

製夏

澤蘭

陳皮

赤芍 各二錢

炙草 一錢

火焙生薑三片。水煎服。○惡露過多者。去澤蘭。赤芍。倍

加陳皮。生薑。予謂陳皮用二錢過當。用一錢足矣。

胎產心法

卷下

氣逆嘔吐不食方

頁

六君子湯

補中益氣湯

人參養胃湯

俱見上卷諸痛門

附子理中湯

見上卷瘧門附枳實理中湯下

呃逆論 卽吃忒又名咳逆

凡病呃逆者。乃逆氣使然。蓋此氣從胃中出。上衝噴門。吃

忒而作聲也。有胃氣虛寒者。有中氣大虛。衝任之火直犯

清道而上者。有飲水過多。水停而逆者。有大小便閉。下焦

不通。其氣上逆者。有胃絕者。至於產後呃逆。乃胃虛氣寒。

證也。有云。呃噫者。胃氣所生。宜加味理中湯主之。醫通云。

產後氣血俱虛。風冷搏氣而逆上。乃胃氣虛寒之極。最爲

惡候。理中加丁香。古方以丁香。豆蔻。伏龍肝。爲末。用菴仁。

吳黃煎湯調下一錢匙。如人行五里再服。未應。急投參附。

遲則不救。尊生治吃忒云。以可異事。或費思索事。出其不

意扣之。令其思維立止。又立羌附湯以治之。馮氏云。如中

氣大虛。下焦陰火上衝。而致呃逆者。當用桂附。乾薑之類。

加味理中湯

人參

白朮

土炒。各一錢。

胎產心法

卷下

呃逆論

呃逆方

頁

乾柿蒂 二錢

丁香

炮薑 各五分

陳皮

炙草 各八分

水煎服。○有熱。去丁香。加竹茹 二錢。○如虛羸太甚。飲

食減少呃逆者。胃絕也。難治。

羌附湯

羌活

製附子

小茴香 各五分

木香

生薑 各二分五厘

食鹽 一捻

水煎熱服立愈。

理中湯 見上卷病門

腹脹滿悶論

產後有因敗血入於脾胃。腹脹嘔吐者。已於嘔吐門中論之矣。然婦人因產脾胃多虛。飲食最易停滯而生脹悶。若產畢隨服生化湯。消其舊瘀而生其新血。瘀塊既消。便大補氣血。使脾胃健運。自無中虛脹滿之證。其產後大率因傷食而誤用消導。因氣鬱而誤專順散。或因多食冷物而停滯惡露。或因血虛大便燥結。誤下而愈脹。此蓋止知傷

胎產心法

卷下

腹脹滿悶論

厚

食當消。氣鬱當順。惡露當攻。便結當下。不知消耗愈多。胃氣大損。滿悶益增。氣不升降。積鬱之久。兼成膨脹。若再專用攻。消不死不休矣。豈知消導佐於補劑內。則脾強而所傷之食消。氣散逐瘀。佐於養血劑中。則惡露自行而大便濡潤。亦通。再考之綱目內云。飲食停於脾。六君子湯加厚朴一錢。若飲食傷於胃。宜六君子湯以補之。又云。大凡停於脾。莫妙節其飲食。自愈為善。尊生亦用加減六君子湯治之。秘書立有治脹方。並養生化滯湯二方。治產後脹證。均未敢專於消導。前人之慮。產深矣。醫通云。胎前孕婦服

安胎藥過多。或正產半產後。經一兩月惡露未淨。此非敗血之比。宜導氣行血。若用止截。誤矣。又云。飽悶惡露不行。多因血逆。宜行瘀為主。如有塊上升。飽悶欲吐者。二陳湯加薑、桂、香附、炮查、蓬朮。塊不散。積久愈堅。琥珀黑龍丹。謂審知飽悶。實因惡露不行所致。若初產。仍宜服生化湯。瘀去而飽悶自開。可無藉乎。二陳、炮查、蓬朮。恐產虛者難當耳。

治脹方 治產後腹脹。

人參 二錢

白朮 土炒

胎產心法

卷下

腹脹滿悶方

厚

當歸 各三錢

茯苓 一錢五分

川芎 七分

陳皮 四分

甘草 三分

水煎服。

養生化滯湯 治產後大便不通。誤服大黃等藥。致

成鼓脹。

人參

茯苓

川芎

白芍 炒各一錢

當歸 四錢

薤仁 十粒。去皮尖。

肉蓯蓉一錢五分酒洗去泥 大腹皮五分黑豆水製淨

陳皮四分 製香附

炙草各三分

水煎服。○如脹甚。再加人參二三錢。○常治誤用大黃多

者。服參歸至半觔以上。大便方通。腫脹漸退。

加減六君子湯 治產後腹脹。

人參 白木土炒

茯苓各一錢 陳皮六分

厚朴八分 製 砂仁

胎產心法 卷下 腹脹滿悶方 薑

炮薑各四分 炙草五分

水煎服。

生化湯 見本卷生化湯論後

六君子湯 見上卷諸痛門

二陳湯 見上卷子煩門

琥珀黑龍丹 見中卷催生門

浮腫論

產後手足俱浮。皮膚間光瑩色潤。乃脾虛不能制水。腎虛不能行水也。宜大補為主。補中利水湯治之。如因寒邪濕

氣傷表無汗而腫。前湯加薑皮半夏。蘇葉或五皮散亦可。

又有由敗血乘虛停積。而循經流入四肢。留滯日深。腐壞

如水。故令面目四肢浮腫。乍寒乍熱。醫人不識。誤作水氣

治之。多用導水。凡治水藥。極能虛人。產後既虛。藥又虛之。

是謂重虛。多致天枉。如產畢隨服生化湯。化瘀生新。自無

此敗血如水之證。今既失治。宜服小調經散。則血行腫消。

密齋用調經湯。又加味五皮湯。使氣血流行。風濕消散。腫

自消矣。若水氣係肺失降下之令。其人必發咳嗽。小便澀

少。可立而辨也。如脚腫或肚腫或成鼓腫。宜濟生腎氣丸。

胎產心法 卷下 浮腫論 薑

馮氏云。產後浮腫。若寒水侮土。宜養脾肺。若氣虛浮腫。宜

益脾胃。若水氣浮腫。宜補中湯。若兼喘咳。而脈沉細無力。

此命門火衰。脾土虛寒也。八味丸主之。腹滿者。虛氣而非

血也。補中湯送八味丸。一以升補清陽。一以斂納濁氣。升

降既得。而脹滿自消矣。

補中利水湯 治產後七日外。消腫利水。

人參 白木土炒各二錢

茯苓 白芍各一錢

木瓜八分 陳皮五分

紫蘓

木通

製蒼朮

大腹皮

黑豆水製淨

厚朴

薑汁製各四分

水煎服。○如壅滿用製半夏、陳皮、製香附、監之。○虛。加

人參。○熱。加去心麥冬、炒黃芩。以清肺金。○大便不通。

加郁李仁、麻仁 各一錢。

小調經散 治產後浮腫。因敗血者。

歸身

酒洗

赤芍

桂心

各一錢

沒藥

胎產心法

卷下

浮腫方

薑

琥珀

各一分

麝香

細辛

各五厘

炙草

二分

爲末。每服五分。薑汁酒調下。

調經湯

歸身

酒洗

赤芍

丹皮

桂心

赤茯苓

陳皮

炙草

各一錢

細辛

炮薑

各五分

薑一片。水煎服。

加味五皮湯 治產後虛弱。膝理不密。調理失宜。外

受風濕。面目浮腫。四肢腫者。

桑白皮

陳皮

茯苓皮

大腹皮

黑豆水製淨

生薑皮

各一錢

漢防已

枳殼

麸炒

豬苓

各八分

炙草

五分

生薑引。水煎服。○此方重在外。受風濕四字。故用此滲

胎產心法

卷下

浮腫方

薑

利之劑。

五皮散

見本卷痢滯門

生化湯

見本卷生化湯論後

濟生腎氣丸

見上卷諸痛門附六味地黃湯下

補中益氣湯

見上卷諸痛門

八味地黃丸

見上卷諸痛門附六味地黃湯下

咳嗽論

產後七日內外。感風寒咳嗽。鼻塞聲重。惡寒者。只服生化湯自愈。內有芎藭散。其邪也。或於生化湯中。加杏仁、桔梗。

有痰。加天花粉。又有加味生化湯。並皆治之。總不用麻黃。動汗。即嗽而脇痛。亦不用柴胡。伐肝。因其內虛耳。醫通用桔梗湯。加葱白。香豉。生薑。或用小健中湯。且又能治風木乘脾而嗽。至於產後久嗽。宜加味甘桔湯主之。尊生用桑貝芎歸清肺湯。治產後咳嗽甚效。馮氏並綱目書云。產後咳嗽。悉屬胃氣不足。胃為五臟之本。胃氣一虛。五臟失所。百病生焉。雖謂肺主皮毛。腠理不密所致。不知肺屬辛金。生於巳土。亦因土虛不能生金。所以腠理不密。外邪易感。其陰火上炎者。宜壯土以生金。滋水以制火。若不補虛。見胎產心法

卷下 咳嗽論

頁

證治標則誤矣。按壯土生金。異功散也。滋水制火。地黃丸也。故醫通治產後虛嗽。有用異功散。去木。加山藥。細辛。桂枝之方。陰虛感客邪。六味丸。去萸。加桂枝。細辛。陰虛水不制火而嗽。六味丸。加麥冬。五味。等方也。然又有乾嗽。內熱。桔梗湯。加萎蕤。麥冬。丹皮。蜜煎薑橘之類。蓋乾嗽一證。有小兒食乳。易治。無則成勞。產後食鹽醯太早者。難治。須待再產月內。切記運用。更宜少用。方可望愈。密齋云。產後多因惡露上攻。流入肺經。乃成咳嗽。其證胸膈脹悶。宜服二母湯。按二母性涼。豈能治惡露上攻。人參補氣。又何能療。

惡露流入肺經之嗽。雖立齋將杏仁。杏仁加倍以瀉肺導痰。然予終不敢妄於用也。若果痰入肺經。即衝肺證矣。當不止於發嗽胸膈已耳。

加味生化湯 治產後感風寒咳嗽。鼻塞聲重。

當歸 二錢五分 川芎 一錢

杏仁 十粒。去皮尖。 炮薑

桔梗 炙草 各四分

知母 八分。酒炒。

薑一片。水煎服。○有痰。加天花粉。○虛弱。有汗。嗽。加人

胎產心法 卷下 咳嗽方 頁

參一錢。○予謂此方。有知母。花粉。並用。須產久無塊痛。方可用之。

桔梗湯 即甘桔湯 治風熱。肺氣不清嗽。

桔梗 甘草 各三錢

水煎服。

加味甘桔湯 治產後嗽久不止。涕唾稠粘。

甘草 桔梗

款冬花 貝母 去心

前胡 枳殼 熬

白茯苓

五味子碎

麥冬去心、各等分

淡竹葉十五片。水煎服。

桑貝芎歸清肺湯 治產後咳嗽。

前胡

紫菀

貝母去心

桑白皮

茯苓

當歸

川芎

乾葛

紫蘓各一錢

胎產心法

卷下

咳嗽方

夏

水煎服。

異攻散 治肺胃氣虛。稀痰喘嗽。

人參

白朮土炒

茯苓各一錢

陳皮去白

炙草各六分

為散。每服三四錢。生薑煎湯調服。

二母湯 治產後惡露上攻。流入肺經咳嗽不已。

人參

貝母去心

茯苓

知母各一錢

菟仁去皮尖

杏仁去皮尖各二錢

水煎。食後服。

生化湯 見本卷生化湯論後

小建中湯 見本卷脫汗亡陽門附黃耆建中湯下

六味地黃丸 見上卷諸痛門附六味地黃湯下

淋證論

產後淋證。此亦血去陰虛。生內熱也。蓋腎為至陰。主行水道。去血過多。正陰虧損。故生內熱。小便成淋而澀痛。是以熱客於脬。虛則類數。熱則澀痛也。氣血兼熱。血入胞中。則

胎產心法

卷下

淋證論

夏

血隨小便而為血淋。但小便淋瀝。却與不通。當分別而治。不通者。屬氣虛。淋瀝屬內熱。澀痛。故密齋治淋。用知柏導赤散。調益元散治之。馮氏云。血虛熱鬱。當用六味丸。逍遙散。補陰養血。滋其化源。佐以導血藥可也。醫通云。膀胱陰虛。而小便淋瀝。生料六味合生脉散。大劑煎成。隔湯頓熱。續續進之。以滋化源。或補中益氣湯。兼服六味地黃丸。更有收生不謹。以致損胞而得淋瀝者。應用峻補。宜參朮湯。或用參朮膏。煎以猪羊胞湯。極飢時飲之。令氣血驟長。不過月餘。其胞可完。○丹溪曾治一婦。診其脉虛甚。用參耆為

君。芎歸為臣。桃仁、陳皮、茯苓為佐。煎以猪羊胞湯服之。一月而愈。又有茅根湯。並加味茅根湯。濟陰加味四物湯。俱治淋方也。附錄以備擇用。

知栢導赤散

生地 赤芍

木通 麥冬去心

黃栢 知母炒

桂心 甘草生各一錢

燈心四十九寸。水煎。調益元散二錢服。

胎產心法 卷下 淋證方 頁三

益元散一名天水散 治暑月小水不利。

滑石 六兩、水飛、甘草炙六錢、生四錢

為散。清水調服。○老人、虛人、及病後傷津。小便不利。禁

用。○加水飛辰砂一錢。名辰砂六一散。治暑月驚悸多

汗。小便瀉痛。

參朮湯 治婦人生產。穩婆誤用手指搯胞損破。以

致小便不禁。

人參 二錢五分、白朮 二錢土炒

黃耆 一錢五分蜜炙、陳皮去白

桃仁去皮尖、茯苓各一錢

炙草五分

先用猪胞。或羊胞一個。洗淨。水二盞。煮至一盞。去胞。入藥。煎七分。食前服。多劑乃佳。

茅根湯 治赤白沙石諸淋。

茅根一兩、滑石一錢煨

甘草五分、紫貝一個煨

石首魚腦沙一個焙乾研為末、闕字薑一塊

燈心三十寸。煎入魚頭末。空心溫服。

胎產心法 卷下 淋證方 頁三

加減茅根湯 治產後淋。小便痛。及血淋等證。

白茅根一兩、瞿麥

車前 冬葵子

通草各一錢、鯉魚齒一百個為末

水煎。入魚齒末。空心溫服。

濟陰加味四物湯 諸淋皆屬於熱。用此累效。

當歸 川芎

赤芍 生地

杜牛膝 木通

甘草稍 各一錢 朮 仁 五個去皮尖

滑石 一錢五分 木香 二分

水煎服。

六味地黃丸 見上卷諸痛門附六味地黃湯下

補中益氣湯 見上卷諸痛門

逍遙散 見上卷胎逆上通門

生脉散 見本卷暈厥門

參朮膏 見本卷類瘧及寒熱往來門

小便數及遺尿不禁論

胎產心法

卷下 小便數遺尿不禁論

百三

凡人下焦如瀆。所以主瀦洩也。產後氣血虛脫。瀦瀆決裂。瀦蓄不固。水泉不止。故數而遺而不禁耳。治法下者舉之。脫者澁之。宜用升陽調元湯。合桑螵蛸散。主之。醫通云。產後小便數。乃氣虛不能制水。補中益氣。加車前。茯苓。遺尿不知。補中益氣湯。然有腎氣不固者。宜六味丸。加益智。若因膀胱氣虛。小便頻數。當補脾肺。補中益氣。加山萸。山藥。為主。佐以人參。螵蛸散。如係虛寒。以致數遺。益心湯。最妙。馮氏云。小便不禁。若脾腎虛弱。補中湯。送還少丹。若脾腎虛寒。用八味丸。四神丸。佐之。然世有新產之婦。廷孔未斂。

故溺出不知。此恒有之。至六七朝。自止。不必治也。又有臨產損破尿胞遺尿者。已於前淋證門中論治矣。

升陽調元湯 治產後小便數及遺尿不禁。

人參 益智仁

黃耆 蜜炙各一錢五分 升麻

炙草 各一錢

薑棗煎。調桑螵蛸散服。○原方藥通用一錢五分。予謂

升麻炙草宜減。故各錄用一錢。

桑螵蛸散

胎產心法

卷下 小便數遺尿不禁方

百三

正桑螵蛸 炒 白龍骨 煨

牡蠣 各等分。取左顧者煨。

為細末。每服調服三錢。

人參螵蛸散 治產後陽氣虛弱。小便頻數。及遺尿。

桑螵蛸 二三十個。炒 人參 二兩

黃耆 三兩。蜜炙 鹿茸 酥炙

牡蠣 煨 赤石脂 煨

厚朴 薑汁製各二兩

右為末。每服二錢。空心粥飲調下。○外臺方無厚朴。石

脂。有甘草、生薑。

益心湯 治產後小便數。及遺尿。

益智仁 二十七粒。

為細末。每服二錢。米飲調服。

還少丹 治脾腎虛寒。血氣羸乏。不思飲食。發熱盜

汗等證。

熟地 二兩。

山藥

牛膝 酒浸。各一兩五錢。

山萸肉

茯苓 乳拌。

杜仲 薑汁炒斷絲。

胎產心法

卷下

小便數遺尿不禁方

頁四

遠志 製去心。取淨肉。

五味子 炒。

楮實子 酒蒸。

小茴香 炒。

巴戟天 酒浸。去骨。

肉蓯蓉 酒浸。洗去泥甲。各一兩。

石菖蒲 五錢。

棗肉加蜜為丸。每服三四錢。白湯。淡鹽湯。俱可送下。

補中益氣湯 見上卷諸痛門

六味丸

八味丸 俱見上卷諸痛門附六味地黃湯下

四神丸 見本卷腹痛門

募勞骨蒸論

產後去血勞傷。再加之調養失宜。所生者少。脾肺氣弱。不能運其精微。致令骨蒸勞熱。若富貴之家。雖有美食及藥力以調養。必有他事不如意。而怒動肝火。耗傷其方生之血。亦能致飲食減少。虛羸體倦。况新產之婦。原屬血虛。所生之血。無幾。一經傷耗。則陰血更虛。焉得不成內熱。骨蒸也。即蔡藿之人。不特無美食藥力滋生氣血。更兼自乳其子。則方生之血。豈能驟足。倘本質瘦弱。又焉得而不陰虛內熱。以成骨蒸也。即或本體壯盛。常見生育數胎。自為乳

胎產心法

卷下

募勞骨蒸論

頁五

哺。則面顏多有老過年歲者。即此而驗。概可知矣。是以產後易成募勞之證。故治產後虛弱。用參歸湯。作寒熱。白茯苓散。虛證雜見。成募勞者。驚甲湯。無疾覺虛。十全大補湯。又當歸羊肉湯。有治產後骨蒸。先服清骨散。後服保正湯。又有加味大造丸。亦能治骨蒸勞熱。醫通云。產後募勞。因產不順。疲極筋力。憂心勞慮。或產後將養失宜。致令虛羸喘乏。寒熱如瘧。百節煩痛。頭疼。自汗。肢體倦怠。咳嗽。痰逆。腹中絞刺。當扶正為主。六君子。加當歸。若脾肺氣虛。咳嗽口乾。異功散。加麥冬。五味。氣虛頭暈。補中益氣。倍用歸。著

肝經血虛。肢體作痛。四物加參、苓、木、桂。肝腎虛弱。自汗盜汗。往來寒熱。六味丸加五味子。脾虛血弱腹痛。月經不調。歸脾湯倍木香。血虛有熱。增損柴胡湯。骨蒸勞熱咳嗽有紅者。異功散去木。加山藥、丹皮、五味、阿膠、童便。熱而無痰。乾欬。逍遙散用蜜煎薑、橘。蜜蒸白朮。產後虛損。不時寒熱。或經一二載元神不復。月事不轉。先與千金當歸芍藥湯。後與烏骨雞丸調補。大抵此證多因脾胃虛弱。飲食減少。以致疲憊而成。當補脾胃。進飲食。則諸臟有所倚賴。病自愈矣。

胎產心法

卷下 尋勞骨蒸論

百五

參歸湯 治產後虛弱。

人參

當歸

酒浸各二錢

豬腎一個

糯米

葱白

水煎服。

白茯苓散 治產後尋勞。頭目肢體疼痛。寒熱如瘧。

人參

當歸

熟地

川芎

白芍

黃耆 蜜炙

桂心 各五分

茯苓 一錢

豬腎一個

薑棗引。水煎服。

驚甲湯 治產後虛證雜見。成尋勞。

黃耆 蜜炙

驚甲 炙各一錢

牛膝 七分酒蒸

人參

茯苓

當歸

白芍 炒

桑寄生

麥冬 去心

熟地

胎產心法

卷下 尋勞骨蒸方

百五

杏仁 去皮尖

桂心

炙草 各五分

續斷 三錢酒製取淨肉

豬腎煮汁作水。加薑棗引煎服。

當歸羊肉湯 治產後無疾覺虛。

當歸 五兩

黃耆 四兩蜜炙

生薑 六兩

肥羊肉 一觔。煮取汁煎藥。分四服。

清骨散 治骨蒸勞熱。男女皆可用。

柴胡

前胡

胡黃連

烏梅 各八分

猪骨髓 一段

韭白 十根

水煎成。入猪胆汁少許服。○一方將藥為末。猪髓一錢。

猪胆汁 一個。韭白同搗為丸。菴豆大。每服三四十九。開

水食後送下。

保正湯

人參

茯苓

白朮

土炒。如咳嗽。用蜜蒸。麥冬 去心。

白芍

炒。枸杞

胎產心法

卷下 葶勞骨蒸方 頁六

生地

熟地

知母

炒。各一錢

黃耆 蜜炙

川芎

地骨皮 各八分

當歸

天冬 去心。各二錢

五味子

十粒

黃栢 六分。炒

炙草

四分

棗二枚。水煎服。亦可作丸服。○一方天冬只用一錢。無

麥冬。

加味大造丸 治骨蒸勞熱。如服保正湯。不須服此。

人參

當歸 酒浸

山藥

黃栢 炒

枸杞子

各一兩

麥冬 去心

石斛

各八錢

生地 二兩

柴胡

六錢

胡黃連 五錢

紫河車

一具。水洗淨。白酒蒸。

另將麥冬。地黃。先搗如泥。紫河車蒸熟。亦另搗。後入諸

藥於河車。麥冬。地黃內。同搗為丸。如焙乾。河車為末。則

煉蜜為丸亦可。

胎產心法

卷下 葶勞骨蒸方 頁六

增損柴胡湯

治少陽血虛。寒熱不止。

人參

川芎

芍藥

炙草 各一錢

柴胡

梨半夏 各二錢

陳皮

八分

薑五片。大棗四枚。水煎服。

千金當歸芍藥湯

治產後煩滿不安。

人參

芍藥 炒

麥冬

去心

乾地黃 各一錢

當歸 一錢五分 桂心 四分

粳米 一撮 生薑 三片 去核大棗三枚 水煎服。

烏骨鷄丸 治婦人鬱結不舒 蒸熱咳嗽 月事不調

或久閉不行 或倒經血溢於上 或產後蓐勞 或崩

淋不止 及帶下赤白 白淫諸證 兼療男子斷喪太

早 勞嗽吐紅 或虛損者。

烏骨鷄 一隻 取白絲毛者方可用 男用雌 女用雄 揀嫩長

者 溺倒泡去毛 竹刀剖脇出胎肝 去穢 留內金 並

去腸 胎仍入腹內

熟地 四兩 如血熱加生地 北五味 一兩 碎

胎產心法 卷下 蓐勞骨蒸方 厚

上二味入鷄腹內 用陳酒 或酒娘 童便 各二碗 水數碗

於砂鍋內 旋煮 旋添 糜爛汁盡

棉黃耆 三兩 去皮 蜜酒拌炙 於木 三兩 飯上蒸九次

白茯苓 去皮淨 歸身 酒洗

白芍 酒炒 各二兩

右五味 預為粗末 同鷄肉搗爛 焙乾 骨用酥炙 共為細

末 入下項藥

人參 三兩 虛甚 加至六兩 川芎 一兩 童便浸切晒

牡丹皮 二兩 酒浸 勿炒

右三味 各為細末 和前藥中 另用乾山藥末六兩 打糊

衆手丸 或晒乾 勿令餒 磁磧收貯 清晨人參湯 或沸湯

送下三錢 卧時醇酒再服二錢 大便實者 煉白蜜為丸

亦可 〇骨蒸 加炙九肋鱉甲 三兩 銀柴胡 地骨皮 各一

兩五錢 〇經閉 加肉桂 一兩 〇崩漏下血 倍熟地 加正

阿膠 二兩 〇倒經血溢 加去心麥冬 二兩 〇鬱結痞悶

加童便製香附 二兩 沉香 五錢 〇赤白帶下 加正川草

薤 二兩 四製香附 二兩 蘄艾 一兩 〇白淫 倍用參 著 芥

木 〇按烏骨鷄丸 諸藥皆尋常而無奇處 治調經最驗

胎產心法 卷下 蓐勞骨蒸方 厚

蓋鷄屬巽 補肝 猶妙在烏骨益腎 變與歸坎 甲癸同源

兼滋衝任也

十全大補湯 見上卷胎不長養門

異功散 見本卷咳嗽門

六君子湯

補中益氣湯 俱見上卷諸痛門

六味地黃丸 見上卷諸痛門附六味地黃湯下

四物湯 見上卷安胎門

歸脾湯 見上卷胞漏小產門

兼內熱加黃芩、去心麥冬 各一錢。

加味腎氣湯

見上卷諸痛門附六味湯下照九方澤分兩作湯劑煎服

四君子湯

見上卷胎逆上通門

月水不通論

產後月水不通者不必藥也。婦人衝任之脈為經絡之海。皆起胞內。手太陽、手少陰、二經上為乳汁。下為月水。若產後去血過多。常有月水不通。若乳子者半歲一歲之內。月經不行。此猶常候。若半歲左右便行。是必少壯血盛之人。若產後一二年。月經不通。無他疾苦。亦不必服通經之藥。

胎產心法

卷下

胎水不通論並方

夏

蓋因勞傷。榮衛衝任。脈虛氣血衰少耳。但服健脾胃及滋補氣血之藥。自然通行。若強通之。是猶掘苗者也。

癰疽論

新產半月左右。忽發癰腫於四肢胸腹者。是敗血不盡。流滯經絡。或氣血虛弱。榮衛逆者。則平塌散漫。而脈者。則焮腫赤痛。而脈弦洪有力。當補血行血之中。佐以導瘀疎氣為主。如氣血虛弱。榮衛逆者。則平塌散漫。而脈虛微無力。當大補氣血為主。如十全八珍之屬。以固本元。扶胃氣。氣壯血和。其毒自解。若以毒治。而用清涼解毒。勢

必不膿不潰。變成壞證矣。

乳少無乳並乳汁自出論

產婦衝任血旺。脾胃氣壯。則乳足而濃。乃生化之源。旺也。如無他證。但少乳。是氣血滯。用行氣下乳湯。若脾胃氣弱。飲食少進。衝任素虧。其人面必黃色。則乳少而薄。所乳之子。亦怯弱而多病。務服滋養氣血兼通利之劑。宜十全大補湯。加紅花五分。或四物湯。加茯苓、花粉、甘草。王不留行、麥冬、漏蘆、穿山甲、通草、猪蹄汁煎服。如既服通利之藥。亦無大效。仍然乳少。係此婦氣血虧甚。津液短少。何以為乳。

胎產心法

卷下

癰疽論無乳乳汁自出論夏

須另覓乳母可耳。至於選乳母之法。擇其人肥瘦適中。無病經調善食者佳。太肥則多痰。太瘦則多火。兒飲其乳。亦復如是。且人乳原無定性。隨飲食性氣而變。故飲食之調攝。乳母又不可不慎也。但凡乳汁。須要驗其濃白光彩。入蓋中。上面瑩然如玉為上。黃色清薄為下。不可使之哺兒也。至於產後乳汁不行。身體壯熱。頭目昏痛。或乳下發熱身痛。玉露散主之。世有產婦氣血旺而壅滯不行者。法當疏而通之。生化湯。加木香、青皮、白芷、花粉、穿山甲煎服。又有用麥冬、瓜蒌仁、天花粉、人參、葵子、豬胰、木通、漏蘆、猪蹄

之類。養食。而乳行矣。再考全書內。治肥盛婦人。痰氣壅結。乳汁不行。用漏蘆湯利之。至於血氣虛。而燥澁阻滯不行者。宜十全八珍之類。補其虛而自行。全書內有猪蹄湯二方。治氣血不足。乳汁不行。如脾虛。飲食少無乳。宜香砂四君子湯。若乳將至而未得通暢者。宜猪蹄羹。湧泉散。若夫乳汁自出者。乃陽明胃氣不固。亦宜八珍。或十全補之。若陽明血熱而溢者。宜保險煎。或四君子。加枝子。若肝經怒火上衝。乳脹而溢者。宜加減一陰煎。若乳多脹滿而溢者。不必服藥。宜溫帛熨而散之。若未產而乳自出。謂之乳泣。

胎產心法

卷下

乳少無乳

頁

生子多不育。若產婦勞役。乳汁湧下。此陽氣虛。而厥也。獨參湯主之。

行氣下乳湯 治產婦氣血滯。無他證。但少乳。

生地

當歸

川芎 各一錢

白朮 土炒

茯苓 各六分

製香附

陳皮

紅花 各五分

穿山甲 三片 炒

木香 二分

水酒各半煎服。

王露散 治乳汁不行。身體壯熱。頭目暈痛。屬虛者。

人參

茯苓

當歸

白芍 炒

桔梗 各一錢

川芎

柴胡

炙草 各六分

水煎服。○準繩及全書。俱無柴胡。有白芷一錢。參、苓、歸、草、各五分。炒白芍七分。桔梗、川芎、各一錢。

漏蘆湯 治產婦肥盛。脈氣壅結。乳少。

漏蘆 一兩

蛇退 一條

胎產心法

卷下

乳少無乳

頁

土瓜根

共為末。酒調下二錢。○此方峻厲。不宜用。錄之以備參考耳。

猪蹄湯 治產婦氣血不足。乳汁不下。

用八珍湯料。加炙黃耆、漏蘆、陳皮、木通。先用猪蹄一付。煮汁二碗。煎藥服之。○或加天花粉。

又方

川芎 一兩

通草 二兩

甘草 一錢

川山甲 十四片 炒

用猪蹄一副。洗切。入水六碗。同藥煎至三碗。加葱薑鹽料。取汁飲之。助其氣血。乳汁自下。夏月不可失蓋。時用葱湯洗乳為佳。忌生冷食物。

香砂四君子湯 治產婦脾虛。食少無乳。

人參

白朮 土炒

茯苓

麥冬 去心。各八分。

當歸 一錢

陳皮

製香附

砂仁

紅花

炙草 各四分

胎產心法

卷下

瀉砂煎乳

夏

水煎服。

通草猪蹄羹

猪蹄 一隻

通草 四兩

水煮去一半。飲湯。兼服湧泉散即通。

湧泉散

王不留行

瞿麥

麥冬

龍骨 煨

穿山甲

炒。各等分。

右為末。每服一錢。熱酒調下。飲猪蹄羹少許。以油木梳

在兩乳上梳二三十梳。日二服。俱如前梳法即通。○一方無穿山甲。用猪蹄汁一碗。酒一杯。煎服。以木梳於乳上照前法梳之。

加減一陰煎 治水虧火勝。

生地

白芍 炒

麥冬

去心。各二錢

熟地 三五錢

知母 炒

地骨皮 各一錢

炙草

五七分

水煎服。

胎產心法

卷下

瀉砂煎乳

夏

獨參湯 治產後乳汁湧下。

人參

隨證多少用之。

水煎濃湯。作茶飲。

十全大補湯 見上卷胎不長養門

四物湯 見上卷安胎門

生化湯 見本卷生化湯論後

八珍湯 見上卷諸痛門

保陰煎 見本卷惡露不止門

四君子湯 見上卷胎逆上逼門

妒乳吹乳乳癰論

產後妒乳。因無子食乳。蓄結作脹。或婦人血氣方盛。乳房作脹。以致腫痛。增寒發熱。若不以手捏去乳汁。及令人吮通之。必致成癰。四物湯調炒麥芽二兩煎服立消。予謂麥芽過多傷胃。若用三錢亦足矣。又婦人乳頭生小淺熱瘡。搔之黃汁出。亦為妒乳。以搗樹皮煎洗。或天麻草煎洗。至於吹乳之證。有內吹。外吹。上逆。下順之異。總屬胆胃二經。熱毒氣血凝滯。內吹者。胎熱也。外吹者。因兒食乳為口氣所吹也。俱令乳汁不通。壅結腫痛。不急治之。多成癰腫。速胎產心法

卷下 妒乳吹乳乳癰論 夏

服瓜萋散。外以南星末。溫湯調敷。更以手揉散之。勢甚者。惟連翹金貝煎最妙。正宗用橘葉散。治內外吹乳。醫通云。吹乳初起。作寒熱。即服加味逍遙散。加瓜萋霜散之。尊生治慣吹乳。用清肝解鬱湯。又立治吹乳三方。分別初起身熱。結腫施治。至於乳癰一證。即吹乳不散。久積成癰。又云。輕為妒乳。重為乳癰。亦胆胃二腑熱毒氣血壅滯而成。勢甚有餘者。宜先以連翹金貝煎治之。甚妙。如初起腫痛。肉色焮赤。或發寒熱。或增寒頭痛。煩渴引飲。尚未成癰時。於人參敗毒散。加味逍遙散。神效。瓜萋散。選擇治之。腫自消。

胎產心法 卷下

散。若至數日。膿成潰。穢膿湧出。膿盡自愈。予治吹乳。結乳。乳癰等證。立消毒飲二方。外用槐艾洗法。通治乳證。效過多人。又瓜萋貝母飲亦效。並附於各方之後。若產婦氣血虛弱。患此等證。而誤用敗毒。久不收斂。膿清脉大。則難治。醫通云。膿清脉大。非大劑開鬱理氣。溫補氣血。不能收功也。

瓜萋散 治吹乳腫痛。

瓜萋 一個打碎 乳香 二錢

用酒煎服。○外用南星末。溫湯調塗。

胎產心法 卷下 妒乳吹乳乳癰方 夏

連翹金貝煎 治陽分癰毒。或在臟腑肺膈胸乳之間者。此方最佳。甚者。連用數服。無有不愈。

金銀花 土貝母 去心

蒲公英 夏枯草 各三錢

紅藤 七八錢 連翹 一兩。或五七錢。去心

用好酒二碗。煎一碗服。服後。煖卧片時。○不能飲者。酒水各半煎之。○火盛煩渴。乳腫者。加天花粉。○若陽毒內熱。或在頭項之間者。水煎亦可。

橘葉散 治婦人有孕。胎熱為內吹。有兒食乳為外

吹致乳結成腫痛。寒熱交作。甚者嘔惡。並治之。

柴胡 陳皮

川芎 山梔炒

青皮 石膏煨

黃芩炒 連翹去心

甘草各一錢 橘葉二十片

水二鍾。煎八分。食遠服。渣再煎服。

清肝解鬱湯 治慣吹乳。

熟地 茯苓

胎產心法 卷下 妒乳吹乳乳癰方 夏

白芍炒 貝母去心

枝子炒 當歸各一錢

柴胡 丹皮

川芎 陳皮各六分

甘草五分

水煎服。○虛。加入參、白朮。

曾生治吹乳初起一。

當歸 貝母去心

白芷稍 各一錢 花粉八分

製香附 瓜蒌仁

甘草節各六分 青皮

乳香 沒藥各五分

穿山甲一錢炒 川芎四分

水酒煎二服。

曾生治吹乳身熱二。

羌活 獨活

前胡 柴胡

枳殼炒 桔梗

胎產心法 卷下 妒乳吹乳乳癰方 夏

貝母去心 白芷

青皮 當歸

穿山甲炒各等分

水煎服。

曾生治吹乳已結腫三。

陳皮 牛蒡子

山梔炒 忍冬

甘草 瓜蒌

黃芩 花粉

連翹 去心

皂角刺 各一錢

柴胡

青皮 各五分

煎服。○內熱加石膏。○予謂皂角刺不宜用一錢。用四五分足矣。

人參敗毒散 又名敗毒散 治四時傷寒、瘟疫、憎寒壯

熱、風濕、風眩、項強、身體疼痛、嶺南烟障之地、疫癘

時行、或卑濕脚氣、痿弱等證。

人參

茯苓

枳殼 炒

川芎

胎產心法

卷下 妒乳吹乳乳癰方 薑

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

甘草 各等分

水一鍾半。薑三片。煎服。或為細末。沸湯點服。

神效瓜蒌散 治乳癰。及一切癰疽初起。腫痛即消。

膿成即潰。膿出即愈。治癰之方甚多。獨此方神效。

療癰瘡毒猶效。凡一切癰疽餘毒。皆宜用之。

瓜蒌

當歸 酒洗

生粉草

乳香

沒藥 各一錢。曾生乳沒。各二錢五分。

右用酒煎服。良久再服。如不能飲。以酒水各半煎之。如數劑不效。宜以補氣血之藥兼服之。○若肝經血虛。結核不消。佐以四物。柴胡、升麻、白朮、茯苓。○若肝脾氣血虛弱。佐以四君。芍藥、柴胡、升麻。○若憂鬱傷脾。氣血虧損。佐以歸脾湯。

消毒飲 專治乳房。或乳頂黑量之內。腫毒未破。發

熱惡寒。瘡處或痛。或不痛。或麻木。服之即消。

蒲公英

紫花地丁 各一錢二分

胎產心法

卷下 妒乳吹乳乳癰方 薑

當歸 酒洗

白芍 醋炒

赤芍

丹皮

地骨皮

天花粉 各一錢

陳皮 八分

生草 三分

燈心五十寸。水三鍾。煎一鍾。食後服。仍以槐艾水。不時

洗之。

定痛消毒飲 治乳頂傍。或乳房。吹乳成癰。並乳結

之證。發熱惡寒。冷汗自出。勢欲破而疼痛難忍。服

之。即出膿痛定。

蒲公英 紫花地下 各一錢二分

當歸 乳房用身乳頂用尾 白芍 醋炒

赤芍 花粉

浙貝母 去心研各一錢 皂角刺 七分或五分

柴胡 稍用之若乳房易白芷 牡丹皮

廣皮 各八分 明乳香

沒藥 各五分 生草 三分

紅棗二枚去核燈心五十寸水三鍾煎八分臨服加無灰酒小半酒杯入藥滾數滾服之不時用槐艾水洗

胎產心法 卷下 妒乳吹乳乳癰方 頁

槐艾洗法 治產婦乳上結核乳癰

槐條 艾葉 不拘多少

連鬚慈一條將槐艾用水同煎入醋少許頻頻洗之若乳頂傍生瘡膿出洗淨與兒吮之隨以松蘿茶葉末滲上

瓜蒞貝母飲 治乳房結核癰腫

瓜蒞實 土貝母 去心

甘草節 各三錢

煎服效已潰加忍冬一兩佳

四物湯 見上卷安胎門

加味逍遙散 見上卷胎逆上通門附逍遙散下

乳巖論

婦人乳巖一證原非產後之病但乳巖乳癰皆瘡生乳房治此證者混同施治誤世不小不得不分別論明也其乳癰起於吹乳之一時非同乳巖由氣血虧損於數載始因婦女或不得意於翁姑夫婿或諸事憂慮鬱遏致肝脾二臟久鬱而成初起小核結於乳內肉色如故如圍棋子大不痛不癢十數年後方成瘡患爛見肺腑不可治矣故初

胎產心法 卷下 乳巖論 頁

起之時其人內熱夜熱五心煩熱肢體倦瘦月經不調宜早為治療益氣養榮湯加味逍遙散多服漸散氣虛必大劑人參專心久服其核漸消若服攻堅解毒傷其正氣必致潰敗多有數年不潰者最危潰則不治周季芝云乳癰乳巖結鞭未潰以活鯽魚同生山藥搗爛入麝香少許塗塊上覺癢極勿搔動隔衣輕輕揉之七日一塗旋塗漸消若荏苒歲月以致潰腐漸大類巖色赤出水深洞臭穢用歸脾湯等藥可延歲月若誤用攻伐危殆迫矣曾見一婦乳房結核如杯數年諸治不效因血崩後日服人參兩許

月餘。參盡二觔。乳核霍然。此證有月經者。尚輕。如五、六、十、歲無經者。不可輕易看也。

益氣養榮湯 治療癰結核流注。一切鬱熱毒氣。

人參 白木 土炒

茯苓 各一錢 當歸 二錢

川芎 白芍 酒炒各八分

熟地 二三錢 黃耆 蜜炙一錢五分

桔梗 一錢或八分 貝母 去心一錢二分

香附 七八分 橘皮

胎產心法 卷下 乳巖方 乳懸論附方真

炙草 各五分

生薑引水煎服。

加味逍遙散 見上卷胎逆上逼門附逍遙散下

歸脾湯 見上卷胞漏小產門

乳懸論 附方

產後瘀血上攻。忽兩乳伸長。細小如腸。直過小腹。痛不可忍。名曰乳懸。乃危證也。速用川芎、當歸各一觔。水煎濃湯。不時溫服。再用二觔。逐旋燒烟。安在病人面前。棹子下。令病人屈身低頭。將口鼻及病乳常吸烟氣。如未甚縮。再用

一料。則瘀血消。而乳頭自復矣。若更不復舊。用草麻子搗爛。貼頂上片時。收即洗去。

前陰諸證論

產門不閉。如無腫痛。或腫既消而不閉者。此氣血虛不能收。攝以十全大補湯服數貼。再用補中益氣湯加五味子治之。或以補中益氣湯加製半夏、茯苓以健脾。使元氣復而諸疾自愈。或以硫黃湯外洗。又欵官方治子宮不欵甚效。

產後陰戶脫下。乃元氣不足。及陰挺突出。腫痛。清水淋漓。

胎產心法 卷下 前陰諸證論 真

者。用八珍湯加炙黃耆、防風、升麻各五分。即收。或用補中

益氣。加醋炒白芍一錢。五味子十粒。或易酒炒白芍一錢

肉桂五分。補而舉之亦可。兼以硫黃散外治之。又有熨陰

洗陰法。錄後備用。

產門腫痛。因臟中風冷者。當歸湯洗之。

產後陰挺。陰菌。諸蟲痛癢。蓋因婦人七情鬱火。傷損肝脾。濕熱下注。故有陰中舒出如蛇。俗呼陰挺。有翻突如餅。俗呼陰菌。亦有如鷄冠。如鼠乳。亦有生諸蟲。腫痛濕癢。潰爛出水。脹悶脫墜者。其內證口乾。內熱體熱。飲食無味。晡熱

發熱胸膈不利。小腹痞脹。赤白帶下。小水淋瀝。其治法如氣虛。十全大補。加五味子。倍參桂。補而飲之。初產腫脹痛而熱者。宜加味逍遙散。或逍遙散加荆芥。牡丹皮。如產久則於雜證同治法。用四物湯。加柴胡。山枝。丹皮。胆草。濕癢者。歸脾湯。加山枝。柴胡。丹皮。淋瀝者。龍胆瀉肝湯。加白木。丹皮。潰腐者。加味逍遙散。腫悶脫墜者。補中益氣。加山枝。丹皮。以上諸證。均可佐以外治之法。如硫黃湯。熨陰。洗陰諸方。選而用之。

產後子腸不收。宜用收腸方收之。神應丹。收腸甚捷。

胎產心法 卷下 前陰諸證論 辜

產後陰戶中生小瘡。形如痂子。名曰隱瘡。或痛癢如蟲行狀。膿汁淋漓。用療蝕方。椒湯。肉汁。金銀散。殺蟲硫黃散。等方選用。

硫黃湯 治產後玉門開而不閉。及陰戶突出。

硫黃 三錢 吳茱萸

兔絲子 各二錢 蛇床子 一錢五分

右研勻。水一碗。煎湯。類洗自收。

欽宮方 治子宮不斂。

荆芥 藿香

椿根白皮

煎湯薰洗神效。

硫黃散 治產後陽氣虛寒。玉門不閉。

硫黃 烏賊骨 各五錢

五味子 一錢

右為末。搽患處。日三易。

熨陰洗陰法 治陰腫。陰痛。陰脫。

用蛇床子不拘多少。炒極熱。以絹袋盛。或布裏。熨患處。○

又法。用蛇床子 五兩。烏梅 十四個。煎水。日洗五六次。

胎產心法 卷下 前陰諸證方 辜

當歸湯 治產後臟中風冷。陰腫痛。

當歸 獨活

白芷 地榆

礬石 敗醬

煎水適寒煖洗陰。自愈。○千金不用敗醬。

且瀉肝湯 治肝經濕熱。腋脇滿痛。小便赤澀。

初稍 澤瀉 各一錢五分

車前 木通

當歸稍 草龍胆 各八分

生地 二錢 生薑 三片

水煎。食遠熱服。更以美膳壓之。○此本導赤散加柴胡、
胆草之屬。入肝以瀉濕熱也。

月方 治子腸不收。

枳殼 訶子

五倍子 白礬

煎湯熏洗。若不收。再炙頂心百會穴數壯。即上。

又收腸方

凡遇生腸不收。以鐵秀水潤腸上。用堪輿家正磁石 一錢。

胎產心法 卷下 前陰諸證方 薑

研末。酒服。腸即收矣。

千金療蝕方 治隱瘡。

芎藭 當歸

芍藥 地榆

甘草 各等分。

一升。煮至二升。去渣。熱熏。溫洗。日三夜一。即愈。

椒湯治法 治陰中小碎瘡。如癩子。痒不可當。

胡椒 二十一粒。

煎湯洗之自愈。

肉汁治法 治陰戶內瘡。

用猪肉十觔。水煮。取肉汁一半。浸瘡。冷。再頓熱浸之。不過
兩次即愈。

殺陰戶內瘡蟲。

蒲黃 一升 水銀 一兩

二味研勻細末。用以搽瘡即愈。○此方不可輕用。

殺蟲硫黃散 治疳蟲蝕下部五臟。

硫黃研為細末。取東南桃樹枝五七枝。輕打頭使散。以綿

纏粘末。令少厚。又截一竹筒。先內下部中。仍以所搽藥桃

胎產心法 卷下 前陰諸證方 薑

枝。燒着薰之。

十全大補湯 見上卷胎不長養門

補中益氣湯

八珍湯 俱見上卷諸痛門

加味逍遙散 見上卷胎逆上逼門附逍遙散下

四物湯 見上卷安胎門

歸脾湯 見上卷胎漏小產門

神應丹 見中卷催生門

據上海圖書館藏清咸豐八年刻本影印原書版框高一九〇毫米寬二六六毫米

增廣大生要旨

〔清〕

唐千頃撰
葉灝增訂

增廣大生要旨序



言醫之書甚多而莫難於婦人科
婦人科醫書亦甚多而莫難於胎
產夫婦居室天地生人自然之理本
無所為難也特以人之賦稟有厚薄
強弱之不同血氣有虛實寒熱之各

異醫之者苟非目標達本竟委窮
源審其病之所在酌其藥之所主而
歸於的當鮮有不貽誤者大生要旨
一書為我邑唐桐園先生所纂著錄
板行世已久其中列種子胎前臨盆產
後四門酌選古方緊要皆切而穩簡而

明藥到回春以仰體天地大生之德

功莫大焉惜其版散失無存古婁葉
君雅仰仁心好善夙究岐黃其家世
藏婦科胎產諸方悉至精且當保命
衛生歷驗實有明徵者因即唐氏所
輯而增廣之至保嬰諸方俱選經驗

必效者而尤莫要於出痘故以稀痘種
痘為最穩種痘之方舊板亦失雅仰
尚須精選續刻以壽世先以此乞序於
余并附刻余所作種痘之序於後余
故不揣冒昧謹綴數言以推廣大生
之旨云尔

咸豐八年人日

海上翼雲江駕鵬謹識



三

松郡華署東
穆瑞釗刻印

增廣大生要旨序

大生要旨一書吾邑名宿唐桐園先生輯以壽世者也書凡五卷合婦科產科而一之使未生者保生將生者遂生已生者

全生體天地好生之心以生之不息窮生之不息誠哉其為大生也
是書板久漶漫近且失傳不可輯但古方如新出休寧汪氏產科心法脈藥各條闕而不備其他家

傳秘方無論矣雲間葉君雅卿
窮究刀圭六氣五味均有心得念
胎產一門母子命懸呼吸不容稍
緩須臾也爰取原書考以心法
及秘方數則增廣成編錄以示余

余謂古來方書如孫思邈千金方
蘇沈良方按籍而稽或核之不下
以故仲景稱醫聖所著方猶待
後人考酌而行之運用在心醫性
固不殊兵法也然獨至保產保嬰

又不可不遵古法何則天地生萬物
物生而家稱而養皆亘古及今不
變之理無所矯揉造作於其間但
以體質不同感受得異寒熱溫涼
隨方以補攝之要在得乎中和位

育而心醫者苟師心自用庸術妄投
以性命為嘗試則固是書之罪人也
願余又有說焉生民詩曰誕彌厥月
先生如達夫物類之生其不忤不副
無害無害皆是也何物於達比

之蓋羊性善又號乳者也至於巢
窠之類雖未必皆胎生殯卵生強
願生而無異不生則亦非天地所
樂得而生者也今以人之生也而曰
逆產則非順氣曰難產則非易產

四

究其非順非易之故也亦有性成巢
窠而大異於達者與此又天下之生
者當先慎之勿以醫方之不效而
自昧乎民之初生之存也是為序
咸豐八年歲次戊午重陽前之日

臨門李鍾瀚



五

大生要旨一書爲世所珍久矣顧胎產各症間有未備方藥者令人不能無憾夫生育一事比戶有之順者固無煩醫藥設逢險逆刹那之頃兩命所係苟不速爲補救曷能母子兩全而窮鄉僻壤間延醫動至數里往返俄延鮮不敗事一爲設想不禁悚然爰集休甯汪樸齋先生名所著產科心法及家藏胎產各方附列大生要旨中名之曰增廣大生要旨付諸手民苟家置一編平時習閱則臨期可按症施治亦未始非生育之一助也猥以謏陋見聞未廣恐掛漏尙多倘

高明君子有以匡余不逮而 賜教焉幸甚

增廣大生要旨 自序

咸豐八年歲在戊午孟夏 雙縣葉瀨雅卿氏識

大生要旨原序

天地之大德曰生人者天地之心也自帝王卿相下逮一命之士編戶之民鈞是人卽鈞是心莫不以好生爲念而况人之始生兒命所關卽母命所係其所爲維持調護者更不可不周且詳也往者修善之家刊達生編保產機要等書世多有之而相沿襲刻未曉醫理其中不無舛誤且止及臨盆一節而於統前徹後凡得子之道育嬰之方則缺焉未備有心者每以爲憾同邑唐君桐園儒而醫者也其先封王父上采公精岐黃術以藥濟人行誼著通志孝義邑志獨行中尊人仁巖先生余之表母舅也明經碩望

增廣大生要旨 原序

秉鐸白門都人士翕然宗之居鄉居官咸能矜恤單寒至今猶感道不衰蹟亦具於邑乘君稟承世德學有淵源更師事邑之名醫王協中先生同遊講貫精通靈素百家今三折肱矣著有內經註疏傷寒論註疏脈燈諸書義博帙繁剞劂尙需歲月而彙輯大生要旨一編分種子胎前臨盆產後保嬰五卷參用舊說間出新裁視向來諸本務折衷於十全而無弊縉紳仁者見而寶之其勳付梓會子荷

天子寵命巡撫黔中赴江蘇

行在所請

訓便假旋里得快讀斯編見其言簡而意該列明而義舉防於

未至拯於將危所附諸方一一斟酌精審在富室固可奉
行卽貧家亦可遵守至荒村僻壤急遠倉皇之際罔不可
檢閱以知保護因以歎是書之用心足補造化所不及而
爲功至鉅且遠也語云不爲良相卽爲良醫君真今之國
手乎播諸遐邇全活必多卽謂能體乾之大生坤之廣生
也可乾隆二十七年喬光烈潤齋氏序

增廣大生要旨

原序

二十

產科心法自序

醫之一道爲司命之司原非容易但能存心濟人博考羣
書臨症體察以人性命爲重雖未能有聖賢之學而虛實
寒熱表裏陰陽辨釋明白用藥得當自不致於誤人而胎
產一科尤宜謹慎守法略一錯悞則胎不保甚至產母亦
傷能無怨乎至於產後總屬氣血空虛丹溪先生云雖有
他症以未治之此誠千古格言自當遵前賢制方選用斷
不可以杜撰悞人如無憂散佛手散生化湯之類千古不
磨毋庸苟且每見今人醫產全不合法一味杜撰好奇名
爲生化實非生化之意時醫蓋以專誠請來僅以古方施治不特負此一請且恐爲人看輕

增廣大生要旨

原序

三十

不得不搜索林腸另開方體厚者僥倖得愈設遇體薄者藥而卒以害人深堪痛恨禍必立至至於產後汗出須防元陽外越泄瀉卽防中氣
下脫喘急更防惡露上逆此皆產後極忌之處而產後發
熱常有之也緣下元空虛陰虛生內熱只須四物湯加童
便熱卽退也間有瘀血不行者有經風者有停滯者有蒸
乳者各審其因而藥之風感者用歸芎補血之中加黑荆
芥一味足矣蓋產時體虛百節開張腠理不固易入易出
若表其汗則元陽外越未有不死者也其停滯者只於理
脾之藥加穀芽陳皮可矣蓋脾虛則不運化宜用陽藥以
助脾溫胃卽運化矣須知產後有邪總宜補中兼消未有

消而不補之理有等初學無傳之輩放胆竟用柴芩羌防
 山查神麩之劑似治傷寒之病忘卻產後之身致輕者變
 重重者即死悞人不淺真可畏怕也况中風一症乃血虛
 者多內經謂治風先治血血行風自滅張景岳先生師其
 意發有非風之論此皆醫平人而言尚謹慎如此而况產
 後肝血空虛虛生內風更可知矣夫天地有好生之德吾
 儕可不慎重於斯而以人性命為兒戲哉子每見而憫焉
 因產科心法纂選成書此吾數十年來用之效驗悟於心
 而應於手且簡而不繁俾產家觀之為準繩則性命得以
 安全醫家一有準繩則舉手無錯悞矣乾隆四十五年休

增廣大生要旨

甯樸齋汪詒序

原序

四

增廣大生要旨目錄

卷一

種子

論 種子方法 保胎論 女服加味地黃丸 正元

丹 坤厚資生丸 玉鑰啟榮丸 百子建中丸 神

效墨附丸 續嗣降生丹 男服還少丹 大補陰丸

千金種子丹 聚精丸 五子衍宗丸 延年益嗣

丹 寒谷春生丹

卷二

胎前

增廣大生要旨

目錄

總論 驗胎 保胎 難產七因 胎前禁忌 胎前

節養六條 受胎保護 小產當慎 補母壽子安胎

飲

惡阻 二陳湯 六君子湯 竹茹湯

胎動不安 安胎飲 補中益氣湯 保胎丸

胎漏 膠艾湯 四物湯 防風黃芩丸 逍遙散

歸脾湯 八珍湯

子煩 犀角散 淡竹葉湯 香砂六君湯

子懸 紫蘇飲

子眩

子癰 <small>又名子冒</small>	四物加芩連姜夏湯	羚羊角散	理中湯
子癰 <small>又名子滿</small>	胎氣	木通散	葵茯苓湯
子癰 <small>又名子滿</small>	胎水	白朮散	白朮散
加味五皮飲			
子嗽 <small>又名子嘔</small>	宜胎飲	瀉白散	六味地黃湯
子瘡			
子淋	冬葵子湯	子淋散	安樂散
轉胞	三合湯	茯苓升麻湯	八味湯
臟燥 <small>又名孕悲</small>	清燥湯	大棗湯	竹茹湯
尿血	續斷湯	膠地丸	
乳泣			
增廣大生要旨 目錄 二			
胎不長	異功散	黃芪湯	白朮丸
熱病防損胎	平胃散		
妊娠傷寒	香蘇飲		
瘧疾			
泄瀉	神朮散		
痢疾	葛芍湯	香連丸	
鬼胎	雄黃丸	斬鬼丹	
吐血	加味香蘇飲	加減清胃散	
便血			
孤漿			

悞服傷胎藥			
心痛	火龍散	手拈散	
胸腹痛	當歸芍藥散		
腰痛	青娥丸		
子淋固真飲	安胎丸		
綉閣保生保產方	大安胎飲	陳皮大半夏湯	抑
青丸	安胎和氣飲	養胎飲	大安胎如聖飲
胎萬全飲	束胎調氣飲	順胎和氣飲	滑胎飲
豬脂方			
醫方考胎前要法	黃芩白朮考	砂仁葱湯	束胎
增廣大生要旨 目錄 三			
飲	達生散	安胃定胎散	保產無憂散 <small>俗名十催</small>
生諸藥說	痰鼓似胎案		
瘦胎不可服辨	滋榮易產方		
胎前十八方			
卷三			
臨盆			
總論	六字真言	或問七條	十產論
血滯難產	臨產暈絕	交骨不開	胎死腹中
胞			
衣不下	臨產宜忌		
臨產方藥	紫酒	佛手散	臨產方
催生神柞飲			

又方 八珍湯

難產醫案 加味益母丸 附胎產靈符

卷四

產後

新產宜忌

胞衣不下 失笑散 花蕊石散 牛膝散

血暈氣脫分別施治 清魂散 六君子湯

中風發瘕 愈風散 安神定志丸 歸脾湯 養心

湯

產門不閉 生化湯 八珍加味十全湯

增廣大生要旨

目錄

四

心慌自汗 歸姜棗湯 醋炭薰法

惡露不下

血崩 補中益氣湯 瑞蓮散 參附湯

子宮不收 人參乾姜湯 敷藥方 寸金散 又四

方 不語 七珍散 又方 六味地黃湯

發熱 當歸補血湯

乍寒乍熱 愈風散

霍亂

浮腫

蒸乳

乳少 通脈湯 簡易方

乳癰內吹 神效瓜蒌散 五物湯 簡易三方 香

附餅 逍遙散

狂言譫語 補心丸 定神湯 白金丸 琥珀地黃

丸 又方

心腹諸痛 二香散 理中湯 橘核丸

腹內癰 牡丹皮散 苡仁湯 排膿湯 陳皮葵根

湯 海浮湯

呃逆 橘皮竹茹湯

身痛 古拜散

增廣大生要旨

目錄

五

腰痛 獨活寄生湯 清腰湯

葶勞 白茯苓散 羊肉湯 人參鱉甲散

喘促

鼻中起黑煤 參蘇飲 貞元飲

舌黑舌枯 獨參湯

咳嗽

產後備方 增損四物湯 補脾飲 黃芪湯

產後奇病 四物湯

產後二十八症治法 倍參生化湯

五急症治法 十八危症治法 產科醫案

附安胎萬全神應湯

卷五

保嬰

總論 初生去毒 解毒開口法 開口方 先知百

勝散 生下不啼 斷臍裏臍法 臍風撮口論 清

熱順氣湯看臍帶 臍濕不乾 臍突光腫 浴兒法

藏胎衣

初生調護 小兒感冒 初生三急病 口燥 臍風 撮口 天

麻丸 定命丹 硃銀丸 又三方 辰砂膏 急救

臍風引

增廣天生素甫

目錄

木

辨臍風 辨胎黃 附揉焦諸穴圖 又四方

遍體無皮 足趾向後 週身發泡 蝦蟇瘰 陰囊

縮腹 陰囊光腫 二便不通 不小便 乳輩馬牙

疳 鵝口白屑 走馬疳 膠腫齧腫 重舌木舌弄

舌 口角流涎 兩腮腫硬 螻螂子 赤遊丹毒

夜啼 胎黃 胎驚 吐乳 變蒸 疔症 集聖丸

吃泥吃炭 吃生米吃茶葉 溺色 糞色 藥餌

宜慎

急慢驚風 急驚神方

慢驚 蕩驚湯 理中地黃湯 附子理中湯 溫中

補脾湯

四丹說 乾清散 坤靜散 交泰丹 神機丹

魁病 斷乳法 又方

稀痘 元兔丹 稀痘方 六味飲 夏秋冬三月稀

痘 附格言 耆齡培植 新增種痘說

增廣天生素甫

目錄

七

增廣大生要旨卷一

上海唐千頃桐園氏纂著

婁縣葉 灝雅卿氏增訂

種子

總論

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生此造化自然之理亦無思無爲之道也故有人道卽有夫婦有夫婦卽有子嗣人無不生育猶之山無不草木地無不黍稷然其要在得其養耳得其養則穉者以肥瘠者以沃草木黍稷何懼不蕃不秀乎人苟形質強壯而嗜欲無節久之不免虛衰豈能宜子稟賦怯薄而攝養有道終焉亦能完實何患難胎不特少健而老衰早壯而晚憊滋培保護之間固可以挽秋冬之凋殘而復春夏之花果也昔名醫羅天益云戊午春桃李始花雨雪厚寸一圍叟令舉家擊拊墮雪焚草於下是年他果蕭然而此園大熟然則天地之氣尙可以力轉移於人之身豈無所用其術哉

增廣大生要旨 卷一

求嗣之要在乎男精女血充實而無病也故男以補腎爲要女以調經爲先男子之不足則有精滑精清精冷者及臨事不堅或流而不射或夢遺頻數或便濁淋瀝或

好女色以致陰虛或好僮俊以致陽極或過於強固勝敗不治或素患陰疝肝腎乖離此外或以陽衰多寒或以陰虛多熱若此者是皆男子之病不得盡諉之婦人雖廣置姬妾徒自戕賊性命終無益也女子之不孕則有經之或先或後者有一月兩至者有兩月一至者有枯絕不通者有頻來不止者有先痛而後行者有先行而後痛者有淡色黑色紫色者有瘀而爲條爲片者有精血不充而作白帶白濁者有子宮虛冷而獨陰不成者有血中伏熱而孤陽不生者有血痕氣痞子藏不收月水不通者此皆女子之病不能育胎攝胎者也當各

增廣大生要旨 卷一

因其病而治之然精血猶爲後天渣滓有形之物而一點先天眞一之靈氣萌於情欲之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟眞篇所謂生身受氣初者是也故能滋腎調經之中而參行氣補氣之法更能養氣於平時然後一舉而孕天下之男無不父女無不母矣天地生物必有網緼之時萬物化生必有樂育之候如猫犬至微將受妊也其雌必狂呼而奔跳以網緼樂育之氣觸之而不能自止此天地之靈氣生化之眞機也世人種子有云三十時辰兩日半二十八九君須算此特言其大槩耳非的論也丹經云一月祇有一日一日止

有一時凡婦人一月行經一度必有一日細細之候於一時辰間氣蒸而熱昏而悶有欲交接不可忍之狀此的候也於此時順而施之則成胎矣其曰溫溫鉛鼎光透簾幃言其景象也當慾情濃動之時子宮內有蓮花蕊者不拘經淨幾日自然挺生陰內如蓮蕊未開洗浴下體以手探之自知也但含羞不肯言耳求子丈夫預密告之令其自言一舉即中矣蓮蕊之說極妙已屢經試驗矣

子嗣有無全在男子而世俗專主婦人此不盡然之論也易曰坤道其順乎承天而時行夫地之生物不過順承乎天則知母之生子亦不過順承乎父而已知母之順

增廣大生要旨

卷一

三

承乎父則種子者果可以婦人為主乎若以婦人為主試觀富貴之家侍妾已多其中豈無月水當期而無病者乎有已經前夫頻頻生育而娶以圖易者願亦不能得胎更遣與他人轉盼生男矣豈不能受孕於此而能受孕於彼乎所以謂子嗣主於男子不拘老少強弱不拘康甯病患不拘精易泄難泄只須清心寡慾蓋以君火在心心其君主相火在腎腎其根本也心不清靜則火由慾動而自心挑腎先心而後腎者以陽燥陰是氣從乎降而丹田失守已失元陽之本色慾若能寡則腎足而陽從地起而由腎及心先腎而後心者以水濟火

是氣主乎升而百脈齊到期成化育之真機至有既孕而小產者有產而不育者有育而不壽者有壽而黃耆無疆者皆由男子心之動靜慾之多寡分爲修短耳世人不察以小產專責之母不育專付之兒壽夭專諉之數不亦謬乎其少年生子多有羸弱慾勤而精薄也老年生子反多強壯者慾少而精全也好飲者子多不育蓋酒性慄悍火毒亂精而濕熱勝也

大寒之後必有陽春天地之道不蟄封則不發育也今人之無子者往往勤於色慾豈知施泄無度陽精必薄縱慾適情真氣乃傷妄欲得子其能孕乎夫男象天主施

增廣大生要旨

卷一

四

女象地主受一施一受其妊始成今其所施全非先天濃郁之氣不過後天澆漓渣滓之物縱使陰受可化而實無陽施之用矣故有心種子者母傷於思慮母耗其心神母意馳於外而內虛母志傷於內而外駁母以酒爲色媒母以藥物助火燥精彙神靜養日久及至陰陽交媾兩神相搏其一點先天元真之氣勃勃生育之機即寓於慾情大動之時萬舉而萬當矣內經云陰平陽秘精神乃治陰陽離決精氣乃絕老子曰必清必靜母搖爾精人鏡經曰精氣盛則生二男諺云寡慾多男子歷歷名言不特老而無子者當奉爲龜鑑即壯年難子

者亦須尊爲節符

天地之道祇貴和平太熱則陽亢太寒則陰凝陰凝肅殺人果知之陽亢消燦人都不察常見世之艱於子嗣者構覓傳方希圖種子偶見一人用之而中竟不論已之宜否而偏聽如神競相製服將宜於彼者竟謂亦宜於此矣况所編傳種子之方大抵與陽壯熱之品居多甚至煅煉金石及製取毒穢悍劣諸物炫詭矜奇但助房中之樂不顧喪身之禍深爲可愍可恨豈知種子之方本無定軌因人而藥各有其宜凡寒者溫之即種子也熱者涼之即種子也滑者澁之虛者補之去其所偏使

增廣大生要旨

卷一

五

陰陽和平而生化皆種子之法也

種子求嗣之說自古迄今言之不少其以訛傳訛近於春方採煉者姑置弗論即如道藏經以月信止後單日屬陽成男偶日屬陰成女廣嗣訣以經期方止子宮正開及時布種褚氏遺書以血裏精成男精裏血成女東垣以經斷一二日感者成男四五日感者成女丹溪以受氣於左子宮爲男受氣於右子宮爲女聖濟經以左動成男右動成女諸說紛紛或有近理或有憑虛未免穿鑿子以一言蔽之曰寡慾則有子蓋寡慾則不妄交合積氣儲精待時而動亦何求而不得歟然寡慾必先清

心心主血而藏神心有動神即外馳腎志亦隨之而

內亂歐陽永叔所謂有動乎中必搖其精也輕則夢洩白淫重則成癰發毒即幸而免其於交會之際毫無靜一清真之氣所洩之物腐濁而已安能發育長養於其間哉心爲一身之主苟能掃盡邪思自然慾寡神完不惟多子抑亦多壽養心莫善於寡慾正所謂也一說婦人單歲雙月受胎雙歲單月受胎必生男子其說頗效合之前篇運虛之說謹守寡慾之戒加以廣積陰功弄璋之慶可得也

飲食之類雖人之臟氣各有所宜似不必過於拘執惟酒多者最爲不宜蓋胎元先天之氣極宜清楚極宜充實

增廣大生要旨

卷一

六

而酒性淫熱非惟亂性亦且亂精精爲酒亂則濕熱其半真精其半耳精不充實則胎元不固精多濕熱則他日胎毒瘡癩痘疹驚風脾敗之類率已造端於混沌之初矣故凡求子者必宜先有所慎與其多飲不如少飲少飲不如不飲內遠七情外薄五味大冷大熱辛辣膩滯有毒等物一一戒謹此亦胎元之一大機也

求子交會古有擇吉日良時天德月德及四時旺相避忌丙丁幼幼新書著御女日期諸說似屬迂遠不足憑也然惟天日晴明光風霽月時和氣爽之宵自己清思清和精神閒裕不待擇而得天時之正避日月雷光之下

酒白開水服亦可服後即乾物壓之

百子建中丸 調經養血月事參差服之期年即能孕子

熟地 阿膠 蛤粉炒 蕪艾 去筋梗 川芎 去蘆 當歸 去尾 白芍

酒炒各 香附 剉兩去毛并碎水醋

右為細末煉蜜丸桐子大每服八十九丸空心以醋少

許點湯下內寒者溫酒下

神效墨附丸 治婦人久不孕經事不調及數墮胎者

香附 拾貳兩去毛并成米粒分作肆分米泔酒 蕪艾 兩

去筋梗用酒二碗同香附一處煮乾石臼內杵 白茯苓

爛如錢厚大餅子新瓦上炭火焙燥搗磨 白茯苓

增廣本生要旨 卷一

廣木香 伍錢

右為末醋和為丸桐子大每服五十九丸空心好酒下

續嗣降生丹 治婦人五臟虛損子宮冷憊不能成孕

當歸 杜仲 炒酒 茯神 益智仁 龍骨 煨 桂心 吳茱

萸製 乾姜 半生 川椒 去目 烏藥 各壹兩 白芍 炒酒 川牛膝 酒半

夏製 防風 秦芎 石菖蒲 北細辛 桔梗 各伍錢 附

子 一枚重一兩者 臍下作一竅入朱砂參牡蠣 大錢 童便

浸四十九日每五日一換取出用硫黃壹兩為末酒和

塗遍用皮紙糊實米醋浸濕外用鹽泥厚固之候乾用

炭五兩餘可收貯再用 右為末以酒煮糯米糊為丸桐子大用前朱砂為衣

每服五十九丸漸增至九十九丸空心開水或鹽湯溫下

還少丹 治男子命門火衰陽事痿弱精氣不足陽虛症

山藥 牛膝 酒浸 遠志肉 山萸肉 去核 巴戟 去心 白茯苓

五味 石菖蒲 肉蓯蓉 楮實 杜仲 炒 茴香 各一

熟地 壹兩兩 枸杞子 壹兩

右為末煉蜜和棗泥丸每服五十九丸溫酒或鹽湯下

日三服食前服

大補陰丸 治男子相火熾盛內熱遺精尿血

黃柏 鹽酒炒 知母 鹽酒炒 熟地 龜板 去旁酥炙

右為末煉蜜和猪脊髓丸桐子大每服七十九丸空心

增廣本生要旨 卷一

鹽湯下

千金種子丹 治精滑無子及虛損夢遺白濁

沙苑蒺藜 取淨末肆兩再以重羅篩極細末 蓮鬚

揀金色者四兩紅 山萸肉 叁兩 覆盆子 貳兩 艾實 兩 龍骨

五色者佳伍錢 火般紅水飛用

右為末煉蜜止用四兩同蒺藜膏和為丸空心鹽湯

下錢

聚精丸 治精薄無子

黃魚鱔膠 切蛤粉炒 沙蒺藜 兩馬乳浸兩宿隔湯

右為末蜜丸每服八十九丸空心溫酒下忌食魚及牛

肉若氣虛而精不遠射者以蜜炙黃芪四兩煎膏和

煉蜜搗丸

五子衍宗丸 此藥添精補髓通利腎氣不問下焦虛實

寒熱服之自能平秘乃古今第一種子方也

枸杞子 兔絲子 酒煮 五昧子 壹 覆盆子 肆 兩 酒 車前

子 貳 兩

右為末煉蜜丸空心服九十九丸臨臥五十九丸鹽湯開

水任下冬月溫酒下

延年益嗣丹

生地 熟地 各叁 地骨皮 伍 兩 人參 叁 兩 天冬 去心 酒 洗 叁 兩 麥

增廣大生要旨

卷一

十一

冬 去心 酒 洗 叁 兩 白茯苓 伍 兩 何首烏 半 兩 竹刀刮去皮切片

壹 兩 馬料豆 三 合 量 著 水 上 加 筴 放 首 烏 於 筴 上 復 覆 蒸 一 二 時 候 冷 取 出 曬

右共為末煉蜜為丸每晨服五十九丸溫酒下

寒谷春生丹 治虛寒年邁陽痿精衰無子

熟地 兩 冬朮 當歸 枸杞 各 陸 杜仲 酒 炒 仙茅 酒 蒸 一 日 巴

戟肉 甘草 山萸肉 淫羊藿 羊脂 韭子 炒 肉苁蓉 酒 洗 去 甲

各肆 兩 蛇床子 炒 製 附子 肉桂 各 貳 兩

右為末煉蜜丸淡鹽湯或溫酒下七十九丸或加人參

鹿茸更妙

增廣大生要旨卷二

上海唐千頃桐園氏纂著

婁縣葉 灝雅卿氏增訂

胎前

總論

婦人胎產造化自然之理時至則生不必驚疑而人人不

免驚疑者為未明乎自然之理也呂祖云天生天養不

必着忙造化原不令人小產人多不守禁忌因而小產

造化原不令人難產人多不善調攝因而難產造化原

不令人逆生人多倉皇無主因而逆生小產及難產逆

增廣大生要旨

卷二

十一

生性命攸關可不慎歟至於穩婆臨產時不可不用斷

不可輕易聽從蓋此輩無書傳授偏執已見胡做亂為

往往誤事婦人如不識字為夫者宜於平日將此書常

為講解令婦熟聞懷孕知調攝臨產有主張并誠穩婆

安靜以待之自無小產難逆之患凡婦人受妊之後常

令樂意忘憂運動氣血安養胎元早當絕去嗜慾節調

飲食內遠七情外避六淫心宜靜而宜躁體宜動而

不宜逸味宜平而不宜熱食宜煖而不宜寒母久立母

久坐母久臥又宜卻去一切肥甘煎炙油膩辛辣鹹酸

水果魚鱉狐兔鴿雀之類即無胎漏胎動下血子鍾子

痼等症及橫生逆產胎死腹中之患降生之後又無胎熱胎寒胎肥胎怯胎驚胎黃諸般胎毒先正胎教宜遵行之

婦人經期不來已過四五十日或偶見紅而少或脈不應指疑們之間驗之用川芎爲細末煎艾水調空心服二錢腹內覺微動則是孕不動者非也或以外象參看如見食不喜食或惡心而吐或體倦欲臥雖體質平常孕脈不現只要六脈調和亦當是孕此卽是人病脈不病但與養血安胎之藥數劑孕脈自現矣

保胎

增廣大生要旨

卷二

二

婦人懷孕卽遷別室另寢常使身心清靜不犯房勞夜睡須左右轉換使小兒左舒右展肢體活動臨產自然快便生子亦必聰明少疾

贊育編難產七因

一因安逸婦人懷胎血以養之氣以護之宜時常行動令氣血周流胞胎舒展若久坐久臥氣血凝滯則必難產常見田家勞苦之婦其產甚易可證也

一因奉養胎之肥瘦氣通於母恣食厚味多致胎肥難產常見貧家婦容易生產可證也故產母調攝須以白飯香蔬略用肉食爲妙

一因淫慾古者婦人有孕卽居側室不共夫寢若有孕而犯之三月以前常致胎動小產三月以後一則胞衣太厚而難產二則子身有白濁而不壽三則子多瘡毒出痘細密難起以致死亡皆由父母慾火所結耳

一因憂疑今人不講生產之理或問禍福於鬼神或用禱求於卜筮或里中有產厄者孕婦聞之則懼懼則氣怯故亦難產

一因嬌怯如少婦初產子戶未開卽便腰曲不伸展轉傾側以致兒不得出又中年婦人生育既多氣血虛損產亦艱難須胎前服補氣養血之藥調理康健則臨產無虞

增廣大生要旨

卷二

三

虞婦人稟體素弱者亦同此例

一因倉皇將產之際有等愚蠢穩婆不審正產與轉胎但見腹痛遽令努力催生產婦聽從以致橫生倒生子母俱傷

因乏力臨產用力太早及兒欲出母力已乏停住艱難須服人參湯接力卽產

胎前禁忌

一忌食有毒傷胎諸物

牛 犬 羊 驢 馬 兔 鱧 鱉 蟹 黑魚
鱗魚 無鱗魚 雞肉 雞子 鴨子 雀肉 田鷄

豬頭 豬腳 豬心 豬腦 葱 肝腸 血

胡椒 子薑 茨菰 香菌 苡仁 蒜 梅子

杏子 地栗 茄子 萵苣 冰漿 漿水粥 生冷

油麩等物 荳醬不可與麩同食 附忌服藥品歌

烏頭附子與天雄 牛黃巴豆並桃仁 芒硝大黃

牡丹桂 牛膝藜蘆茅茜根 槐角紅花及皂角 三

稜莪朮薏苡仁 乾漆藺茹瞿麥穗 半夏南星通草

同 乾姜大蒜馬刀豆 延胡常山麝莫間 黑丑板

榔同蘇木 傷胎之藥避其凶 此中有安胎止嘔不

得不用半夏者必用開水泡洗三次以去燥烈之性嘔

增廣大生要旨

卷二

四

止即去有熱病閉結傷寒傳經入腑而必欲大黃者有中寒於陰必欲姜桂者此即有病則病當之乃從權也然必不得已而用之不可過劑而藥中亦必有顧胎之味總之胎前有病重在保胎產後有病重在溫補此至穩至當之理

忌洗浴凡覺受妊不可洗頭不可洗足不可浴身多洗

下體則竅開胎易墮初受胎及臨月尤宜禁戒關係非

小

飲食宜淡泊不宜濃厚宜清虛不宜重濁宜和平不宜寒

熱但富貴之家肥甘悅口抑令崇儉勢必不能酌其所

宜開後

蓮心 松子 燕窩 山藥 芡實 鯽魚 鴨

鱸魚 海參 豬脂豬腰肺 麻油 淡菜 腐衣

笋

弗多飲酒弗亂服藥

一切幸殺兇惡之事不宜看脩造立木不宜看龜兔怪異

諸物俱不可見

胎前節養六條

每見產後絕症隨產隨脫無計可施有一種氣虛欲脫

血猶滯於中汗出神昏上吐下瀉或面青肢冷或氣喘

增廣大生要旨

卷二

五

直視危急異常因於瘀滯者用生化湯或芎歸湯先通其瘀即補其原有一種產時去血驟多因而虛脫者用獨參湯沖童便服或參附湯先保其原再和其血又有一種元氣又真虛瘀血又壅滯欲補其原瘀即上攻欲消其瘀原即隨脫雖有攻補兼施之法如人參蘇木飲人參生化湯之類亦難見效此名絕症祇因胎前失於檢點及至臨盆欲救不能追悔何及謹列胎前節養六條預為調理指引孕婦皆登壽域

一除惱怒凡受胎後切不可打罵人蓋氣調則胎安氣逆

則胎病惱怒則否塞不順肝氣上沖則嘔吐衄血脾肺

受傷肝氣下注則血崩帶下滑胎小產欲生好子者必
須先養其氣氣得其養則生子性情和順有孝友之心
無乖戾之習所謂和氣致祥無不由胎教得之也

二禁房勞保產以絕慾為第一要事試觀猫犬至微尚知
有孕後不復交合何況人為萬物之靈而反不如之耶
所以婦人於懷孕後必須分牀獨宿清心靜養則臨盆
易生易育得子少病而多壽倘房勞不慎必致陰虛火
旺半產滑胎其害有不可勝言者可不謹歟

三戒生冷胎前喜食生冷只因懷孕以後多惱多氣不慎
房勞以致火旺口渴殊不知生冷等物豈能退血分之

增廣大生要旨 卷二

六

熱徒使脾胃受傷瘧疾痢疾嘔吐泄瀉諸病皆由此起
病則消耗精液口渴愈甚惟戒惱怒慎房勞服健脾補
血之藥調理本原可保平復否則臨產之虛脫產後之
絕症斷不免也

四慎寒溫胎前感冒外邪或染傷寒時症鬱熱不解往往
小產墮胎攸關性命要知起居飲食最宜調和夏不登
樓宜著地氣夜不露坐宜煖背腹古人有言不受寒自
不發熱不傷風自不咳嗽此為胎前緊要關頭

五服藥餌胎前產後藥能起死回生世人監誤治之害遂
言胎產不必服藥迷亂人意以致失於調補株守含忍

勉強臨盆諸症蜂起若知節養有方隨時調治其所安
全母子者藥餌之功正復不淺也

六宜靜養胎前靜養乃第一妙法不校是非則氣不傷矣
不爭得失則神不勞矣心無嫉妬則血自充矣情無淫
蕩則精自足矣安閒清靜即是胎教紹宗祧之重承可
姑之歡叶琴瑟之和衍螽斯之慶者胥在是也

受胎保護

一受胎後不可看戲及鬼怪形像

一受胎後不可升高處恐傾跌有損亦不可舉手向高處
取物恐傷胎而子鳴腹中如鐘聲亦有治法但令曲身

增廣大生要旨 卷二

七

片時即安蓋胎內有疙瘩兒含口中因母舉手向高處
脫出兒口是以啼也又法散錢於地令母拾取亦效

一受胎後三五箇月常要緊束其腹勿令胎放難產

一受胎六七箇月或八九箇月胎忽亂動兩三日間或痛
或止或有水下但腰不甚痛是胎未離經名曰弄胎又
曰試胎胎水有無俱不妨但直身坐臥行立不可驚憂
逼迫以致悞事二者俱非正產必因觸犯至此

小產當慎

三月五月而墮者為小產此因胎臟損傷胞繫腐爛以致
墮胎此比正產更險視為輕忽而殞命者極多必須倍

加將息宜服補血養氣生新去瘀之劑世更有服墮胎藥者為禍最烈也

七月而墮者為半產此除跌撲損傷外有無故而忽墮者多在三五七月若前此受胎此月曾墮者後至此月必應期而墮

娠妊三月乃手厥陰心包絡所養心包絡名相火內屬於心代君火行事其經多血少氣若悲哀思慮驚動而神氣內虛則墮當此之月名曰始胎血不流行未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好玩佩玉欲子賢能講論詩書欲子端正莊嚴口談正

增廣大生要旨

卷二

八

言身行正事是謂外象而內感者也

娠妊五月乃足太陰脾經所養脾為五臟之本生化之源其經多氣少血若飲食失宜起居不慎脾土受傷不能化血養胎則墮

妊娠七月乃手太陰肺經所養肺主一身之氣所以流行血氣舉載胎元是經亦多氣少血若多言大哭薄衣洗浴食涼犯寒氣血虧損不能內固則墮○凡此三經關係最大此月經虛不能任養而墮後至此月經益虛故復墮必須用對症之藥先期半月服十餘劑調補防過此月則胎可固矣

大凡胎氣腹痛者常事而腰痛則切須防備急宜服藥補

腎安胎不可不早至紅一漏只可十保其三宜服之胎

飲重用熟地或加人參桑寄生但小產重於大產益大

產乃瓜熟蒂落天生自然小產必有所由驚動而下乃

斷其蒂胎之胞附於帶脈帶又環繫於腰是以腰痛帶

脫胞胎即下矣預服保胎丸即無患方見後又法三月前

用芎歸補中湯或茯苓湯五月前用安中湯或五味異

功散加芎歸麥冬阿膠如嘔吐用六君子加砂仁山藥

扁荳生姜大棗七月前用神中益氣湯倍加當歸川芎

砂仁棗仁薑棗如有別症更加斟酌此月防過尤宜加

增廣大生要旨

卷三

九

慎

補母壽子安胎飲養血益胎治屢產生子無氣或育不壽氣血

虛弱孕成不安或得孕數墮照方每月限五帖弱甚者

十帖大益胎而分娩易又生子精神而有壽神效良方

也

人參壹錢弱人白朮貳錢歸身川芎捌分懷生地蒸熟

芩壹錢紫蘇陳皮甘草各肆分虛肥人陳皮去白加黃

連五分棗二枚水煎

脾胃弱常泄瀉加蓮子拾粒帶皮砂仁叁分減地黃

多怒而瀉再加木香貳分 口燥加麥冬壹錢 怔冲去心

驚悸加棗仁益智仁各壹錢 桂圓拾枚

惡阻孕婦嘔吐名曰惡阻非指經阻而言

娠妊之際經不行濁氣凝滯上干清道或中脘停痰胸膈滿悶眩暈嘔吐或倦臥無力而不喜食或一時覺大病之象過時而全無病此所謂孕婦多怪病實非病也名惡阻方用二陳湯加枳殼炒砂仁去殼研以安胃化痰若脾氣虛用六君子湯加紫蘇梗 枳殼炒砂仁炒各伍分香附陸分加姜棗煎服其半夏必用姜水泡洗三次若與人參同用更穩惡阻之症雖屬尋常然嘔多不食氣必上逆逆則防冲動心包孕婦有礙急宜安胎調胃

增廣大生要旨 卷二

二陳湯

製半夏壹錢 廣陳皮柒分 白茯苓壹錢 炙甘草伍分

本方加人參捌分 白朮壹錢 即六君子湯俱宜加姜棗煎服

竹茹湯 治懷孕五十四日四肢軟倦背惡寒眩暈惡心嘔吐痰涎思食酸物為惡阻之症宜服此湯五六劑

熟半夏泡 陳皮 蘇梗 廣藿 條芩焙 枳殼麩炒

白芍酒炒 雲苓壹錢 竹茹叁分

河水煎如火旺吐甚者加酒炒川連伍分 黑山梔壹錢 麥冬貳錢 去心胃虛者加白朮壹錢 土炒金石斛貳錢 氣滯者加香附壹錢 酒炒

胎動不安

胎動各有所因或怒動肝火或起居不慎或跌撲閃動及房事動擾則胎不安孕婦腰痛發熱不食不眠方用安胎飲主之各有加減若不安之甚防其胎傷於內須驗其舌色面色如面赤舌青知胎已傷面青舌赤母傷子存面舌俱赤母子無妨面舌俱青母子亡如口吐白沫唇口色青者立死不救故娠妊者切宜慎養

安胎飲

大熟地叁錢 歸身壹錢 白芍酒炒 炙甘草伍分 艾葉伍分 砂仁伍分

白茯苓壹錢 川芎叁分 白朮土炒 阿膠壹錢 水煎服

增廣大生要旨 卷二

起居不慎房事擾動者加人參壹錢 杜仲貳錢 川斷壹錢 桑寄生壹錢

生貳錢 如無力用參以蜜炙黃芪三錢代再加潞黨參壹錢

若怒動肝火本方加柴胡叁分 黑山梔捌分 若脾虛氣滯

除熟地加人參伍分 陳皮伍分 白扁豆貳錢 若跌撲傷動

另用當歸壹錢 川芎伍分 青木香壹錢 桑寄生貳錢 此物極能安胎惟

真恐不 若感風寒相搏須按各經以祛之輕者於本方

除熟地加蘇梗壹錢 此物能寬胎或加青芎叁錢 大凡

皆可加入 更有氣虛胎下陷者另用補中益氣湯以升舉

胎元則安凡體弱之人安胎飲內皆宜加人參壹錢 合成

膠艾八珍湯

補中益氣湯

炙黃芪錢貳 白朮壹錢 陳皮伍分 歸身壹錢 柴胡壹錢 黨參壹錢 升麻壹錢 炙甘草伍分 加美棗煎服

保胎丸 亦名千金保孕方極有效驗

杜仲兩 荆兩用糯米粥兩 山藥貳兩 炒陸兩另磨粉 川斷壹兩 當歸兩 酒炒兩 兩打糊法丸

用山藥粉打糊加棗肉為丸不拘時開水下四錢凡有

孕者即合服之服過七箇足月方止此方物省而功大

永無小產之患且產後多乳貧家宜傳此方與服雖受

增廣大生要旨

卷二

三

外感亦勿間斷見有小產者即傳此方其效如神

凡孕婦患虛損潮熱骨蒸少力或崩漏或少食皆由氣血

不充胎弱不能鼓動或胎不安上攻或跌撲損胎不動

或患熱病損胎或悞服動胎藥及食莧菜雖血行胎逼

斷不可用落胎之方妄議去胎以救母必須滋補母之

氣血力健自安即果胎死助血自落若強攻其胎胎落

而母即殞矣慎之慎之

胎漏

婦人之經血一有孕時即畜之以養胎至產後則變乳以

養子此天地生人自然之妙倘孕婦忽然見紅名曰胎

漏急宜服藥勿使血去多而胎不保也

膠艾湯 懷孕而點滴下血者係陰虛不足以濟火氣虛

不足以固血也此湯主之

熟地壹錢 艾葉伍分 當歸壹錢 川芎伍分 甘草伍分 黃芪貳分

阿膠蛤粉炒

產科心法曰若因風熱動血者用四物湯送防風黃芩丸

二錢一日二三服若因怒動肝火者用逍遙散加黑山

梔壹錢 條芩伍分 若血虛妄走者用四物湯加茯神貳錢 阿

膠壹錢 艾葉伍分 蓮子拾粒 若脾虛不能攝血者用歸脾湯

加膠艾蓮子 若氣虛下陷者亦用補中益氣湯若去

增廣大生要旨

卷二

三

血太多須用八珍湯大補之必要人參即同血脫益氣

一體耳百問曰胎息未實勞力觸犯或食毒物或房勞

驚恐令子宮虛滑經血淋瀝敗血湊心子母難保此急

症也速大補之 產集曰肝經有風下淋胎血宜服防

風黃芩丸此實症也

四物湯

大生地錢參 當歸錢壹 白芍錢壹 川芎錢參 加絲絲燒灰伍分

水煎服

防風黃芩丸

實條芩醋炒黑 防風壹兩 共為末酒糊為丸米湯下

逍遙散

歸身錢壹 白芍錢壹 白朮錢壹 柴胡分叁 炙甘草分伍 茯苓錢壹 分

水煎服

歸脾湯

人參錢壹 白朮錢伍 黃芪錢貳 歸身錢壹 炙甘草分伍 茯苓錢壹 分 遠志分伍 廣木香分伍 桂圓肉分伍 加姜棗水煎

八珍湯

人參錢壹 白朮錢伍 茯苓錢貳 甘草分伍 熟地錢伍 歸身錢壹 白芍錢壹 川芎分伍 加姜棗煎服

增廣大生要旨

卷二

古

補中益氣湯

見前胎動

千金方曰：娠妊下血不止，名曰漏胞。胞乾便死，急用生地八兩，以清酒三升煮減半，絞去滓服。此亦急症也。

有等妊婦紅漏不多，精神如故，六脈和平，此小兒血盛有餘之症也。

子煩

懷妊而煩悶者，心肺有熱也。名曰子煩。此方主之。

犀角散

犀角錢壹 地骨皮錢貳 麥冬錢貳 赤茯苓錢壹 條芩錢壹 草分伍

之

犀角錢壹 地骨皮錢貳 麥冬錢貳 赤茯苓錢壹 條芩錢壹 草分伍

草分伍

產科心法曰：子煩症，心煩悶亂，說不出之難過。此君相二

火翕聚以養胎，火盛內熱致煩也。宜用淡竹葉湯主之。

若氣滯痰凝而悶者，用二陳湯加白朮、黃芩、蘇梗、枳殼。

若脾虛胃弱，食少嘔吐者，用六君子湯或加香砂以安。

之。但子煩之症，不善調攝，則胎動不安，須防小產之患。

又有吐久氣逆，胃元大虛，不能進食，恐致產母氣脫，故

初即欲降火，繼即安胃進食，此一定之理也。

淡竹葉湯

淡竹葉洗片 黃芩錢壹 知母錢壹 麥冬錢壹 茯苓錢貳 水煎服

增廣大生要旨

卷二

古

二陳湯

見前惡阻

六君子湯 同見 如加香附分捌 砂仁分伍 即香砂六君子湯

子懸

紫蘇飲 懷孕而胎氣不和，湊上心腹，腹滿閉悶，氣寒欲

死，名曰子懸。此方主之。

蘇梗錢壹 人參錢壹 陳皮錢壹 當歸錢貳 川芎分捌 大腹皮錢貳 豆汁

肆次淨甘草分伍 白芍分酒炒

子眩

產科心法曰：子眩為氣逆暈厥，並用紫蘇飲。然有脾虛夾

痰，用六君子湯加天麻五分。若脾不甚虛，獨頑痰閉塞。

者用二陳湯加竹瀝姜汁虛實之閒宜察辨之如不合
法即防胎落大約川經氣逆者多予常用紫蘇飲加枳
殼鈎藤而安

紫蘇飲 見前 六君子湯 二陳湯 並見前

子癇 又曰 子胃

四物加芩連姜夏湯 懷孕而癇仆者由陰虛火亢痰氣

厥逆故令暈倒作羊犬之聲名曰子癇此方主之

當歸 錢貳 川芎 陸分 熟地 錢叁 白芍 酒炒 黃芩 錢伍分 黃連 酒

伍分 夏 壹錢 製泡 生薑 貳片

產科心法曰孕婦血虛風邪入肝忽然昏冒不知須臾即

增廣大生要旨 卷二

未

醒過時復發久則變痙痙即口噤搐搦背腰反張如兒
童發驚之狀方用羚羊散定之若怒動肝火佐以逍遙
散加入參五分若引動胎氣逆上佐以紫蘇飲兼脾虛
夾痰者佐以六君子湯或因中地而發者宜用理中湯
加防風鈎藤此症宜速治若頻發無休不但胎孕驟下
抑或血隨洩散母命難保如胎下即大溫補氣血為要
方可保全母命遲恐難以挽回

羚羊角散

羚羊角 獨活 各壹錢 當歸 貳錢 川芎 叁分 人參 捌分 茯神 壹錢
桑寄生 貳錢 鈎藤 叁錢 防風 柒分 甘草 伍分 加姜煎服 或加竹瀝

理中湯

白朮 錢貳 炙草 伍分 乾姜 錢壹 水煎服或加人參更妙

逍遙散 紫蘇飲 六君子湯 俱見前

子癇 又名 子滿 胎水

木通散 妊婦氣血失調營衛滯滯故令身體浮腫而小

便不利此名子腫宜服此方

木通 蘇梗 茅朮 炒 桑白皮 各壹錢 枳殼 炒 檳榔 各伍

條 錢壹 訶子皮 叁分 木香 叁分

產科心法曰娠妊婦人常有面目腿足腫脹故有各腫之

名其實皆由脾土不足以傳化水穀之濕而胞胎壅遏

增廣大生要旨 卷二

七

膀胱不化水泛橫流致肺氣不降而喘息水便淋漓不
利古方用鯉魚湯 葵茯湯 白朮散皆有妙處子每
用五皮飲如水腫法治之亦多驗蓋一體水症也此方
簡而易不愈再用鯉魚湯惟參朮不宜早補補則填塞
不通總宜利濕為先如輕而小便利者或體厚者亦可
不必治待生子後自消

葵茯湯

冬葵子 半斤 茯苓 兩 共為末米飲下三錢

白朮散

白朮 錢伍分 茯苓 貳錢 澤瀉 錢壹 陳皮 捌分 姜皮 肆分 大腹皮 壹

錢伍分 木香肆分

加味五皮飲

桑白皮

壹錢伍分

大腹皮

壹錢伍分

此味只可治胎腫常見

治水腫者服之愈腫切須慎用

茯苓皮

壹錢伍分

新會皮

壹錢伍分

紫蘇梗

壹錢伍分

車前子

壹錢伍分

老姜皮

捌分

五加皮

壹錢伍分

二三劑後再加白朮茯苓俟

消去大半再用六君子湯補其脾氣宜食淡淡以滲利

也

子嗽又名子哈

宜胎飲

治懷孕四五月咳嗽五心煩熱胎動不安或痰

血或鼻衄皆因火旺上沖肺經謂之子嗽宜服此方六

增廣大生要旨 卷二

六

七劑

生地叁錢 歸身

麥冬

去心各壹錢伍分

白芍

酒炒

阿膠

杜仲

鹽水續斷 炒

條芩

枳殼

麩炒各壹錢

加炒熟砂仁末

叁分

河水煎

產科心法曰

妊娠數月胎熱沖肺金常有咳嗽者宜用瀉

白散加黃芩蘇梗川貝主之如感風熱再加荊芥桔梗

甘草毋任咳嗽傷肺致成產勞又不可用溫散之味如

羌活麻黃桂枝之類反傷肺而助火恐胎熱上逼莫可

療也如瀉白散加味服之不愈可服六味地黃湯為至

穩之法

瀉白散

桑白皮

錢貳

地骨皮

錢叁

煎服

六味地黃湯

熟地叁錢 黃肉

錢壹

茯苓

錢壹

山藥

錢貳

澤瀉

捌分

麥冬

壹錢伍分

煎服

子痞

產科心法曰

妊娠至八九月忽然不語謂之子痞不必驚

慌但以飲食調養亦不必服藥此胞胎繫於腎腎脈貫

舌本待分娩自能言也如不放心可服四物湯

見前加

茯神遠志亦有即能言者若妄投雜藥反恐有誤

增廣大生要旨 卷二

九

子淋

與三十頁參看

冬葵子湯

懷孕而小便淋瀝此本於濕熱名曰子淋宜

服此湯

冬葵子

略炒

柴胡

伍分

桑白皮

炒

白茯神

歸身

各壹錢伍分

又方單用地膚子四兩水煎分三次服

產科心法曰

腎開竅於二陰與膀胱為表裏熱則小便淋

瀉甚者心煩悶亂用子淋散主之如腎虛熱不能司化

用六味湯

見前

子淋散

加車前子又安樂散葵子散皆可選用

茯苓貳錢 麥冬壹錢 木通壹錢 甘草叁分 大腹皮貳錢 淡竹葉壹錢
水煎服

安樂散

人參肆分 麥冬伍分 歸身伍分 甘草叁分 通草捌分 滑石壹錢
細辛叁分 燈心伍分 水煎服 如用党參壹錢

葵子散

冬葵子壹錢 滑石壹錢 木通捌分 加葱白七寸水煎服

轉胞

三合湯探吐法 孕婦中氣怯弱不能舉胎胎壓其胞以致小便不通名曰轉胞用二陳四物四君子三方合煎

增廣大生要旨 卷二

辛

服而探吐之以升提其氣上竅通而下竅自利也

人參壹錢 白朮炒 白芍酒炒 各壹錢 茯苓 生地 當歸各錢
川芎捌分 半夏壹錢 陳皮壹錢 甘草伍分

產科心法曰此症不比淋淋乃頻數不通轉胞則點點滴滴甚至點滴不能下症重於子淋矣此胎墜於下胞系被壓故名轉胞其禍最速如不急治即濁汚上逆上吐清水如關格可不危乎朱丹溪先生用補中益氣湯隨探吐之大有義理吾師鍾齡先生用茯苓升麻湯每效如神古方有用四物湯加黃芩澤瀉此治輕者而用也又張仲景先生治轉胞方用熱八味湯乃下焦偶感虛

寒胎氣陰冷寒水斷流得煖則陽氣宣通也又有一症為孤陽無陰不能化氣者宜補其陰古方滋腎丸是也

間常用六味湯加車前牛膝亦多收功斯二症一陰一

陽水火之分極宜深究不可錯悞當診其脈之遲數察

其人之喜冷喜熱合而辨之庶不悞人

補中益氣湯見前胎動不安 四物湯見前胎漏 六味湯即八味除桂附

茯苓升麻湯

白茯苓 赤茯苓 升麻 當歸 川芎 芍藥 苓根

急流水煎服

八味湯即六味加桂附

增廣大生要旨 卷二

壬

熟地錢 萸肉錢 山藥壹錢 茯苓貳錢 澤瀉捌分 麥冬壹錢 代丹皮

肉桂叁分 製附子叁分 此二味胎中慎用 水煎涼服

滋腎丸 黃柏壹兩 知母一兩 肉桂壹錢 淨皮研蜜丸開水下五錢

臟燥

清燥湯 治懷孕六七十日大便燥結腹滿努力難解無

故悲泣謂之臟燥宜服此湯六七劑

瓜蒌仁炒 白芍酒炒 歸身各壹錢 甘草肆分 生地 麥冬去心
蘇仁炒 枳殼炒 條芩各壹錢 加松子仁三錢河水煎調

白蜜十匙服

產科心法曰孕婦無故悲泣為臍燥也用大棗湯或竹茹湯治之自愈

大棗湯

小麥兩參甘草兩參大黑棗拾水六碗煎三碗分三四次服

竹茹湯

人參 茯苓各壹錢半夏伍分麥冬伍錢甘草伍分竹茹壹錢

加姜棗煎服此方心虛虛煩驚悸皆可治

又曰孕在腹中總有胎熱大便燥者多切勿臨園用力努爭多有因此而小產者為用力努傷胎氣致兒隨下亦有掙傷胞衣而墜下者蓋胎被氣迫下氣愈迫大便愈

增廣大生要旨

卷二

三

難出只宜服生地四物湯見前加松子黑芝麻或麥冬

瓜萹並以菜油或生麻油沖湯飲之皆潤腸之意如大黃滑利之藥斷不可服

尿血

又曰孕婦血尿不必驚慌方用續斷湯或膠地湯如怒動肝火用加味道遙散見前若食火炙熱物用加味清胃散見後有血熱流滲於脬即為血淋用葵子一升研細水煮分三次服

續斷湯

川續斷 赤芍 當歸各伍錢生地壹兩其為末每空心蒸

白煎湯調服二錢

膠地丸

阿膠研末大生地酒蒸熟二味為丸如桐子大每服七十九丸空心米飲下此方極穩且補血如急時每樣

二錢水煎服

乳泣

有孕在腹乳自出名曰乳泣出多恐生子難養緣內血不足以養胎也乃氣血虛弱不能統攝宜多服八珍湯見前胎不長

增廣大生要旨

卷二

三

婦人月經不行已六七箇月從前月事準今又無病腹不見大脈見微滑但不甚旺此胎不長也是以常有十二三箇月而生者此產母血氣不旺法當助其血氣補其脾胃即胎長腹大矣補脾用五味異功散培血用八珍湯如有別疾隨症加減 指掌方用黃芪湯白朮丸皆能長胎均助脾胃補衝任之法

五味異功散即六君子除半夏

人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 加姜棗煎服此

除陳皮加四物湯即八珍湯

黃芪湯

黃芪壹錢 白朮壹錢五分 茯苓壹錢 麥冬壹錢 人參伍分
陳皮捌分 甘草叁分 姜棗煎服如無力用參以党參壹錢 代伍分

白朮壹錢 當歸壹錢 阿膠壹錢 熟地叁錢 川芎捌分
牡蠣伍錢 川椒柒粒 蜜丸

熱病防損胎

孕婦或感傷寒或染時令火症燒熱昏昏不退急用涼藥
清解以保其胎如三黃解毒芩連羚羊之類惟犀角傷
胎之物不宜用如不解至胎損腹中不得下孕婦昏憤
斯時極難措手須驗產母之舌如面赤舌青其子已損

增廣大生要旨

卷二

去

急用平胃散加朴硝服下立出但死胎不得不下下之
又恐氣隨下脫不下又難保產母倘面青舌赤及面舌
俱青而口吐白沫者皆兩命難存不可為也設遇胎下
面轉赤色尚有一息之機隨即以參芪歸地救之間可
十活一二 若用加味芎歸敗龜板湯亦可下死胎則
平穩較勝

平胃散

蒼朮貳錢 厚樸壹錢 陳皮壹錢 甘草捌分 加朴硝叁錢 煎服 又
方獨用朴硝三四錢童便一鍾和熱酒調服即下但下
後即加產後溫補若仍作熱症醫即錯矣

娠妊傷寒
凡遇傷寒必保胎莫與尋常一樣猜最穩只宜香蘇飲分
經加味變通來

香蘇飲

香附貳錢 紫蘇壹錢 陳皮壹錢 甘草肆分 砂仁伍分 如太陽經加防
風壹錢 荆芥壹錢 秦艽壹錢 陽明經加葛根捌分 知母壹錢 少陽經

加柴胡叁分 黃芩壹錢 人參叁分 或滋
瘧疾即 是少陽症邪在
半表半裏之間

此症乍寒乍熱過時神清有一日一發有間日一發者始
則亦宜香蘇飲表之如待寒熱分明始用以柴胡湯和

增廣大生要旨

卷二

去

解之切勿早用柴胡若汗多宜加人參如熱盛寒少而
有汗可加石膏知母以涼散退熱勿使熱傷胎氣當早
為留意

泄瀉

感寒熱者水瀉食生冷而不化者溏瀉皆神朮散治之

神朮散

製蒼朮壹錢 厚樸捌分 陳皮捌分 甘草伍分 砂仁伍分 藿香壹錢
加姜一片煎服 或加茯苓
大腹皮

痢疾

瀉輕而痢重痢則裏急後重下痢紅白稠粘臭穢此積物

與熱結聚腹胃氣閉不通宿滯不去不愈初宜葛芍湯
後用香連丸總以能食為輕食減為重絕食噤口者死

葛芍湯 葛根壹錢 赤芍叁錢 廣皮壹錢 苦參壹錢 陳茶葉貳錢 煎服不已

再加山查叁錢 炒 神麴壹錢 炒 或檳榔伍分

香連丸

廣木香壹兩 川連伍錢 神麴糊為丸每服二錢米飲下

止後隨服生地四物湯見前 以調血分

鬼胎

人之臟腑安和心思靜正精神健旺氣血充實安得有妖

增廣大生要旨

卷二

美

魅之邪惟體本柔弱精神惑亂或獨居靜室而多驚疑
則邪氣交侵而受或夢與鬼交而成經閉腹大正如懷
子一般但其婦必面色青黃不澤脈細澀或大或小兩
手兩樣變更無定或作寒熱之狀攢眉不樂之形此由
肝脾憤鬱之氣非胎也治用雄黃丸攻之而以各經見
症之藥輔助元氣前賢又有斬鬼丹亦極妙消去隨服
桂附八味或六君子湯歸脾湯以補正心脾自無他患
虞氏曰此肝腎相火發為白淫流入子宮結為此胎
是本婦之精結成非真有鬼交也

雄黃丸

明雄黃 鬼臼 丹砂水飛各伍錢 延胡索柒錢 麝香壹錢 半夏壹兩 川芎柒錢 共為末蜜丸空心服三十九

不可稍大

吳茱萸壹錢 川芎叁錢 秦朮肆錢 柴胡壹錢 芫花貳錢 僵蠶貳錢

巴豆霜捌分 巴戟天壹錢 蜜丸酒服七丸下惡物愈

桂附八味丸見前 六君子湯見前 吐血 孕婦吐血或因感風熱者必先咳嗽嗽久見血用香蘇飲

加黃芩象貝以清散風去咳止血必不吐也或胎熱胃

增廣大生要旨

卷二

美

火上冲而吐者但用安胎飲加黃芩麥冬其生地須用
小者胎涼血自歸原或因食煎炒炙博之物致胃火上
逆而吐血者用清胃散去丹皮加麥冬黃芩主之若本
體虛弱素有血症者用六味地黃湯加地骨皮欒石斛
麥冬牛膝降其虛火自安

安胎飲見前 六味地黃湯見前

香蘇飲

蘇葉壹錢 香附捌分 陳皮柒分 甘草伍分 荆芥捌分 蔓荊子壹錢 川芎叁錢 秦朮伍分 防風伍分 水煎服

清胃散加減

生地錢叁連翹壹錢川連貳分麥冬貳錢黃芩伍分象貝壹錢煎服

便血

孕婦大便見血亦是血熱妄行大凡血症上行爲逆下行

爲順宜服生地四物湯見前加麥冬壹錢槐米伍分赤

芍貳錢甘草叁分主之如係臟毒加金銀花貳錢必自愈

孤漿

孕婦六七箇月暴下黃汁水或如膠或如豆汁多至升許

名曰孤漿並非產也然每每胎動腹痛皆氣血元虛若

認爲產心慌神張則胎必墮急服黃芪糯米湯可保胎

服人參更妙方用黃芪六兩糯米半升水七升煮汁三

增廣大生要旨

卷二

天

升分作四服日三夜一儘服完爲妙

悞服傷胎之藥

薛立齋曰妊婦悞服毒藥胎動不安急服甘草黑豆淡竹

葉濃煎以解之子謂毒藥者卽內經婦人身重毒之如

何此必有他病而用胎中所忌之藥以致胎動非真有

信砒毒也

心痛

大全曰娠妊心痛乃風邪痰飲交結子謂肝氣不暢者多

若傷於絡則乍作乍安名曰厥痛若胎動下血乃傷觸

子臟也用安胎飲或火龍散手拈散輕者一味砂仁湯

使氣調自安若果真心痛指甲青朝發暮死夕發旦死

無能爲力然此症懷孕者少蓋真心痛爲寒冷入心水

尅心火滅也而懷妊者必有胎熱當之不致寒水凌心

火龍散

川棟子 茴香各壹錢艾葉柒分煎服

手拈散

延胡索伍分五靈脂伍分草果陸分乳香油去淨沒藥去淨油共

爲末服一錢

胸腹痛

張仲景曰懷孕腹痛當歸芍藥散治之此益氣血也然或

增廣大生要旨

卷二

天

有宿痰或風冷觸犯或氣或食總以香附砂仁蘇梗生

姜四味最穩

當歸芍藥散

當歸壹錢白芍壹錢茯苓貳錢白朮土炒壹錢澤瀉壹錢川芎陸分

煎服或爲末每服二錢

腰痛

大凡腰痛皆屬腎虛在妊中最宜急治蓋胞胎繫於帶脈

帶脫則胞下墜矣古方用青娥散治之子常以熟地杜

仲合保胎丸多效

青娥丸自尿血至此出產科心法

155 子部 醫家類 3 頁下

杜仲肆兩補骨脂壹兩核桃肉貳兩為末蜜丸酒下三錢
子淋固真飲 治懷孕三四月內熱體倦腰腿酸痛白帶

淋漓小便頻數飲食少思謂之子淋宜服此方

白朮壹錢條芩壹錢續斷壹錢白蓮鬚壹錢芡實壹錢廣皮壹錢

杜仲壹錢山藥壹錢麥冬壹錢加建蓮五粒不去心

打碎天泉水煎服

安胎丸 治懷孕三月惡心懶倦已退臟燥已潤於四五

六七八月逐月服此丸料善能和中保胎養血調氣健

脾進食功效無比

生地兩兩水酒煮爛蒸歸身壹錢白芍壹錢於朮壹錢片飯上蒸

增廣大生要旨 卷二

曬伍次土拌陳皮 條芩壹錢酒斷壹錢水杜仲壹錢鹽水壹錢炒麥

冬貳兩去心各共搗曬乾磨末煉蜜為丸每朝砂仁湯送下

三四錢 如脾虛多瀉加山藥芩絲餅各三兩 如元

氣大虛加人參二兩○如血虛加阿膠二兩

繡閣保生書保產方

懷孕一月不須服藥如有不安即當調治宜服安胎飲

白朮壹錢條芩壹錢水一鍾煎服如血不足加歸身

一錢五分

大安胎飲

當歸貳錢人參伍分炙甘草伍分荆芥穗伍分砂仁壹錢去殼桑寄

生 白朮壹錢白芍壹錢條芩壹錢續斷壹錢水川芎壹錢煨熟地壹錢

皮大半夏湯 水煎服如覺氣不順而喘加蘇梗一錢

陳皮壹錢水煎服如覺氣不順而喘加蘇梗一錢

草伍分製半夏伍分姜一片水一鍾煎七分食遠服

懷妊三月惡阻不止飲食少進前方為主煎湯下抑青丸

川黃連壹錢姜汁壹錢研末米糊為丸如茶豆大每服七分

懷妊四月如覺倦臥不安或口苦頭痛腳弱及腫急服安

胎和氣飲

歸身壹錢白朮壹錢土炒壹錢白芍壹錢茯苓壹錢香附壹錢鹽水壹錢

增廣大生要旨 卷二

陳皮壹錢去白黃芩壹錢炙甘草壹錢川芎壹錢水煎服如

熱多加山梔一錢

懷妊五月覺胎長腹重睡臥不安服養胎飲

白朮壹錢分炒壹錢白芍壹錢酒斷壹錢澤瀉壹錢川芎壹錢黃芩壹錢

分枳殼壹錢分炙甘草壹錢水煎服

懷妊六月或腹痛或脹悶或胎動不安服大安胎如勝飲

當歸壹錢白朮壹錢分茯苓壹錢子芩壹錢白芍壹錢砂仁壹錢去衣

桑寄生壹錢各壹錢甘草壹錢水煎服

懷妊七月覺胎氣不安或損傷漏血或腹大重墜急服清

胎萬全飲

當歸 白朮炒續斷各壹錢伍分酒洗子芩酒炒白芍酒炒桑寄

生 熟地 阿膠蛤粉炒茯苓 荆芥各別分甘草伍分水

煎服

懷妊八月覺胎氣不安氣逆氣喘宜服東胎調氣飲

陳皮 枳殼麩炒蘇梗 茯苓 白朮壹錢子芩伍分甘

草叁分水煎服

懷妊九月雖無他症亦宜順氣和中扶脾安胃使無難產

之患宜服順胎和氣飲

當歸貳錢白朮壹錢大腹皮捌分豆汁浸淨水煎服

增廣大生要旨

卷二

三

懷妊十月宜服滑胎飲二三日一服

當歸 白朮炒陳皮 香附各壹錢伍分白芍貳錢川芎陸

黃芩炒蘇梗各伍分甘草叁分水煎服如氣虛加人參一錢

胎肥加枳殼一錢炒

豬脂方

人參壹錢蓮肉壹兩去心白藕豆貳兩去皮用雄豬脂一箇洗淨將

參等裝入用線紮口將大砂鍋一箇用碎碗片鋪底以

防著底鍋裂扣水漫火燉熟孕婦七八箇月每月吃二

三箇連湯藥吃完大補脾胃精神健旺可免崩暈諸症

醫方考胎前要法

黃芩白朮考白朮益脾能培萬物之母黃芩瀉火能滋子

戶之陰故曰安胎聖藥

砂仁慈湯 妊娠腹痛此方主之

砂仁去衣壹錢連翹壹錢白根叁分煎湯服腹痛者氣血澁滯不

通之故用砂仁順氣於下慈白順氣於中氣行血和其

痛自止倘別有他故而痛者宜隨症治之

東胎飲 凡難產者或因肥甘凝滯以致兒身肥大或因

胎中有火熱盛而胎液乾澁娠妊七八月服此則胎氣

斂束令人易產

白朮貳兩茯苓柒錢陳皮兩黃芩兩水煎分五服

增廣大生要旨

卷二

三

達生散 娠妊臨月服之易產達小羊也羊子易生故名

大腹皮叁錢豆汁浸水人參壹錢陳皮壹錢紫蘇壹錢歸身壹錢

白芍壹錢白朮壹錢炙甘草伍分蒸根黃楊樹頭柒分

春加川芎 夏加黃芩 秋冬加砂仁 枳殼

安胃定胎散

白朮壹錢陳皮柒分砂仁伍分茯苓壹錢歸身捌分藿香叁分加老姜

一片炒米二錢水煎服如惡心而吐痰者加製半夏五

分

保產無憂散俗名十一味方此方懷妊後每月服一二劑臨月再

服二三劑若月分雖足腹中似痛總宜服此方庶易產
并可免產後餘患若未及時而痛者服之即安真仙方
也若兒已離母下咽即死斷斷不可悞服慎之慎之

黃芪蜜炙當歸壹錢川芎捌分白芍壹錢酒炒夏炙甘
草伍分羌活伍分厚朴姜汁炒枳殼陸分斷艾伍分荆芥穗捌分
兔絲子壹錢川貝壹錢加老姜一片水煎服產科心法加
大腹皮五分

催生諸藥說

生不必催也催之非但無益而反害之矣古方有用兔腦
丸者有用猪脂者有用油蜜葱白者有用冬葵子者有

增廣大生要旨

卷二

壹

牛乳榆皮滑石者有用金鳳子者有用弩牙灰者有用
石槿枝者有用筆頭灰者有用百草霜者有用伏龍肝
者有用鑿頭灰者有用握石燕者有用蓖麻子貼於足
心者用之不驗徒增煩擾噫平時失於調理不守禁忌
以致臨產艱難類以雜藥催之又何濟乎

痰鼓似胎案

產科心法曰昔於庚辰歲海甯萬家渡金姓娶妻十載未
孕忽月事過期長安醫者謂之孕遂以熟地阿膠苓朮
之類補之延至十月尚不見產腹日大婦日病及至十
五月人不起牀食不下喉腹大異常偶一腹痛即腹鳴

如踏水車之聲門外俱聞其嚮危急之甚延予診治其
人已淹淹一息諸醫袖手待斃有曰鬼胎有曰經阻予

診之六脉滑大無倫按之堅實乃曰非孕也此痰鼓也
由思多傷脾脾不為胃行其津液而化痰初悞為孕服
滋膩寒涼之藥致痰不行積久而成斯症若不攻之必
無生理隨用二陳湯加南星厚朴枳榔三稜莪朮桂姜
二三劑即下行病家恐致痢急請復視脈稍和所下者
赭色成塊挑開內白色予曰此血裏痰也即於前方加
大黃礞石又數劑日下二三十行腹漸消而進糜粥矣
十日後轉用姜桂六君子湯枳實理中丸煎丸並進而

增廣大生要旨

卷二

壹

病人起矣彼時若再姑息不攻安得不脹死所以藥貴
得當何妨破格用之以起沉痾因存是案以備後人之
用又嘗讀吳菱山先生辨疑書中治一婦痰飲血癥症
為前醫悞認為胎與此症相似

瘦胎不可服辨

前錄諸方用香附枳殼者十有七八
言二藥之害故其胎前十八方皆屏除二味專
補胎元兼顧他症茲并錄之以俟擇用雅卿識

時人用香附枳殼等耗氣藥立斂胎易產方非無見也蓋
做古方士進湖陽公主枳殼瘦胎方後遂擴增幾味耗
氣藥品巧立斂胎易產名目使人秘而信之惑世害人
甚矣彼方士因湖陽公主居養厚而形樂食膏粱而胎

肥過期難產特進此方亦俾中耳其胎之損元不壽不
責咎也常人豈可概服乎夫孕至九十兩箇月胎形全
具一母之氣分陰其胎業已兩用正宜大補母弱兼培
他症反消耗之則母已不暇救安望有餘血分蔭其胎
是以虧損胎元日漸瘦弱未見斂胎易產之效反滋虧
元損壽之患可不慎乎其孕母氣血虧損多至臨盆難
產晚後暈厥危症亦由所致人自不知耳即婦人良方
所載無憂散保氣散神寢丸俱不可服

滋榮易產方保孕婦九十兩月服之有益

川芎壹錢當歸叁錢人參壹錢茯苓捌分甘草肆分陳皮肆分

增廣大生要旨

卷二

美

黃芩貳錢大腹皮 懷生地 益母草 白朮各貳錢

凡孕婦謹守禁忌可保安正產若悞服降性藥多則胎墮
小腹悞食莧菜則胎欲產稟弱人孕至五六月亦腰疼
欲墮三者並服補母壽子方以安之方見墮胎後惡阻前胎傷藥
食墮下者少加升麻伍分以提之腰疼欲墮者一時頓服
兩帖方安弱母成孕後食減困倦足腿腫者日服一帖
以安之又必謹戒房勞

胎前十八方

一孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間作疼或飲食
無味孕至五六月並宜服 加減丹溪安胎飲開胃安胎

白朮各貳錢當歸各貳錢川芎 條芩各捌分人參壹錢熟地貳錢
陳皮 紫蘇各肆分砂仁叁分姜棗水煎

二孕婦元氣不足倦怠或胎動不安或身微熱減食並宜
服之如腰疼腿痛必一日一夜兩帖方安 加味安胎

飲培元補腎

人參貳錢當歸貳錢白朮叁錢條芩捌分陳皮 紫蘇各肆分

熟地貳錢砂仁 甘草各叁分煩渴加麥冬壹錢姜棗水煎

三孕成三箇月內惡阻嘔逆惡食或頭暈倦怠宜服 加

味參橘飲定嘔安胎

人參 竹茹各壹錢白朮 當歸各貳錢半夏捌分橘紅 藿

增廣大生要旨

卷二

毛

香 甘草各肆分砂仁叁分肥人加竹瀝半盞姜汁半匙水

煎服

四孕婦常多怒氣胸腹滿悶或多服烏藥香附砂仁等耗

氣藥反加滿悶可服 加減順氣安胎飲平怒寬胸

人參 白朮 當歸各貳錢川芎 條芩各捌分陳皮肆分甘

草 木香磨沖各貳分

加味安胎飲 定痛祛寒

人參壹錢白朮 當歸 熟地各貳錢川芎捌分甘草 紫

蘇 陳皮各肆分姜水煎兼寒加吳茱萸壹錢或乾姜 砂

仁各伍分

五孕婦而目虛浮四肢有水氣多因脾胃氣虛或久瀉所

致可服加減 全生白朮散 健脾利水

白朮 當歸 各貳錢 人參 茯苓 各壹錢 川芎 捌分 甘草 叁分 紫

蘇 肆分 陳皮 大腹皮 各柒分 水煎服

六孕婦胎氣上攻心腹脹滿作痛可服 加減順氣安胎

飲 消脹

人參 壹錢 白朮 當歸 各貳錢 紫蘇 甘草 陳皮 砂仁

各肆分 川芎 條芩 各捌分 姜水煎

七孕婦下血不止或按月去血點滴名曰漏胎大率多因

勞力或因氣血虛損或因喜食炙博物多宜戒房事可

增廣大生要旨

卷二

美

服加減 補中安胎飲 止血

白朮 當歸 熟地 條芩 各貳錢 人參 壹錢 甘草 肆分 紫蘇

白芷 各伍分 姜水煎

八孕婦頓仆動胎下血不止宜先服補中安胎飲 見上一日

兩帖不止可服此方加減 膠艾無憂散 止血安胎

人參 伍錢 當歸 熟地 白朮 各貳錢 川芎 條芩 各捌分 甘

草 陳皮 紫蘇 各肆分 阿膠 壹錢 艾葉 捌分 姜水煎如感寒

頭痛加連鬚葱白二箇腹痛去艾葉加帶皮砂仁四分

九孕婦心驚胆怯煩悶不安名曰子煩可服加減 竹葉

安胎飲 定驚

人參 棗仁 麥冬 各壹錢 白朮 當歸 各貳錢 甘草 肆分 川

芎 柒分 陳皮 叁分 黃芩 遠志 各捌分 竹葉 拾分 生地 壹錢 姜棗

水煎煩渴加竹茹 壹錢 有痰加竹瀝半盞姜汁半匙脾胃

瀉去棗仁地黃

十孕婦腿膝發腫氣促滿悶不舒或指腫水出蓋脾主四

肢脾氣虛弱不能製水而發腫肺腎少氣而氣促滿悶

名曰子氣宜服補中健脾湯虛人服天仙散必加人參

歸朮方可用天仙藤散 消腫治水

天仙藤 卽青木香 香附 各陸分 陳皮 紫蘇 各肆分 甘草 叁分

烏藥 柒分 木瓜 壹錢 姜皮 叁分 水煎虛人加人參 壹錢 白朮 貳錢 當

增廣大生要旨

卷二

美

歸朮如脾胃虛弱兼服補中益氣湯 見前胎動不安

十一孕婦口噤項強手足攣縮言語蹇澁痰涎壅盛不省

人事不可作中風治宜用羚羊角散如無痰言語如常

但見似中風症多因血燥類風切不可一概作中風治

誤人事也可服加味羚羊角散 開噤消痰

羚羊角 壹錢 川獨活 捌分 棗仁 炒壹錢 五加皮 捌分 苡仁 捌分 防風

分 川芎 柒分 當歸 貳錢 茯神 捌分 杏仁 去皮尖十粒 木香 貳分 甘草 肆分

姜水煎虛加人參 壹錢 痰加竹瀝半盞姜汁半匙脾胃弱

加白朮 貳錢

十二孕婦小便澀少或成淋瀝名曰子淋可服 加味安

榮飲通便

人參 白朮 當歸 麥冬各貳錢 茯苓皮 通草 甘草

草各壹錢 燈心伍分 若有痰侵肺金加黃芩柒分

十三孕婦咳嗽屬風屬寒可服甯肺散止咳

天冬 知母各壹錢 桔梗 紫蘇 甘草各伍分 寒嗽加杏

仁十枚 桑皮捌分 廣橘紅肆分 竹瀝姜汁熱嗽加黃芩捌分 虛嗽

加紫苑壹錢 欵冬陸分 夜喘嗽加麻黃肆分 虛損嗽加瓜蒌壹錢

竹瀝姜汁心胃不舒加貝母壹錢 百合壹錢

又方嗽不止胎不安

杏仁貳錢 甘草肆錢 紫苑壹錢 桑皮伍錢 桔梗捌分 天冬壹錢 伍分 水

增廣大生要旨

卷二

罕

煎服

十四孕婦霍亂吐瀉心煩腹痛宜服 六和湯止咳

陳皮 藿香 甘草各肆分 半夏柒分 杏仁拾粒 竹茹 木瓜

各壹錢 扁豆貳錢 砂仁伍分 人參壹錢 茯苓捌分 姜棗水煎 次服

丹溪安胎飲前見

十五孕婦熱病嘔吐不食胸中煩燥宜服蘆根散止咳

葛根 蘆根 人參 麥冬 知母 梔子 竹茹各壹錢

葱白寸參

十六孕婦熱病癰出赤黑色小便如血氣欲絕胎欲落宜

服 青胎飲退熱

梔子 黃芩 升麻各壹錢 青黛捌分 豆豉肆拾粒 生地貳錢

仁拾粒 石膏壹錢 葱白寸柒

十七孕婦熱痛骨節疼不急治卽落胎

葛根捌分 石膏貳錢 前胡捌分 青黛水飛淨壹錢 有痰加竹瀝一

酒薑姜汁半匙

十八孕婦患吐衄血或因破傷失血驀然口噤項強背直

類中風症宜服安胎飲

人參參錢 當歸 白朮 熟地 天麻各貳錢 麥冬壹錢 陳皮

甘草 條芩 防風 荆芥各肆分

增廣大生要旨

卷二

罕

增廣大生要旨卷三

上海唐千頃桐園氏纂著

婁縣葉 瀨雅卿氏增訂

臨盆

總論

婦人生產乃造化自然之理俗所謂瓜熟蒂落原屬平常
易事毋庸驚疑然竟有難產者皆因娠妊之後不知培
養之道犯禁忌於平時及至臨期但急催生而用力太
早以致橫生逆生種種難產傷害母子或在頃刻或遲
月日可不畏乎所以胎前保護不可不講而臨盆坐草

增廣大生要旨

卷三

亦宜究心焉

六字真言附或問
七條

一字曰睡將產時須要調養心神愛惜氣力若能上牀閉
目安睡片時最好若不能睡暫時起身或扶人緩行或
倚桌站立痛若稍緩又上牀安睡總以睡為第一妙法
但宜仰睡使腹中寬舒小兒易於轉動且大人睡下小
兒亦睡下轉身更不費力

二字曰忍痛若腹中痛且令扶行或痛或止尚痛得慢名
曰弄胎非正產也凡腹痛腰不痛者未產腰痛腹不痛
者未產不可使穩婆試手探亦不可屈腰眠臥直至腰

腹齊痛甚緊一陣不住連痛三五七陣時時眼中如見

火光此真欲產也自然易生若痛陣未急又須扶策徐

行起若艱難即憑物立切勿不耐腹痛坐草太早以致

難產 或問忍痛過久恐有不妙曰最妙從未有私胎

而難產者蓋私胎怕人知覺只得極力忍痛忍到沒柰

何時子自脫然而下此理甚明有何疑慮

三字曰慢臨盆將產時切不可輕易臨盆倘若聽信穩婆

說孩兒頭已在此以致用力太早誤盡大事此乃天地

自然之理若當其時小兒自會尋路鑽出何須着急從

來瓜熟蒂落水到渠成自然而不待勉強及至生下

增廣大生要旨

卷三

即產母亦不知其所以然也

或問大便亦須用力如何生產不須用力要知大便是呆

物必須人力小兒自會運動不但不必用力卻又切忌

用力蓋小兒在母腹中要聽其慢慢轉身尋到產門頭

向下腳向上倒懸而出若小兒未曾轉身用力一遍則

腳先出轉身未定時用力一遍則橫臥腹中一手先出

即或轉身向下生路未正用力略早亦偏在一邊不得

出種種弊病皆是時候未到誤於用力之故即如大便

未到糞門縱然用力亦不能出而况於生產乎

或問如何方是用力之時答曰若小兒逼到產門則產母

交骨分開胸中陷下腰腹重墜異常大小便一齊俱急
目中金花亂閃真其時矣當於此時用力一迸小兒誕
生便稱恭喜矣

或問早一時斷不可動矣不知遲了一時可不妨否答曰
不妨若果當其時必無不出之理卽或有不出者此是
小兒力乏不能卽出但令產婦上牀安睡使小兒在腹
中亦得安睡歇力片時自然生矣

或問臨期有經驗丸丹亦可用否曰不用大凡生產自有
時候時至自生何須用藥未到時候切不可早用催藥
強其速生使兒不能轉胞反致橫生倒生如欲用藥須

增廣大生要旨

卷三

三

待腰腹痛急胞水與血水俱下真正是將產時候始可
用藥順勢推之藥亦只須用加味芎歸湯佛手散蓋胎
前要血足血一足如舟得水何患不行特恐產母血少
又或胞漿早破以致乾澁耳今二方俱大用芎歸使宿
血頓去新血驟生隨手見效且使產時快便則產後無
病其飲耗氣損血等藥雖極靈應總之有礙昔陳氏妻
生產九日不下僅存一息叩醫求免腦丸問之曰頭暈
產門不得出醫令安臥卽與加味芎歸湯明日生下母
子兩全設與催藥反或有悞按此係產母用力太早逼
令橫在腹中耳豈有倒懸十日而尙得生者乎

或問穩婆總究該用否曰既有此輩亦不可不用但要全
憑自家作主不可聽命於彼耳大抵此等人多愚意不
明道理一進門來不問遲早便令坐草用力必定說孩
頭已在此或揉腰擦肚或手入產門探摸多致殞命更
有狡惡之輩不肯安靜故作哎呀之聲以逞其能欲索
重謝以致產母驚疑害尤不可言按吳越間謂之穩婆
江淮間謂之收生婆徽甯間謂之接生婆因其年老慣
熟使之接兒落地收生上牀耳原非要他動手也每見
富貴之家預將穩婆畱住及到臨時稍不快便前門後
戶引到無數紛紛攘攘開成一片所謂天下本無事庸

增廣大生要旨

卷三

四

人自擾之

昔張氏妻年輕體壯每孕必八箇月而產每產必數日
而下生女必遇而歿一醫曰日後臨產可相聞明年又
入箇月而產三日不下僅存殘喘忽憶醫言飛輿迎視
診之脈未離經穩婆在傍曰兒頭已抵產門不得出耳
醫急令安臥且戒勿擾與安胎藥明晨主人出謝問夜
來若何主人曰想是試胎今已安好後百二十日計十
二箇月足生男且少病多壽始知從前皆生採取出因
產婦體壯年輕幸全性命耳
或曰催藥不可亂投穩婆不可輕信已聞教矣若先時悞

於用力以致橫生倒產奈何曰急令安睡用大劑加味芎歸湯服之略用手法自然生矣手法見後十產論

十產論

凡生產先知此十症庶母子兩命皆得保全世之業收生者宜知此庶不害人娠妊之家宜知此庶不自害

一曰橫生因兒身方轉產母用力太早逼令兒身不正先露手臂但令產母安然仰臥穩婆以手徐推兒臂令上復以中指探兒肩弗使臍帶絆繫待兒身轉正頭對產門即生

二曰倒生因兒未及轉身產母努力一迸故先露足亦令

增廣大生要旨

卷三

五

產母安然仰臥穩婆以手徐推足入靜候片時候兒身轉正近門即生 但見兒手足略有出意即令產母寬心仰臥輕輕送入弗令多出蓋出少則易入未久則易入如出多而久則手足青硬子必受傷難以扶入切不可聽信穩婆用刀斷兒手足手足一斷則必亂擾腹中兩命俱傷矣 昔一產婦用力太早兒手出不入穩婆礪又以須其翁商之於子聞之惻然遂急令安臥與大劑芎歸湯以鹽半分塗小兒手心以香油抹兒滿手輕輕推入明日生下母子皆安右臂紫黑數月始消鹽收縮且整人痛兒手得鹽則痛而縮進自然轉身生下足先出者亦如此法

或問橫生倒產此皆用力太早之故世間亦有未曾用力

而多難產者何也答曰或因母體本弱血氣虛損胎養不足或因病傷寒之後熱甚損胎亦或孕後不戒房事以致慾火傷胎又或多食椒姜炒炙等物熱毒傷胎以及跌撲損傷等症皆致難產藥用加味芎歸湯佛手散三曰偏產因兒雖已轉身但生路未正被母用力逼兒頭偏一邊雖露頂非頂也額角耳令母仰臥穩婆輕手扶正頭頂即生 又有兒頂後骨偏住穀道旁露其額者令穩婆以絛衣烘溫裹手於穀道外邊輕推兒頭令正即生

增廣大生要旨

卷三

六

四曰礙產因兒轉身時母用力太早致兒臍帶絆肩雖兒生已正門路已順兒頭已露猶不能生令產母仰臥穩婆輕輕推兒向上以中指按兒肩撥下臍帶候兒正順即生 五曰坐產因兒將產其母疲倦久坐椅褥抵其生路須用手巾一條拴繫高處令母以手攀之輕輕屈足作坐狀產戶舒張兒即生下 六曰盤腸產因產母平日氣虛及臨產時用力努掙周身氣血下注以致腸隨兒下一次如此下次路熟亦必如此治法以潔淨不破損漆器盛之待兒胞衣俱下產母

仰臥自己吸氣上升穩婆以香油塗手徐徐送入 古

方用草麻子四十九粒研爛塗產母頭頂腸收上急洗

去 一法以生半夏為末搗鼻中其腸自上 又法以

醋半盞水七分調和噴產母面每噴一縮三噴收盡謂子

若用此法恐產母受 又法濃煎黃芪湯浸之 其腸

驚氣散反有不便 若乾以磨刀水少許溫潤之再用磁石煎湯服之即收

上磁石須覓 能吸鐵者 又方大紙然麻油潤之點火吹息以煙

薰產婦鼻中腸即上此方最平善可用

七日凍產冬月嚴寒被衾單薄下部受凍以致血冷凝滯

骨節產戶堅收兒不能即生速以芎歸湯加炮姜或肉

增廣大生要旨 卷三 七

桂與服衣服宜厚產室宜煖下體更宜溫厚但火氣不

可太熱恐致血暈 一法以紫蘇煎湯薰洗大抵嚴寒

時產久傷冷氣血必凝用薰洗之法甚妙坐草太早去

被良久常有此患慎之

八日熱產夏月酷暑產室人多熱氣逼蒸使產母熱傷氣

分頭疼面赤昏昏如醉氣乏不能產下宜服六一散室

中須置井水若涼臺水閣以及狂風陰雨更當謹避總

之產婦當溫涼得中為妙

九日驚產或因少婦初次生產或因向來難產臨期恐懼

以致氣結不行兒不即下紫蘇飲最妙或用紫蘇一錢

當歸三錢長流水煎服名舒鬱湯

十日傷產懷胎未足月有所傷動以致臍腹疼痛忽然欲

產或妄服催藥逼兒速生如此生息未必無傷慎之

胞衣先破其故有二一因母弱氣血虛胞衣薄兒身轉動

隨觸而破一因兒身未轉坐草早用力狠以致胞破胞

破久水血乾產路澁兒難下急用大劑加味芎歸湯加

熟蜜一兩助氣而兼潤滑自當順下 又法濃煎葱湯

薰洗產戶即下或以黃芪當歸助許以大釜煎之使藥

氣充滿一室產母鼻口俱受其氣亦良法也此法冬月

亦可若夏月熱 熱斷斷不宜 又有胞水先破被風所吹以致產戶

增廣大生要旨 卷三 八

腫脹乾澁狹小者亦莫妙於濃煎葱湯洗再服加味芎

歸湯 又有狡滑穩婆意欲害人私以手指指破胞衣

極要關防

臨期難產敗血凝滯不能生下者芎歸湯加牛膝瞿麥服

之即產 昔醫宿客店值店婦生產數日不下下體冷

甚急令以椒橙茶葉等煎濃湯薰洗臍腹產門等處氣

溫血行遂產

產期未至不可令扶產人早抱腰恐兒難轉身

臨產暈絕

臨產兒未生下忽然暈絕者此因痛極氣悶急用生半夏

爲末飯丸如豆大納鼻中卽醒此扁鵲法

交骨不開

臨產交骨不開有鎖骨者有元氣素弱胎前又失於調養以致氣血不能通達而然也用加味芎歸湯無不立驗外法令穩婆以麻油調滑石末塗入產門

加味芎歸湯

當歸 川芎各壹兩 敗龜板一箇酥炙或童便炙 血餘炭壹錢 水煎服約人行五里卽生如死胎亦下體虛者川芎只用叁錢

胎死腹中

增廣大生要旨 卷三

九

臨產腹中胎死或觸損傷或犯禁忌或因胎氣薄弱不成而殞至於臨盆太早胞漿先破胎血乾涸而死者更多只宜佛手散加味芎歸湯服之自下若不下再用當歸一兩厚朴陳皮各二錢酒水各半煎好加朴硝一錢能令化下極易如或不便服藥但令產母不要慌忙逼迫亦遲遲生下定不傷母慎弗亂用奇方并聽克惡穩婆致傷兩命
或問何以知其胎死曰面赤舌青母活子死面青舌赤口中沫出子活母亡面舌俱青口邊沫出子母俱死且死胎冷墜脹痛或爲嘔惡或穢氣上衝與好胎不同 薛

增廣大生要旨 卷三

立齋云下死胎平胃散加朴硝最妙方用厚朴蒼朮陳皮各二錢甘草五分朴硝五錢水煎服

胎死不出及胞衣不下產後諸疾狼狽者刺羊血熱飲一

小盃極效聖惠方

胞衣不下

胞衣不下亦是臨盆太早之故當產時骨節開張壯者數日而合法者彌月而合今不待其開而強出之故胎出而骨眼隨閉以致胞出不及耳如遇此症用佛手散加牛膝瞿麥各二錢滑石一錢水煎服自下

若敗血流入胞中胞卽脹大不得下治之稍緩脹滿腹中

增廣大生要旨 卷三

十

上衝心胞疼痛喘急宜急斷臍帶使其子血脈不潮入胞中但此帶極脆宜以軟絹裹之用心拿定然後斷之否則胞上掩心立至危殆宜急服牛膝湯或佛手散逐去胞中敗血卽時墜下只要產母安心自無患害切不可輕信穩婆妄用手法多致危亡也
兒旣脫胞帶必下墜胞在腹中形如仰葉仰則盛聚血水脹礙難出惟得老成有識穩婆以手指頂其胞底使血不畱聚或以指摸上口扳開一角使惡露傾瀉則中空自落矣
其有氣血疲弱不能傳送而不出者產母但覺乏力別無

三五三

脹痛又當補氣助血宜加味芎歸湯不可亂投方藥
或將產母頭髮吊起急以髮稍探母喉中一嘔卽下

臨產宜忌

臨產時只宜老成二三人安靜伺候切不可多人一切親
族婦女勿令入房若多一人卽多一時遲延孝服穢濁
人尤當避忌 夏月更不宜多人熱氣擁盛能令產母
煩躁發暈其害非小

穩婆只宜一人入房不可多喚反致混鬧有悞 凡用穩

婆須擇老成忠厚者預先囑託及至臨盆務必從容安
靜千金日在半覺痛日中則生可知時至自然分娩不

增廣大生要旨

卷三

十一

得用法催逼

在房伺候者總宜安靜不可多言令產婦穩睡爲妙第一
要勸其安心忍痛歇息切忌房中大驚小怪交頭接耳
咨嗟歎息及求神許愿皆能令產母憂疑擾亂以致悞
事

最忌曲身眠臥產母畏痛不肯直身行動以致胎轉不順
將到產門被母曲腰遮閉再轉再閉兒必無力而不能
動決定難產人見其不動卽謂胎死實因無力非死也
此時任有妙藥亦不能助兒有力而動只要產母心安
氣和息養片時自然生下切忌驚憂躁急蓋驚則氣亂

變則氣結躁則氣逆惡血上冲多致悶絕

天時寒冷產母衣裳宜厚被褥宜溫胸背更宜和暖房中
宜多設火盆辟除寒氣否則氣凝寒滯兒難送下

盛暑之月產室須要清涼熱甚則產母頭疼面赤必致昏
暈宜多備井水以收熱氣須頻頻換之若遇疾風陰雨
又當謹避

或有兒生不順與雙胎難出以及恠胎不必驚慌自然生
下總要穩婆多方安慰能不令產母聞知更妙倘若驚
慌則愈難生下

臨產以進食爲本此時心內憂疑腹內疼痛甚至精神疲

增廣大生要旨

卷三

十二

倦口中失味全要美味調養倘不能食鷄鴨脂肺清湯
宜頻頻與之 宜時食稠膩米粥令弗饑渴以致乏力
更不宜食冷硬難化之物

產時捏產母中指若中節跳動方真是產候
臨產腰痛甚急兒逼產門方可坐草

臨產方藥

紫酒 治孕婦腰痛如折

黑料豆貳合炒焦白壹碗煎至七分空心服如不善飲酒者

水煎服藥後隨飲酒一二口以助藥力

保產無憂散見二卷第
三十四頁

佛手散 妊娠六七月後或跌撲傷胎或胎死腹中疼痛
不已口噤昏悶或心腹飽滿血上衝心者服之生胎即
安死胎即下又治橫生倒生及產後腹痛發熱頭疼逐
敗血生新血并除諸病

當歸 錢伍 川芎 錢叁 水七分酒三分煎服

臨產方 臨盆將產服此最妙屢試屢驗

當歸 壹兩 枳殼 壹錢 川芎 錢叁 益母 錢叁 黃芪 錢伍 水煎服

催生神柞飲 婦人臨產服之活血逐瘀可保萬全不拘

橫生倒生胎爛腹中脹悶及少婦交骨不開用之屢效

生柞枝 洗到 甘草 錢伍 水二碗煎一碗服

增廣大生要旨 卷三 五

又方 少婦初產交骨不開或因臨盆太早用力催逼兒

橫腹內諸藥無效此方百發百中實救急之良劑也

生柞枝 洗到 益母草 各壹兩 川芎 錢叁 當歸 錢伍 人參 錢叁 水二碗

煎一碗溫服

產婦須仰臥片時待藥力一到交骨自開兒身自正然

後扶起臨盆脫然而生全不費力矣 方用柞枝取其

滑澤益母動血活血芎歸養血調氣人參接養母力更

兼安心靜臥使藥力通達自必脫然而產矣

八珍湯 產科 治交骨不開而血水去多胞中子腸乾澀

者

人參 白朮 炒土 茯苓 白芍 川芎 各壹錢 炙草 叁分 熟地 叁錢 當歸 伍錢 姜棗水煎服 或加丹參 錢叁 乳香 去油須極 淨伍分 益母草 錢貳 寒天加炮姜 錢壹 嘔吐加生姜 砂仁如胎上逼 加淮牛膝 錢叁

附產科心法載難產醫案

昔龐安治產七日不下諸治莫效龐令其家作湯溫其腰

腹自以手上下與之拊摩孕婦覺腸痛甚少問生一子

問其故曰兒已出胞因手執母腸不能出我爲隔腹捫

兒手潛針之無他術也視兒右手虎口果有針痕

又婦坐草早恐俱氣結不下蓋恐則氣結而精神怯上焦

增廣大生要旨 卷三 五

閉下焦腹脹用紫蘇飲 方見二卷 子懸 卽生

滑伯仁治七日不產且食少用涼粥一盂搗楓葉煎湯調

飲旋產 楓葉先生者先 落用是意也

吳菱山見產三日不下以車前子爲君冬葵子爲臣枳殼

炒 白芷爲佐服下立產

高賓治劉姓婦產不出而死臨殮見其貌不似死者斯時

天寒異常知是凍產必由血冷凝滯不行卽令用紅花

濃煎湯絲醮乘滾盪於腹上再用熱湯薰洗而甦甦後

隨產一子無恙

子治錢氏婦產難用佛手散加炮姜再用薛立齋法取路

旁草鞋一雙以鼻絡小繩燒灰酒調和服片時即產

又許衛中妻產難三四日不能下穩婆欲用拆胎之法子

曰不可設胎未傷而用刀必負痛上衝於心豈不兩命

俱喪縱使胎死不下子自有藥下之乃令穩婆出隨用

佛手散加炮姜二錢厚朴一錢煎服時已初更至半夜

而產其胎雖為穩婆動手所傷而產母無恙此亦冬寒

血冷之故也

又于勝元五日產不下用四物湯方見二卷漏胎加倍進之不應

因思胞水瀝乾再進入珍湯方見醫案前助其氣血更煎湯

薰洗陰戶而產 此皆在浙時略記之餘惟用保產無

增廣大生要旨

卷三

五

憂散及佛手散應驗者多不及多載諸書催生方頗多

緣恐方愈多而用者心愈亂故不繁載

至於安產婦臥房雖有其說亦不必盡信思小戶之家無

處可移亦要生子也

加味益母丸出家傳胎產各方孕婦諸症並宜服之

益母草肆兩白朮壹兩條芩捌錢共為末煉蜜丸彈子大清湯

送下一丸亦作細丸孕內常服甚好多氣加木香錢弱人

煎安胎飲送下胸腹不舒加紫蘇陳皮各貳錢

附胎產靈符

是書將付剞劂適友人以胎產靈符見示云自天師府

傳來屢著靈驗已救活多人因非附於三卷之末以公

諸世特非至危至險不可輕用恐

喪濟神明反致不虞也某識

原序 達生編一書流傳久矣其所以保育嬰孩安全

之術也夫男女構精萬物化醇此亦天地自然之生理

先出一足者俗名踏蓮生是皆用力太早小兒於腹中

尚未轉身何討躑躅之有故達生編以產母安睡為

第一要訣然使一遇此等迷致產母心驚旁人意亂穩

婆從而動手稍有不慎倉猝釀成變故良可慨也此符

傳自天師府靈驗頗著余所目觀者如某廚妻產兩日

不下命瀕於危友人問而書紫光一符以貼之復書一

符以飲之頃刻之間竟得分娩母子無恙謂非起死回

生者歟亦大奇矣夫神靈所賦原在可解不可解之間

如此符之靈異設千百而遇一則活一人千百而遇十

則活十人是足以補達生編之所未逮而功亦甚偉也

增廣大生要旨

卷三

末

因付剞劂以廣流傳

而為之述其緣起云

穀旦

咸豐八年歲次戊午孟陬月

凡例

一 偏隅鄉曲有此符木片刻可以救人實屬一片婆心當奉為至寶

一 難產之家只須用紫光一符已立見效後三符自可弗用存之以備十分艱險者

一 此符為難產而設不可心存欲速貪圖痛少輕易用之

一 鄉人或婦女看不明白請人代書不可錯誤不可受謝以致不靈反延時刻此代書者之罪過

一 此係符咒須安潔淨處慎勿穢褻惟書寫時葦素不增廣大生要旨 卷三 七

忌

一 倘有好善君子刻廣布須校對無訛方徵信驗因所用緊要關頭故不憚詳說

胎產靈符

安胎符

龍 五龍吐水 鐵筆一下萬水不流 速與安胎 止 縮谷道緊閉一身

右安胎符止字一小豎由下剔上小字均照寫亦在符內下文尚有符膽

靈 救 靈 長 靈 解 靈 厄 靈 難

以上四字連小字是膽蓋在龍字上面重疊寫上即成一片墨亦可但不可寫錯本日寫即本日服不可隔夜

增廣大生要旨 卷三 九

不可受謝此符凡孕婦胎動無論幾月皆可化服其化服之法先點一燈以清茶大半杯左手擎茶右手將符近燈化入茶面須順放下符灰不可撥亂連口吞下即安

催生符

我從賢聖法來未曾殺生

以上十字用淨硃新筆紅紙書好貼在孕婦臥牀對面或牆或板再令產婦默念此十字至半字則出聲此經驗符云 牛即生字

催生屢驗方

紫光夫人在此

上六字用無替黃紙潤一寸長三寸用硃砂新筆朝東方寫貼在孕婦牀頭

紫光夫人命赦

上六字亦用黃紙照前寫用開水化服符灰不可攪碎服之立產產後即將牀頭所貼一條用元寶一提當天謝送不可忘記遲則生腸立出切記切記此符靈驗異常不可輕用如實係難產虔心書服自得母子俱安

催生萬全符三道

此符三道每一道用煖茶大半杯將符化灰在茶面上

增廣大生要旨 卷三

九

符灰不可撥碎服如安胎符法但每道有二張第一道宜先化龔字張隨化昏字張服之為一道第二道先化明字張隨化⊕字張服之為二道不可顛倒第三道止一張則無分先後矣服第一道後待一二刻若小兒未下再服第二道再待一二刻服第三道倘有橫生逆產或先出一手一足之類不必驚恐慢慢將手足托回裏面將符按次化服無論生死胎立即便下用時須本日書本日服不得隔夜隔夜則不效矣符放潔淨處倘可不用則當空焚化可也

第一道第一張

龍

五龍吐水

牛

感爽無疑滯十月懷胎滿與送下

馬

猛馬四張穿山破岩 焮火冲 泉流通

第一道第二張

昏字大聖北斗七元君能解產生厄上工十

骨鎖開 是男是女速生來

右符第一道用無替黃紙潤四分長五寸潔淨筆墨書化服法如前

第二道第一張

明

日月已成毛髮已成是男是女速生下來把吾符去子母離莫傷母命莫損子身急急如律令救

增廣大生要旨 卷三

三

第二道第二張

以舌黃龍捲動筆池水滿吞下祖宮以身一蹲開生后存身為產女着力直下存嬰身翻身直下

⊕字落筆由外圈入內一筆直下尚有符膽照寫勿錯

龍

救苦龍

長生龍

解厄龍

召戶漸耳

上六字即符膽加在⊕字上面每寫一字念咒一遍連小字作一個字隨寫隨念照字重疊寫上成一片墨不妨

書符咒語

速生來看破應出筆直下是男力曲折是女符破有驗

右咒語不可句讀連念可也

第三道是死胎符

蓬騰斬印暗耳加龜龜龜龜龜龜

右死胎符作第三道

增廣大生要旨

卷三

三

增廣大生要旨卷四

上海唐千頃桐園氏纂著

婁縣葉 灝雅卿氏增訂

產後

新產宜忌

小兒出戶扶產人即以兩手輕抱產母胸前產母亦自以兩手緊抱肚臍令胎衣下墜再宜以手從心下輕輕按摩至臍日三四次使惡露不留

宜厚鋪衲褥高枕靠墊勿令睡下宜仰臥不宜側睡宜豎膝不宜屈足宜閉目靜養切忌大喜大怒亦不得熟睡

增廣大生要旨

卷四

恐倦極熟睡血氣上壅因而眩暈亦不可高聲急叫以致驚恐

四壁遮圍使無空隙庶免受風

房中宜燒舊漆器或用鐵秤錘燒紅入醋中或以醋沃炭火上或以銅杓盛醋微火常煎令醋氣入鼻以免血暈且收斂神氣又能解穢

婦人產後如無他症不必服藥三日之內但以益母草煎湯紅糖調化溫與頻服間服生化湯使惡露下盡自無血暈腹痛之患三日之後少飲陳酒不可令醉又不可仰食鷄子猪羊等肉須以白粥調理松江鯊魚淡蒸或

淡梅乾菜食之半月方與笋鷄鮮肉漸漸加至如量纔免陽盛陰衰發熱脹滿瀉痢等患若不避風寒而感冒不慎口腹而傷中俱致發病

初產時不可問男女恐多言語而泄氣或以愛憎而動氣皆能致病倘連胎生女亦人事之常凡為翁姑與丈夫只宜好言寬慰切不可咨嗟歎息抱怨產婦令其氣苦致病傷生

生男生女自有定數明理人固安義命世有因連胎生女而或棄或溺者能不傷上天好生之心乎文王之聖后妃之德故得螽斯之慶修德行仁自縣瓜瓞求嗣者萬

增廣大生旨 卷四

二

勿河漢予言

滿月後方可梳頭洗足否則手足腰腿必有酸痛等症不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣不可刷齒恐致血逆須至滿月氣血平復方可照常理事

胞衣不下 與三卷中參看

產科心法曰胞衣不下最關利害或孕中食煎炒或臨產氣力疲憊皆不能出宜於剪臍時用苧線繫定不可即剪服以芎歸湯即佛手散自下如或血入胞衣之中脹大不能下以致心悶脹痛喘急者速用失笑丸三錢清酒吞下如不應再用花蕊石散二錢或牛膝散亦可血散脹

消其胞卽下如不急取恐瘀血上升有傷產母之患是以失笑散花蕊石散產科必須預備以防急用

失笑散

蒲黃略五靈脂洗去泥略炒二味等分用米飲丸淡醋水吞或參錢此方治兒枕痛亦必用

花蕊石散

好花蕊石壹觔細研篩淨上色硫黃肆兩研細二味和勻分四分用

好羊腎確揀無疤損者用黃泥週身塗之陰乾曬至裂縫卽補好恐進火氣使內丹走出將藥裝入再用瓦油盞頭一箇仰蓋口上用鹽泥封固口縫待乾用細鐵線上下四圍紮好如此四確用大砂盆一箇將確安放下

增廣大生旨 卷四

三

用大鐵釘攔住週圍硬炭文武火煉大香三炷退去火不可動次日已冷然後取出研極細裝磁瓶聽用此藥十年五載收陳不妨每服二錢熱酒童便調服使瘀血化水而下如不應再進可也 產後敗血暈迷或胞衣脹急不省人事但心頭溫者灌下卽甦亦是起死回生之法然煉此藥亦不易如火候文武不勻確口封不如式硫黃性最猛烈每致迸裂人宜防備且藥亦無用矣

牛膝散

淮牛膝 川芎 蒲黃微炒丹皮各貳兩當歸壹兩肉桂肆錢其為末每服水調五錢 薛氏云胞衣不下則腹脹急

用此藥加朴硝合服自能腐化而下緩則不救

血暈與氣脫宜分別施治

血暈是實症逐瘀為主此因惡露不行惡血冲心心下滿急神昏口噤不省人事切勿放倒急與生化湯失笑散或佛手散皆可用 一法用韭菜一把切碎放有嘴瓶內以熱醋一大盞灌入紮口瓶嘴向鼻遠薰之

氣脫是虛症補正為主此因平素虛弱臨產復用力勞傷去血過多亦致昏暈不醒微虛者少頃即甦大虛者脫竭即死但察其面白口開自汗手足厥冷六脈微極是氣脫症也生死判於頃刻切勿放倒令一人挽住頭髮

增廣大生要旨

卷四

四

急與大劑芎歸參附等回其陽或增損四物湯煎濃徐徐灌之但得下咽即可救活若認作血暈而以行血藥投之益速其斃

產後血攻或下血不止心悶面青身冷欲絕者刺新羊血一盞乘熱飲之三兩服妙

若血氣虛弱又感風邪卒然昏暈不知人者清魂散最佳清魂散 治產後氣血虛弱外感風邪昏暈不省

當歸錢貳川芎伍分人參壹錢炙甘草叁分荆芥捌分炒黑水煎服

子方生下母即昏暈不省此時藥不及備遲則不救急用細絹舊衣謹閉產戶令知事婦女曲膝抵住勿使下面

氣洩又令人一手挽住髮一手捫住口勿使上面氣洩俟其稍轉方用醫治

產科心法曰張仲景先生云產後鬱冒為血虛而厥也其脈微弱嘔吐不食大便堅頭汗出此血虛於下孤陽上冒防其脫也宜大補之 李東垣曰陰血暴亡心神無依致昏冒 鐘齡先生會用人參兩許加炮姜附子以救之子亦救多人用參芪歸地並進而起案附卷尾大抵脾虛痰厥頭眩而嘔者用六君子湯加炮姜若瘀血不行腹痛拒按者服佛手散下失笑丸此為半虛餘皆大虛如面白眼闔口張手散足冷鼻寒皆宜十全大

增廣大生要旨

卷四

五

補若一味退縮不急峻補則人已去遠後悔何及

六君子湯

人參壹錢半夏壹錢白朮土炒壹錢茯苓貳錢炙甘草伍分陳皮叁分

姜棗水煎

十全大補湯見前臨產即入珍佛手散見前失笑丸見前

中風發瘧

產後為風邪所中角弓反張口噤不開名曰瘳風華陀愈風散灌之最妙不得大發其汗并轉吐瀉不能生矣愈風散 治產後中風口噤手足抽掣及角弓反張或血暈不省人事四肢強直或心頭倒築欲吐欲瀉

荆芥穗去梗結每服三錢童便調下口噤則挑牙灌之
或以童便煎取清汁滴入鼻中其效如神

若臨產努逼勞傷陽氣陰血又虧無以養筋為風邪所感
以致牙關緊閉四肢痙強或腰背反張肢體抽搐名曰
痙症當大補氣血略兼荆芥薄荷一二味驅風之品若
專治風邪必致不起

產科心法曰心慌驚悸或目不轉睛語言健忘此由心血
空虛神不守舍當補心神為主安神定志丸歸脾湯並
進或佐以訥菴養心湯其諸症自愈

安神定志丸

增廣本生要旨

卷四

六

茯神 茯苓 遠志 人參各壹兩 石菖蒲 龍齒各壹錢

為末蜜丸桐子大辰砂為衣每服二錢

歸脾湯

人參壹錢 黃芪伍錢 炙黃芪貳錢 甘草伍分 歸身壹錢 茯神參錢

仁貳錢 白朮貳錢 桂圓肉伍枚 姜棗煎

養心湯

人參 炙黃芪 茯神 茯苓 夏麴各壹錢 當歸貳錢

川芎 遠志 柏子仁去油各伍分 肉桂 炙草各壹錢 五味

子貳分 水煎服

又曰產婦汗多發痙俗謂產後驚風實非風也乃肝血空

虛不能榮筋以致手足抽搐有似中風之狀更有口噤
咬牙角弓反張此血氣大虛之惡候若非十全大補加
附子將何以救之或先用古拜散配歸芎服之再服大
補湯自可成功

薛氏案與女科指掌俱云小續命湯此必刻書之人補
入者不然二公何亦荒唐至此不思小續命湯是仲景
傷寒論中風症也第可用之以疎風豈可施之產後乎
且中風一症氣血虛者多有之經謂治風先治血張景
岳有非風之論謂治平人尚宜補血矧其為血氣大虛
之產婦乎

增廣本生要旨

卷四

七

古拜散見後十全大補湯 見前

產門不閉

產門不閉氣血虛也服加味芎歸湯方見 總以大補氣血

為主

產科心法曰此血氣大虛也先用生化湯一二劑隨進入
珍湯補之如不應十全大補湯溫補之自愈間有難
產被穩婆手指撐傷致產門破損疼痛即用花蕊石散
少許搽於傷處自愈

生化湯 治產後兒枕作痛及惡露不行腹痛等症

當歸伍錢 川芎壹錢 桃仁七粒 去皮尖 炮姜叁分 炙草伍分 或加

益母草貳錢水煎溫服或加酒及童便少許沖服 此仙

方也凡新產當服數劑自然去瘀生新產後無病或有

他故再按各症治之 按產後本屬血虛陰亡則陽孤

氣亦受傷若峻補則氣血易滯失調則諸邪易襲此方

去瘀生新扶陽益血行中有補化中有生至當之劑也

八珍湯見前臨產加黃芪肉桂卽十全大補湯

心慌自汗

產科心法曰產後心慌自汗宜服歸姜棗湯并醋炭薰法

當歸肆錢黑炮姜壹錢炒棗仁貳錢加黑棗水煎服若服後自

汗不止心慌無主恐防暈脫可加人參壹錢熟附子伍分顧

其根本仍用醋炭薰之以收神氣汗自止此內外並治

之妙法其人參在初產原不使用然虛脫之象不得不

用只要重用當歸則瘀血不得停畱不礙事也人皆狐

疑不敢用是不知制法用之不當自然悞事若遇氣虛

脾弱汗出泄瀉嘔吐不食等候非用參附將何以救之

經謂血脫益氣虛極生寒必以十全大補湯收功也

惡露不下

產後惡露不下其症或腹痛往來寒熱或小腹痛引腰脊

蓋因腹有宿冷或感新寒以致敗血壅滯不行生化湯

最妙佛手散亦可若惡露淋瀝不絕因腹中惡血未盡

增廣大生要旨 卷四

八

也治法同

產科心法曰產後診視必先問臨產瘀血多與少有與無

此物關係極大眼前則防發熱腹痛小便被阻甚有積

成內癰之患久後變成癥塊積致血鼓豈不大有干係

如瘀不行必多服生化湯自然流通如兼腹脹佐以失

笑丸見前胞衣不下如感冒下部受寒加肉桂

產後血崩

產科心法曰惡露不可不行又不可多行崩者如水之流

此症最重總屬榮氣空虛不能攝血歸經當以歸脾湯

主之然又有怒傷肝者於歸脾湯加炒黑山梔壹錢阿膠

增廣大生要旨 卷四

九

艾葉伍分酒炒柴胡貳分或服補中益氣湯 又有瑞蓮散

方止崩妙劑重者參附湯加阿朮地補之

歸脾湯見前中風

補中益氣湯

黃芪貳錢白朮壹錢歸身壹錢人參壹錢柴胡叁分炙

草伍分升麻叁分陳皮柒分姜棗煎

瑞蓮散

蓮肉百粒棕櫚灰 當歸各壹兩川芎伍錢鯉魚鱗燒灰炮姜

炭伍錢其為末酒調二錢二服自止

參附湯平時崩症亦當參以此理

人參錢叁熟附子錢壹水煎服虛甚加熟地兩壹扶神錢貳阿膠錢伍艾葉分伍大劑補之方能成功遲則防脫貧者以黃芪兩許代參

子宮不收

臨產坐草太早勞力努掙致陰下脫若脫肛狀及陰挺出

逼迫腫痛舉重房勞即使復發清水流注小便淋漓宜

人參乾姜湯或補中益氣湯前見加醋炒白芍外以五味

子為末泡湯洗又用末藥敷之或洗以寸金散

人參乾姜湯 治子宮下脫

人參另煎白芍酒炒山藥各壹歸身貳炮姜伍炙草伍水

增廣生要旨

卷四

十

煎服

敷藥方

血竭伍分人參叁分藥珠壹分冰片貳分釐貳其研極細末摻之

寸金散

紫梢花 胡盧巴 蛇牀子 樟腦各壹錢水煎薰洗

一方用香油抹子宮上以牙皂末吹鼻中取嚏時縮上

此方與盤腸產參看一方以猪大腸斤許煎湯入五倍子末五錢

用細軟細片溫洗緩緩托上 一方蛇牀子一升炒熟

帛包熨患處 一方硫黃烏賊魚骨五味子各五錢為

末摻之 薛立齋曰子宮有損落一片者皆氣血虛脫

所致但服參芪升提之藥自愈此非腸胃可比無礙也補之血肉原可自長

不語

產後不語因母素弱臨產勞傷以致血氣擾亂上壅心竅而不能通津於舌則舌本強而不言語也宜芎歸湯見方盆加石菖蒲之類七珍散亦可

七珍散

人參壹兩石菖蒲錢伍生地兩壹川芎兩壹細辛錢壹防風錢伍辰砂錢伍

另研伍錢共為末每服一錢薄荷湯調下

一方人參石菖蒲石蓮肉各等分共為末每五錢水煎

增廣生要旨

卷四

十一

煎服

產科心法曰此症因心腎虛而不交脾虛不能運動舌本縱有微邪皆由元氣不足所致古方七珍散其中菖蒲細辛防風須酌用如果因風邪所閉且暫服一劑再察其病源兼症治之 若思慮傷脾倦怠食少者服歸脾湯見前若氣血兩虛內熱者用八珍湯見前若脾虛生痰嘔噁少食者用六君子湯見前或水虧生熱而赤火浮者用六味地黃湯如法按經調理自然易愈倘妄行祛風攻痰或用香散之藥則去之遠矣

六味地黃湯

大熟地參錢 山萸肉 淮山藥各錢 牡丹皮 澤瀉各錢

茯苓壹錢 水煎服

產後發熱

不論正產與小產數日後忽然渾身大熱面紅眼赤口渴欲飲凉水晝夜不息此血虛之症宜當歸補血湯以補其血若認作傷寒而誤以陽明症及傳入三陰熱病看而投以寒涼清火之藥必立斃矣

當歸補血湯 大補陰血治血虛發熱如神

黃耆壹兩 當歸伍錢 水煎服

產科心法曰產婦發熱皆因血虛宜四物湯加黑姜溫治

增廣大生要旨

卷四

三

之則熱自退如不應更加童便少許冲服熱自然退但童便性寒不可多用又有脾虛傷食亦能發熱更有胃虛發熱法當調其飲食理其脾胃用五味異功散補之如傷食少加神麩穀芽更有躁熱面目赤色煩渴引飲其脈洪大重按全無此虛極假熱也宜服當歸補血湯重者用十全大補湯或加製附子收其浮散之陽熱必自退若誤醫風熱投以涼散之品立見危殆慎之慎之

乍寒乍熱與前發熱合參

產科心法曰凡產後風寒發熱晝夜不退宜於生化湯中加黑荆芥一味足可驅邪蓋產後體虛百節開張腠裏

不固易受易出此小賊也不比傷寒症之必刀兵驅盜

耳 如血虛與傷食則日晡發熱清晨必退二症雖相

似其中仍有分別如傷食必愛腐吞酸胸膈滿悶穀芽

陳皮湯頻飲可愈其血虛者則無前項等象只可用四

物湯見後加炮姜可退若嘔吐不利腹痛食少脈沉細

而遲或浮大而空宜理中湯溫補之見後腹痛寒熱虛實若

不辨明安能無悞

五味異功散即六君子湯除半夏見前血暈十全大補湯見前產門不閉

愈風散

荆芥穗炒黑壹錢 當歸伍錢 作一服為末生姜湯調下或加川

增廣大生要旨

卷四

三

芎藭煎服亦可此方退風並驚風搖擗俱妙

霍亂

產後勞傷氣血脾胃虛弱或多食煎炒厚味不能運化又

或風寒外侵陰陽隔絕輕則上吐下瀉重則遍體轉筋

腹痛手足厥冷命在頃刻急用佛手散方見前當歸伍錢 川

芎錢叁 加入參白朮炙草乾姜之類以溫其中

浮腫

產後敗血停積以致營衛阻滯運行失度面目四肢浮腫

宜芎歸湯方見前加血餘炭黑荆芥牛膝瞿麥之類

血行則腫自消若作水氣治產後既虛又以藥虛之是

謂重虛多致厥枉 凡水氣必發嗽小便數若小便如常不發嗽但覺手足寒乃氣血塞而不通也不可攻水若因氣血虛而腫者又當調補不可以敗血醫治益傷脾氣

蒸乳

產科心法曰乳必使呼通如不通必乳腫作寒熱之狀此非他症為乳所阻宜用香附瓜蒌通草橘葉煎服其藥渣煎洗如不自乳子者只煎炒麥芽三錢薰洗乳退熱亦退

乳少

增廣大生要旨

卷四

齒

乳少者血虛胃弱之故產時去血過多或產前有病以及貧苦之家僕婢下人產後失於調養血脈枯槁又或年至四十血氣漸衰往往無乳但服通脈湯自能有乳若用穿山甲漏蘆王不留行等物勉強催逼乳汁清薄令兒不壽且損傷氣血產後多病不久便乾反為不美惟壯健婦人痰氣壅盛乳滯不來者可用疎利之藥

通脈湯 治乳少

生黃芪兩壹錢當歸伍錢白芷壹錢通草貳錢用七孔猪蹄一對煮湯吹去浮油煎藥一大碗服之以被覆面而睡即有乳或未效再一服新產無乳者不用猪蹄只須水酒各半

煎服體壯者加好紅花三五分以消惡露 簡易方 凡婦人乳汁不通用小赤豆一斗即赤豆之小者俗乎米赤煮粥食之乳自通利 乳汁乃氣血所化產後不可多食鹽不獨少乳且能發嗽也

產科心法曰產後憑乳以養兒凡乳少總屬氣血不足然酒雖引血生乳宜用淡酒若多飲及飲好酒每致少乳藥服黃芪補血湯見前作寒乍熱加山藥三五錢極妙或以蝦斤許煎淡酒去蝦飲

乳癰內吹外吹

產後乳腫脹痛其因大抵有二一必少壯之婦氣血強盛

增廣大生要旨

卷四

辛

乳汁多而兒尚小不能喫退以致宿乳留畜新乳又生陳陳相因壅塞乳竅凝滯不通以致腫痛成癰最易成而易潰勢必傳房不致一癰而已一必任兒含乳睡着兒不吮乳反吹氣入乳中亦閉乳竅以致脹痛其症稍緩二症只消疎通乳竅兒吮手揉使乳汁流暢便可消散非若病由七情鬱結致生乳岩不赤不痛積之歲月者之難治也但不急醫而任其潰爛後必乳少汁清致兒缺乳多病受累無窮其母須自慎之

神效瓜蒌散 治乳癰

瓜蒌壹個研生粉草當歸酒洗各伍錢乳香油去淨沒藥去淨油各

錢用酒煎服良久再服

五物湯 治乳多腫痛成癰

四物湯 見後腸中癢 加麥芽五錢煎服

簡易方 治乳癰初發

貝母爲末每服二錢熱酒下即揉乳使通

又方 治乳癰乳吹

蒲公英一握搗爛入酒半鍾絞酒溫服渣貼患處甚者

三五服愈

又方 能托散諸毒女人乳癰尤效

將遠志用米泔水浸洗槌去心爲末服三錢用好陳酒

增廣大生要旨

卷四

六

一鍾煎澄清飲之滓敷患處

產科心法曰婦人乳疾必發寒熱兒在母腹中七八個月

乳忽紅腫名曰內吹產後有硬塊者或乳不通宿乳積

成或被子含口中吹氣貫入名曰外吹俱防生癰宜服

瓜萸散外敷香附餅自可消散又有婦人肝氣鬱怒者

並用前方加柴胡參分白芍壹錢俱酒炒橘葉十片煎服早

消爲妙或服逍遙散亦可

瓜萸散 前見

香附餅

香附肆兩炒麝香參分共爲末另用蒲公英貳兩銀花參錢酒

煎去渣以此藥酒調香附末頓熱敷患處內服瓜萸散

自消

逍遙散

當歸貳錢白芍壹錢柴胡酒略炒茯苓壹錢白朮壹錢炙

草伍分薄荷伍分姜貳片煎服此方加丹皮黑山梔名加味道

遙散平肝火也

狂言譫語

產後狂言譫語如見鬼神者其源不一一則心虛中風精

神恍惚言語錯亂宜芎歸合華陀愈風散方見前二則敗

血迷亂心經顛狂悶暈同血暈治法三則感冒風寒惡

增廣大生要旨

卷四

七

露不行憎寒發熱如瘧晝日明了暮則語如見鬼神宜

芎歸湯方見前加驅風寒藥一二味如荆芥藜本炮姜之類四則產

傷氣血心氣大虛以致心神驚悸不安時見鬼神言語

顛倒宜芎歸湯吞補心丸得臥即安

補心丸

黃芪蜜炙棗仁去心遠志甘草湯泡焙茯苓各貳錢生地伍錢人參

錢壹錢菖蒲參分共爲細末大棗和丸硃砂爲衣

產科心法曰產後顛狂譫語或乍見鬼神甚有不避親疎

不知羞恥者其間有血虛神不守舍者有敗血未盡悞

補而然者有心脾本虛妄思妄想致心神不安者治法

用安神定志丸倍人參加歸芎主之佐以歸脾湯子制
定神湯每用取効此皆安神補虛之意也倘早能逐清
敗瘀則新血自生安有顛狂之變此為姑息錯治所致
病久名曰失心症有縣延數載者治法惟白金丸最妙
也

定神湯

人參壹錢熟地叁錢當歸貳錢茯神貳錢製附子伍分肉桂叁分澤蘭
參錢鬱金壹錢龍齒捌分橘紅捌分用鐵秤碾燒紅淬水煎服
白金丸 經驗方曰婦人失心病狂驚憂痰結血於心絡
竅者服之神效屢用奇驗

增廣大生要旨

卷四

六

真川鬱金兩明礬兩為末薄荷疊法為丸每服五十丸

開水下一方用薄荷湯為丸

安神定志丸見前歸脾湯見前

琥珀地黃丸 此方治產後偶感惡露不行憎寒發熱狀
如瘧疾晝明白夜譫語與熱入血室同皆血分病用此
丸極妙若攻痰則危矣

琥珀另研延胡索糯米炒當歸各壹兩蒲黃貳兩生地壹斤搗
以汁浸生薑壹斤搗爛絞汁以共為末煉蜜為丸彈
姜渣曬乾汁浸生地渣曬乾子大開水化下一丸

又方 治敗血上衝發熱狂言脈虛大者

生地 丹皮 荷葉各貳錢煎湯調真生蒲黃末二錢下
心腹諸痛以下皆產科心法

心腹痛各有不同有瘀血凝結有飲食停滯有風冷客進
指掌各為各類未免煩衍大抵初痛總宜服生化湯去
瘀生新亦有二三劑而痛即止者如或瘀積小腹不散
轉側若刀錐刺痛手不可按痛而不移者用失笑丸主
之佐花蕊石散二錢二方並見前胞衣不下 瘀行痛止如感風寒
必口鼻氣冷如停食必吞酸滿悶此二症俱用二香散
主之若中氣虛寒腹中冷痛必喜熱物熨手按而痛稍
緩用理中湯加肉桂溫之如小腹氣從下逆冲而上痛

增廣大生要旨

卷四

九

連心腹忽聚忽散此瘕氣也另用橘核丸主之如小腹
有塊手不可按係瘀血壅滯名曰兒枕痛並用失笑丸
若瘕不散久之防生腸癰即於後編查看審治

香散

香附貳錢廣木香壹錢砂仁伍分陳皮捌分炙草伍分炮姜壹錢生薑
片水煎服

理中湯

白朮貳錢炙草柒分乾姜壹錢人參壹錢煎服加製附子名
橘核丸

橘核鹽酒炒小茴香 川棟子煨去桃仁雙仁者不用

香附 山查核炒各壹兩紅花 黃木香各伍錢 共為末以補麩三兩打糊為丸每服三錢開水下

腹內癰作痛

產後積瘀每生內癰人所罕識其流腿股而生者外毒也外科可治無害積於內而生大小腸癰者內科產科之事不可不知往往穿臍而貫或內爛斷腸而死人第知為腹痛而死不知腸癰之為害子治愈多人因著於編以補前人所未發并使後之產科知之知所補救其症當按其腹痛處有硬塊在臍邊按之愈痛者是也若塊堅硬猶未成膿脈必不數痛無休歇方用牡丹皮散數

增廣大生要旨

卷四

辛

刺必消如尺脈已數按塊稍軟內必腸鳴二便不甚利痛或一止少頃又痛此癰已成膿毒無出路小腸癰必穿臍而出勢已危矣以大劑人參補之或可十中救一然性命雖保亦終身不能生育矣倘不知治法則尿從臍出必死無救其大腸癰大便難下治不如法或不與出毒毒必爛腸腸傷必瀉上不飲食而嘔惡口中有一股濁穢之氣此腸爛穿必死子治驗有案附於卷尾若癰流腿股或腰髖則痛如錐刺手不可近亦防生疽宜服桃仁湯早散之 腸癰初起小腹痛小便不利六脈微緩不作寒熱者輕若小腹堅硬而腫六脈洪數者

險或尺部獨數尚可治潰後腥臭不進食不受補者不治初服丹皮散不消再進桃仁湯或薏苡仁湯如消不去以排膿湯如未穿與陳皮葵根湯即穿膿出後仍有微痛用海浮湯三服毒未盡可盡毒已盡者易於收口三服後即宜服四物入珍十全大補等湯補之不然毒雖去內尚虛防有食少面黃盜汗無力神倦不寐一派虛象出矣併忌房事年餘食物氣惱俱宜謹慎

千金牡丹皮散

丹皮 苡仁 茯苓 生黃芪 生甘草 桃仁 白芷以上各壹錢 當歸叁錢 川芎壹錢 官桂伍分 木香叁分 人參壹錢 無

增廣大生要旨

卷四

辛

黨參伍陸錢代之 水煎食前服

薏苡仁湯

苡仁 瓜蒌仁各叁錢 丹皮 白芍各壹錢 桃仁貳錢 去皮尖研空

排膿湯

生黃芪 當歸各叁錢 銀花 川芎 甲片炒散 瓜蒌仁 白芷各壹錢 甘草伍分 水煎空心服

陳皮葵根湯

生黃芪伍錢 廣皮 當歸 皂角各貳錢 蜀葵花根壹兩 切片 水三碗酒一盃煎分二次服

海浮湯

明乳香去淨油 沒藥去淨油 浙貝 茯苓各壹錢 生黃芪

酒炒炙草伍分 水煎服

四物湯見後 入珍湯見前 產門不開 加黃芪

呃逆

此乃傷寒失下症有之今產婦脾胃虛或食熱物冷熱相

搏或寒凝於中皆有之寒者用丁香肉桂熱用橘皮竹

茹湯加柿蒂主之或炙其門穴自止

橘皮竹茹湯

廣皮貳錢 竹茹壹錢 甘草伍分 姜棗水煎

增廣大生要旨

卷四

三

產後身痛

身痛者因產時百節開張血脈空虛不能榮養筋骨也又

有敗血乘虛流注經絡致痛大意按之痛者非風寒即

瘀滯若按之不痛附熱者虛寒也如血不足以流通者

四物湯見後 加黑姜桃仁紅花澤蘭補兼運行如或喜

按畏寒者四物湯加人參白朮黑姜補養自安有外感

風寒則發寒熱頭痛身痛或鼻塞口出火氣斯為外感

用古拜散加歸芎黑姜秦艸以溫散如散後痛未盡止

乃氣血虛致榮衛未和用入珍湯補之此散後補之大

法也

古拜散

荆芥穗炒黑為末生姜湯調下一二錢量人虛實用

本方加當歸亦名清魂散更穩此方產後受風筋脈引

急或搐抽口噤或昏憤不省人事頭身痛發寒熱一二

劑即愈蓋產後空虛之人斷不可用羌防柴葛之類以

重其疾也

產後腰痛

產後未有不傷腎者腰痛總屬腎虛當用六味地黃湯見前

不加杜仲續斷肉桂或食豬腰子補之又有腎氣不足

用入珍湯見前 杜仲續斷肉桂又或風冷客於下部必上

增廣大生要旨

卷四

三

連脊背下連腿膝用獨活寄生湯甚加附子溫散然祗

可服一二劑不可多服痛稍定隨用前方補之子制清

腰湯服之頗當

獨活寄生湯

當歸壹錢 獨活壹錢 桑寄生壹錢 秦艸伍分 茯苓壹錢 牛膝壹錢 甘草

參伍分 威靈仙壹錢 細辛伍分 肉桂伍分 或官桂壹錢 狗脊伍分 姜片貳分

煎服

清腰湯

黑料豆伍錢 狗脊壹錢 桑寄生 川斷各壹錢 杜仲 丹參各

錢 肉桂伍分 青鹽貳分 水煎服

蓐勞

產後氣血空虛真元未復一有勞動則寒熱交作食少不寐頭目四肢脹痛或日輕夜重或時發時止變症不一名曰蓐勞最難調治大凡陽虛則惡寒陰虛則惡熱清陽不升則頭目痛血不足以榮養則四肢痺痛宜用入珍湯補之見前若脾虛食少嘔噁多痰用六君子見前加炮姜以溫中諸症自可全退然非參不可若一見前症遽用表散則失之遠矣所以初產數日斷不可梳洗勞動因其骨節尚未鬥筍筋脈易於損傷不可因體健而大意常有纏綿難愈日久成勞或致廢疾者不可不慎

增廣大生要旨

卷四

齒

也

白茯苓散 指掌曰白茯苓散羊肉等方皆治蓐勞亦甚靈驗因附於此以備擇用

茯苓壹兩 人參 炙黃芪 當歸 川芎 白芍酒炒 熟地

桂心各伍錢 共為末用猪腰去油膜 淨一對姜叁片 棗貳枚 水煎姜棗

腎煎湯去渣入前藥末伍錢再煎服

景羊肉湯

精羊肉壹斤 當歸伍兩 黃芪肆兩 生薑叁兩 水八升先煮羊肉生薑取湯五升入歸貳兩再煎減至三升每服七合 人參 黨甲散

人參伍錢 炙黨甲兩 淮牛膝 炙黃芪 茯苓 桑寄生

當歸 桂心 白芍炒 桃仁 川斷 甘草 熟地

麥冬各伍錢 共為末和勻另用猪腰一對去淨膜加姜叁片

棗貳枚 水三碗煮取湯一大碗入前藥末三錢又加葱白

一寸烏梅三個荆芥叁分再煎溫服日日如此服完藥末

即愈

喘促

新產氣急喘促因榮血暴竭衛氣無依名曰孤陽極危險

之症急用六味地黃湯見前加人參以益其陰若脾肺

虛者用四君子湯見前血暈即六君子加當歸黑姜以益

增廣大生要旨

卷四

齒

其陽如見自汗厥冷再加附子又有假熱喘而多汗者

用十全大補湯見前加附子大劑重用方可救耳最

怕喘急弔引瘀血上來一入於肺則鼻衄出乃肺欲絕

矣入於心則昏憤無知心欲絕矣如外感嗽喘或素有

痰哮喘症者則無妨用四君子湯加蘇梗陳皮炮姜歸芎

治愈

鼻中起黑煤

產後有病或汗多或喘急發熱俱要留意看鼻尖黃明者

生若鼻尖青環口黑色鼻內起煙煤者皆是絕敗之候

如喘急即用二味參蘇飲或可速救敗絕張景岳云氣

不能升降乃元海無根虧損肺腎而喘及至鼻煤唇黑氣將脫矣急服貞元飲救之

參蘇飲

人參壹兩蘇木叁錢水煎服如厥冷自汗加熟附子貳錢

錢

貞元飲

大熟地叁兩當歸叁錢炙草壹錢陰寒足冷加肉桂壹錢或加炮

姜人參各叁錢水煎頻服

產後舌黑舌枯

凡產後妄投冷散致舌黑而枯或光紅無底皆危症也有

增廣大生要旨

卷四

美

汗出多或童便用多而未顧其心腎者均有之蓋舌乃心之苗腎之本也如黑而帶潤色尚可挽回六味湯前見不重用熟地加人參炮姜主之若舌乾黑而枯且渴者為血液已亡不可救矣斯時惟有獨參湯兩許頻灌之或可十中救一若無力用參亦無益此症腎氣已竭不備用附桂剛烈之品惟人參能救氣於無何有之鄉且陽能生陰又生津液庶望回春 此症產十日內見者多不然必是汗多亡陽下虛亡陰譬如痢疾見舌枯或光紅如緞而乾渴者皆不治即下虛亡陰也

獨參湯

好人參一兩煮一碗或加五味子一錢頻灌入或人參伍錢大熟地貳兩名二儀膏煎服亦妙

產後咳嗽此皆產科心法

產後嗽輕者肺虛也用生化湯加北沙參或酒炒黃芪如聲重咳不止者風也或虛火上冲也風則於生化湯中加黑荆芥穗火則於生化湯中除黑姜加炒麥冬又有冬月寒氣冲肺致嗽用黑姜加生姜自止但肺為嬌臟不可久延致吊起瘀血或久嗽傷肺而致吐血入損總之肺經之藥勿用剛燥宜從滋潤養陰則無悞矣凡肺經之藥補用沙參黃芪清用貝母杏仁散用荆芥桔梗

增廣大生要旨

卷四

毛

涼用桑皮白前皆一定不易更有用參朮苓草補脾者虛則補其母也有用熟地阿膠補腎是補其子也使金水相生之理久嗽防損必補土補水子母相生亦一定也不特治產宜然即平人咳嗽皆以此法為準繩

產後備方

增損四物湯 治產後下血過多及血脫等症

當歸叁錢川芎 白芍酒炒人參各壹錢炮姜叁分炙草伍分水煎

冲入童便一小盃溫服

補脾飲 治婦人臨產損破脾胃小便不禁

黃絲絹天生黃者三尺用炭灰淋汁煮爛以清水漂極淨黃蠟伍錢白蜜壹兩馬兜

勃 茅根各貳錢 水二盞煎至一盞空心服服時須斂氣不得作聲如作聲則無效

黃芪湯 治因產陰虛又遇風邪虛汗不止

黃芪蜜炙 熟地各貳錢 白朮土炒壹錢 防風柒分 茯苓壹錢 麥冬伍分 去心牡蠣粉壹錢 紅棗貳枚 水煎溫服

產後奇病

產子之後有舌不能收者以飛淨辰砂敷其舌仍命作產子狀令兩人掖之乃於壁外潛累破盜墜地作碎聲聞其聲舌即收矣

新產之後有兩乳忽長細如腸垂過小腹痛不可忍名曰

增廣大生要旨 卷四

天

乳懸將川芎當歸各一觔以半觔剉散入瓦器內用水煎濃不拘多少頻服以半觔切塊於房內燒煙令婦將鼻吸煙如未愈再製一料更以草麻子肉一粒研碎塗頂俟愈急洗去

產後用力產戶垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹以老姜三觔連皮搗爛入麻油二觔拌勻炒乾先以熟絹五尺摺方令人輕輕盛起肉線使之屈蟠納入產戶再以絹袋盛姜就近薰之冷則更換一日夜收入大半二日收盡其肉線切不可使斷斷則不可治矣

有產後忽生蟲一對長寸餘置地能行埋入土中數日發

視暴大如拳名子母蟲以後月生一對用苦參米泔浸一宿蒸乾 加入祛蟲藥為丸服之又生一對而愈

產後腸癢難忍者以平日所用針線袋或箭箝及簇置臥褥下勿令婦及他人知癢自止產科心法曰產後腸癢因去血多或調理失宜氣血兩虧所致服四物湯滋養自安或以食鹽炒熱布包熨臍上自愈

四物湯

大熟地叁錢 當歸貳錢 白芍壹錢 川芎伍分 水煎服

一婦產後日食黍粥二十餘碗一月後其身冷處有數塊以指按之其冷即從指下上應於心如二年諸治不

增廣大生要旨 卷四

天

效以八物湯去地黃加橘紅入姜汁竹瀝一鍾不十劑而愈

產後諸症治法以下諸條係子家家傳胎產秘方也錄各條中對症施治罔不應手奏效因附於此以備選用葉瀨識

一產後起居太早產戶因虛感風產門如生陰毒痛苦手不可近衣被難著急用祛風定痛方慎勿悞服敗毒等藥

當歸 生地各貳錢 川芎壹錢 獨活 防風 肉桂 茯苓 荊芥各伍分 棗水煎

二產後勞傷氣血兩虛及稟弱少食患脫肛癩疝等症宜

服大補生化湯

三產後血多或勞倦昏暗血暈宜頻服生化湯服至產婦

精神如舊而止如血暈形色脫或汗多加人參三四錢

四產後胞衣不下宜溫服生化湯兩帖初煎下益母丸一

丸次煎又一丸外用烘熱衣服煖產婦腹凡冬月慎不

可在淨桶及人身上守候胞衣致嚴寒損害產母必須

上牀蓋被火籠暖身頻服生化湯方無失悞

益母丸 孕婦諸症並宜服之

益母草肆兩白朮壹兩條芩捌錢煉蜜丸如彈子大孕內多氣

加木香叁錢胸腹不舒加紫蘇陳皮各貳錢

增廣木生要旨

卷四

幸

五產後頭痛身熱惡寒雖明知感冒只宜連服生化湯服

至熱退疼除而止如三四帖後頭疼如故加連鬚葱頭

四五个

六產後乍寒乍熱脇痛或頭痛宜服生化湯三兩帖如未

除加桂枝七八分以散寒塊木香磨一分

七產後感寒上攻則心痛下攻則腹痛且血塊又痛宜服

生化湯加桂枝壹錢以定痛如兩帖未止再加吳茱萸或

姜三片必用在生化湯中助血方妥若獨用諸熱藥攻

寒其痛雖止血分虧矣

八產後身熱或夜熱或寒熱往來並宜服生化湯

九產後寒熱往來每日應期發作似瘧只宜服生化湯幾

帖寒熱自除如汗多人虛加人參

十產後感寒心下痞滿宜服生化湯加陳皮桔梗白豆蔻

各伍分木香壹錢

十一產後感寒咳嗽或身熱宜服生化湯加杏仁拾粒知母

天冬各壹錢甘草肆分桔梗伍分痰加橘紅肆分天花粉捌分有汗

加人參

十二產後傷食宜生化湯加神麴壹錢麥冬伍分如停肉食加

砂仁山查各肆分傷寒飲食加吳茱萸壹錢桂枝伍分傷寒食

脇痛加肉桂柒分

增廣木生要旨

卷四

幸

十三產後忿怒心膈滿悶宜生化湯加木香貳分

十四產後日久大便不通宜生化湯加菴蓉貳錢日服二三

帖助血血旺自通另研芝麻三合爲末和米一升作粥

飲之

十五產後血多或汗多小便澀少或不通宜生化湯加人

參五味麥冬如仍不通用葱頭一箇切一指厚放臍上

艾灸之

十六產後氣血虛冒寒小便不禁或多遺溺宜服生化湯

加益智仁六分

十七產後泄瀉宜生化湯加茯苓壹錢澤瀉柒分另蓮子同糲

米粳米等分煮粥食之如脫形昏倦即服加參生化湯
十八產後失血心神失守妄言妄見宜生化湯加茯苓
仁遠志柏仁去油各壹錢橘紅肆分麥冬壹錢如虛汗脫即服加
參生化湯

十九產後足冷發厥血塊又痛宜生化湯

二十產後痢不分紅白宜生化湯減干姜加木香三分

廿一產後血崩大脫宜頻服生化湯加炒黑荆芥穗壹錢如
不效服加參生化湯

廿二產後霍亂吐痢多因虛中感寒用生化湯加砂仁茯
苓藿香生姜

增廣大生要旨 卷四

廿三產後遍身痛多屬氣血虛滯宜生化湯加蕉白二十
根肉桂八分

廿四產後癱疽宜生化湯加連翹天花粉各壹錢又菘豆粉
錢和服不可服敗毒散大黃等藥

廿五產後四肢麻木血虛宜生化湯加浮萍如血崩脫而
麻木宜加參生化湯

廿六產後目疼昏熱赤腫宜生化湯加荆芥

廿七產後卒然口噤牙緊手足攣搐類中風宜生化湯加
天麻羌活防風姜壹片

廿八墮胎即小產凡孕後患傷寒或患疫症熱久皆能墮

胎墮後未免增熱因熱消陰血又繼產脫血故治者慎
勿妄論傷寒痰熱未除誤投梔子豉湯芩柏等藥或寒
熱往來柴胡斷不可用或潮熱往來大小便秘承氣五
苓等湯亦斷不可投總宜頻服生化湯日進兩帖服至
熱退停藥如虛脫形色脫或汗多或渴兩帖後即加人
參麥冬以防暈厥且生化湯有川芎性辛散邪乾姜助
血能除大熱其結燥便秘灼熱多服生化湯自然津液
漸生二氣和通矣

倍參生化湯 產後危急諸症並宜服

當歸伍錢川芎貳錢乾姜肆分炙甘草肆分人參叁錢桃仁拾粒

增廣大生要旨 卷四

去皮棗貳枚尖研貳枚五急症

一 晚下即時昏暈形色脫宜倍參生化湯加荆芥穗五分

二 產後勞倦形色脫宜倍參生化湯加黃芪壹錢熟地叁錢

附子叁分如血塊痛除地茛

三 產後血崩形色脫宜倍參生化湯加荆芥穗肆分如血塊
痛可服升舉止崩神烏方

白朮 當歸 熟地各壹錢人參肆錢黃芪肆錢黃連 甘草

升麻 陳皮 白芷 荆芥各肆分熟附三分棗水煎

四 產後汗多形色脫宜倍參生化湯減乾姜加麻黃根棗

仁黃芪各壹錢 熟地叁錢 血塊痛未止除芪地加浮小麥拾粒 防風捌分

五產後氣短似喘宜服倍參生化湯加沉香貳分 陳皮香

附各叁 以上五症兼見雜症俱照後開加減法

渴加麥冬壹錢 北五味伍粒 瀉加白茯苓壹錢 澤瀉捌分 大便不

通加茯苓伍錢 驚悸加棗仁壹錢 益智仁壹錢 傷麵食加神

麩捌分 麥芽伍分 傷肉食加砂仁伍分 山查壹錢 小便不禁加益

智仁陸分 寒嗽加杏仁拾粒 桂枝伍分 痰加天花粉捌分 橘紅肆分

虛嗽加天冬壹錢 瓜蒌仁捌分 食少加白朮貳錢 氣虛痰加竹

瀝半酒盞姜汁少許

增廣大生要旨

卷四

毒

一產後頭疼身汗倦怠宜倍參生化湯加黃芪壹錢 麻黃根肆錢

地骨皮壹錢 白芷防風羌活各肆分 棗水煎

二產後感寒身熱頭疼嗽重有痰有汗宜生化湯加人參

壹錢 天花粉壹錢 麻黃根肆錢 地骨皮壹錢 桔梗肆錢 如頭疼甚加

連鬚葱頭五箇

三產後先寒後熱或潮熱夜熱每日應時類瘧有汗宜生

化湯加軟柴胡青皮各捌分 烏梅貳個 汗多加麻黃根肆錢 汗

不止加熟地貳錢 食少加黃芪白朮各壹錢 陳皮肆分

四產後妄言妄見宜加味生化湯加棗仁茯神柏子仁遠

志麥冬各壹錢 橘紅肆分

五產後足冷發厥一日三四次厥去宜倍參生化湯加白

朮壹錢 熟地壹錢 製附子肆分

六產後身熱有汗大便不通宜倍參生化湯加麻黃根肆錢

麻仁地骨皮肉苁蓉各壹錢

七產後身熱有汗脇痛或潮熱宜加參生化湯加麻黃根

肆錢 黃芪壹錢 桔槔壹錢 柴胡各柒分 臍下痛按之稍止加熟地

貳錢

八產後大便不通潮熱睡中妄言宜加參生化湯加棗仁

地骨皮各壹錢

九產後有汗小便少宜加參生化湯加麻黃根肆錢 麥芽肆錢

增廣大生要旨

卷四

毒

根五味黃芪各伍分

十產後有汗泄瀉宜生化湯加麻黃根肆錢 肉果壹個 蓮子拾粒

十一產後有汗泄瀉危困甚宜丹溪醫按方見第十

十二產後大便不通誤服大黃成鼓脹

十三產後傷食誤服消導藥成鼓脹

十四產後忿怒誤服耗氣藥成鼓脹 以上三症誤下誤

消誤耗並宜用丹溪醫按方 人參、當歸各叁錢 川芎

白芍 茯苓各壹錢 澤瀉捌分 厚朴製 紫蘇各伍分 陳皮肆分

腹皮 萊菔子各陸分 傷麵食加神麩壹錢 麥芽壹錢 傷肉

食加焦山查壹錢砂仁伍分怒氣加木香叁分

十五傷食痛或脇痛誤服消導方多絕穀食獨用鍋飯焦

為粉後用人參壹錢姜片壹錢煎湯調服焦粉漸漸引開胃口

十六產後血崩日久不止宜服升舉大補方 白朮 當

歸 熟地 人參 川芎 黃芪 麥冬各貳錢 荆芥

羌活 防風 升麻各伍分 陳皮 甘草各肆分 黃連 黃

柏各叁分 此方常人血崩服之亦效

十七子宮不收產戶不閉脫肛重者並宜倍參生化湯

十八產後神昏形脫有汗倍參生化湯內減乾姜忌食姜

葱 以上十八危症並以補氣為主隨症緩急按方加

增廣大生要旨

卷四

美

減在用者細心參酌

附產科心法汪樸齋治驗醫案

產後腹脹惟胞未下者有之兒生後自收子族弟媳產下

時腹已收次日忽大如鼓較之產前更甚脹悶難安氣

急促命在旦夕子適遠歸急治之腹大且堅二便不通

咸謂未產日食物停滯子診其脈軟而濇知非停食必

產時冷風入子宮致瘀血凝滯用生化湯加肉桂壹錢煎

好下失笑丸叁錢又調花蕊散叁錢進二帖而腹減半再服

生化湯倍黑姜數帖而安此症若不憑脈理遽用消食

則誤矣

大族姪媳產後發疹醫謂是瘡麻用桔梗荆防發之兩日

遂喘汗熱悶幾欲絕子視之脈寸大尺空且遲曰此非

麻瘡也緣下部虛寒其無根失守之火浮遊於上發虛

疹如蚊蹟隱於膚內耳且新產纔七朝豈堪任此涼散

急進十全大補湯加附子而汗止喘定二帖後易八珍

湯半月後與六味而痊此症設被壞事祇知瘡發不出

而死誰怨其錯可不懼哉

海鹽俞姓婦腹孕三子俱不育臨產時穩婆見胞半出以

手拖下傷其帶脈致腹痛一足縮不能伸經一月痛楚

難睡子視之乃弔腳腸癰也脈已數知毒熟矣乃用黃

增廣大生要旨

卷四

美

芪皂角甲片陳皮當歸加葵根酒水煎服次日下膿數

碗腹痛漸減隨服參芪地歸補之繼用四物湯八珍湯

月餘而起

有陳姓妻產後小便不通脹痛難安子曰瘀阻膀胱氣不

化也與生化湯加肉桂陸分澤蘭貳錢夜半得小便次日復

用六味湯吞失笑丸遂痊

許姓婦產後寒熱醫進鉤藤荆芥不效繼用柴胡湯熱愈

盛面赤鼻出血子視之乃血虛症誤用柴胡致血上冲

若再進必死急用四物湯加牛膝茯神而鼻血止轉用

八珍湯加黑姜而熱退後以芪歸地朮補之而愈

子族女產後驚風子曰此肝風內動又感外邪而然今熱不退而汗多手足搐搦已成痙厥此外將解而內虛為重隨用歸芎加黑荆芥少許外用醋炭薰之汗漸少即進姜桂四物湯而熱退次日轉用八珍湯加肉桂數帖而愈

吳姓婦產後腹脹小便不利子診脈遲軟知寒結衝任二脈氣滯不宣用五味異功散加熟附子壹錢數帖而安

許姓婦孕五月醫謂經阻用紅花桃仁香附行血等藥夜半血崩子往視形脈俱脫不知人事即用人參貳錢炙芪貳錢兩阿膠貳錢熟地貳錢製附子壹錢煎好灌下至五更脈出人

增廣大生要旨 卷四 素
甦襜內見胞胎方知藥誤小產斯時倘不峻補安能有命

項氏婦小產崩脫子診之已無脈胸膈滿悶氣促汗出危急之極子用人參貳錢熟地壹兩阿膠叁錢艾葉壹錢製附子壹錢炙黃芪壹兩當歸叁錢速令煎服服半帖氣仍悶促隨令再進胸悶頓舒氣亦勻脈亦續至次早又進原方遂漸愈

此即內經所謂塞因塞用也緣氣不歸原下不納氣致浮於上又即下虛上實血既亡矣陽無所附若非大補即脫去矣

附安胎萬全神應湯 治胎孕三月前後或經怒或蹶跌

以致胎傷腹痛腰疼一帖即安雖見血一二日未離宮者亦即安倘先經三四五個月曾半產者及到月分略覺腰骨酸脹一帖便安數服即萬全矣

當歸壹錢熟地壹錢姜汁製白朮壹錢黃芩壹錢川芎壹錢白芍壹錢杜仲壹錢白茯苓壹錢炙黃芪壹錢阿膠珠壹錢胸前作脹加紫蘇陸分陳皮陸分下帶或紅加地榆壹錢斷艾壹錢見血加川續斷壹錢糯米百粒水煎空心服

增廣大生要旨 卷四 素

增廣大生要旨卷五

上海唐千頃桐園氏纂著

婁縣葉 顓雅卿氏增訂

保嬰

總論

嬰孩初誕尚如一點萌芽此時調護極須得宜庶無不測之症兒之易長易成其權總操父母天壽之故有二一則由於稟賦一則由於撫養稟賦為胎元之本精血之受於父母者是也撫養為栽培之本居處寒溫飲食得宜是也稟賦之說已於求嗣卷中言之至於撫養常見

增廣大生要旨

卷五

少年得子自尙童心貪佚多慾失於顧復而富貴艱嗣者又矜張姑息往往過情太過不及同一致病故以養孩之法列後為保嬰良式

初生去毒

分娩之時初離母體口有液毒如血塊狀啼聲一出隨即嚥下伏於命門他日發為驚熱瘡疹惡痘等症須於未啼時急用絲絲裹指挖去口中濁穢以清臟腑然倉卒之際多不暇及至已啼而拭多不見物須用落地解毒法

落地解毒開口法

新產小兒飲食未開胃氣未動是混一清虛之府以甘草

細切少許將潔淨細絹包裹用沸湯泡浸蓋內不宜太

甜用軟帛裹指蘸汁徧拭口中去其濁穢隨用胡桃肉

去皮研極爛以稀絹或薄紗包如小棗納兒口中任其

吮汁非獨和中且能養臟最佳法也若母氣素寒小兒

清弱者及產時收生遲慢致受風寒者兒必面色皸白

唇色淡紅只以淡姜湯拭之最能去胃寒并免吐瀉之

患此法最妙拭後仍用胡桃肉法

世間多有有用黃連拭口者不知黃連大苦大寒能損胃氣

小兒初脫母胎全賴後天脾胃強健豈可卽以苦劣之

增廣大生要旨

卷五

味相犯他日變嘔變瀉不乳腹痛長病驚勞皆由此起

陳文中曰小兒初生便服硃砂輕粉白蜜黃連本欲下

胎毒不知多傷脾敗陽之藥輕粉損心硃砂損神兒實

者服之軟弱弱者服之易傷反致變生諸害不可不察

真至言也

凡下胎毒只宜用甘草淡豆豉濃煎汁與三五口其毒自

下又能助養脾氣消化乳食按近日人家惟用黃連黃

湯

新增小兒開口方

生大黃叁分 酒拌 桃仁叁粒 去皮尖搗 當歸尾叁分 紅花叁分

生甘草分壹用水一盃煎汁半盃以蘇浸冷兒吮要於六個時內服完 嬰兒痘毒多因母腹瘀血穢惡生下不易消盡致出痘之時種種危險或未痘之先驚風瘡痍皆由於此只在兒生後六個時內服此藥解下瘀物如黑漆痰膠再停半日或一日俟瘀物下盡食乳痘竟不出即出稀少屢試屢驗兒初生未會食乳多餓不妨可以放心

新增先知百勝散

川白蜜 小磨麻油 鷄蛋清 黃酒

凡小兒初生洗三時即以右物四種各一調羹和勻先

增廣大生要旨 卷五

三

敷前胸次敷後背用新木梳略梳幾梳後以青布輕輕摩擦如有白毛挺出將攝子齊根拔出淨盡其毛尖頭黑而粗極堅硬長五六分其餘兩手心兩足底腦後兩肩尾骨等處只須如法挨次而行至少有數十根多則二百餘根為率無論多少總宜擦徧拔完至要至囑惟所擦各處有無不定若竟無一根擦出者可保長生其有者即天折之根苗一經拔出止驚風稀痘花百病無慮而傷風傷食諸小恙更可少犯如逾四五日尚可拔過則其毛漸次攻進其為患實非淺鮮按此法宜和暖寒改小兒受乘恐非所宜

生下不啼

兒初生下氣欲絕而不能啼者或臨產勞傷胎氣或天時寒冷所致未可速斷臍帶急將絲裹抱懷中離胞寸許用芋皮紮緊將大紙條蘸麻油點火於臍帶上遠遠薰之使暖氣入臍俟氣回能啼方可斷臍或用蘆艾炙臍帶上亦可

兒生下地即不啼哭奄奄如死者急看喉間懸癰前上脛上有一泡用指摘破以帛拭去惡血弗令嚙下以京墨搽之即能通聲吞乳如不即挑泡老難破

嬰兒生下不啼或因糞門有一膜閉住兒氣故不能出聲

增廣大生要旨 卷五

四

名曰閉臍生以銀簪腳輕輕挑破其膜即能出聲啼矣

斷臍裹臍法

凡將斷臍必須先用熟湯浴過不使水氣入內一手握帶一手向臍將三四次令胞血貫滿臍穴離胞寸許用絲弦紮緊以磁鋒割斷勿使臍血外泄則兒血旺易育若勿用割隔單衣咬斷又將暖氣呵七口更無內弔之疾不用刀者鐵氣寒冷恐傷生氣也

發明臍風撮口等病由

臍之生風方書從無確論惟朱純嘏先生臍風論發明生風致病之源示人勿犯其論云凡嬰初生以潔淨熟溫

水白頭至足及腋膀孔竅諸凹處透除垢污不妨頻添
熱水拭淨裹以舊衣然後將臍帶令人牽着以一手守
定臍根一手推送帶中液水約送九寸外令人指定用
軟希布輕手收乾水蹟再用細草紙捲筒燃熏往來九
寸內以收水液并可便煖氣透入臍中徐熏推送指亦
如之如此三五次熏推得法則臍帶鬆軟水液必淨去
臍半寸紮定復於七寸外亦紮定方可剪斷用舊薄絮
剪碗口大中間通一小孔以臍帶透過盤於絮上又用
枯礬末摻於帶上再加薄絮蓋之軟油紙護之紬帕束
縛之透洗如此裹護如此不致尿濕外侵方能無害凡

增廣大生要旨 卷五

斷臍不盈尺或束縛不緊則風濕入臍或斷臍用鐵器
致冷氣內侵恒有臍風撮口之患故不必更洗三朝也
如必洗三庶乎時值暑天權宜亦可若在寒冬能不風
濕兩受乎寒濕交攻肚即因之而痛痛急哭急痛緩哭
緩甚至口眼歪斜手足抽掣漫云臍風不知此撮口臍
風皆因寒濕所致也醫者到此誰能辨別遂以祛風化
痰猛劑攻之十不救一此洗兒去垢斷臍裹護之法所
謂調護於未病之先臍風無由而致矣預防臍風此第
一要緊之事故不憚繁言以相告焉况初洗既透日後
長大肌膚自然滋潤其大來有發粗白皮時脫時長皴

增廣大生要旨 卷五

裂出血者雖因受胎之後父不能遠房室母不能謹口
腹所致亦有由初洗不淨之故兒離母腹十二足日謂
小滿月調護得法過此則不發臍風矣其有初生嬰兒
朝內腹痛啼哭因內熱者必眼目微紅淚凝粘眵不似
臍受寒濕之兩眼角及鼻準有黃色可辨者若是內熱
治宜清熱順氣湯服後大便出一二次內有黃黑糞相
間則熱去全愈也
清熱順氣湯 嬰兒仰身啼哭手煖面赤口中氣熱眼目
微紅眼眵粘閉小便少而大便閉見燈火啼更甚者此
內熱心煩腹痛而然此湯治之

增廣大生要旨 卷五

鉤藤 鈎入 山查肉 各菜 橘紅 柴胡 各伍 黃芩 酒炒 枳殼
蘇木 通皮 薄荷 入 熟大黃 各叁 梔子仁 酒炒 黃連 酒炒 甘
草 壹分 右加燈心五十寸金銀各一件水一鍾煎三
分作五六次徐徐溫服得大便行一二次有黃黑糞各
半自此全愈若不辨面色概用驅風化痰猛劑以圖速
效未有能生者
看臍帶脫落法
臍帶脫落雖有十日內外之不等然不必拘但包紮之處
始則三日一看繼則逐日解看弗令兒尿浸濕以致臍
風既無兒尿浸濕又須側看有眼法揭絮要手輕其脫

落斷非一時齊下必有微角粘連已脫者勢必乾硬礙肉則痛痛必啼哭苟不知此悞為臍風醫家不察遂以風痰治之萌芽嬰兒豈能當斯悞哉故應細看其已脫未脫之間用新絲花丸棗子大填於臍上帶下令乾硬者不礙肉兒自不痛不啼天脫後以新絲花拭淨臍液先以枯礬細末少許納臍底次用紅哆呢燒灰存性填滿臍內外剪錢大貼風膏封之仍將舊絲油紙覆護納帕束縛守過十二日萬無一失矣

臍濕不乾

凡兒臍中腫濕汁出不乾若至百日即危急宜治之枯礬

增廣大生要旨

卷五

七

龍骨黃丹各一分麝香少許為末敷之須避風如潰爛出血或水出不止赤石脂紅絲灰血餘炭或破草屋上爛茅灰皆可為末頻搽良油胭脂作膏貼之亦愈

臍突光腫

小兒月內旬日臍突光腫如吹捻動微響赤腫虛大可畏亦由斷臍在前洗浴在後或束縛不緊濕入所致用大黃煨牡蠣五錢朴硝一錢為末多用田螺浸水調一二錢敷臍上其水從小便而下光腫即消矣

浴兒法

三日洗兒俗禮也今南方俱用益母草或白露日收香苦

草煎湯於落地時即洗子意倘或兒生脆弱反致有害不如遲以十日半月擇晴明和煖之日於無風房內浴之為妥浴湯用桑槐榆柳桃五樹嫩枝三寸長者各二十段煎湯入猪胆汁二箇看冷熱恰好浴之不犯生水過歲內可免瘡疥丹毒之患又可辟邪北方生兒多不必洗

藏胎衣

胎衣以清水浴過又以清酒浴之入錢一文於衣內盛以新瓶青布裹口待滿月後擇天德月空之辰於向陽高

增廣大生要旨

卷五

八

燥處掘地三尺埋之須堅築勿令有損俾兒康健不可忽略

初生調護

小兒初生兩乳必有餅子須常揉搥捏去乳汁以散為度否則腫硬成毒如初生洗浴時即將兩乳頭各捏一把便無此患

小兒初生肌膚未實腠理未密宜用舊絮護其背亦不可太煖致令出汗使表虛易受外邪

兒生雙滿月後若遇晴和天氣令乳母抱兒數見風日則血氣剛強肌肉緻密可耐風露若厚衣煖被藏於重幃

密室則筋骨軟脆不任風寒多易致病所以貧兒堅勁無疾富兒柔脆多災譬諸草木方生以物覆蓋不見風日雨露則萎黃柔弱矣

小兒衣服當隨天氣之寒熱加減但令腹背常煖爲佳三冬卽或嚴寒不可烘火惟以重絛壅煖可無火毒發熱瘡瘍丹毒驚疳之患

小兒衣裳被衲日曬日收不宜在外過夜書云天上有飛星惡鳥不可干犯小兒染着戾氣生無辜疾啼叫不絕須卽換下所着衣服醋炭烘之太陽照之

月內小兒不可聞啼卽抱一啼便乳須常令啼哭則胎中

增廣大生要旨

卷五

九

所受熱毒從此而散胎中驚氣從此而解庶葇月之間無重舌木舌口噤胎風胎熱之病

小兒腸胃細嫩如葱乳哺不宜過飽陳氏所謂耐三分寒喫七分飽類揉肚少洗澡要背煖肚煖頭涼心胸涼皆至論也又須令乳母預慎七情厚味炙博則乳汁甯靜兒不致疾

小兒乳哺須要得法乳者奶也哺者食也乳後不可便與食哺後不可便與乳乳食相連難以化大者成癖成疳小者泄痢腹疼

凡乳兒先須搯去宿乳少許然後與兒吮之乳亦不可過

飽飽則溢而成嘔吐若乳來多極取出按後再乳如夏月不去熱乳冬月不去寒乳令兒瀉痢不可不慎

小兒半歲以前只與乳喫六箇月後方與稀粥週歲以前切不可喫葷并忌生冷之物若待一二歲腸胃稍厚略與葷喫訣云喫熱莫喫冷喫軟莫喫硬喫少莫喫多自然無別恙故凡粘膩乾硬酸鹹辛辣一切魚肉水菓濕麵燒炙煨炒煎燻俱是發熱難化之物皆宜禁絕婦人不知禁忌畏其啼哭無所不與積成痼疾追悔莫及語云惜兒須惜食又云若要小兒安常帶三分飢與寒皆至言也

增廣大生要旨

卷五

十

凡乳母臥寐當以兒枕臂令兒頭與乳相平母欲睡着時卽奪其乳恐其不知飽足亦成嘔吐若父母交合之間兒臥於側或驚醒啼起不可卽與乳吮蓋氣乳未定恐致殺兒也

小兒飲食有任意偏好者無不致病所謂爽口味多終作疾也極宜慎之嘗見王隱君曰子幼時酷愛甘飴忽一日見飴中有蚯蚓自此不敢食至長始知長上所爲可爲節戒之妙法

乳母領兒同睡切忌鼻風口氣吹兒顛門恐成風疾初生小兒未剃胎頭不可戴帽則自幼至長可免傷風永

無鼻塞涕之疾

小兒氣血未充而一生盛衰之基全在幼時培養故飲食宜調寒溫宜適若在期內斷然生不得病須知小兒身體微弱臟腑柔脆豈堪先以疾病摧其生機繼以藥物資其消燦精神暗耗早年戕賊能保長生乎

乳子之母身體務要珍惜母強則子強母病則子病母寒則子寒母熱則子熱一氣感化其應如響故保嬰者必先保身也

初生小兒形骸雖具筋骨甚柔氣質未實譬猶木之柔條軟梗可曲可直可俯可仰故百日之內不可豎抱豎抱

增廣大生要旨 卷五

十一

則易於惹驚且必頭傾項軟有天柱倒側之虞半歲前不可獨坐恐風邪入背脊骨受傷有龜背偃僕之疾

小兒感冒不須服藥

初生小兒受風鼻塞不能吮乳不可輕易發散惟大天南星為末生薑自然汁調成膏貼於額門即愈或以草烏皂莢為末葱汁搗膏貼額門亦妙

小兒偶因寒熱不調肌腠柔弱最易感冒發熱不必用藥但於熟睡時夏以單被冬以絛被蒙頭鬆蓋勿壅其鼻但以稍煖為度使其鼻息出入皆此煖氣少頃則微汗津津務令上下稍透則表裏通達而熱自退矣若寒天

衣被冷冽汗不易得則輕撲着身赤體相貼上覆其面無有不汗出者此至妙之法百發百中者也若寒邪甚者兩三次微汗無有不愈此法行於寅卯時則汗易出而效尤速

初生三急病

一口噤一臍風一撮口名雖有三病則一類皆急症也口噤尤甚過四月方免此症百日內須防病甚者多不治口噤又名噤風眼閉口噤不乳啼聲如鴉或舌上聚肉如粟米狀大小便皆通但口噤面赤多啼口不吐白沫與撮口異

增廣大生要旨 卷五

十二

撮口唇撮聚而不開面目青黃啼聲不出氣自喘急口吐白沫若舌強唇青聚口撮面四肢冷者皆不救也其或肚脹青筋吊腸卵疝內氣引伸皆腸胃不通所致

臍風臍腫腹脹四肢柔直啼不吮乳甚則發搐若臍邊青黑手拳口噤不治矣

凡兒初生七日內若有臍風等症小腹必發青筋一道行至肚生兩丫又若行至心便不治急以艾圓灸其筋頭上并丫又盡處青筋消去便活 已上三症非獨謂斷臍之時為水濕風邪所乘多因胎中受熱兼之風濕所激裏氣壅滯總宜取下胎毒為妙事已如此不可因循

畏縮姑息悞事古方天麻丸定命丹硃銀丸可量與圖生然七日內見者百無一生所以愛惜子嗣者胎前宜慎也

天麻丸 治斷臍後為水濕風冷所乘入臍流於心脾遂令肚脹臍腫四肢柔直日夜多啼不能吮乳此方制驚

化痰凡釣腸鎖肚并治

南星炮貳錢 白附炮 牙硝 天麻煨 五靈脂 全蝎各壹錢

輕粉伍分 巴豆去淨油貳分半 共為末稀糊丸麻子大每服三丸

薄荷生姜湯下

定命丹 治急驚天釣撮口通利痰熱

增廣大生要旨 卷五

三

全蝎壹錢 天麻煨 南星 白附子炮各貳錢半 辰砂飛 青黛各壹錢

麝香各伍分 冰片貳分 共為末粟米糊丸菜豆

大每服一丸荆芥薄荷湯下先研半分吹入鼻中

硃銀丸 治臍風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之

毒亦治驚積量病用之

全蝎壹錢 白附子炮壹錢半 南星炮 辰砂飛貳分半 犀黃伍分 蘆會

分伍分 天漿子 麝香各伍分 冰片貳分 僵蚕炒拾條 水銀壹錢 蒸棗

肉研鉛霜伍分 水銀伍分 共為末粟米糊丸芥子大每服一丸

薄荷湯下如未利加至二三丸

一方治撮口臍風用紫蘇前胡僵蚕炒 各五錢水煎去渣

候溫頻頻滴兒口中以口開為度開口後切弗即令吮乳

一法將天南星去皮臍研細末龍腦少許合和用指蘸生

姜汁同藥末於大牙根上擦之能開

又方用神仙退即父母指甲 三分炙灰以乳調下或含好燒酒

對臍吮之亦妙

辰砂膏 類萃治臍風眼閉口噤啼聲不出口吐白沫

飛辰砂叁錢 礞砂 馬牙硝各壹錢 元明粉貳錢 全蝎去尾

真珠各壹錢 麝香壹分 存為末油紙包裹自然成膏每服

一二豆許 諸驚薄荷湯下潮熱甘草湯下月內乳汁調

增廣大生要旨 卷五

四

塗乳頭令吮之 保嬰撮要曰撮口肚脹青筋吊腸卵

疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疎利辰

砂膏是也 傳真曰臍風總由胎毒所致忌用散風之

藥當以此膏疎利之

急救臍風引

夏禹鑄曰嬰兒初生七朝之內有臍風一症甚為危急幼

科諸書論症不確治療無憑所用之方無非祛風清熱

化痰鎮驚之品後人依而用之百不救一故臍風一症

竟無成法可師實古今之闕典也子於數十年中夢寐

誠求感神明之告人幸得心而應手重開生面別立規

模實有起死回生之妙不敢自私剖心相告倘得其相傳佈俾嬰兒得躋春臺亦壽世之一助也

一辨臍風 凡嬰兒出胎翦落臍帶帶口有水風因乘水由臍入腹風入於腹始附於肝肝木也風附木而鳴目為肝苗故兩眼角有黃色風入於肝必逆犯脾鼻準脾之苗故亦有黃色既入脾必逆犯腎唇屬腎故色黃口撮入腎必逆犯心舌為心苗故必強直到此風火交戰亡之必矣臍風初發吃乳必較前稍鬆或啼哭無時速抱兒於亮處看兩眼角及眉心有黃色宜急治之極易愈黃到鼻準治之仍易至人中承漿治之稍難口不撮

增廣太生要旨

卷五

五

而微有吹噓猶可治也若唇口鎖緊舌頭強直不必治矣一見眼角鼻準人中有黃色而唇不鎖緊者曲兒小指揉外勞宮即用粗燈草蘸好麻油點火於額門眉心中人中承漿兩大指少商各穴一燹臍輪六燹臍帶未落於帶口火燃既落於臍心一燹風使止而黃即退矣病未全愈仍照前治此火靈應無異金丹功效神速捷於影響願此法遍傳庶百千萬億中無一兒殤於臍風也

一辨胎黃 胎黃由娠母感受濕熱傳於胞胎故生下數日面目通身皆如金色便秘溺黃者是也治用生地赤芍茵陳豬苓花粉甘草

各伍分

一服即愈若臍風必不至


通體皆黃惟眉心鼻準人中有黃色耳幸勿悞認歌曰 三朝七日眼邊黃便是臍風肝受傷燈火十三能起死回春只此是仙方

增廣太生要旨


卷五

五

附 揉 燹 諸 穴 圖



此七火須由上而下則毒往下行稍則則毒閉矣



掌中背外勞正對掌心

初生七日內面赤喘急啼聲不出名曰撮口臍風視齒齟
上當有小泡如粟米狀急以溫水蘸青軟帛或用絲絛
裹指輕輕擦破即愈不須服藥

治撮口方

增廣大生要旨

卷五

七

赤腳金頭蜈蚣壹條 蝎尾肆個 僵蚕炒去絲 瞿麥伍分 右為細末先將鴛管吹藥一分入鼻內使嚏啼哭為可醫隨用薄荷湯調服三五分立效

又方白僵蚕四枚炒去絲 為末蜜調敷唇內

繆仲淳曰撮口之症如先大便熱須用生犀角及羚羊角

磨和蜜汁飲之急則用大黃貳錢 甘草貳錢 煎服以上四則出醫便初

集續

初生異症

遍體無皮 兒初生下遍體無皮俱是紅肉因母受胎以後久處高樓不沾地氣故有此異用純黃土研細盛軟

絹袋在兒週身輕輕撲之一日三四次俟皮生即止或用珍珠細白和米粉亦可作錢五穀恐促兒壽用黃土最妙煨熟發赤者母之火盛也用石羔末敷

足趾向後 兒初生兩足趾俱向後曲因母懷妊時適不能行動日惟盤坐兒在母腹一氣相通形隨氣化故亦如是用軟絛捲如棍子木兒膝後灣內外煎木瓜湯常洗熨之日久筋長自能伸由二症觀之胎前調養不可不慎也

週身發泡 初生週身如魚泡或如水晶擦破則水流滲以蜜化僧研極細炒過乾摻內服蘇合香丸

增廣大生要旨

卷五

末

蝦蟇瘟 小兒胸腹忽如水晶色臟腑俱見此名蝦蟇瘟用大蝦蟇六隻將四足紮起以蝦蟇肚皮在水晶色處撫摩幾次置兒臍上再用第二隻亦如前法更換六隻其病即痊但蝦蟇眼有蟾酥須防迸出射人宜以絹遮其眼用畢將蝦蟇放於曠野

陰囊縮腹 初生六七日後陰囊收縮入腹啼哭不止者受寒所致也用硫黃吳茱萸各五錢為細末研大蒜調塗臍下再以蛇牀子炒熟帛包熨臍即下

陰囊光腫 陰囊腫大墜下不收用紫蘇為末如患處濕則乾摻乾則香油調塗雖皮潰而核欲墜悉有神效

初生諸疾

二便不通 初生大小便不通腹脹欲絕者急令人溫湯
漱淨口吸嘔兒之前後心臍下兩手足心共七處每處
吸嘔五七口取紅赤色氣透為度氣透則便自通
不小便 初生六七日不小便用葱白三四寸搗爛入乳
拌入兒口內再與乳吮嚙下即通

乳蕈馬牙疳 兒口中有肉腫高起如菌名乳蕈牙齦處
生白泡名馬牙疳致兒不能喫乳以指摘去其頭倘有
血出以帛拭去輕者京墨搽之即愈重者急以直僵蚕
三條去絲嘴炒人中白四分冰片少許研細擦患處略

增廣大生要旨

卷五

九

停片刻用絹蘸苦茶洗淨再擦日三四次自愈如未愈
加礪砂血竭青黛各三分兒茶分半藥珠一分為細末
和入前藥每日洗擦三四次無不愈者簡易方以馬齒
莧根即醬板草根瓦上焙少加雄黃研末擦

驚口白屑 初生百日中口有白點旋拭旋生滿口纏綿
內竄入喉啼哭不乳俗名雪口又名驚口屑用甘草黃
連等分煎湯以帛裹指拭去取桑皮中汁塗之立愈再
以辰砂益元散燈心湯調下簡易方用驚口中水一鍾
作數次服亦愈

走馬疳 牙牀腐爛若已出牙亦致牙齒脫落名走馬言

急也此熱毒蘊蓄而成大為凶症以綠豆煎濃汁頻飲
使毒從小便出外以人中白四分銅錄醋製杏仁各二分
冰片少許為細末敷患處

腮腫 齶腫 頰裏及上腭腫者名腮腫齒斷腫者名齶
腫皆宜針破出血即愈

重舌 木舌 弄舌 舌為心苗三症係心脾蘊熱皆能
殞命重舌者舌根肉壅腫疊出短小如舌用竹瀝浸黃
柏一宿點舌上木舌乃舌尖腫大塞滿口中或僵硬如
木不能轉掉用草麻子油蘸紙擦點火吹滅以烟薰之
即消若舌下有如螻蛄或如臥蚕急於腫處砭去血用

增廣大生要旨

卷五

十

釜底煤以鹽醋調厚敷之脫去再敷或井花水調亦可
經驗方用真蒲黃頻刷舌上亦愈弄舌舌出掉弄如蛇
也心安則舌靜心擾則舌動已上三症總屬火象輕者
燈心湯重者黃連湯細細與服

口角流涎 涎自口角流出滯於頤間名滯頤由脾冷涎
多脾虛不能攝津液泛出漬滯頤間用焦白朮陳皮青
皮炮姜各五分熟半夏丁香木香各一錢為末麵糊丸
黍米大一歲十丸米湯下亦有脾熱而然者用焦白朮
飛滑石各五分炒扁豆茯苓石斛各三分黃連二分葛
根一分半甘草一分為末燈心湯調下每服一錢

兩腮腫硬 兒生月內兩腮腫硬有核或在一邊名疔腮
兒面必黃鼻端起黑瀉啼哭不乳用蜒蚰一條銀珠錢
許同研爛搽腫硬處勿令擦去即消一法用桑柴灰少
許入雄鷄冠血二三滴再加鹽滴一匙和勻頻擦患處
螳螂子 月內小兒有口噤不乳啼聲難出兩腮腫硬俗
名螳螂子鄉村惡婦捏造割取之法騙人取利兒體強
者倖全性命弱者盡被割斃近日即縉紳之家亦有受
其惑者耳聞目覩割死頗多為父母者輕以兒命送於
村嫗之手死而不悔猶謂病重救遲深堪痛惜原本有
治法三方間嘗歷試惟一方最靈茲特存效驗一方原

增廣木生要旨

卷五

手

有子者遇有是疾速照方施治效驗如神萬勿聽信村
嫗枉送兒命也方用斑毛三個蝎尾五個俱炙脆存性
不可太焦致藥無力研極細麻黃一錢煎湯少許去渣
入棗肉錢孔大一粒收乾麻黃汁打爛和斑蝎末丸如
桐子大放小膏藥上貼兒印堂即兩眉之間及左右兩頤一
週時三處皆起泡毒泄即愈若泡破出水須防毒水流入目中
赤遊丹毒 小兒一歲以內身發赤遊風者皮如丹塗狀
故謂之丹一切紫赤丹癩總由妊母血熱流胎熱毒蘊
於腠理或乳母好酒嗜辛喜啖炙博或烘曬熱衣即與
包裹柔嫩肌膚感受熱毒所致發於四肢易治入腹入

囊皆難療也發於頭面胸背身如火灼煩躁脹悶者古
人謂入心必死治法用朴硝大黃青黛為末新汲水調
敷或芭蕉根搗汁塗乾則再塗冬月畏冷則燉稍溫塗
上無論赤白丹毒用寒涼塗之不放者將伏龍肝為極
細末以熟鷄子黃熬油調塗

夜啼 小兒夜啼不安有寒熱驚滯四因寒啼者脾氣寒
冷陰盛於夜則腹中作痛故面青手冷腰曲而啼也用
炙黃芪當歸甘草赤木香等分為末塗乳頭上令兒吮
之熱啼者心火煩盛面赤手煖口中氣熱仰身而啼見
燈火愈啼用鉤藤茯神甘草燈心辰砂木通各一錢煎

增廣大生要旨

卷五

手

湯服滯啼者乳食停滯作痛啼而不哭直聲來往無淚
者是也用生麥芽山查各一錢煎湯服驚啼者心氣不
足神不安穩哭而不啼連聲多淚宜從驚治服天王補
心丹外以伏龍肝蚯蚓泥等分為末水調塗兒頭頂心
口及手足心

胎黃 兒生下遍體金黃此胎中濕熱也用生地花粉茵
陳各一錢煎服

胎赤 兒生月內遍生紅赤肌若丹塗此胎中熱毒也服
前方去茵陳加甘草連翹各一錢外用藍葉浮萍水苔
搗爛絞汁調朴硝土砂塗之

胎驚 月內壯熱翻眼握拳搐掣驚啼此胎驚也因妊婦
調攝乖常有傷於胎故生下即病急取猪乳細研辰砂
牛黃少許調抹口中神效或煎服導赤散乳母服防風
通聖散簡易方以新汲水辰砂研濃汁塗五心最效
吐乳 小兒嘔吐長此不已遂成慢驚不可不慎若吐自
口角出即是乳哺太過乃滿而溢出非病也只須節乳
若直出而不停畱者謂之覘乳用炒麥芽三錢橘紅一
錢丁香三分煎服可止乳母服調氣之藥
變蒸 變者易也生五臟蒸者熱也養六腑輕則發熱似
驚重則壯熱煩躁三十二日一變六十四日一蒸至五

增廣木生要旨

卷五

疳

百七十六日變蒸既畢兒乃成人也古無其說創於西
晉繼於隋唐繁於今日但余常見有保護得宜至長無
病豈此子獨不變蒸乎或上月有變蒸此月不病豈一
孩有先後不同乎總之小兒或發熱或吐泄凡屬違和
不由外感必因內傷不過調養失宜之故但宜謹於平
時不可惑於變蒸之說而忘致病之由也
疳症 小兒諸疳最為重候顧疳字从甘明其貪嗜肥甘
損傷脾胃也蓋中土一虛百病蜂起故疳症名目有二
十餘而治法總在脾胃楊氏曰疳者乾也在小兒為五
疳在成人為勞夫曰乾曰勞非精血敗竭之病乎疳變

既多方難主一貴在臨診酌宜也

程鳳雛曰小兒肥甘無節積鬱既久則熱生焉熱蒸既久
則蟲生焉有熱有蟲而疳成矣當其有積時用藥消導
則熱退而蟲不生及其將成仍用我朮三稜枳榔厚朴
消其積川連胡黃連清其熱使君子蕪荑川棟蘆薈殺
其蟲不可驟用補劑如參朮訶子薏仁等適足增其鬱
熱五疳諸症不必瑣為分晰虛實冷熱蟲積總不出集
聖丸加減治熱不可過涼治冷不可過溫尤不可妄施
汗下疳者甘也一切甘甜果食俱宜忌之但以固脾胃
為主蓋脾家病去則諸臟皆安矣慈幼

增廣木生要旨

卷五

疳

集聖丸 治冷熱新久一切疳症以此為主其有五臟兼
症照後開加減不必多求方法準此方不熱不寒補
不致滯消不致耗至穩至妥
蘆薈酒洗去泥 夜明砂炒 廣皮酒炒 青皮醋炒 蓬莪
朮煨 使君子肉煨 木香 川芎 當歸一砂仁 貳錢各
潞黨參 川連姜汁炒 乾蟾蜍酥炙各 右為細末公猪胆
取汁和藥粟米糊丸龍眼大米飲化服 咬牙舒舌
舌上生瘡愛飲冷水唇紅面白喜伏地臥此心疳也本
方去莪朮砂仁青皮廣皮川芎木香六味加生地茯苓
胆星各貳錢 辰砂甘草各壹錢 面青目生白膜泄瀉夾水

或青色此肝疔也本方去莪朮砂仁廣皮木香加胆星
 甘草梔子仁防風天麻蟬蛻各錢青黛半錢食泥土冷
 物面身俱黃髮稀作穗頭大項小腹脹脚弱泄瀉肌瘦
 晝涼夜熱不思飲食此脾疔也專用本方 鼻下赤爛
 手足枯細口中腥臭右腮晃白喘嗽此肺疔也本方去
 莪朮砂仁青皮川芎木香加桑皮桔梗蘇葉阿膠炙甘
 草各錢耳內外生瘡脚如鶴膝頭縫不合或齒鼻爛
 變成走馬牙疔此腎疔也本方去莪朮砂仁青皮廣皮
 木香五靈脂加熟地茯苓山藥萸肉各錢久瀉不止
 胃虛成疔本方去蘆薈五靈脂加茯苓冬朮肉果訶子各錢
 增廣大生要旨 卷五 五

錢 黨參倍用 久痢不止脾虛成疔本方去莪朮蘆薈
 青皮五靈脂加訶子蓮肉各錢 瘧久未已脾虛成疔
 本方去蘆薈五靈脂加黃芪鼈甲柴胡製半夏神麴各錢
 錢 黨參倍用 食積成疔形瘦腹緊潮熱見生人則哭
 本方去蘆薈五靈脂加黃芪茯苓冬朮製厚朴製半夏
 枳實神麴麥芽三稜鱉甲各錢 腦疔皮毛光潔滿頭
 瘡餅腦熱如火髮穗頤高眼痛腮腫多汗其病在肝本
 方去莪朮砂仁青皮廣皮加羌活防風胆星甘草升麻
 各錢 脊疔發熱黃瘦煩渴下痢拍背如鼓鳴脊背如
 銀齒十指皆瘡頰嚙指甲本方去莪朮砂仁青皮廣皮

當歸川芎加苦楝皮貫衆蕪荑枳榔各錢 蛔疔縞眉
 多哭嘔吐青沫腹痛結塊摸之硬起滿肚青筋唇口紫
 黑腸鳴齒癢同上 丁奚疔手足極細項小骨高尻削
 作瘦腹大臍突號叫胸陷用本方 哺露疔寒熱往來
 頭骨分開翻食吐蟲煩躁嘔噦用本方 無辜疔身熱
 黃瘦腦後項邊有核如彈丸動而不痛中有蟲如米粉
 宜刺破其核以膏藥貼之本方去莪朮砂仁五靈脂加
 黃芪鼈甲枳榔各錢
 吃泥 吃炭 乃脾家濕熱也宜服神機散方見後用開水
 調下
 增廣大生要旨 卷五 五

吃生米 吃茶葉 乃胃腑熱也宜蒼朮用米泔浸一日
 炒山梔炒等分爲末餗餅爲丸梧子大米飲下五十九
 一日三服
 溺色 小兒小便如米泔或溺停少頃變作泔濁者此飲
 食不節以致脾胃濕熱或脾虛下陷而然疔之兆也當
 預防之急服神機丹若小便色黃因火者十居一二因
 陰亡而氣不化者十居七八急當滋其化源服交泰丹
 糞色 小兒糞色當與大人相同色深黃蒼老而細膩者
 是全陽正色胃強無病者也若嫩黃不蒼渣滓不能全
 細則胃中火力便有不到之處若再淡黃則近白矣是

穀食之半化也是火力之半衰也若至色青色白則虛寒極矣元陽憊矣生氣微矣一見嫩黃急以神機丹救之

藥餌宜慎

小兒之起居飲食當謹慎調攝前已言之至於用藥治病猶須明見的確照顧本元看清病症然後施治不可以散風消食清痰降火行滯利水滿江一兜為周到而穩當也夫有是病而後用是藥則病當之無是病而用是藥則元氣受燥矣

急慢驚風

增廣木生要旨

卷五

毛

小兒急驚屬肝木風痰有餘之症宜平肝鎮心驅風消痰降火清內熱慢驚屬脾土不足因吐瀉久虛或大病後元氣不足宜補中兼疎利俗以一藥通治二症悞矣

急驚神方

陳胆星肆錢 全蝎貳錢 荆芥穗 防風去蘆 僵蚕炒 天竺黃各參 琥珀 犀黃另研 蟬退 木香各壹錢 辰砂天葵草 另研伏過壹 右為末山藥粉打糊丸龍眼大辰砂為衣每服一丸姜湯化下極效

江筆花曰俗所稱慢驚風者脾虛生風也小兒或吐或瀉久則脾虛肝木乘之面色青白手足微搐是內風侮土

非外風也陽衰神怠氣息短促是中氣脫乏非驚嚇也宜補其脾回其陽則土振而木靜矣此症不補必死而謬以驚風名之可乎

莊在田曰慢驚之症小兒吐瀉得之居多或久瘧久痢痘後疹後或因寒食積滯過於攻伐傷脾或稟賦本虛誤用涼藥或因急驚用藥攻降太甚或失於調理虛極生風皆可致此其症神昏氣喘或大熱不退眼開驚搐或乍寒乍熱三陽晦暗面色淡白青黃二便清白或唇雖開裂出血而口中氣冷或瀉利冷汗四肢冰冷腹中時響喉內痰鳴角弓反張目光昏暗鼻孔煽動昏睡露睛

增廣木生要旨

卷五

末

頓門下陷汗出如洗此虛症亦危症也俗謂之天吊風慢脾風若再用寒涼消導或胆星抱龍以消痰天麻全蝎以祛風芩連知柏以清火巴豆大黃以去積殺人如反掌此時治風而風無可治治驚而驚亦無可治實因脾腎虛寒孤陽外越元氣無根陰寒至極風之所由動也治宜先以辛熱再加溫補益補土所以敵木治本即以治標凡小兒吐瀉屢作不拘何因皆當急用參朮以救胃氣蓋其先雖有實邪一經吐瀉業已全除脾胃空虛若不急治虛痰上湧命在頃刻庸醫誤指為食投以去積之藥立時告變今特列經驗四方以為慢驚主治

之用并將慢驚辨症臚列於后

一慢驚身冷陽氣抑遏不出也服藥之後往往致此

一慢驚鼻孔煽動真陰失守虛火燥肺也

一慢驚面色青黃及白氣血兩虛也

一慢驚大小便清白腎與大全無火也

一慢昏睡露睛神氣不足也

一慢驚手足抽掣血不行於四肢也

一慢驚角弓反張血虛筋急也

一慢驚吐瀉脾胃虛寒也

一慢驚口鼻中氣冷中寒也

增廣大生要旨 卷五 美

一慢驚乍熱乍涼陰血虛小陰陽錯亂也

一慢驚汗出如洗陽虛而表不固也

一慢驚手足痠痲血不足以養筋也

一慢驚顛門下陷虛至極也

一慢驚身雖發熱口唇焦裂出血却喜不飲冷茶進以

寒涼愈增危篤以及所吐之乳所瀉之物皆不甚消

化脾胃無火可知唇之焦黑乃真陰之不足也明矣

大凡因發熱不退及吐瀉而成者總屬陰虛陽越必成慢

驚並非感冒風寒發熱可比最忌發散治宜培元救本

加薑桂以引火歸源必先用辛熱沖開寒痰再進溫補

之法用者宜參以活變相機調治

逐寒蕩驚湯 凡因風熱不退及吐瀉而成者總屬陰

虛陽越必成慢驚非感風寒可比故不宜發散治當培

元固本引火歸元先用辛熱沖開寒痰再進溫補

伏龍肝兩丁香拾粒炮姜 胡椒 肉桂去皮各研勻水

煎一小杯灌下一劑吐瀉立止接服後方

理中地黃湯 此救陰固本之要藥補造化陰陽所不

足起死回生倘大虛之後須大劑多服為妙

熟地伍錢白朮 當歸三四劑後泄枸杞各錢黃肉半錢

姜半錢炙芪 黨參 棗仁炒補骨脂各錢炙草 肉桂

增廣大生要旨 卷五 美

各壹 胡桃肉壹生薑叁紅棗叁用灶心土煮湯煎藥

汁大 加附子叁煎湯攪入量兒大小分數次灌之咳

加櫻栗殼金櫻子大熱不退加白芍泄瀉加丁香各一

錢 只服一劑去附子用丁香七粒隔二三日再用附

子一二分用附太多則小便閉塞不通不用則沉寒不

開不用丁香則泄瀉不止 若吐瀉不止微見驚搐胃

中尚可受藥吃乳便利者不必服蕩驚湯只服此方一

劑風定神清矣 如尚未成驚不過昏睡發熱不退或

時熱時止或日安夜熱或午後發熱總屬陽虛均宜服

附子理中湯 治慢驚亡陽症

黨參錢貳冬朮錢貳炮姜 熟附子 炙草各伍分姜片參棗
水煎溫服服後若知渴汗止或二便閉去附子加熟
地 張景岳曰附子溫中回陽慢驚之聖藥 徐蘊山
曰慢驚有亡陰亡陽之別如遇久瀉漸至汗吐亡陰症
也理中地黃湯主之若由久汗漸至吐瀉亡陽症也宜
用附子理中湯二法相輔而行庶無偏弊

溫中補脾湯 薛氏治吐瀉亡陽成慢脾者

白朮炒壹錢 黨參 黃芪蜜炙各捌分 製半夏柒分 白茯苓

丁香 乾姜 砂仁製各伍分 官桂 陳皮 炙草 白芍

酒炒各肆分 生姜片壹錢 紅棗去核壹枚 水煎溫服虛寒甚者加熱附

增廣本生要旨 卷五 辛

子五分兒小者分數次服必得肢體溫和風除神爽方
可止服 聶久吾曰慢驚之候由脾土虛極中氣不足
故寒痰壅盛而風動筋急此陰症也急用此湯溫補脾
胃風痰自退

善鑑堂小兒四丹說

小兒知識未開七情未動其所病者非寒溫之失當而外
感六淫即飲食之失宜而內傷脾胃余故制乾清散以
治外感坤靜散以治內傷王道平正萬舉萬當至若無
病之兒焉能常保安和理宜預為調攝使之息息生長
而諸病不生者一在培後天之基址一在滋先天之

兀余故又制交泰神機二方為平時之調養補而能通
瀉而寓益若間服弗輟不特永無病患且能聰明超舉
才力過人幸毋視為平淡而忽之也

乾清散 治小兒感冒風邪發熱咳嗽鼻塞涕流等症

荊芥穗 薄荷葉 黃芩炒 黑山梔 桔梗 甘草

為極細末重羅篩過每服每歲一錢開水調下

坤靜散 治小兒恣食肥膩過啖生冷腹堅脹痛等症

烏藥 製厚朴 麥芽麩 山查肉 廣木香 蓬莪

朮蜜三稜

為極細末重羅篩過每服每歲一錢姜湯調下

增廣本生要旨 卷五 辛

交泰丹

生地黃兩貳 丹皮錢伍 山萸肉壹兩 淮山藥兩壹 遠志肉

去心甘草湯澤瀉酒浸柒錢伍分 石菖蒲一兩 九節菖蒲去毛忌

龍骨酒浸一宿煨赤 炙龜板伍錢 雲茯苓伍分 為極細

末月內小兒每服一分逐月遞增至期歲滿一錢二歲

滿一錢五分三歲滿二錢七歲滿三錢九歲滿四錢開

水調下與神機丹間服

神機丹

蘇黃芪蜜炙 土炒於朮參 白茯苓兩壹 扁豆肉兩壹 建蓮

肉壹兩 山查肉兩壹 炙甘草陸錢 九節菖蒲製如前方 陸

苡仁炒壹 新會皮陸 爲極細末服如前方遞增開水調

下

下

小兒三歲以內胃氣未全穀氣未充專賴乳汁若未斷乳時乳母先有身孕兒食孕乳肉消顯大髮萎腿枯形如傀儡狀若早魁故名魁病又有母體虛弱乳汁不充早強粥飯津液內亡外資漿水生冷瓜果任其過啖漸成此症孔子曰子生三年然後免於父母之懷乳其可容早缺乎操璋瓦之權者急宜留心治法先令斷乳隨製交泰神機二丹相間服之以轉生機余已救活數嬰真

增廣大生要旨

卷五

聖

神妙也

斷乳法

以梔子三枚炒存性雌黃辰砂輕粉各少許爲末麻油調勻兒濃睡時塗兒兩眉上醒來自然不喫未效再塗是斷乳忌逢五七日宜卯日及伏斷日

又方 山梔壹 辰砂 雄黃 雌黃 麝香各 輕粉壹 其爲末照前法調塗名畫眉膏

稀痘

痘曰天瘡以其毒自先天所種非緣後起也稀之法雖有其方然與其欲稀於具形成象之後孰若清心淡慮先

稀於二五妙合之前乎

元兔丹

元參酒洗 兔絲子水淘淨酒煮研 爲末不犯鐵器黑砂糖丸彈子大每日令兒服三丸沙糖湯下

稀痘方

羌活 生地 黃柏酒浸 防風 升麻各在 麻黃 甘草

歸身各參 川芎 藁本 柴胡 乾葛 黃芩酒原

紅花 細辛 丹皮 白朮各 吳茱萸 連翹各

右藥逐味秤准逢立春立夏立秋立冬日用水二鍾

八分一碗將細紗一方覆碗口露一夜次朝溫服一

增廣大生要旨

卷五

聖

內服四次不可缺永不出痘卽出亦稀蓋四立日係天地陰陽氣候變易之時人在氣交中氣血亦隨之轉動乘其闔闔之候驅其胎毒耳春秋減麻黃一分夏減黃分半增連翹三分冬照原方

六味飲 將發時服

山查 紫草 牛蒡子各壹 防風 荆芥各一錢 甘草

任水煎服

夏月稀痘法 嬰兒無論男女用肥大光潔川練子一歲

至三歲七個搗碎忌鐵器 水三碗新砂鍋煎濃傾入盆內

避風處將新白布蘸水自頭至足遍身洗擦不留餘空

拭乾避風一刻四五歲用川練子九個水五碗六七歲用十五個水七碗八歲至十歲用二十個水九碗十一歲至十五歲用三十個水十五碗照前煎洗洗浴日期須擇七個除日洗七次於五月至八月止天熱尤便也

秋月稀痘法 取絲瓜不老不嫩纔不可食者懸簷下風乾只取近蒂三寸許瓦上炙存性為末每一錢配飛辰砂三分每服五分黑砂糖調服 初生時一服三歲內二服兒愈大愈須多服

冬月稀痘法 大寒前擇成日將青菓一枚劈碎同甘草一寸劈四片用雨水一碗煎至一酒盃須一頓服完問

增廣大生要旨 卷五 日一服至五次後有黑糞遺出服至七次而止須在立春前服完

附 格言

昔有客與文忠公論世間萬物皆有影惟人心無影文忠公曰子孫即其心之影子孫賢善之影子孫不賢惡之影也書曰以義制事以禮制心垂裕後昆詩曰燕及天克昌厥後天道福善禍淫理無作惡之家而反能永保子孫之昌熾者但心惡繁隱難以名言倘能時時省察不吝改過以復我生性善之良則惡日消而善日積必有餘慶以獲桂子蘭孫之報也

髮齡培植

髮齡之年如甘未受和白未受采此時教以禮讓喻以尊卑聞善言見善行能終身不忘故耄耋之人其中年之記誦杳不可憶而幼時句讀歷歷能舉良以蒙養之時嗜欲未紛目之所先見耳之所先聞習與性成久而不遷也願世之教子弟者誦讀小學經書之外即宜以先聖先賢之嘉言懿行為之講說庶所見所聞無非正道且氣常存則將來之福祿不卜可知矣

新增種痘說

天花之發由於先天之胎毒胎無火不成有火所有毒故

臍帶炙灰服後四五日卽發雖發小點似痘而後日天花
仍出每多難治在刻是方者亦出仁心而誤人不淺斷不
可用慎之慎之或者曰生死由天倘遇兒命中犯天折者
縱過此痘關其能保無他病而不傷乎是說也余不暇辨
上海果存子翼雲江駕鵬撰

增廣大生要旨終


幼幼新書一

〔宋〕劉昉等編

據上海圖書館藏明萬曆十四
年陳履端刻本影印原書版框
高二〇四毫米寬二六〇毫米

重刻幼幼新書序

上古聖人其視黔黎真若一體稍得其所以生者即思去其所以害生者以故炎帝甫制耒耜教民對執而五穀之外百藥性味之所宜與對治之法君臣佐使之用即繼之黃帝之造其人甫息肩于兵革即憂其灾厲疹疾而岐紫之術



幼幼新書

章句之刻

顯彼其一日而不能忘衛

民之生也如此然聖人之于民老老幼幼寧有二觀且必自幼而壯而後老而至于幼幼之術抑何其簡略不備哲也至秦越人之遊秦以其地賢小兒始為盧顛醫而張仲景之高弟衛汎衍其方而得一卷已爾若夫倉公華佗徐氏父

幼幼新書

章句之刻

子之術神矣而未有所稱及
幼幼者何也豈聖人之仁
其心思尚有所不及而三
代之民不甚愛其子耶將
無風氣樸茂所得于先天
者不薄而天札之慮少故
也然自余之生長閭里間
耳目所覩見人之生以日
計而得全者十不能七也
以月計而得全者十不能

八也以歲計而得全者多
矣然痘癘染之則十又不
能六也夫痘疹于幼為甚
危而醫之于方絕不及者
何也或曰其症不起唐以
前第不知所繇始攷之前
史備載人貌之妍醜正偏
獸不言疹靨其然哉夫勇
者之為疾非若壯而老者
之有七情五欲集心勞形

以為罔其感也不煩而治
之若稍易然既不能自名
其所苦與所繇病狀欲以
方寸之指而察其脉則甚
難天下之為人父以律為
人子者之情則老者差急
而少者差緩然以事理論
則老者所必至而少者尤
摧關而可憫用是而觀凡
唐宋之際有能究顛顛及

痘癘諸方證而筆之書者
其人不必聖人而其用心
與操術則聖人也宋故有
幼幼新書長沙劉帥託叢
為方者王曆王湜萃諸方
而詮次之而李康為之序
者也凡三百餘季而書箴
佚不備吾覩之精于醫者
陳履端氏奉其父之遺意
求之二十餘年而始得其

全念其傳之弗廣也訂其
誤刪其複而手書之以授
梓人於戲若履端者不亦
聖人之徒也哉竊聞之

主上高拱淵穆日勤思元

元卹災賜租必欲使斯壘

登仁壽之域而後愉快然

則是書行其所以陰翊王

政不淺也是故感而為序

之

嘉議大夫南京刑部右侍
郎予告瑯琊王世貞謨



重刻幼幼新書序

德大
市平

夫醫之道難言也其原稽之五
運六氣而論衛氣以二十八星
房昴為緯虛張為經奎璧角亢
則其門戶也又推之太乙移天五
帝之所司鬼神之與幽此聖人
之能事而豈今之所論乎昔之
喜方者太倉公自言其所授出
公孫光陽慶始甚秘必精謹始
有傳然經脈言小兒者尤鮮也

幼幼新書序

惟官能言嬰兒病頭毛逆上者
不全一言耳及扁鵲入秦為兒
醫則固有其術哉漢以來乃無
其書豈盡載他方中耶曹魏後
漸著矣江左有俞氏療小兒方

幼幼新書序

徐疔嚮療少小百病方逮療少
小雜方又療少小疹方范氏療
小兒襍方王末療小兒襍方小
兒經方徐氏少小方療小兒丹
法皆自晉以來傳梁大清樓所

列也唐以後書不能盡舉顧今
 註不存雖宋劉湖南書尚亡洪
 陳子得之如此其艱也夫少小者
 雖云生長之易然氣猶舍而未
 充故云孩黃也凡物根莖之萌
 唯在所滋植之辟豫章之始芽
 蘖也搔之不勝逮其長也而後
 能勝震陵之風雨則夫幼幼者
 經方藥論可不備陳哉且幼之
 病病者無窮而醫之論病者莫

幼幼新書 卷

三

盡矧血營猶淖筋節尚柔脉
 之不可究尋止以形氣色澤毛
 革決之其凝泣之端淺深之候
 順逆之變少多之喻虛實之殊
 過不及之分迎奪之用合離之
 辨所謂拙者以不足巧者以有
 餘是尤不可以盡言也且人知少
 者始之病疹也似同而終之所傳
 化也不測醫之始投也似易而率
 之所取驗也甚微謂攻之可使疾

幼幼新書 卷

四

一第1008册 黃帝內經 卷 7 反之下

去者而不知毋伐其和取之于毫
芒而失之于千里以為養長之者
而其入愈深至不可療是何其相
盪之甚也而以為其初未始殊故
陳子類之百數十門者古所謂如

幼幼新書

序

五

迎浮雲如窺深淵殆猶未耶若痘
疹者尤幼少所以係死生也謂古
或未有者張鷟陳澤不以面乎
唐人所謂麻胡與黑靨巨胡將
無是耶然胡迺不患故不敢深

犯我者是以地耶則古今之變又
安可窮者大要發之以至於痂而
晚若苗之秀以實乎必若內則之
言致謹於閨門衽席間眎聽飲
食盡所謂胎教者必無患矣是

幼幼新書

序

六

其為十全之禁方哉宋以來吳
之專家者曰陳曰錢二氏陳以
熱錢以涼故有火與冰喻者今
二家漸歇而書猶出自錢則其
源緒可推而金陵之陳自叔田

益盛陳子傳父學而參以衆家
 尤精良有驗四方來謁藥者恒
 滿若是書求之累年不置為之
 分析條其義與所授各有宜其
 解悟得之性手敏心調特以神
 遇之而猶必本之方所載可謂不
 輕用矣予固好數意尤善之予所
 聞五驗曰敷和升明備化審平靜
 順此醫之大旨也少小方當不易
 此屬鈔梓且完為書此刊其

幼幼新書 卷七

端

賜進士河南按察司僉事

晉階朝列大夫前監察御史

沛國劉鳳撰



始平馮時範書



幼幼新書 卷八

吳郡章英之刻

校刊幼幼新書序

友人陳子履端校輯幼幼新書既就緒復手
自繕寫付梓應文閱之而深有感焉夫人之
所病病疾多而醫之所病病道少方書之切
於世用也尚矣矧嬰兒質特脆而語未達調
治為艱又古方之傳者獨鮮宜陳子之悉力

新序

購求而殫精刊定也其為病者謀為治病者
謀可謂均無憾也已抑醫之能十全也不專
在方方不足則患夫少筭而不勝方有餘則
患夫多岐而易惑欲其不乖於方而不泥於
方也必也運量於一心乎傳曰如保赤子心
誠求之雖不中不遠矣語天下之無所不用

其心孰如父母之愛子者善醫者果能以眾
父母心為吾心即隨時審症處方授藥採縱
損益動中機宜必能通其不能言之意而奏
彼不世出之功雖古方所未教者咸可裁自
一心而投之既向靡不如意也奚但顛顛一
科擅神聖功巧哉推是心也而視人親若吾

新序

親則過雒陽而即為耳目痺醫可也憫匹夫
疋婦弗獲其所則過邯鄲而即為帶下醫可
也舉同類之痺疴疾痛者而皆孩之惟醫國
醫天下者且將就而問道焉而况呱呱襁褓
者疇不長育於寸衷之惻怛耶然則新書四
十卷而一言以蔽之者豈他物也且夫世所

急願治而醫所不易治者皆以嬰兒所苦為
最甚或者邂逅此際而一念稍差於是乎見
鼎盛家而為貪求心見下劣家而有輕忽心
若然者其胸次已先自亂矣縱有禁方五車
誰復能決擇而善用之乎故嘗謂業醫者活
人之心不可無而自私之心不可有未醫彼

新序

三

病先醫我心夫然後可與斟酌變化握道樞
以應無窮而幼幼之書始不為紙上陳言已
矣陳君君子長者也仁慈一脉既紹松田先
生之家學而早歲習儒中歲奉釋其滋培夫
心地者尤有素所謂不可無之心幾備而不
可有之心幾泯焉者其究心是編也雖曰載

籍極博以愚觀之皆若妙明心之註脚云爾
噫嘻愚更有叩於君君方刊布新書而復叅
尋內典內典所謂有妙藥王名阿伽陀遍治
眾病者此非特新書未載蓋自炎帝所嘗軒
帝所問尚秘焉以此幼幼奚啻十全即萬全
不足道也第不知其藥之貌象若何君試拈

新序

四

出與宇宙間精於醫者共識之
萬曆十有四年歲在丙戌秋九月之望日巢
居子張應文著并書



幼幼新書古序

門人左迪功郎潭州湘潭縣尉主管學事巡
捉私茶鹽蔡李庚

醫家方論其傳尚矣自有書契以來雖三墳之言世
不得見而神農本草黃帝內經乃與宓犧氏之人卦
綿歷今古爛然如日星昭垂信乎藥石不可關於人
而醫書尤不可廢於天下或者乃謂醫特意耳不庸
著書唐史臣以此劇口稱道於許嗣宗殊不知張仲
景孫思邈輩率千百年而得一人使其方劑之書不

幼幼新書

序

傳則醫之道或幾於熄矣是或一偏之論也

湖南帥潮陽劉公鎮拊之暇尤善方書每患小兒疾
苦不惟世無良醫且無全書孩抱中物不幸而殞於
庸人之手者其可勝計因取古聖賢方論與夫近世
聞人家傳下至醫工技工之禁方間巷小夫已試之
秘訣無不曲意尋訪兼收並錄命幹辦公事王曆義
道主其事鄉貢進士王湜子是編其書雖其間取方
或失之詳立論或失之俗要之皆因仍舊文不敢輒
加竄定越一年而書始成惜乎公未及見而疾不起

公臨終顧謂庚曰幼幼新書未有序引邇來欲自為
之今不皇及矣子其為我成之庚曰謹聞命嗚呼學
士大夫公天下以為心者幾何人哉平日處念積慮
無非急已而緩人先親而後踈物我異觀私為町畦
其來蓋非一日昔吾夫子助祭於蜡出游魯觀之上
喟然發嘆以為大道之行天下以為公故人不獨親
其親不獨子其子大道既隱天下為家各親其親各
子其子夫子之嘆蓋嘆魯也然而天下後世豈止一
魯而已哉滔滔者皆是也東漢人物如第五倫者悃

幼幼新書

序

二

悃無譁質直好義似若可然也意其設心必有大過
人者至於或人問之以有私乎倫則曰吾兄之子嘗
病一夜十往退而安寢吾子有疾雖不省視終夕不
寐自以謂不能無私夫以兄之子尚若爾况他人之
子乎以第五倫尚若爾况下倫一等者乎宜乎夫子
之嘆之也今公之為是書使天下之為父兄者舉無
子弟之戚少有所養老有所終家藏此書交相授受
慶源無窮其為利顧不博哉以此知公之存心非特
無愧於今之人抑亦無愧於古之人矣紹興二十年

九月幾望謹序

幼幼新書

序

三

重刻幼幼新書叙

醫兵也小兒病弱國幼主被敵也質柔脆易侵難禁且不能自達難測而易起疑故治小兒病輔弱固扶幼主而禦強敵也不有祖述即山甫方耕不免浪戰即勝猶幸况不勝乎宋本幼幼新書心保赤子具本具未具變悉中冓縻得呂牙孫武制勝合變之玄機誠醫家韜鈴之選也板經兵火已失已久印本世唯存二一留中秘遠不可得一屬錢氏閱不可求端世幼科傳自白下先子枳田痛嬰兒多抱期願而天

幼幼新書 自序

襁褓宏修前學斬斬若不逮構得一二端髫時捧讀心慕更求無獲而錢氏故本轉歸雲間顧研山氏端因黃清甫河水為介紹懷資借某懇得之與某各歲其半顧本合南北宋板復缺三卷有奇端神祈廣詢一恒徐永錫氏有質本抄得其全玉菴楊大潤氏欲抄而索之某竟秘以烈燭辭閱歲徐本歸古歛程大綱氏度往抄之始獲觀全帙深慰天幸且筆且讀領其要畧會見壺醫傷寒家無分七熱風食輒以傷寒治問之曰不爾何以身熱如炙也疳積家無分五疳

蟲食積聚輒以疴積治問之曰不爾何以面黃腹脹
肌羸也驚悸家無今痘疹痲瘋風痰魃厥悉以驚風
治問之曰不爾何以涎潮搐搦戴目也昧日用偏仁
智治多天闕目擊其弊知不可戶曉也鄙心惻然欲
以書傳布而廣濟之載易寒暑刪繁理亂裁初本十
之三稿凡四易卷四十總五百四十七門便簡閱也
傾貲採梓數字償值手錄授工首事兩月食木者六
之一同志如某者雜以力助完卷可冀庶乎家世者
不至襲醫名而妄投崛起者不至無章程而杜誤師

幼幼新書 自序

門授受不至秘而不傳使人人祖述病者起生者延
天者壽仁術廣開惠澤宏溥遠宗作者之謀近繼先
子之志一生苦心盡是矣雖然病有機變方貴合宜
運用之妙存乎一心書猶筌蹄也亦猶兵家時日異
宜戎蠻異性器械坐作巨膠柱也尤有進焉大率腦
糜牛黃髮豎石藥悍劑皆不可輕用醫家每以細利
而重投病家每因慕名而甘戀不知厚味一進引寇
入肝脾心臟牢不可拔遂為兒異日害雖鵠緩莫能
施其術此又世之大戒也故更以鄙見擬別錄本草

輔之見古方不可執一云
萬曆十四年太歲丙戌瑞陽日古吳陳履端謹序

幼幼新書 自序

幼幼新書

凡例

一原初

此書議論悉中肯綮凡遇一病具本具末具變故病名甚夥顧顛經以後是書以前盡皆編入降是幼科諸書若百問類萃集成等書不過四五冊然是書為幼第一全書但卷帙浩繁工未易集方論重複觀者起厭未有專刻者

幼幼新書

凡例

一古序

序云取方失之詳立論失之俗要之皆因仍舊文不敢輒加竄定以此卷帙繁冗端極知借長盡加筆削撮要刪繁期于便覽獨于本旨則毫不敢失云

一參考

宋演山省翁曰潭州周宅廣取其文編集幼幼新書四十卷排列名方似涉繁碎猶如元帥欲以一箭退伏兵定太平求選善射一夫

百萬軍衆皆張孤矢以待以較臨機對壘檢閱較審正猶關而鑄兵夫萬軍皆張孤矢則一箭雙雕下者回衆而不中紅心者亦多以是故就中稍加去取若必無益而有害者皆削去合于時者存之至若論議可否並載以待觀者自裁止于章句加筆削云耳

一正訛

第四卷將護小兒法門保衛鞠育章云衛白之天五杜風池之邪白即古顛字衛白之天

幼幼新書

凡例

五疑當作衛顛顛之天夫此書雖王曆王湜所編想劉帥病革後止完三十八卷餘皆潦草以完故事未經對訂故此類甚多中亦有文脉相斷者悉用鄙意恭定改政

一存疑

第七卷驚啼門千金翼方用阿伽佗藥此在釋典華嚴經第七十八卷入法明品彌勒菩薩告善財童子云善提心者如阿伽佗藥能令無病永安隱故則知阿伽佗之一味或佛

一書... 丹... 8

之寓言表理或竺軋實有是藥但震旦從來
 所無千金翼之意蓋特謂驚啼之證天意人
 事相半儻非藥石所能療者醫家病家皆須
 發菩提心即福德陰佑庶幾嬰兒自安乎至
 若疫啼門睡洪散用佛花下註云即昇陀羅
 華則此品本出法華經云天雨摩訶勇陀羅
 華註為大白華斯乃天中之天將說諸佛世
 尊以一大事因緣出現于世故天帝先現奇
 祥尚非人寰所有况東土哉今以此境白花
 結子號風茹者文以美名權充之不啻優孟
 之效孫孫教耳然既與乳香朱砂麝香共劑
 想能安神止啼則指物而非譚理却與阿伽
 陀例不同又按華嚴經所論一菩提心而所
 喻百千端只藥部中有名善見者能除一切
 病有名無畏者離五恐怖有名摩訶應伽者
 毒蛇聞氣遠去有云毗笈摩者毒箭自然墮
 落此皆事理兼帶不可思議因茲想像佛之
 法藥豈但區區愈人四大病已耶

一刪繁
 書既未經窺定方皆排列則其繁處頗多或
 一章盡合全刪或章中句有繁者刪或句中
 字有繁者刪悉皆刪以就簡別削章削句削
 字例具後

一理亂
 如第三卷秘要指迷具人面部穴前總一圖
 後列八圖每圖各于五官窩穴并色及見證
 殊覺紊亂難觀今總一圖先于某處填某穴
 以便觀者知其部位後即細開頭顙印堂太
 陽山根眉為一項面臉為一項眼目眩睛為
 一項耳聾人中為一項口唇承漿為一項細
 開某處見某色主某證主吉主凶

一去複
 如第三卷病原門止宜列病名并致病之由
 如五疳止宜直書名目莊氏五疳歌細分某
 疳見某病証此病證形候門事不宜在病原
 門然病証形候門水鑑五疳歌與病原門莊

氏五疇歌持三五句異今病形候門以水鑑為主而莊氏同者削去異者悉分行註于下餘倣此

一就便

第二卷三關錦紋門載八段錦脉形論歌水鑑楊大鄴莊氏各為一宗而圖文不異頭緒既繁觀者不便今總為八圖每圖下以水鑑為主而楊大鄴莊氏與水鑑同者削去異者分行註下餘倣此

幼幼新書

凡例

五

一削重

第一卷求子方論門第一條云周南國風芣苢后妃之美也和平則頌人樂而有子王氏以芣苢為藥使人有子爾雅云芣苢馬馬車前也夫立言以經為首固邇其本原然不切方論削之餘倣此

一削句

第一卷求子方論門第二條千金論求子必得下有若其本命五行相剋及與刑殺衝破

并在子休癢死墓中者則求子了不可得慎無措意此數語與前當知夫婦本命五行相生與德合等數語特相反耳今于求子必得下着一不然字接下縱或得之終亦累人而于若其本命五行相剋數語削去餘倣此

一削字

第一卷求子方論千金雜禁忌法削雜法二字聖惠人無子條若壻墓不嗣年命相剋此二者非藥能益削不嗣相剋此二者數字餘倣此

幼幼新書

凡例

六

一定方

古方與今方不殊豈人不同歟亦氣有厚薄也尚論古人漢世啗玉唐人餐石宋去唐不遠石藥未盡除方今氣滿雖草根樹皮不可輕用故人參養命藥也食之令人飽悶多致不效况其他乎故用藥者固宜慎觀書者尤當酌

一削方

古方多用金銀屑水銀輕粉砒等夫以腦麝石藥尚不宜輕用况此輩乎哉存而不削甚惑初學今皆刪去其或存一二者因病瀆死萬一得中幸而獲全差有愈于死耳觀者審之

一酌方

首卷千金白薇丸與聖惠白薇丸方同少有不同者于千金方下書聖惠少石膏等多曾蒲千金柏子仁丸與聖惠柏子仁丸亦此例

幼幼新書

凡例

十一

若干金秦栴丸與聖惠秦栴丸藥品一味不殊則削聖惠方餘倣此

一補遺

湯飲丸散如第三卷云益黃散見胃氣不和門當在第二十一卷第九門中求之下云瀉青丸見驚熱門而不見于驚熱者當在四十卷末附方中求于此不見必此方贗本元闕不必他求

一方書

此書率內經顛顛巢氏千金聖惠等書詮次成帙每條上貫以本書名叙論如素問云何顛顛云何巢氏云何叙方如顛顛某湯某丸千金某湯某丸聖惠某湯某丸若一書而錄論三四條四五方者首條上冠以書名餘止書論并方耳

一品方

方不合時與捍劑並削有去取間者則先書病原後書湯散丸飲名若先書某湯某飲某散某丸而後及病原者愚意為可用若天有寒暑地有南北歲運有陰陽人稟有厚薄及氣血之強弱性質之宜溫宜寒受病之深淺并寒熱之殊久新之異要當臨機酌用此非愚之所逆料也

一服法

藥有食前者有食後者有早服者有臨卧服者有早晚各一服者有宜早午而不宜晚者有宜午晚而不宜早者有日三四服者有夜

亦宜服者有不時服者悉具本方後其云更量與者或以時之早晚量以年之大小量以病之淺深量蓋量以施藥也在藥則湯飲以合量散以錢匕刀圭量丹丸則以圓量而圓者又以如粟量如黍量如梧子如雞頭量者凡可意裁者悉以量書

幼幼新書

凡例

九

幼幼新書目錄

第一卷

求端探本

凡一門

求子方論

第二卷

方書叙例

凡十三門

叙初有小兒方第一

叙小兒有病與大人不殊第二

叙小兒方可酌量藥品分兩第三

叙小兒有病宜早治第四

叙調理第五

叙修合藥第六

叙用藥第七

叙氣弱不可容易吐瀉第八

叙十五以下皆可以小方脉治第九

論初受氣第十

相壽命第十一

三關錦紋第十二

幼幼新書

目錄

脉法第十三

第三卷

病源形色

凡十四

五歲所主病第一

五歲病相生刑剋第二

五歲病四時所不宜第三

胎中滋養第四

胎中受病第五

稟賦之殊第六

幼幼新書

卷目錄

二

得病之源第七

病證形候第八

察形色治病第九

治病要法第十

第四卷

刑初保育

凡二十二門

胎教第一

兒初生將護法第一

擇乳母法第三

附下乳

乳兒法第四

乳母雜忌慎法第五

哺兒法第六

初哺日第七

浴兒法第八

拭兒口法第九

斷臍法第十

灸臍法第十一

裹臍法第十二

封臍法附

幼幼新書

卷目錄

三

甘草法第十三

黃連法第十四

韭汁法第十五

朱蜜法第十六

牛黃法第十七

汞粉法第十八

豬乳法第十九

藏衣法第二十

剃頭法第二十一

襍謝法第二十二

第五卷

初生有病

凡十七門

不作聲第一

眼不開第二

初生輒死第三

不喫乳第四

吐不止第五

不小便第六大便附

幼幼新書 卷自錄

有懸癰病第七

重舌第八

重顴重齦第九

口中有虫第十

着噤第十一犯風附

戴口第十二

木舌第十三

撮口第十四

臍風第十五

臍腫濕第十六氣臍附

臍瘡第十七

第六卷

稟受諸疾

凡十九門

解顛第一

顛不合第二

顛填第三

顛陷第四

滯顛第五口中涎下

幼幼新書 卷自錄

齒不生第六

髮不生第七

髮黃第八

虫胞第九胎中頭生瘡瘡有虫

鶴節第十

手拳不展第十一

脚拳不展第十二

語訖第十三

通睛第十四俗呼

慢肝風第三

驚退而啞第四

驚退而筋脉不舒第五

天癆第六

驚風內釣第七

盤腸氣釣第八

腹肚釣第九

灸二十四釣第十

胡孫嚇第十一

白虎病第十二

第十一卷

癩論候法

凡十二門

癩論第一

癩候第二

驚癩忤是三候第三

癩法第四

截癩法第五

五歲之癩第六

六畜之癩第七

一切癩第八

灸癩第九

癩差復發第十成癩疾

癩差身面腫第十一

癩差不能語第十二

第十二卷

五癩異治

凡五門

風癩第一

驚癩第二

食癩第三

熱癩第四亦名退癩除熱

顛癩第五

第十三卷

胎風中風

凡十門

胎風第一

一切風第二

中風第三

中風痙第 四	中風口噤第 五	中風涎潮第 六	中風四肢拘攣第 七	中風不隨第 八 <small>附 痰找</small>	中風口喎邪癱第 九	中風失音不語第 十	第十四卷	熱風暑寒 凡十一門	幼幼新書 卷第錄	十一
溫壯第 一	壯熱第 二	時氣第 三	溫病第 四	熱病第 五	傷風第 六	傷暑第 七	傷寒第 八	顛風傷寒第 九		

夾食傷寒第 十	夾驚傷寒第 十	第十五卷	傷寒變動 凡二十門	傷寒自汗第 一	傷寒頭汗出第 二	傷寒咳嗽第 三	傷寒發喘第 四	傷寒鼻衄第 五	傷寒嘔啞第 六	傷寒發渴第 七	傷寒大小便不通第 八	傷寒發狂第 九 <small>餘發 狂附</small>	傷寒結胃第 十	傷寒腹痛第 十一 <small>腹滿 附</small>	傷寒下利第 十二	傷寒口内生瘡并喉痛第 十三	傷寒發斑第 十四 <small>餘發 斑附</small>	幼幼新書 卷第錄	十二
---------	---------	------	-----------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	------------------------------	---------	------------------------------	----------	---------------	-------------------------------	----------	----

傷寒發黃第十五亦名黃病附餘發黃

傷寒餘熱不退第十六

傷寒勞復第十七

傷寒失音第十八

傷寒變疽第十九

傷寒變疹第二十

第十六卷

欬嗽諸病 凡十一門

欬嗽第一

欬逆第二

喘欬上氣第三餘喘急附

欬嗽作呀呷聲第四附欬

欬嗽聲不出第五

驚膈欬第六驚差而欬作

傷風欬第七

痰欬第八

寒欬第九

熱欬第十

久欬第十一

第十七卷

寒熱瘧瘵 凡二十二門

瘵實第一

寒熱往來第二

寒熱五藏煩滿第三

寒熱腹痛第四

寒熱結實第五

寒熱食不消第六

寒熱能食不生肌肉第七

寒熱不食羸瘦第八

瘵疾第九

瘵疾熱而後寒第十

瘵疾寒而後熱第十一

瘵疾寒熱更作第十二

瘵疾熱而不寒第十三

瘵疾寒而不熱第十四

瘵疾熱多于寒第十五

瘡疾寒多于熱第十六

瘡疾寒熱相等第十七

瘡瘡第十八

久瘡第十九

瘡後引飲第二十

瘡後脅內結硬第二十一

瘡後頭面浮腫第二十二

第十八卷

斑疹麻豆

凡十六門

幼幼新書

卷目錄

十四

瘡疹論第一

瘡疹候第二

瘡疹未見乃可疎利第三

瘡疹初出第四

瘡疹已出未出第五

瘡疹出未快第六

瘡疹倒靨第七

瘡疹太盛第八

煩喘燥渴附

瘡疹愛護面目第九

瘡疹攻咽痛第十

瘡疹大小便不通第十一

瘡疹便膿血第十二

瘡疹膿汁不乾第十三

瘡疹入眼第十四

瘡疹後解餘毒第十五

瘡疹後滅癍痕第十六

第十九卷

諸熱痰涎

凡十門

幼幼新書

卷目錄

十五

胎熱第一

膈熱第二

亦名壅熱

胃熱第三

風熱第四

煩熱第五

潮熱第六

積熱第七

實熱第八

極熱第九

痰涎第十

第二十卷

熱蒸汗痘

凡九門

虛熱第一

骨熱第二

病初則骨熱
病劇則骨蒸

骨蒸第三

盜汗第四

喜汗第五

勞氣第六

幼幼新書 卷目錄

熱渴第七

黃疸第八

附胎疸

黑疸第九

第二十一卷

寒痛逆羸

凡十六門

胎寒第一

虛寒第二

胃中有寒第三

胃脘滿痛第四

心痛第五

腹痛第六

腹脹第七

冷熱不調第八

胃氣不和第九

附脾胃

乳食不下第十

膈氣第十一

氣逆第十二

肌膈羸瘦第十三

幼幼新書 卷目錄

病後虛羸第十四

病後聲不出第十五

病後不能語第十六

第二十二卷

癥瘕積聚

凡十門

積聚第一

癥瘕第二

癖氣第三

乳癖第四

是脾

疝氣第五
痞結第六
宿食不消第七
傷飽第八 <small>食不知飽附</small>
丁翼第九
哺露第十
第二十三卷
五疳辯治 凡九門
五疳論第一
五疳候第二
五疳可治不可治候第三
五疳總方第四
風疳第五 <small>亦名肝疳風疳生核附</small>
驚疳第六 <small>亦名心疳</small>
食疳第七 <small>亦名脾疳</small>
氣疳第八 <small>亦名肺疳</small>
急疳第九 <small>亦名腎疳又名走馬疳</small>
第二十四卷

無辜疳劇 凡五門
無辜疳第一 <small>亦名無辜病無辜疳附</small>
無辜針烙法第二
一切疳第三
五疳出虫第四 <small>諸疳虫附</small>
疳疾吹鼻第五
第二十五卷
諸疳異證 凡十一門
走馬疳第一
口齒疳第二
臍疳第三 <small>亦名臍疳</small>
眼疳第四
腦疳第五
脊疳第六 <small>歷脊疳附</small>
妳疳第七
疳肥第八
疳瘦第九
乾疳第十

肉疔第十一

第二十六卷

諸疔餘證

凡十五門

疔熱第一

疔渴第二

疔勞第三

疔嗽第四

疔積第五

疔瀉第六

疔痢第七

疔痢久不差第八

疔痢腹痛第九

疔濕第十 疔痢濕

蛔疔第十一

疔瘡第十二

疔腫第十三

疔後天柱倒第十四 他病天

疔氣灌入陰第十五

幼幼新書 卷目錄 十一

第二十七卷

吐噦霍亂

吐逆第一

吐覘第二

噦逆第三

霍亂吐利第四

霍亂第五 或霍亂吐而不利或霍亂利而不吐或止霍亂而不吐利

吐利第六 但吐利而不霍亂

吐利津液少第七

吐利心腹痛第八

冷吐第九

熱吐第十

挾驚吐第十一

毒氣吐第十二

第二十八卷

泄瀉羸腫

一切泄瀉第一

積瀉第二

幼幼新書 卷目錄 十二

驚瀉第三

傷瀉第四

冷瀉第五

熱瀉第六

洞泄第七

水穀瀉第八

暴瀉第九 亦名卒利 又名暴利

暴瀉第十

利久不止第十一 瀉利

幼幼新書 卷目錄

二十三

利渴不止第十二 瀉利

下利腹痛第十三 瀉利

下利羸瘦第十四 瀉利

下利浮腫第十五 瀉利

第二十九卷

滯痢赤白 凡十二門

八痢第一

一切痢第二

冷痢第三 亦名白痢

熱痢第四 亦名赤痢

冷熱痢第五 亦名赤白痢

白膿痢第六

純血痢第七

膿血相雜痢第八 重下利附

五色痢第九

休息痢第十

蟲痢第十一

脫肛第十二

幼幼新書 卷目錄

廿三

第三十卷

諸血淋痔 凡十九門

吐血第一

嗽血第二

衄血第三

大便血第四

小便血第五

大便不通第六

小便不通第七

大小便不通第八

大便失禁第九

小便數第十

大便青第十一

小便白第十二

小便淋瀝第十三

石淋第十四

氣淋第十五

熱淋第十六

血淋第十七

寒淋第十八

痔疾第十九

第三十一卷

三虫癩疔

虫動第一

蛭虫第二

蛭虫第三

寸白虫第四

幼幼新書

卷目錄

古

癩疔第五

偏癩第六亦名羗癩
顧音積

陰腫第七

陰瘡第八

疔起外腎第九

第三十二卷

水飲鬼症

痰飲第一

腫滿第二

水氣第三

中惡第四

卒死第五

鬼持第六附鬼氣

疔病第七

尸症第八

虫症第九

第三十三卷

眼目耳聾

凡二十四門

幼幼新書

卷目錄

古

眼赤痛第一	<small>附目腫</small>
胎赤眼第二	<small>緣目有瘡而赤者是</small>
睛生障翳第三	
眼痒第四	
眼暗第五	
睛高第六	
青盲第七	
雀目第八	
疣目第九	
目中有味第十	<small>目澀羞明附</small>
耳聾第十一	
耳鳴第十二	
耳中痛第十三	
耳瘡第十四	
月蝕瘡第十五	
聾耳第十六	
耳中有息肉第十七	
底耳第十八	

幼幼新書

卷目錄

廿六

百虫入耳第十九	
鼈鼻第二十	
鼻塞第二十一	
鼻流清涕第二十二	
鼻乾無涕第二十三	
鼻有息肉第二十四	
第三十四卷	
口唇喉齒	凡廿四門
口瘡第一	
口臭第二	
口乾第三	
鸞口瘡第四	
唇口上生瘡第五	
舌腫第六	
舌上瘡第七	
舌上血出第八	
唇腫第九	
緊唇第十	

幼幼新書

卷目錄

廿七

脣青第十一

咽喉腫痛第十二 喉中瘡附

尸咽第十三

咽中噎第十四

喉痺第十五

馬痺第十六

纏喉風第十七

齒痛第十八

齒齩宣露第十九

幼幼新書 卷目錄

齒齩腫痛第二十

齩齒第二十一

虫齩第二十二 裂齒附

齒落久不生第二十三

頰車挫閃第二十四 牙車急附

第三十五卷

一切丹毒

凡三十八門

丹候第一

一切丹第二

土虺丹第三

眼丹第四

五色丹第五

伊火丹第六

燹火丹第七

茱萸丹第八

赤丹第九

白丹第十

黑丹第十一

幼幼新書 卷目錄

天雷丹第十二

天火丹第十三

殃火丹第十四

神氣丹第十五

神火丹第十六

神灶丹第十七

鬼火丹第十八

野火丹第十九

骨火丹第二十

家火丹第二十一	火丹第二十二	螢火丹第二十三	朱田火丹第二十四	胡吹竈丹第二十五	胡漏竈丹第二十六	土竈丹第二十七	天竈火丹第二十八	癸竈火丹第二十九	尿竈火丹第三十	野竈丹第三十一	大孕丹第三十二	尔朱丹第三十三	赤流丹第三十四	赤遊丹第三十五	身有赤處第三十六	赤白溜第三十七	卒腹皮青黑第三十八
---------	--------	---------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	-----------

幼幼新書 卷目錄 三十一

第三十六卷	癰疽瘰癧	瘰癧第一	疽第二	附骨疽第三	毒腫第四	癰第五	軟癰第六	惡核第七	惡瘡第八	癰瘡第九	癰癧第十	癰氣第十一	第三十七卷	瘡癩疥癬	一切瘡第一	痔瘡第二	風熱瘡第三
-------	------	------	-----	-------	------	-----	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	-------

幼幼新書 卷目錄 三十二

熱毒瘡第 四

頭面身體瘡第 五

風搔癢疹第 六

疥第 七

癬第 八 附疥

癩瘡第 九

燥瘡第 十

尿灰瘡第 十一

酢瘡第 十二

幼幼新書 卷 目錄

臭臍瘡第 十三

王灼瘡第 十四

火灼瘡第 十五

黃肌瘡第 十六

浸淫瘡第 十七

第三十八卷

頭瘡凍痺

凡十八門

頭瘡第 一

禿瘡第 二

白禿瘡第 三

赤禿瘡第 四

漏頭瘡第 五

蠅蝮尿瘡第 六

自懸瘡第 七

代指第 八

手足皸裂第 九

脚瘡第 十

凍瘡第 十一

幼幼新書 卷 目錄

痂子第 十二

赤癩第 十三

白駁第 十四

漆瘡第 十五

金瘡第 十六

湯湯火燒第 十七

瘡中風中水第 十八

第三十九卷

鯁刺虫毒

凡十七門

惡刺第一	<small>竹木刺 狐尿刺 并刺中風水附</small>
骨鯁第二	<small>附</small>
食土第三	
落水第四	
遺尿第五	
尿牀第六	
狐臭第七	
諸虫咬第八	
頭多生虱第九	<small>身有虱附</small>
幼幼新書	卷目錄
擲撲損瘀第十	
誤吞銅鐵第十一	
耳中有物不可出第十二	
臧癩痕第十三	
中食毒第十四	
中藥毒第十五	
中水毒第十六	
百病第十七	
第四十卷	

論藥叙方	凡十五門
玉石部第一	
草部第二	
木部第三	
人部第四	
獸部第五	
禽部第六	
虫魚部第七	
果部第八	
幼幼新書	卷目錄
米部第九	
菜部第十	
本草雖無而人可識者第十一	
本草既無而未識者第十二	
前代方書第十三	
近代方書第十四	
士大夫家藏第十五	
附拾遺方	<small>元本無不編入第</small>
幼幼新書目錄	

幼幼新書卷第一 求端探本

凡

後學古吳陳履端于始輯

錫山華承美以剞校

求子方論第一

素問岐伯曰女子二七而天癸至任脉通太衝脉盛

月事以時下故有子經脉也腎氣全盛衝任流通經

血漸盈應時而下天真之氣降與從事故云天癸然

衝為血海任主胞胎二者相資故能有子所以謂之

月事者平和之氣常以三 丈夫二八腎氣盛天癸至

精氣溢寫陰陽和故能有子男女陰陽之質不同天

幼幼新書 卷一 海滿而去血陽動應合而

泄精二者通和故有子 千金曰欲求子者當知夫婦本命五行相生與德合

并本命不在子休廢死墓中者求子必得不然縱得

之終累人

凡人無子夫妻俱有五勞七傷虛羸百病所其治法

男服七子散女服紫石門冬丸及坐道藥盪胞湯無

不有子

古者求子多用慶雲散承澤丸

陰陽調和二氣相感陽施陰化是以有娠而三陰所

會則多生女姪娠二月名始胎血脈不流象形未定見物而化是以男女未分不滿三月可服藥方術轉之令生男也方術見本門

御女者當避丙丁日及亥望晦朔大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地晦冥日月薄蝕虹蜺地動犯之男損神女得病子必顛狂頑愚瘡癰聾瞶躄跛盲眇多病短壽不孝不仁至于日月星辰火光之下神廟佛寺之中井竈園廁之側塚墓尸柩之傍皆悉不可夫交合如法有福德大智善人降托胎中仍令性

行調順所作和合家道日隆禎祥競集又須待婦人月經絕後一三五日擇旺相日及月宿在貴宿以生氣時夜半後施瀉子皆男且壽而賢明高爵也六日後不可不然反是

旺相日	春甲乙	夏丙丁	秋庚辛	冬壬癸
月宿日	正月一日	六日	九日	十日
	十一日	十二日	十四日	廿一日

此与上月宿日相合尤益

黃帝雜禁人有怒血氣未定因以交合令人癩疽又不可忍小便交合使人淋莖中痛面失色遠行疲乏入房為五勞虛損少子且婦人月事未絕交合令人成病得白駁

聖惠云人無子者其事有三一墳墓不嗣二夫婦年命相剋三夫病婦疹若墳墓年命非藥能益婦人無子由勞血血氣生病或月經澀閉或崩血帶下致陰陽之氣不和經血之行乖候故無子診右尺脈浮為

物幼新書

卷一

五

陰陽脈絕無子微澀中年得此為絕產少陰脈如浮緊則絕產惡寒脈尺寸俱弱絕產

婦人將攝失宜飲食不節暴風取冷或勞傷過度致風冷之氣乘其經血結于子藏故無子

肘後婦人崩中漏下青黃赤白致無子方

禹餘糧 赤石脂 牡蠣 桂心

烏賊魚骨 竈下黃土

等分為末粥飲服方寸七日三

乾薑經墨等分為末丸酒下日三

鹿茸當歸蒲黃等分搗篩酒服一錢七稍加至方寸

七

燒露蜂房三指撮酒服之

常灸猪腎脂食或麵裹煮吞佳

千金七子散治丈夫風虛目暗精氣衰少無子

五味子 牡荊子 兔絲子 車前子

新薑子 附子 蛇床子 石斛

署預 乾地黄 杜仲 鹿茸

遠志各八 芎藭六 山茱萸 天雄

物幼新書

卷一

六

人參 茯苓 黃耆 牛膝各五

桂心十 巴戟天十二 菝葜十一 鍾乳粉八

治末篩酒服方寸七日二不知增至二七知為度

禁如藥法不能酒蜜丸一方加覆盆子八銖

朴硝盪胞湯治婦人全不產及斷緒久不差

朴硝 牡丹 當歸 大黃

桃仁生用各 細辛 厚朴 桔梗

赤芍藥 人參 茯苓 桂心

甘草 牛膝 橘皮各二 蜜虫

水蛭十枚

附子六銖

以咀清酒水各五升煮取三升分四服日三夜一
相去三時如常覆被取汗冬日火籠之必下積血
及冷赤濃如赤小豆汁本子宮有此惡物或天陰
臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下
盡氣弱不堪再服二三服即止如大悶不堪可食
酢飢冷漿一口即止恐惡物不盡不大得藥力忍
服盡更好一日後仍看藥千金翼不用甘草桔梗

著坐導藥方

幼幼新書

卷一

二

皂莢

山茱萸千金翼作苦瓠

當歸各一兩

五味子

細辛

乾薑各二兩

礬石

戎鹽

蜀椒

大黃各半兩

末之絹囊盛大如指內婦人陰中坐卧任意行勿
急小便時去之更新者必下青黃汁止即御有子
未見出只安十日為服朴硝湯恐去未盡用之值
天陰冷不疼不必用一日外服紫石門冬丸

紫石英

天門冬各三兩

當歸

芎藭

紫葳

卷柏

桂心

烏頭

乾地黄

牡蒙一作牡荊

禹餘糧

石斛

辛夷各一兩

人參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

乾薑

食茱萸

牡丹

牛膝各三銖

柏子仁一兩

署預

烏賊骨

甘草各一兩半

為末蜜丸如桐子酒服十九日三漸增至三十九
腹中熱為度不禁房室不盡劑即有孕夫不在勿服

白薇

細辛

防風

人參

幼幼新書

卷一

八

秦椒

白欬一云白止

沙參

桂心

牛膝

秦朮

蕪荑

芍藥

五味子

白僵蚕

牡丹

鱗蛸各一兩

乾漆

柏子仁

乾薑

卷柏

附子

芎藭各三銖

紫石英

桃仁各一兩半

鍾乳

乾地黄

白石英各二兩

鼠婦兩半

麻布叩腹頭一尺

水蛭

蜜虫各十枚

吳茱萸十八銖

為末蜜丸桐子大酒服十五丸日再加至三十九

當有所去小覺有異止

慶雲散主丈夫陽氣不足不能施化施化不成

覆盆子 五味子各一升 天雄一兩 石斛

白朮各三兩 桑寄生四兩 天門冬九兩 兔絲子二升

紫石英二兩

治篩酒服方寸七先食日三素不耐寒者去寄生

加細辛四兩陽氣不足而無子去石斛加檳榔十

五枚

承澤丸主婦人下焦三十六疾不孕絕產

切切新書

卷一

九

梅仁 辛夷各一升 葛上亭長七枚 溲疏三兩

藁本一兩 澤蘭子五合

為末蜜丸先食服如大豆二九日三不知稍增若

腹中無堅癖積聚者去亭長加通草一兩按酒送下

大黃丸主帶下百病無子服藥十日下血二十日下

長虫及清黃汁三十日病除五十日肥白

大黃同黑豆熬黑 乾薑 柴胡 朴硝各一升

芎藭五兩 蜀椒二兩 茯苓如雞子

為末蜜丸如桐子先食服七丸米飲下加至十九

五日微下

吉祥丸治女人積年不孕

天麻 柳絮 牡丹 茯苓

乾地黄 桂心各一兩 五味子 桃花

白朮 芎藭各二兩 覆盆子一升 桃仁一百枚

兔絲子 楮實各一升

為末蜜丸豆大每服空心酒下五九日中一服晚

一服

消石大丸治十二癥瘕及帶下絕產無子先服此下

切切新書

卷一

十一

之廼服寒食散此不下水穀但下病不令人困

消石六兩朴亦得 大黃八兩 人參 甘草各二兩

為末三年苦酒置銅器中以竹筴柱器中一升作

一刻置火上先內大黃攪不息使微沸盡一刻內

餘藥微火熬使可丸如雞子黃欲合先齋戒一宿

勿令兒婦奴婢等見欲下病用二丸若不能可分

作小丸多不過四丸不分為善人羸少食強者不

須二十日五度服和調半日乃下若下如雞肝或

如米汁色赤黑或一升三升下後慎風冷作粥食

後作羹臠自養如產婦法六月有子禁生魚猪肉
辛菜寒食散方未見

金太守白薇丸治月水不利閉塞絕產十八年服此

二十八日有子

白薇 細辛各三 人參 杜蘅一用

牡蒙 厚朴 當歸 紫苑

白彊蚕 半夏各十 蜀椒 防風

附子 兩各半 沙參 乾薑 秦艽

牛膝 兩各半

幼幼新書

卷一

十一

為末蜜丸如桐子先食服三丸不知增至四五丸

覺有娠止用之大驗崔氏有桔梗丹參十八銖

白薇丸主久無子或上熱下冷百病皆治

白薇 乾薑 蜀椒 乾地黄

車前子 各十銖 石膏 紫石英 藜蘆

菴藺子 各三銖 卷柏 各三銖 芎藭 蛇床子

當歸 各一兩 白龍骨 太一餘糧 麥門冬

遠志 兩 澤蘭 茯苓 赤石脂 各二

覆盆子 白芷 桃仁

人參 各兩 細辛 三兩 蒲黃 桂心 各二兩

橘皮 兩半

為末蜜丸梧子大酒服十五丸日再漸增以知為

度可至五十九丸慎猪雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛肉

等覺有娠止聖惠少石膏石英菴藺

秦椒丸治婦人絕產生來未產盪滌府藏玉門受子

秦椒 天雄各十銖 玄參 人參

白欬 鼠婦 白芷 黃蓍

桔梗 露蜂房 白彊蚕 桃仁

幼幼新書

卷一

十一

蟬蛸 白薇 細辛 蕪荑 各一兩

牡蒙 沙參 防風 甘草

牡丹皮 牛膝 卷柏 五味子

芍藥 桂心 大黃 石斛

白朮 各三銖 柏子仁 茯苓 當歸

乾薑 各兩 澤蘭 乾地黄 芎藭 各一兩

附子 各二兩 乾漆 白石英 紫石英

麻布叩懷頭 七尺 鍾乳 二兩 水蛭 七十枚 蜜虫 百枚

末之蜜丸如桐子酒服十九日再加至二十有所
去如豈汁臯涕此是病退覺有孕止
丹參丸主始覺有娠養胎并轉女為男

丹參 續斷 芍藥 白膠

白朮 柏子仁 甘草各二兩 蕪荑十八銖

東門上雄雞頭一枚 當歸 吳茱萸

橘皮各一兩 白芷 冠纓燒灰各一兩 乾地黄兩

人參 芎藭 乾薑各三銖 犬卵乾一具

為末蜜丸酒服十九日再加至二十九如梧子

幼幼新書 卷一 十三

琴弦一枚絳囊盛帶左臂一懸腰下百日

雄黃一兩絳囊盛帶要女用雌黃

以斧一柄置卧床下刃向下勿令人知不信待雞抱

卵試之

大澤蘭丸治婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛

或頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上遊風去

來目淚出多涕唾忽忽如醉或腎中冷逆胸中嘔不

止及瀉痢淋瀝或五藏六府寒熱不調心下痞急邪

氣欬逆或漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或身體皮

膚中澀如麻豆苦痒痰癖結氣或四肢拘攣風行周
身或上氣惡寒洒淅如瘧或喉痺臯瘕風癩癩疾或
月水不通或竟晷不定飲食無味并產後血無所不
治令人有子

澤蘭二兩 藁本 當歸 甘草各一兩

芎藭 乾地黄 柏子仁

五味子各一兩 桂心 石斛 白朮各一兩

白芷 茯苓 厚朴 防風

暑預 茯苓 乾薑 細辛

幼幼新書 卷一 十四

卷柏各一兩 蜀椒 人參 杜仲

牛膝 蛇床子 續斷 艾葉

蕪荑各一兩 紫石英三兩 赤石脂 石膏各五兩

禹餘糧一兩一本有枳實

末之蜜丸如梧子酒服二十九至四十九又赤白

痢去乾地黄石膏麥門冬柏子仁加麥蘗陳麩龍

骨阿膠黃連各一兩半有鍾乳加三兩良

柏子仁丸治婦人五勞七傷羸冷瘦削無顏色飲食

減少貌失光澤斷緒無子久肥白補益

紫石門冬丸主風冷在子宮有子常隨或始為婦便患心痛成疾月水未曾來服之肥克有子	紫石英	禹餘糧	天門冬	烏頭	紫石門冬丸主風冷在子宮有子常隨或始為婦便患心痛成疾月水未曾來服之肥克有子
聖惠無烏頭有龍骨防葵秦尤各半兩并治產後半身枯	茯苓	桂心	甘草	五味子	聖惠無烏頭有龍骨防葵秦尤各半兩并治產後半身枯
柏子仁	石斛	人參	澤瀉	澤瀉	柏子仁
遠志	燕萸	杜仲	蜀椒	蜀椒	遠志
卷柏	桑寄生	石南	雲母	雲母	卷柏
當歸	烏賊魚骨	烏賊魚骨	烏賊魚骨	烏賊魚骨	當歸
黃蓍	乾薑	白石英			黃蓍
紫石英	鍾乳	赤石脂	厚朴		紫石英
桂心	白朮	茯苓	細辛		桂心
獨活	人參	五味子	石斛		獨活
白芷	芍藥	桔梗	防風		白芷
烏頭	地黃	蜀椒	澤蘭		烏頭
藜蘆	燕萸	杜仲	當歸		藜蘆
甘草	芎藭				甘草

幼幼新書

卷一

十五

末之蜜丸如梧子酒服二十丸加至四十九丸	乾薑	牡丹	附子	水蛭	末之蜜丸如梧子酒服二十丸加至四十九丸
鼈甲丸治女人小腹積聚大如七八寸盤面上下周流痛難忍手足苦冷效噫腥臭兩脇熱如火炙玉門冷如風吹經水不通或月前或月後服三十日差有子	鼈甲	沙參	吳茱萸	麤虫	鼈甲丸治女人小腹積聚大如七八寸盤面上下周流痛難忍手足苦冷效噫腥臭兩脇熱如火炙玉門冷如風吹經水不通或月前或月後服三十日差有子
皂莢	當歸	芍藥	甘草		皂莢
防葵	蟬蛸	大黃	蜜虫		防葵
末之蜜丸如梧子酒下七丸日三稍加知為度	牡蒙丸治婦人產後十二癥帶下無子皆冷風寒氣或產末百日胞絡惡血未盡便利于懸圍上及久坐濕地寒入胞裏結在小腹牢痛小如雞子大如拳按之跳手隱隱如虫嚙或如針刺時槍入心兩脇支滿不食或食不消化上下流通或守胃管連玉門背膊	末之蜜丸如梧子酒下七丸日三稍加知為度			末之蜜丸如梧子酒下七丸日三稍加知為度

幼幼新書

卷一

十六

痛嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中創效引陰痛小便
自出子門不正令人無子腰膝疼痛四肢沉重淫躍
一身盡腫乍來乍去大便不利小便淋瀝或月經不
通或下如腐肉五色如豆汁夢想不祥

牡蒙 桂心 吳茱萸 芎藭

厚朴 消石 前胡 乾薑

麤虫 牡丹 蜀椒 黃芩

桔梗 茯苓 細辛 葶藶

人參各十 當歸 大黃二兩 附子一兩

幼幼新書 卷一 十七

末之蜜和更搗萬杵丸如梧子空心酒服三九日
三不知加至五六九下赤白青黃物如魚子病根
出矣

女人腹中十二疾一經水不調二經如清水三經水
不通四不周時五生不乳六絕無子七陰陽減少八
腹苦痛如刺九陰中寒十子門相引痛十一經來凍
如葵汁十二腰急痛得病之時因與夫卧起月經不
去或卧濕冷地及冷水洗浴當時取快後生百病或
瘡癩未差便合陰陽起早作勞衣單席薄寒從下入

耳服此

半夏 赤石脂各一兩 蜀椒

乾薑 吳茱萸 當歸 桂心

丹參 白欬 防風各一兩 瞿蘆兩

末之蜜丸如梧子空心酒服十九日三稍加知為

度

外臺廣濟療無子令子宮內灸丸

麝香二分 蜀椒六分 皂莢十分

搗篩蜜丸酸棗仁大以綿裹內產宮中留少綿線

幼幼新書 卷一 十八

出覺憎寒不淨下多即抽出一日一度換之無問
晝夜

白薇丸療久無子

白薇 牡蒙 藁本各五分 當歸

薑黃 地黃各七分 人參 柏子仁

石斛 桂心 附子炮 五味子

防風 吳茱萸 甘草 牛膝

芎藭 桑寄生各六分 烏餘糧八分 秦光二分

搗篩蜜丸如梧子空腹酒下二十九丸加至三十日

再不利忌生葱菜熱麵蕎麥猪肉葵菜蕪荑菘菜
海藻粘食陳臭物等

地黄湯瘵久無子斷緒小腹冷疼氣不調

乾地黄 牛膝 當歸各八兩 芎藭

卷柏 防風各六兩 桂心 牽牛末各三分

切水六升煮取二升三合去滓分三服服別和一分牽牛末服如人行四五里更取一服以快利止
忌熱麵蕎麥炙肉生葱蕪荑蒜粘食等物

茱萸丸瘵陰寒十年無子

物幼新書 卷一 十九

蜀椒去目汗 吳茱萸各一升

末之蜜丸彈子大綿裹道腸中日再易無所下但

開子箴令陰溫即有子

聖惠杜蘅丸主婦人腹箴久積風冷血氣凝澀不能

宣通故無子

杜蘅 防風 白茯苓 細辛

附子炮去皮臍各一兩 白薇 牛溲

沙參 半夏湯洗七次去滑微炒 秦艽

菖蒲 藁本 蛇床子 桂心各三分

川椒一分去目及閉者微炒去汗

羅為末蜜和搗五七百杵丸如桐子空心及晚溫

酒下三十九丸有子止

紫石英丸主久無子由于箴久積風冷陰陽不能施

化 紫石英二兩水飛 細辛 厚朴去皮塗生薑汁炙令香熟

桔梗 川楝去目及閉者去汗微炒 防風

硫黃 川大黃 附皮炮去臍 白薇

當歸微炒 桂心各一兩 鼈甲一兩半生半熟 牡蒙

物幼新書 卷一 二十

人參 桑寄生各三升 半夏湯洗七次 白僵蚕炒

紫苑 續斷 牛膝 杜衡各半兩

羅蜜和搗五七百杵丸如桐子空心晚食前各一

服溫酒下三十九丸

卷柏丸治子箴冷由風寒邪氣客于經血

卷柏 牡蒙 藁本 當歸微炒

熟地 柏子仁 乾薑炮 禹餘糧燒醋

石斛 白薇各一兩 芎藭 人參

桂心 五味子 附子炮去皮臍

防風 甘草 微炙至 吳茱萸 湯浸七次 焙乾 微炒

牛膝 桑寄生 川椒 微炒 各三分

羅末蜜和搗五七百杵丸如梧子空心晚食前温

酒下三十丸

陽起石丸主血海久積虛冷

陽起石 二兩 酒煮 半日 細研 熟地 一兩 乾薑 炮

白朮 牛膝 吳茱萸 湯炮七次 焙乾 微炒 各三分

末之蜜和搗二三百杵丸如梧子空心晚食前温

酒下三十丸

幼幼新書 卷一 十一

熟地黄散治婦人久無子是子藏積冷血氣不調

熟地 牛膝 當歸 微炒 柏子仁

白薇 各一兩 桂心 半兩 防風 芎藭

卷柏 各三分

為散每服三錢水一鍾煎六分去渣空心服

靈苑內補丸治受氣虛弱及五勞七傷藏府積冷瘕

癖癥塊虛脹或經脉不調疴冷赤白帶下口苦舌乾

面色痿黃黑點心煩驚悸頭目旋暈不喜飲食痰涕

黏涎手足百節熱疼無力肌肉消瘦子息斷緒服一

月當姪娘百病皆愈

草薢 四兩 牛膝 五加皮 各二兩 白朮

川烏頭 炮去 皮臍 丹參 枳實 炒 各一兩

細末蜜丸梧子大温酒下二十九丸空心日午晚各

一服

阿膠煎丸治婦人血氣久虛胎孕不成大補虛損常

服滋助血海

伏道艾 葉搗熟篩去查用茸二兩米 醋煮一伏時候乾研成膏 阿膠 炙二

糯米 炒 大附子 炮去 皮臍 枳殼 各一兩 炒

幼幼新書 卷一 十二

為細末入前膏內杵勻丸如梧子空心温酒下三

十丸午食前再服忌藻菜羊血腥臊等物

千金婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸

婦人絕嗣胞門閉塞灸關元三十壯報之 一灸胞門 五十壯

婦人姪子不成若墮落腹痛漏見赤灸胞門五十壯

在關元左邊二寸右邊二寸各子戶

婦人絕嗣灸氣門穴在關元傍三寸各百壯

婦人絕嗣漏赤白灸泉門十壯三報之穴在橫骨當

陰上際

一書 續修四庫全書 第 30 版 反文內

千金翼崩中帶下因產惡露不止中極穴在關元下一寸婦人斷緒最要穴四度針即有子若未有更針入八分留十呼得氣即寫灸亦佳但不及針日灸三七至三百止

莊氏膈穴婦人月水不利黃豚上下并無子灸四滿三十壯穴在丹田兩邊相去各一寸半
妊數隨胎妊娠三月灸臍下一寸七壯

幼幼新書卷第二

方書叙例 凡十三門

後學古吳陳履端于始輯

吳江周應郊孺獻校

叙初有小兒方第一

千金曰小兒氣勢微弱在于襁褓乳氣腥臊醫者操行英雄詎肯瞻視靜而思之可為太息者矣小品方云黃帝凡人年六歲以上為小十六歲以上為少三十歲以上為壯五十歲以上為老六歲以下經所不載乳下兒有病難治無承據也中古巫妨立願願經以占壽夭判疾死生始有小兒方逮晉宋江左推諸蘇家齊徐王氏有小兒方三卷今之學者頗得傳授然徐氏方不甚深細少有可採今博選諸家及自經驗以為此篇茲小無橫天之禍也

叙小兒有病與大人不殊第二

小大之病不殊用藥有多少之異其驚癇客忤解顛等篇合為一卷餘下痢等方並見諸篇中

叙小兒方可酌量藥品分兩第三

肘後云古今方藥品分兩灸穴分寸不類者蓋古今

人體大小有異藏府血脈亦差以意酌量藥品分兩多必配之或一分為兩或一銖為兩以蓋當升可也如中卷紫丸方代赭石脂各一两巴豆四十粒杏仁五十枚兒服一麻子百日服一小豆且多矣若兩用二銖四黍巴豆四粒可療十數小兒此其類也灸之今寸取人中指中節即病有毒狼虎性藥乃急救性命者或遇毒發急掘地作小坑以水令滿熱攪稍澄飲水自解名為地漿

叙小兒病宜早治第四

外臺秘要凡人少有病若似不如平時須早治若隱忍則不療兒益甚

叙調理小兒第五

嬰童寶鑑人稟陰陽二氣生疾病于三焦然宿壯易明童稚難治黃帝云吾不能療其幼小者為別是一家調理耳小兒如水中泡草頭露用藥毋令造次為小兒藏府嬌嫩血氣懦弱肌體不密精神未備故稱不易醫嬰孩兒童大小各異不可槩以用藥也必明消息形候審定生死察病患之淺深知藥性之寒熱

廼一世之良醫

叙修合藥第六

修合藥餌切要分別州土深曉好惡明辯真偽然後精細潔淨炮熅炙燂依方分兩子細秤定始可和合又須用不津器盛藥勿令嘗饘聖惠云眾鼻噴眾口嘗損藥精氣不靈效又不可全用古方恐今兩差悞古今風俗尚不同豈得更用古方今兩合小兒藥唯少是妙故別立圭則古方用一刁圭即今一錢七以錢一錢重是秤之一錢秤二錢半為一分四分為一两依此修合是

無差兒藏府与大人異故立此一篇

叙用藥第七

萬全論兒純陽病則熱多冷少藥宜少冷于大人有用溫藥處以意減損如水瀉白痢胃冷之類用溫藥若丸散一月與百日同周歲與二歲同三歲与四歲同同者多少同一服更詳輕重而減增之

叙小兒氣弱未易吐瀉第八

秘要云天地之性人為貴氣清者賢氣濁者愚乃受父母胎氣成人兒病難曉受氣血弱不可吐瀉所謂

病輕藥重反受其殃人命既絕不可復生

叙十五歲以下皆小方治之第九

聖惠云襁褓至一歲曰牙兒二歲曰嬰兒三歲曰孺童四歲曰孩兒五歲曰孩兒六歲曰小兒以至十五歲皆以小方脉治

論受氣第十

聖濟孕元立本章曰渾淪一判既見氣矣曰太初形既立矣曰太始氣初形始天地相因生生化化品物彰矣有生之初雖陽与之正育而充之必陰為主因

幼幼新書

卷二

四

形移易日改月化坤代終也謂之姪陽既受始陰壬之也謂之胞已為正陽陰包之也謂之坏未成為器猶之坏也謂之胎既食于母為口呂也若娘則以時動也若懷則以身依也天之氣地之德陰陽之至和相流薄于一體能慎時數謹人事勿動而傷生育之道得美觀四季運而生長收藏儀則咸備天地之氣未嘗虧蓋陰陽相養以相濟也昧者不知欲拂自然之理謬為求息之術推生克于五行蘄補養于藥石雖或得子孕而不育育而不壽者衆矣昔人謂男不

盡八八女不盡七七氣血有量豈能逃陰陽至數哉

藏真賦序章曰水木火土金相生有母子之道水火相治維人稟生命門肇乎始胎之後未有不相克而成者自乾坤交遇于亥一陽始壬于西北壬為陽水合丁之陰火而生丙丙為陽火合辛之陰金而生庚庚為陽金合乙之陰木而生甲甲為陽木合己之陰土而生戊戊為陽土合癸之陰水而生壬茲夫婦之義化毓妙理出焉方壬之兆懷命門初具有命門然

幼幼新書

卷二

五

後生心心生血法丁之生丙也有心然後生肺肺生皮毛法辛之生庚也有肺然後生肝肝生筋法乙之生甲也有肝然後生脾脾生肉法己之生戊也有脾然後生腎腎生骨髓法癸之生壬也腎與命門合二數備矣壬者其一水一石之謂欵此腎于五藏所以獨耦尚徒知器有權準物有龜蛇色有黑赤不知一水一石之道是未達生化之妙夫太一真精兆于水立于石故火之悍金之堅木之撓土之和得以朕存諸中其相克相治者正所以相成也犯人之形者詎

可一于相生相繼而欲以收成物之功哉析而推之
一月血凝二月脉兆三月陽神為竟四月陰靈為魄
五月五行分五藏六月六律定六府以之七精開竅
八景神具宮室羅布氣足象成靡不有自然之序觀
妙之士兩之以九竅之變參之以九藏之動了然曾
次無或逆施者其始生之序如此

顛顛云天地大德陰陽化功父母交和中成胎質爰
自精凝血室兒感陽興血入精宮女隨陰旺故清氣
降而腸谷生濁氣升而陰井盛此二者二儀互換五
幼幼新書 卷二 六 張在淵

氣相參自覩元機非賢莫趨謂真陰錯雜使精血聚
而成殃陽發異端感榮衛合而有疾遂使嬰兒繞養
驚候多端不測始末亂施攻療致兒枉損吁哉蓋天
和太清降乘赤海真一元氣乘之則母情光槐蕩漾
熾然是陽盛發陰當姓其男也六脉諸經皆舉陽證
所以姓衰不勝藏氣則觸忤而便傷姓勝而氣劣則
母疾三五月而發皆隨五藏心藏干而口苦舌乾肺
藏膈而多涕發寒肝藏邪而服酸多睡脾藏散而嘔
逆惡食腎藏困而軟弱無力藏姓氣平則和而無苦

胎若劣則強得藏養至生亦多疾二儀純陰之證升
雜真一者謂陰發陽則父情博姓當成女也六脉諸
經皆發陰證若血盛氣衰則肥而劣氣氣盛血衰則
瘦而壯氣餘藏姓之氣同男說孩兒子處母腹內時
受化和之正氣分陰陽之紀綱天地降靈日月而化
萬物以生成隨其時變大理清純至一化成祥瑞之
基金真道一故生成焉一月為坏精血凝也二月為
胎形兆分也三月陽神為三竟動以生也四月陰靈
為七竟淨鎮形也五月五行分藏安神也六月六律

定臍姿靈也七月精開竅通光明也八月元神具降
真靈也九月宮室羅布以生人也十月氣足萬象成
也太一元真在頭曰泥垣惣眾神也得諸百靈以禦
邪氣陶真萬類以靜為源是知慎終靜遠以守恬和
可以保長生耳故小兒之瘦疴蓋他人之過也
千金云兒在胎一月脉二月胎三月有血脈四月形
體成五月動六月諸骨具七月毛髮生八月藏府具
九月穀入胃十月百神備則生生後六十日瞳子成
能咳笑應和人百日任脉成千金翼能自反覆百八

十日髑骨成能獨踞二百十日掌骨成能扶伏三百
日髑骨成能獨立三百六十日膝骨成能行千金作
若不依期必有不平處

張渙曰嬰兒在腹亦可辯男女詎母脉左手沉實為
男右手浮大為女母面南行呼之左回首男右回首
女且妊娠一兩月血脉行澀勿食腥辛居必靜三四
月形漸成無食薑兔五六月勿食辛七八月勿食瓜
果酸物九十月忌生冷一切動風痰物常端心清虛
行任坐卧視聽言動喜怒思慮皆無邪慝見偃倮醜

幼幼新書 卷二

惡之人則避之田野禽獸之類則不覩蓋動靜聽聞
胎必隨母不依此法兒無由聰慧且多疾病又妊娠
常須調蓄寒暑小不調便須服藥去疾病益氣血扶
養胎氣則生兒強盛慎之

相壽命第十一

千金云兒生枕骨不成能言死

尻骨不成能踞死一作膝骨

掌骨不成能扶伏死

踵骨不成能行死聯珠

臑骨不成能立死聯珠
胛骨不成能坐死聯珠云此不足之疾皆父母已過之疾也
生身不収者死

魚口者死

股間無生肉者死

頤下破者死

陰不起者死

囊下白者死赤者死

相法甚博略述數條

幼幼新書 卷二

兒初生額有旋毛早貴妨父母

陰大與身色同者成人

叫聲連延相屬者壽聲絕復揚急者不壽

汗血者多危一作云血

目不正視數動者非佳人

自開目者不成人

通身軟弱如無骨不成人

髮稀少者強不聽人聖慮不聽

臍小者不壽

早行早坐早語早齒生皆惡性非佳人

頭四破者不成人

毛髮不周匝者不成人

啼聲散不成人

啼聲深不成人

汗不流不成人

小便凝如脂膏不成人

常握手足不成人

兒初生臍下有血者好

幼幼新書 卷二

鮮白長大者壽

卵下縫通達而黑者壽

觀兒性氣高下即知壽夭故少時識悟通敏過人多

天項索頰田之流是也骨法成就威儀迴轉遲舒稍

費人精神彫琢者壽預知人意迴旋敏速者天楊脩

孔融之涑是也

三關錦紋第十二

水鑑云兒託質胞胎成形氣血誕生之後三歲之間

榮衛未調筋骨輕軟腸胃微細動靜易驚致于夭凶

得不傷哉編成三關之脉于右深可指迷

脉形論兒手第二指指有三節脉之形出其上近虎

口之位號曰風關其次氣關指端曰命關凡有疾當

視三關之脉察病斷之指左手指也一云男在女

脉形圖楊大鄭寶童莊氏

風關脉是驚傳心藏莊氏云黑主癩赤

受冷邪青絛

大者主寒邪

氣關脉是疳傳肺藏莊云赤青色

命關是肺風急慢驚不療通度者死

幼幼新書

魚刺形

風關慢驚可醫楊云急驚可治

本驚風

氣關心疳可醫莊云青主疳勞身

命關難醫莊云虛風邪

形如魚刺物多驚遍體如湯面色青或瀉或狂


宜此斷消徵調氣便惺惺

寶童

因驚者

紋如魚刺是初驚紅色須知病在心若遇黑時

連腎脉更宜詳審究元因難治



懸針形

風閉水驚亦醫

莊有青黑

氣閉寸入肺亦醫

莊積熱

三關通度慢驚候下二關不斷難療單

關亦醫

莊別肺疳通度驚風不治



形如懸針瀉痢多水驚急療更安和莊水驚紫
受病只因心藏起三關通度是沉疴

寶童

有驚在心

驚傳心藏積因多壯熱通身氣不和此患却稱

天鈞病緩若醫持不柰何

幼幼新書

卷二

三

水字形

風閉是肺藏驚

莊效嗽面赤別本驚積

氣閉慢驚有虛積

莊膈上有涎

命關疳氣風不瘵

莊驚不拘五色別

形如水字肺家驚虛積相傳面色青膈上有食

宜便取消癥洗肺得安寧

莊膈上

寶童

夾驚傷寒

紋黑驚傳入腎囊青黃脾藏受災殃夾驚傷寒

紅赤色鎮心解表要相當



乙字形

風閉肝風易醫

莊別肺風不治

氣閉慢驚風入肺難醫

莊驚風

命關不瘵

莊慢脾青黑危



形如乙字病傳肝眼慢驚啼淚不乾此是肺風
傳受得莊云三關觀候細詳看

寶童

喫食并驚有積

紋彎食上有垂時傳受風邪入在脾若黑之時

休整療遲知大命已傾危

幼幼新書

卷二

三

曲虫形

風閉傷肺堪治

莊疳病積聚胃前如橫排箕子肚皮如吹起猪

氣閉大腸有積

莊別肺粗不治

命關難治

莊心傳脾別不直可治

形如曲虫疳積深肺家有病腎瘵心患此若能

醫得好良工須是用情深

莊急消

寶童


驚入肝

曲虫紋是病傳肝外證不明子細看符藥一時

交併服何憂此患不能安



環形



風關肝疳可醫楊腎有積可治

氣關肺疳亦醫楊肺積地治
莊疳入胃吐逆不治一
云大腸受積

命關不治

形似環來腎受疳好泥喜土作常餐消癥未遇
良工藥取動方知體漸安

寶童

驚涎入肺

驚風入肺少人知八錦紋中子細推環子作紋
如面白涎聲潮響急須醫

幼幼新書

卷二

十四

亂紋形

風關楊直腎有積



氣關楊疳細

命關三關若有皆虫楊不治

熱赤脚連連赤紫定為驚更加赤色食
軟硬睡裏驚三關可治小兒腎有積

紋亂涎横虫在心悲啼曉夜痛難禁求神拜鬼
渾無效喫藥安和望治深

寶童

脾生疳虫

虫亂縱横總在脾瀉痢頻生更惡啼亦有筋皮
乾卷縮用心調理莫延遲

流珠形又名沫米



三部都遇有積命關獨有不治面身有
者是流米死候止在風關可下涎取積

流珠死候不須醫更看三關在所推風氣得之
猶可治命關有此死何疑

水鏡八脉主病要括

形如魚刺物驚瘰形似縣針瀉痢多水字肺驚
瘰已見乙知肝積要調和

形如曲虫疳患久如環腎積細詳看逢紋亂後

幼幼新書

卷二

十五

知虫犯流米通身莫望安

寶童多魚鈎形附是驚風在膈上

膈上驚風入肺中病人生熱又遭風涼肌解膈蒸

開胃次鎮心田病乃通

莊氏外八錦紋

曲向裏氣疳

曲向外風疳

斜向右傷寒身熱不食

斜向左傷寒身熱不食

雙鉤



傷寒

三曲如長虫



傷硬物

兩曲如鉤



傷冷

一頭如環脚有



傷冷

面有黑子




再發之候

頭面肚上有脉并青筋



食毒驚積難治

如乳虫



常疳亦有虫疳

食積之疳治之必差凡脉不足細者並是風氣消疳後取虫肥兒為効

幼幼新書 卷二 別本外八錦紋

拍間魚刺動隱上類虫行此病從心得先因四足驚

曲 虛口團成曲因驚或感風熱生由病乳神亂

臉仍紅

上吐多頻併飜腸瀉若傾指紋端似乙有濕

在中停

握頭時拱手熱極意昏沉赤黑紋如現因人自外驚

也

內隱風還盛沉疴目不開都緣因喜怒到此

有連災

丰

赤脉過三節仍加顛似癱縱多神妙藥此病

也難攻

準

頻因驚撲著啼叫沒時休亂紋三節現無病

也堪憂

茅先生論小兒虛口三關脉如丹紅色傷寒及食壯

熱如紅夾青色是驚紫青色腹肚不和紫黑色腹中

冷或瀉或利此是氣閉風關受色与前面同欲丹紫

若患甚色黑必死命關被虛口色充來通治紫黑色

死似以第一節為氣關第二節為風關第一要看大衝脉動即吉

不動凶更看陰陽二部脉沉慢死猛尚通治

楊大鄴云兒脉紅赤色在節內如細魚腸大者即風

熱盛脉微紅風熱也微紅半青驚積風熱脉青色在

指節內如魚腸大者驚候也脉青色在節內如練據

兩頭大中心細者急驚癇風候若如青已過節二三

分如曲鮮伸縮來去者慢驚風候白色在節似細魚

腸大者傷脾瀉也前白色在節內半白紅半赤色者

傷寒候也陰陽候脉息過節二三分如曲鱗縮來縮去者是傷寒被人將藥取動此無辜疾必死疾也白色過節二三分脾泄瀉也傷寒候脉當節中若無辜疾日久也七九十一日以上如見本傷寒者祇一三五日醫得若前白色青紅色在節內似細魚腸大者脾胃不順脉白色在節內即驚釣風也凡兒脉黃色必死過節亦死疾

又定生死三關訣
手上青紋見情知四足驚黑因遭水撲一作赤亦是

知幼新書 卷一

大人驚一作黑內隱連風急一云脉沉紋灣食上尋

渾身雖壯熱耳冷痘還生

又內八片錦

青色小大曲水火飛禽撲黑花小大曲人兔并四

足赤色大小曲米麵并魚肉若有紅絲見慢脾驚

作毒

飛仙論兒脉見青紫紅淡黑有紋如錦一直者妳傷

脾及熱驚發左右手皆有驚積齊發有三條或散肺

生風痰或齶齶鳴者青是傷寒主嗽紅大主瀉兼黑

主痢紅多赤痢黑多白痢兼紫渴且虛也

歌曰

右手三關見錦紋定傷脾胃熱和驚右同左樣

雙紋起食積驚傷是本形一痢傷驚紋頭又着

三叉樣肺熱風涎夜作聲有青却是傷寒候若

只紋紅瀉欲生

寶童歌孩兒生下繞過月有病如何為人說男左女

右席口中若有紫紋是驚熱青色成胎氣未全

亦本驚生搐有涎赤色必然經數日或驚水火

知幼新書 卷一

病相連孩兒一臘至兩臘席口更交開掌握若

生米粒過初關並是有驚防眼合若過一節至

兩節便與驚積同一說似出不出隱隱紋此歸

應傳脾藏結若紫之時定難療青紫有驚入脾

竅此時呼作慢脾風好手醫人急難療若逢紅

色但寬心下藥之時却神妙脉出三關連指面

孩兒死候還須見不須顏色赤白紅萬死一生

休憤怨

保生論脉一直者驚治曲裏傷寒解曲外傷食有積

積紫多瀉痢并有熱黃色雷聲破聲

風關一脈見初得病氣關二脈見病漸深命關三脈

過者死

長沙毛彬傳驚八片錦歌

席口開皆赤星現雙睛翻后卒難辯定是人驚

風八心手足抽牽無定限虎口開時見黑星楊

水頭摸腮門腫起及成坑定知四足曾驚著面上時

捫手不停虎口開時帶白色小兒病是水驚得

口眼同開鼻作聲身上汗珠益流出席口開時

幼幼新書

卷二

二十

青色交楊唇青相應又胃高只因飛鳥來驚

著小腹膨脹氣轉牢席口開時青色長看天仰

面牙齒當小兒高處曾經撲面黑還兼手帶黃

虎口開時帶黃色孩兒兩處曾驚嚇作驚開口

汗常乾頂黑須防被災厄虎口中心色帶紅兒

驚因水遂生風鼻中出氣多開口目直身長勁

似弓席口紋生出外停若逢此症號胎驚不論

紅赤并青黑逢此之時命必傾

脉法第十三

顛顛經兒三歲以下為純陽脉以一寸取之呼之脉

來三至吸之亦三至呼吸定息一至此為無患以大

人脉五至取之若夫七至已上為有氣脉浮如弓之

張弦此為有風七至以下為冷候十五至以上三至

以下死

王叔和兒生死旌歌

小兒乳後輒嘔逆更兼脉亂無憂慮兒啼未定

遽乳之氣逆上乳不得下停滯胃膈則胃滿氣

急令兒嘔逆又母將息取冷氣入乳變壞不

幼幼新書

卷二

三十一

息喘急亦令嘔逆又兒解脫洗浴露體風冷客

脉緩即是不消乳弦主風邪氣緊數細快亦少

苦刑相與虛濡邪氣驚風助痢下宣腸急痛時

浮大之脉歸泉路下痢脉浮大者

聖惠云脉弦緊者客忤 沉數者骨間有冷孔氏骨

浮而數乳癩風熱 緊而絃腹痛千金云

弦而數乳熱五臟壅 牢而實大腸秘澀

乍短乍長乍大乍小不等若有祟

變蒸身熱寸口脉亂汗出不食乳食即吐不藥自愈

兒病困汗出如珠着身不流不治

兒有病胃陷口脣乾目直口中氣冷頭低卧不舉身

手足垂軟身體強直掌中冷皆不治

茅先生辨兒五藏脉

肝弦 心洪 脾緩 肺浮 腎沉

辨兒四季受脉

兒脉數 熱脉洪 瀉痢細 風弦緊 氣洪

頭痛寸口數 水葳急數小便頻滯冷痛

脾脉洪胃中有氣塊不思飲食

幼幼新書 卷二

三

右脉合聲者各受本候淺深兒合陰陽二部脉得

競骨為中關前為陽關後為陰關陽得陰脉死陰

得陽脉如之六歲以前看太衝脉形色并虎口三

關六歲以後即依前法兒脉無至數來遲及不動

死席口三關脉迭起黑色死太衝脉不動死

漢東王先生小兒一見生死歌

幼童脉亂辯何形 兒變蒸候盡陰陽氣足方可

九至風五至虛四至損三至脫二至死十至疳

勞虛損形容瘦劣若身肥血色青白一息十一

二至者虛是風病死為脉亂二三至為脉不來

當冷必死急大有積微細冷虛鞋緊熱時復一

大是驚大小不勻是惡候水鉛論浮數為熱伏

結為寒沉細為冷數者緊也浮者輕也伏者貼

也重手方見結者亂也重按為沉細 二十五種

者微也大小不勻則氣不生必死

甚分明抱着遍身不温煖不瘧四肢垂蹶哭鵝

聲胃主四肢既 啼哭無淚瀉涎清絕 撮眉搐眼

爪甲黑 筋絕筋痒 泥壇腫起或為坑將口咬人

魚口急 兩口角垂 脚直肚大有青筋 筋絕不能

氣上視以觀于高物上視長吁出氣黑文行氣

絕出而不迴黑 喫乳不收舌出口 乳不收胃絕

文血不凝脉 唇不蓋齒眼坑傾 脾主肌肉外應唇 瀉痢多

唇不蓋齒眼坑傾 脾主肌肉外應唇 瀉痢多

幼幼新書 卷二

變異黧血 則血黑 偏搐似笑沒心情也 虛笑

不止顏沒其 不論貴賤及男女救療十人無一

心 情惡候也

錢乙脉法 脈亂治 弦急和 沉緩傷 促急驚 浮風

沉細冷 嬰童寶鑑兒三歲至七歲其脉駛一息七八至為平

八至至十至太過陽盛不及五六至不足陰盛

微為寒 往來如亂絲之細 重手即無輕手得

數為雷度如第通 伏為氣伏行筋中

大小不勻曰中惡或大或小

脈虛病亦虛輕手乃得重手即無

左寸無脈心下痛胃中熱時時嘔口中生瘡由乳母

食冷所致欬嗽頭有汗寒熱作喉中哽塞作聲

右寸無脈短氣氣逆喉中欬噫由乳母抱衝風露

心脈滿大肝脈小急並為癩癧癧之疾

寸脈浮直上直下皆脈連腰脊強不得俯仰大人類

三部脈緊急癰可治 中惡微者可治

吐視浮者可治

弦緊牢強為癧癧脈隨左右見

沉乳食不消 少陰脈數為疳淋

雀啄若緊者風癰孔云兒脈

傷寒脈洪者易理微者難理

浮大者宜發汗

一投一止病假令六投六止六日病也

春脈弦 夏脈洪 秋脈浮 冬脈沉

四季脈緩各推其王相表裏

四季脈緩各推其王相表裏

浮病在表屬皮膚在腑為順陽脈沉病在裏屬藏骨

髓而逆行陰之理也脈在上病在上死生見焉

傷寒身大熱體黃脈沉細者死中惡脈緊細者死黃

疽脈沉細腹滿者死

惠眼云凡疾重當以一指在魚際或太衝者若傷寒

急驚痘疹之類為肺病得浮洪易安沉細難安與回

陽兩三日再診如得陽脈方許調理輕手如捻葱管

乃有滿部重按即無是也若慢驚吐瀉瘡痢之候為

藏病沉細易安浮洪難安蓋陰陽脈行于內不可行

于外輕手按之不顯尋之至骨沉者是陰脈也凡病

脈來三點大又三點細難治兒脈只看陽脈大陰脈

細餘不可驗

保生云兒脈在五百七十六日外歌曰小兒有病須

憑脈一指三關定其息浮洪風盛數因驚虛冷

沉遲實有積

浮為風為平輕手大重手細弱如按葱葉曰浮主中

風傷風欬嗽嚏噴煩躁壯熱鼻流清涕一身頭面虛

浮下泄小便如粉可解表甚者出汗即愈

浮下泄小便如粉可解表甚者出汗即愈

洪為熱夏洪曰平輕手大重手亦大曰洪主間發熱身生瘰癧及瘰癧喉閉頤腫風熱面赤氣喘心藏熱小便淋瀝頻患赤痢

數因驚春數曰平脈來小急過數速疾曰數主夢中咬齒

驚擲見人恐怖夜多盜汗白日多困氣粗不語忽瀉

青糞若得數脈乃生驚候此驚傳膀胱主疝徧墜

沉遲為虛冷沉遲者輕手按不見重手按至骨脈來

沉弱細小主脾胃虛冷泄瀉無時嘔逆不食

實有積冬實曰平一云緊為實輕手不見重手大曰實主藏府

幼幼新書 卷上 主

有積腹脹面黃髮立小便如油面仆地卧頻頻吐食

腹內鳴響又積不治即成疳勞丁奚哺露若兒肥實

宜涼藥取積後補若羸瘦藏府虛薄與溫藥取積後

補凡脈急如弓弦或兩動而止不見者死

寶童中指脈法孩兒五七歲五歲脈方現中指兩畔

內于中子細看

左男右女專心記左主脾肝心腎肺右主熱生

驚氣疳女子背看各從類欲察病源誰得知脈

洪大急來端內皆是傷寒病因熱洪大却慢傷

脾氣遲細脾虛困臥極脈小急來腎虛致疾在小腸憑藥力到此醫人須用意診脈若來三兩通此為死候命須終吸人指面如弓急慢脾死候命將畢

楊大鄴云中指中間為動脈醫家莫便懷疑惻此時

風滿四肢頭萬卷千書醫不得

五指指節冷驚來不可安忽然中指熱必定是

傷寒中指獨自冷疹痘有多般

莊氏脈歌小兒脈數多風熱沉伏元因乳食結弦長

幼幼新書 卷上 主

必動肝腸風弦數驚蛔四肢掣洪浮胸中似火

燒若兼膈痛好添愁息數和平八九至此個分

明不必憂

陳氏頌 柯堂梓



幼幼新書二卷終

幼幼新書卷第三 病源形色 凡十門

後學古吳陳履端于始輯

構李馮夢禎開之校

五藏所主病第一

錢乙論五藏所主

心主驚實則熱叫哭飲水而搐虛則卧而悸動不安
肝主風實則目直大叫呵欠項急頓悶虛則前牙多
欠氣熱則外生氣溫則内生

脾主困實則困睡身熱飲水虛則吐瀉生風一云不思飲食

幼幼新書

卷三

一

生

肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者虛則
哽氣長出氣

腎主虛無實也惟瘡疹腎實則變黑陷更當別虛實

證假如肝病又見肝證前牙多欠呵欠者易治肝虛

不能勝肺故也若目直大叫哭項急頓悶者難治蓋

肺久病則虛冷汗強實而反勝肺也視病之新久虛

實虛則補其母實則瀉其子又云腎病無精光畏明體骨重

論五藏相勝

肝病秋見一作日肝強勝肺肺怯不能勝肝當補脾肺

治肝益脾者母能令子實也補脾益黃散方見胃氣不和門

治肝瀉青丸主之見驚熱門

肺病春見一作早晨肺勝肝當補腎肝治肺藏肝怯者受

病也補肝腎地黃丸見虛寒門治肺瀉白散主之見咳嗽上氣門

中

論五藏相勝輕重

肝病見春金旺肺勝肝當瀉肺輕者肝病退重者目

淡青必發驚更有赤者當搐

肝病見秋木旺肝強勝肺當補肺瀉肝輕者病退重

幼幼新書

卷三

二

生

者唇白而死腎怯虛

心病見冬火旺心強勝腎當補腎治心輕者病退重

者下竄不語腎怯虛

腎病見夏水勝火腎勝心也當治腎輕者病退重者

悸動當搐

脾病見四旁倣此治之順者易治逆者難治脾怯面

目赤黃五藏相反隨證治之

惠眼觀證論五臟氣各有主

心主脉其性動而榮手面惡熱熱傷則脉濁

肺主皮其性堅而榮于毛惡寒傷則皮澀毛立
脾主肉其性厚而榮于唇惡濕傷則脣枯肉腫
肝主筋其性曲直而榮于爪惡風凡驚風搐搦本因
風氣激肝令筋動發搐指爪青黑爪者筋之餘

腎主骨其性流潤而榮于髮惡燥凡疴勞久瀉下虛
上盛夢中咬齒頭髮焦枯齒骨之餘氣髮腦之髓海
五藏受病

心病面黃臉赤胸膈煩躁口鼻乾粗及患赤瘡或瀉
驚膿與喘息聲粗見水驚怕

幼幼新書

卷五

五

肝病搖頭揉眼遍身澀痒毛焦髮立覆地卧及眼生
斑瘡或腹中氣癖與夜睡多汗

肺病臉白喘粗氣急增寒壯熱大腸冷滑臍下常爛
咯唾膿血與欬喘虛脹

脾病腹上多筋喫食難化好喫泥土糞中虫出及瀉
痢頻併多睡與拈眉咬甲

腎病齒齦患瘡胃膈焦渴小便濁下部開張夜中狂
叫與弩嘔多黑

五藏病相生刺第二

漢東王先生論肝屬東方木木生火金剋之旺在春
三月能剋土見秋而衰以脾為婦木為陽脾為陰也
心屬南方火脾屬中央土肺屬西方金腎屬北方水
俱可類推

肝屬木肺屬金肝見水沉肺見水浮何也肝水所生
又行陰道被水土所陰故見水而沉煮熟還其本性
而浮肺屬金心之所近又行陽道被火抽見水權虛
浮煮熟復還本性而沉

五藏病四時所不宜第三

幼幼新書

卷五

四

茅先生論心藏不宜夏

久瀉變成痢瀉血即難當形瘦不行坐心絕口
生瘡若逢如此病端是應南方若向其中得何
須更忖量

肝藏不宜春

眼愛頻頻澀渾身似醉人時時貪睡臥心煩每
好噴唇白眼胞腫狂言不欲聞東方應唇候此
病不宜春

脾藏不宜四季月

面愛常黃好不可見相傳體差增寒熱行難少
食餐此病忌季月脚面腫相連朝來陰腫了不
久在人間

肺藏不宜秋

行後氣常急脹滿似懷身項直時時喘乳食口
不侵積聚成虛氣驚多癖結成秋間逢此候一
命定難生

腎藏不宜冬

痰汗時時有尿多夜夜驚遍身生粟疥手足冷

如冰口內虫常出面黑絕精神應此北方候冬
得損其身

胎中滋養第四

聖濟和調滋育章曰食母氣以養形食母味以養精
豈無時數之宜哉原四時之化始于木十二經之養
始于肝肝足厥陰之脉也次至于太陽自一月積至
十月五行相生之氣天地相合之數在是然手少陰
太陽經無專養者以君主之官無為而已是母之真
氣子賴以養形者也若胎膏之始食必甘美欲扶其

柔脆必忌辛懼散其凝聚既胎之後食稂稻魚鴈于
四月以通水精之成血食稻麥牛羊于五月以助火
精之成氣食猛鷄于六月以強金精之成筋食稂稻
于七月以堅木精之成骨八九月受土石之精以成
膚革皮毛則形已備矣飲醴食甘輔其中和皆天地
動植之產子賴以養精者也氣味之養和理鍾萃深
根固蒂其道出焉雖或氣有不調藥石以攻子不受
弊者養素故也或以妊娠治有傷胎破血之論豈知
邪氣暴戾正氣衰微苟執方無權縱而勿藥母將羸
弱子安能保古聖謂重身毒之有故無殞衷其大半
而止藥性味本以藥疾誠能處以中庸以疾適當知
半而止何疑于攻治哉况胞胎本于生氣食飲與藥
入口而聚胃胃分氣味散于五藏苟非太毒駛劑豈
能遽達胞胎謂母治過矣

胎中受病第五

聖濟氣質生成章曰具天地之性集萬物之靈陰陽
平均氣形完備然奇偶異數有衍有耗劉柔異用或
強或羸血榮氣衛不能逃消息盈虛之理則稟賦之

初詎可繁論是以附贅垂疣駢拇枝指侏儒跛蹙形氣所賦有如此者瘡瘍癰腫聾盲瘖瘂瘦瘠疲瘵氣刑之病有如此者然胚胎造化之始精移氣變之後保衛輔翼固有道矣天有五氣各有所湊地有五味各有所入所湊有節適所入有度量凡所畏忌悉知戒慎質物為養者理固然也寢興以時出處以節可為高明可以周密使霧露風邪不得接間而入因時為養者理固然也以至調喜怒憲嗜欲作勞不忘而氣血從之皆所以保攝妊娠諸邪不得干焉不然方

幼幼新書

卷三

七

授受之時失調內不足以為中之所守外不足以為身之所強氣形弗充疾疢因之若食兔唇缺食犬無聲食雜魚而瘡癬皆食物不戒之過心氣驚而癩疾腎不足而解廬脾胃不和而瘦弱心氣虛而神不足之屬皆氣血不調之過也能飲食知戒推之五味無所傷氣血知調推之邪氣無所乘乃生育相得而成者故曰天不人不因水鑑兒在胎十二候母睡多是胎勞陰氣衰弱服此

遠志 人參 甘草 防風 鼈甲 各五分為末熬飲子

睡驚加少桂且之客熱中心藏逐驚也有暈帶血風須添防葵子其疾立能攻

母多魔是胎癩風服此

鐵粉最宜良牛乳和相當金箔三兩片入口病難傷

母好閉靜不樂人市是血宮勞悶子不安也速療生不患風癩方

幼幼新書

卷三

八

水精并鐵精甘草少難任犀角研百遍作飲免疾生但若如後急加之白茯苓麥門冬六分用意更調停

研犀角水同五味藥煎服五歲立安

母食了即飢是子脾胃氣盛母即胎熱宜菜皮飲人參更入龍甲大腹空皮養神梨葉入三兩片作飲添竹葉真

有胎見夫即怒愛閉靜是胎氣陰盛陽衰生女安兒即死

松葉及柏葉香墨自淪之三般充散喫不計女兼兒

臨產腹痛欲死即生方

凡人多愛使飛牲虫如齧髮喫盡飛牲兒不生

欲免死時牛耳賽拭取將來自能生

飛牲毛燒灰冷水調一字

未足月胎中作聲及言語是胎鳴方

胎鳴及作聲人間莫不驚古鼠穴中土含之立

不鳴

胎漏方

烏牛角 牛糞 故錦

並為及牛乳調一字即定

兒生下便死緣內風與外風相擊未產時手指甲青

產門如孩搐痛是也速治免喪生命

專意取八月荷乳將白蜜調和剪取母髮三七

燒灰喫去殘疴

八月池中蓮子枝燒灰入盞乳調稀入口似神

拈却痛免生虛死女兼兒

子在母胎中死活未分憂母性命

救孩兒

冷宜用此

狗毛七握燒灰蒿莖心七枝冷水和搗汁母喫

救孩兒

胎痛子若熱母手指甲青黃并渴子患冷母心煩痛

嘔逆 藥訛缺

旬日分免不下此為擊著外風生下多疾宜服走馬

散

九夏結冰寒水石燈草七枚力相互去龍將用

三條尺赤馬尾充散寒漿更莫疑

水鑑子倒生方

滑石一分將作散豆蛛二分倒懸虫一童

子小便調與服須更順產效難同採藥

楊氏產乳方妊娘雞子乾鯉魚合食令兒患瘡雞肉

糯米合食令兒多寸白

小兒形證產母忌食

食蒜無筋生兒渾身軟或衝上損目

食鱸無鱗生兒項短鰓背龜背

食獐無膽主多驚風涎獨腎疝氣

食兔無脾主缺唇或六指患脾疾氣

食野鴨無髓主雀目鶴膝風

八殺日節天地交震日七月十六行房有患如左

盲 聾 瘡癩 膝軟 釣腎

蝦背 龜背 缺唇 巴指 鼻巖

舌短 拳拳

五關貫真珠囊舌長心氣盛瞳人光輝肝氣盛肌膚

肥潤肺氣盛唇紅脾氣盛耳大而豐腎氣盛

胎生不治疾透鼻缺唇漏胎所致

社公兒帶月信受胎 頭縫解顱胎氣不足

骨軟酸疼酒醉交合 胎聾瘖天聲地啞日受胎

手足短小無鼻缺耳側卧受胎

天關石女父母大小便俱急受胎

無糞門多食毒物受胎 顛腫胎氣不足

無髮產前多病服金石藥毒

艷鼻脉通于鼻受風邪其氣不和津液停結

胎中體赤姪娠時取熱過度熱氣入胎雖能消亦傷

兒輕者三日消

胎中體黃飽中受胎

稟賦之殊第六

聖濟凝形殊稟章曰天地形之大陰陽氣之大惟形

與氣相資而立男女合精萬物化生天地陰陽之形

氣寓焉七少陽八少陰相感而流通故女二七男二

八天癸至陰陽交合而兆始九老陽十老陰相包而

賦形故陰窮于十男圍之陽窮于九女方之陰陽相

生而成終元氣孕育皆始于子自子推之則男左旋

積歲三十而至巳女右旋積歲二十而至巳巳為正

陽陰實從之自已懷壬男左旋十月生于寅女右旋

十月生于申申為三陰寅為三陽而生育之時著矣

其稟賦也體有剛柔脉有強弱氣有多寡血有盛衰

以至分野異域所產有多寡吉事有祥所夢各應類

故荆揚薄壤多女雍冀厚壤多男熊羆為男子之祥

虺蛇為女子之祥皆理之可推也胎化之法有轉女

為男如食牡雞取陽精之全于天產帶雄黃取陽精之全于地產揀弓矢籍斧斤取剛物之見于人事三月兆形之先儀則未具陽可勝陰也

楊太鄴小兒十月養胎一月妊娠胎本于肝主養魂魄多喫酸物以助木味忌辛辣肺納辛金剋木恐傷肝二月亦然少陽脈養膽肝合故也三月肺主養心心主神宜加辛酸肺主金藏納辛以助金氣食忌苦心納苦主火火剋金故也四月心主養腎宜增焦以助火心主火藏納焦苦勿食鹹腎納鹹主水故也五

幼幼新書

卷三

三

月腎主養脾增鹹少甘脾主土剋水故也六月脾主養氣加甜以助土主脾故也七月筋骨養形而能動轉少喫鹹五味相滋甜淡得所為此月胎通九竅上下相應也八月形神俱足味宜減省勿食熱毒及雞兔猪狗牛羊鳥雀等傷胎之物亦作赤癩但只聽經近善處靜生兒壽永多貴切忌嗔怒頻須動作行住坐卧不得久也九月忌喫炙煨腥臭鱗虫壅毒肥滑黏膩之物恐傷兒頭腦及惡瘡疔毒十一月嬰兒生血脉上下循環化為乳汁依月調護自然男女無諸

剋罰筋骨圓滿聰慧壽長為人易養
漢東王先生小兒受六氣筋骨血肉精氣也
筋實力多

骨實早行立

血實形瘦多髮

肉實少病母乳多汁則粗紫色

精實靈利多語笑不怕寒暑

氣實少髮而體肥

得病之源第七

幼幼新書

卷三

七

聖濟稽原疾證章曰嬰兒五歲未定雖微喜怒嗜欲之傷風雨寒暑飲食居處易以生患外邪襲虛入為諸風肥甘之過積為疳黃襁褓不慎則膚腠受邪而寒熱出處不時則精神不守而容忤蘊熱而班毒積冷而夜啼皆陰陽之寂甚于剋壯者也况根于中者與生俱生如母驚傷胎生而顛疾腎氣不成生而解顛風熱傷胎生而口噤風冷傷胎生而軀啼納汗之為血癖胎弱之為諸癩率由孕育之初是以善保赤子吐下灸刺熨浴粉摩泛應而機隨若病在胃中穢

汁既吞必吐而愈病在腸中乳哺不進必下而愈重
齧重齧治以微針暴癩身直治以灸熨熨風池以泄
微邪浴皮膚以散寒熱摩顛以通鼻塞粉汗以密腠
理差若重舌之膜斷之以爪邪厲之氣穰以祝由蓋
梅弱感疾易以滋蔓要在防微杜漸也彼拘于無治
如田舍兒任其自然未免失病之機過于救治不問
春夏蕩以駛劑未免湯液之傷皆一偏之弊非知治
之大體

顧顛經兒鵝口撮噤並出胎客風著顛臍致以小灸
物物新書 卷三

三壯及烙愈

兒夜啼痰血腹痛夜乘陰而痛則啼

一月內乳痢如膠母寒氣傷胃所致

痢如血母胃有滯熱

兒眼赤母喫炙燂熱麵滯氣入胎薰兒腦致

溫熱從氣實而搏胃氣然下之氣平愈氣虛則生驚

而變癩

驚癩虛邪客熱相搏當補養安和愈加以性冷及太

過即死

噦吐皆胃虛氣逆客于歲當和胃養氣止如下冷即
極霍亂吐逆胃氣與陰陽氣上下交爭當用分和補
藥調養愈餘皆死

客忤因客入觸無辜暴露星月兒嫩弱故此候多惡
孫真人玉關訣辯形證歌

搥頭揉目肝熱生風眵淚增明三焦積熱鼻生
清涕肺受其寒頰赤面黃風傷府熱霍亂吐逆

胃積氣傷瀉痢不常氣攻腸滑面青呵欠驚氣
傳肝盜汗頻頻巖伏虛熱傷寒驚搐風盛發狂

物物新書

卷三

未

胃熱生班氣傷冷厥長吁齧齒風盛氣生上竄

掣頭涎高胃結肺壅氣傷欬嗽咯血涎盛發齧

積傷風熱小便淋赤熱聚膀胱疝氣因啼胎中

積結妳脾痞癖因物所傷喉閉丹瘡肺之受熱

愛喫土泥脾藏生疳嘔吐痰涎蛔虫上出脫肛

瀉血冷熱積傷消渴口瘡心家受熱面黃浮腫

積氣所攻鵝臙解顛因風肺熱行遲語澀胎積

氣傷項硬肝風氣傷木舌

杜光庭拍迷賦

萬物稟天地之一氣男女從精血而兩邪三旬而陰
氣純厚兩月而陽氣方生百日名姪腥半晷為誇乳
童周暮而陰陽各半兒千日而真氣方奢五六歲小
兒之譽定十歲外童子之名華若論變蒸之候法主
數家魂變目明魄變氣加百日神化而喜笑胎中有
滯而顯邪蒸變子氣血自劣不變子真本無遮乳痢
五日乃有撮口十日以避胎驚未及蒸變內鈞百日
如挈胎痘因母氣傳熱黃病則脾胃熱瘕熱極咬人
齧齒風熱面色如花內熱渾身似火腹痛惡哭啞

幼幼新書

卷三

十一

面黃赤而大怕體涼吐與泄而最嫌熱甚驚癇子身
體宜溫傷寒子脈洪邪逆腹脹唯憂足冷脈沉欬嗽
本喜浮滑為病消渴瀕身熱脈洪夜啼為逆霍亂而
脈大體溫心疼憂命順則施藥反言危病面黃色赤
唇青而吐逆堪論目赤唇紅內熱而發潮當詠唇角
微赤而臉黯防驚指黃足冷而驚熱為證搥頭揉目
子肝熱多眵上竄喘粗子風極涎諍嗽喘與鼻寒相
連斑瘡與傷寒同類寒多則皮膚燥澀熱盛則面赤
頰黃熱氣盛驚癇瀕瀕發手足冷氣厥宜防熱連夜而

陰小寒兼晝而陽傷積熱則壯熱不歇伏寒則乍溫
乍涼傷寒熱鼻冷耳熱而喘粗麻痘熱兩耳角冷而
是常唇黃微青而多睡乳食欲吐而脾缺睛急目青
而色黯驚候涎生而胃亡急驚內熱所蘊慢脾中氣
虛荒肝伏熱而雀目穢兼風而臉瘡青盲肝冷腎膜
膽強盜汗內虛所起六虛勞骨傷兼驚伏于內痞及
冷熱而兩詳鼻衄連綿心盛鼻瘍拘攣而筋脈皆冷
口噤而風擊胃強客忤物忤無異卒中惡同童欲
識丁奚腹大氣聚成積病在腑而異治積居陰而難

幼幼新書

卷三

十二

詳始因乳哺不消三焦難整漸次結聚成塊一身消
歷胃寒珍饈不餐脾熱逢粗也喫疳瘦由中熱而胃
傷腹脹是脾衰而氣塞吐本胃虛瀉由寒癖戀甜肥
而生疳虫瘡起脾而毒之所適心脾熱口内生瘡二
歲極重舌相擊邪生則病至積聚則疳居皮膚澀頭
髮作穗面色赤渴飲難除肺氣熱鼻瘡不止大腸冷
糞下如泔心疳則五心煩熱腎疳則面腫骨踈且歲
氣失固使真氣不舒三焦不調而形饒丹腫榮衛不
治而頻出瘡疽積成因乳食太早疳瘦由餐甜不除

瀉有八種驚生急慢胃逆腸寒吐瀉並興脾肺俱虛
瀉痢無間表裏冷而水沫俱下脾胃寒而瀉物成瓣
脾熱胃寒而瀉水兼黃脾虛心熱而如湯之狀小腸
傳熱而便血大腸冷極而膿綻似瀉不瀉脾冷心熱
所蒸飲水不休氣盛金花相諍膀胱受熱尿患五淋
膀胱与小腸積冷偏墜而氣厥漸深傷風因當風解
脫鼻塞由母氣顛侵瘡疾暑氣不出脫肛腸冷瀉頻
衣安月下招無辜腫子未成希物忤風搏血氣結成
瘰癧熱壅巖極丹腫難禁傷飽則骨軟脚弱失乳則

幼幼新書 卷三 五

項細少音解顛骨氣之不足鶴膝肌肉之不任驚熱
下之當愈瀉痢調胃宜深風盛解之即愈傷冷和胃
溫陰論脉尺寸未定別病虛口紋臨次指分三等青
紅在兩尋女尋右手男者左指氣在下紋風居中裡
過風關名曰命關定其色青之与紫先論管氣初節
為始微見紫紅脾氣有滯外青枝子風入脾見紫枝
子邪難止枝頭分黑相連氣虛病子風將起但觀
于初節之間詳吉凶而定其病矣中主于風亦須詳
視青紋紫枝慢驚當耳紫紋青枝似虫不出虛驚氣

散涎盛難治若見青枝衝命風盛而搐掣須當或見
枝赤紋紅定知是風來衝氣紋紫枝青宜防慢驚及
已忽然紋青枝紫過命關而驚候須來枝分兩頭如
線細而涎潮當死紅紋微散可醫黦黑忽見將毀紅
如米而肺熱喘泄胃而未已兩米青紫而入于命關
病候雖在而去如流水紅紫迸甲而命殞內纏指面
而無死若能在意精通假使珍珠無比
茅先生兒受病源歌

幼幼新書 卷三 五
眼赤肝家癰熱甚怕明肝與心受驚肝脾積聚

成雀目嗑氣脾家積虛膨積熱在脾多愛睡牙
疳妳食毒相生毒食脾家俱積熱或是瘡積又
還榮大傷積食脾熱瀉耳聾腎積熱毒併重舌
口瘡心極熱妳癰脾積熱氣行脾中有積腹高
凸心虛見水忽然驚肺中壅熱鼻多塞木舌心
腸積共停顛門腫起腎之死大腸積熱有瘡生
藏中有熱常合口有積心脹眼斑成五心潮熱
疔勞盛疔之餘熱障虛名脾巖毒盛妳不化咬
妳風兼入骨驚龜背肺中有積熱龜胸客風傷

一第1008册 續修四庫全書 子部 醫家類 反文卜

背千聒耳熱元是腎中得毒因傷肺候分明遍
 身虛腫積不盡走馬疳因腎得名天鈞臍風因
 此得喉中痰上惡風驚小便利緣何事積氣
 不散辨其形要識驚顛癩癡者肝之候與及脾
 驚或喜或悲人莫測驚氣入脾速療輕肚脹口
 瘡肝會氣逆胃涎隔熱交橫夜多盜汗如湯潑
 心熱不和人不明多笑是驚餘熱在不然心熱
 亂心驚瀉之日久驚食得冷熱相并特為生
 真珠囊多煩則面青 涎盛則目轉
 實極則吐涎 虛極則霍亂
 撮口則屬氣噉齒兼風 聲嘶而哭傷于肺
 摸手則藏府俱虛
 三結候上結者多因熱及傷寒麻豆疹子安後方結
 病多腮腫喉塞噤物不下
 中結者多因吐瀉不止冷氣結于脾不能下食漸次
 氣悶變成慢驚
 下結者多因醫亂下轉藥後不曾調氣令大腸受風
 虛便結不通肚中虛鳴纔下轉藥瀉住又結

一臘後百日前怕天鈞天蓋地載天父地母天鈞驚
 風自天而得內鈞因敗血乳入腹得冷痰攻心胃初
 發便不食乳口開不利手足攣搐忍其疼痛
 患眼觀證驚風後癩癡由驚氣入心未退
 患痢焦渴主大腸乾燥下膏血主大腸氣虛
 吐血傷寒後氣血壅滯不循故道故吐血衄血
 陰囊腫大腎冷入中下患疝頭面患瘡陽氣散頭面
 瘰癧生
 遍身壯熱口鼻乾燥頭髮作穗熱氣衝四肢
 鼻下赤爛生瘡欬肺疳衝腦
 遍身瘡頭眼赤小便澀滯心肺熱極
 聾耳主腦熱風毒入腎
 肚乾氣痛主生冷衝胃或硬物傷脾小腸痛小便淋
 時時有汗非時壯熱乃生骨蒸
 莊氏兒延月者少病不足月多病六十日腫人就能
 識母二百十日筋骨成能坐三百日掌骨成能匍匐
 骨木開藏府寬毛髮長齒牙生吐瀉熱驚時作時歇
 豈辨變蒸形狀却呼鬼祟或即灸燒致心藏痰躁成

驚或癩搐人呼作風或變如癩瀉痢清水妳食不消
上熱下冷喘息不調四肢厥冷虛汗遍身當細觀察
未滿七歲有十五種無毒疾候有五疳八痢二十四
候無毒者臍風撮口口噤重舌木舌雀舌乳頰妳癩
妳霍龜胃厥腸蛔豚驚風天釣赤瘤五疳者心藏
驚疳肝藏風疳肺藏氣疳脾藏食疳腎藏急疳

病證形候第八

顛顛兒眼青揉痒一有青是肝疳齒焦是骨疳肉色白
鼻中乾一有嗷是肺疳皮乾肉裂是筋疳髮焦黃是

幼幼新書

卷三

廿三

血疳舌生瘡一有頻是心疳喫泥土一有肚是脾疳

肌骨肥實皮膚白無故煩渴此自小妳猛衝
肺依後方人參甘草飲若氣急甚骨脹起鼻連眼下

臉青呻吟死

利如泔酸難效如戴島血脾爛死

孩瘡難效或發無時即口噤咬牙作聲死名瀝瘡疳

亦名鏢腸疳

無故肚大項細四肢消瘦筋脉骨節起是少乳食飢
早成骨熱疳先与保童丸見疳續与柴胡鼈甲飲見疳

頭面青搏肌厚臂腦細瘦行走遲小時抱損

鼻流清涕或鼻下赤痒是腦鼻中疳宜青黛散見疳

已前兒氣血未調臟府胞薄腠理開疎
華佗九候論

慢脾風吐瀉虛損脾胃而成其候面青唇黃口角有
沫多睡不醒或時手脚似搐四肢冷脉沉溺

慢脾之候脉微微昏昏只睡難辯之或若搖頭

并口噤萬中無一可能醫

慢驚風驚痰瀧心而成其候唇紅目直手微動如搐
體微熱不語脉微沉細

慢驚風候要唇紅子細推求速有功顛腫必知
無妙藥靈丹与服也成空

脾困候吐瀉日久而成其候多睡眼合饒轉動身體
温和四肢冷脉微沉細

脾困元因轉瀉虛連連只睡不開舒倘若飼之
雖喫乳虫生口内死非殊

虛積候久積頻取不盡而成傷一云因虛而其候壯熱
瀉白色多喫水乳不化四肢冷脉微沉又云腹內熱
身體溫和

虛積之患事如何飲水頻頻不厭多若是臍凸
并眼腫靈丹若有不醫佗

或瀉或痢又時時穀道開張不肖肥見佗飲水
多頻併愚者猶將疳渴醫

右四慢疾屬陰體皆瘦弱無情緒眼閉慢
急驚風驚涎流灌肝心而成其候甲上眼手足拳搗

喉間涎響渾身掣擲體熱脉洪大
急驚之候本因涎積熱肝心兩所傳眼赤唇青

雙手搐下涎風去是精專

傷寒候冷風傷腠戶而成其候胃氣弱內聚冷風其
形面黃頰赤鼻流清涕多啼壯熱水鑑臍寒時黃流

傷寒患最苦尤須細審詳若言頻表汗七日見
乖張但將涼藥解解脫必生黃滿口瘡難救都

緣純是陽

天鈞驚熱甚而成其候初頻頻呵欠眼忽有淚不落
壯熱不時手足微搐脉浮洪實大

尋常天鈞病休道小兒嬌積熱心留滯脾翻涎
欲潮後仰多因取仍兼唇口焦愚醫猶灸焙必

死在三朝

斑疹候傷寒毒傳胃而成其候有疹有麻有痘其實
一體時多笑叫手脉來大渾身甚熱耳尖鼻準冷飲

水多吐宜發瘡大為陰小為陽
胃熱成斑疹須知此病由哭多心理極舌黑是

堪憂腫滿來雙手紅涎穀道流變成如此候一
見命頃休

右四急疾屬陽其體一般或毒或涎生須急醫死
活頃刻

雜病候歌多睡只應肝是木心留積熱夜驚啼叫呼
冷汗因虫痛寒熱于中積在脾頰赤口瘡心肺

壅虛風搐搦四肢垂冷滑傷脾成瀉痢或膿或
血下無時積多肚大多掀水氣喘腮黃不問醫
眼腫吐涎頭擺急莫教脉息慢微微

水鑑驚候歌

地上坐時睡驚風本在肝夜啼并面白肺藏與
詳觀顏色時時變心形日日觀喘微脾藏之咬
齒骨家看夢中咬

面白腫虛多吹乳四肢煩熱汗頻生雙腮五色
時時見惡叫元來盡屬驚

積證歌

腹脹時時愛覆眼髮黃眼赤吐并宣似小便更煎

痢下腸喧甚去積消癥立見痊

幼幼新書

卷三

七

五疳證歌

肌膚湯熱甚羸力不能禁面黃并頰赤怕冷愛
重衾口鼻常乾涕根源漸次深全因驚撲起此
病本從心

搖頭搖眼鼻白膜上青睛齒痒多揉嘴莊云背痛常生
涎垂眸嗽視親顏貌青碧變黃作遍遍體癩塗身毛
髮多焦立此病本從肝

食物難消化心中愛土泥吐高青脉見頭髮薄
離離喘息多饒嗽無歡只愛啼痢多腥臭甚此

病本從脾

嗽來多喘息口鼻上生瘡糞裡常堆穀身如粟
密裝膨臃腹自脹日日痢非常莊云饒聲唯留齒滑痢瘦在
肢體無筋力嘔血并膿甚全因肺本傷
形容不似常

瀉痢多頻併尋常多受驚上焦炎似火中膈吐
如傾寒熱時時有瘡瘍轉轉盈莊云糞中多出米皮上粟故生

急疳難治療此病腎家生

五疳死候歌

耳邊赤脉起舌上黑班生班點也心疳死候吐甚眼頭

幼幼新書

卷三

七

認眼頭黑點吐黑點遍身全肺死候齒際如同

上疳極輪乾必觀耳輪腎死候

王孫和外證歌

眼上赤脉下貫瞳人顛門腫起兼及作坑鼻乾
黑燥肚大青筋目多直視都不轉睛指甲黑色
忽作鴉聲虛舌出口嚙齒咬人魚口氣急啼不
作聲細虫既出必是死形

茅先生襟證候

唇紅面赤是傷寒

臉青唇黑是驚風

鼻青面白是瘡

面黃如土是有氣來攻

五絕歌

項裏腎家絕目直絕于肝喉牽鋸脾絕舌卷向

心言鼻黑濃絕肺五絕不須看

諸病死候歌同漢東者削

衝心氣築連雙辟手足如冰脚面直吐瀉無常

渴嗽多混濁脉絕似沉寐眼坑陷時熱轉多腹

幼幼新書

卷三

廿九

中乾泄飲乳極胃腫心高連掣手揮手搥頭命

難得是物拈來不奈何或將口啣難將息

小兒死候要消詳背母搥頭搥一廂鼻上汗流

吐若依吐楊燕手拈胃膈必須凶白睛貫入瞳人

內四肢不認痛無常五乾五硬兼五軟下氣頻

頻亦不祥指甲內有紅絲見手心紅赤似生瘡

久患唇紅不須治驚風眼慢不相當眼青臉赤

耳輪黑手掌無紋齒白亡鼻頭渾赤口角垂昏

昏只睡口開張

太衝無脉直視看人魚口自動忽作鴉聲時後

者死氣急滿口粘涎時時惡叫身生黑片五心

作聲不死虛搥舌出不或縮生瘡伏熱不退喉

中空響瀉出黑血面黑狂燥吐瀉不止兩眼半

開走馬落齒瀉止又瀉啼高聲咽魚際不勻

漢東王先生雜病症訣

慢驚風眼喜張

惕脾風眼喜閉

魚目定睛夜死

面青唇黑晝亡

啼而不哭是煩

笑而不啼是躁

瞑目似睡不思乳是虛

搥頭項硬三焦壅

搥頭項軟涎在胃

腹痛盈盈是氣壅

舒手長噓聞言即悲是實

翻身卧是脾疾

形證歌

小兒形證卒難測滿口頑涎喉中塞風痰閉

吐瀉無時加效嗽脾胃俱虛不能化食嗽是胃風

身上皮膚無血色血脈不應

汗出如油頭巉峻榮衛相別津液為汗巉峻是顛門崩心絕

目無光彩鼻中黑肺腎俱絕

浮腎心凸牽撮口肺脈絕也凸

手足如冰脚面直胃絕手足俱直

搐搦睛斜連唇口筋絕搐搦著眼睛

幼幼新書

卷三

三十一

將手抱頭難可救筋搐上故抱頭大惡疾

眼傷青色多焦渴肝絕色青虛即渴

飲水百杯猶未歇胃管直水不蔭

臉腫眼浮脉不來心主血心絕血脉不蔭故臉腫

是物拈來將口呬胃管絕如魚呬水

啼哭無淚及亞聲肝主淚肝絕無淚肺主聲聲出無返是肺欲絕也

喉中牽鋸口吹沫痰閉九竅絕氣出不入故牽鋸沫即衛氣出而不返

此疾誠難可療之免被旁人道醫殺

雜病狀

兒驚哭聲沉不響難去聲浮輕調驚便差驚哭正

頭皮乾枯筋脉緊急唇外赤而肉白有瘡如無津至

薰驚難差是熱極皮膚薄則筋急唇肉白脾虛絕不能榮

赤眼是肝積熱眼肝外應有積

怕明心肝有疳心屬火驚邪干肝

牙疳妳食毒牙出故血口臭生疳因吃了便

喫食不消是脾積冷脾主消化食久冷

耳聾腎之積耳屬腎積攻不聞聲

胎癆肺積風胎癆肺積風

幼幼新書

卷三

三十一

潮熱因驚而得驚在胃膈不入歲府

喉內如鋸上膈客風入肺及驚入大腸而得肺諸歲

驚故如此即是夾驚傷寒

或悲或歌邪入脾

口瘡肚脹疳氣逆心主口舌氣不順攻心故瘡生氣逆則腹脹疳下疳藥及順氣藥

吐虫心與大腸熱久則令人黃瘦

瘡疾脾之積脾受宿食被新食衝或睡而不消亦衝

邪正交爭四季一般也

開口睡五藏毒盛

多哭驚風入肺肺主聲故多哭

夜多盜汗是虛熱疳氣不順肺主氣外膈毛竅氣不順液從竅出盡作疳勞

五心熱是疳勞

腹脹惡心肺中積肺積而有積吐瀉不時則知肺積

喫泥土脾生虫脾食土虫亦食土食甜及糲米而致喫布肺生虫喫炭

肝生虫喫鹽腎生虫喫茶心生虫喫酸膽生虫隨歲府好

錢乙雜病證

目赤兼青欲發搐

目直而青身反折強直者生驚

咬牙甚者發驚

口吐沫水後必虫痛

昏睡善嚏悸者將發瘡疹

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱不露睛胃實熱

吐瀉乳不化傷食也下之

吐沫及痰或白綠皆胃虛冷

吐稠涎及血皆肺熱久則虛

瀉黃紅赤黑皆熱赤亦毒

瀉青白穀不化胃冷

身熱不飲水熱在外飲水熱在內

長大不行行則脚細

齒久不生則不固

髮久不生則不黑

血虛怯為冷所乘則唇青

尿深黃色久則尿血

小便不通久則脹滿當利小便

洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者脾虛或云成癩

吐涎痰熱者下之冷者溫之

口噤不止則失音濕聲同

先發膿泡後發疹子者順班子逆

先發水泡後疹子者逆先疹子後班子順

先發膿泡後發水泡多者順少者逆

先水泡後班子多者逆少者順

凡痘疹只出一般者善

胎實面紅目黑睛多者多喜笑

胎怯面黃目黑睛少白睛多者多笑

凡病先虛合下者先實其母後下使肺虛而痰實合

下當益脾後瀉肺

大喜後乳食多成驚癇大笑後乳食多成吐瀉

心痛吐水者虫不吐水者冷吐水不心痛者胃冷

病重面有五色不常不澤者死

呵欠面赤者風熱青者驚風黃者脾虛驚多睡者內

熱氣熱者傷風

熱證疎利或解化後無虛證勿溫補熱必復生

不治證鼻乾黑瀉不定精神好吹鼻不噴時

氣唇上青黑點頰深赤如塗臘脂搐急不定

楊太鄴看兒不治證

唇不蓋齒鼻上紫黑啼哭無淚身不認痛

心脹不啼大開眼睡四肢不收

顛門腫脚心腫手心腫臍內腫

心上腫眼角垂抱來脚不縮

王訣五歲絕傷候歌

瞪目筋拘肝腎傷胃虛驚逆面青黃心絕不言

魚口噤喘促長嗟肺受殃先者煩絕次者

鳳髓經雜病死候歌

嗽吐嘔逆心凸惡傷寒赤脉脚相交結熱面黑
皮毛落疹子入腹眼不開熱瀉出虫口乾惡鏢
口腰低唇鼻青秋痢脾毒唇卷縮此病因驚兼
有積豈無神仙留妙藥

察形色治病第九


莊氏云凡察兒氣色先定自己神色勿令散亂兒初
睡起及啼聲未絕未可察視患眼云先將候太側兼
括脚心又看眼

漢東王先生兒十歲前觀氣色面如青紗蓋定從髮

際至印堂不以病狀深淺有者六十日死至鼻柱一

月死到人中不過十日滿面即日死

肝驚起髮際
東積在食倉
方冷面青白
木熱正眉當



續修四庫全書 子部 醫家類 卷三十五

肝驚候色淺白起髮際至丞相即便驚風身熱夜啼
宜下驚退可調治不退下至東岳死耳前黑金剋木
外候鼻乾燥眼睛吊主筋縮睛無光腎絕腫子不轉
肝絕爪甲黑


肝積色微黃起食倉下侵襯眉黑睛黃赤早晚發熱
多睡死啼哭無淚是也

肝冷面青淡白淚出齒齲淡白口流清水大便酸氣
日中多睡夜間煎迫是也

肝熱薄赤氣起正眉衝丞相心暴于肝兩眼赤赤多

幼幼新書 卷三 三十一
駁小者吐奶大者吐食有痰生風早晚熱多啼少睡

心 驚印堂上
南 積額角荒
方 冷太陽位
火 熱面頰裝



心驚色微黑起印堂至眉心赤則生風至鼻柱死皮
無血色更生黑驚水剋火即兩日亥子一本難過外
候多焦渴喫乳不收舌出口外

心積起額角太陽穴虛兩眼白赤小便如泔面合地
卧太極即吐熱氣此惡候


心受冷黑筋起太陽侵印堂面色淡赤目無光轉
口吐清水日多煩渴

心受熱起面頰加赤色多驚少睡髮乾頻渴鼻下赤
爛口氣衝人牙林惡臭睡卧開口多煩外候吐虫

幼幼新書 卷三

三十一

脾 驚正髮際
中 積唇應黃
尖 冷眉中岳
土 熱穴太陽



脾驚起髮際色微青即傳肝若至眉心色漸赤即傳
 心若至鼻柱色白若分兩耳黑氣連之即生驚風不
 退周時死其候唇不蓋齒口無津液是脾絕胃主四
 肢垂冷脾絕不中理也五日寅卯時死外候瀉黑血
 脾積唇黃兩眼沉腫早晚面浮太陽穴調外候頭疼
 腹脹食不消夜頻起傷冷瀉白歲熱赤不調赤白痢
 脾冷起眉心中岳色淡白侵鼻柱及元珠外候糞白
 食不消泄瀉無時下應唇白及嘔逆面色黃赤
 脾熱起太陽白薄皮起如竹托口唇乾燥兼有口氣
 幼幼新書 卷三 二十九
 外候大便赤夜間煩燥顛叫

肺 驚髮鬢赤
 西 積髮際歲
 方 寒人中見
 金 熱面臉旁



肺驚微赤色起髮鬢傳司空生驚外候喘無力多啼
 若至幽當死候作鴉聲喉響哭無淚鼻乾黑燥
 肺積起髮際色微赤至眉心腹脹惡心若至鼻梁及
 準頭死喘急不迴者三日後午未時難過
 肺傷寒起人中至承漿亦到下頤其色春青夏赤秋
 白冬黑外候鼻涕眼赤面頰赤喘喉響其惡候面黑
 咬人鼻黑身熱喘不定
 肺熱青白色起面頰衝承漿外候鼻血夜啼煩渴甚
 此為疳
 幼幼新書 卷三 中

腎 驚耳前穴
 北 積眼泡霜
 方 冷額色紫
 水 熱赤食倉



驚入腎微黃色起耳前穴侵潮口外候夢中咬牙乃
侵地角生惡候面黑惡汗出如膠耳前穴黑
積入腎色微黑起兩眼深沉目睛微赤外候聾耳耳
解願生瘡較後載鼓

冷入腎色紫微青起額上侵中岳滿面青白多覘頑
涎 胡曲切 多睡少精光

熱入腎微赤色起食倉到準頭而還日久兩眼延爛
外候耳重眼多眵小便赤

茅先生辯五藏各受色 與寶鑑同
留此歌

心藏色歌左額應紅色丹系心屬南方火下離心亂
心中有餘熱或言風擁莫憂疑

肺藏色歌右額白應在秋庚肺屬西方金位行若見
額中如馬尾此名氣盛氣相騰

肝藏色歌兩眼青時旺甲春在肝屬木象東君忽青
胞目如藍靛即是驚癩風欲逆

脾藏色歌脾胃四季屬中央戊巳相乘土色黃外透
四唇如橘色須因積滯熱相當

腎藏色歌北方壬癸腎黑色膿水隨歸兩耳流若在

耳邊垂黑髮腎家有病是因由

辯四季受色吉凶

春青夏赤秋白平冬黑四季亦同名

春黃夏白秋青色冬赤四季黑為盜

春赤夏黃秋黑色冬青四季白災輕子

春黑夏青秋色黃冬白四季赤同評母

春白夏黑秋色赤冬黃四季青不羸邪為賊

辯面上五色

帶赤色心病 或驚 或壯熱 或傷

帶黃色脾病 或肚脹 或肚痛 或不進食

帶白色肺病 或脾寒 或咳逆

帶黑色腎病 或咳嗽 或氣喘

帶青色肝病 或夜有虛汗 或夜有虛熱

帶青色肝病 身上須發大瘡

雜病色歌白在右額肺氣盛左額微白邪干心透唇

白色氣不順左右人中脾積深胃氣不和黃色

淡睛胞青色只因驚心多驚悸言額左右肺青

風喘嗽聲滿面黑時腎家冷常拋黑糞不曾停
五歲受赤色歌左顴右顴心肺熱兩眼連箱肝候同

唯有四脣耳前後腎脾受熱本同宗

面部雜色歌面黃金色有積餘西方青色號驚呼面

紅身熱傷寒候耳冷瘡瘍是一徒耳身熱面赤耳尖手足冷

客忤黑青翻白沫眼睛黃色積難除疳一主非時

面黑一主赤多驚叫啼哭聲頻氣不蘇面黃臉赤

驚疳積分明解得病當除面青面黃鼻赤痒目

暗風疳是本源面黑面青反紅熱啼呼中水一主

幼幼新書

卷三

四

寒中患由偏

錢乙面上證位不同

左顴肝右顴肺額上心鼻脾頰腎赤熱也隨證治之

錢乙目內證

赤者心熱瀉赤散主之見實熱門

淡紅心虛熱生犀散主之見虛熱門

青者肝熱瀉青丸主之見驚熱門淺淡者補之

黃者脾熱瀉黃散主之見胃熱門

無精光腎虛地黃丸主之見虛寒門

寶鑑論形色須辰後已前看夏未酷熱冬微和時看

初生面日上鼻口左右悉黃為血莖

人中鼻下青乳不消

痢下青水薄中寒

諸陽會于面陽衰有風邪夾冷者青

鼻下兩邊赤名赤鼻

面青白軀身哭者胎中受邪

面青者肝癰面赤者心癰面白者肺癰面黃者脾癰

面黑者腎癰

幼幼新書

卷三

四

心風唇赤汗流面赤肝風兩目連額并唇青面黃脾

風腹滿通身黃腎風脇有癍糞而黑肺風骨滿鼻下

目下色白

面赤或壯熱四肢煩手足心熱為腹心熱痛

面色或青或白甚者面黑唇口爪皆青是心腹冷痛

鼻上赤色是風疳

小兒傷寒鼻燥喘息鼻氣有聲者必衄

面部異色

青色如橫針眼下死

鼻上色青腹中痛死
面青目黑肝氣所傷榮衛不通難差青色連目入耳
死

赤色入口三日死赤色入眉上入目死

黑色從眉透目者七日死黑色入口二日死黑色透

口者死鼻上黑色患水腫人中黑色者死

鼻色白為吐血死亦破傷出血後死

白色透眉患肺疾

黃色鼻上臍中極寒

物幼新書 卷三 四十五

鼻準頭色準頭上微高處曰年上看年更上一位看天

有微高處名壽上看壽

青白黑赤色並不治雌黃色如金者平

春白秋凶夏白冬凶已上論

四墓色兩眉間直上至髮際左父墓右母墓口吻直


下男女墓

四季正色者平

春白七日死夏黑四日死秋赤四日死冬黃死四季

月青死已上論

秘要指迷面部穴圖



頭 顙 印堂 太陽 山根 眉

兒生七日內頭上有赤氣如蚯蚓透頭此在胎受邪熱用白瓦片子于舌根割出少血即安重舌同黑色即刻死

顙門赤腫熱極死黑死

初生印堂黑色主臍風死

印堂上起三條青筋者是驚二條是慢驚

印堂上常有黑色如線十日死

太陽穴半月內有青色胎受驚

幼幼新書 卷三十一

山根黃白氣聲高驚者青人驚紫馬驚赤火驚

山根白氣唇黑主一日内死

山根黑斷主死如通主死六十日方絕

眉紅主風熱青主狗驚

面

初生多變顏色者一月內死號惺惺候

生七日內赤色如麻子者胎受藥毒六十日不差死

初生面紫黑色主傷風傷寒候變黑死

滿面紫里急慢風主七日內死

面目青色主發一邊搐一日死

面青目視口吐白沫驚風主一月內發動

面青身熱主夾驚傷寒

面紅山根青驚疳赤多心疳白多肺疳黃多脾疳青

多肝疳黑多腎疳

面青白主霍亂吐瀉面黃白主疳瀉

面黃肚大髮焦者脾瀉名癖疳

面黃兩臉赤積熱骨蒸之狀

面黃黑色主百日內死不進飲食多瀉必死

幼幼新書 卷三十一

面黃睛黃有疳積

面青唇赤有虫面赤唇白如疑面黃唇青氣疳多痛

面青唇黑吐白沫目直視死

面黃耳尖黑兩臉紅六日内死

面白唇青山根黑吐逆者死

面似土色無光彩三日死

面時變五色七日内必死

面臉通白唇黑者死

兩臉

生七日内两臉赤如大豆胎受熱一月死

初生两臉如土色七日内死肚有青筋不滿月必死

两臉紅赤主身熱虛汗小便赤左赤心熱右赤大便

作腸熱白伏熱乃傷寒之狀主口瘡

两臉如坏色主伏熱在心夜啼不止

两臉及承漿赤主吐血

两臉黃唇紅主渴疾死六十日絕

两臉紫黑主急風天鈞

两臉黃赤主傷寒

幼幼新書

卷三

四九

两臉白多主吐乳

小兒忽然水瀉兩臉紅次日唇青黑者死

眼目眩睛

生七日内眼上眩下生黑如麻子主天鈞風死

初生眼眩上青紫色主浴被風

眼上眉下白如線咳嗽眩上有紫色潮熱

眼下紫黑色主雷兩驚慢脾風

眩上紅如線夜啼青有涎眩上多黑氣主癩死

目視多性急不進食者死

两目青白主吐乳心内痛主蛔虫

睛多青主驚積睛多白直視六十日内散風癩

耳 聾 人中

耳尖黑者死耳後骨黑主死耳穴中黑主死

鼻上三根橫少青者胎驚

初生人中黑九日内必死

口唇 承漿附

口吐白沫面黑者死

口四角眉黑者慢脾風死

幼幼新書

卷三

五十一

身熱唇黑多渴者主六十日死

唇青面黑主風癩唇黑眉青主慢驚風唇紅有汗主

發天鈞急風

唇四角赤急風死

唇白五日死唇動不合十日内死

麻痘未出唇白或黑黯死斑瘡唇白者死斑瘡唇黑

傷寒亦主死

承漿黑一月内死

下糞黑者死痢後汗不止者死

患眼觀證虛實之狀不拘肥瘠繫乎氣色肥而氣怯瘠而氣壯怯則色軟壯則色盛由此觀之五藏之色見于面肝青王于春心赤王于夏肺白王于秋脾黃王于四季月腎黑王于冬設或不春不冬時變青黑非係肝腎也非四季時變黃赤非係心脾也非秋時變白非係肺也忽然青黑主乎痛忽然黃赤主乎熱忽然白色主乎冷此由氣有閉滯耳心肺係兩臉脾係唇四際肝見眼四旁腎見兩鬢之際始見本部又形他位如脾主唇四際色白則吐瀉或痢病久忽然

幼幼新書

卷三

五

紫黑此心腎之氣傳脾主乎敗絕不三日而死眼旁色青主驚涎閉結微白交侵則肺剋肝死候由是推之五藏之氣通行于面不可執一視也

兒病實者面紅赤風欲生先搖頭或劄眼虛者面淡黃夾白氣怯則頭軟目昏又有實而氣血閉者面青黃夜睡多汗加之唇乾氣粗脇痛如刺晚或燥悶又有虛而大小便澀眼遲息緩此脾有滑積

兒初生面葱白色者胎氣不足近六十日遠不過時壽上一點青色驚著胎氣凡驚後兩眼皮筋起赤驚

積青疳積紅風積鼻心紅色直上此心熱主瘰瘡或夜啼睡卧不穩或熱或痢

眉心青氣主著撲不然被打驚

眼坑下紅色主心驚因人叫或雞犬驚胃膈煩夜或熱

兩眼尾青筋直主髮際主肝怯有病愈青面愈白主

慢驚搐搦候大腸亦冷

唇紅面赤主傷壯熱又啼必傷寒頭痛按太陽穴見

動來抵手是也

幼幼新書

卷三

五

臉青唇黑元有驚主驚氣結痛瀉發驚本無驚忽青

唇反乾燥聲直叫因冷傷脾

唇四外淡白主脾虛吐瀉及痢如已吐瀉黑色透唇

死若痢重唇上一路乾白主唇稜白尖微審主痢

唇四外黃主食傷脾一止

唇四際淡青色起主脾胃有涎即發傷寒脾虛引起

潮熱一主唇上黑色主胃絕死

唇四外赤主心脾熱氣血壅滯或發口瘡

兩臉絲紋淡紅夾赤心肺受熱主嗽或血不潮心夢

多驚叫睡卧不安

眼坑下青黑繞轉主肝敗涎生又兩臉有紅絲直上

眼尾此心肺極熱生丹瘡眼睛黃色主肺有黏痰

眼睛青主肝脾有風又白主渴遍身黃腫如鼠李或

瀉痢手足浮眼白青主驚

面色變動或青或赤耳輪冷腹痛好喫冷水發痘疹

兩耳畔青黑筋橫過髮際主臍下痛及疝腎平

生一二月面微青色偃身哭胎中受邪

非時面赤或壯熱四肢煩手足心熱主心腹熱痛遍

身虛腫

面青黃頭皮光腫主熱疔氣入四肢皮上粟瘡

唇口微青黃主肝風熱及脾有滑積或腹痛瀉

生下頭腫胎氣不足

眼澀睛赤揉眼面青黃多淚主風疔在肝

兒氣色言之難矣視之精熟方知子細全黃色中有

黃似黯者唇似微白主疔或淡黃而青主肝脾皆虛

或潮熱或瀉痢兒脾藏生病最多喫物無度冷熱

節因而傷損或瀉或瀉或瀉以致肌肉羸瘦變為丁

翼噴露二候雖同吐高脚細髮枯但丁翼有虫噴露

腹高青筋喫物不變

氣色如淡青黃脾胃虛怯在春與冬未多患傷寒痘

疹秋與夏未多患吐瀉瘡痢蓋病有陰陽各以時觸

成舉此可類見

保生論生死形色法

兩眉屬木青吉黃亂黑從眉入目

兩眼右太陽左太陽黑睛黃傷寒白睛黃積紅發熱紫逆吐

印堂紅夜啼青瀉後黑容悴

年上壽上青驚赤瀉後微黃平

山根青發熱黑及黃甚死

人中黑如虫咬心患久縮死

承漿地閣黃亂黑風雨赤痢

正口紅黃平白絕脾黑透口二

兩頰黑瀉赤瘡

兩頰赤傷寒右赤肺熱左赤心熱

兩金匱青三次驚

主生風

兩耳前 青驚 紅熱

兩太陽 青驚一次 紅淋血

兩顴 赤皆熱 赤連耳入目七日亡

鼻乾黑色二日亡

眉青目黃必亡

面黑唇紅必亡

眉青唇黑不食必亡

莊氏左頰赤肝熱右頰赤腎積熱

口四畔青兼青筋主驚白榮衛氣滯

幼幼新書 卷三 五十五

人中左右兩旁黃主胃逆人中青主下痢

面青愁思客忤驚

面赤頭熱清涕傷寒疹痘瘡

面青兩鼻下赤主盜汗伏冷陰證

面赤時紅或赤變移者主時中受邪驚

眼上赤色啼叫用力吐乳不受手足冷死

毛彬云黑色發于年壽驚伏脾或射風池肝生風或

連氣池大腸冷滑印堂黑耳花黑死餘部皆心不調

但順榮衛別觀所定處

赤色發于顴心伏熱或連氣池傷寒風池上作輪急

驚將起年壽上赤心脾熱極口内生瘡臉上赤胃熱

或生乾逆或吐蛔虫或上衝印堂下達頤門皆逆

青發風池肝虛風下透氣池吐利日久或年壽衝印

堂下上傷寒夾驚當文武臺入眼惕驚起頤門久見

皆久積痞

黃發頤門脾虛疳積年壽上黃大腸冷滑到準頭脫

肛風池黃脾風將起氣池黃胃弱困重生蛔臉堂上

下黃脾困年壽印堂黃吐瀉脾虛黃透金匱承探脾

幼幼新書 卷三 五十六

毒積痢

白發人中或如縑素垂雪當人中者初變蒸當風氣

二池皆肺壅咳嗽或文武二臺上氣滯多成積瀉或

人中到壽上肺疳將甚

面青肝絕赤心絕黃脾絕白肺絕黑腎絕

心絕舌縮魚口腎絕筋拘逆冷脾絕胃逆穀不化肺

絕喘促脫肛肝絕搐搦生涎並死

治病要法第十

孫真人玉關要訣

風盛瀕解

驚熱瀕利

傷冷瀕温

積聚一云熱積瀕下

或虛中有積熱先利熱後治虛

熱裏有虛先補虛後退熱次調胃

患眼觀證論

驚啼者因滯風熱在心恐生涎下之

驚熱治脾驚化心下涎

疳熱脾傷受積傳邪心腎先解邪熱次取疳

驚瀉當勻氣

傷寒微解表裏

疳有五種在意消息

麻痘已出不可冷藥過多恐成瀉痢或毒不出殺人

麻痘未出宜解

霍亂胃氣不調

三歲目忽閉成肝疳服煮肝散

取積後便服勻氣湯不損兒

兒未有天癸之旺常依胃氣為本故治百病不可損

胃氣胃一虛病皆滋長輕者重重者死不深念慮而

云小兒純陽晏姿踈泄因而致斃是故下宜審諦調

理之要也夫兒病自有陰陽歲為陰陰邪所中慢驚

吐瀉瘡痢是也府為陽陽邪所中急風傷寒痘疹是

也然陰陽之氣相感而動以陽感陽以陰感陰陽或

未動待陰而動陰或未動待陽而動者有矣冬末春

初多患傷寒疹豆是陽病感陽而動夏末秋初多患

吐瀉瘡痢是陰病感陰而動也或冬末春初患一驚

候與之化涎未與之下遷延至秋其發則慢是陽病

積之為陰感陰而動也秋末冬初患一驚候不與下

涎至春氣盛激觸而發是陰病待陽而動也由此推

之調理小兒在辨陰陽識虛實審知實則生風虛則

氣怯乃善

懸珠論五虛不治病久虛或腫

手心腫 臍中腫 脚心腫 腎陰腫 舌頭腫

五硬不治

心硬啼無淚 頭硬 手硬 脚硬 背硬

五軟不治

手軟 項軟 脚軟 腰軟 背軟

手軟 項軟 脚軟 腰軟 背軟

小兒不與大人同得病多因驚熱風先治心神
次除熱脉宜緊數及浮洪

毛彬入室生歎歌

看候小兒定脉部左臂為肝右為肺對面為心
並曉然脾病只看見勾腫腎病夜間不發作急
死之候將口約忽然吐出冷頑涎如此徒勞下
良藥聲細聲嘶氣血衰昏昏不語太難醫狂言
不認人形狀氣滿胃中也可悲久患唇紅不可
醫驚來眼慢勿相窺睛青頰赤耳花黑髮直鷗
聲怕亂啼手若無紋舌須黑鼻頭渾黑口雙垂
昏昏只睡不開眼便是神仙難救之

幼幼新書

卷上

七十九

幼幼新書卷第三

春星堂刻

幼幼新書卷第四 形初保育 凡二十二門

後學古吳陳履端于始輯

茂苑楊大潤濟卿較

小兒胎教第一

聖濟扶真翼正章曰泥在鈞金在鎔陶冶所成子在
母胎豈無待而然耶故示以賢人君子使知好德示
以禮法度數使知制心揚以聲音之和若琴瑟鐘鼓
欲厭足于耳作以剛毅之氣若犀象軍旅欲感動於
目觀圭璧珠玉取陰陽之至精誦詩書箴誠取言語
之至正以至調心神和情性戒喜怒節嗜欲皆因物
隨感有益于得者也若人有殘廢物有醜惡鳥獸之
毒怪者欲其勿見刑不全割不正味異常者欲其勿
食是又防閑忌慎無所不至在胎如此生則明智忠
厚端莊好德美好壽考矣昔太任之妊文王也以此
哉

幼幼新書

卷四

章古

小兒初生將護法第二

聖濟保衛鞠育章曰五行孕秀春夏秋冬之異宜五
形有殊相也陰陽委和筋骨氣血之不同五態有殊

氣也夫始生而蒙冲和均稟五行陰陽形態潛異蓋
 母氣胎育有盛衰虛實子有剛柔勇怯之異是以嬰
 兒初舉汗穢欲其蕩滌不足欲其輔翼冲和欲其保
 全如惡血拭以綿指吞在胃膈吐以甘草入在腹中
 利以黃連皆以革汗也啼聲不發呵臍以温之甚者
 灸熯以攻之皆以助不足也衛顛顛之天杜風池之
 邪浴以通血脉哺以助穀神皆以養冲和也三者保
 子之常法然吐利有輕重灸熯有多寡或先吐利使
 汗穢畢除或先灸熯使疾疢不作然後負氣自育其
 幼幼新書 卷四 二

緩急先後之序隨時變通之也若執小兒氣盛不知
 陽中有陰而專于吐利執河北關中地寒不知南北
 之異而專于灸熯或謂嬰孺之病無承據不知榮衛
 血氣與生皆全或兒脉多端与老壯殊不知藏府呼
 吸有形皆同必察剛柔勇怯視其汗穢無憚于吐利
 視其虛弱無憚于灸熯審五形適以寒温之宜審五
 態導以陰陽之平病之輕重緩急隨證治之不蔽于
 難治脉之長短遲速因形別之不拘于至數慈幼之
 道其庶乎

葉氏兒始生肌膚未成衣煖筋骨緩弱不見風日肌
 膚脆軟便易損傷故絮著衣莫用新綿天暖無風抱
 兒日中嬉戲數見風日則血凝氣剝肌肉硬密堪耐
 風寒不致疾病不然如陰地草木軟脆不任風寒薄
 衣之法從秋習之以漸稍寒則必能耐不可春夏卒
 減否則令中風寒冬月著兩薄襦一複裳又當消息
 勿令出汗恐致虛損便受風寒晝夜寤寐皆當慎之
 其飲乳食哺不無痰癖若微不進便當將護甚則下
 之如此不致寒熱也又兒始生氣盛無有虛勞微恙
 幼幼新書 卷四 三

須下病愈調益若不時下疾甚難治冬月下之難將
 護然有疾不可不下夏月下後腹當小脹節哺數日
 又哺須多少有常劑兒稍大食哺當稍增若減少是
 腹中有小不調便當微藥勿復哺止乳之甚者十許
 日輕者五六日自當如常若不肖哺而但飲乳是癖
 為疾不可不下否則寒熱或吐而發癩或致下痢則
 難治治其輕時兒不損而病速除矣兒少病癩者母
 懷妊時勞役運動骨血則氣強胎養盛故也兒背須
 著帽項衣取燥菊花為枕乳兒三時摸兒項風池慎

護之若壯熱熨使微汗不差便灸風池及背第三推
第五椎第七椎第九椎兩邊各二壯一歲七壯兒大
者以意增可至三十壯唯風池特多十歲以上可百
壯穴在頸項筋兩轅邊針灸傷經絡聖惠立夏後吐
慎安針灸
下動藏府微疾慎之當以除熱湯浴之除熱散粉之
除熱赤膏摩之臍中膏塗之令兒在涼處勿禁水漿
常以新水洗河洛間地寒兒喜病痲浴兒三日喜灸
以妨之又灸頰以防噤噤者舌下脉急牙車解急決
者下去血灸頰以治噤江南地温無此疾今不詳南

幼幼新書

卷四

四

北按方用針灸多害是以田舍兒任自然無此天又
春夏決定不得下兒藏府氣弱易虛易實下則下焦
虛益上焦生熱熱則生痰痰則成病非當病不可下
也諸家皆以
此為宗本

千金論生男宜用父故衣裹之女則用母衣勿用新
帛及過厚令兒傷皮膚害血脉發雜瘡而黃
聖惠論兒一暮內不得以綿蓋頭面冬可袂衣蓋頭
夏宜單皆不得着面及乳母口鼻吹兒顛新綿及厚
令兒壯熱或發癩

兒匍匐以後逢物即喫春夏必飲滯水冷物秋初疾
作多啼不食或好伏地面色青黃或時腹痛多啼或
睡中驚啼或大便秘澀秋風吹者背心脚心便成瘡
痢與冷藥傷滑不禁與澀藥氣壅不行傷損藏府益
令不食遂使虛熱上衝面黃髮焦滯惡于内手足如
火自然風水溢橫四肢便腫如此將養十無一生
張渙論兒生兩月目瞳子成能笑識人不得令生人
抱及見非常之物百晬任脉成能反覆當節喜怒造
寒温半晬尻骨成當教學坐二百日外掌骨成當教

幼幼新書

卷四

五

匍匐三百日臑骨成當教獨立周晬膝骨成當教行
步世人不能如法往往抱兒過時損傷筋骨慎之
萬全論田婦護兒絕無他疾辟之草木生于深山大
澤容易合抱至于異果奇材縱加培養間有不秀實
者豈貴賤異哉兒數見風日即血凝氣割肌肉硬密
堪耐風寒以田舍兒較之相似

顧顛兒初生日与平和飲子指迷兒生三
日後与母服

人參

茯苓

甘草

升麻各一

水一盞煎一合半時時與之乳母忌油膩滿月及

百醉加時冷加白朮熱加硝各半錢

仙傳方降真香兒帶之能辟邪惡

別說柳絮與兒卧佳以性涼也

本草白油麻與乳母食子永不病若久熱作飲汁服

停父者發霍亂客食抽人肌肉

千金灸法生兒七日至週年灸不過七壯炷如雀屎

大

擇乳母法第三下乳吹

千金論血氣為乳汁也五情善惡悉是血氣所生母

幼幼新書

米白

六

乳兒須慎喜怒且乳母形色所宜其候甚多不可求

備但取不胡臭瘦瘰氣嗽癆疥癩癰白禿癰瘍潘唇

耳聾鼻等疾便可飲兒

千金治乳無汁方一方有

石鐘乳四兩 漏蘆三兩 菰蘆根一用 通草各五

甘草二兩 方不用

又方 咬咀水一斗煮三升分三服

又方

猪蹄二枚 熬通草 八兩

清酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作一方以水一

更煮飲

千金翼魚湯方

鯽魚長七寸 猪肪半斤 漏蘆 鍾乳各二

咬咀猪肪魚不須洗清酒一斗二升煮魚熟藥成

去滓遣寒温分五服即乳下飲相去須臾令藥力

相及

鼠肉臠方

鼠肉五兩 羊肉六兩 麋肉半斤

幼幼新書

卷四

七

三味作臠勿令疾者知

張氏黃金散治婦人一切疔疾中年胃虛血衰所致

少年因產後卧失將息喜怒食物所致或因兒食乳

吹唾而成未破曰癰既破曰漏

陳皮黃明者新瓦上磨去白水洗淨瀝乾切細麥

麩拌和入銚內文武火炒候香熟黃色攤地上出

火毒去麩為細末入麝少許薄紙裹帖男子懷中

一復時童男尤佳無灰酒調下二錢或三錢睡良

久再服燥痒生癢便散破者合極患者不過三

服

乳兒法第四

顛顛經夏熱時乳母沐浴冷水妳得冷氣血脈皆伏
便與兒乳使多胃毒及赤白痢凡浴後定息良久候
氣定熟揉與之無患

千金論乳兒太飽則嘔吐以空乳乳之即消旧四乳
兒臍未愈太飽令臍中風夏不去熱乳令兒嘔逆冬
不去寒乳令兒效痢母新房乳兒令兒羸瘦交腰不
能行母有熱乳兒令變黃不能食母怒乳兒令喜驚

初初新書

卷四

八

發氣疝又上氣顛狂母新吐下乳兒令虛羸母醉乳
兒令身熱腹滿凡乳兒先按散熱氣勿令汁奔出令
兒噎輒奪其乳食得息息已復乳如是十返五返視
飢飽節度知一日幾乳而足以為常又常捉去宿乳
兒卧以辟枕之令乳与頭平兒不噎母欲寐奪其乳
恐填口鼻不知飢飽
聖惠論乳母不禁忌子百病並生是以春夏衝熱哺
兒發熱疔并嘔逆秋冬以冷乳哺令腹脹羸瘦嗔怒
哺子患狂邪醉後哺子患驚癇天釣急風等病有孕

哺患胎黃及春疔有疾哺患顛癇風病吐後哺嘔逆
羸瘦傷飽哺多熱喘急

乳母雜忌慎法第五

聖濟乳哺襁褓章曰人之初生胃氣未固膚革未成
乳飲易傷風邪易入乳哺欲其有節襁褓欲其有宜
則達其飢飽察其強弱適其襁褓循其寒燠者蓋必
有道論乳者夏熱冬寒怒醉吐下及新房皆致病也
論襁褓襁帛故絮資父母之餘氣以致養重衣幃帳
皆致病也論哺以賴穀氣三日用飲過此用哺多宜

初初新書

卷四

九

以日為則如是五歲得養而胃氣壯矣論襁褓去寒
就温天和無風之時攜抱嬉戲日中如是血凝氣剛
骨骼成就矣聖人論飲食有節起居有常矧嬰兒其
可忽諸
聖惠論乳母食諸豆及醬熱麵韭蒜蘿蔔等可食宿
煮羊肉鹿肉野雞鴈魚鯽魚葱薤蔓菁蒿苣菠薐青
麥著蓬冬瓜等若兒患疔不得食羊肉及魚油膩手
襁褓及抱兒不得以火炙襁褓熱時便與兒著令染
熱病冬尤戒大寒以火炙衣被且拋土上良久熟按

之令冷煖得所即與初之如乳母有夫倘新過犯氣
息未定即乳必能殺兒未滿月驅使人不得令有所
犯到于兒前惡氣觸兒得疾難療

哺兒法第六

肘後兒新生三日應開腹助穀神辟米濃作飲如酪
與兒大豆許數令嚙之頻與三豆許三七日可哺慎
不得次與雜藥紅雪少少得也

千金云兒哺早不勝穀氣令頭面體生瘡愈而復發
又厄弱難養三十日後雖哺勿多不嗜食強與之不

物幼新書

卷四

十一

消復生病哺乳不進腹有痰癖四物紫丸微下之見方

變蒸節哺數日自愈

寶鑑云兒五十日可哺如棗核百日彈丸早晚二哺

莫抱檐下澡浴當風解衣哭未斷而乳胃冷而哺又
不可在神佛驢馬畔各房異戶之親諸色物器並不
可觸犯之害子性為驚癩經云三歲未滿勿食雞肉

子腹生虫

錢乙云兒多因愛惜過當三兩歲猶未飲食致脾胃

虛弱平生多病半年後宜煎陳米稀粥粥面時時與

之十月後漸與稠粥爛飲以助中氣自然易養少病
惟忌生冷油膩甜物等

初哺日第七

外臺初哺良日

平定成日吉哺不得令鹹

寅丑辰巳酉日良

男戌巳日女丙丁日俱不得哺

嬰孺

壬寅壬辰酉日吉

物幼新書

卷四

十一

浴兒法第八

千金論浴兒湯極須冷熱調和不然令兒驚亦致五

歲疾冬浴久則傷寒夏浴久則傷熱數浴背冷則發

癩不浴令兒毛落新生浴兒者以猪膽投湯中終身

不患瘡疥勿以雜水兒生三日用桃李梅各三兩枝

咬咀之水三斗煮三十沸去滓浴兒去不祥終身無

瘡疥治驚辟惡氣以洛金一斤虎頭骨一枚水三斗

煮湯須浴時煮

外臺虎頭骨湯主辟惡氣令兒不驚不患諸瘡

席頭骨五大兩如無 白芷三兩嬰 苦參四兩

切水一斗煮湯內猪膽汁造寒温

簡要方

益母草一大把剉水一斗煮十沸浴且不生瘡疥

益母充 尉苗

紀用經浴法三日五日 七日浴

寅卯酉日吉壬午丁未癸巳凶不能上三日勿犯

下三日

聖惠方

幼幼新書

卷四

十三

白芷兩二 苦參兩三

剉水一斗煮七分去滓加鹽漿水浴了以粉摩之

不畏風且散風

寶鑑浴湯用猪膽瘡疥不生用金銀虎頭骨麝丹砂

辟惡氣容忤驚瀾用桃楮梅根葉解體熱温壯之

病

退風湯

猪膽 苦參 防己 黃連

甘草 白及 藁本 杉

栢 楓葉

莊氏五根湯

栢柳棟栳槐用根剉枝心得加豉為湯浴仍以光

粉鮮粉撲身辟邪吉

拭兒口法第九

千金曰兒初生以綿裹指拭口舌上青泥惡血謂之

玉衡若啼聲一發即入腹成百病翼云成痞病死

聖惠論兒乳後以髮纏指沾清水點拭看齒根有黃

筋兩條以筆刀割斷點猪乳差如兒口難開先點猪

乳

幼幼新書

卷四

十三

集驗云兒初生日以井華水或温水將怕畏指蘸拭

兒口因而捺舌及兩頰令稍寬舒不生口噤積熱風

疾等拭畢用少研細入麝乾坏子烟脂塗口中令兒

美乳食

兒上下唇與齒齦連處皆有一筋牽引若上唇筋緊

即生上煉下唇筋緊即生下煉上煉生瘡滿頭或眉

間如癬狀瘙痒不已復流黃汁至處生瘡下煉起腰

背漸至四肢患亦如上若疾甚不治或頭面上下相

背漸至四肢患亦如上若疾甚不治或頭面上下相

通累年不輕又咬折或成大病是唯每日早晨拭口
佳

斷臍法第十

千金云臍不得以刀割隔單衣咬斷以煖氣呵七遍
即纏結所留帶致兒足跌上短則中寒腹中不調下
痢先斷臍後浴臍中水發腹痛斷訖連臍帶中多有
蟲急剔撥去不爾入臍成疾臍當長六寸長則傷肌
短則傷臟不以時斷及按汁不盡煖氣漸微即生寒
令兒臍風

幼幼新書

卷四

十四

古

寶鑑論斷臍若用剪刀先于懷中令煖又水入臍多
天鈞痛苦啼叫面青黑臍傷動令久不乾傷外風即
口噤不可救

莊氏烙臍丸

豆豉

黃蠟各一兩

麝少許

同搗爛熱捻餅子斷臍訖安臍上灸三壯炷如小
麥不啼灸至五七壯封臍散封之不得濕恐腫

灸臍法第十一

聖惠云兒生一宿抱近明無風處者臍上有赤脰直

上者即于脉盡頭灸三壯赤散無患矣

王時發傳兒初生斷臍時于所留臍帶上當灸處灸

大艾炷三十餘壯令兒強盛

裹臍法第十二

附封

千金論治白練令柔軟方四寸新綿厚半寸與帛等
合之裹臍調其緩急急則吐覘二十日乃解若十許
日怒啼必衣中有刺或臍燥刺腹當更裹臍冬時須
閉戶下帳然火令溫暖換衣亦然仍以温粉粉之若
過月臍有汁燒蝦蟇灰粉之日三四度若臍中水中

幼幼新書

卷四

十五

方

冷腹絞痛天糾啼呼面目青黑當灸粉絮尉之失護
至腫重者灸可至八九十壯不大腫但出汁時時啼
呼搗當歸末和胡粉傳之灸絮日熨之至百日愈以
啼呼為候若兒糞青者冷也與臍中水同

張煥斷臍後著熟艾厚裹愛護不慎浴水入臍或尿

在初袍濕氣傷臍或解脫風冷所乘令兒臍腫多啼

不乳即成風臍急用裹臍法風臍散

當歸焙乾

天漿子

微炒一錢燒

搗羅傳臍中時時用

又方燒絳帛末粉之

莊氏封臍散劉氏多齋香無齋帶

雄鼠糞七枚兩頭

乾薑藥許大

緋帛半

甄帶雞子大以

胡粉燒黃三錢

和研細看臍欲落不落取藥封臍差不患腫濕燒藥勿令灰入

甘草法第十三

肘後方兒新產取甘草如中指節炙碎水二合煮一合纏綿點口中一蜺殼便吐胃中惡汁智慧無病待

幼幼新書

卷四

十一

飢渴更與兩服吐止須盡一合

黃連法第十四

集驗方初生兒惡汁留胃膈壅塞易生蘊熱驚癇瘡癩用好肥黃連數塊槌碎綿裹如妳頭狀湯內浸成黃汁拈撥一二點兒口中惡汁自下乳食便美未盡用空綿別浸黃連後以朱蜜間與之

韭汁法第十五

本草云兒初生與韭根汁灌之即吐出惡水聖惠甘草後暖水浸韭子汁塗兒唇上乾又塗數次

止不令入口

朱蜜法第十六

肘後方吐惡汁後鍊真朱砂如大豆以蜜一蜺殼和日與一豆三日止主鎮心神安竟魄千金云與蜜多令兒脾胃冷腹脹喜陰癇氣急變喑瘵而死

牛黃法第十七

千金方朱蜜竟與牛黃不獨益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣又除百病

幼幼新書

卷四

十一

張煥法

真牛黃一塊好蜜鍊熟成膏每服一豆大乳汁化時滴口中形色不實不宜多若胎熱體黃宜多服之

永粉法第十八

張漢兒面紅潤色赤啼聲響快者用永粉半錢旋旋吮之良久有臍糞下佳

寶鑑銀粉抹口舌上下左右兩頰然後飼朱蜜

猪乳法第十九

聖惠兒滿月內時取猪乳渣口中佳
猪兒飲母次便提後脚離乳急將之即得

藏衣法第二十

崔氏兒衣清水洗勿令沙土草汗又清酒洗之仍內
錢一文在衣中盛新瓶內青綿裹瓶口密蓋置便宜
處三日後依月吉地向陽高燥處入地三尺埋之瓶
上土厚一尺七寸須牢禁令兒長壽智慧若不謹為
猪狗食令顛狂虫蟻食令病惡瘡火鳥食令兵死近
社廟令見鬼近深水湊池令溺死近故窟令驚惕近
井旁令聾盲棄道路街巷令絕嗣當門尸令聲不出
耳聾著水流下令青首弃火裏令生爛瘡著林木頭
令自絞死此忌須慎

天德月空法

- 正月天德在丁月空在丙壬
- 二月天德在坤月空在甲庚
- 三月天德在壬月空在丙壬
- 四月天德在辛月空在甲庚
- 五月天德在乾月空在丙壬

- 六月天德在甲月空在甲庚
 - 七月天德在癸月空在丙壬
 - 八月天德在艮月空在甲庚
 - 九月天德在丙月空在丙壬
 - 十月天德在乙月空在甲庚
 - 十一月天德在巽月空在丙壬
 - 十二月天德在庚月空在甲庚
- 天德月空處埋之若遇反支宜挂宅外福德上向
陽高燥處待過月然後依法埋藏吉

幼幼新書 卷四

忌甲辰乙巳丙午丁未戊申甲寅旬中不得藏埋
甲乙日生丙丁日藏丙丁日生戊己日藏戊己日生
庚辛日藏庚辛日生壬癸日藏吉
子母秘錄用罐盛兒衣清水清酒洗竟入大豆小豆
各一合次城門土市門土獄門土葱園土韭園土各
一合重重復之上用五色帛各一尺五寸重重繫罐
口上用鐵一尺二寸先將淨墨塗遍次以朱砂書云
大豆某胡去無辜小豆歷歷去子癘城門土見公卿
市門土足人行獄門土辟盜兵葱韭園土剪復生與

兒青令兒壽命得長生與兒赤令兒身命皆清吉與
兒白令兒壽祿皆千百與兒阜令兒長壽不衰老與
兒黃令兒清淨去百殃急急如律令此鐵券置權上
埋法同前

剃頭法第二十一

崔氏初剃頭

寅丑日吉丁未日凶

集驗方京畿初剃頭不擇日胎髮穢惡多觸神竈小
兒不安俟滿月產婦與兒俱出房剃頭必于溫暖處

幼幼新書

卷四

二十

剃後以生油杏仁膩粉頭上捺之以辟風邪其後亦
宜此

禳謝法第二十二

崔氏法

軒轅者軋神天丞相使者風伯犯之驚吐取梨枝
六寸埋生處吉

雷公者震神太陰使者天馬犯之煩悶腹滿解之
以三屠家肉為餅于產處謝吉

咸池者坎神天之兩師使者犯之啼不止用羊脯

酒于生處謝吉

豐隆者艮神天之東明使者天僕地害氣犯之乍
寒乍熱大腹以白魚二枚于生處謝又大豆一升
投井中吉

招搖者坤神天上使者犯之驚空嚼不止以酒餅
生處謝愈

天候者巽神天一執法使者犯之腹脹張眼白魚
二枚生處謝吉

吳時者離神天一將軍遊擊使者犯之驚腹痛馬
脯五寸于生處謝吉又以白魚五枚并棗餅埋生
處吉

幼幼新書

卷四

廿一

大時吉兌神小時北斗使者犯之腹脹下痢解以
酒脯于生處謝又以大豆一升投井中吉

犯月殺者驚啼用丹雄雞血于生處謝吉

犯白帟者用稻米一升雞子三枚于生處謝吉黍
亦得

犯大夫者羊肝三枚稻米一升于生處謝用雞羝
羊脾黍米謝亦得

犯口遊者口噤色變欲死者三屠家肉麥飯于生
虔謝吉

幼幼新書

卷四

廿二

幼幼新書卷第四

頌枏堂梓

幼幼新書 卷五

幼幼新書卷第五 初生患病 凡十七門

後學古吳陳履端于始輯

戴湖華宗澤 校

初生不作聲第一

千金論兒生不作聲暖水灌之嬰孺用冷水由難產氣少

也取兒臍向身却捋之令氣入腹仍呵之亦以葱白

徐鞭之若啼始生即舉遲則中寒腹內雷鳴須先浴

後斷臍

水鑑方

幼幼新書 卷五

胎風生下不能啼須使園中小葉葵搗取汁調

熊膽末纔交入口免傾危

初生眼不開第二

患眼兒生眼閉口開常呻吟因受胎熱用涼五葳藥

天竺黃散見重古門及與母喫後以竹筒煎湯洗眼

洗眼方

黃連 秦皮 燈心 大棗等

竹筒煎湯洗

初生輒死第三

千金兒初生輒死視兒口中懸癭上齧有胞者翼云赤胞以指甲取頭令潰去血綿殺血淨血入咽殺兒慎之

初生不喫奶第四

巢氏者產人見兒出急以手料拭兒口無令惡血入口則腹內調和無有疾病若入腹心腹痞滿短氣不能飲乳又母取冷過度氣入胞兒著冷不肖飲乳為胎寒亦名難乳

外臺方

乳兩合葱白一寸煎一兩沸去葱喫即乳

幼幼新書

米五

二

聖惠人參丸

人參

龍膽

黃連

馬牙硝

甘草炙微赤

枳實夫炒微黃各二兩

搗羅蜜丸如桐子乳汁研二丸灌口中日四五服

差

朱砂丸治三歲以下胃口閉不喫乳

朱砂

牛黃

麝

丁香

甘草炙微赤

人參各一

犀角

黃耆

石膏細研水飛

五靈芝各半

搗羅研勻蜜丸如菘豆熟水下三九日四五服

治腹痛不肯飲方

赤茯苓

甘草炙微赤

黃連去鬚各一分

搗羅蜜丸梧子每丸研著妳頭令兒吮點口中亦得

孔氏以乳汁研麝香一字服

灸法兒生二七日內不吮妳多啼者客風中臍循流

心脾灸承漿在下唇稜下宛宛中次灸頰車在耳下

頰骨後炷如雀屎各七壯此非灸不療

幼幼新書

米五

三

兒喉中嗚咽乳不利灸旋璣三壯在天突下一寸陷者中

初生吐不止第五

錢乙論兒初生急須拭掠口中穢惡令淨啼聲一發

咽入喉故吐且多生百病

聖惠藿香散治兒生至半月嘔逆不止

藿香

紫苑洗去苗土各一分

甘草炙赤半兩

麥門冬三分去心焙

桂心半

為散每服一錢水一盞煎五分去滓溫綿點滯口

錢乙木瓜丸治初生吐不止

木瓜

木香

檳榔

麝

膩粉各一

研麵糊丸小黃米大每服一二九甘草水下無時

初生不小便第六便不大

患眼臍風撮口因母食雞猪酒麵薑醋之毒熱流胎

中兒因飲血生下肚臍腫治以豆豉膏貼臍見本

及服牛黃丸熱見風門臍四邊青黑口撮即死

外臺人乳葱白煎服小便神效方見不飲乳

豆豉膏

黑豆一分

田螺十九

葱一大

搗爛芭蕉汁調貼臍下

吉氏粉蜜膏兒生三五日臍府不通六十日內諸患

蜜少許熟水解開調輕粉一錢點兒口極少許令

瀉一二行不可再服

初生懸癭第七此下三門可相通

千金論兒六七日後血氣收斂成肉舌喉頰清淨若

喉裏舌下有物如蘆籜盛水名懸癭以綿纏長針穿

及處如粟米刺之令氣泄去青黃赤血即消未消來

日又刺三刺消盡餘小未消三刺亦止自然消舌下

名重舌頰裏及上齶名重齶齒齶名重齶皆刺去血

汗

初生重舌第八

巢氏心候于舌而主血脾絡脉又出舌下心火脾土

二藏子母也有熱即血氣俱盛其狀附舌下近舌根

形如舌而短名重舌

千金治法見懸癭門

幼幼新書

卷五

四

患眼戴口重舌重齶口瘡皆上焦熱因受胎時大受

極熱急以雞內金為末乾搽口內及朱砂膏見本地

黃膏見本輪涼搽之仍服天竺黃散見本

地黃膏

鬱金皂莢水煎

豆粉各半

甘草一分

馬牙硝研一

生地黄汁蜂蜜對合熬成膏和藥每服兩皂子大

香熟水含化或戴翎掃口內

金朱飲治驚壯熱傷寒伏熱上焦虛熱重舌口鼻生

瘡致赤眼方 本名天竺黃散

川鬱金 對皂莢水黃乾細者如胆壯佳 天竺黃 甘草 炙

牙石 各半 朱砂 一分 蟬殼 十四箇水洗土 射香 少許

為末每服半錢至一錢蜜湯調下

肘後治卒重舌方

燒蛇蛻為末唾和塗舌上差 嬰孺醋調

千金方

田中蜂房燒灰酒和塗喉下愈

三家屠肉切如指摩舌上立能啼

幼幼新書

卷五

木

竹瀝漬黃柏取細細點舌上

千金翼治重舌舌強不收乳

鹿角末如大豆許安舌上日三差

外臺錄驗

乳髮燒灰末傳舌上佳

姚和仲

馬牙硝塗舌下日三

聖惠治重舌口中生瘡涎出

白羊尿塗少許

桑根汁塗口中 一方黃汁令吮凡口內瘡俱佳

蒲黃散

蒲黃 露蜂房 微炙各一分 白魚錢

研勻少許酒調傳舌口中瘡上日三

張渙烏魚散

烏魚骨 一兩燒灰乾 蟻蛭 燒灰 蒲黃 研各半兩 枯礬 一分

研粉半錢以雞子黃調塗嚙津無妨

千金灸行間壯隨年穴在足大指岐中

外臺重舌欲死灸右足踝三壯立愈左右並良 千金灸兩

幼幼新書

卷五

木

足外

嬰孺以兒置箕內東向門中灸箕舌三炷

重齶重齶第九

千金論總前懸癰門

茅先生云心熱壅滯先用朱砂膏 見驚積門 塗舌上後用

牛黃膏 見膈熱門

聖惠牛黃散 一方無前三味有玄明粉

牛黃 白龍腦 朱砂 各一分 鈎霜 半兩

太陰玄精石 一兩

細研為散先于腫處以針鉞破出血鹽湯洗拭口後摻藥神效

初生口中有虫第十

外臺療兒喫妳不穩七日以來壯熱顏色赤鼻孔黃

恐作撮口及牙關虫似蝸牛亦似黃頭白蚌螺

竹瀝半合和少許牛黃服差

又猪肉拭口即虫出

初生着噤第十一風噤

巢氏兒口內忽結聚生舌上如黍不能取乳名噤由

幼幼新書

卷五

九

在胎熱入藏心偏受熱

聖惠初生兒須防三病一撮口二着噤三臍風皆急

病着噤尤甚過一臘方免牙關緊急喫乳不穩啼聲

漸小口吐涎沫茅有眼閉人見大小便通以為冷熱所得

不知病在喉舌狀亦極重善救療者十不得三四依

將護法防于事先必無此患

千金治口噤赤者心噤白者肺噤

雞糞白棗大綿裹水一合煮二沸分再服聖惠用豆大三

枚水

又雀糞四枚末之着乳頭飲兒大十枚

外臺着噤病在咽如麻豆許令兒吐沫不乳

水銀如黍與服下咽便愈以意量之不過小麻子

許事急用

食療茶莓研汁灌口中死亦生生下濕莖端三葉花黃子赤似覆盆子

聖惠川椒一两搜麩果三角各樣燒黃熟以綿蓋兒

口搯去尖如筍頭使椒氣入口效未覺再作

東行牛口沫取塗口額上效

張渙立聖散

幼幼新書

卷五

九

乾蝟稍七

膩粉一錢

乾蜘蛛一個去口足先以竹瀝浸知朱

一宿灸令焦取末

研極細服一字乳汁調時時灌口中

萬全方

兒乳後以髮纏指沾清水點拭着齒齦有黃筋兩

條以筆刀割斷點猪乳便差口難開點猪乳

秘要

木梳先于懷內令煖却于耳門尖上掩一七次即

安

張氏

蜈蚣全一

蝎稍七

鵬砂

朱砂各三

梅花腦

麝各一

研乳母唾調塗口唇四畔并牙關兒以舌攪藥即

安一切急驚生薑蜜水調

附犯風噤方

茅先生兒生一百廿日內犯風噤病同因母受胎有

疾故受毒氣生來血氣未調又被風邪所擊致之治

法先與奪命散吐風涎見急傷後下醒脾散一見胃

初幼新書

卷五

十一

脾風門

夾勻氣散与服見胃氣又下雄朱散見驚

夾朱砂膏見驚常服即愈如手捉拳噤口不開死

初生戴口第十二

巢氏兒初生口裏白屑舌上生瘡如鵝之口故名由

在胎受穀氣盛心脾熱氣重發于口

千金論兒驚口劇者鼻外一作中亦有之妊娠時嗜糯

米使之

茅先生論兒喉中壅一塊肉瘤閉却為喉痺身大熱

舌硬不轉為木舌口開滿口黃如膏名戴口三候皆

熱甚生風風壅熱毒至此為實熱先用積實牛黃丸

見實微與通吐惡涎後用勻氣散見胃氣然用天竺

黃散見實夾牛黃膏見膈與服愈如喉響似鋸及眼

視面青黑不寐食死候

肘後方

以髮纏筋沾井花水拭之三日便脫去不脫可煮

栗茨汁令濃以綿纏筋拭之如無栗茨栗木皮亦

得千金作栗茨

簡要用牙硝細研于舌上搽之日三五度

初幼新書

卷五

十一

秘錄用素白皮汁和胡粉傅之按新藥

用雞胓黃皮燒末乳和服

張渙保命散

朱砂飛

白礬燒各

馬牙硝半

各研細再同研先以手指纏亂髮指舌上垢後取

白鵝糞以水攪汁調藥一字傅之

初生木舌第十三餘木

聖惠脾脉絡于舌舌者心之候若巖府壅滯心脾積

熱邪熱之氣随脉上衝舌本則腫漸漸粗大不早療

滿塞口中當塞殺兒為木舌兒尤多此疾
水鑑木舌要可待黃葵更入黃鈔兩相知黃點之七
遍立便可神方不假藥多期

玄參散一有甘草 炙半兩

玄參 川升麻 川大黃劉微 炒 犀角屑各 三分

散每服三錢水一盞煎五分去滓不計時溫服

馬牙硝丸

馬牙硝三分 細研 川大黃劉微 炒 太陰元精石鈔霜

麝 寒水石各半 兩 甘草一分 炙 赤劉 白礬燒半 分

幼幼新書

擣羅為末蜜丸如彈子常含一九嚥津

射干散

射干 川升麻 木通 藺藺子微 炒

甘草炙微 赤劉 漏蘆各三 分 川大黃劉微 炒 當歸

桂心各半 兩

散之每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時溫

服

又方

犀角 黃苓 木通劉各 兩半 漏蘆

川升麻 麥門冬去心 羚羊角屑各 一兩
為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時溫

服

養生必用 大青患魚膽一枚入五銖錢一文線札 定外用墨塗三次陰乾

少許冷水化開服

張渙川硝散聖惠無 硝鹽

川朴硝兩半 紫雪一分 鹽半 分

研細每服半錢入竹瀝三兩點白湯調塗舌上嚥

津無妨

初生撮口第十四

聖惠兒初生肌肉未歛血凝成肌若血沮敗不成肌

肉使面目統鼻口左右悉黃而啼閉目聚口撮面口

中乾燥四肢不能伸縮宜與龍膽湯

面赤喘急啼聲不出是撮口此患尤甚由母胎中挾

風熱生後氣血未調或洗浴當風初袍失度一臘內

有此 飛仙論臍風撮口多是剪臍帶傷動賊風入臍撮口

不開下乳不得其候面青哭聲不出多撮唇口若吐
出白沫四肢覺冷死

小兒宮氣方

白僵蚕二枚為末蜜和傅唇舌差

陳藏器方先勞兒口傷令見血碎雀甕取汁塗之產

時若開諸物口不令閉多使兒患撮口

聖惠釣藤散

釣藤

川升麻

黃芩各半兩

蜆蛸二枚去翅

足微炒

幼幼新書

卷五

十四

為散每服一錢水一小盞入蘆根一分煎至四分

去滓徐徐溫餵

當兩乳中高下平以線量灸之三壯起死仍用後方

烏驢乳一兩合東引槐枝十枚長三寸

煨槐枝入火一半看其煨頭津出即取拭却

于乳中浸須臾便以槐枝點乳于口中大驗

又赤足蜈蚣一枚雀兒飲菟子下開口者五箇

燒為灰細研粥飲調下一字

漢東王先生定命散

赤脚蜈蚣半條酒炙令乾 烏頭尖生三箇 麝少許

研極細每服一字煎金銀薄荷湯調下

張漢急風散

蛇蛻微炒 乾蝎稍 釣藤各一分

搗羅為細末次用

朱砂一分水飛 麝各半錢研極細

都拌勻再研每服一字取竹瀝一兩點同乳汁調

下

初生中臍風第十五

幼幼新書

卷五

十五

聖惠論臍風者由斷臍後為水濕傷或尿初袍乳母

不覺濕氣傷臍亦因解脫風冷所乘令兒四肢不利

臍腫多啼不能乳哺不急療遂致危殆

茅先生兒生三臘有臍風候腹臍腫滿口撮身熱不

大乳哺因母受胎時恣情餐啜遂熱毒聚胞牙兒飲

母熱血五歲未成復受風邪而得治以朱砂膏見驚積門

蜜化妳上吮後用豆豉膏見本門塗臍四邊日六服朱

砂膏甚疾方愈臍四邊黑口撮此為內搖不治爪甲

黑當日死

千金有臍風臍濕臍瘡三者皆因斷臍後為風濕傷而成夫風入臍四肢不利多啼不能乳為臍風腫濕經久不乾為臍濕風濕相搏令臍生瘡久不差為臍瘡有一不已入于經脈多變為癩癩成作癩治

聖惠兒初生七日封臍雄鼠散

雄鼠糞七枚 胡椒半兩

大棗五枚

綿帛灰

麝一錢

研為散臍欲落不落用藥傳不令風入

又方

幼幼新書

卷五

十七

亂髮雞子大燒烟欲斷不即堪用

蜈蚣一寸許 麝小豆大

羚羊角一錢 雀兒飲瓦子

相和細研勻割臍了便傳效

茅先生貼臍風豆豉膏

豆豉

天南星

白欬

赤小豆

各半兩為末每服二大錢用芭蕉自然汁調塗臍

四邊日一次即安

良方視兒上下斷當口中白色如江豆大急以拍爪

正中搥之自外達內搥令匝微血出不妨白處兩盡

頭亦搥內外氣脈斷不必破肉拍爪勿令大鉅恐傷兒甚驗

孔氏

金頭蜈蚣一枝 青州蝎稍四 白僵蚕七箇 瞿麥二字

為末吹臍內啼時可醫更用薄荷水服一字

初生臍濕第十六氣臍淹破臍附

聖惠兒斷臍後洗浴傷濕水入臍令腫經久不乾斷

臍多着熱艾厚裹不令尿濕着臍

嬰孺論兒尿清者冷與臍中水同兒腹疼糾呼面目

幼幼新書

卷五

十七

青黑當看臍腫輕重者灸八九十壯輕者不大腫

但出汗時啼者搥當歸胡椒末傳之仍炙粉絮日熨

啼止候

顯經治臍濕

白礬一錢 龍骨一錢

末入麝少許搥臍乾用怕風

外臺兒臍濕暖鹽豉熨方

鹽豉等分搥作餅如錢安新瓦上炙熱熨臍差止

亦用黃柏末粉之

絳帛灰傳臍中

聖惠封臍散

胡粉一

雄鼠糞七枚

燒灰 甌帶一圍

乾薑灰

綿帛灰

白石脂各半

細研加麝一錢者臍欲落不落即封差末患傳終

不患燒藥時不令灰入

蝦蟆牡蠣各一枚燒灰細研少許傳臍中日三兩上

差

錢乙藥墨散

幼幼新書卷第五

黃藥

釜下墨

乳髮等分

為末傳少許

良方當歸焙乾為末研細者臍中頻用驗

莊氏氣臍大如栗虛腫而軟疼

竹瀝塗日數上消

兒臍濕淹破屋爛草為末頻搽效

聖惠臍腫灸腰後對臍骨節三壯炷如麥

初生臍瘡第十七

巢氏論見前臍風門千金論

肘後乾蝦蟇燒灰傳日三四佳聖惠有枯礬

張渙金黃散治臍瘡久不差傳經絡變癩

川黃連一分

胡粉

龍骨燒灰各一錢

各另研復合研為細末傳臍中時時用

幼幼新書卷第五

幼幼新書

卷五

十九

一第1006 冊 續修四庫全書 第 14 版反內

幼幼新書卷第六 稟受諸疾 凡十九門

後學古吳陳履端于始輯

嘉定唐正巳 校

解顛第一已下四門通看

巢氏解顛者兒年大顛應合不合頭縫開解是也腎主骨髓腦為髓海腎氣不成則髓腦不足不能結成故頭顛開解

寶鑑客風傷腑即顛骨解顛大

萬全論兒有解顛顛不合顛陷三者大同小異解顛

者腎氣不成顛不合與陷雖因藏府熱氣上衝所致

亦本于腎氣不足

玉訣兒骨氣所傷候歌

解顛雀昧府傷風顛腫因驚胃氣攻語澁行遲

胎氣促筋拳瞪目是肝風

先行風氣利萬下涎次和藏府即無悞

千金熬蛇蛻皮末和猪頰車中髓傳頂日三四度

兒腦長解顛羸瘦色黃四五歲不能行半夏熨方

半夏湯洗七遍 生薑 芎藭各一升 細辛三兩

桂心尺一 烏頭去皮臍十枚

吹咀醇苦酒五升漬之晬時煮三沸絞去滓以綿

一片浸藥中適寒溫熨顛上冷更溫復熨朝暮各

三四度嬰孺無薑

三物細辛傳方

細辛 桂心各半兩 乾薑炮十銖

末之乳汁和傳乾復傳面赤愈

聖惠治兒解顛顛大身有痼病熱頭汗出腹脹咳嗽

上氣肩息脛蹇足交三歲不行皆治之鍾乳丸

鍾乳粉 防風 熟地黄 牛黃

甘草炙微黃 漆花即五加皮

各一分為末更研勻犬腦髓和丸如麻子粥下三

丸早午晚各一服量兒加減

萬全磁石丸磁石易鍾乳乾棘易漆花

嬰孺狗腦丸同萬全少乾棘多白朮

嬰孺銅顛藥使腦不長

黃雌雞臨兒顛上刺其刺以血滲顛上血上以芍

藥粉傳之不見血一日差

狗腦丸治腦長喜搖頭解顛

狗腦箇一 村藤皮五加 甘草炙 白木

防風 鍾乳石 乾地黄各一 牛黃分二

狗腦丸小豆大一歲二九日再未知加兒顛常暖冷即病死

張漢王乳丹

鍾乳粉依法 柏子仁研別 乾熟地黄 當歸洗各半兩

防風 補骨脂淨揀微炒

或加黃蓍茯苓除別研者碾細末次入鍾乳粉等

拌勻蜜丸如黍每服十粒乳前煎茴香湯下

幼幼新書 卷六

丁時發庸骨丸

虎骨 敗龜板 不灰木 乳香各半兩

為末生豬肉于手心內調塗以臍綿包裹第八日

葱湯水洗去前藥再塗經年者三日塗

又服參苓散

人參 茯苓 白附子炮 羌活

甘草炙 芍藥 白木水煑各一分 犀角

京芎 藿香後三味減一半

末每服半錢水一盞金銀薄荷三葉煎三分溫服

通驚氣

顛不合第二

聖惠顛不合氣血少弱骨木不榮由腎氣未成肝肺壅熱上衝于腦遂令髮枯骨髓不足而顛不合

錢乙年大而顛不合腎氣不成長必少笑目白睛多

眦白色瘦者多愁少喜餘見腎虛

張漢解顛顛不合顛填顛陷由腎經虛熱封顛散

蛇蛻皮燒一兩 防風 川大黃濕紙裹火煨存性

白及各半兩

幼幼新書 卷六

細末入青黛半兩研勻用半錢以獾猪膽汁調勻

紙攤四邊回各留少白紙用淡醋生麵糊貼顛上

不住以溫水潤一伏時換

莊氏方

山茵陳兩一 車前子 百合各半兩

末烏牛乳汁調塗脚及腦縫上帛裹頭三日一換

五上効

王氏封顛散顛開崎陷咳嗽鼻塞

柏子仁 防風 天南星各四兩

為細末每一錢猪膽汁調勻稀稠得所攤緋帛上
隨願大小貼一日一換時時湯潤

顛填第三

巢氏乳哺不時飢飽不節或熱或寒乘于脾胃致府
藏不調其氣上衝其狀顛張如物填其上汗出髮黃
而短是也若寒氣上衝即牢鞞音昂頭也腫硬如履頭迭起熱氣
上衝即柔軟又脇下有積氣滿體熱熱氣乘藏藏氣
上衝于腦亦致顛填又欬且啼氣乘藏上衝亦病之
啼甚久氣未定而乳亦顛填所以然者方啼陰陽氣
逆上衝故也

幼幼新書

卷六

五

石壁經三十六種積熱顛虛腫候歌

積聚脾中熱不通致令面赤口唇紅肖高夜嗽
多膜脹休使流傳肺有風喉裏作聲涎上壅顛
門腫起熱來衝但教涼膈安靈府能使三朝速
有功

積有冷熱皆能作腫冷則糞白或酸臭氣衝人亦有
虫出食物皆不能化腹脹滿多困喉中亦鳴熱則多
渴糞赤面黃赤口臭亦虫出各者證調治須分水較

去積并調氣冷則溫脾胃熱則去其熱化涎止渴顛
隱則冷腫則熱風熱宜金華散

石壁經此候宜將時氣門中除濕散濃煎桑白皮湯
下

小兒形證此候肺熱生風涎鳴顛腫將白丁香膏一
二服或南星丸退傷寒變疹門

秘要方兒生一月日內或顛門腫乃胎熱用黃蘗膏
塗涌泉穴如陷半夏膏塗手心此乃嬰兒腎受冷氣

邪干于心致令病生黃蘗半夏皆為未冷水調貼

顛陷第四

巢氏兒顛陷下不平由腸內熱氣熏藏藏熱即渴引
飲而瀉利者即府藏血氣虛弱不能上充髓腦故顛
陷
聖惠兒藏府壅熱氣血不榮致顛陷生地黄散

生地黄

兩

烏雞骨

一兩酥

搗羅為末不計時粥飲調下半錢

以狗頭骨炙令黃搗羅為末雞子清調塗

天靈蓋炙黃羅為末生油調塗

滯頤第五

巢氏脾液為涎脾氣冷不能收制其津液兒多涎唾流出滯漬頤下

真珠囊兒風冷入脾胃故令涎水常流

惠濟歌 宜慈湯丸取驚積門 銀白丸補慢脾風門

滯頤為患本因傷溜出清涎口角傷此患脾虛

寒胃口愚夫即道破涎囊終朝服藥全無效夜

卧流涎亦汗床洗肺更宜温胃口脾元一壯自

安康

幼幼新書 卷六

千金白羊屎內口中

東行牛口中沫塗口中及頤上

張渙温脾丹

半夏 一兩生薑六兩 同搗細炒黃

乾薑

搗羅細末蜜和如黍米飲下十粒量兒加減

温胃散

半夏 白礬水 浸炒黃

乾薑

搗羅細末每一錢水八分生薑二片煎五分食前

温服

齒不生第六

巢氏齒骨之所終為髓之所養兒稟受腎氣不足髓不能充齒骨故久不生

千金翼溺坑中竹木正旦刮塗之

外臺雌鼠屎三七枚以一枚拭齒根處盡二十一日

齒生楊氏產乳方用三十枚 雌鼠翼云頭 尖楊云頭圓

聖惠齒不生或落不生

幼幼新書 卷六

牛糞中黑豆二七枚小開去頭上皮以開處注齒

根時時用之効

張渙香附丹

大香附 刮去皮 沉香 各一兩

乾蟾 燒各半兩

搗羅羊髓四兩煮爛和成膏如黍麝香湯下十粒

量兒加減

髮不生第七

巢氏足少陰腎經其華在髮兒稟少陰血氣不足即

髮疎薄不生亦有因瘡而禿者由傷損其血血氣損少不能榮髮

千金椒葉搗取汁傅頭上立生一葉中心換汁

千金翼髮薄不生
先以醋泔清洗禿處以生布揩令火熱臘月猪脂并細研鐵生煎三沸塗日三遍

外臺頭風烏喙膏髮速長而黑光潤亦治兒髮不生
烏喙 莽草 石南草 續斷

皂莢去皮子熬 澤蘭 白朮各二兩 辛夷人一兩

栢葉半升 猪脂三升
苦酒漬一宿以脂煎于東向竈釜中熱以葦先置

三堆土每一沸即下一堆土候沸定却上至三沸共致土堆上三畢成膏訖去滓置銅器中數北向

屋溜從西端至第七溜下埋之三十日藥成刮兒頭日三塗大人數沐沐已塗

本草甑氣水主長毛髮以物于炊飴時承取沐頭髮長密黑潤

園經兒白禿髮不生搗榆皮末苦酒調塗

聖惠腦疖頭髮連根作穗落兼瘡白禿髮不生黑豆膏

黑豆 菘勝各三分 訶梨勒皮一兩
搗羅水拌勻內竹筒中以亂髮塞口用塘灰內煨

取油貯瓷器中先以米泔皂莢湯洗頭拭乾塗日再十日髮生

又方 葛根末 猪脂 羊脂各二兩
入鉢內慢火熬成膏收瓷合中每一錢塗摩頭上

白禿不生髮燥痛香薷煎 日再

陳香薷二兩 胡椒一兩 猪脂半兩
水一大盞煎香薷取汁三分去滓入胡椒猪脂和

勻塗日再 嬰孺熊白塗

又煮雞子七個去白熬令汁塗

張漢受血氣不足不能榮髮不生名疖病非也菘勝

丹

萱勝研一合 當歸洗焙 生地黃 芍藥各一兩

胡粉半兩

搗羅為細末研勻蜜和如黍黑豆湯下十粒兼化

塗量兒大小

髮黃第八

巢氏足少陰腎經血氣華于髮血氣不足不能潤悅

于髮故黃

千金翼方

臘月猪脂和羊屎灰蒲灰等分傳之三日一為取

黑止

安師傳方

破故紙不計多少銀石器中煬火炒圓為細末地

黃汁煎成膏丸菜豆大每服十五二十九粒湯送

下食前

蟲胞第九

巢氏兒初生頭即患瘡乃至遍身其瘡有虫故名虫

胞

固隄張先生兒初生頭上便有瘡迺遷浸淫至體其

胞

瘡有虫似從胞來名虫胞治法服去鮫虫等藥又洗

貼藥中藥虫之藥效

秘錄燒雞卵殼研和猪脂傳之

千金頭瘡方此下皆能殺虫

胡粉一兩 黃連二兩

末之洗瘡去痂拭乾傳之差再發再傳

又方

胡粉 白松脂各二兩 水銀一兩 猪脂四兩

合煎去滓內水銀粉調傳

苦參洗湯

苦參

黃芩 黃連 黃蘗

甘草多 大黃 芩薺各一兩 蒺藜子三合

吹咀水六升煮三升漬布搗瘡上日數過

安師傳方

百部 雄黃 黃蘗

等分為末油調塗瘡上

鶴節第十

聖惠腎巖者精神所舍元氣所繫氣強盛則骨髓滿

溢故肌體充盛若血氣不足藏府勞傷真氣不守邪氣所侵則腎氣虛弱骨髓枯竭不能榮華故骨萎羸瘦

巢氏兒稟血氣不足即肌肉不充支體柴瘦骨節皆露如雀脚節

集驗補其本原氣體充盛肌膚盈溢補腎地黄丸

熟地黄八錢 焙 山茱萸錢

乾山藥各四錢 澤瀉

牡丹皮

白茯苓去皮各三錢

為末蜜丸如梧子三歲以下三二丸溫水空心化

幼幼新書

卷六

十一

下

手拳不展第十一

聖惠兒在胞母藏府虛為風冷所乘兒生肝氣不足致筋脈攣縮不得伸展故手拳不展薏苡仁散

薏苡仁三分

秦艽

防風

酸棗仁微炒

甘草

微炙赤各半兩

當歸微炒

桂心各一分

為散每一錢水一小盞煎五分不計時服量兒加減

減

羚羊角散兒手不展是風邪滯氣所客令榮衛不通

羚羊角

羌活

五加皮

白鮮皮

桂心各一分

麻黃

半兩去根節

甘草

半分炙

為散每服一錢水一小鍾煎五分量兒加減不計時溫服

時溫服

脚拳不展第十二

聖惠兒在胞母藏府有積冷為風邪所乘生後腎氣不足氣血未榮故脚指拳縮不展宜當歸散

當歸微炒

麻黃

去根節各半兩

羌活

酸棗仁微炒

人參

杜仲微炙

桂心各一分

幼幼新書

卷六

十四

羅為散每一錢水一小盞薑少許煎五分量兒大小乳前分減服

小乳前分減服

乾地黄丸

生地黄

郁李仁

湯浸去皮尖微炒各半兩

牛膝

防風

桂心

海桐皮

羌活

白茯苓

薏苡仁

各一分

擣羅蜜丸如紫豆乳前溫酒下七丸量兒加減

張渙海桐皮散

海桐皮

牡丹皮

當歸湯洗

熟地黄

牛膝酒浸各補 山茱萸各半

羅細末每服一錢水八分葱白二寸煎五分去滓

温服食前

語吃第十三

千金兒初生有連舌舌下有膜如石榴子中隔連舌

下後令兒言語不發不轉可搗斷之微血出無害不

止燒髮及傳止姚不搗

集驗語吃本心氣不足舌本無力故欲有言而舌不

能運有生而不吃兒相較吃誤謂學吃三日改吃三

切勿新書卷六

年舌本無力可調以藥若積習而成急改為上初改

須詳緩

陳藏器鵠鶴主吃炙食之一枚差臘月得者主老嗽

明堂灸翳風二穴耳後陷中按之引耳中手足少陽

三會治耳聾口眼喎斜失欠脫頷口噤不開吃不能

言頰腫牙車急痛

通睛第十四俗語

龍木論通睛外障初因失誤築打頭面額角兼倒盛

撲下令兒肝受驚風使目通睛宜牛黃丸犀角飲通

頂石南散効

牛黃丸

牛黃

芎藭

朱砂

未蜜丸梅子大臨卧薄苛湯下三丸或化乳母忌

熱麵猪肉等

犀角飲

犀角

切勿新書卷六

黃芩

遠志

為末散一錢水一盞煎五分食後温服

通頂石南散

石南

末每用一粳米許一日兩度通頂妙

惛塞第十五

巢氏人有稟性陰陽不和而心神惛塞亦有病而精

采闇鈍皆陰陽之氣不足致神識不分明

肘後療人心孔惛塞多忘喜誤

七月七日取蛛蜘蛛着領中勿令人知

又丁酉日密市遠志着巾角中還未服勿令人知

又牛馬猪雞心乾之末向日酒服方寸七日三

孔子大聖智枕中方

茯苓

茯苓神各五分

菖蒲二分

遠志七分

末水服方寸七日三夜一

行遲第十六

幼幼新書

卷六

十一

巢氏兒自變蒸至能言隨日數血脉骨節備成臄骨成即能行骨是髓養稟生血氣不足髓不充強故骨不成數歲不能行

聖惠肝腎氣不足致骨氣虛弱筋脉無力故行遲

張渙兒周歲疎骨成能行父母氣血虛弱胎氣不強

骨氣軟弱筋脉無力不能行

寶鑑兒骨熱肺脉寒長不能行

顛顛兒自小傷抱脚纖細無力行立不得或骨熱疳勞肌肉消瘦柴胡飲

柴胡

鼈甲米醋塗炙

知母

桔梗

枳殼去穢炒

元參

升麻

等分細剉三歲已下藥半兩水五合煎二合分二服空心食前後忌毒物服後澡浴

澡浴方

苦參

茯苓皮

蒼朮

桑白皮

白礬各半兩

葱白許少

剉沸水二升浸藥一兩通與兒浴溫處避風

千金治數歲不行方

幼幼新書

卷六

十一

蔡家未開戶盜食與哺日三便行翼云未開戶嬰孺就墓門中哺紀用經真五加皮末粥飲酒少許調一粟殼許日三有風骨節不利者尤宜

聖惠兒十歲不行宜生乾地黄丸

生地黄

當歸微炒

防風

酸棗仁微炒

赤茯苓

黃耆

芩朮

羚羊角

羌活

甘草炙微赤

桂心

等分搗羅蜜丸如菘豆食前溫酒下十丸量加減益腎肝羚羊角丸

羚羊角

虎脛骨

塗醋

生地黄

酸棗仁

炒

白茯苓

各半

桂心

防風

當歸

炒

黃耆

各一

搗羅蜜丸如棗豆食前温酒研五丸下

錢乙服二

水化日

三四

張漢麝茸丹

麝

茄茸

煎炙

生地黄

當歸

洗

黃耆

虎脛骨

煎炙

各一兩搗羅羊髓四兩煮爛成膏和如黍乳前摩

幼幼新書

卷六

十一

沉香湯下十粒日三

良方左經丸治筋骨諸疾手足不隨不能行步運動

草烏頭

生肉白者

木鼈

去殼

白膠香

五靈脂

各三

當歸

兩

班猫

一百箇

去翅

為末黑豆去皮生杵粉一斤醋糊丸雞豆大酒磨

下一丸不省針灸傷筋絡者四五丸又效十歲兒

一丸分三服此藥能通榮衛導經絡專治心腎肝

三經服後小便少淋瀝乃其驗也

丁時發治大人小兒劉骨行步艱難脚無力續命丹

防風

乳香

蔓荊子

炒

牛膝

麻黃

羚羊角

酸棗仁

炒

草烏頭

去皮

沒藥

白朮

茯苓

各一

天麻

酒

胡麻

炒

當歸

續斷

各半

川烏頭

去皮

黃耆

各四

蒺藜

分半

細末蜜丸小彈大每服一粒葱酒細嚼一日三五

服用後洗藥服藥三日方洗

草烏頭

當歸

地龍

木鼈

紫貝草

楮目

葱須

幼幼新書

卷六

十一

荆芥

各一

為末煎湯露脚指甲從上淋洗次用薰法

柴胡

草烏頭

赤小豆

吳茱萸

羌活

晚蚕沙

各

末黑豆三升熱水泡少頃去黑豆入煎藥煮盡

薰剉肉處令出骨中汗無力者亦依此

寶鑑灸兩足踝各三壯

語遲第十七

巢氏五歲有五聲心聲為言兒四五歲不言由在胎

時母卒驚怖內動兒戩邪乘于心不和張漢吉至四
五歲不能言

千金論詳語吃門

聖惠舌本無力語遲為藥散

赤芍藥一兩

黃耆三分

犀角

檳榔

甘草各半兩

搗羅每一錢水一小盞煎五分去滓量兒不計時

分減溫服

菖蒲丸治心氣不足舌本無力發轉不得亦云冷傷

少陰經故舌難發音至時不語

卷六

廿一

菖蒲

麥門冬去心

人參

黃連各半兩

丹參三兩

天門冬去心

一兩焙各

赤石脂

搗羅蜜丸如菜豆溫水研下五丸量兒不計時加

減服

張漢菖陽丹

菖蒲一十九節者

遠志去心

桂心各三兩

酸棗仁

黃耆

人參

黃連各半兩

搗羅蜜丸如雞豆服一二粒不時薑湯下
莊氏灸兩足踝各三壯灸心膻三壯在五椎下兩傍
各一寸五分

龜背第十八

聖惠龜背者肺熱脹滿致胃高如龜又多食熱乳
張漢乳兒常捏宿乳夏常洗乳掙捏去熱乳

聖惠大黃丸治龜背肺熱壅滯心膈滿悶

川大黃三分 天門冬焙

百合

杏仁微炒

木通

桑白皮

甜葶藶隔紙 川朴硝各

幼幼新書

卷六

廿二

搗羅蜜丸如菜豆不時溫水研五丸量兒加減

龜尿摩背骨上差

灸兩乳前各一寸半上兩行三骨罅間六處各三壯

炷如麥春夏從下灸上秋冬從上灸下

莊氏取九家灰一斗盛簸箕中令兒合面印背跡于

龜背從上當中及兩邊令三姓人同下火各于灰上

灸三壯乘灰河流或水中

龜背第十九

聖惠坐兒稍早為客風吹脊風氣達髓使背高如龜
錢氏肺熱脹滿攻于背骨即成龜背又乳母多食五
辛又客風入脊髓俱成龜背治以龜尿點節骨
取尿法蓮葉安龜鏡照之即出

張渙松蕊丹 聖惠麻黃丸多考藥少

松花 焙

枳殼 炒

防風

獨活 各一兩

麻黃 去根節

川大黃 炮

前胡

桂心 各半兩

搗羅蜜丸如黍粥飲下十粒量兒加減

聖惠灸肺俞心俞背俞各三壯炷如麥

幼幼新書

卷本

三

幼幼新書卷第六

幼幼新書卷第七 蒸忤喘 凡九門

後學古吳陳履端于始輯

松陵周之軾孺瞻校

變蒸第一

聖濟形氣變成章曰水火既濟血氣變革然後剖柔
有體而形質立造化鑪錘之間不外是以成物茲嬰
孺生而有變蒸也原受氣之初由胚胎而有血脉由
血脉而成形體由形體而能動由動而筋骨立以至
毛髮生而藏府具穀入胃而百神備是具體未形有

幼幼新書 卷七

七

常不變時也若萌區有冰留動而生血脉未榮五藏
未固資陰陽之氣水火之齊甄陶以成非道之自然
以變為常者哉兒生三十二日一變六十四日再變
變且蒸變者上氣蒸者體熱上氣五藏改易氣皆上
朝藏真于肺肺主氣故體熱則血脉敷榮陽方外固
陰使之固爾積三百二十日十變且蒸為小蒸畢后
六十四日一大蒸積二百五十六日大蒸畢凡五百
七十六日變蒸數足形氣成就每經一變則情態異
常蓋天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏

化五氣以生喜怒悲憂恐七情之生得非成于變蒸之後耶候有輕重時有遠近輕者體熱微汗似驚耳與後陰所會皆冷重者壯熱脈亂或汗或否平者五日速者十日而衰先期五日後五日為十日之中熱除務致和平不欲驚擾灸刺湯劑皆非所宜或先變或後蒸未解治以成法或變蒸之中加以時行溫病與非變而得天行者其診大率相類惟耳及後陰所會熱為異耳

葉氏變蒸者長血氣也輕者體熱微驚耳與髓冷上

幼幼新書

卷七

二

五

唇白疣如死魚目珠微汗近則五日遠則八九日歇重者壯熱脈亂或汗或不汗不欲食食輒吐無所苦目白睛微赤黑睛微白蒸畢自明了前後計十日熱除干時勿驚動傷勿多人變蒸或早或晚依時如法者少初變或熱甚者連日數不歇審計日數必是變蒸服黑散發汗熱不止服紫雙丸小差便止翼云有餘熱蒸盡乃于時遇寒則寒熱交爭腹痛夭矯啼不止熨之愈變蒸與溫壯傷寒類非變蒸身熱耳熱是他病可為餘治日數從初生至九十六日三變變者丹孔

出而泄也積三百二十日小蒸畢后六十四日大蒸蒸後六十四日復大蒸又一百二十八日復大蒸積五百七十六日大小蒸畢

千金兒變蒸者是榮血脈改五藏經一變覺情態有

異單變小微蒸小劇

兒生始變身熱也再變且蒸其狀卧端正三變定者候丹孔出而泄四變且蒸能咳笑五變成機關六變且蒸五機成七變能匍匐八變且蒸知學語九變已

亭亭然也變之日若長治則加其疾變且蒸者是兒

幼幼新書

卷七

三

五

送迎月也

聖惠兒變蒸畢延成人血脈骨木皆堅牢

茅先生兒生下便變蒸長意志乃四十九日一變而

長骨肉治用鎮心丸現驚夾勻氣散胃氣不和服自平

和不服也安

錢乙論兒在母腹生骨藏府成而未全生後長骨脈

藏府之神智也變者易也變蒸者自內而長自下而

上身熱故生之三十二日一變變每異情性異前長

生藏府智意也何謂三十二日長骨添神人有三百

六十骨除手足中四十五碎骨有三百二十數自下
 骨一日十段而上之十日百段三十二日三百二十
 段為一變亦曰一蒸骨餘氣自腦分入齦中作三十
 二齒有不足者由變不足其常也或二十八日即長
 二十八齒下倣此但不過三十二數凡一周遍發虛
 熱諸病至十周小蒸畢骨氣全而未壯故初變生腎
 志再變生膀胱耳與聃冷腎與膀胱俱主水數一故
 先生三變生心喜四變生小腸汗出而驚心為火數
 二五變生肝及哭六變生膽目不開而赤肝主木數
 切切新書 卷七 五

三七變生肺聲八變生大腸膏熱而汗或不汗肺屬
 金數四九變生脾智十變生胃不食腸痛而吐乳此
 後齒生能言知喜怒故云始全太倉云氣入四肢長
 碎骨于十變後六十四日長經脈手足受血手持物
 足立能行也經云變且蒸謂蒸畢而周一歲之日也
 師曰不汗而熱者發汗大吐者微瀉不可餘治是故
 兒頃變蒸脫齒如花易苗不及三十二齒由變不及
 齒當變日相合也年壯視齒方明
 秘要兒繞變身熱瀉青黃重藥止住即成慢脾風

真珠囊兒生八蒸候每四十五日一蒸變各有所屬
 重者五日息日數稍異故並載
 一蒸肝生竟肝為尚書蒸後竟定令目腫子光明
 二蒸肺生竟肺為丞相上通于鼻蒸後能令嘔嗽
 三蒸心生神心為帝王通于舌蒸後令兒能語笑
 四蒸脾生智脾為大夫歲智蒸後令兒舉動任意
 五蒸腎生精志腎為列女外應耳蒸後兒骨髓氣通
 流
 六蒸筋脈伸蒸後筋脈通行九竅津液轉流兒能立
 切切新書 卷七 五

七蒸骨神定氣力漸加蒸後兒舉脚行
 八蒸呼吸無停息以正一萬三千五百息也呼出心
 與肺吸入腎與肝故令兒呼吸有數血脉通流五千
 周也
 毛彬變蒸候歌
 變蒸方長是嬰兒一此胎來數可推未到期年
 蒸八變四十九日一迴期第一肝蒸生于竟雙
 眼雖開腫子昏三兩日間微壯熱定目看人似
 欲言第二變蒸生于竟咳嗽噴嚏開胃鬲見人

共語笑喃喃暗裏時時長筋脉第三變蒸生于
神漸能識母畏旁人血脉初生學反覆肌肉皮
膏漸漸勻第四脾蒸生于智尻骨初生獨坐戲
三焦胃管漸開張乳哺甘甜不肖離第五腎蒸
生精志氣候相通轉流利掌骨初成學匍匐反
覆捉搦能隨意第六筋骨蒸初成九竅津液皆
相應時時放手亭亭立氣力加添日漸勝第七
膝踝骨初成顏色紅光遍體榮舉脚擡肩便移
步嘻嘻學語百般聲第八呼吸定精神風血氣

幼幼新書

卷七

六

脉自迴輪八蒸之後細分別一一從頭為列名
七日之中有爭治但看外證辨其名第一看兒
毛髮立口唇尖上白珠生三兩日間寒熱起自
發忽然睡裡作虛驚睡中哭或即遍身流盜汗
氣血長不逮或然微利腹中鳴變實腸或即因
流于毛孔出忽則皮膚急及忽乃嘔逆氣交橫因
悶皮膚急氣急少時却醒之即現不覺被氣節或則困悶通身軟忽然啼哭
沒心情重者不過一七日輕者三朝便得平上
古聖賢製方論還須服藥覓延生

肘後黑散

麻黃兩二

大黃兩一

杏仁分二

杏仁熬研如胎內散同搗聖惠並燒存性密盛器
中勿見風兒一月服如小豆乳和抱得汗勿見風
百日服如棗核千金翼兒變蒸挾時行溫病或詐
蒸時而得時行

紫丸

赤石脂

代赭各一兩

巴豆

四十粒熬翼紀用
三十粒十個生

杏仁五十粒

幼幼新書

卷七

七

各研合搗三千杵者硬加蜜密器盛一月兒如麻
子乳汁下良久復與少乳當少下熱未盡明旦更
服量兒加減兒夏月多熱往往發疾此丸通治數
日進一服代赭難得老顧牡蠣代千金翼治兒變
蒸熱不解并挾傷寒溫壯汗后熱不歇及腹有痰
癖不乳或吐或食癩先寒后熱謂兒氣盛有病下
之無損不下成病難治

聖惠柴胡散治變蒸經時不止挾熱心煩啼叫骨熱
面黃

柴胡 甘草 人參 玄參 各一

龍膽 兩半 麥門冬 兩

散一錢水一盞煎五分不時量兒溫服

嬰兒方治變蒸壯熱不止

代赭 兩 杏仁 兩

細末和勻黃蠟九廿日兒服黑散汗后更服黍大

一九訖少乳兩食久復乳勿過飽平旦一服午藥

勢盡增九雞鳴不差復與一九愈即止一月兒胡

豆大不利壯熱者加半丸藥當全出否則病未盡

幼幼新書 卷七

更服有熱服紫丸寒勤服當歸散黃著散變蒸后

微熱可與黃芩湯

瀟東王先生服黑散有微汗稍涼用香粉散

蚌粉 飛 麝 許少

細末綿裹搽

張渙清心湯治周晬內時或體熱睡不寧乳不調睛

不明或差或作甚者微驚乃長血氣各變蒸過周晬

漸除勿亂投藥

人參 兩半 麻黃 兩 川大黃 麥門冬

甘草 犀角 各一

細末一錢水八分杏仁一個去尖破煎四分去滓

溫時時服

紫砂丹

代赭 研水浸一宿

朱砂 飛 人參 各一

當歸

木香

細末杏仁十個去油巴豆五個研入麝半錢勻澆

水和針頭大服三粒至五粒乳後荆芥湯下

丁時發勻氣散

幼幼新書 卷七

變蒸日數甚分明或瀉槐黃又夾驚發熱喜啼

多不乳急須勻氣便安寧

香附 甘草 各一 天仙藤 人參

橘皮 藿香 各一

細末半錢米飲調下

中客忤第二

巢氏兒神氣軟弱忽有非常之物未經識人觸之與

兒神相忤病發各客忤亦名中客中客吐下青黃

白色水穀解離腹痛反側夭矯面變五色狀似癩但

眼不上插耳脉絃急數是也久則難治若乳母醉及房勞喘后乳者殺兒

脉急數龍膽湯下加人參當歸等分

肘後兒病身軟時醒為癩身強直反張不醒為瘞客忤類癩但目不上接

千金外人氣息為忤雖家人或別房異戶并乳母及父母從外還衣服經履鬼神粗惡暴氣或牛馬氣執作喘息乳氣未定皆為忤將兒避之若不避燒牛屎令煙氣置戶前

兒衣布帛綿履中不得有頭髮

幼幼新書

卷七

十

中客為病無時不有秋夏陽氣在外血脉嫩弱秋初夏末時有暴冷折其陽陽結則壯熱胃冷則下痢然未及恙是中客及殿慎勿先下先殺毒后下

中客急視口中懸癭左右當有青黑腫脉核如麻豆或赤白青色用針刺亦可爪搗決之并以綿纏釵頭拭去血治用豉水拌搗熟丸如雞子摩兒顛手足心及臍上下食頃破視其中有細毛擲丸道中

茅先生客忤候眼番騰腰背強直項硬手足硬返身歸后如角弓面黑色兒雖不出屋汗氣腋氣牛馬氣

兒五歲血氣未就吸着積在心歲日往月來被風森虛而發

寶鑑歌

客忤多因人物衝更遭鬼氣心相同青黃吐出并白沫水穀閉張腹又疼面色五般時變動脉絃急數不干風一同癩吊多驚證兩目依常異有風

千金客忤強項欲死方衣中白魚十枚為末傳乳頭令兒飲入咽愈一方二枚母手掩兒臍中吐下愈亦

幼幼新書

卷七

十一

摩兒項及脊強處

塗頭方竈中黃土蚯蚓糞等分搗和水丸塗兒頭及五心一雞子青和聖惠先以桃柳湯浴

客忤中惡發癩發熱乳哺不消中風反折口吐舌并症忤面青目上挿腹滿顛癩羸瘦症及三歲不行雙丸

麝

牛黃

黃連各二兩

丹砂

礬燒

附子炮

雄黃

桂心

烏賊魚骨各一兩

巴豆六粒十煎

赤頭蜈蚣

一枚煎如無赤脚
三枚用煎二段

各細末研巴豆如膏蜜和搗三千杵密收之兒十
日至一月服如黍二九四日至百日如麻子二
九餘視為加減客忤率多耐藥一日夜四五服汗
出差乳母有孕亦使客忤口中啣血即月客也尋
服兒可全口聚唾腹起熱者當灸臍中二七壯并
動服此藥若喜失子者產訖兒落地聲未絕便以
指刮舌上得啣血如韭菜便以黍大二九服七日
止差聖惠麝牛黃蜈蚣減半

切切新書

卷七

十三

外臺錢七十文水三斗煮有味適寒溫浴兒良聖惠青錢

食療熊骨煮湯浴

紀用擣菖蒲汁內口中艾汁磨刀水俱佳

聖惠兒血氣盛實寒熱作四肢驚掣發熱大吐食不
消壯熱及變蒸不解中客忤人鬼氣并諸癇等龍膽
散

龍膽州

鈞藤

柴胡

甘草炙

赤茯苓

黃芩

桔梗

赤芍藥

川大黃微炒各一分

蜈蚣三枚去翅足微炒

散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減溫服日三

四

辟兒諸般驚叫顫癩癡雜黃丸

雄黃

煎香

鬼臼去毛

白膠香

降真香兩各一分

虎頭骨

猴孫頭骨並微炙三分

麝

白龍腦

乳香

大蛇頭一枚

炙微

細末熟棗肉丸如彈子初長兒前燒一九次用綠

切切新書

卷七

十三

絹袋帶一九辟一切邪氣驚忤

治中客忤體熱方

白龍骨

葛根各一分

牛黃兩半

細散溫水調半錢日三四服

犀角散

犀角

麥門冬焙

鈞藤

朱砂各一分

牛黃半分

麝三大豆

細末不時金銀溫湯調半錢服

猪乳一粟殼牛黃一字和漸澀口中

雄黃散

雄黃

麝無牛
黃代

等分研周時兒服一字刺雞冠血調灌早午各一服量兒

銅照子臯燒赤少酒泮服

禁符

悲麗

出祀

並朱書貼額上

譚氏安神丸

忽爾連連哭不休渾身壯熱脈如鈎驚啼不得

寃神鬼客忤傷心不自由

幼幼新書

卷七

十一

生犀錢

雄黃

人參

茯苓

車前子

細末桃白皮桃符各一兩水二升煎一升去滓煎

成膏和前藥丸如麻子為藥湯下三九

真珠散治兒硬氣築心連喘息多愁胃口涎

真珠錢

生犀錢

香附錢

龍腦半

細研桃仁湯調一字服乳母忌生冷油膩毒物

嬰孺竈黃煨灰火一升醋搜入踈絹袋按作餅摩兒

胃上灰冷去之看有人牛馬猪羊等毛別之皆有形

似灰置婦人脚上先試乃置兒背仍數搖動勿太熱

灸手心主間使大都隱三陰交各三炷

灸大椎下第五節足跟后黃白肉際二七壯

肘後灸臍上下左右各半寸鳩尾下一寸各三十壯

主兒百病

寶鑑灸九角在耳尖上入髮際陽門在當陽下入髮

際嬰孺以爪兒手大
指甲石肉際汁出止

中人忤第三

犯人
禁附

千金客忤中人中馬忤治法多同少異

幼幼新書

卷七

十一

肘後水和粉并熟艾各為丸雞子大摩五心擘毛出

差

徐王神效方治吐乳四肢軟

桂心三兩水二升煮升半分三服又濃滓塗五心

常令溫

千金剪驢前膊胛旋毛彈子大乳汁煎毛消藥成着

乳頭飲愈燒母衣帶三寸并髮乳汁調服
煎兒顛髮并兒衣帶灰乳調服

一物猪通湯殺猪通二升熱湯灌適寒溫浴

嬰孺兒生五六日卒得口牽不乳啼聲不出死覺氣

未入歲府微引乳者宜服亦治魁名

甘草炙 龍骨 茯苓 牡蠣煨赤

乾地黄 黃芩各一分 當歸 桂心各半兩

淡竹瀝一升煎五合去滓入蜜一合服消息節之
茅先生兒生犯人噤候面青黑合噤眼閉吐逆不乳
因生下外人看問或脈氣及月辰不淨或外人帶邪
神觸着氣血未就又被外邪擊致治用朱砂膏乳上
吮驚積後鎮心丸驚一切愈如不乳眼視肚硬死

中馬忤第四

幼幼新書 卷七 十七

千金論兒卒中馬來聞馬鳴馬上衣服馬汗氣臭皆
令人中忤慎謹之特重一歲兒

聖惠中馬毒其狀腹痛吐下青黃白色水穀解離甚
者天

粉為丸行轉摩兒五心臍上下咒曰摩家公摩家母
摩家兒子苦客忤從我始扁鵲雖良不如善唾良咒

訖棄丸道中中客中人皆可用

刀橫竈上解兒衣發心腹一作發持刀向兒咒之嚙輒
以刀擬向心腹嚙音非出曰煌煌日出東方背陰

向陽葛公葛公一作母不知何公子來不視去不顧過

與生人忤梁上塵天之神戶下土鬼所經大刀鏢犀

對竈君二七嚙客愈兒驚嚙啡啡如此二七啡啡每

嚙以刀擬之咒當三遍畢用豉丸亦如上法五六遍

訖破丸中有毛棄道中

取馬口角沫塗口中效燒馬尾令向兒前

被鬼第五附病

巢氏嬾懷妊有惡神導其胎妊嫉而制伏他兒令病

魁娠婦不必恚致敗時有此耳魁疾喜微微下寒熱

幼幼新書 卷七 十七

去來毫髮鬚毛羣鬚不悅

千金敎音小兒也宜龍膽湯凡兒未行婦更妊兒

飲此乳亦作魁黃瘦骨立髮落壯熱繼病

寶鑑魁即腹中子靈識嫉妬非母之魁乎嬰兒眼睜

外兒即畏之致此患

千金挾實白鮮皮湯

白鮮皮 大黃 甘草炙各一兩 芍藥

茯苓 細辛 桂心各十銖

散水二升煮九合分三服

千金翼母帶白馬眼

聖惠挾寶大黃散

川大黃炒微

白鮮皮

甘草炙各半兩

犀角

黃芩

赤茯苓

赤芍藥各一分

散一錢水一盞煎五分去滓量加減日三四服

伏翼散治繼兒精神不爽身骨萎痺千金治鬼

伏翼燒灰細研粥飲調半錢日三五服炙香熟嚼

哺兒亦效

張漢虎頭丹

幼幼新書

卷上

十一

虎頭骨微炙

鬼臼去毛

草龍膽

鬼箭各一分

琥珀

白膠香各半兩

細末蜜丸如黍乳香湯下十粒量加減

繼病母有娠乳兒兒病如瘡痢他日相繼腹大或差

或發北人未識此病娠婦取百勞毛帶之

喜啼第六

肘後兒汗出舌上白愛驚衣厚過熱也臍青下痢青

乳不消喜啼衣薄過冷也兒多患胎寒晝夜啼因成

癩當歸散

錢乙論胃啼兒筋骨血脉未成多哭

寶鑑玉銜兒生下時取口內惡血不盡隨聲入腹令

腹急口噤下青黑糞不乳而啼

肘後當歸散

當歸末小豆大乳汁咽日夜三四度不差當歸半

兩小胛卵一具切酒一升二合煮八合隨兒服日

三夜四

外臺犬頸下毛絳囊盛繫兒兩手效

驚啼第七

幼幼新書

卷上

十一

巢氏云風熱邪氣乘兒心藏則生熱精神不定故卧

不安驚且啼

錢乙邪熱乘心當安心安神丸主之

萬全驚啼者風邪乘心藏府生熱也夜啼者藏冷也

夜則陰盛相感痛甚于晝也犯忌亦夜啼法術斷之

軀啼者腹中痛甚身軀張氣感而啼又胎寒而啼在

胎受病腸胃虛冷不消乳腹脹下痢顏色青白而時

或啼時

楊太鄴曰夜啼驚熱搐搦因乳母恣餐諸毒墮入妳

堂或變蒸未解客忤受驚兒神氣虛怯脉息微細妳
壅成驚則有熱熱則生病驚熱共觸于心致夜啼驚
叫喚裏搐搦不早醫目帶上番手脚痺癢揮發霍
顛顛虎睛丸

犀角 子芩各六分 梔子仁
大黃十分

細末蜜丸如梧子驚啼不喫妳乳汁下七丸風癩
米飲下五丸至七丸兒小減利為度忌毒物有虛
熱加知母六分

幼幼新書 卷七

千金龍角丸主五驚夜啼

龍角六銖 牡蠣煨赤一 川大黃各九銖 黃芩兩半
蚱蟬二枚 牛黃如小豆

細末蜜丸如麻子葶裡兒服二丸量加減

阿伽陀藥治驚啼及諸種病

千金湯主暴驚啼絕死或人從外來邪氣所逐

蜀椒 右顧牡蠣各六銖

酢探水一升煮五合服一合

廣利方治驚啼發歇不定

麝細研清水調一字

聖惠犀角散

犀角 鈞藤 川升麻 黃芩

甘草一分 人參三分

散一錢水一盞煎五分量兒

羚羊角散

羚羊角 黃芩 犀角 甘草炙

茯苓各一分 麥門冬焙半兩

搗羅一錢水一盞煎五分去滓量兒服

幼幼新書 卷七

鈞藤散治驚啼壯熱心煩不穩睡

鈞藤 龍膽 犀角 茯苓

黃芩 甘草炙

等分散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減頻服

龍齒散治同上

龍齒 麥門冬焙各半兩 赤芍藥 川升麻

川大黃炒 甘草一分

散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減頻服

牛黃散主風熱驚啼

牛黃	犀角	人參	茯苓
防風	細辛	蚱蟬 <small>去頭足</small>	蚍蜉 <small>醋炒</small>
朱砂	甘草 <small>炙</small>		
等分搗羅一二歲兒服一字竹瀝調三歲半錢不			
時			
確黃丸治驚啼啼即熱潮手惕惕大便青黃赤白			
雄黃	牛黃	牡蠣 <small>燒粉各半兩</small>	真珠 <small>分</small>
巴豆 <small>三粒去油</small>			
末蜜丸如黍兒五十日內未發時飲服三九抱卧			
幼幼新書	卷七		
汗即解不解再服傷乳不安有痰微下如雞子烏			
屎			
伏龍肝丸			
伏龍肝	朱砂 <small>各一分</small>	麝香 <small>半</small>	
細研蜜丸如菘豆候啼溫水調一丸服效			
雷丸浴湯			
雷丸	牡蠣	黃芩	細辛 <small>各三分</small>
蛇床子 <small>兩一</small>			
水一斗煎七升先浴頭次背膊次腰浴訖避風粉			

撲	嬰孺兒夜睡忽驚啼不識母喚之搥頭		
	是夢母棄之去謂母實去故啼但令人抱坐暗中		
	母從外把火入喚之即止謂去還來也		
	金匱銀屑鎮心丸主驚啼藏氣不足或邪氣所動		
銀屑	虎骨	城門上雞頭 <small>炙</small>	
細辛	雄黃 <small>各一分</small>	獨活	
末蜜丸如桐子絳紗盛懸解男左女右月內兒四		磁石 <small>飛各半</small>	
肢俱繫亦塗手足心合時面東忌婦人雞犬見			
幼幼新書	卷七		
錢乙安神丸			
麥門冬 <small>焙</small>	馬牙硝	白茯苓	乾山藥
寒水石	甘草 <small>各半兩</small>	朱砂 <small>兩一</small>	龍腦 <small>字一</small>
末蜜丸雞頭大沙糖水調半丸服無時			
張渙牛黃膏主啼笑驚叫面赤口乾狀若祟即非夜			
啼常服除胎熱			
牛黃	牡蠣 <small>燒各一分</small>	人參	甘草 <small>炙半兩</small>
細末次入飛辰砂雄黃各一分龍腦半錢鍊蜜成			
膏雞頭大服半粒至一粒薄苜湯化乳後服			

劉氏顛門寫天心丹田寫泥圓

丁時發青雲散

孩兒噬齒即因驚唇赤饒乾面色青夢裡有時

頻叫喚青雲散子早惺惺

石蓮心分一 天南星炮 蠶蚕直 蝎

鬱金卑角煮 雄黃錢 粉霜錢半

細末一字或半錢蜜湯調服

軀啼第八

巢氏兒在胎母傷風冷邪氣入胞傷兒歲府生後猶

幼幼新書 卷七 軀

在與正氣相搏則腹痛故軀張感氣而啼

千金當歸丸一名黑丸 治胎寒軀啼腹痛舌上黑青涎下

當歸 狼毒各九 吳茱萸一作杏仁 蜀椒各半

細辛 乾薑炮 附子炮各十 豉七合

巴豆粒十

搗細末秤研豆豉如膏漸內藥末復搗蜜和桑杯

盛蒸五升米飯下再搗千杵一月兒服如黍日一

夜二知為度亦治水癖

馬齒礬丸治胎寒軀啼驚癇腹脹不嗜食大便青黃

并大人虛冷或有實勿吐下

馬齒礬一斤燒半日棗膏和大人服如梧子二十

日三兒量服腹內溫為度

外臺腹痛軀啼宿乳不消牛黃丸

牛黃三錢 大附子二個 巴豆淨 杏仁熬

真珠各一

搗巴杏如膏內附等搗千杵乾入蜜百日兒服如

黍量加先哺後服日二膈上下悉當微轉藥全出

愈散出更服

幼幼新書 卷七 五

聖惠牛黃丸

牛黃分 代赭石 牡丹各三 麝錢一

末蜜丸如棗豆溫水下二丸

雀糞丸溫中止痛

雄雀糞分一 牛黃 赤芍藥 芎藭各半

當歸兩一

細末蜜丸如麻子百日兒乳汁一九日三量加

治軀啼腹脹胃滿牡蠣散一分

牡蠣燒 伏龍肝 甘草炙 蒼朮炒各

木曰擣羅服半錢澄陳米泔煎竹茹湯調重加
張漢養藏湯

川當歸兩一 沉香 丁香 白朮

桂心 川芎各半

細末一錢水八分薑二片煎四分時時溫滴口中

劉氏治胎弱陰陽不調晝夜嘔啼

乳香坐水中 沒藥 木香 薑黃各四

木鼈廿

末蜜和一歲服半阜子大量加減釣藤湯下無時

切切新書

開胃丸先服一晝夜 蘇米阿調 半錢棗 木半

白朮 木香 蓬莪茂 人參

當歸炒各半兩 白芍藥分一

末炊餅丸如黍服五七丸空心食前麝香湯下

夜啼第九

巢氏夜陰氣盛與冷相搏動則與藏氣相併或煩或痛令兒夜啼亦有犯忌法術斷之

茅先生夜啼屬陰遇起燈前後啼天明不住用抹唇膏抹唇上下更用朱砂膏積

漢東王先生夜啼候獨此書以為驚啼為熱夜啼為寒兒

夜啼非果因胎熱伏心熱物流胎入心 陰則與

陽相刑熱則與陽相合腹中躁悶故啼日陰

水鑑云天蒼蒼天上也心為君 地王王地土也

錢乙論脾冷痛用溫中藥及以法讓主花火膏

患眼見燈愈啼心熱甚用朱砂膏天竺黃散重舌

燈花塗乳上并鮫湯丸驚門 見燈不啼臍下痛氣血

滯因而躁悶宜烏梅散一切 槐角丸腹痛 無故而啼

夜中面目青不識人此邪氣所畜宜符法及驚藥實

者鮫湯丸通利

千金狼糞中骨燒灰為末水調服米大二枚

水鑑方兒髮三寸

丁釘屋角並沒徹不如來取鈿中金黃丹少許

熬令熟剪取髮毛燒灌靈

外臺乳頭散

黃耆 甘草 當歸 芍藥

附子炮 乾薑分

幼幼新書 卷七

散塗乳頭飲兒丸可胡豆三九量服嬰孩乳

姚和仲大虫眼睛一雙為散竹瀝調少許服

聖惠人參散

人參 茯苓 甘草生 川大黃微炒

白芥子微炒 蛇黃 牛黃 犀角

等分散柳桃枝湯調半錢頻服量兒

博濟消積滯順三焦利胃膈定氣刺攻症脇腹脹痛

女人血氣兒夜啼多涎萬全丸

船上硫黃分一 巴豆半兩二味 附子炮

幼幼新書 卷七 附子炮

桔梗 當歸 陳橘去白 柴胡

乾薑 青黛各半

細末麩糊丸如小豆溫水服二三九血氣醋湯夜

啼溫水一丸瀉生熟水血痢地榆湯白痢乾薑湯

化涎薑湯一切氣薑橘湯

茅先生抹唇膏

蟬殼去足 燈花二 朱砂

末遇夜雞冠血調抹兩唇夾朱砂膏

錢乙燈花膏

燈花一顆塗乳頭令吮燈草灰亦得

當歸散治腹痛面青手冷不吮乳

當歸 白芍藥 人參各一分 甘草各半

桔梗 陳皮各一分

散半錢水煎時時服有熱痛啼不止面夜赤唇焦

小便黃赤人參湯下三黃丸實熱

張渙嬰兒歲寒稟弱或多顛解面青白遇夜多啼甚

者煩悶狀若神祟萬全散

沉香 丁香 人參 五味子

幼幼新書 卷七 附子炮

當歸焙 赤芍藥 白朮各半 桂心一分

細末一錢淡探水一盞煎五分時滴口中

寶鑑紅桃散治體熱夜啼不乳

天南星二個中作窩入朱砂滿洗色變止

全蝎半 白附子大者 膩粉一分

研服一字薄苛金銀湯下

萬全五味子散治夜啼及腸痛至夜輒極狀似祟

五味子 當歸微炒 赤芍藥 白朮各半

茯苓 陳皮 桂心 甘草各一分

散一錢水一盞煎五分去滓量溫服

劉氏鬼箭末半錢朱砂一字薄荷汁下

吉氏朱砂膏治諸驚夜啼

朱砂 人參 白茯苓 甘草各一錢

腦麝許各少

細末蜜丸如皂子金銀薄荷湯化

安神散亦治驚啼

茯苓兩一 犀角 雄黃 人參

車前子各半兩

幼幼新書 卷七 羊

細末桃仁湯服一錢

睡洪散

佛花另陸羅花三朵 乳香 朱砂各一錢 麝

細末或半錢一字紅酒調服

千金姪娘時思所飲食物哺兒

外臺日未出及午時仰卧于臍上橫文中屏氣朱書

作血字

陳箴器井口邊草着卧席勿令母知日華子猪案內草烏雞翼

秘錄馱帶懸戶聖惠荒井中敗草

聖惠符三道

屨鬼印貼左印右手

甲貼臍中

衛貼房門

荒井中草并乾牛糞或燒安女席下勿令母知

嬰孺女脫上衣着中衣跪宅四角曰西方白帝東方

青帝南方赤帝北方黑帝中央黃帝氣斷某甲夜啼

荷恩之日奉還酒脯隨意所用還法安五畔置中庭

四角四畔中央一畔恐梓字 啓穎瞻五帝說曰今日奉

還隨意所咒謝之

劉氏寫若以色見我以音聲求我是人行邪道不能

幼幼新書 卷七 廿一

見如來燒灰吞之男左女右

寶鑑灸幼宮三壯又中拈甲後一分

萬全上燈啼雞鳴止者灸中拈甲後一分中衝穴一

壯炷如麥

幼幼新書卷第七

幼幼新書卷第八 驚潮狂困 凡九門

後學古吳陳履端于始輯

太倉吳之彥世美校

驚候第一

形證論肝藏驚風非時眼上窺手脚冷腎藏驚風齧齒面赤脾藏驚風夜啼日多睡心藏驚風心熱四肢逆冷肺藏驚風口內熱喘出氣細微五藏驚邪皆驚風傳受緣初驚涎在鬲上不發或涎潮藏府入驚邪也日久不醫致邪入心肺或傳肝脾等今具于左

幼幼新書

卷八

一

驚邪入脾令非時噴乳嘔逆番吐不思乳成慢驚

驚邪入心令非時面赤惡叫四肢緩慢成慢驚

驚邪入肝令眼上番多白睛引飲成驚癩

驚邪入腎令忽然面黑惡叫咬人驚啼

驚邪入肺令夜多虛汗狂言亂叫或下利是虛驚

患眼日多睡虛汗驚氣納脾喘氣微細驚氣傳肺無

故咬乳驚氣傳腎非時睛甲驚氣在脾夢裡咬牙驚

氣在骨夜啼至曉驚氣傳心面非時紅赤驚氣在心

上喘喫水驚氣在肝惡聲啼叫驚氣在腎前後心及

四肢熱驚氣傳脾欲吐瀉凡驚切忌爪甲青黑吐白虫血瀉下啼叫無淚與眼直半開半閉兼咬人時復鳴聲

胎驚第二

張渙兒在胎藏府未具神氣微弱動靜喘息莫不隨母母調適失宜食飲不節喜怒不常坐卧當風犯酒房勞一切禁忌致生兒形弱頭顱開解或乳食失宜洗浴當風令壯熱吐衄心神不寧手足抽掣身體強直眼目開張名胎驚

幼幼新書

卷八

二

石壁經歌

未出胎中一月來母驚成患子臨胎腰直哭時

先口撮面青拳搐縮雙腮眼閉咬牙筋脉急氣

時若陰氣弱胎易驚落肉消甚陽氣弱胎難驚

落手足細肌肉瘦皆不盡天年若日月滿因驚

汗次治驚調氣乳母服調氣藥兒貼鰓任喚千

聲眼不開退却風涎為治療涎去驚邪自不回

失治則目瞑先治驚則吐瀉秋夏必脾風初見

急慢驚門 顛顛治胎驚及癩或心熱牛黃丸

牛黃	龍齒	馬牙硝	鐵燭粉	各一分細末蜜丸如梧子乳食前調一丸下母忌口	張渙聖星丹諸癩皆宜
天南星	一般大四十九個端午取活蝎四十九個	瓦礫	盛鹽泥固濟	帛靜室中臘日將蝎蜇南星酒	浸一宿焙研細末次用
牛黃	麝	龍腦	各一分	辰砂	飛一分
載研勻薑汁和桐子大服一粒至二粒	人參薄荷	切切新書	卷八	湯化下	白金散
又諸癩潮	發不省	白僵蚕	半兩湯洗炒微黃	搗羅次用	天竺黃
牛黃	錢一	麝	龍腦	各半	細研服半錢薑汁調溫灌
烏金膏	又胎癩	烏梢蛇	一條肉酒	浸一宿焙	蚕紙
一張	單殼	蝎全	朱砂	飛各	金箔
片廿	龍腦	麝	各半	錢	

細末研勻蜜和如皂子人參薄荷湯化一粒	天南星	煎	又胎癩潮	發邊者	天南星	炒	白附子	白花蛇	酒浸肉炙	各一兩
乾蝎	炒	天麻	各半	搗羅好酒兩大盞慢火熬不住攪酒盡為度次用	朱砂	飛半	膩粉	一分	牛黃	麝
龍腦	各半	細研入膏內和如皂子服一粒不時竹瀝化下	祛風散	又胎癩	多啼	胡黃連	兩半	全蝎	犀角	天竺黃
切切新書	卷八	細末半錢入麝一字乳汁調下	鐵粉散	驚風而赤口乾	大便不利尤宜	鐵粉	兩半	鬱金	牛黃	真珠
胡黃連	各一分	各研拌勻服一字溫蜜湯調下	羌活膏	又胎癩	昏	羌活	困不省	獨活	各一	天麻
全蝎										全蝎

人參 白僵蚕炒各一兩烏蛇肉一兩酒浸

搗羅蜜和膏服阜子大麝香荆芥湯化下

麝香膏又胎癩

麝 牛黃 白附子 蚕蛾炒

白僵蚕微炒各一分 全蝎廿一個

並未更研細蜜和膏如阜子服一粒人參荆芥湯化下

孔氏治胎驚涎盛不乳

半夏一枚灰火內炮黃研細薑汁九如粟乳汁下

一九無時

王氏如聖消驚丸治母驚憂喜怒舉動驚胎致生兒

饒驚悸眼睡不穩精神恍惚搖頭上視温壯多睡反折啼叫口眼相引

羚羊角 犀角 麝各一分 膽星四兩

天麻 人參 白茯苓各一兩 白僵蚕炒

全蝎各半兩 朱砂錢一兩三錢半 龍腦錢一

細末蜜丸一兩作八十九一加牛黃一分服一九

麝香湯化下兒小塗乳上服消一切驚癇

驚熱第三

聖惠兒血氣不和熱實在內心神不定故發驚甚則

掣縮成癇變蒸亦微驚熱甚所致

顛顛牛黃丸治驚熱入心擬成癇面色不定啼笑不

出潮熱無度不喫乳食大段眼翻露白手足逆冷呼

喚不應 牛黃 大黃 獨活各一分 升麻

琥珀 菘豆 大麻仁各半兩

研細蜜丸如梧子空心熱湯下一丸頓服食後載

外臺虎睛丸療眠不安驚啼不乳

犀角十二分 子芩五分 梔子仁

大黃各十分 虎睛一枚 聖

搗篩蜜和如梧子服七丸大小量之乳母忌熱麵

風癇熱乳汁或竹瀝研三丸服差為度百日以上

增

聖惠牛黃丸治夜啼多驚煩熱

牛黃 朱砂 薑黃 麝

龍齒	當歸 <small>微炒</small>	赤芍藥	釣藤
蝸牛 <small>麩炒</small>	代赭	牡蠣 <small>燒粉各一分</small>	白僵蚕 <small>兩半</small>
擣羅研勻蜜丸如麻子百日内薄苛湯下三九半			
歲外五九連夜三服量兒			
釣藤散	鮮殼 <small>微炒</small>	馬牙硝	黃連
甘草 <small>炙</small>	川大黃 <small>微炒</small>	天竺黃	
等分羅散服半錢水一盞煎五分去滓不時溫服量加減			
天竺黃散治驚熱煩悶	甘草 <small>炙</small>	川大黃 <small>微炒</small>	馬牙硝
藿香	膩粉 <small>各一分</small>	蒲黃 <small>兩半</small>	
羅散不時湯調半錢量兒			
龍腦散治驚熱心煩不睡	麝 <small>各半</small>	甘草 <small>炙</small>	牛蒡子 <small>微炒</small>
龍腦	馬牙硝	鬱金 <small>各一分</small>	牛黃 <small>兩半</small>
梔子仁			
羅散不時溫薄苛湯調半錢量兒			
茯神散治驚熱煩燥手足抽掣心悸			

茯神	龍齒	川升麻	犀角
石膏 <small>飛</small>	寒水石 <small>各半兩</small>	牛黃 <small>分半</small>	
羅散不時竹瀝調下半錢量兒			
牛黃散治驚熱客忤煩悶			
牛黃 <small>兩一分</small>	麝 <small>兩半</small>	雄黃	朱砂
子芩	梔子仁	人參	川大黃 <small>微炒</small>
甘草 <small>炙</small>	肉桂 <small>去粗皮各一分</small>	龍腦 <small>兩半</small>	犀睛仁 <small>對</small>
羅散更研不時薄苛湯調半錢量兒			
鐵粉丸治驚熱化涎除煩渴			
鐵粉 <small>兩半</small>	牛黃	朱砂	黃芩
人參	川大黃 <small>微炒</small>	犀角	甘草 <small>各一分</small>
金銀箔 <small>各卅片</small>			
細末蜜丸如菉豆不時薄苛湯化三九量兒			
鎮心丸治驚熱煩躁多渴少睡			
牛黃	麝 <small>各一分</small>	金箔 <small>卅片</small>	銀箔 <small>卅片</small>
龍齒 <small>兩一分</small>	犀角	川大黃 <small>微炒</small>	茯神
子芩	馬牙硝	天竺黃	朱砂 <small>飛各兩半</small>
羅末蜜丸如菉豆不時竹瀝研三九以意加減			

犀角丸治驚熱鎮心

犀角 川升麻 子苓 龍齒

鐵粉 麝香各半 蚺蛇膽 牛黃各一

羅末軟餅丸如菜豆粥飲下五丸量加減

青黛丸治驚熱喘粗腹脹有食壅滯不消

青黛 木香 續隨子 麝香各一

蝦蟇一個 檳榔一顆

羅末糯米飯丸菜豆大溫水化一丸水不犯鐵甚效

切切新書 卷八 九

真珠丸治驚熱口乾煩悶卧不安及變蒸諸疾

真珠 牛黃 雄黃 龍齒

犀角 朱砂飛各半兩 麝香二錢 金銀箔

研如粉糯米餅丸菜豆大不時金銀湯下三丸

真珠丸治驚熱化積滯乳食隊痰涎利大腸

真珠 天竺黃 朱砂各一分 雄黃

丁頭代赭 麝香各半兩 杏仁三十粒 麝香

巴豆十粒去皮油煎

細末蜜丸菜豆大薑湯下一丸三歲以上加

保童丸治驚熱及疳氣

牛黃 赤芍藥 甘草炙

牡蠣燒 犀角 熊膽各一 麝香

杏仁炒各半 虎睛一對 真珠 朱砂飛各

薑薈 胡黃連各半

搗羅更研蜜丸菜豆大溫水下三丸量加減

龍膽丸治驚變癇

龍膽 龍齒各三 牛黃一分

搗羅入麝二錢蜜丸如黍不時荆芥湯下五丸

切切新書 卷八 十

博濟真珠丸治驚熱有痰及多溫壯夜卧不穩喫食過多

天南星 半夏 膩粉 滑石各一

巴豆廿四粒去心 膜水浸一宿

研巴豆熟次入衆藥糯米粥丸菜豆大隨年歲服

瀉痢米湯取食葱湯膈上有食即吐在中腕瀉驚

悸薄苛荆芥湯下

靈苑牛黃膏退夾驚積熱心悶煩躁赤眼口瘡壯熱

大小便秘或生瘡癬效嗽頑涎睡卧驚叫手足搐搦

急慢驚風渴瀉等疾

牛黃

朱砂

雄黃

黃芩

山梔仁

苦蕒根

白藥子

甘草

天竺黃

馬牙硝

鬱金

腦子

川大黃

麝

腦子

錢

搥羅白沙蜜鍊熟搗為錠服黑豆許量兒金銀薄苛湯下

桃紅散壓驚治風化痰解傷寒退驚熱

半夏

水浸夏至前五日浸至秋后五日日一換待自成分膠乾細羅取二兩

龍腦

朱砂

石膏

飛兩

細研服一字薑湯調下

至寶膏

生犀

生瑤瑁

琥珀

牛黃

朱砂

雄黃

金銀箔

龍腦

麝香

安息香

酒浸重湯煮成水

淨一兩熬成膏

藥末入香膏內研杵丸如桐子新甕器盛項急中

風陰陽二毒傷寒卒中熱暈卒中惡產後血暈迷

悶及諸疾疫毒山嵐瘴毒卒暗風胎死不下悞中

水毒平氣絕中風不語夢中驚歷童便薑汁煖化

下心肺壅熱霍亂吐瀉神昏不安頭目昏眩不卧

傷寒發狂積痰痞腫邪氣攻心兒驚風諸癩心熱

客忤人參湯化一二九大人三五九更童疾狀

醫局牛黃清心丸治諸風緩縱不隨言語蹇澀心忪

健忘恍惚去來頭目眩胃中煩鬱痰涎壅塞精神

昏憤又心氣不足神志不定驚怖悲感虛煩少睡喜

怒無時或發狂神情昏亂

牛黃

錢

金箔

麝

龍腦

犀羊角

犀角

乾山藥

雄黃

蒲黃

人參

神麩

桂去粗

大豆卷

阿膠

神麩

當歸

防風

黃芩

麥門冬

白芍藥

白朮

甘草

柴胡

桔梗

白茯苓

芎藭

杏仁

鐵半

白欬

乾薑

大棗

去皮核

研成膏

除棗杏牛黃麝金箔雄黃為細末蜜棗丸一錢一

研成膏

除棗杏牛黃麝金箔雄黃為細末蜜棗丸一錢一

研成膏

除棗杏牛黃麝金箔雄黃為細末蜜棗丸一錢一

研成膏

除棗杏牛黃麝金箔雄黃為細末蜜棗丸一錢一

除棗杏牛黃麝金箔雄黃為細末蜜棗丸一錢一

除棗杏牛黃麝金箔雄黃為細末蜜棗丸一錢一

丸金箔衣食後溫水化一九兒風癇酌用竹葉溫湯化

五福化毒丹治積熱驚惕狂躁頰赤咽乾夜卧不安譫語口舌頭面身生瘡癩煩渴

元參 桔梗各六兩 茯苓五兩 人參

牙硝枯 青黛各二兩 甘草半兩 麝香半錢

金銀箔各八片

細末煉蜜每兩作十二丸一歲兒一九分四服薄

苛水化下瘡疹后餘毒上攻口齒鮮血宣露致生

幼幼新書 卷八

十三

臭氣生地黄汁化雞翎掃口疳肌肉黃瘦雀目陳

米泔化食後臨卧服

辰砂金箔散治心膈邪熱神志不寧驚渴悸煩夜不

安卧狂語咬齒及痰實欬嗽咽不利

辰砂飛七兩 桔梗五兩 人參 茯苓

牙硝枯各兩 蛤粉飛八兩 甘草炙五兩 金箔廿

生腦子二兩

細末一歲兒半錢薄苛湯調下百晷內藏府多熱

卧不穩大便澀蜜湯調一字更量兒如喉痛口瘡

下 抹患處噤津效大人隔熱食後臨卧新水調一錢

牛黃膏治驚化涎涼隔鎮心祛邪熱止痰嗽黃

人參廿五兩 甘草五兩 牙硝枯十兩 蛤粉飛二兩

雄黃飛七十兩 朱砂飛十兩 生龍腦四兩 金銀箔各二兩

為百片

細末蜜和一兩八錢作廿丸一歲兒服菜豆大薄

苛湯化下量加減食後

席睛丸治驚風壯熱痰涎壅滯精神昏憤睡多驚啼

幼幼新書 卷八

十四

或搗日上視少

朱砂飛二兩 麝香 天南星 白附子並

天麻 天漿子微炒一百個 天竺黃 胡黃連

天麻 茯苓 天竺黃 膩粉各五兩

青黛七兩 史君子一百個

細末麵糊丸梧子大一歲一九薄苛湯化下量虛

實乳後服

金箔鎮心丸

紫河車二兩 人參 茯苓 甘草各五兩

山藥 <small>十五兩</small>	朱砂 <small>飛十兩</small>	牙硝 <small>兩半</small>	金箔 <small>廿片</small>
生腦 <small>兩一</small>	麝 <small>兩半</small>		
未蜜丸雞豆大金箔衣每半丸薄苛水化下			
嬰孺治驚熱欲發疹消熱定驚煎			
柴胡 <small>分十</small>	寒水石 <small>分十二</small>	升麻	梔子仁
芍藥 <small>分各七</small>	子芩	知母 <small>分各八</small>	竹葉 <small>升一</small>
杏仁 <small>分炒六</small>	鈞藤皮	甘草 <small>分各二分</small>	生薑汁 <small>合三</small>
蜜			
水四升七合煎升半入薑汁蜜慢火煎不住攪存			
一升二合一二歲服二合日再夜一冬夏過服			
錢乙治肝外生感風呵欠頓悶口氣熱大青膏發散			
天麻 <small>分一</small>	白附子 <small>分生錢</small>	朱砂	蝎尾 <small>去毒生</small>
烏蛇稍肉 <small>酒浸焙末各半錢</small>	天竺黃	麝 <small>各一字</small>	
青黛 <small>錢一</small>			
研細生蜜和膏服半皂子大至一皂子月中兒粳			
米大同牛黃膏溫薄苛水化五歲以上同甘露散			
服			
牛黃膏治驚熱及傷風溫壯瘡熱引飲			

雄黃	甘草	川甜硝 <small>各一分</small>	鬱金
腦子 <small>錢各一</small>	萊豆粉 <small>兩半</small>	寒水石 <small>生飛一兩</small>	
研鍊蜜和膏食後薄苛水化半皂子大			
五福化毒丹治熱驚涼心脾			
生熟地黃 <small>焙各五兩</small>	元參	天門冬	
麥門冬 <small>焙各三兩</small>	甘草 <small>炙</small>	甜硝 <small>各二分</small>	青黛 <small>兩半</small>
細研入硝黛蜜丸雞頭大食後水化半丸或一九			
萬全鬱金散			
鬱金	天竺黃	馬牙硝	鉛霜 <small>各半兩</small>
龍腦 <small>分一</small>			
搗羅熟酒調半錢服			
劉氏治驚熱驚瀉痰涎壅滯效嗽退壯熱方鎮心丸			
朱砂	雄黃 <small>通明者各一錢</small>	全蝎 <small>生七個</small>	麝 <small>各一字</small>
巴豆 <small>七粒出油取平二字</small>			
研勺白水糊丸粟大隨年數金銀薄苛湯常服二			
丸不時			
孔氏辰砂膏歷驚化涎理嗽利膈退風熱			
天南星 <small>炮</small>	辰砂 <small>各一分</small>	蝎梢	蠶蚕 <small>炒</small>

乳香錢各一 麝錢半

製末再研蜜和服量多少金銀湯或煎水化乳後

王氏雄珠丸治風邪驚熱躁悶

天麻兩半 防風 全蝎炒 蠶蚕炒各二分

甘草炙 牛黃 麝錢各半 雄黃

朱砂錢各一

末蜜丸雞豆大煎皂兒湯化半丸

吉氏治小驚熱

鬱金 黃連 甘草炮各二兩 蛤粉三兩

幼幼新書 卷八

蜜生一兩煉一兩和藥研更入腦麝各一錢熟酒

化入膏內服半阜子大薄苛湯化下

王允變蒸散治體性常熱及變蒸驚熱不解夾熱煩

躁時叫哭無歇及骨熱生瘡面色常黃瘦不進乳

柴胡 甘草炙 人參 元參各一兩

麥門冬兩半 龍膽草半兩若變蒸或常服用一分臨時加減

末水一盞煎一錢至三五沸溫服日三五常服去

疳骨蒸煩熱尤妙

驚積第四

茅先生兒忽身熱喘聲低夜睡驚腹裡物跳此驚久

不安牛黃膏隔熱 夾朱砂膏調理

玉訣歌烏犀膏取急慢驚門次調氣鎮心下涎

小兒驚積每因涎積熱肝心藏府傳哽氣面青

痰愈盛胃虛煩嘔利多般

石壁經驚風漸熱歌

漸熱多因積在脾瀉如白土又如胎朝來髮內

頻生汗次後多煩渴水啼若取轉虛其熱甚涼

心此患始相宜更看耳畔為形候赤者為風黑

幼幼新書 卷八

熱隨

積深故肚熱手足心亦熱又發驚候飲冷水多煩

躁夜多啼瀉豆沙狀失治則睡重手足搐搦頃分

水穀調氣旋去積次止渴發汗愈有風生銀丸熱金華散見急慢

驚門

水鑑犀角膏

犀角分一 天南星 乾蝎 白蠶蚕炒

鐵粉錢各一 巴豆三上 白附子生二 輕粉

麝許少

末研勻蜜丸黑豆大薄苛湯化

茅先生朱砂膏治驚熱驚積

朱砂兩半 鴉砂 馬牙硝錢各三 真珠錢一

元明粉錢二 腦麝各一

各研拌久自成膏如諸驚黃豆大金銀薄苛湯化

潮熱甘草湯狂躁惡叫生地龍自然汁月內兒調

塗乳頭令吮

博濟小朱砂丸治驚積鎮心藏化痰涎

朱砂分一 巴豆三十粒 杏仁五枚 熟灰內炮湯

切切新書 卷八 十九

半夏湯洗七次焙末抄二錢

研細麩糊丸菜豆大二歲一丸荆芥薄苛湯下兒

大量加有驚行藥出無驚藥不下妙而穩

靈苑朱砂丹治急慢驚風夜啼虛積痰毒

巴豆霜 乾蝎 天南星 朱砂錢各一

木鼈子一個炮

末蒸餅心丸菜豆大一歲一丸桃白皮湯溫吞下

石鐸經羚羊角湯

子苓 羚羊角

等分粗末二錢水一盞煎五分作二服未解加

鳳髓經金華散治一切驚風積實潮熱

鬱金阜角 天竺黃錢各一 牙硝煨 甘草炒各

朱砂半錢

細末半錢或一字薄苛蜜水調下

劉氏治驚積鎮心化痰涎一切無辜驚疾香犀丸

金銀箔各卅 羌活 遠志 史君子炮

京墨燒 全蝎 白附子 麻黃去根

犀角各三 青黛 滴乳 熊膽

切切新書 卷八 二十

蘆會各湯 朱砂 陳臘茶上好 天竺黃各

研極細蜜丸如彈子一九分六服薄苛湯化下

張氏治驚積及男婦血氣臍腹痛或有傷順氣丸

甘草煨 芍藥 官桂去粗 川當歸

蓬莪茂 乾薑炮 陳橘皮 宣連

川大黃濕布裹煨切焙 巴豆去皮醋五升銀器

等分末糯米粥丸如麻子常服三五丸茶湯溫酒

下要宣轉量虛實加至十九十五丸丈夫元氣炒

茴香鹽湯婦人血氣當歸醋湯胃膈不快或瀉利
薑湯小便淋瀝燈心湯兒驚積薄苛湯

莊氏治五驚積朱砂丸常服

朱砂

雄黃各二錢

麝香一分

檀榔一分

天南星

白附子各一錢

蝎梢七個

巴豆霜五個

水浸研无
上注盡

末白糊丸如粟一歲二丸常服荆芥湯下渾身熱
亦可三五丸

吉氏方治諸積或驚怯不通取積立下木香散

切切新書

卷八

廿一

木香一錢

陳皮去白二錢

巴豆五粒去
皮

炒巴豆黃只取五片只用前藥為末服半錢或一
字陳米飲調下吐瀉瓦瓶煎香附湯下量加減

烏犀膏治急驚風熱涎積一切驚積

京墨煨

水銀砂

犀角

輕粉

牛皮膠炒蚌粉

粉霜各一錢

朱砂半錢

滑石

白附子七錢

麝香許

巴豆世個針穿燈
上燒存性

細末蜜丸服阜子大或半豆大加減薄苛冷湯下
涎效

驚虛第五

形證論

長嚔嚔齒面青黃噎乳涎高胃氣傷啞哇饒啼
眠不得上竄氣急瀉偏黃風盛涎多應發搐變
異時時色不常退取虛驚無別候痰涎墜下病
何妨

此虛涎可下變涎丸次補虛勻氣如咬牙啼哭微
下數服通心行小腸藥痊宜安神散

變涎丸

切切新書

卷八

廿一

牙硝一錢

鵝砂

南星

粉霜各半錢

半夏十個

朱砂一分醋
煨

巴豆隨意同半夏朱砂
水煮七粒為膏用

末阜角膏丸如菉豆服七粒至十粒取涎次補虛
凡有涎皆用

安神散治驚虛

人參

茯苓

朱砂各一錢

真珠半錢

甘草炙三寸

蟬退七個

麝香

犀角各少許

末薄苛湯下一錢又解夜啼

搐搦第六

錢乙論肝有風目連劄不搐甚身反折強直不搐心不受熱也當補腎地黃丸治肝瀉青丸凡病久皆引肝風風動而止頭目目屬肝風入目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連劄若熱入目牽其筋脉兩眦俱緊不能轉視故目直若得心熱則搐子母俱實熱風火相搏故也治肝瀉青丸驚熱門治心導赤散實熱門

幼幼新書

卷八

七

早晨發搐因潮熱寅卯辰時壯熱上視手足動搖口生熱涎項急此肝旺當補腎治肝

日午發搐因潮熱巳午未時發搐心神驚悸目上視白睛赤牙關緊口流涎手足動搖地黃丸補腎導赤散治心因心旺故

日晚發搐因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微斜視體似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺益黃散胃氣不補脾瀉青丸治肝導赤散治心

夜間發搐因潮熱亥子丑時不甚搐而卧不穩體溫壯目睛斜視喉有痰大便銀褐色乳食不消多睡不納津液益黃散補脾導赤散涼驚丸治心

傷風後口氣熱呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏驚熱門主之兒怯者多此病

傷食後身溫多唾多睡或吐不思食而搐當先定搐搥退餅子下之後服安神丸虛熱門

百日內搐血氣未實不能任風真者內生驚癇三兩次死假者外傷風冷頻發者輕口氣熱大青膏發散及塗顛浴法

搐稀者內藏發病不可救頻發雖用大青膏勿多服兒至小易虛易實多則生熱

幼幼新書

卷八

七

論發搐順逆云李寺丞子三歲自卯至巳搐目右視大叫哭錢曰逆也男為陽發右女為陰發右若男目左視發搐無聲右視有聲女發時右視無聲左視有聲因左肝右肺肝木肺金男目右視肺勝肝也金來剋木故有聲治法瀉強補弱心實當瀉肺虛不可瀉其候悶亂硬氣長出氣此病男反女故男易治于女使女搐目左視肺勝肝又病在秋旺肝不能任故哭叫當大瀉肺後治心續肝所以俱言目反右視者肝主目也凡搐者風熱相搏于內風屬肝故見于目用

瀉肺湯二日不悶亂知肺病退地黃丸三服后用瀉
青涼驚丸各二服以瀉心肝五日愈不妄治也使男
目右視未反剋金肝旺勝肺而但瀉肝若病在春夏
金氣極微當補肺烏可大瀉

論熱必數搖廣親七太尉潮熱數日欲愈錢曰七使
潮熱將安八使預防驚搖父怒曰勿言八使病錢曰
八使過來日午間即無苦次午果搖召錢治之三日
愈蓋預見目直視顯赤必肝心俱熱更坐石杌子乃
欲冷此熱甚也肌膚素肥盛脈又急促必驚搖言午

者皆心肝用事瀉心肝補腎自安

石壁經歌

多啼急搖更無偏吐瀉風傳氣不宣先受睡中

微有汗風隨先看眼中微有淚因胃氣盛乳食

氣粗眼急哭搖自當然面紅患在肺為差愛哭

心中怯聚涎臉有紅筋癩病作亂紋生指病應

傳看形定色須明雷靈藥除風不在言主氣粗

微涼胃氣次去驚散涎更看兩臉青或紫綠如

結螺疾未全效當調氣次治驚搖生魚刺紋是
先看孩兒面臉青次看背上冷如水陽男搖左

無妨事忽然搖右便驚人女搖右相猶可治搖
歸左畔不須聞更忌手心如小汗皺眉高腹豈

安全肝結在中心中病轉深

此受寒邪所致先調胃次發汗如背上復煖可治

更手中汗或臭氣或叫不止內釣不治

水鑑龍腦膏

生白龍腦錢一分 石腦油許少 水銀一分

末麪糊少許研熟藥器盛不透風丸菜豆大一二

歲服一丸量加金銀薄苛湯下乳香湯亦得

醫局太一丹治諸風驚癇潮搖口眼相引項背強直

精神昏困痰涎不利一切虛風

天南星炮 烏蛇酒浸肉乾 乾蝎少錢 白附子炮

半錢 麻黃去根 大附子炮 天麻各半

白蠶蚕 細末水一升浸三日寒食麵一斗拌作麵六月六

日合楮葉卷七日 逐片紙袋掛當風十四日可用

麵末一兩入

琥珀錢 辰砂飛六錢 雄黃飛三錢 甘草飛半錢

合研蜜丸雞頭大不時溫水化一九

譚氏紅龍散

龍腦許少 朱砂半錢 天南星五錢水浸七日換切晒乾

鉛白霜 龍齒二錢

研極細葱白金銀湯下一字治急慢驚及四時傷

寒壯熱唇口焦乾兩目翻露搐搦連三四服汗出

妙忌一切毒物

寶壽散

幼幼新書

雄黃 茯苓 馬牙硝 人參各一錢

朱砂飛半兩

末熟水下半錢一歲以下一字

大驚丸治驚風及癇搐搦涎潮目直不省人事錢氏

九多龍齒一字

朱砂三錢 蠟薑灰一錢 青濛石半錢 鐵粉

雄黃 蛇黃各一錢

末浸蒸餅丸梧子大服一九薄苛磨刀水送下此

治驚化涎兒歲府口齒腦胃柔弱慎銀粉藥

錢乙塗顛法

蜈蚣 牛黃 麝 青黛各一錢

蝎尾去毒 薄苛各半

研棗肉和膏新綿上塗勻貼顛四方出一拍許火

炙手頻熨百日兒可用

浴法

天麻二錢 蝎去毒 朱砂各半 麝一字

白礬 青黛 烏蛇肉酒浸焙各三錢

研細服三錢水三椀桃枝一握葉五七枚煎十沸

幼幼新書

溫熱浴勿浴背

備用麝香膏治諸風驚涎熱痰搐

麝 乳香 青黛各半 防風

朱砂 龍膽各三錢 甘草各四錢 龍腦

膩粉各一錢 天南星炮 墨半錢

研蜜成膏二歲兒服半皂子大薄苛湯化下

張渙大黃丸治驚風潮搐背強牙緊發歇不時

白附子 全蝎炒各三分 烏蛇肉酒浸 天麻酒浸

白蠶蚕直炒 朱砂各一兩 麝 雄黃

牛黃 真珠 腦子各一分 金箔卅片

天南星水浸三日 換慢大煮 一伏 昔切 焙 麩炒 一兩

研一兩日蜜丸雞豆大荆芥茶湯化一九

鳳髓經玩月散治搐搦直視

獨角仙一個對中切 二片 輕粉拌炙 大金蝎一個酒浸 制同上

左右各為細末各入細辛末半錢麝一豆大研各

收書左右二字記認搐搦中男左女右

張氏治肝經壅目直視手足拳攣寬筋定搐羌活膏

牛膝 羌活 蝎梢 防風

切切新書 卷八

天麻 人參 乾木瓜老者 當歸

紫蘇根焙 麝各一分 白附子 朱砂各半錢

除麝酒浸一宿來日慢火焙搗細入麝勻沙糖和

膏常服阜子大如筋急作搐及瘡子癩癧濃煎荆

芥湯化龍眼大先搐鼻後服不噴難治

莊氏治急慢驚搐搦定命丸

蝎七個 蘆會 熊膽 龍腦各半錢

瓜蒂七個 蟾酥一阜大湯浸 膩粉 牛黃各二錢

麝一錢 朱砂 蛇蛻燒 雄黃各一錢

研如粉薄麩糊丸如黍有驚倒流水化二九渣阜

孔良久噴搐定人行一二里更化二九灌常服一

歲一九臨卧金銀薄苛湯

王氏辰砂丹治驚夜啼潮搐

朱砂 天麻 南星炮 蟪蚕

白芷各一錢 牛黃 腦麝各少許

末粳米餅丸如桐子服一粒金銀薄苛湯化

大驚丸

蛇含個 天麻兩半 乳香一分 犀角半錢

切切新書 卷八

真珠錢 蝎梢卅九個 白附子二個 蓮心卅九個

細末粽丸雞豆大金銀箔衣薄苛湯磨下甚者乳

香湯送

丁時發惺惺散

孩兒搐搦漸加頻見母搥頭轉被驚忽爾發時

唇眼動面還土色救無因

白附子炮一個 蝎全卅個 輕粉二錢 蟪蚕直三個

白薑阜子大塊 鉛白霜一錢 蟬退全七個

末一字或半錢荆芥薄苛湯調服

丘松年乳香丸

白附子

白蟻蚕

天南星

半夏二味
薑制

琥珀

全蝎

薄荷汁浸一宿焙各二錢

白朮

人參

錢各一

烏蛇

酒浸肉半兩

真珠

朱砂各半兩

腦麝各一字

細末麵糊丸如梧子服一丸人參葱白湯化不時

毛林治驚風涎搐壯熱驚掣夜卧不安牙緊

麝

芫薺

羌活

天麻

當歸

膽星

半夏

湯浸七次薑汁煮一伏時各半兩

幼幼新書

卷八

十一

末糯米清糊丸雞豆大荆芥湯化一丸口噤擦牙

奪命散治驚風涎潮搐搦眼直喘急慢風

藜蘆

去鬚葱頭者

瓜蒂

各一分

赤頭蜈蚣

生一條去足

細末臨發筆管抄一字吹鼻孔

狂語第七

聖惠心者火也主于血神之舍兒繼積邪熱藏府瘕

滯令氣血不和心神煩亂故卧多狂語

犀角散

犀角

川升麻

黃芩

柴胡各三分

茯神

川大黃微炒

鈎藤

麥門冬焙

甘草炙各半兩

羅散一錢水一盞煎五分去滓溫服量加減

茯苓散治心熱多驚睡中狂語煩悶

赤茯苓

龍腦

黃芩

甘草炙

鈎藤

玄參

石膏各半兩

川升麻三分

麥門冬焙一兩

羅散一錢水一盞竹葉七片煎五分去滓量加減

犀角散治熱不睡多驚狂語

犀角

茯神

人參

天竺黃

朱砂

川升麻

麥門冬焙

葛根

子苓

黃耆

羶羊角

赤芍藥

甘草炙各一分

柴胡

龍齒各半兩

細羅溫水調半錢服臨時加減

黃連散治熱夜卧狂語煩渴

黃連

川升麻

黃芩

犀角

川大黃微炒

麥門冬焙

甘草炙各半兩

茯神三分

羅散竹瀝調服半錢日三四意加減

羅散竹瀝調服半錢日三四意加減

朱砂丸治心脈積熱黃瘦毛焦睡卧多驚狂語

人參 馬牙硝各半兩 腦麝各一錢 牛黃

天竺黃 麥門冬 犀角 茯神

升麻 子苓 甘草各一分 朱砂飛三分

羅蜜丸菜豆大不時溫水研五丸意加減

驚悸第八

聖惠心藏雍熱為風邪所乘邪搏于心則多驚不安不已則悸動不定

外臺療壯熱時氣驚悸并熱瘡出釣藤湯

釣藤 人參 蚱蟬 子苓各一分

蛇蛻炙三寸 龍齒四分 防風 澤瀉各二分

石膏兩 竹瀝合三

切水二升竹瀝同煎取七合細服差為度

茯神散

茯神 升麻各三分 龍齒 甘草炙各半兩

寒水石 石膏 麥門冬焙各一兩

羅散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合更煎

三兩沸量加減

人參散治驚悸情思不安

人參 甘草炙 犀角各半兩 麥門冬焙

龍骨各一兩 茯神三分

羅散服一錢水一盞煎五分去滓入地黃汁半合

更煎溫服量兒

遠志煎壯熱驚悸心神不寧

遠志 羚羊角 茯神 甘草炙

杏仁炒 紫苑 龍骨 防風各半兩

龍膽 蚱蟬去翅足 百合 牛黃

初物新書 卷八

麝各一分 川升麻三分 川大黃微炒一兩 酥三兩

蜜斤半 粗擣水三升銀鍋煎半升新綿濾滓入牛黃麝酥

蜜等柳篋攪慢火熬如餛飩合盛溫水服兩豆許

日三四量兒

鐵粉煎治熱多驚悸晝差夜甚象鬼神所着

鐵粉兩 牛黃一分 菖蒲三分 酥三兩

犀角 人參 茯神 百合

防風 川大黃 青黛 細辛

遠志	芎藭	麻黃 <small>去根</small>	薯蕷
甘草 <small>炙各半兩</small>	蜜 <small>半斤</small>		
搗水三升銀鍋煎半升新綿濾滓入酥蜜慢火熬			
柳篋攪如飴收斂合溫水調二大豆許服日三四			
牛黃丸治驚悸壯熱黃瘦髮立			
犀角	天竺黃	白附子 <small>炮</small>	茯神
黃連	羚羊角	防風	元參
枳殼 <small>炒</small>	甘菊花	人參	黃耆
甘草 <small>炙</small>	黃芩 <small>各一分</small>	牛黃 <small>錢一</small>	朱砂 <small>飛半兩</small>
切切新書	卷八		
羅蜜丸菴豆大淡竹葉湯研下五九日三四量兒			
天竺黃丸治壯熱驚悸不睡			
天竺黃	黃連	川大黃 <small>微</small>	牡蠣
黃芩	梔子仁	遠志 <small>各一兩</small>	
羅蜜丸菴豆大新汲水下五九量加減			
靈苑抱龍丸解一切熱化風痰治風癇驚癇陽毒狂			
躁及心熱驚悸夜卧不安胃膈壅痰厥頭痛心神恍			
惚服之心膈清涼精神爽快			
天南星 <small>生一斤</small>	朱砂	紫石英	白石英 <small>並</small>

犀角 <small>各一兩</small>	牛黃	阿膠 <small>炒如珠</small>	藿香
麝 <small>各半兩</small>	金箔 <small>五十片</small>	雄黃 <small>通明者水磨四兩</small>	
搗羅研如粉黃牛膽四十五個汁和九櫻桃大服			
一九鹽一捻和藥細嚼新水下膽汁少湯和			
多困第九			
博濟治久患轉瀉脾胃虛弱不進飲食眼澀饒睡脾			
困散			
天南星 <small>炮半錢</small>	冬瓜子 <small>相廿一</small>	生薑 <small>二片</small>	
採水盞半煎四分空心溫服			
切切新書	卷八		
保生蘭臺散治骨蒸勞熱骨肉五心煩躁或大病大			
下后多睡或全不睡			
烏梅肉 <small>焙一兩</small>	蛇黃 <small>二兩醋淬</small>		
未蘊汁調二錢下兒睡起不了了為神不聚此能			
收			
鳳髓經神白散治脾困冷瀉多睡嘔逆悶亂喉生涎			
神麩 <small>炙</small>	人參	茯苓	藿香葉
甘草 <small>炒</small>	黃耆 <small>蜜炙各一分</small>	白附子 <small>炮錢一</small>	大附子 <small>個一</small>
炮去皮尖			

細末紫蘇湯調半錢服

趙氏六神湯治因病氣弱或吐瀉胃虛生風精神沉困不思飲食時時欲吐養氣補虛進食

人參 白朮 白茯苓 山藥各半

綿黃耆各一兩

細末白湯點半錢服

鄭愈睡驚丸治驚風耽睡取下驚涎

龍腦錢半 朱砂錢三 京墨 青黛

盧會錢各二 史君子錢半 膩粉錢二 牛黃字一

初幼新書

麝字半 乾蝎個三 金銀箔各五片

末寒食麵糊丸如梧子五歲二丸薄苛湯化

幼幼新書卷第八

吳郡章禁之別

幼幼新書卷第九 驚風急慢 凡三門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周 向翰承校

急慢驚風第一

養生論古云陰陽癇今云急慢驚陽癇屬府治去溫藥陰癇屬藏治用溫藥寒溫藥須增損無失虫證與癇類學者別之

錢乙論陽動而速曰急陰靜而緩曰慢此陰陽虛實寒熱之別急驚由熱生風或因驚發自上挿涎潮搐

幼幼新書 卷九

搦體與口氣皆熱發定或睡起便了了此急驚證當

搦漸減時與鎮心治熱藥麝香鎮心拖龍取砂等一

二服熱定頃下痰熱利驚丸或大黃朴硝等 心神安自

愈

急驚搐不足畏但扶持不可擒捉蓋風氣方盛流入

筋脉或致手足拘攣慢驚雖靜乃危

萬全云身體壯熱忽四肢抽掣痰壅口噤名急驚身

體壯熱心神不安嘔吐痰涎睡中多驚乍發乍靜在

再經日名慢驚皆內有積熱外感風邪候有遲速故

驚名急慢

玉訣歌

面青呵欠即因驚嗽唯饒啼睡不盜上竄喘粗
頻發熱現乳腸虛瀉痢青

先除驚氣後退驚風次下驚涎方調氣乃安

水鑑睡驚丸

天南星大者一箇酒浸 乳香 水銀結成砂子

琥珀各一錢 牛黃 白龍腦各半錢 青黛三錢

細研入石腦油和丸如紅豆薄苛湯化一九服後

幼幼新書

卷九

二

表

睡覺頓安大人傷風薄苛湯茶嚼一九

王氏福銀丸治急慢驚涎潮發搐常服解心肺痰壅

不利

水銀兩一 黑鉛一分同 川巴豆醋煮黃

黃明膠一片慢火炙黃 百州霜兩二 香墨一

膩粉 蠟全 鉛白霜 青黛

牛黃各一

羅合研千百下米飯九菜豆大服五七九乾柿湯

下薄苛湯亦得更酌兒大小虛實利下青黏滑涎

效

醫局定命丹治急慢驚風天甲撮口潮發搐搦妳痼
壯熱昏塞

蟾酥乾一錢酒浸一宿 乾蝎微炒七枚 麝一字

天南星分一 白附子炮半錢劉張俱一錢 青黛半錢

細研米粥丸如菜豆別以青黛衣荆芥薄苛湯化

一九後困睡無疑先化半九滴臍中噴嚏差

大天南星丸治急慢驚風涎潮發搐目上視口眼相

引牙緊脊強精神昏塞連日不省

幼幼新書

卷九

三

膽星兩半 酒乳香 龍腦 牛黃各半錢

朱砂三錢 麝半錢 天麻 人參

防風各一分 乾蝎十四個微炒

細末杵勻蜜丸雞豆大不時荆芥薄苛湯化一九

量加減

譚氏奪命散治急慢驚風牙關緊急上視甲中脹時

發衆藥不治

乾蝎全一 大薄苛葉包麻線縛火炙香熟為末入

麝一字臘茶清調下更看歲數趙氏竹瀝下紀用

治陰陽癱手足抽掣病後虛風百種驚生惡證照
小蝎四十九個如法製金銀湯調三豆許三歲陪
之加麝牛黃少許佳

又方

朱砂錢 金頭蜈蚣 全蝎並隨多

末半字搗臯

白丁香錢一 膩粉一字薑汁和餅煨火炙

臨時和

木鼈子錢三 蜜陀僧錢二 水磨雄黃錢一

切切新書

並細末蜜水米泔調下

茅先生奪命散

銅青 朱砂錢各二 膩粉錢半 麝少許

蝎尾十四箇去針

末半錢薄荷臘茶清調下此治天釣臍風客忤卒
死撮口戴口木舌喉痺腫顯風壅吐涎後依證調
理

漢東王先生睡紅散治急慢驚風手足搐搦目瞪口
眼相引

烏蛇項下七寸酒浸一宿內炙黃一錢 尾製同

青黛錢二 蝎梢十箇炒 牛黃 鵝砂

腦子 水銀砂子 真珠錢半 麝字一

奎銀箔各十片 蛇黃燒紅醋浸三度 京墨 天南星

半夏並薑汁浸一宿各一錢

粗藥搗羅入麝等載研嬰孩半字半歲一字量加

金銀薄荷湯調下搗定用調氣觀音散單傷寒門再氣

粗發搗進雞舌香散搗搦門二三服

良方黑丸

切切新書

膩粉錢半 墨 白麩 蘆薈錢各一

麝 龍腦 史君子煨熟 牛黃

青黛錢各半

麵糊丸 梧子大薄荷湯研半丸要利一丸

保生方

芭蕉汁時時呷一兩口甚者五升愈

備用定命丹又治天吊臍風撮口搐搦妳癩壯熱

天麻 青黛各半 天南星炮 膩粉各兩

朱砂 白附子炮各兩 麝字二 蝎尾炮十個

研米飴丸如菘豆薄苛湯化一丸急驚水化滴臍

中啼即搗定

治急慢驚風搗搦日數十發搥頭弄舌

蛇蛻分一 牛黃錢一

水一盞煎蛇蛻五分去滓調牛黃頓服五歲以上

加

劉氏保生丹

天南星 白附子並炮 朱砂 麝各半兩

蛇黃四箇辰地上煨鐵色 楮葉汁塗却火

幼幼新書

卷九

六一

端午日三家粽尖丸如梧子竹瀝刷一丸服兼治

男孺一切疾薄苛酒嚼二丸張氏治卒中癱瘓手

足不隨頭旋眼暈口眼喎斜暗風五癩唯南星燒

石灰內炮裂出以水洒地盡蓋一伏時服藥後忌

動風物

張氏奪命丹又名通天再造丹

牛黃 蟾酥 辰砂 天麻

麝 烏蛇各一分 甜葶藶微炒 青黛各半兩

獨角仙一箇去足超 桑螵蛸 蝎各十箇

真腦子許少

細研獐猪膽汁丸米大急慢驚風天鈞新汲水煎

薄苛金銀湯化一粒如藥不下滴臍中噴噴立灌

下神

治急慢驚兼治一百六十種風身自搖動半身不遂

積痰昏眩瘡癬瘙癢

天南星皮炮去 膩粉半入藥半為衣 半夏心去 南粉各半兩

白殭蚕 乾蝎 麝各一分 龍腦錢一

無風處搗羅糯米粥冷丸梧子大溫酒嚼二丸如

幼幼新書

卷九

七一

急風口噤口面喎斜薄苛酒調葱管灌臍內汗出

口自開傷寒薄苛酒下二丸逡巡再服孺人血氣

產前後癱瘓並用當歸酒下二丸兒驚牛黃湯化

一丸

噎驚丸

牛黃 薑會 熊膽各三卓 朱砂兩子大

蟾酥十箇 龍麝半皂 雄黃五錢 全蝎半兩

白礬枯 防風焙 荊芥穗各一兩

細研粳米飴丸如芥子倒流水下一丸亦灌臍內

三次不嚏惡候也瘡疹倒歷或黑酒猪血各半雞
子殼化藥兩三九火內熱時時服重午取蟾酥最
靈

阜礬丸去風痰利胃次常服無痰疾

北礬 兩半如無
南礬枯

半夏 薑汁浸
一宿焙 天南星 切
濃

阜角水 浸一宿
煨火熬乾焙

白僵蚕 直各兩半
浸一宿半生

碾羅薑汁糊丸桐子大服十粒至二十淡薑湯下

如喉痺熱痛含化嚼薄苛新汲水衝下阜角水及

茶脚研一二十粒灌兒急慢驚皂角水研搗齒常

切切新書 卷九

服臨卧薑湯下

貼凹散

石燕 二個燒紅醋
淬乾為度

艾心葉 七個

朱砂 阜子
大

單麻子 七粒

研勻一錢薄苛汁調貼山根上口中睡著候臍尖

汗出安

神仙丸兼治中風癱瘓

朱砂 六錢一
錢衣 人參

沉香

全蝎 微

白僵蚕 微
炒 天麻 灸各
半兩

天南星 半兩
筒者炮

川芎 兩一 附子 一箇重
六錢炮 五靈胎 八錢 乳香 錢

白花蛇頭 烏蛇頭 個一 花蛇頭 頂後連皮
骨七錢

蜈蚣 二條和蛇頭
酒浸三四宿 牛黃 麝

腦子 沒藥 血竭 硃砂 各一
錢

雄雀 一個去腸內研砂
鹽泥固文武火煨

末好酒丸如彈子大人半丸兒一九分四服薄苛

酒磨下

王氏釣藤散治虛風化涎牙緊急慢驚

釣藤 人參 白茯苓 川芎

切切新書 卷九

蝎头 白僵蚕 炒 甘草 炙各
二錢 羌活

黃芩 天南星 半夏 二味
薑制

細末服半錢金銀薄苛湯調下

吳氏神妙丸

蛇退 全紋細者瓦
上燒灰半錢 人參 緊實者
一錢 麝 半錢

天南星 去皮
生五錢

麩糊丸菜豆大服廿九麝米飲下日午夜各一服

吉氏通頂散治急慢驚目上視搐搦牙緊喉有痰

藜蘆末竹管吹左右鼻孔甦服三黃散和氣

三黃散

大鬱金三個每個破兩邊入巴豆一粒線螺一個水一盞截阜角七條同煮乾一個濕紙裹火炮一個生用先焙鬱金為末研入巴豆服一字兒半字冷茶調下

安師傳

大南星一個剉中空入蝎一個朱砂一豆許傾所剉末在上甗裏煨熟來日去麵為細末冬瓜子廿四粒煎湯調半錢兒大水一盞煎二錢兩次服專

幼幼新書

卷九

十一

治慢驚乳香代朱砂皆妙

丁安中搐鼻散

赤脚蜈蚣一條溫湯浸軟竹刀切分左右蟾蜍一個六分左右各焙乾為末男用左藥搐右鼻孔女反是兩手搐通用

番柳散治驚風搐搦涎潮及風熱上壅咽喉不利

大黃炮

鬱金

阜角水煮
五七次焙

甘草炙

黃芩

桔梗

白僵蚕直

雄黃各一分

胡黃連錢一

法製末半錢麝香煎湯調服

鄭愈救生一字散治急慢驚搐搦涎盛目直視

乾蝎頭足去

蜈蚣中

雄黃錢半

腦麝各少許

細末一字濕生虫七個研汁薄荷湯調服不時忌一切毒物

勻氣散治急慢驚取轉了用補

丁香七

白朮

青皮

甘草各一分

荳蔻個一

幼幼新書

卷九

十一

末白湯點半錢服

治一切風不得用牛黃散

巴豆半

礬石一分

鬱金三分

末一字薄荷荊芥湯調服

班防禦治急慢驚天中搐搦癩一切風

鷓鴣一隻不去皮毛肚下取腸胃白礬斤許填滿

麻線縫鹽泥固炭火燒烟盡取出細研溫酒調下

二錢量兒

王氏灸兩足大指甲肉間三五壯須立灸效

急驚第二

巢氏兒血氣不和熱實在內心神不定故發驚甚者
掣縮變癇又變蒸亦微驚由熱氣所為微發驚以長
血脈大驚灸驚脈若五六十日兒灸驚更甚百日後
灸善

聖惠急驚風者由氣血不和風有實熱為風邪肝乘
干于心絡心者神之舍主血脈熱甚血亂則氣并于
血氣血相并又風邪所搏故驚而不安其候壯熱涎
壅四肢拘攣筋脈抽掣項背強直牙關緊急

幼幼新書 卷九

十一

錢乙論因聞大聲或大驚發搐發過如故此無陰也
宜利驚丸急驚因熱生于心身熱面赤引飲口中氣
熱大小便黃赤劇則搐蓋熱甚生風風屬肝此陽盛
陰虛下驚以除痰熱勿與巴豆及溫藥恐搐虛熱不
消也兒客熱痰于心胃雖不聞聲及驚亦自發搐
張渙兒心神多不定胞絡多積痰涎遂生邪熱若熱
盛于心外兼風邪使壯熱涎壅抽掣牙緊名曰急驚
風
石壁纒發急驚風歌

纒發驚風者握拳指大指內指外細項言陰內
陽外為順候掌內紅潤大指握男右女右搐宜
先用藥開關兩目下又將形候再重看噴嚏大
忌悶涎潮入肺結向心中不解痊男搐右女搐
膠粘當利膈去涎目開涎散速與涼心為治療
更當去驚調氣即止不然死解驚下藥始求安肱逆陰陽須用意疾時休用
意定知無命別人問

急驚歌

七日歸前被物驚七日内因驚作熱發驚髮直

幼幼新書

卷九

十一

喉乾瀉又青但看上唇微有汗次觀印內一云腹內
有青筋掌中有似桃花嫩怕物多涎聽有聲會

者鎮驚為妙手莫將風熱一般名

此外證先鎮驚次定渴化涎必痊雖兒氣實亦當
調胃方下驚勿過冷

李劉中云陽動而躁疾而速名急驚陰靜而緩慢而
遲名慢驚兒急搐得于熱淫肝勝表裏連運久而不
除肝風心火因熱相合二歲交爭其氣蓄灼一腎水
不能制二歲也又肝主筋及目熱則筋縮急而風乘

之則發搐風牽引則目上視有左右搐者以偏勝也
烏蛇蜈蚣等藥是治標而不治本錢用瀉青丸導赤
散此上藥也

聖惠天麻丸治急驚風四肢抽掣拘急壯熱或口噤

天麻 雄黃 天竺黃 麝

烏蛇肉 蟬殼 乾蝎 桂心

天南星 白芷 白附 膩粉

半夏湯洗七遍去滑各一分

生用搗羅研勻煮棗肉丸菜豆大不時薄苛酒下

幼幼新書

卷九

十四

三九量兒

犀角丸治壯熱驚悸卧不安手足跳掣胃膈多涎

犀角 牛黃 腦麝 天竺黃

天麻 天南星 白附炮裂 桂心

蟬殼 烏蛇肉 乾蝎 鈎霜

水銀 硃黃與水銀結砂子

並生等分搗羅再研蜜丸菜豆大不時薄苛湯下

三九臨時加減

定生丸治壯熱筋脉不利手足抽掣口噤面青涎壅

及疔氣攻肌體瘦弱

雀兒飢癩內有物者 蟾頭酥炙焦黃各一兩

豬牙阜角去皮子酥炙 天南星炮裂 蝎炒

瓜蒂 天麻各一分 烏蛇半兩肉酒浸炙 青黛

朱砂 腦麝 雄黃 牛黃

蜈蚣微炒 膩粉 曲頭棘針 熊膽各一分

藜蘆 半夏湯洗七次各半分

搗羅猪膽汁丸如菜豆先以溫薑湯研一九灌臍

內噎後薑薄苛湯化三九量兒

幼幼新書

卷九

十五

救生丹治搐搦涎沫身熱驚悸發歇不定

龍腦 牛黃 雄黃 朱砂

薑會 胡黃連 鈎霜 麝

天竺黃 曾青 真珠 犀角

乾蝎錢各一 金銀箔各五片 雀兒飢癩三七枚有物者

研末端午日合大蟾頭十枚取酥研勻入飢丸如

彈與黃稍蝎四十九枚同著碗內令蝎毒蜇藥候

毒盡放蝎重研勻丸如菜豆不時薄苛汁研一九

灌臍內男左女右候噎即以薄苛酒服二九量增

減

雄黃丸治急驚風抽掣牙緊頭熱足寒

雄黃

乳香

朱砂

牛黃各一

麝

白礬灰

鉛霜

熊膽

蝎梢微炒各 蟾酥半兩

末糯米飴丸菜豆大不時溫水化三九量加減

蝎尾散

蝎生廿

白附子尖生廿

臍粉錢一

附子尖生廿

半夏生廿

天南星生 烏頭尖去

切勿新書

卷九

十一

生各

羅末薄苛酒調半字百日内一字分四服或棗肉

丸如菜豆馬蘭叶湯下一丸臨時加減

定命丹

獨角仙去皮翅

蟾酥江豆

桑螵蛸一枚

天屎子七枚

犀角

牛黃

雄黃

天竺黃

青黛

朱砂飛

天南星

白附子

龍腦各半

麝

乾蝎梢

臍粉各一

並生搗羅猪膽汁丸如米溫水化一丸渣臍內

得嚏薄苛水化二九量服

牛黃丸治壯熱筋脉拘急腰背強硬時發搐搦

牛黃

麝

乾蝎炒

晚蚕微

波斯青黛各一

蟻微

蚱蟬微

足各

搗羅糯米飲丸如麻子一二歲兒薄苛湯下三九

量加減

鷓鴣丹治急驚口噤抽掣目直多吐涎沫壯熱

切勿新書

卷九

十一

天屎子有物者七

蝉殼十四枚

牛黃

青黛

麝

蟾酥各一

朱砂飛

防風

烏蛇酒浸肉炙

地龍三條

蚕紙一張

搗羅蜜丸如黍不時新汲水研下三九量加減

蟾酥丸治急驚口噤搐搦多涎悶亂

蟾酥

腦麝錢半

朱砂錢二

青黛錢一

白附子炮

乾蝎微炒各

搗羅猪膽汁丸如菜豆乳汁化一丸渣臍內嚏數

聲即以薄苛汁下一丸臨時加減

朱砂丸治急驚風痰口噤抽掣一有細辛桂心白僵蚕各一分

朱砂 犀角 鉛霜 天南星

白附子並炮裂 半夏湯洗七次去滑 乾蝎微炒各一分 烏蛇酒浸肉炙

黃三 巴豆七枚去油

擣羅一半用無灰酒一盞熬膏一半和丸如菜豆

薑汁竹瀝煖下二丸量加減

真珠丸治驚風搐搦或夾食腹痛面青或大小便不通

通

幼幼新書

卷九

末

漸

真珠 白附子 天南星各半兩 滑石

膩粉各一分 巴豆世粒去皮水浸三日曝研

研勻糯米飯丸如米百日兒葱白湯下一丸一歲

二丸量兒大小病虛實加減

虎睛丸治初生急驚客忤邪氣搐搦涎壅

虎睛一對酒浸炙 牛黃 青黛 膩粉各一分

麝半分 乾蝎七枚微炒

細研蟾酥半錢新汲水浸化如糊搜藥丸麻子大

初生乳汁化一丸百日兒二丸一歲兒薄苛湯下

三丸量加減

追風丸

川烏頭炮製 白僵蚕 乾蝎並微炒各一分 白附子

乾薑 天南星並炮裂各半分

擣羅煮槐膠丸如黍不時溫酒下五丸以意加減

宣風丸治驚風頭熱足冷口噤面青筋脈抽掣多痰

壯甚者宜

巴豆七枚去油 川烏頭一分去皮臍 白附子

天南星並炮裂 膩粉各一分

幼幼新書

卷九

末

漸

研細勻棗肉丸如黍不時薄苛湯下二丸以意加

減

又方

牛黃 麝 青黛各一分 硫黃各半分

巴豆三枚去油

末軟餅丸如黍不時溫水下二丸量兒

朱砂丸治急驚兼治心間涎

朱砂 砒霜各一分 豉三百粒 皂角一寸炙

巴豆十五枚去油

先研砂礪次入豉巴豆細研棗肉丸如粟一二歲
溫水下一丸吐瀉效

醫局牛黃金璠丹

牛黃二兩 雄黃飛百五 天南星 膩粉各廿

天雄炮十二 生龍膽兩五 金箔百葉

末蜜和錢半一丸治急中風身背強直口噤失音

筋脉拘急臯乾面黑壯熱汗出如油目瞪唇青心

神迷悶形體如醉痰塞胃膈喉如拽鋸新汲水化

灌一丸扶坐使藥行少頃薄苛汁灌愈體虛多涎

幼幼新書 卷九 十一

有風之人宜備急覺眼前暗黑心膈悶亂有涎欲

倒不及化藥嚼一丸新汲水下兒一歲服菘豆夫

薄苛汁化臨時加減孕婦勿服

錢乙惺惺丸解毒治急驚風癇潮熱及諸疾虛煩藥

毒上攻躁渴

臘日東行女猪糞燒存 蛇黃西山者燒赤

辰砂飛各 腦麝錢二 牛黃錢一

東涼水作麩糊丸桐子大朱砂衣二三歲溫水化

二丸初生一丸胎中百疾除食後

利驚丸

輕粉 青黛各一 黑牽牛生半 天竺黃錢二

研勻蜜丸豌豆大一歲一丸食後溫薄苛水下

金箔丸

金箔片廿 天南星炒 白附子炮 防風焙

半夏湯浸七次 雄黃 辰砂各一

生犀分半 牛黃 腦麝錢各半

細末薑汁麩糊丸麻子大服二三丸至一二十九

人參湯下慢驚去龍腦服無時

幼幼新書 卷九 十二

張渙已風丹

白僵蚕 乾全蝎 白附子各半 防風

天竺黃 鈞藤各一

細末蜜丸雞豆大服一粒至二粒點麝香荆芥湯

化下

銀箔丹治急驚伏熱潮發

銀箔片十 續隨子 青黛 蘆薈

胡黃連各一 麝錢一 研勻糯米針丸菘豆大服一粒至二粒薄苛湯下

量兒

席睛丹治急驚心膈夾痰

虎睛一對酒浸宿微炙

乾蝎

粉霜

青黛

續隨子

真珠各一

麝錢一

研細軟粳米餅丸如黍服五粒至七粒薄苛湯下

量加減

石僻經釣藤散

釣藤

天竺黃

犀角

蟬退

甘遂煨

甘草炙

幼幼新書

卷九

等分末金銀薄苛湯調服半錢日四

劉氏定命散治急驚手足抽縮眼倒妳不下

鬱金大者二箇生

蝎梢七箇

全蝎一箇

膩粉抄一錢

朱砂錢一

麝少許

巴豆七粒去油

末急驚痲疾未滿歲金銀薄苛湯服一字冷水亦

得服藥後吐涎煖處睡蓋卧汗出良久瀉一兩次

差

孔氏牛黃丸治陽證驚風

牛黃

片龍腦

熊膽

雄黃水磨各半

錢

麒麟竭

朱砂

木香各一

蟾酥

麝各一字

細末新粟米餅丸小豆大常服三九急病五九男

老女右新汲水磨灌臍內

王氏方

積猪糞

掘地坑深尺餘糞和清水攪澄取一茶脚許麝香

調服立醒慢驚勿用

鄭愈水銀丸治急驚諸藥不治者

幼幼新書

卷九

水銀砂子

黃蘗

黃芩各半

風化朴硝

天南星炮

青黛各一

全蝎十四個焙

研細入砂子浸蒸餅丸如米一歲服二九不時溫

薄苛湯下

聖惠灸前頂一穴三壯在百會前一寸不愈灸兩眉

頭及人中一穴炷如麥

慢驚風第三

聖惠兒乳哺不調藏府壅滯內有積熱為風邪所乘

入舍于心其候乍靜乍發心神不安嘔吐痰涎身體

壯熱筋骨不利睡卧多驚風熱不除變化非一進退不定在莨經時名慢驚宜速療

茅先生慢驚風者雙目上視雙手搐搦上喘喉中涎響乍靜乍發心神恍惚不記人事此驚橫心舍而成

有因吐瀉而成有患痢而成有久瀉痢後脾虛風邪乘虛而致急用小便和酒調睡驚膏一服須臾搐定

即吐青沫黏涎方甦進勻氣散二服和胃氣不喉有餘涎下朱砂膏驚積次日下醒脾散三服一胃氣不和

門鎮心丸兩服驚一切若伏熱不退下大附散三日內

安如背母握頭虛舌出口咬乳眼障淚出偏搐死

錢乙論慢驚因病後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻氣亦冷手足時瘳瘳昏睡露睛此無陽也菴蘇湯

主之凡急慢驚陰陽異證切宜辯治急驚涼瀉慢驚溫補又兒傷風冷病吐瀉謂脾虛溫補不已復進涼

藥又不已謂本傷風醫亂攻之因脾氣虛內不能散外不能解至十餘日多睡露睛身溫風在脾胃故大便不聚為瀉當去脾胃風則利止主宣風散後用四君子丸補胃亦有吐利久不差者脾虛生風而成慢

驚

論陰癇壞病云王氏子吐瀉下虛變慢驚其候睡露

睛手足瘳瘳身冷錢曰此慢驚與苦蕒湯其子胃實即開目身溫王疑不小便令利之而不利身復冷錢

曰利小便必身冷王曰身已冷錢曰不食胃中虛若利大小便即死久即脾腎俱虛當身冷自閉幸胎氣

實而難衰用益黃散和胃氣不史君子丸見未四服至午果能食然謂利大小便脾胃虛寒當補脾不可別攻

後又不語作失音治錢曰既失音何開目而能食又

牙不噤而口不緊也以地黄丸補腎虛寒然利小便致脾腎俱虛今脾已實腎尚虛故補腎必安治半月能言一月痊

茅先生死候歌

慢驚風候實難醫遍體昏沉壯熱時睡卧多驚心不穩手牽脚搐喘相隨在莨時多為此候速令下藥莫遲疑

玉訣慢驚靈風疾歌
長噎嚙齒面青黃現乳涎高胃氣傷風盛涎高

生搐搦瀉痢頻頻色不常

先調氣次退驚次下涎調藏府

石壁經慢驚將發歌

未發驚時先好睡睡中吐舌又捏頭面青靨髮

如針立風髓壯熱通身脚似鈎傷寒失治或母

熱或吐瀉又被風邪所苦漸多睡少汗不吐

乳作腥生氣息額中干顆汗珠涼通腸表汗兒

當差若取之時瀉不休

冷傷腠理不通蘊結未發先困面青頭額汗吐乳

幼幼新書

卷九

十一

腥臭先解表旋下後蚘蚋丸一切一二服肥大微

下次調氣安不退成慢脾風

正發歌

惡心繞作便生驚吐瀉頻頻氣上侵舌赤唇紅

雙眼閉捏頭髮直一如針此傷寒表發毒氣如

多吐或瀉不止失治則多困因裡發數日

驚悶生氣急搐雙脇口白生瘡命不任此候未

生宜早治涎潮肺腑更難禁若氣急兩脇微動

冷藥逼毒傷脾胃致白瘡滿口如

李嗣中云陰靜而緩慢而遲錢述得于大病之餘吐

瀉之後或誤服冷取轉致脾胃虛風邪乘之吐瀉不止

驚似搐不甚搐名瘳似睡而精神慢四肢口氣俱冷

睡露睛或胃痛而啼如鷓聲此危證是足太陰脾足

陽明胃表裏俱虛相合受病風溼所勝人以胃為本

胃水穀之海脾之大源乘納水穀清者為榮濁者為

衛脾象土居中州氣血循環以灌四旁今兒氣血未

定五藏方成復乳哺不調冷熱相搏致吐瀉久不差

脾胃虛風邪內乘故面青昏睡口鼻氣冷手足瘳瘳

幼幼新書

卷九

十一

或用鐵粉水銀龍腦朱珠之類是抱薪救火也故錢

用青州白丸金液丹量輕重忝分數二物合和米飲

調之以主脾胃候手足溫即漸減復投醒脾驅風藥

此錢垂教龜鑑也又慢脾亦類慢驚但不輕重亦脾

胃虛風邪乘也

聖惠龍腦散治慢驚心胃痰涎上攻喉咽如呀身體

壯熱筋脉拘急或發渴抽掣

龍腦半 雄黃 麝 蘆會

青黛 牛黃 天竺黃 朱砂

胡黃連 木香 丁香 熊膽

犀角 蝎生 膩粉各一

羅散研勻不時薄苛湯調半錢量加減

牛黃散治慢驚壯熱心煩發渴搐搦

牛黃 麝 雄黃 盧會

天竺黃 夜明砂炒微 犀角 胡黃連

白僵蚕各一分 乾蝎半 熊膽半 朱砂飛半

研散不時薄苛湯調下半錢量加減吹少許臍中

良

幼幼新書 卷九 驚風

牛黃丸治慢驚渴不止

牛黃 天竺黃 胡黃連 犀角各半

芎藭 人參 白茯苓 丁香

鈎藤 龍齒各一分 龍腦錢半 麝錢一

羅末蜜丸菜豆大粥飲下三九量兒

真珠丸治慢驚墜涎

真珠 牛黃 朱砂 雄黃

膩粉

各一分細研粳米飴丸如米一二歲兒薄苛湯下

一九日三量加減

以金丸治胃膈涎悶口噤發渴搐搦縱睡多驚

牛黃 麝 雄黃各一 犀角

朱砂 烏蛇肉炙 乾蝎炒微 水銀

天南星 羚羊角各一分 雀兒飴內有物廿十枚微炒

金銀箔各三七片水同研砂

天竺黃丸治慢驚搐搦

天竺黃 牛黃 麝 朱砂各一

龍腦 雄黃 蘆會 胡黃連

幼幼新書 卷九 驚風

膩粉 熊膽 丁香 木香

犀角各半 雄蚕蠶十四枚 金箔十四片

研羅蜜丸如菜豆不時粥飲下三九量兒大小加

減

天麻丸治慢驚風熱筋脉跳掣精神昏悶風涎不利

天麻 乾蝎生 防風 白僵蚕

白附子生各一兩 甘草炙 朱砂 雄黃

牛黃 麝各一分

羅入朱砂下四味研勻蜜丸菜豆大不時薄苛湯

化三九臨服加減

青黛九治慢驚癱熱多涎渴搗搗

青黛

牛黃

蝸牛黃炒

白附子炮裂

白僵蚕炒微

胡黃連各一分

烏蛇乙兩酒浸

白附子炮裂

乾蝎廿枚

朱砂飛半兩

麝錢一分

狗膽二枚

蟾酥柳葉大三片

朱砂飛半兩

麝錢一分

狗膽二枚

搗羅膽汁糯米飴九如米一二歲薄苛湯下三九

量加

丁香九治慢驚癱熱氣壯熱及乳哺減少

幼幼新書

卷九

十一

母丁香錢半

胡黃連

膩粉

蘆會

雄黃

牛黃

鉛霜各半

朱砂

麝

青黛

天竺黃

蝎梢炒微

白附子炮裂各一分

搗羅端午日粽尖丸如菉豆不時米飲下三九量

加減

朱砂九治慢驚四肢拘急心胃痰滯身體熱

朱砂飛

麝

天南星

白附子炮裂

梨

天麻

乾蝎炒

乾薑炮裂

巴豆去皮心油

牛黃一分

搗羅蜜九如黍乳汁下一九荊芥湯亦得量兒加

減

保命九治慢驚及天鈞驚熱

牛黃

青黛

朱砂

麝

乾蝎

白僵蚕

蟬蛻各微

白附子

天南星各炮

犀角

天棗子炒

天麻各一分

蟾酥分半

羅猪膽汁九菉豆大不時薄苛湯下三九水化

幼幼新書

卷九

廿一

活鼻內連嚏再服量加減

如聖九治慢驚精神昏迷涎逆上喉作聲口噤渴搗

搗

牛黃錢二

朱砂

龍齒

犀角

雄黃

人參

白茯苓

鈞藤

羌活各一分

麝錢一分

蟬殼微炒

甘草微炙

羅事肉丸如菉豆大不時犀角湯化下三九量加

減

七聖丹治慢驚面青口噤四肢拘急

朱砂 牛黃 羌活各一分 麝錢一

白僵蚕 蝎尾微炒各七枚 天南星炮裂半兩

羅棗肉丸如棗豆不時薄苛湯下三九量兒

烏犀丸治慢驚搐搦化涎

烏犀角 羚羊角 麝 薑會

雄黃 朱砂 牛黃 胡黃連

丁香 半夏溲水一升煮盡晒各一分 龍腦錢一

天南星一兩酒一升煮盡晒

羅研勻銚內火上化石腦油丸棗豆大不時溫酒

幼幼新書 卷九 廿二

化下一丸金銀薄苛湯亦得

龍齒丸治慢驚壯執手足拘急

龍齒 朱砂 白芥子微炒 水銀各一分

金銀箔各廿片 麝 阿膠炒熟

羅蜜丸如黍溫酒下三九意加減

萬靈丹治慢驚多涎腹脹發渴搐搦

牛黃錢一 麝 熊膽 暎粉

木香錢各半 朱砂分一 乾蝎微炒五枚 巴豆生二枚

白附子炮裂蟬殼七枚

搗研勻蜜丸如黍薄苛湯服三九量加減

犀角丸治慢驚搐搦煩熱

犀角 麝 牛黃 青黛

地龍微炒各一分 朱砂飛 防風各半 蚕紙一張

蟾酥半錢鐵上焙 天屎子炒 蟬殼微炒各二七枚 烏蛇酒浸肉炙

黃半

羅蜜丸如黍溫荆芥湯下兩丸新汲水先研一丸

澹皁中噎效量加減

幼幼新書 卷九 廿三

麝香丸治慢驚上膈多涎精神昏悶

麝 半夏溲浸七次去 白附子炮

牛黃各半 犀角三分 猪膽乾一 蟾酥大柳葉

片鐵 天屎子十枚

羅麩糊丸如黍一二歲兒五九未差頻服

天南星煎

天南星剉水二盞微火煎至半盞去滓煎膏 天麻各一

白附子半兩

羅入南星煎丸棗豆大三五歲薄苛湯下一九日

量服

博濟補虛丸

新羅白附子湯洗去皮

大半夏各一兩

二味白湯浸三日日換三度焙末薑汁二盞薑末

煮糊丸菜豆大溫黍米飲服三九

牛黃朱砂丸治慢驚搐搦及天釣似癇

牛黃錢半

朱砂錢一

蝎梢二七

麝半兩

黑附子三個

雄黃許少

巴豆肉一

粒燈

研如粉寒食蒸餅丸如蘿蔔子濃煎荆芥湯下一

幼幼新書

卷九

廿四

張

丸被蓋汗出如天釣搐搦開口不得者苦柳蒸蒜

入鹽同杵塗藥兒後心前蒸餅蓋用帛綵定更化

一丸八麝少許覺口中蒜氣渾身汗出若端午合

忌雞犬婦人前蒜上忌有餅字

如聖青金丹治體熱忽吐夜多驚啼荏苒不解或泄

或秘變慢驚或為疳疾等證定搐搦療疳病隊痰涎

鎮心神

龍腦錢一

麝

膩粉各一

香墨錢半

史君子兩個

燄燄

白麩錢三

青黛錢二

金銀箔各十片

研細瀉井華水丸雞頭大冷薄荷水化下一丸瀕

史更睡覺愈更進兩三服小驚急驚只半丸隨大

便下驚效

至聖來復丹此藥二氣配類陰陽均平有天地中和

之氣可熱可冷可緩可急治陰陽不調冷熱相制榮

衛差錯心腎不升降水火不交養男女老幼危證並

治邪熱炎上煩躁冷氣攻注痛膈痞寒熱不可忍腎

邪攻脅注痛不轉動霍亂吐瀉水穀湯藥不住大段

幼幼新書

卷九

廿五

表川

吐逆手足逆冷脚轉筋煖氣復生著熱煩躁昏塞旋

倒不省人事俱效若瀉痢赤白冷熱量惠淺深服非

時吐逆氣痞食飲不下服二十粒並早晨粥飲下甚

者三十粒輕者十五粒重稚十粒嬰兒三五粒新生

一二粒因驚成癇發渴成虛風作慢驚者三五粒慢

驚本非氣衰若已絕一時暫生終不救胃氣在雖困

無不救大人亦然但藏府病一切危急不識證悉治

五靈脂

青皮

硫黃

硝石盛文

武火清勿太過

燄燄

陳皮各二兩

太陰元精

石兩

末麵糊丸如梧子兒如麻子

茅先生睡驚丹

好青黛半錢次

全蝎二七

輕粉半錢

水銀錢一

川巴豆

七片湯浸肉又冷水浸一宿攤乾

棗肉四個研殺水銀星盡入藥研膏用單裹角周

歲丸○大量加減童便酒磨灌如牙噤口不開滯

臍口開便灌不久下涎便依形候次看病方用藥

回陽大附散退伏熱主慢驚下涎後復熱

幼幼新書 卷九

廿五

大附子炮

人參

前胡

桔梗各半

木香分

末半錢薑湯調服

錢乙蘇蘇湯

苦蕒根錢

白甘遂錢

慢火上同炒焦黃研服一字麝香薄荷湯調

溫白丸治脾氣虛困泄瀉瘦弱冷疴洞利及因吐瀉

或久病後成慢驚身冷癩癧

天麻生半

白僵蚕炮

白附子生

乾蝎去毒

天南星湯浸七次焙各一分

末湯浸寒食麪九菘豆大仍養寒食麪內七日養

便服日合成服三七九至三二十九空心煎薑末飲漸

加丸數

又治吐瀉或誤服冷藥脾虛生風成湯驚

大天南星錢一兩者一個

地坑深三寸許炭火五斤燒通赤入好酒半盞後

入南星炭火三條蓋定候微裂出剉微炒熟為細

末服半錢或一字量兒濃煎薑防風湯食前調

幼幼新書 卷九

廿五

釣藤飲治吐利脾胃虛慢驚

釣藤分三

蟬殼

防風焙

人參頂切去

麻黃節去

白僵蚕炒

天麻

蝎尾去毒炒各

甘草炙

川芎各一分

麝錢

細末二錢水一盞煎六分溫服量與寒多加附半

錢無時

羌活膏治脾胃虛肝熱盛生風或取轉過或吐瀉后

慢驚亦治傷寒

羌活

川芎

人參頂切去

赤茯苓

白附子	炮各半兩	天麻	兩一	白僵蚕	酒浸炒	乾蝎	去毒炒
白花蛇	酒浸肉焙各一分	川附子	炮	防風	焙		
麻黃	去節各三錢	荳蔻肉		雞舌香	母丁香	藿香	
沉香		木香	各二錢	輕粉	字一	玢珠	
麝		牛黃	各半錢	龍腦	字半	雄黃	
辰砂	各一分						

細末熟蜜劑旋丸如大豆服一二丸食前薄苛湯或麥門冬湯溫化實熱急驚勿服性溫也服無時古今論雞舌香或謂番棗核得乳香中傷折藥多切切新書 卷九

用之或謂母丁香即丁香之老者極芳烈古人含者正此治氣溫中最易辨

張漢烏梢膏治慢驚吐瀉後生風及心肺中風

烏梢蛇 二兩水浸去肉

天麻

白附子

乾全蝎 人參 半夏 湯洗七次 川附子 炮裂

天南星 炮 防風 各一兩 天楝子 微炒一個

吹咀酒浸二宿焙羅雄黃辰砂各一兩研飛焙同上藥拌入麝二錢生龍腦一錢研勻細糯米餅丸如黍七粒至十五粒金銀薄苛湯下效量加減

蝶蛸膏	治慢驚久不差	真桑蝶蛸	七個炒	天麻	兩半	蝎梢	
白僵蚕	直微炒	麻黃	去根節各一分				
搗羅次用							
朱砂	飛半兩	乳香	分一	鵝砂		麝	各一錢
龍腦	錢半						

研蜜和雞豆大金銀箔衣荆芥薄苛湯化一粒寧眠散治慢驚潮搐不得安卧

天南星 炮裂 人參 白附子 各半兩 乾蝎 廿一個

切切新書 卷九

赤頭蜈蚣 一條酒浸酥炙

搗羅次用

乳香 血竭 各一分

研服一字或半錢酒少許浸薄苛煎湯調下潮搐服之得眠驗兼服辰砂膏

辰砂膏治慢驚潮搐昏困甚者

大附子 粉霜 硃砂 各半錢 炮去皮臍當頂刻一孔入性燒存

天南星 炮裂 蝎梢 羌活 各一分

朱砂 飛半兩

細末煉蜜成膏和雞頭大眼一粒至二粒點入酒三兩點化

萬全保命丸治慢驚天鈞驚熱

牛黃 腦麝 青黛 朱砂

乾蝎 白蠶蚕 蟬殼各微炒 天麻

白附子炮 犀角 天南星炮 天漿子炒

黃去熟一分 蟾酥分

羅續猪膽汁和丸如菜豆薄苛湯下三九水化清

韋中連嚏載服量加減

幼幼新書 卷九 中

石壁經治慢驚先解表散

荆芥 杏仁炒各半兩 京芩錢二 麻黃去節

防風 甘草炙 赤茯苓各半兩

末一錢葱白三寸薑三片水一盞煎三五沸連二

服汗出避風

白朮炮 乾葛各一分 麻黃去節半兩

末荆芥湯下半錢服后忌衝風頭汗如水

治慢驚正發用治心煩噤惡

人參 甘草炙 木香 沉香

藿香 白朮各一分

末飲調一錢服

李安仁酒煎附子四神丹治慢驚及一切霍寒疾升

降陰陽順正杜邪消風冷痰涎散結伏滯氣通利關

節破痰敗凝澀奔衝失經之血接助真氣生續脉息

補腎不足利膀胱小腸秘精固氣定喘止逆歷煩躁

養胃氣療五藏虧損下虛上壅胃中痰飲臍腹冷積

奔豚氣衝上下循環攻刺疼痛脾寒冷汗中風痿痺

幼幼新書 卷九 四十二

精神昏亂霍亂吐瀉手足逆冷陰毒傷寒四肢厥逆

形寒惡風向暗睡卧乍靜乍亂婦人產後諸疾血氣

逆潮迷悶欲絕赤白帶下崩漏不止一應久新病難

辨霍實冷熱證用藥未效悉宜分別陰陽氣止便遂

安和不得已詳證服

水窟雄黃 雌黃 辰砂 透明硫黃

各一斤飛研燒藥合一個燒牡丹皮烟熏令氣醞

黑黃入藥低合口一指醋調臘茶作餅掩蓋與縫

平用赤石脂泥固濟合蓋覆炭火燒熱次加少火

令通赤漸添火氣小又勿令炭厚薄添至三秤得
濟漸去火冷入地坑深一尺好黄土蓋三日出研
約三十兩入

胡椒 華撥各七 赤石脂三 桂心六

附子 酒六錢以上者炮去皮臍末十二兩

九雞豆肉大恐藥乾留少酒膏輕病一丸重病二

三丸空心食前米飲下温酒鹽湯亦得吐瀉慢驚

米飲下有瘡冷宜久服勿多服覺熱渴加木香一

錢此忌

幼幼新書

卷九

甲子

文

張氏小續命湯治中風及脚氣痺弱不能轉側兼治

慢驚

麻黃 湯炮三 桂枝 甘州各半兩 防風 一分

赤芍藥 白朮 人參 川芎

附子 炮裂去皮臍 防已 黃芩各一分

劉如麻豆五錢水盞半煎一盞去滓入薑汁載煎

兩沸温服日夜各二若柔疾自汗去麻黃夏病熱

減桂枝一半春初冬去黃芩

羌活膏治慢驚虛風

羌活 獨活 人參 茯苓

防風 官桂 乾蝎全 硫黃

水銀各半 麝少許

末硫黃銚內鎔汁入水銀細研入藥再研鍊蜜為

膏服阜子大荆芥湯化下

莊氏軟金丹治慢驚有虛積

胡黃連 青黛 薑會 香墨各一

膩粉半錢 史君子五個 天屎子三個 麝字一

研如粉煉蜜丸雞豆大薄荷湯化一丸

孔氏睡驚丸

白附子 蟬殼各七 天麻 朱砂

大附子 裂 青黛 天南星 白礬湯浸

雄黃 全蝎去毒一 麝半錢 腦子一字

末入飛羅麩少許澹水丸雞豆肉大薄荷湯化一

丸

脾風膏解一切傷風及慢驚

天麻 酒浸一 朱砂 人參 川芎各一

乾蝎梢炒 龍腦各一 牛黃字一 麝字一

研煉蜜為膏服半阜子大荆芥葱湯化

慢驚脾風取涎

天南星末用竹瀝油調下喉涎自出

趙氏羌活膏治胃虛生風變陰痲夏齒肉蠕自澀饒

睡又瘡傷風壯熱寒壅風熱鼻塞呵欠精神不爽

羌活 獨活 天麻 川芎

人參 茯苓 直僵蚕 薄荷

全蝎 防風 細末煉蜜和膏服一阜子大荆芥乳香煎湯化

吉氏牛黃散治慢驚化涎

牛黃 朱砂 雄黃 天南星

金銀箔 輕粉 麝香

細末薄苛湯調一字服

醒脾散治吐瀉成慢驚

厚朴 草果 甘草 陳皮

人參 茯苓 白芷 末半錢冬瓜子湯調服棗湯亦得

末半錢冬瓜子湯調服棗湯亦得

萬安散治慢驚亦治慢

全蝎 朱砂 麻黃

生薄荷葉 白朮 各製細末入朱砂細研新生兒半錢周晬一錢量

加減日三金銀薄荷湯下

丁時發睡驚丸

夜啼多熱無精彩口沫涎生病不消除病莫過

靈藥治睡驚九子鎮三焦

青黛 蠶蚕 乳香 天南星

史君子 輕粉 鵝砂 蘆會

龍腦薄荷 巴豆 腦麝

末蜜丸○看兒大小金銀煎湯化下

鄭愈救生散治吐瀉成慢驚

全蝎 白朮 厚朴

附子 人參 末服一錢煎清水茹湯調

末服一錢煎清水茹湯調

末服一錢煎清水茹湯調

末服一錢煎清水茹湯調

末服一錢煎清水茹湯調

末服一錢煎清水茹湯調

聖惠灸尺澤各一壯在肘中橫紋約上動脈中炷如
小麥

幼幼新書卷第九 川上草堂刊

幼幼新書

卷九

四六

幼幼新書卷第十 驚釣噤病 凡十二門

後學古吳陳履端于始輯

九華仙史吳尚朴原初校

一切驚第一

漢東王先生論驚風可醫者十一

非時寫眼驚入肝肝主筋眼為外應受邪故眼搐而

赤非時寫眼糞必青

夢裡咬牙驚入腎腎主骨齒骨也齒痒及夜屬陰乃

咬牙

幼幼新書 卷十

夜啼至曉驚入腸小腸心之府心屬南方丙丁火驚

入小腸陰陽相剋日屬陽夜屬陰相剋故啼至曉乃

歌飛仙肝驚入肺

面青下白驚入膽肝屬木色青膽是肝府故面青下

白而知在膽必吐妳

氣喘吃水驚入肺飛仙肝作肝肺主氣被驚所折其氣即喘

吃水肺虛熱

面臉紅赤驚入心心屬火主血外應臉故赤

喘氣微細驚入肝喘肺也肝屬木肺屬金陰傷陽也

當驚青腫時手足搐治宜瀉肝

前後五心熱驚入脾胃脾俱象土胃主四肢脾之府驚入脾當吐後發熱不時

喉內如鋸驚入大腸大腸肺之府肺為諸藏上蓋又主氣入大腸上衝咽喉作聲響如無痰宜取驚積

無時乾嘔驚入胃胃在咽喉下主化水穀驚風入其中則痒而時時乾嘔宜調胃氣後下驚

睡中驚哭渴在三焦三焦無形只是脂膜睡着時被驚邪所干即驚起而哭日久自羞宜下驚

驚風不可醫者七
驚風爪黑不醫爪甲主肝絕血不陰則爪黑也

驚風瀉黑血不醫心主血為五藏主心絕不能榮血故瀉黑一日死

驚風多盜汗不醫汗主氣衛之所係衛絕不管氣故汗出不止數日死

驚風忽鴉聲不醫肺主聲絕則聲有出無迴三日死

驚風咬人不醫骨主齒絕則齒痒咬人約七日死從裏損出故遲

驚風眼半開半合不醫腎五藏根本外應眼眼黑腫絕則無光無力不能開閉腎屬北方首末其病從下上故四日必死

驚風口鼻乾黑不醫脾主津液絕則津液俱無兩日死在寅卯時木剋土也凡驚風身熱卧則驚叫不時

脾風多因吐得必有風痰急驚風者中外邪也慢驚風者虛積生也胎驚胎熱所為

楊大鄴論百日兒難養者為胃腸未整神氣微怯舉動多驚由在胎母多喫動風及黏滑肥膩之物炙煨

諸般肉等兼嗔怒不常言語高聲又交合時搖動百

脉或生時坐婆踈拙使口中不淨或帶風入四肢或浴當風包裹失度浮熱引惡物于脾胃漸流藏府毒

氣既得榮衛差牙初即頻頻吐哕腹脹呵來噴去腫裏虛驚或手足緩怠目帶上翻

保生論驚候數脈急驚者腎受驚也驚熱之氣流灌于

心為帝王不受搐搦既受搐搦便生風素問腎主驚便而兒面青是驚一次驚太陽左側青脉朝眼男青呵欠兒面青是驚一次驚太陽左側青脉朝眼男右二次驚山根脉青三次驚眼下臉連金匱有青三

慶青主睡中驚擲見人恐怖咬齒無時喉內有涎渾
身抽掣手足癱瘓吐食非時吐舌將手拏人多哭若
風熱甚驚痰流灌肝心二藏令目上視手足急搐惡
叫暴絕悶死名急驚若歲府虛薄驚涎灌心胞絡令
眼目緩慢手足微動喉涎響渾身不熱是慢驚
茅先生驚風候歌

驚風之候有多般說出根源見易難夢裡咬牙
驚入骨非時眼上病歸肝夜啼到曉聲無息面
黑兼青候一般前後心煩四肢熱面紅如血向

心間夜啼盜汗日多困氣粗吃水肺邪干惡聲
頻叫形多黑非時咬妳腎邪端口中氣喘眼直
視此是驚風仔細觀

死候歌

項軟多無力喉中似鋸枋面紅粧色見目暗杏
無光魚口開粗氣脚項直偏長嚙衣胡亂咬痰
血瀉于床白虫吐睛開還又閉渾身硬似殭十般
驚候病休用更思量

惠濟驚風肝絕歌

壯熱頭旋不舉頭目黃眼澀也堪憂有時呢妳
兼翻食四體如水痛入喉頃信本因驚患得連
綿日久更何求只因命盡歸泉路脉亂浮洪却
似鈎

養生說諸蛇骨牙皆大毒損性命蠶蚕去絲嘴剉炒
赤蛇蛻炙黃蟬蛻去土頭翅足焙蛇酒浸取肉焙蟻
螂去頭翅足炙焦蛇黃燒赤醋淬五七次蟻螂勿用
傷水者驚藥多用故載其說

水鑑牛黃散壓驚鎮心治風退一切病

幼幼新書

卷十

五

鬱金二個 果炮

甘草二錢

巴豆七粒 去油

半夏七個 薑汁

犀角

乾蝎一錢 各

白附子生去皮 雄黃

朱砂

末薄苛湯調一字服少入麝

斗門方治未滿月兒驚似中風欲死

新汲水濃刺朱砂塗五心神效

博濟方治驚食硬氣青黛丸

青黛

木香

荳蔻

檳榔各一

傷一

續隨子去皮

蝦蟆三個 燒

細末蜜丸菜豆大服五丸薄苛湯下
靈苑雄朱丹

雄黃 朱砂 麝 膩粉各半

白附子 半夏湯洗七次 天南星炮 川烏頭

附子各生去皮臍去 乾蝎 羌活 天麻

川芎 肉桂去粗皮 白蠟各一兩 木香

白鮮皮 烏蛇 花蛇酒製炙 巴豆淨肉薄苛

汁煮五七沸去油 末米粥丸菜豆大常服茶酒下三丸冷氣薑湯宿

切切新書 卷十 六

食不消橘皮湯大小便不通甘草豈淋酒急風薄

苛酒癱緩豆淋酒酒食傷薑湯元氣茴香酒血氣

荊芥酒或醋湯大腸秘澀薑湯白痢柘湯風眼淡

竹葉湯坐間便退頭風槐枝湯風疹蜜酒赤白痢

二空湯頭痛傷寒鹽湯赤痢甘草湯兒疳米飲風

眼古井水煎淡竹葉湯驚風薄苛乳汁下

牛黃散化風涎治積年心患諸癩風癩謬忘昏亂兒

驚風益精神開心志鎮驚消痰

牛黃 犀角 羚羊角 雄黃

人參 鵝沙 鐵粉 鉛霜

鬱金 膩粉 辰砂各一分 北礬兩

腦麝各半 金箔五十片 天南星入牛膽懸東北

末服一字兒半字薄苛湯調中風涎甚及心疾一

錢兒一字薄苛汁調臨時加膩粉半錢

朱砂散壓驚安魂鎮心藏退風熱一切驚風

朱砂 白附子各二錢 附子一個 天麻

乾蝎全 天南星 半夏湯洗七次去滑各一分

羅極細磁確收二歲下服半字十五歲加至一錢

切切新書 卷十 七

退驚熱風熱咳嗽喉中壅隘食後蜜湯調不問急

慢咬齒拗項翻眼氣粗搐搦冷茶調服良久吐風

涎或汗出差尋時便定有極發一上者良久再進

一眼疾定加牛黃少許薄苛湯調日三薄苛薑汁

蜜酒煮麵糊杵丸菜豆大薄苛湯下五丸量加減

忌動風物

醫局潤體丸治諸風手足不隨神志昏憤言澀口眼

喎斜筋脉攣急骨節煩疼頭暈恍惚健忘怔忡痰癱

及皮膚頑厚麻痺不仁兒驚癇

雄黃	辰砂 <small>飛</small>	牛黃	乳香
生犀	羚羊角	麝	沉香
木香	丁香	藿香葉	檳榔
肉苳菽	白蠶 <small>微</small>	蒺藜 <small>微</small>	防風
蔓荊子 <small>皮去白</small>	黑附子 <small>臍去皮</small>	麻黃 <small>去節</small>	白茯苓
白附子	桂皮 <small>粗</small>	晚蚕 <small>微</small>	芫荽 <small>各兩</small>
乾蝎 <small>微</small>	半夏 <small>水煎世</small>	川烏 <small>頭去</small>	白芷 <small>各兩</small>
皮尖 <small>炒黃</small>	白花蛇	天麻 <small>各三</small>	獨活 <small>各三</small>
各二兩	南番琥珀	膩粉 <small>各半</small>	珍珠
金箔 <small>六十片</small>	細末蜜丸	芡實大服	一丸細嚼溫酒下
治壯熱多睡驚悸	抽掣精神昏憤	痰涎不利及風濕	邪熱天麻防風丸
天麻	防風	人參 <small>各一</small>	乾蝎

白蠶 <small>炒各</small>	朱砂 <small>飛</small>	雄黃	麝
甘草 <small>各一分</small>	牛黃 <small>錢一</small>	細末蜜丸	如桐子服
治驚風壯熱多睡驚掣	精神昏憤痰壅	搐搦目視項	背強牙關緊軟金丹
青黛	麝	充墨 <small>燒</small>	膩粉
胡黃連	史君子 <small>各一分</small>	寒食麵 <small>七錢</small>	天樞子 <small>七</small>
研白麩糊丸	如小豆	金銀薄苛湯化	一丸五歲外
二九史量虛實不時	養生宣利熱毒涎并潮搐等	大驚丸	雄黃
鐵華粉 <small>三錢</small>	青礞石	辰砂	蛇黃 <small>各一</small>
研水浸蒸餅丸	桐子大薄苛煎磨刀水化	一丸服	利即止
嬰孺治五驚及身熱	龍角丸	龍角 <small>聖惠</small>	遠志
龍角 <small>龍骨</small>	牡蠣 <small>煨</small>	大黃 <small>各二</small>	黃芩 <small>分四</small>

末蜜丸二歲小豆大五九日再一歲麻子大癩入
牛黃一分

兒生七日後忽染口鼻青微驚胃中冷視物高生金
湯

生金黑豆大茯神 乾薑各一分 甘草各二分
水一升煮五合服棗大日五夜三

生下便喜驚亦治客忤

剪父母指甲燒灰并花水調一麻子大日三夜一
治溫壯服細辛湯下后熱不差口瘡兼驚黃芩湯

幼幼新書

卷十

七

黃芩分五 釣藤分三 蛇蛻一十 芒硝分一

甘草分二 大黃分四 牛黃豆大三粒

水二升三合煮升二合去滓下硝洋為三服

錢乙涼驚丸

龍膽 防風 青黛各三錢 鈎藤二錢

牛黃 麝各一錢 黃連七錢 龍腦一錢

研麪糊丸粟大溫金銀湯送三九至二十九

粉紅丸一名溫驚丸

牛膽南星四兩 朱砂半錢 天竺黃兩一 龍腦半錢

坯子烟胎錢一

牛膽汁丸芡實大眼一丸兒小半丸砂糖湯調
麝香丸治一切驚疳亦治急驚痰熱

草龍膽 胡黃連各半兩 木香 蟬殼去

蘆會 熊膽 青黛各一分 輕粉

腦麝 牛黃各一錢 瓜蒂三七

豬膽丸如梧子驚疳藏府或秘或瀉清米飲或溫
水下兒五七至二十粒疳眼猪肝湯渴渴猪湯

猪肉湯驚搐眼上薄苛湯化澹鼻中牙疳口瘡研

幼幼新書

卷十

十一

貼虫痛苦棟根或白蕪蕪湯百日大小便不通水

研封臍中虫候加乾漆麝各少許生油一兩點溫

水化凡病急研緩浸化虛極驚勿服

治驚疳百病及諸壞症太惺惺丸

辰砂 青礞石 金牙石各錢 雄黃一錢

蟾灰二錢 牛黃 龍腦各一錢 麝半錢

蛇黃三錢

研水煮蒸餅丸粟豆大朱砂衣百日兒一九一歲

二九食後薄苛湯化

張漢安心神鎮驚邪琥珀丹

琥珀 膽星 天麻 朱砂各一兩

白蠶蚕 白附子 白芷各半兩 龍腦一錢

研蜜丸芡實大人參薄芎湯化一丸服

惠眼鎮心化涎卧不穩驚叫或多虛汗虎眼丸

朱砂 白蠶蚕 天南星生一分

末麵糊丸如桐子服五七丸薄芎湯吞

大黃散

大黃 芍藥

幼幼新書

卷十

十一

等分末猪膽汁調貼顛

劉氏治驚和氣止瀉痢

白朮一錢蜜塗紙糊略炙 甘草半錢生熟各半 全蝎二個薄芎

葉包線懸竹夾炙焦

末驚金銀薄芎湯和氣止瀉痢米飲下

治兒百二十般難驚

天南星 青黛各三錢 麝香少 水銀赤豆

輕粉桃一錢 巴豆七粒去油

末煮麩糊丸如黍一歲至十歲生葱湯吞十九早

午晚宵各一服子女俱忌生冷菓炙烤淹葳花色酒肉又云百晷內五九荊芥湯月內三九蜜薑汁調日三俱空心有不安量輕重服

睡驚十寶丹

朱砂 輕粉 蘆會 青黛

京墨 寒食麩 腦麝等分 史君子比

一上陪 金箔十片

末寒食麩糊丸芡實大金箔衣臨卧薄芎湯化

治諸驚睡應丹

幼幼新書

卷十

十一

京墨 天南星 白附子 朱砂

雄黃炒一錢 金箔二片 腦麝各少許 青黛抄半錢

全蝎一個 輕粉抄三錢

末糊丸芡實大壯熱金銀薄芎湯微吐逆手足冷

喫食進退睡中忽叫乃心葳驚金箔湯下三五丸

卧人參湯更進一服時時瀉青木瓜湯下五七丸

治壯熱發驚痰壅脚手心煩躁夜啼常服壓驚天鈞

紅散子

川南星二兩 桔梗 大防風 白芷

乾蝎糯米炒焦各半兩

麝半錢

靈砂一分

腦子一錢

甘草一兩生熟各半

細研服一錢食後臨卧銀湯點吃

治驚涎盛手足欲動白附丸張氏治驚風天鈞眼睛搐掣名真珠膏又治涎潮心舍叫喚不應并夾驚傷

寒驚癇名人參丸

白附子生二個

天南星炮半兩

全蝎三枚

人參二錢

白蠶蚕七個

朱砂一錢

腦麝

乳香各少許

幼幼新書

卷十

十

末蜜丸芡實大卧時金銀薄苛湯服一丸

金箔鎮心丸治驚睡不穩喉中涎聲夢中狂叫精神

躁悶兼醒脾百日後睡不穩常服半丸

白附子一分

白蠶蚕七個

朱砂一分

腦麝許少

金銀箔各計半錢

細末麪糊丸芡實大薄苛湯臨卧服一丸或半丸

張氏琥珀丸治驚風温壯咳嗽涎壅驚熱孔氏邪熱多睡驚悸

天麻

人參

防風各一兩

甘草

全蝎炒

蠶蚕各半兩

牛黃錢一

朱砂

麝

雄黃各二錢半

末蜜丸梧子大二三歲服一丸薄苛湯化

莊氏退驚化涎七寶散

朱砂

生犀

牛黃

珍珠

腦麝各一錢

金箔五片

研如粉服半錢薄苛水調

孔氏神麪餅子治兒諸疾丙日作麪丁日治藥亦名

丙丁膏

天南星

烏蛇各三錢

天麻

麻黃各半兩

全蝎一分

白附子三錢

蠶蚕四錢

附子炮大一枚

末水一升浸三日布裂去滓寒食麪一斗和作片

楮葉罨七日紙袋吊起十四日治兒吐瀉後精神

困頓多睡四肢逆冷欲變驚麪四兩龍麝少許温

水調變癇鷓聲面青黃癩瘖咽不利加朱砂癇滑

利蜜丸芡實大温水化又麪末一兩雄黃朱砂少

許琥珀甘草二錢蜜丸名太一膏治兒百病

王氏遠志茯神丸治驚悸大啼及見異物動神恍惚

狂忘驚悸睡不穩多汗心冲精神闇鈍寒熱咽乾手

足煩熱

人參

茯神

遠志

菖蒲各二兩

末二兩加桂二錢半麵糊九蒸豆大食後荆芥湯

下十五九日二

吉氏朱砂膏

朱砂

馬牙硝

甜硝

甘草各一錢

鵝砂半錢

腦麝少許

末蜜丸桐子大薄苛湯化一九半九量兒

治驚癇暗風破傷驚涎心氣不足或久伏驚氣尸厥

幼幼新書

卷十

十六

昏昧涎雍因驚忘竟失魄舉動驚怕夢魘或歌哭不

避親疎狂走中風緩弱頑痺等兒慢驚朱砂膏

附子

平正緊實一個五錢淨半兩

大南星

淨一斤一天麻明者取心

半夏

自正中者湯浸七次生

琥珀各二錢

全蝎生一分

赤脚蜈蚣

公取中二寸

蠶蚕

朱砂各半兩

麝分

末蜜冷為膏密器收薑汁化一阜子大次温酒調

兒生薑薄苛湯下豆大更量兒

鄭愈扶神膏治驚風

蝎梢

茯神各半兩

蠶蚕一兩

朱砂

末蜜為膏服一阜子大金銀薄苛湯化

治驚涎壯熱搐搦卧不穩牙關緊蝎梢丸

蝎梢

朱砂飛半為衣

蠶蚕各一分

天麻

芎藭

羌活

半夏洗七次

當歸

膽星

麝各半兩

末糯米粥丸芡實大荆芥湯化一九口噤先擦牙

千金翼灸曲澤主心下澹澹喜驚陰交氣海大臣主

驚不得卧陰蹻主卧驚視如見星大鍾郄門主驚恐

幼幼新書

卷十

十一

畏人神不足然谷湯陵泉主心悚惕恐人將捕解谿

主癰瘕而驚少衝主太息煩滿少氣悲驚行間主心

痛數驚心痛不樂陽谷主風眩驚手撻厲兌主多卧

好驚腋門主喜驚妄言面赤神門主數噫恐悸少氣

間使主喜驚痞不能言三間合谷主喜驚陽谿主驚

癰通里主心下悸大陵主心中澹澹驚恐手少陰陰

郄主氣驚心痛天井主驚癰後谿主淚出而驚腕骨

主煩滿驚

聖惠睡中驚目不合灸屈肘橫文中上三分各一壯

炷如麥睡中驚掣灸足大指次指之端去爪甲如韭葉各一炷如麥名厲充穴

萬全方兒身強角弓反張灸臯上入髮際三分三壯次灸大椎下節間三壯炷如麥風病諸醫不差灸耳上入髮際一寸五分嚼而取之蟀谷穴

慢脾風第二

茅先生慢脾風候時時吐嘔頻頻咬齒手足掣癡舌卷頭低兩眼上視先頭低而次第高因久瀉痢而用冷藥止之不活得脾是以脾虛弱藏府乘虛也用勺

幼幼新書

卷十一

十一

氣散和門胃氣不和門一日後下一醉膏後活脾散夾鎮心丸

驚門一切健脾散常服即愈和門胃氣不和門若更喘吐五硬角弓死

王訣傷寒疹子庸醫未明表裏宣利藏府更使冷熱相通故發搐眼不倒脾困極不醒手足不收回陽醒脾方愈若更吐瀉必損命

茅先生歌

四肢逆冷體沉迷因宣吐瀉補還遲脾胃伏除涎擁肺心生毒熱面青時如此呼為慢脾候更

加喘嗽不通醫

慢驚傳慢脾歌

慢脾只因傷取轉吐瀉虛涎脾胃生四肢逆冷頻頻嘔沉困難醒豈易明唇紅目閉手足搐病行心藏及脾神醫者鎮心為上法更開關竅細詳論莫令加喘頭先軟眼白矇矇命不存

此驚風傳胃兼有虛涎大青丹門驚一二服搐臯散開關次醒脾散

慢脾將死歌

幼幼新書

卷十一

十一

驚入風癇傳在脾直眠不動臥如尸搐搦已休牽掣定為他要好不生疑便通大小難收乳遍體如水汗若泥眼目不開常似睡睡中不覺赴

幽期

慢脾侵肺歌

慢脾多睡重重取吐瀉傳脾胃轉虛逆冷四肢多重困虛涎脾伏盛難除生氣肺藏添邪擁任喚千聲氣不舒莫使目瞑兼項軟十中難保一人甦

活脾散

羊糞焙廿一個

丁香百一

胡椒五十粒

末半錢六年東日照處壁土煎湯調服

玉訣醒脾散

南星一枚去皮臍朱砂

白朮一分

末半錢麝少許冬瓜子湯調服生葱涎九如粟鴉

砂湯下十九後與調味散積熱

劉氏吐瀉生慢脾亦治久瀉胃虛餅

丁香五十粒

藿香一分

木香

韶粉

幼幼新書

卷一

十一

文

大附子炮各一錢

末薑汁搜餅芡實大水煮軟服急用散棗一枚煎

羌活膏治急慢驚風或吐瀉後脾胃虛傳慢脾

羌活

獨活

人參

白茯苓

肉桂

木香

防風各三錢

水銀

硫黃

全蝎各二錢

金銀箔各廿片

麝一錢

細末蜜丸黃豆大薄荷湯化服

張氏釣藤飲吐瀉虛作慢脾魚口目直不開睡不醒

釣藤

防風

麝

麻黃淨各一分

蝎梢

蟬殼各半

細末服一字至一錢量加薄荷湯入醋一澹調服

如四肢梢冷入附三兩片薄荷一葉水五分煎二

分連進二三熱服或吐瀉體冷多睡附半錢炮去

臍為末白朮一錢肉苳菹一個炙甘草一寸棗一

個水六分慢火煎三分溫服體暖煎四君子湯沉

香橘皮喫五六分更喫煖驚藥三二服乳母忌口

不得再驚

莊氏黑散

幼幼新書

卷一

十一

文

乾薑兩半

甘草一分

入磁合火煨存性過矣慢不為末服一錢濃煎烏

梅湯調更看男女加減須目垂面白紗

王氏萬安散已成慢脾者

厚朴水煎

白朮湯浸半日切

朱砂各一分

麻黃半分長直者熱湯浸軟薑汁浸半日

全蝎七個每個薄荷湯浸

表裏黃

細末與朱砂研千百遍服半錢或一字金銀薄荷

湯調微汗效凡欲作慢驚必先壯熱多睡頻吐不

定難治吐主金液丹研開細澀水丸黃米大朱砂
青黛衣服五十九不濟米飲下定吐救生丹

吉氏朱砂散

朱砂 天麻各一錢 蠶蚕 七個 天南星 一個

白花蛇 項下肉半塊 蜈蚣 一條 麝 少許

細末一字薄苛湯調

活脾散治脾困成慢驚

天南星 皮去 半夏 白附子 等分

末服一字至一錢冬瓜子七粒薄苛二葉酒少許

或入水煎

朱氏治久病或吐瀉生驚轉成慢脾蝎梢膏

蝎梢 新好者一兩

石榴開作窠去子無灰酒半盞調入蓋定坐文武

火上時時攪熬膏取出冷服一盞金銀薄苛湯調

急驚勿服

安師傳

附子 炮 木香 不見 生硫黃 半斤 肉豆蔻 洗

等分末冬瓜子四十九粒水六合煎三合入藥一

錢再煎一合頓服治身冷汗出至虛緩搐者
毛彬治胃虛吐瀉煩渴成慢脾銀白散

乾葛 人參 白茯苓 山藥

白扁豆 各半 半夏 一分 糯米 一合 薑汁 浸一宿炒

末二錢水八分薑二片煎六分溫服

鄭愈治胃虛生風醒脾散

藿香 人參 白茯苓 各一錢

天南星 一個重七錢去心入縮砂丁香各一錢 南星 心末封口慢火煨熟

末半錢冬瓜子煎三五沸溫服

慢肝風第三

形証論歌

孩兒眼澀羞明日春不宣兮夏不通秋被毒風傷

肺得次傳肝腎別尋蹤先調五歲患方退退得肝

風便有功蓋為小兒元氣壯此各立號慢肝風

肝肺相剋見日眼合未出月目腫或出血

甘膽湯

甘草 猪膽

末半錢米泔調服

驚退而啞第四

漢東王先生通關散

天南星炮末嬰孩半字量兒加獾猪膽汁調入喉便有聲

集驗方

木通

防風

川升麻

羚羊角

桂心各半兩

甘草一分

粗散一錢水一盞煎五分入竹瀝更煎不時量服

驚退筋脉不舒第五

幼幼新書

卷十

驚

漢東王先生治驚退汗不溜筋不舒不能行天筋散

茄種見霜者焙

附子炮淨各半兩

羌活焙一分

末五七歲半錢量加麝酒調服日三愈止

趙氏

羌活

芎藭

防風

天麻

當歸微炒

甘草各三分

白附子炮一分

細末一錢薄苛酒調服日三量加

天釣第六

聖惠天釣者由藏府風熱脾胃生涎心膈壅滯邪熱

蘊積不得宣通所致皆乳母酒肉過度煩毒入乳便

乳兒食宿滯不消心肺生熱熱盛風蕪風熱觸心藏

令心神驚悸眼目翻騰壯熱不休四肢抽掣名天釣

茅先生用奪命散吐風涎急慢驚門後用勻氣散胃氣不和門

醒脾調氣常服雄朱散驚癇夾鎮心丸一切驚門健脾散

和胃氣不 如眼視魚口鵝聲眼黑無光指甲黑死

聖惠龍齒散治天釣手脚掣動眼目不定笑啼嗔怒

瓜甲青其状似鬼崇

龍齒

釣藤

白茯苓各半兩

黃丹

幼幼新書

卷十

驚

甘草一分

鐵粉

朱砂

川大黃各炒

末一錢水一盞煎六分不時溫服

牛黃散治天釣眼目喎斜手足驚掣發歇不定

牛黃

乾蝎生各半分

木香一分

羌活

獨活

蠶蚕生

朱砂飛各半分

乳香大

細羅乾槐枝煎湯調一字不時量服

牛黃丸

牛黃

朱砂

釣藤各一分

蟾酥

麝各半

蝸牛十枚

研細糯米飯丸如黍不時水化二九滴鼻中即溫水下三九量加

治天鈞心胃痰癰攻咽喉作呀聲發歇多驚不得眠卧保命丹

乾蝎

蝉殼

蠶蚕炒各

天麻

犀角

天漿子內有物者

白附子

天南星並炮

牛黃

青黛

朱砂各一分

蟾酥

麝各半

幼幼新書

卷十

十一

末獭猪膽汁九菜豆大水化二九滴鼻中令嚏冷水服一九日三四量加減

蟬殼丸

蟬殼

蠶蚕

白附子

蚬螂並炒

蟻炒三枚

烏蛇製一枚

青黛

麝各一分

蟾酥錢一

末軟飯入獭猪膽一枚汁九如黍妳汁研一九滴

鼻中候嚏即薄苛湯下三九三歲加

朱砂丸治天鈞心神煩亂搖擗不定

朱砂

蠶蚕微

胡黃連

熊膽各一分

牛黃

麝各半

乾蝎二枚

末粟米飯丸菜豆大不時金銀湯下三九量服

治天鈞巖府壅滯壯熱搖擗保生丸

巴豆生七粒

去心皮粒

天南星一枚

蚬螂生五枚

晴明夜北斗下露一宿明旦為末豉四十九粒口

含脫皮爛研丸如黍隨年數溫水下

靈苑治感厥急風心邪驚癇及疔熱等歸命丹

蛇黃

四兩紫色佳

紙紙視

朱砂少半

鐵粉一兩

幼幼新書

卷十

十一

末獭猪糞餅二兩野放小硬乾者餅固齊燒煙盡冷研末糯米粥丸芡實大一切風薄苛酒磨一九兒半

九疔熱冷水磨一九分四服合時忌婦人雞犬中

風口噤反張涎滿灌一九即醒兒驚發熱薄苛汁

磨端午及甲午日合急用不拘

張漢治天鈞驚風日久不下雙金散

蜈蚣去頭尾尾酥塗灸面南竹

麝一錢

左右研

研在邊藥吹左鼻內右如之用藥勿多若眼未全

下添豈少意量度眼隨手便下止

萬全銀朱丸天鈞多驚搐眼戴上吐逆夜啼遍身如火面青黃不乳並無情緒

水銀一兩煮青州棗廿枚同研盡 朱砂衣 乾蝎生

牛黃分各一 麝分各一 天南星半炮 蠶生

白附子生 鉛霜各半

末棗膏丸如黍一二歲兒服三九薄荷湯下量加

驚風內鈞第七

漢東王先生論驚風內鈞盤腸氣鈞虫痛三者一般

驚風內鈞眼尾有細碎紅脉現石壁唇鼻有黑色鳳髓手在右背高盤

幼幼新書

卷十

廿九

腸氣鈞腰先曲啼無淚上唇乾額有汗虫痛吐涎唇

口紫內鈞用桃符丸後乳香丸氣鈞用鈞藤膏後魏

香散氣鈞 虫痛腹肚鈞痛乾漆散化虫丸如疳 並間

大七寶散利門吐

桃符丸

乳香 銀朱錢各一 大蒜一子

研丸如梧子半歲五九薄荷湯下量加

乳香丸

乳香錢一 蝎梢二七 沒藥錢半 沉香錢半

末蜜丸如黍一歲五九量加減乳香湯吞

盤腸氣鈞第八

石壁經歌

盤腸氣發先腰曲無淚叫啼眼乾哭口開乾一作

脚冷上唇烏乾一作 額上汗流珠碌碌

小腸為寒薄致痛發腰曲為腸結痛温小腸止次

去積冷

形證歌

直莫吐瀉傷榮衛經絡一定痛難屈氣通微用

幼幼新書

卷十

廿九

三兩行却與調和自懽懽

痛來難忍便身黑體硬如弓一向張如婦胎中

傳邪毒醫人何不用名方

氣結小腸寬氣檳榔散煩熱 白丁香膏茴香散煎

服腹肚

漢東王先生鈞藤膏

乳香 沒藥 木香 薑黃錢各一

木鼈子個三

末蜜為膏旋勢如阜子鈞藤湯化服日三

魏香散

阿魏錢一 蓬莪茂兩半

溫水化阿魏浸蓬莪一晝夜焙研細服一字或半錢紫蘇米飲空心調下

宣連丸

宣連 雷丸各一分 木香錢二

末米飯丸如麻子飴飲下十九

莊氏理氣鈞內鈞虫痛外疝心腹痛安息香膏

安息香 莢仁炒 蓬莪茂濕紙 史君子焙

幼幼新書

乾蝎分一 阿魏錢一 茴香錢三

阿魏安息香酒少許湯內蒸去土沙入餘藥末研

煉蜜為膏如皂子薑薄苛湯化量兒服

孔氏治盤腸氣緣懷妊時受冷物或胎中帶不淨

入孩腹每至夜陰氣盛逼兒腹令啼哭不止

大附子尖半寸內 巴豆一粒淨去

班猫一個肉

末麩糊丸如粟苗香芎藭湯臨卧吞五丸此藥久

不壞

吉氏用炒蘿蔔子為末溫酒調半錢三服止

腹肚鈞第九

茅先生兒生五月至七歲腹結癖成塊來去或卵大常叫疼臍下痛為鈞氣服芸薑散茴香散如面黑眼視瀉黑血臍口手足冷不進食死

芸薑散

芸薑子炒 蓬莪茂炮 茴香炒 青橘皮去

甘草各一分 木香分一

末服半錢一錢鹽酒熱調

幼幼新書

形證論茴香散

茴香炒 芸薑子各半 田螺殼錢二 甘草三十

川練子肉分一

末半錢沉香湯調服木香亦得

灸二十四鈞第十

莊氏集驗穴灸法

一鈞牙關緊口不開灸耳門相對一寸七壯穴在直

耳門近眼

二鬼鈞手脚冷眼不轉睛口中亂道灸大拇指後紋

七壯大指節上

三獐釣壯熱手如梳頭啼促灸兩手心及頂前一寸各二七壯

四牛釣弄舌撮口灸鬼門穴在乳下一麥粒七壯

五釣壯熱上氣擡肩喘息不調頭足冷肚脹灸兩肋頭并髮心各七壯兩肋是章門穴

六虎釣目不轉睛兩手不開乍寒乍熱灸百會大拇指節上各三七壯

七貓釣連牙欠口舌吐上唇灸人中穴在鼻柱下玉

泉穴在枕骨下一寸第四椎兩邊各一寸半各七壯

八風釣灸玉枕穴在腦杓尖頭二七壯毛掛名牛星釣

九蟾娘釣撮口吐沫兩手在胸前灸肩上頭臍心各三七壯

十蛇釣吐舌不住灸耳垂下七壯一灸承漿二七壯

十一脾釣胃內氣結喘息不勻灸臍下一寸三七壯

未差灸胃腕臍上四指并穴兩傍各四指七壯腹鳴效

十二血釣瀉血不定灸大敦穴三壯脊骨盡頭

十三搜腹釣脚冷瀉痢不常灸脊膂腰眼上四寸又

穴兩傍各寸半三七壯未差灸腰眼三七壯

十四心釣吐逆壯熱灸百會三七壯未差灸後心三七壯

十五瘖釣不語灸玉泉穴玉枕下一寸又灸乳上三指各二七壯

十六膈釣不熱乳食尋常多睡眠不開灸足踝骨上四寸男內踝女外踝各三七壯又髮際三七壯

十七雞釣手愛抓人口黑灸後心五壯未差灸兩手

心各三七壯

十八猴釣搖一邊眼不住灸前後心三七壯或手如

梳頭灸第六椎兩傍各寸半三七壯

十九弓釣壯熱脊急如反弓灸後心三七壯未差灸第九椎兩傍各寸半三七壯

二十釣乾嘔四肢無力灸氣俞五十壯第十二椎兩傍各寸半

二十一癩釣握手如弓不轉睛灸後心五十壯

二十二釣面青撮口眼淚此破軍星其作灸後心五

十壯

二十三鈞驚哭咬牙作聲此廉正星所作第五椎下
兩傍各寸半灸三七壯

二十四鈞揉眼咬指甲文曲星所作灸兩手心三七
壯未差灸中指頭七壯

毛彬灸法

牙關硬百會灸三七壯又灸耳後一寸效

吐舌名蛇驚灸承漿二七壯

咬人名狐鈞灸後心一百壯

幼幼新書

卷十

五十四

文

翻眼擡睛名天鈞脚大拇指當節上灸一七壯

破腹害肚米穀不消脚脉不行是尋腹鈞準前穴灸

獼猴噤第十一

茅先生兒身微熱雙手捉拳按胃口撮縮肩體似活

獼猴因受胎六個月母見弄獼猴吸其氣生又風邪

相擊致之不速治死

經驗方猫薰燒烟羹即解

白虎病第十二

巢氏堪輿歷年圖白虎神云太歲在卯白虎在寅神

在處兒犯之便身熱有時啼哭有時身小冷屈指如
數似風癩但手足不癢癢
張煥順正集香散

降真香

沉香

檀香

乳香

安息香

人參各一兩

酸棗仁

茯神各半兩

細末一錢水一盞入麝少許煎五分溫服滓卧內

燒

幼幼新書卷第十

茂和堂刊

幼幼新書

卷十

五十五

文

後學古吳陳履端于始輯

常熱嚴 激道徹校

癩論第一

千金論癩瘵病者藏氣不平也新生即癩是五藏不
飲血氣不聚五脈不流骨怯不成多不全育一月至
期歲內癩者乳養失理血氣不和風邪所中也身熱
掣瘵驚啼叫喚而後發脈浮為陽病在六府在肌膚
易治身冷不驚掣不啼呼脈沉為陰病在五藏在骨

幼幼新書

卷十一

癩論

髓極難治病發身軟時醒為癩身強直反張如弓不
時醒為瘵諸反張大人脊下容側手兒容三指不治
脈浮沉復有大小滑澀虛實遲駛諸證各依脈治本
草癩有一百二十種微異于常便是癩變蒸後有病
並寬准中風最暴卒兒四肢不好驚掣氣息小異欲
作癩及變蒸日滿不解宜龍膽湯癩門切
癩有三種風癩驚癩食癩然食癩十無一二先寒後
熱是也風癩緣衣煖汗出風因入也初時屈指如數
延發驚癩起于驚怖大啼延發微者急持之勿更驚

或自止初時不乳哺吐而變熱後發食癩用四味紫

九癩蒸遂癖飲最良去病速而不虛赤丸無此千金

下之始生氣盛有惡下無損不下成大疾難治紫丸

不下用赤丸又不下倍之若下后餘熱不盡稍服龍

膽湯并摩赤膏癩門切風癩當以猪心湯下驚癩按圖

灸及摩生膏癩門切不可大下驚癩心氣不定一作下

之內益虛難治故兒常慎驚勿令聞大聲抱持常安

徐勿令怖又天雷當塞耳作細聲亂之常微驚以長

血脈大驚矣驚脈六十日內灸者驚更甚百日後灸

善兒有熱不乳哺卧不安又數驚此癩之初也兒眠

小驚一月一以紫丸下之滅其盛氣不病癩立夏後

勿妄灸若不欲吐下浴以除熱湯粉以除熱散並壯

摩以赤膏并塗臍中令涼處勿禁水探飲以新水兒

衣薄乳食不消大便醋臭癖之漸也紫丸微消之服

法從少起常令大便稀稀後漸減不醋臭止藥冬月

下無所畏夏月下難差有病不可不下下後腹小脹

當節哺乳數日勿妄下又乳哺令多少有常兒漸大

當節哺乳數日勿妄下又乳哺令多少有常兒漸大

幼幼新書

卷十一

二

癩論

稍增之若減少已有小不調便微服藥但乳勿哺甚者十許日微者五六日自當如常若都不食而但飲乳是有癖為疾重不下致寒熱或吐發癇或更下痢治其輕時兒不耗損而病愈速凡糞黃臭者腹有伏熱宜龍膽湯若白而醋而挾宿寒不消宜紫丸微者令內消甚者小下復節乳哺則胃氣平和否則病易復復下傷胃令腹脹滿而過傷矣凡兒癇脈大必發食癇下之便愈當候掌中有三指脈不可令起不下發癇難療早下脈終不起脈在掌中尚可療至指則

切切新書

卷十一

三

庚

病增凡兒腹有疾則寒熱寒熱則血脈動血脈動則心不定心不定則易驚驚則癇發速

寶鑑兒有數疾久而不醫變為癇壯熱夾驚傷寒痰飲發驚洞泄咳嗽夜啼客忤霍亂吐瀉嘔乳臍瘡常有青黃水久則俱成癇

患眼驚不醫成風風不醫成癇癇不醫成瘵既成瘵難以用藥癇有數種有驚風癇多驚即發有乳風癇食乳衝肺即發發即吐乳急有肝風癇四季多發發即寒熱噤有肺風癇冬月多發發即口噤面黑大抵

癇不害命只邪氣在心須重吐下常服鎮心湯藥如覺一邊手足動微覺麻痺不能動手兼語不清齒牙黑此風涎及邪塞竅也

癇候第二

東氏十歲以上為癇十歲以下為癇其狀或口眼相引而目睛上搖手足癱瘓背脊強直頸項反折諸方說癇名證不同大體有風癇驚癇食癇三種兒氣血微弱易為傷動故也正發時手足掣縮慎勿捉持捉則曲戾不隨

切切新書

卷十一

四

庚

指迷癇有數般且說五歲表裏受風形狀初受驚癇目反視踞坐舉頭唇支青面青黃此病傳肝若唇黑眼慢白口死風癇口吐白沫已傳心放齒咬人或即口頰手指青黑或醒或發若指黑色面青黑五日內死臍風發癇面虛腫搐搦手足動搥兩臉白病傳肺面如土色者七日死搐搦或夢中啼笑下齒咬人似慢脾狀若眉帶黑色病傳腎腎已絕旬日死脾癇喏如鋸多睡不進乳食口乾唇赤眼白多旦夕死

驚癇忤是三候第三

漢東王先生驚癇忤三候略相似皆口面青黑嘔吐涎沫頭項強直手足掣動但驚即發拳搐喉中涎響雙目直視癇即搐搦涎出亦響口眼相引目睛上掣忤即掣癇口吐青黃白沫唯眼不上挿為不同也病初治亦一法

歸竟散治驚癇忤手足癱瘓頭項強直狀似角弓

蝎梢炒

半錢

蜈蚣赤脚半條炙

水銀粉

腦麝各一字

花蛇肉酒浸炙

一錢

天南星薑製五分

川烏頭尖生七個

幼幼新書

卷十一

五

末嬰孩半字量加至半錢金銀薄苛湯調更量虛

實

候癇法第四

巢氏癇未發欲發候或温壯連滯或掣頭弄舌或睡裏驚掣數齧齒

千金癇惡候有不及求醫而困者然氣發于內必先有候當察其精神而探之手白肉魚際脉黑者是癇赤者熱青大者寒青細者為平

鼻口乾燥大小便不利

眼不明上視喜陽

目腫子卒大異常

喜欠目上視

耳後高骨上有青絡盛卧不靜刺青絡出血實鉗三五路青

脉起如

髮逆啼笑面暗不變

鼻口青時小驚

目閉青時小驚

身熱頭常汗出

身熱吐喎而喘

身熱目時直視

身熱小便難

身熱目視不精

幼幼新書

卷十一

木

卧惕惕而驚手足掣振

卧夢笑手足動搖

意氣下而妄怒

咽乳不利

吐痢不止厥痛時起

弄舌掣頭

二十候癇之初也灸陽脉所應或重手爪之令兒

驟啼乃絕依方與湯

嬰孺並服五石紫丸

直視

腫子動

腹滿轉轉鳴

下血身熱

口噤不得乳

反張脊強

汗出發熱

卧不寤手足掣瘈喜驚

八候痼之劇也非湯爪能救當灸之

截痼法第五

張渙論驚不已變痼有不因驚成痼者未發前壯熱連滯不歇素有痰涎咽聲呀呷或搥頭弄舌目斜視眠睡驚掣必欲發痼宜截之外臺黑丸療諸癖結痰飲兒欲發痼

幼幼新書

卷十一

七

桔梗

桂心各四分

巴豆八分

羌花錢二分

杏仁五分

末搗巴杏膏和搗千杵入蜜搗二千杵丸如胡豆

漿服一二丸兒生十日丸如黍諸腹不快體中覺

患服之利愈忌猪葱蘆笋等

聖惠牛黃散治兒未百日取口吐沫欲作痼腹有冷

熱癖

牛黃

細辛

黃芩

當歸炒

甘草炙

防風各一分

柴胡半分

川大黃炒

蟻娘各三分

蚱蟬各三枚

散一錢水一盞煎五分和滓不時量兒溫服

釣藤散治壯熱欲發痼時時四肢抽掣吐白沫

釣藤

甘草炙

川升麻

石膏各半

人參

子芩

犀角

川大黃各炒

分一

蚱蟬三枚

散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合牛黃末

一字量服

治頭額體背俱熱大便秘澀眼赤心悶乍睡乍驚精

幼幼新書

卷十一

八

神昏濁與人不相主當欲作痼藍葉散

藍葉

人參

知母各半

釣藤

川升麻

葛根各三分

子芩

犀角

射干各一分

玄參二分

細末五歲兒竹瀝半合調半錢服量加若未辨單

服玄參犀葛根竹瀝薑大豆地黃汁又蚯蚓糞水

調服

牛黃丸治驚熱入心成痼面色不定哭不出熱作時

不吃乳食大便秘澀眼畜露白手足逆冷

牛黃	川大黃	獨活 <small>分各一</small>	川升麻
琥珀	萊豆粉	大麻仁 <small>各半</small>	
羅末蜜九桐子大不時湯研一丸服量兒加金銀箔各五片藥兩九化下			
治欲發癩極熱生葛汁飲			
生葛根汁	竹瀝 <small>各一</small>	牛黃 <small>杏仁大</small>	
和服半合量加			
嬰孺治驚熱發癩消熱定驚煎			
柴胡	升麻	梔子	芍藥 <small>各七</small>
子芩	知母 <small>各八</small>	寒水石 <small>錢二</small>	竹葉 <small>升一</small>
甘草 <small>分二</small>	杏仁 <small>分六</small>		
水四升七合煮升半絞滓內蜜葛汁文武火煎勻不住手至升二合一月兒一合為三服中間進乳二歲加至二合日二夜一溫服			
變蒸時患驚癩已服四味湯紫丸下後猶熱腹脹目視除熱地黃汁湯			
地黃汁 <small>合半</small>	黃芩 <small>分三</small>	大黃	甘草 <small>炙各一分</small>
梔子仁 <small>分二</small>			

水八合煮四合去滓下地黃汁服一合日三夜一			
五歲癩第六			
千金論肝癩面青目反視手足搖			
心癩面赤心下有熱短氣息微數			
脾癩面黃腹大喜癩			
肺癩面目白口沫出 <small>寶鑑面目反視如枯骨</small>			
腎癩面黑目正直視不搖如尸			
膈癩目反四肢不舉			
腸癩不動搖 <small>寶鑑直而不至瘕</small>			
錢乙論犬癩反折上竄犬叫肝也			
羊癩目瞪吐舌羊叫心也			
牛癩目直視腹滿牛叫脾也			
雞癩驚跳反折手癡雞叫肺也			
猪癩如尸吐沫猪叫腎也重者死病後甚亦死			
五色丸			
朱砂 <small>兩半</small>	鉛 <small>三兩</small>	水銀 <small>分一</small>	雄黃 <small>二兩</small>
真珠 <small>兩一</small>	銀 <small>兩同</small>		
蜜丸麻子大金銀薄苛湯服三丸			

六畜癩第七 在法

千金論犬癩手屈拳舉 寶鑑手

馬癩張口搖頭馬鳴欲反折

牛癩目正直視腹脹

羊癩揚目吐舌

猪癩吐沫 寶鑑振

雞癩搖頭反折喜驚自搖

寶鑑又有烏癩唇口撮聚目手俱搖蛇癩身軟頭舉

吐舌視人

勿勿折書

卷十一

上

博濟犬癩犬聲馬癩馬聲牛癩牛聲羊癩羊鳴雞癩

雞鳴五癩者腑臟相引邪氣盈起寒厥各識手顧口

吐沫頃更如醒復作

一切癩第八

外臺天下有女烏名姑獲又名鈞星鬼兩夜毛落兒

衣使作癩死即化其兒故兒十歲內衣勿露八月尤

忌此鳥無雄不產飛鳴村里喚得來

患眼癩一日之中常三五發作驚治難差此驚邪傳

入筋骨 一經 睡驚膏重下 驚風 次朱砂膏 驚熱 夾去

風藥調理如吐後不語無妨吐損心氣恐來年此時發復下前藥愈

茅先生初癩歌

渾身壯熱腰背強兩眼瞪眼是尋常四肢抽掣

多啼叫時發時醒仔細詳

癩死候歌

四肢癱瘓脈還沉身體如綿不暫醒緊噤牙關

難進乳更兼腹滿轉虛鳴汗出熱來時又至渾

身壯熱喜生驚直饒便是盧醫手手足縱橫也

勿勿折書

卷十一

上

不停

本草臘月烏鴉一隻入瓦甌泥煨燒灰飲下

秘錄竹茹三兩醋三升煎一升量服煎治口噤體熱

肘後

茯苓

龍齒 各二分

鈞藤

芍藥

黃芩 各一分

甘草 半分

蚱蟬 二枚

牛黃 二豆

末竹瀝一合研下東流水二斗金銀各十兩銀器

煮取五升入藥煎升半間乳細服

千金治兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣發熱

吐現變蒸不解中客入鬼氣并諸癩十歲下皆服客
忤及魁加人參當歸龍胆百日兒三銖二百日六銖
一歲半兩餘藥準此龍膽湯

龍膽 鈞藤皮 柴胡 黃芩

桔梗 芍藥 茯苓翼作神 甘草炙各六銖

蠅蝗二枚 大黃一兩

吹咀水一升煮五合兒十五日一合分三服

兒二百日內頭身患瘡治差復發五月中忽效嗽微
溫變癩已與常治癩湯得快吐下經日不爾單與竹

瀝一日夕進一升許發時小踈明日服竹瀝湯

竹瀝合五 黃芩銖三十 羚羊角銖六 木防已銖六

大黃兩二 茵芋銖三 麻黃去根節 白微

甘草炙 桑寄生 單蘇各半兩 白朮六銖一作

白鮮 吹咀水二升半煮減半內竹瀝煎一升服二合去

一食久進一服一煎

外臺療二十五種癩吐痢寒熱百病不乳哺赤湯

大黃兩五 當歸 芍藥 黃芩

蘇蘇 甘草炙 桂心 人參

赤石脂 牡蠣熬 紫石英 麻黃淨各二兩

篩韋囊盛八歲兒乾棗五枚水八合煮五合兩指

撮藥入湯煮三沸去滓服利微汗自除兒大量加

療百日兒癩連發不醒及胎風體冷面青反張麻黃

五癩湯 麻黃去節二分 羌活 乾葛各二分

甘草炙二分 枳實熬三分 升麻 黃芩

杏仁去尖二十 大黃各四分 柴胡 芍藥各三分 鈞藤皮一分

嬰半 蛇蛻三寸 蚱蟬二枚 石膏六分

水二升竹瀝五合煎六合服一合嬰 竹瀝二合 煮六

合半 聖惠朱砂散治五癩手足動搥眼目反視口吐涎沫

心神喜驚壯熱 朱砂 牛黃 白欬 露蜂房

杏仁炒各一分 桂心半

細羅乳汁調一字服日五量加

牛黃丸治諸癩驚惕瘰癧客忤

牛黃 人參 防風 細辛

赤芍藥 苦蕒根 當歸各半 炸蟬七枚

嬰孺二分 川大黃兩 甘草一分 蛇蛻寸皮五

三分 麝一分 巴豆粒淨十

末蜜和搗三二百杵丸如麻子初生至百日服一

丸一歲至三歲服二丸量加薄苛湯下快利嬰孺

兒惕惕驚中人溫壯發熱腹滿不調增服

治癩及傷寒百病雷丸膏

幼幼新書 卷十一 十五

雷丸一分 甘草一分 莠草 川升麻各

兩 防風一分 桔梗二錢 白朮三錢

羅末猪膏一片入鐺慢火煎鎔入藥末柳篦不住

攪成膏綿裹合盛摩患者頂及背

靈苑大金箔丸治一切風及癩解心腎壅熱消痰墜

涎

金銀箔各百 辰砂一兩 牛黃 生犀

丁香 沉香 真珠 木香

腦麝 琥珀 鷓鴣砂 烏蛇肉酒

天麻酒 雄黃 蝎稍 白蠶蚕

附子炮 天南星炮 防風 白附子

甘草一分 香墨兩半

細末金銀箔同水銀三分研如泥再同研蜜丸菜

豆大大人五九薄苛酒下兒三九薄苛湯下

天烏散治一切風及癩肝散

臘月烏鷄肉一隻用 臘月野狐肝一具二味

麝 天麻 犀角各半 乾蝎

白蠶蚕 蝉蛻 牛黃多益 荆芥

藿香 天南星心 白附子 膩粉

桑螵蛸臘月標 烏蛇酒浸

細末半錢荆芥湯或豆淋酒空心服兒薄苛湯調

一字

嬰孺壯熱發癩疹自下痢五癩湯

大黃分十二 釣藤皮 蜂房 麻黃去各二

升麻分七 柴胡 山梔仁 知母

芍藥 升麻分七 炸蟬個 石膏分十

蛇蛻五寸 杏仁六分

水七升煮二升去滓稍稍如人肌煖以拭身

治客忤中惡發癩乳哺不消中風反折蹠口吐舌并

症忤面青目下垂腹滿丁奚羸瘦脰交三歲不行麝

香雙丸

麝 牛黃 黃連各二兩 桂心

雄黃 烏賊魚骨炙 丹砂 附子

巴豆六十粒 去皮炒 特生礬石煨半日 各一兩 蜈蚣一個 沖

別研巴豆如胎同蜜和末三千杵拍合收勿泄氣

幼幼新書 卷十一 十七

一月兒服米許三百日服二麻子許量加日夜四

五服汗出及痊為限

治乳哺不時溫壯吐利驚掣胎寒腹痛一十五癩四

味大黃湯

大黃和四 芍藥 當歸 甘草炙各二分

水三升煮一升一月兒服杏核許日三百日二杏

核許此為準發熱加去節麻黃二分先煮去沫內

諸藥反折戴眼掣縮加細辛四分乳不消壯熱有

實者倍大黃用刀劈勿碎無是勿增下痢者減三

分之一母抱少汗病甚大汗汗後溫粉粉之下痢

者勿汗日夜可四服兒夜啼有微熱口啣乳不安

皆宜一方篩韋囊水升半三指撮藥內湯中煎六

合去滓服真新藥可用王汝南戴眼中風體強增

獨活二分妙

治癩手足掣癢十指顫舌強獨活湯

獨活 麻黃節去 人參各二分 大黃四分

水二升煮麻黃減三合去沫入藥煎九合為三服

治兒壯熱驚癩茵陳湯

幼幼新書 卷十一 十八

茵陳 大黃 黃芩各四分 黃連

硝石無芒 硝代 甘草各二分

水三升煮一升二合內硝為三服

治腹有熱有寒在胃上逆吐腹中雷鳴而滿驚啼甚

即發癩掣縮休作有時十味白朮湯

白朮 當歸各一兩 厚朴炙 半夏

甘草炙 人參 芩 薑各二分

枳實三十枚 炙 食茱萸二合

水七升煮二升溫服三合日三夜二

八味固顛膏

大黃銖十六 定粉銖十八 雄黃 黃芩銖各六

雷丸銖八 附子二兩十銖 生商陸根兩四

煎豬膏三斤去滓入藥沸七上下濾入雄黃攪至凝以摩頂掌中背脇皆遍訖治粉粉之

治百二十癩變蒸宿痞及飲食不節腹滿溫壯朝輕夜甚大小便不通胃弱脾冷牛黃雀屎丸

牛黃 芍藥 甘草 巴豆淨各三分

雀屎白炒 乾薑 當歸 黃芩各二分

切切新書

卷十一

十九

芩 人參各四分 黃耆一分 麩合一分

大黃分五

末蜜丸胡豆大一歲二九日三不知稍加利為度

常服良兒初生腹滿口急難取乳大小便不通胃

中作聲服如半黍十日兒一黍若頭身發熱惕惕

驚不安腹脹滿中惡客忤吐乳皆宜百日兒一丸

及寒熱往來朝夕溫壯身熱利久五色及傷寒食

飲脹滿丁奚大腹食不消吐逆量兒服

張漢治五癩手足抽掣口吐涎沫露蜂房散

露蜂房

石菖蒲各一兩九節 桂心 遠志心去 人參各半 牛黃 朱砂

杏仁炒各一分

細末服半錢麝湯調

石壁經羌活膏治驚風三發成癩

羌活 人參 桂心 防風各半

蝎 朱砂 硫黃 茯苓

木香各一分 腦麝許少

末蜜為膏入金銀箔各十片滾研加減薄荷湯下

切切新書

卷十一

二十一

孔氏治急慢驚風天鈞撮口搐搦妳癩壯熱定命丹

蟾酥酒浸 乾蝎七枚 天南星一分 白附子

青黛各半 麝許少

末粟米粥丸如菘豆別以青黛衣

陳防禦治胎風諸癩手足癩癰目睛上視頸項緊急

強直或搖頭弄舌牙關緊急口吐痰沫反拗多啼精

神不寧睡卧多驚吐利生風昏塞如醉扁金丹

白花蛇肉焙製 防風 蜈蚣全赤 乳香各半

蝎 朱砂 天南星燒 大草烏燒

兩半

麝一錢

牛黃半錢

羅未炊餅丸如梧子捏扁服三餅荆芥湯化如稀糊抹口中漸嚥下候一時更進

朱氏治驚過發疳或風熱未除心藏積熱涎生膈上

壅塞心胸氣亂交橫變癇變候轉頻吐瀉氣弱未嘗

補勝金丸

麝

蘆會

牛黃

胡黃連

等分研熊膽汁九蒸豆大米泔水研三丸服

灸癇法第九

幼幼新書

卷十一

十一

千金兒新生無疾針灸則忍痛動五脉因成癇河洛地寒喜瘧兒多灸以防之灸頰以防噤噤者舌下脉急牙車筋急决去血吳蜀地温無此疾今不詳南北用之多害故田舍兒任自然無天橫兒驚啼四肢掣動變蒸未解慎勿針灸爪之動其百脉仍因驚成癇惟陰癇噤瘕宜針灸爪凡灸癇當先下使虛有實而灸氣逼前後不通殺人癇平旦發足少陽晨朝發足厥陰日中發足太陽黃昏發足太陰人定發足陽明夜半發足少陰視之以定灸穴又有五藏六畜癇或

在四肢或腹內審候隨灸為善若失其要則為害也

千金云肝癇灸足少陽厥陰各三壯

心癇灸心下第二肋端宛宛中為巨關又灸手心主

及少陰各三壯

脾癇灸胃脘三壯夾胃脘傍灸二壯足陽明太陰各

二壯

肺癇灸肺俞三壯又手陽明太陽各二壯

腎癇灸心下二寸二分三壯又肘中動脉足太陽少

陰各二壯

幼幼新書

卷十一

十一

膈癇灸風府又頂上臯人中下唇承漿皆隨年壯

腸癇灸兩承山又灸足心兩手勞宮又兩耳後高骨

各隨年壯又臍中五十壯

右灸五藏癇

馬癇灸頂風府臍中三壯病在腹中燒馬蹄末服

灸法參各三壯右足跟骨

牛癇灸鳩尾骨及大椎各三壯

羊癇灸大椎上三壯

猪癇灸耳後高骨兩傍各一寸七壯

犬癩灸兩手心一壯足太陽一壯肋戶一壯嬰孺灸

陽明肋戶脚頭
兩室各一壯

雞癩灸足諸陽各三壯聖惠灸手少陰三壯在掌後
去腕半寸陰却穴陷者中

右灸六畜癩

暴癩灸兩乳頭女灸乳下二分身直如死及腹中雷

鳴灸太倉及臍中上下兩傍各一寸凡六處又灸當

腹度取背以繩繞頸下至臍中竭便轉繩向背順脊

下行盡繩頭灸兩傍各一寸五壯若面白啼聲色不

變灸足陽明太陰

幼幼新書

卷十一

七

右灸暴癩

日上視眸子動灸顙中橫度口盡兩吻際又橫度臍

下盡兩邊折去臍度半都合口為度從髮際上度之

灸度頭一處正在顙上未合骨中隨手動者是最

要處次灸當額入髮際二分許直望臍為正嬰孺額
上髮際

五壯不言次灸其兩邊當目腫子直上入髮際二分

入髮二分許嬰孺不次灸項迴毛中次灸客主人穴在眉後際

動脈嬰孺眉後次灸兩耳門當耳開口則骨解開動

張陷是次灸兩耳上捲耳取捲耳上頭是一法大人

耳上橫三指兒自取其指次灸兩耳後高骨上青脉

亦可刺血出嬰孺至此有灸人
中當近臍灸承漿次灸玉枕項上高骨

次灸兩風池項後兩棘動筋外髮際陷中次灸風府

當項中央髮際與風池高下等次灸頭兩角當迴毛

兩邊起骨嬰孺此有灸
太極兩眉頭

右頭部十九處兒生十日灸三壯一月五壯五十

日七壯病重俱灸輕者唯灸顙中風池玉枕艾使

熟炷平正着肉火勢達病所嬰孺勿一時灸諸處
無效續灸輕者顙中

額中髮際卑人中耳門風池玉枕可也凡灸頭風
大人不過三十壯風沉者勿頓灸可日灸又灸

幼幼新書

卷十一

七

口吻各
二十七壯

腹滿短氣轉鳴灸肺幕兩乳上第二肋間宛宛中懸

繩取當腫子是次灸臆中次胃堂次臍中嬰孺有次
百壯

薛息兩乳下第一肋間宛宛中次巨關大人去鳩尾

下一寸兒去臍作六分去鳩尾下一寸并灸兩邊

嬰孺臆前蔽
骨下五分次胃管次金門在穀道陰囊中央

右腹部十二處胃堂巨關胃管十日兒三壯一月

五壯陰下縫中可三壯或隨年壯

脊強反張灸大椎并諸巖俞及督脊上當中從大椎

度至窮骨中窟更從大椎度之灸度下頭是督脊

右背部十二處十日兒灸三壯一月以上五壯

手足癱瘓驚者灸尺澤嬰孺肘中次陽明次少商次

勞宮嬰孺掌中次心主次合谷嬰孺手大次三間嬰

大指次指本節次少陽後內側曰中

右手部十六處其要陽明少商心主尺澤合谷少

陽壯數如上

灸伏兔嬰孺膝上次三里次腓腸次鹿溪次陽明次少

陽次然谷嬰孺足踝前

幼幼新書 卷十一 二十五

右足部十四處皆要壯數如上手足陽明謂人四

指凡驚癇皆灸若風病手足掣癱灸手足十指端

又本節後嬰孺候諸處無效方灸翼云灸第二椎

折如人字一角注中央灸下二角脊兩邊五處各

百壯灸癱啼易治不啼難治生十數日得癩灸一

甲乙經灸本神在曲差旁寸半髮際一云直耳上入

髮際四分足少陽陽維之間灸五壯主頭目眩痛頸

項強急胸脇相引不得傾側癩疾不嘔沫兒驚癩

臨泣當目上晉直上入髮際五分陷者中少陽太陽

之會灸三壯主頰青不得視口沫涕出兩目眉頭痛

兒驚癩反視

灸縮筋三壯第九椎節下間督脈氣所發俛取主兒

驚癩癱瘓狂走疾脊急強目轉上掉

聖惠灸長強五壯腰俞下脊體骸端陷者中主腰脊

急強不可俛仰顛狂病大小便難洞泄不禁五淋久

痔兒驚癩

灸癰脈三壯針一分一名資脈在耳內雞足青脈是

主頭風耳後痛兒驚癩癱瘓嘔吐泄主驚恐失精視

幼幼新書 卷十一 二十六

不明眩暈

驚癩灸鬼祿一壯唇內中央絃上炷如麥鋼刀決斷

胎癩妳癩驚癩狐魅神邪及顛狂兩手大拇指綿繩

縛之灸三壯艾炷半在甲半在肉四處盡燒一處缺

不愈神效諸癩灸一壯炷如麥

嬰孺心下一寸宛宛中脊當兌骨上大顛各二七壯

癩差復發第十病

巢氏癩差更發餘勢未盡兒血氣軟弱或乳食不節

或風冷不調或驚動因而重發多成常疹

千金茵芋丸治風癩至長不除或天陰節變便發食
飲堅強亦發百脉變縮行走不正言語不便服之永
不發

茵芋葉 鈔丹 秦艽 鈎藤皮

石膏 杜衡 防葵 菖蒲

黃芩各兩半 松蘿兩半 蜈蚣十枚 甘草各三兩

末蜜丸小豆大三歲內五丸外七丸量加

聖惠鈔丹丸治驚癇復發眩悶倒蹶或湯火不避及
百病

幼幼新書 卷十一 二二

鉛丹 朱砂 鐵粉各半兩 牛黃

雄黃 細辛 獨活 露蜂房炙

人參 漢防已 桂心 甘草炙

川椒炒各一分 蜈蚣炙五枚 蛇蛻炙寸五 雞頭炙一枝

赤茯苓兩一分 末蜜和搗二三百杵丸菜豆大粥飲下五丸量加

減

鷓鴣頭丸治驚癇經年不斷嬰孺多炸蟬十個大黃八分

鷓鴣頭一枚是 桂心 赤芍藥 茯神

露蜂房炙 甘草炙 當歸 芎藭

丹參 牛黃 葶藶子炒各半兩 蜈蚣炙七枚

蛇蛻五寸 麝一分

末蜜和搗二三百杵丸菜豆大溫水下五丸量加

嬰孺治癩三十年亦差

苦參斤三 童便斗二升煎苦參取六升

糯米及麴煎作酒熱澄服半雞子許四五歲兒一

升永差腹中病一切氣塊宿冷癥癖心痛惡病悉

治可放二三年

幼幼新書 卷十一 二二

鎮心銀屑丸治癩差慮餘疾

銀屑 黃耆 大黃 鱉甲炙

甘草炙各四分 細辛 桂心各二分 茯苓

柴胡 黃芩 人參 芍藥各三分

葵子三分 牛黃一分

末蜜丸大豆大服五丸常服良

張渙治胞胥痰涎諸癩差後常服

半夏七次 乾薑 川黃連 桂心

南木香各半兩 牛黃 麝一分 朱砂兩一分

巴豆淨十個炒

末滴水和如黍粥飲下未周歲乳汁三七歲五粒

癩差身面腫第十一

巢氏兒當風取涼乳哺失節成癩差後身面悉腫因

血氣尚虛熱在皮膚與氣相搏致氣不宣泄停併成

腫

集效黃芩湯

黃芩

澤瀉

通草

即木通各八分

木猪苓

杏仁各六分

柴胡

桑皮

各七分

澤漆葉四分

幼幼新書

卷十一

三九

粗末抄三錢水盞半煎五分乳後服

癩差不能語第十二

巢氏心聲為言開竅于口癩雖差風冷之氣猶滯

絡脉心氣不和其聲不發

千金大補心湯

黃芩

附子

炮各一兩

甘草

茯苓

桂心各三兩

石膏

半夏

遠志

各四兩

薑六兩

大棗廿枚

乾地黄

阿膠

麥門冬各三兩

咬咀一大撮飴糖半匙許水盞半煮半盞量兒空心乳前服日二

幼幼新書卷十一

重閣閣刊

幼幼新書

卷十一

三

幼幼新書卷第十二 五癇異治 凡五門

後學古吳陳履端于始輯

胤芝馮時康迪吉校

風癇第一

巢氏風癇者由乳養失理血氣不和風邪所中或衣厚汗出腠理開聖惠風因而入初時屈指如數延發掣縮與脉心湯又身熱癩瘕驚啼喚聖惠而後發脉浮為陽癇內在六府外在肌膚易治身冷不驚癩而啼喚亦作發時脉沉為陰癇內在五藏外在骨髓

幼幼新書

卷十二

一

極難治身軟時醒為癇身強直反張如尸不醒為瘓心脉滿大癇瘕筋攣肝脉小急亦癇瘕筋攣尺寸浮直上直下此為替脉必腰背強直不得俛仰風癇三部脉緊急可治兒脉多雀鬮聖惠要以三部為主若緊者必風癇凡癇發手足掣縮慎勿持捉恐曲戾不隨

外臺療風癇卒倒嘔沫不省

麻黃去節

大黃

牡蠣煨

黃芩各四兩

寒水石

白石脂

石膏

赤石脂

紫石英 滑石各八兩 人參 桂心各二兩

蛇蛻一兩 龍齒六兩 甘草三兩

散八兩薄絹盛水升五合煮七合絞去滓頓服日

再百日内服一合熱多日二服三五日一服亦得

本方無麻黃龍齒蛇蛻忌海藻菘菜生葱熱麪蕎

麥猪肉蒜膩粘物

又方

釣藤皮 麻黃去節各二分 龍齒六分 碎銀斤一

知母 寒水石 梔子 石膏裹綿

杏仁各廿分 子芩十四分 蛇蛻七寸 蚱蟬四枚

柴胡十分 芍藥 沙參各八分 生葛汁五分

蜜七合 牡牛黃大豆許 升麻十分

切水六升淡竹瀝二升煮二升四合絞去滓內杏

仁葛汁蜜微火煎攪不停手冷餘二升三合成三

四歲服二合日再量增大便瀉加大黃十分慎麪

炙肉炙蒜黏食油膩冷水

聖惠治風癇壯熱心煩痛脉拘急牛黃散

牛黃 朱砂 木香 蠶蚕

乳香 <small>各一</small>	乾蝎 <small>七個</small>	羌活 <small>一兩</small>	治風癩并心熱多驚七寶鎮心丸	虎睛 <small>一對</small>	朱砂 <small>飛</small>	雄黃	琥珀
細羅温竹瀝 <small>半合</small>	不時調服	半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	真珠 <small>各半</small>	金銀箔 <small>各五片</small>	腦麝 <small>各一分</small>	細研棗肉丸菜豆大并華水下三九日三量服
羌活 <small>各三</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	治風癩發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸	虎睛 <small>一對</small>	酒	朱砂 <small>飛</small>	麻黃 <small>去根</small>
川升麻	柴胡 <small>各三</small>	甘草 <small>炙</small>	治風癩發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸	虎睛 <small>一對</small>	酒	朱砂 <small>飛</small>	麻黃 <small>去根</small>
白蘇皮	葛根 <small>各半</small>	甘草 <small>炙</small>	治風癩發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸	虎睛 <small>一對</small>	酒	朱砂 <small>飛</small>	麻黃 <small>去根</small>
石膏 <small>二兩</small>	石膏 <small>二兩</small>	釣藤 <small>半</small>	治風癩發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸	虎睛 <small>一對</small>	酒	朱砂 <small>飛</small>	麻黃 <small>去根</small>
川升麻	川升麻	雷丸	治風癩發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸	虎睛 <small>一對</small>	酒	朱砂 <small>飛</small>	麻黃 <small>去根</small>
防風	防風	子芩	治風癩發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸	虎睛 <small>一對</small>	酒	朱砂 <small>飛</small>	麻黃 <small>去根</small>
鐵粉	鐵粉	銀屑	治風癩發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸	虎睛 <small>一對</small>	酒	朱砂 <small>飛</small>	麻黃 <small>去根</small>
川大黃 <small>炒</small>	川大黃 <small>炒</small>	子芩	治風癩發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸	虎睛 <small>一對</small>	酒	朱砂 <small>飛</small>	麻黃 <small>去根</small>
散一錢水小盞煎五分服	散一錢水小盞煎五分服	散一錢水小盞煎五分服	散一錢水小盞煎五分服	散一錢水小盞煎五分服	散一錢水小盞煎五分服	散一錢水小盞煎五分服	散一錢水小盞煎五分服

羌活 <small>各三</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
細辛 <small>一分</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
未蜜和搗二三百杵丸如菜豆薄苛湯下三九日	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
三三歲外加	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
治風癩天甲雄黃散	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
雄黃	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
熊膽 <small>各半</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
朱砂	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
天麻	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
晚蚕蠶	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
天竺黃 <small>各半</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
馬牙硝 <small>兩半</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
麝 <small>錢一</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
治風癩發即迷悶抽掣多痰良久不醒牛黃丸	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
牛黃	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
麝	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
乾蝎	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
半夏 <small>洗七次</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
天麻 <small>各半</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
天南星	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
白附子	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
蠶蚕	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
並生末煮棗三七枚水銀一兩同研星盡八藥丸	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
菜豆大隔日發者煎牛黃乳汁下三九日三驚風	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
荆芥湯下兩丸	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
治心熱風癩發歇不定	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
天靈蓋 <small>酥</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減
黃連 <small>一分</small>	龍齒	石膏 <small>各一兩</small>	末不津器貯温水調半錢量加減	犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多啼少睡	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減	末不津器貯温水調半錢量加減

粗散一錢水小盞煎五分溫服量加

勅賜神驗方治熱風癩兼失心者

菖蒲 宣連 白朮 車前子

生地黄 苦參 地骨皮

等分末蜜丸如菜豆食後服十五丸不時米飲下

兼令長壽忌猪羊肉血飴糖桃梅菓物

嬰孺治少小風癩晝夜數十發麻黃湯

麻黃節 黃芩 黃連 大黃各一

甘草二分

幼幼新書 卷十三

水一升先煮麻黃五沸去沫內諸藥煮五合為五

服日夜再服

治風癩癢身汗而頭獨無小炷灸頂上旋毛中三

壯訖白朮湯浴之菖蒲湯亦佳

白朮 兩五

白米泔二升煮三沸透寒溫洗頭及身差

紫石酒治風癩言語謬錯

紫石英 附子 鐵精 茯神

獨活 遠志 桂心 牛黃

蜂房 乾薑 甘草 人參

絹袋盛清酒五升浸五宿初服一合日二

張漢烏蛇散治風癩角弓反張潮搐及心肺中風

烏蛇稍 白附子 半夏 天麻

蠶 人參 全蝎 羌活

石菖蒲 川附子 炮去皮臍

粗末二錢水二盞薑十片薄苛五葉煎一盞溫時

澹口中

劉氏治風癩驚風

幼幼新書 卷十三

芭蕉自然汁時呷一兩口甚者服五升即平仲云

加麝更佳蔣元明云風疔牙頰腫痛汁一椀煎

八分乘熱嗽腫處頰腫牙齦痛為風牙頰頰不

腫疔牙也

驚癩第二

巢氏兒驚怖大啼精神傷動氣脈不定因驚成癩初

欲驚急抱持之驚自止故兒常慎驚勿聞大聲抱頭

安徐勿驚怖雷鳴當塞耳作細聲以亂之當按圖灸

之膏摩之驚癩心氣不足下之內虛難治

本草

猪齒燒灰服半錢并治蛇咬

蛇黃水煮服汁

顛顛虎睛丸治二十四種驚癇壯熱抽掣嘔吐夜啼

眼腫

虎睛惠一枚 藜蘆各二

兩半 人參惠一分 聖惠一分 釣藤各二

犀角惠一分 聖惠一分 蛇惠一分 燒惠一分

末蜜丸如黍空心熟水下隨年九輕者一服重者

幼幼新書

卷十二

七十一

三服妳汁下亦得毋忌生冷油膩等物

廣利治驚癇迷悶嚼舌仰目

牛黃大許 蜜水調服又犀角末水服半錢

嬰孺服虎睛中水

肘後熊膽一兩和乳及竹瀝服又炙虎睛服

千金鎮心丸治驚癇百病鎮心氣

銀屑銖十二 水銀銖二 牛黃銖六 無銖一 大黃銖六

茯苓分三 茯神 遠志 防已

白欬 雄黃 人參 芍藥各二

防葵 鐵精 紫石英 真珠各四分

水銀銀屑研如泥別治諸藥和丸三歲服麻子大

二九量加

食醫青羊肝五味醬醋食

猪乳澹口中

糜飲與葛粉食

外臺暴得驚癇

釣藤皮 茯神 黃芩 升麻

白鮮皮 沙參各二 龍齒各三 石膏各八

幼幼新書

卷十二

八

寒水石六兩 蚱蟬七枚 甘竹瀝湯二升

切水九升煮三升溫分三服相去行六七里久兒

細飲忌醋物

聖惠犀角丸治驚癇壯熱心神不定

犀角 麝各半 朱砂 天竺黃

牛黃 乾蝟炒各一分 天南星炮半

末水浸蒸餅丸如菘豆薄荷湯下三九日三四量

加

虎睛丸治驚癇邪氣壯熱嘔吐心煩睡不安

虎睛對	牛黃	天竺黃	麝 <small>分各一</small>
川升麻	甘草炙	鈎藤	犀角
梔子 <small>各半</small>	川大黃 <small>炒</small>	炸蟬	蜈蚣 <small>各三</small>
枚	蛇蛻 <small>五寸</small>		
羅末蜜九菜豆大三二歲粥飲研三九量服			
治驚癇頻發不定至寶丸			
金銀箔 <small>各五片</small>	川升麻	子芩	犀角
梔子	川大黃 <small>炒</small>	朱砂 <small>飛各一兩</small>	鐵粉
龍齒 <small>各二兩</small>	麥門冬 <small>半兩</small>	蜈蚣 <small>淨三枚炒</small>	
幼幼新書 卷十一			
末蜜丸如麻子竹葉湯研服五九量加			
治驚癇發熱搖擗鉛霜丸			
鉛霜	馬牙石 <small>各半兩</small>	朱砂 <small>飛</small>	鐵粉 <small>各一兩</small>
麝 <small>分半</small>	川大黃 <small>炒</small>	人參 <small>各三</small>	羌活
芎藭	茯苓	牛黃	乾蝎 <small>炒</small>
龍膽 <small>各一分</small>			
末蜜丸如菜豆不時荆芥薄荷湯下五九量服			
炸蟬煎治驚癇頻發久不差肌體瘦弱			
炸蟬 <small>淨三枚</small>	麻黃 <small>去根</small>	鈎藤 <small>各一分</small>	柴胡

芎藭	犀角	知母	沙參
甘草炙	薑汁 <small>各一分</small>	平黃 <small>分一</small>	生地黄汁
杏仁 <small>各半兩</small>	蟬蛻 <small>五寸</small>	石膏	子芩
蜜	龍齒 <small>各一兩</small>		
細剉水二大盞煎一盞去滓入竹瀝一小盞煎五			
七沸內蜜地黃薑汁慢火煎不停攪約十餘沸瓷			
合盛八牛黃攪勻一合分三服量加			
治心熱驚狂諸癇熱碧雲			
川升麻 <small>兩二</small>	黃芩	鈎藤	犀角
幼幼新書 卷十一			
青黛 <small>各一兩</small>	虎睛對	天竺黃 <small>兩半</small>	腦麝 <small>各一分</small>
川朴 <small>石斤一</small>	竹瀝 <small>合三</small>		
虎睛天竺黃腦麝青黛別研入餘並細剉水一斗			
煎三升去滓澄清下朴硝微火更煎柳木篦攪勿			
住手硝散入竹瀝虎睛等更攪稍凝新瓦盞盛經			
宿即疑擣羅散金銀湯調服三錢食後臨卧服老			
少以意加減			
治中風目眩羸瘦兒驚癇五勞手足無力			
白羊頭 <small>一枚</small>			

蒸極熟細切五味汁食或作餚入五辛醬醋

醫局療脚氣毒遍內外煩熱不解口生瘡狂易叫走

瘴疫毒癘卒死温瘡五尸五症心腹諸疾疔痛及解

諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒昧野道熱毒兒

驚癇百病紫雪

黃金一百兩千金 石膏 寒水石

磁石滑石各三斤搗 水一斛煮四斗去滓

玄參焙 升麻各一斤 羚羊角 犀角

青木香 沉香各五兩 丁香一兩 甘草四兩

入煎藥汁煮斗五升去滓

硝石四升芒硝亦得每 朴硝精者拾斤

入煎藥汁微火煎柳木滾攪不住至七升投木盆

中半日欲凝入

朱砂飛三兩 麝香當門子一兩二錢半

入煎藥汁攪勻寒二日成霜紫色冷水調一二錢

食後臨時加減服

養生治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客忤

驚癇不祥兒驚癇桃奴丸

桃仁十四枚 安息香一兩

雄黃飛三 辰砂飛半 黑犀磨澄末 牛黃

腦麝各一分 末和前膏丸如雞頭陰乾蜜器封安淨室人參湯

研一丸服食後臨卧

治憂志逆衝痞結胃管室塞噎悶藏府積聚欲作癥

瘕酒食毒痰癖嘔逆有妨食飲兼治驚癇客忤泄利

雞舌香母丁 墨畧 麝 牛黃

犀角 鐵鏵粉各五分 棗五枚 燒

烏梅肉焙 巴豆煮大者十五枚淨肉搗水

末煮糊丸如黃米服三五丸人參湯下漸加至十

丸食後服

嬰孺治驚癇發熱如無癇似熱即服

升麻 子芩 犀角 大黃各六分

水二升半煮升二合漸温服微利忌麩猪魚醋

又月候血青黛新汲水調一錢服童兒增減

治驚癇經年小勞輒發牛黃酒

牛黃 鍾乳各八分 麻黃去節 秦艽

人參各六分 桂心七分 龍角 白朮

甘草 當歸 細辛各五分 杏仁四分

蜀椒三分 蜣螂九枚

切入絹袋酒五升浸隨時月數服半合日三

治少小痰實結痞癰或腹內堅強驚癇百病牛黃丸

牛黃 玄參 乾薑各二分 苦參

丹參 桔梗 甘草炙 人參各四分

甘遂炒 沙參各五分 麝香十四個 大黃十二分

蜀椒四分 巴豆百粒 葶藶各半

末蜜丸如小豆一服二丸飲下

治傷寒溫病驚癇八味人參浴湯

人參 牡蠣 雷丸各半 沙參

苦參 玄參 丹參各一分 大黃三分

水三斗作東向竈葦薪煮三沸停後煮小沸度一

斗許去滓先以三指染藥汁注兒口二七次大染

手濕吻額腹背以後如炊物溫之再浴度盡七升

一日一浴甚者三浴無見風浴時避日及陰

張漢截驚癇安神湯

白茯苓二兩 甘草 犀角各一分 人參

遠志 菖蒲 白鮮皮各一分 石膏半兩

末一錢水小盞入麥門冬煎五分去滓溫服

鎮心膏治驚癇及癰發挾熱

遠志兩 漢防已 人參 川大黃炒

茯神各半兩 朱砂飛一兩 龍腦錢 雄黃水磨一分

金箔廿片 銀箔廿片

細末蜜成膏服一皂子大乳後薄苛湯化

治驚癇悶亂犀角丹

犀角 天南星炒各一兩 乾蝎半兩 朱砂飛半兩

牛黃分 麝香錢

細末水浸蒸餅丸如黍人參湯服十五粒

萬全牛黃丸治諸癇驚惕掣瘖客忤

牛黃 熊膽 人參 細辛

赤芍藥 當歸炒 蘇蘇根 防風各半兩

川大黃炒一兩 蚱蟬枚淨炒七 巴豆淨肉三十枚 蛇蛻炙五十

麝分一 甘草三分

未入巴豆研蜜和杵丸麻子大百日內服一九至

三歲二九薄苛湯利為度

犀角丸治驚癇壯熱心神不定

犀角兩半 朱砂 天竺黃 麝

牛黃 乾蝎炒 天南星炮 人參各一

羅蒸餅糊丸如菘豆服三九薄苛湯下量服

劉氏

幼幼新書 卷十一 十一

青州白丸子兩半 陰陽硫黃生熟各

蝎全兩個 一用梢

未一歲至五歲服半錢至十歲一錢無灰酒下忌

動風物乳母亦忌

趙氏治吐瀉後虛風眼澀多睡潮搐驚癇及丈夫煩

人一切虛風頭旋眼黑惡心吐逆筋脉緊緩手足麻

未身體疼痛精神不爽蚱蟬丸

全蝎炒 蠶蚕 雄黃 白附子

天麻 朱砂 麝 南星紙裹

半夏浸七次去麻薑 烏梢蛇尾穿錢一百者

子肉酒 浸炙黃

研細薑汁糊丸如黍三歲下七九五歲下十九已

上十五九荆芥湯下不時大人丸如菘豆服二十

九荆芥茶下急用碎荆芥薑濃煎湯化

鄭愈奪命散治驚風癇病眼翻牙緊口內無氣唇赤

赤蜈蚣條一 輕粉 朱砂 麝

白附子 牛黃各一分 水銀裏內研星

蟾酥錢一 天南星去心一個 真珠字一 巴豆霜三個

幼幼新書 卷十一 十一

未棗肉和服三九薄苛湯下口噤確滴車中心煩

熱荆芥湯下量服

食癇第三

巢氏云食癇乳哺不節所成

聖惠食癇者由歲府壅滯內有積熱因乳哺過度氣

血不調所致皆乳母食飲無常恚怒不節毒鬱于胃

便乳兒致結不消熱積腸胃痞塞不通令壯熱多驚

四肢抽掣故發癇

張渙云傷飽即發

聖惠代赭丸治食癩抽掣壯熱驚悸乳食不消痰壅發歇不定

代赭 朱砂 馬牙硝 川大黃

水銀各一分 星一分 金銀箔各十片 蟾酥錢一

巴豆霜七枚 膩粉 麝各半錢 龍腦錢半

蛎梢四十九個 天漿子有物者二枚 炒

末蜜丸如黍薄荷湯下二九日三量加

虎睛丸治食癩驚風百病

虎睛一對 牛黃 朱砂 真珠

甘遂煨 赤芍藥 赤茯苓 甘草炙

牡蠣炒 杏仁麩炒各一分 麝分半 犀角

巴豆霜各半兩 未糯米飯丸如菜豆荊芥湯下二九量加

張渙妙聖丹治食癩利胸膈

木香 代赭 馬牙硝 川大黃

蝎梢四十九枚 朱砂飛半兩 麝錢一

龍腦錢半 膩粉分半 巴豆霜七個

研滴水丸如黍服三五粒乳後磨沉香湯下量與

熱癩第四除熱

聖惠熱癩者氣血不和內有積熱所致兒骨木輕軟腸胃細微易為傷動若乳食失常藏府壅滯蘊蓄生熱不得宣通熱甚發癩口眼相牽手足抽掣口吐白沫鼻裡作聲頸項反張腰背強直壯熱叫啼熱癩候張渙兒心神多不寧將養過溫内生邪熱故多驚甚者成癩

聖惠風壅氣甚心胸痰滯壯熱發癩釣藤散

釣藤一分 蚱蟬二個 川升麻 麥門冬

川大黃炒 甘草炙 子苓各半兩 蛇蛻五寸

石膏兩一 散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合量兒湯

多竹瀝柴胡 治熱癩癩癢身體如火白蘚皮散

白蘚皮 黃芩 川升麻 地骨皮

釣藤 犀角 胡黃連各三分 麥門冬

龍齒各一分 甘草一分 散一錢水小盞煎五分去滓入牛黃一字量服

散一錢水小盞煎五分去滓入牛黃一字量服

治熱癩嘔吐煩悶體熱子苓散

子苓 人參 犀角 甘草炙

鈞藤兩各半 赤茯苓 川升麻各三分

粗散一錢水一盞煎五分量服

麥門冬散治體熱嘔吐發癩

麥門冬焙一兩 鈞藤兩半 黃芩 赤芍藥

川升麻 茯苓 川大黃炒各三分

散一錢水一盞煎五分量服

犀角散治熱癩面赤心躁

犀角 鈞藤 玄參 蚱蟬淨炒

甘草炙 川升麻 黃芩 梔子各半兩

麥門冬兩一 散一錢水一盞苦竹葉七片煎五分量服

治熱癩迷悶嚼舌仰目梔子散

梔子兩半 子苓 鈞藤 吳藍各一兩

龍齒 石膏兩各二 川大黃炒三兩

散一錢水一盞煎五分量服

治熱癩發歇不定目直體熱吐沫心神迷悶牛黃丸

牛黃兩半 蚱蟬炒三枚 石膏飛 龍齒各二兩

梔子 川升麻 犀角 胡黃連

鈞藤 龍膽 川大黃炒 杏仁炒各錢

金銀箔各五片 末蜜和擣二三百杵丸如菉豆竹瀝研五九量加

張渙治諸癩挾熱蚱蟬殼散

蚱蟬殼 人參各半兩 黃芩 茯苓

川升麻各一分 牛黃 天竺黃 牡蠣各一錢

細研服半錢荊芥薄荷湯調

癩癧第五

素問奇病論帝曰人有顛疾病名何謂安所得之岐

伯曰名胎病得母胎中時母有大驚氣上不下精氣

并居令子發癩

巢氏云癩兒病也十歲已上為顛十歲已下為癩

聖惠顛癩者風邪熱毒傷手少陰經心為君主神之

舍其藏堅固不受外邪風邪蘊積棄之令恍惚不安

精神離散榮衛氣亂陰陽相併而發

新頰虎睛丸治癩發無時口出白沫小便淋瀝

幼幼新書卷第十三 胎風中風 凡十門

後學古吳陳履端于始輯

對溪錢希元虞卿校

胎風第一

聖惠兒在胎藏府未具神氣微弱或調適失宜食飲不節嗔怒無度舉動驚胎或坐卧當風或觸冒寒暑腠理開洩風邪入胞生後邪留臟腑不得宣通又洗浴當風色裏失度冷觸臍帶風傷四肢乳哺不調痰熱壅積令壯熱吐喞睡裏饒驚心神不安手足抽

幼幼新書

卷第十三

一

章在之刊

掣身體強直眼目反張故蹄胎風風熱不除成痼

石壁經歌

人間此患大幽微患此醫流必少知一百日中

同一氣三周天度是胎期子生身熱如湯潑胎

熱還因是母肥腦額有瘡難得效必因胎內與

夫為生瘡兩脚如穿爛此去難推五歲期一臘

未經先撮口兩拳雙握背腰齊便知藏府生邪

毒只限三朝骨肉離男子握拳指歸內女兒向

外不堪醫眉裡有筋紅碧色一青碧色一紅兼赤美來有

命莫相疑若有黑光千萬死風融眉裏赤紅一黑綠若還兼青色

此身何處覓良醫

母食毒物或多飲酒使胎氣熱兒生如湯潑色赤

有滯氣急者不治白者亦然過三歲乃定姓婦八

九月未止房事故額脚上生瘡愈而復發甚者臍

風撮口牙緊不盡天年若生兒手握拳時男大指

在外女大指在內為順逆者死若眉中上下青紅

鮮淨者生不快為惡候節次看證調理

形證論如頭胎或母身大抱惜過度初生時病發看

幼幼新書

卷第十三

二

右之

大按指及眉間赤脉順則安逆則死醫多不識喚作

脾風悞矣宜蚘蚘丸一切癩門或大青丹急慢驚門三五歲方

進通經散

聖惠犀角丸治胎風搐搦筋脉拘急牙或緊硬

犀角 天南星炮 白附子炮 乾蝎炒

天麻 麻黄去節各半兩 白花蛇肉一兩酒浸炙

羅末無灰酒二大盞慢火煎旋添酒不住攪酒盡

為度

之黃 膩粉 水銀棗肉研 朱砂各一分

麝

虎睛一分對

龍腦一分

並細末入酒膏看硬軟丸菜豆大不時竹瀝下三

九量加

天竺黃丸治胎風驚熱手脚急強

天竺黃

胡黃連

犀角

天麻酒浸

蟬殼一分各

牛黃一分

散不時新汲水調一字二歲以上加

治胎風驚熱搐搦心神煩亂或渴牛黃散

牛黃一分

人參

甘草一分

鬱金

幼幼新書 卷十三

川大黃炒

朱砂飛

胡黃連兩各半

真珠一分

散不時蜜水調半錢量服

朱砂散治胎風心熱驚癇

朱砂

牛黃

天竺黃

鐵粉各一分

麝分半

研細竹瀝調半錢不時量服

治胎風驚風虎睛丸

天麻酒浸

乾蝎炒

烏蛇肉炙

羌活

獨活

蠶蚕炒

麝分各一

虎睛酒炙

末麵糊丸如菜豆不時薄荷湯化三九

牛黃丸治胎風搐搦壯熱

牛黃

朱砂

犀角

蝎梢炒

水銀研結砂一分

天漿子

南星炮各一分

麝分半

末糯米飴丸如菜豆不時薄荷湯化三九量加

治胎風搐搦多驚天竺黃丸

天竺黃

天南星炮

胡黃連兩各半

牛黃各一分

幼幼新書 卷十三

末棗肉丸菜豆大不時乳汁研三九量服三歲已

上荆芥酒湯下

治胎風搐搦牛黃丸

牛黃

天竺黃兩各半

麝分各一

全蝎炒

細末蜜丸如麻子一二歲不時薄荷湯下三九三

四歲五丸

張氏治胎風天癆客忤急慢驚往來搐搦涎盛喘逆

硬氣不安蝎稍散

人參三錢

蠶蚕直一分

全蝎十四

辰砂

麝各一分

細末金銀薄苛湯調一字慢驚加白附子末一分

一切風第二

千金翼治傷寒時行賊風惡氣在外肢節痛不得屈伸填頸咽喉痺塞閉入腹則心急腹脹胃中嘔逆病在腹內服在外摩緩風不遂濕痺不仁偏枯拘急口面喎斜耳聾齒痛風頸腫痺腦中風痛石癰結核瘰癧堅腫未潰傳之即消及赤白癰疹諸腫無頭作

幼幼新書

卷十三

五

瘰癧者摩之令消風結核在耳後風水遊腫疼痛瘰癧針出黃汁時行瘟氣服如棗核兒以意減丹參膏

丹參

菊萸根各四分

秦艽三兩

羌活

蜀椒汗

牛膝

烏頭皮去

連翹

白朮各二兩

躑躅花

菊花

莽草各一兩

切苦酒五升麻油七升合煎將盡去滓入猪脂煎成膏凡風冷者酒服熱毒單服齒痛綿沾嚼

水鑑黃鹽方治百日内患風不計名目好惡悉主

黃鹽一斤陶隱居北海黃鹽

薄苛一斤

水銀一兩同上火一復時

通赤水成霜入藥

莖花

菊花

黃葵花

薄苛花

牛蒡子各二分

寒水石一分

並生研如粉入水銀霜研勻蜜丸如麻子

張文仲療一切風及偏風四肢口目喎戾言語蹇澀

羌活

防風各二兩

生地黄汁

竹瀝

荆瀝升三味各五合

蜀附子重一兩者一枚生去皮八九破

切內汁中寬火煎取升五合分二服三日一劑風

甚頻服五六劑無問老少夏冬忌猪肉蕪菜

博濟治癰緩一切風傷寒兒驚風雙九子

幼幼新書

卷十三

六

天麻炙

蝎梢蜂全

天南星炮

蚕戴

生犀

羚羊角

朱砂

藿香葉

白檀香

烏蛇肉酒浸

零陵香各一兩

天雄尖

麝各半

牛黃一分

雄黃錢一

孤肝一具

薄切

烏鴉一隻去嘴爪腸

末秤更研煉蜜和硬軟得所石上槌三百下珀器

盛薄苛湯下二九大人白豆大兒菴豆大卒患併

三服癰瘻中風膩粉同藥大水調下兒驚風金銀

薄苛湯婦人血風產前後中風手足彎曲當歸紅

花酒傷寒豆淋酒下三五丸

透冰丹治一切風毒攻心口舌乾澀痰壅不食及風

毒下注腰脚疼痛脾虛體黃腎敗骨弱踈痰利膈癰

緩兒驚風

川大黃 益智子 茯苓 茯神

蔓荊子 威靈仙 天麻 仙靈脾

吳白芷 山梔七稜小者 麝一分

細黑醋一分燒 川烏頭生四兩淨河水浸半月

並生末之蜜和杵一萬下丸如桐子薄苛汁溫酒

幼幼新書 卷十三 七

下兩丸卒中研四九阜角白礬湯癰緩風服三五

丸常服一丸茶酒任下兒驚風入膩粉少許薄苛

汁化半丸瘰癧慈茶清下一丸忌動風毒物

神寶丹

自然銅斤半 金星礬石 禹餘糧石 石膏各一兩

煨赤礬醋淬七度羅末八磁盆湯淘二十度候浮

盡黑汁收底真藥于磁器內慢火逼盡水服

蔓荊子 威靈仙 茯苓 天竺黃

天仙藤 白蠟蚕 鉛白霜 蜘蛛去毒炒

白蒺藜 旋覆花 莽草 犀角

半夏洗七度炒黃 藿香各一分 桑螵蛸 瓜蒂各二錢

赤小豆九粒 人參 檳榔生熟各半

劍脊烏蛇肉酒浸炙 虎骨浸炙 白龍沙定

白犬粟米餵用第三 擣羅

朱砂兩一 牛黃 龍腦各一分 麝

膩粉 乳香各少許

研如塵入前藥攪槐膠水煮麵糊和鐵臼擣熟丸

如彈子焙每一粒豆淋酒磨下作十服五服後浸

幼幼新書 卷十三 八

阜角水磨服兒量減金銀薄苛湯磨

靈苑太一流金大道散

躑躅花 肉桂 乾薑 附子生各錢半

細辛 朱砂 阜角肉炒 燕蘆各二錢

牡丹皮錢四

各研細氣厥及廁上中惡卒中或厥諸疾不醒人

事手足搐搦戴目悶絕及元氣血氣上衝痛悶欲

絕者頭風夾腦風傷寒不解吹鼻內大人一字兒

半字嚏效傷寒慈汁丸如菜豆服七丸薄苛薑臘

茶下七九傷寒久不解者葱酒下十九

醫局婁金丸治諸風神亂恍惚舌強語澀心忪煩悶
口眼喎斜手足轉曳及風虛眩暈頭目昏痛或旋運
僵卧涎潮搐搦卒中急風不省人事兒驚癇

天竺黃 白附子 牛黃 腦麝各一

天麻 防風 白花蛇肉酒浸焙各三兩

細辛 膽星 川芎 白芷

人參各兩半 羌活 黃耆 蠶蚕燻去絲

羚羊角 芍藥 甘草燻 麻黃去根節

幼幼新書 卷十三 九

茯苓 犀角 藁本各二兩 甘菊四兩

金箔片一百 生地黃汁五升蜜一斤酒二升

細末膏和每兩作五十九金箔衣細嚼一九溫酒

下中風涎潮不語昏塞甚者三九薄苛汁溫酒共

半盞化藥灌常服一九濃煎人參湯嚼薄苛湯亦

得兒阜子大薄苛湯化

龍虎丹治新久急風緩風半身不遂手足筋衰及風
毒攻注遍身瘡疥頭風多白屑毒風面生瘡刺風狀
如針刺痛風急倒作聲頑風不認痛痺癱風頸生斑

駁暗風頭旋眼黑癩風面生赤點肝風臍悶眼瞤偏
風口眼喎斜節風肢節斷續脾風心多嘔逆酒風行
步不前肺風鼻塞項疼膽風不睡氣風肉似虫行腎
風耳內蟬鳴陰間濕痺兒驚風

大附淨炮 天竺黃 牛膝酒浸 川芎

川羌活焙 天麻生 半夏浸七次 細辛生

何首烏 獨活 柴胡 桔梗

藿香 黑牽牛燻 硫黃結砂各二兩 川烏頭淨炮

官桂生 蠶蚕燻 船上茴香燻 白芷

幼幼新書 卷十三 十

甘松焙 縮砂仁 五靈脂生 菊花各五兩

烏蛇肉酒浸半斤 白乾薑炮 白蒺藜燻 防風

地龍燻 朱砂飛各三兩 木香 確黃飛

馬牙硝 水銀結砂各一兩 龍腦半兩

寒水石燒赤飛一斤

細末蜜丸如雞豆大薄苛酒嚼一九日一重者二

服產後驚風亂道見物朱砂酒磨產後虛腫血風
昏沉身如刺髮隨梳落面赤心逆當歸酒嚼日兩
服若傷寒炒葱豉酒嚼一二服出汗愈兒驚風薄

苛酒化下少許大人急風口噤失音薄苛酒化灌常服茶酒任下

治男婦半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞及一切風兒驚風大人頭風洗頭風婦人血風青州白

九子

天南星

生三兩 水洗七兩

川烏 生淨半兩

白附子

生二兩

細末生絹盛井水擺出盡為度放磁盆中日晒夜露曉易井水攪春五夏三秋七冬十日去水晒乾

幼幼新書

卷十三

如玉片大米粉粥清丸如菘豆初服五九至十九

薑湯不時服如癱緩溫酒下廿九日三三日後浴有汗便能舒展五日呵吹是應常服十粒永無風

痰隔壅之患兒驚風薄苛湯下兩三九

返竟丹治諸風顛癇潮發癱瘓口眼相引項背強直牙緊目視及病久虛虛風多睡荏苒不解

烏犀

當歸 酒浸炒 各二兩 蟬殼炒

附子 水浸淨炮

石斛

川芎

肉豆蔻 炒

龍腦

牛黃

朱砂 飛

雄黃 飛 各半兩

天麻 酒洗

檳榔

天南星

湯洗薑汁 煮軟切焙

蟪蚤 淨炒

白附子

肉桂

白花蛇

烏蛇肉 酒各

浸一宿 炙熟

半夏

洗七次薑汁 浸三宿炒

乾蝎

葶藶

細辛

沉香

阿膠 珠炒如

陳皮

防風

槐膠

藿香

羌活

獨活

麻黃 去根

川烏頭 燒

留煙入坑 土圍食頃取出 覆新

木香

羚羊角

麝 各一兩

茯苓

蔓荊子 去白

晚蚕蛾

來蝶蛸 炒

幼幼新書

卷十三

何首烏

米泔浸一宿 煮焙

白朮

米泔浸一宿 炒

藜蘆

縮砂仁

白芷

枳殼

敗龜

虎骨 並酒醋 炙

丁香

厚朴 薑汁炙 各三分

膩粉

金箔 衣片

烏鴉 一隻去 嘴翅足

狐肝 三具二味 臘月採 新確盛 泥固炭一

秤燒 烟盡

水銀硫黃

各半兩 磁盞盛 攪成砂 成汁同水 銀炒成砂

如法修研細煉蜜八酥搗三五千下丸如桐子一歲一九不時溫薄苛汁化下

莊氏治虛風及吐瀉後精神昏困羌活膏

川羌活

防風 各一兩

川芎

荊芥穗

蝎梢焙

天麻二味酒浸三日

人參

白朮

白茯苓各半

未棗肉九櫻桃大朱砂衣薄苛湯化一九蜜和兒易服

中風第三

巢氏兒血氣未定肌膚脆弱若將養乖宜寒溫失度腠理虛開即為風中凡中風皆從背諸巖俞入心中風但偃卧不得傾側出汗唇赤若汗流可治急灸心俞若唇或青白黃黑是心壞為水面目亭亭時悚動

幼幼新書

卷十三

十三

不治五六月死肝中風踞坐不得低頭若繞兩目連額色微青唇青面黃可治急灸肝俞若大青黑面一黃一白是肝傷不治數日死脾中風踞而腹滿身通黃吐鹹汁可治急灸脾俞若手足青不治腎中風踞而腰痛寶鑑有視脅左右未有黃色如麩糶大者可治急灸腎俞若齒黃赤鬢髮直面上色有逆不治肺中風偃卧胃滿短氣冒悶汗出目下卑四迴至口色白可治急灸肺俞若黃肺已傷化為血勿復治也當撥空或拈衣如此數日死年長成童者灸皆百壯五

六歲至嬰兒消息灸之嬰兒中風成癩癩

茅先生兒中風候大熱牙關緊噤狂躁此熱盛乘虛

被邪風吹着所致用奪命散急慢門吐下風涎方醒次

勻氣散和胃氣不醒脾散一慢脾風門夾服三日內

下鎮心丸驚門切第四日下青金丹積聚門下風涎再用

勻氣散廻陽散寒門驚傷醒脾安樂常服鎮心丸

千金增損續命湯治卒中風惡毒及久風角弓不隨

并躄曳僻不能行步

麻黃去根節

甘草炙

桂心各一兩

芩薊

幼幼新書

卷十三

十四

芎藭

升麻

當歸

獨活各十

人參

黃芩

石膏各半兩

杏仁淨廿粒

吹咀水六升煮麻黃去沫內諸藥煮升二合三歲

兒分四服一日令盡得汗以粉粉無汗再服

水鑑水銀膏子兒生半月以前手足抽動是在胎骨

節毛孔中邪風陰陽不正之氣所干生後又被外風

而致不為天癆又云有孕後父母交通惡氣形胎致

之非天鈞容忤

水銀一兩青竹筒貯立臘日下廁中錫蓋密封勿穢入端午取出銀在上如雪

青黛

牙硝各三分

黃葵花一分

胡黃連六分

研鉛霜極細白羊骨髓丸如菴豆水研二九灌

治脚搐手不搐灸即火氣攻心其風難除

竹瀝和黃連更入一銖鉛黃丹熬令充作散塗足

不抽牽

聖惠羚羊角散治中風筋脉拘急項強腰背硬手足

搐搦發歇不定

羚羊角

防風

麻黃去根

黃芩

桂心

細辛

甘草各半兩

羌活三分

幼幼新書 卷十一

粗散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合煎一

兩沸量兒頻服汗出效

天南星丸治中風四肢拘急心神悶亂腰背強直

天南星炮

膩粉

牛黃

麝各一分

白附子炮

半夏洗七次

麻黃去根

槐子炒

防風

朱砂

犀角各半兩

五靈脂

乾蝎炒各一兩 金銀箔各卅片

羅末醋一大盞入藥末一半慢火熬膏次入餘藥

丸如菴豆一歲一丸溫酒下日三四

治中風手足搐搦及驚風牛黃丸

牛黃

乾蝎炒

防風

麝

鉛霜

南星炮各一分

犀角

天麻

天竺黃

白附子炮

烏蛇肉炙

朱砂飛各半兩

膩粉錢一

羅末蜜丸如菴豆溫薄苛湯研三九更量與

治中風口眼牽急朱砂丸

朱砂飛

蚰蚃炒

蠶蚕炒

南星炮各半兩

羅末麵糊丸如菴豆一歲一丸薄苛湯下

譚氏治中風癱緩一日内

膽礬研如麵服一字溫醋湯下吐涎漸輕

治兒中風牙關不開

天南星一個煨熟紙裹角剪雞頭犬一竅透氣臍

孔中牙關立開

養生續命湯治中風痲身體不收口不能言冒昧不

知痛處拘急不得轉側婦人產後去血老人小兒並

宜風痲身無痛處四肢不收言不變智不能知可治

麻黃去節

桂皮

當歸

人參

石膏	乾薑	甘草	芍藥	石南草	丹參	秦朮	烏頭	獨活	防已	細辛	芍藥	芎藭	切入絹袋清酒五升浸隨時日數服半合日三	治中風往來寒熱脅滿嘿嘿煩心喜嘔不欲食黃	切切新書	卷十三	十一	芩湯	黃芩	人參	甘草	半夏	乾薑	柴胡	棗肉	切水三升煮一升為三服煩者去半夏人參加苦	葶子半個當歸二兩龍骨二兩苦蕒根二兩腹痛	去黃芩加芍藥一兩茯苓二兩表證不解去人參	加桂心二兩微汗病得七八日不解結熱在內往	來寒熱者加黃連二兩芒硝半兩	張漢治中風痰盛蠛蝟散
----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------------------	---------------------	------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	------------

桑螵蛸	天麻	天南星	僵蚕	麝香	牛黃	膩粉	研勻服一字至半錢溫酒調量加	治中風啼不出及心肺中風白花蛇散	白花蛇	桂心	人參	羚羊角	菖蒲	川烏頭	細末服一字至半錢點麝荊芥湯調	治中風不省槐子煎	防風	白附子	槐子	蠶蚕	麻黃	乾薑	半夏	細末好醋兩大盞慢火熬膏	牛黃	麝香	朱砂	金箔	和膏丸如菜豆溫酒服五粒量加牙緊急化灌	保生回生丸主傷寒八九日無汗及日多沉重精神	不與人當汗欲出不出危殆者又傷寒壞病手足筋	攣筋受寒邪而厥冷及高年虛勞煩喘婦人經水不	勻氣血虛劣又破傷風痰嗽肺痿盜汗寒熱身痛兒	鬱督昏迷癱瘓各宜汗者
-----	----	-----	----	----	----	----	---------------	-----------------	-----	----	----	-----	----	-----	----------------	----------	----	-----	----	----	----	----	----	-------------	----	----	----	----	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

麻黃去根 桑白皮一斤 續隨子兩四 白藥子兩三

河水五石浸一宿大釜器旋添浸藥慢火熬以麻

黃心黑水只二三斗為度去滓絹濾再入銀石

熬膏

沒藥 乳香透明水 桔梗 白芷

鍾乳研五 當歸湯洗焙 人參 木香各半

白茯苓兩二 沉香兩一 苦參兩六

末麻黃膏七如彈子臘月合服一九百沸湯化覺

怔忡肉瞤汗出效兒服常以零陵香白芷末養藥

初幼新書 卷十三 七

聚寶治中風孤膽丸

浮萍草紫背者七月 雄狐膽收陰乾

浮萍末膽汁九芥子大服三九不時金銀薄荷湯

服 聖惠兒身強角方反張灸臍上入髮際三分三壯次

灸大椎下節開三壯炷如麥

寶鑑兒五歲中風各遂歲灸本俞

中風痙第四 東氏兒解脫或臍瘡未合為風所傷皆發痙

千金太陽中風重感寒濕則變痙口噤不開背脊頸

項強直如痙擗頭馬鳴腰反折頃更十發氣息如絕

汗出如兩時脫勿得之產婦及金瘡血脉虛竭兒臍

風大人涼濕得痙皆死溫病熱盛入腎兒痙熱盛皆

痙痙瘡厥顛一有尸厥 皆相似故久厥成癩審察之

重者耳中策策痛風入腎也不治入腎喜卒然體痙

直如死皆宜小續命湯兩三劑若耳痛腫生汁作瘡

無害惟風宜防針耳前動脈以風府良

茅先生兒目上視無黑睛身強直或反張如屍或角

弓五硬下黑血因痙失調傳變痙依痙病調理如吐

利不止十無一生

千金翼療賊風急痙鐵屑炒極熱投酒中飲

聖惠牛黃丸治中風痙牙關緊項背強直一切驚痙

牛黃 天竺黃 雄黃 腦麝

犀角 乾蝎炒 水銀粟肉研 附子炮

分 朱砂飛 天麻炙 蠶蚕炒

白附子炮 羌活 獨活 蔓荊子

蟬殼炒 梁蠆炒 羚羊角 香附

麻黃去根 野狐肝炙各半兩 烏蛇肉酒浸一兩

羅末蜜丸如麻子不時薄荷酒研三九量服

烏蛇丸治中風痙及天鈞驚癇一切諸風

烏蛇肉一兩 天漿子枚廿 乾蝎一分 天南星

白附子炮裂 天麻炙 半夏洗七次 防風各半兩

黑附子炮淨一兩

酒浸七日焙末之

牛黃 腦麝 朱砂 雄黃各一分

研八上藥末糯米飯丸如黍不時薄荷湯下三九

幼幼新書 卷十三 廿一

量服

烏犀丸治中風痙及驚癇諸風手足搐搦

烏犀角 天南星 白附子並炮裂 乾蝎炒

天麻各一分 白花蛇肉半兩酒浸炙

羅末無灰酒一盞銀器煎稠

牛黃 腦麝 膩粉 水銀棗研星盡

各一分 朱砂飛半兩 虎睛一對酒浸炙

未入煎丸如麻子不時竹瀝下三九量服

張煥天南星膏

天南星酒熬膏 赤頭蜈蚣炙烏蛇酒浸

全蝎各半兩 朱砂飛一兩 牛黃

未入膏拌勻石臼中搗成膏服卑子大薄荷汁入

酒一滴化下

中風口噤第五

巢氏云手三陽筋入結頷足陽明筋上夾口膚頰膝

虛受風冷客諸陽筋筋得寒冷則變急故機關不利

而口噤

幼幼新書 卷十三 廿一

寶鑑歌

三陽連口頰風傷口必喎諸筋風若中禁急不

能開

肘後

雞屎白如大豆三枚末水飲之聖惠白酒下大豆許

千金

雀屎麻子大丸之飲下聖惠雄雀屎糊丸薄荷湯下麻子大三丸

聖惠治中風口噤冥冥如醉防風散

防風 川升麻 羚羊角 羌活

石膏 <small>各半兩</small>	粗散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合煎一兩沸不時量溫服	桂枝湯治中風口噤四肢拘急	桂枝	獨活	麻黃 <small>去根節</small>	赤芍藥	川大黃 <small>炒</small>	防風	細辛 <small>各一分</small>	羅散不時薄苛溫酒調半錢量服	犀角散治中風口噤腰背強硬搐搦	犀角	獨活	麻黃 <small>去根節</small>	白附子 <small>炮裂</small>	乾蝎 <small>炒</small>	牛黃 <small>一分</small>	天麻	南星 <small>各半兩</small>	麝 <small>半分</small>	細羅又研不時薄苛酒調半錢覆取汗量服	治中風口噤不省欲死	瓜蒂 <small>七枚</small>	赤小豆 <small>二七粒</small>	全蝎 <small>炒一</small>	細散粥飲調一錢服吐涎效	犀角丸治中風口噤體熱筋脉拘急	犀角	羚羊角	防風	黃芩 <small>各一兩</small>	麝 <small>錢一</small>	朱砂 <small>飛半兩</small>
-----------------------	----------------------------	--------------	----	----	-----------------------	-----	----------------------	----	-----------------------	---------------	----------------	----	----	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----	-----------------------	---------------------	-------------------	-----------	----------------------	------------------------	----------------------	-------------	----------------	----	-----	----	-----------------------	---------------------	-----------------------

未蜜丸如菜豆不時薄苛酒研三九量服	王氏治牙關緊不語不乳開關散	蜈蚣 <small>一條</small>	白蠶蚕	天南星 <small>炒各錢一</small>	猪牙卓角 <small>燒二錢</small>	未薑汁蘸藥擦牙關及舌根涎出自開	鄭愈還魂丹	麝 <small>字一</small>	蝎梢 <small>三七個</small>	朱砂 <small>錢二</small>	天南星 <small>個一</small>	細末麵少許滴水丸如菜豆冷水研一九滴口中	令活後用金銀薄苛湯灌二三九別藥調理	中風涎潮第六	張渙白王丹	天南星	半夏 <small>生並</small>	蠶蚕 <small>炒</small>	桂心	石菖蒲 <small>各一兩</small>	膩粉	龍腦 <small>各一分</small>	細末薑汁丸如黍服十粒人參湯下	鬱金丹	鬱金	蝎梢	桔梗	南星 <small>炒各半兩</small>	巴豆 <small>五枚童便浸淨出油</small>	膩粉 <small>錢一</small>	細末滴水丸如黍冷荆芥湯下五九量加
------------------	---------------	----------------------	-----	-------------------------	-------------------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	--------	-------	-----	----------------------	---------------------	----	------------------------	----	-----------------------	----------------	-----	----	----	----	------------------------	----------------------------	----------------------	------------------

莊氏天麻防風丸治風癱涎實中風癩疾筋脈緊急精神昏塞或時驚叫眠睡不穩

天麻炒

防風

人參各一兩

乾蝎炒

蠶蚕各半兩

甘草炙

朱砂

雄黃各一分

牛黃錢一

麝分一

末蜜丸如櫻桃薄苛湯化一九兒不減不時

中風四肢拘攣第七

巢氏兒肌肉脆弱易傷風冷中膺膝入經絡搏筋脈筋脈得冷即急故四肢攣

幼幼新書

卷十三

七

聖惠獨活散治中風四肢拘攣心神煩亂不睡

獨活

黃耆

酸棗仁

茯神各一兩

防風

白蘚皮

羚羊角各一分

桂心

甘草炙各半兩

羅散服一錢水一盞煎五分量服

羌活散治中風四肢拘攣發歇疼痛

羌活

芎藭

防風

天麻

當歸炒

甘草炙各三分

麻黃去節根半兩

白附炮一分

細羅散薄苛酒調半錢日三四量服

治中風手足筋脈攣急一字散

蟬殼

乾蝎

蠶蚕炒

半夏薑汁

南星炮各一分

朱砂飛半兩

末一字荆芥薄苛湯調日三四服

牛黃丸治中風手足拘攣身體強直口噤壯熱

牛黃

羚羊角

胡黃連

釣藤

乾蝎炒

犀角

麝

朱砂

雄黃

天竺黃

水銀各一分

烏蛇肉半兩酒浸炙

幼幼新書

卷十三

七

羅末蒸餅丸如米薄苛湯下五粒取汗量服

嬰孺治風攣兩脚疼痛鎮心止驚石斛酒

石斛分二

牛黃

蜀椒汗

白朮

細辛各四分

秦朮

紫石英

當歸

乾薑各八分

防風

杜仲

桂心

人參

黃耆

甘草各六分

獨活十分

附子炮

地黃

防已各五分

麥門冬七分

絹袋盛清酒五升半浸泥器口春夏五日秋冬十

日初服半合日三稍加知為度

張漢獨活黃耆湯

獨活 黃耆

酸棗仁 羚羊角

桑白皮 肉桂

麻黃 川芎

細末一錢水一盞薑薄荷各三片煎五分溫服

中風不隨第八

葉氏風邪中肢節結筋脈風挾寒者拘急攣痛挾熱者緩癱不隨

聖惠赤箭丸治中風半身不隨肢節拘攣不得轉動

赤箭 蠶蚕炒

白附子 羌活

桂心 牛黃

麝香 白花蛇

未蜜丸如麻子荆芥薄荷湯下五九日三四量服

治中風手足不隨諸藥不效草麻子散

草麻子 石榴

石榴去子盛藥泥裹作球慢火炙燒赤藥氣透即

熱

乾蝎 半夏 天南星 白附

同前藥細研溫酒調一字量服

牛黃丸治中風四肢不隨心神迷悶

牛黃 天竺黃 犀角

天南星 白附子 蠶蚕 地龍

乾蝎 鬱金 蜈蚣 天麻

麝香 朱砂 烏鴉 烏蛇

末米飲丸如黍溫酒下五九量服

保生主中風癱瘓四肢不隨風痺等起死輕骨膏

麻黃 桑白皮 川芎

白芷 蒼朮 甘松 苦參

末研細麻黃膏丸如彈子溫酒一盞化頓服一丸

臨卧取汗五七日再服手足輕快兒驚風量與卒

中涎潮分利涎後用

寶鑑灸百會次風池次曲池 次膝腿并三里

各三壯 中風口喎斜僻第九

葉氏足陽明筋上夾于口手三陽脈偏急而口喎斜

僻是風入頷頰筋

聖惠防風散治中風口喎斜僻手足不遂風入于巖或語不得心神昏悶

防風

川升麻

桂心

羚羊角

麻黃

去根節

羌活

杏仁

炒

芎藭

各一分

粗散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合煎兩

沸溫分二服如行十里再服衣覆取汗量服

蟬殼散

蟬殼

端午採南枝上者

寒食麩

切切新書

卷十三

十九

等分細研醞醋調糊如患左斜塗右邊右斜塗左

口正急洗去

苦蕒瓢水絞汁和大麥麵作餅炙熱熨正即止

治中風偏斜口眼身上頑麻

草麻子

樗根皮

苦蕒瓢

研大麥麵作餅摻藥在上左患貼右右患貼左慢

火熨正急去之身上頑麻津唾調摩

錢乙全蠋散治驚風中風口眼喎斜語言不正手足

偏舉

全蠋

去毒炒

直蠶

炒

川芎

黃芩

去心

大南星

浸七次淨

甘草

炙

桂枝

不見火

赤芍藥

麻黃

去節各三兩

天麻

錢六

粗末三錢水盞半薑七片煎七分溫服無時日三

四忌羊肉

莊氏治偏寫風口面喎斜

赤足蜈蚣竹刀平半截開各為末左用右貼右用

右貼入麝少許同研

中風失音不語第十

切切新書

卷十三

二十

巢氏喉嚨者氣之道路喉厭者聲音門戶暴寒客喉

厭喉厭得寒氣不得發聲故卒然失音不出非牙關

噤

寶鑑中風體緩痛聲不出歌

風冷傷筋脉四肢全不仁痛因冷熱氣緩是一

邊生寒客于喉厭啼聲似啞人溫和湯藥進不

兩損精神

千金石膏湯治中風惡瘵不語口眼了戾四肢不隨

石膏

合

麻黃

去節根

甘草

炙

射干

桂心 芍藥 當歸各四 細辛二

吹咀水三升半煮麻黃三沸去沫內諸藥煮一升

三歲兒分四服日三

聖惠木通散治中風失音不語四肢壯熱

木通 防風 川升麻 羚羊角

桂心各半 甘草一分

粗散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合煎二

沸不時量服

又方

幼幼新書 卷十三

亂髮燒 桂心各一

羅末不時溫酒調半錢量服

治中風失音不語咽中不利筋脉拘急烏犀丸

烏犀角 牛黃 白附子炮 附子炮

殭蚕 全蝎炒 天南星生 半夏洗七次去

滑各一分 膩粉錢一

未軟飯丸如黍不時薄葶藶湯研三九量加

治中風失音不語肢節拘急腰背強直羚羊角丸

羚羊角 防風 羌活 朱砂

天麻炙 白附子各半 蠶稍炒 牛黃

麝各一分

未再研蜜丸如菴豆不時薄葶藶酒研二九量加

治中風失音不語舌根強硬

陳醬汁合半 人乳合二

和少與服

張渙治中風失音不語牙關緊急竹瀝膏

竹瀝 生地黄汁 蜜各半 桂心

石菖蒲並末

幼幼新書 卷十三

慢火熬膏硬軟得所服阜子大一粒梨汁化

幼幼新書卷第十三

葶藶書屋粹

幼幼新書卷第十四 熱風暑寒 凡十一門

後學古吳陳履端于始輯

常熟嚴 澍道時校

溫壯第一

巢氏兒藏府不調內有伏熱或挾宿寒皆搏胃氣足陽明胃經主肌肉胃不和則氣雍澀故蘊積體熱為溫壯兒黃黃真腹有伏熱宜龍膽湯一切若黃白酢真挾宿寒不消脹氣雙九積聚輕者少服默除甚者小增令微利皆當節哺令胃氣調和若不節傷胃病

幼幼新書

卷十四

辛布之

易復腹滿再三利尚可多則傷兒

肘後

大黃分四

甘草炙

當歸

芍藥各二分

水一升六合煮八合分三服兒胎寒腹痛乳哺不時溫壯熱吐利不常諸驚掣縮二十五癩瘡發口瘡惡核目赤黃瘦變蒸用芍藥赤白各半如宣泄純赤生用二分疫癘溫壯肺邪寒熱用四分利小便用赤驚狂瘡疥目赤瀉血當歸肉多枝少氣昏者生二分欲血脈流暢不為瘡核及止腹痛胎寒

腹痛喘不已用四分如理寒熱破積解溫壯加大

黃如牛舌緊硬用蜀中者欲宣蕩用河西錦紋生

者四分下利二分甘草赤黃斷理緊而易折者炙

二分虛熱邪氣大能安神定驚和而不寒故號國

老冒寒邪加去節麻黃一分驚風反折戴眼掣縮

加細辛四分中風加獨活二分

千金竹葉湯主溫壯腹滿息不利或微腫亦主極羸

不食堅痞手足逆冷一有

竹葉升一

小麥升半

甘草炙

黃芩

幼幼新書

卷十四

二

右之

苦蕒根

澤瀉

茯苓

知母

白朮

大黃各一兩

桂心二銖

薑兩半

人參二兩

麥門冬

半夏各二兩

當歸十八銖

咬咀水七升煮麥竹葉四升去滓內藥煎一升六合分四服

合分四服

聖惠黃芩散治溫壯或下後熱不除舌大不含乳胃

有痰口生瘡兼驚悸犀角散無硝蛇多掩

黃芩

川大黃炒各一兩

甘草炙

川芒硝各半兩

蛇蛻三寸

粗散一錢水一盞煎五分去滓入牛黃少許量溫服

牛黃散治溫壯體常熱

牛黃 甘草各半 梔子仁 子芩

柴胡 龍膽各一

細羅金銀湯調下不時服半錢量兒

胡黃連散治溫壯常飲水

胡黃連 犀角 牛黃 龍膽

川大黃炒微 甘草炙 知母各一 麥門冬焙

幼幼新書 卷十四 三

細羅沙糖水調半錢量加減

牛黃丸治溫壯及驚熱

牛黃 天竺黃 腦麝 熊膽各一

犀角 胡黃連 郁李仁 山梔各半

研勻糯米粥丸如麻子不時薄荷湯下三九量加

嬰孺雀糞丸治病後腹中不調飲食不節腹滿溫壯

并客忤驚傷冷乳

雀糞 牛黃各一 芩 芍藥

乾薑 甘草各二 麝 小麥麵

大黃 當歸 人參各三

未蜜丸麻子大一服三九日三欲下五丸常將三

丸乳前後哺可加黃耆黃芩各三分炒

五味湯治下後身溫壯有結熱

五味子各三 黃芩 柴胡 芒硝

麥門冬 石膏各二 黃連 甘草

當歸各一 大黃各四

水二升七合煮一升三合去滓內芒硝再沸二百

幼幼新書 卷十四 四

日兒服三合日三夜一有痰必吐

壯熱第二

巢氏兒血氣盛五藏熱薰于外其發無漸名壯熱若

不甚盛為溫熱溫壯相似伏熱者大便黃臭挾宿寒

者糞白酸臭此藏府不調冷熱之氣俱乘腸胃蘊積

漸染而發壯熱不歇變驚極重者成癇

錢乙論潮熱依時發熱過時即退欲發驚壯熱一向

不已甚發驚癇風熱者身熱而口氣熱有風證溫壯

但溫不熱

壯熱昏睡傷風熱瘡疹傷食皆相似若未辨服升
麻葛根湯惺惺散傷寒門小柴胡湯傷寒門惟傷食大
便酸臭不化畏食或吐食宜下

莊氏壯熱有七

傷寒壯熱時時舌出繳唇

斑瘡壯熱咳嗽腹聲唯耳鼻不熱不然噦逆也

風壯熱鼻兩邊胞一作動吸吸然甚者鼻生瘡手有
血紋

氣積壯熱早辰手足冷晚沉重困悶晚哺潮熱

幼幼新書 卷十四

五

虛積壯熱脚冷手不冷積在左肋右腮赤在右左腮

赤

驚壯熱愛睡便仰卧妄語驚跳啼叫搖頭弄舌上竄
喉痺壯熱時時嗽思飲冷水喉痛時復小寒

千金治腹大短氣熱有進退喫食不安穀不化

大黃 黃芩 甘草 芒硝

麥門冬各半石膏一兩桂心八銖

吹咀水三升煮一升半分三服暮歲兒作五服

五物甘草生摩膏治新生肌膚嫩弱風邪所中或中

大風手足驚掣

甘草 防風各一兩 白朮 桔梗各廿銖

雷丸二兩

吹咀不中水豬肪一斤煎膏內藥微火煎稠去滓

彈丸大一枚炙手塗摩百過無病兒早起摩頤及

手足心甚辟寒風

外臺白芷湯浴兒根苗亦得苦參亦佳

秦白皮一升煎湯澄清浴差冷洗赤眼亦效

日華子治壯熱一切瘡疥皮膚癢痒

幼幼新書 卷十四

六

梓白皮湯洗秋梓佳

聖惠犀角散治壯熱口乾心煩不欲食

犀角 黃耆各一 黃芩 麥門冬焙

柴胡 川升麻 甘草各半兩

粗散一錢水一盞淡竹葉七片煎五分去滓量溫

服 人參散治壯熱心神不安

人參 川升麻 赤茯苓各半

兩 鈎藤 山梔子 甘草各一

粗散一錢水一小盞煎五分去滓溫服

大黃散治春歲至三歲壯熱

川大黃兩一 石膏兩半 柴胡 枳殼炒

黃芩 赤芍藥 梔子 知母

川升麻 杏仁炒 各三分

粗散一錢水一小盞清竹葉七片煎五分去滓溫服

牛黃散治卒壯熱心煩頰壅

牛黃 甘草各半 黃芩 梔子

龍齒 犀角 寒水石各一 麝香錢一

細散竹瀝調半錢服量加減

譚氏

天南星 半夏 滑石各二 巴豆霜字一

細末麩糊丸如粟一歲三粒葱湯下

嬰孺竹瀝葛根湯治壯熱發疹尚熱

竹瀝升二 生葛計五 牛黃三 黑豆許

月內兒服半合四五歲作四服

萬金鈞藤散治壯熱驚悸大小便赤澀

萬金鈞藤散治壯熱驚悸大小便赤澀

鈞藤 天竺黃 地骨皮各一 茯神

犀角 龍膽 川芒硝 甘草

赤茯苓各半 川大黃炒 三

末一錢水一盞煎五分去滓溫服

趙氏人參保童丸治稟氣弱筋骨軟肌肉淺薄乳食不成肌肉面黃體熱多汗

人參 石蓮肉 史君子 沒石子

乾山藥 當歸 白芍藥 白朮各半

木香分一 黃連一分半 夏末一分

末稀糊丸如麻子服七九三歲以上十九溫湯下

吉氏人參散治傷寒潮熱鼻塞頭疼亦治清涕壯熱

人參 茯苓 羌活 當歸

前胡 甘草各一 麻黃去節 三錢

末半錢水半盞薑一片煎三分溫服

時氣第三

巢氏四時忽有非節之氣如春應暖而寒夏應熱而

冷秋應涼而熱冬應寒而溫其氣傷人病頭痛壯熱

與傷寒相似無同長幼病証略同此時通行此氣各

與傷寒相似無同長幼病証略同此時通行此氣各

時氣世呼天行病

天行病發黃脾與胃合俱象土色黃候于肌肉熱入脾胃其氣蘊積蒸發于外故黃

時氣腹滿熱入腹與藏氣相搏氣痞塞故腹滿毒氣瘵心煩懊者死

失時投藥不與病會致病連滯乍差乍劇或寒或熱敗壞無常寶鑑名

日數未滿本當壯熱而邪不退其乘于陽爭則熱瘵于陰爭則寒陰陽之氣為邪所并互相乘加故寒熱

成瘵幼幼新書 卷十四 九

時氣吐下後壯熱不歇是腸胃宿虛而又吐利則重虛其熱乘虛入裏表裡俱熱停滯不歇故雖吐下猶熱

時氣熱渴後不嗜食而面色青是胃中餘熱未盡氣滿故不嗜食諸陽俱上榮于面陽虛未復本帶風邪

挾冷搏于氣血故面青

時氣熱退氣血未和藏府熱勢未盡或起早勞動或飲食不節病復多重于初血氣已虛重傷故也

寶鑑時氣歌

時氣皆因節令虧頭疼壯熱汗微微良醫若得看形候須作傷寒病有歸

時氣后大小便不通歌
熱毒還從府氣衝便成結熱在腸中身體苦煩多躁渴更兼便溺不能通

時氣躁渴歌
誰言吐下熱無餘只為元因藏府虛熱盛更虛皮肉溢至今煩渴躁難除

石壁經歌
夜熱天明又復涼都緣藏府有風傷只消將藥醫脾藏一除次使神方瀉大腸患候但觀喉厭動更看眼急赤鼻頭光此病已傳瘟疫候若能

辨別是醫王

此內傷物外傷邪所致先散邪次去積主夜頭額

多汗口中涎響脾風故多言非出也風髓宜七寶

形證論緣飢過食冷滯脾胃氣不行諸經夜熱晝涼

先南星丸傷寒變三五服後間檳榔散煩熱則氣和

又頃白丁香膏見未取或只磨積調氣不得便取恐難止為肚大成疳疾

聖惠解肌湯治時氣壯熱頭疼咳嗽不食

麻黃去節 杏仁燻 赤芍藥 貝母炮

柴胡 葛根 甘草炙各半兩 石膏一兩

粗散一錢水一盞煎五分去滓不時量服

麥門冬散治時氣咳嗽壯熱

麥門冬焙 川升麻各一兩 貝母煨 甘草炙各三錢

赤芍藥 杏仁燻炒各半兩

粗散一錢水一盞煎五分去滓入淡竹瀝半合更煎一兩沸不時量兒溫服

葛根散治時氣頭痛體熱煩躁

葛根 麥門冬各三錢 黃芩 赤芍藥

人參 犀角 川升麻 甘草炙各半兩

石膏一兩

散一錢水一小盞煎五分去滓不時溫服量兒

生地黄散治時氣壯熱咳嗽心胃脹悶乳食不下

生地黄 麥門冬焙各一兩 款冬花 杏仁燻

陳皮去白 甘草炙半兩

粗散一錢水一盞煎五分入竹茹半合煎去滓不時溫服量兒

葛根散治時氣煩渴腹中痞實

葛根 黃芩 柴胡各半兩 甘草炙一兩

川大黃炒一兩

粗羅散一錢水一盞煎五分去滓不時溫服利為度

蘆根散治時氣嘔吐不止

生蘆根 人參各一兩 竹茹半兩

細到服半合水一盞煎五分去滓不時量兒溫服

嬰孺治壯熱時氣驚悸并熱瘡

釣藤炙 人參 蚱蟬炙 子芩各一兩

蛇殼三寸 龍齒四錢 防風 澤蘭各二錢

石蜜一兩湯成入

切水三升煮七合量兒細服

錢乙人參生犀散解時氣寒壅咳嗽痰逆喘滿心忪

驚悸藏府或秘或瀉調胃進食又一切風熱服涼藥

即瀉而減食者

人參錢三

前胡錢七

甘草錢二

桔梗

杏仁錢五

羅過每二錢水一盞煎八分去滓食後溫服

張渙方

人參

生地黄各一兩 犀角

黃芩

柴胡各半兩

甘草一分

粗末服一錢水一錢薑二片煎五分去滓溫服

傷寒證八物麥門冬飲治天行壯熱咳嗽心腹脹滿

幼幼新書

卷十四

十一

麥門冬各三兩

甘草各一兩

人參各一兩

紫苑

升麻各二兩

貝母一分

服三錢水一盞茅根半握煎七分去滓入竹瀝少許再煎服

許再煎服

吳藍飲療天行頭痛壯熱

吳藍

大青各二兩

麥門冬

甘草各三錢

茵陳一分

梔子仁十五枚

服三錢水一盞八蘆根半握薑五片煎七分去滓

活人書水解散治天行頭痛壯熱一二日煎治癩瘡

未出煩躁或出身高熱

麻黃去節四兩

大麻

黃芩

桂心

甘草各二兩

芍藥各二兩

粗末生熟湯浴訖暖水調二錢相次二服得汗利便差強實人服二方寸七三伏中宜用春去大黃

朱氏人參散解利傷寒四時氣疫上焦虛熱心神恍惚脾胃不和飲食無味口苦舌乾煩悶

人參

茯苓

羌活

獨活

知母

枳殼炒

桔梗

知母

麻黃去根

枳殼炒

幼幼新書

卷十四

十四

甘草各一兩

川芎

陳皮去白

白朮

厚朴薑製

柴萸水煎

桂心不見火

前胡

削木

甘草節

等分末二錢水一盞薑棗煎七分要汗葱白豆豉

薑煎服嗽加杏仁麻黃兒入薄苛婦人止入薑嵐

瘡柳桃條二七節

溫病第四

吳氏冬時嚴寒人觸胃之寒入肌肉春得暖而發頭

痛壯熱謂溫病又冬應寒而反暖其氣傷人即發亦

頭痛壯熱謂冬溫病凡邪之傷人皆觸胃而感之兒
雖不然乳母抱持解脫不避風邪寒熱之氣亦成病
葉氏溫病下利者腸胃宿虛熱入腸胃與水穀相搏
故

鼻衄者熱乘氣入血肺應皮毛主氣開竅于鼻溫病
則邪客皮膚而搏氣結聚成熱乘于血血得熱從鼻
出為衄凡發汗不出或從來無汗鼻燥喘鼻息有聲
此天衄兒衄至一升數合熱因得歇至一斗數升死

幼幼新書

卷十四

十五

溫熱病四五日後熱入裏內熱腹滿宜下若下早裡

虛氣逆熱結胃上則滿短氣為結胃

仲景冬傷于寒春又溫病

醫局柴胡石膏散治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼
鼻塞咽乾心胃煩滿寒熱往來痰實咳嗽浮腫稠黏

柴胡 石膏 前胡 乾葛

赤芍藥 各五兩 黃芩 桑皮 荆芥穗 各

七兩 升麻 廿五

粗末二錢水一盞薑三片豉十餘粒煎七分去滓

稍熱兒三服

人參羌活散治溫邪寒邪溫病時疫瘡疹頭痛體疼
壯熱多睡及潮熱煩渴痰實咳嗽

人參 羌活 獨活 柴胡

芎藭 枳殼 炒 白茯苓 甘草 各

前胡 桔梗 地骨皮 天麻 各

散一錢水七分入薄荷少許煎五分去滓溫服不
時

莊氏甘桂湯春間疫氣欲作先氣壅畏風痰嗽頭昏

幼幼新書 卷十四 十五

鼻塞困悶無問大小以此驅之

甘草 官桂 皮 五味子 黃芩 各半

柴胡 兩 咬咀三錢水一盞薑五片煎七分去滓溫服

熱病第五

仲景論冬傷于寒夏為熱病

黃帝曰老人嬰兒熱病腹滿者死

聖惠冬胃寒氣入肌肉不即發夏為熱病

千金升麻湯治傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹

千金升麻湯治傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹

千金升麻湯治傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹

堅急大小便不利或口瘡或四肢攣掣驚成痲時發時醒醒後身熱

升麻

白薇

麻黃去根

姜萋

柴胡

甘草炙各

黃芩兩一

朴硝

大黃

釣藤各六

吹咀水三升煮麻黃去沫內諸藥煮一升兒一兩

日服二合量加

聖惠解肌散熱病頭痛口乾壯熱心神煩躁

麻黃三分

葛根

赤芍藥

黃芩

幼幼新書

卷十四

七

升麻

甘草炙赤各

篩散一錢水一盞葱白五寸煎五分去滓不時溫服量汗差

石膏散治熱病煩熱驚悸

石膏

川大黃炒

甘草炙各

大青

黃芩

梔子仁

知母

姜萋

川升麻

葛根

龍膽各一

散一錢水一盞煎五分去滓不時量兒溫服

吳藍散治熱病頭痛心躁眼黃

吳藍

大青

蘆根

石膏各一

甘草炙

麥門冬去心

黃芩各三

茵陳

梔子仁各半

粗散一錢水一盞煎五分去滓不時量服

犀角散治熱病煩熱大小腸秘澀心胃悶亂

犀角

赤芍藥

黃芩

川升麻

梔子仁

地骨皮

甘草炙各

麥門冬

川大黃炒各

篩散一錢水一盞煎五分去滓不時溫服量兒

幼幼新書

卷十四

六

牛黃散治熱病壯熱心煩

胡黃連

梔子仁

牛黃

甘草炙各

子芩兩一

細羅散不時蜜水調半錢量服

張煥石膏散

石膏

白茯苓

葛根各一

甘草炙

黃芩

芍藥各半

細末一錢水一盞竹葉薄荷少許煎五分去滓溫服

脹

真珠散治熱病口乾心神煩悶

真珠

牛黃

龍腦各一錢

瓜根

茯神

朱硃飛各半兩

馬牙硝

寒水石各一分

細末半錢蜜水調服

傷風第六

錢乙論傷風昏睡口氣熱呵欠頓悶大青膏熱發散不解有下證大黃丸未見飲水而善食者微下餘勿下

幼幼新書

卷十四

十九

傷風自利一有手足

脾藏虛怯當補益黃散

散大青膏未差調中丸有下證大黃丸下後服溫驚丸俱不

和門

傷風腹脹脾藏虛當補喘發散仍補脾去脹塌氣丸

胃氣不和

傷風兼心驚悸兼肺悶亂喘息硬氣長出氣嗽兼腎

畏明各隨補毋藏虛見故也

傷風下後餘熱下太過胃中虛熱飲水無力當生胃

中津液多服白朮散胃氣不和

傷風吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣粗大便黃白嘔吐乳食不消時咳嗽兼見五藏証煎入藏君臣藥化大青膏後服益黃散如曾下或無下證勿下此肺受寒不能入脾

傷風吐瀉身熱多睡能乳飲水不止吐痰大便黃水此胃虛熱渴吐瀉當生津液白朮散後用發散

傷風吐瀉身涼吐沫瀉青白悶亂不渴噎氣長出氣晦露睛傷風在甚輕怯因成吐瀉當補脾後發散二証多在春冬

幼幼新書

卷十四

二十

王訣歌

鼻塞傷風肺受寒喘欬驚啼卧不安頰赤口乾

頻發熱吐瀉邪攻藏府傳

先解熱後下涎次平胃

劉氏麥湯散治傷風傷寒壯熱咳嗽痰盛

麻黃

去根節薑汁浸一宿

知母

石膏煨

葶藶隔紙炒

地骨皮

杏仁

滑石

等分為末半錢小麥湯調服

莊氏方

京鼓葱生研作屬貼顙上有邪氣者鼓枕頭生研貼

吉氏金箔丸治驚風妳食不化成外傷風壯熱氣粗慢風捏頭口眼不閉及赤白痢

金箔卅九片 朱硃 水銀 膩粉

牛黃 青黛 蟬殼 姜蚕

麻黃去節 白附子 蝎 天麻酒浸

犀角 天南星泥各麝隨多

末煉蜜丸如梧子服二九薄苛湯化下

幼幼新書 卷十四 廿一

傷暑第七

醫局香薷丸治傷暑伏熱躁渴嗜悶頭目昏眩胃膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食霍亂吐利轉筋

香薷 紫蘇莖葉去粗皮 木瓜各一兩

丁香 白茯苓 藿香葉 甘草炙

檀香各半兩

細末蜜丸每兩作三十九服一二九細嚼溫湯下

新汲水化亦得兒不時服半丸

張漢清膈飲治伏暑嘔吐

香茹 淡竹葉焙各一兩 白茯苓 人參

半夏湯洗七次焙 檀香 甘草炙各半兩 白粳米合一

粗末一錢水一大盞煎七分去滓溫如熱水時時服

傷寒第八

葉氏云冒寒于冬八腠理搏血氣則發寒熱頭痛體疼為傷寒又春應燠而反寒傷即發病為時行傷寒

兒多由解脫時久寒氣傷之診其脉一投而止得病

幼幼新書 卷十四 廿二

一日假令六投六止者得病六日脉洪易治細微難治

傷寒瀆解肌令腠理開津液為汗發泄其氣則熱歇

無問長幼男女春夏宜汗脉浮大宜汗病在表故

千金論時行疾疫之年兒出腹便患痲治其時行節

度如大人用藥分劑少異藥少冷

聖惠傷寒勿用燥藥發汗燥極于藏府熱極傷心氣

多厥不可治用寒藥陽受于冷冷熱相擊驚叫不睡

熱衝腦頭縫開皮肉筋脉急脹不可治用熱藥助陽

也陽極則陰爭四肢汗出如油手足或熱或冷多狂
顛驚癡不可治

茅先生傷寒變蒸夾驚夾食中風所中傷寒各別根
源用藥如傳變吐不止大小便不通大渴耳濃出身
生赤痲心狂眼視聾口乾燥不治

漢東王先生兒傷寒可醫者七

臍內清水是傷寒臍肺竅身皮毛髮皆主肺涕流清
水身寒毛立後身熱躁叫口乾冷汗寒邪傷正氣正
氣軟弱不能主身被邪攻出故汗多令面黃無力若

勿勿新書 卷十四 廿三
不止則體生風宜補實

臍塞是傷寒所受正在肺外邪傷肺之正氣榮衛滯
而不通故臍塞汗後更與通關藥

面赤是傷寒寒邪傷氣及邪入腹肺當旺不肖受邪
肺受患初傳心則虛而面赤口乾夜不卧陰陽相剋
故日中可服解涼藥

吐白水是傷寒胃為寒邪所傷則弱而吐白水若吐
食則入脾差後身發黃脾胃俱象土故黃宜早暖脾
胃

兩眼黃赤是傷寒脾先受色黃次傳肝主眼共脾邪
入肝令眼黃宜洗肝後發汗

小便黃赤是傷寒寒氣傷肺肺虛不受于心心以小
腸為府心實傳府受邪則滯滯氣而赤後尿如血通
小便後取

不可醫者七

傷寒面黑不治寒氣傷皮膚即入肺肺傳腎腎主水
水屬北方色黑復傳心心屬火水大能剋火故面黑
不治

勿勿新書 卷十四 廿四

傷寒大小腸痛不治寒傷肺肺以大腸為府藏不能
受倒傳入一藏載傳入心則火剋金心將小腸為府
故大小腸痛

傷寒忽作鴉聲不治肺主聲寒邪傷肺則絕故聲出
不迴

傷寒叫聲不出不治傷寒入腎失解腎絕不能作聲
死

傷寒糞黑不治大腸肺之府寒邪傷肺肺絕不能行
血血色黑從大腸下如灰戴鴨血者死如無赤黑不

妨是熱感宜涼藥

傷寒爪甲黑不治肝主筋爪甲筋之餘傳肝邪勝正

氣肝絕不能榮爪色黑死

右皆邪氣傷藏府滯其血氣則寒熱血脈亂不能飲

食頭痛面赤為陽毒面青不語多哭身寒為陰毒凡

傷寒三日前宜汗三日後宜轉又言陰毒宜迴陽熱

藥后陽毒宜解先涼藥后汗有初便宜轉

活人書序尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主

之咽喉不利痰嗽鼠粘子湯瘡疹頭額身溫熱大便

幼幼新書

卷十

廿

黃赤腹中有熱四順散溫壯連翹飲三黃丸頭額身

體溫熱大便白酸臭胃有食積雙丸主之兒無異疾

唯飲食不節心腹脹滿身熱頭痛雙丸悉治身腫潮

熱頭目碎痛心神煩躁小便赤大便秘此熱劇宜洗

心散傷寒大小調胃承氣湯主之傷寒自頭疼散熱

而畏人惡寒傷寒証主升麻湯傷寒口無汗麻黃黃

芩湯有汗升麻黃芩湯皆要藥尋常不可過當服涼

藥胃冷虫動証與驚類須進驚藥加腦麝遂吐胃虛

成慢驚兒有熱証方可踈轉慎用丸藥當以大黃川

耳等以咀作湯以湯灌熱用巴豆乃攻食積之丸

楊大鄭兒傷寒瘟疫者神氣雖圓性情未定衣裳不

痺厚薄或恣情脫著嬌縱不常生冷任意因致頭疼

氣涎發熱增寒或飲多尚渴或虛汗連連精神啾啾

又綿綿用藥須精審根源細察表裡仍看脉體未可

便下切勿知虛實消息藥分在意處方

兒傷寒者數類一兼驚者因患驚風三日後治驚退

四五月忽嗽急粗面色恍惚變動渴不止急治脾胃

幼幼新書

卷十

廿

下麥湯散見未平胃散噦逆附子散虛寒不得下冷藥

恐水脾氣伏熱不退二揆實者因兒肥實吃食傷飽

閉却胃氣其候嘔逆唇紅面赤如曾吐嘔必頭痛或

瀉用蘇湯丸急慢通利後與氣散胃氣不麥湯散夾

服驚氣者氣腫脹咳嗽涎響煩躁藏府疼痛夢中虛

驚先用烏犀膏風熱滾涎次麥湯散及大驚丸驚一切

夾服至兩日下蘇湯丸通利一二日氣行後常服醒

脾平胃藥如遍身生黑點血所謂爛斑不治三溫壯

者渾身微熱面紅常睡微汗因客風吹着毛竅冷氣

急鼻塞大段與變蒸相似只麥湯散與紅綿散已出

未出治之

小方論傷寒因三陰三陽受病與諸熱疾皆同惟傷寒眉聚呻吟宜麥煎散

茅先生初受傷寒候歌

小兒傷寒身壯熱面赤唇紅眼赤黃身上寒毛初凜凜更兼冷汗潤汪汪鼻中清涕消涓涓小便如粉又如屎上喘鼻塞將加嗽口乾嘔逆是尋常

幼幼新書

卷十四

十一

死候歌

傷寒吐不止便逆是難通汗后發熱渴耳中瘡潰膿身上斑黑點鼻立出傾筒咳嗽四肢厥心狂下取攻體軟睡不寤腹脹喘聲確手足心熱痛此候命須終

玉訣歌

鼻中清涕肺傷風寒氣相傳鼻不通壯熱脉浮生內熱發驚涎盛轉加濃先治風次下涎次調胃氣

石僻經正受傷寒候歌

傷寒初得渾身熱惡哭多啼無喜悅眼紅臉赤類驚風却被醫人道驚熱但須涼膈莫令渴渴便飲水無休歇若將三黃飲子服汗出身輕便不熱

風邪傷肌汗閉熱氣內蘊致煩躁多渴喘嗽發熱若服冷藥使汗不出反作別候須先出汗次涼膈愈不然慢脾慢驚緣此得之

千金芍藥四物解肌湯

幼幼新書

卷十四

十一

芍藥

黃芩

升麻

葛根各半兩

吹咀水三升煮九合去滓周歲兒不三服瘧疾傷寒痲瘋

治夏月傷寒四肢煩疼發熱嘔逆滿劇如祟寒熱相搏七物黃連湯

黃連

茯苓

黃芩各十銖

芍藥

葛根各一兩

甘草各六銖

小麥三合

吹咀水七升煮三升冷分三服服後胃中熱及咽喉痛皆差明日更進一劑此無毒但除熱下氣安

病人

水鑑治兒百日內壯熱

錘鐵一斤燒赤水二斗碎三七遍煎
二停更入柳葉七片浴兒不用

油胡麻粒三七 松柏葉枝二七 牙硝

乳香各一

金箔片一 白芥子粒三七

散蜜丸彈子大青物裹一丸如燒香法與兒雙足

微汗差

兒三歲內傷寒陰陽二毒因母毒氣所致庸醫見壯
熱不食多睡便與冷藥物兒轉加甚蓋染熱動風藥

幼幼新書

卷十四

寒

寒嘔逆宜走馬散

大黃醋煮一兩水 乾地龍粒一 牙硝分一

末研三百下陰乾再研薑汁調灌驗量之

聖惠治傷寒壯熱頭痛射干散

射干 甘草炙 川升麻 杏仁炒

赤芍藥 石膏各半 麻黃去根節三分 桂心分一

羅散服一錢水一小盞煎五分去滓不時加減溫

服

犀角散治傷寒頭痛壯熱

犀角 黃芩 川大黃炒 赤芍藥

麻黃去根 苦蕒根各一 柴胡 石膏各半

粗末水一盞煎五分去滓量兒溫服

聖惠治傷寒心胃壅悶煩熱頭痛前胡散

前胡兩半 石膏兩一 黃芩 赤茯苓

枳殼炒 甘草各一

羅散每一錢水一小盞煎五分去滓不時量兒溫

服

附子散治中風傷寒眼合手足厥冷口出涎啼聲不

幼幼新書

卷十四

寒

出齒噤或時躁悶

附子炮 葛根各半 蜣螂炒 人參

桂心各一

羅末服一錢水一盞薑少許煎四分去滓今二溫

服量增減

桔梗散治傷寒頭熱足冷顛門張多躁啼不睡小便

赤四肢熱

桔梗 人參 葛根各半 附子炮

甘草各一分

羅散每二錢水一盞薑少許煎五分去滓不時溫服量加減

知母散治傷寒體熱煩躁

知母 甘草炙 杏仁炒 竹茹各一分

麻黃去根節

粗羅服一錢水一盞葱白二寸香豉三七粒薑少許煎五分不時溫服量兒增減

抵聖丸治傷寒五日不語熱在胃中

犀角 麻黃去根節 黃芩 釜下黃土

幼幼新書

卷十四

廿二

梁上塵 竈突墨各半 川大黃炒 朴硝各一兩

末蜜和搗二三百杵丸如彈子服不時新汲水研

一丸如渴飲新汲水當有汗末汗更服汗止熱退

能語兒量服

靈苑紅綿散治寒傷壯熱解表效

黃麻兩半 乾蝟個七 天麻 甘草焙各一分

末一錢紅綿一片搽藥綿上薑一片棗半個煎半

盞冷服

殊聖解交飲

初得傷寒兩日間作時壯熱四稍寒朝來還似依稀差至夜猶然夜火熒

元明粉一錢加紅粉散二錢分四服茶調下次服

救生丸無毒 及真珠散客忤

嬰孺當歸湯治傷寒發熱服解肌湯不除宜此

當歸 桂心 甘草炙 黃芩

芍藥 人參 乾薑各一兩 大黃三兩

切水三升煮一升去滓下芒硝一兩再煎三兩沸

三百日兒服半合量加減利為度

幼幼新書

卷十四

廿三

治傷寒寒熱不休不能服藥浴湯

莽草 丹參 肉桂各三兩 菖蒲斤半

蛇床子兩 雷丸五十個

水三升煮十餘沸適寒溫浴兒

又方

葛根兩四 麻黃葉 人參各二兩 甘草炙

桂心各兩 薑二兩

水六升棗十枚煮二升百日兒服一合量增取汗

汗出溫粉粉之

麻黃湯治傷寒寒熱往來

麻黃去節

牡蠣

雷丸各十分

乾薑

桂心

枳殼

厚朴各四分

白欬四分

大黃六分

蜀椒汗一

豬脂一斤杵熟入絹囊夾微熱摩兒腹背手足汁

盡絞摩訖粉之厚衣把汗出宜春夏秋冬勿用

瀟東王先生治單傷寒及夾驚傷寒紅綿散

麻黃去節

全蝎炒

甘草炙

大黃濕焙

白附子

蘇木炒

天麻生各一錢

幼幼新書

卷十四

廿三

末嬰兒一字二三歲半錢水半盞綿臙脂豔子同煎十數沸如無綿裹藥候綿紅色服

治嬰孩變蒸及傷寒濕壯斑瘡水痘夜啼驚叫諸驚

餘熱口瘡小便赤七寶輕青丹

螺頭青黛兩半

蒼粉

鈎藤炒

天竺黃各一分

白附子三字

丁香炒一

麝半

麝半

鈎錫錢二

末粟米糊九菜豆大嬰孩一九分三服量加薄苛

熬蜜水磨下

張煥羌活湯治傷寒解利邪氣

羌活

防風

川芎

人參各一兩

葛根

川升麻

犀角

甘草各一兩

羅細末服一錢水八分薑二片薄苛三葉煎五分

去滓溫服

治傷寒四五日邪熱不除前胡散

前胡一兩

甘草炙

桔梗

半夏湯洗七次

黃芩

柴胡

人參各半兩

細末一錢水一盞薑二片棗一枚煎五分去滓溫服

幼幼新書

卷十四

廿四

服

良方治傷寒風痲小黑膏

烏頭

天南星

各一枚大者燒赤入小瓶濕紙密口火城刮存中白者

薄苛

玄參各五錢

蜜和葱白湯調豆許服筋緩急加乳香煎

活人書治一切熱連翹飲

連翹

防風

甘草

山梔仁

等分散二錢水一盞煎七分

治吐血黃疸及腹中熱三黃丸

黃連兩三

大黃兩一

黃芩兩三

細末蜜丸如梧子白湯吞十五丸兒減

治傷寒無汗頭疼發熱惡寒麻黃黃芩湯

麻黃去節一兩

赤芍藥各半 甘草炙

桂枝去皮各一分

細末二錢煖水調服日三煎治天行熱氣痘瘡不

快益煩躁昏憤或出尚身疼熱

治傷風有汗頭疼發熱惡寒升麻黃芩湯

升麻

黃芩

葛根

芍藥各三錢

幼幼新書

卷十四

廿五

甘草炙錢半

劉如麻豆二錢水一盞煎六分去滓溫服時行瘡

豆出不快煩躁不眠加水香錢半

治身熱頭疼食飲不消腹脹滿或心腹疼痛大小便

不利或下重數起未差可再服兒蒸候哺食減氣息

不快夜啼不眠腹內不調宜下雙丸

巴豆六粒十粒出油晒如霜

麥門冬二兩

甘草一分 甘遂兩半

朱砂錢一

牡蠣煨二兩

麩核仁四兩

細末合搗二千杵更入蜜搗極熟旋丸二歲服如

麻子分為一雙量兒加減雞鳴時服日出時不下

熱粥飲進數合即下藥皆準出利甚冷粥飲止

聚寶治驚風及四時傷寒壯熱唇口焦乾兩目翻露

搐搦昏迷紅龍散

龍齒

鉛白霜各二錢 朱砂錢半

龍腦許少

天南星水浸七日日換切晒五錢

細末合後蜜水調半錢服

王氏羌活散治四時傷寒熱病時行疫癘山嵐瘴癘

幼幼新書

卷十四

廿六

早晚中露霧及暴中風寒不論陰陽症候老幼虛實

並宜汗出安

川羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

桔梗

枳殼炒

白茯苓

削木

防風各一兩

細辛

官桂

甘草炙各半兩

細末三錢水一盞薑三片棗二枚煎八分和滓熱服

三服汗出兒加減不及煎熱酒調亦可

丁時發治傷寒咳嗽紅綿散

麻黃 <small>去節</small> 天麻 全蝎 甘草 <small>炙</small>	人參 白朮 <small>各半</small>	未半錢水六分葱白一寸紅綿棗煎四分服	治傷寒一二日頭疼發熱增寒身體疼痛	麻黃 <small>湯浸</small> 石膏 <small>各一兩</small> 蒼朮 山茵陳	桔梗 甘草 <small>炙各半兩</small>	末二錢葱茶調服兒小減	鄭愈治傷寒壯熱宜汗浮萍散	浮萍 麻黃 京芩 天麻 <small>各二錢</small>	幼幼新書 卷十四 廿七	末二錢薄荷酒調服寢出汗	願風傷寒第九	茅先生兒氣急喫乳不得身溫熱鼻塞此因願未合	女抱睡鼻氣衝着願故鼻塞葱涎膏塗願後磨鎮心	丸氣通愈	貼願葱涎膏	猪牙皂角 天南星 赤小豆	等分為末葱汁塗願次塗鼻孔	兼治諸驚鎮心
------------------------------------------------	-------------------------	-------------------	------------------	---------------------------------------------------	---------------------------	------------	--------------	--------------------------------	-------------	-------------	--------	----------------------	----------------------	------	-------	--------------	--------------	--------

朱砂 白附子 白蠟 <small>蚕酒</small> 蟬殼	茯神 <small>各半</small> 全蝎 <small>去尾一分</small> 腦麝 <small>隨意</small>	未薄荷汁丸如雞頭銀朱拌腦麝衣金銀薄荷湯	磨一九服	夾食傷寒第十	茅先生兒大熱嘔逆肚臃上渴泄瀉因食物傷五藏	結實所得青金丹下三四次 <small>寒門驚傷</small> 醒脾散 <small>一胃不和</small>	一慢脾 勻氣散 <small>胃氣不和</small> 與服如咳嗽麥湯散 <small>寒門驚傷</small>	調理愈	幼幼新書 卷十四 廿八	瀟東王先生夾食傷寒與單有積候稍異從膝下熱	者為單有積必潮熱取之即補津身熱面青是夾食	傷寒先理傷寒后取並審度用藥驗	夾食傷寒者面青吐逆津身熱或渴煩躁頭疼宜水	精丹天明取下觀音散 <small>胃氣不和</small> 三二服補後下薄荷	散三二服解寒氣餘熱未退七寶輕青丹 <small>寒門問人</small>	參散調理	石鐸經歌 <small>風龍与坏煎散表夾驚傷</small>	夾食傷寒先自熱內中有物傷形節 <small>風龍表自</small>
--------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	----------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----	-------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	------	--------------------------------	------------------------------------

熱那更傷
寒未相接面上紅斑有似丹開口時時生躁渴

先表次取一兩行藏府調和自安悅

此氣血弱食物滯脾胃使肌肉或面如豆大或如

指赤斑點主夜不眠多渴者輕重先取積次和胃

退熱再者證調理

瀛東王先生水精丹治夾食傷寒又虫積食積胎積

驚積又惡物食傷

天南星錢一 滑石錢二 水銀粉錢半 蕪荑仁一
百片

巴豆五十
粒

幼幼新書 卷十四 廿九

先研巴豆次蕪荑次衆藥爛飯九粟大服三五丸

歲數加減米湯泡葱空心吞下膈上有食吐出膈

下有食瀉下忌生硬果肉等卧時服

人參散治夾食傷寒取後補虛調胃進食止吐瀉

人參 蓮肉 茯苓各一
分 黃耆蜜炙
半兩

甘草錢二

未嬰孩一字二三歲半錢水半盞棗半個煎十數

沸服

夾驚傷寒第十一

巢氏寒氣客皮膚搏血氣腠理閉密氣不宣泄蘊積
生熱故頭疼體痛而壯熱蕪驚者是熱乘心心主血
脈兒血氣軟弱心神易動為熱所乘故驚不止變驚
癇

瀛東王先生渾身壯熱心躁發渴睡裡多驚手足不

定頰赤眼腥直視也小便赤宜薄荜散夾食傷
寒門輕青

丹單傷各三二服間調胃藥夾食傷
寒門更進七寶牛黃

丸治驚及金連散三二服退熱不退變驚風

至訣傷寒驚搐歌

幼幼新書 卷十四 卅一

傷寒驚搐即生涎胃熱乘虛遍體班頰赤口乾

脾受熱涎高風盛發狂言

此風盛太過先解涎實者下之傷冷溫之熱即利

之利涎調氣無誤

傷寒熱病胃邪攻燥渴頻頻面色紅本是先傳

心與肺急須解利治驚風

此寒在表宜芫煎散次烏犀膏利涎急慢
驚門又調榮

衛忌熱藥

石壁經歌

脚冷頭燒氣不和漸生喘急愛眠多有時夢裡
頃頻搐極嗽生涎不柰何吐沫且汗方為妙解
熱消痰去久痾汗出除驚方已疾其餘平藥且

調和

先調氣次發汗和解解即涼膈涼膈涎自化涎化
搐自住

形證論如先傷寒退傷寒先驚退驚用南星九傷寒

有餘熱火青膏未見大青丸退傷寒與解表散驚慢

後調胃散積熱

幼幼新書 卷十四

係生論傷寒夾驚脈浮洪兒內停冷乳已嚼之食外

冷風傷于腠戶令面黃頰紅鼻塞氣喘身上寒毛起

鼻流清涕咳嗽噴嚏煩躁吐食頻多下泄小便如粉

皆傷寒候若睡中驚擲在叫卧不安穩是夾驚傷寒

宜坏煎散三服出汗次鎮心丸驚門只大喘啼叫是

傷寒正候宜三黃散寒門三服次麥湯散

博濟方治驚風傷寒四五日無汗擢頭揚手上竄多

啼叫不睡吃水不休鈆白霜丸

鈆白霜

朱砂

馬牙硝

人參

天竺黃

甘草各半兩

山梔子一兩

末蜜丸如梧子服一丸蜜湯化

茅先生迴陽散

蒼朮一兩米泔

甘草炙

白朮炮

陳皮去白各半兩

木香

大附子炮去皮

各一錢

末一錢鹽湯空心點服可夾傷寒藥更看形候

麥湯散

知母

人參

茯苓

杏仁去

肉桂

石膏

滑石

甜葶藶

幼幼新書 卷十四

甘草炙

地骨皮等分

麻黃去節加

末一錢看大小麥煎湯調服依形候調理

張漢金泥膏治傷寒邪熱藥心兼發驚

菖蒲九節

遠志

釣藤各一兩

人參

草龍膽

甘草炙各半兩

搗羅次用

水銀分一

金箔味甘片二

麝香各一錢

用銀石鍋水二升八諸藥慢火熬至一升新綿濾

滓下酥四兩蜜半斤金泥柳枝不住攪熬膏磁合

盛每一大豆薄苛湯化下

祛風鎮驚及傷寒夾驚防風天麻膏

防風 天麻 人參各一分 甘草炙

白蠶蚕 乾全蝎 白附子各半

細末次用

朱砂飛一分 牛黃一分 麝一分

拌勻蜜丸阜子大服一粒薄苛湯化

玉訣治夾驚傷寒解發汗坯煎散

全蝎 川烏炮去皮尖 甘草炙 朱砂

切切新書 卷十 四三

大黃炮 羌活 川芎 麻黃去節

天麻酒浸 白蠶蚕去絲分 腦麝各少許

末一錢入坯子五粒葱白半寸煎三四沸通口服

二三服出汗

石僻經白附子散

白附子 朱砂各三分 全蝎半分 黑附子炮

雄黃 羌活各半 石膏七錢 麻黃去節

腦麝隨意

末半錢或一字薄苛臘茶湯調服如熱再服

鳳髓經坯煎散治夾驚傷寒壯熱睡中驚擲咳嗽煩

躁泄多

川烏頭炮半 大黃蒸三錢 雄黃 白附子

甘草炙 川芎 天麻 蠶蚕各一錢

麻黃去節 麝許少

末半錢加至一錢半水半盞入坯子三粒葱白半

寸煎數沸溫服如出汗併三服

保主治變蒸伏熱傷寒效嗽噴嚏體熱面赤麥湯散

麻黃去節 滑石 甘草 杏仁

切切新書 卷十四 四四

大黃 赤芍 地骨皮

等分細末一錢減至一字小麥薄苛湯下

劉氏治夾驚傷寒吐逆躁悶熱渴夜啼不睡常服溫

平鎮心不涼過百日常服不妨紅綿散

全蝎 人參 白茯苓 天麻各一分

麻黃去節 大辰石砂一錢

細末一錢水少許薄苛葉同煎十沸溫服

吉氏治驚胃虛吐後搗搦眼唇俱青不進飲食是夾

驚傷寒沒石子膏

沒石子個上三 人參 訶子個 白朮各二錢

丁香個五七 甘草兩各半 香附子去皮七個

未煮猪肉熬研丸如梧子不進飲食白朮湯下

治夾驚傷寒鐵刷散

麻黃去節根一兩 甘草分各半 細辛兩半 石膏

葶藶 青皮分各一 杏仁個十一

未外風把定閉竅三二日面黃白壯熱發渴此傷

寒候三五日內心藏熱面赤唇紅多躁壯熱熱極

生涎即夾驚傷寒下異攻散二服紫蘇木瓜同此

幼幼新書 卷十四 四十五

半錢水一盞薑三片煎四分溫服頭面微汗寒不

退如壯熱煎勝金散如壯熱後多睡更煩躁口乾

手足冷是外風把定閉竅用綿煎散汗出竅通用

異攻散和胃氣不和 和氣更服此解傷寒

治傷寒退熱綿煎散

麻黃去節一兩 天麻 紫蘇 南星油煎

蠶蚕各半 未兒傷寒驚風壯熱面熱沉困頭疼不進飲食水

一盞藥半錢綿一片薄苛湯調服睡時更煎鐵刷

散無驚二日進二服效

朱氏天竺黃散

白蠶蚕 鬱金 蟬退 甘草各

天竺黃 山梔子

等分末半錢金銀薄苛湯服

丁時發乳香膏治夾驚傷寒壯熱涎鳴風熱癰盛鎮

心化涎退熱定搐

朱砂 鈔白霜 天竺黃 葛粉

人參 茯苓各半 天麻 甘草各三錢

幼幼新書 卷十四 四十六

白附子分一 乳香錢二 牛黃 腦麝各半

細末蜜丸梧子大薄苛湯化下二丸

鄭愈無惜散

紫背浮萍錢一 犀角錢 鈔藤鈎三七

末半錢蜜水調服連進三服汗為度常服佳

幼幼新書卷第十四 元善堂雕

幼幼新書卷第十五 傷寒變動 凡二十門

後學古吳陳履端于始輯

吳江周之琦仲大校

傷寒自汗第一

巢氏傷寒者寒氣客皮膚搏血氣使腠理閉密氣不
宣泄蘊積生熱故頭痛體疼壯熱也汗出者陽虛受
邪邪搏于氣故發熱陰氣又虛邪又乘陰陰陽俱虛
不能制其津液而汗

活人書病人歲無他病時發熱自汗不愈衛不和也

幼幼新書 卷十五

先時發汗則愈屬桂枝太陽病發熱汗出者為榮弱
衛強欲救風邪者宜桂枝湯又病常自汗此榮氣和
外不諧也以衛氣不共榮氣諧故爾以榮行脉中衛
行脉外復發汗榮衛和則愈傷風自汗太陽病發熱
汗出惡風脉緩為中風屬桂枝湯又太陽病項背強
凡凡反汗惡風桂枝加葛根湯主之汗出而渴五苓
散不渴茯苓甘草湯雖仲景云傷寒自汗用桂枝然
須仔細假令傷風自汗若脉浮而弱設當行桂枝服
湯後無桂枝脉息證候而煩者勿再服若自汗小便

數尤不可仲景云太陽病自汗四肢拘急難以屈伸
若小便難者桂枝湯加附子小便數者勿與宜芍藥
甘草湯若候桂枝附攻表便咽乾煩躁厥逆嘔吐甘草
乾薑湯以復其陽若厥愈足溫更與芍藥甘草湯脚
即伸若胃氣不和讞語與調胃承氣湯微澹則止其
讞緣芍藥甘草湯主脉浮自汗小便數者寸口脉浮
為風大為虛風則微熱虛則兩脛攣小便數仍汗出
為津液少勿用桂枝宜芍藥甘草補虛退風熱通治
候服桂枝後病證仍存陽明病自汗不惡寒反惡熱

幼幼新書 卷十五

濺濺汗出若陽明病汗多而渴勿與猪苓湯汗多胃
燥猪苓復利小便故也故仲景云陽明發熱汗多急
下之以汗多津液外出胃中燥大便必硬讞語者調
胃承氣湯雖陽明汗多急下若小便自利為津液內
竭勿攻須蜜導大便陽明病汗出脉遲微惡寒表未
解宜桂枝湯陽明法多汗若脉浮無汗而喘發汗愈
且麻黃湯亡陽自汗太陽病發汗多遂漏不止其人
惡風當溫經宜桂枝加附傷寒尺寸脉俱緊汗出者
亡陽也屬少陰法當咽痛而復吐利其人熱不退內

3 反文下

拘急四肢疼厥逆而惡寒四逆湯主之汗多不止溫粉撲之若汗多不止必惡風煩躁不得卧者先服防風白朮牡蠣湯次服小建中湯諸方見後

仲景桂枝湯

桂枝

芍藥各三兩

甘草二兩

剉麻豆大抄五錢七水盞半薑五片棗二枚煎一盞溫服須臾飲熱稀粥一盞以助藥力溫覆時許

微汗佳此湯西北二方人四時俱驗江淮間惟春

冬可行春末及夏至前桂枝證加黃芩一分謂陽

旦湯夏至後加知母半兩石膏一兩或加升麻一

分若人素虛寒者用古方或曰桂枝最難用雖表

不解脈浮可發汗宜桂枝湯須常自汗小便不數

手足溫或手足稍微冷少頃溫身雖微似煩又增

寒始可行若無汗小便數或手足冷不惡寒或飲

酒家不喜甘者勿用

桂枝加葛根湯

桂枝

甘草各一兩

葛根二兩

芍藥

麻黃各兩半

桂枝

甘草各一兩

葛根二兩

芍藥

麻黃各兩半

剉麻豆大抄五錢七薑四片棗一枚水一盞半煎八分服覆取汗

五苓散

猪苓

白朮

茯苓各三分

澤瀉一分

桂枝

去皮半兩不見火

篩散抄三錢白湯調各治秤

茯苓甘草湯

茯苓

桂枝去皮各二兩

甘草炙一兩

剉麻豆大五錢七水盞半薑五片煮八分溫服

桂枝加附子湯

桂枝去皮

芍藥各兩

甘草炙一兩

附子炮淨半兩

剉麻豆大五錢七薑四片棗一個水盞半煮八分

溫服

芍藥甘草湯

芍藥

甘草炙各二兩

剉麻豆大五錢七水盞半煮八分溫服

甘草乾薑湯

甘草

乾薑各二兩

甘草

乾薑各二兩

劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分分臧脹

調胃承氣湯

甘草兩一 芒硝一分兩 大黃二兩 去皮

劉如麻豆服五錢水一盞煎七分服

蜜煎導若土瓜根及大猪膽汁亦可導

蜜四兩銅器中微火煎凝如飴攪勿焦捻作挺如

指許內穀道中

麻黃湯

麻黃兩半 去節 桂枝兩一 甘草兩二 炙半 杏仁廿五 圓

幼幼新書

卷十五

五

劉如麻豆五錢七水盞半煮八分溫服取汗傷寒

熱病藥性瀕涼性熱夏月服有發黃班之失

四逆湯

甘草兩二 乾薑兩半 附子一個 生

劉如麻豆服四錢水盞半煮七分溫服強人加附

半個乾薑兩半

溫粉法

白朮 藁本無亦 可 芎 白芷

等分細末一兩米粉三兩和撲周身

防風白朮牡蠣湯

防風 牡蠣黃炒 白朮

等分細末二錢酒調下米飲亦得日二三汗止服

小建中湯

小建中湯

桂枝兩半 去皮 芍藥兩三 甘草兩一 膠飴半升 者去之

微瀉或嘔

劉如麻豆五錢七水盞半薑四片大棗一枚煮八

分去滓下膠飴兩匙許煎化溫服日三夜二尺脉

幼幼新書

卷十五

六

尚遲再服加黃耆末一錢

傷寒頭汗出第二

活人書病人表實裏虛元腑不開則陽氣上出汗見

于頭者五內乾枯胞中空虛津液少也復下之為重

虛然頭汗有數證傷寒五六日頭汗微惡寒手足冷

心下滿不欲食大便鞭硬作脉細為陽微結必有表復

有裏也脉沉亦有裏汗出為陽微假令純陰結不復

有外證為半裏半表脉雖沉緊不得為少陰病蓋陰

不得汗今頭汗知非少陰也小柴傷寒五六日汗下

胃脅滿微結小便不利渴不嘔但頭汗往來寒熱心煩此表未解柴胡桂枝湯頭汗身無汗齊頸而還小便不利渴引水為痰熱在裡身必發黃茵陳蒿湯陽明病下之外熱手足溫不結胃心懊憹不能食但頭汗梔子豉湯心下緊滿無大熱頭汗柴胡湯胃脅以汗頭出別水結在證小半夏湯加茯苓湯

小學胡湯

柴胡兩 黃芩兩半 腹痛去之加芍藥兩半 心下悸小便澀去之加茯苓二兩

人參兩半 不渴外微熱去之加桂枝兩半 取汗愈 欬嗽去參棗加五味一兩一分 乾薑一兩

幼幼新書

卷十五

七

甘草兩 半夏一兩一分 湯洗胃中煩不嘔去 之一湯去此加參 三分苦薑根二兩

劉如麻豆抄五錢 七薑四片 棗一個 水盞半 煮八分 溫服日三

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡 桂枝皮去 黃芩各兩 苦薑根兩二

乾薑 甘草 牡蠣熬各

劉如麻豆抄五錢 七水盞半 煮八分 溫服食頃載

服

服

茵陳蒿湯

茵陳蒿兩 大黃去皮 大梔子三枚

劉如麻豆大水二大盞 煮茵陳次內二味 煮八分 溫服日三 利尿如阜莢汁

梔子豉湯

肥梔子十四枚 香豉四合

劉如麻豆服五錢 水二盞 煎八分 溫服得快吐止 後服

赤茯苓湯

幼幼新書

卷十五

八

赤茯苓 陳皮焙 人參各一兩 半夏洗去

芍藥 白朮炮各

搗粗末 服四錢 水鍾半 薑五片 煎七分 不時溫服

小半夏加茯苓湯

半夏五兩 洗七次 白茯苓三兩

劉如麻豆半兩 水三盞 煎一盞 薑四錢 取汁 投藥

中更煎一兩 沸不時熱喫

傷寒欬嗽第三傷寒後

巢氏肺應皮毛主氣寒邪客皮隨氣入肺故欬盛有

瀉血

寒搏氣入藏府故表裏俱熱熱退肺尚未知邪猶未盡隨氣入肺與肺相搏故傷寒後猶嗽

活人書太陽證嗽小青龍小柴胡少陰證嗽真武湯四逆散猪苓湯大抵熱在焦必水停心下肺為之浮

肺主欬水氣乘之故欬而微喘仲景云傷寒表不解心下水乾嘔發熱而欬小青龍湯主之小便不利

麻黃加往來寒熱胃脅滿痛或欬小柴胡湯去柴胡若小陰證嗽四肢沉重疼痛小便不利自下

初物新書 卷十五 九 利而欬真武湯主之真武湯加五味乾薑大抵治水氣欬病在陽四肢厥逆腹中痛或泄利而欬四逆散主之在陰真

味乾下利六七日欬嘔渴心煩不得眠猪苓湯主之錄驗陳橘皮湯治嗽佳

石壁經 唇青一作車紫嗽聲連肺胃于中養毒涎夜嗽

胃高兼肚脹汗收體熱氣難宣食逆復翻言語重嗽聲頻作豈能痊行風發汗方為妙定使風

除絕本源

內熱蘊積賊風所傳致寒熱相感便嗽久則胃高如覆盆肚脹聲重當汗行風次調氣化涎利膈若腹臑結當利

千金麻黃湯治傷寒發熱欬頭面熱 麻黃 薑 黃芩 甘草

石膏 芍藥 桂心 杏仁 石咀水四升煮升半分二服兒小減

聖惠白朮散治內中冷外傷寒咳嗽或時寒熱頭痛 白朮 紫花 麻黃 厚朴

幼幼新書 卷十五 人參 杏仁 甘草 赤芍藥 陳皮 各一分

粗散一錢水一盞煎五分不時量服 貝母散治傷寒痰逆欬不乳

貝母 桔梗 甘草 人參 乾薑 半夏 陳皮

杏仁 桂心 粗散一錢水小盞薑少許煎五分不時溫服量兒

枇杷葉散治傷寒壯熱欬嘔吐

枇杷葉一分試去 川升麻 人參

貝母煨各半兩 茅根兩 竹茹三分

粗散一錢水小蓋薑一枚薑少許煎五分不時量

溫服

杏仁散

杏仁炒麩 貝母煨 川升麻 甘草炙

麻黃去根節各半兩

粗散一錢水小蓋薑少許煎五分不時量溫服

嬰孺貝母湯治傷寒壯熱加嗽

幼幼新書

卷十五

十一

貝母 石膏各八分 升麻 知母

黃芩 梔子 芍藥各六分 杏仁

柴胡各五分 羚羊角 射干各四分 甘草炙二分

切水四升煮升二合為四服一二歲量與

麻黃湯治傷寒喘急

竹葉八分 貝母八分 柴胡 升麻各七分

枳實炒麩 紫苑各三分 梔子 杏仁各六分

甘草炙 麻黃去節各二分 大黃十分

切水四升煮升三合暮歲兒為四服四歲為二服

張漢麥門冬湯

麥門冬 欬冬花 人參 紫苑各一兩

桂心兩半 甘草炙一分

羅細末入杏仁廿粒麩炒細研拌服一錢水一鍾

薑三片煎五分溫服

活人書小青龍湯

麻黃去此兩半微利去此加羌花障子大熱赤若噴

茯苓二兩兩端去此 半夏此加苦薑根兩半

芍藥 桂枝 細辛 乾薑

幼幼新書

卷十五

十三

甘草炙各兩半 五味子一分

劉如麻豆抄五錢水一盞半煮八分溫服

真武湯

茯苓三分小便利減 芍藥三分下利去此 附子一枚

白朮二分細辛乾薑各一分

劉如麻豆抄五錢薑四片水盞半煎八分溫日三

服

猪苓湯

猪苓

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石

各一兩

劉如麻豆抄五錢水盞半煮七分溫服

四逆散

甘草

炙

枳實

炒

柴胡

芍藥

各一兩

咳加五味乾薑各半兩下利悸加桂半兩小便不利加茯苓半兩腹痛加附半枚炮裂泄利下重先

濃煎薤白湯內藥末三錢七煮一二沸溫服或細

散米飲下二錢日三

散米飲下二錢日三

幼幼新書

卷十五

十一

古今錄驗橘皮湯

陳橘皮

紫苑

麻黃

杏仁

當歸

桂

甘草

黃芩

各半兩

劉如麻豆抄五錢七水盞半煎一盞服

傷寒發喘第四

活人書傷寒喘只有太陽陽明二證太陽頭疼發熱

身疼惡風無汗喘宜汗麻黃湯

葛根黃芩黃連太陽誤下微喘表未解桂枝加厚朴

杏子湯汗後勿更行桂枝湯汗出而喘無大熱麻黃

膏湯 陽明汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱宜下承

氣湯 汗出無汗喘後 太陽陽明合病喘而胃滿勿下

宜麻黃湯又汗後飲水多欬而微喘以水停心下腎

氣乘心故喘小青龍去麻黃加杏仁小腹滿去麻黃

加茯苓 何去麻黃失治心下有水而喘不當汗

形證傳傷寒歌

身熱皆因積熱生至今潮熱變傷寒先除積熱

方成路便作傷寒事轉難夾食夾驚瀕下積癖

他虛實與重看喘虛莫下熱當下更與調榮患

迺安

幼幼新書

卷十五

十四

先潮熱後傷寒加喘急失調成驚難治用南星九

傷寒變 或白丁香膏 見少 退潮熱如下盡熱方調

氣或虛驚邪與蚘蝨丸一二服 一切 用意調理

聖惠人參散治傷寒心胃煩悶喘促

人參

麻黃

甘草

貝母

杏仁 炒各一分

粗散一錢水小盞煎五分不時量溫服

活人書麻黃湯見傷寒自汗門夏至後加知母半兩

石膏一兩黃芩一分蓋麻黃性熱故也冬春虛寒

者用正方

葛根黃芩黃連湯

葛根兩四 黃芩

黃連各兩

甘草兩一

劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服日三二

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝去

芍藥各一

甘草六錢

杏仁十七

厚朴薑炙六

錢三字

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一個煎八分溫服

覆取汗

幼幼新書

卷十五

一五

樓

麻黃杏子甘草石膏湯

麻黃二

杏仁廿五

石膏四

甘草兩一

劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服

大承氣湯

大黃生二兩

枳實二枚

芒硝半合

厚朴薑炙

劉如麻豆抄五錢七水二盞煎八分去滓入芒硝

再煎一二沸溫服利為度

傷寒鼻衄第五

葉氏肺應皮毛主氣開竅于鼻寒客皮膚搏氣成熱

熱乘血血得熱則流從鼻出為衄凡熱病應衄者壯

熱頻發汗不出或未及發汗而鼻躁喘息鼻氣鳴即

衄凡衄兒止半升數合則熱因以歇若一二升死

活人書傷寒太陽證衄血乃解陽氣重故也仲景謂

陽盛則衄脈浮緊無汗服麻黃湯不中病發煩目瞑

劇者必衄小衄脈尚浮緊者再與衄後脈微勿用若

脈浮自汗桂枝湯不中病證尚在必須頭疼甚而致衄

小衄而脈尚浮再與衄後脈微勿用大抵傷寒衄血

不可汗脈微故也衄勿發汗出額上陷脈緊急直

幼幼新書

卷十五

十六

樓

緊再與麻黃湯有汗而衄脈已微黃芩芍藥湯犀角

地黃湯衄血不止茅花湯若衄而渴心煩飲水則吐

先五苓散次竹葉湯陰證無熱不衄若少陰病但厥

無汗強發之必動血或從口鼻或從耳目是謂下厥

上竭難治

千金麥門冬湯治兒未百日傷寒鼻衄身熱嘔逆

麥門冬十八 石膏

寒水石

甘草炙各

桂心八

吹咀水二升半煮一升服一合日三

聖惠竹茹散治傷寒臍衄煩熱頭痛

苦竹茹 甘草各一分 黃芩各半兩 麥門冬焙

伏龍肝 石膏各一兩

粗散一錢水小盞煎五分不時量兒溫服

治臍衄數日不止

生地黄汁 白蜜各一小盞 蒲黃一兩

和微煖服半盞量兒分減頻服

生乾地黄二兩剉銀器中酒一中盞煎七分不時溫

分三服

切勿新書 卷十五 十一

亂髮燒灰細研頻吹臍中

張漢立應散治傷寒血熱妄行臍衄不止

石榴花焙 乾葛根 蒲黃各半兩

細末半錢生地黄汁調下

活人書黃芩芍藥湯

黃芩三分 芍藥 甘草各半兩

粗末三錢水一盞煎六分溫服

犀角地黄湯

犀角無升麻代 牡丹皮各一兩 芍藥三分 生地黄半斤

劉如麻豆服五錢七水盞半煮一盞有熱如狂加黃芩二兩脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用

用

茅花湯

茅花大一把水三盞煎一盞分二服無花用根

竹葉石膏湯

淡竹葉半把 石膏四兩 半夏二分 人參

甘草各半兩 麥門冬半兩 嘔加薑一兩

劉如麻豆抄五錢水盞半粳米百粒煮八分米熟

切勿新書 卷十五 十一

湯成溫服

張漢雞峰方治傷寒時氣衄血不止

松煙墨細末雞子清和如桐子白湯下十粒

生蘿蔔汁半盞鹽少許攪勻頓服

傷寒嘔哕第六

巢氏傷寒胃氣虛熱承虛入胃胃得熱則氣逆故嘔

活人書無陽則厥無陰則嘔嘔者足陽明胃經陽明

氣下行令厥上行氣逆則嘔仲景云嘔雖多不大便

勿下與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣決和然

汗出而解大抵嘔證不一各有治法要之小柴胡湯尤當服胃腸滿而嘔日晡潮熱加芒硝若不止心下急鬱鬱微煩與大柴胡若大便秘加大黃大柴胡治嘔最妙為枳實去穢壓虛嘔雖有陽明勿下古人治嘔用半夏生薑祿真人云薑嘔家勝藥仲景皆用太陽陽明合病必下利若不熱胃有邪腹痛欲嘔黃連湯太陽少陽湯金匱諸嘔吐合病自利若嘔者黃芩加半夏生薑湯穀不下小半夏湯小半夏加茯苓小半夏加橘皮湯可選用嘔而發熱主小柴胡嘔而發渴主猪苓湯先嘔却渴為欲解急與之先渴後嘔為心停心下屬飲

切勿新書 卷十五

家仲景云本渴飲水而嘔柴胡不中宜治膈間水主赤茯苓湯若少陰證而嘔真武湯去附子加生薑若汗吐下後虛煩不得眠若嘔者主梔子生薑豉湯傷寒差後嘔者餘熱在胃腕竹葉湯加薑主之大凡嘔者飲食不下乾嘔為嘔或因汗出或因有水或下利脾胃有熱便乾嘔官局桔梗湯最佳仲景汗出乾嘔者桂枝證也表不解心下有水乾嘔發熱者小青龍也身涼汗出兩脇痛或乾嘔者十棗湯也少陰下利脈微白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪

膽汁湯少陰下利裏寒外熱脈微欲絕或乾嘔通脈四逆湯乾嘔吐沫頭痛吳茱萸湯傷寒論食穀欲嘔得湯反劇屬上焦也仲景無治法大抵吳茱萸湯湯治少陽證較入胃而嘔屬陽明宜小柴胡湯若直嘔吐而復腳弱或疼作腳氣治

聖惠治傷寒煩熱頭痛嘔逆麥門冬散

麥門冬 石膏各三分 甘草一分

粗散一錢水小盞煎五分不時量溫服

傷寒吐逆不寒藿香散

藿香 丁香 木香 葛根各一分

切勿新書 卷十五

人參 甘草各半兩

粗散一錢水小盞煎五分臨時分減溫服涼一方一

嬰孺治傷寒壯熱嘔吐蘆根湯

生蘆根合五分 知母十二分 淡竹青皮五分

水三升煮一升為三服更用冬瓜汁一升減水一升煮

活人書柴胡芒硝湯

柴胡一兩 黃芩 人參 甘草各半兩

半夏四錢半 芒硝一兩

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八

分去滓內芒硝微沸溫服

大柴胡湯

柴胡四兩 黃芩 芍藥各兩 半夏一分

枳實二枚

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水二盞半煮

八分去滓溫服利為度欲下加大黃二兩

官局桔梗湯

桔梗 半夏 陳皮各一兩 枳實半兩

粗末三錢七水一盞薑五片煎七分溫服

小半夏湯

大半夏七枚 薑薄五片

水一盞煎半盞食後溫服

葛根加半夏湯

葛根一兩 麻黃三分 甘草炙 芍藥

桂枝去皮各半兩 半夏二分

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚煎八分溫服

覆取汗

黃連湯

黃連 甘草炙 乾薑 桂枝各三分

人參二兩 半夏二兩

劉如麻豆每十錢七棗二枚水二盞煮薑半分二

服

黃芩加半夏生薑湯

芍藥 甘草各二分 黃芩三分 半夏二分

劉如每五錢薑四片大棗一枚水二盞煮八分溫服

小半夏加橘皮湯

大半夏七枚 薑薄切五片 橘皮一大片

水一盞煎半盞食後溫服

梔子生薑豉湯

梔子七枚 薑二兩 香豉二合

分二服水二盞煮梔子薑至一盞內豉同煮七分

溫服快吐止

十棗湯

芫花炒赤 甘遂 大戟

等分擣秤再杵二三百下先以水升半煮肥棗十枚取八合去滓內藥強人一錢七羸人半錢棗湯送下平旦服若下少病不除明日再服加半錢利後糜粥自養合下不下令脹滿通身浮腫死

白通湯

附生一 乾薑一兩

劉如麻豆抄五錢七水盞半葱白四寸煮七分服

白通加豬膽汁湯

附子生半 乾薑兩 葱白二 溺半合

幼幼新書

卷十五

二十三

水一盞煮五分去滓內猪膽汁半合和温分服

通脉四逆湯自汗門

面赤加連鬚葱九莖腹中痛去葱加芍藥二兩嘔

加薑二兩咽痛去芍藥加桔梗一兩利止脉不出

去桔梗加人參二兩未差急作一劑脉續續出愈

真茱萸湯

吳茱萸一兩二錢 洗三次 人參三

劉如麻豆服四錢薑五片棗一個水二盞半煮八

分分二服

莊氏治傷寒頭痛和氣止逆止渴人參散

人參 白朮 麻黃去根 藿香

甘草炙 乾葛各一 石膏半兩

末一錢水一盞葱白一寸豉廿粒煎五分温服

傷寒發渴第七

巢云傷寒熱渴是熱入藏藏得熱則津液竭燥故渴

活人書傷寒脉浮而渴屬太陽表不解心下有水氣

加苦蕒湯太陽病脉桂枝汗後煩渴白虎加人參湯

浮小便不利微熱消渴五苓散四五日身熱惡風骨

根太陽證身熱而渴者為風温苦蕒根湯 有汗而

渴屬陽明白虎加人參湯虛人老人春秋月與竹葉

必發黃宜茵陳湯小柴胡 傷風寒熱或發熱惡風而

去半夏加人參苦蕒湯 傷風寒熱或發熱惡風而

渴屬少陽小柴胡去半夏加人參苦蕒根湯 白

利而渴屬少陰傷寒熱于流于少陰主腎腎惡燥

猪苓湯利飲飲水 太陽證無汗而渴勿與白虎湯

者有熱白頭翁湯 太陽證無汗而渴勿與白虎湯

云渴欲飲水無表證白虎加人參湯脉浮發熱無汗

表未解勿與白虎湯意小青龍小柴胡湯也仲景云

五日身熱惡風骨下滿手足温而渴小柴胡去半夏

加人參 汗後脉洪大而渴與之陽明證汗多而渴者

苦蕒 勿與五苓散 汗多胃中燥猪苓復利小便故也意竹

多急此仲景妙法仲景猶苓湯證六腑之凡病非大

渴勿與水若小渴咽乾小小呷滋潤之令胃和若大

渴煩躁甚能飲一斗與五升全不與則乾燥無由作

汗發汗死人見渴飲水作汗小渴遂劇飲致停飲心

下滿結喘死者甚衆當五苓散或陷胃丸金匱云時

渴欲飲水不能多不當與何者以腹中熱高少不飲

消之便更作病至七八日大渴欲飲水猶當依證與

之常令不足人見仲景云得病反能飲此為欲愈小

渴強飲因成禍大抵傷寒飲水過多致水停心下氣

上乘心為悸為喘結于胃脅為水結胃中虛胃冷

為噦嘔冷氣相薄為噎上迫肺為效瀆腸中為痢邪

熱所薄畜于下焦為小便不利 若陽毒倍常躁盛大

小腹痛或裏急瀉皮膚為腫

渴黑奴丸中暑伏熱深累取不差發渴不已酒蒸黃

連丸

聖惠大青散治傷寒頭痛壯熱煩渴

大青 知母 柴胡 葛根

甘草 川升麻 黃芩 赤芍藥

梔子仁各半 石膏一兩 川芎一分

粗散一錢水小盞煎五分不時溫服量兒

治傷寒壯熱頭痛口乾煩渴柴胡散

柴胡 麻黃去根節 赤芍藥 黃芩

葛根 甘草一分 石膏一兩

粗散一錢水小盞薑少許葱白三寸豉廿粒煎五

分不時溫服汗為效量兒下時發有

治傷寒煩熱大渴不止赤瓜根

土瓜根 麥門冬焙 柴胡各半 葛根

批把葉去毛 甘草一分

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫服

張漢葛根湯治傷寒體熱煩渴

葛根 人參各一 麥門冬 甘草炙

幼幼新書 卷十五

白茯苓 澤瀉各半

細末一錢水八分一盞薑二片薄芎三葉煎六分

溫服

活人書白虎加人參湯

石膏四兩 知母兩 甘草炙半 粳米合

人參三分

劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分米熟為度溫

服

苦蕒根湯

苦蕒根分三 葛根生兩半 乾三錢 石膏兩二 人參

防風 甘草炙各兩

劉如麻豆服五錢水盞半煎一盞服

白頭翁湯

白頭翁兩一 黃蘗 秦皮 黃連各兩半

劉如麻豆分五服水二大盞煮八分溫服不差更

服

大陷胃丸

大黃兩二 苦葶藶熟 芒硝 杏仁熟各三分

幼幼新書

卷十五

二十七

文

羅研如脂丸彈子大服一九甘遂性猛酌用末一字

七白蜜一合水二盞煮一盞頓服一宿延下不下

再服

黑奴丸

麻黃去節泡一兩 沸焙三兩 大黃兩二 釜底煤

黃芩 芒硝 竈突墨 梁上塵

小麥奴各一兩

羅末蜜丸彈子大新汲水研一九渴與冷水盞足

飲之須臾當寒寒竟汗出差日移五尺不汗再服

一丸須微汗麥奴麥末熟時叢中不成麥捨成黑

勃無此亦得須病人渴倍常可與不渴者成禍

酒蒸黃連丸

黃連四兩無天酒浸面 上約一十重湯煎

羅末糊丸熱水下三十九宵隔涼不渴效

傷寒大小便不通第八

巢氏寒痺氣而生熱熱流大小腸故澀結不通是內

熱不歇或乾嘔或言語而氣還逆上則心腹脹滿

聖惠大黃散治傷寒壯熱心躁頭痛口乾大小便赤

幼幼新書

卷十五

三十一

文

川大黃炒半兩 梔子仁 赤芍藥 甘草炙

黃芩各一分

粗散一錢水中盞煎五分量溫服利效

三黃散

川大黃炒微 麥門冬焙各半兩 石膏兩一 甘草炙

川芒硝 黃芩 黃連各一分

粗散一錢水小盞煎五分量服利效

張渙犀角散治傷寒六七日大便不通熱甚

犀角

川大黃炮

柴胡各一兩

人參兩半

朴硝

甘草各一分

細末一錢水八分薑二片棗一枚煎五分溫服量

加減

活人書治壯熱頭目碎痛背搏拘急大熱衝上口苦唇焦夜卧舌乾咽喉腫痛涕唾稠粘痰壅喫食不進心神躁熱眼澁睛痛傷寒鼻塞四肢沉重語聲不出百節痛大小便不利麩豆瘡時行瘟疫狂語多渴及兒天癆夜驚洗心散

幼幼新書

卷十五

二十九

大黃米泔浸一炊慢炒

當歸炒

芍藥

甘草炙

荊芥各四兩

白朮炒一兩

細末抄二錢水一盞薑一片薄荷二葉煎八分溫和滓服畧卧去枕少時如五歲壅實煎四五錢七

要澹轉熱服

傷寒發狂第九

餘詳熱發狂附

活人書傷寒陽毒發狂畜血如狂證與脉俱不同病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脉實潮熱獨語如見鬼為陽毒仲景云傷寒吐下後不解不大便六日至十餘日晡潮熱不惡寒獨語如見鬼劇者不

識人循衣摸床惕惕不安微喘直視但發熱譫語大承氣湯若一服利止脉弦者陽生滿者陰元陽證見脉滿勿下陰脉死陽證無表證不寒熱唇燥欲漱水不欲入咽

脉微沉小腹鞭滿小便反利大便秘黑身黃發狂血

證諦也熱壯渴滿口燥脉反無熱為陰血證審矣仲

愈外不解者尚未可攻當先解表宜桂枝湯外已解但小腹結者表氣未解表宜桂枝湯大抵傷

寒當汗不汗熱在裏化為血喜忘如狂血上逆則喜

忘血下畜則內爭甚者抵當湯抵當丸輕者桃仁承

氣犀角地黄湯盡取黑物效有畜血證而外不解未

枝湯以解外緣失汗熱畜勝脫太陽經也又火邪發驚狂者醫以火卧床

幼幼新書 卷十五 二十九

下或以火迫周身劫汗或熨成火邪其人亡陽煩躁

驚狂卧起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆

湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯凡灸及燒針後證似火劫

良驚癇門柴胡加龍骨牡蠣湯更捷

桃仁承氣湯

桃仁五十枚 大黃四兩 桂枝去皮 甘草炙

芒硝各二兩

劉如麻豆服五錢七水二大盞煮八分溫服未利

移時再服

抵當湯為丸

水蛭十枚 為害尤甚 煎去子 杵碎入腹 復生

桃仁七枚

大黃兩 去皮 洗 壹重 翅足 煎

劉如麻豆作二服 水二盞 煮七分 溫服

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝兩 蜀漆洗 各兩半 甘草炙 兩 牡蠣二兩 煨

龍骨兩

劉如麻豆抄五錢 七薑四片 棗一枚 水盞半 煮八分 溫服

分溫服

幼幼新書 卷十五

三十一

桂枝甘草湯

桂枝去皮 兩 甘草炙 兩 牡蠣煎 兩 龍骨分 兩

劉如麻豆抄五錢 水盞半 煮八分 溫服

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡兩 黃芩兩 鉛丹一分 人參一分

桂枝兩 茯苓兩 龍骨煨 各三分 牡蠣煨 各三分

半夏錢湯洗六半 大黃兩半

劉如麻豆五錢 七薑四片 棗一枚 水盞半 煮八分 溫服

溫服

傷寒結胸第十

活人書傷寒本無胃結應身熱下早熱乘虛入痞結

不散便成結胸若誤轉未成結胸頻與理中湯自解

者候日數足可下承氣湯再下之其證心下緊滿

按之石硬而痛項強如柔瘕狀發熱汗出不惡寒名柔瘕 脈寸口

浮關尺皆沉大率當下脈浮大下之死尚宜汗結胸

小柴胡湯等發表裏證罷方與結胸藥便安崔行功

云傷寒絕胃欲絕心高手叵得近大陷胃湯不差是

下虛逆氣已不理毒復上攻氣毒相薄結胸中枳實

幼幼新書 卷十五

三十三

理中丸理氣次療諸疾然結胸有三種大結胸而痛

硬大陷胃丸小結胸按之心不痛 水結胸脅亦名結

胃頭微汗但結胸無大熱小半夏又有熱實結胸

煩躁心內懊懷舌上燥渴脈寒實結胸 無熱證三物

沉滑者皆熱證大陷胃湯白散枳實理

中近世結胸多行金針丸硫黃陽起石寒實結胸或

差若熱實胃行之死大陷胃湯用甘遂太峻須量虛

實輕重大陷胃丸最穩聖餅子灸臍尤不可藏結仲

景無治法大抵藏結如結胸狀飲食如故時時下利

理中湯

人參 乾薑炮 甘草炙 白朮各三兩

腹痛加人參兩半寒加乾薑一兩渴欲得水加白朮兩半臍上築腎氣動也去白朮加桂四兩吐多去朮加生薑三兩下多用朮悸加茯苓二兩四肢拘急腹漏下利或轉筋去朮加生附一枚

劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服日三

小陷胃湯

半夏湯洗二兩 黃連一兩

幼幼新書

卷十五

五

劉如麻豆服五錢蘇蘇半枚水二盞煎九分溫服未知再服利黃涎便安

大陷胃湯

錦紋大黃兩半 芒硝一兩 甘遂赤連珠者一兩

末水三盞煮大黃至一盞去滓下芒硝一沸下甘遂溫服快利止

又方

桂枝 人參各一兩 甘遂半兩 大棗三枚

蘇蘇實一枚用四分之一

劉五錢七水二盞煮八分溫服胃中無堅物勿服

枳實理中丸

枳實越炒十片 茯苓 人參 白朮

乾薑炮 甘草

細末煉蜜丸如雞子黃熱湯化一丸連進二三服胃中豁然渴加苦薑二兩下利加牡蠣二兩煨

三物白散

桔梗 貝母各三分 巴豆熱黑研如

散白飲和服強人半錢羸減之病在膈上必吐膈

幼幼新書

卷十五

五

下必利不利進熱粥利不止進冷粥身熱皮粟不解引衣自覆若水喫并洗益令熱却不得出當汗不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上

法

古方金針丸治結胃傷寒

陽起石 不灰木各半兩 硫黃一分 巴豆

杏仁各三枚

搗細末糯米粥丸如櫻桃以針劄窠子晒乾如患者以劄針用麻油紙燒燭盡細研炒生薑湯調一

丸患重夾轉藥兩三九金針九下不妨更置虛實
存此者欲人知須審用

傷寒腹痛第十一 附 腹滿

栗氏傷寒熱入腹傳于藏氣結聚故腹滿若挾毒者
腹滿疑作痛心煩懊悶多死

活人書腹痛本太陽病反下之腹滿時痛是有表復

有裏仲景用桂枝加芍藥湯主之痛甚加大黃即小建中

太陰脈弱自利設當行大黃芍藥宜減之胃難經云

虛陽氣易動故也下利者先煎芍藥十餘沸難經云

痛為實宜下外景云發汗不解腹滿痛宜大承氣湯

有熱痛有冷痛尺脈弦腸鳴泄利而痛冷也小建中

湯仲景云陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛與小建中

湯不差與小柴胡湯小柴胡去黃芩加芍藥陰證腹痛即四逆

散通脈四逆加芍藥湯腹痛小便不利真武湯關脈

實腹滿大便秘按之痛實也桂枝加大黃湯黃連湯

大承氣湯主之腹脹滿陰陽不和也桔梗半夏湯最

良仲景論太陽證發汗後腹脹滿厚朴生薑半夏甘

草人參湯下後心煩腹滿卧起不安梔子厚朴湯吐

後腹脹滿調胃承氣湯少陰病六七日腹脹不大便

急下承氣湯

桂枝加芍藥湯

桂枝去皮三兩 芍藥六兩 甘草二兩

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八

分溫服下利先煎芍藥三四沸

桂枝加大黃湯

桂枝去皮兩半 芍藥三兩 甘草二兩 大黃各一

痛甚加大黃大實痛加兩半羸者減

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚煮八分溫服

桔梗半夏湯

枳實熬半兩 桔梗炒 半夏製 陳皮各一

粗末四錢水一盞薑三片煎七分熱服

厚朴生薑半夏甘草人參湯

厚朴四 半夏一分 甘草一兩 人參半

劉如麻豆抄五錢七水鍾半薑五片煮八分溫服

梔子厚朴湯

大梔子七枚 厚朴二 枳實二枚

切分二服水二盞半煮八分溫服得吐止

傷寒下痢第十二 傷寒後下痢附

葉氏傷寒表熱雖歇而裏熱猶停腸胃與水穀相併腸胃虛則泄痢痢色黃若熱不止變血痢若重遇冷熱相加變赤白滯痢

活人書傷寒下痢多種須辨識陰陽 三陽下痢身熱太陰下痢手足

濕少陰厥陰下痢身不熱大抵扶 太陽陽明合病必

痢葛根湯主之 下痢頭疼腰痠肌熱身 太陽少陽合

病自痢黃芩湯主之若嘔黃芩加半夏生薑 下利頭

或口苦咽乾或往來寒熱而嘔脈浮大而弦 陽明少陽合病必痢脈不負

幼幼新書 卷十五 傷寒

者順負者失互相剋賊名負 下痢身熱胃脘痞滿乾

而弦蓋陽明土脈長大少陽木脈弦合病土被木賊

更下痢為胃困若脈不弦者順為土不負負者死

自痢不渴屬太陰 四逆湯 自痢而渴屬少陰 白通湯

猪膽湯通脈四逆湯猪苓湯 餘下痢皆汗下後證大

抵傷寒下痢瀆者脈與外證下痢脈大者虛脈微弱

者自止下痢日十餘行脈反實者逆下痢脈數滑者

有宿食下之愈脈遲滑者實痢未便止宜下下痢三

部脈皆平按其心下硬者急下挾熱痢臍下必熱大

便赤黃及腸間津汗垢膩 腸之 寒毒入胃則齏臍下

必寒腹脹滿大便或黃白或青黑或下利清穀濕毒

氣盛則下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁下利欲

飲水者有熱下利譏語有燥屎寒毒入胃四逆湯理

中湯白通加附子四逆散加薤白挾熱利黃芩白頭

翁湯三黃熱艾湯薤白湯赤白脂丸濕毒下膿血者

桃花湯地榆湯黃連阿膠散雖自利而渴屬少陰然

三陽下利亦有飲水者有熱也三陰下利宜溫少陰

自利清水心下痛口乾燥宜下此又不可不知 少陰

下重多投熱藥濃煎葱白湯內四逆散用枳實芍藥

之類尋常胃中不和腹中雷鳴下利生薑瀉心湯二

幼幼新書 卷十五 傷寒

葛根湯

葛根 兩 麻黃 兩 桂枝 去 甘草 炙

芍藥

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八

分溫服覆取汗

黃芩湯

黃芩 兩 芍藥 兩 甘草 各一

劉如麻豆抄五錢棗一枚水盞半煮八分溫服

黃芩加半夏生薑湯

黃芩錢三 半夏二分 芍藥 甘草各二分

劉如麻薑四片大棗一枚水二盞煮八分溫服

四逆加人參湯

甘草二兩 附子一枚 人參一兩 乾薑二兩

劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服日三

三黃煎艾湯

黃芩 黃連 黃蘗各三兩 熟艾半斤

劉如麻豆水二盞煮七分溫服

薤白湯

薤白一握 梔子七枚

豉半斤 劉如麻豆水二升半煮梔子十沸下薤白煮二升

下豉煮升二合服一湯盞

赤石脂丸

黃連 當歸各二兩 赤石脂 乾薑各一兩

末煉蜜丸桐子米飲吞卅九日三

桃花湯

赤石脂四兩 乾薑一分

劉如麻子四錢粳米二撮水盞半煎一盞去滓入

赤石脂末方寸七日三一服愈即止

地榆散

地榆 黃連微炒 犀角 茜根

黃芩各一兩 梔子仁兩

粗末四錢水一盞薤白三寸煎六分不時溫服

阿膠散

黃連二兩 阿膠微炒 黃蘗微炒 梔子仁兩

粗末四錢水一盞煎七分不時溫服

生薑洗心湯

黃芩 甘草炙 人參各兩 乾薑

黃連各半兩 半夏一分

劉如麻豆抄五錢七水盞半薑七片棗二枚煮一

盞服

丁時發苦薑散治傷寒煩躁大便不止身熱

苦薑根 麥門冬 甘草炙 柴胡

葛根各半兩 枇杷葉一分

末一錢水一盞煎七分溫服

傷寒口内生瘡并喉痛第十三

巢氏傷寒口生瘡熱毒在嚴上衝胸膈氣發于口故生瘡

咽喉痛者心胃熱盛氣上衝咽喉故痛若挾毒則喉痛結腫水漿不入毒還入心煩悶死

活人書咽喉痛有陰陽二證脉浮數面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血者陽毒也

陽傷盛陰暴絕必躁狂走妄言面赤咽痛身如錦紋或下利赤黃脉洪實或骨促宜酸苦藥令陰氣復而大汗解矣葶藶苦酒湯陽毒升麻湯大黃散拖子仁湯黑奴丸可選用近治傷寒脉洪大內外結熱舌卷焦黑卓中如烟煤疊布數重新水漬稍換去水

幼幼新書 卷十五 四十一

搭胃上口數易熱甚置病人水中亦良 脉沉遲手足厥冷或吐利咽痛

少陰證也病源云此下部脉都不至陰陽隔絕邪客

足少陽胎毒上衝故咽不利或痛生瘡傷寒脉陰陽

俱緊汗出少陽也屬少陰法當咽痛而復吐利汗下

熏熨俱不可汗出者藁本粉傅之咽喉痛者甘草湯

桔梗湯猪膚湯半夏散通脉四逆去芍藥加桔梗湯

麻黃升麻湯可選用又有伏氣病謂非時暴寒中人

伏氣于少陰經旬月乃發脉微弱怯先咽痛似傷寒

非喉痺病次必下痢用半夏桂甘湯次四逆散只一

二日差古謂腎傷寒也

十物升麻湯治傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹

堅急大小便不利或口瘡或壯熱因四肢攣掣驚仍

作癩時發時醒醒後身熱如火

治胃中客熱口臭不思飲食或肌煩不欲食齒齲腫

疼膿血舌口咽有瘡赤眼目臉重不欲開瘡疹已發

未發甘露飲子

葶藶苦酒湯

苦酒即米醋葶藶熱一生艾汁半升無黃熟艾或根汁

煎七合作三服

陽毒升麻湯 升麻分二 犀角 射干 黃芩 人參 甘草 射干 黃芩 劉如麻豆水三升煎升半飲一湯盞食頃再服溫覆手足出汗不解重作

大黃散 川大黃兩半 桂心分三 甘草炙 木通 大腹皮兩各一 川芒硝兩二 桃仁廿一枚

粗末四錢水中盞煎六分不時溫服利為度

梔子仁湯

梔子仁

知母

赤芍藥

大青各一兩

柴胡兩半

川升麻

黃芩

杏仁炒

石膏各二兩

甘草半兩

粗末抄四錢水中盞薑半分豉百粒煎六分不時

溫服

仲景甘草湯

甘草二兩

幼幼新書

卷一五

四三

劉如麻豆四錢七水盞半煮六分溫服日二

桔梗湯

桔梗兩一

甘草兩二

劉如麻豆抄五錢水盞半煮八分溫分再服

猪膚湯

猪膚二兩六錢半

水二大盞半煮一盞許去滓加白蜜合半白粉一

合

半夏散

半夏洗湯

桂枝去皮

甘草炙

等分服三錢水一盞煎八分冷少少嚙

麻黃升麻湯

麻黃去節二兩半

升麻

當歸各一分

知母

黃芩

姜各三分

芍藥

天門冬

桂枝

茯苓

甘草炙

石膏綿

白朮

乾薑各一分

劉如麻豆抄五錢水盞半煮八分溫服一炊久進

一眼汗出愈

幼幼新書

卷一五

四四

半夏桂枝甘草湯

半夏洗湯

甘草炙

桂心

劉如麻豆四錢七水盞半煎七分冷少含細嚙

十物升麻湯

升麻

白薇

麻黃

姜各一分

柴胡

甘草各半兩

黃芩兩一

朴硝

大黃

釣藤各一兩

劉如麻豆服三錢水一盞煎七分去滓下硝煎溫

服

甘露飲

熟地黄 生地黃 天門冬 麥門冬 焙

枇杷葉毛去 枳殼炒 黃芩 石斛

山茵陳 甘草

細末二錢水一盞煎六分食後臨卧溫服

傷寒發斑第十四餘發

巢氏胃主肌肉傷寒溫壯熱挾毒蘊積于胃薰發肌

肉狀如蚊蚤噬赤斑起周匝遍體此或傷寒或時氣

或溫病由熱不歇入胃變毒發斑赤者十生一死黑

者十死一生

幼幼新書 卷十五

漢東王先生斑瘡水豆耳麥湯散解之次透關散更

進敗毒散各三二服不退進槐花散一服微利觀音

散調胃和胃氣不再用七寶輕青丹寒門

活人書溫毒發斑冬胃寒毒至春始發初在表或一

證未罷毒氣不散故發斑黑膏主之又冬月溫暖人

感乎庚之氣春或被積寒所折毒氣不泄至天氣暄

熱溫毒始發肌肉斑爛癢疹如錦紋而心若熱病

發斑與時氣發斑並同或未發汗或已經汗下而熱

毒不散表虛裏實乘虛出于皮膚所以發斑疹如錦

紋俗名瘧瘡素問謂疹下早熱氣乘虛入胃下大濕

亦發大抵斑勿表蓋表虛裏實若發汗重令開泄更

增斑爛當用化斑湯白虎加人參湯中添姜蕤玄參

升麻湯阿膠大青四物湯猪膽雞子湯紫雪尤妙可

下者調胃承氣湯暑月病陽重者常宜

寶鑑歌

傷寒毒熱胃中存勿作斑瘡出滿身若見口唇

烏似墨只應長往在逡巡

形證論歌

幼幼新書 卷十五

傷寒胃熱作斑瘡倒壓因風氣受傷損汗內虛

多紫黑大者為陰小者陽

惠濟歌

斑毒常推是豆瘡肺兼腎藏有風傷渾身熱甚

四肢冷肺裏煩窅痛莫當胃發連皮肌肉下好

交心熱變清涼次與調脾仍趕趁體冷舌黑在

隄防

聖惠治熱毒發斑心神煩悶大青散

大青

玄參

川升麻

川大黃微炒

甘草 <small>炙</small>	梔子仁 <small>各半</small>	篩散一錢水小盞煎五分不時量兒溫服
犀角	川升麻	白蘇皮
漏蘆	川大黃 <small>炒</small>	赤芍藥
寒水石 <small>兩一</small>	甘草 <small>炙各</small>	梔子仁
篩散一錢水小盞煎五分不時分減溫服	治斑瘡大便壅滯心神煩躁大黃散	川大黃 <small>炒</small>
川大黃 <small>炒</small>	甘草 <small>炙</small>	枳殼 <small>炒</small>
黃芩 <small>各半</small>	細散不時新汲水調一錢三歲下半錢	治發斑散惡毒氣
生葵菜葉絞汁少服又黑豆汁徐服	治斑疹瘡心煩躁眠卧不安青黛散	青黛 <small>兩半</small>
細研煖磨刀水調半錢日三量兒服	瀟東王先生麥湯散治傷寒欬嗽溫壯水痘	地骨皮 <small>炒</small>
甘草 <small>炙</small>	滑石 <small>各半</small>	麻黃 <small>去節</small>
知母	羌活	大黃 <small>濕紙</small>

甜葶藶 <small>隔紙炒</small>	末嬰兒服一字或半錢三五歲一錢水半盞小麥
七粒或二七粒煎數沸服	通經透關散治斑瘡水痘心躁發渴大小便不通及
赤色口舌生瘡	地扁竹 <small>兩半</small>
山梔仁 <small>炒分</small>	大黃
木通	車前子 <small>炒</small>
瞿麥 <small>去粗</small>	甘草 <small>炙各</small>
末嬰孩服一字二三歲半錢四五歲一錢水半盞	紫草三寸煎數沸溫服
活人書黑膏	生地黃 <small>斤半</small>
好豉 <small>升一</small>	猪膏二斤合露之煎三分減一絞滓內豆大雄黃
麝攪和盡服之毒從皮出愈忌蕪荑	葛根橘皮湯
葛根	橘皮
杏仁	知母
黃芩	麻黃 <small>去節</small>
甘草 <small>炙各</small>	劉如麻豆服五錢水盞半煎一盞溫服
苦車橘皮湯	

黃連

兩四

橘皮

杏仁

枳實

麻黃

葛根

厚朴

甘草

各一兩

劉如麻豆抄五錢水盞半煎一盞服下痢當先止

化斑湯

人參

石膏

各半兩

姜莖

知母

甘草

各一分

劉如麻豆抄五錢水盞半糯米一合煎八分米熟

為度溫服

元參升麻湯

幼幼新書

卷十五

五

元參

升麻

甘草

各半兩

劉如麻豆抄五錢七水盞半煎七分溫服

阿膠大青四物湯

大青

兩四

阿膠

甘草

並炙各一兩

豉

八合

劉如麻豆抄五錢水盞半煎一盞旋入膠煎

猪膽雞子湯

猪膽

苦酒

各三合

雞子

一枚

合煎三沸強人盡服羸人煎六七沸服汗出甚

傷寒發黃第十五 亦名黃病餘發黃附

東氏熱入脾胃蘊積與穀氣相搏蒸發于外故皮膚
悉黃眼亦黃脾胃肌肉俱象土故色黃或傷寒或時
行或溫病皆熱不時解入胃也凡發黃下痢心腹滿
死脈沉細死半歲內兒傷寒溫病身黃亦是胃熱將
息過度所為薄其衣數與除熱粉散自歇不得妄與
湯藥及灸

活人書寒濕在裏不散熱蓄脾胃腠理不開瘀熱與
宿穀相薄鬱蒸不消故發黃 濕熱南方暑濕近身病
熱蓋痺者黃也古以黃

為痺濕熱相薄民
多病痺甚為明腫然發黃與瘀血外證及脈俱相似

幼幼新書 卷十五 五

但小便不利為黃小便自利為瘀血要之發黃心脾

蘊積發熱引飲脈必浮滑而緊數若瘀血證即如狂

大便必黑為異凡病人身體發熱頭面汗出身無汗

齊頸而止渴引水小便不利必發黃茵陳蒿湯五苓

十加茵陳散 五分溫水調
三錢日三小便利如皂莢汁赤一宿

黃減黃從小便出古云治濕不利小便非其治也梔

子蘗皮湯麻黃連翹赤小豆湯可選用傷寒欲發黃

急用瓜蒂末口含水搗一字入臍出黃水用茵陳酒

調五苓散白虎與黃證相近遍身汗為熱越白虎證

也頭面汗頸下無汗發黃證也又一身盡痛發熱身
如薰黃此太陽中濕也仲景云傷寒發汗已身目為
黃寒濕在裏不解故也勿下于寒濕中求之風雨襲
虛山澤
蒸氣人多中濕濕流關節頭身體煩痛脈沉緩為中
濕脈細非也主一身蓋痛發熱身黃小便自利木附
湯若小便不利大便反快當利小便宜甘
甘草附子湯五苓散麻黃加白木湯脈弦浮大短
氣腹滿脅及心痛久按之氣不通臍乾不得汗嗜卧
身目悉黃小便難有潮熱時時欬嗽少陽中風也主
小柴胡湯

千金方

幼幼新書

卷十五

五十一

搗土瓜根汁三合服聖惠
安和

又韭根汁澄清滄鼻中出黃水差

外臺療天行三日外忽覺心上滿堅硬脚手心熱變

為黃不療殺人秦朮湯

秦朮

紫草

白蘚皮

黃芩

梔子仁

等分切水一大升半牛乳一大升煮七合分二服

意量

經驗方治遍身金色

瓜蒂六月六日收丁香入廿鍋燒烟盡
各四十九個

細研勻兒半字吹鼻內及揩牙

聖惠茵陳散治黃病身如橘色

茵陳

川朴各一兩

梔子仁

川大黃炒

黃芩

犀角

寒水石

木通各半兩

篩散一錢水小盞煎五分不時溫服意量

治脾胃熱毒致肌肉變黃小便赤色心中煩懊茵陳

丸

茵陳

梔子仁

川大黃炒

甘草炙

幼幼新書

卷十五

五十二

秦朮各一兩

川朴各半兩

末煉蜜丸如菜豆不時湯下五九量與

治諸黃大黃散

川大黃炒

黃連

苦蘘根

黃芩

梔子仁各半兩

粗散一錢水小盞煎五分不時溫服意量

大黃丸

川大黃炒

甜葶藶

隔紙炒

茵陳各半兩

羅末煉蜜丸如梧子不時新汲水研三九量服

治身面俱黃黃瓜丸

黃連兩一 胡黃連兩半

羅末黃瓜一枚去瓢留蓋子入藥末蓋定大麥麩
裹燒焦去麩擣丸菜豆大一歲一丸量加

嬰孺茵陳湯

茵陳 升麻 黃芩 柴胡

知母 羚羊角各八分 大黃 石膏各錢二分

梔子錢一 芍藥六分 瓜蒂七個 藍葉一分

甘草分二

幼幼新書 卷十五

切水五升煮升半一二歲為八服四五歲為四服

張漢蘆根湯

蘆根兩一 茵陳 山梔 黃芩

甘草各兩半

細末一錢水八分薄荷三葉煎五分溫服

活人書茵陳蒿湯

茵陳蒿嫩者兩半 大黃去皮兩 梔子大者三枚

劉如麻豆水二大盞煮茵陳減半內二味煮八分

溫服日三

梔子蘆皮湯

梔子八枚 黃蘗兩一 甘草各兩

劉如麻豆抄五錢水盞半煮七分溫服

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃節去 連翹根用 甘草各兩 赤小豆升半

生梓白皮兩二 杏仁廿枚

劉如麻豆抄五錢薑四片棗一枚水盞半煮八分

溫服

木附湯

幼幼新書 卷十五

白朮兩二 附子半個 甘草各兩

劉如麻豆抄五錢薑五片大棗一枚水盞半煮七

分溫服日三一服覺身痺半日許再服三服都盡

如冒狀是附朮走皮逐水氣未得除耳法當加桂

一兩大便堅小便自利不加

甘草附子湯

甘草 白朮各一兩 附子一枚 桂枝兩二

劉如麻豆抄五錢水盞半煮七分溫服汗出解身

腫加防風二兩悸氣小便不利加茯苓兩半

麻黃加朮湯

麻黃兩半

桂枝去皮一兩

甘草炙

蒼朮各半兩

杏仁廿五枚

劉如麻豆抄五錢水盞半煮八分溫服

傷寒餘熱不退第十六

巢氏傷寒邪氣與正氣交爭正氣勝則邪氣散故寒熱俱歇若邪氣未盡時干正氣則壅痞還熱故餘熱往來不已其狀肉常溫溫赤熱

聖惠傷寒四五日熱入裏下後熱不除是餘熱未盡

幼幼新書

卷十五

寒

瀛東王先生日中可夜熱甚天明復涼為餘熱未解

聖惠歲時散逐毒氣

歲時

川大黃炒

川升麻

甘草炙

黃芩

大青各半兩

羅散一錢水小盞煎五分不時量服

治傷寒汗利後熱不除口乾心煩不乳黃著散

黃著

知母

赤茯苓

甘草炙

黃芩各一分

麥門冬焙半兩

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

麥門冬散治傷寒汗利後餘熱不解身體疼痛心神虛煩不思乳食

麥門冬

川升麻

柴胡

前胡各半兩

元參

犀角

子芩

葛根

赤芍藥

甘草炙各一分

羅散一錢水小盞薑少許煎五分不時溫量服

治傷寒後餘熱不除心神不安茯苓神丸

茯苓

麥門冬焙

鐵粉

朱砂各半兩

犀角

梔子

白蘚皮

川升麻

幼幼新書

卷十五

寒

元參

車前子

搗羅煉蜜丸如菜豆不時湯下五丸量加

傷寒後餘熱不除四肢不利用浴湯

川大黃

甘草

防風

丹參

白朮各半兩

雷丸三分

散一兩水三升煎二升半去滓密室中浴兒宜避

風隔日再用嬰孺猪脂和摩兒頭足遍身

醫局治傷寒汗後表證解心胃煩渴欲飲水反吐或

下痢後七八日邪毒不解熱結在表表裏俱熱時時

惡風大渴舌乾燥煩欲飲水數升又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴白虎湯

石膏洗廿五斤 知母百五十兩 甘草燻七十兩

細末服三錢水盪半粳米三十餘粒煎一盞溫服或加人參食後服夏宜暾春秋并亡血虛家勿服

治傷寒當取白虎湯此方叙邪毒不解熱結在裏故收之

嬰孺除熱粉散

雷丸三兩 牡蠣 桂心各一兩

為粉粉兒身

幼幼新書 卷十五

張渙解傷寒邪熱餘毒清涼湯

當歸 大黃 生地黄各一兩 芍藥

甘草各半兩

細末一錢水八分竹葉薄荷各少許煎五分溫服

傷寒勞復第十七

活人書傷寒新差血氣尚虛津液未復因勞動生熱

熱復入經絡名勞復仲景云小柴胡湯主之脈浮者

汗解柴胡桂枝湯 脈實者下解大柴胡湯 又大病勞復枳實梔

子湯千金起死麥門冬湯又大病新差脾胃尚弱穀

氣未復強食過多停積不化發熱名食復新病差多因傷食作 病乾噎食夏腹中雷鳴下痢生蓋瀉心湯 仲景枳實梔子湯黃帝曰熱病 遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食故有所遺也若此者皆病已氣而熱有所藏因其藏食相薄兩熱 相合故有所遺也黃帝曰善治遺者何岐伯曰視其虛實調其逆從何使必已食肉則復多食則遺此其 禁也廣濟療勞復雄鼠屎散許仁則七味葱白湯可選

千金五味子湯治傷寒久不除差後復劇瘦瘠骨立

五味子銖十 甘草炙 當歸各十銖 芒硝五銖

石膏兩一 大黃 麥門冬 黃芩

幼幼新書 卷十五

前胡 黃連各六銖 吹咀水三升煮升半服二合得下便止量加減

活人書柴胡桂枝湯

柴胡兩二 半夏三錢 甘草炙半兩 桂枝去皮

黃芩 人參 芍藥各三分

劉如麻豆抄五錢薑四片棗一枚水盪半煮八分

溫服

枳實梔子湯

枳實二枚炒 梔子七枚 豉兩二

清漿水二盞半煮八分內枳實梔子取九分下豉
再煮五六沸溫服覆汗出有宿食內大黃如博棊
子五六枚同煎

麥門冬湯

麥門冬兩一 甘草兩二

劉如麻豆水二小盞粳米半合煎未熟去米約水

小盞半入藥五錢棗二枚竹葉十五片同煎一盞

服

雄鼠屎散

雄鼠屎二十七粒兩

梔子十四個

枳殼三枚

粗末四錢水盞半葱白二寸豉三十粒煎一盞分

二服勿令病人知

許仁則七味葱白湯

葱白連鬚半升 乾葛三合

新豉半合

薑三分

麥門冬 乾地黄兩三

勞水四升抄

煎三分減二分二服漸覆取汗

傷寒失音第十八

聖惠喉嚨氣之道路喉嚨氣之門戶舌者聲之機口

者聲之扇風寒客喉嚨間故卒無音

茅先生方

金毛狗脊 甘草

等分末一錢煮臘指頭大水六分煎四分服

集效方

桂指面大含之漸漸聲音如響

王氏三拗湯

麻黃全 甘草生 杏仁全

等分服三指撮水一大盞煎七分時時溫呷

傷寒變疽第十九

石僻經歌

先前五日臉紅鮮一見生人怕又驚

兩臉唇青 驚觀曾前赤痣起漸同梅李一般形

怕語言 血光齒上時聞臭指甲無紅色似銀會者可醫

無苦病不識言風道熱驚用藥表脾涼上膈心

涼疽伏始安寧

鳳髓經宜二聖散表

形證論表發用參苓散涼心南星丸

傷寒變 不逞解

表散慢驚去毒托裏散傷寒變

參苓散治嗽化痰

人參 麻黃

甘草炙

欵花各一

小半夏湯浸十

葶藶各半

馬兜鈴三

末服半錢桑皮湯下

傷寒變疹第二十

石壁經歌

預先五日戰如寒不覺看來又似癩繞發有同

梅李樣眼睛青碧臉紅鮮手心如火毛髮立腫

幼幼新書

卷十五

本

裏狂言卧不安躁熱嫌人撥手睡又生喘息氣

相連二三歲時為疹子此候須知有病源智者

莫令通藏府只將丸散表心間能催疹子添光

大七日如期定却安

傷寒失表毒氣攻裏而未安凡冬月春夏初精明

色辰勿同驚風治

形證論先有蘊熱忽風傷腠理發熱狂言氣急生涎

天南星丸退心間風涎微用解表退傷寒量虛實宣

瀉托裏散勻氣如不宣卒未安

形證論初如傷寒或似驚風辨子細出在皮膚宜平

和藥表解勻氣更量肥瘦聊通利關竅勻氣皮膚疹在

可通利已出通利內

鳳髓經治疹痘欲出不出二聖散

浮蘋 香白芷

等分服半錢或一錢麝香酒下

治疹痘不出用藥發出餘熱未退發渴熱水迺下血

牛蒡散解斑

甘草節 荆芥穗

牛蒡子炒

幼幼新書

卷十五

本

等分末錢半解毒薄苛湯下未出紫草湯下進數

服

形證論治急驚風因赤體或變蒸遂留不出因滯潮

熱天南星丸

天南星去皮 朱砂一

蝎半

輕粉少

末酒麪糊丸如菜豆服七粒薄苛湯下日二

治傷寒變瘡疹通關勻氣托裏散

人參 麻黃

甘草節各一 白朮

蔓荊子

紫草各一

白茯苓半

升麻分

未一錢瘡未出好酒調已出香湯調下

卷中張仲景方見別門者不錄據此考本門

自汗門

五苓散

桂枝湯

四逆湯

小建中湯

調胃承氣湯

藁本粉即溫粉法

頭汗門

小柴胡湯

門內某方去某加某湯其去其加者只據本方無別見餘做此加減三方

赤茯苓湯

茵陳湯

幼幼新書

卷十五

五

欬嗽門

小青龍湯

加減一方

猪苓湯

真武湯

四逆散加減四方

發喘門

麻黃湯

大承氣湯

承氣湯

真衄門

竹茹生薑湯

竹葉石膏湯

竹葉湯

犀角地黄湯

嘔哕門

大柴胡湯

白通湯加減二方

黃連湯

通脈四逆湯加減一方

發渴門

白頭翁湯

大陷胃丸

黑奴丸

結胃門

理中湯

下痢門

幼幼新書

卷十五

六

生薑瀉心湯

幼幼新書卷第十五

幼幼新書卷第十六 咳嗽諸疾 凡十一門

後學古吳陳履端于始輯

延陵吳安仁長卿校

咳嗽第一

巢氏肺主氣候皮毛而俞在背兒解脫風寒傷皮毛
從肺俞入肺感寒即咳嗽故兒背常令暖夏月着單
背襠若背冷得嗽月內難治百日內十差一二耳
嬰孺兒離母而啼氣未定乳之啼時陰陽俱盛虛實
更作肺胃受邪故嗽

幼幼新書 卷十六

錢乙嗽者肺感微寒八九月間肺氣大王病必實面
赤痰盛身熱葶藶丸下之見未久者勿下十一月嗽
風從背俞入麻黃湯汗之見未有熱證面赤飲水涎熱
咽痰不利兼甘桔湯實熱若五七日間身熱痰盛唾
黏補銀丸下之痰涎肺盛者咳而喘面腫欲飲水有
不飲水者其身即熱瀉白散喘嗽上若傷風五七日
無熱證而但嗽者葶藶丸下後化痰肺虛嗽而硬氣
時長出氣喉有聲久病也阿膠散補之喘嗽上痰盛
者先實脾後補銀丸微下涎退即補嗽止吐水或青

綠者百祥丸下瘧疹倒嗽吐痰涎乳食者白餅子下

阿膠散效而痰實不甚喘面赤時飲水者補銀丸治

嗽大法盛即下久即補更量實增損

嗽病訣死杜氏子五歲自十一月始嗽而吐痰是風

寒搗肺宜麻黃輩發散後用涼藥壓之當愈時醫下

補銀丸肺虛嗽甚至春三月間面青而光嗽而喘促

硬氣時出氣錢曰病困十已八九面青而光肝王也

春三月肝位肺衰時也嗽肺病十一月至三月久即

幼幼新書 卷十六

虛痿又曾下之脾肺子女也復肝勝為逆故嗽而喘

促硬氣長出氣急與瀉青丸驚熱後阿膠散實肺次

日面青而不光又補肺而嗽如前又瀉肝加肺虛唇

白如練錢曰肝太王而肺虛絕肺病不得其時而肝

勝之今三瀉肝而肝病不退三補肺而肺證猶虛當

死此證在秋十救三四春夏十難救一果大喘死

寶鑑嗽眼上視下青黑糞灰

惠眼生一月至三五歲嗽分數種
妳下嗽熱妳傷肺下溫肺散瘧嗽及人參膏塗唇

鞠鞠嗽氣急喘逆早起眼腫渾金丹咳門量大小
與吐下涎即用勻氣化涎涼心肺藥

疳嗽久瀉脾胃虛上嗽發熱攻擊心氣宜疳藥蘆蒼
九夾烏犀丸肥疳後退心熱及防已丸疳

傷寒嗽風容肺肺氣伏熱嗽後多吐宜金粉散傷風
上諸嗽如脾胃實胸膈太壅蘇湯藥丸利之急慢

肘後方
紫苑分六 貝母分二 欵冬花分一
搗散服如豆大着乳頭嚙之日三四母勿食大鹹

醋聖惠清粥飲調一字
千金治十日至五十日卒得聲效吐乳嘔逆暴嗽晝
夜不息生薑煎或加麥門冬

生薑兩七 乾薑兩四 桂心兩二 甘草
欵冬花 紫苑各三 杏仁 蜜各一

末微火煎取如飴餉量大小多少與兒含嚙百日
兒棗核許日三四

四物欵冬丸治嗽日中差夜甚不得息不能啼

欵冬花 紫苑各兩 桂心兩半 伏龍肝六

末蜜和如泥棗核大敷乳頭日三漸令飲
水鑑兒百日内嗽逆不止

咳嗽不止使神攻梔子乾薑力不同乳前一合
分三分必定獲安五葳通

葳氣不和不宜大藥
外臺療咳嗽不卧

甘草分六 桔梗分四 桑白皮 貝母
茯苓分三 大青 吳藍 五味子

人參分二
切水二升煮八合量服忌如常法

聖惠天門冬散治心胃煩悶體熱咳嗽
天門冬焙 桑白皮 赤茯苓 柴胡

百合 紫苑 藍葉 甘草各兩

粗散一錢水一盞薑少許煎五分量兒分減温服
陳橘皮散治咳嗽胃中滿悶不欲食乳

陳橘皮焙去白 桔梗 雞蘇 杏仁燉

人參各一 貝母兩半
羅散一錢水一盞燈心十莖煎五分温量服日三

桔梗散治卒咳嗽吐乳

桔梗

陳橘皮

焙去白

人參

各一分

甘草

炙

麥門冬

焙

紫苑

各半

粗羅一錢水一盞煎五分以意加減

治咳嗽頭熱乳母服百部散

百部

貝母

煨

紫苑

各一分

葛根

各一分

石膏

兩二

篩三錢水一盞竹葉二七片煎六分食後服即飲

乳

切切新書

卷十六

五

博濟犀灰散

疑少犀灰

巴豆

杏仁

去皮

半夏

等分末合盛赤石脂閉縫三斤炭煨冷研如粉兒

半字淡薑湯調大人薑湯下一字

靈苑金杏煎丸

杏仁

生四十九個

大苦蕒

個一

不中阜角

錠一

生百部

兩一

三銖並水按搗絞汁

銀石器慢火熬膏

牽牛子

兩一

木香

分半

入藥膏杵丸如菘豆服五七丸糯米飲下量服

漢東王先生治咳嗽金花散

鬱金

兩半

防風

各一分

半夏

各一分

巴豆

三七粒

阜角

莖一

水一升銀器煮乾去巴豆阜角溫湯洗餘三味焙

末服嬰孩一字二三歲半錢或一錢薄苛蜜湯調

張渙治肺癰咳嗽大便不利馬兜鈴丹

馬兜鈴

各半

紫蘇子

各一分

人參

各一分

款冬花

木香

各半

杏仁

一分

細末蜜和如黍服十粒薑湯下量服

切切新書

卷十六

六

嬰孺方

紫苑

各五分

射干

各五分

貝母

各一分

升麻

各一分

杏仁

各八分

柴胡

各四分

茯苓

各一分

芍藥

各一分

黃芩

各八分

甘草

各四分

枳殼

各六分

竹葉

各一分

蜜

合八

水三升煮升八合去滓入杏仁蜜煎六合一歲服

一合

張渙養肺湯治嗽溫養肺胃

紫苑

焙

半夏

湯洗七次

款冬花

各一分

阿膠

炙各兩

人參 桂心各半兩

細末一錢水一盞薑二片糯米五粒煎五分溫時服

治月內并三歲兒嗽雄黃膏

雄黃錢 杏仁七粒 半夏七個童便

研勻薑汁半兩蜜半兩并藥入罐內重湯熬柳杖攪成膏一卓子大塗乳頭令兒吮或糯米飲調

王氏蘇香散

紫蘇 半夏湯洗 知母 貝母

幼幼新書

卷十

十一

人參 款冬花 五味子 桑皮各半兩

厚朴炒 甘草炙各二兩

細末米飲調一錢不時服

吉氏貝母散

貝母羊兩每個

末一錢百沸湯點不時服

丘松年蜜瓜膏

蘇蘇皮蜜塗慢火炙

末一錢蜜調成膏時抹兒口

黃芩散

黃芩童便浸三日焙

細末一字或半錢白湯調乳後服

寶鑑灸肺俞穴風疔各三壯

咳逆第二

巢氏效逆由乳哺無節因挾風冷傷肺肺主氣為五臟上蓋在胃間兒啼氣未定因而飲乳乳與氣逆則引乳射肺故效而氣逆冷乳冷哺搏肺氣亦效逆千金治效逆短氣胃中吸吸呵出涕唾嗽出臭濃

幼幼新書

卷十

十一

淡竹瀝煮二十沸服一合大人一升俱日五不妨

食息乳哺

治寒熱效逆膈有癖乳若吐不欲食

乾地黃兩四 麥門冬 五味子 蜜各半升

大黃 硝石各一兩

吹咀水三升煮一升內硝蜜煮令沸服二合日三

有宿乳汁升許出大者五合

杏仁丸主效逆上氣

杏仁三升熬擣如膏蜜一升為三分先內一分杏

內搗令強更內一分搗如膏又內一分搗熟先食
含嚙日三服不得過半分寸七

聖惠紫苑散治欬逆上氣痰壅不欲食乳

紫苑兩半 甘草分三 五味子 黃芩

麻黃去根節 桂心 半夏洗七 枳殼麩炒

分

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分不時分二服

治欬逆上氣乳食即吐人參散

人參 半夏洗七 紫蘇子各半 桂心

幼幼新書 卷十末 九

陳橘皮去白焙 款冬花 甘草炙 紫苑各一

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分不時量服

生地黄散治寒熱欬逆上氣逆滿膈有痰乳即吐

生地黄 杏仁炒 麥門冬焙 川大黃炒

五味子各半 硝石分一

粗散一錢水一盞蜜半匙煎五分不時溫服量兒

嬰孺治欬逆連年不止吳茱萸湯

吳茱萸升半 款冬花 桂心 薑各一

射干 紫苑各二

水六升煮升半先乳服三合

八味紫苑湯治逆氣喘傷肺經久嗽良

紫苑 細辛 甘草各二 款冬花三

桂心 牡蠣各一 豉一 竹葉一

水七升煮二升五歲服五合不知加

治欬逆善嘔面腫涕出胃滿肺脹短氣肩息白狗肺

湯 白狗肺具一 紫苑分五 清酒 人參

烏韭 款冬花 細辛 桂心

幼幼新書 卷十末 十

白朮各一 薑三 飴糖斤 豉升一

甘草各一 麻黃去節 吳茱萸升半

清酒一斗同藥微火煮七升服一合日三夜一

無桂心有杏仁七個

喘欬上氣第三急附

巢氏肺主氣有餘即喘欬上氣若風冷所加氣聚于

肺令脹即胃滿氣急

錢乙肺藏怯唇白阿膠散補肺若悶亂氣粗喘促哽

氣難治脾肺病久則虛而唇白脾肺之母女子皆虛

不能相營故怯

肺主唇唇白澤者吉白如枯骨者死

寶鑑兒宿痰飲成塊散後遍身虛腫急喘

客風傷肺即氣促

金匱小青龍加石膏湯治肺脹欬上氣煩躁而喘脉

浮者心下有水

麻黃去節三兩

芍藥

桂枝

細辛各三兩

甘草炙

乾薑各三兩

半夏湯洗

五味子半升

石膏二兩

幼幼新書

卷十六

十一

咳咀水一斗煮麻黃減二升去沫內藥煮三升去

滓強人一升羸者減日三兒服四合

肘後杏仁湯

杏仁淨世

麻黃分

水二升煮一升分溫服五合以意度外臺百日兒

患熱氣急勿服小便赤黃服

千金麻黃湯治卒肩息上氣不得安惡風入肺

麻黃去根節

甘草炙

桂皮寸五

五味子半升

半夏洗

薑各二兩

經驗方定喘化痰

猪蹄甲四十九個洗控乾每個入半夏白礬各一

字入罐封勿令烟出煨赤研入麝一字糯米飲下

兒半錢

治欬嗽喘促胃滿坐卧不安葶藶散

甜葶藶紙炒

麻黃去根

貝母煨

甘草炙

杏仁各一分

粗散一錢水一盞煎五分溫服日四五量與

幼幼新書

卷十六

十一

治欬嗽心煩喘粗杏仁煎

杏仁炒

天門冬

寒食錫各一兩

酥各一

生地黄汁一盞

貝母炒半

搗杏仁如膏地黃汁煎貝母天門冬至五分研絞

汁入杏膏等同熬如稀錫溫水調半錢量服

欬冬花丸治咳嗽不差喉鳴喘急

欬冬花

甘草炙

紫苑各一分

麻黃去根

貝母煨

麥門冬焙

赤茯苓

杏仁炒各

羅末入杏仁勻蜜丸菜豆大清粥飲研五丸量加

人參散治咳嗽心胃壅悶喘粗不欲乳食

人參分三 桔梗 前胡 赤茯苓

麥門冬焙 子芩 欵冬花 甘草各半兩

粗散一錢水一盞竹葉七片煎五分量溫服

錢乙瀉白散治肺盛氣急喘嗽

桑白皮炒 地骨皮焙各兩 甘草炒半兩

細末一錢水中盞糯米百粒煎六分食後溫服

阿膠散治肺虛氣粗喘促

阿膠炒 鼠粘子炒 甘草各一分 杏仁七個

幼幼新書 卷十六 十一

馬兜鈴焙半兩 糯米一兩

末一二錢水一盞煎六分食後溫服

張渙治肺氣不利蟬殼湯

蟬殼炒 五味子洗七次焙 人參各一兩 陳皮去白焙

甘草各半兩

細末服半錢薑湯調

聚寶治氣不和定喘和氣補虛思食平氣散

人參 白茯苓 百合 甘草各

白朮 桔梗

等分末一錢水八分薑少許煎五分溫服

張氏治肺喘急

天南星 半夏洗七次 人參 桑皮炒

陳皮炒 等分散水六分薑二片煎三分溫服

吉氏清肺散治遠年近日肺氣喘息咳嗽并治勞

半夏薑汁浸宿 麻黃各半兩 馬兜鈴 貝母

川升麻 杏仁 地骨皮 青皮

細辛 麥門冬 桑白皮各一分 百合

幼幼新書 卷十六 十四

欵冬花 柴胡 桔梗 茯苓各三分

末二錢水一盞薑三片烏梅一個煎七分溫服

調氣定喘勻氣散

丁香九粒 白朮一分 荳蔻一個 青皮半兩

甘草各一分

末一字量加減陳米飲下

治傷冷氣喘涎多

蘇蘇大者一箇開蓋 阿膠一分 沙糖半兩

二味入蘇蘇內蓋着白紙封飯甑蒸兩遍傾出隨

兒大小冷服

朱氏真珠散治氣喘多涎

真珠

生犀各半

香附錢四

龍腦許少

末半銅錢桃仁湯調服嬰孩一字一歲下半錢

鄭愈治痰涎不利上喘效嗽生白丸

白附子

新羅

天南星

各半

半夏

一兩

末薑汁麩糊丸薑湯下量服

咳嗽作呀呷聲第四附

聖惠胃膈痰多嗽動痰上搏咽喉間痰與氣相擊隨

幼幼新書

卷十六

十五

嗽動息呀呷有聲效嗽大都雖同治加消痰破飲藥

為異

楊大鄴效嗽氣粗者兒藏府虛細食肥膩熱物及生

冷致冷熱相爭遂積痰涎結聚冷熱攻脾壅閉不通

宿痰粘涎肺經虛熱生膈上喉中如鋸氣喘悶絕嘔

吐不快面色青黃大約難逢妙藥積久變風病

王訣歌

咳嗽因風肺受寒氣傷咯血喘生涎鞞鞞府熱

同風盛嗽喘無時卧不安

先治肺後利膈下涎

惠濟歌

鞞鞞推來肺熱風一田發作氣相衝得名妳鞞

為初候龜背龜胃恐起峰口閉不言涎作響一

衝雙目柘黃同此根終久成殘患少有各方得

斷蹤

聖惠陳橘皮散治效咳嗽中呀呷

橘皮去白

桑根白皮

杏仁麩炒

甘草

各

甜葶藶

隔布炒紫

幼幼新書

卷十六

十一

粗羅服一錢水一盞煎五分溫加減服

蟬殼散

蟬殼炒

半夏洗七次

漢防已

甘草

各

桔梗

細末薑粥飲調一字三歲上半錢

治痰嗽辰砂半夏丸

半夏湯浸

甜葶藶

杏仁麩炒

朱砂

飛半

五靈胎分半

羅末薑汁麩糊丸如菜豆麻黃湯下三九日三量

服

貝母散

貝母煨微

紫苑

麻黃去根節 麥門冬焙

甘草炙

杏仁夫炒黃

羅散一錢水一盞煎五分以意不減服

茅先生渾金丹

巴豆

砒

白丁香

阜角濃煎膏九菴豆大量服三九鯽魚湯吞掠出
涎勻氣散補

切切新書

卷十六

十七

嬰孺九味湯

細辛

桂心

阿膠炙

甘草炙

紫苑

款冬花各二兩

半夏四兩

薑三兩

蜜合二

水一斗煮半夏六升去滓入諸藥煮二升五歲盡
服三歲六合酌之千金治水雞聲

張渙桔梗湯

桔梗

半夏洗七次焙

紫蘇葉炒微

石膏

甘草炙各半兩

阜莢燒存性

細末一錢水一盞薑三片煎五分時時溫服

玉訣貝母丸

貝母

天南星薑製

人參

茯苓

甘草炙

白附子等分

阜角子七個

未蜜丸 每服五七丸薄苛湯吞

惠眼渾金丹

黃丹

信砒各抄二錢

飛羅麵抄三錢

研極細澹水丸如黍服三九砂糖冷水五更初吞
天明不吐再進一二九兒丸

切切新書

卷十六

十八

吉氏治氣嗽作聲

麻黃去根節

桔梗苦

石膏

紫苑各半兩

乾薑

半夏各半錢

王母杖一作貝母

杏仁一分

未一錢米飲調或蜜丸如黍服七丸飲下兒減

治妳乾

天竺黃

蚌粉炒

等分蜜調塗妳頭喫

治鞠乾

雌黃錢 砒霜拌豆粉 朱砂各半 梔子錢五

麵糊九粟大服三粒生油冷水下兒一粒

治年久乾乾軟肺丸

衡砒錢一 豆豉半兩蒸去皮

細末蒸餅丸如粟服二三九嚼魚鮓吞下

鄭愈千金散治鯁嗽喘滿嘔涎黃色

川鬱金生十個 半夏麴 青皮去白各錢半 巴豆個十

末一字猪肉一片搽藥火炙黃任意細嚼冷薑汁

一呷送下兒少服

幼幼新書 卷十六 十九

效嗽聲不出第五

寶鑑肺主聲咳嗽聲不出為客風傷肺管吸門

聖惠杏仁煎

杏仁水一盞研 蜜 酥各一

鑊中重湯煮杏仁汁減半入酥蜜又煮甘沸入貝

母紫苑末各一分甘草末半分更煎攪如錫收

罷清粥飲調半錢日三夜一量服止為度

又方

貝母煨半兩 牛黃錢 甘草錢一

細羅溫水調半錢日三四加減服

又方

麥門冬焙 杏仁麩炒 甘草炙 貝母煨

款冬花各一分 紫苑兩半

細羅乳汁調半錢日三四意加

驚膈嗽第六

茅先生兒驚風好便作嗽號驚膈嗽金杏丸夾勻氣

散兒氣未盛月內嗽不治心陷胃高渴不進食死

金杏丸

幼幼新書 卷十六 王

杏仁 甜葶藶 瀟防已 馬兜鈴去皮

等分末蜜丸黍大服十粒麥門冬湯吞

勻氣散

桔梗 縮砂仁 陳皮 茴香各一兩

甘草兩二 白薑分

末半錢一錢霜木瓜煎湯調紫蘇鹽湯亦得

傷風嗽第七

茅先生有一種百日內傷風嗽如豆膏效嗽 夾朱砂

青

張渙治肺中風欬喘滿貝母湯

貝母炒 半夏白礬湯洗七 乾薑炮

麻黃去根 甘草炙 欬冬花各半

羅一錢水一盞薑三片杏仁兩個煎五分溫服

惠眼治欬嗽傷寒涎壅發欬杏仁散

杏仁 巴豆 半夏 皂莢

銅青

等分入甘鍋鹽泥固濟煨勿走藥氣末薑蜜湯調半錢或一字

幼幼新書 卷十六 廿

金粉散最治傷風欬嗽或回嗽後多吐

麻黃節連 貝母 糯米 鬱金阜角

杏仁 甘草炙 天南豆薑汁浸一宿作餅炙

人參 地膽 知母

等分末入杏仁膏服一錢水半錢蜂糖二分盞薄

苛二葉煎五七沸

劉氏肺中風欬嗽氣急咽喉有痰

麻黃去根節 訶子肉二 甘草炙一

水三椀煎半椀溫服一歲小盞三分三二歲五七

分五歲一盞不時

痰嗽第八

張渙論肺最嫩弱有疾難調兒氣血未實解脫不避風寒傷皮毛隨氣入肺令咳嗽當煖背夏月背襠蓋肺俞久嗽不止致傷真氣生驚風百晷內欬嗽十一二差膈上痰涎宜隨證療之

玉訣歌

欬嗽因風府受寒三焦伏熱轉生涎胃冷虛痰頻嗽吐時時發熱喘連連

幼幼新書 卷十六 三

先下涎次和胃後治欬

聖惠貝母散治欬嗽心胃痰壅咽喉不利少乳食

貝母煨 桔梗 馬兜鈴 百合

欬冬花 半夏浸七次 乾薑炮 漢防已

麻黃去根節 甘草炙半 杏仁炒黃研

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分溫服日三四

蟬殼散

蟬殼炒 桔梗 人參 甘草炙

陳皮去白焙 半夏半分洗七

細羅薑粥飲調一字日三五以意加減

醫局治風化痰安神定志利咽膈清頭目止咳嗽除

煩悶辰砂化痰丸

辰砂飛

白礬枯各半兩

天南星炮一兩

半夏洗七次薑

汁作麩三兩

末薑汁麵糊丸桐子大朱砂衣食後薑湯吞十九

兒一丸槌碎薑薄苛湯下

嬰孺麻黃丸治胃中痰實嗽并治傷寒逐水

麻黃

茯苓各三兩

紫苑四分

五味子

幼幼新書

卷十六

廿三

杏仁

細辛

桂心

乾薑各二分

末蜜丸小豆大三四歲二三九不知稍增

治胃中嗽滿涎出擦膈五味湯

五味子

甘草炙

細辛

常山各一分

麻黃去節二分

水三升煮升二合為三服

濼東王先生治欬嗽有痰并解諸藥毒及上焦壅身

生瘡消疳氣三黃丸

雄黃

鬱金煅各一錢

巴豆個三

末爛飯丸如粟嬰孩三九飯飲吞薄苛湯亦可

張渙消痰飲止咳嗽人參半夏丹

人參

半夏湯洗七次焙

川麩薑

白朮

天南星並炮各一兩

細羅薑汁糊丸如黍薑湯下十粒百碎兒針頭大

沾乳頭吮

保生利膈丸治風盛痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛四兩生熟各半

青橘皮去白

皂角不神肥者

肉酥炙二兩

齊州半夏湯洗七次焙一兩

幼幼新書

卷十六

廿四

薑汁糊丸如桐子兒作小丸量與

玉塵散治痰壅欬氣促喘滿咽膈不利大治勞嗽

天南星

半夏並湯洗七次焙

桔梗

桑根皮

等分粗末三大錢水盪半薑如錢六七片煎八分

不時溫服

張氏

木通

青橘皮

天南星

阜角燒各一兩

杏仁

巴豆燒上

輕粉各

麝半錢

雄黃錢六

研散食後茅香燈心湯下兩字許

孔氏惺惺散解風壅痰熱化涎嗽止煩渴

桔梗 人參 甘草 苦蕒根

白朮 防風 細辛

細末一錢水一盞荆芥少許煎五分去滓溫服

王氏治痰實效嗽壯熱生驚呀呷喘滿頭痛心忪胃

膈不利心嘈惡心墜痰丸

半夏 天南星 杜薄荷 白茯苓

白礬灰 人參

幼幼新書 卷十木 牛車

細末薑汁糊丸薄荷湯下五七至十九

丁時發牽牛丸治痰鳴效嗽氣粗不食涎潮定喘

牽牛末 螺青 白礬 鵝砂

巴豆 杏仁

末糊丸菜豆大淡薑湯下七粒

治痰鳴涎響效嗽喘逆半夏丸

大蘿蔔一個開小竅成罐入半夏半兩好醋煮赤

研如泥入朱砂雄黃各一錢丸菜豆大兒五七十

九量服薑湯下

寒嗽第九

錢乙論寒熱相反運使李公孫八歲病嗽而胃滿短

氣衆言肺熱用竹葉湯牛黃膏各二服三日加喘錢

曰肺氣不足復有寒邪即喘滿當補脾肺勿服涼藥

若作肺熱何不治肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治

心藥也錢治愈

千金紫苑湯治中冷及感寒暴嗽或上氣喉咽鳴氣

逆或臍塞清水出

紫苑 杏仁 黃芩 當歸

幼幼新書 卷十木 牛車

甘草 麻黃 桂心 橘皮

青木香 大黃

呔咀水三升者九合百日兒服二合半量加

五味湯治風冷入肺上氣氣逆面青喘迫效嗽晝夜

不息 食則吐不下

五味子 當歸 乾薑 桂心

人參 紫苑 甘草 細辛

呔咀水二升半煮丸合百日兒服二合半嬰孺多

棗廿枚少乾薑大黃一無欵花大黃有棗

芎藭九治暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴

芎藭 烏頭炮 杏仁 礬石

細辛 阜莢各六 欵冬花 乾薑炮

桂心 紫苑各十 蜀椒各五 吳茱萸各六

末蜜丸如梧子三歲五丸至十九日三暴嗽數服

差 醫局潤肺散治寒壅相交肺氣不利欵嗽喘急語聲

不出痰涎壅塞胃膈煩滿卓塞清涕咽喉乾痛

幼幼新書 卷十 廿七

麻黃去根 人參各二 貝母 杏仁並炒

甘草各一 陳橘皮去白 桔梗

阿膠炒黃各 羅末一錢水八分煎六分食後溫服

華蓋散治肺感寒邪欵嗽上氣胃膈煩悶項背拘急

聲重卓塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲

紫蘇子隔紙 麻黃去根 杏仁炒 桑白皮蜜

赤茯苓 陳皮 甘草各一分

末服一錢水一盞煎五分去滓溫服

人參半夏丸治肺胃受冷欵嗽氣急胃膈痞滿喉中

呀呷嘔吐涎沫乳食不下亦治癆嗽

人參 細辛 陳皮各二 丁香

半夏湯浸 厚朴各四 細羅薑汁糊丸如麻子三歲服廿丸薑湯食後量

服 錢乙治肺寒壅微喘百部丸

百部焙 麻黃去節各 杏仁四十個微炒

末熟蜜丸阜子大溫水化三二丸無時日三四仲

幼幼新書 卷十 廿八

陽加松子仁五十糖丸含

張渙木香半夏丹 木香 半夏湯洗 肉豆蔻各一 藿香

丁香 白朮炮各

羅薑汁丸如黍人參湯下十粒量加

王氏潤肺膏 水蓼 桑針 覆盆子 枸杞各半

阜兒炮 杜苗香 薑 甘草

京三稜炮 胡桃合十

細末煉蜜和一兩作八十九細嚼溫湯下兒小白湯

熱嗽第十

錢乙論溫冷張氏孫九歲病肺熱眾以犀珠龍麝牛黃治一月不愈嗽喘悶亂飲水不止全不食錢用史君子丸益黃散蓋涼藥久則寒不食兒虛不能食服補脾藥二日欲食又瀉白散治肺愈張曰何以不虛錢曰先實脾後瀉肺故譚氏知母散

幼幼新書 卷十末

小兒頻嗽又饒啼喘息時時似火堆此是乳食衝膈熱莫寬神竈恐延遲沙糖元劍塗酥炙杵合依方請不疑更取麥門冬知母三焦洗了是良醫

知母 麥門冬 甘草生各一分 阜角去皮酥炙

去火毒半兩

末二錢水一盞煎八分冷分五服

張氏治虛熱生涎欬嗽人參散

人參 貝母炒 欬冬花 半夏水浸透薑

作餅 甘草炙各一分

細末半錢水四分杏仁二粒煎二分溫服

吉氏治上焦壅熱及心肺虛熱嗽不止清肺丸

連翹兩一 腦子許少

蜜丸彈子大食後臨卧含化忌猪肉濕麵

丁時發半夏散治肺熱欬嗽止瀉潤肺

半夏薑製一兩 貝母分三 柴胡 杏仁

川升麻 桑白皮炙 地骨皮 欬冬花

麥門冬 馬兜鈴 青橘皮各半兩 甘草分一

幼幼新書 卷十六 半

末一錢薄竒一葉綿裹水一盞薑一片棗半個煎

五分盞盛放火上時時溫服忌生冷毒物

久嗽第十一

聖惠苦蕒煎治嗽久不止心神煩悶

苦蕒一類熟者去仁薑便一升和煮絞汁 酥兩一 甘草生一分

蜜兩二

銀鍋慢火煎如稀餈粥飲調半錢日四五量服

嬰孺麻黃丸治欬嗽經年不差喉鳴喘成疹

麻黃節去 細辛 甘草炙各二分 欬冬花

柴胡

紫苑

茯苓

百部

枳實

各三分

貝母

大黃

各五分

黃芩

四分

杏仁

炒六分

末蜜丸烏豆大四五歲服廿九日再稍加

桑白皮煎治嗽經時不差一嗽氣絕及傷肺見血

桑根皮

東引者五分

白狗肺

具一

甘草

茯苓

芍藥

升麻

貝母

各十分

杏仁

炒十分

李根白皮

四分

淡竹青皮

八分

款冬花

麥門冬

各六分

蜜

地黃汁

各一分

黃芩

十一分

幼幼新書

卷十六

世

水一斗煮三升去滓下香膏地黃汁蜜微火煎不任攪至二升三合綿濾二三歲一合溫服日夜各三

丁時發治久嗽不止痰吐喘悶氣噎知母散

知母

貝母

柴胡

黃耆

炙

紫苑

馬兜鈴

半夏

白礬

杏仁

研

桑白皮

炙

白礬

款冬花

等分末一錢水七分煎三分去滓時時服薑汁糊

九薑湯服五七丸

貝母散

貝母

煨

麥門冬

款冬花

杏仁

炒各一分

紫苑

兩半

末乳汁調半錢

半夏丸治久嗽痰吐頭疼

半夏

南星

阜角煮各一兩

白礬

石膏

川烏頭

炮各一分

末薑汁丸菜豆大薑湯服十九

幼幼新書

卷十六

世

幼幼新書卷第十六 凝香閣刻

章樂之