




《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社



一〇二〇・子部・醫家類

醫學綱目四十卷（卷一至卷二十七）〔明〕樓英撰……………一

醫學綱目序

予夙有志方藥少困舉子業遲也歲  
癸丑釋褐都下迨丁巳承乏比部意通  
都大邑良師萃焉聽讞之暇留心誌訪  
或枚舉一二輩曰是出入於公卿之門  
者衆皆靡然從之徃徃不暇攻其術業  
呀狗名之弊豈特仕道然哉已未歲先  
君子以腸癖背養聞病不至是抑不審  
醫之過也使不孝長抱終天之恨焉因  
自顧拙於宦者與世之拙於醫者安可  
預人家國事耶遂絕意進取間取靈素  
諸書反覆讀之古奧淵邃莫知端倪友  
人邵君偉元授予以醫學綱目四十卷  
曰是書出於蕭山婁全善先生所輯簡  
而知要繁而有條悉本於靈素亦猶律  
之條例比附不出於禮經也公以禮律

佐時獨不能以是書濟瘥疾耶予笑而  
受之惜抄本相傳魚豕盈帙前此欲刻  
者數家而難於校正徃徃中止今亦無  
踰是乎因與偉元暨劉君化卿各帙校  
讐矢志弗措有不合者晝繹夜思若將  
通之凡再逾寒暑而後就梓詎者正缺  
者補秩然可觀回視舊本若草藁矣此  
書二百年來幾晦而復明幾廢而復舉  
寧不有定數存乎書大要本之陰陽以  
定其準參之運氣以稽其變察之色脈  
以明其診酌之虛實以立其法攻之同  
異以正其訛是故時至有早晚則民病  
有徵應矣氣位有正變則勝復有徵甚  
矣血氣有虛實則調治有逆從矣氣味  
有厚薄則約方有輕重矣營衛有宣壅  
則補瀉有疾留矣其說一正於靈素甲



乙而參之以仲景東垣諸君子之緒論  
病必有門門必揭其綱治必有法法必  
詳其目巨細不遺詳畧通貫參互衆說  
而折衷之於經能由此者謹道如法萬  
舉萬全不由此者實虛天入長命  
故覽其書如大都列肆之中丹砂玉札  
馬渤牛溲何所不有而其取裁劑量則  
固存乎人焉耳先生嘗曰病之千變萬  
化不越陰陽五行又曰氣失其平則為  
疾醫者意也不過平其氣耳嗚呼此數  
言者又為是書之綱領乎夫不治刑不  
知造律者之深意不治病不知著書者  
之苦心先生康濟之心甚盛而幾於無  
所用者予得而推廣之亦邵劉二君後  
史之力也同年趙君宗正寔聞而協成  
之予與宗正同官比部者也疇昔堯刑

之意重於殺人抑此書之行為生人計  
也亦重於殺人之慮也處心積慮有始  
終同而不異者宜得牽連書之以示後  
世焉時

嘉靖乙丑歲中秋日前進士履齋曹灼  
撰



醫學綱目序

醫之為學其道博其義深其書浩濔其要不過陰陽五行而已蓋天以陰陽五行化生萬物其稟於人身者陰陽之氣以為血氣表裏上下之體五行之氣以為五臟六腑之質由是人身具足而有生焉然陰陽錯綜五行迭運不能無厚薄多少之殊故稟陰陽五行之氣厚者血氣臟腑壯而無病薄者血氣臟腑怯而有病陽多者火多性急而形瘦陰多者濕多性緩而形肥陽少者氣虛表虛上虛而易於外感陰少者血虛裏虛下虛而易於內傷況乎人以易感易傷之軀徇情縱慾不適寒溫由是正損邪客而陰陽臟腑愈虛愈實或寒或熱而百病出焉故診病者必先分別血氣表裏上下臟腑之分野以知受病之所在大察所病虛實寒熱之邪以治之務在陰陽不偏傾臟腑不勝負

醫學綱目序

寫書人標榜  
刻書人夏文錦

補瀉隨宜適其病所使之痊安而已然其道自軒岐而下仲景詳外感於表裏陰陽丹溪獨內傷於血氣虛實東垣扶護中氣河間推陳致新錢氏分明五臟戴人熱施三法凡歷代方書甚衆皆各有所長耳故後世用歷代之方治病或效或不效者由病名同治法異或中其長或不中其長故也姑舉一病言之設惡熱病熱病之名同也其治之法異四君治血實之熱也四物治血虛之熱也白虎治氣實之熱也補中治氣虛之熱也麻黃治表熱也承氣治裏熱也四逆治假熱也柴胡治真熱也瀉青導赤瀉白瀉腎瀉黃治五臟熱而各異也各能洞燭脈證而中其肯綮則皆效其或實用虛法虛用實法表用裏法裏用表法其用假法假用真法則死生反掌之間尚何責其效乎哉不悟是理泛用古今之方妄試疑似之病每致

少矣若是者虛竊濟生之名實所以害人之生亂醫之真

孔子以癡亂德為德之賊斯則醫之賊也暗損陰陽神明不佑可不謹哉英爰自髫年潛心斯道上自內經下至歷代聖賢書傳及諸家名方晝讀夜思廢食忘寢者三十餘載始悟千變萬化之病態皆不出乎陰陽五行蓋血氣也表裏也上下也虛實也寒熱也皆一陰陽也五臟也六腑也十二經也五運六氣也皆一五行也鱗集於魚輻輳于轂醫之能事畢矣是以不揣蕪陋撥拾經傳方書一以陰陽臟腑分病拆法而類聚之分病為門門各定陰陽臟腑之部於其卷首而大綱著矣析法為標標各撮陰陽臟腑之要於其條上而衆目彰矣病有同其門者立枝門以附之法有同其標者立細標以次之凡經有衍文錯簡脫簡者一以理考而釋正之傳失經旨衆論矛盾者各以經

醫學綱目序

二

推而辨明之庶幾諸家之同異得失得以曲暢旁通精粗相因巨細畢舉同病異法如指諸掌名之曰醫學綱目載之巾笥以便考求使夫臨病之際自然法度有歸不致誤投湯劑而害生亂醫獲罪神明者矣雖於軒岐心法之妙不敢同年而語然亦天地生物之心一助云耳

蕭山仙居岩樓英全善撰

醫學綱目序



醫學綱目序例

凡治法皆以正門為主枝門旁考之假如心痛門為正門其下孝心痛胎前心痛產後心痛等枝門皆以心痛正門治法為主其卒痛胎前產後則旁考以佐之也

凡門分上下者其上皆內經之元法其下皆後賢之續法如穴法門上穴法門下是也標之上下亦然如針灸上皆內經元法鍼灸下皆後賢續法是也

凡所類之方皆先賢名方今號其名但號所編之人且如王海藏所編之方有仲景方有千金方有易簡方并種種名方今但號海藏之名實不及仲景并千金易簡等方也凡所類之方獨東垣海藏羅謙甫丹溪以扶護元氣為主可純依元方其餘諸方多是攻邪之劑善用之者必詳其人虛實灼見其實者可依元方若兼虛者氣虛必以四君子相兼用之或各半作複方用之血氣必以四物湯兼用之或各半作複方用之庶不夭人長命也

醫學綱目序例

凡言運氣皆謂一歲之中長幼之病多相似者俗謂之天行時氣是也

凡所載藥方在本條者宜考本條其有病在本條而方見別條者詳載目錄以便檢閱又有方名而無方藥者另立補遺以備參考

凡傷寒藥方六經自相為用不必另立別條

醫學綱目目錄

卷之一 陰陽臟腑部

陰陽

五臟

卷之二 陰陽臟腑部

診法通論

診虛實法

診病傳變 診病愈劇 診病生死

諸脈診病雜法

卷之三 陰陽臟腑部

治法通論

倒倉法

丸散法

服藥法

分兩法

製藥法

藥貴精專

煎藥法

卷之四 陰陽臟腑部

治虛實法

治上下法

診五臟虛實

診五邪相干

診五邪分虛實賊邪正

醫學綱目目錄

五邪相干

四君子湯

生脈散

益氣丸

人參黃芪湯

調中益氣湯

四物湯

三才丸

溫衛補血湯

八物湯

黃芪建中湯

雙和散

大補十全散

正氣天香散

導氣丸

通真丸

木香和中丸

木香板榔丸

全真丸

神功導水丸

舟車神祐丸

大聖瀉川散

越鞠丸

順氣丸

金剛丸

牛膝丸

煨腎丸

清神益氣湯

稀涎散

豆麥散

三聖散

二仙散

碧霞丹

獨聖散

瀉青丸

安神丸

八物定志丸



瀉心湯	導赤散	錢氏益黃散
人參安胃散	瀉黃散	補肺阿膠散
瀉白散	補腎丸	補血丸
固真丸	三才封髓丹	八味地黃丸
離珠丹	還少丹	玉女長春不老丹
芩黃湯 <small>俱本</small>	小建中湯 <small>太陰</small>	尙仁承氣湯 <small>傷寒</small>
四逆湯 <small>少陰</small>	麻黃湯 <small>傷寒</small>	桂枝湯 <small>傷寒</small>
承氣湯 <small>陽明</small>	養正丹 <small>眩暈</small>	柴胡調經湯 <small>婦人</small>
瓜蒂散 <small>太陰</small>	青黛散 <small>頭</small>	水芝丸 <small>小便</small>
卷之五	陰陽臟腑部	
治寒熱法	治發熱	勞瘵骨蒸熱
專屍勞熱	產後發熱	
治寒熱法		
當歸補血湯	補中益氣湯	清涼飲子 <small>四</small>
三補丸	桔梗湯	清神散
龍腦飲子	涼膈散	立效散
石韋散	清金丸 <small>又名與</small>	抑青丸
千金地黃丸	門冬丸	清心丸
火府丹	當歸龍薈丸	回金丸
佐金丸	滋腎丸	木香金鈴散
牛黃散	妙香丸	黃連解毒湯
三黃丸	紫雪	柴胡升陽湯
火鬱湯 <small>俱本</small>	白虎湯 <small>太陽</small>	地骨皮散 <small>往來</small>
桃仁承氣湯 <small>傷寒</small>	大小承氣湯 <small>俱陽明</small>	
調胃承氣湯 <small>發熱</small>	三物黃芩湯 <small>產後</small>	瀉白散
瀉心湯	導赤散	瀉青丸 <small>四方俱</small>

鮮毒雄黃丸 <small>喉</small>	勞瘵骨蒸熱	草還丹	瓊玉膏	清神甘露丸
黃芪膏子煎丸	補天丸	黃芪膏子煎丸	補天丸	補腎丸
六味地黃丸 <small>加五味為</small>	防風當歸飲子	六味地黃丸 <small>加五味為</small>	防風當歸飲子	黑地黃丸
柴胡飲子	地骨皮枳殼散	柴胡飲子	地骨皮枳殼散	大金花丸
麥煎飲	人參柴胡散	麥煎飲	人參柴胡散	秦丸 <small>驚甲丸</small>
人參地骨皮散	四物湯加減法	人參地骨皮散	四物湯加減法	大黃蠶虫丸
百勞丸	逍遙散	百勞丸	逍遙散	
五蒸湯 <small>以上俱</small>	鷄酥丸 <small>咳吐</small>	五蒸湯 <small>以上俱</small>	鷄酥丸 <small>咳吐</small>	小陷胸湯 <small>傷寒</small>
炙甘草湯 <small>傷寒</small>		炙甘草湯 <small>傷寒</small>		
傳屍勞熱	太乙明月丹	傳屍勞熱	太乙明月丹	取傳屍伏屍勞虫法
神人阿魏散	白茯苓湯	神人阿魏散	白茯苓湯	犀角紫河車丸
瀨肝散 <small>俱本</small>		瀨肝散 <small>俱本</small>		
產後發熱	犀角飲子 <small>俱本</small>	產後發熱	犀角飲子 <small>俱本</small>	
人參湯	陰陽臟腑部	人參湯	陰陽臟腑部	
卷之六		卷之六		
治惡寒	往來寒熱	治惡寒	往來寒熱	外熱內寒外寒內熱
上熱下寒上寒下熱	產後往來寒熱	上熱下寒上寒下熱	產後往來寒熱	
瘧寒熱	久瘧	瘧寒熱	久瘧	瘧脹
治寒熱		治寒熱		產後瘧
升陽益胃湯	黃芪補胃湯	升陽益胃湯	黃芪補胃湯	白朮附子湯
巴戟丸	胡椒理中丸	巴戟丸	胡椒理中丸	鐵刷湯
二氣丹	附子理中丸	二氣丹	附子理中丸	大建中湯
天真丹	代灸膏	天真丹	代灸膏	沉香桂附丸



大已寒丸	姜附湯 <small>俱本</small>	桂枝加附子湯 <small>陽明</small>
汗自	桂枝加芍藥人參新加湯 <small>傷寒</small>	還少丹 <small>三方俱</small>
神珠丸 <small>即神丹</small>	八味地黃丸	定志丸 <small>驚悸</small>
茯苓散 <small>吐</small>	雙和散 <small>虛實</small>	小青龍湯 <small>傷寒</small>
芎藭丸 <small>小兒</small>	益黃散 <small>虛實</small>	
四逆湯 <small>少陰</small>		
往來寒熱		
調中湯	解風湯	防風湯
地骨皮散	柴胡散	地黃丸
既濟解毒湯 <small>俱本</small>	潤肺散 <small>欬</small>	大柴胡湯 <small>少陽</small>
產後往來寒熱		
柴胡四物湯	小柴胡加生地湯	
增損柴胡湯	熟地散	增損四物湯
黃芪丸 <small>俱本</small>		
瘧寒熱		
桂枝羌活湯	麻黃羌活湯	白芷湯
桂枝石膏湯	桂枝芍藥湯	桂枝黃芩湯
雙解飲子	麻黃黃芩湯	白虎加桂枝湯
蜀漆散	牡蠣湯	柴胡去半夏加括
萎湯	截瘧方	人參養胃湯
絕瘧青蒿丸	七寶湯	剋効飲子
辟邪丹	斷瘧如聖散 <small>俱本</small>	衄仁承氣湯 <small>傷寒</small>
小柴胡加桂枝湯 <small>傷寒</small>		小柴胡湯 <small>少陽</small>
久瘧		
蔡蘆散	雄黃散	驚甲煎丸
瘧母丸	十棗湯 <small>俱本</small>	三花神佑丸 <small>水脹</small>

小胃丹 <small>內傷</small>	蒼朮湯 <small>本</small>	產後瘧	草菓飲子	卷之七	卷之八	卷之九	卷之十	諸風	中深難言	身瘰	卒中之初	中淺	三黃湯	續命丹 <small>俱本</small>	加減中和湯	牢牙散	益氣調榮湯	荆瀝湯	紫古加減續命湯
飲食			生熟飲子 <small>俱本</small>	陰陽臟腑部	陰陽臟腑部	陰陽臟腑部	肝膽部	卒中之初	產中風	口噤	口眼喎斜	勝金丸 <small>俱本</small>	疎風湯		當歸連翹湯	清肺飲子	地黃飲子	黃芪湯 <small>黃法</small>	雲岐子加減法
				刺灸通論	刺灸通論	刺灸通論	用藥宜禁	中分淺深	口噤			救急稀涎散	極濟換骨丹		玄參升麻湯	潤腸丸	地黃煎	仲景續命湯	
				刺灸通論	刺灸通論	刺灸通論	刺灸通論	中淺能言	口噤						玄參升麻湯	潤腸丸	地黃煎	仲景續命湯	

一第1028册 續修四庫全書 子部 醫家類

三化湯	羌活愈風湯	四白丹
二丹丸	大秦花湯	天麻丸
獨聖散	竹瀝湯	煮散
犀角防風湯	輕骨丹	風藥聖餅子
稀簽丸	正舌散	扶神散
地黃酒	防風湯	竹瀝湯
防已湯	獨活煮散	保命金丹
活命金丹	鮮語丸	瀉青丸
至寶丹	獨活丹	續命散
產中風		
血風湯		
口噤	白木酒	
分涎散		
口眼喎斜		
清陽湯	秦芫升麻湯	定風餅子
枳茹酒		
癢		
何首烏散	消風散	濕洗藥
卷之十一	肝膽部	
眩	癩癩	子癩
勞風	胎前症	產後症
顛振	產從癩癩	厲風
眩		瘰癧
鈎藤散	芫薺散	天麻半夏湯
羌活湯	羚羊角散	都梁丸
川芎散	養正丹	半夏白朮天麻湯

葛木湯	旋覆花湯	獨聖散
搜風丸	白朮附子湯	二生散
澤瀉白朮湯	大豆紫湯	芫歸湯
水煎金花湯	半夏加茯苓湯	五苓散
青黛散		
癩癩		
祛痰丸	礞石丸	參珠丸
神應丹	琥珀壽星丸	密陀僧散
五癩丸	防風通聖散	風引湯
犀角丸	龍腦安神丸	珠子辰砂丹
烏頭丸	法煮草麻子	升陽湯
碧霞丹	沉香天麻湯	
子癩		
葛根湯		
防風當歸散	麻黃加獨活防風湯	
瓜蒌加桂枝湯	桂枝加芫防湯	千金續命湯
柴胡加防風湯	倉公當歸湯	八物白朮散
桂枝加芍藥防風湯	附子散	
桂心白朮湯	附子防風散	神朮加羌活麻黃
湯	白朮加桂心黃芪湯	
葛根湯		
大承氣湯		
勞風		
皂角化痰丸		
胎前症		



獨活防風湯	防風葛根湯 <small>俱本</small>	破傷風	玉真散	羌活防風湯	蜈蚣散	白朮防風湯	大芎黃湯	羌活湯	地榆防風散	養血當歸地黃散	人參益氣湯	獨活湯	胃風湯	薯蕷丸	續命散	牛黃散	續命散 <small>俱本</small>	獨活散 <small>俱本</small>	顛振	星附散	金牙酒 <small>俱本</small>	產後瘕瘕	愈風湯	增損柴胡湯	秦朮湯 <small>俱本</small>	厲風	醉仙散	四聖保命丹	祛風散	通天再造散	愈風丹	換肌散	二聖散	栝蔞散	權皮散	凌霄散	祛風丸	如聖散	補氣瀉榮湯 <small>俱本</small>	卷之十二	肝膽部	諸痺	行痺	痛痺	麻木	着痺	鶴膝風	身痛	產後身痛
-------	-------------------------	-----	-----	-------	-----	-------	------	-----	-------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------------	-----------------------	----	-----	-----------------------	------	-----	-------	-----------------------	----	-----	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------	-----	----	----	----	----	----	-----	----	------

諸痺	升麻湯 <small>俱本</small>	行痺	桂枝芍藥知母湯	烏頭湯	防風湯	薤苳仁散	麝香丸	龍虎丹	附子八物湯	和血散痛湯	大羌活湯	麻黃湯	牛蒡子散	控涎丹	大豆蘗散	犀角湯	茵芋丸	控涎加朮仁湯	定痛丸	松節酒 <small>俱本</small>	松葉酒 <small>俱本</small>	痛痺	潛行散	二妙散	犀角升麻湯	四物蒼朮各半湯	活血丹	蒼朮復煎散	煖筋湯	九	八珍丸	烏雞丸	活血應痛丸	五加皮酒	姜桂諸般法	拈痛散	紅藍花酒	虎骨丸	木瓜虎骨丸	麒麟竭散	越痛散	姜黃散 <small>俱本</small>	茯苓丸	着痺	芍藥補氣湯	除濕補氣湯	芍藥補氣湯	黃芪桂枝五物湯	清陽補氣湯	補氣升陽和中湯	溫經除濕湯	除風勝濕羌活湯	茯苓湯	烏頭粥	續斷丸	前胡散	蜈蚣丸	換骨丹 <small>俱本</small>	神效黃芪湯 <small>目録</small>
----	-----------------------	----	---------	-----	-----	------	-----	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	------	-----	-----	--------	-----	-----------------------	-----------------------	----	-----	-----	-------	---------	-----	-------	-----	---	-----	-----	-------	------	-------	-----	------	-----	-------	------	-----	-----------------------	-----	----	-------	-------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------------	-------------------------

身痛	烏頭湯	熨腎散 <small>俱本</small>	拈痛湯	甘草附子湯 <small>太陽</small>	產後身痛	卷之十三	驚悸怔忡	善太息	內障	目淚	絲垢入目	驚悸怔忡	溫膽湯	密陀僧散	辰砂遠志丸	獨活湯 <small>仁方俱</small>	茯苓甘草湯 <small>厥陰</small>	產驚悸	七寶散	諸目疾 赤腫	補肝散	針頭丸	
養血地黄丸	羚羊角湯	活血通經湯	麻黃桂枝升麻湯 <small>俱本</small>	五積散 <small>太陽</small>	肝膽部	產驚悸	心動	赤腫	不能近視	風沿爛眼	視岐亂見	倒睫拳毛	半夏麻黃丸	寒水石散	茯苓丸 <small>俱本</small>	羌活勝濕湯 <small>腰痛</small>	炙甘草湯 <small>見驚悸</small>	大牡丹皮散 <small>俱本</small>	赤腫	止痛散	桔梗丸	救苦丸	芩辛湯
養血地黄丸	羚羊角湯	活血通經湯	麻黃桂枝升麻湯 <small>俱本</small>	五積散 <small>太陽</small>	肝膽部	產驚悸	心動	赤腫	不能近視	風沿爛眼	視岐亂見	倒睫拳毛	半夏麻黃丸	寒水石散	茯苓丸 <small>俱本</small>	羌活勝濕湯 <small>腰痛</small>	炙甘草湯 <small>見驚悸</small>	大牡丹皮散 <small>俱本</small>	赤腫	止痛散	桔梗丸	救苦丸	芩辛湯

明目細辛湯	洗肝散	碧天丸	神聖散	廣大重明湯 <small>俱本</small>	羌活除翳湯	神仙退雲丸	五秀重明丸	連栢益陰丸	羌活退翳膏	金絲膏	蟾光膏	選奇湯 <small>偏</small>	人參補胃湯	芩連湯	益陰腎氣丸	甘菊花丸	補肝散	補肝散	蘆薈丸	磁石丸	補肝散	益本滋腎丸
菊花散	地黃湯	驅風散	拔毒散	局方流氣飲	羌活退翳湯	羚羊角散	升陽泄陰丸	退翳膏子	金露膏	碧雲散	瀉青丸 <small>虛實</small>	益氣聰明湯	復明散	滋陰地黄丸	四神丸	五福還瞳丹	羚羊角散	羚羊角散	除風湯	黃連羊肝丸	養肝丸	補腎丸
四物龍膽湯	助陽和血補氣湯	碧雲散	宣風散	撥雲散	消翳散	補陽湯	百點膏	圓明膏	夜光丸	搐鼻方 <small>俱本</small>	圓明內障升陽湯	熟地丸	當歸湯	柴胡散	羚羊角飲子	除風湯	鎮肝明目羊肝丸	熟地丸	鎮肝明目羊肝丸	神麴丸 <small>俱本</small>	神麴丸 <small>俱本</small>	神麴丸 <small>俱本</small>



不能近視	地芝丸 <small>條本</small>	不能遠視	定志丸 <small>條本</small>	雀目	蛤粉丸 <small>條本</small>	目淚	常歸飲子	川芎丸 <small>條本</small>	風淫爛眼	盧甘石散	倒睫本毛	神効明目湯	撥雲湯	努肉攀睛	還睛散	卷之十四	脇痛	諸疝	閉瘡遺溺	閔	產遺尿	疝陰臭	轉筋	脇痛	桂枝散									
							銀海止淚方	當歸湯		紫金膏 <small>條本</small>	防風通聖散 <small>條本</small>	神効黃芪湯	連翹飲子	青黛散 <small>條本</small>	飛絲塵垢諸方	于金方	肝膽部	脇痛氣逆	腋腫	腋臭	癩疝	狐疝	產小腹痛	胎前產後淋	小便不通	淋	小便數	小便黃赤	遺溺	陰縮陰挺	陰痿陰汗陰	筋	霍亂轉筋	芍葛湯

薏苡仁丸	枳殼煎散	神保丸	枳實散	沉香導氣散 <small>條本</small>	龍香丸 <small>條本</small>	控涎丹 <small>行</small>	腋臭	腋氣神効方	諸疝 <small>治法同</small>	丁香練貫丸	玄胡苦練湯	天台烏藥散	烏頭煎	沉香桂附丸	控引翠丸	癩疝	香附散	安息香丸	大戟丸	失笑散 <small>條本</small>	狐疝	蜘蛛散 <small>條本</small>	小便不通	清肺散	黃連丸	括萎瞿麥丸	髮灰散	王芩散 <small>條本</small>	枳殼煎散	大黃附子湯	調中順氣丸	煮黃丸 <small>條本</small>	丁香疝氣丸	胡蘆巴丸	木香練子散	茴香散	菝葜湯	礪砂丸 <small>條本</small>	海蛤丸	地黃膏子丸	念珠丸	金鈴丸	抵聖丸	雄黃散	茯苓戎塩湯	滋腎丸	白花散	導氣除燥湯	蒲灰散	滑石白魚散	菝仁煎 <small>條本</small>	猪苓湯
------	------	-----	-----	-------------------------	-----------------------	----------------------	----	-------	-----------------------	-------	-------	-------	-----	-------	------	----	-----	------	-----	-----------------------	----	-----------------------	------	-----	-----	-------	-----	-----------------------	------	-------	-------	-----------------------	-------	------	-------	-----	-----	-----------------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	-------	-----------------------	-----

瘰癧	琥珀散	茯苓琥珀湯	鹿角霜丸
	石葦散	火府丹	石燕丸
	海金沙散	八正散	葛粉丸
	腎着湯	茯苓丸	巴戟丸
	腎瀝湯	真眩膏 <small>俱本</small>	
	胎前淋瀝	歸母苦參丸 <small>俱本</small>	
	茯苓散		
產後淋瀝			
茅根湯 <small>俱本</small>			
小便數	茯苓琥珀湯	水芝丸	衛真湯 <small>俱本</small>
	石脂神砂丹 <small>方滯下</small>		
遺溺			
鹿茸丸	白薇散	茯苓丸 <small>俱本</small>	
神苦導水丸 <small>虛實法</small>			
產遺尿			
桑螵蛸散			
陰痿陰汗陰冷陰臭			
龍膽瀉肝湯	固真湯	溫腎湯	
補肝湯	清震湯	柴胡勝濕湯	
椒粉散 <small>俱本</small>	八味丸 <small>虛實法</small>		
霍亂轉筋			
建中加木瓜柴胡湯			
湯	半夏湯	建中加附子當歸	
一粒青金丹 <small>俱本</small>	四君子湯 <small>虛實法</small>	木瓜湯	
		平胃散 <small>瀉</small>	

建中湯 <small>吐陰</small>	香薷散 <small>吐陰</small>
卷之十五	肝膽部
頭痛	產後頭痛
大頭痛	眉痛
不得臥	多臥
咽隘痛	乳蛾
項頸強痛	喉如梗狀
頭痛	諸物哽咽
大青空膏	小青空膏
補氣湯	安神散
石膏散	荆芥散
神妙丸	羌活附子湯
救苦神白散	黑龍丸
順氣和中湯	青黛散
茶調散	大川芎丸
芎辛丸	微清膏
茯苓半夏湯	白芷散
如聖散	瓜蒂神妙散
頭風壓散方	頭風餅子 <small>俱本</small>
產後頭痛	半夏白木天麻湯
一奇散	加減四物湯
偏頭痛	芎附散 <small>俱本</small>
川芎散	細辛散
雷頭痛	白附散 <small>俱本</small>
茶調散	愈風餅子
	升陽湯 <small>俱本</small>



涼膈散 <small>寒熱法</small>	大頭痛	普濟消毒飲子	肩痛	選奇湯 <small>本條</small>	頭重	頭暈	不得臥	酸水湯	喉痺	荆芥湯	解毒雄黃丸	一字散	開關散	咽嗝痛	潤喉散	咽喉備急丹	桔梗湯	乳蛾	咽喉乳蛾方	玄參散	喉如梗狀
		黑白散 <small>俱本條</small>			紅豆散 <small>本條</small>	清風散 <small>本條</small>		驚甲丸		五香散	烏犀角膏	玉鑰匙	神效散 <small>俱本條</small>	半夏桂枝甘草湯 <small>少陰</small>	龍麟聚聖丹	增損如聖湯	發聲散 <small>俱本條</small>		粉香散	乾姜散 <small>俱本條</small>	
								羌活勝濕湯 <small>腰</small>		如聖勝金錠	備急如聖散	玉屑無憂散	桔梗湯 <small>咽嗝</small>	小續命湯 <small>中風</small>	祛毒牛黃膏	利膈湯			羅青散		
								真珠母丸													

半夏厚朴湯	項頸強痛	木瓜煎	卷之十六	心痛	胃痛胃滿	胎產煩躁	產謔妄	健妄	下氣	心痛	木附湯	烏頭赤石脂丸	大建中湯	二姜丸	禁本湯	麻黃桂枝湯	取寸白虫方	失笑散	煮黃丸 <small>內傷飲食</small>	厚朴丸 <small>胃</small>	正氣天香散 <small>虛實法</small>	卒心痛	黃連湯	胎前心痛	白朮散 <small>本條</small>
諸物梗方	養神湯	心小腸部	卒心痛	胃痺短氣	懊懣	循衣撮空	諸痛	諸痛	扶陽助胃湯	桂枝姜枳湯	括蕪蘆白半夏湯	果附湯	草薺薏丸	木香丸	化虫丸	木香三稜散	手拈散	神佑丸 <small>腹木</small>	紫苑丸 <small>塊積</small>	黃連湯	龍膽湯	走馬湯 <small>俱本條</small>			
			妊產心痛	煩躁	稽悶	飛屍鬼疰	諸逆衝上	意	金鈴子散			九痛丸	硃砂丸	補金散	粉蜜湯	海蛤丸 <small>俱本條</small>	小胃丸 <small>內傷飲食</small>	烏奔丸 <small>塊積</small>	龍膽湯 <small>二方見後</small>						

產後心痛	火龍散	大巖蜜湯 <small>俱本</small>	失笑散 <small>心</small>
諸氣痛	調氣湯	寬中丸	和氣散 <small>俱本</small>
胃痛胃滿	枳實白芍酒湯	枳實白桂枝湯	上清散 <small>俱本</small>
人參湯	枳朮大黃湯	三物小陷胷湯	漆澤湯 <small>咳</small>
括萎韭白半夏湯	枳朮大黃湯	三物小陷胷湯	漆澤湯 <small>咳</small>
胃痺短氣緩急	茯苓杏仁甘草湯	橘枳姜湯	
虛煩	葱豉附子散 <small>俱本</small>		
陳皮湯	淡竹茹湯	硃砂安神丸	
妙香丸 <small>俱本</small>	梔豉湯 <small>傷寒</small>	竹葉石膏湯 <small>傷寒</small>	
溫膽湯 <small>解</small>	酸棗湯 <small>眠</small>		
胎前虛煩	知母丸 <small>婦人</small>		
產後虛煩	芍藥梔豉湯	三物黃芩湯	
竹葉湯			
竹皮大丸 <small>俱本</small>			
霹靂散 <small>傷寒</small>			
遠志丸	茯神散	加減續命湯	
八毒赤散	雄砂散	五邪湯 <small>俱本</small>	

太乙神精丹 <small>方</small>	蘇合香丸 <small>中</small>	還魂湯 <small>中</small>
產後譫妄	奪命散	調經散
循衣撮空	生地黄連湯 <small>本</small>	健忘
大聖枕中方	開心不忘方 <small>俱本</small>	定志丸 <small>驚</small>
諸逆衝上	赤丸 <small>本</small>	噫
枳殼散 <small>本</small>	旋覆代赭湯 <small>傷寒</small>	心小腸部
諸見血	衄血	久衄
吐血	咳唾血	妊娠咳唾血
澀血	妊娠尿血	下血
諸痿	注夏	解你
舌腫	舌卷	舌強
自嚙舌	汗	自汗
手足汗	無汗	盜汗
五絕	暴死暴病	卒中暴厥
諸見血	生地黄散	龍腦鷄蘇丸
黃芪桂枝湯 <small>黃</small>	白芍當歸湯 <small>婦人</small>	文蛤散 <small>俱本</small>
當歸建中湯 <small>虛弱</small>	桂婦六合湯 <small>婦人</small>	增損胃風湯 <small>下</small>
芩歸朮附湯		



黃芪四君子湯	當歸四逆加吳茱萸湯 <small>補遺</small>
止衄散	畫粉散
生料鷄蘇散	寸金散
苦梅丸	御院麝香散 <small>俱本</small>
又衄	黃芪芍藥湯
吐血	三黃補血湯
人參救肺湯	必勝散
大補血丸	五神湯
瀉心湯	犀角地黃湯
二合灰散	除濕湯
門冬飲子	天門冬丸 <small>俱本</small>
咳唾血	八寶上清丹 <small>俱本</small>
七傷散	恩袍散
大阿膠丸	切勞散
子芩散	黃芪鱉甲散
人參蛤蚧散	麥門冬湯
紫苑散	三拗湯
鷄子散	鷄蘇丸
百部丸	欬冬散
甘桔加阿膠紫苑湯	人參半夏丸 <small>俱本</small>
桂苓甘露散 <small>補遺</small>	人參半夏丸 <small>俱本</small>
瘦血	玉屑膏
小薊飲子	冬藥散 <small>俱本</small>
	髮灰散
	鹿角膠丸
	葎草汁法 <small>淋</small>

下血	升麻補胃湯	和中益胃湯	升陽除濕和血湯
	益智和中湯	黃連湯	芍藥黃連湯
	涼血地黃湯	升陽除濕防風湯	
	當歸和血散	槐花散	結陰丹
	椿皮丸	玉屑丸	平胃地榆湯
	胃風湯	烏荊丸	黃土湯
	赤小豆當歸散	蒜連丸	烏奔丸
	五槐丸 <small>俱本</small>		
諸痿	補益丸	龍虎丹	虎潛丸
	加減四斤丸	芸苗丹	衛生湯 <small>俱本</small>
	健步丸	補益腎肝丸 <small>俱本</small>	神龜滋陰丸 <small>下涎</small>
	人參酒	商陸飯 <small>俱本</small>	
注夏	清暑益氣湯	黃芪人參湯	清燥湯 <small>俱本</small>
舌腫痛	金沸草湯	黑散子 <small>俱本</small>	烏犀膏 <small>喉</small>
	舌強舌卷	磐石散 <small>俱本</small>	
	舌縱涎下	神龜滋陰丸	通天愈風湯
	神龜滋陰丸	清心牛黃丸 <small>俱本</small>	清心導痰丸
自汗	牡蠣散	周衛湯	羌活勝濕湯
	芪附湯	人參丸	白朮散

安胃湯俱本

盜汗

當歸六黃湯

正氣湯

嚴氏黃芪湯

栝子仁丸

白朮湯

黃芪散

五仙丸俱本

龍膏丸法實

牡蠣散自汗

卒中暴厥

蘇合香丸

三物備急丸

大黃龍丸

附子理中湯

白薇湯

倉公散

全生活血湯

當歸附子湯

仲景救卒死方俱本

條

解毒雄黃丸喉痺

乾姜附子湯遺精

五絕

一自縊

二推壓

三溺水

四厥暈

五產乳諸法

醫學綱目錄

圭

卷之十八

心小腸部

癰疽

腫瘍

潰瘍

癰疽所兼諸症

久漏瘡

腫瘍

內疎黃連湯

內托復煎散

當歸黃芪湯

奪命丹

淨腋湯

白芷升麻湯

托裏溫經湯

內托榮衛湯

縮毒金粉散

羌活當歸湯

檳榔散

黃柏當歸湯

十宣散

托毒散

五香湯

五香連翹湯

內托散即護心散

排膿湯

托裏排膿生肌散

車螯散

保安湯

柞木飲子

內消丸

漏蘆湯方二

內消升麻湯

內消丸

單煮大黃湯

神仙追毒丸

消毒飲子

神効托裏散

回毒金銀花湯

黃芪散

黃芪四物湯

內固黃芪湯

阿膠飲子

牛膠飲

黃礬丸

國老膏

遠志酒

忍冬酒

安神散

黃連消毒飲

排膿散

當歸散

四虎散

乳香膏

內消金黃散

太白膏

針頭散

萬應針頭丸

獨勝散

騎竹馬灸法

木香散俱本

千金托裏散方見

潰瘍

替針丸方二

托裏溫中湯

加味十全湯

麥飯石膏

猪蹄湯

雄黃散

神異膏

熱瘡寒膏藥

寒瘡熱膏藥

通毒散

欬瘡口方

乳香散

堯紅散

生肌散

平肌散俱本

癰疽所兼諸症

竹葉黃芪湯

金銀花散

忍冬丸

黃芪六一湯

桑枝湯

五味子湯

犀角膏

和氣散

聖愈散俱本

久漏瘡

骨碎補丸方二

桂附丸

陷脈散

神應膏

烏金散

截疔散俱本

卷之十九

心小腸部

癰疽部分形狀不同

疔瘡

石癰

諸腫

瘰癧

結核

癰瘡





丹毒	消毒丸	金花散 <small>俱本</small>
漏蘆散		
神佑丸 <small>水</small>		
瘰		
旋覆花丸 <small>本</small>		
疥		
麻黃飲	消毒飲	一上散
蘭茹散	木香散 <small>俱本</small>	防風通勝散 <small>俱本</small>
癬		
苦參丸	何首烏散	栢脂膏
祛濕散 <small>俱本</small>	烏頭丸 <small>紫白</small>	
紫白癜風白禿		
龍蛇散	加減何首烏散	烏頭丸 <small>俱本</small>
面瘡		
洗面方	面油摩風膏	瑩肌如玉散
白附丹 <small>俱本</small>		
口瘡唇瘡		
黃連升麻湯	祿袍散	蜜栢散
紅芍藥散	化毒法	多効散 <small>俱本</small>
牙疳		
神功丸 <small>本</small>		
耳內瘡		
黍粘子散	會丹散	黃連散 <small>俱本</small>
腎臟風陰瘡		
四生散	烏頭丸 <small>俱本</small>	
下疳瘡		

泄水丸	追毒錠子 <small>俱本</small>
婦人陰瘡	
洗塌散	甘濕散
蛇床子 <small>俱本</small>	苑枝煎法
臙瘡	
翠玉膏	黃芪丸
脚氣瘡足跟瘡	二妙丸 <small>俱本</small>
捷應散 <small>俱本</small>	
凍瘡	
如神散 <small>俱本</small>	
手足皸裂脚縫爛	
潤肌膏 <small>俱本</small>	
惡瘡	
乳香消毒散	碧霞錠子 <small>俱本</small>
顛撲傷損	
內消方	走馬散
接骨散	定痛乳香神應散
定痛接骨紫金丹	聖靈丹
破血消痛湯	復元羌活湯
當歸導滯散	奪命散
花蕊石散	芒葶散 <small>俱本</small>
金瘡	
生肌地黃散	末藥散
劉寄奴散	王不留行散 <small>俱本</small>
杖瘡	
鬼代丹	乳香散
	五黃散



沒藥散	杖瘡丹 <small>俱本</small>	鷄鳴散 <small>前傷</small>	湯火瘡	保生救苦散	冰霜散	綠白散 <small>俱本</small>	竹木針刺入肉諸方	箭頭入肉	萬全神應丹 <small>俱本</small>	一上散 <small>俱本</small>	諸虫蛇蜂蝎咬方	雄黃消毒膏	馬虎能犬咬諸方	蟬花散 <small>本</small>	定風散 <small>本</small>	附猪馬畜瘡方	癩犬咬	卷之二十一	脾胃部	內傷飲食	胎前傷食	痰症	痞	不能食	饑不能食	惡食	妊娠惡食	消痺	上消	中消	下消	胎前產後渴	口躁咽乾	黃疸	產後發黃	食勞疰黃	黃汗	目黃	黑疸	內傷飲食	除濕散	導飲丸	五苓散	烏梅丸	百益丸	葛花解醒湯	麴蘗枳木丸	木香枳木丸	枳木丸	木香檳榔丸	保和丸	大安丸	三黃枳木丸	除濕益氣丸	上二黃丸	枳木導滯丸	白木丸	半夏枳木丸	木香乾姜枳木丸	丁香爛飯丸	小胃丹	調飲枳實丸	金露丸	木香見睨丸	三稜消積丸
-----	-----------------------	-----------------------	-----	-------	-----	-----------------------	----------	------	-------------------------	-----------------------	---------	-------	---------	----------------------	----------------------	--------	-----	-------	-----	------	------	----	---	-----	------	----	------	----	----	----	----	-------	------	----	------	------	----	----	----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-------	-------	------	-------	-----	-------	---------	-------	-----	-------	-----	-------	-------

感應丸	神應丸	雄黃聖餅子	枳榔丸	煮黃丸	瓜蒂散 <small>俱本</small>	烏毒丸 <small>塊</small>	四逆加吳茱萸生薑湯	通脈四逆湯 <small>少陰</small>	理中丸 <small>太陽</small>	備急丸 <small>中</small>	胎前傷寒	白木散 <small>俱本</small>	百病皆生於痰	妙應丸加減法 <small>即控</small>	導痰湯	黃芩利膈丸	中和丸	滾痰丸	祛風丸	導痰丸	小黃丸	五飲湯	倍木丸	川芎丸	五飲湯	倍木丸	旋覆花湯	木香半夏丸	降痰丸 <small>俱本</small>	十束湯 <small>痰</small>	大青龍湯 <small>太陽</small>	小青龍湯 <small>傷寒</small>	半夏加茯苓湯 <small>乾</small>	五苓散 <small>前傷</small>	澤瀉白朮湯 <small>眩</small>	厚朴大黃七物湯 <small>小腹</small>	苓桂朮甘湯 <small>短</small>	小半夏加茯苓湯 <small>吐</small>	甘遂半夏湯 <small>濕</small>	真武湯 <small>太陰</small>	黃芪補中湯	葶蘆丸	木香消痞湯	大消痞丸	黃連消痞丸	失笑丸	回金丸 <small>俱本</small>	枳實理中丸 <small>傷寒</small>	人參湯 <small>胃</small>	半夏瀉心湯 <small>傷寒</small>	枳木丸	檳榔丸	煮黃丸 <small>三方內</small>	不能食	和中丸 <small>方</small>	七珍散	六神湯	異功散	寬中進食丸	交泰丸
-----	-----	-------	-----	-----	-----------------------	----------------------	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------	------	-----------------------	--------	--------------------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	-------	-----	-------	------	-------	-----	-----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-----	-----	------------------------	-----	----------------------	-----	-----	-----	-------	-----

醫學綱目 目錄

麩朮丸	二神丸 <small>俱本</small>	木香枳朮丸	木香乾姜枳朮丸 <small>二方內傷飲食</small>	人參半夏丸 <small>咳嗽</small>
惡食	失笑丸 <small>痞</small>	消癰	炙猪肚湯 <small>中消</small>	羊肉冬瓜湯
			化水丹 <small>上消</small>	小承氣湯 <small>陽明潮熱</small>
			腎氣丸 <small>寒熱</small>	順氣散 <small>遺補</small>
			鳳髓丹 <small>遺</small>	內化丸
上消	人參石膏湯	加減地骨皮散	人參白朮散	
	麥冬飲子 <small>加</small>	止渴潤燥湯	化水丹	
	蜜河方	文蛤散	神效散	
	千里漿 <small>二</small>	芷毒湯	文蛤飲	
	甘草石膏湯 <small>俱本</small>	白虎加人參湯 <small>陽明</small>		
	調胃承氣湯 <small>太陽發熱</small>	三黃丸 <small>熱發</small>	六味地黃丸 <small>虛實</small>	
	五苓散 <small>傷食</small>	猪苓湯 <small>陽明</small>	火府丹 <small>淋</small>	
	白虎湯 <small>太陽發熱</small>	涼膈散 <small>寒熱</small>	小柴胡湯 <small>少陽寒熱</small>	
中消	四君子理中湯			
	猪肚丸	順利散	參蒲丸 <small>俱本</small>	
下消	生津甘露飲子	和血養氣湯	地黃飲子	
	清涼飲子	甘露膏	千金地黃丸	
	黃連丸	麥冬湯	冬瓜飲子	
	三消丸	胡粉散	葛根丸	

行氣丸	茵香散 <small>俱本</small>	黃芪湯 <small>瘧</small>
胎前渴	葛根散	人參黃芪散
產後渴	玄胡索散	知母散 <small>俱本</small>
竹葉湯	口燥咽乾	黃芪湯 <small>俱本</small>
黃芪湯 <small>俱本</small>	五味子湯	桑枝煎 <small>二方瘧</small>
黃疸	茯苓除濕湯	茵陳梔子湯
	桂枝加黃芪湯	麻黃醇酒湯
	梔子大黃湯	大黃硝石湯
	理中加茯苓湯	茵陳附子乾姜湯
	養榮湯	補中湯
	葛根湯	噎鼻瓜蒂散 <small>俱本</small>
	小柴胡湯 <small>傷寒在</small>	小建中湯 <small>太陽腹瀉</small>
	食勞疳黃	小半夏湯 <small>嘔吐</small>
	大溫中丸	小溫中丸
	紫金丹	東蔡丸 <small>五方俱本</small>
黃汗	黃桂酒湯 <small>條本</small>	煖中丸
目黃	青龍散 <small>條本</small>	
黑疸	硝石散 <small>條本</small>	
卷之二十二	脾胃部	
腹痛	胎前腹痛	產後胎痛
	腸鳴	



嘔吐	吐	乾嘔	惡心
嘔苦水	吐酸吞酸	嘔吐清水	嘔沫
嘔膿	嘔吐虫	吐利	關格
膈氣	反胃	噎	噎塞
口開目瞪	嘈雜	噦	產後噦
腹痛			
草薺寇丸	神聖復氣湯	益智和中丸	
溫胃湯	木桂湯	麻黃薺寇丸	
厚朴湯	高良姜湯	附子粳米湯	
益智散	五靈脂湯	芍藥甘草湯	
厚朴三物湯	當歸丸	四物苦練湯	
混中丸	大蒼朮丸	七氣湯	
小建中湯	理中湯	四逆湯	
真武湯	附子湯	正陽散	
回陽丹	當歸四逆湯	芍藥黃芪湯	
胎前腹痛			
當歸芍藥散	地黃當歸湯	芍歸湯	
產後腹痛			
捲荷散	黑白散	紫金散	
立効散	下淤血湯	桂心丸	
內補當歸建中湯		獨聖散	
枳實芍藥散	黑神散	四物加玄胡散	
白芷湯	四物苦練湯	當歸生薑羊肉湯	
腸鳴			
葶藶丸	升陽除濕湯		

嘔吐	小半夏加茯苓湯	大半夏湯
嘔吐	加減二陳湯	藿香安胃散
嘔吐	藿香平胃散	丁香藜蘆湯
嘔吐	竹茹湯	枇杷散
嘔吐	香靈丸	半夏瀉心湯
嘔吐	紅豆丸	四逆湯
嘔吐	猪苓散	
嘔吐	桔梗湯	木香散
嘔吐	枳椇散	荆黃湯
嘔吐	青鎮丸	大黃甘草湯
嘔吐	碧霞丸	茯苓澤瀉湯
嘔吐	陳皮湯	獨參湯
嘔吐	惡心	
嘔吐	生薑半夏湯	茯苓半夏湯
嘔吐	蒲黃散	開胃散
嘔吐	咽醋丸	柴胡半夏湯
嘔吐	參茸丸	服蒼朮法
嘔吐	茯苓飲	乾姜丸
嘔吐	半夏乾姜散	藿香安胃散
嘔吐	烏梅丸	

吐利

黃芩加半夏生薑湯

黃芩湯

水煎金花丸俱本

關格

大承氣湯陽明潮熱

背胃

紫沉丸

厚朴丸

附子丸

白朮木香散

白朮散

十膈氣散

芫花散

新瓦散

人參利膈丸

大黃湯

玄胡粉

芫花丸

紅豆丸

丁香附子散

附子散

桂香散

鯽魚散俱本

六丁丸即香靈丸見嘔吐

噎

漢防己湯

五噎膈氣丸俱本

人參散大發

厚朴丸反胃

噎塞

吳茱萸丸本條

黃芪補中湯痞

利膈丸齒

滋腎丸寒熱

消痞丸痞

嘈雜

導引丸內傷

噦

陳皮竹茹湯

柿錢散

丁香柿蒂散

羌活附子湯

小承氣湯陽明潮熱

卷之二十三

泄瀉

腰骨部

產後泄

久泄久利

泄瀉

產後泄

久泄久利

泄瀉

產後泄

產後痢

大便不通

產後大便閉

大小便不通

產後大小便閉

泄瀉

胃苓湯

對金飲子

平胃散加減法

四苓散

益元散

參芩丸

甘遂半夏湯

白朮芍藥湯

蒼朮芍藥湯

蒼朮防風湯

升陽除濕湯

人參升胃湯

止瀉姜麴丸

固腸丸

訶子散

厚朴枳實湯

補脾丸

扶脾丸

蒼朮湯

訶子丸

赤石脂禹餘糧湯

朝真丹

藥水散

桂枝湯

止瀉丸

桂木丸

止瀉丸

附子濕中湯

鞠藭丸

桂香丸俱本

八怪星綱目錄

誦

進退大承氣湯

涼膈散熱

四逆湯少陰下利

赤石脂丸少陰下利

乾薑湯補

消風湯

大柴胡湯寒熱

水煎金花丸利

木香和中丸虛實

芍藥升麻湯

蒼朮地榆湯下

玉龍丸傷寒中暑

食泄

加減木香散

白朮湯

防風芍藥湯

蒼朮防風湯

補本丸

木香丸俱本

宣風散小兒痘

滯下

芍藥湯

玄青丸

利積丸

烟臘丸

香連丸

荳蔻香連丸

黃連阿膠丸

導氣湯

進退承氣法

芍藥黃芩湯

當歸導氣湯

紫參湯



定痛黑九子	靈砂丹	陳麴丸
茯苓湯	神效越桃散	堅中丸
芍藥柏皮丸	加減平胃散	青六丸
蒼朮地榆湯	槐花丸	石脂神砂丹
水煑木香膏	斷下湯	白朮安胃散
訶子皮散	養臟湯	地榆芍藥湯
救命延年丸	阿膠梅連丸	黃連丸
感應丸	白頭翁湯	升陽除濕防風湯
桃花湯	建中湯	理中湯
附子理中湯	胃風湯	膠艾湯
久洩久痢	震靈丹	
白朮黃芩湯	五味子散	乾薑丸
聖餅子	肉蔻丸	固中丸
洩瀉丸	訶黎勒丸	木香散
芍藥湯	麻黃升麻湯	小續命湯
胎前下利	黃連湯	厚朴散
大寧散		
草果飲		
產後痢		
救急散	黃連丸	白頭翁加甘草阿
膠湯	當歸芍藥湯	
大便不通		
潤腸丸	活血潤腸丸	當歸潤腸湯
導滯通幽湯	潤腸橘杏丸	人參散
菴菴潤腸丸	益血丹	七宣丸

厚朴湯	枳椇散	大黃牽牛散
半硫丸	麻黃白朮湯	蜜煎導法
霹靂煎	通關散	宣積丸
麻仁湯		
大小便不通		
車狗散	廻生神膏	搽臍法
卷之二十四	脾胃部	
水脹通論	水腫	胎前水腫
少腹脹	少腹脹滿	胎前腹脹
水腫		產後水腫
防已黃芪湯	防已茯苓湯	越婢湯
甘草麻黃湯	杏子湯	導滯通經湯
白茯苓湯	大棗湯	羌活散
五加皮散	香蘇散	白丸子
葶藶丸	聖靈丹	赤茯苓丸
續隨子丸	三種散	無礙丸
茯苓散	取十種水病方	補藥方
三花神佑丸	海金沙散	海藻散
知母湯	復元丹	實脾散
蒲灰散	牡蠣澤瀉散	中消分消丸
胎前水腫		
防已湯	葶藶散	
產後水腫		
大調經散	小調經散	奪魂散
加減吳茱萸湯		
少腹脹		

附子菘菴湯	索氏三和湯	調胃白朮澤瀉散
枳朮湯	木香化滯湯	小溫中丸
禹餘糧丸	桂枝去芍加麻辛附子湯	
牛黃琥珀丸	防已椒蘆丸	葶蘆丸
楮實子丸	廣茂潰堅丸	四炒枳殼丸
沉香交泰丸	沉香海金沙丸	治腫木香散
香薷丸	厚朴七物湯	木香順氣湯
中滿分消湯	木香塌氣丸	中滿分消丸 <small>俱本</small>
白九子 <small>木</small>	三補丸 <small>寒熱</small>	
少腹脹滿		
澤漆湯	晞露丸	烏喙丸
見睨丹	石英散	大黃甘遂湯
萬病丸 <small>俱本</small>		
胎前腹脹	八寶丹 <small>俱本</small>	天
枳殼湯	紫金丹	抵聖湯
白聖散 <small>俱本</small>	枳朮湯 <small>小腹</small>	
卷之二十五	脾胃部	
積塊癥瘕	婦人血積	胎前產後積
息積	面部	面腫頰腮痛
面熱面寒	面青面塵	面赤
面白	面黑	頰車病
狂	欲獨閉戶牖而處	顛狂通論
口苦	口糜	口瘡 <small>入赤</small>
口疳 <small>入中</small>	唇	唇瘻 <small>入口</small>
肉部	身重	四肢
奇病	怠嗜嗜臥	壘毒

積塊癥瘕	消塊和胃湯	磨積方	柳宗元纂救三元
方	萬病紫苑丸	萬病丸	溫白丸
醋煮三稜丸	神功助化散	乾柿丸	硝石丸
紅九子	雞爪三稜丸	雞爪三稜丸	聖散子
治瘕丸	玄胡索丸	玄胡索丸	礪砂煎丸
二賢散	小阿魏丸	小阿魏丸	荆蓬煎丸
破積導飲丸	小三稜煎	小三稜煎	神效五食湯
流氣丸	肥氣丸	肥氣丸	加減肥氣丸
伏梁丸	痞氣丸	痞氣丸	加減痞氣丸
息奔丸	加減息奔丸	加減息奔丸	奔豚丸
肥氣丸	五靈丸	五靈丸	束香膏
定喘葶蘆丸	奔豚湯	奔豚湯	聚散湯 <small>俱本</small>
潤下丸 <small>痰</small>	妙應丸 <small>痰</small>	妙應丸 <small>痰</small>	保和丸 <small>食</small>
琥珀膏 <small>痰</small>			
婦人血積	加減四物湯	加減四物湯	黑神丸
當歸丸	牡丹散	牡丹散	木香礪砂丸
沒藥散			
桃仁煎 <small>俱本</small>			
胎前產後積			
芍藥湯 <small>俱本</small>			
息積	化氣湯 <small>俱本</small>	化氣湯 <small>俱本</small>	
磨積丸			
面寒面熱			
升麻加黃連湯 <small>俱本</small>			



面白	巴戟丸 <small>寒</small>	冲和順氣湯 <small>本條</small>	鎮心丹	驚氣丸	龍膽瀉肝湯 <small>本條</small>	口臭	胡黃連散	口臭喉腥	加減甘露飲	身重	甘薑芩朮湯	怠惰嗜臥	人參補氣湯 <small>本條</small>	蠱毒	辰砂丸	礬灰散 <small>俱本</small>	卷之二十六	咳嗽	厚朴蘇黃湯
			來麴膏	牛黃膏 <small>俱本</small>			必效散 <small>俱本</small>		加減瀉白散 <small>俱本</small>		參朮湯 <small>俱本</small>			解毒丸 <small>二</small>	解毒毒方	肺大腸部	乾咳嗽	澤瀉湯	
			當歸承氣湯	礬丹丸 <small>在</small>							防已黃芪湯 <small>傷寒</small>			青黛雄黃丸	奇病諸方	咳嗽喉中作聲	久嗽	三拗湯	
																	姪娠嗽		

水養金花丸	化痰玉壺丸	天麻丸	小黃丸	白朮丸	玉粉丸	薑桂丸	太白丹	法製半夏	人參欬花散	紫蘇半夏湯	紫蘇飲	紫蘇散	杏參飲	利膈丸	杏仁煎	潤下丸	桔梗湯	白朮湯	白朮散	防風丸	皂角化痰丸	白龍丸	潤肺散	抑痰丸	溫脾湯	甘膽丸	瓜蒌丸	生薑甘草湯	桂枝去芍藥加皂	荑湯	九仙散	欬花清肺散	人參清肺湯	人參欬花散	安肺散	人參理肺散	黃連化痰丸	青礞石丸 <small>二</small>	定嗽化痰丸	人參半夏丸	金珠化痰丸	人參清金丸	半夏溫肺湯	丁香半夏丸	溫胃化痰丸	胡椒理中丸	柴胡飲	杏子湯	搜風化痰丸	延壽丹	防風丸	川芎丸	團參散	人參欬花膏	補肺湯	欬花補肺湯	清肺湯	瀉火補肺湯	蛤蚧丸	大利膈丸	墜痰丸	透羅丹	清金丸	欬氣丸	紫參飲	貝母湯 <small>俱本</small>	清金丸 <small>寒</small>	越婢加半夏湯	小青龍加石膏湯 <small>二方</small>	麻黃湯 <small>傷寒</small>	赤石脂禹餘糧湯 <small>少陰</small>	桔梗湯 <small>傷寒</small>	芍藥甘草湯 <small>厥陰</small>	小柴胡湯 <small>少陽</small>	黃芩加半夏生薑
-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---------	----	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------------	----------------------	--------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	---------

湯利	升麻湯 <small>傷寒</small>	烏梅丸 <small>厥陰</small>
麻黃附子細辛湯 <small>傷寒</small>	茯苓甘草湯 <small>厥陰</small>	
錢氏異攻散 <small>小兒</small>	吳茱萸湯 <small>少陰</small>	厚朴湯 <small>大便不通</small>
千縉湯 <small>喘</small>	十棗湯 <small>久</small>	稀涎散 <small>實</small>
三聖散 <small>實</small>	瓜蒂散 <small>發黃</small>	碧霞丹 <small>實</small>
乾咳嗽	補肺法 <small>俱本</small>	
甘桔湯		
咳嗽作聲		
射干麻黃湯	白前湯 <small>俱本</small>	
久嗽		
薰法二條	枳殼湯	生半夏湯
馬兜鈴丸 <small>俱本</small>	蛤蚧丸 <small>咳</small>	
妊娠嗽		
馬兜鈴丸	麻黃散	紫苑湯
桔梗散 <small>俱本</small>		
卷之二十七	肺大腸部	
喘	喘不得臥	產後喘
少氣	善悲	妊娠善悲
鼻淵	鼻鼈	鼻塞
鼻黑肩背痛	鼻瘻肉	酒齋鼻
皮膚痛	皮膚索澤	皮膚
喉疳	胎前產後疳	舌疳
穀道痛蝕	疳	脫肛
喘		
麥門冬湯	天門冬丸	越婢加半夏湯
小青龍加石膏湯		麻黃定喘湯

麻黃蒼朮湯	四磨湯	平氣散
加減瀉白散	槐角利膈丸	定喘飲子
木防已湯	木防已加茯苓芒硝湯	
千縉湯	半夏丸	雙玉散
紫金丹	清金丹	化痰丸
人參平胃散	參蘇溫肺湯	加減瀉白散
加減三奇湯	紫參散	清金湯 <small>俱本</small>
沉香滾痰丸 <small>痰</small>	四七湯 <small>胸中如硬狀</small>	
人參半夏湯 <small>咳</small>	葶藶大寒瀉肺湯 <small>喘</small>	
白朮散 <small>咳</small>	稀涎散 <small>實</small>	調中益氣湯加減
法		
喘不得臥		
神祕湯	苓桂五味甘草湯	
真應散	紫金丹 <small>俱本</small>	
產後喘		
血竭散	參蘇飲	旋覆花湯
見睨丸 <small>俱本</small>	奪命丹 <small>胞衣不下</small>	小調經散 <small>水</small>
短氣		
正元散	苓桂木甘湯 <small>俱本</small>	欬花補肺湯 <small>嗽</small>
茯苓杏仁甘草湯		橘枳生薑湯 <small>二方</small>
括蕪菴白半夏湯 <small>心</small>		腎氣丸 <small>勞</small>
善悲		
甘麥大棗湯 <small>本</small>		
鼻塞		
麗澤通氣湯	溫肺湯	御寒湯
溫衛湯	溫衛補血湯	葶藶茄丸



通草散	葛蒲散 <small>俱本</small>	鼻淵	防風湯	蒼耳散	辛萸散 <small>俱本</small>	鼻中瘰肉	羊肺散	荜蕒膏	輕黃散 <small>俱本</small>	酒醴鼻	鉛紅散	簡要方	粉黃膏	栝柳散 <small>俱本</small>	升麻湯 <small>傷寒陽毒</small>	瀉青丸 <small>虛</small>	肩背痛	通氣防風湯 <small>本</small>	皮膚索澤	大黃蜜虫丸 <small>勞</small>	葶藶湯 <small>患</small>	喉痞	訶子湯	發聲散	玉粉丸	蛤蚧丸	通聲音 <small>俱本</small>	產後痞	七珍散	孤鳳丹 <small>俱本</small>	脫肛	香荊散	鍼粉散 <small>俱本</small>	痔	秦芫蒼木湯	秦芫白木丸	蒼木澤瀉丸	痔瘻膏子	驚甲丸	蓮花蕊散	七聖散丸	秦芫防風湯	秦芫羌活湯	當歸郁李仁湯	神應散	淋洗法	蒲黃散	薰痔法	枯痔法	割痔麻藥 <small>俱本</small>	黑地黃丸 <small>勞</small>
-----	-----------------------	----	-----	-----	-----------------------	------	-----	-----	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------------	-------------------------	----------------------	-----	------------------------	------	------------------------	----------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----------------------	-----	-----	-----------------------	----	-----	-----------------------	---	-------	-------	-------	------	-----	------	------	-------	-------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------	-----------------------

卷之二十八	腎膀胱	腰痛	胎前腰痛	產後腰痛	脊痛脊強	寒熱厥通論	寒厥熱厥	產後寒厥	脚氣衝心為厥逆	產脚氣	脚氣頑麻腫痛為痺厥	足痿軟不能為痿厥	腰痛	立安丸	杜仲酒 <small>方</small>	麋茸丸	補腎丸	補陰丸	蒼木湯	牛膝酒	獨活寄生湯	防風湯	川芎肉桂湯	獨活散	羌活湯	橘核散	如神湯	桃仁酒	地龍湯	橘核酒	桃仁酒	無活勝濕湯	摩腰丹	皂角膏 <small>俱本</small>	煨腎丸 <small>法實</small>	八味腎氣丸 <small>法實</small>	小續命湯 <small>風中</small>	五積散 <small>法實</small>	腎著湯 <small>身</small>	胎前腰痛	五加皮散	五茄皮丸 <small>俱本</small>	產後腰痛	紫金丸	生地黃湯	桃仁湯 <small>俱本</small>	寒厥	加減白通湯 <small>本</small>	痺厥	竹瀝湯	風引湯	大鱉甲湯	麻黃湯	獨活湯	厚朴湯	風引獨活湯	地黃丸	薏苡丸	勝駿丸	蒼木丸	酒浸牛膝丸
-------	-----	----	------	------	------	-------	------	------	---------	-----	-----------	----------	----	-----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	------	------	------------------------	------	-----	------	-----------------------	----	------------------------	----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------

當歸括痛湯	羌活導滯湯	開結導飲九方
枳實大黃湯	茵芋丸	健步丸
十全丹	續斷丸	薏苡仁酒
虎骨酒	栝柳散	漂洗法 <small>俱本</small>
越婢加白朮湯 <small>烏頭湯行</small>		
痿厥		
補益腎肝丸	健步丸	神龜滋陰丸
越婢加朮湯	左經丸	續骨丹
商陸飯	人參酒 <small>俱本</small>	通天愈風湯 <small>注夏</small>
黃芪人參湯	清燥湯 <small>注夏</small>	
厥逆		
三脫散	大腹子散	桑白皮散
薏苡仁散	礬石湯 <small>俱本</small>	八味地黃丸 <small>法虛實</small>
救三死方 <small>增精</small>		
卷之二十九	腎膀胱部	
耳聾	暴聾	耳鳴
停耳	虫入耳	骨
齒搖斷露	牙蛀牙不生	髮黃白
髮落不生	二陰	欠噫
嚏	身體拘急	夢遺
恐		白濁
耳聾		
燒腎散	嚴氏從蓉丸	蟻彈丸
栝柳神芎丸	犀角散	茯苓散
地黃湯	蠶蠟散	通神丹 <small>俱本</small>
復元通氣散 <small>應</small>		

暴聾	滿黃膏	龍腦膏 <small>俱本</small>
耳鳴	黃芪丸	柴胡耳鳴湯 <small>俱本</small>
耳腫痛	嚴氏犀角飲子	解熱飲子
停耳	紅綿散	松花散
齒痛	麝香散	禹餘糧丸 <small>俱本</small>
牢牙地黃散	當歸龍膽散	益智木律散
立效散		細辛散
獨活散	治虫散	獨活散
追風散	定痛散	雄黃定痛膏
透關散	牢牙散	白牙散
麝香刷牙散	刷牙方 <small>俱本</small>	
齒搖斷露	羌活散	黃連散
羌活散	麝香散	取蛀牙法 <small>俱本</small>
牙蛀牙不生	牙疔牙不生	甘露飲子 <small>小兒疳</small>
麝香散	救苦散	葶藶散 <small>俱本</small>
髮黃白	張天師草還丹	青絲散 <small>俱本</small>
髮落不生	滋榮散	三聖膏 <small>俱本</small>



夢遺	巴戟丸	金鎖丹	固真丹
補真玉露丸	秘真丸	八仙丹	
珍珠粉丸	鳳髓丹	清心丸	
桂枝龍骨牡蠣湯		天雄散	
猪苓丸	烏金散 <small>俱本</small>		
白濁			
加減珍珠粉丸	鹿茸丸	茯苓丸	
金箔丸	王瓜散	葶藶分清飲 <small>俱本</small>	
恐			
人參散	茯神散	補膽防風湯 <small>俱本</small>	
卷之三十	傷寒部		
傷寒通論 續傷寒通論		太陽症	
發熱	惡寒	頭痛	項強
身體痛			
太陽症			
桂枝湯	麻黃湯	大青龍湯	
溫粉方	桂枝加葛根湯	葛根湯	
桂枝二越婢一湯		桂枝麻黃各半湯	
抵當湯	麻黃附子細辛湯		
柴胡加桂枝湯			
發熱			
調胃承氣湯	白虎湯	黃芪湯	
調中丸	理中丸	神木湯	
白朮湯	又黃芪湯	川芎湯	
黃芪建中加當歸湯		九味羌活湯	

大白朮湯	五積散	參蘇飲
柴胡散	人參散	
惡寒		
四逆加人參湯	芍藥甘草附子湯	
桂枝去芍藥湯	桂枝去芍藥加附子湯	
頭痛		
連翹葱白湯	葛根葱白湯	獨活湯
石膏川芎湯		
項強		
桂枝去桂加茯苓白朮湯		
身體痛		
桂枝加芍藥生薑人參新加湯	麻黃加朮湯	
甘草附子湯	桂枝附子湯	白朮附子湯
麻黃杏仁薤白甘草湯		杏仁湯
麻黃復煎湯		
卷之三十一	傷寒部	
陽明症	胃實不大便	自汗
不得臥	潮熱	譫語
捻衣摸牀	渴	嘔
少陽症	口苦咽乾	眩
脇滿痛	胸滿	胸痛
陽氣獨盛變陽毒		少陽症續法
腹痛	發黃	太陰症
口燥舌乾	咽痛	腹滿
下利	厥陰症	少陰症
吐衄	厥	但欲寐嗜臥
		氣上衝心 饑不欲食
		少腹滿囊縮

陰氣獨盛變陰毒	陽明症胃實不大便	麻仁丸	蜜煎導法	猪膽汁法	自汗	桂枝加附子湯	防風白朮牡蠣散	不得臥	黃連阿膠湯	酸棗仁湯	黃連解毒湯	潮熱	梔子烏梅湯	大承氣湯	小承氣湯	柴胡加芒硝湯	狂亂	鵲石散	防風黃連湯	渴	白虎加人參湯	五苓散	猪苓湯	文蛤散	人參湯	嘔	葛根加半夏湯	乾嘔	赤茯苓湯	人參葛根湯	少陽症往來寒熱	小柴胡湯	大柴胡湯	柴胡桂枝乾薑湯	脇滿痛	十棗湯	陽毒	升麻鱉甲湯	陽毒升麻湯	陽毒梔子湯	大黃散	葛根散	黑奴丸
---------	----------	-----	------	------	----	--------	---------	-----	-------	------	-------	----	-------	------	------	--------	----	-----	-------	---	--------	-----	-----	-----	-----	---	--------	----	------	-------	---------	------	------	---------	-----	-----	----	-------	-------	-------	-----	-----	-----

丹砂丹	太陰症腹滿	桂枝加大黃湯	厚朴薑半夏湯	桔梗半夏湯	腹痛	黃連湯	小建中湯	葶藶湯	發黃	茵陳蒿湯	梔子柏皮湯	麻黃連翹赤芍湯	茵陳湯	五苓加茵陳湯	瓜蒂散	少陰症欲寐嗜臥	麻黃附子甘草湯	附子湯	四逆散	咽痛	甘草湯	桔梗湯	半夏散	苦酒湯	半夏桂枝甘草湯	吐	吳茱萸湯	乾薑芍藥人參湯	建中湯	吐利	理中湯	四逆湯加猪膽汁方	香薷散	白朮散	訶子散	人參散	回陽散	增損縮脾飲	茯苓澤瀉湯	下利	四逆湯	白頭翁湯	真武湯	猪膚湯	麻黃升麻湯	白通湯
-----	-------	--------	--------	-------	----	-----	------	-----	----	------	-------	---------	-----	--------	-----	---------	---------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	---------	---	------	---------	-----	----	-----	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	----	-----	------	-----	-----	-------	-----



白通加猪膽汁湯	通脈四逆湯	黃芩湯	葛根連芩湯	赤石脂禹餘糧湯	桃花湯	薤白湯	赤石脂丸	黃連阿膠湯	燥腸丸	枳實芍藥薑甘湯	厥陰症氣上衝心	瓜蒂散	桂枝加桂湯	李根湯	當歸四逆湯	茯苓甘草湯	芍藥甘草湯	烏梅丸	少腹滿急縮	五味子湯	正陽散	回陽丹	陰毒	陰毒甘草湯	正元散	五聖散	白朮散	還陽散	返陰丹	代灸塗膏	破棺丹	卷之三十二	傷寒部	台病併病汗下吐後等病	身重	難轉側	遺尿	盜汗	面赤	壞病	戰慄振搖	筋惕肉瞤	叉手冒心	驚悸	痞氣同異	結胸	痞	臟結胸	煩躁	欬	小便利	小便難	尸厥	尸厥	噫	噦	無汗
---------	-------	-----	-------	---------	-----	-----	------	-------	-----	---------	---------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------	------	-----	-----	----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-------	-----	------------	----	-----	----	----	----	----	------	------	------	----	------	----	---	-----	----	---	-----	-----	----	----	---	---	----

瘧狀	頭汗	舌白胎	動氣	鼻衄	下血	唾血	畜血	吐血	短氣	心痛	除中	下重	身熱惡寒身寒惡熱	虛	痲	狐惑	百合病	喘	桂枝加厚朴杏仁湯	甘草石膏湯	身重	防已黃芪湯	壞病	羊肉湯	戰慄振搖	茯苓桂枝白朮甘草湯	驚	柴胡加龍骨牡蠣湯	桂枝去芍藥加蜀	漆牡蠣龍骨救逆湯	茯苓丸	犀角湯	麥冬茯苓飲子	悸	桂枝甘草湯	茯苓桂枝甘草大棗湯	炙甘草湯	結胸	大陷胸湯	小陷胸湯	三物白散	大陷胸丸	枳實理中丸	增損理中丸	穿結散	海蛤散	結胸灸法	痞	大黃黃連瀉心湯	附子瀉心湯
----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------	---	---	----	-----	---	----------	-------	----	-------	----	-----	------	-----------	---	----------	---------	----------	-----	-----	--------	---	-------	-----------	------	----	------	------	------	------	-------	-------	-----	-----	------	---	---------	-------

半夏瀉心湯	甘草瀉心湯	生薑瀉心湯
桂枝人參湯	旋覆代赭湯	桔梗枳殼湯
煩 梔子豉湯	梔子甘草豉湯	梔子乾薑湯
梔子厚朴湯		
煩躁 薑附湯	茯苓四逆湯	桂枝甘草龍骨牡
礪湯	霹靂散	已寒丸
欬 小青龍湯	補肺散	阿膠散
桔梗湯		
噫 如聖加枳實湯	如聖加人參養香杏仁湯	
入書 橘皮乾薑湯	半夏生薑湯	勻氣散
嘔 陰毒吃逆方	肉苳蔻湯	良薑湯
瘡狀 桂枝二麻黃一湯		
動氣 防葵散	枳殼散	前胡散
臭齕 犀角地黃湯	茅花湯	滑石湯
畜血 抵當湯	抵當丸	桃仁承氣湯
吐血 生地黃丸		

麻黃人參芍藥湯		
痲 射干湯		
痲 黑膏方	葛根橘皮湯	玄參升麻湯
痲 大青四物湯	猪膽雞子湯	消毒飲子
狐惑 雄黃散	治蠱桃仁湯	黃連犀角湯
痲 百病病		
百合知母湯	滑石代赭湯	百合雞子湯
百合地黃湯	括蕞牡礪散	百合滑石散
卷之二十三	傷寒部	
入書 勞復	陰陽易	四時傷寒不同
冬傷寒	春溫病	夏暑病
溫疫	風溫	濕
婦人傷寒	熱入血室	妊娠傷寒
小兒傷寒	溫病	韓氏和解因時法
溫中法	灰包燻法	
勞復 枳實梔子豉湯	牡礪澤瀉散	竹葉石膏湯
補脾湯	麥冬湯	雄鼠屎湯
七味葱白湯		
陰陽易 燒棍散	竹葉湯	青竹茹湯
殺鼠糞湯	當歸白朮湯	



温病

升麻解肌湯

暑病

一物瓜蒂湯

酒蒸黃連丸

黃芪湯

消暑丹

温疫

老若神明散

風温

知母乾葛湯

婦人熱入血室

桂枝加芍藥湯

乾薑柴胡湯

小柴胡加牡丹皮湯

黃湯

甘草芍藥湯

妊娠傷寒

黃連解肌湯

風濕六合湯

大黃六合湯

梔子六合湯

琥珀六合湯

四物大黃湯

芍藥湯

桂枝石膏湯

橘皮湯

蒼木石膏湯

消暑丸

聖散子

調中湯

防已湯

麻黃加生地黄湯

小柴胡加地黃湯

桂枝加附子紅花湯

表虛六合湯

升麻六合湯

人參六合湯

石膏六合湯

膠艾六合湯

桂枝芍藥當歸湯

阿膠散

表實六合湯

柴胡六合湯

厚朴六合湯

茯苓六合湯

附子六合湯

安胎白朮散

葱白湯

產後傷寒

竹葉湯

小兒傷寒

大青膏

七寶散

大黃丸

藿香正氣散

和經因時法

調脈湯

薄荷湯

六物麻黃湯

人參湯

芍藥湯

温中法

温中湯

厚朴丸

二苓湯

熨法

厚朴丸

卷之三十四

婦人治通論

血崩

婦人通治

四物湯加減法

調經

護胎方

玉露散

雄黃膏

麻黃黃芩湯

薄荷散

小建中減桂加黃芪湯

葛根柴胡湯

防風湯

七物柴胡湯

石膏湯

知母湯

橘皮湯

白朮湯

七物理中丸

橘皮湯

人參羌活散

升麻黃芩湯

枳殼半夏湯

香芍湯

發表湯

解肌湯

婦人部

調經

經閉

柴胡四物湯

芎歸湯

四物加芩連湯	四物加芩木湯	四物加葵花湯	四物加地黃當歸湯	桂枝桃仁湯	柴胡丁香湯	琥珀散	交加散	交加地黃丸	益母草丸	土瓜根散	四物加黃芩湯	升陽舉經湯	紫石英丸	芩心丸	當歸散	經閉	五補丸	衛生湯	萬病丸	血極膏	紅花當歸散	牛膝散	溫經湯	牡丹散	通經丸	掌中金丸	礬石丸	桂枝桃仁湯	血崩	旋覆花湯	備金散	醋附丸	縮砂散	當歸芍藥湯	芎歸膠艾湯	益胃升陽湯	調經升陽除濕湯	柴胡調經湯	獨聖散	黃芪當歸人參湯	枳黃散	伏龍肝散	狂礪散	涼血地黃湯	小劑湯	芎歸酒	金華散	丁香膠艾湯	香礬散	五靈脂散	琥珀散	荆芥散	神應散	如聖散	四物膠艾湯	赤白帶	乳香散	樗皮丸	固腸丸	地榆膏	苦棟丸	伏龍肝散	循經固真湯	調經補真湯	地黃丸	桂附湯	坐藥龍盤膏	勝陰丹
--------	--------	--------	----------	-------	-------	-----	-----	-------	------	------	--------	-------	------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-------	----	------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	---------	-------	-----	---------	-----	------	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-----	-----	-------	-----

回陽丹	酒煮當歸丸	當歸附子湯	固真丸	補真潤腸湯	溫經湯	益母散	白芷散	摩腰膏	卷之三十五	婦人部	胎前症	求子	受胎	惡阻	妊娠經來	胎漏下黃汁或如荳汁	胎動不安	胎上逼心	跌撲毒藥傷胎	胎病可下胎	斷胎	胎自墮	十月未足欲產過期不產	縮胎法	坐草法	催生法	下死胎法	產後症	胎衣不下	血暈	血不下	血不止	虛弱	無乳	乳汁自出	陰脫	求子	益斯丸	大五補丸	增損三才丸	紫石英丸	湯胞湯	坐導藥	受胎	驗胎散	惡阻	半夏茯苓湯	茯苓丸	乾薑人參半夏丸	歸原散	人參橘皮湯	安胎飲	胎漏下血	桂枝茯苓丸	立聖散	胎漏黃汁	銀苧酒	胎動	永固丸	當歸散	養胎白朮散
-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	----	----	----	------	-----------	------	------	--------	-------	----	-----	------------	-----	-----	-----	------	-----	------	----	-----	-----	----	----	------	----	----	-----	------	-------	------	-----	-----	----	-----	----	-------	-----	---------	-----	-------	-----	------	-------	-----	------	-----	----	-----	-----	-------





五福化毒丹	瓜萋湯	青白九子
溫白丸	釣藤飲子	羌活膏
返魂丹	八仙散	醒脾散
釀乳方	揀痰方	芎藭散
油珠膏	補脾益真湯	前朴散
醒脾丸	蠲積散	回生散
梓朴散	豆卷散	黃芪益黃散
奪命散方	大黑龍丸	鎮驚丸
保命丹	溫熱丸	抱龍丸
天麻散	天麻防風丸	七味羌活膏
釀乳方	補銀丸	地黃丸
瀉青丸	益黃散	導赤散
大青膏	小續命湯	白餅子
安神丸	調中九	李
黃連安神丸	寒水石丸	異功散
辰砂丸	紫雪	麝香丸
桃枝丸	史君子丸	軟金丹
驚癇	五色丸	雌黃丸
沉香天麻湯	牛黃丸	得效方
斷癇丹	奪命丹	
天弔		
九龍控涎散	釣藤飲	
雀目疳眼		
養肝丸	龍膽飲子	
通睛		

小便不通	牛黃丸	木通散	久葵子散
喉痺	碧霞丹		
卷之三十七	小兒部		
心主熱	潮熱	積熱	溫病
變蒸熱	心痛	美舌	重舌
木舌	舌白胎	臭	遲言
盜汗	自汗	癰癤	腮腫
惡核瘰癧	赤丹	疥癬	眉煉
耳瘡	面瘡	口瘡	癩頭瘡
疥瘡	痘疹治法通論		痘出太密
出不快	癢場	灰白色	黑陷倒靨
寒戰	發熱	寒熱	痘渴
瀉瀉	瀉不渴	吐逆	腹脹
脹痛	痘喘	大便秘	餘毒
痘入目	咽痛	痘風	癩瘡
痘瘡痛	膿而不痂	痘後瘡癩	痘癰
中惡	客忤		
潮熱			
地骨皮散	生犀散	犀角散	
秦芫散	金星丸	瀉白散	
甘桔湯	涼膈散	四逆湯	
捻頭散	桂枝芍藥湯	香薷丸	
四順飲	奪命散	惺惺散	



積	紅綿散	六神散	銀白散
桃枝散	梔枝飲子 <small>俱本</small>		
變蒸熱			
紫霜丸 <small>俱本</small>			
心痛			
靈礬散 <small>俱本</small>			
臭舛			
地黃湯 <small>俱本</small>			
進言			
甘肅丸	雞頭丸 <small>俱本</small>		
盜汗			
黃芪散	虎杖散 <small>俱本</small>		
自汗			
香朮丸 <small>俱本</small>			
赤丹			
防已散	荆芥散	解毒散 <small>二</small>	
白玉散	生料四物湯 <small>俱本</small>		
疥癬			
苦瓠散	青金散 <small>俱本</small>		
耳瘡			
白磁散 <small>俱本</small>			
口瘡			
如聖散	狂礪散 <small>俱本</small>		
痘法通論			
安裏解毒防風湯			
			升麻葛根湯

惺惺散	四物解肌湯	防風蒼朮湯
黃栢膏	胡荽湯	消毒救苦湯 <small>俱本</small>
當歸丸	東變百祥丸 <small>俱本</small>	
枳實丸	枳木丸	神應丸 <small>三方俱</small>
白虎湯 <small>發熱</small>	八正散 <small>淋</small>	十二味異功散 <small>不出</small>
葛根湯 <small>傷寒</small>	七味肉苳菴丸 <small>瀉不</small>	
甘露飲 <small>嘔</small>	小柴胡湯 <small>寒熱</small>	玉露散 <small>吐</small>
出太密		
鼠粘子湯	調肝散 <small>俱本</small>	
出不快		
錢氏消毒飲	六一湯	活血散
陳氏異功散	藍根散	鼠粘子湯
化毒湯	透肌湯	甘桔加梔子湯
水解散	四聖散	紫草廻班散
紫草木通散	人參蟬蛻散	紫草散
絲瓜湯 <small>俱本</small>	犀角地黃湯 <small>血</small>	升麻葛根湯 <small>補</small>
升麻黃芩湯	麻黃黃芩湯 <small>傷寒</small>	
黑陷倒靨		
紫草散	回生散	麻黃湯
猪尾膏	龍腦膏子	四毒散
百祥丸	生李膏	無比散
箬葉散 <small>俱本</small>		
發熱		
連翹散	梔子金花丸	三黃丸
宣風散	通膈丸 <small>俱本</small>	四聖散

紫草木通散 <small>俱出</small>	寒熱	太和散 <small>條本</small>	渴	六味人參麥冬飲 <small>條本</small>	渴瀉	十一味木香散 <small>條本</small>	瀉不渴	七味荳蔻散 <small>條本</small>	痘喘	杏甘湯	宜風散 <small>熱痘</small>	大便秘	當歸丸	痘入目	蟬蛻散	撥雲散	蛤粉散 <small>俱本</small>	羊肝散 <small>下麥</small>	咽痛	如聖餅子	甘露飲子	消毒散 <small>俱出</small>	痲搖	括蔓湯
				七味人參白木散						人參清膈散	前胡枳殼湯 <small>俱本</small>		棗變百祥丸	洗心散 <small>俱本</small>	地黃散	蜜蒙花散	黃柏膏 <small>痘通</small>	調肝散 <small>痘</small>		甘草桔梗升麻湯	地黃丸 <small>俱本</small>	鼠粘子湯		溫驚丸 <small>俱驚</small>

痘瘡痛	五物木香散 <small>條本</small>	膿而不痂	雄黃散	痘後瘡癩	連翹散 <small>條本</small>	痘癰	木香散 <small>條本</small>	中惡	龍腦膏 <small>痘黑</small>	容忤	真珠散 <small>條本</small>	卷之三十八	脾主濕	泄瀉	水腫	宿食	脾弱多困	腹痛	滯頤	吐瀉	白附丸	和胃丸	錢氏異功散	白餅子 <small>毒</small>
			綿薑散								小兒部		吐瀉	乳食不化	疳	疔	渴	鵝口	臍風囁口	吐	玉露散 <small>一名甘</small>	金液丹	溫中丸	益黃散 <small>虛實</small>
			減癩藥 <small>俱本</small>										吐	赤白痢	疳疔	疔	大小便秘	口瘡 <small>見心</small>		吐水吐虫	和中散	荳蔻散	半粟散 <small>俱本</small>	開胃丸 <small>補</small>



萬安膏 <small>二</small>	朱沉丹	定吐紫金核
香銀丸	白木散	養香散
門冬飲	清膈飲子	鐵粉丸
二氣散 <small>俱本</small>		
泄瀉		
萬安膏 <small>吐</small>	蘇合香丸 <small>中</small>	平胃散 <small>大人</small>
四君子丸 <small>痲</small>		
赤白痢		
白附香連丸	荳蔻香連丸	木香丸
小香連丸	黃栢丸	醱乳法
黃連加減例 <small>俱本</small>		
腹脹		
塌氣丸	調中丸	阿魏丸
小阿魏丸	肥兒丸	六神丸
十全丹	中滿分消丸	消痞丸
升陽滋血湯	麻黃升麻湯 <small>俱本</small>	白餅子 <small>痲</small>
解毒丸 <small>痲</small>	大黃丸 <small>小兒</small>	紫霜丸 <small>痲</small>
痲		
史君子丸	厚腸丸	芎朴丸
大蘆薈丸	胡黃連麝香丸	榆仁丸
沒石子丸	紅鉛散	乳香丸
蘭香散	龍骨散	白粉散
五福化毒丹	胡黃連丸	木香丸
如聖丸	麝香丸	睡驚丸
驚甲散 <small>方</small>	猪肚丸	龍膽丸
烏犀丸	化虫丸	大胡黃連丸

大蕪蕪湯	龍粉丸	三稜散
黃龍丸	膽礬丸	肥兒丸
蘆薈丸	五疳保童丸	生筋散 <small>俱本</small>
涼驚丸 <small>痲</small>	安神丸 <small>法</small>	二丁丸 <small>痲</small>
進食丸 <small>痲</small>		
疳虛羸		
蘆薈丸	露星膏	橘連丸
二聖丸 <small>俱本</small>	木香丸	胡黃連丸 <small>並</small>
宿食		
消乳丸	七聖丸 <small>俱本</small>	
痲		
甘遂散 <small>俱本</small>	枳朮丸 <small>俱本</small>	枳實理中丸 <small>俱本</small>
痲		
白餅子	進食丸	雙聖丸
珍珠丸	消積丸	丁香化癖散
二丁丸	紫霜丸 <small>俱本</small>	
渴		
白木散 <small>消</small>		
大小便不通	郁李仁丸 <small>俱本</small>	
黃疸		
加減瀉黃散	梔子栢皮湯	犀角散
連翹赤小豆湯	消食丸	茯苓滲濕湯
瓜薑散 <small>俱本</small>	茵陳湯 <small>傷寒</small>	五苓散 <small>陽明</small>
益黃散 <small>法</small>	史君子丸 <small>痲</small>	調中丸 <small>痲</small>
人參白木散 <small>消</small>		

第一〇〇〇冊 續修四庫全書第 4 版反內

腹痛

釣藤膏

魏香散

蒜乳丸

調中丸

當歸丸

三稜散

安虫散

安虫丸

蘇美散俱本

三黃丸法實

消積丸

白餅子俱本

白朮散法實

滯頤

溫脾丹條本

清心導痰丸舌燥

便下

撮口膈風

栢墨散條本

卷之三十九

小兒部

肺主燥

咳嗽

嗽膿血

喘

馬脾風

悲哭

夜啼

疳

鼻

龜胸

龜背

脫肛

脫肛癢

腎主虛寒

解頤

頤填

行遲齒遲髮遲

停耳

呵欠

繼病

額黑唇青

雜病寒熱

瘡

繼病

五硬五軟

咳嗽

葶藶丸

人參荊芥散

麻黃湯

福銀丸

百部丸

紫蘇子散

黃芪湯

塗唇膏俱本

瀉白散

補肺阿膠散俱本

百祥丸法實

白餅子俱本

白附丸吐瀉

嗽膿血

甘桔散條本

喘

萬金丹小兒

馬脾風

牛黃奪命散

無價散俱本

悲哭

龍齒散條本

夜啼

五味子散

燈花散俱本

蒜乳丸

疳

當歸丸俱本

蒲黃散舌

牡蠣散口

鼻

通關散條本

脫肛

五倍子散

赤石脂散

水聖散俱本

解頤

天南星散

三辛散俱本

補腎地黃丸條本

行遲齒遲髮遲

五加皮散

羚羊角丸

芫黃散

停耳

香薷散俱本

紅玉散

湯氏龍黃散俱本

額黑唇青

補陽湯條本

雜病寒熱

平胃散大人

進食丸條本



症

萬金丹

草菓飲

露星散

小柴胡湯

青皮湯

養胃湯

鬼哭散

驚甲飲子

大腹皮湯

四獸散

截瘡丹俱本條

繼病

龍膽湯條本

卷之四十

運氣部

運氣總論

南北政

六節盛衰

盛衰正變

歲步終始

升降交接

勝復盈虛

運氣應人

藥應陰陽

歲味歲殺

逆從反佐

內外調治

治先歲氣

約方

氣至太過不及占

應時應化占

動亂辨法占

八十一

三十一

地理占

正變淫勝勝復占

釋九

釋病機

醫學綱目目錄

醫學綱目卷之一

陰陽臟腑部

陰陽

榮衛

蓋陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之

本始神明之府也治病必求於本積陽為大積陰為地陰

靜陽躁陽生陰長陽殺陰藏陽化氣陰成形陰陽應

清陽為天濁陰為地地氣上為雲天氣下為雨雨出地氣

雲出天氣故清陽出上竅濁陰出下竅清陽發騰理濁陰

走五臟清陽實四肢濁陰歸六腑水為陰火為陽陽為氣

陰為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化

生精氣生形味傷形氣傷精精化為氣氣傷於味陰味出

下竅陽氣出上竅同

天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心時上使

五色修明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養

八十一

十一

五氣氣和而生津液相成神乃自生六腑藏

榮衛

靈人受氣於穀穀入於胃以傳與肺五臟六腑皆以受氣

其清者為榮濁者為衛榮在脈中衛在脈外榮周不休五

十而後大會陰陽相貫如環無端榮衛生 ○其浮氣之不

循經者為衛氣其精氣之行于經者為榮氣衛氣

素榮者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於六腑乃能入

於脈也故循脈上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣

也其氣慄疾滑利不能入於脈也故循皮膚之中分肉之

間薰於百膜散於胸腹肺

榮衛

靈五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積

於胃中出於喉嚨以貫心脈而行呼吸焉榮氣者心其津

液注之於脈化以爲血以榮四末內注五臟六腑以應刻

數焉衛氣者出其悍氣之慄疾而先行於四末分肉皮膚

之間

之間



之閒而不休者也晝行於陽夜行於陰常從足少陰之分

間行於五臟六腑邪客

帝曰榮衛之行奈何岐伯曰穀始入於胃其精微者先出

於胃之兩焦以溉五臟別出兩行榮衛之道其大氣之搏

而不行者積於胃中名曰氣海出於肺循喉咽故呼則出

吸則入天地之精氣其大數常出三入一故穀不入半月

則氣衰一日則氣少矣五味

丹溪天地屬金說 邵子曰天依地地附天天地自相扶

附內經曰大氣舉地夫自清濁肇分天以氣運於外而攝

水地以形居於中而浮於水者也是氣也即天之謂也自

其無極者觀之故曰大氣至清至剛至健屬乎金者也非

至剛不能攝其水非至健不能運行不息以舉地之重非

至清其剛健不能長久上古而不老或曰子以天氣為屬

金固周易乾卦取象之義何至遂以屬金言之乎善言天

者必有證於人善言大者必取譬於小願明以告我曰天

生萬物人為貴人形象天可以取譬肺主氣外應皮毛內

經謂陽為外衛非皮毛乎此天之象也其包裹骨肉臟

腑於其中此地之象也血行於皮裏肉腠晝夜周流無端

此水之象也合三者而觀非水浮地天攝水地懸於中乎

聖人作易取金為天氣之象厥有旨焉

劉河間說脈者血氣之先斯論得之矣人身之脈血氣之

所為而不知所以周流不息者正乾道乾乾之意也亦猶

理之寓乎氣所以為血氣之先先之一字厥有旨焉

靈黃帝曰願聞衛氣之行出入之合何如伯高曰歲有十

二月日有十二辰子午為經卯酉為緯周天二十八宿而

一面七星四七二十八宿房昂為緯虛張為經是故房至

畢為陽昂至尾為陰陽主晝陰主夜故衛氣之行一日一

夜五十周於身晝日行於陽二十五周夜行於陰二十五

周周行五臟是故平旦陰盡陽氣出於目目張則氣上行

於頭循項下足太陽循背下至小指之端其散者別於目

銳眇下手太陽下至手小指之間外側其散者別於目銳

眇下足少陽注小指次指之間以上以上二指其散者

循手少陽之分側下至小指之間別者以上二指其散者

耳前合於頰脈注足陽明以下行至肘上入五指之間其

散者從耳下下手陽明入於大指之間入掌中其至於足

也入足心出內踝下作踵行陰分復合於目故為一周是

故日行一舍人氣行於身一周與十分身之八日行二舍

人氣行三周於身與十分身之六日行三舍人氣行於身

五周與十分身之四日行四舍人氣行於身七周與十分

身之二日行五舍人氣行於身九周日行六舍人氣行於

身十周與十分身之八日行七舍人氣行於身十二周在

身術文也與十分身之六日行十四舍人氣二十五周

於身有奇分與十分身之四陽蓋於陰陰受氣矣其始入

於陰常從足少陰注於腎腎注於心心注於肺肺注於肝

肝注於脾脾復注於腎為周是故夜行一舍人氣行於陰

臟一周與十分身之八亦如行陽之二十五周而復合於

目陰陽一日一夜合有奇分十分身之四與十分身之二

是故人之所以臥起之時有早晏者奇分之不盡故也氣

右衛氣之行晝行陽則目張而寢夜行陰則目瞑而寐

謹按此節言平旦陽氣之出目而下行於手足三陽也

皆一時分道並注非有先後次第也此經篇末言水下

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

衛法天  
之滯地

衛行脈  
外五十







骨之前廉上出於柱骨之會上下入缺盆絡脈下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔

足陽明

胃足陽明之脈起於鼻之交頰中旁約太陽之脈下循鼻

外入上齒中還出挾口環唇下交承漿却循頰後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙其支者從

大迎前下入迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中其支者起於胃口下循

腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兔下膝膕中

下循脛外廉下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

下足跗

循小指之內出其端

手太陽小腸之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端

循手太陽之脈起於小指之端



兩骨之間兩骨之間上腕三寸支溝穴也上貫肘天井循膈外上肩而交出足少陽之後入缺盆布膈中散絡心包下膈循僂三焦其支者從膈中上出缺盆上項繫耳後直上出耳上角以屈下頰至頰頰也其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳眦

足少陽膽足少陽之脈起於目銳眦上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眦後其支者別銳眦下大迎合手少陽抵於頰下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胃過季脇下合髀厭中齊氏云腋下腹以下循髀厭出膝外應下外輔骨之前外輔骨之前膝之下直下抵絕骨之端陽輔也下出外踝之前立處也循足跗

上入小指次指之間小指次指之間本節前腕中溪溪穴也其支者別跗上入大指之間循大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛

足厥陰肝足厥陰之脈起於大指叢毛之際大敦也上循足跗上廉足跗上廉大指間中太衝穴也去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後中封穴也上膈內廉曲臑循股陰入毛中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頰頰連目系上出額與督脈會於巔其支者從目系下頰頰環唇內其支者復從肝別貫膈上注肺經脈右榮氣之行自手太陰始足至厥陰終一周於身也詳其一周於身外至身體四肢內至五臟六腑無不同通故其五十周無晝夜陰陽之殊衛氣之行則不然晝則周陽於身體四肢之外不入五臟六腑之內夜則周陰

於五臟六腑之內不出身體四肢之外故必五十周至平旦方與榮大會於肺手太陰也

黃帝曰脈行之逆順奈何岐伯曰手之三陰從臟走手手太陰從中焦注大指次指少陰從心中注手中指手厥陰從胃中注手小指次指此手三陰從臟走手也手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹

脈度黃帝曰願聞脈度岐伯曰手之六陽從手至頭長五尺五六三寸之六陰從手至臂中三尺五寸三六一丈八尺四丈八尺足之六陰從足至臂中六尺五寸六六三丈六尺五六三尺合三丈九尺躡脈從足至目七尺五寸二丈四尺二五一尺合一丈五尺督脈任脈各四尺五二四八尺二五一尺合九尺凡都合一十六丈二尺此氣

之大經隧也脈度

督脈者起於小腹以下骨中央女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合纂間繞後別統督至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎與太陽起於目內眦上額交巔上入絡腦還出別下循肩膊內挾脊抵腰中入循脊絡腎必有脫節否則古此衍文也其男子循莖下至纂與女子等其少腹直上者貫膈中央上貫心入喉上頰環唇上繫兩目之下中央骨空右督脈始終行身之後東垣云督脈者出於會陰穴即經文根於長強穴上行脊裏至於巔附足太陽膀胱之脈膀胱者諸陽之首兼榮衛之氣係焉督脈為附督者都能為表裏上下十二經之病焉王註云自其少腹直上至兩目之下中央指任脈之行而言是督脈



所係由此言之則任脉督脉衝脉名異而同一體也謂  
之任脉者女子得之任養也謂之衝脉者以其上氣衝  
也謂之督脉者以其督領諸脉也

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉  
上頤循面入目

右任脉始終行身之前東垣云任脉起於會陰根於曲  
骨入前陰中出腹裏過臍上行附足厥陰之經為生化  
之元也貫穿諸經無所不係焉

衝脉者起於氣街並少陰之經挾臍上行至胃中而散

靈衝脉任脉皆起於胞中上循背裏為經絡之海其浮而  
外者循腹右上行會於咽喉別而絡唇口

入醫學綱目卷一

十一

為二道起於會陰根於氣街為二道入腹中央俠臍兩  
傍上行附足陽明之脉至胃中而散一說上至腦耳上  
角下至足內踝絡跗上若指如引繩之狀上下動之若  
一貫諸經之脉無所不到以其從胃脉故也十二經之  
海也旺為生化升降之主

醫脉黃帝曰躡脉安起安止何氣何榮岐伯答曰躡脉者少陰  
之別起於然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰上循  
胃裏入缺盆上出人迎之前入頤屬目內眥合於太陽陽  
蹻而上行氣并相還則為滯且氣不榮則目不合黃帝曰  
氣獨行五臟不榮六腑何也岐伯答曰氣之不得無行也  
如水之流如日月之行不休故陰脉榮其臟陽脉榮其腑  
如環之無端莫知其紀終而復始其流溢之氣內溉臟腑  
外濡腠理黃帝曰躡脉有陰陽何脉當其數岐伯答曰男

子數其陽女子數其陰當數者為經其不當數者為絡也  
脈度論○頤音他

右躡脉始終獨言陰蹻而不及陽蹻者有脫簡也當數  
謂當脉度一十六丈二尺之數也男子以陽蹻當其數  
女子以陰蹻當其數

八奇

難經脉有奇經八脉者不拘有十二經何也然有陽維有  
陰維有陽蹻有陰蹻有督有任有帶之脉凡此八脉  
者皆不拘於經故曰奇經八脉也經有十二絡有十五凡  
二十七氣相隨上下何獨不拘於經也然聖人圖說溝渠  
通利水道以備不然天雨降下溝渠溢滿當此之時露霈  
妄行聖人不能復圖也此絡脉滿溢諸經不能復拘也

入醫學綱目卷一

十一

脉者起於中極之下以上至毛際循腹裏上關元至咽喉  
衝脉者起於氣街並足陽明之經挾臍上行至胃中而散  
也帶脉者起於季脇迴身一周陽蹻脉者起於跟中循外  
踝上行入風池陰蹻脉者亦起於跟中循內踝上行至咽  
喉交貫衝脉陽維陰維者維絡於身溢蓄不能環流灌溉  
諸經者也故陽維起於諸陽會也陰維起於諸陰交也比  
於聖人圖設溝渠溝渠滿溢流於深湖故聖人不能拘通  
也而人脉隆盛入於八脉而不環周故十二經亦不能拘  
之其受邪氣蓄則腫熱發射之也



分陽明之經挾臍左右各二寸氣衝又是陽明脈氣所發如此推之則衝脈自氣街起在陽明少陰二經之內挾臍上行其理明矣

靈黃帝曰經脈十二而手太陰足少陰陽明獨動不休何也岐伯曰足陽明胃脈也胃者五臟六腑之海其清氣上注於脈肺氣從太陰而行之其行也以息往來故人一呼吸再動一吸脈亦再動呼吸不已故動而不止黃帝曰氣之過於寸口也上十焉息下八焉伏何道從還不知其極岐伯曰氣之離臟也卒然如弓弩之發如水之下岸上於魚以反衰其餘氣衰散以逆上故其行微黃帝曰足之陽明何因而動岐伯曰胃氣上注於脈其悍氣上衝頭者循咽上走空竅循眼系入絡腦出頰下客主人循牙車合陽明并下人迎此胃氣別走於陽明者也故陰陽上下其動

也若一故陽病而陽脈小者為逆陰病而陰脈大者為逆故陰陽俱靜俱動若引繩相傾者病黃帝曰足少陰何因而動岐伯曰衝脈者十二經之海也與少陰之大絡起於腎下出於氣街循陰股內廉邪入膕中循脛骨內廉並少陰之經下入內踝之後入足下其別者邪入踝出屬跗上入大指之間注諸絡以溫足脛此脈之常動者也

陽脈人迎脈也陰脈寸口脈也經脈十二者伏行分肉之間深而不見其常見者足太陰過於外踝之上無所隱故也諸脈之浮而常見者皆絡脈也六經絡手陽明少陽之大絡起於五指間上合肘中飲酒者衛氣先行皮膚先克絡脈絡脈先感故衛氣已平榮氣乃滿而經脈大盛脈之卒然動者皆邪氣居之雷於本

末不動則熱不堅則陷且空不與衆同是以知其何脈之動也雷公曰何以知經脈之與絡脈異也黃帝曰經脈者常不可見也其虛實也以氣口知之脈之見者皆絡脈也雷公曰細子無以明其然也黃帝曰諸絡脈皆不能經大節之間必行絕道而出入復合於皮中其會皆見於外故諸刺絡脈者必刺其結上甚血者雖無結急取之以瀉其邪而出其血雷之發為痺也凡診絡脈脈色青則寒且痛赤則有熱胃中寒手魚際之絡多青矣胃中有熱魚際絡赤其暴黑者雷久痺也其有赤有黑有青者寒熱氣也其青短者少氣也凡刺寒熱者皆多血絡必問日而一取之血盡乃止乃調其虛實其小而短者少氣其者瀉之則悶悶甚則休不得言悶急坐之也

黃帝曰夫絡脈之見也其五色各異青黃赤白黑不同其故何也岐伯曰經有常色而絡無常變也帝曰經之常也何如岐伯曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脈之色也黃帝曰絡之陰陽亦應其經乎岐伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行也寒多則凝凝凝則青黑熱多則溼溼則黃赤皆常色也謂之無病五色具見者謂之寒熱帝曰善

靈經脈為裏支而橫者為絡絡之別者為孫孫而血者疾誅之盛者瀉之虛者飲藥以補之  
素目受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝  
許昌滑壽著十四經發揮經脈為曲絡脈為直經為榮氣絡為衛氣乃所以惑亂來學也謹按經云經脈十二伏行分肉之間深而不見諸脈浮而常見者皆絡脈



也又云諸絡脉不能經大節之間必行絕道而出入復合於皮又云當數者為經不當數者為絡今發揮謂手太陰脉其支從腕後出次指端交於手陽明者為手大陰絡手陽明脉其支從缺盆上挾口鼻交於足陽明者為手陽明絡凡十二經之支脉伏行分肉者皆釋為絡脉則是絡脉亦伏行分肉之間而不浮見亦能經大節而不行絕道亦當經脉一十六丈二尺內之數而非不當數也又按經云足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下耳後未嘗言其脉有曲折也今發揮謂足少陽脉起目銳眥作三折從目銳眥至完骨是一折又自完骨至睛明是一折自睛明至風池是一折則是內經以經脉之曲折朦朧者為直行也又按經云水穀入於胃也其氣分為三隧故宗氣積胃中出喉嚨而行呼吸焉榮氣

入腎經綱卷一 古

者心其津液注之於脉化以為血以榮四末內注五臟六腑以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慄疾而皆行於四末分肉皮膚之間而不休者也又云衛出於上焦常與榮俱盡行於陽二十五周夜行於陰二十五周故至平旦五十周復與榮氣大會於手太陰矣此言衛氣與榮氣相會未嘗及宗氣今發揮謂氣行一萬二千五百息脉行八百十丈適當時復會於手太陰則是將積於胃中呼吸與榮氣相會之宗氣率合作晝行陽夜行陰與榮五十周方會之衛氣也非外經義非孰甚焉陽者天氣也主外陰者地氣也主內故陽道實陰道虛陰在內陽之守也陽在外陰之使也陰者藏精而起亟也陽者衛外而固也天

陰者藏精而起亟也陽者衛外而固也

陰者藏精而起亟也陽者衛外而固也

外者筋骨為陰皮膚為陽壽天剛足太陽與少陰為表裏少陽與厥陰為表裏陽明與太陰為表裏是為足之陰陽也手太陽與少陰為表裏少陽與心主為表裏陽明與太陰為表裏是為手之陰陽也氣

脉度

曰先度其節骨之大小廣狹長短而脉度定矣黃帝曰願聞衆人之度人長七尺五寸者其骨節之大小長短各幾何伯高曰頭之大骨圍二尺六寸胸圍四尺五寸腰圍四尺二寸髮所覆者顛至項一尺二寸髮以下至顛長一尺君子終折結喉以下至缺盆中長四寸缺盆以下至髆骨長九寸過則肺大不滿則肺小髆骨以下至天樞長八寸過則胃大不及則胃小天樞以下至橫骨長六寸半過則

入腎經綱卷一

迴腸廣長不滿則狹短橫骨長六寸半橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半內輔下廉下至內踝長一尺三寸內踝以下至地長三寸膝圍以下至跗屬長一尺六寸跗屬以下至地長三寸故骨圍大則太過小則不及角以下至柱骨長一尺行腋中不見者長四寸腋以下至季脇長一尺二寸季脇以下至髀樞長六寸髀樞以下至膝中長一尺九寸膝以下至外踝長一尺六寸外踝以下至京骨長三寸京骨以下至地長一寸耳後當完骨者廣九寸耳前當耳門者廣一尺三寸兩額之間相去七寸兩乳之間廣九寸半兩髀之間廣六寸半足長一尺二寸廣四寸半肩至肘長一尺七寸肘至腕長一尺二寸半腕至中指本節長四寸本節至其末長四寸半項髮以下至背骨長二寸半脊骨以下至



尾髭二十一節長三尺上節長一寸四分之二奇分在下故上七節至於脊骨九寸八分之二此衆人骨之度也所以立經脈之長短也骨度篇云切

唇至齒長九分口廣二寸半齒以後至會厭深三寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二寸半咽門重十兩廣二寸半至胃長一尺六寸胃結曲屈伸之長二尺六寸大一尺五寸徑五寸大容二斗五升小腸後附脊左環迴周疊積其注於迴腸者外附於臍上迴運環十六曲大一寸半徑八分之二少半長三丈三尺迴腸當臍左環迴周葉積而下迴運環反十六曲大四寸徑一寸之少半長二丈一尺廣脈傳脊以受迴腸左環葉脊上下辟大八寸徑二寸寸之太半長二尺八寸腸胃所入至所出長六丈四寸四分迴曲環反三十二曲也腸胃論

難七衝門何在然唇為飛門齒為戶門會厭為吸門胃為賁門太倉下口為幽門大腸小腸會為闌門下極為魄門故曰七衝門也四十一  
上下素腰以上為天腰以下為地  
三焦難上焦者在心下下膈在胃上口主內而不出其治在膻中玉堂下一寸六分直兩乳間陷者是 中焦者在胃中脘不上不下主腐熟水穀其治在臍下 下焦者在臍下當膀胱上口主分別清濁主出而不內以傳導也其治在臍下一寸三寸難

靈黃帝曰願聞榮衛之所行皆何道從來岐伯答曰榮出於中焦衛出於上焦黃帝曰願聞三焦之所出岐伯答曰上焦出於胃上口並咽以上貫膈而布胃中走腋循太陽之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與榮俱行於

二十五度行於陰亦二十五度一周也故五十度而復大會於手太陽矣黃帝曰願聞中焦之所出岐伯答曰中焦亦並胃中出上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脈乃化而為血以奉生身莫貴於此故獨得行於經隧命曰榮氣黃帝曰夫血之與氣異名同類何謂也岐伯答曰榮衛者精氣也血者神氣也故血之與氣異名同類焉故奔血者無汗奪汗者無血故人生有兩死而無兩生黃帝曰願聞下焦之所出岐伯答曰下焦者別迴腸注於膀胱而滲入焉故水穀者常并居於胃中成糟粕而俱下於大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉黃帝曰善余聞上焦如霧中焦如漚下焦如瀆此之謂也榮衛論

焦者足太陽之別也又靈樞經云臍下膀胱至足為足三焦右手尺脈為命門與包絡脈同診此包絡亦有三焦之稱為命門之火游行於五臟之間主持乎內乎三焦主持乎上足三焦主持乎下上中下三焦通為一氣衛於一身為外護既云頭至心心至臍臍至足是有狀也呼為三焦是有名也以無狀可平經曰三焦者水穀之道路也却是其形狀何以然上焦者主內而不出中焦者主腐熟水穀下焦者主出而不內故經曰上焦如霧中焦如漚下焦如瀆也手經者主持上也足經者主持下也命門者主持內也為衛者主持外也三焦真氣為父氣散於包絡相從母也並行而不相離母之真氣也故俱會於胃中經云膻中之分父母居之氣之海也如天地之尊不係五行也清邪中於上焦名曰潔也頭項強腰脊痛濁邪中於下焦名







寒邪初傷客於肌表邪鬱而為熱有似燥  
喘喘靜則多言體若燔炭汗出而散  
短為拘弛長為痿  
張精絕碎積於夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽  
聽潰潰乎若壞都汨汨乎不可止  
清靜則視聽動作所振之精竭絕備於夏月而動  
則秋之呼吸為病俗人名曰注夏者是也或曰熱成云  
曰以耳目與口鼻對言則口鼻為陽耳目為陰以耳目口

鼻與臟腑對言則耳目口鼻為陽臟腑則陰故陽氣行於  
二十五度於身之外則耳目口鼻皆受陽氣所以能知  
覺視聽動作而經行陰二十五度於臟腑之內則耳目口  
鼻無陽氣運動所以不能知覺而覺明者豈非陽氣為  
之乎夫人之耳目口鼻皆天之賦也月之明也日之照也  
則陽氣之加無以受之而視聽之聰明耳目之知覺血  
則陰血之不能自施而聰明亦失是故耳目之聰明必  
能視聽也 陽氣者大怒則形氣絕而血苑於上使人游  
厥有傷於筋縱其若不容汗出偏沮使人偏枯汗出見濕  
乃生痲痺膏梁之變足生大疔受如持虛勞汗當風寒薄  
為鼓鬱乃痲 王註云鼓鬱也鼓曰粉刺陽氣者精則養神  
柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大痲榮氣不從逆於  
肉理乃生痲腫陷脈為癢雷連肉腠膈氣化薄傳為善畏  
及為驚駭 榮氣不從逆於肉理乃生痲腫十二字皆本元  
之為榮氣後榮氣逆而為痲腫失治後榮氣逆而為痲  
痲而陷雷連於肉妄言口搜力生切背背不能仰也  
汗未盡形弱而氣燂穴俞以閉發為風痲故風者百病之

八醫經綱卷一

辛

始也清淨則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此因時  
之序也故病久則傳化上下不并良醫弗為故陽蓄積病  
死而陽氣當隔隔者當瀉不亟正治倉乃敗之  
帝曰余知百病生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消  
恐則氣下寒則氣收是則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則  
氣結九氣不同何病之生岐伯曰怒則氣逆甚則嘔血及  
殞泄故氣上矣喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則  
心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣  
消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣  
不行矣寒則腠理閉氣不行故氣收矣是則腠理開榮衛  
通汗大泄故氣泄矣驚則心無所倚神無所歸慮無所定  
故氣亂矣勞則喘息汗出外內皆越故氣耗矣思則心有  
所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣

八醫經綱卷一

壬

飲食  
陰  
陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷  
陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味  
勞倦  
勞倦所傷論 調經篇云陰氣生內熱岐伯曰有所勞  
倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱  
氣薰胃中故內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘息汗出外  
內皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞倦皆損  
其氣衰則火旺火旺則乘脾土脾主四肢故困熱無氣以  
動懶於語言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜  
安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱火以酸味收其散氣  
以甘溫調其中氣經言勞者溫之損者溫之是也仲景云  
平人脈大為勞脈極虛亦為勞夫勞之為病其脈浮大平  
足煩熱春夏劇秋冬瘳脈大者熱邪也極虛者氣損也







神神在天為風在地為木在體為筋在臟為肝在色為蒼  
 在音為角在聲為呼在變動為握在竅為目在味為酸在  
 志為怒怒傷肝悲勝怒風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸  
 南方生熱熱生火火生苦苦心心生血血生脾心主舌  
 其在天為熱在地為火在體為脈在臟為心在色為赤在  
 音為徵在聲為笑在變動為憂在竅為舌在味為苦在心  
 為喜喜傷心恐勝喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣酸勝苦  
 中央生濕濕生土土生甘其生脾脾生肉肉生脈脾主口  
 其在天為濕在地為土在體為肉在臟為脾在色為黃在  
 音為宮在聲為歌在變動為噦在竅為口在味為甘在志  
 為思思傷脾怒勝思濕傷肉風勝濕其傷肉酸勝其  
 西方生燥燥生金金生辛辛生肺肺生皮毛皮毛生腎肺  
 主鼻在天為燥在地為金在體為皮毛在臟為肺在色為  
 白在音為商在聲為哭在變動為欬在竅為鼻在味為辛  
 在志為憂憂傷肺喜勝憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦  
 勝辛  
 北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎腎生骨髓骨髓生肝腎  
 主耳其在天為寒在地為水在體為骨在臟為腎在色為  
 黑在音為羽在聲為呻在變動為慄在竅為耳在味為鹹  
 在志為恐恐傷腎思勝恐寒傷血燥勝寒鹹傷血其勝鹹  
 天氣通於肺地氣通於嗔風氣通於肝雷氣通於心穀氣  
 通於脾雨氣通於腎六經為川勝胃為海九竅為水注之  
 氣以天地為之陰陽勝之汗以天地之雨名之陽之氣以  
 天地之疾風名之暴風象雷逆氣象陽故治不法天之紀  
 不用地之理則災害至矣陰陽論  
 靈肺合大腸大腸者傳道之府心合小腸小腸者受盛之

府肝合膽膽者中正之府脾合胃胃者五穀之府腎合  
 膀胱膀胱者津液之府少陽屬腎腎上連肺故將兩臟  
 者中瀆之府水道出焉屬膀胱是孤之府也是六府之所  
 與合者本論  
 五臟常內閱於上七竅也故肺氣通於鼻肺和則鼻能知  
 香臭矣心氣通於舌心和則舌能知五味矣肝氣通於目  
 肝和則目能辨五色矣脾氣通於口脾和則口能知五穀  
 矣腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣五臟不和則七竅  
 不通六腑不和則雷為癱瘓論  
 難肝主色心主臭脾主味肺主聲腎主液鼻者肺之候而  
 反知香臭耳者腎之候而反聞聲其意何也然肺者西方  
 金也金生於巳巳者南方火也火者心心主臭故令鼻知  
 香臭腎者北方水也水生於申申者西方金也金者肺主  
聲故令耳聞聲  
 素心之合脈也其榮色也其主腎也肺之合皮也其榮毛  
 也其主心也肝之合筋也其榮爪也其主肺也脾之合肉  
 也其榮唇也其主肝也腎之合骨也其榮髮也其主脾也  
五臟生 五臟所主心主脈肺主皮肝主筋脾主肉腎主  
成論 骨是謂五主宣明五 五臟化液心為汗肺為涕肝為淚  
 脾為涎腎為唾是為五液同 諸脉者皆屬於目諸髓者  
 皆屬於腦諸筋者皆屬於節諸血者皆屬於心諸氣者皆  
 屬於肺五臟生  
難經言八會者何也 府會太倉臟會季脇筋會陽陵泉髓  
 會絕骨血會膈膈會大杼脉會太淵氣會三焦外一筋  
 直兩乳內也熱病在內者取其會之氣穴也四十一  
五難 靈心者君主之官也神明出焉肺者相傳之官治節出焉



肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膽中者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣凡此十二官者不得相失也故主明則下安以此養生則壽歿世不殆以為天下則大昌主不明則十二官危使道閉塞不通形乃大傷以此養生則殃以為天下其宗大危戒之戒之靈蘭秘五臟所藏心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏志是謂五臟所藏宣明五五精所并精氣并於心則喜并於肺則悲并於肝則怒并於脾則畏并於腎則恐是謂五并虛而相并者也發當作思同上帝曰脾不主時何也岐伯曰脾者土也治中央常以四時

醫學綱目卷一  
五

長四歲各十八日寄治不得獨主於時也脾臟者常著胃土之精也土者生萬物而法天地故上下至頭足不得主時也大陰陽靈黃帝曰願聞穀氣有五味其入五臟分別奈何伯高曰胃者五臟六腑之海也水穀皆入於胃五臟六腑皆稟氣於胃五味各走其所喜穀味酸先走肝穀味苦先走心穀味甘先走脾穀味辛先走肺穀味鹹先走腎穀氣津液已行榮衛大通乃化糟粕以次傳下五人之所受氣者穀也穀之所注者胃也胃者水穀氣血之海也海之所行雲氣下者天也胃之所出氣血者經隧也經隧者五臟六腑之大絡也食氣入胃散精於肝淫氣於筋經食氣入胃濁氣歸心淫精於脉脉氣流經經氣歸於肺肺朝百脉輸精於皮毛毛脉合精行氣於府府精神明留於四臟

氣歸於樞衡樞衡以平氣口成寸以決死生 飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也同上

丹溪相火論 太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物故恒於動人有所生亦恒於動其所以常於動者皆相火助之也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣也其於人者寄於肝腎二部肝屬木而腎屬水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心包絡者腎之配三焦以焦言而下

醫學綱目卷一  
五

焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能有生天之火雖出於木水而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而為火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天也或曰相火天人之所同何東垣以為元氣之賊又曰火與元氣不兩立一勝則一負然則如之何而可使之無勝負乎曰周子言神發知矣五性感動而萬事出有知之後五者之性為物所感不能不動謂之動者即內經五火也相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測無時不有煎熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣內經以暑與熱言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈有甚於君火者也故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子亦曰必使道心常為一



身之主而人心每聽命焉。此善處乎火也。人心聽命道而能主之以靜。彼五火將寂然不作。而相火惟有裨補造化。以為生生不息之運用。爾何賊之有。或曰。內經相火。註言少陰少陽矣。未嘗言及厥陰太陽。而吾子言之。何也。曰。足太陽少陰東垣嘗言之矣。治以炒柏取其味辛能瀉水中之火是也。戴人亦言膽與三焦尋火治肝和包絡俱無異。此歷指龍雷之火也。予亦備述天人之火皆生於動。如上文所云者。實推廣二公之意。或曰。內經言火不一。往往於六氣中見之。言臟腑者未之見也。二公豈自有所據邪。予能為我言之乎。經曰。百病皆生於風寒暑濕燥火之動。而為變者岐伯歷舉病機一十九條。而屬火者五。此非相火為病之出於臟腑者乎。攷諸內經。少陽病為瘕瘵。太陽病時眩仆。少陰病發瘕暴瘡。鬱冒不知人。非諸熱發瘕之屬火者乎。少陽病惡寒鼓慄。膽病振寒。少陰病瀝。浙惡寒振慄。厥陰病瀝。浙振寒。非諸振鼓慄如喪神守之屬火者乎。少陽病嘔逆。厥氣上行。膀胱病衝頭痛。太陽病厥氣上衝。胃少腹控。引腰脊。上衝心。少陰病氣上衝。胃嘔逆。非諸逆衝上之屬火者乎。少陽病譫妄。太陽病譫妄。膀胱病狂。顛疾。非諸燥狂越之屬火者乎。少陽病附腫。善驚。少陰病發熱。吐酸。附腫不能久立。非諸病附腫。發酸驚駭之屬火者乎。又原病式曰。諸風掉眩。屬於肝火之動也。諸氣憤鬱。病痿。屬於肺火之升也。諸濕腫滿。屬於脾火之勝也。諸痛痒癢癩。屬於心火之用也。是皆火之為病。出於臟腑者然也。注文未之發。爾以陳無擇之通達。且以暖熾論君火日用之火。言相火。而又不曾深及宜乎後人之不無聾瞽也。悲夫。

東垣胃虛則臟腑經絡俱病論。針經本輸曰。手陽明大腸之穴在巨虛。上廉。此二穴皆在足陽明胃二里穴下也。大腸主津。小腸主液。大腸小腸受胃之榮氣。乃能行津液於上焦。澆灌皮毛。充實腠理。若飲食不節。胃氣不及。大腸小腸無所稟受。故津液涸竭焉。內經曰。耳鳴耳聾。九竅不利。腸胃之所生也。此胃弱不能滋養。手太陽小腸手陽明大腸故有此證。然亦止從胃弱而得之。故聖人混言腸胃之所生也。或曰。子謂混言腸胃所生。亦有據乎。予應之曰。經云。脾不及。令人九竅不通。謂脾為至陰。受胃之陽氣。能上升水穀之氣於肺。充溢皮毛。散入四臟。今脾無所稟。不能行氣於臟腑。故有此症。此則脾虛九竅不通之謂也。雖曰脾虛。亦胃之不足所致耳。或曰。經云。五臟不利。則九竅不通。此不言脾不言腸而言五臟何也。予曰。此說與上二說無以異也。蓋謂脾不受胃之稟命。致五臟所主九竅不能上通天氣。皆閉塞不利。故以五臟言之。此三者止是胃虛所致耳。然亦何止於此。胃虛則五臟六腑十二經十五絡四肢皆不得榮運之氣。而百病生焉。豈一端盡之乎。真氣又名元氣。乃先身生之精氣也。非胃氣不能滋之。胃氣者穀氣也。榮氣也。運氣也。生氣也。清氣也。衛氣也。陽氣也。又天氣人氣地氣乃三焦之氣分而言之。則異其實。一也不當作異名異論而觀之。飲食勞役所傷。自汗小便數。陰火乘土位。清氣不生。陽道不行。乃陰血伏火。况陽明胃土右燥左熱。故化燥火而津液不能停。且小便與汗皆亡。津液津液至中官。變化為血者也。血者脈之腑也。血亡則七神何依。百脈皆從此中變來也。人之百病莫大於中風。



有汗則風邪客之無汗則陽氣固密腠理閉拒諸邪不能傷也或曰經云陽不勝其陰則五臟氣爭九竅不通又脾不及則令人九竅不通名曰重強又五臟不和則九竅不通又頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也請析而解之谷曰夫脾者陰土也至陰之氣主靜而不動胃者陽土也主動而不息陽氣在於地下乃能生化萬物故五運在上六氣在下其脾長一尺掩太倉太倉者胃之上口也脾受胃稟乃能薰蒸腐熟五穀者也胃者十二經之源水穀之海也平則萬化安病則萬化危五臟之氣上通九竅五臟稟受氣於六腑六腑受氣於胃六腑者在天為風寒燥濕暑火此無形之氣也胃氣和平榮氣上升始主濕熱濕熱者春夏也行陽二十五度六陽升散之極下而生陰陰降則下行為秋冬行陰道為寒涼也胃既受病不能滋養故六

八醫經綱目卷一

手

腑之氣絕以致陽道不行陰火上行五臟之氣各受一腑之化乃能滋養皮膚血脈筋骨故言五臟之氣已絕於外是六腑生氣先絕五臟無所稟受而氣後絕矣肺本收下又主五氣氣絕則下流與脾土壅於下焦故曰壅強胃氣既病則下瀦經曰濕從下受之脾為至陰本乎地也有形之土下填九竅之源使不能上通於天故五臟不和則九竅不通胃者行清氣而上即地之陽氣也清陽成天口清陽出上竅曰清陽實四肢曰清陽發腠理者也脾胃既為陰火所乘氣閉塞而下流即清氣不升九竅為之不利胃之一腑病則十二經元氣皆不足也氣少則津液不行津液不行則血虧故筋骨皮肉血脈皆弱是氣血俱羸弱矣勞役動作飲食飢飽可不慎乎凡有此病者雖不變易他疾已損其天年更加之針灸用藥差悞欲不夭枉得乎

陽不密則外邪入五臟凡陰陽之要陽密乃固兩者不和若春無秋若冬無夏因而和之是謂聖度故陽強不能密陰氣乃絕陰平陽秘精神乃治陰陽離缺精氣乃絕因於露風乃生寒熱是以春傷於風邪氣留連乃為洞泄夏傷於暑秋為痰瘧秋傷於濕上逆而致發為痿厥冬傷於寒春必溫病四時之氣更傷五臟生氣通天論

黃帝問曰天有八風經有五風何謂岐伯對曰八風發邪以為經風觸五臟邪氣發病所謂得四時之勝者春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春所謂四時之勝也東風生於春病在肝肺在頸項南風生於夏病在心肺在胃脇西風生於秋病在脾肺在肩背北風生於冬病在腎肺在腰股中央為土病在脾肺在春故春氣者病在頭夏氣者病在脈秋氣者病在肩背冬氣者病在四肢故春善病

八醫經綱目卷一

手

軌軋仲夏善病胃腸長夏善病洞泄寒中秋善病風瘧冬善病痺厥故冬不按蹻春不軌軋春不病頸項仲夏不病胃腸長夏不病洞泄寒中秋不病風瘧冬不病痺厥痰泄而汗出也夫精者身之本也故藏於精者春不病溫金匱論○按蹻二字非所文其上必有脫簡蓋即冬不藏精者春必溫病之義也

五勞傷

五勞所傷久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋是謂五勞所傷宣明五多食酸則脈凝泣而變色

多食苦則皮槁而毛拔多食辛則筋急而爪枯多食酸則肉胝爛而脣揭多食其則骨痛而髮落此五味之所傷也

成篇

酸黃帝曰酸走筋多食之令人癰何也少俞曰酸入於胃其氣溢以收上之兩焦不能出入也不出即留於胃中胃中和溫則下注膀胱膀胱之胞薄以懦得酸則縮絀約而



不通水道不行故癢陰者精筋之所終也故酸入而走筋矣。黃帝曰：鹹走血多食之令人渴何也？少俞曰：鹹入於胃其氣上走中焦注於脈則血氣走之血與鹹相得則凝。凝則胃中汁注之注之則胃中竭竭則咽路焦故舌本乾而善渴血脈者中焦之道也故酸入而走血矣。黃帝曰：辛走氣多食之令人洞心何也？少俞曰：辛入於胃其氣走於上焦上焦者受氣而榮諸陽者也。辛之氣薰之榮衛之氣不時受之久留心下故洞心。辛與氣俱行故辛入而與汗俱出。黃帝曰：苦走骨多食之令人變嘔何也？少俞曰：苦入於胃五穀之氣皆不能勝苦苦入下脘三焦之道皆閉而不通故變嘔。齒者骨之所終也故苦入而走骨故入而復出知其走骨也。黃帝曰：甘走肉多食之令人惋心何也？少俞曰：甘入於胃其氣弱不能上至於上焦而

入腎學綱卷一

三

與穀留於胃中者令人柔潤者也胃柔則緩緩則虫動動則令人惋心其氣外通於肉故甘走肉。五味  
天邪者 天之邪氣感則害人五臟水穀之寒熱感則害人六腑。地之濕氣感則害人皮肉筋脉。陰陽應 犯賊風虛邪者陽受之食飲不節起居不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五臟入六腑則身熱不時臥上為喘呼入五臟則填滿閉塞下為飧泄久為腸癰。大陰陽  
陽邪從 陽邪從頭而入也奈何岐伯答曰：邪氣之中人，高下也。黃帝曰：高下有度乎？岐伯曰：身半已上者邪中之也，身半已下者濕中之也。故曰：邪之中人也無常中，于陰則濡于府，于陽則濡於經。黃帝曰：陰之與陽也，異名同類，上下相會，經絡之相貫如環無端，邪之中人或中於陰，或中於陽，上下左右無有恒常，其故何也？岐伯曰：諸陽之

會皆在於面中人也。方乘虛時及新用力若飲食汗出腠理開而中於邪，中於面則下陽明，中於項則下太陽，中於頰則下少陽，其中於膺背兩脇亦中其經。黃帝曰：其中於陰奈何？岐伯曰：中於陰者常從臂肘始，夫臂與肘其陰皮薄其血淖澤故俱受於風，獨傷其陰。黃帝曰：此故傷其臟乎？岐伯曰：身之中於風也，不必動臟，故邪入於陰經則臟氣實，邪氣入而不能容，故還之於腑。故中陽則瀆於經，中陰則瀆於腑。黃帝曰：邪之中人，臟奈何？岐伯曰：愁憂恐懼則傷心，形寒飲冷則傷肺，以其兩寒相感中外皆傷，故氣逆而上行有所墜墜惡血留內有所大怒，氣上而不下積於脇下則傷肝，有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾，有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎。黃帝曰：五臟之中風奈何？岐伯曰：陰陽俱感邪乃得往，邪氣勝則黃

入腎學綱卷一

三

帝曰：有一脈生數十病者，或痛或癢或熱或寒或痺或痺或不仁，變化無窮，其故何也？岐伯曰：此皆邪氣之所生也。帝曰：余聞氣者有其氣，有正氣，有邪氣，何謂真氣？岐伯曰：真氣者所受於天，與穀氣并而克身也。正氣者正風也，從一方來非實風，又非虛風也。邪氣者虛風之賊傷人也，其中人也深不能自去，正風者其中人也淺合而自去，其氣來柔弱不能勝真氣，故自去。虛邪之中人也灑淅動形起毫毛而發，腠理其入深內搏於骨則為骨痺，搏於筋則為筋攣，搏於脈中則為血閉不通，則為癰痺，搏於肉與衛氣相搏，陽勝者則為熱，陰勝者則為寒，寒則真氣去，去則虛虛則寒，搏於皮膚之間其氣外發，腠理開毫毛搖，氣行來行則為痺，留而不去則為痺，衛氣不行則為不仁。刺節真  
醫學綱目卷之一



醫學綱目卷之二

陰陽臟腑部

諸脈診病雜法

診經言望而知之謂之神聞而知之謂之聖問而知之者謂之工切脈而知之者謂之巧何謂也望而知之者望見其五色以知其病聞而知之者聞其五音以別其病問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也切脈而知之者診其寸口視其虛實以知其病在何臟腑也經言以外知之曰聖以內知之曰神此之謂也

診法當以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未感絡脈調勻氣脈未亂故乃可診有過之脈切脈動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六腑強弱形之衰盛以此參伍災死生之分脈要精

望經曰診脈之道觀人勇怯肌肉皮膚能知其情以為法也

也凡人形長不及短大不及小肥不及瘦人之色白不及黑嫩不及蒼薄不及厚而况肥人濕多瘦人火多白者肺氣虛黑者腎氣足形色既殊臟腑亦異外證雖同治法迥別所以肥人青脈浮瘦人黃脈沉躁人青脈緩緩人黃脈躁不可一察觀之

仲景云肥人當沉今反浮瘦人當浮今反沉故責之聞善診者察色按脈先別陰陽審清濁而知部分視喘息聽音聲而知所苦觀權衡規矩而知病所主按尺寸觀浮沉滑澁而知病所生以治無過以診則不失陰陽應象論

問閉戶塞牖繫之病者數問其情以從其意得神者昌失神者亡移精變氣論必審問其所始病與今之所方病而後各切切循其脈視其經絡浮沉以上下逆從循之三部九候論凡未診病者必問嗜食後賤雖不中邪病從内生名曰脫榮

醫富後貧名曰失精五氣留連病有所并醫工診之不在臟腑不變軀形診之而疑不知病名身體日減氣虛無精病深無氣瀝灑然時驚病深者以其外耗於衛內奪於榮良工所失不知病情論五

百病晝則增劇夜則安靜是陽病有餘乃氣病而血不病也晝則增劇晝則安靜是陰病有餘乃血病而氣不病也晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也晝則安靜夜則發熱燥是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室晝則發熱煩燥夜亦發熱煩燥是重陽無陰當亟瀉其陽峻補其陰夜則惡寒晝則安靜是陰血自旺於陰分也夜則惡寒晝則惡寒是重陰無陽當急瀉其陰峻補其陽晝則惡寒夜則煩躁飲食不入名曰陰陽交錯者死矣

肺主氣其脈居右寸脾胃命門三焦各以氣為變化運用故皆附焉心主血其脈居左寸肝膽腎膀胱皆精血之隧道竅庫故皆附焉男以氣成胎則氣為之主女挾血成胎則血為之主男子病右脈充於左者有胃氣也病雖重可治女子病左脈充於右者有胃氣也病雖重可治反此者虛之甚也

脈有陰陽知陽者知陰知陰者知陽凡陽有五五二陰有五五二陰在左手所謂一也別於陽者知病忌時別於陰者知死生之期陰陽別論○主註曰頭謂人迎脈在手魚際之後一寸兩者相應俱性俱來者引別於陽者知病

陰者知死生之期陰陽別論○主註曰頭謂人迎脈在手魚際之後一寸兩者相應俱性俱來者引別於陽者知病



從來別於陰者知死生之期王機真  
氣口候陰人迎候陽四時  
謹熟陰陽無與衆謀所謂陰陽者去者為陰至者為陽

靜者為陰動者為陽遲者為陰數者為陽別論

諸浮不躁者皆在陽則為熱其有躁者在手但浮不躁則

在手陽脈之中諸細而沉者皆在陰則為骨痛其有

靜者在足諸浮而沉者皆在陰則為骨痛其有

浮脈按之不足舉之有餘沉脈舉之不足按之有

餘遲脈呼吸三至去來極遲數脈去來促急七

虛脈遲大而軟按之不足指下豁豁然空實脈大而

長微強按之隱指幅幅然一日舉緩脈去來亦遲小

於遲一日軟緊脈數如切繩狀一日如轉洪脈極大

在指下細脈小甚似無而有滑脈往來前却流利展

轉替替然與數相似一日澆虛如欲脫○仲景云翁奄沉

故名曰滑許學士云仲景此三字論滑脈是也翁奄也

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

謂而後合也淹沉言忽降而下也方俞而合依律而下

右陰陽相反脈狀者以王氏經文之脈形狀移置如陳  
氏三因云脈偶也蓋浮沉相反浮主表沉主裏陽沉主裏  
病屬陰也遲數相反遲主寒疾并病及陽氣虛數主熱并  
病及血虛也虛實相反虛主血氣虛實主血氣實也洪  
細相反洪主血氣多細主血氣少也滑濇相反滑主血  
實氣虛濇主氣實血虛也緩緊相反緩主緩縱寒主緊  
縮也強革與濡弱相反強革主虛寒濡弱主虛熱與緩  
緊同法推也結促相反結主陰盛促主陽盛也浮數實  
緊洪滑強革散屬陽沉遲虛緩細濇軟弱結微動伏  
代屬陰後賢因別陽脈為七表陰脈為八裏也

浮與沉相類 弦與緊相類 滑與數相類

革與實相類 沉與伏相類 微與濇相類

軟與弱相類 緩與遲相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類

陽相類 陰相類



狀奇

寸脈俱平一作直上直下此為衝脈中有寒也  
青經之為病何如然陽維維於陽陰維維於陰陰維  
能自相維則依然失志落落不能自收持陰陽維  
而陰急陽蹇為病陰緩而陽急衝之為病逆氣而裏急督  
之為病春強而厥素問作青任之為病其內苦結男子為  
七疝女子為癥聚帶之為病腹滿腰疼若坐水中陽維  
為病苦寒熱陰維為病苦心痛此奇經八脈之為病也

陽滯於陰陰滯於陽論○精要云陽滯於陰脈浮洪弦  
數陰滯於陽脈沉細弱瀉陽滯以寒治之陰滯以熱治之  
竊詳其意陽滯陰滯當作熱滯寒滯求之寒熱固可作陰  
陽論能於陰於陽分明是於氣血他無可言也熱滯於氣  
固矣獨無寒滯取寒滯於血固矣獨無熱滯取何寒不能

傷氣何熱不能傷血耶以愚觀之氣為陽行脈外血為陰  
行脈內相並分派周流循環一身無停止謂之脈一呼脈  
行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈共得六寸一身通七  
尺五寸行得八百一十丈得熱則行速為太過得寒則行  
遲為不及五味之偏七情之過氣為凝滯津液稠厚積而  
久之為飲為痰滲入脈內血為所亂因而凝滯運行泣注  
或為沸騰此陰滯於陽也正是血滯於氣也氣病矣或以  
藥助邪病上生病血病日增溢出血外隧道隘塞升降有  
妨運化失令此陽滯於陰也正是氣滯於血也病分寒熱  
者當是稟受之素偏虛邪之雜合豈可專以陽為熱陰為  
寒耶浮洪弦數氣病之脈也豈可遽作熱論沉細弱瀉血  
病之脈也豈可遽作寒論此萬病之根本豈止疥癬瘡瘍  
癰疽而已幸相評其是否法切切

表裏

寸口脈沉而堅者曰病在中寸口脈浮而盛者曰病在  
外平人氣象論下同海藏云脈浮為表沉為裏大沉之  
脈感滑堅者病在外脈小實而堅者病在內  
氣口主中人迎主外禁服人迎盛堅者傷於寒氣口  
盛堅者傷於食五色

右氣口脈謂兩手掌後手太陰之脈也人迎脈謂挾喉  
兩傍足陽明之脈也

內外傷

辨內外傷 傷風鼻中氣出翕合口不開肺氣通乎天  
也傷食口無味津液不減鼻息氣勻脾氣通乎地也 外  
傷一身盡熱先太陽也自內而之外者先無形也 內傷  
手足不和兩脇俱熱先少陽也從內之外者先有形也  
內外俱傷人迎氣口俱盛或舉按皆實大表發熱而惡寒  
股不和而口液此內外兩傷也 凡診則必捫手心手背

三部脈

手心熱則內傷手背熱則外傷次以脈別之  
脈有三部九候各有所主之然三部者寸關尺也九候  
者浮中沉也上部法天主胃以上至頭有疾中部法人主  
膈下至臍上有疾下部法地主脾以下至足有疾宜審之  
凡初下指先以中指端按得關位掌後高骨為關乃  
齊下前後二指為三部脈前指寸口也後指尺部也若人  
臂長乃踈下指臂短則密下指若先診寸口浮按消息之  
次中按消息之次重按消息之次上竟消息之次下竟消  
息之次推指外消息之次推指內消息之凡診脈以氣息  
平定方下指以一呼一吸為一息其息之間脈息四至  
或五至不大不小與所屬部分四時相應者為平和脈矣  
過則為至不及則為損損至之脈難經詳言之矣  
仲景曰吸而微數其病在中焦實也當下之即愈虛者不



治在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆難治呼吸動搖振振者不治

五臟不平六腑閉塞之所生也通評虛

何以別知臟腑之病也然數者腑也遲者臟也數則為熱遲則為寒諸陽為熱諸陰為寒故以別知臟腑之病也

病有欲得溫者有欲得寒者有欲得見人者有不欲得見人者而各不同其病在何臟腑然病欲得寒而欲得見人者病在腑也病欲得溫而不欲得見人者病在臟也

何以言之腑者陽病欲得寒又欲見人臟者陰病欲得溫又欲閉戶獨處惡聞人聲故以別知臟腑之病也

臟腑發病根本等不然而不然也奈何然臟病者止而不移其病不離其處腑病者彷彿貴繼上下行流居處無常五十二難

帝曰夫百病之生也皆生於風寒暑濕燥火之化之變也經言盛者瀉之虛者補之余錫以方士而方士用之尚未能十全余欲令要道必行桴鼓相應由拔刺雪污功巧神聖可得聞乎岐伯曰審察病機無失氣宜此之謂也帝曰願聞病機何如岐伯曰諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸氣膹鬱皆屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸熱瘛瘲皆屬於火諸痛癢瘡皆屬於心諸厥固泄皆屬於下諸痿喘嘔皆屬於上諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸痲項強皆屬於濕諸逆衝上皆屬於火諸脹腹大皆屬於熱諸躁狂越皆屬於火諸暴強直皆屬於風諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱諸病腫疼酸驚駭皆屬於火諸轉及反水液混濁皆屬於熱諸病水液澄徹清冷皆屬於寒諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱故大要曰謹守病機各司其屬

八醫經類編卷一 七

有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疎其血氣令其調達而致和平此之謂也至真要大論

右病機一十九條實察病之要旨而有者求之無者求之盛者責之虛者責之一十六字乃各篇首盛者瀉之

虛者補之之旨而總結病機一十九條之義又其要旨中之要旨也河間原病式但用病機一十九條立言而遺此一十六字猶有舟無操舟之工有兵無將兵之帥不免臨病之際湯劑候投致人夭折今負僭踰引經傳之旨證其得失其補大矣夫諸風病皆屬於肝也風木

盛則肝太過而病化風如木太過發生之紀病掉眩之類俗謂之陽瘧急驚等病治以涼劑是也燥金勝則肝

為邪攻而病亦化風如陽明司天燥氣下臨病掉振之類俗謂之陰瘧慢驚等病治以溫劑是也諸火熱病皆

屬於心也熱甚則心太過而病化火熱如歲火太過病謗妄狂越之類俗謂之陽躁譫語等病治以攻劑是也

寒水勝則心為邪攻而病亦化火熱如歲水太過病躁悸煩心謗妄之類俗謂之陰躁鄭聲等病治以補劑是

也諸濕病皆屬於脾也濕土甚則脾太過而病化濕如濕勝則濡洩之類仲景用五苓等劑去濕是也風木勝

則脾為邪攻而病亦化濕如歲木太過病飧泄之類錢氏用宣風等劑去風是也諸氣膹鬱皆屬於肺也燥金

甚則肺太過而病化燥鬱如歲金太過甚則喘欬之類東垣謂之寒喘治以熱劑是也火熱勝則肺為邪攻而

病亦化燥鬱如歲火太過病咳嗽之類東垣謂之熱喘治以寒劑是也諸寒病皆屬於腎也寒水甚則腎太過

而病化寒如太陽所至為屈伸不利之類仲景用烏頭

八醫經類編卷一

六〇



湯等劑是也濕土氣勝腎為邪攻而病亦化寒如濕氣  
 變物病筋脉不利之類東垣用後前散健步丸等劑是  
 也其在太過而化之病為虛感者真氣也其在受攻而  
 化之病為虛虛者假氣也故有其病化者恐其氣之假  
 故有者亦必求之無其病化者恐其邪隱於中如寒勝  
 化火之類故無者亦必求之其病之化似虛者恐其感  
 之未的故感者亦必責之其病之化似虛者恐其感  
 未真故虛者亦必責之凡一十九條病機皆用此一十  
 六字為法求之庶幾補瀉不差也今河間捐此一十六  
 字但以病化有者為感無者為虛而不復究其假者虛  
 者為未備此實智者之一失也

五病 五氣所病心為噫肺為欬肝為語脾為吞腎為欠為噫  
 胃為噦逆為噦為恐大腸小腸為泄下焦溢為水膀胱不


五味 利為癢不約為遺溺勝為怒是為五病宣明五  
 色味當五臟白當肺辛當心苦當肝酸當脾其黑

當腎鹹故白當皮赤當脉青當筋黃當肉黑當骨五臟生  
 目赤色者病在心白在肺青在肝黃在脾黑在腎黃色

不可名者病在胃中論病診  
 五脉應象肝為弦心脉鈎難經改脾代難經改肺脉

毛難經改腎脉石難經改  
 毛難經改腎脉石難經改

海藏四正脉傷之圖



色青者其脉弦也赤者其脉鈎也黃者其脉代也白者

其脉毛黑者其脉石見其色而不得其脉反得相勝之脉  
 則死矣得其相生之脉則病已矣邪氣脈論  
 難經言見其色而不得其脉反得相勝之脉者即死得相  
 生之脉者病即自己色之與脉當參相應為之奈何然五  
 臟有五色皆見於面亦當於寸口尺內相應假令色青其  
 脉當弦而急色赤其脉浮大而散色黃其脉中緩而大色  
 白其脉浮瀟而短色黑其脉沉濡而滑此所謂五色之與  
 脉當參相應也脉數尺之皮膚亦數脉急尺之皮膚亦急  
 脉緩尺之皮膚亦緩脉瀟尺之皮膚亦瀟脉滑尺之皮膚  
 亦滑五臟各有聲色臭味當於寸口尺內相應其不相應  
 者病也假令色青其脉浮瀟而短若大而緩為相勝浮大  
 而散若小而瀟為相生也難經 假令得肝脉其外證善  
 潔面青善怒其內證臍左有動氣按之牢若痛其病四肢



滿閉淋瀝便難轉筋有是者肝也無是者非也 假令得  
 心脈其外證面赤口乾善笑其內証膈上有動氣按之牢  
 若痛其病煩心心痛掌中熱而嘔有是者心也無是者非  
 也 假令得脾脈其外證面黃善噫善思善味其內  
 證當膈上有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重  
 節痛怠墮嗜臥四肢不收有是者脾也無是者非也 假  
 令得肺脈其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其內証膈右  
 有動氣按之牢若痛其病喘咳灑淅寒熱有是者肺也無  
 是者非也 假令得腎脈其外證面黑善恐數欠其內証  
 膈下有動氣按之牢若痛其病逆氣小腹急痛泄如下重  
 足脛寒而逆有是者腎也無是者非也 十六  
 有正經自病有五邪相干已上經文皆診正經自病其五  
 邪相干診法附在治法門

相合脈

**海虞相合脈** 脈之相合各有虛實 假令洪弦相合洪客  
 弦主也子能令母實也弦洪相合弦客洪主也母能令子  
 虛也 洪弦相合見于春為子能令母實也弦洪相合見于  
 夏為母能令子虛也 又如洪滑相合見于秋亦子  
 能令母實也流澀相合見于冬至於手足之經亦相合假  
 令傷寒膀胱脈浮堅而洪者即手足經合也 餘條  
 經脈不勝者挾其子之勢也脈弦而入金之分非火之勢  
 則不敢侵金之分 弦而帶數甲經於申也 緊而帶洪  
 壬經於丙也

**五病所發陰病發於骨陽病發於血陰病發於肉陽病**  
 發於冬陰病發於夏是五發也五邪所亂凡邪入於陽則  
 狂邪入於陰則痲搏陽則為癩疾搏陰則為瘡陽入之陰  
 則靜陰出之陽則怒是為五亂 宣明五

**經脈有陰陽之法何謂也** 然呼出心與肺吸入腎與肝呼

吸之間脾受穀味也其脈在中浮者陽也沉者陰也故曰  
 陰陽也心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短  
 瀉者肺也腎肝俱沉何以別之然牢而長者肝也按之濡  
 舉指來實者腎也脾者中州故其脈在中是陰陽之法也  
 四 脈有輕重何謂也然初持脈如三菽之重與皮毛相  
 得者肺部也如六菽之重與血脉相得者心部也如九菽  
 之重與肌肉相得者脾部也如十二菽之重與筋平者肝  
 部也按之至骨舉指來疾者腎部也故曰輕重也 五  
 右以脈之輕重候五臟

三部九

**寸尺內兩傍則季脇也** 尺外以候腎尺裏以候腹中 兩尺  
 寸外以候心寸裏以候肺 尺外以候命門三焦凡  
 寸外者皆指背之外側也凡言內者皆指近背也 附

上左外以候肝內以候膈 左關脈以候肝左  
 胃內以候脾右關脈以候脾右關 上附上右外以候肺

八 醫學綱目卷三

三

內以候胃中 右寸脈也 脈經右  
 中 左寸脈也 脈經左  
 喉中事也 下竟下者少腹腰股膝脛足中事也 脈經  
 內經以寸關尺脈候臟腑者止於如此至難經始定寸  
 關尺為三部浮中沉為九候至後世但診寸關尺之三  
 部湮晦其足手面之三部為大失也

**無擇心部在左手寸口屬手少陰經與小腸手太陽經合**  
 肝部在左手關上屬足厥陰經與膽足少陽經合 腎  
 部在左手關後尺中屬足少陰經與膀胱足太陽經合  
 肺部在右手關前寸口屬手太陰經與大腸手陽明經合  
 脾部在右手關上屬足太陰經與胃足陽明經合 右  
 腎部在右手尺中屬手厥陰心包絡與三焦手少陽經合  
 經脈有三部部有四經手有太陰陽明足有太陽少陰為

經脈有三部部有四經手有太陰陽明足有太陽少陰為



上下部何謂也然手太陰陽明金也足太陽少陰水也金生水水流下行而不能上故在下部也足厥陰少陽木也生手太陽少陰火炎上行而不能下故為上部手心主少陽火生足太陰陽明土土主中宮故在中部也此皆五行子母更相生養者也十八

**東垣** 兩手攪抄於前俱仰其手掌左手居外右手居裏則木火土金水五行相序而經絡四時之令無差忒矣六微旨大論曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之是次列五行相生之理也

攪抄兩手六脉五行相生之圖



帝曰何謂三部岐伯曰有下部有中部有上部部各有三候三候者有天有地有人也必指而導之乃以為真上

部天兩頰之動脈王註云在額兩傍 上部地兩頰之動脈王註云在耳前 中部地手陽明也王註云在手大指次指岐 下部地足少陰也王註云在足內踝後

相應如參春者病甚上下左右相失不可數者死中部之候雖獨調與眾臟相失者死察九候獨小者病獨大者病獨疾者病獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨陷下者病比

庭者首面也關上者咽喉也關中者肺也下極者心也直下者肝也肝左者膽也下者脾也方土者胃也中央者大腸也挾大腸者腎也當腎者膈也面王以上者小腸也面王以下者膀胱子處也額者肩也額後者臂也臂下者手也目內眥上者膈乳也挾繩而上者背也循牙車以下者股也中央者膝也膝以下者脛也當脛以下者足也巨分者股裏也巨屈者膝膕也此五臟六腑肢節之部也庭



下關上關首咽喉之部分也自關中筋車而下車端屬肺  
 心肝脾腎五臟之部分也自目內眦筋車而下至承漿屬  
 肺胃大腸小腸膀胱六腑之部分也自口而下至承漿屬  
 腎手之部分也自手少陰而斜下屬胃脾足之部分也  
 經云五臟分于中央六腑挾其兩側首面各有部分有部  
 上于陽庭王官在下極正謂此也 各有一部分有部  
 分用陰和陽用陽和陰當明部分萬舉萬當能別左右是  
 謂大道男女異位故曰陰陽審察澤天謂之良工沉濁為  
 內浮澤為外黃赤為風青黑為疝白為寒黃而膏潤為膿  
 赤甚者為血痛甚為寒甚為皮不仁五色各見其部察  
 其浮沉以知淺深察其澤天以觀成敗察其散轉以知遠  
 近視色上下以知病處積神於心以知往今故相氣不微  
 不知是非屬意勿去乃知新故也明不掩沉天為其不明  
 不澤其病不其色散駒然未有聚其病散而氣痛聚  
 未成也皆乘心先病腎為應色皆如是男子色在于面  
 王為小腹痛下為卵痛其圓直為莖痛高為本下為首狐  
 八腎經相本二 五



畢者肺之官也目者肝之官也口唇者脾之官也舌者心  
 之官也耳者腎之官也故肺病者喘息鼻張肝病者皆青  
 脾病者唇黃心病者舌捲短顛赤腎病者顛與頰黑五臟  
 色起兩眉薄澤者病在皮膚唇青黃赤白黑者病在肌  
 肉榮衛濡然者病在血氣目色青黃赤白黑者病在筋耳  
 焦枯受塵垢病在骨常氣失  
 黃帝曰五臟之氣閱于面者余已知之矣以肢節知而閱  
 之柰何岐伯曰五臟六腑者肺為之蓋巨肩陷咽喉見其  
 外五臟六腑者心為之主缺盆為之道船骨有餘以候腧  
 筋肝者主為將使之候外欲知堅固視目大小脾者主為  
 衛使之迎糧視唇舌好惡以知吉凶腎者主為外使之遠  
 聽視耳好惡以知其性黃帝曰善願聞六腑之候岐伯曰  
 六腑胃為之海廣散大頸張胃五穀乃容臯隨以長以候  
 八腎經相本二 六

赤色小理者心小麓理者心大無腧筋者心高腧筋小短  
 舉者心下腧筋長者心下堅腧筋弱小以薄者心脆腧筋  
 直下不舉者心端正腧筋倚一方者心偏傾也 心小則  
 安邪弗能傷易傷以憂心大則憂不能傷易傷於邪心高  
 則滿於肺中悅而善忘難開以言心下則散外易傷於寒  
 易恐以言心堅則藏安守固心脆則善病消瘴熱中心端  
 正則和利難傷心偏傾則操持不一無守司也  
 白色小理者肺小麓理者肺大巨肩反膺陷喉者肺高合  
 腋張脇者肺下好肩背厚者肺堅肩背薄者肺脆背膺厚  
 者肺端正脇偏踈者肺偏傾也 肺小則少飲不病喘噎

大腸唇厚人中長以候小腸目下暴大其臍乃橫臍孔在  
 外膀胱漏泄臍柱中央起三焦乃約此所以候六腑者也  
 八腎經相本二 六



肺大則多飲善病胸痺喉痺逆氣肺高則上氣肩息欬肺下則居貴迫肺善脇下痛肺堅則不病欬上氣肺脆則苦病消痺易傷肺端正則和利難傷肺偏傾則胸偏痛也  
青色小理者肝小、蒼理者肝大、廣胃反散者肝高、合脇免酸者肝下、胃脇好者肝堅、脇骨弱者肝脆、膈腹好相得者肝端正、脇骨偏舉者肝偏傾也、肝小則臟安無脇下之病、肝大則逼胃迫咽、迫咽則苦膈中且脇下痛、肝高則上支賁切脇挽為息、賁肝下則逼胃脇下空、脇下空則易受邪、肝堅則藏安難傷、肝脆則善病消痺易傷、肝端正則和利難傷、肝偏傾則脇下痛也

黃色小理者脾小、蒼理者脾大、揭唇者脾高、唇下緩者脾下、唇堅者脾堅、唇大而不堅者脾脆、唇上下好者脾端正、唇偏舉者脾偏傾也、脾小則臟安難傷于邪也、脾大則苦溼、眇而痛不能疾行、脾高則眇引季脇而痛、脾下則下加于大腸、下加于大腸則臟苦受邪、脾堅則臟安難傷、脾脆則善病消痺易傷、脾端正則和利難傷、脾偏傾則善滿善脹也

黑色小理者腎小、蒼理者腎大、高耳者腎高、耳後陷者腎下、耳堅者腎堅、耳薄不堅者腎脆、耳好前居牙車者腎端正、耳偏高者腎偏傾也、腎小則臟安難傷、腎大則善病腰痛、不可以俛仰、易傷以邪、腎高則苦背脊痛、不可以俛仰、腎下則腰尻痛、不可以俛仰、為孤疝、腎堅則不病腰背、痛腎脆則善病消痺易傷、腎端正則和利難傷、腎偏傾則苦腰尻痛也  
五臟皆小者少病、苦焦心、大愁憂、五臟皆大者緩于事、難使以憂、五臟皆高者好高舉、指五臟皆下者好出人下、五

臟皆堅者無病、五臟皆脆者不離于病、五臟皆端正者和利得人心、五臟皆偏傾者邪心而善盜、不可以為人平反、覆言語也

肺應皮皮厚者大腸厚、皮薄者大腸薄、皮緩腹大者大腸大而長、皮急者大腸急而短、皮滑者大腸直、皮肉不相離者大腸結

心應脉皮厚者脉厚、脉厚者小腸厚、皮薄者脉薄、脉薄者小腸薄、皮緩者脉緩、脉緩者小腸大而長、皮薄而脉衝小者小腸小而短、諸陽經脉皆多紆屈者小腸結

脾應肉肉脘堅大者胃厚、肉脘磨者胃薄、肉脘小而磨者胃不堅、肉脘不稱身者胃下、胃下者管約不利、肉脘不堅者胃緩、肉脘無小裏累者胃急、肉脘多少裏累者胃結、胃結者上管約不利也

肝應爪爪厚色黃者膽厚、爪薄色紅者膽薄、爪堅色青者膽急、爪濡色赤者膽緩、爪直色白無約者膽直、爪惡色黑多紋者膽結也

腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚、倉理薄皮者三焦膀胱薄、疎腠理者三焦膀胱緩、皮急而無毫毛者三焦膀胱急、毫毛美而倉者三焦膀胱直、稀毫毛者三焦膀胱結也

黃帝問余欲無視色持脉獨調其尺以言其病從外知內為之奈何、岐伯曰審其尺之緩急、小大滑澀肉之堅脆而病形定矣、視人之目窠上微癢如新臥起狀、其頸脉動時欬、按其手足上窻不起者、風水膚脹也、尺膚滑其澤澤者風也、尺肉弱者解休、安臥脫肉者寒熱不治、尺膚滑而澤脂者風也、尺膚濇者風痺也、尺膚倉如枯魚之鱗者水



沃飲也尺膚熱甚脈盛躁者病溫也其脈盛而滑者病且  
 出也尺膚寒其脈小者泄少氣尺膚炬然先熱後寒者寒  
 熱也尺膚先寒久大之而熱者亦寒熱也肘所獨熱者腰  
 以上熱手所獨熱者腰以下熱肘前獨熱者膺前熱肘後  
 獨熱者肩背熱臂中獨熱者腰腹熱肘後處以下三四寸  
 熱者腸中有虫掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒魚上  
 白肉有青血脉者胃中有寒尺炬然熱人迎大者當奪血  
 尺堅大脈小甚少氣悅有加立死論疾診尺篇  
 單頭色青腹中痛占冷者死單頭色微黑者有水氣色  
 黃者胃上有寒色白者亡血也設微赤非特者死其目正  
 圓者瘧不治又色青為痛色黑為勞色赤為風色黃者便  
 難也鮮明者有雷飲言遲者風也搔頭言者其裏痛也  
 行遲者其表疆也坐而伏者短氣也坐而下一膝者必腰  
 痛也裏實護腹而懷卵者必心痛也師持脈病人久者無  
 病也脈之因伸者無病也假令向壁臥聞師到不驚起而  
 目盼視若三言三止脈之咽唾此為詐病假令脈自和更  
 言此病大重當須服吐下藥針灸數十百處乃愈病者  
 素不應食而反暴思之必發熱也師曰息搖肩者心中  
 堅息引胃中上氣者欬息張口短氣者肺痿吐沫師曰  
 病人語聲寂然善驚呼者骨節間病語聲暗然不徹者  
 心膈間病語聲啾啾細而長者頭中病  
 經脈一來而久住者宿病在心主中治 脈二來而久  
 住者病在肝支中治 脈三來而久住者病在脾下中治  
 脈四來而久住者病在腎間中治 脈五來而久住者  
 病在肺支中治 五脈病虛羸人得此者死所以然者藥  
 不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

診虛實法

診寒熱法俱入

病傳變

素帝曰病成而變何謂岐伯曰風成爲寒熱痺成爲消中厥成爲癩疾久風爲癘泄脈風成爲癘病之變化不可勝數脈要精

曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消其傳爲息責者死不治 曰三陽爲病發寒熱下爲癰腫及爲癘厥喘痛其傳爲索澤其傳爲頰疝

曰一陽發病少氣善欬善泄其傳爲心掣其傳爲膈 二陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠名曰風厥 二陰一陽發病善脹心滿善氣 三陽三陰發病爲偏枯痿易四肢不舉別論

黃帝問曰五臟六腑寒熱相移者何岐伯曰腎移寒於肝癰腫少氣脾移寒於肝癰腫筋攣肝移寒於心狂膈中心

移寒於肺肺消肺消者飲一溲二死不治肺移寒於腎爲涌水涌水者按腹不堅水氣容於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也脾移熱於肝則爲驚衄肝移熱於心則死心移熱於肺傳爲膈消肺移熱於腎傳爲柔痊腎移熱於脾傳爲虛腸澀死不可治胞移熱於膀胱則癰溺血膀胱移熱於小腸腸澀不便上爲口糜小腸移熱於大腸爲虛瘕爲沉大腸移熱於胃善食而瘦入謂之食併胃移熱於膽亦曰食併膽移熱於腦則辛癩鼻淵者濁涕下不止也傳爲衄衄且故得之氣厥也論氣厥

診病愈劇

靈黃帝曰夫百病者多以旦慧晝安夕加夜甚何也岐伯曰朝則人氣始生病氣衰故旦慧日中人氣長則勝邪故安夕則人氣始衰邪氣始生故加夜半人氣入臟邪獨

入醫經卷之三  
 二十七  
 入醫經卷之三  
 二十七



居於身故甚也帝曰其時有反者何也岐伯曰是不應

四時之氣臟獨主其病者是以臟氣之所不勝時者其

以其所勝時者起也四時篇

【醫】肝主春足厥陰少陽主治其日甲乙病在肝愈于夏

夏不愈甚於秋秋不死持於冬起於春禁當風肝病者

愈在丙丁丙丁不愈加於庚辛庚辛不死持於壬癸起于

甲乙肝病者平旦慧下晡其夜半靜

心主夏少陰太陽主治其日丙丁病在心愈在長夏

長夏不愈甚於冬冬不死持於春起於夏禁溫食熱衣

心病者愈在戊己戊己不愈加於壬癸壬癸不死持於甲

乙起於丙丁心病者日中慧夜半其平旦靜

脾主長夏足太陰陽明主治其日戊己病在脾愈在秋

秋不愈甚於春春不死持於夏起於長夏禁溫食飽食濕

地滯水脾病者愈在庚辛庚辛不愈加於甲乙甲乙不

死持於丙丁起於戊己脾病者日晡慧日出其下晡靜

肺主秋手太陰陽明主治其日庚辛病在肺愈在冬冬

不愈甚於夏夏不死持於長夏起於秋禁寒飲食寒衣

肺病者愈在壬癸壬癸不愈加於丙丁丙丁不死持於戊

己起於庚辛肺病者下晡慧日中其夜半靜

腎主冬足少陰太陽主治其日壬癸病在腎愈在春春

不愈甚於長夏長夏不死持於秋起於冬禁犯燥煖熱食

溫炙衣腎病者愈在甲乙甲乙不愈甚於戊己戊己不

死持於庚辛起於壬癸腎病者夜半慧四季其下晡靜

夫邪氣之客於身也以勝相加至其所生而愈至其所

不勝而其至其所生而持自得其位而起必先定五臟之

脈乃可言間甚之時死生之期也脈氣法

右以五臟時日占病愈甚極準錢仲景深得此理學者

宜究心而又擴充之

病在臟沉而大者其病易已小為逆病在腑浮而大者

其病易已脈口滑小緊以沉者病益甚在中人迎氣大

緊以浮者其病益甚在外脈口滑以沉者病日進在內

人迎脈滑盛以浮者病日進在外脈口浮滑者病日進

人迎沉而滑者病日損五色

診生死

凡治病察其形氣色澤脈之盛衰病之新故乃治之無

後其時形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已脈從四

時謂之可治脈弱以滑是有胃氣命曰易治取之以時形

氣相失謂之難治色天不澤謂之難已脈實以堅謂之益

其脈逆四時為不可治必察四難而明告之所謂逆四時

者春得肺脈夏得腎脈秋得心脈冬得脾脈其至皆懸絕

沉瀯者命曰逆四時主機真氣實形實氣虛形虛此其

常也及此者病穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也及此者病

脈實血實脈虛血虛此其常也及此者病論志氣虛身

熱此謂反也穀入多而氣少此謂反也穀不入而氣多此

謂反也脈盛血少此謂反也脈少血多此謂反也氣盛

身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑穀入多而氣少者得

之有所脫血濕居下也穀入少而氣多者邪在胃及與肺

也脈少血多者飲中熱也脈大血少者脈有風氣水漿不

入此之謂也上形盛脈細少氣不足以息者危形疲脈

大胃中多氣者死形氣相得者生參互不調者病三部九

候皆相失者死上下左右之脈相應如參春者病甚上下

左右相失不可數者死中部之候雖獨調與衆臟相失者



死中部之候相減者死目內陷者死全文見前上形肉已脫九候雖調猶死

熱病脈靜汗已出脈盛躁是一逆也病泄脈洪大是二逆也着痺不移脰肉破身熱脈偏絕是三逆也淫而奪形身熱色天然白及後下血衄血衄篤重是謂四逆也寒熱

奪形脈堅搏是謂五逆也五禁篇○膈梁損切腹脹身熱脈大是一逆也腹鳴而滿四肢清泄其脈大是二逆也

而而不止脈大是三逆也咳且沒血脫形其脈小勁是四逆也欬脫形身熱脈小以疾是謂五逆也如是者不過十

五日而死矣其腹大脹四末清脫形泄甚是一逆也腹脹便血其脈大時絕是二逆也欬沒血形肉脫脈搏是三逆也嘔血胃滿引脊脈小而疾是四逆也欬嘔腹脹且殮泄

其脈絕是五逆也如是者不及一時而死矣工不察此者

而刺之是謂逆治玉版篇○熱而脈靜泄而脫血脈實病在中脈虛病在外脈堅滑

者皆難治平人氣脈曰脈病人不病名曰行尸以無生氣卒眩仆不識人

者短命則死人病脈不病名曰內虛以有正氣雖困無苦

左有病而右痛右有病而左痛下有病而上痛上有病而下痛此為逆逆者死不可治 肥人脈細小如絲欲絕

者死 羸人脈躁者死 人身滑而脈往來滑者死 人身小而脈往來大者死 人身大而脈往來小者死 人身短而脈往來長者死 人身長而脈往來短者死 人身滑而脈往來濡者死

五臟者中之守也中盛臟滿氣勝傷恐者聲如從室中言是中氣之濕也言而微終日乃復言者此奪氣也衣被

不飲言語善惡不避親疎者此神明之亂也倉廩不藏者是門戶不要也水泉不止者是膀胱不藏也得守者生失

守者死論要精五臟者身之強也頭者精神之府頭傾視深精神將奪矣背者胃中之府背曲肩垂府將壞矣

者腎之府轉搖不能腎將僂矣膝者筋之府屈伸不能行則僂俯筋將僂矣骨者髓之府不能久立行則振掉骨將

僂矣得強者生失強者死五臟之氣故色見青如草茲者死如如相實者死黑如焰者死赤如衄血者死白如

枯骨者死此五色之見死也五臟生成篇○青如翠羽者生赤如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑

如鳥羽者生此五色之見生也生於心如以縞裹朱生於脾如以縞裹紅生於肝如以縞裹紺生於脾如以縞裹紫生於腎如以縞裹紫此五臟所生之外榮也

夫精明五色者氣之華也赤欲如白裏朱不欲如赭白欲如鶩羽不欲如鹽青欲如蒼壁之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土黑欲如重漆色不欲如地蒼精微

論 病人面目俱等者不死

面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑者皆不死也

面青目青面赤目白面青目黑面黑目白面赤目青皆死也王註云凡色見者為有胃氣故不死五臟以胃為本故無黃色皆自死焉○五臟生成篇

病人面青目白者死 病人面青目黃者五日死 病人面青目黑者五日死 病人面青目白者死

病人面青目白者死 病人面青目黃者五日死 病人面青目黑者五日死 病人面青目白者死 病人面青目黃者五日死 病人面青目黑者五日死



傷病因留積 病人面黑目直視惡風者死 病人面而  
目黑者死此謂榮華已去血脉空虛 赤色出兩頰大如  
母指者病雖小愈必卒死全文見暴死口類類皆也東垣  
論亦色于兩頰若金剛脂之狀而又且圓也病至于此不  
可久居于世譬猶根本已竭枝葉未卸葉落亦如紅霞滿  
天也

病入耳目及額頰赤者死在五月中 黑色出  
於庭大如母指必不病而卒死全文見暴死口類類皆也東垣  
論亦色于兩頰若金剛脂之狀而又且圓也病至于此不  
可久居于世譬猶根本已竭枝葉未卸葉落亦如紅霞滿  
天也

額上髮際下直鼻脊兩額上者亦死在五月中 病人黑  
氣出天中下至年上額上者死 病人及健人或黑色及

白色起入目及鼻口者死在三日中 病人耳目鼻口有  
黑色起入于口者必死 病人面黑兩脇下滿不能自轉

反者死 病人面黑唇青者死 病人面青唇黑者死

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如焦黑者死

病人面無精光若土色不受飲食者四日死 病人目

無精光及牙齒黑色者不治

五邪所見春得秋脈夏得冬脈長夏得春脈秋得夏脈

冬得長夏脈是謂五邪皆同命死不治宣明五氣篇○仲  
何以言至秋當死春二月之時脈當濡弱反得毛脈者  
故知至秋死二月肝用事肝脈屬木應濡弱反得毛脈者  
是肝脈也肺屬金金 春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病  
來而木故知死也

但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰今病藏真散於

肝肝藏筋脈之氣也 平肝脈來奕奕招招如揭長竿末

稍曰肝平春以胃氣為本病肝脈來盈實而滑如循長竿

曰肝病死肝脈來急益勁如新張弓弦曰肝死

夏胃微鈞曰平鈞多胃少曰心病但鈞無胃曰死胃而有

石曰冬病石甚曰今病藏直通於心心臟血脉之氣也

平心脈來累累如連珠如循琅玕曰心平夏以胃氣為本

傷病因留積 病人面黑目直視惡風者死 病人面而  
目黑者死此謂榮華已去血脉空虛 赤色出兩頰大如  
母指者病雖小愈必卒死全文見暴死口類類皆也東垣  
論亦色于兩頰若金剛脂之狀而又且圓也病至于此不  
可久居于世譬猶根本已竭枝葉未卸葉落亦如紅霞滿  
天也

病心脈來喘喘連屬其中微曲曰心病死心脈來前曲後  
居如操帶鈞曰心死

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有

弦曰春病弦甚曰今病藏真高於肺以行榮衛陰陽也

平肺脈來厭厭羸羸如落榆莢曰肺平秋以胃氣為本病

肺脈來不上不下如循鷄羽曰肺病死肺脈來如物之浮

如風吹毛曰肺死

冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有

鈞曰夏病鈞甚曰今病藏真下於腎腎藏骨髓之氣也

平腎脈來喘喘累累如鈞按之而堅曰腎平冬以胃氣為

本病腎脈來如引葛按之益堅曰腎病死腎脈來發如奪

索辟辟如彈石曰腎死

長夏胃微奕奕曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰死奕

弱有石曰冬病弱甚曰今病藏真濡於脾脾藏肌肉之氣

也 平脾脈來和柔相離如鷄踐地曰脾平長夏以胃氣

為本病脾脈來實而盈數如鷄舉足曰脾病死脾脈來銳

堅如鳥之啄如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死

參人脈

真肝脈至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟弦色青白

不澤毛折乃死仲景云肝死藏浮之弱按之  
如索不來或曲如蛇形者死 真心脈至

堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死仲景  
死藏浮之脈實如豆麻

真肺脈至大而虛如以毛羽中

人膚色白赤不澤毛折乃死仲景云肺死藏浮之虛按  
擊手按之益燥者死

真腎脈至搏而絕如指彈石辟辟然色黑黃不澤毛折乃

死仲景云腎死藏浮之堅按之  
死如轉丸益下入中者死 真脾脈至弱而乍疎乍

數色黃青不澤毛折乃死仲景云脾死藏浮之大堅按之  
中如覆杯然者死



諸真藏脉見皆為死不治也。黃帝曰見真藏曰死何也。岐伯曰五臟者皆稟氣於胃胃者五臟之本也。藏氣者不能自致于手太陰必因於胃氣乃至于手太陰也。故五臟各以其時自為而至于手太陰也。故邪氣勝者精氣衰也。故病甚者胃氣不能與之俱至于手太陰故真藏之氣獨見獨見者病勝藏也。故曰死。人以此水穀為本故人絕水穀則死。脉無胃氣亦死。所謂無胃氣者但得直藏脉不得胃氣也。所謂陰者真藏也。見則為敗敗必死也。所謂陽者胃脘之陽也。凡持真脉之藏脉者肝至懸絕急十八日死。心至懸絕九日死。肺至懸絕十二日死。腎至懸絕七日死。脾至懸絕四日死。寸脉下不至關為陽絕。尺脉上不至關為陰絕。此皆不治決死也。若計其餘命死生之期以月節剋之也。

於春夏陰絕死於

於冬此言甚應

王註云

所謂五十禁者五臟皆受氣持其脉口數其至也。五十動而不一代者五臟皆受氣四十動一代者一臟無氣。三十動一代者二臟無氣。二十動一代者三臟無氣。十動一代者四臟無氣。無氣者謂之短。期要在終始所謂五十動而不一代者以常也。以知五臟之期予之短期者乍數乍疎也。難經云脉不滿五十動而一止一臟無氣者何臟也。然人吸者隨陰入呼者因陽出今吸不能至腎至肝而還故知一臟無氣者腎氣先盡也。

按脉之來緩而時一止復來者名曰結陰也。又脉來動

而中止更來小數中有還者及動名曰促陽也。脉來動而中止不能自還者動而中止復來如前名曰代陰也。得此脉者必難治。自還者動而中止復來數於前動也不能自還者動而中止復來如前動而不數也。

有結脉有促脉有代脉結者陰也陰盛則結脉來緩時一止復來曰結主留滯煩躁促者陽也陽盛則促脉來數時一止復來曰促主積聚氣痞憂思所成大抵結促之脉雖時一止為病脉非死脉也。唯代脉者真死矣。往來緩動中止不能自還因而復動名曰代也。代者死也。仲景傷寒脉結代心動悸不安草湯主之。

熱病脉五至一日死時一大至半日死忽忽悶亂者

熱病脉六至半日死忽忽疾大至有頃死

熱病脉

四損三日死所謂四損者平人四至病人脉一至名曰四損。熱病脉五損一日死所謂五損者平人脉五至病人脉一至名曰五損。熱病脉六損一時死所謂六損者平人脉六至病人脉一至名曰六損。若絕不至或久乃至立

死。平人不病脉來如屋漏雀啄者死。此脾真藏脉也。王註云

而此時後起而不相連屬也。脉來如彈石去如解索者死。此腎真藏脉也。王註云彈石者彈石者彈石者彈石者

如魚之翔者死。此心真藏脉也。王註云魚之翔者魚之翔者

如刀者死。脉滿不去者死。脉忽去忽來者死。復來者

死。脉分絕者死。脉去者死。脉去者死。脉去者死。脉去者死。

三部脉

三部脉



診病傳  
生死

如釜中湯沸朝得暮死半夜得日中死日中得半夜死  
寸口脉平而死者何謂也然諸十二經脉者皆係於生  
氣之原所謂生氣之原者謂十二經之根本也謂腎間動  
氣也此五臟六腑之本十二經脉之根呼吸之門三焦之  
原一名守邪之神故氣者人之根本也根絕則莖葉枯矣  
寸口脉平死者生氣獨絕於內也尺脉皆平而無也  
五臟相通移皆有次五臟有病則各傳其所勝不治法  
三月若六月若三日若六日傳五臟而當死 風者百病  
之長也今風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱當  
是之時可汗而發也或痺不仁腫痛當是之時可湯熨及  
火灸刺而去之弗治病入舍於肺名曰肺痺發欬上氣弗  
治肺即傳而行之肝病名曰肝痺一名曰厥脇痛出食當  
是之時可按若刺耳弗治肝傳之脾病名曰脾風發痺腹

六經全綱卷一六二

中熱煩心出黃當此之時可按可藥可浴王註云出黃瀉  
之所弗治脾傳之腎病名曰疝瘕少腹寬熱而痛出一  
名曰蠱當此之時可按可藥弗治腎傳之心病筋脉相引  
而急病名曰癰當此之時可灸可藥弗治滿十日者法當  
死腎因傳之心心即復反傳而行之肺發寒熱法當三歲  
死此病之次也然其卒發者不必治於傳或其傳化有不  
以次不以次入者憂悲喜怒不得以其次故令人有  
大病矣因而喜大虛則腎氣乘矣怒則肝氣乘矣悲則肺  
氣乘矣恐則脾氣乘矣憂則心氣乘矣此其道也故病有  
五五五二十五變及其傳化傳乘之名也王機真  
右邪初入表蓋傳之緩者也  
夫病傳者心病先心痛一日而咳心傳三日脇肢痛肺  
傳五日閉塞不通身痛體重脾傳三日不已死冬夜

半夏日中 肺病喘欬三日而脇肢滿痛肺金傳一日身  
重體痛五日而脹脾木一日傳十日不已死冬日入  
夏日出 肝病頭目眩脇肢滿三日體重身痛五日而脹  
肝木三日傳脾土 三日腰脊少腹痛脛痠脾土傳三日  
不已死冬日入夏早食 脾病身痛體重一日而脹脾土傳  
二日少腹腰脊痛脛痠三日背脇筋痛小便閉脾土傳  
三日傳 十日不已死冬人定夏晏食 腎病少腹腰脊痛  
脛痠三日背脇筋痛小便閉腎傳三日腹脹腎水傳  
三日兩脇肢痛腎水傳二日不已死冬大晨夏晏睡  
胃病脹滿五日少腹腰脊痛脛痠胃土傳三日背脇筋  
痛小便閉胃土傳五日身體重脾土傳六日不已  
死冬夜半後夏日晷 膀胱病小便閉五日少腹脹脛脊  
痛脛痠膀胱傳一日腹脹膀胱火傳二日身體痛膀胱火傳

六經全綱卷一六二

痛痛亦二日不已死冬鷄鳴夏下晡諸病以次是靈樞無  
相傳如是者皆有死期不可刺問一臟止靈樞無及至三  
四臟者乃可刺也標本病  
右靈樞謂之大氣入臟蓋傳之急者也王註云有緩傳  
者有急傳者緩者或一歲二歲三歲而死其次或三月  
若六月而死急者一日二日三日四日或五六日而死  
則此類也王氏此言甚能推廣經意然不能驗日數者  
但驗病之次傳如心先病心痛次傳於肺或欬或喘次  
傳於肝或脇痛或頭眩次傳於脾胃或閉塞不通或身  
痛體重或脹或泄次傳於腎膀胱或少腹腰脊痛脛痠  
或背脇筋痛小便閉如此曰必死無疑累驗有在鄰人  
趙氏始肝病脇痛半載次傳之脾腹脹而死又上叔英  
嫂氏始肺病咳喘次傳之肝頭眩不寐次傳之脾腹脹



釋次傳  
元開傳生

而死又楊白廉師始脾病腹痛次傳之膀胱小便淋瀝  
次傳之心胃痺痛通身青脉而死矣蓋心主血脉故也  
經言七傳者死間臟者生何謂也然七傳者傳其所勝  
也間臟者傳其子也何以言之假令心病傳於肺肺傳於  
肝肝傳於脾脾傳於腎腎傳於心一臟不再傷故言七傳  
者死也間臟者傳其所生也假令心病傳脾脾傳肺肺傳  
腎腎傳肝肝傳心是母子自相傳周而復始如環之無端  
故言生也五十三難

經言者素問靈樞二經之病傳論所言也七傳當作次  
傳次傳者死即素靈二經病傳論言諸病以次相傳皆  
有死期不可刺者是也心火傳所勝之肺金肺金傳所  
勝之肝木故曰傳其所勝也間臟者生即素靈二經病  
傳論言間一臟及至三四臟乃可刺者是也蓋心病本

傳肺肺本傳肝肝本傳脾今心病間肺一臟傳肝或間  
肺肝二臟傳脾肝木生心火心火生脾土故曰傳其所  
生也難經諸證惟呂廣釋七傳為次傳為得經旨虞庶  
父非是註而穿鑿釋之實秦越人呂廣之罪人也

傷寒入裏見標脉則生假令胃病下之脉浮而汗出是  
也雜病出表見標脉則死假令脾病補之脉弦而面青者  
是也

診死期

九候之脉皆沉細懸絕者為陰主冬故以夜半死感  
躁喘數者為陽主夏故以日中死 寒熱病者以平旦死  
熱中及熱病者以日中死 病風者以日夕死 病水  
者以夜半死脉乍疎乍數乍遲乍疾者日乘四季死三九候  
肝見庚辛死心見壬癸死脾見甲乙死肺見丙丁死  
腎見戊癸死是謂真臟見皆死平人氣象論 五臟受氣於其

所生傳之於其所勝氣舍於其所生死於其所不勝病之  
且死必先傳行至其所不勝病乃死此言氣之逆行也故  
死上

肝受氣於心傳之於脾氣舍於腎至肺而死

緩者秋死急者庚辛日及日晡死是也

心受氣於脾傳之於肺氣舍於肝至腎而死

緩者冬死急者壬癸日及夜半死也

脾受氣於肺傳之於腎氣舍於心至肝而死

緩者春死急者甲乙日及朝死也

肺受氣於腎傳之於肝氣舍於脾至心而死

緩者夏死急者丙丁日及日中死也

腎受氣於肝傳之於心氣舍於肺至脾而死

緩者長夏死急者戊己日及戊辰丑未死也

此皆逆死也一日一夜五分之此所以占死生之早暮也

大骨枯葉大肉陷下胃中氣滿喘息不便其氣動形期六

月死真臟脉見乃予之期日王註云皮膚枯乾骨間肉陷

大骨枯葉大肉陷下胃中氣滿喘息不便內痛引肩項期

一月死真臟見乃予之期日

大骨枯葉大肉陷下胃中氣滿喘息不便內痛引肩項身

熱脫肉破脰真臟見十日之內死王註云脰謂肘腋後肉

大骨枯葉大肉陷下肩髓內消動作益衰真臟未見期一

歲死見其真臟乃予之期日王註云肩髓內消謂缺盆

大骨枯葉大肉陷下胃中氣滿腹內痛心中不便肩項身

熱破脰脫肉目眶陷真臟見日不見人立死其見人者至



五種傷  
死期

真臟論  
其所不勝之時則死 急虛身中卒至五臟絕閉脈道不通氣不往來譬於墮溺不可為期其脈絕不來若人息五六至其形肉不脫真臟雖不見猶死也林註云一息當五至

悲衰動中者竭絕而失生喜樂者神憚散而不藏愁憂者氣閉塞而不行盛怒者迷惑而不治恐懼者神蕩憚而不收本神篇

心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破脛脫肉毛悴色天死于冬

脾愁憂而不解則傷意意傷則悵亂四肢不舉毛悴色天死于春

肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精不精則不正當人

陰縮而壅筋兩脇骨不舉毛悴色天死于秋

肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色天死于夏

腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色天死于季夏

恐懼而不解則傷精精傷則骨疼痿厥精時自下是故五臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣

瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕此决死生之要不可不察三節九候

足太陽氣絕者其足不可屈伸死必戴眼 太陽之脈其終也戴眼反折痠痲其色白絕汗乃出出則死矣診要經

同凡痲痲亦戴眼矣戴眼者六即瞳下不聚也若戴眼者仍眼戴不下者是為太陽絕也上註絕汗滿出汗如珠不

流復旋

少陽終者耳聾百節皆縱目暈絕系絕系一日牛死其死也色先青白乃死矣景岳直解

陽明終者口目作動善驚妄言色黃其上下經盛不仁則終矣王註云經盛謂脈自強而無邪也

少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉上下不通而終矣而黑者少陰虛也

太陰終者腹脹閉不得息善噎善嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通不通則面黑皮毛焦而終矣

厥陰終者中熱噤乾善澀心煩甚則舌卷卵上縮而終矣此十二經之所敗也

手足太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫于皮毛者也故氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮節津液去皮節者

則爪枯毛折毛折者則毛先死丙篤丁死火勝金也經脈

手少陰氣絕則脈不通脈不通則血不流血不流則髦色不澤故其面黑如漆柴者血先死壬篤癸死水勝火也

足太陰氣絕者則脈不榮肌肉唇舌者肌肉之本也脈不榮則肌肉軟肌肉軟則舌痿人中滿人中滿則唇反唇反者肉先死甲篤乙死木勝土也

足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脈也伏行而濡骨髓者也故骨不濡則肉不能著也骨肉不相親則肉軟却肉軟却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊篤己死土勝水也

足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚于陰器而脈絡于舌本故脈弗榮則筋急筋急則引舌

也

也



與卵故唇青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木也  
五陰氣俱絕則日系轉轉則日運日運者為志先死志先  
死則遠一日半死矣

六陽氣絕則陰與陽相離離則腠理發泄絕汗乃出故曰  
占夕死夕占旦死

脈浮而洪身汗如油喘不休水漿不下體形不仁乍靜  
乍亂者此為命門絕也又未知何臟先受其災若汗出髮  
潤喘不休者此為肺先絕也陽反獨留形體如烟煤直視  
搖頭者此為心絕也唇吻反青四肢熱熱汗出者此為肝  
絕也環口鰐黑柔汗發黃者此為脾絕也溲便遺尿狂言  
日及直視者此為腎絕也又未知何臟陰陽相絕若陽氣  
前絕陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭  
者其人死身色必黃腋下溫心下熱也 六腑氣絕于外

者手足寒上氣脚縮五臟氣絕于內者利不禁下甚手足  
不仁

雅  
絕

病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不  
見人汗出如水不止一云二 病人膽絕七日死何以知  
之眉為之傾 病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青  
呼罵不休一云八 病人心絕一日死何以知之肩息回  
視立死一云二 病人腸絕六日死何以知之髮直如  
乾麻不得屈伸自汗不止一云小 病人脾絕十二日死  
何以知之口冷足腫腹熱臃脹泄利不覺出無時度一云  
五  
病人胃絕五日死何以知之脊痛腰中重不可反覆  
病人肉絕六日死何以知之耳乾舌背腫滿  
血大便赤泄一云九 病人肺絕三日死何以知之  
張但氣出而不還一云九 病人大腸絕不治何以知之

之泄利無度利絕則死 病人腎絕四日死何以知之齒  
為暴枯面為正黑目中黃色腰中欲折自汗出如流水一云  
七 病人骨絕齒黃落十日死 諸浮脈無根者皆  
死已上五臟六腑為根也

病人五臟已奪神明不守聲嘶者死 病人循  
衣縫語者不可治一云 病人陰陽俱絕掣衣掇空妄  
言者死 病人妄語錯亂及不能語者不治熱病者可治

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死  
病人臥遺尿不覺者死一云 病人尸臭者不可治 病  
人面是白直視肩息者一日死一云 病人陰結陽絕目  
睛眊眊者死 病人陰陽絕竭目眩陷者死 病人目系

傾者七日死 病人口如魚口不能復閉而氣出多不反  
者死 病人口張者三日死 病人唇青人中反者死一云

病人唇反人中滿者死 病人唇口忽乾者不治  
病人唇腫齒焦者死一云 病人陰陽俱竭其齒如  
燕小豆其脈歇者死 病人齒忽變黑者十三日死一云

病人舌卷卵縮者必死一云 病人汗出不流舌卷黑  
者死一云 病人髮直者十五日死一云 病人髮如  
乾麻善怒者死一云 病人髮與眉衝起者死一云 病人

爪甲青者死 病人爪甲白者不治 病人手足爪甲下  
肉黑者八日死 病人榮衛竭絕面浮腫者死 病人卒

腫其面蒼黑者死 病人手掌腫無文者死 病人臍腫  
反出者死一云 病人陰囊並便腫者死 病人

脈絕口張足腫五日死 病人足跗上腫兩膝大如斗者  
十日死

諸脈診病雜法



諸脉診病雜法者竊恐迷亂診病大綱故以雜法名之也  
凡前篇脉之浮沉遲數虛實洪細滑澀所指陰陽表裏寒  
熱血虛氣實之病者皆診病之大綱學者常須識此勿令  
悞也故內經論脉主病必以陰陽相對言之或以五臟分  
配言之未嘗雜他法者欲人識其綱也故診病先定大綱  
然後雜究諸病如診得浮脉大綱主表也沉脉大綱主裏  
也然後雜究其或屬寒屬風屬氣等病之類是也餘見如  
左方

浮為在表 為風 為氣 為熱 為痛 為嘔  
為脹 為痞 為喘 為厥 為內結 為滿不食 浮  
大為臌塞 為緩為不仁 浮大長為風眩顛疾 浮滑  
疾為宿食 浮大濇為宿食滯氣 浮短為肺傷諸氣  
浮滑為飲為泄利 浮細而滑為傷飲 浮滑疾緊為百

合病 浮數為大便堅小便數 浮緊為淋為癃閉  
辨脉浮所主病不同○浮者沉之反也管管然見於  
皮毛上與皮毛相得微按之則絕無有如空中之浮雲所  
主病一則為風一則為虛古人云浮而有熱者虛也浮而  
無熱者風也予謂此未盡善蓋風有八風寒熱溫涼各各  
不同其中有風熱止言脉浮雖不能分別八面之風燕見  
脉候止說浮而已須燕見的證單在一臟或兩臟相合亦  
足以分何臟之病言風無熱則非也况八風之脉皆見於  
左手寸脈外側若右手行陰道脉中受虛邪賊邪之風亦  
於氣口外側顯見推而內之外而不內者是也其虛勞脉  
雖有傳變必顯於內側六脉互傳皆為不足之病則是五  
臟傳變必從四時傳變於外六腑乃受之如是則勝復之  
作不能相過此之謂也若浮而弦者風也見於左關浮而

遊者虛也見於右寸  
寸扎為吐血 微扎為衄血 關扎為大便血出  
尺扎為下焦虛小便血出 為咳

滑為血 為滿 為熱 為伏痰 為宿食 為畜血  
為癰閉 為瘰 為血氣俱實 滑而浮散為癰瘰 滑  
數為結熱 滑實為胃實 滑利為妊娠 滑而大小不  
勻必吐為病進為泄利 滑而浮大小腹痛弱則陰中痛  
大便亦然

弦為風 為嘔 為痛 為氣寒 為喘咳 為大便  
不禁 實緊為陰不勝陽 為胃寒 為腰痛  
弦為寒 為痛 為飲 為瘕 為水氣 為中虛 為  
厥逆 為拘急 為寒痺 弦緊為惡寒 為疝瘕 為

瘕 弦而鈞為脇下刺痛 弦長為積隨左右上下  
細弦則衛氣不行  
無脈緊為寒 為痛 為咳 為喘 為滿 浮緊為肺  
有水 緊而滑為蠱 緊為逆尺 緊數為寒熱 動為  
宿食 為逆痛  
緊盛而緊曰脹  
本經記有人患傷寒六七日心煩昏睡咽燥小便白色自  
汗予診之寸口尺中俱緊予曰寒中少陰之經是以脉緊  
仲景云脉緊而汗出者亡陽也屬少陰法當咽痛而復下  
利蓋謂此也有難之曰脉訣緊脉屬七表仲景以緊脉屬  
少陰然則緊脉屬陽耶屬陰耶予言仲景云寸口脉俱緊  
者清邪中於上焦濁邪中於下焦又云陰陽俱緊者口中  
氣出唇口乾燥蹠臥足冷身中澀出舌上滑胎勿妄治也



又云緊則為寒又云諸緊為寒又曰曾為人所難緊脈從何而來師云假令亡汗若吐以肺裏寒故令脈緊假令咳者坐飲冷水故令脈緊假令下利以胃虛故令脈緊又云寸口脈微尺脈緊其人虛損多汗由是觀之則是寒邪之氣久客經脈所致皆虛寒之脈也其在陽經則浮而緊在陰經則沉而緊故仲景云浮緊名為傷寒又曰陽明脈浮而緊者必潮熱此在陽則浮而緊也在陰則沉而緊故仲景云寸口脈微尺脈緊其人虛損多汗則陰當先絕而不見陽又云少陰緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者此欲解也此在陰則沉而緊也仲景云浮為在表沉為在裏數為在腑遲為在臟欲知表裏臟腑先以浮沉遲數為定然後兼於證而別陰陽也

**無指洪為脹** 為滿 為痛 為熱 為煩 洪實為癰

**洪紫為癰疽** 為喘急亦為脹 洪浮為陽邪來見

**大者陰不足陽有餘為熱中也** 脈要精 大則病進

丹溪云大洪之別名其病得之於內傷者陰虛為陽所乘故脈大當作虛治之其病得之於外傷者邪客於經脈亦大當作邪勝治之合二者觀之皆病方長之勢也謂之病進不亦宜乎海藏云君臣是也

**平人脈大為勞** 大則為虛

**數為熱為虛** 為吐 為痛 為煩渴 為煩滿

脈促 釋曰其促有五 一曰氣 二曰血 三曰飲 四曰食 五曰痰

但臟熱則脈促以氣血痰飲留滯不行則止促非惡脈也

**散脈** 散經無 釋曰六腑氣絕於外則手足寒上氣五臟氣絕於內則下利不禁甚者不仁其脈皆散散則不聚病亦危矣

**革脈** 革為瀕 為急 為虛寒相搏 半產漏下

釋曰革者革也固結不移之狀三部應之皆危脈也

**微為虛** 為弱 為嘔 為嘔 為泄 為亡汗 為拘急 微弱為少氣 為中寒

沉為在裏 為實 為水 為寒 為喘 為癥 沉弱為寒熱 沉細為少氣臂不能舉 沉滑為風水 為下重 沉緊為上熱下冷 沉重而直前絕者為汚血 沉重而中散者為寒食成癥 沉重不至寸細絕者為遁尺 沉緊為懸飲 沉遲為癰冷 沉重為傷寒發熱

緩為在下 為風 為寒 為弱 為痺 為疼 為不仁 為氣不足 為眩暈 緩而滑為熱中 緩而遲虛寒相搏食冷則咽痛

**澁為少血** 為亡汗 熱氣不足 為逆冷 為下痛

**為心痛** 澁而緊為痺 為寒濕

**脈澁曰痺**

**脈之狀不一** 大率多兼見之人之病有四曰實曰熱曰寒曰虛故學者診亦必浮沉遲數為之綱以察病情初學者又以浮數為熱為有餘沉遲為寒為不足其間最難體認者澁脈也最難調治者弦脈也澁脈細而遲往來難且散又曰短而止得此脈者固為寒為濕為血虛為汚血為氣多然亦有病熱與實者或者得脈之帶澁徒見其有細有遲又散皆是不足之象便以為虛而寒猛浪用藥蓋不候人若夫或因多怒或因憂鬱或因厚味或因補劑燥劑或因表裏無汗氣騰血沸清化為濁老痰凝血膠固雜揉脈道澁滯亦見澁狀參之形證病情斯得先賢曰澁而堅按之不減有力為中焦實有伏結脾肺氣寒實熱在胃中



可不慎歟弦為春今之脉非春時而見者木為病也五臟更相制伏以防其太過木為病則肝邪盛矣肝之盛金之衰也金之衰火之炎也火之炎水之弱也金不足以制木則土病矣攷之諸家則曰弦者虛也為反胃為痛痺沉弦為疝瘕弦長為積病雙弦為寒飲雙弦而遲為心下堅偏弦飲也弦急為腹痛弦而鈎主黃尸弦緊而微細主寒積微弦而伏主癥不治弦而大主半產漏下亡血失精弦而小主寒痺弦在左寸頭痛弦在右寸水走腸胃弦在左關怒而血聚弦在右關寒痛四肢拘急弦在跌陽腸痔下血弦在尺中小腹痛白腸挺核木邪風氣上極土敗為病先哲蓋常言之矣惟金因火伏木寡于畏之論猶未發明倘非滋水以降火厚土以養金而又以行濕散風導鬱為之輔佐邪何由去病何由安况弦脉為病甚多而治法又有

八書學綱目卷二

隔二隔三之異故不容於自默也若曰不然何弦屬陽而仲景列沉瀯弱微弦為五陰之數至於敗散殘賊之脉又以弦為之首瀯為之中其意可見瀯遲為寒 為痛 遲而瀯為瘕瘕咽酸 伏為霍亂 為疝瘕 為水氣 為溇泄 為停痰 為宿食 為諸氣上衝 為惡膿死肌 瀯為虛 為痺 為自汗 為氣弱 為下重 瀯而弱為內熱外冷自汗 為小便難 弱為虛 為風熱 為自汗 細為血氣俱虛 為病在外 為積 為傷濕 為後泄 為寒 為神勞 為憂傷過度 為腹滿 細而緊為瘕瘕積聚 為刺痛 細而滑為僂仆 為發熱 為嘔吐

動脈主 動為痛 為驚 為鬱 為泄 為恐 虛為寒 為脚弱 為虛 為食不消化 為傷暑 結為痰 為飲 為血 為精 為氣 釋曰氣寒脉緩則為結氣熱脉數則為促雖緩數不同亦當如促脉分別可也

代脉代者一臟絕他臟代至

釋曰代真死脉不分三部隨應皆是

三部主 三部主 寸浮則中風 寸芤則胃中積血 寸滑則嘔逆 寸實則胃中熱 寸弦則胃中急痛 寸緊則頭項急 寸洪則熱甚於胃中 寸微則陽虛 寸沉則陰中伏陽 寸中痰 寸緩則太陽中濕 寸溢則中氣虛 寸遲則陰溢於上 寸伏則胃中積氣 寸濡則多自汗 寸弱則陽氣虛微

八書學綱目卷三

關浮則腹脹滿 關芤則腸中積血 關滑則胃寒不能食 關實則胃中切痛 關弦則胃寒不能食 關緊則腹中鬱結 關洪則雷胃吐食 關微則氣結於心下 關沉則心下痛 關緩則腰痛難伸 關溢則血少而雷 關遲則粥漿不入 關伏則腸癰腹痛 關濡則少氣精神散 關弱則胃氣虛 尺浮則大便乾澀 尺芤則小便有血 尺滑則下焦停寒 尺實則小腹脹小便不禁 尺弦則下焦停水 尺緊則臍腹痛 尺洪則陰絕 尺微則臍下有積 尺沉則腰脚重 尺緩則飲食不消 尺溢則逆冷傷血 尺遲則寒甚於腰脚 尺伏則殮泄穀不化 尺濡則骨肉不相親 尺弱則陰氣內絕 夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則



病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少澁則心痛渾渾革至如湧泉病進而色散綿綿其去如弦絕者死

寸口之脈中手短者曰頭痛寸口脈中手長者曰足脛痛久病脈滑浮而疾者謂之新病脈小弱以澁者謂之不奪者新病也徵其脈不奪其色奪者此久病也徵其脈與五色俱奪者此久病也徵其脈與五色俱不奪者新病也推而外之內而不外有心腹積也推而內之外而不內身有熱也推而上之上而不下腰足清也推而下之下而不上頭項痛也按之至骨脈氣少者腰脊痛

而身有痺也按開寶寺僧衣鉢甚厚常施惠於人孫重之與往還一日謂孫曰某有一事於翁約賞罰為戲可否孫曰如何為賞罰僧曰若診吾脈若知其病賞二十千為一筵若不中罰十千歸小僧孫曰諾與之診左手無脈右手有脈遂尋載脈行常道豈有移易之理往昔少年為驚撲震動心神脈脫舊道乍移臂外復遇驚撲不能再歸年歲長大氣血已定不能復移目下無病爾僧曰其襖襖而撲皆幾死固宜脈失所基亦平生無病亦不曾診脈聞公神醫試驗之果神醫也

診一歲病證相同一歲病證相同者五運六氣所為之病也五運六氣之病

有常有變難診易詳於運氣類證今但取常而不變者編之

正邪	實虛	風八合
坤	離	巽
震	中央	兌
艮	坎	乾

太乙常以冬至之日居叶蟄之宮四十六日明日居天魚四十六日明日居倉門四十六日明日居陰洛四十六日明日居天宮四十六日明日居玄委四十六日明日居倉果四十六日明日居新洛四十五日明日復居叶蟄之宮曰冬至矣太乙日遊以冬至之日居叶蟄之宮數所在日從一處至九日復及於一常如是無已終而復始太乙移日天必應之以風雨以其日風雨則歲美民安少病矣先之則多雨後之則多旱太乙在冬至之日有變占在君太乙在春分之日有變占在相太乙在中宮之日有變占在吏太乙在秋分之日有變占在將太乙在夏至之日有變占在百姓所謂有變者太乙居五宮之日瘋風折樹木揚沙石各以其所主占貴賤因視風所從來而占之風從其所居之鄉來為實風主生長養萬物從其衝後來







醫學綱目卷之三

陰陽臟腑部

醫之可法 自伏羲神農黃帝而下名醫雖多可法者有數人至于華氏之剖腹王氏之鍼法術非不神也後人安得而效之非若岐伯之聖經雷公之炮灸伊摯之湯液箕子之五行越人之問難仲景之傷寒論叔和之脈訣士安之甲乙啓玄子之述作錢仲陽之議論潔古之方書皆活法所可學者豈千方萬論印定後人眼目者所能比哉其間德高行遠奇人異士與夫居縉紳隱草莽者雖有一法一節之可觀非百世可行之活法皆不取也予豈好辨哉欲使學者觀此數聖賢而知所向慕而已或有人焉徒欲廣覽泛涉自以為多學而用之無益者豈為知本錢氏活人王朝奉王德孚所論甘米人易老守真皆金人所用之劑寒熱之不同者蓋本諸此讀此數書而用之

人醫綱目卷之三

亦當以地方世代所宜責之然莫若取法于潔古折衷于仲景湯液則萬世不易之大法也

治法

邪風之至病如風雨故善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治六腑其次治五臟治五臟者半死半生也病之始起也可刺而已其盛可待衰而已故因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之形不足者溫之以氣精不足者補之以味其高者因而越之其下者引而竭之中滿者瀉之於內其有邪者瀉形以為汗其在皮者汗而發之其慄悍者按而收之其實者散而瀉之審其陰陽以別柔剛陽病治陰陰病治陽定其血氣各守其鄉血實宜決之氣虛宜掣引之並見陰陽應象論大法春宜吐夏宜汗秋宜下冬宜溫及灸

病在天之無形當吐病在天之有形當吐病在地之無形當利小便病在地之有形當利大便

夫欲治病當先知其證何起乃可攻之耳

假令治病無問傷寒蓄血結胃發黃等諸證并一切雜證等各當於六經中求責之如發黃證或頭痛腰脊強惡寒即有太陽證或身熱目痛單乾不得臥即有陽明證餘

做此不獨六經中求責也如發黃證或頭痛腰脊強惡寒即有太陽證或身熱目痛單乾不得臥即有陽明證餘

熱而喘即有心證也餘證中

治病必求其本 病之有本猶草木之有根也去葉不去根草猶在也治病猶去草病在臟而治腑病在表而攻裏非惟戕賊胃氣抑且資助病邪醫云乎哉

一法治瘧積下利吐痰而愈 一法治汚血嘔噎用非汁開汚血而愈 一法治下疔瘡自利用龍膏九柴胡

湯而愈其詳分見各門

治病必求其本 假令腹痛桂枝加芍藥大實痛桂枝加大黃何為不用芍藥大黃等而於桂枝內加之要從太陽中來以太陽為本也又如結胃證自高而下脉浮者不可下故先用麻黃湯解表表已脉沉後以陷胃湯下之是亦求其本也至於畜血下焦血結膀胱是從太陽中來侵盡無形之氣乃侵膀胱中有形血也

先病而後逆者治其本先逆而後病者治其本先寒而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本

病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生病者治其本



治分新

發而有餘本而標之先治其本後治其標病發而不足標而本之先治其標後治其本謹察開甚以意調之問者并

行甚者獨行先小大不利而後生病者治其本標本病

夫病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾也

初治之道法當峻猛者謂所用藥勢疾利峻峻也緣病

得之新暴感雖輕得之重皆宜以疾利之劑急去之

治之道法當寬猛相濟為病得之非新非久宜以緩疾得

中之藥養正去邪相濟而治之假令如見邪氣多正氣少

宜以去邪藥多養正藥少凡加減法如此之類更宜臨證

消息增減用之仍依時令行之無妄也更加針灸其病即

愈末治之道法宜寬緩寬者察藥性平和緩者廣服無

毒以養氣血安中益為病證已久邪氣伏潛至深而正氣

微少故以善藥廣服養正氣而邪氣自去更加針灸其效

必速

治分五

治病之道有五法即取從折屬也 一治各有五五五二

十五如火之屬衰於戌金之屬衰於辰是也 一治日和

假令小熱之病當以涼藥和之和不已次用取 二治

日取為熱勢稍大當以寒藥取之取之不已又用從 三

治日從為勢已甚當以溫藥從之為藥氣溫也味隨所用

或以寒因熱用或以熱因寒用或以汗發之發之不已又

用折 四治日折為病勢極甚當以逆制之制之不已當

以下奪之下奪之不已又用屬 五治日屬為求其屬以

衰之緣熱深陷在骨髓間無法可出針藥取之不能及故

求其屬以衰之求屬之法同聲 經曰陷下者衰之夫衰

熱氣之法同前所云火衰於戌金衰於辰之類是也如或

又不已當廣其法而治之壁孫子之用兵若在山谷則塞

淵泉有水則把渡口在平川廣野當清野千里塞淵泉者

刺膈穴把渡口者奪病發時前清野千里者如肌羸瘦弱

宜廣服大藥以養正氣 夫病有中外治有緩急 在內

者以內治法和之 在外者以外治法和之 氣微不和

以調氣法調之 其次大者以平氣法平之 感甚不已

則奪其氣令其衰也故經曰調氣之方必別陰陽定其中

外各守其鄉 內者內治 外者治外 微者調治 其

次平治 盛者奪之汗之下之 寒熱溫涼衰之以屬隨

其攸利

臟病難治腑病易治何謂也然臟病所以難治者傳其

勝也腑病易治者傳其子也與七傳間臟同法也

脈之不病其神不言當自有也脈之既病當求其中神

之有與無焉謂如六數七極熱也脈中有九即有神也三

遲二敗寒也脈中有九即有神也熱則有神也當泄其熱

則神在焉寒則有神也當去其寒則神在焉寒熱之脈無

力無神將何藥以泄熱去寒乎苟不知此而遽泄去之將

何依以生所以十七八九

形樂志苦病生於脈治之以灸刺形樂志樂病生於肉

治之以鍼石形苦志樂病生於筋治之以熨引形苦志苦

病生於咽嗑治之以百藥形數驚恐經絡不通病生於不

仁治之以按摩醪藥是謂五形志也血氣形

緩急辨 經云治主以緩治客以急所當知也 諸有

表證當汗脈浮急汗之脈沉緩汗之 諸有裏證當下脈

浮緩下之脈沉急下之 三陽汗當急而下當緩 三陰

汗當緩而下當急 主為病則緩去之 客為病則急去

之 胃中氣病自病也為主治當緩 胃中血病他病也



為客治當急 上無形下入腹中即為客也治當急 下  
有形上入腹中即為主也治當緩 歲之六氣主也 司  
天在泉間氣客也 補上治上制以緩不犯血藥便謂之  
緩非緩慢之緩也 補下治下制以急不犯氣藥便謂之  
急非急速之急也 熱在至高之分故用輕劑從高而按  
治從緩也若急服之上熱未退而中寒復生矣若入有形  
當下之者從其急從其急者從其權也 大腸滑泄治以  
收之服藥當以一物壓之欲其及於下部也故服在空心  
食前若在食後非徒無益而又害之此謂治之緩也 近  
者奇之先急而後緩 遠者偶之先急而後緩 下者奇  
之先緩而後急 汗者偶之先緩而後急

特分四

靈樞奇偶 汗從九地之下 下從九地之上  
東垣諸病四時用藥之法不問所病或溫或涼或熱或寒

如春時有疾於所用藥內加清涼風藥夏月有疾加大寒  
之藥秋月有疾加溫氣藥冬月有疾加大熱藥是不絕生  
化之源也錢仲陽醫小兒深得此理內經曰必先歲氣無  
伐天和是為至治又曰無違時無伐化又曰無伐生生之  
氣此皆常道也用藥之法若反其常道而變生異證則當  
從權施治假令病人飲酒或過食寒或過食熱皆可以增  
疾如此以權衡應變治之權變之藥豈可常用乎權變之  
藥於時禁藥禁有不暇顧者矣故不可輕用

辨攻

愚問張子和書惟務攻擊其意以正氣不能自病因為

邪所客所以為病也邪去正氣自安因病有在上中下深  
淺之不同立為吐汗下三法以攻之初看其書將謂醫之  
法盡於是矣復因思內經有言謂之虛者精氣虛也謂之  
實者邪氣實也夫邪所客必因正氣之虛然後邪得而客

之苟正氣實邪無自入之理由是於子和之書不得不致  
疑於其間又思內經有言陰平陽秘精神乃治陰陽離缺  
精氣乃絕又思仲景有言病當汗解診其尺脈濇當與黃  
芪建中湯補之然後汗之於是知張子和之書非子和之  
筆也和子馳名中土其法必有過於同輩者何其書之所  
言與內經仲景之意若是之不同也於是決意於得明師  
以為之依歸發其茅塞遂遊江湖但聞某處有某醫便往  
而拜問之連經數郡無一人焉後到真定始得原病式東  
垣藥乃大悟子和之孟浪然終未得的然之議論將謂江  
浙間無可為師者泰定乙丑夏始得聞羅太無於陳芝岩  
之言遂往拜之蒙叱罵者五七次越二閱月始得降接  
因觀羅先生治一病僧黃瘦倦怠羅詢其病因乃蜀人出  
家時其母在堂又遊浙右經七年忽一日念母之心不可

八醫外類卷三

六

過欲歸無腰纏徒爾斯夕西望而泣以是得病時僧二十  
五歲羅令隔壁宿泊每日以牛肉猪肚甘肥等糞爛與  
之凡經半月餘且時以慰諭之言勞之又曰我與銀拾錠  
作路費我不望報但欲救汝之死命耳察其形稍甦脉稍  
克與桃仁承氣一日三貼下之皆是血塊痰積方止次日  
乃與熟菜稀粥將息又半月其人遂如舊又半月餘與銀  
遂行因大悟攻擊之法必其人克實稟受素壯乃可行也  
否則邪去而正氣傷小病必重病必死羅每日有求醫  
者必令其診視其脉狀回稟羅但臥聽口授用某藥治某  
病以某藥監某藥以某藥為引經往來一年半並無一定  
之方至於一方之中有攻補兼施者亦有先攻後補者有  
先補後攻者又大悟用古方治今病焉能照合隨時取中  
此之謂歟其時羅又言用古方治今病正如拆舊屋補湊



新屋其材木非一一再經匠氏之手其可用乎由是又思許學士釋微論曰予讀仲景書用仲景法然未嘗守仲景之方乃為得仲景之心也遂取東垣方稿手自抄錄乃悟治病入當如漢高祖繼暴秦周武王繼商之後自非散財發粟與三章之法其受傷之氣倦憊之人何由而平復也於是知陰易之陽易亢攻擊宜審正氣須保護以局方為懲戒哉

許先生論梁寬父症右脇肺部也咳而吐血舉動喘逆者肺診也發熱脈數不能食者火來刑金肺與脾俱虛也肺與脾俱虛而火乘之其病為逆如此者例不可補瀉蓋補金則慮金與火持而喘咳益增瀉火則慮火不退位而痰癆及感止宜補中益氣湯先扶元氣少以治病藥和之聞已用藥而未獲效必病勢苦逆而藥方未到也當與

八醫學綱目卷三

寬父執論遠期秋涼庶可平復蓋肺病者惡春夏火氣至秋冬則退正宜於益氣湯中隨四時陰陽升降浮沉溫涼寒熱及見有症增損服之升降浮沉則順之溫涼寒熱則反之順其理和其氣為治之大方也或覺氣壅間與加減枳朮丸或有飲間服局方枳朮湯數月後庶逆氣少回逆氣回則治法可施但恐已至色青色赤脈弦脈洪則無及矣近世論醫有上河間劉氏者有主易州張氏者張氏用藥依準四時陰陽升降而增損之正內經四氣調神之義醫而不知此是妄行也劉氏用藥務在推陳致新不使少有佛齋正造化新新不停之意醫而不知此是無術也然主張氏者或未盡張氏之妙則順眩之劑終莫敢授至失幾後時而不救者多矣主劉氏者或未極劉氏之妙則取效目前陰損正氣遺害後日者多矣能用二子之長而無

二子之弊其庶幾乎史副使病不見色脈不能懸料以既愈復發言之則恐亦宜取張氏依準四時陰陽升降用藥以扶元氣庶他日既愈而不發也寬父病後初感必深所傷物恐當時消導不盡停滯滯延變生他症以至于今恐亦宜效劉氏推陳致新之法少加消導藥於益氣湯中庶可以取效也

倒倉法

謂之倉若積穀之室也倒者傾去舊積而滌濯使之潔淨也胃居中屬土喜容受而不能自運者也人之飲食過適口之物寧無過量而傷積者乎七情之偏五味之厚寧無傷於中和之德乎糟粕之餘停痰瘀血互相糾纏日積月深鬱結成聚甚如桃核之穢諸般奇形之虫中宮不清矣士德不和矣誠於中形於外發為癰瘰為痔瘡為蠱脹

八醫學綱目卷三

為癰疾為無名奇病先哲制為萬病丸溫白丸等劑攻補兼施寒熱並用期中病情非不功巧然不若倒倉之為便捷者也以黃牡牛擇肥者買一二十斤長流水煮爛融入湯中為液以綿濾出查滓取淨汁再入鍋中文武火熬至琥珀色則成矣每飲一鍾少時又飲如此者積數十鍾寒月則重湯溫而飲之病在上者欲其吐多病在下者欲其利多病在中者欲其吐下俱多全在活法而為之緩急多寡也須先置一室明快而不通風者以安病人視所出之物可盡病根則止吐利後或渴不得飲湯其小便必長取以飲病者名曰輪迴酒與一二碗非惟可以止渴抑且可以滌滯餘垢睡一二日覺飢甚乃與粥淡食之待三日後始與菜羹自養半月覺精神煥發形體輕健沉痾悉安矣其須五年忌食牛肉吾師許文懿公始病心瘋用此



燥香辛如丁附桂姜茸治數年而足墜痛甚且惡寒而多  
嘔甚而至干靈砂黑錫黃芽減丹繼之艾火十餘萬又雜  
治數年而痛益甚自度為廢人矣衆工亦技窮矣如此者  
又數年困甚煩渴惡食者一月已服通聖散半月餘而大  
腑逼迫後重肛門熱氣如燒始時下積滯如五色爛錦者  
又如柏燭油膩者近半月而病似退減又半月而畧思穀  
唯兩足難移計無所出至次年三月遂作此法節節如應  
因得為全人次年再得一男又十四年而壽終又一婦人  
久年脚氣吐利而安又臨海林兄患久嗽吐血發熱消瘦  
衆以療治之百方不應召予視之脈兩手弦數日輕夜重  
計無所出亦因此而安時冬十月也第三年得一子又鎮  
守百戶蕭伯善公以便濁而精不禁親與試之有效夫牛  
坤土也黃土之色也以順為德而效法乎健以為功者壯

大醫綱目卷十

九

之用也肉者胃之樂也熱而為液無形之物也橫散入肉  
經由腸胃而滲透膚腠毛竅爪甲無不入也積聚久則形  
質成依附腸胃回薄曲折處以為棲泊之窠曰阻碍津液  
氣血薰蒸燔灼成病自非倒腸刮骨之神妙孰能去之又  
豈以合勺銖兩之丸散所能窺犯其藩牆乎臍平切詳肉  
液之散溢腸胃受之其厚皆倍於前有似乎腫其回薄曲  
折處非復向日之舊肉液充滿流行有如洪水泛漲其浮  
莖陳朽皆推逐蕩漾順流而下不可停留表者因吐而汗  
清道者自吐而通濁道者自泄而去凡屬滯碍一洗而空  
牛肉全重厚和順之性盎然渙然潤澤枯槁補益虛損寧  
無精神煥發之樂乎正似武王克商之後散財發粟以賑  
殷民之望也其方出於西域之至人於中年後可行一二  
次亦却疾養壽之一助也 與藏補齋書倒倉法非敢吝

也志於學者不多也然患者往往徂於苟安而靠後功夫  
全籍自飲輪迴酒十餘盃以祛逐餘垢迎接調勻新布榮  
衛使臟腑盲膜生意敷暢有脫胎換骨之功者也多嫌其  
穢而不肯喫若非明物理通造化者其肯視為美醞良藥  
乎前日相見時尖議此一節蓋有數人曾因此成中輟者  
寧不功虧一篔簹徒爾跋涉且是暴殄天物敢此詳告 又  
中間飲到七八鍾後藥力經涉經絡骨節中搜逐宿垢正  
邪寧不抵牾必有急悶似痛非痛有一段惡况此皆好消  
息邪不勝正將就擒耳尤須忍耐而受又於欲吐未吐欲  
聽醫者以靜待之况此等又有大半日景象必先說知使  
方寸瞭然庶臨時可以安守也 倒倉治癩癆癰癩等症  
推陳致新扶虛補損可吐可下用黃色肥牯牛腿精肉二

大醫綱目卷三

十

十斤順取急長流水於大鍋內煮候水耗少再添湯不可  
添冷水以肉爛成查為度濾去查用肉湯再熬如琥珀色  
隔宿不吃晚飯如大便秘者隔宿服神功丸不秘者不用  
五更以密室不通風處溫服一鍾候隔間藥行又服陸續  
至七八鍾如病人不欲服強再與之必身體皮膚間皆痛  
方見吐下如病在上欲吐多者須緊服又不可太緊恐其  
不納病在下欲利多者須疎服又不可太疎恐其下遠臨  
時消息大抵先見下方可使吐須極吐下使其上下積俱  
盡出大便中須見核桃肉狀無臭氣則止得睡覺氣定與  
喫還魂酒一二鍾即病人粥食持息無有不愈未行此法  
前一月不可近婦人已行此法後半年不可近婦人三年  
不喫牛肉如性急好色不守禁忌者不可行此法也 倒  
倉全在初三鍾慢飲最緊要能行經陸中法



藥性不

厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱陰陽應

防風 升麻 羌活 柴胡

葛根 歲靈仙 細辛 獨活

白芷 桔梗 秦粘子 藜本

川芎 蔓荊子 秦艽 天麻

麻黃 荊芥 薄荷 前胡

熱浮長氣之厚者陽中之陽氣厚則發熱

附子 烏頭 乾薑 生薑

良薑 肉桂 桂枝 草豆蔻

丁香 厚朴 木香 益智

白豆蔻 川椒 吳茱萸 茴香

八腎經藥目

玄胡索 縮砂 紅花 神麩

濕化成其蒸氣味氣溫涼寒熱在人則以胃應之

黃芪 人參 甘草 當歸

熟地 半夏 蒼朮 白朮

陳皮 青皮 藿香 檳榔

莪木 三稜 阿膠 訶子

杏仁 麥芽 桃仁 紫草

蘇木

燥降收氣之薄者陽中之陰氣薄則發泄

茯苓 澤瀉 猪苓 滑石

瞿麥 車前子 木通 燈草

五味子 桑白皮 犀角 白芍藥

天門冬 烏梅 牡丹皮 地骨皮

枳殼 琥珀 連翹 枳實

麥門冬

寒沉厥味之厚者陰中之陰味厚則泄

大黃 黃柏 黃芩 黃連


石膏 草龍膽 生地黃 知母

防已 茵陳 牡蠣 瓜蒌根

朴硝 玄參 山梔 川練子

香豉 地榆

八腎經藥目





脾不主時於四季末各旺一十八日乃坤土也生化一十一歲受胃之稟乃能生化

天有陰陽溫涼寒熱四氣是也溫熱者天之陽也寒涼者天之陰也地有陰陽辛甘淡酸苦鹹六味是也辛甘淡地之陽也酸苦鹹地之陰也輕清成象味薄細茶之類本乎天者親上重濁成形味厚大黃之類本乎地者親下味之薄者為陰中之陽味厚則通酸苦鹹平是也味之厚者為陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也氣之厚者為陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也氣之薄者為陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也

清陽發滕理清之清者也清陽實四肢清之濁者也濁陰歸六腑濁之濁者也濁陰走五臟濁之清者也粥淡陽中之陰所以利小便茶苦陰中之陽所以清眼

目

苦藥平升 微寒平亦升 甘辛藥平降 甘寒瀉火 苦寒瀉濕熱 苦甘寒瀉血熱

壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣陰陽應 壯火姜附之屬少火升麻葛根之屬

帝曰五味陰陽之用如何岐伯曰辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽六者或收或散或緩或急或燥或潤或軟或堅以所利而行之調其氣使其平也至真大要論

辛能散結潤燥 苦能燥濕堅軟 鹹能軟堅 酸能收緩收散 甘能緩急 淡能利竅  
五辣 蒜辣心 薑辣頰 蔥辣鼻 芥辣眼 蓼辣舌

五味所入酸入肝辛入肺苦入心鹹入腎甘入脾是謂五入宣明五氣篇

太陽經 手羌活 足黃柏

陽明經 手白芷升麻 足石膏

少陽經 手柴胡 足青皮

太陰經 手桔梗 足白芍藥

少陰經 手獨活 足知母

厥陰經 手柴胡 足青皮

向導 手太陰肺

南星 欬冬花 升麻 桔梗

山藥 檀香 梗米 五味子

白茯苓 天門冬 麥門冬 阿膠

桑白皮 葱白 杏仁 麻黃

益智 丁香 白豆蔻 砂仁檀香黃

知母 梔子 黃芩 石膏

足太陰脾 草薺 茱萸 砂仁人參益 防風

當歸 益智 黃芪 蒼朮

白朮 膠飴 代赭石 茯苓

麻子 甘草 半夏

通入手足太陰肺脾

升麻 芍藥 木瓜 藿香

白芍藥 玄胡索 砂仁

手陽明大腸

升麻 白芷 麻子 秦艽



薤白	白石脂	砂仁 <small>白石脂使</small>	肉苁蓉
石膏			
足陽明胃	草薺	砂仁	防風
丁香	知母	白朮	神麴
石膏	烏藥	半夏	蒼朮
葛根	白芷	葱白	
升麻			
通入手足陽明	麻黃酒	連翹	升麻
白朮	葛根	石膏	檀香 <small>佐以他藥</small>
白芷			
手少陽三焦	川芎	大黃酒	柴胡
	熟地	黃芪	地骨皮
白朮	細辛	附子	
石膏			
足少陽膽	半夏	草龍膽	柴胡
通入手足少陽	青皮	川芎	柴胡
			連翹
手厥陰心包絡	沙參	白朮	柴胡
	牡丹皮	敗醬	熟地
足厥陰肝	草龍膽	蔓荊子	阿膠
	桃仁	山茱萸	代赭石
當歸	甘草	青皮	羌活
			熟石莢

吳茱萸	白朮		
通入手足厥陰	青皮	熟地	柴胡
	皂角	苦茶	桃仁
手太陽小腸	白朮	生地黃	羌活
	赤石脂	砂仁 <small>赤石脂使</small>	赤茯苓
足太陽膀胱	蔓荊子	滑石	茵陳
	猪苓	澤瀉	桂枝
	羌活	麻黃	黃柏
通入手足太陽	防風	羌活	藜蘆
	茴香	黃柏	白朮
	防已	大黃酒	澤瀉
手少陰心	麻黃	桂心	當歸
	黃連	代赭石	紫石英
	獨活	赤茯苓	梔子
足少陰腎	知母	黃柏	地骨皮
	猪尾	牡丹皮	玄參
	牡蠣	烏藥	山茱萸
	猪苓	澤瀉	白茯苓
	甘草	五味子	吳茱萸
	丁香	獨活 <small>或用</small>	桔梗 <small>或用</small>
			砂仁 <small>黃柏使</small>



通入手足少陰

細辛

熟地

五味子

澤瀉

地榆

附子

知母

白朮

命門

附子

沉香

益智

黃芪

製方大

國藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同類之物味皆鹹其氣皆寒之類是也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣互相為用各有厚薄性用不等製其方者必宜明其為用經曰味為陰味厚為純陰味薄為陰中之陽氣為陽氣厚為純陽氣薄為陽中之陰味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱又曰辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽凡此之味各有所能辛能散結潤燥苦能燥濕收堅鹹能軟堅酸能收緩收散甘能緩急淡能利竅若用其味必明其氣之可否若用其氣必明其味之所宜識其病之標本臟腑寒熱虛實微甚緩急而用其藥之氣味隨其症而製其方可也是故方有君臣佐使輕重緩急君臣大小反正逆從之制也主治病者為君佐君者為臣應臣者為使用此隨病之所宜而又贊成方而用之君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之制也去咽嗑近者奇之遠者偶之汗者不奇下者不偶補上治上制之以緩補下治下制之以急急者氣味厚也緩者氣味薄也薄者少服而頻食厚者多服而頻食又當明五氣之鬱木鬱達之謂吐令條達也火鬱發之謂汗令疎散也土鬱奪之謂下無雍滯也金鬱泄之謂解表泄小便也水鬱折之謂制其衝逆也通此五法乃

治病之大要也  
帝曰非調氣而得者治之奈何有奇無毒何先何後願聞其道岐伯曰有毒無毒所治為主適大小為制也帝曰請言其制岐伯曰君一臣二制之小也君一臣三佐五制之中也君一臣三佐九制之大也寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之堅者削之客者除之勞者溫之結者散之留者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者益之逸者行之驚者平之上之下之摩之浴之劫之開之發之適事為故帝曰何謂逆從岐伯曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒用寒因熱用寒因寒用通因通用必伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已論下同

此言內氣失調而得病之治法也

帝曰氣調而得者何如岐伯曰逆之從之逆而從之從而逆之疎氣今調則其道也

此言內氣本調因感外邪得病之治法也蓋內氣失調之病根本不固惟病邪微者可逆治之苟病邪甚者逆治之則病邪格拒必變危矣故反從其病勢而治之也如元氣本調之病根本堅固則不分微甚皆可逆從而治之也

帝曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上下三品之謂也帝曰三品何謂岐伯曰所以明善惡之殊貴也

為君者最多為臣者次之佐者又次之藥之於症所主同者各等分凡藥之所用者皆以氣味為主補瀉在味隨



時換氣主病者為君假令治風防風為君治上焦熱黃芩  
為君治中焦熱黃連為君治濕防已為君治寒附子之類  
為君兼見何症以佐使藥分治之此制方之要也 如仲  
景治表虛製桂枝湯方桂枝味辛熱發散助陽體輕本平  
天者親上故桂枝為君甘草芍藥為佐陽脈瀆陰脈弦法  
當腹中急痛製小建中湯方芍藥味酸寒主收補中本平  
地者親下故芍藥為君桂枝甘草佐之一則治表虛一則  
治裏虛各言其所主用也後之用古方者觸類而長之庶  
不至差悞矣 凡解利傷風以防風為君甘草白木為佐  
經云辛甘發散為陽風宜辛散防風味甘辛又治風通用  
故防風為君甘草白木為佐 凡解利傷寒以甘草為君  
防風白木為佐是寒宜甘發也或有別症於前隨症治病  
藥內選用其分兩以君臣論 凡眼暴熱赤腫以防風黃

八醫學綱目卷三

九

本為君以瀉火以黃連當歸根和血為佐兼以各經藥用  
之 凡眼久病昏暗以熟地黃當歸根為君以羌活防風  
為臣甘菊甘草之類為佐 凡痢疾腹痛以白芍藥甘草  
為君當歸白木為佐見血先後以三焦熱論 凡水瀉茯苓  
白木為君芍藥甘草為佐 凡諸風以防風為君隨症  
治病藥為佐 凡嗽以五味子為君有痰者以半夏為佐  
喘者以阿膠為佐有熱無熱以黃芩為佐但分兩多寡不  
同耳 凡小便不利黃柏知母為君茯苓澤瀉為佐 凡  
下焦有濕草龍膽防風為君甘草黃柏為佐 凡痔漏以  
蒼朮防風為君甘草芍藥為佐詳別症加減 凡諸瘡以  
黃連當歸為君甘草黃芩為佐 凡瘰癧以柴胡為君隨所  
發時所屬經分用引經藥佐之  
已上皆用藥之大要更詳別症於後隨症治病藥內逐

一加減用之

夫諸病在臟欲攻之當隨其所得而攻之如渴者與猪  
苓湯餘皆倣此

頭痛須用川芎如不愈各加引經藥 太陽川芎陽明白  
如辛少陽柴胡 頂癩痛須用藜本去川芎 項痛  
厥陰吳茱萸 肢節痛須用羌活去風濕亦宜用之 腹痛須用芍藥惡  
寒而痛者加桂惡熱而痛者加黃柏 心下痞用枳實黃  
連 肌熱及去痰者須用黃芩肌熱亦用黃芪 腹脹用  
薑制厚朴 虛熱須用黃芪止虛汗亦用 脇下痛往來  
寒熱日晡潮熱須用柴胡 脾胃受濕沉困無力怠墮好  
臥去痰用白木 破滯氣用枳殼高者用之 夫枳殼者損  
胃中至高之氣三二服而已 破滯血用桃仁蘇木 補  
血不足須用甘草 去痰須用半夏熱痰加黃芩風痰加

八醫學綱目卷三

十

南星胸中寒痰痞塞用陳皮白木多用苦寒則瀉脾胃  
腹中窄狹須用蒼朮 調氣須用木香 補氣須用人參  
和血須用當歸凡血受病者皆當用當歸也 去下焦  
濕腫及痛并膀胱有火邪者必須酒洗防已草龍膽黃柏  
知母 去上焦濕及熱須用黃芩瀉肺火故也 去中焦  
濕熱與痛用黃連瀉心火故也 去滯氣用青皮勿多服  
多服則瀉人真氣 渴者用乾葛茯苓禁半夏 嗽者用  
五味子 喘者用阿膠 宿食不消用黃連枳實 胃中  
煩熱須用梔子仁 水瀉須用白木茯苓芍藥 氣刺痛  
用枳實者何部分以引經藥導使之行則可 血刺痛用  
當歸詳上下用根稍 瘡痛不可忍用苦寒藥如黃柏  
黃芩詳上下根稍用及引經藥則可 眼痛不可忍用  
黃連當歸根以酒浸煎 小便黃者用黃柏數者瀉者或



加澤瀉 腹中實痛熱用大黃芒硝 小腹痛用青皮  
莖中痛用生甘草稍 飲水多致傷者用白朮茯苓  
苓 胃脘痛用草薢 凡用純寒純熱藥必用甘草以  
緩其力也寒熱相雜亦用甘草調和其性也中滿禁用經  
曰中滿者勿食甘

**補** 非白朮不能去濕非枳實不能消痞非天雄不能補  
上焦陽之虛非附子不能補下焦陰之虛

**瀉** 如麻緩急情嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平  
胃散若脈弦氣弱自汗四肢發熱或大便泄瀉或皮毛枯  
槁髮脫落從黃芪建中湯 脈虛而血弱於四物湯中摘  
一味或二味以本題症中加之 或真氣虛弱及氣短脈  
弱從四君子湯 或渴或小便秘澀亦黃多少從五苓散  
去桂摘一二味加正藥中 假令表虛自汗春夏加黃芪

八醫學綱目卷二

主

秋冬加桂如腹中急縮或脈弦加防風急甚加甘草腹中  
窄狹或氣短者亦加之腹滿氣不轉者勿加雖氣不轉而  
脾胃中氣不和者勿去但加厚朴以破滯氣然亦不可多  
用於甘草五分中加一分可也腹中奔悶此非腹脹乃散  
而不收可加芍藥 如肺氣短促或不足者加人參白芍  
中焦用白芍則於脾中升陽使肝膽之邪不敢犯也腹中  
窄狹及縮急者去之及諸酸清藥不可用 腹中疼痛者  
加甘草芍藥稼穡作其甘者已也曲直作酸酸者甲也甲  
已化土此仲景妙法也腹痛熱加黃芩惡寒或腹中  
覺寒加桂 急情嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或泄瀉  
加蒼朮自汗加白朮小便不利加茯苓渴亦如之氣弱者  
加白茯苓人參氣盛者加赤茯苓砂仁氣復不能轉運  
有熱者微加黃連心煩亂亦加之小便少者加猪苓澤瀉

八醫學綱目卷二

主

汗多津液竭於上勿加之是津液還入胃中欲自行也  
不渴而小便秘塞加炒黃栢知母小便澀者加炒滑石小  
便淋澀者加澤瀉且五苓散治渴而小便不利無惡寒者  
不得用桂不渴而小便自利妄見妄聞乃瘀血症用炒黃  
栢知母以除腎中燥熱竅不利而淋加澤瀉炒滑石只治  
竅不利者六乙散中加木通亦可心藏熱者用錢氏導赤  
散中滿或但腹脹者加厚朴氣不順加橘皮氣滯加青皮  
一橘皮三氣短小便利者四君子湯中去茯苓加黃芪以  
補之如腹中氣不轉者更加甘草一半腹中刺痛或周身  
刺痛者或裏急者腹中不寬快是也或虛坐而大便不得  
者皆血虛也血虛則裏急或血氣虛弱而目睛痛者皆加  
當歸身頭痛加川芎苦頭痛加細辛此少陰頭痛也髮脫  
落及臍下痛者加熟地黃 如皮毛肌肉之不伸無大熱  
不能食而渴者加葛根半兩 燥熱及胃氣上衝為衝脈  
所逆或作逆氣而裏急者加炒黃栢知母覺胃熱而不渴  
加炒黃芩如胃中結滯氣澀或有熱者亦各加之如食少  
而小便少者津液不足也勿利之益氣補胃自行矣 如  
氣弱氣短者加人參只升陽之劑助陽之勝多加參 惡  
熱發熱而燥渴脈洪大者白虎湯主之或喘者加人參如  
渴不止寒水石石膏各等分少少與之即錢氏方中甘露  
散主身大熱而小便數或上飲下洩此燥熱也氣燥加白  
葵花血燥加赤葵花 如小便利行病增者此內燥津液不  
能停當致津液少加炒黃栢赤葵花 如心下痞悶者加  
黃連一黃芩三減諸甘藥不能食心下軟而痞者甘草瀉  
心湯則愈 存有九種治法 如喘滿者加炙厚朴使  
不利者加之 如胃虛弱而痞者加甘草 喘而小便不



利者加苦葶藶、如氣短氣弱而腹微滿者不去人參去甘草加厚朴然不若苦味泄之而不令大便行如腹微滿而氣不轉者加之、如中滿者去甘草倍黃連加黃柏更加三味五苓散少許此病雖宜不宜汗如汗多亡陽加黃芪四肢煩熱肌熱與柴胡羌活升麻葛根甘草則愈、如臍清涕惡風或項背脊強痛羌活防風甘草等分黃芪倍加臨臥服之、

脈熱身熱加減法見發熱門、

約方

禁服篇云約方猶約囊也囊滿弗約則輸泄方成弗約則神與氣非俱未滿而知約之可以為上不可以為天下師此聖人所以退太過而進不及以平為期也大凡氣味者有毒無毒固宜常制矣是以大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九餘

一、六、書、身、修、一、卷、三

三

以穀肉菜果食養盡之無使過之傷其正也至如君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也近而奇偶制小其服遠而奇偶制大其服大則數少小則數多則九之少則二之補上治上制以緩補下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄下不以偶汗不以奇隨其邪之所在高下淺深輕重虛實影響無間萬舉萬全是謂中行故可為師也假如證大而湯劑小則邪氣少屈故藥力已乏欲不復治其可得乎猶一盃水救一輿薪之火火竟不滅是謂不及故不可以為師而可以為工矣證小則湯劑大而邪服邪已盡而藥餘亦欲不傷正何所容哉猶火炎崑崙王石俱焚莫之能止是謂太過此又不可以為工是為醫也三者之論惟中而已過與不及皆為偏廢然而太過猶甚於不及何以明之蓋失於姑息邪復勝正者止於勞而無益猶可

丸散法

勉而適中或失苛暴則血氣被傷因致廢替者有之危殘者有之滅亡者有之非徒無益而又害之此所謂猶甚也可不戒哉嘗考仲景之書於承氣湯下攻裏則曰若更衣止後服於桂枝方後發表乃云藥發微汗益佳不可令如水淋漓皆本平軒岐之微旨也

言到如麻頭與咬咀同意夫咬咀古之制也古者無鉄刃以口咬細今如麻頭為倉末煎之使藥水清飲於腹中則易升易散也此所謂咬咀也今人以刀器到如麻頭大比咬咀之易成也若一槩為細末不分清濁矣經云清陽發騰理濁陰走五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑咬咀之藥取汁易行經絡故也若治至高之病加酒煎去濕以生薑補元氣以大寒發散風寒以葱白去膈上痰以蜜細末者不循經絡止去胃中及臟腑之積氣味厚

一、六、書、身、修、一、卷、三

三

者白湯調氣味薄者煎之和查服去下部之疾其丸極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小用稠麪糊取其遲化直至下焦或酒或醋取其收其散之意也犯半夏南星欲去濕者以生薑汁稀糊為丸取其易化也水浸宿炊餅者易化滴水丸者又易化煉蜜丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化而旋旋取效也大抵湯者湯也去久病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去之取用藥之舒緩而治之意也病在上者先食而後藥病在心下者先藥而後食病在四肢者宜飢食而在且病在骨髓者宜飽食而在夜古之方劑錙銖分兩與今不同云一升者今之大白蓋也云銖者六銖為一分即二錢半也二十四銖為一兩也三兩者今之一兩二兩者今之六錢半也料例大者合三分之一足矣大黃忍



寒則損胃氣須煨至於川烏附子須炮以制毒也 黃柏知母下部藥也久弱之人須合用之酒浸曬乾恐寒傷胃氣也熱地黃酒洗亦然當歸酒浸助發散之意也

至元庚辰六月許伯威年五十四中氣不弱病傷寒八九月醫者見其熱甚以涼藥下之又食梨三四枚痛傷脾胃四肢冷時發昏憤余診其脈動而中止有時自還乃結脈也心亦悸動吃噁不絕色變青黃精神減少目不欲開倦臥惡人語笑以炙甘草湯治之成無已云補可去弱人參大棗之甘以補不足之氣桂枝生姜之辛以益正氣五臟痿弱榮衛涸流濕劑所以潤之故用麻仁阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脈通心是也加以人參桂枝急扶正氣生地黃減半恐傷陽氣對一兩劑服之不效予再候之脈證相對莫非藥有陳腐故不效乎再而藥之氣味厚

者煎服其證減半再服而安凡藥之昆虫草木產之有地根葉花實採之有時失其地則性味少異失其時則氣味不全又况新陳之不同精麤之不等倘不擇而用之其不效者醫之過也內經曰司歲備物氣味之精專也修合之際宜加謹焉 病人服藥必擇人煎熬制度令親信恭誠至意者為之煎藥銚器除油垢腥穢必用新淨甜水為上量水多少斟酌以慢火煎熬分數用紗濾去查取清汁服之無不效也

醫學綱目卷之三

醫學綱目卷之四

陰陽臟腑部

治虛實法

虛實大 邪氣盛則實精氣奪則虛 通評虛實論○此二邪之所湊其氣必虛 許無論○針經云風雨寒濕不得虛其氣必虛留而 不去其病則實

人有三虛三實何謂也有脈之虛實有病之虛實有診之虛實脈之虛實者濡者為虛緊者為實病之虛實者出者為虛入者為實言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實診之虛實者濡者為虛牢者為實痒者為虛痛者為實外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外虛故曰虛實也

所謂重實者言大熱病氣熱脈滿是謂重實 論下同 脈氣虛尺虛 虛甲乙經作脈虛是謂重虛所謂氣虛者言無

醫學綱目卷四

常也尺虛者行步惛然脈虛者不象陰也 脈盛皮熱腹脹前後不通悶發此謂五實五實死身汗得後利則實者活 玉機真藏論下同○于和診一舟子病乃五實也作大類下七八九不動滿計竭智窮無如之何忽憶然花皆九前藥相兼而下其昏困數日方已 脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入是謂五虛五虛死藥粥入胃泄注止則虛可活 治五虛黃芪建中湯理中 瀉胃中元氣盛則能食而不傷過時而不饑脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉脾實而邪氣盛也 治脾胃虛補中 形氣不足病氣有餘是邪勝也急瀉之形氣有餘病氣不足急補之形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可刺之刺之則重不足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣形氣有餘病氣有







不澤其脉空虚已上見

右精氣津液血脉六者蓋精氣即衛氣津液血脉即營

血之異名衛氣根於血管血根於氣故曰一氣也

脫血候臂多青脉曰脫血平人氣象安臥脉盛謂之脫血

尺炬然熱人迎大者當奪血尺論脉弦則衛氣不行內經

氣虛則脉弦血虛則脉大仲景云脉弦則衛氣不行內經

云脉盛大者陰不足陽有餘也

脉大而堅者血氣俱實脉小者血氣俱虛 脉大者血

氣俱多脉細微者血氣俱虛

脉動而實且疾者疾瀉之虛而徐者則補之終始

脉有陽虛陰盛陽虛何謂也然浮之損小沉之實

大故曰陰盛陽虛沉之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是

陰陽虛實之意也六

脉滿如車蓋者名曰陽結也脉累累如循長竿者名

曰陰結也如車蓋者浮大而加也

寸口脉澀澀如羹上肥陰氣微連連如蜘蛛絲陰氣衰

如美上肥者平大而無力

也如絲者細而無力也

脉綿綿如瀉瀉之絕者亡其血也

脉滑者多血少氣脉澀者少血多氣

寸口脉微而澀微者衛氣衰澀者榮氣不足

雖脉有損至何謂也然至之脉一呼再至曰平三至曰離

經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此死至之脉也何

謂損一呼一至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰死

四呼一至曰命絕此損之脉也至脉從下上損脉從上下

也損脉之為病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損

損於血脉血脉虛少不能榮於五臟六腑三損損於肌肉

肌肉消瘦飲食不能為肌膚四損損於筋筋緩不能自收

持五損損於骨骨痿不能起於牀反此者至脉之病也從

上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者

死治損之法奈何然損其肺者益其氣損其心者調其榮

衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其

腎者益其精此治損之法也治損之法脉來一呼再至

一吸再至不大不小曰平一呼三至一吸三至為過得病

前大後小即頭痛目眩前小後大即胃滿短氣一呼四至

一吸四至病欲其脉洪大者苦煩滿沉細者腹中痛滑者

傷熱澀者中霧露一呼五至一吸五至其人當困沉細夜

加浮大晝加不大不小雖困可治其有大小者為難治一

呼六至一吸六至為死脉也沉細夜死浮大晝死一呼一

至一吸一至名曰損人雖能行猶當者脉所以然者血氣

皆不足故也再呼一至再吸一至名曰無氣無氣者當死

也人雖能行名曰行屍上部有脉下部無脉其人當吐不

吐者死上部無脉下部有脉雖困無能為害也所以然者

譬如人之有尺樹之有根枝葉雖枯槁根本將自生脉有

根本人有元氣故知不死已上十

寸口諸微亡陽諸濡亡血 脉來緩時一止復來者名

曰結脉來數時一止復來者名曰促脉陽盛則促陰盛則

結此皆病脉

挾喉兩旁人迎脉大為陽盛兩寸口脉大為陰盛詳

見鍼灸門刺虛實法內經以挾喉兩旁動脈為人迎脈

陰不勝其陽則脉流薄疾并乃狂陽不勝其陰則五臟

氣舉九竅不通生氣通天論

氣虛氣弱者

陳皮 黃芪 人參



氣實氣結者	青皮	厚朴	木香	沉香
血虛者	生地黃	當歸身		
血虛惡血積聚者	當歸稍	蘇木	紅花	
氣血弱者勿與枳殼以其損氣也	氣血盛者勿與丁香以其益氣也	脈弦而虛者勿損氣脈大而實者勿益氣	脈中有少力浮則似止胃中真氣不及也	
人參	五味子	麥門冬	沉香	
川芎	益智	白荳蔻	丁香	
氣虛則生脈散	血虛則三才丸	四君子湯治真氣虛弱及短氣脈弱		
白朮	人參	黃芪	茯苓	
右為粗末每服伍錢水一盞煎至七分食遠溫服				
益氣丸治語言多損氣懶語補上益氣				
麥門冬	人參	橘皮	桔梗	
炙甘草	五味子			
右為極細末水浸油餅為丸如雞頭大每服一九細嚼				
津唾嚥下				
虎損人參黃芪湯				
人參	黃芪	白朮	陳皮	
甘草	當歸	茯苓		
右咬咀水煎空心熱服胃熱不能食者加姜棗湯煎				
補中益氣湯治飲食勞倦所傷				
調中益氣湯治脈弦洪緩而沉按之中之下時得一溢其				
證心腹滿閉肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽				

肥忽瘦四肢懶倦口失滋味腹難舒伸大小便溺清利而	數或上飲下泄或大便澀滯不行一二日一見夏月發泄	米穀不化或便後見血及白膿胸滿短氣膈咽不通或痰	嗽稠粘口中沃沫食入反出耳鳴耳聾兩目焰火視物昏	花努肉紅絲熱壅頭目不得安臥嗜臥無力不思飲食
黃芪	甘草	人參	柴胡	升麻
右到如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去香帶熱				
服宿食消盡服之寧心絕思藥必神效蓋病在四肢血	脈空虛宜在旦服	如時顯熱燥是下元陰火蒸蒸發	也加真生地黃	如大便虛坐不得或大便
了而不了腹常逼迫血虛血澀也加當歸身				
體沉重雖小便數多亦加茯苓	病其脈絡於心中故顯濕熱相合而生煩也	如胃	氣不和加湯洗半夏	生薑三片以制半夏之毒有嗽
者去之綠痰厥頭痛非半夏不能除此足太陰脾經之	邪所作也如無已上證只服			
黃芪	人參	甘草	橘皮	
柴胡	升麻	蒼朮	黃柏	
右件到如麻豆大依前煎服				
中氣不足隨時加減用藥法	如食少不饑加炒麩	如		
食已心下痞別服橘皮枳朮丸	如脈弦四肢滿悶便	難而心下痞加甘草黃連柴胡	如腹中氣上逆者是	衝脈逆也加黃柏
心下痞加黃連桃仁少加大黃當歸身	如心下痞券			



悶者加白芍藥黃連 如心下痞腹脹加五味子白芍藥縮砂仁 如天寒少加乾姜或中桂 如心下痞中寒者加附子黃連 如心下痞嘔逆者加黃連生薑橘皮 如冬月不加黃連少入丁香藿香葉 如口乾咽乾加五味子葛根 如脇下急或痛加柴胡甘草 如胸中滿悶鬱鬱然加橘紅青皮木香少許 如頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏生薑或三分 如腹中或周身間有刺痛皆血滯不足加當歸身如噦加五味子多益智少 如脈洪大兼見熱症少加黃連黃芩生地黃甘草 如脈緩沉重怠惰無力者濕勝也加蒼朮澤瀉人參白茯苓五味子 如脈澀覺氣滯澀者加當歸身天門冬木香青皮陳皮有寒者加桂枝黃芪 如食不下乃胃中胃上有寒或氣滯澀加

青皮陳皮木香此三味為定法冬天加益智仁草薏苳仁縮砂仁夏月少用更加黃連秋月氣滯澀氣不下更加枳椇草薏苳仁縮砂仁或少加白薏苳仁如春三月食不下亦用青皮少陳皮多更加風藥以退寒覆其上如初春猶寒更少加辛熱以補春氣之不足以為風藥之佐益智草薏苳皆可也如脈弦者見風熱之證以風藥通之 如胃中綴塞或氣閉悶亂者肺氣滯澀不行宜破滯氣青皮陳皮少加枳椇木香冬月加吳茱萸人參如胃中綴塞閉不通者為外寒所遏使呼出之氣不得伸故也必寸口脈弦或微緊乃胃中有寒若加之以舌上有白胎滑者乃丹田有熱胃中有寒明矣丹田有熱者必尻骨冷前陰間冷汗兩丸冷是邪氣乘其本而正氣走於經脈中也若遇寒則必作陰陰而痛以此

四物湯

辨丹田中有伏火加黃柏生地黃勿誤作寒証治之如秋冬天氣寒涼而腹痛者加半夏或益智或草薏苳之類 如發熱或捫之而肌表熱者此表証也其服補中益氣湯一二服亦能得微汗則涼矣 如腳膝痠軟行步無力或痠痛乃腎肝中伏濕熱也少加黃柏空心服之不愈更增黃柏加漢防已 錢則腳膝中氣力如故也 如多唾或唾白沫者胃口上停寒也加益智仁如少氣不足以息者服正藥二三服氣猶短促者為膈上及表間有寒所遏當引陽氣上伸加羌活獨活藁本最少升麻多柴胡次之黃芪加倍

四物湯益榮滋氣血  
 熟地黃 補血如補下痛非此不  
 此不能除乃通腎經之藥 川芎 治風泄肝木也  
 通腎肝之藥 芍藥 和 當歸 如血虛頭痛非  
 此不能除乃通腎經之藥

右為粗末水煎 又春則防風四物加防風倍川芎夏則黃芩四物加黃芩芍藥 秋則門冬四物加天門冬倍地黃 冬則桂枝四物加桂枝倍當歸 若血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹痛六合 若風眩加秦艽羌活謂之風六合 若發熱而煩不能睡臥者加黃連梔子謂之熱六合 若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合 若氣虛弱起則無力睪然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若虛寒脈微自汗氣難布息便清白加乾姜附子謂之寒六合 若身熱脈躁頭昏項強者加柴胡黃芩 若因熱生風者加川芎柴胡防風 若目赤暴發作雲翳痠痛不可忍宜四物龍膽湯 若瘡疾加荆芥酒煎常服 若虛煩不得睡加竹葉人參 若虛熱病四物與參



蘇飲相合名補心湯主之 若煩躁大渴加知母石膏

若陰虛致熱與血相搏口舌乾渴飲水加瓜蒌麥門

冬 若諸痛有濕者宜四物與白朮相半加天麻茯苓

川山甲酒煎 若四肢腫痛不能行動四物蒼朮各半

湯主之 若嘔者加白朮人參生薑 若水停心下微

吐逆者加猪苓茯苓防己 若治燥結四物與調胃承

氣湯各半為玉燭散 若臟閉澀者加大黃桃仁 若

老人風秘加青皮等分煎 若流濕潤燥宜四物理中

各半湯 若滑瀉者加官桂附子 若血痢加膠艾煎

若腹脹加厚朴枳實 若虛勞氣弱咳嗽喘滿宜厚

朴六合四物湯四兩厚朴姜製一兩枳實炒半兩

若血氣上衝心腹肋下滿悶宜治氣六合四物湯四兩

加木香枳殼各一兩 若發寒熱者加乾姜炒黑牡丹

醫學綱目卷四

皮白芍藥柴胡 若虛壯熱似傷寒者加人參柴胡

四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈

等皆可作各半湯此易老用藥大畧也 四物湯加減

治婦人穉病方二十六道見婦人部 四物湯加減治

妊娠傷寒方名六合湯一十五道見傷寒部 四物湯

加減調經方七道見調經

三才丸

天門冬 地黃 人參 各等分為末煉蜜丸空心服

溫衛補血湯治耳鳴鼻不聞香臭口不知五味氣不快四

肢困倦不收行步歌側毛髮脫落食不下膝冷陰汗帶下

喉中啞啞不得臥口舌液乾太息頭不可回顧項筋緊脊

骨強痛頭旋眼黑頭痛呵欠嚏噴

蒼朮分 升麻分 柴胡根分 生地黃分

牡丹皮分 熟甘草分 白朮分 當歸分

人參分 生甘草分 丁香分 王瓜根分

黃芪分 陳皮分 吳茱萸分 葵花分

右為鹿末水二盞煎法如常食前服 一本加藿香黃

栝地骨皮桃仁

脾胃不足皆為血病是陽氣不足陰氣有餘故九竅不通

諸陽氣根於陰血之中陰血受火邪則陰虛陰盛則上乘

陽分而陽道不行無生發升騰之氣也夫陽氣走空竅者

也陰氣附形質者也如陰氣附於土陽氣升於天則各安

其分也今所立方中有辛甘溫藥者非獨用也復有甘苦

大寒之劑亦非獨用也以火酒二劑為之引使苦甘寒藥

至頂而復入腎肝之下所謂升降浮沉之道自偶而至奇

自奇而至偶也瀉陰火以諸風藥升發陽氣以滋肝膽之

醫學綱目卷四

用是令陽氣生上出於陰分末用辛甘溫藥投其升藥使

大發散陽分而令走九竅也

治陰不勝陽脈至數疾六七至甚則狂者治見寒熱門黃

連解毒湯三黃九紫雪諸方求之甚者承氣湯

云陽先絕色青陰先絕色赤

脈絕者陰入于地中也脈者如地中溝渠也通達諸經

灌漑一體陽氣鼓舞而行之陽不行則脈不動矣是以陰

離而不守故大小便皆為之不禁內溫之外灸之並行而

不可緩溫之四逆重灸之臍下臑穴一寸五分氣海是也

八物湯方四物四君

白朮 茯苓 人參 黃芪

當歸 芍藥 川芎 地黃

右為散每五錢水二盞煎至一盞去渣食後溫服



虛勞憂思諸不足黃芪建中湯主之

黃芪三兩 桂枝二兩 甘草二兩 大棗十二

芍藥六兩 生姜二兩 膠飴一斤

右七味以水七升煮取三升去渣納膠飴更上微火消

解溫服一升日三服 氣短胃滿者加生姜 腹滿者

去棗加茯苓兩及療肺虛損不足補氣加半夏兩

又治脉弦自汗四肢發熱或皮毛枯槁髮脫落宜黃芪

建中湯

虛勞畏急悸衄腹中痛夢失精四肢酸疼手足煩熱咽

口乾燥小建中湯主之傷寒

口乾和飲補血益氣治虛勞少力

黃芪 熟地黃 當歸 川芎各乙

白芍藥乙錢 官桂 甘草各七

右為粗末每服四大錢水一盞半生薑三片肥棗三枚

煎至八分去渣服予製此方是建中四物二方每傷寒

瘧疾中暑大疾之後虛勞氣乏者以此調治皆驗不熱

不冷溫而有補

大補十全散治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲

食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面

色痿黃脚膝無力喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治

之

肉桂 甘草 芍藥 黃芪 當歸

川芎 人參 白朮 茯苓 熟地各等

右為末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至

七分不拘時候溫服桂芍藥甘草小建中湯也黃芪與

此三物即黃芪建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子

湯也川芎芍藥當歸地黃四物湯也以其氣血俱衰陰

陽並弱法天地之成數故名曰十全散

正氣天香散治九氣

烏藥兩 香附末兩 陳皮 蘇葉 乾姜各乙

右為細末調服

導氣丸

白木香 蘇荀子 茴香 枳殼 牽牛頭末各四

右為末薄糊丸如桐子大每服三四十九

桃仁承氣湯方見傷寒

通真丸婦人通經男子破血

大黃去皮切 桃仁各四兩去 天水末四兩天水一

乾漆上焙煙盡 杜牛膝二兩 右為末醋糊丸如桐子大每服六七十丸

木香和中丸

木香 沉香 白荳蔻 枳實 枳殼

蓬朮 青皮 陳皮 當歸 黃芩

木通 黃連 縮砂 猪牙皂角去皮弦并

乾姜 郁李仁湯去 三稜末乙兩

大黃兩 香附兩 黃柏兩 牽牛頭末兩

右為末水丸每服三錢重白湯下或姜湯下

木香枳榔丸流濕潤燥推陳致新

木香 枳榔 青皮 陳皮 廣茂

枳殼 宣連各半 黃柏乙兩 大黃乙兩 黑牽牛

評曰此戴人經驗方也善治下虛上實抑火升水流濕

潤燥推陳致新資陰代陽散鬱破結活血通經及治肺

痿喘嗽胃膈不利脾濕黃疸宿食不消一切雜証不能



盡迷戴人每令病人夜睡服之以進食任服他藥婦人調和血氣小兒驚悸積熱皆可量輕重用之原本有香附二兩全真丸治脾臟積熱洗滌腸垢潤利燥澀風毒攻經手足浮腫或頑痺不仁痰涎不利涕唾稠粘胃膈痞塞臍腹脹滿飲食減少困倦無力凡所內傷並宜服之

黑牽牛八兩燥火炒四兩生用 大黃二兩米泔浸三日逐日換

右以皂角二兩輕手揉去皮子水一大碗浸一宿入蘆荷一兩切作片子同皂角一處熬至半碗去渣再熬至二盞搜和上件藥末乾濕得所丸如桐子大每服三十丸諸飲下不拘時候金宣宗救賜名保安丸

神芎導水丸治勞瘵停濕二陽病熱鬱

黃芩兩 黃連兩 大黃兩 川芎兩

滑石兩 薄荷兩 黑牽牛四兩

河間制治一切熱証其功不可盡述設或久病熱鬱無問瘦瘠老弱并一切証可下者始自十九丸以爲度常服此藥除腸垢積滯不傷和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦不困倦虛損遂病人心意或熱甚必急須下者使服四五丸未效再服以意消息常服二三十丸不動臟腑有益無損或婦人血病下惡物加桂半兩病微者常服甚者取利因而結滯開通惡物自下也凡老弱虛人脾胃經虛風熱所鬱色黑齒槁身瘦焦瘵黃或服甘熱過度成三消等病若熱甚於外則肢體躁擾病於內則神志躁動拂鬱不開變生諸症皆令服之惟臟腑滑泄者或寒寒脈遲者或婦人經病產後血下不止及孕婦等不宜服

舟車神祐丸洩水濕

甘遂兩 大黃兩 芫花兩 黑牽牛四兩 輕粉錢 大戟兩 青皮 陳皮 木香 枳榔各半 取薑加蕪荑半兩爲末水丸空心服

河間依仲景十棗湯例製出此方主療一切水濕爲病戴人云十棗洩諸水之上藥所謂溫藥下者是已如中滿腹脹喘嗽淋閉水氣蠱腫雷飲癖積氣血壅滯不得宣通風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛久新瘧痢等患婦人經病帶下皆令按法治之病去如掃故賈同知稱爲神僊之奇藥也緣此方河間所定初服五丸日三服加至快利後卻常服以病去爲度設病愈後平人能常服保養宣通氣血消運飲食若病痞悶極甚者便多服反

煩滿不開轉加痛悶宜初服二丸每服加二丸加至快利爲度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法加減至戴人變爲神芎丸神祕不傳然每令病人夜臥先服百餘粒繼以瀉川等藥投之五更當下種種病出投下少未再服和腸藥須以利爲度有五日一下者三日一下者病輕者可一二度止重者五六度方愈是檢縱卷舒之妙臨証制宜非言可論觀其藥雖峻急認病的確自非老手諳練有大負荷者焉敢見諸行事予每親製用之若符節然又隨人強弱當依河間漸次進服強實之人依戴人治法行之神効可驗

大聖瀉川散 大黃兩 甘遂錢 牽牛兩 木香錢



郁李仁配 芒硝三錢

評曰此下諸積之聖藥也諸濕為土火熱能生濕土故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥乾濕病本不自生因於火熱沸鬱水液不能宣通停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣多為兼病內經云明知標本正行無問者是也夫濕在上者目黃而面浮在下者股膝腫厥在中者肢滿痞脹逆在陽不去者久則化氣在陰不去者久則成形世俗不詳內經所言留者攻之但執補燥之劑悖鬱轉加而病愈甚也法當求病之所在而為施治瀉實補虛除邪養正以平為期而已又嘗考戴人治法假如肝木乘脾土此土不勝木也不勝之氣尋救于子巳土能生庚金庚為大腸味辛者為金故大加生薑使伐肝木然不開脾土無由行也遂以舟車丸先

六鬱 氣血冲和百病不生

通閉塞之路是先瀉其所不勝後以姜汁調瀘川散大下之是瀉其所勝也戴人每言瀘水丸必用禹功散繼之舟車丸必以瀘川散隨後如寒疝氣發動腰膝痛急痛者亦當下之以瀘其寒水世俗聞於治體一槩鹵莽有當下而非其藥終致委頓而已豈知巴苴可以下寒甘遂芫花可以下濕大黃芒硝可以下燥如是分經下藥兼食療之非守一方求其備也故戴人曰養生與攻病本自不同今人以補劑療病宜乎不効是難言也

- 氣 香附 撫芎 蒼朮
- 濕 蒼朮 川芎 白芷
- 痰 海石 香附 瓜蒌 南星
- 熱 青黛 香附 蒼朮 川芎 梔子

- 血 桃仁 紅花 青黛 川芎 香附
- 食 蒼朮 香附 山查 神麩 鐵砂加醋
- 春加用芎 秋冬茱萸 夏加苦參
- 越鞠丸解諸鬱

凡鬱在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假如食在氣上提其氣則食自降矣餘皆倣此

益陰經血解五臟結氣用山支炒令十分有二分焦黑為末以姜汁入湯煎飲之其效捷於他方也

四順氣丸治血鬱香附半斤童便浸曬乾粟糊為丸

其母能散心胃鬱結之氣殊有功

論曰虛損之人寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛故損自上而下治之宜以辛甘淡過于胃則不可治

也感熱則損陰陰虛則陽盛故損自下而上治之宜以甘苦酸鹹過于脾則不可治也自上而下者一損損於肺皮聚而毛落二損損於心血脉虛少不能榮於臟腑婦人月水不通三損損於胃飲食不為肌膚自下而上者一損損於腎骨痿不能起於牀二損損於肝筋緩不能自收持三損損於脾飲食不能消克論曰心脚擗而色敗腎肝損而形痿穀不能化而脾損感此病者皆損之病漸浸之深皆虛勞之疾也

四君子湯治脾損而皮聚毛落益氣可也  
八物湯治心脾虛損皮聚而毛落血脉虛損婦人月水愆期益氣和血  
十全散治心脾損及胃飲食不為肌膚益氣和血調食



金剛丸治腎損骨痿不能起於牀益精補腎

華解 杜仲炒 茯苓酒 兔絲子酒

右細末酒煮猪腰子為丸桐子大每服五七十九空心酒下

牛膝丸治肝腎損骨痿不能起牀筋緩不能收持宜益精緩中

牛膝酒 華解 杜仲炒 茯苓酒

防風 兔絲子酒 白蒺藜等桂心

右細末酒煮猪腰子九桐子大空心酒下五七十九

煨腎丸治肝腎損及脾食穀不化宜益精緩中消穀

牛膝 華解 杜仲 茯苓 兔絲子

白蒺藜 胡蘆巴 破故紙等 桂心

右丸如金剛丸法治腰痛不起者神效

右陰陽虛損諸方蓋謂虛而無熱者設也若虛而有熱者作虛熱治之虛熱又分二法一治新病屬虛熱者反治條求之一治久病屬勞瘵者骨蒸神求之

絡氣不足經氣有餘者寸口熱而尺寒也秋冬為逆春夏為從治主病者經滿絡虛刺陰灸陽若經虛絡滿者尺熱寸口寒瀉也春夏死秋冬生絡滿經虛灸陰刺陽經絡皆實是寸脈急而尺緩也皆當治之故曰滑則從瀉則逆也通評虛

夫人之常數太陽常多血少氣少陽常多氣少血陽明常多氣多血少陰常多氣少血厥陰常多血少氣太陰常少血多氣此天之常數也

脈浮而有力者表實也浮而無力者表虛也沉而有力者裏實也沉而無力者裏虛也

雲脈浮診得六數七極者為表實也浮診得三遲二敗者為表虛也如中診得六數七極者是中焦之熱實也中診得三遲二敗者中焦虛也如沉診得六數七極者下焦有實熱也沉診得三遲二敗者下焦虛也

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

中外各守其鄉內者內治外者外治微者調之其次平之盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命

帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命



之今邪在表何以云表實也予曰古人稱邪之所湊其氣則虛留而不去其病則實蓋邪之入人也始因虛入及邪居中則反為實矣大抵調治傷寒先要明表裏虛實能明此四字則仲景三百九十七法可立而定也何以言之有表實有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛予於表裏虛實歌中常論其事矣仲景麻黃湯之類為表實而設也桂枝湯之類為表虛而設也裏實則承氣之類是也裏虛則四逆之類是也表裏俱實所謂陽盛陰虛下之則愈尚表裏俱虛所謂陽虛陰盛汗之則愈也常讀華陀傳有府吏倪尋李延其証俱頭痛身熱所苦正同陀曰尋當下之延當發汗或難其異陀曰尋外實延內實故治之異耳

麻黃湯桂枝湯承氣湯三方並見傷寒論 四逆湯方見傷寒論

右仲景治表裏虛實法萬世之準繩也

因戊申六月初樞判白文舉年六十二素有脾胃虛損病日疾時作身面目睛俱黃小便或黃或白大便不調飲食減少氣短上氣急喘嗜臥四肢不收至六月中目疾復作醫以瀉肝散下數行而前疾增劇予謂大黃牽牛雖能除濕熱而不能走經絡下咽不入肝經先入胃中大黃苦寒重虛其胃牽牛其味至辛能瀉肺氣重虛肺本故嗽大作蓋標實不去本虛愈甚加之適當暑雨之際素有黃証之人所以增劇也此當補脾胃肺之本臟瀉外經之濕熱製清神益氣湯主之而愈

防風分 生薑分 蒼朮分 茯苓分  
澤瀉分 升麻分

此藥能走經除濕熱而不守故不瀉本臟補肺與脾胃

本臟中氣之虛弱

橘皮分 青皮分 人參分 生甘草

白朮 白芍藥各二分

此藥能守本而不走經不走經者不滋經絡中邪守者能補五臟之元氣

五味子分 麥門冬分 人參分 黃柏分

此藥去時令虛熱濕蒸

右判如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去查稍熱空心服

火熾之極金伏之際而寒水絕體於斯時也故急救之以生脈散除其濕熱以惡其太其肺欲收心苦緩皆酸以收之心火盛則甘以瀉之故用人參之甘佐以五味子之酸孫思邈曰夏月常服五味子以補五臟氣是也麥門冬微

入書牛藥上卷四

注

苦寒能滋水之源於金之位而清肅肺氣又能除火刑金之嗽而飲其痰邪復微加黃柏之苦寒以為守位滋水之流以鎮墜其浮氣而除兩足之痿弱也

右舉東垣一法為例餘可觸類而長也

病有急當救裏救表者何也師曰病醫下之續見下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體疼痛清便自調者急當救表也救裏四逆湯救表桂枝湯

征南帥不鄰吉反腸鳴自利咽噎腫痛先治咽塞後治下利愈方見外熱內寒

不醫後周姚僧垣名醫也帝因發熱欲服大黃藥僧垣曰大黃乃急快藥至尊年高不宜輕用帝不從服之遂至不起及元帝有疾諸醫皆謂至尊至貴不可輕服大黃宜用平藥僧垣曰脈洪而實必有宿食不用大黃必無瘥理元



帝從之果下宿食乃愈合用與不用必心下明得諦當然

診左右

後可  
浮汗而沉下右手沉實 調胃 承氣

左手沉實 桃仁 抵當

難經沉汗而浮下 右手浮實 枳實 牽牛

左手浮實 桃仁 四順

右手 襍病是為之表 傷寒是為之裏

左手 襍病是為之裏 傷寒是為之表

上下虛

天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也

地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也帝

曰何以然岐伯曰東方陽也陽者其精并於上并於上則

上盛而下虛故其耳目聰明而手足不便也西方陰也陰

者其精并於下并於下則下盛而上虛故其耳目不聰明

而手足便也故俱感於邪其在上則右甚在下則左甚此

天地陰陽所不能全也故邪居之 頭痛顛疾下

虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招尤目冥耳聾

下實上虛過在足少陽厥陰甚則入肝腹滿脹肢膈肘

脇下厥上冒過在足太陰陽明咳嗽上氣厥在胸中過在

手陽明太陰心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰

診治上

下虛則厥下盛則熱上虛則眩上盛則熱

兩寸脈實 謂之陽盛陰兩寸脈俱虛 謂之陰盛皆虛補

之以甘藥兩寸脈不足求之于地地者脾胃也當從陰

寸脈短小乃陽氣不足病在下也謂之陰盛陽虛取之下

陵三里補瀉無形是謂導氣同精治在五亂中取法乃不

足病也當取穴於腹募氣海膈下一寸五分甚者取三里

上下用

氣衝以毫鍼引之 兩關脈俱實 上不至發汗下不至利

實 兩關脈俱虛 脈沉細宜服理中湯脈弦宜兩尺脈俱

實 汗之則愈 兩尺脈俱虛 宜服黃芩湯脈沉而兩尺脈俱

宜 下下之則為逆逆者死 兩尺脈或不可見或短小病在天

上求之於五臟皆命或血絡經隱伏火 是天上陰火故

經云下部無脈或兩尺 陽不收斂也又難

惡風也 脈要精 補上治上制以緩補下治下制以急急則

氣味厚緩則氣味薄適其至所此之謂也病所遠而中道

奇耦制小其服也遠而奇耦制大其服也大則數少小則

數多多則九之少則二之 言其數論遠近

病在上為天 煎藥宜武宜清服宜緩飲制度宜炒酒

病在下為地 煎藥宜文宜濃服宜急飲

於上多服則峻補於下 病在上者先食而後藥 病

在心下者先藥而後食 凡用黃芩黃連半夏知母病在

頭面及手皮膚者須用酒一鍾借酒力以上升也咽之下

膈之上須酒洗之在下生用大凡生降熟升 凡諸藥根

在上者中半已上者氣脈上行以生苗者為根中半已下

者氣脈下行以入土者為根病在中焦上焦者用根下焦

者用根則根升而稍降也 去下部之疾者其九極大而

光治中焦之疾者次之治上焦者極小稠麵糊取其遲化

直至下焦稀麵糊取其易化水浸宿蒸餅為丸及滴水為

丸者又易化也 羅東垣先生治消渴以甘露飲子劑為粗散時時以舌舐



之取膈上停留此劑之緩也治心煩欲吐怔忡不安臥以辰砂安神丸如米大津液下十餘丸此近而奇耦制小其服也心膈在上為近劑小者不令下行故也治膈臭製瀉肝湯其說云難經論心主五臭入肝為膈臭此其一也用柴胡苦平微寒為君佐以龍膽苦寒以瀉心火澤瀉車前子甘鹹寒平淡滲肝之邪所謂在下者引而竭之多用水煮頓服之此制之急也以下焦陰虛制滋腎丸以黃柏大苦寒為君知母苦寒為佐使桂甘辛大熱為臣用丸如雞頭實大空心沸湯下百餘丸此遠而奇耦制大其服也

**高者抑之**下者舉之至真要論云王註云高者抑之制其勝也下者舉之濟其弱也

**熱在至高之分**故用輕劑從高抑之治從緩也若急服之上熱未除中寒生矣如治大頭痛用酒煨大黃及黃連等類是也

局方養正丹

方見難經

**垣柴胡調經湯**一婦人經候黑血凝結成塊左脘有血瘕水瀉不止穀有時化有時不化東垣云經漏不止是前陰之氣血已下脫矣水瀉數年不愈是後陰之氣血下陷亦已脫矣是病人周身之氣常行秋冬之令久沉久降當大舉大升以助春夏次用四物隨顯証加減調經湯方見血崩

**一婦人產後**有物如衣裙半在腹半在膝醫不能曉先生曰此子宮也氣血虛隨子而下不能入即與黃芪當歸之劑而加升麻舉之仍以外攻之法而用五倍子作湯洗濯皴其皮使緩欬頃之子宮上先生慰之曰三年後可再生兒無憂也已而果然

**陷下則灸之**東垣云陷者皮毛不任風寒如陽下陷也其脈數中必得細強而緊小或沉澀脈其脈上者可灸陰脈者細強脈小沉澀是也

**氣反者**病在上取之下病在下取之上病在中傍取之五帝取大篇

**一男子病小便不通**醫以利藥治之加劇丹溪云此積痰病也積痰在肺肺為上焦而膀胱為下焦上焦閉則下焦塞譬如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉乃以法大吐之吐已病如失又治一老人泄痢百方不應膈悶食減丹溪與吐劑吐出膠痰升許而痢止詳見久痢此者舉之之意夫小便不通氣血壅塞於下焦也泄瀉日久氣血降沉於下焦也今大吐之則一身血氣皆升浮而復通降沉者升舉故皆痊也

**病在上取之下**如噎逆喘滿上氣者灸臍下丹田三里引氣下降其病立痊之類是也

**仲景云**傷寒三四日邪氣未傳於裏止用瓜蒂散吐而瘥豈可汗也又傷寒六七日胃中微悶不欲言懊惱昏眩無下証仲景梔子湯吐之立可又云中風不知人事亦不須發汗喉中呬嗚有聲用稀涎散吐之又云風頭痛若不吐涎久則瞽目而不治用瓜蒂散吐之三吐而瘥又暴嗽風涎上壅咽塞不利茶調散吐之陽癰久不愈未成痂呆用導涎散吐之又陰癰用三聖散吐之又膏梁之人多食生鱸化蟲伏於胃中胃膈不快噎食不下用葱蘆散吐之又久患腸痛諸藥不能治用獨聖散加蠅稍半錢吐之諸癰不時發作不知人事用半生熟湯吐之暗風病久不瘥發過如舊用鬱金散吐之瘵瘵久不瘥發寒熱無時用常山散吐之蛟龍瘵腹痛脹如鼓久不愈欲死用糖棗散吐之吐出其物形如蜥蜴長七八寸亦可一人初患傷寒飲冷心腹悶身熱見食則嘔用赤小豆散吐之婦人筋絡急

八信經細卷四



痛用神應散吐之或曰筋病吐之何爲答曰木鬱達之所謂達者令其條達或又有打撲墜損先吐之用金花散後下之用承氣湯蓋承者順也偏枯証半身不遂者用追風散吐之頭風後有目疾眼有半明可收者用防風散吐之小兒上喘喘熱先用鬱金散吐之後用鎮涎散下之立効治顛狂病久不已用三聖散吐之後大下之諸風掉搦目直不知人事便可用懸頭膏吐涎立効智膈滿背痛或臂疼可先用祛風湯吐之後服烏藥散厲風或瘡瘍惡瘡便用三聖散吐之後服苦參丸諸厥氣中風不省人事便用神聖散莫內灌之吐涎立効破傷風牙關緊急角弓反張亦用神聖散吐之吐後汗下之効三法俱用之者乃上古高醫神妙莫測今庸下之流止看諸方不知治法不識源流不行聖人法去聖日寢遠矣可惜悲哉

**凡吐**取逆流水調藥吐之凡藥升動真氣者皆能吐如防風桔梗芽茶山柅川芎蘿蔔子以姜汁醋少許瓜蒂散少許入壺汁溫服之以鴉毛鈎探之

**子**和稀涎散  
猪牙皂角不蛀者去皮法乙兩 綠礬五錢 藜蘆半兩

右爲細末每服半錢或一二錢幹開牙關漿水調灌之吐食積痰用蘿蔔子五合油炒插入漿水攪汁入桐油白蜜少許旋旋半溫用帛緊束肚皮然後用鴉毛攪喉中令吐 又法用蝦帶殼半斤入醬姜蔥等料物煮汁先吃蝦後飲汁以鴉翎鈎引即吐必須緊勒腹肚吐肥人濕痰用益元散薑汁調下探引吐之

**四** 荳參散吐痰輕劑  
赤小荳 苦參

右爲末酸漿水調服用鴉翎探之

**吐法單藥**  
桔梗蘆 人參蘆 艾葉 末茶  
瓜蒂 藜蘆 附子尖 砒

此數味皆自吐不用手法探引但藥湯皆可吐虛病症用人參蘆吐之

**三聖散**  
防風二兩 瓜蒂三兩 藜蘆聖惠方減用之或三錢

右各爲麤末每服約半兩以壺汁三茶匙先用二盞煎三五沸去壺汁次入水一盞煎至三沸却將先二盞同一處熬二沸去查澄清放溫徐徐服之以吐爲度不必盡劑

**一方用**  
鬱金半兩 藜蘆錢 苦參錢

右爲末壺汁調吐如吐不止丁香一粒止之又不止葱白湯呷之

治風涎用天南星一枚中開一竅如粟米大好醋納於中焙乾如此三次藜蘆二錢半並爲末酒糊丸每三五丸空心溫酒下一飯時自吐如未吐再三丸如涎盡嘔不止冷葱白湯止之

**瓜蒂散**方見傷寒論氣上衝活  
衍義云凡用瓜蒂良久涎未出者含砂糖乙塊下咽即涎吐之

**二仙散**瓜蒂好茶各等分爲細末每服二錢薑汁調下空心用之



瓜蒂此即甜瓜蒂也去瓜皮用蒂約半寸許暴極乾不限多少細末量疾每用一二錢膩粉一錢七以水半合同調勻灌之治風涎暴作氣塞倒臥服之良久涎自出或覺有涎用諸藥行化不下但如此服涎即出

**和劑碧露丹**

石綠細研九度 附子尖 川烏尖 蝎梢各七

右為末入石綠令勻糊丸雞頭大每服用薄荷汁半盞

化下一丸更以酒半合溫服之須臾吐出痰涎

右吐痰熱劑凡吐痰用寒劑累累吐不透者必用熱劑

吐之方透丹溪用瓜蒂梔子苦參藜蘆等劑累吐許白

雲先生不透後以附子尖和漿水與之始得大吐也

**子**獨聖散用砒不以多少為細末每服一字以新水調下幹開牙關灌之尋常勿用

八醫綱目卷四

天

**治痰喘**

砒乙錢麵二兩清水捏餘香油煮黃色為末每用末

子乙銅錢面江茶三銅錢面調勻五更井水調下如

不吐可添半銅錢面次日再服

**子**青黛散搗鼻取涎神妙方見頭痛氣實痰熱結吐

**吐法**先以布搭膊勒肚腹於不通風處行之 凡用探

吐鵝毛須浸以桐油却以皂莢水洗去油曬乾待用

**子**療痰者以斂股雞翎探引不出以蠶投之不吐再投

之且投且探無不出者吐至昏眩慎勿驚疑書曰若藥不

瞑眩厥疾不瘳如發頭眩可飲冰水立解如無冰水新汲

水亦可強者一二吐而安弱者可作三次吐之庶無損也

吐之次日有頓復者有轉甚者蓋引之而上未平也數日

當再為之如覺渴者冰水新水瓜梨涼物皆不禁惟禁食過飽硬物乾脯難化之物 一醫吐一婦人半月不止命懸須臾予煎麝香湯解之下咽立止或問麝香何能止吐予謂之曰瓜苗開麝香即死吐者瓜蒂也所以立解 如

藜蘆吐者不止以葱白湯解之如石藥吐者不止以甘草

貫衆解之諸草木吐者可以麝香解之丹溪云丁香甘草

吐藥之苦寒者有豉豉瓜蒂茶末梔子黃連苦參大黃黃

芩 苦辛而寒者有鬱金常山藜蘆 甘苦而寒者有地

黃汁 辛而寒者有輕粉 酸而寒者有晉礬綠礬薑汁

酸辛而寒者有膽礬 酸鹹而寒者有青鹽白米飲

甘鹹而寒者有滄鹽 甘而寒者有牙硝 甘而微溫且

寒者有人參蘆 苦而溫者有木香遠志厚朴 辛苦而

溫者有薄荷芫花 辛而溫者有穀精草葱根鬚 甘而

八醫綱目卷四

天

溫者有烏頭附子尖 酸而溫者有飯漿 鹹而溫者有

皂角 辛而熱者有蝎梢 酸而平者有銅綠 甘酸而

平者有赤小豆 凡此三十六味惟常山膽礬瓜蒂有小

毒藜蘆芫花輕粉烏附尖有大毒外二十六味皆吐藥之

無毒者各對証用之宜先小服不吐積漸加之

病勢劇危老弱氣衰者不可吐吐不止則亡陽血虛者不

可吐諸吐血嘔血咯血衄血嗽血崩血失血者皆不可吐

病人無正性妄言妄從者不可吐主病者不辨邪正之說

不可吐性行剛暴好怒喜淫之人不可吐

**脈**尺中按之有力當吐之若尺中按之無力不可吐也

有力則陽氣下陷於陰中為陰中所遏故吐之使陽氣得

上升也

**吐**脾胃虛不可妄用吐藥論 六元正紀論曰木鬱則達



之者蓋木性當動蕩軒輊是其本體今乃鬱於地中無所  
施為即是風失其性人身有木鬱之証者當開通之乃可  
用吐法以助風木是木鬱則達之之義也又說木鬱達之  
者蓋謂木初失其性鬱於地中今既開發行於天上是發  
而不鬱也是木復其性而有餘也有餘則兼其所勝脾土  
受邪見之於木鬱達之條下不止此一驗也又厥陰司天  
風木旺也厥陰之勝亦風木旺也俱是脾胃受邪見於上  
條其說一同或者不悟木鬱達之四字之義反作木鬱治  
之重實其實脾胃又受木制又復其木正謂補有餘而損  
不足也既脾胃之氣先已不足豈不因此而重絕乎 明  
胃中空寒常吐 氣口三倍大於人迎是食傷太陰上部  
有脈下部無脈其人當吐不吐則死以其下部無脈知其  
木鬱在下也塞道不行而肝氣下絕矣兼肺金主塞而不

降為物所隔金能剋木肝木受邪食塞胸咽故曰在上者  
因而越之仲景曰實煩以瓜蒂散吐之如經汗下謂之虛  
煩又名懊憹煩燥不能眠知其木鬱也以梔子豉湯吐之  
昧者不知膈咽不通上支兩脇腹脹胃虛不足乃濁氣在  
上則生脹脹之病猛浪吐之況胃虛必怒風木已來乘陵  
胃氣內經以鐵烙鎮墜之豈可反吐助其風木之邪不宜  
吐而吐其差舛如天地之懸隔唯窒塞煩悶者宜吐之耳  
治下實大承氣湯在前表裏條

肝氣虛則怒實則怒論本神 肝實則兩脇下痛引少腹  
善怒虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐如人將捕之經  
見刺虛  
春脈太過則令人善怒忽眩冒而顛疾其不及則令  
人胃痛引背下則兩脇脹滿玉機真藏論曰青者肝之分  
野肝木不及而肺金乘之故

心氣虛則悲實則笑不休本神 心實則胃中痛脇肢  
滿脇下痛膺背扁臂間痛兩臂內痛虛則胃腹大脇下與  
腰相引而痛經文見刺  
虛實法

夏脈太過則令人身熱膚痛為浸淫其不及則令人煩  
心上見欬唾下為氣泄玉機真  
藏論

脾氣虛則四肢不用五臟不安實則腹脹經洩不利神  
胸 脾實則身重善饑肉瘦足不收行善痰膝下痛虛則  
腹滿腸鳴於泄食不化經文見刺  
虛實法

脾脈太過則令人四肢不舉其不及則令人九竅不通  
名曰重強玉機真  
藏論

肺氣虛則鼻塞不利少氣實則喘喘曾盈仰息本神  
肺實則喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝脛腓足皆痛

虛則少氣不能報息耳聾啞乾經文見刺  
虛實法

秋脈太過則令人逆氣而背痛玉機真  
藏論 喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音玉機真  
藏論

腎氣虛則厥實則脹本神 腎實則腹大脰腫喘咳身  
重寢汗出憎風虛則胃中痛大腹小腹脹清厥意不樂經  
文

冬脈太過則令人解休脊脈痛而少氣不欲言其不及  
則令人心懸如病饑眇中清脊中痛少腹滿小便變玉機  
真藏論

木不及其病內含胠脈外在關節 火不及其病內含膺  
膈外在經絡 土不及其病內含心腹外在肌肉四肢

金不及其病內含膺膈肩背外在皮毛 水不及其病內  
含腰脊骨節外在絡谷踠膝經文  
見刺虛

五藏受  
病分野



五藏者

問曰春脈如弦何如而弦岐伯曰春脈者肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來栗弱輕虛而滑端直以長故曰弦反此者病帝曰何如而反岐伯曰其氣來實而強此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中

春脈弦反者為病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內

帝曰夏脈如鈎何如而鈎岐伯曰夏脈者心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鈎反此者病帝曰何如而反岐伯曰其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其氣來不盛去反盛此謂不及病在中

夏脈鈎反者為病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內

帝曰秋脈如浮何如而浮岐伯曰秋脈者肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛以浮來急去散故曰浮反此者病帝曰何如而反岐伯曰其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中

秋脈毛反者為病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內

帝曰冬脈如營如何而營岐伯曰冬脈者腎也萬物之所合藏也故其氣來沉以搏故曰營反此者病帝曰何如而反岐伯曰其氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病在中

冬脈石反者為病何謂反其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在中

外氣來虛微是謂不及病在中

外氣來虛微是謂不及病在中

外氣來虛微是謂不及病在中

帝曰四時之序逆從之變異也然脾脈獨何主岐伯曰脾脈者土也孤藏以灌四傍者也帝曰然則脾善惡可得見之乎岐伯曰善者不可得見惡者可見帝曰惡者何如可見岐伯曰其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此謂不及病在中

脾者中州也其平和不可得見衰乃見耳如雀之喙如水之下漏是脾之衰見也

陰氣盛則夢涉大水而恐懼陽氣盛則夢大火而燔焮陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢墮甚饑則夢取甚飽則夢與肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢恐懼哭泣飛揚心氣盛則夢善笑恐畏脾氣盛則夢歌樂身體重不舉腎氣盛則夢腰脊兩解不屬凡此十二盛者至而瀉之立已厥氣客于心則夢見丘山烟火客于肺則夢飛揚見金

鐵之奇物客于肝則夢山林樹木客于脾則夢見丘陵大澤壞屋風雨客于腎則夢臨淵沒居水中客于膀胱則夢遊行客于胃則夢飲食客于大腸則夢田野客于小腸則夢聚邑街衢客于膽則夢鬪訟自剝客于陰器則夢接內客于項則夢斬首客于脛則夢行走而不能前及居深地窮苑中客于股肱則夢禮節拜起客于胞胲則夢洩便凡此十五不足者至而補之立已也

肝膽 味辛補酸瀉 氣溫補涼瀉

心小腸 味酸補甘瀉 氣熱補寒瀉

脾胃 味甘補苦瀉 氣溫補涼瀉

肺大腸 味酸補辛瀉 氣涼補熱瀉

腎膀胱 味苦補熱瀉 氣寒補熱瀉

肝苦急食甘以緩之甘草 肝欲散急食辛以散之川

肝欲散急食辛以散之川

肝欲散急食辛以散之川



芎 以辛補之細辛 以酸補之芍藥 肝虛以生薑陳  
皮之類補之虛則補其母腎者肝之母也以熟地黃補  
腎如無他証錢氏地黃丸補之 補肝丸四物湯內加防  
風羌活等分爲細末煉蜜爲丸是也 鎮肝丸即瀉青丸  
去梔子大黃是也治肝虛錢氏補腎地黃丸方見  
瀉肝實以白芍藥瀉之如無他証錢氏瀉青丸主之實則  
瀉其子心乃肝之子以甘草瀉心

錢氏瀉青丸

當歸去酒 草龍膽去酒 川芎

川大黃煨 羌活

防風去

梔子

右各等分爲末煉蜜爲丸雞頭大每服一丸煎竹葉湯  
同砂糖溫水化下海氣暈暈暈以此劑瀉之大効初覺

八醫學綱目卷四

五

問曰上工治未病何也師曰夫治未病者見肝之病知  
肝傳脾當先實脾四季脾土不受邪即勿補之中工不曉  
相傳見肝之病不解實脾惟治肝也夫肝之病補用酸助  
用焦苦益用甘味之藥調之酸入肝焦苦入心甘入脾脾  
能傷腎之氣腎氣微弱則水不行水不行則心火氣盛則  
傷肺肺被傷則金氣不行金氣不行則肝木自愈此治肝  
補脾之要妙也肝虛則用此法實則不必用之經曰虛虛  
實實補不足損有餘是其義也餘臟准此  
垣從前來者爲實邪從後來者爲虛邪此子能令母實母  
能令子虛是也治法云虛則補其母實則瀉其子假令肝  
受心火之邪是從前來者爲實邪當瀉其子火也然非直  
瀉其火十二經中各有金木水火土當木之分瀉其火也  
故標本論云本而標之先治其本後治其標既肝受火邪

先於肝經五穴中瀉榮火行間穴是也後治其標者於心  
經五穴內瀉榮火少府穴是也以藥論之入肝經藥爲引  
用瀉心火藥爲君標而本之先治其標後治其本既肝受  
水邪當先於腎經湧泉穴中補木是先治其標後於肝經  
曲泉穴中瀉水是後治其本以藥論之入腎經藥爲引用  
補肝經藥爲君是也

心苦緩急食酸以收之五味子 心欲軟急食酸以軟  
之芒硝 以鹹補之澤瀉 以甘瀉之人參黃芪甘草  
心虛以炒鹽補之虛則補其母肝乃心之母以生薑補肝  
如無他証錢氏安神丸是也

安神丸

麥門冬去心 馬牙硝

甘草各半

白茯苓

乾山藥

寒水石研

甘草各半

硃砂研

龍腦研

右爲細末煉蜜爲丸如雞頭大每服半丸砂糖水化下  
無時

八物定志丸補益心神安定魂魄治痰去胃中邪熱理

肺腎此方補心更

人參乙兩 菖蒲

遠志去

茯神去

茯苓乙兩 硃砂二錢

白朮

麥門冬去心

牛黃二錢

硃砂二錢

麥門冬去心

右爲細末煉蜜丸如桐子大米飲湯下三十九無時

若髓竭不足加生地黃當歸 若肺氣不足加天門  
冬麥門冬五味子 若心氣不足加上黨參茯神菖  
蒲 若脾氣不足加白朮白芍藥益智 若肝氣不  
足加天麻川芎 若腎氣不足加熟地黃遠志牡丹  
皮 若膽氣不足加細辛酸棗仁地榆 若神昏不



足加砵砂預知子茯苓

心實以甘草瀉之如無他証以錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散

瀉心湯

黃連去乙兩

右為極細末每服一字至半錢乙錢臨臥溫水調下海

云易老單方瀉心湯出於此乃實邪也實則瀉其子

錢氏導赤散丹溪云導赤散正小腸藥也

生地黃

木通

甘草各等分

右同為末每服三錢水乙盞入竹葉七片同煎至五分

食後溫服一本不用甘草用黃芩

脾苦濕急食苦以燥之白朮 脾欲緩急食甘以緩之甘草

以甘補之人參 以苦瀉之黃連 脾虛以甘草大

入胃經藥也

未

棗之類補之如無他証以錢氏益黃散補之虛則補其母

心乃脾之母以炒鹽補心

益黃散

陳皮乙兩

青皮

阿子肉

甘草各半兩

丁香錢二

右為細末每服二錢三錢煎服海藏云此劑瀉脾以燥濕

固本忠編集錢氏方以益黃散補土又言風旺必克

脾土當先實其脾昧者不審脾中寒熱一例用補脾藥又

不審藥中有丁香青皮辛熱大瀉肺金脾虛之症豈可反

瀉其子為寒水反來侮土中寒嘔吐腹痛瀉瀉青白口鼻

中氣冷益黃散神治之藥也如因服熱藥巴荳之類過劑

損其脾胃或因暑天傷熱積食損其脾胃而成吐瀉口臭

中氣熱而成慢驚者不可服之今立一方治胃中風熱名

人參安胃散

黃芪錢二

人參錢乙

生甘草錢半

炙甘草錢半

白芍藥錢七

陳皮錢乙

黃連錢少

白茯苓錢四

右為極細末每服水二盞煎五沸去渣溫服

脾實以枳實瀉之如無他証以錢氏瀉黃散瀉之實則

瀉其子肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

瀉黃散

藿香錢七

山梔仁錢乙

石膏錢半

甘草錢二

防風錢四

右剉同蜜酒微炒香為細末每服二錢水一盞煎清汁

服海藏云此劑瀉肺熱

肺苦氣上逆急食苦以瀉之呵子皮一作黃芩 肺欲

收急食酸以收之白芍藥 以酸補之五味子 以辛瀉

入胃經藥也

未

之桑白皮 肺虛以五味子補之如無他証錢氏補肺阿

膠散主之虛則補其母脾乃肺之母以甘草補脾

補肺阿膠散

阿膠乙兩

黍粘子乙兩

馬兜鈴錢半

甘草錢乙

杏仁錢七

糯米錢乙

右為末每服二錢水一盞食後海藏云杏仁瀉肺非若當以意消息之

肺實以桑白皮瀉之如無他証以瀉白散主之實則瀉

其子腎乃肺之子以澤瀉瀉腎

瀉白散

桑白皮乙兩

甘草錢半

右為細末每服二錢水一盞入粳米百粒同煎食後服

易老加黃連海藏云治肺熱傳骨蒸熱白宜用此以直瀉之用山梔黃芩方能瀉肺但當以氣血



之分

腎苦燥急食辛以潤之知母黃柏 腎欲堅急食苦以堅之知母 以苦補之黃柏 以酸瀉之澤瀉 腎虛以熟地黃栢補之

腎有兩枚右為命門相火左為腎水同質而異性也經曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味又云氣化精生味和形長無陰則陽無以化當以味補腎真陰之虛陰本既固陽氣自生化成精髓若相火陽精不足宜用辛溫之劑世人用辛熱之劑治寒甚之病非補腎也難經云臟腑有兩者何也然腎兩名非皆腎也其左者為腎右者為命門命門者諸精神之用食元氣之所係也故曰男子以藏精女子以繫胞故知腎有二也左腎屬水水不足則陰虛宜補腎丸

右為末粥丸一方無姜有側栢葉用地黃膏為丸

補血丸 龜板酒炙 黃栢炒 知母炒 生乾姜乙

杜牛膝二兩 右為末粥丸

固真丸 龜板酒炙 虎骨酥炙 蒼耳酒蒸九次三兩 生地薑汁 栢皮半兩 乾姜三錢 烏藥半兩

右為末姜汁糊丸

三才封髓丹降心火益腎水 麥門冬心法 熟地 人參各半 黃栢炒三 甘草炙七 縮砂仁乙兩 右為細末水糊丸每服五十九丸用菴菴半兩

作片酒浸一宿次日煎至三五沸去渣送下前九子空

心服 右腎屬火火不足則陽虛宜八味丸

八味丸治腎氣虛之下元傷憊臍下疼痛夜多漩溺脚膝緩弱面色痿黃或黧黑及虛勞不足渴欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利並宜服之脾惡濕腎惡燥古人制方益腎皆濕潤之藥也故八味丸仲景謂之腎氣丸以熟地黃為主

熟地補腎水真 肉桂補腎水真 丹皮補神志不 附子能行諸經而不 白茯苓能化腎邪 澤瀉去胞中留 三山茱萸治精滑不 乾山藥能治皮毛中乾 右八味為細末煉蜜丸皆君主之藥也若不依易老加減服之終不得效若加五味子為腎氣丸述類象形之

劑也益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光

地黃丸加減法 如陽事多痿不振依本方然夏月減附子三錢精完全減 血虛陰衰熟地黃為君 精滑山茱萸為君 小便或多或少或赤或黃或白茯苓為君

小便淋漓澤瀉為君 心虛腸胃積熱心火熾盛心氣不足壯丹皮為君 皮膚癢乾山藥為君 已上言為君者其分兩用八兩其乾地黃只依為臣分兩餘皆同

保金剛丸牛膝丸煨腎丸並見虛 滋離珠丹又名神珠丹治下焦陽氣虛乏臍下腹冷痛足

肝寒而逆 杜仲炒去絲 萹藤二兩 呵子炮五 龍骨乙 破故紙三兩 巴戟酒浸去 胡桃乙百箇 砂砂另研乙 縮砂仁兩半



右為末酒為九梧桐子大硃砂為衣每服三十九空心  
溫酒鹽湯任下

還少丹大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰  
膝沉重肢體倦怠血氣虛乏小便渾濁

乾山藥

牛膝酒浸

遠志心去

山茱萸去核

白茯苓

五味

巴戟酒浸

肉蓯蓉酒浸

石菖蒲

楮實

杜仲去絲

姜汁

舶上茴香各乙

枸杞乙兩

右為細末煉蜜同棗肉為丸桐子大每服三十九溫酒  
或鹽湯下日三服食前五日覺有力十日精神爽半月  
氣壯二十日目明一月夜思飲食冬月手足常煖久服  
令人身體輕健筋骨壯盛怡悅顏色壽延難老更有加  
減法如熱加山梔子乙兩心氣不寧加麥門冬乙兩少

精神加五味子乙兩陽弱加續斷乙兩常服固齒牢牙  
永無瘡癩婦人服之容顏悅澤煖子宮去一切病

水芝丸方見小  
玉女長春不老丹牛膝根汁蒼耳根汁各二碗不可入  
水和一處磁器熬成膏如稠蜜金罌子為末散半斤用不  
去皮蓮子實豬肚即猪蒸熟取蓮子曬乾四兩和前二  
末膏子丸如梧子大溫酒下廿九一月身和暖二月覺精  
神服一料驗甚

腎實須澤瀉瀉之腎本無實不可瀉錢氏止有補腎地  
黃丸無瀉腎之藥 治脉洪而實錢氏地黃丸加生地黃  
去山茱萸是也此治左手本部脉實若右尺洪實以風隨  
丹瀉之

假令水在木之分是從後來者此為虛邪雖水為虛邪則

假令水在木之分是從後來者此為虛邪雖水為虛邪則

補并  
子法

木本虛矣經曰母能令子虛 假令火在木之分是從前  
來者此為實邪雖火為實邪則木本實矣經曰子能令母  
實 假令兩手脉弦無表証乃東方實也是西方不足也  
緣母虛所致宜大補其脾土微補肺大泄其火微泄其木  
棟症諸論云先調其氣次治諸疾況此本經不足的証也  
難經云東方實是西方虛也又云欲泄其邪先補其虛此  
之謂也此証當以溫藥補肺以氣藥燥劑為用如正氣已  
勝當再服泄火瀉風之藥清涼上勿令入胃此為全治  
用益黃加白朮半夏茯苓甘草如酒病得之加澤瀉治手  
足陽明二燥益黃者燥濕而補氣也實瀉黃也泄火瀉風  
用瀉青之類兼治防風生地黃甘草黃連等分黃芩倍之  
凡用藥補即用各方之生數如理中九建中湯是也瀉即  
用各方之成數七宣九是也

有正經  
自病有五邪所傷何以別之經言憂愁思慮則  
傷心形寒飲冷則傷肺志怒氣逆上而不下則傷肝飲食  
勞倦則傷脾久坐濕地強力入水則傷腎是正經自病者  
也何謂五邪有中風有傷暑有飲食勞倦有傷寒有中濕  
此之謂五邪假令心病何以知中風得之然其色當赤何  
以言之肝主色白入為青入心為赤入脾為黃入肺為白  
入腎為黑肝為心邪故知當赤色也其病身熱脇下滿痛  
其脉浮大而弦何以知傷暑得之然當惡臭何以言之心  
主臭自入為焦臭入脾為香臭入肝為臊臭入腎為腐臭  
入肺為腥臭故知心病傷暑得之也當惡臭其病身熱而  
煩心痛其脉浮大而散何以知飲食勞倦得之然當喜苦  
味虛為不欲食實為欲食何以言之脾主味入肝為酸入  
心為苦入肺為辛入腎為鹹自入為甘故脾邪入心為喜

有正經  
自病有五邪所傷何以別之經言憂愁思慮則  
傷心形寒飲冷則傷肺志怒氣逆上而不下則傷肝飲食  
勞倦則傷脾久坐濕地強力入水則傷腎是正經自病者  
也何謂五邪有中風有傷暑有飲食勞倦有傷寒有中濕  
此之謂五邪假令心病何以知中風得之然其色當赤何  
以言之肝主色白入為青入心為赤入脾為黃入肺為白  
入腎為黑肝為心邪故知當赤色也其病身熱脇下滿痛  
其脉浮大而弦何以知傷暑得之然當惡臭何以言之心  
主臭自入為焦臭入脾為香臭入肝為臊臭入腎為腐臭  
入肺為腥臭故知心病傷暑得之也當惡臭其病身熱而  
煩心痛其脉浮大而散何以知飲食勞倦得之然當喜苦  
味虛為不欲食實為欲食何以言之脾主味入肝為酸入  
心為苦入肺為辛入腎為鹹自入為甘故脾邪入心為喜

有正經  
自病有五邪所傷何以別之經言憂愁思慮則  
傷心形寒飲冷則傷肺志怒氣逆上而不下則傷肝飲食  
勞倦則傷脾久坐濕地強力入水則傷腎是正經自病者  
也何謂五邪有中風有傷暑有飲食勞倦有傷寒有中濕  
此之謂五邪假令心病何以知中風得之然其色當赤何  
以言之肝主色白入為青入心為赤入脾為黃入肺為白  
入腎為黑肝為心邪故知當赤色也其病身熱脇下滿痛  
其脉浮大而弦何以知傷暑得之然當惡臭何以言之心  
主臭自入為焦臭入脾為香臭入肝為臊臭入腎為腐臭  
入肺為腥臭故知心病傷暑得之也當惡臭其病身熱而  
煩心痛其脉浮大而散何以知飲食勞倦得之然當喜苦  
味虛為不欲食實為欲食何以言之脾主味入肝為酸入  
心為苦入肺為辛入腎為鹹自入為甘故脾邪入心為喜



苦味也其病身熱體重嗜臥四肢不收其脉浮大而緩何以知傷寒得之然當諸言妄語何以言之肺主聲入肝為呼入心為言入脾為歌入腎為呻自入為哭故知肺邪入心為譫言妄語也其病身熱灑灑惡寒甚則喘咳其脉浮大而濇何以知中濕得之然當喜汗出而不可止何以言之腎主濕入肝為泣入脾為涎入肺為涕自入為唾故知腎邪入心為汗出不可止也其病身熱而小腸痛足脛寒而逆其脉沉濡而大此五邪之法也九難

肝主色 心主臭 脾主味 肺主聲 腎主液

肝色青 其臭臊 其味酸 其聲呼 其液泣

心色赤 其臭焦 其味苦 其聲言 其液汗

脾色黃 其臭香 其味甘 其聲歌 其液涎

肺色白 其臭腥 其味辛 其聲哭 其液涕

腎色黑 其臭腐 其味鹹 其聲呻 其液唾

病有虛邪有實邪有賊邪有微邪有正邪何以別之從後來者為虛邪從前來者為實邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為微邪自病者為正邪何以言之假令心病中風得之為虛邪傷暑得之為正邪飲食勞倦得之為實邪傷寒得之為微邪中濕得之為賊邪五十一  
一脈為十變者何謂也然五邪剛柔相逢之意也假令心脉急甚者肝邪干心也心脉微急者膽邪干小腸也心脉大甚者心邪自干心也心脉微大者小腸邪自干小腸也心脉緩甚者脾邪干心也心脉微緩者胃邪干小腸也心脉瀇甚者肺邪干心也心脉微瀇者大腸邪干小腸也心脉沉甚者腎邪干心也心脉微沉者膀胱邪干小腸也五臟各有剛柔邪故令一脈源變為十也十難

黃帝曰請問脉之緩急大小滑濇之病形何如岐伯曰臣請言五臟之病變也心脉急甚者為痰厥微急為心痛引背食不下謂色赤脉約而急也餘緩甚為狂笑微緩為伏梁在心下上下行時唾血大甚為喉吟微大為心痺引背善淚出小甚為無噦微小為消痺滑甚為善渴微滑為心疝引臍小腹鳴瀇甚為瘕微瀇為血溢維厥耳鳴顛疾肺脉急甚為癩疾微急為肺寒熱急情咳唾血引腰背骨若鼻息肉不通謂色白脉毛而急也餘緩甚為多汗微緩為痿痺偏風頭已下汗出不可止大甚為脛腫微大為肺痺引胃背起惡目光小甚為泄微小為消痺滑甚為息責上氣微滑為上下出血瀇甚為嘔血微瀇為鼠瘻在頸腋腋之間下不勝其上其應善瘻矣

肝脉急甚者為惡言微急為肥氣在脇下若覆杯謂色青脈微此緩甚為善嘔微緩為水瘕痺也大甚為內瘕善嘔衄微大為肝痺陰縮欬引小腹小甚為多飲微小為消痺滑甚為瘕疝微滑為遺溺瀇甚為溢飲微瀇為瘕擊筋痺脾脉急甚為痰厥微急為膈中食飲入而還出後沫沫緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心慧然若無病大甚為擊仆微大為疝氣腹裏大膿血在腸胃之外小甚為寒熱微小為消痺滑甚為瘕瘕微滑為蟲毒蝟蝎腹熱瀇甚為腸瘕微瀇為內瘕多下膿血  
腎脉急甚為骨癩疾微急為沉厥奔豚足不收不得前後謂色黑脉石而急也餘緩甚為折脊微緩為洞洞者食不化下噎還出大甚為陰痿微大為石水起臍已下至小腹腫脹然上至胃脘死不治小甚為洞泄微小為消痺滑甚為瘕瘕微滑為骨痿坐不能起起則目無所見瀇甚為大瘕微瀇



為不月沉痾黃帝曰病之六變者刺之奈何岐伯答曰諸  
 急者多寒緩者多熱大者多氣少血小者血氣皆少滑者  
 陽氣盛微有熱滑者多血少氣微有寒是故刺急者深內  
 而久留之刺緩者淺內而疾發鍼以去其熱刺大者微瀉  
 其氣無出其血刺滑者疾發鍼而淺內之以瀉其陽氣而  
 去其熱刺滑者必中其脈隨其逆順而久留之必先按而  
 循之已發鍼疾按其痛無令其血出以和其脈諸小者陰  
 陽形氣俱不足勿取以鍼而調以甘藥也初詳滑者陰氣  
 氣盛者陽氣有餘今反言少氣多血恐二脈乃  
 交互間宜更詳之已上並見邪氣腫脹病形篇

肝五邪

假令肝病實邪風熱相合風性急火搖動焰而旋轉其  
 脈弦而緊洪風熱發狂宜芎黃湯

芎活 川芎 大黃各乙 甘草半  
 右咬咀每服半兩水二盞煎至六分去渣溫服

八醫經卷一末四

聖

虛邪風寒相合木慮腎恐拘急自汗其脈弦緊而沉仲景  
 云風感太陽移証在少陰經中桂枝加附子湯主之 賊  
 邪風燥相合血虛筋縮皮膚皴揭脈弦浮而濡仲景云血  
 虛筋急桂枝加括萎湯主之 微邪風濕相合體重節痛  
 臟腑洞泄脈弦長而緩仲景云身體疼痛下利清穀急當  
 救裏四逆湯主之 正邪中風目眩頭重吐怒不出脈弦  
 緊而長仲景云甚則如癩為瘕宜羌活湯本草云羌活主  
 瘕癩防風黃芩為佐小兒為癩大人為瘕

心五邪

假令心病實邪熱濕相合憤憤心煩熱蒸不眠脾經絡於  
 心心經起於脾二經相接故為濕熱脈浮大而緩足太陰  
 寄証在手太陽宜梔鼓湯若瘕加厚朴枳實 虛邪熱風  
 相合妄聽妄聞耳有簫聲膽與三焦之經同出於耳銅人  
 云刺關衝出血瀉支溝脈浮大而弦初小柴胡湯後大柴

肺五邪

胡湯此証是太陽與少陽為病前客後主也 賊邪熱寒  
 相合膈惕心懸如餓神怯恐怖足少陰與手厥陰相接水  
 中心經故神怯怖耳脈大而沉濡亦在太陽經中內經曰  
 心虛則憊嗽以黃連附子瀉心湯主之治法云熱多寒少  
 以熱為佐如寒多熱少加附子乾姜佐之 微邪熱燥相  
 合過飲歌樂實為熱燥俗言暢飲也病人言快活快活是  
 有聲歌樂也以意思漿是無聲歌樂也脈大而洪滑白虎  
 湯主之喘則加人參 正邪熱也脫陽見鬼燥擾狂越脈  
 洪實一呼四至是八至脈也小承氣湯主之謂腹不堅大  
 也

假令肺病實邪燥寒相合毛聳皮涼洩多而清其脈短澀  
 而沉此証如秋冬宜八味丸若春夏宜地黃丸 虛邪燥  
 濕相合微喘而痞便難而痰其脈浮澀而緩枳實理中湯

八醫經卷一末四

聖

主之如喘甚加人參若便難加木香枳榔各半錢為極細  
 末煎下理中丸 賊邪燥熱相合鼻窒衄血溢血泄其  
 脈澀而浮大甚者桃仁承氣湯微者犀角地黃湯極者抵  
 當湯微者抵當丸 微邪燥風相合皮燥甲枯血虛氣虛  
 二臟俱虛先血後氣其脈浮澀而弦大養氣血藥主之  
 正邪燥自病其氣曠鬱皆屬於肺諸燥有聲其脈浮澀而  
 短則諸嗽藥選而用之

腎五邪

假令腎病實邪寒風相合當藏不藏故下利純清其脈沉  
 滑而弦仲景云少陰証口燥咽乾下利純清大承氣湯主  
 之脈沉弦而遲四肢逆冷者宜四逆湯等 虛邪寒清相  
 合咳唾多呻瀝浙寒清無寐經言燥化清其脈沉實而澀  
 酸棗仁湯主之 賊邪寒濕相合腎為胃關關閉水溢關  
 閉不利水在胃為腫在肺為喘及變諸証其脈沉緩而大



仲景云大病瘥後腹下有水氣者牡蠣澤瀉湯主之微邪寒熱相合勝脫熱鬱津液枯少其脈沉濡而大內經曰水少乾涸是也猪苓湯主之 正邪寒自病為寒急用蒸黑痺經沉其脈沉濡而滑宜黑痺天麻丸如証同脈異微者肝病也甚者臟病也

脾五邪

假令脾病實邪濕燥相合胃中燥屎腹滿堅痛其脈緩而長濇正陽陽明証也調胃承氣湯主之 虛邪濕熱相合熱陷胃中腸辟下血脈緩而大黃連解毒湯主之 賊邪濕風相合嘔逆脇痛往來寒熱脈緩而弦長小柴胡湯主之 微邪濕寒相合寒來求濕身黃而不熱體重而不渴謂之寒濕其脈緩沉而滑木附湯主之如小便不利者加茯苓 正邪濕自病腹滿時痛手足自溫其脈沉濇而長虛痛桂枝加芍藥湯實痛桂枝加大黃湯主之

八 醫學綱目卷四

脾

胃為十二經之海十二經皆稟血氣滋養於身脾受胃之稟行其血氣也脾胃既虛十二經之邪不一而出假令不能食而肌肉削乃本病也其右關脈緩而弱本部脈也本部本証脈中兼見弦脈或見四肢滿閉淋瀝便難轉筋一二証此肝之脾胃病也當於本經藥中加風藥以瀉之本部本証脈中兼見洪大或見肌熱煩面赤而不能食肌肉消一二証此心之脾胃病也當於本經藥中加瀉火之藥本部本証脈中兼見浮濇或見氣短氣上喘咳痰盛皮濇一二証此肺之脾胃病也當於本經藥中兼瀉肺之邪及補氣之藥本部本証脈中兼見沉細或見善恐數欠之証此腎之脾胃病也當於本經藥中加瀉腎水之浮及瀉陰火伏熾之藥

弦脈 風邪所傷甘草芍藥黃芪建中 湯之類或甘酸之劑皆可用之

洪脈 邪所傷三黃丸瀉黃散調胃 脾胃右關其脈緩如得緩脈 本經太過濕邪所傷正胃散 劑皆可用之

濇脈 燥邪所傷與攻散加當歸四君子湯加 沉細脈 寒邪所傷益黃散養脾丸理中湯如 前項所定方藥乃常道也如變則更之

脾胃不足不同餘臟無定體故也其治肝心肺腎有餘不 足或補或瀉惟益脾胃之藥為切經言至而不至是為不 及所勝妄行所生受病所不勝乘之也至而不至者謂從 後來者為虛邪心與小腸來乘脾胃也脾胃脈中見浮大 而弦其病或煩躁悶亂或四肢發熱或口苦舌乾咽乾蓋 心主火小腸主熱火熱來乘土位乃濕熱相合故煩燥悶 亂也四肢者脾胃也火乘之故四肢發熱也飲食不節勞

六 醫學綱目卷四

脾

役所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口中津液不行故 口咽乾也病人自以為渴醫者治以五苓散謂止渴燥而 反加渴燥乃重竭津液以至危亡也經云虛則補其母當 於心與小腸中以補脾胃之根蒂以甘溫之藥為主以 苦寒之藥為之使以酸味為之臣佐以心苦緩急食酸以 收之心火旺則肺金受邪金虛則以酸補之次以甘溫及 甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也所勝妄 行者謂心火旺能令母實母者肝木也肝木旺則挾火之 勢無所畏懼而妄行也故脾胃先受之或身體沉重走注 疼痛蓋熱濕相搏風熱鬱而不得伸附麗於有形也或多 怒者風熱下陷於地中也或目病而生內障者脾裹血胃 主血心主脈脈者血之府也或云心主血又云肝主血肝 之竅開於目也或妄見妄聞起妄心夜夢亡人四肢滿悶



轉筋皆肝木火盛而為邪也。或生癢或生痺或生厥。或中風或生惡瘡。作腎痿。或上熱下寒。為邪不一。皆風熱不得生長。而木火過於有形中也。所生受病者。言肺受土火木之邪。而清肅之氣傷。或胃滿少氣。短氣者。肺主諸氣。五臟之氣皆不足。而陽道不行也。或欬嗽寒熱者。濕熱乘其內也。所不勝乘之者。水乘木之妄行。而反來侮土。故腎火下亢。致督任衝三脈盛。火旺煎熬。今水沸騰。而乘脾肺。故痰涎唾出於口也。下行為陰汗。為外腎冷。為足不任身。為腳下隱痛。或水附木勢而上。為眼渣為眩。為冷淚。此皆由肺金之虛。而寡于畏也。夫脾胃不足。是火不能生土。而反抗拒。此至而不至。是為不及也。

白朮君 人參臣 甘草佐 芍藥佐  
黃連使 黃芪臣 桑白皮佐

諸風藥皆是風能勝濕也。諸甘溫藥亦可。

心火亢盛。乘於脾胃之位。亦至而不至。是為不及也。

黃連君 石膏佐 芍藥佐 知母佐  
黃柏臣 甘草使 生地臣 黃芩佐

肝木妄行。胸脇痛。口苦舌乾。往來寒熱。而嘔多怒。四肢滿閉。淋洩便難。轉筋腹中急痛。此所不勝乘之也。

柴胡君 防風臣 白朮佐 羌活佐  
獨活佐 芍藥臣 甘草臣 升麻使

茯苓佐 猪苓佐 澤瀉佐 肉桂臣  
藥本 川芎 細辛 蔓荊子

白芷 石膏 黃柏 知母

滑石  
肺金受邪。由脾胃虛弱。不能生肺。乃所生受病也。故欬嗽

氣短。氣上。皮毛不能禦寒。精神少。而渴情慘慘。不樂。皆陽氣不足。陰氣有餘。是體有餘。而用不足也。

人參君 白朮佐 白芍藥佐 橘皮臣  
青皮破滯 黃芪臣 桂枝佐 桔梗引

桑白皮佐 甘草 木香佐 枳榔  
五味佐此三味

腎水反來侮土。所勝者妄行也。作涎。及清瀉。嘔多。溺多。而惡寒者是也。上火復之。及三脈為邪。則足不任身。足下痛。不能踐地。骨乏無力。喜睡。兩丸冷。腹陰陰。而痛。妄聞。妄見。腰脊背脇皆痛。

乾姜君 蒼朮佐 川烏臣少許 白朮臣  
肉桂佐 茯苓 澤瀉使 猪苓佐

附子佐

按虞部郎中汪奉老疾革。有子可升。當遺表奏。歷召孫至。曰。郎中亡矣。不可治。可升告孫曰。生且固難。如何可延。三日以待。奏回。孫曰。郎中之患。肝氣將絕。脾土反勝。當後脾土火旺。肝氣乃絕。方今日辰巳間。當畧瀉脾土。使不能勝。肝則木且未絕。三日後早。奏下。當日氣絕。孫尚藥。精究五臟盛衰類此。天地之氣。內淫而勝。為病。藥方六氣乘虛。為病。相勝。藥方六氣之復。為病。藥方並見運氣類註。

醫學綱目卷之四



醫學綱目卷之五

陰陽臟腑部

治寒熱法

陰勝則陽病陽勝則陰病陽勝則熱陰勝則寒重寒則熱重熱則寒陰勝則陽勝則熱陽勝則陰勝則寒重熱則寒陰勝則陽勝則熱陽勝則陰勝則寒重寒則熱重熱則寒

汗而身寒陰陽不足則有汗而身熱補此句為病之重者莫大於此如刀削肌肉危之甚不能久矣按經曰邪生於陽者得之風雨寒暑又曰陽虛生外寒陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通上焦不通則寒氣獨留於外故寒慄又曰陽盛生外熱上焦不通利則皮膚緻密腠理閉塞玄府不通衛氣不得泄越故外熱經曰邪生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒又曰陰虛生內熱有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣薰胃中故內熱又曰陰虛生內寒厥氣上逆寒氣積於胃中而不瀉不瀉則溫氣去寒獨留則血凝血凝則脈不通其脈盛大以澁故中寒

視其顏色黃赤者多熱氣青白者少熱氣黑色者多血少氣經曰凡診絡脈脈色青則寒且痛赤則有熱胃中寒手魚際之絡多青胃中有熱魚際絡赤其暴黑者留久痺也其有赤有黑有青者寒熱氣也其青短者少氣也浮絡多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見其寒熱也

經云數則為熱遲則為寒諸陽為熱諸陰為寒

治分反

食不化虛則熱中出度少氣消色變之熱者寒之微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從少從多觀其事也帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒用寒因熱用寒因寒用通因通用必伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使瀉堅可使氣和可使必已

正治

其寒之氣則下奪之奪之不已則逆折之折之不盡則求其屬以衰之小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣則汗發之發之不已則逆制之制之不已則求其屬以衰之

六經卷之五

二

陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰虛陽盛汗之則愈下之則死

帝曰論言治寒以熱治熱以寒方士不能廢繩墨而更其術也病有寒者寒之而熱有病寒者熱之而寒二者皆在斯病復起奈何岐伯曰諸病寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也







也太陽為標有陽之名無陽之實謂其將變陰也其脈紫而數按之不鼓而空虛是外見虛陽而內有其寒也故仲景以姜附湯久久熱煎不溫服而寒服之亦是寒治也姜附氣味俱陽加之久久熱煎取重陽之熱瀉純陰之寒是治其本也不溫服而寒服此以假寒治太陽標之假陽也故為其假相對之治法因藥處治者當知其脈之空虛則是內伏陰寒之氣外顯熱症大渴引飲目赤口乾面赤身熱四肢熱如火者此浮陽將絕于外而內則為寒所拒也

天因熱

入醫學綱目卷五

五

手少陰心之經乃寒因熱用且少陰之經真陰其心病根本是真火也故曰少陰經標陰本熱是內則心陽為本外則真陰為標其脈沉細按之洪大緊甚而盛者心火在內則緊甚洪大真陰為標則得脈之沉細寒水之體也故仲景以大承氣湯酒製大黃煎成熱服之以除標寒用大

治熱以寒

黃芩硝磺辛苦大寒之氣味以瀉本熱以此用藥可以為萬世法矣

丹溪治色目婦人惡寒用八物湯去芩加炒柏治之反劇知其病熱深而藥無反佐之過也仍取前藥熱炒與之而愈此治熱以寒借火之力溫而行之也

治熱以寒溫而行之有三皆因大熱在止用黃芩人參甘草此三味者皆甘溫雖表裏皆熱燥發於內捫之肌熱於外能和之汗自出而解矣此溫能除大熱之至理一也熱極生風乃左遷入地補母以虛其子使天道右遷順行諸病得天令行而必愈二也況大熱在上其大寒必伏於內溫能退寒以助地氣地氣者在人乃胃之生氣使真

治寒以熱

氣旺三也

治寒以熱涼而行之謂因寒用之類極用乾姜仲景治少陰病下利脈微者與白虎湯利不止厥逆無脈乾嘔煩熱自通加猪膽汁湯主之此治寒以熱借膽汁之涼而行之也

垣治寒以熱涼而行之有三北方之人為大寒所傷其足脛脹乃寒勝則浮理之然也若火灸湯浴必脫毛見骨須先以新汲水浴之則時見完復矣更有大寒凍其面或耳若近火湯必脫皮成瘡須先於涼房處浴之少時以溫手熨烙必能完復此涼而行之除其大寒之理一也大寒之氣必令母實乃地道左遷入肺逆行於天以涼藥投之使天道右遷而順天令諸病得天令行而必愈二也況大寒在外其大熱伏於地下者乃三焦包絡天真之氣所居

入醫學綱目卷五

六

之根帶也熱伏於中元氣必傷在人之身乃胃也以涼藥和之則元氣充盛而不傷三也

治寒非熱

惡寒非寒惡熱非熱論○經曰惡寒戰慄者皆屬於熱又曰戰慄如喪神守皆屬於火惡寒者雖當炎月若遇風霜重綿在身如覺凜凜戰慄如喪神守惡寒之甚也原病式曰病熱症而反覺自冷此為病熱實非寒也或曰往往見有服熱藥而可愈者何也病熱之人其氣炎上鬱為痰飲抑遏清道陰氣不升病熱尤甚積痰得熱亦為暫退熱勢助邪其病益深或曰寒勢如此誰敢以寒涼藥與之非殺而何予曰古人遇戰慄之症有以大承氣湯下燥糞而愈者惡寒戰慄明是熱症但有虛實之分耳

經曰陰虛則發熱夫陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌



表之間而惡熱實非有熱當作陰虛治之而用補養之法可也或曰傷寒惡寒惡熱者亦是邪子曰若病傷寒者自外入內先賢論之詳矣愚奚庸贅

治發熱

火鬱當看熱在何經輕者可降重者則隨其性而升之  
人虛火盛顛者用生薑湯若投以冰水正治之立死  
實火可瀉小便降火極速 有補陰即火自降炒柏地黃  
之類 凡氣有餘便是火急甚者必緩之生甘草兼瀉兼  
緩參朮亦可 凡火盛者不可驟用寒涼藥必兼溫散之  
左金丸治肝火用黃連六兩吳茱萸一兩 陰虛火動難  
治 喫酒人發熱難治 不飲酒人因酒發熱者難治  
一男子二十三歲因酒發熱用青黛瓜蒌仁入姜汁每日  
數匙入口中三兩月而愈

入醫學綱目卷五

七

小兒痘後餘熱不退痲不收斂大便不行是謂血燥則當以陰藥治之因而補之用清涼飲子通大便而瀉其熱  
潔古云涼風至而草木實夫清涼飲子乃秋風微熱之劑也此甘寒傷寒表邪入於裏日晡潮熱大渴引飲語狂燥不大便是胃實乃可攻之夫胃氣為熱所傷以承氣湯瀉其上實元氣乃得周流承氣之名於此具矣此苦寒瀉今世人以苦泄火故備陳之除熱瀉火非甘寒不可以苦寒瀉火非徒無益而反害之故有大熱脈洪大服苦寒劑而熱不退者加石膏 如症退而脈數不退洪大而病有加者宜減苦寒加石膏如大便軟或泄者加桔梗食後服之此藥誤用則其害非細用者旋旋加之如食少者不可用石膏石膏善能去脈數如病退而脈數不退者不治  
大熱而脈反細小不可下者瀉心湯主之脈有力可用

之 骨肉筋血皮毛陰足而熱反勝之是謂實熱

能食而熱口舌乾燥大便難者實熱也以辛苦大寒之劑下之瀉熱補陰經云陽盛陰虛下之則愈脈洪盛而有力量者是已

人壯氣實火盛顛狂者可用正治苦硝冰水之類飲之  
骨瘦肉燥筋緩血枯皮聚毛落陰不足而有熱疾是謂虛熱

不能食而熱自汗氣短者虛熱也以甘寒之劑瀉熱補氣經云治熱以寒溫而行之脈虛弱無力者是已

當歸補血湯 治婦人肌熱大渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無內經曰脈虛血虛脈實血實又云血虛發熱是也症象白虎惟脈不長實難辨也悞服白虎湯必死此病得於饑困勞役

入醫學綱目卷五

八

黃芪兩 當歸二錢

右剉作一服水二盞煎至一盞去查稍熱空心服之  
補中益氣湯 治飲食勞倦所傷始為熱中蓋人受水穀之氣以生所謂清氣營氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別名也夫胃氣為水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也若飲食失節寒溫不適則脾胃乃傷喜怒憂恐損耗元氣脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火代之相火包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流肝腎陰火得以乘其土位故脾症始得則氣高而喘身熱而煩其脈洪大而頭暈或渴不止其皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火



上衝則氣高喘而煩熱為頭痛為渴而脉洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是春生之令不行則無陽以護其營衛不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然與外感風寒之症頗同而實異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷其外則有餘有餘者瀉之傷其內則不足不足者補之汗之下之吐之剋之之類皆瀉也溫之和之調之養之之類皆補也內傷不足之病苟誤認作外感有餘之症而反瀉之則虛其虛也實實虛虛如此死者醫殺之耳然則奈何唯當以辛甘溫劑補其中而升其陽甘寒以瀉其火則愈矣經曰勞者溫之損者溫之又曰溫能除大熱大忌苦寒之藥損其脾胃脾胃之症始得則熱中今立法治始得之症

黃芪病甚熱甚人參分有甘草五分當歸身酒製二分

橘皮分二升麻分二柴胡分二白朮分三

右吹咀作一服水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去查食遠稍熱服如傷重者不過二服而愈若病久者以權立加減法治之如腹中痛者加白芍五分炙甘草三分惡寒冷痛者加中桂去皮二分如惡熱喜寒而腹痛者於已加芍藥甘草中更加生黃芩三分或二分或夏月腹痛而不惡熱者亦然治時熱也若天涼惡熱而痛於加白芍甘草黃芩中更加桂少許天寒腹痛去芍藥味酸寒故也加益智仁三分或加半夏五分生薑三片如頭痛加蔓荊子三二分痛甚者加川芎二分頂痛腦痛加藜本三分或五分若苦頭痛者加細辛二分諸頭痛者併用此四味足矣若頭上有熱則此不能治別以清空膏治之如臍下痛者加

真熱地五分其痛立止如不止者乃大寒也更加肉桂去皮三分或二分內經所說小腹痛皆寒症從復法相報中來也經曰大勝必大復從熱病中變而作也非傷寒厥陰之症也仲景用抵當湯併丸主之乃血結下焦膀胱也如胃中氣壅滯加青皮二分氣促少氣者去之如身有疼痛者屬濕若身重者亦濕加去桂五苓散一錢如風濕相搏一身盡痛加羌活防風各五分升麻桑木根各一錢勿用五苓散所以然者為風藥已能勝濕故別作一服與之如病去勿再服以治風之藥大損元氣而益其病故也如大便秘瀉加當歸稍一錢如閉瀉不行煎成正藥先用一口調玄明粉半錢或一錢得行則止此病不宜下下之恐變成凶症也如久病痰嗽者去人參初病者勿去冬月春寒或秋涼

入醫學綱目卷五

十

時各宜加不去節麻黃半錢如春今大溫則加佛耳草三分款冬花二分如夏月病嗽加五味子三分去心麥冬二分或三分如舌上白滑胎是胃中有寒勿用之如夏月不嗽亦加人參三二分并五味子麥冬各等分救肺受火邪也如病人能食而心下痞加黃連二分或三分如不能食而心下痞勿用如脇下痛或急縮者俱加柴胡甘草

右一方加減是飲食勞倦喜怒不節始病熱中則可用之若未傳寒中則不可用也蓋甘酸適足益其病耳如黃芪人參甘草芍藥五味之類是也

固氣運衰旺圖

濕胃化 熱小腸長 風膽生 皆陷下不足先補則用黃芪 甘草 當歸 升麻 柴胡 人參乃辛甘發



散以助春夏生長之用者也

土脾形 火心神 木肝血 皆大盛上乘生長之氣後

瀉則用甘草稍之甘寒瀉肺火逆於胃中傷氣者也黃

芩之苦寒以洩胃中之熱喘氣上奔者也 紅花以破

惡血 用黃芩大補腎水益肺氣瀉血中火燥者也

寒膀胱藏氣 燥大腸收氣 皆大旺後瀉則用黃芪之

甘溫止自汗實表虛使不受寒邪當歸之辛溫能潤燥

更加桃仁以通幽門閉塞利其陰路除大便之難燥者

也

水腎精 金肺氣 皆虛衰不足先補則用黃柏之苦寒

除濕熱為痰乘於腎救足膝無力亦除陰汗陰痿而益

精甘草積黃芩補肺氣洩陰火之下行腎苦氣上逆急

食苦以洩之也

八醫經類卷五

土

此初受熱中常治之法也非權也權者臨病制宜之謂

也 晝熱則行陽二十五度大抵柴胡飲子 夜熱則行陰

二十五度大抵四順飲子 又云一身盡熱或日晡潮熱

也四順飲子或桃仁承氣湯遲而用之當視其 平日

由表入裏腹痛血刺痛腹中有無轉天氣之異 平旦

發熱熱在行陽之分肺氣主之故用白虎湯以瀉氣中

之火 又云白虎治脈洪故抑 日晡潮熱熱在行陰之

分腎氣主之故用地骨皮以瀉血中之火 又云地骨皮

率之使春氣得以上升也 按地骨皮治虛熱方也

氣分熱

柴胡飲子

血分熱

清涼飲子

桃仁承氣湯

氣分熱

白虎湯

血分熱

清涼飲子

桃仁承氣湯

通牽牛味辛烈能瀉氣中之濕熱不能除血中之濕熱

防已味苦寒能瀉血中之濕熱又通血中之滯塞

柴胡飲子 方見 白虎湯 方見 地骨皮散 方見

清涼飲子 方見

大黃 蒸 甘草 炙 當歸 洗 芍藥 洗

右吹咀每服五錢薄荷十葉水一盞半同煎至七分去

查溫服

桃仁承氣湯 方見

人病脈虛氣鬱發熱

芍藥 酒炒一兩 香附 兩 蒼木 兩 沙參 三

甘草 五分

右吹餅丸服

脈滑陽有宿食常暮發熱明日復止者於宿食門求之

濕痰夜熱以三補丸加白芍藥為丸

三補丸方 黃芩 黃柏 黃連 為末粥糊為丸

八醫經類卷五

三

有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱故苦者

以治五臟五腑屬陰而居于內辛者以治六腑六腑屬陽

而在外故曰內者下之外者發之又宜養血益陰身熱

自除 浮大有力為外熱沉大有力為內熱

熱在上焦者因欬為肺痰熱在中焦者為堅熱在下焦

者為尿血亦令淋閉不通

肘前熱者腰以上熱手前獨熱者腰以下熱肘前獨熱者

膺前熱肘後獨熱者肩背熱臂中獨熱者腰腹熱肘後以

下三四寸熱者腸中有虫掌中熱者腹中亦熱 全文見

三焦熱用藥大例 上焦熱梔子黃芩 中焦熱小便

不利黃連芍藥 下焦熱黃柏大黃

上焦熱 清神散 連翹防風湯 涼膈散

龍腦飲子 犀角地黃湯



中焦熱 小承氣湯 調胃承氣湯 洗心散

下焦熱 四順清涼飲 桃仁承氣湯

大承氣湯 五苓散 立効散

八正散 石膏散 四物湯

身熱脈洪無汗多渴者熱在上焦宜桔梗湯

桔梗 連翹 山梔 薄荷 黃芩 甘草各等

右為粗末竹葉白水煎溫服汗之熱服 春倍加防風

羌活 夏倍加黃芩知母 季夏滿雨倍加羌活 秋

加桂五錢 冬加桂一兩亦可以意消息隨症增損而

用之

清神散消風壅化痰涎治頭目眩面熱

檀香 人參 羌活 防風 薄荷 甘草 荆芥 石膏

右為末每服二錢沸湯點服或入茶末點服此方虛

龍腦飲于治蘊積邪熱咽喉腫痛眼赤口瘡心煩鼻衄

砂仁 瓜蒌根 藿香葉 石膏

甘草 梔子 右為末每服二錢至三錢用新汲水入蜜調下

加減涼膈散退六經之熱丹溪云涼膈散

涼膈散減大黃芒硝加桔梗甘草一法加防風同為

舟楫之劑浮而上之治胃膈中與六經之熱以手足少陽

之氣俱下膈終臂中三焦之氣同相火遊於身之表膈與

六經乃至高之分此藥浮載亦至高之劑故施於無形之

中隨高而走去胃膈中及六經之熱也

梔子仁 芒硝 連翹 薄荷

黃芩 甘草 大黃

右為粗末每一兩水二盞竹葉七片同煎至一盞去查

入蜜少許食後服加姜煎亦得去六經熱減大黃芒硝

加桔梗甘草人參防風治肺經邪熱咳嗽有痰加半夏

涼膈與四物湯各半服能益血洩熱名雙和散錢氏去

連翹加藿香石膏為瀉黃散

本方治大人小兒五臟積熱煩燥多渴唇裂喉閉目赤

鼻衄結硬口舌生瘡陽明疝傷寒發狂見鬼譫語大小便

閉一切風壅並皆治之

山梔仁 甘草 赤芍藥 大黃

朴硝 連翹 薄荷 乾葛

右為散每服二錢水一盞入竹葉七片蜜三匙同煎至

七分去查食後服唯陽明疝傷寒忌下 此藥局方亦

載綠味數與用藥大段不同予一姪婦忽患熱病欲死

付之一服立效後來累服累驗幸毋忽

又方

白朮 荆芥 赤芍藥 大黃

車前子 木通 甘草 當歸

右為細末大便秘結米泔調空心服三錢上膈壅熱或

生赤丹或生癰瘡用水二盞煎六分若小便結如淋狀

用蘆根打碎洗淨煎湯下五心煩熱用生薑一片同煎

服效

小承氣湯 調胃承氣湯 四順飲子

桃仁承氣湯 大承氣湯 立效散治下焦結熱小便黃赤淋閉痰痛或出血



山梳妙牛 瞿麥穗一 甘草分三  
右為末每服五錢水一碗入連翹葱根七箇燈心五十  
莖生薑七片同煎至七分溫服

手便熱  
大小便  
熱用血  
熱屬下

石葦散治膀胱有熱水道淋瀝或尿如荳汁及出砂石

石葦 木通 滑石 王不留行各二

甘草稍兩當歸 白朮 瞿麥 芍藥

葵子兩各三黃芪兩

右為細末每服煎湯調下空心服

經云胃足陽明之脈氣盛則身以前皆熱當取足三里等

帝曰人有四肢熱逢風寒如炙如火者何也岐伯曰是

人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩陽相得而陰氣虛少

少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而

止耳逢風如炙如火者是人當肉燥也見逆詞論

仲三物黃芩湯治婦人四肢煩熱方見

治手足心熱用東垣火鬱湯方見後

治手足心熱此方神妙

梔子 香附 蒼朮 白芷 半夏

川芎 右用神麴糊丸

身熱有五不同論 五臟有邪各有身熱其狀各異以

手捫摸有三法以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在

皮毛血脉也重按至筋骨之分則熱蒸手極甚輕摸之則

不熱是熱在筋骨間也輕手捫之則不熱重手加力按之

亦不熱不輕不重按之而熱是熱在筋骨之上皮毛血脉

之下乃熱在肌肉也此謂三法以三黃丸通治之細分之

則五臟各異矣

肺熱者輕手乃得微按全無聲響然見於皮毛上為肺主

皮毛故也日西尤甚乃皮毛之熱也其症必見喘欬濕瀉  
寒熱輕者瀉白散重者涼膈散白虎湯之類治之及地黃  
地骨皮散

心熱者心主血脉微按於皮膚之下肌肉之上輕手乃得  
微按至皮毛之下則熱少加力按之則全不熱是熱在血

脈也日中太甚乃心之熱也其症煩心瘋掌中熱而燥  
以黃連瀉心湯導赤散硃砂丸安神丸清涼散之類治之

脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨又不熱不輕不重在  
輕手重手之間此熱在肌肉遇夜尤甚其症必急嗜嗜臥

四肢不收無氣以動以瀉黃散調胃承氣湯治實熱用之  
人參黃芪散補中益胃湯治中虛有熱者用之

肝熱者按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱寅卯間尤甚  
者其脈弦其病四肢滿悶便難轉筋多怒多驚四肢困熱

筋痿不能起於牀瀉青丸柴胡飲之類治之兩手脈弦者

或寅申發者皆肝熱也俱宜用之

腎熱者輕按之不熱重按之至骨其熱蒸手如火如炙其

人骨酥蘇然如承餉其骨困熱不任亦不能起於牀滋腎  
丸六味地黃丸主之以脈言之則輕按之如三按之重與

重與血脉相得而數者心熱也如九按之重與肌相得而  
數者皮熱也如十二按之重與筋相得而數者肝熱也按

而數者腎熱也

黃連瀉心火 木通瀉小腸火 黃芩瀉肺火

黃芩瀉大腸火 柴胡瀉肝火 柴胡瀉膽火

知母瀉腎火 黃柏瀉膀胱火 石膏瀉胃火

皮膚如火燎而以手重取之不甚熱肺熱也目白睛赤

煩躁引飲單與黃芩一物湯



清金九伐脾肺火 黃芩為末粥丸又名與點丸

右二方瀉肺中血分之火瀉白散瀉肺中氣分之火

瀉白散方見治虛實 涼膈散 白虎湯方見前

瀉心湯瀉方見治虛實

肝柳青九伐心經之火須審虛實用之 黃連為末粥丸

本方治心熱千金地黃丸

黃連四兩為 生地半斤研取汁連查

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九食後門冬湯下

門冬九治心經有熱

麥冬兩 黃連兩

右為細末蜜丸如桐子大食後熟水下三十九

清心丸治熱

黃柏兩 麥冬兩 黃連兩 龍腦錢

煉蜜丸如桐子大每服十九臨臥門冬酒下或薄荷湯亦得

導赤散瀉方見治虛實

火府丹丙丁俱瀉

黃芩兩 黃連兩 生地兩 木通兩

為細末煉蜜如梧子大每服二三十丸臨臥溫水下

瀉黃散方見治虛實 調胃承氣湯方見 瀉青丸方見

當歸龍薈丸

當歸兩 草龍膽兩 山梔兩 黃連兩

黃柏兩 黃芩兩 大黃兩 蘆薈兩

青黛兩 木香兩 麝香兩

右為末煉蜜丸如小豈大小兒如麻子大生姜湯下二

三十九忌發熱諸物兼服防風通聖散

回金九伐肝經火亦審虛實用之

黃連兩 吳茱萸兩

右為末粥丸

佐金九佐肺金以伐肝木之邪

片苓兩 吳茱萸兩

右為末蒸餅丸

滋腎丸 黃柏兩 知母兩 肉桂兩

右為末熟水丸如雞頭大每服百丸加至二百丸白沸湯下空心服

治腎熱諸方方見

胃中熱則消穀令人懸心善饑臍已上皮膚熱腸中熱則

出黃如糜臍已下皮熱則腸中熱則出黃如糜臍已下皮熱則

熱者病在肺積熱者病在腎肝暴熱者宜局方雄

黃解毒丸積熱者宜局方妙香丸暴者上喘也病在心肺

謂之喘宜木香金鈴子散上焦熱而煩者宜牛黃散有

病久憔悴發熱盜汗謂之五臟齊損此熱勞骨蒸之病也

瘦弱虛損煩喘腸澀下血皆蒸勞也治法宜養血益陰熱

能自退此謂不治而治也錢氏地黃丸主之

雄黃解毒丸治上膈壅熱痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫

木香金鈴散治暴熱心火上喘不已

大黃兩 金鈴子兩 木香兩 輕粉兩



朴硝二  
右為末柳白皮煎湯調下食後三四錢以利為度  
牛黃散治上焦熱而煩不能臥睡

山梔 大黃 鬱金各半 甘草

右為末每五錢水煎溫服微利則已

妙香丸 丹溪云疎決腸胃

辰砂八兩 龍腦 膩粉研 麝香研各

牛黃兩 金箔九十 巴苳三百十五粒去皮心

右合研勻用淨黃蠟六兩入白礬七錢半同煉蜜勻為

丸每兩作三十丸米飲吞下如要藥速行即用鍼刺一

眼入冷水浸少時服之

久熱屬勞瘵治法見瘵門

諸熱分而言之則有氣血表裏上下五臟之異合而言

八醫學綱卷五 十九

之則氣熱表熱上焦熱心肺熱皆屬陽而治相類血熱  
裏熱下焦熱腎肝熱皆屬陰而治亦相類中焦與脾熱  
亦然

通治熱氣用黃連解毒湯治大熱甚煩躁錯語不得眠

黃連半 黃柏 山梔各半 黃芩兩

右吹咀每服五錢水煎去查熱服如未效再服

前方中加防風連翹為金花丸治風熱加柴胡治小兒

潮熱與四物相合各半為湯治婦人潮熱

三黃丸治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤

腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁飲食不美下

焦有熱小便赤澀大便秘結五臟俱熱即生癰瘡瘡瘻及

治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血 丹溪云此

黃連 黃芩 大黃

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸熱水吞下視  
臟腑虛實加減服之小兒積熱亦宜服

紫雪治脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫

走瘵毒及解諸熱藥毒卒黃等毒并蠱魅野道熱毒又治

小兒驚疇熱病 丹溪云此心脾

寒水石 石膏 磁石 滑石 已上四味各三斤

青木香 升麻各五 丁香兩 甘草八兩 已上八

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥

升藥汁中下項二味藥 升藥汁中下項二味藥



冷物水月錄

火鬱湯治五心煩熱是火鬱于地中四肢土也心火下陷在脾土之中故宜升發火鬱丹溪云治下足心熱用東

升麻

葛根

防風

柴胡根

炙甘草

白芍藥各五錢

右咬咀每服三四錢水二大盞入連翹葱白三寸煎去查稍熱服

運氣發熱有三

一曰火熱助心實而熱經曰歲火太過炎暑流行病甚則身熱骨痛而為浸淫又曰少陽所至為瘍疹身熱又曰少陰司天客勝則頭痛是少陽之發熱治以諸寒是也

八醫經綱目卷五

三

熱煩心燥悸陰厥又曰歲金不及炎火乃行寒復則陰厥且格陽反上行發熱又曰少陽在泉主勝則熱反上行熱發格中而嘔蓋主勝者謂冬寒勝少陽之客熱治以諸熱是也

三曰風扇火及寒濕鬱火而熱經曰太陽司天之政初之氣氣乃大溫民病身熱頭痛是風扇陽而熱也治宜清之又云四之氣風濕交乘民病大熱少氣又云少陽司天之政二之氣火反饒白埃四起民病頭痛身熱是寒濕鬱火而熱治視寒熱少多其制是也

黃帝曰刺節言微衣夫子乃言蓋刺諸陽之奇輸未有常處也願卒聞之岐伯曰是陽氣有餘而陰氣不足陰氣不足則內熱陽氣有餘則外熱內熱相搏熱於懷炭外畏綿帛近不可近身又不可近席腠理閉塞則汗不出舌焦

唇槁脂乾噎燥飲食不讓美惡黃帝曰善取之奈何岐伯曰取之於其天府大樞三痛又刺中膺以去其熱補手足太陰以去其汗熱去汗稀疾於微衣刺節真邪篇火熱在上推而下之從下上者引而去之

身熱臂脇痛不可反側願息主之 嗜臥身體熱不能動搖大濕 三陽絡主之

兩手太熱為骨厥如在火中可灸湧泉穴三壯立安

手心發熱 魚際針向後三分 少府針向後三分 脚心發熱濕

東骨補氣後 足底發熱脚核疼 公孫針向後三分

脈浮而澀瀉而身有熱者死通評虛實論 熱而脈靜者難治玉機真

脈盛汗出不解者死脈虛熱不止者死詳見傷寒論

勞瘵骨蒸熱

八醫經綱目卷五

三

虛者皮毛肌肉筋脈骨髓氣血津液不足也若男女終日勞役神耗力倦饑飽越常喜怒憂思形寒飲冷縱欲恣情素問曰今人未及半百而衰者以酒為漿以妄為常醉以入房以慾竭其精以耗散其真根源從此而虛竭矣五臟六腑如何不弱五勞六極七傷從此而始何謂五勞心勞血損肝勞神損脾勞食損肺勞氣損腎勞精損六極謂筋脈肉皮毛骨瘁損是謂六極七傷難經言之甚詳傷形與氣謂之七傷總而言之為虛是也大抵五行六氣水特五之一耳夫一水既虧豈能勝五火哉虛勞等症蜂起死其體虛者最易感於邪氣當先和解微利微下之從其緩而治之次則調之醫者不知邪氣加之於身而未除便行補劑邪氣得補遂入經絡致死不治如此誤者何啻千萬良可悲哉內經中本無勞瘵之說其曰勞者溫之溫者溫



存之義不足者補之以味穀肉菜果百味珍羞無非補也  
 今之醫者不通其法唯知大補之道輕則當歸鹿茸雄附  
 重則乳石丹砂加之以灼艾補燥其水水得熱愈涸生火  
 轉甚少而成嗽痰血潮熱煩渴喜冷此則熱症明矣重則  
 失音斷不可救猶且峻補不已如此死者醫殺之耳及遇  
 良工治駭而以清劑解之不合病人之意反行性責及開  
 發表攻裏之說畏而不從甘死於庸工熱補之手雖死不  
 悔深可憫也夫涼劑能養水清火熱劑能燥水補火天下  
 之事無出乎理理既明何患疾之不安勞為熱症明矣還  
 可補乎惟無邪無熱無積之人脈舉按無力而弱者方可  
 補之又必察其胃中及右腎二火虧而用之心虛則動悸  
 恍惚憂煩少色舌強宜養榮湯琥珀定神丸之類以益其  
 心血脾虛面黃肌瘦吐利清冷腹脹腸鳴四肢無力飲食

八醫心方卷之三

三

不進宜快胃湯進食丸之類以調其飲食肝虛目昏筋脈  
 拘攣面青恐懼如人將捕之狀宜牛膝益中湯虎骨丹之  
 類以養助其筋脈肺虛呼吸少氣喘乏咳嗽啞乾宜枳實  
 湯加人參黃芪阿膠蘇子以調其氣腎虛腰背脊膝厥逆  
 而痛神困耳鳴小便頻數精漏宜八味丸加五味子鹿茸  
 去附子用山藥等丸以生其精  
**勞瘵主陰虛痰與血病** 虛勞漸瘦屬火陰火消鍊即  
 是積熱宜照後法治之  
 草還丹治陰虛骨蒸用青蒿一斗五升重便三斗文武火  
 熬約童便減至二斗去蒿再熬至一斗入猪膽七箇再熬  
 數沸用甘草末收和為丸梧子大每服五十九  
 治勞瘵四物湯加竹瀝入小便 陰虛發熱四物湯加黃  
 栢降火補陰甚者加龜板

**治骨蒸** 方生地黃一升搗取汁盡分再服利則減  
 之以身涼為度

右丹溪論勞瘵主乎陰虛者蓋自子至巳屬陽自午至  
 亥屬陰陰虛則熱在午後子前屬陽陽虛則陰陰虛則  
 汗從寐時盜出也升屬陽降屬陰陰虛則氣不降氣不  
 降則痰涎上逆而連綿吐出不絕也昧浮屬陽沉屬陰  
 陰虛則浮之洪大沉之空虛也此皆陰虛之症用四物  
 竹瀝又加炒栢龜板皆補陰降火之劑又須達嗜慾薄  
 滋味靜心調養以助之也

**陰虛發熱** 四物湯加黃栢兼氣虛者加參芪白朮  
 御院瓊玉膏滋血補氣延年益壽

人參三十六兩去蓋 白茯苓二十四兩去 生地  
 黃十六斤搗取汁 蜜斤

醫心方卷之三

三

右和勻入銀石器瓶中內用油紙外用竹箬包以軟篾  
 縛緊瓶口入重湯內懸胎煮之用桑柴文武火不住手  
 三晝夜入井中浸一日夜出火毒又煮一日出陰毒取  
 出每早空心用酒或白湯調下

**清神甘露丸** 治男子婦人虛勞不足大骨枯大肉陷皆  
 治之

生地汁 白蓮藕汁 生乳汁用生

右三味等分用砂石器內以文武火熬成膏子用後藥  
 人參 白朮 黃連 黃芪 五味子  
 胡黃連

右各等分為細末以前膏子和劑丸如桐子大每服五  
 十九人參湯下

**黃芪膏子煎丸**



人參 白朮 各一兩半 柴胡 黃芩 各一兩

白芷 知母 各半兩 甘草 半兩 鱉甲 一兩 炙 龜板 一兩 炙

黃芪 半斤 為粗末 用水二斗 煎一斗 去渣 再煎 今不

今煎放 右為末 用黃芪膏和勻 丸每早白湯服下

呼吸少氣 懶言語 無力 動作目無睛光 面色晄白 皆兼氣

虛也

補天丸 治陰虛 骨蒸 發熱 形羸 瘦者 紫河車 洗淨 用布

絞乾 用補腎丸 藥末 搗細 焙乾 再碾 為末 酒煮 米糊 為丸

梧子大 每服七八十九 熱湯下 夏月加五味子 紫河車 即

初生男子 胞衣也

補腎丸 治陰虛 有痰 膈不清者

龜板 一兩半 黃柏 半兩 牛膝 二兩 乾姜 二兩

陳皮 兩

入醫學綱目卷五

右為末 姜汁打糊 丸每服七八十九

治酒色過傷 少陰

黃柏 半兩 黃芩 半兩 地黃 兩 龜板 五兩 炙

夏加砂仁 三錢 五味 五錢 冬加乾姜 炒黑 三錢 用炊

餅為丸 食前白湯服 三五十九 丹溪心法以

地黃丸 治久新 憔悴 汗發 熱五臟 齊損 瘦弱 虛煩 腸

澀下 血骨 蒸痿 弱無力 不能 運動 東垣云 治脈 沉而 虛者

熟地 兩 山茱萸 兩 山藥 各四兩 牡丹皮 兩

茯苓 澤瀉 各三兩

右為細末 煉蜜 丸 桐子大 空心 溫酒 服 五十九

或問錢氏地黃丸 補腎 又曰 補肝 何也 曰 然 手厥 陰心

主 包絡 足厥 陰肝 經 俱 治 在 下 焦 經 云 不 足 者 滋 其 化 源

故 肝 腎 之 病 同 一 治 法 此 地 黃 丸 補 二 經 之 意 也 海藏云 若加五

味為腎氣丸此滋

黑地黃丸 加五味子 為假月氣丸 治陽虛 陰衰 脾胃 不足

房室 虛損 形瘦 無力 面多 青黃 而無 常色 此補 氣益 胃

若木 一斤 熟地 斤 五味子 斤 乾姜 半斤 炙

右為細末 棗肉 丸 梧子大 食前 米飲 或酒 服 白丸 治血

虛久 痔甚 妙經 曰 腎苦 燥 急食 辛以 潤之 此藥 開腠 理

生津 液通 氣又 五味子 酸以 收之 此雖 陽盛 而不 燥熱

乃是 五臟 虛損 於內 故可 益血 收氣 此藥 類象 神品 方

也

治陽虛 心肺 不足 宜八 味丸 四肢 弱無 力多 困未 知陰 陽

先損 夏可 用地 黃丸 春秋 宜腎 氣丸 冬宜 八味 丸

雞蘇丸 治嗽血 方見

入醫學綱目卷五

右治肺腎虛 蓋肝心屬陽 肺腎屬陰 陰虛則肺腎虛矣

腎虛者 從房室 中來 其症 或腰 痠 腹痛 或足 痿 足 痿 足

熱 或遺 精白 濁是 也 肺 虛者 或咳 嗽 或吐 血是 也 治 腎

虛 四方 前二 方龜 板黃 柏為 君 有 痰 無 痰 皆 可 用 後 二

方 地黃 為君 無痰 可用 痰多 而膈 不清 者宜 審之 治肺

虛 咳嗽 唾血 者方 法浩 大另 立咳 嗽唾 門也

虛勞 皆積 熱成 始健 時可 用子 和法 後日 羸憊 四物

湯加 減送 消積 丸使 熱不 作也 蒸蒸 發熱 積病 最多

小陷 胃湯 治濕 痰發 熱極 妙方 見傷 寒

退實 熱勞 積痰

鱉甲 龜板 側柏 瓜蒌仁

半夏 黃連 黃柏

右為末 炊餅 丸



又濕痰發熱

黃芩 黃連 香附生 蒼朮

右為末瓜蒌穰為丸 青礞石九方見 河間人參半

夏九方見

治施官人年三十餘不可勞動勞動則發熱臆洪而大

在右手短而瀉在左手予謂此必酒痰成濕傷血又問之

遇少勞則喘乏力小便或赤或白

當歸 黃芪 人參各五分 芍藥一分

白朮二分 川芎五分 木通三分 黃芩三分

陳皮五分 厚朴五分 炙甘草二分 煎湯下青礞

石九

柴胡飲子解一切肌骨蒸熱寒熱往來及傷寒發汗不

解或汗後餘熱勞復或婦人經病不快產後但有如此之

症並宜服之

黃芩 甘草炙 大黃 芍藥

柴胡 人參 當歸各半

右咬咀姜三片煎熱服

防風當歸飲子治煩熱皮膚索澤食後煎服空心宜以

此飲下地黃丸

柴胡 人參 黃芩 甘草 防風

大黃 當歸 芍藥各半 滑石二錢

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片煎七分溫服如痰

嗽加半夏如大便黃米穀完出驚悸崩血淋閉欬血衄

血白汗頭痛積熱肺痿後與大金花丸

大金花丸

黃栢

黃芩

黃連

山梔各一

右為細末水丸小豆大每服一百丸溫水下日二三服

或大便實加大黃自利如中外熱者此藥作散煎服名

解毒湯或腹痛嘔吐欲作利者每服解毒湯半兩加半

夏茯苓厚朴各三錢姜三片如白膿後重下利後重者

加大黃三錢

麥煎散治少男室女骨蒸婦人風血攻疰四肢

赤茯苓 當歸 乾漆 鱉甲炙

常山 大黃煨 柴胡 白朮

生地 石膏各一 甘草半

右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後臨臥服若有

虛汗加麻黃根一兩東坡云此黃州吳判官瘡骨蒸黃

瘦口臭肌熱盜汗極效吳君寶之不肯妄傳

當歸龍薈丸治肝有積痰汚血結熱而勞瘵者其大衝脉

必與衝陽脉不相應宜以補陰藥吞此丸神效方見

右勞瘵兼痰積其症腹脇常熱手足頭面則於寅卯時

分乍有涼時者是也若頑痰膠固難治者必以吐法吐

之或沉香滾痰丸透腦丹之類下之又甚者或用倒倉

法若痰積閉塞經脉則太衝脉與衝陽寸口脉數而不

相應者極難治自陰虛條至此凡六法但患勞者罕能

脫此六法自此以後數法宜審而行之無其病莫妄施

也

治骨蒸熱神效

前胡 柴胡 胡黃連 猪脊髓

猪膽

右水煎入猪膽汁服之

地骨皮枳殼散治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多

右水煎入猪膽汁服之

地骨皮枳殼散治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多



盜汗

地骨皮 秦艽 柴胡 枳殼

知母 當歸 鱉甲醋炙

右等分爲末水一盞桃柳枝頭各七箇姜三片烏梅一箇去查臨臥服

汗 羅秦芩鱉甲散治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤目倦盜

柴胡 地骨皮各一兩 秦艽 知母

當歸各半兩 鱉甲一兩去帶

右爲末每服五錢水一盞入烏梅一箇青蒿五葉同煎至七分去查溫服臨臥空心各一服

人參地骨皮散治臟中積冷營中熱按之不足舉之有餘陰不足而陽有餘也

醫學綱目卷五

茯苓兩 知母 石膏各一兩 地骨皮

人參 柴胡 生地各一兩

右咬咀每服一兩生薑三片水煎細細服

人參柴胡散治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛夜有盜汗及婦人虛勞骨蒸尤宜

白茯苓 人參 白朮 柴胡 當歸 半夏麩 乾葛 甘草炙 赤芍藥已上各

右爲細末每服三錢姜四片棗三枚水煎帶熱服許學

但有勞熱症皆可服熱退即止大抵透肌

右四方治虛損復受邪熱皆宜用柴胡衍義云柴胡本經並無一字治勞今人方中治勞鮮有不用者誤人甚多常原病勞有一種真虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也當斟酌之如經驗方治勞熱青蒿煎丸

用柴胡正宜服之無不效熱去即須急已若無邪熱得此愈甚雖至死人亦不怨王海藏云苟無實熱醫取用之不死何待後之用柴胡者宜審諸又大忌茶連枳殼用純苦寒藥反瀉其陽但當用瓊玉膏之類大助陽氣使其復還寅卯之位微加瀉陰火之藥是也

火鬱湯方見 柴胡升陽湯方見

右二方治重陰覆其陽火不得伸或酒酒惡寒或志意不樂或脉弦數或四肢五心煩熱是也病去即已不可過劑 服寒涼藥症雖大減脉反加數者陽鬱也 大忌寒涼宜升宜補犯之死速

問兩手寸關弦病脾弱火勝木旺土虧金鏗當作何治 答曰不治標本從乎中治木標也土本也火中也燉金虧土旺木者皆火也錢仲陽安神丸主之山積麥冬益金之

醫學綱目卷五

氣金益則氣旺而木自平寒水石牙硝火中添水使化爲濕熱也濕熱爲季夏之令非土而何故用硃砂以墜火下行將退與子權行濕令也故脉弦得除而土自旺秋喘加人參丹砂等夏則不加養氣者加沉香欲發汗者臨臥先與白粥一盞後藥之則汗也寒熱神少振搖小便淋或多或大便走完穀不化口乾舌縮唇吻有瘡心下痞大渴引飲惡乾喜濕目花四肢無力怠惰嗜臥食不入皮膚燥澀面色黧黑肌肉消鑠胃腹中急額上汗者法宜洩火益濕補氣脉弦浮沉者同治以安神丸主之方見治 氣不化小便不利濕潤肌滑熱蒸陰少氣不化 氣走小便利自汗肌燥瀉爲迫津液不能停離珠丹主之方見 弦數者陽陷于內從外而之內也弦則帶數甲經于乙緊則帶洪壬經于丙若弦虛則無火細則有水此二脉從內之外不



宜離珠丹

火令速行而土虛土虛則長夏不  
至難經曰虛則補其母資其化源

右寸顯弦數脈是東方實乃乘子勢也既瀉其子火木

自虛矣以寒藥瀉火是補北方水木既乘火勢而來侮

金當金中瀉火火退則木無所恃而自退是實則瀉其

子也

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷  
饑傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑

緩中補虛大黃蜜垂丸主之結在內者手足脈必加失此

大黃十兩 黃芩兩 甘草兩 桃仁升

杏仁升 芍藥兩 地黃兩 乾漆兩

蜜垂升 水蛭枚 蟅蟲升 麩垂斤

右十二味為末煉蜜丸如小葶大日三服酒下五丸

陳大夫傳張仲景百勞丸治一切勞瘵積滯疾不經藥壞

症者宜服

當歸炒 乳香 沒藥各一 人參錢

大黃錢 蜜垂十四枚 水蛭十四枚

右為細末煉蜜丸如桐子大都作一服可百丸五更百

勞水下取惡物為度服白粥十日百勞水用杓揚百遍

仲景甘爛水是也

外治骨蒸桃仁一百二十枚去皮併雙仁留尖杵和為

丸平旦井花水服今盡服訖量性飲酒仍須吃水多效隔

日又服一劑百日不得食肉

炙甘草湯一名復治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動  
如常不出百日急者十一日死方見

四物加減湯治婦人骨蒸

當歸 白芍藥 川芎 地黃已上

地骨皮瀉腎 牡丹皮瀉包絡火

右咬咀水煎服

道通散治血虛勞倦五心煩蒸煩赤盜汗室女血弱陰

虛營衛不和月水不調痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

茯苓 白朮 當歸 芍藥

柴胡 甘草

右咬咀生薑一塊煨切破薄荷少許同煎

右二方治婦人骨蒸大法若夫要處並同於前陰虛法

取之 蒸病治者宜隨各經虛實內外淺深用藥加減

可也

古今錄驗五蒸湯

茯苓 甘草 人參 竹葉 地黃

葛根 知母 黃芩 石膏 粳米

右咬咀以水三盞煎小麥二合至二盞去麥煎藥至一

盞溫服隨症加減于後忌海藻菘菜蕪菜大醋

實熱 加黃芩 黃連 黃柏 大黃

虛熱 加烏梅 秦艽 柴胡

血 加青蒿 鱉甲 蛤蚧 小麥 牡丹皮

肺蒸 加烏梅 天冬 麥冬 紫苑

大腸 加烏梅 加大黃 芒硝

皮蒸 加石脂 桑白皮

膚蒸 加丹皮



氣蒸 <small>鼻乾喘促</small>	加人參	黃芩	山梔
心蒸 <small>舌</small>	加黃連	生地	
小腸 <small>下</small>	加赤茯苓	生地	木通
血蒸 <small>髮</small>	加生地	當歸	桂心 童便
脉蒸 <small>白波語脈結</small>	加當歸	生地	
脾蒸 <small>急</small>	加白芍	木瓜	苦參
胃蒸 <small>下</small>	加石膏	粳米	大黃 芒硝 乾葛
肉蒸 <small>無味而嘔</small>	加白芍		
肝蒸 <small>加川芎</small>	當歸	前胡	
膽蒸 <small>加柴胡</small>	括萆		
筋蒸 <small>加當歸</small>	川芎		
三焦蒸 <small>加石膏</small>	竹葉		
腎蒸 <small>加生地</small>	石膏	知母	寒水石
膀胱蒸 <small>加澤瀉</small>	茯苓	滑石	
腦蒸 <small>加生地</small>	防風	羌活	
髓蒸 <small>加生地</small>	當歸	天門冬	
骨蒸 <small>加鱉甲</small>	地骨皮	丹皮	
腎蒸 <small>加石膏</small>	黃芩		
胞蒸 <small>加澤瀉</small>	茯苓	生地	沉香 滑石

凡此諸症皆熱病後食肥甘油膩房事飲酒犯之而成  
 久蒸不除變成痲病死期近矣  
 牡丹皮治無汗之骨蒸能瀉陰 知母治有汗之骨蒸  
 治骨蒸勞用薄荷汁與藥熬成膏  
 治患勞人燒香法玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一  
 斤和勻入磁瓶內封閉地中埋置半日取出更用炭末六

兩煉蜜六兩和勻入瓶內封置五日取出燒使鼻中常聞  
 香氣疾自愈矣  
 治骨蒸勞熱 膏膏在四指下五指上各開三  
 里  
 治勞上氣喘滿 肺俞五分留七 尺澤  
 崔氏治骨蒸傳尸勞灸四花穴兼治赤白帶  
 第一次取二穴令患人正立取一蠟繩從足大拇指端  
 衣貼肉量至後跟上端至委中橫紋絕斷為則子復令患  
 人解分兩邊令見頭繩卻平身正坐取前則子從鼻端  
 貼肉上至頭後下至項脊骨以則子盡處為記用墨點之  
 是穴又另取一繩令患人合口將繩兩頭至口吻當中鈎  
 起至鼻柱根如人字齊兩吻截斷却展直於前則子盡頭  
 墨記處橫量開取兩平頭是穴頭左右當牛 第二次取  
 二穴令平身正坐又取一繩繞項向前雙垂與乳頭齊截  
 斷却背翻繩頭向項後以繩中停於結喉上其下雙垂繩  
 頭盡處當背骨中用墨點之亦不 又取一繩令病人合口  
 橫量二吻截斷移於前脊中記處橫量取平頭左右當牛  
 兩頭是穴連前第一次通取共計四穴同時上火七壯至  
 二十壯灸至百壯候灸瘡瘻却取三次穴 第三次取二  
 穴將前第二次量口吻繩子於第一次雙繩頭盡處墨點  
 記上當脊骨直上下豎點令繩子中停中心在墨點處於  
 上下繩盡處是穴灸如前法  
 治骨蒸熱不可治者或前板齒乾燥 大椎  
 又法 鳩尾灸二十七  
 右背俞取膏肓肺俞四花穴大椎等穴治勞瘵者皆為



陽氣下陷而寒熱往來也若灸之早百發百中果試有

效

傳尸勞 湧泉第二足指端量至極盡折中足針三

男子婦人脈大為勞極虛亦為勞 男子面色薄者主

及亡血卒喘悸脈浮者裏虛也 勞之為病其脈浮大

手足煩春夏劇秋冬瘕陰寒精自出瘦削不能行 脈弦

而大弦則為減大則為孔減則為寒孔則為虛虛寒相搏

此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精 跌陽脈

浮而孔浮者衛氣衰孔者榮氣傷其體瘦肌肉甲錯浮孔

相搏榮氣衰微四屬斷絕

右胗脈浮而大或大而弦皆為虛勞者蓋陽盛陰虛之

症也暮多見之

男子婦人脈虛細弱者勞也 男子脈虛沉弦無寒熱

短氣裏急小便不利面色白時目膜兼少腹滿此為勞

使之然 脈沉小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒

腹滿甚則溇泄食不消化也

右胗脈虛微細弦為虛勞者蓋陰陽俱虛之症也最多

見之

骨蒸之極聲啞咽痛面黃脈躁直視汗出如珠喘乏

氣促出而無入毛焦唇反此皆不治之症雖有神醫亦無

如之何矣

傳尸勞熱

治傳尸勞太乙明月丹其病肌瘦面黃嘔吐咳嗽不

安先燒安息香令烟出病人吸之不嗽非傳尸也不可用

此藥若烟入咳嗽不止乃傳尸也宜用此藥

雄黃 木香 天靈蓋 輕粉

右為末用法酒一大升大黃末半分熬膏入前藥為丸

彈子大硃砂為衣五更初服勿令人知以童便和酒化

一丸服如人行十里許必吐出虫狀如燈心細長及如

爛瓜子又如蝦蟆狀各不同未效次日再服以應為度

治紅者難青黑者即死最驗若熏之良久無毛者即非

此症乃為勞瘵虛損即用前參茸溫補之藥

取傳尸伏尸勞虫法

天靈蓋 安息香 虎糞骨

次之 鱉甲 桃仁 青蒿 豉

麝香 枳殼 楓葉 桃柳東南

板如筋大者每七條各七寸

右先將青蒿桃柳楓葉芬頭用水二官升煎半乾去渣

入天靈虎糞鱉甲安息香童便煎取汁去渣約有四

五合將枳殼麝香研勻調作一服早晨空腹服以被蓋

汗恐汗內有細虫以白紙拭之投火中須臾必下如有

虫以大火焚之棄流水中所用藥勿令病者知之半月

後氣血復完再進一服依前法三次無虫乃止以美飲

食調理其病自愈

又方

桑枝 柳枝 石榴枝 桃枝



梅枝各七莖 青松一小

右用童便一升半芴白七莖去頭葉煎及一半去查別入安息香阿魏各一分煎至一鍾濾去查調辰砂末半錢栲櫟末一分麝香一字分作二服調下五更初一服五更三點時一服至已牌後取下重色紅者可治青者不治見有所下即進稀粥飲溫煖將息不可食粉麵生冷毒物合時須擇良日不得令猶犬孝服穢惡婦人見之

神人阿魏散治骨蒸傳尸等寒熱羸勞困倦喘嗽

阿魏錢 青蒿一握 東北方桃枝細切

甘草如病人中指許大

右以童便二升半隔夜浸藥明旦煎取一大升空心溫服分為三服每次調入栲櫟末三分如人行十里再進

八寶丹

一服男病女煎女病男煎合藥時忌孝子孕婦病人及腥穢鷄犬等物服後忌油膩濕麵生冷硬物服至一二劑即吐出虫予或瀉出更不須服餘藥若未吐利即當盡服病在上則吐在下則利皆出虫如馬尾人髮即愈服藥後覺五臟虛弱魄不安即以白茯苓湯補之

白茯苓錢 人參錢 遠志二錢 龍骨

防風錢 甘草三 生地四 麥冬四

犀角末錢 大棗七

右以水二大盞煎作八合分三服溫服如人行十里一服仍避風寒若覺未安隔日更作一劑已上藥餌須連服之

羅犀角紫河車丸治傳尸勞三月必效其餘勞症只消數服

紫河車一具米泔浸一 驚甲餅 桔梗

胡黃連 白芍 大黃 敗鼓皮心

貝母心 龍膽草 黃藥子 知母已上各

芒硝 犀角 蓬朮各一 朱砂錢

右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣空心溫酒服三四十丸

本草葛洪云鬼疰者是五尸之一疰又按諸鬼邪為害其變動乃有三十六種至九十九種大畧使人淋漓沈沈然

於死傳於旁人乃至滅門覺知是候者急治獺肝一具陰乾取末水服方寸七日三服效未知再服此方神良天慶觀一法師行考校極精感時一婦人投狀述患人有所附須臾乃附語云非我所禍別是一鬼亦自病人命衰為祟

八寶丹

耳今已成形在患人肺中為虫食其肺系故令吐血聲嘶師掠之曰此虫還得長生否久而無語再掠之良久云唯畏獺爪屑為末以酒服之則去矣患家如其言得愈此予所目見也究其患亦相似獺爪者獺肝之類歟

治屍疰鬼疰病用桃仁五十枚研碎以水煮取四升作一服盡當吐如病不盡二三日再服

治傳屍蟲瘵之症父子兄弟互相傳染甚者絕戶此乃祖父冤債或風水所係雖有符文法水下虫之法然虫去人亡亦未為全美若能平素保養則自愈矣

產後發熱

人參湯治產後諸虛不足發熱盜汗

人參 當歸分

右為末以猪腰子一具去脂膜切小片子以水三升糯



米半合芴白二條煮米熟取清汁一盞入藥末二錢煎至八分不拘時溫服

犀角

麥冬

白木

柴胡

枳殼

地骨皮

生地

甘草

當歸

人參

茯苓

黃芩

黃連

右咬咀入浮麥七十粒姜三片同水煎每服四錢產後發熱多屬虛寒惟乾姜加入補藥中神效此丹漢法也

方脈經卷之五

五

醫學綱目卷之五終

醫學綱目卷之六

陰陽臟腑部

治惡寒

陽虛惡寒

陽虛惡寒用參芪之類甚者加附子少許以行參芪之氣

末康呂親家形瘦色黑平生喜酒多飲不困年近半

百且有別館忽一日大惡寒戰且自言渴却不能飲予診

其脉大而弱惟右關稍實畧類弦重取則澁遂作酒熱內

鬱不得泄由表熱而下虛也黃芪一物與乾葛同煎與之

盡黃芪二兩乾葛一兩脉得小次日安矣

脾胃之虛怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少

退體重節痛口舌乾食無味大便不調小便頻數不嗜食

食不消兼見肺病洒浙惡寒氣慘慘不樂面色惡而不和

乃陽氣不伸故也當升陽益胃名曰升陽益胃湯

羌活

柴胡

獨活

白木

人參

甘草

防風

黃芪

半夏

澤瀉

黃連

茯苓

橘皮

白芍藥

人參

白木

類反補旺為脾胃虛則肺

受病故因時而補母虛也

右咬咀每服三錢生薑五片棗二枚去核水三盞同煎

至一盞去渣溫服早飯後午飯前服之禁忌如前其藥

漸加至五錢止服藥如小便罷而病加增劇者是不宜

利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初二日不可飽食

恐胃再傷以藥力尚少胃氣不得轉運升發也須薄滋

味或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不可

淡食以損藥力而助邪氣之降沉可以小使形體使胃

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安



靜尤佳若胃氣稍強少食果以助穀藥之力五穀為養  
五菓為助者也及酒溫麵大料物及六蒸寒涼淡滲之物

黃芪補胃湯治表虛惡賊風

黃芪三錢 甘草一錢 麻黃一錢 草薺一錢

橘皮一錢 青皮一錢 當歸一錢 香白芷一錢

升麻三錢 藜蘆三錢 柴胡六錢 黃柏八錢

右劉如麻豆大水二盞煎至一盞去渣稍熱食前服

丹晉胡石錫年三十一歲形肥而大色稍蒼厚家富而足更嗜口味兩年前得消渴病醫與寒涼藥而得安有一人教以病後須用滋補令其專用黃雌雞因此食至千餘隻漸有腦滿嘔吐之病醫者意為胃寒遂以附子沉香之藥自餘貼嘔病除月餘天氣大熱忽惡風足亦怕地氣

八醫經綱目卷六

二

遂堆糠尺許厚上鋪以簾糊以重紙方可坐臥而兩手不能執筆口鼻皆無氣以呼吸欲言無力行十餘步便困倦脉皆浮大而虛僅得四至予作內有濕痰因多服燥熱藥遂成氣耗血散當此夏令自合便死因其色之蒼厚元氣尚全可以安穀遂以人參黃芪白朮熬膏煎淡五味子湯以竹瀝調飲之三日諸病皆愈令其頓絕肉味一月後康健如舊又以雞湯下飯一月後胸腹膨滿甚自煎二陳湯加附子白苳苳飲之其病頓除遣人問調理藥予教以絕去諸藥與肉飲自然平安

右陽虛惡寒五法皆以參芪為君首一法佐以附子中三法佐以升陽之劑末一法佐以消痰之劑也

夫脾胃之症始則熱中終傳寒中經云陰盛生內寒厥氣上逆寒積於胃中是腎水反來侮土此謂所勝者妄行

也作中滿腹作涎作清涕或溺足下痛不能任身履地骨乏無力喜睡兩九多冷時作陰陰而痛或安見鬼狀夜夢亡人腰背胛眼腰脊俱痛而不渴不瀉此濕氣去寒獨留寒獨留則血凝泣血凝泣則脉不通故其脉盛大以滑名曰寒中

白朮附子湯

白朮 附子炮 陳皮 蒼朮制

厚朴制 半夏湯 茯苓去 澤瀉各一

猪苓去皮 肉桂四錢

右劉如麻豆大每服五錢水二盞生薑三片煎至一盞食前溫服量虛實加減

夫病熱中症者衝脉之火附二陰之裏傳之督脉督脉者第二十一傾下長強穴是也與足太陽膀胱寒氣為附經

八醫經綱目卷六

三

督脉其盛也如巨川之水疾如奔馬其勢不可遏太陽寒氣細細如線督脉逆太陽寒氣上行衝頂入額下鼻尖入手太陽傳於胷中手太陽者丙熱氣也足太陽膀胱者壬寒氣也壬能尅丙寒熱逆於胷中故脉盛大其手太陽小腸熱氣不能交入膀胱經故十一經之盛氣積於胷中故其脉盛大其膀胱逆行盛之極子能令母實手陽明大腸金即其母也故燥旺其燥氣挾子之勢故脉濇而大便不通以此言之脉盛大以濇者手陽明大腸脉也

若見此病中一症皆為寒禁川諸甘酸藥

帝曰人身非衣裘也中非有寒氣也寒從中生者何岐伯曰是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出

帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是為何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎



脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火故不能凍慄名曰骨痺是人當變節也

寒分氣

東垣云晝則惡寒是陰氣上溢於陽分也夜則惡寒是陰

血自旺於陰分也

潮氣分寒 桂枝加附子湯方見傷寒自汗 桂枝加芍藥人參

新加湯方見傷寒體痛

血分寒 巴戟丸 神珠丸方見治虛實法

巴戟丸

良薑兩六 紫金藤兩十六 巴戟兩二 青塩兩二

肉桂 吳茱萸兩四

右為末酒糊丸每服二十九丸暖鹽酒送下鹽湯亦得

八醫名類卷六

三焦寒用藥大例

上焦寒陳皮厚朴藿香 中焦寒大小便不通白木乾薑

丁香 下焦寒肉桂附子沉香

桂附丸 二氣丹 還少丹

上焦 鐵刷湯 中焦 大建中湯 下焦 八味丸 天真丹

胡椒理中丸

欵冬花去梗 胡椒 甘草炙 華撥

良薑兩四 白木兩五 乾薑 陳皮去白

細辛去苗

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸温湯酒米飲任

下

鐵刷湯

良薑兩六 茴香兩二 甘草兩一 蒼朮木酒浸

右為細末每服二錢薑三片鹽一捻水一盞煎至七分

温服或熱酒調下

二氣丹

肉桂去粗皮 硫黃細研各一錢 乾薑炮 硃砂研為末

附子製為末半兩

右為細末研勻麵糊為丸梧子大每服三十九丸鹽湯下

附子理中丸

人參去 附子炮去 乾薑炮 甘草炙

白木兩二

右為末煉蜜和丸每一兩作十九丸每服一丸以水一盞

化破煎至七分服

八醫名類卷六

五

大建中湯治內虛寒急少氣手足厥逆少腹脹急或腹滿  
弦急不能起臥微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦唇口  
乾精自出或手足乍寒乍熱而煩苦酸痛不能久立補中  
益氣

桂心錢一 芍藥 黃芪各二錢 甘草一錢

生薑錢五 當歸 人參錢三 附子半錢

半夏錢二 棗三枚

右吹咀水五盞煎至三盞去渣分三服

恒天真丹治下焦陽虛

沉香 巴戟酒浸炒 茴香鹽炒香 破故紙炒

蘇蘇酒浸 胡蘆巴炒 杜仲去絲 琥珀各

官桂錢五 牽牛炒黑去鹽取

右為末用沒藥酒糊為丸梧子大每服五十九至八十



九空心温酒下

潮下焦寒四逆例乾薑味苦能止而不行附子味辛能行而不守泄小便不通二藥皆陽氣化能作小便若薑附木三味內加茯苓以分利之為佳附生用而不炮則無火力熱則行而不止兼以水多煎少則熱直入下焦

代灸膏治老人衰弱元氣虛冷臟腑虛滑腰脚冷痛沉重飲食減少手足逆冷不能忍者用此代灸其効不能盡述

大附子一箇

吳茱萸

桂皮

木香

蛇床子各半

馬蔞草一兩

右為細末每用藥半匙白麵半匙生薑汁半盞用煎成膏攤於紙上臨臥貼臍以油紙覆其上綿衣繫之自夜至明乃去每夜如此貼之其腰腹如炙百壯除寒積腰疼貼腰服

背惡寒是痰飲仲景云心下有留飲其人背惡寒冷如冰

治法茯苓丸之類是也

身前寒屬胃經云胃足陽

明之脉氣虛則身以前皆寒慄治法宜鍼法補三里穴是也手足寒者厥也

堂中寒者腹中寒魚上白肉有青血脉者胃中有寒也

五臟寒方

肝寒雙和湯方見治 心寒定志丸葛蒲丸方見

脾寒益黃散方見 肺寒小青龍湯方見

腎寒八味丸方見治 海通治大寒大已寒丸

沉香桂附丸 沉香 附子炮 肉桂 乾薑炮 良薑 吳茱萸 茴香炒 川烏各一兩

右為末醋煮麵糊為丸桐子大每服五七十九米飲下食前一服忌生冷

海大已寒丸

華撥

肉桂各四兩

乾薑炮

良薑各六兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧子大每服二十粒米飲湯下食前服

按之無力腹中時痛心胃相控掣隱隱而痛或大便溏泄

臭不聞香臭清濁涕止目中淚出喘喝痰嗽唾出白沫腰

沉沉苦痛項背骨節時作痛目中流火口臭惡寒時時頭

痛目眩苦振寒不止或嗽或吐或嘔或噦則發燥蒸蒸而

熱如坐甌中必得去衣居寒處或飲寒水則便如故其振

寒復至或氣短促胃中滿悶而痛如有膈咽不通欲絕之

狀甚則口開目眩聲聞於外而淚涕痰涎大作其發燥方

過而振寒復至或面白而不澤者脫血也悲愁不樂情慘

意悲健忘或善噦此風熱大損寒水燥金復也如六脉細

弦而瀉按之空虛此大寒症也亦傷精氣以辛甘温熱潤

之劑大瀉西北二方則愈

薑附湯治中寒口噤四肢強直失音不語忽然暈倒口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復煩燥兼治陰証傷寒大便

利而發熱者

乾薑 熟附子分

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去渣瀉服或慮此藥性太燥即以附子理中湯相繼服餌薑附本治傷寒經下後又復發汗內外俱虛身無大熱晝則煩燥夜則安靜不渴六脉沉伏並宜服此不知脉者更宜審之



兼治中脫虛寒久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆一方附子湯以生用者名曰白通湯一方白通湯內加白朮倍之甘草減半名生附子白朮湯治中風濕昏悶恍惚腹脹滿身重手足痠痲繫繫自汗失音不語便利不禁一方用薑附湯加麻黃白朮人參甘草等分名附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱腰脊強急口眼喎喎語聲渾濁胸腹脹氣上喘急不能轉動更宜審而用之

六月病

海六月大熱之氣反得大寒之病氣難布息身涼脉遲何以治之答曰病有標本病熱為本大寒為標用涼則順時而失本用熱則順本而失時故不從乎標本而從乎中治中治者何用溫是已然既曰溫則不能治大寒之病治大寒者非薑附不可若用薑附又似非溫治之例然衰其太

八醫學綱目卷六

八

半乃止脉得四至餘病便無令治之足矣雖用薑附是亦中治也非溫而何經曰中熱遠熱雖用之不當然勝至可犯亦其理也

右虛寒正治蓋謂脉虛而惡寒者設也脉虛惡寒真寒也故正治

丹色目婦人年近六十六月內常覺惡寒戰慄喜炎火御綿多汗如雨其形肥肌厚已服附子十餘貼渾身痒甚兩手脉沉瀝重取稍大知其熱甚而血虛也以四物去川芎倍地黃加白朮黃芪炒黃柏生甘草人參每服一兩重方與一貼腹大世目無視口無言予知其病勢深而藥無反佐之過也仍用前藥熱炒與之蓋借火力為向導一帖利止四帖精神回十帖病痊安 蔣氏年三十餘形瘦面黑六月喜熱惡寒兩手脉沉而瀝重取似數以三黃丸下之

以薑湯每服三十粒二十帖微汗而安三黃恐是三補海婦人先病惡寒手足冷全不發熱脉八至兩脇微痛治者便作少陽治之陽在內伏于骨髓陰在外致使發寒治當不從內外從乎中治也宜以小柴胡調之倍加薑棗子和一婦人身冷脉微食沸熱粥飯六月重衣以衣帽蒙其首猶覺寒泄注不止常服薑附硫黃燥熱之劑僅得平和稍用寒涼其病轉加三年不愈戴人診其兩手脉皆如橫繩有力一息六七至脉訣曰六數七極熱生多以涼布熨心以新汲水淋其病處婦乃叫殺人不令入時時復以冷水淋之至三四十桶大戰汗出昏困一二日而向之所惡者皆除此法本於華陀所用世無知者素陽明所謂酒酒振寒者陽明者午也五月盛陽之陰也陽盛而陰氣加之故酒酒振寒也脉解

九醫學綱目卷六

九

右寒實反治蓋謂脉實而惡寒者設也脉實惡寒假寒也故反治

丹久病惡寒常用解鬱 濕痰積中抑遏陽氣不得外泄身必惡寒 進士周本道年近四十得惡寒症服附子數百帖而病甚予診其脉弦而緩遂以江茶入生薑汁香油些少吐痰一升許減大半又與通聖散去麻黃大黃芒硝加當歸地黃百帖而安

一女子惡寒用苦參赤小豆各一錢為末壺水吐後用後川芎 南星 蒼朮 黃芩 酒麴丸服

上焦不通則陽氣抑遏而皮膚分肉無以溫之故寒慄東垣升陽益胃湯用升發之劑開發上焦以伸陽明出外溫之也丹溪吐出濕痰亦開發上焦使陽氣隨吐升發出外溫之也故寒慄皆愈二者治陽虛表寒之要



運氣惡寒有三

一曰火熱經曰諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火又云少陽所至為惡寒戰又云少陽在泉客勝則腰腹痲而反惡寒治以寒劑是也

二曰風經云厥陰在泉風淫所勝病洒洒振寒治以辛涼是也

三曰寒濕包熱經云陽明司天之政清熱之氣持於氣交民病振寒四之氣寒雨降病振慄治視寒熱輕重多少其制是也

治寒厥

陰陽者寒暑也熱則滋雨而在上根荖少汁人氣在外皮膚緩腠理開血氣滅汗大泄皮淖澤寒則地凍水冰人氣在中皮膚緻腠理閉汗不出血氣強肉堅濇當是之時善行水者不能往水善穿地者不能鑿凍善用針者亦不能取四厥血脈凝結堅搏不往來者亦未可即柔故行水者必待天溫水釋凍解而水可行地可穿也人脈猶是也治厥者必先熨調和其經氣與脈肘與脚項與脊以調之火氣已通血脈乃行然後視其病脈淖澤者刺而平之堅緊者破而散之氣下乃止此所謂以解結者也刺節真邪

醫學綱目卷六

十

用針之類在於調氣氣積於胃以通榮衛各行其道宗氣留於海其下者注於氣街其上者走於息道故厥在於足宗氣不下脉中之血凝而留止弗之火調弗能取之用針者必先察其經絡之寬虛切而循之按而彈之視其應動者乃後取之而下之六經調者謂之不病雖病謂之自巳也  
大寒在外留而補之入於中者從合瀉之針所不為灸之所宜官能篇  
從合治之

黃帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄補諸陽

鍼灸臟腑惡寒有三

其一取肺經云振寒鼓頷不得汗出腹脹煩冤取手太陽是也 其二取胃經云胃足陽明之脉是動則病洒洒振寒善伸數欠視盛虛熱寒陷下取之也 其三取膽經云膽足少陽之脉所生病者汗出振寒視盛虛熱寒陷下取之也

針灸下

關元 腎俞

桑君又法 氣海 中極

振寒痲痺手不伸咳嗽唾濁氣膈善嘔鼓頷不得汗煩滿身痛因為痲痺尺澤主之 頭項惡風汗不出悽厥惡寒嘔吐目系急痛引額頭重項痛玉枕主之 樓樓振寒

醫學綱目卷六

土

數欠伸弱俞主之

密語通身惡寒筋脉拘急十指不得近風

絕骨二十半推而上之

治往來寒熱

聖藥之生病也寒熱少氣血上下行壽天剛

仲云婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯

主之方見

海小柴胡加減法 如寒熱往來經水不調去半夏加秦

芫芍藥當歸知母地骨皮牡丹皮川芎白朮茯苓 如小

柴胡湯與四物湯各半名調經湯 無孕嘔者加半夏

無汗者加柴胡 惡寒者加桂 有汗者加地骨皮 嗽

者加紫苑 通經者加京三稜廣茂 勞者加鱉甲



冷脈沉

羅完顏小將軍病寒熱間作脫後有斑三五點鼻中微血出兩手脈沉瀆胸膈四肢按之殊無大熱此內傷寒也問之向者臥殿角傷風又渴飲水酸水此外感者輕內傷者重外從內病俱為陰也故先斑後顯顯內陰症寒熱間作脾亦有之非徒少陽之寒熱也與調中湯數服而愈

白茯苓 乾薑 白朮 甘草各等

右剉如麻豈大每服五錢水一盞半煎

經云風氣盛於皮膚之間內不得通外不得洩風者善行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶其寒也則衰飲食其熱也則消肌肉故使人快慄而不能食名曰寒熱皮膚入為寒熱○全文見風門候慄一作失味因於露風乃生寒熱全文見風感為寒熱見診

木香 藿香 香薷 白朮 甘草

河解風湯治中風寒熱頭目昏眩肢體痠痛手足麻痺上膈壅沸

人參 川芎 獨活 甘草

麻黃去節湯洗焙各一兩 細辛兩

右為末每服三錢水一盞生薑五片薄荷葉少許同煎至八分不計時候

防風湯治中風寒熱

防風 甘草 黃芩 桂枝

當歸 白茯苓 秦艽 乾薑各一兩

杏仁五十枚

右為散水酒薑棗煎服

脈大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧輕則消導重則下之見脫方之類也

右積聚而寒熱以積聚治之

雲地骨皮散治血中風氣體虛發渴寒熱

柴胡 地骨皮 桑白皮 枳殼

前胡 黃芪各七 白茯苓 五加皮

人參 甘草 桂心 芍藥白條各

右咬咀每服三錢生薑三片水煎

柴胡散治寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩

柴胡 黃芪 赤茯苓 白朮各二

人參 地骨皮 枳殼 桔梗

桑白皮 赤芍藥 生地黃各七

右咬咀每服四錢薑五片水煎

本事有一師尼患惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自

汗是時疫氣大行醫見其寒熱作傷寒治之大小柴胡雜

進數日病劇予診視之三部無寒邪脈但厥陰弦長而上

魚際宜服抑陰等藥予製此地黃丸

生地黃兩 柴胡 秦艽 黃芩各半

赤芍藥兩

右細末煉蜜丸桐子大每服三十九烏梅湯吞下不拘

時候日三服昔宋褚澄療師尼寡婦別製方蓋有為也

此二種寡居獨陰無陽慄心萌而多不遂是以陰陽交

爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為勞嘗讀史記倉公傳載

濟北王侍人韓女病腰背痠寒熱眾醫皆以為寒熱也

倉公曰病得之欲男子不可得也何以知其然診其脈

肝脈弦出寸口是以知之蓋男子以精為主婦人以血

為主男子精盛則思室婦人血盛則懷胎夫肝攝血故



也厥陰弦出十口入上魚際則陰血盛可知褚澄之言  
信有為矣

右地黄丸雖曰抑陰實補陰瀉陽之劑也

丹趙儒人夜間發寒後便熱丑寅時退起來口渴食少無  
味穀不化腹痛而泄倦怠或遇事則熱燥赤眼氣壅又不  
耐風寒亦惡熱

白朮錢一 芍藥錢一 陳皮錢一 黃芩錢一

炒栝錢三 炙甘草分二 炒苓分三 牡丹分三

木通分三 人參錢半 歸身錢二 硝砂分三

煎下保和丸實腸丸各三十九

呂十四孺人怒氣後寒熱咳嗽食少淋泄

縮砂分三 甘草分三 人參錢半 白朮錢一

連翹錢一 陳皮錢一 茯苓錢一 薑二片同煎

潤肺散治嗽方見 大柴胡湯治結熱在裏往來寒熱助

有宿食者以宿食法治之

臟腑寒熱有四

一曰肺經云脉之至也喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而

使內也又曰肺脉微急為肺寒熱是也

二曰脾經云脾脉小甚為寒熱是也

三曰太陽經云三陽為病發寒熱是也

四曰陽維難經云陽維為病苦寒熱是也

運氣寒熱有二

一曰火熱攻肺經云少陰司天熱氣下臨肺氣上從喘嘔

寒熱又云少陽司天火氣下臨肺氣上從寒熱肺腫又云

少陰司天熱淫所勝寒熱皮膚痛又云歲木不及燥乃大

行復則病寒熱瘧瘵治以寒劑是也

二曰寒熱相錯經云陽明司天之政天氣急地氣明民病  
寒熱發暴三之氣燥熱交合民病寒熱又云陽明司天燥  
氣下臨肝氣上從民病寒熱如瘧又云少陰司天之政四  
之氣寒熱互至民病寒熱治視寒熱多少其制是也

子和武陽仇天祥之子病發寒熱諸醫作骨蒸勞治之半  
年病甚戴人往視之診其手脉尺寸皆朝於關關脉獨大  
戴人曰肺癰也問其乳媪曾有痛處乳媪曰無戴人令兒  
去衣舉其兩手觀其兩脇下右脇稍高戴人以手側按之  
兒移身避之按其左脇則不避戴人曰此肺部有癰已吐  
膿矣

素灸寒熱之法先灸項大椎以年為壯數人年壯者  
灸極骨以年為壯數尾骨謂視背膈陷者灸之陷者為筋

六書學綱目卷六

五

骨之間陷中也王註舉臂肩上陷者灸之有陷也兩季脇之  
背間陷者有陷也也

間灸之也外踝上絕骨之端灸之陽補足小指次指間

灸之依溪下陷脉灸之承筋外踝後灸之也缺盆骨

上切之堅動如筋者灸之也膺中陷骨間灸之天

穴也未掌束骨下灸之也臍下關元三寸灸之毛

際動脉灸之也膝上一灸之也百會灸二十九處灸之

不已者必視其經之過於陽者數刺其俞而藥之推至

上一灸之二十九處也

皮寒熱者不可附麻毛髮焦鼻槁脂不得汗取三陽之

絡以補手太陰肌寒熱者肌痛毛髮焦而唇槁脂不得汗

取三陽于下以去其血者補足太陰以出其汗骨寒熱者

病無所安汗注不休齒未槁取其少陰于陰股之絡齒已











三歲死見赤脉不下胃瞳子 寒熱病者平旦死全文見

產後往來寒熱

雲產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

保治日久虛勞微有寒熱脉沉而數宜柴胡四物湯

川芎 當歸 芍藥 熟地黄各一錢半

柴胡錢八 人參 黃芩 甘草

半夏錢三

右為末水煎服

雲產後往來寒熱而脉弦者少陽也小柴胡加生地黃湯

柴胡二兩 黃芩五錢 人參三錢 半夏一兩五錢

大棗三枚 生地黃 梔子 枳殼各五錢

右如前煎服

增損柴胡湯治產後虛發寒熱飲食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半夏

陳皮 川芎 白芍藥各等分

右吹咀每服三錢薑五片棗二枚水同煎食後日二服

大全治產後乍寒乍熱增損四物湯

人參 當歸 芍藥 川芎

乾薑各一兩 甘草

右吹咀每服四錢水一盞薑三片煎七分去渣熱服無

時 熱地黃散治產後虛勞皆由體虛氣力未壯勞復所起

四肢煩疼時發寒熱

熟地黄 人參 白芍藥 白茯苓

白朮 續斷各一兩 黃芪 桂心

五味子 當歸 川芎各七錢半

右吹咀每服四錢薑三片棗一枚水同煎

黃芪九治產後虛勞寒熱進退頭目眩痛骨節酸疼氣力

乏

黃芪 黨甲 當歸炒各一兩 桂心

白芍藥 續斷 川芎 牛膝

茯苓 沉香 栝子仁 枳殼各六錢

五味子 熟地黄各半兩

右為細末煉蜜為丸栝子大每服四五丸粥飲下食

後

外熱內寒外寒內熱

仲云病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也

大與小柴胡湯治熱也

羅病有遠近有緩急 征南帥不隣吉亥年七旬丙辰冬

南征至楚丘諸路迎送多獻酒醴因而過飲太多遂腹痛

腸鳴自利日夜約有五十餘行咽噎腫疼耳前後赤腫舌

本強涎唾稠粘欲吐不吐以手洩之方出言語艱難反側

悶亂夜不得臥予診得脉浮數極按之沉細而弦即謂中

丞粘公曰仲景言下利清穀身體疼痛急當救裏清便自

調急當救表救裏四逆湯救表桂枝湯今胃氣不守下利

清穀腹中疼痛雖宜急治之比之咽噎痛猶可少待公曰

何謂也答曰內經云瘡發咽噎名曰猛疽此疾治遲則咽

塞咽塞則氣不通氣不通則半日死故宜急治於是遂砭

刺腫上紫黑血出頃時腫勢大消遂用桔梗甘草連翹黍

粘酒製黃芪赤麻防風等分吹咀每服約五錢水煎清令

熱嗽冷吐去之咽之恐傷脾胃自利轉甚再服涎清腫散



聲出後以神應丸辛熱之劑以散中寒解化宿食而燥脾濕丸者取其不即化則不犯上焦至病所而後化乃治上以緩也不數服利止痛定後胸中閉塞作陣而痛思坐極云上焦如霧宣五穀味蒸膚充身澤毛若霧露之溉是為氣也今相公年高氣弱自利日久致脾胃中生發之氣不能滋養於心肺故使閉塞而痛經云上氣不足推之揚之脾不足者以甘補之再與發散甘辛之味溫養脾胃加以升麻人參上升以順正氣不數服而胸中快利痛止內經云調氣之方必別陰陽內者內治外者外治微者調之其次平之盛者奪之隨其攸利萬舉萬全又曰病有遠近治有緩急無越其製又曰急則治其標緩即治其本此之謂也

仲云病人身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

上熱下寒上寒下熱

羅上熱下寒治驗 中書左丞姚公茂六旬有七宿有暗風至元戊申末因酒病發頭面赤腫而痛耳前後腫尤甚胸中煩悶噎咽不利身半已下皆寒足脛尤甚由是以牀相接作坑身半已上常臥於牀飲食減少精神困倦而體痛命予治之診得脉浮數按之弦細上熱下寒明矣內經云熱勝則腫又曰春氣者病在頭難經云畜則腫熱射之也蓋取其易散故遂於腫上約五十餘刺出血紫黑約一盃數頃時疼痛消散又於氣海中灸艾灸百壯乃助下焦陽虛退其陰寒次於三里二穴各灸三七壯治足胫下寒引導陽氣下行故也遂製一方名曰既濟解毒湯以熱者寒之然病有高低治有遠近無越於此以黃芩黃連苦

寒酒製為引用瀉其上熱桔梗甘草辛甘溫升佐諸苦藥治其熱柴胡升麻苦平味薄者也陽中之陽散發上熱連翹苦辛平散結消腫當歸辛溫和血止痛酒煨大黃苦寒引苦性上行止煩熱投劑之後腫散痛減大便利再服減大黃慎言語節飲食不旬日良愈

既濟解毒湯治上焦頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得臥身半已下皆寒足胫尤甚大便赤秘

大黃酒煨大便

連翹酒製 黃芩酒炒

甘草炙

黃連酒炒

桔梗各二

柴胡

歸身

升麻各一

既熱病所謂陽附陰者腰以下至足熱腰以上寒陰氣下爭還心腹滿者死所謂陰附陽者腰以上至頭熱腰以下寒陰氣上爭還得汗者生

鍼灸

上寒下熱先刺其項太陽久留之已刺則髮項與肩胛令熱下合乃止此所謂推而上之者也

下寒視其虛脉而陷之於經絡者取之氣下乃止此所謂引而下之者也

國另有上熱下寒經曰陰病在陽當從陽引陰必須先由絡脉經隧之血若陰中火旺上騰於天致大陽反不衰而上充者先去五臟之血絡引而下行天氣降下則下寒之病自去矣慎勿獨瀉其六陽此病陽亢乃陰火之邪滋之只去陰火只損血絡經隧之邪勿悞也 聖人以上熱下寒是有春夏無秋冬也當從天引陽下降入地中此症乃上天羣陰火熾而反助六陽不能衰退先於大陽中決血絡出血使氣下降三陰雖力微能逐六陽下行以陰血自降故也亦可謂老陽變陰之象也故經云上熱下寒視



其虛脈下陷於經絡者取之此所謂引而下之也但言絡脈皆是也病大者三稜鍼決血去陽中之熱熱者手太陽小腸中雷火熱之邪致此老陽不肯退化為陰而下故先決去手太陽之熱血使三陰得時之用而下降以行秋令奉收道下入地中而舉藏也乃瀉老陽在天不肯退化行陰道者也至元戊辰春中書參政楊公正卿年踰七十病面頰鬱赤若飲酒狀痰稠粘時眩暈如在風霧中一日會都堂此症忽來復加目瞳不明遂歸命予診候兩寸脈洪大尺脈弦細無力此上熱下寒明矣欲藥之為高年氣弱不任記先師所論凡上熱下寒猶鳥巢高顛射而取之即以三稜針於顛前髮際疾刺二十餘出紫黑血約二合許即時頭目清利諸苦皆去自後不復作刺上熱下寒與經絡責其虛治之能引上熱下降也經旨於寒處熱處得血候熱自裏退而下降也

八明此編卷六

雷

密語上寒下熱上熱下寒、懸鍾二十半上寒下熱先補後瀉或分開上寒補懸鍾五分下熱瀉曲池一十五分

瘧寒熱

魄汗未盡形弱而氣燥穴俞已閉發為風瘧見生氣通天論

秋善病風瘧全文見 夏暑汗不出者秋成風瘧

素黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其蓄作有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷帝曰何氣使然願聞其道岐伯對曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也巨陽虛則腰背項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲飲也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏

內經論 瘧皆生於風身 於風身 邪入并 陰則陰 實陽虛 故瘧 邪出并 陽則陽 實陰虛 故瘧

於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也此令人汗空疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以冷水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作帝曰其間日而作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內着陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰善其作日晏與其日早者何氣使然也岐伯曰邪氣客於風府循脊而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此作日稍益晏也其出於風府日下一節二十五日作一一下至骶骨二十六日作二入於脊內注於伏膂伏膂之脈其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早也其間日發者由邪氣內薄

本經卷六

圭

於五臟橫連募原也其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也天樞經云瘧者內薄於五臟其行遲不能日作故次日乃發而作也帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之始發也不當風汗其日作者奈何岐伯曰此邪氣客於頭項循脊而下者也故虛實不同邪中異所則不當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所舍則其府也 帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒冷之水

風無常府 瘧者無常府 瘧者無常府



寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧帝曰先熱而後寒者何也此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧帝曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏岐伯曰溫瘧得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓燥肌肉消腠理發泄或有所用邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外者也如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧其但熱不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧帝曰瘧瘧何如岐伯曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消燦肌肉故名曰瘧瘧帝曰瘧未發其應何如岐伯曰瘧氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脈躁在陰則寒而脈靜極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休衛氣集則復病也衛與邪相并則病作與邪相離則病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒已離於陽則熱已至次日又集而并合則復病也

帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘧者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴已上俱瘧論

帝曰火熱復惡寒發熱有如瘧狀或一日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會遇之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相薄盛衰之節也瘧亦同法至真要大論

帝曰論言夏傷於暑秋必病瘧今瘧不必應者何也岐伯曰此應四時者也其病異形者反四時也其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏病者多汗帝曰夫風之與瘧相似同類而風獨常在瘧則有時而休者何也岐伯曰風氣留其處故常在瘧氣隨經絡沉以內薄故衛氣應乃作瘧論

保夏傷於暑秋必病瘧蓋傷之淺也近而暴傷之重也遠而深瘧瘧者久瘧也是知夏傷於暑濕熱閉藏而不能發洩于外邪氣內行至秋而發為瘧也初不知何經受病隨其受而取之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪氣其症各殊同傷寒論之也故內經曰五臟皆有瘧其治各別在太陽經者謂之風瘧治多汗之在陽明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂之風熱瘧治多和之此三陽受病皆謂暴瘧也發在夏至後處暑前者此乃傷之淺者近而暴也在陰經者則不分三經皆謂之溫瘧宜以太陰經論之其發處暑後冬至前有此乃傷之重者遠而深也瘧瘧者老瘧也故謂之久瘧

桂枝羌活湯治瘧病處暑前後頭痛項強脈浮惡風有汗

桂枝 羌活 防風 甘草炙

右為籠末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服迎發日服吐者加半夏麩

瘧疾頭痛項強脈浮惡風無汗者宜麻黃羌活湯



麻黃 羌活 防風 甘草炙各半兩  
右同前服法如吐加半夏等分

治瘧病身熱目痛熱多寒少脈長睡臥不安先以大柴胡湯下之微利為度如下過外微邪未盡者宜白芷湯以盡其邪

白芷湯 白芷 知母各一兩 石膏四兩  
右為籠末同前服法

治瘧無他症隔日發先寒後熱寒少熱多宜桂枝石膏湯

桂枝五錢 石膏 知母各一兩 黃芩二兩  
右為籠末分作三服水半盞同煎服間日者邪氣所舍深也如外邪已罷內邪未已再下之 從卯至午發者宜大柴胡湯下之 從午至酉者知邪在內也宜大承

氣湯下之 從酉至子發者或至寅時發者知邪在血也宜桃仁承氣湯下之 前項下藥微利為度以小柴胡湯微其微邪之氣

治瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明合病也謂之大爭寒熱作則必戰動經曰熱勝則動也發熱則必汗泄經云汗出不愈知為熱也陽盛陰虛之証治當內實外虛不治恐久而傳入陰經也宜桂枝芍藥湯主之

桂枝二錢 黃芪 知母 芍藥 石膏各半兩

右為籠末五七錢用水煎 如前藥服之寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜桂枝黃芩湯以和之

甘草四錢 石膏五錢 知母五錢 桂枝二錢

柴胡二兩 黃芩四錢 人參半兩 半夏四錢

右為籠末依前服法桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深透而入血故夜發乃陰經邪此湯發散血中風寒之邪

世桃仁承氣湯治夜瘧有實熱者方見 治先熱後寒者小柴胡湯先寒後熱者小柴胡加桂枝湯

右為籠末同煎服後如外邪已罷內邪未已用大柴胡湯下之

治處暑後冬至前後瘧其法並於久瘧法求之

局方雙解飲子治瘧疾辟瘴氣神效

肉苳蔻 草苳蔻各二箇一箇用水和 厚朴二寸一分用生薑 甘草大者二兩一分 生薑二塊如棗大一塊用

右各咬咀每服分一半用水一碗煎至一大盞去渣空心溫服東垣云此藥暑氣發病熱症知其寒也局 治發瘧如前症是夜發者麻黃黃芩湯主之

麻黃一兩 甘草三錢 桃仁三十枚 黃芩五錢 桂枝二錢

右為細末依前服法

世桃仁承氣湯治夜瘧有實熱者方見 治先熱後寒者小柴胡湯先寒後熱者小柴胡加桂枝湯

多熱但熱者白虎加桂枝湯多寒但寒者柴胡桂枝湯

仲溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時便難白虎加桂枝湯主之詳前發朝辨

小柴胡加桂湯治瘧先寒後熱方見 小柴胡湯治瘧先熱後寒

仲溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時便難白虎加桂枝湯主之詳前發朝辨

小柴胡加桂湯治瘧先寒後熱方見 小柴胡湯治瘧先熱後寒

仲溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時便難白虎加桂枝湯主之詳前發朝辨



知母 <small>六兩</small>	甘草 <small>二兩</small>	石膏 <small>一斤</small>	粳米 <small>二</small>
桂 <small>三兩</small>			
右剉每服五分水一盞煎八分去渣溫服出汗愈			
柴胡桂薑湯治瘧寒多微有熱或寒不熱 <small>傷寒</small>			
瘧多寒者名曰牡瘧蜀漆散主之			
蜀漆 <small>燒去</small> 雲母 <small>燒三</small> 龍骨 <small>等</small>			
右三味搗為散末發前以漿水服半錢七如溫瘧加蜀漆一錢臨發時服一錢七			
牡蠣湯治牡瘧			
牡蠣 <small>四兩</small> 麻黃 <small>去節</small> 甘草 <small>二</small> 蜀漆 <small>三</small>			
右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服			
柴胡去半夏加枳實湯治瘧病後渴者亦治勞瘧			
柴胡 <small>八</small> 人參 黃芩 <small>各三</small> 枳實根 <small>四</small>			
生薑 <small>二</small> 大棗 <small>十二</small> 甘草 <small>三</small>			
右七味以水一斗二升煮取六升去渣再煎取三升溫服一升一日兩三服			
丹瘧 有風 有暑 有食 有痰			
三日一發者受病一年 間日一發者受病半年 一日一發者受病一月 二日連發住一日者氣血俱受病 一日間日者補藥帶表藥後用截瘧丹截之在陰分者用藥徹起陽分方可用截方			
常山 草果 檳榔 知母			
烏梅 川山甲 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small>			
用水酒各一大碗煎至半碗露一宿臨發前二時溫服之如吐則勿服之			

大法暑風必當發汗夏月多在風涼處歇遂閉汗而不泄 因食者必從飲食將息 瘧而虛者須先用參朮一二帖 托住其氣不使下陷後用他藥治內傷挾外邪者同法 內必生痰必以汗解二陳湯加柴胡常山黃芩 瘧而甚 者發寒熱頭痛如破渴而飲水自汗可與			
人參 黃芪 白朮 黃連			
黃芩 梔子 川芎 蒼朮			
半夏 天花粉 水煎服			
一丈夫瘧脈弦細每日近午發此風寒也			
白朮 柴胡 青皮 半夏			
蒼朮 麻黃 木通 <small>半</small> 桂 <small>錢</small>			
甘草			
何氏子年二十歲瘧間日作頭痛惡寒為甚			
麻黃 白朮 青皮 木通			
蒼朮 桂皮 <small>半</small> 半夏 炙甘草			
小娘患瘧汗但未到下體			
白朮 麻黃 知母 半夏			
人參 桂枝			
分二貼薑三片水二盞半煎至半盞露星月下一夜次日早空心熱服			
陳一之子二歲間日瘧			
麻黃 白朮 蒼朮 陳皮			
半夏 木通 甘草			
何主首二十歲瘧間兩日作寒自足起發時口渴身痛頭痛服已有汗			
麻黃 黃芪 白朮 青皮			



芍藥 蒼木二 木通一 炙甘草三

柴胡一 王舅瘧左弦甚右界滿將退時有汗

人參一 半夏一 白朮 柴胡六

蒼木 青皮各五 木通一 甘草三

分五帖煎服三之一去查入薑汁半杯露一夜次早溫服之

王孺人舊患瘧疾因勞心力又發今骨節疼痛惡心食少與此方

人參五 白朮一兩 蒼木一 陳皮一

川芎 當歸 木通各七 甘草一

分六帖薑三片

馮官人發瘧脉弦有汗

醫子書卷六

重

人參五 黃芪 黃連 白朮三

芍藥兩 茯苓三 黃芩三

作五帖水煎服

盧兄瘧後辛苦再發脉大洪而浮此血傷也宜補之

人參半 白朮一 黃芩四 甘草四

白芍一 黃連三 生地黃 茯苓

歸尾各五

作一帖熱飲仍灸大椎穴五壯

一婦人五十餘歲形實喜作勞性急味厚喜火食夏却患惡寒發熱更作無休時衣被雖厚常凜然兩脉皆瀼予作雜合邪治之遂以四物湯加陳皮以人參白朮為君生甘草黃柏為佐多入薑汁吞通神丸二十九回金柳青各二十九阿魏十九煎三帖而得睡第五帖而身和第七帖通

身微汗諸症皆去

獨方人參養胃湯

草菓 茯苓 人參去蘆各

甘草七 橘紅七錢 厚朴去皮 蒼木湯洗

半夏湯洗各 藿香葉洗去

右咬咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一箇煎至七分去查熱服

右朴蒼藿香發散也半菓茯苓切痰也人參用之惟虛人最宜

丹絕瘧青蒿丸

青蒿 冬瓜皮 官桂 馬鞭草各二

右藥炮乾為末糊為丸如胡椒大每兩分四服於戌時前一時服盡 治瘧方百草霜黃丹等分細研每服

醫子書卷六

重

二錢七於發日虛心水調服不止連兩服愈 治瘧用蒜不拘多少研極爛以黃丹少許聚為度丸如雞頭大候乾每服一九新汲水下而東服至妙

垣治瘧疾

大蒜一頭分

右一片內入巴豆肉一粒輕紙裹煨熟去巴豆研入黃丹為丸如雞頭大每服一九先發寒用桃枝七寸東向

者煎湯發日五更面北服如發熱用冷水送下未全好次發又可進一服除根

右黃丹劫痰例輕劑也

易簡七寶湯

常山 陳皮 青皮 枳椇

草菓 甘草 厚朴等

厚朴等



右吹咀每服半兩水酒各一盞煎六分當發日侵辰服之此服有常山必須吐而愈或當日大作俗謂關藥是也虛怯人及脾胃寒者不宜服

右此劫痰例重劑也虛人慎之或補後用之

芎方尅効飲子

龍腦

麝香

定粉各研 荷葉焙

葶藶末

甘草炙各

硃砂一兩

信各半

金箔二十五片

右為末煉蜜搜和每兩作二十九無名異為衣每服一之隔數日發者前一日夜服之

河碎邪丹治嵐瘴鬼瘧併日頻日

葶藶

雄黑豈各四十九粒

信半錢

六

黃丹

硃砂

右為末同入乳鉢內滴水為丸分作三十粒每服一粒用東南桃枝取七枚研汁并花水早晨日欲出不出時向日吞之

右信硃劫痰為至峻之劑虛人切忌之

運氣瘧疾有二

一曰火熱經云歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣又云火太過曰赫蕪其病笑瘧狂妄又云火鬱之發民病溫瘧又云少陽司天火淫所勝民病發熱惡寒而瘧又云少陽之復發而為瘧又云少陽司天之政民病寒熱瘧治以寒劑是也  
二曰寒濕經云陽明司天為四之氣病瘧寒之候是也  
河斷瘧如聖散

砒二

蜘蛛大者 雄黑豈四十九粒

右為末滴水為丸如雞頭大如來日發於今晚夜北斗下先獻過次早以紙裹於耳內札一九立愈如神一粒可救二人

素帝曰夫經言有餘者瀉之不足者補之今熱為有餘寒為不足夫瘧者之寒陽火不能溫也及其熱水水不能寒也此皆有餘不足之類當此之時良工不能止必須其自衰乃刺之其故何也願聞其說岐伯曰經言無刺熇熇之熱無刺渾渾之脉上註曰渾渾無刺瀉瀉之汗故為其病逆未可治也夫瘧之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而渴夫瘧氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱瘧者風寒

之不常也病極則復至病之發也如火之熱如風雨不可當也故經言曰方其盛時必毀因其衰也事必大昌此之謂也夫瘧之未發也陰未并陽陽未并陰因而謂之真氣得安邪氣乃亡故工不能治其已發為其氣逆也帝曰善攻之奈何早晏何如岐伯曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此其往而未得并者也九治瘧先發如食頃乃可治過之則失時也瘧發身方熱刺跗上動脉開其空出其血立寒瘧方欲寒刺手陽明太陰足陽明太陰出而刺之瘧脉滿大急刺背俞用中針傍五腧各一適肥瘦出其血也俞者謂大杼五腧瘧脉小實急灸脛少陰刺指井指井至陰穴也瘧脉緩大虛便宜



用藥不宜用鍼 諸瘧而脉不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小莖者盡取之 刺瘧者必先問其病之所先發者先刺之 先頭痛及重者先刺頭上及兩額兩眉間出血王註云頭上謂上星百會兩額謂懸顛兩眉間謂橫竹等穴 先項背痛者先刺之 先腰脊痛者先刺脊中出血 先手臂痛者先刺手少陰陽明十指間 先足脛痠痛者先刺足陽明十指間出血 風瘧瘧發則汗出惡風刺三陽經背俞之血者 瘧瘧痛甚按之不可名曰肺癰病以鑱針針絕骨出血立已 身體小痛刺至陰諸陰之井無出血間日一刺 瘧不渴間日而作刺足太陽渴而間日作刺足少陽

八醫經卷六

五

足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已刺郄中出血金門穴黃帝中誥謂經云委中主之海藏 足少陽之瘧令人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽伏兔 不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽伏兔 去汗出喜見日月光火氣乃快然刺足陽明跗上衝陽 足太陰之瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即取之待病衰即取之井俞及公 足少陰之瘧令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已見少陰中是賊邪故難已 足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如瘧狀非瘧也數便恐懼氣不足腹中悒悒刺足厥陰太衝穴海四物加 心寒寒甚熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明合谷 心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰神門 肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥

陰見血中 脾瘧者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰丘 腎瘧者令人濕漉然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺太陽少陰太鍾 胃瘧者令人且病善饑而不能食而肢滿腹大刺足陽明太陽橫脈出血膺兗解絡 瘧寒熱甚寒熱厥取手陽明 瘧寒少熱多取足少陽 瘧面赤目眴眴心痛取手陽明少陽 瘧腰背痛不渴取足太陽俱刺 瘧振寒熱盛狂言天樞主之 瘧瘧熱列缺主之 瘧寒厥及熱厥煩心善噦心滿而汗出刺少商出血立已 熱瘧口乾商陽主之 瘧寒甚欲嘔沫陽谿主之 風瘧汗不出偏歷主之 瘧多寒少熱大鍾主之 瘧欬逆心悶不得臥嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱太谿主之 瘧瘧瘧驚股膝重筋轉筋

八醫經卷六

五

頭眩痛解谿主之 瘧日西發臨泣主之 瘧多汗腰痛不能俯仰目如脫項如拔崑崙主之 瘧不渴間日作崑崙主之 久瘧者瘧瘧也以其隔二三日一發纏綿不去丹老瘧係風暑之邪入在陰分在臟宜用血藥引出陽分而散川芎撫芎紅花當歸蒼白朮白芷黃柏甘草露一宿早服古方多用峻劑恐非稟受怯弱與居養所移者所宜始悟常山砒丹烏梅劫劑或誤投之輕病變重重必危矣三日一作邪入於三陰經也作於子午卯酉日者少陰經瘧也作於寅申巳亥日者厥陰經瘧也作於辰戌丑未日者太陰經瘧也瘧得於暑當以汗解或因取涼太過汗鬱成痰其初感也弱者即病胃氣強者伏而未發至於再



感復因內傷其病乃作宜其難痊夫感暑與風皆外邪也故非汗多不解今之遺此疾者已經再三劫試胃氣重傷何由得愈欲治此症必先與參朮等補劑為君加柴葛等發散藥漸而收汗得汗而虛又行補養下體屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆

丹治一婦病瘧三日一發食少經不行已三月脈無時冬寒議作虛寒治疑誤再診見其梳洗言動如常知果誤也經不行非無血為痰所碍脈無非血氣虛乃積痰生熱結伏其脈而不見耳當作實熱治與三花九旬日後食進脈出帶微弦調胃氣既全雖不瘧當自愈而經行也令淡滋味果應

一婦身材小味厚瘧瘧月餘間日發於申酉頭與身痛寒多喜極熱辣湯脈伏面慘晦作實熱治之以十連湯為末粥九黍米大服十粒津嚥日三次令淡飯半月大汗愈久瘧欲吐不吐宜吐之用藜蘆散或雄黃散瘧病能食而瘵伏者小胃丹

一人性急好酒色味厚適多憂怒患久瘧忽大熱下臭積大孔痛陷下此大虛脈弦大而浮以瓦磨如錢圓燒紅童便煇急取以紙裹於痛處恐外寒乘虛而入也以參歸陳皮煎服淡味半月而安

一婦人久痢因哭子變瘧一日五六作汗如雨不止脈微數疲甚無邪可治陰虛陽散死在旦夕且服四獸等熱劑遂用參朮各二兩白芍藥一兩黃芪半兩炙甘草二錢作大劑四五服而愈

一人因勞役發嗽得瘧瘧又服發散藥變為發熱舌短語言不正痰吼有聲脈洪實似滑先用獨參湯加竹瀝二粒

設一服後吐膠瘧舌本正後用黃芪人參湯服半月而愈藜蘆散 大藜蘆末 溫葶水調下以吐為度 雄黃散 雄黃 瓜蒂 赤小豆 右為細末每服半錢溫水調下以吐為度 驚甲煎丸 治瘧母

驚甲煎丸 烏扇 三分 黃芩 鼠婦 大黃 桂枝 石韋 厚朴 紫葳 阿膠 乾姜 人參 桃仁 柴胡 羌活 芍藥 牡丹皮 廣虫 蜂窠 芫花 葶藶 半夏 赤硝 右二十三味為末取銀竈下灰一斗清酒一斛五斗浸灰候酒盡一半著驚甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁

內諸藥煎為丸如桐子大空心服七九日三服瘧母丸 青皮 桃仁 紅花 神麩 麥芽 驚甲 三稜 蓬朮 海粉 香附 右為末神麩糊為丸如桐子大每服五七丸白湯下

小兒瘧疾痞塊用生地芍藥各一錢半陳皮川芎黃芩半夏各一錢甘草二分姜水煎調驚甲末服 十棗湯 芫花 大戟 甘遂 右為末每服半錢水一盞棗十枚同煎半盞服

瘧脹 秋深久瘧胸中無物又無痰癰腹高而食少俗謂瘧氣入腹宜蒼朮湯主之



蒼朮兩 草烏頭錢一 杏仁三十箇  
右為粗末起作一服水三升煎至一半均作三服一日服盡

產後瘧

產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調之熱多者宜服草菓飲子

半夏湯泡七次 赤茯苓 草菓煨去 甘草炙

陳皮 川芎 白芷各一分 紫蘇

良姜 青皮各六分 乾姜四分

右咬咀分二貼水二盞姜五片棗二枚煎至八分當發

日早連進三服無不効者

寒多者宜服生熟飲子

肉苳蔻 草菓仁 厚朴 半夏

陳皮 甘草 大棗擘 生姜各二分

右咬咀分二分一半生一半以濕紙裹煨香熟和勻分作二貼水二盞煎八分空心一服食後一服二相并煎午前服

醫學綱目卷之六

醫學綱目卷之七

陰陽臟腑部

大法

靈小針之要易陳而難入難入者難於入也 難入者難於入也 難入者難於入也

神者正氣之神也 邪者不正之神也 神者正氣之神也 邪者不正之神也

原者其始也 粗者其末也 原者其始也 粗者其末也 原者其始也 粗者其末也

徐者其緩也 守者其固也 徐者其緩也 守者其固也 徐者其緩也 守者其固也

氣機之動不離其空 針之疾除也 氣機之動不離其空 針之疾除也

守氣勿失也 其來不可逢 守氣勿失也 其來不可逢 守氣勿失也 其來不可逢

知機之道者不可掛以髮 失也 知機之道者不可掛以髮 失也

知補瀉之意血氣知其往來要與之期 知其往來要與之期 知其往來要與之期

與之期者知其粗之開乎 冥冥不知氣 妙哉上獨有之者 冥冥不知氣 妙哉上獨有之者

意也 針者為逆 小者為逆 意也 針者為逆 小者為逆 意也 針者為逆 小者為逆

逆順正行無問之虞也 迎而奪之惡得無虛追而濟之 迎而奪之惡得無虛追而濟之

惡得無實迎之隨之以意和之針道畢矣 迎而奪之惡得無虛追而濟之 惡得無實迎之隨之以意和之針道畢矣

補也難經云所謂迎隨者知榮衛之流行經脈之往來隨 補也難經云所謂迎隨者知榮衛之流行經脈之往來隨 補也難經云所謂迎隨者知榮衛之流行經脈之往來隨

其逆順而取之故曰迎隨又云迎而奪之者瀉其子也 其逆順而取之故曰迎隨又云迎而奪之者瀉其子也 其逆順而取之故曰迎隨又云迎而奪之者瀉其子也

而濟之者補其母也 假令心病瀉其子心主俞是謂 而濟之者補其母也 假令心病瀉其子心主俞是謂 而濟之者補其母也 假令心病瀉其子心主俞是謂

迎而奪之也 補其母也 假令心病瀉其子心主俞是謂 迎而奪之也 補其母也 假令心病瀉其子心主俞是謂 迎而奪之也 補其母也 假令心病瀉其子心主俞是謂

者虛則實之 氣口虛而當補之也 謹按針下猶言針後也 滿則泄 者虛則實之 氣口虛而當補之也 謹按針下猶言針後也 滿則泄

之針下寒也 氣虛乃寒也 宛陳則除之 去血脈也 邪 之針下寒也 氣虛乃寒也 宛陳則除之 去血脈也 邪

盛則虛之 邪也 素出針勿瀉其大要曰徐而疾則實 徐而疾則實 盛則虛之 邪也 素出針勿瀉其大要曰徐而疾則實 徐而疾則實

出也 素出針勿瀉其大要曰徐而疾則實 徐而疾則實 出也 素出針勿瀉其大要曰徐而疾則實 徐而疾則實 出也 素出針勿瀉其大要曰徐而疾則實 徐而疾則實

針而疾按之 疾而徐則虛 疾出針而徐按之 言實與 針而疾按之 疾而徐則虛 疾出針而徐按之 言實與 針而疾按之 疾而徐則虛 疾出針而徐按之 言實與

虛若有若無 言實者有氣虛者無氣也 素云言實與虛者 虛若有若無 言實者有氣虛者無氣也 素云言實與虛者 虛若有若無 言實者有氣虛者無氣也 素云言實與虛者

察後與先若二若存 言氣之虛實補瀉之先後也 為虛與 察後與先若二若存 言氣之虛實補瀉之先後也 為虛與 察後與先若二若存 言氣之虛實補瀉之先後也 為虛與

實若得若失 言補者然若實者得也 瀉則然若失也 實若得若失 言補者然若實者得也 瀉則然若失也 實若得若失 言補者然若實者得也 瀉則然若失也

若得若失 言補者然若實者得也 瀉則然若失也 若得若失 言補者然若實者得也 瀉則然若失也 若得若失 言補者然若實者得也 瀉則然若失也

失其法若得若失者 難其法也 虛實之要九針最妙 失其法若得若失者 難其法也 虛實之要九針最妙 失其法若得若失者 難其法也 虛實之要九針最妙

為其各有 補瀉之時以針為之 與氣開閉相合也 為其各有 補瀉之時以針為之 與氣開閉相合也 為其各有 補瀉之時以針為之 與氣開閉相合也



瀉曰迎之必持而內之放而出之排陽得針邪氣得泄按而引針是謂內溫血不得散氣不得出也

補曰隨之意若忘之若行若按如蚊蚋止如留如還去如弦絕今左屬右其氣故止外門已閉中氣乃實必無留而急取誅之持針

之道堅者為實正指直刺無針左右神在秋毫屬意病者審視血脈者刺之無殆方刺之時必在懸陽及與兩衛神

屬勿去知病存亡血脈者在胸橫居視之獨澄切之獨堅刺之而氣之不至無問其數刺之而氣至乃去之勿復

針針各有所宜各不同形各任其所為刺之要氣至而有

效效之信若風之吹雲明乎若見蒼天刺之道畢矣邪氣

來也紫而疾殺氣來也徐而和並見九針十二凡刺之屬三刺至殺氣邪僻妄合陰陽易居逆順相反浮

沉異處四時不得稽留淫泆須針而去故一刺則陽邪出

再刺則陰邪出三刺則殺氣至殺氣至而止所謂殺氣至

者已補而實已瀉而虛故以知殺氣至也所謂三刺則

殺氣出者先淺刺絕皮以出陽邪再刺則陰邪出者少益

深絕皮致肌肉未入分肉間也已入分肉之間則殺氣出

故刺法曰始淺刺之以逐邪氣而來血氣後刺深之以致

陰氣之邪最後刺極深之以下殺氣此之謂也故用針者

不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以為工也

針二篇

右候氣有二一曰邪氣二曰殺氣凡刺氣至則候邪氣

盡盡則殺氣至至則止針矣所謂邪氣者曰紫而疾曰

補而未實瀉而未虛也所謂殺氣者曰徐而和曰補而

已實瀉而已虛也

觀其色察其目知其散復一其形聽其動靜上工知相而

謂尺寸大小緩急知其邪正者如論虛邪與持而御之者言持針而氣至而去之言持針而

已上見針解凡將用針必先診視脈氣之刺易乃可以

治也

素五臟已定九候已備後乃存針王註云先定五臟之脈

存意於用黃帝問曰經言氣之盛衰左右傾移以上調下

以左調右有餘不足補瀉於榮俞余知之矣此皆榮衛之

傾移虛實之所生非邪氣從外入於經也余願聞邪氣之

在經也其病人何如取之奈何岐伯對曰夫聖人之起度

必應於天地故天有宿度地有經水人有經脈天地溫和

則經水安靜天寒地凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸

溢卒風暴起則經水波涌而龍起夫邪之入於脈也寒則

血凝泣暑則氣淖澤虛邪因而入客亦如經水之得風也

經之動脈其至也亦時離起其行於脈中循循然其至寸

口中手也時大時小大則邪至小則平其行無常處在陰

與陽不可為度從而察之三部九候卒然逢之早過其路

帝曰候氣奈何岐伯曰夫邪去絡入於經也舍於血脈之

中其寒溫未相得如涌波之起也時來時去故不常在故

曰方其來也必按而止之止而取之無逢其衝而瀉之真



奈何岐伯曰此攻邪也疾出以去盛血而復其真氣此邪新客溶溶未有定處也推之則前引之則止逆而刺之溫血也刺出其血其病立已邪之新客來也未有定處推之則前引之則止逢而瀉之其病立已俱難令

右候邪氣新客經脈而取之之法也言邪之初客經脈其寒溫未相搏如涌波之起也時來時去故不常在欲取之者必於三部九候之間診察以待之儻於一部一候見其如涌波之來則按而止之然後取之不可逢其衝來便瀉之故曰其來不可逢其或候氣不審至於涌波之大氣已過去而瀉之則真氣脫邪氣復至而病益蓄故曰其往不可追也凡診三部九候而待邪至之機以發刺者必專心致意故曰知機道者不可掛以髮也所謂涌波者脈浮大也三部九候非寸關尺乃面有三

八醫學綱目卷七

四

部手有三部足有三部合三部為九部也

帝曰善然真邪已合波隴不起候之奈何岐伯曰審淵循三部九候之盛虛而調之察其左右上下相失及相減者審其病藏以期之不知三部者陰陽不別天地不分地以候地天以候天人以候人調之中府以定三部故曰刺不知三部九候病脈之處雖有大過且至工不能禁也誅罰無過命曰大惑反亂大經真不可復用實為虛以邪為真用針無義反為氣賊奪人正氣以從為逆榮衛散亂真氣已失邪獨內著絕人長命予人天殃不知三部九候故不能長久因不知合之四時五行因加相勝釋邪攻正絕人長命難合真邪論

右候邪客已久真邪已合而取之之法也言取邪之新客者但候波隴之脈來處取之今真邪已合波隴不起

而不知邪客之處也故又必當捫循三部九候之盛虛視其盛處瀉之虛處補之左右相失而左大右細者瀉左補右上下相失而上大下小者瀉上部補下部上下大者補上部瀉下部左右上下皆相減而細者審其何臟之減以其減臟日時之衰者補其所減經減臟日時之盛者瀉其所勝經候邪去真復而止故曰刺不知三部九候病脈之處則誅罰無過反亂大經用實為虛以邪為真真氣已失邪獨內著絕人長命也

上工救其萌芽必先見三部九候之氣盡調不敗而救之故曰上工下工救其已成救其已敗救其已成者言不知三部九候之相失因病而敗之也知其所在者知診三部九候之病脈處而治之故曰守其門戶莫知其情而見邪形也八正神

八醫學綱目卷七

五

難言上工治未病中工治已病者何謂也然所謂治未病者見肝之病則知肝當傳之於脾故先實其脾氣無令得受肝之邪也故曰治未病焉中工見肝之病不曉相傳但一心治肝故曰已病也七十

自篇首至此乃察病用針切要之旨學者當潛心體認之醫而不知此非工也噫今世稍知穴法便自驕滿由不知粗守形上守神之論也可慨哉

靈夫氣之在脈也邪氣在上針解云言邪氣之中人濁氣在中言水穀皆入於胃其精氣上注于肺濁瀉于腸胃若在中言暑不濕飲食不節而病生於腸胃故命曰濁氣在中清氣在下言清濕地氣之中人也必針陷脈則邪氣出也

取之中脈則邪氣出明合也針大深則邪氣反沉言浮淺欲深刺也深則邪氣入皮肉筋脈各有所處有結各病各有所宜甲乙經宜各不同形各以任其所宜見小針解及



素病有浮沉刺有深淺各至其理無過其道過之則內傷不及則生外應壅則邪從之淺深不得反為大賊內動五藏後生大病故曰病有在毫毛腠理者有在皮膚者有在肌肉者有在脉者有在筋者有在骨者有在髓者云云

論 病在脉調之血病在血調之絡病在氣調之衛病在肉調之分肉病在筋調之筋病在骨調之骨燔針劫刺其下及與急者主注云調筋法也病在骨燔針藥熨法也病不知所痛兩蹠為上身形有痛九候莫病則繆刺之刺絡也痛在於左而在脉病者巨刺之刺經脉也見

靈 手屈而不伸者其病在筋伸而不屈者其病在骨在骨守骨在筋守筋終始

難言刺榮無傷衛刺衛無傷榮何謂也然針陽者臥針而刺之刺陰者先以左手攝按所針榮俞之處氣散乃納針

是謂刺榮無傷衛刺衛無傷榮也見七十

素刺骨者無傷筋刺筋者無傷肉刺肉者無傷脉刺脉者無傷皮刺皮者無傷肉刺肉者無傷筋刺筋者無傷骨刺骨無傷筋者針至筋而去不及骨也刺筋無傷肉者至肉而去不及筋也刺肉無傷脉者至脉而去不及肉也刺脉無傷皮者至皮而去不及脉也林註云此謂深淺不所謂刺皮無傷肉者病在皮中針入皮中無傷肉也刺肉無傷筋者過肉中筋也刺筋無傷骨者過筋中骨也此之謂反也成其大深也刺齊論

九鍼 凡針之要官針最妙九鍼之宜各有所為長短大小各有所施也不得其用弗能移疾淺針深內傷良肉皮膚為癱病深針淺病氣不瀉反為大膿病小針大氣瀉太甚疾必為害病大針小氣不泄瀉亦復為敗失針之宜大者

瀉小者不移已言其過請言其所施官針

靈 一曰鏡針長一寸六分頭大末銳去瀉陽氣九針十二切○紫古云手半寸長一寸六分其頭大末銳主熱在頭分宜此

甲 一者天天者陽也五臟之應天者肺也肺者五臟六腑之蓋也皮者肺之合也人之陽也故為治鏡針鏡針者取法於巾針去末半寸卒銳之長一寸六分大其頭銳其末令無得深入而陽氣出主熱在頭身者故曰病在皮膚無常處者取之鏡針於病所膚白勿取

靈 二曰員針長一寸六分針如卵形楷摩分間不得傷肌肉以瀉分氣九針十二原紫古云其身長針如卵形肉分氣病宜此

甲 二者地地者土也人之所以應土者肉也故為之治員針員針者取法於絮針必循其身而員其末其鋒如卵長一寸六分以瀉肉分之氣令不傷肌則陽氣得瀉故曰病在分肉間取以員針

靈 三曰鍤針長三寸半鋒如黍粟之銳主按脉勿陷以致其氣九針十二原紫古云其氣脉氣虛少者宜此

甲 三者人也人之所以成生者血脉也故為之治鍤針鍤針者取法於黍粟大其身而員其末如黍粟之銳長三寸五分令可以按末勿陷以致其氣使邪氣獨出故曰病在脉氣少當補者取以鍤針針于井榮分輸

靈 四曰鋒針長一寸六分刃三隅以發痼疾九針十二原出血液泄痼疾

甲 四者時也時者四時八風之客於經絡之中為痼病者也故為之治鋒針鋒針者取法於絮針循其身而鋒其末刃三隅長一寸六分令可以瀉熱出血發泄痼疾故曰病在五臟固居者取以鋒針瀉于井榮分輸取以四時也



靈五曰鈹針長四寸廣二分半末如劍鋒以取大膿九針

甲五者音也音者冬夏之分分子子午陰與陽別寒與熱

爭兩氣相搏合為癰膿者也故為之治鈹針鈹針者取法

於劍令其末如劍鋒廣二分半長四寸可以取大膿出血

故曰病大膿血取以鈹針

靈六曰負利針長一寸六分大如釐且負且銳中身微大

以取膿氣九針十二原聚古云火如毫且負

甲六者律也律者調陰陽四時而合十二經脈虛邪客於

經絡而為暴痺者也故為之治負利針負利針者取法於

釐針且負且銳中身微大長一寸六分以取癰腫暴痺令

尖如釐微大其末反小其身令可深內也故曰病痺氣暴

發者取以負利針

六醫經綱目卷七

六

靈七曰毫針長三寸六分尖如蚊虻喙靜以徐往微以久

留之而養以取痛痺九針十二原聚古云火如

甲七者星也星者人之七竅邪之所客於經合於絡而為

痛痺者也故為之治毫針毫針者取法於毫毛長一寸六

分令尖如蚊虻喙靜以徐往微以久留正氣因之真邪俱

往出針而養生以治痛痺在絡也故曰痺病氣通而不去

者取之毫針

靈八曰長針長七寸鋒利身薄可以取遠痺九針十二原

痺深居骨解腰

甲八者風也風者人之股肱八節也八正之虛風傷人內

舍於骨解腰脊節腠之間為深痺也故為之治長針長針

者其針也長七寸長其身而鋒其末令可以取深邪遠痺

故曰病在中者取以長針九針

九曰大針長四寸尖如挺其鋒微負以瀉機關之水也九針

甲九者野也野者人之節解皮膚之間也淫邪流溢於身

如風水之狀而溜不能過於機關大節者也故為之治大

針大針者取法於鋒針其針微負長四寸以瀉機關內外

取大氣之不能過於關節者也故曰病水腫不能過關節

者取以大針

黃帝問曰刺有五邪何謂五邪伯高曰病有持癰者有容

大者有狹小者有熱者有寒者是謂五邪九針凡刺

癰刺用鈹針無迎隨易俗移性不得膿膿道更行去其鄉

不安處所乃散亡諸陰陽過癰者取之其輪瀉之 凡刺

大邪用鋒針日以小泄奪其有餘乃益虛刺其通針其邪

肌肉親視之無有反其真刺諸陽分肉之間 凡刺小邪

六醫經綱目卷七

九

用負針日以大補益其不足乃無害視其所在迎之界遠

近盡至其不得外侵而行之乃自費刺分肉之間 凡刺

熱邪用鏡針越而蒼出游不歸乃無病為開通關門戶使

邪得出病乃已 凡刺寒邪用毫針日以溫徐往徐來致

其神門戶已閉氣不分虛實得調其氣存也九針

靈九刺有九日應九變一曰輪刺輪刺者刺諸經榮輸藏

腑也二曰遠道刺遠道刺者病在上取之下刺府輸也三

曰經刺經刺者刺大經之結絡經分也四曰絡刺絡刺者

刺小絡之血脉也五曰分刺分刺者刺分肉之間也六曰

大寫刺大寫刺者刺大膿以鈹針也七曰毛刺毛刺者刺

浮痺皮膚也八曰巨刺巨刺者左取右右取左九曰燔刺

燔刺者刺燔針則取痺也 凡刺有十二節以應十二經

一曰偶刺偶刺者以手直心若背直痛所一刺前一刺後



以治心痺刺此者傍針之也 二曰報刺報刺者刺痛無常處也上下行者直內無拔針以左手隨病所按之乃出針復刺之也 三曰恢刺恢刺者直刺傍之舉之前後恢筋急以治筋痺也 四曰齊刺齊刺者直入一傍入二以治寒氣小深者或曰三刺三刺者治痺氣小深者也 五曰揚刺揚刺者正內一傍內四而浮之以治寒氣之博大者也 六曰直針直針刺者引皮乃刺之以治寒氣之淺者也 七曰輸刺輸刺者直入直出稀發針而深之以治氣盛而熱者也 八曰短刺短刺者刺骨痺稍搖而深之致針骨所以上下摩骨也 九曰浮刺浮刺者傍入而浮之以治肌急而寒者也 十曰陰刺陰刺者左右率刺之以治寒厥中寒厥足踝後少陰也 十一曰傍針傍針刺者直刺傍刺各一以治留

醫學綱目卷七

十

痺久居者也 十二曰贊刺贊刺者直入直出數發針而淺之出血是謂治癰腫也 凡刺有五以應五藏一曰半刺半刺者淺內而發針無針傷肉如拔毛狀以取皮氣此肺之應也 二曰豹文刺豹文刺者左右前後針之中脉爲故以取經絡之血者此心之應也 三曰關刺關刺者直刺左右盡筋上以取筋痺慎無出血此肝之應也或曰淵刺一曰豈刺 四曰合谷刺合谷刺者左右雞足針于分肉之間以取肌痺此脾之應也 五曰輪刺輪刺者直入直出深內之至骨以取骨痺此腎之應也 六曰標幽賦 拯救之法妙用者針察歲時於天道定形氣於予心春夏瘦而淺刺秋冬肥而刺深不窮經絡陰陽多逢刺禁既論藏府虛實須向經尋原夫起有中焦水初下漏太陰爲始至厥陰而方終穴出雲門抵期門而最後正經

十二別絡走三百餘支正側偃伏氣血有六百餘候手足三陽手走頭而頭走手足三陰足走腹而胸走手要巖迎隨須明逆順況夫陰陽血氣多少爲最厥陰太陽少氣多血太陰少陰少血多氣又有氣多血少者少陽之分氣盛血多者陽明之位先詳多少之宜次察應至之氣輕滑慢而未來沉澹緊而已至既至也量寒熱而留疾未至也據虛實而病氣氣之至也若魚吞釣餌之浮沉氣未至也似閉處幽堂之深遠氣速至而效速氣遲至而不治觀夫九針之法毫針最微七星可應衆穴主持本形金也有獨邪扶正之道短長水也有決凝開滯之機定刺象木或斜或正口藏比火進陽補虛循機捫而可塞以象土實應五行而可知然而一寸六分包含妙理雖細擬於毫髮同貫多岐可平五藏之寒熱能調六府之虛實拘攣閉塞遣八

醫學綱目卷七

十一

邪而去矣寒熱痛痺開關而已之凡刺者使本神朝而後入既刺也使本神定而氣隨神不朝而勿刺神已定而可施定脚處取氣血爲主意下手處認水木是根基天地人三才也湧泉同璇璣百會上中下三部也大包與天樞地機陽陽陽推并督脉主肩背腰脚在表之疾陰陰陰維任帶衝主心腹脇肋在裏之危二陵二蹻二交似續而交五大兩間兩商兩井相依而列兩支足見取穴之法必有分寸先審自意次觀肉分或屈伸而得之或平直而安定在陽部筋骨之側陷下爲真在陰分鄰膈之間動脉相應按五穴定一穴而必端取三經用一經而可正頭部與肩部詳分督脉與任脉異定明標探本論刺深刺淺之經住痛移疼取相交相貫之運豈不聞藏府病而求門海俞募之微經絡滯而求原別交會之道更窮四根三結依標本



而刺無不痊但用八法五門分主客而針無不效八脉始  
終連八會本是紀綱十二經絡十二原是為樞要若一日  
刺六十六穴之法方見幽微一時取十二經之原始知要  
妙詳夫補瀉之法非呼吸而在手指速效之功要交正而  
識本經交經繆刺左有病而右畔取瀉絡遠針頭有病而  
脚上針巨刺與繆刺各異微針與妙刺相通觀部分而知  
經絡之虛實視浮沉而辨藏府之寒溫且夫先令針耀而  
慮針損次藏口內而欲針溫目無外視手如握虎心無外  
慕如待貴入左手重而切按欲令氣散右手輕而徐入不  
痛之因空心恐怯直立側而多暈背目沉插坐臥平而勿  
昏至推于十十變定孔穴之開闔論其五行五藏察時  
日之旺衰伏如橫勞應若發機陽交陰別而定血暈陰騫  
陰維而下胎衣揮厥偏枯迎隨禪經絡接續漏崩帶下溫

醫學綱目卷二

三

補使氣血依歸靜以久留停針候之必准者取照海治喉  
中之閉塞喘的處用大鍾治心性之呆痴大抵疼痛實瀉  
痒麻虛補體重節痛而俞居心下痞滿而井主心脹咽痛  
針太衝而立除脾痛胃疼瀉公孫而立愈胸滿腹痛刺內  
關脇疼肋痛針飛虎筋攣骨痛而補魂門體熱勞嗽而瀉  
魄戶頭風頭痛刺申脉與金門眼癢眼疼瀉光明與地五  
瀉陰郄止盜汗併小兒骨蒸刺偏歷利小便兼大人水蠱  
中風環跳而宜刺虛損天樞而可取由是午前卯後太陰  
生而疾溫離左酉南月死朔而速冷循捫彈努留吸母以  
堅長爪下伸提疾呼子而短動退空歇迎奪右而瀉涼  
推內進搓隨濟左而補煖慎之大凡危疾色脉不順而莫  
針寒熱風陰饑飽醉勞而切忌望不補而晦不瀉弦不奪  
而朔不濟精其心而求其法無灸艾而壞其肌正其理而

求其源免投針而失其位避炎處而和四肢四十又九禁  
刺處而除六俞三十又二抑又聞高皇抱疾而未瘥李氏  
刺巨闕而得甦太子暴死為屍厥越人針維會而復醒有  
井曲池甄權刺脾痛而復射懸鐘環跳華陀刺蹇足而立  
行秋夫刺腰俞而鬼免沉痾王纂針交俞而妖精立出刺  
肝俞與命門使醫士視秋毫之末刺少陽與交別俾聾夫  
聽夏蚋之聲嗟夫去聖逾遠斯道漸墜或不得意而散其  
學或眩其能而犯禁忌庸愚智淺難契於玄言至道淵深  
得之者有幾偶述斯言不敢示諸明達者焉庶幾乎童蒙  
之心啓

醫學綱目卷七

三

通玄賦 必欲治病莫如用針巧運神機之妙工開聖理  
之深外取砭金能蠲邪而扶正中含水火善回陽而倒陰  
原夫終別支殊經交錯綜或溝渠溪谷以岐異或山海丘  
陵而隴共斯流派以難揆在條綱而有統理繁而味縱補  
瀉以何功法捷而明自迎隨而得用且如行步難移大衝  
最奇人中除脊脊之強痛神門去心性之呆痴風傷項急  
始求於風府頭眩目暈要覓於風池耳閉須聽會而治也  
眼痛則合谷以推之胸結身黃取湧泉而即可腦昏目赤  
瀉攢竹以偏宜但見若兩肋之拘攣仗曲池而平掃治半  
身之不遂作環跳以長驅牙齒痛呂細堪治頭項強承漿  
可保太白宣導於氣衝陰陵開通於水道腹膨而脹奪內  
庭以休運筋轉而冰瀉承山之在早大抵脚腕痛崢嶸解  
俞股膝痠陰市能醫癩發顛狂今憑後路而瘳理瘧生寒  
執兮仗開使以扶持期門罷胸滿血崩而可用勞宮退胃  
翻心痛以何疑考天大敦去七疝之偏疼王公謂此三里  
却五勞之羸瘦華老言斯固知腕骨祛黃然谷瀉腎行間



治膝腫腰疼尺澤去肘疼筋緊目昏無見二間宜取鼻寒  
不聞迎香可引肩井除兩脚難任絲竹空療偏頭痛不忍  
咳嗽寒痰列缺堪治眩暈冷淚臨泣尤准完骨將腿痛以  
祛殘腎俞把腰疼而瀉盡以見越人治屍厥於維會隨手  
而甦文作瀉死胎於三陰交應針而墮聖人於是察麻與  
痛分實與虛實則自外而入也虛則自內而出之是故濟  
母以裨其不足奪子而平其有餘觀二十七之經絡一一  
明辨據四百四之疾症件件皆除故得天柱都無躄斯風  
於壽域幾微已判彰往古之玄書抑又聞心胸病末掌後  
之大陵有背患貴肘前之三里冷痺腎俞取足陽明之土  
連膈腹瀉瀉足少陰之水脊間心後者針中渚而立痊脇  
下助運者刺陽陵而即止頭項痛擬後路以安然腰脚疼  
在委中而已矣夫用針之士於此理苟明者焉收祛邪之

入醫學綱目卷七

功而在乎撻指

瀉兩脇痛少陽丘墟 心痛少陰太溪湧泉足厥陰原穴  
腰痛崑崙及委中出血 喘滿痰實口中如膠足少陰  
太溪 嘔噦無痰手厥陰太陵 熱無度不可止陷谷出  
血 骨節疼痛實無所知三稜刺絕骨出血 小腸疝氣  
足厥陰太衝 血衄不止大小便血婦人血不足刺足太  
陰井 喉閉手足少陽井并少商手足太陰井 大煩熱  
不止晝夜無度刺十指間出血謂八關大刺 陰頭中痛  
不可忍卒疝痛婦人陰中痛俱刺足厥陰井 眼大眦痛  
刺手太陽井小指痛刺少陰井 骨熱不可治者板齒乾  
燥灸骨會大維  
接經 手足經同  
經曰留瘦不移節而刺之使十二經無過絕假令十二經

中是何經絡不通行當刺不通凝滯俱令氣過節無問其  
數以平為期如諸經俱虛補十二經如諸經俱實瀉十二  
經補當隨而濟之瀉當迎而奪之  
右大接經從陽引陰從陰引陽皆取十二經井穴  
門針  
灸條

脈之所者深不見者刺之微內針而久留之以致其脈氣  
也脈淺者勿刺接絕其脈乃刺之無令精出獨出其邪氣  
耳  
病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也深刺之痒者陽  
也淺刺之病在上者陽也在下者陰也病先起于陰者先  
治其陰而後治其陽病先起于陽者先治其陽而後治其  
陰 春氣在毛夏氣在皮秋氣在分肉冬氣在筋骨此病  
各以其時為齊故刺肥人者秋冬之齊瘦人者春夏之齊

入醫學綱目卷七

難言春夏刺淺秋冬刺深者何謂也然春夏者陽氣在上  
人氣亦在上故當淺取之秋冬者陽氣在下人氣亦在下  
故當深取之春夏各致一陰秋冬各致一陽者何謂也然  
春夏溫必致一陰者初下針沉之至腎肝之部得氣引持  
之陰也秋冬寒必致一陽者初內針淺而浮之至心肺之  
部得氣推內之陽也是謂春夏必致一陰秋冬必致一陽  
也  
垣夫陰病在陽者是天外風寒之邪乘中而外入在人之  
背上府俞藏俞是人之受天外寒邪亦有二說中於陽則  
流於經此病始於外寒終歸外熱故以治風寒之邪治其  
各藏之俞非止風寒而已六淫濕者燥火皆五藏所受乃  
筋骨血脉受邪各有背上五藏俞以除之傷寒說從仲景  
中八風者有風論中暑者治在背脊上小腸腑中濕者治在



胃腑中燥者治在大腸腑此皆六淫客邪有餘之病皆瀉其背之腑腑若病久傳變有虛有實各隨病之傳變補瀉不足只治在背府腑 陽病在陰者病從陰引陽是水穀之寒熱感則害人六府又曰飲食失節及勞役所傷陰火乘於坤土之中致穀氣榮氣清氣胃氣元氣不得上升滋於六府之陽氣是五陽之氣先絕於外外者天也下流伏於坤土陰火之中皆先由喜怒悲憂恐為五賊所傷而後胃氣不行勞役飲食不節繼之則元氣乃傷當從胃腑合三里穴中推而揚之以伸元氣故曰從陰引陽若元氣愈不足治在腹上諸府之募穴若傳在五藏為九竅不通隨各竅之病治其各藏之募穴於腹故曰五藏不平乃六府元氣閉塞之所生也又曰五藏不和九竅不通皆陽氣不足陰氣有餘故曰陽不勝其陰凡治腹之募皆為元氣不

六醫學綱目卷七

未

足從陰引陽勿誤也若錯補四末之俞錯瀉四末之俞皆非也錯瀉者差尤其矣按岐伯所說只取穴於天上天上者人之背上五藏六府之俞不當瀉而瀉豈有生者乎與言及此寒心徹骨若六淫客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脉之病苟錯取穴於胃之合及諸腹之募者必危亦岐伯之謂下工可不慎哉

刺虛實

素曰刺法言有餘瀉之不足補之何謂有餘何謂不足岐伯對曰神有有餘有不足氣有有餘有不足血有有餘有不足形有有餘有不足志有有餘有不足夫心藏神肺藏氣肝藏血脾藏肉腎藏志而此成形志意通內連骨髓而成身形五藏五藏之道皆出於經隧以行血氣血氣不和百病乃變化而生是故守經隧焉 神有餘則笑不休神

不足則悲血氣未并五藏安定邪客於形酒淅起於毫毛未入於經絡也故命曰神之微神有餘則瀉其小絡之血出血勿之深斥斥推也小絡孫絡也針經曰經脈為裡中其大經神氣乃平神不足者視其虛絡按而致之刺而利之無出其血無泄其氣以通其經神氣乃平帝曰刺微奈何曰按摩勿釋著針勿斥移氣於不足神氣乃得復氣有餘則喘咳上氣不足則息利少氣血氣未并五藏安定皮膚微病命曰白氣微泄氣有餘則瀉其經隧無傷其經無出其血無泄其氣不足則補其經隧無出其氣問曰刺微奈何對曰按摩勿釋出針視之曰我將深之適人必革精氣自伏邪氣散亂無所休息氣泄腠理真氣乃相得血有餘則怒不足則恐血氣未并五藏安定孫絡水溢則經有留血血有餘則瀉其盛經出其血不足則視其虛

六醫學綱目卷七

七

經內針其脉中久留而視脉大疾出其針無令血泄問曰刺留血奈何對曰視其血絡刺出其血毋令惡血得入於經以成其疾 形有餘則腹脹溼漉不利不足則四肢不用血氣未并五藏安定肌肉蠕動命曰微風形有餘則瀉其陽經不足則補其陽絡問曰刺微奈何對曰取分肉間無中其經無傷其絡衛氣得復邪氣乃索 志有餘則腹脹食泄不足則厥血氣未并五藏安定骨節有動志有餘則瀉然筋血者不足則補其復瀉然筋問曰刺未并奈何對曰即取之無中其經邪乃能立虛問曰虛實之形不知其何以生對曰血氣已并陰陽相傾氣亂於衛血逆於經血氣離居一實一虛 夫五藏之虛實皆生於血氣之盛而實也不足者血氣離去其藏衰而虛也經氣未并五藏安定者五藏之血氣未并為實未離者安其初所治則瀉并瀉離而虛藏所離之血氣有并歸於實藏所以



陰陽相傾而不均乎... 凡陰陽表裏上下... 血并於陰乃為冥中... 血并於下氣并於上... 如是血氣離居何者... 惡寒寒則泣不能流... 虛血之所并為氣虛... 乃言血并為虛氣并... 為虛故氣并則無血... 焉絡之與孫脉俱輸... 并走於上則為大厥... 八音... 卷七

曰實者何道從來虛者何道... 曰夫陰與陽皆有俞... 充其形九候若一命... 於陽其生於陽者得... 居處陰陽喜怒問曰... 人也先密於皮膚傳... 脉滿則輸于大經脉... 天故曰實實者外堅... 之傷人也奈何對曰... 榮血泣衝氣去故曰... 之則氣足以温之故... 曰喜怒不節則陰氣... 故曰實矣問曰陰之... 醫學綱目 卷七

消則脉虛空因寒飲食寒氣... 問曰陽虛則外寒陰虛則... 予已聞之矣不知其所由... 皮膚分肉之間今寒氣在... 氣獨留于外故寒慄問曰... 倦形氣衰少穀氣不盛上... 薰胸中故內熱問曰陽盛... 則皮膚緻密腠理閉塞玄... 問曰陰盛生內寒奈何對... 不瀉不瀉則温氣去寒獨... 盛大以瀉故中寒問曰陰... 之奈何對曰刺之者取之... 哉因四時多少高下問曰... 補瀉奈何對曰瀉實者氣... 門如利其戶針與氣俱出... 以出其疾樞大其道如利... 乃屈問曰補虛奈何對曰... 氣出針入針空四塞精無... 熱不得還閉塞其門邪氣... 氣不失遠氣乃來是謂追... 補瀉法

帝曰不足者補之奈何岐伯... 之推而按之彈而怒之抓... 閉其神呼盡內針靜以久... 日暮其氣以至適而自護... 推闔其門令神氣存大氣... 令氣忤靜以久留無令邪... 醫學綱目 卷七



針針盡乃去大氣皆出故命曰瀉論  
補法左手插穴右手置針於穴上令病人咳嗽一聲然針入透於腠理後令病人呼氣一口隨呼針至分寸待針沉緊時轉針頭向病所以手循捫經絡覺氣至却因針頭向下覺針沉緊令病人吸氣一口急出其鍼急閉其穴虛羸氣弱痺麻者補之

瀉法先以左手插穴右手置針於穴上令病人咳嗽一聲然針入于腠理復令病人呼氣一口隨吸氣入針至分寸覺針沉緊轉針頭向病所若覺氣退便轉針頭向下以手循取經絡覺針沉悶令病人吹氣一口徐出其針不閉其穴命之曰瀉豐肥堅硬疼痛者瀉之

右以病人氣之呼吸醫人針之出納分補瀉令病人吸氣而入針氣與針同入為補令呼氣出針針與氣同出

八醫經卷二

手

為瀉呼氣氣出而入針為瀉吸氣氣入而出針為補也  
何謂補瀉當補之時何所取氣當瀉之時何所置氣然當補之時從衛取氣當瀉之時從榮置氣其陽氣不足陰氣有餘當先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當先補其陰而後瀉其陽榮衛通行此其要也  
針有補瀉何謂也然補瀉之法非必呼吸出內針也然知其為針者信其左不知為針者信其右當刺之時必先以左手厭按其針榮衛之處彈而努之爪而下之其氣之來如動脈之狀順針而刺之得氣因推而內之是謂補動而伸之是謂瀉不得氣乃與男外女內不得氣是謂十死不治也

右以鍼之推內動伸分補瀉也從衛取氣者謂淺內針待衛氣至漸漸推內進至深也從榮置氣者謂深內針

待榮氣至却漸動伸退至淺也蓋補者針入腠理得氣後漸漸作三次推內進至分寸經所謂徐內疾出世所謂一退三飛熱氣榮榮者是也瀉者直針入分寸得氣後漸漸作三次動伸退出腠理經所謂疾內徐出世所謂一飛三退冷氣沉沉者是也

經言能知迎隨之氣可令調之調氣之方必在陰陽何謂也然所謂迎隨者知榮衛之流行經脈之往來也隨其逆順而取之故曰迎隨調氣必在陰陽者知其內外表裏隨其陰陽而調之故曰調氣之方必在陰陽

右以迎隨分補瀉也然迎隨之法有三此法以針頭迎隨經脈之往來一也又瀉子為迎而奪之補母為隨而濟之二也又前法呼吸內出針亦名迎隨三也又針頭之隨者謂榮衛之流行經脈之往來手之三陰從胸走

八醫經卷二

手

手手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹也迎者以針頭斜迎三陰三陽之來處針去也隨者以針頭斜隨三陰三陽之往處針去也

夫行針者當刺之時口溫針煖先以右手揣按其針榮衛之氣彈而努之爪而下之捫而循之通而取之隨病人咳嗽一聲右手持針而刺之春夏二十四息秋冬三十六息徐出徐入氣來如動脈之狀補者隨經脈推而內之左手閉針孔徐出針而疾按之瀉者迎經脈動而伸之左手閉針孔疾出針而徐按之隨而濟之是謂補迎而奪之是謂瀉

右合迎隨推內動靜二法言補瀉也

瀉補須一方實深取之徐按其痛以極出其邪氣一方虛淺刺之以養其脈疾按其痛母使邪氣得入 脈實者深



刺之以泄其氣，脈虛者淺刺之，使精氣無得出以養其脈，獨出其邪氣。始

右以淺深分補瀉，淺為補，深為瀉也。

凡補瀉，非必呼吸出內而在乎手指何謂也？故動搖進退，搓盤彈撚，指循捫攝，按抓切者是也。動者如氣不行，將針伸提而已。退者為補，瀉欲出針時各先退一頭許，然後却留針方可出之，此謂之退也。搓者，凡令病人覺熱，外向臥針，似搓線之狀，勿轉太緊，治寒向裏臥，依前轉法以為搓也。進者，凡不得氣，男外女內者，及春夏秋冬各有進退之理，此謂之進也。盤者，為如針腹部于穴內，輕盤搖而已，此謂之盤也。搖者，凡瀉時欲出針，必須動搖而出者是也。彈者，凡補時用大指甲輕彈針，使氣疾行如瀉不可用也。撚者，以手撚針也，務要記左右左為

六醫學綱目卷二

三

外右為內也。循者，凡下針於所部分經絡之處，用手上下循之，使氣血往來，經云推之則行，引之則止。捫者，凡補者出針時，用手捫閉其穴是也。攝者，下針時如氣滯，隨經絡上用大指甲上下切其氣血，自得通行也。按者，以手按針，無得進退如按切之狀也。抓者，凡下針用，手指作力置針有准也。切者，凡欲下針，必先大指甲左右于穴切之，令氣血宣散，然後下針，是不傷榮衛故也。問穴各有兩如補瀉，只刺病所即兩穴俱刺，即曰不然，隨病左右而補瀉之，左則左補，右則右補。問針經云，幾壯針訖而後灸何也？曰針則針，灸則灸，若針而弗灸，若灸而弗針。難言有見如入，有見如出者何謂也？曰謂左手見氣未至，乃內針，針入見氣盡，乃出針，是謂有見如入，有見如出也。

王註謂此法取有其

靈所謂氣至而有效者，瀉則益虛，虛者脈大如其故而不

堅也。堅如其故者，適雖言快病未去也。補則益實，實者脈

大如其故而益堅也。大如其故而不堅者，適雖言快病未

去也。故補則實瀉則虛，痛雖不隨針病必衰去。終始

靈刺虛者須其實，刺實者須其虛。針解云：刺實瀉其虛者，乃去針也。刺虛瀉其實者，為針陽氣至而後針。

靈三脈動于足，大指之間必審其實虛，虛而瀉之，是謂重

虛重虛者，病益甚，凡刺此者，以指按之，脈動而實且疾者

疾瀉之，虛而徐者，則補之。反此者，病益甚，其動也，陽明在

上，陽明厥陰在中，太陽少陰在下。太溪

難言東方實西方虛，瀉南方補北方，何謂也？然金木水火

土當更相平，東方木也，西方金也，木欲實金當平之，火欲

實水當平之，土欲實木當平之，金欲實火當平之，水欲實

土當平之，東方者肝也，則知肝實西方者肺也，則知肺虛

瀉南方火補北方水，南方火火者木之子也，北方水水者

木之母也，水勝火子能令母實，母能令子虛，故瀉火補水

欲令金不得平木也。經曰不能治其虛，何問其餘，此之謂

也。七十五難全不得平木不字衍文

素上實下虛切而從之，索其經絡，刺出其血，以見通

靈一經上實下虛而不通者，此必有橫絡盛加於大經，令

之不通，視而瀉之，此所謂解結也。邪之所在，皆為不足

故上氣不足，胸為之不滿，耳為之苦鳴，頭為之苦傾，目為

之眩，中氣不足，腹便為之變，腸為之苦鳴，下氣不足，則乃

為痿厥，心使補足外踝下留之。上氣不足，推而揚之，下

氣不足，積而從之，陰陽皆虛，火自當之。

氣不足，積而從之，陰陽皆虛，火自當之。

氣不足，積而從之，陰陽皆虛，火自當之。

氣不足，積而從之，陰陽皆虛，火自當之。



甲內傷不足三陽絡主之

靈陰陽不相移虛實不相傾取之其經始

難言虛者補之實者瀉之不實不虛以經取之何謂也曰

虛者補其母實者瀉其子當先補之然後瀉之不實不虛

以經取之者是正經自生病不中他邪也當自取其經故

言以經取之也九六十一

右自篇首分陰陽臟腑虛實而施補瀉法者皆謂陰陽

相移虛實相傾而血氣所離之經為虛所并之經為實

故一實一虛而用針補虛瀉實矣若陰陽不相移虛實

不相傾則血氣未離并無虛經無實經但取本經自病

不於他經補瀉也

靈帝曰經脈十二者別為五行分為四時何失而亂何得

而治岐伯曰五行有序四時有分相順則治相逆則亂帝

六 醫經卷七

曰何謂相順對曰經脈十二者以應十二月十二月者分

為四時四時者秋冬春夏其氣各異榮衛相隨陰陽已和

清濁不相干如是則順之而治帝曰何謂逆而亂對曰清

氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衛氣逆行清濁相干亂于胸

中是為大悅故氣亂于心則煩心密嘿俯首靜伏亂于肺

則俯仰喘噎接手以呼亂于腸胃則為霍亂亂于臂脛則

為四厥亂于頭則為厥逆頭重眩仆帝曰五亂者刺之有

道乎岐伯曰氣在手心者取之手少陰主之輪氣在手肺

者取之手太陰榮足少陰輪氣在手腸胃者取之足太陰

陽明不下者取之三里氣在手頭者取之天柱太杼不知

取足太陽榮輸氣在手臂足取之先去血脈後取其陽明

少陽之榮輸帝曰補瀉奈何對曰徐入徐出謂之導氣補

瀉無形謂之同精是非有餘不足也亂氣之相逆也五

邪刺

靈邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善慄節時拘

取之行間以引脇下補三里以溫胃中取血脈以散惡血

取耳間青脈以去其擊邪

素肝病者兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目眈眈無見

耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽氣逆則

頭痛耳聾不聰頰腫取血者肝者肝之野怒者肝之用

靈邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不足而調之其

輸也

素心病者胃中痛脇支痛脇下痛膺背脊甲間痛兩臂內

痛虛則胸腹大脇下與腰相引而痛取其經少陰太陽舌

下血者其變病刺郄中血者胃者心之野背脊者心

靈邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善

饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹脹陰陽俱有餘若

俱不足則有熱有寒皆調于三里

素脾病者身重善饑肉痿足不收行善癢脚下痛虛則腹

滿腸鳴食泄食不化取其經太陰陽明少陰血者

靈邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之

膺中外俞背三節五藏之傍以手疾按之快然乃刺之取

之缺盆中以越之

素肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝臍膈足皆

痛虛則少氣不能報息耳聾隘乾取其經太陰足太陽之

外厥陰內血者

靈邪在腎則病骨痛陰痺除痺者按之而不得腹脹腰痛

大便難有背脛項痛時眩取之湧泉崑崙視有血者盡取

之



邪刺六府

素腎病者腹大脛腫喘咳身重寢汗出憎風虛則胸中痛  
大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽而取之此上經

大腸病者腸中切痛而鳴漉漉冬日重感于寒即泄當  
臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉邪氣藏府腹

中腸鳴氣上衝胸端不能久立邪在大腸刺盲之原巨虛  
上廉三里

胃病者腹脹脹胃脘當心而痛上支兩脇脇壅不通飲食  
不下取之三里邪上五飲食不下膈塞不通邪在胃脘

在上腕則刺抑而下在下腕則散而去之同上四

小腸病者小腸痛腰脊控擊而痛時窘之後當耳前熱若  
寒甚若獨肩熱甚及手小指次指之間熱若脉陷者此  
其候也手太陽病也取之巨虛下廉同上邪小腹控擊

引腰脊上衝心邪在小腸病者小腸者連繫系屬于脊貫  
肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃燥肝散于背結于膈

故取之育原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之取巨  
虛下廉以去之按其所過之經而調之同上四

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不得肩  
上熱若脉陷及足小指外廉及脛踝後皆熱若脉陷取委

中央同上邪

三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留即  
為脹候在足太陽之外大絡大絡在太陽少陽之間亦見

于脉取委陽小腹痛腫不得小便邪在三焦約取之太陽  
大絡視其脉絡與厥陰小絡結而血者腫上及胃脘取三

里同上四  
臍病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之噎中

十二經

介介然數睡在足少陽之本末亦視其脉之陷下者灸之  
其寒熱者取陽陵泉同上邪善嘔嘔有苦長太息心中  
澹澹恐人將捕之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆  
則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以  
開膽逆却調其虛實以去其邪同上四

靈寸口主中人迎主外兩者相應俱往俱來若引絕大小  
齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大如是者名曰平人

人迎大一倍于寸口病在足少陽一倍而躁病在手少陽  
人迎二倍病在足太陽二倍而躁病在手太陽人迎三倍

病在足陽明三倍而躁病在手陽明盛則為熱虛則為寒  
緊則為痛痺代則乍甚乍間盛則瀉之虛則補之緊痛則

取之分肉代則取血絡且飲藥陷下則灸之不盛不虛以  
經取之名曰經刺人迎四倍且大且數者名曰溢陽溢陽

為外格死不治必審按其本末察其寒熱以驗其藏府之  
病禁服人迎一盛瀉足少陽而補足厥陰二瀉一補日

一取之必切而驗之踈取之上氣和乃止人迎二盛瀉足  
太陽而補足少陰二瀉一補二日一取之必切而驗之踈

取之上氣和乃止人迎三盛瀉足陽明而補足太陰二瀉  
一補日二取之必切而驗之踈取之上氣和乃止終始

靈寸口大于人迎一倍病在足厥陰一倍而躁在手心主  
寸口二倍病在足少陰二倍而躁在手少陰寸口三倍病

在足太陰三倍而躁在手太陰盛則脹滿寒中食不化虛  
則熱中出糜少氣弱色變緊則痛痺代則乍痛乍止盛則

瀉之虛則補之緊則先刺而後灸之代則取血絡而後調  
之陷下則徒灸之陷下者脉血結于中中有著血而寒故

宜灸之不盛不虛以經取之寸口四倍者名曰內關內



關者且大且數死不治必審察其本末之寒溫以驗其  
府之病通其榮輸乃可傳于大數大數曰盛則徒瀉之虛  
則徒補之緊則灸刺且飲藥陷下則徒灸之不盛不虛以  
經取之所謂經治者飲藥亦曰刺灸脈急則引脈大以弱  
則欲安靜用力無勞也其服 脈口一盛瀉足厥陰而補  
足少陽二補一瀉日一取之必切而驗之疎而取之上氣  
和而止脈口二盛瀉足少陰而補足太陽三補一瀉二日  
一取之必切而驗之疎而取之上氣和乃止脈口三盛瀉  
足太陰而補足陽明二補一瀉日二取之必切而驗之疎  
而取之上氣和乃止所以日二取之者太陰主胃大富于  
穀氣故可日二取之也終始 人迎與脈口俱盛三倍以  
上命曰除陽俱溢如是者不開則血脈閉塞氣無所行流  
淫于中五藏內傷如此者因而灸之則變易為他病矣上同

六 醫學綱目卷七 天

肺手太陰之脈是動則病肺脹滿膨而喘咳缺盆中痛  
甚則交兩手而脊此為腎厥是主肺所生病者欬嗽上氣  
喘渴煩心胃滿膈臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則有  
背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則有背痛寒少氣  
不足以息為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則  
留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍  
于人迎虛者則寸口反小于人迎也  
脾足太陰之脈是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善  
噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌  
本痛體不能動強立股膝內腫厥足大指不用為此諸病  
閉黃疸不能臥強立股膝內腫厥足大指不用為此諸病  
盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不  
盛不虛以經取之盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反

小于人迎也

大腸手陽明之脈是動則病滿痛頰腫是主津液所生病  
者目黃口乾乾嘔衄喉痺肩前痛大指次指不用氣有餘  
則當脈所過者熱腫虛則寒慄不復為此諸病盛則瀉之  
虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以  
經取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反小于寸口  
也

胃足陽明之脈是動則病洒洒振寒善呻數欠顏黑病至  
則惡人與火聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶塞牖而  
處甚則欲上高而歌棄衣而走其腹脹是為肝厥是主  
血所生病者狂瘧溫淫汗出衄衄口喝唇疹頸腫喉痺大  
腹水腫膈腫痛循膈乳氣街股伏兔外廉足跗上皆  
痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘于胃則消穀善

六 醫學綱目卷七 天

饑渴色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿為此  
諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸  
之不盛不虛以經取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人  
迎反小于寸口也  
心手少陰之脈是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥  
是主心所生病者目黃脇痛膈臂內後廉痛厥掌中熱痛  
為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下  
則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大再倍于人迎虛  
者寸口反小于人迎也  
腎足少陰之脈是動則病饑不欲食面如漆柴欬唾則有  
血喝喝而喘坐而欲起目眈眈如無所見心如懸若饑狀  
氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是為骨厥是主腎所  
生病者口熱舌乾咽腫上氣益乾及痛煩心痛黃疸腸



辟脊痠股內後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之灸則強食生肉緩帶被髮大杖重履而步盛者寸口大再倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

小腸手太陽之脉是動則病嗌痛頰腫不可以顧肩似按臍似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸項有腫肘臂外後廉痛爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

膀胱足太陽之脉是動則病衝頭痛目眩項如拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結喘如裂是爲蹠厥是主筋所生病者痔瘡狂顛疾頭顛項痛目黃淚出軌項背腰尻膕膕脚皆痛小指不用爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱

醫學綱目卷七

手

則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

心主手厥陰心包絡之脉是動則病手心熱臂肘變急腋腫甚則臂反滿心中澹澹大動面赤目黃喜笑不休是

主脉所生病者煩心心痛掌中熱爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經

取之盛者寸口大一倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

肝足厥陰之脉是動則病腰痛不可以俛仰丈夫疝痛婦

人少腹腫甚則嗌乾而塵脫色是主肝所生病者智滿嘔

逆殮世孤疝遺溺閉癆爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱

則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者

寸口大一倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

三焦手少陽之脉是動則病耳聾渾渾焯焯嗌噎

主氣所生病者汗出目銳皆痛頰痛耳後有腫肘臂外皆痛小指次指不爲用爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

臍足少陽之脉是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭痛頰痛目銳皆痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾瘰汗出振寒瘧胸脇肋膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

雖言脉有是動有所生病一脈輒變爲二病者何也然經言是動者氣也所生病者血也邪在氣氣爲是動邪在血

醫學綱目卷七

手

血爲所生病氣主响之血主濡之氣留而不行者爲氣先病也血滯而不濡者爲血後病也故先爲是動後所生也

右十二經爲病通表裏而言若其病或見于表或爲痰

痛或爲癰癤者但當于其所痛之分野求其經脉屬何

經而鍼灸之也另立經脉分野圖于左

頭部  
頰足太陽厥  
中行前直鼻上顛後直  
第三行足少

頭角直耳上中是  
第二行足太陽一十五分各

面部  
額足少陽  
人中足陽明

鼻足陽明太陽  
唇足陽明

足陽明

足陽明







足少陰之別名曰太鍾當踝後繞跟別走太陽其別者并經上走于心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉滯虛則腰痛取之所別也

手心主之別名曰內關去腕二寸出于兩筋之間循經以手繫于心包絡心系實則心痛虛則為頭項強取之兩筋間也

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者徑脛上擊結于莖其病氣逆則舉腫卒疝實則挺長虛則暴痒取之所別也

手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡有蠲實則節弛肘廢虛則生疔小者如指痂疥取之所別也

足太陽之別名曰飛陽去踝七寸別走少陰實則就室頭

背痛虛則就取之所別也

手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循臂乘肩髃上曲頰偏齒其別者入耳合於宗脈實則齟齬虛則齒寒痺隔取之所別也

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痺瘡瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也

手少陽之別名曰外關去腕二寸外透臂注胸中合心主病實則肘攣虛則不收取之所別也

足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥虛則痿躄坐不能起取之所別也

任脈之別名曰尾翳下鳩尾散于腹實則腹皮痛虛則痒搔取之所別也

督脈之別名曰長強挾脊下項散頭上下當有脾左右別走太陽入貫脊實則項強虛則頭重取之所別也

脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸布胸脇實則身盡痛虛則百節盡皆縱此脈若羅絡之血者皆取之脾之大經絡也 凡此十五絡者實則必見虛則必下視之不見求之上下人經不同絡脈異所別也

素黃帝曰余聞繆刺未得其意敢問何也岐伯對曰夫邪之客於形也必先舍於皮毛留而不去入舍於孫脈留而不去入舍於絡脈留而不去入舍於經脈內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃傷此邪之從皮毛而入極於五藏之次也如此則治其經焉今邪客於皮毛入舍於孫絡留而不去閉塞不通不得入于經流溢大絡而生奇病也夫邪客大絡者左注右注左上下左右與經相干而布於

四末其氣無常處不入於經命曰繆刺帝曰願聞繆刺以左取右以右取左奈何其與巨刺何以別之岐伯曰邪客於經左盛則右病右盛則左病亦有移易者左痛未已而右脈先病如此者必巨刺之必中其經非絡脈也故絡病者其痛與經脈緣處故命曰繆刺

調經篇云身形有痛九候莫病則繆刺之痛在于左而右脈病者巨刺之蓋身形有痛邪在絡脈故繆刺絡脈于井穴也病在於左而右脈病則知邪偏入半邊經脈而半邊經脈偏盛并引其無病者半邊亦痛故宜刺經脈於左邊偏盛者之榮俞也

帝曰願聞繆刺奈何取之何如岐伯曰邪客於足少陰之絡令人卒心痛暴脹胸脇支滿無積者刺然骨之前出血如食頃而已不已左取右右取左病新發者取五日已



邪客於手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛  
手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痛壯  
者立已老者有頃已左取右右取左比新病數日已邪  
客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉  
交者各一痛男子立已女子立頃已左取右右取左邪  
客於足太陽之絡令人頭項痛刺足大指爪甲上與肉  
交者一痛立已不已刺外踝下三痛左取右右取左如食  
頃已邪客于手陽明之絡令人氣滿胃中喘息而支肘  
胸中熱刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一痛左取  
右右取左如食頃已邪客於掌臂之間不可得屈刺其  
踝後先以指按之痛乃刺之以月死生為數月生一日一  
痛二日二痛十五日十五痛十六日十四痛邪客於足  
陽蹻之脉令人目痛從內皆始刺外踝之下半寸所各二

大醫學綱目卷七 五

痛左取右右取左如行十里頃而已 人有所墮墜惡血  
留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脉下  
傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之前血脉出血刺足跗  
上動脉不已刺三毛上各一痛見血立已左刺右右刺左  
邪客于手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺手大指次  
指爪甲上去端如韭葉各一痛立開不已刺中指爪甲上  
與肉交者立開其不時聞者不可刺也耳中生風者亦刺  
之如此數左刺右右刺左凡痺往來行無常處者在分肉  
間痛而刺之以月死生為數用針者隨氣盛衰以為痛數  
針過其日數則脫氣不及日數則氣不瀉左刺右右刺左  
病已止不已復刺之如法月生一日一痛二日二痛漸多  
之十五日十五痛十六日十四痛漸少之邪客於足陽  
明之絡令人齕衄上齒寒刺足中指次指爪甲上與肉交

者各一痛左刺右右刺左邪客於足少陽之絡令人脇  
痛不得息欬而汗出足小指次指爪甲上與肉交者各  
一痛不得息立已汗出立止數者溫承飲食一日已左刺  
右右刺左病立已不已復刺如法邪客於足少陰之絡  
令人齕痛不可肉食無故善怒氣上走贛上刺足下中央  
之脉各三痛凡六刺立已左刺右右刺左啞中腫不能內  
唾時不能出唾者刺然骨之前出血立已左刺右右刺左  
邪客於足太陽之絡令人腰痛引少腹控眇不可以仰  
息刺腰尻之解兩胛之上是腰俞以月死生為痛數發針  
立已左刺右右刺左邪客於足太陽之絡令人拘攣背  
急引脇而痛刺之從項始數脊椎挾脊疾按之應手如痛  
傍刺之三痛立已邪客於足少陽之絡令人留于樞中  
痛解不可舉刺樞中以毫針寒則久留針以月死生為數

大醫學綱目卷七 五

立已治諸經刺之所過者不病則繆刺之耳聾刺手陽  
明不已刺其通脉出耳前者齒齕刺手陽明不已刺其  
脉入齒中者立已邪客于五藏之間其病也脉引而痛  
時來時止視其病繆刺之于手足爪甲上視其脉出其血  
間日一刺一刺不已五刺已繆傳引上齒齒唇寒痛視其  
手背脉血者出之足陽明中指爪甲上一痛手大指次指  
爪甲上各一痛立已左取右右取左邪客于手足少陰  
太陽足陽明之絡此五絡皆會于耳中上絡左角五絡俱  
竭令人身脉皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥刺其  
足大指內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後刺足中指  
爪甲上各一痛後刺手大指內側去端如韭葉後刺手心  
主少陰銳骨之端各一痛立已不已以竹管吹其兩耳其  
其左角之髮方一寸燔治飲以美酒不能飲者灌之立已



凡刺之數先視其經脉切而從之審其虛實而調之不調者經刺之有痛而經不病者繆刺之因視其皮部有血絡者盡取之此繆刺之數也刺論

靈黃帝曰願聞奇邪而不在經者岐伯曰血絡是也帝曰刺血絡而仆者何也血出而射者何也血少黑而濁者何也血出清而半為汁者何也發針而腫者何也血出若多若少而面色蒼蒼者何也發針而面色不變而煩惋者何也多出血而不動搖者何也願聞其故岐伯曰脉氣盛而血虛者刺之則脫氣脫氣則仆血氣俱盛而陰氣多者其血滑刺之則射陽氣畜積久留而不瀉者其血黑以濁故不能射新飲而液滲于絡而未和于血也故血出而汁別焉其不新飲者身中有水又則為腫陰氣積于陽其氣因于絡故刺之血未出而氣先行故腫陰陽之氣其新相得

八醫經卷之二

夫

而未和合因而瀉之則陰陽俱脫表裏相離故脫色而蒼蒼然刺之血出多色不變而煩惋者刺絡而虛經經虛之属于陰者陰脫故煩悶陰陽相得而合為痺者此為內溢於經外注於絡如是者陰陽俱有餘雖多出血而弗能虛也帝曰相之奈何岐伯曰血脉者盛堅橫以赤上下無常處小者如針大者如筋則其瀉之萬全也故無失數矣失數而反各如其度黃帝曰針入而肉著者何也岐伯曰熱氣因于針則針熱熱則肉著于針故堅焉血絡論○經脉者必取其結上甚血者雖無結急取之以瀉其邪留之發為痺也又云其小而短者少氣甚者瀉之則悶悶甚則什不得言悶則

右刺藏府經絡四病各不同十五絡病至淺在表也十二經病次之六腑病又次之五臟病至深在裏也故治法有難易焉至於絡又各不同十五絡之絡乃陰經別

走陽經陽經別走陰經而橫貫兩經之間所謂橫者為絡與經相隨上下者也繆刺之絡乃病邪流溢大絡不得入貫經俞而其痛與經脉繆也乃絡病經不病者也血絡之絡及皮膚所見或赤或青或黑之絡而小者如針大者如筋也以淺深言之血絡至淺繆刺者次之十五絡近裏而貫經俞也

四海

胃者水穀之海其輸上在氣衝下在三里水穀之海有餘則腹滿不足則饑不受穀食

衝脉者為十二經之海其輸上在于大杼下出于巨虛之上下廉血海有餘則常想其身大怫然不知其所病血海不足亦常想其身小狹然不知其所病

膻中者氣之海其輸上在于柱骨之上下前在于人迎氣海有餘者氣滿胃中悅息而赤氣海不足則氣少不足以

八醫經卷之二

夫

言腦為髓之海其輸上在于其蓋下在風府髓海有餘則輕動多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈怠安臥審守其輸而調虛實

刺寒熱



醫學綱目卷之八

陰陽臟腑部

穴法上

肺出于少商少商者手大指端內側也為井木

銅人云少商二穴木也在大指端內側去爪甲角韭葉許手太陰脈之所出也為井以三稜針刺之出血以瀉諸積之熱不宜灸甲乙經云針入二分留一呼灸一壯

溜于魚際魚際者手魚也為榮

銅人云魚際二穴火也在大指本節後內側散脈中手太陰脈之所行也為榮針入二分留三呼可灸二壯

注于大淵大淵魚後一寸陷者中也為膈

銅人云大淵二穴土也在手掌後陷中手太陰脈之所注也為輸針入二分可灸三壯

行于經渠經渠寸口中也動而不居為經

銅人云經渠二穴金也在寸口陷中手太陰脈之所行也為經針入二分留三呼禁灸灸則傷人神

入于尺澤尺澤肘中之動脈也為合手太陰經也

銅人云尺澤一穴木也在肘中約紋上動脈中手太陰脈之所入為合針入二分可灸五壯

溜于勞宮勞宮掌中中指本節之內間也為榮

銅人云勞宮一穴火也在掌中央動脈中心原虛處屈中指無名指取之手厥陰脈之所流也為榮針入三分留六呼

注于大陵大陵掌後兩骨之間方下者也為膈

銅人云大陵二穴土也在掌後兩筋間陷中手厥陰脈之所注也為輸針入六分可灸三壯

行于間使間使之道兩筋之間三寸之中也有過則至無過則止為經

銅人云間使二穴金也在掌後三寸兩筋間陷中手厥陰脈之所行也為經針入三分可灸五壯其穴有大絡為限故入絡過脈後正勞宮後三寸寸止處是穴故經曰有過則至無過則止也

入于曲澤曲澤肘內廉下陷者之中也屈而得之為合手

少陰也

銅人云曲澤二穴木也在肘內廉下陷中屈肘得之心包絡脈之所入也為合針入三分留七呼可灸三壯

肝出于大敦大敦者足大指之端及三毛之中也為井木

銅人云大敦二穴木也在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中足厥陰脈之所出也為井針入三分留六呼可灸二壯

溜于行間行間足大指間也為榮

銅人云行間二穴火也在足大指間動脈應手陷中足厥陰脈之所流也為榮針入六分留十呼灸三壯

注于太衝太衝行間上二寸陷者中也為膈

銅人云太衝二穴土也在足大指本節後二寸或云一寸五分陷中足厥陰脈之所經也為輸針入三分留十呼可灸

行于中封中封內踝之前一寸半陷者之中使逆則宛使和則通搖足而得之為經

銅人云中封二穴金也在足內踝前一寸仰足而取之陷中伸足乃得之足厥陰脈之所行也為經針入四分留七呼可灸三壯其穴使足逆則宛有宛陷可定針使手足和其穴有菴道可通故曰使逆則宛和則通也

入于曲泉曲泉輔骨之下大筋之上也屈膝而得之為合

足厥陰也 銅人云曲泉二穴木也在膝內輔骨下太筋上小筋下陷中屈膝得之足厥陰脈之所入也為合針入六分留十呼可灸三壯

脾出于隱白隱白者足大指之端內側也為井木

銅人云隱白二穴木也在足大指端內側去爪甲如韭葉足太陰脈之所出也為井針入一分留三呼可灸三壯

注于大都大都本節之後下陷者之中也為榮

銅人云大都二穴火也在足大指本節後管中足太陰脈之所流也為榮針入二分留七呼可灸三壯按本節後更詳

注于太白太白胫骨之下也為膈

銅人云太白二穴土也在足大指本節後管中足太陰脈之所行也為經針入二分留七呼可灸三壯



銅人云太白二穴上也在足大指內側核骨下陷中足  
太陰脈之所注也為輸刺入三分留七呼可灸三壯  
行于商丘商丘內踝之下陷者之中也為經  
銅人云商丘二穴金也在足內踝骨下陷前陷中足  
太陰脈之所行也為經刺入三分留七呼可灸三壯  
入于陰之陵泉陰之陵泉輔骨之下陷者之中也伸而得  
之為合足太陰也

銅人云陰陵泉二穴水也在膝下內側輔骨下陷中伸  
足乃得之是太陰脈之所入也為合刺入五分留七呼  
可灸三壯  
腎出于湧泉湧泉者足心也為井木  
銅人云湧泉二穴一名地衝在足心陷中屈足捲指宛  
宛中取之少陰脈之所出也為井刺入三分留七呼  
可灸三壯

溜于然谷然谷者然骨之下者也為榮  
銅人云然谷二穴火也在一龍骨足內踝前起大骨下  
陷中足少陰脈之所過也為榮刺入三分留三呼可灸三  
壯刺之多見血  
使人立欲飲食

注于太溪太溪內踝之後跟骨之上陷中者也為輸  
銅人云太溪二穴土也在跟後上踝後跟骨上動脈陷中  
足少陰脈之所注也為輸刺入三分留七呼可灸三壯  
凡人病有此脈  
則生無則死

行于復溜復溜上內踝二寸動而不休為經  
銅人云復溜二穴金也一名伏白一名昌陽在足內踝  
上二寸筋骨陷中足少陰脈之所行也為經刺入三分  
留三呼可灸五壯

入于陰谷陰谷輔骨之後大筋之下小筋之上也按之應  
手屈膝而得之為合足少陰經也  
銅人云陰谷二穴水也在膝下內輔骨之後大筋下小  
筋上足少陰脈之所入也為合刺入三分可灸三壯

勝胱出于至陰至陰者足小指之端也為井金  
銅人云至陰二穴金也在足小指外側去爪甲如韭葉  
足太陰脈之所出也為井刺入一分留五呼可灸三壯

溜于通谷通谷本節之前外側也為榮  
銅人云通谷二穴水也在足小指外側本節前陷中足  
太陽脈之所過也為輸刺入二分留五呼可灸三壯

注于束骨束骨本節之後陷者中也為輸  
銅人云束骨二穴木也在足小指外側本節後陷中足  
太陽脈之所注也為輸刺入三分留五呼可灸三壯  
過于京骨京骨足外側大骨之下為原  
銅人云京骨二穴在足外側大骨下赤白肉際陷中按  
而得之是太陽脈之所過也為原刺入三分留七呼可  
灸七壯

行于崑崙崑崙在外踝之後跟骨之上為經  
銅人云崑崙二穴火也在足外踝後跟骨上陷中足  
太陽脈之所行也為經刺入五分留十呼可灸五壯

入于委中委中在腘中央為合委而取之足太陽也  
銅人云委中二穴土也在腘中央約文中動脈陷中足  
太陽脈之所入也為合刺入五分留七呼可灸三壯  
膽出于竅陰竅陰者足小指次指之中也為井金  
銅人云竅陰二穴金也在足小指次指之端去爪甲角  
如韭葉足少陽脈之所出也為井刺入一分留三呼可  
灸三壯

溜于挾溪挾溪足小指次指之間也為榮  
銅人云挾溪二穴木也在足小指次指二岐骨間本節  
前陷中足少陽脈之所過也為榮刺入二分留三呼可  
灸三壯

注于臨泣臨泣上行一寸半陷者中也為輸  
銅人云臨泣二穴木也在足小指次指本節後間陷中  
去挾溪一寸五分足少陽脈之所注也為輸刺入二分  
留三呼可灸三壯

過于丘墟丘墟外踝之前下陷者中也為原  
銅人云丘墟二穴在足外踝下如前陷中去臨泣三寸  
足少陽脈之所過也為原刺入五分留七呼可灸三壯

行于陽輔陽輔外踝之上輔骨之前及絕骨之端也為經  
銅人云陽輔二穴火也在足之外踝上四寸輔骨前絕  
骨端三分去丘墟七寸足少陽脈之所行也為經刺入  
五分留七呼可灸三壯

入于陽之陵泉陽之陵泉在膝外陷者中也為合伸而得  
之足少陰也  
銅人云陽陵泉二穴土也在膝下一寸筋外陷中足  
少陽脈之所入也為合刺入六分留十呼可灸七壯至



④

胃出于厲兌厲兌者足大指次指之端也為井金

銅人云厲兌二穴金也足大指次指之端去爪甲角如韭菜足陽明胃脈之所出也為井刺入一分留一呼

溜于內庭內庭次指外間也為榮

銅人云內庭二穴水也足大指次指外間中足陽明胃脈之所流也為榮刺入三分留十呼可灸二壯

注于陷谷陷谷者上中指內間上行二寸陷者中也為膈

銅人云陷谷二穴木也足大指次指本節後陷中夫內庭二寸足陽明胃脈之所注也為俞刺入五分留七呼可灸

過于衝陽衝陽足跗上五寸陷者中也為原握足而得之

銅人云衝陽二穴一名會原在足跗上五寸去陷谷各三寸骨間動脈足陽明脈之所過也為原刺入三分留十呼可灸

行于解谿解谿上衝陽一寸半陷者中也為經

銅人云解谿二穴土也在膝下衝陽後一寸五分腕上陷中足陽明脈之所行也為經刺入五分留五呼可灸

入于下陵下陵膝下三寸脛骨外廉三里也為合復下三里三寸為巨虛上廉復下上廉三寸為巨虛下廉也大腸

屬上小腸屬下足陽明胃脈也

三焦者上合手少陽出于關衝關衝者小指次指之端也

銅人云關衝二穴金也在手小指次指之端去爪甲角如韭菜手少陽脈之所出也為井刺入一分留三呼可灸

為井金

銅人云關衝二穴金也在手小指次指之端去爪甲角如韭菜手少陽脈之所出也為井刺入一分留三呼可灸

溜于液門液門小指次指之間也為榮

銅人云液門二穴水也在手小指次指間中握拳取之手少陽脈之所流也為榮刺入三分留三呼可灸三壯

注于中渚中渚本節之後陷者中也為膈

銅人云中渚二穴木也在手小指次指本節後陷中夫液門下一寸手少陽脈之所注也為俞刺入二分留三呼可灸

過于陽池陽池在腕上陷者之中也為原

銅人云陽池二穴一名別陽在手腕上陷中手少陽脈之所過也為原刺入二分留三呼可灸

行于支溝支溝上腕三寸兩骨之間陷者中也為經

銅人云支溝二穴火也在腕後三寸兩骨之間陷中手少陽脈之所行也為經刺入二分留七呼可灸二七壯

入于天井天井在肘外大骨之陷者中也為合屈肘乃得

銅人云天井二穴土也在肘外大骨後肘上一寸兩筋間中足陽明脈之所入也為合刺入一寸灸三壯



為井金

銅人云少澤二穴金也。在手小指之端外側去爪甲一分。指冲手太陽脉之所出也。為井刺入一分。留二呼。可壯。

溜于前谷前谷在手外廉本節前陷者中也為榮

銅人云前谷二穴水也。在手小指外側本節前陷中。手太陽脉之所流也。為榮刺入一分。留三呼。可灸一壯。

注于後谿後谿者在手外側本節之後也為腧

銅人云後谿二穴木也。在手小指外側本節後陷中。手太陽脉之所注也。為腧刺入二分。留三呼。可灸三壯。

過于腕骨腕骨在手外側腕骨之前為原

銅人云腕骨二穴在手外側腕前起骨下陷中。手太陽脉之所過也。為原刺入一分。留三呼。可灸三壯。

行于陽谷陽谷在銳骨之下陷者中也為經

銅人云陽谷二穴火也。在手外側腕中銳骨下陷中。手太陽脉之所行也。為經刺入二分。留二呼。可灸二壯。

入于小海小海在肘內大骨之外去端半寸陷者中也伸臂而得之為合手太陽經也

銅人云小海二穴土也。在肘內大骨外肘端五分陷中。屈手向頭取之。手太陽脉之所入也。為合刺入二分。留七呼。可壯。

大腸上合手陽明出于商陽商陽大指次指之端也為井

銅人云商陽二穴金也。一名經陽。在手大指次指內側。去爪甲如莖葉手陽明脉之所出也。為井刺入一分。留一呼。可壯。

溜于本節之前二間為榮

銅人云二間二穴水也。在手大指次指本節前內側陷中。手陽明脉之所流也。為榮刺入三分。留九呼。可灸三壯。

注于本節之後三間為腧

銅人云三間二穴火也。在手大指次指本節後內側陷中。手陽明脉之所注也。為腧刺入三分。留三呼。可灸三壯。

過于合谷合谷在大指岐骨之間為原

銅人云合谷二穴在虎口第一、二指間。手陽明脉之所過也。為原刺入一分。留三呼。可壯。

銅人云合谷二穴在手大指次指岐骨間。手陽明脉之所過也。為原刺入三分。留六呼。可灸三壯。

行于陽谿陽谿在兩筋間陷者中也為經

銅人云陽谿二穴火也。一名中魁。在腕中上側兩筋間陷中。手陽明脉之所行也。為經刺入三分。留七呼。可灸三壯。

入于曲池在肘外輔骨陷者中也屈臂而得之為合手陽

明也。銅人云曲池二穴土也。在肘外輔骨陷中。屈臂得之。手陽明脉之所入也。為合刺入五分。留七呼。可灸三壯。

是謂五臟六腑之腧五五二十五腧六六三十六腧也六

腑皆出足之三陽上合于手者也。已上並出。

右五臟腧二十五穴六腑腧三十六穴并巨虛上下廉

共六十四腧實切要之穴也。凡五臟六腑有病皆此六十四穴主之。其太淵太陵太衝太白太溪為五臟之原。其三里巨虛上下廉委中委陽陽陵泉為六腑之合。又

切要中之切要而醫所最當先者也。六腑之合謂胃合

于三里大腸合入巨虛上廉小腸合于巨虛下廉此三腑皆出足之陽明也。三焦合于委陽膀胱合于委中此二腑皆出足之太陽也。膽合于陽陵泉此一腑出足之少陽也。六腑有疾皆取此六腧。故後於其尾結之曰六腑皆出足之三陽而表章之也。今效寶漢卿傍通十二經孔穴圖而復折衷之於經開如左方。

井木少商	中衝	大敦	隱白	湧泉
榮火魚際	勞宮	行間	大都	然谷
俞土太淵	太陵	太衝	太白	太溪
經金經渠	間使	中封	商丘	復溜
合水尺澤	曲澤	曲泉	陰陵泉	陰谷



天腸 小腸 膽 胃 膀胱 三焦

井金商陽 少澤 竅陰 厲兌 至陰 關衝

榮水二間 前谷 挾谿 內庭 通谷 液門

膈木三間 後溪 臨泣 膻谷 束骨 中渚

原 合谷 腕骨 丘墟 衝陽 京骨 陽池

經火陽溪 陽谷 陽輔 解溪 崑崙 支溝

合土曲池 巨 小海 巨陽 陵泉 三里 委中 天井

素黃帝曰願聞五臟六腑所出之處岐伯曰五臟五膈五

五二十五膈六腑六膈六六三十六膈經脈十二絡脈十

五凡二十七氣以上下所出為井所溜為榮所注為腧所

行為經所入為合二十七氣所行皆在五膈也節之交三

百六十五會知其要者一言而終不知其要流散無窮所

言節者神氣之所遊行出入也非筋肉皮膚也九針十

難十變又言陰井木陽井金陰榮火陽榮水陰膈上陽膈

木陰經金陽經火陰合水陽合土陰陽皆不同其意何也

然是剛柔之事也陰井乙木陽井庚金陽井庚庚者乙之

剛也陰井乙者庚之柔也乙為木故言陰井木也庚為

金故言陽井金也 經言所出為井所入為合其法奈何

然所出為井井者東方春也萬物始生故言所出為井也

所入為合合者北方冬也陽氣入藏故言所入為合也

十變言五臟六腑榮合皆以井為始者何也蓋井者東方

春也萬物始生諸趾行喘息蠕蠕動當生之物莫不以

春而生故歲數始於春月數始於甲故以井為始也 諸

井者肌肉淺薄氣少不足使也刺之奈何然諸井者木也

榮者火也火者木之子當刺井者以榮瀉之故經言補者

不可以為瀉瀉者不可以為補此之謂也

右緊論

難經言春刺井夏刺榮季夏刺膈秋刺經冬刺合者何也  
蓋春刺井者邪在肝夏刺榮者邪在心季夏刺膈者邪在  
脾秋刺經者邪在肺冬刺合者邪在腎其肝心脾肺腎而  
繫于春夏秋冬者何也然五臟一病輒有五也假令肝病  
色青者肝也勝與者肝也喜酸者肝也喜呼者肝也喜泣  
者肝也其病衆多不可盡言四時有數而並繫于春秋冬  
夏者也針之要妙在於秋毫者是也

海藏天元圖

肝 青 大敦 脾 曲泉 酸 中封 呼 大衝 泣 行間  
心 赤 少府 焦 少衝 苦 少海 言 靈道 汗 神門  
脾 黃 太白 香 大都 甘 隱白 歌 陰陵泉 滲 商丘  
肺 白 經渠 腥 太淵 辛 魚際 哭 少商 滌 尺澤  
腎 黑 陰谷 腐 復溜 鹹 太溪 呻 然谷 液 湧泉

夫天元法者謂之五化靈元當從其首繫其數首者寅方  
春也在人為肝是從東方順天輪數至所主之處計從幾  
數却於所受病一方倒疊回去數至依前數盡處便於受  
病一方穴內瀉所主之方來路穴也不得於所主之方內  
經中瀉之勿誤 假如病者聞香臭二者心主五臭也入  
脾為香臭從東數至所主之處所主五臭者心也東一南  
二計得二數却當於受病之方倒疊回去脾一心二元數  
二也是數至心心者榮火也當於受病之方內瀉榮火是  
從脾經瀉大都是也或曰何以倒疊數對曰此從地出為  
天輪所載右遷於天不當於所顯之處治之此舟行岸移  
之意也

右天元圖乃海藏發明扁鵲七十四難之義但心膈五



穴不合經皆按內經言心臟堅固邪非能容故手少陰  
 獨無膈其外經病而臟不病者獨取其經於掌後銑骨  
 之端其餘脈出入屈折其行之徐疾皆如手少陰心主  
 之脈行也故諸邪之在心者皆在心之包絡也今圖中  
 列心五邪曰赤焦苦言汗者皆當在心包絡所受而不  
 列心包絡中衝勞宮太陵間使曲澤五穴反列手少陰  
 少府少衝少海神門靈道五穴為未得也

難五臟六腑各有井榮俞經合皆何所主然經言所出為  
 井所溜為榮所注為腧所行為經所入為合井主心下滿  
 榮主身熱腧主體重節痛經主喘咳寒熱合主氣逆而泄  
 此五臟六腑其井榮俞經合所主病也

井心下 膈元 身熱 節痛 寒熱 逆氣  
 入醫經綱目卷八 十一

榮身熱	心下滿	元證	體重	寒熱	逆氣
俞節痛	心下滿	元證	寒熱	逆氣	
經喘咳	心下滿	元證	體重	逆氣	
合逆氣	心下滿	元證	寒熱	逆氣	

假令膽病善潔面青善怒元得弦脈肝又病心下滿當刺  
 如見善潔面青善怒脈又弦又病身熱當刺又病體重節  
 痛當刺如見善潔面青善怒脈又弦又病喘咳寒熱當刺  
 又病逆氣而泄當刺餘經例做此假令肝經洩淋便難  
 轉筋春刺井夏刺榮季夏刺腧秋刺經冬刺合此是斷五  
 邪之原

陰陽例即人元圖

陰陽者子午也謂榮合水火之稱名曰陰陽也十二經皆  
 有之或感得父氣或感得母氣而病焉子午者乾坤乾坤

包六子六子附乾坤也故七十難云春夏各致一陰秋冬  
 各致一陽春夏刺井榮秋冬刺經合是各致一陰一陽之  
 義亦謂井經近乎子午然當微瀉其井大瀉其榮微補其  
 經大補其合或補或瀉反作是寒則留之熱則疾之故微  
 大補瀉以應之春食涼夏食寒秋食溫冬食熱 假令膽  
 病善潔面青善怒脈得浮之實大沉之損小是感得父氣  
 為陽中之陰當於本經中瀉火補水却得浮之損小沉之  
 實大是感得母氣為陰中之陽當于本經中瀉水補火

配合例  
 難曰上工治未病者見肝之病則知肝當傳於脾故先實  
 其脾氣無令受肝之邪氣也假令見肝病欲入其脾者先  
 於足太陰經中補土字一針又補火字一針後於足厥陰  
 肝經內瀉木字一針又瀉火字一針

子母例  
 假令見肝病滿閉淋洩便難轉筋又見心病煩心心痛掌  
 中熱而喘當於足厥陰肝經內木火二字各瀉一針

兄妹例  
 假令見足厥陰肝經太過又兼見膽之証太過是為兄妹  
 當瀉肝經內木火二字各一針又瀉膽經內水火二字各  
 一針此五法乃人元法也 四針上子母兄妹名曰  
 靈五臟有六腑六腑有十二原十二原出于四關主治五  
 臟五臟有疾當取之十二原十二原者五臟之所以稟三  
 百六十五節氣味也五臟有疾應出十二原而原各有所  
 出明知其原視其應而知五臟之害矣  
 陽中之少陰肺也其原出于太淵太淵二  
 陽中之太陽心也其原出于太陵太陵二



陰中之少陽肝也其原出于太衝太衝二  
陰中之至陰脾也其原出于太白太白二  
陰中之大陰腎也其原出于太溪太溪二

膏之原出于鳩尾鳩尾一  
胃之原出于氣海氣海一凡此十二原者主治五臟六腑  
之有疾者也九針十

淵言肺之原出于太淵心之原出于太陵肝之原出于太  
衝脾之原出于太白腎之原出于太溪少陰之原出于厲  
兌膽之原出于丘墟骨之原出于衝陽三焦之原出于陽  
池膀胱之原出于京骨大腸之原出于合谷小腸之原出  
于腕骨十二經皆以俞為原者何也然五臟俞者三焦之  
所行氣之所留止也三焦所行之原為俞者何也然臍下  
腎間動氣者人之生命也十二經之根本也故名曰原三

焦者原氣之別使也主通行三氣經歷于五臟六腑原者  
三焦之尊號也故所止氣為原五臟六腑之有病者皆取  
其原也

海藏拔源例

假令針肝經病了又於本經原穴亦下一針如補肝經亦  
於肝經原穴上補一針如瀉肝經來亦於肝經原穴上瀉  
一針如餘經有補瀉針畢做此例亦補瀉各經原穴  
靈黃帝曰余聞五臟六腑之氣榮輸所入為合今何道從  
入入安連過願聞其故岐伯曰此陽脈之別入於內屬  
于腑者也黃帝曰榮輸與合各有名乎岐伯曰榮輸治外  
經合治內府黃帝曰治內府奈何岐伯曰取之于合黃帝  
曰合各有名乎岐伯曰胃合于三里大腸合入于巨虛  
上廉小腸合入于巨虛下廉三焦合入于委陽膀胱合入

于委中央膽合入于陽陵泉黃帝曰取之奈何岐伯曰  
取之三里者低附取之巨虛者舉足取之委陽者屈伸而  
索之委中者屈而取之陽陵泉者正豎膝予之齊下至委  
陽之陽取之取諸外經者揄申而從之黃帝曰願聞六腑  
之病岐伯曰曰面熱者足陽明云云即前所謂內腑之病  
而用合穴治之也內腑病見針灸六腑條

穴法下

頭部銅人神庭一穴在鼻直上入髮際五分足太陽督脈之會  
禁不可針針即發狂宜灸七壯至三七壯

上星一穴在額顛上鼻直中入髮際一寸陷中容豆是穴  
督脈氣所發刺入二分留十呼灸三壯至五壯止不宜多  
灸

入醫經卷八

古

願會一穴在上星上一寸陷者中是穴督脈氣所發刺入  
三分灸二七壯七七壯止針入二分留三呼得氣即瀉

前頂一穴在額會上寸五分骨陷中是穴督脈氣所發  
刺入一分可灸三壯至七七壯針入三分留七呼瀉五吸

百會一穴一名三陽五會在前頂後一寸五分所中央旋  
毛中可容豆是手足三陽督脈之會刺入二分灸七壯

後頂一穴在百會後一寸五分枕骨上督脈氣所發可灸  
五壯針入四分

強間一穴在後頂後一寸五分督脈氣所發可灸五壯針  
入三分

腦戶一穴在枕骨上強間後一寸五分足太陽督脈之會  
禁不可針灸七壯

風府一穴在項後髮際上一寸大筋內宛宛中人疾言其  
肉立起言休立下足太陽督脈陽維之會禁不可灸灸之



令人瘖針入三分

瘖門一穴在項後入髮際五分宛宛中督脉陽維之會入

繫舌本仰頭取之不可灸針入八分

右正頭部中行前髮際至後髮際十穴通長一尺一寸

取頭部同身寸法見後雜法條

曲差二穴在神庭傍一寸五分入髮際足太陽脉氣所發

針入二分灸三壯

五處二穴在上星傍一寸五分足太陽脉氣所發針入三

分留七呼灸三壯

承光二穴在五處後二寸足太陽脉氣所發針入三分不

可灸

通天二穴在承光後一寸五分足太陽脉也針入三分留

七呼灸三壯

絡却二穴在通天後一寸五分足太陽脉氣所發針入三

醫學綱目卷八 五

分灸三壯

玉枕二穴在絡却後七分半夾腦戶傍一寸三分起肉枕

骨上入髮際三寸足太陽脉氣所發可灸三壯針入三分

天柱二穴在夾項後髮際大筋外廉陷中足太陽脉氣所

發針入二分得氣即瀉

右正頭部第二行一十四穴

臨泣二穴在目上眥入髮際五分陷中足太陽少陽陽維

之會針入三分留七呼

目愈二穴在臨泣後一寸足少陽陽維之會針入三分灸

五壯

正營二穴在目愈後一寸足少陽陽維之會針入三分灸

五壯

率谷二穴在正營後一寸五分足少陽陽維之會可灸三

壯

腦空二穴在率谷後一寸五分夾玉枕傍枕骨下陷中足

少陽陽維之會針入五分灸三壯

風池二穴在腦空後髮際陷中足少陽陽維之會針入七

分留七呼可灸七壯

右正頭部第三行十二穴

額厭二穴在曲周下腦空上廉手足少陽陽明之交會針

入七分留七呼可灸三壯

懸顛二穴在曲周上腦空中足少陽脉氣所發針入三分

留七呼可灸三壯

懸釐二穴在曲周上腦空下廉手足少陽陽明之交會針

入三分可灸三壯

曲發二穴在耳上髮際曲隅陷中鼓頰有空處足太陽少

醫學綱目卷八 未

陽之會針入三分灸七壯

右側頭部在耳前者八穴額厭在腦空上廉懸顛在腦

空中廉懸釐在腦空下廉皆直頭角上至耳前定其三

穴曲發又在懸釐之後

率谷二穴在耳上入髮際一寸五分足太陽少陽之會可

灸三壯針入三分

天衝二穴在耳上如前三分氣府注云足太陽少陽之會可灸七壯針

入三分

角孫二穴在耳郭中間上開口有空可灸三壯針入三分

右側頭部在耳上者六穴率谷最上天衝次之角孫最

下

竅陰二穴在完骨上枕骨下搖動有空足太陽少陽之會



針入三分可灸七壯  
 浮白二穴在耳後入髮際一寸足太陽少陽之會針入五分可灸三壯  
 完骨二穴在耳後入髮際四分足太陽少陽之會針入五分可灸七壯  
 顛息二穴在耳後青絡脈中足少陽脈氣所發不宜針可灸七壯  
 換脈二穴在耳本後鵝足青絡脈刺出血如豆汁可灸三壯針入一分  
 翳風二穴在耳後尖角陷中按之引耳中痛手足少陽之會針入七分灸七壯  
 右側頭部在耳後者十二穴翳風帖耳換脈次之顛息又次之完骨又次之浮白最後窻陰又若浮白之上也

八醫學綱目卷八

鼻素邪一穴在鼻柱上端準頭督脈氣所發宜禁針灸  
 水溝一穴在鼻柱下人中近鼻孔陷中手足陽明之會針入四分留五呼灸三壯至七壯  
 先端一穴在唇上端手陽明脈氣所發針入三分留六呼灸三壯  
 斷交一穴在唇內齒上斷縫中任督足陽明之會針入三分灸三壯  
 右面部中行從鼻端下至唇內四穴督脈也  
 承漿一穴在頤前下唇下宛宛陷中太陽脈胃脈督脈任脈之會針入三分灸七壯至七七壯  
 廉泉一穴在頤下結喉下四寸中央乃陰維任脈之會可灸三壯針三分  
 右面部中行從唇至結喉上二穴任脈也

攢竹二穴在兩眉頭少陷中足太陽脈氣所發不宜灸針入一分宜以細三稜針刺之宜洩熱氣  
 睛明二穴在目內眥頭外一分手足太陽少陽陽明陽蹻陰蹻五脈之會針入一分留三呼不可灸  
 右面部第二行直目內眥上至眉尖四穴足太陽也  
 迎香二穴在禾卯上一寸鼻下孔傍五分手足陽明之會針入三分不宜灸  
 禾卯二穴在鼻下俠谿水溝傍五分手陽明脈氣所發針入三分灸三壯  
 右面部第二行直目內眥俠鼻而下四穴手陽明  
 陽白二穴在眉上一寸直目瞳子手足陽明少陽陽維五脈之會可灸三壯針入三分  
 右面部第三行直目瞳子上至眉上二穴足少陽

八醫學綱目卷八

承泣二穴在目下七分直目瞳子陷中蹻脈任脈足陽明之會可灸二壯不可針  
 四白二穴在目下二寸足陽明脈氣所發可灸七壯針入三分  
 巨膠二穴在俠鼻孔傍八分直目瞳子蹻脈足陽明之會針入三分可灸七壯  
 地倉二穴在俠口吻傍四分如近下有脈微動者是蹻脈手足陽明之會針入三分可灸二七壯  
 大迎二穴在曲頤前一寸三分骨陷中動脈是足陽明脈氣所發針入三分留七呼可灸三壯  
 右面部第三行直目瞳子下至大迎骨空十六穴足陽明  
 本神二穴在曲差傍一寸五分直耳上入髮際足少陽陽維之會針入五分可灸三壯



絲竹空二穴在肩後陷中足少陽脉氣所發不可灸針入三分留三呼

右面第四行直目銳眥上髮際四穴手足少陽

瞳子膠二穴在目外去眥五分手太陽手足少陽之會可灸三壯針入三分或云禁灸

頰膠二穴面鳩骨下廉銳骨端陷中手少陽太陽之會針入三分

右面第四行直目銳眥後下頰骨下廉四穴手足少陽

頭維二穴在額角入髮際本神旁一寸五分足少陽陽明脉之會針入二分禁灸

禾膠二穴在耳銳髮下橫動脉手少陽脉氣所發針入七分可灸三壯

客主人二穴在耳前起骨上廉開口有空動脉宛宛中足

六營經目卷八

九

陽明少陽之會可灸七壯若針必側臥張口取之禁針深上關若刺深令人欠而不得故下關若久留針即欬而不

得欠牙關急耳門二穴在耳前起肉當耳缺者針入三分留三呼可灸三壯

聽會二穴在耳前陷中上關下一寸動脉宛宛中張口得之手少陽脉氣所發針入七分留三呼可灸五壯至二七壯止

下關在客主人下耳前動脉下廉合口有空開口即閉閉口有穴足陽明少陽之會針入四分不可灸

右側面部在耳前十二穴頭維骨上禾膠客主人欠之

耳門又次之聽會又次之下關右下

聽宮二穴在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽三

脉之會針入三分可灸三壯

右側面部在耳中二穴

頰車二穴在耳下曲頰端近前陷中足陽明脉氣所發側臥開口取之針入四分灸七壯至七七壯止

右側面部在耳下者二穴

頸項部天突一穴在頸結喉下四寸宛宛中陰維任脉之會針五分留三呼得氣即瀉灸三壯

右頸項中一穴

人迎二穴在頸大脉動應手夾結喉兩旁一寸五分仰而取之以候五臟氣足陽明脉氣所發不可灸針入四分針過深則殺人

水突二穴在頸大筋前直人迎下氣舍上足陽明脉氣所發針入三分可灸三壯

六營經目卷八

辛

氣舍二穴在頸直人迎下天突陷中足陽明脉氣所發針入三分可灸五壯

右頸項第二行六穴

扶突二穴在人迎後一寸五分手陽明脉氣所發可灸三壯針入三分針經云在氣舍後一寸五分

天鼎一穴在頸缺盆氣舍後一寸半直扶突曲頰下手陽明脉氣所發可灸三壯針入三分

右頸項第三行四穴

天窓二穴在頸大筋前曲頰下俠扶突後動脉應手陷中手太陽脉氣所發針入三分可灸三壯

右頸項第四行二穴

天容二穴在耳下曲頰後手太陽脉氣所發針入一寸可灸三壯



右頸項第五行二穴

天牖二穴在頸筋間缺盆上天容後天柱前完骨下髮際  
上手少陽脉氣所發針入一寸留七呼不宜補亦不宜灸

右頸項第六行三穴

天柱二穴見正頭部

右頸項第七行二穴

風府一穴見正頭部

右項中央一穴

有部膈會二穴在肩前廉去肩頭三寸宛宛中手少陽陽維之  
會針入七分留三呼灸七壯

肩髃二穴在肩端凸骨間陷宛宛中舉臂取之手陽明  
筋之會針入六分留六呼可灸七壯至二十七壯若灸偏風  
七七壯不宜多灸恐手臂細若風病筋骨無力久不瘥者

大醫綱目卷八

三

當灸不畏細也

缺盆二穴一名天盖在肩上橫骨陷中針入三分不宜太

深使人逆息可灸三壯

右肩前廉六穴膈會極外肩髃次之缺盆極裏

肩髃二穴在肩端膈上陷中針舉臂取之針七分可灸三

壯

巨骨二穴在肩尖端上行兩叉骨罅間陷中手陽明陽蹻

之會針入一寸半可灸三壯

肩井二穴在肩上陷缺盆上大骨前一寸半以三指按取

之當中指下陷中手足少陽陽維之會針入五分灸七壯

乘風二穴在肩小髃骨後舉臂有空處手太陽陽明手

足少陽之會針入五分可灸五壯

天膠二穴在肩缺盆中上髃骨之際陷中央手少陽陽維

之會針入八分可灸三壯

右肩有上廉自肩髃至此十穴有膠極外巨骨次之肩井  
又次之乘風又次之天膠極在裏

膈俞二穴在肩髃後大骨下髀上廉陷中手足太陽陽維  
陽蹻之會舉臂取之針入八分可灸三壯

肩貞二穴在肩曲髀上兩骨解間有髃後陷中針入八分  
可灸三壯

天宗二穴在乘風後大骨下陷中手太陽脉氣所發針入  
五分留六呼可灸五壯

曲桓二穴在肩中央曲髀陷中按之應手痛針入五分可  
灸三壯

肩外膈在肩甲上廉去脊三寸陷中針入六分可灸三壯  
有中膈在肩甲內廉去脊二寸陷中針入三分留七呼可

大醫綱目卷八

三

灸三壯

右肩後廉十二穴膈膈有真極外天宗曲桓次之外膈

中膈極裏

廉部淵腋二穴在腋下三寸宛宛中舉臂取之刺入三分不宜

灸灸之不幸令人生腫蝕馬瘍內潰者死寒熱者生馬瘍

可治

大包二穴在淵腋下三寸脾之大絡布胃脇中出九肋間

針入三分可灸三壯

輒筋二穴在腋下三寸復前行一寸着脇足少陽脉氣所

發針入六分可灸三壯

天池二穴在乳後一寸腋下三寸着脇直腋腋肋間手厥

陰足少陽脉之會針入三分灸三壯

右側腋八穴



大杼一穴在項後第一椎下陷中手足三陽督脉之會針入五分留三呼瀉五吸若灸以年為壯  
 陶道一穴在大椎節下間俯而取之督脉足太陽之會可灸五壯針入五分  
 身柱一穴在第三椎節骨下俯而取之督脉氣所發針入五分灸七七壯  
 神通一穴在第五椎節下間俯而取之督脉氣所發針入五分留五呼可灸三壯  
 靈臺一穴在第六椎節下間俯而取之督脉氣所發療病法出素問  
 至陽一穴在第七椎節下間俯而取之督脉氣所發針入五分可灸三壯  
 筋縮一穴在第九椎節下間俯而取之督脉氣所發針入五分可灸三壯  
 脊中一穴一名神宗在第十一椎下間俯而取之督脉氣所發針入五分不可灸  
 懸樞一穴在第十三椎節下間伏而取之針入三分可灸三壯  
 命門一穴在第十四椎節下間伏而取之針入五分灸三壯  
 右背部中行自項中央直脊至命門穴與臍相對十穴命門與臍相對若取可正身立用一杖自地量至臍截斷却移向後量脊枕頭截處是穴也  
 陽關一穴在第十六椎節下間坐而取之針入五分灸三壯  
 腰膪一穴在二十一椎節下間宛宛中以挺伏地舒身兩

手相重支額縱四體開然後巧取乃得其穴督脉氣所發針入八分留三呼瀉五吸灸可七壯至七七壯  
 長強一穴一名氣之陰邪督脉別絡在脊骶端足少陰少陽所結針入三分抽針以大痛為度其穴伏地而取之乃得可日灸三十壯至二百壯止  
 右背部中行自命門穴直脊下至尾間骨端三穴  
 大杼二穴在項後第一椎下兩旁相去各一寸五分陷中手足太陽之會針入五分可灸七壯  
 風門二穴在第二椎下兩旁相去各一寸五分督脉足太陽之會針入五分留七呼灸三壯  
 肺膪二穴在第三椎下兩旁相去各一寸五分足太陽脉氣所發針入三分留七呼灸百壯  
 厥陰膪二穴在第四椎下兩旁相去各一寸五分針入三分灸七壯  
 心膪二穴在第五椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留七呼禁灸  
 膈膪二穴在第七椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留七呼灸三壯  
 肝膪二穴在第九椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留六吸灸三壯  
 膽膪二穴在第十椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分灸三壯  
 脾膪二穴在第十一椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留七呼灸三壯  
 胃膪二穴在第十二椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留七呼灸隨年壯



二焦膈二穴在第十三椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入五分留七呼灸三壯

腎膈二穴在第十四椎下兩旁相去脊中各一寸五分與膈平針入三分留七呼灸隨年壯

大腸膈二穴在十六椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留六呼灸三壯

小腸膈二穴在十八椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留六呼灸三壯

膀胱膈二穴在十九椎下兩旁相去各一寸五分足太陽脈氣所發針入三分留六呼灸三壯

中膈內膈二穴在二十椎下兩旁相去各一寸五分俠脊起肉間針入三分留十呼灸三壯

白環膈二穴在二十一椎下兩旁相去各一寸五分足太陽脈氣所發針如腰戶法同挺杖伏地端身兩手指重支額縱息令皮膚俱緩乃取其穴針入五分得氣即先瀉如瀉多補之不宜灸

右背第二行去中行各一寸五分俠脊直下三十四穴上膠二穴在第一空腰踝下夾脊陷中足太陽少陽之絡針入三分可灸七壯

次膠二穴在第二空夾脊陷中針入三分可灸七壯甲乙云針入三分留七呼灸五壯

中膠二穴在第三空夾脊陷中足厥陰少陽所結之會針入二分留十呼可灸三壯甲乙云針入二分留十呼

下膠二穴在第四空夾脊陷中足太陰厥陰少陽所結之會針入二分留十呼灸三壯

會陽二穴在陰尾尻骨間兩旁督脈所發針入八分可灸

五壯

右背第二行自膈踝骨夾脊斜下四骨空八穴內經謂之八膠穴是也陰尾骨兩旁二穴

附分二穴在第二椎下附項內廉兩旁相去各三寸手足太陽也令正坐取之針入三分可灸五壯

魄戶二穴在第三椎下兩旁相去各三寸正坐取之足太陽脈氣所發針入五分宜久留針可灸七壯至百壯

膏肓膈二穴在第四椎下兩旁相去各三寸又法人正坐豎脊伸兩手以臂着膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從髀骨上角摸索至骨下頭其間當有凹肋之間灸中間從髀骨之裏去髀骨容側指許舉指去來筋間空處按之自覺牽引於肩中灸兩髀中一處至百壯多至三百壯當覺下髀轉然如水流之狀亦當有

所下若得痰疾則無所不下也如病人已困不能正坐當令側臥俛上臂令前取穴灸之又以右手從肩上升指頭所不及者是穴也左取亦然乃以前法灸之若不能正坐當伸兩臂令人俛兩髀骨使相離不爾即髀骨覆其穴灸之無驗此穴無病不治

神堂二穴在第五椎下兩旁相去各三寸正坐取之足太陽脈氣所發針入三分可灸五壯

譙謁二穴在肩膊內廉第六椎下兩旁相去各三寸正坐取之足太陽脈氣所發以手重按之病者言譙謁是穴針入六分留三呼可灸一十一壯

膈關二穴在第七椎下兩旁相去各三寸陷中正坐取之足太陽脈氣所發針入二分可灸五壯

魂門二穴在第九椎下兩旁相去各三寸陷中正坐取之

入醫學綱目卷八

三

入醫學綱目卷八

三

三



足太陽脉氣所發針入五分可灸五壯  
陽綱二穴在第十椎下兩旁相去各三寸陷中正坐取之  
足太陽脉氣所發針入五分可灸五壯  
意舍二穴在第十一椎下兩旁相去各三寸陷中正坐取  
之足太陽脉氣所發針入五分灸五十壯至百壯  
胃倉二穴在第十二椎下兩旁相去各三寸足太陽脉氣  
所發針入五分可灸五七壯  
盲門二穴在第十三椎下兩旁相去各三寸义肋間經云  
與鳩尾相直足太陽脉氣所發針入五分可灸三十壯  
志室二穴在第十四椎下兩旁相去各三寸陷中足太陽  
脉氣所發針入五分可灸三壯  
包盲二穴在第十九椎下兩旁相去各二寸陷中伏而取  
之足太陽脉氣所發針入五分可灸五七壯

秩邊二穴在第二十椎下兩旁相去各五寸陷中伏而取  
之足太陽脉氣所發針入五分可灸三壯

右背第三行二十八穴

天突一穴在結喉下一寸宛宛中陰維任脉之會針入五  
分留三呼針宜橫下不得低可灸五壯  
璇璣一穴在天突下一寸陷中仰頭取之任脉氣所發針  
入三分灸五壯  
華蓋一穴在璇璣下一寸陷中仰頭取之任脉氣所發針  
入三分灸五壯  
紫宮一穴在華蓋下一寸六分陷中仰頭取之任脉氣所  
發針入三分半  
玉堂一穴在紫宮下一寸六分陷中任脉氣所發針入三  
分灸三壯

豐中一穴在玉堂下一寸六分橫直兩乳間陷中仰臥取  
之任脉氣所發禁穴不可針

右膺輪部中行自缺盆中間下至兩乳中間六穴  
中庭一穴在豐中下一寸六分陷中任脉氣所發針入三  
分可灸五壯

右膺輪部中行自兩乳中間下至鳩尾岐骨間一穴一  
膺腑二穴在巨骨下去璇璣旁各二寸陷中仰而取之足  
少陰脉氣所發針入三分灸五壯  
或中二穴在膺腑下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉  
氣所發針入四分灸五壯  
神藏二穴在或中下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉  
氣所發針入三分灸五壯  
靈墟二穴在神藏下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉  
氣所發針入三分灸五壯

神封二穴在靈墟下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉  
氣所發針入三分灸五壯  
步郎二穴在神封下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉  
氣所發針入三分灸五壯

右膺輪部第二行十二穴

氣戶二穴在巨骨下膺腑兩旁各二寸陷中仰而取之足  
陽明脉氣所發針入三分可灸五壯  
庫房二穴在氣戶下一寸六分陷中仰而取之足陽明脉  
氣所發針入三分灸五壯  
屋翳二穴在庫房下一寸陷中仰而取之足陽明脉氣所  
發針入三分灸五壯  
膺臆二穴在屋翳下一寸六分足陽明脉氣所發針入三



分灸五壯

乳中二穴當乳足陽明脈氣所發禁不可灸灸則生飢瘡瘡中有汁膿血可治瘡中有瘻肉若蝕瘡者死宜淺刺二分

乳根二穴當乳下一寸六分陷中仰而取之足陽明脈氣所發針入三分灸五壯

右膺輸第三行十二穴

雲門二穴在巨骨下俠氣戶旁各二寸陷中動脈應手手太陰脈氣所發針入二分若刺深令人氣逆可灸五壯

中府二穴乃肺之募在雲門下一寸乳上三肋間動脈應手足太陰之會針入三分留五呼可灸五壯

右膺輸第四行貼巨骨下一寸四穴中府二穴手足太陰會也雲門二穴手太陰也

大醫學綱目卷八

手

周榮二穴在中府下一寸六分陷中仰而取之足太陰脈氣所發針入四分灸五壯

胃鄉二穴在周榮下一寸六分陷中仰而取之足太陰脈氣所發針入四分

天谿二穴在胃鄉下一寸六分陷中仰而取之足太陰脈氣所發針入四分灸五壯

食竇二穴在天谿下一寸六分舉臂取之足太陰脈氣所發針入四分灸五壯

右膺輸第四行自巨骨下一寸下至腋八穴皆足太陰也

鳩尾一穴在前臆蔽骨下五分此穴大難針須大好手方可下針針入三分留三呼瀉五吸禁灸

巨闕一穴心之募也在鳩尾下一寸任脈氣所發針入六

分留七呼得氣即瀉灸七壯至七七壯

上腕一穴在巨闕下一寸五分去鳩尾下三寸任脈足陽明手太陽之會針入八分日灸二七壯

中腕一穴胃之募也在上腕下一寸五分手太陽少陽足陽明所主任脈之會上紀者中腕也針入八分留七呼瀉五吸灸二七壯

建里一穴在中腕下一寸針入五分留十呼可灸五壯

下腕一穴在建里下一寸足太陰任脈之會針入八分灸七壯至百壯

分水一穴在下腕下一寸膈上一寸任脈氣所發針入八分可灸七壯水病禁針針即成水蠱病死

神闕一穴當膈中是穴灸百壯禁針

大醫學綱目卷八

手

陰交一穴在膈下一寸任脈氣所發針入八分灸百壯

氣海一穴在膈下一寸五分任脈氣所發針入八分灸百壯

后門一穴在膈下二寸三焦之募也任脈氣所發灸二十壯

關元一穴在膈下三寸小腸之募也足太陰少陰厥陰三陰任脈之會下紀者關元也針入八分留三呼灸三壯至三百壯

中極一穴在關元下一寸膀胱之募也足三陰任脈之會針入八分留十呼灸五壯

曲骨一穴在橫骨上毛際陷中動脈應手任脈足厥陰之會針入二寸灸七壯至七七壯

右腹部中行自膈已下至橫骨六穴



會陰一穴一名屏翳在兩陰間任脉別絡腎脉衝脉之會  
可灸三壯

右腹部中行在兩橫骨下至兩陰之間一穴

幽門一穴挾巨關兩旁各五分衝脉足少陰之會針入五  
分可灸五壯

通谷一穴在幽門下一寸衝脉足少陰之會針入五分灸  
五壯

陰都二穴在通谷下一寸衝脉足少陰之會針入五分灸  
五壯

石關二穴在陰都下一寸衝脉足少陰之會針入一寸灸  
三壯

商曲二穴在石關下一寸衝脉足少陰之會針入一寸灸  
五壯

八腎經綱目卷八

三

盲膪二穴在商曲下一寸直膪旁五分衝脉足少陰之會  
針入三分灸五壯

中注二穴在盲膪下一寸衝脉足少陰之會針入一寸灸  
五壯

四滿二穴在中注下一寸衝脉足少陰之會針入五分灸  
三壯

氣穴二穴一名胞門一名子戶在四滿下一寸衝脉足少  
陰之會針入三分灸五壯

大赫二穴一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脉足少  
陰之會針入三分灸五壯

橫骨二穴一名下極在大赫下一寸衝脉足少陰之會針  
入一寸可灸三壯

右腹第二行二十二穴詳幽門下通谷上欠二穴

不容二穴在幽門兩旁各一寸五分去任脉二寸直四肋  
端足陽明脉氣所發針入五分灸五壯

承滿二穴在不容下一寸足陽明脉氣所發針入二分灸  
五壯

梁門二穴在承滿下一寸足陽明脉氣所發針入三分灸  
五壯

關門二穴在梁門下一寸足陽明脉氣所發針入三分灸  
五壯

太一、二穴在關門下一寸足陽明脉氣所發針入八分灸  
五壯

滑肉門二穴在太一下一寸足陽明脉氣所發針入八分  
灸五壯

天樞二穴大腸之募也在俠膺兩旁各二寸足陽明脉氣  
所發針入八分留七呼灸百壯

外陵二穴在天樞下一寸足陽明脉氣所發針入八分灸  
五壯

大巨二穴在外陵下一寸足陽明脉氣所發針入五分灸  
五壯

水道二穴在大巨下三寸足陽明脉氣所發針入二寸五  
分灸七壯

歸來二穴在水道下二寸足陽明脉氣所發針入八分灸  
五壯

氣衝二穴在歸來下鼠臑上一寸動脉應手宛宛中足陽  
明脉氣所發可灸七壯艾炷如大麥大禁針

右腹第三行二十四穴

期門二穴肝之募也在不容旁一寸五分直兩乳第二肋



端足太陰厥陰維之會針入四分可灸五壯

日月二穴膽之募也在期門下五分隔中足太陰少陽陽維之會針入七分可灸五壯

腹衰二穴在日月下一寸半足太陰陰維之會針入五分灸五壯

大橫二穴在腹衰下二寸五分直膈旁足太陰陰維之會針入七分灸五壯

腹結二穴在大橫下一寸三分一名腹屈針入七分灸五壯

府舍二穴在腹結下三寸足太陰陰維厥陰之會此三脉上下入腹絡肝脾結心肺從脇上至肩此太陰鄰三陰陽明之別針入七分灸五壯

衝門二穴上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約文中動

脉足太陰厥陰之會刺入七分灸五壯

章門二穴脾之募也在大橫外直膈季脇端側臥屈上足伸下足舉臂取之足厥陰太陽之會針入六分灸百壯

帶脉二穴在季脇下一寸八分針入六分灸五壯

五樞二穴在帶脉下三寸一云在水道旁一寸五分針入一寸灸五壯

維道二穴在章門下五寸三分足少陽帶脉之會針入八分灸五壯

居膠二穴在章門下八寸三分監骨上陷中陽蹻足少陽之會針入八分灸三壯

京門二穴腎之募也一名氣府在監骨下腰中挾脊季肋

下一寸八分針入八分留七呼可灸三壯

右腹第六行二穴 少商二穴 魚際二穴 大淵二穴 俱見前

右大指內側至寸口動脉六穴 孔最二穴去腕上七寸手太陰之郄針入三分灸五壯

經渠二穴 尺澤二穴 俱見前 右寸口動脉循臂內上骨下廉至肘中六穴

中衝二穴 勞宮二穴 俱見前 右中指內廉至掌心四穴

內關二穴在掌後兩筋間去腕二寸手心主絡別走少陽針入三分可灸三壯

郄門二穴在掌後去腕五寸手厥陰郄針入三分可灸五壯

大陵二穴 間使二穴 曲澤二穴 俱見前 右掌後循臂內兩筋間至肘內廉十穴

黃帝曰手少陰之脉獨無倫何也岐伯曰少陰心脉也心者五藏六府之大主也精神之所舍也其藏堅固邪弗能容也容之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在於心之包絡包絡者心主之脉也故獨無倫焉黃帝曰少陰獨無倫者不病乎岐伯曰其外經病而藏不病故獨取其經於掌後銳骨之端其餘脉出入屈折其行之徐疾皆如手少陰心主之脉行也邪客

少衝二穴木也一名經始在小指內廉端去爪甲角如韭葉手少陰脉之所出也為井針入一分可灸三壯

少府二穴火也在小指本節後陷中直勞宮手少陰脉之所流也為榮針入二分灸七壯

少澤二穴木也在小指末節後陷中直少澤手少陰脉之所流也為榮針入二分灸七壯

少澤二穴木也在小指末節後陷中直少澤手少陰脉之所流也為榮針入二分灸七壯

少澤二穴木也在小指末節後陷中直少澤手少陰脉之所流也為榮針入二分灸七壯



右小指內廉至掌後廉四穴

神門二穴土也皆掌後銳骨之端陷中手少陰脈之所經也為俞針入三分留七呼灸七壯

陰郄二穴在掌後脈中去腕五分手少陰郄針入三分灸七壯

通里二穴在腕後一寸針入三分灸三壯

靈道二穴金也在掌後一寸五分手少陰脈之所行也為經針入三分可灸三壯

少海二穴水也在肘內大骨外去肘端五分手少陰脈之所行也為合針入三分灸七壯

右掌後銳骨端直臂內廉至肘內廉十穴

關衝二穴 液門二穴 中渚二穴 陽池二穴俱見前 右第四指外間至手表腕八穴

八醫經卷八

外關二穴手少陰絡在腕後二寸陷中針入三分留七呼灸三壯

會宗二穴在腕後三寸空中針入三分灸三壯

三陽絡二穴在臂上大交脈支溝上一寸灸七壯禁針

四瀆二穴在肘前五寸外廉陷中針入六分留七呼灸三壯

支溝二穴 天井二穴俱見前

右臂外兩骨之間至肘十二穴 商陽二穴 二間二穴 三間二穴 合谷二穴俱見前

右大指次指上廉至合谷兩歧骨間八穴 列缺二穴去腕側上一寸五分以手交叉中指末筋骨缺

中手太陰絡別走陽明針入二分留三呼灸七壯 偏歷二穴手陽明絡別走太陰在腕中後三寸針入三分

留七呼灸三壯

溫溜二穴在腕後小士五寸大士六寸手陽明郄針入五分可灸三壯大人小兒也

下廉二穴在輔骨下去上廉一寸斜針入五分留五呼灸三壯

上廉二穴在三里下一寸其分獨抵陽明之會針入五分灸五壯

三里二穴在曲池下二寸按之肉起銳肉之端針入二分可灸三壯

肘膠二穴在肘大骨外廉陷中針入三分灸三壯

陽溪二穴 曲池二穴俱見前 右腕上側兩筋間循臂上廉至肘後曲縫尖十八穴

八醫經卷八

少澤二穴 前谷二穴 後溪二穴 腕骨二穴

陽谷二穴俱見前 右小指外側至腕中十穴

養老二穴在手踝骨上一空腕後一寸陷中手太陽之郄針入三分灸五壯

支正二穴在腕後五寸手太陽絡別走少陰針入三分灸三壯

少海二穴俱見前

右臂骨下廉至肘內側肉骨之間六穴 挾白二穴在天府下去肘五寸動脈中針入三分可灸五

壯 天府二穴在腋下三寸臑臂內廉動脈中針入四分留三呼不可灸

右肘內約文中動脈直上腋中之前動脈四穴



天泉二穴一名天溫在曲腋下臂二寸舉臂取之針入六分灸三壯

右肘內曲澤穴直上腋中二穴

青靈二穴在肘上三寸舉臂取之灸七壯

極泉二穴在臂內腋筋間動脈入骨針入三分灸七壯

右肘內廉少海穴直肱內後廉四穴

清冷淵二穴在肘上三寸伸肘舉臂取之針入三寸灸三壯

消灤二穴在肩下臂外間腋斜肘分下行針入六分灸三壯

右肘骨上兩筋間天井穴至肩端四穴

五里二穴在肘上三寸行向裏大脈中央灸十壯禁針

臂臑二穴在肘上七寸臑內端手陽明絡針入三分灸三壯

右曲池穴直上肩骨前廉四穴 肘內側兩骨間直上

肩端後肘太陽脈無穴

公孫二穴在足大指本節後一寸別走陽明足太陰絡針入四分灸三壯

隱白二穴 大都二穴 太白二穴 商丘二穴俱見前

右大指內側至內踝前廉十穴

大敦二穴 行間二穴 太衝二穴 中封二穴俱見前

右大指外間至內踝前一寸八穴

厲兌二穴 內庭二穴 陷谷二穴 衝陽二穴

解溪二穴俱見前

右第二指外間至腕上十穴

地五會二穴在足小指次指本節後陷中去俠溪一寸針

入二分不可灸之令人瘦不出三年死

發陰二穴 俠溪二穴 臨泣二穴 丘墟二穴俱見前

右第四指外間至外踝之前十穴

申脈二穴陽蹻所生在外踝下陷中容爪甲白肉際針入五分留六呼灸三壯

金門二穴在足外踝下足太陽之郄陽維所別屬也針入一分灸三壯

僕參二穴在跟骨下陷中拱足得之足太陽陽蹻上二脈之會針入三分灸七壯

至陰二穴 通谷二穴 束骨二穴 京骨二穴

崑崙二穴俱見前

右小指外側至外踝之後一十六穴

照海二穴陰蹻所生在足內踝下令患人穩坐足底相對

赤白肉際陷中針入三分灸三壯

水泉二穴足少陰郄去太溪一寸在足內踝下針入四分灸五壯

太衝二穴在足跟後衝中別走太陽足少陰絡針入二分留七呼灸三壯

湧泉二穴 然谷二穴 太溪二穴俱見前

右足心斜至內踝之後一十二穴

蠡溝二穴在足內踝上五寸別走少陽足厥陰絡針入二分留三呼灸三壯

中都二穴一名中都都在內踝上七寸胛骨中與少陰相直針入三分灸三壯

右內踝前一寸上踝至八寸足厥陰脈四穴

地機二穴一名脾舍足太陰之郄在膝下五寸針入三分



可灸三壯

血海二穴在膝膕上內廉白肉際二寸半針入五分灸三壯

壯

箕門二穴在魚腹上越筋間陰股內動脈應手經云股上起筋間針入三分留六呼灸三壯

陰陵泉二穴見前

右內踝上八寸循脛骨後上膝股內前廉足太陰脈入

穴 三陰交二穴在足內踝上三寸骨下陷中足太陰厥陰少陰之會針入三分灸三壯

漏谷二穴一名大陰絡在足內踝上六寸骨下陷中針入五分灸三壯

右內踝前廉上踝至八寸足太陰脈四穴

膝關二穴在犢鼻下二寸旁陷中針入四分灸五壯

陰包二穴在膝上四寸股內廉兩筋間針入六分灸三壯

五里二穴在陰廉下去氣衝下三寸陰股中動脈應手針入六分灸五壯

陰廉二穴在羊矢下去氣衝下二寸動脈中針入八分灸三壯

曲泉二穴見前

右內踝上八寸上脛內廉循踝至腹足厥陰脈十穴

交信二穴在足內踝上二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄針入四分留五呼灸三壯

築賓二穴在內踝上膕分中陰維之郄針入三分灸五壯

陰谷二穴 復溜二穴見前

右內踝之後直端至骨內廉上股內後廉八穴

懸鐘二穴在足外踝上三寸動脈中足三陽之大絡接之

陽明脈絕乃取之針入六分留七呼灸五壯即絕骨穴

光明二穴在足外踝上五寸別走厥陰足少陽絡針入六分留七呼灸五壯

外丘二穴在足外踝上七寸足少陽少陽所至針入三分灸三壯

陽交二穴在足外踝上七寸斜屬三陽分肉間針入六分留七呼灸三壯

陽陵泉二穴 陽輔二穴俱見前

右外踝之前至絕骨端上外輔骨前十二穴

陽關二穴在陽陵泉上三寸犢鼻外陷中針入五分禁灸

中犢二穴在髌骨外膝上五寸分肉陽陷中針入五分留七呼灸五壯

環跳二穴在髌骨中側臥伸下足屈上足取之針入一寸留十呼灸五十壯

右外輔骨前上膝解外廉六穴

豐隆二穴在外踝上八寸下脛外廉陷中別走太陰足陽明絡針入三分灸三壯

條口二穴在上脛上一寸舉足取之針入五分灸三壯

犢鼻二穴在膝膕下脛骨上骨解大筋中針入六分灸三壯

巨虛下廉二穴 三里二穴俱見前

右髌骨外廉至膝膕一十二穴

梁丘二穴在膝上二寸兩筋間足陽明之郄針入三分灸三壯

陰市二穴在膝上三寸伏兔下陷中拜而取之針入三分



留七呼禁灸

伏兔二穴在膝上六寸起肉正跪正坐而取之一云膝蓋上七寸針入五分禁灸

髀關二穴在膝上伏兔後交文中針入六分灸三壯

右膝膕中直伏兔上至氣衝八穴

附陽二穴在足外踝上三寸陽踠之郄太陽前少陽後筋骨間針入五分

飛陽二穴在外踝上七寸針入三分灸三壯

承山二穴在腓腸下分肉間陷中針入七分灸七壯

承筋二穴在腓腸中央陷中灸三壯不可針

合陽二穴在膝約文中中央下二寸針入六分灸五壯

委中二穴見前

右外踝之後直臑至臑中一十二穴

醫學綱目卷之八

聖

浮郄二穴在委陽上一寸展膝得之針入五分灸三壯

委陽二穴見前

右臑外廉四穴

殷門二穴在肉郄下六寸針入五分留七呼灸三壯

承扶二穴在尻臂下股陰上約文中針入二分灸三壯

右臑中直臑後廉至尻四穴

臑間同寸法者曰以中指大指相屈如環取內側交兩

角為寸

右臂漢卿取中指內側為同身寸者大法也若取頭部

膺膕部腹部同身寸又各有活法不可執一也 其頭

部法前髮際至後髮際通長一尺二寸取法以軟篾直

鼻從前髮際貼肉量至後髮際截之即將此篾折為十

二分度則其十二分度之一分乃頭部同身寸之一寸

也 其膺膕部法自天突穴至臑中穴通長六寸八分取法亦以軟篾從缺盆中間天突穴宛宛中貼肉量至直兩乳中間膕中穴截之折為六分八釐度則其六分八釐度之一分乃膺膕部同身寸之一寸也 其腹部法自鳩尾至臑下通長八寸取法亦以軟篾從鳩尾蔽骨端貼肉量至臑中央截之折為八分度則其八分度之一分乃腹部同身寸之一寸也量腹部同身時宜正臥針灸亦然

醫學綱目卷之八

聖

醫學綱目卷之八



醫學綱目卷之九

陰陽臟腑部

調攝宜禁 用藥宜禁 刺禁 灸禁

大法

醫事不能嚴不能動神外為柔弱亂至失常病不能移則

凡陰陽之要陽密乃固兩者不和若春無秋若冬無夏因

而和之是謂聖度故陽強不能密陰氣乃絕陰平陽秘精

神乃治陰陽雜決精氣乃絕全文見五臟

素春夏養陽秋冬養陰以從其根故與萬物沉浮於生長

之門逆其根則伐其本壞其真矣四氣調

因陽有餘陰不足論○人受天地之氣以生天之陽氣為

氣地之陰氣為血故氣分常有餘血分常不足何以言之

天地為萬物父母天大也為陽而運於地之外地居天之

中為陰天之氣舉之日實也亦屬陽而運於月之外月

缺也屬陰稟日之光以為明者也人身之陰氣其消長視

月之盈缺故人之生也男子十六歲而精通女子十四歲

而經行是有形之後猶有待於乳哺水穀以養陰氣始成

而後可與陽氣為配方能成人而為人之父對古人必近

至三十二而後嫁娶可見陰氣之難於成而古人之善

於攝養也禮記註曰惟五十而後養陰者有以加內經曰

年四十陰氣自半起居衰矣又曰男子六十四歲而精絕

女子四十九歲而經斷夫以陰氣之成止供給得三十年

之視聽言動已先虧矣夫人之情慾無涯以此難成易虧

之陰氣若之何而可以縱恣也經曰陽者天氣也主外陰

者地氣也主內故陽道實而陰道虛又曰至陰虛天氣絕

至陽盛地氣不足虛與盛之所在非吾之過論也蓋主閉

藏者腎也司疎洩者肝也二臟皆有相火而其系上屬於

心心君火也為物所感則易動心動則相火亦動動則精

自走相火翕然而起雖不交會亦暗流而疎洩矣所以聖

賢只是教人收心養心其旨深矣天地以五行更迭衰旺

而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月屬巳五月

屬午為火大旺火為肺金之夫火旺則金衰六月屬未為

土大旺土為水之夫土旺則水衰况腎水常藉肺金為母

以補助其不足故內經詳詳於資其化源也古人夏月必

獨宿而淡味兢兢業業愛護保養金水二臟正嫌火土之

旺爾內經又曰冬不藏精者春必病瘟十月屬亥十一月

屬子正火氣潛伏閉藏以養其本然之真而為來春發生

升動之本若於此時恣嗜慾以自戕賊至春升之際下無

根本陽氣輕浮必有溫熱之病夫夏月火土之旺冬月火

氣之伏此論一年之虛耳若上弦前下弦後月廓月空亦

為一月之虛大風大霧虹霓飛電暴寒暴熱日月薄蝕憂

愁忿怒驚恐悲衰醉飽勞倦謀慮動動又皆為一日之虛

若病患初退瘡癩正作尤不止於一日之虛而已今人多

有春未夏初患頭疼脚軟食少體熱仲景謂春夏劇秋冬

瘥而脉弦大者正世俗所謂注夏病也若犯此四者之虛

似難免此夫當壯年便有老態仰事俯育一切墮壞與言

至此深可驚懼古人謂不見所欲使心不亂夫以溫柔之

感於身聲音之感於耳顏色馨香之感於目鼻誰是鉄漢

心不為之動也唯善攝生者於此五箇月出居於外苟值

一月之虛亦宜暫遠帷幕各宜珍重保全太和期無負故

身之教幸甚

茹淡論○或問內經精不足者補之以味又曰地食人以

五味古者人年五十而食肉子今年過七十矣盡却鹽醢



豈中道乎何子之神茂而色澤也曰味有出於天賦者有  
成於人為者天之所賦者若穀菽果菜自然冲和之味有  
養人補陰之功此內經所謂味也人之所為者皆烹飪調  
和偏厚之味有致病伐命之毒此吾子所疑之味也今鹽  
醃之卻非直茹淡者夫麥與粟之醃粳米山藥之甘葱薤  
之辛之類皆味也子以為淡乎安於冲和之味者心之收  
火之降也以偏厚之味為安者欲之縱火之勝也何疑之  
有內經又曰陰之所生本在五味非天賦之味乎陰之五  
宮傷在五味非人為之味乎聖人防民之具於是為備凡  
人饑則必食彼稷米之甘而淡者土之德也物之為陰而  
最補者也惟可與某同進經以稷為充者恐於饑時頓食  
或慮過多因致胃損故以稷助其充足取其疏通而易化  
此天地生萬物之仁也論語曰肉雖多不使勝食氣又曰

本草綱目卷九

王

疏食菜羹又曰飯疏食飲水傳曰實主終日百拜而酒三  
行以避酒禍此聖人施教之意也蓋穀與肥鮮同進厚味  
得穀為助其積之也又寧不助陰火而致毒乎故服食家  
在卻穀者則可不卻穀而服食未有不被其毒者內經謂  
久而增氣物化之常氣增而久天之由也彼安於厚味者  
未之思爾或又問精不足者補之以味何不言氣補曰味  
陰也氣陽也補精以陰求其本也故補之以味若甘草白  
朮地黃澤瀉天門冬五味子之類皆味之厚者也經曰虛  
者補之正此意也上文謂形不足者溫之以氣夫為勞倦  
所傷則氣虛故不足溫者養也溫存以養之使氣自充氣  
充則形完矣故言溫不言補經曰勞者溫之正此意也彼  
為局方者不知出此凡諸虛損証悉以溫熱佐輔補藥名  
之曰溫補不能求經旨故也

房術

或曰千金方有房中補益法可用否予應之曰傳曰吉凶  
悔吝皆生於動故人之疾病亦生於動其動之極也病而  
死矣人之有生心為火居上腎為水居下水能升而火能  
降一升一降無有窮已故生意存焉水之體靜火之體動  
動易而靜難聖人於此未嘗忘言也儒者立教曰正心收  
心養心皆所以防此火之動於妄也醫者立教曰恬澹虛  
無補精養神亦所以遏此火之動於妄也蓋相火藏於肝  
腎陰分君火不妄動相火惟有稟命守位而已焉有燔灼  
之虐賦飛走之狂勢也哉易先取象於少女先說也遇少  
男艮為咸咸無心之感也艮止也房中之法有艮止之義  
也若艮而不止徒自戕賊何補益之有竊詳千金之意彼  
壯年貪縱者此水之體非向日之靜也故著房中之法為  
補益之取此可用於質壯心靜遇敵不動之人也有無聖

本草綱目卷九

四

賢之心神仙之骨未易為也女法水男法火水能制火一  
樂於與一樂於取此自然之理也若以房中為補殺人多  
矣况中古以下風俗日媮資稟日薄說夢向痴難矣哉  
候切○房中補益論  
醇酒冷飲論○醇酒之性大熱有大毒清香美味既過於  
口行氣和血亦宜於體由是飲者不自覺其過於多也不  
思肺屬金惟畏火又畏寒其體脆其位高為氣之主為腎  
之母木之夫酒下咽膈肺先受之若是醇酒理宜冷飲過  
於肺入於胃然後漸溫肺先得溫中之寒可以補氣一益  
也次得寒中之溫可以養胃二益也冷酒行遲傳化以漸  
不可恣飲三益也古人終日百拜不過三爵既無酒病亦  
無酒禍今予稽之於禮經則曰飲齊視冬時飲齊酒也視  
猶比也冬時寒也奈之內經則曰熱因寒用厥旨深矣今



則不然不顧受傷只圖取快蓋熱飲有三藥存焉腸滯通快喉舌辛美孟行可多不知酒性喜升氣必隨之痰鬱於上溺澀於下肺受賊邪金體必燥恣飲寒涼其熱內鬱肺氣得熱必大傷耗其始也病淺或嘔吐或自汗或瘡癩或鼻鼓或自泄或心脾痛尚可發散而去之若其久也為病深矣為消渴為內疔為肺痿為內痔為鼓脹為失明為哮喘為勞嗽為癩癩又為難名之疾倘非具眼未易處治可不謹乎人言一盞冷酒須兩盞血乃得行酒之不可冷飲也明矣此齊東之語也今參之於經證之以理發之為規戒子尚以為迂耶 賤體在病年餘而今秋又得痢者一月自揆不久終獲苟安蓋久病之後氣血銷損脂膏消散當此之時初感之証已退減惟諸虛百損在耳大凡藥雖參芪亦是毒物內經於藥字之下加毒字又加攻字天地

入醫學綱目卷九

五

間養人性命者惟穀耳備土之德得氣中和故其味淡甘而性和平大補而滲泄乃可久食而無厭是大有功於人者在藥則不然矣不肯得安全者自去秋得病餌藥至冬節日便不吃藥惟一味白粥不吃下飯雖鹽醬與醃醃清滴皆不入口此等淡味初亦其難自想此証必無他慮但思已過收放心自訟自責安心待死既自待死尚可吃粥猶有可生之理由是自解以死不愈於淡乎如此乃可打捱得過此時非淡不可以和此氣血氣血不和不足以復此生意不以死在而操此心以推抑其怒與妄想血氣雖欲復生不可得也詳玩來書此時無病可言矣曰煩躁曰喘急曰氣響曰腹痛曰咳嗽曰大腑澀曰小腑澀皆吾兄之所自求者平時為學不肯先求已過而克治之但欲妄得以遂其受用之私心至於染病之後又不能歸罪於已

思所以安其親之心而盡其子職之當然者方且操欲速之念以極其怨尤之痴所以怒火熾矣而况稟受急躁火中又火加之口味不節又起陰經之火至於奄奄延歲月陰且受火克所存者鮮矣惟有借殺氣以扶持所以未死其所以煩躁者厥隨火升也喘急者氣因火鬱而為痰在肺胃也氣響與痛或咳嗽者由食成積而愈盛也大腑澀者肺因火燥不行收令其大腸之門戶不得飲也小腑澀者血因火燥下焦無血氣不得降而滲洩之令不行也據高懷欲速之心便欲倚重於藥而掃除之殊不知此法不可行矣而此病有必安之理昔者孟子教滕君於齊人築薛以為滕之深計令其強為善而已矣者心也蓋他無良策有以禦齊之侵奪彼齊君者只亦欺我無君人之德爾以常人聽孟子之言非迂濶乎孟子之學出于孔子者也豈

入醫學綱目卷九

六

欺滕君哉凡之症有似乎此今之議藥為尤難欲攻則無病邪之實欲補又無的在之慮惟有減欲心斷絕口味使內靜外安陰氣自然以漸而復其自去冬至節直至今日不曾用刀圭之藥今已十月安好矣又病之後若欲以藥力推趨速效此是捱苗助長者也無可求之理內經諄諄言之而後人特未之思爾守禁忌東垣天病不守禁忌論○病而服藥須守禁忌孫真人千金方言之詳矣但不詳言所以守禁忌之由敢陳其約以為規戒夫胃氣者清純沖和之氣人之所賴以為生者也若謀慮神勞動作形苦皆然無節思想不遂飲食失宜藥餌違法皆能致傷既傷之後須用調補若恬不知性而乃恣意犯禁傷染之証尚未消退方生之証與日俱積吾見醫藥將日不暇給而傷敗之胃氣無復完全之望去死近



陰虛忌

矣方書云二人同患痢一人愈後自能食口大便而  
世俗以肉為補性之物肉無補性惟補陽而今之虛損者  
不在於陽而在於陰以肉補陰猶緣木而求魚何者肉性  
熱入胃便熱發熱便生痰痰多氣便不降而諸証作矣  
又病後可用作養胃氣蓋胃氣非陰氣不足以自全所以  
淡味為自養之良方尤當今之急着也食淡又須安心使  
內火不起可也

東垣養老論○人生至六十七以後精血俱耗平若無  
事已有熱症何者頭昏目眩肌痒溺數遺精牙落涎多寐  
少足弱耳聾健忘眩暈腸燥面垢髮脫眼花坐久兀睡未  
風先寒食則易飢笑則有淚但是老境無不有此或曰局  
方烏附丹劑多與老人為宜豈非以老年氣弱下虛理宜  
溫補今吾子皆以為為熱烏附丹不可施之老人何耶予曉

本草綱目卷九

七

之曰奚止烏附丹劑不可妄用至於好酒膩肉濕麵肉汁  
燒炙煨炒之類辛辣甜滑皆在所忌者或又曰甘旨養老  
經訓具在為子與婦甘旨不及孝道便虧而吾子之言若  
是其將有說以通之乎願聞其略予愀然應之曰正所謂  
道立行而不相悖者請詳言之古者井田之法行鄉閭之  
教其人知禮讓比屋可封肉食不及幼壯五十方纔食肉  
當時之人血氣冲和筋骨堅凝腸胃清厚甘旨養老何由  
致病今則不然幼小食肉強壯恣養比及五十疾已蜂起  
氣耗血竭筋柔骨痿腸胃壅滯涎沫充溢而况人身之陰  
難成易虧六七十後陰不足以配陽孤陽幾欲飛越因天  
生胃氣尚爾留連又籍水穀之陰羈縻而不走耳所陳前  
證皆是血少內經曰腎惡燥烏附丹劑非燥而何夫血少  
之人若防風半夏蒼朮但是燥劑且不敢多况烏附丹劑

本草綱目卷九

八

乎或者又曰一部局方悉是溫熱養陽吾子之言無乃繆  
妄乎予曰局方用燥劑為劫濕病也濕得燥則豁然而收  
局方用燥劑為劫虛病也補脾不補腎脾得燥則易化而  
食進下雖暫虛亦可少回內經治法亦許用劫正是此意  
蓋為質厚而病淺者謹此亦儒者用權之意若以為經常  
之法豈不大悞彼老年之人質雖厚此時亦近乎薄病雖  
淺其本亦易以撥而可用劫藥以取速効乎若夫形肥者  
血多形瘦者血實間或有可用劫藥者設或失手何以收  
救吾寧稍遲計出萬全豈不美乎烏附丹劑其不可輕餌  
也明矣至於飲食尤當謹節夫老人內虛脾弱陰虧性急  
內虛胃熱則易飢而思食脾弱難化則食已而再飽陰虧  
難降則氣鬱而成痰至於視聽言動皆成廢懶百不如意  
怒火易熾雖有孝子順孫亦是動徹扼腕况未必孝順乎  
所以物性之熱者炭火制作者氣之香辣者味之甘膩者  
皆不可食也明矣雖然腸胃堅厚福氣深壯者世俗觀之  
何妨奉養縱口固快一時積久必為災害由是觀之多不  
如少少不如絕爽口作疾厚味醋毒古人格言猶在人耳  
可不慎歟或曰如子之言殆將絕而不與於汝安乎予曰  
君子愛人以德小人愛人以姑息况施於所尊者哉惟飲  
與食將以養生不以致疾若以所養轉為所害恐非君子  
之所謂孝與敬也然則如之何則可曰好生惡死好安惡  
病人之常情為子與孫必先開之以義理曉之以物性旁  
譬曲諭陳說利害意誠辭確一切以敬順行之又須以身  
先之必將有所感悟而自無杆格之逆矣若子所謂絕而  
不與施於有病之時尤其是孝道若無病之時量酌可否以  
時而進某物不食以某物代之何傷於孝敬乎若夫平居



關話素無開導誘掖之言及至飢腸已鳴饑涎已動飲食在前馨香撲鼻其可禁乎經曰以飲食忠養之忠之一字恐與此意合請勿輕易看過予事老母固有愧於古者然母年踰七旬素多痰飲至此不作節養有道自謂有術只因大便燥結時以新牛乳豬脂和糜粥中進之雖得暫時滑利終是膩物積多次年夏時鬱為粘痰發為脇痞連月苦楚為人子者置身無地因此苦思而得節養之說時以小菜和肉煮進之且不敢多又間與參米補胃生血之藥加減遂得大腑不燥面色瑩紫雖瘦弱終是無病老境得健職此之由也因成一方用參米為君牛膝芍藥為臣陳皮茯苓為佐春加川芎夏加五味黃芩冬加當歸身倍生姜一日或一貼或二貼候其小水纔覺短少便進此藥小水之長如舊即是卻病捷法直到八十有七一且無

八醫學綱目卷九

九

病而死顏貌如生後到東陽因問老何安人性聰敏七十以後稍覺不快便却粥數日單服人參湯數貼而止後九十餘無疾而卒以其偶同故筆之以求是正  
東垣安養心神調治脾胃論○靈蘭秘典論曰心者君主之官神明出焉凡喜怒哀悲憂思恐懼皆損元氣夫陰火之熾盛由心生凝滯七情不安故也心者神之舍心君不守化而為火夫火者七神之賊也故曰陰火太盛經營之氣不能順養於神乃脉病也神無所養津液不行不能生血脉也人心之神真氣之別名也得血則生血生則脉旺脉者神之舍若心生凝滯七神離形而脉中惟有火矣善治斯病者惟在調和脾胃使心無凝滯或生懽欣或逢喜事或天氣暄和居溫和處或食滋味或見可欲事則慧然如無病矣蓋胃中元氣得舒伸故也

脾胃將理法○或方怒不可食不可大飽大飢飲食欲相接而溫和宜穀食多而肉食少不宜食肉汁忌寒濕物令肌肉不生陽氣潛伏四肢怠惰之症疼痛沉重時當濕雨則洩利大便後有白膿血痢或腸澀下血痛此乃諸陽氣不行陽道之故也 勞則陽氣衰宜乘車馬遊玩遇風寒則止 行住坐臥各得其宜不可至疲倦 日晴暖可以溫湯澡浴勿以熱湯令汗大出 勿困中飲食雖飢渴當先臥至不困乃食食後少動作 忌博奕勞心遇夜汗出宜避賊風 夜半收心靜坐少時此生發周身血氣之大要也 夜寢語言大損元氣須默默少時候周身陽氣行方可言語 忌浴當風汗當風須以手摩汗孔合方許見風必無中風中寒之疾 遇卒風暴寒衣服不能禦者則宜掙努周身之氣以當之氣弱不能禦而受之者死 遠

八醫學綱目卷九

十

行卒遇疫癘之氣飲酒者不病腹中有食者病空腹者死 白粥粳米菘豆小豆鹽豉皆滲利小便且小便數不可更利况大瀉陽氣反行陰道切禁濕麵如食之覺快勿禁 藥中不可服澤瀉茯苓燈心琥珀通草木通滑石之類皆瀉陽道行陰道也如濕小便不利或閉塞不通則服得利勿再服 忌大鹹助火邪而瀉腎水真陰及大辛味蒜韭五辣醋大料物官桂乾姜之類皆傷元氣 如衣薄而氣短則添衣於無風處居處如氣尚短則用沸湯一碗薰其口鼻即不短也 如衣厚而氣短則宜減衣摩汗孔令合于漫風處居止 如久居高屋或天寒陰濕所遇令氣短者亦如前法薰之 如居周密小室或大熱而處寒涼氣短者則出就風日凡氣短皆宜食滋味湯飲令胃調和 或大熱能食而渴喜寒飲當從權以飲之然不可



就嗜如冬喜熱飲亦依時暫飲 夜不安寢厚熱壅故也當急去之仍拭汗孔或薄而寒即加之睡自穩也 飢而睡不安則宜少食飽而睡不安則宜少行坐 遇天氣變更風寒陰晦宜預避之大抵宜溫暖避風寒省言語少勞役為上 若服升浮之藥先一日將理次日腹空方服服畢更宜將理十日先三日尤甚不然則反害也

風從南方來名曰大弱風其傷人也內舍於心外在於脈其氣主為熱全文見脈論病經諸所謂風者發於折木揚其氣主為熱沙起石開發脈理者也其從太乙所居之方來者為實風主生長萬物其從後來者為虛風主殺害傷人故聖人謹候虛風而避之惟能言今言風從南方來者夏不為實風太乙所居之方故也冬至為虛風從北方風首以其剛太乙者故也餘方虛風實風同義

風從西方來名曰剛風其傷人也內舍於脾外在於肌其氣主為燥立秋為實風春分為虛風

八醫經綱目卷九

土

風從西北方來名曰折風其傷人也內舍於小腸外在於手太陽脈絕則溢脈閉則結不通善暴死立冬為實風

風從北方來名曰大剛風其傷人也內舍於腎外在於骨與肩背之筋其氣主為寒冬至為實風

風從東方來名曰嬰兒風其傷人也內舍於肝外在於筋兩脇腋骨下及肢節立春為實風

風從東南方來名曰弱風其傷人也內舍於胃外藏於肌其氣主為濕春分為實風

此八風皆從其虛之鄉來乃能病人故聖人避風如避矢石焉

病禁 病在肝禁當風 病在心禁溫食熱衣 病在脾禁溫食飽食濕地濡衣 病在肺禁寒飲食與衣 病在腎禁犯

炸煖熱溫食炙衣全文見診病食刺○宜明五氣篇云心所惡而禁之也坤音對

靈肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸腎病禁甘肺病禁苦味

素五味所禁辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病無多食鹹苦走骨骨病無多食苦甘走肉肉病無多食甘酸走筋筋病無多食酸是謂五禁勿令多食宜明五 肝色青宜食甘稷米牛肉棗葵皆甘 心色赤宜食酸小豆犬肉李

韭皆酸 肺色白宜食苦麥羊肉杏雍皆苦 脾色黃宜食鹹大豆豕肉栗菴皆鹹 腎色黑宜食辛黃黍雞肉桃葱皆辛 辛散酸收甘緩苦堅鹹與毒藥攻邪五穀為養

八醫經綱目卷九

土

五果為助五畜為益五菜為充氣味合而服之以補精益氣此五者有辛酸甘苦鹹各有所利或散或收或緩或急或堅或與四時五臟病隨五味所宜也藏氣法時論○五藥以攻病邪五味之中和者則為散藥以助益其氣者則為藥

仲五臟病各有得者愈五臟病各有所惡各隨其所不喜者為病病者素不應食而反暴食之必發熱也

用藥宜禁

冊病雖實胃氣傷者勿便攻擊論○凡言治者多借醫為喻仁哉斯言也真氣民也病邪盜賊也藥石兵也或有盜起勢須剪除而後已良將良相必先審度兵食之虛實與時勢之可否然後動動涉輕妄則吾民先困於盜次困於兵民困則國弱矣行險僥倖小人所為萬象森羅果報昭顯其可不究心乎治呂氏寒厥用葛藟一法治葉先生滯下用參朮而後下之愈○一法治婦



人積塊用消石九火峻後用 大凡攻擊之藥有病則受  
補劑開服愈詳各見本門 之病邪輕藥力重則胃氣受傷夫胃氣者清純冲和之氣  
也惟與穀肉菜果相宜蓋藥石皆是偏勝之氣雖參芪輩  
爲性亦偏况攻擊之藥乎 忌春夏不宜桂枝秋冬不宜  
麻黃 藥忌已汗者不可再發已利者不可再利 病忌  
虛人不宜用涼實人不宜用熱

東垣止治病服藥必知時禁經禁病禁藥禁夫時禁者必  
本四時升降之理汗下吐利之宜大法春宜吐象萬物之  
發生耕耨斫斫使陽氣之鬱者易達也夏宜汗象萬物之  
浮而有餘也秋宜下象萬物之收成推陳致新而使陽氣  
易收也冬宜固密象萬物之閉藏使陽氣不動也夫四時  
陰陽者與萬物沉浮於生長之門逆其根伐其本壞其真  
矣用溫遠溫用熱遠熱用涼遠涼用寒遠寒無翼其勝也

六 醫學綱目卷九

三

故冬不用白虎夏不用青龍春夏不用桂枝秋冬不服麻  
黃不失氣宜如春夏而下秋冬而汗是失天信伐天和也  
有過則從權過則更之 經禁者足太陽膀胱諸陽之首  
行於背表之表風寒所傷則宜汗傳入本則宜利小便若  
下大早則變証百出此一禁也足陽明胃經行身之前病  
主腹滿脹大便難宜下之蓋陽明化燥火津液不能停禁  
若發汗利小便爲重損津液此二禁也足少陽膽經行身  
之側在太陽陽明之間病則往來寒熱口苦胸膈痛祇宜  
和解且膽者無出無入又主發生之氣下則犯太陽汗則  
犯陽明利小便則使發生之氣反陷入陰中此三禁也三  
陰非胃實不當下爲三陰無傳本須胃實得下也分經用  
藥有所據焉 病禁者如陽氣不足陰氣有餘之病則凡  
飲食及藥忌助陰瀉陽諸淡食及淡味藥物瀉陽升發以

藥禁

助收斂諸苦藥皆沉瀉陽氣之散浮諸苦附官桂辛熱之  
藥及濕麵酒大料物之類助火而瀉元氣生冷硬物能損  
陽氣皆所當禁也如陰火欲衰而退以三焦元氣未感必  
口淡如臍物亦所當禁也 藥禁者如胃氣不行內亡津  
液而乾渴求湯飲以自救非渴也乃口乾也非濕勝也乃  
而病也當以辛酸益之而淡滲五苓之類則所當禁也汗  
多禁利小便小便多禁發汗咽痛禁發汗利小便若大便  
快利不得更利大便秘澀以當歸桃仁麻子仁郁李仁皂  
角仁和血潤腸如燥藥則所當禁者也吐多不得復吐如  
吐而大便虛軟者此上氣壅滯以姜橘之屬宜之吐而大  
便不通則利大便藥所當禁也諸病惡瘡小兒癩後大便  
實者亦當下之而姜橘之類則所當禁也人知脈弦而服  
平胃散脈緩而服黃芪建中湯乃實實虛虛皆所當禁也

六 醫學綱目卷九

四

人稟天地之濕化而生胃也胃之與濕其名雖二其實一  
也濕能滋養于胃胃濕有餘亦當瀉其太過也胃之不足  
惟濕物能滋養仲景云胃陰思湯餅而胃虛食湯餅者往  
往增劇濕能助火火旺鬱而不通則生大熱初病火旺不  
可食濕以助火也察其時辨其經審其病而後用藥四者  
不失其宜則善矣

春忌下

丹天病虛脫本是陰虛用艾灸丹田者所以補陽陽生陰  
長故也不可用附子可多服人參  
垣春宣論○春蠢也陽氣升浮草木萌生蠢然而動人氣  
在頭有病宜吐又曰傷寒大法春宜吐宜之爲言揚也謂  
吐之法自上而出也今世俗往往有瘡痍者膈滿者蟲積  
者以爲不於春時宜瀉毒氣不可愈也醫者遂用牽牛巴  
豆大黃枳殼防風葶藶爲丸藥名之曰春宜丸於二月三月



服之謂俾下利而止初瀉之時臟腑得通時暫輕快殊不知氣升在上則在下之陰甚弱而用利藥戕賊真陰其害何可勝言况仲景承氣湯等下劑必有大瀉大堅其有燥屎轉矢氣下逼迫而無表証者方行此法可下之証悉具猶須遲以待之泄利之藥其可輕試之乎予伯考形肥骨瘦味厚性沉五十歲輕於聽信忽於三月半贖春宜丸服之下二三行甚快每年習以為常至五十三歲時七月初熱甚無病暴死此豈非妄用春宜為春瀉而至禍耶自上召下曰宣宣之一字為吐也明矣子和已詳論之昔賢豈妄言哉後之死者又有數人愚故表而出之以為後人之戒

夏曰伏陰在內論○天地以一元之氣化生萬物根於中者曰神機根於外者曰氣血萬物天地同此一氣人靈於

物形與天地參而為三者以其得氣之正而通也故氣升亦升氣浮亦浮氣降亦降氣沉亦沉人與天地同一橐籥也子月一陽生陽初動也寅月三陽生陽初出於地此氣之升也巳月六陽生陽盡出於上此氣之浮也人之腹屬地氣於此時浮於肌表散於皮毛腹中之陽虛矣經曰夏者經滿氣溢孫絡受血皮膚充實長夏氣在肌肉所以表實表實者裏必虛也世言夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰冷看其悞甚矣或曰以手捫腹明知其冷非冷而何前人治暑病有玉龍丹大順散桂苓九單黃良姜與縮脾飲用草果等皆溫熱之劑何吾子不思之甚也予曰經云春夏養陽王太僕謂春食涼夏食寒所以養陽也其意可見矣若夫涼薑水瀉大瀉風車陰木寒泉水果冰雪寒涼之傷自內及外不用溫熱病何由安詳玩其意實非

為內伏陰而用之也前哲又謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之若於夏月火令之時妄投溫熱寧免實虛虛之患乎或曰四月純陽於理或通五月一陰六月二陰非陰冷而何予曰此陰之初動於地下也四陽浮於地上燭灼焚燎流金礫石何陰冷之有孫真人製生肌散令人夏月服之非虛而何東垣經云一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾聖濟經曰陽劑剛勝積若燎原為消渴癰疽之屬則天癸竭而榮涸陰劑柔勝積若凝冰為洞泄寒中之屬則真火微而衛散故大寒大熱之藥當宜權用之氣平而止如寒熱有所偏勝令人臟氣不平嗚呼生死之機捷若影嚮殆不可忽

丹局方地榆散○治痢每用粟殼地榆而治瘧每用砒丹常山然此四五件亦痢瘧之一藥但以粟殼葷投之一二服投之不止反閉胃口而有嘔逆之証漸成禁口常山葷投之一二服投之不去反耗損真氣而寒熱纏綿之咎漸成勞瘵今局方水菴木香丸以青皮為君地榆散以枳殼為君稍可擔負亦須證明而後可但枳殼為君以枳實為臣非獨止痢且有安胃氣止瀉泄之功若止用枳殼雖亦言其安胃氣却無止瀉泄之功局方中地榆

羅仲景云瘡家雖身疼痛不可發汗其理何也予曰此榮氣不從逆於肉理而為瘡腫作身疼痛非身感寒邪而作疼痛故戒之以不可發汗如汗之則成瘡又問仲景言鼻衄者不可發汗復言脈浮緊者當服麻黃湯發之衄血自止所說不同願聞其故答曰此與瘡家藥同且夫人身血之與汗異名而同類奪血者無汗奪汗者無血今衄血妄行為熱所逼若更發其汗則反助熱邪重竭津液必變凶



証故不可汗若腠浮則為在表緊則為寒寒邪鬱遏陽不  
得伸熱伏管中迫血妄行上出於鼻則當麻黃湯散其寒  
邪使陽氣得伸其血自止又何疑焉或者嘆曰知其要者  
一言而終不知其要者流散無窮漢古之學可謂知其要  
者矣傷寒斷忌  
汗者微脈

海當汗而不汗則生黃當利小便而不利亦然脾主肌肉  
四肢寒濕與內熱相合故也 不當汗而汗亡其津液令  
毒氣擾陽之極極則侵陰矣故燥血而畜之胃中或利小  
便過多亦然○若犯發汗多畜血上焦為切若利小便多  
畜血為發狂 或問曰傷寒雜症一體若誤下變有輕重  
何也答曰傷寒誤下變無定體雜症誤下變有定體何以  
然曰傷寒自外而入陽也陽主動雜証自內而出陰也陰  
主靜動者犯之其變無窮靜者犯之其變止痞與腹脹痛

而已故變無窮者為重病痞與脇痛者為輕也  
羅無病服藥辨諺云無病服藥如壁裏安柱此無稽之說  
為害甚大夫天之生物五味備焉食之以調五臟過則生  
疾故經云陰之所生本在五味陰之五官傷在五味又曰  
五味入胃各隨其所喜故酸先入肝辛先入肺苦先入心  
甘先入脾鹹先入腎久而增氣氣增而又天之由也又云  
酸走筋辛走氣苦走骨鹹走血甘走肉五味者口嗜而欲  
食之必自裁制勿使過焉至於五穀為養五果為助五畜  
為益五菜為充氣味合而食之補精益氣倘用之不時食  
之不節猶或生疾况藥乃攻邪之物無病而可服乎聖濟  
經云彼修真者蔽於補養輕餌藥石陽劑剛勝積若燎原  
為消渴癰疽之屬則天癸絕而陰涸陰劑柔勝積若凝冰  
為洞泄寒中之屬則真火微而衛散一味偏勝一臟偏傷

一臟受傷四臟安得不病唐孫思邈言藥勢有所偏勝令  
人臟氣不平裴潏諫唐憲宗曰夫藥以攻病非朝夕嘗用  
之物况金石性酷烈有毒又加煉以火氣非人五臟所能  
禁至於張臯諫穆宗曰神慮淡則氣血和嗜欲多而疾疾  
作夫藥以攻疾無病不可餌故昌黎伯銘李予之墓曰余  
不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此  
其或也今直取目見親與之遊而以藥敗者六七公以為  
世誠工部尚書歸登殿中御史李虛中刑部尚書李益第  
刑部侍郎常建襄陽節度使工部尚書孟簡東川節度使  
御史大夫盧植金吾將軍李道古今又復取目見者言之  
僧開仲章服火煉丹砂二粒項出小瘡腫痛不任牙痒不  
能嚼物服涼膈散半斤始緩後飲酒撒藥以寒涼之劑  
則緩終身不愈鎮入李潤之身體肥盛恐生風疾至春服

搜風丸月餘便下無度飲食減少舌不知味口乾氣短膈  
腹脹足脛冷眩運欲倒面色青黃不澤日加困篤乃告親  
知曰妄服藥禍悔何及後添煩躁喘滿至秋而卒張秀  
才者亦聽方士之說服四生丸推陳致新服月餘大便或  
溇或瀉飲食妨阻怠惰嗜臥目見黑花耳聞蟬聲神虛頭  
旋飄飄然身不能支至是方知藥之悞也遂調飲食慎起  
居謹於保養二三年間其証猶存踰十年後方平復劉氏  
子聞人言臘月晨飲凉水一杯至春無目疾遂飲之旬餘  
腹中寒痛不任咳嗽嘔吐全不思食惡水而不欲見足脛  
寒而逆醫以除寒燥熱之劑急救之終不能效此皆無故  
求益生之祥反生病焉或至於喪身殞命壁裏安柱果安  
在哉且夫高堂大厦椽棟安基址固壞塗毀墜安柱壁中  
甚不近人情察古老人云無病服藥無事生事此誠不易



之論人之養身幸五臟之安泰六腑之和平謹於攝生春  
夏奉以生長之道秋冬奉以收藏之理飲食之有節起居  
而有常少思寡慾恬淡虛無精神內守此無病之時不藥  
之藥也噫彼數人者既往不咎矣後人當以此為龜鑑哉  
仲陰盛陽虛不宜下辨○陰盛陽虛汗之則愈下之則死  
此言邪氣在表之時也夫寒邪屬陰身之外皆屬陽各臟  
腑之經絡亦屬陽也蓋陽氣為衛衛氣者所以溫肌肉充  
皮毛肥腠理司開闔此皆衛外而為固也或煩勞過度陽  
氣內損不能為固陽為之虛陽虛者陰必湊之故陰得以  
勝邪氣勝則實陰盛陽虛者此也陰邪既勝腠理致密陽  
氣伏鬱不得通暢所以發熱惡寒頭項痛腰脊強應解散  
而藥用麻黃者本草云輕可去實葛根麻黃之屬是也蓋  
麻黃能退寒邪使陽氣伸越作汗而解故曰陰盛陽虛汗

六 醫學綱目卷九

九

之則愈裡氣和平而反下之中氣既虛表邪乘虛而入由  
是變症百出故曰下之則死外臺秘要云表病裏和汗之  
則愈下之則死正此意也

仲陽盛陰虛不宜汗辨○陽盛陰虛下之則愈汗之則死  
此言邪氣在裏之時也夫寒邪始傷於表不解而漸傳入  
於裏變而為熱人之身在裏者為陰華陀云一日在皮二  
日在膚三日在肌四日在胃五日在腹六日入胃入胃謂  
之入腑也腑之為言聚也若府庫而聚物焉又為水穀之  
海榮衛之源邪氣入於胃而不復傳流水穀水穀不消去  
鬱而為實也此陽盛陰虛者此也故潮熱引飲腹滿而喘  
手足熱漿汗出大便難而語宜大承氣湯下之則愈潮  
熱者實也此外已解可攻其裏而反汗之表無陰邪汗又  
助陽陽實而又補表表裏俱熱不死何待外臺秘要云表

和裏病下之則愈汗之則死正此意也

汗多亡陽○齊大兄冬月因感寒邪頭項強身體痛自用  
酒服靈砂丹四五粒遂大汗出汗後身輕至夜前病復來  
以前藥復汗其病不愈復以通聖散發汗病添身體沉重  
足脛冷而惡寒是日方命醫醫者不究前治又以五積散  
汗之翌日身重如石不能反側足脛如冰冷及腰背頭汗  
如貫珠出而不流心胸燥熱煩亂不安喜飲西瓜梨柿水  
水之物常置左右病至於此命予治之診得六脉如蛛絲  
微微欲絕予以死決之主人曰得汗多矣焉能為害予曰  
夫寒邪中人者陽氣不足之所致也而感之有輕重治之  
者豈可失其宜哉仲景云陰盛陽虛汗之則愈汗者助陽  
退陰之意也且寒邪不能自汗必待陽氣泄乃能出也今  
以時月論之大法夏月宜汗然亦以太過為戒况冬三月

六 醫學綱目卷九

辛

閉藏之時無擾乎陽無泄皮膚使氣亟奪為養藏之道也  
逆之則少陰不藏此冬氣之應也凡有觸冒宜微汗之以  
平為期邪退乃已急當衣煖衣居密室服實表補衛氣之  
劑雖有寒邪弗能為害此從權之治也今非時而大發其  
汗乃謂之逆故仲景有云一逆尚引日再逆促命期今本  
傷而并汗汗而復傷傷而復汗汗出數四使氣亟奪衛氣  
無守陽泄於外陰乘於內故經云獨陽不生獨陰不長不  
死何待雖虛痛亦不能治也是日至夜將半項強身體不  
仁手足搐急瓜甲青而死矣金匱要畧云不當汗而妄汗  
之奪其津液枯槁而死今當汗之一過中亦絕其命况不  
當汗而強汗之者乎

下多亡陰○真定趙客乙丑歲六月間客於他方因乘困  
傷濕麵心下痞滿燥熱時作臥不得安遂宿於寺中僧妄



以大毒食藥數十餘行心瘁稍減越日困睡為盜劫其財貨心有所動遂燥熱而渴飲冷水一大既夜膈腹脹痛僧再以前藥復下十餘行病加困篤四肢無力燥熱身不停衣喜飲冷水米穀不化痢下如爛魚腸腦赤水相雜全不思食強食則嘔痞甚於前噫氣不絕足脣冷少腹不任其痛請予治之診其脈浮數八九至按之空虛予泝流而尋源蓋暑天之熱已傷正氣又以有毒大熱之劑下之一下之後其所傷之物已去而無遺矣遺巴豆之氣流毒於腸胃之間使嘔逆而不能食胃氣轉傷而然及下膿血無度大肉陷下皮毛枯槁脾氣弱而衰也舌上赤澁咽乾津液不足下多亡陰之所致也陰既亡心火獨旺故心胃燥熱煩亂不安經曰獨陽不生獨陰不長天之由也遂辭而退後易他醫醫至不審其脉不究其源惟見痞滿以

六醫學綱目卷九

枳殼丸下之病添喘滿利下不禁而死金匱要畧云不當下而強下之令人開腸洞泄便溺不禁而死此之謂也夫聖人治病用藥有法不可少越內經曰大毒治病十去其六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病十去其九復以穀肉果菜食養盡之無使過之過則傷其正矣記有之云醫不三世不服其藥蓋慎之至也彼僧非醫流妄以大毒之劑下之太過數日之間使人殞身喪命用藥之失其禍若此病之擇醫可不謹乎戒之戒之方成勿約之失○丁巳冬十一月予從軍回至汴梁有伶人李人愛謂予曰大兒自今歲七月間因勞役渴飲涼茶及食冷飯覺心下痞請醫治之醫投藥一服下利兩行其症遂減不數日又傷冷物心腹復痞滿嘔吐惡心飲食無味且不飲食四肢困倦懶於言語復請前醫診視曰此病

易為更利幾行即快矣遂以無憂散對加牽牛末白湯服至夕腹中雷鳴而作陣痛少焉既吐又瀉煩渴不止飲食無度不復能禁時發昏憤再命前醫視之診其脉不能措手而退頃之冷汗如洗口鼻氣漸冷而卒矣小人悔恨無反敢以為問予曰未嘗親見不知所以然既去或曰予親見之果藥之罪歟而非歟予曰此非藥之罪乃失其約量之過也夫藥之無據反為氣賊內經云約方猶約囊也囊滿弗約則輸泄方成弗約則神與氣弗俱故仲景以桂枝治外傷風邪則曰若一服汗出病瘥停後服不必盡劑大承氣湯下大實大滿則曰得更衣止後服不必盡劑其慎如此此為大戒蓋得聖人約囊之旨也治病必求其本蓋李人以雜劇為戲勞神損氣而其中痛因時暑熱渴飲涼茶脾胃氣弱不能運化而作痞滿以藥下之是重困也加以不慎又損其陽虛而復傷傷而復下陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆內起仲景所謂一逆尚引日再逆促命期如是則非失約量之過而何故內經戒云上工平氣中工亂脉下工絕氣不可不慎也

八醫學綱目卷九

脫管忌瀉○疏五過論云常貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫管鎮陽一士人軀幹魁梧而意氣豪雄喜交遊而有四方之志年踰三旬已入仕至五品出入從騎塞途姬侍滿前飲食起居無不如意不三年以事罷去心思鬱結憂慮不已以致飲食無味精神日減肌膚漸至瘦弱無如之何遂耽嗜於酒久而中滿始求醫醫不審得病之情輕以丸藥五粒溫水送下二十餘行時值初秋暑熱猶盛因而煩渴飲冷過多遂成腸鳴腹痛而為痢疾有如魚腦以至困篤命予治之診其脉乍大乍小其症反覆悶亂元元



欲吐噴息不絕予料曰此病難治答云子云神屈故也以其貴之尊榮感之屈辱心懷慕戀志結憂惶雖不中邪病從內生血脈虛減名曰脫營或曰願聞其理黃帝針經有曰宗氣之道內穀為主穀入於胃乃傳入於脈流溢於中布散於外精專者行於經隧周而復始常營無已足為天地之紀故氣始從手太陰起注於陽明傳流而終於足厥陰循腹裏入缺盆下注肺中於是復注手太陰此營氣之所行也故晝夜氣行五十營漏水下百刻凡一萬三千五百息所謂交通者並行一數也故五十營備得盡天地之壽矣今病者始樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀阻暴喜傷陽暴怒傷陰喜怒不能自節蓋心為君主神明出焉肺為輔相主行營衛制節由之主貪人欲天理不明則十二官相使各失所司使道閉塞而不通由是則經營之氣

八醫綱卷九

五

脫去不能灌溉周身百脉失其天度形乃大傷以此養生則殃何疑之有

瀉火傷胃○經歷晉才卿膏梁而飲至春病軀醫曰諸見血為熱以清涼飲子投之即止越數日其疾復作醫又曰藥不勝病故也遂投黃連解毒湯既而或止而復作易醫數四皆用苦寒之劑俱欲勝其熱然終不愈而飲食起居浸不及初肌寒而時躁言語無聲口氣臭穢如冷風然其衄之餘波則未絕也或曰諸見血者熱衄熱也熱而寒之理也今不惟不愈而反害之何哉予言內經曰五臟以平為期又云下工絕氣不可不慎也彼惟知見血為熱而以苦寒攻之抑不知苦寒能瀉脾胃夫脾胃土也乃人身之所以為本者也今火為病而瀉其土火固未嘗除而土已病矣土病則胃虛胃虛則榮氣不能滋榮百脉元氣不

循天度氣隨陰化而變無聲與肌寒也噫粗工嗜嗜以為可治言熱未已寒病復起此之謂也

下工絕氣危生○丁巳予從軍至開州夏月有千戶高國用謂予曰父親年七十有三於去歲七月間因內傷飲食又值霖雨瀉痢暴下數行醫以藥止之不數日又傷又瀉止而復傷傷而復瀉至十月間肢體瘦弱四肢倦怠飲食減少腹痛腸鳴又以李醫治之處以養臟湯治之數日泄止後添嘔吐又易以王醫用丁香人參藜香橘紅甘草同為細末生薑煎數服而嘔吐止延至今正月間飲食不進扶而後起又數日不見大便予問醫曰父親不見大便何以治之醫曰老官人年過七旬血氣俱衰弱又况瀉痢半載脾胃久虛津液耗少以麻仁丸潤之可也眾親商議一親曰馮村牛山人見証不疑有果决遂請治之診其脉問

八醫綱卷九

五

其病曰此是風結也以搜風丸百餘丸服之利數行而死予悔恨不已敢以為問予曰人以水穀為本今高年老人久瀉胃中津液耗少又重瀉之神將何依靈樞經曰形氣不足病氣不足此陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅少者不復矣又曰上工平氣中工亂脉下工絕氣危生絕氣危生其牛山人之謂歟

用藥無據反為氣賊○北京按察書吏李仲寬年五旬至元巳巳春患風症半身不遂麻痺言語塞滯精神昏愒一友處一法用大黃半斤黑豆三升水一斗同煮豆熟去大黃新汲水淘淨每日服二三合則風熱自去服之過半又一友云用通聖散四物湯黃連解毒湯相合服之其效尤速服月餘精神愈困遂還真定歸家養病親舊獻方無數



不能悉錄又增瘡癰不能言氣冷手足寒命予診視細詢  
前由盡得其說予診之六脈如蛛絲細予謂之曰夫病有  
表裏虛實寒熱不等藥有君臣佐使大小奇偶之制君所  
服藥無考焉故病愈甚今已無救君自取耳未幾而死有  
吏曹通甫妻蕭氏年六旬有餘孤寒無依春月忽患風疾  
半身不遂言語塞澁精神昏憤口眼喎斜與李仲寬症同  
予刺十二經井穴接其經絡不通又灸肩井曲池詳病時  
月處藥服之減半予曰不須服藥病將自愈明年春在張  
子敬郎中家見其行步如舊予嘆曰夫人病痊得不亂服  
藥之故由此論之李仲寬亂服藥終身不救蕭氏貧困恬  
憺自如內經曰用藥無據反為氣賊聖人戒之一日姚雪  
齋舉許先生之言曰富貴有二事反不如貧賤有過惡不  
能匡救有病不能醫療噫李氏之謂歟

醫學綱目卷九

圭

戒妄下○真定鈔庫官李提舉年踰四旬體幹魁梧肌肉  
豐盛有僚友師君告之曰肥人多風証今君如此恐後致  
中風搜風丸其藥推陳致新化痰宜服之李從其言遂合  
一料每日服之至夜下五行如是半月覺氣短而促至月  
餘添怠惰嗜臥便白膿小便不禁足至膝冷腰背沉痛飲  
食無味仍不欲食心胸痞滿時有燥熱健忘恍惚不安凡  
三易醫皆無效因陳其出請予治之予曰孫真人云藥勢  
有所偏助令人臟氣不平藥本攻疾無疾不可餌平人穀  
入於胃脉道乃行水入於經其血乃成水去則榮散穀消  
則衛亡榮散衛亡神無所依君本身體康強五臟安泰妄  
以小毒之劑日下數行初服一日且推陳矣陳積已去又  
何推焉今飲食不為肌虛水穀不能運化精微灌漑五臟  
六腑周身百脉神將何依故氣短而促者真氣損也怠惰

嗜臥者脾氣衰也小便不禁者膀胱不藏也便下膿血者  
胃氣下脫也足脛寒而逆者陽氣微也時有燥熱心下虛  
痞者胃氣不能上管也恍惚健忘者神明亂也金匱云不  
當下而強下之令人開腸洞泄便溺不禁而死前証所生  
非天也君自取之治雖粗安促命期矣李聞之驚恐汗淡  
於背起謂予曰妄下之過悔將何及雖然君當盡心救其  
失予以為病勢過半病將難痊固辭而退至秋疾甚醫以  
奪命散下之燥熱喘滿而死內經曰誅罰無過是謂大惑  
如李君者內經所謂大惑之人也衛生君子可不戒哉

刺禁

五臟之氣已絕於內而用針者反實其外是謂重竭重  
竭必死其死也靜治之者輒反其氣取腋與膺之氣已  
絕於內者脈氣口內絕不知者反取其外之病處與陽經  
之合有留針以致陽氣陽氣至則內重竭重竭則死矣其

醫學綱目卷九

圭

死也無氣五臟之氣已絕於外而用針者反實其內是謂  
逆厥逆厥則必死其死也躁治之者反取四末之氣已  
絕於外者脈氣口外絕不知者反取其四末之病處與陰  
經之合有留針以致陰氣陰氣至則內重竭重竭則死矣其  
有餘故躁○難經云五臟脈絕於內者腎脈已絕於內  
也而醫反補其心脾五臟脈絕於外者心脾脈已絕於外  
也而醫反補其腎脾五臟脈絕於內者心脾脈已絕於內  
實實虛虛損不足益有餘如此死者醫殺之耳刺之害中  
而不去則精泄害中而去則致氣精泄則病益甚而惟致  
氣則生為難癆瘵無實虛損不足而益有餘是謂甚病  
病益甚難經云假令肺實而肝虛肝者木也肺者金也金  
少氣用針不補其肝而反重實其肺故曰取五脈者死  
也蓋虛虛損不足而益有餘是謂甚病也取五脈者死  
之氣令病入奪陰者死五里五往者也奪陽者狂針害  
畢矣者任正言也  
甲問曰針能殺生人豈不能起死人乎對曰能殺生人不



能起死人者也是人之所生受氣於穀穀之所注者胃也胃者水穀之府氣血之海也海之所行雲雨者天下也胃之所出氣血經隧也經隧者五臟六腑之大絡也迎而奪之而已矣迎之五里中道而止五至而已五往而藏之氣盡矣故五五二十五而竭其輸矣此所謂奪其天氣者也故曰闕門而刺之者死於家中入門而刺之者死於堂上黃帝曰請傳之後世以為刺禁經隧靈樞

凡刺之補瀉無過其度與脈逆者無刺  
靈凡刺之禁 新內勿刺 新刺勿內 已刺勿醉  
已醉勿刺 新怒勿刺 已怒勿刺 新勞勿刺  
已刺勿勞 已飽勿刺 已刺勿飽 已饑勿刺  
已刺勿饑 已渴勿刺 已刺勿渴 大驚大恐  
必定其氣乃刺之 乘車來者臥而休之如食頃乃刺之

六醫經綱目卷之

毛

步行來者坐而休之如行十里頃乃刺之  
凡此十二禁者其脈亂氣散逆其禁衛經氣不次因而刺之則陽病入於陰陰病出於陽邪氣不生粗工不察是謂伐身形肉已奪是一奪也大奪血之後是二奪也大奪汗之後是三奪也大泄之後是四奪也新產又大下血是五奪也此皆不可瀉也  
天溫日明則人血淖液而衛氣浮故血易瀉氣易行天寒日陰則人血凝泣而衛氣沉月始生則血氣始精衛氣始行月廓滿則血氣實肌肉堅月廓空則肌肉減經絡虛衛氣去形獨居是以因天時而調血氣也是以天寒無刺天溫無疑月生無瀉月滿無補月廓空無治是謂得時而調之因天之序盛虛之時移光定位正立而待之故日月生而瀉是謂藏虛月滿而補血氣揚溢絡有留血命曰重

實月廓空治是謂亂經陰陽相錯真邪不別沉以流止外虛內亂淫邪乃起八正神  
刺陽明出血氣刺太陽出血惡氣刺少陽出血惡血刺太陰出血惡血刺少陰出血惡血刺厥陰出血惡氣也血氣

六禁

神庭不可刺 上關不可刺令人耳  
顛顛刺不可多出血 左角刺不可久留  
人迎刺過深殺人 雲門刺不可深使人逆息  
缺盆刺不可過深逆氣 五里禁不可刺經穴  
臍中禁不可刺 伏兔禁不可刺經穴  
三陽絡禁不可刺 復溜刺無多見血  
承筋禁不可刺 然谷刺無多見血  
乳中禁不可刺 鳩尾禁不可刺

六醫經綱目卷之

毛

時禁

靈刺上關者喙不能欠刺下關者欠不能喙刺橫骨者屈不能伸刺兩關者伸不能屈本論  
蓋春氣在經脈夏氣在孫絡長夏氣在肌肉秋氣在皮膚冬氣在骨髓中帝曰願聞其故岐伯曰春者天氣始開地氣始泄凍解冰釋水行經通故人氣在脈夏者經滿氣溢入孫絡受血皮膚充實長夏者經絡皆盛內溢肌膚中秋者天氣始收腠理閉塞皮膚引急冬者蓋藏血氣在中內着骨髓通于五臟是故邪氣者常隨四時之氣血而入客也至其變化不可為度然必從其經氣辟除其邪則亂氣不生帝曰逆四時而生亂氣奈何岐伯曰春刺絡脈血氣外溢令人少氣春刺肌肉血氣環逆令人上氣春刺筋骨血氣內着令人腹脹 夏刺經脈血氣乃竭令人解休夏刺肌肉血氣內却令人善恐夏刺筋骨血氣上逆令人善怒



秋刺經脈血氣上逆令人善忘秋刺絡脈氣不外行令人臥不欲動秋刺筋骨血氣內散令人寒慄冬刺經脈血氣皆脫令人目不明冬刺絡脈內氣外泄留為大痲冬刺肌肉陽氣竭絕令人善忘凡此四時刺者大逆之病不可不從也反之則生亂氣相淫病焉故刺不知四時之經病之所生以從為逆正氣內亂與精相薄必審九候正氣不亂精氣不轉四時刺

春甲乙日自乘無刺頭無發滕于耳內夏丙丁日自乘無振埃于肩喉廉泉長夏戊己日自乘四季無刺腹去爪瀉水秋庚辛日自乘無刺關節于股膝冬壬癸日自乘無刺足脛是謂三禁

素黃帝問曰願聞刺要岐伯對曰病有浮沉刺有淺深各至其理無過其道過之則內傷不及則生外壅壅則邪從

之淺深不得反為大賊內動五臟後生大病故曰病有在毫毛腠理者有在皮膚者有在肌肉者有在脈者有在筋者有在骨者有在髓者是故刺毫毛腠理無傷皮皮傷則內動肺肺動則秋病溫瘧泝泝然寒慄刺皮無傷肉肉傷則內動脾脾動則七十二日四季之月病腹脹煩不嗜食刺肉無傷脈脈傷則內動心心動則夏病心痛刺脈無傷筋筋傷則內動肝肝動則春病熱而筋弛刺筋無傷骨骨傷則內動腎腎動則冬病脹腰痛刺骨無傷髓髓傷則銷鑠肝酸體解依然不去矣刺要

雜禁

凡刺之道必中氣穴無中肉節中氣穴則針遊于巷中肉節則皮膚痛補瀉反則病益篤中筋則筋緩邪氣不出與真相搏亂而不去反還內着用針不審以順為逆刺中心一日死其動為噫刺中肺三日死其動為欬刺中肝五日

死其動為欠素問刺中脾十五日死素問作其動為吞刺中腎三日死素問作六日其動為噦刺中膽一日半死其動為嘔刺中膈為傷中其病雖愈過一歲必死刺跗上中大脈血出不止死刺陰股中大脈血出不止死刺面中溜脈不幸為盲刺客主人內陷中脈為內漏為顛刺頭中腦戶入腦立死刺膝髓出液為跛刺舌下中脈太過血出不止為瘖刺臂太陰脈出血多立死刺足下布絡中脈血不出為腫刺足少陰脈重虛出血為舌難以言刺郄中大脈令人仆脫色刺膺中膈中肺素問刺膺為喘逆仰息刺氣衝中脈血不出為腫鼠蹠刺肘中內陷氣歸之為不屈伸刺脊間中髓為偃刺陰股下三寸內陷令人遺溺刺乳上中乳亦為腫根蝕刺腋下脇間內陷令人欬刺缺盆中內陷氣泄令人喘欬逆刺少腹中膀胱溺出令人少腹滿刺

宜灸

手魚腹內陷為腫刺膈膈內陷為腫刺匡上陷骨中脈為漏為盲刺關節中液出不得屈伸俱出刺

垣針經云陷下則灸之天地間無他惟陰與陽二氣而已陽在外在上陰在內在下今言陷下者陽氣下陷入陰血之中是陰反居其上而覆其陽脈証俱見寒在外者則灸之異法方宜論云北方之人宜灸熯也為冬寒大旺伏陽在內皆宜灸之以至理論之則腎主藏藏陽氣在內冬三月主閉藏是也太過則病固宜灸熯此陽火陷入陰水之中是也難經云熱病在內取會之氣穴為陽陷入陰中取陽氣通天之竅穴以火引火而導之此宜灸熯也若將有餘之病一舉灸之豈不悞哉仲景云微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也又云脈浮宜以汗解用火灸之



邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也脈浮熱甚而反灸之此為實實而虛治因火而動必咽燥唾血又云身之穴三百六十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之為災并中髓也仲景傷寒例第三十

按明堂針經各條下所說禁忌明矣內經云脈之所見邪之所在脈沉者邪氣在內脈浮者邪氣在表世醫只知脈之說不知病症之禁忌若表見寒証身汗出身常清數慄而寒不渴欲覆厚衣常惡寒手足厥皮膚燥枯其脈必沉細而遲但有一二症皆宜灸之陽氣下陷故也若身熱惡熱時見燥作或面赤而黃咽乾嗌乾口乾舌上黃赤時渴咽嗌痛皆熱在外也但有一二症皆不宜灸其脈必浮數或但數而不浮亦不可灸灸之則災害立生若有鼻不聞香臭鼻流清涕眼臉時痒或久或

八醫綱目卷之九

圭

嚏惡寒其脈必沉是脈証相應也或輕手得弦緊者是陰伏其陽也雖面赤宜灸之不可拘于面赤色而禁之也更有腦痛惡寒者雖面赤亦宜灸風府一穴若帶偏腦痛更惡風者邪在少陽宜灸風池無灸風府然艾炷不宜大但如小麥粒一七壯足矣若多灸艾炷大防損目四十五難曰八會者何也然府會太倉臑會季臑筋會陽陵泉髓會絕骨血會膈俞骨會大杼脉會太淵氣會三焦外一筋直兩乳內也熱病在內者取其會之氣穴東垣辨之矣內經中說熱病在內取會之氣穴皆指下者灸之從陰引陽於背膂府會太倉太倉者中腕也是六府六陽之總稱也臑會季臑者脾之募也在腰背腹募之間與臍平是兩儀之間也五藏六府陽陷者皆取脾胃是萬物有餘皆出於土也脾胃者五藏之總稱也

禁灸

帶脉者脾之附經也又其別稱也血會高俞高俞者背之上也骨會大杼大杼者背也髓會絕骨絕骨者是骨名也在足外踝上也乃足少陽之分筋會陽陵泉陽陵泉者足少陽經中膝下外側也脈會太淵太淵者兩寸脈也氣會膻中膻中者兩乳是也熱病在內取會之氣穴者謂熱陷于內故取百會之穴以灸伸之此為陷下者灸之非太過不及本經所生自病中它邪者乃以經取之也恐後學所疑復明其理以証之陷者皮毛不任風寒知陽氣下陷也其脉中得必細弦而緊小或沉澁覆其上知其熱火陷下也雖脈八九至甚數而陰脉覆其上者皆可灸陰脈者細弦緊小沉澁如上說是也

頭維禁不可灸  
承光禁不可灸  
腦戶禁不可灸  
風府禁不可灸灸之不幸使人瘖

八醫綱目卷之九

圭

瘖門禁不可灸灸之使人瘖  
耳門耳中有膿不可灸  
下關耳中有乾糖不可灸  
人迎禁不可灸  
承泣禁不可灸  
白環俞禁不可灸  
石門女子禁不可灸  
淵液禁不可灸  
陰市禁不可灸  
天府禁不可灸使人逆氣  
地會五禁不可灸使人瘖  
經渠禁不可灸傷人  
絲竹空禁不可灸灸之不刺使目小及盲  
脊中禁不可灸  
乳中禁不可灸  
氣衝灸之不得息  
鳩尾禁不可灸  
陽關禁不可灸  
伏兔禁不可灸  
瘻脈禁不可灸

醫學綱目卷之九



諸風

大法

素帝問曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癘風或為偏枯或為風也其病各異其名不同或內至五臟六腑不知其解願聞其由岐伯對曰風氣藏于皮膚之間內不得通外不得泄風者善行而數變腠理開則酒然寒閉則熱而悶其寒也則衰食飲其熱也則消肌肉故使人快慄而不能食名曰寒熱風論治見寒熱門心快也慄慄也

寒熱

風氣與陽明入胃循脈而上至目內眦其人肥則風氣不得外泄則為熱中而目黃人瘦則外泄而寒則為寒中而泣出治熱中見黃疸門治寒中見目淚門

不仁

風氣與太陽俱入行諸脈俞散于分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤脹而有湯衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也治見痺門

癘風

風寒客于脈而不去名曰癘風或名曰寒熱癘者其榮衛不清故使鼻柱壞而色敗皮膚癢潰

癘府風

以春甲乙傷于風者為肝風以夏丙丁傷于風者為心風以季夏戊己傷于邪者為脾風以秋庚辛中于邪者為肺風以冬壬癸中于邪者為腎風風中五臟六腑之俞亦為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風治見中風

俞穴風

風氣循風府而上則為腦風治見頭痛風入係頭則為目風眼寒治見眼目飲酒中風則為漏風治見入房汗出

門

中風則為內風上註以勞風為內風治見在門新沐中風則為首風治見久風入中則為腸風飧泄治見下痢外在腠理則為泄

癘

風故風者百病之長也至其變化乃為他病也無常方然致甲乙經有風氣也帝曰五臟風之形狀不同者何願聞

或府風

致甲乙經有風氣也帝曰五臟風之形狀不同者何願聞

其診及其病能岐伯曰肺風之狀多汗惡風色餅然白時

欬短氣晝日則瘳暮則甚診在肩其色白餅字音邊切景云肺中風者口燥而心風之狀多汗惡風焦絕善怒

身重而重胃而腫脹

肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼

善怒時憎女子診在目其色青仲景云肝中風者頭

目睛

脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄

微黃不嗜食診在鼻上其色黃仲景云脾中風者鼻

而短氣

腎風之狀多汗惡風面瘡然浮腫脊痛不能正

立其色始隱曲不利診在肌上其色黑奇病論云有瘡然

大紫身無痛處形不瘦不能食食少名為何病岐伯曰

病生在腎名曰腎風腎風不能食善驚而心氣凌者死

張子和平治桑惠民病風面黑畏風不敢出視已眉毛

脫落作痛醫三年不瘳求治于戴人戴人曰非癘也乃出

素問風論云腎風之狀多汗惡風脊痛不能正立其色焮

面然然浮腫今公之病乃腎風也宜先刺其面大出血其

血當如墨色三刺血變色矣于是下針自頤上下排針直

至兩頤皆出血果如墨色遍腫處皆針之惟不針目眦外

兩傍蓋此少陽經少血多氣隔日又針之血色乃紫二日

外又刺其血色變赤初針時癢再刺則額角痛三刺其痛

不可任蓋邪退而然也後二十日餘又輕刺一遍方已每

刺必以水水洗其面十日黑面退一月面稍赤三月乃

紅白但不服除下熱之藥病胃風之狀頸多汗惡風飲

食不下膈塞不通腹善滿失衣則腹脹食寒則泄診形瘦

而腹大首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚

頭痛不可以出內至其風日則病少愈漏風之狀或多

汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風衣常濡口

乾善渴不能勞事泄風之狀多汗汗出泄衣上口中乾

上清其風不能勞事身體盡痛則寒

右五臟風症多汗惡風其治法用仲景桂枝湯之類孫

真人皆灸本臟背腧兼用續命湯治之

黃帝曰人之善病風厥漉汗者何以候之少俞答曰肉

診



不堅腠理疎則善病風帝曰何以候肉之不堅也少俞答曰膈肉不堅而無分理者粗理粗理而皮不緻者腠理疎此言其渾然者論

素暴厥而壅滯塞閉不通內氣暴薄也不從內外中風之病故瘦留者也通評虛實論 汗出而身熱者風也全文

尺膚滑其淖澤者風也 尺膚滑而澤脂者風也全文

脈脈浮而大者曰風 病風以日夕死全文

中風 卒中之初 中分淺深 中淺半身偏痛舌能言 中深半身不收舌難言

產中風 口噤 口眼喎斜 瘖 中風世俗之稱也其症卒然仆倒口眼喎斜半身不遂或古強不言唇吻不收是也然名各有不同其卒然仆倒者

經稱為擊仆世又稱為卒中乃初中風時如此也其口眼喎斜半身不遂者經稱為偏枯世又稱為左癱右瘓及腰腿風乃中倒後之証邪之淺者如此也其古強不言唇吻不收者經稱為痲痺世又稱為風懿風氣亦中倒後之症邪之深者如此也東垣以邪淺為中脈中腑而易治邪深為中臟而難治者得之矣凡病偏枯必先仆倒故內經連名稱為擊仆偏枯也後世迷失經意以偏枯痲痺之旨一

以中風名之遂指偏枯為枯細之枯而非左癱右瘓之症習俗之弊至于如此也殊不知仲景云骨傷則痿名曰枯蓋痿緩不收則筋骨氣肉無氣以生脈道不利手足不粟水穀之氣故曰枯非細之謂也或積日累月漸成細者間有之非可便指枯為細也

凡治消痺什擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏梁之

內經素問 凡治消痺什擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏梁之

風

疾也通評虛 三陰三陽發病為偏枯痿易四肢不舉全文

風中五臟六腑之俞亦為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風全文

右經四節論偏枯前一節屬內傷後二節屬外感蓋此症內傷外感相兼而成也至于河間東垣丹溪則專主

內傷仲景陳無擇孫思邈則專主外感今詳偏枯邪淺者宜瀉外感為上補內傷佐之痲痺邪深者宜補內傷為主瀉外感佐之也

兩中風為百病之長乃氣血閉而不行此最重疾凡治風之藥皆辛溫上通天氣以發生為體是元氣始出地之根蒂也

河間東垣 風病多因熱盛俗云風者言末而忘其本也所以中風而有癱瘓諸症者非謂肝木之風實甚而卒中之也亦非

外中于風良由將息失宜而心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不為用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐之五志有所過極而卒中者由五志過極皆為熱甚故也所謂肥人多中風者肥則

腠理緻密而多鬱滯氣血難以通利若陽熱又甚而鬱結甚故多卒中也其瘦者腠理疎通而多汗洩血液衰少而

為燥熱故多有勞嗽之疾也然肥人反勞者由暴然亡液損血過極故也瘦人反中風者由暴然陽熱太甚而鬱結

不通故也經云人之氣以天地之疾風名之故中風者非

外來風邪乃本氣病也凡人年逾五旬氣衰者多有此疾

壯歲之際無有也若肥盛則間有之亦形盛氣衰如此治

壯歲之際無有也若肥盛則間有之亦形盛氣衰如此治

壯歲之際無有也若肥盛則間有之亦形盛氣衰如此治



法宜和臟腑通經絡便是治風東垣論中風從內出其治法則如外入之証亦以發

表法行中

中風 仰天風之為病當半身不遂或但臂不遂者此為痺脈微而數中風使然無擇諸方論中所謂左癱右瘓者蓋邪氣

中人邪氣反緩正氣即急正氣引邪喘僻不遂也風熱者以心悶閉不能言但噤噤作聲蓋肺氣入心則能言邪中

心肺涎潮塞故使然也四肢緩縱為風非者以風涎散注于關節氣不能行故使四肢不遂也舌強不能言者以風

入心脾經心之別脈系于舌本脾之脈使咽連舌本散舌下今風涎入其經絡故舌不轉而不能言也四肢拘攣者

以中風冷邪氣入肝臟使諸經變急屈而不伸也風柔者以風熱入于肝臟使諸經張緩而不收也故經曰寒則擊

急熱則弛張風顛者以風入于肝臟經絡上氣不守正位

故使頭招面搖手足顛掉也風瘖者以風冷之氣客于中帶而不能發故使口噤不能言也與前所謂涎塞心肺同

候此以口噤為差耳腰腿風者半身不遂失音不語臨事不前亦偏中于心肺經所致也已上皆言風從外入

法 初中治 初中倒時隨即醒者宜治若不醒者宜搯人中至醒若痰涎壅盛者宜吐之口噤者亦宜吐之若口開手撒遺尿者

為陽暴絕速宜大料參芪補接之若眼戴上者宜灸之

本治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮于上膈氣閉不通宜救急稀涎散

猪牙皂角性四快肥實不 晉攀光明者 右為細末研勻輕者五分重者三字七溫水調灌下不大嘔吐但微微令涎出一二升便得醒醒後緩緩調治

不可便大投藥恐過傷人

治中風同前症勝金丸

生薄荷兩 猪牙皂角二兩細研水一升二味

右將硃砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如龍

得吐即配不醒者不可治必用方論中風無吐法引金

虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關緊急氣閉

不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可乎但不

當用銀粉藥搗碎入四肢爾予用此三方每每有

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子皮膜一粒上白礬如柳指大

右將二味在于新瓦上煨令江子焦赤為度為末煉蜜

丸如雞豆大每服一丸用綿裹放患人口中近喉處良

效吐痰立愈

中倒後口禁牙關緊急治法另見後口噤門亦用吐法



表裡

虛邪偏客于身半其入深內若榮衛榮衛稍衰則真氣去邪氣獨留發為偏枯故其邪氣淺者脉偏痛邪氣深者偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠之間巨針取之蓋其不足拍其有餘乃可復也邪之為病也身無痛者四肢不收志亂不慧其言微知可治甚則不能言不可治也

診

右內經論中風之淺深也其偏枯身偏痛而言不變志不亂者邪在分腠之間即仲景東垣所謂邪中腑是也邪病無痛手足不收而言瘖志亂者邪入于裡即仲景東垣所謂邪中臟是也

八醫學綱目卷十

在臟在腑

正氣即急正氣引邪喘僻不遂邪在于絡肌膚不仁邪在于經即重不勝邪入于腑即不識人邪入于臟舌即難言口遂吐涎  
風者百病之始善行而數變行者動也風本為熱熱勝之治法則風動宜以靜勝其燥養血是也治須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮汗下各得其宜然後宜治其在經雖有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者宜汗之中臟者宜下之此雖合汗下亦不可過也仲景云汗多則亡陽下多則亡陰亡陽則損氣亡陰則損形故經言血氣者人之神不可不謹養也所謂表裏不和須汗下之表裡已和是宜治之在經也其中腑者面頰顯五色有表証而脉浮惡風惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中腑也其病多易治其中臟者唇吻不收舌

表

難經所謂偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠是也

解表難經  
仲三黃湯治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒終日不欲飲食  
黃芪二錢 獨活錢四 細辛二錢 麻黃五錢  
右五味以水六升煮取二升分溫作三服一服小汗二服大汗心熱加大黃二錢腹滿加枳實一枚氣逆加人

八醫學綱目卷十

八

不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞽大小便秘結皆曰中臟也其病多難治若風中腑者先以加減續命湯隨証發其表如兼中臟則大便多秘澀宜以三化湯通其滯表裏証已定別無變端後以大藥和而治之大抵中腑者多著四肢中臟者多滯九竅雖中腑者多兼中臟之証至于舌強失音久服大藥能自愈也  
項中血脉則口眼喎斜中腑則肢節廢中臟則性命危急此三者治各不同如中血脉外有六經之形証則從小續命湯加減及疎風湯治之如中腑內有便溺之阻隔宜三化湯或局方中麻仁丸通利之外無六經之形証內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦羌湯羌活愈風湯治之中臟痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若中血脉中腑之病初不宜用龍腦牛黃為麝香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入



參三錢悸加牡蠣三錢湯加瓜蒌根三錢先有寒加附子一枚

聖疎風湯治半身不遂或肢體麻痺筋骨疼痛

麻黃去節 益智仁 杏仁去皮尖各

甘草炙 升麻各五錢

右咬咀每服一兩水一小碗煎至六分去渣熱服脚蹬

熱水葫蘆候大汗出去葫蘆冬月不可服

海極濟換骨丹自汗者不宜服

槐皮苦木芷 仙人防首蔓 十味各停勻

苦味香減半 龍麝加少許 硃砂作衣纏

麻黃膏煎丸 大小如指彈

右治半身不遂口眼喎斜手足不仁言語蹇澁或痛入骨髓或痺在皮膚或中急風涎潮不言精神昏塞行步

艱難筋脉拘急左癱右瘓一切風疾並皆治之

人參 桑白皮 蒼朮

槐笮子生 人參 桑白皮 蒼朮

川芎 何首烏 蔓荊子 歲靈仙

防風各二 五味子 木香 苦參各一

香白芷二 麝香二錢 龍腦二 辰砂五錢

右十四味為細末入麝香令勻又用麻黃十斤去根節

用大河水三石三斗熬至六斗去滓再熬至二斗半入

銀石器內熬成膏入前藥末和勻杵三五千下每一兩

作十九硃砂為衣每服一九先搗碎酒一盞浸自晨至

晚食後臨卧攪勻服之神清無睡是藥之驗更隔五日

服之如無汗宜服若體自汗服之是重亡津液也若風

盛人于密室溫臥取汗

羅續命丹治男子婦人卒中諸風口眼喎斜言語蹇澁牙

關緊急半身不遂手足搐搦頑痺疼痛涎潮悶亂婦人血

風喘嗽吐逆坐臥不寧

川芎 羌活 南星 川烏

白蘇皮 海桐皮 肉桂 當歸

防風 熟地 乾葛 地榆

虎骨 硃砂 鈴白霜 烏蛇生

牛黃 雄黃各三 輕粉二

麻黃去節 雄黃各三 輕粉二

關緊急半身不遂手足搐搦頑痺疼痛涎潮悶亂婦人血風喘嗽吐逆坐臥不寧

川芎 羌活 南星 川烏

白蘇皮 海桐皮 肉桂 當歸

防風 熟地 乾葛 地榆

虎骨 硃砂 鈴白霜 烏蛇生

牛黃 雄黃各三 輕粉二

麻黃去節 雄黃各三 輕粉二

右為末以麻黃酒汁入蜜半斤熬成膏和藥為丸彈子

大每服一九豈淋酒下或葱湯化下不拘時候中書左

丞相謙患半身不遂麻木大醫劉子益與服之汗大

出一服而愈

服桑枝法桑枝一小升細切炒香以水三大升煎取二

升一日服盡無時圖經云桑枝溫平不涼不熱可以常服

瘰癧中風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣咳

嗽消食利小便又服身輕聰明耳目令人光澤無瘰癧口乾

仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子政和問何子

常病兩臂痛服諸藥不效依此作數劑臂痛即愈

外療偏風半身不遂冷痺非附子一兩生用咬咀納于無

灰酒中經一七日隔日飲之服一小合瘥

中深半身不收舌難言

經所謂非之為病身無痛四肢不收志亂不甚其言微知

可治甚則不能言者是也

丹今世所謂風病多與痰証滾同論治良由局方多以治

風之藥通治諸痿也古聖論風痿各有篇且源流不同治

法亦異不得不辨按風論風者百病之長至其變化乃為

風症辨

風症辨

風症辨

風症辨

風症辨

風症辨

風症辨

風症辨



它病又曰善行數變曰因下露風曰先受邪曰在膝理曰  
客曰入曰傷曰中歷陳五臟與胃之傷皆多汗而惡風其  
發明風邪係外感之病有臟腑內外寒熱虛實之不同若  
是之明且盡也別無癱緩痿弱卒中不省僵仆喎邪變縮  
眩運語澁不言之文也或曰吾子謂內經風論主于外感  
局方用麻黃桂附葶將以解風寒也用腦麝蘇合靈仙黑牽  
牛葶將以行疑滯也子之口過矣曰風病外感善行數變  
其病多實少虛發表行滯有何不可治風之外何為又歷  
述神魂恍惚起便須人手足不隨神志昏憒癱緩痺曳手  
足筋攣眩運倒仆半身不遂膝脚緩弱四肢無力顛掉拘  
攣不語語澁等諸痿症兼治之考諸痿論肺熱葉焦五臟  
因而受之發為痿躄心氣熱生脈痿故經縱不任地肝氣  
熱生筋痿故宗筋弛縱脾氣熱生肉痿故痺而不仁腎氣

八醫學類卷十

十一

熱生骨痿故足不任身又曰諸痿皆生于上謂之上者指  
病之本在肺也又曰昏惑曰瘖瘖曰瘖瘖曰瘖瘖曰瘖瘖  
曰瘖瘖暴瘖曰瘖瘖皆屬于火又曰四肢不舉曰舌本強  
曰足痿不收曰瘖瘖有聲皆屬于上又禮記註曰魚肉天  
產也以養陽作陽德以為倦怠悉是濕熱內傷之病當作  
諸痿治之何局方治風之方兼治痿者十居八九不思諸  
痿皆起于肺熱傳入五臟散為諸症大抵只宜補養若以  
外感風寒治之寧免實虛虛之禍乎風病外感之邪有  
寒熱虛實而挾寒者多痿病內熱之傷皆虛証無寒可  
散無實可瀉局方本為外感立方而以內傷熱証滾同一  
治其為害也似非細故

丹溪補  
中帶坎

右丹溪諸論蓋因局方治中風虛浪用發表行濕之藥  
戕賊血氣誅伐根本不知補養之法故引痿病以救局

方之失而其言如此然局方所述中風手足不隨起便  
須人神魂恍惚不語語澁等証即內經熱病相同至于  
異處不得不察針經刺節真邪云真氣去邪獨留發為  
偏枯痿論云陽明虛則宗筋縱帶脈不引而足痿不用  
由是知手足不隨者在偏枯手足為邪氣阻寒脉道而  
然在痿病則陽明虛宗筋縱帶脉不引而然也非病有  
言變志亂之症痿病則無之也非病又名風痺而內傷  
外感兼備痿病獨得于內傷也非病發于擊仆之暴痿  
病發于怠惰之漸也凡此皆明非與痿明是兩疾也

風病治  
法為先  
左右氣  
血之分

大率治風主血虛有痰治痰為先或作屬虛扶火與濕半  
身不遂者大率多痰在左屬死血在右屬痰 左以四物  
湯等加桃仁紅花竹瀝姜汁 右以二陳四君子湯等加  
竹瀝姜汁 氣虛有痰者濃煎獨參湯加竹瀝姜汁 聲

八醫學類卷十

十一

如軒者屬氣虛以人參一兩煎湯一盞入竹瀝姜汁 遺  
尿者亦屬氣虛以參芪竹瀝姜汁與之少食者亦為氣虛  
宜參芪竹瀝 血虛有痰宜四物湯俱用姜汁炒恐泥痰  
再加竹瀝入內服 治痰若氣虛少食者用竹瀝氣實能  
食者加荆瀝此二味開經絡行氣血入四物湯中必少用  
姜汁肥人多濕用附子烏頭行經肥人中風口喎手足麻  
木左右俱作痰治用

貝母 瓜蒌 南星 半夏 陳皮 黃芩 白朮  
黃連 羌活 黃柏 防風 荆芥 歲莢仙 薄荷  
桂心 甘草 天花粉 多食濕麵加附子竹瀝姜汁  
酒一匙行經

瘦人多  
瘦人脈虛火實四物湯加牛膝竹瀝一匙行經黃芩黃柏  
有痰加痰藥痰盛者口眼喎邪者不能言者皆當用此



氣虛

法輕者用瓜蒂散汁鼻角急者用葱熨五分或三分加射  
香灌入鼻內吐痰出如口不噤者灌入口內吐痰出一吐  
不已再吐之亦有虛而不可吐者有痰者先吐後用藥

風中腑兼中臟治驗○順德府張安撫云去年六十一  
歲于己未閏十一月初患風証半身不遂語言蹇澁心神

昏憤煩躁自汗表虛惡風如洒冰雪口不知味鼻不聞香  
臭耳聞木音則驚怖小便頻多大便結燥欲用大黃之類

下之則平日飲食減少不敢用不然則又滿悶晝夜不得  
瞑目而寐最苦于此約有三月餘凡三易醫病全不減至

庚申三月七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥疼痛不利唾  
多中脘氣痞似噎予思內經云風寒傷形憂恐忿怒傷氣

氣傷臟乃病臟病形乃應又云人之氣以天地之疾風名  
之此風氣下陷入陰中不能生發上行則為疾矣又云形

木薑子

三

樂志苦病生干脉神先病也邪風加之邪入于經動無常  
處前証互相出見治病必求其本邪氣乃服論時月則宜  
升陽補脾胃瀉風木論病則宜實表裡養衛氣瀉肝木潤

柴胡

黃芪各五

升麻

當歸

甘草各三

半夏

黃柏各三

黃芩

陳皮

人參

芍藥各二

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去渣溫服自汗加黃

芪五分五味子二十粒晝夜不得睡乃因心事煩擾心

火內動上乘陽分衛氣不得交入陰分故使然也以硃

砂安神丸服之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡

三月有餘今困睡不已莫非它病生否予曰不然衛氣

者晝則行陽二十五度夜則行陰二十五度此衛氣交

入陰分循其天度故安撫得睡也何病之有焉止有眼  
白睛紅腫難開宜以當歸連翹湯洗之

黃連

黃柏各五

連翹

當歸

甘草各三

右作一服水二盞煎至一盞去渣時時熱洗十三日後

至日晡微有悶亂不安于前冲和湯中又加柴胡三分

以升少陽之氣飲三服至十五日全得安卧減自汗惡

寒燥熱胃膈痞元小便多服藥後小便減少大便一二

日一行鼻聞香臭口知味飲食如常脉微弦而柔和按

之微有力止有咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早晨語言

快利午後微澁宜以玄參升麻湯治之

升麻

黃連各五

黃芩各四

連翹

桔梗各三

風粘子

玄參

甘草

木薑子

三

姜蜜各三

防風

右咬咀總作一服水二盞煎至七分去渣稍熱飲時

時咽之前症良愈止有牙齒無力不能嚼物宜以牢牙

散

牢牙散治牙齒無力不能嚼物

羊脛骨灰

升麻各二

生地

黃連

石膏各一

白茯苓

人參各五

梧桐淚各三

右為細末入麝香研勻臨臥擦牙後以溫水漱之

安撫初病時右有臂膊痛無主持不能舉動多汗出肌

肉瘦不能正臥臥則痛甚經云汗出恒阻使人偏枯余

思針經云虛與實隣決而通之又云留瘦不移節而刺

之使經絡通和血氣乃復又云陷下者灸之為陰氣下

陷入陰中有時時痛不能運動以火導之火引而上補



之温之已上症皆宜灸刺為此先刺十二經之井穴于  
四月十二日右肩臂上有井穴內先針後灸二七壯及  
至灸瘡發于枯瘦處漸添肌肉汗出少有臂微有力至  
五月初八日而灸左肩井穴下尺澤穴各灸二十八壯  
引氣下行與正氣相接次日臂膊又添氣力自能搖動  
矣時值仲夏暑熱漸盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定  
心氣

白芍藥五分 人參 升麻 柴胡各四分  
天門冬 麥門冬各三分 陳皮二分 甘草生  
甘草 黃芩 黃柏各二分  
右咬咀作一服水三盞煎至一盞去查温服食後汗多  
加黃芪五分後以潤腸丸  
潤腸丸治胃腸痞滿大便澀滯

麻子仁 大黃 酒各半 歸尾 枳實  
白芍藥 桃仁泥 升麻兩 人參  
甘草生 陳皮各三分 木香 枳殼各二分  
右除桃仁麻仁外為末却入二仁泥蜜和丸如桐子大  
每服七八十九温水食前服初六日得處暑節暑猶未  
退宜微收實皮毛益胃氣秋以胃氣為本以益氣調榮  
湯主之藥中加時藥使邪氣不能傷也

人參 益氣和中  
熟地 潤燥滋陰  
白木 和中厚腸胃  
當歸 和血潤燥  
半夏 燥胃進食  
柴胡 出干胃中乃風行于天上

麥門冬 三分為佐倘有暑氣未退故  
右咬咀作一服水二盞煎至一盞去查温服忌食辛熱  
之物反助暑邪秋氣不能收正氣得復而安矣  
太陰所謂入中為瘡者陽虛已衰故為瘡也內奪而厥  
則為瘡此腎虛也少陰不至者厥也脾解篇王註云脾  
不足者

熟地 巴戟 山茱萸 肉桂各酒浸  
石斛 附子炮 五味子 白茯苓  
苜蓿 遠志 官桂 麥冬各心各  
右為末水一盞半每服三錢生姜五片棗一枚薄荷同  
煎至八分不拘時服

附治中風四肢逆冷吐清水婉轉啼呼者取桂二兩咬咀  
以水三升煮取二升去查適寒温盡服  
生地黃煎治熱風心煩悶及脾胃熱不下食冷補方  
生地汁 枸杞根汁各二 生姜汁  
酥各三 荆瀝 竹瀝各五 天門冬  
人參各八 茯苓兩 大黃 梔子各四

右十一味擣後五味為細末先煎地黃等汁成煎次納  
藥末攪勻每服一七日再漸加至三七覺利減之  
荆瀝湯治患風人多熱宜服  
荆瀝 竹瀝 生姜汁各五  
右三味相和温煖為一服每日且服煮散午後進此平  
復乃止 煮散見後解  
唐王太后中風不能言脉沉而口噤醫人許胤宗曰既



薰之

不能下藥直湯氣薰之藥入腠理週時可瘥乃煎黃芪防風湯數斛置床下氣如烟霧薰之其夕便得語藥力薰蒸其效如此

丹溪云人之口通平地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而受無形地主濁故口受有形而兼乎無形王太后病風不言而脉沉其急非大補不可也若以有形之藥湯緩不及事今以黃芪防風煎湯氣如烟霧滿室則口鼻俱受非智者通神之法不可為也

雄方

食主風中心氣風熱手足不遂及風痺不任筋脉五緩恍惚煩躁能肉二斤切如常法調和作醃腊空肚服之  
附治中風四肢不收者或三升水九升煎三升分爲三服日二服亦可酒漬飲之治卒風中不得語者煎豆煎汁如

飽含之亦可濃者飲之佳

聖治卒風中不語舌根強硬陳壽五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服又當愈

附治中風卒不得語以苦酒煮白芥子附頸一周以綿裹之一日夕而瘥

凡治中風莫如續命之類然此可扶持初病若要收全功大艾爲良中風皆因脉道不利血氣閉塞也灸則與醒脉道而血氣得通故收全功

本凡中風續命排風風引竹瀝諸湯及神精丹茵半酒之類更加以灸無不愈者然此疾積聚之久非一日所能收皆大劑久而取效唐書載王太后風瘡不語醫者蒸黃芪防風湯數斛以薰之得瘥蓋此類也今人服三五盞求效

則責醫也亦速矣孟子曰七年之病必求三年之艾久而後知爾

仲景續命湯治中風非身體不能自收口不能言骨脈不知痛處或拘攣不能轉側

麻黃 桂枝 當歸 人參  
石膏 乾姜 甘草 芎藭

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治肺風但服不得臥咳逆上氣面目浮腫

附治中風外有六經之形症先以加減續命湯隨証治之  
麻黃 人參 黃芩 芍藥  
甘草 川芎 杏仁 防已

官桂 防風 附子  
右除附子杏仁外搗爲粗末後入二味令勻每服五錢水二盞半生薑五片煎至一盞去渣稍熱服食前

如無汗惡寒者加 麻黃 防風 杏仁 右依本方加一倍宜針太陽經至陰出血如有汗惡風者加

桂枝 芍藥 杏仁 右依本方加一倍宜針風府已上二証太陽中風也

如身熱無汗不惡寒者加 知母 石膏 甘草 如

身熱有汗不惡寒者加 葛根 桂枝 黃芩 右依

本方加一倍宜針陷谷刺膈先針陷谷者去陽明之賊也刺膈先者瀉陽明之實也已上二証陽明中風也

如無汗身涼者加 附子 乾姜 甘草 宜針隱白去太陰之賊也此一証太陰中風也



如有汗無熱加桂枝附子甘草若依本方加一倍宜針太溪此一証少陰中風也

如無此四証六經混淆繫于少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜羌活連翹續命湯

小續命湯羌活連翹

右古之續命混殺無經今立分經治療又各分經針刺無不愈也治法宜刺厥陰之井大敦以通其經灸少陽之經絕骨以引其熱是針灸同象治法之大體也

附雲岐子加減法如精神恍惚加茯苓遠志如心煩多驚者加犀角如骨節間煩腐有熱者去附子倍芍藥骨間冷痛者倍用桂枝附子如燥悶小便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎服如臍寒下痢者去防己黃芩倍附子白朮一兩煎服如脚弱加牛膝

入醫學綱目卷一

滕石斛各一兩如身疼痛加秦芫一兩如腰痛加桃仁杜仲各半兩如失音加杏仁一兩如或歌笑語無所不及者用麻黃三兩入參桂枝白朮各二兩無附子防風生薑有當歸一兩自汗者去麻黃杏仁加白朮春加麻黃一兩夏加黃芩七錢秋加當歸四兩冬加附子半兩

攻裡 內有便溺之阻隔復以三化湯導之

厚朴製 大黃 枳實 羌活各等

右剉如麻荳大每服三兩水三升煎至一升半服之以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中道又服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失于通寒或一氣之微汗或一旬之通利此為常治之法也又則清濁自分榮衛自和矣

行中道

羌活愈風湯療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤及冷風濕內弱者是風熱體重也或瘦而一枝偏枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜而多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病生靜則萬病息是以此藥能安心養神調陰陽無偏勝保命集云內邪已除外邪已盡當服此藥以行中道之如覺風動服此不致倒仆

羌活 甘草 防風 黃芪

蔓荊子 川芎 細辛 枳殼

人參 地骨皮 麻黃 知母

甘菊 薄荷 枸杞 當歸

獨活 白芷 杜仲 秦芫

芍藥 黃芩 白茯苓 蒼朮

石膏 生地 蒼朮 肉桂

入醫學綱目卷一

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服如遇天陰加生薑三片煎空心一服臨臥再煎吞服俱要食遠服空心嚥下二丹丸謂之重劑臨臥嚥下四白朮謂之輕劑是動以安神靜以清肺 假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作四服每服加生薑五七片空心服以粥投之得微汗則住 如一旬之通利用愈風湯三兩大黃一兩亦勻作四服如煎煎臨臥服之得利為妙常服之藥不可失四時之輔如望春大寒後加半夏柴胡人參各二兩木通四兩此迎而奪少陽之氣也 望夏加石膏黃芩知母各二兩此迎而奪陽明之氣也 望秋大暑後加厚朴藿香各二兩此勝脾土之濕也 望冬霜降後加附子官桂各一兩



當歸二兩此勝少陰之氣也。如得春減冬所加藥四時類此此藥治七情六慾四氣無使五臟偏勝及不動于榮衛如風秘服之永不燥結如又瀉服之能自調適初覺風氣便服此藥與石方天麻九一料相為表裡乃治未病之聖藥也不問男子婦人小兒風癩急慢風等病服之神效

四白丹能清肺氣養魄為中風者多昏目氣不清利也

白朮 白茯苓 人參 砂仁

香附 甘草 防風 川芎

白芷 白檀 知母 羌活

薄荷 獨活 細辛 麝香

牛黃 龍腦 檀香 甜竹葉

右為細末煉蜜丸如桐子大每兩作十九臨臥嚼一九

入醫經卷一

用愈風湯送下能上清肺氣下強骨髓

二丹丸治健忘養神定志和血內以安神外華腠理

熟地 天冬 丹參 茯苓

甘草 萬蒲 遠志 人參

麥冬 珠砂 右為細末煉蜜丸如桐子大空心用愈風湯送下至六十九

中風外無六經之形証內無便溺之阻格知為血弱不能

養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮

也當以秦芫湯主之

秦芫 石膏 甘草 川芎

當歸 羌活 獨活 防風

黃芩 白芍藥 白芷 白朮

生地 熟地 白茯苓 細辛

右制每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓溫服無時如遇

天陰加生姜七八片加心下痞每服一兩加枳實一錢

同煎

天麻丸行榮衛壯筋骨

天麻 玄參 牛膝

杜仲 當歸 附子

羌活 生地 獨活

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五七十九病大至百

九空心食前溫酒或白湯服忌壅塞失于通利故服藥

半月稍覺壅塞微以七宣丸輕疎之使藥可為用也

如素有痰又病中風津液湧溢在胸中氣不得利者用獨

聖散吐之吐後用利氣瀉火之劑

獨聖散治諸風隔痰諸病痰涎津液湧溢用芫芫一兩炒

黃色為末每服量虛實又新或二錢藥末茶一錢酸漿汁

一鍾調下若用吐法須天氣晴明陰晦無用如病卒暴者

不拘此法吐時宜辰卯二時故內經云平旦至日中天之

陽陽中之陽也若論四時之氣仲景大法春宜吐是天氣

在上人氣亦在上一日之氣辰卯是其候也故宜早不宜

夜先令病人隔夜不食如服藥不吐用熱蘆水投之如

吐風瀉者加全蝎五分微炒 如有重者加狗油五七點

雄黃末一錢甚者加芫花五分立吐虫出 如濕腫滿者

加赤小荳末一錢此藥不可常用大要辨其虛實實則瓜

蒂散虛則梔子豉湯滿加厚朴不可一槩用之吐罷可服

降火利氣安神定志之劑



清熱 潔瀉清丸治中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安臥此  
是風熱煩躁方見治  
解表雜方  
一婦人年六十左灘手足不語涎痰。

防風 荆芥 羌活 南星  
沒藥 乳香 木通 茯苓  
厚朴 桔梗 甘草 麻黃  
全蠍 紅花

右作末酒湯下不拘時春脈漸伏以淡鹽湯薑汁每早  
一碗日五日仍以白朮甘草陳皮厚朴葛蒲一日二貼  
後以川芎山梔豆豉瓜蒂菴葶粉薑湯吐不用蒼木南  
星生姜牛膝茯苓酒糊丸服十日後夜間微汗手足動  
而能言

竹瀝湯治風痲四肢不收心神恍惚不知人不能言方

患熱風者必先用此以制熱毒

竹瀝升 生葛汁升 生姜汁五  
右三味相和溫服分三服平旦日晡夜各一服服訖覺  
四肢有力次進後湯方

竹瀝升 生葛汁五 芍藥 防已  
附子 人參各一 羚羊角兩 芍藥  
黃芩 甘草 桂心各一 生姜四

石膏兩 杏仁四枚 麻黃 防風各一  
右十六味以水七升煎減半納瀝再煮取二升五  
合分三服取汗間五日更服一劑頓服三劑漸覺少損  
仍進後方

竹瀝升 防風 升麻 羚羊角  
防已 桂心 芍藥各二 麻黃兩

右八味以水四升合竹瀝煮取二升半分三服兩  
日服一劑常用加獨活三兩此方神良頓進三劑若手  
足冷者加生薑五兩白朮二兩若未除更進後服

竹瀝升 甘草兩 人參 芍藥  
獨活 升麻各二 防風 麻黃  
芍藥各一 羚羊角 生薑 石膏  
附子各一 防已 桂心 黃芩  
白朮各二

右十七味以水八升煎減半納瀝煮取二升半分  
三服相去如行人十里又更服若有氣者加陳皮牛膝  
五加皮各一兩  
凡風痲服前湯得瘥訖可常服煮散除餘風方

防已 防風 獨活 秦艽

黃芪 芍藥 人參  
白朮 茯苓 遠志  
升麻 石斛 牛膝 五加皮  
丹參 甘草 厚朴 天門冬  
陳皮 地骨皮 黃芩 桂心各一  
乾地黄 杜仲 生薑 麻黃  
檳榔 藜蘆 烏犀角各二 苡薏仁升

石膏兩  
右三十三味搗篩為粗散和攪勻每服以水三升藥三  
兩煮取一升綿濾去渣頓服之取汗日服若覺心中熱  
煩以竹瀝代水煮之

世治卒中風不語桂枝薄辣者去皮一兩懷中藏三箇時  
辰分三服水煎併進神效



右解表諸方治中風全不能語經所謂甚則不能言者是也

羅犀角防風湯治一切諸風口眼喎斜手足躄攣言語蹇澁四肢麻木皆治之

犀角 防風 甘草 天麻

羌活 滑石 石膏 麻黃 獨活 山梔 荆芥 連翹

當歸 黃芩 全蠍 薄荷 大黃 桔梗 白木 細辛

右咬咀每服五錢水二盞生姜十片煎至一盞去查稍熱服未汗再一服如病人臟氣虛則全減大黃

輕骨丹治風癱瘓四肢不隨

苦參 桑白皮 白芷 蒼朮

甘松 川芎 麻黃 右為末入前麻黃膏和丸如彈子大每服一九溫酒研化服之臥取汗五七日間再服手足當即輕快卒中涎潮分利後用之

風藥聖餅子治半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅盛及一切風他藥不効者小兒驚風大人頭風婦人血風並治之

川烏 草烏 麻黃 蒼朮 何首烏 白附子 白姜 川芎 防風 乾姜 雄黃 藿香 荆芥 右為末醋糊丸如桐子大捏作餅子嚼碎茶湯送下食

後

世採浮萍草法并方 不在山兮不在岸採我之時七月半一任癱風與瘧風些少微風都不算豆淋酒內下三錢鐵僕頭上也出汗

困治風半身不遂此方其妙

川山甲 川烏頭 紅海蛤 右為末每用半兩生葱自然汁調成膏作餅子約一寸

半左患貼左脚右患貼右脚貼在足掌心內用舊絹片緊扎定于密房中無風處椅子上坐用湯一盆將有藥

脚浸于湯中用小心人扶病人恐汗出不能支持候汗

出急去藥如汗欲出時身必麻木以汗週遍為妙如未

効半月後再用一次神妙

世治卒中手足不遂用麥麩五升入烏頭尖一升連翹半

升同餽飲令人熱鋪在席下以手足不遂處臥之令熱氣薰蒸候出汗為度日用三次元藥再蒸用之候兩日外別

用新藥如無烏頭尖只用草烏頭半升不去皮尖研作粗末亦可

子治半身不遂用蛋沙兩石分作三袋每袋可七斗蒸熱一袋着患處如冷再換一袋依前法數數換易百不禁瘥

止須羊肚釀粳米葱白姜椒鼓等者爛熟喫日食一具十日

日止此方千金不傳

右解表方治中風語言蹇澁經所謂志亂不甚其言微

知者是也

羅中臟治驗○真定府臨濟寺趙僧判于至元八月間患

中風半身不遂精神昏憤面紅頰赤耳聾鼻寒語言不出

診其兩手六脈弦數常記策古有云中臟者多滯九竅中

方通理雜



腑者多着四肢今語言不出耳聾鼻塞精神昏憤是中臟也半身不遂是中腑也此臟腑俱受病先以三化湯一兩內疎二三行散其壅滯使清氣上升充實四肢次與至寶丹加龍骨南星安心定志養神使各臟之氣上升通利九竅五日音聲出語言稍利後隨四時脈証加減用藥不旬日稍能行步先以繩絡其病脚如履闕或高處得人扶之方可踰也又刺十二經之井穴以接經絡翌日不用繩絡能行幾步百日大勢皆去戒之慎言語及節飲食一年方愈

子和一衲子因陰雨臥濕地一年手足皆不遂若遇陰雨其病轉加諸醫皆作中風偏枯治之用當歸芍藥乳香沒藥自然銅之類又服反加大便澀風燥生經歲不已戴人以舟車丸下三十餘行去青黃沫水五升次以淡劑滲泄

入醫經卷之十

毛

之數日手足能舉戴人曰受風濕寒三氣合而為痺水濕得寒而浮畜于皮膚之間久而不去內舍六腑宜用去水之藥可也水濕者人身中之寒物也寒去則血行血行則氣和氣和則愈矣

世治中風大便秘者用不蛀皂角燒灰為細末每服一錢米飲調下

行中道雜方

本稀簽丸稀簽俗呼火坎草莖葉頗類蒼耳春生苗葉秋初開花秋末結實法于五月五日六月六日九月九日採其葉去根葉花實或云秋花成實後和枝取用洗淨曝乾入甌中用酒蜜蒸之九遍焙乾搗篩為細末煉蜜丸如桐子大空心用溫酒或米飲下四五十丸張乘進表云誰知至賤之中乃有殊常之效臣服至百服眼目清明至千服髮變黑筋骨強健又云其益元氣療諸疾患備合施

人服無不效

正舌散治中風舌強語澀

雄黃研 荆芥各等

右為末每服二錢用豆淋酒調下

扶神散治証同前

茯神心兩 薄荷兩 蟬稍去毒二

右為末每服一二錢溫酒調下

本治風在肝脾語澀寒脚弱大便多秘地黃酒

熟地兩 附子 茵芋 羌活

防風 芎藭各一 石斛兩 丹參二兩

牛蒡根二兩 牛膝 杜仲 桂枝各一

大麻子升

右剉入絹袋盛寬貯之用無灰酒一斗九升封漬七日

入醫經卷之十

毛

逐日空心食前後飲一盞常醺勿令吐

治中風內虛脚弱語澀防風湯

石斛一兩 地黃 杜仲 丹參

防風 川芎 麥門冬 桂心

獨活各一

右為粗末每服五錢水一大盞半寒三枚同煎去查溫服

治中風入肝脾經四肢不遂舌強語澀竹瀝湯

歲薑仙 附子 桔梗 防風

蔓刺子 枳殼 川芎 當歸各等

右為粗末每服四錢水一盞竹瀝半盞生薑四片同煎

至八分去查溫服日三四忌口

治久風邪入肝脾二經言語不轉防已湯







羅灸風中脈口眼喎斜

聽會二穴 頰車二穴 地倉二穴

凡喎向古者為左邊脈中風而緩也宜灸左喎陷中二七

壯 凡喎向左者為右邊脈中風而緩也宜灸右喎陷中

二七壯艾炷如大麥大

灸風中腑手足不遂等疾

百會一穴 肩髃二穴 曲池二穴

足三里二穴 絕骨二穴 風市二穴

凡覺手足痺或麻或痛良久乃已此將中腑之候宜灸此

諸穴病在左灸右在右灸左

灸風中臟氣塞涎上不語極危者下火立效

百會一穴 風池二穴 大椎一穴

肩井二穴 曲池二穴 間使二穴

足三里二穴

凡覺心中憤亂神氣不怡或手足麻木此中臟之候也不

問是風與氣可速灸此七穴五七壯日後再別灸之隨年

壯止凡遇春秋二季可時時灸此七穴以泄風氣

凡人風發怕痛不肯灸忽然卒死是謂何病曰風入臟故

也病者不可不知予自五月間口眼喎斜灸百會等三穴

即正右手足麻木無力灸百會髮際等七穴得愈七月氣

塞涎上不能語魂魄飛揚如墮江湖中頃刻欲絕灸百會

風池等左右頰車二穴氣遂通吐涎半碗又下十餘行伏

枕半月遂平復自後凡覺神氣少異于常即灸百會風池

等穴無不立效

本范子默記崇寧中凡兩中風始則口眼喎斜次則涎潮

閉塞左右共灸十二穴得氣通十二穴者謂聽會頰車地

倉百會有髑曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池也依

而用之無不効

羅中風鍼法出實大師氣元歸類

手太陰 列缺偏風半不遂 天府卒中惡用症不得安臥

手陽明 有髑偏風半不遂 曲池偏風半不遂

足陽明 大巨偏風半不遂 衝陽偏風口眼喎斜足緩不收

手太陽 腕骨偏風半不遂

足太陽 輔陽偏風半不遂 照海大風偏枯半身不遂善悲不樂

足少陽 陽陵泉半身不遂 環跳風眩偏風半身不遂

甲非痿臂腕不用唇吻不收合谷主之 偏枯四肢不舉

善驚大巨主之 偏枯不能行大風默默不知所痛視如

見星溺黃小腹熱咽乾照海主之 偏枯臂腕發痛肘屈

不得伸手足又風頭痛泣出有臂頸痛項急煩滿驚五指掣

不得屈伸戰惕腕骨主之

羅天接經從陽引陰治中風偏枯出雲岐子醫李新說

足太陽膀胱之脈出于至陰小指外側去爪甲如韭葉為

井金針 足少陰腎之脈湧泉起于小指之下斜趨足心

三 手厥陰心包之脈其直者循中指中衝出爪甲如韭

葉陷中為井其支者別掌中小指次指出其端 手少陽

三焦之脈起小指次指之端去爪甲如韭葉為井 足

少陽膽之脈起足竅陰小指次指之端去爪甲如韭葉為

井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛中

三 足厥陰肝之脈起大敦大指入叢毛之際去爪

甲如韭葉及三毛為井 手太陰肺之脈起大指之

端出于少商大指內側去爪甲如韭葉為井其支者出次



指內廉出其端、手陽明大腸之脉起大指次指之端入  
 次指內側去爪甲如韭葉為井、呼中指內交、足陽明  
 胃之脉起足大指次指之端去爪甲如韭葉為井、其支者  
 入大指出其端、足太陰脾之脉起足大指端循指內  
 側去爪甲角如韭葉為井、隱白是也、手少陰心之脉  
 起于小指內出其端循指內廉去爪甲角如韭葉為井、  
 手太陰小腸之脉起于小指之端去爪甲下一分、陷中為  
 井、  
 大接經從陰引陽治中風偏枯、  
 手太陰肺之脉起于大指端出于少商、大指內側去爪甲  
 角如韭葉為井、手陽明大腸之脉起于大指次指  
 之端去爪甲如韭葉為井、其支者入大指間出其端、足  
 陽明胃之脉起于大指次指之端去爪甲如韭葉為井、其  
 支者入大指間出其端、足太陰脾之脉起于大指端循  
 指內側去爪甲如韭葉為井、隱白也、手少陰心之脉起  
 于小指內出其端循指內廉去爪甲如韭葉為井、手太  
 陽小腸之脉起于小指之端去爪甲下一分、陷中為井、  
 足太陰脾之脉起于小指外側至陰、去爪甲如韭葉為  
 井、金、足少陰腎之脉起于小指之下、斜趨足心為井、湧  
 泉穴也、手厥陰心包之脉、其直者循手中指出其端去  
 爪甲如韭葉為井、中衝穴也、其支者循掌中循小指次指  
 出其端、手少陽三焦之脉起于小指次指之端去爪甲  
 如韭葉為井、足少陽膽之脉起于竅陰、小指次指之端  
 去爪甲如韭葉為井、其支者入大指岐骨內出其端、還  
 貫爪甲出三毛中、足厥陰肝之脉起于大指之端入叢  
 毛之際、去爪甲如韭葉為井、大敦也、

大接經皆十二經井穴也、此羅謙甫治趙僧判中臟刺十  
 二井穴愈治張安撫中臟炎十二井穴愈、內經所謂留瘦  
 不移節而刺之是也、  
 羅陰蹻為病陽緩而陰急、陽蹻為病陰緩而陽急、  
 羅云治失音不語、  
 手陽明 天鼎 喉痺并 合谷 瘖不  
 手少陰 陰郄 瘖不 靈道 瘖不  
 足陽明 頰車 地倉 瘖不 瘖不  
 手少陽 支溝 瘖不 三陽絡 瘖不  
 手太陽 天窓 瘖不 通谷 瘖不  
 足少陰 通谷 瘖不 間使 瘖不  
 手厥陰 間使 瘖不 頂門 瘖不  
 玉中風不語不省人事 頂門 瘖不 百會 瘖不  
 又撮要法 中衝一分 大敦一分 百會一分  
 瘖穴又法 十指尖出血 瘖不  
 玉中風失音 瘖門 瘖不 人中 瘖不  
 突 湧泉 瘖不 神門 支溝 瘖不 如舌急不語瘖門  
 東陽卒中失音不能言語 緩縱不隨 天窓刺之一分 灸五  
 十壯 息火仍移灸百會 五十壯 畢復灸天窓 五十壯 始發  
 若先灸百會則風氣不得洩內攻五臟 甚閉伏仍失音所  
 以先灸天窓  
 子治風非不語手足不遂 度病者男左手女右手小  
 指內岐骨至指端為度 以度臍上直望心下以朱塗度上  
 端畢又作兩度積所塗上令其下開其上取其本度橫置







木五錢。若有氣症加生姜一兩半若手足不遂加牛  
 膝一錢半並解三錢黃芪四錢。若腹痛加當歸芍藥  
 七錢半。若不食加人參五錢玄參一兩。若寒中三  
 陰所患必冷小續命湯加姜煎。若暑中三陽所患必  
 熱小續命湯去附子減桂心一半加薄荷煎。  
 保血氣湯治產後諸風痿攣無力。  
 秦朮 羌活 防風 白芷  
 川芎 芍藥 當歸 白朮  
 茯苓 熟地各等分  
 右為末一半蜜丸一半散酒調下五七十九妙。  
 食治產後風虛五緩六急手足頑痺氣血不調大豈一升  
 炒令熟熱投三升酒中密封飲之。  
 小品治產後中風語澁四肢拘急羌活三兩為末每服五  
 錢水酒各半煮煎去香溫服。  
 右產後中風用續命湯及羌活發散之藥必詳氣血以  
 四物四君子相與各半停對分兩服之可也。  
 口噤中例之初有口噤者故附之  
 丹口噤搗鼻用鬱金黎蘆為末水調搗之。治口噤卒不  
 得語附子杵末內管中吹喉中立安。千金翼云吹喉中恐是吹鼻中  
 經治急中風目瞋牙噤無門下藥者用此末子以中指蘸  
 末指大牙左右二三十遍其口自開始得下藥名開關散  
 天南星搗為末白龍腦二件各等分研五月五日午時脩  
 治者只一字至半錢效涎盛者吐之。  
 吐痰法  
 簡治中風口噤涎潮壅塞吐涎方用皂角一挺去皮塗猪  
 脂炙黃為末每服一錢七非時溫酒服如氣實脈盛調二  
 錢七如牙不開用白梅搗齒口開即灌藥吐出風涎痰。

本治中風不省人事牙關緊急用黎蘆一兩去蘆濃煎防  
 風湯洗過焙乾切炒微黃褐色搗末每半錢溫水下以吐  
 涎為效如人行三里許未吐再服。  
 羅分涎散治中風涎湖作聲口噤手足攣攣  
 藿香 全蝎 白附子 南星炮各  
 川砂 膩粉 粉霜各二  
 右為細末每服一錢七至二錢薄奇湯或茶湯調下未  
 吐利再服。  
 衍黃芪防風湯方見中深半  
 治中風口噤不知人事產後中風用白朮四兩水三升  
 煎一升頓服。  
 大白朮治妊娠中風口噤語言不得。  
 白朮 獨活兩 黑豈炒  
 右制以酒三升煮取一升半去渣溫分四服口噤者幹  
 開灌之得汗即愈。  
 子治中風通身冷口噤不知人事用獨活四兩好酒一升  
 煎半升分溫再服。  
 破傷風口噤見被傷  
 簡中風口噤不開 人中四分 麝香四分 得  
 又法 人中 麝香一分 皮 百會一分 承漿二  
 合谷一分  
 口噤不能言醫風主之 合谷 人中  
 口眼喎斜  
 凡半身不遂者必口眼喎斜亦有無半身不遂之症而喎  
 斜者故另立附之。



運氣

運氣口眼喎斜者多屬胃土風木不及金乘之土寡于畏也經云木不及曰委和委和之紀其動緩戾拘緩又云厥陰所至為縶蓋縶縮短也木不及則金化縮短乘之以勝木之條達也及者口目喎斜也拘者筋脈拘強也木為金之縮短牽引而喎斜拘強也緩者筋脈縱也木為金乘則土寡于畏故土兼化緩縱于其空隙而拘緩者自緩也故目喎斜者多屬胃土有痰治法宜辛溫瀉金之短縮平土之濕痰也

清陽湯治筋脈縮短牽引口目喎斜方見  
孟中賊風口偏不能語者取吳茱萸一升清酒一升和煮四五沸合服之半升日三服得少汗瘥  
下治口喎大莖三升炒令焦好酒三升淋取汁頓服一日一服

治中風面目相引口偏着耳牙車急舌不得轉方  
獨活兩 竹瀝 生地汁各一

右三味合煎取二升頓服即愈

治卒中風口喎不正取空青木如荳大一枚含之即愈  
口目喎斜之症大率在胃而有筋脈之分 經云足之陽明手之太陽筋急則口目為僻皆急不能卒視此胃土之筋為喎邪也 經云胃足陽明之脈挾口環唇所生病者口喎唇邪此胃土之脈為喎邪也

清陽湯治口喎斜頰腮急驚胃中火盛汗不止而小便數

- 升麻二錢 葛根半錢 當歸身二錢 黃芪二錢
- 甘草一分 紅花一分 蘇木五分 桂枝一錢
- 黃柏一分

右吹咀作一服酒三盞煎至一盞三分去查稍熱食前服訖以火熨摩緊急處即愈夫口喎筋急者是筋脈血絡中大寒此藥少代燔針劫刺破惡血以去凝結內泄衝脈之火熾

羅風中血脈治驗○大尉中武史公年六十八歲于至元十月初侍國師於聖安寺丈室中煤炭火一爐在左邊遂覺面熱左頰微有汗師及左右諸人皆出因左頰踈緩被風寒客之右頰急口喎于右脈得浮緊按之洪緩于舉醫學提舉忽君吉甫專科針灸先以左頰上灸地倉穴一七壯次灸頰車二七壯後于右頰上執手熨之議以升麻湯加防風秦艽白芷桂枝發散風寒數服而愈或曰世醫多以續命等藥治之今君用升麻湯加四味其理安在對曰足陽明經起于鼻交頰中循鼻外入上齒中手陽明之經亦貫于下齒中凡兩頰皆屬陽明升麻湯乃陽明經藥香白芷又行手陽明之經秦艽治口喎防風散風邪桂枝實表而固榮衛使邪不能再傷此其理也夫病有標本經絡之別藥有氣味厚薄之殊察病之源用藥之宜其效如桴鼓之應不明經絡所過不言藥性所主徒執一方不惟無益而又害之者多矣學者宜細思之

秦艽升麻湯治中風手足陽明經口眼喎斜四肢拘急惡風寒

- 升麻 乾根 甘草 芍藥
  - 人參 秦艽 白芷 防風
  - 桂枝
- 右吹咀每服一兩水二盞連煎葱根白三莖煎至一盞去查稍熱服食後服藥畢避風寒臥得微汗出則止



舟車舍人口眼喎斜先自右邊牙疼

防風五分

南星一分

桂枝三分

半夏五分

蒼朮五分

甘草二分

白朮一分

茯苓二分

右煎後入姜汁一合服

本治風客陽經邪傷腠理背脊強直口眼喎斜體熱惡寒痰厥頭痛肉腠筋惕辛頰鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭痛眩暈如坐車船常服解風邪傷寒辟霧露瘴氣寒熱神志諸風不生定風餅子

天麻

川烏

南星

半夏

川姜

川芎

白茯苓

甘草生各等分

右為細末姜汁為丸如龍眼大作餅子硃砂為衣每服一餅細嚼熱姜湯下不拘候熙豐間王丞相常服預防風疾神驗

入醫心方卷三

三

子枳茹酒主口僻眼急大驗諸藥不瘥方枳實上青括取末欲至心止得茹五升微火炒去濕氣以酒一斗漬微火燥令得藥味隨性飲之

子和東把一夫患口目喎斜其兩手急數如弦之張有力而實其人壯氣充風火交勝與調胃承氣湯六兩以水四升煎作三升分作四服令稍熱啜之前後約瀉四五行去一兩次以苦劑投之解毒數服以升降水火不司而愈脉訣云熱則生風

筋痛法  
內經治口眼喎斜多屬足陽明筋病蓋足陽明筋結頰上得寒則急得熱則弛左寒右熱則左頰筋急牽引右之弛者而右隨急牽引喎向左也右寒左熱則右頰筋急牽引左之弛者而左隨急牽引喎向右也故其治法以火灸且為之膏油熨其急者以白酒調和桂末塗其弛者又以桑

為鈞鈞其舌吻之喎僻處使正平而高下相等復以水調生桑灰干鈞柄之坎縫處連頰塗之以收其弛兼飲美酒散美肉使筋脉氣和以助外之塗熨不飲酒者自強其筋骨以手拊拍其急處使症自去也

針灸

牡蠣

附子

礬石

竈下黄土

右四味各等分為末取三年雄鷄冠血和藥傳其上持鏡看候欲復故便急洗去之不速去便過不復還也

又方酒煮桂取汁一升以故布浸搗病上則正左喎斜搗右右喎斜搗左此秘方不傳余常用大效

又方大皂莢一兩去皮子搗篩以三年石灰末水和左喎塗右右喎塗左乾又塗之

取硬石灰一合以醋炒和如泥于患偏風牽口喎斜人口唇上不患處一邊塗之立便牽正

孫卒患偏風口喎語澁取衣中白魚摩耳下喎向左摩右向右摩左即正

聖治中風口喎用巴莖七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以暖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

針灸

子和一長吏病口目喎斜予療之目之斜灸以承泣口之喎灸以地倉俱效苟不効者當灸人迎夫氣虛風入而為偏上不得出下不得泄真氣為氣邪所陷故宜灸所以立愈按此乃寒熱喎斜之愈若筋急筋弛非灸可愈必承泣地倉人迎皆足陽明陽明胃脈之所發也

玉口眼喎斜地倉針入二分沿皮斜向頰頰車針向



地倉已上二穴陽右

甲乙口辟類邪及斷交下關主之 面目惡風寒頰腫癰

痛招搖視瞻瘕瘕口僻巨筋主之 口不能水漿嚼餅水

溝主之 厥口僻失欠下牙痛頰腫惡寒口不能收舌不

能言不能嚙大迎主之 口僻偏歷主之 口僻刺太淵

引而下之 口僻紫外關主之 僻不正失欠口不開翳

風主之

干又方以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麩塞密

勿令泄風一頭納大荳一顆并艾燒令然灸七壯即瘥患

右灸左患左灸右千金不傳耳病亦可灸之

癢

凡中風多有痒甚不收者故編此附之于後與前中風方

相兼用之可也

冊經曰諸痒為虛血不榮肌膚所以癢也當以滋補藥以

養陰血和肌潤痒自不作矣 治身上虛癢四物加黃

芩煎湯調浮萍末服之 治諸痒如虫行此虛也先與大

料四物湯服之 益一斗水一石煎減半溫浴三次能治

一切風痒 諸痒凌香花末酒下一二錢此花補陰血

甚速 本草云凌香治熱風身痒游

陶安人身體肥壯久患癢痒自投風藥漸成虛症身上麻

木無力口苦乾小便數

白木 陳皮 芍藥 黃芩

茯苓 歸身 黃芪 人參

川芎 青皮 蒼朮 木通

黃柏 五味子 甘草

每服下黃精九二十九

表邪 虛邪搏於皮膚之間其氣外發腠理開毫毛提氣往來

行則為痒 何首烏散治渾身風寒濕痒

何首烏 天麻 枸杞 生地

熟地 防風 川芎 薄荷

訶子 甘草

右為末每服二三錢溫酒空心服溫茶亦得

集治風氣客皮膚癢痒不已蠅蛻薄荷末等分為末酒調

一錢七日三服 又方治風氣客于皮膚癢痒不已蜂房

炙過蠅蛻等分為末酒調一錢七日二三服

局消風散治皮膚頑麻癢痒

茯苓 川芎 羌活 人參

荆芥穗 防風 藿香 蠅蛻

白姜 厚朴 陳皮

右為末每服二錢茶酒調下

經治風癢痒不止枳殼三兩麩炒微黃去穢為末每服二

錢非時水一盞煎至六分去查服

聖治婦人癢痒身痒不止用蒼耳花葉子等分搗羅為末

頭淋酒調服一錢七

用治一切痒食羊蹄根不宜多

河痒得爬而解者爬為火化微則亦能痒甚則痒去者謂

令皮膚辛辣而屬金化辛能散火故金化見則火化解矣

聖治風癢癢痒偏身痒成瘡者用蚕沙一升水二斗煮取

一斗二升去查執洗宜避風

羅燥洗藥治一切諸風及偏身癢痒光澤皮膚

乾荷葉三十兩葦蘆兩十五兩葉本一斤 零陵香一斤



診

茅香一斤

甘松

白芷各半斤

右為粗末每用二兩生絹袋盛水二桶約四斗煎五沸放熱於無風處淋洗之避風少時如水少時便添熱湯斟酌得所勿添冷水不添藥末浴痒無如鹽濃煎湯最妙

仰寸口脉遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經則身痒而癢疹心氣不足邪氣入中則胸滿而短氣脉緩而大浮為風虛大為氣強風氣相搏大成癩疹身為痒痒者名泄風又為癩

醫學綱目卷之十

癩

醫學綱目卷之十

醫學綱目卷之十一

肝膽部

眩

癩

子癩

成無已云眩者非眩而見其眩謂眼黑眩也運者運為運轉之運世謂之頭旋是也

內經論眩皆屬肝木屬上虛丹溪論眩主於補虛治痰降火仲景治眩亦以痰飲為先也

肝木作眩

諸風掉眩皆屬於肝全法

河掉揺也眩昏亂旋運也風主動故也所謂風氣動而頭目眩運者由風木旺必是金衰不能制木而木復生火風火皆屬陽多為熱化陽主乎動兩動相搏則頭目為之眩運而旋轉故火本動也燭得風則自旋轉人或乘舟車及作環舞而眩運者其動不止而左右紆曲故經曰曲直動搖風之用也眩運而嘔吐者風熱甚故也

醫學綱目卷之十一

狗蒙招尤目取耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則入肝全法

本治肝厥頭暈清頭目釣藤散

釣藤

陳皮

半夏

麥門冬

茯苓各半兩

石膏

人參

甘菊

防風各半兩

甘草一分

右為釐末每服四錢水一鍾半生薑七片煎至八分溫服

治肝厥狀如癩疾不醒嘔吐醒後頭虛暈發熱方

麻黃

釣藤一分

石膏

乾葛

半夏一分

柴胡

甘草

枳殼

甘菊

右為釐末每服四錢水一鍾半生薑三片棗一枚同煎



至八分去查溫服

婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車上蓋因血虛肝有風邪熱故耳素問云狗蒙招搖目眩耳聾上虛下實過在足少陽厥陰甚則歸肝蓋謂此也余常取此方以授人比他藥捷而效速等勞散

川芎兩 當歸三 羌活 旋覆花

蔓荊子 細辛 石膏 藜蘆

荆芥穗 半夏麩 防風 熟地

甘草兩半

右為末每服二錢水一大鍾生薑三片同煎至七分去

查溫服不拘時服

右甘寒瀉風木

羅風痰治驗 參政楊公七旬有二有風痰於至元戊辰

八醫心法卷二

二

春忽病頭旋眼黑目不見物心神煩亂兀兀欲吐復不吐心中如懊懷之狀頭偏痛微腫面赤色腮頰亦赤色足胛冷命予治之余料之此少壯之時喜飲酒久積濕熱於內風痰內作上熱下寒是陰陽不得交通否之象也經云治熱以寒雖良工不敢廢其繩墨而更其道也然而病有遠近治有輕重參政今年高氣弱上熱雖盛豈敢用寒涼之劑損其脾胃經云熱則砭之又云高巔之上射而取之余以三稜針約二十處刺之其血紫黑如露珠之狀少頃頭目便覺清利諸症悉減遂處方云眼黑頭旋虛風內作非天麻不能除天麻苗謂之定風草此草獨不為風所播故以為君偏頭痛者乃少陽也非柴胡黃芩酒製不能治黃連苦寒酒炒以治上熱又為因用故以為臣橘皮苦辛溫灸甘草甘溫補中益氣為佐生薑半夏辛溫能治風痰

苓甘草利小便導濕熱引而下行故以為使服之數劑邪氣平生氣復而安矣

天麻半夏湯治風痰內作胸膈不利頭旋眼黑兀兀欲吐上熱下寒不得安臥

天麻 半夏各乙 橘皮白 柴胡七

黃芩酒浸 甘草炙 白茯苓皮 前胡各九

黃連三

右咬明作一服水二鍾薑三片煎至一鍾溫服食後忌

酒麩生冷物

項羌活湯治風熱壅盛上攻頭目昏眩

羌活 防風 黃芩各乙兩 柴胡七

黃連酒浸 黃柏酒炒 瓜蒌酒洗 甘草炙七

白茯苓錢五 澤瀉六錢

八醫心法卷二

三

右為末每服五錢水煎取清食後或先臥通口熱服之日二服

右苦寒瀉風木

靈筋骨血氣之精而與脈并為目系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣

外感風邪眩

本治一切頭旋本因體虛風邪乘於陽明經上注頭而遂入於腦亦因痰水在於胸膈上犯大寒使陽氣不行痰水結聚上衝於頭目今頭轉旋於羊角散

羚羊角 茯神各一 苦蕒 防風

白芷 半夏湯洗七次 枳殼 附子各一

甘草錢三



右為麓末每服四錢水一鍾半生薑五分慢火煎至七分去查不拘時候溫服

百一 都梁丸治風吹項背頭目昏黑眩痛  
香白芷大塊者用沸湯泡洗四五次焙乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用荊芥湯點茶下

無大豆紫湯治中風頭眩惡風自吐冷水有汗方見產門

聖治風頭旋用蟬殼二兩微炒為末非時下溫酒一鍾七

上虛眩針經胃風篇云上虛則眩又五臟生成篇云狗蒙招尤目  
昏耳聾下實上虛蓋蒙昏胃也招搖掉也眩黑眩也皆謂  
丹陳容婦人近五十頭痛麻木眩運脉甚虛宜補氣益血  
去風行濕

醫學綱目卷二

天麻酒乙 人參錢半 白木錢一 黃芩錢半

歸身尾酒半 川芎錢半 陳皮錢半 甘草錢三

黃芪錢三 半夏錢五 生薑錢三

右作一劑水煎服

賈舅因勞役眼眩倦怠頭不爽肚帶滯滑

黃芪錢半 人參錢半 當歸錢一 黃柏錢三

白木酒一錢 陳皮錢半 蔓荊子錢五 甘草錢三

煎稍熱飲之丑卯時各一次去枕眠少時巳申時又各一次瘥

男子因作勞成病發熱脚酸口苦頭暈

白木 茯苓 黃連 川芎錢半

白芍藥 人參 生地 陳皮

當歸各一 甘草錢一 杜仲錢六

分十八貼食前熱下抑青丸二十二粒

丈夫患熱頭眩脉大而散此是辛苦中來

陳皮錢三 柴胡錢三 人參錢二 白木錢二

黃芪錢三 木通錢一 甘草錢三 分三貼服

本治風眩頭運川芎散

山茱萸兩 山藥 甘菊花 人參

川芎兩 茯苓兩

為末每服二錢酒調下不拘時候日三服不可悞用野菊花

三因芎歸湯治產後去血過多眩暈不省及傷胎去血多

崩中夫血多金瘡去血多拔牙齒去血多不止懸虛心煩

眩運頭重目暗舉頭欲倒方見婦人

丹頭眩屬氣虛挾痰無痰作眩不得治痰為主挾補氣藥

醫學綱目卷二

并降火藥濕痰多者用二陳湯 痰多因火動者二陳湯

加酒茶眩運火動其痰二陳湯加黃芩蒼朮羌活散風行

濕 水煮金花丸治頭眩方見

丹眩運不可當者大黃三次酒炒乾為末茶調下每服一

錢至二錢 一男子年七十九歲頭目昏眩而重手足無

力吐痰口口相續左手脉散大而緩右手緩而脉大不及

於左重按皆無力飲食畧減而微溲大便三四日一行衆

人皆與風藥至春深必死予曰此皆大虛證當以補藥作

大劑服之衆怒而去余教用人參黃芪當歸身芍藥白木

陳皮濃煎作湯使下連栢丸三十粒如此者服一年半而

精力如少壯時連栢丸冬加乾薑少許餘三時皆依本法

連栢皆薑汁炒為細末又以薑汁煮糊為丸

本治虛風頭旋吐痰涎不已養正丹



黑鉛 水銀 硫黃 硃砂各一

右用鐵蓋一隻火上溶鉛成汁次下水銀用柳枝子打勻取下放少時下二味末令冷研為粉用米飲丸或用棗肉丸如梧子大每服三十九丸鹽湯下

此藥升降陰陽補接真氣非止頭旋而已

虛者宜填 補中 天麻之內素有脾胃之病時顯煩躁胃中不利大便不通初冬出外而晚歸為寒氣拂鬱悶亂大作火不得伸故也醫疑有熱治以疎風丸大便秘行而病不減又疑藥力少復加七八十九下兩行前症仍不減後添吐逆食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力不欲言心神顛倒兀兀不止目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥予謂前症乃胃氣已損復下兩次則重損其胃而痰厥頭痛作矣製半

夏白朮天麻湯治之而愈

天麻五分 半夏湯洗一人參五分 白朮一錢

蒼朮五分 橘皮 黃芪 澤瀉

白茯苓各五分 神麩一錢 大麥蘖一錢 乾薑三分

黃柏二分

右件咬咀每服半兩水二盞煎至一盞去香帶熱服食前此頭痛甚謂之足太陰痰厥頭疼非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除其苗為定風草亦治內風之神藥也內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補元氣人參甘溫瀉火補中益氣二朮俱甘苦溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升陽神麩消食蕩胃中帶氣大麥蘖寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃柏苦大寒酒洗以主冬天少火在泉發

躁也

右氣虛扶痰眩暈余嘗治一人臥則稍輕但舉足則頭旋眼黑以天麻半夏茯苓陳皮白附僵蚕參芪草歸生薑黃芩煎服之五六日愈蓋做此方加減之也

瀉芎朮湯治胃中濕痰眩暈逆頭重不食

川芎 半夏酒洗 白朮各一 甘草炙半

右咬咀每服四錢水一盞生薑七片煎服不拘時有附

子粒心

嚴旋覆花湯治中脘伏痰嘔逆眩暈

旋覆花 半夏 橘紅 乾薑各一

枳榔 人參 甘草 白朮各半

右劉碎每服一兩薑水煎服

仲卒嘔吐心下痞滿間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

方見 假令瘦人臍下有悸吐涎沫而頭眩此水也五苓散主之 傷寒

子和青黛散搐鼻取涎治眩神效 頭痛

頭風眩暈可用獨聖散吐之吐訖可用清上辛涼之藥防

風通聖散加半夏等味仲景云此痰結胸中而致也 散見

獨聖散

瓜蒂不以 鬱金各等

右為細末每服一錢或二錢薑汁調下服之用雞翎探

吐

河間搜風丸治邪氣上逆風熱上攻頭目眩暈大小便結

人參 茯苓各半 滑石兩 藿香十

大小便 滯

大小便 滯

大小便 滯

大小便 滯

大小便 滯

大小便 滯

大小便 滯

大小便 滯

大小便 滯



乾薑 白礬生各 蛤粉二 南星  
 大黃 黃芩各二 牽牛四 薄荷兩  
 半夏一 寒水石一

右為末滴水丸小豆大每十九生薑湯下加至二十九  
 日三服

仰白水附子湯治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中  
 益精氣

白朮二 附子一兩半 甘草一兩  
 右三味剉每五錢薑五片棗一枚水鍾半煎至七分去  
 查溫服

治體虛有風外受虛濕身如在空中二生散  
 生附子一分 生南星一分

右二味咬咀每服四大錢水一鍾生薑十片慢火煎至  
 八分去查服戊午年予在新安有此疾張醫傳授此方

三服愈  
 仲息形 腫者利 用澤瀉五兩白朮二兩以水二升煮一升分溫再服

運氣眩有二  
 一曰風助肝盛眩經云厥陰司天之政風行太虛雲物搖

動目轉耳鳴三之氣風乃時舉民病掉眩又云厥陰司天  
 客勝則耳鳴掉眩又云厥陰之勝耳鳴頭眩又云厥陰之

復筋骨掉眩治以諸涼是也  
 二曰濕邪傷腎眩經云太陰司天濕淫所勝頭項腰背痛

而眩治以苦熱是也  
 雜方 河神妙散搗鼻治頭目昏眩偏正頭痛方見頭

針灸 腦為髓之源其輪上在公其蓋下在風麻髓海不足則腦

轉耳鳴腰痠眩冒目無所見全文見針灸蓋者百會穴也  
 上氣不足頭為之苦傾目為之眩補足外踝下雷之見針

邪在腎有背頭項痛時眩取湧泉其會視有血者盡取  
 之針灸

怪穴 頭目眩運 至陰  
 金門 申脈

風池 神庭內風池 金門瀉 三里補  
 心頭暈怕寒些少風寒則目暗癱作不分冬夏常用綿帽  
 包日夜不離一去帽即發 百會 惺惺乙分恐 風池

頭大熱 豐隆二寸  
 桑頭熱 上顛 風門 攢竹 百會

甲風眩善嘔煩滿神庭主之如顏色青者上星主之取上  
 星者先取譙讓後取天牖風池如頭痛顛青者顛會主之

風眩引頰痛上星主之先取譙讓後取天牖風池 風  
 眩目眩惡風寒面赤腫前項主之 風眩目眩顛上痛後

項主之 風眩驚手腕痛泄風汗出至腰陽谷主之 腦  
 風目眩頭痛風眩目痛腦空主之 風逆暴四肢腫濕則

唏然寒飢則煩心飽則眩大都主之 頭眩目痛至陰主  
 之

丹左手脉數熱多 脉澁有死血 右手脉實痰積 脉  
 大必有久病

癩癩 癩癩即頭眩也痰在膈間則眩微不仕痰溢膈上則眩甚  
 仆倒於地而不知人名之曰癩癩徐嗣伯云大人曰癩小

兒曰癩其實一疾也然與中風中寒中暑尸厥等仆倒不  
 同凡癩癩仆時口中作聲將省時吐涎沫省後又復發時



作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則什時無聲  
省時無涎沫者後不復再發間有發者亦如癩癩之常法  
也

大法

丹癩屬驚與痰宜吐 大率行痰為主 黃芩 黃連

瓜蒌 半夏 南星 尋火尋痰分多少治之無有不愈

分痰與熱有熱以涼藥清其心 有痰必用吐藥吐後

用東垣安神丸 此證必用吐吐後用平肝之藥青黛柴

胡川芎之類

潮治長洪伏三脈風癩驚癩發狂惡人與火者灸第三椎

第九椎服局方妙香丸以針穿一眼子透冷水內浸少時

服之如本方若治弦細緩三脈諸癩似狂者李河南五生

九必吞丸方

氣亂于頭則為厥逆頭重眩仆針灸邪搏陽則為癩

上賞

疾見診法下同針經九針厥成爲癩疾厥氣上

素帝曰人生而有病類疾者病名曰何安所得之岐伯曰

病名爲胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而

不下精氣并居故令子發爲癩疾奇病

凡癩癩及中風中寒中暑中濕氣厥尸厥而昏眩倒仆不

省人事者皆由邪氣逆上陽分而亂於頭中也癩癩者痰

邪逆上也中風寒暑濕及氣厥尸厥者亦風寒暑濕等邪

氣逆上也邪氣逆上則頭中氣亂頭中氣亂則脈道閉塞

孔竅不通故耳不聞聲目不識人而昏眩無知仆倒於地

也以其病在頭顛故曰癩疾治之者或吐痰而就高越之

或鎮墜痰而從高抑之或內消痰邪使氣不逆或隨風寒

暑濕之法用輕劑發散上焦或針灸頭中脈絡而導其氣

皆可使頭顛脈道流通孔竅開發而不致昏眩也是知癩

癩之癩與厥或癩疾眩冒癩疾之顛一疾也王太僕誤分  
癩爲二疾獨稱真人始能一之今特冠此氣亂頭顛等經  
文於癩癩篇首使人知疾有所歸而治有所據也

高者因

而趨之

局碧霞丹治五癩疾方見上

正治暗風天麻南星半夏僵蚕白附子防風各半兩白礬

二兩用木瓜一箇切去頂取穰納前藥末用原頂覆住麩

包煨熟就搗如泥爲丸又用阜角二寸敲細酒半盞浸一

宿如發時取前藥一十九粒納口中用酒灌下取出痰即

愈自省後日服三十粒薄湯下

治風癩及心風病用阜角三挺搗破濾汁熬如稀糊攤紙

上晒乾取兩葉如小錢大用溫漿水浸洗去紙注於兩耳

孔各一規殼許須更涎下咬筋灑盡涎後服祛痰丸

代赭石生 白礬生

右爲細末稀糊爲丸如梧子大每服二十九冷水送下

不拘時

神風引湯治癩疾癩癩方見寒

無禁丹丸治五癩百癩無問陰陽冷熱

琥珀各一 晉礬各一

右用壘鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安礬在上

以炭五斤煨令炭盡取出細研以不經水猪心血爲丸

如葉豆大每服十九至二十九橘皮湯下

世治暗風遠年日久不愈皆可服用地黃廣南道地者不

計多少火煨醋焯七次爲細末每服二錢溫酒調下年深

者亦治

羅參珠丸治風癩大有神效

人參 蛤粉 珠砂各等



右為細末豬心血為丸如梧子大每服三十九金銀花湯下食遠服。

神應丹治諸癩用好辰砂不拘多少為細末用豬心血和之得所以蒸餅蒸取出就熱丸如梧子大每服一丸食遠臥時煎人參湯下大有神效。

琥珀壽星丸

天南星一斤搗坑二尺深用木炭五斤煨取出炭芝合過一宿取琥珀四兩硃砂二兩一兩一兩為出再焙乾為末

豬心三箇取血另打生薑麩糊攪令稠粘將猪心血和入藥末丸如梧子大每服五十九煎人參湯空心送下日進三服。

世蜜陀僧散治暗風取蜜陀僧成塊者以鐵線纏又用鐵線懸掛火煨紅用酒醋一升焯盡出火毒研極細每服一

木醫學綱目卷二

錢麝香酒調下治癩疾凌霄花一味為細末每三錢空心酒調服每服藥時以木梳不住手梳其髮又用冷水一

碗逐口合之水温則換水盡在梳如此四十九日永絕其根。

楊氏家藏五癩丸治癩癩發作不問新久並宜服之。

天南星二錢去烏蛇肉酒浸一宿去硃砂二錢半

全蝎二錢去半夏二錢酒洗雄黃一錢半蜈蚣半條去

白附子二兩白僵蠶一兩半麝香三錢

白礬一兩皂角四兩兩提神水半升升煉

右為末薑汁煮麩糊丸如梧子大每服三十九薑湯下

州治癩疾

川芎二兩防風猪牙皂角鬱金

明礬各一蜈蚣一條

右細末蒸餅丸如梧子大空心清茶下十五九一日除根。

羅治癩病心風病用天南星九蒸九曝為末生薑汁打糊為丸如梧子大每服二十九煎人參麥門冬葛蒲湯下亦可。

風木

素春脈者肝也春脈太過為病在外善怒忽眩冒而癩疾全文見治法脈來歲木太過甚則忽善怒眩冒而癩疾全文見治法

治巡檢夫人癩通聖散二錢半薑三片煎下犀角丸三

保防風通聖散

防風川芎當歸芍藥

大黃芒硝連翹薄荷

麻黃各五錢桔梗黃芩石膏各一

白木山梔荆芥穗錢半滑石兩

甘草兩

右為齋末每服一兩生薑煎溫服日再服若勞汗當風寒薄為齋鬱乃瘞此勞汗出於玄府脂液所凝去芒硝倍加芍藥當歸發散玄府之風當調其榮

衛俗云風刺或生癩疹或赤或白倍加麻黃鹽豉菴白出其汗麻黃去節亦去芒硝以鹹走血而內凝故不用之發汗罷依前方中加四物湯黃連解毒三藥合而

飲之日二服故內經曰以苦發之為熱在肌表連內也小便淋閉去麻黃加滑石連翹煎藥中調木香末一錢

七麻黃主於表而不主於裏故去之腰脇走注疼痛者加硝石當歸甘草一服各二錢調車前子末海金沙



末各一錢故經曰腰者腎之府 破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以下之 蕪散之汗下後通利榮血祛逐風邪每一兩加荆芥穗大黃各二錢調全蝎末一錢羌活末一錢 諸風痛搗小兒急慢驚風大便秘結邪熱暴甚腸胃乾燥發汗咬牙上竅腫脹筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩加大黃二錢梔子二錢茯苓末二錢七如肌肉蠕動者調羌活末一錢經曰肌肉蠕動命曰微風 風傷於肺咳嗽喘急者每一兩加半夏栝樓紫苑各二錢 如打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃各三錢半調沒藥乳香末各二錢 解利四時傷寒內外所傷每一兩加益元散一兩芎白十葶藶散一合生薑半兩水一碗同煎至五七沸或煎一小碗溫冷服一半以筋投之即吐吐罷後服一半稍熱服汗出立解 如飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連鬚二錢菝白十莖依法立愈慎勿用桂枝麻黃湯解之頭旋腦熱鼻寒濁涕時下每一兩加黃連薄荷各二錢半內經曰腦移熱於腦則辛頰鼻淵者濁涕下不已王註曰腦液不澄則為濁涕不已如水泉者故曰鼻淵也此為足太陽脉與陽明脉俱盛也如氣逆者調木香末一錢

素心脉滿大痲癢筋攣  
 仰風引湯除熱癩癩又治大人風引少小驚癩癢癩日數十發醫所不療又治脚風

大黃	龍骨	乾薑	桂枝
甘草	牡蠣	寒水石	滑石
赤石脂	白石脂	紫石英	石膏

右十二味杵籠末篩以青囊盛之取三指撮并花水三升煮三沸溫服一升 升少清熱不食後服不效  
 河犀角丸治風癩癩發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末	赤石脂	朴硝	白僵蚕
薄荷葉			

右為末麩糊丸如梧子大每服二十九至三十九溫水下日三服不拘時候如覺痰多即減數忌油膩炙燥  
 龍腦安神丸治男婦五種癩癩無問遠年近日發作無時  
 茯苓末去皮取  
 麥門冬去心各  
 硃砂  
 烏犀角末  
 金薄

右十三味煉蜜為丸如彈子大金薄為衣冬月溫水化下夏月凉水又治虛勞發熱咳嗽語澁舌強日進三服  
 羅沉香天麻湯治癩癩癢癢筋攣癢癢方見小  
 珠子辰砂丹治風癩久不愈者

薯蕷	人參	遠志	防風
紫石英	茯苓	虎骨	虎睛
龍腦	五味子	石膏	丹參
細辛	珠子末		

右件為細末麩糊為丸如梧子大用硃砂二錢研細為衣每服三十五丸煎金銀花湯送下日進三服忌魚肉



濕痺動風之物

烏頭丸治五風癩病

川烏

草烏

天仙子

五靈脂各二

黑荳升

右為細末滴水丸如梧子大每服五七丸溫水下如

中風加附子半兩

實

子和昔項開完顏氏病捕先右臂并右足約捕六七十數

良久左臂并左足亦搭六七十數不瘥兩目直視昏瞶不

識人幾月餘求治於余先涌其寒痰三四升次用導水禹

功散泄二十餘行次服通聖散卒涼之劑不數日而瘥

羅法灸草麻子治諸癩病不問年深日遠

草麻子去皮取仁二兩黃連去鬚剉如

右件用銀器水一大碗慢火熬水盡即添水熬二日兩

夜為度取出去黃連只用草麻子仁風乾不得見日用

竹刀將草麻子每粒切作四塊每次服五粒計二十塊

作一服用荆芥湯食後溫服服草麻子仁者終身忌食

丹治一婦人四十五歲生子多觸胎時有腹痛每夜喜飲

酒三盞即睡其夫性暴而諧謔所以借酒解怒忽九月望

後癩病大作目上視揚手擲足甚強健舉體大筋皆動喉

嚔如鋸涎沫流口兩角如此一時辰許諸症皆靜狀如熟

寢全不知人半時小腹漸痛上至心痛大作汗如雨自頭

至乳而止如此半時痛漸減汗亦收痛作時却自言其痛

其餘言語皆謬誤問亦不答亦不知人痛定又熟寢如前

癩與痛間作晝夜不息經兩宿方召予脈之痛作時脈四

至半似弦非弦左弱於右予未敢與藥候痛作時再看形

脈後作時六脈皆隱但有筋轉於指下眼白青而面不

青手之動三倍於足予問之痛作時必欲重按比痛作時

汗必不出其夫言果然予曰此非死證若尚能嚔藥則易

治試以調香附子末灌之適癩勢稍定却嚔得半盞令急

燒竹瀝未就時痛大作余以肝有怒邪因血少而氣獨行

所以脚受病肺胃之間舊有酒痰為肝氣所抑鬱而為痛

然酒喜動可以出入升降入內則痛出外則癩當乘其入

內之時急為點大敦行間中腕三處穴令分頭同時下火

灸之足上艾火少灸先下腹上痛漸下至腰而止熟藥少

時癩作如前證減半又以竹瀝入少薑汁灌下大半鍾灌

時適值癩定但熱寐如前自是不省人事一晝二夜皆已

棄之余曉之曰身不發熱因痛則汗出大便不通者五六

日自予來亦未見其小水非死症當是血少無神而昏耳

爾為痛指人中俄而呻吟急以人參湯同竹瀝灌之又昏

睡如前余教以作人參白朮膏入竹瀝調下如此二晝夜

凡用人參一斤白朮二斤眼忽能開手能舉自言胃膈滿

而舉身皆痛耳目仍未有聞見忽自溺床甚多余聞之甚

喜且得癩與痛皆不作但教令用陳皮芍藥甘草川芎湯

調參木膏又加竹瀝飲之余欲往他處且與脈之聞其作

聲余自知謬拙不教以粥與藥間服急令作稀粥與之止

嚔得三四匙牙禁不受余遂以木楔幹開以稀粥入藥湯

又與竹瀝同灌一大鍾蓋是粥多而藥居三之一予遂出

門教令粥藥相間與之予在二十里外未申間天大風作

予料此婦癩必作特往視之癩不作而痛作脈去來急無

次急為灸然灸太衝巨關灸罷痛定問其要粥否答曰我

正飢其夫飲之以粥嚔兩鍾予乃往他處仍教以藥湯調

參朮膏竹瀝與粥間與之如前第二夜半時召予甚急往



視之癩病大作奪手不能診脈令人扶定兩時予捉其中指強而脈之四至半愈大有力左右同而右少緩口妄言而無次又怒罵人眼上視不瞬而嘔又欲起走其狀若有所憑然予捉定兩手為灸兩大指背半甲半肉際各三壯怒狀稍殺求免索粥視之耳目仍未有聞見昏寐至夜半狂怒大作且言鬼怪之事而師巫至大罵巫者予靜思之氣因血虛亦從而虛邪因入理或有之且與補藥血氣若克邪當自退仍與前藥又恐痰頑佐以荆瀝又以秦承祖灸鬼法灸之哀告我自去昏睡一晝夜忽自起坐索粥其夫與之方問夫你面垢如許性床上有香氣繼又無所知識惟開眼不睡手足雖能運動却作尋摸態如此又二晝夜粥食稍加又溺床多如前予益喜仍守前藥予又往他處次日晚忽來召予急往視之病人自言渾身皆痛脈之

皆五至左右均而和曰參朮膏俱盡遂教令就與前藥中加參朮煎去荆瀝加香附末與一服覺甚快余且令守此藥至次夜半又來告急曰前痛大作往視之坐榻上叫聲甚高予思之此虛病亦多汗腸燥而糞難耳痛當在小腹與腰急烘琥珀膏下者貼小腹仍教以熱手摩腰腎間連得下氣而痛減就睡少時又起如是者五六次一醫者勸令用通利藥予曰痛與死孰為輕重且堅忍至夜半後當自通又往他處至四更來告急往視之痛大作予令坐以溫湯中當自下換湯痛定覺甚快第二桶湯下結糞二塊就睡天明予又往他處至晚又告急予視痛大作連及兩脇手不可近予思之此痛無因若結糞未盡痛當在下今痛在上必因食多問之果然醫者欲用感應丸予教勿與粥藥病者力索藥遂以香附末令舐之至夜半痛漸減天

明覺畧飢索粥予曰非飢也乃嘈耳勿與而自安其家又自與粥至辰已間予往他處至晚痛又作而病者索香附末不已遂以湯調半碗與之探令吐猶有宿食痛遂止予又往他處至夜半又告痛復作詢之以醋拌蘿蔔苗吃粥又以香附末探吐之痛定教令一晝夜勿與食至次日少與淡粥覺飢時以陳皮湯下白朮丸如此調理自安痰癩癩治法並見上虛條

治風癩病久不能愈者從厚朴丸春秋加添外又於每一料中加人參菖蒲茯苓各一兩五錢和劑服之厚朴丸

升陽湯治陽蹇癱足太陽下行宜升陽氣

麻黃八錢 羌活一兩 防風根八錢 炙甘草五錢

右吹咀每服三錢水五大盞煎至一盞去渣稍熱服宿

食消盡腹中空服之後避風寒一二時辰乃效

瀉毒發治陽蹇申脈二穴在足外踝下陷中容爪甲白肉際是也夜發治陰蹇照海二穴在足內踝下陷中是也先灸兩蹻各二十七壯然後服前藥

治百病風癱用麻仁四升水六升猛火煮令芽生去查煎取七合旦空心服或發或不發或多狂語勿怪之但令人摩手足須臾即定凡進三劑無不愈

羅神應丹治諸風心癩病

狐肝一具 烏鴉一隻 鴟梟一隻 白礬一兩

野狸一箇去肚腸不用皮毛用 生犀角末一兩

右為末用酒打麩糊為丸如皂子大硃砂為衣每服一

丸酒送下不拘時候

楊氏蝎虎治癩法見小兒驚癩門妙



靈暴擊癩眩足不任身取天柱  
氣亂於頭則為厥逆頭重眩仆取之天柱天杼不知取太  
陽榮輸於此義同

癩疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極已而煩心候  
之于顏取手太陽陽明太陰血變而止癩疾始作而引  
口啼呼吸悸者候之手陽明太陽左強者攻其右右強者  
攻其左血變而止癩疾始作先反復因而春痛乃候之  
太陽陽明太陰手太陰血變而止俱出癩

國癩此後癩必先下之乃可灸不狂鳩尾必高千乃可下  
可灸此則不能發人針不抽鳩尾針但宜灸亦不  
令人健忘

鳩尾 湧泉 心膈  
陽交 三里 後谿 太衝 間使

八醫學綱目卷二  
摘風癩熱病心風驚癩 上脫 三里

桑天吊 巨關 百會 顛門  
東癩 平旦發者足少陽 晨朝發者足厥陰 日中發

者足太陽 黃昏發者足太陰 人定發者足陽明 半  
夜發者足少陰 心癩而赤心下熱短氣喘息 巨缺

肝癩而青反視手足搖動 丘墟 中封 脾  
癩而黃腹大善利 胃脘并腕傍一寸各三壯 衝陽

隱白 肺癩面白口吐沫 肺膈 少商 少陽 三  
腎癩面黑正直視身不搖如尸厥 金戶 少海 至陰

湧泉 各三壯 膈癩四肢不舉 風府 一七壯 百會  
人中 承漿 各壯 腸癩都無動靜如尸厥狀 承山

湧泉 勞宮 翳風 各隨年壯  
馬癩目張搖頭馬鳴欲反折 風府 三壯 神關

牛癩目直視腹滿 鳩尾 尖三 大椎三

羊癩揚目吐舌 大椎三壯 浮白三壯

猪癩吐濁沫口動搖 浮白三壯 絲竹空 肋戶各一

犬癩手屈拳攣 勞宮一分 至陰 竅陰 厲兌各壯

鷄癩搖頭反折善驚目捷 至陰 竅陰 厲兌各壯

甲癩疾多言耳鳴目僻頰腫實則聾齒齲喉痺不能言齒痛  
單使血虛則痺膈偏歷主之 癩疾吐舌鼓頰任言見鬼

溫滯主之 癩疾吐舌曲池主之 癩疾互引僵仆  
申脈主之先取陰踠後取京骨 癩疾狂妄行振寒京骨

主之 癩疾身痛狂善行束骨主之 癩疾僵仆轉筋  
參主之 癩疾目眩疏軌崑崙主之 狂癩疾體痛飛

揚主之 癩疾反折委中主之 癩疾憎風而振寒不得  
言得寒益甚身熱狂走欲自殺目反妄見瘰癧泣出死不

知人肺膈主之 癩狂膈膈及肝膈主之 癩疾僵仆目  
妄見恍惚不樂狂走癩癧絡都主之 癩疾互引反折戴

眼及眩狂走不得臥心中煩攢竹主之 癩疾發寒熱大  
煩滿悲泣出解谿主之 癩疾互引口喝喘悸者大迎主

之取手陽明太陰變血而止 癩疾狂多食喜笑不發於  
外煩心渴商丘主之 癩疾嘔沫神庭及兌端承漿主之

其不嘔沫本神及百會後頂玉枕天衝大杼曲骨足澤陽  
谿外丘當上腕傍五分通谷金門承筋合陽主之 委中下

陽 癩疾互引水溝及斷交主之 癩疾上星主之先取  
噫噫後取天牖風池 癩疾嘔沫暫起僵仆惡見風寒面

赤腫願會主之 癩疾癩癩狂走頸項痛後項主之 後項  
十五分 癩疾狂走瘰癧搖頭口喝戾頸強強間主之



癲疾骨瘦眩狂癡癩口噤羊鳴刺腦戶 狂易多言不休  
及狂走欲自殺目反妄見刺風府 癲疾怒欲殺人身柱  
主之 狂走癲疾昏急強目轉上插筋輸主之 癲疾發  
如狂走者面皮厚敦敦不治虛則頭重洞泄淋瀝大小便  
難腰尻重難起居長強主之 寒厥癲疾噤呵癡癩驚狂  
陽交主之 癲疾大瘦腦空主之 癲疾僵仆狂虛脫骨  
及風池主之 癲疾狂癡癩眩仆瘡不能言羊鳴沫出聽  
官主之 癲狂煩滿刺絲竹空 癲疾吐舌沫出羊鳴戾  
頸天井主之 癲疾氣短嘔血胸背痛行間主之  
癡厥癲疾洞泄然谷主之 癲狂互引天柱主之  
右針灸癲法內經但取手足太陽陽明太陰六經而已  
今甲乙經等書又多取督經手足太陽足少陰厥陰蓋  
隨症取之然學者當以內經為主也

八醫學綱目卷十一

主

診  
癲骨癲疾者顛齒諸膺分肉皆薄而骨居汗出煩惋嘔多  
沃沫氣下泄不治 癲疾者骨居汗出 筋癲疾者身  
倦擊急大刺項大經之大杼嘔多沃沫氣下泄不治 脉  
癲疾者暴仆四肢之脉皆脹而縱脉滿盡刺之出血不滿  
灸之挾項太陽灸帶脉于腰相去三寸諸分肉本輪嘔多  
沃沫氣下泄不治 癲疾者疾發如狂者死不治 治癲  
疾者常與之居察其所當取之處病至視之有過者瀉之  
置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨二  
十壯窮骨者骸骨也 俱出  
來疾去徐上實下虛為厥癲疾 全文見治  
素癲疾脉搏大滑久自已脉小堅急死不治 實論  
疾脉虛則可治實則死 同  
脉癲疾脉實堅者生脉沉細小者死 此見與內經相死更  
詳之當以內經為正

子癩  
雷膏根湯治姪娠臨月因發風症忽悶瞶不識人吐逆眩  
倒名曰子癩

葛根 貝母去心 牡丹皮 防風  
當歸 川芎 白茯苓 桂心  
澤瀉 甘草各二 獨活 石膏  
人參各三

右咬咀以水九升煮取三升分溫二服貝母令人易產  
未臨月升麻代之

丹治一婦人懷妊六月發癩手足揚直面紫黑色合眼涎  
出昏瞶不省人事半時而醒腎與震靈丹五十餘貼其疾  
時作時止無減症直至臨產方自愈產一女聲中子母皆  
安次年其夫疑丹毒必作求治之診其脉浮取弦重取瀉

八醫學綱目卷十一

主

按至骨則沉實帶數時正二月因未見其癩發正狀未敢  
與藥意其舊年癩發時乃五月欲待其時度此疾必作當  
審諦施治至五月半其疾果作皆是午已兩時遂教以自  
製防風通聖散用生甘草加桃仁多紅花少或服或吐至  
四五劑疾漸疎而輕發為疥而愈

大治子癩用硝砂末酒調下二錢 詳見  
安胎

大法補

瘧病者口噤角弓反張者是也  
丹瘧大率與癩病相似比癩為虛宜帶補多是氣虛有火  
兼痰宜服人參竹瀝之類不用兼風藥  
無此症多由亡血筋無所營故邪得以襲之所以傷寒汗  
下過多與夫病瘡人及產後致斯病者藥可見矣  
丹一男子二十餘歲患瘧瘡腐謝後忽患口噤不開四肢



強直不能屈時或透膝腰痛一陣則冷汗如雨痛定則汗止時作時止其脈極弦緊而急如真弦狀向知此子極勤苦意其因勞倦傷血山居多風寒乘虛而感又因痘瘡其血愈虛當用辛溫養血辛涼散風遂以當歸身芍藥為君川芎青皮釣藤為臣白木陳皮甘草為佐桂枝木香黃連為使更加紅花少許煎十二貼而安

神木加羌活麻黃湯治剛痙解利無汗神木方見傷寒太陽

白木加桂心黃芪白木湯治柔痙解利有汗白木方見傷寒太陽

太陽陽明加川芎 荆芥穗 正陽陽明加羌活 酒大黃 少陽陽明加防風 柴胡根

熱而在表者加黃芩 寒而在表者加桂枝黃芪附子

熱而在裏者加大黃 寒而在裏者加乾薑良薑附子

已上數經寒熱當以脈別之

八醫綱目卷二 五

表症屬太陽

防風當歸散 防風 當歸 川芎 地黃各一兩

右剉每服一兩水三盞煎至二盞溫服

仲活人治痙法並見後表裏陰陽條 太陽病發熱無汗而反惡寒者名曰剛痙 太陽病發熱汗出而不惡寒者名曰柔痙

仲葛根湯治太陽無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痙葛根湯主之方見傷寒

若發熱無汗反惡寒者名曰剛痙宜麻黃加獨活防風湯

麻黃六兩 桂枝各一兩 芍藥三兩 甘草半兩

獨活 防風各一兩

右剉細每服一兩水二鍾煎至一鍾半溫服

仲瓜蒌桂枝湯太陽病其症備身體強凡凡然脈反沉遲

此為柔痙潮濕治有汗而為柔痙

瓜蒌根二兩 桂枝三兩 甘草二兩 生薑三兩

大棗十二枚 芍藥二兩

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃啜粥發之

潮若發熱自汗而不惡寒者名曰柔痙宜桂枝加川芎防風湯

桂枝 芍藥 生薑各一兩 甘草

防風 川芎各一兩 大棗六枚

右剉細每服一兩水三盞煎至一盞半去渣溫服

凡剛柔二痙並可與小續命湯方見中風門但去查入生薑汁 小續命湯加減法 若柔痙自汗者去麻黃夏間及病有熱者減桂枝一半冬及初春去黃芩

子續命湯治卒中半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智或癡或身強直不語或生或死狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用食大小便不利皆療之

八醫綱目卷二 五

人參 桂心 當歸 獨活

黃芩 乾薑炮 甘草炙各七錢半 石膏一兩

杏仁四十枚

右九味以水九升煮取三升分溫三服日二服取汗無汗者加麻黃

仲剛痙為病曾滿口噤臥不着席脚攣急必齧齒可與大承湯方見傷寒

子扣呂君王之妻年三十餘病風搐目眩角弓反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風痙治之以天南星雄黃天麻烏附用之殊無少效戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直搖



動風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木  
肝木茂而自病因涌風涎二三升次以寒刺下十餘行又  
以排針刺百會穴出血一盃立愈

潮若汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來寒熱脈弦者  
少陽風症宜柴胡加防風湯

柴胡兩 人參五錢 半夏六錢 黃芩五錢  
生薑 甘草各六錢 防風兩 棗三錢  
右剉每服一兩水三盞煮至一盞半去查溫服

若發汗過多發熱頭面暈卒口噤背反張者太陽蕪陽明  
也宜去風養血防風當歸散主之方見本門  
陽症並見表裏條仲身雖曰瘥皆身熱足寒然屬陽不厥  
逆

白一治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之  
以酒或水六升煮取二升去查服

子倉公當歸湯治賊風口噤角弓反張瘥方  
當歸 防風各七錢 獨活一兩 附子一枚  
細辛兩 麻黃一兩二錢

右咬咀以酒五升水三升煮取三升服一升口不開者  
格口納湯一服當蘇二服小汗三服大汗

活八物白木散治陰瘥一二日面腫手足厥冷筋脈拘急  
汗不出恐陰氣內傷

白木 茯苓 五味子各半 桂心三分  
麻黃兩 良薑一分 羌活兩 附子三分  
右為末每服四錢水一大盞生姜五片同煎至五分去  
查溫服無時

海若發熱脈沉而細者附太陰也必腹脹宜桂枝加芍藥

防風防已湯 又宜小續命湯

桂枝兩 防風 防已各一兩 芍藥二兩  
生薑半兩 大棗六枚  
右剉每服一兩水三盞煎至一盞半去查溫服

活附子散治陰瘥手足厥逆筋脈拘急汗出不止頭項強直  
頭搖口噤

桂心三錢 附子一兩 白木兩 川芎三錢  
獨活兩  
石為末每服三錢水一鍾棗一枚煎至五分溫服

桂心白木湯治陰瘥手足厥冷筋脈拘急汗出不止  
白木 防風 甘草 桂心  
川芎 附子

石為末每服五錢水二鍾生薑五片棗二枚同煎至七  
分去查溫服

附子防風散治陰瘥閉目合面手足厥逆筋脈拘急汗出  
不止

白芷兩 防風 甘草各三錢 桂心兩  
附子三分 乾薑三分 柴胡半兩 茯苓三分  
五味子兩

右為末每服三錢水二盞生薑四片同煎去查溫服  
潮發汗太多因致瘥身熱足寒項強惡寒頭熱面腫目赤  
頭搖口噤背反張者太陽瘥也 若頭低視下手足牽引  
肝膝相攢陽明瘥也 若一月或左右邪視并一手一足  
搐搦者少陽瘥也汗之止之和之下之各隨其經可使必  
已

右太陽瘥屬表無汗宜汗之有汗宜止之陽明瘥屬裡



宜下之少陽瘧屬半表半裏宜和之所謂各隨其經也  
丹盧婦人因怒手足強直十指如束左脈弦虛右脈弦大  
而強稍堅此風木攻脾土宜速瀉肝氣助肺金補脾土之  
陰

黃連錢 天南星 白朮 人參

黃芩 天麻 川芎 木通

陳皮 青皮各半 甘草一分

作一貼煎取一盞入薑汁令辣再沸熱服

肺移熱於腎傳為柔瘧全文見診

逆氣

運氣瘧有三 一曰風經云厥陰在泉客勝則大關節不  
利內為瘧強拘急外為不便又云諸暴強直皆屬於風是  
也 二曰濕經云諸瘧項強皆屬於濕王註謂陽內鬱而  
陽行於外是也 三曰寒包熱經云火太過曰赫熱赫熱

入醫經卷二 三

之紀上羽與正徵同其病瘧蓋司天之寒東火於中亦陰

雜方

陽內鬱陰行於外之意也

世治角弓反張胞衣瓶內水鷲毛挑入患人口唇即愈

附治中風身體強直不得屈伸反覆括栝樹皮細切一升  
以酒二升浸一宿每日溫酒服半升酒盡再作精實即拘

子治口噤手足不隨而身體強直伏龍肝五升以水七升  
和攪取汁飲之

仰病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭

動搖卒口噤背及張者瘧病也活人書云外症瘧惡寒

發熱而項背 太陽病發汗太多因致瘧 夫風病下之

則瘧復發汗必拘急 夫瘧脈按之緊如弦直上下行

脈瘧家其脈伏堅直上下行

瘧疾家其脈伏堅直上下行

凡瘧脈皆伏沉弦紫

仰太陽病發熱脈沉而細者名曰達為難治 瘧病有灸

瘧難治此破傷 瘧病若發其汗者寒濕相搏其表益虛

即惡寒 瘧病發其汗已其脈冷冷如蛇暴腹脹大者為

欲解脈如故反伏弦者瘧

風瘧身反折先取足太陽及腦中及血絡出血中有寒

取三里熱刺

太陽所謂強上引背者陽氣太上而爭故強上也脈解

督脈為病脊強反折骨空

足少陰之筋循脊內挾脊上至項其病主癰瘕及瘧在外

者不能伸在內者不能仰故陽病者腰反折不能伸陰病

者不能仰治在燔針

甲風瘧身反折先取太陽及腦中及血絡出血 瘧中有

入醫經卷二

寒取三里 瘧取之陰踴及三毛上及血絡出血 瘧取

顛會及百會又腦輪上關光明主之 瘧目不胸刺腦戶

瘧脊強反折瘧癩疾頭重五樞主之 瘧互引善驚

天衝主之 瘧反折心痛形氣短尻腫瀉小便黃閉長強

主之 瘧筋痛急互引肝輪主之 熱瘧脾輪及腎輪主

之 瘧口噤互相引口乾小便赤黃或時不禁承漿主之

瘧驚互引脚如結腸如裂束骨主之 瘧反折互引腹

脹掖樂背中快引脇痛內引心中脊內肺輪主之 又

刺陽明從項而數背推俠脊脊而痛按之應手者刺之尺

澤三病立已

勞風之瘧

虛邪 四云瘧比瘧為虛蓋因勞汗遇風內挾太陽寒濕之邪治

亦與瘧同法但當視其所勞則知虛在何處如勞於心則



未

虛汗出腠理開風入皮膚得寒則閉風不能出與水俱行其人當目下腫如臥蚕之狀戴人云腎主水其經至于目下故也不禁房室則死明其虛在腎也所以關於太陽何也太陽主寒其經最在外腠理得寒則閉故太陽先受邪也治宜八物白朮散倉公當歸湯見前

胎前症

此病多由風寒濕乘虛而感皆從太陽經治之

活獨活防風湯 治瘧太陽有汗

桂枝兩 芍藥兩 甘草兩 獨活

防風兩

右剉細每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服

防風葛湯 治瘧太陽無汗

葛根兩 麻黃兩 芍藥 防風兩

桂枝兩

右剉細每用一兩先煮麻黃去上沫入後藥同煎數沸

溫服

產後症

千竹瀝湯 治產中風口噤面青手足急強用竹瀝一竹

分為五服微溫頻服大效

此症因虛遇風挾痰而作宜服人參竹瀝之類

虛痰 產問曰產後汗出多而變瘧者何答曰產後血虛腠理不

密因遇風邪搏之故變瘧也宜速斡口灌小續命湯稍緩

解表 即汗出如雨手拭不及不可救也小續命方

舉鄉古拜散 治新產血虛瘧者荆芥穗不以多少瓦上

微炒為末大青黃卷熱酒沃之去黃卷取汁調四五錢和

查飲之其效如神

干大荳紫湯 治產後中風形如角弓反張口噤是潮黑

荳半升炒令焦黑烟起以無灰酒二升沃之入磁器中每

用一盞入獨活五錢同煎至六七分去滓溫服

按續命已下三方太陽厥陰藥也邪實脈浮弦有力者

固宜但產後血氣大虛之人不宜輕發其表但用防風

常歸散治之為妙

海防風常歸散方見前

破傷風 瘰癧 顫振 產後瘰癧

破傷風者因瘡熱甚鬱結而榮衛不得宣通怫熱因之遍

體故多白痲是時瘡口閉塞氣難宣通故熱甚而生風也

先辨瘡口平無汁者中風也過自出黃水者中水也並欲

作瘡急治之又痛不在瘡處者傷經絡亦死症也初覺瘡

腫起白痲身寒熱急用玉真散貼之傷在頭面急嚼杏仁

和雄黃白麩傅瘡上腫漸消為度若腰脊及四肢強直

牙關口噤通身冷不知人急用蜈蚣研細末擦牙吐出涎

沫立甦亦宜按摩導引

破傷風風熱腫甚佛醫在表而裏氣尚平者善伸數欠

筋脈拘急或時惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦也宜以辛

熱治風之藥開衝結滯而愈猶傷寒表熱拂鬱而以麻黃

湯辛熱發散也凡用辛熱開衝熱結滯宜以寒藥佐之

則良免致藥中病而風熱轉甚也如治傷寒發熱用麻黃

桂枝加黃芩石膏知母之類是也若止以甘草滑石蔥豉

寒藥發散甚妙若表不已漸傳入裏裏又未太甚而脈弦

小者宜以退風熱開結滯之寒藥調之或微加治風辛熱

亦得猶傷寒在半表半裏而以小柴胡和解之也若裏勢



已甚而舌強口噤項背反張驚悸搐搦涎吐稠粘胸腹滿  
寒便溺秘結或時汗出脈沉洪數而弦也然汗出者由風  
熱鬱甚于裏而表熱稍罷則腠理疎泄而心火熱甚故汗  
出也法宜除風散結寒藥下之後以退風熱開結滯之寒  
藥調之則熱退結散而風自愈矣  
昔後播者羌活獨活防風甘草向前播者升麻白芷獨活  
防風甘草兩傍播者柴胡防風甘草右播加滑石  
解表  
河玉真散

南星 防風各等  
右為末生姜汁酒調服傷處以此貼之  
羌活防風湯 治破傷風初邪傳在表

羌活 防風 川芎 藜蘆  
當歸 芍藥 甘草 地榆

細辛各一  
右吹咀每服五錢水二盞煎八分熱服熱則加黃芩一  
兩大便秘加大黃一兩

防風湯見前  
蜈蚣散  
蜈蚣對 魚鱉五錢 左蟾龍

貴表 白木防風湯若服前藥已過歲府和有自汗者宜服此藥  
白木 防風 黃芪各一

攻裏 大芩黃湯臍秘小便赤自汗不止者宜速下之  
川芎一兩 黃芩六錢 甘草一兩 大黃一兩

右吹咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服以利

為度

江鱈丸 治破傷風驚而發搐厥府秘澁知病在裏

江鱈半兩 野鴿半兩 雄黃一錢 蜈蚣對

天麻兩 白礬半兩  
右為細末分作三分先用二分燒餅為丸如桐子大珠  
砂為衣又用一分入巴菝霜一錢同和亦以燒餅為丸  
不用珠砂為衣每服珠砂為衣丸藥二十九丸入巴菝霜  
丸藥一丸次服二丸漸加至利為度再服珠砂為衣丸  
藥病愈止

和解 羌活湯 利後宜服播瘧不已亦宜服

羌活 獨活 地榆各一  
每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服如有熱加黃  
芩有痰加半夏

地榆防風散 治半表半裏頭微汗身無汗

地榆 防風 地丁香 馬齒寬

右為細末每服三錢溫米飲調下  
養血當歸地黃散日久氣血漸虛邪氣入胃宜養血四物  
湯加防風藜蘆白芷細辛各等分為細末每用五錢水一  
盞半煎至一盞溫服

瘵癰  
病筋脉相引而急名曰瘵癰俗謂之搐是也  
河諸執瘵瘵皆屬于火熱勝風搏併于經絡風主動而不  
寧風火相乘是以熱瘵瘵生矣治法祛風滌熱之劑折其  
火熱瘵瘵可立愈若妄加灼艾或飲以發表之劑則死不  
旋腫矣

診治 素問云心脉急甚者為瘵瘵此心火虛寒也治宜補心牛



黃散主之靈樞云心脉滿大癩癢筋攣此心火實熱也治宜瀉心火涼驚丸主之肝脉小急亦癩癢筋攣此肝虛也續斷丸主之若肝脉盛者先救脾宜加減建中湯素問云脾脉急甚者亦為癩癢此脾虛肝乘之而癩也故宜實土瀉肝木之劑

虛實汗多不止為虛無汗能食為實  
脾胃垣人參益氣湯 治熱傷元氣四肢困倦手指麻木時時痰癢

黃芪錢二 甘草各五 升麻各五 五味子三十

柴胡分六 生甘草分五 人參分二 炙甘草分五

右收咀作一服水二盞煎至一盞去查熱服  
獨活湯 治風虛昏瞶不自覺知手足痠癢或為寒熱血

虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之  
獨活 羌活 人參 防風

當歸 細辛 茯神 遠志

半夏 桂心 白薇 菖蒲

川芎各五 北草半 每服一兩水二盞生薑五片煎八分食後溫服

胃風湯 治虛風症能食麻木牙關緊急手足痠癢目肉蠕動胃中有風面腫

白芷錢二 升麻錢二 葛根錢一 蒼朮錢一

甘草錢五分 柴胡錢五分 藜蘆錢五分 羌活錢一

黃柏錢一 草薺錢五分 麻黃半錢 蔓荊子錢一

當歸身錢一 右收咀水二鍾姜三片棗二枚煎至一鍾溫服

腎 壬薯預丸 治虛勞不足風氣百疾頭目眩冒驚悸狂癩

薯蕷八分 當歸分十 桂心分七 神麴炒

熟地各十 甘草分二十 人參分十 芍藥分五

芍藥 白朮 麥門冬 杏仁各六

柴胡 枳椇 茯苓各五 鹿角膠分七

乾姜分三 白朮分三 防風分六 大棗一百枚

黃芩分六 大黃黃卷分七 右二十二味末之和棗膏煉蜜丸如彈子大空腹酒服

續斷丸 治肝勞虛寒脇痛脹滿眼昏不食癩癢痲癩

續斷酒 川芎 當歸酒 半夏湯泡

橘紅 乾姜炮各 桂心 甘草各

右為細末蜜丸如桐子大每服百丸白滾湯下

心 牛黃散 治心虛風筋脈攣搐神昏語澀

牛黃 龍腦 硃砂 麝香各一

蟬蛻 烏蛇肉酒浸 全蝎炒 殭蠶炒

桑螵蛸 羚羊角 阿膠炒 天麻

防風 甘菊花 蔓荊子 桂心

細辛 側子炮去 獨活去芦 犀角解



半夏各五 官桂七錢

每服一兩水二盞生薑三片煎至八分去渣通口服汗  
多者加牡蠣粉一錢半

風熱獨活散 消風化痰

細辛 石膏 甘草各 防風

獨活散 旋覆花 川芎 蔓荊子

獨活散

右為細末每服三錢姜三片水一大盞煎七分食後服  
延氣運氣瘕瘕有二

其一曰火經曰火鬱之發民病嘔逆瘕瘕又曰少陽所至  
為暴注暍瘕又曰少陽司天客勝則為瘕瘕是也

其二曰水經曰陽明司天燥氣下臨木氣上從民病筋痛  
目赤掉振鼓慄又曰歲土太過雨濕流行民病足痿不收

針灸 入骨經卷一 柔

行善瘕又曰太陰之復頭項痛重而掉瘕尤甚是也

熱病先手臂身熱瘕瘕唇口聚鼻張目下汗出如轉珠  
兩乳下二寸堅脇滿悸列缺主之 振寒瘕瘕手不伸欬

嗽唾濁氣膈善嘔尺澤主之 大風嘿嘿不知所痛嗜臥  
善驚瘕瘕天井主之 頭重鼻衄及瘕瘕至陰主之 身

熱狂走譫語見鬼瘕瘕身柱主之

子腹清瘕瘕心痛氣滿不得息巨闕主之 嘔血時瘕善  
提頭顏青汗出不過肩傷寒溫病曲澤主之

顛振

顛振也振動也風火相乘動搖之象比之瘕瘕其勢為緩  
內經云諸風掉眩皆屬於肝掉即顛振之謂也又曰諸禁  
鼓慄如喪神守皆屬於熱鼓慄亦動搖之意也此症多由

風熱相合亦有風寒所中者亦有風挾濕瘕者治各不同  
也然此症多於傷寒熱病中見者多於熱甚而  
曳幸數重運者微有不同

風濕星附散 治中風雖能言口不喝斜手足躄曳者

天南星 半夏用上俱 黑附子 附子

白附子 茯苓 川烏 僵蚕

沒藥各等

右咬咀每服五錢水酒各一盞煎八分熱服并進得汗  
為度

獨活散見前瘕

風熱 獨活散見前瘕 瘕瘕年八風五疰舉身躄曳行步跛躄不能  
收持

金牙 碎如米粒用 地膚子 無子用莖葉一

熟地 胡蘿蔔 附子 防風

細辛 莽草各四 川椒合 羌活斤

一方用獨活

右十味咬咀盛以絹袋用酒四斗於磁器中漬封固勿  
令泄氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日服一合

常令酒氣相接不盡一劑病無不愈

產後因虛傷風瘕瘕同傷表症未傳入裏宜服防風湯見

愈風湯 治產後中風口噤瘕瘕亦治血暈四肢強直用

荆芥略炒為末每服三錢豆淋酒下

增損柴胡湯 治產後感異症手足牽搐涎潮昏悶

柴胡 黃芩二分 人參一分 甘草錢半

熱 表

門風

熱



石膏二錢 知母一錢 黃芪二錢 半夏一錢  
右吹咀分二服水二盞姜三片棗二枚煎八分不拘時服

秦芫湯前症已去次服此藥去其風邪

秦芫 芍藥 柴胡各一錢 甘草一錢  
黃芩 防風各一錢 人參 半夏各一錢  
右吹咀分二貼每貼水二盞姜三片煎八分食遠服

癘風

經曰脉風成爲癘俗呼癘風是也

大法 丹六天風病是受得天地間殺物之風古人謂之癘風以其酷烈暴悍可畏爾人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取臭惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物蛻出於穀道中出所出雖有上下道路之異然皆不外於陽明一經而已看其疙瘩上先見在上體多者病在上也下先見在下體多者病在下也上下同得者病在上復在下也陽明主胃與大腸無物不受此風之入人也氣受之在上多血受之在下多血氣俱受者上下皆多自非醫者有神病者有鐵心罕有免者余曾治四五人中間惟一婦人得免以其貧甚無物可吃也孫真人曰吾嘗治四五百人終無一人免者非真人之不能治也第無一人能守禁忌耳

大法重者取積取汗

下劑 醉仙散 治大風疾遍身癢疹痒麻木

胡麻子 牛旁子 枸杞子 蔓荊子各一  
白蒺藜 苦參 瓜蒌根 防風各半  
右爲細末每十五錢末入輕粉一錢拌勻每服一錢茶

調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內出臭黃涎渾身疼痛骨悶如醉次後利下膿血惡臭氣病根乃去矣

四聖保命丹

大黃兩 黃柏兩 苦參 荊芥各四  
右爲末煉蜜和勻分作一百二十九每服一丸溫酒送下食遠日三服忌肉醬一方用蝦蟆一箇燒灰

祛風散

大黃沙五斤先洗淨水 東行蝎虎一條焙乾用白

右爲末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下

通天再造散 治大風惡疾

鬱金丹 大黃一兩 白牽牛六錢半

皂角刺一兩

汗劑愈風丹 治癩  
皂角一斤 去皮弦剉作四指許以無灰酒浸一宿瀝出同新汲水一大碗揉作餅去渣以

砂鍋慢 苦參四兩 土蟻蛻頭尾全用

右二味末以皂角膏丸如桐子大每服七十九空心用

防風通聖散煎成送下日二服服三二日後入浴出汗

病重者不過一料病微者止用烏稍蛇不用土蟻

換肌散 治大風年深不愈至眉毛墮落鼻梁塌壞額顛

腫破服此速效

白花蛇三兩 烏蛇三兩酒地龍三兩 當歸酒

細辛 白芷各一兩 天麻 蔓荊子

藏靈仙 荊芥穗 甘菊花 苦參



燕麥	沙參	木賊	不灰木
川芎	沙苑藜	甘草	天門冬
赤芍藥	葛蒲	何首烏	胡麻
草烏頭	蒼木	木鱉子	定風草
右同為細末每服五錢匕食後酒調服酒多為妙			
緩劑 輕者踈風和血以二聖散治之二聖散方			
大黃	皂角刺	三錢	
右將皂角刺一二箇燒灰研細用大黃半兩煎湯調下			
二錢早服樺皮散中以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散			
此為緩劑			
栢葉湯用東南枝上栢葉一秤水一桶水三沸去查菟盛			
起旋熬蚕沙調服初服苦澁三五日後甜十日四肢沉重			
便赤白痢一月後發出瘡疔瘡破用烏龍散搽之			
烏龍尾	烏雞子皮	二錢	
二味為末用栢油調搽於破瘡上			
樺皮散 治肺癰風毒遍身癢疹瘰癧			
荆芥穗	枳殼	樺皮	甘草
杏仁	枳殼	樺皮	甘草
右為末每服二錢食後溫酒調下			
凌霄散 治癰風神效			
蟬殼	地龍	殭蚕	全蝎
凌霄花			
右為末每服二錢熱酒調下無時於浴室中常蹲湯中			
一時許服藥神效			
祛風九 治疥癩經曰脈風成爲癩也			
黃芪	枳殼	防風	芍藥

甘草	熟地	地骨皮	枸杞子
生地			
右九味木杵相爲細末煉蜜丸如桐子大白湯下五十丸			
洗藥如聖散			
蔓荊子	苦參	玄參	厚朴
荆芥	紫參	陳皮	沙參
麻黃	防風	白芷	葳靈仙
右為細末每服五錢桃柳枝各一把水五升煎臥熱			
洗心五辛			
瘰癧風寒客于脉而不去名曰癰風治之者當刺其腫上			
以銳針刺其處按出其惡氣腫盡乃止常食如常食勿食			
他食如用藥當破血去熱升陽去癰瀉榮以辛冷散之甘			
溫升之行陽明經瀉心火補肺氣乃治之正也			
補氣瀉榮湯			
升麻	連翹	蘇木	當歸
全蝎	黃連	地龍	黃芪
黃芩	甘草	人參	生地
桃仁	桔梗	麝香	胡桐淚
水蛭	蠶虫		
右到如麻豆大除連翹另剉胡桐淚研白荳蔻二分爲			
細末二味另放麝香蠶虫水蛭三味爲末另放外都作			
一服水二大盞酒一匙入連翹煎至一盞六分再入白			



荳蔻二味并麝香等三味再上火煎一二沸去渣稍熱  
早飯後午飲前服忌酒濕麪生冷硬物

針灸經大風刺其肌肉故汗出百且刺骨髓汗出百且凡二百  
日髮骨生而止針

承漿一穴在頤前唇下宛宛中足陽明任脉之會療偏風  
口喎面腫口齒痺蝕虫瘡灸亦佳日灸七壯至七七壯灸  
則血脉通宜其風應時立愈

醫學綱目卷之十一

八醫風類集二

聖

醫學綱目卷之十二

肝膽部

行痺

痛痺

諸痺者痺

鶴膝風

痺

一身盡痛

產後身痛

風痛雜合病

風寒濕

黃帝曰痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為  
痺也其風勝者為行痺行痺者行而不定也稱焉走  
氣勝者為痛痺痛痺者痛而不移也稱焉痛  
為著痺著痺者著而不移也稱焉著  
痺者痺而不仁也稱焉不仁  
處如然不痺者是也 帝曰其有五者何也岐伯曰以冬  
遇此者為骨痺以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脈痺  
以至陰遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺凡風寒濕所  
著痺之病冬遇此者為骨痺春遇此者為筋痺夏遇此者  
為肌痺秋遇此者為皮痺此者為痺之別也 帝曰內含五  
之外又別有骨痺筋痺肌痺皮痺者何也 帝曰內含五

醫學綱目卷之三

一

臟六腑何氣使然岐伯曰五臟皆有合病久而不去者內  
舍於其合也故骨痺不已復感於邪內舍於腎筋痺不已  
復感於邪內舍於肝脈痺不已復感於邪內舍於心肌痺  
不已復感於邪內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺  
所謂痺者各以其時重感於風寒濕之氣也凡痺之客五  
臟者肺痺者煩滿喘而嘔心痺者脈不通煩則心下鼓蒸  
上氣而喘噎乾善噫厥氣上則恐肝痺者夜臥則驚多飲  
數小便上為引如懷腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭脾  
痺者四肢解墮發熱嘔汁上為大寒腸痺者數飲而出不  
得中氣喘爭時發瘧泄 胞痺者少腹膀胱按之  
內痛若沃以湯溢於小便上為清濁 淫氣喘息痺  
聚在肺淫氣憂思痺聚在心淫氣遺溺痺聚在腎淫氣乏  
竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾 行痺者各隨臟之所主而



入為 諸痺不已亦益內也其風氣勝者其人易已也帝曰痺其時有死者或疼久者或易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間者易已帝曰其客於六腑者何也岐伯曰此亦其食飲若處為其病本也六腑亦各有俞風寒濕氣中其俞而食飲應之循俞而入各舍其腑也帝曰以鍼治之奈何岐伯曰五臟有俞六腑有合循脈之分各有所發各隨其過則病瘳也

冬感風寒濕者為骨痺久不已則內入於腎病腎脹足攣尻以代踵身躄脊以代頭 取太溪委中  
春感風寒濕者為筋痺久而不已則內入於肝病臥則驚多飲數小便 取太衝陽陵泉  
夏感風寒濕者為脈痺久而不已則內入於心病心下滿

暴喘噎乾善噫恐懼 取太陵小海  
長夏感風寒濕者為肉痺久而不已則內入於脾病四肢解墮發欬嘔吐 取太白三里  
秋感風寒濕者為皮痺久而不已則內入於肺病煩滿喘

帝曰榮衛之氣亦令人痺乎岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五臟洒陳於六腑乃能入於脈也故循脈上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入於脈也故循皮膚之中分肉之間熏於盲膜散於胸腹逆其氣則疾從其氣則愈不與風寒濕氣合故不為痺帝曰善痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也治視其不痛不仁者病久入深榮衛之行溢經絡時疎故不通皮膚不營故

為不仁治見其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒也治痛中發酒其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽乘陰故為痺熱其多汗而濡者此為逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也 帝曰夫痺之為病不痛何也岐伯曰痺在骨則重在於脈則血凝而不流在於筋則屈而不伸在於肉則不仁在皮則寒故具此五者則不痛也凡痺之類逢寒則急逢熱則縱帝曰善治痺

雜方  
河升麻湯治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱皮色變諸風皆治  
升麻 茯苓 人參 防風  
犀角 羚羊角 羌活 官桂  
右為末每服四錢水二盞生薑二塊碎竹瀝少許同煎至一盞溫服不計時候

素少陰有餘病皮痺癢瘰不足病肺痺 太陰有餘病肉痺寒中不足病脾痺 陽明有餘病脈痺身時熱不足病心痺 太陽有餘病骨痺身重不足病腎痺 少陽有餘病筋痺腸滿不足病肝痺 逆從論 肺脈微大為肺痺引芻背起惡日光 心脈微為心痺引背善淚出  
聖黃帝曰何以候人之善病痺者少俞答曰粗理而肉不堅者善病痺黃帝曰痺之高下有處乎少俞答曰欲知高下者各視其部

表寒  
關中薄澤為風衝濁為痺五色 浮絡多青則痛黑則痺  
素脈瀼曰痺平人氣  
行痺即走注  
仲諸肢節疼痛身體羸脚腫如脫頭眩短氣兀兀欲吐



桂枝芍藥知母湯主之

桂枝兩四 芍藥兩三 甘草兩二 麻黃兩二

生薑兩五 白朮兩五 知母兩四 防風兩四

附子兩二

右以水七升煮取二升溫服七合日三服

病歷節不可屈伸疼癢烏頭湯主之

麻黃兩三 芍藥兩三 黃芪兩三 甘草兩二

川烏兩五 煎取一升即去烏頭

右咬咀五味以水三升煮取一升去查納蜜再煎服七

合不時盡服之

河防風湯治行痺走注無定

防風兩三 甘草兩三 當歸兩三 赤茯苓兩三

杏仁兩三 炒黑 桂兩一 上各 黃芩兩一 秦艽兩一

葛根兩三 升麻兩三 去節

右為末服五錢水酒各二盞棗三枚薑五片煎至一盞

去查溫服

本治濕傷腎不養肝自生風遂成風濕流注四肢筋

骨或入左肩膊肌肉疼痛漸入左指中薏苡仁散

薏苡仁兩一 當歸兩一 小川芎兩一 乾薑兩一

茵芋兩一 甘草兩一 官桂兩一 川烏兩一

防風兩一 人參兩一 羌活兩一 白朮兩一

麻黃兩一 獨活兩一 各半

右為細末每服二錢空心臨臥酒調下日三服

治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如虫噬晝靜夜劇及

一切手足疼痛麻香丸

川烏兩三 大八角者

全蝎兩二 獨活兩一

黑荳兩二十一 地龍兩半

右為細末入麝香半字同研勻糯米糊為丸如菉荳大

每服七丸甚者十九夜臥以令膈空溫酒下微出冷汗一

身便瘥予得此方乃是歷節及不測痰痛一二服便瘥

在欽州日有一貴家婦人遍身走注疼痛至夜則發如

虫噬其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病也三服愈

丹龍虎丹治走注疼痛或麻木不遂或半身疼痛

草烏兩一 蒼朮兩一 白芷兩一

右研為末水拌發熱過再入乳香一錢當歸牛膝各半

兩酒糊丸如彈子大酒化下

無附子八物湯治歷節風四肢疼痛如錐鍛不可忍

附子兩一 地黃兩一 乾薑兩一 芍藥兩一 茯苓兩一

半夏兩一 桂心兩一 白朮兩一 人參兩一

右到散每服四錢水二盞煎至七分去查食前服

丹痛風走注疼痛

黃柏兩一 蒼朮兩一 酒炒各

右作一服煎就調酒葳靈仙末羚羊角灰臣蒼朮佐芥

子使用薑一片入藥末一錢搗碎以前藥再溫服

更和血散痛湯治兩手十指一指疼下一指疼後又腫

骨頭裏痛膝痛左膝痛了右膝痛發時多則五日少則三

日晝輕夜重痛時覺熱行則痛輕腫却重解云先血後氣

乃先痛後腫形傷氣也

羌活兩一 升麻兩一 麻黃兩一 獨活兩一

桃仁兩一 柴胡兩一 紅花兩一 歸身兩一

防風兩一 甘草兩一 獨活兩一 猪苓兩一



黃栢<sup>一</sup> 防已<sup>六</sup> 知母<sup>一</sup> 黃連<sup>酒</sup>  
右咬咀分作四服每服水一大盞煎至一半去查空心  
熱服

羅真定府張大素好嗜酒五月間病手指節腫痛屈伸不利膝髓亦然心下痞滿身體沉重不欲飲食即欲吐面色痿黃精神減少至六月間求予治之診其脈沉而緩緩者脾也難經云俞主體重節痛俞者脾之所主四肢屬脾蓋其人素飲酒加之時助濕氣大勝流於四肢故為腫痛內經云諸濕腫滿皆屬脾土仲景云濕流關節肢體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之內經云濕淫於內治以苦溫以苦發之以淡滲之又云風勝濕羌活獨活苦溫透關節而勝濕故以為君升麻苦平葳靈仙蒼朮防風苦辛溫發之者也故以為臣血壅而不流則痛當歸辛溫以散之

甘草甘溫益氣澤瀉鹹平茯苓甘平導瀉而利小便以淡滲之使氣味相合上下分散其濕也

羌活 升麻<sup>各一</sup> 獨活<sup>七</sup> 蒼朮  
防風 甘草 葳靈仙 茯苓  
當歸 澤瀉<sup>各半</sup>

右剉作一服水二盞煎至一盞溫服食前一服食後一服忌酒麪生冷硬物

本麻黃湯治歷節  
麻黃<sup>一</sup> 羌活<sup>一</sup> 黃芩<sup>三</sup> 細辛  
黃芪<sup>各五</sup>  
右為籠末每服五錢水二盞煎至八分去查溫服接續三四日有汗慎風  
治風熱成歷節攻手指作赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇

暑熱或大便秘即作牛蒡子散

牛蒡子 新葶鼓<sup>炒</sup> 羌活<sup>各三</sup> 生地<sup>二兩</sup>  
黃芪<sup>一兩</sup>

右為細末湯調二錢服空心食前日三服此病習膈生痰久則赤腫附著肢節久久不退遂成腐風此孫真人預戒也宜早治之

河大荳藥散治周痺注五臟雷滯胃中結聚益氣出毒潤澤皮毛補腎用大荳藥一升炒香熟為末每服半錢溫酒調下空心加至一錢日三服本草云大豆清熱解毒補人取汗蒸去其毒也  
無控涎丹凡人勿管背手脚頸項腰膝隱痛不可忍連筋骨牽引釣痛坐臥不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走注便用風藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚欲為癰疽

亂投藥賦亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變為疾或令人頭痛不可舉或神思昏愒多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲口流唾涎手脚重腿冷痺氣不通誤認為癰疽亦非也凡有此疾但用是藥不過數服其疾如失

甘遂<sup>心去</sup> 紫大戟<sup>皮去</sup> 白芥子<sup>真者各</sup>  
右為末煮糊丸如桐子大晒乾臨臥淡薑湯或熱水下五七丸至十九痰猛氣實加丸數不妨其効如神  
犀角<sup>二</sup> 羚羊角<sup>一</sup> 前胡 黃芩  
梔子仁 射干 大黃 升麻<sup>各四</sup>  
右九味咬咀每服五錢水二盞煎服



本茵芋丸治歷節腫滿疼痛

茵芋 硃砂 慈苡仁各一

牽牛半兩 郁李仁兩

右細末煉蜜杵丸如桐子六輕粉滾為衣每服十九至十五丸或二十九五更溫水下到曉未利可二三服快利為度白粥將息

千粒治一稅官風寒濕痺腰脚沉重浮腫夜則痛甚兩足惡寒經五六月間猶綿膠靴足膝皮膚少有跣露則冷風襲之流入經絡其病轉劇走注上下往來無定其痛極處便急而腫起肉色不變膝理如虫行每遇風冷病必轉增飲食減肌體瘦之須人扶稍能行立所服者烏附薑桂種種燥熱熅針着灸莫知其數前後三年不愈一日予服之其兩手皆沉滑有力先以導水丸通經散各一服是夜

八寶丹

入

瀉三十餘行痛減半漸服赤茯苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治痺方是也日三服煎七八錢藥熱汗出余又作玲瓏法薰蒸血熱必增劇諸汗法古方多有之惟以吐發汗者世罕知之故予嘗曰吐法兼汗良以此

夫 干治遊風行走無定或如盤大或如甌或着腹背或着臂或着脚悉主之

海藻 茯苓 防風 獨活

附子 白朮各三 大黃兩 鬼箭羽

當歸各二

右九味咬咀以水二斗漬五日初服二合漸加以知為度

丹控涎散治身及脇走癢痰核死血加桃仁泥丸治走注

疼痛

藏靈仙 川芎 梔子 當歸

肉桂 蒼朮 桃仁 甘草

右用生薑五片水二盞煎半乾入童便半盞竹瀝半盞沸熱服忌肉麵雞

定痛方治一切風濕痺痛 乳香 沒藥 地龍 木鱉

金星石 五靈脂

右等分蜜丸如彈子大每服一丸臨臥酒下

外治歷節諸風百節痠疼不可忍用松脂三十斤煉四五

十遍以煉酥三升溫和松脂三升熟攪令極調勻每旦空腹以酒服方寸七日二服數日食麪粥為佳慎勿食血腥

生冷鮮物菓子百日瘥 松節酒治歷節風四肢疼痛松

八寶丹

九

節二十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

之品 千松葉酒治歷節松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服

一合日服五六度

寒走注疼痛治法及熱走注疼痛治法並見表寒表熱條

垣身體沉重走注疼痛濕熱相搏而風熱鬱不得伸附着

於有形也宜蒼朮黃柏之類

李絳兵部手集方治臂脛痛不計深淺皆効用虎脛骨二

大兩粗春熬黃於羊角一大兩屑新芍藥二大兩細切三

物以無灰酒浸之春夏七日秋久倍日每旦空腹飲一盃

冬月速要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可

服也

經治風毒骨節疼痛芍藥二分虎骨一具塗酥炙黃槌碎



針灸

絹袋盛用清酒三升漬五日每服二合日三服

聖治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃

槌碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少緩飲之妙

靈黃帝問於岐伯曰周痺之在身也上下移徙隨脈其上

下左右相應間不容空願聞此痛在血脈之中邪將分

肉之間乎何以致是其痛之移也問不及下鍼其痛之

時不及定治而痛已止矣何道使然願聞其故岐伯答曰

此衆痺也非周痺也黃帝曰願聞衆痺岐伯曰此各在其

處更發更止更居更起以右應左以左應右非能周也更

發更作也帝曰善此痛安生何因而有名岐伯曰風寒濕

氣客於外分肉之間迫切而為沫沫得寒則聚聚則排分

肉而分裂也分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛

解痛解則厥厥則它痺發發則如是此內則不在臟而外

未發於皮獨居分肉之間真氣不能周故命曰癰痺周痺

癰痺大周痺邪在分肉血脈今云邪獨居分肉之間而命曰周痺者是衆痺之誤也周痺今云邪獨居分肉之間而命曰周痺者是衆痺之誤也

按謬刺論云凡痺往來行無常處者在分肉之間痛而

診

刺之以月死生為數用鍼者隨氣盛衰以為痛數針過

其日數則脫氣不及日數則氣不瀉左刺右右刺左病

已止不已復刺之如法月生一日一痛二日二痛漸多

之十五日十五痛十六日十四痛漸少之詳此亦刺衆

痺於所痛之法當與前衆痺法相參用之

刺五臟六腑痺法見諸痺條

千治歷節但於痛處灸三七壯佳

怪白虎歷節風痛 兩踝尖在內外兩 渾身疼痛往來

上下無常 陽輔 如足跟不得履地 風池 如膝蓋

腫起 曲池半寸 陽陵泉半寸

心婦人四旬因小產成病百節痛無常處臥牀不起

八字五分 環跳四寸 五樞半寸 曲池 液門各半寸

絕骨半寸 如脊背痛者 人中 大椎節下各五分

委中七分見 無附骨疽與白虎飛尸歷節皆相類歷節痛則走注不定

白虎飛尸痛淺按之則便止附骨疽痛深按之亦無益又

一說白虎飛尸亦能作膿着骨而生及其腐潰碎骨出盡

方愈如是則附骨與白虎飛尸同是一病但淺深不同耳

仲寸口脈沉而弱沉即主骨弱即主筋沉即為腎弱即為

肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節 少陰

脈浮而弱弱則血不足浮則為風風血相搏則疼痛如掣

盛人脈濇小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒

汗出當風所致

丹病風論

○氣行脈外血行脈內晝行陽二十五度夜行

陰二十五度此平人之造化也得寒則行遲而不及得熱



則行速而太過內傷於七情外傷於六氣則氣血之運或遲或速而疾作矣彼痛風者大率因血受熱已自沸騰其後涉於冷水或立濕地或扇風取涼或坐臥當風寒涼外搏熱血得寒汚濁凝滯所以作痛夜則痛甚行於陰也治法以溫辛涼之劑流散寒濕發腠理其血得行與氣相和其病自安然亦有數種治法各異謹書一二以証予言一治東陽傳丈腿痛一治朱宅閭內痛藥一治隣鮑子痢後風皆數十貼半年安詳見後丹溪或問此見隣人用草藥研酒飲之不過數貼亦有安者如子之言類皆經久取效無乃太緩乎予曰此切病草藥石上採絲為之君過山龍等佐之皆性熱而燥者不能養陰却能燥濕病之淺者濕疾得燥則開熱血得熱則行亦可取效彼病深而血少者愈却愈虛愈切愈深若朱之病是也子以我為迂緩乎

醫家類卷三 主

朱之病即朱國璋痛醫十月不應而丹溪起之也

潛行散治痛風黃栢一味酒浸焙乾為末生薑汁和酒調服必兼四物等湯相間服之妙

二妙散治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如血虛加補血藥如痛甚以薑汁熱服之

黃栢炒 蒼朮炒製去皮

右為鹿末生薑研入湯煎沸調服此二物皆有雄壯之氣如表實氣實者少酒佐之一法二妙為君加甘草羌活各二錢陳皮芍藥各一錢酒炒薔薇仙半錢為末

服之佳

一男子家貧多勞秋涼忽渾身發熱兩臂膊及腕兩足及膝皆疼痛如鍛晝夜劇醫與風藥則愈痛與血藥則不効惟待斃而已予脉之兩手俱濡而數右甚於左問其飲

血虛血滯而行之

食則如平時形瘦則如削蓋蓋大痛而瘦非病也用蒼朮一錢半酒黃栢一錢半生附一片生甘草三分麻黃五分研桃仁九箇作一貼煎入薑汁此少令辣熱服至四貼後去附子加牛膝一錢至八貼後來告急云氣上喘促不得睡痛似微減此時昏黑不能前去診視予意其血虛因服麻黃過劑陽虛被發動而上奔當與補血銀膠帶味酸之藥以收之遂以四物湯加川芎芍藥人參二錢五味子十二粒作一貼與二貼服之喘促隨定是夜遂安三日脈之數減大半遊脉如舊問其痛則曰不減然呻吟之聲却無察其起居則疲弱無力病人却自謂不弱遂以四物湯加牛膝白朮人參桃仁陳皮甘草枳櫛入薑三片煎服如此藥與五十貼而安一月後因負重擔痛復作飲食亦少再與此藥每貼加黃芪三分又二十貼方全愈 東陽傳丈

醫家類卷三 主

年踰六十性急作勞患兩腿痛動作則痛甚予視之曰此兼虛証當補血虛病自安遂與四物湯加桃仁陳皮牛膝生甘草煎入生薑研潛行散熱飲三四十貼而安 何縣長年四十餘形瘦性急因作勞背脊疼痛骨節疼足心發熱可與四物湯帶熱下大補丸保和丸共六十粒食前服 婦人脚疼脚怕冷夜劇日輕

生地 白芍 歸尾各五 黃栢炒

黃芩 白朮 陳皮各三 牛膝二

蒼朮三 甘草稍一

右分六貼煎服食前熱飲之

隣人鮑子年二十餘因患血痢用遊藥取效後患痛風號叫撼騰里予視之曰此惡血入經絡血受濕熱久為凝滯所下未盡留滯遂道所以作痛經久不治恐成枯細遂



與四物湯桃仁紅花牛膝黃芩陳皮甘草煎生薑汁研滑  
行散入少酒飲之數十貼又與刺委中出血近三合而  
安病後風係血入臟腑下未盡復還經絡不得行故也  
松明節一兩以乳香一錢炒焦存性蒼朮一兩紫葳一兩  
半甘草半兩黃柏一兩桃仁去皮不去尖一兩俱為末每  
服三錢生薑同杵細水盪起二三沸服

朱宅閻內年三十食味甚厚性亦燥急患痛風變縮數月  
醫不應予視之曰此挾痰與氣症當和血疎痰導氣病自  
安遂以潛行散入生甘草牛膝枳殼通草陳皮桃仁薑汁  
煎飲半年而安

陸郎左腿又骨舊痛小便赤少此積憂痰涎所為

白朮 枳殼 赤芍 條芩  
連翹 通草 甘草稍

六安人脚取骨痛

蒼朮 白朮 陳皮 芍藥  
木通 甘草

分四貼煎下大補丸四十粒

右丹溪治痛風法主於血熱血虛血汚或挾痰皆不離

四物潛行黃柏牛膝生甘草桃仁陳皮蒼朮生薑汁而  
隨症加減發前人之所未發醫世俗之所不醫其有功  
於世也大矣

本王檢正患鼻額間痛或麻痺不仁如是數年忽一日連  
口唇頰車髮際皆痛不開口雖言語飲食亦妨在額與頰  
上常如糊手觸之則痛予作足陽明經絡受風毒傳入經  
絡血凝滯而不行故有此症或者以排風小續命透髓丹  
之類與之皆不効製此犀角升麻湯贈之數日而愈

犀角十兩 升麻 防風 羌活各三  
川芎 白附 白芷 黃芩各半

甘草

右龍末每服四大錢水一盞半煎至八分去渣通口食  
後服臨臥一服日三四服足陽明胃也經云腸胃為市  
又云陽明多血多氣胃之中脘膈五味無所不納如市  
廛無所不有也六經之中血氣俱多腐熟飲食故飲食  
之毒聚於胃此方以犀角為主解飲食之毒也陽明經  
絡環唇挾舌起於鼻合頰中循頰車上耳前過客主人  
循髮際至額頰王公所患皆一經絡也故以升麻佐之  
餘藥皆滌除風熱升麻黃芩專入胃經稍通者自能曉  
海四物蒼朮各半湯治肢腫不能舉動四物湯蒼朮各半  
兩同煎服效

活血丹與四物蒼朮各半湯相表裏治遍身骨節疼痛如

神 熱地黃 當歸 白朮 白芍

續斷 人參

右細末酒糊丸如桐子大

東垣蒼朮復煎散治寒濕相合腦戶痛惡寒項筋強肩  
背脚卵痛膝腫痛無力行步能食身沉重其脈沉緩洪上  
急

蒼朮 升麻 柴胡 羌活  
白朮 黃柏 紅花 澤瀉

右為龍末用蒼朮湯二盞煎至一大盞去渣溫服空心  
微汗為效忌酒類



緩筋湯治目如火腫痛兩足及伏菟骨筋痛膝少力身重  
腰痛夜惡寒痰嗽項頸筋骨皆急痛目多眵淚食不下

羌活

獨活

藥本

麻黃

蘇木

升麻

甘草

草薢

生地

黃芩

黃柏

蒼朮

歸身

柴胡

熟地

生甘草

右為

蘇木

都作

一服

仲桂

枝芍

藥知

毋湯

世治

痛風

草烏

四兩

煨香

白芷

三兩

沒藥

龍三

兩狗

為丸

每服

羅活

血應

痛九

治風

能轉

側皮

膚不

仁遍

注脚

膝重

痛少

力行

血脈

壯筋

骨使

氣脈

狗脊

六兩

蒼朮

十兩

沒藥

二錢

草烏

半兩

右為

細末

酒煮

麩糊

或熱

湯送

下不

拘時

丹八

珍漱

治一

切痛

乳香

沒藥

代赭

石

川烏

不去

皮尖

生用

羌活

半兩

全蝎

二十一

右醋

糊丸

如桐

子大

羅烏

重九

治久

患風

五靈

脂兩

川烏

去皮

入醫學綱目卷三

末

入醫學綱目卷三

七

右為細末酒煮麩糊為丸如桐子大每服十九加至五  
十九空心溫酒下忌一切冷物

史丞相

遇仙方

治諸般

痛風手

足艱難

斜言語

澀

附子

皮去

川烏

皮去

羌活

肉桂

杜仲

去皮

黃芪

白朮

白朮

人參

川牛膝

酒浸

防風

天麻

白茯苓

草薢

狗脊

續斷

獨活

肉桂

赤芍

虎脛骨

右二

十二

味切

細以

口春

三日

夏二

日秋

糊丸

如桐

子大

用浸

生冷

油膩

葷麪

食發

世五

加皮

酒治

風濕

飲之

或入

在麩

內造

丹治

環跳

痛不

已防

為使

大料

煎入

酒深

麻黃

一二

貼又

不動

以

小便

赤體

坐其

氣暢

而愈

時行

熱毒

可容

則止

却燒

令熱

泄氣

立安

若手

痛者

衍用

三升

醇酒

拌香

又按者

以酒行

藥性不

動者重

之製之



上今患風冷氣閉及近感癱風人就所患一遊臥着溫熱處厚蓋覆汗出為度若虛人須在左右防大熱昏冒仍令頭面壅覆未全愈間再作

外治風痛腫白虎病以三年醱醋五升熱煎三四沸切葱白二三升煮一沸濾出布帛熱裹當病上熨之瘥為度

寒痺之為病也雷而不去時痛而皮不仁黃帝曰刺寒痺內熱奈何伯高答曰刺布衣者以火焯之刺大人者以藥熨之黃帝曰藥熨奈何伯高答曰用醇酒二十斤蜀椒

一升乾薑一斤桂心一斤凡四種皆咬咀漬酒中用綿絮一斤細白布四丈并納酒中置酒馬矢煨中蓋封塗勿使

泄五日五夜出布綿絮曝乾之乾復漬以盡其汁每漬必晬其日乃出乾之并用查與綿絮複布為複巾長六七尺為六七巾則用之生桑葉炙中以熨寒痺所刺之處令熱

八醫全書卷三

木

入至於病所寒復炙中以熨之三十遍而止汗出以巾拭其身亦三十遍而止起步內中無見風每刺熨如此病已矣此所謂內熱也內音納○毒天附系篇

羅拈痛散治肢節疼痛熨烙藥

羌活 獨活 細辛 肉桂

防風 白木 良薑 麻黃不去

天麻生去 川烏生去 吳茱萸 乳香研

小椒生去 全蝎生 當歸各一兩 川薑五錢

葛根兩

右為籠末入乳香研勻每抄藥一十錢甚者十五錢同細鹽一升炒令極熱絹袋盛熨烙痛處不拘早晚頻用

藥冷再炒一次用畢甚妙

婦人六十二種風及腹中血氣刺痛紅藍花酒主之用

汚血

紅藍花一味以酒一大升煎減半頓服一半頃之再服

虎脛骨各一兩 沒藥各另 赤芍 熟地

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻線纏定勿令透氣好酒六升煮酒盡取木瓜去皮研如泥

更入熟蜜少許杵和為丸如桐子大每服五十九病在上食後在下食前溫酒下

羅木瓜虎骨丸治風寒濕合而成痺脚重不仁疼痛少力足下癢痛不能踏地脚膝筋拳不能屈伸及項背拘急手足無力耳內蟬鳴頭眩目運諸證脚氣行步艱難并皆治之

木瓜 麒麟竭研 虎脛骨炙 木香

八醫全書卷三

丸

自然銅七兩 楓香脂 龜板炙 骨碎補毛去

甜瓜子 桂皮 當歸 沒藥各一兩

右件十五味除沒藥外為細末拌勻酒麵糊為丸如桐子大每服三十九溫酒送下煎木瓜湯送下亦得漸加至五十九空心食前服

濟麟麟散治寒濕傳於經絡疼痛不可忍

血竭 南乳香 沒藥 白芍

當歸各六錢 水蛭碎炒 麝香各三錢

右八味為細末和勻每服三錢食前溫酒下

丹起痛散 乳香 沒藥 桃仁 紅花



當歸	地龍	五靈脂	牛膝
羌活	香附	生甘草	
如痰熱加酒茶酒栢			
痛風大法	蒼朮	南星	川芎
白芷	當歸	酒茶	
在上者加羌活	蒼朮	仙桂枝	在下者加牛膝
防已	木		
通黃栢	薄桂	治痛風無味而薄者	獨此能橫行
手臂			
南星	蒼朮	等至痛處	
上中下痛風方			
南星	台芎	白芷	
桃仁	桂枝	漢防已	
龍膽草	蒼朮	黃栢	
紅花	葶藶	神麩	
羌活			
右為末	麩糊丸	食前服	一百丸
世疾	苓丸	治臂痛	如神
控涎丹	加去油木	鱉子一兩	桂五錢
治臂痛	每服	二十九	
丹治臂痛			
半夏	陳皮	茯苓	蒼朮
葶藶	酒	白朮	南星
香附	甘草		
世治臂痛			
紅化	神麩	俱為末	調服之
薑黃散	治臂痛	非風非痰	
薑黃	甘草	羌活	白朮

腰已下痛者加海桐皮當歸芍藥

臂痛有六道經絡究其痛在何經絡之間以行本經藥行其氣血血氣通則愈矣若表上諸痰痛便下之則不可當詳細辨之

右東垣云臂痛有六道經絡以行本經藥行其氣血者蓋以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而定之則其臂膊之前廉痛者屬陽明經以升麻白芷乾葛行之後廉痛者屬太陽經以藜朮羌活行之外廉痛者屬少陽以柴胡行之內廉痛者屬厥陰以柴胡青皮行之內前廉痛者屬太陰以升麻白芷葱白行之內後廉痛者屬少陰以細辛獨活行之并用針灸法視其何經而取之也

虛實足痛新病以痛風法治之久病非脚氣以鶴膝風治之各

入醫學綱目卷三

自有門痛風多屬血虛然後寒熱得以侵之治法並見血

丹張子元氣血虛有痰小便白濁陰火間起痛風時作

人參 白朮 熟地 川黃栢

山藥 海石 瑣陽 乾薑

南星 敗龜板

右粥為丸如梧子大淡鹽湯下

痛風有痰帶熱先以舟車丸或導水丸神芎丸下之後以

越痛散調血如痰熱越痛散加酒茶酒栢

治痛風方

糯米 黃躑躅根 黑荳

右件用酒水各一碗煎半乾徐徐服之大吐大瀉一服

住便能行動

子和一男子六十餘病腰尻脊膝皆痛數歲不愈晝靜夜



躁大痛往來屢求自盡天且則定夕則痛作必令人手槌擊至五更雞鳴則漸減回帶則痛止戴人診其脈兩手皆沉滑堅勁有力如張弓弦謂之曰病雖瘦難任然腰尻脊膊皆痛者必大便堅燥其左右曰有五日或八九日見燥屎一兩塊如彈丸結硬不可言渾身燥痒皮膚皺揭枯澁如髮片戴人既得病之虛實陰用大承氣以瀉其煎之加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑蓋病者聞煖則悅聞寒則懼說補則從說瀉則逆此敵非一日也而況一齊眾楚於是藥煎成使稍熱咽之從少至多累至三日且晚臍臍下泄四五行約半盆以燈視之皆燥屎硬塊及瘀血雜臍臍穢不可近須臾痛減九分昏睡莫息謂如常人睡至明日始覺饑而索粥溫涼與之又因睡一二日其痛盡去次令飲食調養日服導飲丸甘露散滑利便溺之藥四十

八寶丹

三

餘日乃復 常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛戴人曰四肢諸陽之本也當時散越而不痛及乎秋冬收斂則痛以三花神祐丸大下之執遂去

運氣

運氣有二

一曰濕經云太陰司天濕淫所勝病肺腫骨痛陰痺陰痺者按之不得治以苦熱是也

二曰燥經云陽明所至為尻陰股膝臍臑足痛又云歲金太過燥氣流行甚則尻陰股膝臍臑足皆痛是也

針灸

內經刺灸諸痛法先明經脈次別淺深蓋經脈者為手足十二經脈也

手前廉痛屬陽明經云手陽明脈所生病者肩前臑痛大指次指痛不用 後廉痛屬太陽經云手太陽脈是動則病有似拔膈似折所生病者肩臑肘臂外後廉痛 外廉

痛取少陽經曰手少陽脈所生病者耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用又云邪客手少陽之絡令人臂外痛手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痛左取右右取左 內廉痛取厥陰經云手厥陰脈是動則病手心熱肘臂急脈腫 內前廉痛屬太陰經云手太陰脈所生病者臑臂內前廉厥掌中熱 內後廉痛屬少陰經云手少陰所生病者臑臂內後廉痛厥掌中熱痛 足前廉痛屬陽明經云足陽明脈所生病者膝膕腫痛循膺乳氣街股伏兔胛外廉足跗上皆痛中指不用 後廉痛屬太陽經云足太陽脈是動則病頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲脚如結腦如裂是謂蹠厥所生病者項背尻臑脚背痛小指不用 外廉痛屬少陽經云足少陽所生病者胛脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸

六寶丹

重

節皆痛小指次指不用又云足髀不可舉側而取之在樞合中以員利鍼大鍼不可刺又云邪客於足少陽之絡令人留於樞中痛髀不可舉刺樞中以毫針寒則久留鍼以月死生為數立已 內廉痛屬太陰經云足太陰脈所生病者股膝內腫厥足大指不用 內後廉痛屬少陰經云足少陰脈所生病者脊股內後廉痛足下熱而痛 內前廉痛屬厥陰經云足厥陰脈是動則病腰痛不可以俛仰 此十二經手足脈痛皆視虛實寒熱陷下而施補瀉疾留灸之法也 已上全文並見針灸門十二經條盛則瀉之衰則補之

淺深者謂皮膚內筋骨之淺深也 病在皮調之皮蓋取血絡也 病在脈調之脈即取前手足十二經之血脈也 病在肉調之分肉內經云病在肌膚肌膚盡痛名曰肌







甲膝外廉痛熱病汗不出目外皆赤痛頭眩兩額痛逆寒泣出耳鳴多汗目痒曾中痛不可反側痛無常處俠溪主之。膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁陽關主之。髀痺引膝股外廉痛不仁筋急陽陵泉主之。膝內廉痛引髓不可屈伸連腹引咽喉痛膝關主之。

東腿膝內廉痛引髓不可屈伸連腹引咽喉痛太衝五分中封。膝關。脛痠寒足下熱不能久立濕痺不仁中都衝陽。承山。承筋。脛寒四肢重少氣難言不得臥至陽。三陰交。

甲痺脛重足跗不收跟痛巨虛下廉主之。脛痛足緩失履濕痺足下熱不能久立條口主之。脛若若苦痺膝不能屈伸不可以行梁丘主之。

玉草鞋風崑崙六呼。太溪六呼。申脈五分。補少海灸。

攝草鞋風足腕痛崑崙太。丘墟。商丘。各寸半。又法崑崙。丘墟。商丘。照海。后取。太衝。解。

足腕不用痿躄坐不起。髀脚痛光明五分。丘墟五分。腕緩不收履足不任脛痠。然谷。浮白。崑崙。

攝外踝紅腫痛。申脈半寸。攝繞踝風。曲池。如繞外踝痛刺孫絡。如繞內踝痛。如繞前廉痛。如繞後廉痛。如繞小指間三分。兼刺大指三。

王脚背紅腫太衝。丘墟。衝陽。臨泣。又法。太衝。臨泣。行間。內庭。下取。崑崙。

丘墟。攝大拇指本節前骨疼太衝。足五指盡痛不得踐。

地湧泉。然谷。風寒從足小指起脈痺上下帶臂脇痛無常處至陰主。

之。足下熱痛不能久坐濕痺不能行三陰交主之。骨痺煩滿商丘主之。膚痛痺外丘主之。寒氣在分肉間痛上下痺不仁中瀆主之。

靈衛氣不行則為麻木。神效黃芪湯治半身麻木不仁或左或右半身麻木或面或頭或手臂或脚腿麻木不仁並皆治之。芍藥補氣湯治皮膚間有麻木此肺氣不行也。

黃芪。白芍。橘皮。澤瀉。甘草。升麻。右咬咀每服一兩水二大盞煎至一盞去渣溫服如肌肉麻必待瀉營氣而愈如濕熱相合四肢沉痛當瀉濕熱。

垣杜彥達患左手右腿麻木右手大指大指亦常麻木至腕已三四年矣諸醫不效求治明之曰麻者氣之虛也直氣弱不能流通填塞經絡四肢俱虛故生麻木不仁與一藥共三日効速製人參益氣湯服二日便覺手心熱手指中間如氣滿脹至三日後又覺兩手指中間皮肉如不敢觸者似痒痛滿脹之意指上瑟瑟不敢用手擦傍觸之明之云直氣通至矣遂於兩手指甲傍各以三稜針一刺之微見血如黍粘許則痺自息矣又為處第二第三服之。

人參益氣湯治五六月間兩手麻木四肢困倦怠嗜嗜臥乃濕熱傷元氣也以此藥治之。

黃芪。人參。甘草。升麻。五味子。升麻。柴胡。

黃芪。人參。甘草。升麻。五味子。升麻。柴胡。黃芪。人參。甘草。升麻。五味子。升麻。柴胡。



芍藥

右咬咀每服稱半兩水五盞煎一盞去查空心溫服服後令少臥於麻痺處按摩屈伸少時午飯前一服日

二服

第二次藥煎服如前

黃芪

紅花

陳皮

澤瀉

第三次服藥

黃芪

黃柏

橘皮

澤瀉

升麻

白芍

生甘草

五味

生苓

炙甘草

右咬咀分作四服煎服如前法稍熱服秋涼去五味冬

月去黃芪服之大効

除濕補氣湯治左腿麻木沉重

黃芪

甘草

五味

升麻

當歸

柴胡

澤瀉

紅花

陳皮

青皮

右咬咀分作四服水三大盞煎至一盞去查稍熱食前

服

仲血痺病從何得之師曰夫算榮人骨弱肌膚感重困疲

風寒

勞汗出臥不時動搖加被微風遂得之形如風狀但以脈

自微澹在寸口關上小緊宜鍼引陽氣令脈和緊去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外証身體不仁如

風痺狀黃芪桂枝五物湯主之

黃芪

芍藥

桂枝

生薑

大棗

黃芪

芍藥

桂枝

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三服一方有

人參

羅中書左丞張仲謙至元戊辰春正月在大都患風証半身麻木一醫欲下之未決可否命予決之予曰治風當通因通用汗之可也然此地此時雖交春今寒氣猶存汗之則虛其表必有惡風惡寒之証仲謙欲速瘥遂汗之身體輕快後數日再來邀予視之曰果如君言官事繁劇不敢出行當如之何予曰仲謙云大法夏宜汗陽氣在外故也今時陽氣尚弱初出於地汗之則使衛氣亟奪衛氣失守不能肥實腠理表上無陽見風必大惡矣內經曰陽氣者衛外而為固也又云陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰當此之時猶有過汗之戒况不當汗而汗之者乎遂與黃芪建中湯加白朮服之滋養脾胃生發榮衛之氣又以溫粉撲其皮膚待春氣盛表氣漸實即愈矣內經曰化

大醫學綱目卷三

无

不可伐時不可違此之謂也黃芪建中湯方見治虛實條

垣戊申春節使趙君年七旬病體熱麻股膝無力飲食有汗妄喜笑善饑痰涎不利舌強難言聲啞不嘔身重如山

求治於先師診得左手脈洪大而有力是邪熱客於經絡中也兩臂外有數癩遂問其故對以燃香所致先師曰君

之病皆此也夫人之十二經灌漑週身終而復始蓋手之三陽從手表上行於頭加之用火邪陽升於陽勢甚熾焉

故邪熱毒行流散於周身而熱麻鍼經云胃中有熱則虫

動虫動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下熱傷元氣而沉重

無力飲食入胃慄慄之氣不循常度故多汗心火盛則妄

喜笑脾胃熱則消穀善饑肺金衰則聲啞不鳴仲景云微

數之脈慎不可灸焦枯傷筋血難復也君奉養以膏梁之

味無故加以大毒熱傷於經絡而為此病明矣內經曰熱

氣在表

火毒



潘所勝治以苦寒佐以苦甘以甘瀉之以酸收之當以黃  
 柏知母之苦寒為君以瀉火邪壯筋骨又腎欲堅急食苦  
 以堅之黃芪生甘草之甘寒瀉熱補表五味子酸止汗補  
 肺氣之不足以為臣炙甘草當歸之甘辛和血潤燥柴胡  
 升麻之苦平行少陽陽明二經自地升天以苦發之者也  
 以為佐咬咀同煎取清汁服之更繆刺四肢以瀉諸陽之  
 本使十二經絡相接而泄火邪不旬日而良愈遂名其方  
 曰清陽補氣湯

蒼木四錢 藁本二錢 升麻六錢 柴胡三錢  
 五味一錢 黃柏三錢 知母二錢 陳皮半錢  
 甘草二錢 當歸二錢 黃芪三錢  
 右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查空心服之  
 待少時復以美饌壓之

補氣升陽和中湯李正臣夫人病診得六脉中俱弦洪緩  
 相合按之無力弦在其上是風熱下陷入陰中陽道不行  
 其症閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而目開則麻木漸  
 退久則絕止常開其目此症不作懼其麻木不敢合眼故  
 不得眠身體皆重時有痰嗽覺胃中常是有痰而不利時  
 煩燥氣短促而喘肌膚充盛飲食大小便如常惟畏麻木  
 不敢合眼為最苦觀其色脉形病相應而不逆內經曰陽  
 盛瞑目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脉皆屬於目靈  
 樞口開目則陽道行陽氣遍布周身閉目則陽道閉而不  
 行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木為風雖三尺  
 之童皆以為然細按之則非如久坐而起亦有麻木假為  
 繩繫縛之人釋之覺麻木作而不敢動久則自己以此驗  
 之非有風邪乃氣不行也不須治風當補其肺中之氣則

八醫聖類卷三

麻木自去矣知其經脈陰火乘其陽分火動於中為麻木  
 也當兼去陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外濕在上作也  
 當實其皮毛以溫劑身重脈緩者濕氣伏匿而作也時見  
 燥作當升陽助氣益血微瀉陰火去濕通行經脈調其陰  
 陽則已非五臟六腑之本有邪也補氣升陽和中湯主之

右咬咀每服三錢水二大盞煎至一盞去查稍熱服早  
 飯後午飯前服之至八服而愈

溫經除濕湯李夫人十月二十日得立冬嚴霜作時病四  
 肢無力乃痿厥濕熱在下焦也醋心者是濁氣不降欲消  
 也合眼麻木者陽道不行也開目不麻木者目開助陽道  
 故陰寒之氣少退也頭眩暈者風氣下陷於血分不伸  
 越而作也

羌活七分 獨活三分 柴胡二分 黃芪二分  
 人參一錢 甘草一錢 白芍三錢 陳皮二錢  
 白木一錢 蒼木二錢 澤瀉一錢 猪苓一錢  
 黃連一錢 木香各二分 草薢各二分  
 神麴二分 麻黃三分 升麻五分 當歸三分  
 右剉如麻豈大作二服水二大盞煎一盞去查稍熱服  
 食遠治肢節沉重疼痛無力之聖藥也  
 濕氣風症不退眩暈麻木不已除風濕羌活湯主之

八醫聖類卷三



濕痰死  
火解

羌活兩一 防風兩一 柴胡五分 藥本三分  
 獨活五分 蒼朮未泔制 茯苓二錢 澤瀉二分  
 猪苓二分 甘草五分 黃芪錢一 陳皮三分  
 黃柏三分 黃連一分 升麻七分 川芎三分  
 右咬咀每服三錢或五錢水二盞煎至一盞去查稍熱服量虛實施用如不盡証候依加減法用之

丹手足木者是濕痰死血 十指麻是胃中有濕痰死血  
 子和郟城梁賈人年六十餘忽曉梳髮覺左手指麻斯須  
 半臂麻又一臂麻斯須頭一半麻比及梳畢從脇至足皆  
 麻大便二三日不通往問他醫皆云風或藥或針皆不解  
 求治於戴人戴人曰左手三部脉皆伏比右手小三倍此  
 枯澀痺也不可純歸之風亦有火燥相兼乃命一涌一泄  
 一汗其麻立已後以辛涼之劑調之潤燥之劑濡之惟小

八醫類編卷三

重

指次指尚麻戴人云病根已去此餘烈也可針溪谷溪谷  
 者骨空也一日晴和往針之用靈樞中難足法向上臥針  
 三進三引訖復卓針起向下臥針送入十指間皆然手熱  
 如火其麻全愈

停飲

濟茯苓湯治停飲支飲手足麻痺多睡眩冒  
 半夏湯 赤茯苓法 陳皮各一 枳實去穢  
 桔梗去 甘草炙

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎服不拘時

形數驚恐經絡不通病生於不仁治之以按摩醪藥見全  
 法

雜方

一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半  
 炮去皮同為末滴水丸如彈大每服一丸生薑溫酒磨服  
 治風冷氣血閉手足身腫疼痛冷麻

風寒干  
筋不行

風論云風氣行諸脈俞散於分肉之間與衛氣相干其道  
 不利故使肌肉憤脹而有瘍衛氣有所礙而不行故其肉  
 有不仁也全文見

又氣穴論云肉分之間谿谷之會積寒留舍榮衛不居內  
 為骨痺外為不仁命曰大寒留於谿谷此亦風寒相干衛  
 氣致衛氣不行而不仁也全文見  
 仰黃芪五物湯方見本門 世傳惡風而麻木者烏附最  
 驗

本治風寒濕痺麻木不仁粥法 川烏生為末

右用白米作粥半碗藥末四錢同米用慢火熬熟稀薄  
 不要稠下姜汁一茶匙許蜜三大匙攪勻空心噉之溫  
 為佳如是濕更入薏苡仁二錢增米作一鐘服○此粥  
 治四肢不隨痛重不能舉者有此証預宜防之左氏曰

八醫類編卷三

重

風淫末疾謂四肢為四末也脾主四肢風邪客於肝則  
 淫脾脾為肝剋故疾在末穀氣引風濕之藥徑入脾經  
 故四肢得安此湯劑極有力予常用此方以授人服者  
 良驗

治風濕四肢浮腫肌肉麻痺甚則手足無力筋脉緩急宜  
 續斷丸

川續斷 萆薢 當歸炒 附子  
 防風 天麻各一 乳香 沒藥各半

川芎三分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九酒或飲下  
 空心食前服

丹溪劉河間作原病式嘗以麻為盜同歸燥門中真識病  
 機者也



河前胡散治榮虛衛實肌肉不仁致令痲重者曰肉苛

前胡 白芷 細辛 官桂

白朮 川芎 附子 吳茱萸 湯泡

當歸 川椒 生用 二兩

右剉以茶酒三升拌勻同膏一宿以煉成猪脂膏五斤

入藥煎候白芷黃紫色漉去查成膏病在處摩之凡大

癥瘕瘡癩皆治并去諸風痞疔癩傷折墜損

內經針灸着痺分新久新者湯熨灸之經云風寒客入皮

膚或痺不仁腫痛可湯熨及火灸刺而去之是也法見經

傳久者焯針刺之經云着痺不去久寒不已焯取三里是

也四時 垣陝帥郭巨濟偏枯二指着痺足不能伸迎先師治之以

長針刺委中至深骨而不知痛出血一二升其色如墨又

且繆刺之如是者六次服藥三月病良愈

凡膝寒痺不仁不屈伸轉關主之

着痺不移腫肉破身熱脈偏絕是逆也全大凡 着痺久

而入臟腑者為逆諸法見

素榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不

用肉如故也人身與志不相有曰死

脈診人被風不仁痿廢其脈虛者生緊急疾者死

鶴膝風之類

羅翹 治鶴膝風腰膝風縮之疾

白附 阿魏

白芷 乳香

沒藥 北漏蘆

當歸 牛膝 羌活

地骨皮 歲靈仙 各一兩

右蜜為丸彈子大空心温酒化下一丸胡楚望博士病

風痿手足指節皆如桃李痛不可忍服之悉愈

一丈人年七十歲患脚膝痠痛稍腫

生地 歸頭 白芍 蒼朮

炒栝 川芎 桂枝 木通 半錢

分四貼煎取小盞食前熱服

一男子年近三十滋味素厚性多焦怒秋間脚板左右一

點發痛延及膝盡靜夜劇痛劇惡寒口或渴或不渴或痞

或不痞醫多用風藥兼用補血至次年春其膝漸腫痛愈

甚食漸減形瘦羸至春末膝腫如桃不可屈伸診其脈左

弦大頗實寸瀉甚大率皆數知其小便必數而短遂作飲

食痰積在太陽陽明治之炒栝一兩生甘草稍犀角屑蒼

木鹽炒各三錢川芎二錢陳皮牛膝木通芍藥各五錢遇

暄熱加條芩三錢為細末每三錢重與生薑自然汁同研

細多少以水盪起煎令沸帶熱食前飲之一晝夜四次與

至半月後數脈漸減痛漸輕去犀角加牛膝敗龜板半兩

當歸半兩如前服又與半月腫漸減食漸進不惡寒唯脚

膝痠軟未能久立久行去蒼朮黃芩時當夏熱加炒黃柏

至一兩半予依本方內加牛膝春夏用草葉冬用根杵取

汁用之効尤速須斷酒肉濕麵胡椒當仲夏加生地黃半

兩冬加柴葛桂枝

防風 牛膝 當歸 虎骨 酥炙各

枸杞 羌活 獨活 敗龜板

秦艽 草薢 松節 蚕沙 各一



茄根法二兩 蒼木四

酒浸或酒糊丸皆可

食脚筋急痛灸木瓜令爛研作粥漿樣用罌瓶處冷即易

一宿三五度熱裏便瘵灸木瓜時入一半酒煮之

子和嶺北李文卿病兩膝屈伸有聲刺刺然或以為骨

鳴戴人曰非也骨不憂焉能鳴此筋濕也濕則筋急緩者

不鳴急者鳴也若用子之藥一湧一泄上下去其水則自

無聲矣李文卿從其言既而果然

素寒膝伸不屈治其捷骨節論下同經云輔骨上橫骨下

外之中側止搖動取之筋動應手滑云輔骨上橫骨下

治其機云云依筋為機即兩骨相接處為機也坐而膝痛

而暑解治其骸關經云膝為骸關王註云暑熱也若膝

滑云起而引膝解中為機也膝痛痛及捩指治其肌輔骨上

為關王註云關為膝解之使曲伸之申委中穴

坐而膝痛如物隱者治其關云

痛如折者則針陽明

膝痛若別治巨陽少陽榮

通谷穴足少陰榮然谷穴也

淫滲脛痠不能立久治少

陽之維在外上五寸痛而無力也外踝上五寸光明穴也

右捷機骸關諸穴更參訂之

通膝腫 行間

撮要陽陵泉 橫透陰陵泉

法見前 五龍下

世脚抽痛 委中出血

桑脚膝痛筋急 風池 三間 三陰交 三里

熱學 經所謂肝氣熱則筋膜乾筋膜乾則筋急而變

門見後 又云因於濕首如裹濕熱不攘大筋痠短小筋弛

長綆短為拘弛長為痿之類是也 全文見陰陽丹溪云大

傷筋不能求骨故為痿弱

丹王秀濕熱大作脚痛後手筋拘攣足乏力

生地 當歸 川芎 白朮各二

蒼朮半錢 甘草分三 木通

煎湯下大補丸三十九大補丸須炒煖

心蕙苡仁散治筋脉拘攣久風濕痺

蕙苡仁一升 搗散以水二升 取末敷患處 空腹食

則縮而短故變急不伸則可用蕙苡

仁若素問言因寒筋急不可用也

寒學 寒學者經所謂寒多則筋攣骨痛者是也

本同官欽承張德操常言其內子昔患筋攣脚不得屈伸

逾年動則令人抱持求醫於泗水楊吉老云此筋痠宜服

下三方一年而愈

治筋極養血地黃丸 蘇夏

熟地分一 蔓荊分一 山茱萸錢五 黑狗脊

地膚子 白朮 乾漆 躑躅炒

天雄 車前子各三 草薢 山芋 藥

澤瀉 牛膝各一







心除一切風濕痺因肢拘攣蒼耳子三兩搗末水一升半煎取七合去查啞

針灸 食酒煮木瓜散藥筋急痛處佳方見陽

內經鍼灸法取學有筋攣脈學之異取筋攣者經云病在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痺刺筋上為故刺分肉間

不可中骨也病起筋筋病已止者是也全文見取筋脈

者經云手厥陰脈是動則病手心熱肘腕攣急腋腫辨虛

實寒熱陷下取之是取筋脈之變也全文見又曰少

陽之別名曰外關去腕二寸則肘攣取之所別也全文見

刺之從項始數脊椎俠脊疾按之應手如痛刺之傍三痛

千灸筋急不能行內踝筋急灸內踝四十壯外踝筋急灸

外踝三十壯立愈

玉兩肘俱攣 曲池九分先瀉後補 尺澤手如弓方可

標筋攣骨痛 冤門補

張仲文禪山灸法治脚筋攣急見腰痛門兩脚

攣膝曲筋急不能舒 曲泉一寸

兩膝筋拘攣不開 兩膝外曲交尖灸二十

甲兩手攣不收伸及被偏枯不仁手瘦偏小筋急太陵主

之 掖拘攣暴脈急引脇而痛內引心肺謔諸主之

一身盡痛

一身盡痛其病暴似傷寒屬濕痺並見傷寒太陽症門其

留連難已者於此求之 寒而一身痛者甘草附子湯熱

者拈痛湯甘草附子湯方

者拈痛湯見傷寒身痛門

者拈痛湯見傷寒身痛門

者拈痛湯見傷寒身痛門

者拈痛湯見傷寒身痛門

者拈痛湯見傷寒身痛門

垣拈痛湯治濕熱相搏肩背沉重疼痛上熱胃膈不利及遍身疼痛

羌活兩半 人參二錢 甘草五錢 防風三錢

苦參酒炒 升麻去蘆 葛根二錢 知母酒炒

黃芩酒炒 澤瀉三錢 猪苓三錢 茵陳酒炒

白木半錢 當歸酒炒 蒼朮二錢

右為細末每服一兩水二盞煎至一盞食遠或空心日

一服

婦人患身痛食少脉流畧沉重取弦實此氣滯也

白木二錢 青皮 黃芩 芍藥

木通 陳皮附 神麴炒 桂二錢

甘草五分 蘇梗二錢 右分十貼煎

麻黃五分 桂枝三錢 升麻 人參五分

白木三錢 甘草三錢 黃芪五錢 半夏二分

生薑一分 陳皮一分 厚朴一分 木香一分

茯苓一分 澤瀉一分 黃柏一分 附子二分

草薢二分

右吹咀水二大盞煎至一盞去查稍熱食遠服

本治遍身皆痛如勞証者若傷寒身體痛不可服但少

年虛損冷憊老人諸疾並皆治之

黃芪 人參 甘草 附子炮

羌活 木香 知母 芍藥

麻黃五分 桂枝三錢 升麻 人參五分

白木三錢 甘草三錢 黃芪五錢 半夏二分

生薑一分 陳皮一分 厚朴一分 木香一分

茯苓一分 澤瀉一分 黃柏一分 附子二分

草薢二分

右吹咀水二大盞煎至一盞去查稍熱食遠服

本治遍身皆痛如勞証者若傷寒身體痛不可服但少

年虛損冷憊老人諸疾並皆治之

黃芪 人參 甘草 附子炮

羌活 木香 知母 芍藥







醫學綱目卷之十三

肝膽部

驚悸怔忡 產驚悸 心忪悸動

大器驚者心卒動而不寧也悸者心跳動而怕驚也怔忡亦心動而不寧也

丹怔忡大脈屬血虛與痰 有慮便動者屬虛 時作時止者痰因火動 瘦人多血虛 肥人多痰飲

真覺心跳者是血少宜四物安神之類

治勞役心跳大虛症

陳皮 甘草 黃連 各三錢 歸身 白芍 側柏 川芎 各五錢

右用猪心血為丸

六脈俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脈也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜

入醫心經卷之三

氣浮以甘辛溫微苦峻補其血熱地黃生地黃柴胡升麻白芍藥牡丹皮川芎黃芪之類以補之以防血溢上竭

鎮墜之劑謂

杜林學士本南人歷內地為官有一子甚端嚴而聰敏父母愛之居常喜食海蛤飲食之頃未嘗不設至十八年忽

面色頓青形體瘦削夜多驚悸皆謂勞瘵之疾百療不瘳遂召杜脈之杜曰非病何以知之蓋雖病削面青精神不

減問學院子秀才好食甚物曰多食南海中味杜曰但多服生津液藥病當自愈如是經兩月面色漸有紅潤意夜

亦無驚悸林學士延杜而問曰醫師之驗久聞世名願聞此病所以杜曰王冰素問曰鹽發湯乃勝血之証海味皆

鹹物既多食海味使心血漸衰則夜驚悸今既去鹹用生津液之藥人且少壯血液易生面色漸有紅潤此疾去乃

安矣衆醫以為勞瘵非其治也

下必停 水停心 抑食少飲多水停心下其者則悸微者短氣飲水必

無五飲停蓄閉於中脘最使人驚悸屬飲家 溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽

懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸症或短氣悸乏或復自汗 脾虛不能致脾則 脾之水飲作矣

半夏 竹茹 枳實 各二兩 栝皮 去白

甘草 炙 茯苓 各五錢

右為剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分去查食前服

仲心下悸者半夏麻黃丸主之

半夏 麻黃 各等分

右二味為末煉蜜和丸如小豆大飲服三九日三服

茯苓甘草湯

茯苓 甘草 芍藥 各三錢 桂枝 二錢

東方青色入通於肝其病發驚駭全醫其 脾移熱於肝則為驚駭病傳變

一陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠者名曰風厥全文 三陽一陰太陽脈勝一陰不得止內亂五臟外為驚駭陽

不珍其丸獨活丸並治臥驚悸多驚二方並見不得臥○ 今而不寐臥不寐 肝故驚悸於臥也

東羌活勝濕湯治臥而多驚悸多驚洩者邪在少陽厥陰 也加柴胡五分如淋加澤瀉五分此下焦風寒二經合病

也經曰腎肝之病同一治為俱在下焦非風藥行經不可 也羌活勝濕湯 方見脫痛

諸病疹酸驚駭皆屬於火全文 見診



因驚成  
悸者病  
在心膽

丹病自驚而得者則神出其舍空得液則成痰也血氣  
入舍則痰其神不得歸焉神志

無驚悸因事有所大驚而成者名曰心驚膽寒病在心膽  
經其脈大動如鼓無頭尾者也東垣硃砂安神丸方見

垣云外物驚宜鎮平  
以黃連安神丸是也

無鎮心丹治驚悸

辰砂用黃連 龍齒用連志

右只取辰砂龍齒各等分為末猪心血為丸如芡實大  
每服一九以麥門冬葉葉燈心白蜜水煎苴熟為度  
臨臥咽下小兒磨化半丸量歲數與之

世蜜陀僧散治驚氣入心絡不能語者昔有為狼及大蛇  
所驚皆以此而安用蜜陀僧研極細末茶調一錢七服  
即愈

不驚者

無寒水石散治因驚心氣不行鬱而生涎結為飲遂為大  
疾忪悸煩慄不自勝持少遇驚則發尤宜服之

寒水石煨 滑石水飛各 生甘草一錢

右為末每服二錢熱則新汲水下怯寒則薑棗湯下加  
龍膽少許尤佳

子和術德新之妻旅宿樓上夜值盜劫人燒舍驚墜床下  
自後每聞有響則驚倒不知人家入輩躡足而行真敢冒  
觸有聲諸醫作心病治之人參珠珀及定志丸皆無効戴  
人見而斷之曰驚者為陽從外入也恐者為陰從內出也  
驚者為自不知也恐者為自知也足少陽膽經屬肝木膽  
者敢也驚怕則膽傷矣乃命侍女執其兩手按於高椅上  
坐當面下置一小几戴人曰娘子當視此一木猛擊之  
其婦人大驚戴曰我以木擊几何必驚乎伺少停擊之驚

少緩又斯須連擊三五次又以杖擊門又暗遣人擊背從  
之憲徐徐驚定而歎曰是何治法戴人曰內經云驚者平  
之平者常也常見必無驚是夜使人擊其門憲自昏昏達  
曙熟臥不聞夫驚者神上越也從下擊几使之下視所以  
收神也一二日雖聞雷亦不驚德新素不喜戴人至是終  
身敬服

仲炙甘草湯治脈結代而悸方見

丹驚悸定志丸加琥珀鬱金

無定志丸治心氣不足驚悸恐怯

葛蒲炒 遠志心 茯苓各二 人參一兩

右為末蜜丸如桐子大每服五十九米湯下一方去茯  
神名開心散服二錢七不時

不安神鎮心治驚悸消風痰辰砂遠志丸

石菖蒲 遠志 人參 茯苓

川芎 山藥 鐵粉 麥門冬

天麻 半夏 南星 白朮生各

細辛 辰砂各半

右為細末生薑五兩取汁入水煮稠丸如棗大另以  
硃砂為末每服二十五丸夜臥服生薑湯下小兒減服  
茯苓丸

石菖蒲 辰砂 人參 遠志

茯苓 真鐵粉 茯苓 南星牛膽

半夏麩分

右為細末生薑四兩取汁和水煮稠丸如桐子大別用  
細末為衣乾之每服十粒加至二十粒夜臥生薑湯下



上二方療驚良驗

胃足陽之脈是動則病聞木音則惕然而驚欲動

素陽明所謂甚則惡人與人聞木音則惕然而驚者陽氣

與陰氣相搏水相惡故惕然而驚也

足陽明之脈病惡人與火聞木音則惕然而驚鐘鼓不為

動聞音而動何也岐伯曰陽明者胃脈也胃者土也故聞

木音而驚者土惡木也

木音而驚者土惡木也

痰飲驚悸屬脾土

選氣驚悸有三

一曰肝木不及金來乘之經曰木不及曰委和委和之紀

其發驚駭又云陽明之復則入肝驚駭筋學是也

二曰火邪助心經云少陽所至為驚惑又云少陽所至為

驚躁又云少陽之勝善驚是也

三曰寒邪傷心經云歲水太過寒氣流行病煩心躁悸是

也

按經云陽氣者開闔不得寒氣從之乃生大僂陷脈為

瘦留連肉腠俞氣化薄傳為善長及為驚駭者是瘦瘡

所為之驚駭也蓋俞則瘦瘡之俞窠其痛氣留連肉腠

之間恐人觸着而痛故化惕惕然之心內薄而傳為善

畏驚駭之疾也

撮心燥燥跳動少衝瀉之灸立効

甲驚善悲不樂如墮墜汗不出面塵黑病飢不欲食照海

主之○膽寒怯寒厥手足痛善驚妄言而赤泣出液門主

之○善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱噎乾渴行間主之

素肝脈驚暴有所驚駭

○二陽急為驚

○白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中名

針灸

全

因驚生

病有四

曰肺痺寒熱

○陽明瀆則病積而善驚

寸口脈動而弱動即為驚弱即為悸

脈驚主病者其脈止而復來其人目睛不轉不能呼氣

仲病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四病皆從驚發得

之

產驚悸

大七寶散產後服之安神壓驚

辰砂 研 桂心 當歸 川芎 人參 白茯苓 羚羊角 乾薑 炮 右為末每服一錢用羌活豆淋酒調下如不飲酒漬米水飲調下○如心煩熱悶以麥門冬去心煎湯調下減薑桂○如心下煩悶而痛用童便酒調下○如腹痛加當歸○如心悶加羚羊角○如心虛氣怯加桂心 不下食或惡心加人參○虛顛加茯苓



人參分六 羚羊角屑 麥門冬 茯神各八分  
 茯苓 白藜皮 甘草各四 石膏二分  
 淡竹瀝兩大  
 右咬咀用水二升煎至七合下竹瀝分三服

心澹澹動

厥陰病 心澹澹 大動  
 澹澹因痰動也心澹澹動者謂不怕驚而心自動也驚恐亦曰心中澹澹恐謂怕驚而心亦動也

其澹澹自動之病屬二經一屬心主手厥陰病經云心主手厥陰之脈是動則病心中澹澹大動面赤目黃喜笑不休視盛虛寒熱陷下取之是刺灸之法也又曰太陽司天寒淫所勝病心澹澹大動胸脇胃腕不安治以甘熱是運氣之寒傷心主也○其二屬少陽病經云一陽發病少氣善欬善噫其傳為心掣是也掣尺制 反曳也

怒

怒在陰陽為陰閉遏其陽而陽不得伸也經云陰出之陽則怒又云血并於上氣并於下心煩冤善怒東垣云多怒者風熱陷下於地是也○怒在臟腑所屬經在臟為肝在志為怒又云肝藏血血有餘則怒又云膽為怒是也

丹治怒方

香附末六 甘草末一  
 右和勻白湯調服五錢

怒皆屬木太過  
 運氣怒皆屬木太過經云木太過曰發生發生之紀其病怒又云歲木太過風氣流行甚則善怒又云歲土不及風反大行民病善怒是也○怒在禁忌多生厥逆經云陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥又云暴怒傷陽又云怒則氣逆甚則嘔血及衄泄是也

善太息  
太息皆傷肝 傷脾  
 運氣善太息皆屬燥邪傷肝經云陽明在泉燥淫所勝病善太息又云陽明之勝太息嘔苦又云少陰司天地乃燥婁愴數至脇痛善太息是也

內經灸刺善太息皆取心膽二經經云黃帝曰人之太息者何氣使然岐伯曰思憂則心系急心急則氣道約約則不利故太息以出之補手少陰心主是少陽留之也又曰膽病者善太息口苦嘔宿汁視足少陽脈之陷下者灸之又云膽足少陽之脈是動則病口苦善太息視盛虛實寒熱陷下取之是也

面色蒼蒼然太息如將死狀振寒洩白便難中封主之脾虛令人病寒不樂好太息商止主之○凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即取公孫及井膈

實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂飲多不嗜臥虛則腹脹腸中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之

目疾門 目赤腫痛 外障 內障  
 不能遠視 不能近視 雀目日落不見物  
 目淚不止 風沿爛眼 倒睫拳毛 努肉  
 攀睛 飛絲塵垢入目 視岐亂見

目具陰陽  
 經云瞳子黑眼法於陰白眼赤脈法於陽故陰陽合傳於精明此則眼具陰陽也全文見視又曰五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其氣之精為白眼肌肉之精為約束裹擷筋骨氣血之精而與脈并為系上屬於腦後出於項中此則眼具五臟六腑也全文見視後世以內外皆



屬心上下兩臉屬脾白眼屬肺黑眼屬肝瞳子屬腎謂之五輪蓋本諸此也又有八廓之說無義無據今不得則入焉

臟腑主目有二

一曰肝經云東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝又云人臥血歸於肝肝受血而能視又云肝氣通於目肝和則目能辨五色也

二曰心經云心合脈諸脈者皆屬於目是也至東垣又推之而及於脾如下文所云

東垣五臟生成篇云諸脈者皆屬於目目得血而能視針經九卷大惑論云心事煩冗飲食失節勞役過度故脾胃

虛弱心火太盛則百脈沸騰血脈逆行邪害孔竅天明則日月不明也夫五臟六腑之精氣皆稟受於脾土而上貫

於目脾者諸陰之首也目者血氣之宗也故脾虛則五臟

之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火代行其令相火者胞絡也主百脈皆榮於目既勞役運動勢乃妄行及因邪氣所升而損其血脈故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本不明正理也

陽主散陽虛則眼楞急而為倒睫拳毛○陰主斂陰虛不斂則瞳子散大而為目昏眼花

瞳子散大者為內障○診脈痛赤脈從上下者太陽病從下

上者陽明病從外走內者少陽病太陽病宜溫之散之陽

明病宜下之寒之少陽病宜和之也論疾診

保論云眼之為病在腑則為表當除風散熱在臟則為裏

當養血安神暴發者為表而易療久病者為裏而難治除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸主之婦人熱地黃丸主之或有肥體氣盛風熱上行目昏遊視子散主之此由胸中濁氣上行也重則為痰厥亦能損目常使胃中氣清自無此病也又有因目疾服涼藥多則損氣者久之眼漸昏弱乍明乍暗不能視物此則失血之驗也熟乾地黃丸消氣定志丸相須而養之或有視物不明見黑花者此之謂腎氣弱也宜補腎水駐景丸是也或有暴失明者謂眼居諸陽交之會也而陰反閉之此風邪內滿當有不測之病也

目赤腫痛

目疼有二一謂目皆白眼痛一謂目珠黑眼疼蓋目皆白眼疼屬陽故晝則疼甚點苦寒藥則效經所謂白眼赤脈

法於陽故也目珠黑眼疼屬陰故夜則疼甚點苦寒則反

劇經所謂瞳子黑眼法於陰故也

簡補肝散治肝虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及羞明怕日夏枯草五錢香附子一兩共為末每服一錢臘茶調下無時候服

右夏枯草治目珠疼至夜則疼甚者神效或用苦寒眼藥點上反疼甚者亦神效蓋目珠者連日本日本又名目系屬厥陰之經也夜甚及用苦寒點之反甚者夜與寒亦陰故也丹溪云夏枯草有補養厥陰血脈之功其草三四月開花遇夏至陰生則枯蓋稟純陽之氣也故治厥陰目疼如神者以陽治陰也予周師目珠疼及連眉稜骨痛并頭半邊腫痛遇夜則作用黃連膏子點上則反大疼諸藥不效灸厥陰少陽則疼隨止半月又作



又灸又止者月餘遂以夏枯草二兩香附二兩甘草四錢同為細末每服一錢五分用茶清調服下咽則疼減大半至四五日良愈又一男子年六十歲亦目珠連眉稜骨疼夜甚用苦寒劑點亦甚與前証皆同但有白翳二點在黑目及外眥為翳翳皆不效亦以此藥間東垣選奇湯又加四物黃連前服并灸厥陰少陽而安

本治睛疼難忍者

川歸

防風

細辛

薄荷

右為末每服二錢麥門冬熱水調下食後日午夜臥各一服

保止痛散治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛脈弦作內障也得之於飢飽勞役

柴胡

甘草

瓜蒌根

當歸

黃芩

生地黃

右為末每三錢水一盞半薑三片棗一枚臨臥熱服小便不利加茯苓澤瀉各五錢

治太陽經衛虛血實目腫赤臉重頭中濕流膚腎睛痛肝風盛眼黑腎虛

桔梗丸  
桔梗一斤 牽牛頭末二兩  
右細末每服四五十九至一百丸食前溫水下日二次

行暴赤眼無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢底點目熱淚出隨點隨愈但小兒甚懼不須疑已試良驗不可用

張仲文治眼暴赤腫痛不得開又淚出削附子赤皮末加蠶屎着背中以差為度

本治丈夫女人室女小兒諸般赤眼針頭丸

川烏尖

白僵蚕

右為末用猪膽取汁調藥不令稀用成軟塊攤在碗內荆芥艾各一兩皂角小者一莖燒將藥碗覆蓋之常將藥膏攪勻轉又攤又熏以皂角荆芥艾盡為度再搜成塊用油紙裹入地中出火毒冬天兩日夜夏天一夜春秋一日夜取出九如針頭大每一九點眼中妙

丹治目中百病乳汁煎黃連點之

陽毒治法

能視盡水入於經其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁即血也用以點目豈不相宜者哉○治眼痛小黃栢皮一名小栢子以籠布揩去籠皮刮取柔細黃屑以手急捏成團如鷄子大以苧絲縛之次以蘿蔔葉包之

又用苧絲縛之置灰火內煨去外二三層有灰者急用紗絞出黃汁收之點眼甚妙一方用乳汁拌小黃栢皮同煨

世傳信方眼風泪痒或生翳或赤皆一切皆主之宜州黃連搗為細末糝核仁去皮碾為膏綠此性稍濕未不得故耳與黃連等分相合取不蛀乾棗三枚割頭少許留之去核以二物填於中却取割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以水半碗於銀器中文武火煎取一鷄子殼以綿綿待冷點眼萬萬不失前後試驗數十人皆應

保點眼藥除昏退翳截赤定痛

當歸錢 黃連錢 防風五分 細辛五分

比草錢

右劉如麻草大水一大碗文武火煎滴水中不散為度



入熟蜜少許點開

丹暴赤眼痛枸杞汁點妙手 目卒痛荆芥燒汁點之  
保救苦丸治眼暴赤發噴痛甚者

黃連兩 川歸錢 甘草一錢

右剉細水半碗浸一宿以火熬約至一半綿絞去查令  
淨再熬作稠膏攤在碗上倒合以物蓋之用熟艾一大  
塊如彈子大底下燃之薰膏子令艾盡為度下下項藥

硃砂一錢 腦子五分 乳香 沒藥各分

右研入膏和丸如米大每用二丸點眼兩角仰面臥藥  
化方起

世點藥方黃連五錢去鬚槌碎用水三碗浸夏月三日冬  
五日以古文錢百枚筒同煎取汁半碗又將查再煎凡三  
次取綿繭過以磁器煨成膏子如沙糖樣却將盧甘石黃

入醫學綱目卷三

連牙茶小便煨過者入麝香少許同研細入前膏子再煨  
可丸為度如桐子大化點○一方不用盧甘石只將膏子  
入麝少許點尤妙○一方陰陽寒熱通用以生薑自然汁  
重綿繭過渣薑泥晒乾却用黃連膏入蜜少許以薑泥為  
丸餅如錢厚或水化或乾點神效

薑汁點法見前黑睛痛條治目痛惡寒脈浮者效○治目  
皆白眼痛諸法並見後表裏寒熱虛實等條

東垣選奇湯防風飲子治眉骨痛不可忍方見眉

芎辛湯治兩目晝夜隱澹難開羞明畏日目赤視物昏暗

芎藭 蔓荊子各五分 細辛二錢 防風一錢

甘草 白芷各一錢

右作一服水一大盞八分煎至一盞去查稍熱臥服之  
極佳

明目細辛湯治兩目發赤微痛羞明畏日去風寒怕火眼  
睫成細膠糊多隱澹難開眉骨攢痛悶鼻涕唾極多如稠膿  
大便微硬喜食冷物

麻黃 羌活各三錢 桑本一錢 川芎五分

細辛少許 白茯苓一錢 蔓荊子六分 荆芥蕙二錢

當歸稍少 生地黃六分 川椒八粒 桃仁二十

紅花少許 防風二錢

右並剉如麻草大分作四服每服水二大盞煎至一盞  
去查稍熱服食後忌酒濕麪及風寒處行走

本治肝腎風毒氣上衝眼痛菊花散

其菊花 牛蒡子各八兩 防風兩 白蒺藜去刺

甘草一兩

右為細末每服二錢熱水調下食後臨臥

入醫學綱目卷三

凡目赤痛或大腑秘或脈實有力者為有裏證宜微利之  
實熱條瀉青丸洗肝散之類是也

海目赤暴作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯

四物各五錢 羌活 防風各三錢 草龍膽

防已各二錢

右水煎服

丹丈夫患眼赤腫痛

連翹 黃芩 歸身 陳皮

蒼朮各二錢 木通一錢 甘草一錢

分三貼薄芎藭五片水二盞煎一半入此好酒熱飲之

保櫻子散治體肥氣盛風熱上行目昏澹

櫻子 黃芩 木賊 蒼朮各等

右細末食後茶送下



川芎散治風熱目眩熱腫及胸中不利

川芎 槐子各一

右為末氣滯下利薑湯調目疾茶清調熱上攻吹咀一

兩煎服

治眼赤暴發腫散熱飲子

防風 羌活 黃芩 黃連各一

右切每半兩水二盞煎食後溫服加大膽秘加大黃一

兩如痛甚加川歸地黃煩躁不得臥加梔子一兩

治目暴發赤腫除風散熱瀉青丸方見治法門

局洗肝散風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱滯膠淚

薄荷去根 當歸 羌活 防風各去

梔子仁 甘草 大黃 川芎各二

右為末每服二錢食後熱水調下

本事治目暴赤腫疼痛

木賊半兩 細辛半兩 草烏一分 龍膽草半兩

右為到散每服三大錢水一大盞黑草半合煎至一二

沸入沙糖一塊如大彈子大煎至八分去查食後溫服

一應諸眼患並用忌煎煉油麩酢醬熱物及不得嗔怒

房色等事則便易獲痊矣

治腎經虛冷水候不升不能上滋肝木致令眼目昏暗或

痛或痒須用此藥方調治之

川芎 荆芥 天麻 葶藶

川烏炮 烏藥 羌活 黑牽牛炮

川歸 金銀石各等分

右為末煉蜜丸如茱萸大硃砂為衣每服一丸薄荷湯嚼

下

目赤腫足寒者必用時時溫洗其足并詳赤脈處屬何經

灸三里臨泣崑崙等穴立愈○海藏四物龍膽湯方見

獨地黃湯治眼小昏翳因發而久不能瘥

防風 當歸 黃芩 黃連

人參 茯神 羌活 地黃各等分

右龍末每服五錢水一盞半煎至一盞溫服

丹赤眼痒痛煎枸杞汁服方見

恒助陽和血補風湯治眼發上熱壅白睛紅多淚無疼

痛而隱滯難開此服寒藥太過而真氣不能通九竅也故

眼昏花不明宜助陽和血補氣

防風七分 黃芪錢一 甘草五分 蔓荆子

歸身五分 白芷二分 升麻七分 柴胡

右吹咀作一服水一盞半煎至一盞去查熱服臨臥避

風及忌食冷物

碧天丸治目疾累服寒涼不愈兩目蒸熱有如火煎赤而

不痛紅系血脈滿目貫睛膏悶昏暗羞明畏日或上下臉

赤爛或不伏風土而內外銳皆皆洗破之

瓦粉炒 銅綠七分 枯白礬一分

右研銅綠白礬令細旋旋入瓦粉銅綠勻熱水和之共

為丸每用一丸熱湯半盞浸一二筒時辰洗至覺微瀼

為度少合眼半時辰許臨臥更洗了眼目就睡尤神妙

一丸可洗十日如再用重湯內頓令熱此藥治其標為

裏熱治已去矣裏實者不宜用此當瀉其實熱諸方見

前大膽秘堅條

子和濟州王正之壬午年十五歲目赤多淚裏工無效戴人

見之曰此兒病在日晷當得之母腹中被驚其父曰姪



時在臨清被圍戴人令服瓜蒂散加鬱金上湧下泄各去  
涎沫數升人皆笑之其母曰兒腹中無病何以吐瀉如此  
至明日其目輝然奕奕明○一小兒名得孫眼發赤其母買  
銅綠欲洗兒目煎成家人誤與兒飲之須臾大吐吐訖立  
開○安慶趙君玉目暴赤腫點洗不退偶思戴人法曰凡  
病在上者皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散君王  
歎曰法之妙其迅如此乃知法不遠人人自遠耳

孫仁廟朝中衛才人忽患眼疼衆醫皆不能療或投寒藥  
或投補藥加之腑臟不安上乃問孫孫曰臣非眼科乞不  
全責於臣降旨有功無過孫乃診之肝脈弦滑非熱壅也  
乃才人年壯血盛肝血併不通遂問及官人月經已二月  
不通衆醫曰有孕孫曰此正為疾耳遂下通血藥其經既  
通不日眼疾亦愈上賜錢三十萬才人贈金一囊官人謠

曰神醫不來雙目難開

丹治風赤眼乾蛭蚘十箇炙為末冷清茶下二錢夜臨臥  
與服聖惠

點藥諸方分陰陽並見前眼痛分黑白條

世治眼暴赤腫大田螺以清水洗去泥塵去掩入黃連末  
一錢麝些少在內將一盞子安少濕泥仰安田螺在泥上  
粘定露一宿次日早盡化為水以鷄翎刷眼痛處則瘥  
外治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白碗中浸春  
夏一食時以上看碧色出即以筋頭纏綿仰臥點所患眼  
乃先從大眇中滿眼點微痛不畏良久三五飯頃即側臥  
瀝却熱汁每日十度已上不過二日瘥○治赤目痒痛地  
骨皮三升水三斗煮取三升去查納鹽二兩煎取二升傳  
目或加乾薑二兩

傅濟治風毒上攻眼腫痒流痛不可忍或上下臉皆赤  
爛浮翳肉侵睛神效驅風散

五倍子兩 蔓荊子五錢

右同杵為末每用二錢水二盞銅瓦器內煎及一盞澄  
查熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去渣  
痒

濕眼稍赤爛

黃連三錢

白礬三錢

銅綠

蜜陀僧一錢

輕粉少

右為極細末少少貼之

東碧雲散搽藥

青黛一錢

蔓荊子半錢

川芎二錢

薄荷二錢

鬱金一錢

石青錢

細辛錢

紅荳粒

芒硝錢

右為細末口噴水鼻孔內噴之

乳香

沒藥

川芎

石膏

雄黃各二錢

盆硝半

右為細末專治赤眼冷淚頭風耳聾耳痒鼻塞聲重一  
搗牙根便住

保眼發赤腫毒氣侵睛眼痛宜拔毒散

盆硝

乳香

雄黃

沒藥各等

右為細末研以少許搽鼻中

治眼風毒發腫鼻中欲嚏嚏多鼻損而生瘡宜風散

川芎

甘菊各二錢

乳香

沒藥各一錢

右為末少許搽鼻中



貼洗雜方

本治赤腫眼以白薑末水調貼脚掌心 又以上硃蜜調

赤眼用九節黃連秦皮龍末加滑石一塊煎湯洗 又

方用熱湯盪洗或濃煎冬青葉湯入鹽熱洗

州治火眼艾燒細烟以碗蓋之候烟上成煤取下以溫水

調洗之入黃連尤妙

均廣大重明湯治兩目臉赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼臉

并及痒極抓至破爛赤腫眼楞生瘡翳目多眵痛隱澹難

草龍膽稍 防風 甘草根 細辛 各等

右剉如麻蓋大內甘草不剉只作一挺先以水一大碗

半煎草龍膽一味乾一半再入餘三味煎至一小半碗

夫查用清汁帶熱洗以重湯坐令極熱日用五七次洗

運氣目赤有二

一曰風助火鬱於上經云少陰司天之政二之氣陽氣布

風乃行寒氣時至民病目眩目赤氣鬱於上而熱又云少

陽司天之政初之氣風勝乃溢候乃大溫其病氣拂於上

火獨盛 熱在中 肝實宜 清之 肝虛宜 湯之 針灸

之也

其二取足陽明經云目痛赤脈從下上者陽明病故知取

之也

其三取足少陽經云目痛赤脈從外走內者少陽病又手

足少陽之脈所生病者皆目銳眦病故知取之也

其四取睛脈經云邪客足陽蹻之脈令人目痛從內眦始

刺外踝之下半寸所左刺右刺左又云目中赤痛從內

皆始取之陰蹻也

灸刺黑珠痛有三法

其一取足太陽經云足太陽有過項入于腦者正屬目本

名曰眼系頭目若痛取之在項中兩筋間是也

其二取足厥陰經云肝足厥陰之脈上入頰頰連目系故

取之也

其三取少陰經云手少陰之別名曰通里屬目系取之掌

後一寸也又足少陽之正陽明之正皆繫目系經無取法

子

和余嘗病目赤或腫或翳作止無時偶至新息帥府百

餘日羞明隱澹腫痛不已忽眼科姜仲安云宜刺上星至

百會連以銚針刺四五刺橫竹穴絲竹空穴上兼眉際

二十刺及鼻兩孔內以草莖彈子出血如前約二升許來

日愈大半三日平復如初

深眼痛睛欲出者須八關大刺十指間出血須

十指縫

心眼暴赤腫 神庭 上庭 顛門 前頂

百會各出血

世眼腫 二間 行間 合谷 立

抽眼疼不可忍 風也



匡眼紅腫羞明怕日并昏 睛明可直針忌灸 童子翳

針入一分沿 太陽 翳上三

寶眼痒痛 光明 第五 各流 行間

集羞明怕日 橫竹 合谷灸 小骨空 灸如二間

張風眼卒生翳膜赤痛 中指本節尖上 灸三壯小麥大

諸障 睛明 四白 在珠下 太陽百會商陽厲

兌光明各出血合谷三里命門肝膈光明各灸之

撮要眼赤腫疼痛 陽谷 一分 瀉 至陰

兩內皆赤腫目眩無所見皆痒痛溼膚白翳睛明主之

○目眩赤痛天柱主之○目痛泣出甚者如脫前谷主

之○眼痛下廉主之○白膜覆珠子無所見解溪主之○

青盲無所見遠視眩暈目中溼虛白膜覆瞳子目窓主之

○目痛口僻疾目不明四白主之○目痛引眦少腹偏痛

作春一嘔痰視昏嗜臥照海主之瀉左陰蹻取足左少陰

前刺陰蹻後刺少陰氣在橫骨上○目中白翳然谷取

之○目視不明振寒自發瞳子不見腰兩脇痛脚痠轉筋

丘墟主之○目赤目黃翳主之○目眩無所見偏頭痛

引目外眦張急領厭主之○目中痛不能視上星主之先

取嚏嚏後取天牖風池○目痛不明斷交主之

葉眼痛久不愈○魚際 灸七

外障 在睛外

經云診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從

外走內者少陽病按此論表裏之翳明矣用以治症如鼓

應桴也

凡赤脈翳初從上而下者屬太陽以太陽主表其病必連

肩脊骨痛或腦項痛或半邊頭腫痛是也治法宜溫之散

之溫則臘茶鹽川附等分煎服立愈戴立齋嘗以此證用

川附一錢作一服隨愈散則簡要夏枯散東垣選奇湯之

類是也○一方附子半兩芽茶一大撮白芷一錢細辛川

芩防風羌活荆芥各半錢煎服神效

簡夏枯草治眉稜痛目翳從上下者累效必與退雲丸相

兼服夏枯草方見目珠痛條

垣選奇湯治眉稜骨痛目翳從上下者妙方見眉

羌活除翳湯治太陽寒水翳膜遮睛不能視物

麻黃根一分 羌活一兩 防風一兩 藥本七

薄荷葉二錢 細辛少許 荆芥一錢 煎成

川芎二錢 當歸根三錢 生地酒一 小椒五分

黃柏四錢 知母三錢 右咬咀每服三錢水三大盞煎至一盞半入荆芥蔥再

煎至一盞去查稍熱服後忌酒濕麪

本方

防風一兩 白蒺藜一兩 羌活一兩 甘菊二

右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點服食後

赤脈翳初從下而上者或從內眦出外者皆屬陽明以陽

明主裏其症多熱或便實是也治法宜下之寒之下則局

方流氣飲錢氏瀉青丸局方溫白丸加黃連黃柏之類累

用果驗寒則一味黃連羊肝丸之類也

局流氣飲治目生翳障

大黃炮 牛蒡子炒 川芎 菊花去枝

白蒺藜炒去細辛苗 防風苗 玄參苗

山梔反 黃芩炒 甘草炙 蔓荊子

荆芥煨 木賊各一兩 草決明半兩 蒼朮二兩

上者陽 下者陰 宜寒 宜下



右為末每服二錢臨臥用冷酒調下  
羅撥雲散治因眼發濕熱不退而作翳膜遮睛昏暗羞明  
隱瀆難開

川芎 草龍膽 楮實 薄荷

羌活 荊芥 石決明 草決明

蒼朮 大黃 甘草 木賊

密蒙花 連翹 川椒 甘菊

桔梗 石膏 地骨皮 白芷

白蒺藜 檳榔 石燕

右件搗羅為細末每服三錢溫茶清一盞調下食後一

日三服忌雜魚鳥諸肉

海藏東垣先生治癩後風熱毒翳膜氣暈遮睛以瀉青丸  
子瀉之大效初覺易治之瀉清丸減大黃一半用之

八 醫學綱目卷三十三

妻姪女形肥筭年時得目疾每一月或二月一發發時

紅腫滿痛難開如此者三年服除風散熱等劑及尋常

眼藥則左目反有頑翳從銳眥來遮瞳人右目亦有翳

從下而上經云從外走者少陽病從下上者陽明病

予謂此少陽陽明二經有積滯也脈短滑而實晨則似

短潔古云短為有積滯遏抑臟腑宜下之遂用溫白丸

減川芎附子三之二多加龍膽黃連如東垣五積法從

二九每日加一丸加至大利然後減丸又從二九加起

忽一日於利中下黑塊血若干如墨大而硬堅從此漸

覺痊而翳盡去矣

世黃連羊肝丸治目翳從下上者從內皆出外者神效方

赤脈翳初從外皆入內者為少陽以少陽主半表半裏治

內外赤脈翳初從外皆入內者為少陽以少陽主半表半裏治

法宜和解之神仙退雲丸之類是也

垣神仙退雲丸治一切翳障內外障昏無睛者累效妙方

七

川芎 當歸 犀角 枳實

川棟 蟬殼 甘菊 薄荷

瓜蒌仁 生者 密蒙花

荆芥 同焙乾去此味與甘草不用 地骨皮 洗

白蒺藜 微炒羌活 生地 酒洗焙乾

川木賊 便浸一宿焙乾

右為細末煉蜜為丸每一兩分作十九米泔湯調服日

進二三丸食後婦人當歸湯下有氣者木香湯下使之

在人消息

本治諸眼患因熱病後毒氣攻眼生翳膜遮障服此藥逐

旋消退不犯刀針

青箱子 防風 枳殼 羌蔚子

細辛 各半 枸杞子 澤瀉 生地黃

石決明 各一兩半 黃連 兩半 車前子 川當歸

麥門冬 去心各二兩

右各如法修事焙乾為末煉蜜丸如桐子大每服三十

丸飯飲吞下忌一切熱毒物

垣羌活退翳湯

羌活 防風 黃芩 柴胡

五味子 黃柏 芍藥 黃連

甘草 草龍膽 黃芪 升麻

歸身 石膏 石燕

右件剉如麻葉大水二盞分作二服煎至一盞入酒少



許去查臨臥熱服忌言語  
消翳散一名龍膽散

青蛤粉兩半 羌活 龍膽草 黃芩炒各三錢

蟬退五分一錢 麻黃一錢 般精草兩 升麻二錢

川鬱金兩 甘草根分五

右為細末每服二錢食後溫茶調下已上四方熱多者宜之

又方

川芎 羌活 旋覆花 防風各二兩

甘草 蒼朮油浸一夕去皮 楮實

楮葉並八月採陰乾 甘菊 枳實

蠅退木賊各一兩

右木曰中治為末茶清調下二錢早食後臨臥各一服治暴赤眼忌濕麪及酒楮實須具無實者取葉不爾諸

木實學錄卷三十一 注

藥無效合時不得煇及犯鐵器予觀此方取楮葉必無實者蓋陰陽二合相配耳有實者陽也無實取葉者陰也所以不得真楮實者悉無效

羅五秀重明丸治眼翳膜遮睛隱澁昏花常服清利頭目

甘菊花開頭五 荆芥五 木賊去節五 楮實五百

川椒開口者五百粒

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼時時咽下食後嚼化無時臨臥大忌酒麪熱物已上二方無翳者宜之

麥冬

翳膜者風熱重則有之或凝入眼此肝氣盛而發在表也翳膜已生在表明矣宜發散而去之若反疎利則邪氣內播為翳益深邪氣未定謂之熱翳而浮邪氣已定謂之水翳而沉邪氣年而深者謂之陷翳當以煇發之物使其邪氣再動翳膜乃浮佐之以退翳之藥而能自去也病久者

不能速效宜以歲月除之  
新翳所生表散方東垣羌活除翳湯有熱血虛者退雲丸之類是也

偏治水翳久不去者羚羊角散

羚羊角 升麻 細辛各等分 甘草半錢

右為末一半煉蜜為丸每服五七十九用一半為散以

泔水煎吞九子食後

煇發陷翳亦羚羊角散之類用之在人消息若陰虛有熱者兼服神仙退雲丸

垣補陽湯治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青

白翳見於大眇乃足太陽少陰經中鬱滯足厥陰肝經氣

不得上通於目故青白翳內阻也當於太陽少陰經中九

原之下以益肝中陽氣衝天上行此當先補其陽後於足

八管學錄卷三十一 注

太陽少陰標中瀉足厥陰肝經陰火乃次治也內經曰陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服瀉陰丸若天色變大寒大風并大勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不得服候體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通於肝經之末利空窅於眼目矣

羌活 獨活 當歸身去蘆頭用稍

甘草稍 熟地黃 人參去 黃芪

白木已上各 澤瀉 陳皮去白各 生地黃炒二

白茯苓去 知母炒黃色 柴胡去苗 防風去蘆

白芍藥兩 肉桂去皮

右同為末每服半兩水二大盞煎至一盞去查溫服

空心使藥力行盡方許食



連栢益陰丸

羌活 獨活 甘草根 當歸身

防風 五味子 黃連 草决明 黃芩

石决明 知母 黃栢

右為細末煉蜜丸如菘荳大每服五十九漸加百丸止

臨臥清茶送下常以助陽湯多服少服此藥以此藥一

則妨飲食二則力大如升陽湯不可多服

升陽泄陰丸

羌活 獨活 甘草根 歸身

熟地 人參 黃芪 白朮 白茯苓

瀉澤 白芍藥 陳皮 生地 知母

防風 肉桂 柴胡 柴胡 柴胡

右吹咀每服五錢水煎熱服另合一料煉蜜丸如桐子

大食遠茶清送下五十九每日與前藥各一服不可飽

服如天氣熱甚加五味子三錢或半兩天門冬去心半

兩枳實亦加半兩

右上一三方合治一病空心補陽湯臨臥連栢丸食遠升

陽泄陰丸

滋陰地黃丸治內障兼右目小眦青白翳腫子散大內障

丹丈夫因勞力後兩眼上星右邊獨昏此熱傷血

白朮 歸身尾 生地 木通

黃連 黃芩 黃栢 甘草

分三貼煎服大熱加白芍藥

醫從下而上諸方瀉青之類

醫從下而上諸方瀉青之類

醫從下而上諸方瀉青之類

醫從下而上諸方瀉青之類

日期復發者或間一月或二月一發皆為積治如脈滑者

宜溫白丸加黃連草龍膽如東垣五積法服之

百點膏張濟民眼翳以至遮瞳人視物不明如覺雲氣遮

障以此方治之

黃連 防風 羌活 獨活 甘草根 當歸身

右劉如麻荳大粒仁另研如泥同熬滴入水中不散去

查沫入好蜜少許再煎少時為度極要病人心淨點之

點至目微痛為度一日點五七次臨臥點尤妙名曰百

點膏但欲多點使藥力相續

羌活退翳膏治足太陽寒水膜遮左睛白翳上視物不明

椒樹 黃連 歸身 防風 柴胡

生甘草 升麻 生地黃 漢防已

右淨水一碗先煎漢防已黃連生甘草當歸身生地黃

煎至一盞入餘藥再煎至一盞去查入銀磁器內熬稀

膏點之有力為度

退翳膏子治黑白翳

荆芥穗 黃連 生地黃 甘草

歸身 連翹 柴胡 升麻

防風 羌活 細辛

右先用水半盞浸荆芥一處次將黃連生地甘草三味

用水一大碗煎至半碗再下餘七味同煎至一盞去查

更上火熬至半盞入荆芥水二匙入蜜少許再煎令勻

點之神效

點之神效

點之神效



圓明膏治內障生翳及瞳子散大皆勞心過度飲食失節

柴胡去苗 麻黃去節 歸身三錢 生地兩半

黃連五錢 甘草二錢 訶子皮濕紙裏

右七味先以水二碗煎麻黃至一碗去沫外六味各咬

咀如荳大篩去沫子秤入內同煎滴水中不散去渣沫

入蜜少許再熬點之

右點方四皆東垣先生所製乃隨證立法非如泛常通

用之方如瞳子散大用訶子收之之類也

保金絲膏點眼

生薑取汁 白蜜煉去沫 猴猪膽汁三錢 黃連四兩

至五升 右先煎黃連水後入薑汁次入蜜同煎去沫淨入下項

腦子 硼砂 熊膽各四錢 射香

青鹽各三錢 輕粉少 鵬砂二錢

右研細攪勻同煎令稀膏用之

羅金露膏

麩仁一兩 黃丹各一兩 黃連兩半 蜜六兩

右件先將黃丹入鍋中炒黃至紫入蜜攪勻下長流水

四升以嫩柳枝頭七莖把定攪之次下麩仁候滾十數

沸又下黃連用柳枝不住手攪旋至二升置籬內傾藥

在紙上慢慢滴之無令塵汚如有瘀血加硼砂一錢上

火煨開入前膏子內用

夜光丸治赤眼翳目昏花

宣黃連 訶子去核各 當歸兩 銅綠一錢

右咬咀用河水三升同浸兩晝夜入銀磁器熬取汁再

入文武火熬槐柳枝攪滴水成珠為度

猴猪胰子二箇先 去脂以水洗換水無度令

蘆甘石一兩 黃連四兩 河水浸去

青鹽六兩 蜜一斤 梨十枚 去皮

右將梨汁甘石入膏子內熬五七沸次入青鹽用槐柳

枝攪褐色傾入磁甕冷水中拔去火毒臘月合為妙正

月十一月次之餘月皆不可

濟蟾光膏治遠年目病不通道路去翳膜須用臘月戌開

日合

白沙蜜四兩 色白者炒隔年煎一枝去頭皮短切與

放定用 黃丹三錢 蜜三錢 佛手三錢

當歸 赤芍藥 杏仁湯炮去皮尖已

黃連去蘆頭川芎 秦皮 訶子皮

防風 石膏 玄精石 井泉石

無名異 玄參 代赭石 石決明已上

味各三錢咬咀或雪水或長流河水五升銀磁器內

入前放下藥蜜一同慢火熬藥水

沒藥 琥珀 硃砂另 麩仁帶殼去

已上五味各三錢前四味先研爛後入麩仁水飛一同

研細澄有渣再水飛打清再水飛方傾入前紫金藥內

一同復熬一二沸以藥滴於水中不散為度大抵勿令

過與不及取下土中埋七日取出置銀器中如法收貯

再添入後細藥傾入藥時亦用桃柳枝攪勻

南鵬砂 珍珠 龍腦 珊瑚枝四味

錢 麝香五分

右件五味研極細亦以桃柳枝攪勻傾入前藥中復攪



白然後以帛封器盒口旋取用如有取不盡藥用淨水  
斟酌洗碗却將碗藥水熬三五沸另行收拾或洗眼或  
膏子藥稠了時傾入些少調解

右用素柴燒共計二十九味  
壯療目熱生膚赤白膜取雀屎細直者人乳和付目上消  
爛盡○烏賊骨主目中一切浮翳細研和蜜點之又骨末  
治目中熱有效

丹治眼翳榜白皮索為繩日乾燒為灰研細點之自漸退  
妙○又方猪膽皮去汁熬為繩燒灰點之亦妙  
東碧雲散治外障搗藥

麻黃根一錢 歸身一錢 乳香少 麝香如少加  
右將當歸麻黃為籠末炒黑色入乳射研極細噲化搗  
入鼻中

六 醫學綱目卷三  
指鼻  
薄荷三錢 石膏一錢 芒硝 川芎各等  
細辛二錢 蔓荊子三錢 青黛一錢

右為末鼻內搗之  
丹楊生娘患赤眼生膜似白星  
秦皮 滑石 黃連 荆芥  
歸頭 赤芍藥各三錢

右分四貼煎洗仍教其莫洗浴止可洗脚  
子治法以鵝翎截之近黑睛及當白睛翳之膜自聚上以  
針鈎挽之割去即見物以綿當眼着血斷三日瘥

東垣醫魏邦彥夫人目翳暴生從下而起其色綠腫痛不  
可忍先師曰翳從下而上病從陽明是也綠非五方之正  
色殆肺腎合為病邪乃就畫家以墨臚粉合成色諦視之

與醫同色肺腎為病無疑矣乃瀉肺腎之邪而入陽明之  
藥為之使既效而他日病復作者三其所從來之經與翳  
色各異乃以意消息之曰諸脈皆屬於目脈病則從之此  
必經絡不調則目病未已也問之果然因視所不調者治  
之病遂不作  
針灸外障並見目赤門

內障  
在睛裏昏暗與不患之眼相似唯瞳人裏有隱隱青白者  
無隱隱青白者亦有之

一老人病目暴不見物宅無所苦起坐飲食如故予曰  
太虛急煎人參膏二斤服二日目方見一醫與青礞石藥  
予曰今夜死矣不悟此病得之氣大虛今不救其虛而反  
用礞石不出此夜必死果至夜半死○一男子四十餘歲

醫學綱目卷三

形實平生好飲熱酒忽目盲脈濇此因熱酒所傷胃氣汚  
濁之血死在其中而然也遂以蘇木作湯調人參膏飲之  
服二日鼻內兩手掌皆紫黑予曰此病退矣滯血行矣以  
四物加蘇木桃仁紅花陳皮煎調人參末服數日而愈○  
一男子五十五歲九月間早起忽開眼無光視物不見急  
就睡片時却能見人物竟不能辨其何人何物飲食減平  
時之半神思極倦脈之緩大四至之上重按則散而無力  
予作受濕治詢之果因臥濕地半箇月得此証遂以白朮  
為君黃芪茯苓陳皮為臣附子為佐十餘貼而安  
右三方治目不明皆為氣脫而用參朮追回者也經云  
上焦開發宜五穀味薰膚充身澤毛若霧露之漑是謂  
氣脫者目不明即其証也  
人參補胃湯治勞役飲食不節內障眼病此方神效



黃芪根一兩 人參兩 甘草錢八 蔓荊子錢二  
 白芍藥錢三 黃柏三錢 酒炒四錢  
 右咬咀每服三四錢水一大盞煎至一盞去查稍熱服  
 臨臥三五服兩目廣大視物如常惟覺兩脚踏地不知  
 高下蓋火伏升發故也病減住服七日再服此藥宜春  
 間服之

益氣聰明湯治飲食不節勞傷形體脾胃不足內障耳鳴  
 或多年視物昏眩令目廣大久服無內障耳鳴耳聾之患  
 又令精神倍常飲食增倍身輕體健耳目聰明

黃芪兩半 甘草根錢六 人參兩 升麻根三錢  
 葛根三錢 蔓荊子一錢 白芍藥錢一 黃柏一錢 酒  
 炒黃

右咬咀秤二錢水二鍾煎至一鍾去查熱服臨臥服五

八醫學綱目卷三

毒

更再煎服之得睡更妙如煩亂或有熱春月漸加黃柏  
 夏月倍之如脾胃弱去之熱減亦少用但有熱或麻木  
 或上壅頭目三兩服後其熱皆除又治老人腰以下沉  
 重疼痛此藥久服治人上重反有精神兩足輕浮不知  
 高下空心服之或少加黃柏輕浮自減小兒減服多則  
 壅滯若治倒捷去黃柏芍藥忌煙火酸物

圓明內障升麻湯治內障得之脾胃元氣衰弱心火與三  
 焦俱盛為此疾劉舜卿因南征飲食失節形體勞役心不  
 得休息眼疾復作今擬此方服之效

柴胡根七 羌活根半 防風根兩 白朮  
 升麻根兩 白芍錢六  
 歸根兩 升麻根兩 白芍錢六  
 乾薑一 五味子二 人參 葛根  
 黃芪兩 白茯苓三

右咬咀每服五六錢水三大盞煎至二盞入黃芪黃連  
 湯二錢同煎數沸去查煎至一盞食後熱服

黃芪黃連湯一方有升麻五  
 黃芪一兩 酒洗炒 黃連去鬚酒洗 草龍膽一兩 酒洗  
 生地酒洗

右咬咀每服二錢入水二盞煎數沸去查再煎至一盞  
 熱服午後晚間俱不可服唯午飯時服之方效  
 復明散治內障

黃芪半錢 川芎五分 柴胡 連翹  
 甘草各一錢 歸身二錢 蒼朮五分 生地一錢  
 陳皮五分 黃柏分

右劉如麻荳大每作一服水二大盞煎至一盞去查稍  
 熱服食後忌酒濕麪辛熱大料之物

八醫學綱目卷三

毒

右四方治目不明皆氣虛而未脫故可與參芪中微加  
 連栢若氣既脫則黃栢等涼劑不可施經云陽氣者煩  
 勞則張精絕目盲不可以視耳閉不可以聽之類是其  
 證也

內障腫子散大論并方 腎主骨之精為瞳子散大者因腎  
 精散大視物花也 ○凡心包絡之脈出於心中代心君行事也與少陽為

表裏瞳子散大者少陰心之脈挾目系厥陰肝之脈連目  
 系心主火肝主木此木火之勢盛也其味則宜苦宜酸宜  
 涼大忌辛辣熱物是瀉木火之邪也飲食中常知此理可  
 也以諸辛主散熱則助火故不可食諸酸主收心氣瀉木  
 火也諸苦瀉火熱則益水也尤忌食冷水大寒之物此物  
 能損胃氣胃氣不行則元氣不生元氣不生緣胃氣下陷  
 胃中三焦之火及心火乘於肺上入胃灼髓火主散益瞳



子之散大者以此大熱之物直助火邪尤為不可食也藥中去羌蔚子以味辛及主益肝是助火也故去之加黃芩半兩黃連三錢黃連瀉中焦之火黃芩瀉上焦肺火以酒洗之乃寒因熱用也亦不可用青箱子為助陽火也更加五味子三錢以收瞳人之散大也且火之與氣勢不兩立故經曰壯火食氣氣食少火少生氣壯火散氣諸酸物能助元氣孫真人云五月常服五味子助五臟氣以補西方肺金又經云以酸補之以辛瀉之則辛瀉氣明矣或以藥中有當歸其味亦辛其而不去何也此一味辛甘者以其和血之聖藥也况有甘味又欲以為鄉導為諸藥之使故不去也

熟地黃九治血弱氣虛不能養心致火旺於陰分瞳子散大少陰為火君主無為不行其令相火代之與心包絡之脈出心系分為二道少陽相火之體無形其用在其中矣火盛則能令母實乙木肝旺是也其心之脈挾目系肝之脈連目系况手足少陽之脈同出耳中至耳上角斜起終於目外小背風熱之盛亦從此道來上攻頭目致偏頭腫悶瞳子散大視物昏花血虛陰弱故也法當養血涼血益血收火散火而除風熱則愈矣

歸身酒洗 柴胡去苗 天門冬去心 熟地酒洗 人參去蘆 甘草炙 地骨皮 黃芩半兩 枳殼炒 五味子 生地黃 右為細末煉蜜丸如菘葶大每服一百丸茶湯送下食後日二服制之緩也大意辛辣物而助火邪及食寒冷物損其胃氣藥不上行也又一論云瞳子黑眼法於陰

由食辛熱之物助火乘於胃中其睛散散則視物亦大也

益陰腎氣丸 此壯水之主以鎮陽光也

山茱萸 取皮 兩 茯苓 去皮 心 五錢 熟地 二錢

乾山藥 五錢 澤瀉 半錢 牡丹皮 五錢 生地 酒洗 兩

歸身 酒洗 兩 右為細末煉蜜丸如桐子大硃砂為衣每服五七十九

淡鹽湯送下

滋陰地黃丸治內障右眼小背青白翳大背亦微顯白翳腦痛瞳子散大上熱惡熱大便澀後落難小便如常遇熱煖處頭疼暗脹能食日沒後天陰暗則昏此症可服熟地黃丸

黃丸在大眦加葛根升麻翳在小眦加柴胡羌活

熟地 八錢 生地 酒洗 兩 歸身 酒洗 兩 知母 酒洗 炒 兩

丹參 兩 黃柏 酒洗 兩 芍藥 一兩 防已 酒洗 兩

羌蔚子 兩 牡丹皮 三錢 寒水石 一錢 柴胡 兩

黑附子 兩 川芎 二錢 右為細末煉蜜丸如小荳大空心五十九白湯下如宿食未消候飢時服之飯後忌言語隨後食壓之

保當歸湯治翳補益瞳子散大

歸身 黃芩 各 黃連 地黃 各 三

柴胡 一錢 芍藥 二錢 甘草 炙 三

右水煎臨臥服

羅甘菊丸治男子腎臟虛弱眼目昏暗或見黑花常服明目暖水臟活血駐顏壯筋骨

甘菊花 去土 兩 枳殼 兩 熟地 兩 乾山藥 兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九空心食後



各一服溫水下

瑞竹四神丸治腎經虛損眼目昏花補虛益損及兩眼雲翳遮睛

甘州枸杞一斤揀去白膜青者一兩分作四分一  
香荷香各一兩四錢用川椒一兩四錢用乳  
合炒炒時先用好酒一盞將枸杞淘過

右件炒過將川椒等四味篩去不用止用枸杞子加熟地白木茯苓各一兩同為細末煉蜜為丸如桐子大每

服五七十九丸空心溫酒送下加甘菊一兩尤妙

右地黃枸杞補腎例按瞳子散大不當用羌蘇川芎附子今東垣滋陰地黃丸兼用者蓋有外障大小皆之醫

保柴胡散明目益腎水

柴胡 羌活 防風 生地

甘草 芍藥

右為釐末水煎服

東垣云肝木旺則火之勝無所畏懼而妄行也故脾胃先

受之或病目而生內障者脾畏血胃主血心主脈脈者血

之腑也或曰心主血又云脈主血肝之竅開於目也亦前

肉筋膜骨髓牙爪至於世之萬物蓋皆有之乃氣出入升

降之道路門戶也人之眼耳鼻舌身意神識能為用者皆

見耳無所聞鼻不聞臭舌不知味筋痿骨痺爪退齒腐毛

閉密而致氣液血脈榮衛精神不能升降出入故也各隨

鬱結微甚而為病之輕重故知熱鬱於目則無所見也故

目微昏者至近則轉難辨物由目之玄腑閉小如隔簾視

物之象也或視如蠅翼者玄腑有所閉合者也或目昏而

見黑花者由熱氣甚而發之於目亢則害承乃制而反出

其泣氣液昧之以其至近故雖微而亦見如黑花也

誠哉河間斯言也目盲耳聾鼻不聞臭舌不知味手足

不能運用者皆由其玄腑閉塞而神氣出入升降之道

路不通利故先賢治目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連

等藥入肝解肝中諸鬱蓋肝主目肝中鬱解則目之玄

腑通利而明矣故黃連之類解鬱熱也椒目之類解濕

熱也羌蘇之類解氣鬱也芍歸之類解血鬱也木賊之

類解積鬱也羌活之類解經鬱也磁石之類解頭鬱墜

邪氣使下降也蔓菁下氣通中理亦同也凡此諸劑皆

治氣血鬱結目昏之法而河間之言信不誣矣至於東

垣丹溪治目昏用參芪補血氣亦能明者又必有說通

之蓋目主氣血盛則玄腑得利出入升降而明虛則玄

腑無以出入升降而昏此則必用參芪四物等劑助氣

血運行而明也

羊肝丸三方又散一方並見肝條治肝中諸鬱目昏如神

本治久年眼生黑花不明者

椒目兩 蒼木兩

右件為末醋糊丸如桐子大每服二十九醋茶送下不

過十日取效丹溪云椒目行

外補肝散治二十年失明蒺藜子七月七日收陰乾搗散

飲食後水服方寸匕

崔但瞳子不壞者療十得九愈葶藶子六升蒸之看氣過



用甌下釜中熱湯淋蒸乾還淋如是三遍即取杵篩為末  
食上清酒調二錢送下日再服本草云葛黃子下氣利五  
經入利大便通中益氣  
經治虛勞目暗味三月蔓菁花陰乾為末以并花水空心  
調下二錢七久服長生

內障  
足厥陰  
太陽手  
少陰

世五福還瞳丹治目白翳赤石脂川椒二味同炒辰砂荻  
神乳香末肉為丸如桐子大空心溫酒下百九十服見效

按內障先患一目次第相引兩目俱損者皆有翳在黑  
睛內遮瞳子而然今詳通黑睛之脈者目系也目系屬

足厥陰足太陽手少陰三經蓋此三經臟腑中虛則邪  
乘虛入經中鬱結從目系入黑睛內為翳龍木論所謂

腦脂流下作翳者即足太陽之邪也所謂肝氣衝上成  
翳者即足厥陰之邪也故治法以針言之則當取三經

之腧穴如天柱風府太衝通里等穴是也其有手巧心  
大醫經卷之三

審諦者能用針於黑眼裏探其翳為効尤捷也以藥言  
之則當補中疎通此三經之鬱結使邪不入目系而愈

今集龍木論并方于後

龍木論羚羊角飲子治圓翳內障不痛不痒

羚羊角 細辛 知母 車前子  
人參 黃芩 防風 半

右為末每一錢以水一盞煎至五分食後去渣溫服之  
補肝散治肝風內障不痛不痒眼見花發黃白黑赤或一

物二形  
羚羊角 防風 羌活 車前子  
人參 茯苓 細辛 玄參

黃芩 炒各  
右為末食後調服一錢米飲湯下

羚羊角散治綠風內障頭旋目痛眼內痛澀者

羚羊角 防風 知母 人參  
茯苓 女參 黃芩 桔梗

細辛 車前子  
右為末以水一盞散一錢煎五分食後去渣溫服

羚羊角湯治青風內障勞倦加昏重頭旋腦痛眼內痛澀  
者

羚羊角 人參 玄參 地骨皮  
羌活 車前子

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去渣溫服

右四方皆治羚羊角玄參細辛羌活防風車前子為君蓋  
羚羊角行厥陰經藥也丹溪云羚羊角入厥陰經其捷

是也玄參細辛行少陰經藥也海藏云玄參治空中氣

益之氣無根之火為聖藥也羌活防風車前子行太陽  
經藥也如筋脈枯澀者諸方中更加夏枯草能散結氣

有補養厥陰血脈之功嘗試之有驗然此諸方又當悟  
邪之所在若氣脫者必與參膏相半服之氣虛者必與

東垣補胃人參湯益氣聰明湯之類相半服之血虛者  
必與熟地黃丸之類相兼服之更能內觀靜守不干塵

累使陰氣平伏方許作効

蘆薈丸黑水凝翳內障不痛不痒微有頭旋脈澀者

蘆薈 甘草 人參 牛膽  
栝子仁 細辛 羚羊角 蜜炙

右為末煉蜜為丸如桐子大空心茶下十九  
隊翳丸治假月翳東花翳等病微有頭旋額痛者

青羊脂 青魚膽 鯉魚膽 能膽



牛膽兩 麝香少 石決明

右為末麪糊丸如桐子六空心茶下十九

除風湯治五風變成內障頭旋偏腫痛腫人結白者

羚羊角 車前子 芍藥 人參

茯苓 大黃 黃芩 芒硝各一兩

右為末水一盞散一錢煎至五分食後去渣溫服

磁石九治雷風內障頭旋惡心嘔吐

磁石煅赤醋二大 五味子 牡丹皮 乾薑

玄參各一兩 附子炮半

右為末煉蜜丸如桐子大食前茶下十九

禾治目方用黃連多矣而羊肝丸九奇異用黃連末一兩

白羊肝一具去膜同於砂盆內研令極細象手撚為丸如

桐子大每服以溫水下三十九連作五劑但是諸眼目疾

不醫學類表三 聖

及障翳青盲皆治忌猪肉冷水唐崔承元為官治一死囚

出活之後數年以病且致死一日崔為內障所去喪明逾

年後半夜獨坐自歎忽聞塔除窸窣之聲崔問是誰徐曰

昔年蒙恩活囚也今來報恩遂將此方告訖而沒依此合

服不數月眼復得明

又方治內障

白錫羊肝只用于肝一片熟地一兩 兔絲子

蕤仁 車前子 麥門冬 地膚子去

澤瀉 防風 黃芩 白茯苓

五味子 桂心 杏仁炒 細辛

枸杞子 羌活 苦苧藤 青箱子各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸溫水下日

三服不拘時候張臺卿嘗苦目暗京師醫者令灸肝俞

遂轉不見物因得此方眼目遂明一男子內障醫治無效因以餘劑遺之一夕燈下語其家曰適偶有所見如隔門縫見火者及旦視之眼中醫膜俱裂如線張云此藥靈勿妄與人忽之則無驗予益信之且欲廣其傳也經云肝虛則目眈眈無所見耳汨汨無所聞善恐如人將捕之狀海藏云目眩肝氣不治也

肝氣虛 又鎮肝明目羊肝丸

羯羊肝一具新瓦盆中煨丁更 甘菊

羌活 栝子仁 細辛 官桂

白木 五味子各半 黃連三

右為細末煉蜜丸如桐子大空心食前溫水下三四十丸

千補肝散治目失明方

青羊肝一具去膜薄切之以新瓦瓶子未用

入醫學類表三 聖

麥子一合炒 右為末食後服方寸七日二加至三七不過一二劑能

一歲服可夜讀細書

治目眈眈無所見方用青羊肝一具細切以水一斗銅器

中煮以麪餅覆上上鑽兩孔如人眼大以日向就薰不過

再薰即瘥

濟養肝丸治肝血不足眼目昏花或生眵淚

肝血不

當歸酒洗 車前子酒蒸 防風去 白芍藥

蕤仁酒洗 熟地酒蒸 川芎 枳實各等

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九丸熱水送下不拘

時

本素問云久視傷血血主肝故勤書則傷肝主目昏肝傷



則自生風熱氣上騰致目昏亦不可專服補藥但服益血  
鎮肝明目藥自愈  
熟地黃丸

熟地半兩 黃連 決明子各一 沒藥半兩

甘菊花兩 防風 羌活兩各一 桂心五錢

硃砂五錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服二十九熱水下食後  
日三服

千明目髮不白落方用牛膽浸槐子陰乾百日食後每日  
吞一枚十日身輕三十日白髮再黑百日通神

膽移熱於腦則辛頰鼻淵傳為翳膜眼目全文見診  
經云腎足少陰之脈是動則病坐而欲起目眈眈如無所  
見○又云少陰所謂起則目眈眈無所見者陰內奪故目

眈眈無所見也此蓋房勞目昏也  
治瞳子散大諸方並見前陰虛睛散大視物花條

東益本滋腎丸必與前陰虛睛  
黃柏去皮炒 知母去毛炒 酒

右為極細末滴水丸如桐子大每服一百五十九熱湯  
送下空心服服後以乾物壓之

滋補腎丸治腎氣不足眼目昏暗瞳人不明漸生內障  
磁石煅醋炒七 兔絲子酒蒸二次

五味子 熟地酒蒸 枸杞子 楮實子

覆盆子酒浸 肉苁蓉酒浸 車前子酒浸 石斛去根各

沉香 青鹽各半兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九空心鹽湯下  
千神麴丸主明目百歲可讀細書

神麴丸 磁石煅醋炒七 光明砂水飛  
右為末煉蜜丸如桐子大每服五丸米飲下食前日三  
服常服益眼力此方神驗不可具述

外治積年目失明不識人決明子二升杵散食後以粥飲  
服方寸七本草云決明子微

子白瓜子七升絹袋盛攪沸湯中三偏暴乾以酢五升浸  
一宿暴乾為末酒調方寸七服日三服之至百日可夜讀

書本草云白瓜子平寒外臺名補

運氣目昏有四

一曰風熱經云少陰司天之政風熱參政雲物沸騰太陰  
橫流寒乃時至往復之作民病雖瞑此風熱蒸布目昏也

二曰熱經云少陰在泉熱淫所勝病目眠治以鹹寒此熱  
勝目昏也

三曰風又云歲水不及濕乃大行復則大風暴發目視眈  
眈此風勝目昏也

四曰燥經云陽明司天燥淫所勝目昧背凝治以苦熱是  
也

本讀書之苦傷肝損目誠然晉范甯嘗苦目痛就張湛求  
方湛戲曰古方宋陽子少得其術以授魯東門伯次授左

丘明遂世世相傳以及漢杜子夏晉左太冲凡此諸賢並  
有眼目疾此方用損讀書一減思慮二專內視三簡外觀

四宜起晚五宜早眠六凡六物燉神火下以氣簾蓋於胸  
中七日然後納諸方寸修之一年近能數其目睫遠視尺

筆之餘長服不已洞見牆壁之外非但明目乃亦延年  
如是而行非可謂嘲戲亦奇方也

羅省郎中張子敬年六十七歲病眼目昏暗微黑色皮膚



不澤六脈弦細而無力一日出示治目二方問予可服否予曰此藥以黃連太苦之藥為君諸風藥為使且人年五十膽汁減而目不明內經云土位之主其瀉以苦瀉風藥亦能瀉土年六十脾胃虛而皮肉枯重瀉其土使脾胃虛而不能營運榮衛之氣滋養元氣胃氣不能上行膈氣吐食諸病生矣又况年高衰弱此藥不可服只宜慎言語節飲食慾忿室然此不治之治也子敬以為然明年春除關西路按察司三年致仕還精神清勝脈遂平服此不服寒涼之劑也內經云誅伐無過是謂大惑解之可也

六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開液道開故涕泣出焉液者所

八醫學綱目卷三

星

以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣故命曰奪精補天柱經俠頸俠頸謂頭中分也

針灸

針灸內障有四法此篇是其一也

其二取肝經曰肝虛則目眈眈無所見善惡取其經厥陰與少陰取血者是也

其三取腎經云腎是少陰之脈是動則病目眈眈無所見視寒熱虛實取之也

其四取陽蹻經云邪之所在皆為不足上氣不足目為之

玉眼久病昏花 肝膈一分沿皮向外一寸半補三野 三里一寸瀉

童子宛

子和戴人女僮至西華自急暴盲不見物戴人曰此相火

也太陽陽明氣血俱盛乃刺其鼻中攢竹穴與項前五穴大出血目立明

見目潤動與項口相參引鳴辟口不能言刺承泣 目瞑身汗出承漿主之

撮要眼無光○商陽一分沿皮向外 睛青盲商陽主之○瞳目目眈眈偏歷主之○瞳目目眈眈少氣灸手五里左取右取左○目瞑遠視眈眈日愈主之○青盲瞳且惡風寒上關主之

金針開內障法

龍木論內障根源歌 不疼不痛漸昏濛 薄霧輕烟漸漸濃 或見蛇飛花亂出 或如絲絮在虛空 此般狀樣因何得 肝臟停留熱與風

八醫學綱目卷三

星

大叫大啼驚與恐 腦脂流入黑睛中 初時一眼先昏暗 次第相牽與一全 苦口何須陳逆耳 只緣肝氣不相通 此時服藥宜鎖定 將息多垂即沒功 日久既應全黑暗 時名內障障雙瞳 名字隨形分十六 龍師聖者會推窮 靈藥這回難得效 金針一撥日當空 強脩將息依前說 莫遣依前病復踪

針內障眼法歌

內障由來十六般 學醫人子審須看 分明一一知形狀 下針方可得安然 若將針法同圓翳 誤損神光取瘥難 冷熱光明虛與實 調和四體待今安











肝為淚全文見  
垣水附木勢上為眼溢為眩為冷淚此皆由肺金之虛而

肝木寡於畏也

孫英宗朝國婆婆患眼冷淚眼科醫官治二三年不能瘳  
上召孫孫至曰臣非眼科但有藥耳容進方用石決明一  
兩赤小豆一兩半半夏五錢生班猫二十一粒炒去頭尾  
木賊五錢為末薑汁九如桐子大每服二十九粒湯下方  
進聖旨下眼科詳定眼科醫官奏曰此方於眼科甚不相  
涉班猫有疾恐傷臟腑不敢用合再取聖旨國婆婆聞之  
曰眼科醫官不惟不能亦不愿使我治也但合此藥總傷  
無怨上聞之孫自進藥服經十餘日愈八分二十日全愈  
時眼科並降兩官孫賞錢三十萬  
銀海止淚方

不情字類卷三

李

蒼朮米泔浸木賊去節 香附子炒去毛

右為末煉糊丸如桐子大食後鹽湯下三九

汗多淚出者風  
經云風氣與陽明入胃循脈而上至目內眥則寒中而泣  
出此中風寒淚出也

河當歸湯治風邪所傷寒中日淚自出肌瘦汗不止

當歸 人參各三兩 官桂一兩 乾薑炮

白朮 白茯苓 甘草 川芎

細辛 白芍藥各半兩 陳皮一兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至八  
分去渣熱服不計時併三服

本治頭風冷淚胤安常二方

甘菊 決明子各二錢 白朮 羌活

川芎 細辛 白芷 荆芥穗各半兩

右為細末每服一錢溫湯調下食後日三服  
又方

川芎 甘菊 細辛 白朮

白芷已上各等分

右為末蠟丸如黍米大夜臥服一九日中一時辰換一  
丸

本治風盛隔壅真寒清熱氣攻眼淚下淚多眩齒間緊急  
作頭痛川芎丸

川芎 柴胡各一兩 半夏麩 甘草炙

甘菊 人參 前胡 防風各半兩

右每服四錢水一盞生薑四片薄荷五葉同煎七分去  
查溫服

靈五臟六腑心為之主耳為之聽目為之視肺為之相肝

不情字類卷三

李

為之榮脾為之衛腎為之主外故五臟六腑之津液盡上  
滲于目心悲氣并則心系急心系急則肺舉肺舉則液上  
溢夫心系與肺不能常舉乍上乍下故欬而泣出矣  
丹婦人患眼眩不思食四物湯加白朮陳皮黃芩連翹分  
六貼煎食煎熱服 又灸合谷

肘治眼淚出不止用黃連濃漬綿乾拭目

山風淚眼九節黃連和槐樹皮灰雞末煨湯澄清頻洗

垣神効明目湯連翹飲子治淚不止二方並見

運氣 運氣淚出皆從風熱經曰厥陰司天之政三之氣天政布  
風乃時舉民病泣出是也

針灸 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣

運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣

運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣 運氣



風熱

丹風沿眼系上隔有積熱自飲食中挾怒氣而成頑痰痞塞濁氣不降清氣不上升由是火益熾而水益降積而久也眼沿因膿潰而腫於中生細小虫絲遂年久不愈而多痒者是也

世蘆甘石散治爛風眼以蘆甘石不拘多少先用童便煨七次用黃連濃煎汁煨七次用谷雨前茶清濃煎煨七次又併三汁餘者一處再煨三次然後安放地上一宿出火氣細細研入冰片射香點上神妙蘆甘石煨時須用

好紫鉛炭極大者鑿一穴以安蘆甘石再治風沿爛眼一蚕沙用香油浸月餘重綿纏過點之愈久愈妙世紫金膏用水飛過號丹蜜多水少文武火熬以器貯點之

保治眼赤腫以青泥蛆淘淨晒乾末之仰臥合目用藥一錢放眼上須臾藥行待少時去藥赤睛自無東垣目眶赤爛歲久俗呼赤睛是也常以三稜針刺目外以洩濕熱立愈

撮要風弦爛眼 大骨空 小骨空 倒睫拳毛 眼睫毛倒入眼中央是也

神效明目湯治眼榜緊急致倒睫拳毛損目及上臉皆赤爛睛亦赤痛昏暗目則冷淚長流夜則眼眵滿眼

葛根半錢 甘草根錢二 防風根錢一 蔓荊子五分 細辛根分三

又一方加黃芪根錢一 右咬咀作一服水一盞八分煎至一盞去香稍熱臨臥服効

防風飲子治倒睫拳毛 黃連炒 甘草炙 人參各一 葛根

防風分五 歸身半錢 細辛葉 蔓荊子各三分 右判如麻荳大都作一服水二大盞煎至一盞去香溫服食後避風寒濕熱處眠之

神効黃芪湯治渾身麻木不仁及兩目緊急縮小羞明畏日或隱澁難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少睛光或目中熱如火服五六次神効

黃芪二兩 人參去蘆 甘草炙 蔓荊子錢二 白芍藥兩 陳皮半兩

右咬咀每服四五錢水一盞八分煎至一盞去香臨臥稍熱服如小便淋瀝加澤瀉五分如有大熱證加黃柏三錢酒浸四次炒如麻木不仁雖有熱不用黃柏再加黃芪一兩如眼縮小去芍藥忌酒醋濕麵大料物蔥蒜蒜及淡滲生冷硬物如麻木重甚者加芍藥一兩木通一兩

撥雲湯戊申六月徐總官患眼疾於上眼皮下出黑白翳二箇隱澁難開兩目緊急而無疼痛兩手寸脈細緊按之洪大無力知是太陽勝熱為命門相火煎燼逆行作寒水

一兩



翳及寒膜遮睛與下項一服神效外證呵欠善悲健忘噤  
噴時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠氣上而  
喘

黃芪七分 細辛五分 柴胡七分 生薑

荆芥一分 防風一分 羌活一分 茯苓一分

升麻一分 葛根五分 川芎五分

知母一分 黃柏一分 歸身一分

右劉如麻草大作一服水二大盞煎至一盞稍熱服  
連翹飲下治目中溜火惡日與火隱澁小角偏緊久視昏  
花迎風有淚

蔓荆子 甘草 連翹各三分 柴胡二分

酒黃芩五分 生地三分 防風五分 人參三分

黃芪五分 紅花三分 升麻一分 歸身三分

羌活五分

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去查稍熱食後服

前一方法治倒睫拳毛後三方治眼榜緊急縮小眼榜緊

縮小者倒睫拳毛之漸也故以其方附於後蓋陽虛則

眼榜緊急陰虛則瞳子散大故東垣治眼榜緊急用參

芪補氣為君佐以辛味疎散之而忌芍藥五味子之類

酸收是也治瞳子散大用地黃補血為君佐以酸味收

斂之而忌羌薤子青箱子之類是也

治倒睫眼友以無名異末摻捲在帛中作捻子點看至藥

末處吹殺以烟薰之自起

本治倒睫爛弦

蘇沙一分 硫丹五分

右二味慢火燒成心入輕粉五分裝黑色逐時湯泡洗

翳青黛散治眼倒睫極效

蜩刺 東棘針 白芷 青黛

右各等分為細末左眼倒睫口噴水左鼻內搗之右眼

倒睫右鼻內搗之

山眼毛倒睫摘去拳毛用虱子血點入眼內數次即愈

四眼生倒睫拳毛由目緊急皮縮之致也蓋內伏熱攻陰

氣外行當去其內熱并火邪使眼皮緩則眼毛立出翳膜

亦退用手法攀出內臉向外刺以三稜針針出熱血以左

瓜甲迎住針縫立愈

努肉攀睛

羅選睛散治眼翳膜昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎 草龍膽 草決明 石決明

荆芥 枳實 野菊花 野麻子

白茯苓去皮 甘草炙 木賊 白蒺藜

川椒炒去 仙靈脾 茵陳已上各

右為細末每服二錢食後茶清調下一日三服忌雜魚

肉及熱麪蕎麥等物一方有楮實子無仙靈脾茵陳枳

殼三味

治卒患赤目努肉生內痛者取好漿一箇搗絞汁黃連

三枚碎之以綿裹漬令色變仰臥注目中

外主目翳及努肉用礬石最白者納一黍米於翳上及努

肉上即冷淚出綿拭之令惡汁盡其疾日減翳自消薄便

瘡若石須真白者方効

干治目中生息肉翳滿目閉瞳子及生珠管方

貝齒七枚燒 真珠等

右為細末如粉以注翳肉上不過五度即瘥



針灸 集勞肉攀睛 睛明 風池 太陽出血 期門

飛絲塵垢入目

雜方

治飛絲入目者用頭垢點入眼中即出神效○飛絲入

眼用柘樹漿點了綿裹筋頭蘸水於眼上微拭涎毒○治

飛絲入目以火麻子一合杵碎并花水一碗浸攪却將古

浸水中涎沫自出神效方用麻子法七妙

丹飛絲落眼腫如珠痛澁不開鼻流清涕用京墨濃炭

以新筆塗入目中閉目少時以手張開其絲自成一塊看

在眼白上却用綿輕輕惹下則愈如未盡再塗此方累效

○治眯目鹽與豉置水中浸之視水其查立出孫真

子治稻麥芒入眼取蟻蟻以新布覆自上待蟻蟻從布上

摩之其芒出着布上

山物落眼中用新筆蘸微出○又方濃研好墨點眼立出

精不視 岐視

靈帝曰余嘗上清冷之臺中階而顧俯而前則感余私

異之竊內怪之獨眼獨視安心定氣而不解獨據獨眩被

髮長跪俛而視之後久之不已也卒然自上何氣使然岐

伯曰五臟六腑之精氣皆注於目而為之精精之窠為眼

骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其氣之精

為白眼肌肉之精為約束裹筋骨血氣之精而與脈并

為系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛

其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則目系

急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比也

則精散精散則視岐故見兩物大惑

不荀牧仲頃年嘗謂予曰有人視一物為兩醫作肝氣盛

靈樞有云目之系上屬於腦後出於項中云云則視岐故

見兩物也令服驅風入腦藥待愈

神氣

目者五臟六腑之精也榮衛氣之所常營也神氣之

所生也故神勞則氣散志意亂是故瞳子黑眼法於陰

白眼赤脈法於陽也故陰陽合轉而睛明也目者心之使

也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常處精神

冤鬼散不相得故曰惑也帝曰余疑其然余每之東苑未

曾不惑去之則復余唯獨為東苑勞神乎何其異也岐伯

曰不然也心有所喜神有所惡卒然相感則精氣亂視誤

故惑神移乃復是故問者為迷甚者為惑大惑

素夫精明者所以視萬物別白黑審長短以長為短以白

為黑如是則精衰矣

右目亂見治法東垣益氣聰明之類是也

目閉不開

足太陽之筋為目上綱足陽明之筋為目下綱熱則筋縱

目不開全文見

睛目直視睛目者目睛斜倒不

甲睛目者水溝主之

直視者視物而目睛不轉動者是也若目睛動者非直

視也傷寒直視者邪氣壅盛目其正氣使神氣不慧臟腑

之氣不上榮於目則目為之直視傷寒至於直視為邪氣

已極證候已逆多難治經曰衄家不可發汗發汗則額上

脈脈緊急直視不能瞬不能眠以肝受血而能視亡血家

肝氣已虛目氣已弱又發汗亡陽則陰陽俱虛所致也此

雖錯逆其未甚也逮狂言反目直視又為腎絕直視搖頭

又為心絕皆臟腑氣脫絕也直視譫語喘滿者死不利者



一多... 九... 二... 月... 人...

診

亦死又劇者發狂則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視脈弦滑者死皆邪氣盛而正氣脫也

少陽終者其百節縱目最絕系全文見診生死條目系絕目直視如驚目不動而直視注注注注

目上視

瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕全文見診生死戴眼者目直視不能轉動

太陽之脈其終也戴眼反折癩癧針灸目上視見中風上

醫學綱目卷之十三

无

醫學綱目卷之十三

醫學綱目 卷一四

醫學綱目卷之十四

肝膽部

脇痛 脇痛氣逆 附腋腫 腋臭

丹肝木氣實肝火盛而脇痛者當斷龍膏丸為瀉肝火要藥 脇痛甚者用生薑自然汁吞下龍膏丸以肝火盛也

經云肝氣實則怒又云肝痛者兩脇下痛引少腹善怒龍膏丸治肝實脇痛其人氣收者善怒是也甚則用姜汁吞下經云風木淫勝治以辛涼是也

壽四郎右脇痛小便赤少脉少弦不數此內有陳久積痰飲因外感風寒所過不能宣散所以作痛與龍膏丸三十粒保和丸三十粒細嚼姜片以熱湯下服後脇痛已安小便尚赤少再與

白朮 陳皮 芍藥 木通

條芩 甘草

右姜三片煎熱飲之

一婦人脾疾帶脇痛口微乾問已多年時尚秋用二陳湯

加川芎乾葛青皮木通下蘆薈丸二十粒 章宅張郎氣

痛自右脇時作時止脈沉而弦小便時有赤色吞酸喜嘔

出食此濕痰在脾肺間所以肝善乘之小柴胡湯去黃芩

加川芎白朮木通芍藥滑石生薑煎湯下保和丸三十五粒

一婦人氣壅兩脇皆痛口乾

青皮 半夏 白朮 黃芩

川芎 木通 陳皮 桔梗

甘草

右分六帖煎熱服 又脇下有食積一條扛起加吳茱

三〇七



肝膽筋痛中清  
 莫炒黃連  
 本治因驚傷肝膽骨裡疼痛不已桂枝散  
 枳殼一兩 桂枝兩  
 右為細末每服二錢姜棗湯調下  
 際勻氣散專治腸痛  
 山梔 熟地 茯苓 細辛  
 桂心 川芎各等  
 右研為末加羊脂煎服  
 本治腸下疼痛不可忍兼治肺弱苦葛湯  
 川芎 乾葛 桂枝 細辛  
 枳殼 人參 芍藥 麻黃  
 防風各半 甘草二錢  
 右為粗末每服五錢水二盞生姜三片同煎至七分去  
 大醫經綱目卷四 二  
 查溫服日三服有汗避風  
 治腸下風氣作塊寒痲發則連小腹痛攢心其積屬肝在  
 右脇下故病發則右脇手足頭面昏痛不思飲食  
 乾葛兩 麻黃分 附子箇 川芎  
 防風 當歸 枳實 芍藥  
 桂枝 羌活 甘草各四錢  
 右為粗末每服四錢水一盞半生姜三片同煎至七分  
 去查服日三有汗避風  
 治脇痛如前兼去手足枯痺薏苡仁丸  
 薏苡仁兩 石斛用細者 附子兩  
 牛膝 生地黃各三錢 細辛  
 人參 枳殼 栝子仁 川芎  
 當歸各半 甘草 桃仁各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九酒吞下食  
 前日三服九子食前煮散食後相兼服為佳  
 治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脉緊腰脚重滯兩股  
 筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至脊橋急此藥大治腸  
 痛枳殼黃散  
 枳殼四兩 細辛 桔梗 防風  
 川芎各二兩 葛根一兩 甘草  
 右為粗末每服四錢水二盞半姜棗同煎至七分去查  
 空心食前溫服  
 右肝虛脇痛經所謂木不及病中清肚脇痛是也中清  
 謂中有寒也熱實脇痛當歸龍薈丸是也  
 附子湯  
 附子湯  
 大醫經綱目卷四 三  
 右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二  
 升半分溫三服服後如人行四五里更進一服  
 神保丸治心膈痛腹瀉血痛腎氣脇下痛大便不通氣  
 噎宿食不消  
 木香半錢 胡椒半錢 巴豆十枚去皮  
 乾蝎七枚  
 右四味共為末湯浸蒸餅為丸如麻子大亦用硃砂為  
 衣每服五丸心膈痛帶燈心湯下腹痛帶煨姜湯  
 下血痛炒姜醋湯下腎氣脇下瀉而香酒下大便不通  
 蜜湯調栝榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒  
 任下  
 許學士云沈存中良方載項在建陽醫者王琪言諸氣唯



痰氣

勝於脇下痛最難治謂神保丸能治之熙寧中病項筋骨痛諸醫皆作風治之數月不瘥乃流入于背脊又臂掌痛甚苦憶理語有証乃合服之一服而瘥再發又一服立効紫黃丸治脇下痠痛如神方見內

丹控涎丹治一身氣痛及脇走痛痰挾死血加桃仁泥凡脇痛有痰流注二陳加南星川芎蒼朮實者控涎丹下之本治男子兩脇疼痛枳實散

枳實兩 白芍藥炒 雀腦芩 人參各半  
右紙末姜枣湯調二錢酒亦得食前日三服  
東調中順氣丸治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香 白芷 羌活 青皮 炮 京三稜 炮 各  
陳皮 大附子 各二 半夏 湯炮七 縮砂 炮 各  
枳實 兩 白芍藥 炒 雀腦芩 人參 各半  
右紙末姜枣湯調二錢酒亦得食前日三服

檳榔 沉香 各半  
右為末煮麪糊為丸如桐子大每服三十九漸加六十丸食後陳皮湯送下

沉香 二錢 人參 五錢 枳殼 二錢 白朮  
烏藥 麥蘗 炒 神麩 炒 紫蘇葉  
大腹皮 炒 厚朴 製各 訶子皮 炮 半 香附 炮 一  
姜黃 橘紅 甘草 各四 京三稜 二  
廣茂 兩 益智 兩 紅花 兩  
右為細末每服二錢食前沸湯點服  
丹溪云脇痛有死血者桃仁紅花川芎之類是也若跌撲脇痛者亦為汚血流歸脇下而痛東垣復元活血湯之類是也治法見癱撲傷損門

汚血

運氣

運氣脇痛者鄉境皆病脇痛也其証有二其一風木助肝氣實而痛經云厥陰所至為脇痛又云厥陰在泉風淫所勝民病兩脇裡急支滿又云少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫其病脇痛治以涼劑得痊也

其二燥金攻肝虛而痛經云少陽所至為脇痛又云陽明司天燥氣下臨肝氣上從脇痛又云少陰司天地乃燥淒滄數至脇痛善太息又云歲木不及燥乃大行民病中清肱脇痛治以溫劑得痊也

針灸

丹咳嗽脇痛方二陳湯加南星多香附青皮薑汁內經灸刺脇痛有三法其一取肝經云肝病者兩脇下痛引小腹善怒取其經厥陰與少陽又云邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內行善

製節時脚腫取之行間以引脇下補三里以溫胃中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其壅是也其二取膽絡經云邪客足少陽之絡令人脇痛不得息欬而汗刺足小指次指爪甲上與肉交者各一痛不得息立已汗出立止欬者溫衣飲食一日已左刺右右刺左其病不已復刺如法是也

其三取心經云心手少陽脈所生病者目黃脇痛視虛實熱寒陷下施補瀉疾留灸之法也

集脇痛 懸鍾 竅陰 此二穴左取右右取左竅陰出血妙 外關 三里 此一穴 正取 支溝 章門 中封 陽陵泉 治閉 行間 瀉肝 期門 治傷寒 治脇并胸痛不可忍 期門 分 章門 至七分七壯



行間	丘墟	湧泉
東胸脇痛	期門 <small>沿皮三寸</small>	支溝
胸脇脹滿痛	公孫	膽俞 <small>沿皮半寸</small>
太衝	三陰交	腰脇痛
至陰	太白	陽輔
脇肋痛	支溝 <small>透關使</small>	外關 <small>透內關如取支溝</small>
通脇痛	陽陵泉	外關 <small>不必再取外關</small>
甲脇下支滿嘔吐逆陽陵泉主之	腹中氣脹噎噎不嗜	
食脇下痛陰陵泉主之		
仲寸口脈弦者即脇下拘急而痛其人膏肓惡寒也		
靈合腋張脇者肺下肺下則居實迫肺善脇下痛 青色		
粗理者肝大肝大則逼胃迫咽則苦膈中且脇下痛		
凡脇骨偏舉者肝偏傾則脇下痛 揭唇者脾高		
脾高則引季脇而痛 <small>俱見本</small>	脾滿氣逆 <small>見喘</small>	
附腋腫	腋臭	
內經針灸刺腋腫有二法		
其一取膽經云膽足少陽之脈所生病者缺盆中腫痛腋		
下腫是也		
其二取心經云心主手厥陰脈是動則病手心熱腋腫皆		
視虛實寒熱陷下施補瀉疾留灸也		
丹腋氣神效方		
蜜陀僧 <small>一</small>	白礬 <small>七</small>	硃砂 <small>少</small>
右為細末先用皂角煎湯洗後傳上	射香 <small>少</small>	
又方		
銅青	蜜陀僧	辰砂
硃砂	白附子	白礬

亦如前法搽之。

因治腋氣用夜明砂不拘多少為末用豆豉汁調塗立效

又方以銅青好者不以多少采醋調成膏先洗淨腋下用

輕粉搽過却使上件塗之立效

經治狐臭用生薑塗腋下絕根本

三因治狐臭大蜘蛛一箇以黃泥入少赤石脂搗羅極細

入鹽少許杵為一窠包藏蜘蛛在內以火燒令通紅放冷

剖開將蜘蛛研細歸臥入輕粉一字用醋調成膏付腋

下明日登廁必瀉下黑汗臭穢不可聞於遠僻處傾埋之

免致染人

聖治腋氣先用刀削去腋毛淨用白定粉水調搽俾患處

至過六七日夜後次日早看腋下有一黑點如針孔大用

筆點定即用艾炷灸七枚灸過攻心中痛當用後藥下之

青木香	檳榔	丁香	檀香
射香	大黃		
右煎服以下為度			
諸疝 <small>附少腹痛</small>	癰疝	狐疝	產小腹痛
疝痛屬足厥陰肝經也小腹亦肝經也故疝痛與小腹痛			
同一治法所謂疝者舉丸連小腹痛也其痛有獨在舉丸			
者有獨在小腹偏於一邊者有舉丸如升斗者癰疝是也			
又立臥出入往來者狐疝是也			
丹疝痛之甚者也舉丸連小腹急痛也有痛在舉丸者有			
痛在五樞穴邊者皆足厥陰之經也或有形或無形或有			
贅或無聲或有形如瓜有聲如蛙者素問以下歷代名醫			
皆以為寒蓋寒主收引經絡得寒收引不行所以作痛理			
固然也有得寒而無疝者又必有說通之可也予嘗因明			



之寒

戶上履霜雪湯水徒涉不曾病此以予素無熱在內也因而思之此症始於濕熱在經鬱而至久又感寒氣外束濕熱之邪不得疏散所以作痛若只作寒論恐為未備或曰此症多客厥陰一經其道遠其位卑鬱積濕熱何由而致予曰大勞則火起於筋筋飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝本經火積之久而母能生子濕氣便盛厥陰屬木係於肝為將軍之官其性急速火性又暴為寒所束宜痛之亦大暴也愚見有用烏頭梔子等分作湯用之其効亦敏後因此方隨症與形加減用之無有不應然濕熱又須分多少而施治但濕者腫多癩疔是也又有挾虛而發者當以參朮為君而以疏導藥佐之於其脈不甚沈急而大謬無力者是也然其痛亦輕惟覺重墮牽引耳羅丁香練實凡治男子七疝痛不可忍者婦人癢聚帶下

大醫綱目卷一四

皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸於一

當歸去 附子炮 川練子 茴香各一

右剉碎以好酒三升煮酒盡為度焙乾作細末每藥末一兩入下項藥

丁香分五 全蝎十三 玄胡索錢五 木香分五

右四味同為細末入前項當歸等末內拌勻酒糊為丸

如桐子大每服三十九至百九溫酒空心送下一方無木香名苦練凡疝氣帶下皆屬於風全蝎治風之聖藥也

川練茴香皆入小腹經當歸玄胡索和血止痛疝氣帶

下皆積寒邪於小腸之間故以附子佐之丁香木香為

引導也漆匠韓提控疝氣發痛不可忍則於榻兩末

各置一枕往來伏之以受如是三年不已服此藥三劑

良愈

醫學綱目 卷一四

丁香疝氣丸治臍下撮急疼痛并臍下週身一遭皆急痛小便頻數清其五脉急洪緩瀼沉按之皆虛獨腎脉按之不急皆虛無力名曰腎疝

當歸 茴香各半 甘草稍五 麻黃根節

丁香分五 全蝎十三 玄胡兩 羌活稍分

肉桂錢 防已錢 川烏兩

右件為細末酒糊丸如雞豆大每服五十九淡鹽湯送

下須空心宿食消盡服之

羅當歸四逆湯治男子婦女疝氣臍下冷痛相引腰膝而

疼

當歸稍分 附子炒 官桂 茴香炒各

芍藥分四 玄胡索 川練子 茯苓各分三

澤瀉分二 柴胡分五

右研為粗末都作一服水煎空心

玄胡索苦練湯治臍下冷撮痛陰冷大寒

肉桂分三 附子分三 熟地黃錢 甘草稍錢半

苦練子分二 黃柏引用 玄胡索分二

右件都作一服水四盞煎至一盞依法食前服

右四方桂附治寒玄胡當歸川練茴香丁香木香和血

調氣蓋寒症挾汚血滯氣者宜之

葫蘆巴丸治大人小兒小腸氣疝腸奔豚疝氣偏墜陰腫

小腹有形如卵上下來去痛不可忍或絞結繞臍攻刺嘔

吐悶亂並皆治之

葫蘆巴兩 茴香兩半 吳茱萸湯洗炒

川練子兩二錢 巴戟去心炒

川烏炮去皮尖 黑丑炒取頭

三三一



右研為細末酒糊為丸如桐子大每服十五丸至二十丸止空心溫酒送下小兒五丸茴香湯下食前一服無黑丑

衍胡蘆巴本經云得茴香桃仁治膀胱氣甚效管合用桃仁炒各等分拌酒糊丸半為散每服五七丸空心食前鹽酒下散以熱米飲調下與九子相間空心各一二服

丹腎氣丸

茴香 破故布 吳茱萸 鹽炒各

木香 三錢 胡蘆巴 七錢

右為細末羅荷搗汁丸鹽湯下

右三方胡蘆巴破故布巴戟為君蓋酒而元陽素虛少者宜之

醫聖綱目卷五

本治小腸氣不可忍

烏藥 碎酒 高良姜 剉 茴香 略

青皮 去白

右研為末每服二錢遇發熱酒調下

治遠年小腸氣聚醫不獲者

硫黃 茴香 剉 鐵 各等分

右研為末每服五錢用熱酒調空心服除根本

川練散

木香 一兩 茴香 一兩 蘆 一匙 一處

川練子 一兩 剉 細 用 巴 豆 十 粒 打

右研為細末每服二錢空心食前調下

天台烏藥散

烏藥 木香 茴香 剉 良姜 各五錢

枳榔 三 川練子 十 巴豆 十四 青皮 半

右八味先以巴豆打碎一同練實用麩炒候黑色去巴豆麩俱不用外為細末每服一錢溫酒調下痛甚炒生薑熱酒下亦得

簡木香練子散治小腸疝氣膀胱偏墜又藥不効者服此其効如神

川練子 三十箇 巴豆 二十粒 同炒黃赤色

蓮薹 兩 石菖蒲 一兩 青木香 一兩

荔枝核 二十

右研為細末每服二錢入射香少許空心炒茴香鹽酒調下

右以巴豆炒藥例許學士云大抵此疾因虛而得之不可以虛驟補邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實

醫聖綱目卷四

矣故必先滌去所畜之邪熱然後補之是以諸藥多借

巴菝氣者蓋為此也

仲寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治抵當烏頭桂枝湯主之

右用烏頭一味以蜜二升煎減半去渣以桂枝湯五合解之令得一升後初服二合不知再服三合又不知復加至五合其知者如醉狀得吐者為中病傷寒門海藏

腹痛脈弦而緊弦則衝氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝寒疝繞臍痛若發則自汗手足厥冷其脈沉弦者大烏頭煎主之

大烏頭煎 炒去皮不咬咀以水三升煮取一升後服食後一服過後不再作矣



丹溪治  
內痔之  
溫熱

治諸疝方

枳實九粒 桃仁十四 山梔九箇

吳茱萸七粒 山查四粒 生姜如指

右味同入搗盆搗細取順流水一鍾入瓶內煎至微沸

帶查服如濕勝癩疝者加荔枝核如痛甚者加鹽炒大

茴香二錢如痛處可按者加薄桂少許

又方治疝痛

山梔二兩 山查四兩 枳實炒 茴香各二

柴胡 牡丹皮 八角茴香炒各

桃仁 茱萸炒半

右研為末酒糊丸空心鹽湯下五六十九

治陽明受濕熱傳入太陽發熱惡寒小腹連毛際間悶痛

不可忍

八醫學綱目卷四

主

梔子仁炒 桃仁炒 枳實炒 山查各半

右味同研細入生姜汁半合同水一小鍾盪起煎令沸

熱服之一方加茱萸

楊淳三哥因舊有腎氣上引乳邊及右脇痛多夾有時隔

上痞塞大腑秘結平時少汗脉弦甚與保和温中各二十

丸研薏仁郁李仁吞之

本治膀胱氣痛茴香散

茴香 金鈴子肉 蓬莪朮 京三稜各一

甘草半兩

右為細末每服二錢熱酒調下每發痛甚連日只三二

服立定

治膀胱氣金練散

巴豆一百粒

川練子二十四箇湯浸去

右三味用麩二升同炒令黃赤去麩與巴豆不用只將  
川練練肉一味為末每服三錢温酒空心送下余關古  
今一切名方無如此奇特有效一方川練子不用巴豆  
炒亦妙

按之不  
痛處

鑿胃中熱腸中寒則疾饑小腹痛脹師傳篇 疾飢胃  
熱痛脹腸寒也

因諸疝痛處用手按之不痛者屬虛必用桂枝炒山梔細

切川烏頭等分為細末生薑自然汁打糊為丸如桐子大

每服三四十九空服白湯下

疝可按者並于歷代獨治外寒條下求之

丹溪云疝有挾虛而發者其脉不甚沉緊而大謬無力者

是也然其痛亦輕惟覺重墜牽引耳當以參朮為君疏導

八醫學綱目卷五

主

瀉姬提領因疾服涼劑數日遂病臍腹下大痛幾至於死

與姜附等劑雖稍蘇痛不已隨本方內倍芍藥服之愈

羅疝氣治驗○癸丑歲治火兒赤憐歹病疝氣復因七月

間饑飽勞役過飲潼乳所發甚于初面色青黃不澤臍腹

陣痛搗撮不可忍腰不能伸熱物礙之稍緩脉得沉小而

急予思難經有云任之為病男子內結七疝皆積寒于小

腸所致也非大熱之劑即不能愈遂制一方名之曰沉香

桂附丸每服一百丸空心温酒下間服天台烏藥散旬日

良愈明年秋如故

沉香桂附丸治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美氣不調和

退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴面

色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛

引小腹不可忍腰痛不能伸喜熱熨稍緩



沉香 附子 <small>炮去</small> 川烏 <small>炮去</small> 乾姜 <small>炮</small>	良姜 <small>炒</small> 官桂 <small>皮去</small> 茱萸 <small>炒</small> 茴香 <small>炒</small>	右研為細末醋煮麵糊為丸如桐子大每服五十九至七十九丸止空心食前熱米飲湯下日三服忌冷物	丹治疝劫痛方 川烏頭 <small>細切</small> 梔子仁 <small>去</small>	右各等分煎湯服之神効濕多癩腫者烏頭為君蓋川烏頭治外束之寒梔子仁治內鬱之熱也	羅疝疝足厥陰之脈環陰器抵小腹或痛因腎虛寒水涸竭瀉邪補肝宜以蒺藜湯主之	疾熱湯治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也房慾勞痛不可忍者	蒺藜 <small>炒去</small> 附子 <small>炮去</small> 山梔仁 <small>各半</small>	右研為末每服三錢水一盞半煎至七分去香食前溫服	丹又方 橘核 桃仁 梔子 茱萸	川烏 <small>各等分</small>	右研煎服	治疝作急痛 蒼朮 <small>鹽炒</small> 香附 <small>鹽炒</small> 茴香 <small>炒為</small> 黃柏 <small>酒炒</small>	青皮 玄胡索 益智 苑仁 <small>為</small>	附子 <small>鹽水</small> 甘草 <small>為</small>	右研為末作湯服後一痛過更不再作矣	仲寒疝腹中痛及脇痛裏急者當歸生薑羊肉湯主之	當歸 <small>兩</small> 生薑 <small>兩</small> 羊肉 <small>斤</small>
---	---	---	---	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	------------------------	-----------------------------	-----------------------	------	---	--	---	------------------	-----------------------	---

右三味以水八升煮取三升溫服七合一日三服若寒多者加生薑十片痛多而嘔者加陳皮二兩白朮一兩如加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之

仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不應驗有一婦人產後寒疝氣入產門腹脹以下脹滿手不敢攪此寒疝也師將治之以抵當湯謂有瘀血非其治也可服張仲景羊肉湯二服遂愈

丹諸疝痛處用手按之大痛者為實也

羅疝氣痛及脚膝無力控舉証 至真大要論云小腹控舉引腰脊上衝心唾出清水及為噦噫甚則入心善忘善悲甲乙經曰邪在小腸也小腸病者小腹引腰脊貫肝肺其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既入則厥証上衝肝肺客冷散于厥結於臍控引舉丸上而不下痛而入腹甚則衝于心胸蓋其經絡所係也啟玄子云控引也舉陰丸也

控引舉丸治小腸痛結上而不下痛引心臍即東垣茴香利老利大便痛為實此方有茱萸等剛劑本不可入此條錄先花有利性故入之

川練子 茴香炒 吳茱萸湯洗 青皮

陳皮各一兩 芫花醋炒 馬蘭花醋炒

右為細末醋糊為丸如桐子大每服三十九丸溫酒送下食前服量虛實加減以利為度

本治小腸氣痛撞腹面青唇黑欲死者

木香 茵陳 芫花 甘遂各等

右四件為末每服二錢水一盞煎至七分去香溫服服過此藥後應犯甘草藥皆不得吃恐與甘遂相反故也其藥甚妙亦甚有理屢有驗效

桐砂丸 木香 沉香 巴豆肉各一兩



青皮二兩不

銅青半兩 礪砂一錢

右已上二香青皮三味細研同巴豆慢火炒令紫色爲度去巴豆爲細末入礪砂二味同研勻蒸餅和丸如梧桐子大每服七丸至十九丸鹽湯吞下日二三服空心食前服。

子和律科王敏之病寒疝臍下結聚如黃瓜每發繞臍急痛不能忍戴師先以舟車丸及猪腎散下四五行覺藥繞病三五次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒治寒萬舉萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒疝本是水故也即日病減八分食進一倍又數日以舟車丸百餘粒通經散四五錢服之利下候三四日又服舟車丸七八十粒猪腎散三錢乃健步如常矣 近穎尾一夫病卒疝赤腫大痛數日不止余以導水丸一百五十九令

入醫學綱目卷四

夫

三次咽之次以通經散三錢空腹淡酒調下五更下二三十行腫痛皆去不三日平復如故。

右治實疝利大便形氣實脈有力者宜之。

小便不利者利

杜三十七太尉忽患小腸氣痛醫官及京城醫家用藥皆不效每一發幾死上召杜至進藥數服不驗太尉曰我命不久致良醫不能治上召杜問所以杜對臣用古方書皆不獲愈今日撰一方容進上杜曰撰方已成未敢進先合藥以進太尉一服十愈八九再服全愈然後進方名曰救命通心散川烏頭一兩用青蘆一錢酒一盞浸一宿去皮尖焙乾川練子一兩用巴豆二十一粒同炒候黑色去巴豆茴香半兩石燕一對土狗五枚芥子一錢六分爲末每服三錢入羊石子內濕布煨香熟夜半時用好酒半升入搗細嚼石子以酒嚥下不得作聲小便大利其病遂去五

家今錄

本項在嶽城日欽尉宋荀甫膀胱氣作疼不可忍醫者以剛劑與之痛愈其小便不通三日矣臍下虛脹心悶予因候之見其面赤黑脉洪大予曰投熱藥太過陽痞塞氣不得通爲之奈何宋尚平持四神丹數粒云醫謂不止更服此予曰若服此定斃後無悔渠求治予適有五苓散一兩許令三服用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水一盞半煎至七分令接續三服中夜下小便如墨汗者一二升臍下寬得睡翌日臍之脉已平安矣續用礪砂丸與之救日瘥。

右利小便治疝常治謝人妻小腹疼痛小便不通先艾灸三陰交以茴香丁香青皮枳殼桂枝更玄胡索山查枳實又倍用黃柏煎服之愈。

入醫學綱目卷四

三

丹赤岸朱同道年四十歲八月望雨後得涼半夜後腹痛甚汗如雨兩脚踏破壁痛在小腹手不可近六脉弦而細實重取如循刀刃責責然問之云六月大熱時于深潭浴水病或起於此與大承氣湯大便微利痛遂頓止至次日酉時其痛復作痛在小腹堅硬手不可近又與大承氣加桂兩服研堯仁同煎大便下紫黑血升餘而痛頓止至次日酉時痛復作如初脉雖稍減而責責然猶在與大承氣湯加附子兩貼研堯仁同煎下大便五行得黑紫血如破絮者二升許痛遂頓止一夜得睡次日酉時痛復如初詢知小腹和軟痛在臍腹間下脉亦和似若無病但呻吟如舊詢知乃食蘿蔔菜苗羹兩頓與小建中湯一貼而愈世一婦人少腹痛百藥不效一醫用杉木節置便煎服下血而愈。



丹治膀胱氣急用藥黃和食鹽等分綿裹如棗大納下部  
或下水惡汗并下氣佳

手治小腸氣用血師一兩米醋一升以火燒血師通赤炸  
入醋中以炸竭為度搗羅如麩用湯調下一大盞即瘥如

神血師代赭石也

圍治寒疝小腹及陰中相引而痛自汗出欲死丹參一兩  
杵為散每服熱酒調下二錢七

丹治諸疝時用海石香附二味為末生姜汁湯調亦能  
治心疼

獨木賊細剉微炒搗為末沸湯點二錢服食前治小腸膀胱  
氣緩必效

本治疝氣

青礬一兩 白礬一兩各  
入醫聖類聚卷五

右用小瓦罐子一隻入二藥在內用麻皮縛緊搗益泥  
封固以炭五斤煨令通紅盡炭為度取出埋地穴中伏  
一宿出火毒醋糊為丸如菉豆大每服十九空心益湯  
送下或白湯亦可

通氣肝運氣小腹痛有三一曰肝病小腹痛引脇痛是也經云厥陰  
之復少腹堅滿暴急暴痛是風氣助肝盛而然治法當瀉  
肝也又云歲金太過民病兩脇下痛小腹痛又云歲木不  
及燥乃大行民病中清肚脇痛少腹痛又云歲土不及風  
乃大行民病腹脹復則胸脇暴痛下引小腹者是燥邪攻  
肝虛而然治法當補肝瀉金也又寒氣客於厥陰之脈則  
血泣脈急故脇肋與小腹相引痛者治法亦同也

二曰小腸其病小腹引腰脊痛是也經云少陰之脈  
心下熱善饑臍下痛又云少陰之復熱內作小腹痛

三曰膀胱其病小腹腫不得小便是也經云太陰在泉  
淫所勝與太陽之復皆病小腹控引腰脊上衝心痛及  
太陰司天大寒且至病小腹痛者是寒邪攻小腸虛而然  
治法當補小腸瀉寒邪也

四曰督任衝脈經文見如左  
素病在小腹不得大小便病名曰疝得之寒刺小腹兩股  
間刺腰髀骨間刺而多之盡其病已

疝取之旨原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之巨虛  
下廉以去之按其所過之經以調之是也

者足熱助小腸盛而然治法當瀉小腸也又太陽在泉寒  
淫所勝與太陽之復皆病小腹控引腰脊上衝心痛及  
太陰司天大寒且至病小腹痛者是寒邪攻小腸虛而然  
治法當補小腸瀉寒邪也

三曰膀胱其病小腹腫不得小便是也經云太陰在泉  
淫所勝與太陽之復皆病小腹控引腰脊上衝心痛及  
太陰司天大寒且至病小腹痛者是寒邪攻小腸虛而然  
治法當補小腸瀉寒邪也

補膀胱瀉濕土邪也

內經刺灸小腹瀉共四法一曰肝經曰肝病者兩脇下痛  
引小腹取其經厥陰小腸

絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉交者各一疝男  
子立已女子有頃已左取右右取左者是也

之後取巨虛下廉又云小腸控引腰脊上衝心邪在小  
腸取之旨原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之巨虛

下廉以去之按其所過之經以調之是也

三曰膀胱經云膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲  
小便而不得取委中央又云小腹腫痛不得小便邪在三

焦約取之足太陽大絡者是也

四曰督任衝脈經文見如左  
素病在小腹不得大小便病名曰疝得之寒刺小腹兩股

間刺腰髀骨間刺而多之盡其病已

疝取之旨原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之巨虛  
下廉以去之按其所過之經以調之是也

疝取之旨原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之巨虛  
下廉以去之按其所過之經以調之是也



摘元裁發動臍下痛不可忍	氣海	三陰交	立命
左右取			
玉而氣少腹偏痛	大敦	二分沿皮向後三分	瀉之
三陰交	十吸		
撮又法	大敦	水道	小海
桑又法	中極	印腎	
摘卒疝少腹痛不可忍	大敦	三分	瀉之
陰市	五分	照海	三分
疝癰小腸膀胱腎餘疝氣	氣海	五樞	五分
三里	三陰交	之刺	
桑疝	三陰交	三里	足三間
摘疝	行間	三里	
集大法	關元	水道	三陰交
海底	歸來		
摘少腹痛	關元	三里	
用陰跳遺溺小便難痛陰上下入腹中寒疝陰挺出偏大			
腫腹臍痛腹中悒悒不樂大敦主之			
滿癰莖中痛怒瞋不欲視泣出長太息行間主之			
痛陰寒兩丸縮腹堅痛不得臥太衝主之			
引痛腰中痛中封主之			
陰暴痛遺溺便大虛則暴瘵氣逆腫卒疝小便不利如			
癆狀數噫恐悸氣不足腹中悒悒少腹癰瘕中有熱有癭			
肉狀如着欲出背擊不可俛仰暴滿主之			
右取藏經厥陰			
男子陰疝兩丸上下少腹痛五樞主之			
大疝腹堅坵墀			
主之			

右取腑經少陽

少腹痛發泄出糜次指熱若脉陷寒熱身痛唇乾不渴汗出毛髮焦脫肉少氣內有熱不欲動搖泄膿血腰引少腹痛暴驚狂言非常巨虛下廉主之

少腹痛控牽引腰脊疝痛上衝心腰脊強弱黃赤口乾小腸膈主之

疝瘕中急痛循膈上下搶心腹痛積聚府舍主之

腹痛疝積聚上衝心雲門主之

右巨虛下廉小腸膈者取本腑也府舍雲門者刺太陰以予之也

四肢淫滲身悶癆疝至陰主之

疝疝繞臍痛衝胸不得息灸臍中

陰疝引寒陰交主之

少腹痛臥善驚氣海主之

疝疝繞臍痛石門主之

暴疝痛少腹大熱關元主之

少腹痛難陰下縱橫骨主之

男子陰端寒上衝心中假假會陰主之

癰疽然谷主之

卒疝少腹痛照海主之

病在左取右右取左立已

陰暴起疝瘕胞中有血四滿主之

疝疝繞臍痛時上衝心天樞主之

氣疝噦嘔面腫奔豚天樞主之

陰疝瘕莖中痛兩丸塞臥不可仰臥刺氣衝

陰疝衝門主之

疝疝一疝

寒疝下至腹膝膝腰痛如清水大腹諸疝按之至膝上伏兔主之

寒疝痛腹脹滿瘕少氣陰谷主之

素厥陰脉滑則病孤疝風少陰滑則病肺風疝太陰脉滑則病脾風疝陽明脉滑則病心風疝太陽脉滑則病腎風疝少陽脉滑則病肝風疝四時

疝疝肝脉滑甚為癰疝

心脉微滑為心疝引膈下小腹鳴

腎肝滑甚為瘕瘕

夫滑脉關已上見者為大熱蓋陽與陽併也故大熱滑



脉尺部見為大寒生癩疥滑脉者命門包絡之名也為丙  
丙丁熱火併于下蓋丙丁不勝壬癸從寒水之化也故生  
癩疝

素帝曰診得心脉而急此為何病岐伯曰病名心疝小腹  
當有形也帝曰何以言之岐伯曰心為牡藏小腸為之使  
故曰少腹當有形也脉要精心脈搏滑急為心疝肺脉沉  
搏為肺疝腎脉肝脈大急沉皆為疝俱大

脈脈來中央堅實徑至關者衝脈也動若少腹痛上搶心  
有瘕疝絕孕遺矢瀉腸支滿煩也

丹膈下忽大痛人中如墨色者多死

子和七疝圖○寒疝其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或控  
辜丸而痛得于坐臥濕地或寒月涉水或冒雨雪或坐臥  
磚石或風冷處使內過勞宜以溫劑下之久而無子

八醫學綱目卷四

疝

水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫而狀如水晶或囊  
痒而極出黃水或少腹中按之作水聲得於飲水醉酒使  
內過勞汗山而過風寒濕之氣聚于囊中故水多令人為  
卒疝宜以逐水之劑下之有漏針去水者人多不得其法  
筋疝其狀陰莖腫脹或潰或痛而裏急筋縮或莖中痛痛  
極則痒或撻縱不收或白物如精隨洩而下久而得於房  
室勞傷及邪術所使宜以降心火之劑下之

血疝其狀如黃瓜在小腹兩旁橫骨兩端約中俗云便癰  
得於重感春夏大燥勞于使內氣血流通滲入疝囊留而  
不去結成癰腫膿少血多宜以和血之劑下之和血門物

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱之  
而脹罷則氣散者是也有一治法以針出氣而愈者然針

有得失宜以散氣之藥下之或小兒亦有此疾俗云偏氣  
得于父已年老或年少多病陰痿精怯強力入房因而有  
子胎中病也此疝不治惟築賓一穴主之

狐疝其狀如瓦臥則入小腹行立則出小腹入囊中狐則  
晝出穴而濕夜則入穴而不濕此疝出入上下往來正與  
狐相類也亦與氣疝大同小異今人帶鉤鉗是也宜以逐  
氣流經之藥下之

癩疝其狀陰囊腫絕如升如斗不痒不痛者是也得之地  
氣卑濕所生故江淮之間湫澹之處多有此疾宜以去濕  
之藥下之女子陰戶突出雖亦此類乃熱則不禁固也不  
可便謂虛寒而泄之燥之補之本名曰瘕宜以苦下之以  
苦堅之王註云瘕氣下墜陰氣上舉則瘕多下

八醫學綱目卷四

疝

勿拘俗法經所謂陰盛則腹脹不通者癩癰疝也不可下

右疝圖雖七然寒疝即疝之總名水疝即癩疝之屬氣  
疝即狐疝之屬血疝即癰疝之屬惟筋疝罕見之蓋下  
疝瘡之屬也

癩疝  
癩疝腫大如升如斗是也

丹下部癩氣不痛之方細思非痛斷房事與厚味不可用  
藥惟促其壽若蒼朮神麩白芷山查川芎枳實半夏皆要  
藥人視其藥皆鄙賤之物以啓慢心又不能斷慾以愛護  
其根本非徒無益而反被其害者多矣且其藥宜隨時月  
寒濕更按君臣佐使加減大抵癩疝屬濕多

蒼朮 神麩 白芷 枳實 山查



川芎 枳實 半夏 南星  
 右神麴糊為丸有熟加山扼一兩堅硬加朴硝半兩秋  
 冬加吳茱萸二錢半

癩疔  
 南星 山查 蒼木各二兩 白芷  
 半夏 枳實 神麴各一兩 海藻  
 昆布各半兩 玄明粉 吳茱萸各二錢

又方治木腎不痛  
 南星 半夏 黃柏洗 蒼木洗  
 枳實 山查 白芷 神麴炒  
 滑石炒 茱萸 昆布

右為末酒糊丸空心鹽湯下一方加枸杞子  
 大醫學綱目卷之五 毒

無香附散治癩脹用香附子不拘多少為末每用酒一盞  
 海藻一錢煎至半盞先撈海藻嚼細用所煎酒調末二錢  
 服

東又方治偏墜初生用川山甲茴香二味為細末酒送下  
 以乾物壓之

可木腎以楮木葉雄者晒乾為末酒糊為丸空心鹽酒下  
 本方云無  
 實者謂也

從小便  
 利惡瀉  
 海蛤醋炒 當歸 海金沙 賦粉  
 硃砂各一錢 海藻 粉霜各五錢 水蛭二十一錢  
 青黛 滑石 乳香各一錢 硃砂二錢  
 地龍二十一錢  
 右細末鹽煮面糊為丸如小葶大硃砂為衣每服十丸

煎燈心湯空心服之小便下冷膿惡物乃効却以黃連  
 紫荷車板藍根各二錢煎湯嗽口以固牙齒去板藍根  
 加管仲

世治偏墜大者用乾姜桂各一兩為末以綿一兩水大三  
 碗同煮二十餘沸起晒乾又煮不盡為度用乾綿包陰丸  
 汗出數次漸愈  
 痲瘋痛  
 者易治

此藥  
 痲瘋痛  
 者易治

血竭 沉香 木香 廣茂炮  
 玄胡索 蛤蚧 人參 當歸  
 川芎 川練炒 續斷 白木  
 全蝎 茴香炒 柴胡 吳茱萸

沒藥已上分兩不定 氣多者加青皮  
 血多加肉桂  
 右同為細末地黃膏子九桐子大空心溫酒下二十九  
 日加一九至三十九

能忍香丸治陰氣下墜痛脹卵核腫大堅硬如石痛不  
 能忍者

玄胡索炒 海藻洗 昆布洗 青皮去  
 茴香炒 川練子核 馬蘭花已上各

木香半兩不 木香兩不 大戟酒浸三宿切片  
 右為細末另將硃砂真阿魏真安息香三味各二錢半  
 用酒一盞醋一盞將硃砂阿魏安息香淘去砂石用酒  
 醋合一盞熬成膏子再入麝香一錢沒藥二錢半俱各  
 另研細入前藥一同和丸如葶葶大每服十丸至十五



九空心用綿子灰調酒下

本治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍念珠丸

乳香

硃砂各三

黃蠟一

右乳香硃砂同研勻溶蠟和為丸分作一百單八九以

線穿之露一宿次日用蛤粉為衣旋取用乳香湯下頃

年有人貨疝疾藥日貨數阡有一國醫多金得之用之

良驗

熱鬱者  
內疎之

丹鄭子敬因吃酒後飲水與水果偏腎女時作蛙聲或作

痛炒枳實一兩茴香鹽炒炒梔子各三錢研煎下保和丸

呂世官膀胱氣下墜如蛙聲臭穢子核炒十枚桃仁二

十枚蘿蔔自然汁研下保和丸七十 混兒年三十左腎

核腫痛此飲食中濕墜下成熱以橘核腳臭 五枚桃仁七

枚細研順流水一盞煎沸熱下保和丸

本治膀胱腫硬牽引疼痛及治小腸氣陰囊腫毛間出水

宜服金鈴丸

金鈴子肉五

茴香炒

馬蘭花炒

兔絲子

海蛤

破故紙

海帶各二

木香

丁香各一

右細末糊丸如桐子大每服二三十丸溫酒鹽湯空心

食前服

無大戟丸治陰癰腫脹或小腸氣痛

大戟去皮制炒

葫蘆巴炒四

木香一

附子炮去

茴香

訶子煨去

檳榔各半

川練五

麝香半兩

右為末獨取川練以好酒二升葱白頭七枚長三四寸

煮川練軟去皮取肉和上件藥杵丸如桐子大空心

溫酒下十九潮發疼痛炒姜熱酒下十五丸

抵聖丸治陰癰腫滿赤腫大便秘飲水按之臍腹痛

續隨子

慈苳仁

郁李仁

茵芋

白牽牛各一錢

右為末滴水丸如桐子大每服五丸用博濟方香姜散

嚙下黃昏服五更利下惡物效

子和汝南司候李審言因勞役王事飲冷水坐濕地乃濕

氣下行流入脘囊大腫痛不可忍以金鈴川練等藥不效

求治于戴人曰可服洩水丸審言感之又數日痛不可堪

竟從戴人先以舟車丸灌川散下青綠水十餘行痛止後

用茴香丸五苓散以調之三日而腫消至老更不作

西木脣以枇杷葉野紫蘇葉蒼耳葉水晶蒲萄葉濃煎湯

薰洗

無雄黃散治陰腫大如斗核痛人所不能治

雄黃一兩

礬石

甘草半

右剉散以水五升煎洗

芫花散治腎腫

芫花一兩

朴硝二

右為粗末蘿蔔葱同煎湯淋洗

懶治辛外腎腫痛大黃末醋和塗之乾即易之

懶治男子陰腫大如升核痛人所不能治者搗馬鞭草塗

之 男子陰腫大如斗核痛人所不能治者搗青根搗傅

之

運氣願症有二經云陽明司天燥淫所勝丈夫癩亦婦人

小腹脹又云陽明之勝外發癩症者是燥邪攻用氣虛而



肝

小腸

針灸

然治法當補肝瀉燥金也全文見運

素厥陰所謂癩疝婦人少腹腫者厥陰者辰也三月陽中

之陰邪在中故曰癩疝少腹腫也所謂癩疝膚脹者曰陰

亦盛而脈脹不通故曰癩疝也俱味

三陽為病發寒熱下為癰腫及為痿厥胎疝其傳為癩疝

全文見診病傳變王

靈黃帝曰刺節言去瓜夫子乃言刺關節肢絡應卒聞之

岐伯曰腰脊者身之大關節也肢脛者人之骨以趨翔也

莖垂者身中之機陰精之候津液之道也故飲食不節音

怒不時津液內溢乃下流於壘血道不通日大不休俛仰

不便趨翔不能此病榮然有水不上不下鉞石所取形不

可匿常不得蔽故命曰去瓜帝曰善刺節真

內經刺癩疝共四法其一節此篇文所謂鉞石取莖囊

中水液者是也其法今世人亦多能之舉九囊大如斗者

中藏穢液必有數升信知此出古法也鉞針如

其二取肝經云足厥陰之脈是動則病丈夫癩疝婦人小

腹腫是也于足厥陰肝經視虛熱寒陷下而施補瀉

留疾與矣也全文見針灸

其三取肝之絡經云足厥陰之別名曰蠶溝去內踝五寸

別走少陽其別者徑脛上臑結于莖其病氣逆則臑腫卒

疝取之所別是也於內踝上五寸貼脛骨後近肉處蠶

溝取之也全文見針灸

其四取足陽明筋經云足陽明之筋聚於陰器上腹其病

轉筋前腫癢腹筋急治在燔針劫刺以知為數以痛

為輸是也於轉筋痛處用火針刺之也

桑治偏墜當外腎縫沿皮針透即消

木腎紅腫如升太不痛 大敦 三陰交 海底 歸

來在木道下二十針 木腎紅腫陰汗偏墜 關門玉趾

入二十針 三陰交

甲癩疝大巨及地機中鄰主之 癩疝陰暴痛中封主之

千金云癩疝癩疝 氣癩癩疝陰急股樞膈內廉痛交信

主之 丈夫癩疝陰跳痛引篡中不得瀉腹支脇下指滿

閉癩陰痿後時泄四支不疲實則身疼痛汗不出目腫脛

然無所見怒欲殺人暴痛引髓下節時有熱氣筋變膝痛

不可屈伸狂如新發衄不食喘呼小腹痛引噫足厥痛湧

泉主之

木腎紅腫疼痛 然谷半寸

世於關元者可愈蓋炎之早方效 前陰分大寒大熱囊垂縮○陰陽別論云三陽為病發

寒熱下為壅腫及為痿厥肺消其傳為索澤又傳為癩疝

夫熱在外寒在內則累垂此九夏之氣也寒在外熱在內

則卵縮此三冬之氣也足太陽膀胱之脈逆上迎手太陽

小腸之脈下行至足厥陰肝之脈不得伸其任脈並厥陰

之脈逆則如巨川之水致陽氣下墜是風寒濕熱下出囊

中致兩辜腫大謂之曰疝太甚則為癩足厥陰之脈與大

腸膀胱寒水之脈同至前陰之末傷寒家說足厥陰肝經

為病煩滿囊縮急下之宜大承氣湯以瀉大熱靈樞經云

足厥陰肝經筋中為寒則筋攣卵縮為大寒前說囊縮為

大熱此說為大寒此說囊縮垂墜下引癩疝脚氣為大寒

風濕盛下垂為寒與上二說不同何也曰以平康不病人

論之夏暑大熱囊卵累垂冬大寒急縮收上于前三說

又不同何也是相乖取不相乖取答曰傷寒家囊卵縮大



熱在內宜承氣湯急下之與經筋說囊卵縮大寒在外亦是熱在內與傷寒家同故再引平康人以證之冬天陽氣在內陰氣在外人亦應之故寒在外則皮急皮急則囊縮夏月陰氣在內陽氣在外人亦應之故熱在外則皮緩皮緩則囊垂此癩疝之象也三說雖殊皆一理也用藥者宜詳而審之已上三論各有所主兼此考訂則脈証陰陽寒熱虛實之辨判然矣

狐疝

臥則入腹立則出腹偏入囊中者是也

海藏仲景療陰狐疝氣有大小時時上下者蜘蛛散主之

瓜使伏而蓋見以見疝處厥陰之分即人之陰囊與之既下而夜上故以狐疝名焉

蜘蛛十四枚

桂半錢要入厥陰

右為散每服一錢蜜丸亦可雷公云凡使勿用五色者

不醫學綱目卷四

辛

兼大身上有刺毛生者并薄小者已上皆不堪用須用屋西南有網身小虎大腹內有蒼黃腹者真也凡用去頭足下研如膏投藥中用此余之方法若仲景妙焦用全無功矣

針灸

一方治水瀕偏大上下不定疼痛不止牡蠣不拘多少鹽泥固濟炭三斤煨令火盡冷取二兩乾姜一兩焙為細末二味和勻冷水調得所塗病處小便大利即愈  
內經刺灸狐疝但取足厥陰一經經云肝足厥陰之脈所生病者狐疝是也隨其經虛虛寒熱隨下取之也  
甲狐疝太衝主之 陰股內痛氣難狐疝走上下引少腹痛不可俛仰上下商丘主之 狐疝驚悸少氣巨缺主之心婦人疝瘕結核疼痛發作無時日出穴夜入穴或負重即下稍輕即止此狐疝也 天井五分 肘尖五分小壯

診

氣海三寸又互換東西上下 中極三寸  
耳後隨者腎下腎下則腰尻痛不可俛仰為狐疝見診  
產後少腹痛 併見產後

閉癧遺溺

閉癧分二病

小便不通

淋

胎前淋閉

胎後淋閉

小便數

小便黃赤

遺溺

姓遺尿

產遺尿

遺尿者溺出不自知覺也閉癧者溺閉不通而淋瀝滴點也惟肝與腎脈三焦膀胱主之

肝脈

肝脈督脈主之者經云肝足厥陰之脈過陰器所生病者遺溺閉癧又云督脈者女子入繫廷孔其孔溺孔之端也

其男子循莖下至篡與女子等其生病瘡痔遺溺故遺溺閉癧皆取厥陰腧穴及督脈俞穴也

不醫學綱目卷四

辛

三焦

三焦主之者經云三焦下脈在干足太陽之前少陽之後出于膈中外廉名曰委陽足太陽絡也二焦者足太陽少

陽之所將太陽之別也上踝五寸別入貫膈腸出于委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癧虛則遺溺遺溺

則補之閉癧則瀉之是也

膀胱主之者經云膀胱不利為癧不約為遺溺是也然遺

膀胱

溺閉癧不取膀胱腧穴者蓋膀胱但藏溺其出溺皆從三

焦及肝督脈也

閉癧分二病

久暴

閉癧合而言之病也分而言之有暴久之殊蓋閉者暴

病為溺閉點滴不出俗名小便不通是也癧者久病為溺

癧淋漓點滴而出一日數十次或百次名淋病是也今分

其病立為二門



小便不通

小便不利在氣在血之異夫小便者足太陽膀胱所主長生於申申者西方金也金能生水金者肺也肺中伏熱水不能生是絕小便之源也人法象天地膀胱之源自頭項下至於足故曰陽中之陰如渴而小便不通者肺不能降是也治法者用清燥金之正化氣味薄之藥茯苓猪苓澤瀉琥珀燈心通草車前子瞿麥扁蓄之類皆為淡滲之藥能瀉肺火而清肺金滋水之化源也若不渴熱在下焦是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之二者之病一居上焦在氣分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有濕故不渴也二者之殊至易分別耳

茯苓

猪苓

澤瀉

琥珀

燈心

木通

通草

車前子

瞿麥

扁蓄

桂

右為末每服五錢水煎服五苓散八正散亦宜用之

仲猪苓湯治脉浮發熱渴而小便不利方見

五苓散治煩渴飲水過多或水入即吐心中淡淡小便不利方見

茯苓戎鹽湯方

茯苓斤半 白米兩 戎鹽九枚

右三味為末白湯調下

小便不通車前子草一斤水三升煎取一升半分作三服

東滋腎丸治下焦陰虛脚膝無力陰汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉者邪熱在血分也

熱在血分

熱在氣分

黃柏

知母

肉桂

內經云熱者寒之又云腎惡燥急食辛以潤之以黃柏之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君以知母苦寒瀉腎火故以為佐肉桂辛熱寒因熱用也

右為細末熟水為丸如雞豆大每服百丸加至二百九煎百沸湯下空心服昔長安有大醫王善夫病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極腿脚腫脹破裂出黃水雙睛凸出晝夜不得眠飲食不下苦痛不可名狀求予治之因問受病之始知病不渴近苦嘔噦眾醫皆用治中滿利小便滲淡之藥急難措手乃辭歸從夜至旦取取不寢窮究其理忽記素問有云無陽則陰無以生無陰則陽無以化又云膀胱州都之官津液藏焉

烏氣化則能出矣此病小便癃閉是無陰而陽氣不化者也凡利小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥陽中之陰非北方寒水陰中之陰所化者此乃奉養太過膏梁積熱損北方之陰腎水不足故膀胱腎之室又而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦非膈上所生也獨為關非格病也潔古老人曰熱在下焦填塞不便是治關格之法今病者內關外格之病悉具死在旦夕但治下焦可愈隨處以黑北方寒水所化大苦寒氣味俱陰者黃柏知母桂為引用丸如桐子大沸湯下二百丸服藥少時須臾前陰如刀刺火燒之痛溺出如瀑泉湧出臥具皆濕床下成流顧盼之間腫脹消散予驚喜曰大哉聖人之言豈可不遍覽而執一者也其証小便閉塞而不渴時見躁者是也凡諸病在下焦皆不渴也二者之



病在氣在血最易分別

聖黃連丸治因服熱藥過小便不利諸藥莫能效者或臍下痛不可忍者

黃連炒 黃柏炒 甘草各等分

右以咀水煎溫服食前如更不通加知母此藥助氣使氣得化則通矣

羅白芍散治小便不通膀胱有熱用朴硝不以多少為細末每服二錢煎茴香湯調下食前簡要先用茴香酒調

增導氣除燥澀治小便不通乃血滯致氣不通而致澀之症

知母三分 黃柏四分 滑石二分 澤瀉三分

茯苓一分

右和勻每服半兩水煎稍熱空心服如急閉小便不拘

時候

小便不通用蚯蚓杆以冷水搗過濃服半碗立通大解熱疾不知人事欲死者服之效

瓜萎根兩 茯苓 薯蕷各三 附子一枚

瞿麥兩

右五味末煉蜜丸如桐子大服三九日三服不知增至七八九以小便利腹中溫謂之知

小便不通腹下痛狀如覆梳痛悶難忍者乃腸胃乾涸腹中氣不下故經所謂膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故腹中者臣使之官三焦相火腎為氣海也王註

曰膀胱津液之府胞內居之少腹處間毛內藏胞器若得氣海之氣化則波便注下氣海之氣不及則隱秘不通

故不得便利也先用木香沉香各三錢酒調下或八正散

其則宜上湧之令氣通達便自通利經所謂病在下上取之王註曰熱攻於上不利於下氣盛于上則溫辛散之苦

以利之方煎陳皮茯苓湯調下 以利之香沉香未服之空心下

小便不通屬氣虛血虛有實熱痰氣閉塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋氣承載其水者也氣虛引參朮

升麻等先服後吐或就參朮藥中調理吐之血虛用四物湯先服後吐或就芩歸湯探吐之痰多二陳湯先服後探

吐之痰氣閉塞二陳湯加香附木通探吐之實熱當利之或用八正散蓋大便動則小便自通矣

四治一男子小便不通用吐法一吐便如注論見治虛實法病在下取之上條

小便不利蒲灰散滑石白魚散茯苓戎鹽湯主之蒲灰

蒲灰七分 滑石三分

右二味杵為散飲服五分方寸七日三服

滑石白魚散方 滑石二分 亂髮二分 白魚二分

右三味杵為散飲服五分七日三服

無髮散治膈下急滿小便不通用髮灰研細每用二錢

米醋二合調服一法與葵子等分為末飲服二錢訖即炒黑荳葉蓋其上即通丹溪云髮灰補

本桃仁煎治婦人積血頃在昆陵有一貴官妻妻小便不通膈腹脹痛不可忍眾醫皆作淋治如八正散之類數種皆治不通病愈甚予診之曰此血癥也非瞢眩藥不可去



予用此藥初服至日午大痛不可忍臥少頃下血塊如卷者數枚小便如黑豈汁一二升痛止得愈此藥猛烈大峻氣虛血弱者宜斟酌之

桃仁 大黃 什硝各一 玄虫半兩

右四味為末以醇醋二升半銀石器內慢火煎取一升五合下大黃桃仁虫等不住手攪良久出之九如梧子大前一且一晚食五更初温酒吞下五九日午取下如赤豈汁或如雞肝蝦蟇衣狀未下再作如見鮮血即止續以調血氣藥補之此方出千金此方不

劑須認得分曉用之  
虛實  
西吕仲年六十六歲病傷寒得汗熱退後脉尚洪此洪脉作虛脉論與人參黃芪白朮炙甘草當歸芍藥陳皮數日

其脉仍大未收飲又小便不通小腹下妨悶頗為所苦但仰臥則點滴而出予曰補藥服之未至前藥倍加黃芪人參大劑與服兩日小便利

雜方

小腹痛脹如覆桃為實其法有二氣壅塞於下者用吐法以提之血汚於下者用桃仁之類以破之  
世治小便閉用大田螺生去殼搗細封臍上即通治傷寒後小便不通用生姜八九塊杵碎水十餘椀麻布五六尺同煎數沸用桶盛至候通手以布頻熨小腹良久恰用紅豈末一七江茶二七井花水調服神效小便如注  
本治小便難小腹脹滿不急治殺人用葱白一斤細剉炒令熟以帕子裹分作兩處更替熨臍下即通  
玄陰陽關格前後不通利大便小水自行中有轉胞之証諸藥不效無救則脹滿悶亂而死予曾以甘遂末水調傅

臍下內以甘草節湯飲之藥汁至臍一藥相反而胞自轉矣小水來如湧泉此救急之良法也

聖治小便難腹滿悶不急療之殺人用藜朮一兩去苗以水一大盞煎取七分去查每于食前作兩服處

世治小便不通用大杏仁二十一枚研水調分作二服妨

子治婦人卒不得小便用紫苑末以井花水服三服便通小便血五撮立止

外若小便不通數病而微腫方取陳筆頭一枚燒為灰和水服之此方

經云腎合膀胱膀胱者津液之府也小腸屬腎腎上連肺故將兩藏三焦者中瀆之府也水液出焉是屬膀胱乃腎之府也又云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣

由是言之膀胱藏水三焦出水治小便不利故刺灸法但取三焦穴不取膀胱也小腸屬腎肺故東垣用清肺飲子滋腎丸利小便便是也

運氣  
運氣小便不利有三

其一屬濕邪攻三焦經云太陰在泉濕淫所勝病小腹痛腫不得小便又云水不及曰涸流涸流之紀上宮與正宮同其病癃閉是也

其二屬風邪攻脾經云厥陰司天風淫所勝病癃泄水閉是也

其三屬燥熱經云陽明司天之政天氣急地氣明民病癃閉初之氣其病小便黃赤其則淋又云少陰司天之政地氣肅天氣明二之氣其病淋是也

內經刺灸小便不利法有五

針灸



其一取肝經云肝足厥陰之脈所生病者痿閉又云小脘滿身寒熱小便不利取足厥陰又云癃取陰蹻及三毛上及血絡出血是也

其二取三焦經云三焦病者腹氣滿小腹九堅不得小便窘急溢則水流即為脹候在足太陽之外大絡大絡在足太陽少陽之間亦見于脈取委陽又云小腹痛腫不得小便邪在三焦約取之太陽大絡委陽視其絡脈與厥陰小絡結而血者當有取之是也

其三取腎絡經云足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其病實則癃閉取之所別也

其四取脾經云足太陰之脈所生病者溇瀉泄水閉視虛實寒熱陷下而施補瀉疾留灸也

其五雜取經云內閉不得洩刺足少陰太陽與髀骨上以

長針氣逆則取其太陰陽明厥陰甚則取少陰陽明動者之經也

經治小便淋瀝或有血以赤根樓慈延根截一寸許安臍中上以艾灸七壯

羅治小便淋瀝不用鹽不以多少炒熱填滿病人臍中却用艾如筋頭大灸七壯其小便自出

內陰谷 關元 為度便控小便却取穴 三陰交 三分 陰谷 即透

撮小便閉數不通 陰谷一分五 陰陵泉 濕 標又法 偏歷

集小便閉不通 陰陵泉 陰谷 三陰交 氣海 關元 五分 壯刺二十 太溪 陰交

東熱林小便黃腹滿 陰陵泉 關元 氣衝 七

石淋不得小便 關元 七 氣門 大敦 七 血淋 氣海 丹山 各七壯 小便熱痛目赤尿如血 列缺 沿皮 太陵 承漿 各五分 又法 曲骨 七壯 陰陽二 陵泉 各五分

甲少腹中滿熱閉不得溺足五里取之 溺難痛白濁卒 疝少腹腫欬逆嘔吐卒陰跳腰痛不可以俛仰面黑熱腹 中腹滿身熱厥痛行間主之

癃遺瀉風脈痛小便難而白期門主之 陰胞有寒小便 不利扶承主之

筋急身熱少腹堅腫少腹時滿小便難尻股寒髀樞痛外 引季脇內控八竅委中主之 癃中窞主之 胸滿膨膨 然實則癃閉腹下腫虛則遺溺脚急就然筋急痛不得 大小便腰痛引腹不得俛仰委陽主之 小腹脹急小便

不利厥氣上頭顛滿谷主之 勞癃小便赤難前谷主之 氣癃溺黃關元及陰陵泉主之 腎病不可使仰 氣 癃小便黃氣虛則遺溺石門主之 小便難數中熱實則 腹皮痛虛則痒癢會陰主之

癃即淋病 丹朱郎小便淋痛脉左大右澁此為勞傷經血勿作淋治 可補血行肝經帶血自愈

生地 當歸 赤芍 各一分 川芎 三分 條苓 三分 甘精 三分 陳皮 五分 木通 五分 黃柏 二分 紅花 大 杜牛膝 錢 右桃仁泥研滑石同前待淋病去退滑石桃仁杜牛膝 木通入川牛膝代木通分兩倍之

金華申明叔年踰七十因壯年踏冷患腎氣痲痛常食芬

者補血

者補血

者補血

者補血



木烏附等藥二十餘年疝氣少止却患小便淋痛又十三  
 年其間又服朴硝大黃治諸淋之藥百方俱試並無一效  
 至是年春頸項帶右邊發一疽延及缺盆可尺許不能食  
 淋痛愈加必須呌號其瘡淫潰膿血淋漓精神困憊時正  
 六月診其脉兩手清短左微是弦狀輕重皆近五至予謂  
 此瘡皆前烏附等藥積毒所發此淋亦因燥烈之藥凝積  
 滯血滿膀胱况遊脉為敗血短脉為血耗遂令於溺後視  
 之有物出如敗膿者否視之果然因思之忍痛則傷血叫  
 則傷氣遂先治淋令取杜牛膝根莖葉同煎取濃汁却煎  
 四物湯作大料與服三日後痛漸減前所謂敗膿者至是  
 漸少五七日淋病全安此時瘡亦定蓋四物能生血也但  
 飲食減少瘡未收斂耳遂用參芪當歸白朮四藥大劑於  
 瓦器熬為膏以陳皮半夏縮砂木香煎取清汁調膏藥飲

醫學綱目卷一四

甲

遂能食又一月而瘡安 一方名血餘散治血淋內崩吐  
 血舌上出血便血用亂髮以皂角水洗淨晒乾燒灰為末  
 每服二錢以茅根車前葉煎湯調下

主治五種淋用葶藶根兩莖打碎水一椀半煎半碗頓服  
 即通太妙丹溪云葶藶根

團治五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麩裝煨為末每一錢七  
 水一盞煎至七分空心服

氣虛淋八物湯加杜牛膝黃芩汁煎服老人氣虛亦能淋  
 參朮中加水通山梔

仁八姪淋病脉沉而大此主勞苦傷血下焦蘊結

人參 歸尾 白芍 香附  
 條芩 木通 山梔 黃芪  
 生甘草稍分五

分六帖杜牛膝湯兩莖煎取一盞晨前熱飲之  
 胡雲六朝奉七十餘因損後與荆芥大黃等藥傷正氣  
 以致惡血結聚今則小便如淋中滿食少以此治之

作一帖煎服

又生氣藥  
 縮砂三錢 海金沙 紅麩二錢 檀香二錢  
 木香 白荳蔻 丁香  
 分六帖研杏仁十四枚入生氣散  
 死血作淋牛膝膏妙但虛人能損胃不宜食

本治婦人諸般淋苦杖根俗呼杜牛膝多取洗淨碎之以  
 一合用水五盞煎至一盞去渣入麝香乳香少許研調下

醫學綱目卷一四

甲

鄞縣武尉耿夢得其內人患砂石淋者十三年矣每漩  
 痛楚不可忍溺器中小便下砂石剝剝有聲百方不效偶  
 有此方啜之一夕而愈自所見也

子用牛膝以酒煮服治小便淋痛射後方用牛膝根莖葉  
 亦以酒煮服治小便不利莖中痛欲死及治婦人血結堅  
 痛如神蓋牛膝治淋之聖藥也但虛人當用補劑監治之

世茄樹散治放尿有血帶血線童子小便煎茄樹根汁服  
 之效

羅琥珀散治五淋瀝瀝痛小便有膿血出  
 琥珀 海金沙 沒藥 蒲黃  
 右研為細末每服三錢食前煎葶藶根湯調下日三服  
 黃明之小便澀莖中痛不可忍相引脇下痛制以茯苓



珀湯主之

川練子去核 甘草生各 人參五分

玄胡索七分 茯苓四分 琥珀 澤瀉

歸稍 柴胡三分

右咬咀都作一服長流水三盞煎至一盞去查溫服空心食前數服大効

瑞治諸般砂石淋琥珀二錢研細空心用葱白頭濃煎湯

調下無問諸般淋證一二服立効丹溪云琥珀古今方用者反受其毒急之苦耳本草琥珀清淨自無毒

無鹿角霜丸治膏淋

鹿角霜 白茯苓 秋石各等

右為末糊丸如桐子大每服五十九米飲下

圖治石淋導水用螻蛄一枚鹽二兩同于新瓦上鋪蓋焙

乾研末溫酒調下一錢七服之即愈

靈花活五種淋疾氣淋熱淋勞淋石淋及小便不通至甚者透膈散用硝石一兩不夾泥土雪白者研為末每服二

錢諸淋各依湯使如勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子煎湯下通後更須服補虛丸散血淋小便不出時下血疼

痛並用冷水調下氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂

石令人悶絕將藥末先入銚子內隔紙炒至紙焦為度再

研令細用溫水調下小便不通小麥湯下在患諸淋並以

冷水調下並空心先調使藥消散如水即服之更以湯使

送下服藥未効者服此立愈

子和百亭劉十三之子年六歲病砂石淋戴人以苦劑三

瀉之以益腎散三下之立愈 鹿邑一閭閻之家有子二

十三歲病膏淋三年矣鄉中醫不能治往京師備訪多作

虛損補以溫燥灼以針艾無少減聞戴人僑居滬東見戴

人曰感蠱之疾也亦曰白淫實由少腹熱非虛也可以瀉

以泄其人以時暑憚其法峻不決者三日浮屠一僧曰予

亦有暑病近覺頭痛戴人曰亦可瀉願與君同之母畏之

于是瀉痰三升色如黑紫汁內有死血并黃綠水又瀉積

穢數行尋覺病去方其來時而無人色及治畢次日面如醉戴人慮其暑月路遠又慮數方使歸以自備云 屈村張氏小兒年十四歲病約一年半矣得之夏秋發則小便天痛至握其腕跳躍旋轉號呼不已小便數日不得下下則成砂石大便秘澀肛門脫出一二寸諸醫不能治求治于戴人戴人曰今日治今日効時日在辰巳間矣以調胃承氣僅一兩加牽牛頭末二錢沒河水煎之今作三五度

木醫學編目卷五

咽之又服苦末丸如芥子許六十九日加脯上瀉下泄一時齊出有膿有血涌泄既覺定今飲新汲水一大盞小溲已利一二次矣是夜凡飲新水二三十盞病去九分止哭

一次明日困卧如醉自晨至暮猛然起走索食于毋歌笑自得頓釋所苦繼以太白散八正散等調理一日大瘥恐

暑天失所養留五日而歸戴人曰此下焦約也不吐不下

則下焦何以開不令飲水則小便何以利大抵源清則流

清也苦末丸

丹諸淋皆屬於熱余每用黃柏滋腎丸每百丸用四物湯

加甘草稍杜牛膝木通桃仁滑石木香煎湯空心吞服煎

灸三陰交如鼓應桴累試累効者

保淋閣者涼膈散加滑石四兩茯苓一兩涼膈散方

羅石葦散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宜出



少起數臍腹急痛或尿如荳汁或便出砂石並皆治之

木通 石葦 滑石 炙甘草

王不留行 當歸 白朮 瞿麥

芍藥 葵子

右為細末每服二錢小麥粥湯調下空心服一方加沉香陳皮無滑石瞿麥白朮木通

本治心經熱小便澁及治五淋火府丹

生地 木通 黃芩 甘草

右為細末煉蜜杵丸如桐子大每服二十粒木通煎湯下此藥治淋澁臍下滿痛

右二方解熱利小便兼補之劑

無石燕九治石淋多因憂鬱氣注下焦結所食酸氣而成令人小便砂痛不可忍出砂石而後小便通

石燕 燒令通赤水中炸三

石葦 瞿麥 瞿麥 瞿麥

右為末糊丸桐子大煎瞿麥燈心湯下十九食前服日二三

羅海金沙散治小便淋澁及下焦濕熱氣不施化或五種淋疾癢閉不通

海金沙 木通 瞿麥 滑石

通草 杏仁 湯洗去皮尖

右為細末入燈心同煎空心服

八正散治小便赤澁或淋閉不通及熱淋並宜服之

大黃 木通 瞿麥 滑石

菡萏 車前子 山梔仁 甘草

右為末入燈心同煎小兒少與之

紫菜花散治小便淋澁經驗紫菜花根一味洗淨剉水煎五

七沸服之立效

世葛粉丸治男女淋病疾痛効速勿輕忽之

沙糖 葛粉

和丸如桐子大井花水化開一二丸

治血石淋湯樹蛙肩烏梅一大棗三水一盞煎服

靈苑治卒患諸淋遺澁不止小腸赤澁痰痛三葉酸漿草

人家園林亭檻中着地開黃花味酸者是取嫩者淨洗研

絞自然汁一合用酒一合攪勻空心服之立通

無蘆草汁治膏淋及尿血律草搗汁二升醋二合和空腹

服一盞又濃煮汁飲亦治淋瀝尿血

胞移熱于膀胱則癰瀉血

難痺論云胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃以濕澁于小

便上為清涕夫膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出

矣今風寒濕邪氣客于胞中則氣不能化出故胞滿而水

道不通其小腹膀胱按之內痛若沃以濕澁於小便以足

太陽經其直行者上交巔入絡腦下灌鼻竅則為清涕也

治胞痺小便不通腎着湯

赤茯苓 白朮 甘草 乾薑

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去渣溫服日三

茯苓丸治胞痺小便內痛

赤茯苓 防風 細辛 白朮

澤瀉 官桂 瓜蒌根 紫苑

附子 黃芪 芍藥 甘草

三三一九



生地	牛膝酒	山芋	獨活
半夏湯	山茱萸各一		
右十八味為細末煉蜜丸如桐子大每服十九溫酒送下食前			
巴戟丸治胞腫腹痛小便不利			
巴戟 <small>去心一兩</small>	桑螵蛸 <small>炒</small>	遠志 <small>去心</small>	
生地	山芋	附子 <small>炮</small>	續斷 <small>各一兩</small>
肉苁蓉 <small>酒浸各一兩</small>	杜仲 <small>灸</small>	石斛	
鹿茸 <small>灸</small>	龍骨	兔絲子	五味子
山茱萸	官桂 <small>各三錢</small>		
右十六味為細末煉蜜丸如桐子大溫酒下三十九空心食前			
腎瀝湯治胞腫小腹急小便不利			
桑白皮 <small>炒</small>	犀角屑	杜仲 <small>灸去</small>	五加皮
麥門冬	木通	桔梗 <small>各一兩</small>	赤芍藥 <small>五錢</small>
右八味為末每服五錢水一盞半羊腎一箇切竹瀝少許同煎去渣溫服			
諸淋皆屬于熱古方有冷淋蓋十百之一也今因胞腫屬風寒濕故主寒條			
無頭眩膏治諸淋疼痛不可忍受及砂石淋大蘿蔔切一指厚四五片好白蜜淹少時安淨鉄錘上慢火炙乾又蘸又炙盡蜜二兩番覆炙令香軟不可焦候蜜盡細嚼以鹽湯一盞送下立效			
聖治冷淋小腸不利並心急痛用解葉搗末每服二錢水一盞葱白七寸煎六分去渣食前溫服			
權療石淋便中有石子者胡桃肉一升細米煮漿粥一升			

相和頓服即瘳淋病

運氣小便淋氣及針灸淋闕法並見小便淋闕門

仲淋家不可發汗發汗則便血 淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中

腎脈滑實為癰瘕 脾脈滑甚為癰瘕全文見治瘕瘕法

肺少陰脈數婦人則陰中生瘡男子則氣淋

素病有瘡者一日數十洩此不足也身熱如炭頸膺如格入迎躁盛喘息氣逆此有餘也大陰脈細微如髮者此不足也其病安在名為何病岐伯曰病在大陰其盛在胃頰在肺病名曰厥死不治奇病論曰難病脈細不治

胎前淋闕

丹轉胞病胎婦稟受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大率有之古方皆用滑利疎導藥鮮有應效因思胞為胎所展展在一邊胞系于庚不通耳胎若舉起懸在中央胞系得疎水道自行然胎之墜下必有其由一日吳宅龍人患此脈之兩手似瀉重取則弦左手稍和予曰此得之憂慮瀉為血少氣多弦為有飲血少則胞弱而不能自舉氣多有飲中焦不濟而溢則胞知所避而就下故喜墜遂以四物湯加參朮半夏陳皮生甘草生薑空心飲隨以指探喉中吐出藥汁候少頃氣定又與一貼次日亦然如是八貼而安此法果為的確恐偶中耳後有數人歷歷有效未知果何如耶仲景云婦人本肌盛頭舉身滿今反羸瘦頭舉中空臍胞系了疾亦致胞轉其義未詳必有能知之者

一婦人四十一歲妊娠九箇月轉胞小便不出三日矣下急脚腫不堪存活來告急予往視之見其形慘脈之右澹而左稍和此飽食而氣傷胎系弱不能自舉而下墜



着膀胱偏在一邊氣急為其所閉所以水寒不能出也轉胞之病大率如此予遂製一方補血養氣血氣既正胎系自舉則不下墜方有安之理遂作人參膏歸身尾白芍藥白朮帶白陳皮炙甘草半夏生薑煎湯與四貼任其叫噉至次早天明又與四貼藥查作一貼前令頓飲之探喉令吐出此藥湯小便立通皆黑水後就此方加大腹皮枳殼青葱葉縮砂仁二十貼與之以防產前後之虛果得就厚平安產後亦健 一婦人妊娠七八箇月患小便不通百醫不能利轉加急脹診其脉細弱予意其血氣虛弱不然水載其胎故胎重墜下壓在膀胱下口因此溺不得出若服補藥升扶胎起則自下藥力未至愈加急滿遂令一老婦用香油塗手自產門入托起其胎溺出如注脹急頓解一面却以人參黃芪升麻大劑煮服或少有急滿仍用

手托放取溺如此三日後胎漸起小便如故

仲問曰婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了疾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸主之

產後小便不通及胞轉系蟻蟻搗末米飲服方寸七日三

神妊娠有水氣重身小便不利洒浙惡寒起即頭眩葵子茯苓散主之

葵子 茯苓各三

右二味杵為散飲服方寸七日三服小便利則愈

妊娠小便難飲食如故歸母苦參丸主之

當歸 貝母 苦參各四

肺氣難 外治妊娠患子淋猪苓五兩一味為末以白湯三合服方寸七漸至二七日二夜

天治妊娠卒不得小便杏仁一味去皮尖搗丸如大棗煎燈心湯吞七粒立利

丹朱室婦人三十餘歲四箇月胎大小便閉因與通利冬葵子等藥已通但氣未順此由性急血耗氣亂須和其氣滋其血乃安

陳皮 青皮 芍藥 人參 歸身尾 川芎 地黃 白朮 茯苓 木通 甘草

針灸 甲小腸難水脹滿溺出少胞轉不得屈曲骨主之 胞轉不得小便小腹滿關元主之 產後淋閉

無治產前後淋其法不同產前當安胎產後當去血瞿麥蒲黃最為產後要藥

茅根湯治產後諸淋主之

白茅根 瞿麥 葵子 白茯苓

人參 蒲黃 桃膠 滑石 甘草 紫貝 石首魚枕石

右剉為散每服四錢水一盞半薑三片燈心二十莖煎至七分去查溫服亦可為末木通煎湯調下

大療產後小便不通用陳皮去白為末空心服酒調二錢一服便通

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒用鹽填臍中却以葱白剉去粗皮十餘根作一縛切作一指厚安臍上用大艾炷滿葱餅上火灸之覺熱氣入腹內即時便通神驗







破故布

胡蘆芭已上各一兩並炒

川姜

川烏

草烏半兩炮

山藥二兩

右各炮治如法同為細末醋糊為丸如桐子大每服十五丸空心溫酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日二服耳目永不昏聩髮髮不白

衍隣家有一男子小便日數十次如稠米泔色心神恍惚瘦瘁食減今服桑螵蛸散未終一劑而安此藥能安神魂定心志治健忘小便數補心氣用桑螵蛸遠志菖蒲龍骨人參茯苓當歸龜甲醋炙已上各一兩為末以人參湯調下二錢

海蓋附石脂神砂丹治小便數而不禁怔忡多忘方見丹因看盧氏醫鏡見此一藥味數分兩同惟丹砂用伏火者及治病有差所治者小便數而不禁怔忡多忘驚夢不

已不同耳見其不同審而詳之乃得此治法不差且泛論之經言腎主大便肝主小便淋瀝難經云小腸為赤腸是面赤色及便溺色赤皆出心與小腸南方赤色顯於外也經言下焦如瀆者正謂大小便也大便為陰為有形氣化乃下焦之下者也謂腎主大便不言大腸者明子行父道為腎臟病小便為陽為無形氣化乃下焦之高者也謂肝主小便淋瀝亦是子行父道為肝臟病凡諸無形氣化者皆腑病所主諸有形氣化者皆臟病所主此二証俱在下焦則同但有形無形及在腑在臟有殊俱是丹田衰敗不言心火者以其相火代行君之政令故也細分之則膀胱上水勝丙火小腸者不傳入陰故為泄血泄血利不禁為有形質病且不傳陰則陰不病何為有形病此為陰之體也為腑之用也天地陰陽互為體用以斯可見是明五臟

為六腑所用六腑者為五臟所用明矣是有形皆為傳陰也大小便不禁是膀胱不禁為遺溺此不傳陰也是丹田胞絡受寒為壬所克大抵諸臟皆乘有形病者皆在腑責其所乘皆在臟也用伏火丹砂者去其寒性耳治法同者以其俱在下焦補諸無形同在胞絡耳以其胞與腎相對有渠相通故也腎主大便肝主小便所治安得不殊經曰腎肝同歸一治又曰少陽主骨所生病便澀難膀胱主筋所生病亦可知也小便不禁茯苓湯下大便不禁米飲下此論方委附

運氣小便數皆屬火經云少陽之復便數憎風是也小便數惟二藏有之

一屬肺經云肺手太陰之脉氣盛有餘則肩背痠風寒汗出中風小便數而欠是也以刺言之瀉手太陰則愈

一屬肝經云足厥陰之癰令人如癢狀而小便不利又云肝痺者夜卧則驚多飲數小便是也視虛實補瀉之則愈

東小便數腹痛 尿胞在玉泉下一

玉小便多 命門在兩腎之中 腎俞一分沿皮向外六

集小便滑數 中極在臍中 腎胸在臍中 陰陵泉在胫下 氣海

陰谷 三陰交

溺赤

諸病水液渾濁皆屬於熱全文 小便黃者少腹中有熱也全文 小便黃無如黃柏知母效

脈尺滿足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯足太衝補之

臟腑小便黃有四

一屬肝熱經云肝熱病者小便先黃是也

二屬胃實經云胃足陽明之脉氣盛則身已前皆熱其有

脈為其

脈為其

脈為其



餘於胃則消殺善饑溺色黃是也

三屬肝虛經云肺手大陰之脈氣虛則有背滿寒少氣不足以息溺色變故耳

四屬腎虛經云冬脈者腎脈也冬脈不及則令人眇清春痛小便變是也

運氣

運氣小便黃有二一屬風經云厥陰之勝壯腸氣并化而為熱小便黃赤是也

二屬熱經云少陰司天熱淫所勝病溺色變又云少陽之勝溺亦善驚又云陽明司天燥氣下臨暴熱至乃暑陽氣鬱發小便變是也蓋暴熱謂地氣少陰之熱也

針灸

邪之所在皆為不足中氣不足溲便為之變補足外踝下留之全文見刺虛實法

不醫學綱要古

五

甲小腸有熱溺赤黃中管主之 溺黃下廉主之 小便黃赤完骨主之 小便黃腸鳴相追逐上廉主之

遺溺

遺小便遺失者肺金虛也宜安臥養氣禁勞役以黃芪人參之類補之不愈當責有熱加黃柏生地甲乙云肺熱則少氣不足以息

下虛謂膀胱下焦虛經云水泉不止者是膀胱不藏也仲景云下焦竭則遺溺失便其氣不能自禁制不須治久則愈又云下焦不歸則遺溺世用桑螵蛸雞臍之類是也

壯治遺溺桑螵蛸酒炒為末薑湯送下二錢妙

無鷄內金散治溺床失禁鷄臍一具并腸洗淨燒為灰男用雌女用雄即是鷄臍內黃皮研為末每服二錢酒飲調服妙 又方用羊肚系盛水滿線縛兩頭煮熟取中水

調服妙 又方用羊肚系盛水滿線縛兩頭煮熟取中水

頭服之瘥

虛寒

山大人遺溺不知善後根細研酒下

丹鹿茸丸治又虛冷小便自濁滑數不禁

鹿茸

牡蠣

雞臍脰

右為末酒糊丸桐子大食前酒下二十九此方因沉香漢取

沉香

石斛

補骨脂

附子

肉蓯蓉

桂

桑螵蛸

鹿茸

雞臍脰

牡蠣

沉香

石斛

補骨脂

附子

肉蓯蓉

桂

桑螵蛸

鹿茸

雞臍脰

牡蠣

沉香

石斛

寒熱

又云鹿角屑炒黃為末溫酒下二錢妙本草云鹿角逐陰中邪氣惡血鹿茸丸虛條

八醫學綱要古

五

得血而能攝掌得血而能握足得血而能走臟得血而能液腑得血而能氣然血所通流則氣亦然也氣血先行則其中神自清和而應機能為用矣故經曰血氣者人之神不可不謹養也故諸所運動時習之則氣血通利而能為用閉塞之則氣血行微而其道不得通利故劣弱也若病熱極甚則鬱結而氣血不能宣流無所用而不遂其機隨其鬱結之微甚而有不用之大小焉是故目鬱則不能視色耳鬱則不能聽聲鼻鬱則不能聞香舌鬱則不能知味至如筋痿骨痺諸所出不能為用皆鬱結之所致也

丹千金翼白薇散治尿出不知時

白薇本草云

右為末溫酒調下方寸七日三服食前

嘗治一男子遺溺不覺尿洪大盛以黃柏知母杜牛膝

白芍藥各等

右為末溫酒調下方寸七日三服食前

嘗治一男子遺溺不覺尿洪大盛以黃柏知母杜牛膝

白芍藥各等

右為末溫酒調下方寸七日三服食前

嘗治一男子遺溺不覺尿洪大盛以黃柏知母杜牛膝



為君青皮甘草為臣木香為佐桂些少反佐服數貼大  
効此法與前白薇散皆河間所謂熱甚延孔鬱結神無  
所用不能收禁之意也

世神苦導水丸治遺尿有實熱者每百丸空心白湯下若  
一服利止後服前法河間所謂延孔鬱結不能收禁此所  
謂滲氣遺溺痲痺在腎脾謂氣血不通宜

無茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁及遺泄  
白濁

赤茯苓 白茯苓

右為末以新汲水浸洗澄去新沫控乾別取地黃汁同  
好酒銀石器內熬成膏搜和為丸如桐子大空心熱酒  
嚼下

世用薏苡仁鹽炒煎服効方見  
小兒

本燕蓐草主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主  
噦氣即燕窠中草也

膀胱效者欬而遺溺全文  
見林

針灸遺溺法有四

其一取肝其二取督脉其三取三焦並見遺溺閉塞門其  
四取肺經云手太陰之別名曰列缺其病虛則欠欬小便  
遺數取之去腕一寸別走陽明者是也

遺尿失禁 陰陵泉 陽陵泉二寸  
半 大敦七 又方

曲骨 陰陽 二陵泉各二  
寸半

甲遺溺關門及神門委中主之 氣滯小便黃氣滿虛則  
遺溺石門主之

肝脉微滑為遺溺全文見  
治法

妊娠遺尿

天白薇散治妊娠不知尿出時方見前  
熱條  
產後一味桑螵蛸散治妊娠小便數不禁方見前  
下虛條 又方  
用鷄尾毛煨灰末酒調方寸匕

產遺尿

無婦人產後產理不順致傷膀胱遺尿無時

丹嘗見尿胞因收生者不謹以致破損而得淋瀝病遂為  
廢疾一日有徐婦年壯難產得此因思肌肉破傷在外者  
宜可補完胞雖在腹恐亦可治遂診其脉虛甚予曰難產

之由多是氣虛產後血氣尤虛試與峻補因以參芪為君  
芩歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為佐煎以猪羊胞中湯極  
饑時飲之但劑小率用一兩至一月而安蓋令氣血驟長

其胞自完恐稍緩亦難成功矣

喬町婦人產後尿不禁面微浮暑發熱于午後此膀胱為  
坐婆所傷

黃芪 歸身尾 芍藥各一 白朮  
人參 陳皮分五 甘草各  
些

右煎熱飲之

雲桑螵蛸散治產後小便數及遺尿

桑螵蛸三十  
炒 鹿茸各三  
兩 黃芪各三  
兩  
牡蠣各  
兩 人參 赤石脂 厚朴各二  
兩

右為細末空心米飲調下三錢匕

又方

桑螵蛸半兩 龍骨兩一  
右為細末米飲調下二錢空心

前陰諸疾 陰縮陰縱 陰痿陰汗  
陰冷陰痒 陰臭陰腫 陰痛陰吹



前陰諸疾前陰所過之脉有二一曰肝脉二曰督脉經云  
脉足厥陰之脉入毛中過陰器抵少腹是肝脉所過也又  
云督脉者起於少腹以下骨中央女子入繫庭孔循陰器  
男子循莖下至纂與女子等是督脉所過也

陰縮陰縱

陰縮謂前陰受寒入腹內也陰縱謂前陰受熱挺長不收  
也經曰足厥陰之筋傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不  
收治在行水清陰氣是也

丹鮑兄二子餘歲玉莖挺長腫而痿皮塌常潤磨股不能  
行兩脇氣上手足倦弱先以小柴胡加黃連大劑行其濕  
熱畧加黃柏降其逆上之氣其挺腫漸收漸減及非但莖  
中有堅塊未消遂以青皮一味為君佐以散風之劑末服  
外以絲瓜汁調五倍于末傅而愈 平江王氏子年三十

入腎經細末

美

歲忽陰挺長腫而痛脉數而實用朴硝荆芥湯浸洗又用  
三一承氣湯大下之愈

內經刺灸前陰挺長之法有一經云足厥陰之别名曰蠶  
溝去內踝五寸別走少陽其病實則挺長取之所別是也  
明堂陰卵入腹 臍下六寸兩旁各一寸六分灸七

內經診陰縮而死者皆屬肝傷經云肝悲哀動中則傷魂  
魂傷則狂妄不精不精則不正當陰縮而舉筋兩脇骨不  
舉毛悴色天死于秋又云厥陰終者喜溺舌卷卵上縮是  
也

陰痿陰汗陰冷陰臭

陰痿傷陰痿皆耗散過度傷于肝筋所致經云足厥陰之經其病  
傷于內則不起是也

陰汗腫 陰痿陰汗腫臭論○一富者前陰間嘗聞腫臭又因連

日飲酒腹中不和求于治之子應之曰夫前陰者是厥陰  
之脉絡陰器出其挺末臭者心之所走散入于五方為臭  
入肝為臊臭此其一也當于肝經中瀉行間是治其本後  
於心經中瀉少衝以治其標如惡針當用藥除之治法當  
求其本連日飲酒夫酒者氣味俱能生濕熱是風濕熱合  
於下焦為邪故經云下焦如瀆又云在下者引而竭之酒  
者是濕熱之水亦宜去前陰以去之是合下焦二法治之  
龍膽瀉肝湯治陰部時復濕痒有臊臭

柴胡稍 澤瀉各一 車前子 木通各五  
當歸稍 龍膽草 生地各三

右剉如麻豆大作一服水三大盞煎至一盞去查稍熱  
服空心宿食消盡服便以美饀壓之柴胡入肝為引用  
澤瀉車前子木通其淡滲之味利小便亦除臊臭是名

入腎經細末

美

在下者引而竭之生地黃草龍膽之苦寒瀉酒濕熱更  
兼車前子之類以徹肝中邪氣肝主血用當歸以滋肝  
中血不足也

固真陽治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水小便後有餘滴臊  
氣尻醫并前陰冷惡寒而喜熱膝亦冷正月內定此方

升麻 柴胡 羌活各一 甘草  
澤瀉各半 草龍膽 知母 黃柏各二  
右剉如麻豆大水三盞煎至一盞去查稍熱空腹服以  
美饀壓之

溫腎湯治面色痿黃身黃脚軟弱無力陰汗陰莖有青色  
二月定此方

麻黃六 防風根五分 白朮一  
蒼朮半 澤瀉二 猪苓 升麻



白茯苓 黃柏酒各 柴胡稍六

右件分作二服每服水二大盞煎至一盞去香稍熱服食前天晴明服之候一時辰許方食

補肝湯治前陰如冰冷并冷汗兩脚痿弱無力

黃芪七 人參 葛根各三 甘草後五

升麻四 知母 柴胡 羌活

陳皮 歸身 黃柏少 防風

白茯苓 澤瀉各二 蒼朮分五 麩末分二

猪苓四 連翹分二

右咬咀水二大盞煎至一盞去香稍熱服食前忌酒濕

麩

清震湯治溺黃腥臭淋瀝兩丸如水陰汗浸兩股陰頭亦冷正值十二月天寒凜冽霜雪交集寒之極矣

升麻分五 柴胡分二 羌活錢一 黃柏錢一

蒼朮分五 防風分三 甘草分二 葶本分三

紅花分 歸身分二 猪苓分三 澤瀉

黃芩分五 麻黃根分三

右剉如麻苳大都作一服水二大盞煎至一盞去香臨臥服忌酒濕麩

柴胡勝濕湯治兩外腎冷兩髀樞陰汗前陰痿弱陰囊濕

痿騰氣

澤瀉半錢 羌活半錢 升麻半錢 生甘草

柴胡各三 草龍膽錢一 黃柏酒二 紅花少

當歸稍 麻黃 漢防已 茯苓錢一

五味子二十

右咬咀水三大盞煎至一盞去香稍熱服食前忌酒濕

右咬咀水三大盞煎至一盞去香稍熱服食前忌酒濕

麩房事

固仲景八味丸治陽事多痿不振今依全方夏減桂附一

半春秋三停減一味去補足全減桂附只依六

腎脉大其為陰痿全文 見診

運氣陰痿皆屬濕土制腎經云太陰司天濕氣下臨腎氣

上從陰痿氣衰而不舉是也

椒粉散治前陰兩丸濕痿秋冬尤甚夏月減

麻黃錢一 黑狗脊分五 斑猫箇二 猪苓分三

肉桂分二 歸梢分三 輕粉少 紅花少

蛇床子分五 小椒分三

右為極細末滲上避風寒濕冷處坐臥

丹腎囊濕痒先以吳茱萸煎湯洗之後用吳茱萸半兩寒

水石三錢黃柏二錢半猓猓蛇床子各半兩輕粉一錢白

麩三錢硫黃二錢煨榔三錢白芷三錢為末糝之

子有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜痛悶不得

眠取生椒擇之洗淨以布帛裹着丸囊令厚半寸須臾熱

氣大通日再易之取出瘥

本曾有人陰冷漸次冷氣入陰囊腫滿晝夜疼悶不得眠

煮大薊汁服立瘥

內經針灸陰暴痒痛足厥陰之別名曰蠶溝上內踝五寸

是也全文見

撮陰瘻關元補 陰濕 陰谷十半

陰穴陰中濕痒外腎生瘡 海底在膀胱底十字文

獨陰在足第二指節下橫

陰冷陰腫陰瘻陰吹

溪婦人陰腫腎痛積實半斤切碎炒熱布裹包熨之冷即







踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛陰器紐痛下引  
臍兩脇痛引膈中脊內痛治在燔針劫刺以知為數以痛  
為輸名曰孟秋痺也

足少陰之筋起于小指之下並足太陽之筋邪走內踝之  
下結于踵與太陽之筋合而上結于內輔之下並太陽之  
筋而上循陰股結于陰器循脊內挾膂上至項結于枕骨  
與足太陽之筋合其病足下轉筋及所過而結者皆痛及  
轉筋病在此者主癰瘰及瘰在外者不能伸在內者不能  
仰故陽病者腰反折不能伸陰病者不能仰治在燔針劫  
刺以知為數以痛為輸在內者引飲藥此筋折紐紐發  
數甚者死不治名曰仲秋痺也

足厥陰之筋起于大指之上上結于內踝之前上循脛上  
結內輔之下上循陰股結于陰器絡諸筋其病足大指支  
內踝之前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷於內則不  
起傷于寒則陰縮入傷于熱則縱挺不收治在行水清陰  
氣其病轉筋者治在燔針劫刺以知為數以痛為輸命曰  
季秋痺也

手太陽之筋起于小指之上結于腕上循臂內廉結于肘  
內銳骨之後彈之應小指之上入結于腋其支者後走  
腋後廉上繞有腓循脛出走太陽之前結于耳後完骨其  
支者入耳中直者出耳上下結于頰上屬目外眥其病小  
指支肘內銳骨後廉痛循臂陰入腋下腋痛腋後廉痛  
繞有腓引頰而痛應耳中鳴痛引頰目眩良久乃得視頸  
筋急則為筋癭頸癭寒熱在頸者治在燔針劫刺以知為  
數以痛為輸其為腫者復而銳之本支者上曲牙循耳前  
屬目外眥上頰結于角其痛當所過者支轉筋治在燔針

劫刺以知為數以痛為輸名曰仲夏痺也

手少陽之筋起于小指次指之端結于腕上循臂結于肘  
上繞臑外廉上有走頰合手太陽其支者當曲頰入繫舌  
本其支者上曲牙循耳前屬目外眥上乘頰結于角其病  
當所過者支轉筋舌卷治在燔針劫刺以知為數以痛  
為輸名曰季夏痺也

手陽明之筋起于大指次指之端結于腕上循臂上結于  
肘外上臑結于腋其支者繞有腓挾脊直者從有髑上頰  
其支首上頰結于頰直者上出手太陽之前上左角絡頰  
下右頰其病當所過者支痛轉筋有不舉頰不可左右視  
治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰孟夏痺也

手太陰之筋起于大指之上循指上行結于魚後行寸口  
外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下出缺盆結有前臑

上結缺盆下結胃裏散貫膈合貫下抵季脇其病當所過  
者支轉筋痛甚成息貫膈急吐血治在燔針劫刺以知為  
數以痛為輸名曰仲冬痺也

手少陰之筋起于中指與太陽之筋並行結于肘內廉上  
臂陰結腋散前後挾脇其支者入腋散貫中結于臑其  
病當所過者支轉筋前及胸膈息貫治在燔針劫刺以知  
為數以痛為輸名曰孟冬痺也

手少陰之筋起于小指之內側結于腕骨上結肘內廉上  
入腋交太陰挾乳裏結于胸中循臂下繫于臑其病  
內急心承伏梁下為肘網其病當所過者支轉筋筋痛治  
在燔針劫刺以知為數以痛為輸其成伏梁唾血膿者死  
不治名曰季冬痺也名曰季冬痺也六字元誤在  
經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽



急則反折陰急則伸不伸刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔針艾灸亦然今世不分寒熱足之陽明手之太陽筋急則口目為噤皆急不能卒視治皆如右方也俱見靈樞

形樂志苦病生于筋治之以慰引全文見

諸筋病皆屬于節經云諸筋者皆屬于節又云手屈而不伸者病在筋是也 肝主諸筋經云肝主筋又云在臟為

肝在體為筋又云酸生肝肝生筋筋生心是也 筋病忌

風忌食酸辛忌久行經云風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸

又云酸走筋筋病無多食酸又云多食辛則筋急而爪枯

又云久行傷筋也

轉筋

血熱 丹轉筋皆屬血熱四物加黃芩紅花蒼朮南星有筋轉于

醫學綱目

三

足大指轉上至大腿近腰結下乃因奉養厚飲酒感寒而

雜方

作加酒茶紅花蒼朮南星煎服

聖治肝虛轉筋用赤芍藥切作三合水一盞酒三合煎

至四合去渣溫分二服

孫尚藥治脚轉筋疼痛急松節二兩細剉如米粒乳香

一錢右件藥用銀石器內慢火炒令焦只留一分性出火

毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下同是筋病皆治

之外治轉筋取故綿以醋醋浸籠中蒸及熟用綿裹病人脚

令更易勿停瘥止

仲轉筋之為病其臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹者鷄

尿白散主之用鷄屎白一味為散取方寸七以水六合和

溫服

針灸

丹轉筋偏身入肚不忍者作極鹹鹽湯于槽中暖浸之

則經所謂以痛為輸之法蓋用火燒熨針切刺轉筋之時

當察轉筋之痛在何處在何處則刺之在後則刺其前

刺之以知竟應效為度故曰以知為數是也

齊轉筋而疼灸承山而可治

足太陽之下血氣皆少則善轉筋腫下痛全文見

霍亂轉筋

海吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜和中四君子湯平

胃散建中湯方見治虛每服一兩水三盞姜五片煎至一

盞去渣溫服 如吐瀉轉筋自汗脈浮者四君子加桂五

錢主之 如吐瀉轉筋筋下痛脉弦者宜建中加木瓜柴

胡湯平胃散加木瓜五錢亦可也

桂枝二兩 芍藥三兩 甘草兩 膠飴半

生薑半兩 大棗六枚 木瓜錢五 柴胡錢五

右剉如麻豈大每服一兩水三盞煮至一盞半去渣下

膠飴兩匙煎化服 如吐瀉後小便不通胃中實痛者

四君子湯加大黃一兩主之 如吐瀉轉筋腹中痛體

重脉沉而細者宜四君子湯加芍藥高良姜湯四君子

湯四味各一兩芍藥良姜各五錢同煎法 如吐瀉

霍亂四支拘急脉沉而遲者宜四君子湯加姜附厚朴

湯四君子四味各一兩生薑附子厚朴炮製各同煎

服

如吐瀉轉筋四支厥冷脉微緩者宜建中湯加附子當歸

湯

桂枝兩 當歸錢 芍藥二兩 甘草半兩

膠飴半兩 生薑兩 附子三錢 大棗六枚



右同煎服

活香需散治非時霍亂大渴煩燥汗出轉筋疼痛不可忍  
吐利門

丹怡六官霍亂泄多吐少口渴脚轉筋

滑石三錢 白朮二錢 蒼朮 厚朴

乾葛 陳皮各錢 甘草些 木通一錢

姜五片

下保和丸四十粒

本霍亂轉筋香需散汁飲之無不瘥者

肘治霍亂心腹痛煩短氣未得吐下若轉筋燒梔子二十  
枚研末熟水調下

不渴為寒  
霍亂轉筋吐瀉不止宜半夏湯

半夏錢 茯苓 白朮各半 甘草錢

入醫學綱目卷四

右為末渴者涼水下不渴溫水下無時如吐瀉不止

身無汗者可與瀉痢門漿水散兼桂枝湯又與白朮

湯

直指木瓜湯治霍亂吐瀉轉筋擾悶

木瓜兩 茴香二錢五分 甘草錢二

吳茱萸洗焙七

右吹咀每服四錢水一盞半生姜五片烏梅少許煎溫

服

活霍亂轉筋者用理中湯去朮加附子一枚生用理中湯方見傷寒

諸藥不效者寒  
治霍亂吐瀉不止及轉筋諸藥不効者一粒青金丹

硫黃一兩 水銀八錢

右二味銚子內炒柳木篦子不住手攪勻更以柳枝蘸

冷醋頻頻洒候如鉄色結如青金塊方成刮下再研如  
粉留小半為散餘以粽子尖三箇醋約半盞研稀調得  
所成膏和丸如鷄荳大硃砂為衣每服一丸煎丁香湯  
磨化下熱服如服散丁香湯調下一錢傷寒陰陽乘伏  
用龍腦冷水磨下日二三服

雜方  
梅治霍亂轉筋皂角末一小荳許入鼻中取嚏便瘥

古今錄治霍亂轉筋取蓼花一把去兩頭以水二升半煮  
一升半頓服之

食治吐後轉筋煮木瓜汁飲之甚良

外治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生姜三兩搗碎以酒  
一升煮三四沸頓服

世霍亂之証輕則上吐下瀉兩脚轉筋甚則遍體轉筋腹  
肚疼痛手足厥冷若欲絕者倉卒之際宜于臍中灼艾及

用麥一把煎湯炮洗次投以姜附理中湯之類其脉洪大  
者易治脉微腎縮舌卷者不治

針灸  
世霍亂轉筋灸承山灸二十七 又法中風亦灸承山

東霍亂轉筋在兩臂及胸堂中者筋拘不及動搖 臍中

中府 巨闕 胃脘 尺澤 太陰灸七

甲霍亂轉筋 金門 僕參 承山 承筋主之

肝之合筋也其榮爪也全文見 肝熱者色蒼而爪枯全文

多食辛則筋急而爪枯全文見

醫學綱目卷之十四

三四一



醫學綱目卷之十五 肝膽部

頭風痛 產頭痛 偏頭痛 雷頭痛

大頭痛 眉痛 頭重 頭風屑

**四頭痛** 多主於痰痛甚者火多有可吐者亦有可下者

**金匱真言論**云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣

者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目

內眥上額交巔直入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少

陽膽之脈起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從

上受之風寒傷上邪從外入客經絡令人振寒頭痛身重

惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之

則愈此傷寒頭痛也治法見頭痛耳鳴九竅不利者腸胃

之所生乃氣虛頭痛也治法見頭痛如氣上不下頭痛顛疾者

下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也治法

見寒有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓以腦為主腦

逆故令頭痛齒亦痛治法見有心煩頭痛者病在膈中過在

手巨陽少陰乃濕熱頭痛也治法見

頭痛分三陰三陽見陰陽

諸血虛頭痛當歸川芎主之 諸氣虛頭痛人參黃芪主

之 主者主治也兼見何證以佐使藥治之此立方之大法

也 血氣俱虛頭痛者於調中益氣湯加川芎蔓荊子細

辛其効如神 諸濕厥頭痛清空膏主之印風濕熱頭痛

諸痰厥頭痛半夏白朮天麻湯主之方見脾 諸厥逆

頭痛羌活附子湯主之方見 如濕熱在頭者以苦吐之

不可執方而治方見

**三陽頭痛**

羌活 防風 荊芥 升麻

葛根 白芷 柴胡 川芎

芍藥 細辛 蔥白連翹分兩

陰證頭痛只用溫中藥如理中薑附之類也

**凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也**高頰之

上惟風可到故味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦

有三陰三陽之異 太陽經頭痛惡風寒脈浮緊川芎獨

活之類為主 少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡黃芩

主之 陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脈浮緩長實者升

麻葛根石膏白芷主之 太陰經頭痛必有痰體重或腹

痛為痰癖脈沉緩者蒼朮半夏南星主之 少陰經頭痛

三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃

附子細辛湯主之 厥陰經頭痛或吐痰沫冷厥其

脈浮緩吳茱萸湯主之方見

清空膏治偏正頭痛年深不愈者及瘵風濕熱頭痛上藥

損目及腦痛年深不止

羌活 防風 柴胡 川芎

甘草 黃連 黃芩 製一兩半酒

右為細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在

口內少用白湯送下臨臥如苦頭痛每服中加細辛二

錢如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛加羌活防風川芎

甘草又加半夏一兩半如偏正頭痛服之不愈減羌活

防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴正陽明

頭痛只與白虎湯加白芷

東垣云諸濕熱頭痛清空膏主之丹溪云東垣清空膏諸

般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治又云治

少陽頭痛如痛在太陽脈陰者勿用蓋謂頭顛痛也



小清空膏治諸般頭痛惟血虛頭痛不治用片苓細切酒拌勻晒乾為末茶清調下酒亦可

清上瀉火湯昔有人年少時氣弱於氣海三用節次約灸五七百壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜風寒其頭痛便愈微來煖處或見烟火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活 三分  
防風 七分  
升麻 七分  
柴胡 五分

蒼朮 三分  
細辛 少許  
川芎 二分  
荆芥 二分

蒼朮 三分  
蔓荊子 二分  
黃芩 酒製一分  
黃連 酒製一分

黃柏 酒製一分  
甘草 五分  
知母 酒製一分  
當歸 三分

生地 錢一  
黃芪 錢一  
紅花 少許

右劉如麻荳大分作二服每服水二盞煎至一盞去渣稍熱服食遠

補氣湯服前藥之後服此藥

黃芪 八分  
甘草 錢一  
歸身 各二錢  
柴胡 錢一

升麻 各二分  
細辛 少許  
麻黃 少許  
苦丁香 各半錢

水煎服

安神散治頭旋眼黑頭痛

羌活 兩一  
防風 半錢  
柴胡 錢五  
升麻 五分

酒黃柏 兩一  
酒知母 半錢  
酒生地 兩半  
黃芪 兩一

甘草 錢三  
生甘草 錢三

右吹咀每服半兩水二大盞煎至一盞半加蔓荊子半錢川芎三分再煎至一盞臨臥去渣熱服

右東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒苓酒連酒柏加風劑也

川芎散治頭風偏正頭痛昏眩

川芎 細辛 羌活 槐花

甘草 香附子 石膏 荆芥

薄荷 菊花 防風 茵陳

右為細末每服二錢食後茶清調下日三服

石膏散治頭疼不可忍

麻黃 兩一  
石膏 各一兩  
何首烏 兩半  
葛根 七錢

右為細末每服三錢生薑三片水煎稍熱服

石膏散治頭疼

川芎 石膏 白芷

右各等分為細末每服四錢熱茶清調下

荆芥散治頭風

荆芥 石膏 白芷

右為細末每服二錢薑三片蔥白三寸和鬚使水一盞煎至七分食後服

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風頭疼一切頭疼並皆治之

茵陳 麻黃 石膏

右為末每服一錢酒茶調下食後服服畢仰臥霎時

玉真丸治腎氣不足氣逆上行頭疼不可忍謂之腎厥其脈舉之則弦按之則堅

硫黃 石膏 半夏 硝石

右為細末研勻生薑汁糊為丸如桐子大陰乾每服二十九薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃九子亦佳虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩

素問云頭疼巔疾下虛上實過在足少陰巨陽其則入腎狗蒙招尤目眩耳聾下實上虛過在足少陽厥陰其則入



肝下虛者腎虛也故腎虛則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈狗蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆虛之狀也故肝厥頭暈腎厥頭痛不同如此治肝厥頭暈神妙丸治頭疼及腦風

食鹽 硫黃各等分

右為末水調生麩為丸如桐子大每服十五丸用薄荷茶食前下荊芥酒亦得

孫兆口訣治頭疼附子炮石膏煨等分為末入腦麩少許酒茶下半錢妙

右硫附中加石膏之劑

治頭風如神附子一枚生去皮臍用葉立一合同煮豈熟為度去附子只喫豈立瘥每附子一枚可煮五次後末服之秘要

醫聖綱目卷五 五

治氣虛頭疼用大附子一枚剝去心入全蠟二箇在內取前附子末同鍾乳一分麩少許水和裹炮熟却研為末以焦黃為度煎茶調下一錢或半錢

又方用大附子一枚和皮 大川芎一箇剝

以水和附子末如麩劑裹川芎作四處如附子末少入

少麩裹畢以針穿數孔子用真腦射薰其穴內覺附香再捻合穴子如未覺內有香即再薰一炷細羅成灰用

銚子內熱灰炮熟末之每服半錢煎茶調下不拘時候

右酒醫揚古老二方神効

右附子純熱例

大寒犯腦頭痛  
帝曰人有病頭痛數歲不已此安得之名為何病岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛病名曰厥逆奇病

腦光活附子湯治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰腦風出奇病論中

防風分二 黃芪錢一 麻黃錢一 芥末半錢

升麻分二 甘草分二 黑附子分一 羌活半錢

白芷 白僵蚕 黃栢各三分

右咬咀水煎去香溫服食後若有寒嗽加佛耳草三分

川芎神功散治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新並皆治之

川芎兩一 甘草半錢 川烏生去皮臍 白芷

天南星 麻黃半兩

右為末每服三錢水二盞生薑三片煎至七分投清酒半盞和查溫服密室避風如人行五七里再服汗出為度其病立愈

醫聖綱目卷五 六

救苦神白散治男子婦人偏正頭痛骨兩太陽穴痛及熱上攻頭目赤赤不巳項筋拘急耳作蟬鳴

川芎 甘草各錢 甘松去土 赤芍藥

白芷 兩頭尖 川烏頭去皮臍

右為細末每服二錢溫茶調下服藥後飲熟水半盞

治一切頭疼黑龍丸

天南星洗 川烏各半斤黑豈 石膏半兩

麻黃 薄荷各四 葉本 白芷各二

京墨兩

右為細末煉蜜杵丸彈子大每服一丸薄荷茶湯調下治傷寒頭疼太陽頭疼及一切頭疼

川烏炮 草烏各半 麻黃 川芎

防風 羌活各半 地龍去土 全蠟一箇



雄黃三錢

右為細末每服半錢食後茶清調下

麻黃吳茱萸湯治頭痛胸中痛食減少咽噎不利寒

脈左寸弦急

麻黃半錢

吳茱萸二分

黃芩二分

川烏一分

羌活五分

細辛少許

蔓荊子一分

藜蘆

柴胡

黃芪各二分

蒼朮錢一

黃連二分

半夏一分

黃柏

升麻各二分

紅花少許

當歸二分

右咬咀作一服水二大盞煎至一盞去查稍熱服食後

東陽陳允露筋骨體稍長患體虛而勞頭痛甚至有訣

別之言予察其脈弦大而帶數以人參為君川芎陳皮為

佐至五六日未減衆皆訝之以藥之不對也予曰藥力有

次第更少俟一二宿當自安忽其季來問曰何不少加黃

芪予不答又經一宿忽自言病頓愈予脈之覺指下稍盛

又半日病者言胃上滿不覺飢視其腹紋已隱矣予曰藥

中莫加黃芪否曰然止與三貼遂連與二陳湯加厚朴枳

殼黃連以瀉其衛三貼而安

血虛頭痛自魚尾上攻頭痛必用川芎當歸湯

尾

六一奇效治血虛頭痛神妙

半兩為末每服二錢臘茶調下其効曾有產後頭痛者一

服即愈

治頭痛欲裂當歸一兩酒一升煮取六合飲至醉効

氣虛頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也

氣虛

治頭痛

治頭痛

治頭痛

治頭痛

治頭痛

氣虛頭痛治驗 參詳相仲實年六十一歲二月間患

頭痛不可忍晝夜不得眠邀往視之其人云近在燕京思

頭昏悶微痛醫作傷寒解之汗出後痛轉加後汗解病轉

加而頭愈痛遂歸每召醫用藥雷同到今痛甚不得安臥

惡風寒而不喜飲食診其脈弦細而微氣短而促懶言語

內經曰春氣者病在頭今年高氣弱清氣不能上升頭面

故昏悶此病本無表邪因發汗數四清陽之氣愈虧損不

能上榮亦不能外固所以頭苦痛而惡風寒不喜飲食氣

短弱宜升陽補氣頭痛自愈名之曰順氣和中湯

黃芪半錢 人參錢一 白朮五分 陳皮分三

當歸五分 芍藥五分 甘草分二 升麻分三

蔓荊子分二 柴胡分三 川芎分二 細辛分二

內經曰陽氣者衛外而為固也今年高氣弱又加發汗

衛外之氣愈損故黃芪甘溫補衛實表為君人參甘溫

當歸辛溫補氣補血芍藥味酸收衛氣為臣白朮陳皮

炙甘草苦甘溫養衛氣生發陽氣上實皮毛腠理為佐

柴胡升麻苦辛引少陽陽明之氣上升通百脈灌漑周

身者也川芎蔓荊子細辛辛溫體輕浮清利空竅為使

右件咬咀作一服水二盞煎至一盞去查溫服食後服

之減半再服而愈

調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛治氣血俱虛頭痛方

治法

治頭痛

治頭痛

治頭痛

治頭痛

治頭痛

治頭痛

治頭痛

治頭痛

治頭痛



頭痛指鼻取涎

蕪橙 川芎 薄荷 白芷

細辛各等分

為末入猪膽內與汁拌勻陰乾再為末用無根水為丸如菘荳大青黛為衣每一丸茶清化灌鼻中口噙銅錢三文其涎來如泉一方有玄胡索葉本青黛無薄荷細辛

治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近尅日取效名透頂散

細辛 瓜蒂 丁香 糯米

腦子 麝香

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻另自治為末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻用瓦甌子盛之謹閉

甌口患人隨左右搐之一大荳許良久出涎一升許則安

東垣云濕熱在頭而頭痛者必以苦吐之若用上項搐鼻藥而涎少者必兼下項吐法治之

治痰厥頭痛以烏梅十箇取肉鹽二錢酒半盞合水煎至七分去渣非時溫服吐即住

頭痛難忍支風痰所致梔子末蜜和濃塗舌上吐即止

頭痛非冷非風此膈有痰也濃煎茶啜一二升探吐之吐而又吐候苦汁出乃止不損人待渴自止妙

茶調散瓜蒂好茶二味等分為末每服二錢薑汁調下空心用之丹霞德病頭痛常居暗室不敢見明其頭熱痛以布圍其巔上置水於其中日易數次熱不能已諸

醫莫識其證求見戴人戴人曰此三陽蓄熱故也乃置炭

火於煖室中出汗涌吐三法併行七日方愈常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一二次發必

頭痛痛則擊數百拳出黃綠涎一二盞方愈此年發益頻目見黑花昏不知人三四日方省諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一效戴人以雙解散發汗以苦劑吐痰病去

八九續以分劑平調自春至秋如此數次方獲全瘥邪在胃而頭痛者必下之其證必兼隔痞或動作則痛甚

或右手脈滑盛者是也治法並見脾胃條東風生於春病在頭命在頸項五臟春氣者病在頭

新沐中風為首風頭面多汗惡風當先風一日則病甚至其風日則少愈大川芎九主之

大川芎九治首風旋暈弦急外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身體拘攣

川芎 天麻 右為末煉蜜丸每兩作十九每服一九細嚼茶酒下食後服

風氣循風府而上則為腦風項背怯寒腦戶極冷神聖散

神聖散治腦風邪氣留飲不散項背怯寒頭痛不可忍者

麻黃 細辛 乾葛 右為末每服二錢荊芥薄荷酒調下茶亦得并治血

風證又方治腦風邪氣留飲頭疼不可忍者用遠志末不以多

少於鼻中搐於痛處揉之相兼前藥可用也



風虛則  
痛重而  
散之

頭疼連眼痛此風痰上攻須用白芷開之

雨前茶 川芎 白芷 防風

台烏 細辛 當歸 為末湯調服

偏正頭風川芎細辛防風白芷烏頭尖全蝎稍南星薑  
製麝香少許為末每一字溫酒調服

頭風方

羌活 細辛 川芎 乾葛

甘草 防風 半夏

右除川芎細辛二味外研為末用酒和炒晒乾入川細  
二味末和勻每服一錢茶清調下

又方

荆芥 草烏尖 防風 甘草

台芎 蔓荊子 桔梗 麻黃

八寶墨細目卷五 士

右為末茶調服

治頭疼面赤煩悶咽乾上膈風痰頭目暈昏百節疼痛  
背項拘急等辛丸

川芎 防風 僵蚕 獨活

桔梗 麻黃 細辛 白附子

羌活 甘草 薄荷 荊芥

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一粒茶酒吞下食後  
微清膏

川芎 蔓荊子 細辛 薄荷

薄荷 生甘草 炙甘草

右為細末食後茶清調下一錢或半錢

治頭目風荆芥穗細辛川芎等分為末飯後湯點二錢  
凡治頭痛皆用等並羌防辛等溫氣藥升散者由風木

風濕痰  
亂方見

虛不能升散而土寡于長得以壅塞而痛故用此助肝  
木散其壅塞也若風盛疎散太過而痛服辛散藥反甚  
者則宜用酸澀收而降之乃愈後乳香蓬落散是也  
乳香蓬落散治男子婦人偏正頭疼不可忍大有神効

御米殼 柴胡 甘草 桔梗

柴胡 去苗各

右為細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長四指同煎  
七分去查食後溫服

半夏白朮天麻湯治太陰痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩

東垣先生壯歲病頭痛每發時兩頰青黃眩暈目不欲開  
懶於言語身沉體重元元欲吐數日方過潔古老人曰此  
厥陰太陰合而為病名曰風痰宜以局方王壺丸治之少

風濕藥二味可加雄黃白朮以治風濕更有水煮金花丸  
更從俠溪二穴各二七壯不旬日愈是知方者體也法者  
用也徒知體而不知用者弊體用不失可謂上工信矣哉

徐舍人因作勞頭與目腫痛足冷身熱脈大而不甚數  
作勞瘵治之

半夏 川芎 黃芩 白朮

陳皮 木通 甘草

分二貼煎薑一片下保和丸二十九

夜苓半夏湯治風熱痰逆嘔吐或眩運頭痛

半夏 陳皮 黃芩

甘草 右用水二鍾生薑三片煎一盞分三服作一日溫服無



時

又治濕痰頭痛

黃芩酒炒 蒼朮酒炒 川芎 甘草一錢

為末搗生薑一片和勻茶清調服

賈孺人脈沉有痰頭痛

川芎一錢 澤瀉酒炒 白朮半錢

煎下茯苓九三十粒見痰飲門

治偏正頭疼併夾腦風連兩太陽頭痛以白僵蚕細研為末用蔥茶調服方寸匕

右濕痰頭痛用半夏南星及酒木酒茶燥其痰也風痰頭痛用風藥除者並見風頭痛條

鼻氣腫

陽明所謂客孫脈則頭痛鼻鼾腹腫者陽明并於上

大醫學綱目卷五

主

者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼾腹腫也

館職學士張居易嗜酒散誕不為名利拘束忽發熱頭

疼俾翰林醫官治之十日愈甚諸學士共議召孫孫至脈

之曰餘人皆曰傷寒故作此疾也張學士好酒多痰食所

傷也今疾非傷寒而右手脈其數左手脈平和此必傷酒

食而作頭痛宜喫食藥五七丸俟之半日進退決矣孫遂

用食藥經食久隔漸寬頭痛遂減再進利膈藥遂獲安大

凡陽邪頭疼經十日豈得不變發熱而狂亂故知非傷寒

乃食病之過也

胡孺人因喫冷粉與肉頭痛自汗膈痞小便赤

白朮二錢 陳皮一錢 木通 川芎

薑水煎熟吞下草薹九阿魏丸保和丸各五十粒

脈動作頭重痛熱氣潮者屬胃謂胃有酒食及痰積之類也

頭痛如破酒炒大黃半兩茶煎服

右以酒炒大黃下頭痛蓋病在胃而頭痛者必下之方

愈也如孫兆以利膈藥下張學士傷食頭痛詳見本條

郭茂恂以黑龍丹下其嫂金華君產後汚血頭痛詳見

產後頭痛皆下咽即安是也

心火

心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰東垣清空膏之類

治之全文見治法

腎水

頭痛顛病下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎頭痛全見治法

許學士謂之腎厥頭疼也用玉真丸治之東垣云此寒濕

頭痛氣上而不下也玉真丸方見寒熱條

運氣

運氣頭痛有四

一曰火鬱於上而痛經云少陽司天之政初之氣風勝乃

搖候乃大濕其病氣佛於上頭痛二之氣火反鬱白埃四

起其病熱鬱於上頭痛又云少陽司天火淫所勝民病頭

痛發熱惡寒而瘡治以寒劑為君也

二曰寒氣逐熱氣上行而痛經云歲金不及炎火乃行復

則陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及腦頂發熱又云太

陽之勝熱反上行頭項頂顛腦戶中痛自如脫又云太陽

之復心痛痞滿頭痛治以熱劑為君也

三曰濕邪傷腎勝膀胱而痛經云太陰司天濕淫所勝腰脊

頭項痛時眩又云太陰在泉濕淫所勝病衝頭痛目似脫

項似拔又云太陰之復頭項痛重而掉懸尤甚亦治以熱

劑為君也

四曰陽明復氣兼非位之心病而痛經曰陽明之復欬噦



雜方

煩心病在膈中頭痛治以溫劑也。

白芷散治風頭痛插鼻

石膏二錢 薄荷錢三 芒硝二錢 鬱金

右細末口噙水插鼻若症在太陽加羌活二錢防風一錢紅荳二粒為末搗之。

川芎散插鼻

青黛半錢 蔓荊子 川芎各一錢 鬱金

芒硝各一錢 石膏二錢 細辛根錢一 薄荷葉錢一

紅荳一錢

右為末搗鼻

瘦人搗鼻藥

軟石膏 朴硝半錢 腦子 檀香皮

荊芥 薄荷葉錢一 白芷 細辛各三

入醫學綱目卷五

如聖散治眼目偏痛頭風

麻黃半兩 盆硝二錢 麝香 腦子各少

右件為細末搗之神效

又方

楊梅青 硝石 伏龍肝等

右為末搗鼻立効

瓜蒂神妙散治偏正頭目昏眩及偏正頭痛

煇硝 雄黃 川芎 薄荷葉

道人頭即蒼藜蘆各一錢 天竺黃一錢

右為細末含水鼻中搗一字神驗

右六方搗鼻治頭痛屬熱者也

治八般頭風

草烏尖 細辛等 黃丹少

右為細末葦管插入鼻中立効

治卒頭上痛皂莢末吹鼻嚏則止方

火筒散治頭風應驗方

蚯蚓糞四錢 乳香二錢 麝香少

右為末用紙筒自下燒上吸烟搗鼻內神効

仲頭風摩散方

大附子一枚 食鹽分

右二味為末以方寸七摩疹上令藥力行

治風頭痛每天欲陰風雨先發者用桂心一兩為末以酒調如膏用傳頂上并額角

治頭風餅子

五倍子 全蝎 土狗七

右為末醋糊作如錢大餅子發時再用醋潤透貼太陽

穴上灸熱貼之驗甚仍用帕子縛之吸濃茶睡覺即愈

治時氣頭痛不止用朴硝二兩為末生油調塗於頂上

經患頭風山荳根搗末油調塗之

治熱風頭痛燒杏仁令烟盡去皮尖以亂髮裹之咬於所患處齒下其痛便止

世偏正頭痛風醉頭風以草麻子九粒先用米調成膏塗茶碗底却用火燒草麻仁烟出以茶碗覆薰烟上候烟盡

用少湯衝開服之覺額上痒是効

頭內如虫虻響名天白蟻用茶子細末吹鼻中周氏

厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明大陰厥頭痛頭脈痛心悲善泣視頭動脈反盛者刺盡去血後

調足厥陰厥頭痛如刺者厥頭痛貞刺刺頭重而痛

滿頭上五行行五先取手少陰後取足少陰厥陰頭痛

針灸

針灸

針灸

針灸

針灸



意善忘接之不得取頭面左右動脈後取足太陽 厥頭  
 痛項先痛腰脊為應先取天柱後取足太陽 經云頭日苦  
 兩筋間蓋風府穴也又云足太陽脈是動則頭項痛目如  
 厥項似按所生病者頭顛項痛故應取項取足太陽也  
 厥頭痛頭痛甚耳前後脈湧有熱瀉出其血後取足少  
 陽痛者頭痛故耳前後脈湧熱者取足太陽也 真頭  
 痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治 頭痛不可取于  
 脛者有所擊墮惡血在于內若肉傷痛未已可刺不可  
 遠取也 頭痛不可刺者大痺為惡日作者可令少愈不  
 可已 陽迎頭痛腦滿不得息取之人迎 陽迎即陽逆也  
 是邪血腫滿取之也  
 偏正頭風 絲竹空 透骨針入寸 風池 橫針入寸  
 谷 針入寸 解溪 三里 中腕 針入寸  
 正頭風 百會 一分灸 上星 二分灸 七壯 合谷  
 不愈 神庭 灸七 太陽 在兩額角眉後紫脹  
 再取 神庭 針一分 印堂 針一分 攢竹 針一分 沿皮  
 醉頭風 穴通玄同 印堂 針一分 攢竹 針一分 沿皮  
 里 寬中 灸 風門 針一分  
 頭風面腫項強不得回顧 天牖 五分留七呼不宜補  
 血腫合 諶諶六分留三呼瀉五吸後取天  
 當取下穴 諶諶風池即瀉此古流注之法  
 頭風 後谿 京骨  
 右手足太陽  
 頭痛嘔吐 神庭 針一分 印堂 在兩眉中沿皮透左攢竹  
 竹補三吸  
 風痰頭痛 豐隆 針一分 腎厥頭痛 湧泉 針三分  
 嘗治一老婦人頭痛久歲不已因視其手足有血絡皆  
 紫黑遂用三稜針盡刺出其血如墨汁者數處後視其  
 受病之經灸刺之而得全愈即經所謂大痺為惡及頭

痛久痺不去身視其血絡盡出其血是也  
 腦風頭痛惡見風寒 厥鼻窒喘息不通承靈主之  
 頭痛身熱引兩頰急 腦空主之 頭痛日愈天衝風  
 池主之 亦第三行也 善嚏頭痛身熱頰厥主之 熱  
 病頭痛引目外皆而急煩滿汗不出引頰齒面赤皮疼懸  
 燈主之 熱病偏頭痛引目外皆懸燈主之 醉酒風熱  
 發兩角眩 兩目痛不能飲食煩滿嘔吐率谷主之 此條在  
 風 頸額搭滿引牙齒口喞不閉急痛不能言曲鬢主之  
 在耳前也 頭痛引頸發陰主之 頭風耳後痛煩心  
 及足不收失履口喞僻項搖蕩牙車急完骨主之 諸穴  
 皆在耳  
 白主之 頭目腫子痛不可以視俠項強急不可以顧陽  
 主之 在上諸穴皆 頭痛振寒清冷淵主之 頭痛項背  
 急消灤主之 頭風痛鼻翹眉頭痛善嚏目如欲脫汗  
 出寒熱面赤頰中痛項強不可左右顧目系急懸癢攢竹  
 主之 頭眩痛重目如脫項似拔狂見鬼目上反項直不  
 可顧暴擊足不任身痛欲拆天柱主之 風眩頭痛鼻不  
 利時嚏涕涕自出風門主之 暴病頭痛身熱痛肌肉動  
 耳聾惡風目背爛赤項不可以顧脾振痛泄腸辟束骨主  
 之 風眩頭痛少海主之 厥頭痛面浮腫煩心狂見鬼  
 喜笑不休發於外有所大喜喉痺不能言豐隆主之 陽  
 厥妻妻而寒少腹堅頭痛脛股腹痛消中小便不利善嘔  
 三里主之 厥頭痛面腫起商丘主之 厥頭痛孔最主  
 之 頭重頂痛目不明風到腦中寒重衣不熱汗出頭中  
 惡風刺腦戶主之 頭重目瞑厥寒熱項強難以顧汗不  
 出陶道主之 頭痛如破身熱如火汗不出瘧瘵裏急腰



診

股相引痛命門主之

寸口之脈中手短者曰頭痛平人氣推而下之而下而不上頭項痛

脈診頭痛目痛久視無所見者死久視不見見諸脈病難卒視上而病若頭痛目痛脈急短澀死其義未詳

血虛

一奇散治產後頭疼用當歸川芎為細末每服二錢水

寒熱

產婦年三十餘身熱頭痛肚痛

陳皮 白朮 白芍各二錢 黃芩二錢

川芎一錢 乾薑 牡丹皮 甘草各一錢

荆芥半錢 分四貼煎服

八醫學綱目卷五

治產後頭痛血虛痰癱寒厥皆令頭痛加減四物湯

蒼朮一兩 羌活 川芎 防風

香附炒 白芷各一兩 石膏二兩 細辛乙兩

當歸 甘草各五錢

右鹿末每一兩水煎服無時如有汗者知氣弱頭痛也

方中加芍藥三兩桂一兩半生薑煎如痰癱頭痛加

半夏三兩茯苓一兩生薑煎如熱痰頭痛加白芷三

兩石膏三兩知母一兩如寒厥頭痛加天麻三兩附

子一兩半生薑三片煎服

敗血

大芎附散治產後敗血作梗頭痛諸藥不效

右大附子一枚醃醋一碗用火四畔灸透醋令盡去

皮臍加川芎一兩並為細末每服一錢茶清下

郭茂恂嫂金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛

作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無瞬息間辨頭

痛甚欲取大石壓良久漸定心痛作則以十指抓壁血流

滿掌痛定日復痛又以兩手自刺取之如是十日不已眾

醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服下瞑且寢如平

昔至平且下一行約三升許如蝗虫子三疾減半已刻又

行如前則頓愈矣後血不下餘

偏頭風 有痰者多

左屬風 荆芥 薄荷 左屬血虛 川芎 當歸

右屬痰 蒼朮 半夏 右屬熱 黃芩

川芎散治偏頭痛神效 甘菊 石膏 川芎 白僵蚕 生各

右為極細末每服三錢茶清調下

治頭痛連睛痛 石膏 鼠粘子炒 右為末茶清食前調下

細辛散治偏頭風 細辛二錢 川芎七錢 柴胡二錢 黃芩一錢

生黃芩五分 瓦粉二分 甘草一錢 黃連七分

右咬咀每服三錢水煎食後溫服之

經治偏頭痛絕妙葶藶為末一兩於食前用清粥飲調半

錢服

治風寒客於頭中無時疼痛牽引兩目遂至失明宜白

附散 白附子一兩 麻黃不去 川烏 南星各半



全蝎五 乾薑 硃砂 麝香各一分  
右為細末酒調一字服畧睡少時效一族人患頭痛不可忍一服瘳

治偏頭風

猪牙皂角去皮 香白芷 白附子各等分

右為末每服一錢臘茶調下右疼右邊臥左疼左邊臥皆疼仰臥食後服

偏頭風單按猪膽搗鼻中

治偏頭風用好蘿蔔自然汁一蠅殼許令患人仰臥左疼注左右疼注右或兩邊皆疼皆注之雖十年患者亦效

王荆公患十二年用之立效後醫數人皆愈此禁中秘方

針灸

雷頭風

雷頭風

頭痛而起核塊者是也

凡雷頭懶于俗呼之謬名也可用茶調散吐之次用神芩丸下之然後服烏荊丸及愈風餅子之類衰者可用

涼膈散消風散熱

茶調散方見上下部仰下之

大黃 黃芩各二兩 牽牛 滑石各四兩

右為細末滴水為丸如小豈大溫水下十五丸每服加十九以和為度日三服

愈風餅子

川烏炮半兩 川芎 甘菊 白芷

防風 細辛 天麻 羌活

荆芥 薄荷 甘草各一兩

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細嚼

茶酒送下不計時候

涼膈散方見前

夫治雷頭風者諸藥不效為與證不相對也蓋雷頭風者震封主之震仰孟故予製藥內加荷葉者象震之形其色又青乃通類象形當煎局方中升麻湯主之

升麻湯治頭面疔瘡增寒拘急發熱狀如傷寒

升麻 茶木 荷葉

右為細末每服五錢水一盞煎七分溫服食前後或燒

全荷葉一箇研細調藥服之妙

雷頭風者是頭上有赤腫結核或如酸棗狀可用排

針出血則愈矣

雷頭風 上顙 百會 風池

大頭痛

頭痛如腫大如斗是也大率多是天行時疫病

泰和年東垣以監納濟源稅時長夏多疫癘初覺憎寒體重大傳面目腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥

俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多不救張縣丞亦得此證至五六日醫以承氣湯加藍根下之稍緩翌日其

病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可以請治遂命診視具說其由曰夫身半已上天之

氣也身半已下地之氣也此雖邪熱客於心肺之間上攻

頭而為腫盛以承氣下之瀉胃中之實熱是誅罰無過殊

不知道其病所為故遂處方用黃連黃芩味苦寒瀉心肺

間熱以為君橘紅玄參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以為

臣連翹鼠粘子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬兜鈴白

僵蚕味苦平散腫消毒定喘以為佐新升麻柴胡苦平行

上熱



少陽陽明二經不得伸桔梗味辛溫為舟楫不令下行共為細末用湯調時時服之拌蜜為丸喻化之服盡良愈因歎曰往者不可追來者尤可及凡他所有是病者皆事另以貼之全治甚眾

普濟消毒飲子

黃芩

黃連各半

人參三錢

橘紅

玄參

甘草生各

連翹

鼠粘子

板藍根

馬尾勃各一錢

白僵蚕炒七分

柴胡

桔梗各二錢

右為細末服如前法或加防風薄荷川芎當歸身咬咀

如麻草大每服五錢水煎去香熱服之食後時時服之

如大便硬加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫熱甚者

宜砭刺之

木醫學綱目卷五

重

大頭病者雖在身半以上熱伏于經以感天地四時非節瘟疫之氣所着以成此疾至於潰烈膿出而又染他人所以謂之疫癘也大抵足陽明邪熱太甚實資少陽相火為之熾多在少陽或在陽明甚則逆傳視其腫勢在何部分隨其經而取之濕熱為腫木盛為痛此邪發於首多在兩耳前後所先見出者為主為根治之宜早藥不宜遲恐過其病所謂上熱未除中寒已作有傷人命矣此疾是自外而之內者是為血病况頭部分受邪見於無形之處至高之分當先緩而後急先緩者謂邪氣在上着無形之部分既着無形所傳無定若用重劑大瀉之則其邪不去反過其病矣雖用緩藥若又急服之或食前或頓服咸失緩體則藥不能除病矣當徐徐清無形之邪或藥性味形體擬象服餌皆須不離緩體及寒藥或酒炒浸之類皆是也

後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入於中是到陰部未於有形質之所若不速去反損陰也此却為客邪當急去

之是治客以急也且治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下各為本家病也若急治之不惟不能解其紛而反致其亂

矣此所以治主當緩也治客當急者謂陽分受陽邪陰分受陰邪主也陰分受陽邪陽分受陰邪客也凡所謂客者

當急去之此治急以客也假令少陽陽明之為病少陽

者諸邪出於耳前後也陽明者首面大腫也先以黃芩黃

連甘草通炒過剉煎少少不住服呷之或服畢再用大黃

或酒浸或煨又以鼠粘子新瓦上炒香咬咀煎去查肉芒

硝各等分亦細細呷之當食後用徐得微利及邪氣已只

服前藥如不已再服後藥依前次第用之取大便利邪已

即止如陽明渴者加石膏少陽渴者加瓜蒌根湯陽明行

經加升麻葛根芍藥之類太陽行經加羌活防風荆芥之

類選而加之並與上藥均合不可獨用散也

黑白散治大頭病如神

烏黑蛇酒浸

白花蛇去頭尾酒浸

雄黃二錢

右為極細末每服一二錢白湯調無時

疫毒頭腫者其枯湯加鼠粘子大黃芒硝

大頭天行病

羌活

酒茶

酒蒸大黃

巨陽之厥則腫首頭重全文

大頭風川井底泥調大黃芒硝塗之此方在表者宜之在裏者宜之

運氣大頭病皆屬火蓋經所謂上腫者即其屬也經云少

陽司天之政風熱暴布大陰橫流寒乃時至民病上怫腫

運氣

風

運氣

運氣

運氣

運氣



色變又云少陰司天之收熱病生於上清病生於下民病  
隘乾腫上終之氣燥令行餘火內格腫於上咳嗽其治方  
東垣普濟消毒飲子得之矣

眉痛

眉痛屬風熱與痰作風痰治類頭風用白芷酒黃芩末  
酒調下

又方

川烏 草烏二味為君 細辛  
羌活 黃芩 甘草各等分

選奇湯眉骨痛不可忍

防風 羌活各三錢 酒黃芩一錢冬不用如能  
比草三錢夏用 食熱滿者加之

右咬咀每服三錢水煎稍熱服食後時時

針灸

眉間痛 橫竹 頭維一分沿皮斜向下透  
眉稜骨痛 橫竹 合谷 神庭

頭重

濕氣

紅豆散治頭重如山此濕氣在頭也  
麻黃根 沙半 苦丁香 紅葦 羌活

右五味為細末鼻內搐之

又方

針灸

督脈之別名曰長強挾脊上項散頭上下當肩胛左右別  
走太陽虛則頭重高搖之挾脊之有過者取之所別也  
見針灸心長強穴在脊際即尾骨端也

頭重如石 印堂一分沿皮透橫竹先

頭風屑

羅肝經風盛木自搖動尚書云滿招損老子云物壯則老  
故木交脾土金來克之是子來為母復仇也使梳頭有屑  
皮見肺之證也謂肺主皮毛大便實瀉青丸主之虛則消  
風散主之 瀉青丸方見

消風散治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩痛肌肉  
蠕動目眩旋運耳簾蟬鳴眼澁好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻  
燥痒癩疹又治婦人血風頭皮腫痒眉骨痠旋欲倒痰逆  
惡心

羌活 人參 茯苓 白僵蚕 藜香 荆芥 甘草

蟬殼 陳皮 防風

木醫學綱目卷五

右為細末每服二錢茶清調下如久病偏頭風每日三  
服便覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛身重寒熱倦  
倦用荊芥茶清調下半盞不拘服之小兒虛風目澁昏  
倦及急慢驚風用乳香荊芥湯調下亦得

雜方

頭痺風屑發黃用酒炒大黃茶調服  
萬病紫苑丸治頭多白屑每服三九至五七九薑湯下

治風屑極燥痒無時此乃氣虛風邪侵於皮表而生用  
藜蘆不拘多少為末先洗頭須避風候未至十分乾時用  
末糝之須用入髮至皮方得緊縛之兩日夜次日即不燥  
痒如尚有些少可再用一次立效

禹錫按陳藏器云鹽麩子主頭風白屑俗名麩鹽其  
患頭上白屑極多山荳根油浸塗以孩兒乳汁調塗効



本又方

白芷 零零香各半  
右為末如前法用之候三五日筵去傳三二次終始不生

多臥 不得臥

陰陽

黃帝曰病而不得眠者何氣使然岐伯曰衛氣不得入於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰則陰氣虛故目不瞑矣又曰病目不得視者何氣使然岐伯曰衛氣留於陰不得行於陽留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰蹻滿不得入於陽則陽氣虛故目閉也  
足太陽有通項入于腦者正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交于目銳眦以蹻脈考之皆陽氣盛則瞑目陰

醫學綱目卷五

走

陰盛則瞑目論 帝問曰夫邪氣之客入也或令人目不瞑不臥出者何氣使然伯高曰衛氣者晝日行於陽夜

行於陰常從足少陰之分間行於五臟六腑今厥氣客於五臟六腑則衛氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻滿陰蹻不得入於陰陰氣虛故目不瞑黃帝曰治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通其臥立至黃帝曰善此所謂決瀆壅塞經絡大通陰陽和得者也愿聞其方伯高曰其湯方以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭為一升半去其查飲汁一小杯日三稍益以知為度故其病新發者覆杯則臥汗出則已矣久者三飲而已也邪客篇○按本草秫米即所謂糯米是也 黃帝曰人之

多臥者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕而分肉不解焉腸胃大則衛氣留久皮膚濕則分肉不解其行遲夫衛氣者晝常行於陽夜行於陰故陽氣盡則寐陰氣盡則寤故腸胃大則衛氣行留久皮膚濕分肉不解則行遲留於陰也久其氣不清則目瞑故多臥矣其腸胃小皮膚滑以緩分肉解則衛氣之留於陽也久故少瞑焉黃帝曰其非常經也卒然多臥者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦上焦閉而不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒然多臥焉

虛勞 虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之  
酸棗仁二兩 甘草一兩 知母 茯苓  
芳菊各二兩 一兩  
右以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫三服

治勝虛不得眠四肢無力驚甲丸  
驚甲 酸棗仁 羌活 牛膝  
黃芪 人參 五味子各等

右為細末煉蜜杵為丸如桐子大每服三四十九溫酒送下

治骨蒸勞煩心不得眠用酸棗仁一兩水一大盞半研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更煮過不計時服之



帝曰人有臥而有所不安者何也岐伯曰藏有所傷及精有所寄之則安故人不能懸其病也精有所寄之則安則臥不安是也

胡洽治振悸不得眠人參白朮茯苓甘草生薑酸棗仁六物煮服

肝虛 其珠母丸治肝經因虛內受風邪臥則寬散而不收狀若驚悸

珠母三分研 熟地各一兩 人參

酸棗仁 栝子仁 犀角 茯苓各一兩

沉香 龍齒各半

右為細末煉蜜為丸如桐子大辰砂為衣每服四五十丸金銀薄苛湯下日午後臥服

獨活湯

獨活 羌活 人參 前胡

細辛 半夏 五味子 沙參

白茯苓 酸棗仁 甘草各一兩

右為粗末每服四大錢水一盞半薑三片烏梅半箇同煎至七分去渣不拘時候

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每臥則鬼飛揚覺身在牀而神離體驚悸多驚通夕無寐更醫不效予為診視詢之曰醫作何病治董曰象皆以為心病予曰以脈言之肝經受邪非心病也肝氣因虛邪氣襲之肝藏冤者也遊魂為變平人肝不受邪臥則冤歸於肝神靜而得寐今肝有邪冤不得歸是以臥則冤飛揚若離體也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此未之聞雖未服藥已覺沉痾去體矣願求治之予曰公且持此說與眾醫議所

治之方而徐質之閱旬日復至云醫編議古今方無與病相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除此方用真珠母為君龍齒佐之其珠母入肝經為第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以為鎮心藥殊不知龍齒安冤虎睛定魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏冤西方白虎金也屬肺而藏冤龍能變化故冤遊而不定虎能專靜故冤止而有守予謂治鬼不寧者宜以虎睛治冤飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失在夫人達之而已

治之方而徐質之閱旬日復至云醫編議古今方無與病相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除此方用真珠母為君龍齒佐之其珠母入肝經為第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以為鎮心藥殊不知龍齒安冤虎睛定魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏冤西方白虎金也屬肺而藏冤龍能變化故冤遊而不定虎能專靜故冤止而有守予謂治鬼不寧者宜以虎睛治冤飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失在夫人達之而已

羌活勝濕湯加柴胡治臥而多驚邪在少陽厥陰也方內經半夏湯治不得臥乃去飲之劑也方見前

溫膽湯治大病後虛煩不得眠兼治驚悸方見前

丹煩不得眠六乙散加牛黃服之即愈

和一家婦人傷思慮過甚二年不得寐無藥可療其夫求戴人治之戴人曰兩手脈俱緩此脾受邪也脾主思故也乃與其夫議以怒激之多取其財飲酒數日不處一法而去其婦大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寤自是食進其脈得平此因勝虛不能制脾之思慮而不

陽明者胃脈也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥也下經曰胃不和則臥不安此之謂也

喘不得臥 以喘法治之

厥不得臥 以腳氣法求之

帝曰人之不能偃臥者何也岐伯曰肺者藏之蓋也肺氣盛則肺大肺大則不能偃臥

膽寒不得臥 竅陰一分補

針灸

針灸



**得臥浮邪主之**  
驚不得眠善斷水氣上下五臟遊氣也陰交主之

多臥

**濕熱**  
陳州長史一小兒病寐而不寤三日諸醫作睡驚治之或欲以艾火灸之或以大驚丸及水銀餅子治之其父曰此子平日無疾何驟有驚乎以子之病問戴人戴人診其兩手脈皆平和戴人曰若驚風之脈當洪大而強今則平和非驚風也戴人竊問其乳母爾三日前曾飲酒醉否遽然笑曰夫人以艾酒見餉酒味甚美三飲一罍而睡夫陳酒味甚而慈臘酒氣滿乳兒亦醉也乃剉甘草乾葛花縮砂仁貫衆煎汁啜之立醒

**運氣**  
運氣多睡皆屬內熱經云陽明司天之政初之氣陰始凝氣始肅病中熱善眠是也

**針灸**  
怪穴困睡多 無名指第二節尖 灸一壯 喉痺 喉中

**喉**  
喉 喉痺 咽喉痛 乳蛾 喉中  
介介如梗 諸物梗咽 項頸強痛

**法**  
經云一陰一陽結謂之喉痺又云肝者中之將也取決於膽咽為之使故以喉咽入肝膽部

**喉主天氣咽主地氣**  
太陽陽明 地氣通於咽 全文見五  
下接連胸中肺葉之間即咽也

**音聲之戶也懸壅者音聲之關也**  
全文見喉

**子**  
咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉以納氣故喉氣通於天咽以納食故咽氣通於地會厭管平其上以司開闔掩其喉則其食下不掩之其喉錯必舌抵上齶則會厭能閉其喉矣四者交相為用闕一則飲食

抵上齶則會厭能閉其喉矣四者交相為用闕一則飲食

癆而死者

喉痺

**喉痺**  
凡經云喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而天氣閉塞也云咽痛云噎痛者謂咽喉不能納唾與食而地氣閉塞也云喉痺咽噎痛者謂咽喉俱病天地之氣並閉塞也蓋病喉痺者必兼咽噎痛病咽噎痛者不能兼喉痺也今以喉咽俱病諸方並入喉痺門中

**喉痺惡寒及寸脈小弱於關尺者皆為表證宜甘桔湯半枝甘草湯詳寒熱發散之若水漿不得入口者用解毒雄黃九四五粒以極酸醋磨化灌入口內吐出濃痰却服之間以生薑自然汁一蚬殼噙下之神效**

**按喉痺惡寒者皆是寒折熱寒閉於外熱鬱於內薑汁散其外寒則內熱得伸而愈矣切忌膽礬酸寒等劑點**

入醫學綱目卷五

三五

**喉反使其陽鬱結不伸又忌硝黃等寒劑下之反使其陽下陷入裏則禍不旋踵矣韓祗和云寸脈弱小於關者宜消陰助陽垣云兩寸脈不足乃陽氣不足故用表藥提其氣升以助陽也或三部俱小弱亦可用其法也喉痺鄉村病皆相似者屬天行運氣之邪治必先表散之亦大忌酸藥點之寒藥下之鬱其邪於內不得出也其病有二**

**其一屬火經云少陽所至為喉痺又云少陽司天之政三**

**之氣炎暑至民病喉痺治宜仲景桔梗湯或面赤斑者屬陽毒宜陽毒諸方汗之**

**其二屬濕經云太陰之勝火氣內鬱喉痺又云太陰在泉濕淫所勝病益腫喉痺治宜活人半夏桂枝甘草湯或面**

**青黑者屬陰毒宜陰毒諸方汗之**



**桔梗湯**治傷寒客熱咽痛方見傷寒咽痛○海養治咽痛并桔梗湯加鼠粘子竹茹妙  
**無**荆芥湯治咽喉腫痛語聲不出喉之痛甚

荆芥兩半 桔梗兩 甘草兩  
右剉散每服四錢水一盞薑三片煎六分去渣溫服

**活**半夏桂枝甘草湯治暴寒中人咽痛方見傷寒咽痛  
**無**治卒喉痺不得語小續命湯加杏仁七箇煎甚妙續命湯方

**和**五香散治喉咽腫痛毒氣結塞不通  
麝香另研三錢 沉香 雞舌香 藿香各一

右為末入麝香研勻每二錢水一盞煎服不拘時

**本**治中風急喉痺欲死者白僵蚕搗篩為末生薑自然汁調下喉立愈丹溪云僵蚕係火而有土與木者得金氣而僵治喉痺者取其火中清化之氣以從治相

**陳**附子去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入內含之勿咽其汁主喉痺

**和**如聖勝金錠治咽喉急閉腮頰腫痛并單蛾結喉重舌木舌

硫黃細研兩半 川芎兩 鵬茶 薄荷去根梗各半兩  
貫衆兩 硝石研四兩 荆芥兩

右為末生蔥汁搜和為錠每服先用新汲水灌嗽次嚼生薄荷五七葉却用藥一錠同嚼極爛并水嚥下甚者連進三服并以一錠安患處其病隨藥便消

**羅**征南帥不勝吉亥病咽痛下利方見表熱裏寒門

洪武戊辰春鄉村病喉痺者甚眾蓋前年終之氣及當年年初之氣二火之邪也予累用此桔湯加黃連半夏薑

蚕鼠粘子根等劑發之挾虛者加參或歸葉水漿不入者先用解毒雄黃丸醋磨化之灌喉痰出更用生薑汁灌之却用上項藥無不神驗若用膽礬等酸寒點過者皆不治蓋邪鬱不出故也

**雄黃** 鬱金各一 巴豆去皮油  
右為細末醋糊為丸薑豈大茶清下七丸吐出頑痰立甦未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下幹口開灌之下咽無有不治如小兒驚熱痰涎壅塞或二九三九量小大加減灌之法用雄黃丸三粒醋磨化

**大**治纏喉風雄黃一塊新汲水磨急灌吐痰

**中**纏喉風屬熱痰宜用鷲翎蘸桐油探吐之又法用射干逆流水吐之

**世**遠志去心為末每半錢水小半盞調服口含竹管吐痰涎極捷治喉痺如神

烏犀角膏治咽喉腫痛及一切結喉爛喉道尸纏喉痺喉急喉飛絲入喉重舌木舌等證

皂莢兩條子揀碎用水三升浸一時久按汁去渣入瓦器內熬成膏 好酒合  
鵝砂 白霜梅各少許並研入膏中 人參為末

右拌和前藥用鷲毛點少許於喉中以出盡頑涎為度却嚼甘草二寸嚥汁吞津若木舌先以麝布蘸水揩舌冷次用生薑片擦之然後用藥

**中**纏喉風皂角搽水灌下得吐愈

**治**纏喉風喉痺飲食不通欲死者用反寬草根並淨洗內入喉中取寒痰出即瘥神驗更以馬牙硝津蘸之即



絕根反莖草一名紫苑

治咽痛用土烏藥即矮樟根以醋兩盞煎一盞先噴後嘔吐出痰涎為愈

治纏喉風束氣不通用蛇蛻灸黃芩等分為末溫酒調下一錢七得吐愈

備急如聖散治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃細研 藜蘆生用 白礬飛 猪牙皂角去皮

右等分為細末每用一荳大鼻內搗之立效

一字散治喉閉氣塞不通飲食不下

雄黃另研 蝎梢七 白礬生 藜蘆各一 猪牙皂角七

右為末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎為愈

治喉咽痛牙關緊急用巴豆去殼以紙壓出巴豆油在紙上以此紙作捻子點火吹滅以烟薰入鼻中即時口鼻涎流牙關開矣

喉痺不惡寒者及寸脈大滑實於關尺者皆屬下證宜硝石青黛等寒藥降之或白礬等酸劑收之也韓祗和云寸脈大於關尺者宜消陽助陰東垣云兩寸脈實為陰盛陽虛下之則愈故予每用此法治急喉痺如鼓應桴或三部俱實亦可用其法也

玉鑰匙治風熱喉痺及纏喉風

酸硝半兩 鵬砂兩 腦子一 白僵蚕一

右為末以竹管吹半錢入喉中立愈

治喉咽痛用蒲黃甘草青黛等分為末時時噴

荳許神効

喉痺神驗朴硝一兩細細合噉汁立愈

玉屑無憂散治纏喉風咽喉疼痛語聲不出咽物有碍或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癩小兒疔癩或慢吞骨屑哽塞不下

玄參 貫衆 滑石 砂仁

黃連 甘草 茯苓 山荳根

荊芥各半 寒水石煨 鵬砂各三

右為末每服一錢先抄入口以清水嚥下此藥除三尸去八邪辟瘴瘡濁

治喉痺呼吸不通須臾欲絕格石草二兩水升半煎取二盞去查細細呷之立通

治喉痺白瑞香花根寸許研細調灌之妙

辛喉痺取黃栢片含之又黃栢一斤吹咀酒一斗煮二沸去查悉飲便愈

喉痺水穀不下難言汁咽之甚佳

又方李實根一片噉口內佳 治風熱痰喉痺先以干柿湯次以四物湯加黃栢知母養陰則火降矣

治急喉閉遠巡不效者鱖魚膽臘月收陰乾為末每用少許點患處藥至即瘥病深則水調灌之

用李實根研水傅頂上一遭 治喉痺卒不語羊蹄獨根者勿見風日及婦人難大以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傅之

又方

酸硝 枯礬各五 鵬砂一 杜牛膝調傅

右降之之劑



羅開關散治喉風氣息不通

白僵蚕兩分 枯白礬各等分

右為細末每服三錢生薑蜜水調下細細服之

治纏喉風用白礬末半錢烏雞子清一箇二味調勻灌入喉中立刻如神此方活人不計數幸毋忽

喉閉用枯礬末吹納喉中急用燈盞底油腳灌下

治喉痺馬尾勃白礬等分為細末以舊翎吹入喉中吐痰二升愈馬尾勃 治喉閉一握金一握燒灰拌白礬末

妙青色為度用筋三四根壓下舌看喉中端的吹入患處妙此藥一名八角荷一名山荷葉如川苦樣生深山詩云

一葉一枝花深山是我家疏黃怕我死水銀化成砂

神効散荆芥草麻肉等分為末蜜九皂子大綿裹含化治喉痺語聲不出者佳

又方猪牙皂角和霜梅為末噙之

治喉痺咽腫手足不和惡寒者用鴨嘴膽礬末以筋蘸藥點患處藥至即瘥神効

右收之之劑

治喉痺取蟾蜍唾汁點在喉中下咽即開

治喉痺寒不通取紅藍花搗絞取汁一小升服之以瘥為度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗咽喉寒服之皆瘥

又方用茜草一兩煎服降血中之火

治咽腫杜牛膝搗自然汁和醋服之本草云杜牛膝主血結及血燥

馬鞭草本草云馬鞭草味辛涼破血去瘀 治患喉痺連頓吐氣數者

右搗自然汁每服一合許又一法用馬啣鐵煮汁服

亦妙

治喉痺射干切一片含嚙汁外惠秘要云射干解熱味辛涼

押班都知潘元從喉閉急召孫至於夾袋中取藥末半

七吹入喉中少頃潘吐出膿血立愈翌日潘詣孫謝曰火

急之難非明公不能救救人之急非藥不能療贈金一百

兩願末方以濟非常之急孫以其方授之用猪牙皂角白

礬黃連等分細剉新瓦上焙乾為末每用半錢吹入喉中

因曰神方無價安用以利易哉遂不受所贈

急喉痺其聲如無有如痰在喉嚨者此為肺絕之候速宜

參膏救之用薑汁竹瀝放開服如未得參膏或先煎獨參

湯救之服早者十全七八次則十全四五遲則十全一

也

一陰一陽結謂之喉痺陰陽

治喉閉送巡不救方

皂莢去皮弦子生半兩為細末以筋蘸點少許在腫處 出立瘥丹溪以雞毛蘸藥末厚塗項上須臾便破血 毛蘇傳腫處尤妙

又用遠志去心水調傳項上一遭

治喉痺青艾和莖葉一握用醋同杵傳痺處冬月用乾者方 一法用青艾汁灌下



針灸

四世喉氣不通者以冷水徐灌之

內經刺灸喉痺法有二今以經脈所過咽喉取之驗者及他病相干而致喉痺取之者通六經也

其一取手足陽明經云喉痺不能言取足陽明能言取手陽明又云胃足陽明脈從大迎前下人迎附循喉嚨所生病者頸腫喉痺視盛虛熱寒陷下取之又云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其病氣逆則喉痺卒瘕取之所別也又曰大腸手陽明脈所生病者喉痺視盛虛熱寒陷下取之也

其二取手少陽經云三焦手少陽之脈出缺盆上項繫耳後是動則病隘腫喉痺視盛虛熱寒陷下取之又曰邪客手少陽之絡令人喉痺刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一瘡壯者立已老者項已左取右取左是也

其三以經絡所過咽喉者有二經云肝足厥陰之脈循喉嚨之後故喉之後疼者取之累驗也又云腎足少陰之脈上貫肝高循喉嚨實漢卿所謂必准者照海治喉中之閉塞是也

其四他病相干致喉痺者有一經云心欬之狀喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺取心之俞蓋太陵穴是也

文潞公一日喉腫翰林咽喉科治之經三日愈甚上召孫治之孫曰病得相公書判筆一管去筆頭水露筆管點藥入喉便愈孫隨手便刺相公昏仆不省人事左右皆驚愕流汗孫乃笑曰非我不能救相公須更嘔出膿血升餘旬日乃平復如故見上上喜曰孫召良醫甚有手段予嘗治一男子喉痺於大溪穴刺出黑血半盞而愈由是言之喉痺以惡血不散故也凡治此疾暴者必先發散發散不

愈次取痰取痰不愈次去汚血也

治喉痺 豐隆 湧泉 關衝此者以小三棱針或筆尖刺之 血如下立愈

喉痺乳蛾 少商針入一分 照海 太衝

喉痺不通 少商 隱白 少衝 湧泉

喉痺頰腫如升水粒不下 少商出血 手太指背頭筋

喉痺完骨及天應氣舍天昇尺澤合谷商陽陽溪中渚後前三里雲門皆治之 喉痺胸中暴逆先取衛脈

喉痺刺少陰少陰在手腕當小指掌後動脈是也針入三分補之

喉痺咽如梗三間主之 喉痺不能言溫留曲池主之

喉痺氣逆口喎咽喉如扼狀行間主之 喉痺咽腫木漿不下璇璣主之 喉痺食不下鳩尾主之

白色瘡理者肺大肺大則多飲善病喉痺全文 心脈大甚為喉吟全文見治

咽痛必用荊芥 陰虛火炎上者必用玄參

氣虛人參加竹瀝 血虛四物加竹瀝

咽痛有陰氣大虛陽氣飛越痰結在上遂成咽痛脈必浮大重取必瀉去死為近宜補陰陽人參一味濃煎湯細細飲之此証皆非勞嗽日久者有之如用實

咽瘡多虛火游行無制客於咽喉宜用人參蜜炙黃柏煎芥治之



潤喉散治氣鬱夜熱咽乾梗塞用

桔梗二錢 粉草 紫荷車 香附各三

右為細末傳口內

咽喉生瘡損了不用生薑用之辛辣痛又能散不收

咽痛實熱者 黃連 荆芥 薄荷

蜜薑汁調喻

咽中瘡腫草麻子一粒去皮朴硝一錢同研新汲水作一

服連進二三服效丹溪云草麻子係金性善其能通

龍麝聚聖丹治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫頭痛或

成喉痺或結硬不消愈而復發經久不瘳或舌本腫脹滿

口生瘡飲食難咽並宜服之

川芎兩 生地 犀角屑 羚羊角

琥珀五錢 馬牙硝研三 鵬砂兩一 人參

赤茯苓各三 玄麥 桔梗 升麻

鉛白霜研 連翹各五 硃砂水飛 牛黃研二

麝香研三 腦子研三 金箔為衣

右為細末煉蜜為丸每兩作十九用金箔為衣每服一

丸薄荷水化下或細嚼或喻化如無薄荷新水亦可臨

臥用之

祛毒牛黃膏治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬滿口生瘡

涎潮喘急飲食難進咽膈不利

牛黃研三 人參 琥珀 犀角取細

桔梗 生地 鵬砂各半 雄黃一

玄參 升麻各三 蛤粉水飛 寒水石研二

硃砂七錢 鉛白霜 腦子各一 金箔為衣

右為細末煉蜜丸如小彈子大金薄為衣用磁石器內

收貯每服一九濃煎薄荷湯化下或新汲水服亦得日

進二三服喻化亦得

咽喉備急丹

青黛 芒硝 白僵蚕各一 甘草兩

右為細末用膈月內牛膽有黃者盛藥其中蔭四十九

日多時為妙

患喉痛含山荳根一片細咽津極妙

咽痛鵬砂或和膽礬白僵蚕白霜梅和喻 又方百藥

煎去黑皮鵬砂甘草生白礬等分為細末每服一錢食後

米飲調細細咽下

咽喉卒腫食飲不通黃栢搗傳腫上冷復易之用苦酒

和末佳

婦人患咽疼用桔梗一兩生甘草半兩分三貼水二碗

煎取一小盞稍熱飲之先與蚤休末細咽之蚤休末即金

增損如聖湯治風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫

痛並治之

桔梗二 甘草一 枳殼湯浸 防風各半

右件為細末每服三錢水一大盞煎至七分去渣入酥

如米許攪勻食後溫服

治虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡利膈湯

雞蘇葉 荆芥 防風 桔梗

人參 牛旁子隔紙 甘草各一

右為細末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加僵

蚕一兩

桔梗湯治咽腫微覺痛聲低冬季合之



麻黃不去節 桔梗一錢 黃芩三錢 甘草一錢

白僵蚕三錢 馬尾勃一錢 桂枝少許 婦身三錢

右吹咀水二盞煎去查稍熱服食後可徐徐呷之

發聲散治咽痛妨悶咽物則微痛不宜寒涼藥過泄之此妨悶虛熱也

瓜蒌一錢 白僵蚕微炒 桔梗七錢 甘草炒二錢

右為細末每用少許乾糝咽喉中若腫痛左右有紅或

只一壁紅紫長大水米難下用此散一錢朴硝一錢和

勻糝喉中咽津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用前散

一錢七白礬細研半錢乾糝

薑汁調僵蚕末治咽痛神效詳見喉痺

蜜附子治感寒咽閉不能咽大附子一枚生去皮臍切作大片蜜塗炙令黃含熱津甘味盡更以附子片塗蜜

次用之

治咽痛用諸藥不効者此非咽痛乃是鼻中生一條紅

絲如髮懸一黑泡大如櫻珠垂掛到咽門而口中飲食

不入須用深取牛膝根直而獨條者洗淨入好醋三五滴

同研細就鼻孔滴二三點入去則絲斷珠破其病立安

肝者中之將也取決於膽咽為之使奇病

咽痛用倒摘刺根淨洗入好酒醋同研滴在喉中耳若

痒即安 范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿水

飲下方寸七

主咽喉寒鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一箇

開頭取白去黃著米酢煨拌泔火頓沸起擊下沸定須頓

三度就熱飲酢盡不過一二次痰

運氣咽喉噎痛皆屬寒經云太陽在泉寒濕所勝民病噎

痛

痛

痛頰腫是也

內經灸刺咽喉有二

其一取足少陰經云腎足少陰之脈所生病者咽腫上氣

噎乾痛又云噎中腫不能內唾時不能出唾者刺然骨之

前出血立已左刺右右刺左又云邪客足少陰之絡令人

噎痛不可納食無故善怒氣上走贛上林億云贛也

刺足下中央之脈各三痛凡六刺立已左刺右右刺左是

也

其二取手太陽經云小腸手太陽之脈是動則病噎痛頰

腫視虛實寒熱陷下取之也

咽中痛不可納食湧泉主之 咽腫難言天柱主之

喉痛瘡不能言天突主之

乳蛾

入醫學綱目卷五

治咽喉乳蛾方

雄黃各五錢 鬱金各五錢 白礬生用二錢 膽礬五錢

右為細末以竹管吹入喉中立能言語

粉香散吹乳蛾即開

白礬三錢 巴豆三粒去油 輕粉 麝香各少許

右於鐵器上飛白礬沸入巴豆在礬上枯去不用巴豆

為細末三味和合吹喉中

治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩燒灰塩花一兩二味

細研以筋頭點藥在上

羅青散治單雙乳蛾

蒲黃五錢 羅青 盆硝研各三錢 甘草二錢

右為細末每服一錢冷蜜水調細細咽之吞不下雞翎

蘸藥喉內掃之立効



**不**玄參散治懸壅痛不下食

玄參兩 升麻 射干 大黃各半  
甘草

右為細末用水煎至七分放溫時時含咽良驗

有表者散之 乾薑散治懸壅熱卒暴腫大

乾薑 半夏湯洗去

右為細末以少許著舌上噉津

汚血破之 乳蛾用杜牛膝根紅者研調男用女乳汁女用男乳汁納鼻吸之

**丹**治喉中卒生肉綿裹筋頭蘸鹽搯一日六七次易之真

咽中介介如梗狀

雜方 仲婦人咽中如有炙傷半夏厚朴湯主之

半夏兩 厚朴兩 茯苓 生薑各四

蘇葉兩 右五味以水七升煮取四升分溫四服日三夜一

**丹**痰結核在咽此濕痰必用痰藥中醎能軟堅之味

瓜蒌實 青黛 杏仁 海蛤粉

桔梗 連翹 風化硝

右為末薑蜜丸噉化

針灸 內經灸刺咽隘介介如梗狀有二

其一取陽陵泉經云膽病者善太息口苦嘔宿汁噉中介介然數唾取陽陵泉是也

其二取太陵經云心欬之狀喉中介介然如梗狀取心之俞是也

諸物梗喉

此之

**治**諸哽者雜白令半熟以線縛定手執線頭少嚼雜白咽之度雜白至哽處便牽引哽即出矣 又法用綿一小塊以蜜煮用如食雜法

**治**骨哽入喉

確砂 甘草各等

右為末以綿裹少許噉之旋旋咽津久之即出

骨哽以乳香燒烟吸入喉即吐出

**治**諸魚骨哽久不出方以皂角少許吹入鼻中得嚏哽出多秘此方

**治**獺主魚骨哽不可出者取獺足於項下爬之亦可煮汁食之

**治**哽蟻蝨膽一枚吞下亦治刺不出傳之刺即出

古今錄療魚骨橫喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合燒作屑水服之即出未出再服

大醫經綱目卷五

吳

右治骨哽

**子**和一小兒誤吞一錢在喉中不下諸醫皆不能出亦不能下乃命戴人戴人熟思之忽得一策以淨白表紙令卷實如箸以刀縱橫亂割其端作鬚髻之狀又別取一箸縛針鈎於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑探之覺鈎入於錢窠然後以紙卷納之咽中與鈎尖相抵覺鈎尖入紙卷之端不得肌肉提之而出

**醫**誤吞釵取雜白曝令萎黃煮使熟勿切食一大束釵即隨出

**治**誤吞錢釵及鏢用飴糖一片漸漸食之自出外臺秘要

右治錢哽

**世**治骨哽檳榔樹葉油馬尾勃砂糖三味熬膏為丸噉化累

下之



効

治骨哽喉痛用水牛屎上生出草晒乾為末用砂糖為丸徐徐嚥吞下仍用砂糖為衣不然損牙

外治魚骨哽在喉中以少礪砂口咀嚼咽之立下

世治魚骨哽用玉簪花根研細取汁竹管灌喉中不可著齒着則齒酥骨哽用萱草根汁服之傳者云可立視骨

下即云萱草即鹿又方魚骨哽細嚼蘿蔔徐徐咽之愈

治魚骨哽百法不能療者錫糖丸如鷄子黃大吞之立

治諸哽生艾數升水酒各五升煮取四升稍熱服之

世魚骨哽楮子搗自然汁濾去查服或收晒乾為末水和

汁服亦可楮子即谷一方用楮樹皮

橄欖味遊食久則甘嚼汁咽治魚哽

治哽以覆麥為末水調方寸七服

治骨哽白茯苓一味臨時細切為末以所哽骨煎湯調

治雞骨哽用水簾草搗汁飲之骨自消 治骨哽以野

苧根洗淨搗爛如泥每用龍眼大如被雞骨所傷以雞糞

化下如魚骨所傷魚湯化下 治一切骨哽用金鳳花子

嚼爛嚥下無子用根亦好

誤吞稻芒麥芒咽悶者急取鴨口中涎灌之或取鴨頭

草嚼亦妙

魚骨在肚中刺痛煎茱萸汁一盞飲之骨軟而出

治吞錢艾一把水五升煎至一升頓服使下

治吞錢及鐵物在喉者不得下南燭根燒細末湯調一錢

診

誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服

誤吞錢併金銀等物以糊粉一兩搗調之分再服如吞

金銀物在腹中以水銀服之令消烱

凡治哽之法皆以類推如鸕鷀治魚哽磁石治針哽髮

灰治髮哽狸虎治骨硬亦各從其類也

項頸強痛

缺盆之中任脈也名曰天突當缺盆中央 一次任脈

側之動脈足陽明也名曰人迎在喉二旁之 二次脈手

陽明也名曰扶突在喉一側之 三次脈手太陽也

名曰天窗在喉之後 四次脈足少陽也名曰天容

五次脈手少陽也名曰天牖在耳後 六次脈足太陽也名曰天柱在項中 七次脈頸中央

之脈督脈也名曰風府 足陽明挾喉之動脈也其脈在

膺中 手陽明次在其膺外不至曲頰一寸 太陽當曲

頰 足少陽在耳下曲頰之後 手少陽出耳後上加完

骨之上 足太陽挾項大筋之中

內經刺灸項頸痛有二

其一取足手太陽治項後痛經云足太陽之脈是動則病

項如板視虛盛寒熱陷下取之又云項痛不可俛仰刺足

太陽不可以刺刺手太陽又云大風項頸痛刺風府風府

在上椎又云邪客於足太陽之絡令人頭項痛刺足小

指爪甲上與肉交者各一疔立已不已則刺外踝下三疔

左取右右取左如食頃是也

其二取足手陽明治頸前痛經云足陽明之脈所生病者

頸腫又云手陽明之脈是動則病頸腫皆視盛虛寒熱陷

針灸



下取之也

項痛 後難

項強 承漿 風府

甲 頭項痛重暫起僂仆鼻窒翕翕喘息不得通天主之

頂上痛風頭重目如脫不可左右顧百會主之 頸痛

項不得顧目泣出多眦鼻翕翕目內皆赤痛氣厥耳目不

用咽喉引項筋掣不收風池主之 項腫不可俛仰頰

腫引耳完骨主之 項強刺瘡門 頸項痛不可以俛仰

頭痛振寒瘕瘕氣實則脇滿俠脊有并氣熱汗不出腰背

痛大杼主之

東風生於春病在肝喻在頸項全文見

本治筋急項不得轉側木瓜煎

木瓜兩箇取 沒藥研二 乳香研一

右二味內木瓜中用蓋子合下竹簽簽定飯上蒸三四

次研爛成膏子每服三五匙地黃酒化下生地黃汁半

盞無灰酒二盞和之用八分一盞熱燉化服有人患此

證自午後發至黃昏時定予曰此患先必從足起經言

足十二經絡各有筋惟足太陽之筋自足至項大抵筋

者肝之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又曰陽

中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶畢法六

離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發於是

時予授此方三服而愈

男子項強不能回顧動則微痛診其脈弦而數實右手

為其予作痰熱客太陽經治之用二陳湯加酒洗黃芩羌

活紅花服後二日愈

項養神湯治精神短少不得睡項筋腫急難伸禁甘温宜

苦寒

黃芪錢一 人參錢三 甘草錢七 蒼朮錢五

白朮錢三 柴胡錢四 升麻錢四 歸身錢五

麥芽錢五 木香錢一 川芎錢三 半夏錢七

橘皮錢一 黃連錢五 黃芩錢二 黃柏錢一

右吹咀每服五錢水二盞煎去查稍熱服不拘時

本治腎氣上攻項背不能轉移椒附散

大附子炮去皮臍末之

右末每二大錢好川椒二十粒用白麩填滿水一盞半

生薑七片同煎至七分去椒入鹽空心服予一親戚患

項筋痛連背脊不可轉移服諸風藥皆不効予嘗憶予

金髓有腎氣攻背強一證予處此方與之一服頓瘥自

爾與人皆不驗蓋腎氣自腰夾脊上至曹溪穴然後入

泥九宮曹溪一穴非精於搬運者不能透今逆行至此

不得通用椒以引婦經則安矣氣上達椒下達故服之

愈

治風項強不得顧視穿地作坑燒令通赤以水洒之令

冷納生桃葉鋪其席下臥之令項在藥上以衣着項邊令

氣上蒸病人汗出良久即瘥

又方治頭項強不得顧視蒸大苳一升令變色納囊中枕

之

諸瘕項強皆屬於濕全文見診法治法

醫學綱目卷之十五



醫學綱目卷之十六

心小腸部

心痛 卒心痛 胎前心痛 產後心痛

諸般氣痛

丹心痛即胃脘痛凡心痛必用溫藥此是鬱結不行阻氣不運故痛在下者多屬食宜溫利之 大凡心膈痛須分新久若明知身受寒氣口喫寒物而得者於初得之日當與溫散或溫利之

溫散謂治身受寒氣於外者如陳無擇麻黃桂枝湯治外因心痛之類是也

溫利謂治口食寒物於裏者如仲景九痛九潔古煮黃丸治大實心痛之類是也

若曰病得之稍久則成鬱久鬱則蒸熱熱久必生火原病式中備言之矣若欲行溫散溫利寧無助火添病耶由是

本草綱目卷之十六

方中多以山梔為熱藥之向導則邪易伏病易退正氣復而病安矣然病安之後若恣縱口味不改前非病復作時乃委咎於醫悞也 大槩胃口有熱而作痛非山梔不可須薑汁佐之多用台芫開之 用山梔炒去皮每十五枚煎濃湯一呷入薑汁令辣再煎少沸吞九枚加川芎一錢尤妙 又方用山梔去殼炒黃為末以薑汁調粥丸有寒者加草薹薹末丸服之

又方治氣實心痛

山梔 去殼炒 香附 乙 菜莢 一

右為末炊餅九如花椒大以生地黃用酒洗淨同生薑煎湯下廿九外用胡椒草搽各半兩為末以醋調埋成九于吞之

心痛方

黃連 炒

山梔 炒

菜莢 各五

荔枝核 燒存性為末 三錢

滑石

右為末薑汁化炊餅為丸

又方治心痛

白朮

白芍藥

砂仁

半夏

當歸 各三

桃仁

甘草

黃連

神麩 炒

陳皮

吳茱萸 各一

薑茶

人參 錢一

又方二陳湯加川芎蒼朮倍加炒梔痛甚者加炒乾薑此從治反治之法

保寒厥心痛者手足逆而通身冷汗出便利瀉清或大便利而不渴氣微力弱急宜以木附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發暮死宜急救之是知久病非寒暴病非熱也

木附湯治寒厥暴心痛厥微氣弱附湯也

附子 炮去皮白朮 甘草 煎

右為末附子令勻每三錢水一盞半薑五片煮一煎煎至一盞去渣溫服食前

羅胃脘當心而痛治驗 漕運使崔君長男雲卿年二十五體本豐肥奉養膏粱時時有熱證友人勸食寒涼物因服寒藥至元庚辰秋瘧發醫以砒霜等藥治之新汲水下禁食熱物瘧病未除反添吐瀉脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦屢醫未效至冬不瘧延至四月間勞役煩惱過度前證大作請予治之診視脈得弦細而微手足稍冷面色清黃不潔情思不樂惡人煩冗飲食減少微飽則心下痞悶嘔吐酸水每發作冷汗時出氣促悶亂不安須人額相抵而坐少時易之予思內經云

中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則為痿



厥心寬又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得熱則已非其辛大熱之劑則不能愈遂製一方名曰扶陽助胃湯

附子炮去皮 乾薑炮 甘草炙 草薺各一 益智仁

棟參 官桂 白芍藥各一

吳茱萸 陳皮 白木各五

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑天辛熱溫中散寒故以為君草薺益智仁辛甘大熱治客寒犯胃為佐脾不足者以甘補之炙甘草甘溫白木陳皮苦溫補脾養氣水挾木氣亦來侮土故作急痛桂辛熱以退寒水芍藥味酸以瀉木來剋土吳茱萸苦熱泄厥氣上逆於胸中為使右剋如麻荳大都作一服水二盞薑三片棗二枚同煎至一盞去渣溫服食前二服大勢去痛減半至秋先灸中脘三七壯以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣

六醫學綱目卷六

滋榮百脈以還少丹服之喜飲食添肌肉皮膚潤澤明年春灸三里二七壯乃胃之合穴亦助胃氣引氣下行又以芳香助脾服育氣湯加白檀香平治之戒以懲忿窒慾慎言語節飲食一年而平復

困熱厥心痛者身熱足冷痛甚則煩躁而吐額上自汗知為熱也其脈洪大宜灸太谿崑崙表裏俱瀉之是為熱病引熱下行汗通身出者安也灸後與金鈴子散痛止服枳實白朮丸去其餘邪也

金鈴子散治熱厥心痛或作或止久不愈者

金鈴子 玄胡索各一

右為末每服三錢酒調下痛止與枳朮丸

外療峭心痛能膽如大荳許和水服大效本草熱胆

仲心中寒者其人病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹

寒厥

心譬如蠱注其脈浮者自吐乃愈

經云寒氣客於背俞之脈則血脈澁血脈澁則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣此亦寒氣客心背而痛也

心痛徹背背痛徹心烏荳赤石脂丸主之

蜀椒兩 烏頭炮 附子炮 乾薑炮

赤石脂兩

右五味為末蜜丸如桐子大先食服一九日服三不效稍加服

胸痺不得臥心痛徹背者括萎薤白半夏湯主之

括萎實枚 薤白三 白酒一 半夏半

右四味同煮至四升服一升日三服

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭

足上下痛而不可觸近大建中湯主之

蜀椒二合 乾薑兩 人參兩

右三味以水四升煮取二升去渣內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之

心中痞厥逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之

桂枝 生薑各一 枳實五

右三味以水六升煮取三升分溫三服

聖治寒疝心痛四肢逆冷全不飲食用桂心二兩去皮搗

羅為散不計時候熱酒調下一錢匕

世果附湯治寒氣心痛

附子 草果 良薑等

以酒煎服立效



羅二薑丸養脾胃去冷消痰大治心脾疼寬胸下氣進飲食及一切冷物所傷並皆治之

乾薑炮 良薑

右等分爲細末麪糊丸如桐子大每服十五丸至二十丸食後陳皮湯送下婦人不宜服

右方辛甘熱以散寒結

世治心痛累效水梅一箇去核生硫黃爲末相和搗勻以可丸爲度作一丸白湯下立愈病不再作

右方酸熱以收散寒凡服辛劑反甚者改服酸劑立愈也

丹客寒犯胃草薤九主之熱亦宜用止可一二服

草薤薤一錢四分炒裂 吳茱萸湯泡洗

益智仁 傷黍炒 歸身 青皮各六分

神麩 薑黃各四分 生甘草三分

半夏湯泡七錢 澤瀉一錢小 桃仁去油

炙甘草六分 柴胡四分詳下 麥蘖炒半

黃芪 陳皮 人參

右一十八味除桃仁另研如泥外爲極細末同研勻湯浸炊餅爲丸如桐子大每服三十九丸熱白湯送下食遠

旋斟酌多少用之

監縣之問年五十餘春末心脾疼自言腹脹滿手足寒過肘膝須綿裹火烘胸襟畏熱却喜掀露得風涼則快脈皆

沉細而澁稍重則絕經取似弦而短口渴乾而喜飲穀肉全不食遂以草薤九三倍加重連滑石炒神麩爲丸

白朮爲君茯苓爲佐陳皮爲使作湯送下一百丸服至二斤諸証皆愈

虛寒 以物柱按而痛者按虛以二陳湯加炒乾薑和之

按之痛止者爲虛治法並見寒心痛條丹溪云草薤薤丸

治氣餒弱人心痛方見寒熱通用條

仰九痛丸治九種心痛

附子三兩 生狼牙一兩巴豆炒如脂

人參 乾薑 吳茱萸

右六味爲末煉蜜丸如桐子大酒下強人初服三九日

三服弱者二丸兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連

年積冷流注心胸痛併冷腫上氣落馬墜車血疾等證

皆主之忌口如常法

寒實 蒼木兩

右劉每服一兩水二盞煎至半盞溫服

右寒實

熱實 仰按之心下滿痛者此爲實也當下之宜大柴胡湯

子和一將軍病心痛不可忍戴人曰此非心痛乃胃脘當

心痛也內經曰歲木太過民病胃脘當心而痛乃與神祐

丸一百餘粒病不減或曰此胃脘有寒宜溫補不宜與涼

劑將軍素知戴人明了復求藥於戴人戴人復與神祐丸

二百粒作一服大下六七行立愈

右熱實 丹蔣氏子年十六久瘧方愈十日而心脾大痛兩手脈皆



及兩脇予曰此必與穀太早間之果然遂斷其飲食亦與藥蓋宿積已因小胃而稍解其痛又因新穀與餘積相併而復作若又攻擊必大傷胃氣所以不與藥又斷食三日其家大恐以為不收時有怨言予曰六日不能思食強禁不與方成惡候待其索食與之又須較量方可至夜更餘心嘈索食予先用白朮黃連陳皮作九子遂以熱湯下七八十九以除其嘈雜若以為飢而與粥其痛必如前矣其家苦欲與予詢病者隔問莫尚問否答曰我纔飢作必繼之薄悶今雖未甚快然亦未嘗思食過兩時許又索食予以前丸與之如是者又一晝夜飢不再作人亦昏困思睡予教以用稀粥減平日之半兩日禁其雜食調理半月而安小胃丹方見飲食內傳

保心痛用小胃丹津下十五丸

右漸除熱宿食積法

世木香丸治食積心痛

木香 丁香 三稜 蓬朮

青皮 陳皮 檳榔 白芷

巴豆肉 積殼 蘇子

右末醋糊丸麻子太

本治一切積聚有飲心痛礪砂丸

礪砂 三稜 乾薑 香白芷

巴豆 大黃 乾漆 木香

青皮 胡椒 檳榔 肉苳蔻

右為細末醋醋二升煎五七沸後下三稜大黃末同煎

五七沸入礪砂同煎成膏稀稠得所入諸藥和勻杵丸

如菜豈大年深成塊生薑湯下四五丸食積熱水下白

痢乾薑湯下赤痢甘草湯白痢當歸湯蔥酒亦得  
厚朴丸紫苑丸治積聚心痛厚朴丸方見雜考

神心傷者其人勞役即頭面赤而下重心中痛而自煩發熱臍跳其脈弦此為心臟所傷也

丹心痛輕者散之麻黃桂枝重者加石礪用川芎蒼朮炒

山梔作丸服

桂枝 麻黃 石礪

右為末薑汁浸炊餅為丸桐子大熱薑湯下十五丸如

服丸數多又治痰飲

無麻黃桂枝湯治外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘急不

得轉側

麻黃 桂心 芍藥 細辛

乾薑 甘草 半夏 香附

右剉每五錢水盪半生薑五片煎七分去渣食前服大

便秘入大黃量虛實加減

世治心疼其效

檳榔 桂心 葛根 甘草

細辛 半夏 桔梗 枳殼

川芎 防風

右等分惟甘草半之水煎服有人心疼諸藥不效服此

愈

丹青嚴劉山長子年三十六歲得心疼十八年矣因酒飲

牛乳病發時飲食無礙得病八年後盛暑及沐浴飲食時

皆無汗中間更醫不一悉以丁附諸丹等熱藥治之至是

黃瘦食減若不勝衣痛作時須以一物拄之診其脈皆三

至弦弱而濇末風先寒大便或閉或泄最苦是胸膈吞酸



七月內遂以二陳湯加白朮黃連黃芩桃仁郁李仁澤瀉  
每旦用此藥飲而出之所吐皆苦黑水雜以如浸木耳片  
者此日却再與兩貼飲而不出如此兩月近二百餘貼遊  
脈漸退至數漸添忽一日診其脈純弦漸有充滿之狀時  
正立冬後頗暄暖意其必欲作汗又意其血氣未充汗難  
以發以人參黃芪芍藥當歸陳皮半夏甘草調理二日此  
時痛雖緩每晝夜一二作至第三日與麻黃蒼朮當歸川  
芎甘草等藥纒下咽目上視口噤而無神色予呼之不應  
見其四肢不收急以左手抱其頭就坐於床以右手拊指  
捻其人中須臾而愈通體汗如雨自此痛不復作但人倦  
食未增耳續又大為噤酸所苦每晝夜六七作其作時  
有一酸塊自胸膈間直衝上咽喉情狀極惡遂悉羅諸藥  
以黃連濃煎取冷俟酸塊欲上時以冷黃連汁數滴與之

醫學綱目卷六

九

即回如此六七次半日許其塊亦除於是罷藥淡粥調養  
又近三箇月時以立春節旬餘中腕處微有脹急而帶青  
色氣息喘促時天氣尚寒意謂脾土因久病衰弱水氣行  
令此肝凌脾急以索矩三和湯與之至四日而安  
一婦人年四十餘歲因二十年憂患後心痛或可按或不  
可按食甚減口渴而不能飲水形瘦骨立心痛止則頭痛  
作其痛無常處頭痛止則心痛作夜間全不寐大便七八  
日一行堅小而黑而出亦難累與四物加陳皮生甘草前  
後約百餘貼病雖不增却無退減予曰此肺久為火所鬱  
氣不得行由是血亦畜塞遂成汚濁氣壅則頭痛血濁不  
行則心痛通一病也治肺當自愈遂做東垣方清空膏例  
細切酒炒透令赤色為細末以熱白朮湯調下頭上稍汗  
如此十餘貼漸漸汗至通身及膝而止諸病皆愈因其膝

下無汗形瘦病久小便數大便澀兩手皆見澀脈當議補  
血以防後患問其又思水而不飲遂與白朮加陳皮生甘  
草桃仁酒芩以補之遂安

重痛

羅化虫丸

鶴虱

五十

檳榔

二十

胡粉

炒

苦楝根

去厚

右為末麩糊為丸桐子大小兒疾病多有諸虫或因臟  
腑虛弱而動或咽食甘肥而動動即腹中疼痛往來上  
下攻心痛則笑不休合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎  
沫或吐清水四肢羸困面青色黃飲食雖進不生肌肉  
或寒或熱沉沉默默不的知病處一歲兒服五丸溫漿

醫學綱目卷六

十

下入香油一兩點打勻下之米飲亦得其虫自下

保妙香丸治男子婦人心痛強中搐熱如癩狀方見

風癩者羌活湯引下妙香丸羌活湯方 血癩者當歸湯

引下妙香丸 當歸湯方

丹虫痛者面上白斑唇紅能食治用棟根錫灰之類脈堅

實不大便者下之

羅補金散治諸般虫

鶴虱

生

定粉

錫灰

上各

右為末每服三錢空心少油調下又用猪肉一兩燒熟

搽藥在上細嚼亦得用翎毛掃甘遂末一錢與前藥一

處服之其虫自下

本治寸白虫方黑鉛灰炒四錢一服先與猪肉脯少許一

時來却用砂糖濃水半盞調灰五更服虫盡下白粉將息



一日良

又療寸白虫用錫灰、蕪荑、檳榔者極佳。予宣和中每覺心中多嘈雜，意欲作飲，又疑虫漫依此方所說，翌日下長虫二條，一長二尺五寸，頭扁闊，尾尖銳，每寸作一節，斑如錦紋，一條皆寸斷矣。千金謂勞則生熱，熱則生虫，虫曰蛔，脾虫曰寸白，腎虫如方截，絲綫肝虫如爛杏，肺虫如蚕，皆能殺人。惟肺虫為急，肺虫居肺葉內，蝕入肺系，故成瘵疾。咯血聲嘶，藥所不到，治之為難。道藏中載諸虫頭皆向下，行唯自初一至初五以前頭上行，故服藥多取月朧以前，蓋為此也。

取寸白虫方

書粉

密陀僧各等分

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

取寸白虫

錫灰一兩

木鱉

蘆薈二十文

十九愈千金方為末，空心温醋湯下，虫當出。

經宿食冷，多寸白虫，每朝空心熱酒調山荳根末三錢服之，其虫自出。

簡治諸虫在臟腑久不瘥，檳榔半兩炮搗為末，每服一錢，至二錢，煎蜜煎湯調下，空心。

外療蛔虫心痛，惡心吐水，乾漆熬搗蜜丸服十五丸，日再服。

范旺治寸白虫，方狼牙五兩搗末，蜜丸麻子大，隔宿不夜食，明旦以漿水下一合服盡愈。

天治寸白虫，以酸石榴東引根一握，淨洗細剉，用水三升煎取半碗，已下去查，五更初温服盡，至明日取下虫一大團，永絕根本，一日喫粥補之。

本金櫻東行根治寸白虫，剉二兩入大米三十粒，水二升煎五合，空心服，須臾瀉下。

王治寸白虫，菜蕒根洗去土，四兩切以水酒各一升，漬一宿，平旦分再服，凡菜蕒皆用細根，東北陰者良，若稍大如指已上者皆不任用。

食治蛔虫心痛，面青口中沫出，取臨水扁蓄葉一斤細切，以水三斗煮如餲，去查，空心服一升，虫即下，至重者再服，仍通宿不食，來日早明服之，效。

本取寸白虫，苦絲瓜不以多少，研為末，每服二錢，好酒二盞，空心調服。

竹木香三稜散治腹中有虫，面色痿黃，一切積滯。

黑牽牛半生 大腹子多 檳榔 雷丸

錫灰一兩 三稜煨 蓬朮煨 木香

大黃一兩



右為細末每服三錢空心用蜜米調下或砂糖水亦可  
須先將燒肉一片口中半嚼之休噀下吐出口中肉汁  
後服藥

右方有攻性而下重者

本崔元亮海上方治一切心痛無間新久以生地黃一味  
隨人所食多少搗取汁投麪作餅餠或冷淘食良久當利  
出重長一尺許頭似筆管後不復患至元十年通事舍人  
崔抗女患心痛垂氣絕遠作地黃冷淘食之便吐一物可  
方一寸如蝦蟆狀無目足等微似有口蓋為此物所苦自  
此頓愈麪中忌用鹽

吐治蛇虫吐清水氣口刺痛取生艾汁隔宿勿食以肥香  
脯方寸片先喫令虫聞香次即飲一升必下蛇虫胸喉中  
覺有虫上下偏喜聞葱豉油食之香者兩三日不食開口

入醫學綱目卷六

三

而臥將油煎葱豉令香放口邊虫當自出引而去之但隨  
所喜物用之亦可

世治心痛稀苳草搗汁醋和服之效有人服此吐虫二條  
終身不發

子和酒官楊仲仁病心氣痛此人常好飲酒物飲二三杯  
必奔走三五十次其酒稍散方能復席飲至前量醉後至  
明日嘔清黃水數口夜變魚腥臭六七日始安戴人曰宜  
吐乃吐虫一條青黃色長六七寸口目鼻俱全二目膜瞠  
狀如蛇類楊醃乾示人

吐蛇虫為病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止甘草粉  
蜜湯主之

甘草二兩

粉一兩

蜜四兩

右三味以水三升先煮甘草取二升去查內粉蜜攪令

和煎如薄粥溫服一升瘥即止

孫向大王宮中有一宮人七太尉所寵也忽患一疾凡惡  
心則吐虫數條後乃頻作七太尉甚怒之累治不瘥每用  
殺虫藥則吐虫愈多召孫診之孫曰六脈皆細非虫脈也  
今雖吐虫乃臟寒而虫不安失居上膈因而吐出復用殺  
虫藥虫為藥所苦不能自安所以吐虫愈多也孫遂用藥  
不三五服皆一色丸子虫遂不吐明日再召孫至六脈漸  
大進前藥其病不作後求方乃硫黃附子各一兩並末粳  
米糊為丸每三十九丸米飲下

仲烏梅丸治蛇虫陰疾

氣痛 河正氣天香散治心痛但忍氣則發者方見氣

血痛 丹心痛脈澀者有死血又云作時飲湯水下作吃者有死  
血桃仁承氣湯下之傷寒 凡治證必要先問起居何如

入醫學綱目卷六

四

假如心痛有因平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛  
用桃仁承氣湯下之切記輕者用葦汁桔梗能開提其氣  
血藥中兼用之

經失笑散治婦人心痛氣刺不可忍五灵脂淨好者蒲黃  
等分為末每二錢用黃醋一杓熬成膏再入水一盞煎至  
七分熱服效

世手拈散治心脾疼極驗詩云草果玄胡索灵脂并沒藥  
酒調三二錢一似手拈却 又治心痛劉寄奴末六錢玄  
胡索末四錢薑汁熱酒調服妙

簡治九種心痛腹脇積聚滯氣筒子乾漆二兩搗碎炒出  
烟細研醋煮麪糊和丸如桐子大每服五九至七九熱酒  
下醋湯亦得服無時

外治心痛當歸為末酒調服方寸七



痰痛

四治心痛亦能治哮喘半夏研碎香油炒薑汁炊餅為丸

薑湯下二十九

五味鹹更堅條海蛤丸寒條括萎半夏韭白湯表條桂麻

石碱丸皆治痰飲心痛之妙劑也

世治心痛累效陳年白蠟螺殼洗淨為末熱酒調下一錢

半即愈

四一味牡蠣粉酒調下二錢氣實者可用

治痰飲心痛海蛤丸

海蛤燒為灰研極細過日火毒散用之瓜萎仁帶核

右以海蛤入瓜萎內乾濕得所為丸每服五十九

又方治脾寒海蛤粉佐香附末用川芎山梔生薑汁煎辣

湯調服為佳

手治血氣攻心痛不可忍以蓼根剉酒浸服之痰

世心痛粘礬辰砂少許每半錢入參湯調下 一方用白

礬辰砂糊丸好醋吞下神效 又方辰砂一味研好醋調

服效 又方用白礬為細末每服一錢茶調下

外黃連湯肘後龍膽酒並見卒心

仲粉蜜丸脚受肝制而急故虫不安用粉蜜之甘緩以安

之方見

素少陽所謂心脇痛者言少陽盛也盛者心之所表也九

月陽氣盡而陰氣盛故心脇痛也所謂不可反側者陰氣

藏物也物藏則不動故不可反側也

臨蚕沙散治男子婦人心氣痛不可忍者晚蚕沙不拘多

少為細末用滾湯泡過濾淨取清水服之立止 又方黃

荆子炒焦為末米飲調下亦治白帶 治心痛用洗淨玉

簪花根搗濃汁雜和好酒一半熱服

運氣

子治心腹俱痛以布裹椒薄注腹上火熨令椒汗出良

運氣心痛凡熱風濕寒燥五氣之初皆能于心而痛蓋心

為五臟之主故也

一曰熱邪干心經云少陰司天熱淫所勝病心痛肺脹又

云少陰之復暴瘧心痛又少陽之勝熱客於胃煩心心痛

又云陽明司天燥氣下臨暴熱至甚則心痛此在泉之熱

為痛治皆以寒劑是也

二曰寒邪干心經云太陽司天寒氣下臨其則心痛又云

陽明司天之政四之氣寒雨降病心痛又云歲水太過民

病上下中寒煩心躁悸心痛又云歲金不及炎火乃行復

則寒雨暴至心痛又云水鬱之發民病寒客心痛又云太

陽司天寒淫所勝病厥心痛又云太陽之復心胃生寒心

痛痞滿又云少陽在泉主勝則熱反上行而客于心心痛

蓋終之氣寒勝其客也又云歲火不及寒乃大行病辨胃

蒙昧心痛又云太陽之勝寒厥入胃則內生心痛皆治以

熱劑是也

三曰風邪干心傷胃經云少陽司天之政終之氣風乃至

心痛又云少陽司天風行于地心痛胃脘痛不通又云

歲水不及濕乃大行復則暴風大發高中痛於心腹又云

木鬱之發民病胃脘痛而痛隔咽不通又云厥陰在泉

風淫所勝心痛支滿又云厥陰司天風淫所勝胃脘痛心

而痛又云厥陰之復厥心痛又厥陰之勝胃脘痛而痛

治皆以涼劑是也

四曰濕邪干心經云土鬱之發心痛脇脹又云太陰在泉

濕淫所勝病飲積心痛又云太陰之勝火氣內鬱心痛熱

格治皆以熱劑是也



五曰燥邪干心經云陽明之復善大息心痛痞滿治以溫劑是也

六曰寒熱中于心經云少陰司天之政寒熱凌犯而爭於中寒厥入胃心痛三之氣大火行寒氣時至民病氣厥心痛治分寒熱多少調之是也

針灸

厥心痛者他臟病干之而痛皆有治也真心痛者心臟自病而痛故夕發旦死旦發夕死無治也然心臟之經絡有病在標者其心亦痛而有治經云心手少陰之脈是動則病噎乾心痛渴而欲飲又心主手少陰之脈所生病者心痛掌中熱皆視盛虛熱寒陷下取之又經云手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋之間實則心痛取之兩筋間也又云邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不及調其俞是也

八醫經卷六

七

靈厥心痛與背相控善瘳如從後觸其心僂者腎心痛也先取京骨崑崙發針不已取然谷厥病篇下同

心痛引背灸刺法有四  
其一取足太陽經刺節云取京骨崑崙者是其穴也蓋足太陽之正循脊當心入散絡故心痛引背取之也

其二取足少陰經刺節云取京骨崑崙不已取然谷者是其穴也又經云腎足少陰經之脈所生病者煩心心痛視盛虛熱寒陷下取之也又經云心痛引腰脊欲嘔取足少陰者是也蓋足少陰脈貫脊絡心故亦治心痛引背也

其三取足少陽經云心痛引背不得息刺足少陰不已取少陽者是也蓋手少陽之脈散絡心脈又三焦下俞曰委陽是足太陽絡足太陰循脊當心入散絡故亦治心痛引背也

其四取督任脈經云背為心相控而痛所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也又云心痛當九節刺之按已次按之立已不已上下求之得之立已者是也蓋十椎與九節者督脈也胃脘與天突者任脈也厥心痛腹脹胸滿心尤痛甚者胃心痛也取之太都太白心痛兼脹灸刺法有二

其一取足太陰經云取太都太白者是其穴也又經云脾足太陰之脈是動則病胃脘痛腹脹所生病者煩心下急痛者視盛虛熱寒陷下取之又云心痛腹脹齊齊然大便不利取足太陰者是也蓋足太陰脈從胃上膈注心中故心痛腹脹者取之也

其二取足陽明經云胃病者腹脹胃脘當心而痛飲食不下取之三三里者是也蓋胃脘當心痛者似心痛實非心痛也

八醫經卷六

木

厥心痛如以錐針刺其心心痛甚者脾心痛也取之然谷太谿

脾心痛而取然谷太谿者故孫真人張潔古謂之妄經也

厥心痛色蒼蒼者如死狀終日不得太息肝心痛也取之行間太衝

心病色蒼如死狀者取肝其兼小腸滿便澀難者亦取肝經云心痛引少腹滿上下無常處便澀難刺足厥陰是也

厥心痛臥若徒居心痛間動作痛益甚色不變肺心痛也取之魚際太淵

徒居謂間居間謂痛緩心痛臥與間居則痛緩動作則

也



益甚者取肺其兼短氣者亦取肺經云心痛但短氣不足以息刺手太陰者是也

心痛不可刺者中有盛聚不可取于膻膈中有虫瘕及蛟蛭皆不可取以小針心腸痛懷作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟蛭也以手聚按而堅持之無令得移以大針刺之久持之虫不動乃出針也

集九種心痛 間使 靈道 公孫 太衝 三里 陰陵泉

桑心氣痛 巨缺 雄尾各取 興隆瀉之

撮脾脊後心疼痛 中渚瀉之 灸心痛背脊上穴 心俞

一高俞

澀心痛脈弦肝原穴 脈沉腎原穴 脈瀆肺原穴 脈

浮心原穴 脈緩脾原穴

膻冷心痛 巨缺 刺之如五臟氣相干而膻痛

王心脾疼 上腕 中腕 多瀉少

甲心痛不可按煩心巨缺主之 心痛有虫多涎不得反

側上管主之 心痛上搶心不欲食支痛引肩建里主之

撮心胸痛并氣攻 勞宮 大陵 瀉之 內關

甲心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心恒而驚太陵及間使

主之 心寒痛難以悅仰心痛衝胃死不知人中腕主之

心痛嘔噦嘔血驚恐畏人神氣不足郄門主之

陰維為病苦心痛 內關

甲脾逆氣寒厥急煩心善噦噦噫胸滿噦呼胃氣上逆心

痛太淵主之 針云肺 心膨痛尺澤主之 下金云心煩悶

息 心痛卒欬逆尺澤主之出血立已 胸痺心痛肩內

麻木天井主之 胸脇背相引而痛嘔吐不食幽門主之

診

胸痺心痛不得息痛無常處臨泣主之千金云不得反側  
三五服藥方可喫物 心痛左手脈數熱多脈滑有死血  
右手脈實是痰積 脈大必是久病 兩手脈堅實不  
大便者下之 痛甚者脈必伏多用溫藥附子之類不可  
用參朮

寒

心脈微急為心痛引背食不下全文見希  
仲問曰病腹痛有虫其脈何以別之師曰腹中痛其脈當  
沉若弦反洪大故有虵虫 脾脈微滑為蠱毒蛟蛭腹熱  
虛實法

熱

脈關上脈緊而滑者虵毒 脈沉而滑者寸白 肘後籠  
以下三四寸熱者腸中有虫全文 真心痛手足青至節  
心痛甚旦發夕死夕發旦死

實

卒心痛  
斑貓七箇頭胡椒四十  
右將二味同炒令斑貓焦碎吹去斑貓不用却將淨胡  
椒研為細末只作一服熱酒調下不拘時候

治暴心痛不可忍者  
荔枝核丹溪云荔枝核  
右為末每服一錢水醋各半煎七分稍熱服

治卒心痛黃連八兩一味咬咀水七升煮五升絞去查  
溫飲五合日進三服

肝卒心痛龍膽草四兩酒三升煮一升半頓服

仲走馬湯治中惡心痛腹脹大便不通  
巴荳二枚去杏仁二枚



右三味以綿纏槌令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下  
老少量服通治飛尸鬼擊等病

有聖  
竹海上方急救男子婦人心疼牙關緊欲死者用隔年陳  
蔥白三五根去皮類葉搗為膏將病人口幹開用匙將膏  
送入咽喉用香油四兩灌送下油不以多少但得蔥下喉  
其人必甦少時將腹中所停虫病等物化為黃水微得利  
為佳除根永不復發累效一方用真香油頓服一盞亦妙

雜方  
治卒心痛白艾成熟者一升水二升煮取一升去查頓  
服若為客氣中者當吐虫丹溪云艾屬火而有  
治卒心痛東引桃枝一握切碎以酒一升煎去半升頓服  
大效

針灸  
經云邪客于足少陰之絡令人卒心痛暴脹胸脇支滿無  
積者刺然骨之前出血如食頃而已不已左取右右取左  
病新發者五日已

八  
氣海 湧泉 無積者刺之如食頃而已有積者先飲  
間使 支溝 三里

丹鍼灸經治卒心痛不可忍吐冷酸水及原臟氣少灸足  
大指次指內約文中各一壯如小麥大下火立瘥

卒心痛瘕瘕互相引肘內廉痛心教然間使主之  
卒心痛汗出大敦主之出血立已 心腹中卒痛而汗出  
石門主之

胎前心痛  
天治妊娠卒心痛氣欲絕

血虛  
川芎 當歸 茯苓 厚朴各等  
右水六升煎二升分二服

白木散治妊娠卒心痛欲死不可忍者

白木 赤芍藥各二黃芩一兩  
右水六升煮取二升半分三服半日令盡微下水令易  
產忌桃李雀肉

產後心痛  
艾葉 蘇枳 茴香 川練子 各  
右為末水煎服

濁氣  
羅火龍散治產後心痛  
大治婦人血崩心痛甚者名曰殺血心痛小產下血過多  
而心痛者亦然用烏賊魚墨炒為末醋湯調下此魚腹多  
人過必吐其  
墨以蓋身

七  
救治產後血不盡心腹痛荷葉熬令香為末水煎下方寸

寒  
大品蜜湯治產後血寒心痛  
熟地 當歸 獨活 吳茱萸  
芍藥 乾薑 甘草 桂心  
小阜各一 細辛半

右為散每服半兩水三盞煎至一盞去查稍熱服  
聖治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心三兩搗羅為散  
狗膽汁和丸如櫻桃大不拘時候熱酒磨下二丸

諸般氣痛  
丹氣痛一身眩子裏氣痛少用木香於藥內行得開

河正氣天香散治婦人一切諸氣或上凌心胸或攻築脇  
肋腹中結塊發渴刺痛月水不調或眩暈嘔吐往來寒熱  
減食方見治虛

實氣血條



調氣方

香附四兩 人參兩 烏藥二兩 砂仁一兩  
甘草二兩

右為細末熟湯調服

本治脾積氣婦人諸般氣痛

香附五兩 蓬朮兩 甘草各二兩

右各淨研為細末每服二錢入鹽少許白沸湯空心熱服

治一切氣疾丈夫婦人撞心冷氣並皆治之

香附一斤炒 陳皮四兩 甘草一兩

右為細末每服二錢空心鹽湯點服

丹寬中丸 枳殼為末酒糊丸

婦人患氣痛喜食熱物 二陳湯加木通薑五片煎下保

入胃熱利末云

和丸

女子患氣痛要揉者曾服烏沉湯有效又再發

陳皮六錢 半夏 青皮兩 芍藥二兩

木通 川芎 茱萸一錢 甘草五分

右分五貼薑三片煎服

明五院君出外怒喘膈痞痛不思食脈沉弦稍數此氣抑不通也

半夏三錢 青皮 枳殼各二錢 黃芩

芍藥各錢 木通 甘草各一錢

右薑三片煎取半盞下保和丸三十粒

三七嫂怒後氣痛脈沉不思食

青皮一錢 柴胡半兩 甘草一分 半夏一錢

黃芩五分 木通三錢 陳皮五分

右薑三片煎服

感村婦人五十七歲氣痛不可按漸漸痛至足

青皮 芍藥各三兩 川芎 陳皮各三兩

黃柏炒 木通各一兩 甘草一錢

右分三貼煎熱飲

本治婦人室女血氣刺痛不可忍日夜叫喚可憐者一服效

芸薹子 肉桂板桂 良薑 沒藥各等分

右焙乾為末每服三錢乳香湯調下熱服不拘時候

孟詵心腹中結伏氣杏仁陳皮桂心訶黎勒皮為丸空心服三十九

實積 本和氣散治男婦一切氣疾他藥不瘳者

甘草兩半 白芨一兩 地骨皮 山蜈蚣

藿香兩半 白芷兩 木香 紅內消

山慈菘各半

右焙乾為末每服二大錢空心鹽湯點服余鄉村有一

老醫教世習醫凡婦人氣疾惟憑此藥百發百中

胃病胃滿

心病 經云南風生於夏病在心俞在胃膈又云仲夏善病胃膈

此則胃膈痛屬心故入心部

肝病 肝虛則胃膈引背膈肝實則胃膈不轉側喜太息肝著則

常欲蹈壓其脘經云春脈如弦其氣不實而微此謂不及

令人胸膈引背下則兩脇脹滿此肝虛而其脈症見於春

如此也

仲肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胃中痛不得轉側

食則吐而出汗也 肝著其人常欲踏其胃上先未苦時



但欲飲熱旋覆花湯主之方未考金匱婦人門有  
蓋陽明所謂胸痛短氣者水氣在臟腑也水者陰氣也陰  
氣在中故胸痛少氣也

胸痺之病喘息咳嗽胸背痛短氣寸口脈沉而遲關上  
小緊數者宜以括萎薤白白酒湯主之

括萎實一箇 薤白半升 白酒升  
右三味同煮取二升分溫再服

括萎薤白半夏湯治胸痺不得臥心痛徹背方見心  
胃痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心枳實薤白桂  
枝湯主之入參湯亦主之

枳實薤白桂枝湯  
枳實四枚 厚朴兩 薤白斤半 桂枝兩

括萎實一箇  
右五味以水五升先煮厚朴枳實取二升去渣納諸藥  
煮數沸分溫作三服

人參湯  
白朮 人參 甘草 乾薑各二

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三服

孫主簿季述之母患胸中痞急不得喘息按之則痛脈數  
且澹曰曾痺也因與仲景三物小陷胸湯一劑和二劑愈

仲支飲胸滿者枳朴大黃湯主之

厚朴兩 大黃兩 枳實四枚

右三味水五升煮取二升分溫再服

脈寸口脈沉胸中引脇痛胸中有水氣宜溼漆湯及刺巨  
關瀉之澤漆湯仲景方也見咳門

杜壬治胃腸痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰咳大括  
萎去穢取子熟炒連皮研和麩糊為丸如桐子大米飲下  
五十九

治胸腹腫脹去痰開胃用半夏洗淨焙乾搗羅為末生  
薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水一  
盞用餅子一塊如彈丸大入鹽半錢煎取一盞溫服能去  
胸膈壅滯大壓痰毒及治酒食所傷其功效大矣

丹鄭仲淳年二十有三高有一點相引痛吸氣皮骨急

滑石兩 桃仁兩 枳殼一兩 黃連半兩

甘草二錢  
右為細末每錢半以蘿蔔根自然汁研煎熱飲之一日  
五六次

仲本年二十七因吃熱補藥又妄自學吐納以致氣亂血  
熱嗽血消瘦遂與行倒倉法今嗽血消瘦已除因喫炒薑  
米隔間有一點氣梗痛似有一條絲垂映在腰與小腹亦  
痛大率偏在左邊此肝部有惡血行未盡也

滑石兩 黃丹三錢 枳殼一兩 黃連五錢

生甘草二錢 紅花一錢 柴胡五錢 桃仁兩

右為細末每服一錢半以蘿蔔自然汁煎服之

頃上清散清利頭目寬快胸中不利者悉利於表

黃芪三錢 甘草二錢 人參三錢 葛根一錢

防風根一錢 蔓荊子半錢  
右咬咀分作二服每服水一盞半煎至一盞去渣臨臥  
溫服以夾衣蓋覆面首不語須臾汗出為效未服藥預  
一日不語如服藥畢亦一日不語

運氣胸痛有二



其一火邪助心經云歲火太過甚則胸中痛脇支滿脇痛  
膈背肩胛兩臂內痛是也

其二金邪傷肝經云歲金太過民病胸痛引背兩脇滿且  
痛引少腹又云歲土不及風乃大行民病體重腹脹痛金復  
則胃腸暴痛引少腹者是也

內經灸刺胸痛有四

其一取心經云心痛者胸中痛脇支滿脇下痛膈背肩胛  
間痛兩所臂內痛實則胸腹大脇下腰子相引而痛取其  
經少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者是也

其二取腎經云腎虛則胃中痛大腹小腹脹取其經少陰  
太陽血者按刺法不分補瀉但言取血王註謂先去血脈  
後調虛實也

其三取膽經云膽足少陽脈所生病者胸脇肋髀膝外皆  
痛詳成虛熱寒陷下取之也

其四取筋經云手心主之筋其病當取過者又轉筋前及  
胸痛息責治在燔針劫刺以知為數以痛為輸又足太陽  
之筋足少陽之筋痛皆引胸痛治在燔針劫刺以知為數  
以痛為輸也

灸刺胃滿有三法  
其一取氣滿經云膈中者氣之海其輪上在手柱骨之上  
下前在於人迎氣滿有餘者氣滿胸中悅息而赤番守其  
輪而調其虛實無犯其害是也

其二取肝經云肝足厥陰脈所生病者胸滿嘔逆發泄狐  
疝遺溺閉癢詳成虛熱寒陷下取之也  
其三取胃經云厥逆腹滿面腫唇漂然暴言難甚則不  
能言取足陽明是也

霍胸脇痛不堪 期門分 章門 行間  
丘墟 滄泉

又法 期門 支滿 膈俞  
甲胸滿痛璇璣主之 胸脇痛引胸中華蓋主之  
胸脇痛引痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心紫宮主之  
胸中滿不得息脇痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心王堂主  
之 胸脇背相引痛心下胸中嘔吐多睡飲食不下幽門  
主之 胸脇痛引膈不得息悶亂煩滿不得飲食靈  
墟主之 胸脇痛引背痛臥不得轉側胸鄉主之  
大氣不得息息即胸脇中痛實則其身盡寒虛則百節盡  
縱大包主之 胸滿善太息胸中膨脹然丘墟主之  
背時寒間使主之 胸滿不得息頸項腫陽谷主之

胸脇痛引膈不得息悶亂煩滿不得飲食靈墟主之

胸中滿不得息脇痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心王堂主之

胸脇背相引痛心下胸中嘔吐多睡飲食不下幽門主之

胸脇痛引膈不得息悶亂煩滿不得飲食靈墟主之

胸中滿不得息脇痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心王堂主之

胸脇背相引痛心下胸中嘔吐多睡飲食不下幽門主之

胸脇痛引膈不得息悶亂煩滿不得飲食靈墟主之



診

仰脈當取太過不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也  
白色麓理者肺大肺大則多飲善病胸痺全支乳  
胸偏踈者肺偏傾肺偏傾則胸偏痛

胸痺短氣緩急

仲胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之

主之

茯苓杏仁甘草湯

茯苓兩二 杏仁五十 甘草兩一

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服

橘枳薑湯

陳皮斤一 枳實兩三 生薑斤半

右三味以水五升煮取二升分溫再服

大醫學綱目卷十六

于治胸痺氣滿壅心膈不利枳實二兩麩炒微黃為末非時以清粥飲調下二錢聖惠

仲胸痺緩急者薏苡仁附子散主之

薏苡仁兩十五 大附子十箇

右二味杵為散服方寸七日三服

煩燥 虛煩 胎前虛煩 產後虛煩 躁 懊憹 昏悶

昏悶

昏悶

大法

煩燥發熱論 黃帝針經五亂篇云氣亂於心則煩心  
蜜然俯首靜伏云云氣在於心者以少陰心主之俞又云  
咳喘煩寃者是腎氣之逆也又云煩寃者取足少陰又云  
煩寃者取足太陰仲景分之為二煩也蓋火入於肺  
則煩入於腎則躁俱在於腎者以道路通於肺母也大抵  
煩躁者皆心火為病心者君火也火旺則金燥水虧惟火

診

獨存故肺腎合而為煩躁又脾經絡於心中心經起于脾中二經相搏濕熱生煩夫煩者擾擾心亂兀兀欲吐怔忡不安躁者無時而熱冷汗自出少時則止經云陰躁者是也仲景以梔子色赤而味苦入心而治煩盪鼓色黑而味鹹入腎而治躁名梔子豉湯乃神藥也若有宿食而煩者梔子大黃湯主之

運氣

運氣煩躁有二

一曰熱助心火煩躁經云少陰之復燥熱內作煩躁驚悸又云少陽之復心熱煩躁便數憎風是也

二曰寒攻心虛煩躁經云歲水太過寒氣流行邪害心火病身熱煩心躁悸陰厥是也

成煩為擾而煩躁為憤躁之躁合而言之煩躁為熱也析而言之煩陽也躁陰也煩為熱之輕者躁為熱之甚者

無內熱曰煩外熱曰躁

謹按先賢治煩躁俱作有屬熱者有屬寒者治獨煩不躁者多屬熱惟悸而煩者為虛寒治獨躁不煩者多屬寒惟火邪者為熱蓋煩者心中煩胸中煩為內熱也躁者身體手足躁擾或裸體不欲近衣或欲在井中為外熱也內熱者有本之熱故多屬熱外熱者多是無根之火故屬寒也

內外俱虛身軀冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆躄不得安靜者死 執病七八日其脈微細小便不利加暴口躁脈代舌焦乾黑者死

虛煩

活人云虛煩似傷寒非傷寒也成無已云傷寒有虛煩有心中煩有胸中煩二說不同攷之於書成無已之言實出



仲景活人無據然往往有非因傷寒而虛煩者今故兩存之立虛煩一門於此心部立傷寒煩一門於傷寒部

無虛煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥不渴清清不寐皆虛煩也

但煩熱者清肺去痰

但獨熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊故知非裏實也不可下病此者內外皆不可攻攻之必遂煩渴當與竹葉湯若嘔者與陳皮湯一劑不愈再與之孫真人云此法數用有效

陳皮湯

陳皮半兩 甘草錢五 人參一分 竹茹五錢

右劉如麻苳大每服五錢水一盞半薑三片葱一枚煎至七分去查食前服

無淡竹茹湯治心虛悶頭疼短氣內熱不解心中悶亂及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬心去 小麥各二兩半 甘草兩一 人參

白茯苓兩半 半夏兩 湯洗

右劉散每服四錢水二盞薑七片葱三枚淡竹茹一塊如指大煎至七分去查食前服

煩熱者心亂者安神

煩朱砂安神丸治心亂煩熱怔忡心神顛倒兀兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊憹之狀皆膈上血中伏熱蒸然不安宜用權法以鎮陰火之浮行以養上焦之元氣用甘草之甘溫補之當歸生地又為長生陰血之聖藥黃連去心煩除濕熱朱砂納浮游之火而安神明

朱砂一錢 黃連一錢半 甘草五分 生地

右為極細末蒸餅為丸如黃米大每服十九津下

下痢後更煩按之心下濡者為虛煩也梔子豉湯主之

帝曰有病身熱汗出煩滿煩滿不為汗解此為何病岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥帝曰愿卒聞之岐伯曰巨陽主氣故先受邪少陰與其為表裏得熱則上從之從之則厥也帝曰治之奈何岐伯曰表裏刺之飲之服湯也飲之服湯謂仲景止逆下

丹一女子年二十餘歲在室素強健六月間發煩悶困憊不食發時欲入井六脈皆沉細而弱數兩日後微渴眾以為病暑治不效四五日加嘔而人瘦手心極熱喜在陰處漸成伏瘕時妄語予急制局方妙香丸如桐子大以井水下一丸半日許大便藥已出病無退減遂以麝香水洗藥以針穿三竅次日以凉水送下半日許大便下稠痰數升是夜得睡困頓伏枕旬日而愈因記金匱云昔肥而今瘦者痰也遂作此藥治之

妙香丸丹溪云疏決腸胃制伏木火藥也

辰砂 飛研 牛黃 龍腦 膩粉 麝香 研各 金箔 九十 巴豆 三百十五粒去

右令研勻煉黃蠟六兩入好蜜三分同煉令勻為丸每兩作三十九如要此藥速行針刺一眼子冷水浸少時服效更速小兒百病丸如葉莖大

溫膽湯治大病後虛煩不得眠方見不

煩不得眠

煩不得眠

煩不得眠

煩不得眠

煩不得眠



虛

領生於虛

運氣

針灸

仲酸寒湯治虛勞虛煩不得眠方見不  
 右九法治熱煩前五法煩熱怔忡知熱在心肺也故用  
 竹葉石膏辰砂鎮墜其熱使下行也第六法煩而下利  
 知熱在上也故用梔豉湯吐之第七法煩而汗出不解  
 知表裏有邪也故用表裏飲湯第八法脈沉口渴手心  
 熱知熱不在表也故用妙香丸下之第九法溫膽酸寒  
 治不得眠也

凡心虛則煩心肝腎脾虛亦煩心經云夏脈者心也其不  
 及者令人煩心又云肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩寃者  
 是知煩多生於虛也

運氣煩有五  
 一曰熱助心實而煩經云少陰司天熱淫所勝病胃中煩  
 熱噎乾又云少陽司天火淫所勝病煩心胃中熱又云少  
 陽之勝煩心心痛治以鹹寒是也

二曰心從制而煩經云太陽司天寒氣下臨心氣上從寒  
 清時寒火氣高明心熱煩是也

三曰金攻肝虛而煩經云歲金太過燥氣流行肝木受邪  
 民病體重煩寃是也

四曰土攻腎虛而煩經云歲土太過雨濕流行腎水受邪  
 民病體重煩寃又云歲水不及濕乃大行民病煩寃足痿  
 是也

五曰木攻脾虛而煩經云歲木太過風氣流行脾土受邪  
 民病體重煩寃蓋肝虛腎虛皆令人體重煩寃故金太過  
 則肝虛土太過則腎虛木太過則脾虛凡此三太過之歲  
 則肝腎脾受邪而虛皆病體重煩寃也  
 灸刺煩心有四

其一取心俞經云心主手厥陰心包絡之脈所生病者煩

心瘋掌中熱詳虛盛虛熱寒陷下取之又云氣亂于心則

煩心密默俯首靜伏取之手少陰心主之脈是也

其二取腎膀胱俞經云腎足少陰之脈所生病者煩心

痛痿厥足下熱痛視盛虛熱寒陷下取之又云舌縱涎下

煩悅取足少陰又云足少陰之別名曰大鍾當踝後統跟

別走太陽其病氣逆則煩悶取之所別也又汗出煩滿不

解表裏取之巨陽少陰也

其三取肺俞經云手太陰之脈所生病者煩心胃滿視盛

虛熱寒陷下取之又云振寒洒洒鼓頷不得汗出腹脹煩

寃取手太陰是也

其四取脾俞經云脾足太陰之脈所生病者煩心心下急

痛泄瀉水閉視盛虛熱寒陷下取之是也

胎前虛煩  
 大竹葉湯治妊娠苦煩悶名曰子煩  
 防風 黃芩 麥冬 去心各 白茯苓 四  
 右剉散每服四錢水二盞竹葉十數片煎七分去查溫  
 服之  
 益母丸治子煩似虛不得臥者即知每丸用葱肉為丸  
 欲產明  
 治子煩口乾不得臥用黃連去鬚為細末每服一錢粥飲  
 調下  
 產後虛煩  
 大治產後餘血不盡奔心煩悶生藕汁飲二升甚效竹瀝  
 治產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕羊血  
 一盞頓服如不定更服立效



產後血虛為煩生地黃汁清酒各一盞相煎一沸分服服之

治產後虛煩用蒲黃以東流水和服方寸七極良

治產後短氣欲絕心中煩悶竹葉湯

竹葉切 麥門冬 小麥各一 甘草一

生薑二 大棗十四

右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去香納餘藥煮取三升去渣溫服虛悸加人參二兩少氣力加糯米五合

產後虛煩不得眠芍藥梔子湯

芍藥 常歸 梔子各五 香豉半

右如梔子豉湯修服產後傷寒便同下後變証此方雖不若仲景酸

大竹葉湯方見

經治產後煩躁禹餘糧一枚狀如酸餛者入地埋一半四面繁築用炭一秤發頂火一斤煨去火三分耗二為度用

濕沙土覆一宿方取出打去外面一重只使裏內細研水

淘澄五七度將昏稠乾再研數千遍用甘草煎湯調二錢

七只一服立效

四散煩 表 痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

黃芩一 苦參一 乾地黃一

右三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下虫

婦人產中虛煩嘔逆安中益氣竹皮大九主之

生竹茹分 石膏分 桂枝分 甘草分

白薇分

右五味末之棗肉和丸彈子大以飲服一九日二夜二

服有熱者倍白薇煩喘者加栝實一分

躁

口燥舌乾 諸躁狂越皆屬於火 全文見診○丹溪治一女子煩欲入

心熱脈洪 伏其心 愈此乃火 井中口渴心熱脈洪者妙香丸下之

陰盛發躁名曰陰躁欲坐井中宜以熱藥治之

得入井中 陰躁欲坐 井中但欲水不 得入井中

以寒藥投之其死也何疑焉况寒涼之劑入腹周身之火

得水則升走矣

酒霍亂散方見 診躁法見煩

懊憹 懊憹虛煩之劇者治法並見虛煩門成無已云懊者懊惱

之懊憹者鬱悶之貌即心中懊惱惱煩煩懊憹鬱鬱然

不舒暢憤然無奈比之煩悶而甚者懊憹也

鬱悶 鬱悶亦虛煩之甚者治法並與傷寒虛煩同蓋鬱者昏也

悶者煩也凡鬱而不悶者名曰昏迷悶而不鬱者名曰虛

煩今日鬱悶者謂昏迷虛煩併病許學士所謂懊憹終夕

不得臥心中無晷會處者是也

運氣 運氣鬱悶者屬內熱經云火鬱之發民病鬱悶懊憹又云

太陽司天之政三之氣寒氣行民病心熱鬱悶不治者死

是也

諸安附中惡尸 產後諸安 產後循衣撮

空

虛病瘵病有似鬼祟論 血氣者身之神也神既衰之

邪因而入理或有之若夫血氣兩虧痰客中焦妨碍升降



不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治之其人必死吁哉冤乎誰執其咎憲慎之子傳九年十七八時暑月因大勞而渴飲梅漿又連得大驚三四次妄言妄見病似鬼邪診其脈兩手皆虛弦而帶沉數予曰數為有熱虛弦是大驚又梅漿之酸鬱於中脘補虛清熱導去痰滯病乃可安遂與人參白朮陳皮茯苓連等藥濃煎湯入竹瀝薑汁與旬日未效眾皆尤藥之不對予脈之知其虛之未完與痰之未導也仍與前方入荆瀝又旬日而安 外弟戚一日醉飽後亂言妄見詢之係伊亡兄附體言出前事其的乃叔在邊叱之曰非邪乃食魚生與酒太過痰所為耳灌鹽湯一大碗吐痰一二升汗因大作歷一宵而安 金氏婦壯年暑月赴筵暴乃姑詢其坐次失序遂報然自愧因此成疾言語失倫其中多間一句

曰奴奴不是脈大率皆數而弦予曰此非邪乃病也但與補脾清熱導痰數日當自安其家不信邀數巫者噴水而呪之旬餘而死或曰病非邪而以邪治之何遽至於死予曰暑月赴宴外境蒸熱辛辣適口內境鬱熱而况舊有積痰加之愧悶其痰與熱何可勝言今乃驚以法尺是驚其神而血不寧也噴以法水是滯其體密其膚使汗不得泄汗不出則蒸熱內燬血不寧則陰消而陽不能獨立也不死何為或曰外臺秘要有禁呪一科庸可廢乎予曰移精變氣乃小術耳可治小病若內有虛邪當用正大之法自有成式昭然可攷然符水惟膈上熱痰一叩冷涼胃熱得之豈不暫快亦可取安若內傷而虛助冬令嚴寒符水下咽必水胃而致害彼鬱熱在上熱邪在表須以汗解卒得清冷膚腠固密熱何由解必致內攻陰陽離散血氣乖乘

去死為近又何評焉  
 在邪哭使冤鬼不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人多畏合目欲眠夢遠行而精神離散鬼鬼妄行陰氣衰者為顛陽氣衰者為狂

本治因驚言語顛錯不能服溫藥宜遠志丸  
 硃砂半兩入磨 金箔五片 遠志  
 南星 人參 白附子 白茯苓

右為細末煉蜜丸如桐子大朱砂為衣每服三十九薄苛湯下食後臥服

茯神 乾地黄 白芍藥 川芎  
 當歸 桔梗 白茯苓 遠志已上等分

右為細末每服二錢水二盞燈心末肉同煎至七分不拘時候貫明遠教授母七十四歲因戎為驚疾如上証服此二方得效

運氣 運氣謬妄即傷寒家謬妄也其病有二  
 一曰火邪助心經云歲火太過上臨少陰少陽病反謬妄狂越又云火太過曰赫曦其動炎灼妄擾又云少陰所至為謬妄又云少陰之復振慄謬妄又云少陽之勝心痛煩心善驚謬妄治以鹹寒是也

二曰寒邪傷心經云歲水太過寒氣流行邪害心火病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒謬妄上臨太陽渴而妄言又云陽明司天之政四之氣寒雨降振慄謬妄治以甘熱是也  
 加減續命湯治中風或歌或笑語無所不至



麻黃三兩 人參 桂枝 白朮各二兩  
 當歸 防己 黃芩 甘草  
 白芍藥 芫花 杏仁各一兩  
 右剉散每服四大錢水一盞半棗二枚煎七分去查不以時服

病者卒心腹脹滿吐利不行如乾霍亂狀世所謂中惡是也。由人精神不全心志多恐遂為邪鬼所擊或附着沉沉默默妄言謔語誹謗罵詈訐露人事不避讒嫌口中好言未然禍福及至其時毫髮未失人有起心已知其故登高陟險如履平地或悲泣呻吟不欲見人如醉如狂其狀萬端但隨方俗攷驗治之

雄黃 礬石 朱砂 牡丹皮  
 八毒赤散治男子婦人染着神鬼謂之鬼疰病

附子炮 藜蘆 巴豆各一兩 蜈蚣一條  
 右八味為細末煉蜜為丸如小豆大每服十九丸冷水送下無時

本飛尸者發無由漸昏然而至其狀心腹刺痛氣息喘急脹滿遁尸者停遁在人肌肉血脈之間觸即發動亦令人心腹脹滿刺痛喘急攻脇衝心瘥後復發沉尸者發時亦心腹絞痛脹滿喘急雖歇之後猶沉痼在人府藏令人無處不惡風尸者在人四肢循環經絡其狀冷躍去來沉沉默默不知痛處衝風則發伏尸者其病隱伏五藏積年不除未發身體都如無患發則心腹刺痛脹滿喘急又有諸尸注候者則是五尸內之尸注而挾外鬼邪之氣流注身體令人寒熱淋漓或腹痛脹滿喘急或礪塊踊起或擊引腰脊或舉身沉重精神雜錯恒覺昏謬每節氣改變輒致

大惡積年累月漸至頓滯以至於死死後復易傍人乃至滅門故為尸疰皆用忍冬藤葉剉散煎煮令濃取汁煎服日三瘥

太乙神精丹蘇合香丸治此疾第一

因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣成諸證變動不已似冷似熱風氣觸則發用雄朱散

雄黃 朱砂 桔梗 羌活

芍藥 當歸炒 升麻 川烏

龍腦 川芎 南星炮 山梔

陳皮 木香 莽草 白朮

枳殼 檳榔 黃芩各等分 麻黃五分

白僵蚕炒 虎頭骨燻 紫蘇子 鬼箭羽炒

蜈蚣二條 酒炙

右為細末每服二錢酒調下日三服  
 頃在徽城日常修合神精丹一科庚申子家一婦人夢中見二蒼頭一前一後手中持一物前者云到也未後應云到也擊下爆然有聲遂覺後心一點痛不可忍昏悶一時許予忽憶神精丹有此一証取三粒令服之少頃已無病矣云服藥覺痛止神醒今如常矣日後相識稍有邪氣與一二服無不應驗方在千金中治中風之要藥但近世少得曾青磁石為難合爾

無還魂湯治卒中惡奄忽氣絕口噤不開方見在中暴厥但加桂耳

子五邪湯治邪氣啼哭或歌或笑

禹餘糧 防風 桂心 芍藥

獨活 甘草 白朮 人參



石膏 牡蠣 秦艸各二 防已  
 芎藭 茯苓 雄黃 蛇蛻皮各一  
 右吹咀每服五錢水三盞煎七分服之  
 仲大瘧湯治婦人悲傷欲哭象如神靈方見肺

產後譫妄  
 奪命散治產後血暈入心經語言顛倒健忘失志  
 沒藥 血竭等

右研細為末產後用童便與細酒各半盞煎一二沸調  
 下二錢良久再服其惡血自下行一婦人產後譫妄如  
 而愈

又方治產後敗血衝心發熱狂言奔走脈虛大者  
 乾荷葉 生地黃 牡丹皮等  
 右三味濃煎湯調蒲黃二錢七一服即定

郭氏論產後乍見鬼神者何答曰心主身之血脈因產耗  
 傷血脈心氣虛則敗血得積上干於心心不受觸遂致心  
 中煩躁臥起不安乍見鬼神言語顛倒醫人不識呼為風  
 邪如此但服調經散每服加龍膽一檢得睡即安  
 沒藥 琥珀並細 桂心各一 芍藥  
 當歸各一 麝香細辛各三

右為末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服  
 天治方產一日見鬼言語顛倒用蘇合香丸一錢以童便  
 調服即醒

熱  
 雲治產後發熱狂言奔走脈虛大者四物湯加柴胡如不  
 愈加甘草柴胡生地黃等分煎服亦可  
 曠治產後血暈心悶不識神言鬼語急欲絕  
 芍藥 甘草 丹參各一 生地汁

生薑汁升各一 白蜜  
 右水二升先煮三味取八合下地黃生薑汁蜜調分為  
 二次服

大治產後敗血及邪氣入心如見鬼物顛狂用大辰砂一  
 二錢研極細用乳汁三四茶匙許調仍握紫項活地龍一  
 條入藥候地龍滾三滾取出地龍不用不令帶藥出但欲  
 得地龍身上涎耳入無灰酒與前乳汁和合七八分盞重  
 湯溫遇疾作分三二服

栝子仁散治產後狂言亂語皆由內虛敗血挾邪攻心  
 栝子仁 遠志去心 人參 桑寄生  
 防風 琥珀研 當歸炒 生地焙  
 甘草等

右為末先用白羊心一箇切片以水一大盞半先煮  
 至九分去羊心入藥末五錢煎至六分去渣無時服  
 循衣撮空

熱  
 瀾治婦人血風症因大脫血崩漏或前後失血因而枯躁  
 其熱不除循衣撮空摸床閉目不省揅手揚視搖動不寧  
 錯語失神脈弦浮而虛內躁熱之極也氣虛鼻乾不潤上  
 下通躁此為難治宜生地黃黃連湯主之  
 川芎 生地黃 當歸各七 赤芍藥  
 梔子 黃芩 黃連各三 防風一

右為末每服三錢水二盞煎至七分去渣取清飲無  
 時徐徐與之若脈實者加大黃下之  
 大承氣湯氣藥也自外而之內者用之生地黃黃連湯血  
 藥也自內而之外者用之氣血合病循衣撮空証同自氣  
 而之血血而復之氣大承氣湯下之自血而之氣氣而復



診

之血地黃黃連湯主之二者俱不大便  
睡病人循衣縫諸語者不可治 病人陰陽俱絕掣衣撮  
空妄言者死

喜笑不休

喜笑皆屬心火經云心藏神神有餘則笑不休又云在藏  
為心在聲為笑在志為喜又云精氣併於心則喜又云火  
太過為赫曦赫曦之紀其病笑狂妄又云少陰所至為喜  
笑者是也

河笑蕃茂鮮淑舒榮彰顯火之化也故喜為心火之志也  
喜極而笑者猶燔燼太甚而鳴笑之象也故病笑者心火  
之盛也

子和路經古宅逢一婦病喜笑不止已半年矣衆人皆無  
術求治於戴人戴人曰此易治也以滄塩成塊者二兩餘

醫學綱目卷六

聖

用火燒令通赤放冷研細以河水一大碗同煎至三五沸  
放溫分三次啜之以叙探於喉中吐出熱痰五升次服降  
火劑火主苦解毒是也不數日而笑定矣內經曰神有餘  
者笑不休也所謂神者心火是也火得風而煽故笑之象  
也五行之中惟火有笑常治一老男子笑不休口流涎黃  
連解毒湯加半夏竹瀝薑汁而笑止矣

針灸

刺灸喜笑獨取心主一經經云心主手厥陰之脈是動則  
病面赤目黃喜笑不休詳盛虛熱寒隔下取之

健忘

丹健忘精神短少者多亦有痰者  
吳黃帝曰人之善忘者何氣使然岐伯曰上氣不足下氣  
有餘腸胃實而心氣虛虛則榮衛留於下久之不以時上  
故善忘也

虛

孔子大聖枕中方

龜甲神龜板 遠志 菖蒲

右四味等分爲末酒服方寸七日三服常令人大聰明

於物象用補心甚驗

治多忘方

菖蒲分一 茯苓 茯神 人參各五分

遠志分七

右五味爲末酒服方寸七日三夜一五日夜

蜀定志丸治善忘安神定志方

鹽千金翼聖惠同補心虛治健忘令人耳目聰明用戊子  
日服開心不忘方

菖蒲 遠志各一分

右搗爲細末服方寸七食後令人耳目聰明從外見裏

醫學綱目卷六

聖

及千里外事令人長生去三百病毒不能爲害

疝治人心孔悒塞多忘喜誤丁酉日密自至市買遠志著  
巾角中爲末服之勿令人知

腎傷

腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言全文見  
血并於下氣并於上亂而喜忘全文見

運氣

運氣喜忘皆屬心火虛經云火不及曰伏明伏明之紀其  
病昏惑悲忘又云太陽司天寒氣下臨心氣上從善忘又

云太陽之復其則入心善忘善悲是也

雜方

本草商陸花主人心悒塞多忘喜誤取花陰乾百日搗末  
日暮水服方寸七臥思念所欲事即於眼中自覺

針灸

集健忘 列缺 心俞 神門 中脘 三里 少海  
無開虧者心高心高則滿於肺中悅而善忘難開以言全文

診

見



諸痛門

諸部分痛各入本門如痛風入痺門目痛入目門此特痛之大法耳

素黃帝問曰予聞善言天者必有驗於人善言古者必有合於今善言人者必有厭於已如此則道不惑而要數極所謂明明也今予問於夫子令言而可知視而可見捫而可得令驗於已如發蒙解惑可得而聞乎岐伯再拜稽首對曰何道之問也帝曰愿聞人之五臟卒痛何氣使然岐伯對曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛帝曰其痛卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不可按者或按之而痛者或按之無益者或喘動應手者或心與背相引而痛者或脇肋與小腹相引而痛者或腹痛引陰股

醫學綱目卷六

聖

者或痛宿昔而成積者或卒然痛死不知人少間復生者或痛而嘔者或腹痛而後泄者或痛而閉不通者凡此諸痛各不同形別之奈何岐伯曰寒氣客於脈外則脈寒脈寒則縮絀縮絀則脈急絀急則外引小絡故卒然而痛得是則痛立止因重中於寒則痛久矣吳古通切熱也寒氣客於經脈之中與吳氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也寒氣稽留吳氣從上則脈充大而血氣亂故痛甚不可按也寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按之痛止寒氣客於俠脊之脈則深按之不能及故按之無益也寒氣客於衝脈衝脈起於關元隨腹直上寒氣客則脈不通脈不通則氣因之故喘動應手矣寒氣客於背俞之脈則血脈泣脈泣則血虛血虛則痛其命注于心故相引而痛按之則熱氣至

熱氣至則痛止矣若見心痛寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈者絡陰器繫於肝寒氣客於脈中則血遊脈急故脇肋與小腹相引痛矣治見胸脇痛厥陰客於陰股寒氣上及小腹血泣在下相引故腹痛引陰股治見腹脇痛寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣治見積寒氣客於五臟厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也治見吐法寒氣客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛矣治見泄下熱氣留於小腸小腸中痛癰熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不通矣治見秘結帝曰所謂言而可知者何也視而可見奈何岐伯曰五臟六腑固盡有部視其五色黃赤為熱白為寒青黑為痛此所謂視而可見者也帝曰捫而可得奈何岐伯曰視其

醫學綱目卷六

聖

生病之脈堅而血及陷下者皆可捫而得也但寒痛論寒氣傷痛形傷腫故先痛而後腫者氣傷形也先腫而後痛者形傷氣也陰陽應象論寒有形而不痛者陽之類也無形而痛者陰之類也無形而痛者其陰完而陽傷之也急治其陰無攻其陽有形而痛者其陰完而陽傷之也急治其陽無攻其陰陰陽俱動乍有形乍無形加以煩心命曰陰勝其陽此謂不表不裏其形不久也痛隨利通則不痛痛則不通又云痛隨利減亦有當隨其經絡而通之則疼痛去矣如輕可去實麻黃葛根之屬是也謂如頭痛當用川芎細辛之類通之則無疑滯痛隨利減也海諸痛為實痛隨利減世多以下之為利也假令痛在表者實也痛在裏者實也痛在血氣者亦實也故在表者汗



之則愈在裏者下之則愈在血氣者散之行之則愈以  
以利為下乎作通字訓則可得矣故經曰通則不痛痛則  
不通此之謂也

運氣諸痛皆屬火經云諸疼痛皆屬於火是也

一屬火實經云火鬱之發民病骨痛節乃有動是也

一屬火虛經云火不及曰伏明伏明之紀其發痛是也

四諸痛皆屬火寒涼藥不可峻用必用溫散之藥 諸痛  
不可用人參蓋補氣氣旺則不通而痛愈甚矣

諸逆衝上

逆氣象陽全文見 凡氣逆必見象陽症面赤脈洪當以  
法降其逆愈者以氣象陽盛而用寒藥攻之則不救矣

氣上衝心咽不得息治法見傷寒厥陰病條

如秋冬之月胃脘四道為衝脈所逆并脇下少陽脈二

道而反上行病名曰厥逆經曰逆氣上行滿脈去形七神

昏絕雖去其形而死矣其証氣上衝咽不得息喘息有聲

不得臥於調中益氣加吳茱萸半錢或一錢觀厥氣多少

用之如夏月有此症為大熱也蓋此症隨四時為寒熱溫

涼宜以酒黃連酒黃柏酒知母各等分為細末熟湯為丸

如桐子大每服二百丸白湯空心下仍多飲熱湯服畢少

時便以美飲食壓之使不得胃中停留直至下焦以瀉衝

脈之邪也

寒氣厥逆赤丸主之

茯苓 桂心各四兩 細辛一兩 烏頭

附子各二兩 射罔如大棗

右六味為末內真珠為色蜜丸如麻子大先食酒飲下  
三九日三夜一服不知稍增之以知為度一方用半夏

逆氣五臟皆有

一曰心小腸經云諸逆衝上皆屬於火又云少腹控裏引

腰脊上衝心邪在小腸取之盲原以散之刺太陰以予之

取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調

之是也

二曰胃經云胃為氣逆是也胃逆有嘔有吐有噦故刺

吐取中脘三里也刺噦取乳下黑根盡處及臍下三寸皆

大驗也治各有本門

三曰肺大腸經云肺苦氣上逆急食苦以泄之又云腹中

常鳴氣上衝胃喘不能久立邪在大腸刺盲之原巨虛下

廉是也其肺逆曰咳喘取天突人迎泄之也治亦各有門

四曰肝經云肝氣逆則耳聾不聰煩腫取血者是也

五曰腎即奔豚氣逆脚氣衝心之類是也治亦各有門

六曰腎經云督脈別絡生病從少腹上衝心而痛不得前

後為衝疝是也治見

玉腎氣衝心 關元二寸 帶脈外二寸半

膈腹有逆氣上衝心腹脹滿不得息 氣衝右臍下七寸

逆氣厥逆有三

一曰風火經云少陽司天火氣下臨風行于地厥逆膈不

通是也

二曰寒經云水鬱之發善厥逆是也

三曰濕經云太陰司天濕氣下臨厥逆是也

下氣

仰上焦竭喜噫何謂也師曰上焦受中焦氣未和不能消  
是故能噫耳云云上焦不竭者噫而酢酸云云

一第 1020 册 續修四庫全書 第 16 反文句



焦之氣不至其部則物 噫屬心脾及二陽一陰經云心  
不能傳化故噫而噦吞 陰虛而上走於陽  
明陽明絡屬心為噫故曰上走心為噫也又云二陽一陰  
發病主驚駭背痛善噫欠也

寒熱 臣旋覆代赭湯治痞而噫方見傷寒卷門  
本心下蓄積痞悶或作痛多噫敗邪氣枳殼散主之

枳殼 白朮各半 香附一 檳榔二  
右為細末每服二錢米飲調下日三服不拘時候方見

丹宜州人與前方証皆除氣上築心膈噫氣稍寬脈之右  
關弱短左關左尺長洪大而數此肝有熱宜瀉肝補脾

青皮一 白朮半錢 木通 甘草分  
煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒  
噫氣胃中有火有痰

入 南星 半夏 軟石膏 香附

各等分水煎服  
運氣噫有三

一曰熱助心實而噫經云少陰之復噫噦是也

二曰寒攻心虛而噫經云太陽司天寒淫所勝善噫又云  
太陽之復唾出清水及為噦噫是也

三曰風攻脾虛而噫又云厥陰在泉風淫所勝腹脹善噫  
是也

針灸 針灸噫獨取脾經云脾足太陰之脈是動則病腹脹善噫  
視盛虛熱寒陷下取之也

診 仲甘口脈弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞  
酸食卒不下氣填於膈上  
臍寸脈緊寒之實也寒在上焦胸中必滿而噫 跌腸脈

微而澁微無胃氣清即傷脾寒在膈而反下之寒積不消  
胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胸膈上虛下實穀氣  
不通為閉塞之病 跌腸脈微澁及寸脈緊而噫者皆屬  
寒全文見 太陰中者腹脹閉噫氣嘔逆

下氣 下氣屬心虛經云夏脈者心也心脈不及下為氣泄者是  
也

河腸胃鬱結穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故善噫  
而或下氣也

診 痲痲勞若若氣下泄不止者必死此真氣竭絕腸胃膝  
理閉塞穀氣不能宣通於腸胃之外故從腸胃中泄出也

醫學綱目卷之十六  
三

醫學綱目卷之十六



醫學綱目卷之十七 心小腸部

諸見血門 衄血 久衄 產後衄

吐血 咳唾血 妊娠咳唾血 瘦血

妊娠尿血 下血 中壘下血

大法

衄血出於肺以犀角升麻梔子黃芩芍藥生地紫參丹  
參阿膠之類主之咯唾血者出於腎以天門麥門貝母知  
母桔梗白部黃梅遠志熟地黃之類主之如有寒者乾薑  
肉桂之類主之痰涎血者出於脾葛根黃芪黃連芍藥其  
草當歸沉香之類主之嘔血出於胃實者犀角地黃湯主  
之虛者小建中湯加黃連主之

榮之生病也寒熱少氣血上下行方見寒熱

帝曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出  
清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何何以得

八醫經卷之十七

之岐伯曰病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入  
房中氣竭肝傷故月事衰少不來也帝曰治之奈何復以

何術岐伯曰以四烏鯁骨一鹿茹二物并合之丸以雀卵  
大如小豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也

諸者見血無寒衄血吐血溺血皆屬於熱但血家症宜服  
生地黃以主之

生地 熟地 枸杞子 地骨皮

甘草 天門冬 黃芪 芍藥

黃芩

右剉每一兩水盞半煎一盞去渣溫服服微身涼惡風

每一兩加桂半錢吐血者多有此證

海龍腦雞蘇丸治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衄血熱驚

悸脾胃熱口其吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不定上  
而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩等疾

薄荷斤 麥冬去心 甘草 生薑

黃芪 新蒲黃炒 阿膠 黃連

人參 上俱未木通各二 銀柴胡 兩到同木通沸

右為細末好蜜二斤先煎一二沸然後下生地黃末不  
住手攪時加木通柴胡汁浸蒸成膏勿令火緊焦了然  
後加前藥末和丸如豌豆大每服二十九白湯下 虛

勞虛煩梔子湯下 肺熱黃芩湯下 心熱悸動恍惚  
人參湯下 唾咳吐血四血去心麥門冬湯下 肝熱

防風湯下 腎熱黃柏湯下 已上並食後臨臥服  
治五淋及婦人漏下車前子湯下 痰嗽者生薑湯下  
莖中痛者蒲黃滑石水一鍾調下 氣逆者橘皮湯下

八醫經卷之十七

室女虛勞寒熱潮作柴胡人參湯下

治吐血下血并婦人漏下雞蘇莖葉煎取汁飲之

胸中聚集之殘火腹裏積久之太陰上下隔絕脈絡部  
分陰陽不通用苦熱以定于中使辛熱以行於分升以甘

溫降以辛潤化嚴肅為春溫變燥烈為和氣汗而愈也然  
餘毒土直猶有存者周身陽和尚未泰然胸中微躁而思

涼飲因食冷物服涼劑陽氣復消陰再作脈退而小弦  
細而遲激而為衄血唾血者有之心肺受邪也下而為便

血溺血者有之腎肝受邪也三焦出血色紫不鮮此重沓  
寒濕化毒凝泣水穀道路浸漬而成若見血證不詳本源

便用涼折變乃生矣陰証下如肝

上而血者黃芪桂枝湯 白芍當歸湯

中而血者當歸建中湯 增損胃風湯



寒

下而血者尋端木附湯 桂附六合湯 若三血証在行陽二十五度見黃芪四君子湯主之 若三血証在行陰二十五度見當歸四逆加吳茱萸主之

寒

血證吐血衄血便血其人陰虛陽走其脈沉而散其外証虛寒無熱候宜烏金丸散止之法宜上用散下用丸次以木香理中湯加大七氣湯入川芎煎調蘇合香丸溫之運氣上下出血有四

一曰熱助心火甚而血湧沸也經云歲火太過炎暑流行肺金受邪民病血溢血泄又云少陽之復火氣內發血溢血泄王註謂血上七竅為血溢泄利便血為血泄者是也二曰寒攻心火虛而血逃亡也經云太陽司天寒淫所勝血變于中民病嘔血血泄衄血善悲又云太陽在泉寒淫所勝民病血見是也

三曰濕勝血亡經云太陰在泉濕淫所勝民病血見是也四曰寒熱凌犯血亡經云少陰司天之政水火寒熱持於氣交熱病生於上冷病生於下寒熱凌犯而爭於中民病血溢血泄是也

雜方治諸般血

血餘散治血淋兼治內崩吐血舌上出血小便出血用亂髮皂角水淨洗酒乾燒灰為末每二錢以茅草根車前草煎湯調下本草謂髮灰消瘀血通關格利水道破癥瘕血衄有人生血瘤大如栗常被衣擦破則血出不止用此血餘灰付之愈一人刀傷血流不止用胎髮灰付之亦愈孫真人九竅出血方荆葉搗取汁酒和服之九竅出血以刺刺一握絞汁以酒半盞和服之如無生者搗乾者為末冷水調三錢舌上無故出血如線用槐花炒研末用手搽之

牙齦血

舌上忽出血如簪孔者香薷汁服一升日三服用髮灰二錢米醋二合調服或付舌上血出孔處文蛤散治熱壅舌上出血如泉

五倍子 洗 白膠香 牡蠣粉各等

右為末每用少許搽患處或燒熱鐵烙孔上

治陰虛牙出鮮血氣熱以四物加牛膝香附生甘草側柏

牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宜露出血口氣等疾

當歸 藁本 地骨皮 防風

白芷 槐花 川芎 甘草炙

升麻 細辛各等

右為細末每用少許擦牙痛甚者取三錢水一盞半黑荳半合生薑二片煎至一盞去粗熱嗽冷吐之

治滿口齒有血枸杞根為末煎湯嗽後喫又治膈上吐血妙

齒縫中多出血當以鹽湯嗽又能益齒走血之驗也

齒痛斷出血夜以指厚付斷上有涎瀝盡乃臥延出時叩齒勿住十夜瘥忌魚肉

齒間出血不止苦竹茹以醋浸一宿含之

濃煎竹葉湯入鹽少許含之止濃煎茶含嗽亦妙

治牙血用附米白芷大黃三物燒灰以青鹽和擦之

治一切牙疼風熱齦常出鮮血以至崩落口臭不可近人者宜服之

大黃 生地黄 薄切

右二味旋切各用一片二片合定貼所患牙上一夜即愈未全可則再如前法用忌說話恐引風毒津液漬頂



處

無故牙動牙宣血出香附米用薑汁浸一宿晒乾為末嗽口搯齒令白且堅而不動無血矣 又方以楊梅樹皮濃煎湯嗽口勿藥神妙

治齒斷間津液出血不止以礬石一兩燒水三升煮取一升先拭齒乃合之

有人病齒縫中血出以紙擦離蟾酥少許於血出處按之立止

治虛氣攻牙齒痛血出牙斷痒痛骨碎補二兩細剉炒令黑色杵末依常盥漱後搯齒斷下良久吐之臨臥後嗽之無妨

耳中血 治耳中出血以龍骨末吹入即止

病者汗出汚衣名曰汗血皆由大喜傷心喜則氣散血隨氣行婦人產後有此證治以律草汁

律草 不拘多少俗名葛勒蔓也蔓生葉似草麻而小葉有細刺花黃白子如麻子  
右搗汁二升醋二合和空腹飲一盞或煮濃飲亦治沸瀝尿血

右九竅血舌血牙血汗血不愈又當於衄血吐血條相參用之

衄血吐血下血婦人下血不止 隱白五分 又法 隱白 太陵 神門各五分 太溪七分

婦人經脈妄行鑽心脇疼妄行於上則衄血中則吐血下則下血 癰門乙分治 巨缺一分治 氣海五分治 中極三分 二陰交五分

血證與黃證俱頭汗出 衄血溢上行或唾或嘔或吐皆凶也若變而下行為惡利

者順也血上行為逆其治難下行為順其治易故仲景云 畜血症下血者當自愈意同若無病之人忽然下利者其病進也今病血症上行而復下行惡利者其邪欲去是知吉也

脈沉為在裏榮衛內結胸滿必吐血

大脈浮目睛黃赤未止暈黃去目睛慧了知衄今止 病人面無血色無寒熱脈沉弦者衄也浮弦手按之絕者下血煩欬者必吐血 心脈微瀆為血溢 肺脈微瀆為衄血 肺脈微瀆為上下出血

脈弦而大弦則為減大則為乳減則為寒乳則為虛虛寒相搏此名曰革婦人則半產漏下男子則亡血失精

衄而不止脈大而逆也 衄而不至脈大而逆也 衄而不至脈大而逆也 衄而不至脈大而逆也

病若吐血復熱衄脈當沉細反浮大而牢者死 吐血衄脈滑弱者生實大者死 汗出若衄其脈滑小者生大躁者死

衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也

衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也

衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也

衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也

衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也

衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也 衄血胸滿引背脈小而疾者逆也

黃芪六 赤茯苓 白芍藥各三當歸



生地 阿膠炒各三錢

右為細末煎黃芪湯調下三錢未止再服。

治血衄不愈以三稜針於氣衝上出血立愈更服此藥尤效。

五味子十粒 麥門冬去心五分 當歸五分 黃芪錢一

生地三分 人參五分

右吹咀作一服水二盞煎一盞空心熱服。

鼻血不止諸方不效糯米炒微黃為末新水下二錢此方甚妙。

治鼻衄出血眩暈欲死燒亂髮細研水服方寸七須臾吹鼻中瘥。

衄血先服朱砂粉次服木香黃連大便結者下之用大黃芒硝甘草生地瀉軟者梔子黃芩黃連可選用之。

熱 實

衄血以涼血行血為主 犀角地黃湯入鬱金同用丹

治咯血衄血白芍藥一兩犀角一分為末新水服一錢七衄止為限。

畫粉散治鼻衄血不止一二服除根白土即畫匠所用畫粉研極細每服五錢新井水調服立止。

人中白為末白湯調服治衄累效。

羅生地黃湯治鼻衄昏迷不省。

衄血不止麥門冬飲子 麥門冬去心 生地黃

右切水煎服。凡治鼻衄及膈上熱盛乾地黃龍腦薄荷等分為末冷

水下

鼻衄服散有熱。

人參三分 黃柏炒二分 黃連五分 地黃錢一

相火所制然也宜生料雞蘇散治之。

雞蘇葉 黃芪錢一 生地 阿膠

白茅根各一兩 麥門冬去心 桔梗 蒲黃炒

右吹咀每服四錢薑三片水煎服。

治大熱衄血用萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時時細呷丹溪云萱草屬水性下行陰分

鼻血貫仲根細末水調一錢七立止。

寸金散治鼻衄不止。

黃藥子五錢 土馬磁半兩有 生甘草各一錢

右為細末每服二錢新水調下未止再服立瘥本草云馬磁生垣牆之上背陰去牆上多有之

治鼻衄不止黃藥子為末每服二錢七煎薄荷湯下良

久以新汲水調麩末二匙頓服之。

衄血用蚌竹木米飲調服驗。 膈移熱於腦則辛頰鼻淵傳為衄全文見診 定命散治膈受熱熱血妄行鼻中衄并血汗不止。



**寸口脈微苦寒為衄宜服五味子湯** 磨萊萸帝令汗出

予男衄寸口脈微小用寒涼藥不止後用小建中湯加梔

**七叔婆鼻寒時有血些少出**

羌活 獨活 防風 升麻

乾葛 蒼朮 陳皮 甘草

白芷 麻黃 黃芪

分二貼入開口紅椒七粒寒二枚去核蔥白三根水二

盞煎取淺蓋稍熱飲之

藏府 春善病衄

從春至夏衄者太陽從秋至冬衄者陽明

衄血不止以養胃湯一貼煎服效 一方治衄血妄行

用百藥煎半燒半生和水酒調服

**茜梅丸治衄血無時**

散者殺

茜草根 艾葉 烏梅肉

右為細末煉蜜丸如桐子大烏梅湯下三十九

運氣衄有三

一曰熱助心火而血溢為衄經云少陰所至為衄衄又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從衄衄鼻窒又云少陰司天熱淫所勝民病衄衄又云少陽司天三之氣炎暑至其病血溢衄衄又云少陽司天火氣下臨肺氣上從衄衄鼻窒又云少陽司天火淫所勝病甚則衄衄又云少陽之復太

熱將至欬衄必也

二曰寒攻心火而血逃為衄經云太陽司天寒淫所勝

血血泄衄衄善悲時眩仆也

辨方

三曰寒熱相逼而衄經云陽明司天之政初之氣陰始凝氣始肅民病中熱衄衄此外寒鬱內熱而衄也又云少陰司天之政四之氣寒熱互至民病衄此下寒迫上熱而衄也

**衄血白芨末新汲水調下神妙**

御院醫官散治鼻衄不止

白礬 白龍骨 麝香

右三味杵和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕然後吹藥於鼻中或以濕紙蘸藥塞鼻尤妙

**治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍骨末吹一豈許**

於鼻中立止

**榴花百葉者主心熱吐血及衄血等乾之作末吹鼻中立**

**立瘥** 亂髮微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒

驚癩止血鼻衄燒之吹鼻內立已

**山梔不拘多少燒存性為末搐入鼻中立愈** 蔡子渥傳云同官趙無疵其兄衄血甚已死入殮血尚未止偶一道人過聞其家哭詢問其由道人云曾服丹或燒煉藥予有藥用之即出此藥半錢七吹入鼻中良久得活併傳此方

**治鼻衄人中白係尿缸結者燒灰少許吹入鼻中**

**鼻衄過多昏目欲死用香墨濃研點入鼻中**

**鼻衄血龍腦研塞立止入豉尤妙**

**勝金治衄血以蔥白一握搗汁投酒少許抄三四滴入鼻**

**中瘥**

**無白芨散治鼻衄立效** 白芨不以多少為末冷水調用紙

花貼鼻中 一方用黃膠湯浸令軟貼鼻中

**治鼻衄久不止或素有熱而暴作者諸藥不效神法以**



大白紙一張作十數摺於冷水內浸濕置頂中以熱熨斗

熨之至一重或二重紙乾立止

治鼻血不止服藥不應宜用蒜一枚去皮細研如泥攤

一餅子如錢大厚一莖許左鼻血出貼左脚心右鼻血出

貼右脚心如兩邊俱出貼兩脚心即瘥血止即以溫水洗

去之 一法用紙團兒右衄塞左耳左衄塞右耳 又冷

水調白麪飲之

治衄不止百藥不效因心憂慮得者急縛兩手中指上立

止

針灸衄取四經

其一取足手太陽經云衄而不流血取足太陽大衄衄

血取手太陽不已取宛骨下不已刺腦中出血又云膀胱

足太陽之脈所生病者衄衄項背腰尻腫痛視盛虛熱

寒陷下取之又云足太陽之別名曰飛陽去踝七寸別走

少陰虛則衄衄取之所別也

其二取足手陽明經云胃足陽明之脈所生病者衄衄又

云大腸手陽明之脈所生病者目黃口乾衄衄皆視盛虛

熱寒陷下取之又云邪客於足陽明之絡令人衄衄上齒

寒刺足中指次指爪甲上與肉交者各一病左刺右右刺

左

衄血 瘖門分三 合谷 內庭

又法 瘖門 三里 照海分五

又法 三里 外關瀉 重者風府

又法 風府 上星 百勞 合谷不已取後穴 迎

香人中 印堂

口鼻出血不止 上星灸三報穴

虛 診

頭腦中寒鼻衄目泣出神庭主之 衄血不止承漿及

委中主之 衄衄腰脊胸膈痠重戰慄不久立臑如裂脚

急跟痛足攣引少腹痛咽喉痛大便難腫脹承山主之

頭重鼻衄反痰涎汗不出煩心足下熱不欲近衣項痛目

醫及小便皆不利至陰主之

診衄法見諸見血門

久衄

世久衄炒糯米為末水調服神妙詳見

黃芪芍藥湯治鼻衄血面多黃眼溢多眩手麻木張彥

明男衄血多成不效用此方

黃芪 甘草 升麻 葛根

羌活 白芍 升麻 葛根

右為鹿木每服半兩水二盞煎至一盞去渣溫服二十

五貼而愈六脈細弦而滿按之空虛其色必白而天不

澤者脫血也此大寒証以辛溫補之以養血以甘溫潤

之劑佐之即愈此脫血傷精氣之証也六脈俱大按之

空虛心動面赤善驚上熱乃手少陰心之脈也此因氣

盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜浮氣以

辛溫微苦峻補其血再用三黃補血湯

三黃補血湯

熟地 生地 當歸 柴胡 各錢

白芍 藥五 川芎 牡丹皮 升麻

黃芪 各一錢 補之治 右為鹿木每服半兩水二盞煎五沸去渣溫服食前兩

手脈花兩頭則有中問全無而虛曰衄血至胸中或衄

血吐血以犀角地黃湯主之



地黃散治衄血往來久不愈

生地 熟地 枸杞子 地骨皮各等

右為細末每服二錢蜜湯調下日三服

治鼻血常發者於發時用生薑碎碎合額上一日如痒就搔之永不再發

治人少小鼻衄小勞輒出鼻耳無多少炒令焦搗末每血發以杏仁大塞鼻中數度可 大病後後小勞便鼻衄壯礪一分石膏五分搗末酒服方寸七日三四服亦可蜜丸如桐子大服之

產後衄

產後口鼻黑起及鼻衄者名曰胃絕肺敗此証不可治遇有此疾急取緋線一條并產婦頂心髮兩條繫係中指節即止 治產後鼻衄中風以刺芥為末重便調下神驗此方氣虛人勿用

吐血

治吐血以人參一味為末雞子清投新汲水調下一錢服之千金

人參救肺湯治吐血亦用

人參 升麻 柴胡 歸稍 蒼朮各一 熟地 白芍藥 黃芪各二 陳皮 蘇木 甘草各五

右為籠末作一服水二盞煎一盞去渣稍熱食前服必勝散治血妄流溢或吐或衄

小蘗用 人參 蒲黃 當歸 熟地 川芎 烏梅去核各 右咬咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

保羅蘇散治虛損氣逆吐血不止

雞蘇葉 黃芪 刺薊 生地 黃芪各一 當歸 赤芍藥各半 阿膠 伏龍肝二

右為籠末每服四錢薑三片竹茹彈子大水同煎丹朱富六因辛苦吐血或衄夜間發熱口乾身疼食少當作虛勞治

白朮六錢 人參 青皮炒 生地 芍藥 陳皮 歸尾 甘草炙半 川芎三 紅花五分

分十貼水二盞煎至三之一食前稍飲下保和丸十四粒與點丸十粒 婦人年五十餘管吐血今又作面黃身蠕動食少

青皮兩 人參三錢 白朮 陳皮各三 白芍藥 木通各二 黃連炒 乾薑 黃芪炒 川芎各錢 黃柏炒一 生甘草

分七貼水二盞煎至三分之一去渣入藕汁半盞再煎沸通口飲之

夫口鼻出血皆係陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經也 大補血丸治陰虛吐血

當歸一 生地一錢 右以杜牛膝汁浸三日取起酒洗淨入臼內杵千杵為丸桐子大白湯下

治吐血神效方生地黃汁一升二合白膠香二兩以磁



器盛入甌蒸令膠消服妙 一方獨用生地黄汁半升飲之立止神妙

五神湯治婦人熱毒上攻吐血不止 生藕汁 刺刺汁 生地黄各二 生薑汁半

右和煎三兩沸無時以一小盞調炒麪一錢食前服 治心熱吐血口乾獨用刺 刺刺汁一盞服

四生丸治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行 生荷葉 生艾葉 生栝葉 生地黄各等

右研爛丸如雞子大每服一九水三盞煎一盞濾過溫服 經治吐血咯血一味荷葉倍乾為末米湯下二錢

治吐血咯血蒲黃一兩搗為散每服三錢溫酒或冷水 治吐血或血腥或吐血用韭菜汁服立效

調服妙 治吐血茜草一兩生搗羅為散每服三錢水一盞煎七分放冷食後服

治內損吐血飛羅麪不以多少微炒濃磨細墨一匙茶調下二錢立效 又方治吐血用松烟墨磨汁服立效

治大吐血好墨細末二錢以白湯化阿膠清稠稀得所 頓服熱多者尤相宜

先見紅後見痰多是陰虛火逆痰不下降四物湯加痰火藥

治火血上錯經妄行四物湯加炒山梔童便薑汁此後諸便薑汁雖無痰 治吐血衄血用鬱金為末以童便薑汁

好酒調服一方不 治吐血紅山茶花陰乾為末每服一錢用童便半鍾生薑汁少許調服

治吐血鼻紅生薑二分絞汁并壯健丈夫小便一升乘

熱頓飲瘥 又方以童便一分酒半分搗栝葉溫飲之 吐血痰積方可下若一碗兩碗吐者只補陰降火用四物大劑之類挾痰若用血藥則泥而不行只治火其血自止山梔最清胃脫血

吐血者由憂思諸氣鬱極方散而生熱則心血妄行宜玄明粉加黃丹服之次用四物解毒加藕節治之如前症之熱並宜清之

心氣不足吐血衄血瀉心湯主之 亦治 大黃二 黃連 黃芩各一

右三味以水三升煮取一升頓服之 雲岐子犀角地黃湯治寸花血在上焦 生地二 黃芩一兩 黃連一兩 大黃兩

右吹咀秤一兩水二盞煎去查食後服之 治吐血川大黃一兩搗為散每一錢生地黄黃汁一合水半盞煎三五沸無時服

吐血覺胸中氣塞上吐紫血桃仁承氣湯下之 馮鼻氣上奔吐血心膈疼 枳殼三 青皮二 生地 木通

牡丹皮半錢 桃仁二十 川芎 黃芩 黃連一 甘草少 生乾薑 桔梗

分四貼煎服 或暴吐紫血一碗者無事吐出好此熱傷血死肝中宜服四物解毒之類

治墜馬積血心胃唾血無數乾荷花根為末酒服方寸七日三服



**加味芩歸湯**治打撲傷損敗血流入胃腕嘔吐黑血或如甘菜汁

川芎 當歸 白芍藥 百合水浸半日

右劉散每四錢水一盞酒半盞煎七分去查不拘時候  
**夫酒客**飲者必致吐血此因極飲過度所致也此即肺

道之屬

**吐血**有三種有內衄有肺疽有傷胃內衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間津液出還流入胃中或如荳羹汁或如切嫩血凝停胃中因即蒲悶便吐或去數斗至一石者是也得之於勞倦飲食過常也 肺疽者或飲酒之後毒滿悶吐之時血從吐後出或一合半升一升是也 傷胃者因飲食太飽之後胃中冷不能消化便煩

悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝臟因傷裂胃口吐血色鮮正赤腹亦絞痛自汗出其脈緊而數者為難治也

八醫學綱卷十七 七

**理中湯**能止傷胃吐血以其方最理中脘分利陰陽安定血脈海藏亦云飲冷傷脾吐血以理中湯理治中脘分利陰陽此亦理治內衄之法也方見傷寒

二合灰散治因啖辛熱嘔吐出血一合或半升許名曰肺疽

紅蓮和核燒存性 百藥煎各等分

右為細末每服二錢米飲調下

除濕湯治胃雨着湯鬱干經絡血溢作衄及血溢流入胃胃滿吐血

茯苓 乾薑各四分 甘草炙 白朮各二分  
右劉每服四錢水一大盞煎八分去查服頭疹加川芎

二錢最止浴室中發衄此方治胃雨吐血理中湯治傷大吐血不止亦用乾薑一味炮為末重便調

男子年十七家貧而多勞十一月得寒病時吐三兩口血六脈緊澹一日食減中痞醫投溫膽湯枳桔湯三日後發微熱口乾不渴口中有痰此感寒也詢知云因十日前霜中曾渡三四次溪水心下有悲泣事腹亦飢遂以小建中湯去芍藥加桔梗陳皮半夏四貼而安 又方治吐血

以交趾桂五錢為末冷水調服亦小建湯治感寒吐血之義經云太陽司天寒淫所勝血變于中嘔血泄血孰舛平以辛熱者即理中建中用乾薑桂枝治吐血之類皆同也

吐血挾熱者治法並見血虛 治嘔血黃栢好者以蜜塗炙乾杵末用麥門冬熱水調下二錢七立瘥

八醫學綱卷十七 六

**治心熱吐血不止**生葛根搗汁半大升頓服立瘥

吐血挾寒者多是口食寒物身受寒氣之病治法並見內傷飲食外感雨寒條

吐血不止栢葉湯主之

栢葉 乾薑各二分 艾三

右三味以水五升取為通汁一升合煮取一升分溫再服

**治吐血鼻衄不止**伏龍肝半升以新汲水一大升淘取汁和蜜頓服

運氣血溢有五

一曰熱助心血沸而溢經云少陽司天之政初之氣候乃大溫其病氣沸於上血溢又云少陰司天客勝甚則血溢又云少陽司天客勝則血溢又云火鬱之發民病血溢治



以酸寒是也

二曰寒攻心血逃而溢經云太陽司天之政寒濕之氣持於氣交民病血溢治宜苦以燥之溫之也

三曰內火格拒外寒壅遏而血溢經云少陰司天之政終之氣燥令行餘火內格甚則血溢是也

四曰風濕相薄血溢及下寒相薄蒸熱於上而血溢經云太陰司天之政物之氣風濕相薄民病血溢此風濕相薄

血溢也四之氣畏火臨濕蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄民病騰理熱血暴溢此地氣之寒相薄天氣

蒸熱於上而血溢也  
五曰燥邪攻肝血溢經云歲金太過燥氣流行病反側欬逆甚而血溢是也

傷肝  
夫傷肺者脾氣不守胃氣不清經氣不為使真藏壞矣

經脈傍絕五臟漏泄不則則嘔示能容輸口傷肺即傷氣當於氣虛不能攝血條參

門冬飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少血吐血

五味子五箇 甘草 芍藥 黃芪各一錢

紫苑半錢 人參 婦身 麥門冬

右為籠末作二服水煎食後服

天門冬丸治吐血咯血能潤肺止咳  
天門冬 甘草 杏仁炒 貝母  
白茯苓 阿膠各六兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸嚥津含化日夜十九

酒色過度飢飽吐血痰血神妙  
枇杷葉 欵花 北紫苑 杏仁去雙仁皮尖

鹿茸法如桑白皮

右煉蜜丸臨臥合化

經云怒則氣逆其則嘔血故氣上矣又云陽氣者大怒則形氣絕而血苑於上使人薄厥此皆怒則傷肝氣而嘔血以黃連香附青黛梔胡甘草平其肝自愈矣宜服赤茯苓瀉心湯

四治嘔血咯血衄血肝損白芨為末米飲調服神妙

治吐血解葉搗末每服二錢水一盞煎七分和查服中蠱毒吐血見下

刺灸吐血有二  
其一取肺經云暴痺內逆肝相搏血溢鼻口取天府是也其二取筋經云手太陽筋病當所過者支轉筋痛甚成息奔脇急吐血治在燔針劫刺以知為數以痛為諭是也

八寶藥綱卷七

嘔吐血 風府 大椎 鬲俞 肝俞各五分瀉

又法 胃脘中 肝俞各沿皮

又法 寬中 中脘 氣海 三里 乳根 支溝 不取穴肺俞 腎俞 心俞 膏肓 關元

嘔血太陵及郄門主之 嘔血上氣神門主之 心下

有膈嘔血上腕主之 嘔血肩急脇下痛口乾心痛與背相引不可欬欬則肩痛不容主之

肝脈太甚為內癢善嘔全文見治診吐血法見前諸虛實法

咳唾血 咳唾血 痰盛 身熱多是血虛



血熱

七傷散治勞嗽吐血痰

黃藥子 白藥子 各一兩 赤芍藥 七錢 知母

玄胡索 各半兩 鬱金 二錢 當歸 兩 山藥

乳香 沒藥 各二錢 血竭 各二錢

右為末每服二錢茶湯下 本草云黃藥子白藥子治肺熱有功○一法紅花當歸前

恩袍散治咯血吐血及治煩躁

真生蒲黃 薄荷 各一兩

右研勻細每服三錢濃煎桑白皮湯調下

地黃散治一切吐血咯血能解一切毒及諸熱煩躁

茜草根 四兩 大豆子 黃藥子 甘草 各二兩

右為細末每服二錢新汲水調下加入參二兩治痰嗽有血

八醫類卷七 三

痰帶血絲出重便竹瀝主之 又方用韭汁童便二物

合和加鬱金細研入內服之其血自消 經血逆行或血

腥吐血唾血非汁服立效咯血用薑汁童便膏薰入血藥

中加四物湯牛膝膏地黃膏之類

治一切肺病咳嗽膿血及唾膿血不止方好酥三十斤

煉取凝當中醃服一合日三升即止一切藥皆不及此

方 甘桔加阿膠紫苑湯治肺痿唾膿血方見傷寒

肺疾膿血取薏苡仁十兩杵碎以水三升煎取一升入

酒少許服之 本草云薏苡仁下

大阿膠丸治嗽血唾血

阿膠 卷栢 生地 熟地

大薊 雞蘇葉 五味子 栢子仁

茯苓 百部 遠志 人參

麥門冬 防風 乾山藥

右為細末煉蜜丸如彈子大煎小麥麥門冬湯嚼下一

丸食後

右方保養精血純補劑也血虛者宜之

治上氣喘息咳嗽吐血咯血人參細末雞子清調三錢

五更初服便去枕睡仰臥只一服愈年深再服忌酸醃酢

醬麪等物及過醉飽須好將息 一男子三十歲因連夜

勞倦不得睡成一痰嗽出白黃膿嗽聲不出時初春大寒

醫與青龍湯四貼遂覺咽喉有血絲腥氣逆上兩日後血

腥氣多遂有血線一條自口中右邊出直上如此每晝夜

十餘次診其脈弦大而散弱左大為甚人倦而苦於嗽予

作勞倦感寒強以甘辛燥熱之劑以動其血不宜急治恐

成肺痿遂與人參黃芪當歸身白朮芍藥陳皮炙甘草生

甘草不去節麻黃煎熟入藕汁與之兩日而病減嗽止却

於前藥去麻黃又與四日而血症除脈之散大者未收飲

人亦倦甚遂於前藥中除藕汁加黃芩硝砂半夏至半月

而安

切勞散治肺痿痰嗽痰中有紅線益汗發熱熱過即冷

飲食減少

白芍藥 黃芪 甘草 人參

當歸 半夏 白茯苓 熟地

五味子 阿膠

右咳阻每服三錢水盞半生薑二片葱三枚煎九分無

時溫服日三服日華云有女及笄病甚危一歲之間百

藥無效偶得此方只一料除根

八醫類卷七 三



五味子黃芪散治嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦脚膝無力

麥門冬 熟地 黃芪 桔梗各半

甘草分 白芍藥 五味子分 人參錢二

右為籠末每服四錢水煎日三服

雲岐子苓散涼心解勞熱

黃芪兩 白芍藥 黃苓 人參

白茯苓 麥門冬 桔梗 生地各半

右為籠末先用竹葉一握小麥七十粒水三盞薑三片煎一盞半入藥末三錢煎七分去查溫服

席延賞治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾又不可服涼藥好黃芪四兩甘草一兩為末每服三錢如茶點羹粥中亦可服

右參芪剉純補劑也丹溪云脈大發熱為氣虛此氣血俱虛者宜之若血虛而氣不虛者不宜當用前阿膠丸之類及汚血條求之

婦人五十六歲盛夏吐紅痰有一二聲嗽

人參錢一 防風分五 白木錢一 陳皮

茯苓各一 乾薑分三 生甘草分一 桔梗錢半

右煎二之一入藕汁二大蛤再煎帶熱下三黃丸

王北四丈發熱腸痛咳嗽紅痰口渴大便便秘忘脈稍數而虛詢之發熱曾飲水一碗病因飲食不節成積痰發又飲冷水傷胃成虛傷肺成痰

白木半錢 人參 陳皮 川芎各一

芍藥 茯苓 桔梗 甘草各五

右作二貼煎取八分入竹瀝二分煎沸熱飲下龍

九壯丸如嗽二十九

右丹溪參朮藕汁竹瀝法也

脈大發熱喉中痛者是氣虛用參芪蜜炙黃柏刺木地黃當歸非汁重便薑汁磨鬱金飲之其血自消

右參芪加鬱金非汁重便補中解鬱也

黃芪錢甲散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忡日晚潮熱夜有盜汗胸膈不利食減多渴咳嗽粘時有膿血

黃芪兩 素白皮 半夏 黃苓

甘草分 知母 赤芍藥 紫苑各五

秦艽 白茯苓 生地 柴胡

地骨皮各六錢 肉桂 人參

桔梗各三錢 鱉甲去裙 天門冬各一兩

右為籠末每服二大錢水一大盞食後煎服

人參黃芪散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱咽乾頰赤心忡潮熱盜汗減食咳嗽膿血

人參兩 秦艽 茯苓各二 知母二錢

桑白皮兩 桔梗兩 紫苑 柴胡二兩

黃芪兩 半夏兩 鱉甲去裙 紫苑

右為籠末每服三錢去查服

右參芪整甲例補中有通也

人參蛤蚧散治三二年間肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿連日

杏仁去皮尖

貝母

知母

素白皮各二

茯苓

甘草分三 人參

知母

素白皮各二



右為細末磁器內盛每日如茶點服神效

蛤蚧補肺勞虛嗽有功效治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛用蛤蚧

阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一兩除膠外皆為屑次入膠分四服每服用河水三升於銀石器內慢火煮至半升

濾去查臨臥微溫細呷之其查候服盡再提都作一服以水三升煎至半升如前服病人久虛不喜水當減水

右蛤蚧例亦補中有通久嗽不愈者宜之

麥門冬湯治傷寒後傷肺欬唾膿血胸膈脹滿上氣羸瘦

麥門冬心 桑白皮 生地 半夏 紫苑 桔梗 淡竹茹 麻黃 五味子 甘草 右為庵末每服五錢水二盞生薑二錢半棗三枚劈破

同煎去查食後溫服

續斷散治骨蒸勞熱傳尸瘦病潮熱煩躁喘嗽氣急身疼盜汗兼治咳嗽唾膿血

續斷 紫苑 桔梗 青竹茹 五味子 生地 桑白皮 甘草 赤小豆 右為庵末每服三錢入小麥五十粒水煎去查日三服

紫苑散治欬嗽唾血虛勞症肺痿癆瘵

紫苑 人參 知母 貝母 桔梗 甘草 五味子 茯苓 阿膠

右為庵末生薑水煎服

右門冬五味例亦補中有通也

外療傷唾血方用茅根一味服方寸七日二服亦可絞汁飲之主熱渴

治勞瘵傳尸寒熱交攻久嗽咯血日漸羸瘦先服三拗湯與蓮心散萬不失一

三拗湯 麻黃 甘草 杏仁 右到碎薑煎服

蓮心散 當歸 黃芩 甘草 枳殼 前胡 柴胡 防已 阿膠 蓮肉 南星 川芎 芫花 右十三味吹咀合和獨芫花另包每服二錢半水一小盞半生薑三片棗一枚入芫花一撮煎八分服無時須

吐有異物後芫花漸減蓋芫花反甘草多之所以殺虫少之所以去寒熱妙處在此

治勞瘵吐血損肺及血妄行神傳膏用剪草一斤萎台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨

洗為末加入生蜜一斤和為膏以器盛之不得犯鐵九蒸九曝日一蒸曝病人五更起面東坐不得語用匙挑藥如

粥服每服四匙良久用稀粟米飯壓之藥冷服粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋

常咳嗽血妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其

算人常以此方界之九日而藥成前一夕病者夢人戒令

翌日勿亂服藥次日將服之為屋上土墜器中不可服再

合既成又將服之為猶覆器又不得服又再合未就而是

人卒矣此藥之異如是若小小血妄行一啜而愈或云是



陸農師夫人鄉人艾平先嘗親說此事渠後作大觀本草亦收入集中但人未識不肯信爾

療咳逆唾膿血雞子湯

雞子一箇 甘草二分 甘遂一分 大黃二分 黃芩二分

右用水六升煮取二升去杏內雞子攪令調盡飲之良忌海藻松菜

○和 臆湯劉氏一男子年二十餘歲病勞嗽咯血吐唾粘臭近不可聞秋冬少緩春夏則甚寒熱往來日晡發作狀如痰瘧寢汗如水累服麻黃根敗蒲扇止汗汗自若也又服寧神散寧肺散止咳嗽自若也戴人先以獨聖散湧其痰痰狀如雞黃汗隨湧出昏憤三日不省時時飲以涼水精神稍開飲食加進又與人參半夏九桂苓甘露散服之不數日愈

台州林德方年二十餘歲得嗽而咯血發熱肌體漸瘦

衆醫以補藥調治數年其症愈甚予診其六脈皆虛予曰此好色而多怒精血耗少又因補藥太多榮衛不行汚血內積肺氣壅遏不能下降治肺壅非吐不可精血耗少非補不可惟倒倉二者俱備但使之吐多於瀉耳兼灸肺俞五次而愈

雞蘇丸治虛熱昏憤倦怠下虛上熱嗽血衄血

雞蘇葉一斤 黃芪一斤 甘草 川芎各半

防風 枳椇 荆芥 甘菊

生地 腦子 右為細末煉蜜丸如彈子大每服一九麥門冬去心煎

湯嚼下若肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不得喘嗽痰

瀉或發寒熱小便赤澀加車前子二錢用桑枝剉炒香煎湯下

脈浮大者作虛治宜虛條下參芪諸方主之若浮大而上熱者宜此雞蘇丸方 脈沉滑有力者作實治宜實條諸方主之

○先痰嗽後見紅多是痰積熱降痰火為急 痰涎帶血出此胃口熱血蒸而出重則山梔輕則藍實 荆芥能散喉管痰血

效血方 青黛 瓜萎實 訶子 海石 山梔

右為末薑汁蜜調噴服嗽甚加杏仁後以八物湯加減調理

鄭仲本年二十三歲因心痛服丹附等藥得上氣病膈兩脇急迫脹觸不快便時嗽咯出血病形漸瘦大便燥而難脈弦數夜同身熱食稍減因與燈籠草和節麻黃細末以白朮桔梗木通甘草湯調下十餘服病減半又與通聖散去石膏為丸以桃仁湯下之

○治咯血黃藥子漢防已各一兩為末每服一錢七水一盞小麥二十粒同煎食後溫服

朱砂高鎮心安神解熱及肺損嗽血等疾

蒼朮二錢 朱砂 生犀 人參 玳瑁 甘草 珍珠 牛黃

麝香 龍腦 南鵬砂 琥珀 羚羊角 安息香 蘇合香油

各一兩

各一兩

各一兩



右為末煉蜜破蘇合香油劑諸藥為小錠子更以金箔  
裹之磁器收貯每服一皂子大食後化備尉葉丞得  
效并阿膠九相雜服此藥治血安神更勝至寶丹每兩  
作五錠子

肺熱咳唾血惟七傷散用黃藥子白藥子最有效方見血  
鬱血汚條又脈浮數忌灸若誤灸之必吐血仲景云脈浮  
熱甚反灸之必咽燥唾血是也 孫兆因博士王珣患咽  
喉乾塞胸膈不利時發寒熱夜多盜汗忽心胸塞悶咳血  
三數日即止晚後脈數口乾涎唾稠粘咳嗽一二聲不透  
肩背微痛當於關元氣海中腕三里等穴着艾不詳病得  
之肺虛其狀中容熱症皆因誤灸服暖藥所致遂與外臺  
第一廣濟紫花湯為九合服之立效方未

百部九主諸咳不得氣息唾血方

人醫藥類卷之七 无

百部根二 升麻兩 桂心 五味子

甘草炙 紫苑 乾薑各一

右七味蜜九桐子大每服三十九日三次知為度忌生

蔥海藻菘菜

療肺偏損胸中虛肺偏痛唾血氣欬欬冬散

款冬花 當歸各六 桂心 芫蕪

五味子 附子各七 細辛 貝母各四

乾薑 生地各八 白朮 甘草

杏仁各五分 紫苑三分

右共為末清酒服方寸七日二服忌生蔥生菜桃李雀

肉海藻菘菜猪肉蕪荑

按唾血咳血屬寒者少今此二方用其附熱劑蓋為腎

足少陰脈是動病咳唾血者設也用者審之

肺傷者其人勞倦則咳唾血其脈細緊浮數皆吐血此  
為躁擾噴怒得之脈傷氣壅所致

經云肺脈不及則令人喘呼吸少氣而咳上氣見血下者  
此病皆肺虛咳唾血之症治法並見氣虛條

治虛勞久嗽咯血用五倍子焙為細末每服一錢用溫茶  
一大口許調勻食後米飲半盞調服

肺經嘔咳諸血及痰中有血初用生蘿蔔汁半盞入搗  
少許服之立效如無生蘿蔔用蘿蔔子一錢蘇葉一錢同  
煎服次用雞蘇散加阿膠治之 本草云蘿蔔大下氣

治咳嗽甚者或有吐血鮮素白皮一斤米泔浸三宿淨  
刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾一處搗為末每服一二  
錢米飲調下此方神效

治久嗽咯血成肺痿及吐白涎胸膈滿悶不食區豆散

區豆 生薑各半 枇杷葉去毛 半夏

人參 白朮各一 白茅根三分

右剉水三升煎一升去渣下檳榔末一錢和勻分四服  
不拘時候

治上氣咳喘喘息喉中有物唾血方

生薑汁 杏仁各二 糖 蜜各一

猪膏二 右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令淨搗如  
膏和薑汁蜜糖等合煎令可九每服如杏仁一枚日夜  
六七服漸次增加

右後二方生薑多肺虛及汗多亡陽與血下便者忌用

少陰所謂咳唾則有血者陽脈傷也

運氣咳唾血有二

腎傷

血

運氣



一曰熱傷肺經云少陰司天熱淫所勝民病唾血又云少陽司天火淫所勝病欬唾血治以酸寒是也  
二曰濕傷腎經云太陰司天濕淫所勝咳唾則有血治以苦熱是也

**丹** 治咯血用白芨一兩藕節半兩為細末每一錢湯調服神效或云芩下咽至血竅則竅塞芩末填而血止也

**山** 咯血新綿灰半錢酒調下

**針灸** 針灸唾嗽血毒取足少陰一經經云腎足少陰之脈是動則病咳唾有血視盛虛熱寒陷下取之也

**東** 吐血內損  
地五會三分灸 魚際五分 尺澤一寸

**甲** 唾血時寒熱瀉魚際補尺澤 唾血振寒陰乾大淵主之 內傷唾血不足外無骨澤地五會 胸脇脹滿咳逆

**外** 治上氣唾膿血灸兩乳下黑肉際各一十壯

**仲** 寸口脈數其人咳口中及有濁唾涎沫者何師曰此為肺痿之病若口中辟辟燥咳即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰 咳唾膿血脈數虛為肺痿數實為肺癰

右肺痿唾膿血治法散見本門諸方若肺痿但唾涎沫無膿血者見咳嗽門

肺脈微急為肺寒熱急情咳唾血引腰背胸若鼻息肉不通證云急者多寒

肺脈搏堅而長當病吐血王註云肺虛極則咯逆

唾血脈強者死滑者生

手少陰筋病內急心承伏梁下為肘網其成伏梁唾膿血者死不治全文見筋心伏梁

心脈微緩為伏梁在心唾血全文見

肺痿辨 華嚴寺何上座年未四十四月間因濕浴大汗出還寺刺頭傷風寒頭疼四肢困倦就市中贈取通聖散服之又發汗頭疼少減再日復作又以前藥發之汗數次四肢添勞重喘促自汗惡風咳而有血懶於言語飲食減少求醫治之與藥又多以生薑為引至六月間精神愈困飲食減少形體羸瘦或咳或唾紅血極多請予治之具說前由診其脈浮數七八至按之無力予曰不救矣或曰何為不救予曰血之與汗異名同類在汗者無血奪血者無汗金匱要畧云肺痿之病從何得之師曰或從汗出或被快藥下利重亡津液故得之今肺氣已虛又以辛藥瀉之重虛其肺不死何待藏氣法時論云肺欲收急食酸以收之以酸補之以辛瀉之蓋不知內經之旨仲景云醫術

淺挾情然不知病源為治乃誤發汗吐下之相反其禍至速世人但務彼翁習之榮而莫見此傾危之習惟明者居然能護其本近取諸身夫何遠之有焉其僧不數日果亡

**妊** 孕咳唾血

心妊孕寒熱往來咳嗽血痰或嘔吐不食無力或喘滿乳吞相應痛或口中唾如霜雪出語無聲或耳鳴或痰涎日夜數碗誤用熱藥之故也 風門 鬼戶各五分 支溝

如寒熱未解百節痠疼昏憤再取絕骨五分 大溪三分

如脈氣未平瀉太淵 太白各二分 熱府

已上穴實瀉虛補治產前病立效此病安後半年必有一變四肢消瘦腹腫脹即取陰交一穴去其惡血

洩血



**玉屑膏**治尿血并五淋砂石疼痛不可忍受者

黃芪

人參

右為末用蘿蔔大者切一指厚三指大四五片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二兩為度勿令焦至熟蘸黃芪人參末吃不以時仍以鹽湯送下

**外療**虛尿血方乾膠三兩炙搗末酒二升和溫服

**無髮**散治小便尿血

髮灰本草云髮灰能消瘀血通閉格利水

右一味每用二錢以米醋二合湯少許服并花水調亦得一法茅草根車前子煎湯調下尤妙兼治肺疽心衄內崩吐血一兩口或舌上出血如針孔若鼻衄吹內立已

**治**小便出血當歸四兩細剉酒三升煮取一升頓服

**有**血虛四物湯加牛膝膏

悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數

澀血也全文

**治**小便出血龍骨末方寸匕水調溫服日三服

**治**淋下血麻根十枚水五升煮取二升一服取血神效

**治**尿血不止以鬱金一兩搗為末蔥白一握相和水一

盞煎三合去渣溫服日三服

**鹿角膠**九治房室勞傷小便尿血

鹿角膠

沒藥

油頭髮交絡三

右為末用茅根汁打麩糊丸如桐子大每服五十九鹽湯下

**胞**移熱於膀胱則癃溺血全文

**熱**在下焦者則尿血亦令淋閉不通

**丹**溺血屬熱山梔炒水煎或用小薊琥珀

玄小便出血是心伏熱在於小腸宜鏡面草自然汁加生

蜜一匙服之以八正散加麥門冬煎服如小便澀痛以

海金沙細末調治之八正散

**外治**尿血車前草搗取汁五合空心服之

**小薊**散于治下焦結熱尿血成淋

生地

小薊根

滑石

通草

蒲黃

藕節

淡竹葉

當歸

山梔仁

甘草

右吹咀每服四錢水一盞煎八分空心溫服

**無**律草汁法方見

**丹**尿血者可用當歸承氣湯下之後以四物加山梔

承氣湯即調胃

脈尺脈滑氣血實婦人經脈不利男子尿血宜服杜確煎

大黃湯下去經血針關元瀉之

**丹**冬榮散治小便出血及腸風下血用夏枯草燒灰存性

為末米飲下 一方用凉水調下

少陰清則病積澀血又見

咳而且澀血脫形其脈小勁是逆也全文

咳洩血形肉脫脈搏是逆也同上

**聖**治妊娠尿血用阿膠炒黃為散每食前以粥飲調下二

錢七

**大**治妊娠尿血

阿膠

右為末空心粥飲調二錢



下血

大按

下血不可用純寒涼藥必於寒涼藥中加辛味為佐久不愈者後用溫劑必兼升舉藥中加酒浸炒涼藥如酒煮黃連丸之類凡用血藥不可單行單止腸風獨在胃與大腸出治用黃芩秦艽槐角升麻青黛定腸風痛用蒼朮滑石當歸生地黃黃芩甘草下血屬虛者當溫散之四物加乾薑升麻便血過多者四物加蠟皮有熱者四物加山梔升麻秦艽阿膠有兼風者蒼朮秦艽芍藥香附胃清血非藍實不除

如清血色鮮者腸風也血濁而色黯者戒毒也肛門射如血線者垂痔也亦是一種下部虛陽氣不升血隨氣而降者仲景云脈弦而大者弦為緊大為孔緊則為寒孔則為虛

六 醫學綱目卷七

虛虛為

寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精此下部虛而下者也若得革脈須宜服溫補藥重痔宜熏千金用蠟皮艾者佳予嘗用有效方見

升麻補胃湯治宿有腸血症因五月大熱吃杏腸辟下血遠三四尺散漫如篩腰沉沉然腹中不痛血色紫黑病名濕毒腸澀是陽明少陽經血症升陽湯主之

升麻	錢一	羌活	錢一	獨活	錢五	柴胡	錢一
防風	錢半	葛根	錢二	肉桂	少許	白芍藥	錢五
牡丹皮	錢半	黃芩	錢一	熟地	錢五	生地	錢五
婦身	錢三	甘草	錢五				

右剉如麻子大作二服水二盞煎一盞去查稍熱食前服

和中益胃湯治太陰陽明腹痛大便常澀泄若不泄即秘

而難見在後傳作濕熱毒下鮮紅血腹中微痛腸下急縮脈緩而洪弦中指下得之按之空虛

升陽除濕和血湯治腸澀下血另作一派其血溼出有力而透射四散如篩下春二月中旬日下二行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當升陽去濕熱和血脈不兩服而愈

六 醫學綱目卷七

寒寒

右咬咀作一服水四大盞煎一盞稍熱空心服立效益智和中湯治腸澀下血紅或深紫黑色腹中痛腹皮惡寒右三部脈中指下得之俱按之無力關脈甚緊肌表陽明分涼腹皮熱而喜熱物熨之內寒明矣

升麻	錢一	葛根	錢五	白芍藥	錢一	甘草	錢一
桂枝	錢四	益智	錢五	半夏	錢五	肉桂	錢一
婦身	錢一	黃芩	錢一	乾薑	少許	牡丹皮	錢一
柴胡	錢五						

右為劑末作一服水三盞煎一盞食後溫服

婦人年六十性多沉怒大便下血十餘年不止食成形困心搖動或如烟熏情性極惡早起面微浮急此時便血尤未盡絕中間若得一二口不來則意思稍清但遇稍不



如意事則血復作百法不治左三部脈浮大稍重手則無久取之又似滯澁而至數不勻右三部沉澁細弱寸脈沉絕予謂氣鬱生涎涎鬱胸中清氣不升經脈壅遏不降心血絕少不能自養所以有如熏之狀非開涎不足以行氣非氣行則血不能歸隧道以壯脾為君諸藥佐之遂以二陳湯加酒紅花升麻當歸身酒黃連青皮貝母澤瀉黃芪人參白朮酒芍藥每貼生附子一小片煎服四貼後血止遂去附子加乾葛牡丹皮山梔子而如熏之狀亦除去又於前方加礞砂炒神麩熟地木香倍參朮服半月而全愈治下血蒼朮地黃同搗細末為丸不用鐵器

大便下血曰腸風切勿止澁究其本末症狀先清其表後攻其裏其血自止如脈洪大宜後方四物合解毒湯調治解毒湯方

本治腸風瀉血

牽牛五 牙皂三兩不蛀

右二味水浸三日後除皂角不用將酒一升煮令乾焙為末煉蜜丸如桐子大每服七丸溫酒送下空心日午夜臥各一服或轉下黃物不妨病可後每日常服五丸飯飲送下

黃連湯治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連 當歸各五 甘草各二

右咬咀每服五錢水煎

芍藥黃連湯治大便下血腹中痛者謂之熱毒下血

芍藥 黃連 當歸各半 大黃一

淡桂五 甘草各二

右咬咀每服五錢水煎如痛甚者調木香檳榔末一錢

服之

夫腸澼者為水穀與血另作一派如柳桶湧出也夏濕熱太甚正當客氣盛而主氣弱故腸澼之病甚也以涼血地黃湯主之

黃柏去 知母各 青皮 槐子

當歸 熟地各五

右咬咀俱作一服水一盞煎七分溫服 如小便澀膈下悶或大便前後重調木香檳榔細末各半錢稍熱於食前空心服如裏急後重又不去者當下之 如腹中動搖有水聲而小便不調者停飲也診是何臟以去水飲藥瀉之假令脈洪大用瀉火利小便之類是也 如胃虛不能食而大渴不止不可用淡滲之藥止之乃胃中元氣少故也與七味白朮散補之 如發熱惡

六

熱煩躁大渴不止肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力或無日痛真乾者非白虎湯症也此血虛發躁當以黃芪一兩當歸二錢咬咀水煎服 如大便秘塞或裏急後重數至固而不能便或少有白膿或少有血慎勿利之利之則必致病重及鬱結不通以升陽除濕防風湯升其陽則陰氣自降矣

升陽除濕防風湯

蒼朮酒炒去 白朮一 白茯苓

白芍藥各一 防風二

右咬咀除蒼朮另作片水一碗半煮至二大盞內諸藥同煎至一大盞去香稍熱空心食前服如發泄不禁以此藥導其濕如發泄及泄不止以風藥升陽蒼朮益胃去濕脈實腹脹閉塞不通宜從權以苦多甘少藥泄之



如得通復以升陽湯助其陽或不便以升陽湯中加泄藥通之

當歸和血散治腸澼下血或濕毒下血

槐花 青皮 荆芥 熟地

白朮各六 當歸 升麻各一 川芎各四

右為末每服二三錢清水飲湯調食煎下

治腸風臟毒槐花散

槐花 柘葉 荆芥 枳殼

右等分為末每服二錢米飲調空心食前服經治下痢

大便下血者肺與大腸受熱宜四物同解毒藥入艾煎

下三黃丸調治之

治便血久久傷血并麻風症癩瘡見面者用

龜板 升麻 香附各半 白芍藥一兩

側柏葉 椿皮 右為末粥丸先用四物加白朮黃連甘草陳皮等藥作湯送下

積熱便血 蒼朮 陳皮 黃柏 黃芩各七

連翹 生地 右為末以地黃膏搜為丸

脈緩大口渴便血月經紫色勞挾濕熱

白朮 地黃 黃柏 白芍藥各三

地榆 黃芩 香附 右為末炒餅為丸

孫用和治腸風瀉血黃芪黃連等分為末酒糊丸如黃芪

大每服三十九米飲下

結陰丹治腸風下血臟毒下血諸大便血疾

枳殼 煨 炭 鹿靈仙 黃芪 陳皮白去

椿根白皮 何首烏 荆芥穗各半

右為末酒糊丸如桐子大每服五七十九陳米飲入醋

少許煎過放溫送下

椿皮丸

臭椿皮 去皮 枳殼 蒼朮

右為末醋糊丸如桐子大空心食前米飲下三十九

治腸風瀉血久不止玉屑丸

槐根白皮 苦練根 去皮 天南星

椿根白皮 半夏 寒食麩 右為末水丸如桐子大每服三十九以水一盞煎沸

下九子煮令浮以匙抄起溫送下不嚼空心食前服

頃年有人下血盈盆頓爾疲萎諸藥不效予曰此正

腸風令服玉屑丸三服而愈

經治臟毒下血以苦練子炒黃為末蜜丸米飲下十九至

二十九甚妙

治腸風痔瀉血羊蹄根葉蒸爛一碗食之立瘥

外治卒下血不止龍膽草一虎口以水五升煮取二升半

分為五服瘥

本蕨菜花不以多少文武火焙乾為末每服三錢飯飲調

下

子一男子臟毒下血當六月熱不可堪自其於死忽思

蜜水猛捨性合飲一大盞痛止血住



結陰者便血一升再結二升三結三升龍古云結陰不得外行血無所滲入腸間故便血也其脈虛者是也血泄者脈急血無所行也從容

真定總管史侯男年四十二歲形體本瘦因勉強飲酸酒得腹痛次傳泄瀉十餘日便後見血或紅或紫腸鳴腹痛醫以諸見血皆熱治以芍藥栝皮湯之類前證如故仍不欲食食則嘔酸形體愈瘦面色青黃不澤心下痞惡冷物口乾時有煩躁不得安臥請予治之診得脈弦細而微遲手足稍冷內經曰結陰者便血一升再結二升三結三升又曰邪至五臟則陰脈不和陰脈不和則血留之結陰之病陰氣內結不得外行血無所滲入腸間故便血也以平胃地榆湯主之

蒼朮 白朮 陳皮 茯苓

厚朴各五分 甘草炙 乾薑 當歸

炒麩 白芍藥 益智仁 人參各三錢

地榆七分 升麻一錢 葛根五分 黑附子一錢

右作一服水一盞生薑三片寒二枚煎至一盞去查食前溫服此藥溫中散寒除濕和胃數服病減大半又灸中脘二七壯引胃氣上升次灸氣海自壯生發元氣灸則強食生肉以還少丹服之至春再灸三里二七壯溫脾壯胃生發元氣次服芳香之劑慎言節飲食而愈楊師大醉醒發大渴飲水三大盞又飲米茶三碗後病便鮮血四次約一盆先與吳茱萸丸翌日又與平胃五苓各半散三大服血止後自利又與神應丸四服自利乃止或問曰何不用黃連之類以解毒予曰若用寒藥其疾大變難治寒飲內傷復用寒藥非其治也况血為寒所凝入

大腸間而便下血溫之乃行所以得熱則自止 楊氏飲冷酒瀉血服對金散止亦理中脘分利陰陽安定血脈之意也 唐生病因飲酪水及食生物下利紫黑血十餘行脾胃受寒濕毒與六神平胃散半兩加白朮三錢以利腰膝間血一服愈

胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如荳汁或下瘀血日夜無度

人參 茯苓 川芎 官桂 當歸 芍藥 白朮各等分

右以咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去杏稍熱空心服小兒量力增減 若加熟地黃芪甘草等分為十味名十補湯 若虛勞嗽加五味子 若有痰加半夏 若發熱加柴胡 若有汗加牡蠣 若虛寒加附子 若寒其加乾薑皆依本方等分 若骨蒸發熱飲食自若者用十補湯加柴胡一兩 若氣弱加人參 若小便不利加茯苓 若脈弦澀加川芎 若惡風加官桂 若脈澀加當歸 若腹痛加白芍藥 若胃熱濕盛加白朮

治血下防風為上使黃連為中使地榆為下使 若血赤者陳血也加熟地黃 若血鮮色紅者新血也加生地黃 若寒熱者加柴胡 若肌熱者加地骨皮 若脈洪實稍甚者加酒浸大黃

治腸風烏痢丸 川烏頭一兩炮去皮尖 荆芥總二兩

右為末醋九桐子大每服二十九溫酒送下熱水亦得 有病發時食前日三服無病時日一服



**速血**  
下血先便後血者此遠血也黃土湯主之

甘草 熟地 白朮 附子炮  
阿膠 黃芩各三 灶中黃土升

**下血**  
下血先便後血者此近血也赤小豆當歸散主之

赤小豆 當歸 赤芍 芍藥 各五兩 浸令

**赤豆**  
右杵為末漿水服方寸匕日三服或因食熱物發動以赤小豆炒熟為末每服二錢米飲下

**內傷**  
食飲不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則腹滿閉塞下為飧泄久為腸澼

**因而飽食**  
筋脈橫解腸澼為痔

**右飲食不節**  
腸澼如羅謙甫治真定總管史侯男飲酸酒下血法及海藏治楊師飲冰茶下血法治唐生飲酪

**水下血法**  
是也並見寒濕條

**治酒積下血**  
不止並後見諸藥不效

**神麴**  
神麴一兩 白酒藥二

**右同為末**  
用清調作餅子慢火上炙黃為細末每服二錢白湯調下亦治泄瀉神效

**春傷於風**  
夏生飧泄腸澼

**治腸風**  
治腸風下血及血崩用五靈脂炒去火毒每服二錢

**治腸風**  
治腸風下血馬鞭草葉研碎扭汁服

**治腸風**  
治腸風下血車前草連根一握生薑一小塊新水研碎去渣候血欲下時腰間必覺重便服此藥一盞少坐漸覺冷下腹中即登廁已不見血矣甚者不過再服

**黃連 生薑**

右二味煎湯下二氣九次服五槐丸方列于後

**金星草**  
三兩草味苦寒 陳乾薑 右為末每服一錢新汲水調空心服

**孫真人治**  
葉後有血濃煎艾葉湯和生薑汁三合服之

**治臟毒**  
赤連九鷹爪黃連末用獨頭蒜一顆煨香熟研和丸如桐子大每服三四十九陳米飲下

**患暴下血**  
以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉搗為膏可即丸如桐子大以米飲下五六十九無不愈者

**烏梅丸**  
治腸風下血服之立效

**真僵蚕**  
烏梅肉 煨乾

**右為末**  
薄糊丸如雞頭肉大每服百丸食前白湯送下

**五槐丸**  
治腸毒

**五倍子 槐花糖**  
百藥煎 好者各 右焙乾為末酒糊丸如桐子大每服二十九空心米湯

**治下血**  
用白芷五倍子為末丸服

**治腸風**  
五倍子 白礬 各五 右為末順流水丸如桐子大每服七丸米飲下忌酒

**右酸寒之劑**  
糞前有血令人面黃石榴皮取末茄子枝湯下

**治腸風**  
下血百藥不效有一良醫獨用山裏寒俗名鼻涕團又名酸寒最治下血之疾試取乾者為末服之應手



而安藥苟對症其效若此烏可以賤而忽之哉行義云酸

右酸熱之劑

本丈夫傷血婦人血崩瀆入大腸出血

草苳蔻

檳榔各炒

鴛栗殼燒

右等分爲末每服二錢空心米飲調下

世冬禁散治腸風下血方見

血見

博治遠年日久腸風下血不止枳殼燒灰存性羊脛炭爲末和勻用濃米飲一中盞調下空心五更初一服如人行

五里再服立效每服枳殼灰五錢炭末二錢

本治腸風炒赤小苳蔻方見上下血條赤

又方瓜萎三箇燒灰存性每服三錢空心米飲調下

靈苑治腸風下血久不止茄蒂燒存性爲末每服三錢七

食前米飲調下丹溪云茄蒂燒灰存性山梔炒

入醫學綱目卷七

聖

本治腸風絲瓜燒灰存性空心溫酒調服二錢

食療治下鮮血梔子燒灰水和一錢七服之量其大小多

少服之

廣治瀉血不止素耳一兩熬令黑水一大升三合煎取六

大合去查空心分溫三服

本治腸風下血

核桃殼

蘭退

皮鞋底

赤雞冠花分

右燒灰爲末每服一錢空心溫酒下

又方治臍毒

當歸

枳殼

側柏葉

陳槐花子

百草霜

芍藥各一

右剉碎一處炒令烟微起爲末每服二錢空心溫酒調

下日午米湯下各食前服甚妙

藥方

針灸

一治腸痔大便常血取葱白三五斤煮作湯盆中坐立瘡

其一二取腎經云腎是少陰之脈所生病者黃疸腸痔視盛

虛熱寒陷下而施補瀉疾留灸也

腸關脈花大便出血數斗者以膏俞傷故也宜灸膏俞若

下重去血者宜針關元

治腸風下血灸二十椎下隨年壯三報穴立愈

腸中有寒熱注下腸澼便血會陽主之 腸鳴澼泄下

卵主之 腸澼泄切痛四滿主之 腸澼中氣主之

惟穴治腸風下血肘內曲澤下一寸

又法 三間 商陽 太陵 內關 命門 扶承

血症與黃証俱頭汗出惡風口飲酒便褐色或黑色者

亦同血症治之

腎脈小搏沉爲腸澼下血血溫身熱者死大奇

溢而奪精身熱色天然及酒後下血血篤重是逆也全診

心肝澼亦下血二臟同病者可治其脈小沉澼爲腸澼

其身熱者死熱見七日死大奇 帝曰腸澼便血何如岐

伯曰身熱則死身寒則生 帝曰腸澼下膿血何如岐伯

曰脈懸絕則死滑大則生 帝曰腸澼之屬身不熱脈不

懸絕何如岐伯曰滑大者生懸澼者死以臟期之但通詳

脾脈外鼓沉爲腸澼久自已 肝脈小緩爲腸澼易治



奇論大  
腹脹便血脈大時絕是逆也如此者不及一時而死矣全  
見診生死○絕謂  
斷絕而不相續也

腸澼下膿血脈沉小留連者生數疾且大有熱者死  
腸澼筋擊其脈小細安靜者生浮大緊者死

陰陽虛腸澼死陰陽  
胃移熱於脾傳為虛腸澼死不可治全文見診

中蠱下血血如爛肉者心腹絞痛下  
治中蠱下血如雞肝出其餘四臟俱壞惟心未毀或鼻  
破待死取則蘭根末水服方寸七隨吐則出極神此苗似  
葛蔓綠紫生子似橘子

治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死用  
白蘘荷葉密安病人席下勿令病人知覺自呼蠱王姓名

治中蠱毒或吐下血者若爛肝取蚯蚓十四枚以苦  
酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可治

治蠱毒下血蝟毛燒末水服方寸七當吐蠱毒  
取一升服之吐即愈 又方用苦酒一升煮蠱令消服之  
神效

諸痿 注夏  
痿者手足痿軟而無力百節緩縱而不收也

痿屬濕熱 有濕痰者 有氣虛者 有血虛者 有  
食積妨礙不降者 有死血者

黃帝問曰五臟使人痿何也岐伯曰肺主身之皮毛心  
主身之血脈肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨  
髓故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄者則生痿癱也心氣熱

則下脈厥而上上則下脈虛虛則生脈痿極折羸膠從而  
不任地也肝氣熱則膽洩口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而  
擊發為筋痿脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿腎  
氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿帝曰何以得之  
岐伯曰肺者臟之長也為心之蓋也有所失亡所求不得  
則發肺鳴則肺熱葉焦故曰五臟因肺熱葉焦為痿癱  
此之謂也悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則  
心下崩數洩而也故本病曰大經空虛發為肌痺傳為脈  
痿思想無窮所願不得意滯於外入房太甚宗筋弛縱發  
為筋痿及為白淫故下經曰筋痿者生於肝使內也有漸  
於濕以水為事若有所留居處相濕肌肉濡漬痺而不仁  
發為肉痿故下經曰肉痿者得之濕地也有所遠行勞倦  
逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱合於腎腎者水臟

也今水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發為骨痿故  
下經曰骨痿者生於大熱也帝曰何以別之岐伯曰肺熱  
者色白而毛敗心熱者色赤而絡脈溢肝熱者色蒼而不  
枯脾熱者色黃而肉蠕動腎熱者色黑而齒痛也帝曰論  
言治痿者獨取陽明何也岐伯曰陽明者五臟六腑之海  
主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也衛脈者經脈之海也  
主滲灌諸谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣  
街而陽明為之長皆屬於帶脈而絡於督脈故陽明虛則  
宗筋縱帶脈不引故足痿不用也帝曰治之奈何岐伯曰  
各補其榮而通其俞調其虛實和其逆順筋脈骨肉各以  
其時受月則病已矣帝曰善

治痿癱  
或問曰治痿之法取陽明之一經此引而未發之言願明  
以告我予曰諸痿生於肺熱只此一句便見治法大意經

醫學綱目 卷一七



曰東方實則西方虛瀉南方補北方此固就生尅言補瀉而大經大法不外於此東方木肝也西方金肺也南方火心也北方水腎也五方之中惟火有二腎雖有兩水居其一湯常有餘陰常不足故經曰一水不勝二火理之必然金體燥而居上主氣畏火者也土性溫而居中主四肢畏火者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡於畏而侮所勝肺得火邪則熱矣木性剛急肺受熱則失所養木寡於畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作焉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此駱龍吉亦曰風火既熾當滋腎水東垣先生取藤皮為君黃芪等補藥輔佐以治諸痿而無一

定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有挾氣者臨病制方其善於治痿者乎雖然藥中肯啓矣若將理失宜醫不治也天產作陽氣厚發熱先哲格言但

是患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安也

- 清暑益氣湯** 黃芪人參湯 清燥湯二方並見注夏
- 補益丸治痿**
- 龜板** 酒浸 瑣陽 酒浸 生地 酒浸 歸身 酒浸
- 陳皮** 酒浸 杜牛膝 酒浸 白朮 酒浸 乾薑 酒浸
- 黃柏** 酒浸 虎脛骨 酒浸 五味子 酒浸 茯苓 酒浸
- 白芍藥** 酒浸 虎骨 酒浸 兔絲子 酒浸 熟地 酒浸
- 諸藥為末紫何車為丸如無紫何車猪腦骨髓亦得
- 龍虎丹治痿**
- 敗龜板 酒浸 虎骨 酒浸 黃柏 酒浸 乾薑 酒浸

瑣陽七錢 金箔片 神麩 如懶言語加  
山藥末七錢  
右為末糯粉糊為丸空心白湯服

虎潛丸  
龜板四兩 知母二兩 黃柏四兩 熟地二兩  
牛膝三兩 瑣陽一兩 虎骨一兩 當歸一兩  
芍藥半兩 陳皮半兩 乾薑半兩

右為末酒糊丸加附子治痿厥如神  
濕熱痿東垣健步丸加蒼朮蒼朮 東垣補益腎肝丸治  
脚膝無力 二方並見 蕭炳神龜滋陰丸 丹溪氣虛  
病痿四君子加蒼朮蒼朮 血虛病痿四物湯加蒼朮黃  
柏下補陰丸 保命集治脾虛四肢不用以十全散者蓋  
治氣血俱虛者也

無痿治  
痿補  
加減四斤丸治腎肝虛熱滯於內致筋骨痿弱不自勝  
持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不  
生氣力諸虛不足

- 肉苁蓉 酒浸 牛膝 酒浸 木瓜 兔絲子 酒浸
- 鹿茸 酒浸 熟地 天麻 五味子 酒浸
- 右為末蜜丸如桐子大每服五十九丸溫酒米湯食前下
- 王啓玄傳玄珠耘苗丹三方序曰張長沙戒人妄服燥烈  
之藥謂藥勢偏有所助勝尅流變則真病生焉猶憫苗不  
長而握之者也若稟氣血不強合服此而不服是不耘苗  
者也故名耘苗丹此丹養五臟補不足秘固真元均調二  
氣和暢榮衛保神守中
- 五味子 酒浸 巴戟心 遠志 酒浸 枸杞子 酒浸
- 山藥 白茯苓 肉苁蓉 酒浸 百部 酒浸



杜仲炒斷 蛇床子 防風去 栝子仁研

兔絲子酒浸另研

右為末蜜丸桐子大食前溫酒鹽湯任下三十九春乾  
寒湯下夏加五味子四兩四季月加菴蓉六兩秋加枸  
杞子六兩

衛生湯補虛勞強五臟除煩熱養真元退邪熱順血脈

當歸 白芍藥各四兩 甘草一兩 黃芪八兩

年老加酒半盞同水煎

蕭炳治脚軟丹參酒方見

經治骨軟風腰膝疼行復不得遍身搔痒何首烏大而有  
花紋者同牛膝劉各一斤以好酒一升浸七宿焙乾於木  
臼搗末蜜丸每日空心食前酒下三五十九

四股不舉俗曰癱緩故經所謂脾太過則令人四肢不

脾濕

人醫學綱目卷一七

舉又曰土太過則敦阜阜高也敦厚也既厚而又高則令  
除去此真所謂膏梁之疾其治則瀉令氣弱陽衰土平而  
愈或三化湯調胃承氣湯選而用之若脾虛則不用也經  
所謂土不及則卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不舉四  
肢皆稟氣於胃而不能至經必因於脾乃得稟受今脾病  
不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脈道  
不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治可十全散加  
減四物去邪留正

脾實病痿者經云脾病者肉痿足不收又云脾脈太過則  
令人四肢不舉又云其犯雨濕之地則為痿者是也

丹濕痿病痿二陳湯加蒼朮白朮黃芩黃柏之類入竹瀝

斗商陸飯治脚軟方見

子和陳下一武卒宋子玉因駐軍息城六月間暴得痿病

脾實則  
四肢不  
舉者  
者下之

腰膝兩足皆不任用臂而不行求治於子子察其兩手脈

俱滑大而有力量思內經火滯於內治以酸寒以鹽水越

其隔間寒熱宿痰新者為熱舊者為寒或宿食宿飲在上皖者可以

漏之宿痰既盡因而下之節次間行覺神志日清飲食日

美兩足漸舉脚膝漸伸心降腎升又繼以黃連解毒湯加

當歸等藥及瀉心湯涼膈散柴胡飲子大作劑煎時時呷

之

保心熱盛則火獨光火炎上腎之脈常下行今火盛而上

炎用事故腎脈亦隨火炎燦而逆上行陰氣厥逆火復內

涌陰上隔陽下不守位心氣通脈故生脈痿膝腕樞如折

去而不相提挈經筋縱緩而不任地故也可下數百行而

愈

痿病食積妨礙不得降者亦有死血者俱宜下之

脾虛則  
四肢不  
用

帝曰脾病而四肢不用何也岐伯曰四肢皆稟氣於胃

而不得至經必因於脾乃得稟也今脾病不能為胃行其

津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脈道不利筋骨肌肉

皆無氣以生故不用焉帝曰脾與胃以膜相連耳而能為

之行其津液何也岐伯曰足太陰者三陰也其脈貫胃絡

脾絡陰故太陰為之行氣於三陰手足三陰陽明者表也

五臟六腑之海也亦為之行氣於三陽手足三陽臟腑各

因其經而受氣於陽明故為胃行其津液四肢不得稟水

穀氣日以益衰陰道不利筋骨肌肉無氣以生故不用焉

大陰陽篇云調經篇云脾藏肉不足則四肢

不用從容論云四肢懈惰此脾虛之不行也

脾虛四肢不用治法並見前肺熱條

諸痿喘嘔皆屬於上全文

此即諸痿皆生於肺熱之義王註云上謂上焦心肺氣



運氣經有三

一曰熱痿經云少陰之復少氣骨痿又云少陽之復少氣脈痿是也

二曰濕痿經云歲土太過其則病肌肉痿足痿不收又云土太過曰敦阜敦阜之紀其病四肢不舉又云太陽司天之政寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉痿足痿不收四之氣風濕交爭風化為雨民病大熱少氣肌肉痿足痿又曰陽明司天之政四之氣寒雨降民病骨痿是也

三曰風制脾痿經云厥陰司天風氣下臨脾氣上從而土且隆體重肌肉痿是也

針灸 陽明根於厲兌結於頰大頰大者鉗耳是也

而痿疾起矣故痿疾者取之陽明視有餘不足無所止息者真氣稽留邪氣居之也 足陽明根于厲兌溜于衝陽

注于下陵入于人迎豐隆也 手陽明根于商陽溜于合谷注于陽溪入于扶突偏歷也 盛絡皆當取之

刺痿經文見前熱條今既舉其畧肺熱葉焦則肺喘鳴生痿癭色白而毛敗者 補其榮魚際 通其俞太淵 至

秋病已 心熱生脈痿數洩血握折不相提挈經縱不能任用於地

色赤而絡脈溢者 補其榮勞宮 通其俞太陵 至夏

病已 肝熱生筋痿下白滯口苦筋急攣色蒼而爪枯者 補其

榮行間 通其俞太衝 至春病已

脾熱生肉痿乾渴肌肉不仁色黃而蠕動者 補其榮大都 通其俞太白 至長夏病已

腎熱生骨痿足不任身腰脊不舉骨枯髓減色黑而齒稿者 補其榮然谷 通其俞太溪 至冬病已

又痿痺足不收取之少陽陽明之別經云足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰虛則痿痺坐不能起取之所

別也又云滯滯瘰癧不能久立治少陽之維在外踝上五寸又云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其病

虛則足不收脛枯取之所別者是也 骨痿懈惰取足少陰髓海經云少氣身潔潔也言呼吸也

骨痿懈惰不能動補足少陰又云腦為髓之海其俞上在干其蓋下在風府髓海不足則腦轉耳鳴脛痠解怠安臥

審守其俞而調其虛實者是也百節弛縱取脾手太陽之

絡經云脾之大絡名曰大包出淵液下液三寸布胸膈虛則百節盡皆縱此脈若羅絡之血者取之脾之大絡也又

云手太陽之別名曰支正上腕五寸實則節弛肘廢取之所別者是也

甲痿不相知太白主之一云耳重骨 足下緩失履衝陽主之 足緩不收痿不能行不能言語手足痿痺不能行

地倉主之 腎脈微滑為骨痿坐不能起則目無所見 全文見治

注夏 濕熱 子知痿之作也皆五月六月七月之時午者少陰君火之位未者濕土庚金伏火之地申者少陽相火之分故痿發

此三月之內為熱也故病痿之人其脈浮大



注夏屬陰虛元氣不足補中益氣中去柴升加黃柏炒  
挾痰者用南星

國刺志論云氣虛身熱得之傷暑熱傷氣故也痿論曰有  
所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍於  
腎腎者水藏也今水不能勝火則骨枯而髓虛足不任身  
發為骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也此濕熱成痿令  
人骨乏無力故治痿獨取於陽明時當長夏濕熱大勝蒸  
蒸而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣  
促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩心下膨痞小便黃而  
數大便溏而頻或痢出黃如糜或如泄色或渴或不渴不  
思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣不病也其脈中  
得洪緩若濕氣相搏必加以遲遲病雖互換少差其天  
暑濕令則一也宜以清燥之劑治之內經曰陽氣者衛外

醫學綱目卷七

五

而為固也熱則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃芪甘  
溫補之為若人參陳皮當歸甘草微溫補中益氣為臣  
蒼朮白朮澤瀉滲利而除濕升麻葛根苦甘平善解肌熱  
又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故炒甘辛青  
皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃柏苦寒  
借其味瀉熱補水虛者滋其化源以人參五味子麥門冬  
酸甘微寒救天旱之傷於庚金為佐名曰清暑益氣湯

黃芪	一錢五分	人參	去蘆	升麻	一錢
澤瀉	五分	蒼朮	洗去	葛根	二錢
五味子	九分	白朮	五分	神麴	炒五分
麥門冬	三分	歸身	三分	陳皮	五分
		青皮	去皮三分		

右件同收咀作一服水二大盞煎至一盞去查大溫服  
食遠劑之多少臨時斟酌此病皆由飲食勞倦傷其脾

胃乘天暑而病作也但藥中犯澤瀉者茯苓燈心通  
草木通淡味滲利小便之類皆從時令之旺氣以泄脾  
胃之客邪而補金水之不及也此正方已是從權而立  
之若於其時病濕熱脾旺之症或小便已數腎肝不受  
邪者誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先損其兩目也復  
立變證加減法于後 如心火乘脾乃血受火邪而不  
能升發陽氣伏于地中地者人之脾也必用當歸和血  
少用黃柏以益真陰 如脾胃不足之證須少用升麻  
乃足陽明太陰引經之藥也使行陽道自脾胃中右遷  
少陽行春令生萬物之根蒂也更少加柴胡使諸經右  
轉生發陰陽之氣以滋春之和氣也 如脾虛緣心火  
亢盛而乘其土也其次肺氣受邪為熱所傷必須用黃  
芪最多甘草次之人參又次之三者皆溫甘之陽藥也

醫學綱目卷七

五

脾始虛肺氣先絕故用黃芪之甘溫以益皮毛之氣而  
閉腠理不令自汗而損元氣也上喘氣短懶語須用人  
參以補之心火乘脾須用炙甘草以瀉火熱而補脾胃  
中元氣甘草最少恐資滿也若脾胃之急痛并脾胃大  
虛腹中急縮腹皮急縮者却宜多用經曰急者緩之若  
從權必加升麻以引之恐左遷之邪堅盛卒不肯退反  
致項上及臂肉添而反行陰道故使引之以行陽道  
使清氣出地右遷而上行以和陰陽之氣也若中滿者  
去甘草咳甚者去人參如口乾益乾者加乾葛 如脾  
胃既虛不能升浮為陰火傷其生發之氣榮血大虧榮  
氣伏於地中陰火熾盛日漸煎熬血氣虧少且心包與  
心主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰恍惚  
者心惑而煩悶不安也是由清氣不升濁氣不降清濁



相干亂於胸中使周身血氣逆行而亂經云從下上者引而去之故當加辛溫甘溫之劑生陽陽生而陰長也已有甘溫三味之論或曰甘溫何能生血又非血藥也曰仲景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血也更加當歸和血又宜少加黃柏以救腎水蓋甘寒瀉熱火火減則心氣得平而安也如煩亂猶不能止少加黃連以去之蓋將補腎水使腎水旺而心火自降扶持地中陽氣也 如氣浮心亂則以硃砂安神丸鎮固之得煩減勿再服以防瀉陽氣之反陷也如心下痞亦少加黃連氣亂於胸為清濁相干故以陳皮理之能助陽氣之升而散滯氣又助諸甘辛為用故長夏濕土客邪火旺可從權加蒼朮白朮澤瀉上下分清其濕熱之氣濕氣大勝主食不消化故食減不知穀味加炒麩以消之復

入醫學綱目卷七

五

加五味子麥門冬人參瀉火益肺氣助秋損也此三伏中長夏正旺之時藥也

脾胃虛弱隨時為病隨病制方 夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱甚損傷元氣怠惰嗜臥四肢不収精神不足兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中溜火而視物眩暈無所見小便頻數大便難而秘結胃脘當心而痛兩脇痛或急縮臍下周圍如繩束之急甚則如刀刺腹難舒伸胸中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌強腰背腹痛頭痛時作食不下或食入即飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天氣之熱助本病也乃庚大腸辛肺金為熱所乘而作當先助元氣治庚辛之不足黃芩人參湯主之

黃芪一錢如自汗 人參五分 甘草二分  
白朮五分 蒼朮五分 橘皮二分 黃柏酒洗三分  
神麩三分 五味子九粒 麥門冬二分  
婦身酒洗 升麻六分

右咬咀俱作一服水二盞煎至一盞去查稍熱食遠或空心服之忌酒濕麩大料物之類及過食冷物 如心下痞悶加黃連三分 如胃脘當心痛減大寒藥加草薤薤仁五分 如脇下痛或縮急加柴胡三分 如頭痛目中溜火加黃連三分 川芎三分 如頭目不清利上壅上熱加蔓荊子三分 藜蘆二分 細辛一分 川芎三分 生地黃二分 如氣短精神少或夢寐間困乏無力加五味子九粒 如大便澁滯隔一二日不見者致食少食不下血少血中伏火而不得潤也加當歸身生地黃各五分 桃仁三分 另

入醫學綱目卷七

五

研麻子仁五分 如大便通行所加之藥勿再服 如大便又不快利勿用別藥少加大黃半錢 如不利者非血結血秘而不通也是熱則生風其病人必顯風症單血藥不可復加止常服黃芪人參湯藥只用羌活兩防風兩二味咬咀以水四盞煎至一盞去查空心服之大便必大走也一服便止 如胸中氣滯加青皮并去白陳皮倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之 如氣滯太甚或補藥太過或人心下有憂滯鬱結之事更加木香三分 砂仁三分 白荳蔻仁二分 與正藥同煎服 如腹痛不惡寒者加白芍藥半錢 芩二却減五味子

夫脾胃虛弱至六七月間河漲霖雨諸物皆潤人汗沾衣身重短氣甚則四肢痿軟行步不正脚酸眼黑欲倒者此



腎水與膀胱俱竭之狀也當急救之滋肺氣以補水之上源又使庚大腸不受邪熱不令汗大泄也汗泄甚則亡津液亡津液則七神無所依經云津液相成神乃自生津者庚大腸所主三伏之義為庚金受囚也若亡津液汗大泄濕令亢甚則清肅之氣亡燥金受囚風木無可以制故風濕相搏骨節煩疼一身盡痛亢則害承乃制是也孫思邈曰五月常服五味子是瀉內火補庚金大腸益五臟之元氣壬膀胱之寒已絕於已癸腎水已絕於午今更逢濕旺助熱為邪西方北方之寒清絕矣聖人立法夏月宜補者補天元之真氣非補熱火也令人夏食寒是也為熱傷元氣以人參麥門冬五味子生脈脈者元氣也人參之甘補元氣瀉熱火也麥門冬之苦寒補水之源而清肅燥金也五味子之酸以瀉火補庚大腸與肺金也當此之時無病

大醫家集卷之七

之人亦或有二症况虛損脾胃有宿疾之人遇此天暑將理失所違時伐化必困乏無力懶語氣短氣弱氣促似喘非喘骨乏無力其形如夢寐朦朧如烟霧中不知身所有也必大汗泄若風犯汗服皮膚必搐項筋皮枯毛焦身體皆重肢節時有煩疼或一身盡疼或渴或不渴或小便黃澁此風濕相搏也頭痛或頭重上熱壅盛口鼻氣短氣促身心煩亂有不樂生之意情思慘悽此陰勝陽之極也病甚則傳腎肝為痿厥厥者四肢如在火中者為熱厥四肢寒冷者為寒厥寒厥則腹中有寒熱厥則腹中有熱為脾主四肢故也若肌肉濡漬痺而不仁傳為肉痿證證中皆有肺疾用藥之人當以此調之氣上衝胸皆厥證也痿者四肢痿軟而無力也其心煩寃不止心脾肺風厥者氣逆者是也也甚則大逆故曰厥逆其厥痿多相須也於前已立黃芪

人參五味子麥門冬湯中每加白茯苓二澤瀉四分猪苓白朮各一如小便快利不黃澁者只加澤瀉二分與二朮上下分清其濕如行步不正脚膝痿弱兩足軟側已中痿邪者加酒洗蒼朮知母三分或五分令二足湧出氣力如汗大泄者津脫也急止之加五味子六炒黃柏五分炒知母三不令妨其食當以意斟酌若妨食則止候食進再服取三里氣街以三稜針出血若汗不減不止者於三里穴下三寸上廉穴出血禁酒濕麵夫痿者濕熱乘於腎肝也當急去之不然則下焦元氣竭盡而成軟癱必腰下不能動心煩寃而不止也若身重減氣不短小便如常及濕熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子澤瀉猪苓茯苓黃柏知母蒼朮白朮之藥只依本病中證候加減常服藥亦須用酒黃柏三分或六七月之間濕令大行于

大醫家集卷之七

能令母實而熱旺濕熱相合而刑庚大腸故用寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動矣步行不正兩足軟側以清燥湯主之

黃芪 <small>半錢</small>	黃連 <small>去鬚一錢</small>	蒼朮 <small>一錢</small>	白朮 <small>一錢</small>
陳皮 <small>五分</small>	五味子 <small>一錢</small>	人參	白茯苓
升麻 <small>各三</small>	當歸 <small>二錢</small>	澤瀉 <small>五分</small>	柴胡
麥門冬	生地	神麴 <small>炒</small>	猪苓
黃柏 <small>酒炒</small>	甘草 <small>炙各二分</small>		

右劉如麻荳大每服半兩水二盞煎至一盞去渣稍熱空心服

宋其勞傷發熱當作注夏治之

黃柏 <small>炒</small>	升麻 <small>各三</small>	黃芪	人參
---------------------	----------------------	----	----



<p>木通 甘草<small>各</small> 白芍藥<small>各五</small> 白木<small>半錢</small> 陳皮</p>	<p>婦人患注夏手足痠軟而熱 白木<small>一錢</small> 黃柏<small>炒</small> 白芍藥 陳皮</p>	<p>當歸<small>錢一</small> 蒼朮<small>五</small> 甘草<small>生</small> 薑<small>二</small></p>	<p>解休即痿類 解休之證懈倦困弱似痿故附痿後</p>	<p>冬脈太過為病在外則令人解休脊脈痛而少氣不欲言</p>	<p>尺脈緩澹謂之解休<small>平人氣象論云王註云尺為陰部</small></p>	<p>尺內弱者解休安臥脫肉者寒熱不治<small>全文見</small></p>	<p>刺骨無傷髓傷則消燼肝瘦體解休然不去矣<small>全文見</small></p>	<p>足少陽之瘧令人身體解休寒不甚熱不甚惡見人見人</p>	<p>心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽<small>全文見</small></p>	<p>舌 舌腫痛 舌強舌卷 舌縱涎下多</p>	<p>唾 自嚙舌 舌胎 舌黑<small>二條見</small></p>	<p>舌屬心脾二臟經云心主熱又云在臟為心在竅為舌又</p>
--	--	--	-----------------------------	-------------------------------	---	--	---	-------------------------------	--	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

<p>嗽口吐一半喫一半世醫用此發散傷寒傷風及加杏</p>	<p>仁五味子治咳嗽皆效獨未知用之舌腫牙疼辛未年</p>	<p>有人患舌腫滿塞粥藥不入其勢危甚大煎此一劑乘</p>	<p>熱以紙籠氣薰之遂愈 烏犀膏治重舌木舌<small>方見</small></p>	<p>治心脾熱木舌腫脹 玄參 升麻 大黃 犀角<small>各三</small></p>	<p>甘草<small>兩</small> 右為細末每服三錢水一盞煎至五分溫服不拘時</p>	<p>舌腫脹出口鵬砂細末切生薑薑藥搗舌腫處即退</p>	<p>又云草麻取油蘸紙燒烟熏之愈又治牛舌出亦好</p>	<p>重舌用好膽礬研細傳之 黑散子治舌忽然腫破用釜底煤研細以醋調傳舌上</p>	<p>下脫去更傳能先决出血竟傳之尤佳一法用葶等分調</p>	<p>舌腫亂髮燒灰水調下 飛絲入口喉舌間生泡紫蘇嚼白湯下立效</p>	<p>針灸舌痛獨取脾脈經云脾足太陰之脈所生病者舌本</p>	<p>痛視虛熱寒陷下取之也 治舌下腫難言口瘡舌縱涎出及舌根急縮 廉泉<small>三</small></p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--

治舌腫 廉泉三分 金津 玉液各用三錢 天突

少商 又法 廉泉 然谷 風府 天突 關元

廉泉一穴一名舌本在頷下結喉上治舌下腫難言舌

縱涎出口禁舌根急縮下食難刺瘡論云舌下兩脈者廉



泉也刺禁論云刺舌下脈太過血不止為瘡刺節直邪論云取廉泉穴血變而止以明宜出血禁用針或問取廉泉穴二說不同一說取頰下結喉上一說取舌下兩脈何者為當答曰舌本者乃舌根蒂也若取舌下兩脈是取舌稍也舌標也此法誤也當取頰下者為當此舌根也况足陽明之脈根於鴈兌結於廉泉頰下乃足陽明之所行也若取舌下兩脈非足陽明經也戊與兌合廉泉足少陰也治涎下解云胃中熱上溢廉泉開故涎下當出血瀉胃中熱又知非舌下兩脈也頰下結喉上者為准矣脈論曰廉泉巨英者津液之道也按針經云少陽結於廉泉今日陽明者誤也

**子**和南隣朱老翁年六十餘歲身熱數日不已舌根腫起和舌尖亦腫腫至滿口比元舌大三倍一外科以燔針刺其舌兩旁下廉泉穴病勢轉凶將至顛載人曰血實者宜決之以針針磨令鋒極尖輕砭之日砭八九次出血約一二盞如此者三次漸覺血少痛減腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈又諸痛痒瘡瘍皆屬心火燔針艾火皆失此義也

**凡**舌腫下必有噤重狀如蜈蚣臥蚕有頭尾小白可燒鐵烙烙頭上即消

**舌強舌卷**  
**鑿石散**治風濕寒舌強不能語  
 枯礬 桂心各等分

右為末每服一錢安舌下

針灸舌卷獨取手少陽絡與筋經云邪客手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一疇又云手陽明之筋其病支

寒熱  
 痧  
 痛轉筋舌卷治在燔針劫刺以知為數以痛為輪是也  
 舌卷若唇青卵縮者必死經云厥陰絡者其則舌卷卵上縮經又云肝者筋之合也肝脈弗榮則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死也

舌縱涎下多唾

治口角流涎不止口目喎邪手足痿軟方如左流涎者自然流也

神龜滋陰丸治足痿

龜板炙四兩 知母酒炒二兩 瑣陽酒洗一兩 黃柏炒赤二兩  
 枸杞子 五味子各一兩 乾薑炮半兩

右為末清水丸如桐子大每服七十九空心鹽湯下

通天愈風湯

人參錢一 葦靈仙去蘆半錢 南星泡湯 貝母去心錢一

連翹 防風去蘆五分 瓜萎仁十五粒 白朮半錢  
 桔梗三錢 甘草 荆芥穗各五錢 生薑三錢

右水一鍾半煎七分去渣入荆瀝一啣薑汁些少半飢時服吞下清心導痰丸五十粒日一服

清心導痰丸

白附兩一 南星姜製二兩 半夏姜製二兩 黃連炒七錢  
 天花粉兩一 白僵蚕炒半兩 川烏鹽製二錢  
 鬱金丹七錢 天麻 羌活各半兩

右為末薑汁糊為丸如桐子大每服五十九用通天氣風湯吞下

清心牛黃丸

膽星兩一 牛黃錢二 黃連兩一 婦身  
 甘草 辰砂各半兩



右為末湯浸蒸餅為丸菴荳大每服五十九臨臥時唾津嚥下

涎多自然流出者為熱嘗治宣文炳口流涎不止喜笑舌瘡脈洪大用連芩栝梔白朮蒼朮半夏竹瀝薑汁服之五日涎止笑息

唾多用力吐此者為寒云大病瘥出喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜理中丸東垣云多唾或唾白沫者胃口上停寒也藥中加益智仁此多唾皆用世方出也

針灸舌縱涎下頰悅取足少陰寒熱黃帝曰人之涎下者何氣使然岐伯曰飲食者皆入於胃胃中有熱則動垂動則胃緩胃緩則廉泉開廉泉開故涎下補足少陰口問篇

針灸舌縱涎下頰悶陰谷主之

白嚙舌黃帝曰人之白嚙舌者何氣使然岐伯曰此厥逆走上

脈氣皆至也少陰氣至則嚙舌少陽氣至則齧頰陽明氣至則齧唇矣視主病者則補之

汗 自汗 頭汗 手足汗 無汗 盜汗

陰陽氣陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽有餘則無汗而寒脈要精論飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞

苦汗出於脾經脈別論

自汗 陽之汗以天地之雨名之全文見陽加于陰謂之汗

不任外寒為陽陰陽別論口陽氣入內加于陰氣也凡傷寒始病脈浮至汗出則沉入內加于陰也

表虛自汗秋冬用桂枝春夏用黃芪能治虛勞自汗脈經有寒者亦用桂枝無寒者用黃芪

牡礪散治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗許學士方亦治盜汗不止

黃芪 麻黃根 牡礪附 右剉散每服三錢水一盞半小麥一百粒煎至八分不拘時服

周衛湯治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任外寒

黃芪 麻黃根 生甘草 猪苓 羌活 麥門冬 歸稍 生地 生黃芩 五味子 蘇木 紅花

半夏湯洗七次五分 右咬咀如麻荳大作一服水一盞煎至一盞去查稍熱服中風症必自汗汗多不得重發汗故禁麻黃而用根節也

張芸夫已酉四月天寒陰雨寒濕相雜因官事飲食失節勞役所傷病解之後汗出不止沾濡數日惡寒重添厚衣

心胸悶躁時躁熱頭目昏憤壅塞食少減此乃胃外陰火熾甚與夫雨之濕氣挾熱兩氣相合令濕熱大作汗出不休兼見風邪以助東方甲乙以風藥去其濕以甘藥瀉其熱羌活勝濕湯主之

甘草 黃芪 生甘草 生黃芩 防風 酒黃芩 人參 升麻 川芎 藜蘆 獨活 細辛 蔓荊子

柴胡 薄荷 右作一服水二盞煎一盞半後入細辛等四味再煎至一盞去查熱服一服而止諸症悉去

薄荷 清利頭目

生甘草 生黃芩 人參 升麻 川芎 細辛 蔓荊子

羌活 獨活 酒黃芩 生黃芩 防風 細辛 蔓荊子

柴胡 薄荷 右作一服水二盞煎一盞半後入細辛等四味再煎至一盞去查熱服一服而止諸症悉去



陽虛者用之

人參黃芪少佐桂枝湯甚者附子亦可用

黃芪去蘆 附子炮去皮臍

右咬咀每服四錢水一盞薑十片煎八分食前溫服

通治虛

補精氣止肝邪平補五臟虛羸六腑怯弱充肌膚進飲食人參丸

人參 山藥 白朮 白茯苓

石斛 黃芪取頭 五味子各一兩

右為細末蜜丸如桐子大每服三十九空心食前飲下久服不熱尤宜少年

尺脈虛汗為陰虛

平人氣象論云尺瀋脈滑謂之多汗王註謂尺瀋瀋而尺脈滑也膚瀋者榮血內涸又針經云腠理發泄汗出漆漆是謂津脫津脫者腠理開汗大泄按此二經論自汗多而

八皆然科卷二

汗濕勝自

血涸津脫者其治法乃東垣正陽湯用炒黃柏知母及當歸六黃湯之類是也汗以臟腑言之皆屬心經云心為汗難云腎邪入心為汗出不可止者是也

或問濕之與汗陰乎陽乎予應之曰西南坤土也在人則為脾胃陽之汗以天地之雨名之濕主淋漓驟注者濕勝也陰滋其濕為露為雨此陰寒隔熱火也隔者解也陰濕寒下行地之氣也仲景云汗多則亡陽陽去則陰勝也

重虛則表陽虛極矣其為寒中濕勝則音聲如從甕中出若中水也相家有言土音如居深甕裏言其壅也遠也不出也其為濕也審矣又知此二者亦為陰寒內經云氣虛則外寒雖見熱中蒸蒸為汗終傳大寒知始為熱中者表虛無陽不任外寒終傳為寒中者多成痺寒矣夫色以候天脈以候地形者乃候地之陰陽也故以脈氣候之皆有

形之可見者也

右濕勝自汗治法並見陰虛條

痲症亦有汗 火氣上蒸胃中之濕亦能作汗可用涼

膈散

帝曰有病身熱解情汗出如浴惡風少氣此為何病岐

伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉朮各十分

麩術五分合以三指撮為後飯病能為麩術一名

白朮散治飲酒中風汗多不可單衣食則汗出如洗久

不治必為消渴症

牡蠣二兩 白朮二兩 防風二兩

右為末每服一錢溫水調下不計時如惡風倍防風白

朮如多汗面腫倍牡蠣

酒風一名漏風經云飲酒中風則為漏風漏風之狀或多

汗常不可單衣食則汗出甚則身喘息惡風衣裳濡口乾

善渴不能勞事此即酒風同治也凡五臟風皆自汗惡風

雜方

周師脈弦左大於右不數身易得汗小便赤口燥此為

虛

白朮 陳皮 婦尾 青皮各半

白芍藥 人參各七錢 黃芩 川芎各三錢

木通二錢 甘草炙五錢

分九貼煎三之一稍熱飲之前藥下保和丸二十粒

動而汗出有虛者有熱者

安胃湯治因飲食汗出日久心中虛風虛邪令人半身

不遂見偏風痿痺之病先除其汗慄悍之氣按而收之

黃連去 五味子 烏梅去 生甘草各五分



針灸

熟其草分 升麻稍分  
右吡咀分作二服每服水二盞煎一盞去渣溫服食遠  
忌濕麪酒五辛大料物之類  
刺灸汗出有二

其一取肺經云邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬  
動肩背取之膺中外輪背三節五椎之傍以手疾按之快  
然乃刺之取之缺盆中以越之者是也  
其二取手足少陽經云三焦手少陽之脈所生病者汗出  
目銳皆痛頰痛耳後痛膈足少陰之脈所生病者汗出振  
寒瘧皆視盛虛熱寒陷下而施補瀉疾留灸也

肺脈與而散者當病汗至令不復發散也  
肺脈緩甚多為汗  
虛實法

頭汗  
頭汗出刺額而還血證也額上偏多何謂也曰首者六  
陽之所會也故熱薰蒸而汗出也額上偏多以部分左頰  
屬肝右頰屬肺鼻屬中州頤屬腎額屬心三焦之火涸其  
腎水溝渠之餘迫而上入於心之分故發為頭汗而額上  
偏多者屬心之部而為血證也飲酒飲食頭汗出者亦血  
證也至於雜證相火迫腎水上行入於心為盜汗或自汗  
傳而為頭汗出者或心下痞者俱同血證例治之無問傷  
寒雜病酒積下之而心下痞者血證也何以然曰下之亡  
陰亡陰者則損脾胃而亡血氣在胸中以亡其血陷之於  
心之分也故心下痞世人以為血病用氣藥導之則痞病  
愈甚而又下之故變而為中滿膨脹非其治也如此然當  
作何治獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

盜汗  
盜汗不出曲差主之

針灸

手足汗  
一男子手足汗醫用芩連栝并補劑皆不效又足汗常多  
後以八物半芩為君白附川烏佐使其汗即無

治脚汗  
白礬 乾葛各等  
右二味為末每半兩水三碗煎十數沸洗逐日一次纏  
三五日自然無汗

奪血者無汗奪汗者無血  
真氣已虧胃中火盛汗出不休胃中真氣已竭若陰火  
已衰無汗反燥乃陰中之陽陽中之陽俱衰四時無汗其  
形不久濕衰燥旺理之常也其形不久者秋氣主殺生氣  
乃竭生氣者胃之穀氣也乃春少陽生化之氣也

盛夏浴食無汗者為表實  
楊順二官子患脈滿而短重取而弱此久受濕傷血多年  
無汗遇勞身熱倦怠如沙病狀

蒼朮 白朮 芍藥各半 陳皮六  
歸身二 甘草 紅花各半

分六貼薑三片煎服  
謝老形質夏月無汗成久嗽病

半夏 蘇葉  
二味為末入莎末枕流末仁陷末以瓜萎穰桃仁泥半  
兩為丸先服三物湯三貼却服此九子

汗不出曲差主之

盜汗



熱

當歸六黃湯治盜汗之聖藥也

當歸 生地 熟地 黃柏

黃芩 黃芪 黃連各等分

右為籠末每服二三錢水一盞半煎七分去渣溫服小

兒用半錢

正氣湯治盜汗

黃柏炒 知母炒 甘草炙

右籠末作一服水二大盞煎一盞去渣臨臥服

當歸龍薈丸治盜汗見治法門

治盜汗外腎濕

人參 苦參 龍膽草 麻黃根各三

右件為末煉蜜丸如桐子大每服三十九燒麩湯下

寒

嚴氏黃芪湯治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛發厥自

入醫學綱目卷七

圭

汗或盜汗不止並宜服之

黃芪去蘆蜜炙 白茯苓去 熟地酒 桂枝不見

天門冬去心 麻黃根 龍骨各一 五味子

小麥炒 防風去 當歸酒 甘草炙

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎七分溫服不拘時

發厥自汗加熟附子發熱自汗加石斛

盜汗臨夜喫淡煮麥圓子空心服妙香散

戢陽氣止盜汗進飲食退經絡熱栢子仁丸

栢子仁 半夏麩 牡蠣甘 子內火 煨用

人參 麻黃根炙 白朮

五味子各一 淨麩炒

右八味為末塞肉丸桐子大空心米飲下三五十九日

二服得效減一服將愈即住作散調服亦可

白朮湯治盜汗用白朮四兩分作四處

一兩用黃芪一兩石解 一兩牡蠣 一兩麩

各味炒黃色餘藥不用只用白朮研末每服三錢用粟

米煎湯送下盡四兩為效

世治盜汗出山藥一味為末臨臥酒調下三錢效

世牡蠣散治盜汗方見前

世黃芪散治盜汗

黃芪 木通 葛根

右為籠末水煎服

世治盜汗尤切將椒目微炒搗細末用半錢匕以生猪上

唇煎湯一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水蠱

世五仙丸治盜汗 天仙子 五靈脂

右為末水糊丸桐子大三十九白湯臨臥服本草云天

入醫學綱目卷七

圭

世治盜汗

藏腑盜汗皆屬腎經云腎病者盜汗出憎風是也

運氣盜汗皆屬寒水經云歲水太過寒氣流行甚則勞汗

出憎風又云太陽所至為寢汗症是也

世治盜汗桑葉為末茶服之諸藥不應者果驗出醫

世豆豉能治久盜汗患者以一升微炒令香清酒二升漬

兩三日取汁任人服之不差更作三兩劑即止

世牡蠣煨過麻黃根等分同研極細粉治盜汗及陰汗

世盜汗 陰都 五里 間使

世盜汗 中極 氣海 虛損盜汗勞熱 百勞三分瀉

世肺俞四分補

世盜汗者謂睡而汗出者也不睡則不能汗出方其睡也



溱溱然出覺則止而不復出矣

卒中暴厥 五絕 暴死暴病

卒中者卒然不省人事全如死尸但氣不絕脈動如故或脈無倫序或乍大乍小或微細不絕而心胸煖者是也

尸蹇脈動而無氣氣閉不通故靜而死也 葛蒲屑內鼻孔中吹之令人以桂屑著舌下 又方別取左角髮方寸燒末酒和灌之立起此即內經法也詳見後

針灸

邪客于手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會于耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀

若尸或曰尸厥刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一痛後刺手大指內側去端如韭葉後刺手心少陰銳骨之端各一痛立已不已以竹管吹其兩耳其左角之髮方一寸燔飲以美酒一杯不能飲者灌之立已全文見刺經

八寶金剛卷七

圭

氣昏暈 奪命在曲澤上針入三分先補後氣回後 玉泉八分補十呼 隱白三分先補後瀉補生

尸蹇 鬼擊 支滿二分先補後瀉 三里補十呼瀉五呼此

少陰脈不止腎氣微少精血奔氣促迫上入膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱喘陰股與陰相動令人不仁

此為尸蹇當刺期門巨闕 恍惚尸蹇煩痛中極及僕參主之

尸蹇死不知人脈動如故隱白及大敦主之 尸蹇暴死金門主之

仁宗最寵貴妃一日食次忽仆倒遍身卒冷急奏帝上

錄不

乃急召孫杜既至奏曰不妨此乃氣厥爾少頃吐即復甦也御坐良久果吐而甦上問因何而得一人並奏曰此貴妃方食因憂怨氣上遂與食相併故如此者吐即氣透故復甦也上問妃有何事如此妃對曰陛下無嗣臣妾不能為陛下生皇嗣所以自怨氣忽上逆而至驚動聖駕上歎曰朕亦自責乃勞汝致病耶因嘉獎孫杜之能良久曰醫道如此豈非良醫也耶

右暴厥不知人不治自愈經云帝曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知人也又云血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死者是也

大寶金剛卷七

圭

嘗治一人陰先虧而陽暴絕者浦江鄭元年近六十養受用之人也仲夏久患滯下而又犯房勞忽一晚登廁間兩手踈散兩眼閉而無光尿自出汗如雨喉如鋸呼吸甚微其脈大而無倫次無部位可畏之甚予適在彼急令煎人參膏且先與灸氣海穴壯如小指大至八十壯右手能動又三壯唇微動參膏亦成遂與一盞至半夜後盡三盞眼能動盡二斤方能言而索粥五斤而痢止至數十斤而安

救卒死而四肢不收失便者方

馬屎一升水三斗煮取二斗以洗之又取牛洞稀糞一升溫酒灌口中灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一壯

救卒死而張口反折者方



灸手足兩爪後十四壯飲以五毒諸膏散方未

救小兒卒死而吐利不知是何病方

狗屎一九絞取汁以灌之無濕者水煎乾者取汁

目閉口  
鼻塞  
五發

救卒死客忤死還魂湯主之

麻黃去節 杏仁去皮尖 炙甘草一錢 千金有桂二兩

右三味以水八升煮取三升去查分令咽之通治諸感

忤千金方云主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或

已無脈口噤拘不開去齒下湯湯下口不下者分病人

髮左右提掄肩引之藥下復增服一升須臾立甦

蘇合香油入安息 薰陸香研 龍腦研各

青木香 白朮 白檀香 丁香

朱砂研 沉香 香附炒 犀角屑

草撥 安息香另為末調無灰 麝香研

訶梨勒煨取皮 各二兩

右為細末入研藥勺用安息香膏并煉白蜜和劑每九

桐子大清晨新汲水溫冷任意化服四九老人小兒一

九溫酒化服亦得用蠟紙裹一九如彈子大縫袋帶之

陳無擇云病自內作不曉其名者服之皆效最治氣厥

氣不和吐利關格甚有神效

扁鵲中惡與卒死鬼擊亦相類為治皆宜相參用之已

死搗菖蒲生根絞汁灌之立瘥

救卒死而目閉者搗韭汁灌耳中吹皂莢末鼻中效

治厥卒死諸暴絕症用半夏不拘多少湯泡七次為末

每用少許吹入鼻中心頭溫者可治倉卒無方急於人中

穴及兩脚大拇指離甲一韭葉許各灸三五壯即活

一夫病痰厥不知人牙關緊急諸藥不能下候死而已

戴人見之問侍病者口中曾有涎否曰有戴人先以防風

藜蘆煎湯調瓜蒂末灌之口中不能下乃取長蛤甲磨去

亦以紙裹其尖灌於右鼻竅中咽然下咽有聲復灌其左

竅亦然戴人曰可治矣良久涎不出遂以砒石一錢又投

之鼻中忽偃然仰面似覺有痛斯須吐穢及膠涎數升頓

甦砒亦尋常勿用以其病大非此莫能動然無瓜蒂亦不

可使用宜消息之

凡卒中口厥鬱胃中風中暑之類皆當發表也仲景云鬱

胃欲解必是大汗出還魂湯用麻黃桂枝清魂湯用荆芥

及諸卒中用皂角半夏搐鼻取嚏用藜蘆砒霜折齒取痰

皆所以開發上焦使表邪流通也中暑忌冷水開表亦此

意

入醫學綱目卷二十七

本解毒雄黃九治卒中仆地不知人事方見

三物備急丸

大黃 乾薑 巴豆各一兩去皮尖

右藥各須精新先搗大黃乾薑為末研巴豆內中合搗

千杵蜜和丸器中貯之 主心腹諸卒暴百病若中惡

客忤心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤停尸卒死者以

熟苦酒服大葶許三四丸或不下捧頭起灌令下咽須

臆當瘥如未瘥更與三九當腹中鳴即吐下便瘥若口

噤亦須折齒灌之

中暑 中暑悶倒急扶在陰涼處切不可與冷水當以布巾衣

物等蘸熱湯熨臍中及氣海續以湯淋布上令微臍腹煖

即漸醒如倉卒無湯處搗道上熟土於臍以多為佳冷即

易之古法道塗無湯即搗熟土於臍上仍撥開作窩子令



人更弱於中以代湯續與白虎竹葉石膏湯 凡覺中暑急嚼生薑一大塊冷水送下如已迷亂嚼大蒜一大瓣冷水送下如不能嚼即用水研灌之醒路中倉卒無水渴甚急嚼生蔥二寸許津同嚙可抵飲水二升中暑之病即見也

大黃龍九治中暑眩暈昏不知人或身熱惡寒頭痛狀如傷寒或往來寒熱渴甚嘔吐泄瀉常服去暑毒分陰陽

硃黃 硝石各一 雄黃雄黃者 白礬

滑石各半 寒食麪各四

右為末滴水丸如桐子大每服五丸至七丸加至二十

丸新汲水下昏塞不知人則以井水開口灌之中暑忌冷此藥以冷水下之乃熱因寒用

本又方解一切暑毒欲死者便服之立甦

入胃牛和末七

半夏四兩醋一升 甘草一斤 肉桂

赤茯苓各半 白茯苓一斤

右為末用生薑汁麪糊丸如桐子大每服五十九丸熱水

下予夏日登途常畜此藥於篋筒中防諸緩急及僕僕

門每日服一服無伏暑之疾奇驗不一

中暑發昏以新汲水滴兩乳以扇搗之重者以地漿灌之則醒若與水飲則死

仲諸乘寒者則為厥鬱員不仁以胃無穀氣脾不通口急

不能言戰而慄也

無附子理中湯治五臟中寒口噤四肢強直失音不語昔有武士守邊大雪出帳外忽然暈倒時灌以此藥兩劑遂

醒

大附子炮去 人參 乾薑炮 甘草炙

白木各等

右到為散每服四大錢水一盞半煎七分去渣空心服口噤則幹開灌之

乾薑附子湯治中寒卒然暈倒或吐逆涎沫如暗風手脚

攣搐口噤四肢厥冷或復躁熱傷寒

四治凍死法四肢有口噤只有微氣者用大釜炒灰令煖

以囊盛熨心上冷即易之目開氣出然後以粥清稍稍進

之若不先溫其心便將火灸則冷氣與火爭必死矣

無脈者 四治傷暑昏俗呼昏迷慎不可下汗之則愈此因出虛血也

中鬱胃欲解必大汗出

人平居無疾忽如死人身不動搖默然不知人目閉不能開口啞不能言或微知人惡聞人聲但如眩目移時方

寤此由汗過多血少氣併于血陽獨上而不下氣壅塞而

不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱

胃亦名血厥婦人多有之宜白薇湯倉公散

白薇湯 白薇 當歸各一 人參兩半 甘草一分

右籠末每服五錢水二盞煎一盞去渣溫服

倉公散 藜蘆 瓜蒂 雄黃 礬石煨

右等分為細末少許吹入鼻中

問曰婦人病經水適下而發其汗則鬱胃不知人何也

師曰經水下故為裏虛而發其汗則表亦虛此為表裏俱

虛故令鬱胃也

婦人半產誤用寒涼藥有損論治法○婦人分娩及半

產

產

產

產



產漏下昏冒不省眼目無所知覺蓋因血暴亡此有形血去之後則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火乘肺眼目不省人事是陰血暴亡不能鎮撫也故血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱傷反為不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之倖免不死暴虧氣血生命豈能久活又不知內經有云病氣不足宜補不宜瀉眼目合眼之病悉屬於陰宜汗不宜下又不知傷寒鬱胃得汗則愈是禁用寒涼藥也分婉半產本氣不病是暴去有形之血亡血補血又何疑焉補血則神昌常時血下降亡今當補而升舉之心得血則能

養神不昏矣血暴降下是秋冬之令大旺今舉而升之以助其陽則目張神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足以全生活血湯主之

紅花	蔓荊子	細辛	生地
熟地	藥本	川芎	防風
羌活	獨活	甘草	柴胡
葛根	歸身	白芍藥	升麻
右咬咀每服五錢水煎去查食前稍熱服			
當歸附子湯	治臍下冷痛赤白帶下		
當歸	炒鹽	蠟稍	升麻
甘草	柴胡	黃柏	附子
乾薑	良薑		

右咬咀每服半兩水煎去查稍熱服或為細末酒麪糊丸亦可

治婦人血風攻腦痛旋悶絕忽死倒地不知人事者用喝起草取其嫩心不限多少陰乾為末以常酒服一大錢不拘時候其功大效服之多達腦蓋善通頂門今蒼耳是也

治姪娠因外感風如中風狀不知人用熟艾為末醋炒令極熱乘熱以絹帛裹臍下良久開省

奔豚氣上衝咽喉發作亦似死狀往來寒熱是也

卒中仆地半身不遂者為中風

卒中仆地口吐涎沫者為癲癩

運氣鬱昌有二

其一屬熱經云少陰之復鬱昌不知人惡寒振慄又云少

陽所至為昏昧又云諸熱發瘵皆屬於火治以鹹寒是也其二屬寒經云歲火不及寒乃大行民病鬱昌蒙昧心痛又太陽司天與太陽之復皆病善悲眩仆又陽明司天之政四之氣寒雨降病眩仆治以甘熱是也

中惡客忤卒死者灸臍中百壯以皂角末搗鼻或研菲汁灌耳中

救卒死	烏梅	吳茱萸
右三味以水一斗煮之以病櫛內中三沸櫛浮者生沉者死煮取三升去查分飲之		
救卒死方		
雄雞冠割取血以管吹內鼻中	豬脂	雞子
一升煮沸灌喉中	雞肝	及血塗面上以灰圍四旁立



起 大荳二七粒以雞子白并酒和盡吞之  
救卒死而壯熱者方用礬石半斤以水一斗半煮消以浸  
脚令沒踝

驚怖死者以温酒灌之  
痰中後心下迷悶汪洋食少倦怠

白木二錢 川芎半錢 蒼朮 半夏

茯苓各一錢 薑片三錢 水煎服

四六嫂因食生菜青梅痰發昏冒不知人口渴脈滑今已  
能言但說心下痞痛乏力

陳皮 白木各錢 蒼朮半錢 滑石一錢

木香三錢 甘草少 半夏七分 水煎服

婦人三十餘歲因產後能食半月後忽頭暈仆不知人醒  
後至今食少

醫學綱目卷七

白木二錢 川芎 黃芩 茯苓各一錢

薑片三錢 右煎取三之一下保和丸三十粒

世言氣中者雖不見於方書然暴喜傷陽暴怒傷陰憂  
愁拂意氣多厥逆往往多得此疾便覺延朝昏塞牙關緊

急若繫作中風候用藥非止不相當多致殺人元祐庚午  
母氏親遭此禍至今飲恨母氏平時食素氣血羸弱因先

子指館憂惱忽一日氣厥牙禁延潮一里醫便作中風以  
大通丸三粒下之天下數行一夕卒予嘗痛恨每見此症

急化蘇合香丸灌之便醒然後隨其寒熱虛實而調理之  
無不愈者

經云無故而瘖脈來乍大乍小乍短乍長者為祟滑者鬼  
疰緊而急者遁尸

脈至如喘名曰暴厥厥者不知與人言大奇 ○脈浮而  
散者為胸中不足云云 ○脈實而微者為虛身中卒至五臟  
絕閉脈道不通氣不往來譬於墮溺不可為期其脈絕不  
來若人一息五六至其形肉不脫其藏雖不見猶死也玉

論 中暑脈陽弱陰虛微遲似芤  
問曰婦人病如瀕疾鬱胃一日二十餘發師脈之反言  
帶下皆如師言其脈何類何以別之師曰寸口脈濡而緊  
濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛氣虛血竭凝寒陰陽不  
和邪氣舍於榮衛疾起年少時經水來以合房室移時過  
度精感命門閉經下血虛百脈皆張中極感陽動微風激  
成寒因虛舍榮衛冷積於丹田發動上衝奔在胸高津液  
掩口入涎唾涌溢出眩目狀如厥氣衝解裏熱龍醫名為

瀕灸之因大刺○問婦人病苦氣上衝胸眩胃吐涎沫體  
裏氣衝熱師脈之不名帶下其脈何類何以別之師曰寸  
口脈沉而微沉則胃氣伏微則榮氣絕陽伏則為疹陰絕  
則為亡血病當小便不利津液閉塞今反小便通微汗出  
沉變為寒咳逆嘔沫其肺成痿津液竭少亡血損經絡因  
寒為血厥手足苦痺氣從丹田起上至胸脇沉寒拂鬱於  
上胸中窒塞氣歷陽部面赤翕翕如醉形體似肥此乃浮虛  
醫反下之長針復重虛榮衛久發眩胃故知為血厥也

問曰寸口脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏  
血氣入臟即死入腑即愈此為卒厥何謂也師曰唇青身  
冷為入臟即死如身温和汗自出為入腑即愈

人病尸厥呼之不應脈伏者死脈大反小者死 卒中  
惡腹大四肢滿脈大而緩者生緊大而浮者死緊細而微

醫學綱目卷七

瀕灸之因大刺○問婦人病苦氣上衝胸眩胃吐涎沫體  
裏氣衝熱師脈之不名帶下其脈何類何以別之師曰寸  
口脈沉而微沉則胃氣伏微則榮氣絕陽伏則為疹陰絕  
則為亡血病當小便不利津液閉塞今反小便通微汗出  
沉變為寒咳逆嘔沫其肺成痿津液竭少亡血損經絡因  
寒為血厥手足苦痺氣從丹田起上至胸脇沉寒拂鬱於  
上胸中窒塞氣歷陽部面赤翕翕如醉形體似肥此乃浮虛  
醫反下之長針復重虛榮衛久發眩胃故知為血厥也

問曰寸口脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏  
血氣入臟即死入腑即愈此為卒厥何謂也師曰唇青身  
冷為入臟即死如身温和汗自出為入腑即愈

人病尸厥呼之不應脈伏者死脈大反小者死 卒中  
惡腹大四肢滿脈大而緩者生緊大而浮者死緊細而微



者亦生

五絕

丹治五絕一自縊二摧壓三溺水四魔魅五產乳用半夏一兩末為丸甚大內鼻中愈心温者一日可治出子母

救自縊死法

仲救自縊死自旦至暮雖已冷必可治暮至旦則難恐此常言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微温者一日已上猶可治之當徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使緩一人以手按據胸上數摩動之一人摩持臂脛屈伸之若已僵直但漸漸強屈之并按其腹如此一炊頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按莫置亦勿勞之須臾可少與桂湯及粥清含與之令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此法最善無不活者

八寶丹

全

山自縊者切不可割斷繩子以膝蓋或用手厚裹衣物緊頂穀道抱起解繩放下揉其項痕指鼻及吹其兩耳待其氣回方可放手若便泄氣則不可救矣

肘自縊死安定心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶温者則冠血滴口中即活男雌女雄 又方雞尿白如

惠大酒半盞和灌及鼻中尤妙 千金方以藍汁灌之餘

法同上

救癱瘓死法

山卒墮癱壓倒打死心頭温者皆可救將本人如僧打坐令一人將其頭髮捺放低用半夏末吹入鼻內如活却以生薑汁香油打勻灌之

救溺死法

山溺水者放大瓮上睡着將脚後登脚站起二磚却蘸塩

擦臍中待其水自流出口不可倒提出水此數等但心頭微熱者皆可救治 又方溺水死一宿者尚活搗皂角綿裹內下部須臾出水即活

救癱瘓死法

得嚏即氣通

魔死不得近前喚但痛咬其脚跟及唾其面不省者移動此少臥處徐徐喚之元有燈則存無燈切不可點燈及用皂角搗兩鼻

臥忽不寤勿以火照之殺人但痛嚙大指甲際而唾其面則活取韭搗汁吹鼻孔冬月用韭根取汁灌口中

治卒魔雄黃搗末細篩以管吹入鼻孔中

暴死暴病

暴死乃真死也皆死於片餉半日或一日二日如非卒中

八寶丹

合

可再醒也

虛

黃帝曰其有卒然暴死暴病者何也少師答曰三虛者其死暴疾也得三實者邪不能傷人也黃帝曰願聞三虛

少師曰乘年之衰逢月之空失時之和因為賊風所傷是為三虛故論不知三虛二反為倉帝曰願聞三實少師曰

逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能危之

三虛相搏則為暴病卒死

運氣 運氣暴死暴病有四

運氣

一曰虛經云六位之氣盈何如岐伯曰大小異也大者之

至徐而常少者之至暴而亡是也蓋暴雖謂所至之氣然

病氣皆在其中也

二曰火經曰火鬱之發甚則悶懊懷善暴死又云少陰所



至為暴死又云少陽司天之政三之氣炎暑至民病暴死又云陽明司天之政二之氣榮厲大至民善暴死又云少陽所至為暴病是也

三曰風火經云少陽司天火氣下臨風行於地其主暴速又云厥陰司天風氣下臨其發機速主所謂變化卒急其為疾病速在發機是也

四曰金經云金太過曰堅成堅成之紀其動暴折癘疰是也此金兼火化之氣金主折火主暴也

雷公曰人不病而卒死何以知之黃帝曰火氣入於臟腑者不病而卒死矣雷公曰病小愈而卒死者何以知之

黃帝曰赤色出兩額大如拇指者病雖小愈必卒死黑色出於庭大如拇指必不病而卒死

赤色出兩額即脈訣所謂暴病如脫不久居者是也

針灸

太陽根于至陰結于命門命門者目也太陽為開開折則

肉節瀆而暴病起矣故暴病者取之太陽視有餘不足瀆者皮肉宛腫而弱也

醫學綱目卷之十七

醫學綱目卷之十八 心小腸部

癰疽 腫瘍 潰瘍 癰疽所兼諸症

久漏瘡

腫瘍者癰疽未見膿而腫者也潰瘍者癰疽之膿已潰出者也丹溪云腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主設欲行大黃者宜審其虛實之原瘍潰內外皆虛宜以補接為主設欲行香散者宜防其虛虛之失由是言之則癰疽之腫時與潰時不同今分腫瘍潰瘍為二門

腫瘍

癰疽方腫未見膿者也

托裡透毒法 癰瘍者火之屬須分內外若其脈沉實當先疎其內以絕其原也其脈浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至甚遏絕經絡故發癰腫經曰榮氣不從逆于

不醫學綱目卷之十八

肉理乃生癰腫此因失托裏及失疎通又失和榮衛也治瘡之大要須明托裏疎通行榮衛三法托裏者治其外之內疎通治其內之外行榮衛者治其中也內之外者其脈沉實發熱煩躁外無焮赤痛甚邪氣深于內也故先疎通臟腑以絕其原外之內者其脈浮數焮腫在外形証外顯恐邪氣極而內行故先托裏以防其干也內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宣通知其在經當和榮衛也用此三法之後雖未瘥必無變証亦可使邪氣峻減而易痊也

表裡寒濕之異

瘡疽之發其受之有內外之別治之有寒溫之異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥則是皮毛始受之邪引入骨髓受之內者法當疎利以寒劑反用溫劑托裏則是骨髓之病上徹皮毛表裏通潰共為一瘡助邪為毒苦楚百倍輕則危殆重則死矣予聞紫古云瘡瘍之生也表裏



不同或攻或發少有差舛發証隨能殺人甚于傷寒也針灸施治各隨其宜所用之藥又當明入五臟君臣是其法也

味沉寒 痛深者 宜寒劑 利之 內疎黃連湯治嘔心逆發熱而煩脉沉而實腫硬木

黃連 芍藥 當歸 枳殼

木香 黃芩 梔子 薄荷

桔梗 甘草 連翹

右除檳榔木香為末外並到每服一兩水一盞半煎一盞先吃一二服次每服加大黃一錢再加二錢以利為度如有熱証止服黃連湯大便秘澀加大黃如無熱証止用復煎散時時叩之如此內外皆通榮衛和調則經絡自不遏絕矣

脈浮數 宜溫劑 在皮內恐邪氣盛則必侵于內急須內托以救其裡

地骨皮 黃芪 防風 芍藥

黃芩 白朮 茯苓 人參

甘草 當歸 防己 桂枝

右吹咀先將蒼朮一斤用水五升煎至三升去蒼朮滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又煎蒼朮滓為湯去滓再依前煎十二味藥滓服之此除濕散鬱熱使胃氣和平如或末已再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利煩熱已退却服復煎散半料如此使榮衛俱行邪氣不能內侵也

表裡已當歸黃芪湯治瘡瘍臟腑已行而痛不可忍者

當歸 黃芪 地黃 川芎

地骨皮 芍藥

右吹咀水煎服如發熱加黃芩 如煩躁不能睡卧者加梔子 如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮

表裡 藥方 奪命丹治惡瘡癰疽發背

大黃 生薑 沒藥 乳香 牡蠣

右為粗末轉作九子一錢用好酒一升木炭火熬一沸分二碗盛之夜露一宿早晨去滓空心服

治發背方蒼耳炒黃擦其刺再炒深黃不見風研細末每服五錢七好熱酒調食前臨卧服

一則用大黃牡蠣一則用蒼耳知有內外之別也 前用奪命丹二藥表裏不同何以然乃膏粱之變脉沉而滑

地之濕氣感則害人皮肉筋脉浮而滑所以有泄之發之之異也

難疽因積毒在臟腑非一朝夕今發于外宜以標本為治當先助氣壯胃使根本堅固而以行經活血為佐參以經絡時令使毒氣外發此症仲景解表用麻黃桂枝之意

施治之早可以內消此乃內托之本意也

通父家程梗於虎醫上足太陽經生癰堅硬腫痛大作左右尺脉俱緊按之無力

羌活 黃柏 防風 紫本

連翹 肉桂 甘草 蒼朮

陳皮 當歸 黃芪

右作一服酒二大盞水一大盞煎至一盞去渣熱服空心以夾被蓋覆其癰使藥行罷去之一服愈



王姑夫七十餘患項疽脈實而稍大此因憂悶而生太陽經治之

歸頭二錢 黃柏一錢 黃芪 羌活

地黃酒 黃芩炒酒 桔梗一錢 黃連炒酒

連翹 防風 甘草生 人參

陳皮 防已 澤瀉錢半 白水煎服

淨肢湯治皮膚痒腋下瘡背脊上瘡耳聾耳鳴

麻黃一錢 桂枝二錢 草薺一錢 當歸稍分

紅花少 羌活錢二 防風錢一 柴胡錢一

升麻分半 連翹 桔梗分五 甘草分五

生地五 黃芩錢一 蒼朮錢一

右剉如麻荳大都作一服水二大盞煎至一盞去查稍熱服

不醫學綱卷之八 中

尹老家素貧寒形志皆苦干手陽明經分出癰第四日忽腫幼有癰疔其臂外皆腫痛先腫在陽明左右寸皆短中得之俱弦按之洪緩有力此癰得自八風之變以脈斷之邪氣在表然其症大小便如故飲食如常腹中和口知味知不在裏也不惡風寒止熱躁脈不浮知不在表也表裏既和知邪止在經脈之中凝滯為癰出身半已上風從上受之也故與卻寒邪和經脈中氣血使無凝滯也白芷升麻湯

白芷分七 升麻 桔梗分五 甘草分

黃芩生 歸稍 生地錢 酒黃芩

黃芪 連翹各二 中桂少 紅花少

右水酒各一盞同煎至一盞臨卧熱服一服愈

此症雖曰經脈之中然得之自八風之變其藥制度皆

發表之意

婦人兩乳間出黑頭瘡頂陷下作黑眼子其脈弦洪按之細小

升麻 連翹 葛根各一 肉桂分三

黃芪 歸身 甘草一錢 黍粘子分五

黃柏二錢

右作一服水一盞酒半盞煎至一盞二服愈

汗之則瘡已 丁巳年委子從軍回住曹州有趙同知

鼻經歷病頭面赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒

牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安臥一瘍醫腫上疔

刺四五百餘針腫赤不減其痛益甚不知所由然予往診

視其脈浮紫按之洪緩此寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升

聚而赤腫經云天寒地凍則水冰人氣在中皮膚緻腠理

閉汗不出血氣強內堅清當是之時善行水者不能注水

善穿地者不能擊凍善用針者亦不能取四厥必待天溫

冰釋凍解而水可行地可穿人脈亦猶是也又曰冬月閉

藏水冰地拆故用藥多而少針石也宜以苦溫之劑溫經

散寒則已所謂寒緻腠理以苦發之以辛散之也宜以托

裏溫經湯麻黃苦溫發之者也防風辛溫散之者也升麻

苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經中之邪故以為臣

血流而不行者則痛以香白芷歸身辛溫以破血散滯濕

熱則腫蒼朮苦甘溫躡輕浮力雄壯能泄皮膚間濕熱

人參甘草甘溫白芍藥酸微寒調中益氣使托其裏也故

以為佐各剉如麻荳大同秤水煮餌之以薄衣覆其手以

厚被覆其身且于暖處則經血溫腠理開寒乃散陽氣

伸大汗出腫減八九再服去麻黃防風加連翹黍粘子痛

不醫學綱卷之八 五



腫悉去經言汗出則瘡已信哉

托裏溫經湯治寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏榮中聚而赤腫痛不可忍惡寒發熱或相引肢麻疼痛

麻黃去根 白芷 當歸各二錢 防風去蘆

葛根各三錢 升麻四錢 甘草炙 白芍藥各一錢半

人參 蒼朮各錢

右剉如麻苳大每服秤一兩水二盞先煮麻黃令沸熟去沫再下餘藥同煎至一盞去渣大溫服訖卧于暖處即以綿衣覆之得汗而散

少陽脈

蒲津王世祥年七十感寒濕地氣二月間得附骨癱于左腿外側足少陽之分少侵足陽明分潤六七寸長一小尺堅硬漫腫不辨肉色皮澤深以指按至骨大痛又行步作痛與藥下咽疼痛立止二日後柔軟而腫消矣

柴胡 黍粘子各錢 連翹 肉桂各一錢

黃芪 當稍各二錢 黃柏 甘草炙

升麻七錢

作一貼好酒一盞半煎至一盞大溫空心食消盡服之少時以早膳壓之使不令大熱上攻犯上中二焦也

賈德茂男十歲四月天氣大熱于左足大腿近膝股內足厥陰肝之經少侵足大陰脾之經分出附骨疽不辨肉色漫腫皮澤木硬痛勢甚大其脉在三部細弦按之洪緩畧有力

黃芪二錢 柴胡稍 羌活五錢 連翹二錢

肉桂三錢 土瓜根三錢 生地一錢 黃柏酒洗

當歸尾七錢

右作一服酒一盞水三盞煎至一盞空心熱服一服愈

內托榮衛湯治風濕熱鬱其手足少陽致血脉凝逆使榮衛周身元氣消弱其風熱滯于下其面色必赫赤而腫微黯色風水之性上衝額必念色其人多怒其瘡之色亦赫赤腫硬微帶黯色其瘡之形勢亦奮然高起結硬而作痛其脉洪緩而弦宜發其汗而通其榮衛則邪氣去矣

黃芪 桂枝各五錢 防風 羌活

黃芩 當歸各半錢 連翹 柴胡各二錢

甘草炙 人參各一錢 蒼朮 紅花各三錢

右吹咀只作一服水酒各一大盞同煎至一盞溫服

右九方皆東垣及羅謙甫丹溪隨癰疽所發分野制之也其方皆以發表為先不過一二服而愈如癰疽發在

太陽經分野必用防風羌活陽明經分野必用香白芷

升麻少陽經分野必用柴胡太陰經分野必用芍藥升

木醫聖藥

麻少陰經分野必用獨活厥陰經分野必用青皮柴胡

皆以桂佐之身半已下者必用酒水多熟煎之空心服

使藥下行身半已上者必用酒水少帶生煎之臨臥服

使藥上行脈細小無力必于本經藥中加辛熱劑脉洪

大有力必于本經藥中加苦寒劑隨症加減活潑潑地

其効如神真良醫也

縮毒金粉散治但疼痛不急服

乾葛 甘草 鬱金 川芎

瓜蒌根 白芷

右等分並生為末每一錢溫酒入蜜調下不拘時此藥

大散五臟積毒凝滯日三服

羌活當歸湯治腦疽 黃芪酒炒 黃連炒 歸身酒洗 甘草炙



羌活 黃栢酒浸 連翹各五 澤瀉  
獨活 藥本各三 防風 梔子仁各五  
右咬咀分作四服水一小椀先浸一時許入酒一匙煎至八分去渣大溫服食後日二服和查計六服三日服盡去查清藥調下後換柳散  
柳散用柳柳為細末將羌活當歸湯調下  
黃栢當歸湯治疔疽  
黃栢炒七 黃芩炒 當歸身炒 甘草炙各一兩  
黃連炒 防風各五 澤瀉 山梔  
知母 地骨皮各三 連翹分五  
右咬咀分作四服每服水一小椀浸一時許入酒一匙煎至八分去渣調下柳散大溫服與前藥同  
呂孺人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此藥  
不醫學綱目卷八  
白朮 川芎三錢 赤芍藥 連翹二錢  
陳皮 防風 黃芩二錢 木通半錢  
甘草分五  
分五貼水煎服  
治疔酒婦人用酒煨大黃取汗法見膏條條  
十宣散 人參 當歸 黃芪各二兩  
川芎 防風 厚朴 桔梗  
官桂 甘草 白芷各一兩  
右為細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數服以多為妙不飲酒者用木香濃煎湯下然不若酒力之勝也許學士云此方得于都下異人濟苦者不可計數陳無擇謂此藥在第四節服者非也早服中病者必消散

千金托裏散治發背疔瘡方見  
托毒散治癰疽初起高腫發痛不定喘息氣粗  
附子一枚炮 當歸 麻黃 甘草  
官桂 川芎 羌活 石葦  
龍胆草  
右九味等分為末每服二錢水一大盞姜三片鹽少許同煎  
一男子年五十餘形實色黑背生紅腫近胛骨下痛甚脈數而洪紫食亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃栢生附子括萎子甘草節羌活青皮人參黃芪半夏生姜六貼而消此非內托之意歟  
五香湯  
木香 沉香 麝香 乳香  
丁香 粉草 人參 黃芪  
犀角  
右每服四錢水二盞煎至一盞不拘時  
五香連翹湯  
乳香 甘草 木香 沉香各三  
丁香半兩 連翹 射干 升麻  
黃芪 木通 桑寄生如無升麻代之  
獨活各三 麝香一錢  
右咬咀每服三錢水一盞煎至七分溫服大便秘者加大黃  
內托散一名護心散 一日至三日之內宜連進十數服  
真葦荳粉一兩 明乳香半兩 使乾急煎出府令研極細  
右研令勻每服二錢至三錢濃煎甘草湯調下時時細



雜方

呷要藥常在胸膈間若毒衝心有嘔逆之証大宜服此  
如有寒而嘔逆不  
宜服此當用辛熱  
丹溪云內托散菴葶解丹毒又治石毒味甘入陽明胃性  
寒能補為君乳香去惡腫入少陰性溫善竄為佐甘草性  
緩解五金八石及百藥毒為使此方專為服丹石而發疽  
者設若不因丹石而發疽恐非必用之劑又云內托散性  
涼治嘔有降火之理

排膿湯方

甘草二 桔梗三 生姜一 大棗十  
右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服

托裏排膿生肌散

皂角刺不拘多少粗  
大黑紫者

右置瓶中鹽泥固濟炭火燒過存性放冷出研為細末

每服一錢薄酒微溫調下暑月陳米飲下

保安湯治瘡托裏或已成者速潰

瓜蒌新者一個  
去皮火焙沒藥一錢研 金銀花 甘草  
生姜各半

右為細末用好無灰酒三升于銀石器內煎至一升分  
作三盞三次飲盡病微者只一服如服托裏藥不能發  
散又作瘡者用此

柞木飲子

乾柞木葉四兩 乾荷葉中心蒂 乾萱草根  
甘草節 地榆各一

右細剉每服半兩水二碗煎一硃分作二服早晚各一  
服未成者自消潰者自乾其荷蒂去惡血萱根下水鮮  
毒利胸膈柞木有芒刺能驅逐地榆主下焦血病輕小

毒小者  
聖劑內

証候或可倚仗

車螯散

車螯一兩煨通赤本草  
云車螯解毒毒 生甘草 輕粉分五

右一處為細末每服四錢濃煎括萎酒調下五更服轉  
下惡物為度未知再用効在五香之上本草云車螯大  
殼赤出火毒一宿 瓜萎一個去皮  
瓦上炒香

又方車螯四個黃泥固濟火  
煨赤出火毒一宿 甘草節分五

燈心三十 甘草節分五

右為粗末作一服酒二盞煎一盞去渣入蜜一大匙和  
勻每用酒八分盞車螯末二錢膩粉少許調勻空心溫  
服取下惡物黃涎為効

丹云車螯散一以輕粉為佐一以燈心為佐其散腫消毒  
下積安詳穩重輕小症候可以倚仗

治背瘡荆芥穗木鱉子仁大黃歸頭甘草節除荆芥穗為

君外餘各等分酒水各一椀煎至七分空心向東飲即下

積與粥便止若結成者用川練子七枚燒灰酒下次與十

四枚又次與此一枚三貼後雖結亦小之此

漏蘆湯治癰疽丹疔惡肉時行熱毒赤腫

漏蘆 連翹 黃芩 白欬

枳殼 升麻 粉草 麻黃

朴硝各 大黃半

右除硝外每服二錢水一盞姜三片薄荷三葉同煎溫  
服取利為度

漏蘆湯

生黃芪 連翹 沉香 漏蘆各一

粉草半 大黃一

右為細末每服二錢姜末湯調下

毒深者  
聖劑及

醫學綱目卷六

十一



內消升麻湯治血氣壯實若患癰疽大小便不通

升麻 大黃各二兩 黃芩半兩 枳實燒  
當歸 芍藥 甘草各一兩

右咬咀水煎食前

內消丸治瘡腫初生及癰癥結核熱毒鬱滯服之內消

薄荷葉 皂角不蛀者水煮至 牽牛半斤取  
青皮 陳皮各一兩 沉香半兩 廣茂炮

京三稜炮各

右為末入牽牛頭末用煎膏和丸如葶藶大每服三十丸煎連翹湯送下食後

孫真人單煮大黃湯肺實沉而數青紫食肉之

錦文大黃酒洗

右一味剉如麻豈大水煮服

神效追毒丸能解一切毒如被狐狸毒鼠惡菌河鮑毒

疫死牛馬肉毒蛇犬惡虫所傷又治癰疽發背及瘰癧魚臍

瘡人多不識喚作癰疽致命殺人者及治諸風癰疥赤腫

癰等

五倍子搗破洗 山茨菰去皮爭 麝香二錢

千金子即續隨子去壳研 山豈根一兩

紅牙大戟去芦洗淨 雄黃各一兩

硃砂 雄黃各一兩

右除千金子麝香外七味為細末却入研藥另勻用糯

米飲為丸分四十九每服一丸生薑薄荷汁并花水研

服昔有一女子父年病瘵磨一丸服之一時吐下小虫

千餘條半月即無事 丹溪云神仙追毒丸其五倍子

消毒殺虫解風為君山茨菰千金子大戟皆驅逐走泄

之劑佐以麝香升散若用之固裏以發表實非所宜苟能灼見臟腑有積毒異虫深痼而結不虛者亦是快藥

古人兵曰義兵刑曰祥刑戒勿輕于用也

帝曰癰疽何以別之岐伯曰榮衛稽留于經脈之中則

血泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而不得行故

熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能陷肌膚骨

髓不為焦枯五臟不為傷故命曰癰

劉涓子云癰之痛只在皮膚之上又云癰發如火焚茅初

如黍米大三兩日如掌面大五七日如碗面大即易治如

腫冷發渴發逆治之難愈

帝曰何謂疽岐伯曰熱氣浮盛下陷肌膚筋髓枯內連五

臟血氣竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽

劉涓子云疽發或如小瘡觸則徹心痛四邊微起如橘皮

孔色紅赤不全變膿水不甚出至七八日疼悶喘急不止

又云始發腫高五指忽平陷者此內攻之候也精要云生

疽處不熱不痛低陷者此為內發難治必死

疽者上之皮天以堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以澤

此其候也精要云小按乃癰若病勢淺

劉涓子云癰疽有三等毒氣浮淺屬腑傷寒毒氣沉深

屬臟精要云毒氣猛烈而行經絡或淺或深無定五臟六

腑皆受五毒難為調理唯宜急切化傷寒兩感於癰發諸

處不問虛實高腫起盛光澤疼痛只在皮膚之上熱急脹

滿或有痒疼別無惡候初用溫藥平氣次用排膿發穴

治癰所謂平氣者乃犀角欬之類其方用犀角連翹漏

蘆甘草當歸肉桂皆發表之藥也所謂發穴者乃棘針

之類用皂角刺為君甘草川芎乳香為佐使亦托裏之



五元實  
內補虛

藥也然不若紫古東垣諸方發表托裏為穩當

疽發諸處不拘大小

精要謂廣一尺者非惟起在背廣一尺二尺三尺皮厚而紫黑高腫不常內疼如錐刺攻擊滿悶應

四肢重疼

前心亦痛餘處發癢可唯虛處及近筋骨處若膿毒未潰即傷爛筋骨肉損為疽者屬五臟毒氣深沉多

氣伏硬堅實

而不宜緩慢治之須內實五臟外透皮膚令軟勻和即膿透宜用內托實臟氣之藥排膿勻氣乃可不

比癰之毒氣浮淺也

毋作一類治之

凡一切癰腫始覺患起高腫五七日忽平陷者

此是內攻之候也急以內托散及內補湯藥補填臟腑令實最可怕透

膜膜穿十無一生矣

癰之邪淺其稽留壅遏獨在經脈之中而專攻于外故初發時自表便發熱患處便如枕如盆高腫而痛甚者縱欲

下陷緣正氣內固不肯受故或便秘或發渴發逆以拒之

是以骨髓終不焦枯五臟終不傷也疽之邪深其稽留壅

遏內連五臟而不專攻于外故身熱或無熱患處或不腫

痛甚者聲嘶氣脫眼黑眼小十指腫黑如墨多死也治之

之法癰之初發當以紫古法為主表者散之裏者下之火

以灸之藥以敷之膿未成者必消膿已成者速潰也疽之

初發當以消子法為主補填臟腑令實勿令下陷之邪更

延外以火灸引邪透出使有穴歸着而不亂則可轉死回

生變凶為吉今世外科不分癰疽一例宜熱拔毒外以五

香耗其氣內以大黃竭其血終不能自悟其藥之非惜哉

補虛法

治癰疽初覺腫結未成可以消散毒飲子

黃芪

甘草 天羅生 山藥 炒

鬼腰帶

半兩生竹筒陰濕石岸絡石而生好絡

補虛法

治癰疽初覺腫結未成可以消散毒飲子

黃芪

甘草 天羅生 山藥 炒

鬼腰帶

半兩生竹筒陰濕石岸絡石而生好絡

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分入酒三盞同煎一二沸去渣溫服

神効托裡散治癰疽發背腸癰如癰無名腫毒赤疹

痛憎寒發熱不問老幼虛弱並治之

黃芪 忍冬藤 各五

粉草 各八

右為細末每服二錢酒一盞半煎至一盞病在上食後

服在下食前服少頃再進留滓外傳

諸瘡瘍痛色變黑紫者回毒金銀花湯

金銀花 并便黃芪 各四

甘草 一兩

右用酒一升重湯煮三兩時去渣溫服

黃芪散

綿黃芪 兩 甘草 兩 皂角刺 棟和紫者剉

右細末每服二大錢酒一盞乳香一塊煎至七分去渣

服

黃芪湯與四物相和亦名托裏湯血氣齊補也

黃芪四物湯

人參 黃芪 白朮 茯苓

芍藥 甘草 生薑 當歸

地黃 川芎 多加金銀花煎服

內固黃芪湯

綿黃芪 人參 各半

右細末入真生龍腦一錢研細生藕汁和丸如菉豆大

每服三十九溫熱水下加至四十九日三服

五八婦年六十歲背上瘡脈洪大數午後惡寒發熱

少

少



連翹 黃芪生三 人參二 陳皮  
 茯苓五 砂仁三 甘草一 白木一  
 分十貼煎服

右方皆以黃芪為君甘草歸參為佐乃實內補虛之中  
 兼托裏也

**阿膠飲子**  
 明阿膠少如粉草各一 橘紅兩

右咬咀分作三服再服以水一盞煎七分去渣溫服  
 又方牛膠飲截癰疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻于內

牛膠通明者用酒一碗入膠內重湯煮溶透攪勻傾  
 出更侵酒隨意飲能飲者以醉為度此法活人甚多

又方黃蠶丸服過一兩已上無不取效最止疼痛不傷臟  
 腑活人不可勝數

**白蠶丸** 黃蠶兩  
 右和丸如桐子大每服十九漸加至五十九溫酒送下

如未破已消已破即合一日服百粒則有功能防毒氣  
 內攻尤能護膜始終須服半斤瘡愈後服之尤佳治蛇

咬溶化白蠶乘熱滴傷處痛即止一方用明礬飛過研  
 細以鷄子二個取清調礬末稀稠如糊用無灰陳好酒

放開服之膿未成者即消已成膿者從大小便出神效  
 累驗其功大勝黃蠶丸

國老膏治一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其効不可  
 具述

甘草大者二斤槌碎河水浸一宿揉令漿汁濃去盡  
 筋滓再用絹濾過銀石器內慢火熬成膏用器收之

每服一二匙無灰酒或白湯亦可曾服燥藥丹劑者

亦鮮之本方每法草一斤分作三服溫酒  
 遠志酒治一切癰疽發背癰毒惡候浸有死血陰毒在中

則不痛傳之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍傳  
 之即不痛或蘊熱在內熱過人手不可近傳之必清涼或

氣虛血冷潰而不飲若七情內鬱治之必愈  
 遠志不以多少為未酒一盞調末三錢澄清飲之

以滓傳于患處  
 忍冬酒初發便當服此或貧乏中或居鄉僻田夫野老百

發百中  
 忍冬藤生取一把以葉入砂盆研爛入酒少許調和

得所全傳四圍中心各一口又取五兩用木  
 槌碎不甘草一兩

右二味入砂瓶內用水二碗文武火煎至一碗入好酒  
 一大碗煎十數沸去渣分爲三服一日連夜進盡病勢

重一日夜可二劑忍冬藤補血如氣虛及寒多人不  
 阿膠飲牛膠飲黃蠶丸以牛皮屬金屬上補肺氣實大

腸壯胃止泄黃蠶丸以蠟味甘淡入大腸有補難化國老  
 膏以甘草化毒行經遠志酒忍冬酒皆有補性歸心歸血

用之頗切善用者以之配入治腫瘍之散結潰瘍之補虛  
 亦奏捷功

右丹溪實內補虛法皆以參朮歸芪又甚者獨參膏其  
 法並見後分經條及散見潰瘍門虛實寒熱條真轉死

回生之捷法也  
 癰疽當分經絡論 六陰經六陽經分布周身有多氣少

血者有多血少氣者有多氣多血者不可一藥論也若夫  
 要害處近虛處怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞

也何則諸經惟少陽厥陰經之生癰疽理宜預防以其多

禁忌



氣少血也其血本少肌肉難長瘡久未合必成危証又云少陽經多氣少血與厥陰經同少陽有相火尤甚於厥陰經者其有本經少血遠用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵矣請述一二成敗之迹以告來者予族叔父平生多慮質弱神勞年近五十忽右膊外側廉上生結核身微寒熱而易怒食味頗厚脈之俱浮大弦數而重似瀉予曰此多慮而憂傷血時在初秋勿輕視之宜急補以防變証以人參一斤作膏下以竹瀝病者各費招一外科以十宣五香散相間與服旬日後一日大風拔木病者發熱神思不佳急召予視之核稍高大似有膿于中起一紅線延過肩後斜走透背脊過入右脇下不痛覺肩背重而急迫食有嘔意脈同前但致多耳急作人參膏入芎朮生薑汁飲之用人參三斤瘡潰膿乾又與四物湯加參朮陳皮

甘草半夏生薑百餘貼而安此等若在春令雖神仙不治也幸而在秋金之令不幸因時下暴風激起木中相火而致此自非參膏驟補何由得免此正謂子所謂補與瀉者乎何醫疽之生初無甚苦往往間有不救者吾子其能治之乎予曰醫居小腹之後而又在其下此陰中之陰也其道遠其位僻雖曰多血氣運不到氣既不到血亦罕來中年已後不可生癰統有痛腫參之脈証但見虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉若用尋常驅熱拔毒舒氣之藥虛虛之禍如指諸掌可不慎歟

帝曰諸癰腫筋骨痛此皆安生岐伯曰此寒氣之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此四時之病以其勝治之愈也

血脈榮衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客之則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫寒氣化為熱熱勝則腐肉腐肉則為膿膿不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得泄瀉血枯空虛則筋骨肌肉不相榮經脈敗漏薰于五臟臟傷故死矣卷五

生氣通天論云勞汗當風寒薄為酸痿乃瘳又云陽氣者開闔不得寒氣從之乃生大傑榮氣不從逆於肉理乃生癰腫是亦寒邪從勞汗之隙及陽氣開闔不得其理之隙又客之為癰腫也觀此數論則知癰疽之發皆得之於寒邪所客也獨運氣瘡瘍一歲老幼相似之病間有熱者不可不知詳見運氣條

右經數節皆論癰疽乃因寒邪客之而發也治法則精要十宣散五香湯紫古蒼朮復煎散等發表之劑是也

朱郎年四十餘惡寒發熱右腿內廉厥陰分生一腫毒此是冷折熱在肺經血分與此方

瓜萎子	黃藥子	赤芍藥	當歸頭
條苓	青皮	皂角刺	桂枝
甘草節			

右分四貼煎取一盞入忍冬藤汁二盞飯食前煎飲以忍冬藤查傳腫上

安神散治諸色瘡腫調氣順榮術

人參	茯苓	甘草	枳殼
附子 <small>炮去</small>	白姜	山藥	陳皮

右等分爲末每服一錢水一盞生薑三片大棗一個煎至七分進口服

膏粱之變亦是滋味過度榮氣不從逆于肉理乃生癰



種榮氣者胃氣也飲食入于胃中先輸於脾而朝於肺肺朝百脈次及皮毛先行陽道下歸五臟六腑而氣口成寸矣今富貴之人不知其節法酒肥羊雜以厚味積火太過其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走于空竅而先行陽道今反行陰道則濕氣大勝子令母實火乃大旺熱濕既盛必來尅腎若不慎房事損其真水則水乏而濕熱之化上行其瘡必出背脊上及腦此為大疔之最重者若毒氣出肺或脾胃之部分毒之次也若出于他經又其次也濕熱之毒所止處無不潰爛故經言膏梁之變足生大疔受如持虛者如持虛器以受物則無不受矣治大疔之法必當瀉其榮氣以標本言之先受病為本非苦寒之劑為主為君不能除其苦楚疼痛也諸瘡瘍有痛往往多以乳香沒藥雜以芳香之藥止之必無少減之理此其悞也若使經

絡流通臟腑中去其滯滯必無痛矣痛則以苦寒之劑除之無不愈者瘡瘍食肉與自殺無異法當瀉氣而反補之故也  
元好問飲酒太過脈候沉數九月間腦下項上出小瘡不痛不痒如白頭瘡凡四日後腦項麻木腫勢外散熱毒熾發又二日痛大作夜不得寐醫處以五香連翹湯後再邀東垣診視云膏梁之變不當投五香連翹湯已無及矣且疽已八日當先以火攻之然後用藥以火艾炷如兩核許者攻之百壯始覺痛次為處方云是足太陽膀胱之經其病逆當反治脉中得弦緊按之洪大而數又且有力必當伏其所主而先其所因其始則同其終則異必先歲氣無伐天和以時令言之可收不可汗經與病俱禁下法當結者散之賊以乘之然寒受邪而禁賊遂制黃連消毒飲治

之

黃連	四分	黃芩	五分	黃柏	五分	人參	五分
知母	四分	通經	五分	羌活	一分	獨活	五分
防風	五分	藜蘆	五分	連翹	一分	此以甘溫配諸苦寒者	
黃芪	錢一	甘草	三分	此以甘溫配諸苦寒者			
當歸	身一錢	生地	一錢	酒洗此以辛和血補血			
陳皮	五分	補骨脂	五分	生此以補下			
焦元		澤瀉	七分	淡導酒			
歸稍	五分	蘇木	五分	去			
枳椇	一錢	除勝					

所用之藥用酒洗併入酒煎者用酒熱為因為使右俱作一服水三盞煎至半乾去渣入酒少許再煎食後溫服投劑之後大軒日出乃瘡瘡腫減七分精神旺

飲啖漸進痰癢漸膿出而痊服藥後不得飲水必再作膿效遲初患三日者服之立効凡瘡皆陰中之陽陽中之陰二証而已東垣治疽陽藥七分陰藥三分名曰丹陽益胃散老人宜之亦名復煎散或加沒藥乳香各一錢

右東垣論膏梁肉食之變治宜苦寒不宜芳香者如鮮裹條撮要內消升麻湯孫真人單煮大黃湯皆為富貴食肉之輩設也

丹膏治一婦人年將七十形實性急而好酒腦生疽十五日脈弦緊急且瀆子急用大黃酒煨細切酒拌炒為末又酒拌炒入參入姜煎調一錢重又兩時再與得睡而上半身汗睡覺病已此亦內托之意也  
排膿散方



枳實十六分 芍藥六分 桔梗二分  
 右三味杵為散取鷄子黃一枚以藥散與鷄子黃相等  
 揉和煎如薄粥溫服一升即瘥  
 朱紹八官右脚腫生附骨癰吃草藥酒多生惡痰熱瘰  
 無力

人參 黃連 茯苓 瓜蒌子四十粒  
 分二貼入竹瀝熱飲  
 諸瘡腫已破未破煨腫者當歸散主之

川芎 黃芪 括萎 木香  
 黃連各等分

右為粗末水煎一兩服如痛而大便秘加大黃三錢  
 凡癰疽外冷內疼者由陰氣外逼皮膚用熱物熨之  
 大熱亦不覺者須用熱物前後熨令透隨手便用緊急潰膿  
 毒藥使膿外出盡腫平即用生肉煖瘡和正氣藥令進飲  
 食不倦

治癰疽發背初腫時方

風化石灰兩 細辛兩  
 右為粗末用熱醋傅患處乾再傅三上其腫即消

四虎散治發背初生筋脉緊急不舒  
 附子生去皮 天南星泡 半夏湯洗 狼毒各半  
 右四味為末熱酒調成膏攤上腫處以熱絹壓定覺患  
 處如火燒不妨

外熱內 凡癰疽外熱內疼者是有客邪內有積毒欲作膿透之候  
 治背瘡初發時小後五七日赤腫高即毒藥令內毒散滅  
 疼免牽引乳香膏

乳香膏 青薄荷葉四兩 洗乾

右研勻厚敷患處以青絹蓋之如乾以新汲水潤之常  
 令濕其熱毒自然消散如熱毒攻結可用氣毒攻結不  
 可用

貼癰毒令內消金黃散

白芷 白芨 白欬  
 右等分為細末用新汲水調傅

治陽症腫毒并金瘡

大粉草剉細用竹一段刮去青兩頭留節開一小窠  
 入草在內滿後却用油灰塞窠從冬至日放窠缸內  
 待立春日先一日取起豎在有風無日陰處二十一  
 日驗兩窠好却破竹取草為細末用水調傅

白芨各二 南星 草烏 黃柏  
 白芨兩 五倍子炒

右為末調如糊隨血圍匝如牆壁可移險處於不險處  
 如神

傳藥白欬 白芷 南星 白芨  
 貝母各等分

右為末水調傅外用圍藥束定內用傳藥提起制之有  
 理

藥性論甘蕉根搗傅一切癰腫上乾即更傅無不瘥者  
 治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消  
 方搗芋根傅之數易効

諸瘡腫痛不可忍者以葵花根去黑皮搗爛若爛點并  
 花者若不稠不須用水以紙攤如膏藥貼之立効

又方芙蓉葉搗爛卷之立効兩乾為末水調傅亦妙



發背蝸牛百箇活者置淨瓶內新汲水一盞浸瓶中封閉  
自晚至曉其水如涎取水將真蛤粉不拘多少調之刷瘡  
上效

治背癰與癰久年烟壁土黃柏等分細末生姜汁捏成  
膏傅之夏以茅香湯下一二錢妙驗

治癰疽止痛拔毒七寶散乾荷葉心當中如錢片不計  
多少為粗末每用三匙水二盞煨火煎至一碗半放溫淋  
洗乾以太白膏傅之

太白膏寒水石飛用臘月猪脂調成膏隨瘡大小用薄紙  
攤貼之

欽瘡內消方黃明膠二兩水半升鎔消了入黃丹一兩再  
煮三五沸又放溫冷以鷄毛掃在瘡口上如未成即全腫  
處自消

凡癰不問已潰未潰者以膠一片水浸令軟隨腫大小  
貼當頭上開一孔若已潰合膿者當被膠急發之膿皆出  
盡未有膿者腫當自消矣

治發背秘法李北海云此方神受極奇秘以甘草三大  
兩生搗別篩末大麥麩九兩於一盤中相和攪令勻取上  
好酥少許別捻入藥令勻百沸水搜和如餅劑方員大于  
瘡一分熱傅腫上以油紙隔令通風冷則換之已成者膿  
水自出未成者腫便內消

隔皮取膿法治諸般腫毒

白芷兩 草烏四錢  
右為末水調作餅子煨火炙黃出火毒研米醋調成膏  
用白帛攤貼患處毒自毛竅而出其腫自退  
治瘡瘍癰腫木硬針頭散

右以蟾酥乳香各一錢同研勻細以兒乳汁和如泥入  
磁石盒收之乾不妨每用以唾調撥少許於腫處上以  
膏藥貼之毒氣自消雖然有瘡亦輕

萬應針頭丸治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒即  
愈

麝香二錢 血竭三錢如蟻者用  
蟾酥三錢 輕粉二錢  
右為極細末煉蜜和丸為劑如瘡有頭者用針頭挑破  
微有血出將藥一黍米大放挑開瘡內上用棉花周圍  
唾津濕貼瘡上不過時刻即愈 如兩腋見無頭瘡即  
足暗疔即將兩手虎口內白土紋用針挑破如前法用  
藥封蓋忌鷄鴨酒濕麵一切發熱之物

積熱 一省椽背項常有瘰癧愈而復生戴人曰太陽血有  
餘也先令涌泄之次於委中排針出紫血病更不復作也  
予男衮常喜熱火烘灼其背及兩足又食自死肉久而兩  
足常生癩毒愈而復生者半年餘予以清涼飲子下之得  
紫黑血積於便中去者月餘其癩毒頓除是知積熱毒致  
癰腫者如此

沉寒 李世英患疽數日後根脚開大或腹疼泄瀉手足常冷脈  
沉微細或自汗出急用姜附之藥其者於臍下關元着艾  
三五百壯待手足溫泄瀉止飲食知味方可為喜

辨氣 癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經云氣滯于  
經絡與血俱滯而不行壅結為癰疽不言熱之所作而後  
成癰者此乃因喜怒憂思有所鬱而成也  
遠志酒治七情內鬱成癰疽方見後

癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經云氣滯于  
經絡與血俱滯而不行壅結為癰疽不言熱之所作而後  
成癰者此乃因喜怒憂思有所鬱而成也  
遠志酒治七情內鬱成癰疽方見後



**獨勝散**治癰疽皆緣血滯氣凝而致者

香附子 去毛令淨以生薑汁

右無時以白湯調二錢服之又云疽疾多因怒氣得之若行此疾必多怒但服香附進食寬氣自有効

**獨勝散**治氣鬱血滯而諸瘡愈後常服半年尤妙此皆施于牀實氣鬱之人子見吳尤厚味氣鬱而形實性重年近六十患背疽醫與他藥皆不行惟香附末飲之甚快始終只此一味腫潰恃此以安然此等體實而又病實乃瘡千百而一見者也每思香附經不言有補惟不老湯一方乃言於老人有益用片子姜黃香附子甘草三味而以不老為名且引錢鑑先生與劉君為証夫豈無其故哉蓋于行氣中有補之之理耳天之所以為天者健而有常也因其不息所以生生無窮正如堯舜子活血行氣有補陰之

醫學綱目卷八

辛

妙故名益母胎前產後所恃者氣血耳胎前無滯產後無虛以其行中有補也夏枯草治瘰癧亦然

**獨勝散**謂婦人男子癰疽治法無異惟月閉血虛氣結三証有異耳愚謂婦人海滿則行月閉一証固異然婦人性情執着比之男子十倍雖有虛証宜補亦當以執着為慮向見樓氏婦早寡善飲啖形肥偉性沉毒年六十六七月間生背疽近正春醫遂橫直裂開取血雜以五香十宣散與酒飲之月餘未嘗議其寤居之鬱酒肉之毒執着之滯時令之熱卒至于平隔淹延兩三月而不救

藏府

六脈不和則留為癰

諸痛痒瘡瘍皆屬于心

右心火實則為執癰心火虛則為寒癰

運氣

運氣癰疽有四

一曰火熱助心為瘡瘍經云少陽所至為瘡疹又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從其則瘡瘍又云少陰司天之政初之氣寒乃始陽氣鬱炎暑將起中外瘡瘍又云少陽所至為瘡瘍又云少陽司天之政風熱參布大陰橫流寒乃時至民病寒中外發瘡瘍初之氣候乃大溫其病膚腠中

醫學綱目卷八

辛

瘡二之氣火反鬱其病熱鬱於上瘡發于中三之氣炎暑至民病膿瘡又云太陽司天之政初之氣氣乃大溫肌腠瘡瘍此皆常化病之淺也又云少陰司天熱淫所勝甚則瘡瘍又云少陰司天客勝甚則瘡瘍又云少陰之復病癩疹瘡瘍癰疽瘰癧又云火太過曰赫我其病瘡瘍血流又云火鬱之發民病瘡瘍癰腫此是邪變病之甚也

二曰寒邪傷心為瘡瘍經云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中癰疽注下又云太陽司天寒淫所勝血變于中發為癰瘍病本于心又云陽明司天之政四之氣寒雨降民病癰腫瘡瘍是也

三曰燥邪傷肝為瘡瘍經云木不及曰委和上商與正商同其病支發癰腫瘡瘍傷肝也又云陽明司天燥淫所勝民病瘡瘰癧病本于肝是也



四曰濕邪瘡癩經云太陰司天濕氣變物甚則身後癱又云太陰之勝火氣內鬱瘡瘍于中流散於外是也

四精要第一論曰凡有此病未要辨問是癱是疽是虛是實是冷是熱首先便服內托散五香連翹湯宜泄毒氣又云內托散五香連翹湯沉疔湯等諸方不冷不熱不問老幼少壯陰陽虛實多服為妙夫癰疽瘡癩臟腑陰陽有淺深虛實今然川藥有補瀉溫涼老幼少壯其稟受厚薄形志苦樂隨年歲而增損奈何欲以不冷不熱四五方而通治之又多服為妙此不能無疑者也學者當審經絡察病機而處治豈可仗此為通治之法

東陽李元年踰三十形瘦膚厚連得憂患又因作勞且過于色忽左腿外廉側上發一紅腫其大如栗一醫聞其大腑堅實與承氣湯二貼下之不効又一醫教與大黃誅

入醫學綱目卷六

末

砂生粉草麒麟竭又二三貼半月後召子視之曰事去矣又一李兄四十餘面稍白神甚勞忽勝下生一紅腫如桃一人教用補劑眾笑且排於是流氣飲十宣散雜進之旬餘後召子視之曰非惟不與補劑抑且多得解利氣血俱憊難矣已而果然

此二者皆由不預防本經少陽少血遽猛浪用大黃攻裏而死之者也

一男子年近六十形素肥初夏於左膊外廉側生一核方圍二寸餘不甚痛召子治診其脈息緩大而弱予曰此因憂悶而生當氣升散之時須急與人參膏五六斤又看作何應病家召他外科以十宣散五六貼而瘡甚予曰此太虛也勿以輕小視之病家不信一外科仍以十宣散進之又五六貼瘡平痛出清水而死此可為因虛而生癰疽者

針灸

之例 胡經歷女及笄性急而形實未許嫁厚味積毒已深解骨中痛者年餘醫以氣藥雜治之愈而復發至秋冬令忽大痛發熱醫者方悟解樞穴上生附骨疽在外廉側少陽之分其厚味性急自若自首至尾悉是五香湯十宣散服至瘡潰猶與五香湯者月餘忽一日惡寒發熱膈滿醫者不悟升散太多陰血已絕孤陽狂越于上猶恨服五香飲欠多致膈間有滯大服以進一夕喘汗而死

此二者由不預防本經少陽血少遽猛浪用十宣五香表散而死之者也可不戒哉

帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣有餘榮氣不行乃發為癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化為膿小鍼能取之乎岐伯曰聖人不能使化者為之邪不可留也故兩軍相當旗幟相望白刃陳于中野者此非一日

入醫學綱目卷六

末

之謀也能使其民令行禁止士卒無白刃之難者非一日之教也須臾之得也夫至使身被癰疽之病膿血之聚者不亦離道遠乎夫癰疽之生膿血之成也不從天下不從地出積微之所生也故聖人自治于未有形也愚者遭其已成也黃帝曰其已形不予遭膿已成不予見為之奈何岐伯曰膿已成十死一生故聖人弗使已成而明為良方著之竹帛使能者踵而傳之後世無有終時者為其不予遭也黃帝曰其已有膿血而後遭乎不導之以小針治乎岐伯曰以小治小者功小以大治大者多害故其已成膿血者其惟砭石鉞鋒之所取也黃帝曰多害者其不可全乎岐伯曰其在逆順焉爾 法見諸病源序後

治初生癰疽發背神效灸法累試有驗江陵府紫極觀因掘得石碑載之凡人初覺發背欲結未結赤熱腫痛先



以濕紙覆其上立視候之其紙先乾處則是結癰頭也取  
大蒜切成片如當三錢厚安頭上用大艾炷灸之三壯即  
換一蒜片痛者灸至不痛時住不痛者灸至痛時方住最  
要早覺早灸為上如有頭似麻者大者不用若有十數  
頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾于  
餅上燒之一二日十日十日三四日

不痛而後及良肉所以痛也 灸而痛不痛而後止其灸  
灸而痛者先及其未潰所以痛而次及將潰所以不痛也  
瘡痒者灸至不痒痛者灸至不痛大藥以百壯為準又云  
譬如諸盜入主人之家必開門逐之使出萬一門不開無  
從而出必傷主後已

王透發背方序云元佑三年夏四月官京師疽發於背

召國醫治之逾月勢益甚得徐州蕭縣人張生以艾火加  
瘡上自旦及暮凡一百五十壯知痛乃已明日鑷去黑痂  
膿盡潰肉理皆紅亦不復痛始別以膏藥貼之日一易焉  
易時旋剪去黑爛月許瘡乃平是歲秋夏間京師士大夫  
病疽者七人余獨生此雖司命自然固有料理不知其方  
遂至不幸者以人意論之可為慨然於是撰次前從所得  
方模板以施庶幾古人濟眾之意此即當頭隔蒜灸

史源母氏背髀間微痒視之有赤半寸許方有白粒如  
粟黍乃急着艾灸其赤隨消二七壯而止信宿復覺微痛  
視之有赤下流長二寸濶如葉葉舉家皆以前灸為悔或  
云等慈寺尼智全者前病瘡甚大得灸而愈齊問之全云  
劇時昏不知但小師並言范八奉議守定灸八百餘壯方  
與約艾一飾爾亟歸白之見從始以艾作炷如銀杏大灸

其上十數殊不覺痛乃截四旁赤引其炷減四之三皆覺  
痛七壯後覺痒每一壯爐則赤隨縮入灸至二十餘壯赤  
暈收退病者不懼遂以艾作團大灸其上漸加至雞黃大  
約四十圍方覺痛視火焦處已寸餘蓋灸之遲而初發處  
肉已壞壞肉成隔直至好肉方痛四旁知痛肉未壞也病  
者六夜不寐至是食粥安寢至晚視之瘡如覆一甌突高  
三四寸上有百數小窠色正黑突然高者毒氣出外而聚  
也百數小窠者毒未聚而浮攻肌膚也色正黑者皮與肉  
俱壞也非灸火出其毒於壞肉之裡則五臟通矣

桑君當癰疽頭針而瀉之須避筋骨  
地之濕氣自外而入者瘡瘍當先服藥而後用針針時  
先用溫衣覆蓋不令凝泣難滯使血脈得溫少行則血出  
立已若不如此血脈凝滯便針邪毒不瀉反傷良肉益其  
瘡勢也嬰兒瘡亦然

騎竹馬灸法先令病人以肘凭几暨臂腕要直用篾一  
條自臂腕中曲處橫紋男左女右貼肉量起直至中指尖  
盡處截斷為則不量指甲却用竹扛一條令病人腕不騎  
定令身正直前後用兩人扛起令脚不着地又令二人扶  
定勿令僵仆却將前所量臂腕從竹扛坐處尾骶骨盡  
處直向上貼脊背量至尾盡處為則用墨點定此只是取  
中非灸穴也却用薄篾作則子量病人中指節相去兩橫  
紋為則男左女右截為一則就前所點處兩邊各量一則  
盡處即是灸穴兩穴各灸五壯或七壯止不可多灸不問  
癰疽生何處並用此法灸之無不愈者蓋此二穴心脉所  
通處此癰疽皆心火留滯而生灸則心火流通即是安愈  
可以起死救危有非常之効累試以驗



詳臂腕中曲處橫紋即山澤穴間橫紋非掌後腕之橫紋也

凡癰疽之發或因內有積熱或因外寒鬱內如若於生發之際艾灸以散其毒治之不早可以移深為淺改重為輕諸項灸法皆好惟騎竹馬灸法尤為切要此消患於未形之策

凡瘡可灸刺者須分經絡部位血分多少膻穴遠近若從背而出者當從太陽五穴隨証選用或刺或灸泄其邪氣

凡太陽多血少氣

至陰 通谷 束骨 崑崙 委中

從背而出者多從少陽五穴選用 少陽少血多氣

竅陰 夾溪 臨泣 陽輔 陽陵泉

從髀而出者多從陽明五穴選用 陽明多血少氣

厲兌 內庭 陷谷 衝陽 解溪

從腦而出初覺腦痛難忍欲生瘡也腦者髓之海當灸刺絕骨以泄邪氣髓者舍也故脈浮者從太陽經依前選用脈長者從陽明經依前選用脈弦者從少陽經依前選用論曰諸經各有井榮輸經合井主心下滿及瘡色青榮主身熱及瘡色赤俞主身重節痛及瘡色黃經主咳嗽寒熱及瘡色白合主氣逆而泄及瘡色黑各隨經病而見此証者或宜灸或宜針以泄邪氣經云邪氣內播則壅熱宜砭疔之也

右保命集分經灸刺乃大綱耳令更取靈樞經脈篇及銅人等書毫分縷析出各經分野在針門十二經條列為之圖目之曰經絡分野圖使人視之心目瞭然目無

全平矣夫癰疽初發必先當頭灸之以開其戶次看所發分野屬何經脈經脈既定却內用所屬經脈之藥引經以發其表外用所屬經脈之俞穴針灸以泄其邪內外交治邪無容也針灸癰疽者更於針灸門十二經脈分野圖求之

癰疽竅陰主之 頭項癰腫不能言天窓主之

邪氣不傷於腸胃大便如常慎不可下切禁之

精要云大黃治癰疽之要藥以其宜熱拔毒又云瘡始作皆須以大黃等湯極轉利之且排日不廢繼又自言患癰疽者每有泄瀉皆是惡候此是不能無疑者也借曰前

用大黃恐因病結實而大腑秘結有積熱沉痼之積者發也止可破結導滯推令轉動而已豈可謂極轉利之而且排日不廢乎若下利之後又與利藥恐非防微杜漸之意

瘡之始作即周禮腫瘍之時也腫在肌肉若非大滿大實

堅之証自當行仲景發表之法借五香湯為例散之於外何必遽以峻下之藥以奪其真自取其禍乎

精要云大凡癰疽不可舍五香湯此又不能無言者也開卷便於第一論中詳言之吾不知良甫之時有許多大腑堅秘病氣鬱塞若是之頑厚可以驟散而大下者若果有之亦當開陳時之先後証之可否庶乎後人不敢孟浪殺人也或曰癰疽用大黃走泄以去毒自孫真人行千金方已言之矣良甫祖述其說何吾子病之深也曰大黃除諸實熱而性峻急孫以盛行奇術於公卿間時在晚宋民不知兵交游於富貴之家肉食之輩固皆捷効今良甫不分貧富苦樂勞逸一槩用之寧無孟浪之患乎况有房勞而虛者憂怒而虛者極意貪求而虛者強力動勞而虛者大



醉過飽而虛者皆因氣弱而滯血少而濁生疽固是難治之病若大腑秘而稍安穀食肯守戒律甘心淡味者猶為可治但費補工夫耳苟因旬日半月大便秘實不知其氣不降也便以為實而行大黃些少寒熱不知其血氣不和也便以為有外感而行表散如此害人甚速

瘡瘍及諸病面赤雖伏火熱禁不得攻變為陽氣怫鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥藥以潤之如見風脈風証只用發表風藥便可以通利大便若只乾燥秘滯尤宜潤之慎不可下也九竅不利皆不可下瘡瘍鬱目俗呼昏迷是也慎不可下汗之則愈

排膿內補十宣散若用之干些少癰疽與冬月儘可取內托之功若干冬月腫瘍用之亦可轉重就輕移深為淺

若潰瘍與夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗比見世人用此方者不分癰疽冬夏無經絡無先後如盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉 又云內補十宣散瀉術燥血藥太多止可用于輕小証候虛之甚者恐難倚仗

精要云內托散一日至三日之內進十數服治毒氣攻衝臟腑名護心散此方專為服丹石而發疽者若不因丹石而發恐非必用之劑若夫年老病深者証候者跡重者

某豈雖補將有不勝重任之患矣

瘡家雖不疼痛不可發汗汗之則瘡潰爛者托裏之藥輕散也

李世英疽不熱不痛屬陰切不可用冷藥敷貼恐逼毒氣入內

夫外施敷貼正與發表之意同經曰發表不遠熱大凡氣得熱則散冷則飲向見鄭經歷性嗜酒與煎燂年五十餘忽春末夏初在額絲竹空穴湧出一角長短大小如鷄距稍堅求予治予曰此非膏梁所致而何宜斷厚味先解食毒針灸以開泄壅滯未易治也此少陽經所過氣多血少者鄭以棟煩召他醫以黃朴硝腦子等冷藥卷之一夕器開如蟻蚶徑三寸一二日後血自蚶中濺出高數尺而死此冷藥外逼熱鬱不得發宜其發之暴如此也

蟻針法謂開門放毒以為要捷恐可施於輕小証候耳愚謂蟻之所吮止腐間惡血若積毒于臟腑者徒竭之於外而不及于裏恐未為得性見張兄之子甫二歲遍身赤疹如霞片子向見其母父病疔謂毒熱在血所成者張曰誰不因母血所成何謂毒熱之血予曰其母雖茹食肉如平時肉性熱與宿痰之熱相搏非毒歟張不之信自取五六

大蟻吮其血癰頓消乳食起居如舊予曰非其治也未可以為喜張怒越二三日大發熱而暴死非竭之於外血去而氣不能獨居乎

精要云口乾與口渴不同不宜用丹藥藥墜用之其禍如反掌用桑枝煎五味湯以救陰水其妙方也而不言食味起火怒氣生火房勞激火吾恐渴未易除也

精要謂頭上有發毒者不得灸恐因火氣拔起熱毒炎上動病邪而添病愚謂此言過矣火本以暢達振引鬱毒此從治之意也頭為諸陽所聚之處艾炷宜小壯數宜少小者如椒粒少者三五炷而已若孟浪如腹背引痛灸至不痛不痛灸至痛為例斯為誤矣

按東垣灸元好問腦疽以大艾炷如兩核許者至百壯



始覺痛而痊由是推之則頭上發毒灸之痛者艾炷宜小壯數宜少如不痛者艾炷大壯數多亦無妨也又引陳日華之說謂於始發時用針灸十死八九此未之思也切詳因灸而死者必其血虛孤陰將絕無以承當火氣脈必浮數而大鼓與精神必短而昏豈可泛言始發不可灸以誤人

瘡疽已覺微漫腫硬皮不變色脈沉不痛者當外灸之引邪氣出而方止經曰陷者灸之如外微覺木硬而不痛者當急灸之是邪氣深陷也淺者不可灸慎之如有膿水亦不可灸當刺之

按刺之膿出不腫痛者邪已去矣不宜灸若刺之膿出而痛腫不止者亦當于腫上灸之無妨又毒雖淺却有十數頭腫痛者亦灸之無妨

春夏宜急生肌  
一有癰疽瘡癤須順時節春夏為正易為整理緣天氣溫和肌肉緩慢而煖故易治其有肉冷是患人氣虛所致但以溫藥調順氣血外用溫煖膏藥貼之令穴候

穴抽膿盡急用生肌長肉藥滿瘡口不宜緩慢恐至秋冬成漏瘡也或在秋冬發者乃春夏內先有發蒸熱毒過一陰生後再有伏毒至秋冬間又因食毒物酒麪房慾之事忽發初覺微小數日之間腫大疼不可忍初得大便五七日不通小便淋瀝者是其候也先調脾臟氣令實次服發

穴排膿消毒去積之藥內托溫平不得用太熱滋之藥緣脾中臟要煖如用熱藥恐氣滯而不流暢致榮衛不調也貼即用溫涼藥不得用冷藥恐逼入毒氣須引膿外透方漸安矣

諸浮數脈應當發熱而反瀝浙惡寒若有痛處當發其

癰

陰滯于陽則發癰陽滯于陰則發疽而此二毒發無定處當以脈別之浮洪滑數為陽微沉緩瀯為陰陰則熱治陽則冷治

右陽脈當以瀯法治之陰脈當以疽法治之不必拘於熱治冷治也

身重脈緩濕勝者除濕 身熱脈大心躁時腫乍來乍去者清熱 諸痛眩暈動搖脈弦者去風 氣滯氣滯乾燥亡津液脈澁者瀉氣補血 寒勝則脈浮食不入便溺多惡寒脈緊者宜瀉寒水 腎脈澁甚為大癰全文見診發書

夫人人生最可憂者發背也其種有五 一曰陽毒因風熱而有或患熱毒消渴或先患傷寒餘有陽毒觸處畜積起于背脊脊之間不問椎數但從兩夾脊

起止腰上滿背焮熱如炊之狀赤紫或紅如爛膿毒難成成後不止後痛不除驚忽數日之間復平如舊將謂腫消此是內攻肉陷不可療矣

二曰陰毒發背是氣冷而作初如黍米粒起情緒不快情愴而痛直應前心心忪怔頭目昏重寒熱如瘧五七日後始發引攻腫開難收內積有膿深沈遲緩未透宜急以補氣湯藥內托外以抽膿藥貼之宜急見膿無膿即平愈未期

三曰有人多服金石燒煉之藥毒惡流滯成發背者初起如丹疹之狀熱熱漸開如湯火瘡面色如朱心膈煩躁多渴嗜冷其瘡難起起即驚人猶勝于陰陽二毒者緣此有解金石藥毒湯散治其內也賴有根底分明亦須急療方安



四曰人有患酒食毒發背者此疾非近得之乃臟腑久積乘飢乘困食之便睡或多食酒肉冷熱粘滑肥鮮膩未下胸膈房室不禁恣意當風取快脾臟氣虛不能受乘發毒攻背兩夾脊不問椎數初起癰頭如小彈子後大如拳堅如石痛遍四肢加之拘急口苦舌乾腹急大小便澀十數日後頭面手足虛腫及臟腑通泄如利內急痛者是其症也喜方腫引急用收腫發穴潰膿湯藥內實外泄膿水不可放縱遲緩則皮肉腐壞傷骨爛筋漸成膿多因而感邪內敗者死矣

五曰人有胃山嵐瘴氣發背毒氣先在臟腑年月浸遠氣血虛損衰弱初起腫色青黑如靴皮頑癢痛深附筋骨徹髓按之如木石引手加深方覺似有痛處至五七日毒氣浮淺腫高色變青白有如拳打之狀寒戰似瘧及有風候

頭動口偏手足厥逆眼黑睛小白多而慢此內有邪氣相搏急破出清血三五升方有黃膿白汁相和發泄其皮不寬不慢亦急脹痛亦不住直至色退熱疼方愈亦宜急急追趕膿與毒氣外出無害

初患腫三日內灸者生 八日內膿成針烙導引者生 未瘡慎勞力者生 慎忌食者生 慎喜怒者生 懼腫 猛療者生 急療者生 不諱發背者生

待膿自出不導引者死 未內攻而針烙用藥導引者生 內攻後導引針烙者死 癰成後不出不導引但傳藥者死 過此後已內攻者死 膿成後不出不導引但傳藥者死 如赤白痢氣急者是已內攻醫藥無益必死 癰不救十得五生疽不瘳十全死 輕腫怕痛者必死 不遇良方者死 節候不依法者必死 愚執恣意用性逸惰者

死

可治証有發背癰有發背疽如毒氣勇猛而發如火焚亦易下敗壞初發即可如黍米粒大三兩日漸赤引腫如手掌而大五七日如碗面大即易為攻斃熱亦引如火燒之狀浮面漸潰爛開內發腫如炊之狀外爛皮肉如削去紫瘀膿汁多而腫不退亦不止發渴發逆飲食不下嘔吐氣急浮淺開關者尤宜發膿托毒湯藥用之必愈

其間有只如蓋面大者此非不大緣為毒氣深沉內虛毒氣近膜也此必內攻近入臟腑却外入四肢先攻頭面虛浮後攻手面次攻兩足面腫名曰毒氣散入四肢其人聲嘶氣脫眼睛黑小十指腫黑乾焦不治

陰陽 痲九癰疽初發腫硬高者而毒氣却淺此乃六腑不和為難其証屬陽勢雖急而易治若初發如粟粒甚則如豆許與肉俱平或作赤色時覺痒痛時慎勿抵破此乃五臟不調為疽其証屬陰蓋毒氣內蓄已深勢雖緩而難治始發一粒如麻荳大身腫便發熱生疽處腫大熱痛此為發於外雖大如盆治之百可百活

或身熱不熱自覺危急生疽處亦不熱數日後漸大不腫不痛低陷而壞爛此為發於內雖神仙無如之何

雜方 保木香散治小兒疔後生癰如神  
地骨皮 木香 川山甲  
腐香 右末米飲下三錢  
潰瘍 癰疽已潰膿出者也 仲諸癰疽欲知有膿無膿以手掩腫上熱者為有膿不熱



者為無膿

凡瘡疽按之牢物未有膿也按之半軟半鞏已有膿也

宜急破之

凡瘡腫以手指按之按至四畔上赤黑者按之色不變

膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按之白良久方赤

遊毒已息可就赤白色盡處灸斷瘡肉平實久而方消

夫癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並宜灼艾惟癰膿

成則宜針疽膿成則宜烙 切宜執視詳審候其潰熱膿

透於外其勢盈盈欲出只用替針九自瘡頭咬開不半日

許其膿自出切不用針刀也

替針九治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香字 硃砂字 沒藥字 乳香字

石灰餅藥內種糯米十四粒其法用石灰五升爐灰三

升以水五升淋取清汁入大鍋內熬濃汁至三五升用

瓦器盛貯用時以小青盞盛取半盞濃汁却用皮紙

貼瘡中藥汁面上安定然後取糯米十四粒種在皮紙

面上一宿即是

右為細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒未破用津貼

瘡頭薄處即破膿滯不快則用一粒納瘡口內使膿不

滯好肉易生

替針九

雄雀糞 硃砂 陳倉米 沒藥

右研勻以米飯丸如粟大每用一粒貼瘡口眼中即潰

膿出

治諸癰不消已成膿膿針不得破令速決取雄雀糞塗

頭上乾即易之雀糞中堅者為雄

治癰疽已有瘡眼未出膿痛不可忍用此藥紙即膿出

巴豆一個去皮膜不去心油鹽豉十四個口中含去皮令

軟同研爛真麝少許如雞丸入少稀糊裡作餅子如鼠糞

大大小臨時看瘡口紙之只以紙撚子送入藥類史必痛

忍之良久膿遂出

出一切瘡口出膿重殼燒存性無灰酒調下每服一枚

服下一個時辰便有瘡口一個若服兩枚出瘡口兩枚

癰成膿宜針其鉄用馬銜鉄為之形如莖葉兩面皆利

可以橫直裂開五六分許取其毒血如覺病輕須先灸而

後裂

按癰如椒眼數十粒或如蜂窠蓮房而膿出痛不除宜

用針者以針橫直裂之則毒血挾膿出而愈如無椒眼

之類只消直入取膿不必裂之也又法當椒眼上各各

灸之亦佳不必裂也

鍼針者末如劍鋒以取大膿

夫癰氣之息者宜以針開除去之

治癰腫者刺腐上視癰小大深淺刺刺大者

多血小者深之心端內針為故正

手熨烙毒上得膿為効

凡癰覺在虛處及眼不見處皆是惡症如發高腫紫赤

皮薄光澤覺裏有膿毒諸藥貼腐不破者宜用熟銅鍼於

油火上燎透先用墨筆點定如當頭以針淺刺入隨針出

膿者順也有不隨針膿出當用白紙作維紐入針孔引出

膿毒當時腫退可及三分如腫不退是一逆也腫不退疼



不除但膿出二逆也膿疼不退患人不覺瘡輕三逆也雖用針破出膿亦無所濟須急用引膿托裏湯藥以助其勢力可也更有癰生質處不問淺深如有膿即用針烙無害稍遲緩即恐傷筋骨內疼凡近筋脈骨節處不得亂行針烙反致他病也 患疽初生赤硬或在虛處毒氣淺或在實處毒氣深切須仔細辨認仍問患人疼痛覺深覺淺其患處瘡頭不拘多少其間須有一個最大者即是大膿竅當用熟鐵大針頭如釵脚者於麻油燈上燒令熱透以大頭處按定插入一寸或至二寸膿當下恐未有膿毒出却用白紙作緋子緋入直候次日取出其膿即隨緋下矣膿色黃白即好若赤黑色防後有鮮血出即患人寒戰不禁其有虛處不得亂行針烙 凡患發背覺似有膿成便用大熟鐵針烙當正頭上烙之其烙並用麻油燈上燒令通

紅烙入可二寸許初入肉即須橫插入不得正入恐烙透膜也如已有破處皮爛潰熟更不得用針烙如是橫長赤引開闊當須兩頭下火針令膿毒隨針引出肥人膿汁多瘦人膿汁少如肥人却少瘦人却多多是肉敗壞成膿少是肉不腐爛受氣實也尤宜詳審不可造次使行針烙亦看患人氣脈勻和榮衛氣不節滯血脈不致凝澀即行針烙無畏切須仔細患人氣虛脈氣大者亦不可亂行針烙針烙之法不可容易先看皮紋陰慢厚薄紫赤色大光澤者即可用針烙如皮肉未變不可用針針亦無濟大抵用針只欲引膿如針刺無膿是氣伏也不可用針烙 或問烙法如何曰膿或汪洋欲出奈何皮厚肉深難穴者既前無內托之藥先致力于內後又不用烙以開竅脈膿何由出 膿本肉腐所成皆挾毒熱之氣若久留肉膿

間則毒氣浸淫好肉亦化為膿腐此所以烙法有功于潰瘍也彼根淺而皮薄者何必假此以賣弄假法恐嚇而勝取利也

帝曰願聞身形應九野奈何岐伯曰請言身形之應九野左足應立春其日戊寅巳丑 左脇應春分其日乙卯 左手應立夏其日戊辰巳巳 膺喉首頭應夏至其日丙午 右手應立秋其日戊申巳未 右脇應秋分其日辛酉 右足應立冬其日戊戌巳亥 腰尻下數應冬至其日壬子

六腑膈下五臟應中州其大禁太乙所在之日及諸戊巳凡此九者善候八正所在之處所主左右上下身軀有難腫者欲治之無以其所直之日潰治之是謂天忌日也

身形應九野圖

右應立秋戊申	右應秋分辛酉	右應立冬戊戌
手巳未忌開膿	脇西忌開膿	足巳亥忌開膿
膺應夏至	六應中州太乙	應冬至
首丙午日	膈乙所在日	尻應壬子日
頭忌開膿	五及諸戊巳	下壬子日
左應立夏戊辰	左應春分乙卯	左應立春戊寅
手巳巳忌開膿	脇卯忌開膿	足巳丑忌開膿



行年血  
忌忌  
十歲二十二歲三十三歲七十三歲已上四人百神在  
上部不可患癰疽發背見血者死申子辰年血忌餘年不  
妨男女同

二十五歲三十一歲六十八歲七十四歲以上四人百神  
在額不可患瘡腫見血者死

十八歲二十四歲三十五歲四十五歲五十六歲六十七  
歲七十二歲八十九歲以上八人百神在兩肩隅不宜患  
癰疽瘡腫見血者死

十二歲二十七歲三十六歲五十九歲六十六歲九十七  
歲以上六人百神在中部不可患癰疽發背見血者死已  
酉丑年血忌餘年不妨男女同

三十二歲四十二歲五十五歲六十一歲以上四人百神  
在肩背不可患癰疽見血者死

十九歲二十六歲四十九歲五十六歲五十七歲六十二  
歲八十歲九十一歲以上八人百神在肝肺俞不宜患癰  
腫見血者死

十一歲二十三歲二十四歲五十八歲九十六歲以上五  
人百神在脇肋不可患癰疽見血者死

十四歲二十九歲三十九歲四十六歲五十二歲六十歲  
六十九歲七十六歲八十一歲八十八歲九十五歲以上  
十一人百神在下部不可患瘡漏疾見血者死下部尤忌  
見勞瘵人不宜下部出膿難瘥

十一歲十五歲二十七歲六十三歲七十五歲以上五人  
百神在尻尾間不可患癰疽見血者死  
十三歲二十八歲五十二歲七十二歲九十三歲以上五  
人百神在足下不可患癰疽見血者死

二十一歲三十八歲四十一歲五十歲以上四人百神在  
通身不可患瘡腫見血者不治  
凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼或熱或不  
熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺已上者其赤腫  
焮熱者即用紫急收赤腫藥圍定不令引開中心即用抽  
膿聚毒散貼之急令散毒外透內服排膿縮毒內托湯藥  
候膿成相次破穴看瘡大小深淺內發其膿汁膿水大泄  
急須托裡內補雖破穴膿汁不多再須排膿拔毒透後慎  
不令再腫須疼止腫消患人自覺輕便即是順疾也最宜  
節慎飲食其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類  
此是毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣藥內補臟腑即止  
矣此藥謂皂角刺之屬

精要云凡疽疾勿食羊鷄牛鷄魚麪煎燻炙炒法酒等  
味犯之必發熱只有梔子黃芩湯用之取効夫梔子苦參  
犀角輔佐人參固可解食毒之熱若寒月與虛人寧無加  
減乎內經謂膏粱之變足生大疔此原癰疽之因也禁戒  
厚味蓋以厚味能引起宿火之熱此誠富貴養口腹者  
所宜謹守若素貧者大不然矣予治章兒背疽徑尺家貧  
待死而已視瘡穴黑深似有近內之意急作參芪歸木膏  
飲三日略以艾草湯洗氣息奄奄不可支持幸其身不發  
熱而可進飲食每日作餛飩大碗與之盡藥膏五斤餛飩  
多肉者三十碗瘡口漸合以其因肉與餛飩助氣之有益  
也

凡治病必察其下 予從軍戊午年冬于武城縣有賈  
倉使父年踰六旬冬至後數日疽發于背五七日腫勢約  
七寸許不任其痛傷醫曰視之膿成可開矣公懼不從越



脈微泄  
者難感  
夏宜溫

三日醫曰不開恐變証生矣遂以燔針開之膿泄痛減以  
開遲之故迨二日變証果生覺重如負石熱如熾火痛楚  
倍常六脈沉數按之有力此膏癰積熱之變也邪氣酷熱  
故宜寒藥治之時月嚴疑復有用寒遠寒之或乃思內經  
曰有假者反之雖違其時以從其証可也與癰醫議急作  
清涼飲子加黃連一兩五錢與之利下兩行痛減七分翌  
日復用前藥其証悉除月餘平復 陳錄判母年七十餘  
歲忽冬至後腦出痘形如驢面大命癰醫診視俟瘡熟以  
針出膿因怒答侍妾倉即內陷凹一菲葉許面色青黃不  
澤四肢逆冷汗出身清時復嘔吐脈極沉細而遲蓋綠衰  
老之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄已滌肥膿之氣獨  
存憔悴之形加之暴怒精神愈損故有此寒變也病與時  
同與癰醫議遂制五香湯一劑加丁香附子各五錢劑盡

不醫學綱目卷六 吳

瘡復大發隨証調治而愈內經曰凡治病必察其下謂察  
時下之宜也諸痛痒癩瘡皆屬心火言其常也如瘡盛形  
羸邪高痛下始熱終寒此反常也固當察時下之宜而權  
治故曰經者常也法者用也醫者意也隨所宜而治之可  
收十全之功矣 至元壬午五月二十八日王伯祿年五  
十有七右臂臍腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脈  
沉細而微脈證俱寒予舉癰醫孫彥和視之曰此附骨癰  
開發已遲以燔針啓之膿清稀解次日肘下再開之加吃  
逆不絕彥和以丁香柿蒂散兩服稍緩次日吃逆尤甚自  
利臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憤於左乳下黑盡處  
灸二七壯又處托裏溫中湯用乾姜附子木香沉香茴香  
羌活等分咬咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒癩瘡皆屬  
心火又當盛暑之時乾姜附子可乎予應之曰理所當然

不得不然內經曰脈細皮寒瀉利前後飲食不進此謂五  
虛况吃逆者胃中虛寒極也諸痛痒癩瘡皆屬心火是言  
其定理也此証內外相反須當捨時從証非大方辛熱之  
劑急治之則不能愈矣遂投之諸症悉去飲食倍進瘡勢  
溫膿色正彥和又與五香散數服月餘平復噫守常者衆  
人之見知變者智者之事知常而不知變因而取敗者亦  
多矣况醫乎哉守常知變豈可同日而語  
托裡溫中湯治瘡瘍為寒變而內陷者膿出清鮮皮膚涼  
心下痞滿腸鳴切痛大便微瀉食則嘔逆氣短促吃逆不  
絕不得安臥時發昏憤

- 羌活 乾姜炮各 黑附子四錢炮
- 益智仁錢 茴香 甘草炙 丁香
- 沉香錢 木香半錢 陳皮錢

按經曰寒淫于內治以辛熱佐以苦溫附子乾姜大辛  
熱溫中外發陽氣自裡之表以為君羌活味苦辛溫透  
關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐  
吃逆不下食益智仁沉香丁香大辛熱以散寒邪為佐  
瘡氣內攻氣聚而為滿木香茴香陳皮苦辛溫治瘡散  
滿為使也

右咬咀都作一服水三盞生姜五片煎一盞去查溫  
服無時忌一切冷物

一老人年七十患背疽徑尺餘已雜與五香十宣數十  
貼膿血腥穢嘔逆不食者旬餘病人自云吃內托散隔中  
不安且素有淋病三十年今所苦者淋之痛與嘔吐不得  
睡而已急以參芪歸木耆骨以牛膝湯入竹瀝飲之三日  
後盡藥一斤半淋止思食七日後盡藥四斤膿自湧出而

膿虛嘔  
逆不宜  
內托十



得睡又黃省而安 一男子年六十餘性好酒肉昔疽見  
 腹嘔逆發熱蓋其得內托十宣多矣醫以嘔逆於嘉禾散  
 中加丁香以溫胃行氣時七月大熱脈洪數有力予因謂  
 此脈症在瀉瀉才為忌然形氣實只與人參膏和竹瀝飲  
 之盡藥十五斤竹百餘竿而安予曰此病幸安也不薄味  
 必再作仍厚味自若夏月醉後坐水池中又年餘左脇旁  
 生一軟塊如餅二年後軟塊為疽本人見膿血淋漓而脈  
 洪數有力又嘔逆食少遂自以人參膏入竹瀝飲之又百  
 餘竿而安今八十歲強健如舊此病兩以老年血氣弱專  
 服人參竹瀝而愈若與內托十宣散恐未能若是之安全  
 也

腰瀆之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此為虛也宜補  
 之亦有穢氣所觸者宜和解之亦有風寒逼者宜溫散之

補者歸芪之類和解者乳香芍藥之類溫散者防風桂枝  
 之類

權小娘瘰後右腿股生癰破後筋吊疼脈虛而瀉詢之小  
 便時寒處亦相應宜與生血導熱

- |         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| 川芎      | 歸頭 | 條芩 | 生地 |
| 赤芍      | 牛膝 | 黃柏 | 甘草 |
| 青皮      | 檳榔 | 通草 | 桂皮 |
| 右煎食前熱飲之 |    |    |    |

五香湯即五香連翹湯去射干大黃升麻連翹加參犀角  
 若用于瀉瀉猶可借其飛走以攻散其毒使不延蔓若用  
 于瀉瀉雖多有參芪甘草之緩補而走泄太多寧不犯仲  
 景已有得汗復汗得下復下重虛之戒可不省乎  
 精要云血氣聞香則行聞臭則逆又言飲食調令香美

其脾土養其真氣夫甘而淡者可養脾上若香美者但能  
 起火經以熱傷脾熱傷氣為戒今日益脾養氣若施之于  
 腫瘍者似有暢達之益瀉瀉後用香美恐有發濕執損其  
 陰之患矣

精要云熱盛脈數與瀉瀉湯單者大黃等湯不其熱脈緩  
 弱只投五香連翹湯夫熱盛脈數若腫瘍時臟腑秘而身  
 實者猶可與大黃若瀉瀉後膿血出多者熱盛脈數去死  
 為近其可下乎緩弱之脈古人皆以為邪毒已散五香之  
 飛走升散其可用乎

精要云初成膿宜用烙得膿利為効亦服神仙追毒丸此  
 又不能無疑者也夫追毒丸下積取毒之藥決無取膿之  
 効今用烙而得膿若在裏之氣血壯實則膿自出如推矣  
 何不以和氣活血之藥佐參芪補劑使膿自托出乎

精要云瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒與清膿湯  
 萬金散五香連翹湯六味車釐散千金瀉瀉湯皆可用選用  
 下利已後渴尚未止宜用生津補氣藥則津液生氣血完  
 渴自止矣夫大渴而與利藥非明示脈証何以知其當下  
 下又言下利後渴又不止却用補藥又不明言脈証恐是  
 但有大渴必與峻下下後尚渴方與補藥夫醫者治未病  
 如此用藥可乎况渴屬上焦當腫瘍時或可用若瀉瀉  
 時渴恐因血氣之虛何以待下利後方議其虛哉

精要論疽疾咽喉口舌生瘡歸罪於不得內托以致熱毒  
 衝心與琥珀犀角膏夫于腫瘍時用之猶或近理若於瀉  
 瀉後用之彼犀角腦子之升散寧不助病邪致虛以速其  
 死也耶後有犀角散以大黃佐黃芪用黃芪則知其虛用  
 大黃又似疑其有實熱夫瘡潰虛縱有舊熱將自漸因



膿血而消何必以峻利動臟腑若在秋冬何異用刀劍耶

精要論癰疽發寒熱多汗或先寒後熱或先熱後寒或連日作或間日作必先嘔痰然後寒熱寒熱解大汗出不可

專以為有熱亦有氣虛而得者亦有因怒而得者又有先感寒邪脾氣不正而有此証者夫氣虛者當以補氣藥補之因怒者當以順氣藥和之脾氣不正者當以調脾藥養之今用不換金正氣散悉是溫散瀉衛之藥而欲以一兩

人參收拾十四兩之瀉衛可乎若用于腫瘍時感寒邪者猶或庶幾彼氣虛者因怒者脾氣不正者此方能兼治乎又未知用于腫瘍耶潰瘍耶

穴有孔慎風仍慎再合如再合者為風濕邪氣攻搏而再生膿宜如前以通和湯藥依次第用不可急性恐傷氣

害人之命也

瘡瘍未合風入為破傷風濕入為破傷濕二者害人最急倉卒不知其因甚難認治癰疽瘰癧潰後尤宜謹之

加味十全湯治癰疽瘰癧後補氣血進飲食

黃芪 地黃 當歸 川芎

人參 茯苓 芍藥 白朮

陳皮 粉草 桂心 五味

烏藥 右吹咀每服一兩用水一椀生姜五片棗二枚同煎分

作二服留查晒乾為末服之丹溪云加味十全湯須看

年之老壯資之強弱証之緩急時之寒熱加減用之

加味十全湯治癰疽後補氣血進飲食實為切要蓋膿血出多陰陽兩虛非此藥何以回生起死惜其不分經絡

不載時令又在載者觸類而長之今之外科於瘡瘍腫平

痛寬遂以為安漫不加省往往于結痂後兩三日或半年

虛証乃見醫者不察病者不悟無補接調養之功因而轉

成他病者惜哉予治一士夫因脚弱求診兩手俱浮洪稍

鼓飲食如常惟言問不答肌上起白屑如熱片時在冬月

予作極虛處治詢其弟乃知半年前曾于背臂腿三處自

夏至秋冬節次生疽率用五香連翹湯十宣散與之今結

痂久矣予為作參芪白朮當歸膏以二陳湯化飲之三日

後盡藥一斤白屑沒者大半病者自喜呼吸有力補藥應

効以漸而病家反怨藥不速應自作風病論治煉青礞石

二錢半以青州白丸作料煎飲于頓服之予諫止不聽因

致不救書以為警云

運氣癰自潰者惟上不及歲有之經曰土不及曰卑監卑

監之紀其動瘍涌分潰癰腫蓋土不及則肉腐為癰腫故

木化啓折乘之而膿涌分潰其癰腫也

東垣癰疽用藥加減法 如發背疔腫膿潰前後虛而頭

痛者于托裏藥內加五味子 恍惚不寧加人參茯神

虛而發熱者加地黃瓜蒌根 潮熱者加柴胡地骨皮

渴不止者加知母赤小豆 虛煩者加枸杞天門冬 自

利者加厚朴 膿多者加當歸川芎 痛甚者加芍藥乳

香 肌肉遲生者加白欬官桂 有風邪者加獨活防風

心驚悸者加丹砂 口目瞶動者加羌活細辛 一嘔逆

者加丁香藿葉 痰多者加半夏陳皮

麥飯石膏在膿潰後圍瘡口

麥飯石 鹿角 白欬

右用麥飯石末二兩白欬末二兩鹿角灰四兩要研極



細如不細反痛用好米醋入銀石器內煎令魚眼沸却入三味藥末用竹篦子不住手攪熬一二時稀稠得所傾出候冷以紙蓋每用時先以猪蹄湯洗去膿血搥乾以鷲翎拂藥塗四圍凡赤處盡塗之但留一小口如錢大以出膿血凡用塗藥上久則藥乾勿令細急須常用醋拂濕其藥初便一日洗換藥十日後兩日一換肉令者不用

猪蹄湯治一切腫破消毒氣去惡肉凡瘡有口便用此湯濯洗

白芷 生甘草 羌活 露蜂房

黃芩 赤芍藥 川芎等

右為粗末看疽大小用藥如疽大猪蹄兩隻只用白水三升煮軟將汁分為兩次澄去面上油併下面查却

大醫原綱卷八

將藥末投其中再煎十數沸去香以故煎藥湯溫洗薄楷惡血惡肉隨洗而下洗訖仍避風忌人口氣吹之又忌狐臭人月經人

癰疽有死肉不去者用白丁香霜末深則粧之淺則乾搽於膏藥上甚妙

又方膏藥內入雄黃巴豆少許不傷好肉止去惡肉不惟惡瘡凡癰毒有惡肉者俱可去

又方雄黃散以雄黃一錢另研巴豆不去皮研如泥入乳香沒藥少許再研細少上惡肉自去

治惡瘡有死肉者及追膿

白丁香 輕粉 粉霜 雄黃

麝香 各一 巴豆霜 三

右細末新飯和作錠子用之

治瘡疽攻腫息肉突出烏頭五枚苦酒三升漬三日洗之日夜三四次

諸癰疽有肉凸出數寸者更于凸出瘡門求之

神異膏治諸般惡毒瘡癰發背癰疽其妙如神

露蜂房 要用蠟見多者為全蛇蛻以鹽水洗淨

玄參 半兩 綿黃芪 三分

黃丹 五兩 真麻油 斤

杏仁 去皮尖切 男子亂髮 洗淨焙乾

右件藥先將麻油入銀鉢中同亂髮于風爐上慢慢文武火熬候髮焦鎔盡以杏仁投入候杏仁色變黑好絹濾去查再將所熬清油入銀鉢內然後入黃芪玄參二味慢火熬一二時取出鈔子安一冷風爐上候半時又火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝急攪移鉢于

火上不住手攪慢火熬至黃紫色用綿濾過後復入清油在鉢內乘冷投黃丹急攪片時又移鉢於火上文武

火慢慢熬不住手用柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠子則是膏成就矣若珠子稀再熬少

時必候得所然後用瓷器內封收待用或恐偶然熬火太過稍硬難用却入少蠟熬添麻油在內窺器密封蓋

於甌上蒸乘熱攪勻收而用之膏藥熬成了須用所盛

窺器置淨水盆中出火毒一晝夜歇三日方可用此

膏藥極難於火候須耐煩看火緊慢火猛即藥中火發

千萬謹戒勿無出于此

熱瘡寒膏藥

當歸身 水洗焙 杏仁 湯洗去皮

黃丹 六兩 肥嫩柳枝 三兩半切如

許水洗乾



肥嫩桃枝一兩切作如 麻油一斤

右件先熬麻油熱下桃柳枝熬令半焦以綿裹當歸杏仁同煎至柳枝黑焦為度去藥查濾油澄淨抹去銚中查滓令淨再上令沸旋旋入黃丹熬成滴水不散為度

寒瘡熱膏藥

與寒膏藥同只將當歸身改作當歸稍桃柳枝分兩側過便是

劉氏貼發背癰疽膿盡四面皮粘恐有膿毒攻起宜用逼毒散方

黃藥子 白藥子各一兩 赤小豆二兩 雄黃錢一

右為末水調傅

治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用緊瘡口生肌青散子

大醫藥綱目卷六

權花葉盛時收陰乾取四兩為汁 青赤小豆

白芨各二兩

為末臨時用權花末三錢七白芨小豆末各一錢七相和新以水調攤紙上貼四畔中心瘡口不用貼

瘡口方木香檳榔散用之決無疼痛以蠟油塗覆瘡

上生肌歛肉甚速必無惡血瘡口疾合易取平復惟膏梁熱瘡所宜用也貧人害地之寒濕外來寒瘡者禁不可用

木香 檳榔 黃連各等分

右為極細末依前調用濕則乾貼

治寒瘡歛瘡口藥

當歸身一兩切乾 青皮二分 木香一分

黃連五分

右四味為極細末蠟油調塗取效甚速

瘡口大者乳香散

寒水石一兩 滑石各一兩 乳香 沒藥各半兩

腦子許少

右各研細和勻少許搽瘡口上

桃紅散歛瘡口定痛辟風邪

滑石四兩 乳香 輕粉各二錢 小豆粉一兩

寒水石三兩

右為細末乾瘡口上一方改小豆粉為定粉

有人患背疽已潰如碗面大視五臟僅膈膜耳自謂必死用大鯽魚一枚去腸臟以羯羊糞入其中烘焙焦黑極燥為細末乾瘡之瘡口遂收至今無恙此方累用有效須候膿少欲生肌肉時用之

又方治瘡口久不收

大醫藥綱目卷六

小椒去目炒 定粉 風化硝二錢 白礬半兩

乳香 沒藥各一兩 右為末搽之

生肌散

寒水石三兩 滑石 烏魚骨 龍骨各一兩

定粉 蜜陀僧 白礬灰 乾胭脂各半兩

右為細末乾瘡用之

平肌散治諸瘡久不歛

蜜陀僧 花蕊石 白龍骨各一兩 乳香研

輕粉各一錢

右為細末和勻乾瘡

精要論癰疽久而瘡口不合其肉白而膿血少此為瘡

口冷滯乃病氣血枯竭不潮干瘡遂致如此用北艾葉一

把入瓦器內濃煎湯避風處乘熱用艾湯澆洗瘡口四圍



爭肉以網帛燒艾葉乘熱洗沃一日一次洗了須避風仍燒松香以烟薰瘡口良久用神異膏貼之不可與厭穢之人見若不能禁忌瘡口難安藥亦無效夫以血氣枯燥不知補接於內惟務熱洗於外不揣其本而齊其末而乃歸罪于冷滯大抵潰瘍宜洗若非行補接之藥以實其內竊恐淋洗有一時之快少頃恐病躄自覺疲憊有不耐煩之意非虛而何可不先議補接乎補接即參茸也

亂髮蜂房蛇蛻皮各燒灰存性每味取一錢七酒調服治瘡久不合神驗丹溪云髮補陰之功甚捷

收飲瘡口止有柳皮白飲煎湯飲之

眼白青黑眼小是一逆也內藥而嘔者是二逆也腹痛渴甚是三逆也有項中不便是四逆也聲嘶色脫是五逆也除此五者為順也玉版

癰疽破潰之後其形候有逆有順眼白青黑而紫小一惡也不能下食納藥而嘔食不知味二惡也腹痛渴甚三惡也背脊不便四肢沉重四惡也聲嘶色脫唇鼻青黑面目四肢浮腫五惡也煩躁時嗽腹痛渴甚泄利無度小便如淋六惡也膿血大泄淋痛尤甚膿色敗臭氣不可近七惡也喘粗短氣恍惚嗜臥八惡也未潰先黑又陷面青唇紫便汚者九惡也更有氣噎痞塞咳嗽身冷自汗無時瞪目耳聾恍惚驚悸語言顛錯皆是惡証動息自寧飲食知味一善也便利調勻一善也神彩精明語聲清朗三善也膿清腫消色鮮不臭四善也射氣和平五善也五善見三則吉諸惡見四必危

癰疽所兼諸證

熱毒方盛或發大渴此是毒攻心臟令舌乾煩渴也但

以補心氣藥內補即止

竹葉黃芪湯治發背發渴通治諸瘡大渴

淡竹葉二 生地兩 黃芪 麥門冬去心  
當歸 川芎 甘草 黃芩  
芍藥 人參 半夏湯洗 石膏各三

右為粗末每服五錢水一盞半竹葉五七片同煎至一盞去查溫服無時虛弱者忌用石

金銀花散

金銀花 四兩 甘草一兩  
右為細末每服四錢水酒各一盞同煎至一盞去查熱服

外科精要云疽疔安後發渴與加減八味丸夫當此時血氣兩虛當用參芪補氣當歸地黃養血渴當自止何必澤瀉茯苓導水佐以肉桂若忍冬丸黃芪六一湯等方切當忍冬養血黃芪補氣渴何由作

忍冬丸大能止渴及癆渴疾既愈之後須預防外癰疽大宜服此

忍冬草 不以多少根莖  
右入瓶內以無灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許研為細末以所浸酒打麪糊丸如桐子大每服五十九至百丸無時酒飲任下

黃芪六一湯大治渴疾補虛乏常服此藥終身可免癰疽之疾

綿黃芪 去皮六兩 一半生用 粉草 一兩 一半生用  
右為細末每服二錢早晨日午以白湯點服若飲初至用酒調尤妙



桑枝湯大治口乾取桑枝一小升細切炒香以水三大升煎取二升一日服盡

五味子湯大治口燥舌乾此是腎水竭也

五味 黃芪去芦 人參去芦 麥門冬去心

粉草炙半

右咬咀每服半兩水一盞半煎至八分去查溫服無時

候一日二夜五七服妙

丹外科精要云嘔逆有二証一証謂初發時不曾服內托

散伏熱在心一証謂氣虛脾氣不正而嘔伏熱在心與內

托散三兩貼氣虛而嘔宜煎未散有寒熱宜家傳正氣散

兼與山藥丸以補腎謹按病機諸逆衝上嘔越皆屬於火

其內托散性涼固有降火之理若煎未散羣隊以為補虛

之劑補力已少徒有溫煖助火耳山藥丸補腎以壯下焦

之陰粗為近理然治嘔須分先後腫瘍時當作毒氣上攻

治之清湯後當作陰虛補之若年老因疽潰發嘔不食者

宜用參芪白朮膏峻補取効佐藥隨時証加減恐用山

藥丸緩急未易得力河間謂諸病瘡瘍如嘔者濕氣侵于

胃也藥中宜倍加白朮

丹溪治一老人背疽嘔逆用補藥効方見潰瘍門予治一

男子腫瘍嘔諸藥不止用獨參湯一服嘔即愈

精犀角膏治咽喉口舌生瘡昔有一貴人因疽而生此証

醫者以為心臟絕盡皆辭退愚進此藥一日而安

真琥珀 生犀角各一錢 辰砂一分 茯神去木各一錢

真腦子研一錢 人參去芦一錢 酸棗仁去皮研一錢

右人參茯苓神犀角為細末入乳鉢內別研藥味和勻用

煉蜜搜為膏子以薏蘘收貯俟其疾作每服一彈子大

以麥門冬去心濃煎湯化服一日連服五服取効此方不宜

消治發背癰疽膿潰後氣虛脾臟滑泄并四肢逆冷宜用

和氣散

蒼朮四兩水淋浸三日洗淨晒乾并以米醋炒令香黃色 甘草炙

青皮去核各一兩 良姜炒 肉桂 乾姜炮各一兩

陳粟炒

右七味為末每服一錢用炒茴香末半錢相和溫酒調

下不拘時

聖愈湯治諸惡瘡血出不止以寒水石細末搽之立止

或瘡時問作黑色不可潰也藥力去盡却紅和如血出多

而心煩不安不得眠睡此亡血也此湯主之

熟地 生地各三錢 歸身半錢 川芎二錢

黃芪五分 人參三分

右咬咀如麻苳天都作一服水盞半煎至一盞去查稍

熱服無時

梅治背瘡肉長疾皮不及裘見風即成腫以寒水石燒研

為細末傅瘡上再用銅絲細末上之肉即不作腫矣

圖經古方療惡瘡癰腫或連陰髀間疼痛急牽入小腹

不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉搗取汁一升服之日

三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以

來用之起死神効

久漏瘡

丹漏瘡 須先服補藥以生氣血即參芪朮歸芎為主大

劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚艾炷灸炷隨漏之

大小便多令微熱不可令痛乾則易之乾者再研為末再



和再灸如困則止來日再灸宜至肉平為効亦有用附片  
灸仍用前血氣藥作膏藥貼之

經云肉之大會為谷肉之小會為絡肉分之間豁谷之  
會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行  
必將為膿內銷骨髓外破大腠留于節湊必將為敗積  
寒留舍榮衛不養肉縮筋助肘不得伸內為骨痺外為  
不仁命曰大寒留于豁谷也此用附子灸者蓋此義也  
梅師云腎移寒于脾發為癰疽少氣脾移寒于肝發為癰  
腫拘攣又云諸癰腫此皆安生岐伯曰生于八風之所變  
也又云地之濕氣感則害人皮肉筋脈聖濟云衣服之表  
易着寒所得之源大抵如此或發不變色或堅硬如石或  
捻之不痛久則然後變色疼痛漸爽而成膿如淋而稀久  
不能瘥瘡口不合變易為疔漏敗壞肌肉銷損骨髓以致

痿跛宜以此骨碎補丸主之

骨碎補 補骨脂 熟地 當歸

續斷 石楠 石斛 牛膝

杜仲 草薢 附子 芍藥

川芎 兔絲子 沙參 羌活

防風 獨活 天麻 黃芪

此方與大倭方相表裏各等分為末煉蜜丸空心鹽湯  
服

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大  
倭宜用

羌活 防風 細辛 附子

甘草 川芎 續斷 白芍

白朮 當歸 桂心 麻黃

黃芪 熟地

此方與前骨碎補丸相表裏

管氣不從逆于肉理乃生癰腫 陷脈為瘻留連肉腠  
氣化薄傳為善畏及為驚駭全文見陰陽門

桂附丸治氣漏諸瘡

桂心 附子炮裂米醋中浸再 厚朴姜

粉草炙 白朮各一兩 木香分 乳香研二

右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下二三十丸丹

溪云精要治冷漏諸瘡與桂附丸此冷只因瘡久不合  
風冷乘之血氣不潮而成也厚朴雖溫其瀉衛尤速恐

不若參芪佐以陳皮麻乎與病情相得此方治冷漏瘡  
若寒而虛者只以加味十全湯隨時令經絡加減用之  
為當又虛甚者宜參芪歸朮膏

陷脈散治漏瘡及二三十年癰癧或大如盂孟久不瘥

致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟或潰令人驚惕卧寐  
不安軀中掣痛愈而復作

乾姜炮 琥珀研 大黃 附子炮去皮

丹參分 石硫黃研 白石英研 鍾乳粉研

烏賊骨研各半兩

右為末貯以篋合韋囊勿令泄氣若瘡濕即傳無汁即  
煎猪脂和傅之以乾為度或死肌不消加芒硝二兩益

佳一法胡燕屎一枚

攻裡 疔疽小渠衰三因強冠入家傷其兩脰外廉作瘡數年不  
已膿汁常消消然但飲冷則瘡閉冷水浸淫而出延為濕

瘡求治戴人曰爾中焦當有綠水二三升涎數掬袁曰何

也戴人曰當被盜時感驚氣入腹驚則膽傷足少陽經也



兼兩外廉皆足少陽之部此膽之甲木受邪甲木色青當有綠水少陽在中焦如瀉既伏驚涎在中焦飲冷水咽為驚涎所阻水隨經兩旁入瘡中故飲水瘡中水出乃上湧寒痰汗如流水次下綠水果二三升一夕而痂乾真可怪也

管治足膝下至踝漏瘡通足腫大於好足二倍行步不全用五龍丸大下之者六苗每苗皆五七行下後用黃柏蒼朮芫芍地草升葛星半牛膝活石桂調之近三四個月而安

發表

治漏瘡  
川芎兩半 細辛二錢 白芷稍半 甘草兩

右每日作湯服上瘡食後下瘡食前看瘡孔大小用隔年黃麻根刮去粗皮槌軟搥成繩子燃入孔中至不可入則止日淺一日瘡用好膏藥貼之

方

治瘰有頭出膿水不止以啄木鳥一隻燒灰酒調服一錢七立瘥

神應膏治久漏瘡此宋褚防禦治理宗久漏瘡諸方不効獨此膏愈之如腸毒胃毒為丸服之神効

當歸一兩 赤芍藥 大黃各一兩 香白芷 官桂各一錢 玄參三錢 川續斷二錢 莪朮一兩 生地二錢

右九味細剉用真香油二斤浸春五日夏三日秋七日冬十日入鍋內以文武火煎令黑色濾去渣如熟天用黃丹升兩冷月十五兩旋旋下丹不住手攪試水中沉為度不可令婦人雞犬見如漏有孔者以膏送入孔內外仍以膏攤貼之

外仍以膏攤貼之

栝榔散治癰疽瘡疔膿潰之後外融風寒腫收腫硬膿水清稀出而不絕肉腠空虛惡汗臭敗瘡邊于及好肌不生及癰疽瘰癧瘡浸潰不斂方見瘡湯飲瘡口藥即水香栝榔黃連等分為末敷貼也

治漏外寒藥  
蘆甘石 童便 牡蠣粉 右為極細末傅之

烏金散貼惡瘡瘰癧  
橡料子二個內一個黃丹一個實白礬末相合定用黑俏麻皮纏了火內燒研細加麝香少許洗淨瘡貼之

截疔散治年深疔瘰癧  
黃連半 白欬 白芨 黃丹各一 輕粉一 龍腦 麝香各半兩 蜜陀僧一兩

右為細末和勻乾摻在紙上以膏貼之

取朽骨久疽及痔漏中有者  
取黑骨雞脛骨上等砒霜實之搗泥固濟火煨通紅取出地上出火毒去搗泥用骨研細飯丸如粟米大以紙搥送入孔竅內更用膏藥貼之

雄黃治瘡湯尚矣周禮瘍醫凡瘡瘍以五毒攻之鄭康成註云今醫方有五毒之藥作之用黃蠶置石膽丹砂雄黃礬石磁石其中燒三日三夜其烟上着以雞羽取之以注創惡肉破骨則盡出楊大年嘗記其事族人楊偶年少時有瘍于頰連齒輔車外腫若覆碗肉潰出膿血不輒吐之痛楚難忍療之百方彌久不瘥人語鄭法依法製藥成注之瘡中少頃取朽骨連兩牙漬出遂愈信古方攻病之速也黃蠶即瓦盒也

速也黃蠶即瓦盒也



針灸 頭火漏瘡

足內踝上一寸灸三壯 如在上者肩井 鳩尾

肺脈微緩為痿痺續者多熱 文見治虛實法

瘡醫自幼至老凡所經驗必須寫之嘗記瘡瘻惡瘡諸

藥不效者取蟾蜍剪去兩頭安瘡口上以艾炷灸之七壯

一易不過七枚無不效者又法用乞火婆虫兒灸之同前

法累驗神効人皆秘之往往父子不傳

醫學綱目卷之十八

瘡

醫學綱目卷之十八

醫學綱目卷之十九

瘡疽所發部分名狀不同 疔瘡 石癰

諸腫 癰疽 疔瘡 結核 癰疽 偷鍼

天蛇頭代指 甲疽嵌甲 乳癰乳巖

囊腫陰頭癰 便毒 貼骨癰 內癰有

三 肺癰腸癰胃脘癰

五臟身有五部伏兔一胛二胛者膈也背三五臟膈四

項五此五部有癰疽者死寒熱病者王海藏云膈繫於

不可患癰疽者七處 眼後虛處 頤接骨處 陰根

根上毛間勝與尻骨接處 耳門前後重骨接處 諸因

小腹風水所成癰疽 頤骨下近耳後虛處 鼻骨中並

能害人但以諸法療之或有得瘥唯眼後虛處最險 正

腦上一處起為腦癰及腦疽腦鑠並在大椎骨上入髮際

生腦癰皮起易得破穴急破急出膿不害腦疽皮厚難得

破穴須急發內毒使破穴方可

腦鑠一處初起如橫木掘上起頂門下止大椎發腫如火

燒其色青黑如靴皮大硬不見膿即損外反如犬咬去肉

之跡難愈約式

左右髮際起如粟米頭白肉赤熱痛如錐刺此疾婦人患

膿汁是為鬢發此亦危篤之患既損破多為漏瘡

多丈夫患少始因風濕上攻髮際亦宜出膿無傷

左額右額發赤疽不拘大小狀如桃李急宜藥貼破見膿

無害右額角一處發毒疽及惡癰為近太陽穴如腫滿太

陽即成虛損為近穴而難消不可破如破後傷外風水即

能害人亦宜用藥潰膿後速飲合瘡口如經冬月即成冷



瘡綠此處近太陽穴上至額角都為險處

左右太陽穴或發疽癰及癰五七日不潰毒氣流入眼眶攻眼眼合不開用藥貼破破後慎外風水所入即損其睛

症損眼臉而成大疾  
左右眉稜兩處發為發眉不拘在頭尾宜慮未穴已前攻擊在眉頭即攻入眼損睛在眉後即攻入太陽並宜戒慎

鼻下一處人中兩處為發髭此多因摘髮外入風而結攻作不常寒熱相併此亦害人

下頤一處發為發頤肥人多有此疾恐手搔傷而發腫左右牙又骨接處發癰疽處腫脹攻骨及牙關張口不得

因諸風熱上攻或多食燒灸之物所為或因患牙癰即從牙縫中破出膿血切忌外風水觸犯

垂臂兩處發接骨下臂驚上起如鷄鴨卵大皆由榮衛不調所為也喜患實處而不透內亦宜急消或發穴早療

兩臂肘起在接骨下引手至小骨之上發癰癰此處雖實奈連大小筋骨舉動不便垂手多墜疼如膿深沉徹骨即傷筋脈拳縮不舒搗搗宜急以緩慢筋脈藥餌治之

兩手背發癰疽初生如水刺無頭腦頑然滿手背腫滿後聚毒成瘡深入至骨而為發手背此屬五種皆發毒之類也

兩肋起疽名為發肋初腫盛至十數日不穴攻即腫大如杯碗高如鐵背痛徹內腸絞刺左邊患應右邊痛右邊患應左邊痛唯有此處多是內毒却入攻而死者多人有斯患急以針刺出膿血則免內攻傷內矣

三里兩處起癰疽初發如牛眼睛青黑便五七日破穴出黑血汗膿腫攻勝肚連腿裏拘急冷疼此因傷筋氣勞力

所成宜用湯藥注射去其外毒自平息矣

兩脚接骨近上勝肚下一處起丹疽如胡桃大硬如物打搗之狀不苦疼但腫急脹慮其損筋亦須早出膿毒可保平安也

兩脚心發徹骨者不治如脚心微皮破不至深發膿不多者可治 癰發雖重不至損人但世人不曉醫治自至危殆耳

上焦發癰為陽是壅塞實候宜解利溫涼湯藥去其積熱上攻外即貼消毒通腫藥如已結定即用發穴藥候穴破

出其膿毒腫平方貼生肉等藥然後飲合瘡口亦慮外傷風水勿食發風熱醬醃毒物等忌房事

中焦發癰至腰上一節前後心不定所在皆是滯滯候亦乘虛而作不拘大小前起心堆尾者最要緊近兩腋是虛

處兩脇肋下至臍上及臍下兩傍一二寸發癰填氣伏硬難潰膿為此等處偏難發穴穴後難合瘡口並須先用煖

內藥服後用熱藥貼令軟和慢慢破穴不得急破急破即朝夕出膿不住緩慢破穴即一頓出膿易為將息後心者

唯有十一椎脾俞下十四椎上為腎俞腎俞下為腰俞兩處起癰者防毒氣內攻為此處皆是至虛處凡有癰起先須補內氣令實方可破破內氣實則不內攻且易得潰唯

腰俞兩處多成漏疾預防節然則免矣  
下焦發為流注虛損候前陰股兩處起如鷄卵大長橫摺內初起腫核結塊後四畔浮腫相併伏硬色青黑先用和平

平內藥服三五日後用發穴散及毒藥令軟即穴穴後其瘡口即隨摺子內作長瘡瘡口破宜急用抽毒膏出膿膿盡便貼合瘡口藥為此處無肉可壞更不須長肉也







背起心俞及心包絡俞若肩髃二十日不穴死十日可刺其色赤黑膿清者不治 特疽發肺俞及肝俞不穴二十日死八日可刺其色紅赤內隱起如椒子者死 陰陽二氣疽廣潤滿背或大或小不常腫熱脹六十日可刺導引出膿不拘深淺多少發渴體倦十日外不見膿不治 筋疽發夾脊兩邊大筋上其色蒼八日可刺有瘡在肥腸中九十日死 衝疽發小腹疼痛而振寒熱四日消消五日變色可刺不刺即導引出膿毒不治五十餘日死

發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死矣治見經

湧泉疽腫起發大陰如伏鼠二十日不穴死十日可刺發清膿赤黑者死白者可治太陰尻尾

發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變色癰腫內薄於骨

不急治三十日死矣股脛劉涓子作股腸 發於股陰名曰赤施不急治六十日死在兩股之內不治十日死

陰疽發腿髀及陰股始發腰強數飲不能多七日發堅腫脹惡疼心煩躁死不治

發於膝名曰疔疽其狀大癰色不變寒熱而堅勿石石之者死須其柔乃石之者生聖如石者用生棗 諸癰疽之發於節而相應者不可治也發於陽者百日死發於陰者三十日死陽謂諸節之背陰謂諸節之腹脚 發於脛名曰兔齧其狀如赤莖至骨急治之不急治害人也 發於內踝名曰走緩其狀癰色不變數石其輪而止其寒熱不死 發於足上下名曰四滌其狀大癰不急治之百日死 發於足傍名曰厲癰其狀不大初從小指發急治去之其狀黑者不可消輒益不治百日死 發於足指名曰

脫癰其狀赤黑者死不治不赤黑者不死治之不哀急斬之否則死矣

腫疽敦疽發兩足指五日不穴死四日可刺其色發黑癰者不堪未過節者可治 陽疽起足跌及足下二十日不穴死十日可刺發赤白膿血不多其瘡上痒及赤黑者死 禽疽始發者如疥數十處如拳打之狀發寒齒噤如此者十四日死十日可刺導引膿出即愈 衡疽發如腫或時復往來可要其所刺之導引膿出即愈

丹琥珀膏

- |                      |                        |                        |                      |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 歸鬚                   | 川芎                     | 黃芪稍                    | 蜂房                   |
| 細辛                   | 皂角                     | 升麻                     | 甘草稍                  |
| 單麻子                  | 木鱉子                    | 芍藥                     | 白欬                   |
| 獨活                   | 川椒                     | 藜木                     | 防風稍                  |
| 枸杞子                  | 苜蓿                     | 降真香                    | 官桂                   |
| 瓜蒌                   | 蘇木                     | 白芷                     | 杏仁                   |
| 黃連                   | 槐枝 <small>已上各</small>  | 琥珀                     | 沉香                   |
| 木香                   | 丁香                     | 藿香                     | 零香                   |
| 雲母石                  | 乳香                     | 雄黃                     | 硃砂                   |
| 安息香                  | 甘松 <small>已上各</small>  | 輕粉                     | 麝香 <small>錢一</small> |
| 髮灰 <small>錢五</small> | 白礬 <small>一兩已上</small> | 六味 <small>為極細末</small> | 羊腎脂 <small>兩</small> |
| 真酥 <small>兩</small>  | 香油 <small>斤四</small>   | 黃丹                     |                      |
- 右先以前十六味剉碎用水五升文武火熬至二升半去渣再用水五升又熬至二升半去渣與前汁一處慢火煎用槐枝不住手攪成膏用磁器盛頓起將後琥珀等十六味研為極細末用布包起於前膏內下淨羊脂四兩真酥二兩同膏入香油內攪令勻以文武火熬



膏內水盡用昏燃點油燒不爆為度漸入黃丹以二兩五錢重為一次仍用槐枝不住手攪滴水不軟硬得所如軟添黃丹如硬添油再上火熬却入前藥細末五兩微煎數沸用磁器盛貯如用於紙上攤之量瘡口大小專治五發惡瘡疔腫癰癤遠年冷疔痔漏一切無名惡瘡蛇傷蝎螫大吹並皆治之

疔瘡

疔瘡皆生四肢發黃痲中或紫黑必先痒後痛先寒後熱也

毒裏

丙午歲予居葉城人多患疔瘡縣尹董公謂予曰今歲患疔瘡者極多貧民無力醫治近於史侯處得數方用之者無不效官給藥錢君當捨手治之遂諾其語董公榜示通衢命予施藥如此一年全活甚眾其用保生錠子千金

六醫學綱目卷十九

托裏散神聖膏藥破棺丹凡四方

保生錠子治疔瘡背疽癰癤一切惡瘡

金脚信二錢

雄黃三錢

輕粉二錢

硃砂三錢

麝香半錢

巴豆四十九粒另研文

加蟾酥一錢

右為細末用黃蠟五錢溶開將藥和成錠子冷水浸少

時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開每用一餅次用神聖膏後用托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

神聖膏藥治一切惡瘡

當歸 藥本各半 沒藥 乳香各二

白芨 琥珀各二 黃丹二 白膠香二

黃蠟二 粉霜一 木鱉子五十箇

巴豆十五粒 清油 槐柳枝各一百

勝藥

右件一處先將槐柳枝下在油內熬焦取出復下餘藥熬勿至焦濾出却將油澄清下黃丹再熬成膏用緋帛攤之立有神効

托裏散治一切發背疔瘡

黃芪一兩

厚朴二兩

川芎

防風

桔梗二兩

白芷一兩

連翹二兩

芍藥

官桂

甘草節

人參各兩

木香

沒藥

乳香

當歸各半

右為細末每服三錢酒一大盞煎二三沸和查溫服

破棺丹治瘡腫一切風熱

大黃二兩半

甘草

芒硝各一兩

右為細末煉蜜丸如彈子每服半丸食後溫酒化下或

童瀉半盞研化之忌冷水

金砂散取疔瘡

道人頭微妙存性一

硃砂半錢

雄黃三錢

蟾酥以多

右將瘡四圍刺破以少油調藥末置於瘡內緋帛封之數日疔自出如瘡入腹嘔逆者將蒼耳搗汁飲之但用

破塗之更加雄

蒼耳散治一切疔腫神効用蒼耳草根莖苗子但取一

色便可用燒灰存性研細用好米醋米泔澄淀和如泥隨

瘡大小塗上厚二分乾即易之不過十度即拔根出須針

破塗之更加雄

蒼耳散治一切疔腫神効用蒼耳草根莖苗子但取一

色便可用燒灰存性研細用好米醋米泔澄淀和如泥隨

瘡大小塗上厚二分乾即易之不過十度即拔根出須針

破塗之更加雄

蒼耳散治一切疔腫神効用蒼耳草根莖苗子但取一

色便可用燒灰存性研細用好米醋米泔澄淀和如泥隨

瘡大小塗上厚二分乾即易之不過十度即拔根出須針



狀針破患處以一粒納之取蟬蛻法用糊地破後上以竹篾刺下然後換在

苦苣搗汁傳疥瘡殊驗青苗陰乾以備冬月為末水調傳本草云取苦苣莖中白汁傳疥

治疔用磁石為末苦酒和傳封之根出立瘥根出根又取汁滴酒上立消

治疔瘡用麻內蛙虫一條研傳瘡上却用膏藥貼上一飯時去膏藥其疔自出

治疔瘡最有功效用蟬蛻僵蚕為末酸醋調塗四圍留瘡口俟根出稍長然後拔去再用藥塗瘡海藏方單用僵蚕為末津調塗亦佳

治疔瘡奪命散  
烏頭尖 附子底 錫精 雌黃

雄黃各一 蜈蚣一 礞砂 粉霜  
輕粉各五 砒二錢 腦子少 麝香少

右為細末先破瘡出惡血以草杖頭用帛帶藥末插入于內以深為度

日本三藏傳疔瘡方江子肉十粒半夏一大顆研末附于半枚羌螂一枚各為末四味臭也相和看瘡大小以

帛繩子圍瘡口以藥泥上又用絹帛貼傳時換新藥以可為度此方活人甚多

治疔瘡甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金方同

琥珀膏方見瘡症  
又方用鐵刀銼破疔頭以蟾酥傳之後用 野菊花

之酒醒疔化水即痛定如熱除不必去疔亦自愈也

托毒 治疔瘡  
獨脚茅 防風 細辛 甘苴節  
白僵蚕 青皮 黃連 羌活  
獨活 蟬腿 赤芍藥各等

右咬咀每服五錢先將一服加澤蘭葉少許薑一兩同搗爛熱酒和服然後酒水各半薑薑三片煎服此方神効

治十三種疔皆以此法治之  
以緋帛一片裹藥取匣為限先用亂髮鷄子大攤布帛上牛黃如桐子大又以棘刺針二十一枚赤小荳七粒

為末並布髮上捲緋綿作團外以髮作繩十字縛之置熨斗中急火燒灰研細以枸杞或子或根皮枝葉隨得為末用枸杞末二七緋帛灰一七共成三七研勻分二

服空心溫酒調下

奪命丹治疔瘡發惡心及諸惡瘡  
蟾酥半 砒砂三分 輕粉 枯礬  
寒水石 水飛各 銅綠字 麝香字

海羊即牛也 右件為細末將海羊另研為泥和藥一處丸如棗豆大如丸不就加好酒成之病輕者一九二丸重者三丸未效再服服時嚼蔥白一大口極爛置手心放藥丸於蔥內渠合以熱酒送下暖處臥取汗出為效忌米水

返魂丹治十三種疔  
硃砂 膽礬各半 血竭 銅綠  
蝸牛生用各 雄黃 枯白礬各一 輕粉  
沒藥 蟾酥各半 麝香少

醫學綱目卷九

醫學綱目卷九

醫學綱目卷九

醫學綱目卷九

醫學綱目卷九



右將蝸牛蟾酥研爛餘藥為細末同研和丸如鷄頭大每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在手心將藥丸裹在葱白內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即瘥如不能嚼葱研爛裹下極效

治疔瘡毒氣入腹多嘔吐欲死者即服內托香粉散滴乳半兩另研真菝葜粉一兩為細末煎生甘草湯調三錢時時飲之常令灌潤胸膈一方用梅黃菝葜粉乳香等分為水調服

世疔瘡入腹嘔者煎道人頭濃汁飲之

治疔瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁 蟬腿

乳香 錢二

右為細末每服二錢空心溫酒下紫花地丁麥熟時有謝公英狀但蕭公英開紫花地丁開紫花

瑞疔危篤者二服即愈輕者一服立効

土蜂房小窠全本草云土

右作一處器血中盛用黃泥封固火煨存性研為細末

每服一錢空心好酒調服少頃腹中大痛痛止其瘡已

化黃水矣仍服五聖散

大黃 生薑 瓜蔓 皂角針

甘草 金銀花

右吹引用好酒二升同煎至八分去渣不拘時服

破棺丹一方有當歸赤芍連翹牡蠣

山柰 牽牛末 大黃 甘草

京三稜

右煉蜜丸如彈子大酒化服之

世疔瘡最驗用蒼耳臭牡丹各一大握搗爛新汲水或

順流水調服一碗瀉下黑水即愈

追毒丸

海浮石燒赤醋研 乳香 沒藥

巴菝九粒 川烏兩

右為末醋糊丸如桐子大若患二三日服十九五六日服十四九隨病上下服之先喫冷酒半盞或一盞又用冷酒吞下如嘔吞之不妨出藥依上服之病人大便不動再用三九如疔看得端的爪破用頭垢留患處後服藥

疔後犯疔腫垂死菊葉一握搗絞汁一升入口即活

此神驗亦用其根丹溪云根葉葉花皆可紫梗者佳

疔腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞汁冷服一升日

三服甚驗

疔瘡於所屬經絡各瀉之 疔瘡者必發於手足之間

生黃疱其中或紫黑色有一條如紅線直上倉卒之際急

宜以針於紅線所至處刺出毒血然後以蟾酥乳香膏等

藥於正瘡上塗之針時以病者知痛出血為好否則紅線

入腹攻心必致危困矣

疔疔腫以針刺四畔用石榴皮末着瘡上調麩圍四

畔灸痛為度調末傳上急裏經宿連根自出

禹錫患疔腫中風疼痛者爛驢馬糞塗瘡滿五十遍極効

一曰麻子疔其狀肉上起頭大如黍米色稍黑四邊微

赤多痒忌食麻子及衣布并入麻田中行 二曰石疔其

狀皮肉相連色如黑甚硬刺之不入肉內陰陰微痛忌

瓦礫墁石之屬 三曰雄疔其狀炮頭黑蟹四畔仰炮漿

起有水出色黃大如錢孔形忌房事 四曰雌疔其狀瘡



頭稍黃向裏腫赤似灸瘡四面炮漿起心凹色赤大如錢  
孔忌房事 五日灸其狀如湯火燒灼瘡頭黑膿四邊  
有灼漿起如赤粟米忌火灸燥 六曰爛疔其狀色稍黑  
有白癩瘡中潰潰有膿水流瘡形大小如匙面忌沸熱  
食爛帛物 七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豎四  
畔起大赤色今日生一明日二後日三乃至十若滿三十  
六藥所不能治俗名黑鮑忌嗔怒畜積愁恨 八曰蛇眼  
疔其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豎狀似蛇眼大體硬忌  
惡眼看并嫉妬人見之及毒藥 九曰腫疔其狀大如  
匙面四畔背亦有黑粟粒起大忌食鹹物 十曰水洗疔  
其狀大如錢形或如錢孔瘡頭白裏黑膿汁出中硬忌飲  
漿水水洗渡河 十一曰刀鎌疔其狀濶狹如雞葉大長  
一寸左側肉黑如燒燥忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以

醫學綱目卷一九

齒

藥治不可亂攻 十二曰浮瀝疔其狀瘡體圓曲少許不  
合長而狹如雞葉大內黃外黑黑處刺不痛黃處刺則痛  
十三曰牛拘疔其狀肉胞起拍不破  
此十三種初發必先痒後痛先寒後熱熱定則寒多四肢  
沉重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆者難治其麻  
子疔一種始末唯痒所最忌者不得觸犯犯即難治其浮  
瀝疔牛拘疔兩種無忌縱不治亦不殺人欲知犯觸但看  
脊強瘡痛極甚不可忍者是犯禁也步切  
石癰  
治石癰如石不治腫者生商陸根搗擦之燥則易之取  
軟為度張文仲癰未潰以苦苣白汁滴之立潰本草云亦出  
疔根  
木香散治瘡難消不能作膿腫不止酒調下三錢方

諸腫

卒腫起大痛光背根大者杵之和苦酒如泥煮三沸昂  
上包之氏 風毒腫三年苦酒濃煎蔥白以布包慰腫上  
外聖 治一切熱毒腫而陸根和鹽少許傳之日再易  
人食 治一切毒腫疼痛不可忍者搗草麻仁傳之立瘳  
疔後 治腫瘰癧子一升炒黃杵細以香油和如泥再炒  
令焦以舊布如腫之大小攤之貼腫上勿開頭搭上外  
治惡刺及狐狸刺毒腫取蒲公英草根白汁傳之多塗  
立瘳余七月十五日夜左手中指背指着庭木痛不可忍  
十日後瘡日深漸高大痛欲死用此而安孫方  
患熱腫水研山豆根濃汁塗乾再塗  
臘月中以新瓦罐滿注熱水用朴硝二升投湯中攪散  
掛北簷下俟硝滲出罐外却收之以人乳汁調半盞掃一  
切風熱毒氣攻注目臉及發頭面四肢腫痛應手神效  
腫毒或痰痛處以赤小豎為末水調傳頻換或用香白  
芷水調傳尤妙 又方白芙蓉葉曬乾同皂角為末水調  
傳  
治諸處皮裏面痛何首烏末真汁調膏以帛裹於痛處  
用火灸皮鞋底熨之妙方  
瘰癧馬刀  
結核連續者為瘰癧形長如蛤者為馬刀  
羅曲陽縣劉禪師善治瘡瘍瘰癧其效更捷授予四方太  
乙膏玉燭散效効散翠玉膏用之每每見効  
太乙膏治癰子瘡神効  
沒藥四錢 清油斤 黃丹五兩 腦子研一錢  
麝香三錢 輕粉 乳香各二錢



右以清油黃丹熬成膏用柳枝攪又用慈蔥七枝旋旋加下蔥蓋為度下火不住手攪至滴水不散却入沒乳腦麝輕粉等味攪勻磁器內盛用

斑猫四十九箇不 官桂半 粳米四十

赤小豆九 礬砂半

右五味研為細末初服一字次服半錢次服三字又次服四字煎樟柳根湯送下空心服以小便淋瀝併作瀉為効惡心嘔吐黃水無妨其癩癧日自消矣

玉燭散治癩癧自消和血通經

當歸 芍藥 大黃 甘草

熟地 芒硝 黃芩 川芎各等

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去渣

温服日進一服七八日効

翠玉膏方見

楊氏家藏治癩癧方

荆芥 白僵蚕 黑牽牛各二錢 斑猫二十八

荆芥類足用

右為末臨臥時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時

又服五更初却用温酒調藥一錢或二三錢量強弱

用服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第

三日五更初先進白糯米稀粥湯再進前藥一服更以

燈心湯下調琥珀末一錢重服以小便內利去惡毒為

愈如小便痛用青黛一錢以甘草湯調送下即止

三聖丸治癩癧

丁香五 斑猫十 麝香另研

右為末用鹽豉五十粒湯浸研爛如泥和前藥令勻九如葉宜大每服五七丸食前温酒送下日進三服五七日外覺小便淋瀝是藥之効或便下如青筋膜之狀是病之根也忌濕麵毒食

保連翹湯

連翹斤 瞿麥斤 大黃三 甘草二

右剉每服一兩水二碗煎至一盞半早食後已時服在項兩邊屬足少陽經服藥十餘日後可於臨泣穴灸二

七壯服藥不可住至五六十日方効 一方加大黃木通貝母一作各五兩雄黃七分檳榔半兩減甘草不用

同前藥為細末熱水調下三五錢

必勝丸治癩癧不以年深月近及腦後兩邊有小結塊連復數箇兼勞瘵腹內有塊

八寶丹

鯽魚一箇去 雄黃一粒 礬砂一錢已上 味並入

干炭火燒 蜈蚣一條 蓬朮半 梔子五

皂角二枚已上 草麻子五箇去皮

黃明膠三

右為末另用皂角二挺去皮搥碎以水三碗搥去滓煮

精羊肉四兩爛軟入輕粉五匣男子乳汁半兩同研成

膏和藥末丸如棗葶大珠砂為衣温酒浸晨下十九一

服至晚看肉疔瘡子若項有五箇則以五服藥取之視

其所生多少以為服數既可更進數服

白花蛇散治久漏癩癧發於頂腋間增寒發熱或痛或不

痛 白花蛇酒浸軟去皮 犀角鎊半 黑牽牛半兩

青皮兩



右為末每服二錢加膩粉半錢研勻五更糯米飲調下  
已時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一服忌  
發風壅熱物如已成瘡一月可効神驗  
小犀角九常服除去根本截其源流應効如神諸癩並  
宜服之

犀角 青皮 陳皮 黑牽牛  
連翹 犀角 青皮 陳皮 黑牽牛

右為細末用皂角二條去皮弦子炮槌以布絞取汁一  
碗許又用新薄荷二斤研取汁同熬成膏以前藥末為  
九如桐子大每服二十九連翹煎湯食後服間以薄荷  
茶湯服

一婦人病癩癰延及胸臆皆成大瘡相連無好皮肉  
求戴人瘡之戴人曰火瀉所勝治以醃寒命以滄鹽吐之

即一吐而着加次用京膈散解毒湯等劑皮肉反復如初  
治瘰癧未破者如神百藥不應者累効

杏樹葉 萬年霜 白花蛇  
編蝠末 蜜蜂末

右將杏樹葉末用清水調却入前四件藥末調勻俾患  
處却將皮帛一片用針刺孔貼藥上如乾用清水就昏  
上刷之每一晝夜換藥一次如面上發熱服清涼飲子  
數貼其熱自退

敗散瘰癧方神効  
白膠香 海螵蛸 降真香  
右等分為末摻患處外以水帛掩之一夕而退  
已破者

蜜蜂 蛇蛻 蜈蚣  
右用香油四兩將前三藥入油內用文武火熬成入光  
粉二兩用紫枝七條如筋大者急攪候冷出火氣七晝  
夜方可用帛攤作膏貼患處已上二方得之於善門  
便治

貼瘰癧方用大烏頭五箇火炮五箇生用並去皮臍大  
皂莢二條半以好米醋二鍾刷炙醋乾為度一半焙乾並  
去黑皮又用炒糯米一百六十粒同研末以好米醋於火  
上畧頓微煖傳貼患處入蜜少許尤佳 不問有頭無頭  
大蟻五枚日乾細研酥調如麪日兩度貼之 一作如蟻  
或破或不破項以下至胸前者皆治之用九其藤如雞  
卵大洗生嚼常服之取葉搗覆瘡上數服即止 出斗門方  
何也

蝸牛散治瘰癧潰膿未潰皆可治  
蝸牛 不拘多少以竹簽穿

右為末入輕粉少許猪骨髓調用紙花量瘡大小貼之  
一法以帶殼蝸牛七箇生用取去肉入丁香七枚於七  
殼內燒存性與肉同研成膏用紙花貼之  
項後側少陽經中疔瘡不辨肉色不問大小及月日深  
遠或有赤硬腫痛用

生山藥 草烏  
右研勻貼之如神 山藥補陽氣生者能消腫  
不其其為其共腫硬之謂乎  
粉金散

黃柏 草烏  
清涼散餅 為末蜜調傳之



山慈姑用良薑

右俱搗為餅去汁卷之能散去寒熱或以山慈姑磨調酒服大妙此藥大能散癰如神

龍泉散塗癰

瓦粉

龍泉粉炒即磨刀石上粉也

昆布去土

廣茂

京三稜各半兩酒浸炒乾

右件同為極細末煎熱水調塗之用此去疾尤速

世治癰用鯽魚莢花燒灰存性水調傳 治鼠瘻小嫩鼠未出毛者焙乾蝙蝠糞小麥炒鬼箭根焙乾各為末和勻油調傳乾再傳之

治鼠瘻癰刺蝟皮瓦上炒右一味研為末加水銀粉乾傳

治癰癰經年不瘥者生玄參搗碎傳上日一易之

醫學綱目卷九

干

治癰癰燒狼屎灰傳上

治諸癰疾

硃砂

砒霜

礪砂

馬牙硝各等分

右乳鉢內研細麪糊搜如香附子狀相瘡口大小作之盡送入瘡口中恐腫時用薄許研細塗之待收口却將大栢皮白丁香並為末盡入孔中如邊不乾却用江子去殼不拘多少用麻油煎令赤去火氣後去江子入蠟

合如膏看瘡口大小塗之及將白芨末水調塗上立効治漏癰用蛇菰子不拘多少瓦上曬乾為末用紙然藥入瘡口立効蛇菰子未詳

又方用大田螺肉燒存性為末麝香少許濕則乾搽乾則油調傳

虛實

人年五六十其脈浮大者痺俠背行苦腸鳴馬刀俠癰

者皆為勞得之

又治癰癰

人參

白木

當歸

陳皮

芍藥酒浸各一錢

川芎

香附

茯苓

半夏各五分

甘草少

右作一服薑二片以金銀藤煎湯一鍾半煎前藥食後就吞絳宮丸五十粒

又方絳宮丸

大黃酒蒸二兩

山查

連翹

川芎

當歸酒洗

麥芽

桃仁

蘆薈

甘草

芸薹子酒

黃連酒

南星酒

海藻酒洗二兩

升麻

羌活

桔梗

防風酒洗二兩

白朮酒

黃芩炒

醫學綱目卷九

圭

右用神麪糊為丸已破加人參一兩作膏用甘草節僵蚕同煎

治頸上塊動者

夏枯草末六錢

甘草末一錢

右和勻每服一錢至二錢茶清調下食後

言夏枯草大治癰癰散結氣有補養厥陰血脈之功而經不言觀其能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施灸亦漸取効此草三四月開花夏至邊便枯蓋稟純陽之氣得陰則枯耳世人不知故表而出之內瀉病本之法並見前表裏條

連翹散堅湯治耳下至缺盆或至肩生瘡堅硬如石動之無根者名馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇或已流膿作瘡或未破並皆治之

治癰癰

虛實







獨活

防風各一錢已上三味必關手足太陽經症亦當用之為難散結去上風邪故也

益智仁

吐食胃中寒者加之二錢或吐沫

麥芽

食健脾胃神效消化者用之

厚朴

如腹脹加之二分

右共為細末湯浸蒸餅

作餅子晒乾搗如米粒大每服三錢白湯下

如氣不順加橘紅甚者加木香少許量病人虛實消息之毋令藥多妨其飲食此治之大法也

如止在陽明分者去柴胡黍粘子二味餘皆用之

如在少陽分者為馬刀挾瘦獨活漏蘆升麻為根加瞿麥三分

如本人氣素弱其病勢來時氣盛而不短促者不可考其平素宜作氣盛而從病變治之權也加黃

芩黃連黃栢知母防已視邪氣在上中下而用之假令

在上焦加黃芩半酒洗在中焦加黃連半酒在下焦加

酒製黃栢知母防已之類選而用之如大便不通而

滋其邪盛者加酒製大黃以利之如血燥而大便乾

燥者加梔仁泥大黃如風結燥不行者加麻仁大黃

以潤之如風澁而大便不行加煨皂角仁大黃秦朮

以利之如脈澁覺身亦氣澁而大便不通者加郁李

仁大黃以除風燥如陰寒症為寒結秘而大便不通

者以局方半硫丸或加炮附子乾薑煎候水冷服之

大抵用藥之法不惟滄場一家凡諸疾病氣者怯弱者

當去苦寒之劑多加人參黃芪甘草之類以瀉火而補

元氣餘皆倣此

濕痰 治風癱瘓

土附子

食鹽三 小便五

右三味同浸半月日取出將附子去黑皮陰乾為末用

黑豈爛煮研為膏丸附子末如桐子大每服十九酒吞

下早晚二服

初發頭項硬未破者其効如神牡蠣四兩甘草二兩為

末每服一大錢食後服同點日二服半月除根

稱煨通亦取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄

參三兩并搗羅為末以麪糊丸如桐子大早晚食後臨臥

各三十九酒下藥將盡癰亦除根

治領下癰瘰如梅李大宜速消之海藻一斤酒一升漬

數日稍飲之

取藜子微炒研為細末薄許酒調二三錢服治癰瘰久

則効

治癰瘰用夜合草遇夜則其葉閉合本草名合明俗名

連錢母出禾田中貼水面生取其葉搗自然汁服之查盒

患處効

文武膏治癰瘰用桑椹黑熟者一斗以布袋絞取汁石

器中熬成膏子白湯化下一匙日三服紅者晒乾為末湯

調服

治癰瘰腫硬疼痛年深時久不瘥用狸頭蹄骨酥炙黃

搗羅為散每日空心粥飲調下一錢七

黃帝曰寒熱癰瘰在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此

皆風癰寒熱之毒氣也留於脈而不去者也鼠瘻之本皆

在於藏其末上出於頸腋之間其浮於脈中而未內着於

肌肉而外為膿血者易去也黃帝曰去之奈何岐伯曰請



從其本引其末可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之  
徐往徐來以去之其小如麥首一刺知三刺而已寒熱  
右經一章皆從經脈取臟腑之本以治瘰癧之末也其  
末出於耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中者當於  
手足少陽經取之或針或灸如後穴

**瘰癧天井** 肩井

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

**瘰癧天井** 北滿少

繼之早治為上  
流注癰腫人多有之其性急躁其氣怫鬱其心執着初生  
在項破後膿注四肢遍體結毒如梅李狀不瘳自破孔竅  
相穿寒熱疼痛或流膿汁是名流注癰也又名千歲瘡宜  
服托裏救苦神應丸

川烏附片 烏頭 當歸 酒浸

沒藥 白芷 陳皮 甘草節 各一

蟬蛻 木洗 大皂角 皮去子 薑黃 各一

右用皂角敲碎水四大碗煎至二大碗濾去渣用汁一

同煮烏頭川烏候烏頭爛為度播如泥其餘諸藥却另

為末和烏頭泥為丸如桐子大每服六十九丸飽皆用

薄荷湯下若瘡既破穿鑿孔穴其處必生腫肉如指大

或黑或白乃風與氣搏宜驅風行經散氣之劑以化氣

調經湯主之

化氣調經湯與神應丸間服治流注癰

香附末 酒浸一宿 橘皮 羌活 各一

白芷 甘草 牡蠣 天花粉 各一

皂角刺 各半

右為細末每服二錢用清湯不拘時候調下日三次

如脈有力者先用追毒神異湯下之却服救苦神應丸

辰砂 血竭 麝香 一字共 大黃 兩

大甘草節 兩

右為吹咀作一貼河水一鍾煎半鍾調前末子臨臥服

之

單窠癰者生一箇也發於頸項最難治但宜如前藥服之

日久自消或發於顛骨亦難治用毒藥瘡之勿令

之

之

之

之

之

之



久 蓮子癰一胞裏十數枚生於項之左右以手觸則能轉動尚可用藥治療如堅硬按不動者乃不可生憎寒發熱燥渴凡遇此症至難治雖神聖亦無如之何也已

重臺癰生於項頸或左或右初則單窠結在上或在重臺見之是名重臺癰此症藥不可瘥不可針灸若是毒行其腫痛發渴生痰萬死一生宮人極速初覺有之急用小犀角九粉金散治之 燕窠癰形似燕窠不可治

肺脈微瀉為鼠瘻在頸支腋之間下不勝其上其應善瘻全文見治虛瘻法

黃帝曰決其生死奈何岐伯曰反其目視之其中有赤脈上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見三脈半三歲死見三脈三歲而死見赤脈不下貫瞳子可治也寒熱

禁忌

夫瘰癧初發必起於少陽經不守禁戒必延及陽明經大抵食味之厚鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此二端招引變換須分虛實彼實者固易治自非痛斷厚味與發氣之物雖易亦難殊為可慮以其屬膽經主決斷有相火而且氣多血少婦人見此若月經行不作寒熱可生稍久轉為潮熱其症危矣自非斷欲絕慮食淡雖神聖不可治也

獨形而小核者為結核

結核火氣熱甚則鬱結堅硬如果中核也不須潰發但熱氣散則自消

結核或在項在頸在臂在身如腫毒者多在皮裏膜外多是痰注作核不散問其平日好食何物吐下後用藥散

痰積

結核在頸項方

僵蚕炒 大黃酒 青黛 膽星各等分 右為末蜜丸噲

結核在下頰二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡

結核在臂二陳湯加連翹防風川芎酒蒸蒼朮皂角刺僵蚕麝香行大陰厥陰之積痰使結核自消甚捷

治頰下結核不消經効用大肚蜘蛛不拘幾箇以好酒浸之研爛同浸酌酒去查溫熱臨臥服之

瘦瘰 虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而內着寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨內傷骨為骨蝕有所疾前筋疾前二字衍文筋屈不得伸邪氣居其間而不及發為筋瘰有所結氣歸之衛氣留之不得

反津液久留合為腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易甚連以聚居為昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣并日以益大則為骨疽有所結中於肉宗氣居之邪留而不去有熱則化而為膿無熱則為肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名也刺節直邪歸○此皆虛邪中人為病也

新案一婦人年四十餘有瘤三辦戴人令以鹹吐之

三油三汗三下瘰已消半次服化瘰之藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

瘰氣亦瘰丹燥熱勝氣也火之色也

瘰氣先須斷厚味

海藻洗一 黃連二

火

雜方



右為末以少許置掌中時時砥之津咽下如消三分之二須止後服一方用黃柏二兩海藻一兩不用黃連亦佳

治瘰癧氣結核痛腫硬以昆布一兩洗去鹹搗為末每用一錢綿裹於好醋中浸過舍之咽津藥味盡再嚙之

治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去鹹酒浸飲之

破結散  
海藻洗 草龍膽 海蛤 通草  
昆布 礬石枯 松蘿各三 麥麩四

半夏 貝母各二  
為末酒服方寸七日三忌鯽魚猪肉五辛生菜諸雜毒物十日知二十日愈

王壺散治三種癭  
八腎經綱目卷二十九 三

海藻洗 海帶洗 昆布 雷丸各一  
青鹽 廣茂各半

右等分為細末陳米飲丸如榛子大噲化以煉蜜丸亦好

人參化癭丹

海帶洗 海藻洗 海蛤 昆布已上四  
澤瀉炒 連翹已上各 猪鬃 羊鬃各十枚  
即指羊外腎乃 喉中之卵也

右為末蜜丸如鷄頭大臨臥噲化一二丸忌油膩物

寶金散偏醫瘰癧氣無不瘥

猪羊鬃十對洗水洗去脂膜  
海帶各二 丁香 木香 琥珀研  
麝香研各一分 真珠研半

右件先將丁香木香海藻海帶并為細末入下項藥味合和再研細重羅過每服一錢熱酒一盞調服夜臥服垂頭而睡若在室男女十服必効如男子婦人患者一月見効有胎不可服

海帶丸治瘰癧氣久不消  
海藻洗 貝母 青皮 陳皮

右件各等分為細末煉蜜為丸如彈子大食後噲化一丸大効

枯瘤方名一井散  
硃砂 粉霜 雄黃已上各 輕粉  
沒藥 乳香已上各 土黃三錢 雄黃法 硃砂黃  
兩去殼巴黃半兩去油砂另為末二錢右以硃砂黃  
於坩堝內四十九日取出於磁器處  
擊作小塊研細少許硃砂黃印

右為細末以津調塗瘰癧頂外邊歇一菲葉先以花紙貼之上用小黃膏貼之

小黃膏 黃柏 黃芩 大黃各等

右為細末以水調為糊比前藥大一遭三日一易至八九日不取直候可取一方單用黃柏末亦佳

小兒丹瘤草麻子五箇去皮研入麩一匙水調塗之甚妙

生肌青龍散  
訶子皮 高茶 龍骨

右件各等分為細末乾摻上

又枯瘤方

硃砂 雄黃  
輕粉已上各 斑猫生肌三 硃砂 乳香







又方治偷針眼生薑搗細盒之淚出即愈

天蛇頭 代指

雜方

蒲公英草清明時節如薺菜狀中開一朵花如菊花者取乾與蒼耳草二味等為末以好醋濃煎浸洗即愈

蒲公英忍冬酒治天蛇頭極效累驗方見乳

治天蛇頭蒲公英搗細水和調去查服之又搗查盒患處屢效

治天蛇頭用

野落蘇即兼金銀花藤 天蕎麥

右切細用好米醋濃煎先蒸後洗

又方用人糞雜黃泥搗之裹在患處即愈

治手指忽腫痛名為代指以烏梅入醋研浸患處立瘥治手指腫酸漿水入少鹽熱浸之冷即易人方

甲疽嵌甲 散正街反

雜方

治甲疽因剔甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復綠穿穿靴研損四邊腫嫩黃水出浸淫相染五指俱爛漸漸引上脚踏跑漿四邊起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能療者用綠礬五兩形色似朴硝而綠色置於鐵板上聚炭封之吹令火熾其礬即沸流出色赤如溶金汁者是真也候沸定汁盡去火待冷取出研為細末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡帛裏乾用此末傅之愈

治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不瘥凡此疾須剔去肉中甲不治亦愈或已成瘡不瘥用乳香末臙礬燒研等分傅之內消愈

勝金方治甲疽努肉膿血疼痛不瘥用牡蠣頭厚處生研為末每服二錢研綻花酒調下如瘡盛已潰者以此

傳之更服煎藥一日三服  
嵌甲陷甲割甲成瘡久年不瘥者用烏頭尖黃栢等分末之洗淨貼之  
華陀治嵌甲累効方  
乳香並研各膩粉半 橄欖核燒存  
三 黃丹字一  
右為末以生麻油調先以鹽湯洗淨搥乾傅之二次効  
乳癰乳巖

乳癰乳巖

乳癰論○乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有所乳之子隔有滯痰口氣熾熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散失此不治必成癰癤治法踈厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫毒毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或湯或散加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其効尤捷彼村工喜於自術便妄用針刀引惹拙病良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如鷲棋子不痛不痒十數年後方為瘡陷名曰妳巖以其瘡形嵌凹似巖穴也

不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時曾得此察其形脈稍實但性急躁伉儷自謂所難者後姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安

此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而感

消散失此不治必成癰癤治法踈厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫毒毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或湯或散加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其効尤捷彼村工喜於自術便妄用針刀引惹拙病良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如鷲棋子不痛不痒十數年後方為瘡陷名曰妳巖以其瘡形嵌凹似巖穴也

不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時曾得此察其形脈稍實但性急躁伉儷自謂所難者後姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安

此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而感

消散失此不治必成癰癤治法踈厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫毒毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或湯或散加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其効尤捷彼村工喜於自術便妄用針刀引惹拙病良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如鷲棋子不痛不痒十數年後方為瘡陷名曰妳巖以其瘡形嵌凹似巖穴也

不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時曾得此察其形脈稍實但性急躁伉儷自謂所難者後姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安

此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而感

消散失此不治必成癰癤治法踈厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫毒毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或湯或散加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其効尤捷彼村工喜於自術便妄用針刀引惹拙病良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如鷲棋子不痛不痒十數年後方為瘡陷名曰妳巖以其瘡形嵌凹似巖穴也

不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時曾得此察其形脈稍實但性急躁伉儷自謂所難者後姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安

此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而感

消散失此不治必成癰癤治法踈厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫毒毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或湯或散加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其効尤捷彼村工喜於自術便妄用針刀引惹拙病良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如鷲棋子不痛不痒十數年後方為瘡陷名曰妳巖以其瘡形嵌凹似巖穴也

不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時曾得此察其形脈稍實但性急躁伉儷自謂所難者後姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安



又有滯乳因兒口氣吹噓而成又有物怒氣激滯而生者  
煨石膏燒樺皮瓜蒌子甘草節青皮皆神效藥也婦人此  
病若早治之便可立消有月經時悉是輕病五六十後無  
月經時不可作輕易看也

乳癰

青皮 瓜蒌 橘葉 連翹

桃仁留 皂角刺 甘草節 破多加參芪

神效瓜蒌散治乳癰效驗神效丹溪亦云妙捷恐貧賤  
之家未能辦集者用後蒲公英草尤妙

瓜蒌一箇去皮焙 甘草生 當歸酒浸焙

乳香另研各 沒藥另研各 右為末用無灰酒三升於銀石器內慢火熬取一升清

汁分作三服食後良久服如有妨礙便服此藥可杜絕  
病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即於大小便  
中通利如疾甚再合服以退為度 立効散與前方開  
服神妙但於瓜蒌散方減去當歸加紫色皂角刺一兩  
六錢是也

蒲公英草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及  
封之立消

解毒散帶意其可入陽明太陰經洗淨細研以忍冬藤濃  
煎湯入少酒佐之隨手便欲睡睡覺已失之矣

張氏橘皮湯治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍  
者神効因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之用陳皮一味  
湯浸去白晒乾麩炒微黃為細末麝香研酒調二錢初發  
覺赤腫疼痛一服見効

乳癰

乳癰初發腫硬一服差真樺皮末酒服方寸七睡省已  
失出

勝金丹治婦人吹乳極有神効用百齒霜即木梳右一

味不拘多少用無根水為丸如桐子大每服三九倒流水

送下食後冷病左乳者左臥右乳者右臥於濕處汗出愈

用新水傾於房上接之乃倒流水也

治婦人吹乳痛不可忍用川山甲炙黃木通各一兩自

然銅半兩生用三味搗為細末每服二錢溫酒調下不拘

時候

婦人吹乳獨勝散白丁香半兩搗羅為末每服一錢七

溫酒調服無時

治婦人吹乳皂角散謂曰婦人吹乳意如何皂角燒灰

蛤粉和熱酒一杯調一字頃間揉散笑呵呵

又方

乳香研一 瓜蒌根末兩右研令勻溫酒調服二錢

楊孫人乳腫痛

青皮 石膏煨 連翹 皂角刺炒

黃藥子 當歸頭 木通各一 甘草生三

作一貼入好酒些少同煎飲之又有別藥洗腫處

義二孺人平時乳內有結核不為痛忽乳邊又有一腫核

頗却有些痛

黃芩 川芎 木通 陳皮各四

人參錢一 芍藥錢一 大腹皮錢三 炙甘草

生甘草錢各一 當歸頭錢一 分二貼煎服

二孺人但經將行而乳腫先兩日發口乾而不渴食少

清之

有熟者



減脈左弦帶數右却平治用四物湯加陳皮白朮茯苓帶  
熱下與點九三十粒  
產後乳脹調麥牙飲自消  
連翹湯治產後妬乳并瘰

連翹 升麻 芒硝各一 玄參  
芍藥 白朮 防已 射干各八  
大黃 甘草 杏仁 去皮尖

右咬咀以水六升煮二升下大黃次芒硝分三服

一婦人年六十厚味鬱氣而形實多如夏無汗而性急  
忽左乳結一小核大如棋子不痛自覺神思不佳不知食  
味絕半月以人參湯調青皮甘草末入生薑汁細細呷一  
日夜五六次至五七日消矣此乃妬若之始不早治隱至  
五年十年已後發不痛不痒必於乳下潰一竅如巖穴出

入醫學綱目卷之九

膿又或五七年十年雖飲食如故洞見五內乃死惟不得  
於夫者有之婦人以夫為天失於所天乃能生此謂之巖  
者以其如穴之嵌岬空洞而外無所見故名曰巖患此者  
必經久淹延惟此婦治之早正消患於未形餘者皆死凡  
十餘人又治一初嫁之婦只以青皮甘草與之安

雜方 用蒲公英搗爛食患處神妙

用天南星末以溫酒調塗之

治婦人乳痛成癥以益母草為末水調塗乳上一宿自  
瘳生搗爛用之亦得

山婦人吹乳用素樹蛙脰搗成膏貼之

乳頭破裂丁香末傅之

穴乳癰 乳中穴 在乳下中針入一分沿  
皮刺後一寸半灸之

針灸

乳癰寒熱短氣臥不安膺窻主之 乳癰寒熱痛

不可按乳根主之 大驚乳痛梁丘主之 乳癰有熱三  
里主之 乳癰諸藥不能止痛者 女子乳癰驚已虛下廉  
主之 千金云臂腫重 乳癰太衝及復溜主之 妬乳太  
淵主之 婦人乳餘疾盲門主之

囊癰陰頭癰

陰

外科精要云癰疽入囊者死囊屬厥陰今以死言之將  
以為屬少陰腎經邪予親見入囊者七八人悉以濕熱入  
肝經施治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫舉丸懸掛可畏  
者皆不死但未知下虛年老者如何耳

治丈夫陰頭癰師所不能醫用鱉甲一枚燒末以鷄子  
白和傅之良

便毒

虛

治穀道前後生癰謂之懸癰用橫紋甘草一兩四寸截

入醫學綱目卷之九

七

斷以長流水一碗文武火慢慢煎水炙自早至午炙令水  
盡甘草中心見水潤為透細剉却用無灰好酒二小杯入  
甘草煎至一杯溫服之二三服便可保無虞此病初發如  
松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃子即破若破  
難治此藥雖不能消過二十日後必盡消矣投兩服亦無  
害林判院嘗患此癰已破服此藥兩服瘡即合甚妙  
四騎馬癰用大粉草帶節四兩長流水一碗以焯浸水盡  
為末入皂角灰少許作四服湯調頓服立效

青皮湯治便毒

青皮 防風 當歸身 甘草稍 主各

右咬咀分作四服水一小碗煎至八分去粗大溫服空

心日進三服

毒腫或着陰卵或偏着一邊痛牽引小腹痛不可忍方



內疎

癰疽雜病  
毒引小瘰  
王燭散  
即四物湯調胃承  
氣湯各半服之也

又方

劉寄奴 王不留行 大黃 金銀花

木鱉子

右等分酒水煎露一宿五更服

便毒初起

射干 生薑如指大

右取順流水煎微沸服之以瀉為度又用牛皮膠醋煮

塗患處

已結成膿者

大黃 枳實 厚朴 甘草節

連翹 桃仁泥 生薑

八皆熟藥末元 甲

右作一貼煎服之

又便毒

青皮 白芷 柴胡 赤芍藥

檳榔 朴硝 烏藥 木瓜

大黃 連翹 瓜蒌 生地黃

甘草節 三稜 蓮木 黃芩

犀角 皂角刺

右咬咀水三碗煎至一碗大飢服以瀉為度

便毒取大蜘蛛一箇研細熱酒下

又方用甘草節白芷黃連各等分如破者龍骨白枯禁

赤石脂并用鐵圍散癰疽腫毒亦治用之效

乳香 沒藥 大黃 黃連

黃栢 南星 半夏 防風

雜方

羌活 皂角刺 木鱉子 瓜蒌

甘草節 草烏尖 阿膠

右為細末醋調成膏以石器內火熬黑色驚翎傳之

貼骨癰

諸瘡大痛不辨肉色漫腫光色名附骨癰如神三生散

露蜂房 蛇退 頭髮洗淨

右燒灰存性研細酒下三錢

附骨癰熱在血分之極初發時以青皮甘草治之破後

當養血

內癰有三

肝滿腎滿肺滿皆實即為腫王註云滿謂脹氣肺之癰

喘而兩肋滿如木帶燥吐痰肝癰兩肋滿臥則驚不得

小便腎癰脚下至小腹滿下○千金云腸癰之瀉病小

入醫學類卷九 聖

腹痛強按則痛便數似淋仲景云腸癰小腹痞堅蓋小腹

痛而痞堅者腸癰也小便數而似淋者腸癰也即肺癰肝

胃脘癰人迎脈逆而盛全文見後

肺癰腸癰胃脘癰

肺癰須先解表今表而出之

欬唾膿血其脈數實者為肺癰若口中欬即胃中隱痛

脈反滑數此肺癰也

問曰病者欬逆何以知其肺癰當有膿血吐之則死其脈

何如曰寸脈微而數微為風數為熱微則汗出數則惡寒

風中於衛呼氣不入熱逼於榮吸氣不出風傷皮毛熱傷

血脈風舍於衛其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多吐濁沫

時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌

法



可救膿成則死 問曰振寒發熱寸脈滑數其人飲食起居如故此為癰腫醫反不知以傷寒治之不應何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胃中者為肺癰其脈數欬吐有膿血設膿未成其脈自數緊去但數為膿已成也

先解表  
次取膿  
終掃膿

小青龍湯方見傷寒論

葶藶大棗瀉肺湯治肺癰喘不得臥

水三升入棗先煮取二升去棗入葶藶又煮一升頓服

之及曰治肺癰胸滿脹一身并面目浮腫鼻寒涕出

不知香臭酸辛咳逆上氣喘鳴迫塞用前方三日一劑

可至三四劑須先與小青龍湯一劑乃與之

桔梗湯治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥

臭久久吐膿如粥者肺癰也

桔梗 甘草 各一兩

水三升煮取一升去渣分溫再服則吐膿血也亦治喉

痺三因甘草倍之每四錢名四聖散千金亦名桔梗湯

用桔梗三兩甘草二兩服後必吐膿血

葶藶湯治肺癰又云一本治欬有微熱煩滿心胸甲錯

葶藶切三升 薤白仁半 冬瓜仁半 桃仁五十枚

水一斗先煮葶藶得五升去粗入諸藥取二分溫五

服當吐如粥千金云肺癰當吐膿血葶藶切三升

治吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入男子

髮灰研細入和之清米飲下可除根只兩服亦治吐血消

散方刺芥川芎羌活人參茯苓國藥防風藜香蟬蛻各二錢厚朴陳皮各半兩為末是也

獨行方治心胃甲錯為肺癰黃昏湯主之用夜合皮

葶藶大棗瀉肺湯治肺癰喘不得臥 葶藶切三升 薤白仁半 冬瓜仁半 桃仁五十枚 水一斗先煮葶藶得五升去粗入諸藥取二分溫五服當吐如粥千金云肺癰當吐膿血葶藶切三升

取膿

如聖丸治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨悶及肺癰

喘嗽唾膿血胃滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣臭腥久久

咯膿狀如米粥

右為細末煉蜜丸每兩作二十九每用一丸嚥化

濟生桔梗湯治肺癰心胃氣寒咳嗽膿血心神煩悶咽

乾多渴兩足腫滿小便赤黃大便多澀桔梗貝母川歸瓜

葵仁枳殼薤白仁素白皮防風已上各一兩生甘草杏仁

蒸百合各半兩黃芪一兩半右修事吹咀每服四錢水一

碗半生薑五片煎至八分去渣服若大便秘加大黃小便

秘加木通

桔梗白散治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾

腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗 貝母各三 巴豆一分去皮

右三味為散強人飲服半錢七歲者減之病在膈上者

吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一碗則定此

要醫方丹溪不刪採用

肺癰醫元戎搜風湯吐之搜風湯

治肺癰吐膿血作臭氣胃乳皆痛升麻湯

川升麻 桔梗 薤白仁 地榆

牡丹皮 芍藥各半 甘草分



補養方

右劉翁末每一兩水一升半薑五片煎去渣日三服  
濟生排膿湯治肺癰得吐膿後以此排膿補肺生綿芪  
二兩細末每二錢水一碗煎一半服 肺癰收斂瘡口止  
有合權樹皮白欬煎湯飲之

肺癰已破入風者不治 腸癰千金謂要治必殺人腸癰  
為病小腹重而強按之則痛便數似淋時時汗出復惡寒  
身皮甲錯腹皮急如腫狀其脈數者小有膿也巢云洪數  
者已有膿脈若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲  
或透臍生瘡或膿自臍出或大便出膿血

脈問曰羽林婦病何以知腸有膿師曰脈滑而數滑則為  
實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮  
衛相干血為敗濁小腹痞堅小便或澀或自汗出或復惡  
寒膿為已成設脈遲緊則為瘀血血下即安

身熱脈數者  
附子炮二 敗醬五分 薏苡仁錢一  
右為末每服方寸匕以水二合煎頓服小便當下二因  
薏苡仁附子同煎敗醬用一兩一分每四錢水一盞半  
煎七分去查空心服

大黃牡丹湯治腸癰小腹痞堅或偏在膀胱左右其色  
白堅大如掌熱小便自調時自汗出脈遲緊者未成膿可  
下之當有血脈數膿成不復可下

大黃四兩 牡丹皮三兩 芒硝二兩 冬瓜仁升一  
枳仁五十

右咬咀水五升煮一升頓服當下膿血剛繁用芒硝半  
合瓜子五合劉涓子用硝石三合煎後同名瓜子湯三

因用大黃枳仁各二分瓜子三分牡丹皮一錢硝石二錢  
劉散作一貼水二盞煎至八分去查入硝再煎沸頓服  
無時

薏苡湯治腸癰腹中痛煩躁不安或脹滿不食小便澀  
婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑是者便可與或有  
差亦無妨薏苡仁五兩牡丹皮桃仁各三兩瓜子仁四兩  
劉散每四大錢水盞半煎七分服姚氏去桃仁用杏仁崔  
氏加芒硝二兩千金方同

醫案曰女子腹痛百方不治脈滑數時作熱腹微急孫診  
曰腹痛脈當沉細今脈滑數此腸癰也以雲母膏一兩作  
丸如桐子大以牛皮膠烱溫酒調膠水下九子藥餌時服  
盡膏下膿血一盆而安

灸法屈兩肘正肘頭銳骨是穴灸百壯下膿血而安

王氏餘話有婦人腸中痛不可忍大便自小便出李生診  
之曰扎脈見於陽部此腸癰也乃出雲母膏作百十九煎  
黃芪湯吞下利膿血數升而安李曰寸扎積血在胃關扎  
為腸生癰也李乃揚吉老之壻棄舉業習醫官取醫博士  
內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰  
受之七情者臟腑受之宜其發在腔子而向裏非干腸胃  
盲膜也謂之內者以其視之不見故名焉

右腸癰五方丹溪先生所集也前三方內其要畧一方  
元本雖云內有癰膿然先生不言之而又連千金二因  
二方置於篇首者蓋亦腫瘍瀉利例也後二方用膠烱  
黃芪煎湯吞藥者蓋亦潰瘍補例也

帝曰人病胃脘癰者診當何如岐伯曰診此者當候胃  
脈其脈當沉細沉細者氣逆也

診

清癰補

例



勞

盛則熱人迎者胃脈也逆而盛則熱聚於胃中而不行故胃腕為癱也

射干湯治胃腕癱人迎脈逆而盛嗽膿血榮衛不流熱聚胃口成癱

射干毛

梔仁

赤茯苓皮

升麻各一兩

赤芍藥一兩

白朮半兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去查入地黃汁一合蜜半合再煎溫服不計時候

復元通氣散治諸氣逆耳聾腹癱便癱瘡疽無頭止痛消腫

青皮 陳皮各四兩 甘草三寸生 川山甲炮 瓜蒌根各二兩 金銀花一兩 連翹一兩 右為細末熱酒調下

青皮

陳皮

甘草

川山甲

瓜蒌根

金銀花

連翹

右為細末熱酒調下

八醫學綱目卷之十九

四六

腸癱大腸有熱積死血流注桃仁承氣湯加連翹秦艽

近肛門破入風者難治用防風之類 大凡破傷風在

頭面則以白芷為君防風頭佐之蓋去頭面皮膚之風故

也在身體及四肢則以防風為君隨身稍用下部則以獨

活佐之 肺癱吐膿後其脈短而滑者自痊浮大者難治

其面色白而反赤者此火之尅金皆不可治

金匱方論曰熱在上焦者因欬為肺痿肺癰之病何從得

之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便數或從便難又

被快藥下利重亡津液故寸口脈數其人欬口中反有濁

唾涎沫者為肺痿之病若口中辟辟燥欬即胃中隱隱痛

脈反滑數此為肺癰欬唾膿血脈數虛者為肺痿數實者

為肺癰

按此言肺痿屬熱如欬久肺傷聲啞聲嘶咯血此屬陰

虛火熱甚是也本論治肺痿吐涎沫而不欬者其人必必眩多涎唾用灸甘草湯此補虛勞也肺痿吐涎多心中濕液者用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同是皆宜分治之故肺痿又有寒熱之異也

勞傷血氣騰理虛而風邪乘之內盛於肺也則汗出惡

風咳嗽短氣鼻塞項強胃脇脹滿久久不瘥已成肺痿也

肺癰者由食啖辛熱炙煇或酣飲熱酒燥熱傷肺所致

治之宜早

八醫學綱目卷之十九

四

醫學綱目卷之十九







治

人有病面上忽見紅點者多死

丹毒風丹新者為丹毒

賈宅小娘風痒黃精丸四十粒與

白朮分 枳實炒 黃芩錢四

右分八貼下之食前

遍身風痒癢疹交雪花細末酒下一錢立止

鮑允中年五十歲風丹痒甚腹微疼咽不利面身微腫五

六日不退兩寸脉滑大實右浮大左浮弦小以炒茶炒連

歸芍芍地枯草黍粘紫葳各一錢防風黃芪各半錢凡五

六貼而安

河間神佑九治風丹愈而復發或隔一月發或隔半年

愈而復發

六

一人患風丹遍身痒因酒得者

洋葶斛 防風 黃芪 羌活錢三

當歸錢二 乾葛 麻黃錢一 生甘草錢半

治冷丹風

防風 甘草 白姜蚕 鱗膜

川芎 白芷 茯苓 荆芥

陳皮 厚朴 蒼耳子 人參

右為末豆淋酒調二錢

丹痒者用韭菜搽此搗與香油以手摩熱於丹上搯之

立愈出附 治風丹川山甲洗去腥於瓦上炒過存性每

一兩入甘草三錢為末米飲調服 治血風疙瘡瘡癩瘡

浮萍取自然汁豆淋酒下四物浸酒下亦得

用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋刮取塗患處未

瘡更入硫黃少許磨塗之聖惠方

瘡

瘡小癩世謂之熱癩是也王註云大如酸棗或如豈色赤

而內有膿血也

汗出見濕乃生瘡癩為瘡癩也

勞汗當風寒薄為鼓鬱乃瘡 瘡色赤膜內有膿血

旋覆花九

旋覆花兩三 防風 白芷 甘菊

南星 半夏 石膏 川芎

陳皮 白附子各半 蝎梢 姜蚕炒各錢

右細末姜糊九桐子大姜湯下三五十丸食後

瘡

疹似傷寒暴發暴消世訛為瘡子者是也亦似疹而延歲

月或乾濕痒痛不一經所謂癩疹是也癩亦延歲月乾而

不濕痒而不痛是也

疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下

者 疹在表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯

四順飲子虛者補中益氣湯皆同傷寒施治也

治風癩入腹身軀強舌乾燥用蔓菁子三兩為末每服

溫酒下一錢七

運氣疹者有二

一曰熱經云火鬱之發民病瘍瘡又云歲木不及燥乃大

行復則炎暑流火瘡瘍瘡疹又云少陰之復民病瘡疹是

也

二曰風經云歲水不及濕乃大行復則大風暴發肌肉疹

發是也



疥

表

防風通聖散治風熱瘡疥久不愈方見  
朱院君三十餘久患瘡疹身痺而紫色可與防風通聖散加牛旁子為極細末每二錢水盪半入姜汁令辣煎食前熱飲之

麻黃飲治上躄生瘡或痒或痛黃水浸滯結痂推起延蔓於三陽之分根窠小帶紅腫此是濕熱症

麻黃半兩 防風兩 羌活 石膏六錢

黃芩四錢 滑石兩 陳皮 紫葑各七錢

黍粘子七錢 縮砂二錢 蒼耳草三錢 蒼朮兩

生甘草三錢 薄荷葉一錢 荆芥二錢

右咬咀每六錢重水一鍾半猛火煎取六分入好酒四五滴去查熱服須得通身有汗其瘡自安甚者服至百

服之後看汗出到何處若自上而下出過脚腫其瘡自愈

消毒散丹溪云消毒散氣去毒也  
防風兩 甘草兩 荆芥穗兩 黍粘子兩

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分去查食後溫服

初發治皮膚風熱遍身生瘡疹牛旁子浮萍等分以薄荷湯調下二錢日二服

何小官生瘡小便黃用通聖散一錢半煎下黃精九楊三哥女生瘡午後發熱日間惡寒形削食少

白木二錢 連翹錢 煎下黃精九三十粒

每風瘡大風病相似好桑葉洗蒸一宿日乾末湯下二錢七方經方

治風遍身癢疹痛成瘡用白姜蚕少許焙黃細研為

末酒服立瘥

類皇韓吉卿自髀至足生濕腫大者如錢小者如背痒則搔破水到則浸淫狀類重行疥機愈而復生癩瘡成四十餘年不瘥戴人晒之曰此濕濕瘡也

多在水下以舟車濬川大下十餘行一去如掃

瘡入腹亦能殺人用蚕沙濃煎湯洗之

有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連腦脰膺腹及近隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參為丸如桐子大

食後溫水服二十九次日便愈

有樵夫來買苦參欲治疥不識藥性緩急但聞人言可治濃煎一碗服之須臾大吐涎一盆三二日疥作痂矣

一上散治諸般疥瘡或痛或痒或喜湯火烘洗者

蛇床子一兩 黑狗脊兩 寒水石一兩 班毛十四

黃連兩 吳茱萸錢 白膠香一兩 石上硫磺兩

右為細末香油調傅治疥瘡先用蒼耳草或羊不食草

煎煎湯洗去瘡痂然後用煎藥傳可一次愈

小兒面瘡通面爛無全膚膿水流滿百藥不効者陳年瘡

猪油不入鹽者傅之神効兒出小

又諸般疥瘡加減法 腫多加白芷開鬱 痛多加白芷

方解石 痒多加枯礬 陰囊瘡加茱萸濕多香油調

乾痒出血多加大黃黃連猪脂調 虫多加蕪荑錫灰煨

柳藜蘆班毛 紅色加黃丹 青色加青黛 瘡在上多



濕熱 膿胞瘡治熱為主

黃芩 黃連 大黃各三 蛇床子

寒水石二錢 黃丹五分 白礬一錢 輕粉

白芷 無名異各少 木香少前痛

右為細末麻油調塗

教五

又瘡藥膿瘡治熱燥濕為主 虫瘡如癰狀退熱殺虫為主

乾疥瘡開瘡為主加吳茱萸

蕪荑 黑狗脊 樟腦 松香 水銀

白礬 雄黃 硫黃 蛇床子 松皮灰

黃連 方解石 蛇床子 松皮灰

水銀 好茶 間茹 輕粉

右為細末每用不拘多少麻油調塗之

世治疥癬以臘月猪脂不拘多少同生白礬杏仁加輕粉

搗爛擦之除根無復云杏仁輕

治疥亦不問新久方

白蘘荑 檳榔 吳茱萸 硫黃

右為末麻油調搽破瘡之

世治疥殺虫為主

蕪荑 剪草 蛇床子 白礬

明礬 吳茱萸 蒼朮 厚朴

雄黃 寒水石 黃柏 輕粉

世治砂瘡山蟻窠黃荆葉雞毛等分燒存性為末香油

調傳 又方用陳年船底灰搗細篩過桐油調傳立效

又方治砂瘡用水蒿荳蔻灰存性香油調傳立愈水多者

乾傳 水蒿荳蔻如百合狀生水邊

白礬 吳茱萸 樟腦 輕粉

寒水石 蛇床子 黃柏 大黃

硫黃 檳榔 右為末猪脂油調搽

治疥 治癩疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搽之黃水出瘰後復發

取羊蹄根去皮細切熟熬以大酢和先洗淨傳上一時再

以冷水洗之日一傳瘡若為末傳尤妙

蹄根和猪脂塗上或者鹽少許即焦

生瘡疥肉陳煎湯濃洗立安

治痛 有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸而止

粘着衣被曉夕不得睡痛不可忍有下但欲以葛蒲三斗

到日乾之春羅為末布席上使病瘡人恣臥其間仍以衣

被覆之既不粘衣被又復得睡不五七日其瘡如失應手

神驗

浸淫瘡痛不可忍者發寒熱刺刺末水調傳瘡上乾則

易之簡要 治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分

以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌

元希聲侍郎治卒發疥秘驗方石灰隨多少和醋漿水

調塗隨手即滅一法用石灰炒紅出火氣香油調傳

又方淋石灰汁洗之

木香散治多時不斂一切惡瘡此藥能生肌肉止痛

木香 檳榔 黃連 白芷

已上同為細末先洗淨每日一遍乾貼有水出勿怪未

効又貼 又方同上加地骨皮為細末先於瘡口上用

溫漿水洗濕挹乾後上藥治之効不可述醫治下疳瘡



神效

諸瘡癬久年者千年非根炒存性末之猪油調傳三本

手集多年惡瘡不瘥或痛痒生膿研馬糞并齒灰

傳上不過三兩遍效武良相在蜀足脛有瘡痛不可忍得

此方便瘥

風瘡久不瘥燒菘蔞末以傳之按本草即野荑白

痲子茨菰葉陰乾為末傳之

患禿瘡以水研山荳根傳瘡上 患麩豆等瘡以水研

山荳根服少許

連加痒痛搗扁竹封痲落即瘥附後 洗諸瘡疥取冬

瓜藤皮煎湯妙日華 中風犯毒露標木皮煎湯洗妙蘇

運氣浸淫皆屬火經云歲火太過甚則身熱膚浸淫是也

千疥 勞官 太陵

疥瘡頑癬 絕骨 三里各寸 間使 解溪各五

渾身生瘡疥 曲池 合谷 三里 絕骨 行間

癬疥陽谿主之

少陰有餘病皮痺癢全文見

浸淫瘡從口流向四肢者可治四肢流來入口者不可

治

癬

癬瘡用防風通聖散去硝黃加浮萍皂角刺

又方治癬用

浮萍 蒼耳 蒼木 苦參

風熱

浮萍 蒼耳 蒼木 苦參

浮萍 蒼耳 蒼木 苦參

浮萍 蒼耳 蒼木 苦參

黃芩

右為末酒調服或酒糊丸

苦參丸治肺毒邪熱生瘡疥並宜服之以苦參一

味為細末粟米飲丸如桐子大每服五十九空心溫水飲

湯送下

烏頭丸治風癬妙方見紫

何首烏散治脾肺風毒攻腫遍身癩變成癩疹按之成

瘡或肩背拘急肌肉頑痺手足痠裂風氣上攻頭面生瘡

及治紫癩白癩頑麻等風

荆芥穗 蔓荊子 蒺藜 何首烏

甘草 防風 何首烏

右件各等分搗羅為末每服一錢食後溫酒調下沸湯

亦得

癬在脛項間後延上至耳成濕癬他治不應以蘆薈一

兩研甘草末半兩和勻先用溫漿水洗瘡拭上傳之神妙

雙劑

癬瘡方槿樹皮不犯銅鐵每二兩又蘆薈三錢白芨三錢

細研為末刮癬出血用好醋調傳雖痛卻一傳可愈

一方用蘆薈 大黃 輕粉 雄黃

蛇床子 槿樹皮 檳榔

右先刮破癬用醋調藥末塗之

頑癬用槿樹皮加巴荳班毛為細末又加生硫少許水

調傳

治牛皮癬用清香油一兩入全蠟七枚巴荳二十枚班

毛十枚同熬候色焦者先去之去了入黃蠟一錢候滾收

起朝擦瘡愈不損皮肉



又方綠籬根不拘花椒一信烘防風兩  
 江子樹五白芩兩百部兩白欬兩  
 右各為末和綠籬根搗熟成團將藥於癬上擦之候痛  
 過洗浴

又方一味綠籬根去粗皮取細皮貼肉者搗爛用醋調塗  
 癬上立愈

乾癬積年生癩搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末  
 塗之聖惠外臺用斑毛半兩炒為末蜜調傅上

治癬用熟蘆細搗為末生油和傅之  
 治癬亦久不瘥羊蹄根搗絞取汁用膩粉少許調如膏  
 塗傅患處三五遍即瘥如乾即用猪脂調和傅之

相脂膏治乾癬  
 栢油斤黃蠟半杏仁四十五粒剉碎朴硝一

右件相和於鐵器內用老生姜葱白三根一順攪五七  
 次煎沸濾過成膏於瘡上搽之

取楮皮枝中白汁塗癬甚妙  
 治癬濕痒用楮葉半斤細切搗傅癬上

治五種瘡癬以韭根炒存性旋搗末以猪脂調傅之三  
 五度瘥又方患癬搗山荳根末臘月猪脂調塗之

祛濕散治多年濕癬大有神効  
 蚕沙兩薄荷兩

右為細末每用不拘多少乾摻於瘡上或用生油調搽  
 一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至膝發痒

時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流又痛不可忍灸熨  
 溲硫黃蘭茹白姜蚕羊蹄根之藥皆不効其父母求瘡於

戴人戴人曰能從予言則瘥父母誥之以鍼針磨尖快當

其痒時於癬上各刺百餘針其血出盡煎鹽湯洗之如此  
 四次大病方除此方不盡以告後人恐為癬藥所誤濕滯  
 於血不可不從者矣

紫白癩風白禿  
 龍蛇散治風虛頑麻遍身紫白癩風癢痒痛者

白花蛇去骨黑梢蛇去骨草薢天麻  
 黃芪金毛狗脊自然銅骨碎補

楓香研地龍草烏頭鹽水浸對  
 乳香沒藥各三麝香二

右細末酒糊丸桐子大每服十五丸酒下食後為末酒  
 調亦得

加減何首烏散治紫白癩風筋骨疼痛四肢少力眼斷  
 腫人鼻樑崩塌皮膚疥癬手足皸裂睡臥不安行履艱難

何首烏蔓荊子石菖蒲荊芥穗  
 苦參葳靈仙甘菊花枸杞子各一

右為細末每服三錢茶調下不拘時  
 治白癩用馬鞭草不限多少為末每服食前用荊芥薄

荷湯調下一錢七  
 治宿患風癬遍身黑色肌體如木皮膚粗澁及四肢麻

痺宜服烏頭丸  
 草烏頭一斤入竹籬內以水浸用瓦片於籬內就水中

瀧洗如打菱角法宜候瀧洗去大皮及尖控起令乾用  
 麻油四兩鹽四兩入銚子內炒令深黃色傾出油只留

鹽并烏頭再炒令黑色烟出為度取一枚劈破心內如  
 米一點白恰好如白多再炒起熱取羅為末用醋糊丸

如桐子大每服三十九丸空心晚食前溫酒下真州資福



辨方

廉文雅白老有此疾服數年黑點頓除脚力強健視聽不衰有一宗人遍身患紫癩風身如黑履踰年體悅澤予服之一年諸風疥癩皆瘥性寒熱雖云去毒要之五七日作烏頭粥啜之為佳湯法用藥草集中有佳

紫白癩風貝母為末以胡桃肉蘸洗浴後擦之神効又方以信石好者為上研極細用真香油調如薄粥過一宿取清油傅之愈 又方用金獅草搗碎擦之累効

又方杜大黃 飛礬 右肥皂為丸擦之

白禿 松香 蕪荑 黃丹 光粉 枯礬

胡坏 右末香油入姜汁少許調傅上

辨方

又法直兩乳頭以篋量過當兩膈脈絡上灸之膈絡脈俗呼為蝦蟆穴也

面瘡

八腎

辨方

治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺用盡藥不動者惟有此藥可治神妙不可言每以少許臨臥時洗面令淨如面油用之數日間瘡腫處自平赤亦自消如風刺粉刺一夕見効仍塗藥勿近眼處

生硫黃 香白芷 瓜萎仁 膩粉各半

全蝎 彈蛇 芫菁 芫菁 芫菁

右為細末麻油黃蠟約度如合面油法火熬溶取下離

火入諸藥在內每用少許塗面上

面瘡水調平胃散塗之

治臉上熱瘡涎出以蒲黃傅上瘡

洗面藥方治面有黑點或生瘡及粉刺之類并去皮膚

燥痒垢膩潤澤肌膚

皂角 糯米 棗 芫菁

栳實子兩 三奈子 縮砂連皮 白芨二兩 肥

甘松 升麻兩 白丁香 白丁香 白丁香

右七味同為細末訖和棗荳糯米粉及皂角末一處攪

勻用之効

面油摩風膏

麻黃分 升麻根二錢 羌活去皮 防風二

歸身錢 白芨錢 白檀分

右以綿裹定前藥於銀石器中用油五兩同熬得所澄

清去查以黃蠟一兩再煎熬為度

瑩肌如玉散

白丁香 香白芷 升麻兩 白芨兩

麻黃二錢 白牽牛兩 當歸兩 白附子二錢

白蒺藜兩 栳實子錢 白茯苓錢 連翹半

白欬兩 小椒兩

右為細末每用半錢多少洗之

塗點不令生瘡

猪苓 麻黃 桂枝 白蒺藜

白附子 連翹 防風 香白芷

白欬 當歸身 升麻根 白芨

右等分為細末洗面用之臨臥唾調少許塗面上

瘡面多疔點如雀卵色以殺羊膽一枚酒二升煮三沸

塗拭之三日瘡 治面上粉刺搗兔絲子絞汁塗之

白附丹治男子婦人面上黑斑點

白附子兩 白芨 白欬 白茯苓

蜜陀僧 白石脂 定粉各等

右為細末用洗面藥洗淨臨睡用人乳汁如無用牛乳



或雞子清調和丸如龍眼大膏乾逐旋用溫漿水磨開傳之

癩頭瘡

風熱

防風通聖散為末酒浸焙乾九三次食後白湯調服日三服至頭有汗効

濃煎鹽湯洗三五日一洗用一上散傳之久年不愈神効

用好紫霄炭燒通紅入水研之又燒又焯以水熱為度取所焯之水日日洗之使熱毒宣發而愈外以胡荽子伏龍肝懸龍尾屋梁塵也黃連白礬為末調傳又服酒炒通聖散効

一方單用黃連末傳之累効

口瘡唇瘡

大醫綱目卷三

五

王四叔公口瘡舌強多痰

白朮

甘草稍

人參

赤芍藥

木通

生地

黃連

瓜蒞子

右作一貼煎

黃連升麻湯口舌生瘡

升麻

黃連

右為細末綿裹含津嚥

治口瘡黃柏炙同細辛各二錢研極細傳之噙少時當

滿口有涎吐之少刻又傳又噙如是五七次立愈千金方北治

綠袍散

治大人小兒口瘡多不効者

黃柏

甘草

青黛

右先取二味為末入青黛同研勻乾貼

黃柏皮蜜炙與青黛各一分同為末入生龍腦一字研勻治心脾熱舌賴生瘡常搽瘡上有涎即吐之

蜜相散治口瘡久不愈者用黃柏不計多少以蜜炙灰色為細末乾搽上臨臥忌酒醋醬犯之則瘡難愈

好酒煮黃連呷下立愈

治膈上熱極口舌生瘡

膩粉

杏仁

右二味臨臥時細嚼令涎出則吐之用溫湯嗽口未痊可又用

治口瘡以舊穢根避風處打去上煮濃汁溫含冷易之

五倍子治口瘡以末搽之便可飲食

治口瘡以膽礬一塊用百沸湯泡開含漱一夕可瘥八分一方用白礬湯嗽口亦妙 凡口瘡用西瓜漿水瘡

其者以此徐徐飲之冬月無留皮燒灰噙之

治口瘡以好墨研蠶蝨極細傳之立効胡氏 蠶蝨走小腸

勝壯甘効甚捷因力峻氣猛陰虛氣上致瘡者戒勿用惟

體實有熱在上焦者用之如神

治一男子病口瘡數年上至口中至咽嗝下至胃脘

皆痛不敢食熱物一涌一泄一汗十去其九次服黃連解

毒湯不十餘日皆釋

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上先用理

中湯甚則加附子

治滿口生瘡此因虛壅上攻口舌生瘡

草烏 南星 生姜

右焙乾為細末每服二錢臨臥時用醋調作掩子貼手

足心來日便愈



廣用

口瘡以遠志醋研細毛掃患處出涎  
治口臭生瘡用生薑一塊臨睡時細嚼含睡不得開口  
出氣眠着不妨睡覺咽下

治少陰口瘡半夏散聲絕不出者是寒過絕陽氣不伸  
半夏製一兩桂烏頭各一字同煎一盞分作二服 治太

陰口瘡甘藷散以甘草二寸白礬粟子大含化咽津 治  
赤口瘡乳香散以乳香沒藥各一錢白礬半錢銅絲少許  
研為末搽之 治白口瘡沒藥散以乳香沒藥雄黃各一

錢輕粉半錢巴豆霜少許為末搽之  
運氣口瘡有二

運氣

一曰熱經云少陽司天火氣下臨肺氣上從口瘡是也

二曰寒經云歲金不及炎火乃行復則寒雨暴至陰厥且  
格陽反上行病口瘡是也

雜方

治口瘡猪蹄殼燒為末傅之 治口瘡與走  
馬疔茄蒂中木去皮燒存性入少白梅灰與少藥細末傅  
之立安

紅芍藥散  
心病口瘡 紫桔紅蒼 三錢四兩 五服安康  
右件紫莖桔梗紅芍藥蒼朮各等分為細末羊肝四兩  
批開搽藥末三錢用麻扎定火肉燒令熟空心食之大  
効白湯送下

主小兒口瘡通白者及風疔瘡腫透者以白姜香炒令  
黃色拭去蚕上黃肉毛為末用蜜和傅之立効

主口內熱瘡以古文錢二十文燒令赤投酒中服之立  
瘡

口舌生瘡胸膈疼痛用炒鼓細末含一宿便瘡

治口瘡用縮砂不拘多少火煨為末搽瘡即愈  
用柘柳燒灰存性為末入輕粉傅之

治口瘡取桑樹汁先以髮拭口即以汁傅之  
化毒法凡口瘡無問新舊遇夜臥將自己兩丸以手搥  
緊左右交手搥三五十遍但遇夜睡覺行之如此三五度  
因酒而生者一夜愈久病諸口瘡三二夜愈如鼻流清涕  
惡寒者搥二九向上搥之數夜可愈

唇瘡以饒上滴下汗傳之累効如神  
多効散治唇緊瘡及疹  
訶子肉 五倍子 各等  
右為細末乾貼上効  
唇黃泡腫烏頭炒灰研香油調傅之 唇上生瘡  
連年不瘥以八月藍葉一斤搗取汁洗之不過三日瘥

唇瘡

唇上生瘡用白荷花瓣貼之神効如開裂出血者即  
止

口瘡 承漿 合谷 人中 長強 海泉 三棱出血  
穴 金津、玉液 各出

又方 委中 後谿 補此二穴乃心火  
又法 膽俞 小腸俞 各灸七壯 太衝 勞宮  
牙疳瘡

神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕斷肉將脫  
牙落血出不止

黃連 去淨一  
縮砂仁 兩  
甘草 三  
藿香葉 錢一  
生地黃 酒浸 錢二  
木香 錢一  
升麻 錢二  
當歸身 錢一  
藜蘆 如無藜蘆香  
右為細末水浸蒸餅為丸藜蘆大每服一百丸加至二

針灸

神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕斷肉將脫  
牙落血出不止

黃連 去淨一  
縮砂仁 兩  
甘草 三  
藿香葉 錢一  
生地黃 酒浸 錢二  
木香 錢一  
升麻 錢二  
當歸身 錢一  
藜蘆 如無藜蘆香  
右為細末水浸蒸餅為丸藜蘆大每服一百丸加至二

神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕斷肉將脫  
牙落血出不止

黃連 去淨一  
縮砂仁 兩  
甘草 三  
藿香葉 錢一  
生地黃 酒浸 錢二  
木香 錢一  
升麻 錢二  
當歸身 錢一  
藜蘆 如無藜蘆香  
右為細末水浸蒸餅為丸藜蘆大每服一百丸加至二

神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕斷肉將脫  
牙落血出不止

黃連 去淨一  
縮砂仁 兩  
甘草 三  
藿香葉 錢一  
生地黃 酒浸 錢二  
木香 錢一  
升麻 錢二  
當歸身 錢一  
藜蘆 如無藜蘆香  
右為細末水浸蒸餅為丸藜蘆大每服一百丸加至二

神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕斷肉將脫  
牙落血出不止



百九止白湯下食後服兼治血痢及下血不止血下褐色或紫黑色及腸澀下血空心米飲送下其脈洪大而緩及治麻木厥氣上衝逆氣上行腰間者

耳內瘡

少陽 黍粘子湯治耳內痛生瘡

- 桔梗兩分
- 柴胡三分
- 連翹二分
- 黃芩二分
- 黍粘子二分
- 紅花少許
- 歸稍二分
- 生地黄二分
- 蒲黃一分
- 甘草一分
- 黃連二分
- 草龍膽一分
- 昆布一分
- 黃芪三分
- 蘇木一分
- 桃仁錢
- 生甘草一分

右件到如麻荳大作一服水二大盞煎至一盞去查稍熱服食後忌寒藥利大便

少陰

治耳內生瘡者為足少陰是腎之經也其氣通於耳其經虛風熱乘之隨脈入於耳與氣相搏故令耳門生瘡也

曾青散主之

- 雄黃七
- 曾青兩
- 黃芩二錢

右件搗為細末研勻每用少許納耳中有膿出即以綿杖子拭乾用之

黃連散 黃連兩 白礬七

右搗為細末每用少許綿裹納耳中

腎臟風陰瘡

四生散治癩風上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下注陰濕四散搔痒通體生瘡及婦人血風等症

- 白附子
- 茯苓
- 黃芪
- 羌活

右為末每服二錢鹽酒調下有一人將猪腎破開入鹽搽藥煨亦妙類屬宗筋胃陽明養之故有是証

治腎臟風凡指縫白者只一二服効

- 黃芪兩
- 木通
- 甘草
- 黑牽牛兩

右四味細到用斑毛七枚去翅同藥炒焦黑去斑毛餘為末蒸餅糊為丸如桐子大空心鹽湯下三十九

治腎臟風上攻下注生瘡并癩烏頭丸

川烏兩 草烏一兩二味以黑荳半升 天麻 地龍去 白附子各半

右為末酒糊為丸如桐子大每服二三十九空心食前鹽酒鹽湯任下

有一婦人患臍下腹上連二陰遍滿生濕瘡狀如馬刀他處並無熱痒而痛大小便泄出黃汁食亦減身面浮腫

醫作惡瘡治用鰻鮓魚松脂黃丹之類塗瘡上愈熱痛甚治不對故也細問之此人嗜酒食鴨喜魚鱗發風等物急

令用溫水洗拭去膏藥尋馬齒見四兩研碎入青黛一兩再研勻塗瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八正散日三服

發散客熱每塗藥一時久即乾又再塗新濕藥如此二日減三分之一五日減二自此二十日愈既愈乃問曰此瘡

何緣至此曰中下焦風熱毒熱氣若不出當作腸癰內痔仍須藥酒及發風物後不能禁酒果患內痔

陰囊瘡蠟面茶末之先以甘草煎水洗後傳上妙鏡

治丈夫陰下濕痒蒲黃末傳之良

除瘡人屎燒灰傳之安

腎臟風甘草節湯洗極効



腎臟風痺不可當者吳茱萸蛇床子等分煎湯洗神効  
治腎臟陰汗生瘡用莧菜根莖葉燒灰存性研細拆破俾  
之立愈又蒼耳草蛇床子煎湯洗之良

治男子婦人陰部濕淹瘡

五倍子細研五分白礬一分 銅綠少許 輕粉字

乳香分五

右為極細末洗淨搽之

治陰瘡痒痛久不止

銅錢枚百 烏梅枚七 鹽二

右水一碗半煎至一碗洗之無不効驗

腎臟風瘡 血部即百重藥右膝內毒

腎臟風瘡 血部即百重藥右膝內毒 三陰交

下疳瘡

針灸

有一隣人三十餘性狡而躁素患下疳瘡或作或止夏  
初患白痢隔上微悶醫與理中湯四貼昏悶若死片時而  
甦予脈之兩手皆瀆重取畧弦似數予曰此下疳瘡之深  
重者與當歸龍薈丸去癆四貼而利減與小柴胡去半夏  
加黃連芍藥川芎生薑煎五六貼而安 一男子近三十  
歲有下疳瘡雖屢求治以其不能忌口却之忽一日頭痛  
發熱自汗衆作傷寒陽証治之反劇予診其脈弦甚七至  
重按則澁予曰此症在厥陰藥與症不相應遂作小柴胡  
湯加草龍膽黃連胡黃連帶熱服四貼而病脫然 治男  
子耻瘡或痛在莖之竅或痛在莖之標皆手足大陽不利  
熱毒下傳入于足厥陰故變紫黑色作蝕瘡毀其莖而死  
宜以子和泄水丸散導其濕毒無不愈者若已成瘡先泄  
其根次從標而治外以葱白煎汁漂洗拭乾以黃連木

香蜜陀僧乾胭脂之類細末搽之如內潰膿不出以追膿  
散上之又用于和泄水丸如後屢屢少可用黃連木香朋  
脂等貼之

泄水丸一名大智丸

大戟 芫花 甘遂 海藻洗

海藻洗 郁李仁 續隨子已上各

樟柳根兩一

右為細末水煮棗肉為丸如小葶大每服五七十九熟  
水下

治下疳瘡先用張子和泄水去根後用此藥乾上

黃連 滑石各半 定粉錢 輕粉少

乳香錢 蜜陀僧錢 輕粉少

右細末乾上或加乾胭脂或加木香檳榔

下疳瘡

蛤粉 臘茶 苦參 青黛

蜜陀僧 右用臘脂調塗河水洗淨并治膿瘡

又方 青黛 海蛤 蜜陀僧 黃連

右為末傳上

一切熱毒惡瘡及下疳瘡用蜜陀僧黃柏皮末各一分

半膩粉一錢麝香少許先洗瘡拭乾傳之甚者三四次

治下疳瘡雄黃黃連等分為末濕者乾搽乾者油調傳先

用荆芥射干煎湯洗却傳之妙一方用地骨皮末傳神効

追膿錠子膿內潰不出以此藥追之

雄黃錢 巴豆半錢 輕粉字

嘗治一男子下疳瘡每恣飲酒則發醫與小柴胡湯加

補虛

取膿

取膿



黃連敷貼不効又與玉燭散下之反劇予以甘草節小建中各半煎湯服之下咽痛止後以四物湯建中甘草等分與之漸安

**敷貼** 陰頭瘡蜜煎甘草傳之安外臺 又方用頭髮以鹽水洗淨去油再用米泔洗淨又用清湯洗晒乾燒灰傳瘡上便結廕

便結廕

若耳葉為末擦之

治下疳瘡黑形兔為末傳上神効一名烏吊上

治下疳瘡久不愈橡斗子二箇各盛黃丹令滿相合以亂髮纏定燒烟盡為度同研為末先以葱白熱漿水洗瘡膿盡次上藥甚者不過三次如神

瘡人陰生瘡膿出成坎取高昌白礬麻仁等分研煉猪脂相和成膏槐白皮作湯洗瘡拭令乾即塗膏然後以楸葉貼其上不過三五度瘡

下疳瘡用五倍子末傳之

婦人陰瘡

少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕爛者狼牙湯洗之川狼牙二兩以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯

源陰中日三遍

洗相散治陰蝕瘡

甘草一兩 乾漆一兩 黃芩 當歸

地黃 芍藥各二兩 龜甲五兩

右細切以水七升煮取一半去查以綿帛內湯中用桐瘡處良久即易日二度每桐湯可作十里許即把乾檢取汁濕散薄傳瘡上使徧可經半日又以湯榻榻訖如前傳藥

有一婢生此疾蝕處作兩瘡深半寸用此洗桐湯并後甘濕散不經七日平復甚効

甘濕散

蝕蛇膽 青木香 石硫黃 鐵精

麝香各四分 隨時入用 絲射麻毒 若先以相和蛇胆即無力也

右各等分為末更研細有患取如三棊子大和井花水日再服訖先令便利了即以後方桃枝煎下部訖然後取藥如棊子安竹管裏內入下部中日再度老少量減其黃法每日一度不用再

桃枝煎法取東南桃枝五七枝輕打頭使散以綿纏之又搗石硫黃為末將此綿纏桃枝撚轉之令末少厚又截一竹筒先內下部中仍以所撚藥桃枝燒熱薰之

女子陰瘡硫黃末傳之

蛇床子散濕陰中主藥用蛇床子仁一味末之以白粉少許和令相得如棊大綿裝納之自然濕散

氣 連氣陰瘡皆屬寒經云太陽之勝陰中乃瘡隱曲不利治以苦熱是也

瘡

治瘡極妙地骨皮一斤黃柏皮二兩劉為粗末用香油一斤半煎過藥油六七兩入淨松香二十兩黃丹二兩同煎候黃丹微黑色却入輕粉七角光粉二角煎法皆如煎膏法用長條紙拖過掛乾用若此瘡紫黑先用三稜針去惡血以冷水洗淨隨瘡大小剪膏藥掩上用絹帛緊扎縛俟一周時再換膏藥換時須用冷水洗瘡不過數換不問新久即愈須忌日氣火氣陽氣倘換膏藥再看如有黑腫未盡可再出血以紫黑血盡為度

醫學綱目 卷二〇



治瘰癧用糯米泔嗽口過洗瘡拭乾却以地骨皮為細末  
蜜調傅瘡上又以油紙縛之

治瘰癧

白膠香兩 黃柏兩 軟石膏一兩 研青黛兩  
龍骨五

右為細末以香油調傅患處

又方羯羊屎二分石膏一分赤石脂半分為細末香油和  
之舊黑油傘紙作隔膏縛之除根

翠玉膏治瘰癧

瀝青兩 黃蠟 銅綠各五 沒藥三

右件先將銅綠為細末入香油調勻又將黃蠟瀝青火  
上溶開次下油銅綠火上攪勻將沒藥等三味旋旋入  
攪勻用河水一碗將藥傾在內用手扯拔勻油紙裹看

瘡大小分大小塊口嚼捻成餅子貼於瘡上紙封三日

易之

瘰癧用砂糖水煮艾青葉三五沸撈起石壓乾將藥貼  
在瘡口上一日換二遍 腳痛成瘡水煎煎湯洗瘡候乾  
自安

瘰癧用韭汁洗淨搥乾剉虎骨傅上

二妙丸治下焦濕瘡但是下焦有 潛行散末蒼木末

各等分煉蜜為丸桐子大

治兩脚脚膝生瘡局方虛損門服黃芪九立安

黃芪丸

川烏頭炮去 地龍炒土 茴香炒  
杜蒺藜炒去 赤小豆 防風去芦 黃芪一兩  
烏藥兩

右為細末酒煮麩糊為丸如桐子大每服十五丸溫酒  
下鹽湯亦得婦人醋湯下並空心服

脚氣瘡足跟瘡

捷應散治脚濕氣成瘡痒不可當爬之流黃水用羯羊  
糞曬乾為末安於瓦上手把竹柴火燒作灰又研細先用  
葱椒湯洗之次用香油調厚傅上山茶花葉卷之帛縛  
四五日即可

脚上爛瘡久不瘥先以酸漿豆腐水洗三二次尋懸鈎  
担葉地暴扭葉搗細入鹽些少盒之地暴扭葉即覆盆子  
葉也

足跟瘡久不愈毒氣攻注用白木為細末先以鹽漿水  
溫洗乾貼二日一換可以負重涉險

凍瘡

針灸

子細經曰寒瘡流水俗呼為凍瘡或經年不愈者用野中  
爭土晒乾以大蒜研如泥捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡  
口大小貼之以艾火加於餅上灸之不計壯數以泥乾為  
度去乾餅子再換濕餅子灸不問多少直至瘡加覺痛痒  
是瘡可治也然後口含漿水洗漬用雞翎二十莖縛作刷  
子於瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也以軟帛拭  
乾用木香檳榔散傅之如夏月醫之更妙

足跟紅腫凍瘡 足跟左足指面後跟赤白肉際骨下  
莊

足跟凍瘡潰破用椒葱湯洗刮去腐肉用三稜針出血將  
馬尾物入生牛骨髓調和傅之効

雜方

治凍瘡用茄根燒灰洗了用雀兒腦髓塗之  
取臘月牡鼠死者一枚油一大升煎之使爛絞出查



再煎成膏塗瘡及折破瘡

治凍瘡用煎熟桐油蜜陀僧傳

止痛  
用五倍子煎湯洗

如神散治凍瘡皮爛不可忍用川大黃不拘多少為細末新水調掃凍瘡上痛止立効

治凍瘡痛者橄欖核燒存性為末用香油調塗患處其痛隨愈

戴人女僮是有凍瘡戴人令服舟車丸瀦川散大下之逆愈人或疑之戴人云心火降則寒消何疑之有

手足皸裂脚縫爛

潤肌膏治手足皸裂皮膚裂開疼痛不能見風

珠子瀦青兩白黃蠟八乳香錢

右三味於鐵器內用文武火熬下瀦青在鑊內隨手便

雜方

下黃蠟乳香次入清芝麻油一二匙候瀦青盡溶開微

微熬動放大淨水一盆於其傍以攪藥用匙取一二滴

滴於水中試之如硬再入油如軟硬合宜用新綿搥淨

入水中折疊扯之以白為度油當旋旋入勿令軟了以

磁器內盛之或油紙裹亦得每用不拘多少先於火上

炙裂子口却捻合裂子藥亦火上炙軟塗於裂子上用

紙少許貼之自然合矣

老人路次方城北獨樹店之客舍有推小車者皮膚皸

裂甚痛兩手不能執轆足不能履地而車上宿制此藥傳

之即効明日遂行自後屢用屢効故錄於此

治手足皸裂春夏不愈者

生姜汁 紅糟 白鹽 猪膏臘月佳

右研爛炒熱擦入皸內一時雖痛少頃便皮軟皸合再

用即安

手足寒皸裂台椒三四合煮浸半食頃須更再浸及傳

以羊猪髓腦甚妙梅師方

治脚跟皸裂用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬候

油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯不令灰入每用百

沸湯泡洗皸裂令軟傳其上即安一方加水粉

脚裂爛蒸藕研成膏傳之

用五倍子為末同牛骨髓填縫內即好治脚指縫爛瘡

搗鵝時取鵝掌黃皮焙乾燒存性為末濕則搽之

反花瘡瘡有肉肉凸出者是也

諸瘡肉如蛇頭出數寸者硫黃末傳之即縮聖惠方

瘡有肉凸出烏梅燒灰為末傳之立盡聖惠方又以白梅

肉杵細入蜜捏成餅如錢大貼之妙聖惠方

入醫學綱目卷三

又方治反花瘡馬齒莧一斤燒灰細研猪脂調傳

瘡凸出寸許根如小豈或大如梅者用花脚蜘蛛絲纏

其根則漸乾而自脫落

惡瘡

乳香消毒散專治惡瘡

大黃煨 黃芪 牛蒡子炒 金銀花各五兩

甘草三兩 牡蠣煨五兩 乳香 沒藥

懸壺各半兩

右為粗末每服五錢水煎瘡在上食後在下食前

惡瘡入腹心嘔逆藥食不下

荳粉兩 乾胭脂三錢 定粉二錢

右細末新水調下神効

碧霞挺子治惡瘡神効了不覺疼痛者

雜方



銅綠 礪砂 礪酥  
右為細末燒飯和作黍漿挺子每刺不覺痛者須刺出血方繼藥在內以膏藥貼之  
蝕惡瘡方非奇異惡瘡不可用

右為細末傳之  
治惡瘡或有小虫  
膽礬 龍骨 輕粉 虎骨  
白礬 麝香 乳香 礪砂  
腦子 土蜂房 露蜂房 雄黃  
右細末刺破鹽水洗看緊慢上藥神效

雜瘡  
治蒲萄瘡瘡頭如蒲萄色四圍腫起先追膿盡次用水  
梅當瘡頭毒之神愈  
江左有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺臍肉脹起或不食之則臂痺有善醫者教其歷試諸藥無苦至具毋其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒磨具毋水灌之數日成痂遂愈不知何疾也

天泡瘡通聖散及短刺泥畧炒密調傳妙從肚皮起者裏熱發外速服通聖散  
天行斑瘡須臾遍身皆戴白蕪此惡毒氣水微四年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜葉以蒜齏啖之即止  
卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傳  
凡此音休俗病  
凡此音休俗病

手太陽之別名曰支正上腕五寸虛則生疣小者指痂疥

取之所別也  
手足生疣目鹽傳上舌舐之只三次瘡  
凡用雞胃中食指疣上指餘者以石壓之驗

取瘰癧藥  
糯米 石灰 巴荳  
右為末入磁瓶同膏三日每以竹箸挑果許點上自然蝕落

取歷  
風化石灰 花碱  
右為細末上三次如天色冷濕用  
石灰水調一盞如稠粥揀好糯米全者半置灰中半置灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑歷子及紋刺者先微微以針頭撥動置少許於其上經半日許歷汁自出別去藥不用且不得着水二三日愈 又方用水蛭一條雞子一枚開雞子小頭內水蛭以皮兒蓋合封之直至水蛭食盡雞清乾盡自死乃用之

擷撲傷損 金瘡 杖瘡 湯火傷  
竹木刺入肉 箭入肉 漆瘡

凡擷傷皮破血出處疼不可忍乃風寒所着宜用葱杵碎入鹽少許炒熱卷上其痛即住冷則再溫之  
崔給事項在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖按毬子其將軍以杖相格乘勢不能止因傷李相姆指并爪甲劈裂遠索金刀藥裹之強坐頻索酒飲至數盃已過量而面色愈青忍痛不止有軍使言取葱新折者入清灰火煨熱剝皮擘開其間有涕取搗傷處仍多煨葱續續取



熱者凡三易之面色却赤斯須云已不痛九十數度易用  
熱葱并涕裹纏逐畢席笑語

治腦骨破及骨拆葱白爛研和蜜浮封損處立瘥 筋  
斷骨折者以法接之

治搨撲筋斷骨折用粟米半升木鱉肉二十箇半夏半  
兩婦人髮一團葱白鬚一小束同炒烟盡存性為末熱醋

調傅神効 治搨撲筋斷骨折用糯米一升皂角切碎半  
升銅錢百箇同炒至半焦黑去銅錢為末用好酒調膏厚

紙攤貼患處神効  
打撲傷損及一切腫癰未破令內消方

生地研如末 木香末  
右以地黃膏隨腫大小攤於紙上搽木香末一層又再  
攤地黃膏貼腫上不過三五度即愈昔許元公入京師

赴省試過橋墜馬右臂白脫路人語其僕曰急與授入  
白中若血漬白則難治矣僕用其說許以昏迷不覺痛

遂從橋鼻歸或曰非錄事巷田馬騎不能了此疾急  
召之至已日暮因秉燭視其面曰尚可治乃施藥封此

處至中夜方甦達旦痛止去其封損處已白其青痧乃  
移在白上自是日日易之腫直至肩背以藥下之瀉黑

血三升五日復常遂得赴試蓋用此法云

走馬散治折傷接骨

栢葉生 荷葉生 皂角生 骨碎補去毛

右為末先將折傷處搥定令入元位以姜汁調藥如糊  
攤紙上貼骨斷處用杉木片夾定以繩縛之莫令轉動  
三五日後開看以溫葱湯洗後再貼藥復夾七日如痛  
再加沒藥

治腕打傷筋損骨疼痛不可忍

生地切 藏瓜姜糖生 姜切  
右都炒令勻熱以布裹傷折處冷則易之曾有人傷  
折宜用生龜尋捕一龜將殺患人忽夢見龜告曰勿相

害吾有奇方可療於夢中授此方神効

骨碎補卷 閉折筋骨折傷取根搗碎表黃米粥和之裹  
傷處良

接骨丹敷貼藥  
天南星兩 木鱉子兩 沒藥兩 官桂兩  
乳香兩

右為細末姜一斤去皮爛研取自然汁入米醋少許白  
麪為糊同調攤紙上貼傷處以帛縛之用篋夾定麻索

子纏

搨撲骨肉損醋搗肥皂爛厚搽之以帛縛之閉傷醋糟  
平胃散相和服之

治搨傷骨折及血黯方用益元散七分人參湯調之次  
用姜汁好醋二盞用獨子肥皂四箇敲碎接於姜汁醋中

調和以綿濾過去查煎成膏藥貼之遍身亦可

又方柑桔葉白酒糟榨細縛痛處或大段痛用火燒地  
令紅用醋并米泔接地上急鋪荐令患人荐上臥蒸出汗

內則服藥外則貼藥易安

治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用綿裹血立愈

折傷接筋方旋覆花根杆汁滴傷處又將查封瘡上十  
五日使斷筋自續矣蘇良仲方即金 接骨用好無名異  
三兩為末丁乳檀沉木五香各半錢重為末先燒鐵銚紅  
以五香三之一彈入銚內候烟起則全下無名異待滾退



火定後再上火炒熟又將五香彈三之一彈入銚內候滾  
又退火如此者凡三次訖出火毒即用骨碎補去毛約一  
斤與生姜等分搗爛以碗覆之候發熱先約取五之一入  
小葱九莖連根去蒂同入沙盆搗細取其汁調前無名異  
末二錢衝老酒服之其查毒患處即愈如年老氣衰者再  
作一劑多飲酒力助之為妙

治擦落耳鼻用髮入碓子盛泥固濟煨過為末乘急以所  
擦落耳鼻蘸灰綴定以軟絹縛定效江懷禪師為驢所咬  
下臭一僧用此綴之効

負重擔肩破者剪貓兒頭上毛不語唾粘之 遠行脚  
打泡用調生麵糊貼過夜即乾不可擦破又法用飯粘貼  
過夜以紙蓋之次日平復神効

若登高下重物撞打筋嫩刃傷心腹胃中停積鬱血不  
散以上中下三焦分之二其部分上部易老犀角地黃湯  
中部桃仁承氣湯下部抵當湯之類下之亦有以小便酒  
同煎治之 更有內加生地黃當歸前者有太黃者又法  
虛人不禁下者以四物湯加川山甲煎服妙亦有花蓋石  
散以童子小便煎或酒服之者此藥與前寒藥正分陰陽  
不可不辨也若瘀血已去用復元通氣散加當歸煎服亦  
可

按骨神効無比累驗用當三錢一百零八箇鐵線草以  
鐵線穿定用活桑木一根作柴燒錢紅米醋一大碗未煎  
者不入鹽將所燒錢焯入醋中如此焯之以醋乾為度取  
醋中焯落銅錢木就用醋洗去灰晒乾為極細末再用黑  
雄雞一隻清湯煮熟去肉用骨一付以醋炙酥為末入乳  
香沒藥各一兩與銅錢末一處和勻每服一字臨服時用

患人髮在頂上者洗去垢燒灰入藥中無灰酒調服不吐  
只一服如吐出再服如痛止不可再服必須先夾縛所折  
骨端正用楊樹皮刮去肉糊外粗皮傳之下咽便不痛  
五七日便能運動必終身忌葷齊一名地栗義門家  
一方用五銖錢醋焯一兩二錢黑雞骨三兩研細勻每服  
病在下四錢疎服食前病在上二錢半頻服食後一方有  
乳香沒藥

方用醋焯半兩錢蘇木定粉南鵬砂各一錢為末作一  
服當歸酒二三服痛止勿服

沒藥 乳香各五 自然銅醋焯滑石二  
龍骨三 赤石脂錢 麝香後入 白石脂錢  
右為細末以好醋浸沒煮多為上候乾就炒燥為度臨

服入麝香少許挑小茶匙在舌上溫酒下病分上下食  
前後服若骨已接尚痛去龍骨石脂而多服儘好

又方接骨  
乳香 沒藥 蘇木 降真節  
川烏去皮 松明節兩 自然銅未醋焯  
地龍去土麻油 血竭錢 龍骨半兩  
水蛭油炒 上狗十個 油

右為細末每服五錢酒調下在上食後在下食前

定痛乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍腹中疼痛  
乳香 沒藥 雄黑豈 桑白皮  
獨科栗子各一 破故紙炒 當歸兩  
水蛭兩

右為末每服五錢醋一盞沙石器內煎至六分入麝香



少許溫服

定痛接骨紫金丹

麝香

沒藥

紅娘子錢各半烏藥二錢

地龍錢半川烏

草烏地各一兩五靈脂去皮

木盤子去壳茴香二錢

黑牽牛生用骨碎補

藏靈仙

金毛狗脊

防風去自然銅醋煨

各五

禹餘糧研陳皮

青皮錢半

右為細末醋糊丸如桐子大每服十九至二十九溫酒送下病上食後病下食前服

聖靈丹治一切打撲損傷及傷折疼痛不可忍者並宜服之

乳香錢五

烏梅去核

白米一

蒿苳子一大

八錢

重

右為細末神茶和丸如彈子大每服一九細嚼熱酒吞下食後一伏時痛不止再服

經治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下一錢食頃痛更一服痛止便將接骨藥封以物夾定直候至好

初虞世治從高至下墜及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩剉碎炒烟出二件研為細末酒調二錢當下畜血未止再服其効如神

經自然銅有人劍折翅鷹後遂飛去令人打撲損傷研極細末飛過用當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛處

治墜落車馬筋骨疼痛不止用玄胡索一兩搗羅為散不計時服以荳淋酒調下二錢

童便治卒血及心被打內有瘀血者煎服之一服一升

兩香油四兩打勻無灰酒熱調下

兩香油四兩打勻無灰酒熱調下

右乳香沒藥行汚血調氣例衍義云沒藥通帶血打傷撲損疼痛皆以酒化服血滯則氣凝氣凝則經絡滿急經絡滿急故痛且腫矣道而行之則痛腫消焉

打損傷疼痛夜合花末服之酒下二錢七効

治打撲損傷折骨此藥專能接骨

夜合樹即合歡花去粗皮炒黑芥菜子炒

右為細末酒調二錢澄清臨臥服以粗查罨瘡上扎縛之

又方用葱白砂糖二味相等分爛研傅之痛立止且無痕

白蠟屬金龜收飲堅凝之氣外科之要藥生肌止血

定痛接骨續筋補虛與合歡皮同入長肉膏藥用極神効但未嘗試可為藥餌否若合歡皮常試之灸服之大有妙理且有速効不可不知也

治打傷接骨方

接骨木半兩草

乳香神

當歸

自然銅一

赤芍藥

右為細末同黃蠟四兩溶入煎藥末攪令勻候溫軟衆手丸如龍眼大如打傷筋骨及閃拗着疼痛不可忍者

用此藥一丸無灰熱酒一盞浸藥候藥潰開衆熱叫了痛便止若大段傷損碎折須先整骨用川烏草烏為末

等分生薑汁調貼卷之又將帛縛定然後服此藥表裏

兩治無不効者此二方是一副不可分開

治打撲內損筋骨疼痛



沒藥

乳香

芍藥

川椒去子及目者

川芎

當歸酒洗

自然銅煅

右為細末用黃蠟四兩溶開入藥末不住手攪勻濕丸如彈子大每服一九用酒煎開消盡藥熱一服吃盡

看那處痛向痛處臥要時服三五丸立效

治破傷見血酒一碗煎服

半兩當歸酒洗二錢

合來地碎酒同煎

直須軟冷連查吃

一切傷痞保萬全

右夜合黃白蠟例接續筋骨補虛也

破血消痛湯治乘馬損傷跌破脊骨惡血流下腸下甚痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活

防風

蘇木

柴胡

連翹

當歸酒洗

官桂

麝香另研

水蛭酒洗

水蛭酒洗

水蛭酒洗

水蛭酒洗

右為粗末只一服酒二大盞水一大盞水經麝香湯研如泥餘藥煎至一大盞去火稍熱調二味服之兩服立愈

中風有所墮惡血留內有所大怒氣上而不行下積於脇下則傷肝又中風及有所擊扑若醉入房汗出當風則傷脾又頭痛不可取于胎者有所擊墮惡血在內若肉傷痛未已可側刺不可遠取之也

夫從高墜下惡血流於內不分十二經絡醫人俱作中風肝經留於脇下以中風瘵之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有自汗但人人有汗出皆屬風証諸風皆屬於肝木况敗血凝泣逆其所入於肝也從高墜下逆其上行之血氣非肝而何非傷其無汗既汗必由風化之也故以破

血行經藥治之

復元羌活湯治從高墜下惡血流於脇下及疼痛不可忍

者經云有所墮惡血留內有所大怒氣上而不行下損於脇則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少陽宜以

柴胡為引用為君以當歸活血脈又急者痛也以甘草緩其急亦能生新血陽生陰長故也為臣川山甲括蔞根桃

仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以蕩滌敗血為之使氣味相合各有所歸痛自去矣

柴胡酒洗 當歸酒洗 甘草

川山甲炮 桃仁去皮尖 紅花

瓜蔞根酒洗 右件桃仁研爛餘藥剉如麻豈大每服一兩水二鍾酒

半盞煎至七分去查大溫服食前以利為度得利後痛或不盡服乳香神應散

乳香酒洗 神應散前無藥証

此謂血閉臟腑不通

巴戟去心 當歸

地黃 芍藥

川芎各一兩 大黃兩

右為末水煎以利為度

當歸導滯散治打撲損傷落馬墜車瘀血大便不通紅腫青紫疼痛昏悶畜血內壅欲死

大黃兩 當歸分 麝香少

右三味除麝香別研外為極細末入麝香令勻每服三錢熱酒一盞調下如前內瘀血去或骨節傷折疼痛不可忍以定痛接骨紫金丹治之

奪命散治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積心腹疼痛大小便不通

大小便不通利

心腹疼痛大小便不通

心腹疼痛大小便不通

心腹疼痛大小便不通

心腹疼痛大小便不通



水蛭用石灰拌煨火炒 黑牽牛二

右為末每服二錢用熱酒調下約行四五里再用熱酒調黑牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡為度

雞鳴散治從高墜下及木石所壓凡傷損血瘀凝積氣絕欲死煩躁頭暈叫呼不得並以此藥利去瘀血治折傷神妙

大黃一兩 桃仁二十七粒

右研細酒一碗煎至六分去查雞鳴時服次日取下瘀血即愈若便覺氣絕不能言取藥不及急擊口開用熱小便灌之即愈

氏花蓋石散治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損猶狗咬傷或至死血瘀傷處以藥搽之其血化為黃水再搽藥便活更不疼痛如內損血入臟腑煎童子小便入酒少許調

大蓋服之立効若牛舐腸出不損者急內腸入用細系

或桑白皮為線縫合肚皮縫上搽藥血止立活如無桑白皮用生麻綾亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後搽藥婦人產後敗血不盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭覺暖急以童子小便調一盞取下惡物如肝片終身不患血風血氣証若膈上有血化為黃水即時吐出或隨大便出

石硫黃二 花蓋石二

右二味相拌合勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦礫子一箇內可容藥候泥乾入藥在內再用泥封口候乾安在四方磚上上書八卦五行字用炭一秤籠疊周圍自己午時從下着火漸漸上徹直至經宿火冷炭盡又放經宿確冷取出細研以絹羅子羅極細磁盒盛之依法使用

治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛水仙散

未展荷葉陰乾一味為末食前以童子煎小便一小盞調下三錢以利下惡物為度

治撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛以大乾荷葉五片燒令烟盡細研食前以童子煎小便一小盞調三錢七日三服

塞上方治墜傷損瘀血在內煩悶者用蒲黃末空心熱酒調下三錢瘥

宣和中有一國醫忽承快行宣押就一佛刹醫內人醫診視之已昏死矣問其從人皆不知病之由惶恐無地良久有二三老內人至下轎環而泣之方得其實云因蹴鞦韆自空而下墜死醫者云打撲傷損自屬外科欲申明又恐後時參差不測再視之微覺有氣忽憶藥篋中有蘇合

香丸急取半兩於火上焙去腦糜用酒半升研化灌之至三更方呻吟五更下惡血數升調理數日方瘥

治馬墜及一切筋骨損傷

大黃一兩切湯 非帛 亂髮如雞子

敗蒲席三 久用炊單布一尺 桃仁四十九

甘草如中指 右七味以童子小便量多少煎湯或內酒一大盞次下

大黃去查分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯浴以衣被

覆斯須通利數行通後立瘥利後浴水赤勿怪即瘀血

也

治打撲損肌膚青腫用茄子種通黃極大者切作片如

一指厚新瓦上焙乾為末欲臥酒調二錢七一夜消盡無痕



源因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蜜重二十一  
枚煨過同搗篩每用溫酒和散方寸七服血當化為水下  
治被打瘀血在骨節下出者生鐵一斤酒五升煎取一  
升飲之後附

治從高墜下墜損惡血在骨節間疼痛云壹散

荊芥 藕節各二兩 芸臺子 川芎硝

馬齒莧各一兩

右為細末用蘇木半兩酒一大盞煎至七分調下二錢  
服之不拘時服

盛官人因上山惡血瘀入內損傷食少脈弦此須用活  
血和氣

川芎錢三 青皮錢二 芍藥 滑石各一

牡丹皮分五 炙甘草錢一 桃仁七枚

右作一貼服之

凡傷切不可飲冷水血見寒則凝但一系血入心即死

人有所墜惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥  
此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之  
前血脈出血刺足跗上動脈不已刺三毛上各一痛見血  
則已左刺右右刺左善悲驚不樂刺如右方錄刺

針灸

身有所傷血出多及中風寒若有所墜墜四肢懈墜不  
收名曰體懈取小腹臍下三結交者陽明太陰也臍下三  
寸關元也寒熱論○三結交

從高撲損內有血腹脹滿其脈堅強者生小弱者死

金瘡

治金瘡止血除疼痛辟風續筋骨生肌肉地黃散

地黃苗 地崧 青蒿 蒼耳苗

生艾汁各三 赤芍藥各五兩入

右五月五七月七日午時修合以前藥汁拌石灰陰乾  
入黃丹三兩更研為細末凡有金瘡傷折出血用藥包  
封不可動十日瘡不腫不膿

治金瘡風化石灰非藥嫩者同搗入鵝血調和成餅乘  
風陰乾為末傳上亦得 治金瘡血不止用半夏石灰  
鬱金三物為末傳上傷處即住

療金鎗刀斧傷破血以石灰一升石榴花半斤搗取末  
少許捺少時血斷便瘥

末藥散刀箭藥止血住痛

定粉 風化灰各一 枯礬三錢 乳香五分

沒藥一字 右件各研為細末同和勻再研搽之

刀斧傷石灰包之痛止血住

勝金方治刀斧傷止血生肌蠶蛾散晚吞蠶為末搽勻  
絹帛裹隨手瘡合血止一切金瘡亦治 一法用生晚吞  
蛾石灰二味同搗成餅陰乾為末傳之



洗之護肉不壞

治金瘡打撲損傷用蒼術研細入鹽少許卷之愈  
金瘡血出不止按小刺葉封之 金瘡止血杖覆盆花苗  
傳瘡立止

治金瘡血不止兼痛用血竭末傅立止

治惡瘡金瘡刀斧傷見血方以好降真香為末貼之入  
水並無傷痕絕妙 治刀箭傷出血不止并骨折

檳榔 木香 胡地黃

右為末傅瘡口血立止又可接骨

金瘡方王不留行散主之

王不留行 十分八月 薊 薊細葉 十分七月

桑根 用白皮根行東南 甘草 各十分 黃芩 二分

川椒 開口者出汗 乾姜 芍藥

原朴 各二分

右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令過各別研杵

篩合治為散服方寸七小瘡即粉之大瘡但服之產後

亦可服如風寒乘東南根勿取之前三物皆陰乾百日

用

金瘡血不止痛白芍藥一兩整令黃粉細為散酒後米

飲下二錢並得初三服漸加

治金瘡出血肉瘻編編二枚燒烟盡以水調服方寸七

令一日服盡當下如水血消 金瘡腸出欲入之磁石滑

石各三兩為細末白米飲送下方寸七日再用

仲景問曰寸口脈微而澁法當亡血若汗出設不汗者云

何答曰若身有瘡被刀斧所傷亡血故也

金瘡血出太多其脈虛細者生數實者死 金瘡在

處出血不絕陰脈不能至陽者死接陽而復出者生 金

瘡出血脈沉小者生浮大者死 斫瘡出血一二石脈來  
大者二十日死 斫刺俱有病多少血出不自止斷者其  
脈止脈來大者七日死滑細者生

杖瘡

鬼代丹治打不着不痛

無名異 研 沒藥 研 乳香 研 地龍 土

自然銅 研 木鱉子 去殼 等分

右為末煉密丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

乳香散治杖瘡神効

自然銅 研 當歸 研 乳香 研 沒藥 研

茴香 研 當歸 研

右為細末每服五錢溫酒調下

雞鳴散下杖痛腹中惡血甚好

五黃散治杖瘡定痛

黃丹 黃連 黃芩 黃柏

大黃 乳香 等分

右為細末新水調成膏用緋絹帛上攤貼

沒藥散治杖瘡止痛令瘡不移

蜜陀僧 沒藥 乳香 乾胭脂

膩粉 半

右細末次入龍腦少許若多更妙燒葱與羊骨髓生用

同研如泥攤在緋帛上貼之

杖瘡痛用黃柏生地黃紫荊皮敷此皆要藥也只是血

熱作痛用涼藥去瘀血為先須下雞鳴散之類

杖瘡痛用涼藥去瘀血為先須下雞鳴散之類

杖瘡痛用涼藥去瘀血為先須下雞鳴散之類

杖瘡痛用涼藥去瘀血為先須下雞鳴散之類



又方用生地黃黃栢童便調傅或加薑汁 不破者以菘菜蔥頭杵貼令即易之膏藥用紫荆皮乳香沒藥生地黃大黃黃栢之類 又方用木耳盛於木杓內用沸湯浸爛攪水令乾於砂盆內搗細傅瘡上 又方用大黃黃栢為末生地黃汁調傅如乾再傅 又方用野苧根嫩者不拘多少洗淨同鹽併搗傅在瘡上神妙傷重多用鹽

湯火瘡

凡湯火傷急向火炙雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷物塌之及井底泥傅之使熱氣不出爛入肌肉

火燒以好酒洗之又以鹽傅其上如皮塌者以酒浸牛皮膠傅之 如湯傷以淋過第二次灰查傅立安 熱酒

醫學綱目

聖

傷糯米粉炒黑末酒調傅之 治湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰雞子黃和傅之如成瘡用白蜜封之以竹中膜貼上日三

治湯火瘡趁皮炒黑灰為末傅上神妙此方有補性始終皆可用 治湯火瘡取舊煮銀爐中燒過焦黃土研細如粉以生薑調於帛上貼之痛止一方用落銀鍋子細末油調傅佳

治火瘡未起梔子仁燒灰麻油和封之厚乃佳已成瘡燒白糖灰粉傅之燥即瘡用白糖

保生救苦散治火燒熱油所損或至肌肉亦脫一切犬齒損傷并刀斧所傷用生寒水石不計多少為極細末調塗之或乾上然不如油調其痛立止並不作膿無分毫厘苦楚日近完復永無破傷風症

中正治

水霜散治火燒皮爛大痛

寒水石 生 牡礪 朴硝 青黛 輕粉各等

右為細末新水或小油調塗立止

治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂 寒水石 大黃各等

治火燒

右二件以柳條不住手攪成膏再入大黃末石膏末和以牛皮膠入少水溶開外用貓兒肚底毛細剪後上貼之

綠白散治湯火燒疼痛用苦參不拘多少為細末每用以小油調搽

凡被湯熱油痛不可忍取厠下黑淤泥量傷大小斟酌多少次以老姜汁麻油十分之一共研令勻搽傷處立愈以青黛傅之妙

治湯火瘡爛者以黃蜀葵花者淨器收之入水些少待爛成水傅上神妙 熱油澆外痛以蜜傅之立安方

治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和塗之

治湯火瘡至妙用劉寄奴為末先以糯米漿雞翎掃傷處後搽藥末在上並不痛亦無痕大凡湯傷先用鹽末搽之護肉不壞然後傅藥 又方以榆白皮末猪脂油塗瘡

治火湯瘡先以酒洗次以楊梅樹皮為末香油調傅

治湯火瘡用髮一束香油煎以髮盡為度放冷搽患處驗

治中熱油及火燒除外痛以丹參八兩細剉以水微調

愈



取羊脂二斤煎三上三下以傅瘡上愈方同 治湯火至  
聖膏用雞子黃十箇入銀石器內熬自然油調好粉傅之  
愈

竹木刺針入肉

雜方款

凡諸竹木刺入肉中不出以躑躅研傅立出 又方用  
白茅根搗傅之立出 又方嚼牛膝根卷之即出

治竹木刺入深不得出用烏羊糞搗爛水和卷於傷  
處厚傅之曾有庄僕脚心中刺不得出苦痛欲死以此藥  
黃昏傅之至四更其刺出遂安

蘆葦刺入肉者細嚼栗子查盒傷處 木竹刺已出痛  
者螻蛄卷之妙

治針入肉不出用螻蛄腦子同硫黃研細調傅以紙花  
貼定如覺癢時其針自出

醫學綱目卷三

聖

神聖膏取針快入皮膚用車脂不拘多少成膏攤紙上  
如錢許二日一換三五次其針自出 又取針快入皮膚

用烏鴉翎三五枚火炙焦黃色碾為細末好醋調成膏子  
塗在瘡上紙蓋一二時針出効

治針入肉不出用雙仁杏仁搗爛以車脂調勻貼在瘡  
上其針自出

治秀針刺足已出痛者用黃泥卷之

主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出者水煮白梅肉  
研爛調象牙末厚傅骨刺處自軟

生象牙主諸物刺入肉刮取屑細研和水傅瘡上刺立  
出如咽中刺用水調飲之舊象梳屑尤佳

魚骨在肉中不出者嚼吳茱萸封之骨當爛出  
破傷風血凝心針入肉游走三症如神方用烏鴉翎燒

內服方

灰存性研細調一錢服

箭頭入肉

雜方

治箭鏃入骨不可拔者

巴豆去壳 蜈蚣

并研勻塗所傷處須臾痛定又微痒忍之待極痒不可  
忍便撼動箭鏃拔之立出方同

出箭頭方

蜈蚣不拘多少 麝香

右為極細末撥動箭頭擦藥瘡口內

踴鐵管取箭頭一切針刺入肉盡皆治之

鼯鼠頭一個或兩個 蜈蚣四十 芫青兩

土消虫什 巴豆

醬蛆結 夏枯草 礪砂

黃丹 地骨皮 蘇木

石腦油兩 蒿柴灰汁三

右將石腦油蒿柴灰汁文武火熬成膏次下地骨皮等

末令勻磁器內收臨時用量瘡勢大小點藥良久箭頭  
自湧出

萬全神應丹出箭頭魚骨針麥芒等遠近皆治之

於端午日前一日持不語戒遍尋上項科見即取酌中一

科根枝葉實全者口道先生爾卻在這裏道罷用柴灰自

東南為頭圍了用木篋子撮起周迴土次日端午日未

出時依前持不語用木撮只一撮取出水洗淨不令婦人

雞犬見淨室中石臼內搗為泥丸如彈子大以黃丹為衣

以紙袋封懸在高處陰乾若有着箭不能出者以緋絹袋



盛此藥一丸放臍中用綿裹肚緊定先用象牙末貼瘡上  
後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之  
隨出陝西行省出軍曾用有效

孫其人治箭鐵在咽喉胸膈及針刺不出方以蟻貼搗  
取汁滴上三五度箭頭自出

瘡鐵不出搗瓜荑根傳瘡日三易自出

李渤治箭鐵不出及惡刺以齒並和鶴虱傳之

毒箭有二種交廣夷俚用焦銅作箭此一種總傷皮便  
悶膿沸爛而死若中之用飲尿汁并以傳之亦可惟此最  
妙又有一種用射筒以塗箭鐵人中之亦困若着寬處不  
死近腹亦宜急治今葛氏方治射筒者是葛氏方用藍汁

漆瘡方

瘡漆瘡方用湯浸芒硝冷洗之又礬石亦可

漆瘡通身面口腫者亦治苦菜五月五日採曝乾食瘡  
云生食亦可漢椒湯洗之妙 生薑其汁傳亦可

治漆瘡用生紫蘇摩擦之累效 又方用人乳汁傳之

治漆瘡取荷葉乾者一斤水一斗煮取二升洗瘡上日  
再即瘡

漆瘡無名異水調傳

通治諸般惡虫蛇咬 毒蛇咬 蜈蚣咬 蟻咬  
咬 蝎咬 蜂咬 斑蜘蛛咬 刺毛虫咬 蟻咬

聖惠治蛇咬蝎蟻咬妙  
雄黃 三 信 皂角子 巴豆  
耳塞 麝香 各少

右五月五日不聞雞犬婦人處不語搗為細末在杏子  
核內封之針挑出上痛處大有神效

治一切蛇虫傷貝丹末酒調服効

治惡虫咬以酥和鹽傳之瘡

諸般惡虫咬以油浸紫草塗之

治蛇咬毒咬惡虫咬猪骨搗汁傳

治蝎蜘蛛毒雞卵輕敲一小孔合咬處即瘡

治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直毒攻腹  
內成塊速巡不救用蒼耳嫩葉一握研取汁温酒和准之  
將滓厚卷所傷處

治毒蛇射工沙虱等物傷着人眼黑口噤手足強直毒  
氣入腹

白礬 甘草

右為細末每服二錢冷水調下

毒蛇咬

治毒蛇傷急以小便洗出血次取口中唾塗之又以牙  
塗封傷處俾而護之甚妙且止痛腫

路行卒被蛇咬當急扯裹脚帶扎縛傷處上下寸許使  
毒氣不能快傷肌體又急用白礬安刀頭火上溶汁沸滴  
於傷處待冷以長篋子速挑去腐則毒血隨出點腫尚未  
退更滴之以退為度 村山僻及途中夜行卒被蛇傷

咬難求白礬處速作艾炷灸五炷以唾調鹽塗之如點腫  
尚未消釋當更灸更搽毒涎自然流出且不透裏傷人

治一切毒蛇咬用透明雄黃研細末以醇酒濃調厚搽  
傷處水流出如涎痛腫即消一方以黃芩汁和雄黃末作



餅子候乾為末每用少許貼瘡口立効  
 有人被毒蛇所傷已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之  
 遂甦及以藥滓塗患處良久復灌二錢其苦皆去問之乃  
 五靈脂一兩雄黃半兩同為末止此耳後有中毒者用之  
 無不効驗

**治毒蛇所傷**

細辛 香白芷 雄黃

右為末加麝香少許每服二錢溫酒調服効

**雜方**

治一切蛇咬用香白芷嚼碎傳患處又用溫酒調服効

治一切蛇虫所傷用貝母為末酒調令病人盡量飲之  
 頃久酒自傷處為水流出候水盡却以藥滓傳瘡上即愈

治蛇咬腫毒悶欲死者用重臺六分續隨子六顆去皮同  
 為細末以酒服方寸七又以唾調少許傳患處立安

**入醫學綱目卷二**

又方用白礬二錢服之防毒氣攻心 又方金線重  
 樓以水磨少許傳咬處又為細末酒服之 又方用柏樹  
 葉魚腥草地松節鉞而草草决明共一處研細傳傷處極  
 佳

治蛇咬人以獨頭蒜酸漿草搗汁傳咬處佳

治蛇咬男子陰毛口含二十莖噉其津毒不入腹

治諸般蛇咬此傳之於擒蛇者藥味不全亦可

大青 小青 青木香 烏桕葉

火炊草 山蘇朮 過山龍 地蜈蚣

天門冬 白芍藥 香薷

右細末用白木香研細生白酒調服香薷咬處累効

治蛇咬毒食菜更一兩為細末冷水調分為三服立瘥

治蛇毒吃菘菹草攪取以封之其草即野茭白是也

蛇咬作瘡吸酒浸日三次 蛇入人口并七

孔中者割指母尾頭瀝血着口中并孔口上即出

治因熱取京睡有蛇入口中挽不出者用刀破蛇尾內  
 生椒二三粒裹着即出

治卒為蛇繞不解以熱湯淋之無湯令人尿之 蛇咬  
 忌食酸物梅子犯之大痛

**蜈蚣咬**

**雜方**

治蜈蚣咬生雞血傳上立愈累効一男子為蜈蚣入咽  
 喉中咬之垂死之際一醫令殺生雞血乘熱灌喉中蜈蚣  
 即出而愈實良方也 又方用雞糞塗之 又方治蜈蚣  
 諸毒虫傷麻油點燈於瘡口上對口薰之登時愈 又法  
 大油紙燃燒燈吹滅以餘烟燻之 治蜈蚣咬竹葉清研  
 汁傳之立愈 又方用南星磨汁傳之累効

治蜈蚣咬痛不止獨頭蒜磨處立愈

治蜈蚣咬方用蝸牛捲取汁滴入咬處

蜈蚣咬取蜘蛛一枚安咬處當自飲毒如蜘蛛死而痛  
 未止更易生者

蜈蚣咬嚼鹽傳其傷處次以鹽湯洗之 蜈蚣咬  
 頭治塞之不痛則痒 治蜈蚣咬及諸虫咬毒先用鞋底  
 上擦之用大蒜小蒜桑葉葉傷處如無用油或食傷處或  
 藍靛塗之亦効 治蜈蚣毒虫咬用桑枝汁同鹽擦痛  
 處或溶黃蠟滴患處肉黑為度 又方用皂角於咬處上  
 用艾炙熱去之効

蜈蚣咬

治蜈蚣咬成瘡初如粟漸大如豆如火燒泡大痛者速  
 以草茶細末生油調傳瘡上立止甚妙

又方猪膏搗汁

傳之草茶即茶葉

傳之草茶即茶葉



治雨點蠅瘡用百合搗爛入鹽少許傳之効

治蠅瘡尿人影着便令人病瘡如粟粒蠅瘡似刺虫所螫惡寒壯熱川犀角磨汁塗之則愈

蠅瘡虫又名八脚虫隱隱間以尿射人通身生瘡如湯火傷用烏雞翎毛燒灰雞子白塗之 治小兒蠅咬透腹匣即死用梨葉研爛傳之

蠅瘡尿瘡三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹瘡上

雄黃治毒瘡治蠅瘡不可忍

雄黃 信各半 巴豆錢 白礬兩

右為細末黃蠟半兩滾開入藥攪勻為錠子如棗子大用時將錠子穿於燈焰上炙開滴於瘡着處其痛立止

一上散治蠅瘡痛

牛夏一名生用 雄黃一名研 巴豆一名去皮

右三味同研和勻上之 治蠅毒用渣化白礬乘熱滴傷處痛止毒出

治蠅瘡人研蜘蛛汁傳之瘡

治蠅瘡地磨生姜塗之 又方南星米醋調擦之

治蜂螫薄荷貼之瘡 又方蜂螫人用人參嚼以封之

治蜂螫人以酥傳之愈

張薦昔在劍南為張延賞判官忽被班蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如筋繞項上從胃前至心經二宿頭面腫疼如數升益大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出

家財五百千奔為家財五百千其能療者忽一人應召云可治張相初不甚信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一莖碗取蜘蛛投入藍汁良久方出甚困不能動又別搗藍汁復加麝香雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉愈但咬處作小瘡如舊

蜘蛛咬遍身皮膚瘡用青葱葉一莖小頭作一孔盛蚯蚓一條捏兩頭不令透氣搖動化為水點咬處瘡

蜘蛛咬處嚼非白傳之

蜘蛛等諸般虫咬用葛粉生薑汁調傳

蜘蛛咬唾和山荳根末塗之狗咬蜈蚣瘡蛇咬並水研山荳根傳之火蠟也 又方蜘蛛咬一身生絲半乳一件飲之

沈存中秦皮一味治天蛇毒此瘡似癩而非癩也天蛇即草間黃花蜘蛛人被其螫仍為露所濡乃成此疾以秦皮黃汁一斗飲之瘡

刺毛虫蚯蚓蝮蛇咬

春夏月樹下墻壁間有一等雜色毛虫極毒凡人觸着者則放毛入入手足上自皮至肉自肉至骨其初皮肉微痒以漸至痛經數日痒在外而痛在內用手抓搔或痒或痛必致骨肉皆爛有性命之憂此名中射工毒諸藥不効

用好荳豉約一碗清油半盞拌豉搗爛厚傳痛痒處經一時久氣透骨則引出虫毛紛紛可見取下荳豉埋在上中煎香白芷湯洗痛處如肉已爛用海螵蛸即烏賊魚骨為末傳之愈 一方取蒲公英根莖白汁傳之立瘡

又方用鍋底黃上為末以酸醋捏成團於痒痛處搓轉其



毛皆出在土上痛痒立止神效無比與土併代 治蝨蟻

吹用老茶葉細末調傳

治蝨蟻咬如大風狀眉鬚皆落夜則蝨蟻鳴於身上膜

作鹽湯浸數次安傳信

昔有病腹大夜聞蝨蟻鳴於身有人教用鹽水浸之而

愈

治蝨蟻咬用榭葉燒灰細研以泔水浸榭葉取洗瘡拭

之納少許灰於瘡中 又方治蝨蟻咬人用石灰醋和塗

之 蚕咬人用麝香研蜜調傳廣濟

居蚕咬用芋汁塗之

馬虎熊咬人 犬咬 癩犬咬 驢馬汗瘡

附猪馬畜瘡

入醫學綱目卷三

雜方

馬咬細嚼栗子傳傷處

治馬咬毒入心馬齒覓湯食之瘥

治虎咬用野生菜搗爛塞所傷孔中滿不必換自然新

肉長出而愈曾有人被咬已死用此方治之

熊虎傷毒痛發生鉄令有味以洗之 虎傷人瘡取

青布紫捲燒一頭內竹筒中射瘡口令烟薰入瘡口中佳

虎傷人瘡用葶子葉杆細塗之按本草葶子葉即借

熊傷人燒青布薰瘡中毒出仍煮葛根濃汁以洗之日

十次并搗葛根為散煮葛根汁方寸七日五服瘥

鼠咬用貓兒毛燒灰傳之立愈

鼠咬用麝香傳包之驗

人咬傷用龜板或蟹甲燒為灰末以香油調傳

犬咬

犬咬人尿傳之 犬咬人以頭垢傳傷處又用熱牛糞

塗於外附

犬傷人用杏仁量所傷大小嚼爛沃破處以帛繫定立

愈

治犬咬用杏仁去皮尖同馬齒研細先以葱湯洗後

以此藥塗傷處効 治犬咬傷用草麻子五十粒去殼以

井水研成膏先以鹽水洗咬處次以此膏敷貼一方用虎

骨屑傳之 治犬咬人不要洗用紅炭火以物擊細待冷

取塗咬處即愈 治犬咬用黃荆葉搗瘡上即安 又

方灸生姜乘熱擦之尤妙

狗咬用紫蘇葉口嚼碎塗之 犬咬破傷風腫以人參

於桑柴火上燒成灰末傳之安

入醫學綱目卷三

近者 蛇退皮一兩火 存性 蟬殼兩 青黛半兩

細辛五分 右為細末每服三錢酒調下如六畜損傷成瘡用酒灌

下如犬咬傷用醇子和喫蛆皆化為水蠅子不敢再落

又以寒水石末乾擦上

癩犬咬

定風散治風犬咬先口噙藥水洗淨用綿拭乾貼藥更

不再發大有神効

天南星生 防風各等

右為細末乾上更不再發無膿効不可具述

治犬咬梔子皮燒灰石硫黃等分研細傳瘡梅師



治風狗咬用桃核殼半箇將野人乾糞填滿以榆皮蓋  
定於傷處又用艾於桃核上灸十四壯即愈永不發  
或用野犬糞  
如前法灸之

風狗咬即用犬糞塗仍拔去頂上紅髮

瘋狗咬方用班貓七枚去頭足翅以糯米少許於新瓦  
上同炒以米黃香為度去米不用以班貓研碎好酒調下  
能飲人再進酒一盃傷在上食後服在下空腹服當日必  
有毒物從小便出如小狗狀如未下次日再進亦不下又  
進以毒物出為度若進至七服雖不下毒亦不妨矣服藥  
後腹中必不安小便莖中刺痛者不必慮此毒受攻將下  
耳痛甚者以燕青一匙煎甘草湯送下即止如無燕青青  
黛亦可疾愈後急以香白芷多雄黃少許為末搗韭根自  
然汁湯酒調下去班貓毒以水爭嗽口嚼生葱白毒傷處

本草綱目卷三

毒

留小窠子出毒氣不可用他草藥忌犬猪羊及發風毒  
物小兒量歲數加減班貓食瘋狗肉致病者治同即愈或  
過二三年再發治如前 治瘋狗所傷用班貓二十一箇  
去頭翅并足用糯米一勻先將七箇入米內微火炒不令  
米赤去此班貓別用七箇再於前米內炒令班貓色變復  
去之又別用七箇如前法炒以米出青烟為度去班貓不  
用以米研為粉用冷水入清油少許空心調服頃又再進  
一服以小便利下惡物為度如不利再進一服利後腹肚  
疼痛急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷或煎黃  
連水亦可不宜便食熱物或以益元散水調服尤妙  
風狗咬取小兒胎髮炒香傳野菊花研細酒調服盡醉  
止效  
治瘋犬所傷或經久復發無藥可療者用之極驗

雄黃者五錢

麝香五

右研勻用酒調二錢服如不肯服者則蒸其臭而灌之  
服藥後必使得睡切勿驚起任其自醒候利下惡物再  
進前藥則見效矣

瘋犬咬人搗地黃汁飲之并塗瘡口愈 又方煮地榆  
汁飲之兼細末傳瘡上服方寸七日三忌酒若瘡瘰者搗  
生韭汁飲一二升 風犬咬後毒發如狗叫聲於  
化人壇拾頭頂骨燒末傳之 風狗咬毒發如狗叫者百  
方不治以人骨燒末之水下方寸七雖煩亂者亦治

鹽涎馬汗瘡

鹽涎馬汗入瘡腫漸甚可急治之遲則毒深不治以生  
烏頭末傳瘡口上良久黃水出立安

治鹽涎馬汗入瘡用遠志去心為末酒調塗 又方用

入醫綱目卷三

毒

冬瓜青皮陰乾為末貼瘡上 又方馬汗入肉毒氣引入  
如紅線者急用烏梅肉嚼爛塗瘡上 一方用烏梅和核  
爛研用好醋和成膏先將瘡口針破出盡紫紅血拭乾傳  
上以帛縛定 王氏治鹽涎馬汗毒所傷白禁飛過黃丹  
炒令紫色各等分相聚合以貼患處  
馬齒莧又主馬毒瘡以水煎令服一升一半塗瘡上  
濕癬白禿以馬齒膏和灰塗効

附猪馬畜瘡

治猪畜瘡猪瘡方

蛇床子

白礬

苦參

巴豆末

加羯羊糞桐油和傳之

馬老鼠瘡二方 其詳



黃芪 <small>半一兩</small>	甘草 <small>七錢</small>	黃芩 <small>酒炒半兩</small>	黃連 <small>生用一兩</small>
黃栢 <small>錢七</small>	連翹 <small>七錢</small>	蒼朮	當歸 <small>稍</small>
升麻 <small>兩各一</small>	麻黃根 <small>八錢</small>	防風 <small>錢二</small>	澤瀉 <small>錢七</small>
羌活	藁木 <small>各三錢</small>		
右爲細末水二大碗煎至一碗冷灌之神効			
馬老鼠出足陽明太陰經分野大渴小便多草墁			
升麻 <small>二錢</small>	葛根 <small>錢一</small>	連翹 <small>錢二</small>	當歸 <small>身錢一</small>
甘草 <small>錢一</small>	蒼朮 <small>半錢</small>	黃栢 <small>半錢</small>	黃芩 <small>錢一</small>
紅花 <small>錢一</small>	黃連 <small>五分</small>	杏仁 <small>五個</small>	黃芪 <small>錢二</small>
生地 <small>錢一</small>	琥珀 <small>分三</small>	麻黃 <small>冬月加五分</small>	猪苓
柴胡 <small>半錢</small>	白茯苓 <small>半錢</small>	澤瀉	
右爲細末每服半兩水二碗煎至一碗冷灌之			

醫學綱目卷之二十

五

醫學綱目卷之二十一 脾胃門

大法 內傷飲食 胎前傷食 百病皆生於痰

飲食傷論 陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六腑痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之爲二飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺肺病則爲喘咳爲腫爲水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積爲滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治法也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸澀爲痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸澀當分寒熱輕重治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑三稜廣茂巴

芫之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘖黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而越之瓜蒂散之屬主之然而不可過劑過則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加之藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五常正大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病十去其九不可過之此聖人之深戒也

傷食惡食者胃中有物導痰補脾二陳湯加白朮山查川芎蒼朮

傷飲 五苓散治煩渴飲水過多或水入即吐心中淡淡停濕在內小便不利

肉桂兩一 猪苓 茯苓 白朮各一兩 澤瀉二兩 五錢



右為細末每服二錢熱湯調下不拘時候服訖多飲熱湯取汗出愈治傷冷飲者煎五苓散送半夏枳木丸治傷飲不惡寒胸中微覺忪悶身重飲食不化者或小便利者五苓散去桂依前斟酌服之 如疹熱在裏身發黃疸食前濃煎茵陳湯調服愈

除濕散治傷馬牛乳酪及水水一切冷物

半夏湯泡一車前子錢五甘草錢二 紅花錢二

茯苓錢三 乾薑錢三 澤瀉兩半

右為細末每服三錢食前白湯調下

導飲九治水飲 吳茱萸錢三 白茯苓兩一 黃連錢五 蒼朮兩一

獨活錢七 右為細末神麩糊丸服

傷酒 藥黃九治飲用六一散一料加吳茱萸一兩水丸服

酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣其次莫如利小便乃上下分消其濕今

之病酒者往往服酒癥九大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血垂誤甚矣酒

性大熱已傷元氣而復重瀉之亦損腎水真陰及有形血氣俱為不足如此則除血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺

反增其陰火是以元氣消燦折人長命不然則虛損之病成矣酒疸下之久則為黑疸慎不可犯宜以葛花解醒湯

主之

治酒病宜發汗若利小便炎燄不肯下行故曰火鬱則

發之以辛溫散之是從其體性也是知利小便則濕去熱

不去若動大便尤為踈陋蓋大便者有形質之物酒者無

形之水從汗而發之是為近理濕熱俱去故治以苦溫發其火也佐以苦寒除其濕也

其火也佐以苦寒除其濕也

葛花解醒湯治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

青皮分三 木香分五 橘紅分五 人參

猪苓 白茯苓錢一 神麩炒 澤瀉

乾薑 白朮錢二 白芷錢二 葛花

砂仁各五

右為細末每服三錢白湯調下但得微汗則酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃此酌飲成病自損元氣惟

病酒者宜之

治酒醉不醒用菘菜子二合研細并水調服

烏梅丸治酒毒化瘰消食

烏梅斤一 半夏 白礬各八 生薑二兩

右搗為細末以新瓦兩片夾定火焙三晝夜為度次入

神麩麥芽陳皮青皮蓬朮枳殼丁皮大腹子各四兩糊

丸每服四五十九薑湯下

烏梅丸治酒積神效

百杯九治酒停胸中膈氣痞滿面色黃黑將成癱疾飲

食不進日漸羸瘦如欲飲者先服不醉

生薑一斤去皮切片以鹽橘紅三兩 廣茂地三

乾薑三兩 益智仁粒二十 丁香五十 甘草錢二

砂仁三十 三稜錢二 木香 茴香一錢

白芷錢三十

右為末煉蜜丸每一兩作五九硃砂為衣生薑湯下細嚼無時服



傷食

解酒毒併熱毒栢若本草名栢栢北人名曰爛瓜栢州貨賣名蜜屈立春生秋熟冬間經霜後取食

栢木丸治痞積消食強胃海藏云本仲景栢木湯也今易老改爲栢丸治老幼虛弱食不化或腸

枳實去穢白木二兩

右爲末荷葉燒飯爲丸如桐子大每服五十九白木湯下服白木者本意不取其食速化但久服令人胃氣強實不復傷也

麩藥栢木丸治爲人強食所致心胸滿悶不快

神麩炒 麥蘖炒 枳實炒 白木二兩

右爲末荷葉燒飯爲丸每服五十九

木香栢木丸破滯氣消飲食開胃進食

木香 枳實各一兩 白木二兩

照前法爲丸服

又方開胃進食

木香錢三 人參 乾薑各一兩 枳實一兩

白木二兩

照前荷葉燒飯爲丸食前白湯服三五十九忌飽食

栢榔丸消食破滯氣

栢榔錢三 木香錢二 陳皮錢五 甘草錢一

人參錢二

右爲末蒸餅丸每服三三十九食前白湯下

栢香栢榔丸疎三焦寬胸膈破痰飲快氣潤腸

神麩 皂角去皮 郁李仁去皮

杏仁去皮 木香 栢榔 青皮去

枳殼錢一兩

右爲末再用皂角四兩水一碗浸一日揉膏入熱酒少許爲丸桐子大每服五十九淡鹽湯下

保和丸治食積酒積

山查肉一兩 半夏製 蘿蔔子炒各 神麩三錢

麥芽炒 黃連炒 陳皮兩

右爲末酒糊丸服或用神麩糊爲丸尤妙

大安丸脾經消導之劑虛者宜斟酌用之

山查兩 神麩炒 半夏製 茯苓兩

陳皮錢五 白木兩 連翹錢五 蘿蔔子炒

右爲末神麩糊丸服一方無白木

三黃栢木丸治傷肉食濕麩辛辣厚味之物填塞悶亂胸膈不快

黃芩兩 黃連炒 大黃煨 神麩炒

白木

陳皮兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸如棗子大每服五十九白湯下

除濕益氣丸治傷濕麩心腹滿悶肢體沉重

枳實炒 白木 黃芩生 神麩炒

紅花分 蘿蔔子炒

右爲末荷葉燒飯丸每服五十九白湯下

上二黃丸治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩兩 黃連酒洗 升麻 柴胡各三錢

甘草錢二 枳實炒

右爲末湯浸蒸餅丸每服六七十丸白湯下

栢木導滯丸治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶亂不安

黃芩 茯苓 白木 黃連各三錢

安



澤瀉二錢 枳實炒 神麴炒各五錢 大黃二錢  
右為末湯浸蒸餅為丸白湯下五七十九

白朮九治傷 蒼朮粉濕麴油膩之物  
白朮一兩 半夏一兩 橘紅七錢 神麴炒  
枳實炒各一兩 黃芩兩 枯白礬三錢

右為末湯浸蒸餅為丸量所傷多少加減服之如素食多用乾薑故以黃芩瀉之

食狗肉不消心下堅或腹脹口乾發熱長語煮蘆根汁飲之

食魚膾及生肉在胸膈不化必成癥瘕搗馬鞭草汁飲之飲生薑水亦易消

半夏枳朮丸治因冷食內傷一方有澤瀉一兩有小便淋故也

木香乾薑枳朮丸破滯氣消寒飲食  
木香三錢 乾薑炮五錢 枳實炒一兩 白朮一兩  
右為末荷葉飯為丸食前白湯服四五十九

丁香爛飯丸治食傷太陰又治卒心胃痛  
丁香錢一 丁皮錢三 甘草錢一 甘松淨  
砂仁錢一 益智仁各三錢 三稜炮一錢 廣茂炮一錢  
香附錢五 木香錢一

右為末湯浸蒸餅為丸白湯服或細嚼亦可

小胃丹  
芫花好醋拌勻過一宿於瓦器內 甘遂濕鹽裹

日洗曬乾一云水浸冬七日  
春秋五日或用水煮亦可  
大黃以酒潤炒熟切焙乾兩兩 神麴炒  
右為末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨臥津液吞下或白湯送下取其膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心服  
一方加木香換枳各半兩  
藥餅丸每服七八十九

湯下五七九小兒一丸

備急丸治尺寸俱盛填塞悶亂方見車中門  
枳實炒 半夏製 橘紅各二兩 黑丑取頭末

右為末水煮麩糊為丸每服五十九食後生薑湯下

如所傷飲食在胸膈間元元欲吐返覆悶亂以物探吐之甚者用瓜蒂散

人病有宿食何以別之曰脈浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食用大承氣湯下之方見傷寒 脈數而滑者實也此有宿食下之愈宜大承氣湯 下痢不飲食者宿食也亦宜大承氣湯下之 脈緊如轉索無常者有宿食也脈經云寸口脈緊胸中有宿食不化

金露丸治內傷心痞氣不升降水穀不消  
大黃兩 枳實炒五錢 桔梗兩 牽牛五分  
右為末荷葉飯為丸白湯下三五十九食後常服減半

木香見呢丸治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

傷食  
傷食  
傷食



巴苳霜分五 京三稜煨 神麩炒 石三稜煨  
 草薺煨 木香二 香附兩 升麻三  
 右為末湯浸炊餅為丸如菴苳大每服一二十九白湯送下

三稜消積丸治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

京三稜煨 廣茂煨 青皮 陳皮各五

丁皮 益智各三 神麩炒 茴香炒

巴苳和米皮炒

右為末醋麩糊為丸如桐子大每服十九至二十九溫葛湯下食前服量虛實加減得更衣止後服

感應丸治中虛積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷或因飢飽傷食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心

腹大痛霍亂吐瀉大便頻數後重遲滯久痢赤白膿血相雜米穀不化愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞滿四肢倦怠不思飲食不拘新舊冷積並皆治之

木香 肉苳蔻 丁香各一 乾薑煨

巴苳七十箇去皮 杏仁一百四十粒湯

百草霜二

右前四味為末外入百草霜研與巴苳杏仁七味同和勻用好蠟六兩溶化成汁以重絹濾去香更以好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用丸春夏修合用清油一兩銚內熬令香熟次下酒煮蠟同化成汁就銚內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩半同煎熟成汁和膠藥末成劑分

作小錠子油紙裏放旋丸服之每三十九空心葛湯下神應丸治一切冷物冷水及乳酪傷小腹痛腸鳴米穀不化

巴苳 杏仁 乾薑 百草霜各半

丁香 木香各二 黃蠟二

右先將黃蠟用好醋煮去查穢將巴苳杏仁同炒黑烟盡研如泥春夏入香油半兩秋冬入錢溶開下杏仁已荳攪勻次下木香丁香等末研勻搓作錠子油紙裏旋丸桐子大每米飲下三二十九食前日三服大有效

巴苳一百枚雄黃半 白麩十兩炒

右三味內除白麩餘同為細末共麩和勻用新水攪和做餅如手大以水再煮浮於湯上看硬軟捏作餅子每

服五七餅加至十餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利

二行食前茶酒任下

人之生也由五穀之精化五味之備故能生形經曰味歸形若傷於味亦能損形今飲食過節以致腸胃不能勝氣不及化故傷焉經云壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣又云飲食自倍腸胃乃傷以失四時之調節故能成病脈在氣口經曰氣口脈盛傷於食心胃滿而口無味口與氣口同口曰坤者口乃脾之候故胃傷而氣口噤盛夫傷有多少有輕重如氣口一盛得脈六至則傷於厥陰乃傷之輕也枳木丸之類主之氣口二盛脈得七至則傷於少陰乃傷之重也雄黃聖餅子木香檳榔丸枳殼丸之類主之氣口三盛脈得八至九至則傷太陰填塞悶亂則心胃大痛備急丸神保丸消積丸之類主之兀兀欲吐不



已俗呼食迷風是也經曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死瓜蒂散主之如不能吐是無治也經曰其高者因而越之此之謂也備急下之亦可

檳榔九治飲食過多心腹脹悶

檳榔二錢 陳皮 牽牛各一 木香二錢

枳實兩一

右為末醋糊丸生薑湯下三四十九

煮黃九治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣痲痺刺痛如神

雄黃兩一 巴菝五錢去皮研如泥

右入白麩二兩同研勻滴水丸如桐子大滾漿水煮十二九

二九瀉入冷漿水內令沉冷每用時用浸藥冷漿下一

凡一日十二時盡十二九以微利為度不必盡劑

宿食在上脘當吐之宜瓜蒂散又云凡血虛者不可吐

瓜蒂散

八脈絕者當吐

瓜蒂散治大滿大實氣上衝逆上部有脈下部無脈填塞悶亂者用之如尺寸俱盛者宜用備急丸

瓜蒂炒 赤小豆者等

右為細末每服二錢溫漿水調下取吐為度仲景以香

豉七合煮取汁和散一七服之若不至兩尺脈絕者不

宜便服此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胃中窒塞

悶亂不通以物探之得吐則已如探不去方以此劑吐

之或曰盛食填塞胸中痞亂兩寸脈當用事今反兩尺

脈不見其理安在曰胃中有食是木鬱宜達故探吐之

食者物也物者坤土也是足太陰之號也胃中者肺也

為物所塞肺者手太陰金也金主殺伐與坤土俱在手

上而旺於天金能克木故肝木發生之氣伏於地下非

木鬱而何吐去上焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣

食塞於上脈絕於下若不明天地之道無由達此至

水火者陰陽之徵兆天地之別名也故獨陽不生獨陰

不長天之用在於地地下則萬物生長地之用在於天上

則萬物收藏此乃天地交而萬物通也此天地相根之

道也故陽火之根本於地下陰水之源本於天上故曰

水出高源故人五臟主有形之物物者陰也陰者水也

右三部脈主之偏見於寸口食塞於上是絕五臟之源

源絕則水不下流兩尺脈之絕此其理也何疑之有然

必視所傷之物冷熱隨症加減如傷冷物一分熱物二

分則用寒藥二停熱藥一停隨時消息經云必先歲氣

無伐天和此之謂也

秦生好服天生茶及冷物成積而痛寒脈非浮非沉上

下內外按舉極有力堅而不柔觸手突出膚表往來不可

以至數名縱橫不可以巨細狀此陰症鼓擊脈也一身流

行之火萃於胸中寒氣逼之故搏大有力與真武四逆理

中等湯丸佐以芍藥商香使不借上每日服九九夜八九

至夜出汗而愈

既有三陰可下之法亦必有三陰可補之法乎故云內

傷三陰可用溫劑若飲冷內傷雖云損胃未知色脈各在

何經若面色青黑脈浮沉不一弦而弱者傷在厥陰若面

色紅赤脈浮沉不一細而微者傷在少陰若面色黃潔脈

浮沉不一緩而遲者傷在太陰也 如傷在厥陰肝之經

當歸四逆湯加吳茱萸生薑湯之類主之傷在少

陰腎之經宜服通脈四逆湯傷在太陰脾之經理

中九湯主之大便軟者宜湯結者宜丸傷在

唐臣嗜冷食遂成陰症脈遲七八至一止後僅三至予

陰虛脈

木醫學綱卷五



亟與溫劑數服四五日不解遂續進三服一日脈生大汗而解

陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷謂食物無食於多貴在有節所以保冲和而遂願養也若貪多務飽飢寒難消徒積暗傷以召疾患蓋食物飽甚耗氣非一或食不下而上湧嘔吐以洩真元或飲不消而作痰咯唾以耗神水大便頻數而洩耗穀氣之化生洩便滑利而濁耗源泉之滋潤至於精清冷而下漏汗淋漓而外洩莫不由食物過傷滋味太厚如能節滿意之食省爽口之味當不至於飽甚即頓頓必無傷物物皆為益津液內畜精華和氣邪毒不能犯疾疹無由作矣

傷食

胎前傷食  
本治婦人有孕傷食宜服木香丸

木香 二錢 白茯苓 人參 各三錢

右為末麩糊丸每服三十九丸熟湯下

治妊娠氣不和調飲食少味宜服白米散

白米 紫蘇 各一兩 白芷 人參

訶子皮 川芎 青皮 各半 甘草 一錢

右為末每服二錢水一盞薑三片煎至七分不拘時溫服 妊娠傷食又當於前條傷飲食之輕劑參酌用之

經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五臟傷在五味若妊婦飲食不節生冷毒物恣意食啖致脾胃之疾故妊娠傷食難得藥效惟此二方穩便

傷飲

百病皆生於痰  
有痰飲有懸飲有溢飲有支飲 其人素盛今瘦水走腸間漑漑有聲謂之痰飲病痰飲者當以溫藥和之心下

有痰飲者其桂 飲後水流在脇下咳唾引痛謂之懸飲

病懸飲者十棗湯主之 留飲者脇下痛引缺盆咳

嗽則轉甚 胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節疼脈

沉者有留飲 飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身

體疼重謂之溢飲病溢飲者當發其汗大青龍湯小青龍

湯主之 咳逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之

支飲 人咳數年其脈弱者可治實大數者死其脈數者

必苦冒眩其人本有支飲在胸中故也治屬飲家 支飲

亦喘而不能臥加短氣其脈平也 水在心心下堅築短

氣惡水不欲飲 水在肺吐涎沫欲飲水 水在脾少氣

身重 水在肝脇下支滿噎而痛 水在腎心下悸

嘔吐是水飲在心脇仲景云嘔吐心下痞者胸中有水宜

半夏茯苓湯主之又云嘔家本渴今反不渴心下有支飲

故也小半夏湯主之又云先渴却嘔者水停心下小半夏

加茯苓湯主之羅謙甫云痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩

心悸或半身不遂或為寒熱並二陳湯主之 眩

悸是飲仲景云卒嘔吐心下痞眩悸者膈間有水半夏加

茯苓湯主之 又云瘦人膈下有悸吐涎沫而癩眩

者此水也五苓散主之 又云胸滿目眩者苓桂甘

草湯主之 又云心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯

主之 又云心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯

膈上病痰滿喘咳吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其

人振振身劇必有伏飲 脈大心下有留飲其人

背寒冷 病人臂不時疼痛其脈沉細非風也必有飲在

上焦其脈虛者為微勞營衛氣不和故也久久自瘥

九不虛 胸滿是飲仲景云支飲胸滿者厚朴大黃湯主

之

之

之



之方見 又云心下有痰飲胸膈支滿目眩苓桂朮甘湯

渴燥是水飲在腸胃所生仲景云渴而小便不利宜五苓

散主之 又云先渴却嘔者為水停心下小半夏加茯苓

湯主之 又云腹滿口舌乾燥此腸間有水氣防椒藶黃

丸主之但因水所在之處不同而所兼之症不一也

自利有飲故丹溪治久痢皆吐之去膠痰自愈又仲景云

病者脈伏其人欲自利反快雖利心下續堅滿此為留

飲欲去故也甘遂半夏湯主之助觀 又云小便不利四

肢沉重疼痛自利者此為水氣宜用真武湯去芍藥加乾

薑主之久病傷寒表不解嘔效自利者此為水氣宜服小

青龍湯去麻黃加芫花主之 尺膚瘦如枯魚之鱗者水

飲候也見全 色鮮明者有留飲

法 肝脈乘而散色澤者當病溢飲溢飲者暴渴多飲而溢

入肌皮腸胃之外也 肝脈瀆甚為溢飲 肺脈沉而

不弦但苦喘短氣 脈弦數有寒飲冬夏難治 脈沉而

弦者懸飲內痛 脈浮而細滑者傷飲

痰症 絲帛鋪劉真外患傷寒六七日晝夜不得眠方眠即起

風痰多見奇症 凡風痰病必用風痰藥白附子天麻  
 雄黃牛黃僵蚕皂角之類 濕痰多見倦怠軟弱 濕痰  
 宜用蒼白二朮又用油炒半夏  
 痰清者屬寒用二陳湯之類  
 半夏 陳皮 茯苓 甘草  
 每服四錢加生薑七片烏梅一箇煎不拘熱服嘔吐甚  
 者加丁香  
 導痰湯  
 半夏兩 南星 橘紅 枳殼  
 赤茯苓兩 甘草 薑水煎服  
 燥濕痰方  
 南星製 半夏製各 蛤粉兩 青黛為衣  
 熱痰多挾風外症為多用青黛黃連天花粉大快膈上熱  
 痰 痰因火盛逆上者治火為先白朮黃芩石膏之類中  
 氣不足加參朮黃芩假之以降其熱也 食積痰神龜麥  
 蘗山查 欲吐食積痰用蘿蔔子油炒為末漿水調下探  
 而吐之 食積痰必用攻若氣虛者用補氣藥送 老痰  
 海石半夏瓜蒌香附五倍子佐他藥大治頑痰 鬱痰僵  
 蚕杏仁瓜蒌河子貝母五倍子 痰而脾虛者清中氣二  
 陳湯加白朮之類兼用升提藥 內傷痰必用參朮芪  
 之類多用薑汁傳送或加半夏之類虛甚加竹瀝 眩運  
 嘈雜乃火動其痰用二陳湯加梔子芩連之類 噫氣吞  
 酸此係食鬱有熱火氣上動以黃芩為君南星半夏橘紅  
 為臣熱多加青黛 喉中如有物咯不出咽不下此老痰  
 也重者吐之用瓜蒂散氣實用荆瀝 仲景用半升 痰  
 結核在咽喉中燥不能出入化痰藥內加鹹藥軟堅之味



瓜萎仁杏仁海石桔梗連翹少佐以枳殼薑蜜丸噲化  
 凡人身上中下有塊是痰問其平日好食何物吐下後方  
 用藥 痰之為物隨氣升降無處不到 痰在腸胃間可  
 下而愈 痰在經絡中非吐不可出吐中就發散意  
 痰在膈上必用吐之瀉亦不出 痰膠固者及脈浮者俱  
 用吐法吐法見治法 痰在脇下非白芥子不能達 痰  
 在皮裏膜外以薑汁竹瀝導之 痰在四肢非竹瀝不能  
 開 二陳湯善治人一身有痰如在下加下引藥在上加  
 上引藥 潤下丸降痰取妙 青礞石丸重在風化痰  
 小胃丹能損胃食積痰用之然不宜多服 蒼朮治痰飲  
 或策者極效 海粉能治熱痰降濕痰軟結痰消頑痰  
 痰亦可入九子不可入煎藥 枳實瀉痰能衝牆壁 竹  
 瀝能治膈間有痰或癩狂或健忘或風痰最效又能養血  
 木書學綱目卷三 去

荆瀝治痰稍重用此二味效速且穩當二瀝治痰結在皮  
 裏膜外及經絡者必佐以薑汁 薑汁治血滯不行中焦  
 有飲取自然汁冷飲三四盞必覺胸中煩躁不寧後自愈  
 氣實熱痰吐難得出或成塊或吐咯不出及兼水鬱者  
 難治 中焦有痰胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則  
 虛矣 凡治痰用利藥過多致脾氣下虛則痰反易生而  
 多矣

痰之為病方論少有細述之者近惟三因畧言亦無加  
 減法夫痰之源不一有因痰而生熱者有因熱而生痰者  
 有因氣而生者有因風而生者有因驚而生者有積飲而  
 生者有多食而成者有因暑而生者有傷冷物而成者有  
 脾虛而成者有飲酒而成者其為病也驚痰則成心包痛  
 類疾熱痰則成煩燥頭風爛眼燥結怔忡懊惱驚眩風痰

成癱瘓大風眩暈暗風悶亂欲痰成膈痛四肢不舉每日  
 嘔吐食痰成瘡疔口出臭氣暑痰中暈眩冒黃痘頭疼冷  
 痰骨痺四肢不舉氣刺痛酒痰飲酒不消但得酒次日又  
 吐脾虛生痰食不美反胃嘔吐氣痰攻注走刺不定婦人  
 於驚痰最多蓋因產內交接月事方行其驚因虛而入結  
 成塊者為驚痰必有一塊在腹發則如身孕轉動跳躍痛  
 不可忍 凡人手臂或動不得或骨節遍身痛坐臥不寧  
 此痰入骨也 有人脚氣久不治骨節痛與脚氣藥不效  
 此痰病也 凡傷寒病後嘔吐痰不得入亦因初病膈中  
 有涎痰也或因下之太早而遂議其非痰未為確論 傷  
 寒發黃亦是痰病蓋因熱搏而成凡大便秘者亦是痰結  
 右前件諸症變生不一甚不易辨指下難求得此妙訣  
 慎勿輕傳

木書學綱目卷三 去

凡有痰者眼皮及眼下必有烟灰黑色舉目便知不待切  
 脈 眼黑而頰赤者熱痰也而大黃色亦熱痰也外症必  
 煩滿膈熱口乾思冷大便秘結小便赤熱久必生風或眩  
 暈耳鳴眼花多虛症治之而用熱藥服久必脈大實發大  
 熱而中風可急下之 眼黑而行步呻吟舉動艱難者入  
 骨痰也其症遍體骨節疼痛 眼黑而面帶土色四肢痿  
 痺屈伸不便者風濕痰也 眼黑而氣短促者驚風痰也  
 左右關脈大者膈中有痰也可吐之怕吐者消息下之  
 凡人每日背上一條如線而寒起者宜吐下之

凡病百藥不效其關上脈伏而大者痰也用妙應丸加減  
 法方見走注 脚氣加明松脂一錢檳榔木瓜各一兩  
 卷栢半兩先以鹽水煎半日次日白水煮半日同煎藥為  
 丸每服二十九加至四五十丸再服下惡物立效 驚痰



加硃砂二錢又加全蝎每用八九九常與之三三五服去  
 酒痰加雄黃全蝎各二錢每服十九 走注腰痛加核  
 桃三箇燒灰每服三十九加至五十九溫酒下 脚氣走  
 注於前方內加吳茱萸 驚氣成塊者加川山甲炒鱉甲  
 燒各三錢玄胡索蓬朮各四錢每服五十九加至七十九  
 以利為度 腎痺痛加木鱉子去殼研一兩桂半兩 熱  
 痰加益硝等分每服三兩九 寒痰加胡椒丁香蝎桂各  
 等分每服二十五九

洞 痰之為病成偏頭風成雷頭風成太陽頭痛眩運如  
 坐舟車精神恍惚或口眼動或眉稜耳輪俱痒或領腮  
 四肢遊風腫硬似疹非疹或渾身燥痒搔之則隱疹隨生  
 皮毛烘熱色如錦斑或齒頰似痒似痛而疼無定所滿口  
 牙浮痒痒不一或暖氣吞酸鼻間焦臭喉間豈腥氣心煩

鼻寒咽隘不利咯之不出咽之不下或因噴嚏而出或因  
 舉動而唾其痰如墨又如破絮或如桃膠或如蜆肉或心  
 下如停冰鐵閉滯妨悶噁連聲狀如腦氣或寢夢刑戮  
 刀兵劍戟或夢入人家四壁圍遶暫得一寶百計得出則  
 不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲鼻無  
 路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而寤或時郊行忽見  
 天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足膝酸軟或  
 骨節腰腎疼痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊鐵乍起  
 乍止並無常所或 肘手臂麻痠狀如風濕或臥如芒刺  
 不安或如毛虫所螫或四肢不舉或手足重滯或眼如蠶  
 蜃膠粘痒澀開闔甚難或陰睛交變之時胸痞氣結閉而  
 下發則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲  
 初則涕唾稠粘次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳

內蟬鳴眼瞶肉楊治之者或曰勝理不密風府受  
 上感下虛或曰虛或曰寒或曰發邪惟洞虛千倘此疾  
 乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交紐窒塞煩鬱  
 有如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃  
 間湧起凜然毛豎噴嚏千百然後遍身煩燥則去衣凍體  
 稍止片時或春秋乍涼之時多加衣衾亦得暫緩或頓飲  
 冰水而定或痛飲一醉而寧終不能逐去病根乃得神祕  
 沉香丸方屢獲大效愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱  
 語括之詩曰醜裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相逢二  
 八求斤正硝燬青礞倍若沉十七兩中沉半兩水九梧子  
 意須料除驅怪病安心志水瀉雙身却不任

大黃 八 青礞石 一兩 硝燬 如金色

右為末水丸如梧子大白湯食後空心服 一切新舊  
 失心喪志或癩或在狂等症每服一百九氣盛能食狂其  
 者加二十九臨時加減消息之 一切中風癱瘓痰涎  
 壅塞大便或通或結者每服八九十九或加至百九永  
 無秘結之患 一切陽症風毒脚氣遍身游走疼痛每  
 服八九十九未效加至百九 一切無病之人遍身筋  
 骨疼痛不能名者或頭疼牙痛或搖或痒風蛙等症風  
 寒鼻塞身體或疼或不疼非傷寒症者服八九十九痰  
 盛氣實者加之 一切吞酸噯逆膈氣及胸中疼悶腹  
 中氣塊衝上嘔沫吐涎狀如翻胃心下恍惚如畏人捕  
 怵惕不安陰陽關格變生乖症食飢飽憂思過慮心  
 下嘈雜或痛或噦或晝夜虛飽或飢不喜食急慢喉閉  
 赤眼每用加減服 一切新舊痰氣喘嗽或嘔吐頭暈



目眩加減服之 一切顯腫腫硬若癰癰者及口糜舌爛咽喉生瘡者每服六七十丸加蜜少許一處嚼碎喻化睡時徐徐嚥之曾有口瘡者服三十九丸依前法喻之二三夜瘥 一切男婦大小虛實心疼連腹身體羸瘦發時必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下溫暖者量虛實加減服之若事屬不虞之際至百丸即便回生未至顛危者虛弱疑似之間只服三十九或五十九立見生意然後續進之以瘥為度兼服生津化痰溫中理氣之藥 一切疔毒疔疾凡男婦患非傷寒內外等症或酒色過度或吐血或月事愆期心煩志亂或腹脹脇痛勞倦痰喘或暴行日中因暑伏痰口眼喎邪目痛耳憤鼻塞骨節酸軟乾嘔惡心諸般內外疼痛百藥無效眾醫不識者依前法加減服之效大抵服藥須臨臥

八醫學綱目卷三十一

辛

在床用熱水一口許嚥下便臥令藥在喉膈間徐徐而下如日間病出不測疼痛不可忍必欲急除者須是一依前臥法服大半日不可食湯水及不可起身行坐言語直候藥丸除遂上焦痰滯惡物過膈入腹然後動作方能中病每夜須連進二次次日痰物既下三五次者仍服前數下五七次或只下二三次而病勢頓已者次夜減二十九頭夜所服並不下惡物者次夜加十九人壯病實者多加至百丸惟候虛實消息之或服過仰臥咽喉稠粘壅塞不利者痰氣泛上乃藥病相攻之故也少頃藥力既勝自然寧帖性病久結實於肺胃之間或只暴病全無泛濫者服藥下咽即仰臥頓然百骸安靜五臟清寧次早先去大便一次其餘遍數皆是痰涕惡物看甚麼糞用水攪之盡係痰片粘涎或稍稍腹痛

腰腎拘急者蓋有一種頑痰惡物閉氣滑腸裏急者狀如痢疾片餉即已若有痰涎易下者快利不可勝言頓然滿口生津百骸爽快間有片時倦怠者蓋因連日病苦不安一時為藥力所勝氣體暫和如醉得醒如浴方出如睡方起此藥並不洞泄刮腸大瀉但取痰積惡物自腸胃次第而下腹中糟粕並不相傷其推下腸腹之糞則藥力所到之處是故先去其糞其餘詳悉不能備述服者當自知之

熱藥

黃連導痰湯二陳湯加黃連枳實是也

黃芩利膈丸利胸中熱治膈上痰

- 黃芩 生炒各 南星 三錢 半夏 五錢 黃連 三錢
- 枳殼 三錢 白朮 五錢 陳皮 三錢 澤瀉 五錢
- 白礬 五錢

八醫學綱目卷三十一

辛

右為末水浸蒸餅丸每服三四十九白湯下食遠服

中和丸

- 蒼朮 黃芩 半夏 香附

各等分為末蒸餅糊丸

小黃丸化痰止涎除濕和胃氣治胸膈不利

- 黃芩 一兩 乾薑 二錢 白朮 半兩 半夏 五錢
- 澤瀉 三錢 黃芪 兩

右為末蒸餅糊丸白湯下

風痰

祛風丸有人喜食酸醃酒色過節滲注成痰飲聚於胸膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻木升則頭目昏眩降則腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則厥然倒地此藥寬中祛痰搜風理氣和血駐顏延年益壽

- 半夏 麩 荆芥 各四 槐角子 炒 白礬 生



橘紅 硃砂各一

右為末薑汁糊丸每服五六十九生薑皂角子仁湯送下日三服

導痰丸

半夏六兩分作三處一分水浸一分肥皂

右餘藥在下半夏在上浸至十日半月時時動水令二藥相透次相合一處揀去巴豆皂角慢火煮乾取半夏切碎晒乾入

甘遂製二 百藥煎二 僵蚕兩 全蝎二

右為末同前半夏末一處合和用揀出皂角鍊膏為丸如硬再入糊令得所每服十五九實者二十五九

膈上有痰川芎丸

川芎二兩細切 慢火熬熟 川大黃二兩蒸

木實字類卷之三

辛

右件焙乾為末用不蛀皂角五七挺溫水搽汁縮濾出查瓦罐中熬成膏和前二味為丸如桐子大每服十五九小兒三九生薑湯下

經治風痰用鬱金一分藜蘆十分各為末和勻每服一字

用溫漿水調下以餘漿水嗽口仰服以食壓之

五飲湯治五飲最效

旋覆花 人參 陳皮白去 枳實

白木 茯苓 厚朴製 半夏製

澤瀉 猪苓 前胡 桂心

白芍 甘草炙

右等分每兩分四服薑十片水二盞煎去查溫服無時忌肉食生冷等物因酒成飲加葛根葛花砂仁

倍木丸治五飲一曰解飲停水在心下二曰癖飲水在

兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在脰五曰水在脇間瀝瀝有聲皆由飲水過多或飲冷酒所致

白朮 桂心去 乾薑炮各

右為末蜜丸每服二十九溫米飲下加至三十九食前

治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉弦細遲旋覆花湯

細辛 陳皮 桂心 人參

甘草 桔梗 芍藥 半夏

旋覆花已上各 赤茯苓

右為末每服四錢薑七片煎去查溫服

木香半夏丸治痰涎上壅心胸不利常服消痰寬膈

木香錢 半夏兩 陳皮 茯苓

木實字類卷之三

辛

薑屑 人參 草薺 白附子錢五

右為末麪糊丸食後生薑湯下三十五九

降痰丸治三焦氣滯下痰飲食利膈痞滿咳唾稠粘面

熱目赤肢體倦怠不思飲食常服升降滯氣消化痰涎

木香 檳榔 青皮 陳皮

京三稜 枳殼炒 半夏洗 大黃

黑牽牛各一

右為末麪糊丸食後薑湯下

運氣 運氣痰飲皆屬濕土經云太陰在泉濕淫所勝民病飲積又云歲土大過雨濕流行其則飲發中滿又云土鬱之發飲發中滿又云太陰之勝腹背病滿飲發於中治以諸熱劑是也

針灸 諸諸痰為病頭風喘嗽一切痰飲 豐隆 中脘

針灸



一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

婦人年高風痰作楚脈沉實滑數痰在下則無方在上則胸膈閉悶在上則頭風喘嗽昏暈發則抽牽手足抖動  
風門 沿皮二寸 巨關三寸 豐隆半寸 肩井五分  
甲 溢飲脇下堅痛中脘主之

痞 不能食 飢不能食 惡食 姓 身惡食

痞者心下痞滿而不能食是也仲景云滿而不痛為痞滿而痛為結

濕主痞 傷寒下 夫痞者心下滿而不痛是也太陰者濕也主壅塞乃土來心下為痞滿也傷寒下太早亦為痞乃因寒傷其榮榮者血也心主血邪入於本故為心下痞悶仲景立瀉心湯數方皆用黃連以瀉心下之土邪其效如響應梓故活人書云密知是痞先用桔梗枳殼湯非以此專治痞也蓋因

本草綱目卷三

先錯下必成痞症是邪氣將陷而欲過胸中故先用截散其邪氣使不致於痞先之一字早用之義也若已成痞而用之則失之晚矣不惟不能消痞而反損胸中之正氣則當以仲景痞藥治之經云察其邪氣所在而調治之正謂此也非止傷寒如此至於酒積雜病下之太過亦作痞傷蓋下多亡陰亡陰者謂脾胃水穀之陰亡也故胸中之氣因虛下陷於心之分野故致心下痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則其痞益甚其而復下之氣愈下降必變為中滿膨脹皆非其治也又有虛實之殊如實痞大便閉者厚朴枳實湯主之虛痞大便利者芍藥陳皮湯主之如飲食所傷痞悶者常消導之去其胸中窒塞上逆兀兀欲吐者則吐之所謂在上者因而越之是也  
治痞獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣 傷

寒痞者從血中來雜病痞者亦從血中來雖俱為血症大抵傷寒之症從外至內從有形至無形故無形氣症以苦泄之有形血症以辛甘散之中滿者多食其不滿者復當食也中滿者腹脹也如自覺滿而外無腹脹之形即非中滿乃不滿也不滿者病也當以甘治之可也  
黃芪補中湯  
黃芪五分 人參八分 甘草 白朮  
蒼朮五分 陳皮五分 澤瀉 猪苓  
茯苓各三分

治一婦人因有大不如意事遂致膈滿不食因循累月積成癥痞不能起坐至午已間必發熱面赤酉戌後熱退面赤亦退至夜小便雖數每出數滴而已六脈沉澁而短小左右一脈重取皆有經水雖按月亦數滴而已予曰此志不遂而氣鬱胃有瘀血而血亦虛鬱氣成痰在中官却不食兼用補瀉之治法以白朮二錢人參茯苓各一錢紅花一莖大陳皮一錢煎取濃湯一呷食前熱服之少頃藥行後與半匙稀粥又少頃用減輕粉牽牛三花丸如芝蔴大以半睡下十五九一日一夜煎藥丸藥各服四遍至次日方食知味又次日食稍進第三日則熱退面赤亦不如此七日飲食起坐平復如初

白朮 青皮 半夏各二 乾葛一錢  
木通 甘草 茯苓  
分二貼薑二片煎下與熟九三十九保和九二十九



葶藶丸治心下痞胸中不利  
 苦葶藶酒浸人參各三錢 甘草根炙羌活  
 柴胡 獨活各二錢 黃芩三錢一分半酒  
 砂仁 茵陳酒炒各一錢 白芷錢一分半  
 厚朴 半夏各五分 當歸身七錢 青皮  
 右為末蒸餅九箇內水發如米大臨臥白湯服一錢  
 木香消痞湯治因憂氣鬱結中脘腹皮急微痛心下痞滿  
 不思飲食食亦不散常覺痞悶  
 柴胡七分 陳皮八分 甘草炙五分 半夏一錢  
 生薑一錢 歸稍二錢 紅花許少 枳實一錢  
 木香七分 草薺一錢  
 作一服水煎去查食前熱服忌酒麪等物  
 大消痞丸治一切心下痞滿及積年久不愈者  
 黃芩 黃連炒各六錢 薑黃 白朮各一錢  
 人參二錢 甘草炙 砂仁各一錢 枳實炒五錢  
 半夏製四錢 乾薑一錢 陳皮二錢 神麩炒一錢  
 澤瀉三錢 厚朴二錢 猪苓一錢  
 右為末水浸蒸餅為丸每服六七十丸至百丸食遠白  
 湯下  
 黃連消痞丸治心下痞滿壅塞不散煩熱喘促不寧  
 黃連一兩 枳實炒七錢 乾薑二錢 半夏七錢  
 黃芩一兩 茯苓 白朮 甘草炙各三錢  
 薑黃一錢 澤瀉一兩 猪苓  
 右為末湯浸蒸餅為丸每服五七十丸白湯食前下  
 失笑丸治右關脈浮弦心下濕痞惡食懶倦開胃進食  
 枳實 黃連各五錢 乾薑二錢 半夏炒三錢

厚朴炙門 人參錢五 甘草錢二 白朮錢三  
 麥藥二錢  
 右為末水浸蒸餅為丸每服三十九丸白湯送下不拘時  
 量虛實加減服  
 小娘心頭痞悶口乾面微黃脈洪  
 黃連 半夏 白朮 青皮  
 木通各三錢  
 分三點薑煎去查熱服下保和丸十五丸  
 回金丸瀉肝火行濕與熱能開痞結治肝邪補脾土  
 黃連六兩 吳茱萸兩  
 右為末水浸蒸餅為丸一方用黃連六兩吳茱萸半兩  
 一名佐金丸  
 瀉少陰面赤下痢心下痞瀉心湯加減例易老單用黃連  
 瀉心湯用錢氏法後隨症加減 煩者加山梔 燥加香  
 鼓 嘔加半夏 滿加枳實厚朴 腹痛加芍藥 脈遲  
 加附子 下焦寒加乾薑 大便秘加大黃 如用薑附  
 先煎令熟使熱不借後加黃連同用  
 化方見  
 有形血  
 在字中  
 化方見  
 人參湯治胸痺心痞方見 半夏瀉心湯治痞滿關脈  
 沉方見  
 一女子在家因事不如意鬱結在脾半年不食每日食  
 量數枚適喜假頭亦能少食惟深惡粥飯予診其脾氣非  
 枳實不能散遂以溫膽湯去竹茹與服經三月服二百貼  
 而愈 又一女子二十餘許婚後夫遠出二年不歸女子  
 病重不食困臥如痴他無所苦諸醫不效予往治之見女



向裏床而睡形體羸瘦予思之此氣結病也藥不能治  
怒可解予往激其怒堂其面三日責以不得有外思女果  
大怒而哭待其哭一二時許令其父母解之進藥二貼即  
飲食矣予謂其父母曰雖愈必得喜方可解若再思則結  
氣必復至矣其父因傷作其夫有書回約日成婚一月餘  
其夫果婦病得全愈

飲食

飲食傷脾胃者大消痞丸枳朮丸回金丸之類甚者  
微下之吐之下之者檳榔丸煮黃丸吐之者二陳湯及瓜  
蒂散探吐之是也

治膈下冷氣及酒食飽滿常服用青皮四兩分作四分  
一分用湯浸一宿去穢餘三分用鹽二兩拌勻良久銚內  
微炒焦為末每服一錢半茶末五分水一盞煎七分放溫  
常服用沸湯點服尤妙

入醫學綱目卷三 夫

寒熱

寒痞辛甘散之枳實理中丸之類是也熱痞苦寒泄之大  
消痞丸之類是也

治痞軟石膏研末醋糊丸服能瀉胃火食積痰火  
運氣痞有三

一曰濕痞經云土平氣曰備化備化之紀其病痞又云太  
陰所至為滿為積飲痞膈又云太陰司天之政民病寒  
濕痞逆又云土鬱之發痞堅腹滿又云土不及曰甲監甲  
監之紀其病留滿痞塞是也

二曰寒痞經云水鬱之發民病痞堅腹滿又云太陽之復  
心痛痞滿是也

針灸

三曰燥痞經云陽明之復甚則痞滿是也  
問井主心下滿十二經皆有井常治何井 假令善潔  
面青善怒是少陽經受病當治金井竅陰是也 假令滿

禁忌

閉淋洩便難轉筋足厥陰肝經受病當治木井大敦是也  
假令頭項痛腰脊強發熱惡寒足太陽膀胱受病當治  
陽井至陰是也 假令手足自溫自利不渴足太陰脾受  
病當治陰井隱白是也

藥戒○客有病痞者積於其中伏而不得下自外至者  
捍而不得納從醫而問之曰非下之不可歸而飲其藥既  
飲而暴下不終日而向之伏者散而無餘向之捍者定而  
不支焦膈通達呼吸開利快然若未始有疾者不數日痞  
復作投以故藥其快然也亦如初自是不踰月而痞五作  
五下每下輒愈然客之氣一語而三引體不勞而汗股不  
步而慄肌革無所耗於前而其中藹然莫知其所來嗟夫  
心痞非下不可已予從而下之術未爽也藹然獨何如問  
楚之南有良醫焉往而問之醫笑曰子無怪是藹然者也

入醫學綱目卷三 夫

凡子之來因為是藹然也坐吾語汝天下之理有甚快於  
吾心者其末也必有傷求無傷於其中則無望快於吾心  
夫陰伏而陽蓄氣與血不運而為痞橫乎子之胸者其累  
大矣擊而去之不須臾而除其大之累和平之物不能為  
也必將搏擊震撓而後可夫人之和氣冲然而其微泊乎  
其易危擊搏震撓之功成而子之和亦已病矣由是觀之  
則子之痞凡一快者則子之和亦一傷矣不踰月而快者  
五子之和平之氣不既索乎故藹然如不終日也且將去  
子之痞而無害於和也子歸燕居三月而後與之藥可為  
也客歸三月齋戒而復請之醫曰子之氣少復矣取藥而  
授之曰服之三月而疾少平又三月而少康終年而可復  
常且飲藥不得亟進客歸而行其說然其初使人慙然而  
遲之蓋三投藥而三反之也然日不見其所攻之效久較



則月異而時不同終歲而疾平矣客謂醫再拜而謝之坐而問其故醫曰此醫國之說豈特施之於病哉予獨不見秦之治民乎捍而不聽令愷而不勤事放而不畏法令之不聽治之不變則秦之民常指矣商君見其病也厲以刑法威以斬伐悍厲猛鷙不毫髮少貸痛刻而力組之於是乎秦之政如建瓴流通四達無敢或拒而秦之痞常一快矣自孝公以至二世凡幾痞而幾快矣頑者已圯強者已柔而秦之民無不心矣故猛政一快者歡心一亡積快而不已而秦之四肢枵然徒具其物而已民心日離而君孤立於上故匹夫大呼不終日而百姓皆起秦欲運其手足肩背而漠然不我應故秦之亡也是好為快者之過也昔者先王之民其初亦嘗痞矣先王豈不知肅然擊去之以為速也惟恤其有傷於中也故不敢求快於吾心優柔而

大醫學綱卷三

手

撫育之教以仁義道以禮樂陰解其亂而除去其痞旁視而憊然有之矣然月計之歲察之前歲之俗非今歲之俗也不擊不搏無所忤逆是以日去其戾氣而不嬰其歡心於是政成教達安樂久而後患除矣是故三代之治皆更敷聖人歷數百年而後俗成則予之藥終年而疾愈蓋無足怪也故曰天下之理有甚快於吾心者其末也必有傷求無傷於其終則無望快於予心雖然豈特治天下為然哉客再拜而紀其說

不能食

心下不痞滿自不能食也

虛實

兩薑汁浸一宿曝乾為末麪糊丸食後生薑湯下  
和中丸開胃進食

乾薑 木瓜 甘草 陳皮

右為末蒸餅糊丸食前白湯下三五十九

七珍散開胃進食補脾養氣

人參 白朮 黃芪 山藥

白茯苓 粟米 甘草

右為末每服二錢薑棗煎服如故不思飲食加匾荳一

兩名八珍散此方溫平不熱常服飲食自倍

六神湯治傷寒虛羸不思飲食

人參 白朮 黃芪 枳殼

白茯苓 甘草

右為末每服五錢薑棗同粳米合許煎食前服

錢氏異功散治脾胃虛弱難任飲食

紅木香 各等

大醫學綱卷三

手

難謙甫云脾胃弱而飲食難任者不可一藥用克伐之劑宜錢氏異功散補之自然能食或嗜食太過傷脾而痞滿嘔逆權用枳實丸一服慎勿多服予嘗治翁氏久瘧食少汗多先用補劑加黃連枳實月餘食反不進汗亦不止因悟謙甫此言遂減去枳連純用補劑又令粥多於藥而食進又於原方內加附子三分半一服而愈

寬中進食丸滋形氣喜飲食

草薢仁 砂仁 半夏 麥芽

枳實 神麪 甘草 乾薑

陳皮 木香 白朮 白茯苓

猪苓 澤瀉 人參 青皮

右為末湯浸蒸餅為丸每服三五十九白湯下



和中丸治病久虛弱厭厭不能食而臟腑或秘或瀉常服和中理氣消痰進食去濕厚腸胃

厚朴製 白朮一兩 半夏製 橘紅八錢

檳榔四錢 枳實三錢 木香二錢 甘草三錢

右為末生薑汁浸蒸餅丸每服五六十九食遠白湯下

木香枳朮丸 木香參薑枳朮丸能開胃進食見內傷飲食

交泰丸升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脹除

怠墮嗜臥四肢不收沉困懶倦

知母四錢 熟地一兩 半生一兩 柴胡一錢 厚朴去皮

各加一錢 人參一錢 黃連六錢 秋一錢

苦練酒 肉桂去皮 白茯苓三錢 皂角去皮

紫苑去苗 小椒炒 白朮二錢

川烏頭四錢 乾薑三錢 巴豆霜半兩 吳茱萸湯洗

砂仁三錢 右除巴豆霜另研入餘俱為細末蜜丸每服三四十九

溫水下量虛實加減

人參半夏丸下痰進食方見咳

治一男子因服熱藥多又性急形瘦多傷食少此時四

月後與此方分作十四貼食後煎熱下大補丸十五粒

白朮一兩 炒麩一兩 陳皮七錢 黃芩六錢

人參 知母炒 麥門冬 木通各半

生甘草 炙甘草各二

又治勞苦不思飲食

白朮三錢 滑石 白茯苓各一

水煎服下保和丸三十九

治脚氣瘦倦不思飲食

白朮二兩 蒼朮 陳皮 黃連

黃柏 半夏各半 匾栢七錢 香附一兩

白芍藥一兩

右為末薑汁糊丸

憂抑傷脾不思飲食

黃連炒 芍藥酒 香附 青六散末方

滯下即六一散 加紅曲二兩

右薑汁浸炊餅為丸

濕痰氣滯不思飲食三補丸加蒼朮倍香附

治脾氣久虛不進飲食停飲脇痛麩朮丸

神麩炒 白朮五兩 乾薑 官桂各二

吳茱萸 川椒各三

右為末薄糊丸每服三五十九食前薑湯下有飲加白

朮二兩此方自試有效

神丸治脾腎虛弱全不進食

破故紙炒 肉苳菴生

右為末用肥棗四十九箇生薑四兩切片同煮棗爛去

薑取棗剝去皮核用肉研為膏入藥末和杵丸如桐子

大每服三四十九塩湯下有人全不進食服補脾藥皆

不效予授此方服之頓能進食此病不可全作脾氣治

蓋腎氣怯弱真元衰弱是以不能消化飲食譬之鼎釜

之中置諸米穀下無火力終日米不熟其何能化黃魯

直管記服兔絲子淘淨酒浸曝乾日挑數匙以酒下之

十日外飲嗽如湯沃雪亦知此理也

胃弱不思飲食腸鳴腹痛食亦不化 三里 三陰交



三焦停水氣攻不食身黃微熱胃中有寒故也 維

中封 胃俞 腎俞

三焦邪熱不嗜飲食 關元一分沿皮向

全不思食 然谷立脫

脈浮滑而疾者食不消脾不磨 陽脈滑而緊滑則胃氣

實緊則脾氣傷得食不消者此脾不和也 類治之

寸口脈微而滑微者衛氣不行滑者榮氣不達榮衛不

能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則頭疼口難

言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而

吞酸中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則為遺洩

類治之

飢不能食

黃帝曰人之善飢而不嗜食者何氣使然岐伯曰精氣

并於脾熱氣留於胃胃熱則消穀殺消故善飢胃氣逆上

則胃脘寒故不嗜食也 大惑

運氣飢不欲食皆屬濕邪傷腎經云太陰司天濕淫所勝

民病心如懸飢不欲食治以苦熱是也

鍼灸飢不欲食有一法

其一清胃經云胃者水穀之海其膈上在氣衝下至三里

水穀之海不足則飢不受穀審守其膈調其虛實是也

其二取腎經云腎足少陰之脈是動則病飢不欲食心如

懸苦飢狀視盛虛熱寒陷下取之也

飢不能食飲食不下嘔而雷鳴 大迎 中極 食寶

又法 期門 章門

多脈不及為病在中令人心懸如飢 全文見治

寸口脈弱遲弱者胃氣微遲者榮中寒榮為血血虛則

發熱胃為氣氣虛則發厥

惡食

大陰所謂惡食臭者胃無氣故惡食臭也

惡食者胸中有物導痰補脾二陳加白芍香等湯

白朮 山查 川芎 蒼朮

半夏 陳皮 茯苓 甘草

失笑丸治虛痞惡食方見

妊娠惡食

治妊娠惡食

人參 厚朴 生薑 枳殼

甘草 水煎服

凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈

消瘴門 胎前產後濕 口燥咽乾

渴而多飲為上消 消穀善飢為中消 渴而便數有膏

為下消 上消者舌上赤裂大渴引飲逆調論云心移熱於肺傳

為膈消是也以白虎加人參湯主之 渴古曰上消者上焦

飲水而少食大便如常小便清利知

中消者善食而瘦自汗大便硬小便頻數和云口乾飲

水多食亦飢虛癯成為消中者是也以調胃承氣湯及三

黃丸主之 燥古云中消者胃也渴而飲食多小便赤

下消者煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏和云焦煩水易

虧此腎消也以六味地黃丸主之 燥古云腎消者病在下

如膏油之狀至病成面色焦黑形瘦而耳焦小便

濁而有脂液治宜養血以分其清濁而自愈矣

右三消者經謂之渴消渴消者渴而多飲是也中消者

經謂之消中消中者渴而飲食俱多或不渴而獨飲是



世下消者經謂之腎消腎消者飲一澗二其瘦如膏  
即隔消消中之傳變王註謂肺燥氣無所持是也  
蓋肺藏氣肺無病則氣能管攝津液而津液之精微者  
收養筋骨血脈餘者為澗肺病則津液無氣管攝而精  
微者亦隨澗下故飲一澗二而澗如膏油也筋骨血脈  
無津液以養之故其病成漸形瘦焦乾也然肺病本於  
腎虛腎虛則心寡於畏妄行凌肺而移寒與之然後肺  
病消故仲景治澗而小便反多用腎氣丸補腎救肺後  
人因名之腎消及下消也或曰經既云肺消死不治仲  
景復用腎氣丸治之何也曰飲一澗二者死不治若飲  
一未至澗二者病尚淺猶或可治故仲景腎氣丸治飲  
水一斗小便亦一斗之症若小便過於所飲者亦無及  
矣

八醫學綱目卷三  
素

病式服藥

養豬肚湯

小承氣湯

養豬肚湯  
養豬肚湯  
養豬肚湯

羊肉冬瓜湯

腎氣丸

消渴手太陰大渴不止

消足陽明

腎消足少陰

麥冬飲子

兜丸

化水丹

易老順氣散

麥冬飲子

論消渴末傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中  
滿鼓脹聖濟總錄皆為必死不治之症潔古分而治之能  
食而渴者白虎加人參湯主之不能食而渴者錢氏白木  
散倍加葛根主之上中既平不復傳下消矣前人用藥厥  
有旨哉或曰末傳瘡疽者何也此火邪勝也其瘡痛甚而  
不潰或赤水者是也經曰有形而不痛者陽之類也急攻  
其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死末傳

中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢繩墨而更其道也  
然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大  
其服皆適其所至所為故知過與不及皆誅罰無過之地  
也如膈消中消制之太急速過病所久而成中滿之疾正  
謂上熱未除中寒復生者非藥之罪失其緩急之宜也處  
方之際宜加審焉

總錄論消渴有三種一者渴而飲水多小便數有脂似  
麩片而甜者消渴病也二者吃食多不甚渴小便少有似  
油而數者消中病也三者雖渴飲水不能多腿脚瘦小痿  
弱小便數此腎消病也特忌房勞千金云消渴病宜慎者  
有三一飲酒二房勞三鹹食及麪能慎此三者雖不服藥  
亦自可愈消渴之人愈與未愈皆須慮慮大難必於骨節  
間忽發癰疽而卒

八醫學綱目卷三  
素

帝曰夫子數言熱中消中不可服膏梁芳草石藥石藥  
發瘧芳草發狂夫熱中消中皆富貴人也今禁膏梁是不  
合其心禁芳草石藥是病不愈願聞其詳岐伯曰芳草之  
氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和不  
可以服此二者帝曰不可以服此二者何以然岐伯曰熱  
氣慄悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾胃者土也而惡木  
服此藥者至甲乙日更論熱中論王註云多飲數波謂之  
即白芷石藥  
即鍾乳之類

滑石治渴本為竅不利而用之以燥能亡津液也天令  
濕氣太過者當用之若無濕用之是犯禁也

黃帝曰人之善病消瘵者何以候之少俞答曰五臟皆  
柔弱善病消瘵黃帝曰何以知五臟之柔弱也少俞曰  
夫柔弱者必有剛強剛強多怒柔者易傷也黃帝曰何以



候柔弱之與剛強曰此人薄皮膚而目堅固以深者長衝直揚其心剛剛則多怒怒則氣上逆胸中蓄積氣血逆留腕皮充肌血脈不行轉而為熱熱則消肌膚故為消瘴此言其人暴剛而肌肉弱者也五變 肺弱以薄者心脆心脆則善病消瘴熱中 肩背薄者肺脆肺脆則善病消瘴易傷 腸骨弱者肝脆肝脆則善病消瘴易傷 唇大而不堅者脈脆脈脆則善病消瘴易傷 耳薄不堅者腎脆腎脆則善病消瘴易傷全文見 心脈微小為消瘴滑甚為善渴 肺脈微小為消瘴 肝脈微小為消瘴小甚為多飲 脾脈微小為消瘴 腎脈微小為消瘴 諸脈小者陰陽俱不足也勿取以針而調以其藥全文見治法 凡治消瘴肥貴人則膏粱之疾

岐伯曰脈實大病久可治脈懸小堅病久不可治虛實 病若開目而渴心下牢者脈當得緊實而數反得沉澹而微者死也十七

脈消渴脈數大者生細小浮短者死

渴而多飲為上消

治消渴養氣 降火 生血為主 茯苓根治消渴之神藥

心移熱於肺傳為膈消全文見 膈消傳變王註云心膈兩橫膈膜故心熱入膈久久傳化內為膈熱消渴而多飲也

潔古云能食而渴者白虎倍加人參湯主之不能食而渴者錢氏白朮散加葛根大作湯劑廣服之

人參石膏湯治膈消上焦煩渴不欲多食

人參五 石膏一 知母七 甘草四

每服五錢水煎食後溫服  
加減地骨皮散治上消  
知母 柴胡 甘草 半夏  
地骨皮 赤茯苓 白芍藥 黃芪  
石膏 黃芩 桔梗

右為細末每服三錢薑五片水煎食遠溫服

白朮散治虛熱而渴

人參 白朮 白茯苓 甘草各一

乾葛二 藿香一兩 木香一兩

右為末每服三錢煎溫服如飲水多多與服之海藏云

治脾胃虛弱大渴不止而食少小便不利大便不調精神短少腹窄狹如繩束之

白茯苓去 橘紅各一 生薑兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服二九白湯化空心服忌生冷硬物怒發思慮過度如脈弦或腹中急甚者加甘草三錢

易老門冬飲子治老弱虛人大渴

人參 枸杞子 白茯苓 甘草各三

五味子半兩 麥門冬半兩 薑水煎服

門冬飲子治膈消胸滿心煩精神短少多為消病

知母 甘草各 瓜蒌仁 五味子

人參 葛根 茯神 生地

麥門冬各一

右為末每服五錢加竹葉十四片同煎

小便不利而渴知內有濕也小便自利而渴知內有燥

治消渴養氣 降火 生血為主 茯苓根治消渴之神藥



也濕宜泄之燥宜潤之

**四**脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗五苓散上之傷寒 脈浮發熱渴飲水小便不利者猪苓湯主之傷寒

**五**火府丹治消渴方見 壬戌年一卒病渴日飲水三斗不食者三月心中煩悶時已十月予謂心中不伏熱與此藥數服每服五十九溫水下越二日來謝云當日三服渴止又次日三服飲食如故此方本治淋用以治渴效信乎藥要變通用之

**六**石燕主消渴同水牛角和煮飲之 渴而小便自利諸方並見下消燥熱條

**七**神效生津甘露飲子方見下消 消渴泄瀉先用白芍白朮各炒為末調服後隨症用藥

**八**止渴潤燥湯治消渴大便乾燥喜溫飲陰頭短縮舌上白燥唇裂口乾眼難開及於黑處如見浮雲

升麻一錢 柴胡一錢 甘草稍五分 杏仁六錢  
桃仁一錢 麻仁一錢 歸身一錢 紅花少許  
防風根一錢 荆芥穗一錢 熟地一錢 小椒一分  
細辛一分 黃柏一錢 知母一錢 石膏各一錢  
水煎去渣食後熱服

雜症有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以苦堅之 太陽無汗而渴不宜服白虎湯若得汗後脈洪大而渴者宜服之 陽明汗多而渴不宜服五苓散若小便不利汗少脈浮而渴者宜服之

**九**消渴病退後而燥渴不解此有餘熱在肺經可用參苓甘草少許生薑汁冷服 虛者可用人參湯

**化水丹**治手足少陰渴飲不止或心痛者

川烏 廣地黃 甘草 牡蠣 蛤蚧 鹿角 鹿角膠 鹿角霜 鹿角粉 鹿角末 鹿角油 鹿角髓 鹿角腦 鹿角汗 鹿角淚 鹿角涕 鹿角涎 鹿角涕 鹿角淚 鹿角涕 鹿角涎

右為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新水下心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服愈海藏云此藥能化停水

**六經渴**太陽經渴其脈浮無汗者五苓散消石之類主之 陽明經渴其脈長有汗者白虎湯涼膈散之類主之 少陽經渴其脈弦而嘔者小柴胡湯加瓜蒌之類主之 太陰經渴其脈細不欲飲飲思湯不思水者四君子理中湯之類主之 少陰經渴其脈沉細自利者猪苓湯三黃丸之類主之 厥陰經渴其脈微引飲者宜少少與之

**治時氣煩渴**用生藕汁一盞入生蜜一合令勻分為三服

**服** 好乾醉 好蜜 水 細麵

右先蒸蜜水去沫冷下麵醉每日攪三次熱服

**渴欲飲水不止者**文蛤散主之 文蛤五兩按本草云文蛤味鹹寒治消渴渴無揮以文蛤為五味子

右一件捍為散以沸湯和服方寸匕 治一切渴用大牡蠣不拘多少於臘月或端午日黃泥裏煨通赤放冷取出為末用鯽魚煎湯下一錢七小兒五分只兩服

**治渴疾飲水不止神效散** 白浮石 蛤粉 蟬殼 右為末用鯽魚膽七箇調三錢不拘時服



又消渴方

白浮石 船上青苔等麝香少

右為末每服一錢溫湯下

苦堅 黃連九印瓜蒌根丸是也

上焦燥而渴蜜煎生薑湯用大器傾注時時呷之法曰

心肺之病莫厥煩而少飲內經曰補上治上宜以緩又曰

辛以潤之開腠理致津液通則肺氣下流故火氣降而燥

衰矣其渴即止 有人消渴引飲無度或令食韭苗日用

三五兩不得入鹽但吃得十斤即效

千里藥一名水葫蘆

木瓜 紫蘇葉 桂各一 烏梅肉一

赤茯苓一 二方有神麩豆粉

右為末煉蜜丸如彈子大噙化一丸嚥下

大醫經卷之三

又方 百藥煎 烏梅肉 紫蘇葉

人參 甘草 麥門冬

右等分為細末煉蜜丸如彈子大噙化

芷梅湯 烏梅肉 甘草各三 百藥煎一

白芷兩 白檀香 右為細末湯點服

運氣渴有二

一曰熱助心盛而渴經云少陽司天之政三之氣炎暑至

民病渴又云少陰之復渴而欲飲又云少陽之復噎絡焦

槁渴引水漿治以諸寒劑是也

二曰寒攻心虛而渴經云太陽司天寒氣下臨心火上從

噎乾善渴又云太陽司天寒淫所勝民病噎乾渴而欲飲

又云寒水太過上臨太陽民病渴而妄胃治以諸熱是也

藥方 治消渴用燥絲湯飲之能引腎氣上行朝於口

吐酸欲得水而貪飲者文蛤飲主之兼治微風脈緊

文蛤五 麻黃 甘草 生薑各三

石膏五 杏仁五十 大棗十二

右咬咀以水七升煮取二升溫服一升汗愈

甘草石膏湯治渴病全愈再劇舌白滑微腫咽喉嚨唾

覺痛噎腫時渴飲冷白沫如膠飲冷乃止

升麻一錢 柴胡七 甘草根五 黃栢一

石膏六 杏仁六 桃仁 防風根

荆芥穗 生地各一 熟地三 黃連三

知母一 細辛一 紅花許 小椒三

喘身發 右水煎去查食後熱服

針灸

針灸

針灸口渴咽乾有四法

其一取心經云心手少陰之脈是動則病噎乾心痛渴而

欲飲隨虛寒熱陷下取之也

其二取肺大腸經云大腸手陽明之脈所生病者目黃口

乾隨虛寒熱陷下以施補瀉疾留之法也又云肺虛則

少氣耳聾噎乾取其經太陰太陽之外厥陰內血者是也

其三取腎經云腎足少陰之脈所生病者口熱舌乾咽腫

噎乾隨虛寒熱陷下取之又云噎乾口中熱如膠取足

少陰是也

其四取肝經云肝足厥陰之脈是動病甚則噎乾面塵脫

色隨虛寒熱陷下取之

消渴經曰口已上者不可刺

玉液 煎取下穴 三里一分再取下穴 關元



瀉註再  
取廉泉

泉 又法 金津 玉液 承漿 廉泉 人中 廉

小腸俞 陽池 廉泉 又法 胃脘

心膈 胃中 又法 承漿 然谷 勞官 曲

地 意舍 關元 又法 承漿 然谷 勞官 曲

口熱咽乾唾如粘膠口苦隘中介介然 太溪 陽

渴飲身體燥多噫噎白主之 消渴嗜飲承漿主之

消渴脫骨主之 隘乾腹癢痛坐臥目慌慌善怒多言伏

溜主之

消穀善飢為中消 瘰成為中消 者為消瘰王註云瘰為消瘰病也 已食而

飢者胃疴 注夏即瘰瘵病也 穀入多而氣少得之有所

脫血濕居下也 脫血濕居下也 脫血濕居下也 脫血濕居下也

胃中熱則消穀令人心懸善飢眇已上皮熱 中熱腸中寒則疾飢小腹脹 中熱則胃中消穀

三陽結謂之消 消三陽者陽明也手陽明大腸主津液所生病熱則目黃

口乾是津液不足也足陽明主血所生病熱則消穀善飢

血中伏火是血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱

為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治

之以蘭除陳氣也不可服膏粱芳草石藥其氣悍烈能助

熱燥也越人云邪在六腑則陽脈不和陽脈不和則氣留

之氣留之則陽脈盛矣陽脈太盛則陰氣不得榮也故

肉皮膚消削是也

帝曰有病口甘者病名為何何以得之岐伯曰此五氣

之溢也名曰脾瘴夫五味入口藏於胃脾為之行其精氣

津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食

甘美而多肥也肥者令人多熱甘者令人中滿故其氣上

溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也

胃熱則善消水穀可飲其辛降火之劑用黃連末生地

白藕各自然汁牛乳各一升熬成膏和黃連末一斤九如

桐子大每服三五十九少呷白湯下日進十服

猪肚丸治消渴 黃連 瓜蒌根 麥門冬 知母 厚朴 枳實 大黃

為細末納猪肚中線縫置甌中蒸極爛乘熱於石臼中

并可丸為度如硬加少蜜為丸每服三十九漸加至四  
五十九丸渴則服之三因方多藥米社仲本草  
調胃承氣湯治消中渴而飲食多 起時宜服之  
黃丸 方見治 發熱 為效不可多利  
厚朴 枳實 大黃  
每服五錢水煎食遠服  
大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食休 全文見於傷寒  
而過不生肌亦易也東垣云善食而瘦者 胃移熱  
於膽亦曰食休  
參瀉丸治食休胃中結熱消穀善食不生肌肉



人參 赤茯苓 葛蒲 遠志

地骨皮 牛膝 酒浸各

右為末煉蜜丸每服二十九米飲下

運氣消中皆屬熱經云少陰之勝心下熱善飢又云少陽之勝熱客于胃善飢治以寒劑是也

針灸

針灸消中皆取於胃經云邪在脾胃陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢取三里灸之又云胃足陽明之脈氣盛則身已前皆熱於胃則消穀善飢

因陰氣不足熱中消穀善飢腹熱身煩狂言三里主之腹中氣脹引吞痛飲食多而身羸瘦名曰食飢每作先取脾俞後取季脇

藥

張安撫芸天年四十五歲病消渴舌上赤裂飲水無度

木醫學綱目卷三

吳

小便數多先師以此藥治之良愈消渴多傳瘡癰為不救之疾既效亦不成瘡癰享年七十五而終名之曰生津甘露飲子治消渴上下齒麻舌硬赤爛腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢萎弱無力面塵脫色脇下急痛善噎善怒健忘腎肉腰背疼寒兩丸冷甚一方石膏用一兩二錢

石膏 人參 甘草 山梔

白芷 連翹 甘草 炙

草澄茄 黃連 葛蒲 歸身

白葵 麥門冬 杏仁 歸身

蘭香 黃柏 升麻 木香

桔梗 柴胡 知母 全蝎

右為末湯浸蒸餅和勻成劑捏作餅子晒乾杵碎如黃

米大每服二錢挑於掌內以舌舐之津液送下或白湯食後服之神效凡消渴為病燥熱之氣勝也內經云熱滯所勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷氣氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之劑不能故以石膏之甘寒為君啓玄子曰滋水之源以鍾陽光故以栢連栢子知母之苦寒瀉熱補水為臣以當歸杏仁麥門冬全蝎連翹白葵蘭香甘草甘寒和血潤燥為佐升麻柴胡苦平行陽明少陽二經草澄茄白芷葛蒲木香藿香反佐以取之又用栢梗為舟楫使浮而不下也

和血養氣湯治口渴舌乾小便數舌上赤裂此藥生津除燥生肌肉一名地黃飲子

黃連 桃仁 生地 紅花

黃柏 當歸 甘草 升麻

知母 防已 羌活 麻黃根

口乾舌渴加杏仁 甘草 小便數加石

右吹咀作一服水煎去渣稍熱服忌酒麪房事

清涼飲子治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結小便數

羌活 柴胡 升麻 防風

當歸 甘草 石膏 知母

紅花 防已 龍膽草 黃柏

桃仁 杏仁 生地 黃芪根

黃芩 甘草 右水二盞酒一小盞煎服

甘露膏治消渴飲水極多善食而瘦自汗大便結燥小便頻數又名蘭香飲子



石膏二錢 知母一錢 甘草生一錢 人參五分  
 防風根一錢 半夏五分 藜香五分 白芷莖  
 連翹 桔梗 升麻各五分  
 右為末水浸蒸餅丸或裡刺作薄餅子晒乾碎如米大  
 每用淡薑湯下二錢

徐兄年四十歲口乾小便數春未得之夏來求治診其  
 兩手左瀉右畧數而不弦重取似大而稍有力左稍沉畧  
 弱而不弦然瀉却多於右喜兩尺皆不甚起此由飲食味  
 厚生熱謂之痰熱禁其厚味宜降火以清金抑肝以補脾  
 用三消丸十粒左金阿魏丸各五粒以薑湯吞下一日六  
 次又以四物湯加參朮陳皮生甘草五味子麥門冬煎服  
 一日三次與九藥間服一二日自覺清快小便減三之二  
 口亦不乾止渴未除頭暈眼花久坐則腰疼遂以摩腰膏  
 木香半兩 天

治腰疼仍以四物湯用參芪減川芎加牛膝五味子炒栢  
 麥門冬煎飲調六一散服及覺便多遂去六一散仍服丸  
 藥而安 黃連末治消渴要藥加天花粉末人乳生地黃  
 汁生藕汁二物為膏入山藥末攪和以薑汁和煉蜜為膏  
 徐徐挑於舌上以白湯少許送下亦得能食加軟石膏  
 治消渴以天花粉為末用人乳汁生薑汁煎膏丸如菹菹  
 大每服百丸食後服

治消渴小便多者煮瓜蒌根汁飲之良  
 治消渴無方可治者用天花粉大烏頭炒等分為細末  
 蒸餅丸每服百丸黑薑湯下  
 已上四方蒺藜根為君本草云蒺藜根主消渴止小便  
 通月水乳汁夫既能止小便又能通月水知其流濕潤  
 燥治消渴之要藥也

千金地黃丸治腎渴  
 黃連四兩 生地半斤 研取汁連薑汁  
 右再為細末煉蜜為丸食後麥門冬湯下五六十九  
 黃連丸治消渴飲水無度小便頻數  
 黃連一斤 淨半斤用無灰好酒浸一宿  
 重湯蒸一伏時取出晒乾用  
 右為細末滴水丸白湯下五七十九

又方治卒消渴小便多搗黃連細末蜜丸服三四十九  
 麥門冬湯治消渴日夜飲水無度飲下即洩  
 麥門冬法 黃連 冬瓜各二  
 右為麗末每服五錢水煎八分去香溫服若冬瓜無乾  
 者用新冬瓜肉三斤去穰分作十二片為十二服每服  
 用瓜一片劈破水煎日三服  
 冬瓜飲子治消渴能食而飲水多小便如脂麩片日夜無  
 度

冬瓜法 黃連十兩為  
 右先以冬瓜破開去穰搗黃連末在內却用頂蓋定於  
 熱灰中煨熟去皮切細爛研絞汁每服一盞至二盞日  
 三夜一服  
 三消丸用好黃連治淨為細末不拘多少切冬瓜肉研  
 取自然汁和成餅陰乾再為細末用汁浸和加至七次即  
 用冬瓜末為丸每服三四十九以冬瓜汁煎大麥仁湯送  
 下尋常渴止一服效

已上五方黃連冬瓜為君丹溪云冬瓜性走而急久病  
 與陰虛者忌之又有黃連為佐用者審之  
 治消渴飲水不止小便數用田螺五升水一斗浸一宿  
 渴即飲之每日一度易水換螺為妙又方以水煮取汁飲



重劑

之螺亦任吃  
子治飲水百杯尚猶未足小便如砂或如杏色服此方  
三五日小便大出毒注下十日除限此方子和自云此重  
劑試有驗

水銀四 錫二錢同水銀 牡礪

密陀僧 知母 紫苑 苦參

貝母各一 黃丹兩 苳菱根斤

右為細末男子用不生兒猪肚婦人用猪猪肚一箇納  
藥於內以麻線縫之用新瓦二片繩繫一二遭別用米  
一升苳菱根末半升於新水內煮熟取出放冷不用米  
及苳菱只研作肚併肚中藥末爛和為丸如硬加蜜食  
前米湯下三四十九三四方無貝母

胡粉散治大渴百方不痊者亦治腎消

黃丹 胡粉各半 苳菱根二兩 甘草一兩

澤瀉 石膏 赤石脂 白石脂各半

右咬咀水煎服日二服如腹痛減之為丸服尤妙每服  
十九多則腹痛

葛根九治消渴消腎日飲碩水者

葛根三 瓜菱根二 黃丹二 附子炮去皮一兩

右為末煉蜜丸每服十九日進三服春夏去附子

六味地黃丸治腎消效方見治

治消渴不止下元虛者用牛膝五兩細剉為末生地黃  
汁五升晝曝夜浸以汁盡為度蜜丸空心溫酒下三十九  
久服壯筋骨駐顏色黑髮生津液

治男子消渴小便反多如飲水一斗小便亦一斗腎氣  
丸主之方見治

子治腎消以腎氣丸本方內加山藥一味外桂附從  
時加減冬一兩春秋三錢夏一錢 又法腎氣丸去附子  
加五味子一兩半

唐祠部李郎中治消渴者腎虛所致每發則小便甜醫  
者多不知其故亦缺而不言洪範曰稼穡作甘以物理推  
之淋餽醋酒作脯法須臾即甜足明人之食後滋味皆甜  
流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸炎氣化成精氣下入骨髓  
其次為脂膏又其次為血肉其餘則為小便故小便色黃  
血之餘氣也五臟之氣鹹潤者則下味也若腰腎既虛冷  
則不能蒸化穀氣盡下為小便故味甘不變其色清冷則  
肌膚枯槁也猶如乳母穀氣上洩皆為乳汁消渴病者下  
泄為小便皆精氣不實於內則小便數澀溺也又肺為五  
臟華蓋若下有煖氣蒸則肺潤若下冷極則陽不能升故

八醫學綱目卷三

圭

肺乾而渴易於否卦言之矣乾上坤下陽無陰不降陰無  
陽不升上下不交故成否也譬如金中有水以火煖之又  
以板覆之則煖氣上騰故板能潤若無火力則水氣不能  
上升此板終不得潤火力者腰腎強盛也常須煖補腎氣  
飲食得火力則潤上而易消亦免乾渴之患故仲景云宜  
服腎氣丸味九此疾與脚氣雖同皆為腎虛所致其脚氣  
始發於二三月盛於五六月衰於七八月凡消渴始發於  
七八月盛於十一二月衰於二三月其故何也夫脚氣墮  
疾也消渴宜疾也春夏陽氣上故墮疾發則宜疾愈秋冬  
陽氣下故宜疾發則墮疾愈審此二者疾可理也猶如善  
為政者寬以濟猛猛以濟寬隨時變通耳

治諸虛不足胸中煩悸時常消渴唇口乾燥或先渴而  
欲發瘡或病瘡疽而後渴者宜用黃芪湯多服之方見瘡



消渴而小便反多有脂者皆腎氣不固攝  
津液也宜多服黃芪黃芪乃補氣之要藥

**行氣丸治消渴**

五靈脂行義云五靈脂入肝最  
遠能行經血不能生血

烏頭去皮

右等分爲末每服三錢冬瓜湯下無瓜時苗葉亦可日  
三服渴止勿服再服八味丸去附子加五味子

**治消腎小便數鹿角一具炙焦搗篩爲末酒服方寸七**

漸漸加之

**苗香散治消病下焦渴症小便如膏**

苗香炒

苦棟炒

各等分炒爲末食後酒調

下一錢

**治消渴舌焦口乾小便數野雉一隻以五味煮令極熟**

去肉取汁渴飲之肉亦可食

肝瘵者夜臥則驚多飲小便數全文  
見瘵

木醫牛綱目卷三

幸

心移寒于肺消者飲一洩二不治全文見瘵病傳變王註  
云腎臟消氣無所攝

故飲一洩二也

**寸口脈浮而遲浮即爲虛遲即爲勞虛則衛氣不足勞**

則榮氣竭跌陽脈浮而數浮則爲寒數則消穀而大堅氣

盛則洩數洩數則堅堅數相搏即爲消渴 跌陽脈數胃

中有熱即消穀引飲大便必堅小便即數

胎前渴

**葛根散治婦人妊娠胃膈煩燥唇口乾裂四肢壯熱食**

少

葛根

黃芩

人參

麩仁

黃芪

甘草

麥門冬

右各等分每服四錢加竹茹彈子大水煎服

人參黃連散治妊娠身熱煩燥口乾少食四肢壯熱

人參

黃芪

葛根

秦艽

麥門冬各一

知母七錢

甘草五錢

赤茯苓一兩

右咬咀每服四錢薑三片淡竹葉十四片同水煎

治妊娠產熱心神煩燥口乾渴逆

升麻

黃芩

人參

麥門冬

山梔

柴胡

茯神

瓜蒌根

犀角各一兩

知母

甘草各五錢

右咬咀每服四錢水煎服

知母散治妊娠煩悶口乾胞胎臍熱

知母

麥門冬

甘草各半兩

黃芪

黃芩

赤茯苓各七錢半

右咬咀加竹茹同煎

產後渴

木醫牛綱目卷三

幸

**竹葉湯治產後虛弱口渴**

竹葉三升

甘草

人參

茯苓各一兩

生薑

半夏各三錢

麥門冬五錢

大棗十五箇

右咬咀以水九升先用生薑竹葉大棗煎取七升去渣

入藥煎取二升每服五合日三夜

玄胡索散治產後失血渴不止

欒金

乾葛

桂心

青皮

枳殼

玄胡索

右等分以好醋浸一宿焙乾爲末每服二錢陳皮湯調

下日三夜

治產後出血太多虛煩發渴用真正蒲黃末二錢白湯

調下如渴燥甚并花水下

治產後中風煩渴用紅花子五合微炒研碎以水煎濃



徐徐呷之

調下二錢效

桃花散治產後不煩而渴

新石灰 黃丹

右為細末渴時用井水調下一錢

口燥咽乾

禁熱

飲食不節勞倦所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口中津液不行故口乾咽乾病人自以為渴醫以五苓散治之反加渴燥乃重竭津液以致危亡經云虛則補其母當於心與小腸中補之乃脾胃之根蒂也以甘溫之藥為主以苦寒為之使以酸為之臣佐以辛心苦緩急食酸以收之心火旺則肺金受邪金虛則以酸補之次以甘溫及

不食學綱卷三

書

甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也

黃芪湯治心中煩燥不生津液不思飲食

黃芪

熟地

白芍藥 五味子

麥門冬

甘草

人參

天門冬

白茯苓

右以咀每服三錢薑棗烏梅同煎去渣食後服

五味子湯桑枝煎治口乾

夏

運氣

運氣口燥舌乾皆為熱燥二氣然分言之有四

一曰熱經云歲火太過民病噎燥又云少陰司天熱淫所勝病胸中煩熱噎乾治以寒劑是也

二曰燥經云金鬱之發噎乾面塵又云陽明在泉燥淫所勝甚則噎乾面塵治以溫劑是也

忌

大法

三曰上熱下燥經云少陰司天之政水火寒熱之氣

氣交民病噎乾四之氣民病寒熱噎乾是也

四曰上燥下熱經曰陽明司天之政四之氣民病噎乾引飲皆治以寒溫多少其制是也

督脈主病噎乾論 忌南星半夏

黃疸

產後黃

食勞疰黃

黃汗

五疸不要分同是濕熱如食麪相似 輕者小溫中丸

重者大溫中丸 熱多者加苓連 濕多者茵陳五苓

散加食積藥 濕熱因倒胃氣服下藥大便下利者參芪

加茵陳山梔甘草

諸病黃家但利其小便假令脈浮當以汗解之宜桂枝

加黃芪湯 殺疸之為病寒熱不食食即頭眩心胸不安

久久發黃為穀疸茵陳蒿湯主之 黃疸病茵陳五苓散

主之 見傷寒

茯苓除濕湯治黃疸氣熱嘔吐而渴欲飲冷身體面目

俱黃小便不利不得安臥亦不思食

白茯苓

澤瀉

茵陳蒿

猪苓

黃苓

黃連

山梔

防已

白木

蒼朮

陳皮

青皮

右以咀水煎空心服

完顏正卿因官事勞役飲食不節心火乘脾胃氣虛弱更

以悲怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體麻木次傳身

目俱黃微見青色顏黑心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐口

生惡沫飲食不化時下完穀小便癯閉而赤黑辰巳之間

發熱日暮則止至四月九甚予診其脈浮而緩金匱云寸



口脈浮為風緩為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃痰熱已行跌陽脈索食穀即眩為傷脾風寒相搏穀氣不消胃中苦濁濁氣不流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸宜服茵陳梔子湯

茵陳錢一 茯苓五 山梔仁 蒼木炒

白木各三 黃芩生六 黃連 枳實炒

猪苓去 澤瀉 陳皮 防已各二

青皮分

右吹咀作一服長流水煎食前溫服二服可愈山梔茵陳能瀉濕熱而退黃故以為君枳實苦寒泄心下痞滿肺主氣今熱傷其氣故身體麻木以黃芩苦寒瀉火補氣為臣二木苦甘溫青皮苦辛溫能除胃中濕熱洩其壅滯養其正氣防已苦寒能去十二經滯濕澤瀉鹹平

六醫學綱目卷三 五

茯苓猪苓甘平導膀胱中濕熱利小便而去痞閉

治疸脈虛便赤此後五方主之治虛者驗

白木兩 人參 猪苓 茵陳各半

澤瀉錢七 山梔炒 木通錢三 桂枝

一婦人年二十八歲發黃脈澁經水自來不行身體倦怠

未曾生子

陳皮 白木 木通各一 黃芩

婦頭 丹皮各半 甘草錢一

分作十二貼水煎食前熱服

治疸取小麥泔汁絞飲六七合晝夜飲三四次愈

諸疸用猪膏半斤亂髮如鷄子大三枚以髮入膏中煎

至髮盡分再服病自從小便中出

頭腎直湯治腎疸目黃渾身金色小便赤澁

升麻根半 羌活根錢一 防風根半 獨活根半

白木 柴胡根 蒼木錢一 猪苓分

澤瀉分三 白茯苓 葛根半 甘草根分三

黃柏分二 人參 神麴各六

分作二貼水煎食前稍熱服

桂枝加黃芪湯治黃疸脈浮而腹中和者宜汗之若腹

滿欲嘔吐懊憹而不利者宜吐之不宜汗

桂枝 白芍藥各三 甘草二 生薑三

大棗十二 黃芪兩二

白水煎熱服須臾飲熱粥以助藥力取微汗為度未汗

更服

汗法 治一人年二十歲因勞又冒雨得疸脚痠心悸口苦力

弱尿黃脈浮而數病在表宜解外

六醫學綱目卷三 五

黃芪三 白木 蒼木各一 陳皮

蘇葉 木通分五 山梔炒二 甘草稍

白水煎服下保和十五丸與點抑青各十九丸溫中二十

丸

麻黃醇酒湯治黃疸用麻黃三兩以好清酒五升煮取

二升五合頓服盡冬月用酒煮春月用水煮 酒疸或無

熱清言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉弦者先

下之 酒疸心中熱欲嘔者吐之愈如陰症欲吐者韓氏

瓜蒂湯治諸黃用瓜蒂二七枚以水一升煮取五合去渣

頓服

治疸取藜蘆置灰內炮之少變色搗為末水服半錢

七小便不利數服

蔡氏一女病黃遍身浮腫面目如金色困乏無力不

虛



思飲食惟喜食生物炙裁之屬先以苦劑蒸餅為丸  
一碗又以舟車丸通經散下五七行如墨汁更以藥  
磨食散氣不數日安好如初 李七老病瀉水症面黃  
喘二足皆腫按之陷而復起行則濯濯有聲常欲飲水不  
能睡臥戴人令上涌去痰而汗之次以舟車丸瀉川散下  
以益腎散復下之又以分陰陽利水道之劑復下之所苦  
皆瘥

下法

右脈浮而腹不和者吐之

治酒疸心中懊憹或熱痛梔子大黃湯主之

山梔十四 大黃二 枳實五 豆豉升

右四味以水三升煎取二升溫作三服

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之  
宜大黃硝石湯主之

大黃 硝石各四 梔子十五

水煎將熟納硝石頓服

師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時以火劫其  
汗兩熱所得然黃皆從濕得之一身盡發熱面黃肚熱熱  
在裏當下之

黃連散治黃疸大小便秘澀難效

黃連二 大黃二 枳實五 甘草一

右為極細末食後溫水調下二錢日三服先用苧蒂散

搗鼻取下黃水却服此藥

治黃疸皮黃眼睛赤金色小便赤取秦芫五兩牛乳三  
升煮取一升去渣入芒硝一兩服之

安喜趙君玉病疸遍身發黃往問醫眾醫皆云乃陽  
明症公等與麻知幾皆受訓於張戴人是商議吃大黃者

難與論病君玉不悅婦自揣無別病乃取三花神佑丸八  
十粒服之不動君玉乃自悟曰予之濕熱甚矣此藥尚不  
動以舟車丸瀉川散服之大下結糞一斗一夕而黃退君  
玉因此益信戴人之技

右脈沉而腹不和者下之

和法

治黃疸用柴胡一兩去苗甘草一分細剉作一劑以水

一碗白茅根一握同煎至七分去渣不掬服

諸疸小便不利為裏實宜利小便或下之無汗為表實宜

發汗或吐之

建中湯

內感傷寒勞役形體飲食失節中州變寒病生黃非外  
感而得只用建中理中大建中足矣不必用茵陳

治一婦人年六十歲病振寒轉慄足太陽寒水也呵欠

噴嚏足少陽膽也口亡津液足陽明不足也心下急痛而

直手少陰受寒足少陰血滯也身熱又欲近火熱在皮膚

寒在骨髓也臍下惡寒丹田有寒渾身黃及睛黃皆寒濕

也餘症驗之知其為寒濕黃赤而黑又頻數者寒濕勝也

病來身重如山便着床枕者陰濕盛也其脈右手關尺命

門弦細按之洪而弦急為寒加之細者北方寒水雜以

緩甚者濕盛出黃色脈洪大者心火受制也左手又按之

至骨舉手來實者壬癸腎旺也六脈按之俱空虛者下焦

無陽也用藥法先宜以輕劑去其寒濕兼退其洪大之脈

以理中加茯苓湯投之

人參 白朮 甘草 乾薑

茯苓



水煎熟以水冷與之此熱因寒用以假寒對是太...  
假熱以乾薑辛熱瀉勝脫之真氣故曰真對真假對...  
若不愈當以木附湯與之

虛寒

陰黃治驗至元丙寅六月時雨霖霪人多病濕疫真定...  
韓君祥因勞役過度渴飲涼茶又食冷物遂病頭痛肢節...  
亦疾身體沉重胸滿不食自以為外感用通聖散二服後...  
添身困甚方命醫治之醫以百解散發其汗越四日以...  
小柴胡湯二服後加煩燥又六日以三乙承氣湯下之燥...  
渴尤甚又投白虎加人參湯柴胡飲之類病愈增又易醫...  
用黃連解毒湯殊砂膏至寶丹十七日後病勢轉增傳變...  
身目俱黃肢體沉重背惡寒皮膚冷心下痞硬按之則痛...  
眼澁不欲開目睛不了了懶言語自汗小便利大便秘了而...  
不了命予治之於其脈緊細按之虛空兩寸脈短不及本

人醫學綱目卷二

位此症得之因時熱而多飲冷加以寒涼藥過度助水乘...  
心反來侮土先因其母後薄其子經云薄所不勝乘所勝...  
也時值霖雨乃寒濕相合此謂陰症發黃予以茵陳附子...  
益薑湯主之經云寒濕於內治以甘熱佐以苦辛濕淫所...  
勝平以苦熱以淡滲之以苦燥之附子乾薑辛甘大熱散...  
其中寒故以為君半夏草薤辛熱白朮陳皮苦甘溫健脾...  
燥濕故以為臣生薑辛溫以散之澤瀉甘平以滲之枳實...  
苦微寒瀉其痞滿茵陳微苦寒其氣輕浮佐以薑附能去...  
膚腠間寒濕而退其黃故為佐使也煎服一劑前症減半...  
兩服悉去又服理中湯數服氣得平復或難曰發黃皆以...  
為熱今暑熱隆盛又以熱藥治之何也予曰理中然也成...  
無已云陰症有二一者始外傷寒邪陰經受之或因食冷...  
物傷太陰經也二者始得陽症以寒治之寒涼過度變陽

為陰也今君祥因天令暑熱冷物傷脾過服寒涼陰氣大...  
勝陽氣欲絕加以陰雨寒濕相合發而為黃也仲景所謂...  
當於寒濕中求之李思順云解之而寒涼過劑瀉之而逐...  
寇傷君正謂此也聖賢之制豈敢越哉

附子 炮去皮 乾薑 炮 茵陳 二錢 白朮 四錢  
草薤 一錢 白茯苓 三錢 枳實 炒 半夏 製  
澤瀉 錢半 橘紅 三錢  
右生薑五片水煎去查涼服

補養榮湯治五疸脚弱心忪口淡耳響微寒發熱氣急小...  
便白濁當作虛勞治之

黃芪 當歸 桂心 甘草 炙  
陳皮 白朮 人參 各一 白芍藥 三  
熟地 五味子 茯苓 各三 遠志 去心

右每服四錢薑棗煎空心服  
右法治虛寒黃疸

治婦人久勞苦得面黃心忪口苦小便不黃自利食少...  
右脈大於左此虛中受濕也

白朮 芍藥 當歸 各五 黃芪  
黃芩 茯苓 人參 各三 陳皮 半錢  
黃連 錢 甘草 分

分六貼下保和湯中各二十九  
補中湯治面黃多汗目昏赤四肢沉重食腹中時痛...  
咳嗽兩手左脈短右脈弦細兼泄右手關脈虛

升麻 柴胡 各二 梔子 分 蒼朮 分  
澤瀉 分 甘草 分 五味子 分 黃芪 分  
神麩 分 紅花 分 大麥 分



濕熱

右作二服水煎食前  
右三方治虛熱黃疸  
黃疸小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱除必  
噦小半夏湯主之方見嘔吐○小便色不變不可除熱者  
蓋中無熱故清白而不黃自無熱可除也  
諸疸小便色白不可除熱者無熱也若有虛寒症者  
當作虛勞治之 諸疸小便黃赤色者為濕熱治法並見  
表裏虛症

穀疸丸專治穀疸

苦參兩 龍膽草兩 牛膽一

右為末入牛膽汁加少蜜為丸空心薑湯或甘草湯下  
葛根湯治酒疸

葛根兩 枳實兩 山梔兩 豆豉各一  
甘草兩

本草綱目卷三十一

李

白水煎不拘時溫服

治黃疸以柳枝入水濃煎汁服之

患五色急黃以水調山豆根末二錢空心服之

運氣

運氣黃疸皆屬濕熱經云少陰司天之政四之氣溽暑至  
民病黃疸又云厥陰司天之政四之氣溽暑濕熱相薄民  
病黃疸而為附腫是也

雜方

治鼻瓜蒂散治黃疸渾身如金色累效

瓜蒂二 母丁香錢 黍米九粒 赤小豆五

右為細末每夜臨臥時先含水一口却於兩鼻孔噴上  
半字便睡至明日取下水便服黃連散病輕者五日  
效重者半月效黃連散方見  
前大小附錄

治遍身如金色用瓜蒂四十九箇須是六月六日收者  
丁香四十九粒入甘鍋內燒烟盡為度研細小兒用半字

針灸

吹鼻及措牙大人用一字吹鼻內立痊

治黃疸用苦葫蘆瓢如大棗許四枚以童便浸三兩  
食頃取兩棗許分納兩鼻中黃水自出效令病人吸之  
又方治黃疸身眼皆如金色修合不可令婦人雞犬見之  
取東引桃枝一握細切用水二鍾煎至半空心服服後三  
五日其黃離離如薄雲漸散唯眼最後瘥百日方平復身  
黃漸散後可時飲清酒一盞使眼中黃易散忌食熱麪猪  
魚等物

針灸黃疸有二法

其一取脾經云脾足太陰之脈所生病者黃疸視盛虛熱  
寒取之

其二取腎經云腎足少陰之脈所生病者黃疸視盛虛熱  
寒取之

八寶經綱目卷三十一

李

黃疸 腕骨七分 中腕補

黃疸發虛傷寒飲食過多

腕骨一分 湧泉三分 百勞三 三里中腕 膏肓

黃疸善欠脇下滿欲吐脾俞主之千金云身重不可動 消渴身

熱面赤黃意舍主之 消渴黃疸足一寒一熱舌縱煩滿

然谷主之 消瘴善喘氣足咽喉不能言手足清溺黃大

便難噎中腫痛唾血口中熱唾如膠太谿主之 黃疸熱

中善渴太衝主之 身黃時有微熱不嗜食膝內內踝前

痛少氣身重中封主之 黃疸身黃勞宮主之 嗜臥四

肢不欲動搖身黃灸手五里左取右右取左 黃疸刺脊

中千金云服

目黃者曰痺 滿黃赤安臥者亦名黃疸

身痛而色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也論表赤尺篇



**脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃** 腹脹滿面痿黃  
 躁不得睡屬黃家 跌陽脈緊而數數則為熱熱則消穀  
 緊則為寒食即為滿尺脈浮為傷腎 跌陽脈緊為傷脾  
 寒熱相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便  
 不通陰被其寒熱流膀胱身體俱黃名曰穀疸 陽明病  
 脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便又難此欲作穀疸  
 雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也 心中懊憹而熱  
 不能食時欲吐名曰酒疸 病酒黃疸必小便不利其候  
 心中熱足下熱是其症也

**酒疸黃色心下結熱而煩**  
 額上黑微汗出手足中熱薄暮則發膀胱急小便自利  
 名曰女勞疸腹如水狀不治 黃疸之病當以十八  
 日為期治之十日已上宜瘥反劇為難治 疸而渴者難

治疸而不渴者可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人  
 振寒而發熱  
 凡黃家候其寸口脈近掌無脈口鼻冷並不可治

**產後發黃**  
 治一婦人四月內產發黃四肢倦怠食少經事不來時  
 發熱脈弦

白木兩 人參 秦艽 丹皮  
 生地 木通 柴胡 芍藥各半  
 川芎 黃芩 乾葛各一 甘草  
 分十二貼水煎食前熱服  
 食勞疸黃  
 一名黃胖夫黃疸者暴病也故仲景以十八日為期食勞  
 黃者宿病也至有久不愈者故宜另立篇

**大温中丸治黃胖** 朱生時  
 香附一斤 夏者 甘草二  
 斤 宿疾冬三夏 針砂炒紅  
 芍藥五 苦參 冬一夏二 厚朴薑製炒  
 陳皮三 山查五 蒼木五兩  
 白木 茯苓各三 青皮六  
 俱為細末醋糊丸如桐子面黑筋骨露氣實者米飲下  
 五六十丸面肥白與氣虛虛弱者白木湯下三四十九  
 忌一切生冷油膩雞鵝羊鴨生硬併糞糞難化之物服  
 過七日後便覺手掌心涼口唇內有紅暈起調理半月  
 愈

丈夫黃胖胃有宿積口淡脚瘦氣急  
 針砂用細末三兩 蒼木 香附  
 三棱各一 陳皮 黃連 茱萸  
 人參各半 茯苓七 薑

右為末神麩醋糊丸每服五十九若飽入保和十九白  
 湯下

又小温中丸治黃胖宜草野貧賤人服蓋其飲  
 針砂一斤以醋炒為末入糯米炒極黃為末亦用一  
 斤醋糊丸如桐子大每米飲下四五十九忌口同上  
 輕者服五兩重者不過七兩愈

六十嫂面黃口苦而渴此食積生濕熱  
 白木一錢 連翹 羌活 通草  
 煎熟吞下穀疸九保和九各四十粒阿魏九五粒  
 煖中丸治黃胖殺肝邪舒脾氣虛者不宜用  
 陳皮 蒼木 厚朴製 三稜  
 白木 青皮各五 香附一 甘草二



針砂十兩

右為末醋糊九空心監醫湯下五十九晚食前酒下亦可忌狗肉

右五方附朴查青稜蓬以磨積針砂酸醋以瀉肝白木蒼朮以補脾重可去怯之劑唯溫中丸無補性虛者勿用

治黃胖綠縲六兩用米醋於鐵鍋內煮七次以乾為度置地上出火氣為末南星末一兩炒麩一兩大皂角二斤水煮熟揉出膠膠去皮查濾過再熬入末子六兩蒸熟去皮核煎成濃膏搗勻和前藥末為丸如桐子大每服五丸早晚用薑湯各一服忌油膩煎燂如身上發紅斑時急煎薑湯服之斑自愈

治男婦患食勞氣勞遍身黃腫欲變成水及久患瘡癬

小腸膀胱面目勿黃宜服紫金丹

膽礬三錢 黃蠟二兩 大棗五十

右以砂鍋或銀石器內用好醋三升先下礬蠟慢火熬半日取出棗去皮核次下蠟再慢火熬一二時如膏好入蠟茶二兩同和丸如桐子大每服二三十丸茶酒任下如久患腸風痔漏陳米飲下日三服一日見效 宗室趙彥材下血面如蠟不進食蓋酒病也授此方服之終劑血止面鮮潤食亦倍常新安一士人亦知是與三百粒作一服立愈

羅棗礬丸治食勞黃目黃身黃

皂礬不拘多少置砂鍋內燒通赤用米醋點之燒用木炭

右為末棗肉丸每服二三十丸食後薑湯下一方用白礬不用皂

羅棗礬丸治黃胖

皂礬五兩 棗肉二兩 蒸粉三兩

右為末生薑汁丸每服二三十丸一日二次米飲下食前

右三方礬醋之酸以瀉肝棗肉之甘以補脾若虛黃於前痘閉小便自利自汗虛勞痘條下諸方選用之

婦人年三十面黃脚瘦弱口苦喜茶月經不勻且多倦

甘草三分 白木一分 炒栢二分 秦芫二分 人參各一分 當歸錢 木通五分 陳皮五分 芍藥

婦年六十面黃倦甚足瘦口苦脈散而大此濕傷氣也

白木一分 陳皮錢 蒼朮 木通 黃芩各錢 砂仁 人參 川芎各二

黃栢炒一分 甘草五分 分六貼水煎食前服

王官人病後面黃脚瘦弱倦怠食飽氣急頭旋

黃芪二分 蒼朮一分 白木一分 木通二分 甘草一分 黃栢炒三分 厚朴錢 陳皮錢

成疴五官面黃脚瘦無力食不化脈虛而少弦口苦肚脹宜補之

蒼朮半錢 木通三分 白木一分 當歸五分 芍藥 陳皮各五分 甘草二分 川芎五分

人參三分 水煎下保和丸四十九

治食氣遍身黃胖氣喘食不進心胸渴悶用不蛀皂角去皮及子塗好醋炙令焦為末一錢巴莖七粒去油膜二



件以淡醋研好墨為丸如麻子大每服三九食後陳皮湯下日三服隔一日增一九以利為度常服消酒食  
子和一男子作善偶病疽善食而瘦四肢不舉面黃無力其婦翁欲棄之其女不肯婦翁乃農夫招塔意欲作勞見其病甚每日詬辱之人教之餌蠟蟻九三稜九俱不效戴人兒之不眵而瘵使服涌劑去積痰宿水一斗又以泄水丸通經散下四五十行不止戴人命飲水水一盞立止次服平胃散間服檳榔九五十粒七日黃退力生蓋黃疽之症濕熱與宿穀故也俗謂之食勞黃

世喜喫乾茶

石膏 白芍藥 黃芩

水煎服更於積塊門茶瘰條相參用之

山酒麪黃用絲瓜連皮子燒灰因麪得病麪湯調下因酒

得病酒調下

黃汗

黃汗汗出染衣黃如柏汁是也

仲問曰黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如柏汁脈沉何從得之師曰以汗出時入水中浴水從汗孔入得之宜芪桂酒湯主之

黃芪 白芍藥 桂枝

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升初發當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常綠盜汗出者此勞氣也若汗出已反熱者久其身必甲錯若發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久

阻故也

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常綠盜汗出者此勞氣也若汗出已反熱者久其身必甲錯若發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久

阻故也

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常綠盜汗出者此勞氣也若汗出已反熱者久其身必甲錯若發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久

阻故也

阻故也

診

久身必潤又胸前痛腰上有汗腰下無汗腰腕弛痛如有物在皮中狀刺者不能食身疼重煩躁小便不利者此為黃汗桂枝加黃芪湯主之

目黃

經云目黃者曰黃疸然亦有目黃而身不黃者故宜另立

符節門

風

風氣自陽明入胃循脈而上至目皆其人肥風氣不得外洩則為熱中而目黃

青龍散治風氣傳化腹內疼結而目黃風氣不得泄為

熱中煩渴引飲

地黃 威靈仙 防風 荆芥穗

何首烏 右為末每日三服食後沸湯調下一錢

針灸目黃有五法

其一取心經云心少陰之脈所生病者目黃脇痛

其二取心主經云心主手厥陰之脈是動則病面赤目黃

其三取小腸經云小腸手太陽之脈所生病者耳聾面黃

其四取大腸經云大腸手陽明之脈所生病者目黃口乾



其五取勝脫經云勝脫是太陽之脈所生病者目黃淚出  
云 已上五法並視虛寒熱陷下取之

黑疸

黃疸久久變為黑疸身黃額黑或身面俱黃是也若身不  
黃口而黑於章門主之針灸經云神

酒疸

酒疸下之久久變為黑疸目青而黑心中如噉蒜齏狀  
大便正黑皮膚爪之不仁其脈微弱雖黑微黃故知之

女疸

黃家日哺時發熱而反惡寒此為女勞得之勝脫急少腹  
滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大  
便黑或時澹此女勞之病非水也腹滿者難治硝石散主  
之

硝石

硝石 能各  
等分

右為細末勻和以大麥麩粥調服方寸七日三服病隨  
大小便下小便去黃大便去黑是其候也

治黑疸多死宜急治用土瓜根一斤搗碎絞汁六合頓  
服當有黃水隨小便出更服之

面瘡然浮腫脊痛不能正立其色焔黑多汗惡風者屬風  
治見諸  
風門

醫學綱目卷之二十一

醫學綱目卷之二十二

脾胃部

腹痛 胎前腹痛 產後腹痛 腸鳴

疴夫心胃痛及腹中諸痛皆因勞力過甚飲食失節中氣  
不足寒邪乘虛而入客之故卒然而作大痛經言得炅則  
止炅者熱也以熱治寒治之正也然腹痛有部臟腑有  
高下治之者亦宜分之如厥心痛者乃寒邪客於心胞絡  
也前人良薑薑黃大辛熱之味末之酒調服其痛立止  
此直折之耳真心痛者寒邪傷其君也手足青至節甚則  
旦發夕死夕發旦死中脘痛者太陰也理中健中草薤菹  
丸之類主之膈腹痛者少陰也四逆散附粳米湯之類主  
之少腹痛者厥陰也正陽散回陽丹當歸四逆湯之類主  
之雜症而痛者苦練湯酒黃當歸九丁香練實丸之類主

之是隨高下治之也更循各臟部分穴俞而灸刺之如厥  
心痛者痛如針刺其心甚者脾之痛也取之然谷太溪餘  
臟皆然如腹中不和而痛者以甘草芍藥湯主之如傷寒  
候下傳太陰腹滿而痛者桂枝加芍藥湯主之痛甚者桂  
枝加大黃湯主之夏月肌熱惡熱淋洪疾而痛者黃芩芍  
藥湯主之又有諸虫痛者如心腹懊憹作痛聚往來上下  
行痛有休止腹熱善渴涎出面色乍青乍白乍赤嘔吐水  
者就咬也以手緊按而堅持之無令得脫以鍼刺之久持  
之虫不動乃出鍼也或局方化虫丸及諸虫之藥量虛實  
用之不可一例治也

寒 凝秋腹痛肌寒惡寒脉沉微足太陰足少陰主之桂枝芍  
藥湯 中脘痛太陰也理中健中黃芪湯之類 膈腹痛  
少陰也四逆真武附子湯之類 小腹痛厥陰也重則正



中陰  
屬太陰

陽散回陽丹之類輕則當歸四逆湯之類太陰傳少陰

甚者當變下利而止

仲虛勞裏急腹中痛小建中湯主之

羅肝勝乘脾○真定路總管劉仲美年踰六旬有脾胃虛

熱之証至元辛巳閏八月初天氣陰寒因官事勞役渴而

飲冷夜半自利兩行平旦予診視其脉弦細而微四肢冷

手心寒唇舌皆青褐色腹中微痛氣短而不思飲食予思

內經云色青者肝也肝屬木唇者脾也脾屬土木剋土故

色見於唇難經亦云見肝之病則知肝當傳之於脾故先

實其脾氣今脾不受肝之邪也潔古先師云假令五臟各

行已勝侮所不勝當重實不勝微瀉其勝以黃芪建中加

芍藥附子湯主之且芍藥味酸瀉其肝木微瀉其勝黃芪

甘草甘溫補實脾土皆重實其勝桂附辛熱治其寒水又

助陽退陰始抽甘溫補脾之不足肝苦急急食甘以緩之

生姜大棗辛甘大溫生發脾胃升騰其氣行其榮衛能緩

其急每服一兩依法煎服再服而愈黃芪建中湯倍芍藥

量虛實加附子本方見治

仲理中湯方見

垣草薏苡丸治脾胃虛而心火乘之不能滋榮上焦元氣

遇冬腎與膀胱之寒水旺時子能令母實致肺金大腸相

輔而來剋心乘脾胃此大復其營也經曰大勝必大復故

皮毛血脉分肉之閒元氣已絕於外又大寒大燥二氣併

乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引胃中而痛鼻息不通

不聞香臭額寒腦痛目時眩目不欲開腹中為寒水反乘

痰唾涎沫食入反出腹中常痛及心胃痛脇下急縮有時

而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕或腸鳴此脾

胃虛之極也胃中氣亂心煩不安而為霍亂之漸隔咽不通噎塞極則有聲喘鳴閉塞或日陽中或暖房內稍緩口吸風寒則復作四肢厥冷身體沉重不能轉側不可回顛小便澀而時燥此藥主秋冬寒涼大復氣之藥也

草薏苡仁一錢四分 吳茱萸八分

益智仁八分 陳皮八分 白姜一錢 甘草六分

桃仁七分 青皮六分 澤瀉一分 麥蘖一錢

黃芪八分 半夏一錢 人參八分 柴胡四分

神麩四分 姜黃四分 當歸身分 柴胡四分

右件十七味同為細末桃仁另研如泥再入一處研勻

湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三五丸白湯送下旋

斟酌多少

神聖復氣湯治復氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎水之旺

子能令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰背胃膈

閉塞痛疼善噎口中涎目中泣鼻中流濁涕不止或有息

肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如水頭作陣痛目

中流火視物眩暈耳鳴耳聾項并口鼻或惡風寒喜日陽

夜臥不安常覺痰塞膈咽不通口無滋味兩脇縮急而痛

牙齒動搖不能嚼物腰膝間及尻髻膝足寒冷陰汗前陰

冷行步欹側起居艱難掌中寒風痺麻木小便數而晝多

夜頻而少氣短喘喝少氣不足以息卒遺矢無度婦人白

帶陰戶中大痛牽心而痛紫黑失色男子控辜牽心陰陰

而痛面如赭色食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急而

腹皮色白後出餘氣腹不能努或腸鳴膝下筋急肩胛大

痛此皆寒水來復火土之變也

乾姜地三 人參五分 半夏湯泡 柴胡錢



葉本八分	防風五分	羌活錢一	甘草八分
升麻七分	白茯苓五分	歸身六分	黑附子三分
桃仁五分	杏仁五分	郁李仁五分	陳皮五分
右作一服水五盞煎至二盞入	黃芪錢一	草薢錢一	陳皮五分
右件入在內再煎至一盞再入下項藥	黃柏五分	黃連三分	枳殼三分
已上四味預一日另用新水浸又次入	細辛二分	川芎三分	蔓荊子三分
預一日用水半大盞分作二處浸此三味并黃柏等藥	前正藥作一大盞不去查入此浸藥再上火煎至一大	盞去查稍熱服空心又能治咬頰咬唇咬舌舌根強硬	等症如神忌肉湯及食肉使不助經絡中火邪也大抵
腎併膀胱經中有寒肺氣元氣不足者皆宜服之神驗	於月生月滿時隔二五日一服如病急不拘時候	益智和中丸	秋季合治心腹中大痛煩躁冷汗自出
草薢仁四錢	益智仁一分	砂仁七分	甘草錢二分
黃芪	當歸身	人參	乾姜
麥門冬	麴朮	陳皮各五分	桂枝
桂花各一分	大麥藥錢三分	黃連一分	生地錢一
姜黃三分	木香二分		
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服二三十丸溫	水送下細嚼亦得		
溫胃湯治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛	白豆蔻三分	益智	砂仁
姜黃各二分	陳皮七分	澤瀉三分	甘草二分
		黃芪七分	

乾姜二分	厚朴二分	人參三分
右爲細末每服三錢水一盞煎至半盞食前溫服	丹里成人年二十五歲肚痛二箇月食少面微寒	白朮
白朮	陳皮	青皮各半
白芍	半夏各三分	蒼朮
歸身尾	甘草錢一	木通各一分
分七貼姜二片煎下保和丸二十粒	一老人腹痛作隔不禁下者	川芎
茯苓	乾姜	滑石
右八方皆治中寒虛寒腹痛也	垣朮桂湯治寒濕所客身體沉重胃脘痛面色痞黃	麻黃錢一
麻黃錢一	桂枝五分	杏仁箇十
甘草二分	白茯苓錢一	猪苓五分
右咬咀水二大盞煎至一盞去查稍熱服食前	麻黃草薢九	秋季合治客寒犯胃心胃大痛不可忍
麻黃錢一	草薢錢一	炒麴錢一
升麻	大麥麴	砂仁
半夏湯	白朮	陳皮各五分
甘草	吳茱萸	當歸身
木香	厚朴錢一	萆澄茄
蘇木各五分		紅花
右爲末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三五十丸細嚼	溫水送下	



厚朴湯治脾胃虛寒心腹滿及秋冬客寒犯胃時作疼痛

厚朴製 陳皮去白 甘草炙 乾姜各五錢

茯苓去皮

戊火已衰不能運化又加客氣聚為滿痛散以辛熱佐以苦甘溫以淡泄之扶持胃氣以期平也

羅高良姜湯治心腹絞痛如刺兩脇支滿不可忍

高良姜錢五 厚朴製 當歸炒 桂心各二錢

右咬咀以水一升煮取四合分二服若一服痛止便停不須更服若強人分二服劣人分三服增損之

本治心脾痛神效荔枝核為末每服一錢熱醋湯調下

胎腹痛屬少陰

仲四逆湯 真武湯 附子湯並見傷寒 腹中寒氣雷鳴切痛胃膈逆滿嘔吐附子粳米湯主之

附子炮 半夏分五 甘草兩 大棗十箇

六

粳米升半

右五味以水八升煮米熟用湯或去查溫服一升日三服

羅益智散治傷寒陰虛心腹痞滿嘔逆瀉利手足厥逆及一切冷氣攻心脇膈腹脹滿絞痛

川烏炮去皮 益智去皮 乾姜炮 青皮去白

右為細末每服三錢水二盞生姜三片棗二枚劈破同煎至八分去查溫服食前

本又方治胸滿氣噎下部冷膈腹疝痛

半夏二兩 生姜六兩 陳皮四兩 桂一兩

吳茱萸湯洗泡

右咬咀用水十升煮取四升分五服冷再服空心食前服

予少年時曾患膈疝腹痛初不疑其虛過服諸家

藥無効遂自診之覺是虛症合此藥一劑服未至半劑頓愈

羅葱熨治驗 內經云寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣而不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣又寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也諸寒作痛得靈則痛立止真定一秀士年三十一肌體本弱左脇下有積氣不敢食冷物覺寒則痛或嘔吐清水眩運欲倒目不敢開惡人煩冗靜臥一二日及服辛熱之藥則病退延至至元甲戌秋初因勞役及食冷物其病大作腹痛不止冷汗自出四肢厥冷口鼻氣亦冷面色青黃不澤全不得臥扶几而坐咳嗽咽膈不利予與藥服之見藥則吐藥不得入無如之何遂以熟艾約半斤用白紙一張鋪於腹上

紙上攤艾令勻又以葱蔥數枝批作兩半片鋪於熟艾上再用白紙一張覆之以慢火熨斗熨之冷則易之覺腹中熱腹皮暖不禁以帛三搭多縫帶繫之待冷方解初熨時得暖則痛減大暖則痛止至夜得睡翌日再與對証藥服之良愈故立此熨法以救將來之痛也

海夏腹痛肌熱惡熱脈洪疾手太陰足陽明主之芍藥黃芩湯治腹痛脈洪數方見下

丹婦人肚墜痛不泄脈不數

陳皮 地黃 芍藥二錢 黃芩

木通 歸尾錢 甘草些 桃仁二十箇

經卒患腹痛水研山荳根汁半盞服之

五靈脂 香附各等 右為末白湯調服



腹痛或大便利或用千重按痛處不痛者為虛治法  
寒條選用之或無寒者如左方  
芍藥甘草湯芍藥甘草治腹痛稼穡作甘甘者已也曲直  
作酸酸者甲也甲已化土此仲景妙方也

芍藥二兩 甘草一兩  
右以咀舂服五錢水煎服海藏云白收而赤散也酸以  
收之甘以緩之

海肚腹痛者芍藥甘草湯主之

弦 傷氣 芍藥

洪 傷金 黃芩 加棗

脉緩 傷水 加桂枝 生姜

澁 傷血 當歸

遲 傷火 乾姜

大醫學綱目卷之三

丹婦人痢後血少腹痛

白芍藥二錢 歸身尾半錢 陳皮二錢 川芎五分

調服六一散

實 仲痛而秘者厚朴三物湯主之

厚朴兩 大黃兩 枳實五錢

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取  
二升溫服一升以利為度

丹一男子年十八歲自小面帶微黃五月間腹大痛醫者

與小建中湯加丁香兩貼不効加嘔吐清汁又與十八味

丁沉透隔湯兩貼食全不進痛無休止臥不能起如此五

六日又與阿魏丸百餘粒至夜發躁不得睡口却不渴予

脉之左三部沉弦而數開部尤甚右三部沉滑而數實痛

處不可按遂與大柴胡湯四貼加甘草下之痛嘔雖減食

猶未進遂與小柴胡湯去黃芩人參加芍藥陳皮黃連生

甘草二十貼而愈 白雲許先生始因飲食作嘔感脾疼

後累因觸冒風雪腿骨作疼皆以脾疼骨疼為寒雜進

黃牙藏丹等藥雜治十餘年間艾灸數萬計或似有効及

至病再作反覺加重至五十一歲時又冒雪乘船而病愈

加至坐則不能起扶起亦不能行兩膝骨不能開合若脾

疼作時則兩膝骨痛處似覺稍輕若飲食甘美脾疼不作  
則膝骨重痛增諸老袖手計無所出予謂此初因中脘有  
食積痰雜以胃寒濕抑過經絡血氣津液不行痰飲注入  
骨節往來如潮其湧而上則為脾疼降而下則為膝痛非  
湧泄之法不足以治之時七月二十四日遂以甘遂末一  
錢入猪腰子內煨與食之連瀉七行至次日兩足便能行  
步至八月初三日嘔吐大作不能起牀顆粒不食但時煩

燥氣弱不能言語諸老皆歸罪於七月之瀉而又知累年  
熱補之悞皆不敢用藥予嘗記金匱云病人無寒熱而短  
氣不足以息者此實也其病多年鬱結一旦以刀圭之劑  
泄之徒動猖狂之勢他未有制禦之藥所以如此仍以吐  
劑達其上焦以次第治及中下二焦於初三日用瓜蒂吐  
不透初六日用梔子又吐不透初九日用附子尖三枚和  
藥水與之始得大吐其嘔噦終止前後所吐共得膏痰沫  
液一大水桶初十日遂以朴硝滑石黃芩石膏連翹等煎  
藥吹咀一斤蒸煎濃汁放井水中極冷飲之十一月十二  
日十三日十四日每日食上件藥一斤十五日腹微滿大  
小便皆秘悶予欲用大承氣下之諸老皆以為不可十六  
日六脉皆歇至予診其脉獨歇至卯酉二時其餘時刻平  
勻如舊予曰卯酉為手足陰陽之應此大腸與胃有積滯

九



不行所致當速瀉之爭論不已至十八日遂作紫雪半斤十九日早紫雪成每用一匙頭以新汲井水化下至二十日天未明已服紫雪五兩神思稍安腹滿亦減遂收起紫雪不與二十一日大為小便閉作痛所苦遂飲以蘿蔔子汁半茶鍾隨手痛止小便立通廿二日小腹滿痛不可捫摸神思不佳遂以大黄牽牛作丸服至三百丸至二十三日已時下大便併通如爛魚腸三碗許臭惡可畏是日神思稍安診其脉不歇至矣二十四日腹大絞痛殆不能勝者約一時許腰膝沉重且墜兩時不出聲不能言瀉下穢物如柏油條者一尺餘肚中如燒片時方定至廿五日神思漸安夜間得睡廿六日漸能出聲言語自初二日至此並顆粒不曾入口語言並不出聲至廿七日方啜半盞稀粥者四次似有生意至次月初四日方平安其脉自嘔吐

六 醫學綱目卷三十一

十

至病安日皆是平常強大之脉唯中間數日歇至少異耳至次年四月復行倒倉法方步履如初

腸癰亦腹痛但小便數似淋脉滑數為異耳治法見腸 升灸一沸內大錢二七枚煮取二升半強人可頓服瘦人可分之再服

海當歸丸治三陰受邪於心膈少三腹疼痛氣風等症

四物湯各半 防風 獨活 全蝎各五分

續斷各一兩 苦棟 玄胡各七 木香

丁香各二錢 茴香一兩

右為細末酒糊丸桐子大空心溫酒下三五十九大効

四物苦練湯

四物湯各一兩 玄胡索 苦練各一

靈治腹中攪痛不可忍

玄胡索 當歸 白芍 川芎

乾姜各等分

右為末每服三錢溫酒調下

又法治証同前

玄胡索 桂心各半 當歸一兩

右為細末熱酒調下

失笑散治心腹痛欲死百藥不効服此頓愈心方見

經治脾寒氣發厥痛不可忍者茱萸一兩桃仁一兩和炒

令茱萸焦黑後去茱萸取桃仁去皮尖研細葱白三莖煨

熟以酒浸溫分三服

腹痛脈滑者痰脈弦者食

清痰多作腹痛

六 醫學綱目卷三十一

十一

右為末生薑自然汁調入熱湯服之

溫中丸治食積肚痛

白朮 香附各一兩 針砂各四兩

山查肉 神麴各八兩 苦參一兩 川芎半兩

吳茱萸半兩 湯浸各 蒼朮二兩 五錢一兩

右為末醋調麵糊為丸如桐子大一方去山查神麴川

芎加半夏青皮黃連

世大蒼丸治失饑傷飽肚痛不食

蒼朮炒 橘紅等分

右生薑汁打炒神麴糊丸如桐子大每七十九米飲下

丹酒積腹痛用三棱蓬莪朮香附官桂蒼朮厚朴陳皮

甘草茯苓木香枳椇治之



楊淳三哥年六十食積痰作痛在心頭或在腹脇脈皆弦  
瀦食甚少大便秘實此濕積也宜生血行氣進食磨積補  
虛

白朮	炒麴	半夏	郁李仁
歸身尾	芍藥	陳皮	山查
川芎	人參	柴胡	紅花
桃仁			

羅七氣湯治虛冷上氣及寒氣怒氣思氣喜氣憂氣愁氣  
內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時發時止發即  
欲死此藥主之

細末粥丸一日三次食前白湯下四五十丸  
右為粗末入半夏今勻每服二錢水一大盞生姜三片  
煎七分去渣稍熱服食前

腹痛有作止者有塊耕起往來者吐清水者皆是虫痛治  
法見心痛

井窈渠吳孺人年近四十得腹隱痛常以火燒磚瓦熨之  
面與胃襟間惡火之熱氣發時少煩食亦減六脈和皆微  
弦最苦夜間不得睡但世上凶惡之事并憂苦境像皆上  
念時作惡泣說離別囑付後事如此者一年眾作心痛治  
之自覺氣自下衝上雖久病人却不瘦予曰此肝受病迷  
與防風通聖散吐之時尚春寒於通聖中加桂入姜汁調  
之日三四次至初夏稍熱與常歸龍膽丸枳朮丸一月而  
愈

運氣腹痛有二  
一曰土盛攻腎而痛經云歲土太過雨濕流行腎水受邪

民病腹痛清厥意不樂是也  
二曰火鬱之發痛經云火鬱之發民病腹中暴痛是也  
世鹽炒熟用布裹熨痛處神効

丹攪腸沙用台芎為末每一錢許入生薑自然汁半盞熱  
湯內調服 又方樟木煎湯大吐之或用白礬末一錢清  
湯調服探吐之或鹽湯探吐之亦可  
世治發沙面青肚疼昏倒不省人事急以鼠屎一合研為  
細末滾湯調令通口澄清服之一服而安神効宜預收下  
刺灸腹痛有四法

其一取脾胃經云邪在脾胃陽氣不足陰氣有餘則寒中  
腸鳴腹痛皆調于三里又云足太陰之別名曰公孫去本  
節之後一寸實則腹中切痛取之所別也又云腹痛刺臍  
左右動脈已刺按之立已不已刺氣衝已刺按之立已已

其二取大腸經云大腸病者腸中切痛而鳴濯濯感于寒  
即泄當臍而痛取巨虛上廉是也  
其三取督脈經云腎虛則胃中痛大腹小腹痛清厥意不  
樂取其經少陰太陽血者是也  
其四取任脈經曰任脈之別名曰尾翳下鳩尾散于腹實  
則腹皮痛取之所別也

世治絞腸痧症手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸溫水於  
病者膝灣內拍打有紫黑處以針刺去惡血即愈  
玉腹痛并治氣塊 內關 支溝 照海

撮氣痛并治積痛食不化 氣海 中脘  
隱白 巨關 足三間 怪穴 腹中 氣衝

又法 巨關 足三間 怪穴 腹中 氣衝



石一寸半針入二寸半灸五十壯

世膺腹痛 陰陵泉 太衝 三里 支溝下穴 取中

腕 關元 天樞 繞臍痛 公孫 三陰交 陰谷

東胃脘暴痛膈中堅痛 石門 商丘 陰谷 大腸俞

膈俞

中腹中寒疼外陵主之 大腸寒中千金作寒痛 大便乾腹中

切痛者首輪主之 繞臍痛搶心膝寒注利腹結主之

仲夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必

衝不衝者心下則痞也

脈若腹痛脈反浮大而長者死大無妨

心腹痛痛不得息脈細小遲者生堅大疾者死大無妨

胎前腹痛

仲婦人懷胎腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

當歸三 芍藥一 茯苓四 白朮兩

澤瀉半斤 芫藶半斤

右六味杵為散取方寸匕酒和三日服

潔地黃當歸湯治婦人有孕胎痛

當歸兩 熟地兩

右為末作一服水三升煎至一升半去查頓服之

仲婦人腹中痛小建中湯主之方見虛勞

雲芎歸湯治妊娠先患冷氣忽心腹痛如刀刺

川芎 人參 茯苓 桔梗

吳茱萸 當歸各一 厚朴制 芍藥各二

右咬咀以水九升煎取三升分三服氣下即安

丹孫院君因近喪冒惡氣傷胎肚痛手不可近發熱口中

不思食須安胎散滯氣

熱

寒

青皮錢三 黃芩 芍藥各二 歸尾半錢

川芎錢一 木香分五 甘草錢

分二貼水三盞先煎芫根二大片至二盞去芫根入前

藥同煎至一盞熱服

大治妊娠腹痛用生地黃三斤搗汁酒一升合煎減半頓

服愈

眩師曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不動欲知生死

令人摸之如覆杯者則男如肘頸參差起者女也冷在何

面冷者為死溫者為生

產後腹痛

大黑神散治產後惡露不盡心胃痞滿膈腹撮痛汚血諸

疾方見後

四產後三日血塊痛發熱

五靈脂炒 牡丹皮 沒藥 滑石

右研細分五貼豆淋酒下之食前

馮宅產後發熱腹中痛有塊自汗惡寒會服黑神散

白朮 芍藥二錢 滑石錢五 黃芩二錢

牡丹皮半錢 人參 川芎 歸尾

陳皮 荊芥各一 乾姜錢一 甘草

雲捲荷散治產後血上衝心刺血暈腹痛惡露不快

初出捲荷 紅花 當歸各二 蒲黃

牡丹皮各半

右為細末每服三錢空心溫酒調下一碗或用童便調

下妙

大治血癥痛無定處

童便升三 生地汁 生藕汁各一 生姜汁升二

之

之



右先煎三味約三分減二次下姜汁慢火煎如稀粥  
取一合溫酒調下

治兒枕痛乃血瘀也用真蒲黃研細調服二錢如燥渴者  
用新汲水調下

丹治產後兒枕大痛黑白散

烏金石醋煨七次另研 寒水石煨存性

右各收之服時各抄一錢半米飲調下痛止勿服未止  
再服

聖劑 潮四物加玄胡沒藥白芷湯治產後敗血作痛方見婦

四物苦棟湯方見 一方治臍下痛不可忍四物湯加玄

胡索二錢半服之

大紫金丸治產後臍下痛即失笑散醋為丸是也五靈脂

立効散治產枕痛不可忍用五靈脂慢火炒今乾為末二

錢溫酒下立瘥產枕即

丹產後惡露未盡小腹作痛

五靈脂 香附末

右合和醋為丸甚者入留尖桃仁方加

大治產後血不盡血痛悶方取敗荷葉燒作灰暖水和服

養汁服亦良 又方取亂髮如雞子大灰汁洗淨燒為末

酒調服二錢 治產後血瘀腹痛及喉痺熱因寒用鐵稱

鍾煨令通赤焯酒中候溫飲之丹法用焯酒中

仲產婦脇痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中

有乾血着臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利

大黃兩 桃仁二十 蟅虫二十箇  
右三味為末煉蜜和為四九以酒一升煎一丸取八合

頓服之新血下如豚肝

雲又方瘕產後血結下不盡腹中絞痛不止

大黃另 生地 當歸各二 川芎

芍藥 桂心各一 甘草 黃芩各二

桃仁四十九

右切細以水七升煮取二升半大黃更煎一二沸分三

服 桂心丸治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱

四肢羸瘦頭痛

青皮 乾漆炒烟 沒藥 樞榔

當歸 桂心 赤芍 牡丹皮各五

大黃 桃仁六 鱉甲炙 厚朴制

三稜煨 玄胡索各一

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九溫酒下

保治血暈血結或聚於胃中或偏於小腹或連於脇肋四

物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭紅花玄胡各一兩同為粗

末加四物煎調沒藥散服之

右為末入前藥調服血下痛止只服一服

仲產後腹中疼痛當歸生薑羊肉湯主之方見產

術一婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不得犯此

寒痛也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血也予教之曰非

其治也可服張仲景羊肉湯少減作二服遂愈

仲內補當歸建中湯治婦人產後虛羸不足腹中刺痛不

止吸吸少氣或苦少腹中急痛引腰背不能飲食產後一

月日得服四五劑為善令人強壯



當歸 <sup>四</sup>	桂枝 <sup>三</sup>	芍藥 <sup>六</sup>	生姜 <sup>五</sup>
甘草 <sup>二</sup>	大棗 <sup>十二</sup>		
右六味以水一斗煮取三升分溫三服一日令盡若大	虛加飴糖六兩湯成內於火上煖令飴消若去血過多	崩傷內衄不止加地黃六兩阿膠二兩合八味湯成內	阿膠服之
雲產後六七日忽然腹痛皆因呼吸冷氣乘虛入客於	血分宜服當歸建中湯 <sup>方見</sup>	天獨聖湯治產後腹痛當歸為末每服二錢水一盞煎至	七分溫服
雲治產後惡物不盡腹內疼痛產後常服此妙	生地	當歸 <sup>各一兩</sup>	生薑 <sup>九錢</sup>
右為細末姜酒調二錢服			
大治產後血塊痛	熟地 <sup>一斤</sup>	陳生薑 <sup>半斤</sup>	
右拌勻同炒乾為末每服一錢酒調產後以烏梅湯下			
之			
實	枳實 <sup>各令黑</sup>	芍藥 <sup>各</sup>	
產後腹痛服枳實芍藥散不愈者宜下瘀血湯主之 <sup>方見</sup>			
之			
產後七八日無太陽症少腹堅痛此惡露不盡不大便	煩燥發熱日晡時煩燥者不食食則譫語至夜即愈宜大	承湯主之熱在裏結在膀胱也 <sup>方見</sup>	

山兒枕痛用隔年蟹壳燒灰酒下	丹局方五積散治產後餘血作痛以蒼朮為君麻黃為臣	厚朴枳實為使雖有當歸芍藥之補血僅及蒼朮三分之一	一不思產後之婦有何寒邪血氣未充似難發汗借曰藥	性溫和可以推陳致新豈可用麻黃之悍附以蒼朮枳	之散乎虛而又虛禍不旋踵矣
產後血塊痛三陰交氣海 <sup>宜灸</sup>	腸鳴	恒如胃寒泄瀉腸鳴於升陽除濕湯加益智仁五分半夏	五分生薑棗子和煎 <sup>方見</sup>	丹腹中水鳴乃火擊動其水也二陳湯加苓連梔子	腹
中鳴者病本於胃也 <sup>全文見</sup>	腸鳴多屬脾胃虛一男子	腸鳴食少臍下有塊耕動者得下氣多乃已已則復鳴醫			
用疎氣藥與服半年不効予用參朮為君甘草連參枳乾	姜為臣一貼腸鳴止食進又每服吞厚朴紅苳丸其氣耕	亦平經云脾胃虛則腸鳴腹滿又云中氣不足腸為之苦	鳴此之謂也		
肺移寒於腎為涌水涌水者按之腹不堅水氣客於大腸	疾行則鳴濯濯如囊裏水聲也 <sup>本文見</sup>	河葶蘆丸治涌水疾行則腹鳴如囊裏水聲	葶蘆 <sup>隔紙</sup>	澤瀉	椒目
杏仁	猪苓 <sup>去黑皮</sup>	桑白皮			
右為末煉蜜丸桐子大每二十九葱白湯下不拘時以	利為度				
運氣腸鳴有二					
一曰土發經云土鬱之發腸鳴而為數後是也					



二曰熱勝經云少陰在泉熱滯所勝病腹中腸鳴氣上衝  
胃治以鹹寒是也  
針灸腸鳴有三法

其一補脾經云脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太  
陰陽明少陰血者是也

其二補足太陽經云中氣不足腸為之苦鳴補足外踝下  
留之五分申脉穴也

其三取太陽經云腸中雷鳴氣上衝胃邪在大腸刺盲之  
原巨虛上廉三里是也

甲腹中常鳴時上衝心灸臍下 腹中腸鳴盈然食不  
化脇痛不得臥煩熱泄糜不嗜食胃脇痞滿喘息而衝兩  
嘔心痛及傷飽身黃骨瘦羸章門主之 腸鳴相逐不可  
傾倒承滿主之 腸鳴而痛溫留主之 飲食不下腹中

雷鳴大便不節小便赤黃陽綱主之  
嘔吐膈氣總論

大法  
吐分三  
論曰吐有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上  
通天氣主內而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主  
腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是故上焦  
吐者皆從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪其症食已暴  
吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胃而發痛其治當降氣和  
中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛  
其脈浮而弦其症或先痛而後吐或先吐而後痛治法當  
以小毒藥去其積檳榔木香和其氣下焦吐者皆從于寒  
地道也其脈大而遲其症朝食暮吐暮食朝吐小便清利  
大便秘而不通治法宜毒藥通其閉塞溫其寒氣大便漸  
通復以中焦藥和之不令大腑結閉而自安也

右案古論三焦吐其說蓋本於黃帝所謂氣為上膈食  
飲入而遲出為下膈食時時乃反出之其上焦食已暴  
吐者今世謂之嘔吐也中下二焦朝食暮吐暮食朝吐  
者今世謂之膈氣反胃也分嘔吐膈氣為二門

開格

嘔吐 吐 乾嘔 惡心 嘔苦水 吐酸吞酸  
嘔吐清水 嘔沫 嘔膿 嘔吐虫 吐利

恒夫嘔吐噦者俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為  
異耳且如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血  
俱病也仲景云嘔多雖有陽明症慎不可下孫真人云嘔  
家多服生薑乃嘔吐之聖藥也氣逆者必散之故以生薑  
為主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也  
有食入則吐有食已則吐以陳皮去白主之噦者少陽也

少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以姜製半夏為主  
故朱奉議治嘔吐噦以生薑半夏陳皮之類是也究其三  
者之源皆因其脾胃虛弱或因寒氣客胃加之飲食所傷而  
致也宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類主之  
使內消之痰飲者必下之當分其經對證用藥不可亂也

仲諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之  
嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半  
夏湯主之用半夏一升生薑半斤以水七升煮取一升半  
分溫再服  
卒嘔吐心下痞腸閉有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之  
半夏一升 生薑半斤 茯苓三兩 法四兩



右三味以水七升煮取一升半分溫再服

陳皮湯治嘔方見

孫治嘔吐以白胡椒一枚煨陳皮十分炙對為末水一盞煎半盞服之

右姜半橘治嘔吐必用之聖藥然東垣云辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胃中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀氣而已勿作表實用辛藥瀉之

胃虛者

仲胃反嘔吐者大半夏湯主之服前小半夏湯諸湯不愈者服此立愈

半夏二升洗 人參三兩 白蜜一斤

右三味以水一斗三升和蜜揚之二百四十遍煮藥取三升溫服一升餘分再服

李絳療反胃嘔吐無常病飲入口即吐困倦無力垂死者

△醫方類聚卷三

圭

以上黨人參三大兩礬破水一大升煮取四合熱頓服凡久病嘔者胃虛不納穀也

生薑 人參 黃芪 白朮

香附

胃虛有寒嘔吐者東垣丁香茱萸湯仲景理中湯皆益胃推揚穀氣之劑也方見

大便不通者利之

垣若陰虛邪氣逆上室塞嘔噦不足之病此地道不通也

正當用生地黃當歸桃仁紅花之類和血涼血潤血兼用甘草以補其氣微加大黃芒硝以通其閉大便秘邪氣去則氣逆嘔噦自不見矣 復有胃中虛熱穀氣久虛發而

穀氣久虛者食飲和之

為嘔噦者但得五穀之陰以和之則嘔噦自止五穀皆屬飲白湯或喜涼者飲涼水皆能止嘔噦不必用藥也

病者治

仲嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之方見

水

垣加減二陳湯治嘔飲為患或嘔噦惡心或頭眩心腹中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和並宜治之

丁香一分 半夏五分 陳皮五分 茯苓二分

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片烏梅一箇同煎至七分去渣熱服無時或治痞疝加草薢麩果煨熟一兩半

藿香安胃散治脾胃虛弱不飲食嘔吐不時

藿香半錢 丁香二分 人參二分 橘紅五分

右件四味為細末每服二錢水二盞生薑三片同煎至一盞去渣服食前

垣丁香吳茱萸湯治嘔吐噦胃寒所致

丁香五分 吳茱萸 草薢錢 人參錢

△醫方類聚卷三

圭

甘草五分 黃芩一分 柴胡五分 升麻七分

茯苓五分 當歸錢 蒼朮錢 半夏五分

右為細末每服半兩水二盞煎至一盞去渣熱服食前忌冷物

世藿香平胃散治嘔吐不止

藿香一分 半夏二分 陳皮去白 厚朴一分

蒼朮三分 甘草二分

右為粗末每服五錢水一盞半生薑三片棗三枚同煎去渣溫服

羅紅荳丸諸藥不愈者神效方見

杜安業坊有闕氏家老婦人患嘔吐請石秀才醫曰胃冷而嘔下理中丸至百餘丸其病不愈石疑此患乃杜至曰



藥病正相投何必多疑石曰何故藥相投而病不愈杜曰寒氣甚藥力未及更進五十九丸必愈如其言果愈石於是師法於杜

海理中湯加減例理中湯方甘草人參白朮乾姜各等分

若為寒氣濕氣所中者附子一兩名附子理中湯 若

霍亂吐瀉者加橘紅青橘皮各一兩名治中湯 若乾

霍亂心腹作痛先吃鹽湯少許頓服嘔吐出令透即進

此藥 若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一兩生薑

十片 若泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯 若

泄瀉不已者於補中湯內加附子一兩不喜飲食水穀

不化者再加炒砂仁一兩共成八味 若霍亂吐下心

腹作痛手足逆冷於本方中去白朮加熟附名四順湯

若傷寒結胃先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及吐

利後胸痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實茯苓

苓各一兩名枳實理中湯 若渴者但於枳實理中湯

內加瓜蒌根一兩 若霍亂後轉筋者理中湯內加石

膏一兩火 若臍下築者腎氣動也去朮加官桂一兩

腎惡燥故去朮恐作奔脫故加官桂 若悸多者加茯

苓一兩 若渴欲飲水者加朮半兩 若苦寒者加乾

姜五錢 若腹滿者去白朮加附子一兩 若飲酒過

多及啖炙煖熱食發為鼻衄者加川芎一兩 若傷胃

吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉只用本方

若中附子毒者亦用此方或止用甘草生薑等分煎

服或以烏頭煎湯解之

仲嘔而胃滿者吳茱萸湯主之方見傷寒吐 嘔而脈弱小便

復利身有微熱見厥逆者四逆湯主之方見傷寒下利

杜王普侍郎病嘔飲食皆不得進召孫數日亦不愈後復召杜杜曰治嘔愈嘔此胃風也遂用川烏一兩淨洗去皮

臍不去尖以漿水一碗煮乾每箇作兩片復用漿水一碗

煮盡更作四片每細嚼一片以少溫水下少頃嘔遂止痛

既少息杜遂問曰尋常好吃何物曰好吃甘甜之物杜曰

是甘甜乃膏粱之物積久成熱因而生風非一朝一夕之

故也王服其說

痛而嘔為寒經云寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔者

是也

丹嘔吐胃中有熱膈上有痰二陳湯加炒梔子黃連生薑

主之此方累試效

仲嘔而發熱者小柴胡湯主之方見往來寒熱

緊用小柴胡湯加青黛以姜汁打糊為丸名青鎮丸治嘔

吐脈弦頭痛蓋本諸此

本治胃熱嘔以竹茹湯

乾葛錢 甘草錢 半夏三錢姜汁半盞藥水一升

右末每服五錢水一盞姜三片竹茹一彈大棗一枚同

煎至一盞去渣溫服

有熱者手足心熱政和年有京人病傷寒得汗身涼數日

忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等藥

下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃脘孫兆竹茹湯正相

當爾治藥與之即時愈良方中櫻花散亦相應

定嘔吐利膈枇杷散

枇杷葉去毛味苦 人參各一 枳殼五

茅根二 半夏一 右細剉每服四錢水一盞半生薑七片慢火煎至七分



去查入換柳末五分和勻服之

吐嘔吐而病在膈上後思水解急與之思水者猪苓散主之

猪苓

茯苓

白木各等分

右三味杵為散飲服方寸七日三服

仲景云嘔吐思水解者急與之予長男每嘔水三二碗諸藥不効但吃井花水一口即住用白朮茯苓湯服愈信知先賢不誣也

本治卒嘔吐不止不欲食衰把葉汁飲之止渴偏理嘔

丹婦人月經時口渴吃水多心痞善嘔不食

白木

陳皮

山梔

木通

黃芩

炙甘草

醫學綱目卷三

姜

分二貼水二盞煎小盞入姜汁熱飲之

本治產後嘔不止者香靈丸

丁香

辰砂另研各六分

五靈脂一錢

右香脂先研末後入砂再研勻用狗膽或猪膽丸如雞頭大每服一丸生薑陳皮湯磨下

痰厥

諸痰喘嘔皆屬於上全文

素太陰所謂食則嘔者物盛滿而上溢故嘔肺解

辛散

辛散逆氣諸方用姜半桶之類並見上

苦泄

瀉治嘔逆不能食訶黎勒皮二兩去核搗為末煉蜜和丸

梔子大空心服二十九日二服

陰求

食木瓜主嘔嘔風氣又吐而轉筋煮木瓜汁飲之甚良

吐胸氣

世若病人直患嘔吐而復腳弱或疼乃是胸氣當作胸氣治之

運氣嘔吐有四

一曰火熱經云少陰司天熱氣下臨嘔逆躁煩又云少陽所至為嘔涌又云少陽之復嘔逆又云火鬱之發嘔逆治以鹹寒甘寒是也

二曰風經云厥陰在泉風淫所勝病食則嘔又云厥陰司天風淫所勝食則嘔又云厥陰之勝甚則嘔又云厥陰之復嘔吐飲食不入而復出甚則入脾食痺而吐治以辛涼甘清酸清是也

三曰風火經云少陽司天之政風熱參布民病嘔吐二之氣病熱鬱於上欬逆嘔吐三之氣民病嘔又云太陽司天之政初之氣病見熱頭痛嘔吐治以酸寒辛寒酸寒是也四曰濕經云陽明司天之政初之氣其病嘔又云土鬱之發甚則心痛脚腫嘔吐是也

醫學綱目卷三

老

鍼灸嘔吐取法有二

其一取脾經云脾足太陰之脈是動則病食則嘔視虛虛熱寒陷下取之也

其二取肝經云肝足厥陰之脈所生病者胃滿嘔逆視虛虛熱寒陷下取之也

瀉嘔盛無度并乾嘔 太陵 間使

瀉嘔逆 中脘 尺澤

瀉胃中痰飲霍亂驚悸腹脹暴痛恍惚吐逆不食 巨關

六三里立

肝脈緩為善嘔全文見診

禁忌 因孫真人言生薑為嘔家聖藥調上焦氣壅表實之病而言非以瀉氣而言之也若脾胃虛弱穀氣不行榮衛下流是中氣不利清氣津液不上胃中閉塞氣道不開亦令人



噦惟宜益胃推揚穀氣而已勿作外實以辛藥生痰之瀉其壅滯及妄以瀉氣瀉血藥下之則轉增閉塞疼痛或變作結胸復下其膈由此致危者多矣蓋氣已虛而反瀉之是重瀉其氣必胸中如刀削之痛與正結胸無異可不慎哉

丹嘔吐煎藥忌瓜蒌杏仁桃仁蘿蔔子山梔皆要作吐丸藥中帶香藥行散不妨 注船大吐渴飲水者即死童便最好

吐有物 潔治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先降氣和中 桔梗湯

桔梗一兩 白朮半兩 半夏二兩 陳皮白 枳實炒 茯苓 厚朴各一兩

入醫學綱目卷三

夫

右粗末每服一兩水一盞煎至七分取清溫調木香散二錢隔夜空腹服之三服後氣漸下吐漸去然後去木香散加芍藥二兩黃芪一兩半同煎服之病愈則止如大腑燥結食不盡下以大承氣湯去積微下之少利為度再服前藥補之如大便復結又依前微下之

木香散 木香 檳榔等分

右為細末同煎藥調下 保治暴吐上焦氣熱所衝也經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬于火脈洪而浮者刺黃湯主之

荆芥一兩 人參五錢 甘草二錢 大黃二錢 右粗末作一服水二盞煎至一盞去渣調檳榔散二錢空心服之

檳榔散

檳榔二錢 木香一錢 輕粉少 右為細末同煎藥下如丸亦用水浸蒸餅為丸如小豆大每服二十九食後服

李絳獨參湯治嘔吐胃弱欲死方見嘔 仲大黃甘草湯治食已即吐又治吐水

大黃二兩 甘草一兩 右二味以水三升煮取一升分溫再服

潔金花丸治吐食而脈弦者由肝勝于脾而吐乃由脾胃之虛宜治風安胃

半夏一兩 枳殼二錢 雄黃半錢

右細末姜汁浸蒸餅為丸如桐子大小兒另丸姜湯下從少至多漸次服之以吐止為度風痰羈絆于脾故飲食不下

入醫學綱目卷三

夫

治吐頭痛有汗脈弦青鎮丸主之

柴胡一兩 黃芩七錢 甘草 半夏三錢 青黛半錢 人參五錢

右細末姜汁浸蒸餅丸桐子大每服五十九丸姜湯食後下

仲胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯主之

茯苓半斤 澤瀉兩兩 甘草兩 桂枝兩 白朮三兩 生姜兩

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫服八合一日三服

本食即吐欲作反胃白朮散

澤瀉 白朮 茯苓各等分 右為末每服一錢湯調溫服



汚血

雜方

運氣

診

經治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者可以  
 五靈脂不夾土石棟精好者不計多少搗細末研狗膽汁  
 和為丸如雞頭大每服一九煎熟生薑酒磨細更以少生  
 姜酒化下凡湯藥令極熱須是先做下粥溫熱得所左手  
 與患人藥吃不得嗽口右手急將粥與患人吃不令太多  
 碧霞丸治吐逆立効黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥  
 入銚內煎乾却用炭火三稱就銚內煨透紅冷取研細為  
 末川粟米飯丸如桐子大煎醇湯下七九不嚼只一服  
 運氣吐皆屬風木經云厥陰之復甚則入脾食痺而吐又  
 云歲木太過風氣流行民病脇痛吐食治以酸清之類是  
 也  
 灸刺見前灸刺嘔吐條  
 脈陽緊陰數其人食已即吐陽浮而數亦為吐 寸緊尺

八音醫綱卷之三

三

瀉其人胸滿不能食而吐 寸口脈數其人則吐 寸口  
 脈細而數數則為熱細則為寒數為嘔吐

仲問曰病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者何也師  
 曰以發其汗令陽微脈虛脈乃數數為客熱不能消穀  
 胃中虛冷故吐也

乾嘔無物

仲乾嘔噦若手足厥者陳皮湯主之

陳皮四兩 生薑半斤

右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

肝主卒乾嘔不息取甘蕉汁溫服半升日三又以生薑汁  
 一升服並澆 治卒乾嘔不息搗葛根絞取汁服一升瘥  
 本藥云生葛根汁大寒

惡心欲吐

瀉痰

丹惡心有熱有痰皆用生薑隨証用藥  
 仰病人胃中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微心中憤憤  
 然無茶者生薑半夏湯主之

半夏斤半 生薑斤一

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升  
 半少冷分四服日三夜一服止停後服

芫花芩半夏湯治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐是邪氣  
 羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

炒麴三錢 大麥藥半兩陳皮 天麻各二錢

白朮 白茯苓 半夏各一兩

右為粗末每服五錢水二盞生薑五片煎至一盞去查  
 熱服

柴胡半夏湯治舊有風症不敢見風眼澁眼黑胃中有痰

八音醫綱卷之三

七

惡心兀兀欲吐但遇風覺皮肉緊手足難舉動重如石若  
 在暖室少出微汗其症隨減再遇風病復如是

半夏二錢 炒麴一錢 生薑三片 柴胡

升麻各五錢 蒼朮一錢 藜蘆五分 白茯苓七錢

右為粗末只作一服水二盞煎至五沸去查溫服

張文仲治胃氣冷吃食即欲得吐以白薤菹仁三枚搗篩  
 更研細好酒一盞微溫調之併飲三兩盡佳

仲病人欲吐者不可下之

雲蒲黃散治產後三四日惡露不下嘔逆壯熱

芍藥二兩 知母二兩 生薑 當歸

蒲黃兩 紅花錢五 荷葉心中帶筒

生地汁一盞

右咬咀水二升煎至一升去查下蒲黃煎數沸空心分



三服  
療產後嘔吐不止

橘紅一兩 半夏麴 甘草各五錢 丁香一兩  
右為細末每服三錢姜三片水煎

大開胃散治產後胃氣不和嘔吐不止全不納飲食

訶子肉一兩 人參一兩 甘草半兩

右三味為細末別以半夏半分生薑一分葱白二七莖水二大盞煎至六分去渣分為二服

嘔苦水

丹鄭宅如夫人清早嘔苦水脈澹而微起轉如常此胃弱而上腕有濕也

黃芩七錢 滑石一兩 蒼朮一兩 飛礬二兩  
陳皮一兩 山查一兩 半夏一兩 桔梗五錢

炒芩五錢 姜水煎服

針灸  
刺灸嘔苦獨取膽與胃經云善嘔嘔有苦長大息邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔取膽三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以開膽逆卻調虛實以去其邪又云口苦嘔宿汁取陽陵泉是也

運氣  
運氣嘔苦皆屬燥經云陽明在泉燥淫所勝病善嘔嘔有苦又云陽明之勝嘔苦治以苦溫辛溫是也

吐酸吞酸

丹或曰吞酸素問明以為熱東垣又以為寒何也予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成積成積既久濕中生熱故從木化遂作酸味非熱而何其有鬱積之久不能自涌而出伏於脾胃之間略不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味

丹或曰吞酸素問明以為熱東垣又以為寒何也予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成積成積既久濕中生熱故從木化遂作酸味非熱而何其有鬱積之久不能自涌而出伏於脾胃之間略不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味

刺心肌表溫暖膝理開發或得香熱湯九津液得行亦可皆解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也但東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治熱濕鬱積之法為未合經意予嘗治谷酸用黃連芩各製炒隨時令送為佐使蒼朮茯苓為輔湯浸蒸餅為小丸吞之仍教以糲食蔬果自養則病易安 吞酸用吳茱萸順其性而折之此反佐之法也必須以炒黃連為君

咽醋丸

茱萸 去枝梗半兩 陳皮 去白五錢 黃芩 炒五錢 蒼朮 炒二錢 黃連 一兩 切用 陳壁 泥同炒

右為細末糊丸桐子大

參萸丸可治吞酸不可治自利

兵部手集治酸心每醋氣上攻如酸醋茱萸一合水三盞煎七分頓服總濃亦強服

梅治酸心枳椇四兩陳皮二兩細搗為末空心生蜜湯下方寸匕

丹大夫因外感涼氣胸宿飲相搏心下酸感嘔清水後有紅

青皮三錢 黃芩半兩 人參二錢 紫蘇

木通 甘草 枳殼二錢 桔梗半兩

麻黃分斤

病機云諸嘔吐酸中為於熱辨云此上焦受外來客邪也胃氣不受外邪故嘔傷寒論云嘔家雖有陽明症不可攻之是未傳入裏三陰不受邪也亦可見此証在外也神

病機云諸嘔吐酸中為於熱辨云此上焦受外來客邪也胃氣不受外邪故嘔傷寒論云嘔家雖有陽明症不可攻之是未傳入裏三陰不受邪也亦可見此証在外也神



景以生薑半夏治之孫其人云嘔家多用生薑是嘔家藥以禱病論之嘔吐酸水者甚則酸水浸其心不任其苦其次則吐出酸水今上下牙酸澹不能相對以大辛熱劑療之必減吐酸嘔出酸水也酸味者收氣也西方肺金旺也寒水乃金之子子能令母實故用大熱之劑瀉其子以辛熱為之佐以瀉肺之實以病機之法作熱攻之者候矣蓋雜病醋心濁氣不降欲為中滿寒藥豈能治之乎加減二陳湯 養春安胃散 二方並見前

本予平生有二疾一則下血二則膈中停飲下血有時而止停飲則無時始因年少時夜坐為文左向伏几案是以飲食多墜向左邊中夜以後稍困乏必飲酒二三盞既臥就枕又向左邊側睡氣壯盛時殊不覺三五年後覺酒止從左邊下流澆有聲腸痛飲食外減十數日必嘔數升酸

八醫學綱目卷三

水暑月止是右邊身有汗熱常潤左邊病處絕燥過訪名醫及海上方服之少有驗者間或中病止得月餘復作其補如天雄附子參石其利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣予後揣度之已成癆瘵如潦水之有科臼不盈科不行水必盈科而行也清者可行濁者依前停蓄蓋下無路以出之也是以積之五七日必嘔而去稍寬數日復作脾上惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝濕崇土以堆科臼則疾當去矣於是悉屏諸藥一味服蒼朮三月而除此後一向數年不吐不嘔胃膈寬飲啖如故暑月汗周體而身涼飲亦從中下前此飲漬其肝目亦多昏眩其後燈下能書細字皆蒼朮之力也其法蒼朮一斤去皮切末之用白芝麻半兩水二盞研攪取汁大棗十五枚爛煮去皮核研以蘇汁勻研成稀膏攪和入相熟杵丸如桐子大乾之每日空

腹溫湯吞下五十九粒加至一百九二百九忌桃李雀雉初服時必膈微燥且以草木製之覺燥甚再進山梔子散一服久之不燥也予服半年以後止用燥烈味極辛者削去皮不浸極有力亦自然不燥山梔散用山梔一味乾之為末沸湯點服故知久坐不可伏向一邊時或運動亦調息之法

治酒癖停飲吐酸水乾姜丸 聖惠方

乾姜 葛根 枳殼 橘紅

前胡各五 白朮 半夏麴各一 茱萸

甘草各一

右細末煉蜜丸如桐子大每服三十九用米飲服有效治中風痰涎飲眩膜嘔吐酸水頭痛惡心

半夏二 南星 白附各一

入醫學綱目卷三

右並生為末滴水丸如桐子大以生麵裹衣陰乾每服十九至二十九生薑湯下

子和棠溪張鳳村一田叟姓楊其病嘔酸水十餘年本醫飲諸醫皆以燥劑治之中脘膈膈以火艾燻鍼刺之瘡未嘗合戴人以苦劑越之其涎如膠乃出二三升談笑而愈運氣吐酸皆屬於熱經云諸嘔吐酸皆屬於熱又云少陽之勝欲嘔嘔酸治以辛寒是也

東吐宿汁吞酸 章門 神元

嘔吐清水

本一味蒼朮丸治嘔吐清水如神 方見吐 仲茯苓飲治心胃中有停痰宿水自吐出水後心胃間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓 人參 白朮各三 枳實二



陳皮五兩 生姜四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九里進之

丹盛兄兩手麻弦飲後嘔清水

神麴 蒼朮 香附各五 益元散兩

半夏七錢

右為末姜汁浸蒸餅為丸

仲渴欲飲水入則吐者名曰水逆五苓散主之方見傷寒

丹施十年四十因灸艾火太多病腸內下血糞肚痛今痛

自止善嘔清水食不下宜清胃口之熱

黃芩五 陳皮 地黃各一 白朮一錢

連翹五 甘草 茯苓五 生薑三

干治痰飲水吐無時節者其源因於飲過度遂令脾胃氣

入胃平胃散主之

瀛不能消於飲食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停皆

赤石脂散主之赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲時稍加

至三七服盡一斤終身不吐痰水又不下痢補五臟令人

肥健有人痰飲服藥不愈用此方愈

運氣嘔吐清水有二

一曰濕經云太陰之復嘔而密默唾吐清液治以甘熱是

也

二曰寒經云諸病水液澄澈清冷皆屬於寒是也

嘔沫

仲乾嘔吐逆吐涎沫半夏乾姜散主之

半夏 乾姜各等

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓服

之

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之方見傷寒

婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫小青

龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

刺灸嘔沫獨取手太陰經云手太陰脈逆虛滿而欬善嘔

沫治主病者是也

脾脈微急為膈中食飲入而還出後沃沫全文見虛實法經云急者多寒

嘔膿

仲嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

嘔吐虫

丹吐虫黑錫炒成灰楨榔末米飲調下

仲就厥者當吐就今病者靜而復時煩此為厥寒就上入

膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者就聞食臭出其人當

自吐就 就厥者烏梅丸主之又主痢方見傷寒厥陰論

入胃平胃散主之

刺灸嘔虫獨取胃經云胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長虫出

取胃三里是也

脈關上脈微浮積熱在胃中嘔吐就虫心健忘

仲病人有寒復發汗胃中冷必吐就

吐利

成無已云若止嘔吐而利經云謂之吐利是也上吐下利

躁擾煩亂乃謂之霍亂其與但稱吐利者有異也蓋暴於

旦夕者為霍亂可數日久之者為吐利今以暴為霍亂者寓

於傷寒吐利門徐而日久者入此門

海上吐下瀉不止當瀉而反不瀉脈微細而弱者理中湯

主之方見傷寒

丹泄瀉或嘔吐六一散生姜汁湯調

丈夫因辛苦發熱腰腳痛吐瀉交作



白木 滑石 陳皮各二錢 木通  
 柴胡半錢 人參錢 甘草分五  
 脈心乘肝必吐利  
 運氣吐利有二

一曰風木經云厥陰所至為嘔泄又云木太過曰發生發  
 生之紀上微則氣逆其病吐利是也  
 二曰寒水經云水太過曰流行流行之紀其動漂泄沃涌  
 是也謂吐利沃

脾診  
 欬嘔腹痛且發泄其脈絕是逆也全文見  
 仰乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之

黃芩兩 甘草兩 芍藥兩 半夏斤半  
 生薑兩 大棗十  
 右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一

服  
 黃芩湯治乾嘔下利  
 黃芩兩 人參 乾姜各三 桂枝兩  
 大棗十 半夏兩

右六味以水七升煮取三升溫分三服  
 風表  
 水奠金花丸治有痰而泄痢不止甚則嘔而欲吐利下  
 而不能食由風痰羈絆脾胃之間

半夏兩 天南星兩 天麻兩 寒水石兩  
 雄黃半錢 白麵兩  
 右為末滴水為丸桐子大每服百丸先煎藥水沸下藥  
 煮令浮為度漉出生薑湯下食前

關格  
 關者不得小便格者吐逆上下俱病者也

寒熱  
 難邪在六腑則陽脈不和陽脈不和則氣留之氣留之則

陽脈盛矣邪在五臟則陰脈不和陰脈不和則血留之血  
 留之則陰脈盛矣陰氣太盛則陽氣不得相營也故曰隔

關格者不得盡其命而死矣七難  
 關者不得小便格則吐逆關者甚熱之氣格者甚寒之  
 氣是關無出之由故曰關也格無入之理故曰格也 寒

在胃中過絕不入熱在下焦填塞不便  
 雲陰陽易位病名關格胃膈上陽氣常在則熱為主病身  
 半已下陰氣常在則寒為主病寒反在胃中舌上白胎而

水漿不下故曰格格則吐逆熱在丹田小便不通故曰關  
 關則不得小便胃中有寒以熱藥治之丹田有熱以寒藥  
 治之若胃中寒熱兼有以主客之法治之治本當緩治客

當急尺寸反者死陰陽交者死關格者不得盡其命而死  
 矣  
 丹必用吐提其氣之橫格不必在出痰也 有痰以二陳  
 湯吐之吐中便有降 有中虛氣不運者補氣藥中升降

之  
 孫奉職趙令儀女忽吐逆大小便不通煩亂四肢漸冷無  
 脈凡一日半與大承氣湯一劑至夜半漸得大便通脈漸  
 和翌日乃安此關格之病極為難治垂死而活者惟此一

人耳  
 孫治大小便不通關格不利燒皂角細研粥飲下三錢立  
 通  
 外關格脹滿大小便不通獨頭赤燒熱去皮紙裹納下部



氣立通

仰寸口脈浮而大浮為虛大為實在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆

脈下微本大者則為關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死成註云下微謂脈沉之而微也本大謂脈後脈大也

膈氣 反胃 噎 咽 喉 噎 塞 口 閉 目 眩

辨惑

丹局方治氣一門有曰治一切氣冷氣滯氣逆氣上氣用安息香丸丁沉丸大沉香丸蘇子丸勻氣散如神丸集香丸白沉香丸煨姜丸鹽煎散七氣散溫白丸生姜湯其治嘔吐膈噎也用五膈丸五膈寬中散膈氣散酒癪丸草荳蔻丸撞氣丸人參丁香散其治吞酸也用丁香煎丸小理中丸其治痰飲也用倍末丸消飲丸溫中化痰丸五套丸

八寶學類卷三

甲

且於各方條下或曰口苦失味曰噫酸曰舌澀曰吐清水曰痞滿曰氣急曰脇下急痛曰五心中熱口爛生瘡皆是明言熱症何為悉用熱藥夫周流於人之一身以為主者氣也陽往則陰來陰往則陽來一升一降無有窮已苟內不傷於七情外不感於六淫其為氣也何病之有今日冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而至於上焦不納中焦不化下焦不滲展轉變為嘔為吐為膈為噎為痰為飲為反胃為吞酸夫治寒以熱治熱以寒此正治之法也治熱用熱治寒用寒此反佐之法也詳味前方既非正治又非反佐此愚之所以不能無疑也謹按原病式曰諸病嘔吐酸皆屬於熱諸積飲痞滿中膈皆屬於濕諸氣逆衝上嘔涌溢食不下皆屬於火諸堅痞腹滿急痛吐腥穢皆屬於寒深契仲景之意

八寶學類卷三

甲

金匱要畧曰胃痺病胃背痛括蕤薤白湯主之胃痺心痛微背背痛微心瓜蒌薤白半夏湯主之心中痞氣結在胃脇下上逆搶心者枳實薤白桂枝湯主之嘔而心下痞者半夏瀉心湯主之乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之諸嘔吐穀不得入者小半夏湯主之嘔吐病在膈上者橘枳湯主之胃反嘔吐者半夏參蜜湯主之食已即吐者大黃甘草湯主之胃反吐而渴者茯苓澤瀉湯主之吐後欲飲者文蛤湯主之病似嘔不嘔似噦不噦心中無奈者姜汁半夏湯主之乾嘔手足冷者陳皮湯主之噦逆者陳皮竹茹湯主之乾嘔下痢者黃芩湯主之氣衝上者皂莢丸主之上氣脈浮者厚朴麻黃湯主之上氣脈沉者澤瀉湯主之火逆上氣者麥門冬湯主之心下有痰飲胃膈支滿目眩茯苓桂枝木湯主之短氣有微飲當從小便出之宜茯苓桂枝甘草湯主之腎氣丸亦主之病者脈伏其人欲自利者反快雖利心下續堅滿者此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之病懸飲者十棗湯主之病溢飲者當發其汗宜大青龍湯又宜小青龍湯主之心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之支飲胃滿者厚朴大黃湯主之支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之嘔家本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之假令瘦人膈下有悸者吐涎沫而頭眩此水也五苓散主之心胃有停痰宿水自吐出水後心胃間虛氣滿不能食消痰氣令能食茯苓飲主之先渴後嘔為水停心下此為飲家半夏湯加茯苓主之觀其微意可表者汗之可下者利之滯者導之鬱者揚之熱者清之寒者溫之偏寒偏熱者反佐而行之挾濕者



淡以滲之挾虛者補而養之何嘗例用辛香燥熱之劑以火濟火實實虛虛咎將誰執或曰脈訣調熱則生風冷生氣寒主收引今冷氣上衝矣氣逆矣氣滯矣非冷而何吾子引仲景之言而斥其非然則諸氣諸飲諸嘔吐反胃吞酸等病將無寒症耶予曰五臟各有火五志激之其火隨起若諸寒為病必須身犯寒氣口食寒物乃為病寒非若諸火病自內作所以氣之病寒者十無一二或曰其餘痰氣嘔吐吞酸噎膈反胃作熱作火論治於理可通若病人自言冷氣從下而上非冷而何予曰上升之氣自肝而出中挾相火自下而出其熱為甚自覺其冷非其冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故見此症冷生氣者出高陽生之謬言也若病果因於寒當以去寒之劑治之何至例用辛香燥熱為方不知權變寧不誤人或曰氣上升者皆用

八寶丹

黑錫丹養正丹養氣丹等藥以為鎮墜然服之者隨手得効吾子以為為熱甚之病亦將有悞耶予曰相火之外又有臟腑厥陽之火五志之動各有火起相火者此經所謂一水不勝二火之火斯火也出於天造厥陽者此經所謂一水不勝五火之火出於人欲二者之火相扇而動氣之升也隨火炎上升而不降孰能禦之今借丹劑之重墜而降之氣鬱為濕痰丹性燥濕痰被劫亦為暫開所以清快丹毒積久偏助狂火除血愈耗其升愈甚俗人喜溫迷而不悟被此禍者滔滔皆是或曰丹藥之重欲降而升然如之何則可予曰投以辛涼行以辛溫制伏肝邪治以鹹寒佐以甘溫收以苦甘和以甘淡補養陰血陽自相附陰陽比和何升之有先哲治法其則不遠吾不贅及或曰諸氣諸飲與夫嘔吐吞酸噎膈反胃等症局方未中肯綮我知

之矣然則要畧之方果足用乎抑猶有未發者乎予曰天地之氣化無窮人身之病亦變化無窮仲景之書載道也醫之良者引例推之可謂無窮之用借令畧有加減修合終難踰越矩度也初病也其端甚微或因些小飲食不謹或外胃風雨寒暑或內感七情或食味過厚偏助陽氣積成膈熱或資稟素實表密無汗或性急易怒陰火炎上以致津液不行清濁相干氣為之病或痞或痛或不思食或噎噫腐氣或吞酸或嘈雜或膨滿不求本原便認為寒遽以辛香燥熱之劑投之數貼暫得快然以為神方仍前厚味不節將理不謹舊疾被劫暫舒濁液易於攢聚或半月或一月前病復作如此延蔓自氣成積自積成痰此為痰為飲為吞酸之由也良工未遇謬藥已行痰挾汚血遂成窠囊於是為痞為痛為嘔為噎膈反胃之次第諸

八寶丹

症隆起飲食湯液泥滯不行滲道塞滯大便或秘或溏下失傳化中焦愈停醫者不察猶執為冷翻思前藥隨手得快至此賓主皆悞藥欠燥熱顯俟久服脾可以溫胃可以壯以奠一旦豁然之効不思胃為水穀之海多血多氣氣清和則能受脾為消化之官氣清和則能運今得香熱之藥偏助氣血沸騰其始也胃液凝聚無所容受其久也脾氣耗散傳化漸遲其有胃熱易飢急於得食脾傷不磨鬱積成痛醫者猶曰虛而積寒非尋常草木可療妄以烏附助佐丹劑專意服餌積而久也血液俱耗胃乾稿其稿在上近咽之下水飲可行食物難入間或可入入亦不多名之曰噎其稿在下與胃為近食雖可入難盡入胃良久復出名之曰膈亦曰反胃大便秘小若羊屎然者雖不同病出一軀要畧論飲有六曰痰飲懸飲溢飲支飲留飲伏



飲分別五臟諸證治法至矣盡矣第恨醫者不善處治病者不守禁忌遂使藥助病邪展轉深痼去生漸遠深可哀憫或曰千金諸方治隔噎反胃未嘗廢姜桂等劑何吾子之多言也予曰氣之鬱滯久留清道非借香熱不足以行然悉有大黃石膏竹茹芒硝澤瀉前胡朴硝茯苓黃芩蘆根瓜蒌等藥為之佐使其始則同其終則異病邪易伏故易於安或曰胃脘乾痛者古方果可治乎將他要有要捷之法或可補前人之未發者乎予曰古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以清痰乾姜以養血粟米以實胃蜜水以潤燥姜以去穢正是此意張雞峯亦曰噎當是神思間病惟內觀自養可以治之此言深中病情治法亦為近理夫噎病主於血乾夫血者陰氣也陰主靜內外兩靜則臟腑之火不起而金水二氣有養陰血自生腸胃津液傳化合宜何噎之有

翻胃

丹翻胃即膈噎大約有四血虛氣虛有熱有痰 治必用童便竹瀝韭汁牛乳姜汁氣虛入四君子湯血虛入四物湯加童便年少者四物湯清胃脘血燥不潤故便瀉年高者不治治必用參耆茸關防氣虛胃虛 一中年婦人患反胃以四物湯加和白陳皮留尖桃仁生甘草酒紅花濃煎入驢尿以防其或生虫也與數十貼而安 台州一木匠年二十七勤於工作而性巧慧有一艾妻且喜酒病反胃者半載其面白其脈澹而不勻重取則大而弱小便八九日方通一次糞皆燥結如羊屎甚羸乏無力予調精血耗竭也先與甘蔗汁煎六君子湯加附子大黃與之伺大便稍潤令謝去工作臥於牛家取新溫牛乳細飲之

每頓盡一盃一晝夜可五六次以漸而至七八次其餘菜果粥飯皆不入口半月而大便潤月餘而安然或口乾蓋酒毒未解間飲甘蔗汁少許近兩月而安矣 各等分姜煎皮半更 翻胃用韭汁二盞牛乳一盞生姜汁半盞和勻溫服效別有方

不醫學綱卷之三

皮益其血月餘而安

食主脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲不下粟米半升研粉水和丸如桐子大煮令熟點少益空心和汁吞下世治番胃吞酸錫糖查六兩生薑四兩研細和為餅晒乾每用餅十兩入甘草一兩為末湯調下陳彥正服得効陽蓄積病苑而陽氣當隔隔者當瀉不亟正治粗乃敗之 陰陽 全文見

- |       |          |       |           |
|-------|----------|-------|-----------|
| 半夏 錢三 | 烏梅 去核 錢二 | 沉香 錢一 | 杏仁 去皮尖 錢一 |
| 砂仁 錢三 | 丁香 錢二    | 檳榔 錢二 | 木香 錢一     |
| 陳皮 錢五 | 白芷 錢五    | 白朮 錢一 | 巴豆霜 五分    |



右細末入巴苳霜令勻醋糊為丸如黍米大每服五  
 九食後姜湯下愈則止小兒另丸 一法反胃吐食用  
 橘皮一箇浸少時去白膜生薑一塊麩裏碎燒令熟  
 去外麩煎湯下紫沉丸一百九一日二服後大便通至  
 不吐則止此主寒積氣病機有代礬石  
 垣厚朴丸主背胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾其  
 藥味即與萬病紫苑丸同

厚朴 蜀椒去目 川烏頭炮去皮各  
 紫苑去土 吳茱萸湯洗 菖蒲 柴胡去  
 桔梗 茯苓 官桂 皂角去皮  
 乾姜炮 人參各二 黃連二兩 巴苳霜半  
 右為細末入巴苳霜勻煉蜜為劑旋旋丸如桐子大每  
 服三九漸次加至五七九以利為度生薑湯下食後而

臥此藥治効與局方溫白丸同及治處暑以後秋冬間  
 下痢大効 春夏加黃連二兩 秋冬再加厚朴二兩 如  
 治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲茯苓各一兩  
 半 如治風痛不愈者依春秋加藥外更加人參菖蒲  
 茯苓各一兩半 如心之積加菖蒲白茯苓為輔 如  
 肝之積加柴胡蜀椒為輔 如肺之積加黃連人參為  
 輔 如脾之積加萊菔乾姜為輔 秋冬久瀉不止加  
 黃連茯苓  
 保反胃大便不通者是腸勝胃也服局方半硫丸三十九  
 大府秘用  
 附子錢五 巴苳仁 枳一豆  
 右末極細生薑糊丸菴菴大每服一九白湯下  
 治下焦吐食朝食暮吐暮食朝吐大便不通宜附子丸

附子炮五 砒研半 巴苳霜一  
 右同研極細密黃蠟為丸如桐子大每服一二九冷水  
 送下利為度利後更服紫苑丸常服一九勿令再閉  
 聖白木木香散治寒積氣嘔吐腹中痛是無積也胃強而  
 乾嘔有聲無物脾強而吐食持擊強是以腹中痛當以此  
 藥和之

木香錢一 白木兩半 半夏炮 檳榔二  
 茯苓錢五 甘草錢四 丁香錢一  
 右為細末每服一二錢濃煎芍藥生薑湯調下有積者  
 痛時手按之愈痛無積者按之不痛  
 白木散治胃中虛損及痰而吐者  
 半夏炮 白木 木香 甘草各一  
 檳榔半錢 茯苓

右為細末每服二錢食前姜湯下  
 羅十膈氣散專治十般膈氣冷膈風膈氣膈伏膈熱膈悲  
 膈水膈食膈喜膈皆病源也並因憂驚冷熱不調又乖將  
 息更於喜怒無時貪嗜飲食因而而不化積滯在膈上腸鳴  
 痰嗽歲月漸深心胃噎塞漸至羸瘦久若不除必成惡候  
 人參 白茯苓 官桂 枳殼  
 炙甘草 神麩炒 麥芽炒 廣茂炮  
 白木 陳皮去 乾姜炮 京三稜煨  
 訶黎勒去各一兩 厚朴製 檳榔  
 木香已上名  
 右為極細末每服一錢鹽湯點服如覺脾胃不和腹脹  
 心胃滿悶用水一盞生薑七片棗二枚搥少許同煎至  
 八分查熱服空心食前



普慈散治五種膈氣

肉苳菴去皮 木香 人參 厚朴製

赤茯苓去 桂各半 甘草炙 枳實炒

訶梨勒各半 青皮各半 陳皮去白 郁李仁湯泡

大炒黃半兩 半夏湯洗了用生薑搗如泥 蘇合五錢

右為極細末每服二錢入鹽少許如茶點服若入生薑

末同煎亦佳不拘時候能治氣補勞通血脈補脾胃去

痰實

本藥治反胃外臺載昔幼年經患此疾每食餅及羹粥

等須更吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等時稱名醫奉

勅令治醫竭其術竟不能療漸至麻痺死在朝夕忽有衛

士云服驅小便極驗且服二合後食唯吐一半哺時又服

二合人定時食粥吐即便定後奏知大內中五六人患反

胃同服一時俱痊此藥稍有毒服時不可過多盛取尿熱

服二合病深者日服之良驗本草云驅尿治癆反

世又方驅尿調平胃散見世醫

新瓦散治反胃用多年瓦一片燒紅入驅尿內煇廿一次

研為末倉米飯焦亦為末二分飯末一分瓦末蠟精和飯

丸以驅尿和平胃散服之吞下

丹香胃方

黃連細切姜汁 山查肉一錢 保和末六錢

右粥九桐子大人參湯入竹瀝再煎沸熱下六十九

羅人參利膈九治胃中不利痰嗽喘滿利脾胃滯便秘

推陳致新治膈氣之聖藥也

木香 枳實 人參 當歸 藿香 甘草 枳實 大黃

厚朴姜制各

右為細末滴水為丸桐子大如劑丸少加宿蒸餅和丸

每服三五十九食後諸飲下

本大黃湯治冷涎滯胃其候欲發時先流冷涎次則吐食

此乃勞証治不早死在旦夕用大黃一兩生薑自然汁半

茶並灸大黃令燥又焯入姜汁中如此焯汗盡切焙為末

每服二錢陳米一撮葱白二莖水一大盞煎至七分先食

葱白炙服其藥不十日去根

羅玄明粉朴硝不以多少煎過澄瀝五七遍晚於星月露

至明日自然結成青白硝用一无確按實炭火內煨從慢

至紫自然成汁煎至不響再加頂火一煨取出於淨地上

倒合盆去火毒至晚取出為細末每二斤入甘草末二兩

每用一錢二錢桃花湯或葱白湯調下治膈上氣壅滯五

臟秘塞邪熱忌魚及藕

丹香胃積飲通用益元散生薑自然汁澄清日脚丸小丸

子時時服見世醫 翻胃治用茱萸 貝母 瓜萸

牛膝草

本治積聚停飲痰水生虫久則成反胃及變為胃癰其說

在靈樞及巢氏病源芫花丸

芫花一兩 牛膝 狼牙根 桔梗炒

右為細末醋糊為丸如赤豈大每服二三九加至五七

丸食前生薑湯下 此方常服化痰消堅殺虫予患飲

癖三十年暮年常多雜痰飲來潮遲即吐有時飲半杯

酒即止蓋合此症也因讀巢氏病源論酒痕云飲酒多

而食穀少積久漸瘦其病常欲思酒不得酒則吐多睡



不復能食是胃中有虫使然名爲酒瘕此藥治之要之  
須禁酒即易治不禁無益也

海有楊時者因患風氣衝心飲食吐逆遍身枯瘦日服萬  
病紫苑丸五九至二十日瀉出肉塊蝦蟆五六枚白腹二  
升愈又趙侍郎先食後吐目無所見耳無所聞服萬病紫  
苑丸五九至十日瀉出青蛇五七條下惡膿三升方愈

世治番胃用蛔虫火煨爲末肉汁調下  
諸逆衝上皆屬於火見全文

世治番胃大田螺不拘多少用新水養之待吐出泥澄去  
上清水後用米篩張地上却將皮紙鋪在灰上傾此泥於  
紙上候乾稠丸如桐子大每服三十九丸香湯下立愈仍  
將田螺放水中如食之其病不安 治反胃多年壁上和

香附子末米飲湯頻服之  
本治反胃吐食

白礬一斤 黃丹一斤  
右爲末入瓦罐內煨令干取出以淨紙盛放地上盆蓋  
一宿再爲末蒸餅丸如桐子每服五九至七九空心温  
酒下更量老少虛實與之

寒濕 紅苴丸治諸嘔逆膈氣反胃  
丁香 胡椒 砂仁 紅苴各廿

右爲細末姜汁糊爲丸如皂角子大每服一丸以大棗  
一枚去核填藥麵裹燒熟去麵細嚼白湯下食前進三  
服神效

丁香附子散治膈氣吐食  
丁香半斤 檳榔一大 黑附一個半兩重

丁香半斤 檳榔一大 黑附一個半兩重

丁香半斤 檳榔一大 黑附一個半兩重

丁香半斤 檳榔一大 黑附一個半兩重

丁香半斤 檳榔一大 黑附一個半兩重

丁香半斤 檳榔一大 黑附一個半兩重

丁香半斤 檳榔一大 黑附一個半兩重

硫黃石去 胡椒各二  
右先將前四味爲末次入硫黃再研勻每服二錢用飛

硫黃一箇去毛翅足腸肚填藥在內用濕紙五七重裹  
定置慢火內燒熟取出嚼吃後用温酒送下一日三服  
不拘時候如不吃温酒温栗粥飲調下飛硫或云蠟

世六丁丸治番胃如神即香靈丸方見  
本附子散治反胃用附子一枚極大者生於磚上四面着  
火漸漸通熱燂入生姜自然汁中再用火逼再燂約盡生  
姜汁半碗焙乾入丁香二錢好服二錢水一盞粟米少許  
同煎七分不過三服在斗門方用粟米飲調下一錢服之  
又方治男婦小兒唇青面黃肚裏冷疼引牽小腹以至番  
胃換食嘔吐口苦舌乾少寐多寐脚手牽掣不拘年日遠  
近一切脾冷病悉能除愈有一婦人年四十餘久患番胃

面目黃黑歷三十餘年醫不能効脾膈諸穴燒灸交遍其  
病愈甚服此藥七日頓然全愈服至一月遂去其根自是  
服之不一三五服些小脾疾立便瘥平保全胃氣能生肌肉  
進飲食順榮衛當服人有補益累試累驗幸毋忽焉

人參兩 茯苓二兩 附子七錢已上重  
粉草兩 黃芪一兩

右爲細末再服三大錢温湯煎服忌生冷油麪粘膩等  
毒物無不効者甚妙

重劑 羅桂香散治膈氣反胃諸藥難瘥朝食暮吐甚者食已輒  
出其効神速

水銀 黑錫各三 硫黃五

右三味銚內用柳木槌熟研微火上細研爲灰取出後  
用丁香末二錢桂末二錢生薑末三錢都一處研令勻

丁香末二錢桂末二錢生薑末三錢都一處研令勻

丁香末二錢桂末二錢生薑末三錢都一處研令勻

丁香末二錢桂末二錢生薑末三錢都一處研令勻

丁香末二錢桂末二錢生薑末三錢都一處研令勻

丁香末二錢桂末二錢生薑末三錢都一處研令勻

丁香末二錢桂末二錢生薑末三錢都一處研令勻



每服三錢黃米粥飲調下一服効甚者再服

右丁香附子例治番胃灼見臍膈有疾者服之丹溪云

治反胃忌甚燥之劑犯之必死設用必與潤血藥相兼

服又前瀉積條亦香燥劑用者謹之

清血

本治男婦小兒遠年近日番胃吐食方用五靈脂一味不

拘多少為細末用黃犬膽汁為丸如龍眼大每服一丸好

酒半盞溫服不止再服不過三服即効經血有効本草云

味甘溫療心腹冷氣通氣散女子月閉

食不能下者胃脘膈也全大見一陽發病少氣善欬善

泄其傳為膈全大見病傳變〇五註云

者三陽結謂之膈王註云小腸結則血脈燥

運氣膈食皆屬濕經云太陰所至為積飲痞膈是也

世治番胃痛而吐諸氣不入者黃牛鼻繩各姓者七箇長

七寸燒存性為末作三服用好酒調下飯湯調亦得

魚散大鯽魚一箇去腸留膽納綠礬末填滿縫口以炭火

灸黃為末每服一錢陳米飲調下日三服

山番胃細炒棠梨葉去刺為末酒下 又方松木節為末

酒下

靈黃帝曰氣為上膈者食飲入而還出余已知之矣虫為

下膈下膈者食時時乃出時時通余未得其意愿卒聞之

岐伯曰喜怒不適食飲不節寒溫不時則寒汁流於腸中

流於腸中則虫寒虫寒則積聚守於下管則腸胃充郭衛

氣不營邪氣居之腸胃充郭衛氣不營人食則虫上食

虫上食則下管虛下管虛則邪氣勝之積聚以留因邪氣原

而居下膈今虫上而居下管虛則留則癰成癰成則下管約

下管約則食入則痛其癰在管內者即內而痛深其癰在

外者即癰外而痛浮

臍外者則癰外而痛浮上皮膚黃帝曰刺之奈何岐伯曰微按其癰觀氣所行先淺刺其傍稍內益深遠而刺之毋過三行察其沉浮以為深淺已刺必發令熱入中目使熱內邪氣益衰詳此刺非所刺也但刺後使之使熱大癰乃潰伍以參桑以除其內恬憺無為乃能行氣後以醢苦化殺乃下矣

灸刺膈食有四

其一取胃經云虫為下膈按其癰刺之者是其一法也

其二取太陰經云太陰根于隱白結于太倉太陰為開開折則倉厚無所輸膈洞膈洞者取之太陰視有餘不足故開折者氣不足而生病者是也蓋膈洞者經謂之食不化下噎選出也

其三取胃經云胃病若膈咽不通飲食不下取之三二是也又云飲食不下膈塞不通邪在胃脘在上脘則刺抑而下之在下脘則散而去之是也

其四取手少陰經云手少陰之别名曰通里去腕一寸半其病實則支膈取之掌後一寸別走太陽者是也

撮翹胃 勞宮分 中腕灸瀉 心膈一分沿皮向外

玉番胃吐食 中魁中指第三 中腕半 腕骨一分瀉

陳吐食不化 上腕 中腕 下腕

里食飲不化入腹還出下腕主之 又法三里、陰陵泉

三里 又法 腋聚毛下宛宛中 中腕 脾膈 中魁

東今日食明日吐 心膈沿皮 膈膈寸半 胃堂七世

中 巨關 胃脘 五十壯 又掛胃 商丘 通谷

巨關 然谷 隱白 陽陵泉 內庭 膈關



甲背痛惡寒春強俯仰難食不下嘔吐多痰隔關主之  
忌丹切不可用香燥之藥服之必死宜薄滋味  
診脈寸口脈微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足  
血不足則胃中冷跌陽脈浮而清浮則為虛清則傷脾脾  
傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐完穀不化名曰胃反脈緊  
而清其病難治脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃  
反寒在於上醫反下之令脈反弦故名曰虛

脾脈微急為膈中食飲入而還出涎沫全文見  
胃脈奕而散者當病食痺脈要精微論○至真  
腎脈微緩為洞洞者食不化下嗝還出全文見治

此一男子年六十二歲平居不能頓食常喜頻食一日忽  
覺咽膈壅塞大便結糞如羊矢三四日一見走動倦乏與  
噎

補氣藥則作痛醫見食少則與快腸胃消導之藥予脈之  
兩手俱見鴻脈似真臟喜其人形瘦而色紫黑病見乎冬  
却有生意遂於四物湯加白朮陳皮煎取濃湯研桃仁十  
二粒再煎沸飲之多食諸般血以助藥力三十貼而知至  
五十貼而大便潤七十貼而食進百貼而愈

浦江男子年六十自來好色虎甚去秋患吐病或有作時  
或有止時腹結微渴

地黃一錢 人參半錢 白朮一錢 黃芩三錢  
川芎三錢 芍藥一錢 當歸一錢 陳皮各五錢  
枳殼半錢 甘草分二 木通二錢  
楊淳三哥大便秘瀉咽塞不通人參散主之方見大  
後滯厚朴九治飲食噎塞方見  
汚血 東陽王仲延咽膈常覺有物悶悶每食物必屈曲自

膈而下且極瀉作微瀉食亦減他無所苦予脈之右甚  
而關甚沉左却和予曰汚血在胃腕之口氣因而鬱為痰  
此必食物所致明以告我彼不自覺予又曰汝去冬好食  
何物為多曰我每日必單飲熱酒三兩盃過寒氣為製  
一方用生菲汁半盞今細呷之每服半盞一日三次盃菲  
二斤而安

治膈噎馬剝兒即王瓜燒存性每一錢用寒肉平胃散二  
錢溫酒調服食即可下然後隨病源調理神效東肉平胃  
世治噎雞穀袋不問多少不可失包內物一粒用泥固濟  
火煨存性用姜汁炒香附每箇入半兩香附末神麩為丸  
姜湯送下  
治氣噎不下飲食

批杷葉去毛 青皮去 陳皮去  
右等分為末每服二錢水一盞生姜五片同煎至六七  
分溫服不計時候

治膈氣噎不下飲食用陳皮去白不拘多少用大蒜研細  
和丸如棗葦大每服二十九至三十九溫米飲下食後日  
三服

金匱玉函五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉  
水三大盞煮二盞去查溫服  
寒滯 羅漢防已散治五噎  
漢防已五 官桂一 細辛七錢 陳皮去白  
羚羊角末 紫蘇各七 杏仁湯洗去皮  
右為細末每服三錢生姜三片水煎日二  
本治五種積氣及五噎胃膈不快停痰宿飲羅金丹



丁香	木香	沉香	檳榔
官桂	胡椒	硃砂	白丁香
白芷	飛燕	馬兜鈴	南星
五靈脂	瓜蒌根	半夏	硃砂
右為細末入二味研藥和勻生薑汁煮糊丸如桐子大			
每服三九生薑湯下或乾嚼羅漢湯下			
治氣食憂勞思慮五噎膈氣丸			
麥門冬	甘草	人參	桂心
細辛	川椒	遠志	附子
乾姜			
右為木煉蜜丸如雞豆大綿裹二九含化食後日三夜			
三服胸中當熱七日愈			
治氣食憂勞思慮五噎膈氣丸			
半夏	桔梗	肉桂	枳殼
右細末姜汁麩糊丸如桐子大姜湯下三十九食後臥			
以服			

無擇廣五行記永微中有僧惟則病噎不能食謂諸弟子曰吾死後便可開吾智喉視有何物自經而卒弟子果開視胃中得一物形似魚而有兩頭遍躡皆肉鱗第子置碗中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中盛藍作殿適有一僧以澀置器中此虫遂透器中走須臾化為水此乃虫瘕非五噎比後人因以藍治噎快矣

子和沈丘王宰妻病胃膈不利口流涎沫自言咽下胃中常有雷声心間時作微痛又復發昏曾乳之間炎癥如基化痰利膈等藥服之三載病亦依然其家知戴人痰藥不損來求之一涌而出雪白虫一條長五六寸有口鼻牙齒

走於涎中病者惡而斷之中有白髮一莖此正與徐文伯所吐官人髮癭一同虫出立安	運氣噎皆屬燥經云陽明司天之政民病咳噎塞又云陽明之勝內餘噎塞胃中不便噎塞而欬又云陽明司天清復內餘噎塞者是也	右按運氣皆以噎塞生於燥噎塞者噎病也丹溪皆以噎病生於血槁血槁則燥矣得病情合經者丹溪一人也	雜方 禹錫頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈	聖治膈氣咽喉噎塞飲食不下用確背細細蜜丸如彈子大不時含一丸嚥津下	孫治噎欲發時啣鷓鴣鳥嘴遂下外臺秘要同	聖治噎病用狼結喉骨曬乾杵末入半錢於飯飲內食之
妙	針灸 膈五噎吞酸多唾嘔吐不止 天突五分留三呼得通關	在中脘旁各五分針入八分左捻能進飲食右捻能和脾胃	膈為一筋次針破病根腹中作聲為二筋次覺腹入膈	膈治五噎噎中 中脘之口吹火熾	甄精噎塞膈氣 通谷	明堂 五噎分治 氣噎中 憂噎心膈 食噎乳根
乳左下一	勞噎膈膈 思噎天府	集五噎 勞宮 中脘 中腕 三里 太陰 支溝	上腕 取後穴 寬中 太白 下腕 右關 脾	胃膈	仲寸口脈浮大醫反下之此為大逆浮即無血大即為寒	寒氣相搏即為腸鳴醫不知而反與飲水令汗大出水得



噎膈不通飲食不下取之三聖者是也針經云清胃  
干亂於胃中是為大惋大悞者惑也氣不交通最為急症  
不急去之諸變生矣聖人治此有要法陽氣不足陰氣有  
餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發於陽分而後瀉  
陰也春夏之月陽氣在經當益其經脈去其血絡秋冬陽  
氣降伏當先治其臟腑若有噎有寒寒者五臟之所主陰  
也血也噎者六腑之所主陽也氣也二者皆由陰中伏陽  
而作也今立四時用藥法并治法于後

咽喉噎塞口開目暈

本治  
壅堵塞咽喉陽氣不得出者曰塞陰氣不得下降者曰噎  
夫噎塞迎逆於咽喉胃膈之間今諸經不行則口開目暈  
氣欲絕當先用辛甘氣味俱陽之藥引胃氣以治其本加  
堵塞之藥以瀉其標也寒月陰氣大助陰邪於外於正藥  
內加吳茱萸大熱大辛皆之味以瀉陰寒之氣暑月陽盛  
則於正藥中加青皮陳皮益智黃柏散寒氣泄陰火之上  
逆或以消痞丸合滋腎丸滋腎丸者黃柏知母微加肉桂  
三味是也或更加黃連別作丸二藥七八十九空心約宿  
食消盡服之待少時以美食壓之不令胃中停留也此法

胃病

指於補中益  
膈咽不通并四時換氣用藥法 黃帝針經曰胃病者腹  
脹胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取三  
聖夫咽者嚥物之門戶也高者上焦心肺之分野不通者  
升降之氣上不得下交通又云清氣在下則生飧泄滲泄  
者謂泄黃如糜米穀不化者是也濁氣在上則生膈脹腹  
中脹滿不得大便或大便難先結後瀉皆是也濁氣在上  
當降而不降者乃腎肝吸入之陰氣不得入故食不得下  
也此皆氣衝之火逆胃之脈反上而作者也清氣在下則  
生飧泄者胃氣未病之日當上行心肺而榮經也因飲食  
失節勞役形骸心火乘于土位胃氣弱而下陷入陰中故  
米穀入而不得升反降而為飧泄也咽膈之間壅遏之甚  
不得交通者皆衝脈上行逆氣所作也蓋胃病者上衝兩

冬三月陰氣在外陽氣在內當外助陽氣不得發汗內消  
陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬乃水旺之時  
水旺則金旺子能令母實肺者腎之母皮毛之陽元本虛  
弱更以冬月助其令故病者善嚏鼻流清涕寒甚則濁涕  
嚏不止此常也若大惡風寒小便數而欠或上飲下便色

清而多大便不調常夜無寐甚則為痰為嘔為噎為噎為  
吐唾白沫以至口開目暈氣不交通欲絕者吳茱萸丸主  
之

吳茱萸丸治寒在膈上膈咽不通

- |     |    |     |    |     |
|-----|----|-----|----|-----|
| 吳茱萸 | 草薢 | 益智仁 | 白姜 | 各四分 |
| 陳皮  | 人參 | 黃芪  | 升麻 | 各八分 |
| 麥牙  | 一錢 | 甘草  | 歸身 | 各六分 |
| 木香  | 一分 | 澤瀉  | 姜黃 | 各四分 |
| 青皮  | 二分 |     | 柴胡 | 各四分 |

右為末湯浸蒸餅為丸如葶藶大細嚼三十九白湯送  
下不拘時候勿多飲湯恐速走下則減藥力

夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病值此時是天助  
正氣而對其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋



陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈咽不通咽中梗甚者前証俱作治法當從時用利膈九瀉肺火以黃芪補中湯送下如兩足痿厥行步惟怯軟倒側欲倒臂肅如折及作痛而無力或氣短氣促而喘或不足以息以黃芪人參甘草白朮蒼朮澤瀉猪苓茯苓陳皮等作湯送下滋腎丸五六十九六七月之間濕熱之令大行氣短不能言者加五味子麥門冬如心下痞悶食不下以上件白朮蒼朮等湯送下消痞丸七十九更審而用之

黃芪補中湯方見 利膈丸方見 滋腎丸方見

消痞丸方見

噯雜

噯雜只是痰因火而動梔子姜炒黃連不可無 此食鬱有熱山梔黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛

入醫學綱目卷三

本

肥人噯雜二陳湯少加蘇芩蒼朮白朮炒梔子 心下

噯雜者導飲丸最妙方見內

噯 產後噯

噯辨

噯者成無已許學士謂之吃逆是也或曰成無已許學士固以噯為吃逆然東垣海藏又以噯為乾嘔陳無擇又以噯名效逆諸論不同今予獨取成許二家之說何也答曰噯義具在內經諸家察之不詳故論紛紛耳謹按靈樞雜病篇云噯以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已詳此經文三法正乃治吃逆之法按吃逆用紙撚刺鼻使嚏則吃逆立止或閉口鼻氣使之無息亦立已或作寃盜賊大驚駭之亦已此予所以取成許二家之論噯為吃逆為得經旨也蓋噯吃之名雖二而病則一經名為之噯者噯即吃聲之重也俗名為之吃者吃即噯

聲之輕也皆因病聲之輕重得此二名初非噯吃有二病若以噯為乾嘔設使乾嘔之人或使之嚏或使之無息或使之大驚其乾嘔能立已乎噯非乾嘔也明矣若以噯名效逆夫噯者噯之病聲其聲發會厭下效者效之病聲其聲發會厭上故內經噯有噯之口問效有效之篇論病各不同噯不可名效逆也明矣

噯辨

丹吃逆論 吃病氣逆也氣自膈下直衝上出於口而作噯之名也書曰火炎上內經曰諸逆衝上皆屬於火東垣謂火與元氣不兩立又謂火元氣之賊也古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等劑治之未審孰為降火孰為補虛人之陰氣依胃為養胃土傷損則木氣侮之矣此土敗木賊也陰為火所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病

入醫學綱目卷三

五

人見此似為危症然有實者不可不知敢陳其說趙立道年近五十質弱而多怒七月炎暑大飢索飯其家不能急具因大怒兩日後得滯下病口渴自以冷水調生蜜飲之甚快滯下亦漸緩如此五七日召予視脈稍大不數遂令止蜜水渴時且令人參白朮煎湯調益元散與之滯下亦漸收七八日後覺倦甚發吃予知其因下久而陰虛也令其守前藥然滯下尚未止又以煉蜜飲之如此者三日吃尤未止眾皆尤藥之未當將以姜附飲之予曰補藥無速効附子非補陰者服之必死眾曰冷水飲多得無寒乎予曰炎暑如此飲涼非寒勿多疑待以日數藥力到當自止又四日而吃止滯下亦安 陳擇仁年近七十厚味之人也有久嗽病而作止不常新秋患滯下食大減至五七日後吃作召予視之脈皆大豁眾以為難予曰形瘦者尚



可為以人參白朮湯下大補丸以補血至七日而安此二人虛之調也 又一女子年踰笄性躁味厚炎月因大怒而吃作則舉身跳動脈不可診神昏不知人問之乃知暴病視其形氣俱實遂以人參薑三兩煎湯飲一統大吐頑痰數碗大汗皆睡一日而安人參入手太陰補陰中之陽者也蓋則反是大瀉太陰之陽女子暴怒氣上肝主怒肺主氣經曰怒則氣逆因怒逆肝木乘火侮肺故吃大作而神昏參薑善吐痰盡則氣降而火衰金氣復位胃氣得和而解麻黃發汗節能止汗穀屬金糖之性熱麥屬陽燄之性涼失備謂物物具大極學者不可不觸類而長引而伸之也

無凡吐利後多作噦此由胃中虛膈上熱故噦或至八九聲相連於氣不回至於驚人者若傷寒久病得此甚惡內

經所謂擾府者是也

右吐利後噦即丹溪治趙立道與陳擇仁二人噦皆於滯下得之之類六脈大濶用參朮而愈是也予長兄九月得滯下每夜五十餘行嘔逆食不下五六日後加吃逆與丁香一粒噦之立止但少時又至遂用黃連瀉心湯加竹茹飲之吃雖少止滯下未安如此者十餘日遂空心用御米穀些少澁其滑日間用參朮陳皮之類補其虛自服御米穀之後吃聲漸輕滯下亦收而安

仲噦而腹滿視其前後知何部不利利之即愈

小承氣湯治大便不通噦數語方見下

此起越陳氏二十餘歲因飽後奔走數里遂患噦病但食物則連噦百餘聲半日不止飲酒與湯則不作至晚發熱如此者二月脉滑數以血入氣中治之用桃仁承氣湯加

紅花煎服下汚血數次即減再用木香和中丸加丁香服之十日而愈

無噦而心下堅痞噦者以膈間有痰水所為

丹洪孺人年廿六歲夏月因事為長上所阻怒氣折鬱不得舒須臾就浴湯熱不可近怒氣復增就悶絕昏倒乃以衣遮掩就房須臾欬逆大作每一聲必渾身為跳躍仍復昏悶凡三五息一作脈不可診予曰此膈上有痰逆為怒氣所鬱痰熱相搏氣不得降而逆非吐則不可是時夜半又事出倉卒適有人參薑二兩在彼濃煎飲之大吐稠痰二升許通身得汗困睡半夜而安此詳前論所出者燥痰不出者用蜜水吐之

世噦聲頻密相連者為實可治若半時噦一聲者為虛難治多死在旦夕

仲噦逆者陳皮竹茹湯主之

陳皮二升 竹茹二升 大麥三十 生姜半

甘草兩 人參兩

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日五服

乾嘔噦若手足厥者陳皮湯主之方見前

本又方

枳殼五錢 木香一分

右細末每服一錢白湯調下未可再與

孫治諸吃噦陳皮二兩湯浸去穢剉以水一升煎之五合

通口服頃刻更加枳殼一兩去穢炒同煎之

外治久患欬噦連欬一二十聲者取生姜汁半合蜜一匙

頭煎令熱溫服如此三服立効

汚血 起越陳氏噦用桃仁承氣湯下汚血數升而愈是汚血為



咳也

丹溪用益元散大補丸趙立道陳擇仁下而嘔者或用蜜水治嘔者是熱嘔也

寒 剉柿錢散治吃逆

柿錢 丁香 人參各等

右為細末水煎食後服

羅丁香柿蒂散治諸種吃噁嘔逆痰涎

丁香 柿蒂 青皮 陳皮各一

右為粗末每服三錢水一盞半煎七分去渣溫服不拘時候

羌活附子湯

羌活 附子地 木香 茴香各五

乾姜兩

右為細末每服二錢鹽一撮煎二十沸熱服一服止

風府胃為噦全文見五臟虛實論利而不噦者胃實也

運氣噦有三

一曰熱經云少陰之復噦噦治以苦寒是也

二曰寒經云太陽之復嘔出清水及為噦噦治以苦寒是也

三曰燥經云陽明之復欬噦治以辛溫是也靈以刺刺鼻

傷寒將愈忽患吃逆子與古人治吃逆之藥殆通皆不愈

許出無藥逆用皂角末吹入鼻中得嚏而吃逆止少時又

吃又與皂角末嚏而止者九數百次其嚏時出痰涎漸多

自是吃逆漸疎至三二日而止此是合經算刺鼻嚏之法

針灸 黃帝曰人之噦者何氣使然岐伯曰穀入于胃胃氣上注于肺今有故寒氣與新穀氣俱還入于胃新故相亂真邪相攻氣并相逆復出于胃故為噦補手太陰瀉足少陰

篇

世治吃逆於臍下關元穴灸七壯立愈累驗

羅又方男左女右乳下黑盡處一韭葉許灸三壯甚者二七壯

集治氣逆發吃 薑中 中脘先補後瀉不 三里 肺

俞 行間

診 心脈小甚為噦全文見治

產後噦

雜方 大產後欬逆三日不止欲死

肉桂錢五 姜汁三

右同煎服二合以火先炙手摩令背熱時時塗藥汁盡

妙

產後咳逆乾柿一箇切碎以水一盞煎六分熱呷

不醫者納以米三

產寶治產後咳逆經三五日不止欲死方煎壁鏡窠三五箇呷瘧子案

針灸 大噦吃服藥無效灸期門必愈

醫學綱目卷之二十二



泄瀉部

熱下屬 瀉論曰厥瀉利其證亦多大抵從風濕熱論之是知寒少熱多寒則不能久也故曰暴泄非陰久泄非陽論曰春宜緩形形緩動則肝木乃榮及靜密則是行秋令金能制木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則瀉泄身熱脈洪穀不能化重則下利膿血稠粘裏急後重故曰諸泄稠粘皆屬於火經云洩而便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍藥湯是為輕劑是實則瀉其子木能自虛而脾土實矣故經曰春傷於風夏為飧泄此逆四時之氣人所自為也此一節熱瀉有自太陰經脾受濕而為水泄虛滑微滿身重不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜泄之法曰宜補宜泄宜和宜

止和則考藥湯止則訶子湯久則防變為膿血是脾經傳受於腎謂之賊邪故難愈也若先利而後瀉謂之微邪故易安此皆脾土受濕大之所為也却聖智不能逃口食味卑食氣從鼻而入留積於脾而為水泄也此一節濕瀉有厥陰經動下痢不止其脈沉而遲手足厥逆涕唾膿血此症難治宜麻黃湯小續命湯汗之法云為有表邪縮於內當散之而自愈此一節風瀉有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難布息脈微嘔吐急以重藥溫之藥水散是也此一節寒瀉故法曰後重者宜下腹痛者宜和身重者宜除濕脈弦者去風膿血稠粘者以藥竭之身冷自汗者以毒藥溫之風邪內縮者宜汗之則愈蓋溼為利宜溫之而已又曰在表者發之在裏者下之在上者瀉之在下者竭之身表熱者內疎之小便澀者分利之

又曰盛者和之去者送之過者止之兵法曰避其來銳其情歸此之謂也 凡病泄而惡寒太陰傳少陰為上來

剋水也用除濕白朮茯苓安脾芍藥桂枝黃連破血火邪不能勝水太陰經不能傳少陰而反助火邪上乘肺經而痢必白膿也加當歸芍藥之類是已 又裏急後重脈大而下浮者宜下 雖裏急後重脈沉細而弱者謂裏邪在內而洪實為裏實症而痛甚是有物結墜也宜下之若脈浮而氣散也可溫養而自安 裏急後重閉者大腸氣不宣通也宜加檳榔木香宣通其氣若四肢慵倦小便少或不大便起坐沉困飲食減少宜調胃去濕白朮芍藥茯苓三味水煎服白朮除脾胃之濕芍藥除胃之濕熱四肢困倦茯苓能通水道走濕 如發熱惡寒腹不痛加黃芩為主如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主桂枝

佐之如腹痛甚加當歸倍芍藥如見血加黃連為主桂枝當歸佐之 如煩躁或先便白膿後血或發熱或惡寒非黃芩不能止上部血也如惡寒脈沉先血後便非地榆不除下部血也如惡寒脈沉或腰痛或臍下痛非黃連不除此中部血也如便膿血相雜而脈浮大慎勿以大大黃下之必死謂氣下竭也而陽無所收凡陰陽不和惟以分陰陽之法治之 又曰暴泄非陰久泄非陽有熱者脈疾身動聲亮暴注下迫此陽也寒者脈沉而細身困鼻息微者蓋附湯主之身重不舉木附湯主之 渴引飲者是熱在膈上水多入則自胃膈入胃中胃本無熱因不勝其水胃受水攻故水殺一時下此症當灸大椎三五壯立已乃督脈瀉也如用藥使車前子雷丸白朮茯苓之類五苓散亦可 又有寒泄者大腹滿而泄又有驚瀉者是寒泄也



驚者鴨也大便如水其中有少結糞者是也如此者當  
 天麻附子乾姜之類 又法曰泄有虛實寒熱虛則無力  
 不及枯衣未便已泄出謂不能禁固也實則數至固而不  
 便俗云虛坐努責是也裏急後重皆依前法進退大承氣  
 分六經湯主之 太陽病為挾熱痢涼膈散主之 表症下因  
 熱 陽明為痼瘕進退大承氣湯主之 太陰濕勝濡瀉  
 不可下而可溫四逆湯主之 少陰營風不動禁固可瀉  
 赤石脂丸乾姜湯主之 厥陰風泄以風治宜小續命湯  
 消風湯主之 少陽風氣自動大柴胡湯主之  
 分新久保五泄傷寒乃分三部

物說暴 次說中 後說久泄

此說是難經五十七難是三節內該十五法初治以暴藥  
 中以的對症藥得中治也未治久泄仲景論厥陰經治法

大醫學綱目卷三 三

是也  
 垣胃氣和平飲食入胃精氣則輸于脾上歸于肺行於百  
 脉而養榮衛也若飲食一傷起居不特損其胃氣則上升  
 精華之氣反下降是為飧泄久則太陰傳少陰而為腸澼  
 假令傷寒冷飲食膈滿而脹傳為飧泄者宜溫熱之劑以  
 消導之傷濕熱之物而成膿血者宜苦寒之劑以內疎之  
 風邪下陷者升舉之濕氣內盛者分利之裏急者下之後  
 重者調之腹痛者和之洞泄腸鳴無力不及枯衣其脉細  
 微而弱者溫之收之膿血稠粘數至固而不能使其脉洪  
 大而有方者下之寒之大抵治病當求其所因察何氣之  
 勝取相剋之藥平之隨其所利而利之以平為期此治之  
 大法也 論瀉痢久不止或暴下者皆太陰受病不可離  
 甘草芍藥若不受濕則不痢故須用白朮是以聖人立法

若四時下痢於芍藥白朮內春加防風夏加黃芩秋加厚  
 朴冬加桂附然更詳外證寒熱處之如裏急後重須加大  
 黃如身困倦須用白朮若自汗逆冷氣息微加桂附以溫  
 之如或後重膿血稠粘雖在感冬於溫藥內亦加大黃  
 五泄 難有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄名曰後  
 重 胃泄者飲食不化色黃 陰泄也保命云 又有脾泄  
 者腹脹滿泄注食即嘔吐逆 保命云建中 大腸泄者食  
 已窘迫大便色白腸鳴切痛 保命云乾姜 小腸泄者溲  
 而便膿血少腹痛 保命云承 大瘕泄者裏急後重數至  
 固而不能便 保命云胃小腸大腸三症皆清涼飲  
 保命云少陰症裏  
 此治五泄之法也  
 丹泄瀉之症水穀或化或不化並無努責惟覺困倦若滯

大醫學綱目卷三 四

下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或精  
 粕相雜雖有痛不痛之異然皆裏急後重逼迫惱人  
 仰大腸有寒者多驚瀉有熱者便腸垢  
 靈腸中寒則腸鳴飧泄腸中熱則出黃糜 師傳  
 仰下利脉微弱數者為欲自止雖發熱不死 下利有微  
 熱而渴脉弱者亦自愈 下利脉數而渴者今自愈設不  
 瘥必清膿血以有熱故也 下利脉數有微熱汗出自愈  
 愈設脉緊為未解 下利脉反弦發熱身汗者自愈 下  
 利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒  
 汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也  
 素胃脉虛則泄 脉要精  
 脈滑按之虛絕者其人必下痢 肺脉小甚為泄 全文  
 虛實法經云小 腎脉小甚為洞泄 小者血氣皆少腎主  
 者氣血皆虛



以閉藏

故泄  
素尺寒脈細謂之後泄平人氣尺膚寒其脈小者泄小

必清膿 溲病若腹大而泄者脈當細微而澹反緊大而

滑者死  
脈泄注脈緩時小結者生浮大數者死

素泄而脈大者難治玉樓真病泄脈洪大是逆也金

仲下利脈大者為不止 下利日十餘行脈反實者死

靈大便赤辦塗泄脈小者手足寒難已於泄脈小手足溫

泄易已論疾診腹鳴而滿四肢清泄其脈大是逆也如

是者不過十五日死矣全文見腹大脹四末清脫形泄

甚是逆也如是者不及一時死矣

仲六府氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者

利不禁下甚者手足不仁 下利手足厥冷無脈者灸之

不溫若脈不還反微喘者死少陰負跌陽者為順也 下

利後脈絕手足厥冷時脈還手足溫者生脈不還者死

病者痿黃燥而不渴胃中寒而利不止者死 假令下

利寸口關上尺中悉不見脈然尺中時一小見脈再舉頭

數人在下則泄瀉不止在上則吐痰不已者皆死

脫無所管攝故也若用參朮膏救之早者十活二三

泄瀉 理後泄瀉

下痢水穀不入裏急後重是泄瀉也

脾濕 世胃苓湯一名對金飲子治脾濕太過泄瀉不止

平胃散 五苓散各半 右剉水煎服極效

羅內經曰濕勝則濡泄甲乙經云寒氣客於下焦傳為濡

泄夫脾者五臟之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客於

脾故不能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛

莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡泄法當除濕利小

便也治之以對金飲子

平胃散 五苓散 草薢 藜蘆 右剉水煎服極效

右相和作四服水一盞半生姜三片棗二枚煎至一盞

去查溫服食前

增加減平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇助脹滿刺



芪 如心下痞悶腹脹者加厚朴非草減半 如渴  
 加炒黃芩 如遇雨水濕潤時加茯苓澤瀉 如有痰  
 涎加半夏陳皮 凡加時除蒼朮厚朴依例加之如一  
 服五錢有痰用半夏一兩 如嗽飲食減少脉弦細加  
 歸身黃芪 如脉洪大緩加黃芩黃連 如大便硬加  
 大黃三錢芒硝二錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下  
 加減平胃散例若泄瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃  
 散一法加藜香半夏 若加乾姜為厚朴湯 若溫疫  
 時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連翹葱白五寸豆豉三十  
 粒煎二三服取微汗出愈 若五勞七傷脚手心熱煩  
 躁不安百節痠疼加柴胡 若痰嗽痲痢加姜製半夏  
 若小腸氣痛加茴香 若水氣腫滿加桑白皮 若  
 婦人赤白帶下加黃芪 若酒傷加丁香 若飲冷傷  
 八 醫家類卷之三 七  
 加高良姜 若滑脫泄瀉加肉苳蓿 若風痰四肢沉  
 困加荆芥 若腿膝冷痛加牛膝 若渾身虛腫拘急  
 加地骨皮 若腿膝溫痺加兔絲子 若白痢加吳茱  
 萸 若赤痢加黃連 若頭風加藜本 若轉筋霍亂  
 加樟木皮 若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿  
 膝痠痛人宮臟久冷月事不調者加桂枝 若胃寒嘔  
 吐多加生薑一法加茯苓丁香各三兩 若氣不舒快  
 中脘痞塞加砂仁香附三兩生薑煎服 若與五苓散  
 相半為對金飲子 若與六一散相合為黃白散 若  
 與錢氏異功散相合為調胃散 若飲食進退加神麩  
 麥芽冬月加吳茱萸川椒乾姜桂為吳茱萸湯 若加  
 藜本桔梗為和解散治傷寒吐利 若加藜香半夏為  
 不換金正氣散 若瘧疾寒熱者加柴胡 若小腸氣

痛者加紫蘇茴香  
 卅或曰平胃散之溫和可以補養胃氣乎以為何如予  
 曰蒼朮性燥氣烈行濕解表甚為有功厚朴性溫散氣非  
 脹滿實急者不用承氣用之可見矣雖有陳皮非草之甘  
 緩甘辛亦是決烈耗散之劑實無補土之利經謂土氣太  
 過曰敦阜亦能為病况胃為水穀之海多氣多血故因其  
 病也用以瀉有餘之氣使之平耳又須察其痰寒熱  
 寒物者而後投之胃氣和平便須却藥謂之和乎者初非  
 補之之謂豈可以為補劑而常用之乎或曰調胃承氣亦  
 治胃病謂之調者似與平胃之平意義相近何用藥之相  
 遠也予曰調胃承氣治熱中下二焦藥也經云熱濕于內  
 治之鹹寒佐以苦其功在乎導利而行之以緩平胃散止  
 治濕上焦藥也經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以  
 八 醫家類卷之三 八  
 汗為故而止或曰治濕不利小便非其治也此非仲景法  
 耶何子言之悖也予曰淡滲治濕因有濕在中下二焦今  
 濕在上宜以微汗而解不欲汗多故不用麻黃葛根輩耳  
 五苓散治泄瀉水多者方見  
 瀉濕四苓散加蒼朮白朮甚者一朮必用炒  
 白朮 三分加澤瀉一  
 茯苓 錢五  
 猪苓  
 本治水瀉用草烏半生半燒灰存性為末醋丸空心井花  
 水下七丸  
 蒸熱 河益元散治身熱泄瀉小便不利  
 滑石六 甘草一  
 右為末每服三錢蜜湯調下日三服如解寒發汗煎葱  
 白豆豉湯調下四錢併三服以效為度



丹參黃丸治濕熱滯氣者濕熱甚者用為向導上可治  
酸下可治自利

六一散益元散 吳茱萸二兩 一方去茱萸加乾  
姜一兩名溫六丸

本歐陽文忠公嘗得暴下國醫不能愈人云市人有此藥

三文一貼甚效夫人買進之一服而愈後召賣藥者問其  
方但用車前子一味為末米飲下二錢此藥利水

丹黃芩木通入四苓散煎服治火多泄瀉 水養金花丸  
治泄不止乾嘔方見乾嘔

世木香和中丸腹痛泄瀉脈滑者神效驗方別治

仲下利脈遲而滑者實也利未欲止急下之宜大承氣湯  
傷寒 下利脈反滑者當有所去下乃愈宜大承氣湯

下利脈中堅者當下之 下利後三部皆平按之心下堅  
者宜大承氣急下之 病者脈伏其人欲自利利反快雖  
利心下續堅滿此為留飲欲去故也其遂半夏湯主之

甘草大者 半夏十二枚以水一升 芍藥五  
甘草指大 半夏十二枚以水一升 芍藥五

右四味以水二升煮取半升去查以蜜半升和藥汁煎  
取八合頓服之

四仁七姪之子肚泄有積與小胃丹二十粒作二次吞之  
小胃丹方見 積熱作泄亦宜下之

保治寒積痢男婦小兒各不同或赤白或清痢如水不後  
重者寒也經曰澄澈清冷皆屬於寒此為虛寒中有積也

宜附子已薑煎下之見利則愈空心服

下痢氣者當利其小便  
虛者和 瀉治太陰脾經受濕水瀉注下體重微滿困弱無力不欲

飲食暴泄無數水穀不化先宜白朮芍藥湯

白朮 芍藥各一 甘草五分 黃芩五分

右細末每一兩水二盞煎至一半溫服  
如腹疼甚者宜蒼朮芍藥湯主之

蒼朮 芍藥各一 黃芩半

右剉每一兩入淡桂半錢水盞半煎至一盞溫服  
如脈弦頭痛者宜蒼朮防風湯主之

蒼朮 防風各二 右剉同煎法煎服 如下  
血宜蒼朮地榆湯主之方見 已上症如心下痞每服  
加枳實一錢如小便不利每服加茯苓二錢如腰痛漸  
已泄下漸少宜訶子散止之方見

厚氣虛泄瀉人參白朮炒芍藥升麻主之  
其功散治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利不思飲食方見小

人參白朮 芍藥升麻 厚朴枳實 茯苓甘草

濕治之 濕治之 濕治之

滑石六 白朮半 陳皮 當歸各三

厚朴 木通 芍藥各一 甘草五分

分六貼姜一片煎  
四八官患泄小便赤少食少倦怠脈弱此受濕為病當補  
脾涼肺

白朮 滑石各一 黃芩 人參

芍藥各五 木通 陳皮各三 乾姜一

甘草各一 分八貼煎服  
五兒腹泄此受寒涼為病  
白朮 蒼朮各二 乾姜 茯苓



厚朴 <small>各一錢</small>	甘草 <small>各一錢</small>	右為末每服二錢白湯調下	一丈夫腹瀉胃痞不渴	半夏 <small>一錢</small>	蒼朮	白朮	青皮 <small>各二錢</small>		
木通	紫蘇 <small>各一錢</small>	良姜 <small>半錢</small>	甘草 <small>少許</small>	分三貼姜三片水二盞煎服	輝五孺人瘰癧已好止是食少乏力肚泄自汗	牡蠣 <small>一錢</small>	白朮 <small>二錢</small>	乾姜 <small>三錢</small>	陳皮 <small>五分</small>
黃芪 <small>分二</small>	當歸 <small>分</small>	白水煎服	賈宅女人六十八歲腹泄面黃乏力脉浮大而數此有熱積	滑石	白朮 <small>炒各</small>	茯苓	神麴 <small>炒</small>		
陳皮 <small>各五錢</small>	黃連	黃芩	乾姜 <small>一錢</small>	右為末粥為丸山查湯食前下五十粒	一丈夫病熱退未盡食太早日渴倦甚腹泄心煩脚冷	人參	滑石	柴胡	白朮
陳皮 <small>各一錢</small>	木通 <small>一錢</small>	甘草 <small>五分</small>	分四貼煎七分下保和十五丸	右九方丹溪東垣治泄瀉之法大率皆用白朮滑石補脾行濕其餘隨症加減第一二方專治泄也第三方治泄之挾熱也第四五六方治泄之挾寒也第七八方治泄之挾飲食積也	伏匿於陰中耳癸卯歲六七月間淫雨陰寒踰月不止時人多病泄痢濕多成五泄故也一日予體重肢節疼痛大	不足此由弦脉令虛多言之過也皆陽氣衰弱不得舒伸	歸身	益智 <small>各二錢</small>	紅花 <small>少許</small>

便泄并下者三而小便閉塞思其治法按內經標本論大小不利無問標本先利小便又云在下者引而竭之亦是先利小便也又云諸泄利小便不利先分別之又云治濕不利小便非其治也皆言當利小便必用淡味滲泄之劑以利之是其法也噫聖人之法雖布在方冊其不盡者可	以意求耳今客邪寒濕之淫從外而入裏以暴加之若從已上法度用淡滲之劑以除之病雖即已降之又降是復益其陰而重竭其陽則陽氣愈削而精神愈短矣是陰重強陽重衰反助其邪之謂也故必用升陽風藥即瘥以羌活獨活柴胡升麻各一錢防風根半錢炙甘草半錢同	咬咀水二鍾煎至一盞去查稍熱服大法云濕寒之勝助風以平之又曰下者舉之得陽氣升騰而去矣又法云客者除之是因曲而為之直也夫聖人之法可以類推舉一	而知百者也若不達升降浮沉之理而一槩施治其愈者幸也	升陽除濕陽治脾胃虛弱不思飲食洩瀉無度小便黃四肢困弱自下而上引而去之	升麻	羌活	防風 <small>各半</small>			
蒼朮	甘草 <small>各三錢</small>	神麴	澤瀉	右咬咀水二盞煎去查空心服如胃寒腸鳴加益智半	夏各五分姜棗同煎非腸鳴不用	人參升胃湯治一日大便三四次瀉而不多有時泄瀉腹鳴小便黃	黃芪 <small>二錢</small>	甘草 <small>一錢</small>	升麻 <small>六分</small>	柴胡
陳皮	歸身	益智 <small>各二錢</small>	紅花 <small>少許</small>	鳴小便黃	人參升胃湯治一日大便三四次瀉而不多有時泄瀉腹鳴小便黃	黃芪 <small>二錢</small>	甘草 <small>一錢</small>	升麻 <small>六分</small>	柴胡	



人參六分

右對作二服水二盞煎至一盞去查稍熱食前服

神麴六分 茴香二分 生姜二分

右為丸每服五七十丸

痰積泄瀉

海石 青黛 黃芩 神麴

右為丸每服三五十九病少者必用吐法吐之方愈

右積滯洩瀉腹必耕痛方泄者是也或肚腹滿按之堅

者亦是也受病泄者宜神麴之類消導之病深而頑者

必用滯下門後重多熱條進退承氣之類下之方安

枳實四兩 滑石二兩

右為末粥丸所漢云固腸丸性燥若

保訶子散治洩久腹痛漸已瀉下漸少宜此藥止之

訶子一兩半 木香一分 甘草一分 黃連一分

右為細末每服二錢以白朮芍藥湯調下如止之不已

宜因其歸而送之於訶子散內加厚朴一兩竭其邪氣

也

虛滑久而不止者多傳變為痢太陰傳少陰是為鬼邪先

以厚朴枳實湯防其傳變

厚朴 枳實各一分 訶子一兩半 木香一分

黃連一分 甘草一分 大黃一分

右為細末每服三錢或五錢水一盞半煎至一盞去查

溫服已上治

寒 丹補脾丸

白朮二兩 白芍藥二兩

右為細末飯丸冬月去芍藥加肉桂桂澤瀉服之又下

止者於內加飛礬一錢半

氣痢訶黎勒散主之用訶黎勒上枝右一味為散粥飲和

頸服林德云疑非

圍扶脾丸治脾胃虛寒腹中痛滯洩無度飲食不化

白朮 茯苓 甘草 訶子皮

烏梅肉各二 紅苳 乾姜 肉桂各半

麥藥 神麴四分 陳皮一分 半夏一分

右為末荷葉裏燒飯為丸如桐子大每服五十九溫水

食前下香一錢

治痢久臟腑虛滑去積不已用蒼朮湯下桃花丸

蒼朮二兩 防風二兩

右對水一碗煎至一大盞下桃花丸或赤石脂丸小便

利則安桃花丸即滯下門桃花湯為

初有一人病大腸寒清小便精出諸熱藥服及一斗二升

未效後教服赤石脂乾姜各一兩胡椒半錢同為末醋糊

為丸如桐子大空心及食前米飲下五十九丸終四劑遂

愈

本治脾胃不和泄瀉不止諸藥不效訶子丸

訶子皮 川姜 肉荳蔻 龍骨

木香 赤石脂 附子各半

右細末糊丸如桐子大每服四十九丸米飲下

赤石脂禹餘糧湯方治大腸泄瀉

赤石脂制 禹餘糧各四

右對碎每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服



孫治氣虛傷冷暴作水瀉日夜二三十行腹痛不止更  
路行備急朝真丹用硫黃一兩半研令極細枯白礬五錢  
同細研勻水浸蒸餅去水和丸如桐子大硃砂為衣每服  
十五丸溫米飲鹽湯下已上止

暴泄與治暴水洩不止

肉苳蔻三箇用濕紙裹之置火內煨令乾焦去麩丹  
華子稱其下氣以脾胃得補而善運  
此氣自下也非若香附陳皮之類也

右將肉苳蔻為細末只作一服陳米飲調食前服之神  
驗

潮暴泄如水周身汗出一身盡冷脉沉而弱氣少而不能  
語甚者加吐此謂緊病宜以漿水散治之

半夏二錢 良姜二錢 乾姜 肉桂

甘草五錢 附子五錢

六 醫家類全書 五

右細末每服三五錢水二盞煎至一盞熱服甚者三四  
服若太陽經傷動傳太陰下痢為齋滯大腸不能禁固  
卒然而下中有硬物欲起而又下欲了而又不小便  
多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯謙甫云  
齋滯者大便如水其中有少結糞是也

桂枝湯 桂枝 芍藥 白朮各半 甘草二錢

右切每服半兩水一盞煎至七分去渣溫服

白朮散 白朮 芍藥各三錢 乾姜泡半 甘草炙二錢

右籠末如前服之甚則除去乾姜加附子三錢謂辛能  
發散也

發散也

羅麵木丸治時暑暴泄吐脾胃及治飲食所傷胸膈痞悶

神麵 蒼朮洗浸一宿

右為細末麩糊為丸如桐子大每服三十九丸溫米飲送

止洩丸 肉苳蔻五兩 滑石製 右為末搗飯丸惟滑石

夏三兩半秋二兩春冬一兩一錢半

羅中寒治驗 參政商公時年六旬有二原有胃虛症至  
元巳巳夏上都住時值六月霖雨大作連日不止因公務  
勞役過度飲食失節每日解腹作痛腸鳴自利須去一二  
行少定不喜飲食懶於言語身體困倦召予視之予診其  
脉沉緩而弦參政以年高氣弱脾胃宿有虛寒之症加之  
霖雨及勞役飲食失節重虛中氣難經云飲食勞倦則傷  
脾不足而往有餘隨之歲火不及寒乃太行民病齋滯今  
脾胃正氣不足腎水必挾木勢反來侮土乃薄所不勝乘  
所勝也此疾非甘辛大熱之劑則不能瀉水補土雖夏暑  
之時有用熱遠熱之戒又云有假者反之是從權而治其

急也內經云寒濕于內治以辛熱乾姜附子辛甘大熱以  
瀉寒水以為君脾不足者以甘補之人參白朮甘草陳皮  
苦甘溫以補脾土胃寒則不欲食以生薑草薢辛溫治  
客寒犯胃厚朴辛溫厚腸胃白茯苓甘草助姜附以導寒  
濕芍藥酸微寒補金瀉木以防熱傷肺氣為佐不數服即  
愈

附子溫中湯治中寒腹痛自利米穀不化脾胃虛弱不喜  
飲食賴言困倦嗜臥

附子炮去 乾姜炮 人參 甘草炙

白芍藥 白茯苓去 白朮各五錢 厚朴製

草薢剉碎 陳皮各三錢

右剉每服五錢或一兩水二盞半姜五片煎一盞食前  
溫服



簡理中湯治泄瀉加橘紅茯苓各一兩名補中湯若泄瀉不已者於補中湯內加附子一兩不喜飲食水穀不化者再加砂仁一兩共成八味理中湯方見傷寒

本治脾胃中風濕瀉泄滑物九

芫蕪 神麴 白朮 附子各等分

右為細末麩糊丸如桐子大每服三五丸米飲下左

氏述楚子園蕭蕭將潰無社告申叔展曰有麴乎有山

物蕪乎鞠蕪芫蕪也意欲令逃水中以避禍是知芫蕪

能除濕當加木附以制之若脾濕而泄者萬無不中亦

治殮泄

無桂香丸治臟腑虛為風寒所搏冷滑注下不禁老人虛

人危篤累效

附子炮去 肉苳蔻炮 白茯苓各一 桂心

乾姜炮 木香炮 丁香各一

右為末糊丸如桐子大米湯下五十九丸空心服

孫治水瀉無度乾姜末粥飲調一錢服立效

泄而身熱小便不利口渴者益元五苓若火多四苓加木

通黃芩方見濕 泄而困倦不便者及脈數者虛熱者宜

參木滑石苓通方見補脾 泄而脈滑者實熱宜大承

氣湯方見

丹王龍九治一切伏暑泄瀉神效方見傷寒

仲下痢不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利

在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復痢不止者當利小便

下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四

逆湯攻表宜桂枝湯

天賜小腸為泄全文 一陽發病少氣善欬善泄全文

運氣泄瀉有六

一曰土助脾濕感而泄瀉經云歲土太過雨濕流行病泄

泄腸鳴又曰歲水不及濕乃下行民病身重濡泄又云歲

火不及寒乃大行土復則病驚瀉腹痛腸鳴泄注又云土

鬱之發民病欬發注下又云濕勝則濡瀉治以苦溫是也

二曰風水攻脾虛而泄瀉經云厥陰司天風淫所勝民病

本泄滑泄又云春傷於風邪氣雷連乃為洞泄治以辛涼

是也

三曰熱瀉經云少陽所主為暴注又云少陰之勝腹滿瀉

泄又云火鬱之發民病注下治以寒劑是也

四曰寒泄經云歲水太過寒氣流行病腸鳴泄注又云太

陽所至為流泄禁止又云太陽之勝寒入下焦傳為濡泄

治以熱劑是也

五曰熱中寒中泄經云太陽司天之政三之氣寒氣行民

病寒反熱中注下者是外寒內熱泄也又云長夏善病洞

泄寒中者是外熱內寒泄也治以寒熱兼施是也

六曰燥泄經云歲木不及燥乃大行民病腸鳴泄注又云

陽明司天燥淫所勝民病腹中鳴注泄瀉注又云陽明之

勝清發於中澇泄注又云陽明之復腹脹而泄治以溫劑是

也

雜法 子和晉聞山東楊先生者治府主洞泄不止楊初未對病

人與象人談日月星辰纏度及風雷雲雨之變自辰至未

而病者聽之忘其園楊嘗曰治洞泄不已之人先問其所

愛之事好棋者與之棋好樂者與之樂勿輒

針灸 針灸泄瀉獨取大腸一經經云大腸病者腸中攻痛而鳴



濯濯冬日中于寒即泄當臍而痛取巨虛上廉  
瀉治水漬入胃為溢飲滑泄渴能飲水水下復泄泄而大  
渴此無藥症當灸大椎

歷諸下痢皆可灸足大都五壯商丘陰陵泉皆三壯  
甲澹泄不化食寒熱不節陰陵泉主之

玉治久泄瀉內天樞穴天樞二十半灸補氣  
集自痢不止 天樞 中極

世又法 合谷 三里 陰陵泉不應取 中脘 關元  
天樞 神闕

東泄痢不禁小腹絞痛 丹田灸百壯 泄痢不嗜食  
長谷五十壯三報之在腸筋傍

宜忌 虛弱垂命欲盡服之無不效中病當便已不可盡劑世人  
蓋知用而為福不知用而為禍此物損益兼行若俱棄而  
不用當含卒之間又可闕乎

產後泄瀉  
丹治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉洞泄不  
禁下青白黑色用荆芥大者四五穗於盞內燒灰不得犯  
油火入麝香研湯三呷調下此藥雖微能治大病方名

產後泄方  
茯苓 川芎 黃芩 白朮  
乾姜 滑石 陳皮 芍藥炒

右水煎服之  
殮泄  
殮泄米穀不化而完出是也  
素清氣在下則生殮泄陰陽應象論○三謂云熱氣在下

下者功人之脾胃氣衰不能升發陽氣故用升散藥  
助其升之味以引元氣之升不令下陷為殮泄也  
羅內經曰清氣在下則生殮泄又曰久風入胃中則為腸  
風殮泄夫脾胃土也氣沖和以化為事今清氣下降而不  
升則風邪久而干胃是木賊上也故沖和之氣不能化而  
令物完出所以謂之殮泄或飲食太過腸胃所傷亦致米  
穀不化此俗呼水穀利也法當下者舉之而消剋之也以  
加減木香散主之

木香 良姜 升麻 枳殼  
人參錢二 肉苳菟錢 吳茱萸錢 乾姜泡各  
神麩錢二 陳皮錢五 砂仁錢五

右十一味為細末每服四錢水盞半煎至一盞去查食  
前溫服宜加白朮  
河白朮湯治殮泄風冷入中泄利不止脈虛而細日夜數  
行口乾腹痛不已

厚朴錢 當歸錢 龍骨各五 白朮兩  
艾葉半錢  
右為末每服三錢水一盞生姜三片同煎至八分去查  
空心溫服

凡泄則米穀不化謂之殮泄是清氣在下乃胃氣不升  
上古聖人皆以升浮藥扶持胃氣一服而愈知病在中焦  
脾胃也脈訣曰濕多成五泄濕者胃之別名也病本在胃  
真氣弱其氣者穀氣也不能剋化飲食乃濕感故也以此  
論之正以脾胃之弱故也初病奪食或絕不食一二日使  
胃氣日勝泄不作也今已成大泄矣經云治濕不利小便  
非其治也又云下焦如瀆又云在下者引而竭之唯此症  
不宜此論其病得之於胃氣下流清氣不升陽道不行宜



升宜舉不宜利小便靈樞云頭有疾取之足謂陽病在陰也足有疾取之上謂陰病在陽也經曰陽病在陰陰病在陽此之謂也中有疾傍取之傍者少陽甲膽是也中者脾胃也脾胃有疾取之足少陽甲膽者甲風是也東方春也胃中穀氣者便是風化也作一體而認故曰胃中濕勝而成泄瀉宜助甲膽風勝以克之又是升陽助清氣上行之法也又一說中焦元氣不足溲便為之變腸為之苦鳴亦緣胃氣不升故今甲氣上行又云風勝濕也大抵此症本胃氣弱不能化食奪食則一日而可止夫奪食之理為胃弱不能化食則為泄如食不下何以作泄更當以藥滋養元氣令其候泄止漸與食胃勝則安矣若食不化者於升陽風藥內加炒麩同煎蕪食入頓至心頭者胃之上口也必口沃沫或食入反出皆胃上停寒其右手關脈中弦

八醫學綱目卷三

主

按之洪緩是風熱濕相合穀氣不行清氣不升為弦脈之寒所隔故不下也麩之熱亦能去之若胃者更加半夏生薑入於風藥內同煎奪食少食欲使胃氣強盛也若藥劑大則胃不勝藥泄亦不止當漸漸與之今病既久已至衰弱當以常法治之不可多服餌也人之肉如地之土豈可人而無肉故肉消盡則死矣消瘦人有必死者八內經有七外經有一又病肌肉去盡勿治之天命也如肌肉不至瘦盡當急療之宜先奪食而益胃氣便與升陽先助真氣次用風藥勝濕以助升騰之氣病可已矣餘皆勿論此治之上法也治用升陽除濕湯之類是也

羅加減木香散治用升陽除濕湯之類是也

仲下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之方見

河白木散治殮泄脈細方見上

垣治洩痢殮泄身熱脈弦腹痛而渴及頭痛微汗宜防風芍藥湯

防風 芍藥 黃芩各等分

右籠末每服半兩或一兩水二盞煎至一半溫服

梅治水穀痢久不瘥厚朴三兩黃連三兩劉細水三升煎取一升空心服

素春傷於風夏生殮泄生濕通入論 久風為殮泄全文見

久風入中為腸風殮泄論

右久風入中為殮泄經云虛邪之中人也始於皮膚留而不入傳舍於絡脈留而不去傳舍於經留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時青響腹脹多寒則腸鳴殮泄食不化

八醫學綱目卷三

主

此久風入中為殮泄之義同也

水自內濕古云太渴飲水多因致水穀一時下者宜灸大椎三五壯或用車前子雷丸白木茯苓及五苓散等藥溲之詳見大法條又如久風為殮泄者則不飲水而穀完出治法當以宣風散導之後服蒼木防風湯

宣風散方見小兒痘後發熱條

蒼木防風湯

蒼木去皮 麻黃兩 防風錢五

右籠末每一兩生薑七片水一盞煎至一半去查溫服如止後服後藥

補本丸

蒼木 小椒去目炒

右為細末醋糊丸如桐子大每服五十九食前溫水下



一法惡痢久不效者彌佳小兒九如米大

子和趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月六月不愈諸醫以為胃受大寒故併與聖散子益覺九雖止一二日藥力盡而復作諸醫不知藥之非反責明之不思口藏人至而笑曰春傷於風夏必飧泄飧泄者水穀不化而直過下出又曰米穀不化熱氣在下久風入中中者脾胃也風屬甲乙脾胃屬戊己甲乙能剋戊己腸中有風故鳴經曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄診其兩手脈皆浮數為病在表也可汗之直斷曰風隨汗出以火二盆暗置床下不令病人見火恐增其熱詒之入室更服瀉劑以麻黃投之乃閉其戶從外鎖之汗出如洗待一時許開戶滅火一半須臾汗止泄亦止 內經曰春傷於風夏生飧瀉此以風為根風非汗不出者有病此者腹中雷鳴泄注米穀

不分小便清滯皆以脾胃虛寒故耳服豈慈烏梅粟殼乾姜附子曾無一效中脘臍下灸已數千燥熱轉甚津液涸竭瘦削無力飲食減少命予視之余以應象論曰熱氣在下水穀不分化生飧泄寒氣在上則生腹脹而氣不散何也陰靜而陽動故也診其脈兩手皆浮大而長身表微熱用桂枝麻黃湯以姜棗煎大劑連進三服汗出終日且且而愈次以胃風湯和其臟腑調養陰陽食進而愈

腸痺 河木香丸治腸痺多飲不泄上氣喘爭時發飧泄腹痛  
木香 白朮 官桂 蕪荑  
訶子皮 良姜 附子炮去 厚朴製  
肉苳蔻各一乾姜六錢 甘草五錢  
右為末麪糊丸如桐子大每服二十九丸姜湯空心下  
運氣 運氣飧泄皆屬風木攻脾經云歲木太過風氣流行脾土

受邪民病飧泄食減又云歲土不及風乃大行民病飧泄體重腹痛又云土不及曰早監卑監之紀上角與正角同其病飧泄治以涼劑是也

針灸 刺灸飧泄有三法

其一取脾經云脾虛則腹滿腸鳴泄食不化取其經足太陰陽明又云飧泄取三陰之上補陰陵泉皆久斷之熱行乃止又云飧泄取三陰者是也三陰者太陰也 其二取腎經云腎藏志志有餘腹脹飧泄瀉然筋血者是也然筋謂然骨視血絡盛則泄之 其三取肝經云肝足厥陰之脈所生病者胃滿嘔逆飧泄是也視感虛寒熱陷下施法也

渴飲水多水穀一時下者灸大椎三五壯立已詳見大

困飧泄大腸痛巨虛上廉主之 又大衝主之

雜方

遺尿

因治產後遺尿取故蕪巢中草燒灰研細酒調服五分男

子亦治 又方 白礬 牡蠣 右等分為末酒服方寸七日三男女同治

產病人臥遺尿不覺者死 滯下 久泄久痢 胎前痢 產後痢

丹劑初得時一二日間以利為法有熱先退熱 後重者

當利氣木香檳榔腹痛用溫散藥姜桂之屬 下血當涼

血和血當歸桃仁之屬 下痛發熱惡寒身首俱痛此為 表證宜微汗和解用蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生薑三片 表裏煎 下痢身發熱者有外感用小柴胡去參 下痢發熱



久不止者屬陰虛用寒涼藥必兼升散藥并熱藥用下痢初發熱必用大承氣下後看症用藥發熱不惡寒脈洪者宜大承氣若惡寒者忌下下痢腹痛後重小水短下積此為裏証宜和中疎氣用陳皮芍藥滑石枳殼厚朴之類

潔芍藥湯治下血調氣經曰澀而便膿血知氣行而血止也行血則便自安調氣則後重自除

芍藥一兩 當歸一兩 黃連各半 枳殼一兩 木香各二錢 甘草一錢 大黃錢一 黃芩錢一 桂枝一錢

利小便 右旋末每服半兩水二盞煎至一盞食後溫服如血前則漸加大黃如清後臟毒加黃栢半兩同煎服

西一老人年七十面白脉弦數獨胃脉沉滑因飲白酒作痢下血淡水腫腹痛小便不利裏急後重以參朮為君甘

草滑石枳榔木香蒼朮為佐下保和丸二十五丸第二日煎症俱減獨小便不利以益元散服之安

虛實 丹痢初得之必用調胃承氣及大小承氣實者用此下之

下婁男子五十餘下痢晝有積淡紅色夜無積食自進先喫小胃丹兩服再與四十九次六十九去積却與斷下

羅玄青丸治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸藥不能止須吐下之以開除瀉熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜此

黃連 黃栢 大黃 甘遂

羌花 附片 大戟 輕粉 青黛

右為末研勻水丸小葦大初服十九每服加十九空心日午臨臥三服以快利為度後常服十五丸數日後得食力如利尚未痊再加取利後却常服以意消息病去為度後隨症止之小兒丸如黍米大退驚疳積熱不須下者常服十九

玄利積丸 黃連四兩 天水末八兩 當歸二兩 乳香一兩

右為末醋糊丸如桐子大弱者十五丸實者二十五丸治下痢赤白腹痛脹裏急上渴引飲小水亦滿此積滯也宜泄其熱中用清腸丸導氣丸推其積滯而痢自

止矣 凡治積聚之症輕則溫而利之清腸丸是也重者氣少惡食此為挾虛症宜加白朮當歸身尾甚者加人參若又上分重者止用此藥加陳皮補之虛回而痢自

予族叔年近六十夏間患滯下病腹微痛所下褐色後重頻併飲食大減時有微熱察其脉皆弦而滑似數稍長却喜不甚浮大兩手相等視其神氣大減予曰此非滯下乃憂慮所致心血虧脾氣弱也與參朮為君歸身陳皮為臣

川芎炒白芍茯苓為佐使如熱加黃連為使與兩月而安金氏婦年近四十秋初尚熱患滯下腹但隱痛夜重於晝全不得睡食亦稍減口乾不飲已服治痢靈砂兩貼矣予視之兩手脉等滑且不勻神思倦甚飲食全減因與四物



湯倍加白朮以陳皮佐之敷貼而安  
義一姪患瘧間日作蕪痢脈虛甚身痛宜活血補胃待虛  
稍回却又推積

人參分五 白朮錢一 蒼朮 陳皮錢各一

白芍藥分五 川芎分五 滑石錢一 甘草分少

桃仁分七

藥後病退惟脈少弦身倦用此方調補

人參分九 蒼朮錢三 半夏分九 川芎錢一

陳皮錢一 木通錢二 甘草少

煎取三之一飲之可淡粥少少塞飢又靜坐養之

葉先生患滯下後甚逼迫正合承氣症但氣口虛形雖實  
而面黃積白此必平昔食過飽而胃受傷寧忍二三日辛  
苦遂與參朮陳皮芍藥等補藥十餘貼至三日後胃氣稍

完與承氣二貼而安荷不先補完胃氣之傷而遽行承氣  
恐病安之後寧免瘦瘵乎

維方

世治痢煙蠟丸黃蠟不拘多少用銀篋挑於真香油燈上  
燒薰落水碗內凡如此者七次為丸如蘿菔子大每二

十九白痢甘草湯下赤痢烏梅湯下本草云蜜蠟主下利  
膿血補中又云白蠟

白朮錢一

葛治重下此即赤白痢火熬鼓今少焦杵服一合日三效

無比又熬鼓今焦水一升淋取汁冷服治淋日三服有效

食治脾胃氣虛下痢日夜不已腸滑不進食用野雉一隻

如食法細斫着陳皮葱椒調和鹽醬作餛飩熟煮空心食

之

虛熱

丹噤口痢胃中熱甚大虛大熱故也用人參錢二黃連錢二  
濃煎汁終日細細呷之如吐再喫但一呷下咽便開又宜

封臍引熱下行用田螺肉搗碎臍中入麝香少許

世痢疾不納飲食者俗謂之噤口痢以脈症辨之如脾胃

不弱問而知其頭疼心煩手足溫熱未嘗多服涼藥者此

乃毒氣上衝心脈所以嘔而不食宜用敗毒散每服四錢

陳倉米一百粒姜三片棗一枚水一盞半煎八分服若

其脈微弱或心腹膨脹手足厥冷初病則不嘔因服鴛粟

殼烏梅苦澁涼藥太過以致閉食先嘔者此乃脾胃虛弱

用山藥一味剉如小荳大一半入銀瓦銚內炒熟一半生

用同為末飯飲調下 又方用石蓮棗去殼留心并肉碾

為末每服二錢陳米飲調下此疾蓋是毒氣上衝心脈借

此以通心氣便覺思食效

暴注下迫皆屬於熱全文

尚香連丸治下痢赤白裏急後重

黃連去苦二十兩用吳茱萸十  
兩同炒今赤法藥不用 木香四兩八錢  
不見火

右為細末醋糊丸如桐子大每服三十丸空心飯飲下

錢薑蔥香連丸治泄瀉不問寒熱赤白陰陽不調腹脹攻

痛可用如神

黃連錢三 肉苁蓉 木香錢一

右為細末粟米飯丸黍粒大每服米飲下十九至二三

十九日夜各四五服食前

世治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連二兩乾姜半兩各為

末每用連二錢姜半錢和勻空心溫酒下

羅黃連阿膠丸治脾胃氣冷熱不調下痢赤白狀如魚腦

裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

黃連三兩 茯苓二兩 阿膠

右各為末水調阿膠和散散手丸如桐子大每服二十



丸温米飲湯下

仲熱利下重者白頭翁湯主之方見傷寒  
仲下痢膿血裏急後重日夜無度宜導氣湯

芍藥二錢 當歸五錢 大黃 黃芩各二錢

黃連 木香 檳榔各一錢

右為細末每服三錢水一盞煎至七分去渣温服如未止再服下後重則止

潔大瘕泄者裏急後重數至圜而不能便壅中痛用清涼飲子主之其泄自止壅中痛者屬厥陰加甘草裏急後重多者屬少陰加大黃今急推去舊物則輕矣內經曰因其重而減之又云在下者引而竭之清涼飲子方見治瘕法  
裏急後重數至圜而不得便皆宜進退大承氣湯主之  
進承氣法治太陰症不能食是也當先補而後瀉乃進藥

六醫學綱目卷之三

法也先剉厚朴半兩姜製水一盞煎至半盞服若二三服未已胃有宿食不消加枳實二錢同煎服二三服泄又未已如不加食尚有熱毒又加大黃三錢推過泄未止者為腸胃久有塵垢滑粘加芒硝半合垢去盡則安矣後重者宜此法蓋厚朴枳實大瀉元氣故也

退承氣法治陽明症能食是也當先瀉而後補乃退藥法也先用大承氣五錢水一盞依前法煎至七分稍熱服如瀉未止去芒硝減大黃一半煎二服如熱氣雖已其人心腹滿又減去大黃但與枳實厚朴湯又煎二三服如腹脹滿退泄亦自安後服厚朴數服則已

垣感應丸治下痢赤白後重遲滯方見內傷飲食門  
丹或曰治後重疎通之劑羅謙甫水菘木香青東垣白朮安胃散等方已盡矣又有用御米殼等固澁之劑亦愈者

後重有邪塵

何也曰後重本因邪壓大腸墜下故大腸不能升上行

是以用大黃檳榔龍瀉其所壓之邪今邪已瀉其重仍在者知大腸虛滑不能自止而重是以用御米殼等澇劑固其滑收其氣用亦愈也然大腸為邪墜下之重其重至圜後不減大腸虛滑不收之重其重至圜後隨減以此辨之

有產清後不減大腸虛滑不收之重其重至圜後隨減以此辨之百發百中也 其或下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此為死血症法當用搗細桃仁滑石行之或口渴及大便

口燥練是名挾熱即加黃芩或口渴不渴身不熱喜熱手熨盪是名挾寒即加乾姜  
八婦將產患痢脈細弦而稍數後重裏急

滑石三錢 芍藥一錢 枳殼炒錢 木通二錢

甘草五分 白朮錢 茯苓一錢

桃仁每貼九枚研同前

八醫學綱目卷之三

青田人肚痢紅紫血下墜逼迫不渴不熱

白朮 芍藥一錢 陳皮 枳殼炒

歸身 滑石半兩 甘草二錢 桃仁三十粒

分八貼下實腸丸三十粒

一丈夫因酒多下血肚疼後重成痢

滑石半兩 連翹 黃芩 木通

芍藥 枳殼 白朮錢 甘草五分

桃仁一錢 分四貼服

後重積與氣墜下服升清藥不愈者用秦龜皂角子煨大黃當歸桃仁枳殼黃連等劑若大腸風盛可作丸服

自古治裏急後重但用檳榔木香調氣及大黃下積至

丹溪始用桃仁滑石活死血如鼓應桴實發前人之所未發也



其或下墜在血活之後此為氣滯症宜前藥加抵禦一以  
後重當和氣積與氣墜下者當兼升煎消積消滯之  
神類

補血  
仲泄痢下重者以水五升煮薤白三升至二升去查以四  
逆散方寸七內湯中煮取一升半分溫再服東垣云此症  
白泄滯氣  
食主赤白痢下雖白一握切煮作粥食

丹其或氣行血和積少但虛坐努責此為下血症倍用當  
歸身尾却以生地黃生芍藥生桃仁佐之復以陳皮和之  
血生自安

垣虛坐而不得大便皆因血虛也血虛則裏急加當歸身  
凡後重逼迫而得大便者為有物而然今虛坐努責而  
不得大便知其血虛也故用當歸為君生血藥佐之  
凡諸用承氣等藥挨積之後仍後重者乃陽不升也藥中  
當加升麻升其陽其重自去也

垣升陽除濕防風湯治裏急後重數至圍而不能便或少  
有白膿或少血者慎勿利之升陽除濕防風  
湯方見下血

積丹其或在下則纏滯在上則嘔食此為毒積未化胃氣未  
平症當認其寒則溫之熱則清之虛則用參朮補之毒解  
積下食自進矣

治痢方  
蒼朮 白朮 茯苓  
當歸 白芍藥 青皮 生地  
黃連 滑石 甘草

作一服水煎裏急後重加黃連滑石桃仁枳榔甚者大  
黃嘔者加半夏姜汁  
世仲景建中湯治痢不分赤白久新但腹中大痛者神效  
其脉弦急或濇浮大按之空虛或舉按皆無力者是也見方

因萎長官年三十餘奉養厚夏秋間患痢下腹大痛有人  
教服單煮乾姜與一貼痛定少頃痛作又與又定由是服  
乾姜三斤八日後召予視之左脉弦大似數右脉弦而大  
稍減亦似數重取之似緊予曰此必醉飽後吃寒涼大過  
當作虛寒治之因其多服乾姜遂教與四物湯去地黃加  
人參白朮陳皮酒紅花茯苓桃仁煎生薑汁飲之一月而  
安丹澤云下痢腹痛用薑桂溫散之  
法乃乾姜并建中湯加桂是也

聖治冷痢腹中不能食肉豈菹一兩去皮以醋麩暴煨熟  
搗非時粥飲下二錢七

右下痢腹痛必溫散而愈者蓋本於內經所謂寒氣客  
於小腸小腸不得成聚故腹痛後泄及所謂太陽病冬  
日感寒即泄當臍而痛之病也

垣芍藥黃芩湯治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉洪疾  
者及下痢膿血稠粘

黃芩 芍藥各一 甘草五  
右吹咀每服一兩水一盞半煎至一盞溫服無時如痛  
加桂少許

當歸導氣湯治膿血痢無度小便不通腹中痛

當歸一錢 甘草半錢 芍藥一錢 青皮  
槐花七分 木香 枳榔各三 澤瀉五分  
生地黃錢半或二錢

右為末水煎食前溫服如小便利去澤瀉  
下痢腹痛紫參湯主之  
紫參半 甘草兩  
右二味以水五升先煮紫參取三升內甘草煮取一升

熱



半分三次溫服

世治痢疾定痛神效方  
厚朴九治歲暮秋冬間腹痛下痢大效

黃蠟

杏仁

江子

砂仁

右三件香油燈上燒存性鏽蠟和勻加乳香些少丸如米大每服十餘粒

本治積痢定痛靈砂丹

礪砂

硃砂

右用黃蠟五錢巴豆三七粒去殼皮膜同於銀石器內重湯煮一伏時候巴豆紫黑為度去二七粒止用一七粒與前藥二味同研極勻再鏽蠟和藥旋丸葦草大每服二九至五九水瀉生薑湯下白痢艾湯赤痢烏梅湯下服時須極空心服畢一時不可吃食臨臥尤佳次食

淡粥一日瘥疾乳香湯面東不發日晚間服此藥不動

氣服之瀉者止痢者消痞者愈有積者內化亦不動臟腑大凡痢有沉積者不先去其積難暫安後必為害常記陳侍郎經中庚戌秋過儀真求診初不覺有疾及診視肝脈沉弦附骨取則牢予曰病在左腸有血積必發痛陳曰誠如是前某守九江被召冒暑涉長江暨抵行朝血痢已數日矣急欲登對醫者以剛劑燥之難得止數日臍下一塊大如盂旬日如碗大痛發則不可忍故急請公祠以婦耳奈何予曰積痢不可強止故積血結於臍腸下非抵當丸不可渠疑而不肯服次年竟以此終

陳勉

乾姜

官桂

白朮

當歸

厚朴

人參

甘草

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五丸酒送下或淡醋湯亦得食前一日三服發時不拘增數

右久病漸移其積方

脈下痢而腹滿為實當下之

亦可用大承氣調胃承氣下之看其氣病血病然後加戒用藥 氣用參朮 血用四物 因積作後重者保和丸主之五日後不可下脾胃虛故也

腹痛者

腹痛者肺經之氣鬱在大腸之間者以苦梗發之然後用治痢藥氣用氣藥血用血藥 其或痢後精粕未實或食

皮各半煎湯和之自安

粥多及食肉作痛者宜奪食奪

食者減其粥食絕其肉味也

水宜分

因痰致湯治因傷冷水瀉變作赤白痢腹痛減食熱燥四肢困倦無力

茯苓

澤瀉

歸身

芍藥

蒼朮

生薑

肉桂

黃芩

猪苓

甘草

升麻

柴胡

一本無升麻柴胡

右吹咀作二服水煎稍熟食前服

神效越桃散治下痢之後小便利而腹中清痛不可忍此名陰陽反錯不和之甚也

大梔子

良姜

右為末米飲或酒調下三錢

內經膿血稠粘皆屬相火夫太陰主瀉少陰主瀉是先決



忘津液而火就燥腎惡燥居下焦血分其受邪者故便膿血然赤黃為熱青白為寒治須兩審治熱以堅中九苦蕙九香連九治寒白膠香散或多熱少寒水香膏虛滑頻數宜止宜清宜養成湯木香養氣湯並見虛消白膠香散未放堅中丸治脾胃受濕滑泄注下

黃連 黃栢 赤茯苓 澤瀉

白朮 陳皮 肉苳蔻 白芍藥

人參 官桂 半夏 炮薑

右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十丸溫米飲送下食前服

丹下血用四物為主當涼血和血當歸桃仁之屬用藥隨溲澀而便膿血者小腸泄也脈得五至已上洪大者宜七宣丸脈平和者立秋至春分宜香連丸春分至立秋宜芍

藥栢皮丸四時皆宜加減平胃散如有七宣丸症者亦宜服此藥去其餘邪兼平胃氣

芍藥栢皮丸方 芍藥 黃栢 煨薑 右為細末醋糊丸如桐子大每服五十九食前溫湯下加減平胃散經云四時皆以胃氣為本久下血則脾胃虛損血水滲於四肢却入於胃而為血痢宜服此滋養脾胃

白朮 厚朴 陳皮 煨薑 枳榔 甘草 木香 桃仁 人參

黃連 阿膠 茯苓 右咬咀每服五錢姜三片棗一枚水煎溫服無時血多加桃仁 熱泄加黃連 小便澀加茯苓澤瀉 氣不下後重加枳榔木香 腹痛加官桂芍藥甘草 膿多加阿膠 濕多加白朮 脈洪大加大黃

內寒 神效小腸有寒者其人下重便血 瀉治血痢神效乾姜於火上燒黑不令成灰磁砂各等分為末每服一錢米飲調下 瀉大便後有白膿或只便白膿因勞役氣虛傷木腸也必

食積 四下血多土食積與熱或有用朴硝者

蒼朮 白朮 黃芩 芍藥

滑石 茯苓 甘草 陳皮

神麩炒 煎下保和丸

治痢食積

附米 神麩 川芎 梔子

滑石 山查 紅麩 青黛

桃仁 為末丸服

四青六九去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸同服並不單服兼治產後腹痛或自利者能補脾補血亦治血痢效

六一散 三焦元氣 紅麩 活絡

右為丸一方酒粉丸

二十九宣肚痢食少下墜赤積身熱

木通 芍藥 陳皮 白朮

滑石 甘草 分四貼煎下保和丸與煎丸各十九

瀉答木地榆湯治神經受濕下血痢

蒼朮 地榆

右對每一兩水二盞煎一盞溫服

槐花丸治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮 槐花 荆芥 糖

右為末水煎空心溫服

神效小腸有寒者其人下重便血

瀉治血痢神效乾姜於火上燒黑不令成灰磁砂各等分

為末每服一錢米飲調下

瀉大便後有白膿或只便白膿因勞役氣虛傷木腸也必



勞熱  
昔茂人參補之如裏急頻見汚衣者血虛也...  
如便白膿少有滑頻見汚衣者氣脫加附子皮其則加御  
米穀如氣滯者只以甘藥補氣當安臥不言以養其氣  
其藥安臥不言

勞熱  
丹天夫辛苦勞役肚痢白瀉  
滑石兩 陳皮 白朮六錢 芍藥五錢  
黃芩三錢 甘草五分 桃仁三十  
分六貼水二盞半煎取一盞食前服

欬積  
移郎中因飲水過多腹脹瀉痢帶白  
蒼朮 厚朴 白朮 茯苓  
滑石 下保和丸又云加炒麴甘草  
身熱脈  
治痢執多者  
大黃 黃連 黃柏 黃芩

枳殼 白芍藥 當歸 滑石  
甘草 桃仁 白朮  
右等分為末麩糊丸  
世不問赤白痢用苦黃根不拘生乾搗取汁生薑蜜水調服未效再進半碗許立愈

世思赤白痢山葛根搗末蜜丸空心煎水下二十九三服  
子治下痢冷執諸治不瘥方  
烏頭 黃連各一

右二味為末蜜和丸如桐子大下二十九日三夜二神  
世治似痢非痢挾熱者用苦棟根皮去粗皮  
右為末粳米飲為丸米飲下

過度飲食失節至秋深瘧痢併作月餘不愈飲食全減形  
容羸瘦時已仲冬求治於予具陳其由診得脉弦細而微  
如蛛絲身體沉重手足寒逆時復麻痺皮膚疥疥如癩風  
之狀無力以動心腹痞悶嘔逆不止皆寒濕為病久淹真  
氣衰弱形氣不足病氣亦不足陰陽皆不足也針經云陰  
陽皆虛針所不為灸之所宜內經云損者益之勞者溫之  
十劑云補可去弱先以理中湯加附子溫養脾胃散寒濕  
瀝可去脫養藏湯加附子固腸胃止泄痢仍灸諸穴以併  
除之經曰府會太倉即中脘也先灸五七壯以溫養脾胃  
之氣進美飲食次灸氣海百壯生發元氣滋榮百脉充實  
肌肉復灸足三里胃之合也三七壯引陽氣下交陰分亦  
助胃氣後又灸陽輔二七壯接續陽氣令足脛溫暖除清

濕之邪追月餘病退平復 理中湯方見傷寒部加附  
海六脉沉緊按之不鼓膀胱小腸也或瀉痢不止而腹  
脹或純便赤血或雜以血膿小便不多而不渴精神短少  
或面白色脫此失血之故也或面黃氣短此本氣損少之  
故也小腸者手太陽丙火也膀胱者是太陽壬水也是壬  
水乘兩小腸之位小腸被壬所剋而外走也諸手經短而  
足經長蕪五行相剋論之又足經來剋手經此火投於水  
大寒水之症宜溫之可安其與雜經一症寒熱相及亦名  
曰小腸瀉此病火投于水變為寒症又外傷足太陽膀胱  
經左脉俱浮表陽之候也忽變為內寒亦旺火投盛水而  
屈丙就壬化脉反不浮而微沉此內病與外病俱有此火  
投水例非精於脉診者孰能辨之

石脂神砂丹



生附子 乾姜各五 赤石脂 硃砂 右細末酒糊丸黑草大每服十五丸米白湯下

太平廣記真觀中太宗苦於氣痢眾醫不效詔問薛中 有能治者當重賞之有術士進以乳汁煎華撥服之立瘥

世治水泄併赤白痢用草烏大者一兩半將一半燒灰一 半生用為細末醋糊丸如棗豈大每服七丸赤痢甘草湯

下白痢乾姜湯下水瀉并花水下並空心服忌腥臊熱毒 諸冷物

法夏秋治 世俗治夏中暑痢疾用黃連香薷飲加甘草芍藥生薑神 效者蓋夏月之痢多屬于暑潔古治處暑後秋冬間下痢

用厚朴丸大效者蓋秋冬之痢多屬于寒經所謂必先歲 氣毋伐天和者是也厚朴丸方見 初病大腸閉塞裏急

後重法並見 後重法並見 後重法並見

丸未宜遠用蓋固腸丸者雖有去濕實腸之功其或久痢 體虛氣弱滑泄不止又當以訶子肉荳蔻白礬半夏等藥

清之甚者添牡蠣可擇用之然須以陳皮為佐恐太瀆亦 能作痰又甚者灸天樞氣海此穴大

寒滑 仲下痢便膿血者桃花湯止之方見傷寒若一服愈勿再 下焦血虛且寒非乾姜之溫石脂之澁且 重不能止血用糯米之甘以引入腸胃

羅水煖木香膏治脾胃受濕臍腹泄腹中疼痛日夜無 度腸鳴水聲不思飲食每欲痢時裏急後重或下赤黃或

便膿血並宜服之

木香 丁香各一 枳實 五錢 當歸

乳香 訶子皮 肉荳蔻 砂仁 藿香 黃連 白芍藥 青皮 陳皮 厚朴 甘草 乾姜 御米煖水

右為細末煉蜜丸彈子大每服一九水一大匙研破煎 至六七分稍熱食前服

湯易簡斷下湯治下痢赤白無問新久長幼

白朮 茯苓 甘草 草果 右咬咀用當藥殼十四枚去筋膜并其蒂剪碎用醋淹 為齋末用作一服水一大碗姜七片棗子烏梅各七箇

煎至一大盞分二服服之赤痢者加烏荳二粒白痢者 加乾姜五錢當藥殼治痢服之如神但性緊澆多令人

嘔逆既以醋制加以烏梅不致為害然嘔吐人則不可 服大率痢疾古方謂之滯下多因腸胃素有積滯而成

此疾始得之時不可遽止先以巴菝感應丸十餘粒白 梅湯下今大便微利仍以前藥服之無不應手作效若

脾胃素弱用荳蔻橘紅當藥殼各等分為末醋煖麩糊 為丸桐子大每服五十九烏梅湯下兼治泄瀉暴下不

止一服即愈更令藥力相倍為佳如覺惡心却以理中 湯四物湯加荳蔻木香薑調其胃氣仍以二陳湯煖木

香丸定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患尊年人尤非所 宜若果首尾用平和之劑決難作效必致危篤雖欲服

此則已晚矣其秦茂地榆黃栢木通之類其性苦寒却 難輕服 血痢當服胃風湯并膠艾湯之類 白者宜

服附子理中湯震靈丹之屬更宜審而用之 若五色 雜下世瀉無時當用熟烏頭一兩厚朴乾姜甘草各一

兩



熱滑

世治痢

分生薑煎服 今之治痢多用駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連肥腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已則服之取效若病稍重則非此可療

側柏葉一

甘草三

御米殼去頂穢湯洗三次

倍之

右吹咀水煎熟澄清入蜜呷服之先服木香檳榔丸後服此妙

本又方

黑薑伍十

陳皮兩

鶯粟殼十四 甘草

右四味半生半炒水煎空心服盡此一劑無不效者

頃白木安胃散治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘痛日夜無度又治男子小腸氣痛及婦人臍下虛冷并產後兒

枕痛虛弱寒熱不止者

御米殼三兩去頂穢

茯苓

白木各一

烏梅取肉一兩 車前子兩

五味子兩

右為末每服五錢水煎溫服

經治腸滑久痢神妙以石榴一箇劈破炭火簇燒令烟盡急取出不令作白灰用碗蓋一宿出火毒為末用酸石榴一箇煎湯調二錢

聖治痢久不止腸垢已出以烏梅二箇水一盞煎取六分去查食前分為二服

山治痢用五倍子為丸赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下各十九

頃訶子皮散癸卯歲冬十月小雪天冷應時樞密院白家

一老僕面塵脫色神氣特衰長跪於前曰病脫肛日久服

脫肛

藥未驗近日復下赤白膿痢作裏急後重白多赤少不任其苦求予治療予曰此非肉食膏粱者也必多蔬食或飲食不節天氣已寒衣蓋又薄寒侵形體不禁而腸頭脫下者寒也滑也真氣不禁形質不收乃血脫也此乃寒滑氣泄不同故形質下脫也當以澁去其脫而除其滑以大熱之劑除寒補陽以補氣之藥升陽益氣以微酸之味固氣上收名之曰訶子皮散

御米殼五分去花

乾姜六分

陳皮五分

訶子皮七分煨

右吹咀水煎服或為白湯調服亦可若空心一服減半再服全愈

羅養臟湯治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調臟腑受寒下痢去白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疼痛日夜無

度胃腸痞悶腸助脹滿全不思食及脫肛墜下酒毒濕毒

便血諸藥不效者並宜服之

人參

當歸各六

木香一兩

肉蔻炒裏煨

白芍藥一兩

甘草六

白木六

御米殼三兩訶子皮

右吹咀每服二大錢水煎去查食前溫服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈忌酒麪生冷魚腥油膩物臟腑

滑泄夜起久不瘥者可加附子四片煎服此藥神效不可具述

保治泄痢膿血乃至脫肛者宜地榆芍藥湯

蒼朮兩

地榆

卷柏

芍藥各三

右吹咀每服二兩水煎溫服病退勿服

大孔開世治痢大便不禁其大孔開如空洞不開者用慈和花椒



末搗爛塞穀道中併服酸澁固腸之劑收之如御米  
子皮之類是也神效

大孔痛

丹陳伯夫年二十歲性急好酒色奉養厚適有事多憂恐

患久瘧寒熱無時忽一日大發熱大便所下皆是積滯極

臭大孔極痛呻吟不絕其孔陷下囑付後事予曰此大虛

也脉皆弦大而浮遂以瓦片令敲圓如銅錢狀燒紅投童

子小便中急取起令乾以紙裹安痛處其時寒恐外寒乘

虛而入也以人參當歸陳皮作濃湯飲之食淡味至半月

而安

久下赤白大孔痛不可忍炒鹽熨之又炙枳實熨之後

痢久大孔急痛亦有寒熱者熟艾黃蠟訶子燒薰之妙

下痢大孔痛因熱流于下棋榔木香黃連黃芩加乾姜

運氣運氣下血有二

其一熱助心血盛而血下經云少陰司天熱淫所勝民病

血泄溺色變又云少陽在泉火淫所勝民病溺赤甚則便

血又云歲金不及炎火乃行民病血便注下又云厥陰司

天風氣下臨火縱其暴赤沃下注治以鹹寒是也

其二寒攻心血虛而下經云太陰司天寒淫所勝血變干

中民病血泄又云太陽之勝血脉凝泣或為血泄又云陽

明司天之政四之氣民病血便治以諸熱是也

運氣下白皆屬火經云少陽司天客勝甚則下白瀉血是

也

運氣下赤白有三  
其一屬火經云少陽司天火淫所勝民病泄注赤白又云  
少陽在泉火淫所勝民病泄注赤白少腹痛注下赤白治

以甘清是也

其二屬風經云厥陰之勝腸鳴飧泄少腹注下赤白治以

甘清是也

其三屬風濕經云太陽司天之政四之氣風濕交爭民病

注下赤白是也

運氣裏急後重有二

其一濕助脾盛而重經云太陰之勝少腹滿腰腫重強內

不便善注泄是也

其二風攻脾虛而重經云厥陰司天風淫所勝民病溇泄

瘕水閉是也瘕謂後重也

雜方

本救命延年丸治丈夫女人一切重痢

黃連 乾姜 當歸 阿膠

右三件為末用米醋煮阿膠令消盡不可剝却將藥搜

醋丸如桐子大每服三十九飯後吞下甚妙

又方 茱萸 黃連 阿膠 白芍等分同

右為細末麩糊為丸如桐子大每服三十九陳米飲送

下小兒十九

阿膠梅連丸治下痢無問新久赤白青黑疼痛諸症

阿膠 烏梅肉 黃柏 黃連

當歸 赤芍藥 乾姜炮 赤茯苓各等

右為末入阿膠末研勻水丸桐子大米飲下

黃連丸治赤白痢

吳茱萸 黃連

右用好酒同浸三日各自為末各自丸白痢茱萸丸赤

痢黃連丸甘草湯下赤白痢二丸相和服

右四方寒熱蕪施收散蕪用之劑寒熱滑滯雜合為痢



者宜之

崔治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一二碗任意呷之愈若熱痢則薑皮冷則去皮炒又方用陳皮艾葉濃煎湯服

針灸

滯下獨取足太陰一經經云脾足太陰之脉所生病者溇瘕泄水視盛虛熱寒陷下取之也

東泄痢不禁小腹脹後重便膿血

丹田寸復瀼小腸俞灸七壯天樞灸七壯腹哀灸七壯

五分冷痢腹痛泄注赤白關元灸七壯窮谷灸七壯

泄痢及下失氣膿血下腰灸七壯春骨灸七壯三宗骨灸七壯

之便膿血久痢下重小腸俞灸七壯

世裏急後重合谷外關

即便膿血寒中食不化腹中痛腹哀主之溇瘕腹中痛

醫學綱目卷三

聖

臟痺地機主之

宜忌

予曰族叔形色俱實瘕瘕又患痢自恃強健能食絕無忌憚一日召予曰却健而能食但苦汗出耳汝能止此汗否

予曰瘕瘕非汗不能愈可慮者止健與能食耳此非痢也

胃熱善消脾病不化食與積勢已甚矣此時宜節擇飲食

以養胃氣省出入以避風寒候汗透而安叔曰世俗謂無

飽死痢疾我今能食何謂可慮予曰痢而能食者知胃氣

未病也故言不死非謂恣食不擇節者不從所言恣口大

嚼過多又啖水菓如此者月餘後強求治不可着手矣淹

淹又月而死內經以驕恣不論於理為不治之病信哉

又周其姓者形色俱實患痢善食而易飢大嚼不擇者五

月矣予責之曰病中當調補自養豈可恣味戕賊遂教其

只用熟蘆薈吃粥且少與調治半月而安

羅如瀉痢止脾胃虛難任飲食者不可一槩用剋伐之劑

宜補養充足自然能飲食也宜錢氏方中具功散設或喜

嗜飲食太過有傷脾胃而心腹痞滿惡心嘔逆不拘此例

當權用橘皮枳木丸一服得快勿再服若飲食調節不致

有傷則胃氣自和平矣

丹下痢久送者寒涼藥中必兼升散并熱劑初下痢不可

用參朮唯氣虛者用之

衍有一男子暑月患血痢醫妄用寒藥逆制專用木香黃

連阿膠治之此藥始感便用則可倘病久腸虛者不宜服

切宜戒之地榆性沉寒苦惟下焦熱血痢則可用若虛

寒人及水瀉白痢未可輕使

丹古方用厚朴專為瀉積滯之氣然厚朴性太溫而散氣

久服大能虛人滯氣稍行即去之餘滯未盡宜炒枳殼陳

醫學綱目卷三

聖

皮然枳殼亦能耗氣比厚朴雖少緩比陳皮亦為重若滯

氣退一半亦當去之只用陳皮以和衆藥然陳皮去白用

有補瀉之兼能若為參朮之佐亦純作補藥用

久泄久痢

予曰族叔年七十稟壯形瘦夏末患泄痢至秋百方不應

予視之病雖久而神不瘁小便濇少而不赤兩手脈俱濇

而頗弦自言胃微悶食亦減因悟曰此必多年沉積癖在

腸胃詢其平生喜食何物曰我甚喜食鯉魚三年無日不

用予曰積痰在肺肺為大腸之臟宜大腸之不通也當與

澄其源而流自清以茱萸陳皮青蘘蘆首根生薑煎濃湯

和以砂糖飲一碗許自以指探喉中至半時吐痰半升如

膠其夜減半次早又服又吐半升而痢止又與平胃散加

白朮黃連旬日而安朱仲符年近七十右手風攣多年



在下

七月患泄瀉百藥不愈診其脉右手浮滑而洪數寸曰此必太陰分有積痰肺氣壅滯不能下降大揚虛而作泄當治上焦遂用蘿蔔子加漿水密探之而吐得痰一塊大如椀色如琥珀稠粘如膠漸遂止不服他藥鹿茸木作子和東門一男子病泄瀉不止腹鳴如雷不敢冷坐坐則下注如傾諸醫例斷為寒症官桂乾姜丁香荳蔻枯礬龍骨之屬皆服之矣針灸無效遷延已二十載矣一日問于戴人戴人曰兩手寸脉皆滑予不以為寒然其所以寒者水也以茶調散湧寒水五七升又以無憂散泄積水數十行乃通因通用之法也次以五苓散淡劑滲泄利水道又以甘露散止渴不數日而冷食寒飲皆如故此法王啓玄言之矣奈無入用之何哉 太康劉倉使大便少而頻日七八十次常於兩股間懸半枚磁蘆戴人見而笑之曰便

入醫學綱目卷三

甲七

既頻而少欲通而不得通也何不大下之此通因通用也止宜一服藥之力乃與藥大下二十餘行頓止

潔治泄痢久不安膿血稠粘裏急後重日夜無度宜大黃湯用大黃一兩剉用好酒兩大盞浸半日同煮至一盞半去渣分為二次頓服之痢止停服未止再服以利為度又服芍藥湯以和之所以微其毒也乃藥湯方見保白木黃芩湯服前藥痢已除宜以此和之

白木

黃芩

甘草

右咬咀水煎去查溫服

丹有人每早須大瀉一行或腹痛或不腹痛空心服熱藥亦無效有人教以夜食前又進熱藥一服遂安後如此常服愈蓋暖藥雖平且服之至夜力已盡無以敵一夜陰氣之故也

本治腎泄五味子散

五味子

吳茱萸

右二味炒香熟研為細末每服二錢陳米飲下有一人每五更將天明時必泄瀉一次如是數月有人云此名腎泄腎感陰氣而然服此頓愈

每日早起瀉一二行俗謂之受肚瀉是也其症有二一屬寒積在內即前二條之症是也 一屬食積在脾胃治翁仲政久泄早必泄一二行泄後便輕快脉滑而少弱先而厚朴和中丸五十九丸大下之後以白朮為君枳殼茯苓半夏為臣厚朴炙甘草連川芎滑石為佐吳茱萸十餘粒為使生薑煎服十餘貼而愈

入醫學綱目卷三

天

本治痢冷在腸胃間頻年腹痛泄瀉休作無時服諸熱藥不效宜先取去然後調治不可畏藥以養病也

厚朴

乾姜

甘草

桂心

附子

大黃

右咬咀水二升半煎八合後下大黃汁再煎六合去查分三溫服服自夜至曉令盡否則更以乾姜丸佐之

乾姜丸

乾姜

巴豆

大黃

人參

右除巴豆餘為末同研煉蜜丸如桐子大食前用湯吞下一丸陳米飲亦得

有人因憂愁中傷食結積在腸胃欲發吐利自冬後至暑月積傷發暴下數日不已王國云下痢至隔年月日應期而發者此為有積宜下之止用溫脾湯尤佳如難下可佐



以乾姜丸後服白朮散

白朮

木香

附子

人參各半

右細末每服二錢水一盞生薑三片棗子一箇煎六分温服

汚血

丑東陽胡兄年四十歲患痢百餘日百法治不效時正九月初旬予診其六脉促急沉弦細弱托左手為甚晝夜十行視之穢物甚少雖下清涕中有紫黑血絲食全不進予曰此非痢也當作瘀血治之其兄問瘀血何事而致予曰飽食急走極力叫罵歐打顛撲多受疼痛盛怒不泄補塞太過大酒大肉皆能致之彼云去歲枉受責杖經涉兩年恐非此等瘀血予曰服吾藥得瘀血下則生矣以桃仁乳香沒藥滑石佐以檳榔木香用神地糊為丸以米飲下五粒至夜半又不動又依前法下二百粒至天明下穢如爛

魚腸者二升半困頓終日漸與粥食而安

久泄是風邪內縮先煎小續命湯以發其汗使邪氣不能侵於外然後治其痢秋冬間下痢併治番胃加減厚朴丸大妙

此症係風邪縮於內其症下痢不止寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利或嘔吐膿血為難治宜麻黃升麻湯或小續命湯以發之法曰表邪縮于內當散邪於四肢布於絡脉外無其邪臟腑安矣有食積者加枳實五錢如酒入而泄瀉此熱也加黃芩五錢麻黃升麻湯中須

子和李德卿妻因產後病泄一年餘四肢瘦乏諸醫皆斷為死症求治載人戴人曰兩手脉皆微小乃痢病之生脉况洞泄屬肝經肝木克土而成此疾亦是腸澼者腸中

有積水也先以舟車丸四五粒又以無憂散三四錢四五行人皆駭之病羸如此尚可通耶眾人雖疑然未嘗謂且更看之復以導飲丸又通之渴則調飲五苓散向晚使人伺之已起而緝麻前後約三四十行以胃氣湯調之半月而能行一月而安健 劉德源病洞泄逾年食不進肌瘦力乏行步欹傾面色黧黑舉世治痢之藥皆用之無效戴人先以舟車丸無憂散下十餘行殊不困已頗喜食後以檳榔丸磨化其滯待數日病已大減戴人以為去之未盡當再服前藥德源亦欣然請下之又下五行次後數日更以苦劑越之徒問其家彼云已下村中收索去也

酒肉積

一丈夫酒多病泄久不愈又自進附椒等食不進洩愈多

滑石

黃芩半

乾姜

黃連

檳榔

粥為丸每服一百丸

予治方憲可二三年久泄下積但食肉則甚脉右關滑左沉細先以厚朴丸三四粒下之次奪其食用補劑加二陳及朴連查榔等消導藥煎湯下厚朴丸五粒阿魏丸二十五丸服之五六日漸得下氣多而泄不止遂問服固腸丸泄漸止即安是知固腸丸之苦寒治酒肉積之要藥也厚朴丸方

虛寒

垣聖餅子治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

黃丹

蜜陀僧各二錢

定粉

礞石各三錢

右為細末入白麩四錢和水丸如桐子大捻作餅子陰乾食前温漿水磨服以大便黑色為效衍義云黃丹脾泄當大補脾氣而健運之



蒸肉荳丸治腎泄久不愈脉沉細無力者效

破故紙 肉荳蔻各等分

右為末棗肉丸如桐子大米飲空心下

世固中丸治脾久泄去後與氣不快者

蒼朮 肉荳蔻各一兩

右粥丸桐子大每服五十九丸於固中丸內加破故紙一

兩名固下丸治腎久泄

丹泄瀉丸治久病大腸氣泄

熟地五錢 芍藥炒 知母各三錢 升麻

乾姜各二錢 生甘草一錢

右為末白湯調服再服百會三五壯

又方 白朮 神麩 芍藥炒 或散或丸子服愈

虛積 恒治老人奉養太過飲食傷脾常時脾泄

白朮兩 白芍藥酒炒 神麩兩 山查二兩

半夏兩 黃芩兩

右為末青荷葉燒飯丸

虛滑 本治腎泄宜五味子散方見前

訶黎勒丸治休息痢蓋度無度臍腹撮痛諸藥不效

椿根白皮兩 訶子兩 母丁香三十粒

右為細末醋糊丸如桐子大每服五十九丸陳米飲湯入

醋少許一日三服效謂根乃椿根俗所

木香散治隔年痢不止并治血痢尤捷

木香對用黃連 營粟殼對用生薑

其神效

右為細末入麝香少許每服一錢陳米飲下

雜方 世治久瀉不止用百草霜研細以粥糊為丸白湯下

張文仲治痢久下經時不愈者此名休息痢取大虫骨炙

焦搗末調服日三七效

子治赤白痢積年不瘳飲湯調蜜母末方寸七兩服效

又治血痢用千年石灰五升熬黃以水一斗攪令澄清一

服日三升

胎前下痢 本治婦人胎前產後赤白痢

生薑年少者百錢老者二鴨子一箇打碎入

右二味煎至八分入蒲黃三錢煎五七沸空心温服立

效

無雜下痢赤白絞刺疼痛

鷄子一枚烏者佳 黃丹一錢入鷄子殼內打

熟地一兩 當歸一兩 乾姜一兩 人參一兩

右每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女

天治雜症素病頻併下痢腹痛瘦面色痿黃不進飲食

厚朴一兩 白朮 川芎 白芍藥

熟地 當歸 乾姜 人參

訶子三錢 甘草一錢

右吹咀每服四錢姜三片同煎

又方治雜症下痢腹痛小便澀

當歸 黃芪各一兩 糯米一合

右細切和勻水煎分四服

羅大寧散治雜症下痢赤白灰色泄瀉疼痛死者

黑荳三十粒 粟殼二兩半 甘草二兩半

右為粗末都作一服生薑三片同煎食前服神效

快熱 天治雜症下痢赤白亦治男子常痢



<p>黃連 黃栢<small>各一</small> 山梔仁<small>二十</small></p> <p>右吹咀每服五錢水二盞浸二時久煮十沸頓服若嘔加陳皮一兩半姜三兩</p> <p>黃連湯治妊娠下痢赤白膿血不止</p> <p>黃連<small>八</small> 厚朴<small>制</small> 阿膠<small>炙</small> 當歸</p> <p>乾姜<small>各六</small> 艾葉 黃栢<small>各四</small></p> <p>右為細末空心米飲調下方寸匕日三服</p> <p>滯氣厚朴散治妊娠下痢黃水不絕</p> <p>厚朴<small>三</small> 黃連<small>三</small> 肉苳蔻<small>一枚連皮用</small></p> <p>右為食末水煮頓服</p> <p>草藥飲治妊娠氣本虛脾胃少弱臍腹虛滑腹痛</p> <p>日夜無度</p> <p>厚朴<small>二</small> 肉苳蔻<small>一枚連皮用</small></p> <p>八寶丹<small>未三</small> 玉三</p> <p>右吹咀每服三錢姜三片同煎</p> <p>產後痢</p> <p>雲救急散治產後赤白痢腹中絞痛</p> <p>芍藥 阿膠 艾葉 熟地<small>各一</small></p> <p>甘草 當歸<small>各三</small></p> <p>右吹咀水煎分二服空心飲</p> <p>天當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急痛及產後血暈崩中久痢<small>方見推脈</small></p> <p>楊痔妊娠血痢用阿膠二兩以酒一升半煮取一升頓服</p> <p>天產後諸痢煮薤白食之 又方羊腎脂炒薤白空心食之甚佳</p> <p>經治產後胎前痢疾敗龜甲一枚米醋炙研為末醋湯調下<small>丹云龜甲大</small></p>
---

<p>四婦人患墮胎後腸滿食少痢不止脈虛左手尤甚</p> <p>滑石 白芍藥<small>炒</small> 蒼米<small>各五</small> 白朮<small>五分</small></p> <p>乾姜<small>四</small> 茯苓<small>一</small> 訶子<small>二錢</small></p> <p>右為細末調下保和丸四五十粒</p> <p>熱滑</p> <p>雲產後血痢臍腹疼痛四物湯加槐花黃連御米殼等藥</p> <p>黃連丸治產後赤白痢腹中攪痛不忍</p> <p>黃連 阿膠 蒲黃 梔子仁<small>各二</small></p> <p>當歸 黃芩 黃栢<small>各二</small></p> <p>右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸米飲調下日三夜一</p> <p>冷滑</p> <p>仲產後下痢虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之<small>脈經作熱</small></p> <p>白頭翁 阿膠<small>各二</small> 黃連 黃栢</p> <p>秦皮<small>各三</small> 甘草<small>一</small></p> <p>右以水七升煮取二升半納膠令消盡分三服溫服</p> <p>婦人臨產痢疾山梔不拘多少燒灰為細末空心熱水調下一錢甚者不過五服</p> <p>產後血痢小便不通臍腹疼痛用生馬齒莧搗汁二大合煎一沸下蜜一合調頓服</p> <p>寒滑</p> <p>梅治產後血泄不禁餘血作痛燕塊桂心乾姜等分為末空心酒調服方寸匕</p> <p>雜方</p> <p>天療產後痢日五十行者取木裏蠶虫糞炒黃急以水沃之令稀稠得所服之即瘥</p> <p>聖產後諸痢方取蒼耳葉搗汁半盞日三四溫服</p> <p>大便不通 產後大便閉 大小便不通</p> <p>產後大小便不通</p>
---



恒津液耗而燥者以辛潤之 腎主五液津液感則六  
如常若飢飽勞役損傷胃氣及食辛熱厚味之物而助火  
邪伏於血中耗散其陰津液虧少故大便結燥又有年老  
氣虛津液不足而結者腎惡燥急食辛以潤之是也  
潤腸丸并加減法治胃中伏火大便閉澀或乾燥不通全不思  
食乃風結血秘皆令閉塞須潤燥和血疎風則自然通矣

羌活 歸稍 大黃各一兩 麻仁  
桃仁泡去皮尖

右為末除麻仁桃仁另研如泥外為細末煉蜜為丸如  
桐子大每服三五十丸空心白湯下 如病人不小便  
因大便不通而流其邪盛者急加酒洗大黃以利之  
如血燥者加桃仁酒洗大黃 如風結燥者加麻仁大  
黃 如風澁者加煨皂角仁大黃秦芫以利之 如脉

瀉覺身痒氣滯者加郁李仁大黃以除氣燥 如寒陰  
之病為寒結閉者以局方中半硫丸或加煎附子生姜  
湯冰冷與之其病雖陰寒之症當服陽藥補之若大便  
恒不甚通者亦當十服中與一服利藥微通其大便不  
令閉結乃治之大法也 若病人雖是陰症或是陰寒  
之症其病顯燥脉堅實亦宜陽藥中少加苦寒之劑以  
去熱躁躁止勿加如陰燥欲坐井中者其二腎脉按之  
必虛或沉細而遲此為易辨如有客邪之病亦從權加  
藥以去之

右一方加減法隨寒熱虛實及血秘氣秘風秘用藥至  
為詳盡餘方皆不出此也  
恒活血潤腸丸治大便風秘血秘時常結燥  
當歸稍 防風稍 羌活 大黃

麻子仁二兩 桃仁二兩 皂角仁泡存性去皮  
右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸桐子  
大每服五十九丸白湯下三二服後須以蘇子麻子隔每  
日早晚食之大便日久再不結燥以磁器盛之紙封勿  
令見風

當歸稍 熟地 生地  
升麻 當歸稍 熟地 生地  
紅花 大黃 甘草稍 桃仁  
麻仁各一錢

右劉如麻豆大作一服水三盞入桃麻仁煎一盞空心  
稍熱服  
導滯通幽湯治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不  
便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸身 升麻稍 桃仁 甘草  
紅花 熟地 生地 甘草  
右咬咀作一服水二大盞煎至一盞調極細末五分  
稍熱服之

羅許學上治年老虛秘麻仁蘇子各半合研取汁分二服  
煮粥服之不藥而愈  
羅潤腸枳杏丸降氣潤腸服之大腸自無滯滯

橘皮 杏仁去皮尖并双仁者炒黃各  
右等分為末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸空心温水  
下亦不損胃氣

右乃潤燥法蓋桃仁麻仁治血燥杏仁郁李仁治氣燥  
皂角仁治風燥也

一第1020丹黃白風秘時常結燥



再揚淳三哥大便秘瀉小便如常咽塞不通食下便有痰  
出脉濇左右手同此血虛腸燥為脾約病甚者人參散主  
之

人參 黃芪各一 厚朴八分 地黃七

桃仁 枳殼一錢 甘草一錢

煎入竹瀝姜汁飲之又與鎖陽從蓉二錢桃仁一錢煮

粥入竹瀝名潤腸散

婦人腸秘補血和氣以通之

肉蓯蓉一兩 麻仁 白芍藥 陳皮

當歸身各一

右為末晒乾炒神麴糊為丸如桐子大食前白湯下五

十九二次服

世從蓉潤腸丸治發汗過多耗散津液大腑秘結

八醫學綱目卷三

五

從蓉酒浸 沉香另研

右為末用麻仁汁打糊丸如桐子大每服七十九米飲

下

海益血丹治大便秘久虛下血

當歸酒浸 熟地各等

右為末煉蜜丸如彈子大細嚼酒下

丹大腸虛秘而熱者

白芍藥一兩 陳皮 生地 當歸身各一

條苓 甘草

右粥為丸白湯下

右從蓉當歸地黃潤燥法蓋積血枯竭而虛甚者宜之

有積 疴有物有積而結者當下之 食傷太陰腸滿食不化腹  
經響然不能大便者以苦泄之 仲景麻仁丸方七宣七皆  
以大黃為君之類是也

之類是也

垣治注夏大便秘滯者血少血中伏火也黃芪人參湯加

生地黃當歸身桃仁泥麻仁泥潤之 黃芪人參湯 如潤

之大便久不快利者少加煨大黃微利之 如加大黃久

不快利者非血結血秘是熱則生風病必濕風症止當服

黃芪人參湯只用羌活半兩防風半兩水四盞煎至一盞

去查空心服之其大便必大走也

西北方

開脾約丸論○成無已曰約者結約之約又束約之約胃

強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便

硬故曰脾約與此九以下脾之結燥潤腸結化津液入胃

則大便利小便少而愈矣愚竊有疑者既曰脾約脾弱不

能運也脾弱則土虧矣必脾氣之散脾血之耗原其所由

久病大下大汗之後陰血枯槁內火熾灼熱傷元氣又傷

於脾而成此症傷元氣者肺金受火克氣無所攝傷脾者

肺為脾之子肺耗則津竭必竊母氣以自救金耗則木寡

于畏土欲不傷不可得也脾失轉輸之令肺失傳送之官

宜大便秘而難下小便數而無藏畜也理宜滋養陰血使

孤陽之火不熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行

津液津液入胃則腸潤而通矣今以黃芪為君枳實厚朴

為臣雖有芍藥之養血麻仁杏仁之溫潤為之佐使用之

熱甚而氣實者無有不安愚恐西北二方地氣高厚人稟

壯實者可用若用之東南之人內熱自甚而血氣不實者

雖得暫通將見脾愈弱而燥矣後之用此方者須知在西

北以開結為主在東南以潤燥為主慎勿膠柱而調瑟可

秘赤

能飲食小便赤當以麻仁九七宣丸之類主之 仲景麻仁丸



寒陽明病每服二十九未加  
至五十九日三服以判為度  
七宣丸

柴胡五兩

桃仁去皮尖枳實炒

甘草炙

芍藥炙

詞子皮

木香各五兩

大黃切

枳實炒

右為細末煉蜜丸如桐子大每服二十九米飲送下漸  
加四五十丸以利為度

治大便不通用烏柏木皮方一寸劈破以水煎取小半  
蓋服之立通不用多服其功神聖兼能取水或以此湯調  
下五苓散二錢空心更妙

潔胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯主之

陳皮一斤

甘草二兩

厚朴制

白木三斤

半夏麩

枳實炒

右麩末每用三五錢水盞半姜三片棗一枚煎至一盞

八醫學綱目卷三

五十九

去查空心溫服實秘者物也虛秘者氣也

世樞散治腸胃受濕大便秘滯用枳榔不拘為末每服  
二錢蜜湯點服不拘時

診象

海槐杏仁俱治大便秘當以血氣分之年老虛人大便秘  
秘者脈浮在氣杏仁陳皮主之脈沉在血桃仁陳皮主之

所以俱用陳皮者以其干陽明病與手太陰為表裏也又  
云盛則難便行陽氣也敗則難行陰血也

診陰陽

仲問曰脈有陽結陰結者何以別之曰其脈浮而數能食  
不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脈沉而

遲不能食身體重者大便反硬名曰陰結也期十四日當劇  
垣有陽結有陰結陽結者散之陰結者熱之

熱氣留於小腸腸中痛熱焦渴則堅乾不得出故痛而  
閉不通矣全文見

勝脫移熱於小腸腸勝不便全文見診  
腸結 保大黃牽牛散治相火之氣遊走臟腑大便秘結

大黃兩 牽牛兩

右為細末每服三錢有厥冷合用酒調無厥冷而手足  
煩熱者蜜湯調下食後以微利為度此謂不時而熱者  
濕熱也凡用大黃半兩至一兩而大便不利者  
右熱秘皆陽結之屬仲景大小承氣及麻仁丸之類是  
也方見傷寒

世治後分閉塞用萱草根一捻同生薑搗碎取自然汁服  
之立愈

局半硫丸治年高冷秘虛秘

硫黃研細 半夏糯

右等分和勻生薑自然汁打麩糊為丸桐子大每服五

丸

十九丸空心溫酒姜湯任下

垣麻黃白木湯治大便不通五日一過小便黃赤渾身腫  
面上及腹尤甚色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟

不能舉動喘促唾清水吐穢痰白沫如膠時躁熱發欲去  
衣須臾而過振寒頂額有時如冰額寒尤甚頭旋眼黑目

中溜火冷淚卓不聞香臭小腹急痛當勝有動氣按之堅  
硬而痛

麻黃不去根 桂枝分

杏仁四箇

吳茱萸分

白芷五分 厚朴分

炒麩分

升麻分

柴胡

蒼木各三

甘草生

澤瀉

白茯苓各四

橘紅分

黃連酒

黃柏酒

黃芪

猪苓各三

熟甘草分

人參



右攻咀分作二服每服水二大盞半先煎麻黃湯去沫  
再入諸藥同煎至一盞去其稍熱飲之此症宿有  
風濕熱伏於榮血之中其水火乘於陽道而上盛元氣  
短少上喘為陰火傷其氣四肢痿在腎水之間乃所勝  
之病今正遇冬寒得時乘其肝木又實其母肺金克木  
凌火是大勝必有大復其症善怒欠多噎卑中如有物  
不聞香臭目視恍惚多悲健忘少腹急痛遍身黃腹大  
脹面目腫尤甚食不下痰唾涕有血目皆癆大便不通  
只二服皆愈

運氣

運氣大便閉有三

一曰熱經云熱至則淋閉又云少陰之復膈腸不便是也  
二曰寒經云太陽所至為禁止是也  
三曰濕經云太陽司天濕淫所勝病大便難是也

外取法

李

仲蜜煎法

仲蜜煎法方見傷寒胃實外漢云澀公夏中病澀有人  
又不樂大黃藥遂一夕用蜜煎三下結澀  
十枚逆支苦虛人秘者難下藥宜用此法

海藻煎用益與蜜乘熱捻如蜜煎法上用或用十許納  
穀道中少許化開即通一法用蜜煎不通者

海蜜煎與鹽相合如用草烏頭末相合亦可並能軟堅  
潤燥草烏能化寒消結可隨症陰陽所宜用之

急提盆散治雜病非陰候者用草烏頭不拘多少為極細  
末每用葱一枝肥者削去鬚圓頭上有汁濕蘸之納穀道

中

仲猪膽汁方方見傷寒胃實

孟大便不通氣奔欲死者以烏梅十箇置湯中須臾接去  
核杵為丸如棗大納下部少時即通

又方治大小便不通

江子肉 杏仁 皂角  
右為末作餅置臍上灸灸自通  
世通關散治卒閉不通用鹽入臍中灸即通去之  
本宜積丸手心握藥便通

巴豆 乾姜 葶子 良姜  
硫黃 其遂 白胡椒各等

右為細末研飯為丸如龍眼大早朝先用椒湯洗手麻  
油塗手掌口握藥一粒移時便瀉欲止以冷水洗手

針灸大便閉有二法

其一取胃經云腸中不便取三里盛瀉之虛補之是也  
其二取腎經云邪在腎病大便難取之湧泉崑崙視有血  
者盡之

玉大便秘塞 照海五分前二呼 支溝半寸瀉

照海瀉之 太白瀉之 亦可  
照海五分前二呼 支溝半寸瀉

集又法 照海五分前二呼 支溝半寸瀉  
穴者虛實補瀉之虛結補則通熱結瀉  
則通寒結先瀉後補熱結先補後瀉之

摘又法 氣海八分令病人覺便三五次為度出  
五分覺腹中鳴 三五次即瀉

世又法 谷 承筋三寸

取大便閉持七椎兩傍相去各一寸三寸 承筋三寸

陽道 按玉泉相去二寸隨年壯壯  
陽道 按玉泉相去二寸隨年壯壯

又法 石門半 大都分  
瀉治大便不通并傷寒水結 三間沿皮下向至合谷穴

出 承山瀉之  
世大便難中清及太自主之 又大鍾主之

世予觀古方通大便皆用降氣品劑蓋肺氣不降則大便



難傳送用杏仁枳殼沉香訶子等是也又老人虛人風人  
津液少而秘者宜以藥而滑之用胡麻麻仁阿膠等是也  
如妄以峻利藥逐之則津液走氣血耗雖暫通而即秘矣  
必更生他病昔王少府患此疾有人以峻藥利之者累矣  
後為肺痿咯膿血卒至不通而死

產後大便不通

產婦人產後有三種疾鬱胃則多汗汗多則大便秘故難  
於用藥惟麻子蘇子粥最為穩當 用紫蘇子大麻子二  
味各半合洗淨研極細用水再研取汁一盞分二次煮粥  
啜下此粥不唯產後可服大抵老人諸虛風秘皆宜服之  
嘗有一人卅年八十四忽爾腹痛頭疼惡心不食召醫數  
十議皆用補脾進食治風清利頭目等藥數日雖愈全不  
入食其家憂惶予辨說前藥皆誤矣此症正是老人風秘

入者引子三三

三三

臟腑滯聚於胃中則腹脹惡心不思飲食又上至於巔  
則頭痛不清也若臟腑流暢諸疾悉去矣予今作此粥  
兩啜而氣泄先下結毒如胡椒者十餘枚後漸得通利不  
用藥而自愈矣

丹產後秘結不通膨滿者氣急難坐臥用藥末酒下一  
合神效

大小便不通

丹一婦人脾疼後患大小便不通此是痰隔中焦氣聚上  
焦二陳加木通初服後吐查再服  
山大小便不通燒皂角灰為末粥清調下  
本車狗散治大小便經久不通欲死者  
用推車客七箇土狗七箇在土名土狗二物新瓦上焙  
乾為末以虎目樹皮向東南者濃煎湯服之經驗如神

瘵

虎目即虎杖其性大能利小便又能養氣非一藥也  
上用頭身女人病土狗  
用頭身女人病土狗  
瘵迴生神膏治陰症大小便不通及諸雜病陰候大小便  
不通者宜用此治法數日不通危急者用之非急不用

牡蠣

陳粉

乾姜一兩

右為細末男病用女人唾調手內擦熱緊掩二卵上得  
汗出愈蓋卵與乳乃男女之根蒂坎離之分屬也  
脈感皮熱肚脹前後不通暫悶此謂五實全見治  
四掩膈法治大小便不通用連根葱一二莖帶土生姜一  
塊淡豆豉二十一粒葱二匙同研爛作餅烘熱掩臍中以  
肩紮定良久氣透自通不通再換一餅

針灸

大小便不通 大都分

八醫經卷之三

不出

頭大小便難 環周在小腸下二寸 水道二十  
衛在背脊四面各一十八分 腹下三寸 脊脊相去  
四寸 兩邊各四寸 至百壯或云此穴未詳  
甲三焦約大小便不通水道主之  
左後大小便不通

瘵瘵大小便不利下血

車前子

黃芩

蒲黃

牡蠣

生地

芍藥各一兩

右為細末空心米飲服方寸七忌麪蒜

針灸

心治婦人產後忽小腹痛如煎大小便不通氣海三里關  
元三陰交陰谷主之

醫經綱目卷之二十三



醫學綱目卷之二十四 脾胃部

水脹通論

水脹告  
本於勞  
勞過度

黃帝問曰水穀入于口輸于腸胃其液別為五天寒衣薄則為弱與氣天熱衣厚則為汗悲哀氣并則為泣中焦胃緩則為嘔邪氣內逆則氣為之閉塞而不行不行則為水脹余知其然也不知其何由生願聞其道岐伯曰五穀之津液和合而為膏者內滲入于骨空補益腦髓而下流于陰股陰陽不和則使液溢而下流于陰髓液皆減而下下過度則虛虛故腰背痛而脛痠陰陽氣道不通四海塞閉三焦不瀉津液不化水穀并行腸胃之中別于迴腸留于下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則為水脹五瀉津液過度也

水腫

本臍腹四肢悉腫者為水但腹脹四肢不其腫為蠱脹也  
靈黃帝問于岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕石水何以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新臥起之狀其頸脉動時故陰股間寒足頸腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客于皮膚之間發然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹脊而不起腹色不變此其候也鼓脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與腹脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內着惡氣乃起瘕肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒氣客于子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉以留止日以益大狀如懷子月事

不以時下皆生于女子可導而下黃帝曰膚脹鼓脹可刺邪岐伯曰先瀉其脹之血絡後調其經刺去其血絡也論曰石水腫已下腫其脈沉

水腫 胎前水 產後水

黃帝曰其有不從毫毛生而五臟陽以竭也津液充郭其獨居孤精於內氣耗于外形不可與衣相保此四極急而動中是氣拒于內而形施于外治之奈何岐伯曰平治於權衡去宛陳莖微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門潔淨府精以時服五陽已布踈滌五臟故精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平謂之在表者汗之故下文云開鬼門潔淨府也去宛陳莖謂去積久之水物猶如草之不可久留於身中也

仲景法

仲諸有水者腰已下腫當利小便腰已上腫當發汗乃愈風水脉浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之

防已兩 黃芪一分 白朮三分 甘草半兩

右剉每服五錢生姜四片棗一枚水盞半煎取八分去查溫服良久再服腹痛加芍藥一法潔古用此湯調五

苓散治因濕為腫者其人或頭汗出無表症病者但下

重從腰已上為和腰已下

皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢垂動者防已茯苓湯主之

防已 黃芪 桂枝各三 茯苓六

甘草二

右五味以水六升煮取二升分溫三服

厥而皮水者蒲灰散主之方見淋心已上利小便法



風水急風一身悉瘡朕浮不渴續自汗出無大熱越婢湯主之

麻黃六 石膏三 生姜三 大枣十五

甘草二 右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分溫三服 惡風者加附子一枚炮風水加木四兩

裏水者一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水假如

小便自利此亡津液故令渴也越婢加木湯主之于前越

婢湯加白木四兩甘草麻黃湯亦主之

甘草二 麻黃四

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘草煮取三升

溫服一升重覆汗出不汗再服慎風寒

水之為病其脈沉小屬少陰浮者為風無水虛服者為氣

水其汗即已脈沉者宜麻黃附子湯浮者宜杏子湯

麻黃三 甘草二 附子一箇

右三味以水七升先煮麻黃去上沫內藥煮取二升半

溫服八合日三服已上發汗出愈

水腫因脾虛不能制水水積妄行當以參朮補脾使脾

氣得實則能健運自然升降運動其樞機則水自行非若

五苓之行水也宜補中行濕利小便切不可下當用二陳

湯加白朮人參蒼朮為主佐以黃芩麥門冬制肝木若腹

脹少佐厚朴氣不運加木香木通氣若陷下升麻柴胡提

之隨症加減必須補中用大劑白朮補脾如壅滿用半夏

陳皮香附監之有熱者當清肺金門冬黃芩之屬 赤岸

馬令八官素飲食不知飽但食肉必泄忽遍身發腫頭面

加多致目亦不可開膈間滿如築兩足麻至膝而止渾身

不可見風陰器挺長其脈左沉而重取不應右三部雖短

小却有和滑氣象遂令單煮白朮湯飲早晨空心探而去

之食後白朮二錢麻黃五分川芎半錢防風三分作湯下

保和丸五十九如此者二日因吐中得汗通體上截為多

遂得腫寬而眼開氣順而食進却于前方中麻黃防風加

白朮三錢木通通草各半錢下保和丸五十九如此者五

日而安此即開見 蘆節婦年二十餘半月之前夜間發熱面先腫次及身足

腫肚亦腫口渴思冷食水食畧減

大腹皮半 白朮一錢 蒼朮半 梔子四

川芎一 麻黃六 木通一 乾葛二

甘草稍半 朱秀才因父坐受濕能飲酒下血以苦瀉藥乾之遂成腫

疾而肚足皆腫口渴中滿無力少汗脈澀而短乃血為濕

氣所傷法當行濕順氣清熱進食化積

滑石六 白朮二 木通三 厚朴

乾葛各二 蒼朮一 分四貼加蘇葉七片每一貼煎至三之一熱下保和丸

與點丸溫中丸各五十九

王三九孺人浮腫膈滿腹滑泄口苦而渴小便赤少脈虛

而謬大稍遲此有汚積病為人性急

滑石一 陳皮四 蘇梗 白朮

川芎 木通 厚朴各二 茯苓皮半

甘草稍半 分六帖用順流水煎下保和丸廿五九抑青丸十九

吳孺人胃中有積發為腫成瘡疥身倦食少惡寒發熱脈



虛而沉

白朮六錢 滑石二兩 生地 木通

川芎各半 黃芩 茯苓皮 連翹各四錢

紫蘇三錢 甘草錢半

下保和九三十九

一女子年三十餘歲腫病有熱服藥得安但兩足下節不  
退肚內自身尚有熱脈却平矣飲食如昨

白朮錢 郁李仁半兩 蘇梗 木通

條芩 檳榔 枳實兩半 青皮兩

甘草稍錢

分十貼細研郁李仁以順流水三盞盪起煎一盞食前

熱服

張郎廿歲秋得腫疾午前上甚午後下甚口渴乏力脉滯

六醫學綱目卷三

弱食亦少稟氣素怯汗不能自出齋而為水與灸三里肺

俞大椎合谷分水又與此方

白朮錢 陳皮錢 黃芩 紫蘇

海金沙 木通 大腹皮 茯苓皮

乾葛炒 厚朴 甘草各二錢

作一貼水煎服

光明人脚腫肚界急身微熱脉畧數口乾

白朮錢 茯苓分五 乾葛炒分五 蘇梗五錢

大腹皮錢 甘草錢 川芎錢 陳皮分

許宅婦人二十已上脚腫近日有瘡毒

白朮錢 蒼朮 陳皮 犀角末

川芎錢 木通 連翹 蘇葉各三錢

甘草粘

分七貼煎後入姜汁令熱食前服

馮官人因內有濕積兼時令濕熱右腿少陽分發爛瘡如

掌大痒甚兩手脈洪緩畧數面目手足俱虛腫膈中午前

痞悶午後腫到兩足則隔寬

犀角生五錢 枳殼炒五錢 陳皮 連翹

白朮各一錢 木通分五 蒼朮分五 甘草稍二錢

茯苓分五 加姜汁煎服

馮客瘡而發腫微渴脉左手虛右手大食少

白朮半錢 陳皮錢 木通 厚朴炒

大腹皮各五錢 甘草分二 牛膝分五 蘇梗分三

姜三片

馮孺人瘡而浮腫大便自利

人參 半夏 陳皮各一錢 川芎

蒼朮炒 白芷各五錢 木通錢 白朮半錢

甘草分三

王官人年四十瘡兩日一發始善啖至春作腫大小便秘

食少面浮腫口渴

厚朴錢 白朮半錢 木通七分 陳皮錢

川芎 大腹皮各五錢 牛膝 滑石各一錢

甘草分三

右丹溪治水腫之法十五條其法大率皆以甘草佐白  
朮參陳等劑補中氣為君木通滑石郁李仁海金沙行  
水為臣厚朴大腹皮蘇梗通滯氣為佐使如氣不昇浮  
惡痰味沉者探吐以提之頭面先腫加麻黃微汗之挾  
積氣者佐以保和湯中即青等丸磨之挾熱者佐以黃  
芩之類清之挾瘡癰者佐以連翹犀角散之而隨証加



減也

先補後  
羅治腫以胃氣為本至元戊寅五月間積雨淋淫魯齋許  
仲平先生時年五十有八面目肢體浮腫大便溇多腹脹  
腸鳴時痛飲食減少命予治之脈得弦細而緩魯齋曰年  
壯時多服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故  
大發予曰營運之氣出自中焦者胃也胃氣弱不能布散  
水穀之氣營養臟腑經絡皮毛故氣行而滯為浮腫大便  
溇多而肢脹腸鳴皆濕氣勝也四時五臟皆以胃氣為本  
五臟有胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動滋養  
五臟則五臟脈不和平本臟之氣盛者其脈獨見輕則病  
過甚則必死故經曰真臟之脈弦無胃氣則死先生之疾  
幸而未至于甚尚可調補人知服牽牛大黃為一時之快  
不知其為終身之害也遂以平胃散加白朮茯苓草薹菴

八醫學綱目卷五

七

仁數服而腹脹溇泄腸鳴時痛皆愈飲食進止有四肢浮  
腫以導滯通經湯主之良愈

導滯通經湯治溇濕有餘及氣不宣通面目手足浮腫

陳皮 桑白皮 白朮 木香各五錢

茯苓去皮 茯苓去皮 茯苓去皮

霖兩時加澤瀉一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服

白茯苓湯能變水

白茯苓 澤瀉各二錢 郁李仁五錢

右咬咀作一服水一碗煎至一半生薑自然汁入藥常  
服無時從少至多服五七日後覺腹下再腫治以白朮

散 白朮 澤瀉各半兩

專方

右為末煎服三錢或丸亦可煎茯苓湯下二十九以黃  
芪芍藥建中湯之類調養之平復後忌房室猪魚葷麪  
等物

大東湯治四肢腫滿用白朮三兩咬咀每服半兩水一  
盞半大棗三枚拍破同煎至九分去渣溫服日三四服不  
拘時候

梅治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮取  
六升去渣和肉葱豉作臠如常法食之商陸白者好

醫治十種水氣痛不瘥欲死者鯉魚一頭重一斤已上  
者煮熟取汁和冬瓜葱白作羹食之 治十種水氣病不  
瘥垂死者青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮令  
熟作粥空腹食之

梅治水氣脹滿小便濁白鴨一隻去毛腸洗淨飯半升  
與椒姜同穰鴨腹中縫定如法蒸熟食之

八醫學綱目卷五

八

開見門

子郎之管兵狄家小兒病風水諸醫用銀粉粉霜之藥  
小便反滿飲食不進頭腫肚脹四肢皆滿狀若水晶求治

戴人戴人曰此証不與壯年同壯年病水者或因留飲及  
房室此小兒經七歲乃風水証也宜出汗乃置燠室以屏  
帳遮之令不見火若內火見外火必昏曠也使大服胃  
風湯而浴之浴訖以布單重覆之凡三五重其汗如水腫  
乃減五分隔一二日又依前法治之汗出腫減七分又三  
汗而全減尚未能食以換椰丸調之兒已嬉笑如常日矣

木治水氣羌活散

羌活 羅藷子各等分

右同炒香熟去羅藷子不用末之溫酒調下二錢一日  
一服二日二服三日三服取効

一服二日二服三日三服取効



羅五皮散治他病愈後或瘧痢後身體面目四肢虛弱  
便不利麻虛而大此由脾肺虛弱不能運行諸氣氣虛不  
理散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿也此藥並宜服之

大腹皮 赤茯苓皮 生姜皮 陳皮

桑白皮等分

右件為粗末每服五錢水一大盞同煎至八分去渣溫  
服不拘時候日進三服

香蘇散治水氣虛腫小便赤澀

陳皮去白 防已 木通 紫蘇葉各半

右為末每服二錢水二盞生姜三片同煎

外治水病洪腫氣脹不消食用香需五十斤細剉納釜中  
水浸上數寸煮使氣盡去查澄清熬稠丸如桐子大日三  
服每服五丸稍加之以小便利為度

極治水腫作坐臥不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒

灰淋汁煮赤小荳空心食令飽飢即食盡不得吃飯

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

瓜性急火病與

與前四味一處和勻水浸蒸餅搗乾為丸如菴菴  
日姜湯下三服食前下第一日每服二九第二日每服  
三九第三日每服四九第四日每服五九如覺小便多  
腫漸減便勿服如小便不多更服一日二日加作六九  
做一服一日亦三服腫消為効如服藥至第三日覺牙  
縫內痒痛口氣出時使用漱口藥用貫眾黃連各半兩  
為散每服一錢水一盞煎至七分入龍腦少許攪勻溫  
服之每一日煎一錢漱口如腫消忌鹽魚肉冷硬果食  
只服粥百日永瘥如臍滿秘瀉氣實先服治腫海藻散  
此藥親用救人甚多神効

海藻散方見本門

仲牡礪澤瀉散治腰以下腫方見

河澤瀉丸治一切水濕氣通身腫不可當者

人參兩 苦葶藶四兩

右二味同為細末用東肉和丸桐子大每服十五丸煎

桑白皮湯下日進三服空心食前驗

羅聖靈丹治脾肺有濕喘腫盛小便赤澀

苦葶藶四兩 木香 栝榔 茯苓新製

防風 木通 人參已上各二兩半

右為末用東肉為丸如桐子大煎桑白皮湯下

垣赤茯苓丸治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通

小便赤澀

葶藶四兩 防已二兩 赤茯苓兩 木香五錢

右為細末東肉丸如桐子大每服三十九煎桑白皮湯

下食前

續隨子丸治遍身虛腫喘悶不快



人參 漢防已 赤茯苓 木香

枳實 各五 苦葶藶 四兩 續隨子 兩 海金沙 五

右為細末末肉丸如桐子大每服二三十丸煎桑白皮湯食前下

濕潔古方治水腫用蜈蚣去頭尾與葡萄心同搗露七日曝乾為末淡酒調下暑月濕用尤佳聖惠方治水腫喘促未食前湯調半錢至一錢小兒通功

仲夫水病人目下有臥蚕或面目鮮澤脉伏其人消渴病水腫大小便不利其脉沉細者有水可下之

世治水腫 薏苡仁根 君 木香 枳榔 黑牽牛 右為末酒調服

外療水病腫用鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉以

水二升赤小豆一大升和魚肉煮取二升已上生布絞取汁去查頓服盡如不盡分為三服當下利利盡即瘥

本治身軀腫滿水氣急臥不得郁李仁一大合搗為末合和麩搜作餅子與吃入口即大便利氣便瘥

丹有人患脚腫漸上膝足不可踐地大水頭面遍身腫脹滿用苦瓠瓢實稔如豈大以麩裏煮一沸空心服七枚至午當出水一斗三日水自出不止大瘦乃瘥三年內須慎口味 一方治腫取苦瓠殼以鹽搽殼上燒存性為末煎童便一盞調服瘥苦瓠須擇無毒者

世三種散治浮腫用陳蘿蔔種去瓢陳蒲殼去瓢為豈一合同煎服即時退

羅無礙丸治脾濕積流四肢腫滿

大腹皮 木香 蓬朮 京三稜

枳榔 郁李仁 各一

右為細末炒麥麩糊為丸如桐子大生薑湯下

本治腫滿小便利茯苓散

郁李仁 枳榔 赤茯苓 白朮 甘遂 各一錢 陳皮 半錢

右細末每服一錢姜東湯調下

治十種水病并根源証狀方法

一青水先從左右肋腫起根在肝 大戟

二赤水先從舌根起根在心 葶藶子 甘遂 炒

三黃水從腰腹起根在脾 桑白皮 連翹

四白水從脚腫起根在肺 芫花 炒

五黑水從外腎腫起根在腎

六玄水從面腫起根在外腎

七風水從四肢腫起根在骨 澤瀉

八石水從腎腫起根在膀胱 藜蘆

九高水從小腹腫起根在小腸 巴豆 去皮

十氣水或盛或衰根在腹 赤小豆

右十般種病各有根源種種不同看十種病根除一味

倍多餘九味等分逐味依法修治焙為細末煉蜜丸如

桐子大用赤茯苓湯吞下三丸不拘時候每日三服忌

鹽一百二十日綠鹽能化水也又忌魚蟹麪食一切毒

物及生冷房室甚効用此方獲瘥後更用後來補藥

補藥方

肉桂 去粗 赤茯苓 乾姜 莢木 煮

川芎 肉苳蔻 桔梗 各等分依法製服一

皮白 枳榔

木



右等分爲末每服三錢百沸湯點服空心食前日午晚各一服前項二方治水腫病甚効予試用之百發百中獲濟者無數世間所有水病方藥無出此三方之右者幸勿忽

**河**三花神祐九治中滿腹脹一切水濕腫滿

甘遂 大戟 芫花醋拌濕炒

大黃兩一 輕粉錢一 牽牛兩二

右爲末滴水丸如小葶大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服至快利爲度得利止後服神効

**垣**海金沙散治脾濕大過通身腫滿喘不得臥及腹脹如

鼓

牽牛兩一 兩半半一 甘遂錢五 白木兩一

海金沙錢三

入醫學綱目卷五

右爲細末每服二錢煎倒流水一盞食前調下得宣利

止後服

**羅**海藻散治男子婦人通身虛腫喘滿不快

海藻 大戟 隨續子去壳

兩右四味用好酒浸 滑石兩半 白牽牛頭末

一宿取出曬乾候用 甘遂錢一 白葶錢一 青皮錢一

陳皮半兩

右前藥都一處杵爲細末大人每服二錢如氣實者三

錢平明冷茶清調下至夜時取下水三二行腫減七分

隔二三日平明又一服腫消忌魚肉百餘日小兒腫服

一錢五歲以下者半錢女人有胎者不可服

**虛實**錢氏論虛實腹脹實則不因吐瀉久病之後亦不因下

利得之脹而喘急悶亂更有痰有熱及有宿食不化者宜

大黃丸白餅子紫霜丸下之更詳別大小便如俱不通先

利小便後利大便虛則久病吐瀉後其脈微細主目胞腮

虛腫手足冷宜先與塌氣丸後與異攻散及和中丸益黃

散和其氣因氣而腫者煎陳皮湯因濕而腫者煎防已黃

芪湯調五苓散因熱而腫者八正散又一法燥熱于肺爲

腫者乃絕水之源當清肺除燥水自生矣于梔子豉湯中

加黃芪如熱在下焦陰消使氣不得化者宜益陰則陽氣

自化加黃連黃柏是也

**寒熱**中滿分清丸方見

熱水腫 梔子錢五 木香錢一 白木半二錢 急流水煎

服 又方山梔子去皮取仁炒槌碎米飲湯送下如胃脘

熱病在上者帶皮用

**治遊風攻頭面或四肢作腫塊知母湯**

知母 麻黃 黃芪 甘草

羌活 白木 枳殼各一

右粗末每服四錢水一盞半牛旁子百粒研碎煎至七

分溫日三四服覺冷不用牛旁子 有一達官母年七

十中風手拘攣半日止是附子之類扶養一日面浮腫

手背亦腫尋常有一國醫供藥診之是水病欲下大戟

牽牛以導之其家大驚憂惶召子議之子曰素問稱面

腫曰風足腫曰水此服附子太過正虛風生熱之証

咽必噎塞膈中不利誠如子言進升麻牛旁玄參湯繼

以知母湯三日便愈

**復元丹**治三焦不瀉氣脈塞閉樞機不通喘息奔急水

氣盈溢滲透經絡皮膚溢滿足脛尤甚兩目下腫腿腹間

冷口苦心腹堅脹不得正偃醒則咳嗽小便不通夢中虛



驚不能安臥

獨活二

木香炒

川椒炒出

羌活

厚朴去皮

陳皮

吳茱萸炒

桂心各一兩

澤瀉半兩

肉蔻煨

檳榔各半兩

右為末糊丸如桐子大每服五十九煎紫蘇湯送下不拘時此藥世傳屢驗服者宜先屏去諸藥一日三服先服滋利如傾次即腫消喘止宜絕慾屏鹽半年乃不耳

治脾虛浮腫實脾散

大附子一枚

草萊二兩

甘草一兩

乾姜二兩

大腹皮去皮

木瓜一圓去

右用水于沙器內煮乾一半擘開看乾姜不自心為度亦不得令水乾至焦取出焙乾為末每日午時空心沸湯點服

湯點服

蘇府

三陰結謂之水陰陽別論口王註云謂全二見論口王註云下焦為分注之所氣空不瀉則為溢水

下焦溢為水

陽明所謂上喘為水者陰氣下而復上上則邪客于臟腑間故為水也

運氣

運氣水腫有四

一曰濕經云太陰所至為附腫又云濕勝則濡泄甚則水閉附腫又云太陰之勝足脛附腫飲發于中附腫于上又云太陰司天客勝則首面附腫呼吸氣喘治以諸熱是也二曰火熱經云諸病附腫皆屬于火又云少陽司天火氣下臨肺氣上從寒熱附腫又云少陽司天火淫所勝民病皮膚痛色變黃赤傳而為水身面附腫腹滿仰息又云少陽之復渴引水漿化而為水傳為附腫又云少陽司天客

針灸

勝甚則附腫治以諸寒是也

三曰寒經云寒勝則浮是也

四曰燥經云陽明所至為浮虛是也

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病岐伯曰腎者累之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢于皮膚故為附腫附腫者聚水而生病也帝曰諸水皆生于腎乎岐伯曰腎者牝臟也地氣上者居于腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢于風內不得入于臟腑外不得越于皮膚客于玄府行于皮膚傳為附腫本之于腎名曰風水所謂玄府者汗空也帝曰水俞五十七處者是何主也岐伯曰腎俞五十七穴積陰之所聚也水所從出入也尻上五行行五者此腎俞故水病下為附腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得臥分為相輸俱受者水氣之所留也肺腎之標本共上下分為相輸應之病而伏菟上各二行行五者此腎之街也三陰之所交結於脚也踝上各一行行六者此腎脉之下行也名曰太衝凡五十七穴者皆臟之陰絡水之所客也

不醫學綱卷五

共

尻上五行行五

脊中一

長強一

中脘內俞二

盲門二

伏菟上各二行行五

懸樞一

大腸俞二

白環俞二

胞盲二

命門一

小腸俞二

胃倉二

秩邊二



中柱二 四滿二 氣穴二 大赫二  
 橫骨二 外陵二 大巨二 水道二  
 歸來二 氣街二  
 踝上各一行行六

太衝二 復溜二 陰谷二 照海二  
 交信二 禁實二

蠶風疥癩脹為五十七病取皮膚之血者盡取之四時氣滿  
 刺灸水腫有五法

其一取腎膀胱經前篇云五十七穴者是取其二經之穴也又經云腎病者腹大脰腫取其經少陰太陽血者是取其二經之血也

其二取血絡經前云取皮膚之血者盡取之是也  
 其三取胃經云胃足陽明之脉所生病者大腹水腫視盛也

其四取委陽經云三焦病者不得小便溢則水取委陽是也

其五筒針取水先以鈹針針之已刺而筒之引針而納之入而復之以盡其沫必堅來來緩則煩悅來急則安靜間日一刺之沫盡乃止筒針到中有空

腫浮腫 分水 中腕各灸 內庭 行間 臨泣各瀉  
 東水氣皮膚不可近衣小腹敦敦然小便黃身潤 章門

屋翳灸 陰交 章門之  
 外腰水腫先從腰腫起 肝募 水分

內中水腫面痿黃 胃脘 通谷 氣海 水分  
 胞中水腫根在心水赤 心俞 巨闕 氣海  
 腹中水腫從脾起水黃 脾俞 胃脘 水分

肺喘水腫從胸起水白 肺俞 肝募  
 足心水腫從足起 白環俞 水分 豐中  
 四肢水腫變身浮 膽募  
 兩脇水腫四肢枯瘦從脇腫起 章門 期門  
 小腸水腫從臍腫起 氣海

際五脈論五水灸法  
 青水灸肝井灸 赤水灸心榮灸 黃水灸脾俞灸 白

水灸肺經灸 黑水灸腎合灸  
 甲身腫關門主之 水腫脹皮膚腫三里主之 風水膝腫

巨虛上廉主之 風水面附腫顏黑鮮溪主之 風水面  
 附腫衝陽主之 水中留飲胸脇支滿刺陷谷出血立已

面附腫上星主之先取諛諛後取天牖風池 水腫人  
 中盡滿唇反者死水溝主之 水腫大臍平灸臍中無理

不治  
 蓋目窠微腫如吐蚕之狀曰水平人氣 足腫曰水

仲病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此  
 法當病水若小便自利及汗出者自當愈 跌陽脉當伏

今反數本自有熱消穀小便數今反不利此欲作水 寸  
 口脉浮而遲浮脉則熱遲脉則潛熱潛相搏名曰沉伏陽

脉浮而數浮脉則熱數脉則止熱止相搏名曰伏沉伏相  
 搏名曰水沉則絡脉虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚

則為水矣  
 素頸脉動喘疾欬曰水平人氣  
 仲風水其脉自浮外証骨節疼痛惡風針經論疾診尺篇  
 微癢如新臥起狀其頸脉動時欬按其手足上管而不  
 者風膚也又仲云太陰脉浮而緊法當骨節疼痛反  
 不疼身反重而欬其人不可治  
 出即愈為風水治法見前陽虛脉



皮水其脉亦浮外証胸腹按之沒指不惡風其腹如鼓下  
湯當發其汗又云渴而不惡寒者此是皮水蓋法當風水  
亦當發汗也治正水其脉沉遲外証自喘

石水其脉自沉外証腹滿不喘大奇論謂腎肝升沉  
為石水并浮為風水

黃汗其脉沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰  
膿又云身腫而冷狀如癰痺胃中空不能食反  
腹脹痛者不可治此多黃汗治法見黃疸條

他心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其陰大腫 肝  
水者其腹大不能自轉側脇下腹中痛時時津液微生小  
便續通 肺水者身腫小便難時時鴨瀉 脾水者其腹

大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難 腎水者其腹  
大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面黃

瘦便下重

無大抵浮腫帶數即是虛寒潛止于其間又必沉伏沉伏

則陽虛陰實為水必矣 面龐然浮腫疼痛其色枯黑多

汗惡風者屬腎風 諸唇黑則傷肝缺益平則傷

心臍出則傷脾足心平則傷腎背平則傷肺凡此五傷必

不可治也

仲脉得諸沉當黃有水身軀腫重水病脉出者死無擇云  
脉得諸沉當黃有水身軀腫重水病脉出者死大抵浮  
沉快則快則陽虛陰實為水必矣

水病脉洪大者可治微細者不可治 水病腹大如鼓

脉實者生虛者死 水病夜半死全文見  
仲脈得諸沉當黃有水身軀腫重水病脉出者死

仲諸病水者渴而不利小便數者皆不可發汗

素帝曰有病腎風者而脈虛然寒害于言可刺否岐伯曰

虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至帝曰其至何如

岐伯曰至必少氣時熱時熱從背脊上至頭汗出手熱口

乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩

而不能食不能正偃正偃則咳病名曰風水論在刺法

帝曰願聞其說岐伯曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必

湊之故水氣時熱而汗出也小便黃者少腹中有熱也不

能正偃者胃中不和也正偃則咳其上迫肺也諸有水氣

者微腫先見于目下也帝曰何以言之岐伯曰水者陰也

目者亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫  
也真氣上逆故口苦舌乾則不得正偃正偃則咳出清水  
也諸水病者不得卧則則驚驚則欬甚也腹中鳴者病本  
於胃也海脾則煩不能食食不能下者胃脘隔也身重難  
以行者胃脉在足也月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心  
而絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也

禁忌

仲問曰病者若水面目身軀四肢皆腫小便不利脉之不

言水反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微咳喘審如師

言其脉何類師曰寸尺脉沉而緊沉為水緊為寒沉緊相

搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽

損陰虛結寒微動緊氣上衝喉咽塞噎膈下急痛醫以為

留飲而大下之氣擊不去其病不除後重吐之胃家虛煩

咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶

歷丸下水當時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象

若奔豚其水揚溢則浮咳喘逆當先攻擊衝氣令止乃治

咳咳止其喘自差先治新病病當在後

丹廬氏醫鏡水腫辨 內經曰諸氣憤鬱皆屬於肺諸濕

腫滿皆屬于脾諸腹脹大皆屬于熱蓋濕者土之氣土者

火之子故濕每生于熱熱氣亦能自濕者子氣感母濕之

變也凡病腫皆宜以治濕為主所挾不同故治法亦異類

考



例治腫以治水立說而欲導腎以決去之豈理也哉腫上衰弱內因七情外傷六氣失運化之職清濁混淆鬱而為水類例以為本末皆隸于肺腎胃三者而不及脾下文繼以肺金盛而生水水液妄行氣息閉樞機壅而為腫夫脾土受病肺為之子焉有自盛而生水者哉若謂腫之水果生于肺金之清氣則滋長腎陰奉行降令為化生之源何病腫之有今滲透經絡注流溪谷皆濁腐之氣窒碍津液又久灌入隧道血亦化水而欲藉脾上以制之導腎氣以利之不思脾病則肝木來侮子氣亦衰木寡于畏脾欲不病不可得矣治法宜清心經之火補養脾土全運化之職肺氣下降滲道開通使敗濁之氣其稍清者復回而為氣為血為津液其甚者在上為汗在下為溺以漸而分消矣今不明言而曰制水燥水得非白圭以隣國為壑乎經言

入醫學綱目卷五

主

腫病因津液充郭而致不生于肺金之盛也明矣又言氣拒于內氣耗于外責其不能滲運敗濁耳又云開鬼門紫淨府鬼門府脈也屬肺淨府膀胱也屬腎之府未聞有導腎氣之說註文明言陰精耗損腎氣果可導乎仲景謂治濕利小便即經中紫淨府之意苟以清淨為腎而導之果於經意有合乎錢仲陽謂腎無瀉法其可輕易導之乎或曰經言疏滌五臟非導腎歟予曰此承上文五陽已布而言若鬼門開矣淨府紫矣五宮之陽氣條布彼敗濁之氣自然疏導滌除于腎氣何與焉

胎前水腫

雲防已湯治妊娠脾虛遍身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已七錢

桑白皮

赤茯苓

紫蘇葉各一兩

表裡

利

木香二錢  
右為粗末每服四錢姜四片水同煎食前服

葶藶散治妊娠遍身洪腫

葶藶子一兩

茯苓

桑白皮

郁李仁各二兩

右為粗末水六升煎取二升分三服小便利即瘥

又方 澤瀉

葶藶各二兩

茯苓

枳殼

白朮各六兩

右細切以水六升煮取二升半分溫二服

子和治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴猪苓五兩末

以熱水服方寸七日三服

丹子腫多濕用山梔一撮米飲吞下

產後水腫

入醫學綱目卷五

主

丹產後腫必用大補氣血為主少佐以蒼朮茯苓使水自

利

因大調經散治產後腫滿喘急煩渴小便不利

大荳一兩半

茯苓一兩

真琥珀錢一

右為細末濃煎烏荳紫蘇湯調下

產後四肢浮腫者敗血循經流入四肢滯留日深腐爛如

水故令四肢腫面黃宜服小調經散血行腫消則愈

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸各一錢

細辛

麝香各五分

右為細末每服半錢姜汁酒各少許調停服

丹婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此躰虛

而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中道水行氣可也

白朮二兩

陳皮一兩

川芎半兩

木通六錢

虛實

利



寒熱

茯苓<sup>三</sup>

下與點九共五九

天奪魂散治產後虛腫喘促利小便則愈

生姜<sup>三兩</sup> 白麩<sup>三</sup> 半夏<sup>七</sup>

右以生姜汁搜麩裏半夏為七餅子煨焦熟為末水調

一盞小便利為効

如產後風寒在表面目四肢浮腫宜局方中七聖九白

湯下日加以利為度<sup>七聖九</sup> 如浮腫至膝喘嗽加木香

枳椇倍之謂氣多也 如浮腫又頭痛昏冒加羌活川芎

謂風多也 如只浮腫止七聖九本方服之

中滿分消丸<sup>方見眼科熱症</sup>

張宣徽侍寵產後半月忽患浮腫急召產科醫治經半

月不寤病勢轉劇召杜治之杜至曰諸醫作何病張曰皆

八醫學綱目卷三

重

云水氣浮腫杜曰非也且水氣發咳嗽小便澀是也今愛

寵小便不滿不作咳嗽惟手足寒乃血藏虛氣塞不通流

面生浮腫遂用益血和氣藥治之旬日病去七八經半月

全愈所用之藥乃靈苑方牡丹散也其方云治血藏風虛

冷今產科家多用此藥治產後諸病如神更名曰損金湯

者是也 牡丹散<sup>方見產後</sup>

天加減吳茱萸湯治婦人血藏虛宿挾風冷身面虛浮等

疾

吳茱萸<sup>半</sup> 枳椇

麥冬<sup>門</sup> 防風

當歸

右為粗末每服四錢水一盞半煎至七分去查食煎熱

服

乾姜 甘草

半夏 細辛

牡丹皮 桂心<sup>各半</sup>

赤茯苓

右為粗末每服四錢水一盞半煎至七分去查食煎熱

方

丹產後風腫水腫澤蘭防已等分溫酒調下二錢如不能

飲者醋調下亦可<sup>方</sup>

先腹大後四肢腫為脹 或獨腹大四肢不腫者治法同

無附子黃芩湯治寒客皮膚殼殼然而堅腹大身腫按之

陷而不起色不變病名膚脹一劑未知再作

大附子<sup>生去皮切半</sup> 黃芩<sup>二</sup>

右以生姜二兩切水二碗煎至一碗去查分三服空腹

溫服次日行前附子破作四片再用黃芩二兩姜一兩

如前煎服停三日復將附子作八片如前煎服

治鼓脹法並見後行濕寒熱氣血諸條皆其法也

仲脹滿按之不痛為虛痛者為實可下之 腹脹時減復

如故此為寒常與溫藥 腹滿不減不足言須當下之

八醫學綱目卷三

重

宜大承氣湯

海脾虛滿者黃芩湯<sup>方見</sup> 脾實滿不運平胃散<sup>方見</sup>

東垣云腹脹滿氣不轉者加厚朴以破滯氣腹中芬悶此

非腹脹滿乃散而不收可加芍藥收之是知氣結而脹宜

厚朴散之散而脹宜芍藥收之

丹鼓脹大補中氣行濕此乃脾虛之甚必須遠音樂厚

味 朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛終日急氣血皆虛用

大劑人參白朮佐以陳皮蒼朮茯苓之類 有血虛者四

物行血隨証加減 凡補氣必帶厚朴寬滿 腹脹必少

香氣若陷下用升麻柴胡以提其氣水腫當補脾為主白

朮茯苓陳皮佐之

鼓脹論 心肺陽也居上腎肝陰也居下脾居中也亦

濕補虛行



屬土經曰飲食入胃遊溢精氣上輸于脾脾氣散精上  
于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤  
靜之德而有乾健之運故能致心肺之陽降腎肝之陰升  
而成天地交之泰是為無病之人今也七情內傷六淫外  
侵飲食失節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃  
雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否  
于斯時也清濁相混隧道壅塞氣化濁血瘀滯而為熱熱  
留而又氣化成濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以  
其外雖堅滿中空無物有似于鼓其病膠固難以治療故  
又名曰蠱若虫侵蝕有蠱之義驗之治法理宜補脾又須  
養肺金以制木使脾無賊邪之慮滋腎水以制火使肺得  
清化之令却蠱味以防助邪斷妄想遠音樂以保母氣無  
有不妥醫者不察病起于虛急於取效術能希賞病者苦

六三

五

於脹急喜行利藥以求一時之快不知寬得一日半日其  
腫愈甚病邪甚矣真氣傷矣夫死不遠古方惟禹餘糧丸  
又名石中黃丸又名紫金丸制肝補脾殊為切當亦須隨  
証又須順時加減用之為妙予友俞仁叔儒而醫連得家  
難年近五十得此疾自製禹餘糧丸服之子診其脈弦澀  
而數曰此丸新製煅煉之火邪尚存溫熱之藥太多宜自  
加減不可執方俞笑曰今人不及古人此方不可加減服  
之一月口鼻出血色黑骨立而死 楊兄年五十性嗜酒  
病瘧半年患脹病自察必死來求治診其脈弦而澀重則  
大瘧未愈手足瘦而腹狀如蜘蛛遂教以參朮為君當歸  
川芎芍藥為臣陳皮黃連厚朴茯苓為佐生甘草此少作  
濃湯飲之一日定三貼彼亦嚴守戒忌一月後瘧得汗而  
愈又半月小便是而脹愈中間雖少有加減大意只是補

補氣  
為主

氣行濕 又陳氏年四十餘性嗜酒大便時見血于春  
患脹色黑而腹大其形如鬼診其脈數而澀重似弱予以  
四物加黃連黃芩木通白朮陳皮厚朴生甘草作湯與之  
近一年而安一補氣一補血餘藥大率相出入皆獲安以  
保天壽或曰氣無補法子何補氣而獲安果有說以通之  
乎予曰氣無補法乃世俗之言也蓋氣之為病痞悶壅塞  
似難於補恐增病勢不思正氣虛者不能運行邪滯所着  
而不去所以為病經曰壯者氣行則愈怯者著而成病苟  
或氣行不用補法氣何由行或曰子之藥審則審矣何効  
之遲也病者久在床枕將必厭子之迂而求速効者矣余  
曰此病之起或三五年或十餘年根深蒂固欲求速効自  
求禍耳知王道者能治此病也或曰脹病將終不可與利  
藥乎予曰灼知其不因于虛受病亦淺脾胃尚壯積滯不

六四

五

固而又有可下之証亦宜畧與疏導若按張子和濟川散  
禹功丸為例行迅攻之策實所不敢 潘可達女年十九  
歲受風濕厚患胃腹脹滿自用下藥利十數行時脹無增  
減求來治診其脈皆大畧按即散而無力全無數意予曰  
此有表証反攻當死賴藥受好時又在室尚可挽回壽  
損矣急與四物湯加人參白朮帶白陳皮炙甘草煎服至  
半月後病不退又自用蘿蔔根種煎湯浴兩度時腫稍  
增予曰表病攻裏已自難救今又虛其表事急矣于前藥  
去地黃芍藥加黃芪倍白朮大劑濃煎湯飲又吞人參白  
朮丸十日後如初病時又因吃難化物自利以參朮為君  
少加陳皮為佐又與肉苳蔻訶子為君山查子為使粥和  
作丸吞之至四五十貼而安 一男子年四十餘患瘧久  
而腹脹脈不數而微弦重取則來不滑利輕重又皆無力



遂與索氏三和湯三倍加白朮入姜汁服之數服而瘳愈  
小便利二三行脹稍減遂又小便短少予作氣血兩虛于  
前藥內入人參牛膝當歸身尾作大劑料百服而愈  
索氏三和湯三倍加白朮方

白朮 厚朴 陳皮各三 木通一

枳榔 紫蘇各二 甘草 海金沙

大腹皮 白茯苓 枳殼各一 水煎服

調胃白朮澤瀉散治痰病化為水氣傳變水穀不能食

白朮 澤瀉 芍藥 陳皮

茯苓 生薑 木香 枳榔各一

右為末治腹腫如神 若心下痞加枳實 若心下感

加牽牛

仲心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作枳朮湯注之

枳實 白朮

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中軟即當散

也

因積成 積者補 虛者補 如鼓多青絡脈喘不得臥時值暑雨加之自利完穀日晡

潮熱夜有盜汗求子往治之脉得浮數按之有力謂病家

曰凡治積非有毒之劑攻之則不可今脈虛弱如此豈敢

以常法治之遂投分滲益胃之劑數服而便清自調稜以

升降陰陽進食和氣而腹大減胃氣稍平間以消積之劑

不月餘良愈先師嘗曰潔古老人有二養正積自除譬如

滿座君子縱有一小人自無容地今令真氣實胃氣強積

自消矣

一婦人年三十六歲家貧多勞性偏急自七月斷經至

八月小腹下有一塊偏左如拳有時塊起即痛作伏則  
減至半月後腹漸腫脹食減平時三分之一無力遇夜發  
熱天明即稍退其脉得虛微短弱左尤甚初與白朮一

斤帶白陳皮一斤作二十貼服以三聖膏貼塊上經宿則

塊軟再宿則塊小旬日後食稍進熱減半脉稍有力又與

白朮一斤帶白陳皮半斤酒當歸身半斤木通三兩每貼

研桃仁九粒盡此劑病悉除 一婦人年五十餘歲素好

怒因食燒猪肉次早而脹絕不思食倦怠六脈沉瀆獨左

豁大余作軀虛有痰氣為痰所隔不得降當以補虛利痰

為主每早以二陳湯加參朮大劑與一貼服後探令吐出

藥辰已時復與索氏三和湯一倍加白朮二貼至睡後以

神佑七丸以撓其痰去牽牛如此服至一月而安矣 金

一安人年七十一歲好濕麵得帶下病亦惡寒淋瀝醫

與荷花鬚柴胡等藥發熱所下愈多醫與縮砂豆蔻藥以

其食少也腹滿脹氣喘又與葶藶散不應又與禹餘糧丸

病愈甚醫又與崇土散亦不應予脉之兩手洪瀆輕則弦

長而滑實至是喘甚不得臥此不是濕而釀成濕在足太

陰陽明二經水穀之氣為濕所抑不得上升遂成帶下理

用升舉之劑以補氣和血次之而醫反與瀉燥宜其展轉

身病遂與人參生肺之陰以拒火毒白朮以補胃氣除濕

熱行水道莖仁去汚生新郁李仁行積水以通草佐之犀

角屑解毒消腫悶榔榔治最高之氣作濃湯吞下保和

丸藥又疑素厚養有肉積加阿魏小丸同嚥之四五日後

積氣漸消腫漸下又加補腎丸以生腎水之真陰又兩三

日後漸安而得睡食有味矣又兩日後加與點丸以驅逐

肺家之積熱而愈



一丈夫脾胃不熱，胸有虛胃，有積得腫，或進或退，口乾或氣喘，醫連月不退，脈軟而細，以其形肥，不以爲忌，用

白朮錢四 芍藥 地黃錢三 連翹

當歸錢二 青皮錢二 人參 木通

羌活 黃芩錢半 甘草 紅花錢三

右分五貼煎下保和丸

楊生年三十，因癘初安，淡食，甚腐，齋飯成脹，在馬上小便赤少，不思食，口渴，脈弦而滿，此胃中有瘀血用

蘇梗分三 木通錢半 白朮錢一 川芎

枳實 白芍分五 甘草分 陳皮分五

厚朴分三

右研益元散下保和丸五十粒

一丈夫氣上，肌或膨脹，此下虛所致

陳皮錢五 人參 歸類 白朮

連翹錢三 地黃 芍藥錢二 木通錢

甘草分五

右分五貼煎下保和丸

木香化滯湯 白朮錢一 陳皮 大腹子 白茯苓

砂仁 人參錢一 青皮 枳榔

木香 姜黃錢二 白朮錢一 甘草錢四

白檀分二 藿香錢二 桔梗分五

右爲細末，水一大盞，二分煎至一盞，稍熱服，食前沸湯

點服亦得

右方治因積滯成脹，皆以參朮朴通等煎湯補虛行濕

下神佑阿魏等丸消積所謂攻補兼施者也

小濕中丸治腹是脾虛不能運化不可下之

陳皮 半夏湯泡去神麩炒 茯苓各一

白朮兩二 香附子炒 砂砂各一兩半

苦參炒 黃連炒 甘草錢三

右爲末，醋水各一盞，打糊爲丸，如桐子大，每服七八十丸，白朮六錢，陳皮一錢，生姜一片，煎湯吞下，虛甚加人

參一錢，各用本方去黃連，加厚朴半兩，忌口病輕者服

此丸六七兩，小便長病甚者服一斤，小便始長

無禹餘糧丸治十種水氣，脚腫上氣，喘滿小便不利，但

是水氣悉皆主之許李士及丹溪比白云

蛇含石大者三兩，以新鐵鉢盛，入炭火中燒，蛇黃與

出研極細 禹餘糧三兩，以新鐵鉢盛，入炭火中燒，蛇黃與

并藥入炭中燒紅，鋪出，傾藥淨，磚地上候冷，研細

以三物爲主，其次量人虛實入下項治水多者是取轉惟

藥狀非故虛人老人亦可服

羌活 木香 茯苓 川芎

牛膝酒浸 桂心 白朮錢一 大茴香炒

蓬朮炮 附子炮 乾姜炮 青皮

京三稜炮 白蒺藜 當歸酒浸一宿

右爲末，拌勻，以湯浸蒸餅，揆去水和藥，再搗極勻，丸如

桐子大，食前溫酒白湯送下，三十九至五十九，最忌鹽

一毫不可入口，否則發疾，愈其但試服藥，即於小便內

旋去不動，臍臍病去，日日三服，兼以溫和調補氣血藥

助之真神方也

丹麻堅實人壯盛者，或可用攻藥，便收拾白朮爲主

垣中滿治法，開鬼門，繫寧府，開鬼門者，發汗也，繫寧府利



表

程

小便也又中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其氣下焦如瀉氣血自然分化不待洩滓穢如或大實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麵及味厚之物膏梁之人又或食已便臥使濕熱之氣不得施化致令腹脹滿此亦是熱脹也治熱脹分消九主之

**仲氣**分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍加麻辛附子湯主之  
桂枝 生姜 甘草 大棗  
麻黃 細辛 附子  
右七味以水七升者麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如虫行皮中即愈

**牛黃琥珀丸**治水腫腹大氣息不通危急者神效  
牛黃 琥珀 椒目 葶藶  
昆布 海藻 牽牛

右八味為末別研葶藶如泥一處拌勻煉蜜丸如桐子大每服十五丸米飲下以小便利為度日再服河間方有麝香龍胆無琥珀易名苦葶藶膏治法與此方同

**腹滿**口舌乾燥此腸胃間有水氣防已椒蘆丸主之  
防已 椒目 葶藶 大黃

右四味末之蜜為丸如桐子大先食飲服十九日三服稍增口中自有津液渴者如芒硝五錢

**葶藶丸**治腫滿腹大四肢枯瘦小便澀濁  
甜葶藶 薺菜根

右為末蜜丸如彈子大每服一九陳皮湯嚼下只三五小便清數九當依舊法日行濕

**白丸子**治單腹脹神效  
治水氣壅脹腹滿府積實子丸

右二味為末用楮實膏為丸如桐子大不計丸數從少至多服至小便清利及腹脹減為度次服中治丸赤治藥調養疎啓其中忌甘苦峻補其下宜五補七宣丸

**治蠱**用蝦蟇一枚去內腸入蜈蚣七個新瓦上焙乾為末丸酒服如無蜈蚣用縮砂七粒  
黃帝問曰有病心腹滿日食則不能暮食此為何病岐伯對曰名為鼓脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢醴一劑知二劑已帝曰其時有復發者何也岐伯曰此飲食

不節故時有病也雖然其病且已時故當病氣聚于腹也

**五積丸**必心腹脹滿肝為肥氣心為伏梁肺為息奔脾為痞氣腎氣奔豚如斯之類從五積法治之可也

**朱恕**八哥肚腫因濕氣起自五月能飲酒左脇有塊兩足時有腫

白木 三稜 木通 陳皮  
大腹皮 赤茯苓 海金沙 甘草  
炒朴 肉桂

煎湯下保和丸三十溫中丸三十抑青丸十九

**廣茂清堅丸**治中滿腹脹內有積堅硬如石形如盤令人坐臥不寧大小便澀滯為喘氣促面色痿黃

厚朴 黃芩 黃連 草薺



益智五分	半夏分	蓬木分	甘草生
紅花一分	柴胡	升麻	吳茱萸
澤瀉分二	神龜分三	歸精分五	青皮分二
陳皮分一	葛根分四		
右對如麻苳大水二盞煎至一盞去香稍熱服忌酒麪			
二服之後中滿減半止有積不消再立方名曰			
朴湯			
厚朴分八	半夏錢一	吳茱萸	肉桂
紅花	黃連分一	桃仁分	蘇木分五
京三稜	芥子	白木	柴胡
葛根不用	甘草生各	歸精	猪苓
乾姜	升麻分四	草苳燕二	澤瀉分六
木香	青皮	陳皮	黃芩分二
昆布少	神龜		
右對如麻苳大作一服依前煎服之禁忌如前服此藥			
二服後前証又減一半却於前藥中加減之			
厚朴分五	黃芩分二	甘草分五	吳茱萸分一
益智分	砂仁分一	苳燕分三	半夏分四
黃芪分四	紅花少	歸精分一	黃連分
右對如麻苳大作一服水二大盞煎至一盞去香稍熱			
服食前忌苦寒藥泄大便又忌魚肉并葷物房事等			
項			
心腹膨脹內多食積所致			
南星半兩	半夏	瓜蒌仁研和	
香附童便	黃連姜炒各	礞石煨	蘿蔔子錢五
麝香少	連翹錢五	右用麪糊為丸	

腹腫不寬滿食肉多  
 黃連兩一 阿魏半兩  
 作糊丸同溫中丸白木湯送下  
 食肉多腹脹用三補丸料內加香附半夏麪蒸餅丸服  
 方見治  
 積氣  
 四炒枳殼丸治氣血凝滯腹內蠱脹  
 枳殼四兩去穢切作指面大塊分四處一兩用芥末  
 黃去黃子一兩同炒黃去芥末一兩同炒黃去芥末一  
 兩用茴香一兩同炒黃去芥末一兩同炒黃去芥末一  
 右用原炒芥末蘿蔔子乾漆茴香四味同水二碗煎至  
 一碗去香者麪糊為丸如桐子大每服五十九食後米  
 飲下  
 腹中承其郎中妹十歲腹脹色不變按之而大陷心腹  
 痞膈病已月餘按甲乙經云三焦脹者氣滿于皮膚中殼  
 然石堅遂與仲景方厚朴生姜二兩半夏七錢甘草半兩  
 人參一錢每用藥一兩五錢水煎分三服一日服之至二  
 十日愈  
 東一斗置鍋內入水約四指用大戟并根苗蓋過盆合  
 之者熟為度去大戟不用旋旋吃東無時東盡決効如神  
 大戟為丸東肉丸每七九泄利小水却快實者  
 沉香交泰丸 治大便燥結  
 沉香 白木 枳實炒 厚朴姜制  
 柴更 白茯苓 澤瀉 陳皮  
 當歸 大黃 青皮 木香  
 右為細木湯浸蒸餅為丸桐子大每服五十九加至七  
 八十九溫湯下食後微利止  
 沉香海金沙丸治一切積聚脾濕腫脹肚大青筋羸瘦



証

海金沙五錢 沉香二錢 輕粉錢一 牽牛木兩一  
右為末研獨科蒜如泥為丸如桐子大每服三十九加  
至五十九煎百沸灯心通草湯空腹送下更量虛實加  
減丸數取利為度

治腫木香散治水腫脹大如鼓或遍身皆腫

木香 大戟 白牽牛各等分

右細末用猪腰子一雙批片摻末在內煨熟空心服之  
如食左腰子則搗左臂如食右腰子搗右臂如腫不能  
全去于肚上透臍滿腹塗甘遂細末却飲甘草水少許  
其腫便去也

香東丸治蠱氣病有十種苦丁香為細末用熟米為丸  
如桐子大每服三十九煎東湯送下空心服之立効三服  
大愈

大愈

病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故厚朴七物湯主  
之

厚朴半斤 甘草 大黃各三兩 大棗十枚

枳實五兩 桂枝三兩 生姜五兩

右七味以水一斗煮取四升溫服八合一日三服區者  
加半復五合 下利去大黃 寒多者加生姜至半斤

寒熱

治脹專主濕熱治法見前補虛行濕條

諸腹脹大皆屬于熱論 此乃八益之邪有餘之証自  
天外而入感風寒之邪自表傳裏寒變為熱作胃實腹病

日哺潮熱大渴引飲譫語是太陽陽明併大實大滿者大  
承氣湯下之少陽陽明微滿實者小承氣湯下之內經曰

泄之則脹已此之謂也又熱論云傷寒變為熱故下之不  
脹者以明寒因寒用故曰下之脹已非陰盛生內寒胃寒  
脹滿之病假令痰瀉為脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣  
傷暑而得之不即時發至秋發者何也暑天當時助正氣  
故邪不能發至秋暮暑氣衰絕而瘧病作矣知其寒也局  
方用交解飲子者是也此天之邪氣雖有餘病痰瀉猶以  
為寒况不足病為脹滿者乎是知腹脹多為寒病也何以  
言之脉經云胃中寒則脹滿靈樞經云夫飲食不節起居  
不時未傳寒中又云腹脹滿胃脘當心而痛上支兩脇兩  
咽不通飲食不下取胃之三理又云濁氣在上則生腹脹  
靈樞經云脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水為脹與內  
經通評虛實論說腹暴滿按之不下取足太陽經絡者胃  
之募也正同又云腹滿腹脹支兩脇脇下厥上冒過在太

六書學問卷之三

手末

陰陽明此乃胃中寒熱糲過也又云太陰之厥則腹滿脹  
脹後不利不欲食食則嘔不得卧按內經所說寒脹多如  
此老夫但略舉其端其病者不悟寒脹之多一切脹滿病  
作熱治之多用三花神佑丸大黃牽牛之類下之或藥病  
不相應立致夭折由是論之當從靈樞素問乎當從俗醫  
胃臆之論乎今立治中滿腹脹寒脹一方熱脹一方評而  
用之使上下分清其氣可也中滿分清湯治寒脹分清  
丸治熱脹二方並見後條

治熱脹

胃中寒則腹脹胃中寒腸中熱則脹而且泄師傳  
適

寒涼者脹下之則脹已五帝政論云東垣沉香  
有金砂丸方見雜案前 陰并于

下則足寒足寒則脹也論

濁氣在上則生腹脹 陰陽應象論云清氣在下則生

發泄濁氣在上則生腹脹此陰陽反作病之逆從也夫腹  
脹者以寒熱溫涼論之此何脹也曰此飲食失節為脹乃



受病之始也濕熱亦能為脹右關脈洪緩而沉弦脈浮于  
 上是風濕熱三脈相合而為病也是脾胃之令不行陰火  
 亢甚乘于脾胃盛則左遷而陽道不行是六腑之氣已絕  
 于外火盛能令母實風氣外絕風氣外絕者是穀氣入胃  
 清氣營氣不行便是風氣也異呼同類即胃氣者是也經  
 云虛則兼其所勝土不勝者肝之邪也是脾胃之土不足  
 木火大勝者也經云濁陰出下竅濁陰走五臟濁陰歸六  
 腑濁陰歸地此平康不病之常道反此則為脹也陰陽論  
 云飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五  
 臟則膜脹閉塞調經篇云下脘不通則胃氣熱熱氣薰胸  
 中故內熱下脘者幽門也人身之中上下有七衝門皆下  
 衝上也幽門上衝吸門吸門者會厭也衝其吸入之氣不  
 得下歸于腎肝為陰火動相拒故咽膈不通致濁陰之氣

六醫學綱目卷二

元

不得下降而大便乾燥不行胃之濕與客陰之火俱在其  
 中則腹脹作矣治在幽門使幽門通利泄其陰火潤其燥  
 血生益新血幽門通利則大便不閉吸門亦不受邪其腸  
 咽得通腹滿腹脹俱去是濁陰得下歸地矣故經曰中滿  
 者瀉之于內此法是也

沉香交泰丸治濁氣在上中擾清腸之氣鬱而不伸以為  
 腹脹服之以利為度方見

右治脈洪便結而脹

范天秩郎中之內八月中先因勞役飲食失節加之憂思  
 氣結病心腹脹滿且食則不能暮食兩脇刺痛診其脈弦  
 而細至夜濁陰之氣當降而不降腹脹尤甚大抵陽主運  
 化飲食於保推傷脾胃陽氣不能運化精微聚而不散故  
 為脹滿先灸中脘乃胃之募穴引胃中生發之氣上行陽

道後以順氣湯助之則濁陰之氣自此而降矣  
 木香順氣湯治濁氣在上則生腹脹

- 木香 蒼朮 草薢 枳實 枳殼
- 厚朴 青皮 蒼朮 益智 陳皮
- 澤瀉 白茯苓 半夏 乾姜
- 吳茱萸 湯泡 各 當歸 人參 各 升麻
- 柴胡 各 分

內經曰留者行之結者散之以柴胡升麻之苦平行少  
 陽陽明二經發散清氣運行陽分為君以生薑半夏草  
 薢益智仁之甘辛大熱消散中寒為臣以厚朴木香  
 蒼朮青皮之辛苦大溫通順滯氣以陳皮當歸人參辛  
 甘溫調和榮衛滋養中氣濁氣不降宜以苦洩之吳茱  
 萸之苦熱洩之者也氣之薄者為陽中之陰茯苓甘平

六醫學綱目卷二

元

澤瀉醃平氣薄引濁陰之氣自上而下故以為佐氣味  
 相合散之洩之上之下之使清濁之氣各安其位也  
 右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去渣溫服食前忌  
 生冷硬物

右治脈弦細胸膈痛而脹

中滿分消湯治中滿寒脹寒疝大小便不通陰燥足不收  
 四肢厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞下焦燥寒  
 沉厥奔豚不收二服愈

- 黃芪 益智 半夏 川烏
- 吳茱萸 草薢 人參 木香
- 青皮 當歸 黃連 厚朴
- 茯苓 澤瀉 生薑 麻黃
- 升麻 柴胡 乾姜 葶藶



黃栢分五

右剉如麻草大作一服水二盞煎至一盞去渣稍熱服食前大忌房勞酒麪生冷硬物油膩

治大人小兒因食果子多而腹脹氣急者肉桂細米飯丸棗葶大每服十九小兒五粒熱水下方

靈樞經云腹滿大便不利上走胃臆喘息喝喝然取足少陰取者瀉也宜以辛熱散之

良姜

肉桂

益智

草薹薤仁

厚朴

升麻

甘草

獨活使

黃栢引用

又方桂枝

桔梗

人參

青皮炒

陳皮

良姜

白朮

澤瀉

吳茱萸

入醫經綱目表言

三九

四肢濕腫宜糝刺先瀉其血結後刺其真經謂刺去其血結是也

治心腹脹滿短氣以草薹薤一兩去皮為細末生薑湯調下五分

太陰所至為畜滿 辨云脾為陰中之太陰又云脾為

陰中之至陰乃為坤元耳古不遷之土天為陽火也地為

陰水也在人則為脾同陰水之化脾有餘則腹脹滿食不

化故無陽則不能化五穀脾虛乃大寒為脹滿故脈經云

胃中寒則脹滿大抵此病皆水氣寒濕為之也治宜大辛

熱之劑必愈然亦有輕重

木香

陳皮去白

胡椒去毒

草薹薤面裹

木香

青皮各

蝟稍去毒

右為細末水調為丸如桐子大每服三十九溫米飲下

忌油膩服白濁百日者一年小兒九如麻子大桑皮皮湯下十九日三服大人陰囊濕腫水冷者用青鹽乾姜白麩各三錢水和膏攤紙上貼

諸脹腹大皆為熱見文 諸病有寒者之如鼓皆屬于熱

中滿分消丸治中滿熱脹鼓脹氣脹水氣脹大熱脹有寒者不治

黃芩炒

黃連各五

姜黃

白朮

人參去

甘草炙

猪苓去皮

白茯苓去

砂仁各二

枳實炒

半夏湯泡

乾姜二錢

厚朴去皮

知母炒

澤瀉二錢

陳皮三錢

右共為細末水浸蒸餅為丸如桐子大每服一百丸焙乾白湯下食後寒因熱用故焙服

有第二小娘食積挾濕手足生瘡腹滿面浮口渴食少

膈滿小便少大便實

大腹皮

乾薑各二

黃芩五

陳皮五錢

厚朴三

川芎各

炙甘草一兩

白朮一兩

木通半

姜三片煎服

南二濕人面浮腫

蒼朮五

黃栢三錢

白朮兩

陳皮二錢

木通二

川芎分五

滑石炒

甘草三錢

厚朴分五

裝孺人年五十二歲氣上膈滿食少此積熱生濕診得左三部滑小右三部微數重取則大者得無積熱為可治之

病

白朮一

青皮三

陳皮

厚朴各五

大腹皮二

片苓炒

木通二

蘇梗



川芎各三錢 桂枝三錢 甘梢一錢

分十貼姜二片煮飲之前查之湯下保和三十丸

經患腹脹滿亦因掘山柅根少許煎水調一盞服 女人血氣腹腫以山柅根末三錢熱酒空心服之

氣分

寸口脉遲而滑遲則為寒滑則為血不足跌陽脉微而遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿腸鳴相逐氣轉勝脫榮衛俱勞陽氣不通即身冷陰氣不通即骨寒陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿名曰氣分

氣分謂氣不流利而脹血分謂血不流利而脹非脹病之外又別有氣分血分之病也蓋氣血不流利則水亦不通利而尿少尿少則腹中水漸積而為脹但氣分心

下堅大而病發于上血分血結胞門而病發于下氣分

先病水脹後經斷血分先經斷後病水脹也血分治法

藏府

腹滿腹脹支兩脇脇下厥上胃過在足太陰陽明全文見

太陰所謂病脹者太陰子也十一月萬物氣皆藏于中故曰病脹脾解

右脾胃脹治法見前補虛行濕條諸方是也

腎氣實則脹全文見治 二陰一陽發病善脹心滿善氣

運氣

運氣脹有七

一曰濕助脾盛而脹經云諸濕腫滿皆屬脾土又云歲土太過甚則飲食中滿又云歲土不及濕乃大行民病腹滿

又云上鬱之發民病心腹脹滿腸鳴又云太陽司天濕下臨濕氣變物水飲內畜中滿不發甚則附腫治以諸熱是也

二曰風攻脾虛而脹經云厥陰在泉風淫所勝病腹脹治以辛涼是也

三曰寒脹經云水太過曰流行流行之紀其病脹又云歲水太過寒氣流行甚則腹大脛腫又云水鬱之發民病痞

堅腹滿又云太陽之勝皮膚痞腫腹滿又云太陰司天之政民病寒濕腹滿身腫附腫三之氣感于寒濕民病附腫胸腹滿治以諸熱是也

四曰燥脹經云陽明之復腹脹而洩治以溫劑是也

五曰寒鬱熱于中而脹經云陽明司天之政初之氣寒雨化其病中熱脹又云太陽司天之政二之氣大涼反至火

氣遂抑民病氣鬱中滿是也

六曰寒熱相薄而脹經云少陰司天之政水火寒熱接于氣交民病腹脹大又云太陰司天之政四之氣寒風曉蒸

蒸熱相搏民病心腹滿熱臄脹甚則附腫是也

七曰火鬱之發脹經云火鬱之發民病胸腹背面首四肢腫臄臄脹是也

治腹滿不能服藥導引方取獨蒜煨熟去皮納下部冷即易

黃帝曰脈之應于寸口如何而脹岐伯曰其脈大堅以

瀦者脹也黃帝曰何以知臟腑之脹也岐伯曰陰為臟陽為腑帝曰夫氣之令人脹也在于血脈之中耶臟腑之內乎岐伯曰二者皆存焉然非脹之舍也帝曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在于臟腑之外排臟腑而邪胸膈脹皮



兩故命曰脹黃帝曰臟腑之在胸脇腹裡之內也若匣  
 之藏禁器也各有次舍異名而同處一域之中其氣各異  
 願聞其故岐伯曰夫胸腹臟腑之郭也膈中者心主之宮  
 城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五竅者間里  
 門戶也廉泉玉英者津液之道也故五臟六腑者各有畔  
 界其病各有形狀帝曰願聞脹形岐伯曰夫心脹者煩心  
 經氣臥不安甲乙經云心輪肺脹者虛滿而喘欬甲乙  
 肺輸主之亦取肝脹者脇下滿而痛引少腹甲乙云肝輸主  
 脾脹者善噦四肢煩倦身重不能勝衣臥不安甲乙云  
 之亦取亦取腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛甲乙云腎輸  
 太倉亦取胃脹者腹滿脘骨痛鼻聞焦臭妨于食大便難甲乙  
 溪亦取大腸脹者脹鳴而痛濯濯冬自重感于寒則  
 食洩不化甲乙云天小腸脹者少腹脹引臍痛甲乙  
 入醫學綱目卷三  
 三焦脹者  
 勝脹者少腹滿而氣痞甲乙云曲  
 氣滿于皮膚中輕然而不堅甲乙云石 勝脹者脇下  
 痛脹口中苦善太息甲乙云陽 凡此諸脹者其道在一  
 明知逆順針數不失瀉虛補實神去其室致邪失正真不  
 可定粗之所敗謂之天命補虛瀉實神歸其室又塞其空  
 謂之良工黃帝曰脹者焉生何因而有岐伯曰衛氣之在  
 身也常然並脈循分肉行有逆順陰陽相隨乃得天和五  
 臟更始四時有序五穀乃化然後厥氣在下榮衛留止其  
 氣逆上真邪相攻兩氣相搏乃合為脹也榮氣循脈衛氣  
 逆為脈脹衛氣並脈循分為膚脹三里而瀉近者一下遠  
 者三下無問虛實工在疾瀉榮衛循脈至此三十九字原  
 忽聞之上有三里而瀉之當有脈脈甲乙云凡 黃帝曰  
 五臟六腑之脹皆取三里當有脈脈甲乙云凡 黃帝曰  
 善何以解或岐伯曰合之于真三合而得帝曰善黃帝曰

脹論言無問虛實工在疾瀉近者一下遠者三下今有其  
 三而不下者其過焉在岐伯曰此言陷于肉直而中氣穴  
 者也不中氣穴則氣內閉針不陷首則氣不行上越中肉  
 則衛氣相亂陰陽相逐其于脹也當瀉不瀉氣故不下三  
 而不下必更其道氣下乃止不下復始可以瀉全烏有殆  
 者乎其于脹也必審其脈當瀉則瀉當補則補如鼓應桴  
 惡有不下者乎亦取  
 刺灸脹有七法  
 其一取血絡經云膚脹先取脹之血絡是也  
 其二取胃經前篇脹論所謂三里而瀉近者一下遠者三  
 下無問虛實工在疾瀉是其一法也又云胃者水穀之海  
 其輪上在氣街下至三里水穀之海有餘則腹滿審守其  
 輪調其虛實又云胃病者腹脹脹取之三里也又云胃足  
 入醫學綱目卷三  
 陽明之脈是動則病黃腫腹脹胃中寒則脹滿視虛熱  
 寒陷下取之是脹病大法皆瀉胃穴三里也  
 其三取脾經云腹滿食不化腹響響不能大便取足太陰  
 又云脾足太陰之脈是動病腹脹噎噎視虛熱寒陷下  
 取之又云脾虛則腹滿腸鳴飧洩取其經太陰陽明少陰  
 血者又云足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走  
 陽明其別者入絡腸胃虛則鼓脹取之所別也是脹之虛  
 者多補足太陰脾穴也  
 其四取腎膀胱經云腎病者腹大脰腫取其經少陰太陽  
 血者又云腎藏志志有餘則腹脹發洩瀉然筋血者又云  
 邪在腎則病腹脹腰痛大便難取之湧泉崑崙是有血者  
 盡取之又云腹滿大便不利腹大亦上走胸膈喘息喝喝  
 然取足少陰又云男子如蠶女子如阻身軀腰脊如解不



欲飲食先取湧泉見血是跗上盛者盡見血也又云脹以  
三陽是脹病多瀉腎經諸穴也  
其五取三焦委陽穴經云三焦病者腹氣滿小腹尤堅不  
得小便窘急溢則水留即為脹取委陽是也蓋不得小便  
則水無所泄其水溢出皮膚腫者為水其水留于腹中獨  
腹脹者為脹也  
其六取肺經云振寒洒洒鼓領不汗出腹脹煩燥取手太  
陰是也

其七取厥病成脹經云陽明之厥腹滿不得臥太陰之厥  
腹滿腹脹少陰之厥腹滿心痛厥陰之厥少腹腫痛腹脹  
盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之是也

鼓脹之狀腹身皆大 膈上下左右各刺二  
通關三里 手 膚脹之狀空而不堅腹身盡腫按之陷而

不起 太白 公孫 復溜 絕骨 三里 分水

腹脹 分水 二寸 氣海 三里 三陰交 人中

腹脹并兩足有水 內庭 五分 臨泣 三分 瀉用香油抹

腹脹暴脹按之不下 中脘 氣海 三里

單壘脹氣喘 水分 在分水旁各一寸半針

又法 分水 三里 行間 內庭 右關 氣海 各灸

腹脹臍突缺盆中滿尻腰腫 大敦 天牖 崑崙

甲寒氣腹滿痞淫澤身熱腹中積聚疼痛衝門主之 腹

滿嚮嚮然不使心下有寒痛商丘主之 腹脹善滿積氣

關門主之 腹中氣盛腹脹逆不得卧陰陵泉主之 腹

脹腸鳴氣上衝胃不能久立腹中痛濯濯冬日重感于寒

則洩當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠

膈急天樞主之 腹中有大熱不安腹有大氣相和按暴

腹脹滿瀉淫澤氣衝主之 腹滿痛不得息正卧屈一膝

伸一股並氣衝針入三寸氣至瀉之 腸中寒脹滿善噫

聞食臭胃氣不足腸鳴腹脹滿腹瀉食不化心下脹三里

主之 大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立

巨虛上廉主之 腹滿不嗜食衝陽主之 寒腹滿脹厲

先主之 男子如蠶女子如阻寒熱少腹偏腫陰谷主之

胃中寒脹食多身熱瘧瘦腹中滿而鳴腹脹風厥胸脇

痞滿嘔吐吞急痛筋變食不下胃輸主之 頭痛食不下

腸鳴臍脹欲吐時泄注三焦俞主之 腹滿臍脹大便泄

意舍主之 臍脹水腫飲食不下多寒胃倉主之 腹滿

不能食刺脊中 寒中傷飽食飲不化五臟脹滿脹心腹

胸脇痞滿臍虛則生百病上脘主之 腹脹不通寒中傷

飽食飲不化中脘主之 水腫水氣行皮中陰交主之

水腫腹大水脹水氣行皮中石門主之 腹滿胃中有熱

不嗜食懸鍾主之

診

臍盛而緊曰脹 平人氣象論。脹論

唇偏舉者脾偏傾脾偏傾則善滿善脹 全文 腹脹身熱

脈大是逆也如是者不過十五日死矣 全文 見診生死下

不可治緊驗 腹大脹四末清脫形洩甚逆也如是

者不及一時死矣 腹脹便血其脈大時絕是逆也 嘔

咳腹脹且發泄其脈絕是逆也 少陰終者面黃齒長而

垢腹脹閉上下不通而終矣 太陰終者腹脹閉不得息

善噫善嘔嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通不通則面

黑皮毛焦而終矣

少腹脹滿



初石 臍下脹滿是也若先臍下滿漸延及臍上滿者亦用此法  
澤漆湯治石水四肢瘦腹腫不帶其脉沉

澤漆 湯去脂 桑白皮 射干 洗 黃芩

茯苓 白朮 各四 澤瀉 防已 各二

右吹咀每服五錢水三盞烏豆一合煎二盞入藥同煎

七分去渣空腹溫服日三

治腹堅脹滿號石水方用白石英十兩搥大豈大以藥

窺盛用好酒三斗浸以泥重封瓶口用馬糞及糠火燒之

長令酒小沸從卯至午即住火候次日煖一中盞飲日可

三度如吃酒少隨性飲之其白石英可更一度燒之

陰陽結邪多陰少陽曰石水少腹脹 腎肝并沉為石

水論 腎脉微大為石水起臍已下至小腹腫歷然上

至胃脘死不治

六 醫家類

石

腸胃寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫

癖而內着惡氣乃起瘕肉乃生其始生也大如鷄卵稍以

益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移

月以時下此其候也

顯露丸治寒傷于內氣凝不流結于腸外又為瘕瘕時

作疼痛腰不得伸

京三稜 廣茂 各一兩 乾漆 五錢 洗去

茴香 三錢 硃砂 四錢 輕粉 一錢 川烏 半兩 地

青皮 三錢 雄黃 另研 川山甲 炮 二 麝香 五分

巴豆 三十粒 去皮同廣茂 三稜

右除另研四味外餘為細末和勻生薑汁糊為丸桐子

大每服二三十丸溫生薑湯送下溫酒亦得食前

烏喙丸治腸覃亦治乳餘

烏喙 炮去皮 半夏 湯洗 石膏 煨 燕蘆 炒  
牡蠣 煨 茯苓 炙 桂心 乾姜 炮  
巴豆 七個 可分

右末蜜丸如葶藶大每服三五丸食後酒飲任下亦治

男子疝病

石 經云石瘕生於胞中寒氣客于子門子門閉氣不得通惡

血當瀉不瀉以留止日以益大狀如懷子月事不以時

下皆生于女子可導而下之

見現丹治寒客于下焦血氣閉塞而成瘕空大必不消

者

附子 四錢 炮 鬼箭羽 三 澤瀉 肉桂

玄胡索 木香 各二 紫石英 一 檳榔 二錢

血竭 錢半 水蛭 炒 一錢 桃仁 湯浸去皮炒

京三稜 到五 大黃 到二錢 同京三

右除血竭桃仁外同為細末和勻用原浸酒打糊為丸

桐子大每服十九丸溫醋湯送下溫酒亦得食前

石莢散治婦人血結胞門或為瘕瘕在腹脇間心腹脹

滿腫急如石水狀俗謂之血蠱

紫石英 兩 歸尾 馬鞭草 各五

烏梅 肉 五 蓮木 炮 三稜 地 蘇木 節

沒藥 琥珀 研 各 甘草 一

右為末濃煎蘇木酒調下二錢不飲酒姜湯調服

問曰病有血分水分何謂也師曰經水前斷後病水名

曰血分此病為難治先病水後經水斷名曰水分此病易

治何以故去水其經自當下 氣分也

寸口脉沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏跌陽脉



治

伏水穀不化脾氣衰則滯滯胃氣衰則身腫少陽脈卑少陰細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名曰血分是也 師曰寸口脈沉而數數則為出沉則為入出則為陽實入則為陰結跌陽脈微而弦微則無胃氣弦則不得息少陰脈沉而滑沉則為在裏滑則為實沉滑相搏血結胞門其澁不瀉經絡不通名曰血分

大黃 四兩 甘遂 炮 阿膠 炒各 右剉散每服三錢水一盞煎至七分去渣溫服其血當下

萬病丸治室女月經不通臍下堅結大如杯升發熱往來下痢羸瘦此為血瘕若生肉瘕不可為也

本草綱目卷之三

先

乾漆 碎炒令出 牛膝 酒浸一宿

生地黃 四兩 右以地黃汁入下二味為末慢火熬候可丸即丸如梧子大空心米飲或溫酒下一丸日再勿妄加病去止藥

女人氣血虛經不行者不可服之

小腹痛大上走胃至心浙浙身時寒熱小便利取足厥陰

石水痛引脇下脹頭眩痛身盡熱關元主之 振寒大腹石水四滿主之 石水刺氣衝 石水章門及然谷主之 又天泉主之

腸腫之狀內着惡氣乃起瘕肉大如鷄卵日以益大其成也如孕推之則移 中極 氣衝 天樞 五福 石瘕之狀生于胞中惡血不通日以益大如孕 陰陵泉

滯氣

去腹中 復溜 腹溫方可去 胎前腹脹 紫蘇飲治妊娠心腹脹滿而脇妨悶 枳殼湯治婦人妊胎腹脹

枳殼 兩 黃芩 一 右為粗末每服五錢水盞半煎溫服

治胎前腹滿身軀沉重枳殼湯中加白朮一兩

婦人懷妊六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者小腹痛如扇所以然者子藏寒故也當以附子湯溫其藏

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰已上重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實刺瀉勞宮及關元小便微利則愈

本草綱目卷之三

中

治產後血與惡露不下因而血脹用杜牛膝碎用水熬成膏去查每服一匙未如再服神効 子母產後穢污不盡腹滿用麻子三兩酒五升煮取一升分溫二服當下惡

物 治產後穢污下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即出

治產後血脹苗葉同功乃益母草子也

紫金丹治產後腫胸中有物狀是鹽氣不降

代赭石 硃砂石 各等分 右為細末醋糊丸桐子大每服三十五丸酒下胸中痛

抵聖湯治產後腹脹滿悶嘔吐不定不可用尋常治腹



止吐藥

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

人參

陳皮

甘草

右咬咀用水一碗生薑焙乾五錢煎至半碗去渣分熟

三服

丹陽禮五婦人產後腹滿暑渴不飲脉却虛

白朮

陳皮

白芍

厚朴

川芎 每服加海金沙一錢

分四貼煎下保和丸九粒

大枳木湯治虛後心腹大如盤

保又方

代赭石

棗仁

大黃

右細末薄荷水調丸三五十九溫水下無時

治產後腹大堅滿不能卧白聖散

大黃

檉柳根

大戟

甘遂

右細末每服二錢熱湯下取大府利為度此主水氣之

妙藥也

用婦人產後餘疾飲食不下胸脇支滿目眩足寒心切痛

善噫聞酸臭脹腹滿小腹尤大期門主之

醫學綱目卷之二十四

醫學綱目卷之二十五

脾胃部

積塊癥瘕 婦人血積 胎前產後積 息積

丹氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血成聚

宜醋煮海石醋三稜莪朮桃仁紅花五靈脂附子之類石

城白朮湯下之 瓦龍子能消血塊又能消痰 治塊當

降火消食積 行死血血塊去後須大補之

石城痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積 塊在皮裏

膜外須用補氣香藥開之兼二陳湯加補氣藥先須斷厚

味凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不退當用消積藥

融化開則自消

垣治積要法 許學士云大抵治積或以所惡者攻之所

喜者誘之則易愈如礪砂水銀治肉積神麩麥蘗治酒積

水蛭重治血積木香檳榔治氣積牽牛甘遂治水積雄

黃膩粉治痰積礪石巴豆治食積各從其類也若用羣隊

之藥分其勢則難取効須要認得分明是何積聚兼見何

證然後增加佐使之藥不爾反有所損要在臨時通變也

治積常察其所痛以知其病有餘不足可補可瀉無逆天

時詳臟腑之高下如寒者熱之結者散之客者除之留者

行之堅者削之強者奪之鹹以與之苦以瀉之全真氣藥

補之隨其所積而行之節飲食慎起居和其中外可使必

已不然遽以大毒之劑攻之積不能除反傷正氣終難復

也醫者可不慎歟

諸積皆本於喜怒傷臟而陰虛陰既虛矣則風雨襲陰之

虛病起於上而生積清濕襲陰之虛病起於下而成積

壯人無積虛人則有之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四時

諸積皆本於喜怒傷臟而陰虛陰既虛矣則風雨襲陰之

虛病起於上而生積清濕襲陰之虛病起於下而成積

壯人無積虛人則有之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四時



有感皆能成積若遽以磨堅破結之藥治之疾似去而人已衰矣乾漆礪砂三稜牽牛大黃之類得藥則暫快藥過則依然氣愈消疾愈大竟何益哉故善治者當先補虛使血氣壯積自消如滿座皆君子則小人自無容地也不問何臟先調其中使能飲食是其本也

丹有婦人三十歲因哭于至半年後胸痞有塊如杯飲食大減面淡黃慘黑若不勝衣六脈弦細虛澁至日晡後則發寒熱予察其事勢已急補瀉兼用以補中益氣湯隨天氣寒暄加減法與東垣痞氣丸相間服方見五積門食前用湯食後用丸常令湯多於丸些少如此近一月寒熱皆退食亦稍進又以丸用湯相等服之至第二月以後忽一夜大發寒熱至天明熱退胸中之塊如失至晚手足下半節皆腫遂停藥三五日後忽一夜手足之腫如失至天明

胸中之塊復有比如前覺小一暈遂以二陳湯加桔梗白朮枳實調理半月而安次年復生一男一婦人四十餘面白形瘦性急因大不如意三月後乳房下貼肋骨作一塊漸漸長大掩心微痛腸悶飲食減四之三每早覺口苦兩手脈微而短瀉予知其月經不來矣為之甚懼辭勿與治思至夜半其婦尚能出外見醫梳粧言語如舊料其尚有胃氣遂以參朮歸芎佐以氣藥作大服一晝夜與四次外以大琥珀膏貼塊上防其長經一月餘服補藥百餘貼食及平時之半仍用前藥又過一月脈氣漸充又與前藥吞潤下丸百餘貼月經不及兩月而至瀉脈減五分之四時天氣熱意其經行時必帶紫色仍與前補藥加醋炒三稜吞潤下丸以抑青九十五粒佐之又經一月忽報塊已消及大半月經及期尚欠平時半日飲食甘美如常但食

醫學綱目卷二五

肉則覺不快予令止藥且待來春木旺時又與區處至次年六月忽報一夜塊大比舊反加大半指脈累弦左畧怯於右至數日平和自言食飽後則塊微悶食行却自平予意有動心事激之問之果然仍與前補藥加黃芩炒黃連以少木通生薑佐之去三稜煎湯吞潤下丸外以琥珀膏貼之半月值經行而塊散此是肺金為內火所燥木邪勝土土不能運清濁相干積塊輪廓尚在首因氣血之未盡復也濁氣稍留舊塊復起補其血氣使肺不受邪木氣平而土氣正濁氣行而塊散矣 方提領年五十六丁丑年冬因飲酒後受怒氣於左脇下與膈平作痛自此以後漸漸成小塊或起或不起則痛痛止則伏而黃口乾無力食少吃此物便噁此味轉惡風寒脈之左大於右弦澁而長大率左甚重取則全弦此得熱散太多以致胃氣太傷

醫學綱目卷二五

三

陰血下衰且與和胃湯以補胃氣滋養陰血并下保和丸助其化粕何胃膏陰血稍充卻用消塊和胃湯方  
人參 白朮 陳皮 芍藥  
歸身 乾葛 紅花 甘藥  
作一貼下保和丸廿五龍膏九十五  
右三法補氣血藥為主磨積出入佐之皆補多於磨乃氣血虛甚而有積塊之法也  
敢村婦人腹下有塊白木湯下保和丸三十五粒  
王郎心痛膈有塊與  
白朮 青皮 芍藥 木通  
川芎 蒼朮 甘草  
作一貼煎下保和丸三十粒  
馮氏女年三十歲形瘦色嫩滋味素厚幼年曾踏雪嘗以



火烘鞋履以致濕熱上襲至廿五歲時口嘗吐清水酸  
醫用丁香等藥時止時作時仍服前藥至當年心痛  
曾痞有塊吃飯即吐此常出三之一遂與佐金丸廿四粒  
以姜湯下之與三十餘次全不進食予曰結已開矣且令  
止藥或口乾思飲止與半盞熟水開以青六九與之雖困  
臥省床尤以絕藥為善如此近四十日診其脈前後此微  
弦重取似澁輕取稍和至此弦脈漸添遂令與人參酒芍  
藥湯引金瀉木漸漸思食而苦於大便秘病家必欲行大  
黃予止之遂以生芍藥陳皮桃仁人參為丸與之用蜜煎  
導大便秘行而食進調理半月而安

參更九即佐金丸加人參一錢是也  
盧子裕左脇下因癢後食肉與酒而成塊  
白木錢 柴胡錢 茯苓錢 枳殼錢五分

人參

作湯下阿魏五保和甘柳青十與點十玫瑰五  
長垣朱郎因酒多年濕病脇上有塊腹滑泄小便黃

滑石兩 白木 三稜各六 陳皮錢五

黃連 猪苓各三 黃芩 木通各二

防風錢 乾姜錢 甘草五分

分七貼煎下保和丸二十

一丈夫壯左邊帶脇上有塊先吃阻食牛乳者成氣痛又  
因酒肉塊大如桃食減三分之一

滑石兩 白木錢 陳皮 三稜三

蘿蔔子 連翹 黃連各一 乾葛二錢

桃仁兩 黃芩錢 甘草錢

右分四貼水煎服

婦人脇下有塊大如掌脈滑時有熱此虛中有氣積先與  
補虛次與磨積藥

白芍 歸脾錢 陳皮 白木三

青皮 川芎 木通各一 甘草錢

白水煎熱服

磨積藥

三稜錢 枳實 青皮 桃仁各五

大黃錢 桂枝半 海藻三錢

細末神麴糊丸如桐子大每服四十九

世一孺人左脇下舊有塊漸長大脈弦而大稍數詢之近  
亦發熱食亦減倦怠先與補之次攻此塊

陳皮錢 白木兩 柴胡 歸頭

青皮錢 甘草錢 木通半

人參錢 枳實三錢

右作八貼服

次與玫瑰 青皮兩半 桃仁錢 三稜兩半

桂枝半 海藻三錢

醋調神麴糊為丸

一丈夫脇下有積塊內有痰熱汗不得泄兩脈大而散軟  
此體有虛

三稜錢 白木 黃連各三 人參二錢

連翹 木通各三 川芎 桂一

甘草五分 水煎下保和丸

富小娘瘡後左脇下塊小便少

厚朴 柴胡錢二 三稜錢 甘草分五

木通錢 白木半 青皮錢 生薑片

右食前熱服



下邳錢郎正月發沙因此臍邊有塊二枚發起則痛伏則不痛有時又隱痛自炙臍中脈甚弦右手伏重取則畧數此蘊熱因春欲汗解而氣弱不能自發為汗復鬱又因食不節邪挾宿食所以成塊宜以保和二十温中二十抑青十用白朮木通三稜湯下

右十一法皆補藥與磨積相半兼服之前七法治飲食酒肉成積後三法治體虛有熱成積也

丹陳里長男廿七歲舊因飽食牛肉草腐患嘔吐又不節飲食右脇下生一塊漸長今大如掌痛發則見痛止則伏其脈弦而數知此人必性急塊上不可按按則愈痛痛則必吐黃酸苦水詢之果然或作腎氣治予曰非也此足太陰有食積與濕痰

荔枝核二枚 山柈五箇 枳實五箇 山查九箇

柴葛九枚 一方有人參

右細研急流水一盞蕩起煎沸入生姜汁令辣食煎熱服與六貼吐二貼服四貼與此藥且止其痛卻與消塊藥

半夏末六錢 皂角六箇 水麥六錢 石城二錢 黃連五錢

已上三件同為細末以糖棗膏為丸如胡椒大

丹一婢色紫稍肥性沉多憂年近四十經不行三月矣小腹中有一氣塊初起如栗漸如炊餅予脈之兩手皆瀋重取卻稍和試令按塊痛甚捫之高寸半遂與千金消石丸至四五次後忽自言乳頭黑且有汁恐是孕予曰非也瀋脈無孕之理又與三五貼脈之稍覺虛豁予悟曰藥大峻矣今止前藥與四物湯倍白朮佐以陳皮炙甘草至三十

貼候服完再與消石丸數次忽自言塊消一暈便令莫服

又半月經行痛甚下黑血半升內有如椒核者數十粒而塊消一半又來索藥以消餘塊予曉之曰勿性急似開矣不可又攻若夫月經行當消盡矣天月經行下少黑血塊

又消一暈又來問藥予曰且守禁忌至次月又消盡已而果然大凡攻擊之藥有病則病受之病邪輕而藥力重則

胃氣受傷夫胃氣者清純中和之氣也惟與穀肉菜菓相宜蓋藥石皆偏勝之氣雖參芪輩為性亦偏況攻擊之藥

乎此婦胃氣弱血亦少若待塊盡而去藥胃氣之存者幾希矣

一婦人年五十五歲形氣俱實富而神勞味厚性急常經水過多醫每用清藥止後病氣痛留腹共有積塊大小十三枚遇夜痛甚着床累月飲食雖減應接家事如故其脈

兩手皆瀋而弱此因屢用清藥致敗血積聚不行故爾時三月間用蜀葵根煎湯再煎人參白朮陳皮青皮甘草稍

牛膝成湯入玄明粉少許研桃仁調熱飲之服至二貼腹痛下塊一枚再并查煎服又下一枚時以病久血耗不敢

再取塊告技窮而歸後忽此症患病雖重其形質尚可受藥但當去莖根玄明粉其後塊漸消而病安

一女子年廿一歲素因食傷胃脘有塊隨氣上塞咽中問之及因食燥鹽配粥與

白朮半錢 陳皮半錢 桔梗半錢

青皮半錢 木通五錢 甘草半錢 生薑二片

煎服一二次病遂平復再與前藥半月後加桔梗煎一服令其吐出痰積遂愈

子和息城司侯聞父死于賊乃大悲哭罷便覺心痛日增



不已月餘成塊狀若覆杯大痛不堪藥皆無功議用燔針  
姓艾病人惡之乃求治于戴人戴人至適巫者在其傍乃  
學巫者雜以狂言以誑病者至是大笑不忍回面向壁一  
二日心中結硬皆散戴人曰內經言憂則氣結喜則百脈  
舒和又云喜勝悲內經自有此法

暴積  
去之

丹呂宗信年六十素好酒八月間因暑熱中得疾兩足冷  
過膝上腕有塊如掌牽引脇痛不可眠臥飲食減半卻不  
渴已自服生料五積散三貼予脈之六脈俱沉清而小按  
之不為弱皆數而右為甚大便如常小便赤色遂用大承  
氣湯減大黃之半而熟炒加黃連芍藥川芎乾葛甘草作  
湯下瓜蒌仁半黃連貝母九至十二貼足冷退至腰塊  
減半遂止藥至半月飲食復舊諸症悉除

唐柳宗元纂救死方元和十二年二月得脚氣夜半痞絕

入醫心方卷之三

八

脇有塊大如石且死因太寒不知人三日家人號哭榮陽  
鄭詢美傳杉木湯服半食頃大下三次氣通塊散其方用  
杉木節一大升橘葉一大升無葉以及代之大服檳榔七  
箇合搗碎之道便三大升共煮取一升半分二服若一服  
得快利停後服

用治卒暴癱腹中有如石刺痛牛膝一大把并葉酒煮飲  
之

外治卒暴癱腹中有物堅如石痛欲死取蒲葶根一小束  
洗淨去水細擘以酒二升漬三宿煖溫服五合至一升日  
三若欲速得服於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒神  
効

右暴積急去條四方如塊除後必用補劑以救其受攻  
之傷也

海萬病紫苑丸療膈腹久患痲痺如梳大及諸黃病  
氣起時上氣衝心繞膈絞痛一切虫咬十種水病十種熱  
病及反胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行時病女人多年  
月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又治十二種風頑  
痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白屑或哭或笑如  
鬼魅所着腹中生瘡腹痛服之皆効

紫苑去苗

吳茱萸湯洗七

苜蓿

柴胡去

厚朴姜制各

茯苓去

皂莢去皮

杜枝

乾姜炮

黃連去

蜀椒去目及閉口

巴豆去皮膜

人參去苦各

川烏去

獨活

防風各

右為細末入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大每服三九漸  
加至五九七九生薑湯送下食後臨臥服有孕者不宜

服具列于後

九

痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下 膿血痢米飲湯  
下 墮傷血閉四肢不收酒下 蛔虫咬心檳榔湯下

氣噎憂噎荷葉湯下 打撲傷損酒下 中毒掃帚  
灰甘草湯下 一切風升麻湯下 寸口虫檳榔湯下

霍亂乾姜湯下 咳嗽杏仁湯下 腰腎痛豆淋酒  
下 陰毒傷寒溫酒下 吐逆生薑湯下 飲食氣塊

麩湯下 時氣井花水下 脾風陳皮湯下 頭痛水  
下 心痛溫酒下 大小便不通葶草湯下 因物所

傷以本物湯下 吐水煎湯下 氣病乾姜湯下 小兒  
兒天平風擋防風湯下 小兒疳痢葱白湯下 小兒

乳食傷白湯下 月信不通紅花酒下 婦人腹痛川  
芎酒下 懷孕半年後胎漏艾湯下 有子氣衝心酒



下 產暈痛溫酒下 血氣痛當歸酒下 產後心痛  
 腹脹滿豆淋湯下 難產益智湯下 產後血痢當歸  
 湯下 赤白帶下酒煎艾湯下 解內外傷寒粥飲下  
 室女血氣不通酒下 子死腹中某子湯下 又治  
 小兒驚癇大小顛狂一切風及無孕婦人身上頑麻狀  
 如虫行四肢俱腫呻吟等疾 楊駙馬患風氣衝心飲  
 食吐逆遍身枯瘦日服五九至二十日瀉出肉塊如蝦  
 蟬五六枚白膿二升愈 趙侍郎先食後吐目無所見  
 耳無所聞服五十日瀉出青蛇五七條四寸許惡膿三  
 升愈 王氏患大風病眉髮墮落掌內生瘡服之半月  
 瀉出癩虫二升如馬尾長寸許後愈 李靈惠肥氣病  
 日服五九經一年瀉出肉蟹一枚愈 黃門李中風病  
 發時服藥泄出惡膿四升赤黃水一升一肉虫如亂髮  
 愈 李知府妻梅氏帶下病七年血崩不止骨疼着床  
 日服五九至十九五九取下膿血五升黃水一升肉  
 塊如鷄子狀治愈一切萬病如神惟有孕者不宜服  
 局溫白丸治心腹癰塊久癥積聚大如杯枕黃疸宿食朝  
 起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩  
 脇十種水氣八種痞塞翻胃吐逆飲食嗜塞五種淋疾九  
 種心痛積年食不消化或連年瘧疾不瘥及療一切諸風  
 身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及瘡七十  
 二種風三十六種遁尸疰忤及顛癇及婦人諸疾斷續不  
 生帶下淋瀝五邪失心憂愁思慮飲食減少月水不調及  
 腹中一切諸疾連年癩瘦因驚或歌或笑如鬼所使但服  
 此藥無不除愈即前萬病紫苑方減羌活獨活防風  
 萬病丸療八種痞病五種癰病十種疰忤七種飛尸十二

種癩癩五種黃病十二種瘧疾十種水病八種大風十二  
 種痺并風入頭眼翳膜淡漠及上氣咳嗽喉中如水雞聲  
 不得臥飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消壅閉不通心  
 腹脹滿及胸背鼓脹氣結四肢流入胸腹又治心膈氣滿  
 時定時發十年二十年不瘥五種下痢疰忤虫寸白諸  
 虫上下冷熱久積痰飲令人多眠睡消瘦無力陰入骨髓  
 便成漏疾身體氣腫飲食嘔逆腰腿痠疼四肢沉重不能  
 久行久立婦人因產冷入子臟臟中不淨或閉塞不通包  
 中瘀血冷滯流出不盡時時疼痛為惡或因此斷產并小  
 兒赤白下痢及狐臭耳聾鼻塞等病服此藥以三九為一  
 劑不過三劑其病悉除說無窮盡故稱萬病丸  
 牛黃 研 黃芩 去 芫花 醋炒 禹餘糧 醋炒  
 雄黃 研 馬驚 人參 去 紫苑 醋炒  
 蒲黃 炒 麝香 研 當歸 去 桔梗 去  
 大戟 炒 乾姜 炮 防風 去 黃連 去  
 朱砂 研 犀角 鎊 前胡 去 巴豆 去  
 細辛 去 葶藶 炒 肉桂 去 茯苓 去  
 桑白皮 炒 芍藥 川椒 去 目及開口  
 甘遂 各 一 蜈蚣 去 頭足 芫青 去 二十八  
 米同炒 黃 石蜥 去 頭尾 足  
 色去頭足 石蜥 去 頭尾 足  
 右為細末入研藥勻煉蜜為丸如荳大若一歲已下小  
 兒有疾者令乳母服兩小荳大亦以吐利為度近病及  
 卒病多服積病久疾即少服常服微瀉利為度 卒病  
 欲死服三九取吐利即瘥 卒中惡口噤服二九漿水  
 下利即瘥 五疰鬼刺客忤服二九 男女邪病歌哭  
 腹大姪娠者服二九日三夜一間食服之 蠱毒吐血



腹如刺服二九不瘥更服 瘡病未後前服一九未  
 更服 諸有痰飲者服三九 冷癖日三服每服三九  
 皆間食常令微瀉利 宿食不消服二九取利 癥瘕  
 積聚服二九日三服 拘急心腹脹滿心痛服三九  
 上氣嘔逆胸膈滿不得臥服二九不瘥更服 大痢服  
 二九日二服 疔瘰服二九或一九如杏仁大和醋二  
 合灌下部中 水病服三九日再服間食服之瘥止  
 人弱即隔日服 頭痛惡寒服二九覆取汗 傷寒天  
 行服二九日三服間食服之 小便不通服一九不瘥  
 明日更服 大便不通服三九又內一九下部中即通  
 耳聾停急以綿裹如棗核塞之 臭舛服一九 癰  
 腫疔腫破腫內一九如麻子大日一傳之赤根自出  
 犯疔腫血出以猪脂和塗有孔則內孔中瘥 癰瘡以  
 醋洗訖取藥和猪脂傳之 漏瘡有孔以一九內孔  
 中和猪脂傳上 痔瘡塗綿筋上內孔中即瘥 癩癧  
 以醋和塗上瘥 癰瘡以布指令汗出以醋和塗上日  
 一易瘥 胸背腰脇腫以醋和傳腫上日一易又服二  
 九 諸冷瘡積年不瘥者以醋和塗之 惡刺以一九  
 內瘡孔中即瘥 頭蛇蟻以少許內瘡處若毒入腹心  
 煩欲絕者服三九 蜂螫以少許傳之瘥 婦人諸疾  
 胞衣不下服二九 小兒驚癇服一九如米許以塗乳  
 令小兒啣之看小兒大小加減 兒客忤服一九如米  
 大和乳塗乳頭令啣之以意量之 蝎螫以少許傳之  
 瘥 小兒乳不消心腹脹滿服一九如米許塗乳頭令  
 啣之即瘥  
 羅乾柿九取虛實積下隔甚妙

朱砂研為 沒藥研 猪牙皂角去皮花子  
 乾姜研為末 乾漆炒烟盡 京三稜研為末 輕粉一錢  
 青礞石各一錢 木 巴豆三十粒去皮  
 水銀一錢 右件各研勻軟飯和為丸如菹荳大煎柿蒂湯冷下三  
 五九加減用婦人有胎不可服  
 小腸移熱於大腸為久癖為沉俗文見診  
 干消石九治瘰癧  
 硝石六錢 大黃八錢 人參 甘草各三錢  
 右各為末先將硝黃末以三年苦酒先煎候將乾却用  
 參甘二末和勻為丸每三十九米湯下四日一服候下  
 如雞肝或如米泔赤黑色等効下後忌風冷  
 羅醋養三稜九治一切積聚不拘遠年近日治之神効  
 京三稜四兩醋浸透 川芎二兩  
 大黃半兩醋浸透  
 右三味同為末醋糊為丸如桐子大每三十九溫水下  
 不拘時病甚者一月効小者半月効  
 羅神功助化散專治男子婦人腹中痞塊不拘氣血食積  
 所成此方之妙不可盡述  
 地漏蓄五錢 瞿麥五分 大麥蘖五錢 神麩二錢  
 沉香半錢 木香半錢 甘草五分 大黃二兩  
 右為細末淨依分兩和勻男以甘草淡竹葉二味等分  
 煎湯及無灰酒同調服酒多於湯 婦人用紅花燈心  
 當歸等分煎湯及無灰酒同調服酒多於湯忌油膩動  
 氣之物及房事一月藥須用黃昏服大小便見惡物為  
 度神妙非常誓不輕傳匪人



聖散子治遠年積塊及婦人乾血氣

礪砂六兩 大黃八兩 麥蘖六兩 乾漆燒

菖蒲 茴香炒 檳榔各一 如婦人乾血

氣加川山甲二兩

右為細末每服三錢溫酒調下仰臥此藥只在心頭至

天明大便如魚腸小便赤為驗取出並無毒有神効小

兒用一錢十五已上五錢空心服之更効

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注於大經

血氣稽留不得行故宿昔而成積矣全文

海紅九子治大人脾積氣滯胸膈滿悶而黃腹滿脹四肢

無力酒積不食乾嘔不止脾連心胸及兩乳痛婦人脾血

積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不

嗜飲食漸成脾虛不拘老少並宜服之

八醫學綱目卷三五

京三稜五斤水浸軟分 蓬朮五斤 陳皮五斤

青皮五斤 胡椒三斤 乾姜二斤

右研六味同為細末醋糊為丸桐子大礪紅為衣每三

十九食後姜湯吞下

羅雞瓜三稜九治五臟疰疢氣塊

雞瓜三稜 石三稜 京三稜 木香

青皮去 陳皮去 檳榔

肉苳菹各一

右為細末生薑汁麩糊為丸桐子大生薑湯送下

礪砂煎九消積磨塊一切凝滯

黑附子二枚各重五錢已上者 木香三錢

草撥一兩 礪砂三錢 開納在食內火上煨乾

破故紙一兩 煨乾

右將飛過礪砂末封在附子壳內却用剉出附子末蓋

口用和成白麵製約半指厚慢火灰內燒勻黃色去麩

用木香等為細末卻用元裝附子熟黃麩為末醋調煮

糊為丸如桐子大每服十五丸至三十九生薑湯送此

藥累有奇功

本治癥九治丈夫女人小兒年深日近沉積癥塊面色青

黃時上搶心吐水吞酸舌生白沫婦人積年月經不調漸

成血氣或血蠱塊中焦之間覆如杯碗連年累月漸成瘦

瘵寒熱往來一切脾胃受寒久不癒愈之疾並皆治之

巴豆五兩去 蓬朮三兩 京三稜 厚朴三兩

丁香皮二兩 木香一兩 丁香半兩 厚朴三兩

石菖蒲二兩 良姜一兩 薑半兩 川牛膝一兩

香附子四兩 石蓮子兩 薏苡仁兩 史君子去

八醫學綱目卷三五

右為細末稀麩糊為丸如菖蒲大積年癥癥成塊者第

一服用熱水下二十九自後每日三九五九更量虛實

加減與之五日去盡積塊若近脾胃有積者每服五九

米飲吞下一服取効婦人血氣成塊及血癥每服二十

丸用蘇木酒重下小便各一半煎五七沸令溫空心吞

下自後每日用溫酒下三九其血塊逐旋消從大小便

去盡自知小兒就重腹痛不能忍日夜叫喚百藥不救

者陳皮湯下七九立効諸虫皆宜下管服或白湯或姜

湯下三五丸中酒及酒積大便鮮臭者白湯與酒各半

吞十九立効如神一切咽塞心下硬痛皆用棗湯下五

丸不拘時候

寒熱通 用方 羅玄胡索九治吐利腹脹心腹癆瘵氣結虫煩不安順

三焦和脾胃



女胡索 當歸 青皮白 雄黃  
 廣茂炮 木香 檳榔 京三稜炮  
 右為細末入雄黃末水糊為丸桐子大生薑湯下  
 荆蓬煎丸破痰癖消癥塊冷熱積聚胃膈症悶通利三焦  
 升降陰陽順氣消食

京三稜 二兩酒浸多 枳殼炒一 廣茂 二兩醋  
 日夏一日已上二味同以去皮巴豆 沒冬三  
 二十箇銀器內炒令黃色不用巴豆 木香 根  
 青皮白 茴香 檳榔  
 右為細末水糊為丸豌豆大每服三十九生薑湯下  
 丹潤下丸治積塊方塊  
 世二賢散消積塊進食  
 橘紅一斤 甘草四 鹽半  
 右用水二四碗從早煮至夜以爛為度水乾則添水晒

乾為末淡姜湯調下有塊者加姜黃半兩同煎藥煮  
 氣滯加香附二兩同煎藥煮 氣虛者加沉香半兩另  
 入噤口痢加蓮肉二兩去心另入  
 右自久積緩除條至此一十六方皆純是虛積之劑必  
 用補氣血藥相兼服之純用之致死乃醫殺之也謹之  
 驚風成塊者妙應丸加川山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索  
 蓬木各四錢每五十九加至七十九以和為度

世酒積方累効  
 烏梅肉一 半夏麩七 青木香四 枳實半  
 砂仁兩 杏仁錢 巴霜錢 黃連酒浸一兩  
 石膏 黃芩 升麻 為末沙糖調服  
 丹茶癖喜吃茶及吃乾茶者

世酒積方累効  
 烏梅肉一 半夏麩七 青木香四 枳實半  
 砂仁兩 杏仁錢 巴霜錢 黃連酒浸一兩

右為末蒸餅丸菴葶大每八九白湯送下  
 褚澄傳云澄善醫為吳郡太守百姓李道念以公事到郡  
 澄見謂曰汝有重病答曰舊有冷病至今年久眾醫不瘥  
 澄為診曰汝病非冷非熱當是食白淪雜子過多所致令  
 取蒜一升煮食吐一物如升涎聚之開看是雞雞羽翅爪  
 距具足能行走澄曰此未盡更服餘藥又吐得如何者有  
 十三頭而病都瘥  
 衍有人病心腹漣煩彌二歲診曰腹有蟲誤食髮而然令  
 餌雄黃一劑少選吐一蛇如擗指無日燒之有髮氣乃愈  
 此殺毒虫之驗也  
 右二方吐虫積之法也  
 丹治食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩運身  
 熱時作時止

黃連一兩半用紫萸湯浸 山梔半兩 川芎  
 神麩 桃仁去 三稜 蓬木各半兩  
 香附 山查 蘿蔔子  
 右麵糊丸又方有青皮半兩白芥子一兩半炒  
 治脇痛有塊龍膏丸方見治虛實加姜黃 桃仁各半  
 右蜜丸服

世小阿魏丸治脇下積塊  
 三稜 蓬木 青皮 胡椒  
 木香 麝香 阿魏  
 右為末醋煮陳倉米粉為丸桐子大

子 和菓園劉子平妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絕  
 諸法無措戴人令一月之內涌四次下六次取去痰約一  
 二桶其中不化之物有如葵葉煮爛魚腸之狀涌時以木



如意攪之覺病積如括漸漸而平及積既盡塊痕反窪如  
臼岩無少損至是而面有重色經水復行若當年少可以  
有子

丹治塊在何部分 在中為痰飲 在右為食積 在左

阿魏丸去諸積 潤下丸治痰積

山查 南星 半夏 麥牙 瓜蒌 黃連 連翹 阿魏 神麩 貝母 風化硝 石減 胡黃連 白芥子 蘿蔔子 右為九姜汁浸吹餅九一方加香附粉治嗽

羅破積導飲丸治內有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

木香 檳榔 陳皮 青皮 枳殼 枳實 廣茂 京三稜 半夏 神麩 麥蘗 茯苓 乾姜 澤瀉 甘草 牽牛頭末 巴豆 右為細末入巴豆霜令勻生薑汁打麩糊為丸如桐子

大每服三十九溫姜湯送下食前

無小三稜煎治食癥酒痞血癥氣塊時發刺痛全不思食

積滯不消心腹堅脹嘔噦噎酢吞酸

京三稜 蓬朮 芫花 右同入甕器中用米醋五升浸滿封器口以炭火煨令

乾取出稜不將芫花以餘醋炒令微焦焙乾為末醋糊

丸如菘菹大每十五丸生薑湯下

羅神効五食湯丸取虛實積氣食盡脹積塊水氣年深痞

痰並皆治之

大戟 甘遂 胡椒 芫花 巴豆 右件除巴豆并羅為末入巴豆再研勻水熬麵糊為丸

如菘菹大每服五七丸氣實者十九夜臥水一盞入白

米白麩黑菘生菜猪肉各少許煎至半盞去香候湯溫

下藥取下病忌油膩粘滑物婦人有胎者不可服

必効療癰取車下李仁微湯退去皮及並仁者與乾麩相

并搗為餅如麩乾和淡水如常沒麩法作餅大小一如病

人掌為二餅微炙黃至熟空腹食一枚當大利如不利更

食一枚或飲熱粥汁以利為度若至午後利不止即以

飲止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病

盡為限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉等無不効

丹保和丸治食積酒積 阿魏丸治肉積及飽食停滯胃壯者宜此脾虛者勿服

山查 蘿菘子 神麩 麥芽 陳皮 青皮 香附 阿魏 木香 川茴香 青皮 廣茂 陳皮 蘿菘子 補骨脂 葶藶 砂仁 神麩 麥蘗 枳殼 牽牛 檳榔 右為細末麩糊為丸如桐子大食後每服三十九細嚼



白苳薏仁一枚白湯送下

丹治血塊丸

海粉

紅花

五靈脂

香附

石城

三稜

蓬朮

桃仁

右為丸白木湯吞下

木主癥積滿腹諸藥不瘥者取白馬尿服之愈

世治腹中有塊猪腰子一雙切薄片木繫子肉一兩與猪

腰片相間縛定外用濕紙包火內煨熟取出紙搗盆內

搗如泥入黃連末和為丸每服廿九烏梅甘草湯吞下第

二服廿五九三服三十九漸加至以痛為度大便利其塊

自消有神効

難病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故

陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚

入醫學綱目卷五

三

故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其始發

有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚

者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處故

謂之聚故以是別知積聚也

仲病有積有聚有聚氣何謂也師曰積者臟病也終不移

聚者腑也發作有時展轉痛移為可治聚氣者脇下痛按

之則愈復發為聚氣

素青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支脈名曰肝

痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭脈暗是也

難肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令

人發欬逆噎噎連歲不已以季夏戊巳日得之何以言之

肺病傳肝肝常傳脾脾夏適王王首不受邪肝復欲還

肺肺不肯受故留結為積故知肥氣以季夏戊巳日得之

肝脈微急為肥氣在脇下若覆杯

素赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時言於食名曰

心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之

有少腹盛上下左右皆有根此為何病可治否岐伯曰病

名曰伏梁帝曰伏梁何因而得之岐伯曰聚大膿血居腸

胃之外不可治治之每切按之致死帝曰然何以故岐伯

曰此下則因陰必下膿血上則迫胃脘生膈俠胃脘內瘕

此久病也難治居膈上為逆膈下為從勿動亟奪

膈而痛是為何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於

大腸而著於脊背之原在膈下故環膈而痛也不可動之

動之為水瀦瀦之病

入醫學綱目卷五

三

難心之積名曰伏梁起膈上大如臂上至心下久不愈令

人病煩心以秋庚辛日得之何以言之腎病傳心心當傳

肺肺秋適王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受故留結

為積故知伏梁以秋庚辛日得之

心脈微緩為伏梁在心下上下行時唾血

女子同法得之疾使四肢汗出當風是也

難脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢

不收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬癸日得之何以言之

肝病傳脾脾常傳腎腎以冬適王王者不受邪脾復欲還

肝肝不肯受故留結為積故知痞氣以冬壬癸日得之

脾脈微大為痞氣腹大臌血在腸胃之外

入醫學綱目卷五

六



素白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中喘而  
虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也五藏生虛管也  
難肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久不已令人洒  
浙寒熱喘咳發肺壅以春甲乙日得之何以言之心病傳  
肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺復欲還心心不  
肯受故留結為積故知息賁以春甲乙日得之六難  
肺脈滑甚為息賁主氣全文見

素黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺  
得之沐浴清水而臥是也  
難腎之積名曰黃脈發於少腹上至心下若豚狀或下或  
上無時久不已令人喘逆骨瘦少氣以夏丙丁日得之何  
以言之脾病傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎  
復欲還脾脾不肯受故留結為積故知黃脈以夏丙丁日  
得之六難

腎脈微急為沉厥奔豚足不收不得前後全文見治  
肝之積肥氣丸治積在左脇下如覆杯有頭足久不愈  
令人咳逆瘖瘖連年不已

厚朴兩 黃連七 柴胡二 椒去目四錢  
巴苳霜五分 川烏地皮一分 乾姜五分  
皂角去皮一錢半 白茯苓半錢 廣茂一錢  
昆布 人參各二 甘草三  
右除茯苓皂角巴苳外為極細末再另研巴苳霜旋旋  
入和勻煉蜜丸如桐子大初服二九一日加一九二日  
加二九漸加至大便微溏再從兩九加服周而復始積  
減大半勿服  
右後積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在各條

下秋冬加厚朴一半通前重一兩減黃連一錢半若治  
風痼於一料中加人參茯苓葛蒲各三錢黃連只依春  
用七錢雖秋冬不減淡醋湯送下空心服  
加減肥氣丸 仲夏合此治同前

柴胡 厚朴各半 黃連一 川椒  
甘草各五 巴霜三 乾姜兩 肉桂二  
人參兩 川烏三

右除巴苳末外同為細末旋入巴霜研勻煉蜜丸如桐  
子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便  
微溏再從二九加服淡醋湯下空心服利大便秘行秋冬  
去生薑半錢加厚朴一倍減黃連一半  
心之積伏梁丸治起膈上大如臂上至心下久不愈令人  
心煩

黃連一兩 人參兩 厚朴去皮姜黃各三錢  
肉桂錢 乾姜 巴苳霜 川烏地皮各五  
分 紅苳 茯苓各一錢 丹參一錢

葛蒲五分  
右除巴苳霜外為末另研苳霜旋入和勻煉蜜為丸如  
桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大  
便微溏再從二九加服淡黃連湯下食達周而復始即  
減半勿服秋冬加厚朴半兩通前共一兩減黃連半兩  
只用一兩黃芩不用  
脾之積痞氣丸氣在胃脘腹大如盤久不愈令人四肢不  
收發黃疸飲食不為肌膚  
厚朴兩 黃連去八錢 吳茱萸洗三錢 黃芩二  
白茯苓末另為澤瀉各一 巴苳霜四分 乾姜炮一錢



白朮二錢 川烏炮五分 人參一錢 茵陳半錢  
縮砂半錢 桂四分 川椒分五

右除巴苳霜茯苓另研為末旋入外餘藥同為細末煉蜜為丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便微溏再從二九加服淡甘草湯下食達周而復始積減大半勿服

加減痞氣丸 孟秋合此

黃芩酒製三分 厚朴錢一 黃連酒製五分 半夏各五分

益智分三 吳茱萸分三 紅花分五 青皮分二

歸尾分三 澤瀉分五 茯苓分二 神麴分二

廣茂分三 昆布分二 橘皮去白分三 熟地分二

人參分二 附子分三 甘草分二 巴苳霜分二

葛根分二

大醫學綱本主 言

右為末蒸餅為丸桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便微溏再從二九加服淡甘草湯送下

肺之積息奔丸 治左右脇下覆大如杯久不已令人酒浙寒熱喘咳嗽發肺癰

厚朴姜製八錢 黃連炒三分 乾姜炮一兩 桂枝去皮一錢

巴苳霜分四 白茯苓錢一 川烏炮去皮一錢 川椒去汗分半

人參錢二 桔梗錢一 紫苑去苗半錢 青皮分五

陳皮錢一 京三稜炮 天門冬錢一 白苳霜各一錢

右除茯苓巴苳霜旋入外餘藥為末煉蜜丸如桐子大每服二九一日加一九二日加二九加至大便微溏再從二九加服煎淡生薑湯送下食達周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴五錢通前一兩三錢黃連減七錢

用六錢

加減息奔丸 仲夏合此其積為病寒熱喘咳氣上衝膈瀆失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒熱相參氣分寒則分熱治法宜益元氣洩陰火破氣削其堅也

川烏錢一 乾姜錢一 人參錢二 陳皮錢八

黃連酒製一兩 紫苑錢一 桂枝錢二 巴苳霜分四

厚朴半錢 青皮分七 川椒炒去汗半錢 紅花分五

茯苓半錢 桔梗錢一 白苳霜錢一 京三稜半錢

天門冬錢一

右件為末湯泡蒸餅為丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九加至大便微溏為度再從二九加服煎生薑湯送下食前忌酒濕麪辛辣生冷之物

腎之積奔豚丸發於小腹上至心下若豚狀或上下無時

大醫學綱本主 言

久不已令人喘逆骨疼少氣及治男子內結七疝女子瘕聚帶下

苦棟酒製三錢 黃連炒五分 白茯苓錢二 澤瀉錢二

川烏炮五分 芎藭錢二 玄胡索錢一 全蝎錢一

附子錢一 巴苳霜分四 厚朴姜製七錢 獨活錢一

丁香分五 肉桂分三

右除巴苳霜茯苓另為末旋入外餘藥為細末煉蜜丸如梧子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便微溏再從二九加服淡薑湯送下食達周而復始病減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前一兩二錢如積勢堅大先服前藥不減於一料中加存性牡蠣三錢而帶勿加 如大積大聚消其大半乃止藥過劑則死 如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先服本



藏積藥諸疾日愈是治其本也餘積皆然如服藥人  
覺熱加黃連如服藥人氣短加厚朴如服藥人悶  
亂減桂

溼肝之積伏梁溫白九加柴胡川芎治之心之積肥氣

溫白九加菖蒲黃連桃仁治之脾之積痞氣溫白九加

吳茱萸乾姜治之肺之積息奔溫白九加人參紫苑治

之腎之積奔豚溫白九加丁香茯苓遠志治之方見前

丹黃芩六君子十餘歲左脇有塊能飲食

青皮細切 三棱 柴胡三 桂枝

川芎 防風各二 白木半錢 木通半錢

海藻錢一 甘草錢一

右分七貼煎取半盞下保和丸十五粒忌一切

無肥氣丸治肝之積氣三脇下如覆杯其脈弦而細

青皮炒 當歸各 蒼朮各一兩半 蛇含石各一兩

分 蓬木 三棱 鐵砂粉各一兩

右為末醋煑米糊丸葉昔大每服四十九當歸酒下

治伏梁在心下結聚不散用桃奴三兩為末空心溫酒

調下桃奴是桃實着樹不落者正月採樹上乾桃子是也

本治肺喘久不愈為息音五靈丸

五靈脂二兩 木香半兩 馬兜鈴去壳炒

右為細末葱肉和丸如桐子大每服二十九生薑湯下

日三

肺之積名曰息奔在右脇下大如杯令人洒浙寒熱喘嗽

發肺癰重膏丸

葶藶 陳皮 桔梗各等

右下二味為末入葶藶研勻煑肥葱肉和丸如桐子大

每服五七丸飲下子嘗患停飲久漬肺經食已必噎喘

覺肺系大急服此良驗

定喘急肺積葶藶丸

苦葶藶一兩 當歸 肉桂 白茯苓

驚甲 川烏頭 乾姜 吳茱萸

大杏仁 茯苓 人參各五 枳殼一

右為細末煮葶藶肉和枳九如桐子大每服二三九生

薑湯下日四服不拘時候

師曰奔豚病從小腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從

驚恐得之故越人曰驚者神上越也仲景謂奔豚從驚得

神上越也奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

甘草 芎藭 當歸各二 半夏四

黃芩二 生薑二 芍藥二 乾薑三錢

甘草根白皮一

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

扶苓桂枝甘草大棗湯治臍下悸欲作奔豚 桂枝加桂

湯治奔豚氣從小腹上至心此上二方

無散聚湯治有塊痛無常處展轉動移

半夏 枳殼 當歸各一 陳皮

杏仁去皮 桂心各二 茯苓 甘草炙

附子炮去 川芎 枳殼炒 吳茱萸湯

厚朴姜製各 右劉散每四錢水一盞半煎七分去渣食前服



運氣積塊皆從濕土經云土太過曰敦阜敦阜之化甘滯積并積是也

聖方

琥珀膏貼塊

又貼塊三聖膏用石灰十兩細

篩過炒紅急用好醋煨成膏入大黃末一兩官桂末半兩

攪勻以瓦器封貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者

又貼塊

白鴿糞

白芷

硫黃

白炭

木燻子肉

右為木用麩水調和傳患處

貼積聚塊

大黃

朴硝

各為末大蒜搗膏和勻貼之

集驗射療吳茱萸三升碎之以酒和煮熟布裹熨臍上

冷更炒更昔用之癥移走逐射之候消乃止

黃帝曰人之善病腸中積聚者何以候之少俞答曰皮

肉薄而不澤肉不堅而淖澤如此腸胃惡則邪氣留止

積聚乃傷脾胃之間寒溫不次邪氣稍至稽積留止大聚

乃起

胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則能推而外之內

而不外心腹積也

人病有沉滯久積聚可切脈而知之耶然診病在右脇

有積氣得肺脈結脈結甚則積甚結微則氣微診不得肺

脈而右脇有積氣者何也然肺脈雖不見右手脈當沉伏

其外痼疾同法耶將異也然結者脈來去時一止無常數

名曰結也伏者脈行筋下也浮者脈任肉上行也左右表

裏法皆如此假令脈結伏者內無積聚脈浮結者外無積

聚

疾有積身腫不結伏有積疾脈不浮結為脈不應病病不

應脈是為死病也

仲諸積大法脈來細而附骨者乃積也寸口積在胸中微

出寸口積在喉中關下積在臍傍上關上積在心下微下

關積在少腹尺中積在氣衝脈出在左積在左脈出在右

積在右脈兩出積在中央各以其部處之

蓋大陰瀆則病積心腹時滿厥陰瀆則病少腹積氣少陰

瀆則病積少陽瀆則病積時筋急目痛

善頭疾少陽瀆則病積時筋急目痛

而橫曰脇下有積腹中有積積痛

脈左手脈橫微在左右手脈橫微在右脈頭大者在上頭

小者在下 脈遲而滑中寒有癥結偏得洪實而滑為積

弦緊亦為積為寒痺為疝痛內有積不見脈難治見一脈

相應為易治諸不相應為不治 脈弦腹中急痛腰背痛

相引腹中有寒疝瘕脈弦緊而微細者微也大寒痺瘕瘕

積聚之脈皆弦緊若在心下即寸弦緊在胃脘即關弦緊

在臍下即尺弦緊 脈弦小者寒痺

心肺有積痺其脈皆喘數經云赤脈之至也喘而堅診曰

有積氣在中名曰心痺白脈之至也喘而浮上虛下實有

積氣在胸中喘而虛名曰肺痺是也

肝有積其脈弦長而青經云青脈之至也長而左右彈有

積氣在心下支脈名曰肝痺是也

脾腎有積其脈皆大經云黃脈之至也大而虛有積氣

在腹中黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰

腎痺王註云上謂寸口是也

藏府條



三部之積

脈診人心腹積聚其脈堅強急者生虛弱者死 脈弦而

伏者腹中有積不可轉也必死不治

黃帝問曰夫百病之始生也皆生於風雨寒暑清濕喜

怒喜怒不節則傷臟風雨則傷上清濕則傷下三部之氣

所傷異類願聞其會岐伯曰三部之氣各不同或起於陰

或起於陽請言其方喜怒不節則傷臟臟傷則病起於陰

也清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上是謂三

部至於其淫泆不可勝數百病始生是故虛邪之中人

也始於皮膚皮膚緩則腠理開開則邪從毛髮入入則抵

深深則毛髮立毛髮立則淅然故皮膚痛留而不去則傳

舍於絡脈在絡之時痛於肌肉其痛之時息大經乃代留

而不去傳舍於經在經之時洒淅善癢留而不去傳舍於

輸在輸之時六經不通四肢則肢節痛腰脊乃強留而不

入醫學綱目卷三

二十

風雨寒

去傳舍於伏衝之脈在伏衝之時身重身痛留而不去傳

舍於腸胃在腸胃之時胃鬱腹脹多寒則腸鳴飧洩食不

化多熱則瀉出糜留而不去傳舍於腸胃之外募原之間

已上數端皆邪氣襲虛留而不去去以次相傳未曾留

者無有定所若留者而有定所則不能傳矣所謂留者

者當如下文法云  
留者於脈稽留而不去息而成積或着孫脈或着絡脈或

也似陽明之積飽食則痛飢則安 其着於腸胃之募原

也痛而外連於緩筋飽食則安飢則痛 其着於伏衝之

脈者揣之應手而動發手則執氣下於兩股如湯沃之狀

其着於齊筋在腸後者飢則積見飽則積不見按之不

得 其着於輸之脈者閉塞不通津液不下孔竅乾壅此

邪氣之在外入內從上下也此謂風雨寒暑清濕之虛

黃帝曰積之始生至其已成奈何岐伯曰積之始生得寒

乃生厥乃成積也黃帝曰其成積奈何岐伯曰厥氣生足

惋足惋生腰寒腰寒則血脈凝滯血脈凝滯則寒氣上入

於腸胃入於腸胃則腸脹腸脹則腸外之汁沫迫聚不得

散日以成積卒然多食飲則腸滿起居不節用力過度則

絡脈傷陽絡傷則血外溢血外溢則血陰絡傷則血內

溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒

入醫學綱目卷三

三十一

積之積

汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣卒然外中

於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣

不行凝滯血裏而不散津液滲滲着而不去而積皆成矣

此謂清濕寒陰之虛  
黃帝曰其生於陰者奈何岐伯曰憂思傷心重寒傷肺忿

怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房汗之

浴則傷腎此謂喜怒傷臟病起於陰也風雨寒暑清濕之虛則

皆受病其病方成矣此內外三部之所生病者也黃帝曰

針灸

善治之奈何岐伯曰察其所痛以知其應有餘不足當

補則補當瀉則瀉毋逆天時是謂至治

手少陰筋病內急心承伏梁下為肝綱治在燔針劫刺以

知為數以痛為輸其成伏梁唾血膿者死不治

手太陽筋病其成息奔脇急吐血手心主筋病胸痛息奔







右除椒漆外五物皆生半抄為經末用前生熟漆和丸如彈子大又用茴香十二兩鋪陰地陰乾候外乾并茴香收器中至乾去茴香用治腎氣膀胱疝瘕及疝墜五隔血崩產後諸血漏下赤白並一九分四服死胎一丸皆綿灰酒下 若難產炒葵子四十九粒杵碎酒煎下 諸疾不過三服痰氣十服膈氣癥癖五服血瘕三九一婦有塊如杯每發痛不可忍諸藥莫愈投此九盡三服杯氣盡消終身不復作矣

雲沒藥散治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行兒枕痛

血竭 沒藥並細研 桂心 當歸  
蒲黃 紅花 木香 玄胡索  
乾漆炒 赤芍各等分

右為極細末每服二錢熱酒調下食前若血塊衝心痛甚危者以大順散三錢酒調服立止

牡丹散治婦人久虛麻瘦血塊走疰心腹疼痛

牡丹皮 桂心 當歸 玄胡索各一兩  
莢木 牛膝 赤芍各三兩 京三稜一兩

右為粗末每服三錢水酒各半盞

翻木香礪砂丸治婦人痰癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不瘥者

丁香 礪砂研 木香 官桂  
附子炮 乾漆炒 細墨 大黃炒  
乳香 廣茂 青皮 京三稜  
巴豆霜減 沒藥研 猪牙皂角 乾姜炮  
右除礪砂乳香沒藥外同為細末以好醋一升化開

砂去香脚入銀器中煨火焚次下巴豆霜大黃末焚成膏將前藥末與膏為丸如麻子大每服三五丸食後溫水送下加大便利為度

治血積熱之証於產後血塊求之

大桃仁煎 治婦人血瘕血積經候不通出方  
桃仁去皮尖 大黃 蜚蠊 朴硝

右四味末之以醇醋二升半銀石器中煨火煎取一升五合下桃仁大黃蜚蠊等不住手攪干下次下朴硝更不住手攪良久出之丸如桐子大前一日不用吃晚飯五更初用溫酒吞下五丸日午取下如黑豈汁雞肝蝦蟇末未下再作見鮮血即上即以調氣血藥補之

腸單生於腸外月事時下石痕生於胞中月事不以時下二病皆似蟲脹

脈診婦人疝癖積聚脈弦急者生虛弱小者死

甲婦人子藏中有惡血內逆滿痛石關主之

胎前產後積

黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也帝曰愿聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

四血塊如盤有孕難服峻劑此方主之

香附醋炙 桃仁去皮尖 海粉醋炙 白朮

方治血 粳糊丸服

南山婦人年三十八於九月廿三日月經行比前過後十日得草藥以敗血海為下胎之謀有數滴血下因此腹痛在小腹下有塊如碗大不可按湯熨則痛稍定大小便抽痛小便澀大便畧下少赤積垢食不進口畧渴發熱此胃



氣為草藥所敗加以受傷之血妄行而不得洩所以為疔

砂仁分三

甘草分三

滑石分一錢

川芎

黃芩分三

牛膝分二

桃仁分七

水酒煎服

保芍藥湯治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自安

芍藥斤

黃芩

茯苓兩

右散每半兩水煎日三服溫

丹產後消血塊

滑石錢

沒藥錢

血竭錢

右為細末醋糊丸如懸露不下以五靈脂為細末麪糊

九白木湯陳皮湯送下

又消血塊

香附便

桃仁去皮

為末醋糊丸

息積

醫學綱目卷五

美

氣鬱滯帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是為何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可刺灸積為導引服藥不能獨治也奇病論○王註云氣逆息難故

無磨積丸

胡椒十粒

木香二錢

全蝎十枚

右為末粟米丸菴荳大每十五丸陳皮湯下

化氣湯治息積

砂仁

桂心

木香各二錢

甘草各

茴香炒

丁香皮

青皮炒

陳皮

乾姜

蓬朮炮各半兩

胡椒

沉香各一

右為末每服二錢姜蘇鹽湯調下婦人醋湯服

陳無擇云導引法隨意行之皆可愚謂或按摩滿處或手足相屈伸或八段錦或六字氣之類以氣通為効

面腫頰腮痛

面熱面寒

面青

面塵 面赤 面黃

面白 面黑

頰車痛

面候

黃帝曰首面與身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則裂地凌水其卒寒或手足懈墮然而其面不裂何也岐

伯答曰十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走

空竅其精陽氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽

其宗氣上出於鼻而為臭其濁氣出於胃走唇舌而為味

其氣之津液皆上黃於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒

不能勝之也邪氣藏於

面腫頰腮痛

朱奶兩腮熱腫脹之病也

乾葛

桔梗一錢

升麻一錢

蘇葉一錢

甘草分七

薄荷錢

姜片

水煎服

一八醫綱目卷三五

毒

咽痛頰腫脹洪大而赤者羌活勝濕湯加黃芩桔梗甘草各半錢治之如耳鳴目黃頰腫頸肩膈肘臂外後廉

痛面赤脈洪大者以羌活防風甘草藥本通其經血加黃

連黃芩消其腫以人參黃芪益其元氣而瀉其火邪

兩腮腫細辛草烏等分為末入蚌粉以猪脂調傳腫處

口含白梅置腮邊良久腫退出涎患消矣消時腫必先向

下

治疔腮

竹葉

車前草

栝子仁

杵碎熱傳患處

腮腫用赤小荳末傳之立効

疔腮雞子青調赤小荳末及喉下諸般腫痛用蝸牛飛

麪研勻貼腫處



面腫曰風

針灸而腫曰風

針灸而腫痛有三法

其一取手陽明經云頰痛刺足陽明曲周動脈見血立已  
不已按人迎于經立已又云厥胸滿面腫唇澤然暴言  
難甚則不能言取足陽明又云厥頭痛面若腫起而煩心  
取之足陽明太陰為煩心也又云頰痛刺手陽明與頰之  
盛脈出血是也

其二取手太陽經云手太陽之脈是動則頰腫不可以頰  
所生病者目黃頰痛視盛虛熱寒陷下取之也

其三取手足太陽經云三焦手少陽之脈所生病者頰痛  
又云膽足少陽之脈所生病者頰腫視盛虛熱寒陷下取  
之也又云肝氣逆則頭痛耳聾頰痛取血者蓋取足少陽

之血也

面赤頰熱惡風寒領痛 摺竹 玉梳 巨節

頰腫生瘡名枯骨風 合谷 列缺 地倉 頰庫

人中 承漿 玉液 金津 三里

面腫口瘡腫刺陷谷出血立止 頰腫唇瘡頰痛主之  
頰腫痛天寒主之 頰腫口急頰車痛不可以嚼頰車  
主之

面寒面熱

面熱火氣因鬱熱 面寒因胃虛

飲食不節則胃弱胃弱則氣短精神少而生大熱有時  
而火上行獨熾其面針經云面熱者足陽明病

面熱○傷即中之內五十一歲身體肥盛已酉春患頭  
目昏悶面赤熱多服清上藥不効請予治之診其脈洪大  
而有力內經云面熱者足陽明病脈經云陽明經氣盛有  
餘則身已前皆熱况其人素膏梁積熱於胃陽明經多血  
多氣木實則風熱上行諸陽皆會於頭目故面熱之病生  
矣先以調胃承氣湯七錢加黃連三錢犀角一錢疎下三  
兩行微其本熱次以升麻加黃連湯去經絡中風熱上行  
如此則標本之邪俱退矣

升麻

葛根

白芷

甘草

白芍

酒黃連

生犀末

川芎

荆芥穗

薄荷

右對如麻豆大用水半盞先浸川芎荆芥薄荷外都作  
一服水二盞煎至一盞入先浸三味同煎至七分去渣  
食後溫服數服愈忌酒濕麪五辛之物

咳逆停息不得臥面熱如醉此為胃熱上衝其面茯苓  
桂枝五味甘草湯加大黃以利之

羅面寒○其定維摩院尼長老六十一歲身體瘦弱已酉  
十月間病頭面不耐寒氣弱不敢當風行諸治不效予診  
之其脈皆弦細而微且其人年高素食茶葉而已陽明之  
經本虛脈經云氣不足則身已前皆寒慄又加看誦損氣  
由此胃氣虛經絡之氣亦虛不能上榮頭面故惡風寒先  
以附子理中丸溫其中氣次以升麻湯加附子主之

升麻 葛根 白芷 黃芪

甘草 黑附子 人參 草薺

益智仁



右剉如麻荳大都作一服水三盞連鬚白葱頭二莖同煎一盞去查溫服食前數服良愈

升麻湯辨 或曰升麻加黃連湯治面熱升麻加附子湯

治面寒有何依據答曰出自仲景雲岐子注傷寒論中辨

葛根湯云尺寸脈俱長者陽明受病也當一二日發以其

脈夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥此陽明經受病

也始於鼻交頰中從頰至足行身之前為表之裏陽明經

標熱本實從標脈浮而長從本脈沉而實陽明為病蒸蒸

而熱不惡寒身熱為標病陽明本實者胃中燥鼻乾目疼

為本病陽明為肌肉之本禁不可發汗在本者不禁下發

之則發黃症太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉屬陽明

二陽何病葛根湯主之衛者桂枝榮者麻黃榮衛之中桂

枝麻黃各半湯主之榮衛之下肌肉之分者葛根湯主之

又名解肌湯故陽明為肌肉之本非專於發汗止汗之治

桂枝麻黃兩方互併為一方加葛根者便作葛根湯故榮

衛肌肉之次也桂枝芍藥生薑甘草大棗止汗有麻黃桂

枝甘草發汗葛根味薄獨加一味者非發汗止汗也從葛

根以解肌故名葛根湯錢仲易制升麻湯治傷寒瘟疫風

熱壯熱頭痛肢體痛瘡診已發未發用葛根為君升麻為

佐甘草芍藥安其中氣朱泰議作活人書將升麻列作陽

明經解藥予診楊氏婦陽明經標本俱實先攻其裏後瀉

經絡中風熱故用升麻湯加黃連以寒治熱也尼長老陽

明經標本俱虛先實其裏次行經絡故用升麻湯加附子

以熱治寒也仲景乃羣方之祖信哉

面青 面塵

難肝外證面青善驚善怒

通氣面塵有二

一曰燥金制肝經云陽明司天燥淫所勝民病嗌乾而塵

又云陽明在泉燥淫所勝病嗌乾而塵又云金鬱之發嗌

乾面塵宜治以濕劑是也

二曰火經云少陽之復厥氣上行面如浮塵目乃瞶痰治

以寒劑是也

針灸面塵皆取肝膽二經經云肝足厥陰之脈是動病其

則嗌乾面塵脫色又云膽足少陽之脈是動病其則面微

有塵皆視虛虛熱寒陷下取之也

面赤

心外證面赤口乾善笑

面赤為邪氣怫鬱在經宜表不宜下

仲景云下利脈沉而遲其人面赤身有微熱下利清穀者

以鬱汗出而解此面赤亦表而解也

運氣面赤皆屬寒經云太陽司天寒淫所勝民病面赤目

黃治以熱劑是也

針灸面赤皆取心主經云心主手厥陰之脈是動則病面

赤目黃視虛虛熱寒陷下取之也

面黃

脾外證面黃善噫善思善味

陽明經終者口目動作善驚妄言色黃

面白

肺外證面白善嚏悲愁不樂欲哭

血脫者色白天然不澤其脈空虛

巴戟丸治肺病面白不悅則為脫氣脫血脫津脫液脫

精脫神勞遺 脈緊者寒也或面白善嚏或面色惡皆寒



也以羌活防風甘草芩本四味瀉足太陽少加附子以通其脈面色惡悲恐者更加桂附

太陽終者戴眼反折痠痲其色白絕汗出

少陽終者耳聾百節皆縱目暈絕系其色青白已上全文見診生死

面黑若身黃面黑於黑而求之

腎外證面黑惡欠十六

陰出乘陽 一婦人年幾三十憂思不已飲食失節脾胃有傷面色黧黑不澤環唇尤甚心懸如飢狀又不欲食

氣短而促大抵心肺在上行榮衛而光澤於外宜顯而藏腎肝在下養筋骨而強於內當隱而不見脾胃在中主傳化精微以灌四旁冲和而不息其氣一傷則四臟失所憂思不已氣結而不行飲食失節氣耗而不足使陰氣上溢

八醫學綱目卷五

聖

於陽中故黑色見於面又經云脾氣通於口其華在唇今水反來侮土故黑色見於唇此陰陽相反病之逆也上古天真論云陽明脈衰於上面始焦故知陽明之氣不足非助陽明生發之劑無以復其色故以冲和順氣湯主之

升麻錢 葛根錢 甘草分 芍藥分  
白芷錢 黃芪分 防風錢 人參分  
蒼朮分

內經曰上氣不足推而揚之以升麻苦平葛根甘溫自地升天通行陽明之氣為君人之氣以天地之風名之氣留而不行者以辛散之防風辛溫白芷甘辛溫以散滯氣為臣蒼朮苦辛錫除陽明經之寒白芍藥之溫酸安太陽經之法弱十劑云補可去弱人參羊肉之屬人參黃芪甘草甘溫補益正氣為臣至真要大論云辛甘發散為陽生姜

辛熱大棗甘溫和榮衛開腠理致津液以復其陽氣故以為使

右件咬咀都作一服水二盞姜三片棗二枚同煎至一盞去渣溫服早飯後午飯前取陽升之時使人之陽氣易達故也數服而愈

樊樓有店家劉三一日滿面皆黑色有相者斷云不過月餘死既過月且安孫入店與客飲酒遂拜孫述說其病狀孫特與診之曰非病也乃為臭氣所薰穢氣蓄於面部不散故有此色問劉曰汝一月前聞甚一陣非常臭氣不能避耶劉曰一日登廁其廁臭氣不可聞隱忍良久下廁明日遂有此疾孫曰去至臭無過至香我家有南人將至信香可用沉檀二香各一兩碎擘焚於爐中安帳內以薰緇被蓋定勿令香氣散可端坐香邊瞑目靜坐候香氣散

八醫學綱目卷五

聖

方可出帳明日引鑑照之劉依其言面色漸變旬日如故醫典廣屬水脾臭香屬土今夫廁臭者腐臭也故聞之則入野而面黑沉香者香臭也故薰之則脾土勝腎水而色也

針灸面黑有二法

其一取胃經云胃足陽明之脈是動則病酒酒振寒顛黑其二取腎經云足少陰之脈是動則病飢不欲食面如漆柴視盛虛熱寒陷下取之也

少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉全文見診生死下河

太陰終者腹脹閉不得息善噎噎逆則面赤不逆則面黑皮毛黑

類車病

雜方 平江陳氏因驚懼後常用手指甲掐柱兩頰遂兩頰破損心中懊懣不安服藥而實諸藥不愈用活切口義牛黃



清心涼膈丸數服如失

無凡伸欠類症雖但開不能合以酒飲之令大醉睡中吹  
皂角末搯其鼻噴透即自正

狂癲

狂謂妄言妄走也癲謂僵仆不省也各自一症今以狂入  
脾部癲入肝部然經有言狂癲疾者有言狂互引癲者又  
言癲疾為狂者此則又皆狂癲兼病今病有妄言妄走頃  
時前後僵仆之類有僵仆後妄見鬼神半日方已之類是  
以癲狂兼病者也

難頭狂之病何以別之然狂之始發少臥而不飢自高賢  
也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休是也癲疾  
始發意不樂直視僵仆其脈三部陰陽俱盛是也重陽者  
狂重陰者癲五十九難云狂者多怒言不休臥不  
食飲食自言賢智尊貴歌笑行不休今人

以爲癲疾

聖

素二陰二陽皆交至病在腎屬腎妄行顛疾為狂陰陽類  
論云二陰腎水二陽胃土  
土刑水病在腎胃為狂

邪入於陽則為狂轉則為顛疾九針  
論云邪入於陽則為狂轉則為顛疾

素顛疾厥狂久逆之所生也通評虛  
論云素顛疾厥狂久逆之所生也太陽所謂狂顛疾  
者陽盡在上而陰氣從下下虛上實故狂顛疾也解

針灸狂顛有一法

其一取胃經云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太  
陰其病實則狂顛取之所別是也

其二取膀胱經云膀胱足太陽之脈所生病者狂顛視盛  
虛熱寒陷下取之也

用狂癲疾吐舌太乙及滑肉期門主之 狂什溫溜主之  
狂顛疾陽谷及築室通谷主之 狂互引顛疾數發後

然主之 狂顛陰谷主之

狂

欲獨閉戶牖而處陰不勝其陽則脈流瀉疾并乃狂全文  
法虛實

血并於陽氣并於陰故為驚狂全文見  
刺虛法

素帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也帝曰陽  
何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病  
名曰陽厥帝曰何以知之岐伯曰陽明者常動巨陽少陽  
不動不動而動大疾此其候也帝曰治之奈何岐伯曰奪  
其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已使之服  
以生鐵落為飲夫生鐵落者下氣疾也病能

無號磐丹治狂方見集  
新門

鎮心丹治驚悸自汗心煩短氣喜怒悲惡不自知忘魂

失魄狀若神靈所憑及男子遺泄女子帶下

辰砂研 白礬煨等分

右為末水丸如雞頭大每服一丸煎人參湯下食後服

世浙江一婦人顛狂不止醫以瓜蒂半兩為末每一錢重  
井花水調滿一盞投之隨得大吐吐後熟睡勿令驚動自  
此無恙

竹來麩膏治遠年近日風癩心病風狂中風涎沫潮閉牙  
關不開及破傷風並皆治之

皂角一兩肥大無虱  
腫者去皮弦子

右將皂角切碎用漿水一大碗春秋浸三四日冬七日  
夏一二日採開取淨浸透皂角汁入銀器或砂鍋內以  
文武火焚用新柳條槐枝攪熬似膏藥取出攤於火帝  
上陰乾收頓如遇病人取手掌一大片用溫漿化在蒸



內用竹管兒盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將藥水  
入左右鼻孔內良久扶起涎出為驗欲要涎止將溫盪  
湯令病人服一二口便止忌雞魚生硬濕麪等物

子和一男子落馬發狂起則目瞪狂言不識親疎葉衣而  
走罵言涌出氣力加倍三五人不能執縛燒符作醮問鬼  
跳巫殊不知顧服丹砂牛黃犀珠腦麝資財散去室中滿  
然不遠二百里而求戴人一往戴人以車軸埋之地中約  
高二丈許上安中等車輪其輞上鑿一穴如作盆之狀縛  
病人在其上使之伏臥以軟襦襯之又令一人於下坐機  
一枚以棒攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許  
繞車輪數匝病人曰我不能堪可解我下從其言而解之  
索凉水與之冰水飲數升狂乃罷矣

八醫學綱目卷五

案

踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能者何也岐  
伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也  
帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱甚於身故棄衣欲走  
也帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛  
則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食故妄走也  
陽明脈解篇曰陽明所謂病至則欲乘高而歌棄衣而走者陰陽復爭外并於陽故使之棄衣而走也  
漸許氏病陽厥狂怒罵詈親疎或哭或歌六脈舉按無力  
身表如石發即叫呼聲高潔古云奪食則已因不與之  
食予用大承氣湯下之得臟腑渣穢數升狂稍寧數日復  
發復下如此五七次行大便數斗疾瘥身溫脈生良愈此  
易老奪食之法也

保當歸承氣湯

當歸

大黃兩

甘草兩

芒硝兩

右剉如麻苳大每二兩水一大碗姜五片棗十枚煎  
一半去查熱溫服若陽狂奔走罵詈不知親疎此陽有  
餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血陰甘草  
緩中加姜者胃屬土此引入胃中也經所謂微者逆  
之甚者從之此之謂也以大利為度微緩以瓜蒂散入  
防風末藜蘆末吐之其病立安後用調心散洗心散涼  
膈散解毒湯等調之

子和一任人陰不勝其陽則脈流薄疾陽并乃狂難經曰  
陽極則狂陰極則顛陽為腑陰為臟非陽熱而陰寒也熱  
并於陽則狂狂則生寒并於陰則顛顛則死內經曰足陽  
明實則狂故登高而歌棄衣而走無所不為是熱之極也  
以調胃承氣大作湯下數十行三五日復上涌一二升三  
五日又復下之凡五六十日下百餘行吐亦七八度如吐

八醫學綱目卷五

案

時暖室置火以助其汗數汗方平  
一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如虫行兩手  
爬搔數年不已載人診其兩手脈皆洪大如繩斷之曰肝  
主謀膽主決徭役迫遽財不能支則肝膽謀而膽不能  
決肝無所伸怒無所洩心火熾燻乘陽明金然胃本屬土  
而肝屬木膽屬相火火隨木氣而入胃故暴發狂乃命置  
煨室中涌而汁出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則  
發之正謂此也又以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸  
分作三服大下二十行血水與瘀血相雜而下數升來日  
乃康以通聖散調其後  
潘曰且告投藥報恩不忘孫曰有贖物但與師吃待渴却



來道至夜僧果渴孫至遂求溫酒一角調藥一服與之有頃再索酒與之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故潘謝孫問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏得睡此乃靈苑方中硃砂酸枣仁乳香散也人不能用耳

辰砂散治風痰諸病狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴日魂魄不守醫藥無驗

辰砂一兩須光明 酸枣仁半兩 乳香半兩 右量所患人飲酒幾何先令恣飲沉醉但勿令吐至靜室中以前藥都作一服溫酒調下作一盞調之令頓飲

如飲酒素少人但以隨量取醉服藥訖便安置床枕令臥病淺者半日至一日病深者三兩日令家人潛伺之

莫息勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒即神魂定矣萬一驚悟不可復治正肅吳公少時心病服此

一劑五日方寤遂瘥

一醉膏治心恙無灰酒二碗香油四兩和勻用楊柳枝二十條逐條攪一二百下候香油與酒相入成膏煎至八分

灌之熱睡則醒或吐下即安矣

狂之為病少臥少臥則衛獨行陽不行陰故陽盛陰虛令昏其神得睡則衛得入於陰而陰得衛填不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈矣

本寧志膏

人參 酸枣仁一兩 辰砂五 乳香分

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九薄荷湯送下

予族弟綠兵火失心制此方與之服二十粒愈親舊多傳去服之皆驗

海狂邪顛瀾不欲眠臥自賢自智妄行不休此方能安五

腦下心氣用白雄雞一隻煮熟五味調和作羹粥食之經云悲哀動中則傷魂傷魂則狂妄不精不精則不正此悲哀傷魂而狂當用溫藥補魂之陽仲景方以地黃湯本

事驚氣丸之類即是也 經云喜樂無極則傷魄魄傷則

狂狂者意不存人此喜樂傷魄而狂當用涼藥補魄之陰

辰砂歸金白礬之類是也

國治失心

右為細末薄糊為丸如桐子大每服五六丸湯水任

下昔有婦人顛狂可畏數年不愈後遇至人授此方初

服覺心胸中有物脫去神氣灑然再服頓甦至人云此

病用憂驚得之痰涎包絡心竅此藥能去鬱痰

防已地黃湯治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脈

浮

防已 桂枝 防風 甘草

右四味以酒一盃漬一宿絞取汁生地黃二斤咬咀蒸

之如半米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服

本治驚狂積氣瘴風邪發則牙關緊急涎潮昏塞醒則精

神若痴驚氣丸

附子 木香 白姜 白花蛇

橘紅 天麻 麻黃 乾葛

紫蘇葉 朱砂 天南星

右為末加腦麝少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每

服一九金銀薄荷湯化下溫酒亦得此予家秘方也戊

申年軍中一人犯法褫衣將受刑而得釋精神頓失如



痴子與一丸服訖而寐及覺病已失矣提轄張載揚其妻因避寇失心已數年予授此方不終劑而愈又黃彥奇妻狂厥者踰十年諸醫不驗予授此方去附子加鐵粉亦不終劑而愈鐵粉非但化痰鎮心至如摧抑肝邪特異若多悲怒肝邪大盛鐵粉能制伏之素問云陽厥狂怒治以鐵落飲金制木之意也此亦前人未嘗論及無治中風或歌或哭或笑語無所不及小續命湯用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩無防風附子生薑有當歸一兩

風熱世治顛狂發作披頭大叫不避水火苦參為末蜜丸梧子大每服十九薄荷湯化下妙

血熱保生黃膏治熱入血室發狂不認人  
牛黃半錢 硃砂 鬱金 牡丹皮各三錢

甘草 腦子各一錢 辛

右為末煉蜜丸如棗子大新汲水化下  
肝移寒於心狂膈中全文見診

運氣運氣狂皆屬火經云諸燥狂越皆屬於火又云火太過曰赫曦赫曦之紀其病笑謔狂妄又云歲火太過上臨少陰少陽病謔妄狂越治以諸寒是也

雜方子和項開合之妻病飢不欲食常好呼怒罵欲殺左右惡言不輟眾醫皆處藥幾半載尚爾其夫命戴人視之戴人曰此難以藥治乃使二娼各塗丹粉作伶人狀其婦人大笑次日又作角觥又大笑其旁常以兩箇能食之婦誇其食美病婦亦索其食而為一嗜之不數日怒減食增不藥而瘥後得一子夫醫貴有才無才何足慮交無窮

針灸靈狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂飢治之取

手太陰陽明血變而止及取足太陰陽明 狂始發少臥不飢自高賢也自辨智也自尊貴也善罵詈日夜不休治之取手陽明太陽少陰舌下視之盛者皆取之不盛釋之也 狂言驚善笑好歌樂妄行不休者得之大恐治之取手陽明太陽太陰 狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也治之取手太陽太陰陽明足太陰頭兩頰 狂者多食善見鬼神善笑而不發於外者得之有所大喜治之取足太陰太陽陽明後取手太陰太陽陽明 狂而新發未應如此者先取曲泉左右動脈及盛者見血有頃已不已以法取之灸骨節二十壯難經 大熱偏身狂而妄見妄聞妄言視足陽明及大絡取之虛者補之血而實者瀉之因其僵臥若其頭前以兩手四指挾按頸動脈久持之卷而切之下至缺盆中而復止如前熱去乃止此所謂推而散之者也刺經真邪篇○頸動脈

胃足陽明之脈是動病甚則欲上高而歌棄衣而走故狂皆取陽明也

狐魅神邪顛狂諸病并小兒驚癇兩手大姆指用軟繩急縛之灸三壯艾炷着四處牛在甲牛在肉上四處盡燒一處不着其疾不愈神功難量此法累

灸狂發怒欲殺人見鬼 身柱灸三壯 後路

呆痴 神門一次沿皮向前三 後路補生

又法 太鍾

失志呆痴 神門 中衝 鬼服 鳩尾 百會

心悶不已 支溝

狂易魚際及合谷腕骨支正少海崑崙主之 狂言笑見鬼取之陽谿及手足陽明太陽 狂歌妄言恐惡人



與火驚昏三里主之 狂妄走善欠巨虛上廉主之 狂  
易見鬼神與火解路主之 狂言太淵主之 心懸如飢  
之狀善悲而驚狂面赤目黃間使主之 狂疾液門主之  
又俠谿丘墟光明主之 狂互引頭痛耳鳴目赤中渚主  
之 身熱狂走談言見鬼瘵癡身柱主之 狂妄言怒恐  
惡大甚驚昏巨闕主之

欲假閉戶牖而處

陽明所謂欲獨閉戶牖而處者陰陽相薄也陽盡而陰  
虛故欲獨閉戶牖而居 帝曰陽明惡人者何也岐伯曰  
陽明厥則喘而惋惋則惡人 陽明脈解篇

針灸獨閉戶牖而處有二法

其一取胃經云胃足陽明之脈是動則病惡人與火獨閉  
戶牖而處視盛虛熱寒陷下取之也

其二取少陰經云少陰之虛獨閉戶牖而處 注云取太陰

熱病汗不出熱衄眩時仆而浮腫足脛寒不得臥振寒  
惡人與木音喉痺齒惡風臭不利多臥善驚厲兌主之

四厥手足悶者使人久持之厥熱脛痛腹脹皮膚痛善伸  
欬欠惡人與木音振寒噤中引外腎痛熱病汗不出下齒  
痛惡寒日急喘滿寒慄噤齒口禁憊惰不嗜食內庭主之

病若閉目不欲見人者脈當得肝脈弦急而長而反得  
肺脈短而瀋者死也

口甘入中 口苦 口瘡入疥 口糜 口臭喉醒

口者脾之所主胃大腸脈之所挾經云中央黃色入通於  
脾開竅於口藏精於脾又云脾主口在藏為脾在竅為口  
又云脾氣通於口脾和則口能知五味矣此脾之所主也

口也 又經云胃足陽明之脈挾口下交承漿又云大腸手陽明  
之脈挾口交人中此胃大腸之脈所挾於口也

口苦

肝氣熱則膽泄口苦 全文

肝氣

內經曰有病口苦名曰膽痺乃肝主謀慮膽主決斷盛汁  
七合是清淨之府取決於膽膽或不決為之悲怒則氣上  
逆膽汁上溢故口苦或熱甚而使然也以龍膽瀉肝湯主  
之

柴胡

黃芩

生甘草

人參

天門冬

黃連

草龍膽

山梔

麥門冬

知母

五味子

右件咬咀都作一服水二盞煎至一盞去渣溫服食遠

八音集卷之三

辛

忌辛熱物大效

真氣上逆故口苦舌乾 全文見

針灸

帝曰有病口苦者病名為何何以得之岐伯曰病名曰  
膽痺夫肝者中之將也取決於膽咽為之使此人者數謀  
慮不決故膽虛氣上溢而口為之苦治之以胆募俞論病  
膽募穴在腹部期門下五分膽俞穴在  
背第十一椎下兩旁相去各二寸半

針灸口苦獨取於膽此篇經文是其一法也又經云膽病  
者善太息口苦嘔汁當取陽陵泉又云膽足少陽之脈是  
動則病口苦善太息視盛虛熱寒陷下取之也

口糜

熱

膀胱移熱於小腸腸不便上為口糜 全文見診  
移熱湯治口糜內經云膀胱移熱於小腸腸不便上  
為口糜好飲酒人多有此疾易老用五苓散導赤散相合

一第... 貴參... 3 反... 小



服之神效

治滿口白爛，搽一兩厚黃柏一兩六錢為末，用米醋煎數沸後調上藥涎出吐之，再用湯嗽口即愈。重者二次。

胡黃連散治口糜

胡黃連五分 藿香一分 細辛三分 黃連三分

右為末，每用半錢乾擦口內，漱吐之。

必效散治口糜 白礬 大黃

右為細末，臨臥乾貼，涎盡溫水漱之。

運氣口糜皆屬熱經云少陰之復火氣內發上為口糜治以苦寒是也

口臭喉腥

熟地 生地 天門冬 黃芩

枇杷葉 山茵陳 枳殼 金釵石斛

甘草 犀角

右為末，每服二錢水一盞煎至七分去渣食後臨臥溫服小兒一服分作二服更斟酌與之

此方得自一品之家其間用犀角一味甚有道理百發百中予族中有一僕牙宣口臭牙齒漸頹落予與二服頓愈服之無不愈者本事方前集所未載此方緣得之不易故不敢輕泄服之自有奇效

治口臭香需一把以水一斗煮取三升稍稍含之

肺熱喉腥治驗 梁濟民膏梁而飲因勞心過度肺氣有傷以致氣出腥臭涕唾稠粘咽隘不利口苦乾燥以加

減瀉白散主之

桑白皮 地骨皮 甘草 知母 黃芩 五味子 麥門冬 桔梗

難經云心主五臭入肺為腥臭此其一也因洪飲大熱之氣所傷從心火刑於肺金以桑白皮地骨皮苦微寒降肺

中伏火而補氣為君以黃芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣為臣肺欲收急食酸以收之以五味子酸溫以收肺氣

麥門冬苦寒治涕唾稠粘口苦乾燥為君桔梗辛溫體輕浮治痰逆利咽膈為使也

右以咀都作一服水二盞煎至一盞去渣溫服食後一日二服忌酒濕麪及辛熱之物

治口臭仍醫膏腫痛細辛煮取濃汁熱飲令吐盡

親戚莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金為火所乘火主臭應便如是也久則成腐腐者腎也此亢極則反兼水化也病在上宜涌之以茶調散涌而去其七分夜以舟車丸

瀉川散下五七行比日而臭斷

口中腫臭勞官主之

六腑之華在唇經云脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本榮之居也其華在唇四白是也 胃脈肝脈皆脈皆環唇內經云督脈上頰環唇是也 衝脈任脈皆絡唇經云

衝脈任脈別而絡唇口是也

唇反者死經云唇舌肌者肉之本也唇反者肉先死是也

四股



陽主四肢經云四肢者諸陽之本也又云陽氣主是也陽實則肢腫經云結陽通四肢是也陽虛則肢冷經云冬氣病在四肢是也脾主四肢經云四肢皆實氣於胃而不得至經必因於脾乃得重者此也脾實則四肢不舉經云脾脈太過為病在外則令人四肢不舉者是也脾虛則四肢不用經云脾藏肉形不足則四肢不用又云四肢懈惰此脾精之不行是也治脾風五臟有邪留在支節經云肺心有邪其氣留于兩肘肝有邪其氣留于兩腋脾有邪其氣留于兩脛腎有邪其氣留于兩腓是也

運氣 運氣四肢不舉皆屬濕經云土太過曰敦阜敦阜之紀其病腹滿四肢不舉是也

針灸 風逆四肢腫復溜主之

八醫經別類卷之三 素

肉候 脾主肉經云脾主肉在體為肉在藏為脾又云邪在脾則病肌肉痛是也脾病在絡經云北方黑色入通於腎故病在絡絡者肉之小會也

針灸 帝曰願聞絡谷之會也岐伯曰肉之大會為谷肉之小會為絡肉分之間絡谷之會以行禁衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將為膿肉消骨髓外破大脰留於節湊必將為敗積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋助肘不得伸內為骨痺外為不仁命曰不足大寒留於絡谷也絡谷三百六十五穴會亦應一歲其小痺淫溢循脈往來微針所及與法相同

禁忌 形樂志樂病生於肉治之以針石全文見 濕傷肉甘傷肉經云濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘又云

甘走肉肉病無多食甘又云多食酸則肉胝脹而厚揚也坐樂傷肉經云久坐傷肉又云形樂志樂病生於肉治之以針石是也

身重 怠墮嗜臥

身重者濕也補中益氣湯去桂加五苓散主之

起臥不能謂之濕身重是也小柴胡湯黃芪為藥湯

風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之方見前

夏月中風濕身重如山不能轉側宜除風勝濕去熱之藥治之

腎者之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反

不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出表裏冷濕

久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘姜苓朮湯主

之

八醫經別類卷之三 素

甘草 白朮 乾姜 茯苓

右四味以水五升煮取三升分溫二服腰中自溫

肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩冤示從容論心體重身

參朮湯治脾胃虛弱元氣不能榮於心肺四肢沉重食

後昏問

黃芪 人參 升麻 甘草

柴胡 酒黃柏 陳皮 青皮

神麴 蒼朮 當歸

右吹咀作一服水二盞煎至一盞半去香帶熱服食前

運氣身重有五

一曰濕乃濕制腎虛而重經云太陰所至為身重又云太

陰之復體重身滿又云歲上太過濕氣流行民病體重煩



竟又云土鬱之發民病身重是也

二曰濕熱經云少陽司天之政四之氣炎暑間化其病滿身重是也

三曰寒濕經云太陰司天之政三之氣感於寒濕民病身重是也

四曰風乃木制脾虛而重經云歲木太過風氣流行民病體重煩冤又云歲土不及風乃大行民病體重煩冤又云厥陰在泉風淫所勝病身體皆重是也

五曰金乃燥制肝虛而重經云歲金太過燥氣流行民病體重煩冤是也

針灸

針灸身重有二法

其一取脾經云脾病者身重肉疼取其經太陰陽明少陰血者又云脾足太陰之脈是動則病腹脹身體皆重視盛

虛熱寒陷下取之也

其二取腎經云腎病者身重寢汗出憎風取其經少陰太陽血者是也

怠嗜嗜臥

云脈緩怠嗜嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從脾胃散又云怠嗜嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或瀉泄加蒼朮白汗加白朮

虛

補虛損治勞倦一切虛極欲垂死者肥人陰虛宜服

甘草三兩 蒼朮一斤共泔浸一宿切用非

川椒四兩 草烏一斤水浸一宿切用非

右共為末用好酒糟六斤同搗三五千杵令勻為丸如

桐子大每服三十九空心溫酒鹽湯任下婦人淡醋湯

下

食入則困倦精神昏冒而欲睡者脾虛弱也

人參補氣湯治四肢懶倦

黃芪一分 人參一分 甘草一分 生地五分

防風七分 白芍五分 五味二十 升麻七分

肉桂二分 熟地六分 生甘草一分 黃柏七分

知母七分

右為粗末作一服水二盞煎至一盞濾去渣空心熱服

蠱毒

江南閩中山間人以蛇虺蜈蚣蟻蝮等百虫同器畜之使其自相食啖勝者為靈以祀之取其毒雜以菜菓飲食之類以害人妄意要福以圖富貴人或以此狀萬端或年歲間人多死又有人家香火奉祀如家先者亦謂

之蠱能病人世謂之蠱症以姓類屬五音謂之五蠱此皆邊鄙邪僻之地多有此事中都則蔑聞也

夫中蠱毒者令人心腹絞痛如有物吐出皆如爛肉若不即治食人五臟即死驗令病人唾水沉者即是

有人行蠱毒以病人若欲知其姓名者以敗鼓皮燒作末飲服方寸七須臾自呼蠱家姓名可語之令呼喚將去則愈治之亦有方

世驗蠱之法含一大葶其葶脹皮脫者蠱也葶不脹皮不脫者非也以鵠皮至病人臥所下勿令知覺病甚者走居則非也治療之法必須審而後行試而後可令人偶有積聚脹滿之病類乎蠱者便以為蠱尤為非也凡蠱毒之中有緩有急急者十數日便死緩者待以歲月氣力羸敗食盡五臟而後死死則其毒流注於傍傍人亦成蠱注矣



凡中毒嚼生豈不腥嚼白糝味甘者皆中毒無異  
人爲百藥所中傷脈浮瀉而疾者生微細者死洪大而  
遲者生千金選

辰砂丸治蠱毒從酒食中着者端午日合

辰砂研 雄黃另研 赤脚蜈蚣 續隨子各

麝香錢一

右爲末糯米飲爲丸如雞頭大若覺中毒卽以酒下一  
丸蛇蝎所螫醋磨傳効

主蠱毒神效以胡荽根絞汁半升酒和服之立下

治蠱毒土瓜根大如拇指長三寸切以酒半升浸一宿  
服當吐下

一服當吐下

蛇蠱食飲中得之咽中如有物噓不下吐不出悶悶心  
熱服馬兜苳卽吐又服麝香一錢七卽吐蠱毒

五種蠱毒馬兜苳根三兩爲末分爲三貼水一盞煎五  
分去查服當吐虫出未快再服

主蠱毒用大戟桃白皮以火烘乾斑猫去翅足炒三物  
等分搗篩爲散以冷水服半方寸七其毒卽出不出更一

服蠱並出此李饒州法大奇效若以酒中得則以酒服以  
食中得則以飲服之

右吐利蠱毒法

凡諸蠱多是假毒藥以投之知時宜煮大荳甘草薺菀  
汁飲之通除諸毒藥

山荳根不拘多少如中藥蠱毒密遣人和水研以禁聲  
服少許不止再服一方用酒調下二錢

食中有蠱毒令人腹內堅痛兩目青黃淋露骨立病變  
無常用鐵精細研搗雞肝和爲丸桐子大食前或後酒下

五九

蠱下血見血

無解毒丸治設食毒中并百物毒救人於必死

板藍根四兩洗 貫衆去毛 青黛

甘草一兩

右爲末蜜丸桐子大以青黛另爲衣如稍精神恍惚則  
是誤中諸毒急取十五九爛嚼用新水送下卽解

青黛雄黃丸凡始覺中毒及蛇虫咬癰疽纒作卽服此毒  
氣不聚

青黛 雄黃

右爲細末新汲水調下二錢

聖藥解毒丸善治男子婦人及小兒一切積熱不解停留作  
毒上焦壅熱咽喉不利口乾多渴伏暑困悶霍亂不寧或

山嵐瘴氣及食毒酒毒吐逆不定遊風丹毒迷或昏困不  
省人事唐煩發燥赤目口瘡善解四時傷寒之疾發散瘟

疫毒邪之氣及四方人不服水土一切諸毒並皆解之常  
服此藥補真益氣化毒除風神效不可細述

滑石 黃芩 貫仲 茯苓

山梔 乾姜 苜蓿 大荳

青黛 甘草 薄荷 寒水石略一

益智仁 砂仁 大黃 山荳根

生地 桔梗 百藥煎 紫河車自製

菴荳粉 馬勃 板藍根 黃藥各半

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一九新汲水化下  
細嚼或噙化亦得小兒半丸如婦人血暈不省生薑薄  
荷水磨下一丸



解諸毒用玉簪花根搗水服  
治中諸毒

生甘草 黑荳 淡竹葉各等分

右咬咀用水一碗濃煎連服

解諸毒用玉簪花根搗水服

明礬 建茶各等分

右為末每服三錢新汲水調下得吐即效

解砒毒鼠莽毒用旋刺下羊血及雞鴨血熱服鼠莽草未詳

藍飲子解砒毒及巴荳荑用藍根沙糖二味相和搗水服之更入薄荷汁尤妙

解砒毒 白蘆荳 青蘆 甘草

巴荳半粒用半匙去壳不去白 右同為末沙糖一大塊水化開調一大盞飲之砒毒隨

利去却服五苓散之類

解砒毒用早禾桿燒灰新汲水淋汁濾過冷服一碗毒從利下即安又方用井花水調荳粉或荳荳搗水汁皆可

解砒毒

漢椒四十九粒 黑荳十四粒 甘草節二十片 烏梅二枚

右咬咀用水一盞煎至七分溫服

解鼠莽毒用枯過明礬同上等好末茶少許新汲水調服人有用之累效 解鼠莽毒用大黑江荳煮汁服之

如欲試其驗先刈鼠莽苗葉以荳汁澆其根從此敗爛不復生矣

治自死六畜肉中毒方用黃柏搗屑服方寸匕

治鱗肉漏脯中毒鱗肉者蓋之爛者者是也 燒大屎酒服方寸匕或服人乳汁或飲韭汁二三升亦良 治黍

禾中藏肝脯食之中毒方大荳濃汁飲數升即解亦治狗肉漏脯等毒 治食生肉中毒方掘地深三尺取其下土三升以水五升煮數沸澄清汁飲一升即愈 治六畜馬獸肉中毒方水浸荳豉絞取汁服數升即愈

治馬肝毒中人未死方雄鼠屎二七粒末之水和服日再服尿去 又人垢取方寸服之佳 治馬肉中毒欲死方香豉二兩杏仁三兩相和蒸一食頃熟梓服日再服又方

煮蘆根汁飲之良 治噉蛇牛肉食之欲死方辨噉蛇牛後噉者 飲乳汁一升立愈 以泔洗頭飲一升愈 牛膝細切以水一斗煮取一升煖飲之大汗出即愈 治食

牛肉中毒甘草煮汁飲之即解 治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞泄方杏仁一升炒皮熟研以沸湯三升和取汁分三服利下肉片出大

驗 烏獸肉中毒箭死者其肉毒用大荳煮汁及藍汁服之即解

蜈蚣咬用生雞血令病人吃須更以清油灌口中其蜈蚣滾在血中吐出繼以雄黃細研水調服愈

鱈食在心胃間不化吐不出速下除之久成癥病方 陳皮兩一 大黃兩二 朴硝兩二

右三味以水一大升煮取半升頓服消食鱈多不消結為癥病治用馬鞭草搗汁飲之 或以姜

葉汁飲一升亦消 又可服吐藥吐之 食魚後食毒物煩亂用陳皮濃煎汁服之即解 食鯪魚中毒用蘆根

煮汁服之即解 治食河豚魚中毒一時困殆倉卒無藥以清油多灌之使毒物盡吐出為愈



仲食蟹中毒治用紫蘇煮汁飲三升紫蘇子搗飲之亦宜  
冬瓜汁飲二升吃冬瓜亦可 食菓中毒用猪骨燒過  
末之服方寸匕亦治馬肝漏脯等毒

世解一切菌毒掘新地窟以冷水於內攪之令澄少頃取  
飲之見本草陶隱居註謂之地漿 荷葉殺毒

仲食諸菌中毒悶亂欲死治方 人糞汁飲一升 上漿

飲二升 大豈濃煮汁飲之 服諸吐利藥並解 取糞

汁法截淡竹去青皮浸滲其中取筒中汁是也 食楓樹

菌而笑不止亦治以前方

世薑毒吐瀉不止者用細茶研細以新汲井花水服神

效 治薑毒欲死方用石首魚頭或鯢頭亦妙白水煮汁

灌之即愈 治中薑毒用筍竹不入泥者數節煎湯飲之

立效

八醫心編卷三五

五

仲誤食芋煩毒欲死亦治以前方其芋根山東人名魁芋

人種芋三年不收亦成野芋並殺人 蜀椒閉口者有毒

誤食之戟人咽喉氣欲絕或吐下白沫身體痺冷急治之

用肉桂煎汁飲之 或食蒜或食地漿 或濃煮豉豈汁

飲之並解

仲食躁或躁方用豉煮濃汁飲之 鈎吻與芹菜相似誤

食殺人解之用菴菴八兩水六升煮取二升分溫二服鈎

吻生池傍無他異其莖有毛以此別之 菓中有水荳若

葉貞而光有毒誤食之令人狂亂狀如中風或吐血治之

用甘草煮汁服之解 春秋二時龍帶精入芹菜中入偶

食之為病發時手青腹滿痛不可忍名蛟龍病治之用錫

糖二三升日兩度服之吐出如蜥蜴三五枚瘥 食苦瓠

中毒治之用黍稷煮汁服之解 飲食中毒煩滿治之用

苦參三兩苦酒一升半煮半沸三上三下服之吐食出即  
瘥或以水煮亦得 犀角湯亦解 貪食食多不消心腹  
堅滿痛治之用鹽一升水三升煮令鹽消分三服當吐出  
食便瘥

奇病

雜方 項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則項皮斷但逐日飲牛

乳白消 寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊之一似

鐘聲聲日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲即愈 大腸

瀉出寸餘痛甚直候乾自退落又出名為截腸病若腸盡

乃不治但初截寸餘可治用脂麻油器盛之以僻坐之飲

大麻子汁數升愈 口臭中腥臭水流以碗盛之有鐵色

蝦魚如糞米大走躍不住以手捉之即化為水此因壞矣

任其飲食雜肉愈 服上麻痺不仁多煮葱白吃之自愈

八醫心編卷三五

五

婦人小便中出大糞名交腸服五苓散效如未盡愈可

用舊幘頭燒灰酒服之 兩足心凸如腫上面生黑色豈

瘡硬如釘子釘了履地不得脛骨破碎眼髓流出身發寒

顛唯思飲酒此是肝腎氣冷熱相吞用炮川烏頭末傳之

煎韭子湯服效 凡服藥經久忽為數升晝夜不止服藥

不驗乃為氣脫用益智子煎濃湯服之愈 四肢節脫但

有皮連不能舉動名曰筋解用酒浸黃蘗三兩經一宿取

出焙乾為末每服二錢酒調下服盡安 玉莖硬不痿精

流無歇時時如針刺捏之則脆乃為腎滿痛疾用韭子破

故紙各一兩為末每服三錢水一盞煎至六分日三次飲

之愈則住服 咽喉間生肉層層相疊漸腫起不痛多

日乃有蝦子臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服愈

腹中如鐵石膈中水出旋變作虫行之狀繞身匝呀痒



痛難忍撥掃不盡用濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮末入麝香少許水調服痊 眼前常見諸般禽虫飛走以手捉之則無乃肝膽經為疾用酸棗仁芩活玄明粉青箱子花各一兩為末每服二錢水一大盞煎至七分和滓飲一日三服大腸虫出不斷斷之復生行坐不得用鶴虱末水調五錢服之自愈 眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血出名曰肝脹用羌活煎汁服數盞自愈 腹中有物作聲隨人語言用板藍汁一盞分五服服之又名應雷九自愈 有飲油五升以來方始快意長得安不爾則病此是變入胃被氣血聚了化為虫也用雄黃半兩為末水調服虫自出如虫活者置於油中遂死開連油澄之長江 治臥於床四肢不能動只進得食好大言說喫物謂之失說物望病治法如說食猪肉時便云

醫學綱目卷二五

李

你喫猪肉一頓病者聞之即喜遂置肉令病人見臨要却與喫此乃失他物望也當自睡中涎出便愈 手十指節斷壞唯有筋連無節肉虫出如燈心長數尺餘遍身綠毛卷名曰血餘以茯苓黃連煎湯飲之愈 遍身忽皮底混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔以人參善枝青鹽細辛各一兩作一服水二碗煎十數沸去查飲盡便愈 眼白渾黑見物依舊毛髮直如鍊條雖能飲食不語如醉名曰血潰用五靈脂為末二錢酒調下因着艾灸訖大痂便退落瘡內鮮肉片子飛如蝶形狀騰空去了痛不可忍是血肉俱熱用大黃朴硝各半兩為末水調下微利即愈 臨臥渾身虱出約至五升隨至血肉俱壞每宿多痒痛不可言狀雖喫水臥床晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻閉但飲鹽醋湯十數碗

即安 眼赤鼻張大喘渾身出班毛髮如銅錢乃胃中熱毒氣結於下焦用白礬滑石各一兩為末作一服水三碗煎至半令不住飲候盡乃安 有虫如蠅走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化用雷丸雄黃各一兩為末摻在猪肉片上炙熱喫盡自安 手足甲忽然長倒生肉刺如錐痛不可忍喫葵菜自愈 鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍雖忍痛摘去一莖即後更生此因食猪羊血過多遂用乳香礪砂各一兩為末以飯圓梧桐子大空心臨臥各一服水下十粒自然退落 面上及遍身生瘡似貓兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲食減少久則透脛名曰寒瘡多喫魚雞韭葱自愈 脇破腸出臭穢急以香油摸腸用手送入煎人參枸杞淋之皮自合矣喫羊腎粥十日即愈 口臭中氣出盤旋不散涎如黑墨

醫學綱目卷二五

李

色過十日漸漸至肩胸與肉相連堅勝金錢無由飲食此多因瘡後得之煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈 偏身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血擁若不速治潰而膿出以赤皮葱燒灰淋洗喫鼓湯數盞自安 倡毛搖動目不能視交睫噴之不應但能飲食有經日不效者用蒜三兩取汁酒調下即愈 毛竅節次血出若血不出皮脹膨如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名脈溢飲生姜水汁各一二盞即安 忽然氣上喘不能語言口中汁流吐逆齒皆搖動氣出轉大則悶絕蘇復如是名曰傷寒併熱霍亂用大黃人參末各半兩水三盞煎至一盞去滓熱服可安 口内生肉穢臭惡自己惡見有根線長五寸餘如釵股吐穗出飲食了卻吞其線以手輕捏痛徹於心困不可言用水調生麝香一錢服三日驗 渾身生瘡泡如甘



棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生抽盡肌肉不可治急用荆三稜蓬莪木各五兩為末分三服酒調連進愈 頭面發熱有光色他人手近之如火燒用蒜汁半兩酒調下吐如蛇狀遂安 人自覺自形作兩人並臥不別真假不語問亦無對乃是離魂用辰砂人參茯苓濃煎湯服之真者氣爽假者化也 男子自幼喜飲酒至成丁後日飲一二升不醉片時無酒叫呼不絕全不進食日就羸弱令其父用手巾縛住其手足不令動搖但扶少立卻取生辣酒一壺就於其口邊打開其酒氣衝入口中病者必欲取飲堅不可與之須臾口中忽吐物一塊直下墜中即用帛封裹壘口用猛火燒滾約酒乾一半即開視之其一塊如猪肝樣約三兩重週回有小孔如針眼不可數計棄之於江飲食復舊雖滴酒不能飲矣 夜間飲水

誤吞水蛭入腹經停月餘日必生下小蛭能食人肝血腹

痛不可忍面目黃瘦全不進食若不早治能令人死用田

中乾泥一小塊小死魚三四箇將猪脂溶攪勻用巴豆十粒去殼膜研爛入泥內為丸菴荳大用田中冷水吞下十九小兒只用二九至五九須臾大小水蛭一時皆瀉出卻以四物湯加黃芪煎服生血補理婦人產後忽兩乳伸長細小如腸垂下直過小肚痛不可忍危亡須臾名曰乳懸將川芎當歸各二斤半斤對散於瓦石器內用水濃煎不拘時候多少溫服餘一斤半對作大塊用香爐慢火逐旋燒烟安在病人面前卓子下要烟氣在上不絕令病人低頭伏卓子上將口鼻及病乳常吸烟氣直候用此一料藥盡看病證如何或未全安畧縮減再用一料如前法煎服及燒烟薰吸必安如用此二料已盡雖兩乳

畧結上而不復舊用冷水磨草麻子一粒於頭頂心上冷片時後洗去則全安矣 婦人臨產服催生藥驚動太早未嘗離經而用力太過以致盲膜有傷產後水道中垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛欲絕先服笑散數服仍用老姜三斤淨洗不去皮於石鉢內研爛用清油二斤拌勻入鍋內炒熟以油乾焦為度先用熟絹段約五尺長摺作結方令穩重婦人輕裹候油盡稍溫傳在肉線上真覺漸漸冷又用熨斗火熨熱使之常有姜氣如姜氣已過除去又用新者如此熨一日一夜其肉線已縮大半再用前法越兩日其肉縮盡入腹中其病全安卻再服笑散芎歸湯補理切不可使肉線斷作兩截則不可醫 有人患勞瘵兩年諸藥不效

一日聞肉味其腹痛不可忍又恐傳染移在空房候其自

終經停三日病者腹痛氣息將絕思憶肉味之急忽有人

患雞子三枚其病人俛仰取火低頭取瓦銚煎熱吹火屢燃屢滅臭中如有所得將熟間忽噴一聲有紅線一條自鼻中出牽抽約二尺長趨下瓦銚中病人知是怪物急用碗覆煎銚中盡力燒火不住其銚欲裂方住火開銚視之乃是小虫一條頭目皆具已煨死如鉄線樣即以示家人後棄之於江其病即安 居民逃避石室中賊以烟火熏之欲死迷悶中摸索得一束蘿蔔嚼汁下咽而甦又炭烟熏人往往致死含蘿蔔一片著口中烟氣不能毒人或預曝乾為末備用亦可或新水搗爛乾蘿蔔飲之亦可自行擲穿斷舌心血出不止以米醋用雞翎刷所斷處其血即止仍用真蒲黃杏仁去皮尖礪砂少許研為細末煉



蛇狀者用雨滴... 治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳宜急治下部不曉此者但攻其上不以爲意則下部生虫食其肛爛見五臟便死燒艾於管中薰下部令烟入更入少雄黃良附後 有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家棄之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平結 瘵妖魅猶鬼病人不肯言鬼方鹿角屑搗散以水服方寸匕即實言也 蛟龍子生在芹菜上食之入腹變成龍子須慎之用錫糲米杏仁乳餅煮粥食之三升日三服吐出蛟龍子有兩頭 鬼擊之病得之無漸卒者如刀刺狀胸膈腹內切痛不可抑按或即吐血衄血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一升飲之

馬希聖年五十餘性嗜酒常痛飲不醉糟粕出前窠便溺出後窠六脈皆沉澁與四物湯加海金沙木香枳榔木通桃仁服而愈此人酒多氣肆酒升而不降陽極虛酒濕積久生熱煎熬血乾陰亦太虛陰陽偏虛皆可補接此人中年後陰陽虛時暫可活者以其形實酒中穀氣尚在三月後其人必死後果然

醫學綱目卷之二十五

醫學綱目卷之二十六

咳嗽 乾咳 咳喉中作聲 暴咳 久咳 孕咳

咳無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽無聲而有痰脾濕動而爲痰也若咳嗽有痰而有聲者因傷肺氣動於脾濕故咳而熱嗽也脾濕者秋傷於濕積於脾也故內經曰秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而爲咳嗽甚則動脾濕而爲痰也是知脾無雷濕雖傷肺氣亦不爲痰若有痰而寒少熱多故咳嗽非專主乎肺病以肺主皮毛而司於外故風寒先能傷之也內經曰五臟六腑皆能使人咳非獨肺也各以其時主之而受病焉非其時傳而與之也所病不等寒燥濕風火皆能令人咳惟濕病痰飲入胃雷之而不行上入於肺則爲

嗽假令濕在心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在脾經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰所治不同各宜隨症而治之若咳而無痰者以辛甘溫其肺故咳嗽者治痰爲先治痰者下氣爲上是以半夏南星勝其痰而咳嗽自安枳殼陳皮利其氣而痰自下痰而能食者大承氣湯微利之痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱嗽小柴胡四兩入石膏一兩知母五錢用之冬時嗽而發寒者謂之寒嗽小青龙湯加杏仁用之然此爲大例更宜隨症隨時加減量其虛實此治法之大體也

上半年日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降胃火午後嗽多屬陰虛必用四物湯加知母炒黃柏先降其火黃昏嗽多此火氣浮於肺不宜用涼藥五味子五倍子欬而降之春嗽是春升之氣 夏是火炎上最重



秋是濕熱傷肺 冬是風寒外束

治嗽藥大槩多用生薑以其辛散也 咳逆非蛤粉青黛  
瓜蒌貝母不除 大槩有痰者加痰藥 用藥發散之後  
必以半夏逐其痰庶不再來 治嗽痰多用粟殼不必疑  
但要先去病根此乃收後藥也

凡上氣多有服吐藥得瘥亦有針灸得除者宜深體悟

未裏 咳而脈浮者厚朴麻黃湯主之

厚朴兩 麻黃四 石膏如雞子大 杏仁半升  
半夏升 乾姜兩 細辛兩 小麥升

右以水一斗三升先煮小麥熟去查納諸藥煮取三升  
溫服一升日三服

脈沉者澤漆湯主之

半夏升 紫參五錢一作紫苑 澤漆三斤以東流水五升  
生薑 白前各五 甘草 黃芩  
人參 桂枝各三

右以咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜盡

感胃風寒咳嗽者行痰開腠理二陳湯加麻黃杏仁桔  
梗

三物湯治咳嗽感胃風寒鼻塞聲重

甘草不去 麻黃不去 杏仁不去

右以咀每服五錢水一盞半姜五片煎服

四 巡檢舍人夜嗽多脈大而浮三物湯加知母黃芩生薑  
煎 一男子五十餘歲患咳嗽惡風寒口燥乾心微痛兩  
手脈浮緊脅痛滿而數左手大於右手大槩表感裏虛

問其人平日好嗜酒肉素有食積後因汗房勞又往來  
寒水且冒微雨又忍飢歸後繼以飽食酒肉而病先用人  
參每貼四錢麻黃根節一錢半與二三服咳嗽止惡風寒  
除後改用厚朴枳實陳皮青皮瓜蒌仁半夏為丸與二十  
餘貼用人參湯送下痞滿亦散而愈

甘三嬌感冷嗽上有痰

麻黃錢 蒼朮錢 瓜蒌 陳皮  
半夏錢 枳殼錢 黃芩錢 桔梗錢

右分二貼加姜三片煎服

一婦人患嗽頭痛身痛

陳皮錢 人參 川芎 麻黃  
枳殼錢 分二貼水煎服

婦人患身疼嗽而食少

白朮 黃芩 芍藥錢 川芎二  
木通 紫蘇錢 甘草分

右四貼熱服

脾肺 夫咳之為病有一咳即出痰者脾勝濕而痰滑也有連欬  
十數不能出痰者肺燥勝痰濕也滑者宜南星半夏皂角  
灰之屬燥其脾若利氣之劑所當忌也澁者宜枳殼紫蘇  
杏仁之屬利其肺若燥肺之劑所當忌也

治風痰嗽其脈弦而青四肢滿悶便溺閉澁必多燥怒宜  
以水煎金花丸主之

南星 半夏各一兩 天麻錢 雄黃錢

白麩兩 寒水石兩

右為末水丸如桐子大每服五十七丸至百丸煎漿水



沸下藥煮令浮為度淡漿水浸之以姜湯下

**化痰玉壺丸**治風痰吐逆頭痛日眩嗽嘔吐

天南星 半夏各一兩 天麻兩 白麩三兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服三十九丸水煮令藥浮漉出放溫姜湯下

**天麻丸**治風痰

天麻 半夏 天南星各一兩 雄黃少許

白麩三兩

右以水丸每服五七十九丸至百丸先煎水沸下丸煮十餘沸後用姜湯下食前

小黃丸治熱痰咳嗽脉洪面赤煩燥心痛唇口乾燥多喜笑

天南星洗 半夏各一兩 黃芩半兩

入醫學綱目卷三

右為細末姜汁浸蒸餅為丸如桐子大每服五十九丸至七十丸

白朮丸治濕痰咳嗽脉緩面赤肢體沉重嗜臥不收腹脹而食不消

天南星 半夏各一兩 白朮半兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九丸姜湯下食後局方防已丸亦可用

玉粉丸治氣痰咳嗽脉急面白氣上喘促淋瀝酒寒熱悲愁不樂

天南星 半夏各一兩 陳皮去白

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九丸人參生薑湯下食後服

姜桂丸治寒痰咳嗽脉沉面色黧黑小便急痛足寒而逆

心多恐怖

天南星 半夏各一兩 官桂去皮

右為細末蒸餅為丸如桐子大每服五七十九丸生薑湯下食後

治嗽加減法 如心下痞悶加枳實五錢 如身熱甚加

黃連五錢 如體重加茯苓白朮各一兩 如氣逆上者

加苦葶藶五錢 如氣促者加人參桔梗各五錢 如氣

浮腫者加郁李仁杏仁各五錢 如大便秘者加大黃五

錢

**太白丹**治三焦氣滯破除餘痰止咳開胃

半夏洗 天南星炮 寒水石炮 白礬枯

白附子炮 乾姜炮 各

右為細末麩糊丸如桐子大每服三十九丸溫生薑湯下

入醫學綱目卷三

食後

**法製**半夏用大半夏不拘多少湯洗七次去臍焙乾再

洗七遍用米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬

一兩半研溫水化浸上雷水兩指許頻攪冬月宜煖處頓

放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸二日

夜通七日盡取出再用漿水於慢火內煮勿令滾候漿水

極熟取出焙乾每服一二粒食後細嚼生薑湯下

石九方治濕痰滑而易出潔古所謂南星半夏勝其痰

而咳嗽自安者是也

**人參欬花散**治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰

涎嘔逆惡心腹脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽及遠年近

日一切嗽病諸藥不效並皆治之

款冬花 人參 五味子 紫苑



桑白皮各一兩 杏仁八錢 木香 枳榔

紫蘇葉 半夏湯送下 右為細末煉蜜為丸如鷄頭仁大每服一丸食後細嚼

淡姜湯送下 紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇 半夏 紫菀茸 陳皮 五味子各五錢 桑白皮一兩 杏仁六錢 兩桂炒黃

右為籠末每服三錢生薑三片水煎日三服

紫蘇飲子治脾肺虛寒涎痰咳嗽 紫蘇葉 桑白皮 青皮 五味子 麻黃 杏仁 陳皮 人參 半夏

右咬咀每服五錢水二盞姜三片煎至七分溫服

治肺感風寒作嗽紫蘇散 紫蘇 桑白皮 五味子 杏仁 麻黃 甘草 青皮各等

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

治嗽杏參飲 杏仁 欬冬花 前胡 半夏制 五味子 麻黃 柴胡 桑白皮 人參 桔梗各等

右為細末每服三錢水一盞半生薑五片同煎七分溫服

右利肺氣藥紫蘇麻黃表多者宜之

利膈丸主胃中不利痰涎咳嗽促利脾胃壅滯調秘

泄藏推陳致新化食治利膈氣之妙品也

木香 枳榔 藿香各一錢 甘草各五分 人參 當歸 厚朴各三錢 大黃酒洗 枳實各一錢

右為細末水丸桐子大每服三五十九

有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞以枇杷葉

木通欬花紫菀杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製

治訖同為末蜜丸如櫻桃大食後夜臥各含化一丸未終

劑而愈 右利肺氣藥加大黃脾胃壅滯者宜之

杏仁煎治哮喘寒熱少喘多而色不潤食少脉強紫

杏仁一兩去皮尖用童便浸一日一換夏月一日三換浸

半月取出洗淨焙乾研令極細每服一匙大用薄荷葉

白蜜少許水一盞煎食後服其不過兩劑水瘥

用童便浸杏仁七日漉出洗淨研成泥別入瓷瓶中換

小便煎成膏熱水下二錢瘥 用童便一升浸杏仁三升春夏七日秋冬二七日并皮

尖研細濾取汁煮令魚目沸候軟如麪糊即成用柳篋攪

勿令着底即以麻布攤乾為丸每服三五十九茶酒任下

肺帶痰嗽睡不安者 貝母 杏仁 右為細末砂糖入姜汁蒸餅丸含化 右童便浸杏仁利肺氣潤劑也津液枯少者宜之 潤下丸治氣實有痰又治積氣并大腸經氣滯痰嗽 陳皮去白 甘草 食鹽各五分 右以水拌令鹽水乾焙燥為末蒸餅為桐子大或為末 白湯點服立效 有人患氣嗽將期或教以橘皮生薑焙乾神麪等分末



為丸如桐子大食後夜以米飲服三五十丸兼患膀胱氣綠服此皆愈

**玉粉丸**治氣痰脉澁方見

**桔梗湯**除痰下氣舒胸脹滿痰逆惡心飲食不進

陳皮去 半夏製 桔梗炒 枳實炒

右末每服二錢水一盞生姜五片同煎七分去渣服

右用陳皮枳實氣克形實者宜之寒者加姜桂些少後

二方有星半痰澁甚者忌服夫形肥或有汗或脉緩體

重嗜臥之人咳者脾濕勝也形瘦或夏月無汗或脉澁

之人咳者肺燥勝也濕者宜白木蒼木茯苓之屬燥之

是也燥者宜杏仁瓜蒌之屬潤之是也

白木湯治咳嗽體重嗜臥脈緩前濕條白木丸亦治此病

白木 茯苓 半夏各等

右為末每服五分或半兩甚者加水二盞姜七片煎至

一半取清水調神麴末二錢服之病甚者玉壺丸大妙

水除根

白木散治夏暑大熱或醉飲冷酒痰濕不止膈不利

白木 茯苓 黃芩 半夏各等

右為末每服五錢水二盞姜三片同煎去渣調陳皮

神麴末各一錢食後服

**酒性**大熱不宜大飲酒味熱而引飲冷與熱凝於胃

中不散而成濕故痰作矣甚者吐之後與五苓甘露勝濕

去痰之劑

右三方白木燥濕半星勝痰形肥痰滑者宜之

**防風丸**治痰嗽胃中氣不清利者枳實丸亦治此症

**防風** 枳殼炒 白木一

右為末煨飯丸每服六七十丸姜湯下

**仁十二**孺人虛而有濕痰膈上有熱

白木 滑石各一 陳皮 木通五

黃芩三 甘草一 分六貼水煎服

七九嬌嗽有痰

蒼木一 半夏一 陳皮一 甘草二

茯苓五 桔梗二 姜三 煎服

治濕痰 蒼木三 白木六 香附一

右蒸餅丸

治肥人濕痰 苦參 半夏各一 白木二 陳皮一

右竹一服姜三片竹瀝與水共一盞煎食遠吞三補丸

十五丸

**羅**阜角化痰丸治癆風心脾壅滯痰涎感多喉中不利涕

唾稠枯喇塞吐逆不思飲食或時昏聩

枳殼二 天南星炮 白附子炮 半夏湯洗

白茯苓 人參去 赤茯苓去

白龍丸治酒積有痰

右為末神麴糊為丸

右七方白木蒼木白附子半夏燥濕枳殼陳皮利氣形

肥痰澁者宜之



宋徽宗妃苦痰面浮如盤李醫用蚌粉新瓦上炒令通  
放地上出火毒每半兩加青黛少許同淡鹽水滴入麻油  
數點調服而愈

寒痰 本草治喘嗽汗多者 草烏錢 麻黃錢

右為末每服三大錢蘿蔔一箇同煮令熟只喫蘿蔔妙

潤肺散 杏仁煎潤肺丸見燥痰條

貝母一兩 瓜萎仁兩 青黛錢

右為末姜蜜調成膏噲 抑痰丸 瓜萎仁兩 半夏錢 貝母錢

右為末炊餅丸如麻子大 咳逆上氣痰飲心痛 海蛤散見燥痰條

瓜萎仁兩 瓜萎仁兩 瓜萎仁兩

右為丸如麻子大白湯下 楊文治痰嗽利胸膈方瓜萎肥大者割開去子洗淨槌破

刮皮細切焙乾半夏四十九箇湯洗十遍槌破焙乾為末 用洗瓜萎實熱水并穰同熬成膏為丸如桐子大生姜湯

下二十九 溫脾湯治食飽則咳 甘草兩 大棗二十

右二味咬咀水五升煮水貳升溫分三服若咽中痛而 聲鳴者加乾姜一兩

甘肅丸治吃醋搶喉因成咳嗽不止諸藥無效用甘草 二兩去赤皮作二寸段中半壁開用猪膽汁五枚浸三日

取出火上炙乾為細末煉蜜丸每服四十九茶清吞下臥 服神效曾有人患此諸藥不效用此方一服愈

食積咳 丹飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎入韭汁就吞瓜萎仁七仁 連丸

治酒嗽 青黛 瓜萎仁 用蜜姜丸含化散肺毒也 食停積嗽非青黛瓜萎實不除有食積人面青白黃色不

常面上如蟹爪路一黃一白者是也 清金丸治食積嗽方見虛 瓜萎丸治食積痰滯喘咳

瓜萎實 半夏 山查 神麴各等 為末瓜萎穰水為丸竹瀝姜湯送下 又方治食積痰嗽 杏仁 蘿蔔子各二為末粥丸服

肺痿 肺痿專在養肺養氣養血清金 仲生薑甘草湯治肺痿咳吐涎沫不止咽燥而渴

生薑兩 人參兩 甘草兩 大棗十五 右四味以水七升煮取三升分溫三服

炙甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液液者用甘草一味 以水三升煮半升分三溫服

桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫 桂枝 生薑各三 甘草兩 大棗十

皂莢十枚去皮 右五味以水七升微火煮取三升分三溫服

肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然

肺痿 肺痿專在養肺養氣養血清金 仲生薑甘草湯治肺痿咳吐涎沫不止咽燥而渴

生薑兩 人參兩 甘草兩 大棗十五 右四味以水七升煮取三升分溫三服

炙甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液液者用甘草一味 以水三升煮半升分三溫服

桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫 桂枝 生薑各三 甘草兩 大棗十

皂莢十枚去皮 右五味以水七升微火煮取三升分三溫服

肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然

肺痿 肺痿專在養肺養氣養血清金 仲生薑甘草湯治肺痿咳吐涎沫不止咽燥而渴

生薑兩 人參兩 甘草兩 大棗十五 右四味以水七升煮取三升分溫三服

炙甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液液者用甘草一味 以水三升煮半升分三溫服

桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫 桂枝 生薑各三 甘草兩 大棗十

皂莢十枚去皮 右五味以水七升微火煮取三升分三溫服

肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然



者以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎吐甘草  
乾姜湯以溫之若服湯口渴者屬消渴

甘草四兩 乾姜二兩

右咳咀以水三升煮取一升五合去查分溫再服

右治肺痿症或咳沫或咳血今編咳沫者入此門咳血

者入咳吐血門

診

熱在上焦者因咳為肺痿肺痿之病從何得之師曰或從  
汗出或從喘吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥

下利重亡津液故得之

肺脹而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿也

肺脹

咳而上氣煩燥者為肺脹仲景云咳而上氣此為肺脹脈  
浮大者越婢加半夏湯主之又云肺脹咳而上氣煩躁而

喘脈浮者心下水小青龍湯加石膏主之二方並見喘門

八醫學綱目卷三六

丹肺脹而咳者用訶子青黛杏仁 訶子能治肺氣因火

傷極遂成壽暈脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂除

火之功佐以海石香附瓜蒌仁青黛半夏麴麥蜜調嚙之

便附用童 沙糖入姜汁蒸餅為丸清化丸方 肺脹而嗽或左

或右不得眠此痰夾瘀血礙氣而病宜養血以流動平氣

降火疎肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝之類

如血礙氣作嗽者桃仁大黃姜汁丸服

針灸

一法灸但可一邊眠者可左側者灸右足三陰交可右側

者灸左足三陰交立安

經治氣嗽久者亦主之生訶子一枚含之嚙津瘥後

不知食味煎檳榔湯服之便有味

補咳

丹定喘切方

訶子

百藥箭

荆芥各等分

為末姜蜜丸含化

治嗽切方 五味子半斤 甘草二錢 五倍子錢

風化硝 為末蜜丸乾含化

世治痰嗽并喘白礬飛五倍子等分為末每二錢猪肝煎

藥臨臥服

本化痰涎方 明礬二兩 白礬半兩 炒

右為細末生研薄荷令爛和丸如棗豈大每服二十九

薄荷湯下日三服

治遠年近日喘嗽用皂角不蛀者二大莖剉去黑皮切開

去子每子倉內入巴豆肉一粒合就麻皮縛定用生薑自

然汁和蜜塗令周匝慢火炙之又塗又炙以焦黃為度劈

開去巴豆以好明礬一兩枯過草麻七箇姜汁和蜜塗炙

前三味為末却以杏仁二兩去皮尖研成膏與煎藥和勻

每服一錢用柿餅灸過候冷蘸藥細嚼臨臥服忌魚鮮鮭

魚油麵酒米醋煎熱毒等物

右訶子五味五倍白礬例丹溪云黃昏嗽者火浮於肺

酸味飲而降之是也

九仙散治一切咳嗽

桑白皮 人參 桔梗 阿膠

五味子 烏梅 款冬花各一 貝母半

栗殼八兩 去蒂 炒 右為細末每服三錢白湯點服嗽住止後服

款花清肺散治咳嗽喘促胸膈不利不得安臥

人參去 甘草炒 白礬枯 烏梅和核

款冬花各一 甜葶藶一 川粟殼四兩 炒

右為細末每服二錢溫米飲湯調服食後忌油膩物多



言語損氣

人參清肺湯治男子婦人肺胃虛寒咳嗽氣急胸膈咽塞  
腹脇脹滿迫塞短氣喜飲冷咽嗝隱痛及癆肺痿勞嗽  
吐血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食

烏梅 地骨皮 人參 甘草  
阿膠 杏仁 桑白皮 知母

右吹咀每服三錢水一盞半入烏梅一箇同煎至一盞  
去渣溫服食後臨臥

人參款花散治咳嗽久不愈者

人參 款冬花 知母 貝母

右為末每服五錢烏梅同煎臨臥服

安肺散治痰嗽不問新舊

麻黃 甘草 御米殼 杏仁

右為末每三錢水一盞入烏梅一箇煎七分去渣溫服  
臨臥下

人參理肺散治喘嗽不止

麻黃 當歸 木香 御米殼

右吹咀每服四錢水煎

右御米殼烏梅例收後藥也

世治嗽貝母去心畧炒知母去毛各一兩巴豆霜十四粒  
為末和勻老生麥切如錢厚兩面蘸藥末臥嚼嚼時開口  
勿咽

手治咳嗽胸膈滿多喘上氣

生薑汁 砂糖

右二味煎姜汁減半納糖更煎服

咳嗽上氣厥在胸中過在手陽明太陰

海肺咳喘息而有音甚則吐血麻黃湯 太陽咳而遺矢

赤石脂禹餘糧湯桃仁湯不止用猪苓分水散 心咳心

痛喉中介介鯁狀甚則咽喉痺用桔梗湯 小腸咳而

失氣氣與咳俱失芍藥甘草湯 脾咳而

咳兩脇下痛甚不可以轉轉則兩脇下痛小柴胡湯

引肩背甚則不可以動動則咳劇升麻湯 胃咳嘔嘔甚

則長虫出烏梅丸 腎咳腰背相引而痛甚則咳涎麻黃

附子細辛湯 膀胱咳遺溺茯苓甘草湯 三焦咳腹滿

不欲飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣

逆錢氏異攻散

素咳煩寃者是腎氣之逆也 一陽發病少氣善

咳善泄 夏脉不及則令人上見咳唾下為氣泄

凡咳嗽面赤胸膈常熱惟於足下有涼時其脉洪者熱

痰在胸膈也宜小陷胸湯礞石丸之類清膈降痰甚而不

已者宜吐下其痰熱也面白悲噓或脇急脹痛或脉沉弦

細遲而咳者寒飲在胸膈也宜辛熱去之

世小陷胸湯治咳嗽膈有熱痰胸膈常熱者神效方見

丹黃連化痰丸

黃連 吳茱萸 陳皮 半夏

右為末麵糊丸如菴荳大每服百丸生薑湯下



右黃連半夏治痰嗽例

青礞石九去痰或痞痛經絡中有痰皆能治之

青礞石硝煨半夏二錢 風化硝二錢 陳皮七錢

白朮一兩 茯苓七錢 黃芩兩

右炒神麩姜糊丸

又方礞石丸治痰

礞石半兩 半夏七錢 南星 茯苓各五錢

風化硝二錢

右為末神麩糊丸

痰嗽化痰方

黃芩一兩半 滑石兩 貝母 南星各一兩

風化硝半錢 白芥子五錢

右為末湯浸蒸餅丸用淡云腦下痰非白芥子不能除

六醫學綱目卷三六

右風化硝佐礞石茯苓半夏治痰嗽例丹溪云礞石丸重在風化硝

瀝小黃丸治咳嗽面赤煩燥脉洪方見前

羅人參半夏丸化痰墜涎止嗽定喘或風痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏正頭風痰或壅頭目昏眩

耳聾鼻塞咽乾胸膈不利

人參 茯苓 天南星各半 半夏

乾姜 白礞 寒水石各一兩 蛤粉二兩

薄荷五錢 藿香二錢

右為細末水糊丸如桐子大每服三十九生薑湯下食後日三服

金珠化痰丸治痰熱安神定志除頭痛眩暈心怔忡恍惚胸膈煩悶涕唾稠粘痰實咳嗽咽膈不利

生龍腦研細 皂莢仁炒 天竺黃研 金箔研

白礞二兩 半夏四兩

右阜角仁半為末與諸藥同拌勻生薑自然汁為丸如桐子大每服三十九生薑湯下食後臨臥

人參清金丸治熱止嗽消痰定喘

柴胡 人參各一兩 黃芩 甘草各五錢

半夏各七錢 麥門冬 青黛 陳皮各二錢

五味子二錢 右為細末水麩糊為丸如桐子大每服三十九溫白湯下食後

肺皆受寒邪涎出口甘水反侮上寡於畏也腹中大寒病名曰寒中痰白作泡肺中氣虛而為大寒子助母也當於肺中瀉腎水非辛熱之藥不退也口甘涎沫者胃中寒而不和以辛甘熱去之飲酒者多有此反化

半夏溫肺湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜常多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉弦細遲

旋覆花 人參 細辛 桂心

甘草 陳皮 桔梗 芍藥

半夏糊 赤茯苓三

右咬咀每服四錢姜三片煎食後服

丁香半夏丸治心下停飲冷痰頭目眩暈睡臥口中多涎

枳殼三 丁香 半夏各一兩 細辛

六醫學綱目卷三六

七



乾姜 人參各五

右為細末生薑汁糊為丸如桐子大每服二十九姜湯

下日三服食後

羅溫胃化痰丸治膈間有寒脾胃停飲胸膈不快痰涎不

半夏兩三 陳皮白 乾姜炮 白朮各二兩

右為細末生薑麩糊為丸如桐子大每服二十九生姜

湯下不拘時

潔姜桂丸治咳嗽面黧黑足寒脈沉方見前

局胡椒理中丸治脾胃虛寒咳嗽氣急逆氣虛痞不能食

嘔吐痰水

款冬花去枝 薑棧 陳皮 乾姜炮

良姜炒 甘草炙 細辛去 胡椒各四

人醫學綱目卷三十六 六

白朮 右末煉蜜丸如桐子大每服三十九溫湯下

仲吳茱萸湯方見

潔夏月嗽發寒熱者謂之熱嗽用小柴胡湯三兩加石膏

七錢知母三錢治之見傷寒方 冬月嗽而發寒熱者謂

之寒嗽用小青龍湯加杏仁治之方見

丹火嗽宜清金化痰丸 清化痰丸與清金丸同用專治熱

嗽及咽痛蓋苦能燥濕熱輕能治上取燈籠草葉為細末

蒸餅為丸每服三五十丸 燈籠草即苦乾草其結 清金

丸一名與點丸去肺火降膈上熱痰與清化痰丸同用黃芩

一味炒為末水丸服 痰因火動逆上作嗽者先治火次

治痰用知母止嗽清肺金滋陰降火 火鬱嗽用訶子海

石瓜萎仁青黛半夏香附以開之 喘嗽不拘老幼久近

上藥等疾槐花為末滴水丸如桐子大熱水或姜湯下不

拘時

羅柴胡飲治虛勞羸瘦面黃無力減食盜汗咳嗽不止

柴胡兩 五味子錢 地骨皮半兩 鱉甲一兩

知母兩

右為細末每服二錢入烏梅二枚青蒿五葉水煎去查

服

本又方治勞嗽虛症及鼻流清涕耳作蟬鳴眼見黑花一

切虛症丈夫婦人皆可服少年亦不妨

五味子兩 鱉甲兩 地骨皮兩

右為末煉蜜丸如桐子大空心食前溫酒或鹽湯任意

服三五十九婦人醋湯下此方乃曲江人家秘方余服

之大有功效處方有理甚妙

人醫學綱目卷三十六 九

海易簡杏子湯治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞

咯血痰飲停積皆治療

人參 半夏 茯苓 細辛

乾姜 甘草 桂枝 芍藥

五味子各等

右咳咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉二皮姜三

片煎至六分去查溫服 若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用粟殼去筋膜剉碎以醋淹炒等分加

之每貼加烏梅一枚煎服其效尤驗嘔逆惡心者不可

用此 若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃

芍藥乾姜五味子各增一半一名小青龍湯

潔古水黃金花丸治咳嗽多怒 天麻丸 羅氏化痰玉

帶丸已上三方



丹搜風化痰丸

人參

殭蚕

槐角

白礬

天麻

陳皮法

荆芥各一

半夏四兩

辰砂兩

右為末姜汁研蒸餅為丸除辰砂為衣每四十九姜湯

羅延壽丹治風壅痰嗽或寒痰咽膈不利

天麻兩

枸杞兩

明礬生半兩乾姜一兩

右為細末酒和成劑再用蒸餅裝定於籠內蒸熟去麩

局防風丸治風痰上攻頭痛惡心項急目眩旋暈痰涎壅滯昏憤

天麻酒浸

甘草炙

川芎洗

防風各一

朱砂五錢

右為末每兩作十九朱砂為衣每服一九荆芥湯化服

茶亦得不拘時

川芎九消風壅化痰涎利咽膈清目頭痛旋暈

川芎

薄荷去土各桔梗兩

防風兩羌活一兩

右為末煉蜜為丸每兩半作五十九每服一九細嚼臘

茶清下食後臨臥

河間防風通聖散加半夏治風痰咳嗽方見手縉湯方見

潔古治痰嗽不能飲食者厚朴湯治之方見大便

山喘嗽白殭蚕為末姜汁清茶調服臨臥下

潔治痰嗽能飲食者大承氣湯微下之方見

州陰虛咳嗽四物湯加竹瀝姜汁主之陰分嗽者多屬

陰虛治之用知母止嗽勿用生薑以其辛散故也 肺虛嗽甚此好色腎虛者有之人參膏以陳皮生薑佐之

羅團參散治脉氣不利治咳喘止嗽

紫團參

款冬花

紫苑茸

右為細末每服一錢水一盞烏梅一枚同煎七分去查

温服食後

人參款冬花膏治脾胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎

一切咳嗽諸藥不效者

款冬花法

人參法

五味子法

紫苑法

右為細末煉蜜和丸如鷄頭大每服一九食後細嚼淡

姜湯送下或一九分作四服含化亦得

食治咳嗽不瘥者黃明膠炙令半焦為末每服一錢七人

參末二錢七用豆豉湯一盞八分葱少許入銚子煎一兩

沸後傾入蜜過咳嗽時呷三五口

本治十六般哮喘

黃明膠炙

馬兜零

甘草炙

半夏姜汁浸

右為細末每服一大錢水一盞煎至七分臨臥食後服

隨病有湯使為引

心嗽面赤或汗流加乾葛煎早飯後服 肝嗽眼泪出

加烏梅一枚大米十四粒煎 脾嗽不思飲食或一兩

時惡心入生薑二片煎 胃嗽吐逆酸水入蛤粉煎

膽嗽令人不睡加茯神五分茶清調下 肺嗽上喘氣

急入桑白皮煎 膈咳嗽出痰如真塊生薑汁調藥噤



下 勞嗽入秦芩末同煎 冷嗽天曉嗽甚慈白三十  
同煎 血嗽連頓不住常歸末棗子同煎 暴嗽涕唾  
稠粘入烏梅生薑同煎 產嗽背脚疼痛甘草三寸黃  
蠟少許同煎 氣嗽肚痛脹滿入青皮去白同煎 熱  
嗽夜甚蜜一七慈白同煎 哮喘喉如拽鋸入半夏三  
枚同煎 腎嗽入黃芪白飴糖同煎  
上件十六件般嗽痰依法煎服無不效驗此方乃京都  
一家專治此疾因中官厚賂方始得傳屢試有效  
右人參治嗽例

丹有一子三十餘久瘧虛甚盜汗得嗽嗽來便熱夜甚

甘草 防風 黃連

人參 乾姜 黃芪 白水煎服

里成人多嗽怠惰脉不數兩手脉大而長此勞症無熱

白木 陳皮 蒼木 茯苓

神麴 川芎 黃芩 五味子

芍藥 黃芪 甘草 用生薑二片同煎

陳孺人九十餘歲嗽或發或止發時有清痰寒熱作食少  
面虛浮淡黃色

陳皮 青皮 白木 芍藥

麻黃 木通 乾姜 黃芩

甘草 防風 分七貼五味子七粒煎三之一

雲補肺湯治勞嗽

桑白皮 熟地 人參 紫苑

黃芪 五味子

右為末每服三錢水煎入蜜少許食後

同款花補肺湯治年高氣弱肌體瘦困短氣遇秋冬咳嗽  
大作夜間尤甚三五百聲不絕春夏稍緩

黃芪 甘草 當歸 佛耳草

欬花 陳皮 丹皮 黃栢

蒼朮 麩末 右咳咀每三錢水煎去查稍熱食後服

清肺湯除濕熱治金火嗽

黃芪 蒼朮 防風 歸身

茯苓 五味子 陳皮 青皮

澤瀉 黃栢 右剉如麻豆每服五錢水煎去查稍熱臨臥服

瀉火補肺湯治金火嗽五六月間嗽

五味子 黃芪 人參 甘草

陳皮 麥門冬 青皮 升麻

蒼朮 歸身 右剉如麻豆大每服五錢水煎去查稍熱服

右參芪朮治嗽例後三方黃芪為君氣虛甚者宜之膈  
滯食少者忌服

丹蛤蚧丸治肺臟內傷咳嗽氣急久不除漸羸瘦

蛤蚧 細辛 甘草

阿膠 熟地 麥門冬

為末蜜丸每兩作十五丸每一丸食後含化

右蛤蚧丸久嗽不愈者宜之

羅大利膈丸治風痰實喘咳嗽風氣上攻

牽牛 半夏 木香 青皮

下 胃 痰 下 胃 痰 下 胃 痰



槐角 檳榔 大黃各三 皂角去皮各三

右為細末生薑麩為丸每服五十九生薑湯下

丹墜痰九治痰飲

枳實 枳殼一兩 明礬三錢 朴硝三錢  
猪牙皂角二錢 黑牽牛半斤取

右為末蘿蔔子汁為丸每服四十九鷄鳴時服初有痰次有痰

右下痰用大黃牽牛有熱者宜之

世治久嗽痰積半夏二兩用江子五錢敲損同煮至半夏無白心去江子不用杏仁一兩用烏梅半兩同煮去烏梅不用止將半夏杏仁焙乾為末煉蜜丸如菜豆大量虛實服後下痰積

羅透羅丹治痰實咳胸膈不利

皂角兩錢 蘇子微 半夏湯洗各 巴豆去油 大黃一兩 杏仁炒 一兩

右為細末生薑自然汁九如桐子大食後生薑湯送下

二十九咳嗽甚者三四服必效

丹治痰嗽喘

南星錢 半夏 滑石錢三 江子五粒 輕粉少

右用皂角仁浸濃汁九梧子大每服七十九

本治諸般痰嗽

半夏一兩 天南星兩 白礬兩 煨礬二 杏仁去皮 青黛各半 猪牙皂角去黑皮并 巴豆一兩

右一處為不姜糊丸如菜豆大每服七十九臨臥姜湯下小兒五九

丹青金丸治食積火鬱嗽

貝母 知母兩 巴豆霜

右為末姜汁丸青礬為衣

右下痰用巴豆有寒者宜之前一方可服

溼欬氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫

青皮 陳皮 檳榔 木香 杏仁 茯苓 郁李仁法 川歸 廣茂 馬兜零炮 葶藶錢三 人參 防已各四 牽牛兩末

右為細末姜汁麩糊丸如桐子大每服二十九加至七十九食後姜湯送下

羅紫參散治肺氣虛咳喘急胸膈痞痛脚膝微腫

人參二錢 蛤蚧一對 白牽牛炒 甜葶藶炒 木香 苦葶藶炒 檳榔錢五

右為末用熟棗肉丸每服四十九煎人參湯下食後

右下痰用檳榔木香佐牽牛葶藶郁李仁久嗽面浮足腫者宜之

孫兆視雷道矩病吐項間已及一升喘咳不已面色青黯精神不快兆與服仲景葶藶大棗湯一服訖已覺胸中

快利畧無痰唾矣

本治氣喘咳嗽

大黃 葶藶一兩 右為末煉蜜丸如桐子大每服五七十九桑白皮湯下 右下痰用葶藶為效極速虛人忌用



仙咳家其脉弦為有水十棗湯主之 有支飲家欬煩胸中痛不卒死至一百日或一歲宜十棗湯

丹伯温年近四十滋味厚素患咳嗽有痰與通神九神木丸和勻食前生薑湯下五六十九後以津嚥小胃丹十五九日服六服

右十棗湯下痰仲景法也虛人審之丹溪變十棗為小胃丹而少服徐法也

脉欬而時發熱脉弦者非虛也此為胸中寒實所致也當吐之咳家其脉弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐之其脈沉者不可發汗

子和稀涎散 三聖散 仲景瓜蒂散已上三方並右吐熱痰法輕者但用芫花杏仁蘿蔔子姜汁入酸漿汁探吐之

八寶丹 卷之六 主治

右三味為末水調餅子慢火炙黃再研令細每服一字用井花水調一大呷空心服良久吐出為度小兒加減與之忌食毒物

右吐寒痰法丸用藜蘆瓜蒂吐不透者用附尖神效

子和常仲明病寒熱往來時咳一二聲面黃無力懶思飲食夜多寢汗日漸瘦削諸醫作虛損治之用二十四味燒

肝散麻茸牛膝補養二年口中痰出下部轉虛戴人斷之曰上實也先以涌劑吐痰二三升次以柴胡飲子降火益

水不月餘復舊此症何名乃經中云二陽病也二陽之病發心脾不得隱曲心受之則血不流故女子不月脾受之

吐下兼

則味不化故男子少精此二症名異而實同仲明之病味不化也 馳口鎮一男子年二十餘歲病勞嗽數年其聲欲出不出戴人問曾服藥否其人曰家貧未嘗服藥戴人曰年壯不妄服藥可治先以苦劑涌之次服舟車瀉丸大下之又服重劑果瘥 一田夫病勞嗽一涌一世已減大半次服人參補肺湯臨臥更服栝榔丸以進食

右吐下兼施以攻其痰也

本治勞嗽 青黛 辰砂 雄黃 白礬 信生用

右並為末淡豆豉一百粒湯浸去殼研如膏入前五味丸如桐子大每服一九臨臥冷茶清下

治遠年近日喘嗽 八寶丹 卷之六 主治

蠅蛇 五靈脂 砥生 雄黃生 杏仁 去皮尖輕粉 淡豆豉 四十馬兜零 生一

右研除出輕粉另研餘為末用生薑棗釀自然汁合輕粉諸藥為丸如小彈大每服一九臨臥細嚼生薑湯送下

右用信劫痰例蓋為寒濕痰設也

運氣 運氣咳有二 一日火經云少陽司天之政初之氣候乃大溫其病氣拂於上欬逆二之氣火反勝白埃四起其病熱鬱於上欬逆

三之氣炎暑至民病咳終之氣風乃至其病陽氣不蔽而咳是也

二曰燥熱經云少陰司天之政水火寒熱持於氣交民病咳喘三之氣大火行寒氣時至民病咳喘此上熱下燥為



哮喘也終之氣燥令行餘火內格咳喘此外燥包熱

雜方本治諸嗽久不瘥貝母湯

貝母一兩去心 黃芩半兩 乾姜兩生 五味子

陳皮兩 桑白皮兩 半夏 柴胡

桂心兩 木香 甘草各一分

右為粗末每服五錢水一盞半加杏仁七箇去皮尖生

姜七片煎去查熱服有姓蔣者其妻積年嗽制此方授

之一服瘥以治諸般嗽悉愈

右方有寒有熱有收有散諸嗽通用也

蘇黃帝問曰肺之令人欬何也岐伯對曰五臟六腑皆令

入欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也

皮毛先受邪氣邪氣以從其合也此邪從外受之其寒

六腑皆受其寒

飲食入胃從肺脈上至於肺則肺寒寒邪從肺寒則外內

合邪因而客之則為肺欬所謂肺先受邪也五臟各以其時受病

以治時用治春心治夏肺治長感於寒則受病微則為欬

其則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏

則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰

何以異之岐伯曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則吐血

也心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉

痺也肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則

兩胛下滿也脾欬之狀欬則右脇下痛陰陰引肩背

甚則不可以動動則欬劇也腎欬之狀欬則腰背相

引而痛甚則欬涎大也帝曰六腑之欬奈何安所受

病岐伯曰五臟之久欬乃移於六腑脾欬不已則胃受之

胃欬之狀欬而嘔甚則長虫出取三里肝欬不已則

受之膽欬之狀欬嘔膽汁取陽陵泉肺欬不已則大腸受之

大腸欬狀咳而遺矢取巨虛心欬不已則小腸受之小腸

欬狀欬而失氣氣與欬俱失取巨虛腎欬不已則膀胱

受之膀胱欬狀欬而遺溺取委中久欬不已則三焦受之

三焦欬狀欬而腹滿不飲食飲此皆聚於胃關於肺使人

多涕唾而面浮腫氣逆也取支溝帝曰治之奈何岐伯曰

治臟者治其俞治腑者治其合浮腫者治其經見欬

治欬者治天突肺俞二穴泄火熱瀉肺氣

嗽灸兩乳下黑白際各百壯即瘥又以滿當乳頭周匝

圓身令前後正平當脊骨下解中灸十壯又以繩橫量口

中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報三日畢兩邊者

是合度

八醫綱目卷二六

五

治咳嗽

身柱三分瀉 至陽三分瀉取後六肺俞一分瀉取後六

俱是虛補實瀉 又法 風門一分瀉取後六向

咳嗽喘滿氣急不食容顏黧黑流涕涕 風門取後六

補之 巨關取後六太淵取後六期門取後六下皖

瀉之 中皖取後六絕骨取後六支

溝取後六使取後六使取後六使取後六

婦人咳嗽寒熱往來風寒嘔逆勞疸中滿喘急

風門取後六太淵取後六中皖取後六使取後六

效 絕骨 曲池取後六間使取後六使取後六

甲欬逆上氣舌乾脇痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘

尺澤主之 咳乾嘔煩滿俠白主之 欬上氣喘不息得

暴痺內逆肝肺相搏鼻口出血身脹逆息不得臥天府主



之 欬逆上氣喘不得息嘔吐胸滿不得飲食輸府主之  
 欬逆上氣涎出多吐呼吸喘悸不得安或中主之 胸  
 滿咳喘不得息嘔吐煩滿不得飲食神藏主之 欬逆上  
 氣魄戶及氣舍主之 欬逆上氣譫譫主之 胸脇痞滿  
 不得俛仰飲食不下咳唾沫膿周榮主之 欬而泄不欲  
 食者商丘主之 凄凄寒咳吐血逆氣入心痛手陰都主  
 之 欬而胸滿前谷主之 欬逆上氣吐沫天容及行間  
 主之 欬逆不止三焦有水氣不能食維道主之 欬而  
 赤熱支滿主之 欬逆上氣咽喉腫呼吸短氣喘息不  
 通水突主之一 欬上氣喘暴痞不能言及舌下挾縫  
 青脈頰有大氣喉痺咽中乾急不得息喉中鳴翕翕寒熱  
 項痛肩痛胸膈腹皮熱短氣短氣短氣短氣短氣短氣  
 熱身肉盡不仁天突主之 欬逆上氣喘不能言華蓋主  
 之

入醫經卷三六

年

診  
 成無已云欬者欬之欬俗謂之嗽者是也肺主氣形寒  
 飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈咽令喉中  
 溼淫如痒習習如梗是冷嗽甚者續續不已連連不息坐  
 臥不安言語不竟動引百脈咳聲聞四近矣聲枯與切  
 肺痿欬唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也  
 嗽咳肺脹壅遏不得眠者難治  
 人嗽十年其脉弱者可治實大數者死其脉虛者必苦  
 胃其人本有支飲在胸中故也治屬飲家 上氣面浮腫  
 肩息其脉浮大不治又加利尤甚 脈浮短者其人肺傷  
 諸氣微少不過一年死法當嗽也 欬嗽羸瘦脈形堅大  
 者死  
 欬而脫形身熱脉小堅急以疾是逆也不過十五日死

忌

上氣脉數者死謂其形損故也 欬嗽脉沉緊者死浮  
 直者生浮軟者生小沉伏匿者死

欬嗽口燥咽乾有痰不用半夏用瓜蒌貝母飲水者不  
 用瓜蒌恐泥膈不快

乾咳嗽

乾咳嗽者無痰有聲是也此症本於氣滯滯微者連咳十  
 數聲方有痰出濇甚者雖咳十數聲亦無痰出是為乾咳  
 嗽也

開

乾咳極難治此係火鬱之症乃痰鬱其火邪在中用  
 苦桔梗以開之下用補陰降火之劑不已即成勞倒倉法  
 好此不得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒栝之  
 類

氣滯 甘桔湯此仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰吐膿血  
 用生甘草加減二十餘條甘桔湯方用桔梗三兩  
 欬逆氣者加陳皮 欬嗽者加貝母知母 欬發渴者  
 加五味 吐膿血者加紫苑 肺痿者加阿膠 面目  
 腫者加茯苓 嘔者加生姜半夏 少氣者加人參麥  
 冬 膚痛者加黃芪 目赤者加梔子黃連 咽痛者  
 加鼠粘子竹茹 聲不出者加半夏桂枝 疫毒頭腫  
 者加鼠粘子大黃芒硝 胸痛膈不利者加枳殼 心  
 胸痞者加枳實 不得眠者加梔子 發狂者加防風  
 荆芥 酒毒者加葛根陳皮

入醫經卷三六

年

實熱

一中年婦人乾欬寸脉滑動似葶狀餘皆散大不浮左大  
 於右每五更心躁熱有汗但怒氣則甚與桔梗不開諸藥  
 不效遂以石膏香附為君冬連青黛門冬瓜蒌實陳皮炒



**補肺法**  
 栢歸梗為臣五味砂仁川芎紫苑佐之凡二十餘貼而安  
 潔古蜜煎生薑湯蜜煎陳皮湯與燒生薑胡椒方皆治無  
 痰而嗽者以辛甘潤其肺也如但使青皮藥皆宜去白本  
 草云陳皮味辛理上氣去痰氣滯塞青皮味苦治下氣二  
 味俱用散三焦氣也故聖惠法治云陳皮去穢穢不除即  
 生痰麻黃發汗節不去則止汗

**治久嗽方**  
 白蜜一斤 生薑一斤  
 右二味先秤銅銚知斤兩訖納蜜後秤如數次納薑汁  
 以微火煮令姜汁盡惟有蜜斤兩在則止且服如棗大  
 含一九日三服忌一切雜食

**咳喉中作聲**  
 一男子五十餘歲病傷寒咳嗽喉中聲如鋸與獨參湯一  
 服而軒聲徐至二三貼咳嗽亦漸退凡服二三斤病始全  
 愈

**治久患嘔啞咳嗽喉中作聲不得眠取白前搗為末溫  
 酒調二錢七**  
 射干三兩 麻黃 生薑各四 細辛  
 紫苑 款冬花各三 大棗七 五味子  
 半夏各半  
 右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥

**喉如肝**  
 喉如肝  
 喉如肝

煮取三升分溫三服  
 白前湯款逆上氣身體浮腫短氣腫滿且夕倚壁不得  
 臥喉中水雞鳴

**白前** 紫苑 半夏 大戟各三  
 右咬咀以水一斗浸一宿明旦煮取三升分三服

**陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起則重肺使  
 人喘鳴**  
 起居如故而息有音者此肺之絡脉逆也  
 脉絡不得隨經上下故雷經而不行絡脉之病人也微故  
 起居如故而息有音也

**督脉生病其上氣有音治其喉中央在缺盆中者**  
 病上衝喉者治其漸漸者上俠頤也  
 咳嗽中鳴唾血大鍾主之 胸脇支滿不得俛仰瘖瘖  
 欬逆上氣喉咽喝喝有聲太溪主之 咳逆上氣咽喉喝  
 喝喘息挾痰主之

**治暴熱嗽方**  
 杏仁 紫蘇子一升 陳皮一兩 柴胡四兩  
 右咬咀以水一斗煮三升分三服

**暴嗽白蜺殼洗淨研細粥飲下**  
 右先將砒霜安放茶盞內却將白礬末鋪蓋火煨為末  
 烏梅肉丸如葶藶大朱砂為衣每服二丸紫蘇湯下

**治暴嗽**  
 砒霜一錢 白礬一兩  
 右先將砒霜安放茶盞內却將白礬末鋪蓋火煨為末  
 烏梅肉丸如葶藶大朱砂為衣每服二丸紫蘇湯下

**肺受風寒久嗽非此不能除南星款冬花鷲管石佛耳草  
 雄黃為末拌艾以姜一厚片雷舌上次用艾上燒之須令**



煙入喉中一方無佛耳草有爵金 又方鴉管石雄黃各一分半另為末欵花佛耳草各一分半另為末却用紙一幅方方闊四五寸以鷄子清塗其中央四旁各懸一寸許不塗然後以鴉管石雄黃摻於鷄子清上又以欵花佛耳草末摻其上覆之又以一箭筋從不塗紙旁捲起為一紙筒用糊粘牢其旁抽箭筋出焙乾用時將一紙筒含在口一頭火燒以口吸煙令滿嚥之嚥至燒筒盡為度却喫茶二三口壓之

霍療久嗽藥法每旦取欵花好鷄子少許蜜拌花使潤納一升鐵鑊中又用一瓦碗鑽一孔孔內安小竹筒或筆管亦得其筒稍長置碗鑊相合及挿筒處皆糊塗之勿令泄氣鑊下着炭火少時欵冬煙自竹管出以口含筒吸取嚥之如胸中稍悶須舉頭即將指頭捻竹筒頭勿令漏煙

氣出及煙盡止凡如是五日一為之至六日則飽食羊肉銀鮑一頓永瘥一法不用鑊碗用有嘴瓦瓶燒藥蓋住瓶口却以口於瓶嘴吸煙嚥之尤捷

枳殼炒三兩 桔梗二兩 黃芩一兩  
右為細末每早取二兩半水三盞煎至一盞日作三服午時一服中時一服臥時一服三日七兩半服盡又服半夏湯

生半夏湯用半夏製切片每三錢半水盞半姜五片煎至一盞食後服一日二三服二三日服了再服枳殼丸盡其痰為度論曰先消胸中痰氣後去膈上痰再與枳木丸謂首尾合治盡消其氣令痰不復作也

久嗽丸子  
海蛤粉細研 膽星臣 杏仁臣 訶子佐

青黛佐 皂角使  
右為末姜汁丸如桐子大姜湯下久嗽乃積痰久雷肺腕粘滯如膠氣不能升降或挾濕與酒而作

香附童便 姜蚕炒 海蛤粉 瓜萎仁  
蜂房 杏仁 姜汁 竹瀝  
神麩各等

右為末蜜調噙化  
謝老人形實夏月無汗成久嗽痰  
半夏制 紫蘇葉各一兩

右二味入莎末蜆殼末神麩末以瓜萎穰桃仁半兩和丸先服二拘湯三貼方服此丸子  
男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘥後得痰嗽次

年夏末得弦脉而左手虛叩之必汗少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與下項方藥仍灸大椎風門肺俞五處  
半夏兩 白木錢 茯苓錢 黃芩  
陳皮 桔梗 枳殼 石膏煨各半兩

右用神麩糊丸姜湯下三十九丸先與三拘湯加黃芩白木二貼夜與小胃丹十九丸以攪其痰  
潔古欵氣丸治久嗽浮腫 羅氏紫參散用蛤蚧衍義云蛤蚧治久嗽有功

馬兜鈴丸治多年喘嗽不止大有神功  
馬兜鈴去 半夏湯洗七次 杏仁去尖尖 麩各一兩  
巴菝二十一粒

巴上除巴菝杏仁另研外餘為細末用皂角膏子為丸



如桐子大雄黃為衣每十九臨臥煎烏梅湯下以引為度

壬治三十年咳嗽或飲或咳寒氣嗽雖不同悉治之

細辛 欬冬花 防風 紫苑各三

蔡蘆二 川椒五

右六味咬咀取蔡蘆先着銅器中大紫苑次細辛次欬

冬花次椒以大棗百枚間在諸藥中以水一斗二升微

火煮令汁盡出棗曝令燥鷄鳴時服半棗不知明旦服

一枚以胸中溫溫為度若強人欲嗽吐者可少增服之

便吐膿裹結痰吐後勿冷飲食咳愈止藥藥勢靜乃食

不爾令人吐不已

治久嗽不瘥方 兔屎九粒 礪砂一分 胡桐淚一分

右三味為末蜜和丸如桐子大每服三九以粥飲下日

三吐冷物盡即瘥

丹蛤蚧丸治久嗽方見陽虛效驗 又方衍義治久嗽膿血胸膈

噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一兩除膠外皆

為屑次入膠河水三升煮半升臨臥細呷愈詳見效驗 療三

十年嗽以百部根二十斤搗絞取汁煎之如飴服方寸七

日三服驗

百一治久咳嗽上氣十年諸藥治不瘥方以蝙蝠除翅足

燒令焦為末飲服之

妊娠嗽

雲馬兜鈴散治妊娠胎氣壅塞欬喘急

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草

貝母各五 陳皮白 大腹皮 桑白皮

紫蘇各一 五味子各五

右咬咀每服四錢姜三片水煎

麻黃散治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃各五 陳皮白 前胡各一 半夏各五

人參 白朮 枳殼 貝母

甘草各半

右咬咀每服四錢葱白五寸姜三片棗一枚水同煎

紫苑湯治妊娠咳嗽不止胎不安

紫苑 天門冬各一 桔梗各半 甘草

杏仁 桑白皮各二 右咬咀每服三錢竹茹一塊水煎去渣入蜜半匙再煎

二沸溫服

天門冬各一 貝母 人參 甘草

桑白皮 桔梗 紫蘇各半 赤茯苓各二

麻黃各半

右咬咀每服四錢姜三片水煎

醫學綱目卷之二十六



醫學綱目卷之二十七 肺大腸部

六法

喘 喘不得臥 產後喘 短氣 少氣

凡治嗽 未發以扶正氣為要 已發以攻邪氣為主

嘗治一中年男子久嗽每發時不食數日澄椒四餅百

治不効脈寸沉伏關滑遂於未發時用人參白朮當歸地

黃以姜汁制之瓜蒌實陳皮茯苓黃芩連乾姜些少煎

湯下青礞石九將發時先用神祕沉香丸下之次與前藥

中加杏仁枳實蘇葉倍瓜蒌實煎服一月後証減十分之

八後遂守此方漸安凡治數人皆以此法加減治之皆得

大効 氣虛短氣而喘有痰亦短氣而喘不可用苦寒之

藥火氣盛故也 宜導痰湯加干縷湯 陰虛自少腹下火

起衝於上而喘者宜降心火補陰 有火炎上者宜降心

火清肺金 有痰者宜降痰下氣為主 上氣喘而躁者

為肺脹欲作風水症宜發汗則愈 有陰虛挾痰喘者四

物湯加枳殼半夏補陰降火 諸喘不止者用椒目研極

細一二錢生姜湯調下切之氣虛不用 又法用蘿蔔子

蒸熟為君皂角燒灰等分為末姜汁加煉蜜丸如小豈大

每噙化五七十九粒止之後因痰治痰因火治火 氣虛

者用人參蜜炙黃柏麥冬地骨皮之類 氣實人因服黃

芪過多而喘者用三拗湯以瀉氣若喘甚者須用阿膠

若久病氣虛而發喘者宜阿膠人參五味補之 新病氣

實而喘者宜桑白皮苦葶藶瀉之 治哮喘主于痰宜吐

法不可用涼藥必帶表散

肺脹膨脹而喘咳留膈滿壅盛而上奔者於隨証用藥

方中多加五味子人參次之麥門冬又次之黃連少許

如甚則交兩手而背者其氣大虛也若氣短加黃芪五味

子人參氣盛去五味子人參加黃芩荆芥穗冬月去荆芥

穗加草薢薏仁

火逆上氣咽喉不利止逆下氣宜麥門冬湯主之

麥門冬 半夏 人參 甘草

粳米 大棗 右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一

服

天門冬丸治婦人喘嗽手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲

面目浮腫

天門冬 十兩 麥門冬 八兩 生地 三斤 取

右三味為細末膏子為丸如桐子大每服五十九粒送

散下道遙散須去甘草加人參或與王氏博濟方人參

荆芥散亦得如面腫不已經曰面腫因風故宜汗麻黃

桂枝可發其汗後與柴胡飲子去大黃然論曰治臟者

治其膈治腑者治其合浮腫者治其經治膈者治其土

也治合者亦治其土也如兵圍魏救趙之法也

治欬嗽上氣喘急以人參一味為末鷄子清投新水調

下一錢昔有二人同走一舍人參一不合俱走三五里許

其不合者大喘合者氣息自如此乃人參之力也

右用門冬五味入參三味為主治肺虛或自汗或少氣

而喘蓋聖藥也

予治一婦人五十餘歲素有痰嗽忽一日大喘痰出如泉

身汗如油脈浮而洪似命絕之狀予適在彼連用麥門冬

四錢人參二錢五味一錢五分煎服一貼喘定汗止三貼

後痰亦漸少再與前方內加瓜蒌仁一錢五分白朮當歸

芍藥黃芩各一錢服二十餘貼而安此實麥門冬五味人



參之功也如自汗兼腹滿脈沉實而喘者裏實也宜下之  
 上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈 然而上  
 氣此為肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者越婢加半夏湯  
 主之

麻黃六 石膏半 生姜兩 大棗十五

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分溫三服

七三喘喘遇冬則發此寒包熱也解表則熱自除

枳殼三錢 麻黃 防風 黃芩

桔梗各二 陳皮 木通一錢半通利九

紫蘇五

右分四貼煎取小半盞熱飲之

治寒包熱而喘必用發散

半夏 枳殼炒 桔梗 黃芩炒

紫蘇 麻黃 杏仁 甘草

如天寒加桂枝

女子十二歲自小喘嗽

白朮 陳皮 青皮錢五 麻黃

茯苓 木通 片苓錢三 蒼朮

桔梗錢二 乾姜錢一 甘草錢五

一男子年一十四歲哮喘十日則發一遍此疾在上焦不得

汗洩正當九月十月之交宜溫散仍與小胃丹佐之溫散

加

麻黃 黃芩

每貼用一錢半入姜汁研細末以水盞半煎去渣飲之

每夜臨臥時與小胃丹十二粒津下之  
 肺脹欬而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍加  
 石膏主之

麻黃 芍藥 枝枝 細辛

甘草 乾姜各三 五味子 半夏各半

右九味以水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥煎取三升

強人服一升羸者減之日三服小兒服四合

麻黃定喘湯小兒寒喘喘喉鳴腹內鳴堅滿鼻流涕

脈沉急而數

麻黃 草薺卷 益智仁各一兩

甘草 歸身 紅花 黃芩生

柴胡稍分 一升麻 神麩各五 吳茱萸分

蘇木分 全蝎一

右吹咀分二服水二大盞煎至七分去渣稍熱服食後

忌風寒微微有汗効

麻黃蒼朮湯治秋暮冬天每夜連聲嗽不絕大喘至天明

日高方緩口苦兩脇下痛臥而多驚驚悸肢節痛痰吐涎

沫日晚呵欠不能飲食

柴胡根 羌活根 蒼朮各五 麻黃分

防風根 甘草根生 歸稍 黃芩各四

熟甘草分 五味子分 草薺卷分 黃芪分

右發表治喘前五方發寒包熱也後三方發外中皆寒

也

四磨湯治七情鬱結上氣喘急

每貼用一錢半入姜汁研細末以水盞半煎去渣飲之



人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎一二沸放溫服加木香枳

殼為六磨湯有苦寒者加丁香桂亦可衍義云烏藥枳

榔氣少走泄多但不甚剛猛與沉香同磨作湯治胃中

氣膈甚高

右解鬱治喘

一婦人與前方發熱得汗而喘定夜半進少稀粥喘再

作心痞口乾與下方

半夏 枳實 黃連 白朮

木通 陳皮 麻黃 紫蘇

甘草 右吹咀姜水煎服若陰虛喘急者補陰降火四物加

枳殼半夏

平江洗伯寧家豐好肉厚味每年到四月九月內必發氣

喘擡有吐痰脈沉澁而細數諸醫用平肺之藥數年不愈

如此者六七年用人參生地黃膏和膏歸牛膝肉蓯蓉枸

杞子五味子知母黃柏天門冬玄參末為丸如桐子大每

服百丸空心服以救肺虛又用阿魏黃連山查沉香牛黃

辰砂膽星陳皮神麩糊為丸如桐子大臨臥姜湯下三四

十丸治厚味服訖復用瓊玉膏一劑繼服之而安瓊玉膏

治哮喘亦治積鴉子略敲損殺不損膜浸尿缸內三四

日臨夜煮食 海藏本草云陰不

喘則肺實 已未八月中霖雨不止時承上命治不憊

吉及元帥夫人年踰五十身軀肥盛因飲酒及渣乳過腹

脹喘滿聲聞舍外不得安臥大小便澀滯氣口脈大兩倍

於人迎脈沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱

大盛上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣

下之故制平氣散以下之

白牽牛 二兩半生牛熟 青皮 白 檳榔 各三

內經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之故以白牽牛苦寒瀉

氣分濕熱上攻喘滿故以為君陳皮苦溫肺輕浮理其肺

氣青皮苦辛平散肺中滯氣為臣檳榔辛溫性沉重下痰

降氣大黃苦寒瀉滯滿實故以為使

右為細末每服三錢煎生姜湯一大盞調下無時一服

減半再服喘愈止有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽再

與加減瀉白散

桑白皮 地骨皮 知母 陳皮

青皮 桔梗 黃芩 甘草

右件對如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去查

溫服食後數服良愈華陀云盛則為喘減則為枯活人

云發喘者氣有餘也凡看文字須要會得本意盛而為

喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也氣

盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛又為有餘

當清肅下行而不喘以其火入于肺衰與不足而為喘

焉故言盛者非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘

者非言肺氣有餘也言肺中之火有餘也故瀉肺以苦

寒之劑非瀉肺也瀉肺中之火實補肺也用者不可不

知

梔角利膈九治風勝痰實胸滿及喘滿咳嗽

梔角 一兩 酥炙 半夏 梔角 炒各

牽牛 一兩 法破子



右同為細末生薑汁麪糊丸如桐子大每服三十九食後生薑湯送下

定喘餅子神驗

芫花醋浸一宿 桑白皮炒 吳茱萸炒 馬兜鈴

陳皮去白各 寒食麪三 白牽牛取頭末二兩

右為末和勻滴水丸如櫻桃大捏餅子取熟灰半碗在鍋內同炒餅子熟每夜服一餅或兩餅至微明利下神効婦

患人心頭不快加上一餅或兩餅至微明利下神効婦人有胎不可服

洞虛子神秘沉香丸下痰喘方見痰

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三日復發與不愈者宜木防已湯去石膏加茯苓芒硝湯主之

入醫學綱目卷三七

七

木防已兩三 石膏十二枚如 桂枝二兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服

木防已加茯苓芒硝湯方

木防已 桂枝各二 人參 茯苓

芒硝

右五味水六升煮二升去查內芒硝再微煎分溫再服

微利即愈

喘急有風痰者婦人大全千縉湯

半夏七個炮製 皂角去皮 甘草炙各

生薑如指

右用水一碗煮去半頓服一方不用甘草但用半夏末

一兩皂角去皮弦半兩生薑七片同入紗袋口水三升煎至一盞五分以手揉洗取清汁分作三服併服二服効

四七湯治痰涎咽喉中上氣喘逆甚効方見咽喉除閉

半夏厚朴湯

半夏九治因傷風而痰作喘逆元元欲吐惡心欲倒

半夏兩一 檳榔三 雄黃三

右為末生薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服三十五丸姜湯下小兒丸米大

定喘化痰猪蹄甲四十九個淨洗控乾每個指甲內入

半夏白礬各一字裝罐子內封閉勿令烟出火煨通赤去

火弄細研入麝香一錢七有上喘咳嗽用糯米飲下小兒五分至妙

入醫學綱目卷三七

八

治喘急用桔梗一兩半搗羅為末童便半升煎取四合去查溫服

凡治喘正發時無痰將愈時却吐痰者乃痰于正發之時閉塞不通而喘甚當于其時開其痰路則易安也宜

此方桔梗之類及枳殼瓜蒌薤白杏仁蘇葉前胡等引出

其痰候痰出喘退却調其虛實虛者補以參芪歸木實

者瀉以沉香痰痰九之類是也

人參半夏九化痰定喘方見痰喘于平日用此方治久

香痰痰九微

火喘用白虎湯加瓜蒌仁枳殼黃芩神効

雙玉散治痰熱而喘痰湧如泉

寒水石 石膏各等

右細末入參湯下三錢食後服



支飲不得息用葶藶大寒瀉肺湯主之

寒痰

紫金丹治哮喘過冷發者用之

精猪肉三十 砒霜兩研者一

右將肉切如微子大用砒末入肉內拌勻分肉為六分  
每分用紙筋黃泥包之用火烘令泥乾又用白炭火於  
無人處燉青烟出盡為度放地上一宿研極細用湯浸  
蒸餅丸如棗豈大用茶清吞下大人二十九小兒十九  
量虛實用之

哮喘過冷則發者有二証

其一屬中外皆寒治法乃東垣參蘇溫肺湯調中益氣加  
茱萸湯及此方紫金丹劫寒痰者是也 其二屬寒包熱  
治法乃仲景丹溪用越婢加半夏湯等發表諸方之類及

八時學訓卷七

食積

預於八九月未寒之時先用大承氣湯下其熱至冬寒時  
無熱可包自不發者是也

清金丹治哮喘過厚味發者用之

蘿蔔子 淘淨蒸令熟晒 猪牙皂角 火燒過以砒

末三

右為末拌勻用姜汁浸蒸餅丸如蘿蔔子大每服三十  
粒漫啞下一方初喘用姜汁蜜煉丸桐子大每七八十  
丸嚥下止之

化痰丸快脾順氣化痰消食治久喘或作或止者甚妙

半夏 法

南星 法

白礬

皂角 切

生薑

右各一斤用水煮南星無白點為度揀去皂角不用將  
生薑切作片同半夏南星晒乾無日色火焙再加

青皮 法 陳皮 法 紫蘇子 炒 蘿蔔子 法

乾葛 法 杏仁 法 神麩 炒 麥蘆 炒

山查 法 香附子 法

右各半斤淨與前藥合和一處研為細末生薑汁浸蒸  
餅打糊為丸如桐子大每服五七十九臨卧食後茶湯  
送下

病人飲水多必暴喘滿

白朮散治夏月飲冷酒生痰膈滿

喘而心痛油炒半夏為末粥丸姜湯下三十九

哮喘必用吐法吐藥中用醋多不用涼藥

子和稀涎散

治喘用古文錢七個鹽梅七個水一盞同浸二宿每服  
一呷空心良久吐出惡痰而効

六時學訓卷七

寒熱 病機云諸痿喘嘔皆屬于上辨云傷寒家論喘嘔以為

火熱者是明有餘之邪中於外寒變而為熱心火太旺攻

肺故屬於上又云膏梁之人奉養太過及過愛小兒亦能

積熱于上而為喘咳宜以甘寒之劑治之脈經又云肺盛

有餘則欬嗽上氣喘渴煩心胃滿短氣皆衝脈之火行于

胃中而作也係在下焦非屬上也蓋雜病不足之邪起于

有餘病機之邪自是標本病傳多說飲食勞役喜怒不節

水殺之寒熱感則害人六腑皆由中氣不足其填脈脹滿

喘寒喘二方于後

人參平肺散治心火刑肺傳為肺痿欬喘嘔痰涎壅盛

胸膈痞悶咽隘不利

桑白皮 法 知母 法

甘草 法 茯苓 法



地骨皮伍 天門冬四 青皮分 五味子三

陳皮伍 人參伍

右咬咀只作一服水煎食後溫服如熱甚加黃芩四分  
紫蘇葉半夏各五分

喘受寒 參蘇溫肺湯治形寒飲冷則傷肺喘煩心胃滿短氣不能  
宣暢

人參 肉桂 甘草 木香

五味子 陳皮 半夏製 桑白皮

白朮 紫蘇葉各二 白茯苓一

右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去渣  
食後溫服如冬寒每服不去節麻黃半分先煎去沫下  
諸藥

痰補 喘有陰虛自小腹下火起而上者亦有痰火衝上者宜

入胃字續卷五

四物湯加 青黛 竹瀝 陳皮入童便煎服

水短分 調中益氣湯加減法方見治

冬熱夏 如秋冬月胃脈四道為衝脈所逆并脇下少陽脈二道

而反上行病名曰厥逆其証氣上衝咽不得息而喘息  
有音不得臥加茱萸五分或一錢湯洗去苦觀厥氣多

少而用之如夏月有此証為大熱也蓋此証隨四時為  
寒熱溫涼宜以酒黃連酒黃栢酒知母各等分為細末

熟湯丸如桐子大每服二百丸白湯送下空心服仍多  
飲熱湯服畢少時便以美食壓之使不得胃中停留直

至下元以瀉衝脈之邪也大抵治飲食勞倦所得之病  
乃虛勞七損証也當用溫平甘多辛少之藥治之是其

本法也如時上見寒熱病四時症也又或將理不如法  
或酒食過多或辛熱之食作病或寒冷之食作病或居

大寒大熱之處益其病當臨時制宜暫用大寒大熱治

法而取効此從權也不可以得効之故而又用之必致

天橫矣黃帝針經曰從下上者引而去之上氣不足推

而揚之蓋上氣者心肺上焦之氣陽病在陰從陰引陽

宜以入腎肝下焦之藥引甘多辛少之藥使升發脾胃

之氣又從而去邪氣於腠理皮毛也又曰視前痛者當

先取之是先以繆刺瀉其經絡之壅塞者為血凝而不

流故先取之而後治他病

加減瀉白散治陰氣在下陽氣在上咳嘔喘促

桑白皮兩 青皮兩 茯苓錢 地骨皮錢

入胃字續卷五

甘草 陳皮 五味 人參各五

右咬咀每服四錢水一盞半入粳米數十粒同煎去查  
溫服食後

平居則氣平和行動則氣促而喘者亦衝脈之火子族兄  
六旬有餘素有喘証或嘔吐血痰平居時則不喘稍行動

則氣促喘急以黃栢知母滋腎九空心服七八九其証  
大減此黃栢知母能泄衝脈之火者如此効也

治卒上氣喘鳴息便欲死者研菲汁飲一升瘥蓋菲去  
胃中惡血滯氣

主上氣咳嗽胃膈妨滿氣喘堯仁二兩去皮尖以水一  
升研取汁和粳米二合煮粥食之

諸氣衝鬱皆屬于肺全文見証○王註云  
固治肺氣喘嗽馬兜鈴二兩只用裏面子去殼秋石半兩  
入碗內和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味為末一錢水一  
盞煎六分溫呷以藥末含嚥津亦得術義云治







其病不在天之陽不在地之陰在腹中者故取季肋下  
一寸元氣病取之右肺病取之左故在中者取取之此  
其理也

**黃帝曰刺節言振埃夫子乃言刺外經去陽病余不知**  
其所謂也愿卒聞之岐伯曰振埃者陽氣大逆上滿於胃  
中憤膈肩息大氣逆上喘喝坐伏病惡埃烟簡不得息請  
言振埃尚疾於振埃黃帝曰善取之何如岐伯曰取之大  
容黃帝曰其咳上氣窮訕胃痛者取之柰何岐伯曰取之  
廉泉黃帝曰取之有數乎岐伯曰取天容者無過一里取  
廉泉者血變而止帝曰善哉刺節直刺篇  
陽迎頭痛胃滿不得息取人迎  
膈中膈者與下胃動脈雜病氣逆上刺  
刺灸喘滿有六法  
其一取陽氣上四節經文所言者是也

其二取肺經云肺手太陰之脈是動則病肺脹滿膨膨而  
喘咳缺盆中痛甚則交兩手而脅所生病者欬上氣喘渴  
煩心胃滿視盛虛熱寒隔下取之也又云邪在肺則皮膚  
痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外膺背三節五  
椎之傍以手疾按之快乃刺之取之缺盆之中以越之又  
云肺病者喘咳逆氣肩背痛取其經太陰足太陽之外厥  
陰內血者王註謂內外之間是足少陰經也又云肺藏氣  
氣有餘則喘咳上氣瀉其經無傷其經無出其血無出  
其氣楊註謂經隧為列缺穴也又云氣亂於肺則俛仰喘  
喝接手以呼取之手太陰榮足少陰輸是也  
其三取大腸經云腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立邪在  
大腸刺盲之原巨虛上廉三里又云邪客手陽明之絡令  
人氣滿胃中喘息而支肘胃中熱刺手大指次指爪甲上

去端如荊葉各一痛左取右右取左如食頃已足也  
其四取腎經云腎病者喘咳身重汗出憎風取其經少  
陰太陽血者是也

其五取脾經云氣滿胃中喘急取足太陰大指之端去爪  
甲如荊葉寒則留之熱則痰之氣下乃止

其六取脾經內經詳文具痺  
治喘咳 天突入胸五分 中膻中三分 璇機三分  
氣海 膺府一寸半 乳根一寸半

五膈氣喘息不止 中腕八分 期門凡刺腹氣虛人  
丹田用

喘咳刺上穴不愈者可選用之 膏肓 關元 中  
腕 三里 百勞 腎膺各灸 支溝 大陵

東陽喘咳諸穴選用之 天容 譙譙 氣舍 扶突  
太白 魄戶 中府 大包 域中 雲門 石門

期門各灸  
喘咳 乳中在乳下胸中針入一分  
沿皮向後一寸半瀉之

喘滿痰實口中如膠 太谿  
喘少氣不足以息腹滿大便難時上走胃中鳴脹滿口  
舌乾口中吸吸善驚咽中痛不可內食善怒恐不樂大鍾

主之 欬腸下積聚而喘逆卧不安席時寒熱期門主之  
流注氣促喘 天卒  
喘逆執肩甲內廉痛不可俛仰季脇引少腹而痛



張意喜主之

惟穴婦人血弱氣喘 氣中在氣海旁一寸半針

喘者肺主氣形寒飲冷則傷肺故其氣逆而上行衝急

喝喝而息數張口擡肩擡身滾肚是為喘也

喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死全文見小兒喘○

喘上氣喘息低昂其脈滑手足溫者生脈滑四肢寒者死

哮喘必用薄滋味

凡下痰定喘諸方施之形實有痰者神効若陰虛而脈

浮大按之滑者不可下下之必反劇而死也

喘不得卧

凡喘而卧不得其脈浮按之虛而滑者為陰虛去死不速

慎勿下之下之必死宜四物加童便竹瀝青黛兩冬五味

枳殼蘇葉服之

胡安人年六十八惡寒發熱自四月來得痰嗽眠不得

食少心膈痛口中連嗽五更頗甚

白木三錢 枳殼炒 黃連各二錢 芍藥二錢

片苓七錢 桔梗 蘇梗各一兩 木通五分

甘草五錢 五味一錢

右入竹瀝煎服

一丈夫因病喘不可臥肺脈沉而滑此外有風涼濕氣遇

內熱不得舒

黃芩 陳皮 木通各一錢 麻黃

蘇葉 桂枝各 黃連 乾姜

甘草三錢

開二枚肺虛感寒發熱氣喘難臥

蒼朮 麻黃 白木 片苓炒

桂枝三錢 半夏 枳殼各一錢 木通三錢

甘草一錢

右生薑二片同煎加研碎杏仁五個此方半夏為君必

右解表三方前一方便熱多者設後二方便寒多者設

咳逆上氣時時濁唾但坐不得眠者皂莢丸主之用皂莢

八兩刮去皮酥炙右一味為末蜜丸如桐子大以棗膏和

湯服三十九日三夜一

女人年六十自來無汗多痰今得喘病眠不得曾與青州

白丸子 半夏兩 枳殼炒 桔梗 陳皮

木通 黃芩二錢 麻黃一錢 紫蘇

防風各一錢 甘草五分

右分作五貼生薑三片水煎去渣入竹瀝兩蚶殼許熱

飲

夫不得臥則喘者是水氣之客也夫水者循經液而

流也腎者水臟主津液主臥與喘也逆調

神祕湯治病人不得眠眠則喘者水氣逆行上乘于肺

肺得水而浮使氣不流通其脈沉大宜此治之

蘇葉 陳皮 生薑 桑白皮

人參各五錢 茯苓 木香各二錢

右吹咀水煎去渣大溫分二服

咳逆倚息不得卧小青龍湯主之方見傷寒○又云支

氣其脈 青龍湯下已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥

逆氣從小腹上衝胃咽手足痺其面翕然如醉狀因復下

流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味子甘草湯治



其氣衝

桂枝去 茯苓各四 甘草炙三 五味子升

右四味以水八升煮取三升去查分溫三服

衝氣即低而反更咳胃滿者用桂枝茯苓五味甘草湯去

桂加乾姜細辛各三兩以治其咳滿咳滿即止而更復

渴衝氣復發者以細辛乾姜為熱藥也服之當遂渴而渴

反止者為支飲也支飲者法當冒胃者必嘔嘔者復納半

夏半升以去其水於桂苓甘草五味湯中去

水去嘔止其人形腫者加杏仁半升主之其証應內麻黃

以其人遂痺故不納之若逆而納之必厥所以然者以其

人血虛麻黃發其陽故也用

茯苓四 甘草 乾姜 細辛各三

五味子 半夏 杏仁各半升 去皮尖

右煎去查溫日三服

若而熱如醉此胃為熱所衝其面加大黃三兩以利之

無真應散治遠年喘急不能眠百藥不効者

白石英四兩通明者以生絹袋盛用雄猪肚一個以

煎法煮三次煮了前法煮三次煮了

右為末以官局款冬花散二錢入藥末二錢再加桑白

皮二十生薑三片束子一個水一盞半煎至七分通口

服猪肚亦可喫只不得用醬醋塩椒姜等調和款冬花

款冬花一錢且切毋桑葉杏仁半夏阿膠

甘草各二錢麻黃去節四錢煮粗末是也

治多年肺氣喘急哮喘久不得卧紫金丹

砒水飛 碗壹好者二錢用水略潤少

右用膏子和砒同杵極勻丸如麻子大每服十五丸小

兒量大小與之並用蠟茶清極冷吞下臨卧以知為度

有一親戚婦人患十年偏求醫者皆不效後得此

貨此藥漫曠一服是夜減半數服頓愈遂多食而

方予屢用以救人時為神異

不得卧而息有音者是陽道之逆也足三陽者下行今

逆而上行故息有音也陽明者胃脈也胃者六腑之海其

氣亦下行陽明逆不得從其道故不得卧也下經曰胃不

和則卧不安此之謂也道訓論云千金白前湯治後中水

感寒喘不得卧治法見產後喘

針灸 咳喘不得卧不得坐呼吸氣索咽不得卧中熱雲門主

之 咳逆煩滿不得卧胃中滿喘不得息背痛太淵主之

右針灸喘不得卧天突穴甚效子治數人皆中

產後喘極危多死也

郭氏治產後喉中氣急喘促者因所下過多榮血暴竭衛

氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治陳無

方用桂枝湯若惡露不快散血停凝上薰于肺亦

令喘急但服奪命丹血去喘自定奪命丹方見

血竭散治產後敗血衝心胃滿上喘命在須臾宜服

真血竭如無紫 沒藥

右等分研細類篩再研取盡為度每服二錢用童便合

好酒半大盞煎一沸溫調下方產下一服上床良久再

服其惡血自循經下行更不衝上免生百病

參蘇飲治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參為末 蘇木

右以水兩碗煮取蘇木一碗以下去查調參末隨時加

減服神効



表証

若因憂怒性理鬱發而喘者用小調經散以桑白皮

旋覆花湯治產後傷風寒咳嗽痰涎壅盛坐臥不寧

赤芍藥 荊芥穗 半夏

五味子 麻黃 茯苓 杏仁

甘草 前胡

右咬咀每服四錢水盪半姜五片棗一枚煎七分去渣食前溫服

浦江吳輝妻孕時足腫七月初旬產後二月洗浴即氣喘

但坐不得臥者五個月惡風得煖稍寬兩關脈動尺寸皆

虛百藥不効用牡丹皮薤仁桂枝茯苓乾姜枳實厚朴桑

白皮紫蘇五味瓜蒌仁煎湯服之即寬二三服得臥其痰

如失蓋作汚血感寒治之也

裡証

若傷風飲食而喘者宜見睪丸

姜黃 三稜 葶藶 陳皮

良姜 人參 蓬朮

右為細末用蘿蔔浸煮爛研細將汁煮麩糊丸桐子大

蘿蔔子湯下

短氣者氣短而急似喘非喘也

平人無

寒熱

實

便數

庄

平人無寒熱短氣不足以息者實也

正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞相

服之有劫蓬莪朮一兩金鈴子去核一分右件為末入鴈

砂一錢煉過研細和勻每服二錢鹽湯或溫酒調下空心

胃滿少氣短氣者肺主諸氣五臟之氣皆不足而

不行也 氣短小便利者四君子湯中加茯苓黃芪以

補之如腹中氣不轉者更加甘草一半 肺氣短促或不

足者加人參白芍藥中焦用白芍藥則脾中陽升使肝膽

之邪不敢犯之 如衣薄而短氣則添衣於無風處居止

氣尚短則以沸湯一碗薰其口鼻即不短也

厚衣於不通風處居止而氣短則宜減衣摩汗孔令合於

漫風處居止 如父居高屋或天寒陰濕所遇令氣短者

亦如前法薰之 如居周密小室或大執而處寒涼氣短

則就風日九氣短皆宜食滋味湯飲令胃氣調和

胃痺胃中氣寒短氣疾冬杏仁甘草湯主之橘枳姜湯

亦主之 胃痺喘息咳唾胃背痛短氣括萎薤白

半夏湯主之 大短氣有微飲當從小便去之苓

桂甘湯主之 腎氣丸亦主之 欬花補肺湯治

咳短氣

茯苓 桂枝 白朮 甘草

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

仲景論短氣皆屬飲此方苓桂朮甘湯是其一法也金匱

云咳逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲又云支飲

亦喘而不得臥加短氣其脈平也又云膈上有留飲其人

氣短而渴四肢歷節痛脈沉者有留飲又云肺飲不弦但

苦喘短氣其治法危急者小青龙湯脹滿者厚朴大黃湯

胃眩者此方苓桂朮甘湯及澤瀉湯不得息葶藶大棗湯

吐下不愈者木防已湯之類是也

短氣息短不屬動作氣索補足少陰去血絡也



短氣身勞 天井 大椎 肺俞 肝俞 尺澤

短氣心痺悲怒逆氣狂易魚際主之

短氣者短氣而不能相續者是已似喘而非喘若有氣

上衝而實非氣上衝也喘者張口撮舌身滾肚謂之喘

也氣上衝者腹裡氣時時上衝也所謂短氣者呼吸雖數

而不能相續似喘而不撮舌似呻吟而無痛者短氣也經

所云短氣者果實為難辨之証愚師莫識之為治有誤者

多矣要識其短氣之真者氣急而短促謂之氣短者是也

脈沉胃中短氣

陽脈微而陰脈則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣

少氣

少氣者氣少不足以言也

三陽絕三陰微是為少氣方虛 怯然少氣者是水道

不行形氣消索也 言而微終日乃復言者此奪氣

也

右少氣治法蓋生脈散獨參湯之屬是也

一陽發病少氣善咳善泄 全見

運氣少氣有二

一曰火熱經云火鬱之發民病少氣又云少陰之復少氣

骨痿又云少陽之復少氣脈痿治以諸寒是也

二曰風濕經云太陽司天之政四之氣風濕交爭風化為

雨民病大熱少氣是也

針灸少氣有三

一曰補肺經云肺藏氣氣不足則息微少氣補其經隧無

出其氣又云肺虛則少氣不能報息耳聾發乾取其經太

陰足太陽之外厥陰內血者是也

二曰補腎經云少氣身潔潔也言吸吸也骨瘦解懈情不

能動補足少陰是也

三曰補氣海經云膻中者為氣之海其輸上在膻中

上下前在于人迎氣海不足則氣少不足以言審守其輸

調其虛實所謂柱骨之上者蓋天容穴也人迎者結喉兩

旁之脈動處也乃取天容人迎二穴補之也

魚際絡青短者少氣也

脾脈搏堅而長其色黃當病少氣 一呼脈一

動一吸脈一動曰少氣

天堅大脈小其少氣悅有加立死 而脈反小而少氣悅加

也 善悲 妊娠善悲

悲屬肺經云在臟為肺在志為悲又云精氣并於肺則悲

是也

婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大

麥湯主之

甘草 小麥 大麥

右三味水六升煮三升溫分三服亦補脾氣

本鄉里有一婦人數次無故悲泣不止或謂之有祟祈禳

請禱備至終不應予忽憶金匱有一証云婦人臟躁悲傷

欲哭象如神靈數欠伸者宜甘麥大麥湯予急令治藥盡

劑而愈古人識病制方種種絕妙如此

運氣悲皆屬寒水攻心經云火不及曰伏明伏明之紀其

病昏惑悲志從水化也又云太陽司天寒氣下臨心氣上

從喜悲數欠又云太陽司天寒淫所勝善悲時眩仆又云

太陽之復甚則入心善忘善悲治以諸熱是也



針灸悲有二

其一取心經云邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其輸也

其二取厥陰經云厥陰根于大敦結于玉英絡于臑中厥陰為關闔折即氣絕而善悲悲者取之厥陰視有餘不足虛實寒熱陷下而取之也

如娠善悲

論管先生治一娠四五月臑中悲傷遇書則慘感淚下救欠象若神靈如有所憑醫與巫皆無益與仲景大寒湯一投而愈

鼻塞 鼻淵 鼻軌 鼻瘻肉

酒醴鼻 鼻得冷則黑

鼻塞昏屬肺經云肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣又

入骨學子綱一三五

三五

云五氣入鼻藏于心肺心肺有病而鼻為之不利也又云西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺又云肺主臭在臟為肺在竅為鼻是也

金匱真言論云西方白色入通於肺開竅于鼻藏精於肺夫十二經脈三百六十五絡其氣血皆上走於面而走

空竅其精陽氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣出於鼻而為臭難經云肺氣通於鼻肺和則能知香臭矣夫陽氣宗氣者皆胃中生發之氣也其名雖異其

理則一若因飢飽勞役損脾胃生發之氣既弱其營運之氣不能上升邪塞孔竅故鼻不利而不聞香臭也宜養胃

氣實營氣陽氣宗氣上升鼻管則通矣又一說難經云心主五臭肺主諸氣鼻者肺竅反聞香臭者何也蓋以竅言之肺也以用言之心也因衛氣失守寒邪客於頭面鼻亦

受之不能為用是不聞香臭矣故經曰心主有痛鼻不利者古曰視聰明而清涼香臭辨而溫煖者是也治法宜先散寒邪後補衛氣使心肺之氣得交通則鼻利而聞香臭矣

寒邪客肺 腥澤通氣湯治鼻不聞香臭

羌活 獨活 防風 升麻

葛根 錢各二 麻黃 錢各二 蒼朮 錢各二

川椒 錢一 白芷 錢各四 黃芪 錢各四 甘草 錢各二

右每服一兩水一盞生姜三片東二枚葱白三寸同煎

至一盞去香稍熱服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐臥行住

溫肺湯治鼻不聞香臭眼多眵淚

升麻 黃芪 錢各二 葛根 羌活

甘草 錢各一 防風 錢各一 麻黃 錢各二 丁香 錢各一

右粗末分二服每服水二大盞葱白二握同煎一盞去

香稍熱食遠服

禦寒湯治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻塞欬嗽上喘

黃芪 錢一 人參 升麻 陳皮 錢各五

甘草 錢各一 欵冬花 黃柏 錢各二 佛耳草

黃連 羌活 白芷 防風 錢各二

蒼朮 錢七

右咬咀作一服水二大盞煎至一大盞去香稍熱服食

溫衛湯治鼻不聞香臭目中流火氣寒血熱泪多臍下冷

陰汗尼痿弱

黃芪 蒼朮 升麻 知母

升麻 知母

黃芪 蒼朮 升麻 知母

升麻 知母

升麻 知母

升麻 知母

升麻 知母

升麻 知母



羌活 柴胡 歸身各一 人參  
甘草炙 白芷 防風 黃柏  
澤瀉各五 陳皮錢三 青皮錢二 木香  
黃連各三

右作一服水煎去渣溫服食遠日晴明服之  
溫衛補血湯治耳鳴鼻不聞香臭不知穀味氣不快四肢  
困倦行步不正髮脫落食不下膝冷汗帶下喉中啞啞不  
得臥口舌液乾太息頭不可以回額項筋脈急痛旋暈  
眼黑頭痛呵欠噎噴

升麻細 柴胡 甘草生 甘草炙  
地骨皮 桔梗各三 生地 白朮  
吳茱萸 黃柏各一 蒼朮 陳皮  
王瓜根 牡丹皮各二 歸身半 枳仁三

入醫學綱目卷二十七

菊花 右吹咽作一服水煎去渣稍熱食前服  
治鼻塞不通小蘗一把水二升煮一升去渣分服本草  
化血 治化血 治鼻不通

薄荷葉 荆芥穗一錢  
右為細末煉蜜丸如櫻桃大每服一丸喻化  
治鼻不聞香臭多年者亦治用生葱分作三段早用葱  
白午用葱管中截晚換葱管末稍一截塞入鼻中令透裡  
方効

通草散治鼻鼻氣息不通不聞香臭并鼻息肉  
木通 細辛 附子各等  
右為末蜜和綿裹少許納鼻中

世草蒲散治鼻內室塞不通不得喘息  
草蒲 皂角各等

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥少時  
鼻閉塞不聞香臭 迎香一分附皮向上 上星三  
又法 迎香 上星 合谷 三處愈 灸人中 風

針灸 府 百勞  
左空刺右右空刺左兩脇下痛泄上下出曾滿短氣不  
得汗補手太陽以出之 鼻不利前谷主之

鼻淵 鼻淵 鼻淵  
腦移熱於腦則辛類鼻淵者濁涕不止也傳為血  
噴目 全云見診病傳變又脈解精微  
鼻中諸病 腦移熱於腦則辛類鼻淵濁涕不止如湧  
泉不藏久而不已必成衄血之疾防風湯主之

防風 黃芩 人參 甘草炙  
川芎 麥門冬去心各  
右細末每服一錢沸湯點服食後服日三

治鼻淵 溫熱  
南星 半夏 蒼朮 白芷  
神麴 酒芥 辛夷 荆芥

嘗治一中年男子右鼻管流濁涕有穢氣脈弦小右寸  
滑左手寸澁先灸上星三里合谷次以酒芥二兩蒼朮  
半夏各一兩辛夷細辛川芎白芷石膏人參葛根各半  
兩分七貼服之全愈此乃濕熱痰積之疾也

肺中寒者吐濁涕  
無蒼耳散治鼻流濁涕不止名曰鼻淵  
辛夷仁兩 蒼耳子錢半香白芷兩 薄荷葉分五

雜方



右為末每服二錢用葱茶清食後調服  
嚴云辛夷散治鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞  
香臭

辛夷仁 細辛去上 藜木去 升麻

川芎 白芷 木通去 防風

甘草

右為末每服二錢食後茶清調服

運氣鼻淵皆屬熱經云少陰之復甚則入肺咳而鼻淵治  
以苦寒是也

鼻流清涕濁涕 上星灸二七壯

又法 上星 人中 風府取後穴 百會 風池

風門 大椎

鼻流臭穢 上星 曲差灸 合谷不愈取 人中 迎

木香去 丁香去

香

鼻流清涕

肥人鼻流清涕乃飲食痰積也

蒼朮 片苓 南星 川芎

白芷 辛夷 甘草

右或末或丸皆可白湯下

治鼻塞清涕出腦冷所致

通草 辛夷各半 細辛 甘遂

桂心 芎藭 附子名一

右細末蜜丸綿裹納鼻中密封勿令氣泄丸如麻子稍  
加大微覺心痛效揭去為丸即愈

辛夷散治鼻塞腦冷清涕不已

細辛 川椒 乾姜 川芎

吳茱萸 辛夷 附子各三 皂角屑半  
桂心一 猪油六  
右煎猪脂成膏先一宿以苦酒浸前八味取入油煎附  
子黃色止以綿裹塞鼻孔中

運氣鼻軌有二  
一曰火攻肺虛鼻軌經云少陰司天熱氣下臨肺氣上從  
軌軌鼻室又云少陰司天熱淫所勝民病軌軌嚏又云  
少陽司天火淫所勝甚則軌軌又云少陽之復煩躁軌軌  
又云少陰司天客勝則軌軌又云歲金不及火乃行民  
病軌軌又云金不及曰從革從革之紀其病嚏咳軌軌治  
以諸寒是也  
二曰金助肺實鼻軌經曰陽明所至為軌軌治以溫劑是  
也

針灸  
針灸鼻軌獨取足太陽經云足太陽之別名曰飛陽去踝  
七十別走少陰實則軌室頭背痛取之所別是也

鼻軌不利室氣塞喘僻多涕軌軌有瘧迎香主之 鼻  
軌不得息不收涕不知香臭及軌軌不止水瀉主之

羊肺散治肺虛壅鼻生瘰肉不聞香臭

羊肺具一 白朮兩 菴菴 木通

乾姜 川芎各一兩 俱為末

右五味為細末以水盪打稀稠得所灌肺中煮熟焙乾  
細研為末食後米飲服二錢

瘰肉因胃中有食積熱痰流注治本當消食積

蝴蝶蝶二 細辛一 白芷五  
右為末以綿裹藥納鼻中頻頻換又方蝴蝶蝶三分



丹一分細辛一錢如此法塞鼻三因方單用枯礬末面脂用綿裹少許納鼻中數日瘰肉與藥消落

右鼻中用此藥塞更以星半蒼米酒蒸連神麩辛夷細辛白芷甘草消痰積之藥服之為効也

辛夷葉二兩 細辛 木通 木香

白芷 杏仁湯浸去皮尖 右用羊髓猪脂二兩和藥于石器內慢火熬成膏取赤

黃色放冷入龍腦麝香各一錢為丸綿裹塞鼻中數日內脫落即愈此方有理

輕黃散治鼻中瘰肉 輕粉 麝香許 杏仁湯浸去皮尖及 雄黃研

右四味用淨乳鉢內先研杏仁如泥後入雄黃麝香同研極細勻磁合蓋定每有患者不拘遠近夜卧用筋點

梗末大在鼻中瘰肉上隔一日夜卧點一次半月見効

鼻中有瘰肉不聞香臭瓜蒂細辛等分為細末以綿包

如豈許塞鼻中須臾即通有人患瘰肉垂出鼻外用此藥即化為黃水點滴至盡三四日愈聖惠方單用陳瓜蒂以

羊脂和傅上日三次効

消鼻痔方 苳蒂炒 甘遂各四 白礬枯 螺青炒

草烏尖各五 右為末用真麻油搜令硬此子不可爛旋丸如鼻孔大

用藥入鼻內令透痔肉上其痔化為水肉皆爛下每日一次用妙不可言

又方取鼻痔

苦丁香乃瓜 赤小荳 丁香略 右慢火焙乾為末入腦子少許口內先含水次將小竹

管吹藥入鼻中如半盞茶時盡為度候頭疼時取下

取鼻痔 芭荳十二粒 陽起石一 石蓮心三十

右為末每用半字許滴入鼻內又用綿塊子蘸藥塞入

鼻中其痔肉化爛自出 又方取鼻痔 蠟稍 巴荳去油 丁香五 白丁香七

右為細末用螺青一字和勻用內消膏藥溶開入上件藥末搜丸如龍眼核大臨睡用一九安鼻內

右巴荳例 針灸 錢 治久患鼻瘡膿極臭者用百草霜研細用冷水調服三

錢 鼻中瘰肉軌切 風池 風門 風府 人中 禾窠

鼻中瘰肉不利鼻額頰中痛鼻中有蝕瘡斷交主之

軌切涕出中有懸癰瘰肉內室不通不知香臭素窠主之

鼻室口僻清涕出不可止軌切有癰禾窠主之 酒釀鼻

風熱 腦鉛紅散治風熱上攻陽明經絡面鼻赤刺癢疹俗呼

肺風以肺病在皮膚也 硫黃 白礬各五 右細末入黃丹少許染與病人面色同每上五分津液

金之洗嗽罷及臨臥再上兼煎升麻湯下瀉青丸服之



除其本也升麻湯方見小兒痘

**治肺風鼻赤** 用老山查為末 溶黃蠟等分 和丸 彈子大 空心茶酒 嚼下 半月 效 忌酒炙燥

**治赤鼻**

枇杷葉一兩去毛陰乾新者佳 梔子兩

右為末 每服二三錢 溫酒調下 早晨服 先去左邊 臨臥服去 右邊 効若神

**治酒皴風鼻** 上赤 將橘核 微炒為末 每用二錢 七研胡乘肉 一個 同以溫酒調服 以知為度 而經云胡

海云 治酒皴鼻 用山茱萸 煖腰膝 助水 戒除一切風 逐一切氣 破癥

**治酒皴鼻**

片腦此 硫黃明淨者五分 枇杷葉一錢

右用猪臟去頭段一尺 用第二段一尺 割下 臍上 脂煎成油 調和前藥末 入生臍內 兩頭縛定 掛當風處 七日 用時 將小針於臍上 針孔 捏出藥少許 用手傳患處 十日內全愈

**粉黃膏** 治肺熱赤癩 俗曰酒皴

硫黃一分 薤白切去蓋剉作片子入硫黃在內以出細 輕粉 烏頭尖各少許

右研勻 以面油調 即時傳 早晚洗去 以酥調 尤佳

**治酒皴鼻** 用乳香 硫黃 細辛 輕粉 等分 為末 水調 傅

檳榔 散 治鼻頭赤

檳榔 硫黃各等分 片腦少

右為細末 用粗絹帛包裹 時時於鼻上 擦磨 鼻出其臭 効又加 葶麻子肉 為末 酥油調 臨睡時 少許 擦鼻上 使

終夜得聞

**治酒皴** 以桐油入黃連末 天鈞藤 燒灰 傅之

針灸 鼻管 疽發 為病 腦空 主之

鼻頭 微白 亡血 也 赤者 血熱 也 酒客 多有 之

鼻得冷則黑

**面鼻得冷則黑論** 諸陽聚于頭 則面為陽 中之陽 鼻居面中央 而陽明起於頰中 一身之血 運到面鼻 陽部皆為至清至精之氣 矣 酒性善行 而喜升 太熱而有峻急之毒 多酒之人 酒氣薰蒸 面鼻血得酒為極熱 熱血得冷為陰 氣所搏 污濁凝結 滯而不行 宜其先為紫 而後為黑色 也 須用融 化滯血 使得流通 滋生新血 可以運化 病乃可愈 予嘗以酒制四物湯 加酒炒片苓 陳皮 生甘草 酒紅花生姜 煎調下 五靈脂 末飲之 氣弱形肥者 加酒黃芪 無有不應 入好酒數滴 為引 使

有背痛 屬肺 分野 病經云 西風生於秋 病在肺 喻在肩背 故秋氣者 病在肩背 又云 秋肺太過 為病在外 則令人逆 氣 背痛 愠愠 然 是也

**通脈經** 云 風寒汗出 肩背痛 中風 小便數 而欠者 風熱乘 其肺 使肺氣鬱 甚也 當瀉風熱 以通氣 防風湯 主之

柴胡 升麻 黃芪各一 防風

羌活 陳皮 人參 杜草各五

薑本 青皮各三 黃柏一 白朮仁

右咬咀 作一服 水煎 溫服 食後 氣盛者 宜服 面白 脫色 氣短者 勿服

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之

背痛 有背痛 不可回 顧 此手太陽 氣鬱 而不行 以風藥 散之



治一男子忽患背脚縫有一線痛起上肩跨至胃前側脇而止其痛晝夜不歇不可忍診其脈弦而數重取豁大左大於右予意背脚小腸經也此必思慮傷心藏未病而腑小腸先病故痛從背脚起及慮不能決又歸之膽故痛至胃脇而止乃小腸火乘膽木子來乘母是為實邪詢之果因謀事不遂而病故用人參四分木通二分煎湯使吞龍膽丸數服而愈

背痛無二陽一陰發病主驚駭背痛善噫全文見診又云少陰司天熱淫所勝病肩背膈缺盆中痛又云歲金不及其病內舍膈脇肩背外在皮毛治以寒劑是也

針灸肩背有二法其一取肺經云肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出取其經太

陰足太陽之外厥陰內血者又云肺手太陽之脈氣盛有餘則肩背痛風寒汗出氣虛則肩背痛寒少氣不足以息視盛虛熱寒陷下取之是也

其二取腎經云邪在腎則病肩背頸項痛時眩取之湧泉

崑崙視有血者盡取之是也

肩背痛連脚 脚縫在背脚骨下直腋縫尖五樞二

肩背脚痛 崑崙 懸鍾 肩井

肩背頸項腋前痛與胃相引者 湧泉一分見 前腋

不可自帶衣臂腕外側痛不舉陽谷主之 肩背欲折騰

如板手不能自上下養老主之 項背痛引頸魄戶主之 肩痛胃滿悽厥脊背急強神堂主之 肩背髀痛臂不舉寒熱悽索肩井主之

肩背痛 手三里主之

針灸肩背有三法其一取手陽明經云大腸手陽明之脈所生病者肩前臑

痛視盛虛熱寒陷下取之也

其二取手太陽經云小腸手太陽之脈是動則病肩似拔

其三取筋經云手太陽之筋病繞肩引頸而痛應耳中

以知為數以痛為膺也

肩不可動臂不可舉 肩髃二十 巨骨五分 清冷淵

肩端腫 肩髃二十半 腕骨七分先 兩脚痛 肩

肩中痛難屈伸手不可舉腕重急曲池主之 肩肘節

酸痛臂痛不可屈伸肘節主之 肩痛不能自舉汗不出

頭痛陽池主之 肩重肘臂痛不可舉天宗主之 肩脚

周痺曲垣主之 肩中痛而寒至肘肩外膺主之 肩

臂閉急悽厥惡寒魄戶主之 肩痛不可舉天宗秉風主

之 肩重不舉臂痛肩髃主之 肩不可舉不能帶衣清



皮膚痛 皮膚索澤

黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡骨有度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之始

然陽明之陽名曰害蜚上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內少陽之陽名曰樞持上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰者主出以滲于內諸經皆然太陽之陽名曰關樞上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞濡上下同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經其出者從

陰內注於骨心主之陰名曰害肩上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經太陰之陰名曰關蟄上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經凡十二經絡脈者皮之部也是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於腑原於腸胃邪之始入於皮也漸然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脈盛色變其入客於經也則感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋變骨痛熱多則筋弛骨消肉燥腠理破毛直而敗帝曰夫子之言皮之十二部其生病皆何如岐伯曰皮者脈之部也邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脈絡脈滿則注於經脈經脈滿則入舍於腑臟也故皮者有分部不與而生大病也帝曰善

皮膚痛

皮膚屬肺經云肺之合皮也其榮毛也又云肺主皮毛在臟為肺在體為皮毛是也毛折爪枯為手太陰絕經云手太陰者行氣溫於皮毛者也氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮絕者津液既去則爪枯毛折毛折者毛先死

皮膚痛

皮膚痛屬心實經云夏脈者心也夏脈太過則病身熱膚痛為浸淫

針灸

運氣 運氣皮膚痛皆屬火邪傷肺經云少陰在泉熱淫所勝病寒熱皮膚痛又云少陰司天火淫所勝熱上皮膚痛又云少陰之復咳皮膚痛治以諸寒是也

針灸 針灸皮膚痛取肺經云邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出咳動肩背取之膺中外膺背三節五椎之傍以手疾按之快然乃刺之取之缺盆中以越之是也

皮膚索澤

甲身腫皮膚痛不可近衣淫樂苛獲久則不仁屏翳主之是也 皮膚索澤即仲景所謂皮膚甲錯蓋皮膚溢而不滑澤者是也

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃黃虫丸主之

三陽為病發寒熱其傳為索澤 全文見於病傳索澤也王氏云精血枯則故皮膚

咳有微熱煩滿胃中甲錯是為肺癰葶藶湯主之

運氣 運氣皮膚索澤屬燥傷胆氣經云陽明在泉燥淫所勝病







錢七入沙糖一小塊不入童便獨用水五盞煎至三三時細呷一日服盡其効甚速

**發聲散**治咽喉語聲不出

括萎皮 對 白姜 各等分 甘草 各等分

右細末每三錢溫酒調下或生薑自然汁調下用五分

綿裹噙化咽津亦得不拘時候日兩三服

**治卒失音**咽不出陳皮五兩水三升煮取一升去查類

**玉粉丸**治冬月寒痰結咽喉不利語聲不出

半夏 洗五 草烏 炒 桂 字一

右為細末生薑汁浸餅為丸如鷄豆大每服一九至夜

含化多年不愈亦有效黃帝針經中說寒氣客於會厭

卒然而啞此藥主之

八寶丹 治喉痛

蛤蚧丸 治肺間邪氣胸中積血作痛失音并治久嗽失

失音者音 蛤蚧 對上 喘足 溫水 浸去 阿膠 炒 生地 麥門冬 去 北細辛 去

甘草 炙 各 右為末煉蜜丸如棗大每服一九含化食後

**治暴嗽失音**語不出方

杏仁 泥 姜汁 沙糖 白蜜 各一

五味 紫苑 各三 通草 貝母 各四

桑白皮 五 右咬咀以水九升煮五味紫苑通草貝母桑白皮取三

升去查納杏仁 浸姜汁蜜糖和攪微火煎取四升初服

三合日再夜一後稍加

通聲膏方

五味 欵冬花 通草 各三 人參

細辛 桂心 青竹皮 葛蒲 各二

杏仁 升一 白蜜 斤一 薑膏 姜汁 升一

酥 升五 右咬咀以水五升微火煎三上三下去查納姜汁衷膏

酥蜜煎令調和酒服如棗大二九

**嗽聲嘶者**此血虛受熱也用青黛蛤粉蜜調服之

**失音**槐花瓦上炒令香熟於地上出火毒二更後床上

仰臥隨意服亦治咯血

**風寒之氣**客於中滯而不發故瘖不能言

**人患卒啞**杏仁三分去皮尖熬另研桂一分如泥和取

杏核大綿裹含細咽之日五夜三

入醫藥類 治風冷

**治失音**以桂末着舌下嚥津妙 千金 斗門 食 治風冷

失音以紫梗荆芥根一兩研汁入酒相和溫飲半盞服無

時聖惠

**治風冷失音**咽喉不利以菘荷根二兩絞汁酒一大盞

相和令勻不計時候溫服半鍾

**內侍曹都使**新造一宅落成遷入經半月飲酒大醉臥

起失音不能語召孫至診曰因新宅故得此疾耳半月當

愈但服補心氣薯蕷丸治濕用細辛川芎又十日其病漸

減二十日全愈曹既安見上問誰醫曰孫兆郎中上乃召

問曰曹何疾也對曰凡新宅壁土皆濕地亦陰多人乍來

陰氣未散曹心氣素虛飲酒至醉毛髮皆開陰濕之氣從

而入乘心經心經既虛而濕氣又乘之所以不能語臣先

用薯蕷丸使心氣壯然後以川芎細辛又去濕氣所以能

陰虛 失音



語也

氣運氣積有二

一曰熱助心實經云少陰之復暴瘖治以苦寒是也

二曰寒攻心虛經云歲火不及寒乃太行民病暴瘖治以

鹹溫是也

爪或音

狐惑聲啞其証然欲眠目不能閉起居不安是也治法見傷寒

針灸

黃帝問於少師曰人之卒然瘖者何道之

塞何氣出行使音不彰願聞其方少師答曰咽喉者水穀

之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者聲音之戶也

口唇者音聲之扇也舌者音聲之機也懸雍垂者音聲之

關也頰頰者分氣之所泄也橫骨者神氣所使主發舌者

也故人之鼻洞涕出不收者頰頰不開分氣失也是故厭

六書是類也

小而疾薄則發氣疾其開闊利其出氣易其厭大而厚則

開闊難其氣出遲故重言也人卒然無音者寒氣客于厭

則厭不能發發不能下至其開闊不致故無音黃帝曰刺

之奈何岐伯曰足之少陰上繫於舌絡於橫骨終於會厭

兩瀉其血脈濁氣乃辟會厭之脈上絡任脈取之天突其

厭乃發也言其無

厥氣走喉而不能言手足清大便秘不利取足少陰病篇

皆逆氣也足少陰脈循

喉又扶舌本故取之

針灸瘖有三法

其一取足少陰上二段經文是也

其二取足陽明經云足陽明之別名曰胃隆去踝八寸別

走太陰下絡喉嗑其病氣逆則喉痺卒瘖取之所別是也

予治一男十四十九歲久病瘖忽一日感風寒食酒肉

陰風氣走喉病暴瘖與足陽明豐隆二穴各三壯足少

陰照海穴各一壯其聲立出信哉聖經之言也仍用黃芩

降火為君杏仁陳皮桔梗瀉厥氣為臣訶子泄逆甘草和

元氣為佐服之良愈

其三取手陽明經云暴瘖氣哽取扶突與舌本出血舌本

廉泉穴也

瘖不能言合谷及湧泉陽交主之

卒暴失音 神門 湧泉

得息飲食不下天鼎主之 瘖不能言期門主之 暴瘖

不能言支溝主之

胎前產後瘖

黃帝曰人有重身九月而瘖此為何也岐伯對曰胞之

絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫于腎少陰之

脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也

當十月復言其氣少

郭氏論產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後虛弱

多致停積敗血閉於心竅神志不能明了心氣通於舌心

氣閉塞則舌亦強矣故令不語但服七珍散

人參 石菖蒲 生地 川芎

細辛 防風 辰砂 研各

右為細末每服一錢薄荷湯調下不拘時

胡氏孤鳳丹散治產後閉目不語用白礬細研每服一錢

熱水調下

脫肛 穀道痛蝕

脫肛氣虛者補氣參芪川芎升麻血虛者四物升麻

熱中

脫肛氣虛者補氣參芪川芎升麻血虛者四物升麻



氣熱者條芩六兩升麻一兩為末神麩為丸服之 血熱者涼血四物加黃柏

治脫肛以槐花槐角各等分炒黃為末用羊血煎藥炙熟食之酒下

治脫肛 槐花 荆芥穗 白連等分○白連忌是白飲

右為細末空心酒下便入 蠟皮散治肛門或因洞泄或因用力脫出不收

出皮一兩磁石半兩桂心半兩 右為末飲服方寸七忌舉重及房室肘後治女人陰脫

加醬頭一枚燒灰研入 大腸頭出痛若乾又落落又出名截腸病腸盡則死初

出寸餘時治之以芝麻油一盞以醫坐之飲大麻子汁數升愈

五倍子為末每三錢水二碗煎減半入白礬一塊安小桶內洗之立効

治男女脫肛用五倍荆芥小便濃煎洗之

治腸風及脫肛不收有血下用皂角三莖槌碎水一碗

按今皂角油盡用絹二重濾取清汁數分將脫肛腸浸在藥水中其腸自收不用手托如大腸收了更用湯盪其脫

肛上下令皂角氣行則不再作三次盪愈 治脫肛歷年不愈以生鉄三斤水一斗煮取五升出鉄

以汁洗日再 一方用磨刀槩秀水洗亦効 若腸隨脫肛出轉久不可收入搗生括萎汁浸之猪肉

汁中洗手隨按之令暖自得入 又方亦治脫肛

荆芥 龍腦 薄荷 朴硝

右煎湯朝洗之腸頭自入 香荆散治脫肛 香附末 荆芥穗等

右為末每用三匙水一大碗煎熱淋洗 針粉散治脫肛歷年不愈針粉研細每用少許搽之按入

即愈 治腸風并脫肛及有血用蛇床子不拘多少炒為末貼

大腸脫垂處立收甚妙 用木賊不以多少燒存性為細末搽肛門上按之

藥園治瀉多時脫肛疼痛黑聖散用大蜘蛛一個蘇葉

重葉線紫定合子內燒令黑色存性取出細研入黃丹少許同研凡有上件疾即先用白礬葱椒湯洗拭乾後將藥

末搽在軟處將手掌按托入收之妙 治大腸久積虛冷大便脫肛收不得蝸牛一兩燒灰猪

脂和傅之 治脫肛歷年不愈醬頭一枚燒令烟絕將末日傅肛上

手按接之 治脫肛用胡荽燒薰立入

治諸般痔脫肛以死蛇一條如指大濕者用掘地坑燒

之將有孔板蓋坑上坐薰之烟絕為愈大効 腸頭出用皂角薰次用蜈蚣一個入窰浸去蜈蚣將窰

調土硃傅上即入 一女子脫肛醫用糯米一斗濃煎飲

去米候洗肛温柔却先以磚一片火燒通紅用醋沃濕以

青布鋪磚上坐肛於青布上如熱則加布令厚其肛自吸

入腹中而愈 紫葳膏治臟熱肛門脫出以紫葳一握又名魚腥草



搗爛如泥先用朴硝水洗淨肛門用芭蕉葉托入却用藥於痔下貼坐自然收入

針灸  
集治脫肛 大腸輸 百會 長強

縮又法 百會 針二分至七分 世至十七壯

甲脫肛刺氣衝主之

殺道痛蝕

治殺道赤痛熱杏仁杵作膏傅之良愈

治下部虫齒杵桃葉一斛蒸之令極熱內小口器中以

下部搦上坐虫立死

脹蝕陰脫其脈虛小者生脈急死

痔

小腸有熱者必痔

秦芫蒼木湯治痔疾若破謂之痔漏大便秘澁必作大

痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣

也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝

風附熱而來是濕熱風燥四氣相合故大腸頭成塊者濕

也作大痛者風也若大便秘結者主病兼受火邪也熱結

不通去燥屎者其西方肺主諸氣其熱下亦助疾病為

邪須當破氣藥蒸之治法全矣服之其疾立愈不可作丸

以判湯與之効如神速

秦芫 主 澤瀉 三分

防風根 五分 薤仁 五分

黃柏 去皮酒 五分 大黃 少許

枳榔 一錢 細末 皂角仁 煨存性

去皮酒 五分 大黃 少許 枳榔 一錢

細末 皂角仁 煨存性 去皮酒 五分

大黃 少許 枳榔 一錢 細末 皂角仁

煨存性 去皮酒 五分 大黃 少許

枳榔 一錢 細末 皂角仁 煨存性

去皮酒 五分 大黃 少許 枳榔 一錢

細末 皂角仁 煨存性 去皮酒 五分

大黃 少許 枳榔 一錢 細末 皂角仁

煨存性 去皮酒 五分 大黃 少許

右除枳榔薤仁皂角仁三味候煎成藥研勻調入外餘

吹咀作一服水三盞煎至一盞二分去渣入前三味再

上火煎至一盞空心熱服待少時以美饌壓之不犯胃

氣也服藥日忌生冷硬物及酒麪大料物乾姜之類犯

之則藥無効如有白膿加五朶白朶花須除毒去心細

剪入青皮五分不去白入上藥同煎又用木香三分為

細末同枳榔等三味再上火同煎依法服餌古人以

此疾多以歲月除之此藥一服立愈若病久者再服必

愈

秦芫白朶丸

秦芫 去 歸梢酒 薤仁 酒浸去皮去

地榆 三 枳實 煨 白朶 澤瀉

皂角仁 煨存性去 皮各半兩

右為細末和薤仁泥研勻煎熱湯麪糊丸雞荳大焙

乾白湯下空心宿食消盡服之少時以美膳壓忌生冷

硬物冷水冷菜之類并濕麪酒及五辣辛熱大料物之

類犯之則藥無驗十服必愈

蒼木澤瀉丸

蒼木 四兩 澤瀉 枳實 秦芫 各二

地榆 去皮 皂角子 煨存性 各一兩

右為細末燒餅為丸如桐子大每服三十九米飲湯或

酒下

白朶丸 藥味與蒼木澤瀉丸同只

痔漏專一涼血為主

人參 黃連 生地 當歸 枳殼

川芎 和 槐角 涼生 條芩 枳殼

川芎 和 槐角 涼生 條芩 枳殼

槐角 涼生 條芩 枳殼

槐角 涼生 條芩 枳殼

槐角 涼生 條芩 枳殼

槐角 涼生 條芩 枳殼

槐角 涼生 條芩 枳殼

槐角 涼生 條芩 枳殼

槐角 涼生 條芩 枳殼

槐角 涼生 條芩 枳殼

槐角 涼生 條芩 枳殼



升麻起

右煎湯服之外以遊蕪蘆甘石童便煨牡蠣粉龍骨海蛤蜜陀僧之類敷之

許孺人產後痔作瘡有頭如蒜頭大或下鮮血或紫血大便痰與黑神散又多食肉大飽此濕熱在大腸所為

郁李仁去 麻仁 槐角各七 枳實 皂角仁五錢 歸尾 生地各三

大黃炒一 右分六貼內三樣仁另研煎服

患五種痔水研山荳根服味甘寒 又方治痔用雞冠花不拘多少濃煎湯每服一盞空心服本草云雞冠花性涼治諸血

痔頭向上是大腸熱甚收縮為主用四物解毒加枳殼

白木槐角秦芫

治番花痔 荆芥 防風 朴硝 右煎湯洗之次用木鱉子鬱金研末龍腦些少水調塗

治番花痔用信一錢蜈蚣數個以香油炙浸之臥臨時先洗痔拭乾却取浸油傳患處用手按入立愈累效其餘痔皆妙

痔藥膏子治外痔番花脫出黃水不止腫痛並用銀爛篋藥塗傳日一次重者五七次立愈先用藥水洗拭乾却

傳此膏用真桑灰不拘多少淋濃汁兩碗熬至一碗却入草烏片大黃片各二錢再慢火熬至半碗入甘草一錢數

沸下淨細石灰半匙頭不可多略沸三五次用絹一重花紙二重如絞漆狀濾過再熬成膏候冷用真膽礬五分研

極細末放入膏中用瓦器盛貯封之臨用入龍腦末和勻

治風痔漏不問有頭無頭定三日安 蘇蘆燒 天麻各五 皂角針不用皮條 乾姜研 蓮子草 明礬 硫黃各一

大苦瓜萎研麝香 右將瓜萎開一孔入礬并硫黃在內孔如小錢大就將

元捲合定綿紙糊却用瓦罐子盛坐瓶上炭火煨令烟盡為度候冷取出研細同前六味藥末和令勻煉蜜丸

桐子大每服十九至十五丸空心溫酒下日三服三日見効忌油麵醃藏牛馬肉魚腥生冷行房行遠勞力一切等事

治腸痔瘻甲丸

蠶甲 蝟皮炙焦 川山甲炙 白礬枯 附子 猪牙皂角各半兩炙焦

右細末研勻蒸餅丸如桐子大每服二十九食前日三服

又方 槐花炒 白礬枯各 附子錢 右細末研勻蒸餅丸如桐子大每服二十九米飲下食前日三服已上二方龍老傳

治腸風痔漏 赤芍藥 官桂去 甘草炙各

右咬咀每服二錢姜二片白糖一塊水一盞同煎七分去香空心服

因而飽食筋脈橫解腸辟為痔主氣通 黑地黃丸治血虛又痔神妙治痔之聖藥也方見



治痔方神妙

當歸 川芎 黃連 全蝎

三稜 蓮木 羌活 獨活

山茱萸 枳殼 商陸 白芷

巴豆 木香 甘草 鼠粘子

苦參 連本 柴胡 刺蝟皮

猪牙皂角 一方加白木半夏荆芥薄

荷梗椰各一兩

右將巴豆二粒或三粒入枳殼內線扎定却用醋煮爛

訖冷水洗淨去巴豆不用晒焙乾入前藥同為細末煮

醋麩糊為丸桐子大每服三四十九空心醋湯下更用

五倍子羌活獨活前湯洗如大便燥結用煮過巴豆六

七粒加入前藥同丸

右一方疎風泄熱破積滯其効如神

治五痔不以年月日久新積實為末煉蜜丸桐子大空

心飲下二十九

二三十年不愈者三服止用蓮花散

蓮花散 黑牽牛頭末 當歸

右為末先忌食肉五七日空心令食肉一頓就取温酒

下三錢約兩時辰取下膿血或虫是効

海藏外臺治五十歲痔不瘥塗熊膽取瘥神効諸方不及

此

七聖散丸治大腸疼痛不可忍王叔和云積氣生於脾

藏傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦是莫漫多方立紀

網

醫學綱目 卷二七

羌活 檳榔 木香 川芎

桂枝 大黃 郁李仁

右除郁李仁另研外為細末煉蜜丸桐子大驗虛實臨

時斟酌九數白湯下取大便微利一服而愈切禁不得

多利大便若大行其病滋甚

秦芫防風湯治痔漏大便時時發疼痛非痔漏也此藥主

之

秦芫 防風 白木 歸身

黃柏 陳皮 紅花 甘草

升麻 柴胡 菝葜 大黃

右劉如麻荳大總作一服水三盞煎一盞去渣稍熱服

空心宿食消盡服之避風寒忌房事酒濕麪大辛熱物

當風寒處大便

治痔有鼠結核作渴疼痛方

皂角 黃芪 荆芥 槐子

川山甲 木香 蝟皮 桔梗

露蜂房 芍藥 大黃

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九温酒下食前日三

服未知加至四五十丸

治痔下腫痛 枳殼 青木香

右為末每服二錢飯飲調下

治痔疾下血疼痛不止以玩月沙不限多少慢火熬令

黃色為末每二錢入乳香五分空心温酒調下日三四服

瘡即免子瘡是也

外治痔發疼痛裡肉作羹食之良作脯食不過三頓瘡

七二三



世治痔瘡痛不可忍者木綿花煎湯旋入朴硝乘熱薰之候溫浸之單用硝水極妙

本治痔痛

大蜈蚣一 大青州末三 白礬一 塊如

右將蜈蚣白礬二味為末用寒肉丸分作二九燒烟用竹筒透引烟薰妙

升麻根 柴胡 甘草各 麻黃根各 五分

黃芪 秦艽各 防風根分 藥本分

細辛少 羌活根三分

右制如麻苴大作一服水二大盞煎一盞去查空心宿食消盡服之忌如前

梅治痔有虫咬殺道痒或下膿血多取槐白皮濃煎汁安

盆中坐薰之塞其殺道湯冷更煖之良久欲大便當虫出

不過三度即愈如用末綿裹納下部

開治痔殺道中虫痒不止水銀末膏各二兩研勻捏如枣形薄綿裹納之明日虫出若痛者加粉草三大分作丸

羅淋淋藥治下部痔腫大腸頭痒痛

葳靈仙 枳殼各

右為粗末熬水薰洗冷即再煖臨臥避風洗三次挹乾貼蒲黃散

世治痔痒用五茄葉濃煎湯以瓶盛之坐瓶口上薰痔至湯溫洗之三次必効

開腸風痔漏有虫如絲細黑頭取去除根

瞿麥半 猪牙皂角一

世治痔痒用五茄葉濃煎湯以瓶盛之坐瓶口上薰痔至湯溫洗之三次必効

開腸風痔漏有虫如絲細黑頭取去除根

瞿麥半 猪牙皂角一

右為末入猪腰子一雙內用米泔煮空心食之少頃肚痛上攻虫皆隨出作地坑埋之薄粥補之

大腸硬者宜歸郁李仁湯治痔漏大便硬努出大腸頭下痔多血苦疼不能忍

皂角仁另為細末調服 郁李仁 秦艽各 一

麻子仁一錢 當歸稍 生地 蒼木各 五分

澤瀉分 枳實分 大黃三錢

右除皂角仁研細末餘藥剉如麻苴大水三大盞煎一盞去查入皂角末調在內空心食前候宿食消盡服之忌風寒處大小便

丹如欲涼大腸寬大腸則用枳殼去穢入巴豆鉄線繩煮透去巴豆入藥用若丸藥則搗爛用煎藥則乾用

食治野鷄痔下血腸風明目方嫩槐葉一升蒸如茶法取

葉碾作末亦如茶法煎呷之

壬治腸痔每大便下血槐樹上木耳取末之飲服方寸瘥日三服良

肝治腸痔每大便常血水服蒲黃方寸七瘥日三服良

食主五痔下血不止杏仁去皮尖及雙仁水一升研濾取汁煎減半投米煮粥停冷空心食之

單治腸痔多年不瘥下血不止木賊枳殼各二兩乾姜一兩大黃一分四味並剉一處入銚子內炒黑色存三分性搗羅溫粟米飲調食前服二錢七甚妙

外治患腸痔大便常有血食鯽魚羹及隨意任作飽食孫真人同

本治腸痔在腹內有鼠爛下血方

白蕪荑 椿樹東行根 狼牙根



貫衆 蝟皮 雄黃 白鮮

槐東引根

右細末臘月猪脂和一九彈子大綿裹納下部

治痔漏膿用赤石脂白赤脂枯礬黃丹腦子寒之

治腸風痔漏用鯽魚一箇破開去腸入白礬令滿合之

瓦上燒過為細末用雞毛捲藥餅之立効

治痔漏瘡方

雞子一個煮熟去黃取白切炒 白礬明者如皂角子大

右為末先用溫湯洗淨拭乾用紙捻點藥送入瘡孔內

立効日三易

右治痔漏下血如虛血必兼服黑地黃丸乃妙

鱗鱗甲燒一兩存性肉豈菴仁三箇同為末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者刺蝟皮一兩燒服中痛即已不必

運氣 運氣痔發皆屬寒經云太陽之勝痔瘡發治以苦熱是也

盡劑

治痔神應散治五種腸風下血上廁蓋前有血名外痔

糞後有血名內痔大腸不收名脫肛殺道四面有努肉名

爛痔痔頭上有孔漏出名腸風並治之

黃牛角鯁一枚醋中 蛇蛻皮一條猪牙皂角

穿山甲片 刺蝟皮

右五味細剉入甕瓶內以黃泥封固候乾先用小火燒

令烟出後用大火煨令通赤為度取出攤開候冷搗羅

為末服時先令患者臨卧時細嚼胡荽仁一個如糊用

無灰好酒一盞送下不可言語便睡至五更時以溫酒

調下藥末三錢至辰時更進一服雖久年不過三服立

効

治腸風痔漏如神大樹木上寄生葉取乾為末酒服

飲任下或九桐子大服三十九亦得

治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾為末水服方寸

或九桐子大服之立効

洗痔瘡用荆芥朴硝桑寄生定痛解毒去風涼大腸熱安

胎如腫者加五倍子木鱉子研細調傅 又方五倍朴硝

桑寄生蓮房水煎先薰後洗一方加百藥煎洗

淋洗法

天仙子 荆芥穗 小椒 蔓荊子

右水煎湯洗

薰洗痔方用枳殼不拘多少為末每用二錢水一盞砂

瓶內煎令沸先去瓶嘴坐坐薰後却瀉出通手熱洗妙

妙除根

洗痔方輕者用朝東馬齒莧劉寄奴濃煎湯薰待温却

用手洗拭乾薰者加大青葉梗乾者一半同煎

痔痔用灰莧帶根濃煎湯先薰後洗 又方取河水頻

洗用蝟牛塗之

經痔漏用健牛兒膽蝟膽各一個賦粉五十文麝香二十

文將蝟膽汁賦粉麝香和勻入牛膽內懸於簾前四十九

日熟旋取為丸如大菱角急送入瘡內後退出惡物日三

驗候瘡口漸合用生麪蓋瘡內一偏出惡物妙

一方治痔用雄雞膽片腦和勻帖之 一方熊膽塗之

神効

治痔用活蜈蚣一條以香油一小罐浸之陳愈妙傳之

累驗

無貼痔法



蜀葵子半 蟬蛻五 樛櫛一

右用末三枚取肉研細搜和藥末如覺硬痛少者  
膏量大小貼於病處

蒲黃散治下部痔漏

蒲黃 血竭兩

右為細末每用少許貼於患處

治痔疾有頭如雞冠者用黃連末傅之即瘥更加赤

小豆末尤良方用黃連

雄痔法

蟬皮切方二 雄黃末大 執艾子

右為末用瓦器以灰質一半如燒香法安長桶內坐其

上薰之烟氣從口出為佳凡三度薰水瘡勿犯風冷已

雞肉毒物

雄痔方用鼠屎皮一味瓶內燒烟坐身於瓶上薰三五

次除根

痔方赤脚蜈蚣一條香油煎酥紙上搥乾加乳香二錢

沒藥二錢麝香粉霜各五分人指甲五錢泥裏煨乾脆為

末用鷄毛管盛藥吹上如有水即時出盡不致其物結一

硬丁用線繫在上搥落之

治痔神効

雄黃 硫黃 明礬各等

右為末新蓋盛藥先入礬末一半在底次入餘藥又將

礬末一半蓋上用火煨候礬枯為度出火毒研末津液

調傅乾落為度後用石膏五倍子為末收瘡口

周先生枯痔法

明礬 赤石脂五 辰砂一錢 黃丹

右為末先用礬金末護肛門如無礬金用姜黃末代  
調塗四圍好肉如不就加薑豈粉打合却將枯藥傅上  
如肛門疼急濃煎甘草湯放溫拂四圍肛門上就與寬  
腸藥

槐花 大黃 枳殼 木通

連翹 瞿麥 當歸

右半酒半水煎

枯藥早晨上一次日午一次洗去舊藥申時又洗去又上  
一次如要急安至夜半子時又洗上一次至次日且看痔

頭淡淡黑色兩三日如烏舞四五日內用竹篦子輕輕敲

打痔頭見如石堅至七八日便住更不須上枯藥且待自

然如蘿蔔根乃脫去也洗用甘草荆芥槐花洗去舊藥方

上新藥 凡醫痔之法且如明日要下手今日先與此藥

所以寬大腸使大便軟滑不與痔相碍且不泄瀉痔頭未

脫落者須要日日與之以大黃一兩煨枳殼炒當歸酒洗

一兩同為細末如桐子大好酒吞下 治枯痔頭慮生他

証凡用枯藥或觸壞腎根或水道赤痛痛與此方大黃木

通生地各一兩滑石瞿麥各半兩同為細末每用四錢煎

服 催痔方如枯盡未脫落以此催之好磁石一錢白姜

蚕生川烏五分同為細末冷水調傅上立脫 凡用枯藥

去盡乳頭恐留痔硬頭損破肛門四圍成瘡用此藥龍骨

一錢石膏一錢沒藥五分膩粉五分同研十分細先以荆

芥湯洗次摻之切忌毒物生養 痔脫後用甘草湯豈豉

湯洗再用荆芥五倍子煎水洗便不生膿 治痔脫後肉

痒方用大粉草濃煎湯洗 收腸方凡用枯藥脫下乳頭

隨即與此以收其腸此方補氣又收膿去血生肉令痕壯



人參 當歸 川芎 甘草  
 白芷 防風 厚朴 桔梗  
 桂枝 黃芪

整痔法

治痔瘻有頭方用芫花入土根不限多少以淨水洗却入木臼搗用少許水絞取汁於銀銅器內慢火熬成膏將絲線於膏內度過繫痔繫時微痛候心燥落時以紙擦引入膏藥於竅內永除根未落不得便尿

割痔法

周先生割痔藥  
 川烏 草烏尖 胡椒 吳茱萸  
 花椒 白姜蚕 炒  
 右細末酒調傳四邊然後割之又以此藥傳之否則亦

用麝香龍骨塗之

右枯痔繫痔割痔三法用前藥服及敷貼不退者然後用之必敬謹之不可視為常法

蝕痔法

治痔漏此因大腸感風熱而生  
 生砒字 水銀 膩粉字 麝香 小豆粒如

右件並入乳鉢內研極細如痔如有珠子者將藥湯淨洗拭乾用手擦藥指在痔上覺痒便是藥行一日二次又洗五日後住藥見効如或有孔只用紙擦引藥送入令徹其內更用紙貼孔前一日二次使藥自能生全

針灸

針灸痔獨取足太陽經云足太陽之脈所生病者痔瘡視盛虛熱寒陷下取之蓋後世取承山穴者是也其二論督脈而不見其取法經云督脈生病瘰癧痔蓋後世

取長強穴是也

治痔瘡大蒜十片頭垢捏成餅子先安頭垢餅於痔上外安蒜片以艾灸之

唐峽州王文顯充西路安撫司判官乘驛入略谷有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如渣灰火至驛便仆主驛吏云此病予曾患來須灸即瘥用柳枝濃煎湯先洗痔便以艾炷其上連灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時出至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳去

痔漏下血裡急後重或痒或疼

二白 在掌後橫紋上四寸手脈陰脈兩穴相並一穴長強 在兩筋中一穴在大腸外針入三分瀉酒及

灸法 長強 灸可七壯雖久不愈者亦効

又法 脊骨凸處與臍平對是穴 承山 二十半補

痔瘻痛承筋主之 痔瘻痛飛陽及委中扶承主之 痔瘻橫竹主之 痔瘻會陰主之 痔與陰相通者死

陰中諸病前後相引痛不得大小便會陰皆主之 痔骨蝕商丘主之

腸痔為痔如大澤中有少山突出為痔入於九竅中凡有小肉突出皆曰痔不特於肛門邊生有鼻痔眼痔牙痔等其狀不一方書分出五種曰牡曰牝曰腸曰氣牝

痔者肛邊生瘡腫突出一日數枚膿潰即散牡痔者肛邊發露肉珠狀如鼠奶時時滴潰膿血脈痔者腸口顆顆發瀉且痛且痒出血淋漓腸痔者腸內結核有血寒熱往來登瀉脫肛氣痔者遇恐怒則發肛門腫痛氣散則愈又有





ZW 21181000784001

S  
2121.5  
150(1020)

續修四庫全書 子部 醫家類

忌

酒痔每遇飲酒發動瘡腫痛而流血血痔則每遇大便清  
血隨下而不可宜解熱調血順氣為主若久不愈必至穿  
穴為漏矣  
治痔切勿用生肌毒氣入腹反至奄忽忌喫生冷硬物冷  
菜之類及酒濕麵五辣辛熱大料物及乾姜之類犯之無  
效此東垣格言也

醫家類卷之三

三

醫家綱目卷之二十七

七二八