


《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇一五・子部・醫家類

瘍醫大全四十卷（卷二十二至卷三十八）

〔清〕顧世澄撰

瘍醫大全目錄

卷二十二

腦背部

腦疽門主論

髮際疽門主論

後腦發門主論

頭後蜂窩疽門主論

天疽銳毒門主論

耳下石疽門主論

瘍醫大全

卷二十二 目錄

項門癰門主論

項後方龜瘡門主論

項後生疔瘡門主論

失帶症門主論

天柱疽門主論

天壽疽門主論

對口門主論 附方

百脉疽門主論

肩癰門主論

肩疽門主論

過肩疽門主論

肩井毒門主論

擔肩門主論 附方

上中下三發背門主論 附方

對心發門主論

蓮子蜂窩發門主論

兩頭尖疽門主論

瘦癭發門主論

瘍醫大全

卷二十二 目錄

體發疽門主論

陰陽疽門主論

特疽門主論

陰陽二氣疽門主論

黃瓜疽門主論

丹毒發疽門主論

酒毒發疽門主論

上搭門主論 附方

中搭門主論

二 顧氏秘書

左右搭串門主論

癩疽發門主論

禽疽門主論

九疽門主論

小兒龜背門主論 附方

脊縫出虱門主論 附方

肉龜瘡門主論

鼠攢瘡門主論

淵疽門主論 附方

湯醫大全

卷二十二 目錄

三

顧氏秘書

石疽門主論

腎俞發門主論

對臍發門主論

環跳疽門主論 附方

陰毒門主論

無名腫毒門主論 附方

湯醫大全卷二十二

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

塔錢少翁京湯

馬 樞燮用和

腦背部

自腦後有脊背腹癰疽皆彙於此部中以便檢閱
治

湯醫大全

卷二十二 腦背疽

一

顧氏秘書

腦疽



腦疽門主論

鬼遺方云正腦上一處起為腦癰及腦疽腦癰在

大椎骨上入髮際生

王肯堂曰腦癰皮起易得破穴急破急出膿不害腦

疽皮厚難得破穴須急發內毒使破穴方可腦癰

一處初起如橫木掘上起頂門下止大椎發腫如

火燒其色青黑如靴皮大硬不見膿即損外皮如

犬咬去肉之跡難愈

準繩

靈樞經云陽氣大發消腦溜項名曰腦癰其色不樂

瘍醫大全

卷二十二

腦疽

二

顧氏秘書

腦項如刺以針煩心者死不可治

薛立齋曰腦屬足太陽膀胱經積熱或濕毒上湧或

陰虛火熾或腎水虧損陰精消涸始成疽也

陳遠公曰有生疽於頭頂者始名腦疽若對口偏對

口俱非真腦疽也此疽九死一生大約生此疽者

皆腎火沸騰也腦為髓海通於腎腎無火則髓不

能化精腎多火髓亦不能化精不但不化精而髓

火升降且化為毒以生癰疽矣蓋腎之化精必得

腦中之氣以相化若腦中無非腎火勢必氣化為

火久性炎上不及下降即於腦中髓海自發其毒

較之腦氣不流而為毒者更甚故往往有更變形

容改換聲音瘡形紫黑煩躁口乾甚至腦骨俱腐

片片脫下狼狽之狀不可言語形容者又何以救

之耶此症須問飲食若何倘飲食知味即可用藥

名曰五聖丹金銀花八兩玄參麥冬各三兩黃芪

四兩人參二兩水煎服四劑漸愈改用十全大補

湯重四兩服四劑又改用八味地黃湯恣其酣飲

自可全愈矣此救九死一生之法然舍此實無第

瘍醫大全

卷二十二

腦疽

三

顧氏秘書

二法也此疽得於房術者居多與陽溢精俱是丹

石燥烈之品霸阻精道日積月累真陰枯燥髓竭

火發遂至潰頂而不可救人又何苦博女子之歡

喪千金之命耶

水鑑

賈漢卿曰腦疽若色黯不潰或潰而不斂乃陰精消

涸名曰腦癰為不治

全書

髮際疽



瘍醫大全

卷二十一 髮際疽

四


顧氏秘書

髮際疽門主論

王肯堂曰髮際瘡初起如粟米頭白肉赤熱痛如錐刺婦人患此者多丈夫患此者少始因風濕上攻或因風熱上壅若如芡實漫腫寒熱或痛或癢者是髮際疽也 準繩

心法曰此疽生項後髮際形如黍豈痛如錐刺癢似火燎破津膿水亦有浸淫髮內者此由內鬱濕熱外兼受風相搏而成癩腫高腫者易治平塌漫腫毒流肩背未膿先腐者難治十四日得膿為吉

後腦發有正有偏



瘍醫大全

卷二十一 後腦發

五

顧氏秘書

後腦發門主論

申斗垣曰玉枕疽即後腦發乃足太陽兼督脈陽維脈所主多血少氣在玉枕二穴風府穴端 啟玄 陳實功曰玉枕疽生於腦後枕骨中堅而難潰痛引肩項鼻塞氣益此足太陽膀胱濕熱凝滯而成痛瘡不一 正宗

頭後蜂窩疽門主論

申斗垣曰蜂窩疽乃熱毒結成形如蜂窩中多碎孔多生頭後焮痛紅腫者可治疾發者難治毒流兩肩不可救矣 敬立

胡公弼曰此症與蜂窩發背不同與對口同治 青囊

傷醫大全

卷二十二

蜂窩疽

六

顧氏秘書

左名天疽右名銳毒生於耳後一寸三分陷中致命之虞



傷醫大全

卷二十二

天疽

七

顧氏秘書

天疽銳毒門主論

陳實功曰天疽銳毒生於耳後一寸三分致命之處左為天疽天者妖也妖變之物屬於肝木右為銳毒銳者利也鋒利之器屬於肺金二者皆起於積想在心謀慮不決以致火旺而又鬱鬱而又旺誠為險惡之候故形多堅硬頭多隱伏未潰先黑未膿先腐臭穢易生元氣易敗凡得此者多不得外發後必內攻而死初起生於隱微令人多不知覺及其知覺毒已入內矣倘紅活而腫易於膿腐

者無妨 正宗

汪省之曰天疽銳毒又名痲發又名耳後發 理例

胡公弼曰耳後銳毒乃心腎二經受毒若不急治恐

熱氣壅心毒攻喉下必致傷命 青囊



未全

卷二十二 天疽

八

顧氏

石疽



瘍醫大全

卷二十二 石疽

九

顧氏秘書

耳下石疽門主論

馮魯瞻曰耳下石癰者不膿不疼是也大宜養肝血

滋腎水溫補可化如少年脈實者少佐以清肝然

不可輕用行氣破血之藥 錦囊

汪省之曰石疽多生耳項 理例

竇漢卿曰石疽與石癰同惟石疽深寒客於經絡血

氣結聚不散隱於皮內堅腫按之如石此毒若連

頸項之節內先腐爛方出皮膚如膿出頸項者即

死初起宜艾火灸三四十壯發於額面者不可灸

也

又曰商陸搗敷石疽最效

瘍醫大全

卷二十二

石疽

十一

顧氏秘書

項門癰



瘍醫大全

卷二十二

項門癰

十二

顧氏秘書

項門癰門主論

汪省之曰項門癰乃陰陽不調氣熱壅上結在風府
 之傍聚而成毒傷於腦後此惡候也治同癰疽法
 理例

項上肉龜瘡門主論

心法曰肉龜瘡卽胖人項後髮際疽蓋胖人項後髮際肉厚而多摺紋其髮反刺瘡內因循日久不瘥又兼外襲風寒凝結形如卧瓜破爛津水時破時斂俗名謂之肉龜經年不愈亦無傷害

項上肉龜瘡

卷二十二

肉瘡

主

顧氏

項後生疔瘡門主方

項後生疔瘡肉色不變不論大小年深日久者

生山藥去皮 革藤仁十粒

搗爛攤帛上貼之奇驗

項後生疔瘡

卷二十二

疔瘡方

主

顧氏

失榮症



湯醫大全

卷三十一

失榮症

西

顧氏秘書

失榮症門主論

陳實功曰失榮症得之於先得後失始富終貧亦有
 雖居富貴其心或因六慾不遂損傷中氣鬱火相
 凝隧痰失道停結而成其患多生肩之以上初起
 微腫皮色不變日久漸大堅硬如石推之不移按
 之不動半載一年方能陰痛氣血日衰形容瘦削
 破爛紫斑滲流血水或腫泛如蓮穢氣薰蒸晝夜
 不欲平生疔瘡愈久愈大越潰越堅犯此俱為不
 治當以和榮散堅丸飛龍阿魏化堅膏治之雖不

能愈誠緩命之金丹也治此症與乳巖相似 正宗

湯醫大全

卷三十一

失榮症

主

顧氏秘書

失榮症門主方

和榮散堅丸 正宗

失榮症堅硬如石不熱不紅漸腫漸大者服

人參 當歸身 白朮

白茯苓 香附 廣橘紅

熟地 各二兩 天南星 貝母

栝子仁 遠志 牡丹皮

酸棗仁 各一兩 角沉 蘆薈 各八錢

龍齒 一對煨如無龍齒以鹿角尖二兩煨代之 硃砂 六錢乳細為衣

湯醫大全 卷二十一 失榮方 其 顧氏秘書

右為末煉蜜丸桐子大每服八十九食後用合

歡樹根皮煎湯送下患者若改往從新淡薄甘

命其中有得愈者十中一二否則難脫然也

飛龍阿魏化堅膏 正宗

治失榮症及癭瘤乳巖瘰癧結毒初起堅硬如

石皮色不紅日久漸大或疼或不疼但未破者

俱用此貼

用蟾酥丸藥末一料加金頭蜈蚣五條炙黃去頭

足研末全入熬就乾坤一氣膏二十四兩化開攪

極均重湯內頓化紅緞攤貼半月一換輕者漸消重者亦可停止常貼保後無虞矣

湯醫大全

卷二十一

失榮方

七

顧氏秘書

天柱疽門主論

王肯堂曰天柱疽生天柱骨上極癢入骨惡心吐逆
肩背拘急急隔蒜灸癢止為度灸而有泡者吉無
泡者凶服發汗劑得汗可治無汗難治若潰後神
昏嘔噦惡心血不止者死 準繩

傷醫大全

卷二十二

天柱疽

十一

顧氏秘書

天壽疽門主論

申斗垣曰天壽疽其狀大而紫黑生於項背是三陰
三陽經脉交會之處故毒易於內攻若不早治若
熱毒入於淵液 膽經穴名 恐傷肝肺旬日之間必死初
起不論陰陽寒熱當以隔蒜或豆豉餅灸之治同
癰疽法 啟立

傷醫大全


卷二十二

天壽疽

九

顧氏秘書

對口有正有偏



毒流於肩則肩腫
毒流於背則背腫

瘍醫大全

卷二十二

對口

辛

顧氏秘書

對口門主論

申斗垣曰對口生於風府瘡門穴

風府一名舌本入項髮際一寸腦戶

後一寸五分項大筋內宛宛中瘡門在風府後五分入髮際五分入系舌本陽維之會仰頭取之

汪省之曰偏對口又名髮際發理例

陳遠公曰對口初生小瘡先癢後疼隨至潰爛人以

為至凶之癰也不知生正對口者反輕而生於偏

傍者尤重蓋頸項之上乃腎督之部位也其地屬

陰所生多是陰疽非陽癰也陽症必高突色紅腫

發亮疼痛呼號若陰疽色必黑黯疼亦不甚身因

欲臥沉重呻吟無力瘡口不突或現無數小瘡世人不知何處覓頭然陰陽二症皆可內消何可令其皮破腫潰而後治之乎惟內消之法不必分解陰陽但既破潰膿設陰陽不審漫投藥餌則禍生頃刻也內消用三星湯金銀花二兩蒲公英一兩生甘草三錢水煎二服全消陽症已破者亦以此方治之三服必膿盡肉生若陰症大潰者改用七聖湯人參黃芪當歸白朮各一兩金銀花二兩水煎一服血止二劑肉生三劑口小四劑皮合又二

瘍醫大全

卷二十二

對口

辛

顧氏秘書

劑全愈 水鑑

此方治各部癰疽低陷不收口者神效不止治對口陰毒而已也總以陽症可以涼瀉陰症必須溫補故耳

陳寶功曰對口又名腦疽生於項後而對前口者是

也正對口是督脈所主督脈起於下而貫脊行於

上故毒氣得之反能冲突高腫使毒氣不致下流

低陷乃能外發故多易治偏對口乃太陽所司太

陽膀胱主司寒水性質多沉起於巔頂貫項兩傍

順行而下與瘡毒交會下流故瘡多平塌難治之

證以十五日內得膿為吉 正宗

馮晉瞻曰腎消亦有腦疽背癰者蓋腎主骨腦者髓之海背者太陽經寒水所過之地水涸海竭陰火上炎安得不發而為癰疽也其瘡甚而不潰或赤水者是則或黑或紫火極似水之象乃腎水已竭不治若峻補其陰能食便調神安無別惡症或可救也

薛立齋曰腦疽俗名對口乃濕熱交蒸而成從外感受者輕從五臟蘊結內發於外者重項後雖屬於

瘍醫大全

卷二十二

對口

顧氏秘書

督脉又乃太陽膀胱寒水司行之道從外感得者多生正穴氣稟純陽故多不治而愈正穴屬於督脉起自尾閭穴貫脊而上氣血交會故易於高腫潰膿生肌收口偏穴屬太陽膀胱經太陽膀胱主司寒水起於巔頂分脊而下此處發疽毒壅於此氣血流行隨毒而下瘡形平塌腫不高尖根脚走散兩肩漫腫背如負石難以成膿難潰難斂決不可治

又曰五臟蘊結而成者其源有五心緒煩擾動不

寧以致火旺而沸騰行於項間與寒水交滯而為

膿者一也惱怒傷肝項乃三陽統筋之所肝傷則血脉不流筋無榮養凝結為腫故項緊急強痛不能轉側其患未潰前肉色紫暗堅硬漫腫破流血水木痛無膿者二也思慮傷脾脾氣日損又或膏梁損胃胃汁乾枯以致中脘痞塞氣不運行逆於肉裏乃生壅腫其患外皮雖腐內堅不潰口燥舌乾飲食不進根脚走散膿穢色敗者三也憂鬱傷肺肺傷則毛竅閉塞腠理不通氣不舒暢縱橫經

瘍醫大全

卷二十二

對口

顧氏秘書

絡結而為腫其形瘡多平陷色淡不華皮腐脂流形如湯潑氣粗短促鼻微鼻掀碌碌生痰殷殷發嗽者四也恚怒傷腎腎傷則真陰之氣敗真陰一敗相火相生此火最能自升自降或動或靜瘡形紫黑脉數乖度煩躁口乾隨飲隨渴者五也故云從內發外者重

又曰凡不紅不疼不腫灸亦不痛急用披針當頂點入知痛處出其惡血通其瘡竅隨插蟾酥條直入瘡底用膏蓋好取膿為吉餘如癰疽治法托毒

對口門主方

秘方

連翹去心 牛蒡子研 蟬蛻

白芍藥 川芎 當歸尾

防風 赤芍藥各一錢五分 甘草節必要

川貝母去心各三錢 蒲公英二錢 厚朴一錢

桔梗一錢四分 乳香去油 沒藥去油研一各七分

逐味另稱分釐不可增減水二鍾煎加童便一

盞和服服後出汗二三劑即愈

瘍醫大全 卷二十二 對口方 蕭 顧氏秘傳

對口初起

鮮烏魚皮貼瘡上乾則以火酒掃之日換五次

又方

猪首眼瞳中肉取下兩塊盛碗內用木筋搗極爛

如糊敷圍中留豆大一孔透氣至重敷二次即消

又方

山藥同獨核肥皂搗敷

又方

游蜒虫同霜梅搗敷

又方

上好心紅三錢 游蜒十條

搗膏視毒大小貼之未成即消已成即出膿立

時見效

對口背癰仙方

活鯽魚一尾去鱗腸 頭垢五錢

共搗爛加蜜半杯攪勻從外圍入裏面留一孔

出毒氣二次全消即時止痛

對口癰初起

瘍醫大全 卷二十二 對口方 蕭 顧氏秘傳

桃葉尖九個搗爛摻上

又方

抱小雞的母雞熱尿塗消

又方

猪胆剖汁碗盛塗完即愈男用雄猪胆 女用母猪胆

又方

天茄即白牽牛 葉帶莖子採來全生姜三片搗敷

早晚一換三日全愈

又方

甘蔗搯 焙乾 白狗屎 焙燥

研末和勻用竹管將稀絹蒙一頭入藥篩膏藥上貼之雖垂危亦愈

對口

薺菜全醋搗爛敷立消

瘍醫大全

卷二十一

對口方

素

百脉疽門主論

鬼遺方云百脉疽腫起環圍頸項疼痛身體大熱不敢動止惛惛不能食此有大畏恐駭上氣咳嗽其發引耳不可以腫十五日可刺導引不導引見血八十日必死 準繩

瘍醫大全

卷二十一

百脉疽

素

顧氏秘書

肩癰門主論

陳寶功曰肩毒左肩為癰屬肝右肩為疽屬肺 正宗

胡公弼曰發肩乃腎與膀胱受證氣血凝滯不得流


行結成癰疽得膿為吉 青囊

瘍醫大全

卷二十一 肩癰

天

顧氏秘書



瘍醫大全

卷二十一 肩疽

天

顧氏秘書

肩疽門主論

王肯堂曰肩疽此處乃手足三陽交會之所由風熱

鬱結所致或因負重損傷而作 準繩

靈樞云發於肩及臑名曰疔癰其狀赤黑急治之令

人汗出至足不害五臟癰發四五日逆熇之

鬼遺方云丁疽發兩肩惡血留結內外榮衛不通發

成疔疽五日腫大令人口噤寒厥十二日可刺不

治二十日死

陳氏曰乾疽腫發起兩肩及兩大臂連胛骨二七日

痛不息亦不可動五十日身熱不赤六十日可刺
刺之無血者死

薛立齋曰肩疽生於肩骨之上乃肝脾二經積熱毒
氣上衝肩井始生多不知覺惟肩骨中酸痛竟有
六七個月方現形影既潰失治五六載不能收功
甚至肩井骨露則危矣初起宜用艾灸

心法曰肩中疽生肩正中左右相同屬三焦膽二經
一名疵癰

又曰肩風毒生於肩稍膈上骨尖處屬大腸肩髃穴
瘍醫大全 卷二十二 肩疽 辛 顧氏秘書

由邪風深襲骨縫與濕稽留化熱而成

又曰乾疽生於肩前廉左右皆同屬大腸經一各疔
疽

過肩疽門主論

王肯堂曰過肩疽又名筋疽生肩後夾脊兩邊強硬
痛疼寒熱似癰但初起無頭急用灸法

鬼遺方云筋疽發夾脊兩邊大筋上其色蒼八日可
刺有癰在肥腸中九十日死

心法曰過肩疽生在肩後廉左右皆同總由濕熱風
邪過鬱而成亦有負重瘀血凝結而成

瘍醫大全 卷二十二 過肩疽 辛 顧氏秘書

肩井毒門主論

申斗垣曰肩井毒又名氣癰其穴在肩上骨腋動處陷中是也乃怒氣相干氣血凝滯而成初起必用鐵箍散圍住根脚否則毒流肩脊不可治矣 啟玄

傷醫大全

卷二十二

肩井毒

三

顧氏私書

擔肩門主論

申斗垣曰此乃肩挑負重壓傷肩頭氣血凝滯而成或因枕臥冷處致令隧道不通蓄血而成破則流膿出血此外因也治當早灸始能消散 啟玄
又有匾擔因婦女在上跨過即害擔肩

傷醫大全

卷二十二

擔肩

三

顧氏私書

擔肩門主方

驗方

剪猫頭上毛用不語唾粘之

傷醫大全

卷二十一

擔肩方

書

上中下三發背門主論

王肯堂曰上中下三發背俱在脊中屬督脉上發者傷於肺發於天柱骨下中發者傷於肝為對心發下發者傷於腎為對臍發皆由積熱怒氣所致初如粟米或麻或癢或拘急或不痛或大痛初覺便宜隔蒜灸之或汗或下或托量其虛實施治準編又曰腦發背發在上者不可用木通恐導虛下元故也老弱者尤宜戒禁三發背總要之地與他處不同尤所當謹微有痛癢宜速治之

傷醫大全

卷二十一

發背

書

顧氏秘書

鬼遺方云人生最可憂者發背也其種有五 一曰陽毒發背因風而有或患熱毒消渴或先患傷寒餘有陽毒未解蓄積起於背脊脊之間不問椎數但從兩夾脊起止腰上滿背焮腫熱如炊之狀赤紫或紅如焰膿毒難成後不止止後痛不除暮忽數日之間復平如舊將謂腫消此是內攻內陷不可瘥矣 二曰陰毒發背是氣冷而作初如黍米粒起情緒不快愔愔而痛直應前心心內忪怔頭目昏重寒熱如瘧五七日後始發引攻腫開潤

難收內積有膿深沈遲緩未透宜急以補氣湯藥
 內托外以抽膿藥貼之宜急見膿無膿即平愈無
 期 三日有人多服金石燒煉之藥毒惡流滯成
 發背者初起如丹痧之狀紫紫漸開如湯火瘡面
 色如珠心膈煩躁多渴嗜冷其瘡難起起即驚人
 猶勝於陰陽二毒者緣此有解金石藥毒湯散治
 其內也賴有根底分明亦須急療方安 四日人
 有患酒食毒發背者此疾非近得之乃臟腑久積
 乘饑乘困食之便睡或多食酒肉冷熱粘滯肥鮮
 湯醫大全 卷二十二 發背 素 顧氏秘書

腫色青黑如靴皮頑痺痛深附筋骨微離按之如
 木石引手加深方覺似有痛處至五七日毒氣浮
 淺腫高色變青白有如拳打之狀寒戰似瘧及有
 風候頭動口偏手足厥逆眼黑睛小白多而慢此
 內有邪氣相搏急破出清血三五升有黃膿白汁
 相和發泄其皮不寬不慢亦急脹痛亦不住直至
 色退熱痛方愈亦宜急追趕膿與毒氣外出無害
 初患腫三日內灸者生 八日內膿成針烙導
 引者生 未瘥慎勞力者生 慎忌食者生 慎
 湯醫大全 卷二十二 發背 素 顧氏秘書

熾膩未下胸膈房室不禁恣意當風取快脾臟氣
 虛不能受乘發毒攻背兩夾脊不問椎數初起癰
 頭如小彈子後大如拳堅如石痛遍四肢加之拘
 急口苦舌乾腹急大小便澁十數日後頭面手足
 虛腫及臟腑通泄如利內急痛者是其證也乘方
 腫引急用攻腫發穴潰膿湯藥內實外泄膿水不
 可放縱遲緩則皮肉腐壞傷骨爛筋漸成膿多因
 而感邪內敗者死矣 五日人有胃山嵐瘴氣發
 背毒氣先在臟腑年月浸遠氣血虛損衰弱初起
 喜怒者生 懼腫猛療者生 急療者生 不諱
 發背者生 待膿自出不導引者死 未內攻而
 針烙用藥導引者生 內攻後導引針烙者死
 腫焮熱痛方盛已前療者生 如過此後已內攻
 者死 膿成後不出不導引但敷藥者死 如赤
 白痢氣急者是已內攻醫療無益必死 癰不救
 十得五生 疽不療十全死 輕腫怕痛者必死
 不遇良方者死 節候不依法者必死 愚執
 恣意用性逆情者死

王肯堂曰有發背癰有發背疽如毒氣勇猛而發如火燎茅易於收壞初起如黍米粒大兩三日漸赤引腫如手掌面大五七日如碗面大即易為攻焮熱赤引如火燒之狀浮面漸潰爛潤開內發癰如炊之狀外爛皮肉如削去紫瘀膿汁多而腫不退疼亦不止發渴發逆飲食不下嘔吐氣急浮淺開潤者尤宜發膿托毒湯藥服之必愈陽證實也其間有只如蓋面大者此非不大緣為毒氣深沉內虛毒氣近膜也此必內攻近入臟腑却外入四肢先攻頭面虛浮後攻手面次攻兩足面腫名曰毒氣散入四肢其人聲嘶氣脫眼睛黑小十指腫黑乾焦不治陰證也始發一粒如麻豆大身體便發熱生疽處腫大熱痛此為發於外雖大如盆治之百可百活陽證也或身體不熱自覺倦怠生疽處亦不熱數日後漸大不腫不痛低陷而壞爛此為發於內雖神仙無如之何準繩

陳遠公曰背心間先發紅癰後漸紅腫此發背之兆也最為可畏古人云外大如豆內大如拳外大如

拳內大如盤言外小而內實大也然癰疽大毒必辨其陰陽有先陰變陽者有先陽變陰者有前後俱陽者有前後俱陰者陽症雖重而實輕陰症雖輕而實重先陰變陽者生先陽變陰者死何以知之陽症形高而腫起陰症形低平而陷下陽症色紅陰症色帶黑陽症初起必痛陰症初起必癢陽症潰爛多膿陰症潰爛多血陽症收口身必輕爽陰症收口身必沉重至於辨陰辨陽以此消息必不差也凡紅腫高突乃陽症也乘其肉腫初發肉猶未化急以散毒之藥治之可隨手愈也發背至橫決者皆因循失治以至破敗而不可救陽變陰者多矣救癰如救火宜速撲滅否則延燒屋舍不盡不止切勿見為陽症輕緩治也急消湯金銀花二兩紫花地丁一兩茜草甘菊花桔梗天花粉生甘草各三錢貝母二錢黃柏一錢水煎服三劑全消不四劑也水鑑

此方消陽毒初起極神既無迅烈之患大有和解毒之妙人不知法則謂陽毒易於祛除浪用虎狼之味毒雖消散而真氣耗損往往變成他症乃醫者成之也何若王霸並施有益無損為妙

又曰背心發癩癢甚已而背如山重隱隱發紅骨如

盤大此陰癰初起之形最為可畏非前症可比乃

一生罪孽鬼祟憑身必胡言謾語將平日欺心之

事盡情宣布此症本不可救然人心善惡成於一

念苟能悔艾而刀圭無術亦見吾道之無奇矣夫

陽症有可救之條陰症豈無可生之理惟在治之

得法耳陰症雖成於鬼祟之纏亦必正氣大虛邪

得入之也故治法必用補氣血之藥佐以散鬱散

毒之品則正旺邪自散矣變陽湯人參黃芪各二

湯醫大全 卷三十一 發背 聖 顧氏秘書

兩金銀花八兩白芍一兩天花粉生甘草各五錢

荆芥炒三錢柴胡二錢附子一錢水十餘碗煎汁

二碗先服一半後又服一碗陰必變陽而作痛又

一劑痛消再一劑全愈

世人不見皮破血出斷不肯信然先用此方以治
發背無論病人不肯服即醫士亦不肯用往往決
裂潰爛瘡口至如碗大而不可收始悔參芪之選
川矣所以論症而多戒辭勸人早服此方以免喪
命蓋陽毒可用攻毒陰毒必須補正以參芪補氣
氣旺則陰毒之毒不敢入心肺之間金銀花性清
善解陰毒得參芪而功益大然非附子不能直入
陰毒之中而又出於陰毒之外毒深者害深又加
生計草以解餘毒然毒結於背者氣血之滯也極
極者鬱之極也故加柴荆粉芍消痰通滯開鬱引

經自然氣宣血
活痰散毒消也

又曰背癰潰爛洞見肺腑瘡口黑陷身不能臥口渴

思飲人以為陽症敗壞孰知陰虛不能變陽乎夫

癰雖有陰陽之分及至潰膿之後宜補內而不宜

消則陰陽之症一也潰爛而見肺腑足見失補之

故使毒過於延燒將好肉化為菸肉耳肉菸必腐

腐則洞見底裏此症九死一生之兆倘胃氣健能

食者猶可治若見食則惡者必無生理然能受參

芪峻補者向可生也轉敗湯人參熟地各二兩生

湯醫大全 卷三十一 發背 聖 顧氏秘書

黃芪當歸山萸各一兩白木金銀花各四兩麥冬

二兩遠志三錢肉桂茯苓各二錢北五味一錢水

煎一服胃氣大開者即可轉敗為吉倘服後少能

健飯亦在可救若杏無應驗者胃氣將絕無救矣

此方補氣血更補肺腎之陰蓋陰生則陽長陰陽

而生長則有根易於接續後以銀花解毒則毒散

而血生血生而肉長肉長而皮合倘以解毒為事

不補氣血之陰陽則陰毒不能變陽有死而已矣

漸安者尚有生機不可棄置

又曰背癰將愈瘡口不收治無一效人以為餘毒未
盡也孰知陰虛不能濟陽乎夫癰疽初起則毒盛

變膿則毒衰膿盡則毒化矣瘡口不收乃陰之虛非毒之旺人不知治法以敗毒攻之是重虛其虛欲肌肉之長得乎或亦有補而不效者必係只用陽分之品以補陽不用陰分之品以補陰也蓋獨陰不長獨陽不生今膿血已盡陰必大虛只補陽則陽旺陰虛陰不能交於陽矣雖陽有濟陰之心而陰無濟陽之力所以補陽而陰愈虛瘡口愈難合也治必大補其陰使陰精盛滿自能灌注瘡口不必生肌外敷瘡口之肉自生矣生膚散麥冬山

湯醫大全

卷二十二

發背

聖

顧氏秘書

黃銀花當歸各一兩熟地二兩人參白朮各五錢肉桂一錢水煎二服肉自內長又二服外口自平又二劑全愈

此方補陰多於補陽使陰勝於陽也然補陽之藥仍是補陰之助以其能入陰中交於陽內也銀花非特以解毒取其能領各味至瘡口之間也

又曰背瘡長肉瘡口已平忽開裂流紅人以為瘡口肉未堅也孰知色慾惱怒不謹乎夫癰疽最忌色慾次忌惱怒犯惱怒新肉有開裂之虞犯色慾新肉有流水之害然此猶些小瘡癰也其在背癰犯

惱怒者不過疾病犯色慾者多致死亡瘡口開裂之處色必變紫黑流血之處內必變敗壞矣此時必急補氣血切不可仍治其毒蓋前毒未盡必難收口復至敗壞實新肉不堅而自決裂也况發背新愈其精神氣血空虛交合泄精遂變出非常舍補氣血又安求活乎然補氣血必用大劑方能收危亂之功也定變回生湯人參四兩黃芪三兩當歸麥冬白朮銀花各二兩茯苓一兩山萸五錢肉桂三錢北五味二錢水煎二服肉自生矣三劑皮

湯醫大全

卷二十二

發背

聖

顧氏秘書

仍合矣平復如故再犯禁忌無不死矣此方難救此方救瘡瘍壞症仙丹不止治發背愈後犯色敗腐也人疑泄精以至決裂宜熟地大補之何故不用因熟地補陰最緩而症犯甚急所以不用熟地多用氣血之藥救其垂危非熟地不可用輕棄之也此方數劑之後正宜減半而多加熟地以為善後計耳

又曰夏月生背癰瘡口不起脉大無力發熱作渴自汗盜汗用參芪補劑益加手足逆冷大便不實喘促嘔吐人以為火毒太盛也誰知元氣大虛補不足以濟之乎夫癰分陰陽瘡口不起乃陰症也脉大似乎陽症大而無力非陰而何發熱作渴此水

不足以濟火故作渴作熱也既陰症似陽用參芪助陽足以祛陰而返陽矣何以愈補反作逆冷嘔吐此陰寒之氣甚而微陽之品力不能勝耳非加附子之辛熱何能斬關以祛蕩陰邪哉助陽消毒湯人參八兩黃芪一觔當歸白朮各四兩陳皮一兩附子五錢水煎膏二次服諸症退服數劑瘡起乃減半又服數劑而愈

此非治癰之法也然以治癰之法輕劑治此鮮不立亡可見治癰不可執也大約陽癰可用消毒化痰而陰癰切不可用消毒化痰之藥今舍癰從症乃治癰變法醫者不可不知也

湯醫大全

卷二十二

發背

醫

顧氏秘書

又曰背生癰疽潰膿之後或發熱或惡寒或作痛或膿多或流清水自汗盜汗膿成不潰口爛不收人以爲毒氣未盡也誰知五臟虧損血氣大虛之故也凡人氣血壯盛陰陽和平何能生毒惟臟腑內損而毒氣得以內藏久之外泄及至癰疽發出其毒自不留內然臟腑原虛又加流膿血則已虛益虛觀其外而瘡口未斂似乎有餘審其內而氣血未生實爲不足法當全補不必偏補一臟設有偏勝之虞用十全大補湯爲妙以其兼補氣血耳然

有不效者非方之不佳乃用之不得法也夫背何等之症豈細小之劑所能補哉必大劑始克有濟子酌一方人參當歸各一兩黃芪熟地各二兩白芍白朮茯苓各五錢川芎生甘草各三錢肉桂二錢水煎服一劑有一劑之效也

人以此方絕不敗毒如何毒化肉生不知癰疽未潰以化毒爲先癰疽已潰以補正爲急縱有餘毒未盡不必敗毒也敗毒之味非寒涼即消耗消耗即損人血氣寒涼敗傷人胃氣胃氣傷則氣全無血氣損則邪氣反盛何能生肌肉哉此方專助真氣以益胃氣故能收全效且此不但治背癰已潰凡瘡瘍已潰者皆宜用之惜世人未知也

湯醫大全

卷二十二

發背

醫

顧氏秘書

申斗垣曰上搭中搭下搭皆由酒色過度怒氣相干寒熱壅盛而成膿血稀少謂之裏虛難於醫治啟胡公弼曰按足太陽膀胱一經始於睛明攢竹終於通谷至陰凡六十三穴去脊中寸半之間貼脊而行自大杼而下第三椎肺俞五椎心俞七椎肝俞八椎膽俞九椎脾俞十二椎腎俞生發背者上發則傷肺中發則傷心與肝名爲對心發下發則傷脾與腎名曰對臍發家秘云發背一日生二日大三日爛一七出水一七不過良醫爛開四圍毒熾

甚矣若爛見心透膜犯主神手醫救亦難余以為
初起莫妙於灸中間莫妙於薰若有腐而不潰自
降紅升提腐去毒俟毒盡肌生之時再行生肌自
無鎖口之患青囊

汪省之曰凡辨發背令患者以兩手上下摸看搭不
着者方是發背若搭的着者上為上搭下為下搭
左為左搭右為右搭中為中搭俱以手搭治之若
手摸不着則是真正發背必須內外相參上緊醫
救方可保其無變也理例

瘍醫大全

卷二十二

發背

樂

顧氏秘書

陳實功曰心之以上多危險者因屬於五臟故也蓋
心肝脾肺四臟皆繫於背惟腎經一臟獨居於下
雖居於下其本臟精華津液元氣元神盡行灌溉
榮注於上故四臟之火皆賴一臟之水以濟之所
謂五臟根本皆繫於背即此之義也况背乃太陽
膀胱督脉所主太陽者乃六經之首領督脉者十
二經絡之統脉瘡生於背毒犯於此須分陰陽虛
實治之正宗
又曰發背在心之以下腎俞以上者輕因屬於腑分

故曰心之以下多成順蓋其形在下其氣主表其
病為癰正宗

汪省之曰癰發生於神道靈臺二穴乃督脉膀胱經
初起時不作寒熱疼痛紫黑色不破裡面先白黑
爛二十歲已後房勞積熱所生皮黑者不治理例
胡公弼曰對心發蜂窠發蓮子發兩頭尖皆發背之
別名以瘡口開張深淺而言也此症最忌香葷燒
酒猪羊牛驢等肉前後切忌寒涼之劑以免毒攻
內陷青囊

瘍醫大全

卷二十二

發背

樂

顧氏秘書

發背門王方

發背毒瘡

用麵調勻做圈圈住瘡根將黃蠟切薄片鋪平瘡內勿使滲漏以炭火炙化變青色乃毒氣出也再如法行之三五次以黃蠟不變色為度即消矣

發背

滴乳香

去油

沒藥

去油

白兒茶

銀硃

貞定粉

黃丹各四兩

銅綠三錢

瘍醫大全

卷二十二

發背方

吳

顧氏秘書

右研極細末照瘡大小用夾連四油紙戳孔每張稱藥五錢真麻油調攤四圍用線縫好貼上外用軟絹紮自然止痛化腐生新三日翻轉貼之如對口調膏敷之

發背

大狗牙

炒焦黑

研細搽之如神

又方

不拘男婦頭髮一把入真麻油一觔將髮熬化令病人飲之則毒氣漸消不致傷生也



瘍醫大全

卷二十二

對心發

吳

顧氏秘書

對心發門王論

陳實功曰對心發生於背徑對前心者是也此乃心火妄動熱極所致心為君主之官豈容毒邪干犯誠乃毒刻君位最易傷人形截督經害非輕淺况心為一身之主宰周身蘊熱流會於此共結為患且此穴背脊多坑固難起發瘡形落陷腫不高尖治當大降心火急踈蘊熱頂用針通隨行拔法務使毒氣內外宣通各從門出庶不內攻方為成守十五日後內無變證得膿為吉如至期變證漸生

堅硬漸大不作膿者死在二十二朝前後 正宗

湯醫大全 卷二十一 對心發 辛 顧氏秘傳

蓮子蜂窩



湯醫大全 卷二十一 蓮子蜂窩 辛 顧氏秘傳

蓮子蜂窩發門主論

王肯堂曰蓮子發即太陰疽生肩胛內痛漸至潰爛屬手太陰肺經積熱所致赤色者可治青黑者不治喘嗽大渴胸滿脉微者死 羊編

又曰蜂窠發狀如蜂房十日平塌寒熱痛禁

鬼遺方云蜂窩疽發背起心俞及心包絡俞若肩

髃二十日不穴死十日可刺其色赤黑膿清者可

治

陳寶功曰蓮子蜂窩一發此言其形似而名之也多

生於背與心相近與脊中平輕者形長高腫或偏
半背重則形斜平塌兩脇俱傷孔似蜂窩突如蓮
子形雖可畏常能多險多生羸弱不堪反取常安
常穩大規祇怕不純陽治法何妨瘡勢急治宜護
心護膜謹防毒氣內攻 正宗

注省之曰蜂窠者言其頭有五七十不止蓮子者頭
不過一二十通背腫者不救 理例

又曰瘡頭向上發者名曰反證最凶瘡頭向下發者
稍順如無膿痰發及串流於肩膊者不治穿膜者

瘍醫大全

卷二十二

蓮子蜂窩

顧氏秘書

不治又有兩頭開發者更凶 理例



瘍醫大全

卷二十二

兩頭尖

至

顧氏秘書

兩頭尖疽門主論

中斗垣曰兩頭尖又名滿天星乃飲食辛熱蘊釀鬱
積毒壅所致氣虛相沖因虛成毒故此證形口開
而潤上可至肩下可至腰此千無一有之證治與
癰疽同法 散立

王肯堂曰兩頭發又名滿天星又名廣錦背發兩頭
小四邊散因積怒蓄熱所致腫高紅潤者生低陷
黑暗者死 準繩

瘦瘤發



瘍醫大全

卷二十一

瘦瘤發


毒

顧氏秘書

瘦瘤發門主論

申斗垣曰瘦瘤發發於脊之正中近於大椎穴在第三椎上陷中三陽陶道穴在項大椎節下間督脉足督脉所發陶道穴在項大椎節下間督脉足穴在第三椎節穴在項大椎節下間督脉足下間俛而取之三穴之端俱督脉所絡之處甚利害急早托之此是陽維之海督領百脉若生癰疽乃督脉不能統督之意故凶啟玄

體疽發



瘍醫大全

卷二十一

體發疽

毒

顧氏秘書

體發疽門主論

申斗垣曰體發疽上至肺俞穴在第三椎下各依下脊相去一寸五分至肝俞穴在第四椎下兩傍各一寸五分出山跳附經左右相同在高骨之傍乃是太陽膀胱經多血少氣八日可刺如不潰二十日死或初發時腫上如椒子者死啟玄

王肯堂曰竟體發一名椒眼發背上生疽肉色不變麻木微癢頑如牛領之皮二三尺由盛暑時空腹感觸穢氣及憤怒積鬱所致七日內未成膿宜隔蒜灸灸而起發神清脉和者可治灸而不起腹脹

神昏脉微或促或代者死服汗劑得汗者生無汗者死服補劑紅潤起發知痛者生膨脹不食乾枯黑陷者死 準繩

傷醫大全

卷二十二

陰陽疽

素

陰陽疽門主論

王肯堂曰陰陽疽背上麻木不常時腫時塌忽軟忽硬乍寒乍熱由七情內乖陰陽不和也此證必大渴神清脉定者可治昏迷躁亂飲食不進者死十日得黃白膿者可治數日無膿者死 準繩

傷醫大全

卷二十二

陰陽疽

素

顧氏秘出

特疽門主論

王肯堂曰特疽發肺俞及肝俞不穴二十日死八日
可刺其色紅赤內隱起如椒子者死 準繩

湯醫大全

卷二十一

特疽

聚

陰陽二氣疽門主論

王肯堂曰陰陽二氣疽廣潤滿背或大或小不常腫
熱脹大十日可刺導引出膿不拘深淺多少發渴
體倦十日外不見膿不治 準繩

湯醫大全

卷二十一

陰陽二氣疽

聚

黃瓜疽門主論

王肯堂曰黃瓜疽一名肉龜生背側高二寸長尺許狀如黃瓜肉色不變疼痛引心四肢麻木是也此證多不可治 準繩

湯醫大全

卷二十一

黃瓜疽

李

醫氏秘書

丹毒發疽門主論

王肯堂曰丹毒發疽背上細癰無數浸淫一二尺如湯火傷煩躁多渴因服丹石剛劑所致紅潤者生紫黯者死惡證少者黃連消毒散國老膏惡證多神昏脉躁膨脹嘔噦者死 準繩

湯醫大全

卷二十一

丹毒疽

李

醫氏秘書

酒毒發門主論

王肯堂曰酒毒發背當心而痛麻木不常纍纍如彈
如拳堅硬如石痛徹五內遍身拘急由饑飽勞傷
炙燂厚味所致神昏脉亂大渴狂言有妨飲食者
死二便閉結者死有因寒變而內陷者用托裏溫
中湯準繩

傷醫大全


卷二十二

酒毒發

李

甄氏秘書

上搭



傷醫大全

卷二十二

上搭

李

甄氏秘書

上搭門主論

王肯堂曰肩後疽又名鼠疽卽上搭也生肩膊後骨
上乃怒氣積鬱所致屬太陽兼少陽經宜灸準繩
汪省之曰凡辨手搭腰搭發背三證務令患者以手
搭肩上搭着者左爲左搭右爲右搭頭多如蜂窠
者易治向下手搭着者謂之腰搭惟兩手上下俱
搭不着者謂之發背理例
陳實功曰肩下脊上發癰疽者乃脾經蘊積膏粱熱
毒所致腫形根脚不過兩肩者爲順如腫平堅硬

漸大漸開攻注兩肩胸項腫而不定者危 正宗

心法曰上搭手生於脊骨第三節傍 中搭手生於

脊骨四節傍開三寸膏肓穴名青龍疽 下搭手

生脊骨第十四節腰窩內傍開三寸育門穴

瘍醫大全 卷二十一 上搭 李商 氏秘傳

上搭門主方


消上搭方 單方集驗

全 蝮 三個 核桃肉 三個

共研細熟酒冲服一二次自消

瘍醫大全 卷二十一 上搭方 李商 氏秘傳

中搭



瘍醫大全

卷二十一

中搭

李

顧氏秘傳

中搭疽門主論

王肯堂曰中搭即龍疽生第九椎兩傍忽腫痛而無頭寒熱大作屬太陽經由七情不和憤怒積熱所致色赤起發潤澤者可治色黑低陷惡心眩運大便滑泄小便如淋譫語者死

準繩



瘍醫大全

卷二十一

左右搭

李

顧氏秘傳

左右搭串門主論

王肯堂曰左右搭串者左肩骨上生疽串於右者可治右肩骨上生疽串於左者難治古有此說愚謂不然攻注左右者氣血不調陰陽交錯也七惡證少何慮難痊元氣虛憊治之何補哉

準繩

陳實功曰左搭屬肝右搭屬肺俱生於左右肩骨移動之處為可治如左搭串右右搭串左俱為難治

正宗

申斗垣曰兩肩左右齊發名雙串肩搭疽

啟立

療疽發



瘍醫大全

卷二十一

療疽發

癩

顧氏秘書

療疽發門主論

申斗垣曰療疽發發於背之兩傍屬足太陽膀胱經
多血少氣發於脊中屬督脈經初起如豆如梅李
黑白色不定慘痛應心四畔如牛唇四十歲以前
可治已衰弱者難痊 微立

禽疽門主論

鬼遺方云禽疽始發者如疹數十處如拳打之狀發
寒齒噤如此者十四日死十日可刺導引膿出即
愈

王肯堂曰禽疽背忽麻木拘急不痛十數處肉紫色
如拳觸狀七日內寒熱口噤者死得汗可治無汗
不治神昏脈躁或微或代者死漫腫不潰宜服臺
閣紫微丸 準繩

瘍醫大全

卷二十一

癩

顧氏秘書

九疽門主論

汪省之曰九疽一生即有九處當驗人之虛實毒之淺深膿之稀稠潰之遲速以決死生如二三處者則輕理例

瘍醫大全

卷二十一

九疽

羊

小兒龜背門主論

龜背者多因未滿半週強令坐早失護背脊以致客風吹撲傳入於髓寒則體痿故傳變成斯又謂五臟皆繫於背凡五臟受過而成五疔久則蟲蝕脊髓背骨似折高露如龜矣書曰肥腫疔還盛脊高力已衰腎無生氣骨無堅長故為惡候也

瘍醫大全

卷二十一

小兒龜背

顧氏秘書

小兒龜背門三方

孫真人千金方

紅藥首烏研末龜尿調敷脊骨漸漸自平

傷寒大全

卷二十二 小兒龜方

圭

顧氏秘書

脊縫出風門主論

岐天師曰如人背脊裂開一縫出風千餘此乃腎中
有風得陽氣吹之不覺破裂而風出治以活水止
風丹裂縫生風盡死 秘錄

傷寒大全

卷二十二 六經

圭

顧氏秘書

脊縫出風門主方

活水止風丹 岐天師

熟地

山萸肉 各三兩

杜仲 一兩

白朮 五錢

防己 一錢

稀莨草 三錢

白水煎

脊縫生風 張仲景

草麻子三粒研成如膏同紅棗三枚搗成丸如彈子大火燒之薰衣上則風死而縫合蓋草麻子能殺風而去風風去風出則脊自合縫矣

湯醫大全


卷二十二

出風方

書

顧氏秘書

肉龜瘡



湯醫大全

卷二十二

肉龜瘡

書

顧氏秘書

肉龜瘡門主論

汪省之曰肉龜瘡乃心腎二經受症生於胸背兩脇間有頭有尾且有四足皮色不紅突起二寸或有頭向上者毒攻心口或有頭向下者足如刀割或左或右其痛難忍急用神針針住頭尾四足上用艾灸二十八壯龜瘡即死不可去針內服荆防敗毒散加天花粉乳香沒藥然後再瀉其針 理例

鼠攢瘡



瘍醫大全

卷二十一

鼠攢瘡

五

顧氏秘書

鼠攢瘡門主論

汪省之曰鼠攢瘡又名遊走血脾癰生於脇背之間此乃自幼受其胎毒或因缺乳多食麪果熱毒之物臟腑嬌脆不能尅化久作寒熱骨蒸內熱日夜不寧因此毒發生於皮膚之外儼如流注一般狀似鼠形大小不一七八口有膿可治無膿難於收斂
理例

王肯堂曰老鼠攢一名遊走血脾癰生於背脇之間三兩處發疽由怒氣積熱所致多發於足少陽足

厥陰部位七日不見膿及黑陷躁亂者死
心法曰串疽生於背脇之間初發一處挨次發出二三處形雖不同而色仍同也潰後多相串通故又名老鼠攢又名遊走血脾癰

瘍醫大全


卷二十一

鼠攢瘡

五

顧氏秘書

淵疽



瘍醫大全

卷二十二

淵疽

美

顧氏秘書

淵疽門主論

陳寶功曰淵疽發於脇下初起不紅堅硬久則破潰有聲如嬰兒啼狀膏蓋無聲去膏仍有異哉難治真不能也 正宗

心法曰淵疽生於脇下三寸憂恚太過以致肝膽兩傷而成初起堅硬腫而不紅日久方潰得稠白膿者順如豆漿者險瘡口有聲似乎兒啼此屬內膜透也可於陽陵穴在膝膕骨外廉下一寸陷中燻灸二七壯其聲即止將潰未潰宜坐取之即得多服護膜散可免


透膜

瘍醫大全

卷二十二

淵疽

美



淵疽門主方

護膜散

白蠟

白芨 各等分

研末輕者用一錢微重用二錢重者用三錢或酒或米湯調下

傷醫大全

卷二十一

淵疽方

全

顏氏

石疽門主論

王肯堂曰石疽生腰膂之間肉色不變堅硬如石經月不潰者何如屬少陽陽明二經積熱所致邪毒固結元氣不足故不能起發若黑陷不起麻木不痛嘔噦不食精神昏亂脉散或代者死準繩

汪省之曰石疽乃寒氣所作深伏於骨髓之間腿膝有腫與皮肉相似苦疼而堅硬如石故謂之石疽治宜溫補理例

傷醫大全

卷二十一

石疽

全

顏氏



傷醫大全

卷二十二

腎俞發

全

顧氏秘書

腎俞發門主論

王肯堂曰腎俞發即腰疽又名連腎發又名下搭生十四椎傍腰腎之間由房勞太過致傷腎水令人口乾寒熱大作百節俱痛治之稍緩潰爛透膜者死若見咳嗽嘔噎腰間似折不能俯仰飲食不納者死潰而膿水清稀腐爛腥穢迷悶不醒厥逆者不治準繩

陳遠公曰有腰眼間忽生疽毒疼痛呼叫似乎陽症然腰腎乃至陰之地未可作陽症治之也此症雖

本於忍精欲泄不泄以成此毒似乎純是陰分之過但腰雖不遠於內腎火發而毒成則陰中有陽未可純以陰症治之也必陰陽並治以化毒則毒去如掃倘不補陰竟治其毒則腎益傷而毒難速化即補陰而不補陽則陰無以生毒且深藏腎宮不得外泄矣兩治散白木杜仲當歸各一兩金銀花三兩稀莨草三錢防已一錢水煎一服痛輕二劑疼止三劑全愈 水鑑

傷醫大全

卷二十二

腎俞發

全

顧氏秘書

此方以杜仲白木利其腰膈氣通毒自難結又得銀花當歸補中有散而防已稀莨草直入腎宮祛濕熱之毒陰陽無偏勝之虞邪正有解紛之妙自然二三劑成功也

申斗垣曰腰疽乃是太陽膀胱經多血少氣生於腰間腎俞胃倉二穴托之得膿則安若上赤下黑二十日不潰或青黑色無膿出血水者死 啟玄

又曰腰癰發於軟肋下近腰乃帶脉五樞維道穴是少陽經多氣少血寒熱焮腫作痛余曾治一人膿出一桶餘內托大補而愈

寶漢卿曰此證切忌怒氣行房犯之不治又曰治宜補腎加知母黃柏沒藥廣膠

胡公弼曰此發生於兩腰陷肉之間或生兩腰中間在大杼下第十二椎是也此乃慾火消陰十五日前後必死若瘡形紅活高腫有膿尚有可生機枯

陳寶功曰腎俞發生於兩腰內腎陷肉之間或正中亦發凡生於此最為險候蓋腎為性命根本藏精藏氣藏神又乃受命先天育女育男育壽此必房勞過度氣竭精傷慾火銷陰外陽煽動以致真陰從此而耗既耗之後其臟必虛所以諸火諸邪乘

瘍醫大全


卷二十二

腎俞發

齒

顧氏秘書

虛而入如本臟稍有真陰制火瘡形自可高腫紅活為膿治以人參養榮湯加山萸肉北五味子知母黃柏及加減八味丸以救其源若瘡形紫黑乾枯堅硬不作膿者為真陰內敗再無可生之理死在十五日前後 正宗



瘍醫大全

卷二十二

對臍發

金

顧氏秘書

對臍發疽門主論

王肯堂曰對臍發發於背下命門穴與臍相對故名乃督脉經毒發有膿者生如出血水譫語發渴者死 準繩

寶漢卿曰對臍毒即衝疽又名歷腎生於腰腎間也若內腎疼變為渴者萬無一生 全書

環跳疽門主論

心法曰環跳疽生胯骨節間之環跳穴所以腰難曲伸漫腫隱痛此證皆由風濕寒邪凝結而成屬足少陽膽經初起宜服黃狗下頰散更刺委中穴出黑血其腿即能轉動矣

瘍醫大全

卷二十一

環跳疽

全

顧氏秘書

環跳疽門主方

黃狗下頰散

黃狗下頰

連舌皮毛劈下入罐內蓋泥封固鐵蓋蓋口煨一炷香覺烟青即止務宜存性取出黑如炭為度若帶白色其性已過則無用矣用時研細取狗下頰宜用屠家已殺之犬若生取特殺一犬恐傷德反招不祥

碗豈粉

白 蘇 各等分

三味和勻每服五錢温黃酒空心調服出臭汗及熟睡為效外將此藥用香油調敷患處

瘍醫大全

卷二十一

環跳疽方

全

顧氏秘書

陰毒門主論

陳實功曰陰毒者乃純陰無陽被天時寒冷肅殺之氣侵入肌膚流入骨髓以致氣不能升血不能行凝滯經絡疼痛切骨初起不紅不腫不熱朝輕暮重久則作腫漸紅爛斑黑腦臭水淋漓穢氣薰蒸腐爛漸開終久必死 正宗

傷醫大全

卷二十二

無名毒

無名腫毒門主論

王肯堂曰無名腫毒者不拘於頭面手足胸腹等處歛赤腫硬結核疼痛又名腫瘍又名虛瘍但腫無膿無面者俱是也腫熱勢盛者以稜針刺去惡血切不可以火針烙之若暴發赤腫切不可針破之只宜以洗腫方法淋洗 準繩

又曰紫遊風

紫遊虛瘍

均屬無名腫毒

陳遠公曰頭面無端忽生小瘡濇甚第二日頭重如山第三日面目青紫此至危之症苟不速治數日

傷醫大全

卷二十二

無名毒

完

顧氏秘書

內一身發青黑而死若青不至心胸者尚可救因此人素服熱藥熱極而變為毒也人入房久戰雖氣主之而實火主之也氣旺而非火濟之則不足鼓其興趣博久戰之歡補氣之藥斷不能舍參芪而求異味世人貪歡者多而吝惜者不少用熱藥助火非多加人參不足以駕馭其猛烈之威無如人參力難多備方士不得已遷就世人心乃少減參則功力薄多加熱藥以壯火於是金石火燬之藥紛然雜投謂不如此不足以助命門之火也

夫命門之火腎火也非真陰之水不養不同於脾胃之火可以外水解之也且腎水既旺則外勢剛強多御女戎亦復何傷無奈淫心無盡火熾則水乾火沸則水涸水不足以制火熱毒結於腸胃况戰久必大泄精精泄過多火自更旺未免再戰或歸咎前藥太少更多服以助其勢不知藥益多而火益烈戰益頻而水益燥乎久之水涸火炎陽易舉而不能久戰即有忍精勉強而鬪精不化而變為毒結於陰之部位則成癰結於陽之部位則成

湯醫大全

卷二十二

無名毒

李

顧氏必書

毒頭上陽部位也較陰部尤為可畏非多用化毒之藥安能起死回生哉回生至聖丹金銀花八兩元參蒲公英各三兩川芎一兩生甘草五錢天花粉三錢水煎服一劑頭輕青紫色淡又一劑全愈此方化毒而不耗氣敗毒而不損精所以奇也此毒原係水疔之極而瀉毒之味皆損於陰陽惟銀花攻補兼妙故以之為君必多用而力始大加元參去火甘草瀉毒蒲公英清熱花粉消痰川芎散結自然相助成功也石室秘錄奇病門中亦有此症治法宜參看辨證水鑑

又曰腫毒生於思慮不到之處其勢凶惡有生死之關皆以無名腫毒名之不必分上中下也前條只

言頭上而身之左右前後四肢尚未言也治之得法可以通治也大凡上中下之生腫毒者多起於淫慾無度加之氣惱憂鬱火乘其隙處蘊藏結毒故一發而不可救所以此症盡屬陰症而無陽症也治法似用解陰毒之藥矣然解陰毒之藥大半消燦真陰本因虛而結毒復解毒而虧陰安有濟乎余得異傳於補陰之中以行散鬱之法佐以解毒之品少助行經之味是以多收其功不敢秘傳書之於冊以救萬世之人也黑虎湯元參一兩柴

湯醫大全

卷二十二

無名毒

李

顧氏必書

胡三錢生甘草一兩煎湯十碗生頭面者加川芎二兩附子二錢再煎汁取三碗分二日服完未破者即消已破者生肌自愈不必二劑生身左右前後者加當歸二兩甘菊花一兩附子三分如前服生手足四肢者加白朮二兩茯苓一兩附子五分亦如前服無不收功

按元參退浮遊之火得甘草之助解其迅速之威得柴胡之佐能舒抑鬱之氣又有引經之味引至毒處大為祛除用至一兩力量更大又是補中去散則解陰毒不傷陰氣所以建功人勿見藥之重不敢輕試負余慙慙濟世之心也若些小之症與非陰症不必用此重劑不可不知也

又曰有四肢間或頭面上忽然生疽頭黑皮紫疼痛異常此陽症之毒也亦能殺人此症其勢甚驟不急散毒則養成大橫世人每以生疽甚小不似生癰之大往往不以爲意誰知變成大毒疽與癰實有不同癰潰於內而疽腫於外也潰內者難外治腫外者易內消雖癰疽之毒盡由內而發外宜皆治內而外愈而疽尤宜內治也消疽散生地地榆連翹天花粉各三錢忍冬藤夏枯草當歸各一兩白芷生甘草各二錢水煎服永潰者二劑即消已

癰醫大全

卷二十一

無名毒

李

顧氏必書

潰者四劑全愈此方通治惡疽無不神效

蓋補血以散毒則血活而毒難留涼血以清火則血寒而火易散疽多陽症所以治無不宜也

無名腫毒門三方

太乙丹 敬恕堂注

敷一切無名腫毒

頂好騰黃 五十兩 赤小豆

天南星 各二十兩

川五倍子 一百兩 當門子 五兩

右研極細末用白芨二十兩打糊和搗成錠用醋磨敷自消

升麻膏

貼疔瘡頑瘡癰疽瘰癧痰核未成自消已潰自斂

癰醫大全

卷二十一

無名毒

李

顧氏必書

升麻 二十兩

真麻油五筋浸一宿煎枯去渣慢火熬乾滴水不散入飛淨黃丹二十四兩收成膏

一氣丹 胡學海

一切癰疽對口發背無名大毒

斑 貓 去頭足翅糯米 拌炒五錢

乳香 去油

沒藥 去油各三錢

雄黃 二錢

血竭 一錢

麝香 一錢五分

冰片 七分五厘

元胡索

元參 各五分

共乳極細末量瘡大小施用膏貼之上初起立消已成易潰已潰易斂較之紅昇丹其功更捷且紅昇丹不利於對目惟自此最穩久不收口

蘆甘石 張確內煨研細搽之 水淬七次

大頭骨煨 貓頭骨煨 研細搽之即斂

敷魚名毒

小粉炒黃研

瘍醫大全

卷二十三

九十四 顧氏秘書

用不經鐵器搥死鷄將鷄撕開取鷄心肝腔不用腸搥爛敷上一伏時必效

五虎丹

雄黃 菖蒲 艾葉尖

硃砂 不拘多 蜈蚣 一條

五月五日午時配合研細敷搽即消

消腫毒 極肥皂角子陰陽瓦焙研酒調服出汗即消

又方 榆樹南行根條洗淨加鹽少許入糖

全搗敷即散

卷二十二終

瘍醫大全目錄

卷二十三

後陰部

鵝口疳門主論

尾閭發門主論

鬻癰門主論 附方

瘰癧瘡門主論 附方

痔瘡門主論 附方

痔漏門主論 附方

瘍醫大全

卷二十三 目錄

顧氏秘書

臟毒門主論 附方

腸風門主論 附方

寒火瘡門主論

脫肛門主論 附方

臟頭風門主論 附方

風疔門主論 附方

股陽疽門主論

股陰疽門主論

騎馬癰門主論 附方

坐馬癰門主論

上馬癰門主論

下馬癰門主論

涌泉疽門主論

穿襠疽門主論

懸癰門主論 附方

瘍醫大全

卷二十三 目錄

十一 顧氏

瘍醫大全卷二十三

蕪湖顧世澄江氏纂輯

增錢之栢東陽 全校
男 樞燮用和

後陰部

自尾間殺道起至臀股止一切痔漏之疽皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷二十三

後陰部

顧氏

鵝口疽門主論

靈樞曰發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死矣

鬼遺方云涌泉疽腫起發太陰 太陰尻尾前是也 如伏鼠二

十日不穴死十日可刺發清膿赤者死白色可治

陳實功曰此乃三陰所損督脉之經濁氣濕痰流結而成其患發在尾間之穴高骨尖上初起形似魚胞久則突如鵝嘴朝寒暮熱日輕夜重潰後稀膿


出而無禁又或鮮血出而不止凡發此者壯年猶可老者可危 正宗

汪省之曰初起滋陰以濕已成和氣養榮已潰滋腎

保元久而成漏宜琥珀蠟礬丸先天大造丸兼服

澄曰鶴口疽老弱難斂易於成漏

傷醫大全 卷二十三 鶴口疽 二



傷醫大全 卷二十三 尾間發 三 顧氏秘傳

尾間發門主論

王肯堂曰尾間發生於尾間穴乃督脉所主最痛難

忍更難得膿 準編


又曰病候生尾腠骨處結毒如桃李之大紅赤痲痛

不能行動

申斗垣曰得之奔走勞傷或久坐血凝氣滯者易治

得之酒色過度忍精強戰督脉虧損者破必成漏

難以收功 啟玄



瘍醫大全

卷二十三

醫癰

四

顧氏秘譜

醫癰門主論

王肯堂曰腫高根淺為醫癰腫平根深為醫疽俱屬足太陽膀胱經濕熱所致 準繩

薛立齋曰醫乃膀胱經部分也居小腹之後此陰中之陰其道遠其位僻雖太陽多血氣運難及血亦罕到中年後尤慮此患治者毋傷脾胃母損氣血但當固根本為主

陳實功曰醫癰生於小腹之後位遠僻與氣亦罕到血亦少來凡生此者濕熱流結凝滯而成此症必

須托毒外發庶不內攻初起毒從五臟蘊積者患必有頭紅腫墜重如石內必口乾發熱治當通利積熱外以膏貼金黃散敷四圍板出瘀膿血內兼補托自愈若誤用敗毒寒劑外敷涼藥冰凝氣血毒氣不得外泄反致內攻如瘡頭陷無膿根脚平散不痛口乾煩躁譫語痰喘氣麓恍惚不寧者俱為不治但此症多從毒積五臟自內至表者十有八九風寒暑熱自外至裏者百中一二倘既出而復入裏者終為死候 正宗

瘍醫大全

卷二十三

醫癰

五

顧氏秘譜

申斗垣曰醫疽乃太陽膀胱經多血少氣生於承扶穴最痛宜托之生於實處者易治近大小便處者難治 啓玄

馮魯瞻曰癰發於醫乃膀胱之濕毒蒸熱或稟賦陰虛此地最難高聳潰膿大宜托裏為要 錦囊

朱丹溪曰醫癰生於醫上胯下近大腿處由濕熱相侵氣血凝聚鬱毒而成形如大盤腫潤盈尺上覆其腰下遮其胯此為陰中之陰務須宣熱拔毒大補氣血培養腎胃滋補根源如此庶血易聚而膿

易作毒易出而熱可宣不然經年累月腫仍如故
疼痛日深是以中年之後猶慮患此一見虛弱便
與滋補可保終吉若妄以清涼敗毒內服外敷則
氣血得寒益凝多致不救

醫癰門主方

醫癰

五爪龍草連根搗汁酒攪服日進四五次膿從大
便出未成者立消已成膿者以搗敷上立消

洗醫癰潰後並治股瘡

苦參 金銀花 白芷

當歸 黑皮硝 各等分

絹包砂饒內煎濃汁先薰後洗

消醫癰

傷醫大全

卷二十三 醫癰方 七 顧氏秘書

金銀花 四兩 甘草節 一兩

燉膏每日空心酒服 搗留煎湯薰洗

坐板瘡



瘍醫大全

卷二十三

瘡癤瘡

八

顧氏秘書

瘡癤瘡門主論

陳實功曰瘡癤瘡者俗名坐板瘡生於兩股密如撒粟尖如芒刺癢痛非常渾身毛刺此因熱體見風毛竅所閉或因患瘡濕熱流結於此洗用苦參湯甚者皮損粘衣治以鵝黃散主之 正宗

蔣示吉曰坐板瘡有因久坐卑濕之地或坐烈日石上釀成濕熱皆能致之 說約

申斗垣曰此乃脾經濕熱濕毒鬱久而成最痛最癢况股乃至陰之所血亦罕來藥力少至當用外治

之藥治之 啟玄

心法曰坐板瘡一名風疔

瘍醫大全

卷二十三

瘡癤瘡

九

顧氏秘書

痊癩瘡門主方

苦參湯

治坐板瘡作癢抓之又疼坐如棘穩難以安睡

苦參 四兩 大菖蒲 二兩

河水五瓢全煎數滾添水二瓢蓋片時臨洗入

公猪膽汁四五枚淋洗患上不二三次全愈愈

後避風忌發物

又方

糟坊吊大麥酒底水洗三四次效

瘍醫大全

卷二十三

痊癩瘡方

顧氏秘傳

鵝黃散

治痊癩瘡作癢抓之皮損隨後又疼用此撲之

菜豆粉 一兩 黃栢 三錢 輕粉 二錢

滑石 五錢

研細以軟絹帛蘸藥撲於患上止痛收乾

又方

薑黃 一錢 當歸 苦參 各五分

紅花 三分

用麻油一盞全藥熬枯瀉去渣入研細松香末

五錢攪成嫩膏日搽二次忌口味

又方

麻黃枯替猪油煎枯瀉清以熱油擦之

又方 岐天師

輕粉 一錢 冰片 半分 杏仁 去皮尖 十四粒

蘿蔔種子 三錢

研細擦之

又方

雞蛋一個鑿一孔入硫黃明礬細末各三錢調勻

瘍醫大全

卷二十三

痊癩瘡方

顧氏秘傳

糊口灰火內煨研細麻油調搽

又方 醒齋筆記

松香 五錢 雄黃 一錢 如濕加蒼朮 二錢

研末和勻棉紙條作燃二個臘猪油溶化浸透

火燒滴下油搽瘡上立效

又方

明礬煎湯洗

又方

冬青葉牛舌草煎湯薰洗

又方

松香 五錢 雄黃 一錢

研細如濕癢加蒼朮三錢和勻以棉紙捲成藥條用臍月猪油或麻油浸透點火燒着取滴下油搽之加潮腦治疥

又方

芫花 川椒 黃柏

熬湯溫洗即消

毒盛癢痛不止

楊醫大全

卷二十三

瘡癩諸方

十一

顧氏秘書

油缸青布三指寬一條香油調雄黃末一錢攤於布上捲緊燃着吹滅焰頭向瘡癩之癢痛即止

坐板瘡

硃砂 雄黃 各一錢 輕粉

枯礬 黃栢 各五錢

研細先用川椒煎洗後搽

坐板瘡並陰囊發癢


陳荷葉煎湯入白礬洗一二次

坐板瘡

程崙友

又方

生白蘿蔔搗爛擦之不過三次或蘿蔔子研細擦
硫黃一塊放豆腐內煮數滾加蒼朮各等分為末
用醃猪油搗爛搽



瘍醫大全

卷二十三

痔瘡

五

顧氏秘傳

痔瘡門主論

陳寶功曰夫痔者乃素有濕熱過食炙煇或因久坐而血脈不行又有七情過傷生冷以及擔輕負重竭力遠行氣血縱橫經絡交錯又或酒色過度腸胃受傷以致濁氣瘀血流注肛門又有婦人臨產用力過甚血逆肛門亦能致此初起為痔久則成漏正宗

陳遠公曰人肛門內外四傍忽生紅瘰先癢後疼後成為痔日久不愈此乃濕熱所致也而得之縱飲

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡

五

顧氏秘傳

者為多江南人常多患此皆由地之濕熱加之酒熱之毒所以結於肛門不能遽化也夫肛門通於大腸凡有濕熱應隨大便同出何以積而成痔蓋濕在大腸不能久留必盡趨肛門而肛門為大腸鎖鑰有防範之司不容濕熱出於門外於是蓄積既久而濕熱之毒肛門獨受之矣有毒必然而外不生肛門之內必生肛門之外雖內外少殊而作楚則一也治法烏可舍濕熱而他求乎但肛門去脾胃甚速化濕熱之毒必假道於脾胃肛門未必受益而脾胃先損所以無功耳故用藥必須毋損於脾胃有益於肛門者始可奏功益後湯治之白芍茯苓山藥薏仁 各一兩 地榆 三錢 穿山甲 一片 水煎服四劑肛門寬快又四劑內外痔消再以此方十倍蜜丸每日開水下五錢服完一料不再發 水鑑

此方利水去濕既無損於脾胃又有益於脾與肛門兩得也

又曰有肛門邊先生小瘡因不戒酒色以致腐爛變成痔漏不能收口長成肉管每年生一管流膿淌血甚以為苦世人治法多用刀針掛線徒受苦楚

而內毒未除外口難長經年累月難以奏功豈漏
 瘡終不可治乎抑犯酒色之戒乎皆治不得法耳
 夫肛門之肉不比他處肛門之皮亦不比他處他
 處皮肉非橫生即直生惟肛門皮肉有縱有橫最
 難生合况大便不時出入加以刀針掛線是已傷
 又傷安能遽長皮肉乎故刀針掛線切戒輕試惟
 消濕熱之毒內治為佳然漏厄既久毋論漏不可
 止而氣血反傷終難奏效也當於補中兼消則何
 患漏之不痊哉青龜丸烏龜一個茯苓五兩黃芪八兩當
 歸三兩人參兩二薏仁六錢穿山甲五錢瓦松二條陰乾
 白芷槐米乾青苔各一兩羊蹄後瓜四兩研末將龜
 石和內搗死以藥末拌之飯鍋內蒸熟將龜肉與
 甲火焙乾為末全前藥蜜丸每日服三錢一月漏
 痔乾二月漏痔滿服完全愈不復發但服丸時必
 戒酒色三月倘犯之不能奏功
 此方治漏神效非俗方可比有不可思議之妙去
 濕而不散氣敗毒又不損血補破於無形填隙於
 有孔願人敬信此方堅
 三月之戒以去宿疾也
 又曰有大便時先射血幾許始下糞者人以為便血

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡

末

顧氏秘書

證誰知肛門暗生血痔乎夫痔久必變漏宜流膿
 血殊不知受病不同見症亦異此多得之過飲火
 酒熱走直腸而不得遽泄乃結成小痔久則皮破
 血出此血乃外出直腸之外非出直腸之中乃膀
 胱之血也夫膀胱化氣而不化血酒毒滲入膀胱
 將酒氣化水出於陰器而酒毒燥血不能從陰器
 而出不得不趨大腸肛門而出矣無奈門徑各別
 戶口牢閉無可出路而酒毒結直腸之外毒向內
 攻而直腸之痔生矣痔生必破有隙可乘而膀胱
 之血注之久則以血引血不但膀胱之血盡歸之
 也乘大便之開關血先奪門而出耳治當急填其
 隙使血出而無路然私竇既開漏厄易洩不急清
 上游之源而但截下流之隙非計之善也清源散
 黃連槐花地榆人參各三錢茯苓白芍白朮各五錢
 前子葛根各二錢分穿山甲土炒一三七根研
 三錢水煎調末服三劑血較前更多減去黃連又
 三劑血止痔愈必須戒酒終身勿服也若女色只
 忌三月永不再發倘不能禁不必徒治竇吾方也

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡

七

顧氏秘書

此方妙在多用黃連以解酒熱之毒所謂清源也
上游無病下流自安各藥又分派得宜無非去濕
化熱堵截有方故慶平
成何患洪流沖決哉

蔣示吉日痔類不一有牛奶痔雞心痔雞冠痔菱角
痔蓮花痔珍珠痔珊瑚痔蜂窩痔雞肝痔翻花痔
穿腸痔鼠奶痔櫻桃痔鼠尾痔核桃痔蜆肉痔內
痔外痔因形定名總不外乎醉飽入房膏粱醇酒
負重致遠以致濕熱風燥濁氣瘀血流注肛門俱
能生痔婦人產後用力太過瘀血凝滯亦能致此
毒淺者其形正而平常毒深者其形異而頑惡久

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡

十一

顧氏秘書

則崩潰成漏新則墜重刺疼甚者糞從孔出血自
竅流氣血日虧形容日削治法當以涼血行氣爲
主其外治法須分內外內痔以喚痔枯痔之法治
之外痔疼甚者清之頭大蒂小者線結之頭小根
大者枯之

說約

又曰凡瘡久不收口日流膿水甚而醫家任意以紙
撚紐入日逐磨磷漸生膿管如燈草葱管遂名曰
漏症此皆氣血虧損熱毒鬱結使榮衛運行而失
職也偏身虛怯處多有之惟痔瘡成漏最易若用

刀針掛線徒受痛楚不若以推車客散內消之爲
妙也內服十全大補湯補中益氣湯以培助之

馮魯瞻曰痔漏其名有五曰牡曰牝曰氣曰血曰酒
又有腸風痔脉痔雌雄痔皆五痔之別名也初生
俱在肛邊狀如鼠乳或結小核癢痛注悶甚者身
熱惡寒皆由房勞飲酒過度久嗜甘肥不慎醉飽
以合陰陽勞擾血脉腸澼滲漏衝注下部而成治
法始覺便服秦艽槐角連翹土貝之類外用薰洗
以取內消倘仍恣情嗜慾則腐潰膿血逗遛日久
傍穿竅穴卽變爲漏必須補氣血慎調攝方可以
漸收功

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡

九

顧氏秘書

又曰痔者肛門之傍生瘡腫痛者是也亦有生瘡有
孔惡水不乾而爲漏者皆由母食酒麵燻炙在胎
受之或因後天失調心經蘊熱熱傳於肺注於大
腸而成者治小兒痔瘡宜內服涼血解毒外用薰
洗可也

又曰痔漏之源受病者燥氣也爲病者濕熱也皆由
乎酒色過度濕而生熱充於臟腑溢於經絡墜乎

穀道左右衝突為痔雖見症於大腸實陰虛而火實所致經所謂開竅於二陰久則潰而成漏然痔輕而漏重痔實而漏虛治痔不過涼血清熱治漏初則涼血清熱燥濕久則澁竅殺虫兼乎溫散或曰痔漏火是根源何故而用溫澁殊不知痔只出血始終是熱漏流膿水始是濕熱終是濕寒不用溫藥何以去濕而散寒乎非止痔漏百病中多有始熱而終寒者即如瀉利嘔吐初則腸胃氣實而熱久則腸胃虛為寒丹溪下血條云下血久不愈

傷醫大全 卷二十三 痔瘡 三 顧氏秘書

者後用溫劑正此義也

朱丹溪曰漏瘡須先服補藥生氣血參朮芪歸為主大劑服之隨以附子末唾和作餅如錢厚以艾灸之漏大炷大漏小炷小灸令微熱不可使痛乾則易餅再灸如困則止來日又灸直至肉平為效亦有用附子片灸仍用前補劑作膏貼之尤妙治漏法李東垣曰腸頭成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者兼受火熱也是濕熱風燥四氣合邪法當瀉火潤燥疎風和血止痛是其治也十書

馮魯瞻曰痔漏初起須用芩連之類以涼大腸枳殼以寬大腸澀竅用赤白石脂枯礬黃丹腦子之類錦囊

又曰痔漏若能味無味之味正味足矣事無事之事百事備矣若緝調節謹慎合宜未有不瘥者也若不知謹緝強治無功

寶漢卿曰大法治痔以涼血為主如肛旁別有一竅出膿血名曰單漏治之宜溫煖之劑補其內生肌之藥敷其外

傷醫大全 卷二十三 痔瘡 三 顧氏秘書

寶夢麟曰竅在皮膚者易愈臟腑有損而致竅者未易治也

養生必效方載乾義傳僧覺海少年患痔疾其行業比冰霜緣此飽食久坐知痔疾者不必酒色過度矣故素問云田而飽食筋脉橫解腸澀為痔三神凡治僧道痔疾故治有不同也

岐天師曰人有糞門內拖出一條似蛇非蛇或進或出便糞之時又安然無碍此乃大腸濕熱之極生此怪物長於直腸之間非蛇也乃肉也但伸縮如

意又似乎蛇法當用逐邪殺蛇丹服之外用好木
耳一兩煎湯洗之洗後用冰片一分研末掃上掃
盡即縮進而愈神驗 秘錄

澄 日治痔漏鶴口等症患者欲坐不能須用定鋪極
厚蘆花坐墊中開一洞將患處坐向洞中自無壓
擠傷瘡之患

傷醫大全 卷二十三 痔瘡 圭 顧氏

痔瘡門主方

諸痔初起煎方

槐角子 黑牛膽製 生地 當歸 連翹

枳殼 升麻 荆芥穗 陳皮

防風 地榆 各等分 黃連 黃栢

黃芩 此三味春秋用七分夏用一錢五分冬用五分

水煎空心服大便秘加蒸大黃火麻仁

又方

柴胡 甘草 厚朴 獨活

傷醫大全 卷二十三 痔瘡方 圭 顧氏

生地 牡丹皮 陳皮 槐角子

黃芩 白芍 金銀花 當歸

黃栢

水煎服

痔瘡初起大便下血未破無膿皆可內消

象牙 煨 白僵蚕 煨 地榆 煨

胡黃連 各一兩 槐花 火酒拌炒 管仲 火酒拌炒

生地 各二錢 石燕 一對火煨醋淬

研細蜜丸清晨淡鹽湯送下二錢

熊膽散

痔瘡堅硬作痛脫肛腫泛不收

冰片一分熊膽二分研細先將大田螺一個用尖刀挑起螺厖入藥在內放片時待螺化出漿水用雞翎掃痔上頻頻用之即愈

又方

田螺水養伺其厖開入冰片少許螺自化水雞翎掃上

又方

瘡醫大全 卷二十三 痔瘡方 顧氏秘書

槐花研末灌入雄牛膽內陰乾為丸白湯送下三錢

又方

雄鵝膽汁調冰片搽之

又方

白鵝胆取汁三錢 熊膽二分 冰片一分 調勻塗痔上

又方

橄欖核 煨灰 熊膽 各二錢 冰片 六分

研勻鵝膽汁調搽

內痔

樹上乾桃一枚陰陽瓦焙研細末冰片三分入瓶內加豬膽汁擠入肛內立止痔疼

烏梅肉七枚陰陽瓦焙乾再入冰片三分兒茶七分研細末先以瓦松皮硝湯洗過再搽

又方

活蚯蚓洗淨泥土搗爛沖熱酒服外用豬膽調杏

仁冰片末雞翎搽上

痔內生虫

鰻鱺魚骨燒烟薰肛門其痔內虫盡死

藥線方

請痔瘻痛凡根蒂小而頭面大者用此線繫其

患根自落

芫花 五錢 壁 錢二錢 白色細扣線 三錢

水一碗同浸小磁罐內慢火煮水乾為度取線

陰乾凡遇前患用線一根患大者二根雙扣繫

於根蒂兩頭留線日漸緊之其患自然冰冷紫
黑枯落後長肉藥收口

又方

蜘蛛網四邊粗絲合成線結患根上

枯痔法

凡痔瘡泛出即用此藥塗之痔自乾黑枯落欲
用此方四邊好肉須先用護痔散護住良肉

明礬 四兩

輕粉

硃砂 各三錢

白砒 四錢

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡方

疔

顧氏秘書

先將礬入銅杓內煨滾次入砒末攪勻以礬枯

為度去火毒片時次入輕粉硃砂再研極細磁

確收貯每日辰午申三時以溫湯洗淨痔上唾

津調塗七八日其痔自然枯盡方上生肌藥

護痔散

白芨

大黃

苦參

寒水石

菘豆粉

黃栢 各等分

研細熟水調塗四邊好肉上方搽枯痔藥

喚痔散

痔在肛門內腸頭上外面看不見痛苦不勝用
此藥喚出痔來以葱湯洗淨上藥

磁石

石 兩活而
吸鉄者

草烏尖 生用 五分

枯礬 五錢

乾姜

姜 三分泡
另研

共研極細用生姜汁或葱汁調塗肛門上少頃
肛自內脫出痔瘡上下洗淨四邊好肉上用前

護藥次上枯藥一日三上洗用新筆蘸藥洗之

如此六七日脫盡痔根即用生肌藥收口後用

貼頂升陽散收入其腸內服槐角丸

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡方

疔

顧氏秘書

貼頂升陽散

草麻子

四五粒
去殼

麝香

香 三分

共搗膏將頭心髮去錢大一塊貼此藥少頃其

肛即收入如緩再用醋一口噴患人面上立收

薰痔法

蓮蓬殼一個五楮子一個將楮子開一孔納明雄

五分於內再將楮子有孔一頭納入蓮蓬殼內以

線裝緊入小口砂鍋內水煎十數沸對痔上薰之

冷則又溫頻薰自效

又方

蒼耳子 刺芥 黃芩

花 椒 馬齒莧 瓦松

皮 硝 白礬 槐花各等分

每用五錢加葱白五根煎湯薰洗

又方

魚腥草煎湯薰洗仍以草把痔上

又方

鳳尾草煎湯薰洗

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡方

五

顧氏秘書

又方

梓桐樹枝葉煎湯薰洗

又方

稀莖草連根煎湯薰洗

又方

槐花泡汁當茶飲搗再煎薰洗

又方

新蚕豆花梗葉煎湯薰洗

又方

芒硝瓦松陳蓮蓬殼煎湯薰洗

又方

苦蘆菜煮爛為度和湯置器中坐薰待溫下手以

萊頻頻洗之每日洗三次

又方

陳枳殼 乾茄蒂 冬瓜皮 陳槐花

各等分煎湯薰洗

又方

桃樹根皮煮汁每日薰洗三四次

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡方

五

顧氏秘書

又方

馬齒莧煎湯薰洗內食生熟荸薺

又方

苦參茵陳各五錢煎湯薰洗兼治脫肛

又方

枳殼二兩荔枝草四兩河水煎湯先薰後洗

又方

無花果葉煎湯薰洗

洗痔黃硝湯

痔瘡腫痛

大黃二兩水十二碗煎至八碗再入朴硝一兩畧滾傾桶內薰洗之

肛門四邊腫硬癢痛不可忍者

白礬三分研碎用童便化開洗痔上每日二三次

洗痔膏

此膏能洗痔瘡用刀剪不疼不痛

槐花

明礬 各一兩或用膽礬

先將槐花用河水熬取濃汁瀝清復入淨鍋內

瘡醫大全

卷二十三

痔瘡方

辛

顧氏秘書

投礬於內熬至極稠磁罐收貯每用少許入開

水內化開洗之其痛立止

外痔

瓦花 朝北者 同水片搗敷

外痔

五倍子 五個焙 冰片 五厘

研細麻油調搽

痔瘡初起

熊膽 三錢 冰片 四分

研細猪膽汁調搽痔上如已潰者不可用猪膽汁如用在已破之瘡便要極疼

消痔千金散

孩兒茶

黃連

寒水石

各五分

硼砂

赤石脂

蘆甘石

各三分

熊膽 二分

冰片 一分

研細清茶調敷患上腫痛立止

蝸牛膏 集驗

蝸牛一枚加麝香冰片研爛磁盒盛次早取汁塗

瘡醫大全

卷二十三

痔瘡方

辛

顧氏秘書

消痔丸

痔瘡痔漏初起人壯便秘血分壅熱者

生地

四兩水洗

片苓

一兩五錢

金銀花

枳殼

炒

秦艽

各一兩

防風

大黃

九製

當歸

蒼朮

米泔浸炒

地龍

槐豆

炒

赤芍

各二兩

研末煉蜜為丸空心白湯送下三錢

又方

白雞膽二三枚取汁入熊膽二分冰片五厘共研

一處磁盒收藏勿使出氣用時以手指搽之
神藥散

蚕繭納入男子指甲以滿為度外用童髮繩裹燒
灰存性研細密調搽

鯽魚散

鯽魚一尾刮去腸淨入白礬令滿瓦上煨存性研
末用雞毛掃上

猪甲散

猪懸蹄甲為末每空心米湯調下二錢

瘡醫大全

卷二十三

痔瘡方

三

顧氏秘書

痔瘡重置作癢

槐白皮煎濃汁浸洗冷再換洗良久大便欲解當
有虫出

翻花痔

荆芥防風朴硝煎湯薰洗再用木鱉子鬱金研末
加水片熊膽少許水調敷

洗痔

槐花枳殼荆芥艾葉水煎入白礬先薰後洗
又方

木鱉子淨仁七個研加白礬二錢水煎薰洗
痔瘡灸法

大蒜一片頭垢捻成餅子先放痔上再安蒜艾灸
痔瘡頭大蒂小

芫花根洗淨木相搗以少水絞汁於銀銅器內慢
火煎成膏將絲線於管內度透繫痔瘡根上繫時
微痛候心躁痔落時以紙蘸膏擦入竅內除根

偷糞鼠

牛皮膠一兩好酒一碗頓化服一二次自消

瘡醫大全

卷二十三

痔瘡方

三

顧氏秘書

三神丸 養生

治僧道痔瘡

枳 殼炒去 皂 角 煨存性 五倍子 各等分

右為細末煉蜜為丸桐子大每服二三十九溫
水食前送下其效如神

治痔

每日食海螺螯半升用苦茶漱口約食二斗即消
矣痔乃臟火屬陽海螯性寒味鹹屬陰寒能敵火
鹹能軟堅茶又苦涼深得旨矣

小兒生痔

甘草熬膏空心服之自愈

痔瘡初起痛癢不止

舊布鞋底烘熱頻熨之冷則再烘再熨其痛癢

則已

洗痔奇方

夏枯草

黃栢

枳殼

槐花

馬齒莧

五倍子

各二錢

右藥裝夏布袋內入磁罐中加明礬八兩開水

瘡醫大全

卷二十三

痔瘡方

毒

顧氏秘書

沖洗立刻止痛

治痔瘡並脫肛

黃蠟

白蠟

各一兩

雅連

三錢

研細熔化為丸每服三錢白湯送下

痔瘡

熊膽塗之

又方

秦椒

即大椒

曬乾磨細取淨末一觔浸麻油拾觔封

口每飲食時以椒油或下麪或蘸菜喫神效

又方

大田螺一個入銅青麝香水片各五厘入螺內取

水搽之

又方

旱蓮草一把連根洗淨搗爛滾酒沖汁服

又方

秦椒全飯搗爛為丸每服二錢白湯送下止痛神

效

清臟補漏丸

湯松阿道士

瘡醫大全

卷二十三

痔瘡方

毒

顧氏秘書

穿山甲

炮一兩

槐花

炒

明礬

各二兩

共磨細以黃蠟二兩熔化為丸每早空心白湯

送下二錢一料除根

又方

以絹袋裝銀硝二兩縫長條以帶繫腰中如坐即

將硝袋墊肛門痔上久久自愈

偷糞鼠

貓屎井底泥和勻圍之立愈

痔瘡神驗方

周鶴仙

生甘草節大者一百個為末煉蜜為丸桐子大每空心用槐米煎湯送下輕則三錢重則五錢服半料或一料即愈戒房事百日永不發神驗無比此天下第一奇效方也若痔腫痛難忍發而極重者用地骨皮一兩荆芥槐角子枳殼金銀花各三錢煎湯頻洗午後空心再進一服自然漸漸消去而愈不可以平易忽視

大腸火盛肛門腫痛難於大便或生痔並肛門邊生癰毒者

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡方

藥

顧氏秘書

槐米不拘多少炒深黃色土地上去火毒為末空心黃酒調服三錢服三四錢即愈若生痔並一切瘡毒多服自消極驗

痔瘡丸

黃連	苦參	乳香	去油
沒藥	雄黃	連翹	各一兩
僵蠶	蟬蛻	防風	
全蝎	槐角	生地	入牛膝汁煮
牛膝	陳皮	穿山甲	

當歸

枳殼

地

龍去泥晒乾

蜈蚣

焙去頭尾條象牙末五錢

人

參二錢五分

蜂

房一個入玄明粉於眼內草紙濕透包好用微火煨之

各製為末煉蜜為丸空心開水送下三錢 忌

洗痔法

荔枝草

馬鞭草 陰乾各半兩 蒲公英 二兩

甘草 三錢

入罐煎好再入皂礬一兩畧煎數沸 皂礬煎久升去無功

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡方

藥

顧氏秘書

先薰後洗

痔瘡初起

通州膏子眼藥搽之自消

痔瘡 江仍度

粉甘草 八兩用青鹽四兩和水拌晒乾又拌又晒汁盡為度粉甘草 八兩

共磨末煉蜜為丸每早白湯送下三錢

又方

生桐油頻塗

痔瘡痛不可忍

羊膽一個取汁入冰片五分和勻掃上

痔瘡蠟替針

黃蠟融化入枯替末少許於內揉成長條如線看

痔漏深淺插入待膿盡再上生肌藥收功

又方

川貝母五倍子等分研末搽之

痔瘡突出疼痛坐立不便

先用葦葉洗淨煎沸湯於瓦木器中薰之通手沃

洗即愈如未消用生薑切薄片放於痔上痛甚處

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡方

素

顧氏秘書

以熟艾作炷於上灸三炷黃水即出自消若肛門

上有三兩個痔三五日後如前法逐一灸之屢驗

肛門起窠作痛

野薄荷明礬各等分煎湯薰洗自消

外痔

紅棗去核入銅青線紮灰火煨存性研細末痔潮

乾搽痔乾以津潤濕搽之

痔痛下血

川芎

當歸

黃耆

神麴

槐花

地榆

各兩

阿膠

炒珠

血餘

荆芥穗

炒灰

木賊草

炒黑各三錢

煉蜜丸如桐子大每服五十九丸食前米飲送下

痔瘡定痛

白殼旱螺

七個

杭粉

一錢

共研一處陰乾入冰片三分研細瓶貯每以木

鱉子全豬膽汁磨濃調搽

洗五痔

瘍醫大全

卷二十三

痔瘡方

素

顧氏秘書

河堤柳根上鬚一把花椒白芥子煎湯薰洗其重

頭黑身白從痔瘡孔內出

洗痔 吳韻清

魚腥草

夏枯草

馬齒莧

各一兩

五倍子

枳殼

黃栢

各五錢

明礬

四兩

共煎濃汁每用一杯攪滾湯薰洗

又方

瓦松

馬齒莧

槐花

五倍子 去虫 皮 硝 各一 葱 白 十寸

共裝絹袋內煮湯每日薰洗七八次

消痔脫管奇方

刺 蝟 一個皮紙濕包燒灰存性 牛角鯁 一枝燒灰存性

猪懸蹄 二十個燒灰存性 苦 參 二兩

木 耳 石 菖 蒲 陳 棕 燒灰存性

枯 礬 各一 地 榆 槐 角 子

胡 麻 仁 雷 丸 防 風

漏 蘆 蕪 荑 麝 香 各五錢

瘍醫大全 卷二十三 痔瘡方 聖 顏氏秘書

共磨細末煉蜜為丸桐子大每服一錢日三服

白湯送下

洗方

喇 叭 花 即土地黃苗 煎湯日洗二次

却毒湯

瓦 松 馬 齒 莧 川 椒

川 文 蛤 防 風 生 甘 草

枳 殼 側 柏 葉 蒼 朮

菝 白 各三錢 焰 硝 一兩

煎湯日洗三次

此痔並一切內外痔疼痛不可忍

新黃瓜萐一枚以刀鑿下頂不去穰選不蛀皂角

子填滿將頂蓋好外用紙筋泥固濟約三指厚以

炭火簇合燒令紅放於土地坑內出火毒一宿取

出加麝香一錢研極細磁瓶收貯每服一錢米飲

調服

新久痔痛

海螵蛸去粗皮研細末用生麻油調成膏用鴨翎

瘍醫大全 卷二十三 痔瘡方 聖 顏氏秘書

掃上每日夜用之日久自消

外痔神消散 杜秘

紅 梔 子 搗碎 黃 栢 胡 黃 連 各一兩

水兩宮碗煎一碗二煎三煎俱煎一碗共三碗

去渣入皮硝一筋燉化撤去泥脚取上清硝汁

以文火慢煉成硝

大田螺 十六個每個入水片一厘待螺化成水將水拌入硝內再加熊胆兒茶各五錢研細

和入硝內 拌勻聽用

每用頭一次用苦參一兩水三大碗煎成二碗

去渣入製硝末一兩煎二三滾傾盆內先薰後洗每日洗三次 第二日仍用洗剩藥水再加苦參一兩加水一大碗煎成加製硝末五錢如上薰洗 第三日照第二日洗法 第四日舊藥水俱不用照第一日換新水煎苦參製硝洗之 以三日又換一次其痔自消永不復發

痔瘡

線香為丸每服二錢白湯送下

痔漏神方 顧玉書

湯醫大全 卷二十三 痔瘡方 望 顧氏秘書

抱雞蛋殼內皮 煨存性 血餘 各三錢

石 膏 煨二錢 冰 片 兒 茶 各五分

血 竭 三分

共乳極細搽痔上膿水自乾管根自落內用重耿餅一筋粉甘草半筋搗勻為丸每早空心白湯送下三錢此乃秘方經驗多人用之必效

內痔

冬青樹葉煎湯薰洗

外痔

鯨 甲 五 梧 子

煎湯薰洗

痔瘡

廣圓肉一個包明礬五分嚼碎滾水吞下七日後用明礬一錢十四日後用明礬一錢五分待痔枯即止

又方

青餅一個入黃蠟一錢於內置碗中於飯上蒸熟清晨開水細嚼一枚以愈為度

湯醫大全 卷二十三 痔瘡方 望 顧氏秘書

又方

梓桐樹皮葉煎湯洗

又方

菘蕪草連根煎湯洗

痔瘡腫痛

冬瓜煎湯洗

痔漏門主論

證曰痔瘡初起有奔走過急痰凝腸分流注肛門者有色慾違度忍精強固者有耽於醇酒者有好嗜辛辣煎炒炙燂者有濕熱流滯者有久嗽氣虛羣火灼陰而成者有久坐氣血凝聚者又有婦女血燥大便秘結用力努掙而成者亦有生產用力太過瘀血流結而成者更有脾瀉腎泄元氣下陷而成者又有久痢氣陷而成者種種皆能成痔而痔類甚多有因其形而名者有因其部位前後左右

瘍醫大全

卷二十三

痔漏

四

顧氏秘書

內外而名者既潰之後每每多成漏管不能收口者非內服外洗純用苦寒致令脾元日損肌肉難生即係醫家妄用刀針藥線繫紫鉛丸懸墜利剪割切良肉受傷日施藥紙插入拔出日逐將瘡內四傍新肉磨成硬管愈插愈深此固醫者之過然病家見痔瘡潰後雖流膿血不疼不痛嗜飲者依然暢飲好色者仍復貪歡善啖者辛辣煎炒全不禁戒雖無刀剪藥線之害亦斷無不成漏者所以致漏之源又夥更有一等自愚之輩每言痔漏不

可醫痊留此門戶為濕熱外滲之地若收功完口濕熱反無門可出矣殊不知腎開竅於二陰穀道即腎之門戶若使終年破流血水則真陰由此而耗正氣從此而虧安能保其不成癆瘵乎况濕熱若果由大腸而來自由大腸直出豈有歸大腸而不出反由漏口徐徐而泄哉是以痔貴早為培補益氣保元不可用苦寒內服外塗淋洗病者謹戒百日醇酒房勞再無不收口之理若不遵禁忌雖有靈丹亦難奏效

瘍醫大全

卷二十三

痔漏

四

顧氏秘書

痔漏門主方

退管丸 周鶴仙

當歸酒洗 露蜂房槐樹上川 連酒炒

象牙各五錢 槐花微炒 川芎炒

滴乳香包在新鮮箬葉內
去油淨各三錢

共研細末取黃蠟二兩熔化為丸如桐子大每

空心以漏蘆蘆甘石煎湯送下其管退出用剪

剪去亦有化為膿血出者服此藥忌房事豆腐

火酒雖愈仍忌四十九日

瘍醫大全 卷二十三 痔漏方 果 顧氏秘膏

捷法

栢油一兩置有焰盆中用大蜈蚣一條養在盆內

勿令遊去伺蜈蚣將油食盡為度用竹簽將蜈蚣

搦住竹刀剖開取腹內油擦痔漏上務將膿血洗

淨再搽

琉璃餅

陳芥菜切碎 陳琉璃各五錢 螳螂殼水洗陰陽

陳蛸皮煨灰六錢 大田螺二個水 珍珠二粒如無

五味研細收藏取田螺水和藥乘潮捏餅先用

天芥菜入砂鍋內煎湯傾入小口瓶內對患處

熱薰溫洗如無天芥菜即用番白草或苦參煎

湯薰洗亦可洗後拭淨將藥餅放患頂上膏封

一日一換痔管內仍用所存藥末鷲毛管吹入

痔漏丸

大熟地四兩 白茯苓 山藥 山萸肉

牡丹皮 白芍各二兩 象牙一兩 牙五錢 鱉甲

肉蓯蓉 何首烏各三兩

煉蜜為丸如桐子大白湯送下三錢

瘍醫大全 卷二十三 痔漏方 聖 顧氏秘膏

又方

象牙二兩 乳浸一宿 荔枝核二十八

研細用猪膈肝四個白酒洗去油入砂鍋內加

酒半觔許糯米一撮煮爛為度搗爛和藥為丸

每服三錢白湯下虛人用人參湯下

又方

雄牛膽汁入銅鍋微熬飛麵收為丸空心白湯送

下管從大便而出

又方

槐花炒黑 青黛各半 當歸酒洗

打糊為丸先嚼核桃肉一枚淡鹽湯送下三錢

退管至速

又方

胡黃連一兩 石決明火煨 槐花

穿山甲各五錢 蘇油一觔

研細飯丸每早米湯送下一錢四十日見功

又方

胡連姜汁炒 刺蝟皮炒各一兩 指甲炙五錢

瘍醫大全

卷二十三 痔漏方 吳 顧氏秘書

蟻卵七個 麝香二分

研細飯丸每早淡酒送下一錢忌火酒椒薑等

味

退管如神

活獾子一隻殺之退毛淨又將腸內糞去淨入石

臼內連骨舂碎盛坛內封固埋背陰地下或背陰

房內過三伏天聽用看管大小用紙撚蘸坛內浮

油插入其管即出生肌斂口

全蠲補漏

推糞虫七兩 滴乳香去油 沒藥去油各五錢

炙甘草 生礬 生甘草

熟礬各七錢五分

研細黃蠟四兩融化乘熱丸桐子大先服八分

漸加至二錢酒送下其管自退

退管

牛皮末晒炒研一觔槐角子半觔蜜丸白湯送下

又方

木耳一觔用扁柏葉煎水酒上晒乾研末 每歲一分日逐加一分如

瘍醫大全

卷二十三 痔漏方 吳 顧氏秘書

二十五歲可遞加至二錢五分為止俱用白湯調

下如管未退到二十六天遞減一分只服二錢四

分日逐減至一分為止

狗腸丸

象牙屑 建青黛 陳松蘿

女貞子各等分

研細用黃狗腸一具洗淨蒸爛為丸每早白湯

送下三錢

混元毬

治痔漏如神

白馬屎七粒 真川椒二十七粒 斷艾

河 蜆各七錢 槐皮一筋切 片研末

用蜆厩屎作球包衆藥在內晒乾每日一棗安

於馬桶內燒取烟薰

痔漏 濟生

血 竭 象牙末各二兩 乳香六錢 去油

蟬 蛻 沒藥去油 硃砂各二錢

白殭蚕 蜂房各三錢

瘍醫大全

卷二十三

痔漏方

幸

顧氏秘書

右爲細末黃蠟丸彈子大每空心温酒下三九

狐仙封臍丸

此方並不治痔而治痔有神效之功十日見效

服完一料永不再發久服更可延年益壽但服

此當禁色慾

枸杞子 去蒂酒 兔絲子 白茯苓乳拌蒸 晒五次

赤茯苓 大生地竹刀 大熟地

甘菊花 女貞子 何首烏同女貞子 蒸晒五次

山萸肉 遠志肉甘草水 當歸身

人 参 蓮 鬚 栝子仁

天門冬 元眼肉 麥門冬去心

酸棗仁各四兩 北五味 川牛膝

粉丹皮 石菖蒲 澤瀉各二兩

煉蜜爲丸每服二錢白湯送下

痔漏丸

此方退管生肌屢用屢驗

石蓮蓬 冬青子各三兩 川黃連

真川芎 牛膝酒炒 赤芍

瘍醫大全

卷二十三

痔漏方

幸

顧氏秘書

當歸酒洗 黃芩 黃栢

熟大黃各一兩 槐角子 象牙末各二兩

蛇 蛻去頭尾 全蝎各五錢 金墨一錠約重三錢

共研細末煉蜜爲丸每早服三錢至七日後服

二錢五分又七日服二錢忌火酒又七日服一

錢五分每日早晚用柳鬚花椒煎水薰洗一料

服完永不再發忌羊肉驢肉公雞鯉魚辛辣

又方

蚯 蚓半筋用竹刀剖開去淨 腹內泥砂鍋片上焙乾

家牙二兩

共研極細末用白糖水和勻為丸如梧桐子大
每早空心用陳無灰酒送下三錢三服後即有
效驗服至十日有管者漸漸退出內自生肌勿
喫一切發物腥酒猪首公雞等類尤忌房事此
方屢用驗過多人萬勿輕視

推車客散

痔漏不論遠年近日最凶者百日收功其管自
出

瘍醫大全

卷二十三

痔漏方

三

顧氏秘書

酸棗仁 炒

遠志肉

蒼

木

鹽醋米泔
童便四製

穿山甲 象

側柏葉 白礬
水煎

枳

殼

醋煮

地骨皮 各一兩

槐角子 炒

貫

仲

酒拌九
蒸九晒

陳棕灰 各三兩

醋 皮 煨存性
一兩

白花地丁

七八月採生
白花者六兩

如法製度為極細末空心酒調服三錢或白湯

亦可服一月後每服加推車客細末三分

管自退出如出以快剪去之

栢膠丸

內消痔漏

雄黃

全蜜煎
老去蜜

小茴香

各三錢

川黃連

側柏葉

各一兩

廣膠

八兩切斷以牡蠣粉
入兩炒成珠去牡蠣

熊膽

一錢

槐角子

一莢四五粒者佳四兩

研細煉白蜜為丸早晚各服三錢白湯送下
用雞蛋素用豆腐過口 如痔痛極者加乳香

去油 沒藥 去油各二錢 蟾酥 一錢五分

追毒丸

瘍醫大全

卷二十三

痔漏方

三

顧氏秘書

痔漏通腸汚從孔出先用此丸追盡膿毒後服

閉管丸立效

胡連

切片姜
汁拌炒

皮

炙切片再炒麝香
黃色各一兩

香 二分

研細軟飯為丸麻子大每服一錢食前酒下服

丸後膿水反多藥力到也莫懼

閉管丸

胡連

一兩

槐花

微炒

穿山甲

麻油內煮
黃色

石決明

煨各五錢

煉蜜丸麻子大每服一錢空心清米湯送下早

晚日進二服至重四十日而愈如漏四邊有硬肉突起者加蚕繭二十個炒研和入藥中並治遍身諸漏皆效

痔漏不拘蜂窠翻花通腸三十二孔者不用刀針掛

線立建神功

黑丑連皮炒 大黃酒拌蒸極爛 白蓮蕊各三兩

紅礬醋煑 五倍子炒 五味子炒

川當歸各一兩 黃連七錢 乳香去油

沒藥去油各一錢 山豆根五錢

瘍醫大全 卷二十三 痔漏方 齋 顧氏秘書

研細酒疊丸每服一錢五分肉湯送下

退管

童血餘煨 槐角子炒各一兩 白蒺藜炒去刺二兩

直蠶蚕炒 皮硝炒 兒茶

沒藥去油各五錢 蟬蛻酒洗焙三錢 蜂房焙四錢

犀角鹿上炙 鹿茸各五錢 肥皂子四十九粒取肉瓦焙

研細用黃蠟四錢狗油一兩化勻和丸如桐子

大每服六七十九早晚酒送下半月其管自退

加味槐角丸

痔漏通用並治腸風下血

川芎 真阿膠 白芷各五錢

槐角子 生地 當歸身各二兩

黃連 條芩 枳殼

連翹 防風 秦艽

地榆 升麻各一兩 黃芪二兩

研末蜜丸或酒糊丸桐子大每服五十九漸加

至七八十九百九空心溫酒或米湯送下

釣腸丸

瘍醫大全 卷二十三 痔漏方 齋 顧氏秘書

久漏虛濕肛門腫痛生瘡時有膿血及腸風下

血虛寒久不愈者

生附子去皮臍 枯綠礬各一兩 訶子煨

枳殼去穰麩炒 天南星生用 白附子

半夏 枯白礬各二兩 雞冠花微炒五兩

栝蘘燒存性 蟬蛻皮燒存性

胡桃仁十五兩不去油罐內煨存性

研末醋糊丸桐子大每服二十九空心臨卧時

俱用溫酒送下

痔漏出血不止 孫真人

熟附子焙 明礬各一兩

研細密凡桐子大每服二九酒下一日三服數

日血止百日除根

痔漏神方

柿餅放炭火上燒灰存性每一兩入嫩滴乳石一

錢共乳細末每服一匙一日服四五次或茶或米

飲或糕或飯俱可服俱在食前服初服五七日必

流血水管漸化出或痛或不痛次流黃水結疤全

瘡醫大全 卷二十三 痔漏方 孫 顧氏秘書

愈永不再發遠年者用半筋近者數兩 滴乳石要極嫩的指

甲刮的下者為佳生用不必殺

治痔油藥 靈秘丹藥

酥合油 熊膽各五分 雞蛋頭生者二個取蛋清

將雞蛋清熬油三味和勻敷之 有一趙姓患痔垂死用之立愈

治痔藥水

片腦一分 朴硝五分 熊膽三分

蝸牛 田螺肉各十兩 橄欖核燒灰五分

將蝸牛田螺肉搗爛入藥浸一夜取水併藥敷

瘡無不斷根

痔漏 洪武帝親驗

犀角 象牙 乳香

沒藥各一兩 明礬 黃蠟各五錢

銅器熔化蠟入藥丸梧桐子大用連翹金銀花

入好酒煎半日去渣酒服二十一丸自愈

槐角丸

槐角子 槐花各八兩 枳殼四兩

黃芩三兩 刺蝟皮二個酒浸焙

瘡醫大全 卷二十三 痔漏方 孫 顧氏秘書

共為細末煉蜜丸桐子大每空心白湯送下一

百丸

又方 外科秘書

青苔青石上 焙末加生替少許再研聽用先將瓦

花一把水煎滾加鹽滴一碗坐上浴洗其痔漸漸

縮小指乾將藥抹上但要痛三四次即愈永不再

發 痔漏 周鶴仙

金銀花棟淨梗 粉甘草各一筋

右二味以一觔爲末煉蜜爲丸如桐子大以一
觔浸黃酒每用一杯送丸藥二錢一日三服一
料即愈一切痔俱枯落漏管漸退出神效無比
海州州尊李公方

治痔漏血痔如箭腸風下血並效

橡斗子殼四兩 黃 芪蜜炙 枳 殼麩炒

黃 連酒炒 地 榆去下半截只用上頭
半截取淨末各二兩

共爲細末老米打糊爲丸如菉豆大每清晨用

槐花米三錢煎湯送下一錢重者二錢半月全

瘍醫大全 卷二十三 痔漏方 藥 顧氏秘書

愈至重者兼用小靈丹必效

小靈丹

番木鱉不拘多少用麻油煎枯存性取起爲末麩

糊爲丸如蘿蔔子大臨卧時用清茶調服一分六

釐蓋煖出汗切忌不可說話 其油用熊膽爲末

水少許和勻留搽外痔如外痔先以荆芥防風

瓦松煎湯薰洗塗藥如內痔則只服二方丹藥自

愈 此丹兼治中風口眼喎斜如神 此油搽梅

花癩癩三日即好

痔漏

活磁石六兩打如豆大用硫黃一兩研細以
白及水浸磁石將硫黃爲衣晒乾

入陽城罐內鉄蓋蓋定鹽泥固濟升七炷香冷

定開看其靈藥只有三錢聽用 又用

硃 砂 明 礬 火 硝

青 鹽各四兩

入陽城罐內照前升七炷香刮取靈藥 又用

紋 銀 一兩 硫 黃 三錢 白 砒 三分

入傾銀罐內煉化攪成粉將三項藥各稱等分

瘍醫大全 卷二十三 痔漏方 藥 顧氏秘書

米飯爲丸空心白芷煎湯送下一分半日許下

部作脹痛時要人手拍左右其管退出外用好

生肌藥收口其功甚速 如瘡口小可另用好

爛藥爛開瘡口其管更易退出 如欲速於退

管可用草蓆子一兩煎水薰洗其退更速

治痔良方

夫痔何由而生乃心經之積熱流於大腸經爲

害於穀道古人名之曰痔曰漏此證男女皆患

蓋緣美味多醢醇醪過飲醉飽貪慾喜怒交加

漸積而成其患初起結壘如牛乳雞心不破為痔破流膿水為漏變為蓮花通腸雞冠其禍不小不醫則患重於一切世人不審痔源不解漏根動輒藥線穿蝕致受痛苦男子強求一時之功而婦人豈能穿線乎譬夫瓦破則漏水下流不補其瓦漏安能免予得此方男婦並治不理其瘡惟補其氣血為主使其上不漏則下無害矣且無號痛之慘潰爛之險服此藥者不惟能愈痔漏抑且以保壽延年耳

瘍醫大全

卷二十三 痔漏方

李

顧氏秘書

人參

甘枸杞

生地

當歸身

各一兩

扶神

麥門冬

去心

棗仁

炒

遠志肉

白芍

酒炒各八錢

粉甘草

去皮

白朮

土炒

右為細末用猪心血罌加煉蜜為丸如桐子大

每臨臥時無灰酒送下七八十九 先看瘡之

輕重輕者煎五六劑重者十劑候瘡痛止水收

再照方合丸藥服時仰卧一二時勿令心亂

妄想宜少房慾忌火酒葱蒜生酒小鷄宜永斷

羊肉

痔漏方 方君達

若久漏倍人參二三兩若雞冠石榴等痔先宜止痛為主再搽枯痔藥水螺散或用熊膽磨搽或番木鱉磨搽

阿魏

一兩

人參

五錢

生地

三兩

熟地

全

蟬

米泔

槐

花

去梗

阿膠

蛤粉炒

皮

土炒

紅

花

川連

各五錢

柿

餅

生熟地

搗膏

瘍醫大全

卷二十三 痔漏方

李

顧氏秘書

槐角子

連子炒

右為末以柿餅膏和杵為丸如棗豆大每早晚

空心開水送下二錢戒氣惱房事生冷發物如

痔流水時不可行走內外痔漏並下部有漏久

服神效

痔漏混元丹

郭期仙

青礬石

入兩

黑色打碎

黑

鉛

三兩

同硫黃四

兩炒成青金色

陳明瓦

三兩

明雄

水

銀

二錢

雄

水

雌黃

各二兩

白砥

八錢

皂

礬

四兩

牙 硝 六兩同青礬
石煨金色

各研粗末用升量有多少好做混元毬之大小
先以灰如藥數成毬度不致藥多毬小也毬成

將藥裝入混元毬內以泥蓋蓋之封固入灰缸
內用金粟火煨一日至夜又翻轉四面俱煨到

取起去蓋看時如藥茶褐色黃色俱好如白色
黑白色可再封口煨之養火一日取出配後藥

每靈藥一兩加鳳頭管仲去心淨二兩以濕紙包監泥固濟晒乾入
炭煨紅取出悶息存性研細末一兩黑棗肉一兩同入石臼內杵

瘍醫大全

卷二十三

痔漏方

李

顧氏秘書

為丸如黃豆大每空心酒下三四丸或五丸服

後倘喉痛破損止藥一二日待喉中不痛照前
又服以愈為度

做紫土混元毬法
用紫土槌熟加舊草鞋或舊棉絮和入土內多
杵為妙再以舊絹一小方藥多少即用灰多少
於內包裹成毬要圓些上紫之人泥內包裹成
毬以木板打之入灰內過一二日換灰取起又
打之待乾若有縫以泥塗之以無縫為度俟極
乾透解去繩取去灰入藥於內其口先做有子
口小蓋現成裝藥入內以蓋蓋之再以熟泥封
固要緊再
下缸煨之

止午丹

治痔瘡痔漏能止膿水不用退管自然斂口誠
乃痔中之聖藥也

馬蘭子三錢炒牛黃三厘

梨一個去皮上剝一孔去心將藥裝入梨內仍
以蓋蓋之竹簽扞好飯鍋內燉熟不可入水服

時入白蜜七八錢槌爛食之一日喫一個奏功
最捷內外痔均效

凡痔漏發背疔毒腫瘡破流黃水到處起瘡

杭粉一兩入銀罐內化開成老金色冷定研末加

瘍醫大全

卷二十三

痔方

李

顧氏秘書

冰片三分搽之其水自止其痛亦定即不成瘡矣

痔漏退管

貓耳棘刺即十大功勞五錢槐花一兩

煎湯先薰後洗如打噴嚏其管即脫下

治痔漏二三十孔出糞者

犬肉 青 黛福建者各八兩

共搗千杵為丸每空心白酒或白湯送下二錢
至重者一劑全好

薰洗痔漏

瓦松 皮一硝 川椒

地骨皮 槐條

用薰一個煨湯煎藥傾淨桶內先薰後洗

又方

花椒 艾葉 菝白

白茄根 馬齒莧 皮硝

五倍子

煎湯先薰後洗

蝟皮丸

楊醫大全 卷二十三 痔漏方 齋 顧氏秘書

刺蝟皮 三四個 酒浸焙 經霜槐角子 一觔 當歸 三兩

共為末煉蜜丸桐子大每服一二百丸溫酒送

下

痔漏 湯道士

穿山甲 炙一兩 槐花 明礬 各二兩

共研細黃蠟二兩熔化為丸每服一錢五分

痔漏丸

金銀花 一觔 甘草節 連翹 去心各三兩

共研細末用夏枯草八兩熬膏加煉蜜少許和

痔漏

杵為丸如彈子大約重三錢每早晚用開水或酒調服一丸戒色慾燒酒餘者不忌一料全愈

象牙屑二觔研極細末每早用熟鷄蛋三個蘸屑

喫或入稀粥內服完一料全愈

三十年痔漏三料除根

白蓮鬚 黑牽牛 各一兩 當歸 五錢

研末每服二錢空心酒下忌熱物五日見效

楊醫大全 卷二十三 痔漏方 奎 顧氏秘書

器從便之前後而來其腹則痛血濁而色黯者名曰臟毒內傷蘊積久而始發者也謂之挾熱下血雖有毒名實非毒也腸風者風邪滯乎腸胃也臟毒者濕邪滯乎腸胃也若血射如線者蟲痔也腸風臟毒之血自腸臟而來五痔之血自肛門蝕孔處出也

瘍醫大全

卷二十三

臟毒

李

臟毒門主方

臟毒下血 三吳醫案

槐花 木 耳 各三兩

大 黃 酒浸九蒸九晒二兩

郁李仁 皂角子 象牙屑

條 芩 升 麻 血餘灰

荆芥穗 各五錢

共為末煉蜜丸如赤豆大外以四物湯加黑蒲黃各一兩為衣米湯送下空心及下午各二錢服完立愈

瘍醫大全

卷二十三

臟毒方

李 顧氏秘書

又方

乾柿餅燒灰米飲調下二錢

加味臟連丸

治臟毒

黃 連 八兩 枳 殼 六兩 大麥餡子 一升

甘 草 四兩

先為粗末裝入健猪大腸內不拘幾段用線紮緊酒水全煮極爛搗成餅晒乾為細末水盪為丸白湯送下二錢

洗臟毒痔瘡 葉台山

五倍子 富歸 黃栢

槐花 木鱉子各一兩 瓦松十根

紅花五錢

煎湯薰洗

消毒百應丸

治臟毒痔漏

蒼木 猪牙皂 槐花或槐角子

金銀花 黃栢 常歸各四兩

瘍醫大全 卷二十三 臟毒方 主 顧氏秘書

右六味用河井水各四碗煎取濃汁濾清入絞

錦大黃一觔石槌打碎浸透取起晒乾又浸又晒汁

盡為度研細末用陳蕎麥麩和杵丸如紫葢大

如血多加地榆四兩煎湯尋常用二十九丸沉重

用六十四丸體厚者用八十一丸白湯送下

並治內外諸症湯引開後

心痛艾醋煎湯下 追重下積積柳湯下 肚
痛乾薑湯下 咳嗽薑湯下 傷食酒下 夜
多小便山茱萸湯下 疝氣茴香湯下 風火
時眼黃連湯下 白痢薑湯下 赤痢甘草湯
下 渾身痛乳香湯下 五勞七傷鹽湯下
腸風下血吐血當歸湯下 難產童便下 五

淋大小便秘大黃湯下 痔瘡漏瘡頭痛眼脹
傷寒發熱紫蘇湯下 或大黃湯下 經水不通紅
花湯或當歸湯下 肚大青筋膨脹石榴湯下
瘡磨刀 黃腫陳皮湯下 四肢無力熱地湯下
水 下
臟毒下血 丹溪

車前草連根一握生薑一小塊和新水搗爛去渣
取汁候血欲下時腰間必覺重即服此一盞少頃
漸覺冷下腹中登廁便不見血矣

臟毒下血 錦囊

黃連 四兩酒浸春秋五日 夏三日冬十日晒乾

瘍醫大全 卷二十三 臟毒方 主 顧氏秘書

為末烏梅肉六兩搗膏丸桐子大每服二三十

丸空心白湯下

腸風門主論

林氏曰或問風邪何由入於大腸毒氣何因聚於臟腑此風與毒有所分別否答曰此風非外感風寒之風此毒非癰疽膿血之毒總當以氣字看而腸風亦如春傷於風之義本足陽明清氣不能升發透達於四肢腠理之間而反下陷於大腸大腸之血脉亦隨此氣而虛陷久則氣血鬱結而化為濕熱因此血隨氣滯凡登園氣陷火迫之時其血先糞而至至則清散不多初起為之腸風蓋因方

易醫大全

卷二十三 腸風

三

顧氏秘

中多用荊芥防風升麻諸風藥升舉清陽之氣遂疑為外感之風也即使是風亦血熱所化之風豈外風能入於大腸也哉至於臟毒者因腸風日久氣血兩虛虛陷之氣日甚而大腸之濕熱蘊積日深手陽明大腸為積血之處其勢必隨氣下陷從糞之前後而來雖不痛而其色多黑黯成塊故有毒之名而實無痔漏腸癰膿血疼痛之毒也若其病久遠氣血愈虧則脾胃之元氣諒必先虧不能統運周身血脉使之流行無碍亦隨陷於大腸

而成結陰便血之症在下清氣不舉便血而兼滄泄之病在上濁氣凝結中滿而兼喘嗽之恙甚至肢體浮腫胸腹脹悶而死是症應分為三輕口腸風甚至臟毒重則結陰也 活人錄彙編

又曰初起之脉或沉數有力或弦數不清久則乳數無力或沉澇而弱或結陰脾虛之脉非乳澇則虛搏初則宜於升陽清熱次則清補相兼和血解毒結陰則當升清利濁兼於溫補其血可也

又曰近世患痔者多而痔中出血者亦不少多有誤

易醫大全

卷二十三 腸風

三

顧氏秘

認腸風臟毒而用寒劑者不止復用升提者再不應而亦用溫補者總與痔血無干而補瀉盡屬妄投及余細審脉症方知此血實從痔瘡中出痔愈則血不治而自止於是病者大悟求治於專門者痔果全愈而血從此止醫者亦當細心體察特詳贅以詔後學

醫論選要曰腸澼者大便下血也經云風客淫氣其精乃亡邪傷肝也因而飽食筋脉橫解腸澼為痔蓋緣風氣通於肝肝生風風生熱風客則淫氣傷

精精亡則邪熱傷肝因飽行房則筋脈橫解而腸
澀痔漏之症生焉人之不避風毒恣飲醇酒炙煇
之物縱慾喜怒無常臟腑鬱抑飲食自倍腸胃乃
傷陰陽不和關格壅滯熱毒下注血滲大腸而成
腸澀痔漏之疾矣俗謂之腸風臟毒是也其病身
寒脈沉者生身熱脈浮者死治法宜祛風消毒解
熱涼臟和血潤燥為主

錢青掄曰腸風下血貴在節慾戒酒方可除根

朱丹溪曰腸風獨在胃與大腸出血兼風者宜蒼朮

傷醫大全

卷二十三

腸風

五

通比思詩

秦芫香附芍藥之類

馮魯瞻曰腸風者邪氣外入隨感隨見所以色清膿
毒者蘊積毒久而始見所以色濁治腸風以散風
行濕治臟毒以清熱涼血又要看其虛實新久新
者實者降之瀉之虛者久者升之補之夫血之在
身有陰有陽陽者順氣而行循流脈中調和五臟
洒陳六腑謂之營血陰者居於絡脈尚守臟腑滋
養神氣濡潤筋骨若感內外之邪而受傷則或循
經之陽血至其傷處為邪氣所沮漏泄經外或居

絡之陰血因留着之邪潰裂而出則皆滲入腸胃
而泄矣世俗率以腸風名之不知風乃六淫之一
耳若腸胃受火熱二淫與寒燥濕怫鬱其氣及飲
食勞力傷其陰絡之血者亦可謂之腸風乎針經
曰陽絡傷則血外溢而吐衄陰絡傷則血內溢而
便溺是也不可純用寒涼藥必加辛散為佐久之
不愈宜理胃氣兼升舉藥蓋精氣血氣皆生於穀
氣大便下血多以胃藥收功徒用苦寒而不理脾
胃是絕氣危生之下工也

傷醫大全

卷二十三

腸風

五

顧氏秘譜

又曰腸胃本無血而有下血者大腸之病也大腸何
以病下血邪以感之也蓋陰絡不傷腸胃不虛雖
有外邪亦不能患惟醉飽房勞坐臥風濕恣啖生
冷以致濕熱陰絡受傷外邪得以乘之經云陰絡
傷則血內溢而便血又云結陰者便血一升再結
二升三結三升此言陰氣內結不得外行滲入腸
間乃寒濕生災而陰邪之勝也外邪者何風寒暑
濕熱是也風喜傷肝肝傷則不能藏血而下者醉
後飲冷寒飲內傷血為寒凝滲入大腸而下者內

外傷濕濕傷凝胃隨氣下流而致者膏梁人厚味酒色蒸薰人勞役過度以致熱積下焦而致者然濕毒下血者腹中不痛熱毒下血者腹中多痛更有內傷陽氣不足下焦之陰無元陽以維之而下血者書所謂病人面無色脉浮弱平按之絕者下血是也有脾虛陽氣下陷不能統血以致血隨氣降而下者蓋陰必從陽血必從氣脾為氣血生化之源故必賴補中升陽以胃藥收功有以先便後血者為遠血由足陽明隨經入胃先血後便者為近血由手陽明大腸隨經下滲有以心肺為遠血而屬陽肝腎為近血而屬陰以論者名為腸風臟毒實非外感之風腫熱之毒之謂蓋陽明之氣不能上越下陷大腸腸胃之脉隨氣虛陷久則濕熱滯毒隨氣陷而先至其腹不痛血清而色鮮者名曰腸風邪氣外入隨感而見者也謂之挾寒下血後人因古方多用荆防升散而窒之為風寒非風也

又曰凡下血身涼血寒者生身熱血溫者死

傷醫大全 卷二十三 腸風 主 顧氏秘書

腸風門主方

通治腸風主方 活人錄

防風 三錢 生黃芪 山藥 各一錢

黃連 五分 槐米 秦艽 各一錢

甘草 三分

水煎空心午後服

防風佐黃芪達清升之氣以透表山藥甘草和中益脾使血無虛滲之虞秦艽西根清風熱以和血黃連槐米消蘊積之熱毒初起加炒黑荆芥黃芩各一錢去黃芪之驟補日久加黑荆芥一錢烏梅肉升麻各五分再久則加生地三錢白芍二錢升麻五分已上氣血未虧

傷醫大全 卷二十三 腸風方 主 顧氏秘書

火盛便燥可服剪紅丸或犀角地榆丸如臟毒加生地三錢茜根升麻陳皮各五分或防風

一牛去槐米 日久氣血兩虛加人參白芍各一錢五分當歸頭一錢升麻陳皮各五分或防風

風二錢去槐米秦艽服犀角解毒丸如結陰便血浮腫氣喘者加茯苓二錢人參桑皮各

錢五分炮薑車前各一錢陳皮五分或防風二錢去槐米秦艽黃連甘草兼服結陰丸

犀角地榆丸

犀角 黃芩 黃連

地榆 枳殼 槐米

當歸 防風 各等分 生地黃

烏梅肉 木 耳 各加倍

蜜丸早空心滾湯吞服三錢

犀角解毒丸

犀角

升麻

羌活

防風

甘草

荆芥

牛蒡子

連翹

土枸杞

金銀花

當歸身

生地黄

白芍藥 各加倍

蜜丸早空心滾湯吞服三錢

腸風便血 壯實者宜

瘍醫大全

卷二十三

腸風方

去

顧氏秘書

槐角子 五錢

黃連

陳枳殼

地榆

貫衆

各三錢

水煎服 昔潘大司馬患此孫文垣用此方治之 一服即止書其方於壁間遇有便血者

治之無 不立愈

大腸瀉血 普濟方

髮 灰 五錢

雞冠花

扁柏葉

各一兩

研細末臥時酒調下一二錢來早以溫酒投之一

服見效

腸風下血 秘方

豆腐未入袋瀝出漿者帶渣取出鍋內炒燥研末

每用三錢如下紫血塊者白糖湯下紅血塊者砂

糖湯下雖遠年便血垂危者每日用三次神效

又方 唐雲峯

陳蒼麩和健猪膽汁為丸桐子大每早空心開水

送下三錢

又方 昭隱寺流塵和尚傳

刀荳 陰乾陰陽 臭梧桐白根 切片煎湯調服

又方 吳韻清

瘍醫大全

卷二十三

腸風方

去

顧氏秘書

柿餅七個用好醋一筋全煮醋將乾取起晒乾每

早用開水細嚼一個服至三四個即止血痢亦效

又方 懷德堂自驗

黃 芩 炒黑四兩 黑棗頭 半斤煮爛 去皮核

和搗為丸桐子大每早晚各服二錢終劑即愈

便血 江仍度

黃 芪 蜜炙

白 朮 土炒

扶 神 各二

棗 仁 炒三

當歸身 酒炒一

蓮 鼻 酒炒二

粉甘草 蜜炙

山 梔 炒六

遠志肉 甘草水炒

地榆 酒炒 五錢 薑灰 四錢 元眼肉 六兩 煨 爛搗膏

共磨細末用元眼膏畧加煉白蜜和丸如桐子

大每早白湯送下四錢 冬月白蜜不妨多用 夏月白蜜宜少用

便血 方配京

茶館內地下瓜子殼一撮煎湯空心服數次即愈

腸風下血久不愈者兼面黃浮腫者

蒲公英 連根採來洗淨搗爛青 鹽醃一宿曬乾收一觔 木 耳 炒黃 存性

槐角子 炒黑各 柿 餅 炒焦 鹿角膠 各二 一兩 存性 兩

陳棕 煨灰 川 連 一錢 五分

湯醫大全 卷二十三 腸風方 全 顧氏秘書

共為末神麴糊丸每服二錢空心白湯下

腸風下血婦人血崩男子血痔

扁柏葉 明 礬 各一 兩 月月紅 炒黑

陳棕 煨 廣三七 各三 錢

共研細煉蜜為丸白湯送下一錢或二錢忌大

暈

腸風下血

青羊糞 秋後茄蒂 各等分 俱焙黑

右研用荷葉湯打老米糊為丸白湯送下二錢

寒火瘡門主論

王肯堂曰寒火瘡生肛門外潰爛如破時流脂水每

晚發寒繼如火燎多癢少痛是也 華繩

澄 曰曾見江西班糧艘周姓患此每晚必用礬末摻

之方能定癢安睡想風濕相乘濕邪化虫使然也

湯醫大全 卷二十三 寒火瘡 全 顧氏秘書

脫肛門主論

林氏曰或問方書云脫肛有氣虛者有血虛者有血熱或火盛者人患此四者甚多何遂至於脫肛也答曰肛門乃大腸之盡處凡有形之糟粕從此而出為一人身之門戶虛滑則滯下不收枯燥則堅澁而難於轉出皆足以致病而必責之於一氣蓋凡有形之物全賴無形之元氣以轉運出入且肺與大腸為表裏而肺正統一身之元氣故人之登園亦由元氣為之傳導使大腸有形之糟粕得以傳導而出出已則清升之氣復自下而上達於臟腑腠理四肢是為常度若脾肺久虛氣血虧損則統運轉輸之機不利全藉勉力努送而出久久氣滯則肛門因之脫下矣其次有病久氣虛氣陷而自脫者亦有氣虛不能傳導而血隨因之枯澁於是努力掙脫者有陽明燥火亢極而熱結便燥難出因用力強掙火性下迫肛門脫出者有老年血燥或產後血虛液燥結滯難下氣弱無力以送勉強掙脫者有久瀉或久痢氣血兩虛濕熱下陷於

傷醫大全

卷二十三

脫肛

全

顧氏秘書

大腸因而滑脫者有小兒亦因瀉痢氣虛濕火下迫而脫者總由氣血不和失其轉輸傳導出入升降之常度則有是症自在醫者忝其脉證體其虛實以治之 活人錄彙編

又曰久病虛陷自脫者脉必虛微無力以補氣升提為主氣虛血竭努力掙脫者脉必清弱而虛數當以益氣之中加補血潤燥升清之劑大腸實火燥結肛門腫痛而下迫者其脉洪大而數或沉實有力以清火解毒之中佐以升提老年產後總由氣虛血少脉必清數無力當以滋補升提久瀉久痢無論大小脉必虛微沉弱雖主補益升提倘餘病未清則清補相兼

傷醫大全

卷二十三

脫肛

全

顧氏秘書

醫論選要曰脫肛治法內宜溫胃厚腸收斂解毒之劑外宜溫湯頻洗令和軟然後摩挲而入則自愈矣

馮晉瞻曰夫肺與大腸為表裏肛者大腸之門也肺實則溫溫則內氣充而有所蓄虛則寒寒則內氣餒而不能收是以腸頭出露矣多得於久痢不止

裏急後重努力肛開外風所吹而致者或伏暑暴注洞瀉腸頭不禁者或稟賦怯弱易於感冷啼叫努氣大腸虛脫者蓋瀉痢未有不因風暑濕熱傷脾胃虛則肺氣既弱大腸亦虛土為金母母虛不能生金是以少被風冷則腸頭即為虛脫治宜補脾溫胃使金受母之益而上升次投固腸之劑外用薰摻等方若久出而堅者先以溫煖藥湯澆軟漸漸納入

又曰肛門為大腸之使大腸受熱受寒皆能脫肛且

瘍醫大全

卷二十三

脫肛

全

顧氏秘書

大腸者傳導之官腎者作強之官酒色過度則腎虛而盜洩母氣肺因以虛大腸氣無所主故令脫肛小兒血氣未壯老人血氣已衰皆有此證

按丹溪所論脫肛因氣虛血虛者固多亦有因氣熱血熱者宜兼脈候詳察氣虛者補氣參耆朮草製升麻之類血虛者四物湯血熱者涼血四物湯加炒栢氣熱者條芩升麻之類並宜升提

脫肛門主方

驗方 李常山

梧桐葉煎湯薰洗

提肛散

久痔氣虛肛門下墜及脫肛便血脾胃虛弱

人參 白朮 川芎

黃芪 陳皮 當歸

甘草 柴胡 升麻

條芩 黃連 白芷

瘍醫大全

卷二十三

脫肛方

全

顧氏秘書

水煎食遠服搗再煎

通治脫肛主方 活人錄

生黃芪 三錢 人參 當歸 各一錢

白朮 川芎 陳皮 各一錢

柴胡 防風 各七分 升麻 五分

甘草 二分

水煎空心午前服

補中益氣湯加防風川芎於至陰之中升提清陽之氣達於腠理不外地氣上騰之義若地氣上騰則天氣自然下降矣真氣虛寒而自脫者加附子五分血枯液竭燥結下墜及老年產後

血燥者加松子泥五錢生地三錢減黃芪一錢五分去白朮川芎防風服益血潤腸丸或滋燥養血潤腸丸陽明燥火自亢實熱下墜者加黃連一錢五分生地三錢白朮二錢去參芪木芍防風搜風順氣丸或潤下丸脾胃氣虛泄痢而脫者加茯苓一錢五分白朮肉蓯蓉各一錢去芎歸服培元固本啓脾丸或香連固本丸小兒久痢久瀉濕熱下迫而虛脫者加白芍一錢黃連三分減黃芪一錢五分人參五分去芎歸服香連健脾丸或香連固本丸

脫肛

人參

黃芪

當歸身

升麻

川芎

水二碗煎八分食前服 血虛加芍藥熟地血

瘍醫大全

卷二十三 脫肛方

全

顧氏秘書

熱加炒黃栢虛寒加炒黑乾姜外以五倍子末托而上之

又方

剃頭店蕩刀舊青布煨灰托之即上

又方

以手托上用烘熱舊鞋底熨之即上

又方

番木鱉子去殼取仁用冰麝油磨汁掃上即縮入

因久痢脫肛

蝸牛燒灰猪油和敷立縮

脫肛因久患瀉痢所致者

葱湯薰洗令軟送上或以五倍子末敷而頻頻托入或煎湯洗亦可

又方

生鱉頭燒存性研細香油調敷托上

小兒脫肛

黃狗一隻將繩捆狗四足後將狗倒掛候其口中流出粘涎搽上其肛即收矣

瘍醫大全

卷二十三 脫肛方

全

顧氏秘書

脫肛

白礬三分童便二盞燉熱洗之即上

龍骨散

小兒大腸虛肛門脫出

龍骨

二錢五分

訶子

煨去核

沒石子

各二個

赤石脂

罌粟殼

去蓋蒂穰醋炒各二錢

為極細末米飲調化食前服

伏龍肝散

治小兒陰證脫肛

伏龍肝 一兩 鱉頭骨 五錢 百藥煎 二分

為細末用紫蘇煎濃候溫和清油同調敷

又方

五倍子 二錢 研 白礬 一錢

全煎湯洗

又方

木賊草燒灰存性為末摻肛門上按入即愈

又方

葶苈為末乾貼

又方

陳壁土泡湯先薰後洗

瘍醫大全

卷二十三 脫肛方

宋

顧氏秘書

膿頭風門主論

糞門生虫奇癢萬狀以人之勢進出而後快者此乃

幼時為人戲耍乘風而入之故見此怪症也

石室秘錄

瘍醫大全

卷二十三 膿頭風

允

石室秘錄

臟頭風門主方

蜜煎止癢丹 石室秘傳

蛇床子

棟樹根 各三錢
生甘草 一錢

共為細末全蜜煎成作如人勢導入糞門聽其
自化一條即止癢而愈

瘍醫大全

卷二十三 臟頭風方

風疔門主論

心法曰風疔者乃風濕客於穀道形如風癬作癢破
流黃水浸淫遍體微痛宜用如聖散治

馮曾瞻曰穀道癢痛多因濕熱生蟲欲成痔瘻宜以
雄黃和艾燒烟薰之或用桃葉一斛蒸之極熱納
小口瓶中坐薰立死

瘍醫大全

卷二十三 風疔

主

風疔門主方

如聖膏

當歸 五錢 巴苳仁 三錢

麻油八兩熬枯入黃蠟三兩化盡絹濾入輕粉
二錢攪勻搽之

初階大全 卷二十一 疔方 全 頤

股陽疽門主論

心法曰股陽疽生於股之外側腓尖之後其毒內搏
骨節膿深至骨故漫腫不變色也

卷二十一 疔方 全 頤

股陰疽門主論

心法曰股陰疽一名赤施發生於股內合縫下近陰囊之側因偏在厥陰經故名股陰也

騎馬癰門主論

騎馬癰皆由少年人不保重或串花街柳巷或貪倚翠偎紅忍精而戰耐饑而守或將洩而提其氣或已走而再返其陽或人方洩精未經洗淨重與交合皆足以生此惡毒也治以七味聖神湯主之蓋此毒乃乘虛而入必大補其血而佐以逐邪之品則病去如失否則婉轉留連禍不旋踵與其毒勢彌漫到後來發散何不乘其初起正氣未衰一劑而大加祛逐之為快哉方中妙在用金銀花而以當歸補血為君人參為佐大黃為使重輕多寡之得宜也 秘錄

王肯堂曰騎馬癰乃手足三陰經所司毒在腎經濕熱流於大小腸分熱血積而為毒緩治則成漏症大小便俱從此出矣此處不可用刀針如用只可針一二分慎之慎之

心法曰騎馬癰亦名騙馬墜生於腎囊之傍大腿根裏側股縫夾空中由肝腎濕火結滯而成此處乃至陰之下醫治不可過用寒涼藥

傷醫大全 卷二十三 騎馬癰 顧氏秘書

騎馬癱門主方

七味聖神湯 岐天師

金銀花 四兩 蒲公英 二兩 人參

當歸 各一兩 甘草 各一兩 大黃 五錢

天花粉 二錢

水煎服一劑即消二劑全愈潰者三劑愈

騎馬癱已成膿者 新都治驗

黃芪 三錢 人參 二錢 川芎

當歸 各一錢 白芷 防風

傷醫大全 卷二十三 騎馬癱方 雜 顧氏秘書

肉桂 甘草 各五分

白水煎一匙痛止再服自潰十貼肉生

坐馬癱門主論

心法曰坐馬癱生於尻骨畧上屬督經由濕熱凝結而成虛人患此易於成漏

傷醫大全 卷二十三 坐馬癱 雜

上馬癱門主論

心法曰上馬癱生左髻之下摺紋中

傷醫大全 卷二十三 下馬癱

下馬癱門主論

心法曰下馬癱生右髻之下摺紋中

傷醫大全 卷二十三 下馬癱

涌泉疽門主論

心法曰涌泉疽生尻骨之前肛門之後長強穴屬督經首穴由濕熱疑結而成老弱患此多成冷漏難痊

瘍醫大全

卷二十三

涌泉疽

穿襠疽門主論

王肯堂曰穿襠疽生背之下極屬督脈及太陽經由勞傷憂思積鬱所致宜速治稍緩則潰爛難收斂欲成漏者多麻木黑陷泄瀉嘔噦疲倦者不治心法曰穿襠疽生於會陰穴在穀道之前腎囊之後此係皮囊空處如痛連辜丸及腰背肛門根深遲潰腐傷尿管漏溺不能收斂者至險

瘍醫大全

卷二十三

穿襠疽

懸癱



癩醫大全

卷二十三

懸癱

重

顧氏秘書

懸癱門主論

鬼遺方云勝下兩臂尖下大道前道殺小道後道水成懸
 癱皆是虛極人患此近穀道左右乃名痔癱宜急
 補脾臟及發處貼藥即用發穴藥被後用抽膿膏
 膿盡用合瘡口藥合之慎勿過冬即成冷漏難治
 王肯堂曰懸癱生於箕間謂前陰之後後陰之前屏
 翳處也即會陰穴屬任脉別絡俠督脉衝脉之會
 癱生其間人起立則若懸然故名懸癱屬足三陰
 虧損之證輕則為漏瀝盡氣血而亡重則內潰而

即原屬肝腎二經陰虛雖一於補猶恐不治若

又加尅伐不死何待準繩

又曰懸癱與騎馬癱惟製甘草內服外洗

又曰交膈一處近稜線上名騙馬墜俗名跨馬癱防
漏

陳寶功曰懸癱生於腎囊之後肛門之前又名海底

漏最難收功初起腫痛繼即潰膿總由濕熱相火

內灼肺金而然也宜服國老散加減地黃丸此一

定之治法也正宗

癩醫大全

卷二十三

懸癱

重

顧氏秘書

蔣示吉曰懸癱生於穀道之前陰器之後又謂海底
 穴也乃三陰虧損濕熱結聚而成初生狀如蓮子
 少癢多痛日久漸如桃李赤腫焮痛潰而流膿破
 後輕則成漏重則氣血瀝盡變為癆瘵不起之候
 者多矣初起壯實者瀉其病根稍虛者利其濕熱
 已成者托裏排膿已潰者溫補滋陰切忌寒涼損
 胃水凝氣血致生變症說約
 馮魯瞻曰懸癱者穀道前後生瘡是也初發如松
 子漸如蓮子數十日後痛甚赤腫如桃即破破最

難收其治每用粉草一兩無灰酒煎服以解毒此
症多屬陰虛故不足人患之大禁寒涼劑肝腎
虛極之症也重為滋陰峻補並為絕慾急令收功
否則成漏癆瘵之根矣 錦囊

汪省之曰懸癰即騎馬癰也此症多因酒色不慎濕
熱壅滯而作况穀道之前乃任脉會陰發源之地
又乃肝經宗筋所會之處患此多屬肝腎二經陰
虛今人每以敗毒流氣等攻伐之劑治之殊不知
陰既虛矣須一於補尚恐不能成膿斂口反加以

湯醫大全

卷二十三

懸癰

萬

顧氏秘書

勉伐不死何待 理例

懸癰門主方

生熟地黃丸

大熟地

九蒸九晒

大生地

酒洗各三兩

栢子仁

去殼隔紙炒

丹參

酒蒸

當歸

酒蒸

白芍

酒炒各二兩

牡丹皮

酒蒸

山藥

乳蒸

白茯苓

乳蒸各一兩五錢

澤瀉

鹽水蒸

敗龜版

童便浸去穢炙酥研為極細末

遠志肉

甘草水泡透各四兩

共為細末用金釵石斛四兩金銀花十二兩熬

膏和煉蜜為丸每早淡鹽湯送下四錢

湯醫大全

卷二十三

懸癰方

萬

顧氏秘書

國老散

甘草七段用急流水一碗浸之炙乾又浸又炙以

水盡為度研細末每日空心白湯調服二錢忌煎

炒烟酒炙燻辛辣發物

大粉草膏

懸癰已成服藥不得內消者服此未成者即消

已成者即潰已潰者即斂此治斯症之良方

大粉草

用長流水浸透炭火上炙乾再浸再炙如此三度切片

當歸身

各三兩

水三碗慢火煎至稠膏去渣再煎稠厚為度每

日三錢無灰酒一大杯化開空心服之

四神湯

專治懸癰一切腫毒不紅不腫氣血虛者

當歸 八錢 嫩黃芪 金銀花 各五錢

甘草節 二錢

水酒各一碗煎服仍以酒助藥力

又方

甘草稍四兩水煎服

敷法

瘍醫大全

卷二十三

方

東

顧氏秘書

大黃 一兩

熟石膏 三錢

紫金錠 一錠

同搗碎水調敷

瘍醫大全目錄

卷二十四

前陰部

龜頭腫痛門主論附方

陰頭癰門主論附方

魚口便毒橫痃門主論附方

陰腫如斗門主方

下疳門主論附方

初婚玉莖傷損門主論

瘍醫大全

卷二十四 目錄

一

顧氏秘書

傷寒瘰後內外瘡門主論

囊癰門主論附方

腎囊生瘡門主方

腎囊風門主論附方

濕陰瘡門主論

胞漏瘡門主論

陰囊出汗門主方

疝氣偏墜門主論附方

陰器部

陰吹門主論

陰瘡門主論附方

陰腫門主論附方

陰菌門主論附方

陰挺門主論附方

陰癢門主論

陰戶腫突門主論

陰脫門主論附方

產婦陰戶傷損門主論附方

瘍醫大全

卷二十四目錄

二十顧氏秘書

陰戶交接出血門主論

陰戶開張門主論

女子新嫁陰戶痛門主論

陰冷門主論

實女無竅門主方

瘍醫大全卷二十四

燕湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽

男 櫛燮用和 全校

前陰部

自外腎起至前陰腎囊止一切癰疽疔疔蝕皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷二十四

前陰部

二十顧氏秘書

龜頭腫痛門主論

曰龜頭腫痛有因肝經濕熱下注其腫紅脹宜龍胆瀉肝湯主之外搽介靈丹有因塗搽春藥交接違理其腫滲痛宜用松蘿茶洗外搽玉紅膏有因嫖妓變童沾染穢毒其腫紫黯上有黃衣溺管必痛小便淋瀝否則莖皮收緊包住龜頭即成袖口疔瘡亦有龜頭之下紅胞如瘤堅硬亦有所患之胞如水光亮即為雞嗉疔瘡治之大法以大黄下之撤母為主亦有新婚損傷龜頭腫者以濃甘草

湯洗之搽玉紅膏

龜頭腫痛門主方

龜頭腫大硬痛 沈員嶠

用雞蛋三個去黃留蛋清將龜頭挿入一炷禪香時拔出再以捫青布燒灰存性碾末一錢加冰片一分搽上過夜其腫即消

龜頭腫痛

蟹蟄二隻炭火炙去皮肉將骨炙酥為極細末每一分加冰片一分碾勻細細搽上

又方

瘍醫大全

卷二十四 龜頭腫方 三 顧氏秘書

鬼饅頭嫩枝 即木蓮蓬 三四兩煎湯薰洗止痛消腫

又方

蝸 牛 焙乾 枯 礬 各等分

碾細濕則乾搽乾則香油調搽

陰頭癱門主論

王肯堂曰陰頭癱生於陰頭準繩

湯醫大全

卷二十四

陰頭癱

四

顧氏秘書

陰頭癱門主方

驗方

鱉甲為末鷄蛋清調敷


湯醫大全

卷二十四

陰頭癱方

五

顧氏秘書



瘍醫大全

卷二十四 魚口

木 顧氏秘書

魚口便毒橫痃門主論

陳實功曰左為魚口右為便毒兩腿合縫之上名橫痃 正宗

鬼遺方云腿胫兩處起為便毒

王肯堂曰便毒生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏者精與智也男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚經隧乃結為便毒矣蓋腿與小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或

夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成腫結也初起切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣 準繩

孫曰商賈中野合不潔淫妓便搆此證或疔瘡或楊梅者皆由慾火淫熾一旦交合不潔為淫火冲動膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以敗毒之藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣與毒邪下陷治之非彌年累月不愈也捷法只宜發汗其

瘍醫大全

卷二十四 魚口

七 顧氏秘書

次利小便膚腠所感之邪汗易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆順也故治之不旬日便可奏功若曾發汗利小便體厚邪固而不得宣通者乃以破毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之亦不失先後着也

陳實功曰左為魚口右為便毒總由精血交錯生於兩腿合縫之間結腫是也 魚口生於左腿兩腿合縫之間便毒生於右腿兩腿合縫之間生於小腹之下近之陰毛之傍結腫名曰

橫痃又名外疝是也此三症得之於奔走勞役濕熱下注者少得之於入房忍精強固不泄或慾念已萌停而不遂以致精血交錯凝滯結而為腫淫毒內攻者多然其毒從便而入亦當從便而出治當散滯行瘀通利大小二便初起宜通水丹逐之不應用九龍丹山甲內消散七日已後根本堅固恐其作膿宜用火針法刺之亦妙已出膿者十全大補湯服之庶易收斂遲則恐生別症難愈謹戒房事 正宗

瘍醫大全

卷二十四

魚口

八

顧氏秘書

又曰因奔走勞役而得者即用四妙湯補而消之甚驗

馮魯瞻曰便毒生於小腹下兩腿合縫之間小兒是肝火肝疳總屬肝經熱毒治宜瀉肝再視血分毒氣為之斟酌若大人犯此者多因慾火不能直遂其志故敗精搏血留聚經隧乃結為毒治宜散鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣間有因交合不潔為淫火衝動是以受毒所致者治宜先為發汗次利小便可也 錦囊

又曰婦人疝瘕或肝經濕熱下注或鬱怒傷損肝脾其候兩拘小腹腫痛或玉門焮腫作痛憎寒壯熱小便澀滯腹內急痛或小腹痞悶上攻兩脇者肝經濕熱鬱滯也龍膽瀉肝湯玉門腫脹者肝火血虛也加味逍遙散若槩投散血攻毒之劑則誤矣周文采曰便毒初發寒熱交作兩腿合縫之間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏者精與志也男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚中途而結為便毒矣夫人脚腿與小腹合縫之間乃精血所出之道路或觸景而動心或夢寐而不泄既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成腫結也初起慎不可用寒涼之藥恐氣血愈結不得宣散反成大患惟當發散寒氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣 集驗

瘍醫大全

卷二十四

魚口

九

顧氏秘書

申斗垣曰勇疽即俗名魚口生衝門穴 啟玄

薛立齋曰魚口者言其形如魚口張而不合也潰後慎勿行動伸縮恐難斂口此症有公有母之分公者小而形長易治母者大而形圓公則只一箇母

則三四個若母魚口只用艾炷灸初起者則餘者
白消

心法曰橫疔疽在左腿夾縫摺紋中形長如蛤陰疽
在右腿夾縫摺紋中形長如蛤屬三陰經由七情
鬱滯凝結而成漫腫堅硬時疼甚則痛牽舉丸上
及少腹形長如蛤一兩月方能潰破其膿深可知
破後膿稠可愈敗漿最難斂口久必成漏
又曰若膿水淋漓日久有生蟲形類虻蟲亦係膿深
鬱久之所化也屬逆

心法曰便毒又名血疔又名便癰無論男女皆可以
生發於少腹之下腿根之上摺紋縫中屬肝腎二

經由強力房勞忍精不洩或慾念不遂以致精搏
血留聚於中途壅遏而成或因暴怒傷肝氣滯血
凝而發魚口因生於摺紋縫中其瘡口潰大身立
則口必合身曲則口必張形如魚口開合之狀故
名之也

魚口便毒橫疔門主方

九龍丹

魚口便毒騎馬癰橫疔初起未成膿者

穿山甲炒 沒藥 青木香

血竭 滴乳香 兒茶 各一錢

共為末用當歸尾三兩紅花二兩酒煎膏丸如
桐子大每服二錢熱酒送下數服自消

魚口

不見水猪腰子一個剖開入雄黃三錢貼患上

傷醫大全 卷二十四 魚口方 十一 顧氏秘書

山甲內消散

魚口便毒騎馬癰橫疔初起未成膿者

歸尾 甘草節 大黃 各三錢

白蠶蚕 一錢 穿山甲炒 三片 黑丑打碎 一錢

土木鱉去殼 三個

酒水全煎搗再煎服大便行三四次喫淡粥補
住避風為妙

魚口便毒初起

生明礬三錢或五錢碾粗末用生酒吞下欲吐忍

之出汗即愈一半次日全消

胡桃散

大胡桃一個剖開去肉將全蠟二枚裝入燒存性

研末熱酒調服

綠鳳散

魚口便毒瘰癧核初起

雞蛋一個入瓦罐煮三四滾取起用銀簪杆三四

十孔再入罐內加芫花末一錢全煮一二十滾去

藥食蛋

通水丹

卷二十四

魚口方

顧氏秘書

治下部諸瘡魚口便毒橫痃腹癰初起人壯氣

實小便淋瀝者

芫花不拘多少揀淨晒極乾研為極細末磁瓶收

貯每用五分將大棗二三枚去核夾藥在內空心

鴨下冷茶過口

便毒

白蠟蚕 炒

當歸

生大黃

各三錢

甘草

穿山甲

各一錢五分

研細空心酒調服三四錢

魚口

穿山甲 炙

白蠟蚕

左顧牡蠣

煨七次 各五分

大黃 一錢五分

研細酒調服

魚口便毒

芙蓉葉 大黃

金銀花

桔梗 天花粉

陳皮

皂角刺 穿山甲

各等分

瘍醫大全

卷二十四

魚口方

圭

顧氏秘書

研細為丸如桐子大每服三十九丸白湯送下

又方

魚膠切碎蛤粉拌炒研細每服五錢空心酒調下

蓋被出汗連服十次外用胡椒一兩研碎燒酒調

敷患處即消

又方

大蝦蟇一個剝去皮入葱五錢連腸搗爛敷患處

再以皮覆其上半日消散且無留毒之患如毒盛

未消再如法敷一次

又方

肥皂一枚去核鹽一合醋半觔煮如泥搗敷患處

婦人魚口

川貝母 三錢 甘草 一錢

皮酒煎服孕婦忌服

消魚口便毒橫痃奇方 范令聞

九頭獅子草 一錢 貝母 三錢

白水煎服瀉一二次自消重者不過三劑必消

橫痃 長興莫氏

瘍醫大全 卷二十四 魚口方 十四 顧氏秘書

青殼雞蛋 一個 刺蒺藜 一合

好酒全煮蛋熟剝去殼再煎連蛋服立消

立消便毒 陳古公

廣膠 穿山甲 炒 連翹 各二兩

當歸 一兩 荊芥 防風

紅花 各二錢 斑蝥 七個去頭足炒 金銀花 八錢

車前 大黃 各五錢 弱人 只用三錢

葱三根好酒二三觔煎好空心服之儘量飲醉

出汗或下即消

便毒

油核桃 淨肉七個 瓜兒血竭 一兩

二味槌勻丸如蛋大以鹽泥固濟火煨烟盡安

泥地上以碗蓋熄去泥研為細末無灰酒調下

儘量飲醉即消

便毒

槐花 一兩 防風 穿山甲 炙

連翹 僵蠶 荊芥 各三錢

金銀花 五錢 甘草節 八分

瘍醫大全 卷二十四 魚口方 十五 顧氏秘書

酒水全煎不效加乳香沒藥 俱去油各一錢 立消

魚口

獨子肥皂泥封煨赤去泥將肥皂研細每服二錢

酒調服取汗立消

魚口便毒橫痃將成膿者

小粉漿全小活鯽魚搗爛敷上即消

便毒魚口已潰不能長肉收口

狗肉二三觔煨爛取湯洗瘡口淨將狗肉漸漸推

入瘡口內令滿外用絹袱紮定不可行走安息數

日瘡肉漸生狗肉漸出狗肉出盡瘡口長平
魚口初起三五日

五楮子炒黃研末百草霜和勻醋調敷一日夜全消

魚口便毒一口至七日未潰紅腫寒熱

黑 丑 研 白 丑 研 殭 蠶 炒 去 絲

當歸尾 甘草節 金銀花 各二錢

土木鱉 五個去殼切片大黃 五錢 穿山甲 二片 炙

猪牙皂 二條 朴 硝 一錢

湯醫大全 卷二十四 魚口方 七 顧氏秘書

右作一劑酒水各一碗煎空心服行三四次溫

粥補之輕者一服重者兩服消孕婦忌服虛人減半

便毒初起 李岳

皂角子二十一粒洗淨空心好酒吞下儘量飲醉

一覺即消

便毒

生大黃 六錢 全 蝮 去 頭 足 穿 山 甲 各 三 錢

白 芷 四 錢

水煎服外用千年石灰一兩明礬三錢鹽少許
米湯調敷即消

魚口便毒橫痃初起立消

用雞蛋煮熟劈開去黃將蛋連殼合在腫上以艾
圓如荳大灸三五壯如未全消隔日再灸之

魚口

白魚膠五錢剉銅鍋炒黑色畧帶黃些研細末用
老酒調成團空心時以匙挑放舌上須多用酒吞
下其藥直達患處如瘡大可再製五錢服之即消

湯醫大全 卷二十四 魚口方 七 顧氏秘書

如已潰亦效

陰腫如斗門主方

男子陰腫如斗其色紅赤不能治者

馬鞭草搗爛敷之或煎洗亦效

陰腫大如斗核痛

白礬二兩 雄黃一兩 甘草五錢

水煎先薰後洗神效

囊腫秘方錦囊

川椒 麥芽炒焦 地膚子各一兩

葱白頭連鬚二十一根
去土爭不必洗

瘍醫大全 卷二十四 陰腫方 七 顧氏秘書

煎湯淋洗囊上良久次日再洗以消為度

小兒風熱外腎焮赤腫痛日夜啼哭不數日退皮如

雞卵殼狀回春

老杉木燒灰入膩粉清油調敷神效

陰癩腫大不消

礪砂水研塗之大有效

小兒坐地多時或風邪或蟲蟻吹呵陰囊腫硬

蟬蛻五錢水一大碗煎洗不過三次腫消痛止更

服五苓散加燈心煎服

又方

葱園中蚯蚓屎研細以甘草湯調敷

小兒外腎赤腫

老杉木煨存性 官粉各等分

研細清油調搽並治大人繡毯風

腎囊翠丸腫大

棉花子仁一兩煎湯常洗自消

氣卵胞

老絲瓜皮 老生薑皮

瘍醫大全 卷二十四 陰腫方 七 顧氏秘書

共入鍋內炒冲生白酒熱服得汗即消



下疳

瘍醫大全

卷二十四

下疳

三

顧氏秘書

下疳門主論

王肯堂曰下疳瘡生竅口

準繩

又曰小腹至陰之下玉莖之根癢極沸湯沃之稍止

而復作有三四敷黃水淋漓若幼時曾患惡瘡後

來亦有此症作結毒治之

陳實功曰下疳者乃淫慾邪火鬱滯而成其來有三

一由男子慾念萌動陽物興舉淫火猖狂而未經

發泄以致敗精濁血流滯中途結而為腫初起先

必小便淋瀝溺痛次流黃濁敗精陽物漸漸破損

瘍醫大全

卷二十四

下疳

三

顧氏秘書

甚則腫痛腐爛治當疎利肝腎邪火為主用清肝

導滯湯主之一由婦人陰器瘵精濁氣未淨接與

交媾以致淫水毒精傳襲而成初起必先皮腫光

亮甚如水晶皮破流水腫痛日生麻癢時發治當

解毒消風為主如龍膽瀉肝湯合平胃散主之一

由房術熱藥塗抹玉莖洗擦陰器與助陽火煽動

陰精僥倖不衰久戰不泄多致精阻火鬱未發而

成皆由蘊毒所致初起陽物癢痛堅硬紫脹疔瘡

漸生腐爛漸作膿水淋漓不時與舉治當瀉火解

難治

毒為主如黃連解毒湯蘆薈丸主之正宗

蔣示吉曰又有先發時瘡悞用薰條擦藥收斂結毒

於此者最重必成蠟燭卸矣說約

又曰如肝經濕熱下注者不過澁淋黃濁莖中作痛

不紅不腫者輕

又曰濕熱下注者輕淫火毒發者重

又曰下疳又名鬪精瘡潰爛日甚者名蠟燭卸

又曰若小便淋瀝漸爛漸開色紫無膿疼如針刺者

馮魯瞻曰下疳者玉莖生瘡甚至蝕透而久不愈宜
內服燥濕解毒外用薰摻可也多係肝經濕熱故
尤宜清肝除濕錦囊

李東垣曰妬精瘡因壯年精氣盈滿久曠房室陰上
生瘡赤腫作毒妨悶癢痛者是也精義

申斗垣曰龜頭及頸上有瘡腫焮於內而外則皮紫
不見其瘡如袖口之包手故名曰袖口疔最為難

治何也蓋藥不能搽至疔上治法用眼藥加冰片

膏子入雞蛋殼內套龜頭上浸之內服清肝腎濕

瘍醫大全

卷二十四

下疳

圭

顧氏秘書

熱藥敬玄

又曰玉莖有瘡癢而痛赤窠窠中有水此乃交妬不

洗肝經濕熱所致肝性主燥故瘡亦燥名曰燥疔

宜用兒茶敷之

又曰妬精瘡用地骨皮泔水洗過取室女首經布燒

灰搽之立效

寶漢卿曰玉莖内生瘡名內蛀桿玉莖外生瘡名外

蛀桿

胡公弼曰妬精瘡乃陰頭潰爛成膿或癢或痛蓋緣

後生未娶精氣溢盛陽物興起當泄不泄強泄脹
裂龜頭嫩皮日久潰爛腐肉成膿間有害其生命
者治之當戒房事外以黃柏皮散煎洗拭乾再摻
訶子灰散或銀粉神丹青囊

陳遠公曰龜頭生疔瘡服敗毒藥毒盡從二便而出
倘大腸燥結則敗毒藥不能走大腸勢必趨小便
而出小便口細毒難盡泄於是毒不留於腸中而
單結於外勢毒盛必發安得不腐爛哉往往連龜
身爛盡人多以藥外敷雖外藥亦不可少然不先

瘍醫大全

卷二十四

下疳

圭

顧氏秘書

消火毒遽用外過不啻如石之壓草也故必先內

治之用散毒神丹茯苓一兩黃柏生甘草黑梔仁

各三錢肉桂一錢水煎服四劑火毒盡盡從小便

而出疼亦少止後用生勢丹敷之炒黃柏三兩兒

茶生甘草各一兩大黃三錢丹砂勿見乳香沒藥

各一錢冰片麝香各三分為末摻之疼即止數日

膿血乾筋肉再長一月全愈但不能長龜頭也愈

後服十全大補湯一二月則外勢仍能伸縮尚可

種子若多服敗毒泄火之劑無論命門寒冷而外

勢亦且冰冷安得陽和之驟復哉此治法之次序也 水鑑

心法曰下疳統名疔瘡又名妬精瘡生於前陰經云

前陰者宗筋之所主督經脈絡循陰器合纂問又

云腎開竅於二陰是瘡生於此屬肝督腎三經也

其名異而形殊 生於馬口者名下疔 生玉莖

上者名蛙疔 莖上生瘡外皮腫脹包裹者名神

口疔 龜頭外腫如瘤者名雞瘻疔 疔久而偏

潰者名蠟燭疔 痛引辜丸陰囊腫墜者名鷄胞

瘍醫大全 卷二十四 下疔 疔 顧氏秘書

疔 痛而多癢潰而不深形如剝皮爛杏者名癩

疔 生馬口傍有孔如棕眼眼內作癢捻之有微

膿出者名錠根疔 生楊梅瘡時或悞用薰搽等

藥以致腐爛如白者名楊梅疔 又生楊梅時服

輕粉水銀打成劫藥以致便溺尿管內刺痛者名

楊梅內疔

曰凡治下疔第一戒患者喫鹹若肯飲食喫淡一

月收功只消半月

下疔門主方

九味蘆薈丸

當歸 胡黃連 川芎

蕪荑 白芍 各一兩 龍膽草 酒浸炒 焦七錢

真蘆薈 五錢 廣木香 甘草 各三錢

右為末米粥搗丸麻子大每服一錢或一錢五

分白湯送下若虛者佐以加味歸脾湯加味道

適散治之

珍珠散

瘍醫大全 卷二十四 下疔方 疔 顧氏秘書

下疔皮損腐爛痛極難忍及諸瘡新肉已滿不

能生皮又治新婚玉莖損傷新娶陰戶傷痛搽

之極效並治湯潑火傷皮損肉爛疼痛不止

新白珍珠 一錢入豆腐內煮數滾研極細 以研至無聲為度

上好花青 即青黛 真輕粉 一兩 五分

三味共研干轉細如飛麵磁瓶收貯初起搽之

即愈若腐爛疼痛甘草湯洗淨瘡存髓調搽又

治婦人陰蝕瘡極效湯潑火傷痛者以玉紅膏

調搽

滑石 沒藥去油 龍骨各等分

右研極細乘瘡膿汁未乾搽之不可見水自結痂矣

又方 張化儉

紅棗去核將銅綠整塊者包在棗內放炭火上煨存性研極細末加大尼冰片再研磁瓶密貯先將瘡上用陳松蘿茶洗淨軟絹拭乾將藥搽上雖龜頭爛半者無不奇效

又方

瘍醫大全 卷二十四 下疳方 美 顧氏秘書

螳螂子火煨 白殭蚕火煨 兒茶

輕粉各等分

研極細用甘草湯洗淨搽之

又方

玉莖疔瘡或漸至蝕透有爛去一半服此而愈

扁蓄四兩 黃連二兩 甘草一兩

水煎內服外洗

又方

甘蔗頭煨灰一錢 兒茶三分 冰片一分

又方 張化儉

紅棗去核將銅綠整塊者包在棗內放炭火上煨存性研極細末加大尼冰片再研磁瓶密貯先將瘡上用陳松蘿茶洗淨軟絹拭乾將藥搽上雖龜頭爛半者無不奇效

又方

螳螂子火煨 白殭蚕火煨 兒茶 輕粉各等分

研極細用甘草湯洗淨搽之

瘍醫大全 卷二十四 下疳方 美 顧氏秘書

又方

玉莖疔瘡或漸至蝕透有爛去一半服此而愈

扁蓄四兩 黃連二兩 甘草一兩

水煎內服外洗

又方

甘蔗頭煨灰一錢 兒茶三分 冰片一分

滑石 沒藥去油 龍骨各等分

右研極細乘瘡膿汁未乾搽之不可見水自結痂矣

疔瘡簡便方

用戴舊油透羅緞帽沿燒灰杭粉瓦上煨黃色各等分共研極細磁瓶收貯先用紅棗十五個甘草三錢煎湯溫洗患上挹乾搽之

又方

蟬蛛窩拭淨貼之

又方 安慶僧授

白螺螄

要叮在岸上的四十九枚陰陽瓦煨枯如叮在木底者無用

研細生酒調服蓋被取汗外用大田螺二個將

湯醫大全

卷三十四 下疳方

毛 顧氏秘書

曆挑開入冰片三分伺螺化水雞翎攪上如未

痊可如法再製服

又方

蠟殼煨研加冰片少許搽之

又方

鉛粉一錢 冰片一分

研細外以銀花蘄艾花椒煎湯洗淨乾搽

又方

血竭 兒茶 乳香 去油

龍研骨細末搽沒 藥 去油各三分 研細搽之

又方

旱田螺 煨灰 麝香 輕粉

冰片 各等分

研細香油調搽

又方

燈草灰入輕粉麝香少許乾搽

又方

防風煎湯洗

湯醫大全

卷三十四 下疳方

毛 顧氏秘書

下疳妬精瘡

七月七日採鳳眼草燒灰淋水洗之

金螺散

大田螺數枚水養吐盡泥沙俟曆開入研細冰片

末伺螺化水以鉛粉填滿仍用曆合上放新瓦上

煨令紅赤去殼研細又填入第二螺內又煨如此

三次研細密貯任用

二靈丹

下疳初起流膿

兒茶一錢 冰片三分

研勻將瘡先用冷茶或甘草湯洗淨挹乾以雞翎將藥掃上

龜頭爛半

竹蛙虫糞 銀粉

臘肉骨髓 松香各等分

研細和勻用燒酒將瘡洗淨搽之內單服土茯苓湯當茶

七寶檳榔散

玉莖疔瘡或漸至蝕透久不愈者

檳榔 密陀僧 牛黃 輕粉

黃連 黃栢 朴各等分

研末先將葱白漿水洗淨軟帛拭乾如瘡濕乾

聖粉散

下疳疔瘡臭腐爛痛不可忍

密陀僧 黃丹 黃栢蜜炙

孩兒茶 乳香各三錢 輕粉一分

傷醫大全 卷二十四 下疳方 堯 顧氏秘書

研極細用葱湯洗瘡濕則乾搽乾則香油調搽兼治小兒疔瘡

玉莖生疔爛去大半

吧嗒杏二錢研細紙包壓去油取淨白霜一錢加水片三分再乳絕細聽用先以甘草煎湯洗淨挹乾搽上

下疳疼不可忍寶氏

黑羊角煨 穿山甲煨各二錢 乳香去油

沒藥去油各一錢

傷醫大全 卷二十四 下疳方 手 顧氏秘書

研細酒調服

下疳大爛

黃蠟八錢 白蠟 面粉各一兩

冰片一錢 麻油三兩

先將油與二蠟熬化隨下面粉次下冰片和勻

作隔紙膏貼之五日後痛止肉即生矣

銀粉散胡公弼

治下疳母論新久腐爛作痛及楊梅瘡毒後結

毒玉莖腐爛或陽物爛半者

好錫六錢化開入硃砂末二錢攪炒砂枯去硃砂
留錫再化開入水銀一兩和勻傾出聽用又將杭
粉一兩鋪夾紙上捲成一條以一頭點火燃至紙
盡吹去紙灰單用粉同前錫末加輕粉一兩共研
極細末收貯凡遇前症先用甘草煎湯淋洗拭乾
以此藥摻上即能止痛生肌收斂

婦精瘡玉莖爛一二寸者兼用柯子灰散神方周鶴

黃柏荆芥甘草馬鞭草葱全煎洗去膿腐

柯子灰散

瘍醫大全 卷二十四 下疳方 三 顧氏秘書

黃 栢 炒存性 柯子灰 各二錢 麝 香 少許

共研極細摻患處令睡睡醒服冷水兩三口勿
令腸道與起脹斷瘡腐二七即愈 一方無黃栢

銀粉神丹 曹振先

專治玉莖虫蝕生長如初止少元頭者或舌頭
被人咬去抹上此丹亦能長全大有神功

黑 鉛 五錢 寒水石 三錢 五 輕 粉 二錢 五

水 銀 二錢 五 礪 砂 珍 珠 各一錢

先將黑鉛化開投水銀研不見星共為細末收

貯遇前症先用葱艾花椒煎湯洗淨若怕洗畏
痛須先薰止了痛再洗拭乾上藥若舌頭咬去
先用乳香沒藥煎水口噙之止痛後上藥自然
生長全愈

兒茶散

下疳蛙桿

銅綠不拘多少煨紅放地上冷定又煨又冷定乳
細加兒茶等分和勻將下疳洗淨摻之

下疳久不愈 海藏

瘍醫大全 卷二十四 下疳方 三 顧氏秘書

橡斗子二枚合盛黃丹令滿以亂髮厚纏定燒烟
盡為度同研細末先以葱白熱漿水洗瘡膿淨再
上藥甚者不過三次如神

陰頭生瘡 孫真人

蜜煎甘草末頻頻塗之

竹節霜 百效

龜頭因熱毒馬口結蕊或龜衣擦損

取新竹節上霜刮下一攤即愈

下疳蝕爛

白菓樹葉包裹

下疳抄本

蘆甘石 乳香 血竭

川黃連 各一錢 輕粉 五分 冰片 一分

研末米泔水洗淨搽上立效

又方

蝸牛 焙乾 枯礬 各一錢

研末濕則乾搽乾則以香油調塗

疔瘡蛙疔 靈秘丹藥

瘍醫大全

卷二十四

下疳方

重

顧氏秘書

二蚕繭 燒存性 輕粉 二錢 枯礬 五分

紅絹 方圓三寸 兒茶 一錢 五倍子 一個

研末酸漿水葱白川椒煎湯洗淨搽奇效無比

疔瘡蛙疔

銀硃 水飛 兒茶 各一錢 輕粉 五分

黃栢灰 老茶葉 各三分

研末用黃蠟二錢融化為丸作二十粒每服一

丸好酒空心送下神效無敵

下疳陰瘡

邵真人

蘆甘石一兩火煨醋淬五次加兒茶三錢研末

油調敷

蠟燭卸 周鶴仙

紅杷子燒灰每一錢加梅花冰片五厘麻油調搽

下疳

圓厚五倍子一個去頂以砂仁三顆搗碎入於內

仍以頂合好用濕紙包裹火內煨極黑取出為末

搽患處即愈

又方

瘍醫大全

卷二十四

下疳方

重

顧氏秘書

五倍子 燒灰存性 真冰片 少許

研極細搽上立效

疔瘡 周小庵

鳳凰衣 焙 橄欖仁 去油 人參 各五分

兒茶 煨紅存性 珍珠 珠 一分 金箔 十張

共乳細末搽上立刻定痛生肌 此方加南北

鉛製白霜一錢紅升丹三分乳勺搽上更妙

疔瘡舌爛鼻爛龜頭爛

黑鉛 一兩裝入黑狗腦內以鹽泥封固入

金粟火煨紅取出冷定去泥研細

每用法製鉛末一錢五分加

乳香去油 沒藥去油 鉛霜各三分

礪砂一分五厘 雄黃一分 金箔十張

寒水石生用四分 輕粉二分

共乳細末磁瓶密貯 舌斷者用米泔水菹茶

煎湯溫漱拭乾上藥待長時洗去藥又漸漸搽

之 龜頭爛者以菹湯薰洗過搽藥

疔瘡常立庚

龍膽草 山梔生用 當歸尾

湯醫大全 卷二十四 下疳方 葶 顧氏秘書

木通 黃芩 柴胡

澤瀉 生甘草

白水煎痛加紅腫加 荆芥川連 防風白芷稍 大黃

蛙桿疔爛去半段者

先用苦茶洗淨用黃連末搽三四日待腐肉去盡

取雄犬陽莖連肉火上炙黃煨乾存性為末每用

少許加入黃連末內摻之犬莖末只可逐日漸加

不可驟用太多則收口速而反裂破矣至多亦不

過與黃連末等分為率

下疳

輕粉 黃柏各一錢

共研細末先用麥門冬煎湯澆洗摻之

下疳紅腫熱痛

鯉魚膽汁敷

大荳甘草湯

黑荳一合 生甘草一兩 赤皮葱三根

槐條六十寸

煎洗一切疔瘡

湯醫大全 卷二十四 下疳方 葶 顧氏秘書

二子消毒散

肥皂子 杏仁炒 蟬蛻

爛蠶 皂角子各七枚 土茯苓八兩

猪牙皂一條 荆芥 防風

牛膝各一錢 金銀花三錢 猪板油二兩

水入碗煎三碗早午晚分三次服如結毒服二

十一日全愈

袖口疔 加黃柏一錢 肥皂子加倍

楊梅瘡 加葶苈仁 側柏葉 糯米各三錢 皂角刺各一錢

內疔 加海金沙 白丑 五加皮

鳳衣散

抱雞卵淨殼 黃丹各錢 冰片二分

輕粉四分

研極細乾摻或鴨蛋清調搽

旱螺散

冰片 麝香各三分 白田螺殼殼三分

輕粉一錢

研極細香油調搽

瘍醫大全 卷二十四 下疳方 五 顧氏秘書

白玉膏

貼疔瘡一切瘡

白芷 蘆甘石煨 甘松

當歸尾 乳香去油 五靈脂

三柰 北細辛 樟冰各五錢

沒藥去油 象皮 白蠟各三錢

松香 冰片 麝香各一錢

鉛粉十三兩

先將麻油二觔熬至烟起離火入白蠟松香又

熬不住手攪看有大泡便將鉛粉陸續下但滾即取起稍停又入火如此數次見有菊花紋小泡便入前諸藥末仍取起滴水成珠入冰麝攪勻待凝定傾水兩三盞入罐收貯聽攤貼

鳳凰散

治男女下疳腫爛疼痛難忍並一切皮破腫爛諸瘡即時消腫定痛拔毒生肌

抱雞蛋殼連衣殼焙

乳細末每一錢加冰片二分密貯用時或乾摻

或猪膽汁或麻油調搽

黑香散

治男女下疳瘻不可當者並一切極癢諸瘡

橄欖核燒灰存性

研極細末每一錢加冰片二分密貯或乾摻或

麻油猪膽汁俱可調搽

蠟燭卸疔

抱過雞蛋殼焙存性

黃連 輕粉

各等分乳細香油調搽立時止痛結靨

下疳

陳拾灰

椒櫬核煨灰

兒茶

輕粉

各三錢

水

片一錢

研極細末搽上用鷄蛋軟皮黃連湯煮過貼之

湯醫大全

卷二十四

下疳方

七

顧氏私書

初婚玉莖傷損門主論

陳實功曰凡初婚玉莖擠夾傷損出血痛疼者先以

葱湯洗淨隨用珍珠散加冰片摻之腐皮漸乾痛

自漸止 正宗

湯醫大全

卷二十四

傷莖

四

顧氏私書

傷寒瘥後內外瘡門主論

馮魯瞻曰傷寒瘥後若小便澀有血者亦是餘熱毒也名曰內外瘡亦皆有膿若不出膿者死宜用黃連解毒湯加生地當歸尾連翹木通滑石牛膝扁蓄琥珀甘草稍之類 錦囊

傷醫大全

卷二十四

內外瘡

聖

顧氏秘書

囊癰門主論

王肯堂曰囊癰乃足厥陰肝經所主乃濕熱流入肝經而成治當清肝家濕熱佐以養陰固腎又曰腎陰毒即陰囊疽乃坐臥濕地久着汗濕衣袴寒濕下攻陰注經絡久而不散遂生此症初起陰囊紅腫疼痛者是也

朱丹溪曰囊癰即外腎癰也此癰生陰囊之上其症最酷陰道多虧濕熱相聚致生此毒若不速治則囊裂舉丸外懸可用青荷葉包之或紫蘇葉洗去毛

傷醫大全

卷二十四

囊癰門

聖

顧氏秘書

包之或單油紙煮過包之

陳遠公曰有陰囊左右生癰者名曰便毒生於囊之下囊門之前名曰囊癰三處相較便毒易治囊癰最難治以囊之下為懸癰其皮肉與他處不同在他處皮肉或橫生直生俱易合口而囊下橫中有直直中有橫不易收功此皆少年貪於酒色忍精而戰耐飢而交或苟合有毒之婦或鬪精有瘡之妓所謂欲洩不洩化為膿血是也治必先補其虛佐以化毒之味以毒因虛而成不治虛得乎逐邪

至神丹金銀花 四兩 蒲公英 二兩 人參 一兩 當歸

二兩 生甘草 一兩 大黃 五錢 天花粉 二錢 水煎二

服全愈潰者三劑收功此方用金銀花公英佐以

參歸大黃之大料未免霸氣然大虛之症又用大

黃祛逐似乎不宜誰知毒盛乘初起之時正氣未

甚衰大補瀉火之為得乎倘因循不敢治及至流

膿出血正氣蕭索始用參芪補氣往往用至數斤

尙未能復元何若早用于化毒之中正又無傷毒

又易散此因勢利導之法不可不知也 水鑑

湯醫大全 卷二十四 囊癰 聖 顧氏秘書

又曰有飲火酒入房精不得泄至半夜寒熱煩渴小

便淋赤痰涎湧盛次日囊腫痲痛又次日囊處盡

腐玉莖下貼藥者亦腐人以爲酒毒也誰知肝火

得酒毒濕而肆虛乎夫酒何至作腐蓋火酒大熱

之物也人過飲火酒多致醉死死後身體腐爛以

火酒乃氣酒遇熱自焚人身五臟六腑原自有火

以火引火安得不炎燒耶飲火酒入房鼓動精房

之火宜是命門之火非肝火也然木能生火肝木

生相火理之常也入房借火酒之力火勢必猛火

動無根後能久乎必精泄而火解矣無奈精欲泄

而阻抑之火無泄路又無可依火酒又無可解於

是火入于肝將依母自歸也惟是相火內火也可

附肝以爲家而酒火外火也反得木而焚體囊與

玉莖乃筋之火也筋屬肝因入房而聚陰器之際

故火發而囊腫囊腫極而莖亦腐矣治法解酒之

毒益以補氣血之品則濕熱解而腐肉長矣用救

腐湯人參 一兩 當歸 二兩 黃芪 二兩 白木 一兩 茯

苓 五錢 黃栢 三錢 炒梔子 三錢 苡仁 五錢 澤瀉 三

錢 白芍 一兩 葛根 三錢 水煎服四劑腐肉去而新

肉生又四劑囊莖悉平復矣酒毒成於拂抑平肝

泄火利濕解毒宜也何以用參芪歸木大補氣血

耶大凡氣血盛者力能勝酒縱酣飲無碍服火酒

而腐必成于火酒之毒亦其氣血之衰力難勝酒

所以兩火相合遂至焚身外腐苟不急補氣血則

酒毒難消腐肉又何以速長哉

陳寶功曰夫囊癰者乃陰虛濕熱流注於囊結而爲

腫至潰後舉丸懸掛者猶不傷人以其毒從外發

湯醫大全 卷二十四 囊癰 聖 顧氏秘書

治當補陰清利濕熱取效者十有八九近時人誤用疝家熱藥多致熱甚為膿必難收斂初宜龍膽瀉肝湯稍久滋陰外敷金黃散如腫痛日久內膿已成脹痛者即針之內服十全大補湯加山萸肉丹皮澤瀉治之間以六味地黃丸服之自安正宗馮魯瞻曰書曰癰疽入囊者死是屬肝經濕熱初起腫痛小便赤澀治宜清利解毒為主若膿已成而小便不利者是毒氣未散也當針泄之若膿既出而反痛者是氣血虛也當補益之倘元氣未虧而

湯醫大全 卷二十四 囊癰 聖 顧氏秘書

陰囊悉潰舉丸懸露者亦不為害錦囊

又曰若小兒患此而由乳母多怒者宜子母並服清肝之藥

又曰陰囊潰爛舉丸脫露名曰脫囊用紫蘇葉莖為細末如濕乾敷如未破用香油調塗將青荷葉包上內服苓連甘草木通當歸之類多得保全患者勿懼

竇漢卿曰囊癰倘膿熟開刀須待膿熟用油頭繩紮住腎子以小刀開海底穴其膿血即流盡矣

李東垣曰經謂癰入囊者死將以為屬腎耶子治數人悉以濕熱入肝經施治而以補陰藥佐之雖膿潰皮脫舉丸懸外亦不致死但未知下虛人老者何如耳精要

汪省之曰囊癰乃濕熱下注濁氣順下流入膀胱陰道有虧濕熱不利有作膿者故滋陰除濕之藥斷不可缺膿盡則自安耳理例

胡公弼曰又有因腹腫脹漸流入囊腫甚而囊自裂開舉丸懸掛在外水出不止用杉木炭末敷上外

湯醫大全 卷二十四 囊癰 聖 顧氏秘書

以紫蘇葉厚厚包裹令患者仰臥養息內以龍膽瀉肝湯加滋陰藥服之自愈青囊

囊癰門主方

驗方 新都醫案

瓜 萹 甘草節 金銀花 各五錢

連 翹 柴 胡 青 皮 各二錢

水煎服

囊癰潰後

蚌 殼 煨 黃 連 青 黛 各等分

研細搽之

囊癰囊漏皮硬厚而出水者皆能治

湯醫大全 卷二十四 囊癰方 聖 顧氏秘書

蒼 木 吳 茱 萸 炒 川 芎

當 歸 身 各 一 白 木 天 花 粉

官 桂 木 通 各 八 分 青 木 香 一 錢

生 黃 芪 二 錢 龍 膽 草 五 分 蛇 盤 菓 二 錢 如 無 以 草 代 之

右到一劑白酒一碗煎空心服

囊癰渾身發熱口苦咽乾囊上紅腫疼痛是也

杜 仲 鹽 水 拌 炒 斷 絲 磨 為 細 末 用 篩 揀 去 絲 淨 末 一 兩

生酒一觔煎半觔服之取汗即消腫定痛如未

愈再用一服即愈如外敷用明雄黃一兩百

草霜 一錢 研勻蜜水調敷如乾以鷄翎蘸水潤

之愈後再用除根藥 用生南星蘇木紫蘇葉

各五錢 陳香椽 一個 共為細末取未曾下水的雞

猪尿胞一個以酒煮爛搗化全藥末搗勻做餅

曬乾烘脆再磨為細末蒸餅打糊為丸空心燒

鹽湯送下八九十九服此一料永遠除根不發

囊癰

海 蝶 蛸 蛤 粉 兒 茶 各 等 分

研極細摻之

湯醫大全 卷二十四 囊癰方 聖 顧氏秘書

又方

乾 荷 葉 焙 紫 蘇 葉 各 等 分 焙

研極細酒調厚敷赤肉上外用油紙包紮

腎囊風門主論

王肯堂曰腎臟風即腎囊風瘡生隱處癢癢成瘡挾有耳鳴目癢鼻赤齒浮指甲縫白等證是也準繩

戴院使曰癩風俗名腎臟風瘡因精未調外為風濕所襲從陰囊濕汗作癢起流注四肢手了白色悉

生瘡瘍蛇床子吳茱萸或甘草節煎洗外用莧菜根莖葉燒存性乾摻並治陰汗生瘡

陳寶功曰腎囊風乃肝經風濕而成其患作癢喜浴熱湯其形腎囊疙痞頑麻破疏脂水者是正宗

瘍醫大全

卷二十四

腎囊風

完

顧氏秘書

腎囊風門主方

繡毬風

老杉木一段燒存性研細用熟雞蛋黃炒枯取油

調搽

又方

苦參

蛇床子

各二兩 吳茱萸 一兩

水四大碗煎一半放溫洗之帶濕撲上後藥寒

水石硫黃各等分研細摻上絹帛包緊

又方

瘍醫大全

卷二十四

腎囊風方

辛

顧氏秘書

豆殼煎水洗

又方

磨古鏡水搽

又方

落蘇葉煎湯洗並燒灰搽

又方

韭菜煎水洗

又方

苦參

二兩 白茯苓 五錢

甘草 四錢

蛇床子 艾葉 吳茱萸 各一兩

水煎百沸放盆內加芒硝五錢化盡頻洗

又方

紫蘇 明礬 菖蒲

臭樹花 薄荷 花椒

共煎湯薰洗數次除根

又方

乾荷葉不拘多少煎湯薰洗二三次

又方

瘍醫大全

卷二十四 腎囊風方

顧氏秘書

絲瓜子仁酒煎臨臥服之出汗即愈

又方 姚伯玉

繡毬花煎洗

又方

墻頭上醬板豆草或鮮或陰乾煎洗

囊風癢痛黃水不乾者

蚯蚓泥 鉛粉

井水調敷

囊風癢不可忍

楊柳葉煎湯乘熱燻洗後用蚯蚓屎焙燥研搽三四次愈

陰毬開花 單方

狗橘子七個煎湯入罐內將陰毬掛罐口離湯一

二寸俟薰待溫傾盆內洗如此三日全愈

腎囊癢

荷葉 吳茱萸 蒼木 各一兩

水煎滾臨洗加皮硝一兩洗之

繡毬風

瘍醫大全

卷二十四 腎囊風方

顧氏秘書

五椀子一個錐一眼入銀硃一錢用陰陽瓦焙研

細末麻油調搽

洗方

葦靈仙 蛇床子 土大黃

苦參 各五錢 砂仁殼 三錢 老葱頭 七個

煎湯薰洗

腎囊風

山黃肉的核心子煎湯溫洗

腎囊生瘡門主方

卵袋生瘡抓之流水

陳紫蘇 大紅椒

煎湯薰洗三次

外腎生瘡

蚯蚓屎 二兩 菜豆粉 一兩

水研塗乾又敷

瘍醫大全

卷二十四

腎囊瘡方

五

顧氏秘書

濕陰瘡門主論

李東垣曰濕陰瘡由腎經虛弱風濕相搏邪氣乘之
瘙癢成瘡浸淫汗出狀如疥癬者是也 精義

瘍醫大全

卷二十四

濕陰瘡

五

顧氏秘書

一 胞漏瘡門主論

中斗垣口肝經濕熱外胞囊上起窠子作癢甚則滴

水濕透中衣名曰胞漏瘡 啟玄

又曰又有梅毒瘡毒結於此以致腎囊破裂漏水腥臭
久治不痊宜土茯苓湯加入參等補藥治之

湯醫大全

卷二十四

胞漏瘡方

書

顧氏秘書

陰囊出汗門主方

陰囊出水

銀粉 臘茶 五倍子

研細用葱椒湯洗淨以香油調搽

陰囊濕癢

飛鹽 皂角 苦參

川椒 蛇床子 蒼朮

煎湯薰洗數次除根

腎囊夜癢抓之流水及婦人下部陰濕 集驗

湯醫大全

卷二十四

陰汗方

藥

顧氏秘書

牡蠣 蛇床子 乾荷葉

破故紙 官桂 紫稍花 各等分

加葱白數莖煎湯去渣薰洗兩許藥洗一次

沐浴長春散 錦囊

男子下元陰濕久冷陰囊搔癢疼痛成瘡流水

及婦人陰濕子宮久冷

牡蠣 蛇床子 官桂

紫稍花 破故紙 乾荷葉 各等分

每用一兩五錢水一小鍋入葱白數莖煎八分

先薰後洗換搽津調散

卵胞出水

全 蝎一錢酒洗焙 玄胡索 五錢

如出水日久腰痛加 杜仲一錢共為細末作

一服空心無灰酒調下定痛消腫止水三服全

愈或糊丸亦可屢用屢驗

腎囊濕爛並婦女陰蝕濕爛生瘡

抱鷄卵一錢 連殼焙

冰 片 五厘

兒 茶 一分燒灰存性

共乳細搽之

瘍醫大全

卷二十四

陰汗方

老

顧氏秘書

疝氣偏墜門主論

夫疝者是陰氣積於內復為寒氣所襲而發故素問

以下論疝皆以為寒然不可單論曰寒蓋雖為寒

鬱而作亦由醉飽無度內蒸濕熱痰積流於厥陰

木性急速又為寒束是以痛甚症雖見於腎病實

本乎肝厥陰肝脉絡於陰器耳可見內積濕熱鬱

於中外被寒邪鬱束於外且有痰飲食積死血鬱

結為病故謂專主肝經而與腎絕無相干也其候

畢丸牽引少腹或無形無聲或有形如爪有聲如

瘍醫大全

卷二十四

疝氣

老

顧氏秘書

蛙激搏而痛無有定處不堪忍也其症有七寒水

癩血氣孤筋是也 馮氏錦囊

寒疝者厥陰經中受寒故筋攣卵縮其狀囊冷結硬

如石陰莖不舉或控畢丸而痛此必得之於久坐

濕地寒氣鬱於外也

水疝者囊腫痛而狀如水晶陰汗時出癢癢而出黃

水小腹按之而作水聲此必得之於醉酒房勞汗

出遇風濕熱乘虛流結囊中二便脹秘不通也

癩疝者陰囊腫大如斗升不癢不痛此因感受濕氣

是以陰核氣結亦有痲痛者

血疝者狀如黃瓜在於小腹兩傍橫骨兩端俗名便

癰此乃得之重感春夏大煥勞動使內氣血流溢

滲入脬囊結成癰腫也

氣疝者上連腎區下及陰囊是或號哭忿怒氣鬱急

迫而脹痛此必因父精怯陰痿強力入房成胎乃

胎病也

狐疝者其狀如瓦臥則入腹行則乃出腹入囊似狐

之晝出穴而溺夜入穴而不溺故名狐疝也蓋環

傷醫大全

卷二十四

疝氣

李

顧氏秘書

陰器上抵少腹者乃肝經之部分是受疝之處也

一切疝氣非肝木受邪即肝木自病此乃肝經自

病也

筋疝者陰莖腫脹或潰膿而痛裡急筋縮或莖中痛

痛極作癢或陰不收白物如精而隨溺出此得於

房勞或邪術所致也

更有木腎者蓋心火下行腎水自溫直陽下降腎氣

自和既溫且和焉有木強者哉此因嗜慾內戕腎

虛以致陰陽水火不接乃沉寒脹大而痛硬也

畢丸所絡之筋非盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入
絡也故患左丸者痛多腫少患右丸者痛少腫多
也

又有身體發熱耳後忽生疔腮紅腫脹痛腮腫將退

而畢丸忽脹一丸極大一丸極小似乎偏墜而實

非蓋耳旁乃少陽膽經之分與肝經相為表裏少

陽感受風熱而遺發於肝經也

婦人小腹傍逼近陰處併結脹痛或皮裏頂起如鵝

子大乃寒氣聚於厥陰所致小腹受寒其病即發

傷醫大全

卷二十四

疝氣

李

顧氏秘書

是謂陰疝女子血涸不月足蹇咽乾癢秘小腹有

塊前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不

名疝而名瘕

古方以烏頭梔子等分加鹽酒煎服之名梔附湯其

效亦速後因此方隨症加減無有不應須分濕熱

多少而治之丹溪曰烏頭治外束之寒梔子治內

鬱之熱則內熱外寒之理昭然矣况二物皆下集

之藥梔子為烏頭所引則勢下急速不容少緩於

胃中矣若按之痛止者尤屬虛寒須加肉桂以薑

汁丸服若速欲定痛用枳核山查核荔枝核川練
子吳茱萸各炒為末白湯調服

小兒偏墜多因食積不消脾濕下行流入肝部

又有陰莖全縮不見而陰囊光腫不痛此因肝氣虛
損不能舒達也宜溫補之

陳實功曰水疝腎囊皮色光亮無熱無紅腫痛有時
內有聚水宜用針從便處引出水氣自安如腫痛

日久內膿已成脹痛者可即針之內服十全大補
湯加山萸肉丹皮澤瀉 正宗

傷醫大全 卷二十四 疝氣 李 顧氏秘書

林慕莪曰或問氣以疝稱其義何居答曰積土成山

積氣成疝疝者山也其氣日積月累聚而不散而
成疝猶之積土成山自小至大由卑至高之義但

氣本無形因虛而凝聚不散隨其所聚之處為痛
故五臟遂皆有疝蓋即五臟之元氣失其溫養生

發之性營運轉輸之常虛則滯寒則凝自無而有
自微而著自閉塞以至於不通而痛矣 活人書

又曰或問既由無形之氣積久成疝為痛自應痛無
已時緣何亦有不痛之日以為散而不痛則能散

似無成疝之法以為不散則疝從何歸可以不痛

或有時止時發甚至終身不愈者亦由此氣時聚
時散之所致耶抑此氣暫時隱伏耶答曰若氣能

散能聚何由成疝惟其積而不散遂成爲痛爲硬
之勢但元氣之虛有輕重不同爲病亦有新久深

淺之異大約痛之緩急止發亦存乎其人之氣血
虛實而五臟有病有不病也

又曰或問今之所爲疝者必責之寒濕之氣但寒本
足太陽膀胱寒水受病濕乃足太陰脾經濕土用

傷醫大全 卷二十四 疝氣 李 顧氏秘書

事緣何又言足厥陰肝家之病既曰肝病則當責
之濕熱復與寒濕無干矣寧無說乎答曰五臟有

疝出於內經何得獨繫之肝况寒濕二氣鬱久皆
能化熱大凡五行六氣傳變自有不同學者當擴

克其義焉

又曰或問男子固有辜丸大小及小腸膀胱崑崙諸
氣爲疝者矣據云五臟皆疝則婦人亦當病疝疝

將何法以驗之而愈之耶答曰男婦一體五臟俱
各有疝外腎雖無而少陰厥陰之絡脉畢具治法

必依五臟男婦豈有別乎但碍於俗不敢直言耳
又曰或問疝為積氣所成五臟皆有積氣所成爲病
何獨此積又以疝稱也哉答曰聚而不散之爲積
積久而成高大之形爲疝前後似是而實非蓋五
積由乎本經之氣各因七情六鬱而成積而此症
不獨本經因虛自病且有感觸傳變之不同卽如
肺與肝腎無有不從內外感觸而發虛實傳變而
盛者也若正言疝已具七種之名已見醫統準繩
指掌諸書可以不贅今以五臟之疝詳列於後以

瘍醫大全

卷二十四

疝氣

李

顧氏秘書

詔後學 肺疝者或爲風寒深入肺俞冷飲寒氣
直達肺竅本經元氣素虧復爲寒邪所襲初由聚
而不散漸至積而成疝蓋肺症有三一曰肺痺痺
者閉也閉而不通似喘非喘咽噎不利者痺也非
疝也二曰息賁乃肺氣膈滿不能下降日久月深
胸中似有物碍氣道不利語言因之塞澁者息賁
也非疝也三曰肺疝疝則較前二症不同鼻息粗
暴呼吸短促胸膈與雲門中府之間梗塞爲痛者
疝也其名有三爲病亦不相遠惟氣口脉弦急有

力者當以疝治 心疝者心氣久鬱不舒積而成
疝正氣日衰結聚日盛稍有感觸窘迫而痛如割
如裂痛則四肢厥冷汗出如浴左寸關沉而弦急
者虛寒之疝也弦濇而數心煩嘈雜而痛者陰虛
內熱而氣鬱復兼火化也 脾疝者其濁氣自下
逆上連噎不寬脹滿作痛痛則嘔吐清水或苦水
痰涎之類其脉兩關弦急者爲實沉滑者爲虛
肝疝者陰囊赤腫堅硬而痛痛連兩胯小腹之間
以厥陰之絡絡於陰器也右關尺弦急而數兼有

瘍醫大全

卷二十四

疝氣

李

顧氏秘書

寒熱外症此濕熱之氣無由疎泄傳爲囊癰也若
婦人則有小腹脹痛兩胯間大筋偏墜及痛連腰
胯者甚有肝氣下陷戶中陰挺突出爲痛者濕熱
下陷傳爲陰戶掀腫發癢甚則生虫臊臭凡此皆
肝家積氣所化猶男子之疝者也其脉左關尺亦
有沉弦而數或弦急而數者 腎疝者大多縱慾
房勞之人稟氣先虧寒濕之氣得以乘之積久成
疝其痛自腰腎下連陰莖小便兼之淋濁艱澀其
脉微而濇或沉細而濡軟 肺疝以辛散之以苦

順之所爲分清也心病寒者治以溫散之劑熱者兼補兼清脾疝專於溫散若濕熱甚者必先化濕理痰肝疝必須升清利濁分清濕熱之氣腎疝當於溫補之中佐以分清之藥更當以古人之七疝參酌爲治尤爲詳盡無疑

又曰或問丹溪纂要一書爲世首推獨云疝主肝病與腎無涉况肝無補法故前人之治疝者多用苦辛之味以破氣散堅爲主今予主以參朮歸苓治疝已爲背謬而又立腎疝一門豈不與丹溪故爲

瘍醫大全

卷三十四

疝氣

李

顧氏秘書

矛盾耶答曰肝腎之有疝不獨本於內經卽今之患者了然有二蓋厥陰肝經之絡循環乎陰器上連小腹左右之旁以至乎脇下系外腎二子之根故肝疝有子脹偏墜痛連小腹之症若腎者開竅於前陰絡脉於兩腰其病則痛自陰莖上連腰腎者是也然而肝爲腎之子子能令母虛故肝病無有不補腎者母能令子實腎實則肝病無有不愈者况世之患疝由腎虛而致者尤多故治肝必兼顧腎治腎必兼顧肝又治疝之捷要不可不知也

余所以治肝疝之有餘者原不出乎踈泄溫散以

肝家之客邪有餘不得不由踈導而去之耳若病

久肝家之正氣自虛或有挾虛而發其脉不甚沉

急甚則空豁無方面青肢厥者苟非參朮補益而

兼用桂附溫補豈能獲效此正所謂補其母而子

自實之義也世俗苦執肝無補法之說但逢疝症

不分肝腎不論虛實過用尅伐豈知肝虛復益母

氣以自益而腎氣亦因之虧損故有肝病未已而

腎家虛寒之氣上衝心胃而危急者也此正所謂

瘍醫大全

卷三十四

疝氣

李

顧氏秘書

子能令母虛也昔仲景治寒疝腹中痛及脇痛裏急者用當歸生薑羊肉湯無不愈者豈非補肝之驗而王肯堂繆仲淳治疝氣上攻心腹窘迫者用八味地黃丸投之立應者又非補腎之一証乎甚有疝症大便不通者當利大便如許叔微羅謙甫皆用芫花是已小便不通者當利小便如許叔微治宋苟甫以五苓散是已若據纂要於腎經無涉則五苓不當用又言疝無下法則芫花不當用所列之藥及諸書所用七疝之方無非辛苦破氣寒

熱雜收既不能補肝腎之直陰又不能通利二竅使邪有所洩而徒耗其氣於冥冥之中豈不悖哉昔有久疝不愈只於每日空心以淡飛鹽滾湯漱口嚥下無遺不半年而愈永久不發蓋齒乃骨之餘夜臥口閉精氣聚於齒間而成垢以垢補腎正補之以屬也又補腎之一徵也

醫論選要曰夫疝氣者舉丸連小腹急痛也有七疝一曰厥疝謂厥逆心痛足寒飲食吐逆不下二曰癥疝腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂三曰寒疝

湯醫大全

卷二十四

疝氣

李

顧氏秘書

因寒飲食積脇下腹中盡痛四曰盤疝腹中氣痛盤結臍傍五曰氣疝腹中乍滿乍減而痛六曰附疝腹中臍下有積聚七曰狼疝小腹與陰相引而痛大便難此七疝之形症也又有所謂心疝饑疝疝瘳小腸氣膀胱氣奔豚氣橫疝疝疝偏墜木腎腎餘陰腫其名不同皆疝之類也原其所由未有不因七情四氣之所干也夫任脈為病男子內結七疝女子帶下癥聚河間以為聚寒丹溪以為濕熱無擇以為有寒有熱子和以為專屬厥陰肝經

觀內經所論則五臟皆有疝而太陽小腸膀胱與厥陰肝經為疝之主其氣相通連而外腎系於舉丸此三經乃相連相會者也蓋肝者筋之合也聚於陰器凡疝之發其部分故曰疝本肝經治法當以疎導為主或溫之或散之要在隨其各經之症施治則無不愈矣

古人用五苓散內加行氣之藥蓋猪苓澤瀉分理陰陽以和心與小腸之氣白朮既滲腰臍間濕與死血又助中氣以佐運行藥力扶苓淡滲而利膀胱

湯醫大全

卷二十四

疝氣

李

顧氏秘書

水桂能伐肝邪而溫散通行茴香治小腸之氣金鈴子橘核去膀胱之滯檳榔下氣開導少加木通以導小腸之火立方之工穩極矣蓋疝症未有不因內虛外襲然必先疏泄其氣所謂通則不痛若驟加補益攻心入腹變成危症

凡陰囊大而陰莖反縮於內小便淋漓行履滯礙乃膀胱氣也蓋腎與膀胱為表裡腎不能藏為邪所容遺於膀胱小便滲入腎囊耳宜滲利之有陰莖全縮不見而陰囊光腫不痛此因肝氣虛損不能

舒達也宜溫補之

回回俗善保養者無他法惟護外腎使不着寒見南人着夏布褲甚以為非恐涼傷外腎也又云夜卧當以手握之令煖謂此乃生人性命之根本不可不保護也 觚不觚錄

傷醫大全 卷二十四 痢氣 完 顧氏秘書

遊仙散 治一切痢症

草菓 九胡索 五靈脂 上沒藥 各分

共研極細末每服三酒下

又

茅蒼木 五倍子 各分 研細末每酒下二層不

可多服立愈如死亦生

疝氣神方

橘核炒

胡荽炒

吳茱萸炒

故紙炒

荔枝核炒

棗子炒

大茴香

小茴香

肉桂

木香

為細末酒糊

為丸赤豆大

空心鹽酒下

一百丸每不

效而愈外用

新棉花子

炒黑以開水

沖入瓦礫內

量後洗

疝氣偏墜門主方

茴香丸

治疝神效

白木

吳茱萸

橘核

研細煉蜜為九重一錢五分空心細嚼一九薑湯送下

湯送下

橘核消腎丸 濟生

傷醫大全 卷二十四 疝氣方 完 顧氏秘書

一切疝氣

海藻

昆布

廣木香

人參

肉桂

酒糊九桐子大每服六十九丸空心鹽湯或鹽酒任下

任下

消疝丸

白茯苓

荔枝核

枳實

山查核

八角炒

各一兩

各一兩

各一兩

各一兩

各一兩

各一兩

各一兩

各一兩

各一兩

各一兩

各一兩

橘核 鹽炒 藿香 各一兩 大茴

荔枝核 炒 青皮 醋炒 陳皮 各五錢

沉香 二錢 硫黃 三錢 酒煮

為末酒糊丸每服七十九空心溫酒鹽湯任下

崑崙丸

內消疝氣

橘核 鹽炒 川棟肉 鹽炒 香附 童便浸炒 各二兩

茅蒼木 炒 青皮 吳茱萸 鹽酒泡七次去苦水

檳榔 各一兩 玄胡索 枳實

瘍醫大全

卷二十四

疝氣方

圭

顧氏秘書

小茴 鹽水炒 廣陳皮 山查 各一兩

黃川椒 去目 木香 各五錢 肉桂 去粗皮一錢五分

右為極細末醋煮米糊為丸每服六七十九空心淡鹽湯下

心淡鹽湯下

海藻散堅丸

治木腎大如斗硬如石

海藻 洗 川棟肉 鹽水炒 昆布 洗

吳茱萸 鹽湯泡七次壓去 橘核 炒

海帶 洗 桃仁 熬炒各一兩 木通 七錢

荔枝核 打碎 青皮 醋炒 玄胡索 炒

小茴 鹽水炒 廣木香 肉桂 各五錢

研細酒糊為丸如桐子大每服六七十九空心淡鹽湯溫酒任下

疝氣

疝氣

核桃七個放燒餅爐上炙極脆連殼研極細末無

灰酒調服

又方

烏藥 六錢 天門冬 五錢

瘍醫大全

卷二十四

疝氣方

圭

顧氏秘書

水煎服

陰腫或偏墜腎子大小疼痛欲死者

木鱉子 一觔取肉 黃栢 芙蓉葉 各二兩

研細醋調敷立刻止痛

木腎

用艾葉不拘多少用瓦罐一個以好酒浸約淺罐

口半寸紗紫罐口凹下以糯米放在紗上文火煎

滾俟米熟成飯為度去飯埋土中三日去火毒取

起每用艾酒一茶碗沖白酒一茶碗頓服即效

陰丸腫大痛不可忍

川棟肉 小苗 各二錢 沉香

木香 大茴香 炒 食鹽

青鹽 各一錢 荔枝核 新者佳十四枚燒存性

研細末每服三錢空心熱酒調服

偏墜

大茴 葫蘆芭 山查

吳茱萸 官桂 橋核仁

小茴 青木香 枳實

瘍醫大全 卷二十四 疝氣 圭 顧氏秘書

荔枝核 各等分

研細末每服二錢溫酒調服

消疝丹

治小腸疝氣

白朮 荔枝核 炒 山查

小茴香 炒 研 枳 榔 木通

猪苓 崗橘子 昆布

白茯苓 海藻 官桂

澤瀉 川棟子 各等分

水二鍾煎一鍾食前洗浴溫服如房勞腎虛加人參五分

椒目丸

真川椒目不拘多少畧焙為極細末糊丸梧子大

每服二錢空心酒服初服有微汗久服諸疝皆消

葵花湯

膀胱有熱腹脹陰囊腫脹而痛小便不通

猪苓 葵子 滑石

赤茯苓 枳實 瞿麥

瘍醫大全 卷二十四 疝氣方 圭 顧氏秘書

木通 各二錢 車前子 一錢 黃芩 酒炒七分

炙甘草 六分

薑三片煎空心服

穿腸疝氣立刻住痛炙方

用手掐大敦穴一炷香之久即止如不止須灸三五壯 大敦穴在足大指端去爪甲如韭葉

偏墜不拘左右

川棟肉 鹽炒 蒼木 石菖蒲

大茴 廣木香 各等分

右為末水法疊九鹽豆大每服三錢空心淡鹽

葱薑湯送下安臥片時必得微汗立止

疝疾重墜如斗 張師正倦游錄

薏苡仁東壁土炒過水煮為膏服數次即消

斗大疝氣 孫真人

臭梧桐嫩枝葉酒拌九蒸九晒為末每服三錢空

心煖酒調下數日全消其皮垂下再用皮硝明礬

各等分煎水洗之即上

偏墜疝氣 凌氏

瘡醫大全

卷二十四 疝氣方

五

顧氏秘書

葫蘆巴半筋炒香研細每服三錢白湯調服安臥

片時數服即愈

通治五疝主方 活人錄

半 夏 三錢

陳皮 二錢

延胡索 一錢五分

川棟子

紫蘇葉

猪苓 各一錢

生姜三片水煎空心午前服

蓋人身管衛二氣與三焦之氣出入升降晝夜
循環無一息之停合於常度則何病之有苟失
其常致血脈稽留經絡閉塞因而臟腑不和三
焦不利變症無窮此六味固為治疝平劑其中
具有營運升降出入之用後復詳以對症加減
之法疝疝加桑皮杏仁各一錢五分枳殼一錢

去延胡川練如氣虛久病者加紫苑蘇子茯苓

各一錢五分人參車前各一錢減半夏二錢去

丹沉香淡痰丸虛則要玉膏金匱腎氣丸和中

益氣丸 心疝加丹參二錢石菖蒲當歸各一

錢益智仁五分去蘇葉猪苓減半夏二錢病久

氣血虛弱加當歸二錢茯神一錢五分人參二

錢遠志益智蒲各五分去蘇葉猪苓川練減

半夏二錢陳皮延胡各五分服寧志丸 脾疝

加山查肉二錢蒼朮一錢服香砂健脾丸 中氣

久虛加白朮二錢茯苓一錢五分砂仁一錢減

延胡川練陳皮各五分服冲和資生丸 三因中

和丸 疝疝加山查肉三錢柴胡一錢五分青

皮一錢五分或病初得或人壯實者服沉香化氣

丸如病久氣血虛或扶虛而發者其氣空弦瀆

弱或虛謬無力加當歸三錢白朮二錢人參茯苓

各一錢五分柴胡一錢減半夏二錢陳皮一

錢延胡川練各五分去紫蘇猪苓服雙補分消

丸婦人治法相同惟陰痿陰風諸症凡氣

實火盛二便秘結者服當歸龍薈丸清鬱丸血

虛氣滯鬱火下陷濕熱不清者服加減逍遙散

分去蘇葉半夏減陳皮一錢服分消丸如房勞

不足腎家氣血兩虧者加當歸二錢人參澤瀉

雙補分消丸 活人錄

治肝腎之氣血兩虧以致沉寒不散濕熱不清

畢九冷脹陰囊腫大者此丸久服兼補兼消

山梔仁 香附 川椒子 山查

陳皮 烏練子各一兩 橘核 茯苓

當歸 白木各二兩

陳米炒熟為末醋湯打糊為丸每早空心百滾湯吞服二錢

偏墜

地膚子 橘核 升麻各等分

研末每服一錢空心滾酒調下不愈再一服

疝氣筆峯雜典

大茴 小茴各一兩

瘍醫大全 卷二十四 疝氣方 圭 顧氏秘書

猪尿胞一具裝藥砂罐內加酒煮爛連胞搗丸

梧子大白湯送下三十丸

水疝秘方

即木腎凡人心火下降則腎水不患其不溫且陽下行則腎氣不患其不和溫且和安有所謂木強者哉木強則傷腎矣故不可純用燥藥當用溫和散利以逐其邪則邪自消榮衛流轉則愈宜服枸杞丸

甘枸杞 昆布 吳茱萸

天南星炮 半夏 白芷

山查肉 神麴炒 滑石炒

蒼木鹽炒 黃栢酒炒各三兩

磨末酒和丸梧子大每服七十九空心鹽湯下

秘方

陳香櫟核焙脆研細每服二錢熱酒調下取汗

疝氣並治諸氣痛神方周鶴仙

荔枝核四十九個燒焦 陳皮九錢 硫黃四錢

共為末鹽水打麵糊為丸如菜豆大遇痛時空

瘍醫大全 卷二十四 疝氣方 圭 顧氏秘書

心溫酒服九丸良久再服不過四五服奇驗

又方

梔子炒黑 吳茱萸各一錢二分 枳殼

山查各一錢六分 牛膝 木通各一錢

荔枝核七個長流水全煎服

疝氣

荔枝七個殼上開一口入鹽令滿濕紙包灰火烘乾燥 研細空心酒調服

腎子大小

吳茱萸七粒熱酒吞下

偏墜

紫蘇 連鬚莢 玉葡萄藤

煎湯薰洗

小腸疝氣偏墜

荔枝核 七個草紙打濕煨焦 研末熱酒調服

偏墜

野馬料豈生用每早淡鹽湯送下久服自消

疝氣

大蒜梗煎湯入罐內薰之自愈

湯醫大全

卷二十四 疝氣方 堯 顧氏秘書

偏墜疝氣

五去風 即五椋子五六個煨灰存性研末 好酒調服以醉俟醒時

即愈

囊子大

九孔石決明煨研生薑汁調敷即消

偏墜

楠核 三十粒 荔枝核 火煨 大荷 各二錢

小荷 一錢

共為細末生酒調服蓋煖取汗

偏墜

麥珠炒香研細每服三錢熱酒調服小兒即放在糕內食之亦效

疝氣

除夕夜躲大門背後喫小紅橋七枚連皮瓢子嚼下勿與人知永不再發

導氣湯

治寒疝疼痛

木香 三錢 茴香 二錢 吳茱萸 一錢五分湯泡

湯醫大全

卷二十四 疝氣方 全 顧氏秘書

川棟子 四錢

長流水煎服

烏藥散

治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

木香 茴香 良薑 炒

青皮 去白 檳榔 烏藥 姜酒浸一宿各五錢

川棟子 十個用巴豆七十粒打碎同炒川棟子黑色去麩與巴豆只用川棟子

為末每服一錢溫酒調下痛甚者炒生薑熱酒服

陰丸腫大痛不可忍

沉香

大茴香炒

木香

青鹽

食鹽各一錢

新荔枝核十四枚燒存性

川棟肉

小茴香各二錢

為末每服三錢空心熱酒調服

當歸四逆湯

當歸尾七分

熟附子

官桂

茴香炒

柴胡各五分

赤芍藥四分

延胡索

川棟子

茯苓各三分

湯醫大全

卷二十四 疝氣方

全

顧氏秘書

澤瀉二分

水煎空心服

木香棟子散

疝氣久不愈者服之神效

石菖蒲炒

青木香炒各一兩

荔枝核二十枚炒

川草薢五錢

川棟子三十個巴豆二十枚同炒黃赤色去巴豆不用

為末每服二錢入麝香少許空心炒茴香鹽酒

調下

羊肉湯

治寒疝腹痛裡急

羊肉一觔

當歸三兩

生薑五兩寒者加用

水八碗煮取三碗溫服一碗一日飲盡

疝痛氣衝心下築塞欲死手足冷者

硫黃

不拘多少火中鎔化即投水中去毒

荔枝核

橘核炒黃

陳皮焙燥各等分

為末飯丸桐子大每服四五丸酒下甚者六七

丸不可多也

寬脹散

湯醫大全

卷二十四 疝氣方

全

顧氏秘書

婦人陰疝

檳榔

官桂

木香

大腹皮

沉香

青皮各一錢

香附

小茴香各一錢五分

薑引煎服

青木香丸

治腎冷疝氣脹疼

吳茱萸一兩分作二分酒醋各浸一宿焙乾

香附一兩

葶澄茄

青木香各五錢

為末米糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯下
或乳香茛白湯亦可

疝氣腫墜疼痛

猪脬一箇去尿以小茴香大茴香破故紙川棟子
各等分填半滿入青鹽一塊縛定好酒煮熟先食
猪脬以酒下之將內藥焙乾為末酒糊丸桐子大
每服五十九空心溫酒或鹽湯下

甘草黑豆湯

解百藥毒兼治筋疝莖中痛脹不堪春方邪術

湯醫大全

卷二十四

疝氣方

全

顧氏秘書

所致

甘草稍 二兩

黑豆 半升

水煎服

葫蘆巴丸

治大人小兒盤腸奔豚疝氣偏墜陰腫

葫蘆巴 炒一

茴香 炒十

吳茱萸 湯洗七次

川棟子 炒十

川烏 泡去

大巴戟 去心炒

為末酒煮麩糊為丸桐子大每服十五丸空心
溫酒下小兒五丸茴香湯吞下一方加黑牽牛

偏墜初起

穿山甲茴香二味為末酒調下乾物壓之外用煨
牡蠣高良薑等分為末津調塗於腫大之處須臾
火熱其痛即安

肥人腫疝寒熱

五苓散加茴香煎服神效

木香金鈴丸

疝氣外腎腫痛如神

木香

大附子 泡去

人參

湯醫大全

卷二十四

疝氣方

全 顧氏秘書

小茴香 鹽水

乳香

延胡索

全蝎

川棟子 去核

沒藥 各等分

為末好酒為丸桐子大每服一百丸空心黃酒
下其痛即止

神妙丸

治疝氣小腸氣膀胱氣盤腸氣木腎氣及偏墜

下部等症

沉香

吳茱萸 鹽酒

橘核

乳香 各一

木香

荔枝核 搗碎炒

大茴香 各一錢 硫 黃 鎔化傾入水取

川 芎 鹽水煮透取 起切片五分

為末酒九每服五十九空心米湯下

香棟酒

治偏墜氣

南木香

川棟肉

小茴香

大茴香 各三錢

右作一服鍋內炒至香入芎白連鬚五根用水

一碗滓入鍋內以碗合住候煎至半碗取出去

湯醫大全

卷二十四 疝氣方 全 顧氏秘書

渣加好酒半碗和入炒鹽一茶匙空心熱服至

痛者一服立愈

金鈴子丸

治釣腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川棟子

五兩剉作五分製 一分用斑猫一箇去

頭翅同炒去斑猫 一分用茴香二錢鹽

五分炒熟去鹽留茴香入藥 一分用黑

牽牛三錢同炒去牽牛 一分用破故紙

三錢同炒留故紙入藥 一分用蘿蔔子

一錢同炒去蘿蔔子

右將棟子去核同破故紙炒香焙乾為末酒糊

丸桐子大每服三十九溫酒空心下

陰器部

自婦女前陰瘡膿菌挺一切皆彙於此部中以便檢

閱參治

湯醫大全

卷二十四 陰吹 全 顧氏秘書

陰吹門主論

金匱云胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣既不能上升

清道復不能循經下走後陰陰陽乖僻如腸交之

義是也甚或簌簌有聲如後陰之失氣狀宜補中

益氣湯加五味子主之

見開隨錄云產婦不得食葱如悞食之必成陰吹

陰瘡門主論

王肯堂曰陰器屬足厥陰肝經任脈之會準繩

又曰運氣陰瘡皆屬寒經云太陽之濕陰中乃瘍隱曲不利治以苦熱是也

素問云厥陰之脈絡陰器繫於肝

又云督脈者其絡循陰器合其間是也至於足太陽

外合清水內屬膀胱而通水道手太陽外合淮水

內屬小腸而水道出焉則又屬手足太陽也腎主

水則又屬足少陰也飲入於胃游溢精氣上輸於

瘍醫大全 卷二十四 陰瘡 七 顧氏秘傳

脾胃氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則又

屬手太陰也素問又謂前陰者宗筋之所聚太陽

陽明之所合則又屬脾與胃矣癰瘡生其間須細

心求而責之不可專主一厥陰肝經而惟清肝導

濕之為事斯無悞矣

靈樞云筋者聚於陰器而脈絡於舌本肝者筋之會

也又屬督脈

張仲景云少陰脈滑而數者陰中即生瘡陰中蝕爛

者狼牙湯洗之用狼牙二兩以水四升煮至半升以綿纏筋如繭浸湯濕陰中繭三

通

岐天師曰大約暗疾婦人十居其九或生於兒門之

外或生於兒門之中止可陳說然猶有羞愧而不

肯盡言者止可意會而默思之也大約兒門之病

非癢則痛當以默治湯主之此湯皆是平肝去濕

之品毋論有火無火有風有濕俱奏奇功正不必

問其若何癢若何腫若何痛若何爛也秘錄

陳實功曰婦人陰瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下

注為患形多不一總由邪火所化也正宗

瘍醫大全 卷二十四 陰瘡 八 顧氏秘傳

薛立齋曰陰戶毛際正中發毒名曰陰蓋毒紅腫疼

痛此乃肝火鬱結而成治當清肝養血外用敷消

如已成膿治同癰疽法

又曰陰戶一邊結腫亦有兩邊結腫其形如繭名曰

陰繭內膿成自潰頭得之於肝火濕熱或新婚傷

損或交合不潔染毒均能成之

又曰陰戶內子宮腫痛潰爛名廷孔毒肝火鬱結者

重交合所傷者輕俱用海浮散油調灌入仰臥良

久後換玉紅膏調海浮散以綿潤透插入白效

陰瘡門王方

陰戶潰爛 寶氏

兒茶 雞內金 各一錢 輕粉 五分

冰片 三分

研細乾摻

婦人陰瘡

杏仁不拘多少燒存性麝香少許細細研勻如瘡

口深用小絹袋盛藥繫口炙熱納陰戶內

津調散 錦囊

瘍醫大全

卷二十四

陰瘡方

全

顧氏秘書

治妬精婦人陰濕瘡膿汁淋漓臭爛

黃連 欬冬花 各等分 麝香 少許

研細末先用沐浴長春散煎洗軟綿拭乾津調

搽之忌用生湯洗

默治湯 岐天師

當歸 一兩 白茯苓 白芍 各五錢

梔子 三錢 柴胡 一錢 棟樹根 五分

水煎服 有痰加白芥子 有火加黃芩

有寒加肉桂 餘不必加

化毒生肌散 雷公

治產門外生瘡久不愈兼治一切瘡毒神效

黃柏 炒 白薇 炒 鉛粉 炒

兒茶 蚯蚓屎 炒 潮腦 各三錢

乳香 去油二錢 麝香 三分 輕粉

冰片 各五分

研細摻瘡口二日即愈

瘍醫大全

卷二十四

陰瘡方

全

顧氏秘書

陰匿門主論

陳寶功曰婦人陰戶生蟲蠱如小蛆者乃心氣鬱而邪火所化正宗

又曰又有婦女久居寢室淫火妄而又鬱鬱而又妄

邪火久注多致陰中作癢生蟲食入內臟陰中腐

爛攻刺疼痛臭水淋漓口乾發熱形削不食咳嗽

生痰有此證者非藥能愈終歸於死此又名失合

證與癆瘵相似正宗

又曰陰匿瘡宜四物湯加黃連龍膽草木通石菖蒲

湯醫大全 卷二十四 陰匿 李 顧氏秘書

以通散心竅鬱滯外以銀杏散納入陰中

又曰陰器外生疔瘡內生細虫作癢不可忍者此蟲

食人臟腑即死令人多發寒熱與癆瘵相似畏羞

不說因循日久面黃肌瘦咳嗽生痰往往不治者

多矣急與逍遙散吞蘆薈丸外以銀杏散綿裹塞

入殺蟲止癢半月漸愈

又曰陰器內生紅蟲長者一寸短者五六分

治法宜歸脾湯加山梔白木牡丹皮甘草主之

寶漢卿曰婦人之性多偏而多鬱若有不遂則心肝

胃三經之火勃然而起遂致陰內生瘡或生疔瘡或生翻花瘡陰中極癢名蠱瘡又名陰蝕瘡極痛極癢狀如蠱行淋漓膿汁皆由濕熱與心火相擊而生

李東垣曰婦人陰蝕瘡乃腎臟虛邪熱結下焦經絡

痞澁氣血不行或房慾洗浴不潔以致生瘡隱忍

不醫焮腫尤甚因瘡在裏措手無方疼痛注悶或

小便如淋或經十數日潰爛膿血肌肉侵蝕或血

出不止以成下疳男子則陰丸腫潰十書

湯醫大全 卷二十四 陰匿 李 顧氏秘書

張景岳曰陰蝕患於陰戶之中一癢則酸麻徹骨一

痛則痛楚連心良由產後保護不慎以致風寒內

逼臨經調攝失宜致延濕熱中生新產未曾滿月

交接房勞經血不曾乾淨滯慾所傷或惹疔瘡或

因肝鬱是以子宮生蟲作癢潰流穢水失治則子

宮散而陰戶脫矣宜用鷄肝散絲瓜散插之草蓆

湯洗艾葉散薰

陰贖門主方

產門内生蟲 華真人

用雞肝一副以針刺無數孔納入產門內則蟲俱
鑽入雞肝之內矣三副全愈不必添入藥味也止
要刺孔甚多則更有入路三副後再服去濕化痰
湯

去濕化痰湯

白朮

白芍

當歸各五錢

白茯苓

澤瀉

黑山梔

湯醫大全

卷二十四 陰贖方

全

顧氏秘書

生甘草

各三錢 陳皮五分

水煎服四劑再不發

雞肝散

蕪荑

蛇床子

硫黃

川椒

潮腦

枯礬

雄黃

海螵蛸

黃連 各等分

麝香

少許

共研細末取旋宰雞肝一具將藥末塗肝上乘
癢時插入陰戶內

絲瓜散

蕪荑

蛇床子

硫黃

潮腦

枯礬

川椒 各等分

共研細末用鮮絲瓜 刮去皮 一段將藥末厚塗絲
瓜上推入陰戶內

艾葉湯

艾葉

苧麻葉

槐葉

柳葉

白芨

防風

白芷

升麻 各等分

湯醫大全

卷二十四 陰贖方

全

顧氏秘書

右晒燥為粗末入麝少許以器貯馬桶內點着
今患者坐馬桶上遮緊勿走烟薰兩個時辰

草麻湯

扁柏葉

槐葉

青蒿葉

柳葉

草麻葉

桃葉

金銀花

艾葉 各等分

煎湯薰洗

陰戶生黃臭水甚痛

蠶繭二三錢燒存性研細酒調以鴨毛掃上即效

陰菌門主論

陳實功曰陰菌形如雞冠四邊腫痛為肝鬱脾虛
寶漢卿曰陰中腫塊區如草者名陰蕈陰菌如棗核
者名陰茄皆由濕熱與心火相擊而生惟陰茄難
治性氣和緩之婦胸次坦夷服藥易愈若性急悍
妬之婦習與性成服藥百貼方愈必須忌口絕慾
戒性為要治當補心養胃為主

馮晉瞻曰陰中突出如菌四圍腫痛便數瞞熱似癢
似痛小便墜重此肝火濕熱而腫痛脾虛下陷而
瘍醫大全 卷二十四 陰菌 五 顧氏秘書

重墜也先以補中益氣湯加山梔茯苓青皮以清
肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱外以生
豬油和葱蘆末塗之而收 錦囊

又曰或歸脾湯加山梔川芎茯苓神香附陳皮治之
朱丹溪曰陰茄乃生產未曾滿月因取重物膀胱墜
下若是紅茄紫茄可治白茄不治

陰菌門主方

雄黃葱蘆散

婦人陰中突出如蛇或似雞冠菌樣者並治

驚頭煨黃 輕粉 雄黃各一錢

冰片二分 葱管葱蘆二錢研如細麵

以上各研細末和勻再研磁瓶收貯先用芎歸
湯薰洗隨後搽藥早晚二次其患漸收

芎歸湯

當歸 龍膽草 白芷

瘍醫大全 卷二十四 陰菌方 五 顧氏秘書

川芎 甘草各一錢

煎湯浴洗患上隨後搽藥

婦人陰中忽生雞冠肉並生瘰癧方

龍膽草酒拌炒 犬黃 澤瀉各一錢

生地 黑山梔 車前子

木通 當歸 甘草

黃芩炒各五分

水煎服

陰茄

硫黃五分 海螵蛸二錢

研細用鴨蛋清調搽



傷醫大全

卷二十四

陰挺方

生

顧氏

陰挺門主論

陳功實曰陰挺一條如蛇墜重流水溺澀為脾氣下

陷肝火從之 正宗

馮魯瞻曰陰挺逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水

續續小便淋瀝宜內服升補外以硫黃烏賊骨五

味子為末敷之 錦囊

又曰陰中肉肉凸出如蛇頭數寸者名翻花瘡用硫

黃末敷之即縮

注省之曰陰挺宜朝進補中益氣湯晚服龍膽瀉肝

傷醫大全

卷二十四

陰挺

朱

顧氏秘書

湯外塗雄黃藜蘆散其患漸收 理例

寶漢卿曰補心養胃為主

朱丹溪曰子宮脫出名陰癩俗名癩葫蘆由氣血俱

虛所致宜補中益氣湯去柴胡倍升麻加益母草

服之外以草麻子肉搗貼頂心以枳殼半煎煎湯

薰洗

又曰如思慾不遂肝氣鬱結而成者必先於小便時

似有堵塞之意因而努拚久之子宮隨努而下速

令穩婆扶正癩葫蘆患婦仰臥以枕墊腰用噎藥

取嚏即收收入即緊閉陰戶隨以布帛將腿縛定
服補中益氣湯

薛氏曰陰挺下脫牽引腰腹膨痛者或因胞絡傷損
或因子臟虛冷或犯非理房事或因分娩用力所
致當以升補元氣為主若肝脾鬱結氣虛下陷補
中湯若肝火濕熱小便赤澀龍膽湯

湯醫大全

卷二十四

陰挺

李

顧氏秘書

陰挺門主方

道遙散 林氏活人錄
彙編加減法

肝脾血虛發熱或潮熱晡熱或自汗盜汗或頭
痛目澀或怔忡不寧或頰赤口乾或月經不調
肚腹作痛或小腹重墜水道澀痛或陰挺突出
為痛或陰戶焮腫發癢陰臭陰虱或腫痛出膿
內熱作渴等症

當歸 白芍 白朮

白茯苓 柴胡 各一錢 粉丹皮

湯醫大全

卷二十四

陰挺方

顧氏秘書

山梔 炙甘草 各五分

水煎午後臨睡服

道遙者乃輕揚消散之義蓋肝脾血虛氣鬱以
致熱鬱於內不得舒泄甚至鬱陷於下焦積久
而成發熱則照前方如脈虛數無力則加
人參一錢生地一錢五分當歸五分減柴胡五
分生地一錢五分麥冬一錢五分去柴胡則加
參一錢五分麥冬一錢五分去柴胡則加
痛目澀加當歸一錢熱地二錢川芎薄荷各一
錢怔忡不寧實則加生地一錢五分人參麥
冬各一錢當歸五分減柴胡五分目赤口乾
則加生地一錢五分麥冬一錢白芍五分黃連
五分乾葛粉一錢虛則加熟地三錢麥冬一錢
五分人參一錢五味二分當歸白芍各五分減

柴胡五分 月經不調 肚腹作痛 實則加山查
 三錢 建胡二錢 蘇梗當歸各一錢 虛則加熟地
 三錢 當歸川芎各一錢 白芍五分 人參延胡各
 一錢 滋痛實則加澤瀉五分 去山梔 小腹重墜水
 道各一錢 實則加黃連五分 虛則加熟地二錢 當
 冬各一錢 肉桂各五分 人參黃芪各一錢 升麻三
 分 減柴胡五分 去丹皮山梔 陰挺突出乃肝
 經虛氣挾濕熱之氣下陷也 即前方加人參一
 錢 黃芪一錢 五分 白朮二錢 防風當歸白芍一
 錢 丹皮各五分 升麻三分 其餘燉腫至作渴
 等症皆濕熱有餘 隨氣下陷之故 加防風車前
 杜仲各一錢 金銀花三錢 黃連當歸
 白芍茯苓白朮丹皮山梔各五分

傷寒大全 卷二十四 陰癢 顧氏秘傳

陰癢門主論

陳實功曰 產後交骨未合 驟為風所侵 作癢 正宗

又曰 陰戶作癢 四邊黃泡 乃風濕下滲 用苦參金銀

花甘草白芷蛇床子煎湯薰洗

又曰 有抓之血出不痛者

澄曰 婦人陰戶作癢 乃肝脾風濕流注 亦有肝火鬱

結而成

馮曾瞻曰 陰癢陰瘡 多屬蟲蝕 所為始因濕熱 故生

三蟲 在腸胃間 因臟虛 乃動其蟲 侵蝕陰中精華

傷寒大全 卷二十四 陰癢 顧氏秘傳

故時作癢 甚則痛癢 不已潰爛 成瘡 在室女寡婦

尼姑多犯之 因積想不遂 以致精血凝滯 釀成濕

熱 久而不散 遂成三蟲 癢不可忍 深入臟腑 即死

令人發熱 惡寒 與癆相似 亦有房室過傷 以致熱

壅 腫癢內痛 外為便毒 莫不由慾事傷損 肝腎腎

陰虧 而肝火旺 木鬱思達 肝經鬱滯 之火走空竅

下下注 為癢 為蟲 當用龍膽瀉肝湯 逍遙散 以主

其內外 用蛇床子煎湯 薰洗 再以龜仁研膏 和雄

黃末 雞肝研餅 納陰中 以制其蟲 若肢體倦怠 陰

中悶癢小便赤澀者歸脾湯加山梔白朮甘草丹
皮若徒以濕熱為事燥濕清熱則氣血日衰所害
不止陰癢矣

易醫大全

卷二十四

陰癢

草

顧氏秘書

陰癢門主方

陰戶作癢

取淨桶內置瓦一片以破布燒烟薰之

銀杏散

婦人濕熱下注陰中作癢或內外生瘡

杏仁 去皮尖 水 銀 鉛製 輕 粉

雄 黃 各等分

研細和勻每用五分棗肉一枚和丸用絲綿包

裹留一綿條撚線在外先用塌癢湯煎洗將藥

易醫大全

卷二十四

陰癢方

草

顧氏秘書

毯納入陰戶留線在外恐小便取出再入二日

一換重者用四五枚痊愈仍宜兼服煎藥

塌癢湯

鶴虱草 一兩 苦 參 威靈仙

歸 尾 蛇床子 狼 毒 各五錢

用河水十碗煎數滾濾清貯盆內乘熱先薰後

洗臨洗和入公猪膽汁二三枚同洗更妙

陰癢生瘡

紫稍花一兩胡椒五錢煎湯溫洗數次

陰癢三蟲作祟

大黃微炒 黃芪蜜炙 黃芩各一兩

山萸肉 元參 蛇床子

丹參 赤芍各五錢

共為末每服貳錢食遠溫酒調服

陰戶癢極難忍

用鹽塗之即止

陰癢生瘡

蛇床子三錢 杏仁炒研 白礬各五錢

湯醫大全 卷二十四 陰癢方 煎洗 顧氏秘書

煎洗

又方

蛇床子一兩 花椒 白礬各三錢

煎洗

又方

蛇床子一兩 艾葉 五倍子

明礬 杏仁各五錢 川連三錢

煎洗

陰戶腫突門主論

陳實功曰陰戶忽然腫突作痛乃勞傷血風濕火下流正宗

又曰亦有陰戶半邊痛者

又曰治當四物湯加丹皮澤瀉柴胡花粉

朱丹溪曰陰戶忽然腫而作痛者名曰陰腫又名蚌

疽由勞傷血分所致宜四物湯加牡丹皮澤瀉柴

胡天花粉煎服外用艾葉一兩防風六錢大戟五

錢煎湯薰洗

湯醫大全 卷二十四 腫突 顧氏秘書

馮魯瞻曰婦人陰腫有因胞絡虛損風冷客之與血

氣相搏而腫者有因鬱怒傷損肝脾者有因房勞

過度濕熱下流者有慾勝而熱甚生蟲以致腫癢

並作者皆宜戒房室而速治之否則邪氣漸盛陰

戶潰爛不收矣若氣血虛弱補中益氣湯舉而升

之肝經濕熱龍膽瀉肝湯滲而清之肝脾鬱怒元

氣下陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加升柴解鬱結補

脾氣夕用加味逍遙散清肝火生肝血除熱去濕

陰戶腫突門主方

陰戶疼痛

鹽三合炒熱包熨之立止

婦人陰中腫痛及生瘡精生

黃連酒炒二錢 龍膽草酒洗 小柴胡去蘆根一錢

青皮三分

水煎服腫甚加大黃一錢

子宮大痛不可忍入門

五倍子 白礬各等分

傷醫大全 卷二十四 陰戶腫方 煎湯洗之為末參之

煎湯洗之為末參之

產後陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸入門

用四季芎入乳香末同搗成餅安於陰戶兩傍良

久即愈

產戶硬如石表若撞着痛不可忍

青魚膽七個或鮑魚膽七個亦可 絲綿三錢燒存性

以膽汁調勻鴨毛掃上其硬不過半個時辰即

軟

陰戶腫痛

大戟一兩 坊風二兩 艾葉五錢

煎湯熱洗避風外以鯽魚膽汁搗之

傷醫大全 卷二十四 陰戶腫方 煎湯洗之為末參之

陰脫門主論

經曰前陰所過之脉有二一日肝二曰督脉足厥陰之脉入毛中過陰器抵少腹是肝脉所過也督脉起於小腹以下骨中央女子繫廷孔循陰器男子循莖下至纂與女子等是督脉所過也

馮魯瞻曰產後陰脫者多由婦人生產用力太過致陰下脫宜內服升補為主 錦囊

丹心云陰戶脫出蓋因努力太過所致若脫肛狀逼迫腫痛清水續續小便淋瀝宜當歸黃芪飲

傷醫大全

卷二十四

陰脫

東

顧氏秘書

陳實功曰陰脫乃陰戶開而不閉癢痛出水乃憂思太過所致宜逍遙散歸脾湯俱加柴胡山梔白芍牡丹皮外用荆芥枳殼訶子五倍子大劑煎洗

正宗

陰脫門主方

當歸黃芪飲 丹心

治陰脫

黃芪 酒炒三錢 當歸 人參

升麻 各二錢 甘草 一錢

水煎服

外治 丹心

碗黃 烏賊骨 各五錢 五倍子 二錢五分

研細敷患處即效

傷醫大全

卷二十四

陰脫方

東

顧氏秘書

產後生腸不收 丹心

八物湯加防風升麻須用酒炒黃芪為君煎服外

以枵根白皮五錢荆芥升麻藿香各二錢煎湯薰

洗患處即入

又方 丹心

枳殼二兩煎湯溫浸良久自入

又方 良方

取大紙燃蘸油點火吹滅以烟薰產母鼻即上

產後陰戶突出 入門

用四物湯加龍骨或五倍子連服二貼外以香油和湯洗患處

硫黃湯 正傳

治產後玉門不斂

硫黃 四兩 吳茱萸

兔絲子 各一兩 五錢

蛇床子 一兩

共研末每用五錢水一碗煎湯乘溫頻薰洗自斂

又法

丹心

瘡醫大全

卷二十四 陰脫方

重

顧氏秘書

香油五觔煎熱盛盆坐其中一食頃以皂角末吹

鼻作嚏即收

產後用力太過陰門突出

當歸

川芎

赤芍

熟地

水煎入龍骨末少許和勻連服二劑外用麻油

和湯薰洗即收

產婦陰戶傷損門主論

澄曰凡產婦陰戶或一邊焮腫或兩邊均腫難以起坐更有陰戶兩端爛破出膿痛引小腹兩股皆由分妣艱難或是息胎穩婆用手分理骨眼或用手伸入搯取胎胞粗手指甲抓損皮肉而成殊不知產戶皮嬌肉嫩何堪經此再加瘀血淋漓愈淹愈爛况陰戶乃肝脾腎衝任脉絡之地既破之後所以牽引少陰腰股作痛也宜用洗藥煎洗破處用玉紅膏珍珠散搽之自愈

瘡醫大全

卷二十四

陰戶傷損

顧氏秘書

產婦陰戶傷損門主方

陰戶腫痛

枳殼一兩煎洗

陰戶腫潰

當歸

赤芍

白芷

甘草

苦參

各等分

煎湯洗

產婦陰戶腫痛

蛇床子

三錢

白蘿蔔

五個

煎湯黃洗

傷醫大全

卷二

陰戶傷損

一頁

顧氏秘書

陰戶開張門主論

陳實功曰陰戶開而不閉者乃憂思過度証

又曰治當逍遙散歸脾湯加柴胡山梔白芍

藥牡丹皮間服

女子新嫁陰戶痛門主論

陳實功曰新嫁傷而腫痛者宜舒鬱和血

馮魯瞻曰新嫁孔痛宜四物湯加香附紅花主之

錦囊蔣示吉日新交房事傷而腫痛者

珍珠散猪春髓調搽說約

陰冷門主論

馮魯瞻曰婦人陰冷因勞傷子臟風冷客之若小便

澀滯小腹痞痛宜龍膽瀉肝湯若小便澄清飲食

少思大便不實治以八味地黃丸八味丸治血弱不能

榮養臟腑津液枯澀寒客子臟陰冷者甚效鄧囊

實女無寢門主方

無寢

以鉛作槌逐日經之久久自開能入內故也

陰戶交接出血門主論

傷醫大全

卷三

陰戶開張

一頁

顧氏秘書

陳實功曰婦人交接出血者乃肝虛有火不能藏血

脾虛不能攝血當以補中益氣歸脾二湯主之証

又曰或用四物湯加龍膽草柴胡山梔黃芩治之

馮魯瞻曰凡交接出血者此肝火太旺而疎泄過度

且肝虛不能藏血脾虛不能攝血也宜補中歸

脾二法消息用之若六脉俱洪者此腎陰虛而不能

閉藏也宜六味湯加麥冬五味主之錦囊

瘍醫大全目錄

卷二十五

腿膝部

骨痿瘡門主論

腿遊風門主論

肚門癰門主論

上水魚門主論

黃鰓癰門主論

大腿癰門主論

瘍醫大全

卷二十五 目錄

一 顧氏秘書

附骨疽門主論附方

多骨疽門主論附方

咬骨疽門主論

箕門癰門主論

肉蜈蜂門主論

玄疽門主論

陰疽門主論

膝蓋癰門主論

膝眼毒門主論

膝眼風門主論

鵠膝風門主論附方

小兒鵠膝門主論

人面瘡門主論附方

骨槽疽門主論

伏兔癰門主論

下石疽門主論

綏疽門主論

下疽瘡門主論

瘍醫大全

卷二十五 目錄

二 顧氏秘書

委中毒門主論

四灣風門主論

流火門主論附方

腓脛部

三里發門主論

合陽疽門主論

脚氣瘡門主論

膝瘡門主論附方

血瘋瘡門主論附方

血槽風門主論

濕腫門主論 附方

腎臟風痞門主論 附方

濕毒流注門主論 附方

附陰疽門主論

瓜藤纏門主論

接骨發門主論

黃魚癰門主論

龜漏門主論

癩

青蛇便門主論

魚肚癰門主論

腔疽門主論

腓膈疽門主論

瘍醫大全卷二十五

蘇湖顧世澄錄江氏纂輯 增錢之栢東楊 男樞燮用和

腿膝部


自膝至腿膝灣止一切癰疽疔毒皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷二十五 骨痿瘡 一 醫氏秘書

骨痿瘡門主論

申斗坦曰骨痿瘡乃足少陽膽經多氣少血其瘡生於兩膝骨上漸大筋骨俱痛廢開流水水盡則死如膝間相對生瘡者十無一生用夫馬鹿勃熬熟睡莫令磨着內服補中益氣湯啟玄



瘍醫大全

卷二十五

二 顧氏秘書

腿遊風門主論

王肯堂曰腿遊風腿股忽然赤腫風熱相搏屬足太

陽經宜砭去惡血準繩

心法曰腿遊風在兩腿忽裡忽外忽上忽下不定紅
色形如堆雲焮痛由榮衛風熱相搏結滯而
成凡遇此證先施砭石砭去惡血外貼牛肉片以
拔風甚效

肚門癰門主論

心法曰肚門癰生於大腿肚屬足太陽膀胱經所主

瘍醫大全

卷二十五

肚門癰

三

顧氏秘書

上水魚門主論

心法曰上水魚生委中摺紋兩稍腫如高埂長若魚形色紫作痛由血熱遇外寒稽留則血瘀凝結而成外宜向腫埂上砭出惡血用二黃散即顛倒散香油調敷甚效

傷醫大全

卷二十五

上水魚

四

顧氏秘書

黃鰵癰門主論

申斗垣曰黃鰵癰生於大腿外側連醫處有一條如鰵形深陷窄長或不見紅腫堅硬如石約長七八寸大者為頭小者為尾鰵頭向上者防毒內攻小腹難治鰵頭向下毒雖凶不傷命名為順症凡醫必尋其頭用三稜針先針住鰵肚次針鰵尾再用小針針住鰵頭兩邊當用艾灸三十壯左右轉針先起尾針視鰵形不動是鰵已死如動再依前法灸之內服內托流氣飲或真人活命飲外以薑汁猪膽汁好醋全調鉄箍散敷之啟玄

傷醫大全

卷二十五

黃鰵癰

五

顧氏秘書

心法曰黃鰵癰生小腿肚裏側硬腫長有數寸形如泥鰵其色微紅由肝脾二經濕熱凝結而成如期潰出稠膿者吉如潰流污水敗漿者凶治同癰疽全鑑

王肯堂曰脛陰疽又名黃鰵癰生足小肚內側微紅微腫堅硬如石三四寸許痛楚難禁足太陰與足厥陰二經濕熱又積憤所致若過時潰出清水虛火上升嘔吐不食者不治準編

大腿癰門主論

陳遠公曰有腿上忽腫一塊其色如常不疼人以爲癰疽也誰知氣虛之故乎夫癰成于腫未有腫而不變爲癰者予謂氣虛非癰人誰識之嗟乎氣所以行血者也氣行則血行總有邪氣斷難成腫彼邪氣之盛每成于氣血之衰其腫爲癰每每作痛色必變紅赤也今既不疼色又不變是有腫之名無腫之實全是氣虛血無以養非邪盛而氣不能鼓也治法補氣以扶正不必化毒以祛邪用補中

湯醫大全 卷二十五 大腿癰 六 顧氏秘書

益氣湯人參 五錢 白朮 一兩 生黃芪 一兩 當歸 五錢 柴胡 一錢 升麻 五分 陳皮 一錢 生甘草 二錢 半夏 二錢 茯苓 三錢 水煎服十劑腫消此方益氣聖藥非消毒之劑何以用之消腫即益真氣奪則虛邪氣盛則實真氣既虛邪氣益盛不用補氣氣何以行腫何以化耶此方補氣即所以消腫也况益以化痰去濕之品故更易收功耳 水鑑

馮魯瞻曰腿癰者發於內側屬肝脾二經發於外側屬膽胃二經平陷堅硬者爲氣虛當用內補黃芪

湯勢厥腫痛者常用內托柴胡湯外用蒜灸 申斗垣曰陰包毒在大腿內是足厥陰肝經風熱之毒宜黃芪柴胡湯此湯治腿內近股癰疽大有神功 啟玄

實漢卿曰腫疽在腿內側腫高而硬俗言此疽堅硬無膿殊不知內膿已成一時不能透出皮膚須用內托方潰膿急宜針

馮魯瞻曰腿前廉爲陽明白芷升麻爲引後廉太陽羌活防風爲引外廉少陽柴胡爲引內廉厥陰青湯醫大全 卷二十五 大腿癰 七 顧氏秘書

法矣



附骨疽門主論

附骨功曰附骨疽乃陰寒入骨之病凡受者皆由體虛之人夏秋露臥寒濕內襲或房慾之後蓋覆單薄寒氣乘虛入裏初起寒熱交作狀似風邪隨後轉側日久陰變為陽寒化為熱熱甚則腐肉為膿此疽已成也初起萬靈丹發汗散寒通行經絡次以大方風湯行經活血滲濕補虛如生於尻髻部位漫腫作痛者內托羌活湯腿內近膝股漫腫木痛者內托芪柴湯腿外側者內托酒煎湯虛者十全大補湯加羌活牛膝防風防已如已成欲作膿者附子八珍湯膿成脹痛者針之切不可誤用損脾泄氣敗毒等藥外忌寒涼敷捺誤治必致水凝氣血內肉瘀腐日久化為污水敗膿流而不禁大腿漸漸腫如東瓜上過胯腹下連足底牽連漫腫皮色不紅日久潰膿色白腥穢腫仍不消痛仍不減元氣日衰身體縮小唇舌乾焦二便枯秘飲食不進者終為不吉 正宗

傷醫大全

卷二十五

附骨疽

顧氏秘書

馮魯瞻曰如環跳穴即勝及脚眼微痛不已外皮如

故脉沉數或滑者防生附骨疽乃三陰經虛寒濕

流注毒氣附着於骨而成究竟有何毒氣乃腎經

隧道骨縫之間氣不宜行陽和之氣不足故腎部

潰為膿所以有久服入味丸令人無骨疽之語謂

骨煖氣行血無壅滯毒何生焉。錦囊

又曰凡一切附骨癰疽皆起於腎腎主骨治宜溫補

腎氣骨得陽和則腫硬自能冰解矣

李東垣曰附骨疽者以其毒氣深沉附着於骨也此

疾與賊風相類而不同人能辨此庶無誤焉蓋附

骨疽者由秋夏露臥為冷折之風熱伏結附骨成

疽賊風之候由風邪之氣搏於骨節故其痛深徹

骨髓遇寒則痛甚附骨疽痛而不能轉側初按之

應骨皮肉微急洪洪如肥狀是也其賊風皮骨不

甚熱而索索惡寒時復汗出常欲熱熨痛處即得

少寬其附骨疽初時但痛無時乍寒乍熱而無汗

者經久不消極陰生陽寒化為熱而潰也賊風不

治久而變為彎曲偏枯所以不同也

竇漢卿曰附骨疽又名貼骨疽初起用筋頭按患處

傷醫大全

卷二十五

附骨疽

顧氏秘書

極痛是穴以墨點定灸百壯為率不拘壯數總以艾壯爆起乃其驗也可不必多灸矣大法初宜灸之方可保命若待膿成然後火針刺之百人之中能生幾何

又曰骨疽之發皆由血凝氣滯微骨酸疼或房事過勞或乘虛入水感風合寒或風毒邪熱侵乎榮衛或憂鬱傷於心肝膽腎或醇酒炙博是以腫痛日久成膿初起宜灸百壯以骨熱為度久則宜用銀針破之血膿乃元氣盛易愈白膿乃氣弱難愈治

湯醫大全 卷二十五 附骨疽 十一 顧氏秘書

法以獨活寄生湯兼服十全大補湯倍加茅蒼朮新昌白朮及肉桂乾薑人參黃芪當歸為先鋒之要劑治之無不愈者外用肉桂乾薑白芷防風蒼朮烏藥龜版酥五倍子陳小粉各等分為末加麝香少許和勻老薑汁五合醋三合葱半觔蜜一兩全搗取汁火上熬滾乘熱搗藥搽患處四向空中出毒氣時用餘汁煎熱潤之以助藥力少勞戒氣絕慾除想十旬方愈若病人不遵從醫師之訓任一已之見恣情傲物憂慮萬端不能制六氣七情

之私雖天醫院靈官亦不能治何況中醫乎

胡公弼曰貼骨癰即附骨疽生大腿外側骨上高不見高腫不見紅痛深至骨者是也詩囊

陳實功曰初起通用人參敗毒散加木瓜牛膝蘇木

紅花虛者十全大補湯加羌活防已牛膝已成欲

作膿者附子八珍湯膿成針之體實膿黃十全大

補湯體弱膿清保元大成湯

又曰又有風濕相乘之證初起寒熱交作次傳腿腫

作痛其形光亮微紅發熱腫痛按之如泥不便起

湯醫大全 卷二十五 附骨疽 十二 顧氏秘書

者宜當歸拈痛湯

又曰又有房慾傷寒受熱互變氣血乖違經脈橫解

受病日深此等症候皆由元氣不足中來切不可

誤用寒涼

胡公弼曰附骨疽皮色不變勢不高阜微覺痛癢經

久不潰又無膿血者發於骨髓腎主骨腎經虛憊

寒邪易入入則骨氣冷而患成疽毒緊附骨而外

無形症是疽之根原起於腎也宜用八味丸多加

附子以溫腎氣更以十全大補湯助之腎氣一溫

骨不寒而毒勢外出則疽不附骨病者得生機矣
青囊

汪省之曰附骨疽乃流注之敗症也如用涼藥則內
傷其脾外冰其血脾主肌肉脾氣受傷飲食必減
肌肉不生血為脈絡血既受冰則血氣不旺而愈
滯宜用甘溫大補脾氣脾氣一健則中州不寒而
生機暢達肌肉自長氣血自運行矣 理例

按準繩等書咸云傷寒汗後餘邪成流注流注之壞
證成附骨疽夫汗後流注易愈惟失治乃為壞證
不能復生似不能變成附骨疽况附骨疽係調治
可愈之證若果數變之後則壞而又壞矣又豈能
復有成功乎是流注壞證變成附骨疽之說存而
不論可也

瘍醫大全

卷二十五

附骨疽

主

顧氏秘書

附骨疽門三方

雷火神鍼

治風寒濕毒襲於經絡為患漫腫無頭皮色不
變筋骨疼痛起坐艱難不得安臥者用此針之
斷 艾三錢 丁香五分 麝香二分

藥與斷艾揉和先將夾紙作筒如指拇大用艾
藥疊實收用臨用以肖山紙七層平放患上將
鍼點着一頭對患向紙捺實待不痛方起鍼病
甚者再復一次七日後火瘡大發自取功效矣

瘍醫大全

卷二十五

附骨方

主

顧氏秘書

追風逐濕膏

治風寒暑濕相傷以致骨節疼痛筋攣不能步
履或麻木濕痺等症並效

菴黃草

川烏

天南星

羌活

草麻子

打碎

半夏

海風藤

草烏

真桂枝

麻黃

各三兩

茅蒼木

獨活

當歸

白芷

大黃

各一兩

北細辛

一兩

以上藥咀片別葱汁薑汁各二碗并藥先浸一宿次日用香油半觔同藥入鍋內慢火煎至葱薑二汁將乾不燥時再下香油十觔方與藥相煎揅枯為度細絹濾清每油一觔下飛過炒黃丹十兩為準配用再將前油入鍋內煎滾以油滴水成珠不散方下黃丹徐徐攪入其膏已成再下研淨松香末一觔四兩再同熬化取下鍋來以盆頓穩再下乳香木香胡椒輕粉各二兩白芥子末四兩漸入攪和極勻傾入鉢內收貯

傷醫大全

卷二十五、附骨方

齒 顧氏秘書

旋用熱湯頓化絞緞攤貼七日後諸病可痊百發百中

附骨癰將成用此法即散

其法急掘地坑以火煨紅沃以童便赤體坐其上以被蓆圍抱下截使熱氣薰蒸膝裡開氣血暢毒氣解而愈

洗寒濕腿痛

重川椒一錢 斬艾四兩 透骨草一兩

煎湯洗

附骨疽

古銅錢刮末三分 黃蠟三錢 油核桃肉六觔

搗碎和勻軟豆腐衣包好用酒空心送下

貼骨癰疽並寒濕氣疼痛

川烏河水換煮七次 甘草河水換煮七次

羊角尖炙研 番木鱉用麻黃五錢煎湯泡一宿去毛切片土伴炒乾

土木鱉去殼淨肉切片香油炒脆各一兩

共為細末用赤沙糖打糊為丸如棗豆大每服

一錢無灰酒送下

傷醫大全

卷二十五

附骨方

五

顧氏秘書

鶴膝筋骨腫痛

熟附子一兩 全蝎 黑豆各四十

八角川烏一個 蚯劈開攤新瓦上晒乾一兩

共研細末糕糊為丸每服一錢溫酒送下



多骨癰門主論

陳運公曰有大腿邊旁長強穴間忽疼痛高腫變成癰疽久則肉中生骨以鉄拊取出已而又生人以爲多骨癰也誰知是濕熱毒所化乎夫多骨癰之生因人多食瓜果濕熱所成者也早治服一二劑便可解散無如因循失治以至濕毒添熱熱盛而化骨日久遷延臥床不能起也說者謂初起時未嘗有骨可以內散既生骨後必須爛骨外取未可全恃解散誰知不然蓋多骨症無形所化非肉中

傷醫大全

卷二十五

多骨癰

七

顧氏秘書

真生骨也似骨而非骨耳其骨難化似骨又何難化之有治法利濕清熱而主之補氣血之藥骨自消矣五神湯茯苓一兩 金銀花三兩 牛膝五錢 花地丁一兩 車前子一兩 水煎服二劑輕三劑骨消四劑瘡口平五劑全愈此以車前茯苓利水地丁清熱牛膝銀花補中散毒安得不奏功哉 水煎 王肯堂曰多骨疽又名曰刺骨又名朽骨生足脛上生疽既潰甚久而不愈腐爛出骨者是蓋因毒氣瘰癧結成此骨非正骨也此疽因未潰之前補劑

太過故結毒而不散也 準編

岐天師曰多骨疽乃生於大腿之中多生一骨者是乃濕熱而生者也治之得法則易易耳否則變生可畏治以化骨至神丹即愈苟或失治即長一骨橫插於皮間作痛必須取出此骨始愈以鉄鉗鉗出之外以生肌膏貼之此方妙在用白芍蓋白芍能平肝木又能活筋多骨疽者非骨也筋變爲骨似骨而非骨也白芍不特平肝木之火兼能散肝木之邪邪去則筋舒筋舒則似骨非骨者盡化又

傷醫大全

卷二十五

多骨癰

七

顧氏秘書

加金銀花原能去毒此二味之所以相濟也 秘錄 雷真君曰大凡毒生環跳之穴即多骨疽也 張仲景曰多骨之生也雖生於濕熱而成之不由濕熱也必平時喜飲凉水好食果品而成之初起宜消毒散敷之 陳實功曰多骨疽者由瘡潰後久不收口乃氣血不能運行至此骨無榮養所致細骨由毒氣結聚化成大骨由受胎時精血交錯而結日後必成此疽也但腎主骨宜服腎氣九十全大補湯先補脾胃

次用艾附餅灸之令溫暖腐毒朽骨自然脫盡生肌歛口而愈 正宗

汪省之曰多骨疽患一二年不愈常落出骨一片或細骨或有蛙蝕眼或三五個月落骨一片此骨非營氣不從而生乃母受孕復感精氣而成 聖例

心法曰多骨疽母論老少皆有生者多在腮膀牙床眼胞頰下手足腿膊等處有因腎虛之人生瘡久硬不消口不收歛外被寒邪襲入與膿毒凝結於

中借人之氣血化成多骨者又有初生落草肌肉之中按之如有脆骨由胎元受之精血交錯而致

迨其人長大後必於脆骨之處突然發腫生疽及潰後多骨脫出其口方收亦有多骨出之不休者名曰骨脹難愈以上二因治法皆同俱用隔附子

并艾灸之以宜寒凝令骨速脫蓋骨屬腎遇寒則凝故從熱治也

湯醫大全

卷二十五

多骨癰

太

顧氏秘書

多骨疽門主方

固本養榮湯

治骨疽已成骨不吐出或既出不能收歛由氣血之虛脾胃弱也宜服之骨不出者自出口不歛者自歛

大熟地 當歸 白芍藥

川芎 牡丹皮 人參

山萸肉 白朮 懷山藥

黃芪 蜜炙各一錢 北五味 炙甘草

湯醫大全

卷二十五

多骨方

丸

顧氏秘書

肉桂 各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

生肌散

治腐骨脫出肌肉生遲不能收歛者

石膏 赤石脂 輕粉 各一兩

滴乳香 去油一錢 潮腦 瓜兒竭

龍骨 各三錢

右乳極細末先用當歸白芷甘草各一錢煎湯洗淨患上用此乾摻軟油紙蓋裝二日一洗一

換

化骨至神丹 岐天師

金銀花 當歸 白芍藥 各一兩

龍膽草 白木

生甘草 各三錢 柴胡 一錢

水煎服

消毒散 張仲景

治多骨疽初起並敷一切癰疽癩毒無論有骨

無骨用之神效 凡疽生於環跳之間不用此

湯醫大全 卷二十五 多骨方 辛 顧氏秘書

園藥多成多骨疽用此藥則可免多骨之患

芙蓉葉 晒乾 大黃 五倍子 各一兩

麝香 各三錢 生明礬 各三錢 冰片

麝香 各三錢

各為末米醋調成如厚糊塗於多骨疽之左右

四邊以藥圍其皮肉中留一頂如豆大外以醋

用鷺翎不時掃之若不掃任藥乾圍則無益矣

一日夜即肉消

內消神方 雷真君

人參 天花粉 各三錢 大黃 五錢

蒲公英 一兩 金銀花 二兩 薏苡仁 三兩

先用水六碗煎薏苡仁取汁三碗投藥再煎三

碗分作二次服一日服兩劑即消神效

湯醫大全 卷二十五 多骨方 辛 顧氏秘書

咬骨疽門主論

陳實功曰咬骨疽發在大腿內股不腫不紅痛徹骨
髓初宜雷火針針之內用萬靈丹酒調服之 正宗



湯醫大全

卷二十五

咬骨疽

主

顧氏秘書



湯醫大全

卷二十五

箕門癰

主

顧氏秘書

箕門癰門主論

汪省之曰箕門癰生於股內近膝乃足太陰脾經濕
毒所生 理例

又曰骨毒滯瘡又名腿發乃足太陰脾經生於腿上
箕門穴如痛可治不痛難治十二日可刺如膿黃
赤色可治青稀腐臭者不治其瘡赤白色是骨毒
氣發於外十日內未膿必死

肉蜈蚣門主論

申斗垣曰肉蜈蚣生大腿外面皮膚不覺紅腫內裡
疼痛難忍治斯症者切不可輕用刀刺若誤犯之
毒氣直透心胸疼痛不止多致不救治當用白降
丹搽膏藥上貼三日後取下敗肉如蜂之狀再用
生肌等藥收功 啟玄

胡公弼曰肉蜈蚣所生之處乃足厥陰肝經部位風
濕鬱積氣血阻滯注久而成此毒一犯刀刺蜂毒
直入心胸母傳子受肆毒無忌直犯君主故多不

傷醫大全
救 青囊

卷二十五

肉蜈蚣

書

顧氏秘書



玄疽門主論

陳實功曰玄疽生於左腿夾縫之下三寸漫腫連陰
疼及大腿 正宗


傷醫大全

卷二十五

玄疽

書

顧氏秘書



陰疽門主論

陳實功曰陰疽生於右腿夾縫之下三寸痛連腎子

小腹亦痛 正宗

易醫大全

陰疽

卷二十五 顧氏秘書

膝蓋癰門主論

心法曰膝癰生膝蓋色紅焮腫疼痛屬氣血實疔疽亦生在膝蓋腫大如癰其色不變寒熱往來屬氣血虛和軟為順堅硬如石者逆經云肉之小會為谿谿者二肘二膝四腕也凡脾病在谿腎有邪其氣留於兩腰凡筋病皆屬於節筋乃肝之餘故又屬肝是以谿會有病皆從脾腎肝三經邪氣乘之也惟兩膝俱生屬敗證不可治也

易醫大全

卷二十五

膝蓋癰

毛

顧氏秘書

膝眼毒門主論

申斗垣曰膝眼毒先必膝眼酸痛乃成此症乃腎經感受風邪寒濕相侵而受

致立

注省之曰膝外癰是足少陽膽經膝內癰是足太陰

脾經俱多氣少血乃膝間樞紐骨節行動之處宜

仔細治之免成廢疾

理例

王肯堂曰托疽生於膝傍腿側乃足少陽膽經多氣

少血陽關穴陽陵泉穴腫焮作痛半月有膿可治

如不痛出鮮血或出青黑膿及長出頭漸多或腫

湯醫大全

卷二十五

膝眼毒

夫

顧氏秘書

無定處者不治

準繩

靈樞云發於膝名曰疔疽其狀大癰色不變寒熱而

堅勿石之石之者死須其柔乃石之者生

堅如石者用生

樟六根擦之效

書曰諸癰疽之發於節而相應者

劉涓子云應者不

可治也發於陽者百日死

陽謂諸節發於陰者三十

日死

陰謂諸節之觸鄰也

膝眼風門主論

心法曰膝眼風生於膝眼穴

又名鬼眼穴在膝蓋之下左右兩骨空陷中

由下焦素虛外邪易於侵襲先從膝眼隱隱作痛

如風勝則其痛走注不定寒勝則痛如錐刺濕勝

則胖腫曲不能伸其病在筋伸不能曲其病在骨

動移不遂沉寒錮冷之候也惟在臨證詳辨單膝

生者輕雙膝生者重若左膝方愈復病右膝右膝

方愈復病左膝者名過膝風屬險


湯醫大全

卷二十五

膝眼風

夫

顧氏秘書



鶴膝風



湯醫大全

卷二十五

鶴膝風

辛

顧氏秘書

鶴膝風門主論

王肯堂曰兩膝腫痛股漸小曰鶴膝風一名鼓槌風起於中濕或因痢後脚弱緩痛不能行履名曰痢風或傷寒餘毒不能發散風寒濕氣結於經絡血脉不流以致筋愈縮而股愈細屬足少陽足陽明經準繩

又曰膝上腫痛此非一端須要辨明若兩膝內外皆腫痛如虎咬之狀寒熱間作股漸細小膝愈腫大名鶴膝風急宜隔蒜灸服大防風湯倍加乳香以

住痛舒筋但一膝痛引上下不甚腫而微紅名膝遊風膝之兩傍腫痛增寒壯熱晝夜偏劇腫處手不可近為膝眼毒膝蓋上腫痛者為膝癰準繩又曰膝內臙近摺紋之處結核腫痛但核形長如魚之狀名上水魚

陳實功曰鶴膝風乃三陰虧損不足之證上下腿細惟膝眼腫大狀如仙鶴膝形初起寒熱交作亦宜汗解如汗後腫痛仍不見消此陰寒深伏以大防風湯溫煖經絡重者兼灸膝眼二穴敷以琥珀膏

湯醫大全

卷二十五

鶴膝風

辛

顧氏秘書

亦可漸漸收功如以上諸法治之不效終成痼疾不必強勉消之只宜先天大造丸史國公酒藥常常服之或可轉重就輕移步行履尚可圖也正宗岐天師曰此乃因濕而戰立而行房水氣襲之故成此疾秘錄

李子永曰鶴膝風古人多用大防風湯內氣血藥並用以病在下焦陰分故也如岐天師除去血藥想用宜於初起之時如病久古方恐不可廢馮魯瞻曰膝間腫痛不消防成鶴膝風以膝腫如鶴

足脛細脉多弦緊是也乃三陰經虛寒濕流注為患人多誤為濕熱乃至膿成氣血大虧已不可救矣不知此症與附骨疽俱腎虛者多患之因氣衰弱邪氣得以深襲前人用附子者以溫補腎經又能行藥勢散寒邪也故體虛之人為冷氣所襲經久不消極陰生陽寒化為難而潰也若誤用寒涼必成廢疾或擊曲偏枯或痿弱不起或堅硬如石為石疽或日久始潰皮肉俱腐為緩疽下部道遠非桂附不能下達也况腎主骨而髒以下俱屬

腎非桂附不能入其經而宣行也

辨事

可法良規云鼓槌鶴膝起於中濕蓋足膝屬肝肝有風寒濕氣則血脉阻滯不能流行注膝成病下股之血脉有去而無返是以愈瘦愈冷而筋愈縮上腿之血脉有積而無散是以愈腫愈熱而肌愈削其源若起於流注則內凝者必爛爛則冷毒腐骨腐骨一出神仙無術遂成難治廢疾當皮膚未破之時則肌肉尚未死急以玉龍膏熱酒調敷膝之上腿回接陽氣以住骨痛又以冲和膏敷上腿冷

處引其氣血使流動而下通貫血脉又以玉龍膏熬骨肢處以接引所引之血脉以驅散所積之陰氣內服追風丸倍加乳沒則無有不愈者矣

又云一切濕痰濕熱或死血凝滯等症患在關節流注不行非用辛溫開發腠理流通隧道使氣行血和焉能得效人畏附子有毒多不肯服若用童便炮製何毒之有况中病即已又不常服何足為慮經口有是病用是藥者此也故大防風湯活絡丹治脚氣鶴膝風症多效

張直人曰此病乃立而行房風濕侵於兩膝故成此疾然治法絕不治腎止治氣而自愈亦不必治風濕也

良方補遺

心法曰鶴膝風一名遊膝風又名鼓槌風痲後得者為痲風單生者輕雙生者最重潰後如出白漿浮皮腫痛仍前不可用蝕藥只宜用芙蓉葉菊花葉各五錢研末大麥米飲拌勻貼之亦可止痛或豆腐渣蒸熱捏作餅貼之亦可此證係外證中之敗證收功甚難

鶴膝風門三方

神方 岐天師

黃芪 八兩 薏苡仁 四兩 白朮

白茯苓 各二兩 防風 五錢 上肉桂 三錢

水十餘碗煎二碗分作二服上午一服臨睡一服服後以厚被蓋之必出大汗不可輕去其被

令汗自乾即愈一服可也不必再服

此方妙在用黃芪以補氣蓋兩足之所以能動而舉步者氣以行之也今鶴膝之病則人之氣虛不能週到行步自然艱難今用黃芪半兩則氣旺極矣又佐之內桂以通其氣又佐之防風

湯醫大全

卷二十五

鶴膝方

素

顧氏秘書

以散邪始相惡而相濟又佐之白朮薏苡仁以去其寒濕之氣邪氣去則正氣自固此功之所以速成也若以為人不能受畏而不用則反害之矣

又方

黃芪 四兩 薏苡仁 二兩 防風

川草薺 各三錢 牛膝 二兩 上肉桂 一錢

秦芫 一錢五分

水八大碗煎四碗作早中晚三次服不必蓋汗服下自有汗出閉坐房中不可見風俟汗乾再出房門

又方

懷生地 牛膝 各三錢 炙黃芪

白朮 土炒 赤芍藥 防已

川續斷 薑黃 獨活 各一錢

當歸 白茯苓 各一錢 紅花

上肉桂 各六分

加薑二片棗二枚煎服如浸藥酒照方十倍用

木瓜酒二十觔元眼肉四兩浸飲

又方

湯醫大全

卷二十五

鶴膝方

素

顧氏秘書

生薑 葱 去鬚各三助

共搗汁入酒糟半鍾熬一鍾聽用先以酒調麝香分許塗手心內擦兩膝眼上紅赤令透再用

陳油紙攤前膏貼患處其熱如蒸拔出大小孔

如針眼其腿即可伸縮行動矣

兩膝風

當歸 五加皮 生地

薏苡仁 木瓜 各一兩 牛膝 焙八錢

防已 二錢 廣皮 半夏 各三錢

嫩桑葉炒二兩 秦 瓦 續 斷各五錢

火酒八助浸飲

鶴膝風

無名異五錢 地骨皮三錢 乳 香

沒 藥各一錢五分 麝 香一分

研勻用車前草搗汁入老酒調敷五日愈

張真人神方

生黃芪一兩 釵石斛四兩 遠志肉此味最能

懷牛膝各三兩

湯醫大全 卷二十五 鶴膝方 素 顧氏秘書

用水十碗煎二碗再入金銀花一兩煎一碗

氣服之服後覺兩足如火之熱教病人睡了以

厚被蓋之汗出至湧泉始可去被否則斷斷不

可去也一服病去大半再服全愈不分久暫俱

可如法治之

鶴膝瘋 鎮江何仁源

當 歸二錢 罌粟殼 獨 活

羌 活 藥 本 蔓 荆 子

川 芎 半 夏 甘 草各一錢

明天麻一分 白茯苓八分 防 風七分

漢防已六分

生薑三片水二鍾煎服

鶴膝瘋

直斬艾每次半筋煎湯乘熱薰洗洗一次漸消一日洗數次消盡

鶴膝風

番木鱉四兩 酒泡蒸去皮用麻油四兩 熬枯浮起


大楓子淨仁二兩 燈心全水 煮 穿山甲洗淨土炒

湯醫大全 卷二十五 鶴膝方 素 顧氏秘書

西附子二兩 大者煎 隻煮 過去 皮

以上四味共五兩和勻收貯磁瓶中每服七分

空心溫酒調服極醉出汗七服除根



小兒鶴膝門主論


馮晉瞻曰小兒鶴膝如鶴之膝又名鶴節因稟受腎虛血氣不克以致肌肉瘦削形如鶴膝外色不變膝內作痛屈伸艱難若焮赤壅腫而作膿者為外因可治若腫硬色白不作膿者是屬本性難療屬外國者以荆防為主佐以益氣養榮屬本性者以六味加鹿茸補其精血仍須調補脾胃以助生化之源 錦囊

湯醫大全


卷二十五

小兒鶴膝

顧氏秘書



人面瘡



湯醫大全

卷二十五

人面瘡

顧氏秘書

人面瘡門主論

陳實功曰人面瘡瘡象全似人面眼鼻俱全多生膝上亦有臂上患者據古書云積冤所致先須清心懺悔改過自新內服流氣飲外用貝母為末敷之乃聚眉閉口次用生肌斂口兼服調理藥 正宗 岐天師曰人生人面瘡有口鼻雙眼之全與之肉且能食豈非怪病乎世人有以貝母末敷之而即愁眉閉口人以爲冤家債主也而余以爲不然蓋亦有崇憑焉用輕雷丸其效甚捷蓋雷丸最能去毒

而逐邪加入輕粉深入骨髓邪將何隱用茯苓不
過去其水濕之氣耳秘錄

又曰如有人臂上忽生頭一個眼耳口鼻俱全且能
呼人姓名此乃債主索負之鬼結成此奇病也此
症初起之時必然臂痛發癢以手搔之漸漸長大
久則漸漸露形大如茶鍾但無頭髮鬚眉而已如
用刀割之立刻死亡不救宜服解冤神丹服後亦
宜懺經念佛為妙

申斗垣曰此瘡似人面有口鼻眼多生肘膝一種活
湯醫大全 卷二十五 人面瘡 畢 顧氏秘書
者能食口眼能動一種死者口眼俱不能動啟立

人面瘡門主方

輕雷丸 岐天師

輕粉 白茯苓 各一錢 雷丸 三錢

研細敷上即消

解冤神丹 岐天師

人參 八兩 白朮 五兩 川貝母

白芥子 白茯苓 生甘草

青鹽 各三兩 半夏 白礬 各二兩

共為末米飲為丸每早晚白湯各送下五錢白

湯醫大全 卷二十五 人面方 畢 顧氏秘書

然漸漸縮小而愈病雖奇而方更神也

治人面瘡痛甚者

精猪肉切片貼之

又方

川貝母研末小蘆筒灌瘡口數日愈

治死人面瘡法 啟立

雖瘡有口眼人面俱全不能動不能食故名曰

死人面瘡也

須俟人家有死人裝棺材煞釘時斧頭敲釘一下

用手指將瘡按一下男人患瘡用女人手按女人患瘡用男人手按按一下問患人一聲瘡好了患人即答應一聲好了好了待敲釘聲止則止即愈

湯醫大全

卷二十五

人面方

望 顧氏秘書

骨槽疽門主論

申斗垣曰骨槽疽生於膝蓋上並脚踏上腕痛如刀割癢似虫鑽急用艾灸疽上三五壯治同附骨疽
啟玄

湯醫大全

卷二十五

骨槽疽

望 顧氏秘書

伏兔疽門主論

心法曰伏兔疽乃胃經穴道在膝蓋之上六寸正中
用力大如手掌一堆高肉處是也患疽禁用針灸
如發寒熱交作疼痛徹心由胃火毒滯而成潰後
最難收斂

傷醫大全

卷二十五

伏兔

醫

顧氏秘書

下石疽門主論

心法曰下石疽生於膝間毋論膝蓋及左右俱可生
堅硬如石牽筋疼痛腫如鷄卵皮色不變並無焮
熱難消難潰難斂但此證腫潰俱涼若能涼化為
熱見諸善證者始吉否則難痊

傷醫大全

卷二十五

下石疽

醫

顧氏秘書

腿膝緩疽門主論

王肯堂曰緩疽其患熱緩慢積日不潰久乃赤紫黯
色皮肉俱壞故名緩疽是寒氣深伏腿膝骨間而
成治宜溫補 羊繩

心法曰緩疽由外寒深襲血瘀凝滯而成生於兩膝
上或生於兩膝傍腫硬如鰻木痛日增其色紫黯
積日不潰證之情形與下疳相似惟多焮熱腫
久則腐爛肌肉皮膚治與癰疽門法

湯頭大全

卷二十五

緩疽

吳

顧氏秘書

下疳瘡門主論

申斗垣曰下疳瘡又名膝灣癰乃腎經感受寒濕攻
注膀胱血凝氣滯風寒不散遂成此症治當千金
內托散加木通車前子何首烏淡竹葉 啟玄

湯頭大全


卷二十五

下疳瘡

吳

顧氏秘書

委中毒



湯醫大全

卷二十五

委中毒

果

顧氏秘書

委中毒門主論

王肯堂曰委中毒在膝後摺紋即膝後腘內約紋中

堅硬如石微紅微腫屬少陽膽經由臟腑積熱流

入膀胱治之稍遲則筋縮必成廢疾準繩

申斗垣曰委中毒生於膝灣內乃腎經氣血阻滯而

成啟玄

心法曰委中毒生委中穴

穴在膝後腘中央約紋間中即是約紋者摺紋也又

名血都穴屬膀胱經俗名腿凹經曰腘中由膽經積熱流入膀胱

壅遏不行而成木硬腫痛微紅屈伸艱難治宜速

用活血化痰逐下惡血為效緩則筋縮而成廢疾
諸書皆云兼刺委中穴血出白消然刺穴必兼有
腰痛不能轉移者方可刺之即出血亦不可過多
多則令人身撲面見脫色亦有焮痛色赤潰速者
由濕熱凝結所致故耳

湯醫大全

卷二十五

委中毒

果

顧氏秘書



四灣風門主論

心法曰四灣風生於兩腿灣及兩脚拘每月一發形如風癰乃風邪襲入腠理而成其癢無度搔破津水形如濕癰治當大麥一升熬湯先薰後洗搽三妙散溲濕殺虫之藥其癢自止緩緩取效 全鑑

湯醫大全

卷二十五

四灣風

至

顧氏秘書

流火門主論

凡腿上或頭面紅赤腫熱流散無定以城水掃上旋起白霜者此流火也
流火兩脚紅腫光亮其熱如火者是
駱潛庵曰腿脚紅腫名火延丹

湯醫大全

卷二十五

流火

至

顧氏秘書

流火門主方

貼骨火

天茄子搗爛醋調敷

諸般火

黃 栢 草 烏 各等分

腳下火

研細末用水口中漱過吐出調藥鵝毛掃數次

煤炭研細陳醋調敷

流火 衛生備要

野辣芥子五錢研細醋調敷

腳上流火

廣煤用紅糖醋磨敷

流火

當 歸 生 地 防 已

川牛膝 知 母 各三錢

生薑汁半杯水煎臨晚服後再喫晚飯不可過飽一劑即好

流火

蘇薄荷 黃栢 滑 苓

赤 芍 木 瓜 甘 草

陳 皮 川 芎 蒼 朮

川牛膝 羌 活 苡 薏 仁

天花粉

葱薑引服一二劑加當歸澤瀉木通引換薑棗自愈

敷流火

雄 黃 百 草 霜 食 鹽 各等分

流火 衛生備要

蚯蚓糞 塊煤炭 加倍

醋調敷

流火

馬前子水磨濃汁鷄翎掃紅腫上一日五七次其疼即止紅自退兩三日腫全消

流火 腿脚通紅

用炭三觔燒紅以水一盆將紅炭淬入水內其水必熱將紅處洗之即消

流火 脚氣

取活大蝦蟇肚子合足底以絹帛縛好看蝦蟇眼晴紅印解下放去另換一個縛之自愈

火延丹

白海蜃皮洗淨拭乾包紮腫處一伏時揭開看如蜃皮黃枯印另換一張包裹如此三四張印消散矣

湯醫大全

卷二十五

火方

毒

氏秘書

腓脷部

自三里穴起至腓脷止一切癰疽瘡毒皆彙於此部以便檢閱參治

湯醫大全

卷二十五

三里發

毒

顧氏秘書

三里發門主論

鬼遺方云三里兩處起癰疽名三里發初發如牛眼晴青黑五七日破穴出黑血汁膿腫攻膀胱連腿裡拘急冷痛此因傷筋氣勞力所成宜用湯藥注射其外毒自平息矣

心法曰三里發生膝眼下三寸外側前廉兩筋間初腫形如牛眼拘急冷痛由勞力致傷筋骨鬱熱凝結而成漸增腫痛其色青黑潰出紫血次出稀膿治同癰疽 全鑑

合陽疽門主論

汪省之曰合陽疽乃足太陽膀胱經濕熱之毒在膝
下腿外側 理例

湯醫大全 卷二十五 合陽疽 五 顧氏秘書

脚氣瘡門主論

心法曰脚氣瘡生於膝之下足之上腿脛腫胖癢痛
破津黃水上結黃痂皆由濕熱內搏滯於膚腠外
為風乘不得宣通形類黃水瘡惟身體壯熱心神
煩躁經久難瘥為異 全鑑

湯醫大全 卷二十五 脚氣瘡 五 顧氏秘書



廉瘡

湯醫大全

卷二十五

廉瘡

堯

顧氏秘書

廉瘡門主論

陳實功曰廉瘡乃風熱濕毒相聚而成也外廉多服

四生丸內廉多服腎氣丸 正宗

馮魯瞻曰婦人兩廉生瘡或胎產調理失宜傷損脾

胃或憂思鬱怒虧損肝脾以致濕熱下注外廉屬

足三陽易治內廉屬三陰難痊若初起發腫赤痛

屬濕毒所乘人參敗毒散若漫腫作痛或不腫不

痛屬脾虛濕熱下注補中益氣湯或八珍湯加草

薜銀花之類若膿水淋漓體倦少食內熱口乾屬

脾氣虛弱補中益氣湯加白茯苓酒炒白芍若午
後發熱體倦屬血虛前湯加川芎熟地或六味地
黃丸若肢體畏寒飲食少思脾腎虛寒十全大補
湯八味地黃丸色赤屬熱毒易治色黯屬虛寒難
治 錦囊

周文采曰夫廉瘡者皆由腎臟虛寒風邪毒氣外攻
三里之傍灌於陰交之側風熱毒氣流注兩脚生
瘡腫爛疼痛臭穢步履艱難此瘡生於廉骨為重
以其骨上肉少皮薄故難易愈也 集驗

湯醫大全

卷二十五

廉瘡

堯

顧氏秘書

申斗垣曰裡廉是足厥陰肝經外廉是足陽明胃經
主之 敬立

又曰裙邊瘡是受裙邊風所致不戒房事故久久不
瘥

又曰腿廉生瘡最忌房事犯之則漸漸開張腐臭故
有傷守瘡之名言其不守禁忌也今人因其搔癢
遂疑瘡中惹指甲鋒名之曰傷手瘡實非也

又曰裙邊瘡即補口風瘡

又曰補口毒生踝骨之上者是也

明醫集云一女子患賺瘡百藥罔效每月醫治新肉長滿忽瘡中流血三日漸止別無他苦眾醫不識或一醫問曰月經如期否女曰已一年不至矣醫遂用引血歸經藥服之月餘外以生肌膏丹收口而愈此乃抑鬱損傷肝脾錯經之證所以引血歸經歸故道而瘡自愈矣

心法曰外賺屬足三陽經濕熱結聚而成早治易於見效內賺屬足三陰經濕兼血分虛熱而成且賺骨皮肉澆薄難得見效極其纏綿全鑑

湯醫大全 卷二十五 賺瘡 顧氏秘書

蔣示吉日賺瘡紅者多熱腫者多濕癢者多風痛者屬實早寬而暮腫者屬氣虛下陷初起者風熱濕毒為多日久者下陷濕熱為勝說約

賺瘡門主方

驗方

陳燭油熬去渣淨四兩白蠟 黃蠟各五錢

其人鍋內熬數滾入研細銅綠三錢熬一滾傾入磁瓶內退火氣取陳油紙一塊銀針多戳小孔照瘡大小將藥攤上不可見火再用戳孔油紙一塊蓋上縫合藥用先將花椒葱煎湯洗瘡絹片拭乾貼上軟袱縛緊一晝夜揭開又洗拭淨將膏翻貼戒房事發物

湯醫大全 卷二十五 賺瘡方 顧氏秘書

又方

白蠟五錢 真銀粉二錢 冰片五分

蘆甘石一兩火煨兩個時辰黃白色用黃連一錢煎水拌勻晒乾

研細用麻油調勻攤油紙上照瘡大小剪成以下米水洗瘡拭乾貼上一膏可貼三日

又方

石夾明一個煨 赤石脂一錢煨 蘆甘石童便浸煨一兩五錢

冰片四分 麝香二分

研細豬油調搽

又方

茵 陳二兩 白蘚皮 蒼朮各五錢

煎湯洗再用陳石灰黃柏末各等分研細篩於患上包紮數日即愈

又方

黃蠟化攤冬青葉上貼縛定一伏時換一葉七日

換七葉愈

又方

滄鷄屎敷之

湯醫大全

卷二十五

麻瘡方

李

顧氏秘書

又方

黃蠟熔化油紙攤成膏十二張半日一換換時以先貼者加於上不待盡而愈矣

又方

韭菜地上蚯蚓糞乾為末入輕粉末清油調搽

白珥膏

銀粉 密陀僧 黃蠟各二兩

乳香去油 沒藥去油 象皮

白蠟各五錢 輕粉四錢

除黃白蠟不研餘俱另研細末聽用以真桐油一匊放鍋內熬滾去沫油清入密陀僧末攪勻取起入二蠟熔化攪勻待油稍溫方入乳沒象輕末攪三百餘遍以大棉紙攤上陰乾隨瘡大小圓長剪貼初貼時瘡中毒水流出血藥變黑再換新者貼之

又方

先用臘猪油一兩黃蠟六錢熔化入研細鉛粉二兩輕粉三錢攪勻加水片一分任搽之

湯醫大全

卷二十五

麻瘡方

李

顧氏秘書

又方

黃蠟八錢香油一兩熬化入銅青一錢冷定敷之

又方

天花粉五錢 熟石膏八錢 研勻麻油調搽

又方

大片黃柏用穉猪膽汁浸透晒乾又浸又晒如是七日研細仍用猪膽汁調搽或乾摻先以花椒湯洗拭乾搽之任瘻止水

又方

白蠟 八錢 黃蠟 五錢 川椒 二錢 銅青 三錢

先將蘇油四兩全黃白蠟入銅杓內熔化次下川椒銅青末收之以油紙作夾紙膏用銀針戳眼數百孔先以葱椒湯洗淨貼之日換三次四五日全愈

又方

冬青葉不拘多少入香油內煎成膏攤帛上貼之
傷醫大全 卷二十五 瘰癧方 齒 顧氏秘書

又方

甘蔗渣曬乾炒極燥為細末桐油調敷裂脚纏好三日後方可開看先用葱椒湯洗

夾紙膏

川黃連 黃栢 各二兩 大黃

黃丹 各一兩 牡蠣 鬱金 各五錢

沒藥 四錢 乳香 三錢 血竭 二錢五分

麝香 一分 輕粉 三十貼

共為細末清油調勻攤油紙上每一個貼三日

先用豆腐漿水洗三次後貼膏藥膏藥亦翻轉

三次兩層夾紙以針刺眼透藥臨用旋離

隔紙膏 胡公弼

無名異 洗淨微炒一兩 龍骨 血竭

乳香 沒藥 雄黃

牛黃 阿膠 海螵蛸 各二錢

赤石脂 鬱金 黃栢

黃丹 各五錢 輕粉 一錢

右為細末香油調用黑傘紙刺孔作隔紙膏貼

先用鹽葱花椒湯洗淨拭乾貼之三日一換

賺潰成潭 方長平

白菊花不拘多少預收曬乾去蒂研末先以米泔

水溫洗瘡淨拭乾將花末填滿瘡中用指按實有

水浮起添末又按按至瘡乾無水再以草紙包好

軟絹紫少頃開看如紙濕添末又按實包起過夜

即結痂不必開看亦不可剝動五日全愈

久癩瘡疼痛不堪 蘇生

白松香 如琥珀 血竭 輕粉

枯礬 赤石脂 各二錢 銅綠 八厘

真麝香 冰片 各二分

右將各藥稱準乳鉢內不換手順研極細磁瓶盛封固如用每次二錢直桐油調勻油紙攤成隔紙膏兩邊不可戳孔用濃茶洗患處膿淨貼上每膏一張兩邊各貼一日第三日須另換新者半月可愈

治頑瘰久不收口干槌膏

輕粉 銀硃 銀粉 各等分

全健猪脊髓干槌成膏攤隔紙膏貼

又方

此山腎臟虛寒風熱毒氣流注兩腿

水銀 當歸 各五錢 川芎

貝母 各二錢 乳香 沒藥 各五錢

真麻油 五兩 黃丹 二兩 五錢

除黃丹水銀外先將藥同麻油熬黑色去渣下黃丹水銀又煎黑色用桃柳枝攪成膏油紙攤貼

廉瘡血瘋臭不可聞痛不可忍者

柏油桐油入鍋內熬以老嫩得宜取傘紙攤勻照瘡大小剪就針戳密眼貼之或陳油紙亦可攤貼

白玉膏

治多年頑癩兼治大毒刀瘡久不收口

白蠟二兩猪板油四兩熔化濾清入潮腦六錢研勻冷定加輕粉三錢冰片二錢和勻批脚挑塗油紙蓋止

廉瘡並治乳癰

桑白皮 取在土中根不見天日者去外面紅皮又去內裏筋骨只川白皮槌極爛如掃絮者

陳石灰 各等分 研勻全生桐油搗爛敷之

廉瘡並治血瘋瘡

白蠟 黃蠟 各一兩 頭髮 洗去油

礪硃 各三錢 金頭蜈蚣 十條

右用麻油四兩熬滾中調攪勻以陳油紙或舊也攤勻聽用 先將患上用五皮湯或甘草湯煎艾湯葱湯童便俱可淋洗洗去瘡上黑腐穢

物絹帕拭乾用黃蠟紙貼患上拔去惡水務須
勤洗勤換為主俟惡水去盡約十日外後用此
膏貼之腐肉自脫新肉漸生再上玉紅膏收口
傷守瘡 江以言

廣 炭 燒紅透 松花粉 各等分

研極細先將瘡用冷米泔水洗淨拭乾將藥乾
摻絹片紫好每日一換數次即愈

裙邊瘡 效立

大楓子 一百粒 川椒 輕粉 各一錢

湯醫大全 卷二十五 瘰癧方 宋 顧氏秘書

枯 礬 五分

研細真栢油調搽
瘰癧數年爛腿 錢青榆

白蘆甘石煨淬醋內七次研極細麻油調敷日換
取效

又方 呂蜀生

嫩松香 鉛粉 各二錢 葱白 七寸

猪板油 一兩

全搗成膏貼之

腿瘡年久不愈

確口泥研細摻上立愈

濕毒瘰癧 章子試

桐油二兩加川椒三十粒煎枯椒為度去椒不用

加研細輕粉二錢白蠟一兩收成膏用棉紙拖成

膏藥先用苦參洗淨瘡上貼之兩日一換三次愈

又方

醋浸冬青葉飯上蒸透拭乾貼之

又方

湯醫大全 卷二十五 瘰癧方 宋 顧氏秘書

韭菜邊葉淨水洗過入滾水煎數沸取湯洗瘰癧

拭乾以搗槌爛敷瘡口紫紫一日一換數日愈

裙邊瘡 心鏡傳

嫩長桑根白皮刮去粗皮用不落水猪油搗勻敷

即愈

又方

梨葉百片猪油二兩將葉在鍋內炒拌次下研碎

上好白蠟二兩拌在葉內令化在葉上又下蠟一

兩亦拌在內但宜用微火燒不可使藥炒焦起

冷定貼之神效

又方

小蒜地上蚯蚓糞焙研麻油調搽

治脚上一切瘡抄本

珍珠

琥珀

輕粉

乳香去油

沒藥去油

石膏

黃丹各一錢 蝸牛殼四錢

乳細末搽

瘰癧五六年者

易醫大全

卷二十五

瘰癧方

七

顧氏秘書

鉛一兩打極薄片剪碎和水銀三錢加去膜猪板

油研爛攤油紙上外以川椒二兩煎湯洗淨貼之

又方

黃牛屎尖用陰陽水各一碗和勻化開濾去渣加

醋一碗大冬青葉四十九片砂罐內文武火煮乾

留水醋半盞浸在內每日以葉貼瘡一天換三次

葉盡即愈永不發

瘰癧潰爛心岐傳

川椒

松香

黃

蠟各一錢

共研忌鐵器用連根葱白十四段共搗爛做夾

紙膏攤貼

抓傷腿廉傷水腫痛難忍者鄭師甫云子嘗病此一

耳垢封之一夕水盡出全愈

不拘遠近瘰癧周鶴仙

舊爛牛皮鞋掌子取下砍碎陰陽瓦煨存性為末

麻油調敷神驗之極

又方

油麵餛子一兩把葱白五六根全搗極爛將瘡洗

易醫大全

卷二十五

瘰癧方

七

顧氏秘書

淨敷上用布紮緊即愈神效無比不可忽視

瘰癧棒瘡腫毒生肌收口可做隔紙膏貼劉長隨

黃連

黃芩

黃柏

銀硃

紅花

紫草各二錢

苦參

當歸各五錢

大黃三錢

研為細末先用臘月猪油一筋切碎隔水煮

出油來去渣再入藥加羊膽二三個或牛膽一

個煮半炷香又濾去渣又加

乳香去油

沒藥去油

血竭

兒茶 明雄各二錢 潮腦五錢

冰片一錢 黃蠟切片三兩

乳細入內攪勻再煮半炷香傾入磁瓶內不可洩氣凡一切火毒敷之如神捧瘡貼一二張即好如有腐爛不盡之肉少摻輕粉腐去肌生如不收口用南北鉛霜一錢加紅升藥四分細細篩瘡上一二次即愈

廉瘡 吳魯南

鮮桑樹白皮搗爛全粽子再搗照瘡大小做成餅

瘡醫大全 卷二十五 廉瘡方 顧氏秘書

貼上不過七枚全愈

又方

線香研細桐油調將油紙以針刺孔攤夾紙膏貼

又方

鳳尾草搗爛作餅敷之

又方 劉太和

草麻仁 研爛 黃丹 乳香

沒藥 百草霜 松香 各等分

香油調或陳燭油調攤油紙上貼外以笄敲布

條紫住三日一換換時以葱根五七莖煎洗

又方

烏桕樹葉入醋內浸一宿貼患處不時換之

廉瘡並治杖瘡

桐油一半香油一半入槐花一合熬枯去渣入松香五錢煎一沸又濾去渣又入黃蠟五錢熬至滴水不散為度再入乳細陳石灰枯礬各二錢乳香沒藥血竭各一錢五分再熬黑單油紙攤膏先用葱白防風煎湯洗淨膏貼患處候瘡好皮老再去

瘡醫大全 卷二十五 廉瘡方 顧氏秘書

膏藥

又方

健猪膽汁四兩嫩松香八兩共搗干槌再入土地

黃根一寸搗膏用六安茶葉上筋葉水浸軟以針

刺孔將膏攤貼

又方 金元立

先用石膏豆腐全桐油拌均作餅如瘡口大貼上用油紙蓋住一日一換連換七日再用川黃柏細末全濃茶和成餅貼上絹片紮好每日搗去餅俱

用自已小便洗淨再用龍骨二兩乳香沒藥俱用

焙去新瓦鳳凰衣焙乾血竭兒茶各二錢共乳細末以竹

筒用紗慢作篩篩藥於瘡口自愈戒房事忌發物

此法並治驢眼瘡一切脚下毒瘡

又方

大蒜瓣子燒灰麻油調搽

又方

柿葉燒灰存性同川椒末搽

積年爛腿

步醫大全

卷二十五 瘰癧方 顧氏秘書

新鮮白蘿蔔陰乾一兩日其皮錄下貼上乾則再

換數次愈

瘰癧風濕膏藥 張念亨

糧船上北葱三十六根先將麻油一筋半熬入葱

一根菸枯取起又菸一根如法將葱菸完濾清熬

至滴水成珠入炒杭粉一筋和勻成膏攤貼

瘰癧 汪七來

健猪脊髓五條熬油入銅絲三錢乳香沒藥各二

錢成膏攤貼收口時去銅絲另熬一料貼之

諸瘡不收口

青石上白筋以刀刮下乳細全荔枝肉搗成餅貼

又方

五倍子焙 百草霜各等分

研細入黃蠟化勻攤隔紙膏貼

又方

黃栢 輕粉

醫補諸膽汁調用濃茶洗淨貼上絹包好一旬

一換

步醫大全

卷二十五 瘰癧方 圭

又方

桑樹裏白嫩皮 槐樹裏白嫩皮

搗膏做餅以生桐油浸之貼上疼痛漸止三日

收口

又方

牛蹄甲油拌燒灰敷

又方

白蘿蔔搗爛捲一晝夜每日一換數日效

又方

豆腐皮爲末人乳調敷

又方

海螵蛸研極細末搽之

又方

不見水豆腐揼做餅貼上毒水拔出然後用藥

又方

乳香去油 沒藥去油

研細搽之定痛

湯醫大全

卷二十五

瘰癧方

宋

顧氏

血瘋瘡



血瘋瘡門主論

陳實功曰血瘋瘡乃風熱濕熱血熱交感而成也初起搔癢無度破流脂水日漸沿開形同針眼外搽解毒雄黃散如意金黃散俱可如年久紫黑堅硬氣血不行者用磁鋒砭去惡血再以神燈照法薰之以解鬱毒 正宗

醫管瞻曰婦人血風瘡因肝脾二經風熱鬱火血燥所致其外症身發疙瘡癢痛非常搔破成瘡膿水淋漓內症月經無定小便不調夜熱盜汗惡寒

湯醫大全

卷二十五

血瘋瘡

宋

顧氏

熱倦意懶食宜先用加味道遙散或小柴胡湯合四物湯多加胡麻子後以歸脾湯加熟地去木香此乃遍身所發血風瘡治法非單指足下血風瘡也 鈔囊

申斗垣曰血風瘡多在兩小腿裡外膝上至膝下至踝骨乃血分受風邪而生也多癢抓破出黃水成瘡况內有虫 敬立

卷二十五 血風瘡 顧氏秘書

血風瘡門主方

驗方

白螺殼叮東壁土者煨 密陀僧

竹蛙虫各等分

研細將瘡用五皮湯或甘草湯洗乾搽

又方

田中蚯蚓糞瓦焙末醋調貼上即癢不痛但癢定即長肉矣

又方

龜殼一個燒存性桐油調搽

瘡醫大全

卷二十五 血風方

其

又方

密陀僧研末多年陳竹燈掛燒歷下油調搽

又方

輕粉 銀粉

舊皮靴底糠炭各等分

共研細乾搽

又方

土黃連一兩 花椒七粒 食鹽二錢

胡椒

陳醋浸搽

又方

茵陳不拘多少煎濃汁洗

又方

土茯苓一兩 健猪油一塊 威靈仙

白木 紅花 蒼朮

金銀花 生地黃 白殭蠶

荆芥 猪苓 澤瀉各一錢

水二鍾煎一半早晚各服半盞

又方

傷醫大全 卷二十五 血瘋方 牛 顧氏秘書

白蠟五錢 松香二錢 生葱一根

猪油一塊 蜜糖半杯

共搗爛攤隔紙膏貼

又方

烏藥切碎以屋上陰陽瓦焙焦為末醋調以鷄翎

掃上慢慢的半日工夫一二次即好

又方

先看腿上瘡大小買紅油紙照瘡畧大一分剪如

式將鍋燒熱以紙鋪鍋內炙熱用黃蠟在紅紙上

又方

摩遍取起冷片刻又放鍋內炙熱加輕粉末一二指甲掃勻貼上奇效

男子頭垢不拘多少 破舊棉網巾燒灰一錢

真香油煎熟調勻入真輕粉五分作膏貼之七日全愈

日全愈

又方 濟生

人指甲三錢 血餘二錢 乳香

沒藥各一錢 輕粉 白蠟各五錢

傷醫大全 卷二十五 血瘋方 牛 顧氏秘書

冰片五分 建本銀二錢全鉛二錢煨死

用桐油一鍾先將血餘指甲熬至指甲枯血餘

化取出研細俟油滴水不散離火下羣藥惟冰

片待冷方入攤貼

潮腦膏 啟立

黃連一兩 白芷五錢 輕粉

川椒各三錢 潮腦二錢

共為細末用熟菜子油調稠攤在一箇大碗底

上倒合將瓦高墊用艾四兩揉作十團燒烟薰

碗底上藥如油乾再添油并再薰必待艾盡乘熱搽在患上外用油紙草紙包之次日即消不過三宿全好

瘋癩瘡

先將溫茶將瘡痂潤透再以熱湯洗使痂自落再用染坊靛花浮沫鷺翎掃上堆積為度將膏貼之如作癢以手撲之切勿抓破如有潰陷之處用銅片極薄銅片照瘡大小剪貼吸盡毒水自然新生

湯醫大全

卷二十五

血瘋方

全

顧氏秘書

血瘋瘡及脚面瘡窠形如針孔黃水淋漓隨流隨化先用葶搯敷拔去木再用棉花燒灰冷定研細乾則生桐油調搽濕則乾搽

血瘋瘡並治疥瘡

烟膠 三錢 黃丹 一錢五

研細香油或相油調搽

血瘋瘡牛皮癬三日見效除根

輕粉 黃蠟 各一錢

血瘋油半鍾煎化調勻川油紙攤膏貼上外將

布紫紫不可動自有功效

血瘋癩瘡附紙膏

麻油半助文武火熬入白蠟一兩黃蠟二兩又熬離火下飛丹二兩攪勻入乳細薑甘石乳香沒藥血竭兒茶各五錢輕粉三錢冰片一錢作附紙膏貼之

血瘋瘡

馬齒莧 焙乾淨 丹 飛 黃 栝

兒茶 枯 礬 各三錢 輕 粉 一錢

湯醫大全

卷二十五

血瘋方

全

顧氏秘書

其木生桐油調攤紙上先用葱椒湯洗淨貼之血瘋瘡並治癬瘡虫瘡坐板瘡疥癩瘡

大楓肉 蛇床子 各五錢 水 銀 二錢

枯 礬 白 錫 各一錢

為末先將錫化開次入水銀再入末藥栝油共搗勻搽瘡宜乾些臘猪油亦可用

血瘋頑瘰 揚州房揚文

蘆甘石 用黃連黃芩黃柏各一錢煎湯身石火

象牙末 微炒 銀 硃 各三錢 黃 蠟

白蠟 各五錢 輕粉 一錢五官 粉煉黃色
冰片 三分

猪板油四兩先熬去渣入二蠟化開離火下細藥攪勻用連四紙七張層層攤勻將瘡先用葱湯洗淨貼之三日揭去貼肉一張即好七張重疊一齊貼上三日揭去揭完全愈

血瘋瘡 張太和

野芹菜搗爛敷五七分厚油紙裹緊二次愈

年久生瘡孔如蜂窩及膿水瘡血瘋瘡

湯醫大全 卷二十五 血瘋方 合 顧氏秘書

如意草搗爛敷或陰乾微炒研末鷄蛋清調搽

血瘋瘡流水作癢

煮鷄蛋黃熬油和黃丹再加輕粉少許搽

又方

飛丹 輕粉 各一錢 冰片 一分

共乳細先用防風荆芥銀花甘草煎湯洗淨再搽紙包好

又方

枯礬 海蝶蛸 黃蠟

銅礬 輕粉 各等分

研細入麻油熬成膏敷

血槽風門主論

申斗垣曰血槽風生小腿實處可治毒氣多流脚面如脚發背 破立

濕腫門主論

湯醫大全 卷二十五 血槽風 合 顧氏秘書

陳實功曰濕腫者胸膈不寬小水不利面目浮腫漸至偏身此乃土傷不能生化之故也有飲食後驟受風寒有饑渴時悞煖生冷寒積於中食不化皆能致之治當疏通稼土溫養脾元則小水自利浮腫自消二蛟散主之 正宗

濕腫門主方

敷水腫

乾黃土 四兩 朴硝 一兩 生大黃 二兩
研細葱汁調敷

腎臟風瘡門主論

王肯堂曰腎臟風屬腎虛風邪乘於腠理以致皮膚如癬或漸延上腿久則延及遍身外證則癢癢成瘡膿水淋漓眼目昏花內證則口燥舌乾腰腿倦怠吐痰發熱盜汗體疲治當用六味地黃丸準繩心法曰腎氣遊風多生於腎虛之人腿肚紅腫形如雲片遊走不定痛如火烘此由腎熱內蘊外受風邪膀胱氣滯而成

腎臟風瘡門主方

腎氣遊風紅腫痛癢如烘

豆腐研調黃栢末敷之

黃蠟膏

龍骨煨

赤石脂煨

血竭各三錢

共研細末用香油一兩入血餘栗子大一團燻去

揲再入黃蠟一兩白膠香三錢溶化離火再入

前三味末攪勻候冷磁罐盛之用時捏作薄片

貼瘡上絹帛縛定三日後翻轉貼之

濕毒流注門主論

王肯堂曰濕毒流注生足脛之間生瘡狀如牛眼或紫或黑膿水淋漓止處即潰爛久而不斂乃暴風疾雨寒濕暑氣侵入腠理而成準繩

又曰下注瘡又名濕毒瘡生脚膝間膿水不絕連年

不愈因脾胃虧虛濕熱下注以致肌肉不仁而成

瘡也在外屬足太陽少陽經在內屬足厥陰太陰

經女貞葉貼之效

胡公弼曰皮如針眼淌水腥臭腿脚延蔓者是也拖

易醫大全卷二十五濕毒顧氏秘書

紙膏主之青囊

申斗垣曰兩腿腐爛臭氣難聞者是也乃濕熱為患

宜清濕熱效立

凡濕毒所生之瘡皆在兩足脛足踝足背足跟初起

微癢水出久而不愈內服補中益氣湯合二妙散

外搽製栢散為主良規

心法曰此症生於腿脛流行不定或發一二處瘡口

形似牛眼根脚漫腫輕則色紫重則色黑潰破膿

水浸損好肉破爛日久不斂乃暴風疾雨寒濕著

火侵人肌膚而成也初覺急服荆防通聖散加木
瓜牛膝防已蒼朮消之若腿脛至晚發熱者宜服
當歸拈痛湯加牛膝腫痛全消再搽輕粉散斂之

卷二十五 濕毒 顧氏秘書

濕毒流注門主方

製栢散

厚黃栢數筋入糞坑內浸一百日取出入黃土內
埋三日取出晒乾研細末如瘡有水乾摻乾則以
蜜調搽

分濕消毒丹

黃丹二兩 鉛粉炒 白蠟各一兩

乳香去油 沒藥去油 兒茶

潮腦 松香各三錢 輕粉一錢

卷二十五 濕毒方 顧氏秘書

血竭五錢 冰片 麝香各五分

銅綠三分 蚯蚓糞韭菜地上者二兩
炒乾一兩五錢

共為絕細末先用葱湯洗濕之時摻在瘡口之
上必然癢不可當但不可用手抓其癢少頃必
流黃水如金汁者數碗再用葱湯洗之又摻又
流又摻如是者三次則水漸少而痛漸止矣明
日用前膏藥以厚皮攤膏仍入此藥二錢任其
水出倘癢之極外以鶴翎掃之則不癢

分濕內化湯

慈黃仁 二兩 金銀花 白茯苓 各一兩

牛膝 半 夏 甘草

川草薺 各五錢 肉桂 五分

水煎服

拖紙膏 吳丹垣

蔗油半觔入廣膠一條熬化再下黃蠟二兩熔化
傾碗內入血丹玄明粉各二錢五分皮紙攤貼敷

次印乾

輕粉散

輕粉 一錢五 黃丹 黃栢

密陀僧 茶葉 乳香 去油各三錢

麝香 三分

研細密貯先用葱熬湯洗淨再搽

爛腿瘡 懷德堂 乳香 去油 密煤 各三分

百草霜 沒藥 去油一厘 血竭 龍骨

輕粉 各一分 生芝蔴 一撮

生鷄子調做隔紙膏貼

兩脚俱青疔瘡腫痛骨疼

蜀蒜切片約三個錢厚放青處艾灸三炷換蒜又
灸至愈若患處大搗蒜餅鋪上聚艾灸之

腿上濕瘡成片出水時痛時癢

黃栢 一兩 乳香 三錢 如瘡潮 腦 二錢

共為細末乾摻如瘡乾猪油調搽

三妙散

生蒼朮 檳榔 生黃栢 各等分

研細搽之滲濕止癢如濕癬用蘇合油調搽

湯醫大全 卷二十五 黑毒方 奎 顧氏秘書

蝶蛸散 張景岳

治濕熱破爛毒水淋漓等瘡或下部腎囊足股

腫痛下疳諸瘡無不神效

海蝶蛸 不必浸人中白 或人中黃亦可 各等分

右為細末先以百草多煎濃湯乘熱薰洗後以

此藥摻之如乾者以麻油或熟猪油蜜水俱可

調搽 如腫而痛甚者加水片少許更妙若濕

瘡膿水甚者加密陀僧等分或煨過官粉亦可

或煨爐甘石更佳

飛丹散

寒濕風濕脚腿等瘡先用百草煎湯乘熱薰洗

飛丹 人中黃 白更妙 輕粉

水粉 各等分

為末乾摻外以油紙包裝若乾溼者以猪骨髓或猪油調貼之



附陰疽門主論

陳實功曰附陰疽生在內踝上三寸初生小泡漸生赤腫破流血水痛亦徹骨不能步履者是 正宗

心法曰附陰疽生內踝上三寸初如紅粟疼痛日增堅硬赤腫漸如雞卵係三陰交會濕熱積聚而成治同癰疽但三陰交係純陰之穴收斂遲緩調理不可不慎 全鑑

瓜藤纏門主論

王肯堂曰瓜藤纏生足股生核數枚腫痛久之潰爛
不已屬足太陽經由臟腑濕熱流注下部所致
心法曰若濕熱下注遠脛而發結核數枚日久腫痛
腐爛不已名曰瓜藤纏 全鑑

接骨發門主論

鬼遺方云兩脚接骨近上膀肚下一處起丹疽如胡
桃大硬如物打碁之狀不苦痛但腫急脹慮其損
筋亦須早出膿毒可保平安

卷二十五 瓜藤纏 顧氏秘書

心法曰接骨發生於腿肚之下脛骨與足後跟骨相
接處故名之此屬膀胱濕熱凝結而成初如核桃
其硬如物打碁之狀急脹微疼色紅漫腫膿宜
速潰遲則膿毒損筋筋脈既傷腿缺腫行腫行者
不能全足踏地惟恃足指着力而行也治全癰疽
門法 全鑑

黃鯁癰門主論

心法曰黃鯁癰生於小腿肚裏側疼痛硬腫長有數
寸形如泥鯁其色微紅由肝脾二經濕熱凝結而
成破出稠膿者吉潰出污水者危治同癰疽門法
鯁漏門主論

心法曰鯁漏緣濕熱而成初起頗類濕瘡生於腿肚
痛癢相乘破流黃水線線不已其孔深如鑽眼復
受寒氣侵入瘡口以致瘡寒肌冷宜每日用艾葉
老葱煮湯先薰後洗俟瘡口發熱覺癢時貼黃蠟
膏收斂而愈 全鑑

青蛇便門主論

鬼遺方云青蛇便生足肚之下結塊長二三寸許寒熱大作飲食不進屬足少陰與足太陽二經由腎經虛損濕熱下注所致頭向上者難治頭向下者刺出惡血如老弱之人嘔吐腹脹神昏脉躁者死王肯堂曰青蛇便生足小踠上下頭生望上攻走入腹者不可治頭生向下尾在上即為順可治也申斗垣曰青蛇便即青蛇癱生小腿上有一條如蛇大者為頭小者為尾初起宜表汗

傷醫大全 卷二五 青蛇便 顧氏秘書

心法曰青蛇毒即青蛇便生於小腿肚之下形長二三寸結腫紫塊癩頭大尾小憎寒壯熱火痛不食皆由腎經素虛膀胱濕熱下注而成蛇頭向下者毒輕而淺急刺蛇頭半寸出紫黑血隨針孔搽拔疔散外敷離宮錠內服仙方活命飲加黃栢牛膝木瓜亦有蛇頭向上者毒深而惡急刺蛇頭一二寸出紫黑血針孔用白降丹細條插入五六分外貼太乙膏敷紫金錠若毒入腹嘔吐腹脹神昏脉躁俱為逆證

脛疽門主論

靈樞曰發於脛名曰兔啮其狀如赤豆骨急治之不急治害人也

魚肚癱門主論

申斗垣曰魚肚癱生小腿肚上多因幼小坐臥濕地引入風邪寒濕透入骨間遂成此症半月不治毒氣攻心則死

腓脛疽門主論

王肯堂曰腓脛疽生足小肚寒熱煩躁屬足少陰腎經由腎水不足積熱所致古云不治潰出血膿生潰出清水者死

傷醫大全 卷二五 腓脛疽 顧氏秘書

又曰風疽生脚脛及曲脈中癢搔則黃汁出心法曰腓脛即小腿肚也由腎虛膀胱積熱凝結而成古方悉云不治若炊赤高腫疼痛潰出正膿而兼血者為順如漫腫下塌紫暗譽痛潰出清水者為凶初服仙方活命飲潰後八珍湯氣血兩重十全大補湯下虛者用八味地黃丸補之

瘍醫大全目錄

卷二十六

脚氣部

男婦緩風脚氣門主論附方

新增江蘇揚州府江甘儀三邑婦女脚氣門主論

瘍醫大全

卷二十六 目錄

一 顧氏秘書

瘍醫大全卷二十六

無湖顧世澄練江氏纂輯

婿錢之栢東陽 男 櫛燮用和 全校

脚氣部

自男婦緩風脚氣起至揚州江甘儀婦女脚氣治各不同法則俱彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷二十六 脚氣部

一 顧氏秘書

男婦緩風脚氣門主論

太陰陽明論曰陽受風氣陰受濕氣。傷於風者上先受之傷於濕者下先受之。清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上

邪氣臟腑病形篇曰身半已上者邪中之也身半已下者濕中之也

陰陽應象大論曰地之濕氣感則害人皮肉筋脉通評虛實論曰蹠蹠寒風濕之病也

厥氣法時論曰脾苦濕急食苦以燥之禁濕地濡衣

調經論曰寒濕之中人也皮膚不收肌肉堅緊營血
泣衛氣去故曰虛虛者聶辟氣不足按之則氣足
以溫之故快然而不痛

五常政大論曰太陰司天濕氣下臨

六元正紀大論曰太陽司天之政民病寒濕發肌肉

萎足萎不收○太陰司天之政民病寒濕腹滿身

臃憤附腫○太陰所致為重附腫

生氣通天論曰因於氣為腫四維相代陽氣乃竭

經脈篇曰胃病則大腹水腫膝臃腫痛○足陽明實

傷醫大全

卷二十六

脚氣

二

顧氏秘書

則狂顛虛則足不收脛枯

平人氣象論曰足脛腫曰水

張景岳曰脚氣之說古所無也自晉蘇敬始有此名

然其腫痛麻頑即經之所謂痺也其縱緩不收即

經之所謂痿也其甚而上衝即經之所謂厥逆也

逮夫後世則有類傷寒四證而以脚氣居其一謂

凡頭痛發熱身痛便閉而但見脚膝屈弱無力者

便是脚氣此說太混予不然之夫脚氣本水濕下

壅之病而實非陽邪外感證也若諸證之兼見者

則若有之若以外感之脚軟者便認作脚氣則滑
亂意見大不通也

又曰脚氣之證其初甚微飲食動作無不如故或無

他疾而急得之或因病後而漸得之及其病也則

自膝至足或見麻痺或見冷痛或見痿弱或見癢

急或腫或不腫或日漸枯細或蒸蒸惡熱或洒洒

惡寒或如水冷或如火熱或到底能食或不能食

或有物如指發自臍臍而氣上衝心是皆脚氣之

正病也其有為發熱頭痛寒熱往來或腹內作痛

傷醫大全

卷二十六

脚氣

三

顧氏秘書

或見飲食則嘔吐或惡聞食氣或不欲見明或語

言錯亂精神昏憤是皆脚氣之兼證也大抵此證

有緩急緩者其來漸或二三月而日甚其來速或

一二日而即起治之若緩恐其氣上衝心亦能殺

人

又曰脚氣之因有二一則自外而感一則自內而致

也自外而感者以陰寒水濕雨霧之氣或坐卧濕

地致令濕邪襲人皮肉筋脈而凡清濕襲虛則病

始於下致為腿足之病此外因也自內而致者以

肥甘過度酒醴無節或多食乳酪濕熱等物致令
熱壅下焦走注足脛而日漸腫痛或上連手節者
此內因也然在古人謂南方卑濕病多外因北方
嗜酒酪病多內因此固一說然北方亦有寒濕南
方豈少酒濕此固不必分南北其或內或外凡受
邪氣有病始於足而漸致他證者即脚氣之謂也
必察其因而治之則自無失矣

又曰方書以腫為濕脚氣不腫者為乾脚氣濕者宜
除濕乾者宜行氣

湯醫大全

卷二十六 脚氣

四

顧氏秘書

陳無擇曰脚氣不專主一氣亦不專在一經兼有雜
生諸病未易分別須尋經絡之陰陽再察脈息之
虛實以為治也凡自汗走注者為風勝無汗攣急
掣痛者為寒勝腫滿重著為濕勝頰渴燥熱為暑
勝若四氣兼中者但察其多者為勝分其表裏以
施治也

張景岳曰脚氣之病實三氣之所為也然亦有虛實
之異又脚氣本為壅疾古云忌用補劑然必下元
不足及陽明之氣有虧者而後邪氣得以犯之此

其中亦有虛證總之凡治此者只因證施治則萬
全但察其因於表者以發散為主因於裏者以疎
利為主外因者多寒濕宜用溫熱內因者多濕熱
宜用清涼若元氣本虛及病久致虛者必當培補
下元不得以忌補之說為拘也

又曰脚氣初起無非濕滯如無他證兼見而身體重
著者單宜治濕以分利為主○凡脚膝中濕或腰
腿痠痛重著腫痛者宜除濕湯不問久近乾濕並
可用○若脚膝痠軟重著而胃氣不清或見噫氣

湯醫大全

卷二十六 脚氣

五

顧氏秘書

吞酸脹滿者平胃散○若脚氣浮腫而兼泄瀉者
宜五苓散或胃苓湯

又曰寒濕外侵致成脚氣者十居六七其證疼痛拘
攣惡寒清厥脈多弦細治宜以溫經除濕為主是
以古人治此之法大抵熱藥多寒藥少故每用麻
黃川烏桂附乾姜之屬內經曰濕淫於內治以苦
熱正以烏附麻黃走而不守故能通行經絡乾姜
官桂辛甘大熱故能助陽退陰清濕既除病無不
愈○凡感寒濕雨水或四氣流注致成脚氣腫痛

不可忍者宜鷄鳴散如神○若寒濕內侵陽虛陰盛胃氣不强經氣不行頑木浮腫或疼痛不用者獨活湯○若寒邪入腹喘急疼痛或筋急上衝悶亂危急欲絕者茱萸丸或茱萸木瓜湯○若寒濕在經血脈不和腰脚筋骨痠軟無力或拘攣疼痛脈弱而澇者酒浸牛膝丸○若寒濕壅腫氣滯不行或冷或痛者立效散○若寒濕兼風者如五積散小續命湯皆宜用

又曰濕熱內蒸致成脚氣者多因酒食不節其證必

煩熱多渴脈見滑數二便或多不利治宜利濕清火爲主○若濕熱下墜足脛腫痛不消者防已飲加減治之或蒼朮黃柏丸或二妙散或加味二妙丸俱妙○若濕熱氣壅上衝胸腹煩渴悶亂頭痛口乾者活人犀角散○若濕熱流注經絡肢節煩疼脊背沉重手足偏身疼痛熱腫者當歸拈痛湯○若感冒暑濕肢節疼痛身熱口渴小便赤澀氣虛氣促者清暑益氣湯○若肝腎陰虛血熱脚瘡疼痛行止艱難小水不利者續斷丸

又曰脚氣有壅滯氣逆者其證必喘滿氣急上攻心腹甚至危急可畏治宜行滯降氣爲主○凡脚氣上衝心腹喘急不得眠卧者紫蘇散檳榔湯或加減檳榔湯甚者四磨飲○若脚氣喘急腹滿脚腫者桑白皮散或木通散○若脚氣臍下氣升衝心煩悶者木香散或檳榔散○若脚氣心胸壅悶嘔逆多痰不食者半夏散或紫蘇湯○若浮腫心腹痞悶小水不利大腹皮散

又曰風濕合邪而爲脚氣者其證必兼外感而或爲寒熱往來或爲喘欬氣急或流走無常或筋骨疼痛治宜以散風除濕通行經絡爲主○若感四時風疫風濕或處陰濕之地致爲脚氣痿弱筋骨疼痛或寒熱往來者敗毒散○若寒熱如瘧赤腫疼痛者加味敗毒散○若脚氣以風寒濕邪客於經絡而骨髓酸痛不可忍或遍身疼痛惡寒嘔逆者五積散一法加全蝎三個入酒煎服○若脚氣以風濕留滯而陰寒外閉表邪不解或欬喘滿寒熱者小青龍湯○若風濕留滯肢節煩疼心神壅

悶者大腹子散○千金云若脚氣脉大而緩宜服小續命湯二劑立瘥活人云脚氣屬冷者以小續命湯煎成入生姜自然汁服之最快○若脚氣風濕勝而兼發熱欬嗽肢體疼痛者芎芷香蘇散○若脚氣風濕流注憎寒發熱無汗惡寒者麻黃左

經湯
又曰脚氣有虛證凡脾胃肝腎之脉皆出於足邪之易入多有乘虛故肝虛則筋病腎虛則骨病脾虛則肌肉病胃虛則宗筋病或以勞慾不節或以酒

湯醫大全

卷二十六

脚氣

八

顧氏秘書

濕太過或以病後失調凡內有虧損而外有脚氣者無非虛證此當以調補為主而兼察四氣以治之○若肝腎陰虛感觸四氣而癱瘓頑木半身不隨脚膝無力遍體疼痛者神應養真丹或三因四斤丸或虎骨酒或八味地黃湯○若脾胃大虛陰寒在下陽氣不行而病脚氣者獨活湯附子八味湯○若精血不足陰虛於下氣不歸精而脚氣上逆衝心者地黃湯○若脾胃虛寒兼風濕外邪而成脚氣者用引獨活湯或追毒湯○若脚氣以脾

腎虛寒而兼欬嗽氣逆嘔吐者兼補厚朴湯

又曰脚氣有實邪凡壅盛腫痛而或為閉結或為脹滿者治宜以疎導通利為主○若風濕壅盛脚氣腫痛便結腹滿者羌活導滯湯或枳實大黃湯○若四氣流注陽明風熱腰脚腫痛大小便秘喘滿腹痛者大黃左經湯○若脚氣飲食不消心下痞悶腿脚腫痛者開結導飲丸

又曰凡脚氣腫痛之甚者可用敷藥以散之或用椒艾囊以溫之或用香散之藥煎湯以洗之如百草藥之類皆可用或單用紫蘇或忍冬藤煎湯淋洗似妙

湯醫大全

卷二十六

脚氣

九

顧氏秘書

煎及防風荆芥威靈仙艾葉蒼朮蛇床子當歸烏藥之類皆可用或單用紫蘇或忍冬藤煎湯淋洗似妙
觀活人等書云凡脚氣服補藥及用湯淋洗者皆醫之所禁也此亦一偏之說耳蓋補有宜禁者以邪壅氣實者也淋洗有宜禁者以水濕湯氣之宜避者也如果下部虛寒或以病後或以尅伐太過而脚氣不愈者豈尚堪禁補乎又若寒邪濕熱壅結不散而為腫為痛者最宜以辛香疎散之藥煎湯

蒸洗則退邪極速豈禁洗乎惟是濕熱逆而上衝
心腹者不可驟洗恐助濕氣上升也此必先降其
氣俟其毒止在脚再行薰洗自無不利益補以補
其弱也洗以逐其滯也夫何禁之有

又曰有當禁於未發之先者如外臺秘要云第一忌
噴噴則心煩煩則脚氣發又禁大語大語則傷氣
氣傷病亦發又不得露足當風入水以冷水洗足
兩足脛尤不宜冷雖暑月當着帛袴至冬寒加綿
常令兩脛及脰溫暖微汗尤佳依此將息脚氣自

瘍醫大全

卷二十六

脚氣

十

顧氏秘書

消而無邪氣留連之患夏月腠理開不宜當風取
涼涼處坐臥須得勞動關節令其氣暢此拒邪之
法養生之要也每食後宜行三五百步疲倦便止
則脚中惡氣隨即下散雖有浮腫氣亦不上也

孫真人曰古人少有此疾自永嘉南渡衣冠之人多
有之此皆濕鬱於內所致也故凡四時之中皆不
得久坐久立濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣
洗足當風取涼皆成脚氣暑月久坐久立濕地則
濕熱之氣蒸人經絡病發必熱而四肢酸痛煩悶

肘腫寒熱此又山野農夫多有之以久濕傷於外
也

楊大受曰脚氣是壅疾當用宣通之劑使氣不能成
壅也如羌活導滯湯之類所宜通用又如蒼白木
防已南星以去濕羌獨活木瓜栝榔行氣利關節
以去壅佐木通牛膝以引經當歸生地以和血此
必用之藥也又如東垣拈痛湯之類亦甚捷餘因
證之虛實寒熱而辨治之此即通變活法也

瘍醫大全

卷二十六

脚氣

十一

顧氏秘書

以導引濕氣外出及飲醪醴以通經散邪其要法
也○若壅既成而邪盛者必腫痛熱甚一時藥餌
難散宜砭去惡血以消熱腫砭刺之後以藥繼之
古無脚氣內經名厥兩漢名緩風宋齊謂脚氣

內經曰傷於濕者下先受之

發於外者屬足少陰太陽發於內者屬足太陰

陽

千金論曰此病初得即先從脚起因即脛腫時人號
為脚氣經曰緩風濕痺深師云脚弱者即此義也
得此病者多不令人即覺或會他病一度乃始發

動或奄然大悶經兩三日不起方乃覺之久而不
瘥遍及四肢腰背頭項也始起甚微食飲嬉戲氣
力如故故惟卒起脚屈弱不能動有此為異耳或
熱悶驚悸心煩嘔吐或覺臍下冷痞悞悞然不快
兼小便淋漓不似生平皆其候也

馮魯瞻曰經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰傷於濕者
下先受之蓋脾主四肢足居於下而多受濕濕鬱
成熱濕熱相搏其痛作矣古名為壅疾當用宣通
之劑如羌活導滯湯當歸拈痛湯之類使氣不壅

湯醫大全

卷二十六

脚氣

主

顧氏秘書

而痛自愈矣古無脚氣之說內經名厥兩漢間名
緩風宋齊之後謂之脚氣凡腫者名濕脚氣者筋
脉弛長而軟或浮腫是也治宜利濕疎風如不腫
者名乾脚氣者乾即熱也筋脉蹇縮攣痛枯細而
不腫者是也治宜潤血清燥有從外感者有從內
傷者其為濕熱則一而已北方高燥多飲醞酪肉
食醇酒濕熱下流所致南方卑下多濕血氣虛弱
之人或遇房勞負重遠行衝冒雨雪寒濕乘虛所
致大抵風寒暑濕之氣中於諸陽則病在外其症

多在足外踝及足背宜散之而愈中於諸陰則病
在裡其症多在足內踝及膝內宜溫利之外症自
汗走注為風勝無汗疼痛攣急為寒勝腫滿重着
為濕勝煩渴熱頑為暑勝如四氣兼有但推其多
者為勝麻者為風痛者為熱腫者為濕寒勝則蟲
皮膚中之狀熱勝則縱蓋足六經皆能致病惟手六
經不與焉寒則溫之熱則寒之在表則散在裏則
下若大虛氣乏間作補湯隨病冷熱而用之不可
拘執其人黑瘦者易治脾大赤白者難愈黑人耐

湯醫大全

卷二十六

脚氣

主

顧氏秘書

風濕赤白人不耐風濕瘦人肉硬肥人肉軟耳其
用藥當分虛實寒熱表裡如黃柏蒼朮乃濕熱必
用之藥也防已獨活治腰以下至足濕熱腫盛也
木瓜取入肝走筋也赤苓木通滲利其濕也肉桂
烏附散寒濕也木香檳榔香附烏藥宣行氣道之
劑也紅花桃仁活血行凝之劑也牛膝杜仲草薢
虎骨壯筋骨之劑也參芪白朮歸芍地黃補養氣
血之劑也合宜而用則或攻或補皆可奏功 錦囊
又曰脚氣初起甚微多不令人識也食飲嬉戲氣力

如故惟卒起脚屈弱不能動為異耳南北所感雖有內外之殊然皆由腎虛婦人病此者亦由血海虛而得之與男子腎虛同也若入腹衝心嘔吐不止危在頃刻宜入味丸溫以逐之入腎則腰脚腫小便不通目額皆有黑氣冲胸喘而呻吟左尺脉絕者死蓋腎虛陽衰之人多犯此腎乘心水尅火也故腎氣脚氣當以金匱腎氣丸預為服之也又曰南方自外而入者止下脛腫痛北方自內而致者乃或至於手節也治法初用解散次必推蕩大便以導其邪氣

瘍醫大全

卷二十六

脚氣

古

顧氏秘書

經曰臥出而風吹之凝於膚者為痺凝於脉者為泣凝於足者為厥至重要大論云太陰之勝火氣內鬱流散於外足脛附腫飲發於中附腫於下凡內傷酒食脾胃營運之氣有虧不能上升乃下流乘其肝腎之位注於足脛加之房事不節邪氣乘虛乃為脚氣久而不愈遂成痼疾堅硬如石謂之石疽肉色紫赤皮肉潰爛名為緩疽惟宜溫補

又曰脚氣或見食嘔吐憎聞食氣腹痛作瀉或二便阻塞或精神昏憤或妄語錯亂或壯熱頭痛有類傷寒名脚氣攻心多死

又曰其脉浮弦者風濡弱者濕洪數者熱遲者寒微者虛牢堅者實結則因氣散則因憂緊則因怒細則因悲

又曰婦人脚十指如熱油煎者皆由榮衛氣虛濕毒之氣流滯經絡上攻心則心痛下攻脚則脚痛其脚指如焚如脚氣之類經云熱厥是也

瘍醫大全

卷二十六

脚氣

圭

顧氏秘書

醫論曰脚氣之疾皆由脾胃二經虛弱坐卧行動之間而為風寒暑濕之氣所干流注而成此疾得病之始多不令人便覺必感他病乃始發動或奄然太悶經兩三日方覺之先從脚起或緩弱疼痺行起忽倒或脛腫滿或足膝枯細或心中忪悸或小腹不仁大小便秘澀或舉體轉筋骨節酸疼或惡聞食氣見食吐逆或胸滿氣急壯熱憎寒傳足六經外症與傷寒相似但卒然脚痛為異耳其為候不一若寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱

脉浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而濇者起於寒風者汗之濕者燥之熱者清之寒者溫之又當隨四時表裏虛實治之切不可用溫補及湯淋洗此醫家之大戒也蓋補則氣實多致不救淋洗則邪毒入內亦難治矣治之不早使毒氣入腹衝心攻築作痛喘滿上氣嘔吐異常此則漸致傾危其可忽耶

林氏曰或問足跗腫痛明係濕熱如何謂之脚氣既以氣稱亦不失為濕熱如何又有外感內因之別

傷醫大全

卷二十六 脚氣

六

顧氏秘書

乾濕寒熱之異甚至衝心嘔逆譫語神昏以致於死也答曰此一氣字自與平常濕熱不同蓋非一朝一夕所致此症雖由濕氣微邪然而沉伏於足三陰經既久不能發洩鬱蒸為熱瘀而紅腫腫而後痛且足三陰之脉從足之內踝而上至於大小腹更由腹而上溢乎包絡咽嗑之間故腫痛必然牽引經絡而鬱蒸之氣又自下而上逆於心胸遂至寒熱似瘧惡心嘔逆所以有類傷寒之別名况病發之初未有不外感內因或暴怒房勞所觸

發於是內外兼症夾襍倉卒難辨初學臨症茫然昧於用藥倘使表裏虛實之不別補瀉寒熱之罔投未有不至於衝心危殆者也 活人編

又曰或問雖曰脚氣亦不過濕熱久鬱而成有何利害以至於死若果可以致人於死則其症更凶於傷寒何以又謂之類傷寒耶况曰類者亦正與傷寒相近故亦有七日而愈七日而死十四日而愈十四日而死據此豈不可謂之脚氣傷寒乎答曰脚氣與傷寒原屬二症難以混淆只有寒熱嘔逆

傷醫大全

卷二十六 脚氣

七

顧氏秘書

及三陰三陽傳變深淺與傷寒相似故曰類也若論致死之因凡風寒暑濕之邪無有不由於經絡而傳於六腑以至五臟自輕至重自重至危何獨脚氣為然而必與傷寒並論哉
又曰脉與形證此症濕熱為本客邪觸發為標發時還從足跗紅腫微痛而起腫甚則痛愈甚而鬱蒸之氣由經絡入於足三陽之腑故有寒熱交作畏寒煩躁惡心嘔逆煩渴引飲喘急譫語惡食而復能食二便秘結不通其脉浮洪弦數有力者謂之

乾脚氣乃三陽經受病也若二便通利汗多不渴
惡心嘔逆湯飲不受肢厥戴陽神昏譫語六脉沉
伏細軟無力者謂之濕脚氣乃三陰經受病也
又曰脚氣治法乾脚氣初則疎散中則和解末則潤
下濕脚氣初亦疎散中亦和解末則宜乎清補

傷醫大全

卷二十六

脚氣

六

顧氏秘書

男婦脚氣門主方

脚氣流火

黃芪

生地黄

杜仲

五加皮

木瓜

當歸

牛膝

漢防己

秦艽

酒煎服取汗

脚氣痛不可忍者

木瓜

去子忌見鉄

白茯苓

蒸

當歸

酒蒸各二兩

川草薺

鹽水拌炒

牛膝

酒蒸各二兩

薏苡仁

炒四兩

傷醫大全

卷二十六

脚氣方

丸

顧氏秘書

爲末米飲爲丸如梧桐子大每早白湯送下三

錢永不再發

又方

真葳靈仙

洗淨陰乾搗四兩

牛膝

酒浸視臍臍虛實而增減

研末蜜丸或酒調服忌茶以槐角湯代茶

葳靈仙有五陰一味極苦色深翠三折之脆而不紐四折之有微塵如胡連狀五折處有白

葳靈仙

一切脚氣神奇濟世方

穿山甲前二足燒存性研細入麝少許多少隨人

斟酌要服此藥須去他事晚間忌進飲食至夜深
腹空時調服坐卧隨意及鷄鳴再一服痛立止過
一二日便能步履如常

松葉酒 千金方

治脚氣十二風痺不能行

松葉六十觔剉細以水四擔煮取四斗九升以釀
米五斗如常造酒法另煮松葉汁以漬米並饋飯
共釀封七日後澄飲之取醉得此酒力者甚眾

治脚氣屢試神效絕勝諸方

傷醫大全

卷二十六 脚氣方

三

顧氏秘書

白殭蠶 炒二兩

乳香 另研

沒藥 另研各五錢

丁香 一錢

麻黃 三兩去根留節炒黃

各研為末和勻每服一兩好酒調下取醉汗出
至脚為度俟汗乾即愈後用桃柳梅槐桑五樣
嫩枝煎湯先飲好酒三杯洗脚止痛為妙

風脚氣痛不可忍

用回陽玉龍膏加乳香沒藥末酒調敷最妙

洗方

白蘿蔔煎湯洗

又方

收秋天白蘿蔔英陰乾凡有脚氣之人每年逢冬
至數九日煎洗九個九每交九即煎洗共洗九次
保一年不發下年又如法洗之自不再發矣

又方

孔叟叟

菴菴草

蒼耳草

各等分

煎湯薰洗

又方

孔叟叟

品條花葉

即檳榔條

傷醫大全

卷二十六 脚氣方

三

顧氏秘書

搗爛煎湯洗

又方

地骨皮

劉寄奴

煎湯薰洗

又方

香紫蘇

八兩

忍冬花

四兩

木饅頭

七個

蘇木

二兩

為粗末以水煎數沸桶盛分三度添用只一次

洗完永除病根

手脚氣腐爛

水片

海蝶蛸

黃柏

輕粉

兒茶

各等分

研細乾摻

三陽脚氣主方

活人編

防風三錢

乾葛

羌活各一錢五分

蒼木

枳殼

各一錢

木通

檳榔

各五分

生姜二片水煎早晚空心服

湯醫大全

卷二十六

脚氣方

圭

顧氏秘書

右方疎泄表裏之風寒暑濕兼利痰氣之要藥初起宜加蘇葉一錢麻黃五分去檳榔木通使濕熱之邪從汗解散也服疎解和中丸中則加半夏一錢五分檳榔大腹皮各一錢去防風檳榔末若二便不通則加大黃三錢黃連一錢去防風羌活蒼木香菴一錢五分乾葛黃連木瓜各一錢防已五分去防風羌活蒼木檳榔服正氣丸濕痰甚者加陳皮半夏各一錢五分澤瀉一錢服橋半枳木丸

三陰脚氣主方

薏苡仁三錢

茯苓皮 防風各一錢五分

羌活

澤瀉各一錢

防已

大腹皮各五分

生姜一片水煎早晚空心服

邪在三陰誤用重濁之藥則傷元氣右方輕清利導化濕清熱之平劑也初起加乾葛二錢去腹皮中則加木瓜一錢五分去羌活末則加車前木瓜各一錢去羌活腹皮血虛內熱者加木瓜一錢五分牛膝一錢丹皮五分去薏苡仁羌活腹皮氣虛者加人參白朮各一錢五分去羌活腹皮服千里水真陰不足命門之火不歸者常服金匱腎氣丸陽虛者加人參二錢白朮一錢五分附子肉桂各五分去茯苓皮腹皮羌活防風防已服和中益氣丸

寒濕氣腿疼不可忍者 王侍栢 先於街上覓穿壞草鞋不拘隻數放尿桶內浸透晒乾又浸又晒如此三次將晒乾草鞋置小盆內

湯醫大全

卷二十六

脚氣方

圭

顧氏秘書

將火引着放淨圓桶內將腿足置桶上薰之再以棉被蓋住腿足俟薰出粘汗自覺輕爽一二次愈又方

象糞晒乾燒烟薰之除根

輕脚氣

治脚氣

當歸

川草薺 鹽水

川芎

石楠葉

枳榔

薏苡仁

蒼朮

米泔浸 鹽炒

川續斷

獨活

五加皮 杜仲姜汁炒 北細辛

枳殼 宣木瓜 羌活

川牛膝各一兩 麻黃去節 葦靈仙

廣木香 五靈脂 海桐皮各七錢五分

乳香去油 沒藥去油各五錢

右為末酒浸雪糕為丸桐子大每服五十九食

前木瓜湯下

桑寄生丸

治脚氣

湯醫大全 卷二十六 脚氣方 孟 顧氏秘書

羌活 桑寄生 防風

白朮各三兩 杜仲 川續斷

赤芍藥 薏苡仁 當歸

獨活 白茯苓各二兩 蒼朮四兩

紅花五錢 川芎八錢 宣木瓜三兩六錢

右為細末水盪為丸每服三錢白湯送下

洗方

葦靈仙 防風 地骨皮

荆芥 當歸尾 升麻

赤芍藥各等分

煎湯洗

又方

金銀花 防風 猪蹄殼

荆芥 車前草 桃枝

透骨草 柳枝

煎湯洗

又方

杉木 橘葉

湯醫大全 卷二十六 脚氣方 孟 顧氏秘書

煎湯洗

脚氣衝心

礬石煎湯浸脚

新增江蘇揚州府江甘儀三邑婦女脚氣門上論

江南揚州府江都甘泉儀徵三縣婦女脚氣始自康熙五十年間從前並無此證此乃得於陰陽錯謬之沴氣非上古男婦濕熱壅腫五痺之脚氣也其感受也皆由於富貴之家性情驕傲稍不如意恚怒易生安享太過飲食無節傷饑失飽喜發生冷亦有女子婚姻愆期經事驟閉或配非其偶抑鬱不舒肝氣凝結脾氣鬱滯是以肝脾兩傷肝血日

傷醫大全

卷二十六

脚氣

五

顧氏秘書

虧肝氣日增肝無血養筋脉拘攣脾氣日困胃腸不振脾失健運濕熱漸生吐口不寬加之飲食非時七情自戕初見症也月事不調吐口作痛嘔吐酸水綠水痰涎身體大腿作酸小腿漸痛臍下或左或右必有或長或圓氣塊作埂拍拍跳動由上而下覺吐口稍寬則疼痛至足脛跌口熱如火烙再則痛至足指指甲縫中痛如針刺日夜喊叫欲生不可欲死不能忽而足痛稍定則吐口依然脹悶甚則面色呈青目睛倒視胸前非重手按捺男

子脚跟踣住則昏厥不省人事兩足非婦女替換揉搓不能少定痛楚更有四肢搖擗頭項動搖昏厥僵仆有一二時而甦或半日而甦者無論體之強弱但能清餓七日其痛漸定亦有十四朝二十一朝始能漸定者此又在醫之用藥善與不善及一病家妄與粥湯吊住邪氣之所致也考脚氣之論古時有乾脚氣濕脚氣之稱乾脚氣其痛也足脛跌指紅腫疼痛有汗足指縫中流水今揚地俗呼亦有公

傷醫大全

卷二十六

脚氣

五

顧氏秘書

母之稱公脚氣其痛也腫而色白治之縱愈不能望其生育因其血氣大虧經必過期而至慳濟無多母脚氣其痛也腫而色紅其熱如烙經多先期而至治之如法尚可望其生育大勢皆由肝脾素虧邪由虛召施治之法因風寒而發者但散風寒因暑濕而發者但清暑濕因飲食生冷而發者但溫中化滯因氣惱恚怒而發者但平肝散鬱如法治之先分其勢其發必輕但病者當平時無病須作有病想服丸藥每早以養血調經寧神散鬱為

主如調經養血九河車大造九益母八珍九香附
 女金丹益氣養榮丸之類蓋陰藥多滯每早服之
 取其陽中之陽易於消化每晚以健脾和胃為主
 如加味六君子丸加味異功散水登資生丸和胃
 健脾丸之類擇而用之俱宜水法叠作小丸蓋水
 叠細丸入胃即化夜乃陰中之陰即胃腕新進飲
 食亦可藉以消化三年之內勿令間斷其患自可
 永除仍須病人改換性情節戒口味慎之又慎此
 治脚氣之大法也惜乎揚城婦女脚氣相延四五
 十年病家極受痛楚呼天搶地醫家惟知檢查歷
 朝各家五痺脚氣諸方施治無非防已木瓜秦艽
 草薺威靈仙桂枝桑枝蒼朮厚朴烏藥檳榔黃柏
 千年健鑽地風菴葦草五加皮海桐皮降香節肉
 桂附子乳香沒藥虎骨青皮等味一派損脾伐肝
 破氣傷陰之品捨此之外伎已窮矣其所以然者
 醫家認定濕熱先橫一脚氣上衝厥逆無救之害
 於胸中惟以趕其下趨為第一策罔顧病人之正
 氣殊不知其病始於肝脾兩虛厥氣上犯胸膈脹

傷醫大全

卷二十六

脚氣

夫

顧氏秘書

悶驟用攻伐峻利之藥逐其下行豈知正氣與邪
 氣俱陷譬夫盜賊入門自應開門逐賊今將盜賊
 趕入呆巷無門可遁其勢不得不鑽牆挖壁奪徑
 而逃其如婦女十指甲中無縫可逃是以兩足十
 指脹痛有如針挖更有過投以上諸藥正氣大傷
 倉廩空虛正不敵邪邪氣得以肆橫下既無門可
 遁直衝而上鮮有不一衝而喪其生者至於體實
 者七日漸安體虛者十四日始寧更有極虛者二
 十一日始安其故何也斯症即如傷寒六日傳遍
 邪氣已衰七日天地之氣來復凝結之氣隨天地
 之氣來復而解自愈原非醫者追趕藥力能令七
 日自愈耳此又無怪乎醫者之悞當初此症初行
 之時醫家原無頭緒亦不知此為陰陽錯謬之診
 亦不知婦女感受之由考諸方書五痺脚氣門中
 無不過以上諸藥投之不效只嫌病大藥輕惟有
 多加分兩別無他法執而不移任其痛楚七日自
 愈在病家延請羣醫而用藥立方大槩不過如此
 亦遂信而不疑竟無救亦不過委之脚氣上衝本

傷醫大全

卷二十六

脚氣

夫

顧氏秘書

無可救之術揚城婦女四五十年罹此夭折死而
悟良可悲也是以有斯症服斯藥者初起尚輕再
發卽重三發愈危竟有數發而死者多矣豈知秦
漢以來歷朝所著方書有曰緩風有曰弱脚有曰
脚氣所立之方皆治普天下男婦風寒濕熱五痺
脚氣之方並非治揚郡江甘儀三邑婦女感受陰
陽錯謬之沴氣而成脚痛之方也况古時男女朴
實者多地土本厚今揚郡水土本薄知識易開稟
受本弱兼之嬌養性成安逸太過情性乖張喜殮

瘍醫大全

卷二十六

脚氣

辛

顧氏秘書

生冷非暴躁恚怒卽沉默內鬱肝氣鬱經事不
調犯此弊端方成此病况古人雖有先見之明洞
窺臟腑恐未能數千年前卽逆料我朝揚郡江
甘儀三邑婦女將來數千年後必有感此錯謬異
氣而成此脚氣遂留諸方法治之耶卽使果有先
見之神明何不標明某方治男婦五痺脚氣某方
留治揚郡江甘儀三邑婦女脚氣耶且江甘儀三
邑婦女脚氣現症情形不特蘇松常鎮江淮各郡
並無此症卽揚屬高郵寶應興化泰州鄰邑婦女

亦未聞有此異症也至謂揚郡地處卑濕其濕熱
鬱於肌表者瘡疥極多濕熱壅於腸胃者腫滿頗
衆兼亦有男婦濕熱下注腿膝紅腫光亮破流脂
水至晚下淋脛跌脹痛者然其初起決不由肚口
作痛其紅腫脹痛亦不似此等熱如火烙痛如刀
絞之慘若執古方施治何異抱薪救焚施治之法
亦有用防已木瓜秦茺五加皮海桐皮海風藤川
革薺蒼朮黃柏厚朴等味而愈者此男婦脾土高
阜膏梁麪藥蘊積有餘之濕熱用之偶有效耳若

瘍醫大全

卷二十六

脚氣

辛

顧氏秘書

以之治男婦脾土卑監飲食不運化爲不足之濕
熱用之則非徒無益而反有增劇之害也澄每嘆
揚郡男婦飲食不調喜殮生冷脾胃潮濕精神如
舊而胸膈不寬舌有潮胎不思飲食不飲茶湯竟
有三四十日不進粥湯大便不行腹內腸鳴時或
泄氣仍可應酬嬉戲者投以蒼朮香砂姜桂萸附
等劑其病漸愈湯藥服之已多但能進食卽止煎
劑數月之後其病又作形證既同醫家照前蒼朮
混投而病家因前功旣建視蒼朮如參苓亦堅信

而不疑殊不知脾為萬物之母胃為水穀之海初
 病脾土壅遏非蒼朴不足以平胃土胃土既平則
 萬物發生此至理也醫者病者未悉治農之理高
 者平之窪者培之土地既平之後必如農夫懇田
 調其灌溉滋之培之然後能發生五穀萬物資生
 今醫者病者第以平胃為治濕之金丹日事蒼朴
 平胃是將可耕之田平而又平漸平成一聚水之
 深塘但有水液痰涎未有不歸之脾胃虛虛之禍
 可無戒哉意治斯症者高阜自應平胃卑監惟

易醫大全 卷二十六 脚氣 圭 顧氏秘書

宜健脾輕者消補兼施重者補火生土非姜附理
 中湯即桂附六君子病愈之後六君子九加味異
 功丸金匱腎氣丸七味地黄丸歸芍六君子丸水
 登資生丸按症施用自可永除脾胃濕熱之患矣

因僑居揚郡診視既久婦女脚氣及男婦濕熱
 之症極多每見婦女脚氣悲痛號呼披頭散髮抽
 掣咬牙殊令人驚心慘目是以悉心審察病情探
 本尋源另開生面投之藥劑無不旋愈始知前醫
 未識病由妄投攻下以致病家戕其生者不可勝

數今澄既已獲效於前不敢秘其法而不傳爰特
 增此門質 諸高明君子凡我 同道診視此等
 症候務循此法不至仍前錯悞則不但病者受福
 即司醫者亦可種德於無窮矣謹論

脚氣之患多患於富貴之家而經紀小戶從無脚氣
 可見富貴之家奉養太過安逸過甚以日繼夜以
 夜繼日貪頑則當食不餐受者則啖之無厭稍有
 拂鬱則恚怒頻生語言微犯則含蓄不釋是以肝
 脾受傷易於感召也至於經紀小戶婦女非勤於

易醫大全 卷二十六 脚氣 圭 顧氏秘書

針工即勞於操作但得菜飯充腸一衫蔽體既無
 分外之求更無奢靡之想筋骨雖勞氣血反暢黎
 藿充饑脾無壅滯縱有濕熱相干輕則生瘡患疥
 甚則起脚紅腫而已脚氣之邪未能干犯也且婦
 女脚氣一染先從胸膈脹悶肚口作痛嘔吐痰涎
 綠水胸前有硬按之搏手漸則腰腿酸痛由上而
 下痛至足脛跌指則胸膈漸寬倏然腿脚疼痛稍
 減胸膈漸加脹悶或然上攻或然下注其患儼如
 竹夫人肚中毬子滾上滾下胸膈稍寬脚下必痛

脚下稍定胸膈必脹甚則混投粥飲油湯邪氣上衝一衝即厥屢厥必死所以脚氣上攻胸前要人重手緊按竟有要男子雙脚踹踏胸前乳側方免昏厥脚氣下注兩足必要二人揉搓摸撫晝夜不停更有過身酸痛要人揉搓儼如和麩加之煎湯調藥需人豈知晝夜燈燭炭火延醫拯救一人有病十人服侍刻無寧晷且恐病人生氣多方先意承志要一奉十猶以為未足若非富貴之家焉得有如許之人服侍如許之錢措辦假使貧窮小戶

湯醫大全 卷二十六 脚氣 書 顧氏秘書

一夫一婦翁姑年老子女幼小之家患此不特服侍無人日食尚且不敷憑何措此靡費再加昏厥翁姑夫婿何以堪此澄所謂陰陽錯謬之異氣者未嘗不因人而召之也

所謂江甘儀三邑婦女脚氣乃陰陽錯謬之冷氣者凡患脚氣親戚婦女探視偶坐病人床沿即可傳染而成脚氣之異所以為異耳每見婆有脚氣其媳亦然母有脚氣其女亦然姊有脚氣其妹亦然如有脚氣其姪亦然傳染者固多不傳染者亦復

有之

婦女脚氣有一種滴酒不可飲者有一種平時戒飲惟舉發時非酒不能稍定其痛竟有飲燒酒者想來酒能亂性昏神不過一醉神昏即不知錐痛矣凡患脚氣痛止忌人問其仍痛與否但遇有問之者痛必復作

凡患脚氣最忌人談說他人脚氣但聞此語其病必發此乃肝虛膽怯所致耳

凡患脚氣婦女清餓以痛止胸寬為率痛止只宜吃水煮飯湯漸漸吃盪飯不可先進粥湯糕湯度免胸膈脹悶纏綿時日

凡患脚氣平時常忌食物

湯醫大全 卷二十六 脚氣 書 顧氏秘書

鮭魚	黃魚	魷魚	蝦子	蝦油	螃蟹
蟬蚋	鯉魚	猪首	公雞	鷺	鴨蛋
鮮菌	香蕈	蘑菇	黃瓜	番瓜	麩筋
蒲菜	芫荽	茄子	香瓜	薺菜	藟菜
茨菰	蠶豆	黃豆	糟菜	腐乳	醬瓜
菲菜	茼蒿	鮮笋	火酒	雜酒	粘食

麩食 變蛋 蝦米 薑乾 黃鱸 豌豆頭

豌豆 芋子 芡角 御米 蘿蔔 石耳

木耳 鮮蟶 河歪 蛤蚧 滴醋 鷄蛋

湯圓 羊肉 驢肉 芹菜 菠菜 團圓餅

西瓜

凡婦女脚氣舉發時忌聞香氣凡安息芸香蒼朮均不可焚燒

凡婦女脚氣原不必限定七日始定但發於月經後者為日必多發於月經前者只要經水一通其邪

湯醫大全 卷二十六 脚氣 美 顧氏秘書

隨經自解其痛易定可見是肝脾遏鬱氣凝血滯

凡婦女脚氣發後宜靜養調理須戒房事一月

凡婦女有脚氣者將臨月事之前忌食生蘿蔔西瓜

桃子杏子李子生藕荸薺柿子柿餅等物

凡婦女脚氣嘔吐痰涎綠水不得食核桃叭嗒杏落

花生松子此四物有油皆嘔家所忌

凡婦女脚氣平時宜戒暴怒鬱悶必須自惜身命改

換性情無病時作有病想方能不發

雙鈎籐鈎祛風舒筋脚氣定痛聖藥宜多用

新增江蘇揚州府江甘儀三邑婦女脚氣門主

方

獨活湯 治婦女脚氣感風寒而發者遍身腰腿酸

痛

獨活 防風 荆芥 赤芍

陳皮 半夏 厚朴 蘇葉

白水煎 或加鈎籐鈎

加味二陳湯 治婦女脚氣因飲食而發者胸膈脹

悶惡心嘔吐痰涎綠水足膝酸痛

湯醫大全 卷二十六 脚氣方 美 顧氏秘書

廣皮 半夏 白茯苓 厚朴

炒山查 香附 砂仁 澤瀉

蘇梗 獨活

白水煎 胸膈不寬加枳殼 痛加鈎籐鈎 發熱加防風荆芥赤芍

解鬱湯 治婦女脚氣因氣惱恚怒而發者兩脇作

脹腿脚酸痛

蘇葉 廣陳皮 半夏 當歸

鬱金 香附 白芍 遠志肉

白茯苓 青皮 醋炒鈎籐鈎

白水煎氣滿加煨木香

鎮風湯 治婦女脚氣肝風內鼓搐搦拘攣心中跳
動腿脚錐痛面青厥逆

橘紅 半夏 白茯苓 鈎藤勾

明天麻 白芍 當歸 秦艽

棗仁 川續斷

白水煎或加癩葡萄藤一錢
或加赤金為引

清暑湯 治婦女脚氣因暑邪而發者

葛根 防風 赤芍 厚朴

湯醫大全 卷二十六 脚氣方 美 顧氏秘書

赤茯苓 澤瀉 麥門冬 青蒿

秦艽

白水煎

健脾異功丸 治婦女脾胃失調飲食不運面目痿

黃肌膚消瘦每晚服之

人參去蘆 於白木東壁土 白茯苓飯上蒸

粉甘草蜜炙 廣陳皮飯上蒸 製半夏姜汁炒

吳神麴炒 薏苡仁炒 陳枳殼炒

澤瀉鹽水炒 五穀蠹新瓦焙 懷山藥炒黃

穀芽炒香 兔絲餅命火衰
微始用 雞脆皮新瓦焙

右製畢磨為細末水法疊丸如菜豆大每晚白

湯送下二錢

加味養榮丸 治婦女脚氣心虛血少怔忡心悸肝

脾不足調經養血非此不效

當歸身酒洗焙 白茯苓人乳蒸 肥玉竹焙

杭白芍酒炒 酸棗仁炒熟 丹參酒炒

遠志肉甘草湯 栝子仁二兩 川續斷酒炒

橘紅飯上蒸 杜仲鹽水炒 秦艽酒炒

湯醫大全 卷二十六 脚氣方 美 顧氏秘書

女貞實蜜拌蒸 鈎藤鈎四兩全 金二兩

右製畢磨細末用金釵石斛一觔全鈎藤鈎四

兩熬膏和丸如豌豆大每早白湯送下三錢

醒脾和榮湯 治婦女脚氣疼痛漸定者宜服

橘紅 茯神 半麴 當歸

女貞子 石斛 丹參 白芍

棗仁 澤瀉 穀芽 薏苡仁

神麴 麥芽 香附 山藥

秦艽 川續斷 杜仲 栝子仁

蓮子肉 熟地 玉竹 人參

兔絲餅加火微 益母草加臨經 元胡索加腹痛 桑枝

益智仁加涎唾 紅花加經少 鬱金加氣鬱 金橘葉

白荳蔻和胃不加 砂仁加胃寒 煨木香加氣痛 佛手

半夏加痰多 陳皮 枳殼開大便 香櫟皮

車前子小便加 北沙參 鈎藤鈎 麥冬

以上諸藥按症摘用神而明之貴乎當也惟當忌之藥臚列於左司醫者萬勿輕投以免

虛虛之禍不可大意

易醫大全 卷二十六 腳氣方 顧氏秘書

防己 檳榔 木瓜 桂枝

穿山甲 杉木節 乾薑 川草薢

五加皮 海桐皮 海風藤 蘇子

乳香 沒藥 威靈仙 菝葜草

千年健 鑽地風 蒼木 烏藥

黃栢 虎骨 菖蒲引邪入心 虎骨膠

降香 沉香 川牛膝 懷牛膝

以上諸品均為大禁凡誤作有餘風寒濕痺輕投上藥必致輕變重而重變亡縱不即喪其生

必惟愈發愈凶之患不可不慎

腳氣奇方

鮮癩葡萄連穰子放陰陽瓦焙乾存性研末每服一錢白湯或木瓜酒調服立可止痛

又方

癩葡萄藤切片浸酒每飲一小杯其味雖苦久久飲之可除此患此藤陰乾每用一二錢能定小兒驚風大小男婦暑驚又能治孕婦嘔吐不止兼治遍身筋痛

又方

易醫大全 卷二十六 腳氣方 顧氏秘書

翻白草洗淨浸酒每飲一杯立可止痛

又方

鮮鳳尾草朝北者洗淨煎湯服之止痛

又方

牛皮膠切片全麩炒成珠 研細末每用酒調服一二錢止痛

又方

穿山甲二兩 白芷 三奈

甘遂 皂角刺 羌活

乳香去油 沒藥去油 甘松

僵蠶各一兩

共研細末摻脚帶上纏脚不發

椒艾囊

艾葉半觔 川椒一觔 草烏二兩研粗末

三味和勻用興紅布做褥如綿褥狀包足底春夏時不用火烘秋冬宜微火烘使椒艾氣得行

於足自然寒濕風毒諸氣皆能消散立可止痛

平日仍要夜夜包好睡

易醫大全 卷二十六 脚氣方 聖 顧氏秘書

又方

雞蛋清隔湯畧燉温掃上熱痛自止

又方

田中黃土晒燥研細代礬搽脚其根自除

洗脚氣

宣木瓜 秦艽各二兩 生薑

連鬚芎各八兩

右熬湯待温先薰後洗外用生薑汁調乾麩敷

又方

乾桑葉伍錢平時三五日煎湯洗脚除根

又方

白芥子研細末酒調敷

易醫大全 卷二十六 脚氣方 聖 顧氏秘書

傷醫大全目錄

卷二十七

足踝部

風疽門主論 附方

內踝疽門主論 附方

外踝疽門主論

穿踝疽門主論

驢眼瘡門主論 附方

足發背門主論

足心癰門主論

田螺炮門主論

癩疽門主論

婦人脚十指油煎門主論

脫疽門主論 附方

敦疽門主論

青蛇頭門主論 附方

厲癰門主論

癩發門主論

傷醫大全 卷二十七 目錄 一 顧氏秘書

臭田螺門主論 附方

青蛙毒門主論

脚丫毒門主論

脚丫癢爛門主論 附方

甲疽門主論 附方

牛程躑門主論 附方

足跟疽門主論 附方

土栗門主論

足疔怪病門主論

足跟冷疔門主論 附方

雞眼門主論

爛皮濕熱門主論 附方

遠行奔走脚上起泡門主論 附方

足汗門主方

小脚門主方

傷醫大全 卷二十七 目錄 二 顧氏秘書

瘍醫大全卷二十七

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

指錢之栢東

男 樞燮用和

全校

足踝部

白足踝起至足跌底指止一切癰疽疔毒皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷二十七

風疽

顧氏秘書

風疽門主論

心法曰風疽生足脛骨及曲凹之處癢癢皮刺津流黃汁極其粘濃此由風邪留於血脉相搏而成因其根深故有疽名甚則身體煩熱昏冒而肌肉透紅更增腫痛宜服防風湯外塗青竹大豆油即效

風疽門主方

青竹大豆油 全鑑

青竹筒截三尺長徑一寸半筒內裝黑豆一升以穀糠馬糞二物燒火當竹筒中灸之以磁器兩頭接取淌出油汁以漬米泔水和鹽熱洗患處拭乾即塗豆油不過三度極驗

瘍醫大全

卷二十七

風疽方

顧氏秘書



瘍醫大全

卷二十七 內踝疽

三

顧氏秘書

內踝疽門主論

靈樞云發於內踝名曰走緩其狀癰色不變數石其輪而止其寒熱不死

王肯堂曰足內踝生疽名曰鞋帶癰由寒濕滯於足陽明與足厥陰經血澁氣阻所致 準繩

內踝疽門主方

祛濕消邪湯 岐天師

薏苡仁 二兩

生甘草 三錢

金銀花

蒲公英

當歸 各一錢

水煎服

此濕熱也祛濕清邪湯主之蓋濕氣必下受而水流必下行薏苡仁去濕而利關節之氣金銀花去火毒之邪助之以生甘草則邪易散而濕易退矣然而血虛則水氣易侵濕邪易入今用當歸以補其血血足水無所侵而濕難入故用之合宜而病可速效也

瘍醫大全

卷二十七

內踝疽方四

顧氏秘書



湯醫大全

卷二十七

外踝疽

五

顧氏秘書

外踝疽門主論

王肯堂曰外踝疽又名脚拐毒生足外踝屬足少陽

膽經足太陽膀胱經濕熱下注準編

申斗垣曰脚拐毒又名鞋帶疽乃膀胱經寒濕注於

皮膚傷於筋骨平常不覺久則疽發於兩踝是也

玄 救

心法曰外踝疽屬三陽經脈絡也由濕寒下注血溢

氣阻而成其堅硬漫腫皮色不變時時隱痛難於

行走宜服內托羌活湯若虛弱將欲作膿跳痛無

時者俱服十全大補湯全鑑

湯醫大全

卷二十七

外踝疽

六

顧氏秘書

穿踝疽門主論

陳實功曰穿踝疽卽脚拐毒乃足三陰經濕熱下流
停滯而成初起內踝腫痛徹骨舉動艱難甚則串
及外踝通腫此證若不早治因循必成廢疾 正宗
又曰大法初起宜荆防敗毒散加牛膝脹者針之玉
紅膏斂之虛者補之

心法曰穿踝疽乃脾經寒濕下注血滯氣阻而成先
從內踝骨發起串及外踝至蝕裏外通腫不紅以
有頭爲陽易破易治若只悶腫無頭爲陰難潰難

湯醫大全

卷二十七

穿踝疽

七

顧氏秘書

愈如初起寒熱往來有紅暈兼有熱也宜荆防敗
毒散皮色不變者宜萬靈丹其餘悉同癰疽治法

全

又曰內踝疽生兩足內踝近腕之處屬三陰經脈絡
也由濕寒下注血滯氣阻而成其堅硬漫腫皮色
不變時時隱痛難於行走初宜瘡科流氣飲加牛
膝木瓜防已宣通之外以蒜灸消散已成服內托
黃芪湯若虛弱者將欲作膿跳痛者十全大補湯
外敷烏龍膏

又曰穿踝疽內踝疽外踝疽若潰出清水或投方不
應纏綿日久者必成廢疾難治

澄曰內踝疽卽鞋帶疽屬足三陰經脈絡外踝疽卽
脚拐毒屬足三陽經脈絡皆生兩足踝近腕之處
俱由寒濕下注血滯氣阻而成初宜隔蒜灸

湯醫大全

卷二十七

穿踝疽

八

顧氏秘書

驢眼瘡門主論

澄
曰脾經濕毒流滯足脛骨爛如廉瘡四邊紫黑時
流毒水或淌臭膿名曰驢眼瘡俗名夾棍瘡因其
疼痛難堪故名之也亦有碰傷而成亦有毒蚊虻
蠅咬傷而起最難收功

瘍醫大全

卷二十七

驢眼瘡

九

顧大

驢眼瘡門主方

驢眼瘡 集驗

出螺搗爛敷數次即愈

瘍醫大全

卷二十七

驢眼瘡方

十

顧氏秘傳



瘍醫大全

卷二十七

足發背

十一

顧氏秘書

足發背門主論

鬼遺方云足跗發跗一作跌起足跗及足下二十日

不穴死十日可刺發赤白膿血不多其瘡上癢及

赤黑者死

王肯堂曰足跌結毒腫痛名足發背屬足厥陰肝陽

明胃經之會多因濕熱乘虛而下注膿稠可治膿

清紫陷者死準繩

靈樞云發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治之

百日死

王肯堂曰病蝦症患脚背手背腫大有赤痕如蝦之狀準繩

又曰脚背或脚趾腫痛不可忍以脚高懸起其疼方

止些若以脚垂下其疼不可當者名倒拔腫瘍

申斗垣曰脚發背一名蛇沿毒因草木蛇遊人行草

上惹受蛇毒初起堅硬紅腫光澤疼痛作膿者可

治其狀如湯潑發大水泡不久則變紫色而穿破

者或經年不愈至骨成渾者俱難治矣啟立

又曰脚發背亦有腎經濕毒流滯而成

瘍醫大全

卷二十七

足發背

十一

顧氏秘書

汪省之曰足發背發於足背衝陽陷谷二穴乃足陽

明胃經多血多氣初發令人寒熱作嘔痛癢麻木

例

心法曰足發背一名足跗發足背雖屬三陽而偏主

膽胃二經居多證由七情內鬱或兼六經外傷而

成經云三背不宜生瘡惟足背多筋少骨肉少皮

薄又在至陰之下發瘡疽者升發遲慢所以謂為

險候也宜別五善七惡而分順逆發背者大瘡之

通名也或癰或疔均當細辨順逆既分則生死可

判矣

又曰初宜隔蒜艾灸令瘡速潰

卷
曰脚發背生於脚背筋骨之間乃足三陰三陽之所司也此之手發背為尤重皆緣濕熱相搏血滯於至陰之交或赤足行走沾染毒涎抑或撞破悞觸污穢而成總之外染者輕內邪流滯者重

湯醫大全

卷二十七

足發背

主

顧氏秘書



湯醫大全

卷二十七

足心癰

主

顧氏秘書

足心癰門主論

鬼遺方云兩脚心發微骨者不治如脚心微皮破不至深發膿不多者可治

王肯堂曰足心發毒腫痛亦名涌泉疽俗名病穿板又名穿窟天蛇屬少陰腎經虛損所致宜十全大補湯八味地黃湯大劑不問晨夜投之潰爛嘔逆

迷悶脉微代者死

準繩

馮魯瞻曰脚心發毒淺者可治毒深者不治

錦囊

申斗垣曰脚心癰乃心腎二經濕毒流注發於足心

敬

又曰脚底穿心疔又名井泉疽乃腎經外感風邪濕毒流於脚底久則穿爛遂成漏症

心法曰湧泉疽乃足少陰腎經虛損兼濕熱下注而成生足心湧泉穴故名若十四日內卽潰膿淺則爲癰猶爲可救悉照癰疽施治外用神燈照法若虛甚膿遲十全大補湯潰後入味地黃丸若黑陷不疼二十一日之內不潰膿者爲疽屬陰敗之證難救 全鑑

湯醫大全 卷二十七 足心癰 五 顧氏秘傳

田螺炮門主論

心法曰田螺炮多生足掌而手掌罕見由脾經濕熱下注外寒閉塞或因熱體涉水濕冷之氣蒸鬱而成初生形如豆粒黃炮悶脹硬疼不能着地連生數炮皮厚難於自破傳度三五成片濕爛甚則足附俱腫寒熱往來治宜苦參菖蒲野艾熬湯熱洗次用線針將炮挑破放出臭水加味太乙膏貼之再將炮皮剪去宜用石羔輕粉等分研末撒之仍以膏貼更有經年不愈者係下部濕寒以金匱腎氣丸常服甚效 全鑑

湯醫大全 卷二十七 田螺炮 共 顧氏秘傳

陳實功曰田螺泡乃脾經風濕攻注多生手足忽如火燒隨生紫白黃泡不久漸大脹痛不安用針挑破泄去毒水太乙膏蓋如挑破又生者須服解毒瀉脾湯 正宗

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

癆疽門主論

汪省之曰癆疽乃足太陽膀胱經多氣少血生於足

小指後跌在京骨金門二穴五七日得膿不多者

吉如黑色不潰癢甚者凶 理例

湯醫大全

卷二十七

癆疽

七

顧氏

婦人脚十指油煎門主論

馮魯瞻曰婦女脚十指如熱油煎者此由榮衛氣虛

濕毒之氣流滯經絡上攻心則心痛下攻脚則脚

痛其脚指如焚如脚氣之類經云熱厥是也

湯醫大全

卷二十七

油煎

六

顧氏



湯醫大全

卷二十七

脫疽

九

顧氏秘書

脫疽門主論

靈樞云發於足指名曰脫癰其狀赤黑者死不治不

赤黑者不死治之不妄急斬之否則死矣

鬼遺方云癰疽發兩足指五日不穴死四日可刺

其色發黑癰不堪未過節者可治

王肯堂曰足指生疔重者潰而自脫故曰脫疽或曰

惟足大指患之為脫疽其餘之指患之曰致疽易

治惟脫疽難治 準繩

陳遠公曰有足指頭忽先發癢已而作痛指甲黑色

湯醫大全

卷二十七

脫疽

十

顧氏秘書

第二日足指俱黑三日足面俱黑黑至脛骨即死

此無名腫毒得之多服春藥乃火熱之毒非足疽

可比若足疽止黑左足指也然足疽最凶雖不如

無名腫毒之橫而速殺人則一也蓋足為四餘之

末宜毒所不到何以凶惡至此正以毒所不至之

處而毒聚不散反出于指甲間則毒盛非常而治

之轉不可輕視然則以泄毒之藥治之可乎而誰

知不然人身之氣盛則周流于上下毒斷不聚于

一處惟氣血大虧不能循行經絡而火毒惡邪乃

固結于骨節之際足疽之生乃氣血之虧不能周

致之故然則烏可單泄毒以重傷氣血乎必大補

氣血加泄毒之味則全勝之道也顧步湯牛膝一

兩 金釵石解 一兩 人參 三錢 黃芪 一兩 當歸 一兩

金銀花 三兩 水煎服一劑黑色解二劑疼止三劑

全愈若已潰爛多服數劑無不愈也此方以銀花

解毒非牛膝石斛不能直達足指非人參歸芪不

能氣血周流使氣通血活以散毒也即無名腫毒

此方治之亦効不但治足疽也世醫有以刀切去

足指亦是治法然不若此方補中敗毒起死回生
既無痛楚之傷又有全活之妙也 水鑑

陳實功曰夫脫疽者外腐而內壞也此因平昔房術
澀精丹石補藥消燦腎水房勞過度氣竭精傷而
成手足乃五臟枝幹故凡患此者多生手足初生
如粟一點黃泡其皮猶如煮熟紅棗黑色侵漫相
傳五指傳遍上至脚面疼如湯泡火燃其形骨枯
筋縱其穢異香難解其命仙方難活血死心敗筋
死肝敗肉死脾敗皮死肺敗骨死腎敗死生付於
湯醫大全 卷二十七 脫疽 三 顧氏秘書
度外孫直人曰在肉則割在指則切即此病也乘
其未及延散時急用頭髮十餘根纏患指本節盡
處繞裝十餘轉漸漸緊之毋使毒氣攻延良肉隨
片蟾酥餅放原起粟米頭上加艾灸至肉枯瘡死
為度次日日本指盡黑方用利刀每至本節縫中將
患指徐順取下血流不止用金刀如聖散止之餘
腫以直君妙貼散敷之次日倘有黑色未盡單用
蟾酥錠研末摻之膏蓋黑色自退患上生膿照常
法用玉紅膏生肉護骨完口此為吉兆內服滋腎

水養氣血健脾安神之劑若內無變症外無混雜
此十中可保三四凡治此症不可一已醫治必與
高明眾議聽患家願情割取方可動手因此症首
尾吉凶變駁難定故不可輕易用之又有形似而
來非穴真而受異治在活法又不可妄行切割也
當臨症詳酌之 正宗

又曰脫疽多生手足初起如粟漸大其色如褐或似
棗皮漸黑漸開漸大黑如烏羽不知痛癢熱臭難
聞小兒多從積熱積毒大人多因誤服丹石與陽
湯醫大全 卷二十七 脫疽 三 顧氏秘書
等藥羈阻精道房術所致古人雖有割截之法予
見三人俱至七八日而死
馮魯瞻曰脫疽多因房術虧損腎水鬱怒有傷肝脾
地位偏僻藥力罕到氣血難達易致筋潰骨脫故
猶宜補托氣血為主以脉消息若黑色者不治 錦囊
寶漢卿曰訓疽乃肺經受熱發於兩手五指頭上七
八日不瀉必死四日可刺如發黑癰不甚過節猶
可治也黑甚過節者死雖過節猶可治者藥入及
之也其狀因小黯肉中生點子點小者如粟豆大

惟大者如梅李或赤或黑乍青乍白有實核即根
 也不浮腫慘痛應心至骨或身體發熱若不急治
 毒遂冲上面悉腫泡點紫黑爛壞入心殺人南方
 人得此名曰樹着毒即截去其指恐毒上攻罕有
 一生十指端忽然策策痛入於心不可忍之向明
 望者晃晃黃赤或黯青黑是燥疽齒間出臭水血
 者七日亡矣但厚肉處即割去用烙鐵烙之令焦
 如炭亦如治疽之法灸百壯為佳須頓飲葵根汁
 青靛花竹瀝犀角汁枳殼湯消毒飲若吐膿血不
 易醫太全

易醫太全

卷二十七

脫疽

五

顧氏秘書

治宜以灰掩膿血上不則毒氣着人亦相染矣燥
 疽害人不能腫惡風入肌脉初未知覺毒鬱既發
 若火之烈其上隱小而深實點黑而不明其病應
 心稍緩則入臟矣
 心法曰脫疽多生足指之間手指生者間或有之蓋
 手足十指乃藏府枝幹未發疽之先煩躁發熱頗
 類消渴日久始發此患初生如粟黃炮一點皮色
 紫暗猶如煮熟紅棗黑氣漫延腐爛延開五指相
 傳甚則攻於脚面痛如湯潑火燃其臭氣雖異香

難解皆緣膏梁藥酒及房術丹石熱藥以致陽精
 煽惑淫火猖狂蘊蓄於藏府消燼津液而成斯時
 血死心敗皮死肺敗筋死肝敗肉死皮敗骨死腎
 敗此五敗症雖遇靈丹亦難獲効初起宜服解毒
 濟生湯外用大麥米煮飯拌芙蓉葉菊花葉各五
 錢敷之止痛消之如不應必施割法須患者情愿
 將死生付之度外不可輕易動手 全鑑

又曰諸方書論脫疽單生於足大指而別指生者俱
 是敦疽此非確論然脫疽偏生於屬足陰經之指
 易醫太全

易醫太全

卷二十七

脫疽

五

顧氏秘書

者居多學者宜詳審之



脫疽門主方

陰陽二氣丹

治脫疽久服丹石補藥致虧腎水多成口燥咽

乾至飲冰雪不知其冷此孤陽獨旺宜服此解

元 參湯泡去粗皮搗膏 麥門冬搗膏 天門冬搗膏

人中白小兒溺者生用 五味子炒研 黃 栢各一兩

青 黛色嬌嫩者 枯 礬 辰 砂水飛為衣

澤 瀉 甘 草各三錢 冰 片一錢

各為細末同元參二冬膏子加煉蜜少許再搗

湯醫大全 卷二十七 脫疽方 五 顧氏秘書

千餘下軟硬得中丸如桐子大每服六十九童

便乳汁各一鍾空心送下安睡一時其功如神

清神散

治脫疽疔瘡發背毒積甚者腠理發越不盡多

致煩躁悶亂睡則譫語嘔吐不食者並宜服之

甘草節五錢 萊豆粉真者一兩 大硃砂三錢

牛 黃三分 梅花片五分

右為細末每服一錢淡竹葉燈心湯調服

雌雄霹靂火

治脫疽及一切發背初起不疼痛者並宜灸之

艾 草二錢 麝 香一錢 丁 香

雌 黃 雄 黃各二分

將藥研極細搗入艾中作安豆大丸於患上灸

之母論痛癢以肉焦為度如毒已經走散就紅

暈盡處排炷灸之痛則至癢癢則至痛為妙灸

後仍用提疔麥子貼上膏蓋次服蟾酥丸及解

毒濟生湯兼治轉回活色有膿為妙

金液戊上丹

湯醫大全 卷二十七 脫疽方 五 顧氏秘書

治脫疽及疔瘡發背縱食膏粱厚味法酒又或

丹石補藥勉力房勞多致毒積臟腑久則胃汁

中乾腎水枯竭不能上制心火以致消渴消中

消腎饒飲多乾能食多瘦九竅不通驚悸健忘

此證若出後必發疽多難治療宜預服此亦可

轉重就輕移深居淺又解五金入石之藥毒

人 中 黃 烏 梅 肉 胡 黃 連

白 茯 神 五 味 子各一兩 石 菖 蒲

遠 志 肉 明 雄 黃 辰 砂

硝石 各二錢 西牛黃 冰片 各一錢

金箔 二十張 為衣

各乳細末配準前數共入乳鉢內再研干轉於端午七夕或二至二分吉辰在淨室中先將烏梅地黃搗膏極爛和藥漸加煉蜜少許徐徐添搗軟硬得中每藥一兩分作十九金箔為衣每服一丸用人乳童便共一大杯化藥隨病上下食前後服之此藥最解膏梁金石藥毒殺三尸除癆熱極有奇功又治煩癩主安神志辟瘴辟瘟及諸邪魅謔語妄情失心喪志者俱效修合之時服藥之際俱忌婦人僧尼孝服鷄犬等見之此藥用蠟封固收藏勿泄藥味愈久愈效

湯醫大全

卷二十七

脫疽方

毛

顧氏秘書

脫疽門主論

心法曰脫疽多生於足指而手指亦間有生者此由膏梁太過則損脾胃勞太甚則損腎脾既損則血生少腎既傷則精必竭更兼濕熱壅盛而成初起黃粟小炮痛如湯潑火燃其色紅活腫無黑暈潰破有膿腐無敗色此屬血脈未死之候然此證雖無敗色亦由臟腑發出未可視為小毒也急宜內服滋陰救燥補血理脾之藥清心寡慾調理庶無變證 全鑑

湯醫大全

卷二十七

脫疽

毛

顧氏秘書

又曰首尾禁用灸法

青蛇頭門主論

王肯堂曰青蛇頭又名指風毒生足大指節上乃毒蛇所處之地人不知覺毒在經過染受毒氣故生此毒初起狀如湯瀝火燒痛不可忍內毒癩甚增寒壯熱四肢酸痛後則贅肉突出痛如刀割用人龍散敷之贅肉自縮輕者經旬匝月重者兩三月不收功潰敗筋骨多有之矣 準繩

瘍醫大全

卷二十七

青蛇頭

无

顧氏秘書

青蛇頭門主方

人龍散

蛇頭贅肉突出

人龍即蜈蚣人吐出者更在雄黃二錢全搗爛敷贅肉上即時贅肉縮進腫消痛止而愈

瘍醫大全

卷二十七

青蛇頭

无

顧氏秘書



傷醫大全 卷二十七 厲癱 三 顧氏秘書

厲癱門主論

王肯堂曰厲癱發於足傍其狀不大初從小指發急治去之其狀黑者不可消輒益不治百日死 準繩
心法曰靈樞云發於足上下名曰四淫發於足傍名曰厲癱不急治之俱百日死此二證俱由足三陰經虧損為疽者重若兼足三陽經濕熱下注而成癱者輕若紅腫疼痛潰後有膿腐脫無黑氣侵漫屬濕熱偏勝順症易治若微紅微腫潰出膿水屬陰氣凝結不能化膿險症難治若黑暗漫腫痛不

潰膿煩熱作渴小水淋漓為陰敗惡症屬逆四淫無邊沿厲癱類敦疽首尾宜壯脾滋水或可成功若妄用苦寒剋伐之藥多致不救 全鑑

傷醫大全 卷二十七 厲癱 三 顧氏秘書

痼發門主論

陳實功曰痼發乃天時不正之氣感而發之非毒內
作也此患多生手足掌心或腰腿臂下伸縮之處
漫腫無頭憎寒壯熱四肢沉重煩渴為甚初起宜
服萬靈丹發汗解表如仍不消者必欲作膿均照
癰疽已成治法 正宗

心法曰此症疾如痛風其色淡紅

湯醫大全

卷二十七

痼發

三

顧氏秘書

臭田螺門主論

陳實功曰臭田螺者乃足陽明胃經濕火攻注多生
足指脚丫隨起白斑作爛先癢後痛破流臭水形
同螺腐甚者脚面俱腫惡寒發熱先宜甘草湯洗
淨貼蟾酥餅三日三換後用珍珠散猪脊髓調搽
膏蓋腫處以真君妙貼散敷之 正宗

心法曰臭田螺由胃經濕熱下注而生脚丫破爛其
患甚小其癢搓之不能住癢必搓至皮爛津腥臭
水覺痛時其癢方止次日依然作癢經年不愈極

湯醫大全

卷二十七

臭田螺

三

顧氏秘書

其纏綿全編

臭田螺門主方

驗方

甘草 蕙苡仁

煎湯洗之用黃連膏潤之

湯醫大全

卷二十七

臭田螺方

五

顧氏秘書

青蛙毒門主論

申斗垣曰青蛙毒因着濕鞋潮襪一時不覺日久漸成此毒狀如青蛙紅赤者可治紫黑者痛如刀刺經年者難愈必用乳香血竭膏貼之內服活血祛風之劑 啟立

湯醫大全

卷二十七

青蛙毒

五

顧氏秘書

脚丫毒



湯醫大全

卷二十七

脚丫毒

毒

顧氏秘書

脚丫毒門主論

申斗垣曰脚丫毒是足經受症足背肤是足三陽經足掌心丫是足三陰經受症當分何經加引經藥以治之 敬玄

汪省之曰伏鼠疽多生於手足指上了間在背外歷歷三五疽如毳在皮中痛相應者乃伏鼠疽若不早治毒氣攻心即死 理例

脚丫癢爛門主論

陳實功曰婦人脚丫作癢乃從三陽風濕下流凝結不散故先作癢而後生濕爛又或足底灣曲之處癢濕亦然 正宗

申斗垣曰脚丫濕爛乃濕熱下注或熱足下水以致脚丫破爛如平素濕熱盛者聽其淌水不須醫治濕熱由此外泄若驟用燥藥收乾反助濕熱內患也 敬玄

湯醫大全

卷二十七

脚丫癢

癢

顧氏秘書

難行先用礬湯洗拭再以密陀僧煨赤置地下去

火毒研極細末搽之次日即能行走

胡公弼曰凡脚丫初起小泡作癢潰爛毒水流注之處即作癢潰爛出水此乃濕氣侵淫之症以神應散治之 青囊

散治之

脚丫癢爛門主方

枯礬散

石膏煨

輕粉

黃丹各三錢

枯白礬五錢

研勻温湯洗淨搽藥其癢即止

又方濟生

五倍子炒枯

松香

枯白礬

水銀

鉛各五錢全水銀煨死

雄黃三錢

湯醫大全

卷二十七

脚丫癢方

顧氏秘書

右為細末先用荔枝草煎湯洗過將此藥搽之

密陀僧散

密陀僧一兩

石膏

枯白礬各二錢

輕粉一錢

研細桐油調搽濕則乾搽

又方

鷲掌皮焙研細末搽之香油調敷亦良

又方

松蘿茶葉焙研細末搽之

又方

稻草把燒烟薰之

又方

臭樹花煎湯浸洗

又方

九江礬紙揉軟夾脚丫內

又方

草紙煤

石

粉即婦女面疾粉各等分

和研細乾搽

湯醫大全

卷二十七

脚丫癢方

顧氏秘書



甲疽

癩醫大全

卷二十七

甲疽

聖

顧氏秘書

甲疽門主論

王肯堂曰甲疽嵌甲足三陰經皆起於足指氣血阻而不行結於指甲之間能成甲疽凡以經絡之所流注非特肌肉之病也或得於剪甲傷肌或得於甲長侵肉或得於履絢之不適使氣血沮遏而不通腐潰為疽久則爛指上引於脛膝之間而瘡疤者自己然病在四末不必治其內惟塗敷滌濯去惡而除穢及適其行履則愈矣 準繩

又曰按足指在人體最下氣血易沮藥力難到虛弱

之人小有破損即成瘡瘍久而不斂况其大者非其大補氣血豈能易愈古云病在四末不必治內非通論也

寶漢卿曰足三陰經皆起於足氣血阻滯不行潰於指甲間或鞋小不適血氣阻遏不通腐潰久則浸淫爛指用芎椒湯浸洗快刀割去甲角入肉處搥乾用白礬燒令沸定為末敷之濕則再敷數易即散矣

陳寶功曰甲疽因甲長侵肌或修甲損傷良肉或靴鞋窄小俱能生之其患贅肉裹上指甲腫痛異常當以白降丹化去贅肉珍珠散收口 正宗

申斗垣曰嵌指即甲疽非氣血不和而生乃因靴鞋短窄或踢蹙故甲內長瘻肉時時流水痛不可忍百治不愈庸醫悞認指疔上藥罔效須令修脚人修去內甲再上生肌散自愈 破玄



甲疽門主方

甲疽肉腐膿血疼痛

厚杜蠟生研細末每服二錢加青靛少許酒調下

又方

鹽湯盪洗

嵌甲入肉成疽延爛外臺秘要

綠礬五兩燒至汁盡研末
色如黃丹收之

每以鹽湯洗拭用末厚敷以軟絹纏裹當日即

汁斷瘡乾每日一遍鹽水洗淨其痂乾處不須

湯醫大全

卷二十七 甲疽方

聖 顧氏秘書

上藥或作白膿即擦破敷之自愈

華陀屢效散

橄欖核三個煨
存性 黃丹三分 硃砂

乳香各一錢 輕粉五分

研細香油調搽



湯醫大全

卷二十七 牛程躄

聖 顧氏秘書

牛程躄門主論

陳實功曰牛程躄乃因程途奔走熱脚下水見風以致氣滯血枯結成頑硬皮肉榮衛不滋漸生腫痛腫高突起步履難行久則破裂膿水相流每日溫湯洗淨搽牛角散又有內膿攻注皮頑難破者以大線針眼頭挑破出膿乃寬硬皮躄破者剪而去之肉不生者玉紅膏搽之內滿不生皮者生肌散搽之正宗

心法曰牛程躄生於足跟及足掌內頑硬腫高埂起

色黃疼痛不能行履此熱脚着冷水或遇寒邪襲於血脉致令氣滯血凝而成初起宜薰烙之法消之久則破裂膿水津流每日米泔水洗淨搽牛角散四圍頑皮浮起剪去換搽玉紅膏珍珠散生肌飲口全鑑

湯醫大全

卷二十七

牛程躩

聖

顧氏秘書

牛程躩門主方

牛角散 正宗

牛角尖 燒灰

松香

水龍骨

輕粉 各等分

湯 共研細末牛骨髓調搽虛弱者兼服十全大補

又方

治脚後跟老皮肉痛起疽破頭成漏久不完口不能着地疼甚者

湯醫大全

卷二十七

牛程躩方

聖

顧氏秘書

用黃蠟松香各一錢許化開即投入水中取起看漏口大小用藥為丸塞住漏眼外用棉花裹脚裝住勿動十數日之間漏乾着地演試不痛漸漸行動漏內肉長自將藥頂出功難盡述

薰法 全鑑

用瓦盆一箇內安新磚磚上安放鴿糞糞上合篾籬以脚踏在篾籬上再以滾水從傍衝入蒸之後漬之冷則易之初起用之可消

又法

新磚燒紅韭菜汁潑之將病足踏於其上盪之初起自消


易醫大全

卷二十七

牛程踐方

是

顧氏



易醫大全

卷二十七

足跟疽

吳

顧氏秘書

足跟疽門主論

王肯堂曰足跟疽又名兔囓其狀若兔囓故名屬足太陽經穴名申脉在足跟骨下此處乃陰陽二蹻發源之所由臟腑積熱所致其毒深重最忌毒藥敷貼若紫陷麻木神昏脉亂者不治過時潰爛者有妨飲食二便不調或涉房勞怒氣迷悶者死準薛立齋曰足跟乃督脉發源之所腎經所過之地若飲食起居失宜虧損足三陽經則成瘡矣若漫腫寒熱或體倦少食屬脾虛下陷也施治之法滋肝



腎扶脾胃為主

馮魯瞻曰婦人足跟足指腫痛足心發熱皆因胎產
經行大於調攝虧損足三陰虛熱所致若腫痛或
出膿用六味地黃丸為主佐以八珍湯胃虛懶食
佐以六君子湯寒熱內熱佐以逍遙散補熱益甚
頭目不清佐以補中益氣湯凡發熱喘熱內熱自
汗盜汗等證皆陰虛假熱也故丹溪謂火起九泉
陰虛之極也足跟乃督脈發源之所腎經所過之
地諸骨承載之本若不求其屬泛用寒涼其為天

傷醫大全

卷二十七

足跟疽

疑

顧氏秘書

在者多矣

錦囊

又曰男酒色過度者多患此證

汪省之曰爛疽屬足太陽膀胱經多血少氣生於足
跟申脈穴又名足疽如初起赤腫有頭可刺黃白
色膿可治如初起便破黑爛則凶若不早治令人
足落不能生也

理例

又曰筋疽生兩足後跟崑崙二穴乃足太陽膀胱經
多血少氣初起三五日皮如蟲蝕過一年有蟲內
食其骨骨粗膿多時節落盡如筋頭黃赤色經年

不瘥名曰痿漏一名曲疽如膿水不止名曰冷疽
多死

心法曰足跟疽生足跟俗名脚攀根此由臟腑積熱
汗出涉水遠行傷筋而成初腫紅紫疼痛潰破膿
水淋漓狀如兔咬經云兔囓狀如赤豆深可至骨
務須急治遲則害人蓋謂毒之深惡也屬足太陽
膀胱經穴名由臍即陽蹻脈發源之所又乃腎經
所過之路瘡口久潰不合陽蹻脈氣不能冲發腎
氣由此漏洩以致患者蓋虛初起宜隔蒜片灸之

傷醫大全

卷二十七

足跟疽

幸

顧氏秘書

服仙方活命飲加肉桂牛膝潰後宜補中益氣湯
人參養榮湯桂附地黃丸隨症滋補治之

全鑑

王海藏曰兔囓久不收斂用鹽湯洗之白朮研末撒
之兩日一易謹戒一切勞碌即效
澄曰足跟疽多因汗足涉水或遠行有傷筋骨或濕
熱流注而生初起必癢勿視容易可用艾灸或因
循十餘日膿血淋漓經年不斂如瘻以椒鹽湯洗
之

足跟疽門主方

敷法

乳香

沒藥

海蝶蛸

赤石脂

各等分

研細末用黃蠟化開和勻作餅敷上包紮即愈

湯醫大全

卷二十七

足跟疽門主方

顧氏秘書

流水蕪根瘡門主論

申斗垣曰流水蕪根瘡多生於足後跟下赤爛內有肉絲縷縷如蕪根相似故名之是足太陽膀胱經多血少氣又沾房事况在跟下最難收功必先洗去陰藥死肉臭氣用紅升藥加苧蕪根煨灰乾摻

玄敬

宜內服腎氣丸

湯醫大全

卷二十七

蕪根瘡

至

顧氏秘書

土栗門主論

心法曰土栗又名琉璃疽生在足跟之旁形如粟粟
亮而色黃腫若琉璃此由行走崎嶇之路勞傷筋
骨血脉而成膿熱針之膿少水多者陀僧膏貼之
鑑全

湯醫大全

卷二十七

土栗

一

顧氏秘書

足疔怪病門主論

申斗垣曰兩足心凸腫上生黑疽瘡其硬如疔脛骨
有碎孔髓流出身發寒戰惟思飲酒此名足疔怪
病乃肝腎二經寒熱毒氣相合而成 啟玄

湯醫大全

卷二十七

足疔

一

顧氏秘書

足跟冷疔門主論

心法曰冷疔生足跟由濕寒凝結而成形如棗栗起紫白皴疼痛徹骨漸生黑氣腐爛孔深時流血水氣穢經久不斂者宜神燈照之 全鑑

瘍醫大全

卷二十七

冷疔

素

顧氏秘書

足跟冷疔門主方

鐵粉散 全鑑

生鐵粉

即城砂如無用黑鉛四兩鉄杓化開傾水中冷定取出又化又傾以盡為度去水取淨末

三錢

黃丹

水飛

輕粉

松

香

各一錢

麝香

一分

各研細末共和一處再研勻將患處以葱湯洗去血水府臭香油調搽患上油紙蓋上線紮

瘍醫大全

卷二十七

冷疔方

素

顧氏秘書

鷄眼門主論

心法曰鷄眼本名肉刺主於足指形如鷄眼故俗呼之根陷肉裏頂起硬凸疼痛步履不便此緣纏脚或着窄鞋奔行極擠皆能生之宜貼加味太乙膏滋潤之或用紫玉簪根搗爛塗貼油紙蓋之或地骨皮紅花各等分研細香油調敷俱效 余鑑

傷醫大全

卷二十七

鷄眼

辛

顏氏秘書

鷄眼門主方

紫玉簪膏

五倍子 一兩

紫玉簪葉 二十片

乳香

沒藥 各三錢

河豚眼睛 三十個

血竭

兒茶 各二錢

五芝麻油 半觔

東丹 四兩

先將藥全油熬枯再入乳沒茶竭化盡濾清復入鍋內熬滾徐徐下丹老嫩得宜攤貼

又方

蜈蚣一條煨研細末每用少許以膏蓋之

傷醫大全

卷二十七

鷄眼方

辛

顏氏秘書

鷄眼膏

鮮白菜外面綠皮不拘多少搥碎桐油熬枯去渣滴水成珠不散為度加雄黃少許攪勻收貯先將雞眼熱水泡軟貼上一伏時揭下內有紅絲拔出

又方

蜈蚣 一條

紫草 三錢

麻油一兩熬至藥枯去渣入淨鍋內加枯礬一錢東丹一錢熬至滴水不散投白蠟黃蠟各五錢每用少許攤貼

又方

蜈蚣二條 白膠香 蘇油

黃蠟各等分

先將蜈蚣入油熬枯去渣滴水成珠不散再下膠香黃蠟成膏攤貼

又方

雞胃食指之餘者以石壓之立驗

金蓮穩步膏

地骨皮 鮮紅花各等分

湯醫大全 卷二十七 雞眼方 李 顧氏秘書

梓成膏敷雞眼疼處即消若已害者敷之次日

即癩落

脚針膏

阿魏 莖木各三錢 三稜二錢

麝香五分 雞肫皮七個 鱈魚血一杯

大黃四兩 葶藶連皮陰乾二十四個

用蘇油一筋先熬羣藥去渣入阿魏熬枯再下鱈魚滴水成珠入炒黃丹四兩徐徐投攪成膏冷定下麝末攤貼

雞眼

不可用鐵器割只用磁鋒割則再不生患處用葶藶搗爛敷上絹縛即愈

脚上肉刺雞眼止痛

黃丹 朴硝 枯礬各等分

為末炒葱白拌塗之

雞眼膏

葶藶 線穿 火丹草 陰乾 蟾酥

草麻子 桃仁 穿山甲

商大全 卷二十七 雞眼方 李 顧氏秘書

一稜 紅花 莖木

天南星 各二錢 鱈魚血 半杯 陰乾 雞肫皮 不見水

河豚眼 十枚 陰乾 虎耳草 陰乾 阿魏 各一錢

麝香 三分 蘇油 六兩 飛黃丹 三兩

熬膏將雞眼修淨攤貼

又方

烏梅肉荔枝肉各等分搗膏貼之自消

肉刺雞眼 集驗

草麻子為細末敷上一二時其刺自出痛即止

又方

葱根

葶藶搗汁一碗煎用

另用松香四兩麻油全煎滴水成珠方入煎汁

畧熬攤骨貼之即落

又方 集驗

蜈蚣一條 硼砂等分

放磁罐內拌勻埋地下七日取出銀簪點上即

脫

又方

癩毒大全

卷二十七

癩眼方

李

顧氏秘書

玉簪花根搗爛敷

又方

葶藶一個葶藶一錢搗敷一夜除根

爛皮濕熱門主論

足三陰濕熱脚紅腫皮破流脂類乎血瘋浸淫不

止癢痛非常當用黃連膏治之

癩毒大全

卷二十七

濕熱

李

顧氏秘書

爛皮濕熱門主方

黃連膏

治爛皮濕熱

先用桐油一觔入鍋熬起白星為度加黃連一兩五錢溶化入研細炒黑大黃末一觔攪勻入水片二分攤貼

又方

半枝蓮搗爛敷之

瘍醫大全

卷二十七

濕熱方

李

顧氏秘書

遠行奔走脚上起泡門主論

遠行奔走皆由包脚布縱而不平或釘鞋釘或襪底得汗縱起或鞋大小擠脚皆能起泡亦有傷及良肉潰膿厥痛者
又曰行遠路者走十餘里將包脚布從新包裝則不起泡

瘍醫大全

卷二十七

脚上泡

李

顧氏秘書

遠行奔走脚上起泡門主方

又方

飯粘搗敷以紙覆之過夜平復

又方

水調白麩敷之

人走長路緊急被石塊脚底墊腫不能行步痛不可

忍者名曰脚墊 懷德堂秘錄

急用舊草鞋浸尿桶內一夜將新磚燒紅以浸濕

草鞋放磚上隨以腫脚踏上火磚通尿氣入內即

瘍醫大全

卷二十七 脚上泡方 李 顧氏秘書

消若不早治恐潰爛難愈如走長路脚腫疼痛亦

用此法立消

凡久行久立脚心腫痛 單方

蚯蚓尿水和敷一夕即愈

足汗門主方

止脚汗

白礬 乾葛 各五錢

煎湯連洗五日其汗自止

瘍醫大全

卷二十七 足汗

李 顧氏秘書

小脚門主方

桑杏湯

桑白皮 八錢 朴 硝 一兩 乳 香

杏 仁 各二錢

五大碗水先煎桑杏至三碗再入乳硝封口化盡先薰後洗足大能小其軟如綿

又方

明 礬 一兩 葦 靈 仙 川 椒

鳳 仙 花 玉 簪 花 各 三 錢 皮 硝 五 錢

湯醫大全 卷二十七 小脚方 李 氏 秘 傳

水煎一個時辰先薰後洗

湯醫大全目錄

卷二十八

諸瘋部

油風門主論 附方

痛風門主論 附方

癩瘍風門主論

紫白癜瘋門主論 附方

大癩瘋門主論 附方

湯醫大全 卷二十八 目錄

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

摺錢之相

全校

男 櫟燮用和

諸瘋部

自油風痛風起至癩瘋麻瘋止皆彙於此部中以便檢閱參治

傷醫大全

卷二十八

油風

顧氏秘書

油風門主論

陳寶功曰油風是血虛不能隨氣榮養肌膚故毛髮

根枯脫落成片皮膚光亮癢如蟲行此皆風熱不

虛攻注而然治以海艾湯洗之 正宗

心法曰此證毛髮乾焦成片脫落皮紅光亮癢如蟲

行俗名鬼剃頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致

風盛生燥不能榮養毛髮如就延年久宜針砭其

光亮之處出去紫血毛髮庶可復生宜用神應養

真丸以治其本外以海艾湯洗之以治其標

油風門主方

海艾湯

油風血虛風熱所致皮膚光亮眉髮脫落者

海艾 薄荷 葉木

蔓荊子 藿香 甘松

菊花 防風 荆芥 各二錢

用水五六碗同藥煎數滾連渣共入厥口鉢內

先將熱氣薰面候湯溫蘸洗之留藥照前再洗

油風面上及身上俱有不知痛癢 莊敬堂

傷醫大全 卷二十八 油風方 顧氏秘書

當歸 四兩 蝨胡麻 研碎 大生地 銅刀切片

玉竹 各三兩 川芎 五錢 蠶 蠶 炒研

白蒺藜 炒去刺 石膏 蒲 牡丹皮

荆芥 防風 白芷

赤芍藥 各兩

右剉片散藥入壺火酒五觔拌勻封壺口如飲

時對陳無灰酒飲服此三料無不全愈

神應養真丸

熟地 酒蒸 當歸 天麻

羌活

宣木瓜

川芎

鬼絲餅

白芍

蜜丸每服百丸鹽湯或酒服

醫醫大全

卷二十八

油風方

顧氏必書

痛風門主論

林氏曰或問痛風一症係血虛耶血熱耶熱極生風耶抑風邪客於經絡為痛耶其症與痛痺同耶異耶其痛流走不定者風耶火耶其痛多在經絡關節之間者筋病耶骨病耶死血為病耶痛甚於夜而減於晝者何也輕則三日一移動重則七日一移動者何也甚有痛久而傳為痠痺者又何也答曰痛者氣滯血凝經絡為之阻塞而不通也風者善行而數變乃流走不定之義也蓋風寒濕三氣

瘡醫大全

卷二十八

痛風

四

顧氏必書

客於經絡血脈之中未經疏散則鬱久生熱熱極化火而更兼風變其性流走不定伏行於周身經絡血脈之間是為病原自後或因營衛之氣血偶有阻滯於經絡關節之處則此風熱亦因之停阻欲行不行遂至浮腫而痛屈伸亦為之不利或兩三日或五七日此處血氣已通而別處復有稽留則痛亦移換至於衛氣晝則行於陽分之表而營氣亦易運故痛緩夜則衛氣歸陰營氣不行其血脉凝澁而痛甚故此症當責之肝家血少血熱木

燥火炎而虛風復從火化也蓋肝藏血肝主筋凡關節皆經脈之總會血虛既不能滋養筋脈而風火反因之阻於脈絡於是浮腫而熱浮屬風熱屬火腫為氣血阻碍每逢濕熱盛行則發實非筋骨與死血為痛也若云筋骨死血其痛定在一處焉能三日七日移換哉此實肝經無形之風熱為病蓋風熱屬火所以善走若寒與濕則又當始終痛於一處矣雖云風熱每得煖氣而痛緩者則虛火之本固寒其性喜煖再則治病之法用甚寒甚熱

傷醫大全

卷二十八

痛風

五

顧氏秘書

之藥當以從治從治不已又當求其屬以衰之從與屬者正熱痺得煖而易散之義也若痛久則飲食起居必廢精神氣血亦必因病而虛所以筋骨無力關節不利而成痿痺也

活人錄

又曰或問痛風形證與痺無異如何不附於痺症之末而又別立一門也答曰痛痺本乎寒痛風屬乎風血脈得煖則行得寒則凝寒留脈中久成痛痺况痺者閉也閉塞不通之義所以始終痛在一處非若風之善行而數變者也蓋風氣勝者為行痺

故痛風者即痺門之行痺也然其義相似而實不同者乃受病有深淺相沿有新久而病之愈也亦有難易大約瘋痛每得之於暑濕盛行之時氣血沸騰之際或衣汗衣或卧濕地或汗出迎風或貪涼熟寢於漆器竹蓆石牀之上致暑熱之氣得寒而凝因濕而著遇風而閉由是熱滯所勝反兼風化行於經絡血脈之中移動不定痛止非常非若痺症之為病深久而難愈也

傷醫大全

卷二十八

痛風

六

顧氏秘書

又曰形神如故飲食如常脈來洪滑浮弦急數有力而痛甚者實也形神萎弱飲食減少其脈虛弦濇數或微弱無神或虛搏空弦酸疼無力二便不調者虛也

又曰治痛風當分別新久虛實及屬風屬火或有濕熱亦能流注經絡關節為痛新者營衛之氣血未虧當以治病為主若痛久而精神不足者以清補兼之濕熱勝者宜燥濕清熱風火甚者宜滋燥養血大補肝陰蓋治風先治血血行風自滅若過用風藥及寒燥之劑反有耗血過火之患矣

錢青倫曰痛風者通身骨節走注疼痛也謂之白虎
歷節風都是血氣風濕痰火皆令作痛或勞力寒
水相搏或酒色醉卧當風取凉或卧卑濕之地或
雨汗濕衣蒸體而成痛風在上者多屬風在下者
多屬濕治當活血疎風消痰去濕羌活湯加減凡
治痛風用蒼朮羌活酒芩三味散風行濕之妙藥
耳 經 驗

又口一切痛風肢節痛者痛屬火腫屬濕不可食肉
內屬陽火能助火食則下遺遺溺內生痞塊雖油
湯醫大全 卷二十八 痛風 七 顧氏秘書

炒熱物魚翅切宜戒之所以膏梁之人多食煎炒
炙燂酒肉熱物蒸臟腑故患痛風惡毒癰疽者最
多肥人多是濕痰瘦人多是痰火

周鶴仙曰痛風風入骨中輕則隱隱骨內痛重則遍
身骨皆痛也亦有走來走去在骨節間作痛不可
忍者此等病雖邪入在骨髓而骨髓屬腎似宜治
腎然不可徒治腎也必須治陽明始效陽明經胃
經也大腸亦陽明經也論理去陽明之風宜用乾
葛去陽明之火宜用石膏知母然邪終在骨髓必

須用氣分藥提出氣分然後以補腎藥補其骨髓
始能去病宜用黃芪湯主之

經曰風寒濕三氣雜至合而為痺也風氣勝者為行

痺行痺者行而不定也今稱為走

痺注痺痛俗名流火及歷節風 寒氣勝者為痛

痺世稱為痛風及白虎飛尸 濕氣勝者為著痺

著痺者留著其處而不移世稱為麻木不仁或痛

著一處始終不移者是也凡風則陽受之故為痺

行寒則陰受之濕則皮肉筋骨受之故為痺者而

不去皮膚不仁是以夫痺從風寒濕之所生也

經曰以冬遇此者為骨痺以春遇此者為筋痺以夏

遇此者為脉痺以至陰遇此者為肌痺以秋遇此

者為皮痺 此以所遇之時所客之處命名以時令

又曰其入臟者死其留筋骨間者疼久其留皮膚

間者易已又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不

痛不仁者痛久入深營衛之行滯經絡時踈故不

痛皮膚不營故為不仁蓋痺在於骨則重在於脉

則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁

在皮則寒故此五者則不痛也凡痺之類逢寒則

急熱則縱皆由內虛為本可以風名不可以作風

治也

湯醫大全 卷二十八 痛風 八 顧氏秘書

統旨曰風痺者游行上下隨其虛邪與血氣相搏聚於關節筋脉弛縱而不收也寒痺者四肢逆痛關節浮腫濕痺者留而不移汗多四肢緩弱皮膚不仁精神昏塞熱痺者臟腑移熱復過外邪客搏經絡留而不行陽遭其陰故痺痺煖然而悶肌肉熱極體上如鼠走之狀唇口反裂皮膚色變經言止濕三痺此更有熱者蓋鬱久成有風寒熱熱在三氣之內發生者耳三氣合而為痺則皮膚頑厚或肌內痠痛此為邪中周身搏於血脉積年不已則成癭疼風瘡搔之不痛頭髮脫落治宜疎風涼血總由榮衛舍虛外邪留居血氣凝結而成也大抵濕多則腫熱多則痛陰虛則脉弦數而重在夜陽虛則脉虛大而重在日

傷醫大全

卷二十八

痛風

九

顧氏秘書

弱所以然者有新久輕重之分有濕痰死血之異耳治以攻補兼施而標本兼顧也薄桂味薄能橫行手臂領南星蒼朮羣藥至痛處成功葳靈仙治上體痛風漢防己治下體痛風然虛弱人並當以氣血藥兼之方能有功運行藥力

又曰痛風者古名痛痺俗謂之白虎歷節風即四肢骨節走痛也夫氣行脉外血行脉內晝行陽夜行陰各二十五度得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內傷外感則疾作矣彼痛風者因血受熱已自沸騰或再涉冷受濕取涼熱血得寒汚濁凝澁榮衛難行堅牢阻礙邪正交戰所以作痛夜痛甚者行於陰也治當以辛烈暴悍之劑流散寒濕開鬱行氣破瘀豁痰舒風和血開發腠理則佛鬱開而血行氣和自愈大約有餘則發散攻邪不足則補養氣血然亦有數種治法不能無異或因風熱或因痰或因風濕或因血虛若濕痰濁血流注為病在下焦而道路遠者非烏附氣壯者不能行故用為引經若以為主治非徒無益也總肢節腫

傷醫大全

卷二十八

痛風

十

顧氏秘書

痛因經絡感受風寒鬱久成爲濕熱流注肢節之內痛者火也腫者濕也其治宜疎風燥濕佐以調補氣血以助藥力運行終以滋養肝腎以壯筋骨堅強此其治也然痛要在勢如刀割尚屬邪正相爭之象若至全然不痛則邪正混爲一家相安於無事矣

內經論痺四時之令皆能爲邪五臟之氣各能受病六氣之中風寒濕居其半所謂雜至與合則知非偏受一氣可以致痺又云風勝寒勝濕勝者則知

易醫大全 卷二十八 痛風 主 顧氏秘書

但分邪有輕重耳皮肉筋骨脉各有五臟之合初病在外久而不去則各因其合而內舍於臟在外者祛之猶易入臟者攻之實難治外者散邪爲亟治臟者養正爲先治行痺者散風爲主禦寒利濕仍不可廢大抵必參以補血之劑蓋治風先治血血行風自滅也治痛痺者散寒爲主疎風燥濕仍不可缺大抵必參以補火之劑非大辛大溫不能釋其疑寒之害也治着痺者利濕爲主祛風解寒亦不可缺大抵必參以補脾補氣之劑蓋土強可

以勝濕而氣足自無頑麻也病退之後內節慾以保精髓慎寒冷以却外邪戒酒麪以杜濕熱服補養以生氣血則病不復發矣

又曰痺之爲證有筋攣不伸肌肉不仁與風證相似但風則陽受之痺則陰受之故多重着沉痛其三氣之中風氣者爲行痺故走而不留不拘上下左右關節之間流走而痛或三日五日又移一處俗名流火又名白虎風言其往來而痛一如虎咬之狀日輕夜重也寒氣勝者爲痛痺因血脉寒凝痛

易醫大全 卷二十八 痛風 主 顧氏秘書

在一處而不移俗名白虎飛尸濕氣勝者爲著痺上下脉理滯塞不通致令肌肉先麻而後麻木而不知痛癢卽所謂不仁經又以所遇之時所客筋骨皮肉脉之處而命名非行痛著之外另有骨筋之諸痺也崔紫虛曰風寒濕氣合而爲痺浮緊兼瀋三脉乃備則緊瀋之脉重痛沉着之症皆純陰也當助陽溫散之藥方爲對症

靈樞曰衛氣不行則爲麻木丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中分而爲二

也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而感風寒濕三氣乘之故周身掣痛麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也當以類而推治然麻木者不仁之漸也麻為木之微木乃麻之甚古方名為麻痺原病式曰麻者亦猶澁也由水液衰少而燥濕氣血壅滯而不得滑澤通行氣強攻冲而為麻也俗方治麻多用烏附者令氣行之暴甚衝開道路得以通利則中氣行而麻自愈矣然烏附止能溫行更必須兼以補養蓋麻木未有不由於氣血兩虛也或謂麻木為風離三尺之童皆以為然然如久坐而起亦有麻木假如以繩縛繫釋之亦覺麻木久則自己者此非因風邪乃氣不行也故不須治風當補其肺中之氣則麻木自去亦有因陰火乘其陽分火動於中為麻木者當兼治陰火則愈不必去火補陰而火息也大抵諸脉有餘痺在表諸脉不足痺在裏

又曰風者四時八方之氣從鼻而入乃天之氣也疾

傷醫大全 卷二十八 痛風 韋 顧氏秘書

者五穀百物之味從口而入脾胃之濕所結乃地之氣也故風勝者先治其風痰勝者先治其痰風與痰相等則治風先治痰此定法也經云風之傷人也先從皮毛而入次傳肌肉次傳筋脉次傳骨髓故善治者先治皮毛次治肌肉由此觀之乃從右而漸入於左也皮毛者右肺主之肌肉者右胃主之筋脉者左肝主之骨髓者左腎主之從外入者轉入轉深故治皮毛治肌肉不使其深入也又曰濕之傷人也先從足始此則自下而上無分左右者也從外入者以漸而驅之於外從下上者以漸而驅之於下此其治也

十指麻木丹溪曰是乃胃中有濕痰死血宜二陳湯加蒼朮白朮桃仁紅花附子

有或腿足或肩背一塊肌肉木者此陽氣不足不能周及以致陰寒凝泣也

身上虛癢者是血不榮於腠理也用四物湯加黃芩煎調浮萍末服之

傷醫大全 卷二十八 痛風 南 顧氏秘書

痛風門主方

通治痛風主方 活人錄

當歸 三錢 秦艽 二錢 防風 一錢五分

川芎 羌活 各一錢 車前子

黃芩 枳殼 各五分

水煎午後臨睡服

治痛不外乎順氣治風必先於涼血氣順則血活而脈絡通血涼則火清而風息痛則不治而自治如重感風寒使內之濕火鬱而不散者加羌活桂枝各五分去黃芩車前服芎蘇散如外復感暑濕者加蒼朮一錢五分白木澤瀉黃柏各一錢去川芎黃芩枳殼服勝濕丹血

傷醫大全 卷二十八 痛風方 主 顧氏秘書

脈凝閉不通而痛甚者加紅花一錢五分桃仁一錢桂枝五分去黃芩車前服祛風越婢酒及治絡丹病久血枯者加牛膝一錢五分製何首烏二錢服活絡丹或加味史國公藥酒病久氣虛者加白朮三錢人參一錢五分減當歸一錢五分去黃芩枳殼服祛風越婢酒兼加味虎潛丸如勞倦內傷及房勞體虛之人加人參三錢知母一錢五分牛膝一錢去羌活黃芩服滋陰百補丸及滋陰百補酒或加味史國公藥酒如寒濕風濕之痰其脈濡軟而微滑者加白朮一錢五分平夏二錢陳皮蒼朮各一錢去當歸黃芩車前服祛風越婢酒或加味史國公藥酒及四妙散活絡丹蒼朮九血虛血熱風熱內盛者服涼血省風藥酒若大便秘結淋利者服搜風順氣丸

痛風藥酒方 錢青榆 昔實中書方中年患此四肢不舉者五

載累醫罔效偶遇李讓有此秘方修合服之半月身輕目清病遂除因求此方江西淮王傳

鱉甲 七輪者醋炙 甘菊花 淨 防風

杜仲 人參 甘枸杞

粉丹皮 石菖蒲 去蘆根 秦艽

虎骨 酒炙 川羌活 油松節

牛蒡子 各一兩 白朮 黃芪

遠志 去心甘草汁煮 山萸肉 桔梗

蒼耳子 僵蠶 白茯苓

傷醫大全 卷二十八 痛風方 主 顧氏秘書

牛膝 川草薢 石蟹

天花粉 熟地 明天麻

白芍 白附子 獨活

天南星 姜汁炮 荆芥 廣陳皮

白芷 茅蒼朮 米泔浸炒 川芎

川當歸 各五錢

用無灰酒二斗浸之春夏二七秋冬三七封固母洩氣每日空心三次各飲一杯藥渣焙乾研細好酒和丸如梧桐子大每服七十九空心好

酒送下

骨節風疼 赤水玄珠

大川烏 三枚生全 錫 二十一生黑豆二十一

地龍 去泥土酒洗淨

右為末入麝香一分糯米飯和丸菴豆大每服

七丸夜卧酒下微出冷汗一二服便瘥

五汁膏 抄本

白蘿蔔 葛 菘 薤 各五觔

菜子 半觔取汁

瘍醫大全 卷二十八 痛風方 七 顧氏秘書

五汁煎成膏滴水成珠外加麻油東丹石灰收

煉如汁多加多汁少加少做膏藥貼不拘久近

立時見效

左經丸 赤水玄珠

治手足不隨筋骨諸痛遍身風瘡

大草烏 去皮筋 木鱉子 去殼 白膠香

五靈脂 各三兩 斑 毛 五枚去頭足翅

右磨細用生黑豆去皮為末一升醋和丸如芡

實大每服一丸温酒磨下治筋骨痛未經針刺

者三五服見效 此方曾醫一人軟癱風不能行

風氣痛肌膚不能近衣被者 綱目

生薑 各半觔搗汁

加水膠三條切斷投下融化攪勻敷痛處用桑

皮紙大針戳眼扯碎貼上其痛即止

又方

老薑 鳳仙葉 川椒末 香油

共搗擦痛處或鳳仙子煎湯洗亦效

又方

魚膠 四兩 姜汁 一碗

全熬膏攤布上貼痛處即止

痛風遍身骨節走痛

油松節 晚蚕砂

浸酒煮飲每日常服

風濕臂痛

秦艽 一錢 全當歸 防風 各二錢

豨薟草 木瓜 海風藤

白茄根 各三錢 麻黃 五錢

酒二觔砂鍋內煎四五滾在臂上薰洗每日二次不可息畧錢青倫云家慈嘗患此症親試立效後治他人無不響應

白鳳仙花浸燒酒飲亦效

周鶴仙黃芪湯

嫩黃芪 三兩 白朮 二兩 生地黄

元參 各一兩 甘菊 五錢

水煎服一劑少止痛二劑痛除三劑全愈加

防風一兩更妙

傷醫木全 卷二十八 痛風方 元 顧氏秘書

風痰麻木風濕藥酒 江仍度

大生地 十兩 酸棗仁 炒 當歸身

海桐皮 羌活 川草薢 風濕加此 味各二兩

地骨皮 川牛膝 各一兩 桂枝

甘草 各五錢

火酒二十觔嘗七日後即可服每飲二三小盃

不宜過多久服壯筋骨健步履並治筋骨疼痛

萬應膏 江仍度

淨松香 十觔 生大黃 黃栢

甘草 苦參 各二兩 蒼朮 一兩 生薑汁 芎 汁 各二

共入鍋內熬化升盡水氣瀝清復入淨鍋內入

真麻油三觔熬至滴水不散即火候已到用棍

攪勻 預將爛鋼一隻貯水大半鋼將水把鋼

週圍潑濕以免膏藥沾在鋼上貯水已畢即將

麻布一方將膏過入鋼內畧溫復取起以手捏

去水頭再入鍋內化開加去油乳香沒藥各六

兩黃蠟八兩熬化攪均撤去火用篩加研細百

傷醫木全 卷二十八 痛風方 丰 顧氏秘書

草霜四五兩旋入旋攪又以麻布過入水內捏

成團平日俱浸水中用若干只取若干煨化攤

貼一切痛風濕痺麻木痛楚筋骨疼痛如神如

膏老量加麻油化勻攤用可也

除濕固本膏 袁鼎臣賣三兩一張

貼一切風濕筋骨疼痛立刻定痛

人參 另研 大熟地 黃芪

五加皮 去粗皮 大附子 去皮 當歸

川續斷 川牛膝 尺 桂如無厚桂代各三錢

杏仁去皮 白芷去稍各一錢五分

右藥同麻油一筋熬至藥枯濾清去渣將油復入淨鍋內入人參末文火熬至滴水成珠不散入炒過飛黃丹七兩收之傾入水內拔去火毒磁罐密貯臨用攤貼

臨河瘋氣藥酒

當歸身一兩 白芍藥 蕙苡仁

生地各一兩 香附 杜仲各八錢

虎骨酥炙 秦艽各六錢 直川芎七錢

易醫大全 卷二十八 痛風方 圭 顧氏秘書

川續斷 羌活 五加皮各五錢

右用頭生酒三十筋封固煮三炷香放土地上退火氣一七每晚溫飲一杯

紫金錠

治週身風濕筋骨疼痛三服全愈

罌粟殼淨末六兩 開陽花火酒拌晒乾 麻黃去節炒各四兩

自然銅煨一兩 寒水石煨一兩 草烏黑豆全煮去豆

乳香去油 全蝎水洗焙乾 川芎

當歸 白芷 甘草各五錢

右為細末磁瓶密貯或用陳老米糊和搗為餅

重二三錢陰乾密貯每用量人老弱壯實用酒

磨化三四五分為率熱酒和服取汗避風要緊

走注風毒疼痛

小芥子研末和鷄子清調敷

諸般皮裡痛

何首烏末用生薑汁調成膏敷痛處以帛裹用火

烘鞋底熨之

太乙神針集驗

易醫大全 卷二十八 痛風方 圭 顧氏秘書

治一切痛風寒濕筋骨疼痛

人參 麝香各四兩 山羊血二兩

廣三七八兩 千年健 肉桂

乳香 蒼朮 小茴香

鑽地風 真川椒 沒藥各一兩

防風 蕲艾各四兩 穿山甲八兩

共為細末用棉紙一層高方紙二層寬裁一尺

二寸五分長裁一尺二寸將藥末薄薄鋪勻在

上一針約用藥七八錢緊捲如花爆式務要緊

實兩頭用紙封固外用印花布包而亦要整齊好看 用時將針以火焯着或按穴道或在痛處下襯以方寸新紅布數層將針按上若火旺布薄覺疼可加墊布數層但針必須三四枝點着一針焯熄又換一針連進七針無不立愈 近日亦有用粗紙襯患上針者亦效但襯紙襯布俱要墊的平穩若墊的有縐折便要走泄火氣致傷良肉起泡成灸瘡矣 臍間少腹非多襯紅布不可輕試若襯的不厚怕灸瘡潰爛悞事

湯醫大全 卷二十八 痛風方 圭 顧氏秘書


太乙神針其功甚巨極有奇驗只恐施之不善適足悞事澄曾見用此針隔皮袍針左臂麻木者孰知特針重按而皮袍袖口折疊火氣蒸傷臂肉成瘡足害六十餘日始愈此其小悞也又見一醫用太乙神針針臍下丹田一針其痛稍止次日又針而其腹痛更甚豈知婦女皮膚被藥針火氣走散灸瘡大作潰爛鍾口一塊洞腹透腸無法補救而死嗟乎腹痛未必即亡而醫之用之不善致成其生豈可歸咎於太乙神針乎故不得不詳述其悞以誠後之用此針者留意焉



癰瘍風門主論

王肯堂曰癰瘍風乃風邪積熱居於肺腑久而不散流溢皮膚令人頸邊胸前腋下自然斑駁點點相連其色微白而圓亦有紫色者亦無痛癢凡此皆風之與熱伏於肌腠之間氣血不和乃生此疾也 準繩

湯醫大全 卷二十八 癰瘍風 圭 顧氏秘書



紫白
癩瘋



瘍醫大全

卷二十八

癩瘋

圭

顧氏秘書

紫白癩瘋門主論

陳寶功曰紫白癩瘋乃是一體而分兩種也紫因血滯白因氣滯總因熱體風濕所侵凝滯毛孔氣血不行所致此皆從外來而成者初起以萬靈丹發汗散之 正宗

紫白癩瘋門主方

白癩風酒

苦參 五觔 露蜂房 五兩 刺蝟皮 一個

右藥咀片水三斗煮一斗去渣用汁細酒麴五

觔炊黍米三斗作飯拌麴同藥汁如釀酒法酒

成搾去糟食前溫服一二杯

三味黃芪丸 張仲景

黃芪 三兩 蒼耳子 一兩 防風 三錢

水法登丸米飲送下三錢

瘍醫大全

卷二十八

癩瘋方

圭

顧氏秘書

手上白癩瘋

鳳仙花 一棵帶泥入砂鉢內煮滾洗之

紫白癩風汗斑 張仲景

硫黃 密陀僧 各一錢 白砒 六分

研細陳醋調擦

又方

白附子 硫黃 各等分 研細姜汁調勻 茄蒂蘸擦

肥皂方

白芷 山柰 皂角

甘松 各二錢 白附子 潮腦

楮實子 菘豆粉 密陀僧 各一錢

研細用去淨皮茲肥皂一觔搥勻擦洗

又方

白砒二錢 川貝母 白芷 各五分

雄黃一錢 白附子一錢五分

研細烏雞蛋調搽

白癩風 孫真人

硫黃明礬各等分研細末敷之

瘍醫大全 卷二十八 癩瘋方 韋 顧氏秘書

癩風 李時珍

茄子蒂蘸硫黃末擦之取其能散血白癩用白茄


蒂紫癩用紫茄蒂各從其類也

紫雲癩

紫背薄萍陰乾一兩硫黃五分

研細麻油調搽

大癩瘋



瘍醫大全 卷二十八 大癩瘋 韋 顧氏秘書

大癩瘋門主論

陳實功曰大癩瘋乃天地間異症也總之驟被暴晒
霧露風雨之氣所侵或房慾後體虛為風邪所襲
或露卧當風久卧濕地總由風濕相乘氣血凝滯
表裏不和臟腑痞塞陽火所變此其根蒂也其患
先從麻木不仁次發紅斑久則破爛浮腫無膿治
法初宜發汗久當培助氣血 正宗
又曰皮死麻木不仁肉死刀割不痛血死破爛流水
筋死指節脫落骨死鼻梁崩塌此為五不治

又曰心受之先損於目肝受之而發紫泡脾受之遍身如癰肺受之眉毛先脫腎受之足底先穿此為五敗症不治

又曰治之當戒房事厚味動風等物

脉訣曰脉洪大者生沉細者死

汪省之曰大麻瘋有三因一曰風毒二曰濕毒三曰傳染

訣云治風先治氣氣足風自除治風先治血血足風自滅故當分氣血二治有養氣養血之別故治風

場醫木全 卷二十八 大麻瘋 完 顧氏秘書

之要莫穩於益氣活血為主

蔣示吉曰眉落眼盲唇翻聲啞皆為難治所以然者

由邪正交攻氣血沸騰而濕痰死血充滿於經絡

之中熱勝則肉腐故生蟲生瘡痛癢麻木也治法

內通臟腑外發經絡養榮益衛補正逐邪大劑峻

補久服而蟲瘡痛癢麻木俱自愈矣 說約

馮曾瞻曰經文治法有發汗與刺血二法汗出以泄

榮衛之佛熱刺腫以出惡血之留蓄子和曰一汗

抵于針蓋以刺血不如汗之周偏也尤宜助胃氣

以固根本實衛氣養榮血以繼之蓋原其本皆由嗜慾勞動氣血不避邪風冷濕使濕氣與胃氣相干而致是正虛為本而濕熱是標也雖曰是風不可純作風治 錦囊

林氏曰或問何為癘風何經受病何故多死而少生答曰癘者厲也即陰陽乖戾之氣俗稱大麻瘋者是也此氣乃天地間陰霾濕熱賊風不正之氣若人肺家元氣先虧則鼻竅易於觸受而皮毛腠理因之不密倘然早起晏眠宵行露宿則毒氣先由

場醫木全 卷二十八 大麻瘋 幸 顧氏秘書

鼻入而陽明獨受其邪蓋鼻為肺之竅而手足陽明經之絡起於鼻之交頰中故人在氣交之中而鼻為肺與腸胃出納升降之門戶一受風邪則鼻塞息粗打嚏流涕眉稜酸痛是其徵也所以毒厲之氣由鼻而直入陽明之絡先則眉癢而漸脫落兩顴紅潤浮腫而癢漸至兩臂皮粗毛落甚而通身肌膚搖搖作癢難忍其毒深入血脉之中則濕熱蘊積生蟲侵蝕臟腑沿駐肌肉久久精神枯涸諸蟲聚食傳為癘瘵而死 活人錄

又曰或問雖為乖戾之氣潛伏脈絡之中若以清散
疎解之藥治之自當速愈何至生蟲沿駐皮膚臟
腑敗壞腐爛而死也答曰經云大風苛毒虛邪賊
風皆陰閉濕熱鬱蒸之氣所化其性本熱及至陽
明又兩陽合明乃多氣多血之府由是氣溫血熱
最易生蟲蟲多蔓延尤難緩治病者先失於不覺
不知繼則誤於緩視而毒深再則不得其法而無
效遂至於敗壞而死非厲風即可以殺人也患者
慎之

瘍醫大全

卷二十八

大癩瘋

幸

顧氏秘書

又曰此症須在一月之內速為清散可保無恙其精
神氣血未衰六脈洪大而實或洪數有力者用汗
吐下三法分表裏攻逐之使毒氣不得稽留而速
化繼服清熱解毒涼血補血之劑禁用辛燥之藥
及耗津精血液而助酷烈之勢但患者必須清心
寡慾遠色忌口方為有益

馮魯瞻曰大風病是受天地間殺物之風古人謂之
癘風者以其酷裂暴悍耳須分在上在下在上者
以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通

天再造散取惡物陳蠱於穀道中出所出雖有上
下道路之殊然皆不外乎手足陽明二經蓋腸胃
為市無物不受脾肺二經之腑脾主肌肉肺主皮
毛乃腑病及於臟也治此病者須看其疙瘩與瘡
若上先見在上體多者病在上也下先見在下體
多者病在下也上下同得者在上復在下也胃與
大腸無物不受此風之入人也氣受之則在上多
血受之則在下多氣血俱受者甚重是非醫者神
手病者鐵心空有得愈若從上或從下以漸而來
者皆為可治但人易緩忽不能斷味絕色則難免
再發再發則終不救矣

瘍醫大全

卷二十八

大癩瘋

幸

顧氏秘書

又曰風起於八方應其時則物生違其時則物殺凡
人中氣不足如持虛受物乃感受此殺物之氣鬱
而成濕久而成熱氣濁血汚歷傳臟腑生蟲潰肌
流行為害蟲食心則足底穿膝腫食肝則眉落食
肺則鼻崩聲啞食腎則耳鳴啾啾耳莖生瘡或瘰
或痛如針刺狀食身則皮癢如蟲行自頭而來為
順風自足心起者為逆風總由濕熱之毒流結而

成也先以再造散下之稀粥調理勿妄動作勞後以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出或吐或利以洩越其邪面黑漸白而安

又曰大風症者所因不一或色慾當風或醉臥濕地或乘熱脫衣或汗出入水或空心饑餓山行感山嵐瘴氣或勞役奔走途中冒寒雨陰露皆由內傷形體不知避忌外感風濕毒氣入於皮毛血脉肌肉筋骨之間當時失於驅散停積既久以致榮衛不行內外薰蒸內則生蟲外則生瘡臟腑經絡皆

湯醫大全

卷二十八

大痲瘋

毒

顧氏秘書

受患矣眉毛先落者毒在肺面發紫泡者毒在肝脚底先痛或穿者毒在腎偏身如癱者毒在脾目先損者毒在心此五臟受病之重者也古人謂大風疾三四五死三因者一曰風毒二曰濕毒三曰傳染五死者一曰皮死麻木不仁二曰脉死血潰成膿三曰肉死割切不痛四曰筋死手足緩縱五曰骨死鼻梁崩塌與夫眉落眼盲唇翻聲啞皆為難治所以然者由邪正交攻氣血沸騰而濕痰死血充滿於經絡之中熱勝則肉腐故生蟲生瘡痛

癢麻木也治法內通臟腑外發經絡養榮益衛補正逐邪大劑峻服久服而蟲瘡痛癢麻木自愈亦須首尾斷酒戒色忌食發風動氣葷腥鹽醬炙博生冷之物清心寡慾方保無虞

又曰癩瘍所患非止一臟然其氣血無有弗傷兼證無有弗雜况積歲而發現於外須分經絡之上下病勢之虛實不可槩施攻毒之藥當先助胃壯氣使根本堅固而後治其瘡蓋病有變有類之不同而治法有汗有下有砭刺攻補之不一兼證當審

湯醫大全

卷二十八

大痲瘋

毒

顧氏秘書

輕重變證當察後先類證當詳真偽而汗下砭刺攻補之法又當量其人之虛實究其病之源委而施治焉蓋虛者正氣虛也實者病氣實也再造散治其病在陰者用皂角刺直達病所出風毒於榮血中肝主血惡血留止屬肝也且蟲亦生於厥陰風木所化用此以治其臟氣殺蟲為主白丑者專入胃與大腸既走下焦血分復去氣中濕熱追蟲取積從大小便而利出之鬱金者因性輕揚善治鬱遏氣血之凝滯因味苦辛善消陽毒積熱之亢

灸以火黃引入腸胃榮血之分利出瘀血蟲物醉
仙散治其病在陽者用鼠粘子解散陽明風毒徧
身惡瘡胡麻逐諸風潤皮膚蕪藜散惡血而清胃
通鼻氣而祛風防風為諸風之總司枯蕪根解煩
熱之要領枸杞潤腎燥而祛風蔓荊散風淫而明
目苦參專攻濕熱掃除潰瘍以祛赤癩落眉之毒
入者祛風散毒上下內外周而至矣

又曰風有三十六症而厲風為最酷感之難免於死
者以其更多不守禁忌也經曰脉風盛為癘癘者
湯醫大全 卷二十八 大癘瘋 素 顧氏秘書

惡也脉主血血熱而殺癘之氣襲之則血脉凝泣
衛氣不行其氣不清鼻為呼吸之所要宗氣由之
出入也今營運之氣不能上升為用故鼻柱腐壞
肌肉潰瘍也

又曰一貧婦因無膏梁厚味故服醉仙散外又服加
減四物湯百餘劑半年之間月經行而風症亦愈
故貴薄滋味也

風論曰風氣與太陽俱入行諸脉俞散於分肉之間
與衛氣相干其道不利故使肌肉憤脹而有瘍衛

氣有所疑而不行故其肉有不行也○癘者有營
氣熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰
風寒客於脉而不去名曰癘風或名曰寒熱

長刺節論曰病大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌
肉為故汗出百日刺骨髓汗出百日凡二百日鬚
眉生而止鍼○癘風者素刺其腫上已刺以銳鍼
鍼其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食無食他
食

脉要精微論曰脉風成為癘
湯醫大全 卷二十八 大癘瘋 素 顧氏秘書

張景岳曰癘風即大風也又謂之癘風俗又名謂大
癘風此病雖名為風而實非外感之風也實以天
地間陰癘濁惡之邪或受風木之化而風熱化蟲
或受濕毒於皮毛而後及營衛或犯不潔或因傳
染皆得生蟲蓋蟲者厥陰主之厥陰為風木主生
五蟲也蟲之生也初不為意而漸久漸多遂致不
可解救誠最惡最危最醜證也又千金云自作不
仁極惡之孽也所以最為難治觀孫真人云嘗治
數百人終無一人免於死者蓋無一人能守禁忌

故耳惟一婦人病愈後又服加減四物湯百餘劑
半年之上方得經行十分全愈又丹溪治五人亦
惟一婦人得免以其貧甚且寡無物可喫也外三
四人者越二三年皆復作而死由此觀之可見此
證非得出奇秘方鮮能取效故子逢此證不敢強
以為知而妄施治療亦不敢強言治法以惑後人
至若古人論治之法亦甚詳悉用之得宜雖病根
未必可拔而延保餘年天枉自亦可免由是偏求
諸說則惟薛立齋癘瘍機要論列已全今擇其要

傷醫大全

卷二十八

大癘瘋

卷

顧氏秘書

并諸論之得理者以為證治綱領

者婆惡病論曰疾風有四百四種總而言之不出五
種即是五風一曰黃風二曰青風三曰白風四曰
赤風五曰黑風其風合五臟故曰五風五風生五
蟲黃風生黃蟲青風生青蟲白風生白蟲赤風生
赤蟲黑風生黑蟲食人五臟若食人脾語變聲散
食人肝眉睫墮落食人心遍身生瘡食人肺鼻柱
崩倒鼻生瘰肉食人腎耳鳴啾啾或如車行雷鼓
之聲若食人皮皮膚頑痺食人筋肢節墮落五風

合五臟蟲生致多入於骨髓往來無礙壞於人身
名曰疾風疾風者是癘風之根本也病之初起或
如針錐所刺名曰刺風或如蠱走名曰遊風過身
掣動名曰攣風不覺痛癢名曰頑風肉起如桃李
小棗核從頭面起者名曰順風從兩脚起者名曰
逆風如連錢團圓赤白青烏斑駁名曰癘風或遍
體生瘡或如癢癬或如魚鱗或如榆莢或癢或痛
黃汁流出肢節壞爛為膿為血或不癢不痛或起
或滅青黃赤白黑變易不定病起之由皆因冷熱
不調流於五臟通徹骨髓用力過度飲食雜穢房
室不節虛勞轉極汗流通體因茲積熱於五臟致
生多蟲食人五臟骨髓皮肉筋節久久敗壞名曰
癘風惟見黑蟲者最為難治人得此疾速宜棄家
室財物離妻妾入山靜養治無有不瘥

傷醫大全

卷二十八

大癘瘋

卷

顧氏秘書

徐東臯曰經云汗之則瘡已况癩之為風尤瘡之最
惡者故曰癘風諸瘡熱久熱則生風且癘風尤染
肅殺之氣而成者若非汗法何以去其風毒所以
汗之一法乃治癘之最要者其餘諸方次第用之

又曰凡患人身上癢甚蓋以風邪氣鬱血不榮敷而然宜四物湯加黃芩白芷調葶苈末服發汗自愈張子和曰一汗抵千針蓋砭血不如發汗之周遍也然發汗即出血出血即發汗二者一律

沈紫亮曰夫人之生也稟天地之陰陽父精母血而成形體外毫竅內臟腑週身百骸十四經絡合於天地同參故曰天乃一大天人乃一小天然天有精明昧晦風寒暑濕燥火之氣而人亦有氣血盛衰喜怒哀樂之情是故君子調飲食而慎房勞節

易醫大全

卷二十八

大痲瘋

卷

顧氏秘書

喜怒而善攝養無七情之內傷避風寒畏暑濕忌燥火無六淫之外感則病無從而生是無天折之患上古通天論曰上工治未病愚意非工之能乃人自治耳如稱不知節縱慾縱食任喜任怒致七情偏勝氣血不和六淫易入百病生焉即如大痲瘋一症大小輕重計有三十六種症最酷烈最為劇惡而感之者變形易質眉髮脫而手足痿肌肉潰爛十指墮落膿穢淋漓臭惡難聞人皆怨而避之可不慎哉前之先哲論此症之由有五一日風

水陰陽所損二曰源流傳染所因三曰氣穢毒注所犯四曰保養失度所致五曰感冒積鬱所生此言其大畧耳然痲瘋之始由各有不同有壯年而發者有十四五歲而發者有四五歲而發者所感有殊其壯年而發者因不能節慾致喪腎元精液枯涸腠理不密易感寒濕之邪積久不去况水衰不能生木則肝虛易動而風生且風數動易變與濕相搏遂化為熱又不能驅之補之則根堅蒂固日甚一日風引濕熱之毒攻之肌肉皮毛壅遏於

易醫大全

卷二十八

大痲瘋

早

顧氏秘書

肌肉經絡之間則氣血不行初或頭面手足有一點麻木不仁如病者之家明其為惡候即延調治而醫之明察其得病之淺深風濕之輕重刺制不得散漫速為順氣疎風燥濕舒筋健脾補血則氣血和而風濕去矣如病者因其所患甚微不以爲意而醫者又不明其症之深烈驟然不覺妄投補瀉致風濕之毒遍流身體遂致眼反唇翻眉脫髮落手足痿痺十指墮折肌肉潰爛斯時也雖有軒岐再世盧扁復生何能施其術哉可不痛乎其十

四五歲而發者元陽未充天癸未至腎元何由而傷蓋此非壯年而論緣先天不足氣血俱虧膚腠虛疎為父母者不明其本源失於護育致感寒濕之邪入於筋骨復受虛風搏結而成其發之速其遍之易非壯年可比百不能全四五何曰因其筋骨未堅肌肉脆嫩毒易攻耳其四五歲而發者尤甚於此蓋人稟父精母血得成一點真元然後生兩腎而腎生肝肝生心心生脾脾生肺五臟而成六腑就百骸備而皮肉生完形全體而後生育此

傷醫大全 卷二十八 大痲瘋 聖 顧氏秘書

間皮毛之分初作麻木此風之病也迨後皮穿肉腐筋斷骨折非濕之為害焉能至此然濕久則生蟲內食臟腑外食肌肉損筋壞骨久則漫延無所不致矣但毒發於五臟亦有可驗之處如毒盛於心則喜怒不常面帶赤色言語不快眼生齋肉多發泡疹痛癢痲痺不常毒盛於肝善怒而色蒼暗乾多忿上視面生小泡而浮腫毒盛於肺多汗惡風時嗽短氣渾身癢癢晝靜夜劇甚則眉髮落也毒盛於脾身體怠墮四肢不收身面黃而弱遍身

傷醫大全 卷二十八 大痲瘋 聖 顧氏秘書

症繫父母交媾之前先有濕症所懷之胎豈無是疾既生之後日積月累過溢週身復感風邪濕遇風而化熱薰蒸血脉肌肉遂發此症故一發即遍隨成壞症百不一救皆由父母之故也然痲瘋以前諸家各論只言其風不及其濕因不能明其病之本源亦非確論且風屬木肝也而肝主筋若無濕以兼之甚則成癱瘓半身不遂輕則為筋脉抽掣麻木攣痺不仁而痲瘋因風濕搏結於骨髓久而化熱其勢日甚風隨鼓動濕熱壅遏於肌肉之

紅癬或生癰疹毒盛於腎面目浮而腰脊痛不能正立色慘怡顏則脚底先穿夫痲瘋之症有五死五不治之說一曰皮死麻木不仁二曰肉死則割切不痛三曰血死則肌肉潰爛四曰筋死指甲脫落五曰骨死鼻梁崩塌眼斷唇翻五死既現故曰難治一曰不能戒忌者不治二曰酒色不戒者不治三曰不耐性而多怒者不治四曰思慮多者不治五曰大小不和者不治又曰男左脚起者難治女右脚起者難治此乃業醫者之效畧不可不知

也 醫學要則

二十六種瘋症歌訣

心經大癩蛇皮瘋 脫根邪脉魚鱗血

肝經鵝掌鼓槌瘋 血痺齧糕痛癩說

脾經半肢軟難瘋 紫雲刺乾癢瘋別

肺經白癩裁毛瘋 歷節壁泥癩啞列

腎經冷麻漏蹄瘋 蝦蟇桃熱與水夾

胃經雁來疔瘡雞 蠖蝟彈曳蠱瘋捷

心經

湯醫大全 卷二十八 大癩瘋 聖 顧氏秘書

大癩瘋 乃腎虛受濕肝虛動風風濕相搏壅遏於

血脉肌肉皮毛初覺或頭面手足一點麻木不知

痛癢不即醫治漸發遍身久則眉落唇翻十指墮

脫肌肉潰爛不能治矣 宜麻瘋丸回生丸還血丹
白花蛇丸清腎愈風湯

蛇皮瘋 兼腎 乃先發髻股間皮膚迸裂形如蛇腹

之紋或痛或癢蔓延週身發極迅速若不速治則

不救矣宜火龍丹兼大補之 忌點刺薰蒸犯則

即死 宜火龍丹利瘋丹奇效丸

脫根瘋 此症腎
經俱多 初發起於脚根並兩膝下起水泡

或破裂或生小瘡或生腫癩或痛或癢久則穿爛
沿至足底俗呼草鞋瘋又名魚腮瘋同一類也 宜

效丸火龍丹
大清風散

魚鱗瘋 此症兼
肺經 初發起於遍身乾白浮癢麻木漸

生小瘡變成梅花片如刀刮魚鱗之皮癢而搔之

則痛或出黃水冷熱俱怕 宜一粒金丹利瘋丹
火龍丹大清風散

邪脉瘋 初發忽然悲哭如醉狂言驚怖喜笑不語

夢寐多魘或與鬼交乍寒乍熱心胸飽悶聞氣不

食古云氣注 宜珍寶三生
丹疎風散

湯醫大全 卷二十八 大癩瘋 聖 顧氏秘書

血瘋 此症兼肝
脾腎三經 病緣醉飽行房縱慾或閉根裸體

入水或忿怒飲食或忍饑戮力風濕內侵久久邪

毒攻冲初起週身肌肉紅腫形如被杖遍生血泡

邪乘於陽則且甚暮平邪乘於陰則暮甚且平或

吐衄嘔咯等血或噦噫吞酸喜怒不常或生紅片

麻木不仁腫處穿爛流水不止或血從大便中出

面自浮腫頭痛腦裂手足攣痺皆由風濕之邪積

久化熱而風逞濕熱之助濕熱仗風之威攻冲泛

溢無所不至攻傷於心肺則致吐衄等血攻傷於

肌肉皮毛則致紅腫麻木穿漏潰爛之疾而成不救之患可不恤哉初覺之時急用疏風散正陽丹調治尤可保勿死

肝經

鵝掌瘋此症兼肺經始發起於手心併脚踝拐生紫白

蘇麻癢頑皮搔之則起白屑痛癢不常或生足面

稱為鞋帶瘋久則穿潰延及遍身宜大消風散二

丹黑光湯

鼓槌瘋此症兼腎經初起時膝間痠痛怕見寒濕

湯醫大全 卷二十八 大痲瘋 醫 顧氏秘書

風冷行步艱難俗呼為寒濕脚氣久則肢脛虛弱

骨節大痛大肉消去膝蓋踝骨漸大脚趾痠麻形

如鼓槌宜神仙換骨丹素靈丹

血痺瘋此屬腎此因體虛而多勞苦皮膚虛疎易

感風濕之邪侵入血分積蓄既久化熱成蟲蠹食

肌肉初起疲倦汗出臥寐不時身體搖動如被風

吹久則漸發紫塊痛極則癢癢極則痛遂致鼻塌

攣跛而死宜正陽丹乳香搜風丸

酸糕瘋此症兼脾此緣酒色過度不避風濕足三

陰經受邪氣血凝滯久則化熱成毒熱盛冲激泛溢週身初發於眉稜骨上或面頰間結成痞癰久變為瘡潰爛臭惡腥穢膿流沾着之處即變成瘡

頭足乖張眼塌鼻倒指折唇翻遂成不救而死初

發速用乳香搜風丸苦參九大消風散並大

痛瘋 初發四肢骨節抽掣疼痛晝夜不能屈伸臥

難轉側久則遂成癱瘓不能起床宜乳香搜風丸

飲愈風湯 芎朮丹

癩瘋此症兼脾凡多怒則傷肝多慾則傷腎飲食

湯醫大全 卷二十八 大痲瘋 醫 顧氏秘書

不節則傷脾然多怒則肝動肝動則風生腎多慾

則陽虛陽既虛則陰寒盛矣脾緣飲食不節而致

傷則不能運化留積而成濕不即調治則氣血乖

張腠理不固而六淫之客邪入與主病相合乃成

惡疾是以初起寒熱交作或嘔噦咳吐皮肉腫脹

若不能驅邪輔正遂成狂妄叫號筋攣手振四肢

牽引甚致歌舞笑罵毛瘁色敗變症百出而死初

覺即宜奪命還魂丹三生丹

脾經

半肢癱此症兼腎經 是症或因先天不足而受寒濕之

邪或因大醉行房而酒濕熱之氣乘虛入於筋骨

外又復感風邪風木盛而土虛不能生金肺腎無

根賊邪獨勝故成偏風或左或右骨節抽掣疼痛

難忍手足不能屈伸營血凝滯不能行於經絡故

筋攣而絡縱遂成癱瘓呼疼號痛日夜無休而死

或曰偏風又曰痿痺其症一也宜乳香搜風丸寶

散驅邪安神丸 救苦回生丹

軟癱瘋 此症緣氣血俱虛肌肉踈緩膚腠不固致

易醫大全 卷二十八 大癱瘋 聖 顧氏秘書

感風邪乘虛入骨久而化熱壅遏於經絡氣血不

能運行筋無血養以致肢體日夜痠疼手足無力

拘攣不得伸弛不能屈身軟如綿或骨節舉動

有聲遂成癱瘓矣宜搜風順氣丸寶珍丹正

紫雲瘋 此症素因氣血虛而多火動微則汗雨淋

漓然氣虛則腠理疎而衣被之濕易侵皮膚隨又

復感風邪風與濕搏凝滯於皮膚之間久則生蟲

致起紫黑斑點延漫遍身似霞如雲非癩非疥時

作痛癢久則高腫漸作麻木以致喪身害命者百

有四五宜清風飲

乾瘋此症屬肝 此緣肺氣虛而感風邪然金虛不

能生水腎之本源則津液枯涸以致肌膚乾燥且

風邪入於皮膚既久變熱成濕故身無痛處漸生

黑白斑點手足心底發熱如烙遍身發癢而成調

治不痊之症宜復元丹並用藥

刺瘋 此係營虛多熱熱盛則腠理不密易於汗出

是以風邪乘虛而入然汗出多則血益虛且風之

性動遂壅熱橫行於經絡之間如遇正爭氣逆而

易醫大全 卷二十八 大癱瘋 聖 顧氏秘書

不行故致有刀錐所刺之狀待尋摸時而邪正已

分行矣故痛無定處譬諸明末流賊如遇富饒之

處盡情搶擄及至官軍知勦則又不知去向矣或

肢節間如火燒熨痠痛難忍宜一粒金丹

癢瘋此症兼肺經 此病緣衛氣素虛腠理不固風邪易

入浮游於皮膚之間故渾身燥癢不息宜正陽丹

肺經

白癩瘋兼脾 此症因脾積熱不能生金肺虛受風

燥其津液夫血賴脾攝而行今脾為邪熱所困不

能統血而行肺受風邪壅滯於皮毛氣血不和運
行失節風邪所壅之處漸變為白矣然四肢為脾
之本皮毛乃肺之合故起於手足者居多宜棗靈
丹神效

追瘋丸
王樞丹

截毛瘋兼心腎
二經

此由乘汗入水或腎虛而履霜堅

冰致受寒濕久則化火成毒勢盛攻衝激動心火
上炎尅肺而濕熱之毒流注經絡故偶然搔觸悴
然痛極如被截毛所螫之狀久則遍體走注轉側
動搖如被刀針刺刺其體痛楚難忍如走注已遍

瘍醫大全

卷二十八

大瘋瘋

髑

顧氏秘書

不能救矣宜大消風散乳香搜風丸大定風丸
利風丹救苦回生丹驅邪安神丸

歷節瘋兼肝腎
二經

此症由縱慾傷腎大怒傳肝兼且

不能節避下傷於濕外感於風而風濕之邪乘虛
入於筋骨復又不明調治蘊蓄既久則化熱成毒
有碍於營衛運行之道是以肘膝肩膊之間痠麻
抽掣筋攣節大手足難以舉動遂成癱瘓矣宜驅
邪安

神丸救苦回生
丹大定風丸

壁泥瘋兼肝脾
二經

此症緣肝風氣盛尅傷脾土復又

好食生冷動濕之物致脾虛而不能運化濕滯於

中積久化熱然脾土肌肉而風壅濕熱之毒通行
於肌肉之間氣血不運則肉不榮矣故肌膚變為
灰白色如陳壁泥之狀因濕重風輕故無痛癢若
延及遍身則不救矣宜乳香搜風
丸芎朮散

癩瘋兼心脾
二經

此症因脾經積濕致土衰不能生金

肺虛易感風邪蘊蓄既久變而為濕熱之毒蒸鬱
於肌肉之間則蠱生矣故初起癩癩如蕨荳疥癬
之狀或麻癢而不疼或疼而不麻癩久則連片穿
爛以成不救之症宜小棗丹
玉樞丹

瘍醫大全

卷二十八

大瘋瘋

手

顧氏秘書

癩瘋兼肝脾
二經

凡多怒則傷肝氣有餘便是火致木

動而風生矣脾土受風木之傷艱於運化留滯而
成濕且脾土既衰不能輸精於肺肺亦衰矣而肝
木之邪乘勝已之臟衰反挾脾之濕邪上乘於肺
然肺主聲金空則鳴今被肝脾濕熱之邪所干竅
塞而不通故初則聲嘶久則聲啞矣宜寶珍丹奪
命還真丹

腎經

冷瘋兼脾
二經

此緣腎虛而感風濕之邪然腎主骨腎

既虛則骨髓不克而風濕之邪乘虛入於肢節之

間日久邪甚盈溢於肌肉之內故初時為麻木不仁或時冷痛或肢節痠疼遇冬則伏牀不起久則氣血不行發泡穿爛而死

宜奇效丹正陽丹還立丹乳香搜風丸冷風方

漏蹄瘋 此症蓋因色慾太過腎經傷竭兼又不善趨避履霜蹈雪足底受寒濕之邪積久化熱成風

氣血不行故初起先於湧泉穴麻癢不仁漸發水

窠穿破則流黃水久則遊溢週身生蠹穢爛臭惡

難聞為不治之症

宜奇效丹火龍丹乳香搜風丸

蝦蟇瘋兼肝經 此緣肺虛而感風濕之邪蓄於皮膚

湯醫大全 卷二十八 大瘰瘋 韋 顧氏秘書

久而不散化熱成毒營衛不行故渾身發塊似蝦蟇

蟇之狀破即成瘡流膿出血臭穢不堪

宜還立丹正陽丹神效追風丸

核桃瘋兼脾經 此症緣脾經素有濕痰土衰不能生

金氣虛則表不固風邪易感風入交煽積久之濕

痰散漫於肌肉之間故初起遍身塊癩大者似栗

三五串連小者如荳顆粒成行其形色胡桃相似

宜火龍丹

又有一種手指攣攣或足腕股腿腹肋之間或項頰

頭面之上發細黑小塊時值陰雨則發天氣晴明則不見或每日值陰分則發陽分則不見或晴明時其色鮮明陰雨時則變紫黑而痛者名曰蠹癩

瘡此因風濕之邪鬱久不散入於臟腑必祛風養

血調氣清陽燥濕若不速治變成大瘋則難療矣

熱瘋兼肺脾二經 此症因陰虛而感濕肺感風邪風濕

相煽而成熱邪氣上冲壅塞肺竅故鼻中常流臭

黃濁涕咳吐稠涎然目屬陽今因氣虛邪得壅遏

於陽道則氣血不行故目痛如脫時時惡風而寒

湯醫大全 卷二十八 大瘰瘋 韋 顧氏秘書

戰若不速治則濕久生蟲內食五臟即鼻崩眼塌

而死

宜搜風順氣丸聚靈丹神效追風丸

水瘋兼肺脾二經 此症由肝家素有風熱木盛則土衰

停飲留積而為濕兼之多慾則直元耗散不能制

水洋洋泛溢反侮脾土壅遏於肌肉四肢而作腫

脹氣悶如水蠱之形若止水濕不致潰爛此緣肝

之風熱與腎之水濕互相搏結薰蒸於肌肉之間

故漸發水泡穿即潰爛病至於此縱有神丹烏能

救治也

宜搜風順氣丸乳香搜風丸

一第... 丹... 第... 0... 反... 之...

胃經

雁來瘋兼肺脾二經

此症緣脾經有濕肺感風邪風濕

搏結而成然肺主皮毛脾主四肢故每至八月秋

蕭索之時則手足乾燥垂癩瘰癧形似蝕癬或頑

厚如牛領之皮麻痺不仁破則血水頻流時常疼

痛久則遊溢週身潰爛而莫能救矣宜奇效丹乳香搜風丸

疔瘡瘋兼肝脾二經

此症因肝風脾濕交煽而成痰流

注經絡故初在於皮膚之內肌肉之間察瘰連枝

五色癭瘡遇熱則癢逢寒則痛寒熱交作搔之成

瘍醫大全 卷二十八 大麻瘋 聖 顧氏秘書

瘡久則成斑爛若兼腎經而發於足趾足底連片

紫白胛骨枯而脚軟者最為難治宜神效追風丸

鷄爪瘋兼肝經

此症因怒氣傷肝氣化為火然火盛

則風生况肝主筋而風火之邪過溢於經絡阻其

氣血之隧道筋無血養以致攣縮故身不動而自

搖手不動而自抖不能持物舉動艱難久而不治

則成癰瘕宜奪命丹大清風散乳香搜風丸

蝮蠅瘋 此症與疔瘡瘋相似但此尤多腎濕故初

起先於肋際三五連串大小連枝漸成大串延長

如土狗之狀寒熱不時或痛癢麻木頑痺不仁若

不速治則通身穿爛而死宜奪命丹龍八師丹

蟬曳瘋兼肝脾二經

此症因肝脾二經風痰蓄積心血

虛而多火風痰上逆壅塞心竅故卒然撲倒昏迷

不省手足牽掣拳攣伸縮口吐白沫然風痰之邪

乘其虛而忽犯榮衛正氣必爭而驅之若邪盛正

衰其人必致不省而死正勝邪衰故省覺有早晏

也宜一粒金丹四磨丹兼以祛風去痰降火之劑可愈

蠱瘋 此症緣脾家之風濕積久化熱濕熱之毒壅

瘍醫大全 卷二十八 大麻瘋 毒 顧氏秘書

聚於內臟故初起腹大肢瘦其形如鼓既久則邪

毒上攻况眼之上胞屬脾而唇為脾之合故眼塌

唇翻久則散溢週遍故渾身腫脹皮肉變黑毛髮

脫落而死宜搜風順氣丸救苦回生丹

有一種身面生瘡如貓兒眼放光流彩無膿無血久

則自退名曰寒瘡亦怪症也此因多食鱸魚茱萸

所致須用溫補散毒之劑藥薰可愈

有一種渾身生泡形似棠梨破則水出內有石片如

指甲大皮穿石出瘡愈其泡復生不已抽盡肌肉

則死用三稜莪朮各五錢為末分三服溫水調服即愈

有一種面上初起瘡癩似疥非疥似癬非癬多發於春夏之時或癢或痛或蒸熱漸成細瘡黃膿腥穢流注漫延名曰吹風癩婦人多患此乃受火炎鬱積風熱邪毒上升故發面部久則變成瘋癩延入髮際則不治矣治宜清心順氣散肺火祛風熱戒淫慾方愈

湯醫大全 卷二十八 大麻瘋 素 顧氏秘書

大麻瘋門主方

首用煎方 家秘

防風 甘菊花 獨活 荆芥穗

甘枸杞 羌活 山梔子

面部加 白蒺藜 當歸 天花粉
蒼耳子 鼠粘子 薄荷 穀精草

下部加 杜仲 金銀花 牛膝
宣木瓜 桔槔 炙虎骨
枳殼 熟地黃 木通

攝血加 歸元加

湯醫大全 卷二十八 大麻瘋方 藥 顧氏秘書

補虛加 桑螵蛸 夏枯草

血虛加 薔木 紅花

婦人加 四物湯 俱白水煎服

後用天真玉髓丸 家秘

兼治紫雲風

白蒺藜 炒去刺 草胡麻 去土微 苦參 鮮明者

荆芥 當歸身 酒洗 防風 去蘆各 四兩

海風藤 香者為上如馬鞭一根 切出花紋如槌榔尤妙 枳殼 去穢淨

白木 有濕痰在胃則用如胃 不痛無痰則不用 木通 各二兩

乳香去油 沒藥去油如不痛不必用

牛膝下部則川桂枝手臂痛用如鼻塞不

重全竭七個大楓子五兩全天麻五錢煮去白

虎骨酥炙二兩止痛

共磨細末水法叠丸每早午晚各服三錢白湯

送下用香櫟片過口忌食麵醬醬油火酒川椒

羊鷲發物等味惟烏魚芝蔴相宜如服此丸反

覺飲食少進身體倦怠疲困則藥力到矣須耐

心久服可保全功漸加至五錢七錢更妙

瘍醫大全 卷二十八 大痲瘋方 顧氏秘書

全愈後丸方

光橘梨即十大功勞又名八角茶出在浙江上面

刺用剪剪去以醇酒拌九蒸九晒再去葉

元參四兩

磨細末水法為丸每服二錢白湯送下

凡治瘋症忌用興陽熱味並川烏草烏以及藥

大麻瘋兼治癩症

穿山甲一個不拘大小務要頭尾爪甲毫無損缺

方可入藥倘有不全則患者亦於斯處不

能全愈矣以濕絹拭淨灰塵灰須去淨

用上好嚴生漆一筋絞去渣將山甲通身

瘍醫大全 卷二八

漆到陰乾又漆以漆完為度再陰乾用火
將山甲四股分作五塊用雙劍絲穿縛懸
放罈內四邊不可挨粘鹽泥封固罈口開
一孔用文武火煨煉看罈口烟盡即退火
候冷取出鋪放地上一二時研細末每
穿山甲一兩加透明
砂五分和研收貯

每服三錢燒酒調服仍以燒酒過口每日三服

忌鮮魚鷄鷲羊肉麵食惟鴨臘肉猪腰可喫或

病者欲頭先愈即先研山甲頭服之餘做此如

聽其緩效即合研可也若鬚眉已落服完再服

長松即仙茹可復生矣

瘍醫大全 卷二十八 大痲瘋方 顧氏秘書

又方

小胡麻 苦參各十兩 大楓子

白芷 防風各四兩 荆芥八兩

威靈仙 蕪薄荷各一兩 蔓荊子

大黃炒 黃芩 防已

當歸尾 薏苡仁 宣木瓜各一兩

連翹二兩

春加薄荷葉一兩 夏加黃連五錢

秋加蒼木一兩 冬加烏藥一兩

二九七

研末水法叠九清晨白湯送下三錢

又方此方醫人不可受謝

大蜈蚣五十四條好酒一觔半穿山甲六十片用

薏苡仁 檳榔 宣木瓜 各一兩

陳壁土炒成珠

研細加明雄黃五錢和勻每服二錢清晨空心

白酒調服盡量飲醉絮被取汗終身忌鯉魚

江南洲傳秘授仙方

蒼木米泔浸麻黃去節各當歸酒洗

湯醫大全 卷二十八 大麻瘋 禿 顧氏秘書

川烏 防風 草烏

荆芥 金銀花 白芷 各五錢

天麻麩包 桂枝 赤芍藥

釵石斛 海風藤 全蝎去尾酒

薄荷 陳皮 甘草 各三錢

花蛇四兩酒洗

右為細末磁罐密收每日午時稱藥末五分無

灰酒調服十日外加至六分廿口外加至一錢

不可間斷一料即愈止後服藥完多服補藥以

培元氣

蕪蛇酒

黃栢 苦參 甘菊花 丹參

牡丹皮 金銀花 當歸 赤芍藥

百部 赤茯苓 枸杞子 蔓荊子

川草薺各一兩 桑枝一兩 生地二兩 秦艽

獨活 威靈仙各五錢 蕪蛇一具去頭尾如

共煮火酒生酒十五觔退火七日飲

初服發汗清散之劑活人錄

湯醫大全 卷二十八 大麻瘋方本 顧氏秘書

荆芥三錢 防風二錢 秦艽

羌活各一錢 川芎 薄荷

淡豆豉各一錢

葱白頭二枚水煎空心午前服

右皆輕湯升散之品能去肌表之風熱而無辛

熱燥血之虞服後以後藥煎湯洗浴兼服前劑

洗浴方

紫背浮萍陰乾 苦參各四兩 防風

百部各六兩 荆芥八兩

濃煎熱湯無風密室中薰洗

中服探吐清利胃腑痰液之劑

防風 三錢 淡豆豉 二錢 廣陳皮

牛蒡子 各一錢 桔梗 一錢 皂角刺 五分

水煎午前午後服

右藥皆利陽明胃腑風熱之痰而兼能解毒如
不吐以鷺毛探於喉間必使其吐盡積痰或膈
中酸苦稠涎亦可吐後用稀爛陳米粥早暮調
之忌用一切腥膻辛辣膩膈發病之物七日後
精神復旺再用後方

末用下劑蕩滌大腸蘊積之毒

蕩滌大全 卷二十八 大痲瘋方全 顧氏秘書

金銀花 三錢 當歸尾 二錢 枳實

桃仁 各一錢 檳榔 紅花 各一錢

木通 甘草 各五分

水煎十分乘熱泡酒浸大黃末五錢以利為度

不暢以陳皮湯催之不止以陳米飲補之

右乃辛潤苦寒之味專除大腸
積熱之毒兼能殺蟲並去痰穢

調補煎方

製首烏 三錢 生地 二錢 知母 一錢五分

車前 白菊花 各一錢 牡丹皮

薄荷 各五分

水煎午前午後服

蓋肺與大腸相表裏吐利之後臟腑血液枯燥
必然氣逆血熱前方清火滋燥涼血順氣亦治
風活血之餘義也

調補丸方

功效等於前方取其便於常服

製首烏 八兩 百部 生地 各五兩

秦艽 當歸 各三兩 車前子

牡丹皮 白菊花 各二兩

蕩滌大全 卷二十八 大痲瘋方全 顧氏秘書

蜜丸早晚空心百滾湯吞服五錢

膏方

清氣清痰生津潤燥乃調補肺與大腸之要劑

天冬肉 八兩 生地 六兩 麥冬肉

川貝粉 各四兩 牛膝 三兩 白菊花

知母 各二兩

水熬成膏以滴水不散為度冷一週時調入川

貝母粉收瓶伏土七日後臨睡時溫酒和服五

錢

祛風殺蟲肥皂方

百部

新鮮者洗淨晒乾

紫背浮萍陰乾溫火焙燥為末

鮮肥皂

各四兩

浮皮硝

二兩

共搗爛至極細丸如青梅大早晚洗浴淨臉可

以遍擦

大麻瘋洗方

衝艾

棟樹皮

椿白皮

各半筋

白礬

四兩

煎湯浴數次愈

湯醫大全

卷二十八

大麻瘋方

顧氏秘書

大麻瘋 畢玉泉屢驗限日收功

苦參

大胡麻

牛膝

當歸

各一筋

白蒺藜

一筋四兩

荆芥

孩兒菊

各六兩

防風

馬鞭草

羌活

大楓子

淨肉用白木四兩全煮二三十滾去白木各四兩

其為細末以粗渣煎水疊丸如桐子大每服三

四五六七錢每日三服六安茶送下春天三日

見效冬天七日見效俱從頭上好起切忌大量

菜油一切發物蕎麥麵避大風大冷以煖為主

戒房事宜喫牛肉雞魚野味

大麻瘋

苦參

炒

大胡麻

蒼耳子

牛膝

焙

當歸

晒各一筋

白蒺藜

一筋六兩

防風

四兩

羌活

炒五兩

紫背浮萍

荆芥

各六兩

防已

晒八兩

如骨頭痛加獨活六兩共磨細末入甌內蒸以

秤桿戳氣眼鋪平氣透為度冷定聽用

大楓子

淨肉十二兩用白木二兩煮大楓子油盡去白木復將大楓子土炒另研

湯醫大全

卷二十八

大麻瘋方

顧氏秘書

再將大楓子肉末和入前末內又磨勻篩下粗

渣煎水疊丸晒一日晚用青布將丸藥攤土地

上次日又晒又攤如此三日用麻布口袋盛丸

藥令出藥味每日倒動三次掛簷口每日早午

晚各服三錢六安細茶送下 忌一切無鱗魚

及動風之物戒百日房事要緊

蔡藿之人大麻瘋見效更速 方爾聖

火煉蛇一條入大麥或小麥三四升同蛇入罐煮

至水乾肉爛為度其麥以紅雄鷄食之其毛自落

以線扣死去腸不用入罐煮熟打碎焙乾為末神
麩打糊為丸每服三錢空心開水送下但服二三
兩即愈矣

大痲瘋 盛天香

活癩蝦蟆一個用鹽泥搗熟做一匣入蝦蟆於內
炭火燒熟存性去泥將蝦蟆研為細末每服三錢
熱酒調服發汗得汗即止後服

大痲瘋

用明淨松香不拘多少化去渣取河水用淨鍋將

湯醫大全

卷二十八 大痲瘋方 全 顧氏秘書

松香煮化不住手攪視水色如米泔嗜味極苦即
傾入冷水內將松香乘熱扯拔冷定堅硬另換清
水再煮再拔如前法製不論數十次總以松香體
鬆潔白如玉所煮之水不苦為度陰乾為末羅極
細末二筋聽用每日止食白粥量投藥末和勻食
之不可多嚼日進數次不可更喫乾飯只以乾筍
乾菜過口一切油鹽醬醋葷腥酒菓糖麵等味概
禁勿食渴時只飲白滾湯每日服三四錢以漸而
加不可太驟服後大便必下毒物服完一料全愈

大痲瘋

松香

不拘多少以澄清河水不經帶者入銅鍋
內煮約換水煮數十次水白為度每十兩

楓茄花

一名兔兒苗其木錢地如紫茉莉葉似蓼
花其花甚多與白玉簪色形無二產野地
及菴觀三四

月出二兩炒

紫背浮萍

先曬乾後炒
取淨才四兩

共磨細末不拘茶酒食物俱可拌服以愈為度
忌一切發物葷腥愈後仍忌百日要緊

加減大造苦參丸

治大痲瘋及諸風赤白癩風

湯醫大全

卷二十八 大痲瘋方 全 顧氏秘書

苦參 一筋

蔓荊子

牛蒡子

何首烏

禹餘糧

黃荊子

枸杞子

蛇床子 各三兩

防風

胡麻子 半生

半熟

荊芥

皂角刺

蒼耳子 各十

兩

香白芷 一兩

五錢

為末用皂角搗爛熬膏入前藥為丸桐子大每
服五十九茶酒任下

醉仙散

須量人大小虛實用之症候重而急者先以再

造散下之方投此藥須斷厚味鹽醋椒菜茄子煎炒燒炙等物止可淡物淡粥及煮淡熟米或烏稍白花蛇以淡酒煮熟食之以助藥力也

胡麻子 牛蒡子 蔓荊子

枸杞子 四味俱炒黑色 白蒺藜

苦參 瓜蒌根 防風 各五錢

右為細末每一兩入輕粉一錢拌勻每服一錢

茶清調晨午夕各一服服後五七日先於牙縫

內出臭涎渾身痛昏悶如醉後利下惡物臭積

湯醫大全 卷二十八 大麻瘋方 李 顧氏秘書

為效

通天再造散

須調補氣壯方服此藥

皂角刺 剉生者 大黃 炒各 鬱金 五錢

白丑 頭末六錢五分 分半生半熟

右為末每服五錢日未出時以無灰酒調而東

服之當日必利下惡物或臭膿或更如虫口黑

色乃是年深者赤色是近日者數日後進一服

無虫積乃止

治大風肌頑麻木皮膚瘙癢遍身疥癩癰疹面
上遊風或如蠱行紫白癩風賊風攻注腿脚生
瘡

川烏 白芷 苦參

胡麻 荊芥 防風 各三兩

白附子 白蒺藜 山梔子

川芎 羌活 當歸

赤芍藥 獨活 各一兩 大楓子 去殼

湯醫大全 卷二十八 大麻瘋方 李 顧氏秘書

地龍 何首烏 葳靈仙 各二兩

蔓荊子 一兩 烏蛇 一條好酒浸者熟去骨取肉晒乾或焙

為末酒糊丸桐子大每服四十九茶湯下

驗方

蒼耳草 於五月五日六月六日五更時帶露採搗汁熬膏作錠子

取一觔半重鯉魚一尾剖開連腸入藥在內以

線縫之用酒二碗慢火煮乾為度令患人喫盡

魚不過四五尾即愈忌鹽百日

洗法

桃柳桑槐楮五枝煎濃湯大缸坐頭浸一日湯
如油為效 或紫背葶苈煎湯浸洗 或地骨皮
荆芥苦參細辛各五錢水煎薰洗遍身血出為效
務要湯寬浸洗良久方佳

痲瘋丸

治大痲瘋

鮮皂角刺二觔好醋煮九日晒乾取淨末一觔

木鱉羊油炙得法如八兩苦參取淨末二兩紫背

葶苈晒乾取淨末一觔再用苦參八兩好酒打糊

湯醫大全

卷二十八

大痲瘋方

顧氏秘書

為丸每空心日三服先用葱頭薑各二觔搗爛用

麻油熬熟將新鬆布包作六七包先將番木鱉刮

去皮毛碾為末壯盛者服二分老弱者服一分隨

每人持藥一包在病人身上週身擦過用青布衫

褲襪穿好綿被蓋緊睡處不可透風或生炭火待

大汗後漸漸揭下乃起近前向火然後服前藥自

能痊可如身若炭一般而作癢者將石菖蒲打碎

煎湯四週圍住不可漏風連浴數次黑皮脫去平

復如故若一見風必成癢癩最宜謹防慎之慎之

圓生丸

治大痲瘋

人參不拘多少川烏 草烏

白芷 當歸 槐角子

何首烏 枳殼 連翹

海風藤 烏藥 杜仲

桔梗 石楠葉 肉桂各四兩

乾薑 白僵蠶 甘草

赤芍藥 升麻 虎骨

湯醫大全

卷二十八

大痲瘋方

顧氏秘書

防已 白花蛇酒浸 乳香

沒藥 沉香各一兩

以上各為細末用麻黃二十觔去節水煎一日

去渣將汁熬成膏入藥末和為丸每丸重五錢

清晨送下一丸不可見風此丸能消風順氣諸

般風症可服川烏草烏乃諸風之首藥必先製

煉精詳莫待臨時忙亂

製川烏草烏法 川烏取八錢一枚者佳二物

將米泔水好醋各浸一夜用薑汁火酒調勻將

二物包裹在內慢火煨熟取出用陰陽瓦焙乾

為未收貯聽用 如逢大症面赤者宜減

奪命還真丹

此丹非止治大癩瘋癩瘋症冷瘋蝦蟆雞爪
螻蛄諸症即中風癱瘓遍身筋骨疼痛驚癇口
吐涎沫婦人胎前產後月經不調並皆治之

全蠍 白殭蠶 陳皮

生地 杜仲 蔓荊子

知母 甘菊花 黃連各一兩

黃芩 熟地 肉桂

枳殼 柴胡 甘草

湯醫大全 卷二十八 大癩瘋方主 顧氏秘書

石膏 大茴香炒 防風

白朮 半夏 白茯苓各二兩

明天麻 川芎 廣木香

藥本 白芍藥各二兩 人參

兔絲餅酒浸 獨活各一兩 北細辛五錢

蛤蚧酥炙 一對

以上俱為末蜜為丸彈子大金箔為衣每用一
丸隨症用引嚙下

一方多西牛黃 麝香 地骨皮

中風癱瘓大癩瘋癩瘋症茶酒任下
遍身筋骨疼痛不省人事熱醋下
驚癇口吐涎沫温酒下
婦人胎前產後月經不調香附湯下
冷風寒濕黑豆炒焦烹酒下

清腎愈風湯

治大癩瘋

荆芥 防風 羌活

獨活 白鮮皮 白芷

蟬蛻 川芎 當歸

葦靈仙 生地 何首烏

湯醫大全 卷二十八 大癩瘋方主 顧氏秘書

枳殼 苦參 甘草各一兩

茅蒼朮 黃柏 穿山甲

烏藥 石菖蒲各二兩 金銀花四兩

右作十劑好酒煎服

白花蛇丸

治大癩瘋

川芎 天麻子 羌活

白附子炒 當歸 蔓荊子

獨活 葦靈仙 蟬蛻

赤芍藥

雷丸

蒼耳子

枳殼

川草薺

雄黃

石菖蒲

甘草

大楓子

防風

何首烏

烏藥

白殭蠶

牛膝

苦參

皂角

各等分

白花蛇

一條去皮
骨酒浸炒

右為末酒糊丸桐子大每服三十九酒送下

回生奪命神丹

此方能治三十六瘋十四癩有起死回生之妙

瘍醫大全

卷二十八

大癩瘋方

顧氏秘書

羌活

白蒺藜

藁木

天南星

防風

川續斷

蒼朮

五加皮

獨活

海風藤

白芷

大腹皮

烏藥

仙靈脾

防己

皂角刺

川烏

明天麻

桔梗

北細辛

柴胡

蔓荊子

黃芩

川草薺

薄荷

甘松

白芍

大黃

各三兩

紅花

元參

各七兩

草烏

四兩

苦參

二兩

右用陰陽水各一大桶浸春五夏三秋七冬九

日前石沸去渣加煉蜜一筋煎成膏如漆

白朮

胡麻

人參

酒浸蒸
熟晒乾

砂仁

礞石

硝煨

麩仁

去油各
二兩

沉香

白茯苓

木香

檀香

降香

安息香

乳香

去油

沒藥

去油

川芎

瘍醫大全

卷二十八

大癩瘋方

顧氏秘書

牛膝

紅花

香蛇

酒浸
焙乾

血竭

白殭蠶

松脂

煮去
苦水

雲母石

冰片

鴛管石

磁石

肉蓯蓉

原蠶蛾

桑螵蛸

各一兩

蟬酥

麝香

各五錢

人牙

炙黃色
五個

白花蛇

一條酒浸
去皮晒乾

右為末用前藥膏共搗丸彈子大硃石為衣金

箔包裹年深久遠者服十九四五年者服四五

丸一二年者服一二丸須麻姑酒磨下隨汗愈

東華玉髓

凡癱爛敗脫者非服此藥不能全愈

大楓肉 四兩 乳香 沒藥

血竭 各二兩 地龍 七錢 雄黃 五錢

珍珠 琥珀 冰片 各三錢

牛黃 二錢 阿膠 一錢 麝香 六分

右為末楓肉和勻每服一錢酒下加便閉加芒

硝內熱者柿餅湯內寒者花椒湯虛怯者人參

湯下

傷醫大全

卷二十八

大麻瘋方

顧氏秘書

順氣搜風接命丹

滑石 牛膝 各一兩 大楓肉 八兩

荆芥 一兩 防風 川芎

當歸 赤芍藥 麻黃 各五錢

黑山梔 黃芩 連翹

白朮 甘草 薄荷

桔梗 全蝎 蟬蛻

羌活 獨活 胡麻

葛根 各六錢 石膏 八錢 人參 二錢五分

雄黃 一錢 木香 七分 麝香 五分

右為末黃米酒煮糊丸桐子大每服五十九酒

下

蜚龍分師丸

白礬 白花蛇 穿山甲

香蛇 蠶砂 全蝎

鹿角 炒各一兩 蜈蚣 五錢 蟬蛻 二兩

右為末每服四分酒下若此藥加入各方內無

不取效

傷醫大全

卷二十八

大麻瘋方

顧氏秘書

守中丸

防風 胡黃連 陳皮

黃芩 天麻 升麻

山梔 荆芥 苦參

連翹 各一兩 牛蒡子 當歸

胡麻 皂角 白蒺藜

蔓荊子 各三兩 羌活 獨活 各一兩

甘草 硃砂 白芷 各五錢

乳香 沒藥 麝香

水片各二錢 牛黃一錢

右為末米糊丸每服三錢鹽湯送下

大痲瘋燻藥

硃砂三錢 槐花二錢 水銀

鉛皮各一錢 銀硃五分

先將鉛皮剪碎收入水銀和各藥為燻條每日燻臍二次要喫飽口含清水頻頻吐換以愈為度

雄漆丸

湯醫大全 卷二十八 大痲瘋方 韋 顧氏秘書

真漆一兩入盤黃五錢拌勻曬之漸漸去浮面上水

明雄黃 牙皂各五錢

和勻為丸不可見白陰乾每服三分酒下

神仙紫苑丸

白花蛇用酒一碗浸一宿去皮骨晒乾再入酒內浸再晒以酒盡為度

甘草 石決明各一兩 防風

羌活 細辛 川芎

赤芍藥 獨活 白蒺藜

蒼朮 枇杷葉 白芷

苦參 五加皮 金銀花

天麻 牙早各五錢 人參

當歸各七錢五分 何首烏 荆芥

葳靈仙各四錢 白附子 牛蒡子

草烏 石菖蒲 川烏各二錢二分

蛇床子 麻黃各二錢 木香

沉香各二錢五分 乳香 沒藥

胡麻各一錢 雄黃 辰砂各五分

肉菓一枚 麝香 定風草各一錢五分

湯醫大全 卷二十八 大痲瘋方 韋 顧氏秘書

右為末用大楓子二觔去殼搗碎酒拌入罐內箬紙包口鍋內重湯煮一夜成膏入前藥末煉蜜為丸桐子大每服百丸酒下

白玉蟾蜍遺方

治痲癢癰瘰癧癩癰痛危困者並大痲鷄瓜韮曳蠅蝮冷痲等症如神

胡麻 牛膝 木瓜

山梔 黃柏 蒼朮

天麻 五加皮 白蒺藜各五兩

海風藤

羌活

苦參

當歸 各三兩

代赭石 七次

斷蛇 各一兩

蒼耳子

水銀 煨麵包

硃砂 各三錢

取新鮮大楓子肉二十四兩敲碎以水二十碗煮至十碗濾乾入石臼內杵爛入水銀硃砂代赭蒼耳四味研至不見水銀星為度再將楓肉汁打陳米糊丸每日卯午酉各服三錢或二錢五分酒下

煎藥方

湯醫大全

卷二十八

大麻瘋方

羌 顧氏秘書

大楓肉 一觔

當歸

防風

荆芥

何首烏

升麻

羌活

獨活

葳靈仙

甘草 各四兩

苦參

藿香

天麻

細辛 各三兩

川芎

全蝎

血蝎

番木鱉 各一兩

右藥分作五十劑水煎服若紫雲瘋初起者加大黃瀉之若麻瘋用酒隔湯煮不拘時溫服

內府藥酒方

甘草

破故紙

蒼朮 各二錢

何首烏

人參

五加皮

草烏

肉蓯蓉

砂仁

白朮

杏仁

當歸

川椒 各一錢七分

小茴香

牛膝

虎骨

枳殼

半夏

香附

青皮

枸杞子

兔絲子

良薑

木香

厚樸

白扁豆

赤芍

湯醫大全

卷二十八

大麻瘋方

半 顧氏秘書

陳皮

枳實

防風

生地黃

熟地

荆芥

天門冬

五味子

麥門冬

三稜

莪朮

檳榔

吳茱萸

桔梗

桑白皮

藁本 各一錢

胡桃肉 去皮

紅棗 去核

白糖 各五兩六錢七分

右用米燒酒白酒釀各六觔盛罈內以絹袋盛藥掛罈內紮緊放鍋內重湯煮三炷香為度埋

土中七日出火毒每服用磁盃頓熱飲之

再造至寶丹

大樞肉去通身風 白蒺藜去腸內風 防風去肌表風

苦參去九風 荆芥去皮風 胡麻去五臟風

當歸活血各 天麻去麻木 黃連退熱冷

烏藥通身風 棕灰去惡血 雄黃去毒各

海風藤去手足風 人參補氣各 官桂去寒濕熱

甘草各七 天竺黃 檀香根各二

麝香通諸竅

瘍醫大全 卷二十八 大麻瘋方 全 顧氏秘書

右為末米糊丸酒服

凡瘋症五臟各有所因五死有可治之法

肺經毒盛眉毛先落加零度香皂角刺各二兩

肝經毒盛面起紫泡加何首烏五兩

腎經毒盛脚底先穿加血竭二兩

心經毒盛先損其口加珠屑一兩

脾經毒盛遍身瘡癩加蒼木八兩

麻木不仁者冷風也加天麻蒂一兩

肉死則割切不痛加霹靂二兩

血死則潰爛成膿加歸尾八兩

筋死則手足脫落加白殭蠶三兩

骨死則鼻梁崩塌加骨碎補三兩

此五死兼見者大命已絕雖盧扁再生不能活矣

諸瘋初服開竅方

雄黃 天南星 半夏

川芎 草烏 明天麻

硃砂各等分

為末每服二錢酒下

四仙丹

治大麻等瘋三十六症如患者大肉已去者不治

牛黃一錢番木鱉四十九枚去皮麻油一觔煎木鱉子三沉三浮以金色為度撈起放地上存性為

末加硃砂一錢雄黃一錢五分麝香五分研細蜜丸如蘿蔔子大初日服一厘二日服二厘至十日服一分十一日仍服一厘至一分止三白酒送下

宜清晨服忌風戒色慾暈腥要緊後服煎藥四五劑全愈

大痲瘋神方

麻黃 開陽花 天雄各一

紫背浮萍二觔 當歸八兩 明天麻

羌活 防風 白芷

白木各二兩 升麻 枳殼

薄荷 白殭蠶 苦參

歲靈仙 防己 皂角針

白蒺藜 大力子 甘草

川黃連各一兩

用陰陽水煮半日去渣熬成膏

沉香 木香 乳香

沒藥 人參各一兩 蟬蛻

火龍 雄黃各五錢 麝香一錢

湯醫大全 卷二十八 大癩瘋方 顧氏秘書

白花蛇一條酒浸去皮骨晒乾

右為末全前膏和合成餅如圍棋大每服一餅

火酒化開煮酒送下取出臭汗五六服愈

狗聖散

用淨漉片香十筋將桑柴灰濾汁一缸用汁煮片

香一百沸傾入清水缸內拔去苦水俟堅硬方止

復用灰汁約煮十餘次以苦瀆之味盡為度陰乾

研成極細末不拘茶水粥內俱可加服一日可服

七八錢之數服一料即愈切戒動氣房勞謹戒一

切動氣生濕有毒之物

牛黃搜風丸

大楓肉去油淨 陳皮 當歸身

山梔 何首烏 黃芩

白芍藥 黃柏 五靈脂

熟地 白附子 川芎

皂角子 青皮 石菖蒲

烏藥 地骨皮 枳殼

北細辛 羌活 川草薺

湯醫大全 卷二十八 大癩瘋方 顧氏秘書

獨活 連翹 前胡

葉本各一兩 歲靈仙 苦參

白殭蠶 人參 白朮

防風 血竭 牛膝各三兩

白芷 草烏各五錢 木香

牛黃各三錢 香蛇一條酒浸去骨炙

右為末米飯為丸桐子大每服七十九清茶送

下若紫塊血瘋者加桃仁蘇木各二兩每服五

六日表汁一次忌牛羊猪雞鷄等有毒及動風

菓品遠酒色戒憂怒慎寒暑

黃柏散

治手足皮枯破則如水窠或癢如疥癩併雁來瘋

胡椒五錢 黃柏 黃連

防風各四錢 大楓肉 枯礬各二錢

大茴香 花椒各三錢 雄黃

硫黃各五錢 檳榔二枚 斑貓十個

潮腦一分

傷醫大全 卷二十八 大癩瘋方全 顧氏秘傳

右為末臘猪油調搽如麻木者亦可擦其癢搔破擦之則皮自然如舊矣

大癩瘋神方

肥鴨一隻餓一日用赤煉蛇一條切碎麻黃老

活各四兩大附子二兩麝香一錢陳米二升俱

為細末好酒火酒各一碗拌勻作三四次與鴨

喫待鴨毛將落殺之用酒煮爛去骨

當歸 白花蛇 金銀花各四兩

蛇蛻一兩 土茯苓半個 髮灰

伏龍肝各五錢

右為末和鴨搗勻加酒和丸桐子大每服百丸酒下半月自愈

保命丸

苦參十兩 草胡麻 當歸

防風 蕪荑 白蒺藜各五兩

大楓肉 薄荷葉 土木鱉

荆芥各二兩 胡連 銀柴胡各十兩

右為末水法丸細茶下一日服四服約二合輕

傷醫大全 卷二十八 大癩瘋方全 顧氏秘傳

者不過七八升重者一斗五升再重者二三斗

全愈

如身發多瘡或生濕毒通身如蛇皮或破流血

水者是脾經受毒加白木十兩

如手足破傷麻木遍身發紫塊白癩癩滿身肉

痛此胃經受毒加厚樸十兩

如眉髮脫落通身發瘡癩滿頭面上蛇虫痕此

肺家受毒加黃芩十兩

如面起紫泡身如紫雲桑四肢先見者乃肝屬

木而有此瘡也春二三月秋九十月各發一次

此肝經受毒加山梔連翹各一兩

如脚底先穿眼淚如珠流者通身骨節刺痛又

發血癩如桃花染者此心經受毒加黃連山梔

各一兩

如通身起紫塊手足拳攣口眼歪斜此腎經受

毒加破故紙十兩

如五臟受病則藏於內不發於外多生冷疾手足如癱瘓軟狀者加蒼朮黃柏各八兩甘草四兩
五臟受風者加川續斷何首烏葦靈仙各半筋
通身浮腫加乳香去油投藥去油各四兩
骨節疼痛加虎骨三筋
如六腑受病如紫雲塊似核桃糕多內熱兩鼻
出血筋脈弛長四肢無力行步艱難加葦靈仙
川續斷各八兩何首烏一筋
人生此患各受一經兼二經三經者此方萬無
一失若六經通遍五臟先露凶者不救也
春則地氣融和萬物發生加連翹二筋
夏則火旺煩躁加黃連二筋薄荷一筋
秋則霧露乍寒乍熱加白朮一筋蒼朮二筋
冬則嚴寒地凍加烏藥二筋

秘授大痲瘋

湯醫大全 卷二十八 大痲瘋方 顧氏秘書

番木鱉 一兩酥油潤三面火炙
透黃不可焦研末

麻黃 八兩大罐煎汁傾出再煎取汁二升復
用文武火緩緩煎至黃包為妙研末

每以製番木鱉末一兩加麻黃末一錢五分和

研入磁瓶封貯勿令洩氣春夏用二分秋冬用

四五分好酒調服以醉為妙預掃空房一間四

圍勿令透風俱要遮好先用布衫一件青褲一

條以雞子清塗遍裏面令病人光穿二衣再將

綿被蓋之方服藥酒俟出臭汗方去被換衣看

衣上有蟲數合無蟲則風從汗解病出一半換

下衣褲掘一深潭埋之勿使人見以免傳染之
患如不汗透再服一服照前謹慎如法隨服大
補湯五劑看人老少厚薄病之遠近輕重不可
一例治之輕者一服追蟲發汗即愈重者次第
用藥治之百發百中

火龍丹

治蛇皮瘋脫根瘋魚鱗瘋漏蹄核桃瘋

大黃 辰砂 代赭石 醋炙

火龍 即死人蛆
橫死者佳

湯醫大全 卷二十八 大痲瘋方 顧氏秘書

右為末先用防風荆芥煎湯洗浴然後用熱酒

調服三錢被覆取汗毒從皮膚內追出後用雄

黃硫黃代赭石花藥石等分為末香油調搽

利瘋丹 即三生丹

治蛇皮瘋鱗瘋鼓毛瘋

番木鱉一味刀刮去皮毛入麻油內煎至焦黃色

為度取出為末大瘋發表用之每服一分臥時白

湯下須擇無風處出汗一月方可起身

奇效丸 即苦參丸

治蛇皮瘋脫根瘋鬆飽漏蹄冷瘋雁來瘋

苦參 六兩 白蒺藜 防風 各三兩

牛蒡子 胡麻 當歸

斷蛇 蔓荊子 各一兩

共為末大楓子肉三兩去油全飯糊丸桐子大每服三十九熱酒送下

大消瘋散

治脫根魚鱗鷲掌齒飽癢瘋鼓毛鷄爪瘋

防風 白蒺藜 荊芥

瘍醫大全

卷二十八 大癩瘋方 顧氏秘書

苦參 胡麻 黃芩

柴胡 各十兩 麻黃 八兩 乳香

沒藥 麝香 各三錢 大楓肉 一觔 去油

先用一料除去大楓肉乳香沒藥麝香勻為十

五劑水煎服後用全料不可見火晒燥為末酒

米煮糊為丸桐子大每服五十九日三服酒送

下如病面上重加白芷海風藤蟬蛻各四兩升

麻五錢四皮重者加羌活獨活各四兩口眼歪

斜加白僵蠶四兩服此丸須用細辛蒼耳馬鞭

草煎湯洗浴避風取汗為妙

一粒金丹

治魚鱗刺瘋彈曳瘋

白膠香 三兩 京墨 紫背浮萍

阿膠 各二兩 五靈脂 草烏 炒各

香木鱉 五錢 當歸 乳香

沒藥 各七分 地龍 麝香 各二分 五厘

右為末用麻黃二兩煎汁煮大米飯為丸如龍

眼核大珠砂為衣酒送下如有黑汗從脚底心

瘍醫大全

卷二十八 大癩瘋方 顧氏秘書

出為驗

珍寶三生丹

治邪昧半肢軟癱症瘋

火麻仁 大黃 山萸肉

山藥 兔絲子 枳殼 炒

檳榔 牛膝 各三兩 郁李仁

車前子 獨活 各三兩 五錢

右為末蜜丸桐子大每服百丸茶酒任下

疎風散

治邪味壁泥條飽盡瘋水熱血瘰

薄荷 羌活 獨活

荆芥 各三錢 葛根 黃柏 各七錢

苦參 五錢 牛蒡子 山梔

何首烏 人參 各一錢 白僵蠶

防風 白鮮皮 黃連

蔓荊子 連翹 明天麻

黃芩 各五分 戴靈仙 白茯苓 各八分

全蝎 白芷 甘草

湯醫大全 卷二十八 大癩瘋方 全 顧氏秘書

仙靈脾 人虛五分

先用酒煎服二十劑後用水煎服後飲酒盡

量至百劑四月之後病必全愈再照煎藥加十

倍為末加乳香沒藥沉香血竭各一兩牛黃冰

片各一錢麝香三錢用苡仁米為末酒煮糊丸

桐子大硃砂為衣每服百丸溫酒下兼治壁泥

瘋

正陽丹

治血瘋驚掌血痺半肢軟癱瘓瘋冷瘋蝦蟆瘋

苦參 一筋 煎藥薑汁 各浸一夜 晒乾 人參 八兩 酒

白茯苓 犀角 石楠枝

乳香 去油 沒藥 去油 紅花 各二兩

白僵蠶 炒一兩 甘草 五錢

右為末蜜丸桐子大每服四十九茶酒任下

日三服

小棗丹

治驚掌瘰癧

防風 白僵蠶 荆芥

湯醫大全 卷二十八 大癩瘋方 全 顧氏秘書

何首烏 全蝎 蔓荊子

羌活 牛蒡子 獨活

戴靈仙 黃芩 赤芍藥

生地 大楓肉 大黃

苦參 各二兩 薄荷 枸杞子

明天麻 天南星 各一兩 栝枝

山梔 各四兩 甘草 五錢 兩頭尖 重一錢

白朮 一兩

右為末棗肉丸桐子大每服六十九薄荷湯送

下

黑光湯

治驚掌瘋

千里光一大把

蒼木苗一中把

朝東塔頭草一小把

右三味同水入礮內絹帛包裹勿令洩氣煮百

沸先用麝香擦患處後以藥熏之二三次即愈

鴛掌瘋

皂礮煨為末牛油調搽手火烘三四次即愈

又方

瘍醫大全

卷二十八

大麻瘋方

聖

顧氏秘書

白酒漿塗手以栢枝燒火烘乾又塗又烘四五月

即好

神仙換骨丹

治鼓槌軟癱瘋

大黃

白芷

槐花

川芎

防風各一兩

乳香

沒藥

木香

沉香各三錢

蒼朮二兩

草烏半生

北細辛

苦參各一兩

麝香五分

紫背浮萍三兩

右為末麻黃煎膏加煉蜜為丸重二錢硃砂為衣每服一丸酒或葱湯磨服

棗靈丹

治鼓槌白癩熱瘋

大楓肉

胡麻仁各四兩

苦參

荆芥

防風

海風藤

何首烏

牛蒡子各二兩

桔梗

檳榔

兩頭尖

烏藥

白茯苓

石膏

白殭蠶

瘍醫大全

卷二十八

大麻瘋方

聖

顧氏秘書

滑石

石菖蒲

甘草

明天麻

木通

甘枸杞

山梔

甘菊花

薄荷

天花粉

芒硝

棗靈仙

葶藶

廣木香

黃栢

車前子

羌活

陳皮

白朮

厚樸

柴胡

葉本

遠志

麻黃

蟬蛻

血竭

乳香

沒藥 青皮 胡黃連 各一兩

川黃連 辛夷 花蕊石

麝香 梧桐淚 冰片 各五錢

牛黃 一錢

右為末棗肉九棗豆大每服六七十丸春用滾湯夏用茶秋用鹽湯冬用酒服

獨聖散

治鼓椎瘋

川烏重八錢者一枚為末每服二錢用葱頭七個

湯醫丸金 卷二十八 大麻瘋方 全 顧氏秘書

洗浴藥方

酒一碗煎濃服或者服一錢先用後方洗浴然後服藥取汗切宜避風慎之

防風 馬鞭草 苦參

金銀花 荆芥 遍地香

紫蘇 天花粉 澤蘭

煎湯洗浴務須四圍週密不可透風要緊

治脫眉方

防風 荆芥 蟬蛻

白芷 明天麻 何首烏

羌活 各八兩 大黃 牛蒡子 各六兩

大楓肉 四兩

右為末眼赤者加甘菊花一兩眼痛者減大楓肉三兩加全蝎七錢蜜九酒下

乳香搜風丸

治血痺髓飽痛瘋牛肢截毛泥壁水冷瘋漏蹄

雁來雞爪瘋

升麻 牛蒡子 胡麻

湯醫丸金 卷二十八 大麻瘋方 全 顧氏秘書

白蘚皮 連翹 菴葢草

苦參 桑寄生 當歸

懷生地 秦艽 枸杞子

檳榔 何首烏 各四兩 鱉甲 一個重一兩佳

凌霄花 川芎 大楓肉 去油全川烏煮

防已 各一兩 虎脛骨 酥炙 陳皮

牛膝 甘菊花 紫草

海風藤 木瓜 各二兩 杜仲 二兩

甘草 一兩 白芷 二錢 薏苡仁 六兩

芝 藤 二合

乳 香

三助用河水添換煮四五次為度 又用川烏十兩搗碎煎汁一鉢入乳香煮至汁乾為度 再用防風石菖蒲荆芥蒼朮各四兩煎汁一鉢入乳香煮至汁盡為度 又用石菖蒲四助搗汁一鉢入乳香煮乾為末每製乳香一助視藥一斗

用鮮皂角刺三助搗碎水煎去渣熬成膏入前

藥搗丸桐子大初服一錢五分三日後服二錢

又三日服二錢五分再三日服三錢為止服至

二十日伸指酸麻一月後容顏光潔服至百日

而愈

傷醫大全

卷二十八

大麻瘋方

七

顧氏秘書

大定風丸

治痛瘋鼓毛歷節瘋

蒼 朮 八兩

草 烏 三兩

杏 仁

川 烏

白 芷

半 夏

各四兩

右藥用生薑二助葱一助取汁拌勻以薑葱搗

一半鋪瓶底將藥裝瓶內瓶上又將搗一半蓋

上埋土內春五夏三秋七冬九日取出晒乾為

末外加猴薑牛膝紅花末各二兩當歸草薜根

末各四兩酒糊為丸桐子大每服六十九茶酒

任下一日三服

麻黃飲

治痛瘋

石 蠶

海風藤

秦 芫

地蘇木

麻 黃

五加皮

各一兩

熟 地

下山虎

各八錢

用好酒一大壺煮一大炷香出火毒每次量情

溫服至第四日須任情一醉用後愈風湯洗浴

發表出汗一次汗後以粥補之再服數日又表

傷醫大全

卷二十八

大麻瘋方

七

顧氏秘書

一次務要表三四次為妙切宜避風要緊

愈風湯

蒼 朮

陳 皮

甘 草

防 風

皮 硝

苦 參

瓦 松

胡麻仁

紫背葶苈

各等分

煎湯洗浴

芎朮丹

治痛瘋半肢軟癱泥壁瘋遍身風氣及頑風起

身不得一服全愈

川芎	枳殼	甘草
白茯苓	桔梗 <small>各三錢五分</small>	烏藥
蒼朮	葳靈仙	陳皮
羌活	白芷	當歸
黃芩	蒼耳子	秦艽
白朮	杜仲	熟地
香附	海風簾	牛膝
木瓜	防風	紅花
苡仁	荆芥 <small>各五錢</small>	川烏

湯醫木全 卷二十八 大癩瘋方 顧氏秘書

草 烏 各一錢 白花蛇 一寸

右藥用麻袋盛好放酒罈內封固隔湯煮半日許候透埋土中一日夜出火毒每日不拘時飲一茶盃服盡卽好不用加減

四磨丹

治癩瘋癲曳瘋

開揚花 酒拌九蒸九晒 敗龜版 煨各三兩 蒼耳子 炒入

香木 三沉三浮爲度

右各爲末和勻入筒內掛當風處七日初服五

分三四日六分漸加至一錢空心熱酒調服	驅邪安神丸	治癩瘋半肢截毛歷節瘋
秦艽	桑寄生 <small>不見火搗末</small>	扶神
川續斷 <small>酒炒</small>	遠志	海風簾
蒼朮 <small>去粗皮米泔浸製半夏各四兩</small>	熟地 <small>酒煮晒乾八兩</small>	
膽南星	防風	甘枸杞 <small>酒薰</small>
杜仲 <small>鹽水炒</small>	川萆薢 <small>酒炒另搗</small>	牛膝 <small>酒炒</small>
防已 <small>各三兩</small>	肉桂	川烏 <small>童便製</small>

湯醫木全 卷二十八 大癩瘋方 顧氏秘書

草 烏 童便製 黃栢 酒炒

甘草 炙一兩 何首烏 重一觔一枚者黑豆煮晒

右爲細末用鮮石菖蒲十觔去苗搗汁拌前藥末不可太濕晒乾復磨爲末煉蜜丸桐子大每日二服白湯送下百丸

救苦回生丹

治半肢截毛歷節蠱瘋

乳香 沒藥 川芎 各一兩五錢

五靈脂 楓香 自然銅 醋煨

一第〇〇册 續修四庫全書 子部 醫家類

松脂

蘇靈仙

各一兩

荆芥

苦參

白芷

各一兩

鬧楊花

蒸熟

地龍

去泥

虎骨

灸

天麻

全蝎

草烏

京墨

各五錢

黑豆

炒二合

紫荆皮

白殭蠶

各六錢

番木鱉

三十個

冰片

三分

麝香

五分

右為末

米糊為丸龍眼大辰砂為衣金箔裹薄

荷湯磨服

一九昏迷而病愈婦人血暈經閉胎

衣不下

炒黑荳淋酒磨服一九神效

湯醫大全

卷二十八

大麻瘋方

顧氏秘書

稀莖散

治軟癱瘋並風氣攻冲

通身疼痛不能起床

蒼耳子

稀莖草

胡桃肉

各二兩

金銀花

五加皮

地骨皮

防風

海風藤

各一兩

當歸

五錢

紅花

二錢

右用三白酒一壘

將前藥用絹包好貯壘內隔

湯煮令透冷

一日每空心服一鍾三四日後服

鍾半酒乾病愈

清氣飲

治紫雲瘋

麻黃

去節

紫荆皮

荆芥

海風藤

防風

明天麻

羌活

桑白皮

辛夷

牛蒡子

檳榔

各二兩

北細辛

桔梗

乳香

沒藥

升麻

各一兩

白蘚皮

金銀花

牡丹皮

黃柏

生地

湯醫大全

卷二十八

大麻瘋方

顧氏秘書

苦參

各四兩

大楓肉

去油

白芷

各三兩

右藥用火酒一大饌浸三日每飲一小盃不可

大醉終日勿絕酒氣服酒前先用後藥煎湯洗

浴

洗浴藥方

苦參

蛇床子

蒼朮

千里光

白芷

劉寄奴

大黃

番木鱉

搗碎

防風

白殭蠶

烏藥

白蘚皮

各等分

用水一桶煎去十分之三取湯洗浴必待汗出而止切勿透風浴後飲藥酒溫睡至四五日後又浴一次再五日後又浴一次酒到病除皮膚顏色如故飲酒將半兼服大補氣血丸藥致康理固密永絕此患

護元丹

治乾瘋白癩瘋

防風

白蘇皮

麻黃

大楓肉

去油

當歸

牡丹皮

湯醫大全

卷二十八

大癩瘋方重

顧氏秘書

山藥

兔絲子

牛膝

川續斷

黃柏

黃芪 各二兩

澤瀉

白茯苓

黃

廣桂枝

乳香

紫荊皮

沒藥

知母

白芷

荆芥

各一兩

熟地

四兩

胡麻

四合

右為末煉蜜丸桐子大先用愈風湯洗浴切忌避風食後煖酒送下百九即睡取汗隔五日取汗一次三次即愈

小棗丹

治刺瘋

防風

白殭蠶

荆芥

何首烏

全蝎

蔓荊子

苦參

葳靈仙

黃芩

牛蒡子

八黃

赤芍藥

生地

大楓肉

羌活

獨活

各二兩

白木

一兩

兩頭尖

重一錢

扁柏枝

山梔

各四兩

甘草

五錢

湯醫大全

卷二十八

大癩瘋方重

顧氏秘書

薄荷

甘枸杞

明天麻

天南星

各一兩

右為末棗肉為丸桐子大每服六十九薄荷湯下

玉樞丹

治白癩癧瘋

苦參

當歸

元參

荆芥

蒼木

各八兩

羌活

烏藥

胡麻

藜蘆

蒼耳子	川芎	獨活
白芷	白茯苓	防風
大楓肉	甘草	麻黃
紅花	牛蒡子	天麻
白殭蠶	琉璃煨灰	海風藤
薄荷	元胡索	秋石
夏枯草	犀角	旱蓮草
虎骨	血蝎	柴胡
蘇木	蟬蛻 <small>各二兩</small>	牛黃 <small>一錢</small>

湯醫大全 卷二十八 大痲瘋方 顧氏秘書

麝香 <small>二錢</small>	廣木香	沉香
檀香	乳香	沒藥
仙靈脾 <small>各一兩五錢</small>	桑螵蛸	養仁
大黃	桂梗	貝母
烏藥	半夏 <small>各一兩</small>	

右為末將粗藥頭煎汁煮米糊丸桐子大硃砂為衣用黃芩大黃羌活獨活防已防風連翹黃柏倍梗荆芥當歸山梔木通甘草半夏紫蘇薄荷升麻川芎麻黃烏藥等味煎汁送下百丸或

瘍醫大全 卷二八

酒下朝夕服避風要緊

冷瘋方

蒼斑香豈一斗胡桃肉四筋連殼敲碎火酒十筋共入罈內浸五七日每用一大鍾飯上蒸不時服藥到病除

神效追瘋丸

治蝦蟇瘋熱疙痞瘋

苦參 <small>六兩</small>	大楓肉 <small>四兩</small>	荆芥 <small>二兩五錢</small>
麻黃	當歸	羌活

湯醫大全 卷二十八 大痲瘋方 顧氏秘書

白木 <small>各五錢</small>	黃芩	白芍
川芎	白殭蠶	人參
白茯苓	胡麻	防風 <small>各一兩</small>
乳香	沒藥 <small>各二錢</small>	麝香 <small>四分</small>

為末酒煮黃米糊丸桐子大每服五十丸酒下

斑龍入師丹

治蝮蠅瘋

威靈仙	蒼木	透骨草
川烏	草烏 <small>各等分</small>	

三三一

為末每服三錢酒服取汗避風要緊

麻黃散

治漏蹄瘋

乳香

沒藥

黃柏

麻黃根

萬年灰

即煉石灰

水龍骨

各等分

右為末摻之貼夾紙膏收其毒水

治瘋爛瘡

枯礬

四兩

花椒

三兩

蛇床子

二兩

白砒

硫黃

各一兩

生礬

五錢

湯醫大全

卷二十八

大麻瘋方

顧氏秘書

研如泥猪油調搽患處

治癩塊方

蒼耳子

大楓肉

硫黃

潮腦

雄黃

各二錢

用芝蔴一合炒黑和研如泥生布包藥擦之無

塊處不可擦

治瘋癩神方

顧玉書

防風

小青皮

打碎

直隴蠶絲

炒去

白蘚皮

羌活

各五分

鑽地風

當歸

刺蒺藜

各一兩

荆芥

葳靈仙

蟬蛻

各三錢

製大麻

五分

土荆皮

三錢五分

火酒五觔浸五日每日飲一二小杯用後方浸

酒搽之其癩自愈經驗多人

地黃根

八兩

荆芥

白鳳仙花

各四兩

木鱉子

公檳榔

各三個

白砒

雄黃

潮腦

各一兩

白芷

白芨

各一兩

沉香

研細二錢

麝香

一錢

湯醫大全

卷二十八

大癩瘋方

顧氏秘書

母丁香

五錢

防風

六兩

火酒十觔共入罈內封固浸七日搽之

治癩奇方

土荆皮

一觔

白芨

尖檳榔

白芷

各一兩

研細搽三天

土荆皮

一觔

白芨

尖檳榔

白芷

蛇床子

各一兩

胡椒

枯白礬

各五錢

研細搽三天

土荆皮一觔 白芨 尖檳榔

白芷 蛇床子各一兩 胡椒

枯白礬各五錢 白砥三錢 麝香一錢

研細搽三天以上三次計搽九日俱用好醋調

清晨搽上晚上以豆腐漿水洗去過夜次早又搽必愈

傷醫大全 卷二十九 大麻瘋方 顧氏秘書

傷醫大全目錄

卷二十九

癩癬部

蛇虱門主論

烏白癩門主論

辨六經癩形

瘡漏門主論

癬門主論附方

癩癬門主論附方

傷醫大全 卷二十九 目錄 顧氏秘書

葡萄疫門主論附方

濕痰流注門主論附方

腹痛門主論

傷寒瘧後發腫門主論

傷寒身癢門主論

腫塊門主論附方

汗斑門主論附方

瘍醫大全卷二十九

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽

男 樵爨用和

全校

癩癬部

自蛇虱烏癩癬起至濕痰流注止皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷二十九

蛇虱部

顧氏秘書

蛇虱門主論

王肯堂曰蛇虱遍身起如風疹疥丹之狀其色白不

痛但搔癢孤之起白疔

柏葉一味煎水洗

內服蠟礬丸金

銀皂角丸

準繩

心法曰白疔俗名蛇虱生於皮膚形如疹疥色白而
癢搔起白皮由風邪客於皮膚血燥不能榮養所
致用猪油苦杏仁等分搗勻絹包擦

烏白癩門主論

王肯堂曰夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺
皮毛變黑或濛濛苦癢如蟲行或眼前見物如垂
絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如桃李癰瘡
赤黑手足頑麻針刺不覺痛脚下頭痛不得踏地
凡食之時開口出氣而鳴語亦如是身體生瘡痛
癢而時如鼻行或兩肘如繩縛此名烏癩又有黑
癩凡二癩之證大同小異故不別錄也

準繩

又曰白癩者其語聲嘶頃目視不明四肢頑痛身體

瘍醫大全

卷二十九

烏白癩

二

顧氏秘書

大熱心中懊惱手脚緩縱背脊拘急內如針刺或
生癰瘡而起往往正白在皮肉鼻有瘰肉目生白
珠擋於瞳子視無所見名曰白癩也

陳實功曰癩風乃陽明濕熱沸騰於肌表或受風寒
侵襲而成其患初起水泡作癢成瘡破流脂水癢
至徹骨久則成片延及遍身好浴熱湯形如風癩
上體者汗解外毒下體者疏瀉內毒為主

正宗

陳遠公曰八一身發癩皮厚生瘡血出如疥或痛或
癢或濕或乾似蟲非蟲人以爲濕熱留於皮膚誰

知乃氣血不能週到滋潤乎世多以苦參煎湯或
 菴蓂白芷外治不能奏效正成於氣血虛也夫氣
 血足則經絡無閉塞之虞氣血旺則毛竅無乾枯
 之患且氣足血旺則熱散濕消何至瘀滯不通結
 於皮膚之外哉治法以補氣血為主佐以消濕散
 熱雖十載沉疴尚可奏功矧目前近癩乎用掃癩
 丹黃芪三兩當歸金銀花各二兩白朮茯苓麥冬
 白芍熟地玄參各一兩山萸川芎各五錢生甘草
 荆芥花粉各三錢防風二錢水煎服皮色即潤二
 湯醫大全 卷二十九 烏白癩 三 顧氏秘書

劑乾燥解十劑全愈 水鑑
 此方大補氣血無異枯涸之田逢甘霖之滂沛生
 機勃勃水滿平疇而醴醴之類自消於無形矣
 沈紫亮十四種癩症歌訣

心經火癩蟋蟀連 肝經木癩風厲偏
 脾經土狗癩併屬 肺經金癩麩白兼
 腎經水癩雨烏共 胃經酒麻癩總言

夫癩之為害較之風症稍輕然其致害之患一也但
 癩愈而形可復瘋愈則元氣難復癩死者少瘋死
 者多然皆非善症耳 醫學要則

辨六經癩形

心經 火癩如灼之瘡大小不一或形如癬裂斷皮
 膚愈而復發乃心臟受毒病深七年方盛其
 蟋蟀癩亦乃心經毒也

肝經 木癩初起似蝕癬狀大小不同形色不一或
 遍身高低不定俗呼為綿花癬

脾經 土癩或先發熱嘔吐身發黃腫即現癩塊大
 如鷄卵小如彈丸或麻木不仁穿即成瘡膿
 氣臭穢難聞

湯醫大全 卷二十九 烏白癩 四 顧氏秘書

肺經 金癩初發如楊梅毒上無設內泛碎肉凸起
 紫赤潰爛直如楊梅毒入肺經肩睫耗落二
 年鼻梁崩倒眼塌唇翻乃金癩之驗若蠹蟲
 食肺腑致生麩白細蠹舉體艾白斑駁週身
 如癬儼然泥壁風之狀外用薰洗則能取效
 白癩乃風寒暑濕之氣邪毒聚聚彌滿肺竅
 久則蠹蟲食肺管所致

腎經 水癩必先得水病而停蓄又為風濕觸激或
 生在陰莖蝕於陰囊兩傍發腫塊橫疔寒熱

交作腫痛難忍漸大而潰變成爛瘡一年病
 劇眉髮墮落水癩之毒在腎濕久生惡流注
 遍身則生青黑赤紫斑駁以致陰莖痿癩皮
 穿肉爛膿血臭穢烏癩乃邪毒入腎蟲食精
 髓下虛不救若在胸肋脇腿臂肋之間生核
 如桃李之狀穿爛臭惡或似漏瘡或如癩疹
 手足頑痺針刺不知此種之症宜大補氣血
 胃經 酒癩因醉臥汗出迎風邪入於胃所致似赤
 非赤似白非白大者如錢小者如荳此症最
 為難治麻癩由酒毒留滯胃腑遍發瘡毒狀
 如疥癬痛癢難忍或手足發黑白頑痺形如
 雁來鵞掌瘋之狀或發內痔頭硬而碎形如
 鱗頭遍體皆然觸之則大痛冷汗一時即愈
 瘋與癩大同小異但癩輕而瘋重治癩之法可於瘋
 症門中諸方酌用

瘍醫大全 卷二十九 烏白癩 五 顧氏秘書

瘡癩門主論

王肯堂曰夫人陽氣外虛則多汗汗出當風風氣搏
 於肌肉與熱氣併則生瘡癩狀如麻豆甚者漸大
 搔之則成瘡也 準編
 心法曰瘡癩俗名鬼飯疔瘡由汗出受風或露臥乘
 涼風邪多中表虛之人初起皮膚作癢次發扁疔
 瘡形如荳瓣堆疊成片日間癢甚者宜秦艽牛蒡
 湯夜間癢甚者宜當歸飲子外用燒酒浸百部以
 藍布蘸酒搽之謹避風涼

瘍醫大全 卷二十九 瘡癩 六 顧氏秘書

癬門主論

陳寶功曰癬乃風熱濕蟲四者而成風宜散熱宜清濕宜滲蟲宜殺總由血燥風毒尅於脾肺二經耳

正宗
又曰風癬如雲采皮膚嬌嫩抓之則起白屑不知痛癢

又曰濕癬如蟲形搔之則有汁出

又曰頑癬抓之全不知痛

又曰牛皮癬頑硬且堅抓之如朽木

癩諸大全

卷二十九 癩

七 顧氏秘書

又曰馬皮癬微癢白點相連

又曰狗皮癬白斑相簇時作微癢

周文采曰乾癬搔之則出白屑索然彫枯

集驗

又曰刀癬則輪廓全無縱橫不定

申斗垣曰白殼瘡卽癬也

啟玄

王肯堂曰面上風癬初起痞癩或漸成細瘡時作痛

癢發於春月名曰花癬女人多生之此皆肺經蘊

積風熱陽氣上升發於面部或生眉目之間久而

不愈恐成風疾

準繩

蔣示吉曰上半身為頑癬治之易多屬風熱
又曰陰癬生在下半身治之最難多屬寒濕總之血分受病以致皮膚不和也

說約

癩諸大全

卷二十九 癩

八 顧氏秘書

癰門主方

浮萍散

治風癰疥癩

當歸 川芎 荆芥 赤芍藥

甘草 浮萍 七月十五日採取陰乾各一錢五分

麻黃 七分五厘夏月只用三分

加葱白二根豆豉五六十粒水煎熱服取汗

手臂加桂枝 背加羌活 膝加牛膝薄桂

遍身風癰

瘍醫大全

卷二十九

癰方

九

顧氏秘書

防風 金銀花 片芩 山梔仁

生地黄 木通 川黃連 當歸

苦參 各一錢 飛滑石 升麻 各三分 荆芥穗

香白芷 各七分 桔梗 生甘草 各五分 蟬蛻

皂針 牛蒡子 各八分 生薑 一片 穿山甲 四片

水二鍾煎八分食遠服 未服藥先一日用茹

子藤連根葉煎水薰洗將癰擦透次日服藥三

劑除根

濕熱生癰

乾浮萍 一兩 蒼耳子 蒼朮

苦參 各一兩 黃芩 五錢 香附米 二錢五分

酒糊丸上身多食後服下身多食前服白湯送

下三錢

搽癰

土槿皮 一兩 斑貓 二個 鷄心檳榔 三個

番木鱉 四個

火酒半觔浸一伏時蘸搽癰上忌大蒜火酒

又方

瘍醫大全

卷二十九

癰方

十

顧氏秘書

硫黃 輕粉 各等分

研勻蜜調搽

又方

大棗一枚去核入白砒三分泥裹煨透冷定去泥

研細香油調搽

又方

密陀僧五倍子各等分研細蜜調搽

又方

土槿皮研細醋調敷以紙蓋之

又方

商陸根蘸蜜擦之

又方

土槿皮研細粗夏布包裝浸火酒一伏時擦之

又方

秃菜根蘸人乳擦之

又方

白降丹 三分 輕粉 七分 醋調擦之

又方

瘍醫大全

卷二十九 癬方

主 顧氏秘書

土大黃

鳳仙花梗

枯白礬 水飛

共搗麻布包裝蘸醋擦之

又方

白砒

硫黃

罐口 各等分

入杓內化開將地下挖一孔將藥傾入冷定取

出米醋磨敷

又方

硫黃 三錢 枯礬 一分

白芷 三分

斑貓 三個 去翅足

研勻抓破擦之

又方

樹上經露水的蜂房一個以生礬填滿房孔置罐底以細火煨令礬化為度取出研細抓破擦之

又方

牛舌草 卽土六

白薇

棟樹皮 各一兩

冰片

甘草 各一錢

輕粉

蝸牛 各三錢焙乾如無活的殼亦可用

共研細用荔枝核將癬抓破直麻油調擦

瘍醫大全

卷二十九 癬方

主 顧氏秘書

又方

皂礬炒研猪胆汁調搽

又方

鮮土大黃搗爛如川椒白糖鹽各少許用布包入

醋內浸半日取起擦癬

又方

生天南星生草烏各等分研細用土大黃汁調搽

又方

猪蹄鞋內填生白礬瓦上煨存性搽之

又方

蛇床子 藁本 尖檳榔 硫黃

枯礬 白膠香 五倍子各等分

研細乾癬香油調擦濕癬乾擦頑癬醋調擦

又方

土槿皮三兩 明雄黃 水銀各二錢

湖腦一錢 檳榔七分 麝香一分

大楓子 斑貓 木鱉子各七枚

研細入火酒筋半封一七蘸擦

瘍醫大全

卷二十九 癬方

三 顧氏秘書

百部膏

治牛皮癬

百部 白蘚皮 鶴虱 葶藶仁

生地黃 黃栢 全當歸各一兩

麻油半觔入藥熬枯去渣復熬至滴水成珠再

下黃蠟二兩試水不散為度拿起鍋入雄黃末

和勻稍冷傾入磁鉢中收貯退火氣聽用

三五十年頑癬

鐵線粉出廣西要對換 海金沙 冰片

麝香末各等分

生薑煎擦

又方

枯白礬七分血丹三分研勻土大黃根全搗搽

又方

土槿皮三兩 公檳榔一兩

不見火晒乾磨細用好滴醋調如薄糊隔水蒸

一炷香取出敷患處棉紙蓋上二三次即愈

又方

瘍醫大全

卷二十九 癬方

三 顧氏秘書

生白米三兩

土槿皮一兩五錢

不見火晒乾為末滴醋調搽三次必愈

又方

先用生薑汁搽再用栢油搽

頑癬陰癬

土槿皮二兩 斑貓十四枚 明雄黃

礬砂各六錢

火酒二觔浸三日搽之

項上耳傍濕癬

蘆 薈 一兩 甘 草 五錢

研極細先將癬以溫水洗淨拭乾搽之

厚牛皮癬

全 蠲 七個 芭 荳 二十粒 斑 猫 十枚

蘇 油 一兩 黃 蠟 一錢

先將芭蠲斑猫入油熬黃焦色去藥取油如油少可加蘇油煉滾投蠟熔化收貯擦之

又方

土地黃根搗爛和蜜搽癬

瘍醫大全

卷二十九

癬方

五

顧氏秘書

頑癬

大公蝦一個取蝦大瓜抓破癬見血路為度即以

蝦腦塗之二次即消

陰癬

生明礬

熟明礬 各一錢 輕 粉 二錢

銀 硝 三分

研細用土地黃根搗爛布包蘸藥末擦之

頭項以上癬

用傾過銀子的銷罐子大小二個盛硫黃一兩於

大罐內以小罐覆住文武火煨俟火焰高罐上一

寸約一鍾茶時取出冷定取上覆罐研為細末用

栢油猪骨髓調勻將癬用刀刺破搽上一伏時愈

又方

早萍草生擦癬覺疼起泡挑破再擦三日不見

水結疤永不再發

又方

硫黃細末拌生猪油熬熟將癬抓破搽擦自愈

治癬碧玉散

瘍醫大全

卷二十九

癬方

末

顧氏秘書

銅綠硼砂白礬各等分研勻香油調搽

岐天師神方 秘錄

棟樹皮 大楓子

潮 腦 各三錢 水 銀

硫 黃 花 椒 炒

木 鱉 子 明雄黃

蟬 蛻 木 通 各二錢

全 蠲 二個 土槿皮 四

斑 猫 公檳榔 各七個

皮 硝 五錢

用火酒三四觔浸十日擦

又方

蘆 薈 輕 粉 雄 黃 各一錢 大 黃

蛇床子 土槿皮 各三錢 檳榔 二錢

研末先將癬刮破以米醋調搽

頭面荷葉癬

川槿皮研細醋調湯頓如膠將癬抓破搽之

白礬散

遍身生癬日久不愈延至頭面

獨莖羊蹄根搗細白礬研細以極酸米醋調勻抓

破搽癬隔日再搽不過兩次即愈

又方

瘍醫大全 卷二十九 癬方 七 顧氏秘書

紫蘇 潮腦 蒼耳草 浮萍

煎湯洗癬

牛皮血癬

舊銀罐一個 露蜂房 煨灰五錢 枯礬 二錢

研細香油調搽

年久陰癬數日除根

土槿皮 五錢 露水 鏡面燒酒 各四兩

全浸七日抓破癬皮用新羊毛筆塗之每日數

次

千金方 孫真人

以日午時立日光下人影有癬處着艾灸之點艾時念咒 呪曰癬中蟲毛戎戎若欲治待日中

一氣唸三遍俟艾火過添火再唸再灸如此三遍

三炷即愈

癬瘡延蔓 東坡家藏

决明子 一兩研細 水銀 輕粉 各少許

再和研不見水銀星為度刮破上藥立瘥

又方

瘍醫大全 卷二十九 癬方 木 顧氏秘書

銅青 雄黃 斑毛 各等分

研勻無根水調敷起泡刺破柏燭油搽潔淨不

發

又方

杜黃連 即羊蹄根一握洗淨搗濾汁 白梅 數枚去核

全汁搗爛用穿山甲刮破搽數次即愈

荷葉癬 古方

田螺一個開磨入信石二分待肉化水搽上即愈

牛皮癬及多年頑癬

紅粉霜五分卽紅昇丹 明礬 杏仁去油皮

川槿皮各一錢 密陀僧三錢

共研細津調搽一日三次三日全愈

又方

牛皮燒灰油調搽

牛皮血癬古仙方

硫黃九分 白砒一分 巴豆三粒去油

研細茶油調搽

頑癬秘方

瘍醫大全 卷二十九 癬方 丸 顧氏秘書

白砒一分 硫黃九分 白硝三分

明礬四分 冰片五厘

研末津調搽之

楊梅癬

枯白礬 硫黃各一兩 雄黃

膽礬 輕粉各一錢 川椒三錢

研細用生豬板油去皮入藥擦破數次其效如

神

楊梅癬

硃砂 雄黃 沒藥去油

乳香去油 兒茶各一錢 杏仁四十粒

大楓肉二十粒

搗爛絹包擦之

鷺掌瘋癬秘錄

川烏 草烏 何首烏

花粉 赤芍藥 防風

荆芥 蒼朮 地丁各一兩

艾葉四兩

瘍醫大全 卷二十九 癬方 辛 顧氏秘書

煎湯先薰後洗層層起皮痛癢自愈

圈子癬集驗

穀樹皮剪如癬樣大小以毛背一面用唾貼癬上

以手不時撲之即愈

癬方

硫黃 木炭灰各等分

共為極細末將癬用穿山甲刮破擦上數次愈

又方

馬蹄決明子一兩為末入水銀輕粉少許研不見

水銀星為度將癬刮破擦上立愈

又方

馬蜂窩一個仰放瓦上以枯礬末填滿孔內炭火炙焦研末用臘醋調塗即愈

陰癬

鮮早蓮草揉成團用穿山甲將癬刮破擦癬上奇驗

渾身癬

羊蹄根搗汁入墨盆內將白芨磨濃汁搽之

癩醫大全

卷二十九 癩方

主 顧氏秘書

又方

鉛一筋煎水日洗數次即愈

川槿皮錠 劉長隨

治一切癬如神

烏梅肉

半筋用羊蹄根汁浸一夜次日重湯燉一炷香又放飯鍋上蒸軟透取出搗如泥

加番打麻

研細一兩

海螵蛸 研細五錢 入烏梅內又搗勻

稱過每一兩加白降丹

八分 白砒 七分 再搗勻

人白芨細末一錢又搗勻做成二三錢重的錠

子陰乾收貯凡用以羊蹄根同醋磨濃搽之

癬方 胡纈谿

土荆皮 三兩

尖栴榔

斑 猫

去頭足糯米炒

大楓子

木鱉子 各七個

巴荳仁

五個

雄 黃

潮 腦

川 烏

白蘚皮

草 烏 各二錢

麝 香

三分

火酒二筋半全入小口瓶內封口浸七日將癬刮破搽之

頑癬

黑鉛一錢熔化離火入水銀一錢研為極細末加

癩醫大全

卷二十九 癩方

主 顧氏秘書

直輕粉潮腦各一錢和勻再研細取牛舌草根去

土淨搗自然汁和勻再用穿山甲將癬刮破敷上

出盡血水為度癢時則頻頻搽之搽時微痛勿懼

頑癬癩瘡及湯火傷 盛惟章

真川鉛粉

銀 硃 各五錢

麝 香

三分

右為末用葱油搥和如泥用油紙一長條將半

段用針刺孔攤膏合轉來將光面貼癬絹帕縛

緊二三日一換夏月早晚換

牛皮癬

穿舊牛皮靴鞋底上皮膚陰陽瓦煨存性研細將癬刮破擦之

癬

鷄蛋一個開一小孔去白存黃入硫黃川椒末各三錢將濕紙封固灰火內煨熟為末先以蒜線將癬刮破用穀樹漿或羊蹄根汁調搽

又方

多年竹燈掛一個火上烤出汁如膠者另將五倍子去更為末和勻用陳醋在火上溫熱調搽

湯醫大全

卷二十九 癬方

韋 顧氏秘書

頑癬

硫黃一兩 火硝 白砒各一錢研

先將硫黃入銀罐內化開再入硝砒末攪勻傾入土內埋七日搽三五次

癬

雷公藤五分 大楓肉 防風各一錢五分

土槿皮 蚯蚓糞 牛舌草根各三錢

共為末陳醋調搽

牛皮癬

桃樹根全膽礬搗爛敷

癬生臉上如錢大抵之有白屑者

菜豆捶碎以紙糊糊碗口上針戳多孔以碎豆鋪帑上放紅炭一塊架豈上俟豈灼盡紙將焦去豆揭紙碗中有水取搽三五次

老癬

輕粉 雄黃 黃丹

銀各等分

研細用米醋浸大黃夏布包蘸藥擦之

湯醫大全

卷二十九 癬方

韋 顧氏秘書

陰癬

鹽內皂角擦之

燥癬

水銀 胡粉

研蛋清調搽

又方

雄鷄冠血塗

又方

胡粉炒黃赤色 醋調塗

又方

搗桃樹白皮醋和塗

濕癬

石硫黃研用三年陳醋調敷

又方

蛇床子

黃栢

黃連

胡

粉各一兩

研細入水銀一棗子大和猪油研勻塗之

又方

瘍醫大全

卷二十九

癬方

靈

顧氏秘書

用粗碗一隻以皮紙用針戳眼糊碗口上以水潮

紙上令濕將杉木屑堆潮紙碗上用火點着俟杉

木屑燒將盡輕輕掃去屑灰揭開紙看碗中杉木

油取搽癬上必效

癩疹門主論

孫真人論曰素問云風邪客於肌中則肌虛其氣發

散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛搖氣妄行之

則為癢也所以有風疹癢癢皆由於此又有赤疹

者忽然起如蚊蟲咬煩癢極者重抓疹起癢之逐

手起又有白疹者發冷亦有赤疹蓋赤疹者發熱

王肯堂曰夫風癩疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒

相搏則為癩疹若赤疹者由冷濕搏於肌中風熱

結成赤疹也遇熱則極若冷則瘥也白疹者由於

瘍醫大全

卷二十九

癩疹

三

顧氏秘書

風氣搏於肌中風冷結為白疹也遇冷則極或風

中亦極得晴明則瘥着厚煖衣亦瘥也其脉浮而

洪浮則為風洪則為氣風氣相搏則為癩疹致身

體為癢也

準經

朱丹溪曰疹屬熱與痰在肺宜清肺火降痰或解散

出汗亦有可下者

心法

方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱結不散

則成赤疹若因風邪所折風熱相搏則成白疹赤

疹得熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱於內故惡熱宜

冷白疹得陰雨則甚得晴則消蓋熱氣散釋於外故惡冷宜熱熱搏於血分其邪因併發於表則赤若風濕搏於氣分則氣脈不行因邪併發於表則白夫如是然後與治法相應邪熱者故惡熱而喜涼邪濕者故惡雨而喜晴矣方論中又有風痞癩者即內經所謂汗出見濕乃生瘰癧又曰勞汗當風寒薄為鬱乃瘰癧即癩疹屬也故痞癩類也此皆謂外邪鬱肌肉玄府之熱者矣然則與內經言少陽少陰而君相二火客熱之勝為丹疹外發者

癩醫大全 卷二十九 癩疹 毛 顧氏秘書

方論中則無有也故人氣君相二火鬱發而變者宜乎未之及耳若此條是人氣所變之一者也故二火鬱發出血氣之表與外邪所鬱無異更有小兒發痘瘡之外必有出疹二次亦是君相二火發出未盡之胎毒也

又曰癩疹入腹亦能殺人 宜用蚕砂煎濃湯洗之

又曰癩疹熱多則色赤風多則色白甚者癢痛搔之則成瘡也

林氏曰或問斑疹因何而生屬陰屬陽屬虛屬實屬

表屬裏可得聞其詳乎答曰斑疹之發有外感風熱者有胃腑實熱為病者有傷寒失下者有傷寒陽明經症失汗發衄不衄則發願不生願則發斑疹者總屬陽明胃與大腸之風熱亢盛已極內不得疎泄外不得透達怫鬱於皮毛腠理之間輕則為疹重則為斑一如火乘金位金受火尅之故此乃陽毒屬表屬實之斑疹也有陰虛血熱者有陽虛血熱者有氣血兩虛而虛熱鬱盛者此三焦無根之火乘氣血之虛而空發於上怫鬱於皮毛血

癩醫大全 卷二十九 癩疹 毛 顧氏秘書

脈之中內不得清外不得散遂發斑疹乃陰虛屬裏之症也 活人錄

又曰或問何以為斑何以為疹陰陽既別何者為重何者為輕答曰斑者成片不分顆粒一如雲采拱起淡紅者輕紫紅者重黑者凶輕者癢而重者痛疹者如癩瘡或類蚊跡蚤虱痕而不盛一日之中起伏隱現不常隱隱見於肌膚之間不大起發者是大約陽症斑疹易看而易治陰症斑疹挾虛而發難看而難治苟不細審則陰症誤以為陽立至

危殆可不慎歟

又曰身熱無汗煩渴躁悶或痛或癢如雲若錦腹痛
胸滿二便秘結六脉浮洪有力或浮數有力者係
手陽明大腸足陽明胃二經風熱為病所謂陽斑
也若內熱自汗渴不欲飲心煩身躁胃弱脾泄喜
濕惡熱色白而不紅但癢而不痛六脉遲緩微弱
或虛數無力者手太陰肺足太陰脾手少陰心足
少陰腎經之陰火內亢為病所謂陰斑也疹形雖
與斑異而致病之因受病之臟腑及所現之脉與
瘍醫大全 卷二十九 瘡疹 走 顧氏秘書

形症無不同蓋斑有陰陽則疹亦有陰陽自在醫
者審其症之陰陽虛實脉之無力有力可也 一
又曰兩陽合明其火自盛兼有食積致生積熱故斑
疹之因必歸過於胃與大腸也火盛則血熱而金
燥蓋心為火臟主血脉肺為金臟主皮毛火聚胸
中肺受薰蒸心火愈熾或熱極反兼風化或客風
鼓動內火其病發於心肺二經所謂陽斑陽疹必
先清散風熱於表疎導積熱於內表裏和解以救
炎炎之勢如二便秘結急宜利之若脾腎之陰虛

火盛不能歸經固藏發越於上而心肺受其薰灼
而病亦有因風致火或因熱極生風而發所謂陰
斑陰疹初則亦宜清解使其透發寬其胸膈解其
煩躁次則察脉之大小虛實脾胃之實與不實大
便之結與不結或清補或溫補

又曰雖陰陽俱有斑疹而陽症發斑者多且多發於
熱病之末陰症則發疹者多發於病之始蓋斑由
積熱發之稍緩疹兼風火發之尤速發之速者禍
輕發之緩者其禍反深則又天下事理必然之勢
瘍醫大全 卷二十九 瘡疹 走 顧氏秘書

也至於時氣發疹由風熱之邪乘於肺經必兼鼻
寒氣粗痰嗽餘熱不清遺於陽明大腸并其糟粕
蘊積而為濕熱更成積滯自利甚至熱鬱化火火
性急迫隨氣滯下而後重不舒者宜用辛涼升散
之劑清其邪熱使鬱陷之氣透達外解不惟斑疹
自消而濕熱亦散矣若痰嗽不清加以清火消痰
之藥積滯有餘濕熱下迫加以分清利濁健運化
導之劑如木香黃連山查神曲車前澤瀉之類更
用枳殼寬胸開鬱升提鬱陷之邪

風濕鬱於腸胃風熱逆於肌表傷於血分則憎寒壯熱胸中嘈雜肚腹疼痛發為赤疹傷於氣分發為白疹俱令瘙癢無度一日三現三隱俗名風絡疹卽此是也第一宜忌香油蝦鮮麪食並戒酸鹹倘不知禁戒輕則成瘡甚則不時舉發致成終身之累治當疏風散熱托疹為主

癩瘡門主方

通治陽症斑疹主方 活人錄

生地 三錢 防風 荆芥 各一錢

川黃連 犀角屑 牡丹皮 各五分

黃芩 桔梗 各一錢 甘草 三分

水煎不拘時服

血中伏火必先涼血和血故以生地爲君而丹皮佐之芩連瀉心肺之火佐桔梗以開鬱結犀角清心家之熱毒而甘草佐之荆防用以解散內外之風邪外感重者加羌活一錢川芎薄荷各五分暫去芩連生地如陽明家熱毒煩躁熱渴無汗背寒斑疹黑紫色者速加石膏

湯醫大全

一兩連翹一錢五分玄參一錢犀角五分去防風桔梗傷寒邪熱入胃舌胎黃黑有刺二便不通譫語狂熱者加大黃五錢芒硝三錢枳實二錢去生地防風丹皮傷寒陽明失表煩渴外熱牛表半裏大便不去無下症者加乾葛三錢牛蒡子二錢玄參一錢五分薄荷一錢去生地丹皮黃連犀角

通治陰症斑疹主方

白朮 二錢 白茯苓 一錢 人參

炮薑 各一錢 陳皮 炙甘草

防風 各五分 肉桂 三分

水煎早晚空心服

右方乃治陽虛血熱及氣熱血熱凡惡寒喜熱
二便清利口不乾而反欲熱飲六脈沉微細數
或虛數無神者宜之此氣虛不能統運血脈致
血入鬱生熱而有風熱之變也

腎水不足龍火無制陡發越於上心肺受其薰逼而
成斑疹者

八味地黃湯導火歸原兼服腎氣丸

治陰虛血熱熱鬱血中而生斑疹時發時止或疼久
遠不愈者以此涼血清熱滋肝省風兼服濟陰丸

生地 三錢 製首烏 二錢 當歸

乾葛 各一錢 秦艽 丹皮

瘍醫大全 卷二十九 癩癧方 聖 顧氏秘書

甘菊 荆芥 各一錢 薄荷 五分

甘草 三分

水煎午後臨睡服

遍身風疹作癢

生芝麻研碎擦之

又方

過年貼過掛絡擦之

又

鹽蒲包煎湯洗之

風疹不時舉發

真麻油 燒酒 各半

和勻燉熱發時服之再不發矣

瘍醫大全 卷二十九 癩癧方 聖 顧氏秘書

葡萄疫門主論

陳寶功曰葡萄疫乃小兒感受四時不正之氣鬱於皮膚不散結成大小青紫斑點色若葡萄發在偏體頭面乃為腑症自無表裏如邪毒傳胃牙根出血久則虛人斑方漸退初起宜服羚羊角湯清熱涼血久當滋益其內又有牙根腐爛者人中白散主之 正宗

心法曰此證惟腿脛居多

瘍醫大全

卷二十九

葡萄疫論

五

顧氏秘書

葡萄疫門主方

羚羊角散 正宗

羚羊角 防風 麥門冬 玄參

知母 牛蒡子 黃芩 各八分 生甘草二分

淡竹葉十片水二鍾煎六分食遠服

胃脾湯 正宗

北五味 五分 白朮 遠志肉 陳皮

沙參 麥門冬 茯苓 生甘草 五分

水二鍾煎六分食遠服 如虛弱自汗者去沙

瘍醫大全

卷二十九

葡萄疫方

五

顧氏秘書

參加入參黃芪各五分

非疳散

治葡萄疫攻牙疳爛

五倍子 炒茶 人中白 各一兩 冰片 四分

研細用米泔水漱淨吹

濕痰流注門主論

陳實功曰流者行也注者住也由其瘀壅其形漫腫無頭皮色不變所發母論穴道隨處可生皆緣榮氣不從逆於肉裏如風寒相中表症發散未盡者散之房慾之後陰虛外寒所侵者溫之惱怒傷肝鬱結傷脾者歸脾湯加青皮香附散之跌撲損傷瘀血凝滯者和血湯逐之產後惡露未盡流注經絡而成者木香流氣飲導之如不得內消者法當大養氣血培助脾胃溫煖經絡通行關節十全大

瘍醫大全

卷二十九 濕痰流注

顧氏秘書

補湯加熟附子香附主之如膿已成宜急開之

正宗

王肯堂曰不串流者俗曰馬瘕 串流者名曰走散流注俗曰瓜藤馬瘕 遍身骨節內疼痛不能起坐無堆作熱不退者名曰啣骨馬瘕 若脊骨及髀骨上起堆或一二個或三五個名曰過脊馬瘕 若尾骶骨上起堆作熱者名曰殺着馬瘕 若髀骨下痛甚無堆但腫者名曰鎖腳馬瘕 若骨相交接之處疼痛無堆微腫名曰接骨馬瘕 此證因風熱走散四肢治當疎風散熱初起不可用

火針烙之腫勢盛者只宜刺以稜針久熱者可火針烙之流注入股者死

準繩

又曰禁用寒涼尅伐內消等劑

汪省之曰夫流者行也乃氣血之壯自無停息之機注者住也因氣血之衰有凝滯之患故行者由其自然住者由於瘀壅凡得此者多生於體虛之人勤勞之輩不慎調變夏秋露卧縱意取涼熱體當風或中風邪發散未盡或慾後陰虛外寒所侵又或惱怒傷肝鬱結傷脾榮氣不從逆於肉裏又或

瘍醫大全

卷二十九 濕痰流注

顧氏秘書

跌打損傷瘀血凝滯或產後惡露未盡流縮經絡皆成斯疾也初起外以琥珀膏敷貼內服行氣活血之劑其中十可消其五六如不得內消者法當大養氣血培助脾胃溫煖經絡通行關節如木香流氣飲十全大補湯俱加熟附子香附培助根本庶未成自消已成自潰已潰自斂不致殘敗破漏不斂之證且如有膿宜急開之忌用寒涼尅伐內消等藥犯此終至不救者多矣

理例

朱丹溪曰凡人身上中下有塊者是痰然痰在皮裏

膜外則通體遊行腫而色白滯而不痛宜導達疎利如痰因火動而走則體多小塊色紅痛甚流走無定宜解毒清火爲主

又曰痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不能通痰在腸下非白芥子不能達白芥子亦能散皮裏膜外之痰氣竹瀝滑痰非薑汁不能行經絡痰在四肢非竹瀝不開

申斗垣曰三陽經傷寒發汗不透則必痛痛久則腫腫久則赤而熱熱久則破壞此名陽濕痰破瘡如

瘍醫大全

卷二十九

濕痰流注

素

顧氏秘書

三陰經失汗汗鬱成痰則痛痛久則皮色不變而腫至夜痛反甚其痛處冰冷脉亦沉細日久氣血凝注則肌死肌死則破壞腐臭名曰陰濕痰破瘡均宜艾炙

破立

又曰冷流注多附骨硬不消骨寒而痛筋縮不能伸屈庸俗誤用刀針又無膿血止有如屋漏汁或瘀黑血宜用回陽玉龍膏如稍緩再加軍姜內桂白芷草烏等分熱酒調敷則骨寒除而痛自止氣溫

和而筋自伸肉亦軟而腫自消亦不可無石菖蒲

以其性能破堅散腫最妙亦不可多多則解羣藥性也

又曰流注首尾敷冲和膏最穩加乳香沒藥治流注筋不能伸敷之極効

又曰走散流注發因受寒凍凝滯血脉而成一名流注傷寒又名瓜藤發背患生於背遍身皆有之經云傷寒流注尚猶可流注傷寒急如火醫者當察其寒熱虛實治之

胡公弼曰流注又曰走注狀似蟹形毒因風盛而生

瘍醫大全

卷二十九

濕痰流注

甲

顧氏秘書

熱氣因熱盛而走散午前宜四君子湯加芎歸午後宜四物湯加參芪麥冬北五味斷不可用滲利流氣等藥

青囊

又曰治流注大法鬱者開之怒者平之閃撲及產後瘀血者散之傷寒餘邪者調解之大要以固元氣爲主佐以現證之藥

又曰流注一箇要表汗一次如流注三個須表汗三次毒自消矣設治之不早深爲大害

又曰如破潰成膿者先用降藥降去敗肉腐盡生肌

可也

醫林集要云白虎飛尸留連週暮或展轉數歲冷毒朽骨出盡自愈若附骨腐者可痊正骨腐者則為終身廢疾矣

又曰又有結核在項腋或兩乳傍或兩膀軟肉處名為瘰癧屬冷症也又有小兒宿痰失道致結核於頸項臂膊胸背之處亦冷症也並宜熱藥敷貼王西圃曰流痰胸腹流於四肢者可治四肢流入胸腹者難治

傷醫大全

卷二十九

濕痰流注

聖

顧氏秘書

心法曰流注初發漫腫無頭皮色不變凝結日久微熱漸痛透紅一點方是膿熟即宜用針開破若濕痰化成者膿色黏白若瘀血化成者膿色金黃黏水若風濕化成者膿色白稀如荳汁若汗後餘邪化成者膿色或黃或黑稀膿臭穢以上四證發於肉厚處可愈發在骨節及骨空處難痊若滯慾受寒化成者膿色稀白而腥其水中有猪脂水油之狀此為敗漿膿也諸書雖有治法終成敗證

馮魯瞻曰按臟腑津液受病為痰隨氣升降理之常

也若在皮裏膜外及四肢關節曲折之地而臟腑之痰何能流注其所此即本處津液遇冷遇熱即凝結成痰而為病斷非別部之津液受病成痰舍其本位而移於他部者况氣本無形故能無微不至而液隨氣運亦可藉氣周流若至津液受病成痰則變為有形而凝滯焉能隨氣流通於至微不至之所耶

試痰法 用海蜃皮貼上外以膏貼之如痰次日膏藥揭得下海蜃皮揭不下即是害痰

傷醫大全

卷二十九

濕痰流注

聖

顧氏秘書

流注門主方

香附餅 正宗

治風寒流注襲於經絡結成腫痛

香附為末酒和量瘡大小做餅覆患處熱熨斗熨藥餅上未成者自消已成者自潰風寒濕毒宜薑汁作餅熨之

醒脾湯 正宗

治懷抱鬱結思慮傷脾以致脾氣不行逆於肉

裏乃生壅腫疼痛不眠心煩不安神氣不清

傷醫大全

卷二十九

流注方

聖

顧氏秘書

人參

白茯苓

白朮

嫩黃芪 炙

酸棗仁 炒研

遠志肉 各一錢

地骨皮 七分

桔梗

柴胡

川黃連

廣木香

炙甘草

香附 各五分

圓眼肉 七枚

薑三片棗二枚水二鍾煎八分不拘時服

琥珀膏 正宗

治一切皮色不變漫腫無頭氣血凝滯結成流毒母論身體上下年月新久但未成膿者並效

生大黃 二兩

鬱金

白芷

天南星 各一兩

共為細末用大蒜去殼搗爛入上藥再搗畧入酒一二匙調勻遍敷腫上紙蓋隨有熱痛又有不痛俱待藥乾便效次日又有起泡又有不起泡者如有泡起挑去泡中黃水以膏貼之自效調中大成湯

治流注潰後膿水清稀飲食減少不能生肌收斂

欵

人參 二錢

白朮

嫩黃芪 炙

陳皮

傷醫大全

卷二十九

流注方

聖

顧氏秘書

當歸身

山藥

白茯苓

白芍藥 炒

牡丹皮 各一錢

遠志肉

砂仁

藿香

炙甘草 各五分

熟附子

上肉桂 各八分

煨薑三片黑棗二枚煎食遠服

黃芪六一湯

治流注潰後膿水出多口乾作渴煩躁不寧

嫩黃芪 六錢

生用 粉甘草 一錢五分

生炙各半 人參 一錢

水煎食遠服

木香餅

一切氣滯結腫成核或痛或酸閃胸風寒所致

生地黄 搗膏 廣木香 減半 研末

和勻量患處大小作餅置腫上以熱熨斗熨之
堅硬木痛者間日熨之自效

流痰渾身作痛

當歸 瓜蒌仁 獨活 大川芎

白茯苓 白芷 白芍藥 連翹

防己 穿山甲 炒 防風 生地黄

金銀花 牛膝 玉花粉 黃芩

湯醫大全 卷二十九 流注方 聖 顧氏秘書

陳皮 川貝母 甘草 各五錢

分作六劑酒水全煎若上半身痛食後服下半
身痛食前服如遍身痛只用酒煎神效

火龍膏

治風寒暑濕毒襲經絡筋攣骨痛或肢節煩痛

濕痰流注作痛不能行步鶴膝風歷節風疼痛

其效尤速

生薑半觔取汁牛皮膠二兩入鍋內化開入乳香

沒藥末各五錢麝香一錢調勻待溫攤貼患處

濕痰流注奇方 趙君子

木瓜 一個 當歸 五錢 甘草 三錢

細酒一觔全煎減半再加研細乳香沒藥各一
錢露一宿空心熱服未潰自消已潰自斂

濕痰內消方

宣木瓜 五錢 紫花地丁 一兩五錢

臘酒二觔煎好露一宿看症上下分食前後服
內消濕痰流注神方

吉祥草根洗淨搗汁半酒杯和酒沖服取汗即消

湯醫大全 卷二十九 流注方 聖 顧氏秘書

且不生瘡毒

錦囊秘授神效觀音救苦丹 洪醫贈

神治一切風寒濕氣流注作痛手足蹇攣小兒

偏搐口眼喎斜婦人心腹痞塊攻疼不問年深

月久將藥置患處以燈火點着候至火滅連灰

罨於肉上立見痊愈重者用藥米粒大輕者用

藥粒大只須一壯不必復炙若患處潤大連

排數壯一起炙之且炙時不甚熱痛炙後並不

潰膿一茶之頃痲疾如失屢試屢驗真神方也

因思濟之一方不若利之天下惠之一時不若
澤之後世特附於錦囊之中以廣厥傳願後賢
以爲半積半養之珍幸勿專爲嗜奇嗜利之具
麝香一錢 硃砂二錢 硫黃三錢
各研細末先將硫黃化開次入硃麝同化傾入
磁器內候乾再研末隔火化開候開切作如糝
如米大貯磁瓶內慎勿出氣珍藏聽用
一切腫塊濕痰流注

鮮山藥 天麻 各五錢

瘍醫大全

卷二十九

流注方

聖

顧氏秘書

酒水各一鍾煎服三劑全消

敷痰 賈頌周

大蒜頭十數枚去皮入皂礬三錢搗爛聽用用香
一炷點起將藥敷患上以一炷香盡爲度如是痰
卽現青紅色如只紅色則非痰也如是痰隔日敷
之三次自消

又方

天南星 大黃 白芨 各等分

研細薑汁和醋調敷

又方

白蘿蔔葉 扁栢葉向北 乾麵 各等分

研細醋調敷日易一次自消

敷濕痰腫痛癰疽發背無名腫毒

五倍子瓦焙黃 生半夏 生南星 各等分

共研細全滴醋熬數沸加菝薑汁調敷痛處留
頭如藥乾用醋不時潤之至重毒證不過三四
次卽消

敷痰法

瘍醫大全

卷二十九

流注方

聖

顧氏秘書

生山藥一段洋糖飛麵共搗爛塗敷自消

摩腰紫金丹活人錄

風寒濕三氣而兼痰飲留滯於經絡血脉之中
閉塞不通而痛並治腰痛

附子尖 烏頭尖 天南星 各二錢

雄黃 樟腦 丁香 各一錢

吳茱萸 肉桂 硃砂

乾薑 各一錢 麝香 二分

蜜熬菝薑汁和丸如雞頭子大每丸以薑汁化開

敷全患處上貼萬靈膏或蠲痛膏

蠲痛五汁膏

寒濕氣襲於經絡血脉之中為痛痛於兩臂兩

股腰背環跳之間

鳳仙梗 搗汁

老薑汁

蒜汁

菘汁

韭汁 各等分

熬至滴水成珠用草蓆子油同黃蠟收起每以此膏烘熱貼上追出濕氣水液自愈

消痰方

瘍醫大全

卷二十九 流注方

吳 顧氏秘書

芫花研末一錢棗肉搗勻為丸在上食後服在下食前服白湯送下即便出穢痰其腫立消但此法宜施於壯實初起之人須忌甘草

又方

乳香 去油

沒藥

藥 去油各一錢

川貝母

去心研二錢

連翹 八錢

萬年青 三片

煎服自消

雷火針

風寒濕氣痰滯於經絡血脉之中閉塞不通而

痛

蕪艾 一兩

硃砂 二錢

穿山甲 土炙

桃皮

草烏

川烏

乳香

雄黃

沒藥

硫黃 各一錢

麝香 五分

共為細末以蕪艾鋪粗紙上入藥末三錢捲成筒如爆竹式擇吉日將藥筒入瓶內以箬葉油紙封口埋屋下地中四十九日取出任用此針能針百病可於患處用青布或紅布摺二十四

瘍醫大全

卷二十九 流注方

辛 顧氏秘書

層將針燈上點着吹息隔布針之患內煖極即止不過三次即愈

治因氣鬱痰生於頸項皮膚腫硬白色不甚痛疼

天南星半夏研末薑汁調敷或南星半夏末薑汁

和餅隔蒜炙更妙

消痰神方

新鮮針線包

即蘆洲上蘆柴上纏擾之物形如鳥首綠色內有白漿秋深冬月白漿乾

絮者是也

不拘多少搗爛敷上自消

痰注臂痛

湯仁齋

天仙籐 白朮 羌活
白芷 各三錢 姜 黃 六錢 製半夏

每服五錢薑五片水煎服

濕痰腫痛經年不能行者單方

水紅花 花 椒 蘿蔔菜 甘草

槐花 金銀花 蒼朮 白鳳仙花

水龍骨各等分 菴荻草

煎薰患處水稍温即洗之

神仙外應膏秘方

瘍醫大全 卷二十九 流注方 至 顧氏秘書

川烏一筋為末用陳醋入砂鍋內慢火熬如醬色

敷患處如病一年敷後一日發癢二年二日發癢

癢時令人將手拍癢處拍至不癢為度先用升麻

皮硝生薑煎水洗然後敷藥不可見風

濕痰流注初起腫痛無頭皮色不變久而不治則發

熱作膿知覺早者於未破時急服此方十餘劑即能

內消最稱靈驗

橘紅 防風 秦艽

木通各一錢 真瞻星二錢 川貝母

薑 蚕 炒 槐花 炒 五倍子

金銀花 各三錢 防已 八分 白甘遂刮去皮未七分

皂角子鮮者敲碎九個 肥皂子鮮者敲碎十個 土茯苓打碎四兩

虛弱人加 石斛 苡仁 各一錢

痰在頭頂胸者加 夏枯草 一錢

痰在背脊者加 羌活 五分

痰在脇肋者加 柴胡 五分

痰在肚腹者加 赤芍 澤瀉各一錢

痰在臂者加 獨活 五分

瘍醫大全 卷二十九 流注方 至 顧氏秘書

痰在腿脚者加 木瓜 二錢 牛膝 一錢五分

右用河水九碗砂鍋內煎三碗每日早中晚各

熱服一碗如痰在心之上者食後服痰在心之

下者食前服如虛弱人分二劑極虛者分三劑

小兒分四劑忌食鹽醬茶醋猪肉鮮魚雞鷄鴨

一切發物煎炒薑椒烟酒生冷但藥內有甘遂

與甘草相反恐別樣丸散內有甘草者切不可

服已破頭者止服四五劑使氣血調和不致又

流他處隨服十全大補湯加川貝母二錢五分 石斛

二滴乳香去油四分須服數十劑方能全愈若係多
火之人十全大補湯內減去肉桂願體集

治流注抄本

石 膏 一兩 官 礪 三錢

飛麵作丸將丸穿一孔貫以鉄線炭火煨紅
取酒一碗投入冷又燒紅入酒內以丸盡為度
其酒熱即服一日二服自消

又方

金銀花 紅 花 各三錢 地 榆

湯醫大全

卷二十九

流注方

聖

顧氏秘書

苦 參 各二兩

酒水各半煎服近者三劑遠者七劑即消

神驗方 周鶴仙

用薑黃母子是大薑黃身上小釘子是也研末將小紅棗去核

藥末入內填平用絲綿裝緊塞入鼻孔內隨量飲

醉蓋煖出汗已潰者自然全愈未潰者內消神效

之極鼻孔照男左女右塞之藥不可經婦人手

又方

野花椒 山茶萸 各半筋

用酒浸煮三炷香冷定將酒盡量飲醉發汗一
身其毒自散神效

又方

金銀花帶葉和酒糟研爛用淨瓦罐盛藥火中煨
熱敷患處立愈

濕痰初起一劑消蘊公和尙

歸 尾 大貝母 黃 芩

川牛膝 木 瓜 白茯苓

檳 榔 陳 皮 各一錢 牡 蠣

湯醫大全

卷二十九

流注方

聖

顧氏秘書

金銀花 玉木鱉 白殭蠶 各一錢

熟大黃三錢五分加至八分一錢止取效更速

用無灰酒一筋煎一半空心熱服取汗行二三

次渣用酒半筋煎四兩再服

立消渾身上下濕痰並消一切無名腫毒

穿山甲七錢 大 片 者 土 炒 關 羊 花 一 兩

猪 牙 皂 炒 一 錢 羌 活 四 錢

共研細末每服一分八厘加洋糖三錢熱酒調

下

消痰神方 楊警愚

無論流痰敗痰腋核如已經貼有膏藥敷藥內
膿已成者務將膏藥揭去敷藥洗淨然後服藥
一服十消五六至重者不過三服

穿山甲 炒 生大黃 生明礬 各四兩

杏仁 去皮二兩

右四味俱用碾槽研極細末切不可磨若磨則
不效每服三錢痰在上部食後服痰在下部食
前服俱用木瓜酒調下孕婦忌服

傷醫大全 卷二十九 流注方 蓋 顧氏秘書

流痰

紫花地丁 一兩 五錢 宣木瓜 五錢

臘酒二觔煎一觔露一宿痰在上身食後熱服
痰在下身食前服之每日一劑三日後自消脩
服時忌經陰人手

敷流痰 王西圃

生大黃 天南星 白芨 各等分

共研細末生薑汁江醋調敷

敷流痰 張漁山

白蘿蔔葉 搗 朝北扁柏葉 搗 飛 麩

和杵敷上一日一換三日即消敷上宜益暖出

汗

敷痰 徐聲士

土 子 漆匠熬 生半夏 川 烏

生南星 草 烏 各等分

研細末桐油調敷

敷痰

石 灰 當歸尾 皮 硝

傷醫大全 卷二十九 流注方 蓋 顧氏秘書

穿山甲 川 烏 薄荷葉

草 烏 各五錢 生大黃 一兩

研細末鹽搗打糊調敷

濕痰流注

葱 汁 一飯 鳳仙花 一棵搗汁如無鮮者
即用乾者一棵研末

先將二汁熬稠入廣膠二錢溶化再加人中白

細末二錢和勻攤膏貼

又方

蒜 瓣 三十瓣 皂 礬 三錢

共搗爛敷一炷線香時即洗去次日再敷起泡

無妨

又方

乳香 去油 沒藥 去油 雄黃 各三錢

麝香 三分 大蜈蚣 一條

研細末用黃蠟三錢熔化為丸每服三錢陳酒送下隨量飲醉出汗自消

濕熱流注 杜秘

連翹心 八錢 乳香 去油 沒藥 去油

傷醫大全 卷二十九 流注方 老 顧氏秘書

廣木香 各五分

引加萬年青葉七片開口花椒四十九粒水煎服後飲木瓜酒 體壯人加黑白丑 一錢

消痰 吳天序

甘草 三錢 金銀花 羌活

天花粉 各一兩 蒲公英 紫花地丁 各二兩

白水煎加無灰酒儘量服出汗如糊一劑即消

消痰 胡學海

猪牙皂 一錢 蜈蚣 三條 全蝎 五個

乳香 去油 川貝母 穿山甲

明雄 沒藥 去油 各三錢 麝香 五分

共研細黃蠟熔化為丸每服三錢木瓜酒下

消三十六種痰塊仙方 劉介奉

九頭獅子草 川貝母 甜味者佳 各一兩

共磨細末無灰酒跌丸大人每服三錢小兒減半木瓜酒送下或開水亦可不過三服必消孕婦忌服

婦忌服

消痰神方

傷醫大全 卷二十九 流注方 老 顧氏秘書

黑棗 八兩 去皮核 老鼠花 買三文錢 研細

全棗肉為丸如核桃大每服一丸白湯嚼下如是痰服後必腹痛吐的也是痰扇的也是痰候行過數次用溫粥一盞喫之即止其痰即消如未消盡明日再服消盡為度

股痛門主論

風寒氣鬱於皮毛致血不榮於肌表皮槁多痛手足似無皮之狀是股若生焉先將熱湯洗淨潤肌膏擦之就暖勿見風冷自愈如每逢冬即發者須三伏時晒搗爛大蒜間擦三次不再發經云寒因熱治其理甚明

傷醫大全

卷二十九

股痛

李

顧氏秘書

傷寒瘧後發腫門主論

傷寒愈後浮腫若因水氣者宜利之若胃虛食少者宜五苓散加蒼朮陳皮木香砂仁之類胃不虛者以商陸一味煮粥食之亦妙傷寒太病瘧後足腫者不妨但節飲食戒酒色胃氣強腫自消也

傷醫大全

卷二十九

發腫

李

顧氏秘書

傷寒身癢門主論

凡陽明反熱汗皮中如蟲行者胃主肌肉陽明久虛也宜木附湯黃耆建中湯主之如風熱盛身癢發熱無汗口燥舌乾大小便秘澀者宜防風通聖散加羌活主之如風證身癢者宜小續命去附子加白附子主之如血虛身癢者宜四物湯加浮萍蒺藜防風主之

身上虛癢者是血不榮於腠理也用四物湯加黃芩煎調浮萍末服之

易醫大全

卷二十九

身癢

李

顧氏秘書

腫塊門主論

虛怯人氣血乖違肢體患腫塊或痛或不痛或風襲於經絡肢體疼痛或四肢筋掣骨痛宜用熨法其腫自消此外補陽氣而運散壅滯之法也

易醫大全

卷二十九

腫塊

李

顧氏秘書

腫塊門主方

葱熨法

葱頭細切搗爛炒熱熨患處冷則易之再熨腫處
自已即跌打損傷腫痛亦用此法

凡有腫塊處

糯米一二合炊飯或粽子煮熟乘熱入鹽少許加
切碎葱數根白酒麴一小丸全搗極爛如膏烘熱
貼患處油紙及布包縛住自消

又方

湯醫大全

卷二十九 腫塊方 李 顧氏秘書

白酒麴一二丸為末炒枯熱酒調敷即可內消

消塊止痛丹 水鑑

人參 半夏 白朮 各三錢

黃芪 薏苡仁 白茯苓 各五錢

羌活 防風 各一錢 桂枝 五分

水煎服二劑輕四劑止二十劑消盡

汗斑門主論

張仲景曰汗斑乃暑熱之時人不知而用日晒之手
巾擦其身上之汗便成此病最無害而難愈宜內
服蒼耳丸主之

湯醫大全

卷二十九 汗斑論 李 顧氏秘書

汗斑門主方

驗方

硫黃 鉛粉各等分

共研細用生薑切片蘸擦初則變黑次則轉紅紅退則愈

又方

密陀僧 鉛粉各等分

研勻生薑蘸擦

又方

湯醫大全

卷二十九 汗斑方 李孟 顧氏秘書

用厚布一尺以白砒研極細末雞蛋清和勻漿於布上拍勻晒乾不時擦之數日即愈兼治一切頑癬如神

汗斑肥皂

硫黃 雄黃 白砒

明礬 密陀僧 肥皂 去筋弦膜淨六兩

共搗為大圓擦汗斑上停一頓飯時洗去將手巾另用清水搓過切不可擦臉恐有氣息攻目

汗斑 錢懷谷

先將生薑切片擦汗斑上再以薑汁調川貝母細末搽上過宿洗去

汗斑

粗夏布一塊用瓦上青苔不是瓦上長瓦松將井水洗淨

搗汁浸布晒乾用白芷一兩硫黃五錢全炒以雞

蛋清調勻漿在布上晒乾以布擦斑上自愈

又方

密陀僧 硫黃各一錢 冰片一分

研細燒酒調搽

湯醫大全

卷二十九 汗斑方 李孟 顧氏秘書

又方

白礬砂研細擦之即褪

汗斑 楊警愚

北細辛 白芷各二錢 硫黃一錢

共研極細末用花紅連蒂切一片蘸擦除根

赤白汗斑 劉進士

雄黃 硫黃 全

白僵蠶 白附子 密陀僧各五分

麝香 以上共為末蘸生薑於患處搽之百除根終

瘍醫大全目錄

卷三十

幼科諸瘡部

小兒初生無皮門主論附方

小兒初生遍身魚泡門主論

小兒初生夢生門主論

小兒初生黃腫門主論

小兒初生鼻塞不通門主方

小兒初生殺道不通門主論附方

瘍醫大全

卷三十

一 顧氏秘書

小兒初生小便不通門主方

胎毒門主論附方

胎瘤門主論

奶癬門主論附方

燕窩瘡門主論附方

洋鬚瘡門主論附方

肥瘡門主論附方

黃水瘡門主論附方

白蛇串門主論附方

白禿瘡門主論附方

赤遊丹門主論附方

香瓣瘡門主論附方

鍊銀瘡門主論

涇尻瘡門主論

面上熱毒惡瘡門主方

暑痘門主論附方

癩子門主論附方

軟癩門主論附方

癩瘡門主論附方

蓐瘡門主論附方

瘍醫大全

卷三十

目錄

三

顧氏秘書

瘍醫寶鑑卷三十

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

晉錢之栢東陽

男 槐燮用和

全校

幼科諸瘡部

自初生起至胎毒疥丹疥毒止皆彙於此部中以便
檢閱參治

瘍醫大全

卷三十 幼科部

顧氏秘書

小兒初生無皮門主論

小兒初離產門遍身無皮有兩種一是父母蘊積楊
梅淫毒遺於嬰兒是以無皮用早米粉伏龍肝撲
之皆效一是船戶在船生產金木水火皆全所缺
者土耳其但將嬰兒放岸上土地睡卧得土氣其皮
自生 新增

申斗垣曰子在母腹中母食五辛或父母曾患梅毒
致令生子渾身無皮如湯燻去或頭面半體無皮
名曰湯皮瘡宜玉粉散參之 玉粉散用桂府滑石
水飛一兩甘草三錢

冰片二分 勿用解毒藥 以去

瘍醫大全

卷三十

初生無皮

小兒初生無皮門主方

凡生下遍身無皮但是紅肉者 錦囊

速以白早米粉乾撲候生皮方止

又方 寶漢卿

伏龍肝研末雞蛋清調塗

又方

土墜泥研細塗之

傷醫大全

卷三十

無皮方

三

顧氏秘書

小兒初生遍身魚泡門主論

凡生下遍身如魚泡碎則成水流疹者 錦囊

密陀僧研細乾摻仍服蘆合香丸

傷醫大全

卷三十

魚泡

四

顧氏秘書

小兒初生夢生門主論

孩兒生下不能發聲謂之夢生多不知救殊為可憫
切勿斷臍帶將火炙令煖氣入兒腹內更以熱湯
盪洗臍帶却取貓一隻用青布袋包裹其頭足使
伶俐婦女挈住此貓向兒耳邊以口着力咬破貓
耳貓必大叫一聲兒即醒得生
倘因難產或逆產生下或冒風寒舉之遲氣欲絕不
能哭者以父母真氣度之亦活或先紮臍帶以大
油紙燃燎之燒斷此又回生起死之要法也

易醫大全 卷三十 夢生 五 顧氏秘書

或以手鏡向兒頭敲鏡聲並呼其父乳名兒即啼矣
駱潛庵曰嬰兒受母胎中熱毒心寒氣散落地無聲
名曰啞口速服延壽丹少許即愈

或以煖水一器灌之須臾自啼
或以葱白徐徐鞭之即啼

或令將前後門齊開着人在街上兩頭呼其父乳名
從街上直呼至產婦房中兒自啼矣

小兒初生黃腫門主論

凡小兒初生遍身黃腫如膽眼閉呻吟腹脹者緣母
懷胎之時服寒涼剋削之藥太過也 錦囊

易醫大全 卷三十 黃腫 六 顧氏秘書

小兒初生鼻塞不通門主方

小兒初生鼻塞不通乳不得下得效

猪牙皂角 草 烏 各等分

研細用葱涎調成膏塗顛門上即通

又方

紅糖 蘄艾 麝香

共搗勻隔水燉熟敷顛門上以紙蓋之過宿即通

又方

傷醫大全 卷三十 鼻塞方 七 顧氏秘書

用連鬚葱一根放碗內沖滾水以盞蓋之將兒抱

在床上放下帳子以碗對小兒鼻孔薰之額上汗

出即通

小兒鼻塞不能喫乳

醃 三合 青木香 零陵香 各四分

三味煎成膏取少許擦丸塞鼻中或以膏塗顛

門氣通以溫水洗去

又方

通草 北細辛 各一兩

研細末以綿纏如棗核大藥如豆大放綿頭上
納入鼻孔內一日二次即通

傷醫大全 卷三十 鼻塞方 八 顧氏秘書

小兒初生穀道不通門主論

小兒初生穀道不通有一種內有薄膜遮住胎糞不能痢下通之胎糞自利可生有一種肛門長皮並無竅眼者危有用金刀割開胎糞自利亦有生者必須知覺早方能有救若遲延胸腹脹突面色青白不能吮乳者不治新增

曾有一兒肛門內有一隔膜大便瀉時尚不啼哭遇大便乾結時必啼哭喊叫面色紫漲掙下大便如刀劈開者三四歲時一醫以金刀割開隔膜出血傷醫大全 卷三十 穀道不通九 顧氏秘書

時以黑藥止血不過焮腫數日全安新增
簡便方曰所謂悶臍生者小兒初生糞門有一膜遮住兒氣故不能出聲拍之則膜破而能啼哭須用輕巧婦人以銀簪腳輕輕挑破甚便或不能挑急用煖衣緊包勿令散放以熱水浸其胞衣寒天則加火熱之久則熱氣內鼓其膜自破聲出而甦矣

小兒初生穀道不通門主方

急救方

用葱頭一個去鬚留涎蘸麻油潤入肛門內胎糞自利

一法

以戔桿蘸油潤入肛門自通

傷醫大全

卷三十

穀道不通方

顧氏秘書

小兒初生小便不通門主方

驗方

人乳四合 葱白一寸

全煎分爲四服小便即通

傷醫大全

卷三十 小便不通方

顧氏秘書

胎毒門主論

馮魯瞻曰後天諸毒易辨先天所中難明輕則發而爲瘡也起似風癩漸成細瘰一作搔癢即濕而起片如癬白頭遍體上下隨感而發其瘡有虫故名虫胞謂從胎胞而來也總是濕火相乘血熱毒盛賤理愈開淫毒益熾瘡爲氣虛楚屬血虛其證屬腑旋久而氣血兩虛則因熱而起又因熱乘虛而內攻矣治宜托裡解毒爲主然愈時結聚於頂者六陽諸毒上衝火毒炎上之徵也若初起便發於

傷醫大全

卷三十 胎毒

三

顧氏秘書

頂者胎毒壅盛上忝陽位也如髮稀而有白屑至久不愈者即名禿瘡亦有年長而患腦疳白禿不生髮者蓋足少陰腎其華在髮因疳熱血氣損少不能榮髮耳有收在四肢者是日久脾虛濕熱感襲也其驚瘡者驚本無物因蹉其血氣在臟爲積在腑流溢皮膚而爲瘡也戀銀瘡者眉間生瘡是肺熱也風瘡者亦發遍身其形甚小俗呼謂疥也虫窠瘡窠內有虫如細蟻子者是也諸瘡治法若痛癢不可忍者及性急面黑而血熱者宜苦寒如

岑連苦參之類體胖之人宜祛風燥濕清火爲主如久病之後濕蒸於外達者但宜補托切勿多浴塗過致毒內攻然諸瘡雖屬心火當用寒涼但熱則行寒則凝凝則毒皮滯而難痊故莫如透肌解毒和血養陰則風火息而燥癢除且氣血充固諸毒不能爲患矣若痘疹之後生瘡者餘毒未盡也亦宜化毒和血若瘡前發驚與夫瘡後發驚者皆因瘡而致也並宜理瘡爲主至於一切胎毒俱宜涼血清熱解毒發散於外切勿輕從外治以致熱

湯醫大全

卷三十 胎毒

三

顧氏秘書

毒內攻卒成不救小兒臟腑嬌嫩易入熱出耳若至瘡色焦枯肚腹青黑者生瘡而無膿汁者或遍體皆瘡毒發於肋或在少腹或在頂門腫起者並皆不治 錦囊

陳實功曰小兒遺毒爛班乃未生前在於胞胎稟受或因父母楊梅瘡後遺毒既生之後先發紅點次成爛班甚者口角穀道眼眶鼻而皮肉俱壞多妨乳哺啼叫不安初治宜早用土茯苓湯調人中黃末每日數次共飲四五分外用解毒紫金丹磨塗

患上效者可保十之三四遲則爛班遍身不乳百中難治一二此根蒂受毒之深也 正宗

又曰胎毒瘡乃母食辛熱厚味遺毒於胎則生子生瘡治之當戒發物及母慾後乳子不然恐難除根也

又曰有等小兒初產背上有大孔窠一二個但內中有膜完護臟腑者得生如無膜露見臟腑者即死無救如有膜者以補中益氣湯與產母服之乳兒自能長完亦有雖活三五歲而死者有之

湯醫大全

卷三十 胎毒

四

顧氏秘書

陳遠公曰小兒生半歲或一二歲忽身上手足肚腹頭面臂上長成大瘡久變爲毒百計治之不效此非兒毒乃父母之毒當日結胎或感楊梅毒氣坐胎之後或感淫氣火邪以至貽害小兒治不得法多半死亡吾遇異傳治此症已數十人矣吾不傳方則負異人之善念而小兒無方失救不猶吾殺之乎用金銀花二兩生甘草天花粉黃藥錦地羅各三錢人參二錢水煎服二劑毒全消倘外口不愈另有外治用蝸牛生甘草兒茶樟腦黃丹水粉

枯礬各三錢冰片輕粉各一錢地龍糞五錢麝香

三分為細末麻油調敷數日瘡內生肉瘡口外欲

真神方也輕者用煎方不必外治重者內外合法

無不速痊余從萬世起見將方傳世願人廣傳體

余之心為心勿自試為私秘不傳以受天譴水鑑

汪省之曰小兒遺毒爛斑乃在胎胞稟受故既生之

後熱湯洗浴烘薰衣物外熱觸動內毒始發理例

錢青榆曰小兒胎中遺毒患赤剝楊梅瘡並無皮膿

血淋漓瘡瘍名曰竹衣乖竟有胎胎皆然者勿科良方

瘡醫大全 卷三十 胎毒 五 顧氏秘書

駱潛庵曰胎中受母熱毒致生胎毒病症三朝一七

十日半月之內最難救治五六日尤難速服延壽

升豆大三粒即愈推拿秘書

胎毒門主方

胎毒

兒茶五錢焙研獾猪膽汁調勻煎滾冷定將瘡用

甘草湯洗淨敷之

又方 啟玄

大楓肉十五枚 白膠香三錢 烟膠二錢

輕粉一錢

共研細用雞蛋黃熬油調搽如瘡加枯礬五分

又方

瘡醫大全 卷三十 胎毒方 六 顧氏秘書

熬甲煨存性研細麻油調搽

竹衣乖內服丸方勿科良方

真西黃三分 硃砂 雄黃各七分

乳香去油 沒藥去油各五分 麝香一分

山慈菘一錢

右為末蜜丸重三分金銀花湯每日調服一九

取愈

竹衣乖搽方

白蘆甘石般過淬入黃蓮汁內三次童便內四次一兩 赤石脂煨

紫甘蔗皮燒炭存性 兒茶各五錢 栝猪胆塗炙七次七錢

真菉豆粉炒七分 冰片五分

共研細用麻油入雞蛋黃煎黑去渣候冷調搽

即愈

小兒胎熱眼腫赤壯熱啼哭及身上紅腫或頭頂瘡

癩耳出膿汁此方神效 赤水玄珠

鬱金 天花粉 甘草

乾葛 桔梗 薄荷葉各等分

共為末白湯調下五分或一錢仍用艾葉煎湯

湯醫大全 卷三十 胎毒方 顧氏秘書

浸足底引熱下行

胎毒捲皮火奶癩戀眉神方

人中黃三分 川貝每二錢 去心研 金銀花二錢

白水煎徐徐服服至全愈而止或用金銀花八

兩川貝每四兩熬膏入人中黃二兩成膏每早

晚量兒大小白湯沖服一二匙更妙

仙傳延壽丹 駱潛庵

治小兒胎毒啞口口噤臍風馬牙驚口重舌木

舌風熱脾熱積熱骨蒸壯熱夜啼火眼翳障一

切火症如神

錦紋大黃十筋

右切片先用白酒或黃酒浸兩晝夜入砂鍋煮

一枝大香取出鋪在板上晒極乾二次三次亦

如之到四製用藥本煎汁浸一晝夜煮晒如前

五製用車前草摘來洗淨酒水搗汁浸煮晒如

前六製用向東南側栝葉清晨採來水洗搗汁

浸煮晒如前到後三製仍用酒浸煮透晒至九

次止晒半乾便入石臼搗爛為丸或重一分三

分一錢二錢三錢看見大小火症輕重加減用

之

秘方

鮮半枝蓮搗汁掃上以渣煎湯洗即效

又方

慎火草搗汁搽

湯醫大全 卷三十 胎毒方 顧氏秘書

胎瘤門主論

蔣示吉曰初生小兒頭上胸乳間腫起大如偃首小似李梅此乃胎中瘀血凝滯而成須候小兒滿月已外方可用針刺破內如赤荳汁乃安內服五福化毒丹說約

心法曰胎瘤乃胎前孕婦積熱以致胞熱更兼血瘀結滯而成多生頭上及胸乳間初如李核漸大如偃色紫微硬漫腫不甚疼痛如嬰兒初生即有者候過滿月熱透方可針之放出赤荳汁或膿汁其

瘍醫大全 卷三十 胎瘤 九 顧氏秘書

腫即消若滿月後生者必待膿鼓熟透再針

吳半千曰紅絲瘤一名胎瘤發無定處由小漸大嬰兒落草或一二歲之間患之瘤皮色紅中含血絲亦有自破者治法雖同胎瘤但此患由先天腎中伏火精有血絲以氣相傳生子故有此疾終為火證亦難收斂

奶癬瘡門主論

陳實功曰兒在胎中母食五辛喜殮炙博遺熱與兒生後頭面遍身發為奶癬流脂成片睡臥不安搔癢不絕治以文蛤散正宗

吳半千曰小兒初生奶癬類乎疥癩初起手足次延腹背纏綿不已用殭蠶不拘多少去嘴研末煎湯浴之或一日一次毒必發出然後用青黛散搽之心法曰此證初生頭頂或生眉端癢起白屑形如疥癬由胎中血熱落草受風纏綿此即乾癩瘡有悞

瘍醫大全 卷三十 奶癬 十 顧氏秘書

用湯大洗皮膚起粟搔癢無度黃水津滯延及遍身即成濕癩瘡乾用潤肌膏濕用黃柏頭末滑石和勻乾摻癢甚者用烏雲膏

奶癬瘡門主方

蚊蛤散

蚊 蛤 四兩 輕 粉 五錢 點紅川椒 二兩

先將蚊蛤打成細塊鍋內炒黃色次下川椒同炒黑色烟起為度入罐內封口存性次日入輕粉研為細末謹收貯香油調搽乳母戒口為妙

又方

川貝母 去心 金銀花 各等分

共為末煉蜜為丸每重一錢白湯調下

瘍醫大全

卷三十 奶癬瘡方 五 顧氏秘書

又方

大楓肉 黃 栢 各五錢 蛇床子 二錢五分

枯 礬 雄 黃 各一錢 輕 粉 一錢三分

共為末臘猪油調搽

小兒奶癬及滿頭遍身黃水瘡

白麩不拘多少香油拌勻作粗火燒存性為末再

用真香油調搽

青黛散

青 黛 黃 栢 枯 礬

雄 黃 百藥煎 硫 黃 各等分

共研細濕則乾摻乾用香油調搽以愈為度

又方

如意草搗爛塗之

烏雲膏

松香二兩硫黃一兩研勻香油拌如糊攤南青布上半指厚捲成條線紮緊再用香油泡一日取出刮去餘油以火點着一頭朝下用粗碗接之布灰

陸續剪去將滴下油浸冷水中一宿出火毒搽之

瘍醫大全

卷三十 奶癬瘡方 五 顧氏秘書

奶癬並捲皮火

雞蛋 七個煮老去白 杭 粉 二錢

調搽

又方

餛子滾水泡透去餛只以湯洗之


又方

雄 黃 一錢 食 鹽 一分

共研細蘇油調搽

奶癬多生耳後

令伊母嚼白米成膏塗之



傷醫大全 卷三十

羊鬍瘡門主論

申斗垣曰下唇下巴骨生瘡故名乃任脉經濕熱所生也在承漿穴地角邊宜除濕清熱藥主之

啟玄

傷醫大全

卷三十

羊鬍瘡

論

高氏補遺



羊鬚瘡門主方

羊鬚散 申斗垣

烟膠 五錢 輕粉 一錢 羊鬚鬚 一撮 燒灰

共研濕則乾摻乾則油調搽之

醫書大全 卷三十 羊鬚瘡方

肥瘡門主論

陳實功曰肥瘡由胎毒而成者少因飲食之後油手摩頭或枕頭不潔而成者多 正宗

申斗垣曰此瘡宜槐條煎湯洗淨以烟膠枯礬輕粉研細熟油調搽 故玄

馮魯瞻曰此瘡乃臟腑不和之氣上衝血熱之毒上

注小兒陰氣未足陽火有餘故最多犯之宜內服

連翹天花粉荆芥防風貝母元參赤芍藥生地黃

牛旁子清熱解毒涼血和血之劑俟毒氣少解方

瘡醫大全 卷三十 肥瘡 美 顧氏秘書

外用藥以塗之切不可驟加寒涼塗過以致熱毒內攻不救蓋小兒臟腑嬌嫩易入難出也 錦囊

肥瘡門主方

肥瘡

胡黃連

輕粉

雄黃各三分

膽礬二分

枯礬一錢

豬蹄鞋三個煨存性

研細將瘡洗淨搽之

又方

肥皂子煨存性研末猪膽汁調搽

又方

松香

血一丹各等分

瘍醫大全

卷三十一

肥瘡方

七

顧氏秘書

研細猪板油搗汁青布捲條燒之取油搽

又方

東丹八分

枯礬一錢

真鉛粉

松香

各二錢入葱管內飯上蒸化待冷去葱用

共研細末熱香油調搽

又方

黃花

燒灰

輕粉少許

研勻乾搽

小兒頭上肥瘡黃水瘡梅花禿

銅綠

松香各三錢

黃蠟二錢

香油一兩五錢熬勻塗之

頭上生瘡俗名黏瘡絕妙方集驗

海螵蛸二錢

白膠香

輕粉各五分

研勻清油潤瘡以藥乾搽

肥瘡極凶者

苦參

何首烏

當歸

葳靈仙

甘草

金銀花

胡麻

石菖蒲

連翹

瘍醫大全

卷三十一

肥瘡方

末

顧氏秘書

生地

蟬蛻

酒水全煎

又方

鴻禧東房傳

大楓肉五錢

白信三分

油核桃五個

共搗勻作三九夜間取一丸在心口用手擦至

二更天藥氣散開仍聚胸膈仰面而臥次夕亦

然問一夜再擦一九七日後全愈

頭面肥瘡經驗

輕粉

飛血丹

白礬

雄黃各等分

研細裝入葱管內兩頭裝煨過加龜版灰少許
研菜油調搽之效

醫書大全

卷三十

肥瘡方

三

顧氏秘書

黃水瘡門主論

申斗垣曰黃水瘡又名滴膿瘡 啟玄

陳實功曰頭面耳項忽生黃泡破流脂水頃刻沿開
多生痛癢此因日晒風吹暴感濕熱或內發濕熱
之物風動火生者有之治用蛤粉散或四味異功
散搽之 正宗

馮魯瞻曰面上耳邊生瘡時出黃水浸淫不愈名曰
香瓣瘡 錦囊

凡初起細瘡手少動之即破毒水流入何處即生大
瘡 醫書大全 卷三十 黃水瘡 三 顧氏秘書

水泡瘡即為黃水瘡此熱毒鬱於皮毛也當以湯
洗之 秘錄

黃水瘡門主方

四味異功散

松香煉老 生礬 枯礬

銀粉

各等分研細先將搗猪湯或米泔水熬洗去淨瘡腐拭乾穢水乾則麻油調茶濕則乾搽

面上黃水瘡

酸棗 荆芥 羊鬚各煨灰存性一錢

鉛粉五錢

瘍醫大全

卷三十 黃水瘡方

顧氏秘書

研細先以槐條煎水洗淨將藥敷上其瘡自好

洗法 歧天即

雄黃 防風各五錢

水十碗數滾去渣取汁洗瘡即愈

又方

鉛粉用菜油調塗磁碟內多捲紙卷點着合薰時時攪勻待遍黃聽用將靨剝去搽上立愈

又方 周氏抄本

雄猪膽一個黃柏一兩浸焙乾為末搽之



瘍醫大全

卷三十 白蛇串

三

顧氏秘書

白蛇串門主論

申斗垣曰白蛇串即白蛇纏生於腰間兩頭如蛇形兩頭相合則必不能救矣按綱目剪春羅條下治火帶瘡透臍腰腹生者採花葉搗爛蜜和塗之即愈大法宜隔紙膏啟立

白蛇纏腰乃腰裏起一紅泡圈子若不早治被其纏到者不救纏腰者如袴腰樣也錢青榆

寶漢卿曰白蛇串即白蛇纏又名蛇窠瘡全書

朱丹溪曰此瘡因衣服被蛇遊過或飲食中受沾蛇

毒入於皮毛致生瘡且痛可用艾灸之瘡頭上或以松針刺血取蜈蚣浸油搽之或酒調白芷雄黃搽之

濕 曰此患多起於腰間若不急治則瘡形灰爛首尾搭頭無救

傷醫大全 卷三十 白蛇串論 頤氏秘書

白蛇串門主方

劈毒立消丹 吳羨相

治白蛇纏並蛇蝎蜈蚣瘋犬咬毒腫痛垂危者

雄黃 一錢五分 麝香 冰片 各一分

牙硝 二錢

右藥端午午時虔誠修合遇症點男左女右眼

大背內痛一盞茶時即止其腫漸消其痛漸止

三日全愈

隔紙膏 曹羽文

傷醫大全 卷三十 白蛇方 頤氏秘書

雄猪油去皮膜熬化冷定入劈毒立消丹再加麻

油二茶匙飛丹三錢收用攤隔紙膏貼之神效

又方

鱧魚血調雄黃末敷上即焦神效

又方 秘本

蛇殼一條煨灰存性坑厠板上浮泥刮下同研細

用童便調敷數次一二日即愈

又方

白芨 八錢 水龍骨 糞船者妙 一兩

共研細無根水調敷

又方

鍋臍灰研細臭淘米泔水脚子調敷

又方

用紫綿紙三張作三長條以火點着從初起瘡上
焯至瘡尾即將紫綿紙灰用燈蓋油脚調勻搽之
每日一次三日全愈

又方

猪窠草燒灰麻油調搽

瘡醫大全

卷三十一 白蛇方

重

顧氏秘書

禁法

取蛇神紙馬

如舖中無此紙馬可用黃團花放蛇
摺成長條狀如蛇形頭寬尾細

窠瘡上一面遊繞一面禱祝曰家蛇歸洞野蛇上

大路再將各種蛇名隨意念幾遍叫他上大路

如
花蛇叫他上大路赤煉蛇叫他上大路
烏稍蛇叫他上大路水蛇叫他上大路

禱祝畢即將蛇紙順攔患者家歇房門口門檻上蛇頭向外

取艾團三個頭中尾安三處用火灸艾俟艾燒盡

再將蛇紙艾火一全燒灰搽瘡上即止疼如未全

愈次日早晚仍照上法治之不過三日瘡頭乾枯

神驗

又方

陳壁土

頭髮灰 各等分

麻油調搽

又方

人髮煨

黑驢糞煨

墙上青苔 各等分

共為末香油調搽不過三次愈

又方

側柏葉

黃栢

韭地蚯蚓糞

瘡醫大全

卷三十一

白蛇方

重

顧氏秘書

生大黃 各五錢

赤小豆

雄黃

輕粉 各三錢

研細用新汲水或香油調搽

又方

鮮鱗血塗

又方

黃粟米焙研細麻油調搽

又方

乾艾葉搓為紙燃燒烟薰至黃色即住神效

又方

灶心土乾研清油調塗

易醫大全

卷三十 白髮中方

三

白禿瘡門主論

陳實功曰白禿瘡俗名癩瘰乃剃頭時勝理司開外風襲入結聚不散以致氣血不潮皮肉乾枯遂成白禿瘡久則髮自脫落 正宗

申斗垣曰禿瘡乃足太陽膀胱督脉二經受濕熱生虫作癢瘡痴高堆是也風襲則起白屑熱甚則禿久則傷孔不生髮也治當消風除濕殺虫止癢養血 厥玄

汪省之曰白禿瘡久則髮落根無榮養如禿班光澤 易醫大全 卷三十 白禿瘡 素 顧氏秘書 不癢內血不潮以薑擦潤肌膏常擦其髮漸生如禿班乾枯作癢者內必有虫宜用殺虫之藥治之 理例

白禿瘡門主方

驗方

仙人垢即死人棺底垢膩也不拘多少用鯽魚一尾香油煎熟取油調塗一銅錢厚

又方

黑桑椹子入瓶晒二十一日化水洗之

又方

香油一觔入活蜈蚣十條浸一月後晒二三日收藏鴉翎攪之

瘍醫大全

卷三十

白禿方

素

顧氏秘書

又方

乾蜈蚣不拘多少入瓶內真麻油浸一七將頭剃淨用油搽之

又方

蜈蚣三條雄黃三錢研細密貯鮮鯽魚一尾菜油四兩熬枯去油將滾油沖入瓶內浸七日剃淨頭搽之

又方

百草霜研細麻油調搽

又方

雞蛋一個麻油二兩煎枯取油用尖檳榔粗碗底磨化加硫黃花椒末各三分攪勻搽之

又方

厚朴四兩麻油半觔全煎待冷搽之或研末水磨油調搽亦效

又方

百草霜一兩 榆皮三錢 窰內燒紅土四兩 膽礬六錢 輕粉一錢

研細剃頭後猪膽汁調搽

瘍醫大全

卷三十

白禿方

甲

顧氏秘書

香薷煎馮氏

治白禿不生髮燥痛

陳香薷二兩 胡粉一兩 猪脂五錢

水一大盞煎香薷取汁三分去滓入胡粉猪脂和勻日日頭塗之

洗癩頭

蝸牛三十條水三碗煎湯洗之二次全愈

禿頭生髮

秦椒 白芷 川芎 各一兩

蔓荆子 雲苓 香附 各五錢

俱生用剉碎絹袋盛浸香油七日取油日三度擦無髮處其髮自生切勿令油滴白肉上

禿瘡有蟲癢痛 啟玄

烟膠 五錢 水銀 雄黃 各一錢

枯礬 輕粉 各五分

研細用陳臘猪油或馬脂油調搽

多年治不好的禿瘡 啟玄

輕粉 一錢 枯礬 三分

瘍醫大全 卷三十 白禿方 聖 顧氏秘書

用番木鱉不拘多少以油煎枯去木鱉用油調搽

搽

梅花禿胎毒辣癩

雄猪毛一具揀淨洗去油膩陰乾入陽城罐封固

火打三炷香冷定取出為末每用五分香油調搽

先用花椒葱白煎湯洗透待乾搽藥一七全愈髮

出更佳

癩瘰瘡 積德堂陸氏

酒肉店內油透陳竹燈掛一個劈碎裝磁瓶內口

上用舊鬚鐵絲覆瓶口上倒轉下再用一空磁瓶以此瓶合於下瓶口上用火煨之其汁溜下取之搽上神效

又方 積德堂

石灰窰內燒過紅土擊流結上渣輕虛色頰者兩

百草霜 雄黃 各一兩 膽礬 六錢

榆皮 三錢 輕粉 一錢

研細刺頭猪膽汁調搽

又方 周氏抄本

瘍醫大全 卷三十 白禿方 聖 顧氏秘書

黃連末猪骨髓調搽

禿瘡

鴿子糞新瓦焙存性研細麻油或菜油調勻聽用

如瘡層堆起可用清米泔水同葱川椒煎湯洗去

搽上三次無不愈者

又方

澁青 二兩 銅綠 一錢五分 黃蠟

麻油 各一兩

火熬膏攤貼神效

癩瘰白禿

狗油茨馬前子浮起研細先用宰猪湯洗淨搽之

毡帽包頭過三日一掃光

小兒頭上白色圈圍白禿

蒜瓣每清晨搽白禿上自愈

癩瘡

松香 明礬

猪板油搗搽即愈

小兒白禿

癩醫大全

卷三十一

白禿方

聖

顧氏秘書

鮮鱔魚一條搗爛敷

又方

生鷲油塗在頭上用舊鞋底洗淨烘熱擦之擦盡

白皮一連數次不可洗去

又方

大紅棗一枚去核填砒霜入內令滿紮緊炭火燒

焦存性研細米泔水洗淨後塗之

又方

生黃豆炒黃研末香油調搽

肥油膏

吳半十

香木鱉 六錢

當歸

蒸蘆 各五錢

黃柏

苦參

杏仁

狼毒

白附子 各三錢 鯉魚膽 三個

用香油十兩熬至黑黃色去渣入黃蠟一兩二

錢溶化以布摝過收貯每用少許用藍布裹手

蘸擦

躑躅花油

躑躅花根 四兩 搗爛

癩醫大全

卷三十一

白禿方

聖

顧氏秘書

用香油一盞熬枯去渣入黃蠟少許濾清候冷

青布蘸搽日用三次覆帽戴之勿令見風

又方

驢油頻搽患上瘡愈髮長

連床散

治癩瘡及手足身上陰器膚囊抓爛淋漓

黃連 五錢

蛇床子 二錢五分

五倍子 一錢二分半

輕粉 二十分

為細末先以荆芥葱白煎湯洗拭候乾清油調敷

赤遊丹



傷醫大全

卷三十

赤遊丹

聖

顧氏秘書

赤遊丹門主論

內經運氣丹燦皆屬火

經曰少陽司天客勝則丹癰外發及為丹燦是也

聖惠云夫一切丹毒者為人身體忽然變赤如丹之

狀故謂之丹毒也或發手足或發腹上如手大皆

風熱惡毒所為重者亦有疽之類也若不急治則

痛不可忍久則壞爛出膿血數升若發於節間便

令人四肢毒腫入於腹則殺人小兒得之最為急

也

戴復庵曰發丹色狀不一癢痛亦異大槩因血熱肌

虛氣邪所搏而發然色赤者多以赤故謂之丹有

發而色白謂之冷癩此病多緣肌肉踈為風邪所

襲而成風熱則赤風冷則白今人但呼赤為丹白

為癩古方亦名為癩癧非特分寒熱亦兼倫四氣

近世方論呼為白癩癧亦為血風

朱丹溪曰內傷癩者胃氣極虛一身如火遊外所致

宜補以降之

劉涓子鬼遺方云丹者惡毒之瘡五色無痛者為丹

傷醫大全

卷三十

赤遊丹

聖

顧氏秘書

毒癩者為風丹

陳實功曰赤遊丹又名火丹乃心火妄動三焦風熱

乘之故發於肌膚之表有乾濕之不同紅白之各

異乾者色紅形如雲片上起風粟作癢發熱此屬

心肝二經之火治以涼心瀉肝化班解毒湯主之

濕者色多黃白大小不等流水作爛多痛此屬脾

肺二經濕熱宜清肺瀉脾除濕胃苓湯主之腰脇

生之肝火妄動又名纏腰丹柴胡清肝湯主之甚

者急以細磁鋒砭血精猪肉片貼之 正宗

許學士曰飛竈丹從頭頂紅腫光起宜葱白自然汁調白芨末塗

吉竈丹乃膀胱經風熱從頭上向腦後紅腫宜赤小豆

紫荆皮末用雞子清或酒調塗 鬼火丹乃手足陽明經風熱從面

上起紅腫宜蜜調製栢散或雞子清調伏能肝末塗之 天火丹乃腎經

中熱毒膀胱風熱從脊背起赤腫宜一二年陳羊油焙化調羌活

末塗 天竈丹從兩臂赤腫少黃色或一臂乃手陽

明風熱宜柳枝煨灰水調塗之或冲和膏塗 水激丹兩脇虛腫紅熱

乃足少陽膽經風熱宜有孕母猪尿燒灰臘水塗之 胡吹丹從臍

上起黃腫者是任脉中熱與濕宜醋調檳榔末塗或酒調冲和膏塗

瘍醫大全 卷三十一 赤遊丹 吳 顧氏秘書

野火丹從兩脚上起赤腫如火燒乃足陽明經中

風熱宜羊油調乳香末塗或搗火丹草和醋塗或水調白芨末塗之 烟火丹從兩

足背上起赤腫痛乃足三陽經風熱亦有足底心

起是足少陰腎經大熱宜香油調猪石槽下土塗之或蜜調製栢散塗 胡

漏丹從陰上起或黃腫赤腫乃足厥陰肝經虛火

發於外宜羊油調屋漏土塗之或調製栢散醋塗

又曰此俱小兒受胎內之毒如三日不治攻於腸胃

必死

又曰凡小兒未滿百日發丹不拘是何丹必死

竇漢卿曰遊丹發於頭者何以治之必須將患兒眠

在床上以脚跟一頭加磚一二塊以墜毒氣於頭

再用磁鋒砭之使毒氣毒血皆從頭頂而出若乳

母抱立在身砭之則毒氣順下遂塞咽喉必難生

矣近觀同道之友顛倒砭之不得其手法以害諸

兒故不辭瑣瑣又申明之

又曰凡丹入於腹中飽悶臍凸體若燔炭者死

又曰內丹從脇下至腰下腫發赤色至腰則死

申斗垣曰內丹言赤色如塗朱映於肉裏故名內丹

瘍醫大全 卷三十一 赤遊丹 吳 顧氏秘書

似板而微腫如發於淵液金門等穴或右或左皆

少陽膽經一二日者可治如連腰臍青紫及大痛

或大小便不通皆不可治死之必矣 啟玄

又曰夾痘丹者赤也如塗赤朱於皮膚之上乃熱毒

蘊蓄惡血命門相火合而發起與痘相兼而生如

霞片浮而薄者易治厚而紫者難痊當順天時若

暑熱以通聖辛涼之劑解之嚴寒以升麻葛根辛

溫之劑解之痘瘡既發正合其宜又有失於調護

受風熱則血沸騰感寒冷則血凝泣亦可用塗敷

之法於外

又曰丹從腹往四肢者生從四肢入腹者無救

蜜漢卿曰赤丹急用磁鋒砭去紫血自下而上則毒
血流上不可逆砭急用乳香末雞子清調勻塗砭
處時以芭蕉根汁塗之

又曰又有一種爛皮火丹用蓮蓬^煨面粉伏龍肝黃
栢末和勻乾搽

李東垣曰丹毒者謂人身忽然赤如塗丹之狀故謂
之丹毒世俗有云赤瘤或因有瘡誤而相觸四畔

馮醫大全 卷三十一 赤遊丹 兒 顧氏秘傳

焮赤謂之瘡瘤凡丹毒之疾皆遊走不定狀如雲
氣者是也小兒得之最忌百日之內謂之胎瘤以
其氣血嫩弱臟腑柔脆難任鍼針所以忌也

馮醫曰赤紫丹瘤皆心火內鬱而發赤如丹砂故
名曰丹因熱毒客於皮膚搏於氣血而風乘之陰
滯於陽則發丹毒熱極生風片刻之間遊走遍體
虛熱則癢實熱則痛自腹而達於四肢者易治自
四肢而歸於腹者難療書雖有五色之分十丹之
異總不出血熱而屬於心心火內熾客風外乘風

勝則樹木皆搖故令遊走殊速名之丹者以應心
火而色赤也色紅者生白者氣虛挾痰紫者毒盛
色青如苔者死赤者名赤遊丹熱毒感之深也其
狀赤腫片片如臙脂塗染或發於手足或發於頭
而胸背令兒躁悶腹脹其熱如火痛不可忍遊走
通體流行甚速須急治之若一入腹入腎即不可
救白者名曰白遊風感風濕之輕症也其候流塊
作癢壯熱增寒鼻塞腦悶咳嗽吐逆其治之法亦
者清涼解毒甚則砭去惡血以藥塗之白者不過

馮醫大全 卷三十一 赤遊丹 辛 顧氏秘傳

疎散滲濕而已火灼瘡者先天之熱毒也火走空
竅故必於口鼻眼目陰囊糞門之處紅點如癩漸
成紅泡踰日而穿赤色無皮如湯火燬炙之狀痛
苦殊甚睡臥不安一二日間周身能腐若至額門
腫氣陰毒腫亮者不治及一切丹毒入臟臍突出
漿面頰紫浮噎氣不乳手足拳禁大小便絕胸背
血點舌生黑瘡心胸紫腫者皆為不治然小兒臍
腑嬌嫩凡一切丹毒必先內服解毒方可外敷蓋
毒易入難出肌肉受傷其害輕臟腑受傷其害速

耳錦囊

陳實功曰小兒赤遊丹乃受毒於未生前發病於有生後蓋身在胞胎皆賴父精母血藉以生養父母不能節其慾多致滯火猖熾胎必侵受既生之後熱湯洗浴烘薰衣物觸動內毒欲發之時先必發熱啼叫驚搐次生紅腫光亮發熱瞬息遊走無定發無定處先從頭額起者名天奪丹治以升麻葛根湯母子全服餘皆起於腹背腹背流入四肢者輕起於四肢流入胸背者重有此總宜砭去惡血

湯醫大全

卷三十一

赤遊丹

至顧氏秘書

為要砭血之後先用猪精肉縫片貼之一時許以金黃散用水芭蕉根搗汁調敷如毒氣入裏腹脹堅硬不乳者紫雪散下之三日後身漸徹涼砭血之處肉便軟活聲清腹軟乳哺如常者順反此為逆 正宗

錢青榆曰天火丹從背上起赤點

癩 桑白皮為末 羊脂調塗 水

激丹從兩脅虛腫起

生鉄剉末猪糞調塗之

纏腰丹腰生一

紅癩兩邊生紅筋纏至臍必死

金墨磨濃和冷丹 雄黃末塗之

白色塊者

用姜皮一撮煎湯洗之

熱丹紅色塊者

紫背浮萍煎湯洗之

丹瘤或生頰下如櫻桃突出色赤而光者是也宜

綿羊腦子全朴硝研爛貼患處立效

丹疹遍身紅點如酒硃者是也

用防已半兩朴硝犀角黃芩黃芪升麻各一錢加竹瀝煎服即愈

火丹遍身紅腫是也

用當歸赤芍甘草大黃各等分每服三錢水半鍾煎三四分食後服亦效

火丹發於足踝者

用葶藶菜搗救隨手即消

赤遊風丹忽然腫癢流行不止一處者是也此症至急救遲則死

湯醫大全

卷三十一

赤遊丹

至顧氏秘書

用雄黃五分或末醋調塗之或用無名異為末葱汁調塗立消或用鉄銹水塗之即消或用新生荷葉搗爛入鹽少許塗之即消

赤遊丹門主方

升麻葛根湯

治丹毒身體發熱面紅氣急啼叫驚搐等症

升麻 葛根 白芍

柴胡 黃芩 黑山梔 各一錢

木通 甘草 各五分

水煎不拘時母子全服

大連翹飲

治小兒丹毒發熱痰涎壅盛一切諸瘡疹疹頸

瘍醫大全

卷三十 赤遊方

五 顧氏秘譜

項生核或傷風寒時行發熱等症

連翹 生石膏 防風 荆芥

生甘草 滑石 黑山梔 當歸

瞿麥 車前子 木通 牛蒡子

赤芍藥 柴胡 炒黃芩 蟬蛻

各五分燈心二十根白水煎母子全服

消毒犀角飲

小兒丹毒身熱氣逆啼叫驚搐不寧等症

犀角 防風 各一錢 甘草 五分 川黃連 三分

燈心二十根全煎徐徐服之

紫雪散

治小兒赤遊丹毒甚者毒氣入裏肚腹膨脹氣

急不乳即宜此藥救之又治傷寒熱燥發狂及

外科一切蓄毒在內煩燥口乾恍惚不寧等症

升麻 羚羊角 石膏

寒水石 犀角 廣木香

沉香 各五錢 生甘草 八錢 玄參 二兩

水五碗全藥煎至一碗濾清再煎滾投提淨朴

瘍醫大全

卷三十 赤遊方

五 顧氏秘譜

硝三兩六錢微火慢煎水氣將盡欲凝結之時

傾入碗內下硃砂冰片各二錢金箔一百張各

預乳細和勻碗頓水內候冷凝成雪也大人每

用一錢小兒二分十歲者五分徐徐嚥之即效

病重者加至一錢亦可用淡竹葉燈心煎湯

化服俱可

荆防散

赤丹遊走

荆芥 牡丹皮 防風 金銀花

牛蒡子炒 橘紅 生甘草 羌活
連翹 天花粉 玄參 赤芍藥
各等分水煎服
化班解毒湯

治三焦風熱上攻致生火丹延及遍身癢痛者

玄參 人中黃 知母

生甘草 石膏 牛蒡子

升麻 川黃連 連翹各等分

淡竹葉二十片水煎不拘時服

瘍醫大全 卷三十一 赤遊方 五 顧氏秘書

針砭法

小兒赤遊丹毒紅赤焮腫遊走不定須急砭之
用披針鋒尖向患上以烏木重筋在針上面擊之
密砭去血多者為妙血紅者輕紫者重黑者死砭
畢溫湯洗淨用乾精猪肉縫大片貼砭處一時許
方換如意金黃散以水芭蕉根搗汁調敷

搽藥方

石膏 密陀僧 雄黃 生大黃
各等分研細芭蕉根汁調敷

又方

臘月羊油熬搽並治凍圻

又方

薄荷草搗汁搽

又方

芭蕉根搗汁搽

又方

鼠粘根搗汁搽

綠袍散

瘍醫大全 卷三十一 赤遊方 五 顧氏秘書

菘豆五錢 生大黃二兩

生薄荷搗汁入蜜調塗

柏葉散

治三焦火甚致生火丹作痛作癢延及遍身

側柏葉炒黃 大黃 蚯蚓糞韭菜田內者佳

黃栢各五錢 赤小豆 輕粉各三錢

共為細末新汲水調搽

當歸膏

赤遊丹驚掌瘋

當歸 生地黄 各一兩 木鱉子 去殼

大楓子 去殼 麻黃 防風

元參 紫草 黃栢 各五錢

用麻油半觔全藥熬枯濾去渣再將油復入淨

鍋內熬至滴水成珠再下黃蠟二兩試水中不

散為度候稍冷傾入蓋碗內坐水中出火毒三

日聽搽

奇方 湯氏

寵馬即俗呼樟木 在寵內尋出活的去頭以白漿擦赤

瘍醫大全 卷三十一 赤遊丹 藥 顧氏秘書

遊丹上不過數次即愈

小兒赤遊丹胎毒 呂爾青

干脚泥一兩晒乾或烘加珍珠三分同研細菜油

調敷腫處

又方 金雲章

穿山甲 炒炙 血 餘燬即頭髮 各等分

研末每服五分輕者三分黑糖拌滾湯調下

又方

芝蔴炒研油調敷大人小兒火丹俱神效

火丹遍身生遍形如水泡者 單方

用小兒胞衣瓶內水將雞毛掃上隨手而愈

犀角解毒飲 錢青榆

治赤遊丹紅腫遊走遍體壯熱不安

防風 荆芥穗 黃芩 各一錢

犀角 鎊 甘草 各五 牛蒡子 微炒四錢

水煎頻服神效

又方

灶心土不拘多少雞子清調敷

瘍醫大全 卷三十一 赤遊丹 藥 顧氏秘書

又方

船底青苔為末雞子清調敷

丹瘤 修真秘旨

草蔴子五粒去皮研入麩一匙水調塗甚效

香瓣瘡門主論

申斗垣曰香瓣瘡又名浸淫瘡初生甚小先瘡後痛
汁出浸淫濕爛肌肉延及遍身多生面上耳邊

啓

香瓣瘡門主方

面上耳邊香瓣瘡

殺羊鬚

荆芥

乾

棗

去核各煨
存性二錢

研細入銀粉五分每用少許油調先以溫湯洗

淨拭乾塗上即愈

傷醫大全 卷三十一 香瓣瘡

傷醫大全 卷三十一 香瓣瘡 方 李

鍊銀瘡門主論

李東垣曰鍊銀瘡即面淫瘡是母受胎之日喜食酸
辣及邪味過度多生此瘡精義

淫尻瘡門主論

申斗垣曰初生小兒纏縛手足願下頰肢窩腿了內
濕熱之氣蘊積淫爛成瘡此乃乳母看顧不到所
致不可用他藥只用伏龍肝一味不拘多少研細
乾摻以紙隔之啟玄

卷三十

鍊銀瘡

李東垣

卷三十

淫尻瘡

李

氏

面上熱毒惡瘡門主方

面上生瘡

胡粉 輕粉 松香 各等分

研細雞蛋黃灰油調搽

面上熱毒惡瘡 馮氏

胡粉 黃柏 炙 黃連 各等分

研細猪油調敷

面上毒瘡初起

急尋水蛭蚰一二條用醬少許共搗塗紙上留一

小孔透氣貼上 傷醫大全 卷三十一 熱毒方 李 顧氏秘書

暑痘門主論

胡公弼曰暑痘者乃暑熱襲於皮毛其形如痘圓爭根紅脹痛故有痘名 青囊

澄謂小兒因暑月烈日中戲嬉或坐日晒磚石或襖

襦中受母暑熱相感皆能頭面叢生名曰暑痘

治之法內宜清暑利熱棟要害處敷消數枚切不可

遍敷若一槩敷消則所感暑熱無從外解必致

深入瘡痂勢所難免不可因其小而惑之

傷醫大全 卷三十一 暑痘 李 顧氏秘書

暑痘門主方

驗法

初起用飛羅麵放掌心內以旋汲井華水調稀滴暑痘上自消

又方

石蟹水磨敷自消

楊醫大全

卷三十

暑痘方

李

頤氏秘書

癩子門主論

將示吉曰此乃暑邪血熱所致初起不發寒熱高腫於皮膚之間淺而小最大不過一二寸者名曰癩俗呼癩子

說約

李東垣曰有因微熱外攻而發於皮膚之上高腫熱

痛此熱癩也

精義

楊醫大全

卷三十

癩子

李

頤氏秘書

一五〇〇〇〇 冊 續修四庫全書 子部 醫家類 卷三十 暑痘方 李 頤氏秘書

癩子門主方

驗方 精義

大黃 朴硝 各等分

為末醋調敷

熱癩

五月五日午時取獨蒜切片貼眉心至夏不發

熱癩

菊花根搗汁無灰酒沖服癩在上身空心服癩在下身飽服自消

下身飽服自消

癩醫大全

卷三十一 癩子方

顧氏秘書

採二蚕桑葉滴下之水點上愈

頑癩不潰

人乳調白麵敷之不久即潰

癩久不斂

白木槿花殼存性研末搽之

熱癩神效膏

麻油四兩熬成珠再入松香末四兩炒黃丹二兩

攪成膏攤貼

初起熱癩

枯礬研細香油調敷

頑癩久不出頭

生芭豆仁半粒全飯搗成餅貼癩上明日即出膿

癩醫大全

卷三十一 癩子方

顧氏秘書

軟膿癰門主論

軟膿癰乃暑伏三陽因循延漫所致

軟膿癰門主方

翠玉膏

軟膿癰膿水逗流愈而復發

明松香 四兩 銅錄 二兩 棕猪胆 三個

麻油 三錢

先將松香溶化入油令沸再下胆汁銅錄攪勻入水中以手扯拔去火毒磁盒收貯用緋光絹量瘡大小攤貼不必更換聽其自落

又方

瘍醫大全 卷三十一 軟膿癰方 主 顧氏秘書

草麻仁 松香 各等分

搗膏貼之髮可復生

爛癰久不愈者

青石皮 鑄銅杓確子 各等分

研細菜油調搽

又方

川銅錄 一兩 研末

相油熬膏攤布上貼之即消

又方

紅柿子皮貼之自乾

軟瘡

大芋頭搗爛敷

又方

陳明瓦天甯煨研清油調搽

傷醫大全

卷三十一

軟瘡方

三

癩瘡門主論

癩子乃暑氣傷熱而生也

傷醫大全

卷三十一

癩瘡

癩瘡門主方

癩瘡痛癢

菜豆粉微炒四兩 滑石伍錢 研勻搽之

又方

雪水洗之隨洗隨搽

又方

黃瓜即王瓜 切片擦之即愈

又方

石粉撲之良

癩醫大全

卷三十

癩瘡方

十一

顧氏秘傳

佛子摩破成瘡生肌止痛集驗

赤石脂 黃栢去粗皮 臘茶 各五錢

白麩二兩 冰片五分

共研細棉蘸撲之

燕窩瘡門主方

燕土丹申斗垣

烟膠一兩 燕窩土三錢 輕粉一錢

枯礬五分

共研細清油調搽患上神效

燕窩瘡門主論

甲斗垣曰腦窩項後生瘡名燕窩瘡此足太陽膀胱

經濕熱所生也啟立

癩醫大全

卷三十

燕窩瘡方

十一

蓴瘡門主論

錢青榆曰凡小兒百日內生瘡名曰蓴瘡山胎毒所

致從身漸延至頭齊眉癩遍則愈若從頭漸至腹

者難治宜內服犀角丸以化其毒幼科良方

毒瘡門生方

犀角丸 錢青翰

治胎毒毒瘡

天竺黃

防風

羚羊角

全蠍 酒洗

白僵蚕

羌活

明天麻

京墨

煨微烟為度

川黃連

犀牛角

膽南星

麻黃

西牛黃 各等分

為細末蒸餅打糊為丸芡實大硃砂金箔為衣

傷醫大全

卷三十

毒瘡方

三十一

每服一丸薄荷湯下

傷醫大全目錄

卷三十

痘疹部

論痘瘡根源

面部先見報痘八卦方位圖說

面部八卦圖

八卦見標生死訣

先天八卦面部神斷訣

頭面部圖訣

傷醫大全

卷三十

目錄

明氏秘書

風雲雷雨電圖訣

元亨利貞天五部位訣吉凶

五臟部位訣吉凶

八卦生尅預知生死訣

看手神驗圖

看脚掌神驗圖

驗痘出稠密吉凶訣

看痘須知五經判斷吉凶

邵先生看耳筋秘法

見標之時一看預定吉凶

馮氏小兒面部見點吉凶之圖說

三關兩煞五軸

經穴部位諸痘所主

五門八樞

初見標面部八卦占斷吉凶法

馮氏總論痘要歌括

痘前十八犯

異痘須知

瘡醫大全 卷三十一 目錄 顧氏秘書

五種痘

異痘諸名

九不識

五禁瘡

邵公看痘分五色歌

驗苗訣

邵公有痘分五形訣

邵公看痘分惡五色歌

邵公看痘分惡五形訣

邵公看痘秘訣

邵公定痘有可治不可治訣

邵公痘科始終要訣

驗初發熱時吉凶斷訣

羅田萬密齋碎金賦

瘡醫大全 卷三十一 目錄 三 顧氏秘書

瘍醫大全卷三十一

燕湖顧世澄練江氏纂輯

婿錢之栢東陽
男 儒燮用和 全校

痘疹部

自發熱報痘灌漿起脹收靨以及面耳部位預知順逆諸家秘而不傳之術秘法俱彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷三十一

痘源

顧氏秘書

論痘瘡根源

朱純嘏曰粵稽上古之世未聞痘瘡之說亦無治痘之書即素問集中並無隻字言及於痘非黃帝岐伯以痘為輕易不詳加問難而無一言以及之耶蓋三皇五帝之時天清地寧民淳俗樸虛邪苛毒無由而生及至漢時建武年間征邊染毒軍中遂生此疾其說出於萬密齋痘疹心要查建武二十五年征武陵蠻伏波軍次下雋從壺頭進兵會甚暑士卒疫死大半援亦中病卒於軍史乃以疫書

之意者其痘乎然傳之年久姑存以俟後之考正

總之當日不知是何病症因其生長收藏尖圓紅

潤有似於荳故名之為痘後此班師毒氣傳入中

國諸家計議調治皆據內經諸痛癢瘡瘍皆屬心

火之一言為治痘之要領殊不知痘瘡與諸瘡相

隔天壤諸瘡之症未成形可解毒可內消已成形

可攻破既破可生肌如痘不可解毒也不可內消

也不可攻破也自發熱三日之後始見痘苗放苗

之後又三日而出齊出齊之後次第長漿上由面

瘍醫大全

卷三十一

痘源

二 顧氏秘書

部次及身上再則脹及脚下務期稠膿充滿徐徐

回水結痂大約於一十二日之中收其成功自發

熱造端即以熱之輕重報痘之緩急便知痘之疎

密看報痘之部位便知痘之吉凶看痘粒之形色

便知痘之虛實至於起脹灌漿計時限日觀形察

色分別虛實寒熱用藥調治以為灌漿之計失此

不治竟不成漿雖有妙劑仙丹不能保其不死久

吾輩氏曰痘之生死判於漿之有無有漿毒從外

散故生無漿毒留內攻故死膿漿既成結痂又厚

色又蒼蠟此順證也總之痘瘡不與諸瘡同治卽屬心火之一言於痘原無干涉也前代劉河間錢仲陽立方俱以解毒爲主多用寒涼少用溫補張梨古王海藏咸宗之揆其意俱本於屬心火之一言而以寒涼瀉火也迨至陳文中力矯其偏專主溫補宜於虛寒未必宜於實熱至朱丹溪立論又矯陳氏之偏而取錢氏之長主於解毒和中安表其失亦起於拘泥內經屬心火之一言也近如黃西邱著順險逆三圖順症不須用藥險症有藥治之若逆症雖勉強用藥斷不得活曾立逆症圖三十條予每看痘症逐年經見實有一十三圖果係不可活之症無再生之望雖細心極力變方設法亦不能出西邱範圍之外其餘一十七症亦曾用藥救活因以揭逆症一十三條分列於後以廣後學之見聞他如保赤全書舛謬甚多至於證治準繩係王肯堂先生居高位之暇念及斯世之男女大小身染沉痾不能起死回生延各大小方脈內外全科校訂方書取名證治準繩以備後學參考

瘍醫大全

卷三十一

痘源

三

顧氏秘書

可謂詳悉大有功於世獨於痘科悖謬之極或假手於庸醫亦未可定他如金鏡錄痘科正宗痘疹心要痘疹會編等書豈止數十家非無一節之長一論之是一方之妙然皆擇焉而不精語焉而不詳兼之各家痘書流傳年久不惟深山窮谷之中卽各省名邦以及都城輦轂之下凡諸名醫不肯細心究竟辨別是非無不以昔年之痘書爲今日之秘訣不知有清江久吾聶氏名尚恒者生於隆慶末年萬歷年間以鄉進士出知福建汀州府寧化縣事卓有政聲惜當時以儒宦顯不列名於醫林故其姓字不傳於今世岐黃之口卽著有活幼心法一書亦不傳於今世岐黃之家要知天地氣化生聶氏於豫章之清江非爲此一隅之幼兒女起見將令普天之下後世之人提撕警覺救斯世之赤子而令安全於襁褓中也今予獨知久吾聶氏集痘疹之大成開幼科之法眼識論精辨證確用藥當不偏於寒涼亦不偏於溫補深得中和之理合宜之用無過不及之差假生也晚不獲親承

瘍醫大全

卷三十一

痘源

四

顧氏秘書

門牆恭承面諭幸得活幼心法而熟讀之沉潛玩味藜藿三更一旦恍然若有心領神會頓將前此之舊聞洗滌淨盡心胸之茅塞剪鋤豁開又恐天下之大萬方之衆不能週知歲久年深終成湮沒今特表而出之凡業幼科者必當熟讀活幼心法反覆究竟自然得心應手

痘疹定論

又云易曰大哉乾元萬物資始又曰至哉坤元萬物資生夫乾爲父資始者氣之始也坤爲母資生者形之始也人之有生受氣於父成形於母是父精

湯醫大全

卷三十一

痘源

五

顧氏秘書

母血之毒已凝聚於陽施陰受之始是胎元之初成卽胎毒之蘊蓄故名之曰胎毒夫所謂胎毒者不論富貴貧賤俱皆有之豈待成胎之後歸咎於慾火妄動飲食不節降生之頃曠其血而後有是毒耶雖然天地有非常之氣卽有非常之令或於春而不溫和或於夏而不炎熱或於秋而不清涼或於冬而不凜冽四時之正氣失序兩間之雜氣交攻夫然後五臟之邪氣內侵命門之胎毒外透痘疹從此而發矣

痘疹原於胎毒論

又曰痘出五臟疹出六腑前哲言之不究其本後學

傳之不窮其源以致以訛傳訛干有餘年習爲成

語誰知辨其非者今特表而出之非無徵而敢云

然也人之有生受氣於父成形於母當陽施陰受

之始三五之精妙合而凝乾道成男坤道成女在

胎之內先有命門猶混沌未分先有太極命門人

身之太極也自其凝而成形言之先有命門則父

精母血之毒藏於命門真且確矣外形則先長鼻

故今人稱始祖爲鼻祖內如五臟六腑外如百骸

湯醫大全

卷三十一

痘源

六

顧氏秘書

九竅俱從此逐日逐月漸次生長故胎有十月之期而始生育惟命門凝成於有形之初則胎毒亦蘊蓄於有形之始命門卽太極也兩腎兩儀也天一生水地六成之坎中之一陽命門也坎上下之二陰列於兩傍兩腎也今人以右腎爲命門不能致知格物也兩腎列於命門之兩傍是太極生兩儀也地二生火生心也天三生木生肝也地四生金生肺也天五生土生脾也然止能成物不能生物今日地二生火地四生金似與坤作成物說不

去矣然河圖一二三四五者五行之生數也六七八九十者五行之成數也生數五行之發端成數五行之結果故人生以十月為期得天地之成數也間有七個月八個月九個月而生者問亦養育成人婚配生育是六七八九十者五行之成數也明矣然地二生火地四生金天包羅於地之外其氣常行乎地之中非地之孤陰能生火與金也得天之氣貫於其中而生火生金實由天地網緼陰陽配合而生此水火木金土也或問之曰子言胎

易醫大全 卷三十一 痘源 七 顧氏秘書

毒藏於命門固言之有理而心肝脾肺腎可不必復言矣即應之曰是何言也命門體也五臟用也相須而生成也鼻之氣通乎肺如遇痘疹之氣鼻聞其氣則傳於肺金傳腎水腎水傳肝木肝木傳心火心火傳脾土一晝一夜隨天運轉一周天次日早脾土復傳肺金肺再傳於腎腎再傳於肝肝再傳於心心再傳於脾一晝一夜隨天運又一周天次早又復傳於肺五日五夜將五臟傳遍痘疹之時氣自外而達內命門之胎毒從內而發外至

六日而微熱至七日而身熱大作矣或又問曰子何知之詳且悉也答曰以種痘而得造化之機絨也自出之痘無形之氣傳染也種出之痘有形之痂引導也若夫自出之疹亦無形之氣傳染也胎毒蘊於命門其中有陰陽之辨別焉命門也人身之大極也太極所以動而陽靜而陰之本體也陰陽互藏於太極之中陽變陰合而生水火木金土胎毒蘊蓄於命門之中亦有所以動而陽靜而陰之本體也陰陽互藏於命門之內感痘之氣化而

易醫大全 卷三十一 痘源 八 顧氏秘書

出痘感疹之氣化而出疹何也是陰為痘而陽為疹也統言之則為胎毒分言之胎毒之中又有陰陽之各別也當其陽施陰受之始成胎凝結先有命門莫可端倪無可想像命門也胎毒始藏之密處也體也五臟者迎接時氣之傳遞也用也胎毒發出而為痘則胎毒之靜而陰者盡矣一發不復再發矣若出正痘之後隔三五月或隔半年一載或隔七八年之久如感時氣出疹胎毒發出而為疹則胎毒之動而陽者亦盡矣所以一出亦不復

再出矣或又問曰命門在何處荅曰脊骨自上大椎數下二十一椎自尾閭尻骨望上數七椎之上從下數一十四椎之下上下相接之界命門之所居也命門居脊骨之前兩腎列於兩傍脂膜護之為一身之主宰且出痘與疹而腰不痛者順也痘疹初發即云腰痛命門傷也未可以言吉也故曰一身之主宰也

聶九吾曰痘疹之源有謂兒在胎時食母血穢而致者有謂父母慾火所致者慾火之說出於臆測固

瘍醫大全

卷三十一

痘源

九

顧氏秘書

無明據然嘗見孕婦飲食清淡者生子出痘多稀少而平順恣食厚味者生子出痘多稠密而險危則其病源受毒於母胎血穢似有明驗蓋飲食淡則血氣清而胎毒輕飲食厚則血氣濁而胎毒重受毒輕故出痘少受毒重故出痘多若因諸痛癢瘡瘍皆屬心火謂火由慾生致毒因火結故其為害獨勝於諸瘡此其說亦未為全非而總之痘毒一胎毒耳惟其為胎毒則潛伏五臟有觸則發無觸則不發故其發有遲速當其未發時形氣俱泯

無可端倪若未燧之火何處尋覓又何可解釋古立預解痘毒諸方若無故而逐寇於通都不近理也及其觸而發則勃然不可禦蓋其毒氣發自五臟竇動五臟真氣全賴血氣送毒氣而出之於外運化之而成漿收結之而成痂而後臟腑可安若血氣送毒氣不出則毒氣反攻臟腑如寇作於都城主者不能操謀奮武逐之於外致令操戈內攻安得不危故用藥猶如用兵不可不透此理也

論受病之源

瘍醫大全

卷三十一

痘源

十

顧氏秘書

又曰治痘之家多矣劉河間悉用寒涼偏害不小至於錢仲陽立方亦以解毒為主而多用寒涼少用溫補張潔古王海藏咸宗之此其意俱本於內經諸瘡瘍屬心火之一言故以寒涼瀉火也厥後陳文中立方力矯其偏專主溫補凡痘瘡已出未出之間諸症悉用十一味木香散南木香大腹皮赤茯苓杏仁內人參青皮半夏前胡已出之間諸症悉用十二味異功散人參製半夏白朮茯苓當歸陳皮厚朴製附子木香丁香肉桂其意歸重於太陰一經蓋以手太陰肺主皮毛足太陰脾主肌

肉肺金惡寒脾土惡濕故用木香官桂以治肺之
寒用木附半夏以治脾之濕二方用之得其當其
效固大然不分寒熱虛實而一築用之則宜於虛
寒不宜於實熱其偏害又可知也朱丹溪辨之是
矣至丹溪立論矯陳氏之偏而取錢氏之長主於
解毒和中安表以為的當舉世宗之數百年來無
敢議其失者予則以為丹溪治他病多妙論獨於
治痘則孟浪而未盡其妙儻亦干慮之失乎蓋其
矯偏於陳氏而不敢輕用木香丁香桂附等熱劑
易醫大全 卷三十一 痘源 一 顧氏秘書

愈乎故諸瘡以解毒為主能解毒於早則輕不能
解毒於早則重痘瘡以血氣為主血氣能送毒以
灌膿結痂則生血氣不能送毒以灌膿結痂則死
解毒之藥多損氣血不顧血氣之虧損而急於解
毒是猶不慮我兵之羸弱而急於殺敵也故毒有
不必解者又有不可解者若小兒稟賦強壯胃氣
好飲食如常者其血氣自旺自能送毒氣以成功
其痘自始至終多順症此不必解毒者也若其稟
賦素弱脾胃又弱出痘時飲食又少或瀉或渴或
腹脹或手足冷或氣短促或失聲痘或出不快或
根窠不紅活或色白而頂陷或當灌膿不灌膿或
當結痂不結痂皆由氣血不能送毒氣此不可解
毒者也當速用溫補以扶胃氣而助血氣若用參
芪歸朮等而力不及即加入木香丁香桂附等佐
之亦不為過又何可參入芩連芩翹等涼品以監
制溫補之力而損血氣乎所謂丹溪未盡其妙者
此也丹溪又教人用犀角地黃湯以解痘毒後人
沿其說失其初意相習用之以為奇妙而不知其

害蓋心者血之主心之所以能主血者以其屬火也痘瘡屬心火正藉心火以運用一身之血而成功豈心火可瀉而去之乎蓋人身之血溫則流行寒則凝滯犀角地黃湯涼心經而瀉心火心經既涼心火既瀉則一身之血氣凝滯不行何以運化痘毒而成膿結痂乎則內攻之患作而竟以告斃者瀉心之藥實殺之而人竟不知也醫亦竟不悟也可慨也故予謂痘已出之後未痂之前凡一切涼心之藥如犀角生地之類姑禁絕不用直待結痂後用之解餘毒可也或曰若然則未收結之前毒俱不可解乎曰奚為皆不可若其血氣與毒氣俱盛者脉必洪數痘或初出即帶紫黑或既出而稠密紅紫內症則煩悶燥渴少便赤澁大便秘結此則屬實熱宜速用清涼之劑以解毒如大便久秘者量入酒炒大黃微利之可也若其毒氣雖盛而血氣未旺者以解毒為主而兼活血養氣則參芪歸芍之類亦不可離也

又曰近世痘方多宗黃西邱其書自始至終俱分順

傷醫大全 卷三十一 痘源 顧氏秘書

逆險而立三圖說其為順者不必服藥是也謂險者宜以保元湯加減調治猶近理也但謂逆者俱不可治治之徒勞無益是教人袖手待斃矣其言不仁之甚而貽害於世不小也此為俗醫圖利計則甚便而於救濟生靈之術則甚乖也蓋醫者仁術聖人以之贊化之不及所貴者扶危救困起死迴生耳若治其易治者而棄其難治者則何以醫為惟俗醫意在圖利又恐壞名見症有不順者輒委棄之彼誠恐利未必得而徒冒不識症之名若仁人君子當為之死裏求生豈忍斷其必死而坐視不治故曰西邱之言便於俗醫而非所以濟世也且其所指逆症多端痘瘡稠密者多有之如初熱而驚悸吐瀉報痘而先發於印堂司空天庭等處初出而根窠無暈既出而色白灰陷或發水泡或癢塌或當行漿而不行漿或痂未落而寒戰咬牙等症皆其圖說所謂逆而不治者予每治之而得生者多矣奈何悉謂治之無益而戒人勿治乎惟初出形如蠶種既出而紫黑乾枯者難以灌漿

傷醫大全 卷三十一 痘源 顧氏秘書

多不可救耳然寧救之而不活不忍坐視而不救也

折諸家之衷二條

痘症與他症不同自初發熱以至於結痂限日限時救困扶危當用之藥宜及時而用如救焚拯溺不可緩也蓋痘毒發自五臟實動五臟之真氣其出痘多者直氣發洩亦多當此之時人之血氣幾絕岌岌乎殆哉如油盡之燈不速為之增油則燈焰熄如風中之燭不速為之蔽風則燭光滅也時醫則不然輕視人命而重視財利其愚而不知用藥

湯醫大全

卷三十一

痘源

五

顧氏秘書

者姑無論已即稍知用藥者亦不肯及時用藥欲因禍大而顯功直待諸惡症出然後乘人父母之驚懼而要重利遲延至於血氣已絕不可復續雖有對症之藥緩不及事因而悞人性命者多矣嗟嗟天地鬼神昭市森列不可欺罔此輩以貪利而殺人心術不善豈無幽責豈無冥誅殃必及身必及子孫不可逃也此醫家之害而病家不可不知也又時醫識見淺陋未諳妙理執泥祖傳舊方不知通變遇痘症之輕者猶可動手調治而自以為

功一遇危險重症便束手無策不能救療甚至治一家十人而不活者七八人則以為痘症原惡而不自咎其術之拙病家亦以為痘症本惡而不歸咎醫之拙殊不知痘瘡常數若無甚惡之症而調治得宜十可十全間有極惡之症必不可救療者十不過一二今治十人而死者七八何惡症之多也毋亦術之不精乎予深憫之故不得不為之著論立方也

關時醫之謬

湯醫大全

卷三十一

痘源

其

顧氏秘書

凡治病必先辨虛實寒熱四症望聞問切無非辨此四者而已四者了然於胸中則用藥取效其應如響四者不能分辨而執成方以用藥鮮有不悞者即或中病而愈亦幸而偶中也至於痘瘡之虛實寒熱尤為緊要辨之不明用藥多致敗事何以成功奈何歷代治痘之家著論立方互相異同至於虛實寒熱多畧而不辨或辨而不明致令檢方者漫無下手處竟不知某症屬虛屬實當用某方某症屬實屬熱當用某方則雖有千百妙方千百妙論無益於用也無怪乎自古至今治痘者之多迷

途而慈幼之術疎也且痘瘡之虛實寒熱與諸病之虛實寒熱其異同固自有辨諸病有虛者元氣自虛也宜補也痘瘡有表虛有裏虛亦元氣自虛也宜補也此其相同者也諸病有實者邪氣實也可瀉也痘瘡有表實有裏實此則元氣完固而毒氣不能爲害不可瀉亦不必瀉也此其不同者也諸病有虛之甚者陰有餘陽不足則寒自虛生宜溫熱之劑補之也痘瘡有虛之甚者亦陰有餘陽不足而寒自虛生亦宜溫熱之劑補之也此其相

同者也諸病有寒自外入者外感是也當其在表宜發散之久而入裏則鬱而爲熱宜清解之痘出而風寒外襲宜溫而散之或外寒入內而爲吐瀉諸症亦宜溫之而已外不可汗內不可清解也諸病有虛熱者元氣虛津液竭而火從虛中起補之而熱自除也不必解熱也痘瘡亦有虛熱者元氣虛而毒氣肆也當以補元氣爲主而略兼解毒可也三者皆同而有不同者也諸病有實熱者血氣未虧而邪氣壅盛單用寒涼瀉之可也痘瘡亦有

實熱者稟氣強血氣盛而毒氣亦盛亦單用清涼解之可也此又其相同者也今自發熱之初以至還元之後俱先辨症之虛實寒熱而遂立方於其後令人細心審症而後用藥庶不至於虛虛而實實乎不至於損不足而補有餘乎不至於以水益寒而以火益熱乎然痘之虛實寒熱較之他病猶顯明而易察蓋自見點以至結痂其形其色既昭然可觀若又聽其聲音觀其靜躁以其飲食之多少審其大小便之利澁三歲以上者診其脈之遲

數洪微其辨虛實寒熱當如黑白之分明而用藥取效易易矣 辨虛實寒熱之異
又曰痘瘡全憑氣血成功而氣血之盈虧消長其理精微不可不透悟也蓋氣體天而親上血體地而親下痘之出也其高起之疱氣之位也上也氣宜充焉其四暈根脚血之位也下也血宜附焉疱尖而色白潤是氣充而居其親上之尊也四圍有暈而色紅活是血附而安其親下之分也氣居其尊血安其分氣血和順而載毒出外此最吉之痘可

勿藥而愈也頂陷則氣反親下此氣虧而不能充也法當補氣四圍根脚無紅暈此血虧而不能附也法當補血此其理猶易明也其有通頂紅色成血疱者是血反親上也此症最險必不能成漿至八九日後癢塌而死然此非血之獨盈乃由氣虧而失居尊之常故血得以妄行而僭居其位也急宜大補其氣氣充則能統血血自不得泛溢妄行而疱轉白矣世人不識此理見其疱紅則謬認爲血熱而用涼血行血之劑致令氣愈虧而斃愈速

湯醫大全

卷三十一

痘源

九

顧氏秘書

主而佐以血藥與升提藥皆護奇效安在血病不可補氣乎若小兒痘瘡以胃氣爲主則補血必先補氣明矣故氣血消長之理不可不深明也

虧消長之理

未純嘔曰痘之爲症始焉一點紅紅者血之色也血之爲血雖賴氣以生之寃其本則水也天一生水地六成之水乃北方之坎兩腎是也腎水充足而得木火土金之氣交相養互相長而成氣與血焉是血之源於水水之源於腎者明矣雖分屬於心

湯醫大全

卷三十一

痘源

十

顧氏秘書

也不亦悲乎故氣血盈虧之理微妙而難識也至於調治痘瘡氣血其氣獨虛者固宜專補氣而不宜補血蓋陽不能從陰陰愈長則陽愈消也其有血虛者多由胃氣損傷元氣不足所致蓋陰必從陽陽生則陰長也黃汝言明醫雜著乃謂血虛而用參芪以補氣則陽旺而陰愈消甚矣其不明於陰陽消長之理而謬立此言爲世大害矣予每治便血之虛滑者婦人產後去血過多而大發熱者婦人血虛崩漏而下血不止者俱用參芪薑附爲

生血肝藏血脾裹血藉令腎中水枯則心何自而生肝何自而藏脾何自而裹合之則五臟同一太極也陽動陰靜而生水火木金土也痘中之一點紅血也出齊之後次第起長充滿於痘之中者漿也漿者血之所化也化毒而爲漿也漿既充足膿成而毒解也漸次轉褐色回水結痂之候也痂結蒼蠟色此一十二日之成功也何獨前此之高明不論陰陽五行之正理妄立名色且曰惟腎無候而又實之以耳冷飀冷以明腎家無候之證佐又

曰痘之變黑始歸腎也此皆不經之談于有餘年
誰其辨之予不得已著五臟合一論以辨之辨五
臟合

一論

喜泰順曰痘本胎毒號曰天瘡傳染由於外感輕重
本乎內傷初起太陽壬水尅乎丙丁後歸陽明血
水化爲膿漿勢若燃眉變如反掌欲知表裏虛實
須明寒熱溫涼初發之時與傷寒相似或發熱煩
躁臉唇紅赤身疼頭痛乍寒乍熱噴涕呵欠眼目
困倦兩額之間有紅紋見者預知其爲痘也發熱

瘍醫大全

卷三十一 痘源

圭

顧氏秘書

三日當托裏解表使其易出四日五日清涼解毒
使其易長六日七日溫補氣血使其易於灌漿八
日九日清利收斂使痘易靨此治痘之常法也夫
常者可必而變者不可必安可執一以治之哉苟
痘未出而清涼則毒得寒而凝滯熱毒未解而過
補則毒蘊蓄而不能化漿故治痘之法見機生情
隨時應變至於靨後不過慎風寒節飲食而已此
治痘之原論也

又曰凡痘灰白不紅綻不起發出不快昏暗頂陷皆

瘍醫大全

卷三十一 痘源

圭

顧氏秘書

表寒而虛二便清嘔吐泄瀉手足口氣俱冷不渴
少食唇白涕清飲食不化皆裏寒而虛此表裏虛
寒之證急宜溫脾胃補氣血卽參耆桂附在所宜
施痘色紅紫結實高聳頂若塵鋪又兼火刺內夾
痲疹此表熱而實二便秘赤乾嘔吐痰肚腹疼痛
口冲臭氣煩渴腮紅譫語妄言此則熱毒鬱遏皆
裏熱而實此表裏實熱之證急宜涼瀉解毒重加
發散芩連犀柏石膏梔黃又所宜施此表裏虛實
之證顯著於外醫者易明又有表虛裏實者痘色
淡白不紅綻出不快等證是表虛也而兼之內證
頻加肚腹疔痛煩躁熱渴白睛通紅二便秘結此
裏實也表虛裏實之證醫者先當發散不宜苦寒
發散則毒得外洩而內熱自解若寒則毒反冰伏
而出愈難或於三四朝期掛酌下之先清其毒後
補氣血得以成漿或有毒鬱氣虛不能充灌者宜
參連湯治之此治表虛裏實之大畧也裏虛表實
者最爲難治痘瘡煩紅根不鬆活皮毛壯熱色赤
焦紫此表實也而兼之嘔吐泄瀉唇白涕清飲食


不化等證治宜活血鬆肌如紅花查蛻生地丹皮之類在所宜施俟色澤紅潤庶可補托不然則痘不特不能起發竟灌必變紫艷乾枯倒靨空瘡勢如燃眉變若反掌醫者當臨證參詳不可拘於一定表裏虛實寒熱論

又曰實熱之痘初起壯熱腮紅睛赤口渴譫語內證因重見點必凶煩紅瑣碎或三五一堆兩三成羣如同蚊咬急當發散重下名為雙解如查蛻荆防葛根石膏大黃等劑再用西河柳芫荽煎湯洗浴

瘍醫大全 卷三十一 痘源 三 顧氏秘書

使毛竅通利痘方易出大用清涼如熱毒不解色澤不潤根脚不鬆名為血熱仍可下之再加連翹犀栢紫草紅花桃仁黃連涼血之劑再服猪尾膏無價散等劑方可奏效如是血熱壅遏之痘必須清涼解毒以至收靨之時方可清利收斂乃是要訣 實熱壅遏論

面部先見報痘八卦方位圖說



瘍醫大全 卷三十一 痘科 三 顧氏秘書

歌曰

看痘先分部位 乾宮出起定輕 坎宮不美艮三分 震上縱凶現定 巽上先來必重 離宮凶有十分 坤宮七數兌四分 此訣急言人聽 邵慈菴先生秘訣歌

乾上先放定見輕 坎宮十分更見凶
艮宮報知三分痘 震上出起不須驚
巽上九分離十分 坤部先報且夕行
兌上發之吉中凶 八卦之中利鈍分

乾宮大腸若紫紅定知便實喜相逢大便非細則不通苦還

灰白色來至泄瀉如流斷是凶

坎宮腎水若紫鮮腰背定是滾油煎若還灰白無膿

血咬牙寒戰命歸天

艮宮屬胃不宜紅一見黃白喜重重若還紫黑青紅

色胃爛口臭一場空

震屬肝經宜帶綠若還白色金尅木紫紅色見多煩

怒命宮色正藥可服

巽宮小腸若帶白一夜尿流三五場場者陷也紅赤梅花

易醫大全 卷三十一 痘科 蓋 顧氏秘書

品字樣小便淋瀝是熱結

離為心火色宜紅若還紫黑水來攻再加脚潤崩開

去痘盤開張不束任是神仙枉用功

坤宮秘訣屬命門死生一見在其中紫黑慘暗俱不

好口傳心授妙無窮

兌宮金兮色本白若還紅赤火來熾此症問君當如


何嗆喉痰喘預明白

中央戊巳土疎黃無辛苦若還青黑色便是木來侮

右云元微八卦妙入神傳於端人並知音時來得過仙傳訣榮華富貴永無窮

面部八卦圖

一看面部八
宮便知身上
胸背四肢某
處多某處少
某處必黑陷
某處必癢場
某處必瘡疔
神妙之法當
細心熟記之



易醫大全 卷三十一 痘科 蓋 顧氏秘書

歌曰

乾宮屬大腸稠密背受殃糞門多癢場宜服保元湯
坎宮屬腎水稠密陰疔起腎俞似火燒七日子時亡
艮宮屬胃經梅花甚不仁若加紫黑色八日寅時陰
震宮乃屬肝宜大不宜三如品如串樣十四午時喪
巽宮屬小腸稀疎宜帶黃若還梅品赤淋秘還不妨
離宮屬心火蟻形甚不可四肢無容針遍身無你我
坤宮屬命門生死在其中稠密終不好疎朗决無凶
兌宮屬肺金雖多我不驚若還無空地胸背反相因

中央戊巳土稠密兩腿若若還倒塌去兩腳蓮花舞

看面部八卦痘色相尅死期訣

乾兌宮屬金如有紅痘一粒紅痘屬火火來尅金丙

申丁酉日死

坎宮屬水如有焦黃痘一粒黃痘屬土土來尅水戊

子巳亥日死

艮坤屬土如有青痘一粒青痘屬木木來尅土甲戌

甲辰乙未乙丑日死

震巽屬木如有白痘一粒白痘屬金金來尅木庚寅

癸巳日死

癸巳日死

癸巳日死

辛卯日死

離宮屬火如有黑痘一粒黑痘屬水水來尅火壬午

癸巳日死

八卦見標生死訣

乾坎出痘最吉昌

頭面數粒四肢荒荒者少也

此痘九日聚完足

十二收功不必防

艮震出痘果是凶

四肢面部最多蒙

胸背均勻黑數箇

急用針挑尚有功

巽坤出痘品達肢

三粒相連此痘陰陽不分場顆粒不分

八日大凶十救一 遲過一日枉思量

離兌出痘種如蠶 紫黑焦枯點像癩

六發狂來七作癢 八日午時返泉鄉難過八朝

先天八卦面部神斷訣

乾宮出痘更兼紅 心背口多四肢濃濃者多也

尾闕三分痘一箇 若不針穿往瑤宮

十日之內留不住 辰午二時一場空

坎宮痘夾疹相間 委中定有痘疔穿

若是乾宮帶黑色 六朝丑亥上西天

癸巳日死

艮宮出痘不相連 心窩沒有兩傍邊

九日痂完十日滿 此痘皆因氣血全

震宮出痘有焦尖 背上定有一團連

胸腹只有三分痘 四肢如蠶種一般

九日南柯一夢去 父母號陶一聲天

巽宮痘密不分枝 胸背皆然一雲齊湧出也

十日縱捱十四盡 寅申一夢赴瑤池

離宮痘出呂連肢雙粒相串承山有箇痘疔危急早挑去痘疔勿遲

胸前痘疔三四粒 錯過一日枉傷悲

坤宮痘紅分地稀 四肢不覺數多枚
 胸背皆然三二十 心前空了始為奇
 兌宮如串出一連 仔細思量實可憐
 癡塌之中九日故 子亥二時在歸泉
 八卦之中總一般 四肢如蠶地不寬密而多也
 肚腹咽喉毒在內 隱在皮膚往裡鑽全閉也
 五日之內轉過吉起脹分額 八日分明十五行不轉至遲人朝難保

瘍醫大全 卷三十一 痘科 堯 顧氏秘書

頭面部圖



訣曰

痘疹秘訣要專門 表裏虛實看分明
 先觀面上諸部位 吉凶禍福預知聞

左肝右肺宜斟酌 年壽人中脾屬停
 印堂方廣心之主 顴骨尻耳腎同均
 文武雙台真妙訣 左右兩耳珠上尋
 三台只在準頭上 再查八卦細留心
 看痘之法論五經 五經穴道要分明
 分明仔細觀八卦 八卦之中按五經心肝脾肺腎也
 心腎原來不相合 脾肺出痘兩均平
 惟有肝腎出雜痘 肺腎指指兩三寧十有二三可保
 太陽發生難捉摸 年壽之間有活生

瘍醫大全 卷三十一 痘科 堯 顧氏秘書

印堂初發帶紫色 六日南柯一夢傾
 祇有肝經無大變 四者兼宜方寸行
 五行相生併相尅 莫教水火便相爭
 上呼下應方為主 痘疔原來不順情
 我有心中秘法文 合法用之轉回生
 回生秘訣心常用 常用掌中掛在心
 用藥不順安巧計 下手用藥如用兵
 一看天庭並太陽 二看唇口舌尖方
 三看梁上並梁下 四看喉額定太陽


五看諸陽觀氣色 再看周圍八卦方
 一要用功觀形色 二要水火莫相侵
 三要氣色無枯地 四要穀食可調勻
 五要痘報無頂陷 六無雜症辨其真
 腎經一串到太陽 六日有變沒疔量
 若然山根有數粒 九日方推十二傷
 肝經稠密內兼紅 不怕天庭黑陷空
 九日作瀉無大害 十一起從十二亡
 肝經出痘灰白色 太陰太陽淡紅白

瘍醫大全 卷三十一 痘科 圭 顧氏秘書

七日挫喉九日癢 健脾助胃正相當
 心經密密地無縫 兩臉珍珠一片紅
 此痘八九防作癢 正格之中難起漿
 肺經痘串震宮連 只防八日有痰涎
 十一凶凶十三吉 過此凶日後無殃
 肺經痘串到離關 灰白茵塵內有霜
 熱沸爛開霜若見 任君一見也悽惶
 密密細詳根下穴 再看唇上可黃漿
 若還二處有生意 還保一旦太平鄉

風雲雷雨電圖

世上傷心惟痘疹 任是英雄也着慌



瘍醫大全 卷三十一 痘科 圭 顧氏秘書

訣曰
 風庭一粒一庭員 心窠定有七粒全
 空得一場方得免 若還不空枉徒然
 雲庭一連到太陽 四肢皆多地略荒
 胸前數粒荒地潤 背中心有一千雙
 雷庭分枝到太陽 四肢地潤喜洋洋
 胸膛果然只幾粒 背中心畧有數多雙
 雨庭天庭並太陽 痘若連串轉凶防
 大小不等三四樣 週身皆密地無荒

祇有胸腹畧分地 挫喉咬牙定遭殃

電庭鋪瓊起發難 此痘多因毒內藏

入門一見難下藥 過此九朝十二傷

印堂太陽先見痘 十有九死歸泉路

逆候治之總徒然 勸君休望神明護

痘出一日乾宮現 勸君不必掛心念

順症不治而自安 若用湯藥反成患

唇口稠密頭亦多 六日作癢肚不和

天庭鋪瓊陰陽少 八九日看渴嗽杏

陰陽密密面腮稀 八九唇乾泄瀉虛

兩腮患毒陰陽陷 八九內攻外剝皮

面紫乾枯成黑陷 七八大凶九日變

面腮唇口水珠光 癢塌無膿瘡易傷

天庭陰陽一點冰 週身平塌微微起

眼下一點就發大 後來黑陷咬牙戰

面瘡其中帶紫黑 五六氣喘元喪絕

發熱見標內藏針 何必諸醫枉用心

夾熱紅大內無焦 逐日週身定然好

瘍醫大全 卷三十一 痘科 顧氏秘書

訣曰

風逆五粒若梅花 手背品字定無差

心窩七枚相連串 知音用藥妙元佳

雲逆一連到太陽 四肢皆多地畧荒

心胸數粒空濶地 背上定有一千雙

雷逆鋪瓊起發難 此痘多因毒內纏

入門一見難下手 九日將過十日凶

雨逆痘連一串圓 大小不等兩三般

遍身稠密肚稀少 措喉聲啞不堪言

電逆分枝過太陽 四肢地濶妙非常

肥肚若生三七點 自然脫甲不須忙

元亨利貞天五部位 决吉凶

元宮部位赤一條 無齒之人淡紅高

决然來日天心照 二二連股人識少

亨宮稚子知事多 早而無雨急出顯

處處旱魃若不退 自然將來九毒磨

利宮蒼黑色來侵 頭大根細定然輕

將來必至皮兒厚 肚腹數枚可放心

瘍醫大全 卷三十一 痘科 顧氏秘書

貞宮淡白色來多 稠密始知甚惡窠

决然五經齊聚會 三五之期挖破皮

天宮兩壁少人知 黑色出邊甚多虧

自然將來大限到 十一十二往瑤池死在申酉二時

五臟部位决吉凶

肺肝兩經一齊攻 港中拖粘根窠紅

羊車羊里方知症 不必憂疑但放寬

靴乾兩會一齊荒 根窠紅活起帝黃

此痘定然冬吉慶 治之不必掛心腸

傷醫大全 卷三十一 痘科 美 顧氏秘書

帶黑相隨一路行 內中多有白根侵

此痘若見多凶候 施救之功决要明

元宮筋紋白而多 密密如蠶怎奈何

再加白色兼青色 縱是神仙把手搓

震坤二部紅活者 决主癢塌抓破謔語狂亂不能灌

漿或寒或熱定然八日亥子二時命絕

風庭印堂不起漿 决主咬牙寒戰

艮兌二部痘如灰 白决主初起泄瀉凶

斷生死秘訣

死期何以識全憑八卦推離宮如遇逆子日死何疑

震巽甲日死兌絕午無移八卦之方位胸中治法

奇秘傳元妙訣何用再三思

八卦生尅預知生死訣

土尅水時黑耳水尅火如斑紫火尅金知悲喘金尅

木即癰疽木尅土知脫齒離部痘紅紫腰間有黑

疔巽坤有紫赤脇下有斑紋灰白漿難滿還該出

一層白則多泄瀉寒戰咬牙生耳後筋紋淡淡輕

輕細小一定無凶若逢紅赤粗大者不堪同例一


傷醫大全 卷三十一 痘科 美 顧氏秘書

般功耳後筋紋黑色腎經發者無疑將來必主黑

陷神工妙藥難醫

看手掌中則知痘後眼睛或傷一隻或傷二隻或發癰毒在於何處預先可知

看手神驗圖



手中心歌

手上下歌

手左右歌

看脚掌神驗圖



看脚掌部位則知虛實寒熱症候日前
悞投某藥盡皆知之此法可驚服世人

大拇指裡面屬木
小拇指外面屬金
脚指頭為前屬火
脚掌心湧泉屬土
脚後跟為後屬水

傷醫大全

卷三十一

痘科

美

顧氏秘書

邵公曰人之有脚掌猶百木之有根人之有頭
面如樹之有枝極極茂盛樹根亦該茂盛枝
極枯槁樹根亦當枯槁反此則上下不相應也
如看人之面部痘色或青或紅或白或綠或黃
而下部脚掌之色不相應者必是庸醫悞投藥
餌所致一看便知悞於何藥其驗如神

前脚指歌

離宮正色紅 下面亦相同 若還

紫赤色 悞服熱藥攻 悞在香附官 桂附子之類

後脚跟歌

坎宮正色暗 下面亦相同 若還

反帶黃 悞吞發散藥 悞在羌活防 風升麻之類

大指裡歌

震宮正色青 下面該相應 若還

反帶白 悞投芪與參 悞在補 氣太早

小指外歌

兌宮正色白 下頭亦此色 若還

反慘暗 悞在服涼藥 悞在紫草生 地苓連之類

足底中歌

中心正色黃 湧泉該亦黃 若還

反帶青 庸醫用大黃 不當用大 黃而用之

驗痘出稠密吉凶訣

梁上先痂紅活吉

耳上先痂往西天

要明八卦方有主

識透部位即真仙

看痘須知五經判斷吉凶

心者南方丙火色紅者吉

肝者東方甲木色青者吉

脾者中央戊土色黃者良

肺者西方庚金色白者實而圓亮者佳

腎者北方壬水如虛白如珠者凶

初見嫩白色者宜蘇葛湯

宜四物湯四君子湯

湯加減南棗為引

傷醫大全

卷三十一

痘科


美

顧氏秘書

邵先生看耳筋秘法 見標之時一看 輕重吉凶先知

凡看小兒潮熱之際以 兩耳辨其五色為驗便 知生死輕重之秘訣

耳背形



兩耳紅筋痘必輕紫筋起 耳病沉沉縱然有藥來攻 解十箇難求一個生

- 耳珠 屬胃
- 耳輪 屬脾
- 耳中輪 屬心
- 耳皮肉 屬肺
- 耳竅 屬腎
- 耳背玉樓 屬肝

歌曰

瘍醫大全

卷三十一

耳筋法

弄

顧氏秘書

耳後筋紋淡淡紅踈踈磊磊决無凶若然紫黑青白 色任是軒岐枉費功

心耳後紅筋赤一條又無枝葉上而高將來必主心 經痘頭面稀少定然好

肝耳筋紫黑魚刺形紛紛都向裏邊行將來必主肝 經痘滿身斑赤八朝冥

脾耳筋蒼蠟痘主稀頭大尾尖人不知將來必主脾 經痘向外排法更奇

肺耳筋淡白亂如麻紛紛俱向外邊爬將來必主肺

經

經痘形如蠶種七朝嗟

腎耳筋亂發紫黑青腰背定有黑痘疔將來必主腎

經痘滿耳盈盈九日傾

見標之時一看預定吉凶

耳上屬心經之火貴乎鮮紅壯熱不宜黑白冰冷如

見梅花品字樣或串字樣從耳皮上山者皆逆之

兆也

耳下屬腎經之水貴乎紅紫帶冷不宜淡黃壯熱如

見梅花品字樣反是順症若如芝蔴虺蚤咬之形

瘍醫大全

卷三十一

耳筋法

甲

顧氏秘書

皆凶兆也如見此痘腎俞二穴决有黑痘疔

耳裡屬肺經之金貴主淡白帶溫不宜鮮紅赤紫壯

熱如見茱萸形或燈火燒烙之樣皆死兆也見此

痘必然鼻乾口燥痰喘噎喉務宜稀踈大粒淡白

桃紅色方佳

耳外屬肝經之木貴乎青綠溫熱不宜淡白冰冷如

見稠密主凶稀踈數粒主吉

中央屬脾經之土貴宜蒼黃溫和不宜綠壯熱稀踈

如黃蠟色為吉若稠密如蟻色帶青者必凶 歌曰

耳上

金木水火土醫家不識重簡苦若
知此法天下行能服富豪與官府

凡耳後筋三條而枝葉多色淡紅者吉主心經發痘
必吉頭面决主稀少

凡耳後筋紫赤色者主肝經發痘必凶急出者不吉
如不退潮熱將來必五毒九磨

凡耳後筋蒼黃色者或筋頭大而根小者主脾經發
痘頭面胸腹必主稀少

凡耳後筋淡而白色者枝葉繁亂主肺經發痘齊出
如蠶種必主癘場極凶之兆不治之症三五日必

癘醫大全 卷三十一 耳筋法 望 顧氏秘書

癘場抓破死

凡耳筋黑色枝葉多者主腎經發痘必主黑陷腰背

俱有黑痘必然焦苗陷伏疔毒九朝十朝內必死

凡發熱耳筋出現紫黑赤白皆凶耳上涼者為吉耳

下涼者為凶吾今只喜淡淡紅此簡法兒堪用聞

聲知證候識語熱相煎痘色多紅紫大便不閉堅

聲戰寒必定大便泄幾番聲清見症不久自安聲

啞喉必爛聲速毒氣煎飲食噎喉外須臾下九泉

大凡出痘必從腎傳心傳肺傳肝傳脾方愈也

手上涼耳下涼者重

手耳温平主二三分痘

面白主肺經有風寒痰喘主五分痘

面青主泄瀉有四五分痘 若初起瀉者急用四物湯
加豆蔻丸紅糖米飲調服

面紫赤主有八九分痘 或作癘場泄瀉或
吐决然癘場而死

頰車起者决主胸腹背三處有毒

口角內有痘者男子陽竅中有痘疔女子陰竅中有

痘疔主第八日死

兩太陽官筋紋現者主眼中有痘 急宜祛其眼毒急
於陰陽見紋處以

癘醫大全 卷三十一 耳筋法 望 顧氏秘書

燈爆之即磨
去眼中之痘

湧泉穴下有紫泡紅紋現者主心中有痘疔

耳後青脉起主癰癤

兩耳後黑筋橫過髮際主臍下疼腎氣痛

耳蒼鼻黑主小便不通

鼻孔乾燥氣粗主齁

鼻青色主吐乳

印堂黑者主夜啼或胎中受冷之故

人中青主不食大便難通

鼻心紅主心中熱痘癩之毒或夜啼
鼻乾燥主死如鼻赤尚有可生之道

傷寒大全 卷三十一 耳筋法 四

馮氏小兒面部見點吉凶之圖說

凡發熱三日之後其痘先出於面之下部在兩頤者為上在兩頰者為中若額際先發者係毒叅陽位為下下矣凡曉星報點稠密者雖各部稀疎難治如曉星報點稀疎光潤者雖各部稠密必有可治之機焉然五臟之精華皆上注於頭面故五臟之精華充足者則痘點雖多必能顆粒分明高聳潤澤雖多無害若精華不足則邪毒用事奔潰成片如痞如疔而為不救之症矣

傷寒大全

卷三十一 圖說

馮氏秘書



三關兩煞五軸

胸堂乳阜心之關

臍封脾之關

陽毬腎之關

白帝煞門座於氣窩右太陽

青帝煞門座於眼眶左太陽

顴阜胸乳心之軸

左太陽左脇眼胞兩鬢阜肝之軸

右太陽右脇項頸氣突肺之軸

傷醫大全

卷三十一 五軸

靈 顧氏秘書

腮頰中庭口角肚腹手足脾之軸

地閣後頸耳竅背脊腰脊陽毬腎之軸

經穴部位諸痘所主

顛會 在頂上土星一寸可容寸許

方廣 肺之部痘

神庭 肺之部在頭入髮際五分督脉足

天庭 且多者則見標先於此處而

穹窿 五嶽高處是也痘若先見

風疔 在腦之後

印堂 肺之部痘如成片

絲竹 肝之部在眉頭陷中足太陽脉

傷醫大全

卷三十一

經穴部

果 顧氏秘書

天倉 肺之部在太陽之上

綵霞 在兩眉稍之上明

繁霞 在兩眉稍之上明

玄武 在耳齊處

山林 腎之部也

百會 痘毒不

髮際 結毒則睛紅舌

睛明 在內眥而為肉

陽池 在陽明之會肝之部也

迎香	鼻柱	地閣	年壽	鼻準	顛石	顛阜	五岳	瘡醫大全	井谷	玄壁	耳孔	聽會	交骨	魚尾	淚堂	右太陽	左太陽
足在鼻明之會不宜生毒	為吉如色灰煤大齒之美	腎之部也木硬而如錫片者大齒	此者併若木硬而如錫片者大齒	宜生毒不	心之部也上可治	心之部也上可治	兩頰鼻額地閣是也	卷三十一 經穴部 畢 顧氏秘書	見於此則為陰而主齒若先	痘即名瑞脾之部也	各參虎宜速挑治	動脈之部在耳珠前陷中上關穴下一寸	寸如遊鱗主齒	上齒之部如稠密大齒	門如椒實大齒	見稠密大齒	切之殺門

肺窞	臍封	臍中	中腕	臆中	乳盤	項鎖	背座	瘡醫大全	氣窩	喉突	氣樞	承漿	頤池	腮田	腮井	人中	食倉
名所發然五衛之位俱不可多痘若併出於此	必主逆而為旋珠	任脈所會脾之膜也痘如蜂螫為齒	在臍上四寸胃之膜也痘如蜂螫為齒	又各胸臍在兩乳中間玉堂下一寸六分在	心之樞也痘如交	而難盤蛇則毒盛	此乃係難治	卷三十一 經穴部 畢 顧氏秘書	突下窩中若三星垂照必死	之樞生殺之職痘密於此則齒	在結喉一寸宛中陰維任脈之會肺	肺之樞在頤下五分宛中足陽	脾土傷而逆主齒	宜稠密	此與足腫骨相應	兼痘而如車輪之形者主齒	亦名食倉俱脾之部也然近法令紋而在兩腮之次

心窠	兩在背各開五椎骨下
肝窠	兩在背各開九椎骨下
脾窠	兩在背各開十一椎骨下
胃窠	兩在背各開十二椎骨下
腎窠	各在背各開十四椎骨下兩傍
肩窠	此者可治
傷門	五則為傷門
井田	毒則腸結便難
立門	火男之龜女之牝屬水而
瘡醫大全	卷三十一 經穴部
豐邱	五經高處為豐邱
曲池	在手肘曲處宛中痘癰不宜患
三里	此最宜速治否則易成痼疾
醫阜	肝之命雖無妨但防潰筋之處
陽毳	腎之則有
商邱	在足內踝前微陷中足太
公孫	在足內經與系竹相應
湧泉	在足心透足中湧泉牢
太衝	在足大指本節

太谿	在足內踝
太白	在足
陰陵	在足
委中	在足膝
陋谷	在足底與脰井相應
瘡醫大全	卷三十一 經穴部

五門八樞

心為赤帝門附心包絡在額臉

肝為青陽門附膽在眼兩睪併左太陽

脾為黃央門附胃在兩腮及兩頰

肺為肅白門在額併右太陽

腎為元武門在交骨耳垂

兩額為心樞

兩眼眶為肝樞

兩腮頰為脾樞

喉突為肺樞

兩耳垂為腎樞

傷醫大全 卷三十一 八樞 幸 顧氏秘書



初見標面部八卦占斷吉凶法

乾兌屬金肺之象受尅於南離之心火得生於坤艮

之脾土

坎屬水腎之象受尅於坤艮之脾土得生於乾兌之

肺金

坤艮屬土脾之象受尅於震巽之肝木得生於南離

之心火

震巽屬木肝之象受尅於乾兌之肺金得生於坎之

腎水

傷醫大全 卷三十一 吉凶法 幸 顧氏秘書

離屬火心之象受尅於坎之腎水得生於震巽之肝

木

夫乾兌屬金金能尅木木既受尅則衰而不能生

火故金不受其尅以此斷為吉 夫震巽木俱屬

木何異重而震輕也益巽近離火火生土土尅腎

水而元神竭矣故先見此部為凶 如離宮先見

標痘者則火亢水必害不害則火必反逆乘故為

險症惟若痘見滋潤有神則水火交會雖凶為吉

如離宮先出坎宮後出而坎宮痘反光澤離宮

痘反慘暗者是南離心火為坎中腎水所勝而尅
矣然金下而無火則物安能得熟耶故必不能成
漿而死是以為凶其餘可做類推宜再兼以各部
位痘粒疎密顏色之如何以決之萬無不中者也

馬氏總論痘要歌括

預知瘡痘吉凶機氣色都於面部推年上山根猶緊
要紅光可喜黯青疑

痘疹傷寒疑似間古人分證可相參莫將汗劑先輕
視發散惟圖表裏安

瘡疹為陽待熱成微微發熱始和平假如大熱身猶
火解毒常教小便清

始終能食最為良平日其人脾胃強食少却防中氣
弱淹留引日變瘡瘍

傷醫大全

卷三十一

總論

五

馬氏秘書

最宜安靜好平和表裏無邪志自寧煩擾忽來宜察
審最嫌失志轉神昏

陷伏須分實與虛實須清托大相宜如逢虛冷宜溫
補幽谷春回慶有餘

四時分治候須明暑濕風寒不可輕異氣莫教相觸
犯致令翻變亂其真

痘瘡脈候貴和平胃氣悠長最要清弦數浮洪為實
候微沉短澇是虛因

第十犯赤澤栽蓮

凡兒身發惡熱自汗不止眼睛昏花呵欠啼叫其
症纔愈而痘隨形者治宜欽汗而用黃菁熬人乳
頻頻飲之更助以調榮益衛之劑訣曰汗流惡熱
已亡元痘犯心肝十全急補心肝並飲汗痘如
鼎灌自然全

第十一犯巖頭走馬

凡兒跌撲損傷不數日而痘即見者治宜補血活
血兼與扶脾可也訣曰跌撲驚傷未愈時箇中透
出好花枝安經活血調脾脈自得羣花朶朶奇

第十二犯逐鹿亡羊

凡兒往來潮熱腹生痞塊日積月累身體羸瘦面
黃力弱而痘隨出者不宜治痞訣曰病痞花開宜

瘍醫大全

卷三十一

十八犯

毒

顧氏秘書

補元扶脾益胃莫遲延尤須治痘培根本何怕花
兒命不全

第十三犯推車陷雪

凡兒稟父母胎毒身患楊梅廣瘡不時寒熱其症
未愈而痘隨形者將何所治訣曰惡瘡未愈出天
花當用升麻藥不差莫假連翹諸敗毒誤毒毒點
浪塗搽

第十四犯霜透梧桐

凡兒身如火烙不時嘔吐不能飲食投諸理氣而
痘隨見者將何所治訣曰嘔吐驚惶胃不和忍看
花痘又相磨應須安胃兼升表自得成功患可無

第十五犯倦龍行雨

凡兒飲食不節致傷脾胃四肢不收發熱惡寒而
痘隨見者將何所治訣曰兒傷飲食正逢災痘又

陽明胃裏來宜畧內消兼補胃更加升表自花開

第十六犯秋蟬泣露

凡兒未痘之前因感濕熱之氣乃患赤白痢疾其
症未愈而痘隨見者將何所治訣曰痢痘治宜清
濕熱更加培土和氣血還須表痘復滋花根本調
維災自滅

第十七犯凍鱗出谷

凡兒因誤持刀刃致傷手足是以寒熱往來而痘
隨形者將何所治訣曰金瘡未愈痘來呈活血還
兼開滯凝更要升花期表暴扶持昂峻自安寧

第十八犯浪裏漁舟

凡兒每發驚厥或患風癩未久而見痘者將何以
治訣曰風癩復苦痘來催只把花欄着意培得

瘍醫大全

卷三十一

十八犯

毒

顧氏秘書

漿來花朶朶不愁風雨更顛危

各書所載各目不同總痘前十八犯專意培花為
主若痘後犯此十八條則又以專補元氣為要

異痘須知 錦囊

天根痘 凡諸痘不起壯而天庭或曉星起者

天空痘 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

明明痘 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

明蝕痘 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

海溢痘 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

海枯痘 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

有根痘 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

無根痘 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

繞膝痘 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

抱鼻痘 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

單鎖口 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

雙鎖口 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

鎖項托 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

乃係 諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

結頸痘 凡痘喉頸窩太多者是也急服元參桔梗生

聚痘 其痘中間多而兩頭少者甚至絕無者是也

兩頭痘 其痘中間多而兩頭少者甚至絕無者是也

逆痘 其痘上少而下身多者是也此無大害或曰

鴉翎痘 此天元足而壬癸充腎經獨發之痘名曰

鬼捏痘 此痘遍身全無點粒其班成片却

鬼痘 其痘見標既完通體俱多頭而全無者是也

賊痘 其痘初出大紅如紫豆大過一日便如黃豆大

諸痘起壯而天庭或曉星不壯者乃

赤換過皮軟不礙手者亦是因盜周身之氣血而盡附之故易長易膿故名賊痘是比諸痘獨大其大甚速者是也若過三日則必變或水泡其或紫泡黑泡矣若形大而黑摸甚硬或如圓殼色者此為痘疔宜急用銀簪刺破口含清珠末填入瘡內則諸痘自然起發矣

蛇皮痘 其痘頭面遍身並無空地平塌而色白者

藥患痘 初標紅潤至四五日忽變陷伏不起將至裏

九焦痘 凡痘而當正額地陷者名曰九焦乃不治之症也

伏陰痘 其痘名不灌膿而內瀉膿血故名伏陰宜急溫裏

水晶痘 宜急大補然皮薄者難大補無益

瘍醫大全 卷三十一 異痘 李 顧氏秘書

空倉痘 其痘雖似肥滿而內無膿血裏實

半邊痘 其痘或出於左或出於右歪斜頭偏盤散

石白痘 其痘中問有凹四弦凸起光亮好看內實漿

菜莢痘 其痘不甚起其中亦凹而四絃者有縐紋以

愚痘 凡痘夏月患者恒多生重蓋熱勝則肉腐腐則

生重也月有不止夏月生重蓋熱勝則肉腐腐則外解自無內伏等患故曰吉兆或云草腐生蠶

木朽生虫故為凶候宜兼察形何如以定吉凶

血痘 其痘初出紅紫平如珠筆點於遍身者也是

火裏苗 其痘如自見點以至至落痂則身涼矣故名之

血疱痘 此血如血熱毒而自漿也凡刺血黑者不治

血靨痘 凡痘出稀少而四五日胖如豌豆六七日後

懸磬痘 其痘極危蓋此係團聚成塊若紫赤灰陷者

鵝口痘 帶鵝口者是也此處發於脾漸至嘔吐不救

白漿痘 凡初起發其瘡頭便帶白漿者此

破黃痘 其痘人中一粒比眾痘大痘雖稀到至六

四圍痘 其痘初起而根窠起發之際四畔旋出小痘

漏瘡痘 有於膿漿成熱之際瘡頭有孔膿水漏出堆

者乾黑者更有不待養膿忽爾自破漏去清水遂

蛙痘 凡起脹時痘上有小孔不黑不白者此各蛙痘

加丁桂其孔一密而痘自起矣如
僅數顆孔甚黑色者則為疔矣

攀肩痘 其痘如色又不佳者凶

隱血斑 其痘形如痘殼而色灰白全無血色及至
擦破而後血出亦無膿漿者是也

赤萍瘡 凡血者急以解毒升發之藥救之如成爛痘
有血者急以解毒升發之藥救之如成爛痘

妨則無矣

氣血兩敗痘 近看猶如水蓼花遠望懸脂紫可誇
臨察清水不成膿古聖神農無治法

紫萍瘡 凡紫出齊紫色不起兼不灌漿
如紫出齊紫色不起兼不灌漿

白萍瘡 凡白出齊白色不起兼不灌漿
如白出齊白色不起兼不灌漿

燕窩痘 其痘在於後頸之間風門大椎兩穴之
處繁粒稠密是也若色又焦紫者必危

癩醫大全 卷三十一 異痘 顧氏秘書

垂珠痘 兩耳屬腎本伏毒之處不宜受痘今痘出
耳輪之上連綿如灌珠此毒氣傷腎之甚萬

生無一

草尾珠 其痘遍身俱陷惟髑骨一團飽滿如珠者是
也此症尚可急治而用補托灌漿之劑或有

黑痘 多屬血熱毒陷况係天癸奪權本最惡症但形
狀多端有血活而猶可救者有色異而後主貴

者須細辨之惟血
不活者不可治矣

贈痘 贈者增出之謂自起膿灌膿結痂皆有之凡頭
面已破又復灌漿於無痘處復出一層是也

各補空痘此因正氣得補而復邪毒逐外也故
最易長膿若服補托藥後不出贈痘破處不

復腫貫者不治

木痘 此痘中心微微凹陷硬如乾腐無膿血是也
此因小兒眼睛多痰結聚成毒耳九日死

瘋痘 狀似牛狂手足不齊併食不知討終日困沉沉
重者便是瘋元耶到此門關

佛頂珠 此是痘症之問稀少而形
色潤美者是也乃係最吉

癩醫大全 卷三十一 異痘 顧氏秘書

五種痘 錦囊

望痘

一名報痘每見熱微氣爽精神旺強忽起點子自
一點以至十餘點外其盤與頂甚佳貫膿亦足世
每稱上乘者矣或有結痂之後一發熱而周身密
布者亦有將結痂而復潰爛深瘡方乃周身縷起
者毒伏於內人不先察幸其自起得以全生故遇
極少之痘必須細詳耳後紅紋再問周身紋路以
及面部氣血如非報痘則數點可云全吉若猶未
也必須銀針挑破初點點則毒不內攻後
得鮮少也

赤痘

一名九焦其痘勢尖圓易長易貫根脚赤甚似乎
血熱然先後不齊三朝漿至隨貫髓回以其九日
之內必焦故名九焦
是係肺症乃輕候也

瘍醫大全

卷三十一

五種痘

李

顧氏秘書

水痘

其發熱起脹貫膿形色狀貌皆同所以易者惟出
時頂色白亮根脚散大氣色淺白頂無痘眼是亦
肺症可無生死之虞但升表太過後
必變瘡而潰爛殊久耗人元氣耳

石痘

此正痘中之第一傳也按之如石易起易貫易膿
嗜笑如故飲食如常三朝漿至七日漿回十日功
成矣

木痘

其發熱見紋俱似痘狀但出之時忽然見點不一
而足至一二朝漸覺粗肥至二三朝反細而隱有

形無漿者是也是亦肺症不必他慮然此五
種凡值痘症時行偏多此類相混故宜細辨

大全

卷三十一

五種痘

李

異痘諸名 錦囊

紫雲灌頂 其痘遍身俱好但頭頂紫

形雲透頂 此乃熱毒聚於頭頂也須清利之

元至欄 氣會足心之下名湧泉穴若於此中見痘

烏紗覆頂 紅先宜急保元非

梨花漫頂 此因氣血虛寒不能振發光澤耳

雲掩天庭 急用保元湯加天雄或可救

場醫大全 卷三十一 異痘 李 顧氏秘書

紫萍鋪額 其症則熱甚咽痛而悶亂發

烏紗落額 其症元氣血併絕也

灰撲印堂 此症宜補氣血為主

紅紗拂面 此宜涼血解毒為主

楊花撲面 此宜內托散

赤珠繞唇 此乃脾經極熱也

烏飯沾唇 此症必聲啞神昏目睛不轉

霞錦穿胸 此因火毒熾盛

紫雲佈胸 此乃血凝氣滯毒來攻胸也其症必

黑棋排胸 此心火亢極血脈色見

柳絮飛胸 此乃血氣枯弱也宜保

桃花映背 其痘遍身紅活光絳圓滿但背上深

紫萍浮背 其痘背脊上稠密紅紫

毒擁三倉 係一名瘦胸其痘胸前成片此五臟之募

花鈿斜堆 其痘兩鬢獨多若至紫

黑砂落背 此症尤

鼻炎敵聰 一名鎖音其痘在耳獨多者是也耳為腎

場醫大全 卷三十一 異痘 李 顧氏秘書

雪鋪魚背 此五臟血已

赤鱗穿腹 此乃胃家熱甚故大便秘

三陰奏毒 屬少陰足股傍是商邱穴屬太陰若毒奏

白梨墮腹 此係氣血皆敗也半

葡萄落地 其痘鬚眉間紅紫一

爛粟居鬢 其痘遍身俱好惟鬢上一片如粟殼臭

榴花散野 凡諸痘是也宜急為補托下元或有可生

心脾肺三經熱甚也治宜涼血清火解毒

主為

荷錢透水

一名托腮其痘獨兩眉稠密是也若至焦紫神昏者凶

楊花墮枝

其痘獨四肢灰白者是也此因氣血帶耳宜八珍湯加附子主之

泉聚兩頰

一名懸脂撲面一名橋殼臉其痘兩臉紫赤獨多者是也此因肝肺熱甚宜急清熱

毒解

傷醫大全

卷三十一 異痘

九

顧氏秘書

九不識 錦囊

懸鏡痘

此痘背馳三陰毒奏五疳形似發背乃一不識也其候必煩躁語惡渴嘔吐身如火熱

蝎子痘

此痘經於肝道鼻毒總聚左脇其大如豆四沿小者如珠乃二不識也其候必乾渴煩躁

覆金痘

此痘總會諸陽旋繞連澤而下部俱無其候嘔吐頭痛形似禿倉乃三不識也

鎖井痘

此痘毒發脾絡羣聚口沿旋繞無數乃四不識也其候必添舌難咽睡臥不寧

盤蛇痘

此痘毒發肺絡項圍繞形如瘰癧乃五不識也其候痰涎壅塞併眼赤惡渴

豕虎痘

此痘毒發脾胃輪左右鼻淫盤結乃六不識也其候肚腹如絞洩瀉吐逆肢冷惡寒

玄坵痘

此痘經心達腎毒發陽物壯似梅瘡乃七不識也其候小腹痛問便澀而赤口渴身熱

傷醫大全

卷三十一 九不識

九

顧氏秘書

掩月痘

此痘經於陽明毒發兩腋中窩圍鎖十五六顆手臂垂痛其候口吐涎沫惡熱臉赤乃八不識也

卷阿痘

此痘經於脾毒發陽明兩掌心痘四五顆連聚此九不識也其候吐瀉煩躁

邵公看痘分五色歌

桃花紅 桃花之紅淡淡紅 一見此色喜相逢 倘若入朝漿不滿 畧投起頂妙無窮

紫花紅 紫花之紅帶紫色 毒發血滯是秘訣 急投退紫轉紅湯 服下片時通滯血

蠟燭紅 蠟燭之紅紅艷艷 一日六時有三變 此症分明氣有餘 血隨氣行如放電

丹砂紅 丹砂之紅鶴頂樣 果然艷根鮮明亮 倘若慘暗不歸根 退紫轉紅湯可放

鷄冠紅 鷄冠紅亮赤如丹 皎潔鮮明玳瑁斑 恰似龍含珠映水 滿江春色照人間

朱氏辨別七暈

痘出而根脚有暈其名有七焉辨之不可不早也痘

粒之尖圓者氣充也實也痘粒之平塌者氣弱也

湯醫木全 卷三十一 五色 圭 顧氏秘書

虛也若以暈言之老紅也紅紫也紅紫乾枯也淡

紅也焦紅也鋪紅也淡白也此七暈分順險逆

老紅 暈色紅而老不嬌妖也不閃爍也不乍紅而

乍淡也亦不帶紫也此老紅之暈必發熱三

日而始見痘苗也身體必平和不甚熱也必

能飲食也二便必調也精神必精爽也此順

症也痘出必稀疎即 多有百十粒亦順

紅紫 痘色深紅而帶紫也必發熱二日即見痘苗

也身必熱微煩躁也當以敗毒和中散主之

看其出齊即用清毒活血湯 催其長漿漿足亦歸於順

紅紫乾枯 初見痘苗即見如此暈脚其症多係逆

必大熱蒸蒸煩躁昏沉不省人事唇焦

淡紅

暈脚四圍淡紅有嬌妖之色以紙燈照之若

氣血俱虛若初見痘苗之時見此淡紅暈脚

寒涼之藥切不可投倘或身不熱微有煩

躁宜用敗毒和中散去其連紫草茸加羌活

蘇葉白芷以托其苗俟其出齊以千金內托

散催其長漿漿足仍歸於順若先慢用寒涼

暈轉淡白急用參歸鹿茸湯以救之緩則成

陷矣此淡紅之暈易 於變淡白不可不知

初見痘苗頂乃先焦根脚紅紫有芒角不見

滋潤暈脚不圓且又帶紅紫乾枯此乃毒火

內盛若初見痘苗急用敗毒和中散倍加芩

連紫草茸以托之俟其出齊熱不減不能食

兼之神昏不省人事煩躁悶水漿不入則

不可救矣倘或熱少減神氣稍清能食不甚

煩躁急以清毒活血湯催其長漿漿足

仍可歸順此在神而明之存乎其人耳

湯醫木全 卷三十一 五色 清 顧氏秘書

鋪紅 鋪紅良由毒火內盛氣不能統血散漫於皮

膚之問也若神清能食痘稀疎者

可治若人事昏沉則不可救矣

痘之根脚四圍無一絲紅色止見有淡白之

痘而亦不見其有微熱因氣血兩虛或因

久病之後或因內有積患或因生大毒膿血出

致缺乳或因內有積患或因生大毒膿血出

淡白

致缺乳或因內有積患或因生大毒膿血出

致缺乳或因內有積患或因生大毒膿血出

致缺乳或因內有積患或因生大毒膿血出

致缺乳或因內有積患或因生大毒膿血出

多元氣傷後故出此淡白之痘初見痘苗宜用加味參蘇飲以托之俟其出齊即用千金內托散催其長漿如或漿不足即用參歸鹿茸湯以催之今日不足來日再催予曾治此氣血兩虛之症竟至十一二朝漿始足者今之庸醫見八九日漿不滿而平塌者盡委而棄之皆因內無實學知識平常未見此氏活切心法之書親教高明廣其知識臨此等七暈之症內有一定之主意外用合宜之藥品舉斯世之幼穉或出險途而濟壽域豈非仁人君子仁心仁術參天地贊化育乎

驗苗訣

初出痘苗尖聳雖多緩出莫愁齊出焦頭枯槁終須雖久難留

湯醫大全 卷三十一 五色 壬 顧氏秘書

又看顏色氣血榮枯初出見點察色可知窠紅成片潤活可醫黑如煤炭血死無疑 邵公

邵公看痘分五形訣

珍珠形 珍珠之形恰似珠頂白根紅可看書
茱萸形 茱萸之形血有餘解毒湯投預可除
棋子形 頂陷帶黑兼慘暗逢斯可讀邵公書
菜豆形 只因氣滯元陽弱調養湯投還可望
白荳形 祇恐收期難得收口傳秘方不肯錄
上達之士見此形色目力精全智慧兼會舉一隅以知三閩一事而可知十人中可回生八九

邵公看痘分惡五色歌

烏鴉斑 烏鴉斑生症惡多昏昏隱隱亂如梭
紫沙斑 紫沙斑患決不輕其苗頂子似藤柯
雲頭斑 雲頭斑血不得法死在六朝日夕中
蛇蚤斑 蛇蚤斑血滯如何療却如蚊咬一般形
點脂斑 點脂斑血熱氣有餘猶如蠟脂點肉樣
雖然血熱氣有餘畧投解毒便無恙

邵公看痘分惡五形訣

乾皮形 乾皮瘡形微帶紅又兼枯黑熱來攻
紫萍形 紫萍形似紫荷清地湯投急用功
白萍形 白萍瘡形鼓脆皮免教嬰孩九日危
赤萍形 赤萍瘡形出已齊形如桃花貼肉生
蓮肉形 蓮肉紅形痘已齊去毒涼心敗藥宜
形色之惡猶宜謹慎臨症之時不可草率十人之
中尚可保全二三若下愚之流執一之輩非乘機
先講謝儀往返擔延時刻即慮設使難救治之損
名棄而不救此等不堪切勿科即得此許多秘訣用
之斷不應手予此等秘法天下司幼科者百無一
知因予對天立願好利之人不傳下愚之人不傳
惇義之人不傳三不傳者恐知此法乘人之危順
症亦加恐嚇使其父母莫知所法不得與衣當
無保赤之心所以不獨用之無功必遭天譴慎之

湯醫大全 卷三十一 五色 壬 顧氏秘書

邵公看痘秘訣

熱日湧出痘難當 宜查部位再推詳

若是利方先見點 不須憂慮少慌張

初出放點滿頭紅 再查部位用其功

果然報痘方不利 七日之後一場空

初出血點帶紫鮮 雷庭磊落可回天

急宜早早求清地名湯 免的爹娘枉教寬

未出腰痛甚可憐 腮顛年壽不須嫌

若在逆部痘先報 牽牛九方可結緣

瘍醫大全 卷三十一 秘訣 未 顧氏秘書

初出頭面痘形好 遍身如蘇不均勻

若還方法不得訣 連燒十日見閻君

已出頭面却如蘇 遍身痘色莫須誇

風池兩背若先腫 不遇明醫枉費嗟

初出臙脂一片紅 祇因血滯氣難攻

羌活散中加減用 莫待臨時枉用功

初出哭泣啞音聲 色如明潤可回生

若如紫黑發斑疹 一夢南柯十一行

痘放標時手足先 臉多腦少背多纏

四肢果然多密地 斯時看法又玄玄

頭面灰白黑兼多 果然周身紅活窠

心窩兩傍無空地 腎膈夾臍黑穿梭

痘標出放在天庭 胸背稀密不均勻

四肢畧分疎地濶 心窩空地二三分

痘瘡先放在太陽 面上稀疎四肢濃

胸膛背脊無空地 九日之內往泉鄉

痘標初放在司空 顛骨腮少密離宮

胸腹四肢大分地 背心上下密重重

瘍醫大全 卷三十一 秘訣 未 顧氏秘書

方廣出標大可嫌 面多胸少背多纏

此痘定然三四樣 醫人用藥要心專

印堂出痘見形來 太陽方廣磊如堆

心窩鋪瓊無空地 一交九日已時亾

山根年壽痘形先 面胸稀少背相穿

四肢畧有二三十 喉嚨倘痛要清咽

兩腮放痘見形來 面少背四肢排

嬰孩若遇此等痘 不必憂心且放懷

風池三台一點形 其痘原來蚶出行

嘔惡不寧清白糞 急宜用藥救回生

三台放痘要先知 上吐下瀉不須疑

喉嚨又疼難得過 甘桔湯中仔細推

承漿出痘不須疑 其毒原來痘必稀

此痘定燒三日外 退涼身靜再無窮

又訣

六日七朝見痘瘡 滿面稠密地無荒

細看陰陽梁上穴 內中畧有水珠藏

此乃心肝肺痘出 心窩畧有幾數行

易醫大全 卷三十一 秘訣 素 顧氏秘書

二日見標無大害 十一十二防作癢

作癢之中防作瀉 十五十六太平鄉

七八九日見痘瘡 滿面鋪瓊紫色樣

飲食挫喉真可忌 肝腎二經出不祥

二日見標火中出 十一午時枉思量

五六七朝見痘瘡 渾身發痘地疎荒

此乃肝經瘡發出 胸心畧有似紅珊

三日見標連火出 急用疎痘涼地湯

服過之後聽調理 在後不必用他方

六七八日見痘瘡 滿面紅滑水珠樣

此乃肝脾出痘疹 二日見標可推詳

胸中空空有數個 逢人一見喜揚揚

細詳不可一斷論 此痘在後有傳方

九日方來定作癢 作癢之中又作渴

作渴之中又作瀉 寒戰咬牙甚難當

推過十三十四日 過此凶日定無妨

七八九朝見痘瘡 陰陽兩腮甚難當

灰白畧帶淡紅色 肝肺二經發根詳

易醫大全 卷三十一 秘訣 素 顧氏秘書

八九天門見痘瘡 坎離二穴平塌樣

心腎二經紫黑色 水中發出火中殃

十一二日定作癢 內攻外剝見闔王

九日十朝見痘瘡 黑陷焦枯不上漿

陰陽二處不起發 肺腎二經不灌漿

胸背稀疎黑數個 日半見標莫思量

十二咬牙並氣喘 十四午刻返陰鄉

五日六日見痘瘡 痘出皮肉一連丹

斑點陰陽不分地 胸肚紫泡氣難當

日半見之直可惡	九日之內往泉鄉
三日四朝見痘瘡	紅斑紫泡地先胖 <small>腫也</small>
眼目陰陽俱無縫	斑點六日一場空
十八九朝見痘瘡	渾身收完皮肉紅
原痘不曾充灌頂	邵公一見喜相逢
十二咬牙並寒戰	十四子午赴泉鄉
八日九日見痘瘡	滿面稠密一片難
仔細觀其陰陽穴	陰陽天庭畧上漿
邵公問醫無荅者	勉而猶豫始知難
急推土心行八卦	此症訣後有奇方
藥施用當如反掌	危者能生有主張
五日六日見痘瘡	頭臉肢體灰白光
邵公至囑再至囑	急用良劑保安康
此痘氣血相和助	健脾行氣正相當
八日九日見痘瘡	陰陽唇口痘紅藏
肝肺二經痘淡白	心窩稀少四肢均
三日見標真可羨	十一起頂十二藏

傷醫大全

卷三十一

秘訣

全

顧氏秘書

痘之熱症湯水飲多申日必泄 亥日寒戰咬牙惡
 症死期辰午 申日多歸乙亥 丁丑之期已卯
 或靈 辛巳常驗甲申極準仙數難逃 症值吉
 凶從訣可斷 且如凶現堪斷幾朝 用意推詳
 再加目力 究其精奧僅可稱神 謹密仙機幸
 毋亂洩

傷醫大全

卷三十一

秘訣

全

顧氏秘書

邵公定痘有可治不可治訣

痘殃一症難言也有發熱而死者有未發熱不知痘症而死者有發熱三朝並不起發不分顆粒枯黑痧夾痘痘夾麻而死者有五朝忽然漿陷肌膚忽瘦而死者有七朝大小便不通眼開氣洩死者有十二朝忽死者有一月後死者種種不一此言其已知出痘之險惡者更有一種腸痛腰疼數日並不發熱並無報痘忽喊數聲死者又何能知其為痘之險惡耶

瘍醫大全

卷三十一 定痘

全

顧氏秘書

先驚後痘吉

一片蠟黃吉

唇內有水者吉

大便出蛔無妨

黑陷有膿無妨

抓破出血無妨

痘後聲啞無妨

初出紫血有法治

稠密頂陷有法治

畧有紫泡有法治如紫黑色者不治

鼻出蛔虫有法治

飲食堆喉有法治

灰白色有法治

渴瀉不止有法治

寒戰咬牙有法治初起寒戰不治十四朝寒戰可治初起咬牙不治七八朝咬牙可治

疔瘡口臭俱有法治

手摸碍手者有法治

手摸嫩者有法治

瘍醫大全

卷三十一 定痘

全

顧氏秘書

手熱不退有法治

鼻血不止有法治犀角地黃湯主之

泄不止者有法治

吐瀉者有法治

遍身痛者有法治如入九日作痛者乃氣血過盛宜涼膈散

語言不正有法治

二便不通有法治

打呃者有法治

舌上白者有法治

唇乾者有法治

黑頂陷者有法治

初熱悶亂者有法治

唇裂者有法治

初痘起驚者有法治

癢塌抓破血水有法治

白頂陷者有法治

滿口齒落者有法治

口鼻出血有法治

通身臭膿有法治

牙關閉者有法治

暴躁不定者有法治

面部不起有法治

陰毒陷陽有法治

陽毒陷陰有法治

收後黑糞有法治

收後咬牙不止有法治

銅鑼頂者有法治

傷醫大全 卷三十一 定痘 全 顧氏秘書

室女行經有法治

孕婦胎下有法治

十指冷者有法治

初起氣急無妨

初起欬嗽無妨

吐蛔一條無妨

十四朝腰痛無妨

初起目閉無妨

痘七八日口渴無妨

初起聲啞無妨

牙疼無妨

大便出血無妨

口吐鮮血無妨

口吐黃水無妨

肚痛無妨

膿涕者不好

手搖者不治

眼中出血不治

傷醫大全 卷三十一 定痘 全 顧氏秘書

用煮難法

八九日氣急者凶

八九日欬嗽者凶

若吐蛔二條者死如發熱三日見標吐蛔者乃腎中真病不治之症

初起腰痛者凶

十四朝日閉者死

乃氣血不足四物湯治之

先凶後吉

黃連解毒湯主之

吐赤血者不治

平胃散主之

平胃散主之

平胃散主之

耳中出血不治

未出聲啞不治

一出氣急不治

一出青斑不治

一出如珍珠不治

滿頭連肉紅不治

面臉痘不腫不治

痂子形無縫不治

腰痛不止不治

瘍醫大全

卷三十一 疔瘡

全 顧氏秘書

打嚏不止不治

先痘後驚不治

出如蠶種不治

咳嗽聲啞不治

腹脹悶亂不治

哭泣無聲不治

二便漏下見腸不治

瘡嫩易破不治

挑破紫黑血不治

舌捲囊縮不治

癢塌不止不治

遍身成堆不治

皮肉紅腫不治

眼無神者不治

白薄大泡不治

白無色者不治 如白色大小不等者不治

遍身作癢不治

狂悶者不治

瘍醫大全

卷三十一 疔瘡

全 顧氏秘書

身與四肢顫抖咬牙口噤者不治

飲食吐者不治

舌上黑者不治

收後疤白不治

目閉無視不治

水珠不變色不治

遍身俱陷不治

口出活蛔虫不治

氣血俱虛不治

凡痘初出如麻子不碍手者不到第三日反隱入或變水泡聲啞挫喉則七朝辰午二時死

凡痘出如黑痣者九日死

凡痘不起眼胞先腫者九日死面先腫者十日死

凡痘兩額角多抓破者十日死焦枯陷伏者十四日死

死

吐膿痰者無妨 消痰飲治之

吐臭膿痰肺癰不治

泄瀉清糞無妨 理中湯治之

傷醫大全 卷三十一 定痘 全 顧氏秘書

泄瀉白糞乃是寒症可治 理中湯治之

天庭稠密如蠶種似針苗之狀頂陷黑者不治

泄瀉黑糞者不治

目疼者可治

手心疼者無妨 益元散治之

泄瀉紅糞者不治

十指疼者不治

耳後作疼者可治 茯苓湯治之一服即止

背心疼者可治 宜羌退散治之

曲天疼者不治

胸心疼者不治

舌尖紅五心有火可治 麥冬散治之

喉中疼者難治 七八日喉中疼者可治 初起喉中疼者不治

又訣

毒厥中宮咽喉啞

心煩躁悶喘難當

睡臥不寧又不食

痘若初出見青黑

半隱肌膚色不見

若有明醫議諸症

一看咽喉時時啞

喘痰頭上有汗珠

痘出五日聲啞者不治

痘未壯遍身抓破無氣血者不治

舊有瘡瘍不愈者不治

痰壅盛氣急者不治

未出神昏者不治

未出氣促者不治

嘔瀉咬牙命難假

瀉膿出血難主下

熱沉沉南柯差

除是回生重妙訣

用藥不對如刀劍

干代兒孫富且顯

次看咽喉聲轉大

腹中飽悶氣虛滑

醫家若還見此症

再變寒戰終有惡

黑陷動動如泄瀉

吐舌身搖頭動翻

口中氣冷如何治

六日南柯一夢傾

或重或輕心中熱

黑血下流陰氣絕

面青紫黑命難存

除是乘槎聞死人

腹脹瀉膿血者不治

一出全不起發密如蠶種平片花塔者不治

收靨前後內有紅紫泡者不治

肌膚黛黑如枇杷破者不治

漿水米粒不入口者不治

一出晦暗焦黑者不治

眼內黑米起者不治

浮油混眼者不治

除此之外縱有雜症及痘難稠密畧有潤澤學問精明眼力又到胸中誠確所見不錯病家不惑彼

湯醫大全

卷三十一

痘症

李

顧氏秘書

此俱是誠心加意調治必可保全十之六七

又訣

初出頂陷薄肉紅

捱過九日一場空

又無血點帶紅紫

斑症死在六日中

發斑黑者在朝夕

斑青頃刻去匆匆

無膿癢塌十二日

不要疼痛及挺胸

報痘如癩似雞皮

舌捲囊縮命必亡

刺胞刺出黑血者

飲食噎喉諸症凶

難療面腫瘡不腫

青色黑陷及無膿

二便流水下腹垢

更有吐瀉及蛔虫

頭温足冷好飲水

痘先驚後藥難攻

氣促泄瀉渴不止

若無漿者命難供

失音聲啞叫與哭

痘色縱好也難終

但凡氣急亦難治

如灌膿時忽傷風

見此宜服參蘇飲

餘症推詳須用功

天庭痘成串不起此乃氣血俱虛須補氣血為主不

然後必空倉癢塌虛白作瀉寒戰而死

婦女出痘經水不止者凶

湯醫大全

卷三十一

痘症

李

顧氏秘書

墮胎血者凶

不墮胎而血不止者死

收靨時顛搖不止者皆身弱之故 另有治法

靨後目睛無神慢驚頭面青色者不治

收靨時喉痛不止者凶

凡痘腰下現紅點而腰上不現出者不治

醫家科視痘兒之臉形如橘皮不分肉地者死 此即

類粒肉腫瘡不腫也

喜泰順日初出紅點帶紅紫發斑之證五日死初出

滿頂連肉紅七八九日氣絕耳斑如錦紋六日終
斑青頃刻入陰中痘出如痲無縫者摸不得手勿
治也若如湯泡及火燒十日癢塌死難饒痘出腰
腹痛不已煩躁紫黑口臭死頭面一片如臙脂六
日後死何必疑肉面腫浮瘡不腫胸高耳突不治
重痘白面光根不紅久後抓破死無膿無膿癢塌
十二期有膿血者不死矣如麻無縫痘不好聲啞
氣急命皆危二證貫膿痘色光乃傷風寒參蘇當
若是哭泣咳嗽啞痘色光明也不妨痘色不好聲

瘍醫大全

卷三十一

定痘

全

顧氏秘書

音啞斷他必死無或假舌捲囊縮目無神飲食滯
喉必難存紫泡刺破出黑血便中腸垢不治論吐
瀉若還甚不止蛔虫出者死難聞已未出痘聲音
變先痘後驚活不寧三日痘窠全不起紅腫如瓜
君莫治頂陷有眼似針穿紫黑色者死决然貫膿
乾枯無血水此名空瘡痘乃為泄瀉不止二便血
乳食不化痘爛死貫時二便全不通目閉口啞證
亦凶腹中脹滿肌肉黑若還醫治必無功當臙瘡
塌無膿血皮如血殼肝即絕寒戰咬牙痘後驚臙

若竹衣便膿血此皆死證不須醫縱遇神仙難作
力

瘍醫大全

卷三十一

定痘

全

顧氏秘書

痘科始終要訣

邵公曰自初發熱便知吉凶重則痘密輕則痘稀日
 半出齊靈丹莫療緩延三日續敷可生初出之苗
 根潤頂尖必易起壯頭焦脚滯終難行漿肉裏藏
 隱紅斑再察天離苗勢此位粗肥有潤用藥退轉
 為輕大抵微熱三天身涼見標斯為上吉若日半
 兩日帶熱見點此是至凶初熱為始至六日滿方
 齊若二三四五日內見苗熱未退者悉用退火解
 毒直待分地清白七日之後方可補托助漿九日
 易醫大全 卷三十一 始終 葉 顧氏秘書

之期順者飽滿充實逆者粘肉乾枯險者離與起
 窠無漿脚潤十日漸長十二三日頭面俱滿於中
 或有變證用藥調治可保無虞痘若起脹行漿再
 看舌喉背耳舌如黑者必死背無漿者定亡耳上
 乾枯必敗喉間堆鎖定傷膿若稠堅磨自厚實漿
 嫌清少疣必黑焦脚潤漿堅何患諸變氣虧血欠
 立恐災殃八日之前食少無害十日已後少食須
 防出際通紅莫嫌壯期泄水可惡聲清為喜聲啞
 難扶假如咬牙當辨寒熱如逢戰慄驗漿有無熱

戰咬牙托熱涼散寒戰際齒補帶温攻凶逆詳察
 其兩端治止主持於一定有能知此者則不患名
 譽之不彰財利之不廣也

又曰觀其耳便知痘出症輕症重聆其聲則知何部
 痘密痘稀惟見瘡善識心思觀面知身上災殃又
 如身熱唇焦便知作渴痘苗紅紫必發狂言痘若
 稀疏先須頭痛形如蠶種初主腰痛面帶白黃曾
 經吐瀉身如災火必定尿黃蛇蛻一般因熱日半
 一齊湧出茶黃一樣連燒二日陸續敷陽痘若潤
 易醫大全 卷三十一 始終 葉 顧氏秘書

澤稀疏定熱三日身涼見點苗若乾枯畧密未滿
 三日帶熱敷瘡頭面痘紅壯脇上必生斑點額腮
 痘陷腰背間多有陷塘白色漿清再出一層小痘
 瘡平頂陷中有幾個賊瘡漿不滿充猶恐唇舌齟
 疴落齒或如易落切防肢節癱毒流膿磨後眼封
 毒入肝經生翳收期復脹邪留腸胃二經此乃秘
 訣發之必中宗吾法者超乎俗類

驗初發熱時吉凶斷訣

發熱自寅卯時起者是肝經痘也主痘紅潤帶綠頭

面六分背上五分手上四分脚上三分肚上一分半輕之症

發熱起於巳午時者心經痘也主痘脚紅頂尖面上四分背上三分手足上各二分肚上半分爲上吉發熱起於辰戌丑未時者脾經痘也面上不過數粒尖圓飽滿黃潤背上只有十多粒手足各有七八粒肚上心窩全無此極妙者也

發熱起於申酉時者肺經痘也主痘灰白色面上八九分背上七八分手足七分肚上三分險中逆也

傷醫大全 卷三十一 始終 雜 顧氏秘書

發熱起於亥子時者腎經痘也主痘黑陷面上十分背上九分手足八分肚上四分逆也

發熱半朝見點必然先放雷逆就如蠶種相連頭面四肢俱密胸肚地畧疎通痘子不能發出唇翻面腫毒攻又逢口舌尿血神仙妙藥無功

發熱一朝見點必然先放兩宮痘色頭焦脚赤肚脇斑塊血紅先必腰疼肚痛狂言煩躁交攻自然生痰作喘措喉聲啞將終學者宗吾治法保全嬰壽無窮

發熱朝半見點猶嫌先見風宮五粒梅花之樣手背品字相同脚上連三串四心胸七八成叢腰間毒疔二七陰囊黑色無膿勿以此爲順症莫斷此症全凶再費精神飲食隨機用藥成功

發熱兩朝見點必然雲部現踪頭面七分之數手足五分之膿背上四分之象胸肚二分之功所喜尖圓潤活猶嫌枯黑暗紅

二朝半來見點定然發電便逆見標身頭壯熱和中安表助功痘出自然潤活面部稀少地空必要調

傷醫大全 卷三十一 始終 雜 顧氏秘書

元固裏以防變壞於中

凡小兒發熱呵欠鼻流清涕咳嗽痰涎臉紅唇赤睡中驚撮目澀鼻尖紅手足尖冷耳後有紅筋現者是眞出痘也

凡心脾兩臟並出者主頂帶紫黑色根窠紅半輕半重之症放心勿慮

凡肺肝腎三臟並出者主頂帶黑根窠白乃凶極之兆不治之症

凡痘半日出熱不退主紫黑譏語如見鬼神此宜下

生津譖語者承氣湯治之如不急治則三五日子時必死

凡痘二日未退熱見標者畧有紫紅色則宜前藥宜之或不紫紅宜十解散去其內毒後加四物湯為主治之如不服藥則五七日午時必死

凡痘日半未退熱就見標形如蠶種隱在肌膚之內須要托出如托不出七日九日辰卯時死

凡痘一日半未退熱見標者如大紅色宜宣之不可亂用下藥如若不治則九日十二日午時死

傷醫大全 卷三十一 始終 堯 顧氏秘書

凡痘三日未退熱見標者紫黑焦陷者須用五味十解散治之或用芩連紫草之類如若不治十三日咬牙寒戰而死

凡痘三日以前出者是實熱或承氣湯十解散或紫葛湯亦可

凡痘三日以後見標者大抵俱虛而實者少也須要看痘下藥或帶灰白或紅點稠密者宜宣可也

凡痘一見先分表裏虛實不可妄以下藥治之如紫紅乾枯飲水如蜜飲茶不止渾身熱不退者急以

清涼解毒之劑如治之不退則成陷伏倒塌不治如身微熱痘色淡白小便清利口氣又冷宜投大補湯一貼若痘均作二三次出則吉

凡痘一熱一齊出稠密內中無黑陷或天庭一片如雲兩臉畧分明一日灌起服藥見效不致噉放心治之若有黑陷焦枯及不退熱不滋潤者不治

第一看口唇舌尖

第二看痘粒圓活紅潤地步分明雖多有吉

第三看心窩額上稀乃是吉症

傷醫大全 卷三十一 始終 堯 顧氏秘書

第四看痘無陷頂白如蠟色外黃潤如油色吉

第五看痘出來頂不焦不紫者吉

碎金賦

羅田萬密齋此乃痘疹之捷徑初學宜熟讀

痘本胎毒俗曰天瘡雖癘氣之傳染實殺機之顯彰
變遷莫測酷惡難當肌肉潰脫兮若蛇蛻皮龍蛻
骨精神困頓兮如蚓在灰蟻在湯瘡有疎密兮疏
者輕而密者重毒有微甚兮微則祥而甚則殃笑
彼拘於日教者未達遲速之變悲夫惑於鬼神者
不求醫藥之良

瘍醫大全

卷三十一 碎金賦

直 顧氏私書

乾坤妙合震巽分張受氣於父兮得陽精而凝結成
形於母兮賴陰血以培養民多嗜慾氣匪厚龐淫
火熾於衽蓐食穢蓄於膏梁精血稟其毒氣兮甚
於射罔形體負其殺氣兮險於鋒鋦或謂去其口
血兮不過脫空之語或謂解其胎毒兮未見抵聖
之方

五運統於南北兮有大有少六氣分於主客兮曰陰
曰陽變化各正勝復靡常得其序而氣治兮國無
症癘失其序而氣亂兮民有疹瘍應至而不至兮
其氣徐貴迎之以奪其勢未應至而至者其氣暴
姑特之以避其強不知此而妄作兮違時者敗能

審此而慎動兮順天者昌

春令溫和而升生夏令暑熱而浮長秋令清涼而降
收冬令寒冽而沉藏是得四時之正不為萬物之
傷冬反煖煖兮勾萌早發春反栗烈兮蟄虫且藏
夏反清肅兮涼風襲肉秋反蒸溽兮暑汗沾裳若
此逆氣兮染之者即成疫癘又有虛風兮中之者
必致天傷

瘍醫大全

卷三十一 碎金賦

直 顧氏私書

受父母之穢毒兮隱於黝僻觸天地之癘氣兮發其
伏藏自內而出兮布於四體自外而散兮根於五
臟肝主淚而為水泡肺主涕而作膿囊心則斑而
且赤脾則疹而又黃腎乃封藏之本變則黑陷之
象可喜者苗而秀秀而實如鳥之脫距所惡者枯
而陷陷而伏如虎之負罔

東赤南白西黃北黑各分布而有定春生夏長秋收
冬藏自流行而無疆初出血點兮紅鮮得生之氣
次化水液兮白瑩漸長之狀膿成而色黃兮欲收
之候痂結而色黑兮已藏之象謂腎無證者似去
冬不能成歲謂黑為逆者如廢北何以調陽

方其發生兮春夏為順而秋冬非吉及其收斂兮秋
冬為順而春夏不臧應發生而反收斂者謂之陷
伏應收斂而反發生者謂之瀾洋順者不必治兮
待其平復逆者不可治兮避其怨謗若逢險症必
在奇方治不乖方兮險變順而春回幽谷藥不對
病兮險變逆而火烈崑崗

病似順而反逆兮認之要慎病似逆而反順兮察之
貴詳似粟堆聚堅硬兮執若磊落而稠密如丹艷
赤嬌嫩兮不如淡白而老蒼初出現而雨水乍起

揚醫大全 卷三十一 碎金賦 重 顧氏秘書

發而戴漿膿主成而乾黑囊未滿而萎黃早發先
萎兮如園林之花蕊暴長遽消兮似溝澗之潦漭
是謂奪命之證休誇折肱之良

輕或變重兮誤服藥而或犯禁忌重或變輕兮得遇
醫而且善調養蚊迹蚤班兮不旋腫而告變蛇皮
蚕殼兮惟束手以待亡夾痲夾疹兮癩疹消而足
喜頂平頂陷兮平陷起而莫惶切戒臨病揮霍最
宜用藥審詳病有標本兮視急緩以立法藥有補
瀉兮因虛實而立方

噫嘻兮醫無定法述亂者藥無定方大率賤攻而貴
補故多喜溫而惡涼設若病遇虛寒兮溫補有效
假如證屬實熱兮辛香敢嘗辛熱下咽陽之盛者
必困苦寒入胃陰之盛者乃戕戒汗下於首尾兮
惡攻之說補脾土以制腎水兮喜補之常不識補
者之短奚論攻者之長

形尖圓而光壯兮氣之充拓色鮮明而潤澤兮血之
涵養可以勿藥是謂無恙灰白平陷兮氣血虛而
補之以溫紅艷焮腫兮氣血熱而瀉之以涼氣至

揚醫大全 卷三十一 碎金賦 重 顧氏秘書

而血不足兮雖起發而根窠不肥血至而氣不足
兮雖明潤而郭郭不長泥章句以舉一隅者守株
安可得免馳辨說而執兩端者多岐必然亡羊

脾為水穀之本固不可以不補腎為津液之源尤不
可以不將土雖為水之防水能制火之亢腎主骨
髓兮倒陷人於骨髓者莫救腎司閉藏兮變黑至
於閉藏者可防是皆歸腎之害豈可謂腎之強毒
火燔灼兮腎水且涸營氣敗壞兮脾土亦傷故補
脾不如救腎而養陰所以濟陽

昃則氣血淖澤而不飲寒則氣血凝滯而不彰氣血
失養瘡疹受傷或受於熱兮為煩躁為赤為痛或
受於寒兮為振慄為白為瘡順時令之寒暄禁人
畜之來往勿動溷廁之臭勿燒檀麝之香恐乘虛
而易入反助毒以為殃痘雖吉而犯多凶屢經怪
變證雖惡而調治善終見安康

若夫瘡疹之熱相似內外之傷邪火炬赫兮玉石俱
焚直水靜順兮波浪不揚噴嚏咳嗽兮肺金流爍
項急頓悶兮肝木被創呵欠驚悸兮心雖君主而

傷醫大全 卷三十一 碎金賦 聖 顧氏秘書

不寧吐瀉昏睡兮脾則倉廩而不藏各臟各證惟
腎無象不受穢毒之火獨見耳聾之涼

熱微兮毒少熱甚兮火旺大熱安靜兮毒隨熱出而
無慮小熱煩躁兮毒與熱伏而可防凶災莫測兮又
熱又渴輕疎可許兮乍熱乍涼吐瀉勿止兮使毒
得越而無過驚悸不定兮恐毒深入而反藏血妄
洩於空竅兮死期速於彈指語妄涉於鬼神兮變
候易於返掌

形證定其疎密部位決其存亡如痘紛布兮且顆粒

而其疎已定如麻堆聚兮更模糊而其密堪傷挨
頰連口兮庚戌陽明之位額間額上兮壬丙太陽
之鄉頭為元首之尊最怕蒙頭項乃關津之要偏
嫌項鎖鼻準初出兮淫毒犯於天根耳輪先現兮
邪火侵乎玉堂

漸次出兮吉兆齊湧出兮凶狀將出而熱減兮藥勿
妄服痘正出而熱劇兮醫宜早防解其火毒兮恐
鬱遏而乾枯養其氣血兮欲流行而舒暢遠寒熱
之犯兮損之益之而必欲和平助春夏之令兮達

傷醫大全 卷三十一 碎金賦 聖 顧氏秘書

之發之而必使長旺治其未亂兮徹桑土於迨雨
知其必漸兮戒堅冰於履霜

出欲盡而不留發欲透而齊長苗漸成窠兮氣之所
煦血漸化水兮血之所養疎而毒少兮頭面不腫
而休怕密而毒多兮氣血不充而莫荒時日既足
兮自翹翹而雜起表裏無邪兮勿汲汲以作湯
謂良將用兵善攻不如善守又云上農治田勿助
生於勿忘

咽喉忽痛兮勿違時而早治頭面預腫兮但引日以

必亡小便欲清兮大便却欲其堅實淡味可食兮厚味不可以啖嗜茹淡者胃氣不損養厚者火邪益亢或見黑黯兮點之速以黧脂或遇乾枯兮浴之貴以水楊瘡癢忽生兮取茵陳以薰燎爬搔不寧兮雖盧扁而徬徨

痘長滿水毒化成漿愛其稠濃兮惡其清淡取其滿足兮舍其虛洋欲知透與不透兮於手足而細察欲知足與不足兮於輔頰以端詳設四末之未透取脾胃而服藥如一方之未足視經絡以求方譬

瘍醫大全

卷三十一

粹金賦

專

顧氏秘書

如為山兮勿功虧於簣土又如執熱兮寧濯先於探湯

面頰最嫌破頂肩背尤怕焦囊腫忽消兮氣脫語忽妄兮神亡食穀則嘔兮胃爛飲水則噎兮咽傷咬牙兮肝火熾而腎敗寒戰兮陽氣弱而陰強膿反乾兮倒陷膿不成兮伏藏叫哭不止兮毒攻腸胃悶亂不寧兮火烈膏盲倉廩不藏兮鬼魄歸於漠漠水泉不止兮姻親泣於北邙

膿血已化收靨相當兆自唇吻兮漿吐結如珠粒斷

自人中兮部分默以意量令行秋冬兮依先後而不亂氣應陰陽兮循上下而有常額上乎輕兮慮乎倒靨額間先收兮謂之不祥痂不著而墮腫兮由榮血之淖溢瘡盡裂而皺揭兮此衛氣之殘傷當靨不靨當藏不藏便秘不通兮裏氣熱而涼導便溇不實兮中氣虛而溫養熱傷皮毛兮怪肺金不收餘氣濕傷肌肉兮責脾土不燥殘漿頭瘡堆膿不平兮孤陽似燄而不生足瘡包水不乾兮純陰如寡而不長飲食減少兮逆選引日而斃煩熱增

瘍醫大全

卷三十一

粹金賦

東

顧氏秘書

劇兮倏忽絕命而亡

若問痂皮之不脫其間病氣之相妨痘若敗壞兮補空痘勿疑番次瘡如潰爛兮成潰膿莫厭膿漿遍身浸淫兮粘被席而最苦正面腫灌兮息腥臭而再妨利多水液兮此畜水之病也水去盡而自止便多膿血兮此倒靨之證也膿去盡而可祥癩痕凹凸兮陷者虛而突者實痂皮嫩薄兮裏則困而外則瘍

邪氣盡而正復痂皮脫而身康苟幼軀之多病定餘

毒之有藏出或未盡兮無空痘須防卒暴發或未
透兮無潰膿必發疽瘍不及期兮早收毒火陷而
可怕或過期兮不磨邪氣留而堪悵身熱審其虛
羸咽啞觀乎嘔噎勿洒浙而肌熱兮知風寒之外
感暴吐瀉而腹痛兮必飲食之內傷

病有苦而眩暈兮凶多吉少之占身無邪而昏瞶兮
否去泰來之象聲音不出兮求諸肺腎之經斑疹
復現兮責其心脾之藏疔蝕出血者難治洞泄完
穀者莫醫勿謂痘收而縱弛勿謂毒去而追違正
氣浸長而未復邪氣方消而未央特犯禁忌兮今
卽生變恣食肥甘兮後必有殃

瘍醫大全

卷三十一

碎金賦

夏

顧氏秘書

疥癩腐潰兮一面黥癩而似鬼癰疽流注兮四肢殘
廢而如疔目腫赤痛兮冷痘入而成翳齒宣黑爛
兮熱毒浸而潰牀雖曰餘毒之爲害抑皆定數之
莫防形容頓改兮令人駭愕調治悔遲兮空自悵
悵謂人不能勝天兮何以立乎醫藥謂醫不如用
巫兮安能格平穹蒼

但逢壯痘之歲多求解毒之方重者必輕兮輕者不

出凶者變吉兮吉者何妨其方則有其效未常與
其先事而輕妄孰若臨時以消詳審歲氣之災祥
兮必解其鬱視形氣之勇怯各平其臟欲避癘氣
傳染兮必先擇地之善欲仗藥力調護兮尤要識
醫之良

惺惺參蘇乃發散之妙劑惺惺散人參通聖誠疫癘
之奇方人參敗毒散熱而驚悸兮導赤瀉青兮用
導赤散防風通聖散熱而驚悸兮導赤瀉青兮用
瀉青丸熱而焦渴兮柴胡葛根作湯小柴胡湯
自利兮黃芩黃芩芍藥湯不便兮清涼四順清腹痛毒
攻兮勻氣散再加枳實腰疼病劇兮敗毒散更入
木香調元可補兮表裏實者勿飲調元承氣可攻

瘍醫大全

卷三十一

碎金賦

夏

顧氏秘書

養正兮黃耆人參甘草解毒兮連翹山豆牛蒡咽喉
苦痛兮甘桔湯中加大力斑疹夾出兮防風散內
去硝黃防風通小便赤澀兮連翹導赤連翹飲大
便滑泄兮豆蔻木香豆蔻丸瘡若乾枯兮四物合
平涼隔四物湯痘如黑陷兮奪命助以水楊

奪命丹東垣涼膈散瘡如黑陷兮奪命助以水楊
水湯浴法赤艷焮腫兮解毒入生黃歸芍黃連解

灰白牛場兮異功用桂枝薯防異功

氣虛而每盛者無價四君枳實無價散四君子湯血虛而毒

盛者無價四物牛蒡湯四物氣血兩虛兮十全無價

十全大補湯便溺俱阻兮八正三黃八正散三黃丸再用膽瀉

之法以瀉毒氣之藏黑陷審其虛實虛者大補而

實者涼膈十全大補湯養場分其急緩急者異攻

而緩者調陽陳氏異攻散調昏悶譫妄兮龍腦膏

孰知其妙虛煩迷亂兮抱龍丸莫及其良

滿面燥痛兮百花調水百花膏遍身潰爛兮敗草鋪牀

瘍醫大全 卷三十一 碎金賦 錢氏秘書

敗草蟬蛻去目中之瘡蟬蛻苦參治身上之淫

瘡苦參虛熱多汗兮調元湯引用浮麥食積常痛

兮脾積丸飲以原湯飢不喜食兮異攻宜入錢氏

散渴欲飲水兮白朮可常白朮敗毒通聖丸天衝

陣之先鋒人參敗毒散調元異攻信乎殿後之大

員調元湯錢氏異攻散

大抵醫要識證藥不執方專行溫補者則宗乎文宗

喜用涼瀉者則師乎仲陽不解其書兮似瞽冥行

於谿徑不察其神兮如矮仰望乎宮墻嘆吾年之

耄兮欲深造而力不足懼斯道之晦兮特發明而
言不章嘔盡心肺兮非欲立異勞費煩舌兮豈敢
恃長幸取正於具眼徒見笑於大方

大全 卷三十一 碎金賦 錢氏秘書

瘍醫大全目錄

卷三十二

痘疹部

論發熱三朝生死訣

論報痘三朝生死訣

論起脹三朝生死訣

論灌漿三朝生死訣

論結靨三朝生死訣

邵公治痘秘訣

瘍醫大全

順險逆三法說

榮衛論

馮氏誠求心法

論時日氣血循行畧

七日五傳

五臟胎毒所發

五善七惡

論痘不可妄汗妄下及宜微汗微下症

論元氣不可形質拘

顧氏秘書

論虛實

禁忌

雜症勿治

忌食毒物

論避穢氣

論痘觸變歌

樣痘辨

論痘疹癍子膿泡先後順逆

賊痘門主論

瘍醫大全

悶痘門主論

痘瘡夾癍門主論

痘瘡發泡門主論

痘症瘡啞作瘡門主論

痘症寒戰咬牙門主論

痘瘡驚搐門主論

痘瘡癢痛門主論

痘瘡倒靨門主論

痘瘡外靨門主論

顧氏秘書

紙然照法

論服藥法並禁解毒寒涼

看水痘法

瘍醫大全

卷三十二 目錄

三 顧氏秘書

瘍醫大全卷三十二

燕湖顧世澄練江氏纂輯

壻錢之栢東陽 全校
男 槐燮用和

痘疹部

自痘疹發熱報痘起脹灌漿結靨諸症秘法皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷三十二 痘疹部

一 顧氏秘書

論發熱三朝生死訣

聶九吾曰發熱之初若身熱和緩或熱或退神清氣爽飲食如常則不必用藥發汗但戒暈禁風調護而已蓋痘有順而不必治者不輕治即所以調治之也

其或增寒壯熱頭疼發熱頭痛欬嗽鼻流清涕者多因於外感不可不發散也當視兒強弱而用藥發汗兒體氣素壯實者加味升麻葛根湯汗之

白葛根升麻赤芍甘草桔梗防風蘇葉小川芎山查淨肉牛蒡子煎服此方即是傷感而非痘疹服之發汗亦

湯醫大全

卷三十一

發熱

十一

顧氏秘書

無體氣素怯弱者用加味參蘇飲汗之

人參蘇葉小川芎山查肉粉葛陳皮製半夏牛蒡子甘草煎服然皆不可出汗太多恐發虛其表後難起脹灌漿也既經發汗而身熱漸

緩兒頗安靜者其痘出必稀少此為順候且勿服藥以待之亦有發熱和緩後痘多者血氣虛也

發汗之後或身熱不退而煩躁者且勿峻攻姑少待之其或煩悶躁渴而妄語者用敗毒和中散清之

連翹陳枳殼防風升麻前胡小川芎麥門冬桔梗蟬蛻牛蒡子荆芥木通甘草紫草茸酒炒黃連大便秘澀者加酒炒大黃一錢二分微利之不秘者勿加入服此覺煩悶少解即止勿服聽其痘出外

則中自安也

或有腹痛腰痛而煩悶者此其毒氣誠重然只當用敗毒和中散主之大便秘則加酒炒大黃微利之聽其痘毒出外則內痛自止

然後看其痘或稠密或紅紫帶黑又議解毒可也切不可純用寒涼以阻遏其毒出之勢立致內攻告

變涼藥要製過則性純而有效世人不知此理多純用寒涼解毒或用硝黃峻下因而速斃而卒不悟者多矣

當時令眾姓出痘時小兒或有發熱稍緩其熱或作

湯醫大全

卷三十一

發熱

十一

顧氏秘書

或止其紅點或未見或微見而未明或是出痘或非出痘正在疑似之間當此之時不如且勿服藥

以待其自定但禁風寒葷調護之而已所謂不輕治正所以深治之者此也有等富貴之家珍愛太過見其如此屢投以清涼解毒之劑不知若是痘

症則其毒氣發動於五臟勃勃欲出外其勢決不可阻遏屢用清涼阻遏其勢即所以迫之內攻而

禍速矣故犯此者多有報痘數日即煩悶驚搐而死此解毒之劑殺之也正如寇在官牆之內不逐

之出外反過其出路圍而攻之官中之人有不遭
殘害者乎然醫曰吾用解毒藥何至於殺人既不
自任其咎病家亦曰彼用解毒藥何至於殺吾人
亦不歸咎於醫殺人於冥冥之中而已不悟也人
不知也噫亦可悲也已予故表而出之以戒世之
愛而反害者語曰久腊者毒必厚痘毒稟於胎元
伏於五臟其輕者無論已其重者深藏久蓄不為
不厚矣一旦觸發於倏然忽然之頃其勢猛銳欲
出斷不可禦是以必藉氣血載毒出外成漿結痂

易醫大全

卷三十一 發熱

顧氏秘書

然後毒散而功成此病機亦化機也此豈若諸瘡
之毒可以驟然而解散者故解之於既出之後是
順其欲散之勢猶為近理解之於未出之先是遏
其猛銳欲出之勢其禍甚速如初决之堤水勢排
山而欲捧土塞之有是理乎奈何自古治痘之家
其卑者固不足道其高者亦未深悟此理每每於
痘瘡發熱之初欲出未出之際輒以解毒為主且
曰服某藥則毒可解而痘必出稀不知痘之稀由
其初受毒之輕耳豈將出之時所能驟解乎致啟

後之庸醫訛以承訛見痘瘡欲出未出之間毒氣
熾盛則多用寒涼以解之或妄下以解之彼自以
為對症之妙劑而不知反致內攻之奇禍至於殺
人而終不悟前覆而後不鑒其禍又無窮也予觀
近時庸醫治痘多犯此失以致童幼數日而死者
甚多則皆茫然委於症惡難救而舉世莫覺其致
死之由殊可矜惻也故不得不再三發明其理以
救將來

發熱之際有偶感風寒飲食停滯而腹痛者用升消

易醫大全

卷三十一 發熱

顧氏秘書

平胃散 小川芎香附蒼朮紫蘇陳皮麥芽砂仁一
炒厚朴查肉白芷炙草藿香姜引煎服
劑其痛立止 然停食作腹痛與毒氣作腹痛其症
不同停食痛者其痛多急疾而啼叫
必甚多在臍以上痛面必青白唇淡手足冷毒氣
痛者痛稍延緩而有作有止多在臍以下或連腰
而痛面或紅色而唇紫手足不冷
此兩者必分辨明白方可用藥

發熱之際有嘔吐者有泄瀉者有吐瀉交作者全要
辨虛實寒熱而用藥 如吐瀉交作而胸腹痛甚
者此感寒而停食也 仍用升消平胃散
主之一服立效 如胃氣弱
而有寒嘔吐不思飲食或食下即吐其吐多順快
而無聲面青白唇淡精神倦怠宜用參砂和胃散

主之人參砂仁半夏白朮白茯苓香如脾氣虛

弱飲食不化而泄瀉者其泄滑利而色帶白宜用

木苓調脾散主之白朮白茯苓白芍神麴炙甘草扁

姜大棗全煎服如有毒氣作吐瀉者其吐必酸刺而有聲

神氣不甚困倦其泄必黃色臭穢雖或吐泄交作

胸腹多不痛此則毒氣由吐泄而發洩所謂吐泄

為順候而不必止者惟此一症耳若虛寒吐泄與

此迥異者亦多矣張潔古等乃一槩謂痘前吐瀉

寒熱何其孟慎勿亂治而多吉並不分虛實

湯醫大全 卷三十一 發熱 木 顧氏秘書

身熱至二三日後痘欲出不出或煩悶驚搐或狂言

譫語切不可驚惶失措惟詳審虛實寒熱而治之

要知此等症皆由毒氣在內不得宣發於外而作

然毒氣不得宣發症有不同不可不辨 如毒氣

壅盛於內不能驟發於外而驚搐狂躁者宜用清

解散以宣之防風荆芥蟬蛻桔梗前胡葛根升麻

查肉小川黃芩黃連紫菀木通牛蒡連翹甘草

芎煎服 如內毒本盛外為風邪所束鬱滯不得

出而驚搐狂躁者宜蘇解散發之清解散內去芩

羌活乘熱服又有血氣虛弱送毒氣不出而驚搐狂躁

者宜用溫中益氣湯托之人參白朮生薑歸身白

風南木香官桂查肉姜棗引服中病即止

凡辨驚狂諸症最宜精詳觀形察色審聲問症又參

之以脈然後可以分別

察痘影紅紫面赤唇紫聲音亮口氣粗手足熱脈洪

數此毒氣壅盛者也或形色多同但聲重鼻塞或

風寒所束者也然此症多在寒涼之月或不謹避風寒者然後有之

察其痘影淡淡在皮下不見紅活唇淡面白或帶青

脈又遲緩雖煩躁驚狂譫語亦是血氣虛而送毒

湯醫大全 卷三十一 發熱 木 顧氏秘書

氣不出者也三者分別用藥當一劑之後痘出而

驚狂定矣昔人謂痘未出之前驚搐為順豈其然乎

幼兒初出痘有發熱二三日全無痘點形影而忽然

驚搐狀與急驚風一樣者此亦痘氣壅盛不能宣

發所致宜用清解散以宣之痘出即驚定矣若醫

者不知是痘而誤作急驚施治或單以寒涼投之

或以驅痰藥峻下之其兒必死何者阻遏其毒使

不得出而內攻也故未痘之兒若遇此等症即當

經疑恐是出痘不可作急驚治

又有發熱稍輕至三四日而痘尚隱隱不出者最要
 詳察不可一槩認為毒輕痘少而漫不加意若發
 熱和緩精神清爽飲食如常出痘少而點數明頭
 粒尖漸漸長大紅活此為毒輕痘少無疑矣若身
 熱雖輕至三四日而倦怠嗜臥不思飲食所出之
 痘影影淡白點粒不明此非痘毒輕少亦是血氣
 虛弱送毒氣不出也急宜用溫中益氣湯以托之
 甚者必連服二三劑痘始出齊其痘必多若因其
 安靜袖手玩視而不急托痘出外延至五六日後
 湯醫大全 卷三十一 發熱 顧氏秘書

毒氣內攻須臾告變不可救療甚足畏也昔人熱
 輕則痘輕之說可盡信乎而六日之前痘未出齊
 勿用溫補之說可盡拘乎
 自有方書治痘以來其時不啻二千年其人不啻數
 百家然皆詳於已出之後略於未出之前深言出
 速而稠密之言不言留中而不出之禍不知已出
 之毒外寇也未出之毒內寇也出速而稠密者外
 攻也留中而不出者內攻也內寇與外寇勢孰急
 內攻與外攻禍孰烈故痘已出而死者多在旬日

之外痘不出而死者多在六日之內徒知禦外寇
 而不知逐內寇自古以來諸賢之為計疎也然其
 失計安在惟在痘未出而急於解毒緩於逐毒也
 不知未出之毒不可解但當汲汲逐之出外也予
 深悟其理而明鑒其失故長顧却慮為未出以前
 諸症設法惟明辨其虛實寒熱以施治實熱者宜
 發其壅滯以逐毒出外虛寒者補助其氣血以逐
 毒出外至於急用寒涼遏毒內攻等弊則諄諄致
 戒不厭再三一以救前哲之失一以開後人之迷
 湯醫大全 卷三十一 發熱 顧氏秘書

雖岐黃復起不易吾言矣
 喜泰順曰初發悠悠身熱氣息和平二便如常面容
 不改睡臥安寧便見痘末順候肌色青而眈白精
 神少而倦怠此證斷作虛看痘出決然不振再見
 便澹嘔乳祇須補益為先若還熱甚而氣粗煩躁
 而不寧謔語妄言均為內熱如加喘滿膨脹便秘
 須知熱壅肌膚燥而毛色焦口氣熱而身燔灼此
 則蓄熱鬱遏內證固重而外邪尤烈腹脹口張而
 喘息啼聲不倦而啞噎五竅不通須防出血點來

隱隱只恐復留吐乳更兼眼倦面青又見搖頭狂
亂不寧發驚先兆是故熱盛者先宜清涼發散不
宜驟用苦寒發散則毒得外出而熱自解苦寒則
毒反冰伏而出愈難故發散之劑輕則如升麻葛
根以疏其熱而煩躁壯盛者非此何以定其標重
則用麻黃以開其壅而喘急腹脹者非此何以救
其危未萌先瀉有熱證莫作虛看無熱證便為虛
論止熱瀉次清涼重加發散治虛瘡以溫補仍用
開提是以內虛慎用寒涼不特助伊作瀉實熱如
湯醫大全 卷三十一 發熱 十一 顧氏秘書
投溫補只恐轉增劇煩安靜而能食勿謂便實而
可下世瀉而煩熱莫言熱證以投涼
又曰初發壯熱毛直皮焦睡臥不寧腮紅睛赤煩躁
熱渴腹脹喘喘大小便秘兼之腰疼膝痛口中臭
氣冲人此毒火鬱遏大為險逆之途醫者當表下
之俟見形之後再看點粒色澤如何
邵氏曰發熱一日遍身只出紅點猶如蠶種摸之並
不扛手者死
發熱時腸肚大痛腰如被杖臨起痘時痘又乾燥腸

肚痛又不能止更兼紅點並不堅硬者三日後死
先賜肚痛後止者
宜用助血藥救之
發熱時身無大熱腹無疼痛三日後緩緩現出紅點
堅硬扛手者吉
發熱時頭面通紅儼如塗胭脂於滿面者五日後死
發熱時聲音忽變並喉腫者 清涼飲消之可生
發熱時用紅紙撚蘸麻油點着照頂心皮肉裏如一
塊紅身上成紅塊者八九日後死
發熱時飲食不喫並大小便不通者二日後死
瘍醫大全 卷三十一 發熱 十二 顧氏秘書
發熱時口出亂語身現紅紫者四日後死
發熱時或從風寒停食起風寒不散驚悸不散食滯
不消結成一塊者一晝夜必死
發熱遍身緩緩外現不時驚搐者必是心經痘出也
用藥治之可愈
發熱時父母不可亂求醫生看聽彼胡言有損性命
發熱時舉家男婦不祥言語均宜禁忌
發熱時舉家上下人等淫慾之事須戒半月以及孝
服尼僧行經婦女不可觸惡好痘變成壞痘爛漿

枯陷

發熱時或吐或瀉而神氣不減者無妨雖有大熱內解但不宜久

久則恐神氣耗散耳

發熱之始聲音遂變者重可用清肺飲甘桔湯加元參治之

出痘之初凡裏有熱當利小便雖不用涼藥然裏熱

必令從小便泄去小便乃導引熱邪之道可用導

赤散治之

若裏有小熱則不可濇利小便只宜內解其毒若滲

利小便恐損其真氣宜用犀角地黃湯解毒散

湯醫大全

卷三十一 發熱

圭

顧氏秘書

凡發熱或頭溫足冷昏悶如癡渴飲者凶

報痘三朝生死訣

聶九吾曰發熱至三四日報痘形如粟米口鼻腮耳

年壽之間先發數點淡紅潤澤者最吉不必服藥

若身熱一二日即出痘先發於天庭司空印堂等

處者或一齊出而稠密者或乾枯而紫黑者或成

片不分顆粒者皆血氣凝滯而毒氣肆行最為可

憂急宜活血養氣而送毒用調元化毒湯生綿黃芪人參

白芍當歸牛蒡子連翹黃芩黃連防風荆芥桔梗

前胡木通紫草茸紅花生地甘草蟬蛻查肉煎服

腹痛者去參著加炒枳殼大便久秘者去參著加

酒炒大黃微利之大便通仍除之若氣血與毒氣

湯醫大全

卷三十一

報痘

圭

顧氏秘書

俱旺而脈洪數者歸芍減三之一去參著此方以參著養氣歸芍紅花生地活血翹麥芩連荆防前枯紫蟬通草解毒加山查疏氣

若痘出不快者其症不同最宜分別

痘色紅紫乾枯或密如蠶種或一片不分顆粒身熱

大便秘而出不快者此毒氣鬱滯血氣不流行也

用調元化毒湯去參著加小川芎清之

痘色淡白飲食減少身涼手足冷小便清大便滑而

出不快者此氣血怯弱不能載毒出外也用溫中

益氣湯托之

有鼻塞聲重咳嗽惡寒而不出不快者風寒蔽之也宜
加減參蘇飲發散之蘇葉人參陳皮小川芎羌活
防風荆芥桔梗白芷甘草冬
加麻黃五分煎帶
熱服但不可出汗

或因邪穢所觸伏陷而不出不快者其痘必癢宜用平

和湯解之

人參當歸桔梗白芍紫蘇黃耆防風白
芷甘草官桂沉香檀香乳香藿香溫服

痘正出時有忽然傳風眼直視牙關緊者此調護不

謹而為風邪所襲也且勿輕用驅風峻藥宜姜附

湯

白附子老生薑各二錢煎濃湯
灌下一二酒盃出微汗即愈

痘正出時身微溫而不熱不寒者為佳或熱輕和緩

湯醫大全

卷三十一

報痘

五

顧氏秘書

亦無妨惟大熱者可憂若出齊發熱尤可憂其痘

必稠密必紅紫必乾枯仍用調元化毒湯去參耆

看痘出齊與否以脚心為驗脚心有痘則出齊矣若

痘稀少者不必拘此以身不熱為出齊

肉食不可太早必待痘出齊而身不熱方可食猪肉

若熱未退而食肉以助火邪必成大患鷄肉首尾

俱不可食惟起脹時怯弱者可食以助行漿壯盛

者亦忌之諸魚皆腥牛羊皆膾痘家最忌並宜禁

絕

報痘時頭而稀少頂尖碍手根窠紅潤前心後心皆
無其色如水珠光澤者上吉

報痘先花後果花如硃砂梅之色是其花也痘如嫩

黃色後成老黃色頂尖小小紅點者是順症也

一槩而論此正
是知花大法也

先花後痘六日紅是其花也

九日成功亦是
此種順痘也

報痘煩躁不寧腰腹痛不止口氣大臭出紫點者死

報痘色白皮薄而光根窠全無紅色或帶一線紅三

五日即長如葉豆大此痘不能貫漿久後是一包

湯醫大全

卷三十一

報痘

五

顧氏秘書

清水擦破即死

不可因好看妄與
藥治切記切記

報痘全然不起頂如湯泡抑或如燈草燒者十日後

瘻塌而死

報痘起紅斑如錦紋者六日死

報痘遍身如蛇皮者死

報痘遍身起黑斑如痣狀肌肉成黑色塊者指日而

死

報痘過煖毒氣收入心經者半日死

報痘切不可過涼涼極則裏不能外發必閉五日死

天時嚴寒或驟風疾雨衣薄被單同室俱受以見
外寒侵襲而報痘時切不可輕投苦寒水疑氣血
不能外發
其害匪淺

報痘不分根窠其色如灰其痘又如魚子之小者又
癢又痛八日死

報痘有父母平日不謹慎遺火毒於嬰兒臨時先一

發其色黃頭如瘡後焦枯頭面身忽然全無如平

日好時者內歸五經串到即死

報痘嬰兒先天本不足後天又不足先後二天大虧

父母又不滋補嬰兒任其疳羸出痘臨時無藥治

湯醫大全

卷三十一

報痘

七

顧氏秘書

矣不在痘之多小俱因氣血
虧損不能載毒外出耳

報痘夾麻痧者萬難收功也

報痘喉痘阻閉者氣不流行飲食不下者三日死

報痘症出五臟之上外面皮肉並無者一刻死此痘

知是肚內五臟上面出痘師曰有此症者小兒無
病忽然肢體發寒又有汗頭頂髮上有水珠其色
紫脹欲破者是也破則無救
以此辨之則知內臟發痘矣

報痘凡小嬰兒平日不可過與酒糖煎炒等味若平

時過與到報痘時邪入合邪正氣微弱就難以勝

肝脾二火腎水縱有些又何能制二經之火此時

相尅晝夜必死為父母者須防之
於未萌不可不知

報痘之時如四圍淡白色如枯澀屬血虛如痘頂白

色俱收暈而頂陷者屬氣虛急宜芎歸肉桂木香

之類加入乳汁和好酒服之

諸痘未出先有大痘一粒如金黃色又一黑痘如黃

荳大者黃者名曰賊痘黑者名曰痘疔一起之時

急用銀簪刺破以口含清滾湯吸出穢血用紫草

膏或油膩脂加血餘灰珍珠末調敷瘡口諸痘自

然起發也

湯醫大全

卷三十一

報痘

七

顧氏秘書

報痘初出之時多有咽喉腫痛聲啞之證乃內毒壅

塞氣道而起可用甘桔湯加元參牛蒡子治之

喜泰順曰夫痘瘡之發也身熱和緩達於外者必輕

悶亂煩躁彰於外者必重勢之所必然也故顏色

貴潤澤而嫌昏暗顆粒貴圓淨而嫌破碎痘貴高

聳而嫌平塌皮貴結實而嫌虛薄粒貴稀疎而嫌

稠密根窠收斂痘分陰陽見點活動更忌浮腫出

要參差血宜歸附耳後頭項心胸少於他處為佳

眉稜兩太陽額前光澤不滯為妙若一發便出盡

者重也痘夾疹者半輕半重也裏外微紅者輕也
外紅裏黑者重也瘡上黑點如鍼孔者勢極也青
乾紫陷煩紅焦黑昏睡汗出腹脹喘啼大小便秘
者困也善治者於其形色而辨之於其輕重而分
之則輕者可以高枕獲安而重者亦可以扶危而
奏績矣

又曰熱緩神清痘大令根窠紅活出參差四肢溫煖
無寒熱乳食如常渴瀉除更兼腰項當心少但宜
調治不須醫

湯醫大全

卷三十一

報痘

末

顧氏秘書

又曰初熱一日即便出稠密嫩紅減飲食泄瀉煩渴
頭面多紅斑夾斑二便塞平塌灰白欠光明疔毒
膿瘡水流濕若此重證須豫防莫待臨期嘆疎失
又曰先看面上諸經絡生死吉凶自靈通左臉肝兮
右臉肺脾爲年壽及人中心屬印堂方廣額腎爲
額骨耳尻風此是陰陽部位屬痘嫌枯滯及鮮紅
假如年壽部先發人中腮脚亦相同淡紅磊落如
朱潤過期七日自然安若越印堂方廣出心家熱
毒解方頤額骨耳目似麻子重極須知命必終

又曰發熱三日氣體如常見點紅活無分部位出來
遂覺粗肥稀疎可必初出如還瑣碎稠密堪知帶
熱敷瘡陸續出來尖圓高聳顏色光潤雖甚密猶
爲可救一齊擁出嫩紅皮薄即稀疎未必全生細
細白頭如沸乾枯定作內攻形緋緋紅點如丹焦
萎定成憔悴勢粗肥光頂點子不肥終白陷頭尖
嫩薄茱萸紋起定空漿肌嫩則皮薄嬌紅黃瘦則
痘成褐色人黑皮粗瘡色必然慘暗是故嬰兒之
肌肉不同未可一例而斷只要綻凸有神不喜煩

湯醫大全

卷三十一

報痘

九

顧氏秘書

紅乾燥色澤神安見點如珠如粟毛焦皮燥敷瘡
或紫或焦是故帶熱齊出既恐密似針頭縱然陸
續出來尤忌形如蠶種如焚如沸如疹如疥根窩
不立脚地俱無犯此數端皆云莫救夾斑如同蚊
咬惡裂甚似蛇傷乃或螺螄雲電差爲可救未熱
先敷數點俗名報痘若還熱久而不敷便作疔看
先發塊而後發瘡塊名癡毒而必生先發瘡而後
發塊塊名鬼腫以難醫避痘避於隱僻眼胞唇口
必多凶悶痘悶於要害舌喉肩背而不吉順不憎

多逆嫌一粒冷疔先見諸痘不敢彰形賊痘若生諸痘不能灌汁辨認若直急宜挑破是以裏證未平痘雖出而毒猶在內透肌發散尤宜解毒為良便調人靜身雖熱而毒已在表補兼發散仍以安表為先設使內外證平此候不須混治再看精神勇怯詳審表補如何

又曰三日四日痘出當齊點至足心勢方安定猶有陸續不出之狀或隱隱於皮膚之間不見不起者古名不快若非壅遏之因必有氣血不振之過是

易醫大全

卷三十一

痘

顧氏秘書

以四日以前痘毒方出身表宜涼四日以後毒已出定身表宜溫涼則氣血和平痘色必然潤澤溫則腠理開通其毒易於成漿至此而身不微熱雖未至於水伏而痘瘡斷乎弗長醫者當審其故而投之以藥或為風寒吹襲或為嘔吐泄瀉或為穢濁觸犯故身不熱而痘不起已成冰硬之形赤色若還不起變敗可期紅潤依然如舊補之可生若見氣急而腹脹黃泉在邇失聲而妻妻陽數無幾俞天池曰痘未見點豫卜其為吉為凶惟於神情

證象而求之脈理而參之然非極美極惡者未見鏡其將來也放點則有形可察有色可詳順險逆三途昭然而視矣蓋形成於氣色根乎血氣正則拘領其毒毒有所拘痘雖密而得定其位不模糊不細碎顆粒分明而脚必周淨毒有所領毒易於達外痘雖密頂綻突而蒼老此氣得其正而形其無間也血正則榮載其毒毒有所載痘雖密而能安其位根有盤助囊厚其藏而饒涇泳毒受其榮痘不燥濇形雖密淡而不自紅而不嬌此血得其

易醫大全

卷三十一

痘

三

顧氏秘書

正色無咎也反此則氣血反受毒制可知有表裏俱虛而出不快者有表裏俱實而毒壅滯者有氣血虛餒皮薄而色白者有毒火熾盛而形惡色惡者千形萬態總由此出

放點於發熱三日之後身涼神爽顆粒分明淡紅蒼老其餘可知為順不必服藥

放點一日裂熱乾炮帶火而論稀密色一紫艷或嫩紅其他可知此梟毒烈火及早圖之不致日後內潰急以攻毒清火帶清肌透發不可以初見

而玩忽之

放點有身不見熱神情困倦偶因四傍痘氣相感而出見痘色淡皮薄此勝理不密肌肉不固不能約束而然也不宜疏散防日後有瘁塌之患以調中湯主之

放點有先因吐瀉困倦頭溫足冷適感時行而出色淡囊薄而滯滯不起者此氣虛不振不能透發宜以升發中即兼治本免日後有倒陷之患

放點有熱如火熾紫艷嫩紅神情躁亂累日不鬆而

湯醫大全

卷三十一

報痘

三

顧氏秘書

不起者急宜攻毒涼血清火疏肌以透之

放點有僅數粒色不甚紅亦不甚白身體溫和神情

清爽不暗者目之為順其囊窠累日不見粗壯痘

色不見光肥浮沉其間名為等伴痘先見數點者

報痘也四五日後身必忽然大熱神即昏憤大隊

鼻毒一時湧出其痘稠密紫黯大都不起明者即

與挑破吮鬆其毒以藥臘脂貼之內服鴉尾膏通

天散活血疏透來勢猖狂法必蕩滌庶可救也

放點有毒火雄烈氣血不能約束一齊湧出火熱如

焚急宜攻毒涼血清火

放點熱如火灼乾燥如烟神情躁亂不論稀密急宜攻毒涼血清肌散火緩則毒即內攻無及矣

放點痘色乾滯紫紅身宜壯熱而反涼者以毒火遏鬱於內非真涼也急宜散火疏肌活血透發俟火透而後清涼不宜遽與清火

放點痘甚稀疎却間蚤斑或間紫黯有若紫背萍萍或犯貫珠神情愁悶及諸般痛楚之類多因惡毒盤踞於內表裏故不相符不可因其稀而致忽也

湯醫大全

卷三十二

報痘

三

顧氏秘書

即當攻其伏毒鬆肌活血

放點有唇裂爛腫甚有焦黑如煤或口中穢氣不堪

或舌起芒刺此毒火犯胃急宜重以清火涼血解

毒重必攻之

放點皮毛刺痛衣衾苦動此毒壅於肺急宜重以攻

毒鬆肌透發失治至行漿時膿根不起必致燥痒

以斃

放點筋抽脈惕叫喊不已此伏毒於肝宜疏肝毒重

必宜攻有咬牙者亦如之

放點謔語狂煩如見鬼祟此毒火迷心宜涼血清火兼之身熱如烙或諸般痛楚者尤宜攻毒

放點骨節煩疼更有腰如被杖此毒在於腎大都不起攻毒刻不容緩

放點拳毛倒豎目胞下有血絲如線絆於其處或腹痛不已身熱如火肢冷如冰此毒伏於脾急宜攻毒清肌透發

放點小水有如醃魚汁如鮮血如紅花膏此毒火下注小腸急宜攻毒涼血鼻衄成流者亦然

瘍醫大全 卷三十一 報痘 毒 顧氏秘書

放點大便欲解或解時疾首蹙額所解如漆如膠有若痰血有若羊糞者此毒注於大腸急宜攻毒因勢而利導之

放點大便暴注如傾有純解清水而躁亂者此火擾大腸宜分利涼大腸五臟伏火伏毒惟下利者稍輕以大腸為傳送之地雖壅滯艱塞終得因勢利導

放點顆粒稀疎囊窠飽滿而色有蒼紅有紫艷有晦色此毒火在於血分也宜解血分之毒清血中之

火

放點有歸附甚厚而囊窠不鬆或平或陷此血至而氣不至也宜寬氣道鬆肌疏透兼他證凶暴者必下之

放點有乳殼圓滿而盤助乾滯此氣至而血不至也宜清管活血兼他證猖狂者必攻之

放點有外感未愈或風或寒或風熱或輕或重有累日不起有起而不快此為表實審其邪而疏解之令毒有出路

瘍醫大全 卷三十一 報痘 毒 顧氏秘書

放點有飲食未消中宮阻塞口中變腐酸臭腹內飽悶痘出不快者是為裏實急宜消化令得宣暢放點各證治之大畧由此而推之其餘可概矣

起脹三朝生死訣

聶九吾日報痘三日後痘已出齊身體溫和精神清爽顆粒尖圓潤澤根脚紅活胸背稀疎飲食如常二便不澀此順候也不必服藥但節飲食避風寒防穢氣

痘出齊後三日內其時日十分緊要其形色症候最宜精察蓋好痘全要膿漿灌滿其次亦要六七分膿漿方可保無虞痘一出齊形色顯然其膿之成與不成足與不足皆可逆觀矣除以上順候自然

瘍醫大全

卷三十一

起脹 顧氏秘書

膿足不必服藥外其有不順者後必無膿或膿少而清急於此三日內觀察形色分別寒熱虛實用藥調治以為灌膿計猶可及也失此不治多有緩不及事而竟不成膿者矣痘之生死判於膿之有無有膿則毒從外散故生無膿則毒留內攻故死是以膿灌滿而痂厚者上也膿未滿而痂薄者次也其下者偏身俱水疱然水疱七八分而間有二三分膿疱者猶可生也其最下者密不成顆串為一片而其皮下有膿漿又或疱密而潰膿水濕漬

猶可望生也惟乾枯無膿漿或薄漿不滿二三分期者必瘻塌而死無生意矣是以出齊而調治灌膿如拯溺救焚不可緩也

氣血流暢則毒化為膿膿之不成其病有二毒氣熾盛則血燥而凝故不能運化而成膿元氣虛弱則血寒而縮亦不能運化而成膿故痘色紅紫乾枯

或帶焦黑者毒熾而血凝者也必不成膿急宜清

毒活血湯 治紫陷一二劑其痘立轉 灌膿時六

紫草茸前胡牛蒡木通生地生白芍連翹桔梗黃連黃芩甘草查肉人參生黃芪煎服煩渴者去參

瘍醫大全

卷三十一

起脹 顧氏秘書

芪加麥冬 痘色淡白疱不尖圓根無紅暈者氣虛

而血縮者也必不成膿急宜用參歸鹿茸湯治白

陷痘不光溜痂虛漿清行膿二三日尚不充滿皆

可服以托痘鹿茸蜜炙嫩綿黃芪歸身炙甘草人

參元眼肉三箇全煎入好酒一杯溫服兒有能飲

酒者濃煎藥汁與酒相半和服亦好 虛弱未甚

者服此一二劑其痘即轉紅活行漿 困倦手足

冷飲食少者加木香丁香官桂寒戰交牙者再加

官桂附子泄瀉者去當歸加麵炒白木酒炒白芍

白茯苓木香丁香官桂另用參朮散止瀉托膿之

劑莫妙與此方以鹿茸補血力峻與草木諸補藥

不同然恐鹿茸未必得故又錄千金內托散備用

人參歸身蜜炙黃芪白芍川芎官桂炙甘草查肉

泄瀉者尤忌之

出齊後當治不治則漿不行而五陷之症作矣五陷者白陷灰陷漆陷黑陷血陷也

痘稠密紅紫者紫陷也甚則轉而為黑陷也

此毒熱熾盛其氣凝其血而陷也仍用清毒活血湯治之其隨症加減法亦如之然當其紫陷時

不過一二劑而痘立起其效如神及至黑陷則受

毒已深雖用此方救治而不活者十嘗八九矣

痘雖稠密其色淡白根無紅暈而頂陷者白陷也甚

湯醫大全 卷三十一 起脹 天 顧氏秘書

則轉而為灰陷也此氣血虛寒不能運化毒氣以

成漿故陷也宜參歸鹿茸湯或千金內托散治之

其隨證加減法亦如之

又有一種痘瘡頭粒通紅成血泡而不成漿者此氣

虛不能統血而血溢妄居氣位也宜用參芪湯大

補其氣人參炙黃芪炙甘草官桂煎血泡失治則

氣愈虛而為血陷然治之亦不外此方血陷與紫

陷相類但血陷雖紅然淡而不紫也紫陷屬熱氣

粗身熱血陷屬虛氣少身涼不可不辨身熱身涼

虛實顯然

何西邱論五陷說理朦朧不明管樞論之尤舛錯可

惡痘出齊二三日後毒熱化為膿漿漸漸充滿起

頂光滑明潤身體溫和飲食能進小便清利大便

二三日一次此順候也不必服藥但節飲食護風

寒避穢氣而已

犯五陷者治已見前其或雖不陷頂而痘不光潤或

泡虛而漿不過三四分或雖有漿而清薄或行膿

至二三日尚不充滿皆難以收靨宜用參歸鹿茸

湯催足其漿無根窠不能灌漿漿不足不能結靨此時看漿為主

湯醫大全 卷三十一 起脹 天 顧氏秘書

邵氏曰痘出三日應當逐漸起脹根窠紅綻頂紅光

潤澤者生

起脹遍身頭皮俱陷下其中有眼如針孔紫黑者死

起脹時如腰腹或痛或止根窠如蚊蟻所咬全無起

色者死

起脹頂陷者可用助血氣藥救之

起脹如渴不止者用退火回生丹救之

起脹痘復陷黑悶躁不寧神昏氣促而死

起脹小便下血頂尖紫色而乾燥全然不起發者死

一第 1015 冊 續修四庫全書 0 反 E 句

起脹大小便俱下血瀉久氣洩痘枯者死

起脹肚腹膨脹飲食不下者死如畧進飲食速以消膨脹藥治之

如痘初出一小點漸大如葉荳飽滿者是起脹之後

灌膿起脹是將灌未灌之時也

如起脹灌漿之時乃痘發大其氣道窄狹以致喉痛

不治自愈

起脹時色如白飲者死若過此症斷不可作虛寒治之乃毒盛氣滯之故耳

起脹時先有六七粒細而成塊於中有一粒扁潤歪

斜者死

湯醫大全 卷三十一 起脹 三 顧氏秘書

起脹時痘上有小孔不黑不白名曰蛙痘此乃腠理

不密而有是痘泄喪元氣未治則凶用保元湯加丁香肉桂其

孔自密而痘自起矣

喜泰順日五六日來血包已成痘當肥大而粗頂宜

放光而白故根紅而頂白者已具行漿之勢若還

赤色過頭雖見嬌紅可愛延綿六日依然空殼虛

花皮薄而光亮如燈內涵是水頂尖而根脚不紅

行漿弗實是以熱毒未解則為紫為黑痘壅不起

則為陷為塌色滯而不榮則為乾為枯為青為灰

形怯而不振則為不快為停漿或有肉先腫脹而

痘反不起者漿則滯而不行面已虛浮而痘反退

伏者毒則遏而不進是以辨明用劑分虛實寒熱

之證表裏輕重之形補瀉溫涼使氣血交會氣充

於上則頂尖圓血附於下則根紅固頂尖根固庶

可全功至於氣血交會之期頭尖皮薄光亮如燈

根無紅暈至後來必成皮薄漿清之患八九日必

然發癢咬牙抓破無膿臨期十二命厄歸泉若見

頂陷不起頭有火刺之形其根必紫而散塌此氣

湯醫大全 卷三十一 起脹 三 顧氏秘書

血為毒火凝滯故不光潤內證察詳必渴欲飲水

謔語妄言咬牙寒戰諸等實熱顯著於外治法當

清涼解毒斟酌下之大用涼心破血之劑連連進

之氣血分明方有活路又有灰白形怯不振之證

書曰灰白是虛務必兼詳外證如面青皖白肌體

瘦弱便澀嘔乳只須補益為先大用參芪木香丁

桂之劑庶可挽回於十一以上諸證俱要分明虛

實寒熱方可投藥不然則魚目可以混珠美石可

以全玉矣

灌漿三朝生死訣

毒九吾曰痘出五六日內至八九日若膿漿不行亦

當用參歸鹿茸湯托之黃芪生用不必加減若膿漿不起則

無生意矣若有四五分膿猶可望生

膿漿不滿鷄冠酒亦可用用三五年以上大雄鷄先

將好酒一杯頓溫次刺鷄冠血滴入和勻仍頓溫

服之服後或燥痛一時無妨其鷄不可殺

又有一種出痘稠密毒火既盛然元氣虛血氣弱津

液枯竭不能制火以致虛火炎蒸或煩或渴或咽

湯醫大全

卷三十一

灌漿

聖

顧氏秘傳

喉痛或鼻時出血難任溫補痘必不能成漿結痂

大凡年長之男女隨感久開血氣既耗者多有此

症最為難治時醫見其多熱候率用清涼如犀角

地黃湯之類不知原因血氣不能勝毒氣而致有

此症今又純用寒涼則血氣愈虧損而毒氣愈肆

行豈復有可生之理是以以此等痘症時醫治之十

無一生殊可哀憐今特製參麥清補湯以調之

參冬白花粉生黃芪前胡牛蒡炙甘草生甘草生

白芍炒白芍當歸紅花大川芎生地枯梗山查肉

元眼肉三個全煎溫服遇此症者此藥須當頻服

起發灌膿時有吐泄者症各不同

吐有兩端吐而酸若有聲吐訖反快者毒火上騰也

梔連二陳湯止之此痘色必紫紅去白陳皮炙甘

姜汁炒梔子煎緩緩服吐止草白茯苓製半夏姜汁炒黃連

即勿服苓半恐燥陽明也吐而有物無聲不酸

不苦吐訖困倦不思飲食者胃氣虛也參砂和胃

散主之痘色必淡

泄有兩端泄而糞黃臭穢小便赤澁者毒氣奔越也

痘色必紅紫加味四苓散主之治熱泄猪苓木通

黃連黃芩牛蒡心一團食前服泄而糞青白滑利者虛寒也痘

湯醫大全

卷三十一

灌漿

聖

顧氏秘傳

色必淡白參朮散主之止瀉良方專治虛寒白朮

苡仁蓮肉神麴查肉肉豆蔻椰子陳皮南木香為

細末每用二錢清米湯調食前溫服兒有不肯服

者入稀粥內如虛滑不止兼用七味豆蔻丸肉豆

和服亦可子砂仁南木香白龍骨赤石脂枯白替麴糊為丸

如菜豆大每用清米飲下三十九或研碎入粥服

此等丸散治痘之家必須預製以防虛滑泄瀉若

起瀉用湯藥多不效有服至異功散而不止者惟

此丸散可以立止惟毒熱作瀉加味四苓散可止

起脹灌膿時或有六七日不大便而塞悶作痛者毒

孟服之如又不通用前藥加酒炒大黃三錢微利
之若仍不通用猪膽汁滴入穀道中即通終不可
用硝黃大下恐下後變他症則危矣

身涼而汗不止者歸芪湯主之當歸身炙黃芪
酸棗仁水煎服

有痰用白附子熟水磨服切不可用二陳湯恐燥陽

明狐陽無陰不能施化也至收醫時用之無妨

邵氏曰灌膿先嫩黃色一日半後老蠟黃色一日半

二便如常飲食照舊者吉

灌漿時乳母可服參藥補之自有好乳哺見以助後

瘍醫大全 卷三十一 灌漿 膏 顧氏秘書

天之元氣無虧也

灌漿時切不可讓其見亂搗亂抓若任其抓破洩其

正氣無救

灌漿時枯焦忽轉紅黃者必是陰陽而來也

灌漿時先黃色甚好後頭焦白面澆薄漸成平頭者

死

灌漿時根粒如清水泡而軟者七日死

灌漿時先漿膿碍手漸破者死

灌漿時先泡如紅黃色者可愛忽然爛破氣敗者死

灌漿時臭膿臭氣薰人又癢又疼者當用清解湯救
之

灌漿時又熱又寒閉塞二便不通目自閉者六日後

死

灌漿時手足二心並前後心各有一粒黑陷無膿又

兼腰亦是一粒黑子者死

灌漿時痛不止者氣滯也保元湯加木香
山查以行滯氣

灌漿時癢塌不止者血盛也血味本鹹淹浙皮肉所

以作癢保元湯倍加黃芪
芍藥以制血氣盛

瘍醫大全 卷三十一 灌漿 膏 顧氏秘書

漿足時作癢不妨

灌膿時成片作爛膿水不乾內宜大補氣血外用敗

草散敷之如頂平脚濶漿水不滿足用十全大補

湯加木香乾薑治之

灌膿時色白如水晶內無膿者宜內托散加丁香乾

薑木香散加糯米人乳酒服歌曰痘色虛明似水
晶莫將此痘看為輕

十一二日妨癢塌
十四五日命須傾

喜泰順日六七日之期順候漿行半足虛瘡方見分

光毒重而壅過者乾枯退縮紫艷黑陷氣盛而起

發者飽滿榮光血虛而不附者根窠不緊不華氣
虛而不會者頂陷不尖而軟頭面行漿而四肢未
起見之切莫慌張腿膝發泡而臉額焦枯見之且
休歡喜既已懼其發哈且又慮其喘急發哈愁其
尖聲喘急恐其腹脹飲食不多或致臟虛而內陷
水漿頻進恐來泄瀉而發顛調理失宜倒戈反掌
熱甚煩渴到此休以實論再加溲泄此時斷作虛
看大用參苓殭蠶木香等劑熱甚煩渴亦有熱瀉
何可槩為虛論但熱毒鬱遏身必壯熱點必紅紫

湯醫大全

卷三十一

灌漿

素

顧氏秘書

結靨三朝生死訣
聶九吾曰痘出八九日膿漿充滿顏色蒼蠟者上也
若無他症勿藥可也然痘出稠密而膿不甚滿者
至此時飲食多減痰涎多盛宜用養胃開痰湯參
白朮白茯苓炙甘草蓮肉陳皮半夏夏山藥枯梗查
肉煎溫服灌膿時忌用木苓半夏恐其燥乾津液
膿漿不行也至此時將靨時可用矣渴者
去半夏加麥冬北五味吐逆如藿香砂仁
結靨其色蠟黃一二日從頭至兩腿皆靨由胸腹至
脚背和額上一齊皆靨落而愈者吉
結靨時寒戰或手足顛掉氣敗者死急用補助氣血
養脾胃藥救之
結靨時遍身皆臭爛如臭餅臭不能近日中無神者
死
結靨時遍身發癢抓破無膿皮卷如荳殼者死
痘疤應落不落者乃火盛也宜柴芩湯加辰砂六一
散用蜜水調服外用滑石末敷之
痘靨不脫不渴寒戰咬牙者屬虛寒也宜木香散作
癢者白芷當歸蟬蛻治之
痘瘡灌漿已滿熱毒已解至收靨時有數日不焦者
只看痘色如初無妨用八珍湯加木通牛
蒡子補脾利水白安

湯醫大全

卷三十二

結靨

素

顧氏秘書

痘後疤痕雪白並無血色者亦急用補助氣血養脾

胃皮幾可治

此時有效逆者俗呼胃氣上越也取真黃土鼻邊聞

之立止

此時漿滿或為寒所薄一時痘俱紫黑如紫葡萄色

必驚恐急以上好肉桂磨湯或煎服立見如舊

有寒戰咬牙者此直氣外發而內虛寒也宜建中湯

大補之人參蜜炙黃芪白朮歸身川芎附子炮薑

服立止甚者不過二服收斂

後寒戰咬牙者同此方調治

湯醫大全

卷三十二

結廕

素 顧氏秘書

或謂寒戰咬牙之症有熱有寒如痘色紅紫齊勇
掀發身熱煩躁作渴大便秘小便赤瀉脈來洪數
者熱也蓋胃熱則咬牙肺熱則寒戰也如痘色淡
白皮薄頂陷身涼惡寒大小便利脈來沉遲者寒
也蓋胃寒則咬牙肺寒則寒戰也此說當矣然此
症屬寒者十九屬熱者十一見於七八日之前猶
間有屬熱者見於七八日之後其
屬熱者寡矣是以不為熱者立方

九日十日間膿漿足而色蒼蠟者必且發熱薰蒸此

回水之候也蓋真陽運化其水自然消燦而收斂

矣此虛寒症也必身涼而手足冷須大補氣血而

助之收結宜用溫表調中湯人參白朮白茯苓官

身炙甘草炮薑防風白芷丁香附子生薑一片同煎溫服

其有發熱蒸蒸而當靨不靨者毒氣未解也退其熱

則痘自收宜用清表散毒湯地骨皮麥冬花粉牛

瀉黃芩木通生

甘草水煎溫服或用砂糖半酒盃百沸湯調作一碗溫服謂之甘

調治吐瀉分別寒熱用藥俱同前

痘靨時有外潰而膿水淋漓者謂之水靨宜用新瓦

為末篩令極細用絹袋包撲患處若乾痂堆積不

落內又罨膿即以瓦粉用鴨蛋調敷立收而落此

滿熱極而潰也

湯醫大全

卷三十二

結廕

素

顧氏秘書

當靨時或忽然腹痛其痛着在中脘此熱毒凝滯瘀

血作痛也用消毒散血湯牛蒡生白芍桃仁大黃

服立止又有中惡忽然腹痛者死

結痂厚實無他症者不必服藥

結痂後發熱或煩渴者當辨其虛實寒熱調治發熱

壯盛胸腹手足頭面俱熱大便秘澀小便赤澀者

餘毒盛也即當解毒大連翹飲主之若解毒遲則

痂落後必發癰毒連翹牛蒡柴胡當歸赤芍防風

梔甘草蟬蛻全煎大便秘者加酒炒大黃

若其發熱稍緩頭熱面不甚熱手心脚心熱手背脚

背不熱精神困倦大小便利者虛熱也宜補中益

氣湯人參黃芪白朮歸身柴胡升麻川芎炙甘草陳皮渴者加麥冬五味子全煎服

痲落還元後或痲落一半後忽然遍身大熱者餘毒

欲發癰也或手足四肢頭項胸背有一二處熱甚

者即癰之所在也此在膿漿不滿而結痲浮薄者

速收束落者多有之急宜用大連翹飲以退其熱

大便秘者加酒炒大黃微利之如熱不退須連服

幾劑必須熱退身涼癰毒方可內消

湯醫大全 卷三十一 結屬 聖 顧氏秘書

此時又有忽然頭項大痛者餘毒上攻也或因多服

熱藥所致若不急治其毒必注於兩目而目病大

作矣宜用大連翹飲去木通車前滑石加升麻桔

梗川芎薄荷服數劑以解上攻之毒庶可免目患

痲落後有精神困倦飲食減少胸腹頭項手足心發

熱而煩渴者內虛也仍用補中益氣湯主之

或有雖不發熱而倦怠嗜卧不思飲食或手足冷或

津液少而渴或癍白不紅血虛危症皆內虛之候也亦

宜補中益氣湯調治不然恐生他症

須知出痘多者收結之時還元之後五臟真氣發洩

已多一身血氣耗散已盡雖或毒氣未淨而其正

氣極虛是以用涼藥解毒必須用酒炒製其體氣

弱者或時加人參芪歸芎之類以救血氣切不可

因其有熱症而遽投以生三黃生梔子生大黃生

石膏之類此時正氣微弱驟用寒涼峻攻多有一

投而輒斃者戒之戒之

治痘之家既謹其始又必謹其終蓋痘之危險不測

者有二一曰毒盛二曰體虛當其未出之時或三

湯醫大全 卷三十一 結屬 聖 顧氏秘書

五日而速斃者皆因毒盛也及其結痲還元之時

或誤投一藥誤進一飲一食而輒斃者皆因體虛

也然毒盛欲出不出者能順其勢以導之出而不

妄施解毒以阻遏拂逆之則未必致斃故前論再

三戒論深為謹始者慮也體虛者能察其虛而補

養之又防其虛而不峻攻之則可保無虞惟玩其

收結還元而忽易不加謹者多致悞事故又深為

謹終者警也

喜泰順曰痘至八九日來已結乾紅痲兆如或少有

不順至此方起膿裏行漿既已飽滿收痧次第而行若遇身重發熱停漿不易收成此則陽亢陰虛引以清涼收斂漿足氣促或因痰壅而然忽而發驚或乃小便秘結再見氣虛而陷塌倒靨而黑焦一則溫補可興一則攻發可活泄瀉安寧大虛少毒肺寒則下膿粘臟毒必然便血挫喉聲啞漿行飽滿塌瘡咬牙便實聲清猶可活靨來痧硬變證終無痲脫如楚須愁餘毒攻發或致太過潰爛難行收拾身熱若見燎人泡發瘡癩可畏空遺痘殼

傷醫大全 卷三十二 結靨 望 顧氏秘書

不成痲則為漿清熱重腹脹喘呼而塌靨皆因毒入內攻出來不貫黃漿和花猶如血赤若能解毒於先此證斷之終美胃氣絕則口唇腫硬肝熱甚則目睛吊白喘急發於瀉後總是氣虛而斷便瀉繼以煩渴豈為實熱而然泄瀉而煩渴不止理必升提好飲而發渴愈甚熱難援救氣虛寒戰痘瘡無恙即溫經漿足難收便實熱蒸須解利進清涼以助結痲用補法而防過益斟酌咸宜庶無後悔又曰痘成痲疔雖云生意已成餘毒變遷尤未得為

可喜是故眼合腹脹猶陷危機虛浮不退尚羅內咎痲或成而反致失聲前疔恐為黑靨腫未消而眼已先開眼開疑是內攻陽氣極而狂叫喘呼腸胃傷而啼哭不寧以致風寒入胃則痲下膿粘熱滲膀胱則小便尿血熱毒逗留不化結痲而壯熱憎寒經絡各遺餘毒日晡而潮熱往來發在午前為實證煩渴腮紅申過方作是陰虛便調減食他如撮唇弄舌心經熱甚何疑扶肚拍胸肺胃毒冲有準身熱燎人便秘恐成暴急驚風悠悠潮熱便

傷醫大全 卷三十二 結靨 望 顧氏秘書

溘久變慢脾風搐驗喪明於眼合羞明辨口疔於唇焦黑實熱下注大腸必有秘結之禍虛寒客留臟內乃成泄瀉之疔喘渴須分虛實驗證切勿差訛欲觀痲落之餘再審癢痕之色桃紅光潤榮衛俱全紫黑乾枯尚留熱毒粉白為氣血之虛週過也應身逝牙疔狀走馬之齒月餘亦見長驅遍體赤斑乃是失於解利渾身青紫恐為感冒風寒餘毒未消不時為癩為癩見風太蚤猶防復發瘡疾此是先賢之秘訣匪人切勿以胡傳

邵公治痘秘訣

一日發熱蘇發散 二日還宜依本方
 三日見苗方解毒 四日紫黑化斑湯
 五日夾疹大出 若有內熱紫葛湯
 六日齊兼看顏色 托裏散法正相當
 若還內中有陷痘 本方加減實為良
 七日正當痘上漿 虛者俱用火補湯
 痘瘡起從八日來 依法調治甚奇哉
 心中活法皆要用 錯過一日枉思量

瘍醫大全 卷三十一 治痘 醫 顧氏秘譜

九日漿兒正當出 祇恐氣血不周全
 四物湯中兼八物 仔細觀察定陰陽
 十日期來專留毒 霍亂之中莫放空
 逐日工夫十一來 四物湯方莫放開
 猶恐咬牙並氣咳 本方數劑兩和諧
 十二漿完未灌頂 作瀉虛寒生戰來
 異功散方宜穩當 依方調理定無差
 痘瘡已滿十二安 心上工夫活法看
 一看疤色定除熱 散毒方中皆要訣

逐日工夫逐日用 虛實加減始為良
 氣虛理氣為之宜 無血生血理之常
 藥不執方因活用 秘傳心法活工夫
 若還不遵諸秘訣 徒勞心力損嬰兒
 凡發熱三日內有痘疹頭面痛甚或作寒熱或發驚
 搐咬牙目白睛紅皮膚緊急或無汗此是痘毒在
 內毒之盛也痘出不輕用六解散以遏其勢
 凡初出無諸毒只吐瀉不止不能飲食宜和中湯
 凡初發熱不能合眼狂躁大渴身體壯熱或舌尖熱

瘍醫大全 卷三十二 治痘 聖 顧氏秘譜

此毒根在內也或血從口出或從二便出此乃心
 經症也宜大解散發之遲一日則難療矣
 或二三日口上稠密或疔毒鬱斑點在肌膚之中欲
 出不出以紫草透肌湯笑逢散治之本日即出如
 不用此二方則變黑陷焦枯而死
 凡痘出七八日未敷漿未滿乃毒之不行也用七重
 湯加穿山甲三片助其成漿如若不腫不痛是毒
 不收宜牙托散收之如過日期則難治矣如有黑
 陷者宜拔疔丹挑破點之

凡痘初發熱因胃氣虛弱因泄瀉發腫而毒陷者以大劑散或四君子湯加肉豆蔻再用實腸散瀉止仍用保元湯加芎歸以助氣血

凡痘三次灌漿頂陷不起須仔細看年壽上可起發如不起發可憂如手上痘不起發是毒在內急用升天散一服如再不起發看天庭上可起發若起發再用半劑升天散可收全功庸醫不識痘色只看週身光亮即為順症殊不知全以年壽天庭耳後漿足為主

瘍醫大全

卷三十一

治痘

藥

顧氏秘書

凡痘九日內如天庭印堂離宮坎宮不起發用升天散治之此藥服過一時不起再進一服若不起發乃斷不能救決死之症

凡痘收後唇口不起皮急用清血退心湯治之如若不治定變走馬牙疳難治之症

凡痘收後鼓薄灰燥氣血盡矣急用大力解毒湯一劑後用四君子湯治之

凡痘後鼓薄剝落挫喉謔語急用獨活消痰飲治之凡痘寒戰咬牙急用蘇香散去其邪氣倘若痘毒攻

心則難治矣

凡痘後不能飲食只能喫湯此乃心經之症也倘毒攻喉須服開關散切勿太過只畧退心經之熱

凡痘後只能飲食又兼瀉者此係陰陽不和內有餘毒須服補陰湯以解其毒

凡痘後久痢不止者此是陰陽有毒脾胃不和可用消積散可以轉愁生笑不然用止痢湯治之

凡痘後有癰者此乃餘毒發於外也急用敗毒散涼其血氣連服三五劑自消

瘍醫大全

卷三十一

治痘

藥

顧氏秘書

凡痘出兩臉或胸膛天堂印堂生疔毒形如蠶種不分顆粒隱在皮膚最難起發或舌上有紫黑色或痘疔或一點或兩點如呂字或三點如品字或四點如器字或五點如梅花或頭面四肢發紫紅大泡渾身痘如大紅此等形狀皆不能治者如初見急宜用換痘方換之如應手後用十解散治之凡痘發熱作嘔腰疼熱一日兩臉點如針苗次日纔起飲食如常此為吉症若以腰痛為凶但兼作嘔為吉一日見標者多也只要起頂黃潤為吉

治表熱裏寒裏熱表寒訣

痘紫乾紅熱盛皮燥二便清澹飲食極少表熱裏寒

此理顯耀能明此理藥無不效

裏熱表寒痘色灰白糞結尿黃咬牙寒戰辨明施治

功超太皇

表裏俱熱狂言煩躁痘子乾紅熱燥又渴二便不通

早下奇方

表裏俱寒痘色灰白陷頂不紅二便清澹頭溫足冷

清漿作癢寒戰咬牙溫補回祥

易醫大全

卷三十二

治痘

果

顧氏秘書

又曰無汗表實有汗表虛諸痛為實諸癢為虛紅則為熱白則為寒熱應足溫白亦寒熱

五經治法

初熱三日在腎經熱盛而不知用疎散或遍身痛或

發黑斑或出之後見此乃臟腑臭爛必死此腎經

之變證也

見點三日在心經若痘焦赤色狂言煩躁如不知用

解毒藥以致紅黑斑生或口臭尿血心經變證也

起壯三日在肺經以前調治不清不知用疎毒藥或

痰喘欬嗽指喉聲啞或大便瀉此肺經變證也

收斂三日在肝經已前失治而不知疎毒涼血散邪

助氣以致少漿黑陷空收或寒戰咬牙或目翳此

肝經變證也

收靨三日在脾經如已前失治或發癰疽牙齒脫落

唇焦眼腫此脾經變症也

故重在先散腎毒二涼心三平肺氣三臟既平然後斂血歸肝調理脾胃自無變生之患也

初熱三朝腎經主事宜發散 前初半夏蘇葉葛根桔梗茯苓陳皮枳殼火盛

加知母黃柏

出痘三朝心經主事宜清解 歸尾紅花桔梗

易醫大全

卷三十二

治痘

果

顧氏秘書

灌漿三朝肺經主事宜溫補 桔梗白芷

收靨三朝肝經主事宜斂血 地黃白芍桔梗

靨畢三朝脾經主事宜固 茯苓白朮苡仁蓮肉山藥

痘初發熱三朝治法 痘疹之發有類傷寒憎寒壯

熱身體疼痛鼻流清涕者宜參蘇飲若壯熱不退

護語昏迷者宜人參羌活散若泄瀉寒熱小便黃

赤口渴用四苓散加木通若乾嘔加薑汁炒黃連

渴加麥門冬若水瀉小便清可用理中湯加附子

或人參官桂可用

痘見點三朝治法 發熱一朝出者凶也發熱二日
出者次之發熱三四日出者皆輕若熱盛急用人
參羌活散加紫草牛蒡子之類服數劑不妨若紫
紅色者可與化痰湯加酒炒黃芩黃連若吐衄者
可與犀角地黃湯熱極者加黃芩若痘夾疹可用
麻黃甘葛湯主之其疹自退若痘夾癩可與升麻
葛根湯多磨犀角水在內服之仍加紫草蟬蛻煎
服若作渴照前分冷熱治之熱用四苓散冷用理
中湯

瘍醫大全 卷三十一 治痘 至 顧氏秘書

灌漿三朝治法 灌漿三朝務須飽滿如根窠色紅
是順紅疔無膿爲逆可用托裏散多加黃芪人參
肉桂發之若內虛泄瀉可與異攻散治之
痘瘡起脹三朝治法 痘瘡起脹俗名大胖三朝肥滿光
澤根窠紅活飲食如常不須服藥必順若頂陷白
色屬氣虛可與四君子湯加黃芪官桂川芎山查
人參茯苓若紫紅色者乃熱毒未解可用四聖湯
加紫草酒炒黃芩黃連紅花之類治熱者四苓散
寒者理中湯送下豆蔻丸

瘍醫大全 卷三十一

痘至十日當磨治法 痘瘡十日當回癢塌寒戰咬
牙泄瀉腹脹者急用異功散治之如飲食不進水
米不化急與丁香陳皮白芷薏附子之類後再解
毒若無膿聲啞氣急卽死不治
以上痘疹治法諄切明白時時參悟要在隨證處
方對症用藥加之眼力觀看以决生死無不驗也
諸經傳於腎經夾熱見標而毒極盛必轉寒戰而死
也

瘍醫大全 卷三十二 治痘 至 顧氏秘書

痘當收不收宜均氣收漿湯再加人參四物湯治之
痘十餘朝不能大便秘者用木通白朮散治之不然變
寒戰而死
痘癢塌無膿七真湯加何首烏麥冬治之
痘後頭痛加川芎白芷升麻在淫羊均氣二湯內服
痘後聲啞用七真湯或升天散淫羊均氣湯內加訶
子桔梗其功甚大
痘後灰白泄瀉用升天散人參訶子白芷薏治之
痘腹脹用淫羊均氣二湯內加茯苓香附神麴治之
痘便青糞用均氣湯加白朮附子川芎治之

四七九

室女出痘行經用四物湯仍加炒赤芍治之

痘出完泄痢發腫乃毒復入內急用托裏千金散治

之如不早治內攻必死

如天庭有地而成者如菘豆潤澤其痘必有風寒暑

為疏散皮膚去其風寒助氣乃土吉之痘也

如天庭痘密而黃色根窠紅者雖有後變灰色須扶

表裏免成陷伏之症

如天庭痘稀者各部甚多不必服藥而自愈也此痘

須要氣血補足如大意因循後必變為癢塌泄瀉

瘍醫大全 卷三十一 治痘 筆 顧氏秘書

而亡宜用麝香丹 小兒天靈蓋一具米泔水洗淨將痘腐香少許塗上戾令黃色研細薑湯

調下

聶九吾曰太元調治痘瘡自發熱之初見點之時即

須思及何如起發何如灌漿何如收結一動用手

藥便要顧首顧尾慎其初以善其後然後次第調

治可保萬全也

痘有夾癩而出者有紅赤點而無頭粒多隨出而隨

沒又有夾丹而出者紅赤成片如雲頭而突起此

皆毒火浮游散漫於皮膚之間也遇此者不必驚

慌但用元參升麻湯一二劑散其游火其癩丹自

退元參升麻升麻防風 有夾癩疹而出者用前方

加牛蒡子荆芥煎溫服 枯梗 令其癩疹先退痘瘡自當起發

痘瘡初見一二日細小四五日漸大頂平至六七日

脚漸潤頂愈平陷其色金白形如豆殼者名曰倒

靨此氣血大虛而漿不行也宜用參歸鹿茸湯加

官桂白朮鹿茸南木香大便溏泄者兼用參朮散

痘瘡者表虛也此為危症宜參芪實表湯蜜炙黃芪 人參官桂

炙甘草防風白芷當歸厚樸 南木香川芎桔梗煎溫服

瘍醫大全 卷三十一 治痘 筆 顧氏秘書

一方外治痘瘡用荆芥穗為末紙裹搗緊糊指紙

頭令不散仍烘乾燈上燃之却於桌上春去灰指

疔瘡痘頭用荆芥火點瘡處一下患者自以為妙

每瘡痘悉點之立止

痘瘡必定屬虛管標乃謂有氣盛血熱而癢者此無

稽謬說也又有謂因血上行氣分血味本鹹醃齧

皮肉作癢似為近理然灰白之痘不惟氣虛而血

虛亦甚矣豈能上行而醃皮肉而癢者急燒蒼朮紅

棗或黃茶葉以碎之甚者內服平和湯

表虛之痘膿漿不滿多有癢者其在幼兒或兒雖長

而神氣困者必不能禁其手搔須令其着舊軟絹
衣袖長者用絹條縛其袖口令不得爪搔為妙如
無絹衣或作軟絹袋裹兒手亦可有一六歲女孩
其痘不正膿漿
淋瀝而養其膏用此法得不搔破其後頭面亦無
疤痕若不用此法而抓破已多縱性命能保惡疤
免也

痘痛為實此為吉兆用生白芍為細末酒調下一錢
五分立止甚者不過二服

痘出齊後有頭目腫脹而痘不脹者此血氣虛弱不
能抱攝毒氣以成膿故其毒散漫妄行肉分也此

湯醫大全 卷三十一 治痘 頤氏秘書

為危候急宜大補氣血以收攝其毒則痘灌膿而

腫脹自消矣參歸大補湯 人參當歸炙黃芪川芎
桔梗查肉炙甘草防風

白芷厚樸紫草茸
南木香煎溫服

痘瘡原多潰爛收結後或手足等處仍作熱臭爛出

膿水不止者生肌散 地骨皮黃連黃柏五倍子
生甘草等分研細乾摻之

即退熱結痂而愈其有仍作熱作膿而不即愈者
內毒未淨也仍用大連翅飲解之

又有餘毒流注各處出清水者綿繭散 出蠟蠟不
拘多少用

生明礬末與在內燒令
汁盡成灰為末乾摻之

痘有鼻中厥血者毒氣上衝於肺也此其毒氣外洩

亦非惡候不必驚惶只用髮灰散 用少壯無病人
亂髮不拘男婦

肥皂洗淨油垢氣又用溫湯洗淨肥皂氣焙乾量
髮多少用新瓦罐一箇將髮填入內令滿淨瓦片
蓋口並和泥封之又全封瓦罐曬乾用炭火圍罐
一半煨一炷香久取出候冷其灰成塊研令極細
每用二錢童便七分酒三分調服立止輕者只用
灰吹鼻亦止此方極妙不惟可用之痘瘡凡諸血
症皆可用或清肺湯治之 花粉麥冬天冬甘草桔梗當
歸生白芍片苓丹皮知母同
煎一二服或入髮
灰一錢調服尤妙切不可峻用寒涼如犀角生地
山梔生三黃之類水伏其血必為大害世人不諳
此理一遇痘瘡有衄血咽喉口舌等症即認為實
熱遽投以寒涼水凝血脉以致痘瘡不得成膿而

湯醫大全 卷三十一 治痘 頤氏秘書

變為壞症者多矣是治未而妨其本味之甚者也

痘有水疱無膿者血少不能化膿也急宜參歸鹿茸

湯峻補其血若膿疱與水疱相半者無大妨害如

十分中有二三分膿疱者猶有生意惟渾身水疱

全無膿漿則危矣然胃氣好而飲食如常者亦可

望生但其毒氣未散須防發癰耳其或見小痘多

則血氣有限不能盡成膿漿而水疱與膿疱相間

此常理也若無他症不必施治

痘有口舌生瘡者或是熱毒或是虛火當以痘色辨

之切不可藥認爲實熱而純用寒涼解毒如痘色

紅紫湧盛者熱毒也用清上飲主之薄荷防風甘

連翹桔梗黃芩黃連花粉麥冬煎溫服如痘色淡白者虛火也用參

麥清肺湯主之外用赴筵散薄荷黃柏各等分入

如口舌生瘡而腫碍者痘靨自愈不必治治不效

痘有咽喉腫痛者首尾俱用利咽解毒湯山豆根麥冬元參桔

梗牛蒡防風甘草煎食外用玉鎖匙搽礪砂朴硝

後良久分二三起緩服姜蚕水片

研細竹管吹之

痘有音啞者當細辨痘色以分順逆若痘色紅者行

湯醫大全 卷三十一 治痘 葉 顧氏秘書

漿而音啞者此氣陰有痘也是以外痘行漿時內

痘亦行漿蜜得氣道而音不亮也待外痘靨則內

痘亦消而音自亮矣此不必別加調治也若痘色

虛陷灰白而音啞者乃血氣虛弱送毒不出毒留

於肺神氣受傷以致失音此則危矣宜參麥清肺

湯主之兼用千金內托散

痘有咽喉瘡水者順逆不同須當分辨若痘灌膿漿

時瘡水者喉中有痘也外痘成漿則內痘亦成漿

壅於會厭門而喘也蓋是門乃飲食所進之處既

有所壅則飲水必溢入氣喉而發瘡若食物有挫

自能嚙下不犯氣道故不瘡也待外痘靨則內自

痊不藥而愈矣然此雖瘡水其喉不甚痛也若痘

未行漿而喉先瘡水此則毒氣壅塞其喉必痛宜

用利咽解毒湯

痘有小便赤澀者宜導赤湯木通赤茯苓冬車前

同煎饑赤茯苓瞿麥篇蓄車前

時服石末二錢甘草四分燈心同煎如不應宜八正湯子山梔木通各八分滑

服熱盛大便亦秘加大黃一錢

湯醫大全 卷三十一 治痘 葉 顧氏秘書

順險逆三法說

痘有順險逆三者治痘之不可不知也順者吉之象也逆者凶之象也險者悔吝之象也吉則不必治治之反凶凶不勞治治則無益至於險者則宜治矣夫痘之不齊由氣血之不均也凡氣血充盛則毒易解而為順矣此不治而自痊者也如氣血損則毒難愈而為逆矣此即雖治而無益者也惟氣血少弱其毒不能頓解而生意不固乎中故必加以補益扶持之功耳所謂得助者昌失助者亡且

瘍醫大全

卷三十一

順險逆

素

顧氏秘書

痘疎而毒少者則邪不勝正其氣自和其勢自順不須服藥若痘密而毒多者則邪正相持其氣乃病其勢乃險此宜抑邪扶正使邪氣亟奪而不為正氣之賊若痘稠密無縫而毒甚者則正不勝邪其氣自乖其勢自逆即雖善治者束手待斃而已故順者勿治險者貴治逆者不治其理於此可見矣

榮衛論

夫榮行脉中衛行脉外內外衛護互為滋養得天地生生之道而無咎矣然榮衛根於元氣元氣固則榮衛於脉之內外陰陽相濟而無間斷自能拘血附位而功成矣若氣在內而外不及則血載毒出為外剝氣在外而內不續則血載毒入為內攻陽道虛陰柱從之陰道虛陽往從之義也是以榮衛者氣血之德也氣血者痘毒之慮也痘毒者氣血之賊也榮衛德盛則力敵其賊而慮舍全榮衛德衰則賊肆其虐而慮舍剝血不能載則場氣不能拘則陷故治痘宜調補氣血血生則內固氣益則外旺榮血得以隨氣之情培根於內衛氣得以順血之情保障於外矣

瘍醫大全

卷三十一

榮衛論

素

顧氏秘書

夫人之一身本乎榮衛衛者陽氣所以開闔橐籥運動樞機者也榮者陰血所以充溢臟腑灌溉肢體者也故氣虛則神機息血虛則化源絕然二者又不可偏勝也夫痘瘡之毒本於五臟之液各隨經絡部位直犯榮衛而出因即氣血從之故觀其裏

來堅厚窠囊充長者氣之足也根芽紅活形色潤澤者血之足也氣血既足則痘易發易靨不須施治以蹈實實之戒如平陷嫩薄者氣之病也乾枯紫黑者血之病也此宜責而治之不可因循以貽後悔然脾胃者氣血之父也心腎者氣血之母也肝肺者氣血之舍也脾納水穀其悍氣注於腎而為氣腎舍於肺而為衛以溫肉分充皮毛肥腠理司開闔也若衛氣虛則蒼不起發其毒乘氣之虛而入於肺肺受之而為陷伏而歸於腎矣抑脾納

傷醫大全

卷三十一

榮衛論

李

顧氏秘書

水穀其精氣注於心而為血心舍於肝而為榮以走九竅注六經朝百脉也若榮血虛則瘡不光澤其毒乘血之虛而入於肝肝受之則為癢塌而歸於心矣故凡治此者氣病治氣血病治血寒則溫之熱則清之虛則補之實則瀉之仍以脾胃為主而不可犯之凡寒涼解毒傷胃瀉心之藥不可輕用也

夫血之榮如水之溶周流灌溉造化潛孚無時止息氣之衛如城之堅籠固充固浩然剛大直養無害

痘之一症始末俱賴乎榮衛淫毒之攻侮非血氣不能以表暴形色之呈見非血氣不能以鼎峻囊廓之佈列非血氣不能以充貫是以氣血不可相離陰陽不可相犯而有偏勝也血陰宜下氣陽宜上理之然也若痘以陰犯陽則氣失其平而有焦紫疔癍之患以陽凌陰則血逐於邪而致灰煤塌陷之危偏勝於陽陽為熱熱傷氣氣虛則為陷為伏偏勝於陰陰為寒寒則氣血凝滯不能生長矣故痘之出最宜氣血調和是以發熱之時色將放

傷醫大全

卷三十一

榮衛論

李

顧氏秘書

標欲其熱緩氣平二便如常兩頰不甚赤六脉不甚洪見點纍纍根肥頂尖色甚紅活者此氣血調和之候也自一日至二三日口無穢氣色澤光亮以手按之堅纍可數日長一日身無癍點根脚不散者是雖有咳嗽噴嚏呵欠驚悸之候亦氣血中和之症也自四日至六日勢如桃蕊着露綻然可愛肌不甚腫飲食如常者此氣血充潤之候也自七日至九日光潤如珠漿充神旺頂足盤紅身雖熱而不煩口雖渴而不瀉者此氣血安祥之候

也自十日至十二日依部結痂蠟色有神二便調
實者此氣血堅凝之候也自十三日至十六日身
明目開痂毒盡脫熱亦漸退者此氣血還元之候
也如宜起脹之日而平陷嫩薄乾枯紫黑吐瀉不
時驚搐煩悶或癡或泡如將充灌之日而漿清頂
陷根脚散漫飲食少進熱極神昏灰白無膿或焦
枯肉腫如將收靨之日而不結痂瀉利頻作聲啞
陽氣促嗽喘不食者此皆氣血為病榮衛不周陰
陽失序致毒內攻而臟腑絕故氣血實關乎痘豈
可忽哉若以諸瘡皆屬心火而以寒涼瀉心為事
內血凝毒滯心為君主何能運一身之血以成功
耶

瘍醫大全

卷三十一 榮衛論

奎

顧氏秘書

馮氏誠求心法

夫脈為臟腑虛實之據氣血強弱之徵水火盛衰之
驗故治百病必憑脈用藥而無誤痘瘡尤為據脈
施治而有功蓋痘瘡之出全賴正氣以充托達表
也蓋瘡之膿全賴氣以煦之血以濡之者不獨氣
血為用更有真水真火以為氣血之根而後煦濡
有力克成氣血之德也痘瘡之收既賴土德化毒
之功復寓歸藏之理故氣血尚為標而水火土乃
其本也且諸瘡腫毒非氣血不和所致即暴受客
熱而成並無傳經定限故可遷延歲月或調和氣
血而形腫內消或解毒清涼而膿血勿潰至於痘
瘡得於生身之始根於腎發於心傳於肝肺脾刻
期定限十四日之中自頭面以漸而下見點起脹
貫漿收靨而後已寧有內消者乎寧有不成膿者
乎故必調理氣血送毒出表充托成膿則毒化於
外還元於中雖有客邪外犯無足慮也是以治痘
者須於七日以前如花之始蕾而發其勢日盛氣
高於上之時則助氣血以令頭面貫漿氣交於中

瘍醫大全

卷三十一

求心法

奎

顧氏秘書

之時則助氣血以令胸背貫漿氣交於下之時則助氣血以令腿足貫漿借毒火之運行而充貫成漿自易矣有此藥力以代氣血充實之用則膿成之後氣血無傷精神如故也若不調補氣血妄行解毒清涼延緩時日一至七日之後如花之氣歛而欲謝矣其氣日衰而降復欲升提氣血以達頭面行漿不亦晚乎况氣血日衰而充貫自難毒火無從消化重則內攻臟腑輕則變生諸症上古嬰兒天稟有餘故古方惟為疎表清裏以圖易出易解蓋因氣血充足不必為之瞻顧也奈近世嬰孩受質穢漓雖名純陽之子孰知陰既不足而稟陽亦虛當此先天之症發露而陰陽兩虧者甚多難出難膿若始也徒從疎表為事則表虛者不能約束任其一湧而出則氣血充貫不周定有難漿難膿之患裏虛者中氣愈餒無力載毒成形昧者重用毒藥迅攻實同無米炊飯之象非轉虛而成內潰即奔潰而如蚕種蛇皮至於膿也而惟圖清解為事則陽虛者冰伏於中陰虛者枯涸於表水火

瘍醫大全

卷三十一 求心法

齋 顧氏秘書

不行無形之化氣血難成有質之功况稟薄之芽兒不耐疾病一經發熱數日元氣已傷於中再加疎表攻托氣血轉轉潛耗痘之少者雖虛而無傷乎性命痘之密者愈損而絕其生機故 張 痛求至理凡過六脉洪大力者則從古法以解肌若六脉沉微無力者則惟温中以托裏使中氣不餒而氣血鼓舞則逐毒而有力起脹灌漿不謀而至也若六脉弦數無力者則惟為壯水之中仍佐補火之藥使虛濡有力而自出也蓋可見痘瘡為標氣血為本書曰識得標只取本治千人無一損此之謂也

瘍醫大全

卷三十一 求心法

齋 顧氏秘書

論時日氣血循行畧

人身血氣晝行陽夜行陰自平旦黃時從中焦注手
 太陰肺經卯時注手陽明大腸經辰時注足陽明
 胃經巳時注足太陰脾經午時注手少陰心經未
 時注手太陽小腸經申時注足太陽膀胱經酉時
 注足少陰腎經戌時注手厥陰心胞經亥時注手
 少陽三焦經子時注足少陽膽經丑時注足厥陰
 肝經血氣循行不可太過不可不及候氣失時災
 青立見且人之手足各有三陰三陽手之三陰從
 臑走至手手之三陽從手走至頭足之三陽從頭
 下走至足足之三陰從足上走入腹共合十二經
 絡更有曰凡子午卯酉日陰交於陽氣不足其痘
 多攻寅申巳亥日陽會於陰血不足其痘多剝辰
 日陽氣行下血留不進其痘補血戌日陰氣行上
 氣留不足其痘補氣丑未日氣血均行其痘多吉
 此以陰陽立說也然人身氣血虛實一覽可知且
 性稟陰陽各異豈可拘一定之時候以概不一之
 性稟哉

傷醫大全

卷三十一

論時日

李

顧氏秘書

七日五傳

一日二日胎毒自腎而發至骨髓之分
 二日三日傳心血脉之分
 三日四日傳脾胃肌肉之分
 四日五日傳至肝筋之分
 五日六日傳肺皮毛之表
 七日八日膿厚漸乾而愈否則為倒靨或成癰腫矣

傷醫大全

卷三十一

七日五

李

顧氏秘書

五臟胎毒所發

肝為水泡其色青小是即俗謂水痘也

肺為膿胞稠濁色白而大是即俗謂痘子也

心為癍而主血其色赤而小次於水泡是即俗謂瘡

子也

脾為疹其色淺黃而次於癍是即俗謂麻子也

傷寒大全

卷三十三

五臟胎

李

顧氏秘書

五善七惡

痘有五善七惡治者宜熟諳也何謂五善一飲食如

常二大小便調三色澤紅活堅實四脉靜身涼手

足和煖五聲音響亮動止安寧五者不能畢具若

得二三自然清吉其七惡者何煩躁悶亂譫妄恍

惚一也嘔哕泄瀉不能飲食二也青乾黑陷癢塌

破爛三也頭面預腫鼻塞目閉唇裂四也寒戰咬

牙聲啞色黯五也喉舌潰爛食入則嘔飲水則噎

六也腹脹喘促四肢逆冷七也七惡之中但見一

傷寒大全

卷三十三

五善七

李

顧氏秘書

症即勢不可為七惡之外復有渾身血泡心腹刺

痛伏陷不出癍疔肉硬便溺皆血尋衣捏空是又

逆下之候矣

論痘不可妄汗妄下及宜微汗微下症

夫汗下二舉乃不得已之所投也如少誤焉貽毒不淺如痘症本稀原無閉塞表熱不快之症而妄用重藥以發之則在後必成斑爛音啞皮薄癢塌或為虛脫者有矣如氣血本和原無便閉熱毒紫黑之症而妄用重藥以下之則在後必成陷伏不起胃弱灰白或變虛羸腹脹者有矣此皆妄汗妄下之過也可不慎歟然痘亦有當微汗微下者言微者恐其過也如表熱布嫩紅嫩未見之先影色不

瘍醫大全

卷三十一

論汗下

三

顧氏秘書

出煩躁眼紅起不活動者則用輕揚之劑微開腠理使痘易出况火鬱則升之以減其盛勢也其劑如升麻葛根湯參蘇飲之類若既見紅點則忌葛根恐疎表太過遂致成虛根窠易塌表實者用亦無妨更有當下之症而不下之則在後必成紫黑而壅毒熱結血枯者又為失下之患矣是以痘未出時脈數洪大小便赤澀大便閉結氣粗腹脹唇燥煩渴者此是熱毒壅盛而不得洩宜微下之使內無阻滯榮衛升降則痘自順矣然痘瘡首尾無

急症慎勿輕為汗下恐元氣一耗則漿無自而成後必為患矣

瘍醫大全

卷三十一

論汗下

三

顧氏秘書

論元氣不可形質拘

世有一等孩童生得體質魁肥似血氣有餘也何患
 痘瘡則囊房空虛不至灌漿成膿八九日而死者
 何歟蓋天元不可以形拘氣血寧堪以質定彼形
 體雖瘦小而元氣充溢則痘自然起灌成功如形
 體魁大而元氣少則痘必至枯澀難長故治痘
 看人元氣不可擬以形體况痘有經絡部位之不
 同多寡大小之不一氣運時令之不齊調攝愛養
 之得失豈可以形體論哉故痘之經絡既正顆粒
 瘍醫大全 卷三十一 論元氣 圭 顧氏秘書

稀朗氣運淑順調攝合宜鼻毒原淺則瘦小而元
 氣實者固不為害即瘦小而元氣弱者亦有生矣
 如痘之經絡錯犯點數密且時令乖逆調理失常
 鼻毒稟盛則肥胖而氣血衰者固罹其厄即肥胖
 而氣血盛者亦有死者矣况瘡黑者骨堅肉硬且
 氣固於中骨勝肉也出痘多吉肥白者骨脆肉鬆
 且氣居於表肉勝骨也出痘多凶蓋腎主骨痘為
 腎毒耳

論虛實

夫不知虛實者不可以為工經曰毋實實毋虛虛故
 虛實之分不可不知也經曰必先度其形之肥瘦
 以調其氣之虛實此以形體別虛實也又曰穀盛
 氣盛穀虛氣虛此以飲食別虛實也又曰脈實血
 實脈虛血虛此以脈別虛實也又曰邪氣盛則實
 精氣奪則虛此以邪正別虛實也大抵實者邪氣
 實虛者正氣虛經曰邪之所湊其正必虛留而不
 去其病則實是也又云五實死者謂邪氣之實也
 瘍醫大全 卷三十一 論虛實 圭 顧氏秘書

五虛死者謂正氣之虛也凡瘡痘之症其人形體
 肥健飲食能多六脈洪實素無疾病大便如常瘡
 色紅潤者此表裏正氣俱實也不須服藥若形體
 羸瘦素多疾病飲食減少六脈微弱吐利頻頻瘡
 色淡嫩者此表裏正氣俱虛也治宜溫補之法如
 瘡勢太盛焮腫痛脹大熱不退煩渴昏睡大小便
 秘者此表裏邪氣俱實也治宜涼瀉之法如瘡本
 稠密焮發紅活而吐利不食者此表實裏虛也宜
 於補湯中而加解毒之藥如瘡色淡白發不透滿

大小便秘浩飲大嚼者此裏實表虛也宜於解利中而加升發之藥如諸痛爲實然瘡痛者邪氣實也當活血以開其鬱至若痛如刀割悶亂大叫者勿治諸癢爲虛然瘡癢者正氣虛也當補氣以燥其濕至若爬搔不定破爛皮脫者勿治灰白者氣虛也參耆之功爲大乾燥者血虛也歸芎之力宜多虛則補之實則瀉之中病則已無過其制此治之權衡也若本實而反補之是皆補之過也如本虛而反瀉之則正氣益損或爲此利或爲厥逆是

瘍醫大全


卷三十一

論虛實

毒

顧氏秘書

謂歟



禁忌

夫稟氣實者夏不畏熱冬不畏寒稟氣怯者天寒陰雨感寒濕而濡瀉天氣炎熱則伏熱而中暘陽盛人耐冬不耐夏陰盛人耐夏不耐冬此又稟受之不同也故自立夏則氣變純陽治藥者用熱遠熱如自立冬則氣合純陰治藥者用寒遠寒兼天氣大寒則蓋覆宜煖勿使毒氣爲寒所觸而不得出如天氣大熱却宜清涼不可重爲蓋覆以致客熱與毒相併乃至煩躁而瘡潰爛至於時有迅雷烈

瘍醫大全

卷三十二

禁忌

毒

顧氏秘書

風之變則宜謹幃帳節蓋覆多燒辟穢之物以避一時不正之氣卧處最要無風又要通明忌暗時常親人看守夜中燈火莫離以便供奉飲食防禦搔破痘瘡及宜切避穢氣否則未出者不出已出者斑爛甚或瘡黑陷伏臭爛惡痛如刀劍悶亂而死并不可少使飢餒寒冷即在乳母皆所當然蓋痘賴穀氣乳哺以助其內避風寒以護其外苟穀氣一虧風寒乘襲爲害殊甚但勿過爲飽煖及啖煎炒五辛否則熱毒熏膈眼目必傷至於既愈則

肌肉重新洗澡固禁太早風寒尤切謹防幸勿視
為淺淡之言實衛生之大要也

傷醫大全

卷三十一

禁忌

美

顧氏秘書

雜症勿治

痘之為症五臟百骸無不振動血氣無不虛弱故有
雜症相仍最宜戒其峻治蓋雜症痊日無定痘瘡
曆日有期若治雜症一寸則痘疹落後一丈雜症
未痊而痘已先斃矣故治痘不可違限而急治其
標緩治其本痘之毒不解則一病不去痘之毒一
解則百病自痊正在乎本上用力固何在乎一標
哉但有緊要雜症則痘症亦為其所害醫者知其
本末輕重以為治之緩急斯得之矣痘症重而雜
症輕則雜症之藥加於痘症藥內是緩則治其本
也雜症重者先逐雜症而後調其痘症是急則治
其標也然用藥固宜其當調理尤善為良若酷暑
而不加以涼嚴冬而不施以煖則潰爛者潰爛水
伏者冰伏矣故凡用劑及諸調理並宜順四時得
天和令其和暖如春使氣血調暢而毒自釋矣至
於久雨陰濕天之氣阨塞人之氣亦阨塞者久晴
早曠天之氣散逸人之氣亦散逸者久雨亢陽久
旱亢陰而氣血自病並須因時制宜也

傷醫大全

卷三十一

雜症

美 顧氏秘書

忌食毒物

凡氣血弱者則自無所乘載其毒而痘難形此氣血之本咎也奈何不悟其理強以蟲魚腥膻牛鼠人牙等毒投之發動中氣嗟乎以毒攻毒理難並勝兼痘又因時氣感觸故固籍此而出矣殊不知毒藥損人元氣元氣既伐則毒氣愈熾氣無逐毒之能血失運毒之力一任毒藥攻擊逼出腠理之間一倍化為數倍一瘡變作十瘡不成顆粒如疥如疹少頃中氣歸復氣血不外旺藥氣如少歇則酷烈之毒其勢轉烈反為內攻矣况初起而欲表暴則雞冠血雞頭雞腦羊頭羊腦可用也質膿而欲補托則嫩羊肉汁油炒公雞可食也常食物中自有最宜之味既有切於病情復有補於血氣何必仗諸惡劣之物哉

傷醫大全

卷三十一

忌食毒

末

顧氏秘書

論避穢氣

凡臟腑之情遇香則榮衛通行遇臭則榮衛凝塞瘡全賴榮衛和暢而成功疑則執毒無由以舒泄矣然污穢惡臭固宜遠避而蘭麝諸香皆能走洩元氣豈其宜哉所不禁者如棗子燒烟之法一可辟其不正之氣更可助其榮衛之情且能開胃進食如被房事經水生產之穢所犯者俱以大棗燒烟解之若防發癢者則以樺皮和大棗燒烟解之若被酒厭者則以葛根茵陳蒿燒烟解之被五辛厭者則以生薑燒烟解之被死屍之氣及癘氣所犯者則以大黃蒼朮燒烟解之為狐臭犬羊厭者則燒楓毬解之若遇風雨時者則燒蒼朮楓毬避之若血少而癩難之痘則忌燒蒼朮蓋恐愈燥而癩愈難耳若遇諸惡氣則通以乳香燒烟薰之以胡荽酒噴之然俗有煮醋薰痘者以醋能活血殊不知酸能收飲大非所宜也總痘瘡一出則臟腑空虛飲食宜節勿飢勿飽衣服宜調勿冷勿熱一有不得災禍立見故諸禁忌悉宜遵戒

傷醫大全

卷三十一

論避穢

末

顧氏秘書

一痘初起宜食笋尖羊頭雞腦雞冠血飯內煮肉
桑虫酒釀至醱膿時宜食鵝尾肉雄雞頭煮爛蓮
肉棗子年深醃肉圓眼油炒雞蛋白粘米粥肉圓
嫩羊肉汁頂大桑虫及至收靨惟宜清涼忌食毒
物

一痘始終忌食落蘇葱蒜韭薤栗子螃蜞鮮魚蜜
餞椒辣時菓圓蛤鮮猪肉一切心腎血髓肝腸酒
糟物件荔枝橘子小米麥麵火酒生冷發熱發氣
性寒等物

瘍醫大全

卷三十一

論避穢

牛

顧氏秘書

一痘時睡中切不可驚動否則易成痘前驚痘後
驚在灌漿時則易於停漿

一痘如值嚴冬房中多置炭火有迴天之能盛夏
多列水冰得清心之喜務須四時和煖如春令氣
血和暢為妙

- 一忌對梳頭
- 一忌大淫不正之氣
- 一忌生人往來
- 一忌僧道尼師巫入房
- 一忌對搔癢
- 一忌過冷過熱
- 一忌對掃地
- 一忌過飢過飽

一忌驚觸

一忌對荒言

一忌飲食歌樂

一忌懷孕婦人

一忌煎炒油鹽魚腥氣

一忌婦人經候氣

一忌腋下狐臭氣

一忌薰抹瘡藥氣

一忌硫黃蚊烟氣

瘍醫大全

卷三十一

論避穢

全

顧氏秘書

一忌諸瘡腥臭氣

一忌遠行勞汗氣

一忌誤燒頭髮氣

一忌葱蒜韭薤氣

一忌諸腥臊氣

一點燈宜用真菜油不可用棉油雜油

一宜遠避油車蓋聞香即變

如悉遵前戒重視謹慎則重症可以變輕如不避
禁忌輕視忽畧則輕症可以變重慎之慎之

治痘觸變歌

痘觸變紫黑倏時喘急至急覓絲瓜皮須要未生筋時取來焙乾

臨用只取皮蒂為末取末蜜調置甘草地黃湯一服痘更起

若加煩讖時犀角磨湯水此是四五朝治觸當如

此期若至七八空殼觸必死漿半犯觸症按驗若

糊指

痘觸變灰白鼻癢忍不得附子綿黃芪愈多功愈益

盤紅根暈欵用此可効力如無根縷透死症可言

必

傷醫大全 卷三十一 觸變歌 全 顧氏秘書

痘正洶洶纔翁漿適為月水正臨場不知潔淨相防

護致使花欄倏變常月月紅花花一種不分枝葉

取煎湯嫩杪煎湯投酒服根枝煎沸浴花郎不消

時刻還歸正任汝經紅觸滿床

麝香一觸癢難當點點花心帶黑焦急把升麻蒼耳

草濃煎慢浴轉明嬌內應托裏扶元氣生地防風

蟬蛻遭歸芍參芪赤豆共紅花及與橋甘交

死屍觸變目翻斜痘必沉潛吐沫加速把芫荽併棗

艾為筒燒辟正露家外取芫荽和薑醴辰砂再入

畧須佳共將煮就時時呷自得康寧掃去邪

客忤相侵似若驚啼號不歇面渾青絲瓜細結含花

者露摘蒸來焙粉成見症蜜調隨與服量兒大小

進多輕此時莫說絲瓜賤一寸絲瓜一寸金

五六朝來漿正行忽為猫犬獸驚停古人特設烏龍

散遠志菖蒲各等分再加蟬蛻酒煮透去却菖蒲

遠志們蟬蛻獨留研細末砂糖調服酒含噙

傷醫大全 卷三十一 觸變歌 全 顧氏秘書

樣痘辨

樣痘者如一家兄弟姊妹數人或兄患痘瘡沿及於弟而身出數顆此非己之正症即所謂樣痘也若痘有先標者此乃自己經位傳出又非可與沿得者同視世作樣痘者謬矣然凡兄標於弟叔標於姪姊標於妹男標於女則其起樣者正而不戾反是則逆樣痘者可不辨耶

傷醫大全

卷三十一

樣痘辨

全

顧氏秘書

論痘疹癩子膿泡先後順逆

凡瘡疹只出一般者縱有並形尤宜詳焉如先發膿泡後發疹者是脾肺相生也順也先疹後癩者是心脾相生也順也先發水泡後發疹者是肝剋脾也逆也先發膿泡後發癩子者是心剋肺也逆也先發膿泡後發水泡少者是金木兩得而難殺也順者多也金來剋木或木乘金衰矣逆也先水泡後發癩子多者是火乘木衰也逆也少者子衰母旺也順也且春膿泡夏黑陷秋癩子冬疹子是皆逆也然瘡疹既出而有逆順者三有時之順逆者春夏陽氣生發瘡疹為順秋冬陽氣伏藏瘡疹為逆有虛實之順逆者如大便閉而能食者是為實為順也如二便利而不能食者是為虛為逆也有出入之順逆者瘡疹出者為順倒靨伏陷者為逆此其畧也然凡先見疹子而夾出如水痘者定是痘症因疹子耗去榮血故白是水痘但與發散疹子繼養榮血則疹散而痘自成不可認為水痘蓋疹子從不夾水痘者耳

傷醫大全

卷三十一

論痘疹

全

顧氏秘書

賊痘門主論

喜泰順曰痘名賊者多發於行樂之際或四五月之期或六七朝之期氣血未曾交會根窠未分陰陽諸痘未曾灌汁或於頭面之上或於腰背之間三五六粒一二三粒獨貫充足黃而出色此賊痘也賊痘一生則諸痘不能貫汁急以銀針挑破毒雖出而毒猶在內透肌發散尤加解毒為良

易醫大全

卷三十二

賊痘

余

顧氏秘書



悶痘門主論

喜泰順曰秘悶之痘多發於腎發熱之時即行腰痛腹疼或兩腿酸麻不能豎立眼閉語口臭冲人飲沸湯而不知熱飲冰水而不知寒神氣昏瞶點如蚊跡紅而帶紫並無暈脚隱隱皮膚至兩三日來遍身發斑或紅或紫重則青藍大班經曰胃爛發斑臟腑虧損何由而出縱然出來形如蠶種如麩如沸如針如芥無論皮肉一樣通紅此名悶痘斷不可醫

易醫大全

卷三十二

悶痘

余

顧氏秘書



痘瘡夾痘門主論

喜泰順曰夫痘者乃血之餘也有點而無頭粒與蚊迹相似又全珠砂迹點一般雜來其中形如錦紋多發於血熱之證書云紅癍易退紫癍難消青藍之癍成大點大塊狀如蛇傷入陰中不可治矣如見細點紅癍即以黃連黃芩犀角石膏等劑頻頻進之方可挽回於十一不燃先紅後紫痘必乾枯倒陷變證頓加無藥可治

湯醫大全

卷三十二 痘瘡

全 顧氏秘書

痘瘡發泡門主論

喜泰順曰夫泡者乃氣之餘也書曰氣過則泡血過則癍多見於起發之期又見於皮薄之證面上痘不起發而遍身間必有水泡大而且亮如湯潑火燒之狀或紫或黑刺破出水有出紫血者見此俱不能生大抵皆屬肝木肝火重則激成水泡藥宜瀉肝行氣之劑泡消痘起人事安寧飲食漸進方得全生若見氣急腹脹黃泉在通失聲妻妻陽數無幾

湯醫大全

卷三十二 發泡

全 顧氏秘書

痘症音啞作瘡門主論

喜泰順曰夫人之聲出於肺清則聲清實則聲啞肺屬金又曰金空則鳴金實則啞喉之竅虛聲出而清惟痘瘡之法或因熱毒壅遏而不得發散或因氣血虛弱而外感風邪則痰塞肺竅不能流通是以音啞又有痘滿咽喉飲水則噎是水能犯氣道故也飲食有渣滓自能入其門故倉水而不噎食也咳嗽則噎噎久則啞必然之理也是故倉水音啞之證必兼瘡色而定吉凶若是啼哭咳嗽音啞

湯醫大全

卷三十二

痘症

顧氏秘書

痘色光明却不妨是證急宜清肺解毒大用牛蒡子元參桔梗甘草麥冬等劑乃是良方

痘症寒戰咬牙門主論

喜泰順曰痘瘡始末何故寒戰咬牙有發熱而見此證者有起發而見此症者有行漿而見此證者有收靨而見此證者名曰寒戰其病寒也無疑矣有先戰而後寒者有先寒而後戰者書云七日以前而有此證者屬熱而凶七日以後而有此證者屬虛而亦有可治吾深歷其境是寒戰咬牙其屬火也多矣凡痘色紅紫乾枯多有是證其寒也熱極生寒其戰也火甚則戰石膏大黃在所宜施凡痘

湯醫大全

卷三十二

咬牙

李

顧氏秘書

灰白不紅綻不起發昏暗頂陷肌體脫白泄瀉眼開其寒也先必毛竅豎立形如雞皮微微而寒微微而戰是寒也乃氣虛則寒是戰也乃血虛則戰大用參耆木香丁桂之藥以助真元七日以前咬牙者乃陽明胃經主之陽明主肌肉其經走上下齒齦邪併陽明故咬牙也又主胃熱宜清之七日以後咬牙者乃陽陷於陰陰分虛則陽入血道而咬牙也主血虛宜補之是咬牙有虛實之分有輕重之論大抵必兼痘色而定其虛實方為的確假

若七日以後根紅不緊而且紫艷頂陷火刺口唇破裂渴欲飲水煩躁悶亂而見此症者亦為七日後便屬虛乎是以咬牙又當聞其聲其聲蹇蹇如咬索者如嚼莖者屬熱其聲蠅蠅如哺綿者屬虛大抵聲響而硬熱無疑矣聲低而軟虛無惑焉總之見證參詳論痘施治再無失矣

易醫大全

卷三十二

咬牙

全

顧氏秘書

痘瘡驚搐門主論

喜泰順曰諸風掉眩皆屬肝木惟痘瘡之發毒犯於肝毒竅而出故先驚搐手足厥冷目睛上竄如風之證醫者當辨痘疹驚搐不可遽投涼心之劑苟不審而槩以驚藥治之則心寒而肌斂毒氣內陷痘何由而出也然痘先驚者多吉痘後驚者多凶先驚則毒得外洩而熱自解後驚則氣血虛而毒反凝滯恐後日之漿膿不附故內醫者當謹辨之

易醫大全

卷三十二

驚搐

全

顧氏秘書

痘瘡痒痛門主論

喜泰順曰諸痛為實諸痒為虛痛為佳兆痒為惡徵
經曰實者邪氣實也虛者正氣虛也又瘡症為火
火盛則痛火微則痒如痘瘡結實高聳而作痒者
是火溢於皮膚之間游移往來故爾作痒法宜清
涼解毒外以茵陳芫荽等藥薰之其痒自止若七
八日之期皮薄漿清而有是證者是血不能附氣
化漿所以作痒其痒萬不能禁以致頭面抓破如
有鮮血淋漓急以敗草散牛糞灰敷之內用清涼
攻毒之劑以待變臭發毒雖然惡候尚在可醫若
是抓破並無膿血痘必乾枯音啞作瘡種種變證
勢必頻加臨期十日命厄歸泉

瘍醫大全

卷三十一

痒痛

毒

顧氏秘書

痘瘡倒靨門主論

喜泰順曰痘至八九日來漿行半足根暈未收忽而
一齊紫黑古人名為倒靨請君莫認結痂攻發若
得其宜此證猶堪復活傍生血點再行漿危證還
當又治若見氣急腹脹煩躁喘渴此毒氣內攻重
歸臟腑總為惡候定是難醫

瘍醫大全

卷三十一

倒靨

毒

顧氏秘書

痘瘡外醫門主論

喜泰順曰痘瘡順證點粒稀疎根集紅活至八九日
來漿行滿足色漸蠟黃根暈盡化從人中上下醫
至兩腮此正收正醫若遇險證及五六日氣來化
血成漿頭面必腫眼鼻封塞如蒸籠透物氣不走
洩而醇酸也八九日來必串成一塊皮薄易破膿
血齊流急以松花粉搽之內用清涼攻毒之劑至
十朝前後必潰爛變臭雖為惡候尚醫可醫只要
聲音響亮飲食如常臭而不惡外醫之蓋如鷄糞
堆此外醫之正候也如膿漿潰爛濕流不乾臭如
尸惡飲食不進此為爛痘聲音短促或失聲或音
啞眼開腫消不特無蓋形如剝老此外醫之死候
也大抵抓破之時有膿血淋漓者為外醫之候庶
幾可治純是清水不流膿血不能結痂者實為難

醫

湯醫大全

卷三十二

外醫

七

顧氏秘書

紙燃照法

用紙燃飽蘸蘇油卽用烘乾臨時欲用再蘸其油於
燈上往來畧炙令油無泡方點照之則免熱油爆
傷皮肉其照時須將門窗盡閉至令黑暗欲視其
左火移於右欲視其右火移於左上下同此法照
之則痘之多少色之如何預知矣痲疹則浮於皮
外而肉內無根痘瘡則肉內有根而極深者也故
有以手摸之者亦以其痘有根核而驗之耳若以
目光觀之則不見矣故不若火之為可預知也凡
以火照而兒驚搐大叫者亦痘候也因心火太盛
而與外火相搏耳治宜微利以導心火否則驚搐
踵作矣

湯醫大全

卷三十二

紙燃照

七

顧氏秘書

論服藥法並禁解毒寒涼

小兒多不肯服藥強之亦不能多進然病勢猖獗非藥力不能驅逐痘屬虛寒者尚可延綿數日屬實熱者火性急速藥不可緩故惟宜重劑濃煎止用頭服則藥功方能勝病至於乳母亦宜服大劑使乳汁亦有藥力但解毒寒涼之藥不可痘初輕服蓋痘本於胎元伏於腎臟感觸而出毒莫可禦也非若諸瘡之出初發可以解毒內消而愈已成可用解毒逐散而愈蓋臟毒屬陰而最深必藉氣血送出於皮膚運化於窠囊收結成痂還元而後已寧有內消者乎寧有不成膿者乎故諸瘡可以解毒為主而痘瘡必賴氣血以送毒為主也况解毒之藥多傷胃氣多損氣血且毒有不必解者有不可解者如稟賦強旺氣血充足胃強能食自能運毒以成功此不必解毒者也如稟賦怯弱氣血衰微胃虛少食則雖調補氣血尙虞不能送毒成功此不可解毒者也至於解毒之方若投之於將出之際則寒涼抑遏毒滯於中非徒無益而反害之

瘍醫大全

卷三十一

服藥法

七

顧氏秘書

惟結痂之後有餘不盡之毒假藥力以解散之免其流滯為癰則可耳

瘍醫大全

卷三十一

服藥法

七

顧氏秘書

看水痘法

水花兒即是水痘遍身扛手其色白而淡且無紅是
水花兒莫作正痘看

萬密大全

卷三十三

水痘法

一

顧氏秘書

萬密大全目錄

卷三十三

痘疹部

痘疹門主方

痘疔門主論 附方

痘癰門主論 附方

痘疔門主論 附方

痘風瘡門主論 附方

痘瘰癧門主論

萬密大全

顧氏秘書

痘後癍跡不退門主論

痘後瘡收不乾門主論

出痘後細瘡如疥難愈論

精炮製用藥法

四方疹名各別

羅田萬密齋碎金賦

聶氏痧疹論 瘰疹同附方

燕湖顧世澄練江氏纂輯

瑄錢之栢東
男 櫛燮用和 全校

痘疹部

白痘疹主治諸方以及痘疔痘癰皆彙於此部中以
便檢閱參治

痘疹門主方

大熱見痘大小便紅血熱甚者 即公一百三方

當歸 白芍 牛蒡子

升麻 黃連 熟地

枳殼 山梔 地骨皮

木通

水煎服

痘上面收完足下收遲聲音不曉

天花粉 桔梗 甘草

柯子肉 防風 陳皮

白茯苓 葛根 石膏

燈心引煎

痘滿面連肉一片紅者

升麻 少許 陳皮 紫草

紅花 枳殼 甘草

黃連 炒 黃芩 炒 生地

木通 蘇木

水煎服

痘頂陷稠密者

人參 桔梗 川芎

白茯苓 白朮 土炒 甘草

白芷 生黃芪 紫草

防風 穿山甲 炮

水煎服

痘內中有大紫泡者

紅花 淫羊藿 白朮

白羊糞 甘草

水煎服

痘口鼻中並出蛔虫者

防風

當歸

黃連

直僵蠶

木通

熟地

牡蠣

牡丹皮

水煎服

痘飲食挫喉痰涎盛者

桔梗

熟地

呀風

陳皮

川貝母

麥門冬

易醫大全

卷三十三

痘疹方

三

劉氏秘傳

瓜瓞仁

厚朴

北五味

杏仁

牛蒡子

天花粉

水煎服

外用山豆根磨水漱口

痘灰白全無血色者

人參

白朮

當歸

甘草

黃芪

白芍

熟地

肉桂

川芎

穿山甲炮

水酒各半煎服

痘泄瀉不止者

人參

白朮

廣木香

磨汁

訶子肉

麥門冬

肉荳蔻

麩包煨
去油

烏梅

棗引煎加人牙煨乳酒調服

痘胸腹脹悶亂氣促者

赤茯苓

川芎

當歸

熟地

山查肉

麥門冬

檳榔

枳實

木通

易醫大全

卷三十三

痘疹方

劉氏秘傳

枳殼

木通

大腹皮

澤瀉

水煎服

痘初出血點皮內白者

生地

黃連炒

枳殼

牡丹皮

陳皮

紫草

木通

川芎

甘草

棗引煎半熟時加當歸

痘黑陷成斑摸不碍手者

升麻	紫草	陳皮
牛蒡子	熟地	枳殼
紅花	穿山甲	黃荳 <small>四十粒</small>
生地		
糯米引煎服		
痘白首至尾熱不除者		
地膚子	連翹	當歸
柴胡	地骨皮	甘草
牛蒡子	柴胡	前胡
湯醫大全 卷三十三 痘疹方 顧氏秘書		
防風	紫草	黃芩
石膏		
水煎服		
痘遍身作癩者		
人參	川芎	生地
何首烏	白芍	潘羊鬚
黃芪	穿山甲	白茯苓
薑棗引煎服 如不止宜爆燈火		
痘後泄瀉不止者		

人參	白茯苓	白朮
廣木香	川芎	白荳蔻
肉桂	訶子肉	山藥
香附		
薑棗引煎服		
痘狂亂語言不正者		
人參	遠志肉	茯神
天門冬	山查	石菖蒲
燈心十四根水煎服 若還不愈用滑石辰砂各三分水片五厘燈心湯服		
湯醫大全 卷三十三 痘疹方 顧氏秘書		
痘將收靨遍身黑陷膿臭濕爛者		
防風	羌活	桔梗
荆芥	柴胡	黃柏
木通	甘草	
水煎服		
痘如十二三朝不能靨者		
人參	何首烏	黃芪 <small>各一錢</small>
水煎入象牙 <small>炒黃色一錢研</small> 調服		
痘初起吐瀉不止者		

陳皮 半夏 直僵蠶
山查 白茯苓 黃荳 七粒
薑棗引煎服

痘初出大熱稠密半隱肌膚者

牛蒡子 防風 升麻

白朮 白芍

水煎服

又方

荷葉 絲瓜襖 麻黃

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 七 顧氏秘書

肉桂 甘草 紫草

蟬蛻

水煎服

神燈照

解痘厥轉凶為吉歌 痘不起兮怎奈何我有神

主火照天庭太陽窩一日三次周流照其痘中
間定發窠此法上仙留下世醫家少會照沉疴

紫草 上上 白芷 上 沉香 中

北細辛 中 三奈 中 乳香 中

檀香 中 肉桂 下

共乳細末將藥捲入紙條內用麻油黃蠟各五錢熬化將藥擦拖之燃照痘兒面部周身一日數照以解其厥

異功散

治痘風寒滋氣血和陰陽救表裏

人參 廣木香 陳皮

肉豆蔻 官桂 白茯苓

當歸 熟附子 厚朴

母丁香 半夏 白朮

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 八 顧氏秘書

薑棗引煎服 若選用之不常 只消一服即亡

小異功散

治痘喘嗽

人參 麥門冬 杏仁

北五味 陳皮 白朮

水煎服

溫中湯

治痘三朝身涼不渴口氣冷痘淡白一二便清利

陳皮 厚朴 人參

白茯苓 黃芪 官桂

半夏 當歸 川芎

熟地

薑引煎服 泄瀉加白朮澤瀉再不止加訶子

肉肉薑蔻能保脾胃助氣血數劑必灌稠漿

托裏湯

人參 黃芪 當歸

防風 青皮 生地

水煎服 痘不起速服莫待痘苗枯

傷醫大全 卷三十三 痘疹方 九 顧氏秘書

內托均氣散 十二仙方

治痘初熱

蘇葉 八分 乾葛 七分 廣木香 六分

黃芪 川芎 甘草 各五分

桔梗 四分 白芍 紫草 各三分

筍七片引煎服

蘇發散

治小兒感冒傷寒傷風咳嗽流涕

蘇葉 陳皮 蒼朮 各一錢

甘草 各七分 厚朴 枳殼 各三分

葱引煎服

灌膿起頂湯

治痘不起發

人參 七分 黃芪 二錢 白芷

甘枸杞 各一錢 滋羊養 川芎

甘草 各五分 黃芪 七粒

薑棗引煎服

結腐散 傷醫大全 卷三十三 痘疹方 十 顧氏秘書

治痘不收作癢

白芷 一錢 何首烏 七分 川芎

甘草 各五分 木通 蟬蛻 各三分

白朮 荷葉 各二分

水煎服

堅腸湯

治痘泄瀉

黃芪 白朮 肉苳蔻 各一錢

山查肉 七分 川芎 五分 升麻 三分

棗引煎服

鎮胃散

治痘嘔吐不止

藿香 砂仁 白朮

薑棗糯米七粒引煎服

利咽散

治痘咽喉疼痛難進飲食

山豆根一錢 桔梗七分 甘草一分

元參一分 萊菔十粒

易醫大全

卷三十三 痘疹方

十一 顧氏秘書

水煎服

通腸湯

治痘大小便秘結如神

黑芝蔴三錢 大黃 滑石

枳殼各一錢 當歸五分 萊菔七粒

水煎服 加牛膝一錢引經易下

滑利散

治痘小便不通

木通三分 赤茯苓七分 澤瀉五錢

燈心二十根

水煎服

定疼散

治痘肚疼或冷氣

神麩 山查 當歸

熟附子 良薑 甘草

棗引煎服

斬關散

治痘鼻血不止

易醫大全

卷三十三 痘疹方

十二 顧氏秘書

生地 牡丹皮 黃芩各五分

茅根 升麻各三錢 藕節一錢

萊菔五十粒引煎服

奪命丹

治小兒風搐痰氣急慢二驚如神

西牛黃 青黛 甘草各一錢

鬱金 明天麻 白僵蠶

白附子 全蝎各五分 茯神

陳膽星各二錢 鈎藤鈎

桔梗 硃砂各五分

研細蜜丸芡實大金箔三十張為衣每服一九

金銀花煎湯調服

神驗稀痘丹

預服可免痘瘡

絲瓜蒂燒存性 西牛黃 一錢 辰砂 七分

蟬酥乳化 二錢

共為細末一歲一分砂糖湯調服

大解散

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 十一 顧氏秘書

黃芪 羌活各二錢 赤芍藥

桔梗各七分 白芷 黃連

甘草各五分 地膚子 川芎各三分

明天麻 二分

水煎服

紫草透肌湯

紫草 二錢 防風 荆芥

薄荷 山查肉 梔子

甘草各等分

水煎服

笑逢散

山梔仁 蟬蛻各等分

水煎服

七貞湯

治痘二三日可服

升麻 六錢 川芎 五分 甘草 三錢

薄荷 八分 淫羊藿 一錢 穿山甲土炒 二片

水煎服

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 十二 顧氏秘書

牙托散

人牙人乳製 麝香 二分

研細生酒調服

拔疔丹

治痘疔

雄黃 硃砂 白芷各等分

乳細油臘脂調用銀針挑破搽之

實腸湯

治痘泄瀉

白朮土砂一錢 赤石脂五分 甘草四分

龍骨三分 枯礬二分

水煎服

潘羊補漿湯

治痘不灌漿

潘羊藿 人參 白朮土炒

穿山甲炮各二錢 防風 生地

甘草 川當歸 黃蘗炒各三錢

官桂 廣木香 川芎

湯醫大全 卷三十三 痘疹方 五 顧氏秘書

白芷 陳皮各一錢 白茯苓

黃芪各五分 糯米五錢

竹筍煎汁當水煎不拘時服

益氣收漿湯

治痘不收漿

何首烏 白芍 黃芪

桔梗各二錢 人參七分 白朮三錢

陳皮 砂仁 甘草各一錢

山查肉一錢二分

米泔水煎服

升天散

杏仁 防風 甘草

麻黃 梔子 乾葛

乾姜各五分

水煎服

升麻劑

升麻 肉桂 猪苓

澤瀉 白茯苓 黃芪

湯醫大全 卷三十三 痘疹方 六 顧氏秘書

甘草各等分 烏梅一個

水煎服

清血退心湯

麻黃 山梔 官桂

薑黃 蒲黃 木通

連翹 甘草各等分

水煎服

獨活消痰飲

半夏 天南星 乾葛

羌活 木通 甘草各等分

水煎服

解毒散

黃芩 梔子 連翹

烏梅 蘇薄荷 甘草各等分

水煎服

開關散

直殭蠶炒去絲一錢 量加陳膽麝香各二分

煎服

湯醫大全 卷三十三 痘疹方 七 顧氏秘書

陰陽湯

黃芪 白茯苓 白朮

山查肉 甘草 木通

砂仁 杏仁各等分

水煎服

化積止痢湯

神麴 廣木香 檳榔

黃連 砂仁 麥芽

水煎服

敗毒清涼飲

防風 白芍 白朮

羌活 黃芪 獨活

杏仁 甘草 梔子各等分

水煎服

水楊柳湯

水楊柳 春冬用根秋夏用枝葉五觔

水一大鍋煎五六沸先用數杓於木盆內以手

探試不可太熱慢慢添湯洗之拭乾然後以神

湯醫大全 卷三十三 痘疹方 七 顧氏秘書

燈照其週身如陷塌處有暈脚起系便是漿影

也後必滿足倘若不滿又如前法洗之如虛弱

者只洗頭面四肢若洗照不起發者則津液枯

槁難治矣

四味升葛湯

治痘三日前後可用

升麻 葛根 芍藥

甘草

水煎服

和勸湯

升麻 葛根 芍藥

甘草 人參 川芎

羌活 防風 各等分

水煎服

四配清中飲

治痘七日前可用

當歸 芍藥 甘草

大黃

湯醫大全

卷三十三

痘疹方

十九

顧氏秘書

水煎服

解毒三賢飲

治痘十四日前後用

鼠粘子 荆芥 甘草

水煎服

連翹飲

治痘十四朝用

連翹 荆芥 芍藥

鼠粘子 當歸 木通

防風 滑石 瞿麥

車前子 蟬蛻 梔子

黃芩 柴胡 甘草 各等分

水煎服

參蘇飲

人參 紫蘇葉 半夏

陳皮 甘草 前胡

桔梗 枳殼 乾葛 各等分

水煎服

湯醫大全

卷三十三

痘疹方

二十

顧氏秘書

四苓湯

止水瀉

猪苓 白茯苓 澤瀉

白米

水煎服

白螺散

治痘不收靨

古土墻上白螺螄殼洗淨煨乳細末乾摻

金華散

治痘後肥瘡疔瘡疥癬能涼肌解毒收水

黃丹 黃栢 黃芪

黃連 大黃 輕粉

麝香

共乳細濕瘡乾摻燥瘡熬猪油調搽

加味平胃散

治小兒吐乳吐食泄瀉傷寒等症

蒼朮 八分 芍藥 一錢 白朮

神麴 陳皮 厚朴 各五分

湯醫大全 卷三十三 痘疹方 主 顧氏秘書

白芷 甘草 各三分

右為細末人參湯調服

吐瀉相兼用木香湯下 飲食不思山查湯下

煩躁口渴麥冬湯下 二便不利木通湯下

四仙湯

此為治痘之主宰而君臣佐使出入加減全在

慧心

潘羊藿 陳皮 天門冬

甘草

薑三片棗三枚水一鍾煎七分服

痘身熱見紅氣促加天花粉二分白茯苓三分

痘身熱大小便不利加木通燈草

痘身熱暴躁心神不安加棗仁黃芩天冬各三錢

痘前不紅潤加人參白朮當歸木香地黃

痘前紅潤加人參白朮當歸木香地黃

痘後食控嘔加桔梗貝母殭蠶麝香

痘口裂加生地天門冬枯芩白茯苓葛根

痘初熱驚風加蠶蠶天麻烏梅硃砂

痘頂陷加紫草蟬蛻去頭足糯米四十九粒

痘頭足冷加附子乾薑各三分

痘鼻流清涕加蘇葉桔梗各一錢

痘泄瀉加訶子肉桂麥冬

痘痰壅嘔吐加藿香生薑各五分杏仁三分

痘汗出不乾加黃芪一錢浮小麥四十粒

痘初出遍身黑色者加丁香香一粒陳皮白朮砂仁

痘前口相連者加麥冬梔子酒炒用

痘大小便結加木通燈心車前子

痘牙黑加黃連香白芷

痘後失音加訶子皮桔梗麥冬五味子

痘後夜啼加麥冬青皮生地茯神硃砂

痘後中風不語加天南星天麻辰砂春秋加麥冬

痘後腰痛加地膚子破故紙量日期加此二味

和
中散
婦虫燒灰共研細末和服
字婦痘加苧根砂仁各五分

白木 陳皮各一錢 人參

藿香 白茯苓 甘草

砂仁各五分 半夏八分

薑引煎服

托裏千金散

人參 當歸各一錢 廣木香

厚朴 甘草

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 五 顧氏秘書

香附各五分 川芎 白芍藥各七分

白芷八分 桔梗四分 糯米九粒

雞汁一鍾笋二兩煎服

初發熱痘未出者

升麻 紫草 紫蘇

白芍酒炒 牛蒡子 甘草

山查

芎白一根煎服如表之仍不出其痘勢重可加

敗毒散一歲用一分

稀痘湯

看耳後紅筋枝葉者乃兩經齊發未出者

升麻 葛根 芍藥

甘草各等分

水煎服 如一經發者加牛蒡子

單胎法

妊婦出痘先護其胎後再治痘

人參 白木 當歸

枳殼 赤茯苓 甘草

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 五 顧氏秘書

陳皮 防風 白芍

條芩 荆芥 桔梗

紫草 赤芍 白芷

柴胡 葛根 阿膠

砂仁 懷山藥 川芎

糯米各等分 乾柿蒂七個 野苧根七寸

甜瓜蒂一個

金器一件為引入罐內以薄荷葉封口煎空心

服 如大熱加鬱金

換痘法

服之壞痘換為好痘即痘之狼狽時亦可服

穿山甲

先以紫草汁煮過再用甘草汁煮過焙乾研細每用一兩

綠萼梅

淨錢六錢

西牛黃

麝

香各分許

共乳細末磁瓶密貯年長者每服八九分小者

服五六分俱用菜豆赤豆黑豆芎藭煎湯服

救痘不灌漿一服即灌

粉甘草不拘多少切片入青竹筒內上留一孔以

竹針塞住外以荷葉油紙包紮數層冬至日放入

湯醫大全

卷三十三

痘疹方

五

顧氏秘書

糞坑內至春取起陰乾掛風頭每用三錢研細以

參水湯調下即發臭汗一身其漿即灌

換痘法

大田螺三兩去殼取肉入麝香三分半芩子九分

搗爛用帛包裹數層放在痘兒臍上以熨斗熨臍

待其藥紙俱乾為度大便出如黑糖之狀後用湯

藥一二服可也

湯藥方 乾葛白芍牛蒡子 槐花 檳榔甘草煎滾再投大黃服量人

虛實如何再用

換痘法

白牛虱不拘多少入罐內以蠟固口放地上三日
入微火炙七次取出研末每次服一分薑湯調服
痘收氣將絕

胎元

人牙人乳製

鹿牙人乳製

雞蛋

黃芪

人參

純陽草

白朮

陳皮

甘草各等分

共乳細末用人乳全薑汁調灌即刻回生

痘猶移之間初發熱之時用此為主

湯醫大全

卷三十三

痘疹方

五

顧氏秘書

荔枝肉

元眼肉

大棗各七枚

糯米七十粒

薑引煎服其痘即發出

化癰湯

痘瘡夾癰

黃連

何首烏

連翹

馬鞭草

木通

牡丹皮

蟬蛻

赤芍藥

山梔

片黃芩

桔梗

半蒡子

紅花 白茯苓 紫草

生地 荆芥 防風

水煎服 如大癩口燥加石膏 初起夾癩加

葛根升麻浮小麥 初熱時可加純陽草

眼中生痘瘡急用此方

龍膽草 菊花 石決明

秦皮 甘枸杞 甘草

密蒙花 黃芩 木賊草

黃連 炒 萊豆殼 升麻

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 毛 顧氏秘書

穀精草 當歸 白蒺藜 炒去刺

猪肝 四兩 純陽草

順流水煎服

牙疳落齒

落蘇蒂燒灰入蠶繭內以嫩松苗近水邊生者搗汁浸

透焙研細末搽之

痘時喘急火症

白花地丁三錢水煎服即解

三合散

治痘敗痰火盛

四君子湯四物湯二陳湯各等分煎服

犀角地黃湯

治痘血熱失血

生地 牡丹皮 白芍 各等分

水煎好磨犀角汁和服

甘桔湯

治痘咽喉腫痛

桔梗 三錢 甘草 一錢

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 毛 顧氏秘書

煎服

生脉散

治痘後灰白氣血兩虧

人參 一錢 炙黃芪 三錢

煎服

四聖丸

痘後翳膜

兔糞 四兩 家菊花 二兩 白蒺藜

甘草 各一兩

煉蜜爲丸桐子大每服三十九菊花茶送下

四寶丹

治痘疔

珍珠三分 豌豆灰 血餘各等分

冰片五厘

共乳細以油燕脂調成膏每以金銀簪刺破將膏填入瘡口卽刻紅活矣

痘瘡黑陷倒靨乾枯不起

蟬酥 冰片各二分 西牛黃一分

瘍醫大全

卷三十三

痘疹方

羌

顧氏秘書

硃砂一錢 雄黃三分

共乳細將獾猪尾血一錢八分爲丸如小豆大薄荷湯服一丸卽刻生動矣

痘瘡壯熱大便秘塞

當歸 白芍 甘草各等分

煎服

大便不通

黃蜜熬至滴水成珠搯好小指細納入穀道內卽通如秘甚加猪牙皂角末和蜜條內導之或猪膽

汁皂角末裝葱管內塞入穀道內卽通

人虛痘不起漿

炙黃芪二錢 人參 白朮

當歸 柴胡 升麻

陳皮各一錢 甘草五分

煎服

防痘傷目

用寧油卽濟寧油燕脂塗眼眶上下卽免

痘隱不起欲令速出

瘍醫大全

卷三十三

痘疹方

辛

顧氏秘書

芫荽子一升全酒煎不可泄氣待溫去渣除頭面不可噴只從項下噴至前心後心手脚俱到噴後包煖片刻卽現

稀痘百齡方

黑芝朮不拘多少 甜甘草少許

煎服 初生小兒半小杯作三次服從洗三服至百日週歲小兒至五歲每晚服一杯六歲至

九歲早晚各服一杯可保永不出痘矣

凡痘焦平黑陷全無生意

活公鷄一隻約六觔 山羊血一錢伴飯與鷄喫半日後將雞去毛整煮化為稠湯取一碗與乳母服之將乳與小兒喫再用甘草白芍各五分金汁一盃煎好入山羊血五分調服少刻痘即轉紅活矣
痘瘡火症全閉不出

取河底滋泥遍塗嬰兒身上半日後洗去即有紅點現矣

痘漿半起臭爛者

當歸 大黃各五分

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 華 顧氏秘書

煎好調紫雪一分服

痘瘡喘吐

丁香 紫花地丁各一錢

全金銀露煎服即止

痘瘡大小二便秘燥黃赤者

赤芍一錢 黃連八錢 冰片三厘

研細開水沖服

痘漿不起

白牛頭上蝨約二十個 鏡臺後碎錢要有一個

用瓦焙乾再用白磁雞冠血數匙酒釀數匙共入盞內用白鴿煨湯沖服即可起漿

痘瘡灰白下陷

取修脚皮一撮煎湯服即起

十神解毒湯

當歸酒洗 紅花酒洗 生地酒洗

丹皮 赤芍 桔梗

連翹去心帶木通 小川芎

大腹皮洗淨薑汁拌

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 華 顧氏秘書

水煎服 此方以涼血行血為主而佐以桔梗有開提發散之美引以腹通有疎利之能臣以丹翹有清解之良視古方純用寒涼水伏熱毒者大不同痘已出未出二三日間煩悶燥渴小便赤澁睡臥不寧者可用之可與初發熱條敗毒和中散用參

九味神效散 治痘初出稠密紅紫或帶焦黑色者

人參 牛蒡子 黃耆

紫草茸 甘草 紅花

前胡 生地 白芍各等分

水煎服

荆防解毒湯 治痘夾斑夾麻夾丹俱可用

防風去蘆 荆芥穗 升麻各四分

黃芩酒炒 黃柏酒炒 元參

牛薺子炒研各六分

水煎服

四聖散

紫草 黃耆 甘草

木通各一錢

水煎服

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 章 顧氏秘書

鼠粘子湯

柴胡 當歸身 連翹

牛蒡子炒研 黃芩酒炒 炙甘草

黃耆 地骨皮各等分

水煎服

保元湯

黃耆三錢 人參 甘草各一分

老生薑一片大棗一枚去核同煎有熱者黃耆首黃耆薑炙甘草炒熟更加官桂五分

首黃耆薑炙甘草炒熟更加官桂五分

異攻散 治痘灰白癘塌咬牙寒戰泄瀉腹脹治虛寒

人參 白茯苓 白朮

當歸 陳皮 厚朴薑汁炒

製半夏 丁香 肉蓯蓉麩裏煨熟去油

木香 熟附子 官桂

加薑棗水煎先服去附子亦可若衰虛瀉甚又不可無附子

木香散 治虛寒證純陰無陽者

大腹皮黑豆汁洗淨 人參 赤茯苓

前胡 柯子肉 半夏姜湯泡洗七次

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 章 顧氏秘書

青皮去穢炒 丁香 官桂

南木香臨時酒磨入 甘草各三分

生薑三片棗一枚去核煎如虛加黃耆糯米

回生丹 痘灰白虛寒吐瀉手足冷者可用此方應急

丁香九枚 乾薑一錢

水煎熱服

八正散 小便瀉秘服導赤散不效用此方

赤茯苓 藜蘆 山梔仁

瞿麥 車前子 木通各八分

飛滑石二錢 甘草四分
燈心一團煎食前服熱盛大便亦秘者加大黃一錢
無價散 黑陷欲死者用此應急

用無病小兒糞陰乾將傾銀罐二個上下合定鹽泥固濟火煨通紅取出為末密水調服一錢一方

加麝香冰片少許

升麻葛根湯 解發痘疹良方

升麻 白芍藥 葛根

甘草各等分

傷醫大全 卷三十三 痘疹方 薑 顧氏秘書

水煎服

人參敗毒散 解疫癘發痘疹之良方又主腰痛四時通用

羌活 獨活 前胡

柴胡 川芎 枳殼

桔梗 白茯苓 人參各等分

甘草減半

生薑三片溫服 一方有薄荷

柴葛敗毒散 疑似傷寒以此解發

柴胡 蘇葉 葛根

人參 羌活 防風

荆芥 甘草 桔梗

薑引

香蘇敗毒散 疑似傷食以此解發

香附 蘇葉 蒼朮

厚朴 青皮 甘草

山查肉

薑引

雙解散 痘瘡表裏俱實非此不解

傷醫大全 卷三十三 痘疹方 姜 顧氏秘書

防風 川芎 當歸

白芍 大黃 薄荷葉

連翹各五分 石膏 桔梗

黃芩各八分 桂枝 荆芥穗各二分

滑石二錢四分 甘草一錢

薑引

消毒保嬰丹

纏莖藤 黃豆或菜豆梗上纏繞細紅絲者是也八月間生烈日採之陰乾一兩五錢

黑大荳三十粒 赤小荳七十粒 新升麻

赤芍藥	各七錢	生地黃	酒浸	牛蒡子	炒
辰砂	易研	山查肉	各一兩	荆芥	連翹
防風	去蘆	生甘草		川獨活	
當歸	酒洗	黃連	去枝	桔梗	各五錢
老絲瓜	隔年經霜者二箇取				

右各研細和勻用淨沙糖丸如李核大每服一丸濃煎甘草湯化下

其藥味預備須待春分秋分或正月十五日七月十五日十月十五日酒掃靜室至誠修合忌婦人戴孝服人猫犬見之合畢焚香叩齒日出時望東吸氣一口吹佈藥上向太陽密院一

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 三 顧氏秘書

氣七通 神仙草 藥體合自然 嬰兒吞服 天地齊年 吾奉 太上老君 急急如律令 劫

代天宣化丸 嘉靖甲午春痘毒流行 病死者什八九 乃一厄也 時有預服 三豆湯 絲瓜 辰砂 散及方書 所載 預服 痘毒 之法 靡不用 之 未見 其效 予竊 思 痘 疹 疫 癘 之 毒 因 歲 運 災 疇 之 變 難 以 藥 解 而 人 事 未 盡 又 不 可 委 之 天 數 也 於 是 檢 閱 古 方 乃 於 韓 氏 醫 通 得 五 瘟 丹 以 五 運 為 主 喜 曰 此 解 毒 神 藥 也 依 方 修 合 施 售 與 人 但 服 之 者 莫 不 輕 疎 人 皆 神 之 故 名 之

甘草	甲巳年 為君 土黃	芩	乙庚年 為君 金黃	藜	丙辛年 為君 水
山梔	丁壬年 為君 木黃	連	戊癸年 為君 火連	翹	佐
牛蒡子	佐	山豆根	佐		

先視其年所屬者為君次四味為臣君藥倍用臣藥減半佐視臣又減半共為極細末於冬至日修合取雪水煮升麻汁打麩糊丸辰砂為衣竹葉煎湯下

快斑湯 治起發遲

人參	五分	當歸		防風	
木通	各一錢	甘草	三分	木香	
紫草		蟬蛻	各二分		

水煎服

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 三 顧氏秘書

內托散 治無血虛損或風穢冲觸使瘡毒內陷伏而不出或出而不勻快此活血勻氣調胃補虛內托使之盡出易收易屬

人參	黃耆	當歸	各二錢
川芎	桔梗	厚朴	薑汁
白芷	生甘草	木通	各一錢
肉桂	各三分		

此方紅紫黑陷屬熱毒者去肉桂加紫草紅花黃芩若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救裏肉桂救表當貫而不貫者倍參耆當歸煎熟入

人乳好酒溫服泄瀉加丁香乾薑肉豆蔻

真人解毒湯 治痘母

忍冬花 八兩 甘草節 一兩 木通

荆芥 防風 連翹 各三錢

分三劑水酒各半煎以腫消痘出為度

紫草飲 治痘瘡黑陷不起

紫草 芍藥 麻黃

當歸 甘草 各等分

水煎服

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 堯 顧氏秘書

加味四聖散 治痘瘡黑陷倒陷

紫草 木通 木香

黃耆 炙 川芎 甘草

人參 各等分 蟬蛻 十箇

糯米百粒水煎服

元參地黃湯 治痘疹衄血

元參 生地 丹皮

山梔 甘草 升麻 各五分

白芍 一錢 蒲黃 炒五分

水煎服

神應膏 敷護防痘入目

黃栢 一兩 甘草 四兩 真棗 壹粉 一兩 五錢

紅花 二兩

研細末臘脂水同蜜調塗兩眶四畔痘上

麻黃湯 治痘疹初發熱而喘

麻黃 杏仁 甘草 各等分

石膏 加倍一方無石膏有桑白皮

臘茶葉一錢煎服

瘍醫大全 卷三十三 痘疹方 卑 顧氏秘書

清金散火湯 治痘疹初發熱而喘

麻黃 蘇葉 桔梗

牛蒡子 炒 甘草

水煎服如腹脹加厚朴大小便秘加炒葶藶子

粉撲法 治汗出太多不止

黃連 牡蠣粉 貝母 各五錢

粳米粉 一升

為細末撲身上

敗蒲散 止汗

故蒲扇燒灰每服三錢溫酒調下無時服

秘傳復生散 治痘瘡黑陷不起發

珍珠 琥珀 雄黃

硃砂 穿山甲 兩頭尖

香附米各一錢 真蟾酥五錢人乳浸化

研細和勻一歲兒服八厘二三歲服一分二厘

用熟蜜水調下

安胎飲 治娠婦痘疹必用之方

實條芩沉水者人參 當歸身

傷醫大全 卷三十三 痘疹方 望 顧氏秘書

白朮 白芍 大腹皮黑痘汁浸酒洗

陳皮 川芎 紫蘇葉各八分

砂仁連壳炒 甘草各五分

糯米一撮煎溫服

辰砂益元散 治痘熱毒太甚狂言燥渴欲飲水者

飛滑石 六兩 甘草末 一兩 飛辰砂 三錢

合勻每服一錢燈心湯下大人加倍

四順清涼飲 治裏熱證大便結

當歸 白芍 大黃

甘草

水煎服

臙脂塗法 治黑痘良方

先用升麻一味煎濃汁去渣將臙脂於湯內揉汁就以本綿蘸湯於痘上拭之

傷醫大全 卷三十三 痘疹方 望 顧氏秘書

痘疔門主論

喜泰願曰夫疔者乃毒火鬱結腠理秘密發熱之後先著其疔或三五粒或一兩點獨大色赤平匾而潤出來必貫黃漿次日即行收靨見必煩躁狂亂辨認得真即宜銀針挑破口含清水吸去惡血外以雞冠血點之或以拔毒散敷之大用清涼發表之劑疔方得出書云冷疔先見諸痘不敢彰形若不早刺則毒火鬱結久則走黃遍身發腫痘來隱隱不能出痂束手待斃悔無及矣醫者慎之

瘍醫大全

卷三十三

痘疔

聖

顧氏秘書

陳實功曰痘毒升發未盡留毒心肝二經發為痘疔初生紫點次日變黑浮高而潤者毒淺深陷而焦者毒深其發多在七朝上下將靨之際生於靨腿手足身温疤潤聲清者吉發在肚腹腰腎身熱色枯聲啞者凶凡遇此證急用針刺疔根插入蟾酥條候四邊裂縫疔搖者用刀割去搽玉紅膏收口如針刺無血插藥乾枯不變膿者終為不吉但此證屬有餘首尾但宜加減鼠粘子湯主之 正宗

痘疔門主方

加減鼠粘子湯

鼠粘子

知母

天花粉

山梔

荆芥

各六分

甘草

三分

竹葉燈心各二十四件水煎服

拔毒散

專治痘疔及賊痘紫薄萍等症如神

透明雄黃不拘多少研細再將滾水泡棉臙脂取

濃汁調點疔頂上

瘍醫大全

卷三十三

痘疔方

聖

顧氏秘書

四聖丹

專點痘疔即刻回生

牛黃

一錢

兒茶

一錢

砂

八分

珍珠

二分

乳細用口嚼臙脂調勻點之

珍珠膏

治痘不發必有痘疔黑而大臭者宜急點之

珍珠

五顆

豌豆

四十九粒

髮

灰

一錢

乳細用臙脂汁調膏撥疔點之黑疔即變紅活

矣

痘疔

甘蔗渣晒乾直香油點燈燒成灰以津唾調勻銀
簪挑破點上立效

又方

珍珠研末油胭脂調搽神效

傷醫大全

卷三十三

痘疔方

五

顧氏秘書

痘癰門主論

喜泰順曰痘瘡發毒多見於外屬之證膿漿潰爛何
由而足雖云變臭生意已成必發癰毒方為穩兆
發於四肢則傷手足發於頭頂硬處為佳內服消
風化毒湯外用生黃荳層而敷之此險中得順十
無一失也

邵慈菴曰凡有遲延日久而起不圓潤而屬既平之
際又發癰腫人固知其餘毒而不知為何經當辨
之但氣高喘急胸滿壯壯者餘毒在肺也痰涎稠

傷醫大全

卷三十三

痘癰

五

顧氏秘書

粘口咬受齒泄瀉不止口臭者餘毒在脾胃也盜
汗熱不退而渴者餘毒在心也夢中多驚餘毒在
肝也耳聾尚熱餘毒在腎也眼合不開身腫不消
內熱不清醫罔不藥者餘毒諸經皆有矣

心法曰痘後餘毒發出小如李者為毒大如桃者為
癰單生一個者毒在肌肉屬順易治連發數處者
船小載重屬險若結於骨節之間或成對發出者
其毒已盛潰破之後滲泄氣血不能斂口屬逆

陳實功曰痘癰即是痘毒緣滯滯不足毒流於脾肺

二經致手脚胸背結成漫腫大如桃李此多發於收膿之後身涼不渴者吉初起嚼生黃豆敷之自消已成用太乙膏貼候膿熟針之元氣虛弱者保元湯助脾健胃為主 正宗

胡公弼曰痘癰宜大連翹飲主之大便秘加酒炒大黃微利之如疹後風瘡加金銀花

資漢卿曰發於面頤胸脇者難治生四肢者易治

曰凡痘後發熱即是餘毒未盡不會多服敗毒藥

防發痘毒宜仔細脫衣看視乘早消除

瘍醫大全

卷三十三

痘毒

聖

顧氏秘書

又曰發於關鍵要害處及氣血虧敗者險

又曰痘毒斷不可開刀



痘癰門主方

三豆丹 扁鵲

敷痘毒聖藥

黃豆

赤小豆

黑豆

各一合

用醋浸搗研濃漿時時以鷲翎掃上紅腫退去其效如神

三豆飲 扁鵲

凡遇時令不正宜預服此以疎解之

黃豆

赤小豆

綠豆

各一升

瘍醫大全

卷三十三

痘毒方

聖

顧氏秘書

甘草節 二兩

水煮熟食豆飲汁七日乃止永保無患

保元湯

痘癰出膿之後脾胃虛弱膿清不斂者服之

人參

白朮

黃芪

各一錢

甘草 三分

姜一片棗二枚煎食遠服

絲繭散

痘後餘毒流注各處出清水者

出蛾絲繭不拘多少用生明礬末填滿煨灰乾搽

回毒即消丹 岐天師

人參二錢 金銀花五錢 甘草一錢 元參三錢

水二碗煎三分與小兒服之一劑即消大半二

劑全愈付符一道焚在藥中煎汁神效凡服藥

不效焚符於藥中煎藥與小兒飲之十八日生

符式○//川一

咒曰小兒有病病魔作祟吾今施符治無不愈

吾奉

天師岐直君律令勅

傷醫大全 卷三十三 痘癰方 兜 顧氏秘書

書符前念咒一遍書畢又念咒一遍焚於藥內

又念咒一遍此秘訣也

歲久不愈神方 岐天師

黃芪二兩 生甘草二錢 白芥子三錢 柴胡

肉桂各五分 人參 白朮 當歸

金銀花各一兩 薏苡仁三兩

先將薏苡仁用水四碗煎汁二碗再煎前藥半

碗饑服一劑後用

黃芪 薏苡仁 金銀花各一兩 白朮

當歸各五錢 生甘草 白芥子各二錢 陳皮五

水三碗煎半碗四劑全愈其服藥之時更須用

藥洗之

金銀花一兩 甘草三錢 生葱三根

水二碗煎洗之

痘毒潰爛不愈

乾百合為細末摻之數次即愈

痘毒

鴨肉蒸熟淡喫其毒自消

傷醫大全 卷三十三 痘癰方 辛 顧氏秘書

消痘毒

瑞香花葉全冰糖搗敷中留一孔透氣自消

消痘毒

糯稻草燒灰入筒箕內以滾水淋三遍取稻草浸

灰敷之自消

消痘毒 張綱如屢驗方

大蚌一個只取肉用黃土四圍封固火煨至紅只

取蚌肉存性研末油調敷立消

痘癰潰爛不愈

剝泥蛤蟆皮貼上即愈

痘毒 錢青輪

新瓦磨光洗淨置羯羊糞於瓦上上下下以瓦覆之
文武火炙燥烟盡存性取出為末麻油調敷神效
痘後餘毒 丹方全集

人參 白茯苓 犀角

金銀花 各三錢 甘草 一錢 羚羊角 一錢

珍珠 八分

右為末蜜丸每日服一錢白湯下日日服神效

瘍醫大全 卷三十三 痘毒方 至 顧氏秘書

解毒護童膏 陰陽文註證

金銀花一觔用水入銅器內煎至渣無苦味為度
粉甘草四兩用水煎至無甜味為度去渣二汁和
勻用文武火慢煎約十碗至三四碗入米白糖收
成膏埋土內一日出火氣每早以百沸湯沖一鍾
與小兒喫一切瘡毒不生併可稀痘若初出痘後
煎服此膏則遺毒皆盡勝多喫胡桃也

痘毒久不收功奇方 湯聘三

乾百合 參錢 血竭 二錢 梅冰片 一分

共研極細末乾摻即收功矣

移痘毒大毒法

凡毒發虛怯處骨節關鍵處出頭便難飲口可取
池塘綠苔敷在腫上留一空處或上或下即移毒
於所空之處出頭 池塘綠苔夏月浮在水面上冬
月在水底泥上取

痘毒已潰

早稻草根連土烘燥研極細摻之

痘毒初起 張太和

苦丁草伏龍肝全蜜調敷

瘍醫大全 卷三十三 痘毒方 至 顧氏秘書

痘後餘毒

生萊豆末 赤小豆末 白蜜 各五錢

猪油 參錢

用馬齒莧汁一碗全藥淨鍋內熬成膏塗之

消痘毒

漱淨口將柿餅細嚼敷四圍即消

痘毒久不收口

多年頭油罐子放火上煨紅冷定乳細末搽上即

愈

消痘毒

熟黃牛屎加蚯蚓搗敷即消

痘毒久不收功有多骨者

紅昇丹同人中白煨各等分研細搽上膏蓋多骨

自出收功

痘毒久不收功

鮮馬齒莧生搗極爛取汁服之以搽敷痘毒上腫

自消膿自乾口自欵

瘍醫大全

卷三十三

痘毒方

聖

顧氏秘書

痘疔門主論

痘疔乃痘後餘毒未盡正氣已虧邪走空竅是以口
鼻眼耳前陰後陰皆可成疔治當敗毒調元

瘍醫大全

卷三十三

痘疔

聖

顧氏秘書

痘疔門主方

驗方

牛糞尖燒灰存性 雄黃 各等分

每錢加水片二分乳細搽患處立愈

易醫大全

卷三十三

痘疔方

書

顧氏

痘風瘡門主論

陳寶功曰痘風瘡是痧痘後毒發未盡留熱肌膚後被外風侵入其患先從細瘡作癢次漸沿開成片脂水生痂搔之無度宜用麥飯散散擦之 正宗

易醫大全

卷三十三

痘風瘡

美

海

痘風瘡門主方

麥饑散

小兒痘風作癢叠叠成片甚則頑麻不知痛癢
小麥一升炒枯黃色乘熱入鉢內和硫黃四兩白
砒一兩研細待冷取起加烟膠半觔川椒三兩生
明礬枯礬各二兩共研細末臨用葱湯洗淨以麻
油調搽油紙蓋紮三日一換三次即愈並治白禿
神效

瘍醫大全

卷三十三

痘風瘡方

顧

痘癢門主論

申斗垣曰痘出五七日後癢極動手抓破急用仙鶴
翎在痘上掃一二次即止癢就不抓此神驗秘方
也 啟玄

瘍醫大全

卷三十三

痘癢

表

顧

痘後癍跡不退門主論

申斗垣曰痘已愈毒未全解癍雖落盡止有癍痕尚在或黑或凸或凹或成瘡者用真白蜜一兩塗之其癍自滅啟玄

胡公弼曰羊骨髓入輕粉研勻塗之滅癍青囊

瘍醫大全

卷三十三

癍跡

彙

顧氏秘書

痘後瘡水不乾門主論

申斗垣曰痘後瘡水不乾在肢體名曰痘疔用出過蛾的蠶繭不拘多少每個入生明礬令滿炭火煨研為末摻之即乾啟玄

又曰搗壞痘破爛者用多年屋上腐草不拘多少研極細鋪在席子上令兒臥其上自不粘痛或摻之亦妙

瘍醫大全

卷三十三

水不乾

本

顧氏秘書

出痘後細瘡如疥難愈論

申斗垣曰夫痘出痲落宜該清潔或快食發物或勤
拖風前致令復生細瘡似疥非疥最難得愈內宜
用川蜂蜜一二兩同水煎滾時時呷之外用懷孕
母猪的糞晒乾燒灰不拘多少加輕粉滑石各五
分研細酒調勻鴨翎掃搽即愈 版立

瘍醫大全

卷三十三 細瘡

李

顏氏秘書

精炮製用藥法

聶九吾曰凡用寒涼藥品除陽症傷寒熱積痢症及
諸實熱等症外其餘若用之降炎上之火用之清
血分之火俱有寒因熱用之義須依酒炒酒製之
法最為緊要同一寒藥也依法用之則取效不依
法用之則為害若痘瘡中前後所用解毒諸寒藥
皆因毒火燥血而用入血分以涼血活血者是以
芩連梔栢花粉大黃等味必用酒拌濕炒燥牛蒡
子必炒香研碎當歸白芍生地紅花紫草牡丹皮
地骨皮之類必以酒臨時洗用此要法也而時醫
苟簡粗率每每不依法炒製而生用寒涼不惟無
益而反以致害者多矣此其失非小而人不知也
不惟病家莫之知而醫家亦竟不悟也儻悟其失
豈可省此微勞而貽此大害哉予故表而出之以
訓將來也製之大槩有熱者甘草黃耆白芍俱生
用虛寒者甘草炙熟黃耆蜜炙白芍酒炒

瘍醫大全

卷三十三 精炮製

李

顏氏秘書

痧疹門

四方疹名各別四方之方語不同其實皆疹也調治之法俱同避忌之說無異

京師內外名曰溫疹

河南名曰桴瘡

山西陝西名曰糠瘡

山左名曰疹子

江南浙江名曰痧疹

湖廣江西名曰麻疹又名崩子

福建廣東廣西雲南貴州四川俱名曰疹子

痧醫大全 卷三十三 痧疹門 奎 顧氏秘書

碎金賦

疹屬君火氣本少陰傳於其子兮故為脾胃之證乘於其妻兮現乎皮毛之分亦胎毒之所發因疫癘而後成咳嗽噴嚏兮辛金煉於丁火頓悶泣出兮君主御乎將軍將軍將軍也迎而奪之兮其鋒易挫隨而擊之兮其銳難勝如折勾萌兮斧斤不用苟待燎原兮玉石俱焚

其色如斑兮摸之有迹其形似痘兮視之無津朝出暮收兮發之於陽暮出朝收兮發之於陰變化莫測出沒靡定大抵愛赤而惡黑治者喜涼而忌溫赤如點朱兮光明彰顯之象黑如灑墨兮火鬱瞶昧之甚制以酸涼兮收炎光於麗澤投以辛熱兮縱赫曦於重明

痧醫大全 卷三十三 痧疹 奎 顧氏秘書

敗毒防風開發斬關之將人參敗毒散防風通聖散解毒連翹制

伏降虜之兵黃連解毒湯連翹散如錦爛熳兮服化斑而

艷飲化斑湯似火薰蒸兮飲涼膈而熱清東垣涼膈散咽

痛兮甘桔牛蒡止欬嗽更能潤肺甘桔湯溺澀兮導

赤芍藥定驚悸又可涼心導赤散便秘兮承氣

膽導調元承氣湯 便泄兮黃芩猪苓黃芩芍藥湯

大渴兮膈焦置瓜蓼於白虎白虎湯 苦煩兮裏熱加

山梔於安神安神丸 無伐天和兮使陰陽之適調勿

犯胃氣兮雖攻補之不盡

痘欲盡發而不留疹欲盡出而無病或邪氣之鬱遏

兮留而不去或正氣之損傷兮困而未伸毒歸五

臟變有四證毒歸脾胃兮泄瀉不止而變痢毒歸

心肝兮煩熱不退而發驚咳嗽久而血出兮毒歸

於肺牙齒爛而疳蝕兮毒歸於腎輕者從制以嚮

瘍醫大全 卷三十三 痧疹 奎 顧氏秘書

善平之有功重者拒敵而肆惡攻之不勝

熱不除者調元湯加麥冬知母作搗兮兼以抱龍温

驚琥珀抱龍丸 效不止者阿膠散小阿膠散 加杏仁枳

實帶血兮專以補肺太平錢氏補肺阿膠散 注下

兮異功猪苓澤瀉錢氏異 虛滑者大作參苓參苓

散 滯下兮異攻當歸芍藥休息者少與真人真人

湯 惟有牙疳之病原呼走馬之名初息臭而腐肉

漸血出而穿齦內服地黃丸制其火怪地黃丸 外擦

蚊蛤兮殺其蠶精蚊蛤散 牙若脫落兮崩砂之狀可

畏聲若啞噴兮狐惑之證難明

應出不出兮發之初惺惺次通聖奪命大發而有效

惺惺散防風通 應收不收兮解之初葛根次化癍

涼膈大解而最靈升麻葛根湯 化癍 色淡白兮為

虛四物去川芎加紅花桂枝四物湯 色紫黑兮血熱

化癍去人參加元參燒糞化癍湯 奪命發癍疹之聖

丹奪命丹 無價解疫癘之神無價散 發不出而煩躁兮虞

不能臘黑不變而譫妄兮食不及新熱蒸蒸兮色

赤痢滴滴兮氣惺羸瘦骨肉之脫癍癍神識之昏

瘍醫大全 卷三十三 痧疹 奎 顧氏秘書

喘急兮胸高肩聳疳爛兮漏腮缺唇休誇三世之

妙手難留一息之遊魂

豈不聞誤服湯丸兮不如勿藥又不見特犯禁忌兮

可以自省愛吃鹹酸兮咳嗽連綿而不已喜啖辛

燥兮火熱燔灼而不寧甘甜過而齒齲生冷多而

糞清雞乃生風之畜魚則動火之鱗雞魚貪而亂

食風火併而啟釁邪反滋甚兮為癍疹而不息毒

反深入兮值疫癘而再經斯則疹之遺毒亦若痘

之餘證

欲決內傷須詳外證目常赤痛兮青童抱火鼻常靴
衄兮素女臥薪病牙齒以終身兮玄武困於湯鑊
發癩癩而連年兮朱雀驚於燒林漫數短澁兮及
州都之遭火便溇垢蠱兮必倉廩之被焚哮喘炎
上之象丹瘤赤瘰之形唇舌多瘡兮門戶殘烟未
熄咽喉常腫兮管籥餘燼猶存苟求其故兮則一
言之可盡欲撥其本兮豈一旦之能平噫此賦之
作效蛙之鳴詞離鄙俚兮積如累石法則疹秘兮
故曰碎金

傷醫大全

卷三十三

痧疹

李

顧氏秘書

聶氏痧疹論 痧疹同

痧疹形如沙痘疹形如荳皆象其形而名之也痧痘
俱胎毒而痘出五臟屬陽陰主閉藏其毒深而
難散痧出六腑屬陽陽主發散其毒淺而易散
臟陰多虛寒故痘可溫補腑陽多實熱故痧宜解
散然痧雖屬腑而其熱毒之氣上蒸於肺肺主皮
毛實受其毒是以發熱之初雖似傷寒而肺家見
證獨多咳嗽噴嚏鼻涕眼胞腫眼淚汪溢面
腫腮赤是也身體微汗潮潤則出最輕若氣喘鼻
乾作嘔驚狂者最重初見如疥如米尖再後成片
紅色者輕紫色者險黑色者逆不可視為泛常不
可用藥失序又不可過為攻表攻表太過則胃氣
受傷毒氣不能達反令停毒攻肺務宜辨寒熱虛
實察淺深而治之治之法惟在宣發其毒以盡
出之於外雖紅腫之甚狀如漆瘡亦不足慮以其
既發於外即可免內攻不若痘家之必顧其收結
也此症若調治得法十可十全而調治失宜則殺
人亦如反掌大抵初發熱時必當發表見形即宜

傷醫大全

卷三十三

痧疹論

李

顧氏秘書

清涼其用藥最忌酸斂溫補燥熱古云痧要清涼
痘要溫清涼者清肺熱也溫者溫補生漿也一種
初起眼白赤色聲啞唇腫作渴腰疼腹脹人事不
清口鼻出血煩亂狂叫不安此係閉塞不出名曰
閉症最為難治服藥後若能現出者或可得生鼻
內流血者毒重口內出血者毒尤重初起手足心
如火熱非常者毒亦重若初時失於清解以致毒
蘊於胃口鼻出氣腥臭則生牙疳身熱不退餘毒
流入六腸則成痢症或過於發散後來元氣虛弱
骨瘦不堪則成疴疾種種壞症不可不慎此症日
出三次三日九次為順總宜出透毒氣得淨即無
他患又有一種奶痧風疹此類感風熱而出乃皮
膚小疾服藥疎風清熱即愈不在此痧症中論也
正景痧疹有所大忌病家犯其所忌則至於殺人
醫家犯其所忌亦至於殺人也其所忌不同皆忌
閉塞其毒不得發洩也

朱純嘏曰易曰大哉乾元萬物資始又曰至哉坤元
萬物資生資始者氣之始也資生者形之始也萬

物者合天地中之物而統言之也即以人言之亦
天地中之一物也但人為萬物之靈得天地陰陽
五行之正氣以生成因以得其所賦之理以為健
順五常之德人雖天地中之一物而不與萬物同
其形而同其性也故三才之道合天地人而並言
之也人之有生受氣於父成形於母二五之類妙
合而凝乾道成男坤道成女在胎之中先有命門
則父精母血之毒藏於命門且確矣外形則先
長鼻內如五臟六腑外如百骸九竅俱從逐日逐
月漸次生長惟命門凝成於有形之初則胎毒亦
蘊蓄於有形之始命門人身之太極也陰陽五行
包裹於命門之中痘與疹胎毒之陰陽也胎毒藏
於命門無聲臭之可覓必俟外感痘之氣發出而
為痘外感疹之氣發出而為疹何世人不推本求
源而乃隨聲附和曰痘出五臟疹出六腑歷今千
百餘年誰辨其非予不得已特表而出之曰痘與
疹俱出命門或曰痘出五臟疹出六腑前人著書
立說極其詳悉歷今千百餘年無有議其非者今

子一旦遽云痘與疹俱出命門豈不好奇涉怪借此至微至隱之形指此至精至密之理無可端倪之臟腑莫可測度之命門而言前此之非是不亦私相傳謬乎誠恐今之議者烏知後人之不議今乎予應之曰天下之物莫不有理惟於理有未窮故其物雖有定名有定理而不知有不盡也予所云疹與痘俱出於命門非無徵而敢云然也夫未出痘之先疹出多次俱不作正疹之數必俟大痘既出之後或隔一兩月或隔半年一年或三五七年醫醫大全 卷三十三 痧疹論 三 顧氏秘書

年之久遇正疹之時氣感而發之一出則不復出矣或又問曰子言胎毒藏於命門言之固深切著明也當出痘之時胎毒固發出而為痘何不並發出而為疹乎必待隔一兩月或半年一年之久而始出疹是胎毒在命門之中止隨痘之氣而出痘不隨痘之氣而出疹乎予曰正在此分陰陽五行也天以陰陽五行變化痘疹生焉人居氣化之中感痘氣而出痘感疹氣而出疹一定不易之理夫無痘與疹同出之事或又問曰子著定論前言痘

有夾疹而出者今言痘與疹不同出何前後之紕繆若是乎予言痘至回水結痂之際復又身熱遍身上下通紅名蓋痘疹又名解毒疹今言出痘之後必俟隔一兩月或隔半年一年三五七年之久遇正疹之時氣感而發之一出則不復出是此回水結痂之際所出之疹作不得正疹乎予曰痘有夾疹之症當痘出之際發熱蒸蒸脾肺兩家風熱亦隨之而出現故不甚關利害止用黑參升麻湯一劑而疹自消散痘出亦輕若夫回水結痂之際復又發熱遍身上下通紅細看痘粒膿漿克足此乃蓋痘解毒之疹也曰蓋痘者痘之上蓋一層疹也曰解毒者此疹一出可以解痘後之毒也宜用大連翹飲加煨石膏花粉淡竹葉各一錢以清解其餘熱此等症候蓋因灌漿之時痘必稠密極力用藥催漿過於補劑熱滯脾肺故出此疹予歷年久見症多透徹造化之機緘究竟精微之奧妙不敢私之家傳用以公之於同志者

又曰痘瘡形如痘疹形如麻皆象其形而名之也

醫醫大全

卷三十三

痧疹論

三

顧氏秘書

醫醫大全

卷三十三

痧疹論

三

顧氏秘書

昔人皆曰胎毒言之誠是蓋以出一次則不復出
其爲胎毒可知然又曰痘出五臟疹出六腑以訛
傳訛誰知有命門子於痘疹論中言之極其詳矣
夫所謂胎毒者人於胚胎之初受氣於父成形於
母是父精母血之毒已凝聚於陽施陰受之始豈
待成胎之後慾火不節厚味不忌降生之頃嚙其
血而後有是毒也若以胎毒言之不論富貴貧賤
人人俱有然於中有輕清重濁之分是以出疹有
順險逆三等之別揆其因由天地有非常之氣陰
陽鼓舞卽有非常之令鼻聞其氣傳入於肺肺復
傳於各臟漸次傳入命門夫然後五臟之邪氣內
侵命門之胎毒外透正疹從此而發矣疹發而熱
毒之氣上蒸於肺肺主皮毛實受其毒發熱之初
雖似傷寒而肺家見症獨多咳嗽噴嚏鼻流清涕
眼胞腫眼淚汪溢面腫腮赤口乾唇焦此所謂正
疹由於胎毒者是也身有微汗滋滋潤潤氣不甚
粗身不焦熱則疹出必輕若氣喘鼻乾更又鼻掀
作嘔吐驚搐狂躁無汗者最重

瘍醫大全

卷三十三

痧疹論

毒

顧氏秘書

凡疹初未見標之時先必身熱頭疼咳嗽或作吐作
瀉或鼻塞鼻流清涕噴嚏眼肥腫腮赤煩躁不寧
細看兩耳根下頸項連耳之間以及背脊之下至
腰間必有三五紅點此乃疹之報標若無紅點之
證佐當以別證論此屢試屢驗者也如果有紅點
與前證相同宜用宜毒發表湯加芫荽爲引以托
之外出不必拘泥吐瀉疹出而吐瀉自止蓋熱蒸
胃則吐熱衝大腸則瀉此乃疹之常候不必憂其
吐瀉之不止也昔人云疹出六腑或因有此症而
云然也統而言之胎毒藏於命門體也五臟用也
六腑又五臟之用也相須而生成也
凡出疹見標之後形似麻粒大粒而尖稀疎磊落再
後成片紅色滋潤者順若神清氣爽者更順若初
出一時湧出不分顆粒深紫色者險黑色者逆不
可視爲泛常不可用藥失序不可過用攻表不可
驟用寒涼調治之法避風忌葷兼忌穢污惟在用
藥宜發其毒以盡出之於外雖紅腫之甚狀如漆
瘡亦不足慮以其出之於外卽可免夫內攻此症

瘍醫大全

卷三十三

痧疹論

毒

顧氏秘書

若調治得法用藥合宜百不失一若調治失宜則殺人亦如反掌可不慎哉

初發熱時必當發表見標之後發表而兼清涼通身上下通紅總成一片手足之末上下相同無有空處此為出透可用清涼解毒之劑不必兼用發表之藥一解即愈

又有一種疹初出眼胞腫白夾赤色聲啞唇腫掀翻鼻乾鼻又掀氣喘口燥作渴腰疼腹脹人事昏沉口鼻出血煩亂狂叫二便出血此係毒氣鬱過於

傷醫大全

卷三十三

痧疹論

毒

顧氏秘書

內名曰閉症最為難治用宜毒發表湯內加酒炒黃芩七分麻黃五分若能托疹標出外漸次出現或可望生若不出現則無望矣但凡疹症鼻出血者毒重口出血者毒尤重二便出血者毒更重且又危矣初起手足心如火熱者毒重初起脚冷如冰者毒更重

若初見疹標尚未出透失於清解誤用辛熱之劑以致毒蘊於胃口鼻出氣腥臭必生牙疳宜用化毒清肺湯加石膏二錢若已出透速收速散身熱不

退餘毒流注大腸裏急後重紅白相兼已成痢症宜用清熱導滯湯

若其人素稟虛弱當出疹之際過於發散出透之後過於寒涼解毒以致虛弱之極骨瘦神疲面無紅色且又不能多食食多即吐急用香砂六君子湯去半夏加麥冬以補之種種壞證不可不慎

疹之出也出三日而始盡每日出二次子時出者已時散午時出者亥時散經三日而出六次出透稠密無縫方為吉兆昔人有云痘喜稀疎疹宜稠密

傷醫大全

卷三十三

痧疹論

毒

顧氏秘書

雖如漆瘡通紅一片亦不足慮

若夫甫生一月及至半歲一歲之間時值天氣炎熱或出如疹痧疹風癩等疹不在正疹之列亦不由於胎毒而致可以不必用藥其疹自散此類感風熱而出及皮膚小疾常見出一次又出一次及有連出不已者無關利害倘要用藥微用疏風清熱之劑一服即愈

凡出疹發熱三日見標者為順遲至五六日不見標者為逆神氣清爽者為順昏沉者為逆病家知禁

忌者逆可以變順不知禁忌者順亦變逆業勿科者當熟思之當於出疹之家明言之亦可見仁人君子救人之心防於未然無所不至毋以此言爲迂

當出疹之時必宜謹避風寒若不避忌風寒外束疹即收回要其再出甚爲難矣不可不慎

人之生兒育女當出疹之時各宜小心謹慎潔淨內外勿使穢污氣息觸犯出疹要緊

凡小兒乳疹以及癩疹痧疹風熱等疹不在正疹之列亦不由於胎毒此類感風熱而出及皮膚小疾常見出一次又出一次及有連出不已者無大關利害倘身熱不退可用荆防發表湯以散之

如身不熱不必用藥凡正疹由於胎毒其出也必在出痘之後或隔兩三年或隔半年一年之久甚至八九年之遠感正疹之氣而出次後再不復出矣

有所謂溫疹者感於風熱由於胎毒又值時令疫癘之氣城市傳染迅速異常調治乖張立刻變症予

瘍醫大全 卷三十三 痧疹論 三 顧氏秘書

每臨此症俱遵聶氏三方加減變化每獲奇效用是以告後學若先出過正疹再不出溫疹

內廷訂方藥以十三味爲式可少決不可多如滿十三味則將淡竹葉煨石膏入於藥引之內更覺妥當

子每看疹相其時日聞氣聽聲觀形察色然後參之以脉始用宣毒發表湯表之繼以化毒清表湯清之遵此二方加減逐日變化未透則前葛荆防爲必用之藥既透則前葛荆防爲可去之劑氣喘除

升麻不用便秘蒸大黃必需疹色乾焦生地歸尾要用若還紫黑紅花紫茸宜添咳嗽氣急清肺飲解除肺熱口瘡口臭敗毒散清胃利咽成方在此活法由人麻疹已出透用生犀角磨井水和藥同服大能解毒

澄曰壬午年溫疹大行老少男婦傳染死者盈萬子惟以宣毒發表湯化毒清表湯去黃連加觀音柳治之竟無死者其所以然者蓋此次痧疹乃時行溫疹外寒收束初現只宜宣毒發表原不可驟用

瘍醫大全 卷三十三 痧疹論 三 顧氏秘書

苦寒無如成執痧毒清涼見而即用黃連水伏所
以悉成痧閉而亡繼相延時日傳為痧疔喪命者
不少醫者固不知驟用苦寒之悞而病家亦只知
痧疹本凶不察苦寒所悞深可悲也凡我同志遇
此疫癘傳染痧疹均當宜毒發表俟痧疹已齊再
為清表化毒庶不致成痧閉戕其性命也

疹有四大忌

一忌葷腥生冷風寒

出痧疹時大忌食葷腥食生冷胃犯風寒皆能使
皮膚閉塞毒氣抑鬱而內攻也
疹初出時以至出盡之日俱忌食葷腥即素菜亦
忌煎炒葢葷腥煎炒能助胃火昔人云葷痘素疹
誠哉是言也

疹初出時以至透之日未免口渴煩躁想飲冷水
不妨少飲些須以解其煩渴然不可多飲若欲再
飲仍飲些須若土產有荸薺及有秋梨甜者並柿
餅有霜者不妨間與食之雖生喫無妨切不可與
粥及米湯糖餅糖飴麪食荔枝圓眼蜜餞之類食

傷醫大全 卷三十三 痧疹論 堯 顧氏秘書

之恐助毒火倘或餓極煮成粥以開水半大鍾著
飯相小半鍾和勻溫服俗云飽痧餓痘痧疹本不
知餓也
當出疹之時必宜謹避風寒若不避忌風寒外束
疹即收回要其再出甚為難矣慎之

一忌驟用寒涼

初發熱時最忌驟用寒涼以冰毒使毒氣抑遏不
得出則成內攻之患而昔人謂天氣暄熱宜用辛
涼發之如黃連解毒湯之類不知天時暑熱之氣

傷醫大全 卷三十三 痧疹論 堯 顧氏秘書

豈寒涼之藥所能解今驟用寒涼恐不足以解外
熱而適足以阻內熱使不得出也
曾見一宦家艱子得一男甫一歲出痧發熱痧未
見形而發搐醫誤為急驚而用涼藥攻之遂令痧
毒隱隱在皮下不出後醫以滋陰為主而用四物
等藥亦不能救煩悶聲啞至旬日而死此可以知
涼藥冰毒之害矣今因天熱而驟用寒涼豈理也
哉
當疹初出之時雖有身熱煩躁口渴等症即以宣

毒發表湯少加酒炒黃芩三五分以清之切不可
違投黃連黃柏梔仁等大寒之藥恐冰其毒而內
伏疹不得外出矣後雖設法宣表而疹終不得出
可不畏哉

一忌誤用辛熱

初發熱時最忌誤用辛熱以助毒如桂枝麻黃羌
活蒼朮丁香肉桂砂仁之類能使毒壅蔽而不得
出亦致內攻之患卽有痧疹初起四肢逆冷乃火
極似水之故不可妄投熱藥痧現自然漸和而昔

瘍醫大全

卷三十三

痧疹論

全

顧氏秘書

人謂天氣大寒只宜置之煨室謹避風寒可也且
天氣雖寒而人身之熱毒未必減而多用辛熱豈
理也哉

疹初出時或有嘔吐之症醫家必用蒼厚平胃丁
香砂仁煖胃或手足稍冷必用桂枝肉桂溫其手
足殊不知作嘔吐者火熱蒸於胃也今反以辛溫
之味攻之是抱薪而救火至於手足稍作冷者熱
極似寒之象俟疹出透而手足自溫醫不明此反
以桂枝可達四肢之末肉桂可以溫經回陽誤之

又誤陷人性命可不畏哉

一忌用補澁

痧出之時多有自利不止者其毒亦因利而散此
殊無妨如泄利過甚則以加味四苓散與之切忌
用參朮訶蔻補澁之藥以圖速止重則令腹脹喘
滿而不可救輕則變爲休息痢纏綿不已也如痧
後瀉黃紅色乃內有伏熱加木通車前子黃芩可
也記之記之

瘍醫大全

卷三十三

痧疹論

全

顧氏秘書

吾於清解藥中兼用些參朮訶蔻分兩又少何碍
於事一服不見立效又曰分兩輕之故耳於是多
加分兩再服而疹或變症矣可不慎乎

若麻疹出盡之後瀉黃紅色乃內有伏熱仍宜加
味四苓散可也蓋兼用補澁且不可專用補澁又
可乎慎之

聶氏曰痧疹痘瘡險逆等證初時難以現形出不快
利如寒冬之月用芫荽又名秀草或紫蘇宜用砂器將
此種隔水煎煮室中取微微香氣能助發易現今

愚俗不明卽用煎水盈盆將小兒大洗大浴浴後仍加衣被不但無益亦且有損反致熱氣內攻多令小兒悶燥不安啞口難言况痧痘見形卽不當下水知者慎之初起微微浴手足心或可取其內外通達之意耳

朱氏曰芫荽乃透麻疹之聖藥也生取來連根帶葉搗爛約有三錢入於磁碗內用滾水半鍾滾白酒半鍾同入碗內泡少頃其味自出通口服之痧出更快若無芫荽苗葉用子研服亦可再加白芝蔴

瘍醫大全

卷三十三

痧疹論

全

顧氏秘書

同研服更妙窮鄉僻壤用此可當明醫屢試屢驗觀音柳一名西河柳乃小兒痧疹之聖藥也冬月用枝梗春夏取苗葉每用一錢煎湯服年力大者多服一次無妨能清脾解毒發表若在窮鄉僻壤醫藥不便煎服疹卽出現

聶氏曰小兒痧痘初起近來多服笋湯意圖發表不知止可少煎用使引透肌膚取其易出若過用失宜反令元氣受傷脾氣虧損不能消化毒氣以致乾嘔泄瀉出汗心煩灌漿時每有破爛濕痒口瘡

等患藥內引用笋尖尤其所忌特指明爲習弊用笋湯之戒

朱氏曰冬笋尖南醫用以催痘長漿北醫習而不察俱於痘長漿時用作藥引殊不知冬笋非上林之笋也至春二三月自死於土中冬月人取爲美饌今南人又不察物理更於表疹藥中又用笋尖作引若春笋雖生長上林在疹門亦不可用恐其氣味傷泄元氣冬笋乃死氣隨之安可用乎

瘍醫大全

卷三十三

痧疹論

全

顧氏秘書

子疾藜歸尾柴胡紅花等味皆可隨證加減

又曰痧後面色青白骨瘦不堪元氣損傷肝脾血少成痘眼懶睜長明似害非害宜服健脾胃肥兒丸或服八珍湯六味地黃湯九應可漸愈如清火疎風一切治眼之藥萬不可妄投不但痧後如此凡小兒病後失調成疔疾痞眼者俱當如此醫治養血健脾胃爲主儻大便瀉泄稀水白色者歸脾湯補中益氣湯皆對證要藥也

澄曰凡服痧疹煎劑無論男婦小兒每一劑藥湯

可分兩三次服之庶藥力輕徐不致升散過急一湧而出也

瘍醫大全

卷三十三

痧疹方

全

痧疹門主方

宣毒發表湯 初發熱欲出未出時用

升麻 白粉葛 防風 去蘆

桔梗 各五分 荆芥 薄荷

甘草 各三分 牛蒡子 炒香研 連翹 去心蒂 研碎

前胡 枳殼 炒 木通

淡竹葉 各六分

白水煎 天氣大熱加黃芩 炒八分 大寒加麻

黃 蜜炒 八分

瘍醫大全

卷三十三

痧疹方

全

顧氏秘書

解毒快斑湯 痧疹已見形一二日內宜服

連翹 荆芥 各七分 牛蒡子 研破

當歸尾 防風 各六分 蟬蛻 五箇

生地 山查肉 各二錢 黃芩 酒炒

桔梗 乾葛 紫草 各八分

川芎 五分

觀音柳二三分為引不可多用

化毒清表湯 痧疹已出而水腫大甚宜用

牛蒡子 連翹 天花粉

黃連	地骨皮	黃芩	山梔炒	知母	乾葛	元參	各八分	桔梗	前胡	木通	各六分	甘草	薄荷	防風	各三分	口渴加麥門冬	去心	白石膏	煨研	大便滿加大黃	酒炒	一錢	朱氏加	燈心	五分	清肺飲	痧證四五日	回時	尚有餘毒	留於肺胃	咳	嗽氣粗	外熱不退者	石膏	生地	各二錢	麥門冬	生	各一錢	桔梗	黃芩	當歸尾	知母	各八分	柴胡	陳皮	各六分	甘草	五分	僵蠶	五條	加竹葉	三片煎	調元健脾保肺湯	痧後瘦弱成疴疾	痧後面色青白	唇淡氣弱	並治	人參	白茯苓	沙參	牡丹皮	陳皮	熟黃芩	白芍	酒炒	麥門冬	當歸	薏苡仁	百合	炙甘草
----	-----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	--------	----	-----	----	--------	----	----	-----	----	----	-----	-------	----	------	------	---	-----	-------	----	----	-----	-----	---	-----	----	----	-----	----	-----	----	----	-----	----	----	----	----	-----	-----	---------	---------	--------	------	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	-----	----	-----	----	-----

如大便不實瀉白色者	可加木香白朮訶子少	許如瀉黃色加酒炒黃芩車前子	清熱導滯湯	痧毒氣流注而成痢者	黃連	條芩	白芍	枳殼炒	山查肉	各一錢	厚樸	去皮薑汁炒	青皮	檳榔	各六分	當歸	甘草	牛蒡子	連翹	各五分	紅多者加紅花三分地榆五分	秘澁甚者加酒炒大黃一錢二分	清胃散毒湯	治痧後口瘡牙疳等患	牡丹皮	桑皮	金銀花	甘草	生地黃	黃柏	蜜水炒	連翹心	沙參	白茯苓	如體虛加白朮	救苦散	治痧後口瘡牙疳	人中白	煨五分	白礬	一分	寒水石	非水飛	青黛	飛五分	水片	一分	牛黃	二分
-----------	-----------	---------------	-------	-----------	----	----	----	-----	-----	-----	----	-------	----	----	-----	----	----	-----	----	-----	--------------	---------------	-------	-----------	-----	----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	-----	--------	-----	---------	-----	-----	----	----	-----	-----	----	-----	----	----	----	----

瘍醫大全 卷三十三 痧疹方 全 顧氏秘書

瘍醫大全 卷三十三 痧疹方 全 顧氏秘書

共為細末先以苦茶拭過隨搽患處

二聖散 疹因喉腫痛不拘初起回後

白殭蠶二錢 苦參三錢

乳細吹之

和中湯 有一種痧症大吐大瀉而後見者甚輕與作

白木 米泔水 乾葛 各八分 當歸身

白茯苓 桔梗 各七分 白芍 酒炒

甘草 半夏 柴胡

防風 各六分 陳皮 牡丹皮 各五分

瘍醫大全 卷三十三 痧疹方 全 顧氏秘書

生薑一片紅棗二枚為引

加味逍遙散 有一種病後瘦弱唇白氣虛感時氣出

白木 米泔水 蘇薄荷 陳皮

白茯苓 白芍 酒炒 麥門冬

柴胡 當歸身 甘草

牡丹皮 乾葛

白水煎

犀角解毒化痰清火丸 痧疹證咳嗽氣喘唇紅結熱

者

生犀角 紫草 連翹心

花粉 牡丹皮 薄荷

甘草稍 川貝母 各二錢 黃連

牛蒡子 各三錢 生地黃 二兩 當歸尾 八錢

赤芍 六錢

共為細末煉蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯服

健脾肥兒丸 痧疹後失調體瘦氣虛或成疳疾或泄

人參 橘紅 廣皮 各五錢

黃耆 蜜炙 白扁豆 炒 白木 米湯浸

瘍醫大全 卷三十三 痧疹方 全 顧氏秘書

山藥 白茯苓 各一兩 當歸

白合 各八錢 白芍 酒炒 地骨皮

甘草 各六錢 川黃連 炒三錢 山查肉

神麩 炒各二兩

磨細煉蜜丸彈子大每食遠白湯調服

天真膏 痧疹後咳嗽內熱不調心神慌亂夜臥不安

白木 米湯浸 生地黃 元參

生黃芪 知母 麥門冬 去心

沙參 生薏仁 桑皮 各四兩

白茯苓

當歸

白茯苓

橋紅

牡丹皮

紫苑

棗仁炒各二兩

取長流水用砂鍋桑柴文武火熬成珠用上好

白蜜收成盛淨器內每服三五茶匙白滾水調

服

防風發表湯

初起發熱未見時二三日或四五日內或係奶疹風疹皆宜用此疏風清熱

防風

川芎

甘草

各五分

山查肉二錢

乾葛

桔梗

各八分

傷寒全

卷三十三 痧疹方

全

顧氏秘書

枳殼炒七分

蘇梗

荆芥

當歸

陳皮各六分

紅花三分

杏仁去皮尖炒一錢

白水煎如冬月天寒加羌活或蜜炒麻黃引用

細葱白半寸

朱氏曰可去陳皮加牛蒡子七分連翹五分夏

月炎熱可加炒黃芩五分如小便黃澀可加木

通七分

孟氏介石募施治痧神方

凡遇痧疹不拘四時皆可煎服藥味分兩萬勿增損

石膏煨二兩

當歸尾

乾葛

桑白皮各一兩

荆芥

地骨皮

桔梗各八錢

牛蒡子

赤芍

陳皮

薄荷各五錢

枳殼六錢

川貝母

甘草各四錢

紅花三錢

共為細末每次用末三五錢白水三鍾煎湯濾

去渣服輕者三五服重者六七服立愈照方施

濟功德無窮大能起發透表解毒清熱不傷元

氣是以功有神效并表藥性於左

傷寒全

卷三十三 痧疹方

全

顧氏秘書

石膏味辛色白透表淡而利竅煨用即純痧症

要藥清涼解毒用以為君陳皮枳殼桔梗疎氣

清肺桑皮潤肺止喘清火化痰紅花歸尾赤

芍藥辛治肺經血熱血活則毒散牛蒡子解毒

問熱通氣舒毛孔地骨皮解肺毒消熱燥甘草

解毒和藥荆芥散血分之風熱能開毛孔貝母

朱氏曰子見去桑皮不用可加前胡一兩防風

八錢酒炒黃芩八錢連翹五錢

瘍醫大全目錄

卷三十四

諸瘡部

疔瘡門主論 附方

水疔門主論 附方

紅絲疔門主論 附方

楊梅瘡門主論 附方

楊梅癰門主方

楊梅瘡愈後紅黑疤不褪門主方

楊梅瘡

結毒門主論 附方

補鼻遺原法

瘍醫大全卷三十四

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽 全校
男 櫛燮用和

諸瘡部

凡疔瘡楊梅結毒俱彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全 卷三十四 疔瘡論 一 顧氏秘書

疔瘡門主論

華元化曰疔有五色屬五臟紅屬心發於舌根青屬

肝發於目下黃屬脾發於口唇白屬肺發於右鼻

黑屬腎發於耳前以種類言之

孫真人千金方論疔瘡一十三種一曰麻子疔其狀

肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多癢忌食麻子油衣麻衣

入麻田中行二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬

刺之不入肉微痛忌瓦礫磚石之屬三曰雄疔其狀炮起

頭黑靨四畔仰炮將起有水出色黃大如錢孔形

高者忌房 四日雌疔其狀瘡稍黃向裏壓赤似灸瘡四邊施漿起心凹色赤如錢孔者忌房 五日火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑屬四邊有烟漿又如赤粟米者忌火 六日爛疔其狀色稍黑有白斑瘡中潰有膿水流瘡形大小如匙面者忌熱食 七日三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生一明日生二及至十若滿三十六藥所不能治未滿三十六可治忌喫葱蒜 八日蛇眼疔其狀瘡頭黑皮淨生形如小豆狀似蛇眼大體硬

湯醫大全 卷三十四 疔瘡論 王 顧氏秘書

忌惡眼人看并嫉 妬人見忌毒瘡 九日搨疔其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起大忌食 十二水洗疔其狀大如錢形如錢孔頭白裏黑屬汁山中梗忌飲漿水 水洗渡河 十一日刃鎌疔其狀濶狹如薤菜大長一寸左側肉黑如燒烙忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以藥治不可亂攻 十二日浮瀝疔其狀瘡體圓曲少許不合長而狹如薤菜大內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之痛十三日牛狗疔其狀肉色炮起搨不破已上疔瘡十三種初起瘡心先癢後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉

重心驚眼花若重者則嘔逆嘔逆則難治蘇子疔一種始終惟癢以上忌禁者不得觸犯如觸犯者發作難治惟浮瀝牛狗二疔無所禁忌縱不醫亦不害人其狀寒熱與諸疔不同故不殺人也凡疔起後背強瘡痛極甚不可忍者是觸犯禁忌以此為辨此條與外臺秘要神巧萬全所論頗同

王肯堂曰疔之四圍有赤腫名曰護場為可治疔之四圍無赤腫名曰不護場不可治準繩

又曰瘡證急者有應如生一疔之外別處肉上再生

湯醫大全 卷三十四 疔瘡論 王 顧氏秘書

一小瘡卽是有應可用針挑破護場瘡四圍有赤腫生多瘡者謂之滿天星飲食如常頭痛身熱手足溫

陳實功曰疔瘡有朝發夕死隨發隨死誠外科證中迅速之病也凡治此證貴在乎早如在頭面頭乃諸陽之首亢陽熱極所致其形雖小其惡甚大再加艾灸火益其勢逼毒內攻反為倒陷走黃之證作矣既作之後頭面耳項俱能發腫形如胖尸七惡頓起治雖有法百中難保一二不可不慎正宗

又曰毒發於心經者生爲火疔多生心臟之俞募井之端唇口手掌指節或手之小指初生一點紅黃小泡抓破痛癢非常左右肢體麻木心煩發躁言語昏憤

又曰毒氣發於肝經者生爲紫燕疔多生手足腰脇筋骨之間或足大指初生便是紫泡次日破流血水三日後串爛筋骨疼痛苦楚眼紅目暗指甲純青睡語驚惕

又曰毒氣發於脾經者生爲黃鼓疔初生黃泡光亮

瘍醫大全

卷三十四

疔瘡論

四

顧氏秘書

明潤四面紅色纏繞多生口角腮額眼胞上下及太陽正面之處便作麻癢癩急硬強重則惡心嘔吐煩渴乾噦

又曰毒氣發於肺經者生爲白刀疔多生手大指初生白泡頂硬根突破流脂水癢痛驟然易腐易陷腮損咽焦毛聳肌熱咳吐膿痰鼻掀氣急

又曰毒氣發於腎經者生爲黑靨疔多生耳竅胸腹腰腎及足小指湧泉偏僻軟肉之間初生黑斑紫泡毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如釘痛徹骨髓重則

手足青紫驚悸沉困軟陷孔深目睛透露

又曰紅絲疔起於手足節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊或攻大腿令人寒熱惡心嘔吐遲者紅絲至心常能壞人急用針於紅絲盡處挑斷出血尋至疔上挑破插入蟾酥條膏蓋內服蟾酥丸發汗追出疔根得膿自愈

又曰唇下疔又名馬口疔

又曰手掌心疔又名擊珠疔

又曰患疔經五六日不瘥目中見火光心神昏昧口

瘍醫大全

卷三十四

疔瘡論

五

顧氏秘書

乾心煩嘔吐不定皆屬疔毒內陷均須速治馮魯瞻曰疔者經曰膏梁之變蓋因膏梁之人皮厚肉密內多滯熱故變爲疔然古方計有一十三種三十六疔之分總由臟腑積受熱毒邪氣搏於經絡以致血凝毒滯注於毛孔手足頭面各隨臟腑部位而發其形如粟米或痛或癢漸至遍身麻木頭眩寒熱時生嘔逆甚則四肢沉重心驚眼花經雖所載疔色有五以應五臟其實紫黑及黃泡者居多先癢後痛先寒後熱也宜內服發散解毒攻

托之劑外敷拔毒菊花葉蒼耳草之類大概疔已
 成膿則毒已外洩可無他慮惟在初起最宜謹慎
 疔毒攻心禍如反掌蓋疔由心火蘊結故其疼痛
 常為害甚速病人口嚼生莖不覺莖腥者即是也
 若於耳後方圓一寸發者尤甚蓋水枯火熾之極
 也不可妄動如抓破見風毒即內攻不救
 又曰紅絲疔者又名血絲疔發於兩手指而作紅絲
 漸漸行至關節勢必殺人可先以線裝住紅紋之
 處次將銀針砭去惡血以藥塗之上者血紅次者
 血紫下者血黑若一失治則稽留不散輕則爛傷
 墜指重則入腹而死
 又曰內經以白疔發於右鼻赤疔發於舌根黃疔發
 於口唇黑疔發於耳門青疔發於目下蓋取五色
 以應五臟各有所屬部位更有發於或肩或背或
 腰或足發無定處如在手足頭面骨節間者最急
 其餘猶可緩也

李東垣曰疔上按之慘痛應心者是疔也秋冬寒毒
 久結皮膚中變作疔瘡不急治之日夜根長流入

諸脉數道如箭入身顛掉不已若不慎口味房室
 死不旋踵 精義

申斗垣曰夫疔瘡取治其法不一當先看其緩急如
 緩者一日瘡胞白色而小二日色白微大三日色
 微紫四日色真紫此候之緩也急者五日色青紫
 小六日色深青大紫七日色黑如火灸瘡之狀此
 最急之候假如身上生一瘡而他處又生一小瘡
 為之應候先用針挑破小瘡則泄其毒謂之可治
 若只有一疔他處無小瘡謂之無應候不可治疔
 無應候是毒氣之甚故不可治也大抵疔瘡四圍
 有紅赤焮腫者名曰有護場如疔瘡四圍不赤腫
 者即是不護場不可治也有護場方可治也疔之
 生者身熱頭疼手足溫煖飲食如常是常疔也疔
 之危者眼轉大渴而喘唇面青不進食五心腫無
 有脉四肢冷不起床不精神腹痛甚於常是有內
 疔也 啟玄

周文采曰凡療疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四
 邊十餘下令血出去盡惡血敷藥藥力得入針孔

中方佳若藥不達中藥力難達反致悞事又看口中頰邊舌上有赤黑如珠子者是疔也 集驗

養生篇曰人汗入肉食之則生疔瘡不可不慎

竇漢卿曰凡疔瘡針刺患人手足中指不痛者難治

又曰如疔在頭面手足骨節間者甚急

又曰疔瘡頭陷碧綠色者不可用針刀出血

又曰疔瘡日久潰爛者不可用針出血只可用刀割

去腐肉

又曰疔瘡生根入腹者便死用磨針刀鐵漿水一碗

傷醫大全

絲綿濾淨銀筒內煎三四沸服之病者須臾腸鳴

行利一二次甦醒方妙

又曰疔瘡不破則毒入腸胃惟蟬蛻極效用一兩為

末蜜調下

又曰疔發於太陽眼邊者名曰釘腦疔十死一生

又曰疔瘡膿水出孔如蜂巢病易瘥也

又曰凡人暴死多是疔毒急取燈遍照其身若是小

瘡卽是其毒宜急灸之並服飛龍奪命丹等藥亦

有復甦者 全書

竇夢麟曰嘴唇上疔初如米大或粉刺擠破入湯火

風氣卽要變為疔瘡疔瘡卽疔之別名也先用芎

白同飛龍奪命丹五粒和嚼爛熟酒半碗送下以

衣覆患上畧出汗為妙上午服藥下午卽將絕利

磁鋒割破瘡口十字卽搽飛龍奪命末在內而外

用蟾舌研爛蟾肚底皮貼之內服追疔湯劑若發

鬚髮者卽剃去鬚髮如前法治之此法靜夜細思

試而行之百發百中活人多矣焉敢自秘遂並梓

行病人一月內無色慾者患處平妥無腐肉乃其

傷醫大全

卷三十四 疔瘡論

顧氏秘書

徵也 全書

陳遠公曰有生疔瘡者疼痛非常亦陽毒也生之

時人最難辨但以生黃豆令嚼之不知醒者便是

其瘡頭必發黃泡中現紫黑之色細看泡中必有

紅白一線通出泡外凡疔生足上紅線由足入臍

疔生手上紅線由手走心如生唇面紅線由唇面

至喉如見此紅線卽於盡處以針刺出毒血則免

毒攻心若現白絲不必刺也總以消毒瀉火為主

世人戒用官料之藥此乃不知醫之語毒非藥安

得除哉拔疔散治之紫花地丁甘菊花各一兩水煎服一劑紅線除二劑疔散三劑全愈不必外治挑疔之多事也若已潰爛加當歸二兩治之不必四劑毒盡肉生也 水鑑

胡公弼曰猪疔其形圓而小口內有油忌食猪油猪肉 牛疔其形圓而小口內無油炮起搯之不破有寒熱忌食牛肉 狗疔其形長而帶尖色赤有寒熱忌食狗肉 羊疔其形長而帶白色有寒熱忌食羊肉 瓜藤疔不計其數其形圓長如瓜形

瘍醫大全 卷三十四 疔瘡論 十一 顧氏秘書


因食瓜毒而生忌食諸瓜 荳腐疔其狀白炮三日內頂陷因食荳腐內有人汗而生忌食荳腐氣疔其形或大或小炮白如有氣在內因感毒怒而生忌氣惱 鬼疔其形大小不一因中邪毒之氣而生異於諸疔比氣疔夜甚令人言語如見鬼狀 紅絲疔其形縷縷赤色如絲線周身纏繞宜松針刺去血忌熱物 內疔言其生於內臟腑上腔子裏面喉內口內與外疔更不同利害宜托裏追疔 葡萄疔其形黑兼紫如水晶故名之炮內

黑血毒水宜去之宜托毒 楊梅疔形黑紫如蕪梅狀若遍身楊梅瘡內雜疔瘡一二個則令通身瘡不起發須針刺出毒服托裏土茯苓等藥 魚臍疔如魚之肚臍多生臍膊肚小腿肚上乃手足陽明經分毒氣治宜加引經藥 蜈蚣疔形長如蜈蚣亦有頭足發寒熱因飲食中被蜈蚣遊走遺毒於內而生宜加雄黃

程山齡曰疔疔之法貴在乎早初起即治者十全十活稍遲者十全五六失治者十全一二內服莫妙

瘍醫大全 卷三十四 疔瘡論 十二 顧氏秘書

於菊花甘草湯項之以上三陽受毒必用針刺挑斷疔根插藥膏蓋項之以下三陰受毒即當艾灸灸之不痛亦須針刺插藥自效 十法



疔瘡門主方

菊花甘草湯 十法

治疗之聖藥也

白菊花 四兩 甘草 四錢

水煎頓服渣再煎服

反唇疔擊珠疔

經霜南瓜蒂煨灰加水片少許研細麻油調搽

馬口疔生唇下者是

新鮮鯪魚血磨蟬酥塗之

瘍醫大全

卷三十四

疔瘡方

三

顧氏秘書

拔疔法

巴荳 去殼半粒 磁石 研末

用芴涎和蜜為膏敷疔上

血疔出血不止者是

真麻油一鍾服下自止

蟾酥餅

兼治腦疽乳癰附骨疽癰一切惡症或不痛

或大痛或麻木用此敷貼瘡頭

湖腦 硃砂 各一錢 真蟾酥 酒化

沒藥 去油 乳香 去油 明雄黃

芭豆霜 各二錢 輕粉 五分 麝香 三分

以上各為細末於五月五日午時在淨室中用

蟾酥酒和丸如菉豆大每用一丸口涎調貼疔

瘡上以膏蓋之此藥為丸為條為餅聽便施用

一方去巴豆霜潮腦加寒水石 煨 枯礬磨礬各

一錢蝸牛二十一個

惡疔大毒

金銀花 當歸身 各五錢 天花粉 甘草

瘍醫大全

卷三十四

疔瘡方

三

顧氏秘書

地丁 各三錢 皂角針 二錢 川椒 九粒

酒煎服

疔毒惡瘡

家菊花並葉共搗汁用酒冲服將渣加鹽少許敷

上立愈冬月用根亦可

又方

紫梗菊花搗碎白酒煎服

又方

鱗魚鱗用荷花瓣夾好置書頁中遇疔貼上即愈

大疔惡毒秘方

火 硝

北煤係用過倒地上搗內檢出者各等分

研細末磁瓶收貯凡遇一切疔毒用陳窗糊紙水濕掩疔上再以此藥敷之疔根自出

疔瘡神方

蒼耳草根葉搗爛入童子小便絞汁冷服一鍾日三次仍以根莖苗葉任以一束燒灰存性為末用醋泔盪靛和如泥先將瘡中心及四邊刺破令血淌出拭淨敷之不過十次根即拔出為諸方第一

傷醫大全

卷三十四 疔瘡方

十四 顧氏秘書

飛龍奪命丹

正宗

專治疔瘡及癰毒發背腦發乳癰一切無名腫毒惡瘡及有頭不知痛癢者已成未成神效

蟾酥酒化

雄黃各三錢 乳香去油

沒藥去油

銅綠各二錢 膽礬

硃砂

血竭 寒水石 各一錢

當門子

冰片 輕粉 各五分

蝸

牛二十一個 蜈蚣一條酒浸泡炙去頭足

右俱為極細末用蝸牛連殼研如泥少加飛羅

麩和丸如菜豆大每用三丸用芎白三個令病人嚼爛吐於男左女右手手心將丸藥放在芎內熱酒送下被蓋約人行五六里出汗為效無汗以熱酒助之重者再進一服病在上食後服病在下食前服忌冷水瓜茄油膩豬雞魚麪及一切發物孕婦忌服

走馬回疔丹

疔瘡初起針破用此一粒插入孔內膏蓋之次後追出膿血疔根為效

傷醫大全

卷三十四 疔瘡方

十五 顧氏秘書

硃砂

雄黃各二錢 蟾酥酒化

硼砂

白丁香 輕粉 各一錢

蜈蚣

一條炙 金頂砒 麝香 各五分

乳香 六分

右為細末糊和成如麥子大挿瘡內以膏蓋之

鉛粉散

冷疔生於脚上初起紫白泡疼痛徹骨漸至腐爛深孔紫黑血水氣穢經久不瘥用此大效

黑鉛

四兩銖杓內化開傾入水中取起再化如鉛此百遍以鉛盡為度去水取渣下者三錢

松脂一錢 黃丹飛炒 輕粉各五分
麝香三分

共研細先用芎湯洗淨麻油調搽瘡口油紙蓋好

東毒金箍散

疔瘡針刺之後痰毒走散作腫宜此藥箍之

生大黃 鬱金蟬肚者 白芨 白薇

白芷各四兩 黃柏二兩 萊豆粉一兩 輕粉五錢

共為細末酸米漿調箍四邊夏熱甚用蜜水調

湯醫大全 卷三十四 疔瘡方 七 顧氏秘書

消疔簡便方

疔瘡及諸惡毒初起但未成膿者服之神效

白礬研三錢 芎白七莖

右二味同搗極爛分作七塊每塊用熱酒一杯

送下服畢用厚被蓋之再進芎白湯一鍾少頃

汗出如淋從容去其覆物其病如脫此雖味澁

難服其效甚妙凡居鄉村之處遇有此症不及

延醫只傳此方服之活人甚眾誠為良便方也

敷疔

銀珠三錢 紅棗七個煮爛去皮核
搗敷留頂

疔

甘松 三柰各五錢 雄黃研細 麝香一分

酒水各半先煎甘松三柰煎好濾清調雄黃麝

香服

紅絲疔

用銅錢捫起頭處將木上舊釘起一根用棉花包

裏蘸桐油點着令油滴錢眼內一滴即愈

湯醫大全 卷三十四 疔瘡方 七 顧氏秘書

疔瘡

生芎和蜜搗敷患處過一飯時疔即拔出

保生挺子

疔瘡背疽癰癤一切惡瘡

巴豆四十九粒文武火炒研 礮砂二錢 輕粉半大團

金脚信 雄黃各二錢 麝香一錢

為極細末用黃蠟五錢熔開將藥合成挺子冷

水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡

頭撥開安一餅子於頂上次用膏貼

蟾酥丹

蟾酥不拘多少黃丹白麩等分為丸如麥粒大針破疔瘡以一粒納之膏蓋

散疔膏

磁石乳細以芎頭十四根取汁入蜜少許調勻敷留一孔一敷即散妙不可言內服托裏藥

拔疔

蟻螂腹下有一點白者即心也先以針刺破疔頭再將針取出蟻螂心點疔頭上以膏蓋之半日間

瘍醫大全

卷三十四 疔瘡方

末

顧氏秘書

血出根拔而愈忌羊肉

一切疔腫 孫真人

一色蒼耳草連梗葉燒灰以醋脚泥調搽乾即再

搽重者十次愈

喫牛肉中毒生疔

金線重樓

即七葉一枝花

不俱多少切碎研細和溏雞屎

調勻搽上立效

疔瘡怕動刀針

巴荳仁一粒 飯一粒研貼瘡上立時拔出疔根

再尋癩瘡疔取肝貼上神效

諸疔

菊花葉搗汁服一碗死可回生

疔毒已篤者二服即愈

潘霞山

土蜂房 一具

蛇 蛻 一條

黃泥固濟燒存性為末每空心好酒服一錢少刻大痛痛止其瘡已化為黃水

爛頭疔

白梅 二個

大槩蚰 二條

白菊花根 一把

瘍醫大全

卷三十四 疔瘡方

末

顧氏秘書

共搗爛加透明雄黃同敷如乾再另敷一二遍

無不愈者

紫馬疔

切不可食肉生白酒煎菘菴草紫花地丁車前草服之

追疔奪命湯 赤水玄珠

羌活

甘草節

蟬蛻

川黃連

獨活

北細辛

胥皮

金銀花

防風

澤蘭葉 疆蠶 金線重樓
赤芍 各等分

有膿加 何首烏 白芷

要通利加 大黃 牽牛

青木香 山梔

毒在下加 木瓜 各等分

每服五錢先將一貼加澤蘭葉金銀花各一兩

姜十片煎熱服汗出為度病退再加大黃二錢

煎熱服取利一二次去餘毒為妙此方取效如

瘍醫大全 卷三十四 疔瘡方 主 顧氏秘書

神百發百中若心煩嘔吐用甘草節菉豆粉各

等分酸漿湯調下二錢如嘔逆惡心用乳香菉

豆粉各等分甘草湯調下二錢

小奪命散

治疔瘡及腦疽惡毒其效如神

槐花子 地丁 千頭子 即掃帚子 又名地膚子

子各等分

水煎通口溫服加真蟾酥少許尤妙

拔疔丹 一名疔毒撤回 畢峻功

凡一切疔瘡無名腫毒初起磨敷已成已潰用
一粒放瘡口上膿血即拔出如遇陰疽對口大
症可用十數粒鋪瘡上如神

巴荳霜 乳香 去油 沒藥 去油

真蟾酥 酒化開明 雄 各二錢 樟 冰

露蜂房 陰陽瓦 焙存性 劈硃砂 各一錢 真輕粉

當門子 各五分

右各乳極細照分兩稱準和勻以蟾酥膏和忤

為丸如藥珠大晒乾磁瓶密貯任用 此即蟾酥 餅原方加

瘍醫大全 卷三十四 疔瘡方 主 顧氏秘書

露蜂房也

疔瘡丸 馬驥功得自盧成瑛傳

專消一切疔瘡兼治濕痰流注梅瘡初起

巴荳仁 去皮膜 明雄 生大黃 各三錢

共研細末加飛麩醋打糊為丸如金鳳花子大

每服二十三丸熱湯送下瀉三四次無妨弱人

只服十九丸自消得噓即愈

髭疔紅絲疔面白疔腫脹至目與鼻俱隱入肉裡牙

關緊急

昔有一道人用患者耳垢齒垢刮手足指甲屑和
勻如荳大放茶匙內燈火上炙少許取作丸將銀
箸將疔頭挑開抹入外用棉紙一層津濕覆之痛
立止半日目可開腫已消半次日服活命飲二劑
遂愈

血疔或生肘下或生眼角疔有一竅如針眼淌鮮血
不止

真香油四兩無灰酒不拘多少和勻熱服其血立
止隨用野菊花濃煎常服切忌茶湯

萬靈奪命丹
治一切疔毒入腹煩悶惡心兼治癰疽發背惡
瘡

砂 水飛 蟾 酥 人乳泡 輕 粉

膽 礬 各五錢 銅 綠 血 竭 各一兩

雄 黃 枯 礬 各二兩

共為細末麩糊丸芡實大每服一九令病人先
將葱白三寸嚼爛吐在手心將丸包在葱內熱
湯吞下出汗

疔

生磁石 一錢 麝 香 一分

研極細每用少許膏蓋

又方

胡 椒 二十五 大獨蒜 一個 葱 白 三根

共搗爛油紙上作膏貼之神驗

秘方

用鐵釘放屋上受風露之氣日久上鏽以刀刮下
乳極細加麝香少許磁瓶密貯如遇疔瘡已破者

萬靈奪命丹
治一切疔毒入腹煩悶惡心兼治癰疽發背惡
瘡

摻少許即流黑水不過三次疔根自出如未破者
以水調點疔上即可拔疔如神

疔瘡不用刀針 杜寶山

草麻仁 七粒 銀 硃 一分

共研細如乾加唾津少許疔頭讓出即週圍敷
之兩三次即出小黃頭矣

拔疔第一方 徐義峯

草麻仁 四十九 杏 仁 去皮十松 香 二兩一

荔枝肉 三個半 銀 硃 少許

共搗成膏貼之

拔疔 吳韻清

荔枝肉 一個 溇雞屎

共搗爛敷上立愈

菊花根葉 不拘多少

又方

鮓魚鱗貼之

瘍醫大全

卷三十四 疔瘡方

疔 顧氏秘書

水疔門主論

凡人手足一時生出小瘡四圍紅赤中間一點漆烏

堅硬如石痛不可忍者名曰水疔破後惟流血水

啟玄

瘍醫大全

卷三十四 水疔論

疔 顧氏秘書

水疔門主方

治水疔

土牛膝不拘多少搗爛入鹽少許和勻敷疔上半日即愈

又方

陳壁土 食鹽各一錢 雄黃三分

共研細末津唾調敷疔上其疔自落

水疔

五月五日午時採菴葶草搗細末酒調服三錢取

湯醫大全

卷三十四

水疔方

七

顧氏秘書

汗

又方

荔枝肉一個貼疔上以生白酒飲醉取汗為度

紅絲疔門主論

胡公弼曰紅絲疔一名急疔生於手足肘腕之間初起如黃豆大色似緋袍此疔根行如箭日夜行一尺二寸狀如紅絲線一般皆因大喜大怒氣血逆行所致走入心腹令人悶亂不救凡遇此等急症尋見紅絲之處即用神針針斷其根針入四五分取去紫黑惡血急服追疔奪命丹隨飲浮萍酒立愈無愧青囊

湯醫大全

卷三十四

紅絲疔論

七

顧氏秘書

紅絲疔門主方

浮萍酒 陸伯迪

治紅絲疔一服即愈

浮萍不拘多少搗爛用好酒一觔或半觔煎滾沖

浮萍內半時許通口服隨嚼浮萍草敷疔上

瘍醫大全


卷三十四

紅絲疔方

夫

顧氏秘書

楊梅瘡



瘍醫大全

卷三十四

楊梅論

夫

顧氏秘書

楊梅瘡門主論

陳實功曰楊梅瘡者又名時瘡俗名反瘡因其形類
楊梅耳總由濕熱邪火所化先從上部見之皮膚
作癢筋骨不疼其形小而乾者是氣化傳染乃脾
肺受毒毒在皮膚不曾傳裏為輕宜萬靈丹發汗
自解先從下部見之筋骨多疼小水澀淋其形大
而硬者是精化慾染乃肝腎受毒毒在骨髓未透
肌膚為重宜九龍丹通利以瀉骨中之毒須內毒
已解筋骨不疼瘡根淡白方可搽藥若求速効妄

用藥薰擦必貽後患醫家病家均慎重之 正宗

馮魯瞻曰楊梅瘡者因形相似而名之也凡氣受之而得者堅實凸起又名棉花瘡若血受之而得者其形扁摺而潰又名菓子瘡皆類其像而俗呼之北方名曰天泡瘡雖名異而實同然治療須別凡自致者重傳染者輕自致者淫慾太妄以致陰處先見及縱口恣味三焦皆熱精竭血結遺滯諸經而成也傳染者中氣不足外染稍輕然患此者切不可用毒物發之亦不可用涼藥遏之並求速效

瘍醫大全

卷三十四 楊梅論

幸 顧氏秘書

須用煎藥解毒補益托散外用煎藥洗浴仍以膏藥搽貼拔毒出外方無後患 錦囊

申斗垣曰陰楊梅瘡與陽楊梅瘡大不相同陰楊梅瘡色紅而不起不破乃血中受風熱之毒又云男子受婦人梅瘡毒穢起相感而生 攷玄

又曰翻花楊梅瘡是表虛毒勢猖獗而成

又曰楊梅豆子是毒氣之微感之輕也

又曰楊梅癰是患瘡時食了牛肉或洗浴當風抓癢有犯房慾致令渾身腥臭或乾而起白屑或腥水

淋漓治當分氣血身之上下多少

又曰楊梅瘡食豬腸臟致令愈後復生楊梅圈子瘡也

陳遠公曰有嫖妓戀爐酣戰覺馬口間如針刺痛此毒氣已過也未幾生魚口矣生疔瘡矣徧身生瘡矣黃膿汎濫臭腐不堪人以爲毒盛多用敗毒之味不知日事敗毒而毒益盛瘡益多有腐爛而死者夫楊梅之毒中於泄精之時必元氣虧損故毒乘虛而入若元氣大旺毒難深入卽有傳染不過

瘍醫大全

卷三十四 楊梅論

幸 顧氏秘書

輕微之毒可一瀉而痊遍身毒瘡乃大虛而毒深中也不補虛而瀉毒何能奏功乎若止服敗毒無異下石矣二生湯生黃芪土茯苓各三兩生甘草三錢水煎服四劑瘡漸紅又四劑乾燥又四劑全愈 此方不去解毒只以黃芪補氣氣旺邪自難留得甘草之化毒土茯苓之引毒毒去而正氣無傷氣生而血又能養此治之巧無如人不知也可勝嘆息云 辨證水鑑

胡公弼曰楊梅瘡又名砂仁瘡其患皆因色慾過度染受穢污惡毒或先患下疳或先患橫痃然後始發此瘡此瘡將萌手掌心隱隱當見紅點治之者

切不可苟圖財帛暗用輕粉等藥隱之梅毒一服輕粉如油入麪毒入筋骨而莫能解也不但終身骨中疼痛結毒潰爛上至五官頭顱下至玉莖元首蟲蝕無存噫輕粉之爲害可勝道哉患此瘡者亦不可畏人物議而求速效醫者當盡發其毒使之外出務使永無遺患無愧青囊

又曰有患楊梅瘡遍身獨有一二個形色黑紫如薰梅痛疼特甚多令通身瘡不起發此乃楊梅疔也卽如痘疔阻遏不能起發行漿無異須用針刺出

瘍醫大全

卷三十四

楊梅論

三

顧氏秘書

血服托裏土茯苓等劑

又曰楊梅漏初起似肉泡其人起薄皮層層揭去直搗至三四十層方能穿破宜服人參芪苓湯毒未穿不用膏藥如已破貼梅漏膏待肉平去膏藥

蔣示吉日總之楊梅瘡宜發不宜遏貴在除根莫求速愈得其旨矣說約

廣筆記云有以水銀番礪搓擦五心醫楊梅瘡致令患者三日間舌爛齒脫喉潰穢氣滿室吐出腐肉如猪肝色二便不通湯水不入腹脹幾死證已危

急矣醫斯證者須以手按病人之腹不痛者知雖脹未堅毒未及心其毒尚淺速治可救法用鉛二觔分百餘塊加大劑甘桔湯料銀花甘草各四兩水三十碗煎濃汁先服三四碗徐澆舌上任其自流澆灌一個時辰其舌卽可轉動口內可卽漱淨隨令飲汁數盞將前渣再煎連前剩汁纔和一處頻頻洗濯手足次日二便出黑水無數始安然後用吹口藥及內服敗毒內托之劑而痊

瘍醫大全

卷三十四

楊梅論

三

顧氏秘書

瘡乃時氣乖變邪氣湊襲形如楊梅或上或下綿綿不絕皆由入房不淨淫火鬱結之毒若瘡毒傳染氣化者輕先入脾肺其瘡先見於上部皮膚作癢筋骨不疼其形小而且乾毒在皮膚未經入裏治宜發散若淫女構精精化慾染者重流於肝腎先發下疳次生魚口先從下部見之漸至遍身大而且硬筋骨多疼小水澁淋此症最重因其毒氣內入骨髓外達皮毛若非汗下兼行將何以洗濯其臟腑乎若瘡發已久氣血已虛毒猶未退宜解

毒托散為主總以醫至筋骨俱已不痛瘡根淡白
內毒已散方用點藥輕者半年重者一載方可全
愈若不遵此法欲其速愈妄用薰條擦藥哈吸等
法往往致成後患者多矣

瘍醫大全

卷三十四

楊梅論

書

顧氏秘書

楊梅瘡門主方

首用第一煎方

全當歸

穿山甲

切碎微炒

甘草節

沒藥 去油

柴胡

乳香 去油

天花粉

川貝母

皂角刺

赤芍 各三錢

防風

連翹

肉桂 各二錢四分

金銀花

廣陳皮 各七錢五分

白芷 二錢一分

右各準稱分作三劑每日一劑用黃酒一觔水

瘍醫大全

卷三十四

楊梅方

書

顧氏秘書

一觔煎至一觔為度宜砂罐煎之溫服取汗
欠水酒減半照上溫服取汗戒口味不過三服
即愈看何部位照後加味治之神效

頭上加 藜木

面上加 升麻 白芷

頂上加 升麻 桔梗 羌活

腹上加 白芷 柴胡

背加 皂角刺

胸加 瓜蒌

腰加羌活 獨活

脇肘加柴胡 青皮

臂上加肉桂 羌活

耳後加升麻 柴胡 獨活

桔梗

四肢加肉桂 金銀花

肩膊加肉桂 升麻

脚底加肉桂 牛膝

瘡成加肉桂 皂角刺以上引經藥各加一錢

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 顧氏秘書

煮棗神方 家秘 何首烏半觔 天花粉 威靈仙 鱉甲炙

金銀花 皂角刺 川草薺 白殭蚕

木通 白芷 麻黃 蟬蛻

當歸 蒼朮 川芎各二兩 生大黃

生地各四兩 全蛇蛻一兩

右藥用水一斗磁鍋內煎至五六升去渣淨揀大黑棗五觔入汁再煎收至藥汁乾為度將棗晒乾不時食數枚毒漸消口自收落腐而愈

消風敗毒散

歸尾 川芎 生地 赤芍

黃芩 乾葛 升麻各一錢 川黃連

防風 黃栢 連翹各八分 羌活

金銀花 蟬蛻 甘草各五分

水煎二三劑熱服 初起必加大黃二錢芒硝一錢五分通利惡物去淨後即勿用

廿四味風勝飲說約

毒發出時用

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 顧氏秘書

防風 荆芥 白芷稍 連翹

苦參 赤芍 黃連 地骨皮

白蘚皮 黃芩 山梔子 歸尾

木瓜 金銀花 蟬蛻 苡薏仁

黃栢 殭蚕 五加皮 甘草

白蒺藜 皂角刺各一兩 土茯苓白實者三觔

上部瘡多倍加川芎 下部瘡多倍加木通 瘡痛加羌活獨活 體虛加人參茯苓去梔子 分作五六十劑每日水煎二劑服 忌牛肉燒

酒猪肝腸鹽宜炒過食不炒恐生癬此方起死

回生活人甚眾

羊肉發藥 說約

梅瘡初起皮膚燥癢上部多者

蟬 蛻

川 芎

當

歸 各三錢

威靈仙 一兩

麻

黃 春用七錢夏用五錢秋用九錢冬用二兩二錢

先用羊肉一筋水十碗煎七碗去羊肉入前藥於汁內煎至三碗去渣一日內早午晚分三次

服用用羊肉好酒過口喫盡被蓋取汗或吐或

瘍醫大全

卷三十四

楊梅方

長

顧氏秘書

瀉三四次以粥補住內毒日解外毒自發忌牛

狗鷺雞火酒茶醋等物每早食仙棗三枚如病

人不能飲酒或虛極者服臍子湯

仙棗方

大黑棗二十一枚去核入胡粉三分逐個用線紮

緊放小砂礮內畧放水煮熟露一宿空心喫三枚

冷茶送下

臍子湯

說約

楊梅人虛氣弱不能汗下用此解毒托散方能

送毒出外

薏苡米

川 芎

金銀花

牛 膝

木 通

胡黃連

當 歸

川黃連

防 風

各一錢

甘 草

六分

白殭蚕

七條炒研

土茯苓

二觔

米泔浸一二時打豆

肥皂子

七粒打去黑皮

陳酒河水各二碗煎一半入前藥併臍子一副

去油淨同煎一碗空心服取汗忌口如前虛弱

甚者加人參

猪肉茯苓湯 說約

瘍醫大全

卷三十四

楊梅方

長

顧氏秘書

梅毒下身先見遂及遍身骨節酸疼二便澀滯

牛 膝

蒼耳子

甘 草

全當歸

蛤 粉

金銀花

紅 花

天花粉

皂角刺

各二錢

蟬 蛻

二十一箇

土茯苓

洗淨木槌打碎

精猪肉

各四兩

穿山甲

廿一片土炒研大

黃

大便結用一兩如常者用五錢自利者不用

生白酒三碗煎一半空心服猪肉過口大便利

三四次後以粥補住

仙遺糧湯

說約

土茯苓 即仙遺根洗淨木槌打碎二兩 皂莢子 五箇切片微炒

當歸 白蘇皮 川芎

薏苡仁 木通 威靈仙

防風 金銀花 木瓜

茅蒼木 各一錢 甘草 五分 人參 瘡久氣分虛者加入

水二碗煎八分看病上下食前後服腿腳之下加牛膝一錢病淺者一月可退病深者百日可痊此瘡欲發先發下疳預服此方能免發瘡也此治梅瘡初起筋骨疼痛數月延綿不已並治

瘡醫大全 卷三十四 楊梅方 聖 顧氏秘書

楊梅風毒誤服輕粉癱瘓骨疼不能動履之良方也食忌全前

解毒天漿飲

梅瘡不問新久遍身潰爛及筋骨作疼者

土茯苓 二兩 防風 當歸身 蟬蛻

防已 白蘇皮 連翹 海風藤

皂角針 川芎 金銀花 木瓜

苡仁 各一錢 天花粉 二錢 甘草 五分下部加牛膝一錢

水二鍾煎八分臨服入酒一杯量病上下服之

楊梅結毒 王明宇

天花粉 二錢 白殭蚕 蟬蛻 去兩眼珠脚尖

杏仁 肥皂子 獨核者 皂莢子 以上各七箇

金銀花 五錢 土茯苓 取牽連疔瘡長者各鑽筋透骨草四兩壯實用六兩

忌見鉄器用井水六碗煎三碗任服忌茶醋鹽

戒房事如無獨核肥皂子便用肥皂子十箇打

開看內有黑色黃色油膩味的俱不可用只揀

青草色的方可用皂莢子如蟲蛀的便用十箇

如初生魚口渾身筋骨疼痛即宜服此便可不

瘡醫大全 卷三十四 楊梅方 聖 顧氏秘書

發梅瘡此方得之異傳活人千萬功效甚捷但服是藥日日須喫白水肉以免心嘈不可少也

經驗梅瘡方 錦囊

麻黃 穿山甲 白芷

威靈仙 蟬蛻 各二錢 生黃芪 一錢

生羊肉一筋水五碗煎三碗將藥取起入藥在

湯內煎至二碗熱服蓋被出汗為度

楊梅瘡楊梅風方 錦囊

上茯苓 四兩 川當歸 金銀花

牛膝 各二錢

皂莢子

甘草

防風

羌活

川芎 各一錢

熟地 三錢

水煎三鍾三次服

又方 錦囊

土茯苓 四兩

金銀花

皂角 各五錢

水煎湯另用大肥皂核燒存性為末每用三分

調服

梅瘡神方 厥玄

瘍醫大全

卷三十四

楊梅方

聖

顧氏秘書

川黃連

川芎

胡黃連

當歸 各一錢

土茯苓 二兩

猪胰子 一箇

酒水各鍾半煎一鍾看瘡上下分食前後服

二皂飲 沈員嶠

肥皂子

獨核者

皂角子

三十粒

苦參

金銀花 各一兩

河水碗半井水碗半煎一碗露一宿次早空心

熱服其毒自消

又方

土茯苓 四兩

蟬蛻

皂角刺

肥皂子

殭蚕 各一錢

水三碗煎一碗服一七除根

人參芪苓湯

土茯苓 四兩

人參 一分

土黃芪 三錢

如無以黃芪代之

水十五茶鍾煎湯當茶只食淡肉忌鹹

楊梅瘡服此永無結毒之患 濟生

胡黃連 三錢

牛膝

川黃連 酒炒各一錢

加新鮮土茯苓一觔洗淨木槌打碎水入碗瓦

瘍醫大全

卷三十四

楊梅方

聖

顧氏秘書

罐內煎至四碗入猪胰子一箇再煎至二碗再

將猪胰子一箇剉碎入藥內同胰子一日服盡

寶靈丹

母論梅瘡初起已潰服此神效並治結毒下疳

申毒以及男女內外不可明言之處惡毒等症

珍珠

豆腐包

滴乳香

去油

廣木香

真血珀

另研

沒藥

去油

沉香

冰片

各一錢

西牛黃

五分

辰砂

水飛五錢

真胎骨

不拘多少沉香煎水製過

滴乳石 三錢用零陵香紫背天葵甘草茅香各三錢水煎一伏時收取研用

右藥各味另研照分兩配合再研千餘下磁瓶

收貯每用丹三分加飛白麩二分和研極勻分

作三服每服用新鮮土茯苓一觔刮去粗皮以

木槌打碎入砂銚內加河水十碗煎至六碗每

用二碗調服上丹一分七厘如患者中氣不足

土茯苓只用十兩大便不通加百草霜五分調

服膿水多加當歸白芷各一錢五分毒在上部

加川芎桔梗各三錢在咽喉加玄參三錢在腰

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 醫 顧氏秘書

加杜仲三錢在脇加柴胡防風各三錢在下部

加牛膝苡仁防已各三錢俱加入土茯苓湯中

煎服服過如毒氣不行小便不利可於土茯苓

湯中加利水等味服之自利一料除根

琥珀牛黃丸

治楊梅破爛並一切疽癰久潰膿水不乾者

琥珀 猪牙皂 木香 各一錢

人中白 煨 輕粉 雄黃

硃砂 乳香 沒藥 去油

白芷 各三錢 當歸 二錢 西牛黃 三分

槐花 炒一兩 丁香 香 春夏一錢五分 秋冬三錢

右為極細末酒糊為丸如蘿蔔子大初服五丸

五日後服七丸又五日後服九九又五日後仍

服七丸又五日後只服五丸週而復始俱用土

茯苓甘草煎湯下其毒消散如神

又方

芝蔴 槐角子 各一升

全炒研細每清晨白湯調服二合七日即愈

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 醫 顧氏秘書

又方

陳琉璃陰陽瓦焙研極細土茯苓煎湯調服 二錢

又方

白果肉 紅棗肉 肥皂子 各四十粒

共搗為丸每早土茯苓湯送下三錢

又方

羊糞不拘多少陰陽瓦焙存性每服三錢好酒送

下數服自愈

又方

紅棗肉 核桃肉 輕粉各二錢

共研細作丸分九服每服三十九粒砂為衣瘡上食後服瘡下空心服七日瘡愈換用花椒七粒泡湯送下

梅瘡神效丸 錦囊

棉花核炒 肥皂核炒黃 廣膠 麩皮拌

槐花米炒 馬料豆炒 麻子炒各半

為末雄猪胆汁為丸每服五錢酒送下生在上身者加穿山甲土炒二兩

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 吳 顧氏秘書

又方 錦囊

硃砂二錢 雄黃分一錢五 苦參

荆芥 天麻 麻黃

面粉 牛蒡子 槐角子各三錢

右為末用糖心雞蛋為丸桐子大每服三十九用雞湯或羊肉湯送下一日一服表出毒氣再不發忌一月房室神效

楊梅瘡後腫塊方 錦囊

冷飯團十五兩 防風 薏苡仁

木通 金銀花 防已

白蘇皮 木瓜 皂角刺

茯苓各五錢 白芥子四錢 歸身七錢

分三十服每用水煎空心午飯前晚飯前各一服忌雞魚生冷房事及煎炒茶酒十餘日立效 虛弱人加人參五錢其妙不可盡述

梅瘡遍身臭爛

大蟹蟄一隻竹刀腹上割一小孔將大紅棗填滿再加蟾酥五分用線裝好麻油半觔入砂鍋內炙

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 吳 顧氏秘書

至黃色為度取出研細磁瓶收貯每服三分無灰酒調服取汗五日全愈

忍冬湯

金銀花二兩 黑料豆二兩 土茯苓四兩 甘草二錢

白水煎每日一劑助藥力

金蟬蛻甲酒

梅瘡不拘新久輕重皆驗並治結毒筋骨疼痛諸藥不效者更妙

好酒五觔大蟹蟄一箇浸酒內封瓶口煮兩炷香

取起待次日隨量之大小飲醉為度冬夏蓋煖出汗為效所剩之酒次日只服量之一半酒盡瘡愈服酒後七日不見風要緊忌口味房事百日除根久不收口

陳肥臘肉切薄片貼上日三易先以千里光煎水洗之

神應散

何首烏

天花粉

荊芥穗

苦參

防風

各一兩

肥皂核

燒存性

薄荷葉

各五錢

湯醫大全

卷三十四

楊梅方

藥

顧氏秘書

共為末分十服每日用新鮮白土茯苓八兩雄猪肉四兩入煎藥一服用水七碗煮爛去渣其肉聽食其湯代茶飲之不過十日全愈再無餘毒如善啖肉者可作大劑與之

先天一氣酒

治楊梅瘡筋骨疼痛

鉛七觔打成片剪碎用上好堆花燒酒十五觔將鉛片浸酒內泥封壘口隔湯文武火煮一晝夜埋土中一七退火氣早晚任服一二杯待筋骨不痛

然後服入寶丹收功

鯉鱗槐花丸

沈貞疇

槐花揀淨炒研細用鯉鱗搗丸空心酒服三錢

口上楊梅瘡

先將豆腐渣焙熟將布囊盛之熨嘴俟作癢時以膽礬塗之即愈

翠雲散

銅綠

膽礬

各五錢

熟石膏

輕粉

各一兩

湯醫大全

卷三十四

楊梅方

藥

顧氏秘書

共研極細末磁瓶收貯濕瘡乾摻乾瘡公猪膽汁調點一日點三次自愈

又方

杏仁肆拾玖粒泡去皮尖壓去油取霜研極細入輕粉三錢水片五分再研勻猪脊髓調點若瘡一二箇既大且硬可先用白降丹少許拔去毒氣後用此藥收功

鷲黃散

正宗

梅瘡潰爛成片膿穢多而疼甚者宜之

石膏煨 黃柏炒 輕粉各等分

研為細末乾摻爛上即可生疤再爛再摻毒盡乃愈此解毒止痛收乾之妙藥也

梅瘡點藥 啟玄

白砒 精猪肉各一兩 紅棗肉 五錢

共搗如泥外用黃泥固好火煨紅取出研細末用鷺膽調搽如神

又不疼點藥 啟玄

真輕粉 杏仁皮 松花粉各一錢 冰片一分

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 辛 顧氏秘書

用鷺膽汁調搽

梅瘡靈藥 啟玄

水銀 皂礬各一兩 火硝

明礬 青鹽各一兩二分

共研入陽城罐內鹽泥固濟先文後武打三炷香取出冷定聽用點梅瘡神效 一方多雄黃

硃砂各三錢

白粉霜

點楊梅瘡

水銀一兩 食鹽 明礬 皂礬

火硝各二錢 雄黃 硃砂各三錢

除水銀不研將六味研末入陽城罐內中間放水銀上以鉄蓋蓋好再用鉄線裝緊以牡蠣鹽

泥封口晒乾裂縫補好照昇藥法昇打三炷香為度冷定取開刮下蓋內靈藥每用一二厘冷水調點三四次愈

梅瘡膏藥

梅瘡膏藥

猪油熬去渣一兩加香油三錢全熬離火稍冷加

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 辛 顧氏秘書

乳香沒藥各五錢兒茶七錢研細攪勻又入冰片

麝香各一分輕粉五分臨用攤貼神效

又膏方

老松香一觔河井水煮九次先用蘇油四兩煉滴

水成珠入煮過松香膽礬銅綠二味只各用一兩

研細攪勻收膏攤貼

梅漏膏

蘇油半觔熬至滴水成珠入白蠟五錢熔盡入血

竭兒茶乳香沒藥各五錢膽礬一錢再下飛丹二

兩鉛粉五錢離火入冰片一分麝香二分攪勻成膏欲去汚肉加龍骨赤石脂各二錢

五寶丹 丁惠生

杏仁五粒去皮乳霜輕粉五分 銀珠三分

冰片一分 麝香五厘

共研極細末破者乾摻未破者水調塗之隔日

痂脫自愈

洗梅瘡法

黃連 黃芩 黃柏 黃蠟

湯醫大全 卷三十四 楊梅方 季 顧氏秘書

白芨各五錢 川椒三錢 食鹽少許

煎湯洗之

又方

用煎湯入好醋少許加冬青葉三四十斤全煎取

葉貼瘡上搯再煎湯洗

又方

土菖蒲煎湯洗瘡易於收口

又方

臭梧桐 金銀花 野菊花各等分

煎湯入舊馬桶內薰之一日二次有痔漏加枸杞子

通仙五寶散 王范泉傳

鍾乳粉三錢六分 琥珀 冰片各六分

大丹砂二錢四分 飛白麵炒一錢八分

各稱足和勻分十二服每日用土茯苓一觔水

煎十二碗清晨一碗入藥一服服其土茯苓湯

須一日服盡不可別飲湯水並茶重者再服一料無不愈

者忌雞鵝牛羊房事此方古今第一

湯醫大全 卷三十四 楊梅方 季 顧氏秘書

初起燻法 秘本

辰砂末一錢綿紙分作七條香油浸透每次薰二

條燻時板凳坐着暑天用單被冬天用夾被蓋之

不可出氣要口含水恐傷口皮燻完吐去不可嚥

下其效如神 此方弱人不宜輕試

搜風解毒湯 潘霞山秘錄

治梅瘡不犯輕粉重者月餘輕者半月愈

土茯苓一兩 薏苡仁 金銀花

防風 白蘚皮 木瓜各五分

皂莢子四分

氣虛加人參七分 血虛加當歸七分

白水煎日三服 忌茶並毒物房事

西聖復煎丸 扶構寶林僧傳

已破危篤百方不效用此如神

丁香焙 乳香去油 沒藥去油

兒茶各一兩 血竭 阿魏

白花蛇各四兩 飛白麵一觔 白蜜六兩

香油四兩 棗肉入兩

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 膏 顧氏秘書

搗丸彈子大每用一丸土茯苓四兩煎湯化服

五寶霜 懷德堂秘方

水銀一兩 硃砂 雄黃各二錢

白礬 綠礬各二兩

研勻確盛燈蓋蓋定鹽泥固濟文武火煉升確

口掃收每以昇藥三錢入乳香沒藥各五分研

細末摻太乙膏貼之絕效

楊梅結毒 秘方

皂莢 五加皮 當歸

白蘇皮 金銀花各二兩

分八貼每貼加土茯苓四兩煎服

楊梅瘡神驗方 周鶴仙方

牛角 羊角 穿山甲各二兩

皂角刺三錢 生大黃十二兩

牛羊角穿山甲三味用濕紙裹煨焦取淨末如

前數全皂角刺生大黃合為細末每服五錢陳

老酒調服出恭時宜於空地上解完即將土掩

之恐惡氣害他人也間二日再服一服最重者

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 膏 顧氏秘書

不過三服神驗

又方 周鶴仙方

土茯苓二觔用石打碎猪胰子一箇去油水四升

全熬成二升去渣再兌入好酒二觔金銀花生地

桔梗當歸各五錢熬成二升温服渣再煎減半四

服全愈此天下第一奇方也

神方 周鶴仙方

生大黃 麻黃 黃芪

蟬蛻 陳皮各四兩 猪肉一觔四兩

作一劑酒六碗水六碗煎六碗每日食肉一塊
湯一碗分作六日喫三天發汗三天長齊三天
貫漿三天結靨共十二天全愈並無回毒屢驗
只用一劑不可以平易忽之

又方 周鶴仙方

雄黃一分 輕粉一分 杏仁三十粒

共為末先將瘡洗淨用雄豬膽汁調搽二三日
即愈百發百中天下第一方也

小兒梅瘡起於口內延及身膚 外科發揮

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 素 顧氏秘書

土茯苓末乳汁調服月餘自愈

楊梅瘡神方 潘大章

石膏 飛滑石各一分 生甘草一分

硃砂 生明礬 血竭

乳香去油 沒藥去油 冰片一分

麝香八厘

右乳細末約重七錢分作七服每用土茯苓一
觔打碎一半鋪瓦銚內將藥放土茯苓上又將
這一半土茯苓蓋上水四碗煎二碗分二次一

日服完七日七服自效

楊梅瘡

初起先服三四劑升發毒氣

川芎 升麻 連翹

金銀花 當歸尾 甘草節

黃芩 羌活 黃柏

生地黄 白葛根 穿山甲

白芷 蟬蛻 赤芍

防風

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 素 顧氏秘書

水酒全煎服

後服此方三四劑全愈

人參五分 川芎 防風

薏苡仁 金銀花 牛蒡子

甘草 牛膝 蒼朮全陳皮炒

土茯苓 皂角刺 生地黄

當歸 羌活 木通

水酒全煎服

梅瘡搽藥

膽礬五錢研碎紙包麩裹煨熟取研細末一錢沒藥八分京墨調搽

劉氏楊瘡秘方

蟬 蛻一兩五錢 歲靈仙 白蒺藜炒去刺

防風五錢 麻黃一劑冬用一兩夏用三錢春秋只用五錢

先用羊肉一筋煮爛將羊肉取起只用湯吹去

湯上浮油患人每歲加胡椒一粒為引將藥入

湯內煎成一大碗 再將前煨湯的熟羊肉入

醬油用酒飯任意喫之再服煎藥蓋煖取大汗

透次日必要洗浴連頭髮內都要洗透不然恐

楊醫大全 卷三十四 楊梅方 李九 顧氏秘書

有落髮之患第二劑去麻黃加大黃年勿壯實者用五錢

年紀大弱者用三錢藥用水煎不用羊肉湯藥煎好方下

大黃一二十沸即服俟行過四五次即以溫粥

補之即止第三劑去大黃加入參多寡聽用煎服搗

再煎服第四劑去人參加土茯苓半筋健猪肉

四兩同煎服再服三劑共七劑全愈

老君丹 祁道士門人張元履傳邵宗堯用之屢驗

白粉霜 一兩 蜈蚣去足 全蝎酒洗

直殭蠶炒去絲 穿山甲土炒 硃砂水飛

雄黃水飛 廣三七 蟾酥各五錢

乳香去油 沒藥去油 防風

荆芥各三錢 牛黃三分 或加竹青蛇末各五錢更妙

各研細末稱準和勻老米糊為丸如葉豆大陰

乾凡靈藥為丸之藥俱要陰乾不可此丹專治

楊梅結毒一切無名腫毒癰疽疔毒對口痰核

瘰癧濕痰流注每服一分或二三分黃酒送下

看人壯弱病之重輕全在人之機變增減用之

如神 如治結毒常服不比暫用當每服數厘

楊醫大全 卷三十四 楊梅方 李九 顧氏秘書

以免口商之患

昇白粉霜法

火 硝 明礬 水銀

食 鹽各一兩 如昇藥法昇三炷香取出靈藥以紗囊包紮

好用健猪蹄一隻入鍋內以水十五碗煮蹄

半熟去蹄取湯加生甘草一兩全紗囊入湯

內煮水乾為度將靈藥袋埋土中三日取出

研細配前藥用

點梅瘡 丁郁文

兼敷大毒癰瘡 紅昇丹五分 輕粉一錢 鉛粉紅一分

膽礬 煨四分

乳極細用人乳或鷺膽調以羊毛筆蘸掃二三

次即愈

透頂神功散 水利道憲王

治楊梅瘡魚口惡瘡已出者七八日好未出者

半月後手足心起一豈大泡即是毒從此出

鹿茸 蜜炙

穿山甲 炮各一分

知母

白芷 各四錢 蠶 三錢

用河水二大碗煎一大碗將熟入生熟大黃各

瘍醫大全

卷三十四

楊梅方

李

顧氏秘書

五錢畧煎十數滾傾出露一宿再用乳香油

藥 去油各

麝香一分 研細末放碗內五更時將藥

溫熱沖服蓋被出微汗行過數次以溫粥止之

忌猪肉

三三丸 孫北樓

楊梅等瘡

兒茶 一分

輕粉 五分

砒 八厘壯者 用一分

共研細麵糊丸如菜豆大分作九服 日三服

清茶送下三日後無形迹

楊梅瘡

生大黃

生地

金銀花

甘草 各五錢

猪胰 一具

河水煨服

又方

土茯苓 八兩

杜仲

皂角末

金銀花 各五錢

五加皮 一錢

甘草 二錢

水煎服至重者十劑全愈

又方

瘍醫大全

卷三十四

楊梅方

李

顧氏秘書

川烏

黃柏 各五錢

研細猪膽調搽

茯苓糕

治楊梅瘡

土茯苓 去粗皮

為末

白礬

糯米粉 各一匙

和勻蒸糕食之常以土茯苓煎湯當茶宜忌茶

楊梅下疳臭爛不堪者

百草霜

乃燒百草人家竈門口烟煤輕虛成片者

箭頭砂 各一錢

共乳極細以桑皮紙鋪藥燃成三條每條作三次用每次點着以紙遮住看目將烟薰入鼻中每日薰三次但此烟入鼻令人心內作攪可先煨爛肉湯不時呷之至重者不過三條即愈
靈藥方 梁瓠秀

水 銀一兩 劈硃砂 明雄黃 各五錢
硫黃三錢 白礬一錢

右研細末入陽城罐內用鐵蓋合好鹽酒和泥封固以鐵絲紮緊用銀炭十觔先文後武火升
瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 李 顧氏秘書

三炷香為度取起冷定開看取鐵蓋上藥約重二兩七錢如楊梅毒爛喉者用靈藥五分加入中白青黛各八分乳香沒藥各五分冰片二分麝香一分藥珠一分五厘其研細末吹入喉內日五六次三日即全愈如爛嘴鼻再加龍骨象皮血竭兒茶各五分琥珀二分研細摻之外以清涼拔毒膏貼之

清涼拔毒膏

麻油二觔入鍋內熬至滴水成珠再入杭粉一觔

鍋內炭火炒紅黃色為度篩下用桃柳棍攪成膏傾水中拔去火毒任攤用 此膏諸瘡皆可用但靈藥不可用

楊梅點藥

番木鱉火灸存性 輕粉 各五分 杏仁霜 一錢

共乳細猪膽調搽

鶴頂紅

點楊梅瘡

杏仁 輕粉 銀硃 各五分

共乳細磨磨汁調點並治鷄冠痔痔乾以唾津

瘍醫大全 卷三十四 楊梅方 李 顧氏秘書

潤濕乾摻痔潮乾搽

楊梅初起

麻油四兩入藥三條穿山甲三片熬至山甲浮起為度冷定加川烏草烏末各三分壯實人用五分次早將油煎熱服下蓋被出汗即愈愈後宜服防風通聖散以利其毒

又方

大鯽魚一尾半觔 用紫背葶萍二三觔包着鯽魚

令患者先從魚嘴喫起併魚鱗肚腸喫至魚尾細

細嚼爛好酒飲醉絮一條厚蓋出汗自愈蓋過綿絮須於無人處以火薰透免毒貽害他人

又方

臭牡丹根皮乾研細末每服三錢好酒調服厚蓋取汗

汗出透從頭撒被漸撤至足不可見風所用衣被

一槩換去方除後患

又方

生地 白蘚皮 熟地

金銀花 當歸 大楓簾

湯醫大全

卷三十四 楊梅方 齋 顧氏秘書

川芎 薏苡仁 羌活

五加皮 木瓜 穿山甲

藿香 槐花 防風

荆芥 各一兩 土茯苓四兩木搥打碎

水五碗煎三碗每日早午晚服一碗十劑全愈

忌茶牛肉蛋鷺肝腸火酒

又方

乳香箬葉焙去油 沒藥箬葉焙去油 銀硃

水銀 兒茶各一錢 冰片

麝香 各一分

共研細末用紅棗二兩火煨去皮搗膏和丸作四圓如

彈子大每日用木斗一個內放碗一隻碗內置

竈灰放炭火將藥一圓放火內燒烟將患者口

含冷水以被圍住只將鼻孔聞藥味如口含之

水一熱則吐去另換冷水含之四天燻完四圓

第五日再將燒過四圓放在一處燻一天燻之

梅瘡輕者七八日愈重者半月全愈忌鷺鷥魚

肝腸花椒發物

湯醫大全

卷三十四 楊梅方 齋 顧氏秘書

外治楊梅 吳普莖

血丹 輕粉各等分

研勻獐猪膽汁調搽

楊梅秘方 吳普莖

龜版醋炙研明 礬粉

先用龜版三兩明礬七兩米糊為丸每服五錢

早晚二服服至五日即用龜版明礬各五兩為

丸再服四五日即用龜版七兩明礬三兩為丸

又服三四日即用龜版九兩明礬一兩為丸服

至瘡已痊愈再以龜版為丸服數日前後總以

每日服九藥一兩為率忌猪首公雞鯉魚鷄鴨

鷺蛋菜豆等物戒房事

護面散

可保楊梅瘡不上臉

女頭髮煨 明雄各三分

研勻用香油半酒鍾調勻以滾酒冲服一日三
次

槐花蕊 張景岳

瘍醫大全

卷三十四

楊梅方

李

顧氏秘書

凡綿花瘡毒及下疳初感或毒盛經久難愈者速
用新槐蕊揀淨不必炒每早午晚食前清酒吞下
三錢服至二三升則熱毒盡去可免終身餘毒之
患亦無寒涼敗脾之慮此經驗神方也 如不能
飲即用滾水盪湯但不及酒服之效捷也

綿花瘡點藥

杏仁 取霜 輕粉 各等分

研細敷瘡上二三口即痂脫而落

紫霞丹

一切楊梅惡瘡

龜版 醋炙十兩 石決明 炙四兩 硃砂 飛三兩

共為細末水跌為丸每服一錢土茯苓煎湯下

楊梅瘡

真水安息搽即愈

又方 汪玉亭普救

楊梅瘡者皆因風流所致間有侵染觸犯而得者
百無一二治之不得其法不但一身為害而且殃
及妻兒甚有乏嗣悔之莫及然所治之法各有不

瘍醫大全

卷三十四

楊梅方

李

顧氏秘書

同有遏抑其毒而不令其出者有重用行藥而行
去其毒者有用升發之劑而發出其毒者有用解
托之劑而敗去其毒者四者之中惟升發解托可
用至於遏抑內收將來必致結毒若重用行藥必
致大傷元氣予有一方藥止數味即非行托更覺
和平且無論新久不二十劑而收全功不獨永除
後患更且無碍生育但恐收功之後視為容易又
復恣情縱慾是誰之過與相勸患者全愈之後當
痛改前非力行善事免神鬼之鑒臨保父母之遺

體魁妻兒之遺毒培子孫之福壽所得不更多乎

何首烏忌鐵木
棒打碎防風 淨銀花 各三錢

荆芥 二錢 當歸 五錢 肥皂子 九個打碎

猪胰 一副 土茯苓磁鋒刮去皮木
棒打碎四兩

河水六碗砂銚內煎至三碗每日空心及午飯

後晚飯前各溫服一碗 忌鹽醬醋茶鷄魚鶩

鴨蝦蛋鮮物止宜土茯苓煨肉豆腐青菜其餘

一切當忌 用土茯苓湯代茶

又方

楊醫大全 卷三十四 楊梅方 李 顧氏秘書

川芎 葳靈仙 蟬蛻

大黃 各一錢 麻黃 六錢 羊肉剔骨淨一
筋切碎

水八碗煮爛去肉煎藥三碗分三次服上身多

飽服下身多饑服三劑全愈

楊梅癬門主方

秘方

治梅癬並多年頑癬

紅阿膠 三錢 入桐油四兩熬數沸去阿膠卽下研

細密陀僧 二兩 收成膏藥再入乳香沒藥血竭兒

茶輕粉各淨末二錢離火和勻攤貼每張加紅昇

丹一二分摻上貼之百發百中

楊梅瘡後遺癬毒一層又一層頑皮癢不可當

牛油 柏油 香油

楊醫大全 卷三十四 楊梅癬方 李 顧氏秘書

黃蠟 各一兩

共熔化待冷入銀硃一錢五分官粉二錢麝香

五分入油攪勻俟癬癢抓破擦之

楊梅瘡愈後發癬瘡及鴛掌瘋 王中城

牛油 猪油 各二兩 香油

黃蠟 各一兩

共熔化加鉛粉二錢銀硃一錢五分麝香五分

研細攪勻成膏抹癬上火烤再擦再烤如掃

楊梅瘡愈後紅黑疤不褪門主方

驗方

生大黃白礬各等分全研擦之即消肉色如舊

又方

青稞核磨汁搽上即褪

楊梅大全

卷三十四

瘡疤不褪方三

顧氏秘書

結毒門主論

陳實功曰結毒者瘡毒方熾未經發散或被藥火之薰蒸或因輕粉之內拔或經點藥之收斂以致毒沉骨髓積久外攻其始也先從筋骨疼痛漸腫起發無定處故有鼻崩唇缺咽塞喉疼手足拘攣等症治法初起者宜仙遺糧湯胰子湯經年累月毒串筋骨用五寶丹紫金丹選用頭疼欲破用吹鼻碧雲散主之 正宗

胡公弼曰凡服結毒靈藥俱以限十二日為準無愧青囊

楊梅大全

卷三十四

結毒論

主

顧氏秘書

又曰結毒在脚底者名曰漏蹄風

蔣示吉曰結毒者結無定位皆由梅毒服藥不多內毒未盡以致毒氣鬱遏沉伏骨髓積久外攻先從筋骨疼痛漸漸腫起發無定處隨便可生發在關節則損筋傷骨縱愈曲直不便發於口鼻崩梁缺唇雖痊必破相更發於咽喉更變聲音發於手足妨於行動入於顛頂頭痛欲破兩眼脹痛用碧雲散吹鼻中頭自不痛初起仙遺糧湯金蟬蛻甲酒虛弱者芎歸二朮湯年久者五寶丹不斂者十全

大補湯加土茯苓煎服毋得再薰為禍傷人也
澄日每見其人並未患過梅毒而有結毒於手足腰
胯髀間者必是先患濕熱癰瘡膿毒未盡提盡急
求收功醫者遂用輕粉鉛粉收斂完功殊不知毒
氣斂伏在內久而原疤之旁起泡疼痛潰爛穿筋
蝕骨愈而復發此為濕熱結毒內宜補托外面須
用紅升靈藥提盡毒氣待紅肉長平方可用生肌
之法斂口

劉蕙田曰但凡曾患楊梅毒下疳服藥而愈久後如
瘡醫大全 卷三十四 結毒論 三 顧氏秘書

患後開十數證者勿作他治皆結毒證也 一初
起狀如癩子後漸大而軟久則膿潰惡臭難當人
不可近四圍紫而中黃白者此輕粉之結毒也切
勿作癰疽治 一初起渾身拘急筋骨疼痛肉皆
麻木而或有一處如刀鎚之刺痛皮膚不甚紅腫
而紅色深隱肉裡此輕粉之結毒也切勿作貼骨
癰治 一遍身雲頭疙瘩筋骨酸痛或時作癢抓
破有白膿流出此輕粉之結毒也切勿作大痲瘋
治 一頭面胸背併四肢有生硬片狀如牛皮初

瘰及抓則起白屑而麻痛此輕粉之結毒也切勿
作癬治 一手足掌上常生黃皮痛癢不時狀如
鷲掌此輕粉之結毒也切勿作瘋治 一遍身發
紅狀如火毒口渴心煩筋骨如解此輕粉之結毒
也切勿作赤遊丹治 一遍身發紫赤紅斑痛癢
不禁骨疼如杖此輕粉之結毒也切勿作發斑癩
疹治 一腹疼如絞腸痧牽引渾身骨節疼痛不
可忍久則便下膿血此輕粉之結毒也切勿作腸
胃癰治 一惡心嘔吐吐出皆白水而無痰四肢
瘡醫大全 卷三十四 結毒論 三 顧氏秘書

不舉飲食不下骨節酸痛此輕粉之結毒也切勿
作翻胃膈食證治 一喉嚨作痛忽然腫起週身
骨節疼痛遂用針於腫處刺破惡血雖去久潰不
能完口致爛潰通鼻竅或腐涎舌下痛不可忍臭
不可聞此輕粉之結毒也切勿作喉疳治 一頭
痛或腦痛痛則皮腫耳聾目眩牽引週身骨節疼
痛此輕粉之結毒也切勿作頭風腦風治 一渾
身不拘頭面腿脚忽生一瘡其瘡內皆豎頭肉長
流黃水久不潰膿此乃楊梅之母必竟要生梅毒

卽用治梅瘡等藥治之不治則渾身一齊攤出治則費手矣 一父母曾患楊梅下疳而服輕粉其瘡雖愈已身不發後生嬰兒三五日後或七八日後九竅之傍現出紅點紫斑片片若經三四日後卽成小瘡狀如蛇窠啼哭不止二便不通乳不能進身熱如烙腹硬如磚此父母所遺之結毒也切勿作胎毒奶癰治 嗚呼服輕粉而中毒非小毒也輕則發之於自身損形壞質傷筋穿骨甚則遺毒流傳子孫微則殘其筋骨盛則夭其壽命如此

瘍醫大全

卷三十四

結毒論

毒

顧氏秘書

般形證雖異而病原則一惟用五寶丹服之不獨可愈其患亦能解餘蘊之毒而免子孫之遺害也 祁道人曰凡楊梅瘡俱從濕熱邪火化毒而成治之者慣用寒涼清濕熱之藥其毒雖解但不思寒則凝結熱則流通日久多成結毒純陰也故用砒硫靈藥治之是以熱攻其寒此治陰結毒之法也有患陰毒梅瘡濕熱邪火未化久而結成陽毒故用水銀昇煉粉霜硃砂等丸治之之法 見抄本

瘍醫大全

卷三十四

結毒論

毒

顧氏秘書

又曰大槩治楊梅結毒等證當指後人濟世主方用五寶丹八寶丹醫富貴人爲上法若貧士另有捷徑之法治之方載於後擇而用之無不應手

又曰凡楊梅瘡並結毒證煎劑丸藥內不可少海櫻

桃卽千年矮冬天結紅果子 南京樓霞山石道中極多 半枝蓮亦不可少

結毒門主方

五寶丹

治楊梅結毒筋骨疼痛口鼻腐爛諸藥不效

血珀

珍珠

新白冰

冰片

硃砂

飛水

滴乳石

如乳頭下垂研之易碎
明如水晶者佳各二錢

各研極細稱準共合一處再研數百轉磁罐封

貯每用藥末二錢加飛羅麪八錢再研和勻

每日用土茯苓一觔洗極淨置石臼內木槌碎

如散子大用水十一碗煎至七碗去渣再用大

瘍醫大全

卷三十四

結毒方

七

顧氏秘書

竹筒一個絹綳作篩將藥五分置竹筒中細篩

於土茯苓湯內隨手攪勻一日喫完看病上下

食前後服逐日依法製服重者四十服輕者一

二十服即愈 忌食火酒猪首糟物海味茶醋

薑椒蒜牛羊雞鵝豆腐麩筋鮮魚 不忌者猪

肉肝肺腰子鴨

若毒結最重鼻舌腐爛加牛黃胎骨即能暗補

其功最大陽物潰爛亦加胎骨入丹內

若毒結在鼻上加辛夷三錢全土茯苓煎湯

一方加肥皂核一個全土茯苓煎湯

一方硃砂三錢血珀一錢滴乳石二錢珍珠五

分冰片三分

一方五寶丹上部丹內加川貝母三錢赤茯苓

牛膝各一錢中部丹內加赤茯苓三錢川貝母

牛膝各一錢下部丹內加牛膝三錢川貝母赤

茯苓各一錢

邵道人秘傳五寶丹滴乳石

明潤真者 琥珀能
芥子 辰砂 各二錢 大珍珠 五分 冰片 二分 共研為細

瘍醫大全

卷三十四

結毒方

七

顧氏秘書

末入飛白麵肆兩乳勻每服三分用土茯苓一

觔拭去泥土以木槌搥碎入砂鍋內用水十二

碗煎至八碗濾去渣將藥篩下攪勻再煎二三

沸取起陸續一日服完 後開加戒神驗法

一鼻子爛盡臭穢難聞藥中每服加靈山柴

鹿鼻血 陰乾 女子前三日經布 煨存性研細和
各加三厘

勻煎服隨即生肌用此三服鼻長如故

一陽物爛盡腐臭惡氣痛不可忍者藥中加靈

山柴 煨 羊腎血 陰乾 女子前三日經布 煨存性
研細各

加三 煎服隨卽生肌服完三服腎長如故

一 輕粉毒流注穿爛腦頂臉面口頰四肢肩背
腿足惡臭連年不愈只用前藥煎服三次膿盡
臭除肌生肉平如故如成漏而流清水者加當
歸人參黃芪煎服

一 結毒四圍小瘡狀如小蜂窠當中有瘀肉敗
膿流而不乾痛而不止者服此藥後瘡口膿水
乾疼痛除肌肉長只須三服可以全好

一人虛可加人參若瘡在上用桔梗半分浸水

瘍醫大全 卷三十四 結毒方 末 顧氏秘書

煎土茯苓在下用甘草半分浸水煎土茯苓

一人虛極寒戰咬牙肢體如冰用炮附子三分
入藥煎服以身溫戰止爲率不可過服

一 結毒疼痛不可忍者前藥中加乳香沒藥去油

盡各 三厘煎服

一 筋骨疼痛不能搖動乃輕粉之毒深入骨髓

可於本方中加珍珠一倍乳香沒藥各三厘於每

服中煎之

一 噎氣乃輕粉之毒流於口內爲害宜加沉香

木香各五厘入煎藥中服之

一 服此藥後小便利者乃藥將毒行於下故
現滯結之象不須疑慮可用百草霜二錢搗井
水清晨服之卽解或菘豆湯亦可

一 有孕婦患此結毒凡煎土茯苓不可將臉對
藥罐之口恐其氣味觸之作吐也土茯苓一觔
水十二碗慢火煎之但有沫起便以物掠去煎
至七碗去渣方下前末藥煎二三沸取起服之
無孕者煎服照前

瘍醫大全 卷三十四 結毒方 末 顧氏秘書

一 結毒在於手足灣屈曲之處服此藥患愈而
尚不能活動可再服一二劑其筋自舒自能活
動矣

一 結毒服此藥患愈須要守其禁忌庶不再發
亦無他苦若服生鼻長腎之藥俱已長完第一

要戒勞碌房事惱怒雞鷄牛羊驢犬蟹鱉魚蝦
葱蒜韭薤芫荽蘿蔔辛辣鹹酸肥甘油膩煎炒
炙燂苦茶醇醲酪酥胡椒生薑一切毒物若犯
房勞怒氣則皮膚傾陷血肉相戕所長之鼻腎

從此又爛矣雖仍以前藥治之則不如前之效速也如若食物犯毒其患復作者尚在可治不致於十分頹壞也禁忌不但如此二者即梅瘡魚口下疳癰疽俱要禁戒調理節其飲食禁其房闈開其心胸滌其思慮適其寒溫慎其起居如此氣血調和臟腑安實正氣漸盛庶無變異之患也

止痛生肌丸 邵道人

解輕粉結毒

瘍醫大全

卷三十四

結毒方

全

顧氏秘書

東丹

用滾水淨槐花

細末各一兩

大冰片 五厘

右和勻麵糊為丸雄黃為衣每服一錢或八九分或茶或酒送下服至六七日瘡上流臭水十

數日化腐生肌一月全愈

八寶丹 邵道人

鍾乳粉

製五錢

辰砂

飛三錢

熊膽

珍珠

琥珀

西牛黃

冰片

各一錢

飛白麵

炒研五錢

共研細末磁瓶收貯凡治楊梅瘡結毒每用一

分土茯苓半筋煎湯調下 如毒在下部加薏苡米五錢配用

靈砂黑虎丹

治楊梅瘡後頭如破裂之疼痛筋骨拘攣痛不

可忍或起冷痰包膿水淋漓兼治陰結毒一切

濕痰久頑陰寒久不收口之瘡凡結毒頑瘡先

服五寶丹或八寶丹必用此藥收功永遠不發

白砒

三錢

將砒用菜豆水煮過入罐內昇五炷香取出以白蘿蔔同煮過入藥

寒水石

煨

百草霜 各三錢

金頭蜈蚣 二條焙

瘍醫大全

卷三十四

結毒方

全

顧氏秘書

大黑豆

一百二十粒

冰片

麝香

各一分

右研極細和勻用小紅棗四兩煮熟去皮核全搗為丸如豌豆大每服二九日服三次冷水或

茶送下服是藥口服胞腫則藥力到矣緩一日

再服忌喫熱湯水宜喫大暈以免嘈雜 其黑

豆生用冷水泡軟去皮搗碎加紅棗肉丸得起

便罷不必多 或加西黃三分更妙

解毒丸 邵道人

治楊梅瘡楊梅漏服過靈藥久不愈者必內有

輕粉毒為患

黑鉛一筋打成片 山中黃土一筋研

二物入鍋炒至鉛化去鉛不用只將黃土水盪為丸每服三錢酒送下十服即好

結毒擦藥

水銀一兩五錢 生大黃 大腹皮炒

膽礬各一錢 輕粉一錢二分 甘草

番打麻六分患重者加三分

共為細末用真麻油調作四十八丸每日早午

瘍醫大全

卷三十四 結毒方

全 顧氏秘書

晚共用十二丸擦手四灣脚四灣口含冷水熱

則吐去又換冷水含之 第六日如鼻中有惡

氣味並有瘡用大楓子肉十五個麝香三分研

為丸不時嗅之盡一日之用 第七日用麥麩

二升甘草四兩煎水洗浴 第八日可出房門

可喫雄猪肉至半個月諸物不忌只忌鹽醬醋

酒辛辣之物房事斷要忌一百天 第八日用

生地當歸川芎白芍山查枳殼牛蒡銀花水煎

服服十劑後再服當歸川芎白芍熟地人參陳

皮白茯苓炙甘草水煎服

薰法 秘方

治楊梅結毒並梅毒瘡疔瘡破爛者即生肌完口患者不肯服藥者宜用此法

祁陽炭即鷄骨炭一兩五錢先將炭燒着透復悶

面粉五錢 銀珠三錢

共研極細末用棉紙入藥捲成九條 先將房

內板縫窗扇糊得不透風將香爐放桌上將條

子點着坐於桌邊以鼻嗅其氣口中噙冷水熱

瘍醫大全

卷三十四 結毒方

全 顧氏秘書

則吐去又噙冷水以烟盡為度九枝條子分三

日薰完如瘡在上食後嗅烟用川芎煎湯當茶

喫如瘡在下食前嗅烟用牛膝木瓜煎湯當茶

喫每日三次如嘴腫痛即是毒從口出又停數

日再喫 先放白礬砂在口裡再含水更妙

如口臭腫痛以菜豆煎湯喫或蜜糖亦可用蘇

薄煎湯漱口過七日後再用解毒煎劑

楊梅結毒舌爛鼻爛頭爛 秘方

黑狗頭一個用黑鉛一兩裝入腦內用益泥封固

乳香去油 沒藥去油 鉛霜各三分

輕粉二分 硼砂一分五厘 明雄一分

寒水石四分 金箔十張 製鉛一分五厘

共乳極細末磁瓶收貯 凡舌斷米泔水葱茶

煎湯溫漱拭乾上藥待長一二時許洗去藥又

漸漸搽上 凡龜頭爛者以葱湯薰洗搽藥待

長又洗又搽

碧雲散

結毒入於巔頂以致頭疼眼痛如破者吹之

瘍醫大全

卷三十四 結毒方

全 顧氏秘書

鴛兒不食草 川芎各一兩 青黛一錢

共為極細末令患者口噙涼水以蘆管吹藥於

左右鼻中取嚏為效吹後吐去涼水若不噙水

便要嗆喉並治風火時眼眵淚外障吹之亦效

薰洗法

蒼朮一兩 點紅川椒三錢

水五碗煎至四碗入罐內將患處對罐口以熱

氣薰之俟半熱傾於盆內淋洗患上以潔淨布

把淨後用解毒紫金膏

解毒紫金膏

楊梅結毒腐爛作臭膿水淋漓諸藥不效者

細塊礬紅 明淨松香各一兩

共研極細麻油調稠先用前湯洗淨拭乾搽上

此藥油紙蓋好軟絹裝緊毋令血行三日一換

如無前湯薰洗只煎葱艾甘草等湯俱可洗換

又治諸毒頑腫等瘡神效愈後忌食發物煎炒

神仙碧玉膏

結毒潰爛臭穢疼痛不斂以及血瘋腫瘡並效

瘍醫大全

卷三十四 結毒方

全 顧氏秘書

輕粉 杭粉各一兩 白蠟五錢

乳香 沒藥各三錢 樟冰二錢

用公猪淨熟油五兩全白蠟熬化傾入碗內將

上藥和勻水內頓一時取起臨用搥脚挑膏手

心中捺化攤油紙上用葱湯洗淨瘡上貼之

結毒靈藥

楊梅結毒腐爛作臭或咽喉唇鼻腐壞日甚

硃砂 硫黃 雄黃各三錢 水銀一兩

共研極細入羊城罐內泥固鐵蓋梁堯固緊封

口點三炷香為度用水擦蓋內火畢次日取出
蓋底靈藥約有一兩五六錢治尋常腐爛之症
用靈藥五錢輕粉五錢和勻研細小瓶封貯紗
封瓶口臨用甘草湯洗淨患上將瓶倒懸紗眼
內篩藥患上用單油膏蓋一日一換自效男子
婦人咽爛者用靈藥一錢人中白二分研細吹
之日用三次內服不二散其疼即止隨可飲食
硫黃不二散

楊梅結毒發於咽內腐爛痰痛湯水難入者

瘍醫大全 卷三十四 結毒方 全 顧氏秘書

硫黃一錢 靛花一分

共乳細凉水一酒杯調服其痛即止可進飲食

單油膏

貼結毒搽靈藥

麻油二觔熬滴水成珠續下杭粉十三兩攪勻成

膏傾入水內片時取起任用

十服神效湯 胡公粥

楊梅結毒流注筋骨疼痛不論已未破爛神效

升麻 皂角刺 各四兩 土茯苓 一觔

頭頂加白芷 胸中喉面加桔梗 胸前加白芍

肩背加羌活 下部加牛膝 俱只加一錢

共一劑水八碗煎四碗臨服入麻油三匙一日

服一劑十劑全愈此神方也

結毒牛黃丸 胡鳴岐

專治楊梅結毒小兒胎毒下疳神效

揀透明雄黃四兩研細取蘆柴截筒將雄黃末裝

入麵塞筒口將鍋內放水上用蘆柴作架取雄黃

筒橫放架上離水二寸許蒸四炷禪香足火候方

瘍醫大全 卷三十四 結毒方 全 顧氏秘書

到次早取出雄黃每雄黃一兩入好牛黃四分不

可少麝香五厘配定研勻老麵糊九黍米大每早

空心用猪胰子煎湯送下四分諸物不忌只忌蝦

蛋二味服至四兩全愈

結毒久爛 秘方 土茯苓 一觔 生 姜 四兩

共煎數碗服之不十日而愈其潰處以藥汁調

麵糊之漸愈 曾有陽物爛完半年不愈服此得

楊梅疔毒臭爛不堪者 周鶴仙

橄欖核 一個燒 灰存性 真冰片 三厘

共為細末用麻油調塗無比效方也

滌空丹 汪如忠

治結毒楊梅頭腫瘰癧

食鹽 四錢 明礬 火硝

皂礬 水銀 各一兩 白砒 三錢

研細炒老黃色入陽城罐升三炷香冷定刮取

靈藥一兩加

明雄 硃砂 血竭

瘍醫大全 卷三十四 結毒方 朱 顧氏秘書

乳香 去油 沒藥 去油各六錢 槐花米 淨末

穿山甲 焙淨末各一兩

和勻研細老米打糊為丸如蘿蔔子大每服一

分一日三服用土茯苓四兩猪牙皂角一條照

各部位再加引經藥煎湯送下

楊梅結毒頭痛之極用之神效

何首烏 不犯鐵器 天花粉 苦參

荆芥穗 肥皂子 防風 各一兩

共為細末每用七分五厘用土茯苓四兩猪油

一兩五錢水三碗煎一碗半每食後片時用藥汁半碗調藥末服一日三服 會服輕粉筋骨疼痛

當歸 川椒 細茶

黑鉛 甘草 各四兩

右判劑分十服水煎服或後加麝香一分亦妙

頭面結毒

川椒 出桃花洞者佳嚼半粒口不能言者真去

蕪艾 去筋膜一兩 白茯苓 二兩 麻黃 去節二錢

瘍醫大全 卷三十四 結毒方 朱 顧氏秘書

猪頭天靈蓋 火煨存性五錢

研為細末蒸餅打糊為丸如葉荳大飯後白湯

送下三錢服後二三日瘡口乾燥不臭是其效

也服至瘡口平復方住患久者宜間服十全大

補湯去川芎十數劑忌牛羊魚腥房慾火酒

楊梅結毒方

土茯苓 五兩 甘草 六分 天花粉

蟬蛻 去足 麻黃根 各一錢 杏仁 去尖

肥皂子 皂莢子 各七粒 白僵蚕 全足者一

右俱忌鉄器水三碗煎一碗毒在上食飽服毒
在下空心服二十劑見效楊梅瘡十年者五十
劑全愈忌麪胡椒犬肉房事發物燒酒蒜為妙
奪命紫金丹

治楊梅漏瘡並諸瘡毒破爛見骨經年不收口
者或筋骨疼痛不止或遍身破爛出血起皮一
層又起一層或鷺掌風赤白癩風諸般頑癬或
骨爛牙疳口臭膿瘡惡毒併皆服之

琥 珀 一錢甘草水煮一炷香以新青布熨之打
碎再用糯米泔水浸透將磁盤盛糯米琥
湯醫大全 卷三十四 結毒方 李 顧氏秘書

鍾乳石 二錢五分即滴乳石甘草水洗新瓦器焙
用老薑切片鋪銀罐內乳石放薑上以鉄
蓋蓋之鉄絲裝緊用文武火煨一炷香冷
定開看取出另研極細

珍珠 包豆腐內煮一炷香火不可太大
西牛黃 另研各一錢 硃砂 研細水飛

右乳極細每服只稱五厘加飛羅麵炒二分五
厘合計三分為一服土茯苓湯調下每一小料
用丹藥六分炒麪三錢分作十二服土茯苓十
兩水煎分十二碗去渣每早用湯一碗入藥一

服攪勻服之不可別飲茶湯多煎土茯苓湯當
茶十二服完病亦愈矣忌鷺雞羊肉房事
楊梅結毒神方 濟生

滴乳石 三錢五分 琥 珀 人中白 煨各二
硃 砂 珍珠 各五分 西牛黃
冰 片 各三分 乳 香 二分 石 青 頭上用五
三厘 蟾 酥 毒甚者加五分

右為極細末每用六厘加飛麵三分和勻聽用
先用土茯苓一筋洗淨木槌打碎入河水十二
湯醫大全 卷三十四 結毒方 李 顧氏秘書

碗瓦器內煎至八碗再將湯濾起將土茯苓先
鋪一層在底上末藥放在土茯苓上週圍以土
茯苓圍住再將土茯苓湯輕輕傾下再煎至三
碗一日飲盡忌一切發物

解毒至寶神丹 馮氏
治楊梅結毒一切熱毒久患骨蒸熱毒流注六
脉俱數用之清熱毒神效
人參三七 微火焙 嫩滑石 三錢 珍珠 生用
真血琥珀 各四分 生甘草 晒燥 一錢

各研極細和勻每服二分加至三四分人小者一分加至二分草薺三錢煎湯調服

飛龍換骨還元水火仙丹

專治遠年近日楊梅結毒誤服輕粉筋骨疼痛

癰腫下疳陰蝕濕痰流注氣瘰發背喉舌潰爛

目鼻破損遍身梅毒癬鶴膝血瘋癩瘡魚口

便毒服二十日全好忌酒醋色慾發物初服四

九十日後服五九二十日後服至七九再不可

多加其藥俱用老米打糊丸如黍米大每日服

瘍醫大全

卷三十四

結毒方

全

顧氏秘書

此丸俱用土茯苓四兩猪牙皂角一條爲主不

可缺此二味再照後開引經之藥全煎用河水

井水各二碗煎成三碗每早以一碗送丸藥餘

二碗留爲午晚當茶喫但須看人虛實虛者服

此必發寒熱頭痛喉疼口臭不必驚恐停止三

兩日再服

製粉霜

真阿魏

各五錢

槐花

三錢

當歸尾

白芷

小丁香

乳香

不去油沒藥

不去油雄黃

殊砂各一錢牛黃五分冰片三分

製砒霜一分

修合爲丸殊砂爲衣磁瓶密貯勿泄藥性

昇粉霜法

水銀一兩五錢火硝一兩三錢白礬皂礬食鹽

封固昇打文火四炷香武火三炷香候冷開看

鐵蓋上藥刮下聽用看人虛實毒之輕重久近

昇白砒霜法

一兩全煎至一碗去菜豆不用將菜豆湯入甘草

文火兩炷香武火一炷香候冷取出看鐵蓋內

卷三十四

結毒方

全

顧氏秘書

有時如石榴子有時如灰樣此兩色始堪入藥

湯引開列於左

一楊梅結毒生於頭頂或爛見骨至重者昇粉

霜只用三錢昇砒霜只用一分五厘湯引內

加川芎藥本各五錢煎湯送下

一結毒生於眼上昇粉霜只用一錢五分昇砒

霜只用一分湯引內加川芎白芷藥本各五錢

各二錢煎湯送下

一結毒生於鼻上昇粉霜只用二錢昇砒霜一

分湯引內加山梔川芎各二錢煎湯送下

一結毒生於喉中昇粉霜只用二錢昇砒霜一

分湯引內加天花粉石菖蒲川芎各二錢煎

湯送下

為丸湯引內加杜仲懷牛膝各二錢煎湯送下
 一結毒生於陰囊上下玉莖上者昇粉霜六錢
 重者用八錢昇粉霜二分牡蠣煨紅冷定研
 極細末入錢人參五錢為丸湯引內加黃耆
 白朮天花粉懷牛膝各二錢煎湯送下
 一結毒生於腿上下昇粉霜五錢昇粉霜二分
 天花粉三錢防風五錢為丸湯引內加木瓜
 薏苡仁懷牛膝各二錢煎湯送下
 一結毒生於脚板底各二錢煎湯送下
 分天花粉沉香各五錢為丸湯引內加木瓜
 懷牛膝各二錢煎湯送下
 一結毒生於婦女陰戶內上染風毒年久不愈
 潰爛見骨或穿通肛門內爛極臭手足不能
 伸縮或生陰戶上下兩邊者昇粉霜八錢昇
 砒霜三分天花粉三錢為丸湯引內加懷牛
 膝二錢煎湯送下外用猪肝切長條蒸熟乘
 溫插入陰戶內冷則換一條如此十餘條如

湯醫大全

卷三十四

結毒方

毒

顧氏秘書

陰戶內生濕瘡作痛不可忍者另用輕粉兒
 茶各三錢研細搽之倘瘡癢如虫一般次早
 用枸杞根煎湯洗淨仍用猪肝插換搽藥數
 次即愈
 一結毒下疳用昇粉霜三錢昇砒霜一分湯引
 內加懷牛膝猪苓各二錢煎湯送下
 一魚口便毒用昇粉霜二錢昇砒霜一分湯引
 內加懷牛膝鱧魚各二錢煎湯送下
 一瘰癧穿爛日久用昇粉霜六錢昇砒霜二分
 外用玳瑁銼碎絹帛包置婦女乳上一宿次
 早取下玳瑁細末五錢為丸湯引內加夏枯
 草海藻滑石天花粉瓜蒌仁各二錢煎湯送
 下
 一條全煎

解毒仙草

每年二三月金銀花未會起花時嫩枝葉採取即

放籃內蓋住不可見太陽携回掛風頭陰乾用時
 以紙包置懷中俟燥研細每服一錢加黑鉛一錢
 土茯苓八兩打碎七碗水煎三碗每日早午晚各
 飲一碗輕者二三十服重者五六十服忌食瓜子
 花生茶醋公雞鯉魚猪首牛羊肉蝦子

結毒

棕根

活蚪蚪晒乾各等分

米糊為丸每服三錢白湯送下

又方

湯醫大全

卷三十四

結毒方

毒

顧氏秘書

活鼠剝皮貼之

結毒爛鼻

冬青樹枝用童便內浸四十九日取出陰乾研末

入鼻中

結毒膏藥

葱頭七個麻油四兩熬去葱渣入黃丹一兩攪勻

又入黃蠟白蠟各五錢融化再加去油乳香沒藥

各二錢輕粉三錢西牛黃一分珍珠二分攪和成

膏攤貼

二寶丹

治男婦楊梅結毒或在頭腦咽喉鼻中潰爛腐臭可限十二日完口全愈永無餘毒雖後來生育毫無遺毒

劈硃砂

明透者二錢研細用清水揉洗漂去浮紅然後又乳再用清水飛過去脚晒乾只用淨末一錢五分

好滑石

刮去黃一兩研細入水揉洗去淨腐而黃色者晒乾又乳水飛數次至豆青色取起晒乾再乳細只用淨末二錢五分

右二味共研極細重四錢足均為十二包每包

湯醫大全

卷三十四

結毒方

李氏秘書

三分三厘用土茯苓每日一觔以清水洗淨將

磁瓦刮去外面黃皮用木槌打碎先將藥末三

分三厘放於砂鍋底內再將土茯苓蓋上入河

水四碗半做一制子於中驗其淺深再加井水

四碗半共煎至四碗半為度去渣用新瓦壺盛

之分為三次早晨午後晚間當茶溫服如此不

可間斷連喫十二日即愈 食忌最嚴如油鹽

醬醋茶酒糖物毫不可犯只可食白水雞猪肉

青菜梗煎時忌鐵器與陰人手如梅瘡初起之

時必先用羊肉煨食托出毒來方食此藥 洗瘡用苜蓿煎湯洗之

湯醫大全

卷三十四

結毒方

李氏秘書

補鼻還原法

楊梅瘡結毒爛去鼻準或爛去陽物俱能生長如舊

方用乾元

一錢 製乾元法取乾元一個乾元即頭胎男子胞衣竹刀割去血脈及水洗淨炙乾再用大粉甘草半筋人參五錢煎水三碗

再慢火熬至一碗半取起將乾元收磁器內以汁陸續澆灌汁盡為度入磁罐內黃泥固濟炭火

煨紅待冷取出如烏金紙色樣磁罐收藏聽用硃砂

四錢 珍珠琥珀各二錢 滴乳石一分 冰片一分 共研極細末和勻老米飯搗凡菜豆大每用土茯苓四兩

煎湯送下初起服五分二次服三分後皆以三分為率服至一月鼻長如舊但未服藥時先到車匠

店車成一端端正鼻式外以黃蠟融化澆木鼻上取下木鼻將蠟澆就鼻子用火烘粘在土星處

待一月藥完取下蠟鼻看新長鼻子至正何如如不正速用出蛾蚕繭一個煨存性為末黃蠟凡芥

子大熱酒作一服送下如要速爛可用蚕繭二三個煨服次日漸爛三日後照舊爛平仍照前法用

蠟鼻粘上服藥候一月藥完其鼻又長全矣如陽物爛去

亦照玉莖黃蠟澆成火烘粘在根上用土茯苓四兩天花粉

五錢牛膝三錢煎湯服藥一月藥完莖如舊矣終

傷醫大全目錄

卷三十五

諸瘡部

膿內瘻瘡門主論 附方

疥瘡門主論 附方

薄皮瘡門主論 附方

肥瘡門主論 附方

天泡瘡門主論 附方

鮮花瘡門主論

鴉暗瘡門主論 附方

面上熱毒惡瘡門主方

黃水瘡門主論 附方

香癩瘡門主論 附方

金絲瘡門主論 附方

水珠瘡門主論 附方

熱瘡門主論

寒瘡門主論

冷瘡門主論

肉刺毛門主論

魚脊瘡門主論

赤炎瘡門主論

瘰癧門主論

癩瘡門主論

日晒門主論

水漬瘡門主論附方

凍瘡門主論附方

汗浙瘡門主論附方

皴裂瘡門主論附方

蜘蛛瘡門主論附方

漆瘡門主論附方

惡瘡門主論附方

頑瘡門主論

疔瘡門主論附方

血箭門主論

血痣門主論

血疔門主論

瘡醫大全 卷三十五 目錄 十一 顧氏秘書

疔門主論附方

干日瘡門主論附方

瘡醫大全 卷三十五 目錄 十二 顧氏秘書

瘍醫大全卷三十五

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東

男 櫟燮用和

諸瘡部

自膿窠疥瘡血箭血痣以及疔子俱彙於此部中以
便檢閱參治

膿窠瘡門主論

陳實功曰膿窠瘡乃肺經有熱脾經有濕二氣交感
而成其患先從水泡作癢後變膿泡作疼治當清
熱散風涼血除濕為主 正宗

蔣示吉曰膿窠瘡大如黃豆黃膿起炮痛甚者乃脾
虛濕熱者多宜內服四妙湯加蒼朮防風外搽普
濟丹 說約

膿窠瘡門主方

何首烏湯

濕熱風毒遍身膿窠黃水淋漓肌肉破爛

何首烏

防風

金銀花

荆芥

蒼朮

白蘚皮

甘草

苦參

連翹

木通

燈心為引水煎或為細末水盪丸每服三錢淡

酒送下 溼泄如澤瀉 夏熱加梔子黃芩

瘍醫大全

癢加白蒺藜 脾胃弱去苦參加赤茯苓

何首烏丸

何首烏 四兩

荆芥

威靈仙

防風

蔓荊子 炒

車前子 炒

甘草

炙各二兩

研細水法盪丸每早晚淡酒送下一錢五分

連翹解毒湯

四肢濕腫諸瘡

牡丹皮

牛膝

天花粉

木瓜 桃仁去尖去皮 金銀花

苡仁 甘草 白殭蠶

連翹

水煎服

膿窠瘡

生大黃二兩 生石膏一兩

研細麻油調搽

又方

芝 麻炒黃色 硫黃各等分

湯醫大全 卷三五 膿窠瘡方三 顧氏秘書

研細柏油和丸搽之

又方

硫黃末麻油調用尖板柳蘸在紅缸片上磨搽

又方

多年陳桐油竹燈盞燒之取滴下油加花椒末冷

定搽之

又方

硫黃 花椒炒各三錢 潮腦一錢

生明礬 枯白礬各一錢五分 猪板油二兩

搗丸夏布包以火烘之候溫擦之

又方

蒼朮四錢 老松香三錢 枯礬二錢

烟瀝 鞋底皮煨灰 輕粉各五錢

檳榔二個

共研細熬鹹猪油調搽

又方

密陀僧 硫黃 石膏

雄黃

湯醫大全 卷三五 膿窠瘡方四 顧氏秘書

各等分雞蛋清調搽

又方

花椒 白芷 雄黃

血竭 明礬各等分

研細末用陳爛油濾清調搽

又方

松香 輕粉各一兩

香油脚調搽並治疥瘡

又方

硫黃 三錢包豆腐內煮半日用 松香 二錢 東丹 一錢

共研極細末用雞子七個煮熟去白用蛋黃先

將銅杓置火上加菜油少許入雞子黃煎至黑

色油自出也取油調搽

又方

用雞蛋一個打一孔去黃留白入礬石灰二錢用

紙封口外用益泥封固火煨通紅去泥研細茶油

調搽

又方

傷醫大全 卷三十五 膿窠瘡方五 顧氏秘書

雄猪油 四兩 花椒 梔子 各三錢

防風 蒼朮 當歸

連翹 各五錢

煮酒飲

濕熱膿窠爛瘡

大蚌殼 火煨一兩 輕粉 一錢 龍骨

飛丹 枯礬 各少許

研細桐油調搽

百效丸 劉氏秘方

不拘通身上下手足膿窠血瘋疥癬

黃柏 為君 苦參 為臣 連翹

川牛膝 何首烏 當歸尾

生地 牡丹皮 為佐 防風 瘡在上為使

防已 荆芥 紫蘇葉 瘡在下此三味為使

右為末神麩打糊為丸每服三錢白湯送下

筋服完除根不發 加蛇蛻一兩炒研更妙

又方

蛇蛻 一條 豆腐皮 三張

傷醫大全 卷三十五 膿窠瘡方五 顧氏秘書

同炒研末無灰酒調服今夜服之次早其瘡自

愈並治疥瘡

又方

紅棗 去核 芎藭 去鬚 搗爛煎湯先薰湯温即洗洗久

自然不痛搗破皮洗去膿一日即結痂

膿窠疥瘡 方配京

鮮菖蒲根搗爛擦或全猪油搗勻布包擦

通身生瘡藥酒 王樵邱

虎骨 酥炙 薏苡仁 各一兩 當歸

金銀花

防風

白茯苓

連翹

懷生地

貝母 各四錢

蒼耳子

羌活

天花粉

白芍 各三錢

海風簾

黃栢

茅蒼朮 各二錢

共入絹袋盛好酒十觔浸三日隔水煮埋地下

七日出火毒每飲數杯

膿窠瘡流黃水搔癢不已延蔓無止

官粉 一兩炒 冰片 三分

瘍醫大全

卷三十五

膿窠瘡方

顧氏秘書

研細搽

濕熱膿窠

生苡仁

桑枝

鮮松菓

五加皮 各四兩

赤首烏 八兩

火酒十觔浸七日飲

膿窠瘡

防風

金銀花

花椒

粉丹皮

生地

甘草

羌活

苦參

當歸

連翹

荆芥 各五錢

右用麻油一觔入鍋熬枯濾去渣復入淨鍋內

熬至滴水成珠入黃蠟一兩任其自化或加紫

草五錢亦可離火放土地上出火毒搽之

又方

木鱉子

樟腦

蛇床子 各三錢

水銀

雄黃 各八分

大楓子 四錢

共研至水銀無星為度加陳燭油為丸擦之疥

瘡通用

瘍醫大全

卷三十五

膿窠瘡方

顧氏秘書

膿窠疥瘡藥酒方

生地

金銀花


當歸

蒼朮 各二兩

猪板油 十兩

入壺內加酒十五觔封口隔水煮一炷香退火

氣三日任飲



疥瘡門主論

王肯堂曰疥有五種一曰大疥疥赤癢痛二曰馬疥疥有膿

隱起帶根三曰水疥疥癩含漿四曰乾疥癢而搔

搔不知痛五曰濕疥薄皮小瘡常常宜分治之準繩

陳實功曰疥瘡皆因脾經濕熱肺經風毒客於肌膚

毒之淺者為疥毒之深者成癬脾受沴濕之熱發

為膿窠爛瘡疥癬皆有小虫染人最易切忌熱湯

浸洗圖片刻之快暢殊不知熱毒攻裡虫愈深入

雖有良方何能刻日奏效患者戒之兼忌一切發

瘍醫大全 卷三十五 疥瘡論 九 顧氏秘書

物海鮮 正宗

生瘡疥不可在浴室內去浴必須以藥湯在自家屋

內浴之至於藥裏紙內或在火爐或在被內燻治

切不可為訓恐引毒入臟腑害人慎之慎之石室

蔣示吉曰疥有乾疥濕疥虫疥砂疥紫疥之稱小如

疹子乾而且癢者是此乃風熱虫也宜內服疥靈


丹外搽三黃丹自愈說約

心法曰疥有乾濕蟲沙膿五種如肺經燥盛則生乾

疥癢癢皮枯而起白屑 脾經濕盛則生濕疥

腫作痛破津黃水甚流黑汁 肝經風盛則生蟲
疥癢癢徹骨撓不知痛 心血凝滯則生沙疥形
如細砂焮赤癢痛抓之有水 腎經濕熱則生膿
窠疥形如荳粒便利作癢膿清淡白或脾經濕盛
亦生膿窠疥但頂含稠膿癢痛相兼為異而體虛
之人亦生以便秘為實便利為虛亦有虛而便燥
者如氣秘則便燥血分枯燥則便澁又在瘡之形
色脉之有無力辨之

瘍醫大全 卷三十五 疥瘡論 十 顧氏秘書



疥瘡門主方

消毒散

遍身癢疥

金銀花 連翹 白蒺藜

荆芥 白芷 牛蒡子

防風 白蘚皮 赤芍藥

甘草

水煎服 日久不愈加何首烏 乾燥加當歸

有熱加黃芩 下部多加黃柏 小便澇加木

通 傷醫大全 卷三五 疥瘡方 十一 顧氏秘書

疥靈丹

枳殼 炒 山梔 連翹

荆芥 當歸 羌活 各七錢

白蘚皮 炒 白芷 苦參 糯米泔浸 一各一

兩

右為細末煉蜜為丸桐子大每服五十九白湯

送下立可除根

疥癬膿窠一服除根

何首烏 石菖蒲 荆芥

防風 漏蘆 各等分

右為末每服三錢酒調下

療毒湯

治一切久遠痛癢諸瘡

何首烏 荆芥 獨活

防風 威靈仙 胡麻

石菖蒲 苦參

白湯煎服

傷醫大全 卷三五 疥瘡方 十二 顧氏秘書

硫黃丸

硫黃 精明者一兩

研細末糕搗丸如桐子大合三兩重看瘡上身

多食後服下身多食前服俱用荆芥湯送下五

六十九

搽疥方

大楓子 三十枚去殼全 杏仁 十粒 去皮水 銀一錢

生猪板油一兩全搗爛麻布包擦神效

又方 陳在賓

藜蘆 明雄 蒼木 各三錢

健猪油二兩和藥包草紙內捲成條火燒滴油
搽之但此法製時忌與人見人若見則油燒不

下

青桃丸

油核桃 猪板油 各三錢 白薇 二錢

輕粉 防風 蘇葉 各一錢

搗丸如彈子大擦之

減味合掌丸

傷醫大全 卷三十五 疥瘡方 顧氏秘書

大楓肉二十一箇 水銀 製三錢 潮腦 一錢

相油四兩研細丸彈子大以火微烘搽之

損肌丸

白砒 水銀 各三分 油核桃 五錢

大楓肉 一錢

全研不見星爲度絹包每臨臥時擦心口片時
兼戒口味

蛇蛻丹

水銀 楨榔 各一錢 潮腦

枯礬 蛇蛻煨 雄黃

油核桃 花椒焙各五分 杏仁

大楓肉各二十一枚

共研細陳蠟燭油爲丸每早五更時手搓鼻嗅

三黃丹 吳黃九

硫黃 雄黃 黃丹

潮腦 川椒焙 枯礬 各等分

用麻油四兩雞蛋一個將蛋煎枯如絮去蛋不

用將藥末裝粗布袋內慢慢擺入油內取起冷

傷醫大全 卷三十五 疥瘡方 顧氏秘書

定搽之全猪板油搗勻搽之亦可

又方

芝蔴炒 硫黃 輕粉

火硝 枯礬 各等分

搗丸搽之

又方

栢油和猪膽汁熬一滾候冷定搽上三日全愈

又方

大楓子肉十三粒搗爛入輕粉一錢和丸擦脚底

數次即愈

又方

蛇床子

五分先研細末

砒九分二次研細

大楓肉

三兩三次研細

油核桃

四十個研細水

銀一兩五次研細

作五次逐味加入研細臨晚浴淨先飲無灰酒

待其作瘰然後搗破分五日擦之

三聖丸

水銀

潮腦各二錢

川楓子肉五十粒

共研極細加柏油二錢研勻為丸週身滾之立

湯醫大全

卷三五

顧氏秘書

愈若兼瘰竇加硫黃一錢

諸瘡一掃光

此藥治瘰瘡不論新久及身上下或乾或濕異

類殊形但多瘰少痛者用之俱各有效

苦參

黃栢各一筋

烟膠一升

枯礬

木鱉肉

大楓肉

蛇床子

點紅椒

潮腦

硫黃

明礬

水銀

輕粉

各二兩

白砒五錢

共為細末熟猪油二筋四兩化開入藥攪勻作九龍眼大磁瓶收貯用時搽擦瘡上二次即愈

又方

蒼朮一筋研末鋪床上單被掩之睡五七夜自痊

又方

山萸肉五錢

黃豆一兩

硫黃三錢

先將萸肉黃豆炒研加硫再研用銅鍋熬雞蛋

油調搽三四日愈

又方

湯醫大全

卷三五

疥瘡方

下

顧氏秘書

硫黃

皂礬

枯礬

川椒

油核桃

檳榔各等分

共研細猪油調搽

又方

鴿糞

枯礬

硫黃

石膏

蛇床子

各等分

共研細猪油調搽

又方

輕粉

雄黃

寒水石

枯礬 大楓肉 潮腦 各等分

研細相油調勻搽三五次見效除根

又方 岐天師

蘇葉 防風 輕粉 各一錢

白薇 二錢 猪板油 油核桃 各三錢
不可去油

共搗成圓如彈子大擦瘡上一日愈

合掌丸

大楓肉 四十粒 水銀 製二錢 枯礬

畚木鱉 川椒 各三錢 海螵蛸

湯醫大全 卷三十五 疥瘡方 七 顧氏秘書

雄黃 各五分

油核桃肉搗丸並治沙瘡

又方

水銀 東丹 各二錢 潮腦

枯礬 鉛粉 輕粉 各三錢

大楓肉 雄黃 各四錢

熟菜油或陳蠟燭油調搽

青金散

松香 二兩 蛤粉 五錢 青黛 二錢

枯礬 輕粉 各三錢

為末燭油調搽並治煉眉疥癬

又方 集驗

治一切惡瘡醫所不識者

明松香 鉛粉 水銀

黃栢 黃連 甘草

土蜂窩 著土壁上者南方多有之各等分

先將水銀放手掌中以唾津殺為泥入磁器中

以生麻油和研生絹濾如稀餳和藥末再研如

湯醫大全 卷三十五 疥瘡方 七 顧氏秘書

稠餳用溫水洗瘡軟帛拭乾塗之一次即瘥有

黃木者塗之隨手便乾癢不堪忍者塗之立止

痛甚者立定治疥尤佳抓破搽藥

洗疥

紫背萍煎湯洗

又方

苦參半觔切片用河水三四瓢煎數滾添水二瓢

住火片時濾去渣臨洗和公猪膽汁四五枚攪勻

淋洗瘡上三日一洗三次其癢立止矣

又方

苦參一兩 蛇床子 黃柏

荆芥各五分 白礬二錢五分

煎湯溫洗

又方

防風 荆芥 野菊花

苦參 馬鞭草 白礬

花椒

水煎濃汁薰洗

又方

莧菜根煎湯洗

又方

岐天師

蒼耳草半兩 生黃芪三兩 苦參四兩

生甘草 防風 荆芥

金銀花各一兩

水煎湯一大鍋傾盆內乘熱薰之外用簾二條

裹在盆外用衣蓋之使氣不散俟稍涼浴之必

至湯寒而後已一日再浴將渣再煎如前浴之

傷醫大全 卷三十五 疥瘡方 九 顧氏秘傳

三日瘡疥必全愈也

諸瘡作癢並治痘瘡作癢

茵陳一味燒烟薰之

身上起窠子眼胞腫

金銀花一兩 當歸 防風各五錢

薄荷二錢 甘草三錢

煎湯先薰後洗祛風妙法

滿頭癩瘡及手足身上陰器膚囊搔癢抓爛淋漓

黃連五錢 蛇床子二錢五分 五倍子一錢二分

傷醫大全 卷三十五 疥瘡方 十 顧氏秘傳

輕粉二十五

研勻先以荆芥葱白煎湯洗拭乾清油調搽

膿疥瘡 集驗秘方

烟膏 東丹各一兩 雄黃

硫黃各三錢 輕粉一錢

研末醃猪油調抹如連片將油紙攤藥縛好不

動三日脫光

身上生碎重瘡 官方

大楓子 油核桃各二錢 水銀一錢

信石 一分

共重六錢一分九做六九每日用一丸上身多於臍上揉之下身多於臍下揉之空臍處不揉連用五日用去五九歇下一日再用第六九收功

疥癬膿窠神方 劉氏秘法

硫黃 五錢 巴荳霜 四錢 黃丸子 卽麥芽黃

雄黃 各三錢 銀珠 二錢 白砒 五分

共研細末每用一錢入後製藥油一兩和勻搽

湯醫大全 卷三十五 疥瘡方 主 顧氏秘書

之三日全愈

附製瘡藥油法 雄猪油一筋 檳榔大黃黃栢麻黃各一兩 木三碗全藥入鍋內熬至水乾抽出油去渣冷定收貯調一切瘡癬擦藥俱有奇功

劉氏秘製金毛獅子瘡藥

黃芩 荆芥穗 黃連

五倍子 茜草 槐枝頭

芒硝 黃栢 各二兩

共為粗末再炒老黃色 再加

土硫黃 醋煮 枯礬 各二兩

共研細末 再加

巴荳肉 三錢 草薺仁 五錢 大楓子 淨肉二兩

共搗如泥全前藥和研勻細再加

水銀 黑鉛 各一兩 雄黃

潮腦 各五錢

共前藥研和一處每用一錢以前製瘡藥油調

搽治一切血瘋疥癬手足諸瘡如神凡脚上患

血瘋瘡多年不愈先以藥水洗淨拭乾再以研

細輕粉薄薄搽上再搽瘡藥 凡搽瘡藥先一

湯醫大全 卷三十五 疥瘡方 主 顧氏秘書

日用油調鹿角霜細末厚敷瘡上過夜次日再

搽瘡藥更妙

胡麻丸

小兒風癬疥瘡

苦參 五錢 石菖蒲 甘菊花 各一兩

何首烏 威靈仙 白蒺藜

荆芥穗 牛蒡子 胡麻仁

蔓荊子 各三錢

右磨細末酒糊丸棗豆大每服一錢竹葉燈心

湯下

疥瘡

雄檳榔磨麻油搽

又方

大楓子肉 油核桃肉 各四兩

共研爛裝入竹筒內封口放鍋內煮一炷香傾

出加陳蠟燭油布包擦

乾濕疥並膿窠黃水瘡作癢作痛

枯礬 四兩 蛇 蛻 燒存性 露蜂房 各五分

瘡醫大全 卷三十五 疥瘡方 圭 顧氏秘書

大楓肉 二兩 樟 冰 三錢

共為末入相油四兩水銀五錢全研成膏搽

疥瘡及婦人陰蝕瘡諸般惡瘡

蕪 荑 蛇床子 各一兩 雄 黃

大楓肉 川 椒 硫 黃 各五錢

枯 礬 一兩二潮 腦 輕 粉 各二兩

共研細猪油調搽

一切諸瘡發癢

枯 礬 乾 薑 各等分

研細先用細茶食盪煎洗再乾搽

諸瘡疥癬

烟 膏 卽硫皮坊內竈上 黃 丹 水飛各

硫 黃 五錢 溶化地上 掘一 土貝母

白 芷 羌 活 枯 礬 各二錢

麝 香 一錢 輕 粉 三分

共為細末磁瓶收貯有膿水者乾搽無膿者相

油燭調搽如禿瘡剃淨頭以豆腐水洗拭乾搽

瘡醫大全 卷三十五 疥瘡方 圭 顧氏秘書

熟雞蛋一個打破頭取去蛋黃入麻油於內加硫

黃少許放灰火上坐定俟油滾起沫蘸塗瘡上卽

愈

參芪丸

治疥瘡膿窠

生黃芪 苦 參 酒炒 茅蒼木 米泔炒 各一兩

共磨細末水法盪丸菜豆大每服三錢白湯下

驗方

大楓子 四十九粒去殼搗 如泥放碗內

外用麻黃三錢去根去稍斑蝥七個去頭足翅雄猪油二兩全

熬化至炭去渣將滾油冲入大楓子碗內攪勻

將瘡用穿山甲抓破搽之不過三日全愈此藥

妙在外發並不內收須勤擦之

又方

水 銀 硫 黃 枯 礬

樟 腦 各二錢 松 香 一錢

先將松香水銀全麻油研如糊再入三味研如

膏擦之

瘍醫大全 卷三十五 疥瘡方 顧氏秘書

疥瘡

水 銀 一錢 松蘿茶 三錢 麝 香 一分

大楓肉 二十個

右研細擦前心後心兩手灣兩脚灣如神

膿窠疥

大楓肉 杏 仁 桃 仁 各四十粒

研細用麻黃五錢猪油熬去渣和藥調搽

膿窠疥

北細辛 麻 黃 大楓肉 各五錢

全 蝎 二個

右用猪板油十兩熬枯去渣搽

疥瘡

石灰二升以湯五升浸取汁先用白湯洗瘡拭乾再以此汁洗之

又方

搗羊蹄根和猪脂入鹽少許塗之

又方

大楓子 五錢 水 銀 一錢 五 明 礬

瘍醫大全 卷三十五 疥瘡方 顧氏秘書

花 椒 各二錢

研勻以猪油拌藥搗爛搽

薄皮瘡門主論

薄皮瘡又名廣瘡破後只一薄皮者是此風熱鬱於皮毛而成也

卷三十五 薄皮瘡論 三 顧氏

薄皮瘡門主方

驗方

苦參 密陀僧 蛤粉

兒茶

各等分研細先將瘡洗淨搥去白皮拭乾瘡上陳臘猪油調搽如有膿水乾搽可也

卷三十五 薄皮瘡方 三 顧氏

肥瘡



瘍醫大全

卷三十五

肥瘡論

顧氏秘書

肥瘡門主論

陳實功曰肥瘡由胎毒而成者少因飲食之後油手
摩頭或枕頭不潔而成者多 正宗

申斗垣曰此瘡宜槐條煎湯洗淨以烟膠枯礬輕粉
研細熟油調搽 啟立

馮魯瞻曰此瘡乃臟腑不和之氣上衝血熱之毒上
注小兒陰氣未足陽火有餘故最多犯之宜內服
連翹天花粉荆芥防風貝母元參赤芍藥生地黃
牛旁子清熱解毒涼血和血之劑俟毒氣少解方

外用藥以塗之切不可驟加寒涼塗過以致熱毒
內攻不救益小兒臟腑嬌嫩易入難出也 錦囊

瘍醫大全

卷三十五

肥瘡論

顧氏秘書

肥瘡門主方

肥瘡

胡黃連

輕粉

雄黃各三分

膽礬二分

枯礬一錢

猪蹄鞋三個煨存性

研細將瘡洗淨搽之

又方

肥皂子煨存性研末猪膽汁調搽

又方

松香

血丹各等分

湯醫木全

卷三十五

肥瘡方

三

顧氏秘書

研細猪板油搗汁青布捲條燒之取油搽

又方

東丹八分

枯礬一錢

重鉛粉

松香

各二錢入葱管內飯上蒸化待冷去葱用

共研細末熱香油調搽猪油亦可

又方

黃花

燒灰

輕粉

少許

研勻乾搽

小兒頭上肥瘡黃水瘡梅花禿

銅綠

松香

各三錢

黃蠟

二錢

香油一兩五錢熬勻塗之

頭上生瘡俗名熱瘡絕妙方周氏集驗

海蝶蛸二錢

白膠香

輕粉

各五分

研勻清油潤瘡以藥乾摻

肥瘡極凶者

苦參

何首烏

當歸

葳靈仙

甘草

金銀花

胡麻

石菖蒲

連翹

生地

蟬蛻

酒水全煎

又方鴻禧東房傳

大楓肉五錢

白信三分

油核桃五個

共搗勻作三九夜間取一丸在心口用手擦至

二更天氣藥散開仍聚胸膈仰面而臥次夕亦

然問一夜再擦一九七日後全愈

頭面肥瘡輕驗

輕粉

飛血丹

白礬

雄黃 各等分

研細裝入葱管內兩頭紫煨過加龜版灰少許
研萊油調搽立效

栢油膏 劉氏秘方

治小兒頭上肥瘡羊鬍瘡奶癬瘡膿窠瘡脚上
血瘋瘡癬婦人鈕扣風裙邊瘡耳上濕瘡如神

栢油一兩 蘇油四兩 明礬
銅綠各二兩 鉛粉一兩

共入鍋內熬成紅色下黃蠟二兩化盡俟溫不

湯醫大全 卷三十五 肥瘡方 三 顧氏秘方

住手攪勻離火入羊膽汁二個如無入牛膽汁

一個猪膽汁二個攪勻磁鉢收貯搽之或調金

毛獅子瘡藥搽瘡更妙

肥瘡 王衣蘭

紫草浸水麝頭油搽二三次愈

肥瘡瘋癩

煮雞蛋黃二個入銅鍋內熬出油入松香一兩五

錢熬枯為末又用麻油一兩入蜈蚣一條 去頭入

油內熬枯去渣冷定調前末聽用 先將瘡用搽

猪湯煎滾洗透去膿或剃頭後用雞蛋數枚加花
椒五分以香油攤煎餅蓋頭上用舊帽蓋之過一
宿再用蜈蚣油調松香末搽之

又方

海蝶蛸研末炒微黃搽

又方

厚樸烘脆研細末麻油調搽

又方

香附 枯礬各三錢

湯醫大全 卷三十五 肥瘡方 三 顧氏秘方

煎水洗

又方

老益魚一塊香油炙焦去油以油搽之

爛着頭瘡

小麥炒黑色為末酒調敷

頭上肥瘡

宰猪退毛湯洗數次

天泡瘡門主論

陳寶功曰天泡瘡者乃心火妄動脾濕隨之有身體

上下不同寒熱天時微異上體者風熱多於濕熱

宜涼血散風下體者濕熱多於風熱宜滲濕為先

若不早治久則變為頑風紫癩難愈 正宗

申斗垣曰此瘡屬手太陰肺經肺主皮毛因受暑熱

濕蒸之氣故遍身燎漿白皰疼痛難忍皮破赤沾

也 啟玄

王肯堂曰天泡瘡即丹毒之類而有泡者由天行少

陽相火為病故名天泡為風熱客於皮膚間外不

得泄佛熱血液結而成泡如豌豆瘡根赤頭白或

頭亦赤隨處而起若自裡達於外發在春夏三焦

俱熱則服通聖散若止從頭項兩手起者此上焦

熱也則服涼膈散若從身半已下起者則服黃連

解毒和四物湯若發於秋冬則宜升麻葛根犀角

或加栝苓一二味外敷如馬齒莧吳藍赤小豆苧

根之類皆解毒消腫可用於初起之時或髓甲水

龍骨 各煨存性則收濕生肌可用於浸淫之後 準繩

馮晉瞻曰有種天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡
毒氣亦微四年此瘡自西域東流於海內但煮食
葵菜葉以蒜蘸啖之即止 錦囊

傷醫大全 卷三十五 天泡瘡論 手 顧氏秘書

天泡瘡門主方

胡粉散

天泡紅腫發熱急服疼痛用針挑破摻之

石膏煨 蛤蚧粉 輕粉 各三錢

杭粉 一兩

共研極細挹乾患上用此摻之或用絲瓜葉搗汁調搽如冬月無絲瓜葉用染布青缸汁調搽

石珍散

天泡日久作爛疼痛不已膿水淋漓

瘡醫大全

卷三十五 天泡瘡方 顧氏必書

石膏煨 真輕粉 各一兩 青黛

黃栢 各三錢

研細甘草湯洗淨以此藥摻之其痛即止

又方

銀粉煨赤 用鮮絲瓜葉搗汁調搽

又方

馬齒莧搗汁搽

又方

靛花汁搽

又方

陳螺蛳殼煨研乾摻

又方

蚌殼煨研摻

又方

蛤蚧殼煨研摻

又方

芋麻根搗汁搽

又方

井底泥敷

又方

芭蕉根搗汁敷

又方

小麥炒焦研末生桐油調敷

又方

大紅紙剪如瘡大清水潤濕以紅紙正面貼瘡上

又方

馬桶中垢刮下新瓦焙乾麻油調搽七日愈

又方

又方

蚯蚓泥畧炒研末蜜調敷

又方

菊花根汁搽

又方

絲瓜皮汁搽

又方

荔枝核醋磨搽

又方

備要

瘍醫大全

卷三十五

天泡瘡方

顧氏秘書

輕粉青黛等分研細瓦花汁調搽立效

又方

蠶豆殼燒灰塗之

又方

枯礬

寒水石

青

黛

各等分

研細新汲井水調搽

翻花瘡門主論

周文采曰初生如飯粒漸大而有根頭破血流膿出

肉反如花開之狀故名翻花瘡

集驗

陳實功曰此瘡頭大而蒂小小者如豆大者如菌無

苦無痛搯損每流鮮血久亦虛人大法當以津調

水蠲散遍擦正面外用軟油紙包裹根蒂細處用

線連紙裝緊十日後其患自落換搽珍珠散收口

正宗

瘍醫大全

卷三十五

翻花瘡論

畢

顧氏秘書

鴉啗瘡門主論

晉漢卿曰鴉啗者久中邪熱臟腑虛寒血氣衰少腠理不密發於皮膚之上相生如錢竅後爛似鴉啗日久損傷難治用鴉啗散全書

鴻醫大全 卷三十五 鴉啗瘡論 顧氏秘書

鴉啗門主方

鴉啗散 賈氏

老鴉毛 燒灰

大紅絨 燒灰

黃丹 各一錢

珍珠 五分

冰片 一分

麝香 少許

輕粉 三分

枯礬 五分

右為細末先用苦茶洗淨乾摻

鴻醫大全 卷三十五 鴉啗方 顧氏秘書

面上熱毒惡瘡門主方

面上生瘡

胡粉

輕粉

松香

各等分

研細雞蛋白黃煑油調搽

面上熱毒惡瘡馮氏

胡粉

黃栢炙

黃連

各等分

研細猪油調敷

面上毒瘡初起凌漢章秘方

急尋水蛭蚰一二條用醬少許共搗塗紙上留一

傷醫大全

卷三十五

惡瘡方

顧氏秘書

小孔透氣貼上

黃水瘡門主論

申斗垣曰黃水瘡又名滴膿瘡啟玄

陳實功曰頭面耳項忽生黃泡破流脂水頃刻沿開
多生痛癢此因日晒風吹暴感濕熱或內殮濕熱
之物風動火生者有之治用蛤粉散或四味異功
散搽之正宗

馮曾瞻曰面上耳邊生瘡時出黃水浸淫不愈名曰
香癩瘡錦囊

凡初起細瘡手少動之卽破毒水流入何處卽生大

傷醫大全

卷三十五

黃水瘡論

顧氏秘書

水泡瘡卽爲黃水瘡此熱毒鬱於皮毛也當以湯
洗之秘錄

黃水瘡門主方

四味異功散

松香煉老 生礬 枯礬

銀粉

各等分研細先將搗猪湯或米泔水熬洗去淨瘡屬拭乾穢水乾則麻油調搽濕則乾摻

面上黃水瘡

酸棗 荊芥 羊鬚各煨灰存性一錢

鉛粉五錢

湯醫大全

卷三十五 黃水瘡方

聖

顧氏秘書

研細先以槐條煎水洗淨將藥敷上其瘡白好

洗法岐天師

雄黃 防風各五錢

水十碗數滾去渣取汁洗瘡即愈

又方

鉛粉用菜油調塗磁碟內多捲紙板點着合薰時時攪勻待遍黃聽用將麝剝去搽上立愈

又方周氏抄本

雄猪膽一個黃栢一兩浸焙乾為末摻之

又方

松香研細直麻油調搽

又方

銀粉并水調塗碗底以艾團燒烟薰轉綠色刮下研細濕則乾摻乾則油調搽

湯醫大全

卷三十五 黃水瘡方

聖

顧氏秘書

香瓣瘡門主論

申斗垣曰香瓣瘡又名浸淫瘡初生甚小先癢後痛
汁出浸淫濕爛肌肉延及遍身多生面上耳邊

香瓣瘡論 卷三五 香瓣瘡論 聖 顧氏醫書

香瓣瘡門主方

面上耳邊香瓣瘡

殺羊鬚

荆芥

乾

棗

去核各取
存性二錢

研細入銀粉五分每用少許油調先以溫湯洗
淨拭乾塗上即愈

小兒身上起白癩如珠線一二日即破膿水外流癢
甚一處方好一處又起

如意草搗爛敷之以長布縛定一夜即安

又方

香瓣瘡方 卷三五 香瓣瘡方 聖 顧氏醫書

雞蛋殼煨存性研細猪油調搽

又方

紫草一錢麻油浸先搽一塊好了再搽一塊



金絲瘡門主論

金絲瘡形如繩線百不一上下至心即死治法將

瘡頭截住刺之出血再用藥治 集驗

湯醫大全 卷三十五 金絲瘡論 見 顧氏

金絲瘡門主方

驗方

嚼薄萍塗之即愈

湯醫大全 卷三十五 金絲瘡方 見 顧氏

傷醫大全卷三五

火珠瘡門主論

火珠瘡其形如珠始於髮中相染不已亦有傷命者其熱如烙四畔紅赤中藏明亮如珠此心肝二經積熱熾盛而成

傷醫大全

卷三五 火珠瘡論

壬 顧氏秘書

火珠瘡門主方

驗方

生蘿菔搗爛將滴醋浸敷瘡上

傷醫大全

卷三五 火珠瘡論 壬 顧氏秘書

寒瘡門主論

寶漢卿曰寒瘡令人面上及遍身生瘡似猫眼有光彩無膿血久則近脛此乃脾家濕熱所化宜服雄黃解毒丸清肌滲濕湯多食魚雞葱蒜自愈惟鯉鮎魚蝦蟹不可食

全書

心法曰猫眼瘡一名寒瘡每生於面及遍身由脾經久鬱濕熱復被外寒凝結而成初起形如猫眼光采爛爍無血但痛癢不常久則近脛宜服清肌滲濕湯外搽妙貼散

瘍醫大全

卷三十五

寒瘡論

五

顧氏秘傳

冷瘡門主論

申斗垣曰身觸風寒冷氣以致血澁不行其瘡頑滯不知痛癢經久不愈宜用椒附雄礬粉油調敷

微立

瘍醫大全

卷三十五

冷瘡論

五

顧氏秘傳

肉刺毛門主論

汪省之曰肉刺毛隱隱生人遍身皮膚手足間如虫
鑽刺令人難忍若一犯房慾其毒直刺心胸宜礪
砂散主之 理例

傷醫大全

卷三十五

肉刺論

五

顧氏秘傳



魚脊瘡門主論

寶漢卿曰魚脊瘡者乃臟中積冷腎氣虛寒故虛熱
得傳經絡筋骨之間發動不知何處初生如疽癩
破時黃水流生白泡似魚脊若不速治肉爛膿流
命亦難保 經驗

傷醫大全

卷三十五

魚脊瘡方

五

顧氏秘傳



赤炎瘡門主論

申斗垣曰赤炎瘡乃手太陰肺經感受風熱肺主皮毛其經多氣少血故遍身紅瘡點子又名赤炎風乃心火盛血熱也有赤點或有或無久而不愈變為厲風 啟立

卷三十五 赤炎瘡論 顧氏

癰瘡門主論

直指方云癰瘡上高下深纒垂如瞽眼其中帶青頭上各露一舌毒孔透裏用生井蛙皮煨存性蜜水調傳良 詳本草綱目毒部

卷三十五 癰瘡論 顧氏

癩瘡門主論

馮魯瞻曰癩瘡者因風熱毒氣所乘搏於皮膚生癩
寒而潰成瘡故名之 錦囊

易醫大全

卷三十五

癩瘡論

三

日晒瘡門主論

申斗垣曰此乃酷日晒曝先疼後破而成瘡此辛勤
勞作傭工務農之人多有之宜製柏散加青黛治
之 啟玄

易醫大全

卷三十五

日晒瘡論

三

顧氏秘

水漬瘡門主論

申斗垣曰車縫匠及染匠辛苦人久弄水漿不得停
息以致手了濕爛名曰水漬瘡 敬立

傷醫大全

卷三十五 水漬瘡論

李 顧氏

水漬瘡門主方

驗方 敬立
礬水浸洗數次自愈

傷醫大全

卷三十五 水漬瘡方

李 顧氏秘書

凍瘡門主論

陳實功曰凍瘡乃天時嚴冷氣血冰凝而成手足耳邊開裂作痛 正宗

申斗垣曰凍瘡先痛後腫遇煖發燒破流膿血 啟立

石室秘錄云凍瘡乃人不耐寒而肌膚受冷驟用火

烘乃成凍瘡至於耳上凍瘡必是人用手溫之反

成此累也

正字通云今俗呼足跟凍瘡曰龜瘡

蔣示吉曰凍瘡乃肌肉寒極氣血不行所謂死肌患

湯醫大全 卷三十五 凍瘡論 李 顧氏秘書

也初起紫斑久則變黑腐爛作膿碧玉膏主之生

肌斂口 說約

澄 謂熱肌經冷風所激凝滯成片作癢此是凍風切

勿火烤亦忌熱手摸擦越摸越甚一經紫黑破損

即成凍瘡宜棟樹果煎湯洗極效

凍瘡門主方

凍瘡疔裂

桐油 八兩 白蠟 黃丹 各一兩

熬膏貼之

又方

棟樹果煎湯淋洗即以棟樹果擦之神效

又方

五倍子 牛鼻中繩 煨灰各

研末填凍裂處

湯醫大全 卷三十五 凍瘡方 李 顧氏秘書

又方

松香 二兩 黃蠟 一兩

熬勻瓦罐收貯先以熱湯洗令皮軟拭乾將藥

於慢火上炙化塗之

凍耳凍跟

端午日取猪板油四兩去皮膜加乳香二分輕粉

三分雄黃五分研入米燒酒內拌勻再入油拌過

俟收乾懸屋簷下陰乾搽之

手足開裂經春夏不愈者

生薑搗汁 紅糟 食盐

臘猪油

共研爛擦入靴內一時雖痛少頃便軟靴合再用即安

免凍瘡法

杏仁 天花粉 一兩 紅棗 十枚

猪胰 三副

共搗如泥用好酒四杯浸於磁器內早晚擦手及頭面

湯醫大全

卷三十五

凍瘡方

李

類此秘書

冬月凍瘡皮裂疼痛

黃蠟一兩融化入松香三分攪勻每以溫湯洗拭裂處用前藥融化滴入裂縫經旬即愈

凍瘡未破者

白礬研末一錢百沸湯半鍾攪和雞毛掃塗烘乾擦去患處白屑再掃再烘藥盡自愈

洗凍瘡

秋茄根煎湯乘熱洗之如皮破以螃蟹殼煨灰搽之

又方

白芨二兩煎湯洗之如破爛者洗後用橄欖核燒研為末搽之

又方

陳石灰

黃狗屎

露天久者變成白色用炭火煨過各等分

研細末以麻油調之敷上雖成瘡潰爛敷上即止痛生肌

凍瘡久爛不愈

糖漿罈內炒成灰研末一兩加水片少許乾搽

湯醫大全

卷三十五

凍瘡方

李

類此秘書

又方

獨蒜煨杵爛貼

又方

熬熟桐油調密陀僧末敷

又方

五倍子研末和牛骨髓填縫內即好

又方

荊芥煎湯洗之三日愈

又方

生附子為末麩水調敷或加棟樹子肉搗敷

又方

麻雀腦子塗之

又方

猪腦子加熱酒洗

又方

臘月羊油懸掛屋內愈陳愈妙搽之立愈

又方

白芨末調敷裂處

又方

傷醫大全

卷三十五

凍瘡方

李元

顧氏秘書

羊屎不拘多少煨令存性砂糖調敷

又方

狗骨煨存性研末香油調填裂圻內

又方

附子皮煎湯洗

又方

陳蠟燭油全白蠟搽之

又方

糟湯浸洗薑汁塗之

脚指凍風爛化

棉花燒灰搽之

凍瘡

油蘸脂搽之

又方

玉紅膏搽之

又方

五倍子猪油搗成膏填入裂縫

傷醫大全

卷三十五

凍瘡方

李

顧氏秘書

凍耳

姜汁煎塗

凍跟

茄根煎湯洗

免凍

櫻桃擦耳擦脚後跟冬來不生凍瘡

凍瘡

舊貂毛煨存性搽

又方

一三三
天全在四庫全書
4月5日

凍瘡已破者用黃柏末七分生皮硝三分未破者用黃柏末三分生皮硝七分俱用冷水調搽

又方

鴿糞煎湯洗

又方

餅殼燒枯研細菜油調搽

又方

先用胡椒煎洗拭乾再用胡椒研細滲上外以新棉包裹用布紮好

瘍醫大全

卷三十五

凍瘡方

三

顧氏秘書

又方

鮮薑莖葉煎湯洗

又方

雪擦洗凍處

又方

魚膠熬化攤膏藥貼破裂上俟長平自落

又方

甘草甘遂煎湯熱洗三次

凍風開裂

敗荷葉梗 燒存性 頭垢

桐油熬過調膏搽成一塊臨用切作小條揷在

裂縫內

又方

醃菜瀆煎滾洗

瘍醫大全

卷三十五

凍瘡方

三

顧氏秘書

汗浙瘡門主論

申斗垣曰肥人夏月久不洗浴被汗淹浙皮膚浙爛成瘡痛不可忍名曰汗浙瘡 啟立

湯醫大全

卷三十五

汗浙瘡論

主

顧氏秘書

汗浙瘡門主方

驗方

豆蛤粉

滑

石

各等分

研勻撲之

湯醫大全

卷三十五

汗浙瘡方

主

顧氏秘書

皴裂瘡門主論

凡撐船推車打魚染匠輾玉木瓦辛苦之人手足皴裂挽動出血痛不可忍名曰皴裂瘡 啟立

瘡醫大全

卷三十五

皴裂瘡論

七五

顧氏秘書

皴裂瘡門主方

驗方 啟立

宜用地骨皮白礬煎湯洗之至軟再用臘月羊油燉化入研細輕粉一錢搽之神效

瘡醫大全

卷三十五

皴裂瘡方

七五

顧氏秘書

蜘蛛瘡門主論

陳實功曰蜘蛛瘡或衣沾蜘蛛遺尿或虫蟻遊走而

成初生白泡紅根作癢日漸開成簇作痛 正宗

申斗垣曰此瘡生於皮膚間如水窠瘡相似淡紅且

痛五七個成簇亦能陰開可用苧麻在瘡上揉搓

出水卽以苧麻燒灰爲末摻在瘡上卽愈 敬立

汪省之曰蜘蛛尿着人身上卽生瘡如粟粒纍纍似

蠅虫螫痛亦能惡寒發熱卽以犀角磨汁塗之則

愈不然以苧麻搓去瘡內水汁用金黃散搽之 理例

醫醫大全

卷三十五

蜘蛛瘡論

七

顧氏秘書

蜘蛛瘡門主方

驗方

公雞涎掃之

又方

公雞嘴瓜甲煨灰敷之

又方

用蟾酥丸全陳京墨磨搽

又方

苧麻搓瘡令破出水以雄黃枯礬等分研細乾摻

醫醫大全

卷三十五

蜘蛛瘡方

七

顧氏秘書

漆瘡門主論

陳實功曰漆味辛熱火象有毒之物人之皮毛腠理不密故感其毒而成先發作癢抓之漸似癰瘡出現皮膚傳遍肢體皮破爛斑流水作痛甚則寒熱交作忌浴熱湯兼戒口味不然即變頑風癩癩矣

申斗垣曰漆瘡令人渾身上下腫起如癩如火刺刺而痛皮膚燥裂三五日此風熱瘡或疼或癢為異

癩醫大全

卷三十五

漆瘡論

七

顧氏秘書

又曰宜韭菜搗汁調三白散塗之

證曰木形人遇漆起泡發癢變瘡肢腫作痛甚者寒熱交作此疾雖小有受者遍身頭面似癰癩浮腫生瘡痛癢毛髮脫落心神恍惚不得眠者因療之遲遂為他證或成風癩真可畏也

漆瘡門主方

驗方

栗樹皮去淨外面黑皮用裏面青皮炒焦煎水冷洗三四次

又方

木匠店木梯煎湯洗之

又方

皮硝不拘多少用熱水化開新筆掃之

又方

生蟹取黃塗之

癩醫大全

卷三十五

漆瘡方

七

顧氏秘書

又方

老柳樹皮煎水洗一日三次

又方

乾荷葉一觔水煮濃汁洗

又方

柳葉煎洗三五遍內服香油一二碗外搽生蟹黃

又方

鐵匠店磨鐵槽中泥塗之即愈

又方

解沫塗之

又方

磨刀泥塗

又方

蟹殼滑石研細乾者蜜和塗之濕者乾末搽之

又方

石膏輕粉韭汁調搽

煎方 藥驗

元參

知母

石膏

醫方大集

卷三十五 漆瘡方

全 顧氏秘書

人中黃

黃連

升麻

連翹

牛蒡子 各一錢 甘草 五分

淡竹葉二十片煎不拘時服忌浴熱水兼戒口

味否則變為頑風癬愈而又發者多矣

又方

柳葉搗爛煎湯洗

又方

新鮮松木打碎煎水洗

又方

生雞蛋黃塗乾則又塗不過三五次

又方

搗韭葉根塗之

又方

煮薤菜洗之

又方

頻以鹽湯洗之

凡素常遇漆味即患漆瘡者

川椒三四十粒搗碎塗口鼻上即不能為害

醫方大集

卷三十五 漆瘡方

全 顧氏秘書

惡瘡門主論

王肯堂曰惡瘡諸痛癢瘡皆屬於心諸濕腫滿皆屬於脾心主血脾主肉血熱而肉濕濕熱相合潰敗肌膚浸淫不休不可以定名命之故謂之惡瘡也然有辨焉如疥癬癰疹之屬拂鬱氣血在皮膚腠理間者可以表而散內經有謂汗之則瘡已是矣若鬱氣血在肌肉之分外達皮膚作寒熱而生膿者或七情所招或膏粱之變皆宜解內熱不宜汗也張仲景所謂瘡家不可發汗汗之則瘡者是矣

傷醫大全

卷三十五

惡瘡論

全

顧氏秘書

一瘡而有宜汗不宜汗之戒蓋熱有淺深表裡故也故瘡在皮膚則當因其輕而揚之汗之浴之外以殺重潤燥皆解凝結涎沫之藥敷之瘡之在肌肉則當因其重而減之瀉經絡之熱清涼氣血外以化膿生肌膏燭之瘡在頭巔則當射而取之須酒製寒涼劑更以風藥升而上之外以殺重解熱藥敷之能明此三者其於治瘡思過半矣

準繩

惡瘡門主方

驗方

種德堂

杏

仁三十粒
去皮尖雄

黃

一分

輕

粉一錢

研末洗淨以猪膽汁調上二三日即愈百發百中

當歸

張景岳

治癰疽瘡疹血氣不足邪毒不化內無實熱而痛淋漓者悉宜用之此與芍藥茯苓相為奇正也當酌其詳

傷醫大全

卷三十五

惡瘡方

全

顧氏秘書

當歸

熟地

芍藥

酒炒

何首烏

各二錢

荆芥穗

炙甘草

防風

川芎

白芷

各一錢

白茯苓

炒搗碎

或酒或水煎服然水不如酒以行藥力

陽虛不能化毒

者加桂枝再加乾姜附子氣虛不能化毒者加人參黃芪毒陷不能外達者加山甲皂針

芍藥

治通身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡

黃芩

龍膽草

木通

山梔 澤瀉 各一錢 生地

芍藥 各二錢 白蒺藜 連刺搗碎五錢 甚者一兩

白水煎服 如火不甚者宜去龍胆草山梔

一切惡瘡不愈

白蜜敷之必效

諸腫毒瘡疼痛不安人所不識者

取獨頭蒜三四顆搗爛入麻油和研厚敷腫處乾

再易之

又方

湯醫大全 卷三十五 瘡論 全 顧氏秘書

初起即用赤小豆井水調敷立消

丹毒惡瘡

馬齒苋搗敷

頑瘡門主論

陳遠公曰人久生惡瘡或手足頭面胸背經年累月不愈臭腐不堪百藥罔效人所謂頑瘡者言其真頑醫功無所施力也然亦治之不得法耳人身氣血和必不生瘡即間生瘡旬日速愈是生瘡者乃氣血不和也其不和者或因濕侵或因熱盛或濕熱寒邪交至以致氣結不宣血滯不散結於皮而皮生瘡結於肉而肉生瘡久則膿血不淨因而生虫人又用殺虫之藥傷其皮肉則氣血更虛力難兼到棄皮肉於膜外而不顧則成瘡矣故治瘡必以行氣活血為主而虫與毒不必計也然行氣活血亦不易也非補氣血不可蓋氣得補而氣自行一身血得補而血自活於遍體也救頑湯當歸白朮黃芪熟地麥冬各一兩山萸茯苓各五錢生甘草三錢柴胡防風連翹各一錢熟附子一片半夏二錢水煎服二劑瘡口必腫此乃藥助氣血與瘡戰也乃速愈之兆又二劑不疼而癢矣又二劑癢止肉生矣又二劑結靨而愈又二劑不再發

此方單去行氣活血得補之力也氣行血活重將安寄故不必殺重頑瘡自愈矣

又曰有內股生瘡飲如豆許翻出肉一塊宛如菌狀

人以爲重蝕外翻也誰知肝經風熱血燥之故乎

夫肝熱則生風風乃內風而非外風也外風清涼

內風蘊熱故外風宜散內風宜清然清其風而不

補血則熱不能解而風不能舒也必於養血之中

益以清熱之味則燥者不燥熱退則風自靜矣清

風湯白芍一兩人參當歸各五錢白木黑梔丹皮

沙參花粉各三錢川芎二錢柴胡連翹甘草各一

錢水煎服數劑瘡口自斂

此方滋血以養肝非消肉以化毒何以瘡斂而愈

蓋瘡成於肝木之旺平肝而血無過燥之虞自然

風散而熱無炎灼之患苟不平肝而內用降火之

品外再追蝕之法則蝕而又翻翻而又蝕其肉愈

大其氣益虛變出非常恐難援救耳

蓆瘡門主論

申斗垣曰蓆瘡乃久病着床之人挨擦磨破而成上

而背脊下而尾間當用馬... 勃軟襯庶不致損而

又損晝夜呻吟也病人但見蓆瘡死之徵也 敬立

心法曰蓆瘡乃大病後久而生眠瘡也乃皮肉先死

不治

傷醫大全 卷三十五 蓆瘡論 全 賴氏秘譜

席瘡門主方

驗方

馬屁勃墊之

又方

小麥麩絹裝成墊褥墊之

又方

蓋屋陳爛草研細墊睡

傷寒全

卷三十五

席瘡方

先

顧氏秘傳

血箭門主論

陳實功曰血箭乃心經火盛逼血從毛竅中出也治

以桃花散凉水調敷或金墨塗擦自止內宜凉心

凉血 正宗

馮魯瞻曰有毛竅中出血者名曰肌衄因陽氣怫鬱

於內不能敷揚於外以致陰血上乘陽分留滯勝

理日久陽氣開發則陰血不能歸經故血從毛竅

出也宜開鬱清氣凉血之劑如相火內動而乘陰

分以致熱血沸騰者宜滋陰降火之劑前人主乎

傷寒全

卷三十五

血箭論

本

顧氏秘傳

肺熱以肺主皮毛也用男胎髮燒灰撲之有因大

喜傷心喜則氣散血隨氣而溢於表者宜凉心以

歎之

岐天師曰知有人足上忽毛孔標血如一線者流而

不止即死急以米醋三升煮滾熱以兩足浸之即

血止後用人參一兩當歸三兩穿山甲一片火炒研末

以參歸湯調服即不再發此乃酒色不禁恣意縱

慾所致世上人多有之方書未載秘錄

血痣門主論

陳實功曰血痣乃肝經怒火鬱結其形初起色紅如
痣漸大如荳措之血流須用冰蠅散枯去本痣以
珍珠散搽之生皮內服解鬱平肝之劑如血出不
止過甚者涼血地黃湯主之 正宗

癩醫大全

卷三十五

血痣論

十一

血疔門主論

竇漢卿曰血疔乃臟中虛弱邪氣相侵真氣衰少風
毒閉塞腠理發於肌膚初如紫疥破時出血瘡生
遍身行處成瘡損傷皮肉癢痛難經治法先宜養
血清熱次宜清肌滲濕 全書

癩醫大全

卷三十五

血疔論

十二

顏氏秘傳

疣門主論

經曰手太陽之別名曰支正上腕五寸虛則生疣

疣者休俗 小者指疥疥取之所別也

薛立齋曰疣屬肝膽少陽經風熱血燥或怒動肝火

或肝客滯氣所致蓋肝熱水涸腎氣不榮故精亡

而筋攣也宜以地黃丸滋腎水以生肝血為善若

用蛛絲纏螳螂蝟艾炙必多致誤大抵此證與

血燥結核相類故外用腐蝕等法內服燥血消毒

則精血愈虛肝筋受傷瘡口翻突開張卒成敗證

虞博生全 卷三十五 疣門主論 李 顧氏秘書

矣

正字通云疣小者俗謂之瘰子

疣門主方

驗方

地膚子 白 礬 各等分

煎湯洗數次瘰子盡消

又方

天雨鳴雷時有疣者不與人知自已立於簷下迎

着雷以手抹去瘰子口中默念雷打瘰子快走念

七遍抹七遍向天井外抹即自落

瘰子全

卷三十五 疣門主方 李 顧氏秘書

千日瘡門主論

申斗垣曰千日瘡一名洗瘡又名癩子又名晦氣瘡此瘡如魚鱗生於人手足上生一千日自落故名之用鷄肫皮擦之自愈一法用蘆艾在初生第一個上灸之餘皆自落而痊矣 啟立

千日瘡門主論

驗牙谷裕豐

用銅錢一個套在千日瘡上按定取草紙捲着燒透熄下的紙捲在瘡上點着燒透

瘍醫大全

卷三十五 千日瘡門 千日瘡牙 九全 顧氏秘書

去又放紙煤燒之不過五七次其瘡根隨手自落並不痛楚

又牙杜松

治身上忽生豎頭肉內瘡子並斑痣

新石灰

煉各等分

燒酒泡一時即可用每用掃上即起紫泡點破出水結疤如點瘡痣須以針微挑破點之

又牙 王德山

用蛇蛻擦之即落

終

瘍醫大全目錄

卷三十六

跌打部

跌打門主論 附方

落下頰拿法門主論 附方

人咬門主論 附方

救從高墜下門主論 附方

破傷風門主論 附方

瘍醫大全

卷三十六 目錄 顧氏秘書

傷醫大全卷三十六

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢

男 櫪熒用和

全枝

跌打部

自跌打損傷以及人咬破傷風等證俱彙於此部中以便檢閱參治

傷醫大全

卷三十六 跌打部

顧氏秘書

跌打損傷



跌打損傷門主論

傷醫大全

卷三十六 跌打論

顧氏秘書

陳遠公曰有跌傷骨折必用杉木或杉板將折骨湊合端正以繩縛定勿偏斜曲再以布紮切不可因疼痛心軟少致輕鬆反為害事後用內服藥如皮破血出須用外治藥但骨折而外邊之皮不傷即不必用外治藥然內外夾攻未嘗不更佳耳內治法宜活血去瘀為先血不活則瘀不去瘀不去則骨不能接也續骨神丹當歸二兩大黃五錢生地敗龜版末白芍各一兩丹皮三錢桃仁三十個續

斷牛膝乳香末沒藥末紅花各二錢羊躑躅一錢
水煎服一劑瘀去新生骨即合矣又二劑去大黃
再服四劑全愈外治膏藥加末藥摻傷處為妙全
體神膏當歸生地紅花各二兩牛膝續斷劉寄奴
地榆茜草木瓜小蘗人參川芎白朮黃芪各一兩
甘草五錢桑木枝四兩杏仁皂角柴胡荆芥各三
錢麻油三觔熬數沸以麻布濾去渣再煎滴水成
珠加入水漂過黃丹一觔四兩收為膏勿太老再
用自然銅醋浸燒七次海螵蛸乳香花蕊石各三
錢沒藥二錢麒麟竭五錢白蠟一兩為末乘膏未
冷投於膏中以桑木棍攪勻取起以瓦器盛之臨
時以火頓攤大約每張重一兩攤畢再入勝金丹
麝香花蕊石象皮各三錢血竭三兩乳香海螵蛸
沒藥樟腦人參木耳灰三七根兒茶各一兩古石
灰紫石英各二兩自然銅冰片乾地氎乾大蠶琥
珀各一錢生甘草五錢土狗十個研細和勻磁瓶
密貯每膏一張用末藥三錢摻膏上貼之凡接骨
不須二個也重則二個此乃絕奇絕異之方倘骨

湯醫大全

卷三十六

跌打論

三

顧氏秘書

未損傷只貼膏藥不必用勝金丹內外治法三方
有不可形容之妙內外兼治且夕奏功得此三方
無折骨之不救也 水鑑
丹心曰凡金瘡及折傷不可飲冷水血見寒則凝入
心即死
蔣示吉日跌打損傷筋斷血流不止者獨勝散主之
說約
馮魯瞻曰胎前如有跌撲所傷須逐汚生新為主佛
手散最妙腹痛加益母草服如痛止則母子俱安
若胎已損則汚物併下再加童便製香附益母草
陳皮煎濃汁飲之如從高墜下腹痛下血煩悶加
生地黃芪補以安之如因撲跌腹痛下血加參朮
陳皮白茯苓炙甘草砂仁末以保之如胎下而去
血過多昏悶欲絕脉大無力用濃厚獨參湯冲童
便服之小產本由氣血大虛今當產後益虛其虛
矣故較正產尤宜調補
素問云人有所墜墮惡血留內腹中滿脹不得前後
先飲利藥此上傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足

湯醫大全

卷三十六

跌打論

四

顧氏秘書

內踝之下然骨之前血脉出血刺足跗上動脈不
已刺三毛上各一痛見血則已左刺右右刺左善
悲驚不樂刺如右方 繆刺論

靈樞云有所墜墮惡血留內有所大怒氣上而不行
下積於脇下則傷肝又中風及有所擊仆若醉入
房汗出當風則傷脾又頭痛不可取於膺者有所
擊墮惡血在內若肉傷痛未已可側刺不可遠取
之也 邪氣臟腑及厥病篇

靈樞曰身有所傷血出多反中風寒若有所墜墮四
湯醫大全 卷三十六 跌打論 五 顧氏秘書

肢懈惰不收名曰體惰取小腹臍下之三結交陽
明太陰也臍下三寸關元也 三結交者即關元穴是也。寒熱篇

內經云肝脉搏堅而長色不青當病墮若搏因血在
脇下令人嘔逆

金匱云寸口脉浮微而澁然當亡血若汗出設不汗
者其身有瘡被刀斧所傷亡血故也

脉經云從高擲撲內有血腹脹滿其脉堅强者生小
弱者死

李東垣曰夫從高墜下惡血留於內不分十二經絡

醫人俱作中風肝經留於脇下以中風療之血者
皆肝之所生惡血必歸於肝不問何經之傷必留
於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有白汗但人人
有汗出皆屬風證諸風皆屬於肝木况敗血凝泣
逆其所屬入於肝也從高墜下逆其上行之血氣
非肝而何非傷寒無汗既曰汗必自風化之也故
以破血行經藥治之凡寒涼之劑不可輕用 醫學發明

劉宗厚曰打撲金刃損傷是不因氣動而病生於外
湯醫大全 卷三十六 跌打論 六 顧氏秘書

外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病非如六淫
七情為病有在氣在血之分也所以損傷一證專
從血論但須分其有瘀血停積而亡血過多之證
蓋打撲墜墜皮不破而內損者必有瘀血若金刃
傷皮出血或致亡血過多二者不可同法而治有
瘀血者宜攻利之若亡血者兼補而行之又察其
所傷有上下輕重深淺之異經絡氣血多少之殊
唯宜先逐瘀血通經絡和血止痛然後調氣養血
補益胃氣無不效也

脉經云金刃跌撲脉病不相應者死

戴院使云仆踣不知曰擗兩手相搏曰撲其爲損一也

又曰大法固以血之瘀失分虛實而爲補瀉亦當看損傷之輕重輕者頓挫氣血凝滯作痛此當導氣行血而已重者傷筋折骨此當續筋接骨非調治三四月不得平復更甚者氣血內停沮塞真氣不得行者必死急瀉其血通其滯亦或有可治者焉傷損論曰夫傷損必須求其源看其病之輕重審其

瘍醫大全

卷三十六 跌打論

七 顧氏秘書

損之淺深凡人一身之間自頂至足有所傷打傷跌傷及諸刃傷者皆有之凡此數症各有其說有當先表裏而後服損藥者爲醫者當循其理治之然醫者意也不知意者非良醫也或者稟性愚昧不能觀其證之輕重明其損之淺深未經表裏通利先服損藥誤人多矣有因此痰涎上攻有因此大小臟腑閉結差之毫釐謬以千里所謂醫不三世不服其藥信哉

凡腦骨傷破不可見風着水恐成破傷風候

凡腦骨傷碎在硬處可治若傷在太陽穴不可治

如傷在髮際須剪剃去髮看皮破不破好用藥敷

凡腦兩角及後枕或兩眉有傷可治眼睛傷瞳神不

碎可治

頭頂心有損則難治

凡鼻兩孔傷凹者可治血出無妨

齒破傷動者用蒺藜根燒存性爲末常揩擦之卽牢

結喉傷重輒喉斷不可治以湯與之得入腸者可治

若並出者不可治

瘍醫大全

卷三十六 跌打論

八 顧氏秘書

凡手脚骨只一邊斷則可治若兩手脚骨皆斷者不可治

肚上被傷肚皮俱破腸出在外只腸全斷難醫傷破

而不斷者皆可治療

凡腸出可令病人手搭在醫人肩隨其左右收起以

麻油潤瘡口整入腹却以通閉散吹鼻打噴嚏令

腸自入用桑白皮線向皮內縫合後以封口藥塗

傷處外以補肌散用雞子清調勻敷貼

若腸上有小損孔以燈火照之腸中有氣射燈不可

治

凡傷損藥中不可缺乳香沒藥此藥極能散血住痛不可不知

凡傷損初次不可便用自然銅久後方可用之折骨者便宜用之若不折骨不碎骨則不可用修合諸損藥皆要去了如用自然銅必用火煨方可服之然新出火者其火毒與金毒相煽挾香熱藥毒雖有接骨之功燥散之禍甚於刀劍戒之

凡損傷妙在補氣血俗工不知惟要速效多用自然

湯醫大全

卷三十六 跌打論

九 顧氏秘書

銅多成痼疾也初傷只用蘇木活血黃連降火白朮和中童便煎服在下者可下瘀血但先須補托在上者宜飲韭汁或和粥喫切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心即死

十不治證係擲撲損傷或被傷入於肺者縱未即死

二七難過 一左脇下傷透內者 二腸傷斷一半可

醫全斷者不可治 三小腹下傷內者 四證候繁多

者 五脈不實重者 六老人左股壓碎者 七傷破陰

子者 八血出盡者 九肩內耳後傷透於內者皆不

必用藥 得效

馮晉瞻曰凡跌撲損傷踈折挫閃雖由外觸勢必內傷氣血凝滯紅腫或青痛不可忍故始須用甘辛溫散行氣破瘀則痛自退腫自消如獨活白芷荆芥防風川芎當歸沒藥古文錢鹿角灰蘇木赤芍紅花之類以水酒煎藥沖入童便尤妙及其外傷平復猶宜滋補氣血筋骨之藥調之 錦囊

又曰肢體全仗氣血傷損必加補養在上先消瘀血在下先為補養更審胃氣蓋去血過多脈微欲死

湯醫大全

卷三十六 跌打論

十 顧氏秘書

獨參湯加童便接住元氣為急甚有肢冷脈微者參朮附子大劑挽之勢與產婦同也脈來和緩者生急疾托者死宜虛細不宜數實切宜避風

陳實功曰跌撲者有已破未破之分亡血瘀血之別從高墜墮未損皮肉者必有瘀血流注臟腑人必昏沉不醒二便必難當以大成湯通利二便其人自甦不醒者獨參湯救之 正宗

損傷大綱固用藥不可差而整頓手法尤不可孟浪今以人之周身總三百六十五骨節開列於後人

身總有三百六十五骨節以一百六十五字都開
次之首自鈴骨之上為頭左右前後至轅骨以四
十九字共關七十二骨

顛中為都顛骨者一 有勢微有髓及有液

次顛為髖骨者一 有勢微有髓

髖前為頂威骨者一 微有髓女人無此骨

髖後為腦骨者一 有勢微有髓

腦左為枕骨者一 有勢無液

枕就之中附下為天蓋骨者一 下為肺系之本

湯醫大全 卷三十六 跌打論 主 顧氏秘書

蓋骨之後為天柱骨者一 下屬脊竅有髓

蓋前為言骨者一 言上復合於髖骨有勢無髓

言下為舌本骨者左右各二 有勢無髓

髖前為顛骨者一 無勢無髓

顛下為伏委骨者一 但人訛為伏犀骨是也 無勢無髓

伏委之下為俊骨者一 附下即眉宇之分也 無勢無髓

眉上左為天賢骨者一 無勢無髓

眉上右為天貴骨者一 眉上直目睛也 無勢無髓

左睛之上為智宮骨者一 無勢無髓

右睛之上為命門骨者一 無勢無髓 兩睛之下中為鼻

鼻之前之為梁骨者一 無勢無髓

梁之左為顴骨者一 有勢無髓

梁之右為軀骨者一 有勢無髓

梁之端為嵩柱骨者一 無勢無髓

左耳為司正骨者一 無勢無髓

右耳為納邪骨者一 無勢無髓

正邪之後為完骨者左右共二 無勢無髓

正邪之上附內為噎骨者一 無勢少涎

湯醫大全 卷三十六 跌打論 主 顧氏秘書

噎後之上為通骨者左右前後共四 有勢少液

噎上為嚆骨者一 無勢多液 其嚆後連屬為頷也

左頷為乘骨者一 有勢多液

右頷為車骨者一 有勢多液

乘車之後為轅骨者左右共二 有勢有液

乘車上下出齒牙三十六事 無勢無髓庸下就 少則不滿其數

復次鈴骨之下為臚中左右前後至蓀以四十字

關九十七骨

轅骨之下左右為鈴骨者二 多液

鈴中為會厭骨者一 無勢無髓

鈴骨之下為咽骨者左中及右共三 無髓

咽下為喉骨者左中及右共三 無髓

喉下為嚨骨者環次共十事 無髓

嚨下之內為肺系骨者纍纍然共十二 無勢無髓

肺系之後為谷骨者一 無髓

谷下為偏道骨者左右共二 無髓

嚨外次下為順骨者共八 少液

順骨之端為順隱骨者共八 少液

瘍醫大全 卷三十六 跌打論 圭 顧氏秘書

順下之左為洞骨者一 女人無此

順下之右為棚骨者一 女人無此

洞棚之下中央為顴髑骨者一 無髓 俚人呼為鳩尾

顴髑直下為天樞骨者一 無髓

鈴下之左右為缺盆骨者二 有勢多液

左缺盆之前為下狀骨者一 無髓

右缺盆前之下為分髑骨者一 無髓

狀髑之後附下為倉骨者一 無髓

倉之下左右為膠骨者共八 有勢無液

膠之下左為胸骨者一 男子此骨大者好勇

膠之下右為蕩骨者一 女人此骨大者則丈夫

胸之下為烏骨者一 男子此骨滿者髮早白

蕩之下為臆骨者一 此骨高多訛妄

鈴中之後為脊竅骨者共二十二 上接天柱 有髓

脊竅次下為大動骨者一 惟 上通天柱共二十四

大動之端為歸下骨者一 道家謂之尾間

歸下之後為纂骨者一 此骨能限精液

歸下之前為條骨者一 此處薄者多處貧下

瘍醫大全 卷三十六 跌打論 酉 顧氏秘書

復次缺盆之下左右至襯骨以二十五字闕六十

骨 此下止分兩手臂至十指之端衆骨

支其缺盆之後為偃甲骨者左右共二 有勢多液

偃甲之端為甲隱骨者左右共二 此骨長則至

前支缺盆為飛動骨者左右共二 此骨薄病癢

次飛動之左為龍騰骨者一 有勢無髓無液

次飛動之右為虎衝骨者一 有勢無髓無液

龍騰之下為龍本骨者一 有勢有髓

虎衝之下為虎端骨者一 有勢有髓 本端之下為腕也

龍本上內為進賢骨者一	男人此骨隆為名臣
虎端上內為及爵骨者一	女人此骨高為命婦
腕前左右為上力骨者共八	有勢多液
次上力為駐骨者左右共十	有勢多液
次駐骨為擗骨者左右共十	有勢多液
次擗骨為助勢骨者左右共十	右助外為甲 左助外為瓜
瓜甲之下各有觀骨左右共十	無勢無液
復次髑髀之下左右前後至初步以五十一字關	
一百三十六骨此下至兩乳下分左右自兩足心	
<p>傷醫大全 卷三十六 跌打論 五 顧氏秘書</p>	
眾骨所會處也	
髑髀之下為心蔽骨者一	無髓
髑髀之左名為脇骨者上下共十二	居小腸之分也
左脇之端各有脇隱骨者分次亦十二	無髓
脇骨之下為季脇骨者共二	多液
季脇之端為季隱骨者共二	無髓
髑髀之右為肘骨者共十二	處大腸之分也
肘骨之下為肘隱骨者共二	各無隱骨惟獸有
右肋之端為肘隱骨者共十二	無髓

蔞骨之前為大橫骨者一	有勢少髓
橫骨之前為白環骨者共二	有勢有液
白環之前為內輔骨者左右共二	有勢有液
內輔之後為骸關骨者左右共二	有勢有液
骸關之下為捷骨者左右共二	有勢有液
捷骨之下為髀樞骨者左右共二	有勢多髓
髀樞下端為膝蓋骨者左右共二	無勢多液
膝蓋左右各有俠升骨者共二	有勢多液
髀樞之下為肱骨者左右共二	有勢多髓
<p>傷醫大全 卷三十六 跌打論 六 顧氏秘書</p>	
肱骨之外為外輔骨者左右共二	
肱骨之下為立骨者左右共二	有勢有液
立骨左右各有內外踝骨者共四	有勢少液
踝骨之前各有下力骨者左右共十	有勢多液
踝骨之後各有京骨者左右共二	有勢少液
下力之前各有釋欬骨者共十	有勢
釋欬之前各有起仆骨者共十	有勢
起仆之前各有平助骨者左右各十	有勢
平助之前各有觀甲骨者左右各十	無勢少液

釋歌兩傍各有核骨者左右共二 有勢多液
起仆之下各有初步骨者左右共二 有勢無髓
有液女人
則無此骨

凡此三百六十五骨也天地相乘惟人至靈其女人則無頂威左洞右棚及初步等五骨止有三百六十骨又男子女人一百九十骨或隱或視或無髓勢餘二百五十六骨並有髓液以藏諸筋以會諸脉絡谷相需而成身形謂之四大此骨度之常也

傷醫大全

卷三十六 跌打論

十七 顧氏秘書

凡醫跌打損傷者忌用葱若用葱雖醫好遇天陰傷處必發損作痛 梁偉士

可法良規云凡損傷之症乃有形器物所傷為筋骨受病當從血論蓋血得熱則妄行其害甚速須先伐肝火清運火砭患處和經絡則瘀血不致泛注肌肉不致遍潰次則壯脾胃進飲食生血氣降陰火則瘀血易於腐潰新肉易於收斂此要法也若用剋伐之劑虛者益虛滯者益滯禍不旋踵矣 論
血走注

又云凡傷損之症若棍槌重者患處雖不破其肉則死矣蓋內肉糜爛與瘀血相和如皮囊盛糊然其輕者瘀血必深蓄於內宜急砭刺即投大補之劑否則大熱煩躁頭目脹痛牙閉緊急殊類破傷風症此瘀穢內作而然也急刺之諸症悉退若刺破之後或有發熱惡寒口乾作渴怔忡驚悸寤寐不寧牙關緊急目赤頭痛自汗盜汗寒戰咬牙氣短喘促遺尿手撒身熱脉大按之如無身熱不欲近衣或欲投水或惡寒而脉浮大重按微細衣厚仍

傷醫大全

卷三十六 跌打論

十八 顧氏秘書

寒此氣血挾虛使然也皆宜參芪歸朮之類亟補之如不應速加附子緩則不救或手足逆冷肚腹疼痛瀉利腸鳴飲食不入呃逆嘔吐此寒氣乘虛而然也治法全前用藥如有汗而不惡寒或無汗而惡寒口噤足冷腰背反張頸項勁強乃血氣虛而發瘧也治法亦全前用藥少佐見證之劑此瘧症往往誤投風藥以致不起者多矣若果是破傷風證亦係元氣耗損外邪乘虛而致皆宜峻補先固其本為善妄投風藥禍如反掌治者不可不察

論瘀穢內焮

又云傷損之症若內積瘀血焮熱宜砭刺不知砭刺則外皮炙乾縮急堅硬巴連好肉不能腐爛益加脹痛俗名丁痂皮是也以致瘀穢難出治者因將死肉盡行割去瘡口開張反難腐潰怯弱之人多成破傷風證以致不救若杖後刺去瘀穢塗以神效當歸膏投以參朮歸芪地黃之類諸證即退死肉自潰丁痂不結所潰亦淺生肌之際亦不結痂自免皺結之痛論丁痂皮

傷醫大全

卷三十六 跌打論

九 顧氏秘書

又云凡損傷之症若皮膚已破出血過多而昏憤者氣血虛極也大補為主如不應急加附子若墜撲太重皮膚不破血未出而昏憤者瘀血在內也行散為主如不應速加酒炒大黃若下後而有變症者皆氣血虛極也用十全大補湯若因痛甚而自汗昏憤者風木熾甚也用清肝涼血之劑則痛自定汗自止潰自潰苟作外因風邪治之促其危也論亡血昏憤

又云傷損之症若頭腦並致命處所損太重昏憤良

久將至不起者急用葱白細切杵爛炒熱卷患處稍冷更以熱者罨之多自醒矣醒而肢體作痛肌內被傷宜調氣養血若腹中作痛手不可近者瘀血停滯也不可下宜用花蕊石散內化之却以參芪歸朮補托之

又云凡傷損之症若有瘀血內凝致大小便不通若用硝黃苦寒之劑下之血愈凝而不下益加脹滿命在須臾急用木香肉桂末二三錢以熱酒灌之血下乃生不下即死如怯弱之人欲用硝黃加木

傷醫大全

卷三十六 跌打論

十 顧氏秘書

香肉桂全煎益善蓋假其熱以行其寒也論瘀血又云凡傷損之症若誤飲凉水瘀血凝滯氣道不通或血上逆多致不救若入於心即死急飲童便熱酒以和之若患重而瘀血不易散者更和以辛溫之劑睡臥要上身墊高不時喚醒勿令熟睡則血庶不上逆故患重之人多為逆血填塞胸間或閉塞氣道咽喉口鼻不得出入而死論瘀血氣閉上又云凡損傷之症大便秘結若是出血過多而秘結此大腸血虛火熾乾燥而不通耳不可輕用硝黃

峻利之劑宜用潤腸丸以四物湯送下或猪膽套法為善論血虛便秘

又云凡傷損之症胸脇肚腹作痛按之痛甚者瘀血在內也大承氣湯下之既下而腹痛不止按之亦痛者瘀尚未盡也四物湯加穿山甲牛膝補而行之若腹仍痛按之却不痛者血虛也四物湯加參芪白朮補而和之若下後脾胃受傷而腹痛者補中益氣湯為主下後寒氣乘虛而腹痛者溫中益氣湯為主下後昏憤而出汗者虛極而變症也獨

傷醫大全

卷三十六 跌打論

主 顧氏秘書

參湯補之未應急以大劑人參加附子主之緩則不救下後嘔吐泄瀉手足厥冷或指甲青黑者虛寒之甚也附子理中湯主之緩亦不治若口噤手撒遺尿痰盛或唇青體冷汗出昏憤氣血虛極之壞症也非參附湯不能救誤作風治者必死論胸腹作痛

又云凡傷損之症若脇脹痛脈數浮無力以手按之反不脹痛者此血虛而肝脹也宜四物湯加參苓青皮甘草治之若胸脇脹悶或作痛者按之亦然

左關脈洪而有力者此怒氣傷肝之症也以小柴胡湯加芎歸青皮赤芍桔梗枳殼治之若胸脇作脹按之則愈痛者乃瘀血蓄肝之症也急以四物湯加桃仁紅花青皮治之蓋證不必論其受責之輕重問其患處去血之曾否但被人扭按甚重蹉跌撲地努力恚怒以傷其氣血瘀血歸肝多致前症甚則胸脇氣逆脹滿不通或血溢口鼻卒至不救蓋打撲墮墮惡血宜砭不宜留况十二經絡之血生於心藏於肝統於脾小腹與脇皆肝經部位

傷醫大全

卷三十六 跌打論

主 顧氏秘書

惡血蓄而不行必生脹滿疼痛自汗法當破血生血清厥陰肝經則善論脇脹痛
又云凡傷損之症多有患處作痛若出血過多而痛者血虛火盛也宜甘寒以降虛火甘溫以養脾氣若汗出多而痛者肝木火盛也宜辛涼以清肝火甘寒以生肝血若筋骨傷而作痛者正而治之肌肉傷而作痛者調而補之氣血逆而作痛者順而補之氣血虛而作痛者溫而補之熱而痛者清之寒而痛者溫之陰虛火痛者用補陰之劑脾氣虛

而痛者用補脾之劑作膿而痛者托之膿焮而痛者開之切不可槩用苦寒以致復傷脾胃也論患處作痛

又云損傷之症如所傷之處痛至四五日不減者或至一二日方痛者皆作膿也不必用止痛之藥但宜托裡之劑以速其潰膿去則痛止若頭目所傷作膿焮赤作痛者膿出痛亦自止其或頭痛而時作時止者血虛而痛也非傷也若頭痛而兼眩者火也痰也氣虛也木旺也不可作寒治也

瘍醫大全

卷三十六 跌打論

三 顧氏秘書

又云凡傷損之症肉死而不潰或惡寒而不潰者宜補陽氣發熱而不潰者宜益陰血或因作痛或因峻劑而不潰者宜和養脾胃或因失血或因汗多而不潰者宜大補氣血其外面皮黑堅硬而不潰者內火蒸炙而然也內服益陰血制陽火之劑外塗當歸膏以潤之則自潰矣大抵脾胃主肌肉腐潰生肌全在脾胃氣血兩旺倘治者不識病機失於補助故有死肉不能潰而死者有死肉已潰新肉不能生而死者有死肉潰新肉生瘡口久不能

歛而死者此三者皆失於不預為補益耳論死肉不潰

又云凡傷損之症若焮痛而肌肉不生者火盛也日哺作熱而不生者血虛也食少體倦而不生者脾胃虛也膿水清稀而不生者氣血虛也忌敷生肌長肉之藥恐反助其邪也若膿多而臭穢者邪火也脈洪大而作渴者真氣虛而邪氣實也斯為難治大抵傷損症候內無瘀血即當補脾脾氣得補則肉傷者自愈肉死者自潰新肉易生瘡口易合故云脾健則肉自生切不可偏用寒涼剋伐之劑復傷元氣致不能生肌收斂雖行補益緩不濟事矣論新肉不生

瘍醫大全

卷三十六 跌打論

三 顧氏秘書

又云凡傷損之症若壅腫不退或色黯不消元氣虛也宜補之青腫脹痛按之復起膿瘀內滯也宜針之經曰氣主噓之血主濡之者是也當以六君子湯加芎歸培養脾胃元氣則青腫自消瘀滯自散膿穢自出苟服剋伐涼劑虛其氣血益腫益青益潰矣若敷貼寒涼等藥則寒氣入裡隧道益壅瘀血益凝運氣不至近死不遠雖壯實之人亦寒氣

生熱內腐深大氣血衰敗肌肉無由以生欲望其
腫消青退而潰處收斂抑難矣 論青腫不消

又云凡傷損之症若骨已接髓已入其腫不消者此
元氣怯弱也怯弱即不能運散瘀滯益凝故也經
云壯者氣行則愈怯者則着而為病惟補中益氣
湯滋陰助陽內服十全大補湯外敷黑龍散或葱
熨之法則運氣健旺瘀血自散腫痛自消若投行
氣破血之劑則元氣愈怯運氣愈滯患在骨髓及
血氣罕到之處最難調治尤忌寒涼剋伐之藥 論腫

傷醫大全 卷三十六 跌打論 五 顧氏秘書
痛不消

又云凡傷損之症口鼻等竅或患處出血不止者因
木火熾盛血熱錯經而妄行也宜清肝火養肝血
若中氣虛弱血無所附而妄行者宜補中益氣使
血各歸其經若陽氣內脫不能攝血歸經而血出
不止者獨參湯加炮姜治之不應則急加附子若
血蘊於胃而嘔血者四物湯加童便拌炒山梔姜
汁治之若因怒氣傷肝而嘔血者亦治以前藥更
加柴胡黃芩以清之如脉大發熱喉痛者參芪當

歸生地荆芥蜜炙黃柏以主之凡出血脉大者難
治凡見血證不可用寒涼之劑致脾胃受傷反不
能攝血歸原也 論出血嘔血便血

又云凡傷損之症有出汗者當審其陰陽虛實而治
之若陰虛陽往乘之則發熱自汗以甘寒之劑補
其氣如補中益氣湯之屬是也若陽虛陰往乘之
則發厥自汗以甘溫之劑助其陽如參附湯之屬
是也亦有因痛甚而自汗者宜清肝火為主亦有
因陰陽傷損而自汗盜汗者宜補氣生血為主若

傷醫大全 卷三十六 跌打論 五 顧氏秘書
心孔一片汗出者養其心血自止 論出汗

一人年四十墜馬亡血出汗不止煩躁不安次日
其汗遂止熱躁益甚口噤手顫此陰血虛陽火乘
之而汗出為寒氣收斂滕理故汗不得出火不得
泄拂鬱內甚而益增他症也若誤用祛風之藥愈
損氣血促其危矣
又云凡傷損之症有發熱者或出血過多或大潰之
後而發熱者乃陰血耗散陽氣無所依附遂致浮
散於肌表之間是為陰虛非實熱也當歸補血湯
主之若發熱煩躁肉瞶筋惕等症乃亡血也聖愈
湯主之如汗出不止乃血脫也急用獨參湯補之

若血脫脉實汗後脉躁者難治細小者易痊其瘀血內停發熱必肚腹作痛不在此例 論發熱

又云傷損之症若出血過多或大潰之後肌膚發熱大渴引飲目赤而紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無此名陰虛發熱之病當歸補血湯主之誤認實熱反用寒涼必死若身體微熱煩躁面赤其脉沉而微此名陰盛發躁之病宜四君子湯加姜附治之外臺秘要云陰盛發躁欲坐井中用附子四逆湯加葱自治之李東垣亦曰切忌寒涼之劑

傷醫大全

卷三十六 跌打論

毛 顧氏秘書

凡熱來復去不時而動乃無根之虛火也用六君子湯加姜桂不應急加附子或八味地黃丸最善 論發躁

又云凡傷損之症有發熱者當分晝夜陰陽而治之東垣云晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室如晝夜俱發熱煩躁是重陽無陰也當亟瀉其陽而峻補其陰夫熱入血室之症婦人經水適來或因損傷或因大勞或因大怒而

發熱必至前症或有言語謔妄如見鬼神狀者猶宜小柴胡湯加生地主的重陽無陰血虛者亦用小柴胡湯合四物湯治之 論熱分晝夜

又云凡傷損之症有作渴者若出血而作渴者血脫也四物湯加白朮補之不應加人參黃芪以補氣倍當歸熟地以養血若潰後而作渴者大補氣血為主胃熱津液耗散而作渴者用竹葉黃芪湯瘀血內停發熱作渴者用竹葉石膏湯若膿血大潰而作渴或小便赤澀或痛而不通死在反掌及癰

傷醫大全

卷三十六 跌打論

毛 顧氏秘書

疽潰爛後多有此證非六味地黃丸不能救 論作渴 又云凡傷損之症有作嘔者或因痛不止或因攻伐之劑而作嘔者皆胃氣傷也四君子湯加芎歸半夏藿香薑棗之類主之或兼忿怒傷損而致嘔者氣逆也小柴胡湯加山梔枳殼茯苓桔梗之類治之若胃中痰火盛而作嘔者二陳湯加黃連山梔生薑治之胃氣虛寒而作嘔者補中益氣湯加薑棗主之或出血過多或潰後而作嘔者宜大補氣血為主 論作嘔

又云凡傷損之症出血過多如面黑胸脹或膈痛發喘此肺氣虛瘀血入肺急以人參蘇木飲救之如欬血衄血乃火盛氣逆血蘊於肺宜用十味參蘇飲救之加山梔黃芩蘇木主之面黑作喘之症諸書未嘗論及治者不明患者必死惟產寶百問內云產婦瘀血入肺面黑作喘用參蘇飲救之其方乃人參一兩蘇木二兩作一劑煎服 論面黑作喘

又云凡傷損之症小便不利若因出血或平素陰虛火燥而滲泄之令不行者宜滋膀胱之陰若因痰

湯醫大全 卷三十六 跌打論 无 顧氏秘書

痛或平素肺經氣虛不能生化腎水而小便短少者當補脾肺之氣滋其化源則小便自生若誤用分利之劑復損其陰禍在反掌經云氣化則小便出焉又云無陽則陰無以生無陰則陽無以化亦有汗出不止而小便短少者汗止便自利猶忌分利滲泄之劑 論小便不利

又云凡傷損之症出血太多或潰爛之際收斂之後如有寒熱頭痛或自汗盜汗煩躁作渴或遍身疼痛肢體倦怠牙關緊急痰涎上壅等症是血氣虛

極而作變症也當峻補元氣為主大凡傷損症有外邪乃乘虛而入猶當補助作外邪治之禍不旋踵 論血氣內傷

又云凡傷損之症筋糜肉爛膿血大泄陽亦隨陰而走元氣喪敗理勢必然氣血不虛者鮮矣智者審之 論血氣必虛

又云凡傷損之症膿血大潰血出過多兼之惡寒發熱厥痛口乾肝血自然不足况肝主筋血去則筋無以養筋無血養則燥遂不能束骨而屈伸自如

湯醫大全 卷三十六 跌打論 无 顧氏秘書

故有拘攣之象宜聖愈湯加柴胡木瓜山梔麥冬五味子治之如作風證一治筋愈燥而血愈潤豈能伸乎 論血虛筋攣

又云凡傷損之症最忌骨氣虛憊腎主骨腎水足則肝氣克溢經脉強健雖有傷損氣血不虧而潰斂以時氣路不致於上逆痰涎何能而上壅使腎氣一虛水不能生木則肝氣奔騰逆而不下痰氣亦隨之以升非風痰也乃水泛白羊也是水泛為痰之症也宜六味地黃丸或六味地黃湯加清肝之

劑論腎虛氣逆

又云凡傷損之症其患已愈而腿作痛乃受患太重
膿血過多瘡雖愈而肝經血氣尚未充也故濕熱
乘之因虛而襲以致作痛非風證也用八珍湯加
牛膝木瓜蒼朮黃柏防已炙草以祛濕熱養陰血
痛漸止後去防已黃柏服之遂瘳論濕熱乘肝

又云凡傷損之症遍身作癢或搔破如瘡疥此血不
營於肌腠當作血虛治之不應兼補其氣亦有愈
後身起白屑落而又起或有如布帛一層隔於肌

瘍醫大全

卷三十六 跌打論

三 顧氏秘書

膚乃氣血俱虛不能營於腠理宜大補氣血為主
若作風邪治之誤矣論遍身作癢

又云凡傷損之症肢體麻木若口眼如故腰背如常
而肢體麻木者氣虛也蓋血虛則氣虛故血虛之
入肢體多麻木此是陰虛火動而變症實非風也
當用升陽滋陰之劑若作風治凶在反掌論肢體
作麻
又云凡傷損之症如所傷之處不甚尅伐之劑未用
而四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節
沉重氣高而喘身熱而煩心下痞滿不思飲食自

汗體重其脈洪大而頭痛是內傷元氣之症以補
中益氣湯主之如在夏令是暑熱內傷元氣之證
用清暑益氣湯治之若遇秋令是濕熱內傷元氣
之症以清燥湯主之論四肢倦怠

又云凡傷損之症或其人素多濕痰或又服辛熱破
血之劑則濕熱助痰流阻道路反致遍身作痛丹
溪曰東南之人多因濕土生痰痰生熱熱生風證
類中風惟宜清燥湯或二陳湯加羌防歸芍桔梗
炒蒼朮治之論濕痰作痛

瘍醫大全

卷三十六 跌打論

三 顧氏秘書

又云凡傷損之症或手足生瘡在氣血罕到之地切
不可用損元氣之藥若元氣虛怯邪氣滋盛潰爛
延上必死不潰而色黯者亦死手足心背受病色
黑者多死手足節髒損去者不死故傷損骨斷筋
皮尚連者急剪去之若肉被傷欲去尚連者亦剪
之不爾潰及好肉怯弱之人多致不救如手足與
指損去一節可治不死惟去其半節留其半節或
骨斷筋皮相連者最為難治論氣過肉死
又云凡傷損之症不可輕服烏附等味蓋其性味辛

熱恐助火以益其患其平素有失血及血虛之人
 雖在冬令決不宜用緣滯血得火而益傷陰血得
 火而益耗運血得火而妄行患肉得火而益壞新
 肉得火而復潰疼痛得火而益甚若人平素虛寒
 或因病而陽氣脫陷者則用之不在此例論用辛熱之非
 又云凡傷損之症不宜敷貼硝黃之類然其性味鹹
 寒恐濟寒以益其傷若人平素虛弱患而作痛雖
 在夏令亦不宜用蓋胃氣得寒而不生運氣得寒
 而不健瘀血得寒而不行腐肉得寒而不潰新肉
 得寒而不生若內有瘀血停滯服以通之不在此
 例論用鹹寒之非

瘍醫大全

卷三十六 跌打論

毒

顧氏秘書

又云凡傷損之症近用黑羊皮熱貼者蓋羊肉性熱
 而補氣彼受刑太重患處內肉已壞欲其腐潰者
 用之成膿固速若內非補劑壯其根本毒氣不能
 內侵外非砭刺泄其瘀穢良肉不無傷壞設受刑
 輕淺外皮破傷外用神效當歸膏敷貼則丁痂不
 結傷肉漸潰死肉自敗焮腫自退黯色自消內用
 四物加黃連柴胡山梔白朮茯苓清肝木健脾土

自愈若專用黑羊皮卷貼反助其毒腐潰益深難
 於收斂智者審之論用黑羊皮之非
 又云凡傷損之症瘀血已去而肌肉糜爛不肯收斂
 屬氣血俱虛大補猶恐不及豈可復用行氣破血
 之劑反賊其元氣耶當時諸君多蹈此弊而怯弱
 者皆致不救論用行氣之非

瘍醫大全

卷三十六 跌打論

毒

顧氏秘書

又云凡傷損之症遇杖墜跌撲患處如有瘀血止宜
 砭出服壯元氣之劑蓋其氣血已損切不可孟浪
 妄行妄下此肢末之地血氣難到再用行氣下血
 等藥復損脾胃元氣則運氣愈難營達於下而反
 為敗症怯弱者多致夭枉論下血之非
 又云或問寒涼能消腫止痛何以用之反致內潰不
 能生肌且有致死者答曰寒涼之劑敷於肌肉而
 不知痛者是一遇寒涼血因之以凝氣因之以滯
 氣血凝滯肌肉皆為死陰寧復有知其疼痛也哉
 故毒不出而內攻多致不救當知氣血得溫則行
 得寒則凝寒極生熱變化為膿腐潰益深氣血既
 敗肌肉無由而生欲望其不危也幾希論用寒藥之非

又云凡傷損之症遇杖撲重者外皮不破而內肉糜爛與血相和甚者鬻腿如皮囊盛糊然若不疔刺發泄為患匪輕故當時大理司大獄諸君失於不疔以致不起者多矣是不知傷重而內有瘀穢者也須急去之即服補益之劑以固根本庶保無虞古人謂瘀穢惡於虎狼毒於蛇蠍去之稍緩則戕性命非虛言也醫者三復之論不疔之非

又云凡傷損之症貴乎太補氣血則腐肉易於潰爛瘡口易於生肌每見治者不知氣血虧損往往多

傷醫大全

卷三十六 跌打論

美 顧氏秘書

用十宣散又以方內參芪芎歸為補益之劑嫌其中滿多用不過錢許以厚樸防已為清毒之藥因其行散動輒倍加此何益於氣血而欲責其速潰速斂速生肌乎無怪其煩躁作渴飲食益少因之不起者衆矣論不補益之非

得效云凡墮壓死者急安好處以袖掩其口鼻上一食頃候眼開先與熱小便飲之若初覺氣絕急擊開口以熱小便灌之利去瘀血以下載東醫寶鑑又云凡擗打壓傷或從高墮落皆驚動四肢五藏必

有惡血在內專怕惡心先用通二便藥和童便服之立效大小腸俱通利則自無煩悶攻心之患矣又云頭上有傷或打破或金刃傷用藥糊角縛不使傷風慎之

又云如傷臟腑致命處一觀其脉虛促危綱目云卒墮擗壓倒打死心頭溫皆可救將本人如僧打坐令一人將其頭髮控放低以半夏或皂角末吹令入鼻中如活却以薑汁香油打勻灌之入門云若取藥不及急撥開口以熱小便多灌之

傷醫大全

卷三十六 跌打論

美 顧氏秘書

又云凡傷損專主血論肝主血不問何經所傷惡血必歸於肝流於脇脅於腹而作脹痛實者下之又云凡出血已多而又嘔血不止者難治宜用蘇木煎湯調蚌霜散服之

又云凡折傷外損筋骨者可治內損臟腑裏膜及破陰子耳後者並不治醫監曰人為刀斧所傷或墮落險地或撲身體損傷筋骨皮肉皆出血不止或瘀血停積若去之不早則有入腹攻心之患

又云打撲傷損去血過多脉當虛細若得急疾大數者死

丹心云跌撲傷損須用蘇木活血黃連降火白朮和中以童便煎服如傷在上宜飲韭汁

回春云凡鬪毆被打內有瘀血其脉堅強者生小弱者死 脉經

得效云凡脚手各有六出曰四折骨每手有三處出

曰脚亦三處出曰手掌根出曰其骨交互相鎖或

出曰則是挫出鎖骨之外須是搦骨於鎖骨下歸

傷醫大全 卷三十六 跌打論 毛 顧氏秘書

窠若出外則須搦入內若出內則須搦入外方入

窠曰只有手拽斷難入窠十有八九成痼疾也

又云骨節損折肘臂腰膝出曰蹉跌須用法整頓歸

元先用麻藥與服使不知痛然後可用手法

又云搦骨歸窠用竹一片生柳木板片尤佳夾定一

邊一邊不用夾須存屈直處時時拽曲拽直不然

則愈後曲直不得

又云凡骨碎者須用麻藥即草烏散與服或刀割開甚者

用剪剪去骨鋒使不衝破肉或有粉碎者鎌去細

骨免膿血之禍且以藥水一日一洗莫令臭穢

又云凡骨碎者用接骨藥火上化開糊骨上然後夾

定外用夾骨法活血散接骨丹二生膏糯米膏

又云淋洗用蔓荊散

傷醫大全 卷三十六 跌打論 毛 顧氏秘書

跌打損傷門主方

黎洞丸

專治跌打損傷筋損骨斷夾棍刀傷斧砍等症
兼治吐血癆瘵喉口傷寒小兒急慢驚風牙關
緊閉婦人難產下部重傷惡血攻心胸悶發熱
產後惡露不盡兒枕骨疼寒熱乾血癆血山崩
血淋白帶一切危症服之護心散血解毒輕者
三分重者五分陳酒化服一切無名腫毒對口
疔瘡乳癰等症內服外敷毒蛇蜈蚣蝎螫草踏
虫傷俱係外敷

傷醫大全

卷三十六

跌打方

五

顧氏秘書

真天竺黃

生大黃

明雄黃

法製藤黃

真胎骨

瓜兒竭

真廣三七

阿魏

梅片

真西牛黃

麝香

沒藥

透明乳香

五銖錢

醋淬七次

去油各二錢 五銖錢四個火煨紅
製研細末稱準和勻用蜜貳兩黃蠟六錢全煎
化離火攪均乘熱為丸作二種一重三分一重
五分看病人老幼壯弱病之重輕用陳酒燉化

盡量飲醉蓋被取汗

三黃寶蠟丸

此方出自嶼洞軍中救活之人甚眾凡
惡症刀箭鎗棒毒蛇惡虫咬傷跌打損傷破傷
風傷力成癆死血凝滯通身四肢麻木不仁婦
人產後惡血不淨致生怪症瘀血攻心痰迷心
竅危在頃刻每用一丸無灰酒服如受傷日久
病勢重者連服數丸能令通身舒筋效難盡述
破頑痰保元氣却邪毒活絡舒筋效難盡述
起死回生之聖藥也凡一切外傷腫痛之大小
麻油少許化藥勿令見火將雞翎掃瘡上腐
肉不須刀割數次自然生肌長肉凡軍中毒
所傷死在頃刻用五分口內嚼下則毒氣不能
封喉攻心其傷處仍將藥敷數日而愈若鳥鎗
打傷未曾死者亦用三分黃酒送下任量飲醉
安眠片時其餘子即從傷處流出火燒麻油調
敷

傷醫大全

卷三十六

跌打方

五

顧氏秘書

專治跌打損傷惡刀箭毒毒瘡棒瘡毒蛇蠱毒
瘋犬咬傷破傷風傷力成癆產後惡露不淨瘀
血奔心痰迷心竅危在頃刻者只要口有微氣
重者一錢輕則三分或六分無灰酒盪熱調化
服之如受病日久連進數服服後隨飲熱酒數
觔臥煖處出汗即愈如被鳥鎗傷者鉛子即出
再將上藥煎滾取起離火化藥少許以雞翎攪
敷傷處痛即止
法製藤黃 四兩 真天竺黃 紅芽大戟 洗淨

劉寄奴 酒洗 血 竭 各三兩 兒 茶

明雄黃 各二兩 當歸尾 酒洗一兩 撲 硝 一兩

水 銀 下鉛 乳 香 去油 沒 藥 去油

水 粉 各三錢 麝 香 五錢 血 珀 二錢 燈

右碾極細末小蜂黃蠟溶化撒脚以熱水炖之

勿令凍冷候火氣和平入諸藥於內用手攪勻

搓如手指條大用時以刀切薄片酒燉化服忌

火酒等味

製騰黃法 騰黃切如豆大地下掘一小坑坑底置人糞用油紙蓋糞上放騰黃入坑內又將

湯醫大全 卷三十六 跌打方 聖 顧氏秘書

油紙蓋騰黃上再將人糞蓋上用土填踏實三晝夜取出用

接骨金丹

半兩錢 七個或五個打碎放 炭火上煨去油存性 明乳香 去油三

甜瓜子 每歲十粒同半兩錢炒黃 色去半兩錢只用甜瓜子

甜瓜子全乳香一味和勻碾末先用蘆艾煎湯

沃洗傷處以新絮包煖再用好酒冲服以醉為

度蓋煖取汗其骨自然相接傷在上身食後服

傷在下身食前服此方旋配旋用即效如隔宿

則不堪用矣

又方

紅 花 酒炒八 胡桃膈 炒 沉 香

五加皮 酒炒各 沒 藥 去油四 生大黃 二錢

當 歸 酒洗一 乳 香 去油四 土狗子 二十一箇

共碾細末每服一錢煮無灰酒服

又方

山羊心血碾細末二三分冲滾酒服忌魚腥三日

又方

半兩錢 真者一個用醋一杯將錢煨紅 滓入醋內七次以醋盡為度

湯醫大全 卷三十六 跌打方 聖 顧氏秘書

土鱉虫 大者一個盛罐內放火上烘 乾不可傷去足尖以全為妙

自然銅 四錢照半兩錢 製法乳鉢內碾 滴乳香 去油三

巴豆仁 四十九粒去 油盡取霜 沒 藥 去油一

半 夏 姜汁拌炒 川續斷 滴醋浸透炒 乾各三錢

當門子 真者三分臨 貯罐時全乳

碾極細末入磁瓶密貯每歲一厘無灰細酒儘

量飲醉一覺次日即效

又方

猪板油 臘月者 白 蠟 八兩 白 礬 十二兩

辰砂 滴乳香去油 沒藥去油

瓜兒竭各一兩 飛丹 自然銅火煨醋

密陀僧各四兩逐件碾極細另包聽用

先將板油入鍋熬枯濾清復入淨鍋內熬下白

蠟化盡離火放地上將陀僧黃丹自然銅攪勻

投下再煎滴水成珠為度始下血竭辰砂乳沒

明礬用柳枝不住手攪勻待凝丸如彈子大箚

殼觀收凡遇跌打損傷重者用一丸再加猪油

少許火上化開塗傷處以油紙包縛如最重者

傷醫大全 卷三十六 跌打方 聖 顧氏秘書

以藥塗上燈草裹好外用竹片夾縛再用一丸

作小丸用滾熱葱酒吞下若仍痛再進一丸骨

折者用一丸如牙痛納一丸於牙齦即止

又方

土鱉虫一個新瓦焙黃 巴豆一粒去油 生半夏一粒

自然銅火煨醋 乳香去油 沒藥去油

碾極細每用五厘滾酒調服約人行十里汗出

其骨交接有聲忌發物房事一百二十天

又方

土鱉虫新瓦焙 自然銅火煨醋 乳香去油

半兩錢火煨醋 甜瓜子 沒藥去油

共碾細末每服一分五厘熱酒調下上體傷食

後服下體傷空心服接骨如神

回生丹

治跌打損傷如神

黑豆炒去皮 蒲黃 當歸

桂心 赤芍藥 乾薑各八兩

茄種晒乾四兩

傷醫大全 卷三十六 跌打方 聖 顧氏秘書

擇天德月德日修合忌生人雞犬碾細煉蜜為

丸每服二錢童便沖酒送下

接骨紫金丹

治跌打損傷昏迷不省人事瘀血攻心發熱

土鱉虫十個去頭尾酒浸晒 骨碎補切片露三

自然銅火煨醋 巴豆霜 乳香去油

瓜兒竭 沒藥去油 當歸尾酒浸一

礪砂各三錢 地龍十四條酒浸

共碾細末每服三分好酒送下

神效散

肉桂 去皮 紅花 各一錢 川烏 烏 各二錢

共碾細末每服二分酒調下傷重者不過三分即愈此方乃跌打損傷起死回生人千萬富貴之家備以濟人

活血丹

土鱉虫 酒浸死 五加皮 劉寄奴花頭

桃仁 去皮尖 山查 各四兩 大黃 陳酒煮 入兩

湯醫大全 卷三十六 跌打方 聖 顧氏秘書

元胡索 醋煮 蓬莪術 醋炒 牡丹皮

當歸 酒洗 牛膝 酒洗 紅花 各三兩

香附 童便浸 炒三兩 京三稜 醋炒 降香節

凌霄花 蕪木 青皮

枳實 赤芍藥 威靈仙

檳榔 川芎 各二兩 乳香 去油

沒藥 去油各一兩

共碾細末每服二錢壯者三錢陳酒調服核桃肉四五枚過口

透骨丹

跌打損傷深入骨髓或隱隱疼痛或天陰則或年遠四肢沉重無力此藥主之真神方也

真神方 乳香 去油 沒藥 去油各三錢

開糖花子 一兩火酒浸炒三次童便浸炒二次再焙乾

共碾末稱準和勻再加麝香一分再碾磁瓶收

對固每服三分壯者五六分不必喫夜飯要

黃目睡好方服酒可儘量飲量用猪肉過口素

用豆腐過口服後避風有微汗出為效忌房事

湯醫大全 卷三十六 跌打方 聖 顧氏秘書

醃茶醋等物及諸般血如虛弱者間五日一

服壯實者間三日一服

接骨散

黃麻 燒灰二兩 頭一髮 燒灰一兩 乳香 去油 五錢

每服三錢溫酒調服跌撲閃胸骨折疼痛

在正

通導散

折傷跌撲極重大小便不通最危之症先用此藥打下夾血然後服補藥

枳殼 大黃 皮硝各二錢
 陳皮 厚朴 當歸
 木通 紅花 蘓木各一錢
 甘草五分

水煎熱服以通利為度但此藥切不可用酒煎
 令人悶絕而死凡小兒孕婦不可服
 和傷活血湯

損傷瘀血腹脹內壅紅腫暗青瘀痛昏悶欲死
 傷最重者服之

傷醫大全 卷三十六 跌打方 聖 顧氏秘書

大黃 五錢 桃仁 打碎四十九粒 穿山甲 炒碾

當歸尾 威靈仙 紅花

蘓木 生地 五加皮各二錢

乳香 去油 天花粉 沒藥 去油

川芎 各五分 血竭 二分 甘草 三分

水酒各一碗煎臨服入童便一杯和服以瀉出
 瘀血為效

又方

五加皮 茜草 劉寄奴

紅花 各一錢 五分 青木香 枳殼

蓬莪朮 烏藥 京三稜

桃仁 赤芍藥 各一錢 當歸 二錢

頭生酒二觔煎一觔半雞鳴時服

又方

當歸 蘓木 搥碎 紅花

胡桃肉 各四兩

好酒十碗煎四碗任飲醉揠乘熱敷傷處

又方

傷醫大全 卷三十六 跌打方 聖 顧氏秘書

羊躑躅 炒黃 大黃 赤芍藥

當歸 紅花 各三錢 生地 五錢

牡丹皮 二錢 土狗 十個 搥碎 土虱 三十個

酒煎去揠入自然銅 火煨醋淬 七次碾細 一錢調服一夜

其骨自合

又方

澤蘭葉 二錢 百部 三錢 劉寄奴

猴薑 蘓木 各一錢 陳皮 五分

乳香 去油六分 甘草 三分 沒藥 去油六分

金銀花 一錢五分

酒煎服蓋煖出汗

澤蘭湯

通二便除腸中瘀血乃活命之神丹也

澤蘭葉 當歸 各五錢 牡丹皮 三錢

紅芍藥 青木香 各一錢 紅花 一錢

桃仁 十粒去皮尖碾

水煎熱酒冲服如大便不通加炒大黃二三錢

跌撲停瘀

傷醫大全

卷三十六 跌打方

吳 顧氏秘書

當歸尾 紅花 川羌活

沒藥 去油 赤芍藥 桃仁 去皮

川續斷 猴薑 各八分 真桂枝 三分

白酒煎服

打撲損傷痛不可忍者

於白朮 五兩 當歸 焙 上肉桂 刮去皮

白芷 炙甘草 乳香 去油 另研

沒藥 去油另碾 各一兩

碾細末每服二錢溫酒調下

跌打損傷藥酒

當歸 五加皮 生地 各一兩

破故紙 骨碎補 去毛 十大功勞

薏苡仁 紫荊皮 各五錢 廣木香 三錢

羌活 三錢 川芎 杜仲 各八錢

莪朮 桃仁 各三錢 虎骨 酥炙一兩

好酒二十觔入壘封固隔水煮三炷香取起退

火一七早晚聽飲

跌打斷筋折骨疼不可忍

傷醫大全

卷三十六 跌打方

辛 顧氏秘書

路傍墻脚下人便溺處陳碎瓦片一塊洗淨火煨

米醋淬至酥黃為度刀刮為末每服三錢好酒調

服看傷上下分食前後服之如無碎瓦碎磚亦可

又方

活蟹搗汁冲熱酒服

又方

多年糞窖內磚約三五十者洗淨打碎火煨醋

淬以酥為度碾細每服三錢熱酒調服神奇

又方

工驚重 二十個 小便霜 二錢

白酒冲服外用熟附子肉桂當歸川芎碾末入

鳳凰胎 如無以小公雞代之 熱糯米飯同搗敷傷處

跌打損傷兼治夾棍杖瘡

蘇油半觔男婦亂髮洗淨二兩將油滾起入髮熬

化再加生酒攪勻喫下儘量飲醉被蓋出汗傷處

以杉木皮紫紫綿包即愈

跌打氣絕

仙人柴 即九里香葉 搗自然汁一杯灌下即甦但心口

瘍醫大全 卷三十六 跌打方 至 顧氏秘書

有微熱能受此藥無有不活名救命丹

治折傷筋骨遇天陰則痛

益母草不拘多少用水熬膏隨病上下食前後用

酒化服

又方

韭菜汁和童便飲之散去瘀血骨折者蜜和葱白

搗勻厚封患處酒調白芨末二錢服之

打傷瘀凝骨節 用後方

生鐵一觔酒五觔煎一觔飲之

打的青腫過腿面者 啓玄

三七鮮梗葉搗爛敷在青處瘀血即消如神如無

三七即白蘿蔔搗敷亦效

跌打損傷

生蟹一隻白礬三錢搗化敷傷處用杉木皮夾好

又方

馬屎炒熱包熨之冷又換如此二三十遍腫消痛

止內以乾荷葉煨炭童便冲酒調服

又方

獨核肥皂生姜葱頭共搗爛滾燒酒調攤於青布

上貼傷處如冷用火逼之再以紅花蘓木胡桃肉

乳香 去油 酒煎飲之取汗

跌打損傷及踢傷折臂不能動者

肉桂 硫黃 各一兩

碾末糯米飯同搗敷傷處再敷一次全愈

閃跌

木耳瓦上煨碾每服三錢酒調服

閃跌

活松絲 松 柅 槿桑柏根灰

乳 香 去油 黃梔子 獨核肥皂

沒 藥 去油 鍋 煤 各等分

共碾細用無鹽陳酒糟和煉成泥敷上裹緊隔

日藥乾以熱陳酒潤藥復上前藥可也

打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛

未展荷葉陰乾一味為末食前用熱童便一盞調

服三錢以利下惡物為度

韭菜散

湯醫大全

卷三十六 跌打方

聖

顧氏秘書

石炭同韭菜搗成餅貼墻上候乾細碾聽用敷之

止血如神

洗跌打損傷

劉寄奴 猴 薑 紫蘆葉

紅 花 番白草 青 葱

升 草 各 兩

煎水盈盆令被傷人穩坐盆內週圍圍好上面

遮蓋不可透風薰透待溫淋洗疼痛如失

又方

南獨活三兩 地骨皮二兩 骨碎補一兩二錢

透骨草 川續斷 五加皮 各一兩

羌 活 食 鹽 各三錢

先用水十碗煎五碗揸用水八碗煎四碗三次

水六碗煎三碗四次水四碗煎二碗共入砂鍋

內煎滾蒸洗神效

洗門跌

馬尾松毛不拘多少入鍋內熬至水面起絲為度

蒸洗搓揉

湯醫大全

卷三十六 跌打方

聖

顧氏秘書

又方

紫果子籐煎湯揉洗

跌打破損血出

血竭細末搽之

又方

飛麵遇上即血止結疤不復潰膿

黑丸子

治鶴膝風並跌撲損傷風濕筋骨疼痛或瘀血

壅滯

白 欬 赤小豆 各一兩 六錢 白芍藥

百草霜 各一兩 當 歸 白 芫

骨碎補 焙各八錢 天南星 川 烏 各三錢

牛 膝 六錢

酒糊丸桐子大每服三十丸鹽湯溫酒任下

折損或金瘡出血

五倍子 一兩 生半夏 枯 礬 各一兩 五錢

乳 香 去油 沒 藥 去油各五錢 無名異 一兩

龍 骨 煨三錢

傷醫大全 卷三十六 跌打方 垂 顧氏秘書

共為細末搽之不怕風不作膿止血如神

閃跌瘋氣痛

硫 黃 二兩 銀 硃 明雄黃

辰 砂 各三錢 川 烏 草 烏 各一錢 五分

生大黃 黃 栝 各一錢 麝 香 一分

先將硫黃融化入諸藥末攪勻地上預鋪大紙

一張將藥傾上再用紙一張蓋上壓扁成塊候

冷每紙一寸可裁十塊每用一塊點着放粗厚

草紙上不任手以厚紙移熨藥盡又換藥點熨

至熱氣透入肌骨則氣血立刻流通其患如失
秘製跌打損傷瘋疼閃撲凝血闕氣神效膏藥

全當歸 川 烏 白 芫

防 風 木鱉子 生地黃

連 翹 草 烏 官 桂

烏 藥 皂角刺 大 黃

赤芍藥 白 芷 頭 髮

白 欬 各一兩 沒 藥 去油五錢

槐柳桑棗桃枝 各十寸 傷醫大全 卷三十六 跌打方 垂 顧氏秘書

右藥入麻油二觔浸透桑柴火熬枯去渣復入

淨鍋內微火熬至滴水成珠始下飛丹十二兩

足務使老嫩合宜將凝投去油乳香五錢化盡

傾入水盆內揉扯以拔火毒收用攤貼臨時

加麝香半分每張重五錢重者一張輕者一張

貼三四入此方不可加減一味致取不效

跌打閃挫瘋氣痛冷頭風

穿山甲 去皮淨 番木鱉 水泡刮官 桂 切片

當 歸 各一兩 二錢 槐 枝 柳 枝 各一兩

枳殼一兩四錢

蘇油六觔浸透先用文火熬至黑色槐枝棍攪

滿去渣稱油輕重每油一觔加丹八兩熬滾徐

徐轉下不住手攪勻滴水成珠以手試之老嫩

得宜再入

乳香去油 沒藥去油 丁香

兒茶各六錢俱碾細

攪勻入有蓋瓶內埋土中七日去火氣任攤貼

木驚膏宋秘

傷醫大全

卷三十六 跌打方

聖 顧氏秘書

治跌打損傷腫痛瘡瘍一切諸風氣痛

真蘇油三觔番木鱉子一百四十七粒入鍋內熬

至膏水熬黑脆為度熬時以柳枝頻攪將木鱉子

撈出使人鉛粉炒黃色三十兩徐徐投下逐漸成膏

以紙盛非水將膏傾入置露處出火氣一宿撈起

聽攤用後摻藥

摻藥宋秘

三奈上上 北細辛 川烏

樟冰 肉桂 當門子

大茴香 母丁香 乳香去油

沒藥去油 甘松 自然銅煨紅醋

半夏 大黃 草撥

皂角 乾薑 白芷

小茴香各五錢 阿魏三錢

忌見火即自然銅亦須放傾銀罐內煨逐味另

碾合勻密貯勿洩香氣多少隨用可也如骨碎

者不可多同麝香以其性熱而散能耗髓也若

傷損血積離礙者先貼無摻藥膏藥一個貼一

傷醫大全

卷三十六 跌打方

聖 顧氏秘書

二時辰揭起則傷口血跡被膏揭淨然後用摻

藥之膏貼之倘無木鱉膏即尋常膏藥亦可用

金絲萬應膏

治跌撲損傷並寒濕脚氣痛不可忍小兒疳疔

瀉痢不肯服藥貼肚上咳嗽貼背心

瀝清二觔淨末 草蘇子二百粒去皮殼

木鱉子二十八枚去殼切片乳 香 沒藥去油各

黃蠟二兩 蘇油夏二兩春秋各四兩 威靈仙二兩

先將瀝清靈仙下鍋蒸化焦黃色瀉過傾入水

盆候冷取出稱二兩再下鍋熔開下麻油黃蠟
草麻子泥用槐柳枝不住手攪勻慢火熬至滴
水不散不粘手為度扯拔如金絲狀如硬加油
少許如軟加瀝清試得如法却下乳香沒藥末
起鍋在炭火上再用槐柳枝攪數百次又以粗
布漉下水盆內扯拔如金絲為度

風氣跌撲膏藥神方 錦囊

男 髮 一大團 草麻子 去殼二指 猪 脂 熬油二
兩 蘇 油 八兩

瘍醫大全 卷三十六 跌打方 羗 顧氏秘書

以上先熬至髮化草麻子焦枯再入後藥

熟 地 威靈仙 各三兩 金銀花 二兩

川 烏 草 烏 各六錢 肉 桂 去皮

白 芷 各一兩 獨 活 當歸身 各一兩 五錢

以上熬至藥色焦枯去渣細絹濾過慢火再熬
不住手攪入後藥收之

乳 香 善上炙去 沒 藥 善上炙去油

麝 香 二分 真黃丹 炒燥羅細

明松香 水煮三次去木焙化
入夏布濾過淨六兩

以上先將松香黃丹下後煉至軟硬得所滴水
成珠離火再下乳沒麝打勻裝磁器中旋用旋
攤

打撲損傷及一切癰腫未破貼令內消 木事

生地黄 碾如泥 廣木香 碾細末

先以地黄膏隨腫大小攤於紙上摻木香末一
層又再攤地黄膏貼腫上不過三五度即愈

跌打青腫

真三七嚼塗患處

瘍醫大全 卷三十六 跌打方 羗 顧氏秘書

蚌霜散 入門

蚌 霜 百草霜 各等分

右為末每服二錢糯米飲調服

乳香定痛散 入門

治諸傷損疼痛

白 芷 當 歸 生地黄

牡丹皮 赤芍藥 川 芎

乳 香 沒 藥 白 朮

甘 草 各等分

右為末每二錢温酒重便各半調勻服之

乳香散 得效

治打撲傷損痛不可忍

白 朮 當 歸 白 芷

乳 香 沒 藥 甘 草 各等分

右為末每二錢酒調服

尋痛元 得效

治諸傷止痛清心行氣活血如神

草 烏 生用 乳 香 沒 藥

海醫大全 卷三十六 跌打方 李 頌氏秘書

五靈脂 各三錢 生麝香 少許

右為末酒糊丸如指頭大硃砂為衣每一丸薄

荷湯姜汁磨化服

補損當歸散 局方

治墮撲折傷疼痛叫號服此藥不復大痛三日

筋骨相連

川 芎 一兩五錢 桂 心 川 椒

當 歸 甘 草 各七錢五分 附 子 炮

澤 蘭 各一錢五分

右為末每二錢温酒調服其效如神

傷損腫痛瘀血流注紫黑或傷眼上青黑不散 醫鑿

大黃為末生姜汁調敷患處即消

散被毆癢痕亦治跌撲 聖惠

麻油清酒各一碗煎數沸服了卧火燒熱地上一

夜痛止腫消

草烏散 得效

凡骨節出臼用此麻藥麻之然後用手整頓

皂 角 木 鱉 子 紫 荆 皮

海醫大全 卷三十六 跌打方 李 頌氏秘書

白 芷 半 夏 烏 藥

當 歸 川 芎 川 烏 各二兩二錢五分

草 烏 茴 香 坐 牽 草 各二錢五分

木 香 一錢

並無煨製為末諸樣骨節出臼窠者每服二錢

好紅酒調下麻倒不識痛處然後或用刀割開

或剪去骨鋒以手整頓骨節歸原用夾夾定然

後醫治如箭鏃入骨不出亦用此藥麻後或鉗

出或鑿開取出然後取鹽湯或鹽水服之立醒

夾骨法 得效

小蝦蟆四五個皮硝三分生姜一兩酒糟一碗腫者加紅何首烏同搗敷折傷之處

治折傷各活血散 入門

菘豆粉炒紫色新汲水調成膏厚敷折傷處以桑皮夾定其效如神 一方熱酒醋調敷

接骨丹 回春

骨碎筋斷用此復斷如初

古文錢 三個火煨醋

當歸 七錢五分

傷醫大全 卷三十六 跌打方 李 顧氏秘書

川芎 骨碎補 沒藥 各五錢

川烏 煨四錢 乳香 二錢五分 木香 一錢

松香 六兩 香油 一兩五錢

各為末和油成膏攤油紙貼患處

二生膏 醫案

治傷筋損骨痛不可忍神效並治折傷手足

生地黄 一兩 生薑 四兩

右搗爛入酒糟一兩炒熱布裹傷處熨之

傷損臂曰脫出腫痛 得效

生地搗爛攤油紙上次糝木香末一層又攤地黃貼患處明日痛即止

治折傷斷筋損骨 種杏

生地搗取汁好酒和服日二三次最效又搗爛蒸熱封傷處一月筋骨連續蓋地黃屬骨

糯米膏 綱目

治撲傷筋斷骨折

糯米一升皂角切碎半升銅錢百個同炒至焦黑去錢右為末酒調膏貼患處神效

傷醫大全 卷三十六 跌打方 李 顧氏秘書

蔓荊散 丹心

治打落筋骨折傷瘀血結痛頑疼

荊葉 無則荊芥代之 蔓荊子 白芷

細辛 防風 川芎

桂皮 丁香皮 羌活 各一兩

右為籠末每一兩入鹽一匙連鬚葱白五莖漿水五升煎七沸淋洗痛處冷則易

遍身打傷

申薑搗汁沖酒服或申薑切片酒煎不時服或申

薑筋許搗碎酒五觔入罌隔水煮三炷香放地上
一夜去火毒次日溫服外用申薑四兩生薑二兩
敷乾再換昔有一盜捶楚身無完膚服此數日無
恙

跌打閃挫神方 家秘

獨核肥皂去核同紅糖槌爛敷之

接骨仙方

骨斷粉碎者五加皮肆兩雄雞壹隻重陸兩黑者
更妙去毛連骨皮血與五加皮搗爛敷患處用布

傷醫大全

卷三十六 跌打方

李

顧氏秘書

包好准貼一週時揭去切不可太過時內自完好
神效無比再用五加皮伍兩酒煎服盡量飲醉睡
為妙

八厘散

江湖方姓授

土鱉虫

焙末

乳香

去油

沒藥

去油

血竭

各一錢

生半夏

大者

當歸

酒浸

巴豆霜

砂仁

雄黃

香甜瓜子 各五分

共為細末收貯聽用每服八厘好酒調下小兒

三厘但能開口服下即得活矣
上部損傷 集效

如頭破見髓或傷風於內

羌活

防風

半夏

升麻

當歸

赤芍

陳皮

生地

甘草

川芎

白芷

白茯苓

天南星

天花粉

蔓荊子

姜三片煎外加血餘硬落得打各一錢碾末冲

傷醫大全

卷三十六 跌打方

李

顧氏秘書

服

中部損傷

如手折之類

羌活

防風

當歸

赤芍

陳皮

白芷

甘草

秦艽

黃芪

茯苓

生地

官桂

破故紙

天花粉

姜三片煎外加五加皮血餘硬各一錢碾末冲

服

下部損傷

如腿足傷

當歸

芍藥

陳皮

牛膝

木瓜

防已

川芎

茯苓

羌活

白芷

白朮

秦艽

生地

甘草

姜三片煎外加血餘硬一錢研末冲服

傷醫大全

卷三十六 跌打方

李 顧氏秘書

製法 圓春

生葱連根切碎炒令汁乾乘熱敷患處外用絹帛

束之立刻定痛止血

筋骨折傷 赤水玄珠

急取雄雞一隻刺血量受傷人酒量冲服痛立止

神效無比

跌壓瘀血積痛難忍 集驗

大黃

酒蒸一兩

當歸尾

五錢

桃仁

去皮尖二粒

酒煎雞鳴時服至天明取下瘀血即愈

跌打損傷 懷德堂筆記

九世還魂草

鹿啣草

落得打草

麻皮頭 上部此味加倍

土鱉 各等分

下部加苧根

內傷加白頭蚯蚓

上五味為君隨便再加紅花藕木等藥酒水煎

服汗發即愈 有一泥工沈姓者屋上跌下服此三日全愈

接骨不知痛

鳳仙花根酒磨服半寸最多一寸然後揉托入白

並不知痛但多服傷人以一寸為極不可多用

傷醫大全

卷三十六 跌打方

李 顧氏秘書

跌打骨斷 願濟堂刊施

金櫻子堊 即金櫻子根也去皮煎酒熱服積敷患處立效

墜車落馬筋骨痛不止 集驗

玄胡索研末酒服二錢日進二次即愈

閃跌 胡繡翁

用魚鱈切片溶化攤新棉花上乘熱貼傷處取出

青紫傷痕即愈

跌撲損傷急救散 周鶴仙

當歸尾 酒洗

自然銅 醋煨七次

桃仁 去皮尖

紅花 各七錢 陳麻皮 三錢 地鱉虫 燒酒浸

骨碎補 酒洗蒸 六黃 酒洗各 乳香 去油

沒藥 去油 胎兒骨 血竭

雄黃 麝香 各五分

以上共為極細末收貯勿洩氣如遇跌死打死尚有微氣者用酒漿調二厘入口即活如骨折瘀血攻心用藥八厘酒調灌之其傷骨自上而愈神效之極

接骨神方

瘍醫大全

卷三十六 跌打方

李 顧氏秘書

雄土鱉 一個此虫凡雄者用銅刀或竹刀切斷以碗覆之半响其虫能自接上不死者是雄的方可用是雌者生半夏一個 自然銅 醋煨七不可用火煨存性

乳香 去油 沒藥 去油各 五厘

以上俱忌鐵器共為絕細末每服二厘黃酒調下不可多喫如多喫恐長出多骨服藥復須保養四十天復舊此方神效無比有力之家宜修

合濟世

接骨神方

半兩錢 錢上止有半兩二字者以火煨紅淬入醋內數次即脆研極細末七厘

甜瓜子 火焙乾為末七厘

二味末和勻生酒服下即愈但不宜多服多則傍長一多骨矣神驗

跌打損傷膏藥 劉長隨

當歸 三稜 莪木

獨活 白芷 川芎

羌活 杜仲 川牛膝

防風 肉桂 紅花

續斷 防已 五加皮

瘍醫大全

卷三十六 跌打方

李 顧氏秘書

骨碎補 赤芍藥 劉寄奴

秦艽 葱頭 土鱉虫 各三兩

頭髮一握

右藥用麻油十觔浸七日入鍋將藥熬枯濾去渣復入淨鍋內熬至滴水成珠入後細藥末

龍骨 乳香 去油 沒藥 去油

血竭 各二兩 麝香 另收旋加 如皮破骨損者麝香忌用

入油熬化磁鉢收貯 每藥油四兩加製松香

一觔全熬成膏傾水缸內扯拔出火毒收藏

凡攤膏時燉化攤好放土地上一個時辰再貼
得土氣則土蟹重有力易於接骨故也
面目跌撲青紫

生半夏磨汁塗消

接骨 李岳

遠年屋上古舊瓦為細末好酒調服二三錢睡一

覺即接上

跌打

生大黃 肉桂 各一兩

湯醫大全

卷三十六 跌打方

主 顧氏秘書

研細紅糖調敷

跌傷筋骨神方 許元植

糯米 揀去半粒者 燒酒麴 各三錢

研細無灰熱酒調服厚蓋取汗

跌打 吳宇上

牛皮膠用生薑汁熬化布攤貼

黃金膏

治跌打損傷筋骨斷落刀傷杖瘡湯火傷

麻油半觔熬至滴水成珠離火入白蠟黃蠟各五

錢攪化再入騰黃一兩攪勻收貯此藥愈陳愈妙
如收久膏老加熬過麻油燉化攪勻冷透敷之惟
勿頸者勿用因騰黃毒入耳

跌打損傷

松毛

要尋孤松樹四圍無樹倚靠者十兩
清水洗淨帶潮切碎石臼內搥爛

紅梔子

八十一個 飛麵八兩

量加水共搗碎作餅先以葱湯洗患處敷貼外
以皮紙包裹至重者一日一換九日拔出青傷

自愈

湯醫大全

卷三十六 跌打方

主 顧氏秘書

跌打損傷

臭椿樹皮旋揭一塊生薑二兩不拘公母雞絨毛

一把全搗濃敷上用槿木皮遮護以二炷香為度

自愈

接骨仙方

千里馬

八雙燒
灰存性

沉香

廣木香 各三兩

象皮

瓦上焙

琥珀

燈心全

冰片 各二兩

骨碎補

去毛

血竭

各一兩

虎脛骨 醋炙一

乳香

去油

沒藥

去油各一
兩五錢

右各研細和勻磁瓶收貯看傷之大小用藥錢許或八分先用好米醋一茶杯入銅杓內熬滾入藥再熬片時調敷患處不可太熱不可大冷敷上棉紙裹好新綿包紮十日或八日一換忌公雞鯉鱔不忌牛羊肉戒房事百日復舊如神

跌打損傷

地骨皮

藏靈仙

骨碎補

川續斷 各六錢

入磁罐內酒二觔隔湯煮至觔半服取汗渣用

跌打損傷

卷三十六 跌打方

聖

顧氏秘書

酒一觔煎半觔服

接骨

大蝦蟇生搗如泥敷縛定其骨自合

又方

艾雞草葉搗爛取汁熱酒和服數次即愈

跌打之後凡大小便通利者

廣三七二三錢酒煎飲

跌打二便閉澀不通

柞樹根去心皮二錢酒煎服

木石打傷

水龍骨煨研桐油調搽

指甲爬破面皮

生薑汁調輕粉敷好無痕

跌打損傷時值暑天腐爛恐生蛆虫外雖平滿為害

不一

宜用猪血切片引出蛆虫再用白蔘藜白蘇貫仲

為細末香油調敷其虫即滅

傷損愈後肌膚青腫聖惠

跌打損傷

卷三十六 跌打方

聖

顧氏秘書

用茄子種通黃極大者切一指厚放瓦上焙乾為

末酒調二錢臨臥服一夜消盡無痕

擦落耳鼻

綱目

用油髮灰末乘急以所落耳鼻蘸髮灰綴定以軟

帛縛定神效

自行顛撲穿斷舌心血出不止

綱目

取米醋以雞翎刷所斷處其血即止仍用蒲黃杏

仁礬砂少許為末蜜調噙化而愈

接指方

入門

蘇木爲末敷斷指間接定外用蠶繭包縛完固數

日如故

傷破陰囊二丸脫落懸掛未斷痛苦無任醫鑒

須教人漫漫托上多取壁錢敷貼傷處日漸就安

其囊如故

慈雲散 畢峻功

治癰疽疔腫大毒及跌打損傷初起即消已成

即潰接骨回生功效如神

番木鱉

川烏

土鱉虫

湯醫大全

卷三十六 跌打方

姜

顧氏秘書

鹿角

煨灰各二兩

穿山甲

一兩六錢

明天麻

草烏

川芎

升麻

當歸尾

鬧陽花

生香附

殭蠶

各一兩

蜈蚣

斑

貓 各四錢

右各製畢研極細末重者用一錢輕者用六分

或八分俱用無灰酒調服被蓋取汗不可見風

必須汗乾然後出幃幙

跌打昏暈不省人事

蟹殼燒灰存性熱酒調服再將大甘草嚼爛敷之

跌打青腫

生山梔研全白麪熱水調敷

打傷筋骨遍身青腫紫血不行疼痛難忍

白芷一兩 甘松三錢 三柰一錢

麝香三分

共研細每服三錢或童便或酒沖開水調服

接骨方

乳香

自然銅 醋煨

沒藥 去油

龍骨

煨各一錢

麝香三厘

土鱉 一個陰乾

湯醫大全

卷三十六 跌打方

姜

顧氏秘書

共爲細末每服三分服時再入土鱉末一個須

先整定傷骨方可服藥否則接挫

落下頰拿法門主論

落下頰者氣虛之故不能收束闔竅也患者平身正坐以兩手托住下頰左右大指入口內納槽牙上端緊下頰用力往肩下捺開闔竅向腦後送上卽投闔竅隨用絹條兜頰於頂上半時許去之卽愈脫頰起於肺腎虛損元神不足或笑談高興忘倦一時元氣不能接續所致如法拿上須避風速服加味六君子湯不然風邪外受必致痰涎壅盛口眼喎斜而風中臟腑十無一瘳矣

湯醫大全

卷三十六

落下頰拿論

圭

顧氏秘書

落下頰拿法門主方

加味六君子湯

人參

白朮

白茯苓

半夏

天麻

陳皮

白蠟

當歸

附子

川芎

甘草

燈心四十根生姜三片水煎服

落下頰

口噙烏梅一二枚茶頂自上

湯醫大全

卷三十六

落下頰拿法方

圭

顧氏秘書

落下頰

烏梅搗碎作餅塞滿牙盡頭處張口涎隨手托上

人咬門主論

陳實功曰人咬為患良肉受傷但陽明胃經所屬者齒臟腑多火多熱凡食經此無不燐爛下咽又飲食炙燐之毒無不侵襲故傷人發腫其痛異常臭膿腐爛痛徹連心是感受牙齒之毒也初咬時一日内眾人激熱尿浸傷處洗淨牙黃瘀血咬孔上蟾酥餅貼之膏蓋後出微膿漸愈如初咬時未用此法致腫痛發疔痛甚者亦與童便洗淨拖乾用粗紙撚蘸麻油點火用烟焰薰腫痛上良久方住

傷醫大全

卷三十六

人咬論

去

顧氏秘書

以解其毒仍以蟾酥條插入太乙膏蓋候腫消時換玉紅膏搽之長肉完口 正示

人咬傷門主方

驗方

熱尿洗去牙黃瘀血以生栗子嚼極爛塗之如腫痛用麻油紙撚火焰薰之

又方

溇雞屎塗咬處立刻止痛不作膿

又方

乾人糞裝荔枝殼內安放咬處加艾圓灸之以不痛為度

傷醫大全

卷三十六

人咬傷方

去

顧氏秘書

又方

生栗子和飯嚼爛厚卷傷處

又方 綱目

驚鼓或食蛇龜版燒灰敷或油調搽

咬破手指痛不可忍久則爛脫手指手掌

人尿入瓶將患指浸在內一宿自愈

咬破手

白蘿蔔葉嚼爛敷之

被咬受牙黃毒

老鼠屎兩頭尖 荔枝肉一箇 紅糖搗勻敷上牙黃

卽拔在敷藥上

七聖散 胡學海

治人咬傷破爛

人糞燒存性 生大黃 花蕊石

蘆甘石 各二錢 輕粉 一錢 甘草一分 五分

冰片 五分

共乳極細搽之

傷寒大全 卷三十六 人咬傷方 全



從高

墜下

瘀血

攻心



傷寒大全 卷三十六 從高墜下論 全 顧氏秘書

救從高墜下門主論

從高墜下瘀血攻心用淡豆豉一合煎湯飲之或生薑汁同麻油和勻溫服之再將淨土五升蒸熟以舊布重裹分爲二包更換熨之痛止卽已如氣絕沉重撬開口以熱尿灌之用半夏末吹鼻中以艾炙臍將被傷人盤足坐住提起頭髮使氣從上升則可活矣

陳遠公曰人從高墜下昏死不甦人以爲惡血奔心誰知乃氣爲血壅乎夫跌撲之傷多是瘀血攻心

然跌撲出其不意未必心動也惟從高下墜失足時心必驚悸自知必死是先扶一必死之心不比一蹶而傷者心不及動也故氣血錯亂每每昏絕不救治法逐其瘀血佐以醒氣之品則血易散而氣易開倘徒攻瘀血則氣閉不宜究何益乎甦氣湯乳香末沒藥末大黃末各一錢山羊肉末五分蘇葉荆芥丹皮各三錢當歸白芍羊躑躅各五錢桃仁十四粒水煎調服一劑氣甦三劑血活全愈

傷醫大全

卷三十六 從高墜下論

全 顧氏秘書

難矣

陳實功曰從高墜下未經損破皮肉者必有瘀血流注臟腑人必昏沉不醒二便必難大成湯通利二便其人必醒不醒者獨參湯救之尋常墜墮輕者紅花活血湯調之 正宗

錢青榆曰從高墜下及落馬血冲欲死切忌飲冷水急用韭菜汁或熱小便灌之 丹方摘

從高墜下用生半夏末吹入鼻中醒以生姜汁煎蘇油攪勻灌之再以乾荷葉燒灰熱小便調下三錢

日進三服自愈 附刊感應篇註證

傷醫大全

卷三十六 從高墜下論

全

顧氏秘書

救從高墜下門主方

鷄鳴散 三日

金刀傷打撲傷血瘀凝積煩悶欲絕

大黃 酒蒸五錢 當歸尾 三錢 桃仁 十四粒 研

右作一貼酒煎雞鳴時服次日下瘀血即愈治折傷亦妙

傷醫大全

卷三十六 從高墜下方

全

顧氏秘書

破傷風門主論

朱丹溪曰破傷風證多死最急證也始因出血過多或風從瘡口而入或瘡早閉合瘀血停滯於內血受病而屬陰始雖在表隨易傳臟故此風所傷必多難治其證身熱自汗口噤搐搦勢急非常藥可治非全蝎不開兼以防風風藥

馮魯瞻曰凡破傷風邪初受在表者宜用發散同傷寒表證治法

又曰破傷風四惡證不治一面目青黑二額上汗珠

傷醫大全

卷三十六 破傷風論

全

顧氏秘書

不流三眼小目瞪四身汗如油 錦囊

陳實功曰破傷風因皮肉損破復被外風襲入經絡漸傳入裏其患寒熱交作口噤咬牙角弓反張口吐涎沫入陰則身涼自汗傷處反為平陷如故其毒內收矣當用萬靈丹發汗令風邪反出再以玉真散患上貼之得膿為吉如汗出前證不退者死 正宗

凡小兒或男婦頭顱額髮生癩破後因其輕而忽之不肯貼膏藥每致外風水露侵入頭面發腫如破

傷風候常用荆防白芷殭蠶蟬蛻內服取汗外用

紅升丹提之膏蓋自安

回春云凡鬪毆被打成破傷風頭面腫大發熱以九

味羌活湯熱服取汗外用杏仁搗爛入白麵少許

新汲水調敷瘡上腫即消

陳實功曰破傷風症如汗後口噤不開語聲不出諸

症不退傷處不高漸醒漸昏時發時止者死 正宗

破傷風門主方

豆淋酒

黑豆六七合炒香乘熱用麩麪酒一碗傾入即去

豆取酒加羌活五錢煎一半熱服取汗避風如產

後驚風去羌活加蘇葉五錢

又方

黑豆一撮鍋內炒熱沖無灰酒三四杯滾三五沸

調辰砂末少許服

灸法

人耳中垢紙上焙乾為末和蘆艾作圓灸傷處

又方

核桃殼半個內填極乾人糞臙上以槐白皮襯住

加艾圓灸之候遍身汗透為度汗後其人必困一

覺即愈治瘋犬咬並效

破傷風諸藥不效事在危急兼治猪癩羊癩等風發

之昏倒不知人事者

鱉膠切斷微炒 杭粉焙黃 皂礬炒紅色

硃砂另研水飛三錢

上三味研和入硃砂再研每用二錢無灰酒調服取汗外面仍灸七壯知痛為吉猪羊等瘋須每服三錢連進二服

破傷風口噤直強

魚膠燒存性研加麝香少許每服二錢酒調下不飲酒者蘇木煎湯調服外用魚膠一錢煮化封瘡口或用膠如瘡大一片浸濕火焙化開貼之

又方

桑枝尺許長十數段火上炙取汁和酒服

癩醫大全

卷三十六

破傷風方

全

顧氏秘書

又方

草屋上大螻蛄

此虫糞堆內亦有

倒捉俟涎流出滴入

傷處滴後遍身麻木汗出即活神方

天麻散

荆芥穗

三兩

天麻

生南星

炮去皮

防風

各一兩

共為細末每用五錢連鬚葱白煎湯調下

破傷風及產後驚風小兒急慢驚風至危驚者

蝦蟇皮風乾陰陽瓦焙微黃色研細加當門子少

許白酒調服被蓋取汗

治破傷風血凝心針入肉三症如神 錦囊

烏鴉翎燒灰存性細研酒服一錢或白滾湯下

破傷風出血不止

當歸末敷之

破傷風浮腫

蟬蛻為末葱涎調敷患上即時拔出惡水

破傷風寒熱垂危 丹方

蟬蛻肆兩燒末調服

癩醫大全

卷三十六

破傷風方

全

顧氏秘書

奪命散 三因方

治跌撲金刀傷及破傷風傷濕發痛強直如瘕

天南星

炮

防風 各等分

研細末水調敷傷處出水為妙仍以溫酒調服

一錢已死心尚溫者熱童便調灌二錢倘闕毆

內傷墜壓者酒和童便連灌三服即甦亦可煎

灌

玉真散 集驗

天南星

防風

白芷

明天麻 羌活 白附子 各等分

共研末敷患處如打傷欲死心頭微溫者熱酒

童便灌下二錢連進二服立可回生破傷風牙

關緊閉腰背反張甚則咬牙縮舌以童便調服

三錢立愈

破傷風證回生神方 周鶴仙

全斑猫 七厘小兒只用三厘 糯米 炒焦一分三厘

共為末黃酒冲服即愈不可忽視

又方

傷醫大全 卷三十七 破傷風方 主 顧氏秘書

蒼木焙 草烏 薑汁製各一錢

研末溫酒冲服汗出為度

傷醫大全目錄

卷三十七

急救部

三木門主論 附方

杖瘡門主論 附方

湯潑火傷門主論 附方

金瘡門主論 附方

弓箭鳥鎗傷門主方

針入肉門主方

傷醫大全 卷三十七 目錄 顧氏秘書

竹木刺門主方

狐刺瘡門主論 附方

傷水瘡門主方

救自刎門主論

救溺水門主論

救凍死門主論

救熱死門主論

救魔死門主論

救中惡門主論

救嚇死門主論

救五竅出血門主論

救神箭鬼箭門主方

除妖魅鬼魔門主方

崇症門主方

傷醫大全

卷三十七

目錄

十一

顧氏秘書

傷醫大全卷三十七

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢

男 隗燮用和

全校

急救部

自刑杖湯火起至自刎縊溺厲魅等證皆彙於此部
中以便檢閱參治

傷醫大全

卷三十七

三木論

十一

顧氏秘書

三木門主論

世多情不由已事出不虞受害一身重刑難免遭此
極刑何求不得每致冤抑難伸足脛多成痼疾特
立此門救諸慘痛惟鐵布衫一方功效非輕

新增

三木門主方

秘方

生牛肉剝爛作餅四個每個納胡椒十四粒貼夾傷處新綿裹緊一夜即能步履矣

鐵布衫丸

臨審預服受刑不痛亦且保命

自然銅

煨紅醋

木

無名異

洗去浮土

當歸

酒洗搗

沒藥

地龍

去土晒乾

乳香

去油

木鱉子

香油搽在殼上灰焙用肉各等分

傷醫大全

卷三十七 三木方

二

顧氏秘書

研細煉蜜丸如芡實大每服三九預用白湯化服縱受非刑辱拷可保無虞

又方

狗油

飛麵

各四兩

川烏

草烏

各五錢

草蘇仁

三錢

皂角刺

十個

麝香

一錢

肥皂

二十個煮爛去筋皮弦子

二烏皂刺和飛麝研細入上藥共搗爛作四餅先一日貼受刑處忌鐵器冷水或加猴腦或猴頭全搗更妙

預服免痛

自然銅

火煨醋

蛭

白頸者

乳香

去油

番木鱉

沒藥

去油

無名異

各等分

研細煉蜜為丸每重二錢臨時酒下

受刑後

獨核肥皂

一觔 稅米一升

全煮成飯去飯用肥皂搗敷

又方

黃牛肉一觔剝碎入紅銅末四兩搗勻敷

傷醫大全

卷三十七 三木方

三

顧氏秘書

又方

生獨核肥皂

砂糖

真麝香

搗如泥蒸熟作餅貼夾傷上棉花包好

夾棍傷

一出衙門即用熟童便一盆將足浸之如便冷燒紅磚二塊淬之即熱直浸至童便面上浮起白沫其傷盡出矣不瘥不瘡再用肥皂搗如泥入雞蛋清和勻罨傷處以草紙包裹脚縛緊三日不可動即效 內服末藥方人中白煨一木耳燒灰存性五錢

乳香沒藥俱用箸懷牛膝各三錢自然銅煨五錢共研

細末再用牛膝酒煎調服三五錢 如無末藥即

用當歸尾川芎乳香獨活鱉虱胡麻骨碎補紅花

五加皮各一錢生白酒一壺煎數沸量飲避風寒

厚蓋出汗立愈如骨傷加土鱉虫一枚

夾棍傷神驗膏 周鶴仙

大黃 白蠟各四兩 敗龜版

當歸各三兩 松香 乳香各二兩

骨碎補 沒藥各一兩 川續斷五錢

湯醫大全 卷三十七 三木方 四 顧氏秘書

麝香二錢

以上各為細末猪板油三兩將白蠟松香乳香

置在銅鍋內同猪油化開將前藥末入油攪勻

為膏貼於夾傷處第二日即可行走

夾棍軟骨神方 江仍度

川烏炒存性 草烏炒存性 猪牙皂炒成性

草麻子去殼炒 飛麵六兩 狗油牛筋熬

共搗勻作四餅每餅中間包重麝香二分五厘

貼用刑處 先用葳靈仙四兩煎湯足脛浴透

然後以藥餅貼上 修合時忌犯鐵器 如不

用刑以半夏生薑飛麵各等分做四餅貼上即

解

夾棍神方

肥皂子水浸透去外黑皮 搗如泥如明日用刑今

晚用此藥上至脚廉艇一節下至脚底板心併指

甲內處處敷勻不可有一毫空隙以油紙包好外

用裹脚纏定其藥與皮肉一樣顏色不變用刑時

一些不得毫無傷損用刑後以豆漿溫洗之其豆漿須

湯醫大全 卷三十七 三木方 五 顧氏秘書

預先一日將黃豆泡爛磨漿候用

玉紅夾紙膏

專治杖瘡及夾棍大刑並跌打損傷如神

乳香去油 紅血竭 沒藥去油

白兒茶 潮腦各一兩 銀硃八錢

銅綠三錢 嫩松香四兩

研細末

草麻仁肥大者去皮膜四百四十粒入乳鉢內乳

和上藥再乳成膏如杖瘡用夾連油紙一張用

木尺裁九寸五分長一尺一寸寬折過來一面
 用針戳孔一面攤膏於上合蓋夾膏於內以有
 孔者着肉貼之外以桑皮紙包好再用裹脚纏
 緊為妙貼一伏時揭下用後開洗藥洗拭乾淨
 再將膏拭淨仍以原膏貼之至重者不過三次
 全愈 如受大刑亦用夾連油紙雙折四方塊
 共四塊亦如前法碎刺孔眼一面攤膏貼上用
 新棉花包裹再用裹脚纏好或五六日一換此
 膏旋攤旋貼其膏用蓋碗收貯勿洩氣如乾難
 攤以滾水燉開攤忌鐵器忌見火

傷醫大全 卷三十七 三木方 六 顧氏秘書

洗刑杖法

- | | | |
|-----|-----|-----|
| 白木 | 葳靈仙 | 秦艽 |
| 五加皮 | 當歸 | 漢防已 |
| 紅花 | 川牛膝 | 羌活 |
| 劉寄奴 | 甘草 | 宣木瓜 |
| 獨活 | 廣三七 | 白芷 |
| 防風 | 各二錢 | |

煎湯洗後再貼玉紅夾紙膏

夾棍方

如直遇冤枉者可送此藥救之功德無量
 生肥皂 六兩
 真猴骨 一兩到細末
 活鯽魚 大者一尾 小者二尾
 沒藥 去油
 乳香 去油
 生半夏 各五錢
 老生薑 四錢
 麝香 三分
 生葱 二兩
 共研勻做成四餅貼於兩足孤拐上一夜天明
 即去如不受刑用甘草四兩煎濃水趁熱洗一
 二次即解

傷醫大全 卷三十七 三木方 七 顧氏秘書

杖瘡門主論

東醫寶鑑云杖傷大槩通滯血皆以酒引蓋血滯則氣壅淤氣壅瘀則經絡滿急經絡滿急故腫且痛凡打撲着肌肉必腫痛者以經絡傷氣血不行故如是

申斗垣曰叫號傷氣忍痛傷血亦有血奔心而死者宜熱尿灌之 或玄

種杏云凡杖畢即用童便好酒各一鍾合而溫服免血攻心甚妙仍用葱白搗爛炒熱湯杖處冷則易

湯醫大全

卷三十七

杖瘡論

八

顧氏私書

止痛散血如神

馮魯瞻曰宜用紫荆皮乳香沒藥生地大黃黃栢之

類 錦囊

朱丹溪曰黃栢生地紫荆皮皆敷杖瘡之要藥也若

血熱作痛宜涼血去瘀血為先加血竭紅花更佳

心法

入門云凡杖瘡忽乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔吐

者死

陳寶功曰杖瘡已破肉者以清涼膏敷之疼腫即消

未破瘀血內攻者用針放出內蓄瘀血再以大成湯下之便通自愈如傷處瘀腐已作痛疼者玉紅膏搽之自然腐化生新而愈至於辱刑重刑難受之時宜預服鐵布衫丸方得保身全命也 正宗

陳遠公曰腿受官刑皮肉腐爛死血未散疼痛呼號似宜用膏藥末藥外治為佳受刑深重不急內消尚恃外治則遺遺膜外安能衛心使惡血不相犯乎故內治宜速也世人外治之方多有神奇而內治之方絕無應驗往往多一時心亂而死者雖犯

湯醫大全

卷三十七

杖瘡論


九

顧氏私書

法遭刑其中情真罪當者固多而受冤遭陷者更復不少冤氣在心則肝葉開張肝氣填急尤善引血入心使無辜之人一旦輕死固非醫人之罪而治之無法是誰之愆與予得異方凡受官刑即時煎服服後用膏藥末藥內外兼治瘡口易愈必無性命之憂矣衛心仙丹大黃紅花丹皮木耳各三錢白芥子二錢當歸生地各一兩桃仁三十粒水煎一服惡血散矣不必二劑再以膏貼之名護心仙丹大黃白蠟敗龜板當歸各一兩三七根乳香

沒藥各三錢骨碎補松香各五錢麝香五分爲末
先以猪油一兩全白蠟松香入銅鍋化開再下各
藥拌爲膏貼傷處外用油紙包裹以布紮住輕者
一張重者二張足矣如夾棍重傷不須四張即可
行步二方至神至奇內方使惡血盡散外方使死
肉速生合而用之何至損命嘆醫治之無術耳

傷醫大全 卷三十七 杖瘡方 十一 顧氏秘書



杖瘡門主方

杖瘡珍珠散

兼治一切刀傷斧斫敷上立即止血斂口腫毒
久不收口者掃上立即生肌收口

珍珠 入豆腐內煮至豆腐起蜂窩時取出研 乳香 去油

海螵蛸 水飛 琥珀 象皮 炒黃

沒藥 去油 龍骨 火煨紅 兒茶

輕粉 各一錢 瓜兒竭 二錢

研細磁瓶密貯毋洩其味

傷醫大全 卷三十七 杖瘡方 十二 顧氏秘書

製油紙法

槐枝一寸長四十九段麻油四兩熬至枝枯撈起
再入黃蠟四兩融化乘熱即裁厚綿紙長闊四五
寸或厚皮紙拖油取出火氣聽用

凡杖後以刷桿挑敷前製末藥於杖處將油紙
貼上再以尋常油紙蓋之外以新布裹定一日
一換藥紙每次只用藥五六分不過數日設若
杖瘡已經見水過須倍費時日也用此藥必須
製油紙否則收口過速恐留餘毒也

散腫止痛膏

嫩松香煨化 蕪草麻仁搗化 腦一兩

礞石飛過五錢 銅錄木飛二錢

先將松香用重湯煨化再入四味攪勻用陳油紙甘草湯煮過陰乾攤貼杖瘡不可見水貼上紫緊

又方

生大黃末紅糖調敷候乾溫湯洗去又敷數次大有散血止痛之功

又方

傷醫大全 卷二十七 杖瘡方 志 顧氏秘書

凡杖後即用童便和酒一杯飲之以免血氣攻心外用熱豆腐鋪在杖傷處其氣如蒸腐色變紫後易之候紫血散盡轉淡紅色為愈

又方

韭菜搗爛敷之

又方

陳石灰為末水調鷺翎掃上

又方

鳳仙花連梗葉搗敷

又方

豆腐煮透拌黃柏細末搗敷

又方

細磁片搗極細末麻油調敷立時止疼

又方

劉寄奴六錢 馬鞭草四錢

研細蜜調敷潰者乾摻

棒瘡皮破

辟麝草葉搗爛敷上紫住即愈

傷醫大全 卷二十七 杖瘡方 志 顧氏秘書

散瘀拈痛膏 正宗

杖後皮肉損破紅紫青班焮腫疼痛墜重者

用如意金黃散一兩加樟冰三錢研勻以白石灰

一升用水二碗和勻候一時許用灰上清水傾入

碗內加麻油一半和勻以竹筋百轉自成稠膏調

前藥稀稠得所聽用杖後帶血不用湯洗將藥通

遍敷之紙蓋布裝夏月一日冬月二日方用葱湯

淋洗乾淨仍再敷之痛止腫消青紫即退傷重者

另搽玉紅膏完口

又方

臘猪油錢一兩七 黃蠟三錢 潮腦二錢五分

白蠟 輕粉 鉛粉各五錢

冷藥去油二錢 乳香一錢 冰片一分

先將猪油三蠟化開再入各末攪勻攤貼油

紙用甘草湯煮熟捶軟熱湯燉化攤貼凡棒瘡

破爛至重疼痛者一日換一張三日全愈

一方猪油二兩潮腦一兩白蠟黃蠟各七錢五

分輕粉一錢麝香冰片各三分無乳香沒藥鉛

瘍醫大全 卷三十七 杖瘡方 十 顧氏秘書

粉

杖瘡爛下肉至重者 都門內官傳

木耳水泡搗爛敷在爛處止痛生肌

鬼代丹

受杖不痛故名

無名異 木鱉子去殼油 自然銅火煨醋淬

地龍去土 乳香去油 沒藥去油

草烏各等分地上挖一小土坑用炭火燒紅澆醋在坑內入草烏蒸軟一方無草烏

為末蜜丸彈子大每服一丸溫酒化下 凡用

此丸可先用出過蟻的蚕繭子燒灰二錢為末
酒調下再服此丸如服過此丸不曾遇責可用
牛膝甘草煎湯服之即解
乳香散

杖瘡神效

全當歸 自然銅醋淬七次 苗香四錢

滴乳香去油 真沒藥去油各三錢

研細每服五錢溫酒調下

寄杖散 醫鑿

瘍醫大全 卷三十七 杖瘡方 十一 顧氏秘書

未打之先取白蠟一兩細切入碗內滾酒泡服則

雖打着不痛

杖傷 公門秘方

久爛中有四五分深潭不能收口者

血竭錢一 硃丹 輕粉各二錢

白蠟錢五

共為細末搽上一日夜其肉四圍生起兩日即

平

又方

杖後腫痛

雄黃一兩 密陀僧五錢

研細水調敷極妙

杖後

白芨研細每日米飲調下三錢數日即愈

仙傳膏

杖後重傷死血鬱結呃逆不食並夾傷內爛貼之可以起死回生

輕粉 血竭各三錢 樟腦二錢

湯醫大全

卷三十七

杖瘡方

志

顧氏秘書

冰片三分 麝香一分 沒藥去油

乳香去油各一錢五分

共研極細用猪板油一兩二錢黃蠟一兩同化調藥成膏攤貼患處晝夜流水即時甦醒

又方

滑石大黃赤石脂各等分研細蜜調敷

又方

梧桐樹根晒燥炒黃研細重者一錢輕者五分好

酒冲服

湯潑火瘡



湯醫大全

卷三十七

湯火論

志

顧氏秘書

湯潑火傷門主論

申斗垣曰火之為用性最猛烈萬物頃刻成灰何況人之皮肉經此灼燔皮焦肉捲苦痛難熬輕則成瘡重則致死百計千方難免其苦特選奇方以救湯火中傷之苦 啟玄

又曰滾湯沸油熱粥失悞常遭其害令人皮濕肉爛又曰每見貧苦烤火禦寒熾令火氣入肉成瘡作痛出汁宜製栢散加蘇薄荷末搽之

陳實功曰但凡水火之氣當分其勢而利導之切不可

可驟用冷汁淋漓涼藥塗敷熱毒得冷更深入骨
難瘥設令寒涼一逼火毒歸心殺人更速 正宗

又曰此患原無內症皆從外來也有湯火熱極逼毒
內攻又有外傷寒涼激毒入極外皮損爛者以清
涼膏等藥塗之如毒氣入內煩躁口乾二便秘澀
者下之炮破珍珠散搽之 正宗

錢青榆曰湯火傷飲冷水者必死浸冷水中必爛至
骨 丹方

澄曰凡被火傷悶絕者急用輪迴酒或童便灌之或

傷醫大全

卷三十七 湯火論

十一

顧氏秘書

溫水和蜜灌之甚則以酒盪熱入浴缸內令被傷
人浸酒中極重不死

若發熱作渴小便赤澀用四物湯加連翹梔子甘草
滋陰養血以消其毒

若傷處死肉而不作痛者用四君子湯加當歸川芎
連翹健其脾胃以消其毒

若傷處死肉不潰用八珍湯加白芷補氣排膿如不
應加肉桂如不斂用四君子湯加當歸川芎黃芪
健脾養胃生肌不應加炮薑

若小兒被傷目曉頭搖用四君子湯加當歸川芎山
梔健脾胃清肝火

若食後被傷腹脹作痛用四君子湯加山梔神麴山
查壯脾胃以消之此乃規矩準繩不可更張至誤
也

醫鑑曰凡被回祿烟薰致死者白蘿蔔搗汁灌之即
甦以其辛能散氣也

澄曰凡被火傷之人宜用羌活一兩煎服俾火毒得
汗外泄庶免內攻

傷醫大全

卷三十七 湯火論

十二

顧氏秘書

湯潑火傷門主方

雷真君逐火丹 秘錄

治無意之中忽為湯火所傷遍身潰爛與鬼為隣服之可以變死而生

當歸 四兩 白茯苓 黃芪 各三兩

大黃 製 生甘草 各五錢 荆芥穗 炒黑

黃芩 防風 各三錢

水煎服一劑痛減半二劑痛全減三劑瘡口全愈此至聖至神之方也

傷醫大全

卷三十七 湯火方

主 顧氏秘書

又方

蛤蜊殼火煨研細麻油調如稀糊以鴨翎掃上如冰至重者二三遍全愈疤痕全無忌酒如喫酒必作癢抓破有痕

又方

用煮熟雞蛋黃炒出油來調竹蛀虫屑搽之

火瘡疼不可忍

生大黃 黃連 黃柏

黃芩 白芨 各等分

研細末麻油調搽

又方

先以好酒洗之再以鹽敷則護肉不壞如皮塌者以酒熬牛皮膠敷之如遍體傷者用好酒滿浸溫則易之可保火燒不死

又方

菜油一碗浸一刻即不疼兩三日便褪皮如不便浸頻頻塗之

又方

傷醫大全

卷三十七 湯火方

主 顧氏秘書

先以糯米漿雞翎掃上後用劉寄奴研末搽上止痛且無疤痕

又方

陳年白螺螄殼煨研入輕粉和研濕則乾搽不破清油調搽

又方

白芝麻殼燒存性研細敷之若患處乾燥則以麻油調搽

又方

丹參半觔 羊油二觔

煎三五沸濾清塗之

又方

菜豆粉

榆皮麩

輕粉各等分

研細麻油調搽濕則乾摻

又方

先用臘酒冷洗以拔其毒再用煮熟鷄蛋十餘枚

去白取黃炒焦黑取油一盞調生大黃細末二兩

搽之

瘍醫大全

卷三十七 湯火方

顧氏秘書

又方

當歸炒

生大黃炒各等分

研細用麻油或蠟燭油調搽

又方

白蠟三兩

膽黃一兩五錢

用磁碗一個生薑擦過黃土和泥塗之碗不能

碎放火上將蠟熔化膽黃搥如豆大全熬如炭

形為度將膽黃棟去蠟熬如鵝黃色然後加麻

油三觔煎勻收貯搽之

麻黃膏

雄猪油四兩

斑一貓三個

草麻子

去殼研極細一百粒

麻黃五錢

大楓子去殼研一百粒

先將猪油化開下班猫煎數沸隨去班猫再下

麻黃煎枯濾去渣將大楓子草麻子和勻聽搽

又方

大黃

朴硝各等分

菜油調搽取肉得鹹則堅實且解熱毒也

湯火傷已發泡者解熱毒為主

瘍醫大全

卷三十七 湯火方

顧氏秘書

蛤蜊殼煨

蚌殼灰

生石膏

大黃各等分

研細香油調搽取其寒勝熱也

湯泡火傷並治牲口燒傷敷上須臾水出流水則吉

反此為齒

榆樹根白皮研細一兩飛丹二錢和勻并華水調

敷或涼水敷之

又方

細茶

小麥各等分

共炒黑色存性研細末濕則乾摻乾則用麻油調搽

又方

風化石灰入水攪勻澄清加麻油約油三灰水七為率攪勻雞翎掃上

黃栢散

黃栢一大塊以生豬胰塗炙酥為末麻油調搽

火燒悶絕並治狼烟煤炭毒

輕則白蘿蔔汁灌之重則以熱尿灌之

湯醫大全

卷三十七 湯火方

毒

顧氏秘書

火傷並火藥傷

煤炭燒紅搗末醋調塗

湯火傷未起泡者

醬敷

又方

麩糊塗良

又方

鹽汁浸

湯火傷泡已破者當收濕解毒生肌為主

榆樹皮根研細麻油調敷

又方

石膏研細桐油調敷痛即止熱即退

又方

熟石膏東丹研勻摻之

又方

銀杏研末摻之

又方

西瓜皮入磁罍內埋土內化水搽之

湯醫大全

卷三十七 湯火方

毒

顧氏秘書

又方

冷燒酒淋洗止痛

又方

線香嚼碎敷之

又方

秋葵花浸麻油塗

又方

地榆研細麻油調搽或榆白皮末豬油調搽

又方

醃菜葉貼之或鹹菜滴浸之

又方

石膏生桐油調搽

又方

鹽酒浸之

又方

生大黃末雞蛋清或砂糖桐油蜜醋俱可調敷

又方

風化石灰雪水調搽

又方

傷醫大全 卷三十七 湯火方

美 顧氏秘書

白頸蚯蚓糞煨存性蘇油調搽

又方

搥猪毛煨灰香油調搽

又方

扁栢葉焙研蘇油調搽

又方

猪板油加乾麵搗搽

又方

泥漿加鹽醋塗之

又方

柏子樹皮研末蘇油調搽

又方

鹽擦

又方

生大黃研細蘇油調搽立刻止痛不起泡

又方

絲瓜葉搗爛敷上一日即好

又方

傷醫大全 卷三十七 湯火方

美 顧氏秘書

糯米粉炒黑酒調敷熱酒煨傷神效或菜汁調

又方

陳麩糊敷滾油燙傷神效

又方

大麥炒黑研細用粥沫調搽即刻止痛蘇油調亦

可

又方

麩皮炒黑研末敷

又方

臘月猪膽汁塗黃柏炙乾為末敷之

又方

螃蟬殼燒灰麻油調搽

又方

取雄雞宰熱血淋瘡上隨淋隨效

又方

生大黃切片浸麻油搽愈陳愈效

又方

傷醫大全 卷三十七 湯火方

夫

顧氏秘書

扁柏葉同冷濃茶搗爛敷

保生救苦丹

治火燒熱油燬及一切狗嚙損傷

生寒水石 不拘多少

研細油調塗之其痛立止

滾粥燬傷

錫箔通貼神效如受傷重者可喫溫香油一鍾

湯火傷

槐花炒研末油調搽立時止痛

又方

爛茶葉敷

湯火傷爛見骨者 丹方

百草霜 三錢 輕粉 一錢五分

乳細麻油調搽

玄妙飲

川黃連

天花粉

玄參 各二錢

桔梗

陳皮

黑山梔 各一錢五分

淡竹葉三十片水煎服如藥不便只用好酒溫

傷醫大全 卷三十七 湯火方

夫

顧氏秘書

洗拔其熱毒內服童便以護其心使火毒不內

攻隨取大黃末桐油調敷即垂危者皆保無恙

秘方

劉寄奴研為細末桐油或菜油調敷其泡立消其

痛立止頃刻結腐神驗

又方

元服殼燒灰為末真桐油調塗數次即愈

又方

生蘿蔔搗爛敷之甚效

火燒爛神方 周鶴仙

狗骨煨成灰為細末麻油調敷神效無比

燒爛神方

鉄銹花磨水塗之神效

又方

大黃二兩 貫仲 黃栢各一兩

共研細末用煮熟雞蛋黃數枚入鍋內炒出油調敷三五日全好無疤

湯潑

湯醫大全 卷三十七 湯火方 羊 顧氏秘書

老松皮 去外粗皮 去裡青皮 生大黃 各等分

研細末生桐油調如稀糊掃上即出熱氣隨手其泡自消

湯火傷

狗油熬老敷患上隨乾隨敷

又方

臘脂濕冷水貼患處貼後水乾即以涼水滴臘脂上立即止痛不起泡

火燒

人糞瓦上焙枯黑為末香油調搽

火燒滾湯起泡

陳蕎麥麵打糊裱上立止疼痛結廝

火燒湯潑粥盪油盪奇方 程懷書

平日泡過茶的茶葉剩下的茶脚不拘甚的粗細茶葉用瓦壘一個放朝北地上日逐裝在壘內聚之已滿用大磚一塊蓋好須得一年用之方妙愈陳愈好凡遇上症不問已潰未潰搽上即定痛結疤第一驗方

湯醫大全 卷三十七 湯火方 羊 顧氏秘書

湯火所灼

煖灰水和敷並用灰汁洗

又方

黍米炒黑 女麩炒黑各等分

研末雞蛋白和塗

又方

柳樹白皮切細全猪油熬塗

又方

栢樹白皮切細全猪油熬塗

又方

小便清洗

又方

苦酒和雄黃塗

湯火灼已成瘡

白蜜塗上取竹膜貼之

又方

雞蛋白塗

又方

湯醫大全

卷三十七 湯火方

三

顧氏秘書

豆醬汁塗

又方

柳樹皮燒灰敷

又方

猪油和米粉敷

又方

狗毛碎剪炸皮膠和之遍封傷上結痂自落

又方

新熟牛糞塗

又方

石膏細末搽之

又方

白蘇末搽

又方

陳石灰水和敷乾則換敷

滾湯煎膏所傷潰爛

丹參切細羊油熬膏敷

又方

湯醫大全

卷三十七 湯火方

三

顧氏秘書

搗生芝麻如泥厚敷

又方

地榆末全雞蛋清調搽

又方

新牛糞和雞蛋清塗止痛不爛

湯火傷

生梨搗碎敷

又方

猪油

生大黃

頭髮

全熬濾清候冷塗上

又方

絲瓜葉陰乾為末麻油或菜油調搽

湯火燙

汪樹峰云余幼時誤墜烈火中半體皆傷諸治不效後得此方始愈以厚酬始獲此方

平時收老黃瓜不拘多少覓厚實磁瓶收貯藏暗

濕處自爛為水塗傷處立時止痛即不起泡

又方

狗血塗

又方

湯醫大全

卷三十七 湯火方

畫

顧氏秘書

油餛子燒存性研極細末入真香油在乳鉢內研

糊塗

爆竹炸傷

急取鮮栢枝搗和香油調敷

湯火傷

王御臣

傷時人皆倉皇無主切不可用冷水澆洗如一時

敷藥不便先飲童便一碗或生蘿蔔汁一碗後用

雞蛋數個每個打一孔瀝取蛋清入碗內用筋攪

成清水用雞毛蘸掃傷處每次掃六回每日掃六

次止痛消腫退熱生肌無痕

又方

陳石灰

新者亦可

不拘多少泡水中候灰澄底取水和小磨麻油

攪勻似蛋清一樣以雞翎掃患處外用兔毛貼

上若乾後沾實則不必揭動如不沾再掃貼

又方

熟鵝蛋黃置銀石器中熬油調胡椒粉搽

又方

湯醫大全

卷三十七

湯火方

畫

顧氏秘書

楊梅樹皮及根燒存性香油調敷

又方

冬月收頭一次雪水至夏月拾西瓜皮泡雪水內

封貯臨用頻洗傷處其效猶速

又方

梨切片貼止痛不爛

火燒

鱉甲燒灰香油調搽

又方

西瓜皮焙為末雞蛋清調搽

神仙一把抓

治湯火燒並杖瘡

黃丹一兩 潮腦五錢

為末以蜜調勻塗患處立刻止疼好後無痕

傷醫大全

卷三十七

湯火方

美

顧氏秘書

金瘡門主論

陳實功曰大凡金瘡出血不止若素怯弱者當補氣若素有熱者當補血若因怒當平肝若煩渴昏憤當補脾氣若筋攣搐搦當養肝血若投藥不應當用地黃湯以滋腎水忌見風及服止血傷筋等味其人若渴務要忍着宜進乾燥並肥膩等物以止渴切不可食鹹過飲漿水稀粥凡犯之則血動溢出殺人如喜怒憂愁大言狂笑思想房勞暴躁勞碌酸鹹糟油熱羹一槩禁忌雖愈仍忌可服黃芪

傷醫大全

卷三十七

金瘡論

美

顧氏秘書

六一散八味地黃丸可保無虞 正宗

程山齡曰刀刃或磁鋒割損淺者皮破血流而已深者筋斷血飛不住皮破者福緣散摻之止血定痛筋斷者天下第一金瘡藥敷之筋骨俱斷其人面色必黃外避風寒內忌冷物如失血過多者獨參湯八珍湯補之此外別無他法 十法

脉經云金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死金瘡出血脉沉小者生浮大者死 斫瘡出血一二石脉來大者二十日死 斫刺出血不止者

其脉止脉來大者七日死滑細者生如脉病不相應故死

病源云金瘡腸斷者視病淺深各有生死腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日半死小腸三日死腸兩頭見者可連續之先以針線如法連續之斷腸便取雞冠血塗其際勿令氣泄即推納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以漬納之且作粥清稍飲之二十餘日乃喫糜粥百日後乃可進粥

瘍醫大全

卷三十七

金瘡論

三

顧氏秘書

靈惠云金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不得令飲粥則血溢出殺人也又忌嗔怒及大言笑動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹葷皆使瘡痛衝發甚者即死

聖惠云凡金瘡傷天窓^穴眉角腦後臂裡跳脉髀內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五臟六腑命皆死處又破腦出髓而不能語戴眼直視喉中沸聲口中唾出兩手妄舉者俱不可治

得效云金瘡出血虛細則宜實大則傾

又云傷雖淺命脉虛促可慮傷至重命脉和緩永無慮也血出甚者脉不要洪大只要平正重寶

又云肚破腸出在外若腸全斷難醫不斷者可治腸及肚皮破者麻縷爲綿或桑白皮尖葺爲線以花蓋石散敷線上從裏縫之腸子則以清油燃活放入肚內乃縫肚皮不可縫外重皮留皮開用藥糝待生肉

又云傷破肚皮腸與脂膏俱出先用湯藥如活血散佛手散與服用手擘去膏不妨此是閑肉放心去

瘍醫大全

卷三十七

金瘡論

三

顧氏秘書

之然後推腸入內用線縫之仍用通利藥勿令二便秘澀

正傳云大凡金瘡及折傷墜墮內損者必有瘀血停積先宜逐去瘀血若亡血過多則調養氣血爲主花蓋石散奪命散雞鳴散導滯散破血消痛湯復元活血湯皆可選用

金瘡門主方

天下第一金瘡藥 程山齡

治刀斧傷損並跌撲打碎敷上立時止血定痛
更不作膿勝於他藥多矣

雄猪油 一筋四兩 黃蠟 松香 各六兩

乳香 箬烘去油 沒藥 箬烘去油 血竭

兒茶 各一兩 銀粉 炒篩四兩 樟冰 三兩研極細

冰片 麝香 各六分

以上藥研極細先將猪油松香黃蠟三味熬化

湯醫大全 卷三十七 金瘡方 聖 顧氏秘書

濾去渣待冷再入藥末攪勻磁器收貯不可洩

氣

又方 徐元昇

老松香不拘多少將淡河水滿鍋滾透煮之撈起
扯拔浸冷換水又煮又扯如此九遍煮去苦水復
用銅鍋融化傾入冷水中不必扯拔待冷又化如
此三次揀淨松香十兩加去淨油乳香沒藥各一
兩研細和勻敷傷處用絹帛縛緊能止血止痛續
筋生肌不膿不潰跌打破損亦效忌生酒鮮魚豆

腐糟菜

又方

魚膠洗淨用麻布包煮爛隔布絞出乘熱加乳香
沒藥去淨油各二錢銀粉六分共搗勻取青布一
幅用針釘在新板上將竹刀刮藥攤在布上候乾
收貯量傷處大小將藥布入滾水泡軟移攤青絹
上貼傷處止血止痛如將愈之際有一眼仍以前
藥泡軟納瘡眼中即斂口矣

金瘡並陽症腫毒

湯醫大全 卷三十七 金瘡方 聖 顧氏秘書

用大粉草入去青竹管中油灰寒 竹管孔立冬日
放糞缸內立春先一日取起豎立陰乾破竹取甘
草研細金瘡乾者水調敷濕則乾溻熱毒疫毒內
服均妙 即人中黃也

又方

白松香研細將傷口用手擠合厚厚敷之布紮緊
不怕風不怕水旬日即瘥

又方

鉛粉 乳香 去油 風化石灰

沒藥去油各一兩 枯礬三錢

研細摻之

又方

元眼核剝去外面黑漆皮陰陽瓦煨研細末乾摻之
奇驗

又方

蘇木煎湯童便冲服

又方

茜草根煎湯童便冲服

又方

傷醫大全

卷三十七 金瘡方

聖

顧氏秘書

澤蘭葉煎湯童便冲服

又方

紅花煎汁童便冲服

又方

真白龍骨研細摻之血即止

又方

海螵蛸研細摻之血立止

又方

金毛狗脊毛毳傷上

又方

不拘新舊蠶綿絲綢以及舊氈帽俱可燒灰搽之

又方

晚蚕砂為末摻之外以絹條束緊止血生肌

又方

多年戴油舊氈帽邊煨灰摻之或搽亦可

又方

白芍藥一兩炒黃研細末酒調服二錢止痛

又方

傷醫大全

卷三十七 金瘡方

聖

顧氏秘書

白蠟研末填滿傷處布帛裹定二三日即愈

又方

寒水石研末敷之止痛最速

又方

生五倍子為末乾摻血出不止者神效

又方

桑樹皮中白汁塗傷處止血

又方

蘆子嚼爛敷上其血立止且無他患跌破更效

又方

乾蓮蓬焙末搽

又方

烏木篔研末搽

又方

獨設大栗研乾末搽

又方

紅絨煨灰摻

又方

傷暑木全

卷三十七

金瘡方

聖

顧氏秘書

花蕊石研末摻

又方

青石研末摻

又方

半夏研末摻

又方

天南星研末摻

又方

小麥麵乾摻

又方

舊繒帽煨灰同香灰研勻摻

又方

陳石灰同韭菜搗爛陰乾研末摻

又方

百草霜研細摻

又方

初生小鼠同石灰搗勻陰乾摻

又方

傷暑木全

卷三十七

金瘡方

聖

顧氏秘書

血竭末摻之止血生肌

又方

聖惠

原蚕蛾炒研末敷

又方

半夏鬱金風化石灰各等分研末摻上血立止

又方

古墻石灰研末摻

又方

黃丹白礬末摻之血立止

又方

桑葉陰乾研末敷如急用焙乾亦可

又方

劉寄奴為末摻之並治箭傷

又方

驢屎煨存性研末搽之血立止如不及煨即用潮的亦妙

又方

傷醫大全

卷三十七

金瘡方

聖

顧氏秘書

降香節

五倍子 各五錢 廣三七 二錢五分

研極細摻之止血定痛箭傷亦妙

又方

臘月牛膽入風化石灰懸掛風頭避陰處候乾去膽皮將石灰研細敷

又方

五倍子 炒枯

降香節 剉屑炒黑色 各等分

研勻摻傷處紮定

刀傷斷指臂者俱可接整

降香燒未過者六兩荔枝核炒四兩

先將傷斷處接端正取絕細末香油調敷數日後骨肉完全如故

金瘡並磕損折傷血出疼痛不止者

葱白 砂糖 各等分

研勻封之其痛立止更無疤痕

刀傷折傷葱熨法

先飲童便酒後用葱炒搗爛乘熱包縛傷上冷則易之

傷醫大全

卷三十七

金瘡方

聖

顧氏秘書

金瘡毒刺疼不可忍

葱一大把水三升煮數沸漬洗傷上即止

金瘡久不收口

出過雞的蛋殼內嫩皮連血陰陽瓦焙黃研末麻油調搽濕則乾摻

金瘡跌打瘀血內攻腹脹

劉寄奴 延胡索

骨碎補 去毛淨 各三錢

水煎加童便冲服

刀斧砍斷筋

金錢花葉莖根去土淨搗自然汁滴瘡口中以搗敷上不過半月斷筋自續

刀斧斫傷以及跌破頭顱者

霜降後三日取雞冠花葉洗淨入滾水內掇過撈

起青布包過夜次早用線穿掛無烟薰日色之處

陰乾刷去灰塵研末加冰片少許密貯乾摻

五金所傷並竹木刺誤犯人神所在之處流血不止

上身被傷流血不止急以銀一錠燒紅烙傷處如

下身被傷流血不止急以鉄一塊燒紅烙傷處其

傷醫大全 卷三十七 金瘡方 聖 顧氏秘書

血立止此急救良方也

刀斧傷甚

直降香磁鋒刮下研極細末摻上次日結靨如鉄

又方

騰 黃 錢 研碎 五 白 蠟 一 兩

入麻油化膏冷定搽之

又方

多年陳石灰一觔生大黃一兩炒黃色除去大黃

只用石灰研細摻傷上布紮自效

又方 欒 玄

真廣三七煎湯洗之其血立止

又方 聖 惠

白膠香 白 芷 老松皮

血 竭

研細末敷之

又方 聖 惠

黃 丹 滑 石

研末敷之夏月以薄荷葉貼之一日一次以藥

傷醫大全 卷三十七 金瘡方 聖 顧氏秘書

水湯洗自效

金瘡傷至重者 得 效

海味中鹹白鱉成片鋪在傷處以帛紮定血立止

下蚕室瘡不合 入 門

取所割勢火煨爲末酒調服 昔有一人自割其勢 瘡久不合用此方不

數日而愈

金瘡及諸傷重痛悶欲死 入 門

取牛一隻剖腹納其人於牛腹浸熱血中可甦如

傷版用血竭末醋湯調飲出血而愈或戰陣砲矢

所傷血流滿體氣貫膈悶絕者亦甦
傷重暈絕不省人 丹心

熱尿多灌卽甦童尿尤妙

活血散 入門

治刀鎗傷腹裂腸出者

當歸 川芎 黃芪

白芷 續斷 赤芍

鹿茸 細辛 黃芩

附子 各等分

傷醫大全 卷三十七 金瘡方 李 顧氏秘書

研末每三錢酒調服日三立驗

花蕊石散

治一切金刃斫傷及打撲損傷牛馬咬踢或至

死者急於傷處摻藥其血化為黃水再服藥便

活更不疼痛如臟腑有瘀血內損煩悶欲死服

此藥則化為黃水或吐出或下泄出

花蕊石 四兩 硫黃 一兩

為末入瓦罐內鹽泥固濟晒乾安四方磚上以

炭火從巳午時煨至經宿候冷取出研細每服

一匙童便入酒煎熱調服
奪命散 得效

治金刀所傷及從高墮落木石壓損瘀血瘀積

心腹疼痛二便不通

水 蛭 石 灰 拌 炒 大 黃 黑 牽 牛 頭 末 各 二 兩

右為末每取二錢熱酒調下過數時無效再用

一服下惡血

導滯湯 聖惠

治金刀跌撲大便不通壅鬱欲死

傷醫大全 卷三十七 金瘡方 李 顧氏秘書

大 黃 一 兩 當 歸 二 錢 五 麝 香 少 許

為末每服三錢酒調服

金傷散 鄉藥

治一切金瘡

重午日早朝使四人各出四方採草木莖葉各半

把至午時入石灰一筋全搗極爛鑿大桑木三兩

株作孔納藥實築以桑皮蔽之油調石灰密塗之

勿令泄氣更以桑皮填固至九月九日午時取出

陰乾百日搗羅為末如遇傷慘之神效

刀傷

銅匠銼下黃銅細末乳細摻之立合

金瘡出血 採醫書

龍骨 煨二錢 乳香 去油各三錢

白礬 半生半 無名異 各一兩 五倍子 半生半 焙

共為末乾摻不作膿不怕風立時止血住痛生肌

肌

金瘡神方 周鶴仙

松香 去油如油去不盡反將用新磚二塊火內燒極熱上下多攪將松香入在中間壓

湯醫大全

卷三十七 金瘡方 三 顧氏秘書

生半夏 各等分

研極細末搽之有力者宜預合濟世神驗無比

又方

真降香 切片火上 荔枝核 血竭 各等分

為極細末敷患處即刻止痛作癢不三日全愈

雖斷指亦能續也神驗

又方

荔枝核燒灰存性為細末填傷口一夜即平復

又方

揀淨刺下黑頭髮數筋洗淨油膩搥乾將鮮竹筒

取一段打空一節將髮裝入築極緊用木塞口黃

泥封放於微火灰內煨一夜存性打開髮成粉矣

收貯磁瓶內遇刀傷敷之神驗之極

又方

端午午時採苧麻葉陰乾揉成絨罽上即定痛止

血

刀斫斧傷肉落

湯醫大全

卷三十七 金瘡方 三 顧氏秘書

人指甲陰陽瓦焙研細末密貯凡遇斫傷將末摻

上以肉合上急用扇子急力搨之即合 若傷口深

刀傷

琥珀末摻之

又方

一人因劈裂瓜甲指拇索金瘡藥裹之其痛不止

急取葱白入糠火煨熱剝皮劈開其中有涎如涕

取搽損處仍多煨取接續易搽凡三易之血止痛

消並不潰良方也

刀傷湯火跌打斷筋損骨

麻

油熬老冬月用油七兩五錢夏月用油五兩一錢入白蠟一兩膽黃

五錢不住手攪成餅塗搽

刀傷

熊膽和水調搽傷處立刻止血定痛不作膿

小兒刀破手

鍋蓋屑刮下搽

刀傷

瘍醫大全

卷三十七

金瘡方

五

顧氏秘書

圖書店滑石末搽之

又方

生大黃炒黑研細搽

又方

堅實細炭

老松香 各等分

研細用韭菜汁拌陰乾再研細搽之如急用則

不用韭汁拌亦效

夾剪斷指

蟬蛛窩纏指上包煖即好

刀斧傷並跌打流血不止

何首烏研細搽上使血歸經

金瘡跌打止血定痛

乾荷葉研末擦即能生肌

刀傷雖數日作膿亦效

老松香 川大黃各一錢

共研細末乾搽

瘍醫大全

卷三十七

金瘡方

五

顧氏秘書

弓箭鳥鎗傷門主方

弓傷全睛突出並治打傷眼珠腫痛

急以手探入勿見風取精猪肉切薄片攤在熱鉢

上候肉熱急貼傷處冷則更換

箭頭入肉

蠅 十個去殼 土 狗 三個 婦人髮 灰 少

全研如泥厚塗之以兩手感之箭頭自出

箭傷

三七根三錢好酒煎露一宿服即愈

湯醫大全

卷三十七 弓箭鳥鎗傷方 葉 顧氏秘書

中毒箭

急飲麻油數碗其毒自解

中毒箭

藍汁一升飲之並淋傷上若無藍汁以青布漬水

絞汁飲並淋傷上

針刀箭鏃折在肉裏

杏仁嚼細塗之

針刀箭鏃折在肉裡

象牙屑和水敷之

針刀箭鏃折在肉裡

瓜萸根搗爛敷之每日三易

箭頭入肉

推糞蠅螂一個搗如泥煎湯頻洗傷處自出

箭頭入肉

陳臘肉 去皮骨 人指甲 象牙 各二錢

研細入臘肉內搗勻敷四圍即出

鉛子入肉

水銀灌入傷處其鉛即化從傷處隨水銀流出

湯醫大全

卷三十七 弓箭鳥鎗傷方 葉 顧氏

箭傷

劉寄奴研末摻之

箭鏃及金刃中骨脉不出 入門

白 蘇 半 夏 各等分

右為末每用淡姜湯調服一錢日三至二十日

自出

又方 聖惠

螻蛄取汁塗其上自出

又方 聖惠

鼠腦塗其上自出

又方 聖惠

好磁石着其上自出

又方

搗鼠肝或鼠腦塗之即出

鉛子入肉 吳天序

用麩和成作團圍受傷處以白苧菜搗爛納團內

不過三四次鉛子即出或蜂蜜冲酒飲醉亦出

毒箭

瘍醫大全

卷三十七 針灸醫方

彙

顧氏秘

煮藕汁飲

又方

搗生葛根汁飲之

又方

雄黃研敷

箭穿耳並割耳

熱馬糞敷上止痛

箭傷

婦人月經或月經布塗傷處

針入肉門主方

驗方

搗推屎蟻螂敷之自出

又方

螻蛄腦子全硫黃研細調敷以棉紙貼定如覺癢

時其針自出內服棗仁末三錢白湯調下

又方

象牙末水調敷即出

又方

瘍醫大全

卷三十七 針入肉方

彙

顧氏秘書

煮臘肉熟皮貼上其針即出

針悞入肉無眼者不動有眼者隨氣血遊走若走向

心窩胸膛者險

急用烏鴉翎數莖炙焦黃色研細末酒調服一二

錢俱可

如聖膏

治針入肉

車脂輦油不拘多少研如膏調磁石細末攤紙上

如錢許貼之每日換二次

醫家用針將針折在病人肉內
鼠腦研如膏塗之即出



醫醫大全

卷三十七

針入肉方

李

顧氏秘書

竹木刺門主方

竹木刺入肉

收晚蚕蛾入竹管內塞之凡遇竹木刺截入肉內
即取蚕蛾研細和津唾調塗之即出

又方

刮指甲末同紅棗肉搗爛塗之

又方

象牙末磨濃汁滴之良久自出

又方

醫醫大全

卷三十七

竹木刺方

李

顧氏秘書

螻蛄搗爛塗之自出如刺已出肉痛甚者亦效

又方

白茅根搗敷立出

又方

嚼牛膝根敷之自出

又方

烏羊糞搗爛水調厚敷之自出

又方

頭垢敷之即出

花蕊石散

治刺入肉日久血瘀腫脹

花蕊石 八兩 硫黃 四兩

研極勻瓦罐盛之封口鹽泥固濟晒乾安風爐內上下着火煉兩炷香為度候冷打開研細收貯此乃散瘀血之神藥也

凡竹木刺咽喉中

舊象牙梳取屑研細水調服

蘆葦刺入肉

瘍醫大全

卷三十七 竹木刺方

李

顧氏秘書

生栗子細嚼爛敷之

又方

鹿骨煨存性水調敷雖日久不過兩次即出

又方

羊糞燥者燒灰和脂塗之刺若未出再敷之

又方

搗烏梅水和塗刺上立出

又方

莧菜搗爛敷患處外以布裹定即化

又方

牛膝根莖合搗以敷之即出縱瘡合口其刺猶出

又方

煮瞿麥汁飲之日三立出

又方

溫小便漬之

又方

酸棗核燒研服之瘥

又方

瘍醫大全

卷三十七 竹木刺方

李

顧氏秘書

白茅根燒末以膏和塗之亦主諸瘡因風發腫

狐刺瘡門主論

申斗垣曰狐刺瘡是竹木刺簽傷皮肉或手足而成痛不可忍有雌雄二種當分治之雄者只生一箇雌者生有五七箇瘡內皆有亂絲瘡外必然有刺者是也 敬玄

大成書名狐狸刺 蓋螻螂又名野狐鼻涕故名

外臺總錄二書名狐尿刺

心法曰狐尿刺由螻螂盛暑交媾精汁染於竹木諸

物乾久有毒人手足誤觸之則成此患初起紅紫

癩醫大全 卷三十七 狐刺瘡論 杏 顧氏秘傳

斑點肌膚乾燥悶腫焮痛不眠十日後腐開瘡口

自寬宜服黃連解毒湯外以蒲公英連根濃煎溫

洗之若有鮮者搗汁厚塗患處更佳

狐刺瘡門主方

驗方 敬玄

桑柴灰 輕粉等分

研勻乾罨患上以米醋澆之頻換立愈

鐵棘竹木諸刺在肉內不出並蛇骨刺人毒痛

死老鼠煨研敷之

癩醫大全 卷三十七 狐刺瘡方 杏 顧氏秘傳

傷水瘡門主方

凡竹木刺破皮膚或魚刺諸骨傷損之後誤犯生水
疼痛潰爛名傷水瘡

五倍子 蛤粉 黃丹 各等分
全炒變色研細乾摻

傷醫大全

卷三十七

傷水瘡方

李

顧氏秘書

救自刎門主論

斷食類者可治斷氣類者難治

全要知覺早急急將頭扶住乘其氣未絕額未冷用

絲線縫合刀口將活雄鷄一二隻扯下熱雞皮則

無週圍纏護刀口用軟絹帛並棉花紮之外將女

人舊裹脚週圍再纏五六轉勿使洩氣其中自然

合而為一令刎者仰臥以高枕枕住腦後使刀口

不開須要避風衣被蓋煖若氣從口鼻通出用白

米一合入人參一錢生薑三片全煎粥湯飲之接

傷醫大全

卷三十七

救自刎論

李

顧氏秘書

補元氣再請明醫診視

凡自刎喉管不斷者不可見水急用麻線縫之外以

血竭細末罨之隨用天下第一金瘡藥厚塗之綿

紙蓋定然後用狹裹脚布纏住以綿紮之間日加

敷藥頭不可動搯十日全愈 程山齡

自刎者乃迅速之變須救在早遲則額冷氣絕必難

救矣初刎時氣未絕身未冷急用絲線縫合刀口

摻上桃花散多摻為要急以綿紙四五層蓋刀口

藥上以女人舊布裹脚將頭擡起周圍纏繞五六

轉裝之患者仰臥以高枕枕在腦後使項鬱而不直刀口不開冬夏避風衣被覆煖待患者氣從口鼻通出以姜五片人參二錢川米一合煎湯或稀粥每日隨便食之接補元氣三日後急手解去前藥用桃花散摻刀口上仍急纏紮紮二日急用濃葱湯軟絹蘸洗傷處把乾用抵脚挑玉紅膏放手心上捺化捺於傷口處再用舊綿花薄片蓋之外用長黑膏貼鬚周圍交紮不脫近喉刀口兩傍再用黑膏長四寸濶二寸豎在膏上兩頭貼粘好肉

易醫大全 卷三十七 救自刎論 李 顧氏秘書

庶不脫落外再用絹條圍裹三轉針線縫頭冬月三日夏月二日每用葱湯洗把換藥自然再不疼痛其肉漸從兩頭長合內服八珍湯調理月餘如大便結燥用猪膽套法不可用利藥利之雙額俱斷者百日單額斷者四十日必收功完口此法曾治強盜郭忠皂隸沙萬家人顛興俱雙額齊斷將危者用之全活單額傷斷者十餘人治之俱保無虞矣


又曰降香末或松香末摻之神效

救自縊門主論

急用衣物緊塞穀道前後抱起解繩安放平正揪髮向上揉其項痕捻圓喉管脚踏兩肩以兩管吹氣入耳內或刺雞冠熱血滴口中男用雌女用雄鼻即氣轉再屈伸其手足將手摩之使氣血得流通再以皂角末吹鼻切不可割斷繩索雖早至暮身冷猶活

一法抱下徐解繩索用好肉桂三錢煎湯灌之

雷直君活人錄云岐天師救五絕神法五絕者乃縊死跌死壓死淹死壓死是也世人禍存倉猝往往不救然此等之死五臟未絕因外來之禍而在死者也其魂魄守於屍傍相去未遠苟以神術招之魂魄即附體而生也神符一道先書黃紙上焚化在熱黃酒內燒開牙關灌入喉中後再用救絕仙丹黃酒調勻以人口含藥水用葱管送於死人口內少頃即活

招魂符式 

無咒但書符時一心對

雷真君天醫使者 書之自然靈應無比

救絕仙丹方

人參 半 夏 各三錢 山羊血

石菖蒲 製蘇葉 各二錢 紅花

麝香 皂角刺 各一錢

共為末蜜丸龍眼核大酒化開用修合時宜端午日妙如臨時旋合不必如許之多十分之一可也此方神奇之極閒時修合一料大可救人若臨期緩不濟事此方不特救五絕凡有邪祟昏迷一時

癆醫大全 卷三十七 救自縊論 三 顧氏秘書

卒倒者皆可灌之以起死回生也 秘錄

縊死切忌刀剪斷繩急令抱住以膝頂住陰戶穀道

解下雞冠血滴鼻中筆管吹耳即活

一切暴死用生半夏末吹鼻中即活

王今樵曰凡係有人縊死其宅內及縊死之處往往有相從而縊及縊之非一人者俗謂之討替身謂已死之鬼迷以自代此種渺茫幻妄惑世誣民之談豈君子所樂聞然書謂子不語怪夫怪僅曰不語則是怪亦世所嘗有非云世絕無怪也吾鄉有

張姓者其家僅足自食夫先臥婦則仍女紅偷兒

乘夜踰垣往竊未敢竟入伺於窗外見牀側一鬼

婦向本婦先嬉後泣拜跪再三本婦睨視數次忽

長歎潸然淚下偷兒心驚專心伺之婦即自理絹

帛仍有不忍即行之狀鬼婦更復再拜祈求本婦

方行自縊偷兒急甚大聲疾呼其夫鼾睡若不聞

偷兒無法以救適簷下有竹竿取從窗櫺中撞擊

鬼婦其夫方覺偷兒呼令急為開門相助解救在

此婦固不自解竟死為何事其夫亦不問呼門為

何人而偷兒亦自忘乎為偷兒矣事後各道其詳

因發牀側之壁視之其中梁畔實有先年自縊繩

頭尚存雖云朽爛非直而其形其跡則仍宛然由

此以觀則世俗所傳亦未盡屬無根之談荒唐之

論矣據故老所示辟除秘法不知出自何典頗有

行之而驗者法於自縊之人尚在懸掛未解時即

於所懸身下暗為記明白方行解下時或即用鐵

器或即用大石鎮而壓之然後於所鎮四面深為

挖取將所鎮土中層層爬視或三五寸或尺許或

癆醫大全 卷三十七 救自縊論 三 顧氏秘書

二三尺於中定有如雞骨及如各骨之物在內取而或棄或焚則可辟除將來不致有再縊之事實為屢試屢驗其理殊不可解但及時即挖則得之淺而易遲則深而難然亦不出八九尺外也雖云幻妄無稽不知何以行之實有可據得毋如聖哲所云天地之大何所不有心知理之所必無安知非情之所必有其始是欺愚故從而筆之即或行之未驗聊以解愚夫愚婦之疑亦未必非拯救自縊之一預道也 虞初新志

易醫大全

卷三十七

救自縊論

十一

顧氏秘書

心法曰若繩痕深者最稱難治

又曰旦而至暮者可治夜到天明者難治

澄曰凡救縊傷須急令人抱住將結解開切勿剪割

斷繩子以手揉其項痕撚圓氣管並按摩胸腹或

用手捫其口鼻或口對着口接氣再令一人以脚

踏其兩肩手挽其髮常令扯急不可使頭抵下又

令一人以膝頭或手厚裘衣服緊繫頂住穀道若

婦女並抵住陰戶勿令泄氣若手脚已經僵直必

須盤曲如僧打坐之狀急以兩管吹其兩耳再研

生半夏末吹入鼻孔以針尖刺鼻下人中穴以艾炙脚心湧泉穴男左女右各三壯男刺雌雞冠血女刺雄雞冠血滴入口中以安心神再以薑湯化蘇合丸灌之如無蘇合丸以濃薑湯灌之其一切救法必待氣從口出呼吸眼開方可散手甦醒後只宜少飲粥湯潤其咽喉不可驟與飯食依此拯救再無不活之理

又曰針刺艾炙及滴雞冠血於口中三法雖 澄 遍採方書而得之者亦曾用之有驗但必須心口尚溫

易醫大全

卷三十七

救自縊論

十一

顧氏秘書

大便未下舌未伸出彼家的係無故自縊並須有親人在傍協同拯救並無威逼磨折情節方可針刺艾炙滴血若事涉嫌疑萬一難救反起訟端又不得不慮及此也幸高明酌用

真野山羊心血二三釐研極細酒灌下即活 普救

救溺水門主論

急倒提出水用牛一頭令橫臥以腹臥牛脊上牽牛緩行令吐出血中之水以老薑擦牙即活口噤者撬開橫一筋於牙間使水得出如無牛以鍋覆地將溺人臍對鍋臍俯臥脚後稍高以手托其頭水出即活或以皂角末用棉紙捲成條通其穀道其水自出大約倒提出水時人硬可救如已綿軟是回過水不能救

傷醫大全

卷三七

救溺論

七

顧氏秘書

用搐鼻通天散吹鼻中得嚏即甦

搐鼻通天散猪牙皂角去皮並一兩

北細辛去葉半夏各五錢共研細末每用一二分吹鼻中

溺水及服金屑者以鴨血灌之

錢青榆曰溺死切忌倒提出水火烘無救用鍋子合

地急將死者臍對鍋臍覆上用入扶牢徐徐推鍋

轉移走筋夾口中出腹中水即活

澄曰凡水溺之人夏天可救冬天難救撈起時切勿

倒控急急將口撬開橫啣筋一隻使可出水以竹

管吹其兩耳研生半夏末吹其鼻孔以皂角末置

管中吹其穀道如係夏月用牛一隻將溺人肚皮

橫覆牛背之上兩邊令人扶住牽牛緩緩行走腹

中之水自然從口中大小便流出再用蘇合丸化

開灌之或生薑汁灌之若無牛以活人仰臥令溺

人如前將肚皮橫覆於活人身上活人將身子微

微動搖水亦可出若一時無牛活人又不肯為即

用拷拷一隻將溺人覆其上亦可

又曰如係冬月急將濕衣解去一面炒鹽用布包熨

臍一面厚鋪被褥取灶內煖草灰多多鋪於被褥

傷醫大全

卷三七

救溺論

七

顧氏秘書

之上令溺者覆臥其上肚下墊以棉枕一個仍以

草灰將遍身覆蓋灰上再加厚被不可把灰暍於

眼內即撬口啣筋灌蘇合丸生薑湯吹耳鼻穀道

等法冬夏一樣急救醒後宜少飲溫酒夏天只與

清粥飲蓋灰性煖而能拔水凡蠅溺水死者以灰

埋之少頃即活此其明驗也

又曰溺水死者用鴨血灌之立活

救凍死門主論

切忌熱水火烘

急用大鍋炒灰盛布袋內放在心口並熨臍腹之間
袋須數個冷更換灌以溫酒薑湯用厚被蓋煖俟
血脉和通身上漸溫即活

秘要云凍死一日猶可活過此即不療

又云若不先溫其心便持火炙其身體冷氣與火相
搏則死

又曰用厚綿被將凍人捲住睡臥令兩人推來轉去

湯醫大全

卷三十七

救凍死論

美

顧氏秘書

使血脉相通身上漸溫即活如無棉被新草薦亦可

救熱死中暑昏悶

切忌飲冷水不可令臥冷地

當急移陰處用大蒜搗爛加路上熱土和水去渣灌
之再拘路上熱土擁擠臍間作窩令眾人尿滿煖
氣透臍即甦

又法急以姜湯或童便乘熱灌下外用布蘸熱湯熨

臍下三寸穴立醒醒後忌飲冷水飲之立死

又曰暑月曬衣不可便入箱櫃中恐冬月服之有中

暑者若吹透再收便無此患

湯醫大全

卷三十七

救熱死論

美

顧氏秘書

救魘死門主論

原有燈即存燈勿熄如無燈不可點燈但痛咬脚跟並咬大指拇而頻唾其面再灌以姜湯或用皂角末或半夏生研或雄黃末吹鼻中得嚏即醒

諸卒死及魘死急於人中及兩脚大拇指內離瓜一韭萊許灸七壯即活

綱目

凡魘死並中惡切忌火照驚慌烏骨鷄血滴口中立活

扁鵲曰五絕死者一曰白縊二曰墻壁所磕三曰溺

湯醫大全

卷三十七

救魘死論

十一

顧氏秘書

水四曰魘魅五曰產乳皆用生半夏一兩搗篩吹

一大豆許於鼻孔中即活亦有用生半夏末水和

丸如小豆大塞鼻中並吹末於耳內心下溫一日

者尚可救奈人不曉的皆因見其氣絕多不救耳

惜哉

救中惡門主論

或登廁或出郊外野地或遊冷室或行人所罕到之處突然眼見鬼物口鼻吸着惡氣驀然倒地四肢逆冷兩手拳握口鼻出血性命遂巡不救此名中

惡大約此證同尸厥證同但腹中不鳴心腹俱煖為異凡遇此證即刻眾人圍繞不可移動眾人打

鼓燒火或焚麝香蘇合香安息香之類直候至醒

知人事方可移動用犀角一錢硃砂麝香各五分

研細水調服或用石菖蒲搗汁灌口鼻中

湯醫大全

卷三十七

救中惡論

十一

顧氏秘書

又法用鮮菖蒲根搗汁灌入鼻中或口內自活

卒被鬼擊如中箭用桃皮一片安痛上取一匙頭安

桃皮上用艾胡桃大安匙上灸之即瘥

入門

或往死喪墳廟來家即死急斷猪尾取血灌之并縛

豚枕之立活

凡卒死得紫金錠磨汁灌之立甦

書曰中惡者乃遇屍喪邪病古廟墳塚空房冷寓廢

署荒園鬼神壇場祈禱祠社池沼苔蘚醞濕藤蘿

樹木陰鬱一經感觸卒然昏迷名曰中惡急將病

人移於宅內東方以醋炭燃之用薑湯化蘇合丸
灌之或藿香正氣散亦妙再用葱尖刺入病者耳
內出血即活如無血者不治若大吐大瀉口鼻流
血者不治

傷醫大全

卷三十七

救中惡論

顧氏秘書

救嚇死門主論

急抱定用溫酒徐徐灌下即活如九竅出血用大薊
一握絞汁和好酒半盞頓服如無鮮大薊即乾大
薊研末滾水灌服三錢
清晨汲頭一吊桶水噴面極效
書曰嚇煞即驚怖死也

傷醫大全

卷三十七

救嚇死論

顧氏秘書

救五竅出血門主論

耳目口鼻竅中一齊出血藥不及煎死在旦夕俄頃
用冷水當面噴幾口急分開頭髮用粗紙敷唇蘸
醋令透搭在額門血即止次用當歸一兩煎湯磨
沉香降香各五錢加童便服之血自歸經然後以
四物湯加入參黃芪北五味麥門冬為丸服之可
收萬全之功

易醫大全

卷三十七

救五竅出血論

本主

顧氏秘書

救神箭鬼箭打門主方

神箭 不可針刺

狗 骨燒灰 山 梔七個 飛白麵

陳 糟各一兩

醋調敷

鬼箭打

鉄 屑細末二兩 核桃肉 一觔 桃 仁 八兩

全入磁器內加好酒四觔隔湯煮蓋上以糯米

置之米熟為度每日不拘時隨量煖服蓋被發

易醫大全

卷三十七

救神箭鬼箭方

全

顧氏秘書

汗服時痛稍甚服完漸愈勿以服藥時痛而中

止也

鬼箭打

山 梔炒 飛 麩 桃 頭七個

杵餅貼次日作七丸投炭火中燒響即愈

除妖魅鬼魔門主論

妖魅鬼魔不肯明言者鹿角剉細末酒調服即知人事矣

夢與鬼交者以鹿角末清酒調服即出鬼精

婦女夢與邪物交通獨言獨笑心神恍惚者用明雄

細末一兩松香二兩焙化投下明雄以虎爪攪之

丸如彈子大夜焚於焙籠中令女坐其上以被蓋

之露頭在外不過三三次即愈內用菖蒲棗仁遠

志硃砂茯神等味為末服之

鴻禧本全 卷三十七 除妖魅鬼魔方 顧氏秘書

慣多夢魘者用通明大硃砂縫袋盛之藏髮內睡之

是夜即無邪夢矣

崇症門主方

平崇散 秘錄

礪砂 三分 黃連 甘草 各二分

冰片 一分

乳極細人乳調點兩眼角立消

易醫本全 卷三十七 崇症方 顧氏秘書

瘍醫大全目錄

卷三十八

蛇虎傷部

馬汗瘡門主論 附方

馬嚙門主方

虎咬門主論 附方

蛇傷門主論 附方

救蛇入口門主方

辟諸蛇門主方

狗咬門主論 附方

猪咬門主方

猫咬門主方

鼠齧門主論 附方

蜈蚣咬門主方

壁虎咬門主方

蝎螫門主論 附方

蜘蛛咬門主論 附方

壁蟾咬門主論

瘍醫大全 卷三十八 目錄 顧氏秘書

蜂叮門主方

蝸牛傷門主論

蚯蚓咬傷門主論 附方

楊辣虫辣門主論 附方

蠶咬傷門主方

馬蟻齧門主論

八脚虫傷門主論 附方

沙蝨毒門主方

諸色惡虫咬傷門主方

百虫入耳門主方

八角虱門主論 附方

祛臭虫門主方

辟蛇蚤門主方

祛蝨門主方

祛蚊門主方

瘍醫大全 卷三十八 目錄 顧氏秘書

瘍醫大全卷三十八

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽
男 標燮用和 全校

蛇虎傷部

凡蛇虎虫狗蜈蚣蝎蛛鼠齧皆彙於此部中以便檢閱參治

瘍醫大全

卷三十八

馬汗瘡論

顧氏秘書

馬汗瘡門主論

凡患瘡人因騎驟馬沾其涎汗毒入瘡中焮腫疼痛名曰馬汗瘡

馬汗瘡門主方

驗方

冬瓜皮煎湯洗

又方

絲爪葉煎湯洗

又方

冬瓜皮乾為末敷之

又方

用製栢散敷之

瘍醫大全

卷三十八

馬汗瘡方

二

顧氏秘書

馬醫門主方

驗方

皂角子燒灰香油調搽即追出毒氣矣

又方

薄荷汁塗之

馬咬及踏傷

服童便韭汁

又方 集驗

寒水石研敷傷處旬日自愈

傷醫大全

卷三十八

馬醫門方

三

顧氏秘書

馬咋踏人

割雞冠血點嚙處日三次

牡馬用雌雞冠
牝馬用雄雞冠

又方

馬鞭稍三寸鼠屎十四粒煨灰猪油調搽

又方

婦人月經搽

又方

人糞煨

馬糞煨

為末猪油和搽

虎咬



傷醫大全

卷三十八

虎咬論

四

顧氏秘書

虎咬門主論

雷直君曰世人被虎咬傷血必大出其傷口立時潰爛其疼不可當急用猪肉貼之隨貼隨化隨易急用地榆一筋苦參四兩三七根三兩研極細摻之隨濕隨摻血即止痛即定蓋地榆涼血苦參止痛三七止血合三者之長故奏功實神 秘錄

凡人遇虎不死必傷傷必潰爛虎之見人如猶捕鼠先有毒涎噴人人始昏憤

陳遠公曰人遭虎傷流血必多大凡虎傷多在頸項

必有深孔兩個或四個其孔一時即變黑色急以生豬油塞之無則以生豬肉填之隨填隨化庶不再腐所傷之內然後急買地榆牛筋為末敷所傷處血即頓止隨用湯藥以止渴蓋虎傷流血必多而虎又有熱毒直來犯心故口渴甚萬不得已可與小便飲之急投治虎湯三七根末地榆各一兩黃芪當歸麥冬生地各三兩水十碗煎恣其飲完必安然而臥明日傷處大癢又一服又臥如是五日瘡口生合而愈 永鑑

瘍醫大全

卷三十八

虎咬論

五

顧氏秘書

此方大補氣血以生肌用地榆化虎傷毒三七根止血飲口藥料無奇收功實神
王御曰凡虎咬多服生薑汁或自尿淋洗或人尿淋洗傷口以白礬末敷之



虎咬門主方

驗方

真香油灌之外以香油洗之

又方

搗青松汁數斗頻頻飲之以渣敷咬傷處頻易即效

效

熊虎爪牙所傷毒痛

燒青布薰瘡口毒即出仍煮葛根汁令濃洗瘡一日十次再搗葛根為末煎葛根汁調服方寸七每

瘍醫大全

卷三十八

虎咬方

六

顧氏秘書

日五次甚者夜服二次

又方

嚼栗塗

又方

煮生鐵令有味洗瘡

又方

雄黃 硫黃

共研細末搽之

紫石英 各等分

蛇傷



傷醫大全 卷三十八 蛇傷論 七 顧氏秘書

蛇傷門主論

陳遠公曰人被蛇傷不拘何處或上或下腹脹如箕三日不救毒氣攻心必死蛇乃陰物傷人最毒治以解毒為主惟是蛇毒乃陰毒也若以陽毒解之則毒愈熾必用陰分解毒之品順其性而解之也祛毒散白芷紫花地丁蒲公英各一兩夏枯草二兩生甘草五錢白礬三錢水煎服一劑腫漸消二劑毒從大小便而出三劑全愈 冰鑑

此方白芷雖陽分之藥得夏枯草則陽變為陰地丁公英甘草白礬盡消毒之味又且屬陰陰變以

化陰毒自易奏功助白芷直攻蛇毒無留存之害也或問解蛇毒既不可用陽分之藥何以又用白芷不知蛇毒非白芷不除世人不善用之所以有不效者今用於陰分之中自無不效矣何可舍白芷反致無功乎或問雄黃亦制蛇毒何不用之不知白芷陽中有陰不比雄黃純陽也雄黃外用可建奇功內用每至債事不若白芷用陰分之中可建全功耳

諸蛇有毒惟土虺蛇最毒咬人不急治則死

凡蛇誤入人孔竅內即以針刺其尾不過二三針則自褪出

自褪出

丹心云制蛇毒用雄黃末人參湯調服

綱目云人卒為蛇繞不解以熱湯淋之無湯則令尿

傷醫大全 卷三十八 蛇傷論 八 顧氏秘書

之即解

凡毒蛇咬用針刺傷處出血急用繩紮兩頭浸糞缸

內毒不內攻

若毒走腫痛者用麻油紙燃燭薰之再用解毒紫金

丹一錢酒磨服之取汗

蛇傷門主方

毒蛇咬

急於咬傷處上下紮緊使毒氣不走飲食蒜飲酒令飽使毒氣不攻心更搗蒜敷傷處加艾圓灸之

又方

五靈脂一兩 水飛 雄黃 五錢

研極細末用無灰酒調服二錢滓敷患處忌人

參

又方

瘍醫大全

卷三十八

蛇傷方

九

顧氏秘書

黃荳根上有一白豆取來口內嚼爛敷之

又方

川貝母為末酒調儘醉灌之少頃酒自傷處化水流

流出候水出盡以搗敷咬處垂死可活

又方

明雄黃共蒜搗敷內服白芷護心散

白芷護心散

治毒蛇蜈蚣咬

明雄黃

炙甘草 各五錢 白芷 一兩

滴乳香去油三錢

共研細每服四錢酒調服

又方

水洗淨膿腐易水數斗拭乾用鴨嘴替白芷麝香各等分研末敷之

又方

五靈脂 白芷 各五錢 明雄黃 三錢

滴乳香去油 沒藥去油各五分 甘草 二錢

麝香 三厘

瘍醫大全

卷三十八

蛇傷方

十

顧氏秘書

水酒各半煎服其搗敷毒蛇咬處起死回生

又方

半邊蓮藤葉一各金 錢草 用唾津揉洗並敷咬處立愈

諺云有人認得半邊蓮終朝可伴毒蛇眠

又方

柏子樹葉不拘多少冷水搗爛洗過又搗敷上三五次可愈如咬破潰爛用鳳尾草搗如泥如上即

收口如不爛者不必用

又方集驗

又方

白礬銕化乘熱滴傷處痛立止毒氣即趕出

毒蛇及諸色惡蟲咬傷毒氣入腹者

蒼耳草嫩葉搗汁灌之將搗厚敷傷處

土虺毒咬 孫真人

令婦人對咬處尿尿澆之以尿洗之

毒蛇瘋犬咬傷 孫真人

人糞塗咬處極妙 新藥尤佳 諸藥皆不及也

毒蛇咬

用糯米半升揀去半粒者勿用令家內男婦衆人

傷醫大全

卷三十八

蛇傷方

十一

顧氏秘書

嚼爛敷上少停咬處便有黑氣冒出隨又換敷即

出紫黑血水其腫自消其痛自止

蛇咬

採鮮大藍葉搗汁或小藍葉搗汁調乳細雄黃末

敷之

蛇咬

紫金錠酒磨服一錠多飲為妙取汗再用紫金錠

磨敷咬處

又方

黃荳葉搗爛敷

蛇咬毒走腫痛

麻油紙燃烟薰之

毒蛇咬

烟袋燒熱滴油搽之百試百效

又方

用泥蛤蜊搗爛敷咬處即好

又方

白芷末壹兩開水調下死者立生

傷醫大全

卷三十八

蛇傷方

十二

顧氏秘書

蛇咬爛入骨者

白芷壹兩 膽礬五分 麝香三分

乳為細末日日搽之立愈

赤煉蛇咬

用活公雞刀割一塊貼之換貼兩三塊自愈

毒蛇咬

穿山甲炮 廣木香各一錢五分

研細末熱酒調下

又方 捕蛇師

全 蝟 二個研 蜈 蚣 一二條炙

研勻酒調下立愈

又方 抄本

北細辛 白 芷 各五錢 雄 黃 五分

研細每服二錢酒調服

蛇咬方 周鶴仙

雞蛋三個敲破蛋頭合在蛇咬之處聽蛋內有聲變黑色再用一個合之俟蛋內色變黃白不甚黑

再用一蛋合之自愈不疼極妙良方

楊醫大全

卷三十八

蛇傷方

三

顧氏秘書

又方

蒲公英搗爛貼上即愈

又方

廣木香不拘多少水煎服效不可述

解毒散

治一切毒蛇並獸所傷重者毒入腹則眼黑口噤手足強直此藥平易不傷氣血大有神效不可以其易而忽之

白礬甘草各等分為末每服二錢不拘時冷水調

下更敷傷處

毒蛇咬傷跌撲不起將死者

香白芷 搗末 麥門冬 去心

好酒煎服良久有黃水自傷口出俟水盡腫消

皮合仍將藥渣搗爛敷

水蛇刺傷

莧菜根順搗滾酒泡以碗蓋之熱飲取汗為度搗

仍敷咬處

毒蛇咬

楊醫大全

卷三十八

蛇傷方

四

顧氏秘書

烟袋內油塗四邊腫處即消切不可塗咬傷孔內

又方

藍葉搗汁調雄黃末敷之

又方

雄黃一錢生礬二錢杓內熔化將筋頭蘸藥點傷

處冷則易之連點七次

又方

櫻桃葉搗爛塗患處搗汁飲之毒不內攻

又方

半枝蓮搗爛取汁二兩熱酒四兩和汁服取汗搗敷傷處更妙

又方

陰乾蒼耳草五錢水煎一鍾熱服取汗

又方

炙油梳令汗出熨瘡口

又方

雄黃末敷日用三四次

蝮蛇螫人

瘍醫大全

卷三十八

蛇傷方

五

顧氏秘書

燒蜈蚣研末搽

又方

北細辛

雄

黃

各等分

研細搽傷處並治諸蛇及虎傷俱效



救蛇入口門主方

睡者蛇入口中拔之不出

先將快錐橫刺蛇尾即將刀剖尾以川椒數粒納

入纏定自然退出

瘍醫大全

卷三十八

救蛇入口方

五

顧氏秘書



辟諸蛇門主方

驗法

但燒羚羊角令烟出蛇即去矣

又方

燒雄黃祛之

又法

乾薑生麝香雄黃等分搗勻用小絳囊盛之男左

女右佩帶則蛇遠辟 如人遭蛇傷便以此搽之

如無麝香即以射岡和佩之

傷醫大全

卷三十八

辟諸蛇方

七

顧氏秘書

狗咬



傷醫大全

卷三十八

狗咬論

六

顧氏秘書

狗咬門主論

陳遠公曰癩狗傷者人必發癩有如狂淫世人以生
小拘於腹中此誤傳也因如發狂有如狗狀見人
則咬逢女則騶非狗生腹中不宜有此景象况人
為癩狗傷二便必閉不能遽出二便用力虛努似
生產艱難且外勢急痛腰腹作脹而死人以為腹
中有狗不能產而死腰痛者乃小拘內咬也豈不
可笑此乃狗誤食毒物而發癩人但一咬人則毒
氣染傳於人狗愈人死可畏之證也然治之得法

毒解病去如掃矣夫犬性最熱狗食物發癩乃食
熱物之故或食自死之內或殮熱病之屍多成癩
病然則狗之發癩乃熱上加熱也解其熱毒何不
愈之有但人不知解法所以不救耳予逢異傳名
活命仙丹木鱉子三個切斑猫七個陳土米一撮
劉寄奴大黃茯苓各五錢麝香一分各研細末和勻每
服三錢黃酒調服毒氣全解神方也不必二服七
日者奏功七日外者多服數次忌色慾二月並忌
發物餘無所忌 水鑑

瘍醫大全

卷三十八

狗咬論

五

顏氏秘書

是方用木鱉斑猫者以狗最畏二物木鱉大涼又
瀉熱毒得大黃迅掃之則熱毒難留寄奴善逐血
走水敷茯苓利水引毒從小便而出麝香亦走竅
用之不過制斑猫木鱉之毒又何畏癩犬之傷哉
人被犬咬傷即煩躁口乾小便澀頭頂中有紅髮數
根急急拔去輕者用天南星防風各一錢五分研
細以酒調服重者用斑猫五個去頭尾翅足以糯
米合許同炒黃色去米將斑猫研末酒一杯煎半
杯空心溫服從小便行下惡物如小犬狀必待小
便清白方為毒盡如毒未盡須再服之咬處輕者
則以栗子嚼敷或紫蘇葉嚼敷重則必用男子熱

糞敷之冷則更易待大勢將定即用乾人糞燒灰
麻油調敷

澄
曰瘋犬者乃朝夕露臥為四時不正之氣所侵陰
陽肅殺之氣所感故舌出涎流頭低耳垂目紅尾
拖急走無定多見於春末夏初之間人被咬傷即
煩躁口乾小便澀痛最為難救

瘍醫大全

卷三十八

狗咬論

三

顏氏秘書

狗咬門主方

驗方

防

風六錢五分

牽牛

大黃

各一錢五分

雄

黃一錢三分

麝香

一分五厘

斑

貓去頭足糯米炒五分

共為末温白湯調服三錢有血絲從小便出即

愈如未愈可再服三錢必效再用虎骨醋炙研

末陰陽水調服三錢除患

又方

斑

貓九個去頭足翹入糯米二合全炒

硃砂

瘍醫大全

卷三十八

狗咬方

三

顧氏秘書

滴乳香去油

沒藥去油

明雄黃

血竭

兒茶

各二分

共為細末每服二分空心黃酒調服

湧源散

治瘋犬咬神驗但服此藥切忌飲酒食猪羊等

肉鷄鵝魚蝦一切發物仍忌房事一百二十日

終身不可食犬肉如誤食犬肉後必再發則無

藥救矣

斑

貓七個去頭足翹

研末温酒調服於小便桶內見尿沫如狗形為效雖無犬形亦不再發後用辰砂益元散一兩煎服解之

又方

杭粉

一錢

斑

貓

七個去頭足翹全糯米炒黃色去米

研勻空心酒調下即解如小便痛服甘草稍湯

自利

又方

急以人便下熱糞塗之極驗

瘍醫大全

卷三十八

狗咬方

三

顧氏秘書

又方

荔枝肉貼咬處其痛立止

又方

明雄

五錢

杏仁

去皮尖炒一百粒

共研細虎骨煎酒調服二錢咬處即以此藥敷

又方

杏仁

砂糖各等分搗敷

又方

桃樹頭搗敷

又方

又方

舊錫器刮下錫末放咬處

又方

元眼核去外漆皮煨灰搽

又方

洋糖全苜搗敷咬處腫痛立止

又方 孫真人

刺蝟皮頭髮各等分燒灰水和飲一杯口噤者折

齒灌之

瘍醫大全

卷三十八 狗咬方 三 顧氏秘書

又方

虎骨煨存性研末摻之

定風散

羅太無

治瘋犬咬先口嚼漿水洗淨用綿拭乾貼藥更

不再發大有神效

生南星

防風 各等分

共為細末乾上再下潰膿功難盡述

濟世方

治瘋犬咬先用人溺洗去血水再用核桃殼半個

將極乾人糞填滿罨於傷處外以艾於核桃殼上
炙十四壯即愈永不復發

瘋犬咬

急於無風處捏去惡血孔乾者鍼刺出血鹽湯洗

淨搗葱貼上用糯米一撮番木鱉半個切碎斑貓

七個去翅足若過一日多加一個連煎藥炒黃去

斑貓不用研末酒服細看頭有紅髮拔去忌房事

並忌鑼聲終身忌食犬羊肉

家犬咬 感應篇

瘍醫大全

卷三十八 狗咬方 三 顧氏秘書

先須忍痛以河水洗淨血水為主刮生虎骨末摻

咬處

家犬咬 感應篇

刮肉店砧板上油膩拌砂糖敷

又方

鼠糞搗爛敷之即止痛

瘋犬咬

川連 虎脛骨 各三錢 甘草 一錢

番木鱉 三個

先用蘇油四兩將藥煎汁服下將渣再入生酒煎服飲醉取汗忌鵝犬羊肉七日餘不禁

又方

青布煎汁三升服

又方

飲驢尿一二升良

又方

梔子皮 燒灰

石硫黃 各等分

共研細敷一日一換

瘍醫大全

卷三十八

狗咬方

三

顧氏秘書

家犬咬如傷不甚重

搗栗子敷

家犬咬

紫蘇葉搗敷

瘋犬咬其人頭頂中必有紅毛幾根急急拔去用男

子熱糞冷則更易待大勢將定即用男子乾糞

燒灰蒜油調敷

犬咬

用水洗瘡任血出勿止仍洗勿住手俟血止帛紮

緊

又方

嫩蒼耳草葉搗汁

如無用乾者一把

酒水同煎五分熱服

又方

白礬 七分

番木鱉 一個

共為末分三服先用水服後二次用酒服

又方

斑蝥

七個去翅足研細

酒調服令小便於盆內見沫似狗形不再發

瘍醫大全

卷三十八

狗咬方

三

顧氏秘書

又方

野菊花

香附

小兒胎髮 炒斷

研末酒服儘醉

又方

不見日色瓦上青苔刮下敷咬處

猪咬門主方

驗方

松脂熔化作餅貼之

又方

屋霑中泥敷

瘍醫大全

卷三十八

猪咬方

毛

顧氏秘書

猫咬門主方

驗方

薄荷汁塗之

瘍醫大全

卷三十八

猫咬方

毛

顧氏秘書

鼠齧門主論

鼠齧傷手足及肉最難愈何也因其齒細而長上有毒黃能傷筋骨故也

傷醫大全

卷三十八

鼠齧論

无

顧氏秘書

鼠齧門主方

驗方

宜用猫洗其毒去其血再以猫屎填傷處

又方

無要

斑毛燒灰射香少許津唾調敷

又方

猫毛燒灰加麝香少許唾津潤敷

又方

香椿樹皮搗汁一酒杯和黃酒喫下毒氣自消

傷醫大全

卷三十八

鼠齧方

无

顧氏秘書

蜈蚣咬門主方

驗方

雄雞冠血塗咬處

又方

取大蜘蛛放傷處吸去其毒即愈隨投蜘蛛於水內令吐出毒氣以全其命

又方

新竹一段放火上烘出漚取漚搽之止痛

又方

傷醫大全

卷三十八

蜈蚣咬方

三

顧氏秘傳

頭垢搽之痛立止

蜈蚣叮咬其痛切骨或渾身麻木

雄黃末熬香油紙條點火燻其咬處其痛立止

蜈蚣蝎子咬

薄荷葉研末搽咬處立止

又方

蟾酥丸水磨塗

又方

燒鉄刀頭令赤置白礬於刀頭上化汁乘熱將礬

汁滴於被傷之處立瘥

又方

手指探入雞喉內取雞口內涎塗之立愈

又方

取雄雞嘴對傷處吸吸盡毒雞嘴自去

又方

雞蛋一個輕敲一小孔合傷處立效

又方

木梳齒內垢燈上燒油滴傷處立止

傷醫大全

卷三十八

蜈蚣咬方

三

顧氏秘傳

又方

人頭垢封傷處立效

又方

細嚼香附塗之立效

又方

五靈脂炒冷烟蒲黃炒二錢

共研細醋調塗傷處立效

又方

獨頭蒜擦咬處痛立止

又方

燈心蘸香點着向患處焯數下

祛蜈蚣法

凡人家蜈蚣多可用頭髮燒烟或床下或廚房蜈蚣聞之入土三尺

蜈蚣咬

草紙捲點着隔着錫片蒸之熱氣透入其痛即止

又方

趕雄雞令走急然後以雞嘴氣呵之不過二三次

瘍醫大全

卷三十八

蜈蚣咬方

毒

顧氏秘書

即好

又方

桑葉搗汁敷

又方

燒頭髮烟薰之

蜈蚣蝟螫

生半夏

葦

撥各二錢五分

生南星一分

錢五

雄黃

白礬

各二錢

為末就痛處搽之或醋調敷

又方

甘草雄黃磨菜油搽

又方

草紙捲燒烟薰

又方

蘄艾作小丸放咬處灸之

又方

先用鹽湯洗傷處再用劉寄奴擦之

又方

瘍醫大全

卷三十八

蜈蚣咬方

毒

顧氏秘書

生薑汁調雄黃搽

壁虎咬門主方

驗方

青苔塗擦內用敗毒散加青苔三錢煎服

又方

桑柴灰水煎滾濾濃汁調白礬末塗之

又方

以清水淋壁上注咬傷處神效

瘍醫大全

卷三十八

壁虎咬方

三

顧氏秘書

蝎螫門主論

陳嘉謨曰蠍有雌雄兩種雄蠍螫人痛在一處雌蠍螫人痛牽遍體惟聞雜啼其痛漸減

書云凡見一切螫毒之物斷不可起惡念向之亦不得殺之如動此念後必遭螫治亦難愈慎之慎之外臺秘要云余身曾遭螫螫手指痛苦不可忍諸方治之無效有人見余令以冷水漬指並漬手手即不痛水微煖手又痛即換冷水漬之稍煖又換冷水或冷水浸舊布湯之實有奇驗

瘍醫大全

卷三十八

蝎螫論

三

顧氏秘書

吳天麟曰凡蛇蝎蜈蚣咬傷雖有疼痛不可號呼但呵呵大笑數聲其痛即可十減其七蓋毒物咬人之後聞人號痛彼反為喜蜈蚣蝎子自將尾鬣搖動他動一下咬處即錐痛一下但聞大笑彼即氣殺澄曾連被蝎螫即發大笑咬處果不甚痛此亦妙法也不可不知

蝎螫門主方

驗方

糞清搽之其痛立止

又方

水膠一條沾水濕之將火熾熱於傷處擦之

又方

草紙捲緊點着以烟薰之

又方

白礬半夏各等分研末醋調敷

傷醫大全

卷三十八

蝎螫方

七

顧氏秘書

又方 啓玄

香油蘸青布撚子點着插在筆管內扣定痛處以

烟薰之少刻即止痛矣

又方

井底泥塗螫傷處乾則再易

又方

新汲水以青布隨痛處搭之乾則再易

又方

古今錄驗

但以木碗合之即愈

雄蠍螫人一處作痛

井泥塗之乾則再易

雌蠍螫人諸處牽痛

瓦溝下泥塗之

若遇天晴可用新汲水從屋上淋下取泥用之

蝎螫

淨官硝

明

雄

各一錢

麝

香

一分二厘

研細磁瓶密貯每用少許點男左女右大眼角

聞香痛即止

又方

傷醫大全

卷三十八

蝎螫方

七

顧氏秘書

大蝸牛一個搗敷痛立止

良薑膏

治毒瘡並蠍螫諸惡虫咬

高良薑

穿山甲 各六兩

真麻油二觔浸七日熬枯去渣入炒過黃丹一

觔成膏攤貼

蝎螫蜈蚣咬

預於五月五日用新汲水膠乳香各一兩水燉化攤勻

紙上剪作小條每用少許水濕貼之立刻止痛

又方

搗蒜塗

又方

礪砂和水塗

又方

嚼茱萸封之

又方

生烏頭末唾和塗

又方

傷醫大全

卷三十八

蝎螫方

五

顧氏秘書

滴熱蠟燭油於傷處三兩次易之

又方

溫湯浸之

又方

嚼乾薑塗

又方

苦李子仁嚼敷

又方

按蛇盤草取汁敷

蜘蛛咬門主論

申斗垣曰蜘蛛咬人中其毒者一身生蛛絲不知人事

啓立
蟻蛛咬人其毒最能殺人

傷醫大全

卷三十八

蜘蛛咬論

四

顧氏秘書

蜘蛛咬門主方

驗方 啓玄

艾燒烟薰之

又方 啓玄

羊乳灌之立解

又方 傳信方

大藍汁一盃入雄黃麝香少許搽患處仍服其汁

蜘蛛咬

急以桑柴灰煎取汁調白礬末敷

又方

又方

生鐵衣以醋研汁塗

又方

烏麻油和胡粉如泥塗乾則易之

又方

洋桃葉搗敷

又方

炮薑切片貼

又方

雄黃末敷之

又方

蒜切作兩斷指之或蒜磨地上泥塗

瘍醫大全

卷三十八

蜘蛛咬方

望

顧氏秘書

壁蟻咬門主論

本草云壁蟻咬毒人必死宜用桑灰淋濃汁調白礬末塗

聖惠云醋磨雄黃塗

瘍醫大全

卷三十八

壁蟻咬論

三

顧氏秘書

蜂叮門主方

蜂子叮人必有毒刺入肉內務須挑去

好黃酒洗之

又方

生芋梗擦之立刻止痛消腫如無梗用子亦效

又方

青苔擦上痛止腫消

又方

人乳搽之

瘍醫大全

卷三十八

蜂叮方

留

顧氏秘書

又方

小便洗擦拭乾用香油搽之

又方

雄黃末搽之

又方

蜂房研末搽之

又方

陽物上垢手捏擦傷處

又方

就整處地上寫一玉字口中默念金木水火土念一字寫一筆臨了念土字寫一點即取點下之土捻起就傷處敷之

又方

蜂房焙為末猪油調敷

又方

野苧菜搗敷

又方

火紙捲烟薰

瘍醫大全

卷二十八 蜂疔方

聖

顧氏秘書

又方

香油搽

又方

野苧葉擦

又方

桑樹汁擦

又方

手抓頭垢同鹽擦

蝸牛傷門主論

本草云蝸牛傷人毒氣遍身者宜搗蓼子汁浸之即瘥

瘍醫大全

卷二十八 蝸牛傷論

聖

顧氏秘書

蚯蚓咬傷門主論

凡中蚯蚓毒形如大痲瘋眉髮脫落亦有蚯蚓呵傷
令人發腫

又云蚯蚓咬即受其毒但夜則蚓鳴於體中為異耳
宜用鹽湯頻頻洗之其毒自去

瘍醫大全

卷三十八

蚯蚓咬傷論

七

顧氏秘書

蚯蚓咬傷門主方

小兒受傷

用鹽湯溫洗

又方

鴨血塗之

中蚯蚓毒形如大痲瘋眉髮脫落

用石灰泡熱水候冷洗患處浸良久愈

瘍醫大全

卷三十八

蚯蚓咬方

六

顧氏秘書

楊辣虫辣門主論

楊喇虫卽楊辣虫又有瓦喇虫俱能辣人卽令皮膚

腫痛如火燎一般治以淡豆豉搗敷

又曰瓦喇虫卽射工乃樹間雜毛虫也人觸之則能

放毛射人初癢次痛勢如火燎久則外癢內痛骨

肉皆爛諸藥罔效但用豆豉全清油搗敷少時則

毛出

瘍醫大全

卷三十八

楊辣虫辣論

完

顧氏秘書

楊辣虫辣門主方

驗方

淡豆豉搗敷之辣毛卽出不痛如毛未出仍須再

擦之毛出自愈如無豆豉或醋或鹽滷洗之

又方

白芷煎湯洗之

如肉已爛

海螵蛸細末摻之

瘍醫大全

卷三十八

楊辣虫辣方

完

顧氏秘書

蠶咬傷門主方

蠶咬

苧麻根搗汁塗之

瘍醫大全

卷三十八

蠶咬方

五

顧氏秘書

馬蜚嚙門主論

韓秋巖曰雁山春夏多馬蜚毒物善嚙人流血不止
以燒竹葉塗之血立止 檀几叢書

瘍醫大全

卷三十八

馬蜚嚙論

五

顧氏秘書

八脚虫傷門主論

八脚虫隱壁間以尿射人遍身生瘡狀如湯火傷其痛如烙者是

又曰蠟螻虫一名多脚虫若中尿毒令人皮膚起燎漿水泡痛如火燒初如飯糝漸如荳大宜用鹽湯綿蘸濕泡上數次即消

瘍醫大全

卷三十八 八脚虫傷論

五 顧氏秘書

八脚虫傷門主方

驗方

烏雞翎燒灰雞子清調搽

瘍醫大全

卷三十八 八脚虫傷方

五 顧氏秘書

沙蝨毒門主方

沙蝨在水中着人及陰兩日即着人便鑽入皮裏初着有赤點如米

鹽五合水一斗煮一沸漬洗

又方

鹽和麝香塗

瘍醫大全

卷三十八

沙蝨毒門方

五

顧氏秘書

諸色惡虫咬傷門主方

驗方

先用薑汁洗再用雄黃明礬研勻搽之

又方

生芝蔴嚼碎塗之

又方

大黃磨水塗二次再用香油紙燃點着薰傷處

瘍醫大全

卷三十八

諸色惡虫咬方

五

顧氏秘書

百虫入耳門主方

驗方

宜閉口勿言以紙塞耳竅鼻竅只空虫入之耳用
藤油滴入耳竅中或出或死

又方

猫尿滴耳中其中虫即出
取猫尿法以生薑
擦猫鼻上即滴

又方

韭汁和醋灌入耳中

蜈蚣蜜蜂大虫入耳

瘍醫大全

卷三十八 百虫入耳方 七
顧氏秘書

用肉炙香安放耳邊其中虫聞香自出

又方

火炙桃葉塞之立出

蟬蛻入耳

用蚯蚓入葱內化水滴耳內虫自出

百虫入耳

雞血滴耳或韭汁薑汁滴之皆效

又方

麝香和醋灌入即出

壁虱入耳

稻稈灰煎汁灌入即隨水而出

百虫入耳

川椒末一撮以醋半筋調灌耳中行二十四步即
出

蚤虱入耳

菖蒲塞之

蜈蚣入耳

雞肉炒香放耳邊即引出

瘍醫大全

卷三十八 百虫入耳方 七
顧氏秘書

蜈蚣入耳

生姜汁灌之

螞蟻入耳

穿山甲炒研細調水灌之

蟬蛻入耳

羊乳滴入耳內即化為水

八角虱門主論

澄曰八角虱即八角虫又名陰虱瘡其形如花蜘蛛叮於陰毛之上生於前陰毛際其癢如錐內由肝腎氣濁生熱兼淫慾失於浣洗二精不潔搏滯而成瘙癢難忍抓破色紅中含紫點宜內服蘆栢地黃丸主之

又曰此虫最易傳染得此者勿近女子近之則婦人即生此虫不可不慎

又曰亦有髮辮內生八角虱者主其人運氣顛倒

傷醫大全 卷三十八 八角虱論 李 顧氏秘書



八角虱門主方

陰毛內生紅白虫八脚如虱癢不可忍

磨鏡子泥塗之

又方

生白菓嚼爛塗之

又方

銀珠紙燒烟燻之

髮內陰毛生虱

白部烟筋各等分煎湯洗之

傷醫大全 卷三十八 八角虱方 李 顧氏秘書

髮內生虱

藜蘆不拘多少研末摻在髮中經宿其虱自死

衣被生虱

白部全衣用滾湯泡洗蟻虱俱絕

髮內生虱

水銀和棗肉研爛塗毡帽上帶一夕盡絕

蘆栢地黃丸

熟地 八兩 丹皮 白茯苓 各三兩

山萸肉 懷山藥 各四兩 澤瀉 三兩

黃 栢一兩 煎 薑 五錢

煉蜜為丸每服三錢白湯送下

髮內生虱

白部煎洗立絕

瘍醫大全

卷三十八 八角風方

李 顧氏秘書

祛臭虫門方

驗方

採鮮繡毬花置床四角其患自絕

又方

晚蚕沙燒床下臭虫化水

又方

羊骨頭燒烟薰即無矣

但此烟最爛絲紬布帛薰時須將衣帳搬開免破爛

又方

蕎麥秸煎湯淋臭虫即死

瘍醫大全

卷三十八 祛臭虫方

李 顧氏秘書

又方

蒼木

番木鱉

潮腦

香白芷

共研末燒酒搗丸蠶蠶大每燒一丸臭虫即成

皮殼

又方

香木瓜燒烟薰即變空殼

辟蛇蚤門

辟蛇蚤

五月五日採向東桃枝舊蒲根陰乾於十月初一日研末篩簾下即除根

又方

鮮桃葉展淨晒乾研末先鋪葉末後洒微水立除

傷醫大全

卷三十八 辟蛇蚤方

三

顧氏秘書

祛蠶門主方

祛蠶法

水銀勒綿線繫腰間即去

又方

白部煎湯洗衣蠶俱成殼

又方

白苧搗碎漿衣

傷醫大全

卷三十八

祛蠶方

六

顧氏秘書

祛蚊門主方

治蚊由

鰻魚骨即地魚室內燒之致化為水

又方

端午午時用金墨一錠放蝦蟆肚內封只陰乾每

用墨磨濃在壁上書圈或畫大小口葫蘆蚊

皆飛聚圈中此墨又可敷圍腫毒 終