


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇二七・子部・醫家類

- 芷園臆草存案一卷〔明〕盧復撰……………一
- 臨證指南醫案十卷〔清〕葉桂撰 華岫雲輯……………一三
- 掃葉莊一瓢老人醫案四卷〔清〕薛雪撰……………四五
- 醫學讀書記三卷續記一卷附靜香樓醫案一卷〔清〕尤怡撰……………五〇三
- 洄溪醫案一卷〔清〕徐大椿撰……………五五三
- 王氏醫案二卷續編八卷 霍亂論二卷〔清〕王士雄撰……………五九一

芷園臆草存案

錢塘盧復不遠著

辛酉病間出寄紫芝禪室憶自疾作案它日反覆
展視似覺有啟于中因思廿年作醫其昭著人耳
日真實得意處頗有限量因隨記數則其望古人
一着不虛豈不媿殺普請博識大方洞察一生敗

闕癸亥孟夏自記

萬曆乙巳三月梁八秀才以作文時受寒服發散藥
十餘帖熱盛汗多蒸蒸如雲霧高一二尺濕透衣被
日易十數番至十四日遂昏不識人舌短眼瞢脉浮

芷園臆草存案

大無倫子診之先以溫粉撲其周身使汗孔收斂次
用人參五錢生附三錢煎服便能識人惟言語譫妄
又七日始蘇有客問曰脉浮病當在表應從發散汗
出理宜熱退何便神昏表脉盛熱舌短眼瞢邪盛之
極何用大熱補劑盛熱之表何得撲滿孔竅請分疏
之子曰大凡治病先求其本不可泥其形症如寒水
為邪必然心火受病此病原從思慮時受寒政為心
火不及而受水侮此是病本更兼多行發散重虛其
心心液既已散漫精神便無主宰苟非黑附順從水
色而橫助火大人參轉回陽氣而保定精神則無根

芷園臆草存案 自記

之火易滅無主之藏不已亂乎且不先固其外則內
無旋理唯內立真主斯賊始逃遁又黑為癸色甘為
戊味戊癸合德化火真機造化之妙有如此者何得
尚執脉浮表散之言耶苟脉不大熱不盛則元氣盡
去安望其有生理也蓋定民之亂者唯在復其固有
大熱盛脉本其故吾俾之奠安而天下太平是有主
以攝持之爾客曰有主斯定何復言語譫妄七日耶
子曰能識人則志斯立言語譫妄者猶民雖安而侯
尚未寧也七日自復陽生之定理客又奚疑

芷園臆草存案

以為少陰症忍公茫然無措名子脉之沉弱中獨右
關表弦而中滑子以為風邪挾胃中水飲停積所致
用乾葛半夏吳萸黃連急煎緩服嘔吐遂止而熱轉
盛忍公亟召子復診視脉勢欲浮命其進粥聞者皆
駭以熱甚無汗為辭而不敢予再三強之呷濃米飲
半杯遂有汗而熱平再進薄粥汗多而熱退忍公問
子曰風寒之邪世俗大禁飲食喫粥退熱真為聞所
未聞子曰風之與寒原自有別世蓋洞之耳仲景桂
枝湯之治風服已啜粥古人之精義也夫風者木也
木尅土脾胃受之仲景治法妙在不治風木但令濕

土氣行而風木之邪自散。今以正君之弱質水飲雖行而嘔止。風邪欲散而轉熱。故脉勢欲浮也。非穀氣揚溢則胃力孱弱。汗從何來。是借桂枝之義以除風邪之不能汗者。予遵所聞如此。似廣君之未聞。

戊申秋山水泛洪。道途險惡。從桐廬之五管嚴氏轉至分水。王元極家方坐堂上。有人從外來望其色黃而內深青。問元極乃族兄也。問何病。云唯便血。予謂春來病必甚。春分法當死。至己酉二月果急。名予未至江濱而訃。至有僧嘗至元極。知甚悉。乃問予曰。君工方脉。然未嘗診候。何望其來。遠斷云。死在半年之

芷園臆草存案

三

前乎予曰。脉者形之機。色者氣之兆。予讀倉公舍人奴案。故心識其為脾傷之色。至春土不勝木。法當死。然舍人奴以四月死者尚肥。而王之體已瘦耳。僧曰。君嘗往往起危疾于旬日間。半年之前豈無方便以使之生乎。何幸其言之中也。曰。噫。予何人。斯能過扁鵲耶。鵲之言曰。越人非能生死人也。當生者越人能使之起耳。且疾之所在有曰。日絡曰經。曰府曰藏。內經以府病尚屬半死。而藏病則絕不可活。其人既傷脾藏色已外顯。故可預期。予特舉古人之所已驗者耳。又何幸焉。

丙辰永嘉孝廉王龍友南還。從者病。召予診之。望其色黯紫。舌本深紅。知其次日當病。果發熱。越三日其叔培竹欲歸。將發診其脉。沉而散。予遂極力挽留。謂龍友雖病而脉有神。理培竹身雖未病而邪實深入。病于中路。將奈何。至次晚大吐。脉隨脫。藥以人參三錢。脉復。有以棗仁等劑投之者。其熱轉盛。十四日脉已八至。舌短神昏。予以非今晚用下。必然胃爛。幸其甥張季昭為之擔當。因用芩連大黃一劑。次日遂愈。隨行十五人皆疫。一老僕殿後。法亦當下。以無人擔當。稍過期。舌遂縮入。不能咽水漿。七日斃。至人問兩

芷園臆草存案

四

孝廉及隨行皆疫。疫一症也。何其先後重輕不等。而治之下一法也。其當下。下生死霄壤。然又可以前知。是至何術。予曰。天行疫癘。乃一方氣化。人受之者。從口鼻入。因人色力盛衰。為病勢輕重。審色與脉。可以先知之。又疫者溫熱病之沿漫也。其病之因從寒鬱火。其色當紫。紫為水尅火之色也。火病之發。應心之苗。故舌色深紅。杜清碧謂之將瘟。舌而脉體須浮。浮脉象火病。發必順。若沉則邪入甚深。勢必暴焚者。逆也。永嘉兩君一得其色。一得其脉。其輕重亦為易曉。然火性急烈。而中宜虛。故河間得旨。邪入裏深者。

莫不用下之中空而火性自平矣中實則火無從散其潰爛可必當下之時真不可緩失時之宜無繇着力思培竹至僕每爲惕然

陳孟杼尊公戊午六月自山東邸中受寒時尚淹淹未王也至次年二月忽小腹與腰急痛令人緊挽外腎稍鬆便欲死子用羌活黃蘗茯苓肉桂等劑令其刮委中痛止足軟至五月天熱身發紫斑有汗至足而始健孟杼問曰老父痛症甚奇諸名公千方不合而兄以一藥隨愈至足軟意易起耳何待百日而始瘳難易之故云何子曰諸君治病故未得效子臆認

芷園臆草存案

五

症故愈隨之曰何謂証子曰証者外顯之症候也曰諸公豈不以腰痛小腹痛眩暈欲死爲外候耶予笑曰正感于此耳症無指歸病從何愈不知此是小腸府病也經曰小腸病者腰脊控舉而痛予以羌活入太陽小腸故痛隨愈然身猶未健者未盡本病之因必欲待時而暢耳尊公原自六月傷寒太陽有所未盡故入府而痛作久病氣衰雖補未達其因原以寒邪鬱火故需夏時則火力全而血脉之邪始去所以斑出足汗百骸暢美者寒得淨盡而火遂融通也所謂因勢利導當如是耳

芷園臆草存案

秋間孟杼正君因怒發呃三日夜侵晨急東名子以事奪至未末往診孟杼愁容怨語泣涕嗟若子診之日來極遲效極速藥進而寢次日喜見曰昨心欲裂方治後事以兄詎諧寬我耳寧期一藥而果效真不解其故子曰子開肝鬱也內君特怒之未暢氣將入胃而不能故發呃子不治呃用柴胡等條達木鬱鬱解則止暴病氣全故易愈耳

浦江張二如上舍病脊脊痛艱于起拜形偃僂楚甚就子診之以爲精虛須龜鹿四仙膏一大劑服三月方可愈也彼不信越三年再來就治用四仙膏一料

芷園臆草存案

六

佐以透冰丹二十粒全愈其族人問故子曰此房後風入髓中骨氣不精故屈伸艱利用透冰以祛腎風用四仙以填骨髓病去精滿百體從令矣顧二如三年之中未嘗不服補精血祛風邪之藥何不見效必奏予言不知藥不可僮侗而用須精專若能深知底奧自然中效似二如症使之填髓入骨中透風自骨出治得其本寧忍其未若徒事末豈止三年而後效也

白下繕部戴養吾夫人恙名診寸關不透體常倦怠眩暈不食胃脘痞滿子以爲肝脾之氣不伸用八珍

加升麻柴胡愈而體實每病取前方服之即安後之
瑞安之滇南十五年皆倚恃焉若稍為加減便不獲
效養吾公解組林下每過湘水必得良晤嘗以夫人
為信心此方也夫人性靜體厚起居安適是以氣血
不振而消沮故于補氣血藥中加開提之劑蓋得其
性情如布帛菽粟若將終身焉者所云信心二字真
為良藥世之任醫厥常喜新安得恒守一方至十五
年耶

織造劉太監病痿一年欲求速效人亦咸以且暮效
藥應之二月予診之六脈細弱血氣大虛其性忌言

芷園臆葺存案

七

虛以己為內家也然多手擁近侍之美者所以愈欲
諱之子直抗言曰尊體極虛非服人參百劑不復能
愈若所云且暮効者是欺也予不敢為附和遂用十
全大補湯四劑又惑人言不肯用參乃與掌家亢乙
合約陽為不用而陰乃用參至四月參且及斤藥將
百帖而能起矣次年七月疾作予欲再用前法加參
彼仍不信因斷其至冬仍痿立春必死乃主進迎者
以為中人參之毒當拔之使出真為聞所未聞冬至
後果不能起春前二日死嗟嗟藥之已疾者與病對
也豈可曲順人情詭取容哉有問何以先知其痿

子曰冬病在四肢以元氣虛而復病冬則陽氣內藏
外無所用手足便病况舊有厥疾者乎大加培護尚
虞或失可妄施己意耶可付一嘆

來熙菴廉憲急東召予診其姪方大身體豐碩傷寒
已二十八日人事不省不能言語手足揚擲腹脹如
鼓而熱烙手目赤氣粗齒稿舌黑參附石膏硝黃芩
連無不服諸名公已言旋矣予診之脈濁鼓手用大
黃一兩佐以血藥一劑下黑臭血一二斗少甦四劑
始清○熙菴公問子姪昏三日所存唯一息耳君何
用劑且大且多幸遂生全敢問其說子曰治病用藥

芷園臆葺存案

八

譬之飲酒滄海之量與之涓滴則喉唇轉燥矣以若
大軀殼病邪甚深不十倍其藥何效之臻且此恙寒
邪入胃畜血在中其昏沉揚擲是喜忘如狂之深者
也不知為病而望之為死不棄之乎夫大黃未嘗不
用苟投非其時品劑輕小一或不應則心惑矣寧能
放膽而用哉

湖聖史大正君恙嘔吐之聲遠及百武脈之左關鼓
指不連于寸兩尺滑搏于左獨加水飲不入唇七日
矣因為透肝之劑斷必孕男藥進而嘔定月足果產
男因問子曰內子寒熱大作嘔吐不食人皆以傷寒

治之君獨以爲孕其柴胡白芍吳黃連雖未專用
何一劑而嘔遂平予曰醫名方脈者須察脈以定方
也人唯伺其症而不循其因是以失之今脈具在不
爲症瞞因病發藥故其言驗也尺中脈搏固知爲姪
其闕不連寸者蓋肝志專而鬱善怒而不善發也鬱
之既久而自發振拉摧拔之象見焉順其性而伸之
調之肝舒氣平惡自無阻而嘔自定耳

問子將尊堂丙午冬月心忽然如散而沉下便不得
睡幾三月矣名診獨左關弱不能應指子以爲肝虛
須補其母當立春始安用熟地爲君茯苓棗仁當歸

芷園臆草存案

九

人參防風遠志佐之服二十帖至期而愈子將問心
散不寐似屬心經何反以腎肝藥見效而立春日始
應請爲分疏予曰此得之脈也經曰肝不足則恐恐
則氣下雖情志無恐懼而氣象似之據脈按証肝虛
無疑矣因肝不足先其令而疾作補母生肝待時而
元氣乃復豈得以心散便屬心經是非心散也乃心
見身中氣散之象耳則散者爲病見散非病設心藏
病則病矣又何能自見其散哉

湯某長病腹痛痛則繞臍有形甚至欲死人皆謂生
氣獨絕于內似有不起之慮予診之關脈近尺有滑

芷園臆草存案

附之長痛氣羸頗乏精彩因用枸杞爲君白芍茯苓
肉桂吳黃佐之六劑痛止服瑞竹堂方四製枸杞丸
一料竟愈黎茂先舉問何疾予曰臍疝也疝當引陰
原無斯証然疝者有形之痛而有所止之處故字從
山不必定引陰也疝本厥陰肝疾其狀若死亦厥陰
証故用溫補肝藥生氣自復不致內絕此案貪天之
功予爲可作起死一則看也

李某口舌生瘡幾三年矣脈浮細急數按之空虛而
尺尤甚用薛立齋腎虛火不歸經法以加減八味丸
料二劑卽愈此案初試立齋先生法紀其捷效如此

芷園臆草存案

十

爲近世高明之家獨出奇見欲超出規矩繩墨之表
不知視立齋爲何如

德清沈君魚文學教子甚勤自提抱便以碁子寫易
簡字嬉戲中教之識取學語則引和詩章讀書則限
數褪背對課先從一門如天文日月星辰類使之盡
明次教地理等然後天文地理等串合虛實錯綜焉
極易通曉山之作破承文字法頗精簡當講書必使
其從胸中知處透明以俚俗語易經傳義其長公十
歲便能屬文三四藝無難色然兒肆成而自身病矣
亦無他恙止是畏死龜卜筮數無不叩名醫之門無

不造一日就診為之立方用藥導論千萬言畧覺釋然明日侵晨又來求診以上當十日死子遂留宿齋頭大壯其膽指諸葑山叩問谷禪師授參究法參百日念頭始定而全安矣戊午過東瀛吳對亭大參山房晤言及先時恐懼狀蓋君魚善慮慮出于肝非思之比思則志氣凝定而慮則運動展轉久之傷肝肝血不足則善恐矣情志何物非世間草木能變易其性唯參禪一着內忘思慮外息境緣研究性命之原寧為生死所惑是君魚對証之大藥也君魚病良已能了知此藥物否不覺默然

芷園臆草存案

上

永嘉何介甫文學性沉靜病脾數年飲食少啖精神萎悴辛酉七月就診兩關軟弱不透于寸用參苓歸芍陳皮防風甘草數十劑至九月始歸遂善啖肥濃數年之疾脫然壬戌春再過錢塘携美人蕉佛桑花贈遺特盛問曰子疾有年補脾補腎法非不詳而未之效君何從平易得之子曰君疾在肝非脾腎也凡診病者當窮其源無為証惑如飲食少雖關脾胃其所以致脾病者何故此自當審者今君兩關脈弱不透于寸右固脾虛明矣而左則何應此蓋脾體不足而脾用不行也何謂脾之用肝也星家取尅我者為

用神脾體無肝木為之用則氣血便不條暢運化遲鈍而脾轉困矣且秋令金肅肝更不伸子為補助肝木之氣使之揚溢則脾土伸舒精神油然外發雖不治脾實所以治也安用奇特之法哉子政恐不能平易耳平易之言學之所未能者今請事斯語吳叔顯上舍庚申三月生瘡服藥瘡已愈而喘急殊甚十日不能就枕予往診之先用開肺發瘡次用降氣補腎斷其二日當瘡發五日當足腫六日當出水十日可喘定就睡嗣後足生二毒三月始復秋之白下就國學讀書次年七月偶以傷風微熱左三部脈

芷園臆草存案

上

唯隱隱見飲大劑人參歸苓甘草十帖脈方起二十帖如常十月再感左脈更不如秋但微熱而起居如故也三日就枕七日頭疼如破因告其兄極道秋病之危今君昏沉決無生理彼尚疑余言九日果微昏錯語十二日不識人再七日死其族昆問曰叔顯昨歲垂危君言變証歷歷如響幸全生焉今冬示微恙果應君言而歿其症其因為一為兩答曰叔顯骨氣天弱腎精不全其瘡亦從腎發也不知而用發散藥元氣轉耗瘡毒內逆于肺而喘子用四逆散使太陰氣開瘡遂外出用六味料使少陰納氣息遂內勻清

升濁降足。腫生癰病都外去。是以生也。今秋左脉不起。知元氣內索。不堪左旋矣。比起而再戕賊之。病發于骨髓。所以腦痛。因之遂昏。乃內關之証。氣獨內絕。是以死也。論其根本。皆出于腎。是一非兩。不在証之輕重為異同也。

蜀富順孝廉阮太和。諱士肅。病寓吳山下。召子診。披衣強坐。對語甚莊。神氣則內索也。身熱進退。舌胎黃而厚。蓋自吳門受寒。以內羹為補。而時吸之。遂纏綿。及月余。用疎散輕劑。熱退。又復強啖。再熱。不能起坐。子時之富春五日。歸診之。譫妄呼笑。不識人。已三日。

芷園臆草存案

三

形骨立。汗雨下。內熱特甚。而胸脇之熱。捫之烙手。芤脉尚有神。子用人參八錢。加四逆散中一劑。而譫妄定。三劑而熱邪清矣。自言其神魂窮天之上。極地之下。飛揚奇變。得太乙神符名之。始得還生。愈彌旬。方吸粥。病中自為之記。別時問藥狀。余謂此寒傷心氣。荏苒厥深。而奏于胸也。緣以不第南旋。病淹中道。骨內之音。雖近實遠。藥石之給。既缺且竭。心已傷矣。又反覆再四。汗液多亡。內無主宰。熱遂入胸。胸為心主之宮城。精神因而渙散。是以遊魂為變也。用四逆使熱外出。知人參俾神內凝。氣復邪散。是以生耳。

芷園臆草存案

誌甯豐婦婁富陽周。婦馬皆少年水腫。肢體洪盛。臚腹膨脹。水道不通。飲食絕口。有以為疰者。為鼓者。為氣者。子往診之。以藥不克濟。乃針足上出水。皆石餘。次日脹小。減三日。大減。足尚腫。又針之。令服八味丸。以溫其腎。期年皆孕。婁善調護。子母兩全。馬失調護。子母俱斃。此蓋腎中陽氣不足。陰氣有餘。遂聚水而病。作飲食湯藥。用水而不能導之。轉轉助長。乃致于此。非針去水。則菀陳之淤。何從而泄。水去腎衰。非溫補之。則濁凝之陰。必致復聚。腎中之火。大復。然周身之陽氣。有蒂。天癸自行。生育可必。如流離之後。所宜

芷園臆草存案

四

愛養得之。則生聚。否斯待斃耳。庚申臘月二十七夜。子患腹痛。惡寒泄瀉。平旦且止。至暮復作。明日又止。至改元五日。肛左微痛。起因房室。意為腎泄。服四神丸。一大劑。泄痛竟止。早間肛左稍有核。其痛漸近。尾間。暮痛不可反側。次暮以水化熊胆塗之。立覺涼氣直上。肺左痛亦漸緩。略堪展轉。中夜吐痰。痰內見血一二點。辰時痔出白厚膿。竟可起坐。十一日早。與人多話。方梳髮。血從咳至。作意忍之。氣定且止。煎六味丸料服。亦以為腎虛也。暮就枕。夜半睡覺。血印上湧。如潮。喘聲如鋸。進童便及六味

煎藥氣稍定，纔間薑湯氣觸鼻，血即隨湧，且始緩夜再發，如前。凡假寐片晌，背心蒸熱，即血來咽喉，如截斷一湧，盈掬，心急躁亂，欲多語言，聲一響而血游至矣。十三早議下，莫敢應，至晚勢急，似無生理，乃用瀉心配血藥下之，不應。夜方大雪，點水成凍，用水調大黃末服，轉欲去衣被，啜茶連苦藥如甘旨。至五更強進清米飲，藥力忽轉，解黑糞，瘀泥臭穢不可近。凡三次血來之勢少平。十五寅時交立春，以建寧老蓮煎濃湯呷之，甚美。少間足心汗出，次手心出，次背心蒸蒸欲出，一日安和。至暮以多語言吐鮮血數口。

芝園臆草存案

五

頤兒引仲景義以赤小豆連翹合瀉心方法服之，覺上身氣即開，臍以下不動而悶汗出，似前者三日血亦漸減。二十外大便自解，如青泥，次解如鐵彈者二三枚，血方淨盡，嗟嗟未解之前幾至不免汗出之後始有生機。迨思病發之由，十月曾暴怒，頓足叫呼，氣喘如食頃，臘月十七圍爐露坐大半夜，指爪朝來盡折，方旬遂病，蓋自十月便不能構思看書，亦不深入。近覺神思昏昏者，淡旬病乃大重，余作醫二十年，治吐血症衆，往往起其危疑，及自懼此便無至，聯如因房室起病，泄瀉在夜，服四神而病已益信為腎虛不

疑豈知服四神六味反為助長，以致病甚。若非偶中仲景方法，死不免矣。原余之疾本于寒傷陰分，而寒水之氣當乘心火陰分之邪，宜應迫血用補腎血劑，偏助寒氣，愈凝血液，火故暴焚，血雷轉瘀也。立春陰分汗出，勢自然解，瘀穢下盡，血方始清，初以微寒竟成大禍，用藥之難，慣見且誤如臟毒之疼痛吐血之喘急，須認其原從寒生，但當未解時，縱有人指出端倪，恐自亦不信也。而况不知醫者乎？故審疾處方，不可執定規矩，今人知是吐血，便用止血行血順氣降氣種種方法，豈非妙理若不深中肯綮，反成毒害，慎

芝園臆草存案

六

之慎之病愈四十日，方能策杖盤躡室中，出寄紫芝禪室，靜言思之，殊自可醜，簡出成按用供博採，按成客讀之難，曰吐血之因起自于寒，容或有之，血湧之狀以為非火實難深信，且水之與火不可同語，至何說以通之余，曰人生氣交中，平時惟一太極內含陰陽五行之妙，不可得見其端倪，病則偏而動陰陽五行，自相摩盪如止水之風，自有波瀾也。設若受寒即見寒之氣象，便是波瀾內撼其機，變現傾移，往復之相所謂一而二矣。故凡人傷于寒則為病，熱則火反病也。受一分寒，倒見一分火，寒有十分則火有十

分者勢也。理也。吐血固為火象。其所以然。實寒氣抑之。鼓之而火始有力。病之本源。不在乎火。而在于寒。明矣。豈得意以象火而歸重于火耶。治病必求于本。必審于因。毋以形似害其義也。客問傷寒當分六經。君之吐血。屬于何經。曰。寒者。冬時之令也。人病因此。先動氣化。余病在氣化。中論之。不入經也。入經便有定位。便可標的。指示自是。傷寒一家。宜應別論。余初冬。怒甚。便當動血。雖不嘔。出血。奚其清。而寒復傷榮。藥偏補腎。其滔天驚人者。勢使然也。客問設以為寒。何不發散。而以苦寒下之。實有似乎治火矣。又用赤

芷園臆草存案

七

小豆連翹者何義。噉蓮肉湯而得汗者。又何故也。曰。寒之害人。當分陰陽表裏。余受寒于夜。舊濁其血。故邪湊其陰。而陰屬有形之榮。所處深密。非表病之當發散者也。寒凝火鬱。理必炎上。非苦寒之味。從火之性。而使之降。其熱未可服也。火熱鬱勃。勢雖燎原。原從制抑所生。須作不足論之。仲景云。心氣不足。吐血衄血者。瀉心湯主之。瀉心者。瀉血分有餘之邪。使之相平乎。不足之氣也。心有不足。血無所主。兼併舊畜之瘀。鬱遏甚。而致暴挾。載血上行。倉皇海安。非下有形。安竟效哉。顧苦寒下法。似乎降火。不知火之成

芷園臆草存案

患政在不得上炎。有形能去。火空斯發。心氣無虞。不足矣。故知心氣不足之從來。實在堅凝閉密之寒。火得疏通。安問堅凝閉密者乎。則奚為治火。實散寒也。其用連翹之易散。假赤豆之色。同皆欲心氣之開。自無堅凝之害。至若蓮得夏氣之英華。子中復含甲用。透心之端倪者。心氣偏鬱于陰。透之還從陰出。又汗為心液。而從手足陰分。外發則蓮子之用。若神助焉。客問服四神一劑。而泄痛止。六味數進而喘急平。已見成効。何得以之為助長也。曰。余疾之來。始于盛怒。成于受寒。發于房室。三因較之二。分有餘。一分不足。

芷園臆草存案

六

今以四神之堅固。六味之填塞。則腎平矣。而寒水合德。嚴凝甚深。抑火燔炳。非無所自。且藥石之力量。氣血之轉移。祇在毫芒之間。可輕試耶。助長之言。識法自懼耳。客問睡覺血湧。源從何出。此從胃溢出。雖有咳喘。非闕肺也。若自喉來。為真藏證。斷無生理矣。曰。胃經雖多氣多血。吐時盛甚。中有幾何。能若是耶。蓋此從胃出。非胃中來。第自暴怒。傷肝血藏之機。不無沸擾。况是冬時。閉藏不密。浸至于寒。榮遂大泄。周身之血。不凝而濁矣。人臥血歸平和。肝乃納之。今其濁矣。遂會流于胃海。醒時生氣上升。乘之汎濫。滿出耳。

九

客曰聞薑便吐亦生氣之升乎曰血流在胃經以藥力薑氣辛烈觸彼將來之勢遂復湧起無足怪者客曰未吐血時先見神昏者何故曰此畜血之徵也血在上則喜忘在下則如狂昏正喜忘之別稱躁妄如狂之氣象也心主血又主神血無主則妄動神無主而狂與忘隨之矣客曰心氣不足與脈合否曰從病以來脈氣弦弱獨左寸不透正心氣不足之徵而弦則肝之變動為寒外束之象也客曰吐血之因于寒義有三隅之反則風暑燥濕四氣亦可例之否曰天地之間六合之內氣一而已因時之化則有六者之

芷園臆草存案

元

別實五氣耳謂之同品可以因寒自然四氣亦可例之矣然亦可以推深而論如吐血病之一證也則凡可以證稱者皆當用五氣貫之此則萬病之肯綮也客曰病若亟時脈已散亂當至何者用藥曰此當據症不必脈也方此之際生死在指顧中如雨軍相敵非此則彼全在至將有膽力以持之耳余昔曾治一通家子暮方吐血心煩目眩眷屬環繞驚惶擾亂余乃遣其眷屬一手扶掖一手與藥久之自煩而逝乃按臆隱忍堅持不失俟自安定再與調護遂得轉危為安可見至之者須要大有力量拚身向往病者方

有依怙若不按臆不耐性頑已身不顧人命呼吸之間便分生死安可忽諸

錢塘盧不遠明之萬曆天啟間人雖隱于醫然不妄交遊生平與閑子將巖忍公諸文人詩酒往來為肺腑友其沒也巖印持為作傳徐之垣為作行狀李長蘅為作墓表陳元暉為作誌銘悉一時名士他可知矣又嘗遊慈山蓮池閣谷三大師之門故於釋理尤多解悟嘗言上雙徑白雲山訪聞谷師聆其談參禪悟道法因思醫道亦當從參悟入門如河間是從火鬱發之一

芷園臆草存案

三

句悟入東垣是從陽生陰長一句悟入立齋是從一者因得之一句悟入既得入門則中堂與室自能觸處皆通矣其所著有金鉅釋文有芷園覆餘有芷園日記有藥性題後有本草約言有勘方有仰背側人圖說諸種其語多另出新義不辭前人牙後慧閱之能啟發人無限心智蓋由參悟而得者故如此晚年又著本草博議未成而病亟囑其兒子由續之曰是書成吾不死矣其後子由別撰本草乘雅中間所引先人博議云一即其書也讀者見其豎義能發前人

所未發欲盡求原稿讀之不知原稿已盡載乘
雅中矣

乾隆乙酉涂月立春前二日甲子錢江王琦跋

芷園臆草存案

王

芷園臆草存案跋

臨證指南醫案

〔清〕

葉桂撰
華岫雲輯

據浙江圖書館藏清乾隆三十三年衛生堂刻本影印原書版
框高一九三毫米寬二七四毫米

乾隆三十三年鑄

張英士先生著

臨證指南醫案

衛生堂藏

臨證指南醫案 序

夫事之最切於日用者
莫如醫故自軒岐道興
而靈素以下代有名人
歷有著述盧扁以後如
仲景所著傷寒金匱直

序

啓靈蘭之秘洩玉版之
文至若河間東垣丹溪
亦迥出凡流合仲景稱
爲四大名家傷寒暨雜
證之治療法云備矣世

咸宗之但仲景之書辭
義古奧雖經諸名家之
註疏亦未能盡晰其理
近代以來薛立齋張景
岳喻嘉言等皆本之靈

序

二

素或作或述其於諸證
皆有發明迨柯韻伯所
註傷寒能獨開生面惜
其書尚未廣行於世其
他則間有心悟闡揚亦

不能無偏執之弊矣我

皇上仁育為懷命太醫院考
覈前賢精義彙輯金鑑
錄一書頒行海內集諸
賢之大成開後人之心

序

三

法壽世福民孰有善於
此哉夫醫者意也方者
法也神明其意於法之
中則存乎其人也父子
不相授受師弟不能使

巧也吳閻葉君天士稟
賦靈明造詣深邃其於
軒岐之學錯綜融貫處
方調劑立起沉疴故名
播南北所遺醫案與方

序

四

膾炙人口華君岫雲婆
心濟世輯而成帙別類
分門將付剞劂而請序
於余余繙閱再過實足
以啓迪後人使好學深

思者觸類引伸未必非
濟世之一助至進而求
其所以然彼靈素諸書
具在而心領神會則又
存乎其人也云爾

序

五

乾隆二十九年歲次甲
申秋七月旣望吳江李
治運題於太薇清署



吾吳葉天士先生以岐黃妙術擅名於時者五十餘年凡一時得奇疾而醫藥罔效者先生一診視而洞悉源委投以斤劑沉痾立起遠近之向風慕義者無間言余舊居胥江與葉氏世屬通家其門牆桃李亦皆至戚舊交心神其術曰錄其方案成帙藏之有年方欲公諸天

下今錫山華君岫雲為之分別門類授之梓人余喜君之與余有同心也曰任校讐編輯之役書既成君囑余書其緣起夫良醫之功同良相人所稔知也然良醫不能使其身壽同金石而屢試其技於後人亦勢之無可如何者矣今得同心者彙錄其成案而使後人有所取

法觀摩其功願不俾歟使後有能者得是編而神明變化之則先生之遺澤流被於千百世而無窮而先生不死矣今日是書之成爰書其大畧如左
乾隆歲次丙戌季秋李國華大瞻識



醫之為道微矣七情六氣之感病非一端溫涼寒熱之性藥非一類非天資高妙者不可以學醫非博極羣書者亦不

序

足以語醫也今之醫者或記醜而不精於審脈或審脈而不善於處方或泥古而不化或師心而自用或臨症不多或

狃於偏見不能已疾而轉以益疾又烏可以言醫哉吳門葉天士先生天分後人於書無所不讀終身不能忘其視脈

序

也不待病者相告信而推述病源有病者思而後得之者不啻日周旋於病者之側而同其寢興飲食孰其喜怒驚悲

也蓋以其意深識病者
之意而又神明乎古人
處方之精意而直以意
斷之故其處方也一二
味不為少十餘味不為

序

三

多習見不妨從同獨用
不嫌立異輕重繫於杪
忽之間而其效在乎呼
吸及數十年之後投之
所向無不如意迎刃而

解渙然冰釋先生之名
益高從遊者日益衆而
先生固無日不讀書也
嘗記余鄉人有患痼疾
者問伯先生所為處方

序

四

授之曰服此百劑終身
不復發矣其人歸服至
八十劑蓋已霍然者月
餘矣乃止不服逾年病
復發復伯先生所先生

曰是吾令服某方百劑者何乃如是其人以實告令再服四十劑即永不發矣卒如言其神妙若是是豈俗手之意為

序


五

增損者可同年而後哉今所存醫方若干卷皆門弟子所錄存者學者能讀其書以通其意則善矣

乾隆丙戌嘉平錫山拙

脩嵇璜書於徇秋書

屋



序

六

古人有三不朽之事為立德立功立言也蓋名雖為三而理實一貫要之惟求有濟於民生而已夫有濟於民生則人之所重莫大乎生死可以拯人之生死雖韋布之士亦力能為者則莫若乎醫故良醫處世不矜名不計利此其立德也挽回造化立起沉痾此其立功也闡發蘊奧與聿著方書此其立言也一藝而三善咸備醫道之有關於世豈不重且大耶故上古聖帝辨晰陰陽審嘗氣味創著內經垂不朽之仁慈開生民之壽域其大易本草靈素諸書炳若日星為萬世不磨之典厥後亦代有名賢窮究其理各有著述開示後人以冀共躋仁壽無如後世習是業者其立志存心却有天理人欲之兩途如范文正公雖不

臨證指南醫案

序

業醫而其所言不為良相即作良醫者斯純以利濟為心者也俗諺有云秀才行醫如菜作菹者此淺視醫道僅為衣食之計者也夫以利濟存心則其學業必能日造乎高明若僅為衣食計則其知識自必終囿於庸俗此天理人欲公私之判也故每閱近代方書其中有精研義理發前人未發之旨者固多亦有徒務虛名之輩輒稱與貴顯某某交遊療治悉屬險證如何尅期奏效刊成醫案妄希行世不知此皆臨證偶爾倖功乃於事後誇張虛語欺誑後人以沽名譽則其書謬誤不足信也噫欲求遵嘉言喻氏遺法臨病先議證後立方其於未用藥之前所定方案無一字虛偽者乃能徵信於後人但執此以繩世誠不

易多得也惟近見吳閻葉氏晚年日記醫案辭簡理明悟超象外其審證則卓識絕倫處方則簡潔明淨案中評證方中氣味於理昭合能運古法而仍周以中規化新奇而仍折以中矩察其學識蓋先生固幼稟穎絕之才眾所素稔然徒恃資敏若不具沉潛力學恐亦未易臻此神化也惜其醫案所得無多不過二三年間之遺帙每細心參玩祇覺靈機滿紙其於軒岐之學一如程朱之於孔孟深得夫道統之真傳者以此垂訓後人是即先生不朽之立言也故亟付剞劂以公諸世至其一生之道稿自有倍蓰於此箇中義理必更有不可思議者自必存在諸及門處什襲珍藏尚未輕以示人也然吾知卞氏之玉豐城之

臨證指南醫案

序

二

劍其精英瑞氣斷不至於泯沒自必終顯於世只在先後之間耳倘有見余是刻能悉將先生遺稿急續刻行世此豈非醫林中之大快事抑亦病家之大幸事也諒亦必有同志者余將翹企而望之因以為序

乾隆三十一年歲次丙戌季冬錫山華岫雲題



天地之大德曰生醫者贊天地之生者也上古三皇憫下民之
夫扎迺垂卦象以明陰陽消長之機辨氣味以審五行生尅之
理著靈素以立萬世醫學之原大哉至哉非懷胞與之仁慈稟
天資之聖智者其孰能之軒岐以後亦代有明哲之士窮理致
知闡揚斯旨但理道淵深其與難窺故雖懸壺之士如林而洞
垣之技罕觀苟有能不盛盛虛虛而遺人天殃者則已幸矣近
代以來古吳有世醫天士葉君者學本家傳道由心悟吾鄉與
吳郡接壤猶憶曩時凡知交患證棘手瀕於危者一經調劑無
不指下回春其聲譽之隆不特江左一隅抑且名標列省惟是
應策多門刻無寧晷未遑有所著述以詔後世人皆爲之惋惜

臨證指南醫案

序

近有岫雲華君購其日診方案欲付之梓以公諸世請序於余
余雖習醫有年愧未能深知醫理然觀其論證則援引羣書之
精義擬法則選集列古之良方始知先生一生嗜古攻研蘊蓄
於胸中者咸於臨證時吐露毫端此卽隨證發明之著作也其
於陰陽虛實標本格致之功實足以上紹軒岐下開來哲以此
行世凡醫林之士見之自必勤求古訓博採衆方迨將日造乎
高明庶不致臨證有望洋之嘆則此帙實濟世之慈航也故爲
之序

乾隆丙戌仲秋錫山邵新甫題



凡例

一此突出自數年採輯隨見隨錄證候錯雜若欲考一證難於
彙閱余不揣固陋稍分門類但兼證甚多如虛勞欬嗽吐血
本同一證今各分門是異而同也卽如欬嗽有虛實標本六
氣之別今合爲一門是同而異也如暑濕而兼癰痢脾胃病
而兼嘔吐腫脹凡若此者不可勝數欲求分晰至當不易余
本不業醫且年已古稀自謝不敏請侯高明之輩翻刻改正
一一證之中有病源各異如虛勞有陰虛陽虛陰陽兩虛之不
同若再分門恐有繁冗之嘆今將陰虛先列於前繼列陽虛
繼陰陽兩虛使觀者無錯雜之憾餘門倣此

臨證指南醫案

凡例

一此案分門類時已剔去十之二三今一門之中小異而大同
者尚多本應再爲剔選但細閱之小異處却甚有深意故不
敢妄爲去取且如建中湯麥門冬湯復脈等湯稍爲加減治
證甚多若再爲刪削不足以見先生信手拈來頭頭是道其
用方變化無窮之妙矣
一每閱前人醫案治貧賤者少蓋醫以濟人爲本視貧富應同
一體故此案不載稱呼僅刻一姓與年歲如原案已失記者
則以一某字代之至於婦女之病年高者但將一媼字中年
者以一氏字年少用一女字別之然有本係婦女而案中未
經註明者甚多不敢臆度爲分別

一醫道在乎識證立法用方此為三大關鍵一有草率不堪為
司命往往有證既識矣却立不出好法者或法既立矣却用
不出至當不易好方者此謂學業不全然三者之中識證尤
為緊要若法與方只在平日看書多記如學者記誦之功至
於識證須多參古聖先賢之精義由博反約臨證方能有卓
然定見若識證不明開口動手便錯矣今觀此案其識證如
若洞垣所用法與方皆宗前賢而參以己意稍為加減之故
案中有並非杜撰之句余頗業醫者於識證尤當究心如儒
家參悟性理之功則臨證自有把握然後取此法與方用之
必有左右逢源之妙矣倘閱是書者但據拾其辭句動襲其

臨證指南醫案

凡例

二

方藥藉此行道為寬利之計則與余刻是書之一片誠心大
相悖矣幸後之覽者捫心自問切勿墮落此坑塹
一此案須知看法就一門而論當察其病情病狀脈象各異處
則知病名雖同而源不同矣此案用何法彼案另用何法此
法用何方彼法另用何方從其錯綜變化處細心參玩更將
方中君臣佐使之藥合病源上細細體貼其古方加減一二
味處尤宜理會其辨證立法處用硃筆圈出則瞭如指掌矣
切勿草率看過若但得其皮毛而不得其神髓終無益也然
看此案須文理清通之士其虛心活潑靈機曾將靈素及前
賢諸書參究過一番者方能領會此中意趣吾知數人之中

僅有一二知音潛心默契若初學墮者之人未能躡等而進
恐徒費心神耳

一此案惟關火證一門蓋火有七情六氣五志之不同證候不
一難於彙輯故竟不分門至於傷寒惟太陽初感風寒為甚
少寒既化熱之後種種之證散見諸門者頗多觀者自
能會意勿謂先生長於治雜證短於治傷寒觀其用仲景諸
方活潑潑地即可以知其治傷寒之妙矣

臨證指南醫案

凡例

三

或可權衡輕重至於治法則不可移易蓋先生立法之所在
即理之所在不遵其法則治不循理矣南北之人強弱雖殊
感病之由則一也其補瀉溫涼豈可廢繩墨而出範圍之外
乎况姑蘇商旅雲集案中豈之北省之人豈不必因其輕淡
而疑之或又曰案雖佳但未知當將悉能於否余曰萬事不
外乎理今案中評證方中議藥咸合於理理設施自必有
當至於效與不效安得人人而考較之哉
一案中有未經載明難於稽考處如藥味分量炮製丸方煎方
相混與所服劑數多寡若平補之方竟有連服百劑者更有
一人聯用幾方者其間相隔日月遠近辨四季時令俱未註

明惜皆無考全在觀者以意會之可也

一每門之後附論一篇者因治法頭緒頗繁故摯其綱領稍為敘述之以便後人觀覽又恐業醫之輩文才有淺深遂約同志措辭不必高古觀者幸勿因其俚鄙而忽之

一案中所用丹丸有一時不能猝辦者如紫雪丹至寶丹驚甲煎丸玉壺丸等類若有豐裕好善之家依方虔誠合就售與病人既可積德亦不至於虧本

一此案之刻不過一嚮之味耳本欲再為購求廣刻行世奈無覓處倘同志之士有所珍藏亦願公諸於世者恭俟再商續刻然此案雖非全璧實具種種良法已足啓發愚蒙嘉惠來

臨證指南醫案

凡例

四

茲學者苟能默契其旨大可砥時醫庸俗膚淺呆板偏執好奇猛浪膽怯諸弊其於醫學有功不小

一凡治諸證俱有初中末三法如傷寒初起邪在太陽則用麻黃桂枝青龍等湯瘧證初起則用小柴胡加減痢證初起先用芍藥湯加減日疾初起則用柴薄荆防以升散之此皆初

治之大畧也 所輯之案大凡治中治末者十居七八初治者不過十之二其故何歟蓋緣先生當年名重一時延請匪易故病家初起必先請他醫診視迨至罔效始再請先生耳故初治之案甚少觀是書者其中先後淺深層次不可

紊亂須細心審察而行之

華岫雲識

臨證指南醫案 總目

臨證指南醫案總目

卷一	中風	肝風	眩暈	頭風
卷二	虛勞	吐血	失音	肺痿
卷三	遺精	淋濁	陽痿	汗
卷四	積聚	痞	噎膈	噎噎
	嘔吐	吐衄	不食	腸痺
	便秘	肺痺	疔瘡	疔
	喘	呃	疽	
卷五	風	寒	風溫	溫熱
	暑	濕	燥	疫
卷六	鬱	肝火	不寐	驚
	三消	脾瘕	瘧	瀉
卷七	痢	便血	脫肛	痿
	痺	癰脈	驚	癰爛
卷八	衄	疝	頭痛	心痛
	胃脘痛	脇痛	腹痛	肩臂背痛
	腰腿足痛	諸痛	耳	目

鼻	牙	咽喉	瘡瘍
卷九 調經	淋帶	崩漏	胎前
產後	癥瘕	熱入血室	
卷十 幼科要畧	痧疹	痘	疳
吐瀉	痢症厥	虫	集方
臨證指南醫案			
總目			
二			

臨證指南醫案目	
卷一	
中風	
肝風	
眩暈	
頭風	
虛勞	
臨證指南醫案	
卷一 目	

臨證指南醫案卷一

許關李大瞻翰圖

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲司校

邵銘新市

中風

肝腎虛
內風動

錢 偏枯在左血虛不榮筋骨內風襲絡脉左緩大

製首烏四兩 煨 枸杞子去蒂 二兩 用酒洗 歸身二兩 用酒洗

淮牛膝二兩 蒸 明天麻二兩 用酒洗 三角胡麻二兩 打碎水

黃甘菊三兩 煎汁 川石斛四兩 煎汁 小黑豆皮四兩 煎汁

臨證指南醫案 卷一 中風 一

用三汁膏加蜜丸極細早服四錢滾水送

陳四十 肝血腎液內枯陽擾風旋乘竅大忌風藥寒涼

炒杞子 桂圓肉 炒菊花 炙黑甘草

黃芪去心 牡蠣

金 失血有年陰氣久傷復遭憂悲悵鬱陽挾內風大冒

血舍自空氣乘於左口喎肢麻舌暗無聲足痿不耐行

走明明肝腎虛餒陰氣不主上承重培其下冀得風熄

議以河間法

熟地四兩 牛膝一兩 萸肉二兩 遠志一兩 炒黑

杞子二兩 菊花二兩 炒 五味一兩 川斛二兩 四錢

茯神二兩 淡從蓉乾一兩 加蜜丸服四錢

沈四十 脉細而數細為厥陰之虧數為腎液之耗上年夏

秋病傷更因冬暖失藏入春地氣升肝木風動遂令右

肢偏痿舌本絡強言蹇都因根帶有虧之症庸俗泄氣

降痰發散攻風再劫真陰漸漸神憤如寐倘加昏厥將

何療治謹用仲景復脈法 復脈湯去姜桂

又 操持經管神耗精損遂令陰不上朝內風動躍為非

中之象治痰攻劫溫補陰愈損傷枯槁日甚幸以育陰

熄風小安今夏熱益加發泄真氣更虛日餌生津益氣

勿息大暑不加變動再商調理固本丸去熟地加北味

臨證指南醫案 卷一 中風 二

天冬 生地 人參 麥冬 五味

金六 初起神呆遺溺老人脈中顯然數月來夜不得寐是

陽氣不交於陰勿謂痰火而以攻消乃重虛不納識與

潛陽

龜腹甲心 熟地炭 乾從蓉 天冬

生虎膠骨 淮牛膝 炒杞子 黃柏

盧 慎怒動陽恰值春木司升厥陰內風乘陽明脉絡之

虛上凌咽喉環遶耳後清空之地升騰太過脂液無以

營養四末而指節為之麻木是皆排中根萌所謂下虛

上實多致巔頂之疾夫情志變蒸之熱閱方書無不遵

苦降羌防辛散之理肝為剛臟非柔潤不能調和也

鮮生地 玄參心 桑葉 丹皮

羚羊角 連翹心

又 生地 阿膠 牡蠣 川斛 知母

汪三五左肢麻木。膝蓋中牽縱忽如針刺中年後精血內虛

虛風自動乃陰中之陽損傷

淡從蓉乾 兩 枸杞 三兩 歸身 二兩 生虎骨 二兩

沙苑 兩 巴戟天 二兩 明天麻 二兩 桑寄生 四兩

精羊肉膠阿膠九早服四錢交冬加減用人參丸服

錢五八用力努汗精從溺管瀝出已經兩耳失聰腎敷失司

臨證指南醫案 卷一 中風 三

顯然虛象凡腎液虛耗肝風鳴張身肢麻木內風暗擊

多有痺中之累滋液熄風溫柔藥涵養肝腎經言肝為

剛臟而腎臟惡燥若攻風劫痰捨本求末矣

熟地 枸杞 從蓉 石菖蒲

當歸 沙苑 巴戟 遠志

張四九中風以後肢麻言蹇足不能行是肝腎精血殘憊虛

風動絡下寒二便艱阻凡腎虛忌燥以辛潤溫藥

從蓉 枸杞 當歸 柏子仁

牛膝 巴戟 川斛 小茴

陳五九中絡舌暗不言痛自足起漸上麻木腹脹已屬痼疾

參苓益氣兼養血絡僅堪保久

人參 茯苓 白朮 枸杞

當歸 白芍 天麻 桑葉

周 大寒土旺節候中年勞倦陽氣不藏內風動越令人

麻痺肉瞶心悸汗泄煩躁乃裡虛欲暴中之象議用封

固護陽為主無暇論及痰飲他岐

人參 黃芪 附子 熟朮

某 陽明脈絡空虛內風暗動右肩肘及指麻木

玉屏風散加當歸天麻童桑

俞氏 寡居一丁四載獨陰無陽平昔操持有勞無逸當夏

臨證指南醫案 卷一 中風 四

四月陽氣大泄主令忽然右肢麻木如墮不舉汗出麻

冷心中卒痛而呵欠不已大便不通診脈小弱豈是外

感病象似乎痺中其因在乎意傷憂愁則肢廢也攻風

劫痰之治非其所宜大旨以固衛陽為主而宜通脈絡

佐之

桂枝 附子 生黃芪 炒遠志

片姜黃 羌活

唐六男子右屬氣虛麻木一年入春日眼垂邪乃虛風內

動老年力衰當時令之發泄忌投風藥宜以固衛益氣

人參 黃芪 白朮 炙草 廣皮

歸身 天麻 煨薑 南棗

凡中風症有肢體緩縱不收者皆屬陽明氣虛常用
人參為首藥而附子黃芪炙草之類佐之若短縮牽
掣則以逐邪為急

風陽燥 胡五 陽明脈絡已空厥陰陽氣易逆風勝為腫熱久為燥

面熱喉舌乾澀心中填塞無非陽化內風胃受衝侮不
飢不納矣有年久延頗慮非中

羚羊角 蓮翹 丹皮 黑山梔

青菊葉 玄參 花粉 天麻

張五 升 張七 辨中經年眩暈汗出陽氣有升無降內風無時不動

臨證指南醫案 卷一 中風 五

此竟夜不寐屬衛陽不肯交於營陰矣沉痾之症循理
按法尚難速效紛紛亂藥焉望向安議用固陽明一法

桂枝木 生黃芪 川熟附 炒遠志

龍骨 牡蠣 薑 棗

劉三 神傷思慮則肉脫意傷憂愁則肢廢皆痿象也緣高
年陽明脈虛加以愁煩則厥陰風動木橫土衰培中可
效若窮治風痰便是劫燥則謬

黃芪 於朮 桑寄生 天麻 白茯苓

當歸 枸杞 菊花汁 加蜜丸

包 老年隆冬暴中乃陰陽失交本病脈左大右濡內風

據越中陽已虛第五日已更衣神憊欲寐宗王先王議

陽明厥陰主治法以候裁

人參 茯苓 白茯苓 炒半夏

炒杞子 甘菊

某 陽明虛內風動右肢麻痺痰多眩暈

天麻 鈎藤 半夏 茯苓 廣皮

風絡熱 沈 風中廉泉舌腫喉痺麻木厥昏內風亦令阻竅上則

語言難出下則二便皆不通調考古人呂元膺每用芳

香宣竅解毒勿令壅塞致危也 至寶丹 四九 勻四服

葛三年未四旬肌肉充盈中病二年猶然舌強音塞舌厚

臨證指南醫案 卷一 中風 六

邊紫而納食便溺仍好乃心胞絡間久積之熱瀰漫以
致機竅不靈平昔酒肉助熱動風為病病成反聚於清

空之絡醫藥之治痰治火直走腸胃是以久進多投無

效 至寶丹

風濕中 程 脈濡無熱厥後右肢偏痿口喎舌歪聲音不出此陰

風濕中於脾絡加以寒滯湯藥蔽其清陽致清氣無

由展舒法宗古人星附六君子湯益氣仍能攻風祛痰

若曰風中廉泉乃任脈為病與太陰脾絡有間矣

人參 茯苓 新會皮 香附汁

南星 薑汁炒 竹節白附子 薑汁炒

呂九陽邪襲經絡而為偏痺血中必熱又灸反助絡熱病劇廢食清涼固是正治然須柔劑不致傷血且有熄風功能

犀角 羚羊 生地 玄參

連翹 橘紅 胆星 石菖蒲

楊中後不復交至節四日寒戰汗泄遂神昏不醒是陰

陽失於交戀真氣欲絕有暴脫之慮擬進回陽攝陰法

人參 乾薑 淡附子 五味 猪胆汁

又人參三錢 附子三錢

又人參 附子 五味 龍骨 牡蠣

臨證指南醫案 卷一 中風 七

肝風動脈虛數病在左軀腎虛液少肝風內動為病偏枯非外來之邪

製首烏 生地 杞子 茯神

明天麻 菊花 川斛

徐水虧風動舌強肢麻中絡之象當通補下焦視以清

上

熟地 淡從蓉 杞子 牛膝

五味 遠志 羚羊角 茯苓

麥冬 菖蒲 蜜丸

大寒節真氣少藏陽挾內風旋動以致癱瘓 遺赤

中有首滯忌投攻風劫痰益腎涼肝治本為法

生地 玄參 麥冬 川斛

遠志 石菖蒲 煎漿

會二脈弦動眩暈耳聾行走氣促無力肝痔下垂此未老

欲衰腎陰弱收納無權肝陽熾虛風蒙竅乃上實下虛

之象質厚填陰甘味熄風節勞戒飲可免仆中

虎潛去鎖陽知母加大肉從蓉煉蜜丸

張脈細小帶弦冬季藏納少固遂至癱中百餘日來諸

患稍和惟語言欲出忽塞多言似少相續此皆腎脈不

管舌絡以致機竅少宣乃虛象也早用地黃飲子煎法

臨證指南醫案 卷一 中風 八

以治下晚用星附六君子以益虛宜竅

某今年風木司天春夏陽升之候兼因平昔怒勞憂思

以致五志氣火交併於上肝脾內風鼓動盤旋上盛則

下虛故足膝無力肝木內風壯火乘襲胃土胃主肌肉

脈絡應肢遠出環口故唇舌麻木肢節如痿因為中厥

之萌觀河間內火召風之論都以苦降辛泄少佐微酸

最合經旨折其上騰之威使清空諸竅毋使濁痰壯火

蒙蔽乃暫藥權衡也至於顧養工夫寒暄保攝尤當加

意於藥餌之先 上午服

金石斛三錢 化橘紅五分 白茯苓二錢 真北秦皮一錢

草決明錢 冬桑葉錢 嫩鈎藤錢 生白芍錢

又前議苦辛酸降一法肝風胃陽已折其上引之威是

諸症亦覺小愈雖曰治標正合歲氣節候而設思夏至

一陰來復高年本病預宜持護自來中厥最防於暴寒

驟加致身中陰陽兩不接續耳議得攝納肝腎真氣補

益下虛本病

九製熟地先用水煮半日徐加醇酒砂仁再煮一日

肉從蓉用大而黑色者去甲切片盛竹籃內放長

生虎膝骨另搗碎 淮牛膝鹽水蒸 製首烏四兩

川草薢鹽水炒 川石斛八兩 赤白茯苓四兩

臨證指南醫案

卷一 中風

九 右藥照方製末另用小黑糟豆皮八

兩煎濃汁法九每早百滾水服三錢

議晚上用健中運痰兼制亢陽火動風生從外臺茯

苓飲意

人參二兩 熟半夏二兩 茯苓四兩 廣皮肉二兩

川連薑汁炒 枳實炒 明天麻二兩 鈎藤三兩

白茯苓雞子黃拌煮洗 地栗粉兩

右末用竹瀝一杯薑汁十匙法丸食遠開水服三錢

又近交秋令燥氣加臨先傷於上是為肺燥之咳然下

焦久虛厥陰透咽少陰循喉往常口燥舌糜是下虛陰

火泛越先治時病燥氣化火暫以清潤上焦其本病再

白扁豆勿研 玉竹三錢 白沙參二錢 麥冬去心三錢

甜杏仁去皮尖勿 象貝母去心勿 冬桑葉錢

捲心竹葉錢 洗白糯米七合清湯照

暫服煎方

北沙參錢 生白扁豆錢 麥冬三錢 乾百合半一錢

白伏神半錢 甜杏仁去皮尖錢半

又痰火上實清竅為蒙於暮夜兼進清上方法

麥冬八兩 天冬四兩 苡米八兩 柿霜四兩

臨證指南醫案

卷一 中風

十 長條白沙參八兩 生白扁豆皮八兩 甜梨汁二兩

甘藷漿二兩 水蒸膏蒸柿霜收每服五錢開水送下

又夏熱秋燥陽津陰液更傷口齒咽喉受病都屬陰火

上乘氣熱失降使然進手太陰清燥甘涼方法甚安其

深秋初冬調理大旨以清上實下則風熄液潤不致中

厥至冬至一陽初復再議

燕窩菜洗淨另熬 甜梨去皮核 絹袋裝人參 另熬收

九製熟地水煎 天冬去心 麥冬去心 黃芪皮生用

炙黑甘草兩 五味兩 雲茯神兩

又左關尺脈獨得動數多語則舌音不清麻木偏着右

肢心中熱熾難以鳴狀。此陽明脈中空乏而厥陰之陽
挾內風以糾擾真氣不主藏聚。則下無力以行動虛假
之熱上泛為喉燥多咳。即下虛者上必實。意冬至後早
服方從丹溪虎潛法。

九製熟地照前法製八兩 肉從蓉照前製四兩 天冬去心蒸四兩

當歸炒焦二兩 生白芍三兩 川斛熬膏八兩 黃柏鹽水炒二兩

淮牛膝鹽水蒸三兩 右為末另用虎骨膠三兩溶入蜜

搗丸服五錢滾水送

又 太太諸恙向安。今春三月陽氣正升。肝木主乎氣候。

肝為風臟。風亦屬陽。卦變為巽。兩陽相合。其勢方張。內

臨證指南醫案

卷一 中風

十一

風挾陽動。旋脂液暗耗。而麻痺不已。獨甚於四肢者。風
淫末疾之謂也。經云風淫於內。治以甘寒。夫痰壅無形
之火。火灼有形之痰。甘寒生津。痰火風兼治矣。

天冬四兩 麥冬八兩 長白沙參八兩 明天麻四兩

白茯苓照前製四兩 甜梨汁一蘆根汁用八兩

青鹿漿一兩 鮮竹瀝八兩 柿霜四兩 先將二冬沙

參天麻白茯苓加泉水煎汁。濾過配入四汁同熬成膏。

後加柿霜收。每日下午食遠服五錢。百滾水調服。

又 下虛上實。君相火亢。水潤液虧。多有暴怒跌仆之虞。

此方滋液救焚。使補力直行下焦。不助上熱。讓鈇甕申

先生瓊玉膏方

鮮生地水洗淨。搗自然汁。二觔綿紙濾清。隨印入生

白沙蜜一觔。另置一鉛罐。或圓鉛罐。盛前藥。封堅固。

用鐵鍋滿盛清水。中做井字木架。放罐在上。桑柴火

煮三晝夜。頻添水。不可住火。至三日後。連器浸冷水

中。一日頃。取出。入後項藥。

人參蒸烘研細末六兩 白茯苓蒸研粉十六兩 真秋石銀罐內煨候研一兩

三味。拌入前膏。如乾豆沙樣。收貯小口磁瓶內。扎好。

勿令洩氣。每早百滾水調服五六錢。

又 立冬後三日。診得左脈小。弦動數。右手和平。畧虛。問

臨證指南醫案

卷一 中風

十二

得春夏平安。交秋後有頭暈。左目流淚。足痿無力。不能
行走。舌生紅刺。微咳有痰。此皆今年天氣大熱。已久。熱
則真氣泄越。虛則內風再旋。經言痿生大熱。熱耗津液。
而舌刺咳嗽流淚者。風陽升於上也。上則下焦無氣矣。
故補肝腎以攝納腎氣為要。而清上安下。其在甘涼不
傷脾胃者宜之。

製首烏四兩 杞子炒一兩 天冬去心二兩 羌蔚子蒸一兩

黃甘菊半兩 黑糯米皮二兩 茯苓二兩 川石斛熬膏八兩

虎骨膠二兩 右末以川斛膏同溶化。虎骨膠搗丸。

早上滾水服三四錢。

又 久熱風動津液日損舌刺咳嗽以甘藥養其胃陰
老年納穀為寶

生扁豆四兩 麥冬四兩 北沙參三兩 天花粉二兩

甘蔗漿十二兩 柿霜二兩 白花百合四兩 熬膏加飴

糖兩許每服時滾水調服三四錢晚上服

又 液燥下虧腸挾內風上引陰不上承舌絡強則言蹇

氣不注脉則肢痿乏力步趨凡此皆肝腎臟陰本虛鎮
補之中微逗通陽為法以臟液虛不受純溫藥耳

水製熟地四兩 阿膠二兩 女貞實二兩 稽豆皮二兩

淡肉從蓉一兩 茯神二兩 早蓮草二兩 川石斛三兩

臨證指南醫案

卷一 中風

五

用精羯羊肉膠為丸早上滾水服四五錢

又 暫服煎方

生地 沙參 羌蔚子 黑耨豆皮

川斛 牛膝

又 晚服丸方

九蒸桑葉八兩 三角胡麻四兩 九製首烏三兩 白茯神三兩

人參二兩 炙甘草一兩 酸棗仁二兩 苡仁二兩

右為末桂圓肉三兩煎湯法丸每服三錢百滾水下

又 今年天符歲會上半年陽氣大泄見病都屬肝胃以

厥陰為風臟而陽明為盛陽耳陰陽不肯相依勢必暴

來厥中過大暑可免以暑濕大熱更多開泄致元氣不
為相接耳然此本虛標實氣火升騰所致經旨以苦寒
鹹潤酸泄少佐微辛為治議進補陽明泄厥陰法

人參一錢 生牡蠣五錢 生白芍二錢 烏梅肉四分

川黃連六分 熟半夏醋炒清水漂洗一錢 上午服

方九 人參二兩 茯苓三兩 鹽水炒黃連五錢

半夏醋炒水洗一兩半 鹽水炒廣皮二兩 枳實醋炒一兩半

白茯苓雞子黃製一兩半 生白芍一兩 烏梅肉蒸一兩

為末竹瀝法丸早上服三錢百滾湯下

又 夏月進酸苦泄熱和胃通隧為陽明厥陰治甚安入

臨證指南醫案

卷一 中風

五

秋涼爽天人漸有收肅下降之理緣有年下虧木少水

涵相火內風旋轉薰灼胃脘逆冲為嘔舌絡被薰則絡

赤如火消渴便阻猶剩事耳凡此仍屬中厥根萌當加

慎靜養為宜

生雞子黃一枚 阿膠一錢 生白芍三錢 生地三錢

天冬去心一錢 川連一分 上午服

又 心火亢上皆為營液內耗先以補心湯理心之用

人參同煎一錢 川連六分 犀角二錢 玄參二錢

鮮生地五錢 丹參一錢 捲心竹葉二錢

又 苦味和陽脉左頗和但心悸少寐已見營氣衰微做

金匱酸棗仁湯方仍兼和陽益心氣以通肝絡

酸棗仁炒黑勿研五錢 茯神三錢 知母一錢 川芎一分

人參六分 天冬一分

陳 脈左數右弦緩有年形盛氣衰冬春之交真蒸不相

維續內風日熾左肢麻木不仁舌歪言蹇此屬中絡調

理百日戒酒肉可望向愈

羚羊角 陳胆星 丹皮 橘紅

連翹心 石菖蒲 鈎藤 川斛

又 羚羊角 玄參 連翹 花粉

川貝母 橘紅 竹瀝

臨證指南醫案 卷一 中風 五

又 丹溪云麻為氣虛木是濕痰敗血診左脈濡滑有年

偏枯是氣血皆虛方書每稱左屬血虛右屬氣虛未必

盡然

人參 半夏 廣皮 茯苓

歸身 白芍 炙草 桑枝

又 經絡為痰阻大便不爽昨日跌仆氣亂痰出甚艱轉

方以宣經逐

炒牛夏 石菖蒲 廣橘紅 茯苓

胆星 枳實 竹瀝 薑汁

藥 初春肝風內動眩暈跌仆左肢偏癱右絡不和呼吸

不爽痰火上蒙根本下衰先宜清上痰火

羚羊角 茯苓 橘紅 桂枝

半夏 鬱金 竹瀝 薑汁

又 風熱燥筋骨為痛痰火氣阻呼吸不利

照前方去鬱金竹瀝薑汁加白痰紫鈎藤

又 炒牛夏 茯苓 鈎藤 橘紅

金石斛 石菖蒲 竹瀝 薑汁

又 人參 半夏 枳實 茯苓

橘紅 痰核 竹瀝 薑汁

風為百病之長故醫書咸以中風列於首門其論症

臨證指南醫案 卷一 中風 六

則有真中類中中經絡血脈腦腑之分其論治則有

致風劫痰養血潤燥種氣培元之治蓋真中雖風從

外來亦由內虛而邪得以乘虛而入北方風氣剛勁

南方風氣柔和故真中之病南少北多其真中之方

前人已大備不必贅論其類中之症則河間立論云

因煩勞則五志過極動火而卒中皆因熱甚生火東

垣立論因元氣不足則邪乘之令人殞仆卒倒如風

狀是因乎氣虛而丹溪則又云東南氣溫多淫由濕

生痰痰生熱熱生風故主乎濕三者皆辨明類中之

由也蓋醫者為世起代以來醫者不分真偽每用羌防

星半烏附細辛以祛風豁痰。虛症實治不啻如神。葉氏發明內風乃身中陽氣之變動。肝爲風臟。因精血衰耗。水不涵木。木少滋榮。故肝陽偏亢。內風時起。治以滋液熄風。濡養營絡。補陰潛陽。如虎潛固本復脈之類是也。若陰陽並損。無陽則陰無以化。故以溫柔濡滿之通補。如地黃飲子。還少丹之類是也。更有風木過動。中土受戕。不能禦其所勝。如不寐不食。衛疎汗泄。飲食變痰。治以六君玉屏風茯苓飲。酸棗仁湯之屬。或風陽上僭。痰火阻竅。神識不清。則有至寶丹。芳香宣竅。或辛涼清上。痰火法雖未備。

臨證指南醫案

卷一

中風

七

實足以補前人之未及。至於審症之法。有身體緩縱不收。耳聾目瞽。口開眼合。撒手遺尿。失音解脛。此本實先撥陰陽樞紐不交。與暴脫無異。並非外中之風。乃純虛症也。故先生急用大劑參附以回陽。恐純剛難受。必佐陰藥以挽回。萬一若肢體拘攣。半身不遂。口眼喎邪。舌強言蹇。二便不爽。此本體先虛。風陽夾痰火壅塞。以致營衛脈絡失和。治法急則先用開關。繼則益氣養血。佐以消痰清火。宣通經絡之藥。氣充血盈。脈絡通利。則病可痊愈。至於風痲風懿風痺。癱瘓。乃風門之兼症。理亦相同。案中種種治法。余未能

盡宣其理。不過畧舉大綱。分類敘述。以便後人觀覽。餘門倣此。華燏雲

臨證指南醫案

卷一

中風

八

肝風

某 內風乃身中陽氣之動變。甘酸之屬宜之。

生地 阿膠 牡蠣 炙草 黃肉炭

王 陽挾內風上巔。目昏耳鳴不寐。肝經主病。

熟地炙 炙龜甲 黃肉 五味

磁石 茯苓 早蓮草 女貞子

曹三 辛寒清上。頭目已清。則知火風由臟陰而起。劑藥必不見效。緩肝之急以熄風。滋腎之液以驅熱。治法大旨如此。

臨證指南醫案 卷一 肝風 五

生地 阿膠 天冬 玄參

川斛 小黑豆皮

陳五 操持煩勞。五志陽氣。挾內風上擾清空。頭眩耳鳴。目珠痛。但身中陽化內風。非發散可解。非沉寒可清。與六氣火風迥異。用辛甘化風方法。仍是補肝用意。

枸杞子 桂圓肉 歸身 炙草

甘菊炭 女貞子

陸四 肝風陽氣。乘陽明之虛上冒。牙肉腫痛。議和陽熄風。

生地 阿膠 牡蠣 天冬

茯苓 川斛 早蓮草 女貞子

凌 交節病變。總是虛症。目泛舌強。脊背不舒。瘦淋便澀。

昔腎液不營。肝風乃張。當宗河間渴藥。輕服名曰飲子。

熟地 五錢 鹹菴蓉 八錢 炒杞子 三錢 麥冬 二錢

雲苓 一錢 川石斛 三錢 生沙苑 一錢 石菖蒲 一錢

遠志肉 四分 飲子煎法

胡 緩肝潤血熄風

製首烏 杞子 歸身 冬桑葉 三角胡麻

柏子仁 茯神 天冬 黑糖豆皮 蜜丸

某 高年水虧。肝陽升逆無制。兩脇發熱如熱。則火升而赤。遇煩勞為甚。宜養肝陰和陽為法。

臨證指南醫案 卷一 肝風 五

九蒸何首烏 四兩 九蒸冬桑葉 三兩 徽州黑芝蔴 三兩

小黑糖豆皮 三兩 巨勝子 二兩 浸淡天冬 去心 三兩

真北沙參 二兩 柏子仁 一兩 雲茯神 二兩

女貞實 二兩 右為末。青葉汁法。丸。早服三錢。開水送。

張氏 肝陽虛風上感。頭目不清。陽明脈空。腰膝痠爽。議養血熄風。

菊花炭 熟首烏 牛膝炭 枸杞子炭

黑糖豆 茯神

沈 衝氣左升。當鎮肝攝腎

地黃 阿膠 黃肉 淡菜 茯苓

丁三因繫思擾動五志之陽易化內風變幻不已夫陽動
莫制皆燥陰少藏自覺上實下虛法當介以潛之酸以
收之味厚以填之偏寒偏熱烏能治情志中病

熟地 萸肉 五味 磁石 茯神

青鹽 龍甲膠 龜版膠 即溶膠為丸

朱 心中熱燥痞煩不肯寐皆春分地氣主升肝陽隨以
上擾老年五液交枯最有痼瘕之慮

生地 阿膠 生白芍 天冬 茯神

小黑穉豆皮

程 伏暑深秋而發病從裏出始知寒狀熱氣逼迫營分
臨證指南醫案 卷一 肝風 主

經事不當期而來舌光如鏡面黃唇乾而腹痛隱痛正
氣大虛熱氣內陷况乎周身皆痛何傷失和極矣先擬
育陰驅熱肝風不旋不致凝滯五日中不與風波可望
向安

生地 阿膠 天冬 茯苓

麻仁 生杜蘅

金 溫邪深入營絡熱止膝骨痛甚蓋血液傷極內風欲
沸所謂劇則愈速運至矣總是消導苦寒冀其熱止
不慮胃汁竭肝風動乎擬柔藥緩終熱熄風
復脈湯去參薑麻仁 生鱉甲湯煎藥

復脈湯去參薑麻仁 生鱉甲湯煎藥

王 痛從腿肢筋骨上及腰腹貫於心胸若平日經來帶
下其症亦至此素稟陰虧衝任奇脈空曠凡春交地中
陽氣升舉虛人氣動隨升絡血失養諸氣橫逆面赤如
赭飢不欲食耳失聰瘧不成寐陽浮脈絡交空顯然先
和陽治絡

細生地 生白芍 生鱉甲 生龜甲

生虎骨 糯稻根 煎藥送滋腎丸一錢

又 前用滋腎丸痛緩面浮附腫血氣俱乏內風泛越經
言風勝則動濕勝則脈陰虛多熱之質謹先用虎潛丸
每服四錢四服

臨證指南醫案 卷一 肝風 主

某 下元水虧風木內震肝腎虛多驚恐非實熱痰火可
攻劫者

生地 清阿膠 天冬 杞子

菊花炭 女貞實

胡 久病耳聾微喘喉中不甚清爽是陰不上承陽挾內
風得以上侮清空諸竅大凡肝腎宜潤宜涼龍相寧則
水源生矣

人參 一錢 秋石 一分 化 鮮生地 三錢 阿膠 一錢
水并煎乾同煎

淡菜 三錢 白芍 一錢 茯神 一錢

又 陰虛液耗風動陽升雖諸恙皆減兩旬外大便不通

斷勿欲速。惟靜藥補潤為宜。照前方去白芍加柏子仁。又大便兩次頗逆。全賴靜藥益陰之力。第納食未旺。議與胃藥。

人參 茯神 炒麥冬 炙甘草

生穀牙 南棗

又 緩肝益胃

人參 茯神 生穀牙 炙甘草

木瓜 南棗

周 怒動肝風筋脹脇板喉痺

阿膠 天冬 柏子仁 牡蠣 小麥

臨證指南醫案

卷一 肝風

三

陽升血

吳 脉弦小數。形體日瘦。口舌糜碎。肩背掣痛。肢節麻木。膚膜搔痒。目眩暈耳鳴。已有數年。此屬操持積勞。陽升內風旋動。燥筋損液。古謂壯火食氣。皆陽氣之化。先擬清血分中熱。繼當養血熄其內風。安靜勿勞。不致痿厥。

生地 玄參 天冬 丹參

犀角 羚羊角 連翹 竹葉心

方九 何首烏 生白芍 黑芝蔴 冬桑葉

天冬 女貞子 茯神 青蘆

心腎

某 脈右虛左數。營液內耗。肝陽內風震動。心悸眩暈少寐。

生地 阿膠 麥冬 白芍

小麥 茯神 炙草

吉三 心悸蕩漾頭中鳴。七八年中頻發不止。起居飲食如常。此肝胆內風自動。宜鎮靜之品。佐以辛泄之味。如枕

中丹

王 氏 驚悸微腫。內風動也。

人參 龍骨 茯神 五味

煨薑 南棗

曹 肝胆陽氣。挾內風上騰不熄。心中熱。驚怖多恐。進和

陽鎮攝方法

臨證指南醫案

卷一 肝風

三

龜甲 龍骨 牡蠣 茯神

石菖蒲 遠志

又 神識昏安。夜不得寐。胸膈間時時閃爍欲動。乃內風

不熄也。進補心法。

生地 丹參 玄參 茯神 棗仁 遠志

菖蒲 天冬 麥冬 桔梗 硃砂

王 氏 神呆不語。心熱煩躁。因驚而後。經水即下。肉腠刺痛。

時微痞。頭即搖。肝風內動。變瘕厥之象。

小川連 黃芩 阿膠 牡蠣 秦皮

陳 虛風厥痺。清痰阻案。

風

血去

神

天麻 鈎藤 白茯苓 甘菊

連翹 桑枝

包^婦右太陽痛甚。牙關緊閉。環口牽動。咽喉如有物阻。乃

陽升化風。肝病上犯陽絡。大便欲閉。議用龍蒼丸。每服二錢

又 肝風阻竅。脉象模糊。有外脫之危。今牙關緊。咽痺不

納湯水。雖有方藥。難以通關。當刮指甲末。畧以溫湯調。灌倘得開。再議他法。另以蘇合香擦牙

鄭^三九脉右弦。頭脹耳鳴。火升。此肝陽上鬱。清竅失司。

細生地 夏枯草 石決明 川斛

臨證指南醫案

卷一 肝風

五

茯神 桑葉

陳 夏季陽氣暴升。煩勞擾動。致內風上阻。清竅。口喎舌

強。呵欠。機竅阻痺。不靈。脉數。舌胎。忌投溫散。乃司氣所致。非表邪為病也。

犀角 羚羊角 鬱金 菖蒲 胆星

鈎藤 連翹 橘紅 竹瀝 薑汁

又 清絡得效。火風無疑。忌投剛燥。

犀角 羚羊 鬱金 菖蒲 連翹

生地 玄參 廣皮 竹瀝 薑汁

又 脉數面赤。肝風何動。宜和陽熄風。

鮮生地 玄參 羚羊角 連翹 菖蒲根

鮮銀花 麥冬

汪 如寐舌暗。面赤亮。汗出。未病前一日。頓食麩頗多。病

來倉猝。乃少陰腎臟陰陽不續。厥陰肝風突起。以致精

神冒昧。今七八日來。聲音不出。乃機竅不靈。治法以固

護正氣為主。宜利上焦痰熱。佐之。若地冬養陰。陰未驟

生。徒使壅滯在腕。急則治標。古有諸矣。換過十四十五

日。冀有轉機。

臨證指南醫案

卷一 肝風

五

江 左脇中動躍未平。猶是肝風未熄。胃津內乏。無以推

護。此清養陽明最要。蓋胃屬腑。腑強不受木火來侵。病

當自減。與客邪速攻。純虛重補迥異。 酸棗仁湯去川

芎加入參

又 諸恙向安。惟左脇中動躍多年。時有氣升欲噫之狀。

肝陰不足。陽震不息。一時不能遽已。今穀食初加。乙癸

同治姑緩。

人參 茯神 知母 炙草

又 鮮生地 麥冬 竹葉心 知母 沖冷參湯

席五 脈來弦動而虛。望六年歲。陽明脈衰。厥陰內風。暗旋

不熄。遂致胃脈不主。束筋骨以利機關。肝陽直上。巔頂

汗從陽氣泄越。春月病發。勞力病甚。此氣愈傷。陽愈動

矣。法當甘溫益氣。攻病驅風。皆劫氣傷陽。是為戒律。

人參 黃芪 當歸 炙草

冬桑葉 麥冬 地骨皮 花粉

孫氏 胃虛。肝風內震。嘔痰咳逆。頭痛眩暈。肢麻。汗出寒熱。

二陳湯加天麻鈎藤

沈六 色蒼形瘦。木火體質。身心過動。皆主火化。夫吐痰衝

氣。乃肝胆相火。犯胃過屬。納食自少。陽明已虛。解鬱和

臨證指南醫案 卷一 肝風 五

中兩調肝胃。節勞戒怒。使內風勿動為上。

枸杞子 酸棗仁 炒柏子仁 金石斛

牛夏麩 橘紅 茯苓 黃菊花膏丸

梁 木火體質。復加鬱勃。肝陰愈耗。厥陽升騰。頭暈目眩

心悸。養肝熄風。一定至理。近日知飢少納。漾漾欲嘔。胃

逆不降。故也。先當泄木安胃為主。

桑葉 一錢 鈎藤 三錢 遠志 三分 石膏 蒲三

牛夏麩 一錢 廣皮 白牛 一錢 金斛 一錢 茯苓 三錢

又 左脈弦。氣撐至咽。心中憤憤。不知何由。乃陰耗陽亢

之象。謹養肝之體。清肝之用。

九孔石決明 具 鈎藤 兩 橘紅 一錢 抱木茯神 三錢

鮮生地 三錢 羚羊角 八分 桑葉 一錢 黃甘菊 一錢

沈 年歲壯盛。腕有氣痕。噯噯震動。氣降乃平。流痰未愈。

學丸腫硬。今入夜將寐。少腹氣衝至心。竟夕但寤不寐。

頭眩目花。耳內風雷。四肢麻痺。肌膜如刺。如虫行。此屬

操持怒勞。內損乎肝。致少陽上聚為瘕。厥陰下結為疝。

衝脈不靜。脈中氣逆。混擾氣燥。熱化風陽交動。營液日

耗。變亂種種。總是肝風之害。非攻消溫補能治。惟以靜

養。勿加怒勞。半年可望有成。

阿膠 細生地 天冬 茯神

臨證指南醫案 卷一 肝風 五

陳小麥 南棗肉

王五 驚恐惱怒動肝。內風陽氣沸騰。腕專咽阻。筋惕肌麻。

皆風木過動。致陽明日衰。先以鎮陽熄風法。

阿膠 細生地 生牡蠣 川斛

小麥 茯神

曹氏 離愁宛結。都係情志中自病。恰逢冬溫。陽氣不潛。初

交春令。陽已勃然。變化內風。遊行擾絡。陽包上冒。陰不

下吸。清竅為蒙。狀如中厥。舌暗不言。到河間謂將息失

宜火盛水衰。風自內起。其實陰虛陽亢為病也。既不按

法論病設治。至驚熱雷鳴。身即汗泄。春分氣暖。而晝夜

臨不肯寐甚至焦煩迥異於平時何一非陽氣獨激使然耶夫肝風內擾陽明最當其衝犯病中暴食以內風消燦求助於食今胃脈不復氣愈不振不司束筋骨以利機關致鼻準光亮肌肉浮腫考古人虛風首推侯氏黑散務以填實腸胃空隙庶幾內風可息奈何醫者不日清火豁痰即口膩補或雜風藥內因之恙豈有形質可攻偏寒偏熱皆非至理

牛牡蠣

生白芍

炒生地

菊花炭

炙甘草

南棗肉

大凡攻病驅邪藥以偏勝如內經鹹勝苦苦勝辛之

臨證指南醫案

卷一 肝風

五

類精其剋制以圖功耳今則情志內因致病係乎陰陽臟腑不和睦偏就和宜崇生氣如天地間四時陰陽迭運萬物自有生長之外案中曰陽胃不濟法當和陽以就陰牡蠣體沉味鹹佐以白芍之酸水生木也地黃微苦芍微辛從火妙變為苦味木生火也益以甘草大棗之甘充養陽明火生上也藥雖平衍無奇實參軒岐底蘊世皆忽畧不究但執其藥治何病者多矣

經云東方生風風生木木生酸酸生肝故肝為風木之臟固有相火內寄體陰用陽其性剛主動主升全

賴腎水以涵之血液以濡之肺金清肅下降之令以平之中宮敦阜之上氣以培之則剛勁之質得為柔和之體遂其條達暢茂之性何病之有倘精液有虧肝陰不足血燥生熱熱則風陽上升竅絡阻塞頭目不清眩暈跌仆甚則癱瘓痲厥矣先生治法所謂緩肝之急以熄風滋腎之液以驅熱如虎潛侯氏黑散地黃飲子滋腎丸復脈等方加減是介以潛之酸以收之厚味以填之或用清上實下之法若思慮煩勞身心過動風陽內擾則營熱心悸驚怖不寐脅中動躍治以酸棗仁湯補心丹枕中丹加減清營中之熱

臨證指南醫案

卷一 肝風

三

佐以飲攝神志若因動怒鬱勃痰火風交熾則有二陳龍膏風木過動必犯中宮則嘔吐不食法用泄肝安胃或填補陽明其他如辛甘化風甘酸化陰清金平木種種治法未能備敘然肝風一症患者甚多因古人從未以此為病名故醫家每每忽畧余不辭杜撰之咎特為拈出另立一門以便後學考覈云

雲

眩暈

痰火

徐 脈左浮弦數痰多腕中不爽煩則火升眩暈靜坐神

識稍安議少陽陽明同治法

羚羊角 連翹 香豆豉 廣皮白

半夏麴 黑山梔

某 痰火風在上舌乾頭眩

天麻 鉤藤 菊花 橘紅

半夏麴 茯苓 山梔 花粉

某 酒客中虛痰暈 二陳加木白藜鉤藤天麻

臨證指南醫案 卷一 眩暈 五

內風痰

江五 脈弦動眩暈痰多胸痺窒塞此清陽少旋內風日滯
當春地氣上升最慮風邪

明天麻 白痰 桂枝木 半夏

橘紅 茯苓 改仁 炙草

又 頭額悶脹痰多作眩 外臺茯苓飲加羚羊角桂枝

竹瀝薑汁法丸

吳四 診脈孔弱痰多眩暈心神過勞陽升風動不可過飲

助升治痰須健中熄風可緩暈

九蒸白朮 炒杞子 白痰 茯苓 菊花炭

周 內風挾痰眩暈吐吐清水

肝風

張 肝風內沸劫燥津液頭暈喉舌乾涸

大生地 天冬 麥冬 苳肉

阿膠 生白芍

陳 肝風動逆不熄頭暈

九製首烏 兩 甘菊炭 兩 枸杞子 兩 桑椹子 兩

黑芝蘇 兩 巨勝子 兩 牛膝 兩 茯苓 兩

青菓汁法丸

洪四 內風逆頭暈

臨證指南醫案 卷一 眩暈 五

經霜桑葉 錢 炒黃甘菊花炭 錢 生左牡蠣 三錢

黑稽豆皮 錢 徽州黑芝蘇 二錢 茯苓 一錢

某 兩寸脈浮大氣火上升頭眩甚則欲嘔吐厥陰上干
久則陽明失降土被木剋脾胃俱傷先當鎮用陽

製首烏 稽豆皮 炒杞子 柏子仁

紫石英 茯苓 天冬 南棗

某 操持驚恐相火肝風上竄目跳頭暈陰弱欲遺眩左

莖勁右小平

生地 白芍 丹皮 鉤藤

天麻 白痰 黃菊花 橘紅

絡脈

王三辛甘寒眩暈已殺此絡脈中熱陽氣變現內風上冒是根本虛在下熱化內風在上上實下虛先清標恙

羚羊角 玄參心 鮮生地 連翹心

鬱金 石菖蒲

又 昭前方去菖蒲鬱金加川貝花粉

某二暈厥煩勞即發此水虧不能涵木厥陽化風鼓動煩勞陽升病斯發矣據述幼年即然藥餌恐難杜絕

熟地 四兩 龜版 三兩 牡蠣 三兩 天冬 一兩 萸肉 二兩

五味 一兩 茯神 二兩 牛膝 一兩 遠志 七錢 靈磁石 一兩

田七煩勞陽氣大動變化內風直冒清空遂為眩暈能食

臨證指南醫案 卷一 眩暈 三

膚充病不在乎中止以介類沉潛真陽鹹酸之味為宜

淡菜膠 龜版膠 阿膠 熟地 萸肉

茯苓 川斛 建蓮 山藥漿丸

嚴四營虛內風逆心悸頭暈

炒杞子 柏子仁 三角胡麻 川斛

生左牡蠣 冬桑葉

李七高年頗得納穀安寢春夏以來頭暈脚腫不能健步

此上實下虛腎氣衰不主攝納肝風動清發漸蒙大丹

腎宜溫肝宜涼溫納佐涼乃複方之劑

附都氣加車前淡天冬建蓮丸

經云諸風掉眩皆屬於肝頭為六陽之首耳目口鼻

皆係清空之數所患眩暈者非外來之邪乃肝膽之

風陽上冒耳甚則有昏厥跌仆之虞其症有夾痰夾

火中虛下虛治膽治胃治肝之分火盛者先生用羚

羊山梔連翹花粉玄參鮮生地丹皮桑葉以清泄上

焦竅絡之熱此先從膽治也痰多者必理陽明消痰

如竹瀝薑汁菖蒲橘紅二陳湯之類中虛則兼用人

參外臺茯苓飲是也下虛者必從肝治補腎滋肝有

陰潛陽鎮攝之治是也至於天麻鈎藤菊花之屬皆

係熄風之品可隨症加入此症之原本之肝風當與

臨證指南醫案 卷一 眩暈 三

肝風中風頭風門合而參之 華翰雲

頭風

暑熱

趙 右偏頭痛鼻竅流涕仍不通爽咽喉疔腐寤醒肢冷

汗出外邪頭風已留數月其邪混處精華氣血成爲蒙閉豈是發散清寒可解頭顛藥餌務宜清揚當刺風池風府投藥仍以通法苟非氣血周行焉望却除宿病

西瓜衣 鮮蘆根 苡仁 通草 煎送蠟礬丸

木火上升

何一右偏風頭痛從牙齦起

炒生地 錢 蔓荊子 錢 炒一 黃甘菊 錢 茯苓 錢

炒杞子 錢 冬桑葉 錢 炒丹皮 錢 川斛 錢

臨證指南醫案 卷一 頭風

虛中

王五 中年陰中之陽已虛內風偏頭痛冷淚出 還少丹

胃虛風

徐一 頭風既愈復發痛甚嘔吐不已陽明胃虛肝陽化風 愈動恐有失明之憂

炒半夏 茯苓 苦丁茶 菊花炭

炒杞子 柏子霜

朱四 陽明脈弦大而堅厥陰脈小弦數促而赤頭暈及

腦後驚惕肉羸熱汗出早晨小安入暮偏劇此操持

佛髻肝陽挾持內風直上顛頂木火燄胃爲嘔逆陽越

爲面赤汗淋內因之病加以司候春深虛有暴厥癱瘓

之幻夫肝爲剛臟胃屬陽土姑議柔緩之法冀有陽和

效如神決不以虛訣爲助 邵新甫

風燥之理 復脈去參薑桂加雞子黃白芍

王 始用茶調散得效今宜養血和血

川芎 歸身 白芍 酒炒 白茯苓 炒 桑枝

朱三 頭風目痛昏赤火風上鬱最多及前病有三四年遇

風冷爲甚其衛陽清氣久而損傷非徒清散可愈從治

風先治血意

杞子 歸身 炒白芍 沙苑

菊花 鈎藤

頭風一症有偏正之分偏者主乎少陽而風衝火鬱

爲多前人立法以柴胡爲要藥其補瀉之間不離於

臨證指南醫案 卷一 頭風

此無如與之陰虛火浮氣升吸短者則厥脫之萌由

是而來矣先生則另出心裁以桑葉丹皮山梔荷葉

邊輕清涼泄使少陽腎遊之邪亦可倏然而解倘久

則傷及肝陰參入酸涼柔鎮可也所云正者病情不

一有氣虛血虛痰厥腎厥陰傷陽浮火亢邪風之不

同按經設治自古分晰甚明茲不再述至於肝陰久

耗內風日旋厥陽無一息之寧痛掣之勢已極此時

豈區區湯散可解計惟與復脈之純甘壯水膠黃之

柔婉以熄風和陽俾剛亢之威一時頓熄子川之屢

效如神決不以虛訣爲助 邵新甫

虛勞

王二此少壯精氣未旺致奇脉網維失護經云形不足者温之以氣精不足者補之以味今納穀如昔當以血肉充養

牛骨髓 羊骨髓 猪骨髓 茯神 枸杞 當歸 湖蓮 芡實

温三陰虛督損 六味加麋角膠秋石川石斛膏

陳七歷勞在出幼之年形脉生氣內奪冬月可延入夏難挨由真陰日消燦救陰無速功故難治 兩儀煎

臨證指南醫案 卷一 虛勞 三

陳二春病至夏日漸形色消奪是天地大氣發泄真氣先傷不主內守為損怯之症不加靜養損不肯復故治嗽治熱無用交節病加尤屬虛象脉左數甚凡有漏湯最難全好

熟地 炒山藥 建蓮 茯苓 猪脊筋

徐四清金潤燥熱緩神象乃病衰成勞矣男子中年行走無力寐中咳逆温補剛燥難投

天冬 生地 人參 茯苓 白蜜

黃六陰傷勞損

清阿膠 雞子黃 生地 麥冬

麻子仁 炙甘草 南棗

某攝陰得效佐以益氣合補三陰之臟

人參 熟地 炒杞子 五味

牛膝炭 建蓮 炒山藥 芡實

錢陽外泄為汗陰下注則遺二氣造偏陰虛熱勝屬為髓海腹是至陰皆陽乘於陰然陽氣有餘益見陰弱無以交戀其陽因病致偏偏久致損坐功運氣陰陽未協損不肯復頗為可慮今深秋入冬天令收肅身氣泄越人暮灼熱總是陰精損傷而為消燦耳

川石斛 炒知母 女貞子 茯神

臨證指南醫案 卷一 虛勞 三

糯稻根 小黑稻豆皮

又暮夜熱熾陰虛何疑但從前表散致衛陽疎泄穿山甲鑽筋流利後致經絡氣血劫撤內損不復衛陽藩籬交空斯時亦可撐半壁矣失此機宜秋收冬藏主令其在封固蟄藏耳張季明謂元無所歸則熱灼亦是

方 人參 河車 熟地 五味 蓮肉

山藥 茯苓 食後適時服六神湯

張七有年呼氣頗和吸氣則胸中刺痛是肝腎主陰臟絡之虛初投辛酸而效兩和用之體用耳大旨益腎當温複入凉肝滋液忌投剛燥

臨證指南醫案 卷一

大熟地 天冬 枸杞 柏子霜 茯苓

桂圓肉 女貞子 川斛 蜜丸

徐 今年長夏久熱傷損真陰深秋天氣收肅奈身中泄

越已甚吸短精濁消渴眩暈見症都是肝腎脉由陰漸

損及陽明胃絡納穀減服無力越人所云陰傷及陽最

難充復誠治病易治損難耳

人參 天冬 生地 茯神

女貞 遠志

鍾二 少年形色衰奪見症已屬勞怯生旺之氣已少藥難

奏功求醫無益食物自適者即胃喜為補扶持後天真

臨證指南醫案 卷一 虛勞 五

其久延而已

魚鱉 湖蓮 秋石 芡實 金櫻子

周十 脉神形色是老年衰憊無攻病成法大意血氣有情

之屬栽培生氣而已每日不拘用人乳或牛乳約茶盞

許數燉入薑汁三分

某女 交夏潮熱口渴肌膚甲錯此屬骨蒸潮熱

生鱉甲 銀柴胡 青蒿 黃芩

丹皮 知母

湯女 天癸未至入暮寒熱此先天真陰不足為損怯延接

之病腹膨臍食消在大陰厥陰

熟白朮二錢 生厚朴一錢 當歸二錢 丹皮一錢

淡黃芩一錢 生鱉甲五錢

此一通一補之法白朮補太陰厚朴通陽明當歸補

厥陰丹皮泄少陽黃芩清氣分之熱鱉甲滋血分之

熱也

陳二 稗年陰虧陽亢春陽化風地升暮熱晨汗肌柔白脉

數虛非客邪清解倣仲景復脉法 本方去薑桂加甘

蔗汁

王二 稗年純陽諸陽皆聚於骨陰未充長陽未和諧凡過

動煩怒等因陽驟升巔為痛熱寐痛止陽潛入陰也此

臨證指南醫案 卷一 虛勞 罕

非外邪常用錢氏六味丸加龜甲知母鹹秋石以滋養

壯陰

曹三 肌肉蒼赤脉小數疾童真陰未充長囊下肌前已有

漏卮陽獨升降巔竅如蒙常與壯水制火猶慮變幻損

怯 生六味去萸肉加生白芍黃柏知母人中白蜜丸

施三 脉尺垂少藏唾痰灰黑陰水內虧陽火來乘皆損怯

之萌可冀胃旺加餐耳年歲已過三旬苟能靜養百天

可以充旺

熟地 天冬 川斛 茯神 遠志

山藥 建蓮 芡實 秋石 猪脊髓丸

張 勞煩夏秋氣洩而病交小雪不復元咽中微痛血無

華色求源內損不藏陰中之陽不伏恐春深變病

熟地炭 清阿膠 川斛 浸白天冬 秋石二分

許 陰傷及陽畏風外冷午後潮熱舌絳渴飲剛峻難進

腰脊墜音啞心嘈始與柔陽滋液

首烏 枸杞 天冬 黑糯米皮

茯神 建蓮

黃 當純陽發泄之令辛散亂進火升咽乾氣促病根在

下焦陰虛成勞最難調治

熱地 炒山藥 五味 芡實

臨證指南醫案 卷一 虛勞 聖

茯神 湖蓮 又照前方加入參

宋 勞損三年肉消脂涸吸氣喘促欲咳不能出聲必踞

按季脇方稍有力寐醒喉中乾澀直至胸腕此五液俱

竭法在不治援引入身脂膏為總賴之算莫言治病

鮮河車 入乳汁 真秋石 血餘灰

吳 遺濁已久上冬喉中哽噎醫投寒解入夏不痊緣腎

陰為遺消燥龍雷不肯潛伏於冬令收藏之候反升清

空之所內經以少陰之脈循喉嚨挾舌本陰質既虧五

液無以上承徒有浮陽蒸灼柔嫩肺日傷為痺為宣不

外陰虛陽亢格模但養育陰氣貴乎寧靜夫思煩嗔怒

誦讀吟咏皆是動陽助熱不求諸已工夫日喚草木藥

汁生氣暗傷豈曰善策然未嘗無藥也益水源之切制

火炎之熾早用六味減丹澤加阿膠秋石龜膠牡蠣湖

蓮肉之屬以入下介以潛陽滋填滯固却是至靜陰藥

卧時量進補心丹寧神解熱俾上下得交經年可冀有

成

沈 脈細潛入尺澤下元精虧龍旺火熾是口齒齟腫皆

下焦之虛陽上越引火歸窟未嘗不通祇以形瘦液少

慮其劫陰致有瘡瘡起患當預慮也 虎潛去廣歸鎖

陽加山藥從蓉青鹽羊肉膠丸

臨證指南醫案 卷一 虛勞 聖

安 脈堅咽阻心熱得暖氣暑爽腰膝爽弱精滑自遺必

因驚恐傷及肝腎下虛則厥陽衝逆而上法宜鎮逆和

陽繼當填下

生白芍 桂枝木 生牡蠣 龍骨

茯神 大棗 小黑糯米皮

鄭 脈數垂入尺澤穴中此陰精未充早泄陽火潛藏汗

出吸短能相內灼升騰面目肺受薰蒸噎涕交作兼之

胃弱少穀精濁下注溺管疼痛并陽吸其腎陰慈怒多

鬱顯然腎虛如繪議有情之屬以填精做古滑瀉互施

法

牛骨髓四兩 羊骨髓四兩 猪脊髓四兩 麋角膠四兩 熟地八兩
 人參四兩 芎藭四兩 五味三兩 芡實四兩 湖蓮四兩
 山藥四兩 茯神四兩 金櫻粉三兩 膠髓丸
 曹一精氣內奪冬乏收藏入夜氣衝嗆逆不得安寢皆勞
 怯之末傳難治

人參 鮮紫河車 茯苓 茯神
 五味 紫衣胡桃肉

姚三脉左細右空色奪神天聲嘶乃精傷於下氣不攝固
 而為咳汗勞怯重病藥難奏功用大造丸方

程 脉左弦搏着枕眠卧冷痰上升交子後乾咳此腎虛
 臨證指南醫案 卷一 虛勞 醫

陽不潛伏乃虛症也從攝固引導勿驟進溫熱燥藥

熟地炭 生白芍 山藥 茯苓 丹皮

澤瀉 車前 牛膝 胡桃肉

蔣 脉細促三五欲歇止頭垂欲倦着枕即氣衝不續此
 腎臟無根督脉不用虛損至此必無挽法

熟地 五味 茯苓 青鉛 猪脊髓

朱九真陰久傷不復陽氣自為升降行動即覺外感皆體
 質失藏外衛不固矣治在少陰用固本丸之屬加入潛

陽介類 固本丸如淡菜秋石阿膠

金二虛症五年真陰既竭不復長夏陰不生成陽擾升越

巖頂而為痛脹目患不痊病根亦在肝腎與潛陽以益
 乙癸 磁石六味加龜甲
 胡 厥陽上衝心痛振搖消渴齒血都是下焦精損質重
 味厚填補空隙可冀其效

熟地四兩 五味二兩 茯神二兩 建蓮二兩
 芡實二兩 山藥二兩 人乳粉二兩 秋石一兩

生精羊肉膠丸早服四錢

程 今年厥陰司天春分地氣上升人身陽氣上舉風乃
 陽之化氣陰衰於下無以制伏上愈熱斯下愈寒總屬
 虛象故龜膠人乳皆血氣有情服之小效者非沉苦寒

臨證指南醫案 卷一 虛勞 醫

威也茲定鹹味入陰介類潛陽法

炒熟地 龜膠 阿膠 炒遠志 炒山藥

湖蓮 六七日後仍進瓊玉膏菴沉香

蔣五肝厥用鹹味入陰水生木體是虛症治法夏令大氣
 主泄因煩勞病發勢難減於昔日而脉症仍然必靜養
 經年陰陽自交病可全去議介類潛陽佐酸味以飲之

熟地 拍子霜 芎藭 五味 鑽陽

淡菜膠 海參膠 真阿膠 龜版膠 茯苓

湖蓮 芡實 青蘆

金 肝血腎精無藏陽之依附多夢紛紜昔陽神浮越當

以介屬有情填補下焦。

熟地 淡菜 阿膠 萸肉

小麥 龍骨 牡蠣

又 腎虛氣攻於背。肝虛熱觸於心。都是精血內奪。神魂不主依附。此重鎮以理其性。填補以實其下。血肉有情。皆充養身中形質。即治病法程矣。

熟地 牡蠣 淡菜 五味

萸肉 龍骨 杞子

吳十診脈細數。左垂尺澤。先天最素薄。真陰未充。當精通年歲。陰氣早泄。使龍相刻。燥津液暗消。有虛怯根萌。藥

臨證指南醫案 卷一 虛勞

宜至靜純陰。保養尤為要旨。知柏六味去丹澤加龜

甲天冬猪脊髓丸

錢五 錢十 錢說熱自左升。直至耳前後。脈視面色油亮。足心灼

熱。每午後入暮皆然。上年用茶調散。宣通上焦。鬱熱不應。此肝腎陰火乘發。却因男子精虧。陽不下交。經言以滋填陰藥。必佐介屬重鎮。試以安寢。竟夜乃安。參陽動

陰靜至理

熟地 龜版 萸肉 五味 茯苓

磁石 黃柏 知母 猪脊髓丸

顧二陰精下損。虛火上炎。脊股解痠痛。髓空斯督帶諸脈

不用。法當填髓充液。莫以見熱投涼。

熟地 大菟 杞子 魚膠 五味 茯神

山藥 胡蓮 芡實 金櫻膏為丸

陳十一喉痺。目珠痛。吸氣短促。會降血道。精皆陰。不內守。孤陽上越。諸寒當填下和陽。

熟地 枸杞炭 旱蓮草 菊花炭

女貞 茯苓

某二心煩不寧。目彩無光。少陰腎水枯槁。厥陽上越。不潛。議用填陰醫陽。

人參 熟地 天冬 麥冬

臨證指南醫案 卷一 虛勞

茯神 龜版 一兩

某女渴不欲飲。陰不上承。况寐醒神。不舒。易汗。汗出法當飲補。

人參 熟地炭 萸肉炭 茯神

五味 炒遠志

邵 精血傷。氣不潛納。陽浮擾神。則魂魄不寧。厥陰不安。其位。

人參 炙草 建蓮 茯神

龍骨 金箔

盧 有形血液。從破傷而損。神氣無以擁護。當此冬令。藏

陽陽微畏寒奇脈少津之氣貫布行步欹斜健忘若癡
何一非精氣內奪之徵將交大雪純陰無陽冬至一陽
來復也見此離散之態平素不受煖補是氣元長耶今
乃精衰氣竭之象又不拘乎此例也

人參 鹿茸 歸身 炒杞子

茯苓 沙苑

馬 陰精走泄於下陽氣鬱胃於上大衝脈衰厥氣上衝
陡然癱厥陰陽既失交偶內隨陽掀旋陽從汗泄矣宜
遠房幃獨居靜室醫治之法從陰引陽從陽引陰大封
大固以蟄藏為要百日可效經年可以復元

臨證指南醫案 卷一 虛勞 男

淡菘蓉 五味 遠志 茯神

芡實 建蓮 生羊腰子

孫^四形軀豐溢脈來微小乃陽氣不足體質理煩治劇曲
運神機都是傷陽之助溫養有情栽培生氣即古聖春
夏養陽不與逐邪攻病同例用青囊班龍丸
某^二少壯形神憔悴身體前後牽掣不舒此奇經脈海乏
氣少陰腎病何疑

淡菘蓉 甘枸杞 當歸 牛膝

沙苑 茯苓

某 陰陽二氣不振春初進八味減桂之辛益以味芍之

酸從陽引陰兼以歸脾守補其營方得效驗茲當春升
夏令裏虛藏聚未固升泄生令必加煩倦古人謂寒則
傷形熱則傷氣是當以益氣為主通攝下焦兼之做內
經春夏養陽秋冬養陰為法非治病也乃論體耳

夏季早服青囊班龍丸方法

鹿茸 鹿角霜 鹿角膠 赤白茯苓

熟地 菘蓉 補骨脂 五味子

晚服歸脾去木香加枸杞子

王^氏 凡女科書首篇必論調經既嫁必究孕育結禱十載
未能得胎病在至陰之臟延及奇經八脈述經遲晨泄

臨證指南醫案 卷一 虛勞 男

心若搖漾得食姑緩肛瀉久漏都屬下損

人參 鹿茸 紫石英 茯苓

當歸 補骨脂 養艾湯泛丸

汪^氏 女科首列調經今經不調和耳鳴心漾汗出畏恐神
痺兩足皆冷兼浮腫冬至節交病甚於前都因肝腎內
怯陽不交陰所至薛氏加減八味丸淡鹽湯送三錢
萬^二診脈數左畧大右腰牽絆足痿五更盜汗即醒有夢
情慾則遺自病半年脊椎六七節骨形凸出自述書齋
坐臥受濕若六淫致病新邪自解驗色脈推病是先天
稟賦原怯未經充旺用血腎精受戕致奇經八脈中乏

運用之力乃筋骨間病內應精血之損傷也

人參一錢 鹿茸二錢 杞子三錢 當歸一錢

船茴香一錢 紫衣胡桃肉二錢 生雄羊內腎二錢

夫精血皆有形以草木無情之物為補益聲氣必不相應桂附剛復氣質雄烈精血主藏藏體屬陰剛則愈劫脂矣至於丹溪虎潛法潛陽堅陰用知柏苦寒

沉着未通奇脈余以柔劑陽藥通奇脈不滯且血肉有情栽培身內之精血但王道無近功多用且有益

朱三辛溫賊潤乃柔劑通藥謂腎惡燥也服有小效是勞

傷腎真而八脈皆以廢弛失職議進升陽法

臨證指南醫案 卷一 虛勞 吳

鹿茸 菴蓉 歸身 杞子

柏子仁 杜仲 芫絲子 沙苑

范二父母弱症早衰稟質不肯充旺年二十歲未娶見病

已是損快此寒熱遇勞而發即內經陽維脈衰不司維

續護衛包舉下部無力有形精血不得充涵筋骨矣且

下元之損必累八脈此醫藥徒補無用

鹿茸 杞子 歸身 巴戟

沙苑 茯苓 船茴香 羊肉膠丸

施

衛氣胃腸上咽形體日漸枯槁此勞傷肝腎而成損怯由乎精氣不生厥氣上逆耳議以通陽攝陰冀其漸

引漸收非見病治病之方法矣

菴蓉 熟地 五味 枸杞 柏子霜

茯苓 桑椹子 砂仁 青鹽 羊肉膠丸

王三陽虛背寒肢冷陰虛火升煩驚消病偏傷不復總在虛損一門鎮攝之補宜商

早用薛氏八味丸 晚歸脾去芪木香 某 肝腎損傷八脈無氣未老衰憊大著始議通陽守陰

一法俟明眼裁之

淡菴蓉 熟地炭 鹿角霜 五味子肉

柏子仁 茯苓

臨證指南醫案 卷一 虛勞 李

王九掃掃驚恐肝腎臟陰大泄陽不附和陰中百脈之氣

自足至顛起自湧泉以少陰之脈始此欲使陰陽翕固

譬諸招集潰散卒伍所謂用藥如用兵

熟地 枸杞 當歸 五味

遠志 龜版 鹿鞭 羊肉

某 脈虛細夜熱晨寒頰倦口渴汗出厥液已虧當春氣

外泄宗仲景凡元氣有傷當與甘藥之劑陰虛者用復

脈湯

炙甘草七分 人參一錢 阿膠二錢 火麻仁一錢

生地二錢 麥冬一錢 桂枝三錢 生白芍一錢

某二陰傷及陽加以春夏大地陽氣主泄真無內聚形神痿靡大凡熱必傷氣固氣正以迎夏至一陰未復

人參 熟地 五味 炒山藥

次實 建蓮

張二臟陰久虧八脈無力是久損不復況中脫微痛臍中動氣決非滋膩涼藥可服做大建中之製溫養元真壯其奇脈為通納方法

人參 生於朮 炙草 茯苓

熟地 淡從蓉 歸身 白芍

真潯桂 枸杞 五味 蜜丸服四錢

臨證指南醫案 卷一 虛勞 五

許九善嘆食減無味大便溏瀉三年久病內傷何疑但清

內熱潤肺理嗽總是妨礙脾胃思人身病損必先陰陽

致偏是大陰脾臟日削自然少陽胆木來侮宗內經補

臟通腑一法 四君子加桑葉炒丹皮

又 虛勞三年形神大衰食減無味大便溏瀉寒起背肢

熱從心熾每咳必百脈動掣間或脇肋攻觸種種見症

都是病深傳過前議四君子湯以養脾胃中和加入桑

葉丹皮和少陽木火使土少侵服已不應想人身中二

氣致偏則病今厥症乃損傷已極草木焉得振頓見病

治病諒無裨益益氣少靈理從營議食少滑泄非滋膩

所宜暫用景岳理陰煎法參入鎮逆固攝若不自覺知味實難擬法

又 人參 秋石 山藥 茯苓 河車膠丸

張 汗多亡陽是醫人不知勞倦受寒病兼內傷但以風寒外感發散致快淹淹半年乃病傷不復能食者以氣血兼補

人參 白朮 茯苓 沙苑

從蓉 歸身 枸杞

張九陰傷成勞因減食便溏寒熱姑從中治者以脾為營胃主衛也 異功加五味子

臨證指南醫案 卷一 虛勞 五

吳三虛損至食減腹痛便溏中宮後天為急不必泥乎痰

嗽縷治 異功散去朮加炒白芍煨益智仁

楊氏背寒心熱胃弱少餐經期仍至此屬上損

生地 茯神 炒麥冬 生扁豆 生甘草

仲 久嗽神衰肉消是因勞倦內傷營不分自上自下損

傷但以苦寒沉降氣泄汗淋液耗夜熱胃口得苦倍酸

食物從此頓減老勞纏綿詎能易安用建中法

黃芪建中湯上黃

又 照前方加五味子

又 平補足三陰法

人參 炒山藥 熟地 五味

女貞子 炒黑杞子

時二脈細屬陽陰之損平素畏寒怯冷少年陽氣未得充長夏令暴瀉是時令濕熱水必遽然虛損若此令致為形瘦步履頓加喘息勢甚顯然當理脾胃

早服加減八味丸 晚服異功散

某 由陰損及乎陽寒熱互起當調營衛 參芪建中湯

去薑糖

某 入夏發泄主令出下損以及中焦減穀形衰陰傷及陽畏冷至下春季進河車羊肉溫養固髓方法積損難

臨證指南醫案 卷一 虛勞 聖

充不禁時令之泄越耳古人戒食久虛必須胃藥晚進

參朮膏早用封固佐升陽法長夏不復奈何

鹿茸 一兩 鹿角霜 一兩 熟地 二兩 生兔絲子 一兩

人參 一兩 茯苓 一兩 韭子 二兩 補骨脂 一兩

枸杞子 一兩 柏子霜 一兩 蜜丸早服四錢參湯送

參朮膏方 人參四兩另用泉水熬九蒸於朮四兩另

用泉水熬各熬膏成以炭火厚掩乾灰將藥罐收

至極老為度每用膏二錢五分開水化服

李九勞怯形色奪肌肉消食減便滑兼痰喘喉痛知醫理

者再無清咽涼肺滋陰交病人述心事操持病加顯然

內損關係感真冬寒感陽人身之陽升騰失交收斂失司豈見病治病庸淺之見識據說食進逾時必有痛瀉經言食至小腸變化屈曲腸間有阻常有諸矣凡湯藥氣升宜丸劑疎補資生丸食後服

晨服 人參 坎燕 茯苓 黑殼建蓮

五味 次實 山藥藥丸

楊 髮墮於少壯之年能食不化噫氣小溲淋瀝便糞漸細少年脾胃損傷宜煖下焦以醒中腸濟生丸三錢開水送下

陳 入陰損於下中焦運陽亦弱見症少年損怯先天不充

臨證指南醫案 卷一 虛勞 聖

以後天維續但食少難化臍滯勿用由陰損及陽用雙

補丸

某 久勞食減便溏不爽氣短促 異功加五味子

王 二脈如數垂入尺濇病起肝腎下損延及脾胃昔秦越

人云白下焦損傷過中焦則難治知有形精血難復急

培無形之氣為首食少便溏與錢氏異功散

蔡 入嗽氣浮至於食泄瀉顯然元氣損傷若清降消

痰益損真氣大旨培脾胃以資運納煖腎臟以助冬藏

不失帶病延年之算異功散兼服

熟地炭 茯苓 炒黑枸杞 五味

建蓮肉 炒黑遠志 山藥粉丸 早上服

葉三病損不復八脉空虛不時寒熱間或便溏雖步履飲食如常週身氣機尚未得雍和倘調攝失慎慮其反覆

前丸藥仍進煎方宗脾腎雙補法

人參一錢 茯苓三錢 廣皮一錢 炒沙苑一錢

益智仁一錢 煨研 炒鬼絲餅二錢

華二勞損加以煩勞肉消形脫潮熱不息胃倒泄瀉衝氣

上攻則嘔當此發泄主令難望久延

人參 訶子皮 赤石脂 蒸熟烏梅肉

新會皮 炒白粳米

臨證指南醫案 卷一 虛勞 五

呂 冲年久坐誦讀五志之陽多升咽乾內熱真陰未能

自旺於本宮診脉寸口動數怕有見紅之慮此甘寒緩

熱為穩不致胃枯耳

生地 天冬 女貞 茯神

炙草 糯稻根鬚

杜二陰精久損投以填納溫潤入夏至晚火升食物少減

仍屬陰虧但夏三月必佐胃藥

參鬚 麥冬 五味 茯神

建蓮 芡實

許 脉左緊上下直行精損熱自升降

細生地 玄參心 女貞 川斛 糯稻根鬚

又 甜北沙參 天冬 炒麥冬 茯神

阿膠 秋石

又 人參 麥冬 生甘草 扁豆

胡三補三陰虛陰是迎夏至生陰而暈逆欲嘔吐痰全是

厥陽犯胃上巔必靜養可制陽光之動久損重虛用甘

緩方法 金匱麥門冬湯去半夏

王 春牛寐則盜汗陰虛當春陽發泄胃口弱極六黃苦

味未宜用甘酸化陰法

人參 熟地 五味 炙草

臨證指南醫案 卷一 虛勞 五

湖蓮 茯神

某二誦讀身靜心動最易耗氣損管心脾偏多不時神煩

心悸頭眩腕悶故有自來也調養澆灌管陰俾陽不升

越恐擾動絡血耳

淮小麥三錢 南棗肉一枚 炒白芍一錢 柏子仁一錢

茯神三錢 炙草四分

某四脉弦脇痛引及背部食減此屬營損傳勞

桂枝木四分 生白芍一錢 炙草四分 歸身一錢

茯神三錢 生牡蠣三錢 煨薑一錢 南棗三錢

某三脉寒不嗜食腰痠無力咳煩勞營虛所致

當歸 生白芍 桂枝木 茯苓
炙草 飴糖 煨薑 南棗

汪 脉左小右虛背微寒肢微冷痰多微嘔食減不甘此
胃陽已弱衛氣不得擁護時作微寒微熱之狀小便短
赤大便微溏非實邪矣當建立中氣以維營衛東垣云
胃為衛之本營乃脾之源偏熱偏寒猶非正治

人參 歸身米炒 桂枝木 白芍炒焦 南棗
陸 勞傷陽氣不肯復元秋冬之交余宗東垣甘溫為法

原得小效寒楚交味柴葛枳朴是餌二氣散越交紐失
固閃氣疼痛腕中痞結背清陽別喪無攻痛成法唯以

臨證指南醫案 卷一 虛勞 五

和補使營衛之行冀其少緩神甦而已

人參 當歸 炒白芍 桂心
炙草 茯苓

又 右脉濡來去瀦辛甘化陽用大建中湯

人參 桂心 歸身 川椒
茯苓 炙草 白芍 飴糖南棗

汪 勞倦陽傷形寒骨熱脉來小弱非有質滯者與和營
方

當歸 酒炒白芍 炙草 廣皮
煨薑 大棗

勞傷心 程 脉左甚倍右病君相上亢莫制都因操持勞思所傷
若不山林靜養日藥不能却病

鮮生地 玄參心 天冬 丹參
茯苓 鮮蓮肉

顏 操持思慮心營受病加以勞力泄氣痰帶血出脉形
虛小右部帶弦議用歸脾湯減桂圓木香白朮加炒白

芍炒麥冬
又 勞心營液既耗氣分之熱自灼手足心熱咽乾煩渴
多是精液之損非有餘客熱前議歸脾加減乃子母同

治法今以滋清制亢之劑理心之用以復五液

臨證指南醫案 卷一 虛勞 五

人參 生地 天冬 麥冬
丹參 茯苓 燈心 竹葉心

某 神傷精敗心腎不交上下交損當治其中
參木膏米飲湯調送

華 春深地氣升陽氣動有奔馳飢飽即是勞傷內經勞
者温之夫勞則形體震動陽氣先傷此温字乃温養之

義非温熱競進之謂勞傷久不復元為損內經有損者
益之之文益者補益也凡補藥氣皆温味皆甘培生生

初陽是勞損主治法則春病入秋不愈議從中治據述
晨起未納水穀其效必甚百藥坐鎮中宮為宜

金匱麥門冬湯去半夏

徐七虛損四年肛瘍成漏食物已減什三形瘦色黃當以甘溫培中固下斷斷不可清熱理嗽

人參 茯苓 山藥 炙草

芡實 蓮肉

某積勞神困食減五心熱汗出是元氣虛陰火盛宜補

中生脈四君子湯

楊八內損陰及陽分即為勞怯胃弱少納當以建中湯加

人參

朱七既暮身熱汗出早涼仍任勞辦事食減半色脈形肉

臨證指南醫案

卷一

虛勞

堯

不足病屬內損勞怯 人參小建中湯

楊三知飢減食外寒忽熱久病行走喘促坐卧稍安此勞

傷不復議從中以益營衛

九蒸冬朮 炙甘草 煨薑 南棗

汪九此勞力傷陽之勞非酒色傷陰之勞也胃口消倦生

氣日奪豈治嗽藥可以奏功 黃芪建中湯去薑

仲三久勞內損初春已有汗出入夏食減皆身中不耐大

氣泄越右脈空大色痿黃衰極難復無邪病方法議封

固一法

人參 黃芪 熟於朮 五味

嚴八脈小右弦久嗽肺熱着左眼稍過二氣已漏即是損

怯無逐邪方法清泄莫進當與甘緩 黃芪建中去薑

又建中法頗安理必益氣以止寒熱

人參 黃芪 焦朮 炙草

歸身 廣皮白 煨升麻 煨柴胡

王六脈大而空亡血失精午食不運入暮反脹陰傷已及

陽位纏綿反覆至矣 歸身與功散

劉女年十六天癸不至頭項痠痰入夏寒熱咳嗽乃先天

稟薄生氣不充夏令發泄致病真氣不肯收藏病屬勞

怯不治 戊巳湯去白朮

臨證指南醫案

卷一

虛勞

卒

某陽傷背寒胃傷穀減 小建中湯

某畏風面冷衛外陽微 參芪建中去薑加茯苓

華十二此勞怯損傷不復之病已經食減便溏欲嘔腹癢二

氣交傷然後天為急拾仲景建中法都是盲醫矣

建中湯去糖加入參

尹四中年衰頹身動喘嗽脈細無神食減過半乃下元不

主納氣五液蒸變粘澀未老先衰即是勞病

人參 坎羔 紫衣胡桃 炒鬼絲子

茯苓 五味 炒砂仁 山藥漿丸

金四寤則心悸步履如臨險阻子後衝氣上逆此皆高年

綱醫案

下焦空虛腎氣不納所致 八味丸三錢先服四日

淡菴蓉 兩 河車膠 兩 紫石英 兩 小商 五錢 杞子 三兩

胡桃肉 兩 牛膝 兩 五味 一兩 茯苓 二兩 沙苑 一兩

補骨脂 兩 桑椹子 兩 紅棗肉 九

王 久客勞傷氣分痺阻則上焦清空諸病不利初病在

氣久則入血身痛目黃其脈形瘦由精思及乎元虛攻

補未能除病思人身左升屬肝右降屬肺當兩和氣血

使升降得宜若再延揆必成滯日甚結為癆瘵矣

旋覆花湯加桃仁歸鬚蔓皮

肝腎虛 郁氏 失血咳嗽繼而暮熱不止練水仍來六七年已不孕

臨證指南醫案 卷一 虛勞 至

育乃肝腎衝任皆損二氣不交延為勞瘵治以攝固包

舉其泄越

鮮河車膠 黃柏 熟地 淡菴蓉

五味 茯苓 蜜丸

勞力傷 屠二 勞力傷陽延三年損傷延及中宮狀如反胃諸氣欲

斜交會失序遂有寒熱腕力損傷脾胃牛屬坤土當以

霞天膏

勞力傷 朱二 奔走之勞最傷陽氣能食不充肌膚四肢常自寒冷

乃經脈之氣不得貫串於四末有重損之憂

菴蓉 二兩 當歸 二兩 杞子 一兩 茯苓 二兩

川芎 五錢 沙苑 五錢 黃蠟 一條為丸

形四 勞力傷身痛無力 歸桂枝湯去薑加五加皮

虛損之症經義最詳其名不一考內經論五臟之損

治各不同越人有上損從陽下損從陰之議其於鍼

砭所莫治者調以甘藥金匱遵之而立建中湯急建

其中氣俾飲食增而津血旺以致充血生精而復其

真元之不足但用稼穡作甘之本味而酸辛鹹苦在

所不用蓋舍此別無良法可醫然但能治上焦陽分

之損不足以培下焦真陰之本也賴先生引伸三才

固本天真大造桂枝龍骨牡蠣復脈等湯以及固攝

臨證指南醫案 卷一 虛勞 至

諸方平補是三陰法為兼治五臟一切之虛而大開

後人解讀可為損症之一助也夫金匱又云男子尿

大為勞極虛亦為勞夫脈大為氣分泄越思慮鬱結

心脾營損於上中而營分萎頓是歸脾建中養營四

君五味與功等湯之所宜也脈極虛亦為勞為精血

內奪肝腎陰不自立是六味八味天真大造三才固

本復脈等湯以及平補是三陰固攝諸法所宜也然

仲景以後莫醫輩出豈無闡揚幽隱之人而先生以

上又豈無高明好學之輩然欲舍仲景先生之法而

能治虛勞者不少概見即如東垣丹溪輩素稱前代

名醫其於損不肯復者每以參朮為主有用及數斤者其意謂有形精血難復急培無形之氣為要旨亦即仲景建中諸湯而擴充者也又厥後張景岳以命門陰分不足是為陰中之陰虛以左歸飲左歸丸為主命門陽分不足者為陰中之陽虛以右歸飲右歸丸為主亦不外先生所用三才固本天真大造等湯以及平補足三陰固攝諸法而又別無所見也故後人稱仲景先生善治虛勞者得其旨矣 鄒澹九

臨證指南醫案

卷一

虛勞

五

以縷析大凡因煩勞傷氣者先生用治上治中所以有甘涼補脾胃之清津柔劑養心脾之營液或甘溫氣味建立中宮不使二炁日偏營衛得循行之義又因縱慾傷精者當治下而兼治八脈又須知填補精血精氣之分益火滋陰之異或靜攝任陰溫理奇陽之妙處若因他症失調蔓延而致者當認明原委隨其機勢而調之揣先生之用意以分其體質之陰陽為要領上中下見症為着想傳變至先後天為生死斷訣若逆簡推求一一有根菱可考非泛泛然而奏用幾味補藥漫言為治也 邵新甫

臨證指南醫案目

卷二

咳嗽

吐血

失音

肺痿

臨證指南醫案

卷二

目

臨證指南醫案卷二

濟關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

姪旦玉堂

咳嗽

某五寒傷衛陽咳嗽

川桂枝五分 杏仁三錢 苡仁三錢 炙草四分

生薑一錢 大棗二枚

某三勞傷陽氣形寒咳嗽 桂枝湯加杏仁

臨證指南醫案卷二 咳嗽

某四寒熱咳嗽當以辛溫治之 桂枝湯去芍加杏仁

某五形寒咳嗽頭痛口渴 桂枝湯去芍加杏仁花粉

某咳嗽寒熱

杏仁三錢 嫩蘇梗一錢 桔梗一錢 桑皮一錢

象貝母一錢 生甘草三分

王三脈沉細形寒咳

桂枝一錢 杏仁三錢 苡仁三錢 炙草五分

生薑一錢 大棗二枚

吳四咳嗽聲音漸窒診脈右寸獨堅此寒熱客氣包裹肺

俞鬱則熱先以麻杏石甘湯

又葶藶湯

徐七瘧屬外邪瘧止聲音不揚必是留邪于肺系故咳

嗽不已納食起居如常中下無病但以搜逐上焦勿令

邪結可望病已

麻黃 杏仁 生甘草 射干 苡仁

某八風邪阻於肺衛咳嗽面浮當辛散之

麻黃先煎去沫五分 杏仁三錢 生甘草三分 生石膏三錢

某三風襲肺衛咳嗽鼻塞當以辛涼解散

杏仁 嫩蘇梗 桑皮 象貝

桔梗 苡仁

臨證指南醫案卷二 咳嗽

某女風熱上痺痰多咳嗽

杏仁 嫩蘇梗 橘紅 桑葉

白沙參 通草

夏五風鬱咳不止

薄荷 前胡 杏仁 桔梗

橘紅 桑皮 連翹 枳殼

方煩勞衛疎風邪上受痰氣交阻清竅失和鼻塞音低

咳嗽甚皆是肺病辛以散邪佐微苦以降氣為治

杏仁 蘇梗 辛荑 牛蒡子

苡仁 橘紅 桔梗 枳殼

風濕

項二 風濕脈虛嗽

桑葉 薄荷 杏仁 象貝

大沙參 連翹

沈 脈右搏數。風濕嗆咳。

桑葉 杏仁 象貝 苡仁

瓜蒌皮 白沙參

某女 風濕發熱咳。

薄荷 連翹 杏仁 桑皮

地骨皮 木通 黃芩 炒查

某十歲 頭脹咳嗽。此風濕上侵所致。

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 三

連翹 薄荷 七分 杏仁 一錢 桔梗 一錢

生甘草 三分 象貝 一錢

某二十 風濕上受。咳嗽失音咽痛。

杏仁 薄荷 連翹 桔梗

生甘草 射干

邱 向來陽氣不充。得溫補每奏效。近因勞煩。今陽氣

弛張。致風濕過肺。衛以擾心營。欲咳心中先痒。痰中偶

帶血。煎不必過。投沉降清散。以辛甘涼理上燥。清絡熱

蔬食安閒旬日可安。

冬桑葉 玉竹 大沙參 甜杏仁

風濕化燥傷目

生甘草 苡仁 糯米湯煎

宋二 脈右浮數。風濕干肺化燥。喉間痒咳不爽。用辛甘涼

潤劑。

桑葉 玉竹 大沙參 甜杏仁

生甘草 糯米湯煎

某 積勞更受風濕。咽乾熱咳。形脈不充。與甘緩柔方。

桑葉 一錢 玉竹 五錢 南沙參 一錢 生甘草 五分

甜水梨皮 二兩

文 風邪鬱蒸化燥。發熱後咳嗽口乾喉痒。先進清肺。

杏仁 花粉 蘇子 象貝

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 四

山梔 橘紅

薛三 風熱咳。經月不止。

活水蘆根 桑葉 大沙參 生苡仁

地骨皮 象貝 滑石 橘紅

某 風濕客邪化熱。劫燥胃津。喉間燥癢。嗆咳。用清養胃

陰。是土旺生金意。金匱麥門冬湯

陸三 陰虛體質。風濕咳嗽。苦辛開泄。肺氣加病。今舌咽乾

燥。思得涼飲。藥劫胃津。無以上供。先以甘涼。令其胃喜。

倣經義。虛則補其母。

桑葉 玉竹 生甘草 麥冬 元米 炒

白沙參 蔗漿

某 外受風溫鬱遏內因肝膽陽升莫制斯皆肺失清肅
咳痰不解經月來猶覺氣壅不降進食頗少大便不爽
津液久已乏上供腑中之氣亦不宜暢護養胃陰以杜
陽逆不得泛泛治咳

麥冬 沙參 玉竹 生白芍

扁豆 茯苓

某 溫邪外襲咳嗽頭脹當清土焦

杏仁 桑皮 桔梗 象貝

通草 蘆根

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 五

某 咳痰黃咽喉不利此溫邪上侵肺氣不清故耳

桑葉 川貝母 白沙參 杏仁

兜鈴 鮮枇杷葉

某 陰虧挾受溫邪咳嗽頭脹當以輕藥

桑葉 杏仁 川貝 白沙參

生甘草 甜水梨皮

某 脈細數咳嗽痰黃咽痛當清溫邪

桑葉 杏仁 川貝 苡仁

兜鈴 鮮蘆根 又照前方加白沙參冬瓜子

某 脈右弦大咳嗽痰多黃此屬溫邪上伏之故

桑葉 杏仁 白沙參 南花粉

兜鈴 甜水梨肉

王 六脈小數能食乾咳甚冬藏失納水虧溫伏防其失
血用復脈法 復脈湯去參薑桂

張 七冬季溫邪咳嗽是水虧熱氣內侵交驚蟄節嗽減用
六味加阿膠麥冬秋石金水同治是瀉陽益陰方法為

調體治病兼方近旬日前咳嗽復作納食不甘詢知夜
坐勞形當暮春地氣主升夜坐寤且身中陽氣亦有升
無降最有失血之虞况體豐肌柔氣易泄越當暫停讀
讀數日可愈

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 六

桑葉 甜杏仁 大沙參 生甘草

玉竹 青蔗漿

楊 二形瘦色蒼體質偏熱而五液不充冬月溫煖真氣少
溫邪 陰虛感

藏其少陰腎臟先已習習風生乃陽動之化不以育陰
驅熱以却溫氣泛泛乎辛散為暴感風寒之治過辛泄
肺肺氣散斯咳不已苦味沉降胃口戕而腎關傷致食
減氣怯行動數武氣欲喘急封藏納固之司漸失內損
顯然非見病攻病矣靜養百日猶冀其安

麥冬 甜沙參 生甘草 南棗肉

沖入青蔗漿一杯

氣分熱

王二氣分熱熾頭脹痰嗽

連翹 石膏 杏仁 鬱金

薄荷 山梔

又 照前方去山梔加薑皮桔梗

范四脈左弱右寸獨搏久咳音嘶寐則成噎阻咽平昔嗜

飲胃熱遺肺酒客忌甜微苦微辛之屬能開上痺

山梔 香淡豉 杏仁 括蘆皮

鬱金 石膏

林氏宿病營衛兩虛茲當燥氣上犯暴涼外侮氣餒衛怯

肺先受邪脈浮數咳喘欲嘔上熱下冷宜先清化上氣

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 七

有取微辛微苦之屬

桑葉 杏仁 蘇梗 山梔

象貝 苡仁 糯米湯煎

王十歲嗽緩潮熱穉年陰虧氣熱所致

地骨皮三錢 青蒿一錢 知母一錢 生甘草三錢

南沙參一錢 川斛三錢

某嗽已百日脈右數大從夏季伏暑內鬱治在氣分

桑葉 生甘草 石膏 苡仁

杏仁 蘇梗

史四濕鬱溫邪總是阻遏肺氣嘔咳脫痞即病形篇中諸

嘔喘滿皆屬於肺不明口鼻受侵阻氣之理清中疎導
乃過病所伐其無病之地矣

鮮枇杷葉 杏仁 象貝 黑山梔

堯鈴 馬勃

又 輕浮苦辛治肺咳哈頗減咽痛紅腫皆邪窒既久壅

而成毒監乾不喜飲舌色淡不紅仍清氣分佐以解毒

雞子白 麥冬 大沙參 金銀花

萊豆皮 蔗漿

陸 秋暑燥氣上受先干於肺令人咳熱此為清邪中上

當以辛涼清潤不可表汗以復津液

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 八

青竹葉 連翹 花粉 杏仁

象貝 六一散

又 脈右大瘴熱無寒暑鬱在肺當清氣熱佐以宣通營

衛 桂枝白虎湯加麥冬

又 熱止脈右數咳不已

知母 生甘草 麥冬 沙參

炒川貝 竹葉

汪女暑熱入肺為咳

花粉 六一散 杏仁 橘紅

大沙參 黑山梔皮

暑風

某九咳嗽。頭脹口渴。此暑風襲於肺衛。

杏仁 三錢 香薷 五分 桔梗 一錢 桑皮 一錢

飛滑石 三錢 絲瓜葉 三錢

倪三兩寸脈皆大。冷熱上受。咳嗽無痰。是為清邪中。止。

暑風法。

竹葉 薑皮 橘紅 滑石

杏仁 沙參

潘氏久咳不已。則三焦受之。是病不獨在肺矣。况乎咳甚。

嘔吐涎沫。喉癢咽痛。致咳之由。必衝脈之傷。犯胃擾肺。

氣蒸薰灼。淒淒燥癢。咳不能忍。近日晝暖夜涼。秋暑風。

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 九

潮熱溼泄。客氣加臨。營衛不和。經阻有諸。但食薑氣味。

過辛致病。辛則泄肺氣。助肝之用。醫者知此理否耶。未。

診脈右弦數。微寒熱。渴飲。擬從溫治。上焦氣分。以表暑。

風之邪。用桂枝白虎湯。

王三歲 暑風入肺。煩熱咳嗽。防驚。

益元散 黃芩 竹葉 花粉

苡仁 地骨皮

張五形瘦脈數。驟涼暮熱。肺失和為咳。小暑後得之。亦由。

時令暑濕之氣。輕則治上。大忌發散。

大竹葉 飛滑石 杏仁 花粉

桑葉 生甘草

某咳嗽喉痛。溺瀉。

西瓜翠衣 三錢 杏仁 三錢 六一散 三錢 桔梗 一錢

通草 一錢 桑葉 一錢 川貝 一錢 連翹 一錢

曹水穀不運。濕聚氣阻。先見喘咳。必延蔓腫脹。治在氣。

分。

杏仁 厚朴 苡仁 廣皮白

蘇梗 白通草

陸二濕必化熱。薰蒸為嗽。氣隨未清。納穀不旺。必薄味靜。

養壯盛不致延損。

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 十

飛滑石 南花粉 象貝 苡仁

菜豆皮 通草

某渴飲咳甚。大便不爽。

石膏 花粉 通草 紫苑

木防已 杏仁 苡仁

某雨濕寒熱汗出。痰多咳嗽。大小便不爽。胸脘不飢。臍。

左室塞。

杏仁 萊菔子 白芥子 蘇子

鬱金 薑皮 通草 橘紅

朱五中虛少通。濕痰多阻。氣分咳嗽。舌白。

火 濕熱

馮 脉右弦大而緩。形瘦目黃。久嗽聲嘶而濁。水穀氣蘊之濕。再加時序之濕熱。壅阻氣分。咳不能已。久成老年痰火咳嗽。無性命之憂。有終年之累。

蘆根 馬勃 苡仁 浙茯苓
川斛 通草

陳 秋燥。痰嗽氣促。
桑葉 玉竹 沙參 嘉定花粉
苡仁 甘草 蔗漿

又 用清燥法。
臨證指南醫案 卷二 咳嗽 土

施 脉沉弦為飲。近加秋燥。上咳氣逆。中焦似痞。姑以辛泄涼劑。暫解上燥。
甘草 石膏 杏仁
括蕁皮 鬱金 香豉 杏仁

胡六 脉右勁。因疥瘡癩。以熱湯沐浴。衛疎易傷。冷熱皮毛。內應乎肺。咳嗽氣塞。痰多。久則食不甘。便燥結。胃津日耗。不可供肺。况秋冬天降。燥氣上加。漸至老年。痰火之象。此清氣熱。以潤燥。理勢宜然。倘畏虛日投。滯補益。

枯燥矣。

霜桑葉 甜杏仁 麥冬 玉竹 白沙參
天花粉 甘蔗漿 甜梨汁 熬膏
某四 脉弦。胸膈痺痛。咳嗽頭脹。此燥氣上侵。肺氣不宣。使然。當用輕藥。以清上焦。

枇杷葉 桑葉 川貝 杏仁
冬瓜子 桔梗

某十 舌白咳嗽。耳脹口乾。此燥熱上鬱。肺氣不宣。使然。當用辛涼。宜薄滋味。
鮮荷葉 連翹殼 大杏仁 白沙參

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 土
飛滑石 冬桑葉
某五 邪燥肺陰。咳嗽咽痛。喘甚。
玉竹 南沙參 冬桑葉 川斛

玄參 青蔗漿
某二 鼻淵三載。藥投辛散。如水投石。未能却除。辛辣炙燂耳。近復咳嗽音嘶。燥氣上逼。肺衛使然。
杏仁 連翹 象貝 白沙參

桑皮 玳鈴
僧三 脉右寸獨大。氣分咳。有一月。

桑葉 杏仁 玉竹 苡仁

沙參 茯苓 糯米湯煎

某 脉右大。寤咳寐安。病在氣分。

桑葉 川貝 知母 地骨皮

梨汁 蔗漿 熬膏

朱女 肝陰虛。燥氣上薄。咳嗽夜熱。

桑葉 白沙參 杏仁 橘紅

花粉 地骨皮 糯米湯煎

陸女 燥風外侵。肺衛不宣。咳嗽痰多。不時身熱。當用輕藥。以清上焦。

桑葉 杏仁 花粉 大沙參

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 三

川貝 菘豆皮

戎 咽阻咳噎。兩月來聲音漸低。按脉右堅。是冷熱傷肺。

生薑子白 桑葉 玉竹 沙參

麥冬 甜杏仁

吳七 燥氣上逼。咳喘。以甘寒治氣分之燥。

大沙參 桑葉 玉竹 生甘草 甜梨皮

某十 燥熱內伏。發熱。咳嗽口渴。

桑葉 杏仁 白沙參 蓮翹

困圖滑石 鮮蘆根

費一 久瘧傷陰。久季溫舒。陽不潛藏。春木升舉。陽更泄越。

入暮寒熱。晨汗始解。而頭痛口渴。咳嗽陰液損傷。陽愈

熾。冬春溫邪。最忌發散。謂非暴感。汗則重劫陰傷。迫成

虛勞一途。況有汗不痊。豈是表病。診得色消肉燥。脉獨

氣口空搏。與脉左大。屬外感有別。更有見咳不已。膠為

肺熱。徒取清寒。消痰降氣之屬。必致胃損。變重。皆考聖

訓。仲景云。凡元氣已傷。而病不愈者。當與甘藥。則知理

陽氣。當推建中。顧陰液。須投復脉。乃邪少虛多之治法。

但幼科未讀其書。焉得心究是理。然乎否乎。

炙甘草 鮮生地 麥冬 火麻仁

阿膠 生白芍 青蔗漿

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 三

又 由陰傷及胃。痿黃食少。法當補養胃陰。虛則補母

之治也。見咳治肺。生氣日憊矣。金匱麥門冬湯

某五 脫痺咳嗽

鮮枇杷葉 以壁杏仁 桔梗 川貝

冬瓜子 蜜炙橘紅

周二 秋燥從天而降。腎液無以上承。咳嗽吸不肯通。大便

三四日一更衣。脉見細小。議治在臟陰。

牛乳 紫衣胡麻 生白蜜 薑汁

吳 久嗽因勞之致傷。絡血易淤。長夜熱灼。議養胃陰。

北沙參 黃芪皮 炒麥冬 生甘草

炒粳米 南棗

某 喉痺咳喘。脉右大而長。

生扁豆 麥冬 北沙參 川斛 青蔗漿

毛 上年夏秋病傷。冬季不得復元。是春令地氣陽升。寒

熱咳嗽。乃陰弱體質。不耐升泄所致。徒謂風傷。是不知

陰陽之義。

北參 炒麥冬 炙甘草 白粳米 南棗

某二 病後咳喘。當清養脾胃之陰。

生扁豆 麥冬 玉竹 炒黃川貝

川斛 白粳米湯煎

臨證指南醫案

卷二

咳嗽

五

徐仁 形寒畏風。食減久嗽。是衛外二氣已怯。內應乎胃

陽脉不用。用藥莫偏治寒熱。以甘藥調。宗仲景麥門冬

湯法。

張七 入夏嗽緩。神倦食減。渴飲。此溫邪延久。津液受傷。夏

令暴燥泄氣。胃汁暗虧。筋骨不束。兩足痠痛。法以甘緩。

益胃中之陰。做金匱麥門冬湯製膏。

麥冬 二兩 北沙參 一兩 生甘草 錢五 生扁豆 二兩

麥冬 二兩 南棗 二兩 熬膏

湯二 脉左堅數。促冬温咳嗽。是水虧熱升。治不中數。胃陰

受傷。穢濁氣味。直上咽喉。即清肺冀緩其嗽。亦致氣泄。

而嗽仍未罷。先議甘涼益胃陰。以制龍相。胃陰自立。可

商填下。

生扁豆 米炒麥冬 北沙參 生甘草

冬桑葉 青蔗漿

錢氏 脉右數。咳兩月。咽中乾。鼻氣熱。早暮甚。此右降不及。

胃津虛。厥陽來後。金匱麥門冬湯。去半夏。加北沙參。

某四 咳早甚。屬胃虛。

生扁豆 炒麥冬 大沙參 苡仁 橘紅

陳 秋冬形體日損。咳嗽吐痰。診脉兩寸促數。大便通而

不爽。此有年煩勞動陽。不得天地收藏之令。日就其消。

臨證指南醫案

卷二

咳嗽

六

乃虛症也。因少納胃衰。未可重進滋膩。議用甘味養胃

陰一法。金匱麥門冬湯。

錢 久咳三年。痰多食少。身動必息。鳴如喘。診脉左搏數。

右小數。自覺內火燔燥。乃五液內耗。陽少制伏。非實火

也。常以瓊玉膏滋水益氣。暫用湯藥。總以勿損胃為止。

治嗽肺藥。諒無益於體病。

北沙參 白扁豆 炒麥冬 茯神

川石斛 花粉

范氏 兩寸脉大。咳甚。院悶項脹。耳鼻竅閉。此少陽鬱熱上

逆。犯肺。肺燥。喉癢。先擬解木火之鬱。

勞火

羚羊角 連翹 梔皮 薄荷梗

苦丁茶 杏仁 蕁皮 菊花葉

陸 脉小久咳背寒骨熱知飢不食厭惡食物氣味此憂

思悵鬱皆屬內損閱方藥都以清寒治肺不應議益土

泄木法

炙甘草 茯神 冬桑葉 炒丹皮

炒白芍 南棗

尤氏 寡居煩勞脉右搏左澹氣燥在上血液暗虧由思鬱

致五志煩煎固非溫熱補清之症晨咳吐涎姑從胃治

以血海亦隸陽明耳

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 七

生白扁豆 玉竹 大沙參 茯神

經霜桑葉 苡仁 用白糯米半升淘濾清入

滾水泡一沸取清湯煎藥

又 木虛在下情悵悵鬱則五志之陽上蒸為咳固非實

火但久鬱必氣結血涸延成乾血勞病經候澹少愆期

已屬明徵常培肝腎之陰以治本清養肺胃氣蒸以理

標剛熱之補畏其劫陰非法也

生扁豆 北沙參 錢 茯神 三錢 炙草 五分 南棗肉 三錢

熟地 砂仁 木片 鹿角霜 方劑 當歸 小黃香 井

淮牛膝 鹽水炒 雲茯苓 二兩 紫石英 醋煨水

勞熱

青鹽 五錢 另熬生羊肉膠和丸早服四錢開水送

章 自服八味鹿角膠以溫補反咳嗽吐痰形瘦減食皆

一偏之害宜清營熱勿事苦寒

鮮生地 麥冬 玄參心 甘草

苦百合 竹葉心

某七 脉數衝氣咳逆當用攝納腎陰滋養柔金為金水同

治之法

熟地 四錢 白扁豆 五錢 北沙參 三錢 麥冬 二錢

川斛 三錢 茯神 三錢

王八 脉左尺堅久嗽失音入夏見紅天明咳甚而納穀減

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 六

損此勞損之症急宜靜養者

麥冬 大沙參 玉竹 川斛

生白扁豆 雞子白

某 久嗽咽痛入暮形寒雖屬陰虧形痿脉爽未宜妄補

麥冬 南沙參 川斛 生甘草 糯稻根鬚

某 氣急咳頻欲嘔下午火升此上有燥熱下焦陰虧也

早都氣丸 晚威喜丸

張 今年春季時疫大半皆有咳嗽咽喉之患乃邪自上

下肺氣先傷耳近口身動氣喘聲音漸不揚着左眼臥

左脇上有牽掣之狀此肝腎陰虧衝氣上觸冬藏失司

漸有引引音至矣勞傷致損非清邪治咳之病

六味丸加陽秋石阿膠麥冬菴丸

顧 真陰不旺先後天皆虧以填精實下為主若清熱冀

圖治嗽必胃損減穀

熟地 萸肉 山藥 茯苓 湖蓮

芡實 五味 人乳粉 金櫻膏丸

湯 脈左弱右持久有虛損交春不復夜卧着枕氣衝咳

甚即行走亦氣難喘促此乃下元根蒂已薄久藏不固

春升生氣淺少急當固納攝下世俗每以辛涼理嗽每

致不效矣

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 九

水製熟地 五味 湖蓮 芡實

伏龍 青鹽 羊內腎

其氣衝咳逆行動頭脹下體自汗 都氣丸

案 熱病兩三反覆其陰必傷當戊亥時厥昏汗出者乃

虛陽上冒非腎根蒂不牢衝脈震動則請脈俱逆陽泄

為汗耳此咳嗽乃下焦陰不上承非肺病也急當收攝

固澀固腎蘇子釣藤皆泄氣奪世之藥施於陰陽兩損

之醫最宜斟酌 都氣加青鉛

朱 呼吸氣息音行動氣喘此咳嗽是腎虛氣不收攝形寒

法以護衛陽微腎氣丸頗能形氣不足加人參河車

王 氣急嗽逆足冷當用攝納水中藏火法 薛氏加菴

八味丸三錢淡菴湯送下

郭 形瘦脈垂入澤久嗽嘔逆半年不愈是腎虛厥氣上

干醫藥清寒治肺者不少誤人匪淺

坎炁 人乳粉 杞子 五味 胡桃肉

茯神 巴戟肉 萸肉 山藥漿丸

某 冬季咳嗽吐痰漸至卧則氣衝喘急起坐今三載矣

經以肺腎為俯仰之臟是肺主出氣腎主納氣老年患

此按脈右弦左沉為腎氣不收主治不必因痔患而畏

辛熱 腎氣丸去牛膝肉桂加沉香蜜丸

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 十

張 冬季喘嗽似屬外因表散香進反致失音不得着枕

卧眠今戌亥時濁陰上千而喘急氣逆為甚仍議引導

納氣歸腎 六味加附子車前補骨脂胡桃沉香

朱 虛勞食減便瀉已無清肺治嗽之法必使胃口旺真

其久延此非藥餌可效之病

人參 秋石泡 茯神 山藥 建蓮 芡實

以仁 訶子皮 用糯稻根鬚煎湯煎藥

沈 勞嗽食減便瀉汁出陰損已及陽腑中宜扶胃下固

腎陰為治大忌清肺寒涼希冀治嗽

熟地 熟冬朮 五味 芡實

湖蓮 山藥

某 氣弱久嗽痰多午前為甚

早服都氣丸三錢 午服異功散

某 久咳損及中州脾失輸化食減神倦肺無所資至咳
不已診得兩手脈弦細數精氣內損非泛常治咳消痰
所可投

熟地 阿膠 燕窩 海參

天冬 茯苓 紫石英 紫衣胡桃肉

孫 脈搏大陽不下伏咳頻喉痺暮夜為甚先從上治

生雞子白 生扁豆皮 玉竹 白沙參

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 三

麥冬 地骨皮

周四 脈來虛沈形色衰奪久患漏瘍陰不固攝經管勞動
陽氣再傷冬月客邪致咳都是本體先虛春深入夏天
地氣泄身中無藏日加萎頓理固當然此豈治咳治血
者議補三陰臟陰方法

人參秋石 熟地 麥冬 扁豆

茯苓 白粳米

施氏 脈細數乾咳咽燥脊痠痿弱此本病欲損

阿膠 雞子黃 北沙參 麥冬

茯苓 小黑稽豆皮

某 左脈弦數遺泄久嗽痰黃當用填補

炒熟地 芡實 扁豆 女貞

茯苓 糯稻根鬚

丁六 秋令天氣下降上焦先受燥化其效症最多屢進肺
藥無功按經云久咳不已則三焦受之是不揣於理肺
可知矣六旬又三形體雖充而真氣漸衰古人於有年
久嗽都從脾胃子母相生主治更有效久氣多發泄亦
必益氣甘補歟攝實至理也茲議攝納下焦於早服而
純甘清燥暮進填實在下清肅在上比藥味苦辛宜忌
為傷胃泄氣預防也

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 三

早服 水製熟地八兩 白雲苓四兩 五味子去核蒸三兩

建蓮六兩 淮山藥乳蒸四兩 車前子三兩

淮牛膝蒸水三兩 紫衣胡桃肉霜三兩

右為末用蒸熟猪脊髓去膜搗丸服六七錢開水送

晚用益胃土以生金方法

真北沙參有根有鬚者四兩 生黃芪薄皮三兩 麥冬去心二兩

生白扁豆國圖連皮四兩 生細甘草一兩 南棗肉四兩

淡水煎汁濾清收膏階成加真柿霜二兩收晚土開

水化服五錢

徐四 色萎脈濡心悸倉痰咳逆勞心經營氣餒陽虛中年

向哀病加治法中宮理胃下固腎真務以加穀為安
治非宜煎藥用大半夏湯早服附部氣丸

某色白肌柔氣分不足風溫上受而咳病固輕淺無如

羌防辛溫膏知沉寒藥重已過病所陽傷背寒胃傷減

穀病志仍若身體先倦問誰之過歟 小建中湯

又苦辛泄肺損胃進建中得安宗內經辛走氣以甘緩

其急然風溫客氣皆從火化是清養胃陰使津液得以

上供斯燥癢咳哈自緩土旺生金虛則補母古有然矣

金匱麥門冬湯

王 亂藥雜投胃口先傷已經減食便溏何暇紛紛治嗽

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 三

急急照顧身體久病宜調寢食 異功去白朮加炒白

芍炒山藥

高 甘藥應驗非治嗽而嗽減病根不在上腹鳴便忽溏

陰中之陽損傷

人參 冬白朮 雲茯苓 炙甘草

炒白芍 南棗

徐二勞損咳嗽用建中法得效乃無形之氣受傷故益氣

之藥氣醇味甘中土實金受益然必安穀加餐庶幾可

禦長夏濕熱蒸逼真氣致泄反覆 異功加歸芪薑棗

其 內損虛症經年不復色消奪畏風怯必營衛二氣已

乏納穀不肯充長肌肉法當建立中宮大忌清寒理肺
希冀止嗽嗽不能止必致胃敗減食致劇

黃芪建中湯去薑

陳七脈細促久嗽寒熱身痛汗出由精傷及胃

黃芪建中湯去薑

許二久嗽不已則三焦受之一年來病咳而氣急脈得虛

數不是外寒束肺內熱迫肺之喘急矣蓋飯弱無以自

立短氣少氣皆氣機不相接續既曰虛虛則補其母

黃芪建中湯

李四久嗽經年背寒足附常冷汗多色白嗽甚不得卧此

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 三

陽微衛薄外邪易觸而濁陰挾飲上犯議和營衛兼護

其陽 黃芪建中湯去糖加附子茯苓

任五勞力傷陽自春至夏病加煩倦神羸不食豈是嗽藥

可醫內經有勞者溫之之訓東垣有甘溫益氣之方堪

為定法 歸芪建中湯

張九節課誦讀動心耗氣凡心營肺衛受傷上病延中必

漸減食當世治咳無非散邪清熱皆非內損主治法

歸芪建中湯去薑

呂 脈左細右空搏久欬吸短如喘肌熱日瘦為內損怯

症但食納已少大便亦溏寒涼滋潤未能治嗽徒令傷

脾妨胃苦越人謂上損通脾下損及胃皆屬難治之例
自云背寒忽熱且理心營肺循仲景所云元氣受損甘
藥調之二十日議建中法 黃芪建中去薑

馬 虛損脈弦久嗽食減 小建中去薑

損宗內經形不足溫養其氣 黃芪建中湯去薑加人
參五味

某二 脈弦右大久嗽背寒盜汗 小建中去薑加茯神
朱九 五年咳嗽遇風冷咳甚甚是肌表衛陽疏豁議固劑經
其急 黃芪建中湯

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 五

吳三 勞力神疲遇風則咳此乃衛陽受傷宜和經脈之氣
勿用逐痰攻傷之藥 當歸桂枝湯合玉屏風散

某 久咳神衰肉消是因勞內傷醫投苦寒沉降致氣泄
汗淋漓耗夜熱胃口傷殘食物頓減 黃芪建中去薑

某 脾胃脈部獨大飲食少進不喜飲水痰多咳頻是土
衰不生金氣 建中去飴加茯神 接服四君子湯

某 風濕咳嗽多勞氣分不充戊巳湯
人參 茯苓 於朮 炙草

廣皮 炒白芍
某 勞嗽喜得辛煖之物 異功加櫻膏南棗

吳如 病去五六當調寢食於醫藥之先此平素體資不可
不論自來納穀恒少大便三日一行胃氣最薄而滋膩
味厚藥饋商從來久病後大脾胃為要咳嗽 非各症
治脾胃者土旺以生金不必窮究其嗽

人參 鮮蓮子 新會皮 茯神
炒麥冬 生穀芽

某 脈虛久嗽減食 四君子加南棗
汗 初咳不得卧今左眼咳甚並口渴欲飲周身熱熱
汗出此積勞內傷木反乘金不飢不納滋屬難投惟以
培中土制木生金合乎內傷治法

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 五

川桂枝 茯苓 淡乾薑 五味子
生甘草 大棗

某二 咳逆欲嘔是胃欬也當用甘藥
生扁豆 北沙參 麥冬 茯苓 三錢
南棗 糯稻根 五錢

某 伏邪久咳胃虛嘔食殆內經所謂胃咳之狀耶
麻黃 杏仁 甘草 石膏

牛夏 苡仁
王二 脈沉短氣咳甚嘔吐飲食便溏泄乃寒濕鬱滯清陽
明胃營衛不和胸痺如悶無非陽不旋運夜陰用事濁

泛嘔吐矣。唐醫治痰逆氣治肺論咳不思內瀉胃咳之
狀咳逆而嘔耶。小半夏湯加薑汁

石 氣左升腹膨嘔吐涎沫黃水吞酸暴咳不已是肝逆
乘胃射肺致坐不得臥 安胃丸三錢

范 如久咳涎沫欲嘔長夏反加寒熱不思食病起噴怒氣
息上衝不能着枕顯然所逆犯胃冲肺此皆疎泄失司
為勞勞之症故滋膩甘藥下咽欲嘔矣

小青龍去麻辛甘加石膏
顏 氏 久有痛經氣血不甚流暢驟加暴怒肝陽逆行乘肺
則咳病家云少腹衝氣主于其咳乃作則知清潤肺藥

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 三

非中竅之法今寒熱之餘咳不聲揚但脇中拘急不飢
不納乃左升右降不司旋轉而胃中遂失下行為順之
昔古人以肝病易於犯胃然則肝用宜泄胃腑宜通為
定例矣

桑葉 丹皮 鈎藤 茯苓
半夏 廣皮 威喜丸 三錢

某 脉弦右甚嗽午潮熱便溏畏風以大腸嗽治之

生於木 茯苓 三錢 赤石脂 錢 禹糧石 二錢
薑汁 四分 大棗 三枚

又 照前方加白芍甘草

又 肝數右長左弦上咳下瀉

生於木 茯苓 三錢 炙甘草 五分 木瓜 一錢
薑汁 四分 大棗肉 四錢

石 四 咳嗽十月醫從肺治無效而顯張喉痺尻痛顯是厥
陽肝風議鎮補和陽熄風

生牡蠣 阿膠 青黛 淡菜

某 昨議上焦肺病百日未痊形肌消瘦悉由熱化久熱
無有不傷陰液擬擬補如阿膠雞子黃復入苓連苦寒
自上清氣熱以補下雖為暫服之方原非峻尅之劑細
思手經之病原無遠入足經之理但人身氣機合乎天

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 天

地自然肺氣從右而降肝氣由左而升肺病主降日遲
肝橫司升日速咳陰未已乃肝勝木反刑金之兆試言
及久寐寤醒左常似因熱嘈雜如飢及至進食未覺胃
中安適此肝陽化風旋擾不息致陰無平期即候熱之
來升至左頰其左升太過足為明驗倘升之不已入春
肝木司權防有失血之累故左右為陰陽之道路陰陽
既造其偏以致病所以清寒滋陰不能驟其速功

阿膠 雞子黃 生地 天冬
女貞實 糯稻根 續

姚 腦痛久嗽 旋覆花湯加桃仁柏子仁

某 寒熱右脇痛咳嗽

蘆根 一兩 杏仁 三錢 冬瓜子 三錢 苡仁 三錢

枇杷葉 三錢 白蔻仁 三分

咳為氣逆。嗽為有痰。內傷外感之因甚多。確不離乎肺臟為患也。若因於風者。辛平解之。因於寒者。辛溫散之。因於暑者。為薰蒸之氣。清肅必傷。當與微辛微涼。苦降淡滲。俾上焦蒙昧之邪。下移出腑而後已。若因於濕者。有兼風兼寒兼熱之不同。大抵以理肺治胃為主。若因秋燥。則嘉言喻氏之議最精。若因於火者。即溫熱之邪。亦以甘寒為主。但溫熱猶有用苦辛之法。非比秋燥而絕不用之也。至於內因為病。不可不逐一分之有剛亢之威。木扣而金鳴者。當清金制木。佐以柔肝入絡。若土虛而不生金。真氣無所稟。攝者。有甘涼甘溫二法。合乎陰土陽土以配剛柔為用也。又因水虛而痰泛。元游竭而諸氣上冲者。則有金水雙收。陰陽並補之治。或大劑滋填鎮攝。葆固先天一无元精。至於飲邪。竊發亦能致嗽。另有端門兼參可也。以上諸法。皆先生臨證權衡之治。非具慧心手眼。能如是乎。 邵新甫

臨證指南醫案

卷二

咳嗽

三

吐血

朱 形寒暮熱。咳嗽震動。頭中腕中脇骨皆痛。先經嗽紅。

體氣先虛。此時序冷熱不勻。夾帶寒邪致病。脈得寸口獨大。當清解上焦。大忌溫散之劑。

桑葉 蘇梗 杏仁 象貝

玉竹 大沙參

某 風溫上受吐血

桑葉 薄荷 杏仁 連翹

石膏 生甘草

臨證指南醫案 卷二 吐血

三

徐 陰虛風溫氣逆嗽血

生扁豆 玉竹 白沙參 茯苓

桑葉 鬱金

顧 寸口脈搏指而動。痰血能食。初因風溫咳嗽。震動絡

血以清心營肺衛之熱

小生地 黑山梔 地骨皮 天花粉

丹參 連翹 竹葉心

注 右脉大咽喉痒。頭中微脹。此冬溫內侵。陽氣不伏。

絡熱。血得外溢。當調其復邪

桑葉 山梔皮 連翹 白沙參

象貝 牛蒡子
某 脉小而勁。少年體豐。真氣易泄。經月咳驗。自非外感。因冬溫失藏。咳頻震絡。痰帶血出。當薄味以和上焦氣。熱得清病患可却。

桑葉 山梔 杏仁 鬱金

象貝 花粉 糯米湯代水

王五 脉右大。溫邪震絡。咳痰帶血。

桑皮 杏仁 山梔皮 花粉

大沙參 石膏

高 溫邪上鬱。清空目赤頭脹。咳驗見血。此屬客病。不必

臨證指南醫案 卷二 吐血 三

為內損法

連翹 黑山梔 草決明 桑葉

薄荷梗 荷葉邊 苦丁茶 花粉藥用急火煎

唐二 血後。喉燥痒欲驗。脉左搏堅。

玉竹 南花粉 大沙參 川斛

桑葉 糯米飲煎

高一 脉小清。欲涼飲。熱阻氣升血胃。仍議治上。

嫩竹葉 飛滑石 山梔皮 鬱金汁

杏仁汁 新荷葉汁

某 春溫嗽痰。固屬時邪。然氣質有厚薄。不可槩以辛散。

汪七 天明至午。嗽甚痰血。春暖陽浮。是腎虛不藏。聞咳音重濁不爽。先議輕清。治氣分之熱。

桑葉 南花粉 黑梔皮 桔梗

甘草 橘紅

某 脉搏數。舌心灰。咳痰有血。頻嘔絡傷。致血隨熱氣上出。仍理氣分。

桑葉 花粉 苡仁 川貝

黃芩 茯苓

方 夏熱泄氣。胃弱衝逆。失血。

扁豆 茯苓 參三七 茜草

臨證指南醫案 卷二 吐血 三

施 脉小數。舌絳。喉中痒。咳驗血。因暑熱旬日。熱入營。震動而溢。凡肺病為手太陰經。逆傳必及膈中。仍以手厥陰治。

竹葉心 生地 銀花 連翹心

玄參 赤豆皮

高 脉數。汗出身熱。吐血五日。胸脘不舒。舌色白。此陰虛本質。暑熱內侵營絡。漸有時瘧之狀。小溲莖中微痛。宜通腑經為宜。

鮮生地 連翹 鬱金汁 滑石

竹葉 甘草稍

且正在知識發動之年。陰分自不足。以至咳嗽失血。當以甘寒潤降。以肅肺金。

鮮枇杷葉 甜杏仁 南沙參 川貝

甜水梨 甘蔗漿

郭 熱傷元氣。血後咳逆。舌赤。脈寸大。

鮮生地 麥冬 玉竹 地骨皮

川斛 竹葉心

又 心眩。不饑。熱灼氣升。

鮮生地 玄參 丹參 鬱金汁

銀花 竹葉心 菴豆皮

臨證指南醫案 卷二 吐血 三

某 脈濡。咳嗽痰血。不時寒熱。此邪阻肺衛所致。

葦葶湯加杏仁通草

孫二 用力氣逆血亂。咳出腥痰濁血。用千金葦葶湯。

某 邪鬱熱蘊。咳吐膿血。音啞。

麻杏甘膏湯加桔梗苒仁桃仁紫苑

倪二 肛瘍潰膿。雖愈陰氣已絕。走泄當陽氣弛張發泄。今

加嗽血痰多。胃納減於平昔。脈數促。喘逆腕悶。姑清肅

上焦氣分。

蘇子 杏仁 香豉 黑梔皮

鬱金 葦皮 降香 桔梗

又 氣阻不饑

黑梔皮 香豉 葦皮 鬱金

杏仁 橘紅

王氏 入夏陰血。乃氣泄陽升。幸喜經水仍來。大體猶可無

妨。近日頭脹。腕中悶。上午煩倦。是秋暑上受。防發寒熱。

竹葉 飛滑石 杏仁 連翹

黃芩 荷葉汁

江 積痰在絡。動絡血逆。今年六月初。時令暴熱。熱氣吸

入。首先犯肺。氣熱血湧。強降其血。血藥皆屬呆滯。而清

空熱氣。仍蒙閉於頭髓空靈之所。諸竅痺塞。鼻窒瘰肉。

臨證指南醫案 卷二 吐血 三

出納之氣。都從口出。顯然肺氣鬱蒸。致腦髓熱蒸。脂液

自下。古稱燥物消物莫如火。但清寒直泄中下。清空之

病。仍然議以氣分輕揚。無取外散。而事內通。醫工遇此

法。則每每忽而失察。

連翹 牛蒡子 通草 桑葉

鮮荷葉汁 青菊花葉 臨服入生石膏末煎一沸

某二 以毒藥燻瘡。火氣逼射肺金。遂令咳喘痰血。咽乾胸

悶。診脈尺浮。下焦陰氣不藏。最慮病延及下。卽有虛損

之患。姑以輕藥暫清上焦。以解火氣。

杏仁 三錢 菴豆皮 二錢 冬瓜子 三錢 苒仁 三錢

川貝 錢 兜鈴 七分

趙三 咳逆自左而上血亦隨之先以少陽胆絡治

生地 丹皮 澤蘭 茯苓

降香末 荷葉汁

張六 耳目昏蒙甚於午前此屬少陽鬱勃之升嘔惡痰血多是絡熱治以開泄莫投滋膩

桑葉 丹皮 黑梔 連翹

菊葉 藁皮 川貝 橘紅

黃七 色蒼能食腕有積氣兩年秋冬曾有哈血此非虛損由乎體稟木火噴怒拂逆肝胆相火擾動陽絡故也

臨證指南醫案 卷二 吐血 五

金斛 山梔 礞石 丹參

川貝 蘇子 鈎藤 茯苓

又 接用清氣熱安血絡方

生地 麥冬 玄參 知母 花粉

百部 枯柳 川貝 蜜丸

嚴四 脈數滿小結痰血經年屢發仍能納食應酬此非精

血損怯由乎五志過動相火內寄肝胆操持鬱勃皆合

動灼致絡血上滲混痰火必靜養數月方安否則木火

劫燥胃傷減食病由是日加矣

丹皮 薄荷梗 菊花葉 黑梔

淡黃芩 生白芍 礞石 川貝

入夏陽升疾走驚惶更令諸氣益升飲酒多食櫻桃皆辛熱甘辣絡中血沸上出議消酒毒和陽

生地 阿膠 麥冬 嘉定花粉

川斛 小黑糖豆皮

沈 脈左堅上透是肝腎病血色紫乃既離絡中之色非

久痰也勞役暑蒸內陰不生有諸微瓊玉意仍是陰柔

之通劑

鮮生地 人參 茯苓 琥珀末

張 血止脈左大

臨證指南醫案 卷二 吐血 五

天冬 生地 人參 茯苓

笑草 生白芍 女貞 旱蓮草

顧八 脈左堅陰傷大血致咳復脈去參桂姜加白芍

凡咳血之脈右堅者治在氣分係震動胃絡所致宜

薄味調養胃陰如生扁豆茯苓神北沙參苡仁等類左

堅者乃用腎陰傷所致宜地黃阿膠枸杞五味等類

脈弦滿痛者宜蘇子桃仁降香鬱金等類成益盈飽

者為可久花蕊石散仲景大黃黃連瀉心湯一症而

條分縷晰從此再加分別則臨證有據矣

趙四 虛不肯復謂之損納食不充肌膚所賦不能着左遇

節令必帶血脈左細右勁數。是從肝腎精血之傷。延及氣分。倘能節勞安逸。僅堪帶病。永年損症五六年。無攻病之理。臟屬陰。議平補足三陰法。

人參 山藥 熟地 天冬

五味 女貞

張十四 失血五六年。脈虛氣喘。不運不饑。治在中下二焦。望其安穀精生。勿許攻病為上。

人參 炙草 白芍 茯神

炒熟地 五朮

某七 勞力血復來。衝氣咳逆。當用攝納為要。

臨證指南醫案 卷二 吐血 三

熟地 四錢 參三七 錢 大淡菜 兩 牛膝炭 半

川芎 三錢 茯神 三錢

某四 脈弦脇痛已緩。血仍來。

大淡菜 兩 參三七 錢 牛膝炭 半 茯苓 一錢

川斛 三錢 小黒糖豆皮 錢

某七 失血後咳嗽咽痛音啞。少陰已虧。耗藥不易治。

糯稻根鬚 兩 生扁豆 錢 麥冬 三錢 川斛 一錢

北沙參 半 茯神 半 早服都氣丸淡鹽湯下

某三 脈虛數。失血。心悸頭眩。

大淡菜 錢 牛膝炭 半 白扁豆 兩 白茯苓 錢

糯稻根鬚 錢

某九 血來稍緩。猶能撐持步履。乃稟賦強健者。且能納穀。陽明未敗。可驗。而脈象細滑。陰傷矣疑。

北沙參 半 扁豆 一兩 參三七 半 炒麥冬 一錢

扶神 三錢 川斛 三錢

施二 陰血數發。是陽氣過動。診脈已非實熱。夏至一陰來復。預宜靜養。迨其生氣。秋分後再議。生脈六味去丹。澤加阿膠秋石蜜丸。

澤加阿膠秋石蜜丸

張 脈右弦數。左細滑。陰損。失血後久咳。食減便溏。

熟地炭 扶神 建蓮 五味

臨證指南醫案 卷二 吐血 三

芡實 炒山藥

某四 失音咽痛。繼而嗽血。脈來濇數。已成勞怯。幸賴能食。胃強。勿見咳治咳。庶幾帶病延年。

細生地 錢 玄參心 錢 麥冬 半 細川斛 三錢

鮮蓮子肉 兩 糯稻根鬚 錢

沙六 陰虛血後痰嗽。必胃強加穀者。陰藥可以效靈。形羸食少。滋膩久用。必更反胃。靜養望其漸復。

熟地炭 萸肉 五味 川斛

扶神 芡實 建蓮 山藥

馬五 脈左堅右弱。木火易燃。營液久耗。中年春季失血嗽。

痰由情志鬱勃致傷抑且少食延麻古語謂瘦人之病
虛虛其陰

生地 阿膠 北沙參 麥冬

茯神 川斛

某女 脈左數測眠咳血

生地 阿膠 麥冬 淡菜

生白芍 炙草

診脈細左小促乾咳有血寒熱身痛經水先期漸漸色
淡且少此緣陰傷及肝陽奇脈無氣內損成勞藥難驟

效

臨證指南醫案 卷二 吐血 弄

生地 阿膠 牡蠣 炙草

麥冬 南棗

盧氏 沉着濃厚肝腎之血

熟地炭 炒杞子 炒歸身 牛膝炭

茯神 青鉛 砂仁末

又 照前方去牛膝青鉛加桂圓肉天冬

診脈 勞傷血後咳夜熱食少 清骨散加生地

取 久損交節血溢 青鉛六味去萸加炒牛膝川斛冲

熱重便服

某 脈細弦數陰分不足痰中帶紅膠屬春溫之後再劫

津液以致上下失血風淫於內宜散寒

生地炭 阿膠 龜膠 玄參

白芍 女貞 茯苓 穉豆皮

陶 下虛陽動失血 六味去丹澤加阿膠淡菜

陳 日來寒暄不勻煩勞陽升咳喘震動絡血上沸診脈

左數五心熱知饑納穀議育陰和陽方法

生地 清阿膠 天冬 麥冬 茯神

川斛 炒牛膝 青鉛 童便

陳 五形瘦脈促數吸氣如喘痰氣自下上升此屬腎虛氣

不收攝失血後有此乃勞怯難愈大症用貞元飲

臨證指南醫案 卷二 吐血 平

鄒 內傷驚恐肝腎陰日損陽浮引陰血以胃上竅二

氣不交日加寒熱骨熱咽乾不寐陰分虛其熱甚於夜

阿膠雞子黃湯

沈 勞動陽升血自左溢

阿膠 參三七 甜北沙參 茯神

生白扁豆 炒麥冬

江 少壯情志未堅陰火易動遺精淋瀝有諸腎水既失

其固春木地氣上升遂痰中帶血入夏暨秋胃納不減

後天生旺頗好不致勞怯之憂但酒色無病宜節有病

宜絕經年之內屏絕必得却病

熟地 水製 萸肉 山藥 茯苓 湖蓮

遠志 五味 黃柏 芡實 金櫻膏丸

陸六知識太早。真陰未充。龍火易動。陰精自泄。痰吐帶血。津液被燬。幸胃納安。穀保養少。動宜靜。固陰和陽。可痊。

熟地 水製 萸肉 山藥 茯苓 芡實

遠志 五味 煅牡蠣 白蓮鬚 蜜丸

徐四心腎精血不安。火風陽氣熾。失血眩暈。心悸溺精。若過用心作勞。不能復元矣。

熟地 萸肉 山藥 茯苓 芡實

遠志 建蓮 五味 海參膠

臨證指南醫案 卷二 吐血 至

彭七陰虛有遺痰嗽有血。誦讀久坐陽升。

桑葉 生扁豆 北沙參 麥冬

霍山石斛 生甘草 苡仁 茯苓

吳八失血在五年前。咳頻嘔噦。氣自上衝。逆乃下元精血之虛。非外邪寒熱之咳。痰出腥氣。亦從下出。節慾勿勞。力。胃壯可免勞怯。都氣丸。

周二左脈弦數。失血後。咳嗽音嘶。少寐。陰虧。陽升不潛之候。當滋養為主。

生地炭 錢 生牡蠣 錢 阿膠 半 錢 麥冬 半 錢

茯苓 三錢 川斛 三錢

周三屢屢失血。飲食如故。形瘦面赤。稟質木火。陰不配陽。據說服桂枝治外感。即得此恙。凡辛溫氣味宜戒。可以無妨。六味加阿膠龜甲天冬麥冬。

孫三形瘦脈數。寸口搏指。浮陽易動。上胃。都屬陰精不旺。幸胃納尚佳。數發不致因頓。然須戒酒。淡慾。怡情靜養。水足火不妄動。絡血自必寧靜矣。六味加龜甲秋石。

趙八屢遭客熱傷陰。逢夏氣泄。吐血。下午火升。咳嗽。液虧。陰火自灼。胃口尚健。安閑絕慾。可安。

熟地 萸肉 龜甲 淡萊膠 五味

山藥 茯苓 建蓮 蜜丸

臨證指南醫案 卷二 吐血 至

某內經分上下失血。為陰絡陽絡。是腑絡取胃臟絡論。脾。今飲食甚少。桑癭姑緩。上下交病。治在中焦。其午火升。煩嗽。亦因血去。陰傷。以胃藥從中鎮補。使生氣自充也。

人參 茯苓 白朮 炙草

扁豆 白芍 山藥

又因觸膈氣閉。絡血復上。過戌亥時自緩。早上診脈。細促無神。左目珠痛。假寐。喉息有音。足腫。冰冷。皆血胃不巳。孤陽上升。從肝腎引陽下納法。

人參 熟地炭 炒杞子 茯苓

熟地炭 炒杞子 茯苓

熟地炭 炒杞子 茯苓

熟地炭 炒杞子 茯苓

熟地炭 炒杞子 茯苓

熟地炭 炒杞子 茯苓

熟地炭 炒杞子 茯苓

熟地炭 炒杞子 茯苓

熟地炭 炒杞子 茯苓

淡菜 炒牛膝 四服

又 每下午戌亥少陰厥陰龍相上越絡中之血隨氣火上升考五行之中無形有聲莫如風火此皆情志之變動必須陽潛陰固方免反覆也

人參 河車膠 大熟地 五味

炒杞子 茯苓 炒牛膝

倘陰逆有聲加青鉛喉痒痛加阿膠秋石火升用秋石湯煎藥加女貞子便秘加鹹菴蓉柏子仁血止幾日或涉思慮惱怒復有脇痛減食不甘乃少陽木火犯脾當泄胆益土用四君加丹皮桑葉

臨證指南醫案 卷二 吐血 罌

徐二脉左垂右弦陰精不足胃納亦少初冬痰中見紅冬春寐有盜汗難藏易泄入夏當防病發諸凡節勞安逸經年可望安康

熟地 阿膠 五味 萸肉 秋石

山藥 茯神 川斛 旱蓮草膏丸

又 脉左細數肉消肌燥氣衝咳嗽嘔吐失血是肝腎內損下元不主納氣厥陽上胃所致非肺咳矣當交夏氣升血溢姑以鎮納望其血止 青鉛六味加牛膝白芍 又 脉兩手已和惟煩動恍惚欲暈議靜藥益陰和陽 三才湯加金箔

葉 講誦煩心五志之陽皆然恰值芒種節陰未復陽氣升騰絡中血不寧靜隨陽泄以外溢午後上竅煩熱陰不戀陽之徵致頭中微痛主以和陽鎮逆

生地 阿膠 牛膝炭 生白芍

茯神 青鉛

杜二脉小數入尺澤夏季時令發泄失血形倦治宜攝固下焦

熟地 萸肉 山藥 茯神 建蓮

五味 芡實 線魚膠 金櫻膏丸

蘇三脉左堅冬令失血能食而咳脊痛腰痠乃腎臟不固 臨證指南醫案 卷二 吐血 罌

少納腎脉虛餒五液不承寐則口乾喉燥宜固陰益氣

固本丸加阿膠芡實蓮肉丸

潘二形色充偉脉長關搏述冬季血痰血交夏不病蓋夏月藏陰冬月藏陽陽不潛伏升則血溢降則遺精乃稟陽體而性情喜動之累耳

生地 熟地 天冬 麥冬

龜腹甲心 秋石 龍骨 遠志

梅九性情過動失血夫血貴寧靜不宜踈動踈動則有泛溢之虞瘦人陽有餘陰不足補陰潛陽法 補陰丸 某五脉數咳血曾咯腥痰若作肺癆體質木火因煩勞陽

升通肺。肺熱不能生水。陰愈虧而陽愈熾。故血出陽而出也。當金水同治為主。

熟地 四兩 生地 二兩 天冬 二兩 麥冬 二兩 茯神 二兩

龜版 三兩 海參膠 二兩 淡萊膠 二兩 川斛膏 四兩 女貞 一兩

北沙參 二兩 旱蓮草 一兩 膠膏九

鄒四 向有失血是真陰不旺。夏至陰生。伏天陽越於表。陰

伏於裏。理宜然矣。無如心神易動。暗吸腎陰。絡脉聚血。

陽觸乃溢。陰伏不固。隨陽奔騰。自述下有衝逆逆氣。血

湧如泉。蓋任脉為擔任之職。失其擔任。衝陽上冲。莫制。

皆腎精肝血不主內守。陽翹為血溢。陽隆為陰遺。腰痛

臨證指南醫案 卷二 吐血 聖

足脛畏冷。何一非精奪下損現症。經言精不足者。補之

以味。藥味宜取質靜填補。重者歸下。莫見血以投涼。勿

因嗽以理肺。若此治法。元海得以立基。衝陽不來犯上。

然損非旬日可復。須寒暑更遷。安然不動。自日逐安適。

調攝未暇。縷悉也。

人參 三錢 熟地 炒製成炭 四錢 鮮河車膏 一錢

茯苓 一錢 炒黑枸杞子 半錢 北五味 一錢

沙苑 半錢 紫石英 五錢

血脫益氣。用人參熟地兩儀煎方。謂人參同陰藥則

補陰。茯苓入陽明。能引陰藥入於至陰之鄉。河車血

肉滋養。同石英收鎮衝脉。兼以包固大氣之散越。五

味酸收。領其五液。枸杞溫潤。同沙苑之鬆靈入肝絡。

參方中之藥。應乎取味。况肝腎之病。同一治也。

劉二 脉左數八尺。是真陰下虧。先有血症。畢烟後。血復來。

下干火升。陰咳。陰中陽浮。保扶胃口以填陰。

阿膠 淡萊 生扁豆 麥冬

炙草 茯神 斐八 思慮太過。心陽擾動。吸傷腎陰。時時莖舉。此失血皆

矯陽獨升。夜不得寐。寐家談笑。怡情可安。

臨證指南醫案 卷二 吐血 聖

錢 交夏陽氣大升。陰根失涵。火升血溢。必在晡刻冲年

大忌身心少持。必使陽和陰守為要。

生地 阿膠 淡萊 牛膝炭

茯神 川斛

某 口氣腥臊。血色渾濁。下元無根。恐難接續。還元事已

至急。與王先生同議攝陰陽法。

人參 川熟附 熟地 五味

炙草 青鉛

某 脉動極無序。血湧如泉。汗出畏冷。少焉熱驟。此無根

之陽上冒。血凝成塊。非涼藥可止。

熟地炭 生龍骨 茯神 五味

海桂 生白芍 鹽水炒牛膝

又 人參 生龍骨 熟地炭 茯神

炒杞子 五味

華二 陽動失血。皆係陰虧。如心悸咽乾咳嗽。都是陽浮上

亢。必久進填實。厥陰。斯浮越自和。向亮油光。皆下虛少

納。都氣加龜版人乳粉蜜丸

徐 陰根愈薄。陽越失交。初夏發泄。血湧吸短。心腹皆熱

豈止瀉之藥可療。益氣攝陰。乃據理治法。

人參 熟地 五味子

臨證指南醫案 卷二 吐血 聖

臨證指南醫案

羅 上年脇滯。已屬絡傷。今夏四月。陽氣升發。絡中血滯

上溢。陰分熱蒸。下午乃甚。喉痒而喘。心中嘈雜。肝風內

震顯然。 鮮生地 阿膠 丹參 鹽水炒牛膝

女貞子 川斛 童便

龔 咳嗽繼以失血。經言三焦皆傷。喉痛失音。乃陰液無

以上承。厥陽燔療不已。病深難於奏功。憑理而論。鉅胃

制肝。乃和陽熄風之義。

淮小麥 南棗 阿膠 茯苓

北沙參 天冬

陸 脈數。血後咳甚。痰腥。肢腫。身內風鼓動。最難治

生地 阿膠 天冬 麥冬

生白芍 茯神

沈 味進辛辣助熱之用。致肺傷嗽甚。其血震動不息。陽

少潛伏。而夜分爲甚。清氣熱而不妨胃口。甘寒是投。與

內經辛苦急。急食甘以緩之。恰符。

生甘草 玉竹 麥冬 川貝

沙參 桑葉

又 肝陽易逆。內風欲沸。不得着左臥。惡辛氣。喜甘潤治

肝體用。潤劑和陽。

臨證指南醫案 卷二 吐血 聖

生地 阿膠 天冬 茯神

牡蠣 小麥

羅 九血去絡傷。陽氣上蒸。胸膈微痛。非有形滯濁。脈得左

關前動躍如浮。頭中微暈。陽氣化風。何疑。

鮮生地 玄參心 麥冬 地骨皮

知母 川斛

又 左脈形畧欲仍堅。微暈。喉燥。腕痛。熱蒸。陽明津衰。厥

陰陽風自動。而胃氣欲逆。大便不爽。是其明徵。熄風和

陽。必用柔緩。少佐宣暢。腕氣亦暫進之法。

鮮生地 麥冬 火麻仁 桑葉

鬱金 生香附汁
 又 復脈去參姜桂加白芍
 某 血後氣衝形寒法當溫納
 扶苓 三錢 粗桂枝 八分 炙草 五分 五味 七分
 何 早晨未進飲食咳逆自下焦上冲有欲嘔之象虛里
 左脇呼吸牽引震動背部四肢寒冷入暮心腹熱灼而
 舌上乾辣夫陽虛生外寒陰虛生內熱陽屬喘氣主乎
 外衛陰屬臟真主乎內營由絡血大去新血未充穀味
 精華不得四布知味容納而健運未能自然脇右少舒
 全係胃絡下焦陰精損傷中焦胃陽不振夏至初陰不
 臨證指南醫案 卷二 吐血
 主來復交節絡血再動總是既損難以驟復之徵大意
 下焦陰陽宜潛宜固中焦營衛宜守宜行用藥大旨如
 此至於潛心潛慮勿擾情志再於子午參以靜功俾水
 火交陰陽偶是藥餌已外工夫皆培植生氣之助
 養營湯去黃芪蓮志
 又 自服養營湯溫補足三陰臟法半月來諸症皆減惟
 午餘心腹中熱未罷凡精血久損理必質重味厚填納
 空隙祇因中焦運納不旺况長夏時令熱最耗氣議早
 進通陽守陰晚用益中消暑冀其生旺非攻病也
 午服生脈散

服早 人參 熟地 杞子 當歸
 茯苓 肉桂 扶神 五味
 某 操持佛懺五志中陽動極失血喘咳有年皆緣性情
 內起之病草木難以奏安今形色與脈日現衰憊係乎
 生氣剋削慮春半以後地氣升陽氣泄久病傷損裡真
 少聚冬春入冷主藏總以攝補足三陰臟扶持帶病延
 年就是人工克盡矣
 人參 炒白芍 熟地炭 五味
 炙草 建蓮
 馬四 閱病原是腎虛嗽血年分已久腎病延傳脾胃遂食
 臨證指南醫案 卷二 吐血 辛
 戒腹膨病是老勞難以速功行走喘促元海無納氣之
 權莫以清寒理嗽急急收納根蒂久進可得其益
 人參 人乳粉 坎燕 枸杞
 沙苑 五味 茯苓 胡桃
 宋 臟脈附背督脈行身之背足少陰真氣不攝唾中有
 血吸氣少入而腰脊痠楚寐泄魄汗皆真氣內損若加
 噴怒再動川陽木火劫燥脂液春木日旺調之非易
 水製熟地 蜜炙五味 女貞 茯苓
 川斛 炒山藥 炙實 湖蓮
 其下虛當春升之令形與無力嗽血復來以甘溫厚味

者其陰中之陽

枸杞 沙苑 歸身炭 牛膝
巴戟 精羊肉

下項及

錢 一陽初萌血症即發下焦真氣久已失固亡血後飲

食漸減咳嗽則腕中引痛衝氣上逆乃下損及中。最難
痊愈擬進攝納方法

人參 熟地 五味 茯神

川斛 紫衣胡桃 調人鮮河車膠

十七少年陰火宜升宜降上則失血咳逆下墜肛傷延漏

皆虛勞見端食減至半胃關最要非可見熱投涼以血

臨證指南醫案

卷二 吐血

五

嗽泥治

熟地炭 建蓮 霍石斛 茯神

炒山藥 芡實

某三診脈數滑咳血氣逆晨起必嗽得食漸緩的是陰損

及陽而非六氣客邪可通可泄法當養胃之陰必得多

納穀食乃治此損之要者

生扁 北沙參 麥冬 川斛

生甘草 扶神 南棗肉 搗栝根鬚

鄭八虛損四五年肛漏未愈其咳嗽失血正如經旨陰精

不主上奉陽氣獨自升降奈何見血投涼治嗽理肺病

加反胃胃困減食夫精生於穀中土運納則二氣常存
久病以寢食為要不必汲汲病

生黃芪 黃精 訶子肉 白芨 苡仁

南棗 淡水熬膏不用蜜收畧飢用五錢參湯送

脾胃虛

某五向衰之年夏四月時令陽氣發泄遇煩勞身中氣泄

絡血外溢臟液少澀遂痰嗽不已俗醫見嗽投清肺

滋陰必不效驗此非少年情慾陰火之比必當屏煩戒

勞早進都氣晚進歸脾平補腦真再用嗽藥必然胃減

腎胃虛

姜九自上年冬失血漸形減氣弱精血內損不肯再復延

成勢性填養精血務在有情庶幾不奪胃氣

臨證指南醫案

卷二 吐血

五

人參 鮮河車膠 水製熟地 五味

茯神 山藥 芡實 黑殼建蓮

顧六失血血形濃厚必自下先傷胃減無力氣分亦損此

陰藥中必兼扶胃非沉滯清寒所宜

人參 熟地 建蓮 芡實

山藥 茯苓

邵八脈堅形瘦久咳失血有年食物厭惡夜寢不適固以

培本為要所服七味八味湯丸乃肝腎從陰引陽法服

之不效此液虧不受桂附之剛當溫養攝納其下兼與

益胃津以供肺

服晨 熟地 菴蓉 杞子 五味 胡桃肉

牛膝 栢子仁 茯苓 蜜丸

服晚 人參 麥冬 五味 炙草 茯苓

鮮蓮子 山藥

胡三 四季失藏吐血。四月純陽升泄。病不致發。已屬萬幸。其痰嗽未宜窮治。用藥大旨。迺夏至一陰來復。兼以扶培胃氣為要。

人參 熟地 麥冬 五味

茯苓 山藥

王八冲年形瘦腹脹食減便溏。自上秋失血以來。口加屏

臨證指南醫案 卷二 吐血 五

弱脉左堅右濡。雖陰虛起見。而中焦為急。此非小恙。

人參 茯苓 炙草 白芍

廣皮 厚朴

席 半月前恰春分陽氣正升。因情志之動。厥陽上燔致

咳。震動絡中。遂令失血。雖得血止。診右脉長大透寸部。

食物不欲納。寐中呻吟囁語。由至陰損及陽明。精氣神

不相交合矣。議欲攝神氣法。

人參 茯苓 五味 棗仁

炙草 龍骨 金箔

又服一劑。自覺寐入少腹。腹中微痛。逾時自安。此方飲

手少陰之氣。失以和四。不為重。至於直下者。陽明

胃虛也。脉緩大長。肌膚甲錯。氣衰血虧。如榆。姑建其中。

參芪建中湯去姜

又 照前方去糖加茯苓

又 診脾胃脉獨大為病。飲食少進。不喜飲水。痰多嗽頻。

皆土衰不生金氣。金匱謂男子脉大為勞。極虛者亦為

勞。夫脉大為氣分泄。越思慮鬱結。心脾營損於上中。而

陽分萎頓。極虛亦為勞。為精血下奪。肝腎陰不自立。若

脉細欲寐。皆少陰見症。今寢食不安。上中為急。况厥陰

風木主令。春三月。木火司權。脾胃受戕。一定至理。建中

臨證指南醫案 卷二 吐血 五

理陽之餘。繼進四君子湯。大固氣分。多多益善。

徐八因積勞久嗽見血。是在內損傷。先聖曰。勞者溫之。損

者益之。溫非熱藥。乃溫養之稱。甘補藥者。氣溫煦。味甘

甜也。今醫見血投涼。見嗽治肺最多。予見此治法。胃口

立即敗壞者不少。歸脾去木香黃芪加杞子

杜八積勞思慮內損。失血久病。秋季再發。乃夏暑氣泄。勞

則氣愈泄。不收。絡空動沸。此與陰虛有別。色脉胃減。涼

降非法。人參建中湯

臞 血大去。則絡脉皆空。其傷損已非一腑一臟之間矣。

秋分寒露。天氣令降。身中氣反升。越明明裏不肯收攝。

虛象何疑今診脈弱濡瀉時微冷氣傷上逆若烟霧
迷離薰灼喉底故作喻逆大旨以上焦宜降宜通下焦
宜封宜固得安穀崇生再商後法

人參 炒黑杞子 炒黑牛膝 茯神

生苡仁 炒山藥

又 血止納穀甚少不饑泄瀉此脾胃大困陰火上衝面
赤忽嘈先理中宮必得加餐為主大忌寒涼治嗽再伐
脾胃生氣

人參

茯神 新會皮 山藥

炙草 炒白芍

臨證指南醫案

卷二 吐血

聖

又 脈右濡左未斂

人參 茯神 熟朮 廣皮 南棗

又 左脈靜而虛右如數初進穀食宜培中宮霜降後五
日以丸劑攝下

人參 茯神 熟朮 廣皮 南棗

炒白芍 炙草

陳 脈如數痰嗽失血百日來反覆不已每咳喘而汗出
此屬氣傷失統絡血上泛凡寒涼止血理嗽不但敗胃
妨食決無一效從仲景元氣受損當進甘藥冀胃土日
旺柔金自寧

黃芪 生白芍 五苓 炙草
南棗 飴糖

某 勞傷嗽血

生黃芪皮 三錢 茯苓 三錢 炙黑甘草 五分

黃精 三錢 南棗 三錢

錢 四形神積勞氣泄失血食減喘促由氣分陽分之傷非
酒色成勞之比 黃芪建中湯去姜桂

陸 脈細形瘦血後久咳不已復加喘促緣內損不肯充
復所投藥無肺藥理嗽居多當此天令收肅根蒂力怯
無以攝納陰乏戀陽多升少降靜坐勉可支撐身動勃

臨證指南醫案

卷二 吐血

聖

勃氣泛所納食物僅得其悍氣未能充養精神矣是本
身精氣暗損為病非草木攻滌可却山林寂靜兼用元
功經年按法使陰陽漸交而生自振徒求諸醫藥恐
未必有當 建中湯去姜加茯苓

董 此內損症久嗽不已大便不實夏三月大氣主泄血
吐後肌內麻木骨痠痠疼陽明脈絡不用治當益氣大
忌肺藥清潤寒涼

黃芪 炙草 苡仁 白芨

南棗 米糖

李 飲酒少穀中氣先虛酒力溫散助熱絡血隨熱氣以

上沸血止之後。頓然食減脘痞。顯是中氣已因。致靜坐
稍舒。煩言咳急。當以調中爲急。若見血見咳。卽投寒涼。
清陽愈傷。日就敗壞矣。雖酒客忌甘。然救其苦寒。藥傷
勿拘此例。 戊巳子不加南棗

王二 脈稟形勞失血 小建中加玉竹

顧八 勞心神耗。營損上下。見血經年。日衰。今勉納穀不飢。
中焦因不至。運滋陰清肺。更令傷中。無却病好藥。欲其
其安。須山居靜養。寒暑無害。方得堅固。 異功散

錢二 形瘦脾左。數是陰分精奪。自述談笑或多或少。或胃中飢
虛必衝氣咳逆。前年已失血盈碗。此下損精。血有形難
臨證指南醫案

卷二 吐血 羣

復以畧精飲食氣返不趨。急以甘藥益胃。中流砥柱。病
至中不可緩矣。

人參 扶神 炙草 山藥

許八 勞倦傷陽。形寒失血。咳逆。中年不比少壯。火亢之嗽
血。 黃芪建中湯

徐九 奔走五日。卽是勞力動傷陽氣。血從右起。夜有冷汗。
乃陽絡空隙而泄。越矣。凡治吐血之初。多投涼血降氣。
以冀其止。孰知陽愈滲泄。益增病劇。屢矣。

黃精 黃芪 炙草 苡仁 扶神

汪 肝風膨脹。胃氣必虛。酒客不喜柔膩。肌柔色嫩。質體

氣弱。清明春木大旺。理必犯土。急宜培養中宮。中有砥
柱。風陽不得上越。而血可止矣。

人參 炒黃芪 炒山藥 扶苓

炒白芍 炙草

朱二 秋暑失血。初春再發。診脈右大。頗能納食。金匱云。男
子脈大爲勞。極虛者亦爲勞。要之大者之勞。是煩勞傷
氣。脈虛之勞。爲情慾致損。大旨要病根。舉盡安靜一年
可愈。

生黃芪 北沙參 苡仁 炙草

白芨 南棗

臨證指南醫案 卷二 吐血 羣

某 勞力煩心失血。早食則運。暮食飽脹。疎補調中方

人參 扶苓 炙草 生穀芽

廣皮 白芍

馮五 脈弦勁。按之空豁。久嗽。先有瀉血。大便不實。近又嗽
血。是積勞久損。陰陽兩虧。今食不欲餐。先宜甘溫益氣。
但貧窘。患此。參苓未能常繼。斯爲難調。

人參 黃芪 扶苓 炙草

苡仁 白芨

許四 頻頻傷風。衛陽已疎。而勞怒亦令陽傷。此失血症。當
衛理。陽明胃壯。則肝犯自少。脉右空大。可証。若三陰之

熱蒸脈必於左部

人參一錢 黃芪三錢 炙草五分 煨姜一錢 南棗二錢

又甘溫益胃血止五日食腥嗔怒血咳復來不獨衛陽

踈豁絡脈空動若谷豈沉寒堵塞冀獲片時之效倘胃

口拒納無法可投按脈微瀉議治心營肺衛

人參 黃芪 炙草 南棗

白芨 茯神 棗仁

湯三脈細促右空大爪甲灰枯久嗽入春夏見紅食減身

痛形容日瘠是內損難復與養管法

人參 炒白芍 歸身 炙草

臨證指南醫案 卷二 吐血 弄

桂枝木 廣皮 煨姜 南棗

丁七夏季痰嗽入冬失血自述晝卧安逸微寒熱不來則

知二氣已損傷身動操持皆與病相背脈大無神面無

膏澤勞怯不復元大者溫養甘補使寢食兩安若以痰

嗽為熱日餌滋陰潤肺胃傷變症調之無益

歸芪異功散

陳二失血前後心痛 歸建中去姜

某形瘦色枯脈濡寒熱失血心悸是營傷 歸芪建中

去姜

某脈乳汗出失血背痛此為絡虛

人參 炒歸身 炒白芍 炙草

棗仁 茯神

某氏失血半年心悸仲脇下動絡脈空際管液損傷議甘

緩辛補

枸杞 栝子仁 棗仁 茯神

炙草 桂圓

又生地 阿膠 小麥 廣三七 烏賊骨

兔絲子 茯神 補豆 夜服三錢

徐四節課之勞心脾營傷食酸助木中土更虧春陽主升

血乃大吐况茹素既久當培土營陰損極熱自內熾非

臨證指南醫案 卷二 吐血 李

實火也 歸脾湯去參

陳二先患失血復遺驚駭平素有遺泄獨處囁語是有形

精血無形神氣交傷漫言治痰治血真相工卑陋矣補

精宜鎮安神宜靜然無形真氣為要與心脾二經主治

人參 當歸 茯神 棗仁 煨姜 七分

炙草 三分 桂圓 二錢 龍齒 二錢 金箔 五張 沖入

宓遇節血症反覆脈弱廢食脇痛胃爽無治咳止血之

理扶得胃口受納可商調理

人參 炙黃芪 當歸炭 棗仁

茯神 炙草 桂圓肉

又 歸脾去木香遠志加枸杞子

思慮傷於心脾。二漢主乎營血。管出中焦。陰受損。陰虛生熱。蒸蒸絡脈。致血不寧。靜食少痰多。色澤少華。皆虛象也。不宜久進涼潤嗽藥。當以錢氏異功散。開進歸脾湯。戒不吞。

馬六上秋下血。今年湧血。飲橘餅湯甘辛。心中如針刺。營

枯液耗。不受辛藥。但以甘藥柔劑。與心脾有益。

人參 黃精 茯神 栝子仁

炙草 南棗

某 老弱虛咳失血

臨證指南醫案 卷二 吐血 空

生黃芪皮 歸身 煨姜 大棗

馮 診脈左手平和。尺中微動。右手三部。關前動數。尺脈

帶數。夜臥不寐。咳哈有血。晝日咳哈無血。但行走微後

喘促。夫陰陽五為樞紐。隆冬天氣。蒸納。緣煩心勞神。五

志皆動。陽不潛伏。當欲寐之時。氣機下潛。觸其陽氣之

升。衝脉開動。絡中之血。未得寧靜。隨咳哈溢於上。致至

於此。趨言談。亦助其動。搏氣火。此咳哈喘息失血。同是

一原之恙。當靜以制動。投藥益水生金。以制君相之火。

然食味宜遠辛辣熱燥。凡上實者必下虛。薄味清肅上

焦。正謂安下。令其藏納也。愚見約方。參末俟裁。

生扁豆 勿碎 麥冬 二錢 川斛 一錢 上阿膠 二錢

小根生地 錢 真北沙參 一錢

又 診脈同前。述心中怯冷。交四更咽中乾。咳哈連聲。必

血已盈口。論心營肺衛皆在上焦。更擬欬心液滋肺津

一法。

炒棗仁 五錢 鮮生地 三錢 天冬 一錢 炒麥冬 一錢

茯神 一錢 黑牛膝 一錢 茜草 一錢 麥三七 一錢

又 熟地 四錢 生地 二錢 天冬 一錢 麥冬 一錢

北沙參 三錢 茯神 一錢 卧時服天王補心丹

查 十二舌辣。失血易饑。

臨證指南醫案 卷二 吐血 空

生地 玄參 連翹心 竹葉心

丹參 鬱金汁

陳 血止。脈兩寸未和。仍議心營肺衛方。

生地 生扁豆 麥冬 北沙參

丹參 茯苓

陳 夜熱。和迫血妄行。議清營熱。

犀角 鮮生地 丹皮 白芍

邵 營熱失血

生地 竹葉心 玄參 丹參

川斛 茯神

王十脉右大失血知饑胃陽上逆咽乾喉痒

生地 扁豆 玄參 麥冬

川斛 新荷葉汁

某四脉右濇初氣冲失血咳逆能食無味血來潮湧乃陽
明胃絡空虛血隨陽升而然法當填中為要着其見血
治咳而用肺藥斯症可圖正在此矣

大淡菜兩 生扁豆五錢 麥冬二錢 川斛三錢

茯神三錢 牛膝炭半錢

陶六色黃脉小數右空大咳嘔血溢飲食漸減用建中旬
日頗安沐浴氣動血咳復至當以靜藥養胃陰方

臨證指南醫案 卷二 吐血 查

金匱麥門冬湯去半夏

郭 脉右部不鼓擊應指惟左寸數疾昨晚失血之因因
於僣使拾物致陽明脉絡血升今視面色微黃為血去
之象不宜涼解妨胃做古血脫必先益氣理胃又宜遠
肝

人參 秋石水 黃芪 阿膠 茯神

炙草 生白芍

王三腸紅愈後吐血一兩月必發此陽明胃絡氣血皆多
故吐後寢食如昔久發陰虧仍有內損之憂宜養肺胃
之陰以和陽

生黃芪 北沙參 麥冬 生甘草

茯神 元米湯煎

程七吐血數發肢震而熱汗出寐中驚惕蓋陽明脉絡已
虛厥陰風陽上熾飲食不為肌膚皆消燥之徵也

生黃芪 北沙參 生牡蠣 麥冬

小麥 南棗

程二脉左小數右弦食減不飢易於傷風大便結燥冬春
已見血症夫胃陽外應衛氣九竅不和都屬胃病由冬
失藏聚發生氣少遇長夏熱蒸其氣漸困故也急宜絕
慾靜養至秋分再議

臨證指南醫案 卷二 吐血 查

參鬚 黃芪皮 鮮蓮子 茯神

炒麥冬 生甘草

某 着右卧眠喘咳更甚遇勞動陽痰必帶血經年久嗽
三焦皆病 麥門冬湯

華八勞怒用力傷氣動肝當春夏天地氣機皆動病最易
發食減過半熱升冲咽血去後風陽皆熾鎮養胃陰勿
用清寒理嗽

生扁豆 沙參 天冬 麥冬

川斛 茯神

又 衝氣攻腹透喉乃肝胆厥陽肆橫久久虛損而嘔痰

減食皆犯胃之象若不靜養經年必甚

甜北沙參 生白扁豆 生黃芪皮 茯神

炙草 白糯米半升泡清湯煎藥

徐 陰臟失守陽乃騰越咳甚血來皆屬動象靜藥頗合

屢施不應乃上下交征陽明絡空隨陽氣升降自由先

以柔劑填其胃陰所謂執中近之 金匱麥門冬湯去

半夏加黃芪

某五 失血後咳嗽不飢此屬胃虛宜治陽明

甜北參 生扁豆 麥冬 茯神 川斛

陸 食酸助木胃土受傷脫中陽逆絡血上溢內經辛酸

臨證指南醫案

卷二

吐血

室

太過都從甘緩立法穀少氣衰沉苦勿進

生扁豆 北沙參 炒麥冬 茯苓

川斛 甘蔗漿

又 甘涼養胃中之陰痰少血止兩寸脈大心煩脊熱汗

出營熱氣泄之後議用竹葉地黃湯

鮮生地 竹葉心 炒麥冬 建蓮肉

川斛 茯神

陶 一兩年前吐血咳嗽夏四月起大凡春盡入夏氣機升

泄而陽氣弛張極矣陽既多動陰乏內守之職司絡血

由是外溢今正交土旺發泄欲病氣候急養陽明胃陰

夏至後兼進生脈之屬勿步趨於炎歎烈日之中可望

其漸次日安 金匱麥門冬湯去半夏

王 八見紅兩年冬月加嗽入春聲音漸漸喉舌乾燥診脈

小堅厚味不納胃口有日減之虞此甘緩益胃陰主治

麥冬 雞子黃 生扁豆 北沙參

地骨皮 生甘草

盧 四脈大色蒼冬月嗽血納穀減半迄今乾咳無痰春夏

間有吐血夫冬少藏聚陽升少制安閑靜養五志氣火

自平可望病愈形瘦穀減當養胃土之津以生金

甜北參 麥冬 玉竹 木瓜

臨證指南醫案

卷二

吐血

室

生扁豆 生甘草

某 二脈右大左虛夏四月陽氣正升煩勞過動其陽絡中

血溢上竅血去必陰傷生熱宜養胃陰大忌苦寒清火

北沙參 生扁豆 麥冬 生甘草

茯神 川斛

某 九脈搏血湧飢易納食風陽過動而為消燥若不自保

攝餌藥無益

生地 天冬 丹參 茯苓

生扁豆 川斛

倪 三陽明脈空失血後咽痺即陰是納食雖強未得水

殺精華之游溢當益胃陰

北沙參 生扁豆 麥冬 杏仁

生甘草 糯米湯煎

徐三失血能食痰嗽色蒼脉數可與甘涼養胃中之陰胃

和金生痔血便燥柔藥最宜

生扁豆 生地 天冬 麥冬

銀花 柿餅灰 側柏葉

某 失血咽乾

稽豆皮三錢 丹參一錢 麥冬一錢 川斛一錢 藕汁一小杯

陳胃虛氣逆 胃虛客氣上逆為呃噎痰帶血星咽中微痛姑擬鎮

臨證指南醫案 卷二 吐血 五

攝法

人參 熟地炭 五味 茯神 青鉛

又 照前方去青鉛加麥冬川斛遠志炭

孫肝胃不和 脉小弦血去食減服地黃柔膩反覺呆滯且喜肥

甘議兩和肝胃

蘇子 茯苓 金石斛 降香

鈎藤 黑山梔

蔡三九新沐熱蒸氣泄絡血上溢出口平昔痰多又不渴飲

而大便頗艱此胃氣不得下行為順之旨兼以勞煩噴

怒治在肝胃

金石斛 紫降香 桃仁 橘紅

杏仁 茯苓

萬 脉數左堅當夏四月陽氣方張陡然噴怒肝陽勃升

絡血上湧雖得血止而咳逆欲嘔眠卧不得欬左此肝

陽左升太過木火水酒陰虧則生熱是皆本體陰陽迭

偏非客邪實火可清可降之比最宜恬澹無為安靜幽

閒經年不反可望轉偏就和但醫藥治胃減損性矣經

云胃欲之狀欬逆而嘔木犯胃土貫膈即至冲咽入肺

肺衰木反刑金從內經甘緩以制其急

米炒麥冬 糯稻根鬚 女貞子 茯神

臨證指南醫案 卷二 吐血 五

生甘草 南棗肉

又 乙癸同治益胃養陰

人參煨石湯洗 生地 熟地 天冬

麥冬 以人參末收實

某 血去胃傷當從中治况五年前勞怒而得病肝木無

不韋上醫者溫補競進氣壅為脹至夜咽乾無寐食物

不思香不知味為嘔為咳全是胃陽升逆經云胃不和

則卧不安而陽不潛降似屬濁氣膠痰有形之物阻撓

升降而然古人有二虛一實當先治實以開一面之文

余從胃病為主制肝救中理氣清膈乃不足中有餘圖

通之治此機勿得亂治

人參 枳實 半夏 杏仁

甘草 竹茹 生姜 大棗

李 暴怒肝陽大升胃絡血湧甚多已失氣下行為順之
肯仲淳吐血三要云降氣不必降火目今不亂不納寒
厥之藥所致

炒蘇子 降香汁 山梔 炒山查

鬱金 茯苓 川斛 丹參

某 左脉細堅搏指肝陽逆失血汗

熟地 五味 炙草 牛膝

臨證指南醫案 卷一 吐血 完

白芍 桂心 童便冲

李氏 脉細小如無素多鬱怒經來即病冬月胃痛隨有咯
血不止寒戰面赤驚惕頭搖顯是肝陽變風絡血沸起
四肢逆冷真炁衰微內經有肝病暴變之文勢豈輕視
議用昇岳鎮陰煎法制其陽逆仍是就下之義

熟地炭 牛膝炭 肉桂 茯神

生白芍 童便

又 經來血止肝病何疑

炒查肉 當歸 炒延胡 澤蘭

桃仁 茯苓

血虛 沈氏 血後久咳腕痛食減經閉便溏疑連服藥

蘇子 炒丹皮 桃仁 鬱金

鈎藤 白芍

蔡三 水寒外加驚恐內迫陰癘三年繼患嗽血迄今七年
未有愈期詢及血來紫塊仍能知味安穀察其虛傷驚
傷必是肝絡凝瘀得怒勞必發勿與酒色傷損亂投滋
陰膩濁之藥恐胃氣日減致病漸劇

桃仁 三錢 鱉甲 三錢 川桂枝 七分 歸鬚 一錢

大黃 五分 羌蔚子 二錢

柴二 勞傷寒煖不勻脇痛嗽血食物不減宜降氣和絡

臨證指南醫案 卷二 吐血 半

蘇子 茯苓 降香 橘紅

桔梗 苡仁 韭白汁

陸 交春分前五日肝木升旺之候涎血大吐胸皖不爽
此久鬱氣火灼熱神志失守遂多驚恐絡中之血隨火
升氣逆而上當先降其氣不宜寒苦得阻

蘇子 降香 丹參 查肉

桃仁 鬱金 茯苓 黑梔皮

吳 脉滑能食咳血

降香 桃仁 鬱金 蘇子

炒山查 苡仁 韭白汁 冲人

姚^四此勞傷身動失血。脇有瘕聚。因咳甚而血來。先宜降氣。

蘇子 苡仁 茯苓 黑山梔 丹皮

降香 荆芥炭 牛膝炭 藕汁

尖^三形畏冷寒熱。左脇有宿痞。失血咳嗽。曾驟勞力。經年。危^四羸藥不易效。

旋覆花 新絳 歸鬚 炒桃仁

栝子仁 伏神

何^七左乳傍脇中常似針刺。汗出心嘈能食。此少陽絡脉。陽氣燔灼。都因謀慮致傷。將有絡血上湧之事。議清絡。

臨證指南醫案 卷二 吐血 主

宣通勿令凝着

生地 丹皮 澤蘭葉 桃仁

鬱金 琥珀末

又服通絡方。瘀血得下。新血亦傷。嘈雜善飢。陽亢燔灼。營陰不得涵護也。仍以和陽熄風方法。

阿膠 雞子黃 生地 麥冬

生甘草 生白芍

王^十吐血後不飢。胸背痛。

蘇子 桔梗 鬱金 薑皮

山梔皮 降香

羅^八因左脉堅搏。兩投柔劑和陽益陰。血未得止。而右胸似痞。左脇中刺痛。此少陽絡脉經出之所。夫膽為清淨之腑。陰柔滋養。未能宣通絡中。是痛咳未罷。議以辛潤宣暢通劑。

桃仁 丹皮 歸鬚 栝子仁

澤蘭 降香末

又照前方去降香末。澤蘭加黑山梔皮。

又辛潤痛嗽皆減。累進苦降。脇右皆痛。不但絡空。氣分亦餒。古人以身半以上為陽。原無取乎沉苦。

桃仁 栝子仁 鮮生地 玄參 鮮銀花

臨證指南醫案 卷二 吐血 主

程^四脉左弦。右小濡。據病原起於憂鬱。鬱動久而化熱。蒸迫絡脉。血為上溢。凝結成塊者。離絡留而為瘀也。血後納食如昔。是腑絡所貯頗富。况腑以通為用。血逆氣亦上併。澆澆有聲。皆氣火旋動。非有形質之物。凡血病五臟六腑皆有。是症當清陽明之絡為要。至於病發。當治其因。又不必拘執其常也。

枇杷葉 苡仁 茯苓 蘇子

桑葉 丹皮 炒桃仁 降香末

某^八努力咳血。胸背悉痛。常用仲淳法。

蘇子 降香汁 炒丹皮 苡仁

蘇子 降香汁 炒丹皮 苡仁

冬瓜仁 炒桃仁 牛膝 川貝母

某 冬令過溫。人身之氣不得潛藏。陰弱之質。血隨氣逆。

診得陽明脈動。吐出痰黑。絡中離位之血。尚有未可以

止瀉為事。

生地 丹參 丹皮 降香

桃仁 牛膝 非汁 童便冲

某 肝逆失血

蘇子 鬱金 降香汁 炒丹皮 鈎藤

赤芍 丹參 茯苓 白糯米湯煎

候九 胃脘當心。肝經交絡所過。上布於肺。咳嗽胃旁作癢。

臨證指南醫案 卷二 吐血 五

腹脹脹。絡氣逆也。當慮失血。脈數能食。宜和絡氣。

生地 桃仁 桑葉 丹皮

麥冬 扶神

血榮源 胸膈痛 陳七 吐血八日。腕悶脇痛。肢冷。絡傷氣窒。先與降氣和血。

蘇子 鬱金 杏仁 茯苓

桃仁 降香

翁 問謂請靜坐。痰血夏發。入冬不已。胸膈痛引背部。脈

小微瀉。非慾傷陰火。夫痛為絡脈失和。絡中氣逆血上。

宗仲淳氣為血帥

蘇子 苡仁 茯苓 山查

桑葉 丹皮 降香末 老韭白

江 診脈數。涕有血。嗽痰冷熱外。因動肺。緣素思肝。痺左

脇。不耐卧着。恐陽升。血溢。微用苦辛泄降。不宜通劑。

黑山梔 桑葉 花粉 知母

瓜蒌皮 降香

沈 左脇空脹。攻觸作楚。咳痰帶血。無非絡中。不得寧靜。

姑進降氣通絡方

降香汁 蘇子 苡仁 茯苓

橘紅 鈎藤 白蔘 非白汁

又 脈右長。陰血。仍宜降氣。

臨證指南醫案 卷二 吐血 六

蘇子 苡仁 茯苓 山梔

丹皮 鈎藤 鬱金

金 飢飽勞力。氣逆血瘀。胸膈頻吐。此液耗陽升。上逆不

已。血無止期。先宜降氣通調。莫與膩塞。

蘇子 降香 桃仁 丹參

非白汁 山梔 茯苓

某 四脈弦。失血。脇痛氣逆。

枇杷葉 錢 冬瓜子 錢 蘇子 一錢 苡仁 三錢

炒丹皮 錢 桃仁 三錢 降香汁 八分 牛膝炭 半錢

方 四 憂思佛鬱。五志氣火內燔。加以烟辛泄肺。酒熱戕胃。

精華營液為蒸蒸化敗濁經云陽絡傷則血外溢若胃絡受傷陽明氣血頗富猶勉強延磨歲月至於陽明脈絡日衰斯背先發冷右脇痠疼而咳吐不已胃上愈微肝木益橫厥陽愈逆穢濁氣味無有非自下泛上大凡左升屬肝右降屬肺山中焦胃上既困致有升無降並阻交迫何以着左臥眠過其升逆之威且煩蒸熱灼並無口渴飲水之狀病情全在血絡清熱滋陰之治力量不能入絡茲定清養胃陰為主另進通絡之義肝膽厥陽少和冀其涎少脇通積久沉疴調之非易

臨證指南醫案

卷二 吐血

五

桑葉 丹皮 苡仁 蘇子

鈎藤 鬱金 降香 桃仁

又 桑葉 枇杷葉 苡仁 大沙參

蘇子 茯苓 鬱金 降香

又 早服瓊玉膏

胡七有年冬藏失司似乎外感熱熾辛散苦寒是有餘實症治法自春入夏大氣開泄日見懶懶長倦呼吸嘆息有聲脇肋空板欲痛咯紫血絡脈不和議以辛補通調不致寒凝燥結並免膠格上下交阻之累

柏子仁 細生地 當歸鬚 桃仁

降香 茯神

石三先有骨痛鼓脹每至旬日必吐血確證自冬入夏皆然近僅可仰臥着右則咳逆不已據說因怒勞致病都是陽氣過動而消渴舌翳仍納穀如昔姑以兩和厥陰陽明之陽非徒泛泛見血見嗽為治

石膏 熟地 麥冬 知母 牛膝

又 石膏 生地 知母 丹皮 大黃

桃仁 牛膝

將六宿傷怒勞動汗血溢紫塊先以降氣導血

蘇子 降香末 桃仁 黑山梔

金斛 製大黃

臨證指南醫案

卷二 吐血

五

又 天地杞圓加棗仁茯神

某 形盛脈弦目昏黃咳痰粘濁嘔血此胃有濕熱膠痰因怒勞動肝故左脇中痛血逆而吐非虛損也當薄味

靜調戒噴怒百日可却

蘇子 降香 廣皮白 生姜 桃仁

鬱金 金斛 六服後接服海粉九半觔

某 向有背痛尚在勞力氣逆咳血乃勞傷病也

歸建中去姜加茯苓

某 二努力傷絡失血面黃口中味甜腕中煩悶衝氣病在肝胃勿以失血治以滋膩

勞力傷

怒勞血

旋覆花 代赭石 半夏 淡乾姜

塊茯苓 南棗肉

呂九脉數上出右脇上疼則痰血上溢必因噴怒努力勞煩致絡中氣阻所致宜安閑靜攝戒怒慎勞一歲之中不致舉發可云病去

降香末八分 炒焦桃仁錢一 丹皮錢一 野鬱金錢一

茯苓三錢 黑山梔錢一 丹參錢一 橘紅錢一

吳氏氣寒失血咳嗽心熱至暮寒熱不思納穀此怔鬱內損二陽病發心脾若不情懷開張服藥無益

阿膠 麥冬 茯神 白芍

臨證指南醫案 卷二 吐血 夫

北沙參 女貞子

李氏情志久鬱氣逆痰喘入夏咳血都因五志陽升况腕有聚氣二年寡居隱曲不伸論理治在肝脾然非藥餌奏功

降香木 枇杷葉 蘇子 鬱金

瓜蒌皮 黑梔皮 茯苓 苡仁

吳氏鬱損咳血類發當交節氣逆嘔吐肢冷厥逆所現俱是虛勞末路豈是佳景勉擬方

生白芍 烏梅 炙草 炒麥冬

扶神 橘紅

張氏失血口碎舌泡乃情懷鬱勃內因鬱衝不和寒熱可熾病鬱延久為勞所喜經水尚至議手厥陰血分主治

犀角 金銀花 鮮生地 玄參

連翹心 鬱金

失血一症名目不一茲就上而吐者言之三因之來路宜詳也若夫外因起見陽邪為多蓋犯是症者陰分先虛易受天之風熱燥火也至陰邪為患不過甘中之一二耳其治法總以手三陰為要領究其病在心營肺衛如何若夫內因起見不出乎噴怒鬱勃之激傷肝臟勞形苦志而耗損心脾及恣情縱慾以

臨證指南醫案 卷二 吐血 夫

賊腎臟之真陰真陽也又當以足三陰為要領再審其乘侮制化如何若夫不外因者為飲食之偏好努力及墜墮之傷治分臟腑經絡之異要知外因而起者必有感候為先裡因而起者必有內症可據此三因根蒂用藥切勿混亂大凡理肺衛者用甘涼肅降如沙參麥冬桑葉花粉玉竹川斛等類治心營者以輕清滋養如生地玄參丹參連翹竹葉骨皮等類以此兩法為宗隨其時令而加減若風淫津潤加以甘寒如蘆根蔗汁薄荷羚羊之品若溫浮火壯參入苦寒如山梔黃芩杏仁石膏之品若暑逆氣分佐

滑石鮮荷之開解。在營與銀花犀角之清芳。秋令選
純甘以清燥。冬時益清補以助藏。凡此為外因之大
畧。所云陰邪為患者。難以並言也。舊有麻黃人參芍
藥湯。先生有桂枝加減法。至於內因傷損。其法更繁。
若噴怒而動及肝陽血隨氣逆者。用繆氏氣為血帥
法。如蘇子鬱金桑葉丹皮降香川貝之類也。若鬱勃
日久而傷及肝陰。木火內燃陽絡者。用柔肝育陰法。
如阿膠鷄黃生地麥冬白芍甘草之類也。若勞煩不
息而偏損心脾氣不攝血者。用甘溫培固法。如保元
湯歸脾湯之類也。若縱慾而竭其腎真。或陽元陰騰

臨證指南醫案

卷二 吐血

堯

或陰傷陽越者。有從陰從陽法。如青鉛六味肉桂七
味。並加重便之類也。若精竭海空。氣泛血湧者。先生
用急固真元。大補精血法。如人參枸杞五味熟地河
車紫石英之類也。凡此為內因之大畧。至於不內不
外因。亦非一種。如案中所謂烟辛泄肺。酒熱戕胃之
類。皆能助火動血。有治上治中之法。如葦葉湯。甘露
飲。茅根藕汁等劑。在人認定而用之可也。墜墮之傷。
由血瘀而泛。大抵先宜導下。後宜通補。若努力為患。
屬勞傷之根。陽動則絡鬆血溢。法與虛損有間。滋陰
補氣。最忌凝滯。如當歸建中湯。旋覆花湯。虎潛丸。金

剛四斤丸。取其有循經入絡之能也。凡此為不內外
因之大畧。但血之主司者。如心肝脾三臟。血之所生
化者。莫如陽明胃腑。可見胃為血症之要道。若胃有
不和。當先治胃也。仁齋直指云。一切血症。經久不愈。
每每以胃藥收功。想大黃黃連瀉心湯。犀角地黃湯。
理中湯。異功散。雖補瀉寒溫不同。確不離此旨。所以
先生發明治胃方法。獨多有薄味調養胃陰者。如金
匱麥冬湯。及沙參扁豆茯苓神石斛之類。有甘溫建立
中陽者。如人參建中湯。及四君子加減之類。有滋陰
而不碍胃。甘守津還者。如復脈湯加減之類。其餘如

臨證指南醫案

卷二 吐血

全

補土生金法。鎮肝益胃法。補脾疎胃法。寧神理胃法。
腎胃相關法。無分症之前後。一遇胃不加餐。不饑難
運。諸候。每從此義見長。源源生化不息。何患乎病之
不易醫也。邵新甫

失音

寒熱客邪起肺

吳三外冷內熱久通失音用兩解法 麻杏甘膏湯

宋三先失音繼喉痺是氣分室塞微寒而熱水飲嗆出咯痰隨出隨阻此仍在上海舌黃口渴譏與苦辛寒方

射干 麻黃 杏仁 生甘草

石膏 苡仁

陸二秋涼燥氣咳嗽初病皮毛稟藥冬月失音至夏未愈而納食頗安想屢經暴冷暴煖之傷未必是一氣之餒做金實無聲議治

臨證指南醫案 卷一 失音 全

麻黃 杏仁 生甘草 石膏

射干 苡仁

又 蘆根汁 杏仁汁 萊菔汁 鮮竹瀝 熬膏

范三氣燥喉痺失音少陽木火犯上

生雞子白 冬桑葉 丹皮 麥冬

生白扁豆殼

某 喉乾失音一月未復津液不上供肺失清肅右寸脈浮大

枇杷葉一錢 馬兜鈴八分 地骨皮一錢 桑皮八分

麥冬一錢 生甘草三分 桔梗六分 白糯米一錢

失血汗

某 血後音啞便溏

生扁豆 炒白芍 炙草 川斛

山藥 米糖 大棗

何 勞損氣喘失音全屬下元無力真氣不得上注紛紛清熱治肺致食減便溏改投熱藥又是劫液宜乎喉痛神疲矣用補足三陰方法

熟地 五味 炒山藥 茯苓

艾實 建蓮肉

孫二久咳失音喉痺

陳阿膠 同煎生雞子黃 同煎炒麥冬 一錢 川斛 三錢

臨證指南醫案 卷二 失音 全

甜北沙參 一錢 炒生地 二錢 生甘草 三分 茯神 一錢

夫宮商角徵羽歌哭呼笑呻此五臟所屬之音聲也原其發聲之本在於腎其標則在乎肺病有虛實由咳嗽而起者居多或肺有燥火外感寒邪火氣鬱滯而瘖者有肺金燥甚木火上炎咽乾喉痺而瘖者有風熱痰涎壅遏肺竅而瘖者有喚怒叫號致傷會厭者亦有龍相之火上炎凌燥肺金久咳不已而瘖者有內奪而厥則為瘖俳此腎虛也是即暴中之不能言者也先生有金空則鳴金實則無聲金破碎亦無聲此三言足以該之矣有邪者是肺家實也無邪者

是久咳損肺破碎無聲也其治法有寒者散寒有火者清火有風痰則祛風豁痰若罷相上炎燥肺者宜金水同治若暴中之痞全屬少陰之虛宜峻補肝腎或稍兼痰火而治之其用藥總宜甘潤而不宜苦燥斯得之矣華嘯雲

肺痿

辛散和傷肺
洪二勞煩經營陽氣弛張即冬溫外因咳嗽亦是氣泄刑侵辛以散邪苦以降逆希冀嗽止而肺欲辛過辛則正氣散失音不能揚色消吐涎喉痺是肺痿難治矣做內經氣味過辛主以甘緩

北沙參 炒麥冬 饴糖 南棗

查二脉細心熱呼吸有音夜寤不寐過服發散氣泄陽傷為肺痿之病仲景法以胃藥補母救子崇生氣也

金匱麥門冬湯

臨證指南醫案

卷二

肺痿

舍

徐四肺痿頻吐涎沫食物不下並不渴飲豈是實火津液蕩盡二便日少宗仲景甘藥理胃乃虛則補母仍佐宣

通腕間之枵格
人參 麥冬 熟半夏 生甘草

白粳米 南棗肉

沈積勞憂思固是內傷冬溫觸入而為咳嗽乃氣分先虛而和得外痰辛散斯氣分愈泄滋陰非能安上咽痛音啞虛中邪伏恰值春暖陽和脉中脉外氣機流行所以小效旬日若生陽漸振之象數雨暴冷驟加衛陽入致不能擁護致小愈病復診得脉數而虛偏大於右寸

<p>口吐涎沫不能受飲湯水面色少華五心多熱而足背浮腫古人謂金空則鳴金實則無聲金破碎亦無聲是為肺病顯然然內傷虛假為多虛則補母胃土是也肺痿之病謹宗仲景麥門冬湯</p>	<p>王十潰腸流膿經年脈細色奪聲嘶食減咳嗽喉中梗痛皆漏損脂液陰失內守陽失外衛肺痿之病諒難全好人參黃芪</p>	<p>歸身白芨黃芪</p>	<p>黃芪 案灸 生苡仁 白百合 炙黑甘草</p>	<p>臨證指南醫案 卷二 肺痿 金 白芨 南棗 水蒸骨木飲湯送</p>	<p>鮮蘆根 桃仁 絲瓜子 苡仁</p>	<p>肺痿一症概屬津枯液燥多由汗下傷正所致夫痿者萎也如草木之萎而不榮為津亡而氣竭也然致痿之因非止一端金匱云或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便秘又被快藥下之重亡津液故令肺熱乾痿也肺熱乾痿則清肅之令不行水精四布失度脾氣雖散津液上歸於肺而肺不但不能自滋其乾亦不能內瀦陳於六腑分輸精於皮毛也</p>
---	--	---------------	---------------------------	-------------------------------------	----------------------	---

<p>其津液虧貯胃中得熱煎熬變為涎沫浸肺作咳嗽之不已故乾自自乾唾者自唾愈唾愈乾痿病成矣金匱治法貴得其精意大意生胃津潤肺燥補真氣以通肺之小管清火熱以復肺之清肅故外臺用炙甘草湯在於益肺氣之虛潤肺金之燥千金用甘草湯及生薑甘湯用參甘以生津化熱姜棗以宣上焦之氣使胃中之陽不滯而陰火自熄也及觀先生之治肺痿每用甘緩理虛或宗仲景甘藥理胃虛則補母之義可謂得仲景心法矣 鄒野乘</p>	<p>臨證指南醫案 卷二 肺痿 金</p>
--	-----------------------

臨證指南醫案目

卷三

遺精

淋濁

陽痿

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹

臨證指南醫案

卷三日



臨證指南醫案卷三

許關李大瞻翰圖

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

邵銘新甫

遺精

陳厥後吸短多遺議攝下焦

熟地 四錢 桑螵蛸 二錢 覆盆子 一錢 五味 一錢

湖蓮 三錢 芡實 二錢 茯神 三錢 山藥 二錢

某四夢遺精濁煩勞即發三載不痊腎臟精氣已虧相火

臨證指南醫案 遺精

易動無制故精不能固由煩動而泄當填補下焦

充陽潛可以圖愈

熟地 八兩 麥冬 二兩 茯神 二兩 五味 二兩

線膠 四兩 川斛膏 四兩 沙苑 二兩 遠志 一兩

芡實 三兩 湖蓮 三兩 金櫻膏 九

馬一陰虛體質常有夢泄之疾養陰佐以潛劑仍參八

藥可效 六味去丹澤加湖蓮芡實五味遠志秋石

金櫻膏丸

張陰精走泄陽失依附上胃為熱坎水中陽不藏古

必以厚味填之介類潛之乃從陰以引陽與今人是

投涼不同

熟地 龜甲 淡菜 青鹽 茯神

柏子仁 女貞子 山藥 旱蓮草

某二脉左弦右濡。夢遺。咳逆氣急。

熟地 麥冬 萸肉 五味 牡蠣

茯神 女貞子 山藥 湖蓮 川斛膏

芡實 金櫻膏 加蜜丸每服四五錢。淡鹽湯下。

楊 脉垂入尺。有夢遺精。議填陰攝固其下。

熟地 萸肉 五味 山藥 茯神

覆盆子 遠志 線膠 湖蓮 芡實

臨證指南醫案

卷三 遺精

金櫻膏丸鹽湯下

劉 先患目疾流淚。嘈雜不欲食。內鬱動陽氣過動。陰虛

不主攝納。春半溼寒遺泄。腰脊酸楚。皆肝腎病矣。

熟地 龍骨 萸肉 茯神

丹皮 湖蓮 芡實 遠志

某 勞損漏瀉。大便時溇。陰火上升。下則遺滑。

熟地 龜版 芡實 山藥

女貞 建連 炙草 稽豆皮

某 少年頻頻遺精。不寐心嘈。乃屬腎中有火。精得熱而

妄行。日後恐有腎消之累。

焦黃栢 生地 天冬 茯苓

煨牡蠣 炒山藥

某 脉虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽動精

搖下泄。加以夜坐不靜。春寒再折其陽。身不發熱。時

時驚惕煩躁。從仲景亡陽肉瞤例。用救逆湯法。必得神

氣凝靜。不致昏瘖痰癡之變。救逆湯去芍

費 色蒼脉數。煩心則遺。陽火下降。陰虛不攝。有濕熱下

注。此固濟無功

草蘇 黃栢 川連 遠志

茯苓 澤瀉 桔梗 苡仁

臨證指南醫案

卷三 遺精

吳二病形在腎肝。但得瀉頭中痛微緩。少腹陰囊亦脹。想

陰分固虛。而濕熱蒸着。致腑經之氣無以承流。宜化理

固有諸。先泄厥陰鬱熱。兼通腑氣再議。

龍胆草 胡黃連 草蘇 丹皮

茯苓 澤瀉

又 閱病原是臟陰陰精之虧。致陽浮頭痛。兼有遺精。月

數發。下虛上實。純以補瀉。決不應病。性不耐九劑。與通

攝兩用

龜版 秋石 熟地 女貞 遠志

芡實 湖蓮 茯苓 熬膏

錢二脉右弦左垂陰虛濕熱遺精除飢

黃柏 知母 熟地 草薢

茯苓 遠志 蜜丸

某 夢遺病乃是陰氣走泄而濕熱二氣乘虛下陷墜自

腰中至囊環跳膝蓋諸處可見久遺八脉皆傷議用通

藥兼理陰氣 猪苓湯

又 熟地 五味 芡實 茯苓

湖蓮 山萸

宋二 無夢頻頻遺精乃精衰已滑古人謂有夢治心無夢

治腎腎陰久損陽升無制喉中野痰不清皆五液所化

臨證指南醫案 卷三 遺精 四

胃納少而運遲因下必佐健中

人參 桑螵蛸 生龍骨 鎮陽 芡實

熟地 茯苓 遠志 金櫻膏丸

華二 神傷於上精敗於下心腎不交久傷精氣不復謂之

損內經治五臟之損治各不同越人有上損從陽下損

從陰之議然必絕穀資生脾胃後天得振始望精氣生

於穀食自上秋至今日甚乃真氣無藏當春令泄越生

氣不至漸欲離散從來精血有形藥餌焉能驟然充長

攻病方法都主客邪以偏治偏問古東垣丹溪輩於損

不肯復者首宜大進參朮多至數觔謂有形精血難生

無形元氣須急固耳况上下交損當治其中若得中經
加穀繼參入攝納填精飲神之屬方今春木大泄萬花
盡放人身應之此一月中心急挽勿懈矣

參朮膏米飲調送

接進冠氏桑螵蛸散去當歸

此寧神固精收攝散亡乃潛以治脫之法

又 半月來服桑螵蛸散以固下參朮膏以益中遺精得

止其下關頗有收攝之機獨是晝夜將寢心中諸事紛

紛來擾神傷散越最難斂聚且思慮積勞心奔營血暗

損血不內涵神乃孤獨議用嚴氏濟生歸脾方使他疎

臨證指南醫案 卷三 遺精 五

真氣咸歸於脾今夏前止此壯司令把握後天於理最合

歸脾湯

又 立夏四日診左脉自至餘頗有斂聚之意右關及尺

其動若革按臍下過寸動氣似若穿梭此關元內空衝

脉失養而震躍不息此女子胞胎男子裹精之會也大

凡內損精血形氣其胃旺納食者務在滋填今食減不

納假寐片晌必煩燥惕醒而汗自述五心熱熾四肢骨

節熱癢如墮明是陰精內枯致陽不交陰絳枯耗潤自

下及中至上前投桑螵蛸散因滿精氣道沿經月不來

奈寢食不加後天生氣不醒膿厚填補於理難進即參

木甘溫益氣。又恐益其枯燥。宜參生脉以滋三焦。晨進人乳一杯。使氣血陰陽引之。導之。迎夏至一陰來復。早用人乳一盞。隔湯燉熱服。午後畧饑。用生脉四君子湯。又一月來。雖經反覆。參脉症形色。生陽頗有根蒂。近食蚕豆滯氣。腹中微膨。食後口味酸澀。是久卧重着。脾陽運動之機尚少。而火升心煩。動氣汗出遺精。雖戒於昔。未得不復。總是內損已深。若調治合宜。只要精氣復得一分。便減一分病象。長夏脾胃主令。培土助納為要。而精氣散越。仍兼攝固之法。刻下味酸微膨。補脾少佐陳胃宜晚進。其早上另製補攝丸劑。益臟真以招納散失之氣。

臨證指南醫案

卷三

遺精

六

人參 茯苓 白朮 炙草 廣皮
 麥冬 五味 神麴 麥芽 炒黃柏
 早上 人參 桑螵蛸 白龍骨 淡菴蓉 五味
 丸方 芡實 茯神 棗仁 金箔

金櫻膏丸淡鹽湯送三四錢

又 形色有漸復之象。較之夏至。病去三四。但診右脉弦大尚少。冲和左脉細促未靜。發進遲遲。有吞酸脹寐。中仍欲遺精。此中焦之陽。宜動則運。下焦之陰。固則能守。乃一定成法。午後服功散加炒熟茅。

晨服 遺症固瀉下焦。乃通套治法。想精關已滑。瀉劑不能取效。必用滑藥引導。同氣相求。古法有諸。牛骨髓 羊骨髓 猪骨髓 麋角膠 白龍骨 生牡蠣 熟地 萸肉 茯神 五味 山藥 芡實 湖蓮 遠志 砂仁 膠髓代蜜丸晨服四錢。秋石二分。化水下。毛六 長夏暑濕熱鬱。都令脾胃受傷。色黃神倦。氣分自餒。因有遺泄一症。在盛年。陰虛為多。及詢納食未為強旺。遺發必勞煩而來。脉象非數搏。議以養脾立法。歸脾去黃芪桂圓加益智龍骨。

臨證指南醫案

卷三

遺精

七

項 脉左弱右弦。色黃食少。腹脹便溏。常有夢遺洩。此非陰柔清膩可服。用煦陽以酒陰。
 生兔絲子 覆盆子 蛇床子 五味子 韭子
 益智仁 鹿補骨脂 龍骨 建蓮粉丸

丁 陰精走泄。陽不內依。欲寐即醒。心動震悸。所謂氣因精奪。當養精以固氣。從前緩藥不錯。但不分剛柔為偏。

陽是以見血。莫見血投涼。
 龜版 去梢刺桑螵蛸 錢 人參 一錢 當歸 一錢
 青花龍骨 飛 抱木茯神 三錢
 姚二 於念萌不遂其慾。陽下墜而精洩。先夢者。心陽注

腎久則精血日損不充養筋骨為痛下損及中食不運化此非更地賦屬以及清精可效 妙香散

許八陰氣走泄遺精務宜滋填塞固今納穀少而不甘胃

氣既弱滋膩先妨胃口議用桑螵蛸散蜜丸服三四錢

戈遺精數年不但腎關不固陽明脈絡亦已空乏欲得

病愈宜戒慾寧心一年寒暑更遷陰陽漸交用桑螵蛸

散治之

顧九滑精用陰藥頗然食減藥先傷胃據述夢寐驚狂精

走無以護神當固無形矣

人參 生龍骨 桑螵蛸 益智仁

臨證指南醫案 卷三 遺精 八

茯神 茯苓 蓮志 木香

呂三有夢乃遺是心有所觸而致經管操持皆擾神動心

說商賈客於外非關酒色矣 妙香散

俞七壯年形質偉然脈來孔虛述心忪怔多畏懼夜寐不

甚寧靜此陽不易交於陰過用勞心使然用妙香散

張四形壯脈小自述心力勞瘁食減遺精做景岳精因氣

而奪當養氣以充精理其無形以固有形 妙香散

支二痰多鼻塞能食有夢遺精醫投疎泄肺氣消痰六十

劑不効問讀書夜坐陽氣必升充塞上竅上盛下衰寐

則陽直降而精下注為遺用補心丹

黃一真陰損傷而五志中陽上燔喉痛下墜為遺精髓日

耗骨癆無力必延枯槁而後已藥餌何足久恃

胡遺精四年精關久滑不固陰久傷陽氣不入陽蹻穴

夜寐不寐前以鎮攝小效獨心中怔悸不已以桑螵蛸

散從心腎治

畢二有夢遺精是心腎病清心固腎是為成法得以水火

交合病當漸減內傷病從內起豈得與外來六氣混治

熟地 龍骨 蓮志 玉珠 茯神

芡實 建蓮 金櫻膏法

臨證指南醫案 卷三 遺精 四

程左脈剛堅火升神氣昏昏片刻平復宛若無病此皆

勞心五志之陽動龍相輕弱常有遺泄之狀先用滋腎

丸三錢淡鹽湯送

又早服補陰丸 晚服三才加妙黃柏砂仁

又交霜降絡中陡然熱蒸肢節皆麻火風震動多因脾

腎液枯議用二至百補丸意斑龍二至百補丸加黃柏

林八診脈細濡寐則遺精心熱口渴不時寒熱此腎陰內

損心陽暗熾 補心丹三錢四服

某冬令煩倦嗽加是屬不藏陽少潛伏兩足心常冷平

時先夢而遺由神馳致精散必鎮心以安神猶喜胃強

納穀若能保養可望漸愈。

桑螵蛸 金櫻子 覆盆子 芡實

遠志 茯神 茯苓 龍骨

湖蓮 煎膏煉蜜收饑時服七八錢

楊十冲年道精知識太早難成易虧。真陰不得充長。及壯盛未有生育。而久遺滑漏。褚氏謂難狀之疾者。蓋病傷可復。精損難復也。診脉上動尺亢。心動神馳。神馳精散。草木性偏。焉得見長。務宜斷慾百日。以妙香散桑螵蛸散方。理心脾以交腎。固腎氣以寧心。早晚並進。百日以驗之。

臨證指南醫案

卷三

遺精

十

呂二成婚太早。精血未滿。久洩。必關鍵不攝。初則精腐變濁。久則元精滑泄。精濁之病。巢氏分晰彰著。經言腎虛氣漫為張。誠為腎味止溢。口舌皆下。失攝納之權。

生鬼絲子粉 蛇床子 覆盆子 陝沙苑子

家韭子 五味子 鯉魚膠丸

許九脉虛孔。應予失血遺精。先天既薄。更易泄少。藏正褚氏所云難狀之疾。冲年須潛心靜處。莫水火自交。可以精固。莫但圖藥餌。須堅守。時刻強制之功。

鮮河車膏 九蒸熟地 五味 芡實

山藥 湖蓮 砂仁 芡實 金櫻膏丸

李五脉小色白。失血遺精屢發。猶喜納穀胃安。封藏固補。使其藏聚。若再苦寒瀉火。胃傷廢食。坐以待困矣。

熟地 芡實 五味 覆盆子

河車膏 生鬼絲子粉 山藥 湖蓮

茯苓 芡實 金櫻膏丸

某脉左部數。有鋒芒。初夏見紅。久遺滑。入夜痰升。助痛。肝陽上冒。腎弱不攝。固攝助納。必佐原肝。

熟地 湖蓮 芡實 生白龍骨

茯苓 川石斛

兼失血

章脉數虛。氣衝心熱。喘咳失血。屢因嗔怒。肝陽升則血

臨證指南醫案

卷三

遺精

十一

湯。墜則精遺。春末土旺。入夏正當發泄。主令暮熱晨汗。陰陽樞紐失固。議進攝真。其清寒肺藥須忌。

魚鱔膠 生龍骨 桑螵蛸 芡實

茯苓 五味 秋石 芡實

陸一肌肉鬆柔。脉小如數。常有夢遺。陰精不固。上年冬令過溫。溫則腠理以疎。陽動不藏。諸氣皆升。絡血隨氣上溢。見症如頭面熱。目下肉瞤。心悸怔忡。四末汗出。兩足附腫。常冷不溫。走動數武。即吸知微喘。何一非少陰腎氣失納。陽浮不肯潛伏之徵。况多夢紛擾。由精傷及神氣。法當味厚填精。質重鎮神。佐酸以收之。甘以緩之。勿

因血以投涼。真見下寒。輒進燥熱。恪守禁忌以安之。經年冀有成功。所慮中年志慮未純。貽憂反覆。

水製熟地 人參秋石 白龍骨 炒杞子

五味 炒山藥 茯神 牛膝炭

遺精一症。前賢各有明辨。其義各載本門。茲不復贅。

大抵此症。變幻雖多。不越乎有夢無夢。濕熱二者之

範圍而已。古人以有夢為心病。無夢為腎病。濕熱為

小腸膀胱病。夫精之藏制雖在腎。而精之主宰則在

心。其精血下注。濕熱混搖而遺滑者。責在小腸膀胱。

故先生於遺精一症。亦不外乎寧心益腎。填精固攝。

臨證指南醫案 卷三 遺精

清熱利濕諸法。如腎精虧乏。相火易動。陰虛陽冒而

為遺精者。用厚味填精。介類潛陽。養陰固澇諸法。如

無夢遺精。腎關不固。精竅滑脫而成者。用桑螵蛸散

填陰固攝。及滑澇互施方法。如有夢而遺。煩勞過度

及脾胃受傷。心腎不交。上下交損而成者。用歸脾湯

妙香散。參朮膏。補心丹等方。心脾腎兼治之法。如陰

虛不攝。濕熱下注而遺滑者。用黃柏草薢。黃連蒼澤

等。苦泄厥陰鬱熱。兼通腑氣為主。如下虛上實。火風

震動。脾腎液枯而為遺滑者。用二至。百補丸。及通打

下焦之法。如龍相交熾。陰精走泄而成者。用三才封

勸丹滋腎丸。六兩陰丸。峻補真陰。承制相火。以瀉陰

中伏熱為主。又有房勞過度。精竭陽虛。寐則湯陷而

精道不禁。隨觸隨泄。不夢而遺者。常用固精丸。升甲

八脈之氣。又有膏粱酒肉。飲醇厚味之人。久之脾胃

釀成濕熱。留伏陰中。而為夢泄者。常用劉松石猪肚

丸。清脾胃蘊蓄之濕熱。立法雖為大術。然臨症之生

心化裁。存乎其人耳。都蒸丸

臨證指南醫案 卷三 遺精

淋濁

某三濕熱下注淋濁當分利

苜蓿 淡竹葉 羅葵 赤苓

細木通 扁蓄

某八濕熱下注溺痛淋濁先用分利法

草薢 淡竹葉 木通 赤苓

茵陳 海金沙

魏脈數垂淋濁愈後再發肛脈便不其餘液更盛

草薢 猪苓 澤瀉 白通草

臨證指南醫案 卷三 淋濁 十四

海金沙 晚桑沙 丹皮 黃柏

又滯濁下行痛經議養陰通腑

阿膠 生地 猪苓 澤瀉

山梔 丹皮

毛三壯盛體豐當夏令濕熱蒸迫水熱氣墜而有淋濁服

寒涼腹脹得固瀉無效皆非腑病治法 于和桂苓飲

又前用甘露飲淋濁已止而頭暈左肢麻木胃脘腹中

饑則欲痛咽中似有物粘着嗝噎咽食不解診脈左

勁右濡據症是水弱不火滋潤肝陽化風過濕透咽達

類木乘胃土陽明脈衰不司束筋骨以利機關腕腹中

痛得食則緩者胃虛求助也今壯年有此已屬脾中根
苗養肝腎之液以熄虛風補胃土以充絡脈務在守常
勿圖速效可望全好

製首烏 菴蓉 天冬 杞子

栝子霜 茯神 菊花炭 青鹽

紅棗肉九服四錢 晚服猪肚丸方

某膏淋濁膩濕熱居多然亦有勞傷腎傷下虛不攝者

今以酒客腹中氣墜便積苦辛寒分消治

黃柏 茯苓 草薢 海金沙

川棟子 青皮 防已 蚕沙

臨證指南醫案 卷三 淋濁 十五

汪脈左堅入尺濕熱下墜淋濁痛 滋腎丸

周二便濁莖痛 滋腎丸三錢

吳四久瘥不愈已有濕熱知識太早陰未生成早泄致陽

光易升易降牙宣衄血為濁為遺欲固其陰先和其陽

做丹溪大補陰丸合水陸二仙丹加牡蠣金櫻膏丸

黃舌白氣短胸中痛目暗微淋乃陰虛於下氣阻於上

暫停參劑早上服都氣丸三錢晚服威喜丸二錢

葉三脈數形瘦素有失血自覺氣從左升痰嗽隨之此皆

積勞陽氣鼓動陰弱少制六味壯水和陽極是近日便

濁雖宜清熱亦必顧其陰體為要

生地 丹皮 甘草梢 澤瀉

山梔 黑豆皮

某 陰虛濕熱在腑為濁 六味去苳加車前牛膝黃柏

草蘇

某 遺山精竅淋在溺竅異出同門最宜分別久遺不攝

是精閉不攝為虛但熱滴莖中痛痒久腹堅滿此屬淋

閉乃隧道不通未可便認為虛况夏合足趾濕腐其下

焦先蘊濕熱熱阻氣不流行將膀胱撐滿故令脹堅議

理足太陽經 五苓散

下焦不流行 某 五 淋濁溺短瀉痛先通陽氣

臨證指南醫案 卷三 淋濁

革蘇 三錢 烏藥 一錢 益智 五分 赤苓 三錢

遠志 四分 琥珀末 五分

蕭四 脉沉淋濁 分清飲加山梔丹皮茯苓猪苓

某 淋濁小便利不利當清利火腑 導赤散生地用細者

加赤苓瞿麥

黃 心熱下遺於小腸則為淋濁用藥以苦先入心而小

腸火腑非苦不通也既已得效宗前議定法

人參 黃柏 川連 生地 茯苓

茯神 丹參 桔梗 石菖蒲

王 淋屬肝胆濁屬心腎心火下陷陰火上承故濁濁不

禁

人參 川連 生地 茯神

栝子仁 遠志

某氏 氣閉成淋

紫苑 枇杷葉 杏仁 降香末

瓜蒌皮 鬱金 黑山梔

又 食入痞悶小便淋瀝 照前方去紫苑黑梔加苳仁

某三 小洩短赤帶血 導赤散加琥珀末五分赤茯苓

胡五 熱入膀胱小洩血淋莖中猶痛非止血所宜議用錢

氏導赤散加知栝以清龍雷

臨證指南醫案 卷三 淋濁

許十 血淋尿管溺出而痛脉沉實形色蒼黑治從腑熱

蘆薈 山梔 郁李仁 紅花

當歸 酒大黃 龍胆草 丹皮

又 血淋未已用堅陰清熱

小生地 粉丹皮 黃柏 知母

淡竹葉 山梔

祝五 中年已後瘦人陰虧有熱飲酒濕熱下墜精濁痔血

皆熱走入陰則陰不固攝前方宗丹溪補陰丸取其介

屬潛陽苦味堅陰若用固澀必致病加

水製熟地 龜版膠 鹹杜石 天冬

茯苓 黃芩 知母 猪脊筋搗丸

范^二精走濁淋。脊骨生熱。屬陰虛。胃弱勿用膩滯。

龜腹甲心 覆盆子 五味 歸身

鹿角膠 秋石 芡實 金櫻膏丸

戈^四脉左細勁。腰痠。溺有遺瀝。近日凝澀難化。此下焦臟

陰虛。餒漸及中焦。腑陽。收納肝腎。勿損胃氣。

熟地 杞子 栝子仁 當歸身 紫衣胡桃

補骨脂 杜仲 茯苓 青鹽 蜜丸

某^六旬有五。下焦空虛。二便不爽。溺管痠痛。姑與腎氣

湯主治。腎氣湯細絹濾清服。

臨證指南醫案 卷三 淋濁 天

朱^三血淋管痛。腑熱為多。經月來。每溺或大便。其墜下更

甚。想陰精既損。腎氣不收。故也。

鹹菴蓉 栝子仁 杞子 大茴

牛膝 茯苓

某 淋濁經年。陽損腰痛畏冷。

熟地 杞子 鹿角膠 巴戟

杜仲 栝子仁 湖蓮 芡實

葉^七淋屬肝胆。濁屬心腎。據述病溺出渾濁如膿。病甚則

多。或因遺泄後。濁痛皆平。或遺後痛濁轉甚。想精關之

間。必有有形。敗精凝阻。其痰。故藥中清濕熱通腑。及固

清補陰。久餌不效。先議通瘀腐一法。考古方通淋通瘀

用虎杖湯。今世無識此藥。每以杜牛膝代之。

用鮮杜牛膝根水。洗淨。搗爛絞汁。大半茶杯。調入真

麝香一分許。隔湯燉溫。空心服。只可服三四服。淋通

即止。倘日後病發再服。

又 淋病主治。而用八正分清導赤等方。因熱與濕俱屬

無形。腑氣為壅。取淡滲苦寒。濕去熱解。腑通病解。若房

勞強。忍精血之傷。乃有形敗濁。阻於尿道。故每溺而痛。

徒進清濕熱利小便無用者。以濁與精同門異路耳。故

虎杖散小效。以麝香入絡通血。杜牛膝亦開通血中敗

臨證指南醫案 卷三 淋濁 虎

濁也。 韭白汁九製大黃兩 生白牽牛子兩 歸身五錢

桂枝木三錢 炒桃仁兩 小茴三錢 韭白汁法丸

李 敗精凝滯。通瘀痺宣。竅已效。

生熟仁 杜牛膝 人中白 生黃柏 麝香二分

徐^五五旬又四。勞心陽動。陰液日損。壯年已有痔瘡。腸中

久有濕熱。酒性辛溫。亦助濕熱。熱下注為痔。為淋。故初

病投八正五苓。疎氣之藥也。牛年不痊。氣病漸入於血

絡。考古方惟虎杖散最宜。 虎杖散

張 丹溪謂五淋症。濕熱阻。寢居多。三年前曾存是病。月

前舉發竟有血塊壅塞尿管大痛不能溺出。想房勞強忍敗精離位。變成汚濁癆腐。且少腹堅滿。大便秘高。臍氣無權。臍氣不用。考瀕湖發明篇中。有外甥柳喬之病。與此適符。今倣其義。參入朱南陽法。

兩頭尖 川棟子 韭白 小茴

桂枝 歸尾 沖入杜牛膝根汁

又痛脹皆減。滴瀝成淋。前投通濁已效。只要凝塊全無。便不反覆。陰藥呆鈍。桂附劫液通陽。柔劑為宜。

茯苓 歸尾 栢子仁 炒遠志

杞子 茯苓 小茴

臨證指南醫案 卷三 淋濁 三

馬 淋濁屬肝胆居多。桂附劫陰。與剛臟不合。診脈沉滑無力。非五苓八正可投。議用朱南陽法。仍是厥陰本方耳。

老韭根白 兩頭尖 一百 小茴香 五分 川棟子 肉錢

歸鬚 二錢 穿山甲 末 錢

徐 由淋痛漸變赤白濁。少年患此。多有慾心暗動。精離本宮。腐敗凝阻。溺窞而成。乃有形精血之傷。三年久病。形消肉減。其損傷已非一臟一腑。然補精充髓。必佐宣通為是。自能潛心安養。尚堪帶病延年。

熟地 生麋角 茯苓 炒遠志

赤苓 牛膝

某 每溺尿管窒痛。溺後渾濁。敗精阻竅。濕熱內蒸。古方虎杖散。宜敷。通腐甚妙。若去麝香。必不靈效。較諸湯藥更上一籌矣。

酒煨大黃 炒龍胆草 炒焦黃栢 牽牛子

川棟子 黑山梔 小茴 沉香汁

某 陰精上蒸者。壽陽火下陷者。危血淋久而成形。窒痛煩心。心火直升。老人陰精已憊。五液化成敗濁。阻竅不通。欲溺必痛。得泄痛減。即痛則不通。痛隨利緩之謂。故知栢六味及歸脾逍遙之屬。愈治愈劇。其守補升補。滋

臨證指南醫案 卷三 淋濁 三

滯瀉藥。決不中病。用琥珀痛減。乃通血利竅之意。然非久進之方。以不傷陰陽之通潤立方。

生地 益母草 女貞子 阿膠

琥珀 稽豆皮

顧 敗精宿於精關。宿腐因溺強出。新者又瘀在裏。經年累月。精與血並皆枯槁。勢必竭絕。成勞不治。醫藥當以任督衝帶調理。亦如女人之崩漏帶下。醫者但知八正分清。以濕熱治。亦有地黃湯益陰。瀉陽。總不能走入奇經。

鹿茸 龜甲 當歸 杞子

茯苓 小茴 鮑魚

夏三案廣神耗過動天君陽燧直升直降水火不交陰精

變為腐濁精濁與便濁異路故宜利清解無功數月久

延其病傷已在任督凡八脉奇經醫每棄置不論考孫

真人九法端究其事欲潤陰精不漏意在升固八脉之

氣錄法參末

鹿茸 人參 生鬼絲粉 補骨脂

韭子 舶茴香 覆盆子 茯苓

胡桃肉 栢子霜 蒸餅為丸

劉三脉緩瀦濁後有血或間成塊晨傾溺器必有膠濁粘

臨證指南醫案 卷三 淋濁 三

膩之物四肢寒凜納食如昔病傷奇脉

生鹿茸 當歸 杞子 栢子仁

沙苑子 小茴

王五悲憂驚恐內傷情志沐浴薰蒸外泄陽氣絡中不寧

血從漏出蓋衝脉動而諸脉皆動任脉遂失擔任之司

下元真氣何以固納述小便欲出有痰楚如淋之狀診

脉微小滴最宜理陽通補用青蘘斑龍丸

淋有五淋之名濁有精濁便濁之別數者當察氣分

與血分精道及水道確從何來大凡秘結宜通滑

當補若因心陽亢而下注者利其火腑濕熱甚而不

宜者徹其泉源氣陷用升陽之法血脈進化結之方

此數端人所易曉也獨不知厥陰內患其症最急少

腹透前陰如刺小水點滴難通環陰之脉絡皆痺氣

化機關已息先生引朱南陽方法兼參李瀕湖意用

滑利通陽辛鹹泄急佐以循經入絡之品豈非發前

人之未發耶若夫便濁之恙只在氣虛與濕熱推求

實者宜通水道虛者調養中州若虛實兩兼又有益

臟通腑之法精濁者蓋因損傷肝腎而致有精痰精

滑之分精痰當先理其離官腐濁繼與補腎之治精

滑者用固補斂攝倘如不應當從真蒸調之景岳謂

臨證指南醫案 卷三 淋濁 三

理其無形以固有形也然此症但知治肝治腎而不

知有治八脉之妙先生引孫真人九法升奇陽固精

絡使督任有權漏卮自已可見平日若不多讀古書

而臨症焉知此理若不經先生講明予今日亦不知

此方妙處又尿血一症虛者居多若有火亦能作痛

當與血淋同治倘清之不愈則端究乎虛上則主於

心脾下則從乎肝腎久則亦至於八脉大約與前症

相同要在認定陰陽耳 俾新甫

陽痿

徐三脉小數清上熱火升喜食辛酸爽口上年因精滑陽痿用二至百補通填未效此乃焦勞思慮鬱傷當從少陽以條暢氣血

柴胡 薄荷 丹皮 鬱金 山梔

神翹 廣皮 茯苓 生姜

心腎不交 仲二 三句以內而陽事不舉此先天稟弱心氣不主下交於腎非如老年陽衰例進溫熱之此填充髓海交合心腎宜之

臨證指南醫案 卷三 陽痿

熟地 雄羊腎 杞子 補骨脂 黃節

遠志 茯苓 胡桃 青鹽 鹿筋膠丸

王五 述未育子向衰莖縮凡男子下焦先虧各館辦事曲運神思心陽久吸腎陰用斑龍聚精茸珠合方

男子以八為數年逾六旬而陽事痿者理所當然也若過此猶能生育者此先天稟厚所謂陽常有餘也若夫少壯及中年患此則有色慾傷及肝腎而致者先生立法非峻補真元不可蓋因陽氣既傷真陰必損若純乎剛熱燥清之補必有偏勝之害每兼血肉溫潤之品緩調之亦有因恐懼而得者蓋恐則傷腎

恐則氣下治宜固腎約佐升陽有因思慮煩勞而成者則心脾腎兼治有鬱損生陽者必從胆治蓋經云凡十一臟皆取決於胆以云少陽為樞若得胆氣展舒何鬱之有更有溫熱為患者宗筋必弛縱而不堅舉治用苦味辛散淡滲去濕濕去熱清而病退矣又有陽明虛則宗筋實蓋胃為水穀之海納食不旺精氣必虛凡男子外腎其名為勢若穀氣不充欲求其勢之雄壯堅舉不亦難乎治惟有通補陽明而已 華地雲

臨證指南醫案 卷三 陽痿

汗

其二脉細自汗下體任冷衛陽式微使然

黃芪 三錢 熟附子 七分 熟於木 錢 炙草 五分

煨姜 一錢 南棗 三錢

朱三脉微汗淋右脇高突而與色痿足冷不食易飢食入即飽此陽氣大傷衛不擁護法當封固

人參 黃芪 製川附子 熟於木

孫八內膈筋傷心悸汗出頭痛愈畏風怕冷陽虛失護用

真武湯

臨證指南醫案

卷三

汗

某 勞傷陽虛汗泄

黃芪 三錢 白朮 二錢 防風 六分 炙草 五分

顧氏 勞力佛怒心背皆熱汗出往時每以和陽治厥陰肝

臟得效今年春夏經行病發且食納頓減褚氏謂獨陰

無陽須推異治通補既獲小效不必見熱投涼用鎮其

陽以理虛

人參 半夏 茯苓 炙草

牡蠣 小麥 南棗

張五脉弦大身熱時作汗出良由勞傷營衛所致經二六勞

者温之

嫩黃芪 三錢 當歸 半錢 桂枝 木錢 白芍 一錢

炙草 五分 煨姜 一錢 南棗 三錢

其二脉細弱自汗體冷形神疲痺知饑少納肢節痠楚病在營衛當以甘温

生黃芪 桂枝 木 白芍 炙草

煨姜 南棗

某 汗出寒凜其氣發泄痰動風生用辛甘化風法

生黃芪 桂枝 炙草 茯苓

防風根 煨姜 南棗

梅四案積勞神困食減五心汗出非因實熱乃火與元

臨證指南醫案

卷三

汗

氣勢不兩立氣泄為熱為汗當治在無形以實火宜清

虛熱宜補耳議用生脉四君子湯

方 茹素惡服陽明胃弱致厥陰來乘當丑時澱外汗出

少寐多夢

人參 龍骨 茯苓 棗仁 炒白芍

炙草 煎藥吞送蒸熟五味子三十粒

又 鎮攝汗止火升咳嗽仍屬陰虛難得充復育陰滋液

為治

熟地炭 人參 炒麥冬 五味 炒更肉

川斛 茯苓 女貞子 接服瓊玉膏方

經云陽之汗以天地之雨名之。又云陽加於陰謂之汗。由是推之。是陽熱加於陰。津散於外而為汗也。夫心為主陽之臟。凡五臟六腑表裏之陽。皆心主之。以行其變化。故隨其陽氣所在之處。而氣化為津。亦隨其火擾所在之處。而津泄為汗。然有自汗盜汗之別焉。夫汗本乎陰。乃人身之津液所化也。經云汗者心之液。又云腎主五液。故凡汗症。未有不山心腎虛而得之者。心之陽虛。不能衛外而為汗。則外傷而自汗。不分寤寐。不因勞動。不因發散。溼溼然自出。由陰蒸於陽分也。腎之陰虛。不能內營而退藏。則內傷而盜汗。盜汗者。即內經所云寢汗也。睡熟則出。醒則漸收。由陽蒸於陰分也。故陽虛自汗。治宜補氣以衛外。陰虛盜汗。治當補陰以營內。如氣虛表弱。自汗不止者。仲景有黃芪建中湯。先賢有玉屏風散。如陰虛有火。盜汗發熱者。先賢有當歸六黃湯。柏子仁丸。如勞傷心神。氣熱汗泄者。先生用生脈四君子湯。如營衛虛而汗出者。宗仲景黃芪建中湯。及辛甘化風法。如衛陽虛而汗出者。用玉屏風散。附湯真武湯。及甘麥大棗湯。鎮陽理陰方法。按症施治。一絲不亂。謂之明醫也。夫復笑愧。鄒滋九。

臨證指南醫案

卷三 汗

无

脫

陽脫 遺尿目瞤口開面亮汗油陽飛欲脫無藥力挽擬參附湯法。加入童便。固元真接續耳。

又 子丑為陰陽交界之時。更逢霜降。正不相續。後現脫象。進兩攝陰陽方。參附湯加五味子。

又 陽回汗止神甦。無如陰液欲涸。心熱渴飲。姑救胃汁。人參 麥冬 五味 茯神 建蓮

又 腎真未全收納。便溺自遺。無如咽燥喉痛。陽雖初回。陰氣欲盡。難進溫熱之補。大意收攝真陰為治。

臨證指南醫案

卷三 脫

无

人參 麥冬 五味 熟地炭

茯神 遠志炭 菖蒲根

又 胃虛客氣上逆為呃噎。痰帶血腥。咽中微痛。用鎮攝法。

人參 熟地 北味 茯神 青鉛

周 脈革無根。左尺如無。大汗後寒慄。頭顛痛。躁渴不寐。

此屬亡陽。平昔飲酒少穀。回陽辛甘。未得必達。有乾嘔格拒之狀。真危如朝露矣。勉議仲景救逆湯。收攝潰散。

之陽。冀有小安。再議治病。救逆湯加參附。徐 恰交第七日。新聲呵欠。目瞤煩躁。診脈微細而促。此

陰陽並

皆二氣不相接續。衰脫之徵最速。是清神熄風方法。難以進商。急固根蒂。做河間地黃飲。

熟地 附子 菴蓉 萸肉

杞子 遠志 菖蒲 川斛

黃 腎脉不得上榮。肝風突起。掀旋呵欠。鼾聲。口噤。汗出。陰陽不續。危期至速。地黃飲子極是。

熟地炭 萸肉炭 川斛 天冬 淡菴蓉

牛膝炭 五味 遠志 茯神 飲子煎法

凌 脉大不斂。神迷。嚙語。陰陽不相交合。為欲脫之象。救陰無速功。急急鎮固陰陽。冀其甦息。

臨證指南醫案

卷三 脫

手

人參 茯神 阿膠 淮小麥

龍骨 牡蠣

又 陰液枯槁。陽氣獨升。心熱驚惕。倏熱汗泄。議用復脉湯。甘以緩熱。充養五液。復脉去。姜桂加牡蠣。

又 胃弱微嘔。暫與養陽明胃津方。

人參 炒麥冬 炒白粳米 茯神

鮮蓮子肉 川斛

又 人參 秋石水 熟地炭 天冬 麥冬

茯神 鮮生地

又 秋燥上薄。嗽甚微嘔。宜調本兼以清燥。

人參 秋石水 麥冬 玉竹 生甘草

南棗 白粳米

又 安胃丸二錢 秋石拌人參湯送

某氏 脉如雀啄。色枯氣促。身重如山。不思納穀。乃氣血大虛。慮其暴脫。

人參 生地 阿膠 麥冬

炙草 左牡蠣

又 補攝足三陰

人參 熟地炭 棗仁 茯神

五味 鮮蓮子肉

臨證指南醫案

卷三 脫

手

朱氏 久損不復。真氣失藏。交大寒節。初之氣。厥陰風木主候。肝風乘虛上擾。氣升則嘔吐。氣降則大便。寒則脊內更甚。熱則神煩不寧。是中下之真氣杳然。恐交春前後。有厥脫變幻。擬進鎮逆法。

人參 生牡蠣 龍骨 附子

桂枝木 生白芍 炙草

艾 自半月前。寒熱兩日。色脉愈弱。食減。寢少。神不自持。皆虛脫之象。議固之。濟之。不及理病。

人參 生龍骨 牡蠣 桂枝

炙草 南棗肉

又 脈神稍安議足三陰補方

人參 砂仁末炒熟地 炒黑杞子

茯神 五味 牛膝炭

脫即死也。諸病之死皆謂之脫。蓋人病則陰陽偏勝。偏勝至極即死矣。人之生也。負陰抱陽。又曰陰在內。陽之守也。陽在外。陰之使也。是故陰中有陽。陽中有陰。其陰陽樞紐自有生以至老死。頃刻不離。離則死矣。故古聖先賢創著醫籍。百病千方。無非為補偏救弊。和協陰陽。使人得盡其天年而已。夫脫有陰脫陽脫之殊。內經論之最詳。難經又言脫陽者見鬼。脫陰者見人。此不過言其脫時之精狀也。明理者須預為挽救。則可。若至見鬼目盲而治之。已無及矣。今觀先生之治法。回陽之中必佐陰藥。攝陰之內必兼顧陽氣。務使陽濟陰固。庶不致有偏勝之患。至於所脫之症不一。如中風眩暈嘔吐喘衄。汗多亡陽之類。是陽脫也。瀉痢崩漏胎產下多亡陰之類。是陰脫也。痧脹乾霍亂痞脹痙厥。臟腑窒塞之類。是內閉外脫也。陽脫於上。陰脫於下。即人死而魂升魄降之謂也。總之陰陽樞紐不脫。病雖重不死。然則陰陽樞紐何在。其在於命門歟。

臨證指南醫案

卷三 脫

者目盲。此不過言其脫時之精狀也。明理者須預為挽救。則可。若至見鬼目盲而治之。已無及矣。今觀先生之治法。回陽之中必佐陰藥。攝陰之內必兼顧陽氣。務使陽濟陰固。庶不致有偏勝之患。至於所脫之症不一。如中風眩暈嘔吐喘衄。汗多亡陽之類。是陽脫也。瀉痢崩漏胎產下多亡陰之類。是陰脫也。痧脹乾霍亂痞脹痙厥。臟腑窒塞之類。是內閉外脫也。陽脫於上。陰脫於下。即人死而魂升魄降之謂也。總之陰陽樞紐不脫。病雖重不死。然則陰陽樞紐何在。其在於命門歟。

脾胃

錢 胃虛少納。土不生金。音低氣餒。當與清補。

麥冬 生扁豆 玉竹 生甘草

桑葉 大沙參

王 數年病傷不復。不飢不納。九竅不和。都屬胃病。陽土喜柔偏惡剛燥。若四君異功等。竟是治脾之藥。腑宜通。即是補。甘涼濡潤。胃氣下行。則有效驗。

麥冬 一錢 火麻仁 一錢 水炙黑小甘草 五分

生白芍 二錢 臨服入青甘蔗漿一杯

臨證指南醫案

卷三 脾胃

某二 病後胃氣不甦。不飢少納。始與清養。

鮮省頭草 三錢 白大麥仁 五錢 新會皮 一錢 陳半夏 一錢

川斛 三錢 烏梅 五分

某三 脈瀉體質陰虧偏熱。近日不飢口苦。此胃陰有傷。邪熱內熾。古稱邪火不殺穀是也。

金石斛 陳半夏 生穀芽 廣皮白

陳香鼓 塊茯苓

理肺養胃。進以甘寒。

甜杏仁 玉竹 花粉 枇杷葉

川貝 甜水梨汁

虛 肺胃陰

某 脉數口渴有痰乃胃陰未旺

炒麥冬 生白扁豆 生甘草 白粳米

北沙參 川斛

陳二 知飢少納胃陰傷也

麥冬 川斛 桑葉 茯苓 蔗漿

某 胃陽受傷肝病以通為補與守中必致壅逆

人參 粳米 益智仁 茯苓

廣皮 炒荷葉

某 食穀不化胃無火也

生白朮 厚樸 新會皮 益智仁

臨證指南醫案

卷三 脾胃

茯苓 砂仁

計三 陽微痰黑食入不化

人參 生益智 桂心 茯苓

廣皮 煨姜

高六 脉與小帶弦知飢不欲食晨起吐痰是胃陽不足宜

用外臺茯苓飲

又 人參 白朮 茯苓 廣皮

半夏 枳實皮 白茯苓 地米粉

席三 脉右濡臍上過寸有聚氣橫束幾年來食難用飽每

三四日一更衣夫九竅失和都屬胃病上臍部位為氣

分清陽失司做仲景微通陽氣為法

薤白 瓜薑汁 半夏 姜汁

川桂枝 鮮薑汁

某三 脉濡自汗口淡無味胃陽憊矣

人參 淡附子 淡乾姜 茯苓 南棗

王 脉小右弦病屬勞倦飲食不和醫投柴葛維入消導

升表攻裏致汗泄三日腕中不饑全是胃陽大傷防有

噦呃厥逆之變

生益智仁 姜汁 半夏 茯苓

丁香 炒黃米

臨證指南醫案

卷上 脾胃

孫 長夏熱傷為瘧為痢都是脾胃受傷老年氣衰不肯

自復清陽不肯轉旋腕中不得容納口味痰吐不清脉

弦右濡瀉下焦便不通調九竅不和都胃病也此剛補

不安陽土不耐辛熱矣議宜通補方如大半夏湯之類

大半夏湯加川連姜汁

又 小溫中丸

錢一 壯年肌柔色黯脉小濡瀉每食過不肯運化食冷物

臍上即痛色脉參合病象是胃陽不旺濁陰易聚醫知

腑陽宜通自有效驗

良姜 草果 紅苕蔻 厚樸

生香附 烏藥

汪 舌灰黃脘痺不饑形寒怯冷脾陽式微不能運布氣機非溫通焉能宜達

半夏

茯苓

廣皮

乾姜

厚樸

藜蘆

周 脈象室塞能食少運便溏當溫通脾陽

生白朮

茯苓

益智仁

淡附子

乾姜

藜蘆

又 溫通脾陽頗適脈象仍然室塞照前方再服一劑如九方當以脾腎同治着想

臨證指南醫案

卷三

脾胃

吳

吳 酒多穀少濕勝中虛腹痛便溏太陰脾陽少健

平胃合四苓加穀芽

王 素有痰飲陽氣已微再加怙鬱傷脾脾胃運納之陽愈憊致食下不化食已欲瀉夫脾胃為病最詳東垣當

升降法中求之

人參

白朮

羌活

防風

生益智

廣皮

炙草

木瓜

吳 食加便溏胃醒脾不運也方藥皆以太陰陽明是調

異功散加甘松益智

周 脈緩弱院中痛脹嘔湧清涎是脾胃陽微之積勞

午後病甚陽不用事也大凡脾陽宜動則運溫補極是而守中及厥滯皆非其通腑陽間佐用之

人參

半夏

茯苓

生益智

生姜汁

淡乾姜

大便不爽間用半碗丸

朱 陽微食後吞酸

茯苓

炒半夏

廣皮

生於朮

厚樸

淡乾姜 藜蘆 淡吳萸 公丁香 水法丸

某 脈弦食下腹脹大便不爽水穀之濕內着脾陽不主

默運胃腑不能宜達踈脾降胃令其升降為要

金石斛

厚樸

枳實皮

廣皮白

臨證指南醫案

卷三

脾胃

王

苦參

神麴

茯苓皮

麥芽

陳 厥陰三癘半夏至節交春未退舍大寒熱而便解

病傷未平兩濕蒸逼外陽內受水穀不運洞泄之後而

神倦食減濕傷脾胃清氣用東垣清暑益氣主之

清暑益氣法

洪 脈虛滑弱面之渾澤身冷肢冷肌麻木時如寒凜

微熱欲瀉大便有不化之形穀食不納此陽氣大衰理

進溫補用附子理中湯

趙 氣分太虛衛少外護畏風怯冷冬大氣主藏夏季

氣泄外越此天熱煩倦一因也是氣分屬陽故桂附理

陽頗投致八味古稱腎氣有通攝下焦之功能使水液不致泛溢其中陰藥味厚為君乃陰中之陽藥施於氣虛未為中欵。歷舉益氣法無出東垣範圍。俾清陽旋轉脾胃自強偏寒偏熱總有太過不及之弊。補中益氣加麥冬北味 又 間服四君子湯

宣三 痛而納食稍安病在脾絡因饑餓而得當養中焦之營甘以緩之是其治法 歸建中湯

戈 小便短澀渾濁大便頻澀不欲納穀此傷食惡食也當分消土

生益智

黃皮

茯苓

澤瀉

臨證指南醫案

卷三 脾胃

三

炒白芍

炒山查

脾胃之論莫詳於東垣其所著補中益氣調中益氣升陽益胃等湯誠補前人之未備。察其立方之意因以內傷勞倦為主又因脾乃太陰濕土且世人胃陽衰者居多故用參芪以補中二木以溫燥升柴升下陷之清陽陳皮木香理中宮之氣滯脾胃台治若用之得宜誠效如桴鼓。蓋東垣之法不過詳於治脾而畧於治胃耳乃後人宗其意者凡著書立說竟將脾胃總論即以治脾之藥籠統治胃舉世皆然。今觀葉氏之書始知脾胃當分析而論蓋胃屬戊土脾屬己

土戊陽已陰陰陽之性有別也。臟宜藏腑宜通臟腑之體用各殊也。若脾陽不足胃有寒濕一臟一腑皆宜於溫燥升運者自當恪遵東垣之法。若脾陽不虧胃有燥火則當遵葉氏養胃陰之法。觀其立論云納食主胃運化主脾脾宜升則健胃宜降則和又云太陰濕土得陽始運陽明陽土得陰自安以脾喜剛燥胃喜柔潤也。仲景云下存津其治在胃東垣大升陽氣其治在脾此種議論實超出千古。故凡遇稟質木火之體患燥熱之症或病後熱傷脾胃津液以致虛痞不食舌絳咽乾煩渴不寐肌燥煩熱便不通塞此

臨證指南醫案

卷三 脾胃

三

九寒不和都屬胃病也豈可以芪朮升柴治之乎故先生必用降胃之法所謂胃宜降則和者非用辛開苦降亦非苦寒下奪以損胃氣不過甘平或甘寒濡潤以養胃陰則津液來復使之通降而已矣此義即宗內經所謂六腑者轉化物而不藏以通為用之理也。今案中所分胃陰虛胃陽虛脾胃陽虛中虛饑傷食傷其種種治法最易明悉余不察養總之脾胃之病虛實寒熱宜燥宜潤固當詳辨其於升降二字尤為緊要蓋脾氣下陷固病即使不陷而但不健運已病矣胃氣上逆固病即使不上逆但不通降亦病矣故

脾胃之治法與各門相兼者甚多如嘔吐腫脹泄瀉
便閉不食胃痛腹痛木乘土諸門尤宜並參互相討
論以明其理可也 華岫雲

臨證指南醫案

卷三

脾胃

脾

木乘土

肝厥犯胃入膈

半夏

薑汁

杏仁

瓜蒌皮

金鈴子

延胡

香豆豉

白蘞

鮑三情懷不適陽氣鬱勃於中變化內風掀旋轉動心悸
流涎麻木悉歸左腋蓋肝為起病之源胃為傳病之所
飲酒中虛便易滑瀉讓兩和肝胃

桑葉

炒丹皮

天麻

金斛

川貝

地骨皮

吳

脈左數右濡氣塞心痛養胃平肝

半夏

茯苓

炒麥冬

栝子仁

川棟子

青橘葉

顧五脈弦胃脘痺痛子後清水泛溢由少腹湧起顯是肝
厥胃痛之症

吳萸

川棟子

延胡

茯苓

桂枝木

高良姜

某九脈左弦右濡中脘痛及少腹痛病在肝胃

川棟子

青皮

生香附

小茴

茯苓

南棗

臨證指南醫案

卷三

木乘土

脾

某三 舌白惡心。液沫泛溢。病在肝胃。當通陽泄濁。

吳萸 七分 乾姜 一錢 姜汁 三分 茯苓 三錢 南棗 一丸

任三 此情志不遂。肝木之氣逆行犯胃。嘔吐膈脹。開懷談

笑可解。凝滯血藥。乃病之對頭也。

延胡 川棟子 蘇梗 烏藥

香附 紅苳蔻

王四 胃脘痛。高突而堅。嘔清涎血沫。瀉水不能下咽。四肢

冷。肌膚麻木。搥背脊病勢畧緩。此屬肝厥犯胃。

開口吳萸 金鈴子 炒延胡 生香附

高良姜 南山查

臨證指南醫案 卷三 木乘土 聖

某 脈左弦。少寐。氣從左升。泄肝和胃。

生左牡蠣 五錢 川棟子肉 一錢 化州橘紅 一錢

茯苓 三錢 澤瀉 一錢

某 脈緩。左弦。晨倦食減。在土旺之候。急調脾胃。

戊己湯去甘草加穀芽

程五 曲運神機。心多震動。必形之夢寐。診脈時。手指微震。

食納痰多。蓋君相動主消燦。安幾不充形骸。首宜理陽。

明以制厥陰。勿多岐也。

人參 枳實 半夏 茯苓 石菖蒲

某 通補陽明和厥陰。

人參 茯苓 半夏 高良姜

吳萸 生白芍

某四 肝逆犯胃。脘痛腹鳴。氣撐至咽。

川棟子 桂枝木 淡乾姜 川椒

生白芍 吳萸 烏梅 茯苓

程五 操家。煩動嗔怒。都令肝氣易逆。乾嘔味酸。木犯胃土。

風木動。乃晨泄食少。形瘦脈虛。先議安胃和肝。

人參 半夏 茯苓 木瓜

生益智 煨姜

華三 據說氣攻脇脹。春起秋愈。此內應肝木。飽食不和。肝

臨證指南醫案 卷三 木乘土 聖

傳胃矣。

焦白木 半夏 柴胡 枳實

生香附 廣皮 乾荷葉湯泛丸

毛 目微黃。舌黃。煩渴。脇肋板實。呼吸周身牽掣。起於頻

吐食物痰飲。即胸脘痛脹。此肝木犯胃。諸氣痺阻。雖平

昔宜於溫補。今治病宜宜通氣分。

半夏 一錢 廣皮 白一錢 大杏仁 十粒 白蔻仁 八分

川棟子 一錢 炒延胡 一錢 生姜 五分 土瓜萸皮 一錢

又 心中懊惱噎痛。氣分熱痰未平。用溫胆法。

竹茹 一錢 炒半夏 一錢 茯苓 一錢 枳實 一錢

桔梗八分 橘紅一錢 生姜三分

王三癖積是重着有質。今痛升有形。痛解無跡。發於暮夜。衝逆欲嘔不吐。明是厥氣攻胃。由惱怒強食。氣滯紊亂。而成病。發時用河間金鈴子散。兼以宣通陽明。疑遇可愈。

金鈴子 延胡 半夏 瓜蒌皮

山梔 橘紅

秦七面長身瘦。稟乎水火之形。氣阻脘中。食少礙痛。胃口為逆。乃氣火獨熾之象。忌用燥熱劫津。治以平肝和胃。

降香 鬱金 山梔 橘紅

臨證指南醫案 卷三 木乘土 醫

枇杷葉 蘇子 川貝母 姜皮

朱十五半百已衰。多因神傷思慮。夏四月大氣發泄。遂加便溲。長夏暑熱。無有不大耗氣分。寒熱之來。乃本氣先怯。而六氣得以乘虛。今不思納穀之因。皆寒熱一氣擾逆。胃脘清真受戕。所以致困莫甦。不煩不渴。胃陽虛也。凡

醒胃必先制肝。而治胃與脾迥別。古稱胃氣以下行為順。區區木甘之守。升柴之升。竟是脾藥。所以鮮克奏效。

人參 茯苓 炒麥冬 大麥仁

木瓜 烏梅

董病久。正氣已衰。喜熱惡寒為虛。診得左脈尚弦。病在

肝。但高年非伐肝平肝為事。議通補胃陽。

人參 茯苓 煨姜 新會皮

炒粳米 炒荷葉蒂

陸三咽屬胃。胃陰不升。但有陽氣薰蒸。致咽燥不成寐。衝逆心悸。震動如驚。厥陰內風乘胃虛。以上僭。胃脈口虛。肢肌麻木。當用十味溫胆。合秫米湯。通攝兼進。俾肝胃陽和。可以痊安。

人參 茯苓 棗仁 知母

竹茹 半夏 黃色秫米

又用泄少陽補太陰法。六君去甘草加丹皮桑葉金

臨證指南醫案 卷三 木乘土 醫

斛湯法九

郭脈弦。心中熱。欲嘔。不思食。大便不溲。乃厥陰肝陽順乘胃口。陽明脈絡不宜。身體掣痛。當兩和其陽。酸苦泄熱。少佐微辛。

川連 桂枝木 生牡蠣 烏梅

生白芍 川棟子

芮前議肝病入胃。上下格拒。考內經諸痛。皆主寒客。但經年累月久病。寒必化熱。故六氣都從火化。河間特補病機一十九條亦然。思初病在氣。久必入血。以經脈主氣。絡脈主血也。此臟腑絡氣血。須分晰辨明。投劑自

一第1027 野...

可入穀更詢初病因驚夫驚則氣逆初病肝氣之逆久則諸氣均逆而三焦皆受不特胃當其衝矣謹陳緩急先後進藥方法厥陰篇云氣上撞心飢不能食欲嘔口吐涎沫夫木既犯胃胃受尅爲虛仲景謂制木必先安土恐防久尅難復議用安胃一法

川連 川棟子 川椒 生白芍

烏梅 淡姜渣 歸鬚 橘紅

內經以攻病尅制曰勝方補虛益體須氣味相生曰生方今胃被肝乘法當補胃但胃屬腑陽凡六腑以通爲補黃連味苦能降戴元禮云諸寒藥皆凝滯惟

臨證指南醫案 卷三 木乘土 吳

有黃連不凝滯有姜椒歸須氣味之辛得黃連川棟之苦做內經苦與辛合能降能通芍藥酸寒能泄上中木乘又能和陰止痛當歸血中氣藥辛溫上升用鬚力薄其氣不升梅占先春花發最早得少陽生氣非酸飲之收藥得連棟苦寒內經所謂酸苦泄熱也以氣與熱俱無形無質其通逐之法迥異故辨及之又春分前七日診右脉虛弦帶滯左脉小弦勁而數胃痛已緩但常有畏寒鼓慄俄頃發熱而解此肝病先厥後熱也今歲厥陰司天春季風木主氣肝病既久脾胃必虛風木鬱於土宮營衛二氣未能流暢於經脉爲營

養護衛此偏熱偏寒所由來矣夫木鬱土位古人制肝補脾升陽散鬱皆理偏就和爲治勿徒攻補寒熱爲調今春半天令漸溫擬兩和氣血佐以宣暢少陽太陰至小滿氣緩泄越必大培脾胃後天方合歲氣體質調理定春季煎丸二方

人參 茯苓 廣皮 炙草 當歸

白芍 丹皮 桑葉 姜棗湯法丸

間用人參 廣皮 穀芽 炙草 白芍

黃芩 丹皮 柴胡

卜 有年冬藏不固春木萌動入身內應乎肝水弱木失

臨證指南醫案 卷三 木乘土 吳

滋榮陽氣變化內風乘胃爲嘔攻脇爲痛仲景以消渴心熱屢厥陰內經以吐涎沫爲肝病肝居左而病熾偏右木犯土位之徵經旨謂肝爲剛臟非柔不和閱醫藥沉桂萸連雜以破泄氣分皆辛辣苦燥有剛以治剛之弊倘忽厥逆惡瘧奈何議鎮陽熄風法

生牡蠣 阿膠 細生地 丹參

淮小麥 南棗

又 內風陽氣鼓動變幻皆有形無質爲用太過前議鹹苦入陰和陽佐麥棗以和胃制肝獲効蓋肝木肆橫胃上必傷醫治既僻津血必枯唇赤舌絳咽乾穀味即變

酸膩顯是胃汁受劫胃陰不復夫胃為陽明之土非陰柔不肯協和與脾土有別故也

生牡蠣 阿膠 細生地 小麥

炒麻仁 炒麥冬 炙草

張七脈小茲納穀腕中噎噎自述因乎他醫強飲則知木火犯土胃氣不得下行所致議苦辛泄降法

黃連 鬱金 香淡豆豉 竹茹

半夏 丹皮 山梔 生姜

又前方泄厥陰通陽明為衝氣吐涎腕痞不納穀而設且便難艱阻胸脹悶上下交阻有年最慮關格與進退

臨證指南醫案 卷三 木乘土 吳

黃連湯

江晨起腹痛食穀微滿是清濁之阻按脈右虛左弦不思飲食脾胃困頓都屬虛象古人培土必先制木倣以

為法

人參 淡吳萸 淡乾姜 炒白芍 茯苓

周九酒熱濕痰常有年正虛清氣少旋遂致結秘不能容納食少自述多鬱易噎議從肝胃主治

半夏 川連 人參 枳實

茯苓 姜汁

王五噎逆舉發湯食皆吐病在胃之上脘但不知起病之

因由據云左脇內結痼聚肝木侮胃明係情懷憂勞以致氣鬱結聚久病至頗能安設非純補可知泄厥陰以舒其用和陽明以利其腑藥取苦味之降辛氣宣通矣

川棟子皮 半夏 川連 姜汁

左牡蠣 淡吳萸

唐痞逆惡心是肝氣犯胃食入吐着痛而且脹夜寐不安亦是胃中不和貴乎平肝養胃致其復若見有形衝逆之狀攻代菝進有痞滿成脹之患

川連 神麩 吳萸 川棟子

查肉 鬱金

臨證指南醫案 卷三 木乘土 吳

姚寒熱嘔吐腸脹腕痺大便乾澀不暢古云九竅不和

都屬胃病法當平肝木安胃土更常進人乳姜汁以益

血潤燥宜通午後議用大半夏湯

人參 半夏 茯苓 金石斛

廣皮 菖蒲

胡氏經後寒熱氣衝欲嘔忽又如饑仍不能食視其鼻準亮欬汗氣短多藥胃傷肝木升逆非上焦表病

炙甘草 小生地 芝蔴仁 阿膠

麥冬 白芍 牡蠣

又照前方去牡蠣加人參

又衝陽上逆則煩不得安。仍是陰弱。夫胃是陽土。以陰為用。木火無制。都係胃汁之枯。故腸中之垢不行。既知陰虧。不必強動大便。

人參 鮮生地 火麻仁 天冬

麥冬 炙草

徐氏 經候適來。肢骸若振。環口肉。喘蠕動。兩踝臂肘常冷。夫衝脈血下。蹻維脈怯。不用衝。隸陽明。厥陰對峙。因驚肝病。木乘土位。以致胃衰。初則氣升至咽。久則懶食。脘痞。昔人有治肝。不當取陽明。陽明不闕。空洞若谷。厥氣上加。勢必嘔脹吞酸。然陽明胃腑。通補為宜。剛藥畏

臨證指南醫案 卷三 木乘土 平

其劫陰少濟以柔藥法當如是

人參 二錢 半夏 姜汁炒 茯苓 三錢 淡附子 七分

白粳米 五錢 木瓜 二錢

胃虛益氣而用人參。非半夏之辛。茯苓之淡。非通劑矣。少少用附子。以理胃陽。粳米以理胃陰。得通補兩和。陰陽之義。木瓜之酸。救胃汁以制肝。兼和半夏附子之剛。復此大半夏與附子粳米湯合方。

張氏 肝病犯胃。心痛。乾嘔。不能納食。肢冷泄瀉。腑經陽失

流展。非虛寒也。金鈴子散加川連烏梅桂枝生姜

徐氏 屢屢墮胎。下元氣怯。而寒熱久嗽。氣塞填胸。湧吐涎

沫。乃鬱勃噴怒。肝胆內寄之相火風木。內震不息。犯胃則嘔逆吞酸。乘胸侵咽。必脹悶喉痺。漸漸昏迷。欲厥久延不已。為鬱勞之病。此治嗽清肺。重鎮消痰。越醫越凶。

考內經肝病主治三法。無非治用治體。又曰治肝不應當取陽明。蓋陽明胃土。獨當木火之侵侮。所以制其衝逆之威也。是病原治法大畧。安胃九椒梅湯送

鮑姬 風泄已止。胃逆不納食。

人參 川連 烏梅 木瓜

川斛 橘紅

朱氏 噴怒動肝。氣逆惡心。胸脇閃動。氣下墜欲便。是中下

臨證指南醫案 卷三 木乘土 平

二焦損傷不復約束之司。失職擬進培土泄木法。亦暫

時之計

烏梅 乾姜 川連 川椒

人參 茯苓 川棟 生白芍

王氏 寡居多鬱。宿病在肝。適日暑邪深入。肝病必來犯胃。吐衄下利得止。不思飲食。心中爽熱。仍是肝胃木症。况暑濕多傷氣分。人參輔胃開痞。扶胃有益。幸無忽致。痰可也。

人參 川連 半夏 姜汁

枳實 牡蠣

又胃開思食。仍以制肝和胃。

人參 金石斛 半夏 枳實

茯苓 橘紅

呂氏 季脇之傍。是虛里穴。今跳躍如梭。乃陽明絡空也。况

衝脉即血海。亦屬陽明所管。經行後而病忽變。前案申

說已著。茲不復贅。大凡絡虛。通補最宜。身前衝氣欲脹。

衝脉所主。病內經所謂男子內結七疝。女子帶下。瘕聚

今也。痛無形象。諒無結聚。祇以冷汗對寒。食入惡心。鼻

準明環口色青。肝胃相對。一勝必一負。今日議理陽明

之陽。佐以宣通奇脉。仲景於動氣一篇。都從陽微起見。

臨證指南醫案

卷三 木乘土

聖

倣以為法。

人參 茯苓 淡熟附子 生蘆艾

桂枝木 炒黑大茴 紫石英 生杜仲

朱氏 上冬用溫通奇經。帶止經轉。兩月間。納穀神安。今二

月初二日。偶涉噴忿。即麻痺乾嘔耳聾。隨即昏迷如厥。

診脉寸強尺弱。食減少。口味淡。微汗。此厥陰之陽化風。

乘陽明上犯。蒙昧清空。法當和陽益胃治之。

人參 一錢 茯苓 三錢 炒半夏 一錢 生白芍 一錢

烏梅 七分 小川連 一分 淡生薑 二分 廣皮白 一錢

此厥陰陽明藥也。胃腑以通為補。故主之以大半夏。

湯熱擁於上。故少佐姜連以瀉心。肝為剛賊。參入白芍烏梅以柔之也。

又三月初五日。經水不至。腹中微痛。右脇蠕蠕而動。皆

陽明脉絡空虛。衝任無貯。當與通補入絡。

人參 一錢 當歸 二錢 羌蔚子 二錢 香附 一錢 醋炒

茯苓 三錢 小茴 一錢 生杜仲 二錢

又照方去羌蔚杜仲。加白芍官桂。

某氏 久有痛經。氣血不甚流暢。驟加暴怒。傷肝。少腹衝氣

上犯。逆行於肺。為欬。寒熱聲啞。脇中拘急。不飢不納。乃

左升右降。不可轉旋。致失胃氣。下行為順之旨。故肝用

臨證指南醫案

卷三 木乘土

聖

宜泄。胃腑宜通。為定例矣。

鈎藤 丹皮 桑葉 半夏麴

茯苓 廣皮白 又 威喜丸

唐 積勞內傷。腕悶脇脹。嘔吐格拒。眩暈不得卧。陽挾內

風暴張。恐其忽然。痰厥。議通胃平肝法。

小川連 姜汁 半夏 牡蠣

川棟子 生白芍

江 拒按為實。患目病來屬肝。痛必多。嘔大便秘。瀦肝病

及胃。當苦辛泄降。少佐酸味。

小川連 生淡乾姜 半夏 枳實

黃芩 生白芍

顧五 陽明脈衰形寒痞飢不食心痛洞泄兼嘔

人參 吳萸 茯苓 半夏

生姜 炒黃稷米

某 勞怒傷陽氣逆血鬱致痛痞脹便溏風木侮土前方

既效與通補陽明厥陰 大半夏湯去蜜加桃仁栝子

仁當歸姜棗湯法九

某 脈微小弱是陽氣已衰今年太陰司天長夏熱泄氣

分不食不運味變酸苦脾胃先受困也稍涉嗔怒木乘

土中益加不安從東垣培土制木法

臨證指南醫案 卷三 木乘土

人參 廣皮 茯苓 益智

木瓜 淡姜渣

夏 通補陽明開泄厥陰

人參 半夏 茯苓 橘紅

吳萸 白芍

汪氏 氣滯脾弱 逍遙散加鬱金砂仁末

席 大便未結腹中猶痛食入有欲便之意胃陽未復肝

木因時令尚橫用泄木安土法

人參 木瓜 厚朴 茯苓

益智仁 青皮

江 鎮衝任溫養下焦頗效所議治嗽肺藥寒涼清火背

謬顯然

炒黑杞子 淡菴蓉 小茴香拌炒當歸

沙苑 石殼建蓮 茯苓 紫石英煎湯

又 動怒腕下痛不飲食是肝厥犯脾胃病外生枝最非

善調之理理氣皆破泄難用議進制肝木益胃土一法

人參 一錢 炒焦白芍 一錢 真伽南香 汁中五

炒焦烏梅 三分 茯苓 五錢 切小塊 化橘紅 五分宜

又 人參 嫩鈎藤 明天麻 化橘紅

炒烏梅肉 茯苓 伽南香

臨證指南醫案 卷三 木乘土

朱 胃弱痰多補虛宜通肝陽易升左頰赤佐泄少陽

人參 炒半夏 茯苓 鈎藤

經霜桑葉 煨姜 南棗

范五 脾窳開舌舌出流涎為脾病乾脾者少陽胆木以養

脾泄胆治

人參 於木 天麻 姜黃

桑葉 丹皮

某 補太陰泄少陽

人參 茯苓 焦朮 炙草

廣皮 白芍 炒丹皮 桑葉

又 照方去甘草桑葉加木瓜

李十五 少陽木火犯太陰之上持齋淡薄中虛熱灼以補脾

和肝為久長調理 四君子加芍芍桑葉丹皮

金 能食運遲舌紋裂左頤肉腫不喜飲水太陰脾陽鬱

法當補土泄木

於木 茯苓 新會皮 炙草

煨益智 柴胡 丹皮 白芍

張九 脈小弱是陽虛體質由鬱勃內動少陽木火木犯太

陰脾土遂致寢食不適法當補土泄木

人參一錢 白木一錢 半夏一錢 茯苓二錢 甘草五分

臨證指南醫案 卷三 木乘土 姜 棗

廣皮一錢 丹皮三錢 桑葉一錢 姜一錢 棗二錢

肝為風木之臟又為將軍之官其性急而動故肝臟

之病較之他臟為多而於婦女尤甚肝病必犯土是

侮其所勝也本臟現症仲景云厥陰之為病消渴氣

上撞心中疼熱飢而不欲食食則吐衄下之利不

止又內經所載肝病難以盡述大凡其脈必弦脇或

脹或疼偏寒偏熱先厥後熱若一犯胃則惡心乾嘔

腕痞不食吐酸水涎沫熱脾則腹脹便或澀或不爽

肢冷肌麻案中治法有陰陽虛實之殊舉而敘述

之若肝陰胃陰未虧肝陽亢逆犯胃先生立法用藥

則遠柔用剛泄肝如吳萸椒桂通胃如半夏姜汁姜

附加益智枳朴等則兼運脾陽中虛必用人參故大

半夏湯附子粳米湯進退黃連湯瀉心法治中法溫

胆等湯是也若肝陰胃汁已虛木火熾盛風陽覆胃

用藥忌剛用柔養肝則阿膠生地白芍麻仁木瓜養

胃則人參麥冬知母粳米秫米等是也至於平治之

法則剛柔寒熱兼用烏梅丸安胃丸逍遙散若四君

六君異功戊巳則必加泄肝之品用桑葉丹皮者先

生云桑葉輕清清泄少陽之氣熱丹皮苦辛清泄肝

胆之血熱用金鈴子散者川棟若寒直泄肝陽延胡

臨證指南醫案 卷三 木乘土 若

端理氣滯血滯之痛此皆案中之綱領也余另分此

一門者因嘔吐不食脇脹腕痞等恙恐醫者但認為

脾胃之病不知實由肝邪所致故特為揭出以醒後

人之耳目且世人但知風勞燥濕為四大重症不知

土敗木賊肝氣日橫脾胃日敗延至不救者多矣可

不究心於此哉 華嶠雲

腫脹

某^五食穀不運。臌脹嘔惡。大便不聚。脉弦色黃。此胃陽式。

微升降失司使然。法當溫通陽氣。

吳萸 八分 半夏 三錢 葶藶 一錢 淡乾姜 一錢

生姜汁 五分 廣皮白 一錢

陳^三診脉右大而緩。左如小數促。冬季寒熱身痛。汗出即

解。自勞役飢飽。嗔怒之後。病勢日加。向浮足腫。呼吸皆

喘。目淚鼻衄。卧着氣衝。欲起食納。隔中不運。時序交夏。

脾胃主候。觀色脉情形。中滿脹病。日來矣。蓋此症屬勞

臨證指南醫案 卷三 腫脹

倦致損。初病即在脾胃。東垣云。胃為衛之本。脾乃營之

源。臟腑受病。營衛二氣晝夜循環失度。為寒為熱。原非

一癘。邪半表半裏之症。斯時若有明眼。必投建中而愈。經

言勞者溫之。損者益之。建中甘溫。令脾胃清陽自立。中

原砥定。無事更遷。仲景亦謂男子脉大為勞。則知內經

仲景東垣垂訓。真規矩準繩至法。且汗泄積勞。都是陽

傷。醫藥辛走劫陽。苦寒敗胃。病人自述欲寐。即中脘不

舒。頃之少腹急痛便稀。其胃陽為苦辛大傷。明甚。又述

咳頻。衝氣必自下上逆。夫衝脉隸於陽明。胃陽傷極。中

乏坐鎮之真氣。衝脈動。則諸脉交動。滿陰散漫。上布此

卧着欲起矣。愚非遙指其脈。正合內經濁氣在上。則生

臌脹。太陰所至為腹脹相符也。昔有見痰休治痰。見血

休治血。常以病因傳變推求。故辨論若此。

厚朴 杏仁 人參 茯苓

蜜煨姜 南棗

厚朴杏仁。取其能降氣。參苓姜棗。取其建五胃中之

清陽。而和營衛也。

吳^二單脹溺少。溫通頗適。常用大鹹沙九一錢二分。八服

某 食下腹脹。舌黃。當治脾陽。

生白朮 廣皮 一錢 茯苓 三錢 厚朴 一錢

臨證指南醫案 卷三 腫脹

木瓜 五分 淡附子 七分

徐^三攻痞變成單脹。脾陽傷極。難治之症。

生白朮 熟附子 茯苓 厚朴 生乾姜

錢 食入腹脹。已五十日。且痛必有形。攻動頭中微痛。夫

痞滿屬氣。痛因氣滯。二便既通。其滯未必在乎腸胃。從

太陰脾陽傷。以辛溫開泄主之。

桂枝 生白芍 淡乾姜 厚樸

又 照方去白芍。加生益智仁。茯苓

楊^五十飲酒聚濕。太陰脾陽受傷。單腹脹。是濁陰之氣。纏

結。不宜通。二便不爽。治以健陽運濕。

生薑木 草菓 附子 廣皮

厚朴 茯苓 葶藶 猪苓

吳三四食下腹脹便澀不爽肢木不仁此脾陽困頓不能默運使然溫通中陽為主

白木 三錢 附子 一錢 炮姜 一錢 桂枝木 一錢

茯苓 三錢 葶藶 一錢

僧四俗語云膏梁無厭發瘡疽淡泊不堪生腫脹今素有腕痛氣逆嘔吐漸起腫脹乃太陰脾臟之陽受傷不可

鼓動運行陰土宜溫佐以制木治

生於木 茯苓 廣皮 椒目

臨證指南醫案 卷三 腫脹 空

四朴 益智仁 良姜

某六七脈弦脹滿不運便澀不爽皆溫通脾陽

草菓仁 錢 茯苓皮 三錢 大腹皮 三錢 廣皮 一錢

青皮 一錢 厚朴 半錢 木猪苓 半錢 椒目 五分

吳空熱傷中腹微滿舌白用治中法

人參 益智 廣皮 茯苓

澤瀉 金斛 木瓜

周五久嗽四年後失血乃久積勞傷酒肉不忌濕鬱脾陽

為脹問小溲僅通大便仍澀濁陰乘陽午後夜分尤劇

生於木 熟附子

陳五積勞脾陽傷食下脹足腫

生白木 茯苓 熟附子 草菓仁

厚朴 廣皮

某躬耕南畝曝於烈日漬於水土暑濕內蒸為瀉痢邪去正傷臨晚附腫腹滿乃脾陽已困清氣不司運行濁陰漸爾編摻內經病機諸濕腫滿皆屬於脾

生白木 草菓 茯苓 厚朴

附子 澤瀉

鄒九深秋霍亂轉筋必有暴冷傷及脾胃病機一十九條

河間皆謂熱亦屬偏見愈瀉愈脹豈是實症夫酒客之

臨證指南醫案 卷三 腫脹 空

濕皆脾胃陽微不運致濕邪凝聚氣壅成脹見脹滿微投攻下不究致病之因故曰難調之症

生白木 草菓 熟附子 厚朴

廣皮 茯苓

陳四苦寒多用胃陽久傷右脇痛嘔酸濁皆濁陰上干用辛甘溫中補虛痛減病人述早上腹寬暮夜氣緊微硬大便不爽有單腹脹之憂

人參 生白木 茯苓 肉桂

歸身 益智 廣皮 煨姜

趙五胸腹脹滿久病痰多

生白木二兩 茯苓二兩 厚朴一兩 肉桂五錢 姜汁九

本草云厚朴與白朮能治虛脹。倣潔古枳朮之意也。

佐茯苓通胃腸。肉桂入血絡。則病邪可却矣。

楊 脈沉小弦。中年已後。陽氣不足。痰飲水寒。皆令逆趨。

致運納失和。漸有脹滿浮腫。法以辛溫宣通。以本病屬

脾胃耳。

人參一錢 茯苓三錢 白芍一錢 淡附子一錢 姜汁三分

倪二 腹裏膨。便不爽。腑腸不行。

生益智 茯苓 生穀芽 廣皮

砂仁殼 厚朴

臨證指南醫案 卷三 腫脹

又 六腑不通。爽。凡濁味食物宜忌。

雞肫皮 麥芽 山查 砂仁 陳香椽

又 脈沉小緩。早食難化。晚食夜脹。大便不爽。此腑腸久

傷。不可流行。必以溫藥。疎通。忌食閉氣粘葷。

生白朮 附子 厚朴 草菓

茯苓 廣皮白 板榔汁

浦四 腎氣湯。五苓散。一攝少陰。一通太陽。濁泄溺通。腹滿

日減。不為錯悞。但虛寒脹病。而用溫補。古人調劑。必

是通法。蓋通陽則濁陰不聚。守稍恐中焦易鈍。喻氏謂

能變胃。而不受胃變。苟非純剛之藥。曷勝其任。議於暮

夜服玉壺丹五分晨進

人參 半夏 姜汁 茯苓

枳實 乾姜

陳六 老人脾腎陽衰。午後暮夜。陰氣用事。食納不進。膠腸

臌脹。時泄。治法初宜剛劑。俾陰濁不解。陽乃復辟。

人參一錢 淡附子一錢 淡乾姜八分 茯苓三錢

炒兔絲三錢 胡蘆巴一錢

此治陽明之陽也。若參入白朮甘草。則兼走太陰矣。

某七 腫脹由足入腹。診脈細軟。不能運穀。腎治少陰太陰。

生白朮 厚朴 茯苓 淡附子

臨證指南醫案 卷三 腫脹

馬三 暮食不化。黎明瘦泄。乃內傷脾脹之症。脾腎之陽積

弱。據理常用腎氣丸。

顧四 脈微而遲。色衰萎黃。蟹為介屬。鹹寒沉降。凡陽氣不

足者。食之損陽。其致病之由。自試二次矣。久利久泄。古

云無不傷腎。今浮腫漸起自下。是水失火而敗。若非煖

下。徒見泄瀉有紅。為脾胃濕熱。必致中滿敗壞。

生茅朮 熟地炭 熟附子 淡乾姜

茯苓 車前

某 脾腎虛寒多瀉。由秋冬不愈。春木已動。勢必尅土。腹

滿。小便不利。乃腫病之根。若不益火生土。日吃疲藥。焉能却病。

人參 白朮 附子 生益智

兔絲子 茯苓

姚四據說情懷不適。因噴怒痰嗽有血。視中年形瘁肉消。

漸漸腹脹跗腫。下午漸甚。陽氣日奪。早服腎氣丸三錢。

晝服五苓散。

殷氏行動氣墜於下。卧着氣擁於上。此跗腫晝甚。頭脹夜

甚。總是中年陽微。最有腹大喘急之事。濟生丸十服

某 陽微陰結。腫脹。

臨證指南醫案 卷三 腫脹 齋

附子 苡仁 白朮 木防已

澤瀉 細辛

朱 陽明胃逆。厥陰來犯。丹溪謂上升之氣。白肝而出。清

金開氣。亦有制木之功能。而痛脹稍緩。議以溫胆加黃

連方。

半夏 茯苓 橘紅 枳實

竹茹 川芎 白芍

某八舌微黃。腹逆。脫胸悉脹。當和肝胃。

桂枝木 乾姜 青皮 吳萸

川棟子 炒半夏

秦 兩年初秋發。湯脈絡氣血不為流行。而腹滿重。墜卧

則頗安。臍左動氣。卧則尤甚。吐冷沫。常覺冷氣。身麻語

塞。肝風日熾。踈泄失職。經以肝病吐涎沫。木侮土位。自

多腹脹。丹溪云。自覺冷者非真冷也。兩次潰瘍之後。剛

燥熱藥。似難進。商議以宣通肝胃為治。有年久。蒸貴乎

平淡矣。

雲茯苓 三角胡麻 搗碎滾水洗 厚橘紅

嫩鈎藤 熟半夏 炒黃一 白旋覆花 一錢

瀉清服一杯 四帖

又 接服大半夏湯

臨證指南醫案 卷三 腫脹 齋

熟半夏 炒二錢 雲苓 小塊 姜汁 調服 人參 同煎

方九 診脈百至。右緩瀉。左弦勁。始而腸鳴泄氣。由漸腹滿

脹。納食幾廢。便難滿少。此皆情懷少曠。清氣不轉。肝

木侵侮胃土。腑陽窒塞。脹滿日甚。據云。先因胃脘心下

痛症。氣鬱顯然。非旦晚圖功之象。議河間分消法。

杏仁 厚朴 海金沙 陳香櫞

鬱金 萊菔子 木通 雞腕皮

王七 食入不運。脘中脹。病自怙。經年不愈。視色黃形

瘦。按脈小而清。喜涼飲。欲惡熱。大便未通。調九竅不

和皆胃病矣。

川連 雞肫皮 枳實 廣皮

桔梗 瓜蒌實 半夏 萊菔子

鬱金 杏仁 姜汁竹瀝丸

楊十 肝鬱乘胃為脹。經年內結有形。用緩消一法。

生芎木 雞肫皮 川連 生厚朴

淡姜渣 針砂製 椒目湯法丸

畢 濕熱由腑滯及腸中。大便不爽。食入不適。平昔肝木

易動厥陰不主踈泄。少腹形脹。無非滯氣之壅。久則凝

痰日點。小溫中丸三錢十服

程三 脉右弦而黃。腹滿。按之漉漉有聲。每大便先腹痛。便

臨證指南醫案 卷三 腫脹 癸

不能乾爽。此胃氣不降。陽氣自滯。由于嗔怒不息。肝木

橫逆。踈泄失司。腹脹之殊。皆由于此。議泄肝通膈。濁宣

脹減之義。

杏仁 紫厚朴 猪苓 鬱金

椒目 檳榔汁 接服小溫中丸

某七 不飢不運。少腹胃脘悉滿。診脉左弦。乃肝木犯胃。二

腑不主流行。濁陰漸次瀰漫。他日單脹之作。竟有難以

杜患者。速速戒惱怒。安閑自在。誠治斯疾之良圖

小溫中丸一錢五分開水送下

夏 夏四月。脾胃主氣。嗔怒佛鬱無不動肝。肝木侮土而

脾胃受傷。鬱久氣不轉舒。聚而為熱。乃壯火害氣。宜平

減食。脹脹矣。當作木土之鬱。調治。桂附助熱。黃地滋滯。

鬱熱益深。是速增其病矣。

鈎藤 丹皮 黑山梔 川連 青皮子

紫厚朴 萊菔子 山皮白 薄荷梗

又 脹勢已緩。脉來弦實。此濕熱猶未盡去。必淡泊食物。

清肅胃口。以清滲利水之劑。服五六日再議。

猪苓 澤瀉 通草 海金沙

金銀花 茯苓皮 黑穉豆皮

又 診脉浮中沉來去不為流利。氣阻濕鬱。膠痰內着。議

臨證指南醫案 卷三 腫脹 癸

用控涎丹六分緩攻

又 服控涎丹。大便通而不爽。診右脉弦實。目黃舌燥。中

焦濕熱不行。因久病神倦。不敢過攻。議用丹溪小溫中

丸。每服二錢。乃泄肝通胃。以緩治其脹

謝 形神勞煩。陽傷。腑氣不通。疝瘕陰濁。從厥陰乘犯陽

明。胃為陰濁蒙閉。腸中氣窒。日甚。年前邪勢頗緩。宜絡

可效。今閉錮全是濁陰。石非辛雄剛劑。何以直突重圍。

脹滿日增。人力難施矣。

生炮川烏頭 生淡川附子 淡乾姜 淡吳茱

川棟子 小茴香 猪胆汁

唐氏 紫苑 杏仁 通草 鬱金 黑山梔

又三焦不通。腕痺腹脹。便皆秘前方用開手太陰肺。

苦辛潤降。小溲得利。兼運小溫中丸泄肝平胃。脹勢什

減有五。但間日寒熱復來。必是內鬱之氣。陽不條達。多

寒戰慄。議用四逆散和。其小溫中丸仍用。

生白芍 枳實 柴胡 黃芩

半夏 杏仁 竹茹 生姜

張 腹脹腹脹。大便不爽。得煖氣稍快。乃陽氣不主流行。

蓋六腑屬陽。以通為補。若木地氣來升。土中最畏木乘。

勢猖熾。治當泄木安土。用丹溪小溫中丸。每服三錢。

臨證指南醫案 卷三 腫脹 究

肝犯胃 陽虛 張氏 用鎮肝逆理胃虛方法。脉形小弱。吐涎沫甚多。仍不

納穀。周身寒涼。四肢微冷。皆胃中無陽。濁上僭踞。而為

臏脹。所謂食不得入。是無火也。

人參 吳茱 乾姜 附子

川連 茯苓

丁三 噴怒。氣血逆亂。右脇不和。夜食噎噎。腹脹。乃肝胃病。

治以解鬱。宣通氣血。

鈎藤 丹皮 桑葉 生香附

茯苓 神麴 降香末 炒黑查肉

徐 平素肝氣不和。脇肋少腹脹。氣血不調。痰飲漸聚。

厥陰陽明同治。

桃仁 延胡 歸尾 小茴 香附

半夏 茯苓 橘紅 神麴

馬三 脉實。久病痰熱在血。胸不爽。小腹隆。能食不渴。二便

濇少。兩進苦辛宣腑。病未能却。此屬血病。用通幽法。

桃仁 郁李仁 歸尾 小茴 紅花

製大黃 桂枝 川棟子

又 晝日氣墜少腹。夜臥不覺。其則頭昏胸悶。今年五月。

初用疎滯。繼通三焦。續進通幽。其墜脹仍若。議辛香流

氣法。

臨證指南醫案 卷三 腫脹 究

川棟子 延胡 小茴 黑山梔

青木香 橘核 生香附磨汁法丸

董 初因下血轉痢。繼而大便秘艱。自左脇下有形。漸致

脹大堅滿。小便自利。病在血分。久病兩年。形瘦氣短。不

敢峻攻。若五積成例。議用古禹餘糧丸。每日一錢。

鄭氏 得食腹痛。上及心胸。下攻少腹。甚至筋脹。擾於周身。

經絡之間。大便欲解不通。暢此乃腸胃氣阻。故痛隨利

減。神保丸一錢。

張 脉左弦。右浮滑。始因脫痛。貫脇。繼則腹大高。五納食

減少。難運。二便艱滯不爽。此乃有年。操持繁慮。太甚。肝

木拂鬱脾土自困清濁混淆脹勢乃成蓋臟真口滿腑陽不運考古治脹名家必以通陽為務若滋陰柔藥微加桂附凝陰洩濁豈是良法議用局方禹糧丸緩其水臟攻其穢濁俟有小效兼進通陽剛補是為虛症內傷脹滿治法至於攻瀉劫奪都為有形而設與無形氣傷之症不同也局方禹餘糧丸

陳 久鬱傷及脾胃之陽向無華色納粥欲嘔大便暗泄氣陷則跗腫氣呆則腕悶有中滿之憂用治中法

人參 生益智 煨姜 茯苓

木瓜 炒廣皮

臨證指南醫案

卷三

腫脹

主

和來昇 肝脾不和 脈數惡心腕脹

炒半夏 廣皮 藜香黃連一分煎水拌

茯苓 鬱金

又 暑傷脾胃則肝木犯土左腹膨泄瀉

人參 厚朴 廣皮 炒澤瀉

茯苓 木瓜 炙草 炒查肉

又 人參 炒柴胡 炒白芍 炒黃芩

茯苓 炙草 生姜 大棗

宋 食入脘脹此屬胃病視色蒼形瘦自述飲酒嘔吐面得又述耳鳴肉膈是木火犯中鬱勃病甚議用逍遙減

白木合左金方

朱 瘰癧馬刀都是肝胆為病病久延及脾胃腹滿便瀉舌黃微渴非溫補可服泄木火以疎之和脾胃以調之冀其脹勢稍減

吳萸拌川連 生於朮 川棟子 炒山查

黑山梔 厚朴 青皮 椒目

唐 女 氣厥三年近日跌仆嘔吐因驚氣火更逆胸臆填塞脹滿二便皆通自非質滯喜涼飲而起痺厥從病能篇驟脹屬熱

川連 淡黃芩 半夏 枳實

臨證指南醫案

卷三

腫脹

主

肝脾不和 胃陽虛 有濕

顏 今年風木加臨太陰陽明不及遂為臌脹小便不利兩附皆腫大便濇滯治在腑陽用分消湯方

生於朮 茯苓 澤瀉 猪苓

厚朴 椒目 海金沙湯煎

吳 金歲厥陰司天加臨驚蟄節病腹滿喘促肢腫而浮寒熱汗出皆木乘土位清陽不得舒展濁氣痞塞僭踞故泄氣少寬姑擬通腑以泄瀉

生於朮 茯苓 椒目 紫厚朴

澤瀉 淡薑渣

朱九鬱勃久坐中焦不運寒熱小溲不通腹膨脹滿脈小
而瀉全是腑陽失司與泄木通腑分消法

四苓加椒目厚朴大腹皮青皮

肝脾不和
和清陽
痺結

陳 壯盛年歲形消色奪診脈右小促左小弦勁病起上
年秋季腕中卒痛有形梗突病後陡遇驚觸漸次食減
不適食入不運停留上脘腹形脹滿甚則脇肋皆脹四

肢不煖暮夜漸溫大便旬日始通便後必帶血出清早
未食自按臍上氣海有瘕形甚小按之微痛身動飲水
寂然無踪天氣稍冷爪甲色紫細推病屬肝脾氣血不
通則為鬱過久則陽微痺結上下不行有若否卦之義

臨證指南醫案

卷三 腫脹

主

閱醫藥或消或補總不見效者未知通陽之與耳

薤白 桂枝 瓜蒌仁 生姜

半夏 茯苓

又 薤白汁 桂枝木 瓜蒌實 川棟子皮

半夏 茯苓 歸鬚 桃仁

延胡 姜汁 二汁法丸

某 脹滿對腫小溲短瀉不利便泄不爽當開太陽為主

五苓散加椒目

某 少腹單脹二便通利稍舒顯是腑陽空痺濁陰凝結

所致前法專治脾陽宜乎不應當開太陽為要

濕滯
滯小溲
不行當
開太陽

五苓散加椒目

鄭 兩投通裏療法痛脹頗減無如陰陽不分古條煩渴

不欲納穀想太陽膀胱不開陽明胃不司闕法當仍與
通陽腑為要但五苓桂木斷不適用議用甘露飲意

猪苓 茯苓 澤瀉 寒水石

椒目 炒橘核

程 今年長夏久熱熱勝陽氣外泄水穀運遲濕自內起

漸漸浮腫從下及上至於喘咳不能臥息都是濁水凝

痰阻遏肺氣下降之司但小溲不利太陽氣亦不通調

此雖陽虛症若腎氣湯中奠地之酸膩力難下行矣

臨證指南醫案

卷三 腫脹

主

茯苓 桂枝木 杏仁 生白芍

乾姜 五味 生牡蠣 澤瀉

馬 初起胸痺嘔吐入夏對臍少腹悉腫食穀不運溲短

不利此陽氣式微水穀之濕內蘊致升降之機失司當

開太陽姑走濕邪

猪苓 三錢 桂枝木 八分 茯苓皮 三錢 澤瀉 一錢

防己 一錢 厚朴 一錢 四帖

耶 六齡穉年夏至濕熱外薄所食水穀之氣蒸為濕滯

阻遏氣機脾不轉運水道不通腹筋滿脹幼科但知消

導不曉通腑泄濕致脾氣大困泄瀉不分陰陽參苓之

補僅收消滌之害不能却除濕滯故雖受無益於病病根都在中宮泄肝以安胃分利以通腑必得小溲頻利冀有中欬之機

猪苓 澤瀉 海金沙 通草 椒目

吳平昔濕痰阻氣為喘茲因過食停滯陰臟之陽不運陽腑之氣不通二便不爽耐腫腹滿診脉沉弦猶是水

寒痰滯阻遏氣分上下皆不通調當從三焦分治項見案頭一方用兔絲子升少陰吳茱萸泄厥陰不知作何解釋不敢附和仍用河間分消定議

大杏仁 萊菔子 猪苓 澤瀉 苧薏子

臨證指南醫案 卷三 腫脹 毒

厚朴 桑白皮 廣皮 細木通

又三焦分消泄肝通腑二便不爽如昔診脉浮小帶促聞聲呼吸不利是氣分在上結阻以致中下不通喘脹要旨開鬼門以取汗潔淨腑以利尿無非宣通表裡務在治病源頭據脉症參詳急急開上為法合金匱風水反登義矣

麻黃 杏仁 石膏 甘草 苡仁

朱初因面腫邪干陽位氣壅不通二便皆少桂附不應即與導滯滯屬有質濕熱無形入肺為喘乘脾為脹六腑開合皆廢便不通爽濁短渾濁時或點瀉視其舌苔

口渴腑病背脹臟病腹滿更兼倚倒左右腫脹隨着處為甚其濕熱布散三焦明眼難以決勝矣經云從上之下者治其上又云從上之下而其於下者必先治其上而後治其下此症逆亂紛更全無頭緒皆不辨有形無形之誤姑以清肅上焦為先

飛滑石 一錢 大杏仁 十粒 生苡仁 三錢

白通草 一錢 鮮枇杷葉 刷淨毛去筋手 茯苓皮 三錢

淡豆豉 一錢 黑山梔殼 一錢 急火煎五分服

此手太陰肺經藥也肺氣窒塞當降不降杏仁微苦則能降滑石甘涼滲濕解熱苡仁通草淡而滲氣分

臨證指南醫案 卷三 腫脹 毒

枇杷葉辛涼能開肺氣茯苓用皮謂諸皮皆涼梔殼宣其陳腐鬱結凡此氣味俱薄為上焦藥儼齊之才輕可去實之義

某暴腫氣急小溲清少此外邪壅肺氣分不通治當從風水皮水宜其經隧以能食能寢為佳勿得誅伐無過之地

前胡 蜜炙麻黃 牛蒡子 姜皮

紫苑 杏仁 茯苓皮 廣皮

王脾凡微腫小腿下腫甚乃腑陽不行病甚於募宜辛香通其經腑之鬱

生於朮 炮川烏 北細辛 茯苓

漢防已 川獨活

又 中滿用餘糧丸獲效。得煖下泄濁之力。腹脹已去。而

脾尻足跗肌肉腫浮。夫臟寒生滿病。煖水臟之陽培火

生土是法。究竟陽未全復。四末流行未布。前議幽香通

其下焦經脈。果得腫減。議用加味活絡丹。

炮川烏 乾地龍 乳香 沒藥 北細辛

桂枝木 用油松節三兩酒水各半煎汁法丸

汪 腫自下起。脹及心胸。遍身肌膚赤燥。溺無便滑。濕熱

蓄水橫清經隧。氣機閉塞。呻吟喘急。濕本陰邪。下焦先

臨證指南醫案 卷三 腫脹 五

受。醫用桂附其木。邪蘊化熱。充斥三焦。以致日加凶危

也。

川通草一錢 海金沙五錢 黃柏皮一錢 木猪苓三錢

生赤豆皮一錢 真北細辛一分

又 前法腫消三四。仍以分消。

川白通草 猪苓 海金沙 生赤豆皮

葶藶子 茯苓皮 晚蚕沙

又 間日寒戰發熱。渴飲。此為癰乃病上加病。飲水結聚。

以下痛脹。不敢用湧吐之法。暫與開肺氣壅遏一法。

大杏仁 蜜炒麻黃 石膏

又 濕邪留飲。發紅瘰。胸聚濁痰。消渴未已。用木防已湯。

木防已一錢 石膏三錢 杏仁三錢 苡仁二錢

飛滑石一錢 寒水石一錢 通草煎湯代水

陳 進神芎導水丸二日。所下皆粘膩黃濁形色。余前議

腑氣窒塞。水濕粘滯。濁攻犯肺為痰嗽。水漬脈隧為浮

腫。大凡經脈六腑之病。總以宣通為是。內經云。六腑以

通為補。今醫不分臟腑經絡。必曰參朮是補。豈為明理。

然肢節足跗之濕。出路無由。必鍼刺以決其流。此內外

莫可皆安。戊己丸三錢。用二日後。再進前藥一服。

薛 九腹滿。下至少腹。三陰都已受傷。而周身疥瘡。數年不

臨證指南醫案 卷三 腫脹 五

斷。脈絡中必有濕熱。就腹痛泄瀉。腑腸不通。不獨偏熱

偏寒之治。常用四苓散。

猪苓三錢 茯苓三錢 澤瀉一錢 生於朮一錢 椒目五分

倪 濕熱脚氣。上攻心胸。腕中滿脹。嘔逆。乃濕上甚為熱

化。與苦辛先平在上之滿脹。用瀉心法。

川連 黃芩 枳實 半夏

姜汁 杏仁

湯 囊腫腹脹。此屬滯濕。

茯苓皮 海金沙 白通草 大腹皮 枳

厚朴 廣皮 猪苓 澤瀉

木火入絡

氣逆入絡

陽虛單腹瀉

某三性躁氣有餘便是火肝胆中木火入絡成形為脹便

六溺皆赤喉痛聲嘶痰血肝病過偏犯肺久延為單腹脹

難治 小溫中丸三錢

吳五氣逆腹脹汨汨有聲已屬絡病難除病根

老蘇梗 生香附 厚朴 白蔻仁

土瓜萋 桔梗 枳殼 黑山梔

汪脉右瀉左弱面黃瘦露筋乃積勞憂思傷陽濁陰起

於少腹漸至盤踞中宮甚則妨食嘔吐皆單鼓脹之象

大著調治最難欲驅陰濁急急通陽

乾姜 附子 猪苓 澤瀉 椒目

臨證指南醫案 卷三 腫脹 完

又通太陽之裏驅其濁陰已得脹減嘔緩知身中真陽

向為羣藥大傷議以護陽兼以泄濁法

人參 塊茯苓 生乾姜 淡附子 澤瀉

又陰濁盤踞中土清陽蒙閉腹滿腹脹氣逆腹痛皆陽

氣不得宣通濁陰不能下走擬進白通法

生乾姜 生炮附子 冲猪胆汁

黃八停滯單腹並不渴飲書則便利不爽夜則小溲畧通

此由氣分鬱滯致中焦不運先川大針砂九每服一錢

五分煨其水臟以泄濁

某向有宿痞夏至佈一陰來復連次夢遺遂腹形堅大

二便或通或閉是時右膝腫脹清湯未必非濕熱留阻

經絡所致診脉左小弱右緩大面色青黃鼻準明亮納

食必腹脹愈加四肢惡冷熱自裏升甚則衄血牙宣全

是身中氣血交結固非積聚停水之脹考古入於脹症

以分清氣血為主止痛務在宣通要知攻下皆為通腑

溫補乃護陽以宣通今者單單腹脹當以脾胃為病藪

太陰不運陽明愈鈍議以緩攻一法

川桂枝一錢 熟大黃一錢 生白芍半錢 厚朴一錢

枳實一錢 淡生乾姜一錢 三帖

又診脉細小右微促畏寒甚右脇中氣觸入小腹着即

臨證指南醫案 卷三 腫脹 完

即有形墜者議用局方禹餘糧丸煖水臟以通陽氣

早晚各服一錢流水送八服

又脉入尺弦勝於數元海陽虛是病之本肝失疎泄以

致腹脹是病之標當朝用玉壺丹午用疎肝實脾利水

分清太陽太陰之邪

紫厚朴一錢半 縮砂仁一錢 生於朮一錢 猪苓一錢

茯苓一錢 澤瀉一錢

又脉弦數手足畏冷心中兀兀中氣已虛且服小錢砂

丸每服八十粒開水送二服 以後藥壓之

生於朮 雲茯苓 廣皮 煎湯一小杯後服

又 脉如瀉。凡陽氣動則遺。右脇汨汨有聲。墜入少腹。可知腫脹。非陽道不利。是陰道實。水穀之濕熱不化也。議用牡蠣澤瀉散。

左牡蠣四錢 澤瀉一錢 花粉一錢 川桂枝木五分

茯苓三錢 化氣 紫厚朴一錢 午服

又 脉數實。惡水。午後手足畏冷。陽明中虛。水氣聚而為飲也。以苓桂朮甘湯劫飲。牡蠣澤瀉散止遺逐水。

照前方去花粉加生於朮三錢

又 手足畏冷。不喜飲水。右脇汨汨有聲。下墜少腹。脉雖數而右大左弦。信是陽明中虛。常用人參熟附生薑。溫

臨證指南醫案 卷三 腫脹 全

經補虛之法。但因欲回府調理數日。方中未便加減。且

用前方調治太陽太陰。

生於朮三錢 左牡蠣生四錢 澤瀉炒一錢 雲苓三錢

生益智四分 桂枝木四分 炒厚朴一錢 午後食遠服

朝服小溫中丸五十粒。開水送。仍用三味煎湯。摩之。楊六味過辛酸。脾胃氣傷結聚。食入則脹滿。曾服礞石大

黃丸滯濁。既下不愈。病不在乎腸中。前賢治脹治滿。必

日分消。攻有形不效。自屬氣聚為瘕。踈胃宜清。調脾當暖。此宗前賢立法。

生茅朮 廣皮 丁香皮 黃柏 草豆蔻

川黃連 厚朴 茯苓 澤瀉 水法丸

腫脹證大約腫本乎水。脹由乎氣。腫分陽水陰水。其有因風因濕因氣因熱外來者。為有餘。即為陽水。因於大病後。因脾肺虛弱。不能通調水道。因心火射金。肺不能生腎水。以致小便不利。因腎經陰虧。虛火燦肺。金而漸少。俱用行氣分利之劑。漸至喘急痰盛。小水短赤。釀成腫證。內發者為不足。即為陰水。若脹病之因更多。所脹之位各異。或因濕因鬱因寒。因熱因氣。因血。因痰。因積。因虫。皆可為脹。或在臟在腑。在脉絡。在皮膚。在身之上下。表裡皆能作脹。更或始因於

臨證指南醫案 卷三 腫脹 全

寒久鬱為熱。或始為熱中。未傳寒中。且也。脹不必兼腫。而腫則必兼脹。亦有腫脹同時並至者。其病形變幻不一。其病機之參伍錯綜。更難敘述。故案中諸症。有濕在下者。用分利。有濕在上中下者。用分消。有濕而着裏者。用五苓散。通達膀胱。有濕鬱熱兼者。用半夏瀉心法。苦辛通降。有濕熱氣鬱積者。用雞金散。加減消利。並行有氣血鬱積。夾濕熱之邪。久留而不散者。用小溫中丸。清理相火。健運中州。有濕熱與水寒之氣交橫。氣喘滿少。通身腫脹者。用禹餘糧丸。崇土制水。煖下泄瀉。有寒濕在乎氣分。則用姜附。有寒濕

入於血分。則用桂附。有濕上甚為熱。則用麻杏膏。以
 等味。清肅上焦之氣。有濕下着為痺。則用加味活絡
 等劑。宜通下焦之滯。有藉乎薤白瓜萸者。滑潤氣機
 之痺。結於腹脇也。有藉乎製黃歸尾者。搜逐血沫之
 凝滯於經隧也。有藉乎玉壺控涎神保神芎者。視其
 或輕或重之痰飲水積而驅之也。此皆未損夫臟氣
 而第在腑之上下膜之表裏者也。若有胃陽虛者。參
 苓必進。脾陽衰者。木附必投。更有傷及乎腎者。則又
 需加減八味濟生等丸矣。其他如養陽明之大牛夏
 湯。疎厥陰之逍遙散。蓋由證之牽連而及。是又案中

臨證指南醫案

卷三

腫脹

全

法外之法也。已 姚亦陶

臨證指南醫案目

卷四

積聚

痞

噎膈

噫噎

嘔吐

吐衄

不食

癆瘵

便閉

肺痺

胸痺

哮喘

喘

呃

疝

疝

臨證指南醫案

卷四目



臨證指南醫案卷四

許關李大瞻翰副

苦寒紫 桂天士先生著 錫山鄒錦崑滋九全散

華 旦聖堂

積聚

木犯土 虛中夾

葛 噫怒強食肝木犯土腹痛突如有形緩則泯然無跡

氣下鳴響皆木火餘威乃癥疝之屬攻伐消導必變腹滿以虛中挾滯最難速功近日痛瀉恐延秋痢

丁香 厚朴 茯苓 炒白芍

臨證指南醫案

卷四 積聚

廣皮 煨益智仁

又 下午倦甚暮夜痛發陽微陰濁乃踞用溫通陽明法

人參 吳萸 半夏 姜汁

茯苓 炒白芍

又 照前方去白芍加川棟牡蠣

脾胃虛 氣分結

白 疔瘡邪久留結聚血分成形仲景有緩攻通絡方法可

宗但瘡母必在腸下以少陽厥陰表裡為病今脉弦大

面心黃滯腹大青筋皆露頭脉震動純是脾胃受傷積

聚內起氣分受病痞滿勢成與瘡母和結血分又屬兩

途經年病久正氣已怯觀東垣五積必疎補兩施蓋緩

攻為宜

空於木 雞肫皮 川連 厚朴

新會皮 姜渣 水法丸

氣滯濕 熱腑聚

馬二病後食物失和腸中變化傳導失職氣滯釀濕鬱而

成熱六腑滯濁為之聚昔潔古東垣輩於腸胃宿病每

取丸劑緩攻當做之

川連 蘆薈上炙 雞肫皮不落水去垢 新瓦上炙脆

煨木香 小青皮 萊菔子 南山查

紫厚朴 蒸餅為小丸

濕熱

陳入濕勝脾胃食物不化向有聚積腸腑不通熱氣固鬱

臨證指南醫案

卷四 積聚

當進和中忌口勿勞不致變病

黃芩 枳實 廣皮 萊菔子 白芍

白朮 蒼朮 雞肫皮 水法丸

痰凝脈 絡

吳二右脇有形高發按之無痛此屬癥痞非若氣聚凝痰

難以推求然病久僅阻在脈須佐針刺宣通正在伏天

宜商

真蛤粉 白芥子 瓜蒌皮 黑梔皮

半夏 鬱金 橘紅 姜皮

血絡凝 痺

曹 着而不移是為陰邪聚絡診脉弦緩難以五積肥氣

攻治大旨以辛溫入血絡治之

當歸鬚 延胡 官桂 檳榔 韭白

王三騎射馳驟寒暑勞形皆令陽氣受傷三年來右胸脇

形高微突初病脹痛無形久則形堅似梗是初為氣結

在經久則血傷人絡蓋經絡系於臟腑外廓猶堪勉強

支撐但氣鈍血滯日漸痰痺而延癥瘕怒勞努力氣血

交亂病必旋發故寒溫消剋理氣逐血總之未能講究

絡病工夫考仲景於勞傷血痺諸法其通絡方法每取

重雞迅速飛走諸靈俾飛者升走者降血無凝着氣可

宣通身後積除堅徒入臟腑者有間錄法備參末議

瓊瑤石 廢石 當歸鬚 桃仁 川鬱金

臨證指南醫案

卷四 積聚

川芎 生香附 櫻木香 生牡蠣 夏枯草

用大酒麴末二兩加水稀糊丸無灰酒送三錢

某 伏梁病在絡日後當血凝之慮脈數左大是其徵也

厚朴一錢 青皮八分 當歸一錢 鬱金一錢

益母草三錢 茯苓一錢 澤瀉一錢

某 脈數堅伏梁病在絡宜氣血分消

桃仁三錢 鬱金一錢 羌蔚子一錢 枳實七分

厚朴一錢 茯苓三錢 通草五分

自難經分出積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六

腑所成後巢氏病源另立癥瘕之名以不動者為癥

動者為癥究之亦即難經積聚之意也前賢有云積

聚者就其有膜結聚之處以經脈所過部分屬臟者

為陰陰主靜靜則堅而不移屬腑者為陽陽主動動

則移而不定故是案中又從而悟出云着而不移是

為陰邪聚絡大旨以辛溫入血絡治之蓋陰主靜不

移即主靜之根所以為陰也可容不移之陰邪者自

必無陽動之氣以旋運之而必有陰靜之血以倚伏

之所以必藉體陰用陽之品方能入陰出陽以施其

辛散溫通之力也又云初為氣結在經久則血傷入

絡輒仗蠕動之物鬆透病根是又先生化裁之妙於

臨證指南醫案

卷四 積聚

古人書引伸觸類而得若夫蒼朮之去熱滯芥給之

豁疑痰不過為先生用古處也案中積症第見伏梁

不能盡備然宋時諸賢於五積九積治法載在書籍

者頗多大畧消補兼施并以所惡者攻所喜者誘爾

業醫者自當知之稔也 姚亦陶

痞

痰熱內

宋 前議辛潤下氣以治肺癆。謂上焦不行則下脘不通。

古稱痞悶都屬氣分之鬱也。兩番大便胸次稍舒而未

為全瘳。此豈有形之滯。乃氣鬱必熱。陳腐粘凝膠聚。故

脘腹熱氣下注。隱然微痛。法當用仲景梔子豉湯解其

陳腐鬱熱。暮臥另進白金丸一錢。蓋熱必生痰。氣阻痰

滯。一湯一丸。以有形無形之各異也。

黑山梔 香豉 鬱金 杏仁 桃仁

瓜蒌皮 降香 另付白金丸五錢

臨證指南醫案

卷四 痞

五

孫 寒熱由四末以擾胃。非藥從口入以擾胃。邪熱津液

互膠成痰。氣不展舒。阻痺脘中。治法不但攻病。前議停

藥。欲謬藥氣盡。病自退避。三舍耳。

人參 川連 枳實 半夏

鬱金 石膏 蒲

某 脈不清。神煩倦。中痞惡心。乃熱邪裡結。進瀉心法。

炒半夏 黃芩 黃連 乾姜

枳實 杏仁

劉 熱氣痞結。非因食滯。胃汁消燥。舌乾便難。苦辛開氣

酸苦泄熱。是治法矣。

熱氣化

川連 生薑 人參 枳實

橘紅 烏梅 生白芍

顧 氣閉久。則氣結。不飢不食不大便。

川貝母 白菴仁 鬱金 杏仁

金銀花 菘豆殼

又 氣結必化熱。乃無形之病。故徒補無益。

鮮省頭草 川斛 甜杏仁 川貝母 麻仁

何 三煩勞之人。衛氣少固。霧露雨濕。傷其流行。清肅瘡癘

外調。腕脇反痺。乃經脈為病。無關腑臟。

鈎藤 生白朮 鬱金 白菴仁

臨證指南醫案

卷四 痞

六

桑葉 橘紅

又 氣室執鬱。仍治上可以通痹。

杏仁 鬱金 香附 瓜蒌皮

黑山梔 蘇梗

周 寒熱嘔吐。或至自利。是暑濕熱外因。因噴怒動肝。邪

氣入於厥陰。胸滿腹脹。消渴。議以開痞方法。

瀉心湯去參。甘加枳實白芍。

伊 因驚而得。邪遂入肝。故厥後熱。神識昏狂。視得面青

舌白。微嘔渴飲。胸次按之而痛。此屬痞結。乃在裏之症。

宗仲景以瀉心湯為法。

熱邪入

暑濕伏
和夾食

川連 半夏 乾姜 黃芩

人參 枳實

尤 面垢油亮。目背黃頭脹如束。胸脘痞悶。此暑濕熱氣

內伏因勞倦。正氣泄越而發。既非暴受風寒。發散取汗。

徒傷陽氣。按脈形濡滿。焉是表症。凡傷寒必究六經伏

氣。須明三焦論症。參脈壯年已非有餘之質。當以勞倦

傷伏和例診治

滑石 黃芩 厚朴 醋炒半夏

杏仁 薏仁 竹葉

又 胸痞自利狀如結胸。夫食滯在胃而胸中清氣悉為

臨證指南醫案 卷四 痞 七

濕濁阻遏。與食滯兩途。此清解三焦却邪湯藥。兼進保

和丸消導

淡黃芩 川連 淡乾姜 厚朴 醋炒半夏

鬱金 白蔻仁 滑石 送保和丸三錢

談氏 胸痞不饑熱不止。舌白而渴。此暑邪未盡。仍清氣分

鮮竹茹 淡黃芩 知母 橘紅 鹽水炒

滑石 桔梗 枳殼汁 鬱金汁

某四 惡寒泄瀉。悉減胸脘。仍悶餘暑未盡。胃氣未甦。故耳

大麥仁 佩蘭葉 新會皮 半夏 炒

金斛 茯苓 茯苓

劉 濕熱非苦辛寒不解。雖豐陽氣不足。論體攻病為是。

胸中痞悶。不食。議治在胃。

川連 炒半夏 人參 枳實

姜汁 茯苓 橘紅

耶 脈濡而緩。不饑不食。時令之濕。與水穀相併。氣阻不

行。欲作痞結。但體質陽微。開泄宜輕。

炒半夏 茯苓 杏仁 鬱金

橘紅 白蔻仁

某三 舌白脘痛。嘔惡腹鳴。此濕阻氣分。胃痺成痛。是不通

之象

臨證指南醫案 卷四 痞 八

炒半夏 高良姜 廣藿香 橘紅

烏藥 香附

沈四 精氣內損。是皆臟病。更地甘酸。未為背謬。緣清陽先

傷於上。柔陰之藥。反礙陽氣之旋運。食菽中痞。顯然明

白。病人食姜稍舒者。得辛以助陽之用也。至於黃芪麥

冬棗仁。更蒙上焦。斯為背謬極。議辛甘理陽可效。

桂枝湯去芍加茯苓

注 脈沉中脘不寒。服冷

人參 淡乾姜 炒半夏 川熟附

茯苓 草果仁

朱 ^舉 目垂氣短。腕痞不食。太陰脾陽不運。氣滯痰阻。擬用大半夏湯。	人參 炒半夏 茯苓 伽楠香汁	又 脈微有歇無神。倦欲寐。服大半夏湯。腕痛不安。不耐辛通營液。大虛春節在邇。恐防衰脫。	人參 炒麥冬 北五味	某 舌白腕悶。中焦陽氣不宣。	半夏 草果 厚朴 廣皮	茯苓 藿香梗	張 ^五 胃寒湧涎。中痞。	臨證指南醫案 卷四 痞	泡淡吳萸 乾姜 茯苓 半夏	橘紅 川棟子	平 酒客脾胃陽微。下午陰氣漸漫。腕中微痛。不饑。服苦降重。降辛燥。愈加不適者。清陽再受傷。筋也。宗仲景聖訓。以轉旋胸次之陽為法。蒼桂木甘湯。	某 氣阻腕痺。飲下作痛。當開上焦。	枇杷葉 大杏仁 蘇子 降香汁	白蔻仁 橘紅	張 脈滿腕痞不饑。口乾有痰。當清理上焦。	枇杷葉 杏仁 山梔 香豆豉
--	----------------	---	------------	----------------	-------------	--------	-------------------------	-------------	---------------	--------	--	-------------------	----------------	--------	----------------------	---------------

欝金 瓜蒌皮 加姜汁炒竹茹	陳 ^三 食進頗逸。而胸中未覺清曠。宜辛潤以理氣。分勿以燥藥傷陰。	枇杷葉 大杏仁 橘紅 黑山梔 香豉	欝金 瓜蒌皮 晨服。五劑後。接服桑麻丸。	楊 瘧母用針。是泄肝胆結邪。瘦人瘧熱傷陰。夢遺。五心煩熱。亦近理有諸。繼患腕腕痞悶。不饑。食減。大便不。乃氣滯於上。與前病兩岐。焉得用滋陰凝滯之藥。思必病後飲食無忌。中焦清濁不和所致。	杏仁 土括蕪 桔梗 半夏	臨證指南醫案 卷四 痞	黑山梔 枳實 香附汁	俞 ^女 腕痺身熱。當開氣分。	杏仁 瓜蒌皮 枇杷葉 廣皮	枳殼汁 桔梗	王 ^四 勞傷胃痛。明是陽傷。錯認筋風。釣藥敷貼。更服丸藥。心下堅實。按之痛。舌白煩渴。二便清少。喘急不得進食。從病結論治。	生姜汁 生淡乾姜 泡淡黃芩 枳實	姜汁炒川連 半夏	案中六淫外侵。用仲景瀉心湯。脾胃內傷。用仲景苓
---------------	---	-------------------	----------------------	--	--------------	-------------	------------	---------------------------	---------------	--------	--	------------------	----------	-------------------------

一第1027 冊 續修四庫全書 第 0 頁 反 E 9

姜桂甘法。即遵古賢治痞之以苦為泄。辛甘為散。二法。其於邪傷津液者。用苦辛開泄。而必資酸味。以助之。於上焦不舒者。既有枳桔杏萸開降。而又用枳殼除熱化腐。疎暢清陽之氣。是又從古人有形至無形論內化出妙用。若所用保和化食。白金驅痰。附姜煖中。參苓養胃。生脉斂液。總在臨症視其陰陽虛實。靈機應變耳。姚亦剛

臨證指南醫案

卷四 痞

十一

噎膈反胃

陽結於上
陰衰於下

吳脉小瀆腕中隱痛。嘔惡吞酸。舌絳不多飲。此高年陽氣結於上。陰液衰於下。為關格之漸。當開痞通陽。議治。

川連 人參 姜汁 半夏

枳實汁 竹瀝

盧陰陽逆亂已成。關格議用附子瀉心湯。為上熱下寒

主治

徐七八老人。食入涎湧。吐痰畧能嚥粥。二便艱少。是陽不轉

旋上結。陰枯於下。便難極難調治。勿用腥油。羶味。脉弦

臨證指南醫案

卷四

噎膈反胃

十三

大而搏。議妙香丸

又妙香丸。仍服。每五日服大半夏湯。

毛老年形消。不食不便。氣衝湧涎。乃關格之症。議用進

退黃連湯

川連 淡乾姜 半夏 姜汁

人參 茯苓 附子 生白芍

漢十七旬有年。納食脘脹。大便乾澀。並不渴飲。痰氣凝滯

阻陽久延。關格最怕。

川連 枇杷葉 半夏 姜汁

杏仁 枳殼

杜^六老人積勞久虛因渴飲冷再傷胃陽洞泄復加嘔吐不受湯飲食物上不得入下不得出此為關格難治

人參 半夏 川連 淡乾姜

某 清陽日結腹窄不能納穀陰液漸涸腸失潤大便難

桂枝 川連 半夏 姜汁

杏仁 茯苓

畢^五夏間診視曾說難愈之病然此病乃積勞傷陽年歲未老精神已竭古稱噎膈反胃都因陰枯而陽結也秋分後復診兩脈生氣日索交早咽燥晝日溺少五液皆涸難任剛燥陽藥是病諒非醫藥能愈

臨證指南醫案

卷四

噎膈反胃

七

大半夏湯加黃連姜汁

某 脈寸口搏大按之則滿形瘦氣逆上不納食下不通便老年積勞內傷陽結不行致脫閉陰枯腑乏津營必二便交阻病名關格為難治

人參 枳實 川連 生乾姜

半夏 茯苓

蘇^五向來翻胃原可撐持秋季驟加驚憂厥陽陡升莫制遂廢食不便消渴不已如心熱嘔吐涎沫五味中喜食酸甘肝陰胃汁枯槁殆盡難任燥藥通關胃屬陽上宜涼宜潤肝為剛臟宜柔則和酸甘兩濟其陰

肝陰胃汁枯

烏梅肉 人參 鮮生地 阿膠
麥冬汁 生白芍

某 陽明汁乾成膈
梨汁 柿霜 玉竹 天冬 麥冬
甜杏仁 川貝 生白芍 三角胡麻

王^五三老年血氣漸衰必得數日大便通爽然後脫中納食無阻此胃汁漸枯已少胃氣下行之旨噎症萌矣病乃操持太過身中三陽燔燥燥津所致故藥餌未能全功議用丹溪法

麥冬汁 鮮生地汁 栝子仁汁 甜杏仁汁

臨證指南醫案

卷四

噎膈反胃

十四

黑芝麻汁 杜蘇子汁 松子仁漿

水浸布紙絞汁濾清燉自然膏

馬^六勞心勞力經營向老自衰平日服餌桂附生薑三二十年病食噎不下腸吐出此在上焦之氣不化津液不注於下初病大便艱澀按經云味過辛熱肝陽有餘肺津胃液皆奪為上燥彼嘉言清燥法

麥冬 麻仁 鮮生地 甜水梨

桑葉 石膏 生甘草

某 脈濡左大食入為噎是屬液虧失宜理氣後用潤劑
半夏 雲茯苓 枇杷葉 枳實 竹瀝

液虧

噎膈反胃

肺胃氣不降

程 舌黃微渴痰多咳逆食下欲噎病在肺胃高年姑以輕劑清降

鮮枇杷葉 杏仁 鬱金 瓜蒌皮

山梔 淡香豉

肝鬱氣逆

沈 格拒食物涎沫逆氣自左上升此老年悒鬱所致必使腑通濁泄僅可延年議兩通陽明厥陰之法

半夏 苦杏仁 茯苓 橘紅

竹瀝 姜汁

酒熱傷胃

俞 酒熱傷胃腕中食阻而痛治以苦辛寒

小川連 半夏 香豉 枳實

臨證指南醫案

卷四

噎膈反胃

五

茯苓 姜汁

又 苦辛化燥噎阻不舒而大便不爽治手太陰

鮮枇杷葉 紫苑 蘇子 杏仁

桃仁 鬱金

某 憂思鬱結痰痰阻礙已屬噎塞之象當怡情善調

炒半夏一錢 茯苓五錢 秫米三錢 枳實一錢

姜汁三小匙

楊四 脈弦而小清食入腕痛格拒必吐清涎然後再納視

色蒼眼筋紅黃昔肥今瘦云是鬱怒之傷少火皆變壯

火氣滯痰聚日擁清陽莫展腕管窄隘不能食物噎膈

漸至矣法當苦以降之辛以通之佐以利痰消膈莫以

豆蔻沉香劫津可也

川黃連 杏仁 桔梗 土瓜蒌皮

半夏 橘紅 竹瀝 姜汁

胃陽虛

朱五 未老形衰納穀最少久有心下忽痛暑進湯飲不安近來常吐清水是胃陽日薄噎膈須防議用大半夏湯

補腑為宜

人參 半夏 茯苓 白香梗米

姜汁 河水煎

白六 少食頗安過飽食不肯下間有冷厥涎沫湧吐而出

臨證指南醫案

卷四

噎膈反胃

六

此有年胃陽久餒最多噎膈翻胃之處飲以熱酒腕中

似乎快爽顯然陽微欲結所幸二便仍通濁尚下泄猶

可為安

熟半夏一兩 姜水炒 茯苓二兩 生益智仁一兩 丁香皮五錢

新會皮一兩 淡乾姜一兩 右藥淨末分量用香淡豆豉

一兩洗淨煎汁法九淡姜湯服三錢

呂六 勞倦饑飽皆傷胃陽年及花甲最慮噎膈翻胃此類

飯酒肉重濁之物與病不合

半夏 姜汁 香豉 土瓜蒌皮

杏仁 橘紅

馮六有年陽微酒濕厚味釀痰阻氣遂令胃失下行爲順之旨腕窄不能納物二便如昔病在上中議以苦降辛通佐以養胃用大半夏湯

半夏 人參 茯苓 姜汁

川連 枳實

又胃屬脾陽以通爲補見症腕中空塞納食不易過膈膚淺見識以白苳蔻木香沉香麝香獲速功不知老人日衰愈投泄氣斯冲和再無復振之理故雲岐子九法後賢立辨其非夏季宜用外臺茯苓飲加苳蒲佐以竹瀝姜汁辛滑可矣

臨證指南醫案

卷四

噎膈反胃

七

顧四脉濡緩無力中年胸脇時痛繼以早食晚吐此屬反胃乃胃中無陽濁陰腐壅議做仲景陽明辛熱宣通例

吳萸 半夏 草撥 淡乾姜 茯苓

又辛熱開濁吐減行走勢力卽吐痰水食物陽氣傷也用吳萸理中湯

尤脉緩右關弦知饑惡食食入卽吐肢浮便溏溺少不渴飲此胃陽衰微開合之機已廢老年噎格反胃乃大症也

人參 茯苓 淡附子 淡乾姜

炒粳米 姜汁

又通胃陽法服膈病原無所補祇以老年積勞傷陽之質所服之劑開肺卽是泄氣苓連苦寒劫陽姜汁與乾姜附子並用三焦之陽皆通耳若枳朴仍是泄氣與前義悖矣

人參 茯苓 淡附子 淡乾姜

劉四脉左小弦右濡滿五旬又四陰陽日衰勞煩奔走陽愈傷致清氣欲絕食入腕痛痰涎逆逆皆噎膈反胃見症其飲酒愈甚由正氣先餒非酒能致病

川連 枳實汁 茯苓 半夏

廣皮白 黑山梔 姜汁 竹瀝

臨證指南醫案

卷四

噎膈反胃

法

包六胃脘痞悶噎逆三四日必嘔吐粘膩或黃綠水液此屬反胃六旬有年是亦重病

川連 半夏 枳實 鬱金

竹茹 姜汁

陸脉沉微陽氣大傷陰濁偕踞且食不能暮食周身掣痛背脹病狀著難愈之症

人參 附子 乾姜 茯苓 澤瀉

姚六膈陽不通降濁壅爲反胃累遭病反老年難以恢復自能潛心安養望其悠久而已藥不能愈是病矣

人參 附子 乾姜 公丁香 姜汁和丸

陽表虛
運血

積勞有年陽氣漸衰濁凝痰阻腕中常痛扣成噎膈
便塞之症

桃仁 紅花 延胡 川棟子

半夏 橘紅 鬱金汁 瓜蒌皮

李 兩關脈緩滑食入氣阻吐涎稍通前已吐過痰濁膠

粘此皆久積勞倦陽氣不主旋運為噎膈反胃之症此
病最多反覆必須身心安逸方可却病徒藥無益耳

半夏 姜汁 桃仁 韭白汁

香豉 瓜蒌皮 鬱金

某 胃痛得瘀血去而減兩三年宿病復起食進痞悶怕

臨證指南醫案 卷四 噎膈反胃 九

其清陽結而成膈大意益氣佐通仍兼血絡為治

人參 半夏 茯苓 新會皮 木香

生益智 當歸 桃仁 水法丸服三錢

張三 早食暮吐大便不爽病在中下初因勞傷胃痛痰瘀
有形之阻

半夏 枳實 製大黃 桃仁 韭白汁

經云三陽結謂之膈又云一陽發病其傳為膈仲景

云朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反丹溪謂
噎膈反胃名雖不同病出一體多因氣血兩虛而成

然歷觀噎膈反胃之因實有不同大抵飲食之際氣

忽阻塞飲食原可下咽如有物梗塞之狀者名曰噎

心下格拒饑不能食或食到喉間不能下咽者名曰

膈食下良久復出或隔宿吐出者名曰反胃夫噎膈

一症多因喜怒哀憂恐五志過極或縱情嗜欲或恣

意酒食以致陽氣內結陰血內枯而成治宜調養心

脾以舒結氣填精益血以滋枯燥夫反胃乃胃中無

陽不能容受食物命門火衰不能薰蒸脾土以致飲

食入胃不能運化而為朝食暮吐暮食朝吐治宜益

火之源以消陰翳補土通陽以溫脾胃故先生於噎

膈反胃各為立法以治之其陽結於上陰虧於下而

臨證指南醫案 卷四 噎膈反胃 十

為噎膈者用通陽開痞通補胃腑以及進退黃連附

子瀉心諸法上熱下寒為治其肝陰胃汁枯槁及煩

勞陽亢肺胃津液枯而成噎膈者用酸甘濟陰及潤

燥清燥為主其液虧氣滯及陽衰血瘀而成噎膈者

用理氣逐瘀兼通血絡為主其胃陽虛而為噎膈反

胃及憂鬱痰阻而成者用通補胃腑辛熱開瀾以及

苦降辛通佐以利痰清膈為主其肝鬱氣逆而為噎

膈者兩通厥陰陽明為治其酒熱傷肺胃氣不降

而為噎膈者用輕劑清降及苦辛寒開肺為主而先

生於噎膈反胃治法可謂無遺茲錄張景岳云治噎

膈大法當以脾胃為主其理甚通常宗之又有飲膈熱膈及憂氣恚食寒之膈其主治各載本門茲不復贅初滋丸

是證每因血枯氣衰致此凡香燥消清之藥久在禁內案中雖有一二倣用辛熱而亦必審其為陽微濁踞者其餘或苦辛泄滯而兼潤養或酸甘化液而直滋清或鬱悶於氣分而推揚穀氣或勞傷於血分而宣通瘀濁總以調化機關和潤血脉為主陽氣結於上陰液衰於下二語實為證之確切論也姚亦陶

臨證指南醫案

卷四

噎膈反胃

三

噎噎

王二初用辛通見效多服不應想雨濕泛潮都是濁陰土加致胃陽更困倣仲景胃中虛客氣上逆噎氣不除例

人參 旋覆花 代赭石 半夏

茯苓 乾姜

某 味淡嘔惡噎氣胃虛濁逆

白旋覆花 釘頭代赭 炒黃半夏 姜汁

人參 茯苓

注三壯年飲酒聚濕脾陽受傷已久積勞饑飽亦令傷陽

臨證指南醫案

卷四

噎噎

三

遂食入反出噎氣不爽隔拒在乎中焦總以溫通鎮逆

為例

白旋覆花 釘頭代赭 茯苓 半夏

淡附子 淡乾姜

徐 噎氣不爽食後甚

杏仁 半夏麴 橘紅 厚朴

鬱金 桔梗

陳二多噎胸膈不爽胃陽弱宜薄味

生白朮 茯苓 新會皮 半夏麴

益智仁 厚朴 生薑

脾胃不和

某 嘔氣腹微痛脾胃未和

人參 焦白芍 茯苓 炙甘草

內經止有噫字而無嘔字故經云五氣所病心為噫

又云寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故為噫

夫噫嘔一症或傷寒病後及大病後多有此症蓋以

汗吐下後大邪雖解胃氣弱而不和三焦因之失職

故清無所歸而不升濁無所納而不降是以邪氣留

連嘔酸作飽胸膈不爽而為心下痞鞭噫氣不除乃

胃陽虛而為陰所格阻陽足則充周流動不足則膠

固格阻矣仲景立旋覆代赭湯用人參甘草養正補

臨證指南醫案

卷四

噫嘔

五

虛姜棗以和脾養胃所以安定中州者至矣更以旋

覆花之力旋轉於上使陰中格阻之陽升而上達又

用代赭石之重鎮墜於下使鬱陽留滯之陰降而下

達然後參甘大棗可施其補虛之功而生姜半夏可

奏其開痞之效而前賢治噫嘔一症無出仲景右矣

故先生於胃虛客氣上逆及胃陽虛脾胃不和肺氣

不降而為噫嘔者每宗仲景法加減出入或加杏仁

桔梗以開肺智仁朴木以散滿甘草白芍以和胃應

不應手取愈可謂得仲景心法矣 郭時榮

嘔吐

高四咽阻吞酸痞脹食入嘔吐此肝陽犯胃用苦辛泄降

吳萸 川連 川棟子 杏仁

茯苓 半夏 厚朴

錢三脉細右堅大向有氣衝長夏土旺嘔吐不納食頭脹

腕痺無非厥陽上胃議用苦辛降逆酸苦泄熱不加噴

怒胃和可愈

川連 半夏 姜汁 川棟子皮

烏梅 廣皮白

臨證指南醫案

卷四

嘔吐

五

金三四脉細小而弦風木乘土當春勢張食入不變嘔吐得

小便通少緩治以通陽

炮附子 人參 半夏 吳萸

淡姜 茯苓

又 脈右弦濇陽微陰凝食入則吐胃痛脹甚半月前用

藥得效後反大便欲解不通腑陽不利濁乃上攻先用

玉壺丹七分 四服

蔣三脉沉食入嘔吐忌冷滯食物

吳萸 半夏 姜汁 茯苓

公丁香柄 廣皮白

顧 脈濡弱左脇下久有聚氣納食醱積於胃脘之中兩
三日嘔噎吞酸積物上湧吐出此皆怫怒動肝肝木犯
胃胃中陽傷不能傳及小腸遂變化失司每七八日始
一更衣為胃氣不主下行故也法當溫胃陽制肝逆宿
病糾纏恐多反覆

淡附子 淡乾姜 姜汁 生白芍

淡吳萸 白梗米

朱 胃中不和食入嘔吐怒動而病必先制肝溫胆合左
金為宜去甘草茯苓加姜汁

某 氣自左升腹中膨滿嘔吐涎沫黃水暴咳不已是肝

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 五

氣逆乘過胃犯肺當制肝和胃 安虢丸

某 嘔黑綠苦水顯屬下焦濁和犯胃

人參 川椒 烏梅 茯苓

紫石英 桑螵蛸

沈 食過逾時漾漾湧涎欲吐診脈濡滑以胃虛肝乘宗

仲景旋覆代赭法

旋覆花 代赭石 人參 半夏

茯苓 廣皮

王四 肝病犯胃嘔逆口吐清涎頭暈乳房痛肢麻痺

人參 二兩 茯苓 二兩 桂枝木 七錢 川棟子 一兩

川連 鹽水炒 烏梅 一兩 當歸 一兩 生白芍 一兩
某 冷濕傷胃肝木上侮衝氣欲嘔腹痛

淡吳萸 厚朴 草薢 藿香梗

木瓜 茯苓

毛 因驚肝氣上犯衝逆嘔吐涎陽升至巔為頭痛脈右

弱左弦當從厥陰陽明治

人參 川連 茯苓 川棟

川椒 烏梅 乾姜 生白芍

某 脈弦虛食已漾漾欲吐咽阻中痞有痰

人參 吳萸 茯苓 半夏

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 五

廣皮 姜汁

陸 鼻明湯水下咽嘔吐右脈小欲飲明是勞傷肝乘胃

反 小半夏湯加檀香泥炒白梗米

顏 乾嘔脇痛因惱怒而病是厥陰侵侮陽明脈虛不食

當與通補 大半夏湯加姜汁桂枝南棗

某 肥膩滯胃肝木始得再乘土位致氣逆上壅嘔出久

病至節反劇最屬不宜總是調攝未盡善奈何暫與降

逆平肝安胃一法

降香 蘇子 旋覆花 茯苓

半夏 廣皮 姜汁

范 脇痛入腕。嘔吐黃濁水液。因驚動肝。肝風振起。犯胃。平昔液衰。難用剛燥。議養胃汁。以熄風方。

人參 炒半夏 炒麥冬 茯苓

廣皮白 炒香白粳米

又 六味去萸換芍。加麥冬。阿膠。秋石。

唐氏 動氣肝逆。痰性凝寒。滯胃。卒然大痛。嘔涎。乃逆滯上。攻也。治肝厥以通例。

炒黑川椒 烏梅肉 生乾姜 川桂枝木

人參 白芍

某 積勞傷陽。先已腕痛。引背。昨頻吐微眩。脈弱汗出。胃

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 五

中已虛。肝木來乘。防有呃噎吐蛔。俟仲長食入。則嘔者。

吳茱萸湯主之。

吳茱萸 半夏 茯苓 姜汁 粳米

王四 早上水飲米粥。至晚吐出。不化。知濁陰酉戌升逆。痰

形痛而漸大。九藥吐出不化。胃陽之極矣。兩進平肝理

氣不效。法當辛熱開濁。

吳萸 熟附子 良姜 川棟子

茯苓 苝果

某 肝風犯胃。嘔逆眩暈。苦降酸泄。和陽佐微辛。以通胃。

川連 黃芩 烏梅 白芍

半夏 姜汁

李 厥吐。腹痛氣衝。安胃丸。

王 胃虛少穀。肝來乘尅。嘔吐不能受納。蓋厥厥象也。

人參 川連 附子 黃芩

乾姜 枳實

張氏 勉強攻胎。氣血受傷。而為寒熱。經脈之氣。而為身痛。

乃奇經衝任受病。而陽維脈不用事也。內經以陽維為

病苦寒熱。雜者。一身之剛維也。既非外感。羌藟芩葛三

陽互發。世無是病。又苓梔枳朴之屬。辛散繼以苦寒。未

能中病。胃口屢傷。致湯飲皆噦。出無餘。大便不通。已經

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 五

半月。其吐出形色青綠涎沫。顯然肝風大動。將胃口翻

空。而腸中污水。得風翔如浪決。東西蕩漾矣。熄風鎮胃

固是定理。但危篤若此。明理以遷天卷耳。

淮小麥 百 火麻仁 一 阿膠 二 生地 二

秋石 洋人參 錢 南棗肉 錢

陳氏 未病先有耳鳴眩暈。恰值二之氣交。是冬藏根蒂未

固。春升之氣泄越。無以制伏。更屬產後情氣未復。又自

乳耗血。血去液虧。真陰日損。陽氣不交於陰。變化內風

上巔犯竅。衝逆肆橫。胃掀吐食。及腸為瀉。驚走脈絡。肌

肉皆腫。譬如諸門戶盡撤。遂致暴風飄漾之狀。醫者辛

散苦降重墜。不但病未管理致腸更泄陰愈。煩則震動即厥。由二氣不能自主之義。閱王先生安胃一法。最為卓識。所參拙見。按以兩脈。右手瀼弱。虛象昭然。左脈空大。按之不實。亦非肝氣肝火有餘。皆因氣味過辛散越。致二氣造偏。茲以病因大旨。兼以經義酌方。

人參 茯苓 半夏 白芍

煨姜 炒粳米

周 痛從少腹上衝。為嘔為脹。是厥陰穢濁致患。

韭白根 淡吳萸 小茴香 桂枝木

兩頭尖 茯苓

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 疝

又 炒橘核 炙山甲末 韭白 歸尾

川棟子 延胡 小茴香

徐六 氣衝偏左厥逆欲嘔。嘔盡方適。伏飲在於肝絡。辛以通之。

通之

吳萸 泡淡 半夏 三錢 茯苓塊 三錢 淡乾姜 一錢

代赭石 錢二 旋覆花 錢二

某 脈搏肢冷嘔逆。下痢白積。生冷水寒。請生陽。氣上擡心大痛。乃厥陰濁邪上攻。

吳萸 丁香 藿香 川棟子

木香 廣皮 茯苓

清涎上湧。食物吐出。乃飢飽傷及胃中之陽。禁鮮滯冷滑。經年可安。

半夏 厚朴 生益智 姜汁

生白木 茯苓

宋三 陽微不運。水穀悍氣聚濕。致食入即嘔。周身牽掣不和。乃陽明之脈。不用事也。久延恐致腫脹。苓姜木桂湯。

加厚朴椒目

陸七 食已即吐。病在胃也。用辛以通陽。苦以清降。

半夏 川連 厚朴 茯苓 姜汁

曾四 早食頗受。晚食必胃痛嘔吐。陽氣日微。濁陰聚則有臨證指南醫案 卷四 嘔吐 疝

形。夜痛至曉。陰邪用事。乃劇。

半夏 姜汁 淡乾姜 秦椒

厚朴 茯苓

王 診脈右濡左弦。舌白不飢。瘀血上吐。下瀉。胃陽大傷。藥餌下咽則湧。前醫用大半夏湯。不應。詢知所吐皆係酸水痰沫。議以理陽方法。

人參 茯苓 川椒 乾姜

潘十 食後吐出水液。及不化米粒。二便自通。並不渴飲。五年不愈。且理胃陽。用仲景法。

熟附子 半夏 姜汁 白粳米

熟附子 半夏 姜汁 白粳米

又泄瀉陰劫水飲以安胃腸服四日腹脹吐水已減知陽腑之陽非通不闕再宗仲景法真武湯加人參范脉虛無神聞穀乾嘔汗出振寒此胃陽大虛不必因寒熱而攻邪

人參 茯苓 炒半夏 姜汁

烏梅 陳皮

又脉微細小胃陽大衰以理中兼攝其下

人參 淡熟附子 茯苓 炒白粳米

炒黃淡乾姜

又人參 茯苓 乾姜 煨益智仁

臨證指南醫案

卷四 嘔吐

廣皮 生白芍

金參藥不受皆濁陰在上阻塞氣機幾無法矣勉與白通湯加人尿猪胆汁急進以通陽泄瀉

附子 生淡姜 蔥白 五寸 人尿 猪胆汁

沈九吹笛震動元海病治宜填實下焦但嗜食吐出又便溏不實中無砥柱陰藥下未受益中再受傷矣做補益中宮仍佐鎮逆一法

人參 焦術 炒焦半夏 茯苓

旋覆花 代赭石

吳寒熱邪氣擾中胃陽大傷酸濁上湧吐出脫痛如刺

無非陽衰陰濁上僭致胃氣不得下行高年下元衰微必得釜底煖蒸中宮得以流通擬用仲景附子瀉心湯通陽之中原可泄熱開導煎藥按法用之

人參一錢 熟附子一錢 淡乾姜一錢 三味另煎汁

川連六分 炒半夏一錢 枳實一錢 茯苓三錢

後四味用水一盞滾水一杯煎三十沸和入前三味藥汁服

江脉弦遲湯水不下膈嘔吐涎沫此陽結飲邪阻氣議以辛熱通陽反佐苦寒利膈用瀉心法

人參 附子 乾姜 先煎一杯入姜汁四分

臨證指南醫案

卷四 嘔吐

川連 黃芩 半夏 枳實 滾水煎和入前藥服

孫十食物隨入即吐並不渴飲當年以苦辛得效三載不發今心下常痛如辣大便六七日始通議通膈上用生

姜瀉心湯

生姜汁四分 川連六分 黃芩二錢 炒熟半夏三錢

枳實一錢 人參五分

又問或不吐食物腹中腰脅似乎氣墜自長夏起心痛頭重至今未減思夏熱必兼濕在裏水穀之濕與外來之熱相洽結聚飲邪矣當緩攻之議用控涎丹五分間日一用

某_丁診脉左弦右弱食粥腕中有聲氣衝湧吐此肝木乘胃生陽已薄皆情懷不適所致 大半夏湯

中焦火衰食下不運作酸嘔出

炒黃乾姜錢一 川椒分三 半夏錢一 茯苓塊錢三

炒節藕錢四

黃氏靈樞經云中氣不足溲便為變是崩淋泄瀉皆脾胃欲敗之現症今湯水下嘔少頃傾囊湧出豈非胃陽無有失司納物乎奈何業醫者中懷疑惑但圖疲藥待其自安怕遭毀謗耳此症一投柔藥濁升填塞必致脹滿仲景於陽明滿實致嘔攻下者恐以太陰之脹誤治耳

臨證指南醫案 卷四 嘔吐

今舌微紅微渴皆是津液不肯升揚脾弱不運散積而布世豈有面色如白紙尚不以陽氣為首重也耶

人參 熟於木 炙甘草 炮姜

茯苓 南棗

張嘔吐脹悶虛中氣滯

人參 茯苓 砂仁

某氏脉微肢冷嘔吐清水食不下化帶下脊髀痠與陽氣素虛產後奇脉不因急扶其陽用附子理中湯

附子 人參 生白朮 炮姜 炙草

又暖胃陽以劫水濕帶下自緩 照前方加胡蘆巴

又脉象稍和已得理中之效議用養營法

養營去遠志黃芪五味 卽作丸方

蔡如凡論病先論體質形色脉象以病乃外加於身也夫肌肉柔白屬氣虛外似豐溢裏真大怯蓋陽虛之體為多濕多痰肌踈汗淋唇舌俱白乾嘔胸痞煩渴引飲由乎脾胃之陽傷觸和得借踞於中蓄蓄不解正衰邪熾試以脉之短濇無神論之陽衰和伏顯然况寒涼不能攻熱清和便是傷及胃陽之藥今查不納穀大便漸稀若不急和胃氣無成法可遵所謂肥人之病虛虛其陽參揆一方仍候明眼採擇

臨證指南醫案 卷四 嘔吐

人參 半夏 生於朮 枳實

茯苓 生姜

吳三壯年形偉脉小濡惡聞穢氣食入嘔噦緣陽氣微弱濁陰類聚口鼻受汚濁臭氣先入募原募原是胃絡分布上逆而為嘔吐此病理標者用芳香辟穢扶正氣治本以溫上通陽

藿香 草果 公丁香 茯苓 厚朴 砂仁殼 廣皮 草撥

人參 茯苓 生益智 胡蘆巴

煨木香 煨姜

嘔傷胃
中邪熱
動津

孫 寒鬱化熱營衛氣逆遂與痞腐食入即吐胃中熱灼
當忌進腥油先用加味溫胆湯

鮮竹茹一錢 半夏一錢 金石斛三錢 茯苓一錢

廣皮白一錢 枳實一錢 姜汁一匙

吳 兩番探吐腕痛立止氣固宣暢胃津未能無損風木

來乘外冷裏熱診脈右大並不搏指當少少進穀以養

胃多噫多下泄氣調和中焦為宜

炒竹茹 半夏 川斛 橘紅

黑山梔 香豉

肝腎虛
衝脈氣
曹四 少腹屬肝肝厥必犯陽明胃腑故作痛嘔二年來病

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 三

上逆
人已不知因何起病醫徒見病圖治想肝腎必自內傷

為病久則奇經諸脈交傷經謂衝脈動而諸脈交動也

議溫通柔潤劑從下焦虛損主治

淡從蓉乾一錢 茯苓三錢 當歸二錢 杞子二錢

炒沙苑半錢 肉桂心五分 後加鹿角霜

何 寒熱嘔吐胸中格拒喜煖飲怕涼平昔胃陽最虛熱

邪內結體虛邪實最防痙厥

人參 黃芩 炒半夏 姜汁

川連 枳實

某 舌赤渴嘔不寐不饑陽和上擾治以苦辛進瀉心法

暑傷內
結

淡黃芩 川連 炒半夏 枳實 姜汁

某 鬱熱阻飲痺嘔有年最慮噎膈

半夏 金剛 姜汁 茯苓

毛氏 舊有胃痛腕痺嘔吐之病秋前舉發已得小安近痛

嘔復來身體燥熱宿病未罷而暑熱穢氣上竅侵入三

焦混淆恐內閉變現痙厥

川連 淡黃芩 半夏 姜汁

黑山梔 枳實汁

某 舌黃不渴飲久嗽欲嘔吐前用金匱麥門冬湯養胃

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 三

小效自述背寒口吐清痰暑濕客邪未盡虛體當輔正

醒脾却暑

人參 茯苓 廣皮 半夏 姜汁

肝火刑
金 郭五 知饑能納忽有氣衝涎沫上湧腕中格拒不堪容物

內經謂肝病吐涎沫丹溪云上升之氣自肝而出木火

上凌柔金受尅咳噎日加治以養金制木使土宮無戕

賊之害滋水制火令金騰得清化之權此皆老年積勞

致傷豈攻病可效

蘇子 麥冬 枇杷葉 杏仁 北沙參

桑葉 丹皮 降香 竹瀝

曹五勞倦噴怒嘔吐身熱得汗熱解而氣急不寐不飢仍
是氣分未清先以上焦主治以肺主一身氣化也

杏仁 鬱金 山梔 香豉

橘紅 瓜蒌皮

嘔吐症內經與金匱論之詳矣乃後人但以胃火胃
寒痰食氣滯立論不思胃司納食主乎通降其所以
不降而上逆嘔吐者皆由於肝氣冲逆阻胃之降而
然也故靈樞經脈篇云足厥陰肝所生病者胸滿嘔
逆况五行之生尅木動則必犯土胃病治肝不遠隔
一之治此理淺近易明人乃不能察而好奇之輩反

臨證指南醫案 卷四 嘔吐

誇隔二隔三之治豈不見笑於大方也哉試觀安胃
丸理中安蛔丸所用椒梅及胃虛客氣上逆之旋覆
代赭此皆胃藥乎抑肝藥乎於此可省悟矣今觀先
生之治法以泄肝安胃為綱領用藥以苦辛為主以
酸佐之如肝犯胃而胃陽不衰有火者泄肝則用芍
連棟之苦寒如胃陽衰者稍減苦寒用苦辛酸熱此
其大旨也若肝陰胃汁皆虛肝風擾胃嘔吐者則以
柔劑滋液養胃熄風鎮逆若胃陽虛濁陰上逆者用
辛熱通之微佐苦降若但中陽虛而肝木不甚亢者
端理胃陽或稍佐椒梅若因嘔傷痰鬱化熱劫灼胃

津則用溫胆湯加減若久嘔延及肝腎皆虛衝氣上
逆者用溫通柔潤之補下焦主治若熱邪內結則用
瀉心法若肝火冲逆傷肺則用養金制木滋水制火
總之治胃之法全在溫通虛則必用人參藥味皆屬
和平至於治肝之法藥味銜雜或寒熱互用或苦辛
酸鹹並投蓋因厥陰有相火內寄治法不得不然耳
但觀仲景烏梅丸法槩可知矣案輯六十有餘大半
皆由肝邪為患非先生之卓識安能暢發此理乎哉
華岫雲

臨證指南醫案 卷四 嘔吐

吐衄

王厥陰吐衄寒熱乾嘔心胸痞拒舌黑漫不欲飲極重之症

烏梅肉半錢 桂枝木錢 炒黑川椒四分 白芍一錢

小川連三分 黃芩一錢 生淡乾姜錢

脈右歇舌白渴飲院中痞熱多嘔逆相痰曾吐蛔虫此伏暑濕皆傷氣分邪自禪發神欲昏冒濕邪不運自利粘痰議進瀉心法 半夏瀉心湯

又凡衄虫上下出者皆屬厥陰乘犯陽明內風入胃嘔

臨證指南醫案 卷四 吐衄

吐痰涎濁沫如仲景厥陰篇中先厥後熱同例試論寒熱後全無汗解謂至陰伏邪既深焉能隔越諸經以達陽分閱醫藥方初用治肺胃後用溫胆茯苓飲但和胃治痰與深伏厥陰之邪未達前進瀉心湯苦可去濕辛以通痞仍在上中服後胸中稍舒逾時稍寐寐醒嘔吐濁痰有黃黑之形大凡色帶青黑必係胃底腸中逆湧而出老年衝脈既衰所謂衝脈動則諸脈皆逆自逆嘔吐之時周身牽引直至足心其陰陽踰維不得自固斷斷然矣仲景於半表半裏之邪必用柴芩今上下格拒真以桂枝黃連湯為法泰以厥陰引經為通裡之使俾

衝得緩瀉進通補陽明此為治厥陰章首

淡乾姜 桂枝 川椒 烏梅

川連 細辛 茯苓

又肝鬱外舒理進苦辛佐以酸味者其過剛也飯食

穀則嘔例

人參 茯苓 吳茱 半夏

川連 烏梅

又瘧來得汗陰分之邪已透陽經第痰嘔雖未減青緣

形色亦不至最屬可喜舌心白苔未淨舌邊漸紅而神

倦困憊清和佐以輔正一定成法

臨證指南醫案 卷四 吐衄

人參 半夏 茯苓 枳實汁

乾姜 川連

又食入欲嘔心中溫溫液液痰沫味鹹脊背上下引痛

腎虛水液上泛為涎腎脈不司約束議用真武撤其水

寒之逆一服後接服

人參 半夏 茯苓 桂枝

煨姜 南棗

又別後寒熱三次較之前發減半但身動言語氣衝湧

痰吐逆四肢常冷寒熱汗出時四肢反熱此陽衰胃虛

陰濁上乘以致清氣無以轉舒議以胃中虛客氣上逆

為噫氣嘔吐者可與旋覆代赭湯仍佐通陽以制飲逆
加白芍附子

又 鎮逆方雖小效究是強制之法凡痰飲都是濁陰所
化陽氣不振勢必再熾仲景謂飲邪當以溫藥和之前
方劫胃水以甦陽亦是此意議用理中湯減甘草之守
仍加姜附以通陽并入草菓以醒脾 二服後接用

人參 乾姜 半夏 生白朮

附子 生白芍

土 脉沉弦腹痛嘔吐鼻燥舌絳面帶青晦色夏秋伏暑
發熱非冬月乃慢表禁食胃氣受傷致肝木上干胃土

臨證指南醫案 卷四 吐衄 聖

蛇虫上出遂成重病常有厥逆之慮擬進泄肝和胃得
痛止嘔緩冀有轉機

川椒 川連 烏梅 乾姜

人參 茯苓 生白芍 川棟子

程 大病後胃氣極傷肝木乘土蛔欲透膈脘膈陣痛是
土衰木尅古人以狐惑虫厥都以胃虛少穀為調

安胃丸 人參川椒烏梅湯化送二錢

周 兩脇痛尤甚於左嘔吐蛔虫年前好食生米此飢飽
加以怒勞胃土不和肝木來犯試觀幼穉有食米麥泥
炭者皆裡滯久聚初從濕熱營蒸而得宜和陽宣腑辛

竄通絡濕去熱走腑絡自和

川連 乾姜 桂枝 金鈴子 延胡
蘆薈 白芍 枳實 烏梅丸服三錢

李 身不壯熱二便頗通已非風寒停滯之病因驚動肝
厥氣下泛蛔虫上攻觸痛嘔吐清涎仲景云蛔虫厥都
從驚恐得之 人參安蛔法

又 古人云上升吐衄下降狐惑皆胃虛少穀肝厥厥氣
上干耳既知胃中虛客氣上冲逆犯斯鎮逆安胃方是
遵古治法

人參 代赭石 烏梅肉 川椒

臨證指南醫案 卷四 吐衄 聖

川棟子 茯苓 炒當歸 炒白芍
又 人參 茯苓 煨姜 南棗

桂心 炙草 煨姜 南棗
又 忽然痛再發診脉微細恰值立夏之交正氣不相接
續有復厥之慮

人參 桂枝木 川棟子 炒川椒

生白芍 烏梅肉 川連 細辛

濕熱結 葉七熱氣上閉耳聾身熱神識不清當清心營麻痺

竹葉心 飛滑石 連翹 川貝
石菖蒲根 生菜豆皮

又暑濕熱內蒸吐蛔口渴耳聾

川連四分 半夏一錢 枳實一錢 廣皮日三錢

芎藭一錢 杏仁三錢

又身熱三候不解胃痞入暮譫語耳聾吐蛔此熱結厥陰症勢最險

川連 黃芩 乾姜 枳實

半夏 姜汁 茯苓 芎藭

吐蛔本屬肝胃症因厥陰之邪上逆蛔不能安故從上而出也今所輯方案皆因客邪病而致吐蛔者雖有瀉心湯桂枝黃連湯安胃丸等然皆不離乎仲景

臨證指南醫案 卷四 吐蛔

之烏梅丸法以苦辛酸寒熱並用為治當與嘔吐門同參至於幼穉有吐蛔瀉蛔及諸虫之病治標則有殺虫之方治本則溫補脾胃或佐清疳熱前人各有成法不必重贅 華玉堂

不食

張脈虛緩不食不飢形寒浮腫

人參 生益智 廣皮 半夏麩

茯苓 生白芍 煨姜

楊氏胃傷惡食絡虛風動浮腫先與荷米煎

人參 新會皮 檀香泥 炒粳米 炒荷葉蒂

潘不飢不食假寐驚跳心營熱入胃汁全虧調攝十日可愈

鮮生地 麥冬 知母 竹葉心

臨證指南醫案 卷四 不食

火麻仁 銀花

王熱損胃汁不欲食穀

麥冬 蜜炒知母 地骨皮 川貝母

竹葉心 嘉定花粉 生甘草 甜梨皮

陸一時病後脈弦而勁知飢不納胃氣未和當靜處調養

鮮省頭草 鮮蓮子 茯神 大麥仁

川斛 炒知母

鄭四脈濡無力唇赤舌乾微眩不飢不飽此天暖氣泄而煩勞再傷陽氣夫衛外之陽內應乎胃胃既逆則不納不飢矣

上焦濕熱阻氣

炒麥冬 木瓜 烏梅肉 川斛 大麥仁
風濕氣痺不飢

杏仁 滑石 土薏皮 蓮翹

橘紅 鬱金

翁一夏季溫熱上受首先入肺河間主三焦極是今世醫者初用非發散即消食散則耗氣消則劫胃究竟熱蘊未除而胃汁與肺氣皆索故不飢不食不便上脘似格似阻酸濁之氣皆是熱化病延多日苦寒難以驟進先擬開提上焦氣分

蘇子 杏仁 土瓜薏皮 枇杷葉

臨證指南醫案 卷四 不食

黃芩 降香

有胃氣則生無胃氣則死此百病之大綱也故諸病若能食者勢雖重而尚可挽救不能食者勢雖輕而必致延劇此理亦人所易曉也然有當禁食與不當禁食之兩途如傷寒之邪傳入陽明之腑胃有燥熱昏譫者有乾霍亂之上下不通或正值吐瀉之際或癰痧未達於表或瘟疫之邪客於募原或瘧邪交戰之時或初感六淫之邪發熱脘悶邪氣充塞瀰漫嘔惡痞脹不飢或傷食惡食等症此雖禁其穀食可也其餘一切諸症不食者當辨其胃陽虛胃陰虛或濕

熱阻氣或命門火衰其他散見諸門者甚多要知此症淡飲淡粥人皆惡之或辛或酸人所喜也或其人素好之物亦可酌而投之以醒胃氣惟酸膩甜濁不可進至於案中治法一覽可盡茲不重贅 華玉堂

腸痺

肺氣不

張 食進脘中難下大便氣塞不爽腸中收痛此為腸痺

大杏仁 枇杷葉 川鬱金 土瓜蔓皮

山梔 香豉

夏十食下腹脹旬日得一更衣腸胃皆腑以通為用丹溪

每治腸痺必開肺氣謂表裡相應治法

杏仁 紫苑 冬葵子 桑葉 土瓜蔓皮

又 腸痺開肺不效用更衣九三錢

吳 身重不能轉移尻髀板着必得撫摩少安大便不通

臨證指南醫案

卷四

腸痺

聖

、 澀短少不饑少飲此時序濕邪蒸鬱化熱阻於氣分

經胸氣隧皆阻病名濕痺

木防己錢 杏仁二錢 川桂枝錢 石膏三錢

桑葉一錢 丹皮一錢

又 舌白不渴不饑大便經旬不解皮膚麻痒腹中鳴動

皆風濕化熱阻遏氣分諸經脈絡皆閉昔丹溪謂腸痺

宜開肺氣以宣通以氣通則濕熱自走做此論治

杏仁 瓜蔓皮 鬱金 枳殼汁

山梔 香豉 紫苑

沈二濕結在氣二腸之痺丹溪辨治在肺肺氣化則便自

通

紫苑 杏仁 枇杷葉 土瓜蔓皮

鬱金 山梔皮 枳殼汁 桔梗汁

蔣三肺痺鼻淵胸滿目痛便阻用辛潤自上宣下法

紫苑 杏仁 瓜蔓皮 山梔

香豉 白菴仁

董 高年瘧後內傷食物腑氣阻滯胸腹腹痛二便至今

不通診脈右部弦搏渴思冷飲昔丹溪大小腸氣閉於

下每每開提肺竅內經謂肺主一身氣化天氣降斯雲

霧清而諸竅皆為通利若必以消食辛溫恐胃口再傷

臨證指南醫案

卷四

腸痺

聖

滋擾變症聖人以真氣不可破泄老年當遵守

紫苑 杏仁 瓜蔓皮 鬱金

山梔 香豉

又 舌赤咽乾陽明津衰但痰多不饑不食小澀不爽太

便尚秘做古人以九竅不利咸推胃中不和論治

炒半夏 竹茹 枳實 花粉

橘紅 姜汁

葉女 二便不通此腸痺當治在肺

紫苑 杏仁 蔓皮 鬱金

黑山梔 桔梗 又威喜丸

某 瘧瘧肺病未經清理致熱邪透入營中遂有痧血暴下今診舌白不渴不能納食大便九日不通乃氣痺為結宗丹溪上竅閉則下竅不出矣

杏仁 枇杷葉 瓜蒌皮 川鬱金

香豉 苡仁

又 用手太陰藥即思納穀陽明氣痺無疑

紫苑 杏仁 枇杷葉 瓜蒌皮

鬱金 黑山梔

腸痺本與便閉同類今另分一門者欲人知腑病治臍下病治上之法也蓋腸痺之便閉較之燥屎堅結

臨證指南醫案 卷四 腸痺 男

欲便不通者稍緩故先生但開降上焦肺氣上竅開泄下竅自通矣若燥屎堅閉則有則三承氣潤腸丸通幽湯及溫脾湯之類主之然余謂便閉之症傷寒門中當急下之條無幾餘皆感六淫之邪病後而成者為多斯時胃氣未復元氣已虛若遽用下藥於理難進莫若外治之法為穩用蜜煎導法設不通或虛者間二三日再導余見有漸導漸去燥糞五六枚或七八枚直至二旬以外第七次導去六十餘枚而愈者此所謂下不嫌遲也學者不可忽諸 華玉堂

便閉

大便閉 藥二陽氣鬱勃腑失傳導納食中痞大便結燥調理少進酒肉堅凝以宣通腸胃中鬱熱可效

川連 蘆薈 萊菔子 炒山楂 廣皮

川棟子 山梔 厚朴 姜汁 青皮

又 熱鬱氣阻三焦通法

杏仁 鬱金 厚朴 廣皮白

蘆薈 川棟子

李四診脈如前服鹹苦入陰大便仍秘瀉針刺一次病無

臨證指南醫案 卷四 便閉 手

增減可謂沉痾之疾夫病着深遠平素飲酒厚味釀濕聚熱漬筋燉骨既已經年不投區區湯液焉能通逐議以大苦寒堅陰燥濕方法參入酒醴引導亦同氣相求之至理

黃柏 茅朮 生大黃 乾地龍 金毛狗脊

川連 葶藶 晚蚕沙 川山甲 漢防已

仙露脾 海金沙 川獨活 北細辛 油松節

白茄根 黃酒燒酒各半浸七日

吳 脈右如昨左畧小動肝屈震動裏氣大燥更議鎮重

苦滑以通火腑逾六時便通瀉行亦肝喜疎泄之一助

大便不通

濕熱小腸痺

更衣丸一錢五分

江 脾宜升則健胃宜降則和蓋太陰之上得陽始運陽

明陽土得陰自安以脾喜剛燥胃喜柔潤仲景急下存

津治在胃也東垣大升陽氣治在脾也今能食不運醫

家悉指脾弱是病但診脈較諸冬春盛大兼茲據經論

病獨大獨小斯為病脈脾臟屬陰胃腑屬陽脈見弦大

非臟陰見病之象久病少瘵猶勉強支撐兼以大便窒

塞泄氣不爽坐談片刻噯氣頻頻平素痔瘡腸紅未向

安適此脈症全是胃氣不降腸中不通腑失傳導變化

之司古人云九竅不和都屬胃病六腑為病以通為補

臨證指南醫案

卷四

便閉

五

經年調攝不越參朮桂附而毫之應效不必再進湯藥

議做丹溪小溫中丸服至七日俾三陰三陽一週再議

治之義 小溫中丸二兩一錢

朱 足麻僂廢大熱陰傷內鬱大便不通由懷抱不舒病

加先用滋腎丸四錢鹽湯下四服

某 芫朮守中漸生滿脹小便少大便窒腸氣亦滯病久

延虛補湯難進議以每日開水送半硫丸一錢五分以

通經腑之陽

吳 有年二氣自虛長夏大氣發泄肝風熄張見症類中

投劑以來諸恙皆減所嫌旬日猶未更衣仍是老人風

秘閱古人書以半硫丸為首方今當採取用之

半硫丸一錢開水送 三服

陳 用苦藥反十四日不大便腸中陽氣窒閉氣結聚成

形非硝黃攻堅半硫丸一錢二分

又 陽氣窒閉濁陰凝滯成氏稱為陰結口甜夜脹清濁

未分每日用來復丹一錢五分

廿五 脈左微弱右弦前議入夜反胃脘痛是濁陰上攻據

說食粥不化早食至晚吐出仍是不變之形火土不生

不可腐熟溫藥一定至理第氣攻膈中究瀉不得寒必

腸間屈曲隱處無以旋轉機關風動則鳴議用半硫丸

臨證指南醫案

卷四

便閉

五

周 減食過半糞堅若彈丸脾胃病從勞傷治

當歸 麻仁 栝子仁 肉蓯蓉 松子肉

某 液耗胃弱火升便難三才加麥冬茯神川斛

天冬 地黃 人參 麥冬

茯神 川斛

潘 肝血腎液久傷陽不潛伏頻年不愈傷延胃腑由陰

干及乎陽越人且畏凡肝體剛腎虛燥問大便五六日

更衣小溲時間淋漓尤非呆滯補瀉所宜

炒杞子 沙苑 天冬 桂酒并白芍

茯苓 猪脊筋

又 精血損傷。五液必燥。問六七日更衣。以潤劑瀉下。用後有遺精。而陽乘巔頂。法當潛陽固陰。

龜甲心 生地 阿膠 鎖陽 川石斛

顧 陽明脉大。環跳尻骨筋掣而痛。痛甚足筋皆縮。大便燥艱常秘。此老年血枯。內燥風生。由春升上。借下失滋。養昔喻氏上燥治肺。下燥治肝。蓋肝風木橫。胃土必衰。陽明諸脉。不主束筋骨。流利機關也。用微鹹微苦以入陰方法。

鮮生地八錢 阿膠三錢 天冬一錢 人中白一錢

川斛二錢 寒水石一錢

臨證指南醫案 卷四 便閉 五

又 鹹苦治下入陰。病樣已減。當暮春萬花開放。陽氣全升於上。內風亦屬陽化。其下焦脂液。悉受陽風引。吸燥病之來。實基乎此。高年生。既少和陽。必用陰藥。與血攻其病者有間矣。

生地三錢 阿膠二錢 天冬一錢 麥冬一錢

栝子霜二錢 松子仁二錢

虎潛丸去瑣陽加鹹菴菴猪脊筋丸

包 陽升風秘

栝子仁 當歸 紅花 桃仁

郁李仁 牛膝

吳 液耗便艱。進辛甘法。

杞子 栝子仁 歸身 茯神

沙苑 炒山查

某 飢飽勞碌。中州受傷。中脘痛。兩脇脹。噯泄氣寬。靜則安。大便艱。

栝子仁 歸鬚 菠菜 韭菜

五靈脂 桃仁 丹皮

某 高年下焦陰弱。六腑之氣不利。多痛不得大便。乃幽門之病。面白脉小。不可峻攻。擬五仁潤燥。以代通幽。是王道之治。

臨證指南醫案 卷四 便閉 五

火麻仁 郁李仁 栝子仁 松子仁

桃仁 當歸 白芍 牛膝

李 脉小弱。形瘦。腸風已久。年來食少便難。得噯噫泄氣。自覺爽澤。夫六府通即為補。做東垣通幽意。

當歸 桃仁 紅花 郁李仁 冬葵子

栝子霜 蘆管 松子肉 水熬膏服五錢

金 湯飲下咽。噯噫不已。不飢不食。大便乾堅。若彈丸。大凡受納飲食。全在胃口。已經胃逆為病。加以噯怒。其肝木之氣。貫膈犯胃。斯病加劇。况平昔常似有形骨梗。脉得左部弦實。血鬱血結。其肖進商辛潤方法。

桃仁 冬葵子 皂莢核 郁李仁
大黃 降香 鬱金

李 據云兩次服辛溫藥。痰濁隨溢出口。此必熱痰在肝。胃絡間故。腕脇痞脹。大便阻塞不通。蘆薈苦寒。通其陰。僅僅更衣。究竟未能却痰。攻病有年。久恙。自當緩攻。湯藥。蠱滌。理難於用。議以桃仁承氣湯為九。

某 舌白身熱。溺不利。
某 左脉弦數。溺短而痛。導赤散加丹皮赤苓。

杏仁 一錢 桔梗 一錢 滑石 三錢 通草 一錢
連翹 一錢 蘆根 一兩

臨證指南醫案 卷四 便閉 五

汪 秋暑穢濁。由吸而入。寒熱如瘧。上咳痰。下洞泄。三焦皆熱。氣不化。則小便不通。擬芳香辟穢。分利滲熱。必要小溲通為主。

藿香板 厚朴 檀香汁 廣皮 木瓜
猪苓 茯苓 澤瀉 六一散

又 昨進分消方。熱勢畧減。小便畧通。所有濕熱穢濁。混處三焦。非臆說矣。其陰莖囊腫。是濕熱甚而下墜入腑。與方書莖腫。欬症有間。議河間法。

飛滑石 石膏 寒水石 大杏仁
厚朴 猪苓 澤瀉 絲瓜葉

又 川連 淡黃芩 生白芍 枳實
六一散 廣皮白 生穀芽
陳 暑熱不得解散。壅腫瘰閉。宜通六腑。已現瘰厥。非輕冰症。

防已 茯苓皮 猪苓 通草
海金沙 苡仁

又 經腑壅熱不通。治在氣分。三焦之病何疑。
滑石 石膏 寒水石 猪苓

澤瀉 蚕沙湯煎藥
又 定三焦分消

臨證指南醫案 卷四 便閉 五

葶藶 杏仁 厚朴 大腹皮
猪苓 澤瀉 海金沙煎湯

陳 昨用五苓通勝。脫見效。治從氣分。繼而亂治。洩瀉不通。發洩。急當通陽。

生乾姜 燉黑川附子 調入猪胆汁
孔 六膏梁形體充盛。壯年不覺。釀積既久。濕熱滯滯。致小

湯火腑。失其變化。傳導之司。一便閉阻。日盛。右脇瘰阻。作疾。當以苦藥通調。必臻小效。

蘆薈 川棟子 郁李仁 炒桃仁
當歸鬚 紅花 夜服小溫中丸二錢

濕熱小腸

高 多鬱多怒。諸氣皆痺。腸胃不司流通。攻觸有形。乃肝

胆厥逆之氣。木必犯土。嘔咳惡心。致納食日減。勉進水

穀。小腸屈曲。不司變化。為二便不爽。所謂不足之中而

兼有餘。醫勿妄視。丹溪小溫中丸。每服二錢五分。

邵三氣攻腹脇咽腕。得洩瀉洩氣乃安。此病由飢飽失和。

小腸屈曲之處。不為轉旋運行。二便皆致不爽。當用丹

溪小溫中丸。

濕熱肺

金 濕熱在經。醫不對症。遂令一身氣阻。邪勢散漫。壅腫

赤塊。初因濕熱為泄瀉。今則竅閉。致二便不通。但理肺

氣。即可宣通。葦葶湯去瓜瓣。加滑石通草。西瓜翠衣。

臨證指南醫案 卷四 便閉 五

許 暑濕熱皆氣分先病。肺先受傷。氣少司降。致二便癢

閉。此滋血之燥無效。今雖小安。宜生津清養胃陰。

麥冬 知母 甜杏仁 白沙參 三角胡麻

濕熱

顧四 腹滿堅實。足跗脛痛腫。二便皆不通利。因濕熱壅其

腑氣也。此非中虛。當以宣通為法。

黃芩 黃連 厚朴 枳實

青皮 荀子 丹皮 山梔皮

某 少腹脹痛。二便皆秘。 玉壺丹

李三 能食知味。食已逾時乃脹。小便不利。氣墜愈不肯出。

大便四日一通。治在小腸火腑。先用滋腎丸。每早服

三錢淡鹽湯送

某 腹中脹滿。當通火腑。更衣丸一錢六分

某 脈動數。舌乾白。不欲飲水。交夏臍下左右攻痛。服米

飲痛緩。逾時復痛。六七日大便不通。小溲甚少。部位在

小腸。屈曲有阻。乃痛未便。驟認重病。凡六腑宜通。通則

不痛。以更衣丸二錢。當通火腑之壅結。一服

王 日來便難。溺瀉。是下焦幽門氣鈍。血燥。議東垣通幽

意。

鹹菴蓉一兩 細生地二錢 當歸半錢 卯杏仁二錢

栢子霜半錢 牛膝二錢

臨證指南醫案 卷四 便閉 五

張九 少腹微脹。小便通利。方安。大便三四日一通。而燥堅

殊甚。下焦諸病。須推肝腎。腑絡必究。幽門二腸。閱所服

藥。是香砂六君。以治脾。不思腎。惡燥。

當歸 菴蓉 郁李仁 冬菴子 牛膝

小茴 茯苓 車前 蜜丸

張六 脈左弦如刃。六旬又六。真陰衰。五液涸。小溲血水。點

滴不爽。少腹右脇聚液。此屬癰閉。非若少壯瀉火通利

可效。

栢子霜 小茴 鹿角霜 茯苓

當歸 菴蓉

馬六脈實。病久。痰熱在血。胸不寒。小腹墜。能食不渴。二便

清少。兩進苦辛宣肺。病未能却。此屬血病。用通幽法。

桃仁 紅花 郁李仁 製大黃

歸鬚 小茴 桂枝木 川楝子

薛 大小便不爽。古人每以通絡。兼入奇經。六旬有年。又

屬久病。進疎氣。開腑無效。議兩通下焦氣血方。

川芎 醋炒 當歸 醋炒 生大黃 肉桂 三錢

川棟子 醋炒 青皮 一兩 蓬木 錢五 三稜 錢五

五靈脂 醋炒 炒黑查肉 小香附 醋炒

右為末。用青蔥白去根搗爛。畧加清水。淋濾清汁。泛

臨證指南醫案 卷四 便閉 五

為丸。每日進食時服三錢。用紅棗五枚。生艾葉三分

煎湯一杯服藥。

王 遠行勞動。肝腎氣乏。不司約束。肛門痛墜。若是瘍症。

初起必然寒熱。排毒藥味。苦辛寒燥。下焦陰陽再傷。二

便皆滿。此為癰閉。背寒。煩渴。少腹滿脹。議通厥陰。

老韭根 穿山甲 兩頭尖 川棟子

歸鬚 小茴 橘紅 乳香

又 驅濁泄肝。僅僅泄氣。二便仍不得通。倣東垣治上善

夫瘖閉意。滋腎丸三錢。三服。

又 氣鬱腸中。二便交阻。清理腸胃壅熱。

川連 黃柏 川棟子 吳萸 黑山梔

青皮 通草五錢。海金沙五錢。煎湯代水。

又 苦辛已效。當約其製。

川連 黑山梔 丹皮 川棟子 吳萸

海金沙 飛滑石

按便閉症。當與腸痙。淋濁。門兼察。其大便不通。有血

液枯燥者。則用養血潤燥。若血燥風生。則用辛甘熄

風。或鹹苦入陰。故三才五仁。通幽虎潛等法。所必用

者也。若血液燥。則氣亦滯。致氣血結。痙。又當於養陰

潤燥中。加行氣活血之品。若火腑秘結。宜苦滑重錢

臨證指南醫案 卷四 便閉 六

者。用更衣丸以通之。若老人陽衰風閉。用半硫丸溫

潤以通之。腑陽不行。則用玉壺丹。陽空陰凝。清濁混

淆。痞脹。用來復丹。若鬱熱阻氣。則用苦寒泄熱。辛以

開鬱。或用三焦通法。若濕熱傷氣。阻遏經腑。則理肺

氣以開降之。此治大便秘之閉也。小便閉者。若小腸火

結。則用導赤。濕壅三焦。則用河間分清。膀胱氣化失

司。則用五苓。若濕鬱熱伏。致小腸痙。用小溫中丸。

清熱燥濕。若腎與膀胱陰分蓄熱。致燥。無陰則陽無

以化。故用滋腎丸。通下焦至陰之熱。閉。以上諸法。前

人雖皆論及。然經案中。逐一分析。發明。不啻如耳提

面命使人得有所遵循矣。至若膏梁麴蘖釀成濕火，潰筋燉骨，用大苦寒堅陰燥濕，仍用酒醴引導，又厥陰熱閉為癘，少腹脹滿，用穢濁氣味之品，直泄厥陰之閉，此皆發前人未發之秘，學者尤當究心焉。大便閉而大便通調者，或係膀胱熱結，或水源不清，濕症居多。若大便閉而小便通調者，或二腸氣滯，或津液不流，燥症居多。若二便俱閉，當先通大便，小溲自利，此其大畧也。至若胃腑邪熱化燥便堅，太陽熱邪傳入膀胱之腑癘秘，又當於仲景傷寒門下法中，承氣五苓等方酌而用之，斯無遺義矣。華岫雲

臨證指南醫案

卷四

便閉

空

人便燥結，本有承氣湯更逐等丸下之，鑿用猪胆蜜煎潤之，可謂無遺蘊矣。然竟有效不效者，蓋因燥糞未嘗不至肛門，奈肛門如錢大燥糞如拳大，縱使竭力努掙而終不肯出，下既不得出，則上不能食而告危矣。余友教人先以胆汁或蜜煎導之，俟糞既至肛門，令病者親手以中指染油，探入肛門內，將燥糞漸漸挖碎而出，中指須要有指甲者為妙。竟有大便一次燥糞挖作百餘塊而出者，據云此法輾轉授人，已救四五十人矣。若患此證者，切勿嫌穢而棄之。

肺痺

上焦氣分燥熱

某 肺氣痺阻，面浮胸痞，寒熱，葶藶湯

某 肺痺，則則喘急，痛咳兩脇，舌色白，二便少，葶藶湯

曹 二清邪在上，必用輕清氣藥，如苦寒治中，下上結更閉。

堯鈴 牛蒡子 桔梗 生甘草

杏仁 射干 麻黃

某 經熱津消，欬痰痺痛。

桂枝 桑枝 木防己 生石膏

杏仁 苡仁 花粉

臨證指南醫案

卷四

肺痺

空

又 渴飲欬甚，大便不聚，餘熱壅於氣分。

紫苑 通草 石膏 花粉

木防己 苡仁 杏仁

陸 偏冷偏熱，肺氣不和，則上焦不肅，用微苦辛以宣通。

薄荷梗 桑葉 象貝 杏仁

沙參 黑山梔

某女 溫邪形寒，腕痺，肺氣不通，治以苦辛。

杏仁 瓜蒌皮 鬱金 山梔

蘇梗 香豉

曹氏 肺痺，右肢麻，脇痛，咳逆喘急，不得卧，二便不利，胸中

諸脈得之憂愁思慮。所以肺臟受病宜開手太陰為治。

紫苑 瓜蒌皮 杏仁 山梔

鬱金汁 枳殼汁

某二 溫邪鬱肺氣痺咳嗽寒熱頭痛開上焦為主

活水蘆根 兩 大杏仁 三錢 連翹 半錢 通草 一錢

桑皮 一錢 桔梗 一錢

某十 腕中稍寒痰枯氣逆腹膨開肺理氣為主

枇杷葉 厚朴 杏仁 滑石

茯苓皮 通草 白蔻仁 苡仁

王 脈搏勁舌乾赤暖氣不展狀如呃忒緣頻吐胃傷諸

臨證指南醫案 卷四 肺痺 三

經之氣上逆填胸聚腕出入幾逆周行脈痺肌肉着席

而痛轉加平昔辛香燥藥不受先議治肺經以肺主一

身之氣化耳

枇杷葉汁 杏仁 其煎湯沖桔梗枳實汁

某 天氣下降則清明地氣上升則晦塞上焦不行下脫

不通周身氣機皆阻肺藥頗投謂肺主一身之氣化也

氣舒則開胃進食不必見病治病印定眼目

枇杷葉 杏仁 紫苑 苡仁

桔梗 通草

朱 風濕不解邪結在肺鼻發乾焦喘急腹滿唇音不出

此屬上痺急病之險篤者急急開其閉塞

葶藶大棗合葦葶湯

又 風濕喘急是肺痺險症未及周歲臟腑柔嫩故溫邪

內陷易結前用葦葶湯兩通太陰氣血頗驗仍以輕藥

入肺晝夜豎抱勿令橫卧為要川瀉白散法

桑白皮 地骨皮 苡仁 冬瓜仁

蘆根汁 竹瀝

某 風濕化熱上鬱肺氣咽喉阻寒胸腕不通致伸吟呼

吸不爽上下交阻逆而為厥乃閉塞之症病在上焦幼

科消食發散苦降但表裏之治吐氣仍日久延慢驚莫

臨證指南醫案 卷四 肺痺 四

可救療

蘆根 桑葉 滑石 梨皮

苡仁 通草

李 肺象空懸氣窒聲音不出舌乃心苗熱灼則舌本不

展以唇口肺微之病乃辛熱酒毒之痺主以輕揚為治

乃無質之病

羚羊角 連翹心 竹葉心 野赤豆皮

川貝母 金銀花 又暮服威靈丸二錢

唐 脈小瀉失血嘔逆之後腕中痞悶納穀腹脹小便短

赤大便七八日不通此怒勞致氣分逆亂從肺痺主治

鮮枇杷葉 土瓜蔓皮 黑梔皮 鬱金

杏仁 杜蘇子 紫降香 鈎藤

又 更衣丸

肺為呼吸之橐籥。位居最高。受臟腑上朝之清氣。稟清肅之體性。主乎降。又為嬌臟。不耐邪侵。凡六淫之氣。一有所著。即能致病。其性惡寒。惡熱。惡燥。惡濕。最畏火風。邪著則失其清肅。降令遂痺塞。不通矣。今先生立法。因於風者。則用薄荷。桑葉。牛蒡之屬。兼寒則用麻黃。杏仁之類。若溫熱之邪。壅遏而痺者。則有羚羊。射干。連翹。山梔。兜鈴。竹葉。沙參。象貝。因濕則用

臨證指南醫案

卷四

肺痺

奎

通草。滑石。桑皮。苡仁。威喜丸。因燥則梨皮。蘆根。枇杷葉。紫苑。開氣則薑皮。香豉。蘇子。桔梗。葱仁。其葦。葶湯。葶藶大棗湯。一切藥品。總皆主乎輕浮。不用重濁氣味。是所謂微辛以開之。微苦以降之。適有合乎輕清嬌臟之治也。肺主百脈。為病最多。就其配合之臟腑而言。肺與大腸為表裏。又與膀胱通氣化。故二便之通閉。肺實有關係焉。其他如肺痿。肺癰。哮喘。咳嗽。失音。各自分門。茲不重贅。 華岫雲

胸痺

胸痺清 胸不運 浦 中陽困頓。濁陰凝滯。胃痛徹背。午後為甚。即不嗜飲食。亦是陽傷。溫通陽氣。在所必施。

薤白 三錢 半夏 三錢 茯苓 五錢 乾姜 一錢 桂枝 五分

華四 因勞。胸痺。陽傷。清氣不運。仲景每以辛滑微通其陽。

薤白 瓜蒌皮 茯苓 桂枝 生姜

王 曾前附骨板痛。甚至呼吸不通。必搥背稍緩。病來迅速。莫曉其因。議從仲景胸痺症。乃清陽失展。主以辛滑。

薤白 川桂枝尖 半夏 生姜

臨證指南醫案

卷四

胸痺

奎

加白酒一杯同煎

謝 衝氣至腕則痛。散漫高突。氣聚如瘕。由于過勞傷陽。

薤白 桂枝 茯苓 甘草

臨服沖入白酒一小杯

某六 脈弦。胸脘痺痛欲嘔。便結。此清陽失曠。氣機不降。久延怕成噎格。

薤白 三錢 杏仁 三錢 半夏 三錢 姜汁 七分

厚朴 一錢 枳實 五分

徐六 胸痺因怒而致痰氣凝結。

土瓜蔓 半夏 薤白 桂枝

茯苓 生姜

王五氣逆自左升胸院阻痺。僅飲米湯。形質不得下咽。此

屬胸痺。宗仲景法。瓜蒌薤白湯

又脈沉如伏。痞脹格拒。在腕膈上部。病人述氣壅。自左

覺熱。凡木鬱達之火鬱發之患。在上宜吐之。

巴豆霜製一分 川貝母三分 桔梗二分 爲細末服吐

後服凉水即止之

某六肺衛窒痺胸膈痺痛。咳喘痰粘。苦辛開鬱爲主。當戒

腥膻

瓜蒌皮 炒桃仁 冬瓜子 苦桔梗

臨證指南醫案 卷四 胸痺 苓

紫苑 川貝母

華陽氣微弱胸痺。苓桂木甘湯

某二脈弦色鮮明。吞酸胸痺。大便不寒。此痰飲凝滯。清陽

失曠。氣機不利。法當溫通。陽氣爲主。

薤白 杏仁 茯苓 半夏

厚朴 姜汁

某三氣阻胸痛。

鮮枇杷葉 半夏 杏仁 桔梗

橘紅 姜汁

某脈沉短氣珍甚。嘔吐飲食便溏瀉。乃寒濕鬱滯。胸痺

如悶無非清陽少旋。小半夏湯加姜汁

王三始於胸痺。六七年來。發必嘔吐甜水黃濁。七八日後

漸安。自述病發。秋月意謂新涼天降。鬱折生陽。甘味色

黃。都因中焦脾胃主病。做內經辛以勝甘論。

半夏 淡乾姜 杏仁 茯苓

厚朴 草薢 姜汁法丸

某痛久入血絡。胸痺引痛。

炒桃仁 延胡 川楝子 木防已

川桂枝 青葱管

胸痺與胸痞不同。胸痞有暴寒鬱結於胸者。有火鬱

臨證指南醫案 卷四 胸痺 矣

於中者。有寒熱互鬱者。有氣實填胸而痞者。有氣衰

而成虛痞者。亦有脾胃津液枯澀。因燥而痞者。亦有

上焦濕濁瀰漫而痞者。若夫胸痺。則但因胸中陽虛

不運。久而成痺。內經未曾詳言。惟金匱立方。俱用辛

滑溫通。所云寸口脈沉而遲。陽微陰弦。是知但有寒

症。而無熱症矣。先生宗之。加減而治。亦惟流連上焦

清陽爲主。莫與胸痞結胸噎膈痰食等症混治。斯得

之矣。華玉堂

哮

王 受寒哮喘。痰阻氣不能着枕。

川桂枝一錢 茯苓三錢 淡乾姜一錢 五味一錢同

杏仁半錢 炙草四分 白芍一錢 製麻黃五分

十 哮喘當暴涼而發。診脈左大右平。此新邪引動宿邪。

議逐伏邪飲氣 小青龍法

徐 宿哮廿年。沉痾之病。無奏效之藥。起病由於驚憂受

寒。大凡憂必傷肺。寒人背俞。內合肺系。宿邪阻氣。阻痰

病發喘不得臥。譬之宵小。潛伏里閭。若不行動。犯竊難

臨證指南醫案 卷四 哮

以強執。雖治當於病發。投以搜逐。而病去必當養正。今

中年諒無大害。精神日衰。病加劇矣。腎氣去桂膝

病發時。葶塵大棗湯或皂莢丸

陳 哮喘不臥。失血後。胸中畧爽。葶莖湯加葶塵大棗

某 哮喘久咳

桂枝木 杏仁 橘紅 厚朴

炒半夏 炒白芥子

馬 宿哮喘喘頻發 真武丸

朱 宿哮喘喘。遇勞發。小青龍去麻辛加糖炒石骨

鄒 宿哮喘病久。則氣泄汗出。脾胃陽微。痰飲留着。有食

入泛嘔之狀。夏三月熱傷正氣。宜常進四君子湯。以益氣不必攻逐痰飲

人參 茯苓 白朮 炙草

哮喘與喘微有不同。其症之輕重緩急。亦微各有異。蓋

哮喘多有兼喘。而喘有不兼哮喘者。要知喘症之因。若

出外邪壅遏而致者。邪散則喘亦止。後不復發。此喘

症之實者也。若因根本有虧。腎虛氣逆。濁陰上衝。而

喘者。此不過一二月之間。勢必危篤。用藥亦難奏功

此喘症之屬虛者也。若夫哮喘亦由初感外邪。失於

表散。邪伏於裏。留於肺俞。故頻發頻止。淹纏歲月。更

臨證指南醫案 卷四 哮

有痰哮喘。哮喘過食生冷。及幼穉天哮諸症。案雖

未備。閱先生之治法。大概以溫通肺臟。下攝腎真為

主。久發中虛。又必補益中氣。其辛散苦寒。豁痰破氣

之劑。在所不用。此可謂治病必求其本者矣。此症若

得明理。鍼灸之醫。按穴灸治。尤易除根。噫。然則難遇

其人耳。 華玉堂

喘

肺腎水
氣不降

伊 先寒後熱不餓不食。細浮腫喘喘。倪不能仰。仰則不安。古人以先喘後脹治肺。先脹後喘治脾。今山氣分膈。

鬱以致水道阻塞。大便溏泄。仍不爽利。其肺氣不降。二腸交阻。水穀蒸腐之濕。橫趨脈絡。腫由漸加。豈亂醫可效。粗述大畧。與高明論證。

肺位最高。主氣。為手太陰臟。其臟體惡寒惡熱。宜辛則通。微苦則降。若藥氣味重濁。直入中下。非宣肺方。法矣。故手經與足經大異。當世不分手足經混治者。

臨證指南醫案 卷四 喘 辛

特表及之。

麻黃 苒仁 茯苓 杏仁 甘草

某 氣逆咳喘喘促。小青龍去桂枝芍草加杏仁人參

淡乾姜 人參 半夏 五味

茯苓 細辛 單 滄毒內攻。所進水穀不化。蒸變濕邪。漬於經隧之間。不能由腸而下。膀胱不利。濁上塞遏。肺氣不降。喘滿不堪着枕。三焦閉塞。漸不可治。議川中滿分消之法。必得小便通利。可以援救。

臨證指南醫案 卷四

肝升飲 孔上逆 汪 脈弦堅。動怒氣衝。喘急不得臥息。此肝升太過。肺降失職。兩足逆冷。入暮為劇。議用仲景越婢法。

芎藭 苦杏仁 桑皮 厚朴 猪苓

通草 大腹皮 茯苓皮 澤瀉

又 按之左脈。衝氣便喘。背上一線寒冷。宜貫兩足。明是肝逆挾支飲所致。議用金匱旋覆花湯法。

旋覆花 青葱管 新絳 炒半夏

中氣虛

姜 勞煩哮喘。是為氣虛。蓋肺主氣。為出氣之臟。氣出太過。但泄不收。則散越多喘。是喘症之屬虛。故益肺氣藥。皆甘補土母以生子。若上氣散越已久。耳目諸般之阻。

臨證指南醫案 卷四 喘 辛

皆清陽不司轉旋之機。不必續治。人參建中湯去姜。

胃虛

沈 三晨起未食。喘急多痰。此竟夜不食。胃中虛。陽氣交升。中無彈壓。下焦陰傷。已延及胃。難以驟期霍然。

黃精 三角胡麻 炙草 茯苓

腎陽虛 逆

吳 濁飲自夜上干填塞。故陽不旋降。衝逆不得安臥。用仲景真武法。

人參 淡熟附子 生淡乾姜 茯苓塊

腎氣不 納

徐 四色痿痿。陽虛體質。平昔喜進膏粱。上焦易壅。中宮少運。厚味凝聚。蒸痰。拍年咳嗽。但內傷失和。薄味自可。

清肅。醫用皂莢搜攢。肺傷氣泄。噴涕不已。而沉銅膠濁。仍處胸背募俞之間。玉屏風散之固衛。六君子湯之健脾理痰。多是守劑。不令宣通。獨小青龍湯。徹飲以就太陽。初服喘緩。得宣通之意。夫太陽但開。所欠通補陽明一段工夫。不得其闔。暫開復痺矣。且喘病之因。在肺為實。在腎為虛。此病細診色脈。是上實下虛。以致耳聾鳴响。治下之法。壯水源以熄內風為主。而胸次清陽少旋。濁痰阻氣妨食。於卧時繼以清肅上中二焦。小劑守常。調理百日圖功。至於接應世務。自宜節省。勿在藥理中也。

臨證指南醫案

卷四 喘

喘

熟地砂仁製 萸肉 龜甲心 阿膠 牛膝

茯苓 遠志 五味 磁石 秋石

蜜丸早服 卧時另服威喜丸竹瀝姜汁泛丸

張三幼年哮喘已愈。上年夏令。勞倦內傷。致病。誤認外感。亂治。其氣泄越。哮喘音啞。勞倦不復。遂致損怯。夫外感之喘治肺。內傷之喘治腎。以腎主納氣耳。

加減八味丸每服二錢五分鹽湯下 六服

胡六脈沉短氣以息身動即喘。此下元已虛。腎氣不為收攝。痰飲隨地氣而升。有年。陡然中厥最虛。

熟地 淡附子 茯苓 車前

熟地 淡附子 茯苓 車前

遠志 補骨脂
吳氣不歸元。喘急跗腫冷汗。足寒面赤。中焦痞結。先通陽。

熟附子 茯苓 生薑汁 生白芍

王九陰虛喘陰。用鎮攝固納。

熟地 萸肉 阿膠 淡菜膠

山藥 茯苓 湖蓮 芡實

翁四脈細尺垂。形瘦食少。身動即氣促喘急。大凡出氣不。寒而喘為肺病。客感居多。今動則陽化。由于善弱失納。乃吸氣入而為喘。腎病何辭。治法惟以收攝固真。上病

當實下焦。宗腎氣方法意

熟地 萸肉 五味 補骨脂 胡桃肉

牛膝 茯苓 山藥 車前子 蜜丸

沈二陰虛陽升。氣不攝納為喘。

熟地 萸肉 五味 海參膠 淡菜膠

茯苓 山藥 芡實 湖蓮肉 紫胡桃

楊六老年久嗽。身動即喘。晨起喉舌乾燥。夜則溲溺如淋。此腎液已枯。氣散失納。非病也。衰也。故治喘鮮效。便難

乾涸。宗腎惡燥。以辛潤之。

熟地 杞子 牛膝 巴戟肉

熟地 杞子 牛膝 巴戟肉

熟地 杞子 牛膝 巴戟肉

紫衣胡桃 青鹽 補骨脂

陳氏 咳喘則暴身熱汗出乃陰陽樞紐不固惟有收攝固元一法

人參 炙草 五味 紫衣胡桃

熟地 萸肉炭 茯神 炒山藥

又 攝固類應

人參 附子 五味 炙黃芪 白朮

某 瘡癢疥疾致氣喘咳出血痰固是肺蘊熱氣今飲食

二便如常行動喘急與前喘更有分別緣高年下虛腎

少攝納元海不固氣逆上泛是腫脹之萌宜未雨綢繆

臨證指南醫案 卷四 喘 五

六味丸加牛膝車前胡桃

孫 望八大人因冬溫內侵遂致痰嗽暮甚診脈大而動

搏察色形枯汗泄吸音頗促似屬痰阻此乃元海根微

不可藏納神衰嚙語陽從汗出最有昏脫之變古人老

年痰嗽喘症都從脾腎主治今溫邪擾攘上中二焦留

熱雖無溫之理然攝固下真以治根本所謂陽根於陰

豈可不為講究

熟地炭 胡桃肉 牛膝炭 車前子

雲茯苓 青鉛

某 熱熾在心上下不接冲逆陡發遍身麻木喘促昏冒

腎真不固肝風妄動久病湯藥無功誓以玉真丸主之

喘症之因在肺為實。在腎為虛。先生揭此二語為提綱。其分別有四大凡實之寒者必挾凝痰宿飲上干

阻氣如小青龍桂枝杏之屬也。實而熱者不外乎蘊

伏之邪。蒸痰化火有麻杏甘膏。千金葶藶之治也。虛

者有精傷氣脫之分。填精以濃厚之劑。必兼鎮攝腎

氣加沉香都氣入青鉛。從陰從陽之異也。氣脫則根

浮。吸傷元海。危下可立而待。思草木之無情。剛柔所

難濟。則又有人參河車五味石英之屬。急續元真。挽

回頃刻補天之治。古所未及。更有中氣虛餒土不生

臨證指南醫案 卷四 喘 五

全。則用人參建中。案集三十。法凡十九。其層次輕重

之間。絲絲入籠。學者宜深玩而得焉。邵新甫

呃

肺氣鬱

某面冷頰呃。總在咽中不爽。此屬肺氣膈鬱。當開上焦

之痺。蓋心胸背部須藉在上清陽舒展。乃能曠達耳。

枇杷葉 炒川貝 鬱金 射干

陰上逆

王 芎藭。蘇。亮。蘇。陽。呃。逆。服。痛。自。利。先。曾。寒。熱。下。利。加

以勞煩傷陽。高年宜反覆。乃欲脫之象。三焦俱有見症。議從中治。

人參 附子 丁香皮 柿蒂

臨證指南醫案

卷四 呃

茯苓 生乾姜

陳 食傷脾胃復病。嘔吐發呃下利。診兩脈微瀼。是陽氣

欲盡。濁陰衝逆。閱方雖有姜附之理。陽反雜入芪歸。呆

鈍牽制。後方代赭重降。又混表藥。總屬不解。今事危至

急。舍理陽驅陰無別法。

人參 茯苓 丁香 柿蒂

炮附子 乾姜 吳萸

某 脈歇止。汗出呃逆大便溏。此勞倦積傷。胃中虛冷。陰

濁上干。

人參 茯苓 生淡乾姜 炒川椒

炒烏梅肉 釘頭代赭石

黃 脈小舌白。氣逆呃忒。畏寒微戰。胃陽虛。肝木上犯。議

用鎮肝安胃理陽。

人參 代赭石 丁香皮 茯苓

炒半夏 淡乾姜

又 舌白胎厚。胃陽未醒。厥逆濁陰上干為呃。仍用通法。

人參 淡附子 丁香皮 淡乾姜 茯苓

又 照方加姜汁柿蒂

又 人參 炒川椒 附子 茯苓

淡乾姜 炒粳米

臨證指南醫案

卷四 呃

夫

呃逆一症。古無是名。其在內經本謂之噦。因其呃呃

連聲。故今人以呃逆名之。觀內經治噦之法。以草刺

鼻。嚏。嚏而已。無息而疾迎引之。立已。大驚之亦可已。

然歷考呃逆之症。其因不一。有胃中虛冷。陰凝陽滯

而為呃者。當用仲景橘皮湯。生姜半夏湯。有胃虛虛

陽上逆。病深聲噦者。宜用仲景橘皮竹茹湯。有中焦

脾胃虛寒。氣逆為呃者。宜理中湯。加丁香。或溫胃飲

加丁香。有下焦虛寒。陽氣竭而為呃者。正以元陽無

力。易為抑遏。不能暢達而然。宜用景岳歸氣飲。或理

陰煎。加丁香。有食滯而呃者。宜加減二陳。加山查烏

藥之屬。或大和中飲加乾薑木香。凡此諸法。不過舉述其端。其中有宜有不宜。各宜隨症施治。不可以此為不易之法。故先生謂肺氣鬱痺。及陽虛瀉陰。上逆亦能為呃。每以開上焦之痺。及理陽驅陰。從中調治為法。可謂補前人之不逮。丹溪謂呃逆屬于肝腎之陰虛者。其氣必從臍下直衝上出于口。斷續作聲。必由相火炎上。挾其衝氣。乃能逆上為呃。用大補陰丸峻補真陰。承制相火。東垣嘗謂陰火上衝。而吸氣不得入胃。脈反逆。陰中伏陽。即為呃。用滋腎丸以瀉陰中伏熱。一法均為至當。審證參用。高明裁酌可也。

臨證指南醫案

卷四 呃

五

時乘

疸

沈十能食。煩倦。手足汗出。目微黃。常鼻衄。夫熱則消穀。水穀留滯。濕甚生熱。精微不主。四布。故作煩倦。久則痿黃。穀疸。當與猪肚丸。蒼朮。煨白朮。重用苦參。

張三述初病似瘧。乃夏暑先伏。秋涼經受。因不慎食物。胃脘氣滯生熱。內蒸變現黃疸。乃五疸中之穀疸也。滿黃便秘。當宣腑濕熱。但不宜下。恐犯太陰變脹。

綿茵陳 茯苓皮 白蔻仁 枳實皮

杏仁 桔梗 花粉

臨證指南醫案

卷四 疸

全

酒疸

汪三飲酒發黃。自屬濕熱。脈虛。臍腹鳴不和。病後形體瘦減。起居行動皆不久耐。全是陽氣漸薄。兼之思慮勞煩。致損。議兩和脾胃之方。戊己加當歸。柴胡。煨薑。南棗。王右脇高突刺痛。身面發黃。不食不便。熱久聚。恐結

癰瘍

大豆黃卷 木防己 金銀花 生牡蠣

飛滑石 苡仁

張脈沉。濕熱在裏。鬱蒸發黃。中痞惡心。便結溺赤。三焦病也。苦辛寒主之。

杏仁 石膏 半夏 薑汁

山梔 黃柏 枳實汁

黃 一身面目發黃。不飢渴赤。積素勞倦。再感溫濕之氣。候以風寒。發散消導。濕甚生熱。所以致黃。

連翹 山梔 通草 赤小豆
花粉 香豉 煎送保和丸三錢

劉三 心下痛。年餘屢發。痛緩能食。漸漸目黃。溺赤。此絡脉中凝滯。溫熱與水穀之氣交蒸所致。若攻之過急。必變脹滿。此溫燥須忌。議用河間金鈴子散。合無擇穀芽枳實小柴胡湯法。

金鈴子 延胡 枳實 柴胡
臨證指南醫案 卷四 疴 全

半夏 黃芩 黑山梔 穀芽

蔣 由黃疸變為腫脹。濕熱何疑。法亦不為謬。據述些少小丸。諒非河間子和方法。溫下僅攻冷積。不能驅除濕熱。仍議苦辛滲利。每三日兼進瀘川丸六七十粒。

雞肫皮 海金沙 厚朴 大腹皮
猪苓 通草

張三 夏秋疽病。濕熱氣蒸而成。治法必用氣分宣通自效。蓋濕中生熱。外干時令。內蘊水穀不化。黃乃脾胃之色。失治。則為腫脹。今謂治日減。便通利。主腑已通。薄味自可全功。平昔攻苦。思必傷心。鬱必傷脾。久坐必升大過。

降不及不與疽症同例 歸脾丸

楊七 夏熱泄氣。脾液外越為黃。非濕熱之疽。繼而不欲食。便溲。用大牛夏湯。通胃開飲。已得寢食。露降痰血。乃氣洩不收。肅令淺。不必以少壯熱症治。順天之氣。是老年調理法。

人參 炙草 牛扁豆 山藥
茯神 苡仁

黃疸身黃。曰黃濁。黃之謂也。病以濕得之。有陰有陽。在腑在臟。陽黃之作。濕從火化。痰熱在裏。膽熱液泄。與胃之濁氣共併。上不得越。下不得泄。薰蒸遏鬱。侵

臨證指南醫案 卷四 疴 全

於肺則身目俱黃。熱流膀胱。濁色為之變赤。黃如橘。子色。陽主明。治在胃。陰黃之作。濕從寒水。脾陽不能化熱。膽液為濕所阻。漬於脾。浸淫肌肉。溢於皮膚。色如薰黃。陰主晦。治在脾。傷寒發黃。金匱黃疸。立名雖異。治法多同。有辨證三十五條。出治一十二方。先審黃之必發不發。在於小便之利與不利。疸之易治難治。在於口之渴與不渴。再察痰熱入胃之因。或因外併。或因內發。或因食穀。或因酗酒。或因勞色。有隨經蓄血。入水黃汗。上盛者。一身盡熱。下鬱者。小便為難。又有表虛裏虛。熱除作嘔。火劫致黃。知病有不一之

因故治有不齊之法於是脉弦脇痛少陽未能仍至以和湯飲水漿陽明化燥急當瀉熱濕在上以辛散以風勝濕在下以苦泄以淡滲如狂蓄血勢所必攻汗後弱白自宜投補酒客多蘊熱先用清中加之分利後必顧其脾胃女勞有穢濁始以解毒繼之消竅終當峻補腎陰表虛者實衛裏虛者建中入水火劫以及治逆變證各立方論以為後學津梁若云寒濕在裏之治陽明篇中惟見一則不出方論指人以寒濕中求蓋脾本畏木而喜風燥制水而惡寒濕今陰黃一證外不因於六淫內不傷於嗜慾惟寒惟濕管

臨證指南醫案

卷四 疸

全

以卑監之士須暴風日之陽純陰之病療以辛熱無疑矣方雖不出法已顯然故不用多岐恐滋人惑耳今考諸家之說丹溪云不必分五疸總是如金醬相似以為得治黃之扼要殊不知是言也以之混治陽黃雖不中窠不致增劇以之治陰黃下咽則幾何異操刃一言之易遺誤後人惟謙甫羅氏具有卓識力辨陰陽遵傷寒寒濕之指出茵陳四逆湯之治繼往開來活人有術醫雖小道功亦茂焉喻嘉言陰黃一證竟謂仲景方論亡失恍若無所循從不意其註傷寒註金匱辨論數千言而獨於關鍵處明文反為之

蒙昧雖云智者一失亦未免會心之不遠也總之羅氏可稱勤求古訓朱氏失於小成自拙嘉言喻氏病在好發議論而已今觀葉氏黃疸之案寥寥數則而於案中所云夏秋疸病濕熱氣蒸而成其陽黃之治了然於胸中案中又有治黃也而有非黃之論揣其是病必求虛實於是知其是病必辨陰陽如遇陰黃求治於先生者決不以治陽之法治陰而致人長命也苟非師仲景而貌丹溪博覽羣賢之論而不陷於一偏之說者烏能及此名不浮於實堪之得以久行也固宜 蔣式玉

臨證指南醫案

卷四 疸

全

臨證指南醫案目

卷五

風

寒

風溫

溫熱

暑

濕

燥

痰


臨證指南醫案

卷五目

癰痧疹癩

痰

痰飲



臨證指南醫案卷五

古吳葉桂天士先生著

錫山鄒錦昉滋九全較

邵銘新甫

風

某二風傷衛寒熱頭痛腕悶

蘇梗一錢

淡豆豉一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

厚朴一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

某二風邪外襲肺衛畏風發熱咳嗽腕悶當用兩和表裏

臨證指南醫案

卷五 風

淡豆豉一錢

蘇梗一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

江五勞倦過月氣弱加外感頭痛惡風管衛二氣皆怯嗽

則閃爍筋掣而痛大凡先治表後治裡世間未有先投

黃連清裏後用桂枝和表此非醫藥當歸建中湯

沈虛人得感微寒熱參歸桂枝湯加廣皮

經云風為百病之長蓋六氣之中惟風能全兼五氣

如兼寒則風寒兼暑則日暑風兼濕日風濕兼燥日

風燥兼火日風火蓋因風能鼓盪此五氣而傷人故

日百病之長也其餘五氣則不能互相全兼如寒不

能兼暑與火。暑亦不兼寒。濕不兼燥。燥不兼濕。火不兼寒。由此觀之。病之因乎風而起者自多也。然風能兼寒。寒不兼風。何以辨之。如隆冬嚴寒之時。即密室重幃之中。人若裸體而卧。必犯傷寒之病。此本無風氣侵入。乃但傷於寒。而不兼風者也。風能兼寒者。因風中本有寒氣。蓋與爲風。風之性本寒。即巽卦之初爻屬陰是也。因風能流動鼓盪。其用屬陽。是合乎巽之二爻三爻皆陽爻也。如炎歔溽暑之時。若使數人擁一人。其人必致汗孔閉。頭痛惡寒骨節疼等。傷寒之病作矣。斯時天地間。固毫無一些寒氣。實因所揭之風。風中却有寒氣。故令人受之。寒疾頓作。此乃因傷風而兼傷寒者也。故有但傷寒而不傷風之症。亦有因傷風而致兼傷寒之症。又有但傷風而不傷寒之症。有因傷風。而或兼風溫風濕風燥風火等症。更有暑溼燥火四氣各自致傷。而絕不兼風之症。故柯韻伯所註傷寒云。傷風之重者。即屬傷寒。亦有無汗脈緊。骨節疼諸症。此柯氏之書。所以能獨開仲景生面也。至仲景所著傷寒書。本以寒爲主。因風能兼寒。故以風陪說。互相發明耳。學者看書。不可不知此理。若夫臟腑一切內外諸風。各有現症。具載內經。尤當

臨證指南醫案

卷五

二

詳考 華 補 案

臨證指南醫案

卷五

實

客邪外侵頭脹常用平散

蘇梗 杏仁 桔梗 桑皮

橘紅 連翹

寒熱頭痛脫悶

淡豆豉 嫩蘇梗 杏仁 桔梗

厚朴 枳殼

復受寒邪背寒頭痛鼻塞 桂枝湯加杏仁

某九時邪外襲衛痺發熱頭痛先散表邪

臨證指南醫案 卷五 寒 四

淡豆豉 蘇梗 杏仁 厚朴

木防已 茯苓皮

楊四太陽脉行由背抵腰外來風寒先傷陽經雲霧自下

及上經氣逆而病發致嘔痰涎頭痛小溲數行病解勝

脫氣通斯逆者轉順矣當通太陽之裡用五苓散倘外

感病發再議

勞傷陽氣形寒身熱頭疼脫悶身痛

杏仁 三錢 川桂枝 八分 生薑 錢 厚朴 一錢

廣皮 一錢 茯苓皮 錢

傷寒症仲景立法於前諸賢註釋於後先生雖天資

穎敏若擬其治法恐亦不能出仲景範圍其所以異

於庸醫者在乎能辨症耳不以冬溫春溫風溫溫熱

濕溫伏暑內傷勞倦溫疫等症誤認爲傷寒其治溫

熱暑濕諸症專辨邪之在衛在營或傷氣分或傷血

分更專究三焦故能述前人溫邪忌汗濕家忌汗當

用手經之方不必用足經之藥等明訓垂示後人此

乃先生獨擅見長之處也若夫傷寒之書自成無已

註解以後凡註疏者不啻數百家其尤著者如嘉言

三書景岳書傷寒三註四註等篇近有柯韻伯來蘇

集傷寒論翼方翼王晉三古方選註中所解一百十

臨證指南醫案 卷五 寒 五

三方諸家析疑辨義處雖稍有異同然皆或登仲景

之堂或造仲景之室者業醫者當日置案頭潛心參

究庶乎臨症可無誤矣 華岫雲

傷寒一症內經云熱病者皆傷寒之類也又曰凡病

傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲

病暑又曰冬傷於寒春必病溫其症有六經相傳併

病合病兩感直中難經又言傷寒有五有中風有傷

寒有溼溫有熱病有溫病其所苦各不同再加以六

淫之邪有隨時互相兼感而發之病且其一切現症

則又皆有頭痛發熱或有汗無汗或惡風惡寒不食

倦跡煩渴等則又大略相同。故其症愈多。其理愈晦。母怪乎醫者臨症時。不能灼然分辨。即其所讀之書。前人亦竝無至當不易之論。將靈素難經之言。及一切外感之症。逐一分晰辨明。使人有所遵循。故千百年來。欲求一鑿垣之士。察六淫之邪。毫不紊亂者。竟未見其人。幸賴有仲景之書。以六經分症。治以汗吐下和寒溫諸法。故古人云。仲景之法。不但治傷寒。苟能悉明其理。即治一切六氣之病。與諸雜症。皆可融會貫通。無所不宜。此誠屬高論。固深知仲景者也。然余謂六淫之邪。頭緒甚繁。其理甚奧。即彙集河間東垣丹溪。及前賢輩諸法而治之。猶慮未能兼括盡善。若沾沾焉。必欲但拘仲景之法而施治。此乃見聞不廣。膠柱鼓瑟。不知變通者矣。今觀葉氏之書。傷寒之法。固屬無多。然其辨明冬溫春溫。風溫溫熱濕溫之治。實超越前人。以此羽翼仲景。差可嘉惠後學。觀者幸毋忽諸。
華玉堂

臨證指南醫案 卷五 寒 六

風溫

二 近日風溫上受。寸口脈獨大。肺受熱灼。聲出不揚。先與辛涼清上。當薄味調養旬日。

牛蒡子 薄荷 象貝母 杏仁

冬桑葉 大沙參 南花粉 黑山梔皮

楊 脈左實大。頭目如蒙。清竅不爽。此風溫仍在上焦。擬升降法。

乾荷葉 薄荷 象貝 蓮翹

鉤藤 生石膏末

臨證指南醫案 卷五 風溫 七

某 風溫從上而入。風屬陽。溫化熱。上焦近肺。肺氣不得舒轉。則行氣阻。致身痛腕悶。不飢宜微苦以清降。微辛以宣通。醫謂六經。敵投羌防。泄陽氣。劫胃汁。溫邪忌汗。何遠忘之。

杏仁 香豉 鬱金 山梔

瓜蒌皮 蜜炒橘紅

葉 風溫入肺。肺氣不通。熱漸內鬱。如舌苔。頭脹咳嗽。發疹。心中懊惱。腕中痞滿。皆是氣不舒展。邪欲結痼。宜有痰飲不飲飲水。議梔豉合涼膈方法。

山梔皮 豆豉 杏仁 黃芩

瓜蒌皮	枳實汁	郭	風濕入肺氣不肯降形寒內熱胸痞皆膈鬱之象辛涼佐以微苦手太陰主治
黑山梔	香豉	杏仁	桑葉
瓜蒌皮	鬱金	秦	風濕化燥熱
石膏	生甘草	薄荷	桑葉
杏仁	連翹	又	照前方去連翹薄荷加陳萐皮鬱金梔皮
某	風火上壅耳後結核目眶痛	臨證指南醫案	卷五 風濕
薄荷	牛蒡子	前胡	象貝
連翹	黑梔皮	赤芍	生甘草
某	風濕熱伏更劫其陰日輕夜重煩擾不寧	生地	阿膠
		麥冬	白芍
		炙草	蕪荑
馬	風濕熱灼之後津液未復陽明脈絡不旺骨酸背楚治以和補	生黃芪	鮮生地
		北沙參	玉竹
		麥冬	歸身
		蜜丸	
某	陰虛風濕氣從左升桂枝湯加花粉杏仁		

風為天之陽氣濕乃化熱之邪兩陽薰灼先傷上焦種種變幻情狀不外手三陰為病數頭脹汗出身熱咳嗽必然並見當與辛涼輕劑清解為先大忌辛溫消散劫燥清津太陰無肅化之權救逆則有蕪荑蕪根玉竹門冬之類也苦寒沉降損傷胃日陽明頓失循序之司救逆則有復脈建中之類大凡此症驟變則為痲厥緩變則為虛勞其主治之方總以甘藥為要或兼寒或兼溫在人通變可也 郁新甫

臨證指南醫案 卷五 風濕 九

溫熱

溫邪入其脈數甚，頭暈身痛，此屬溫邪。

連翹

煨豆豉

淡黃芩

黑山藥

杏仁

桔梗

某 溫邪化熱，肺燥喘急，消渴胸滿，便秘不食，肺與大腸

見症

淡黃芩

知母

鮮生地

阿膠

天冬

花粉

謝 積勞傷陽，衛氣虛，溫邪上受，內入乎肺，肺主周身之氣

臨證指南醫案

卷五

溫熱

寸

氣壅不化，外寒似厥，其溫邪內鬱，必從熱化，今氣短

刺，病邪在上，大便瀉出稀水，肺與大腸表裏相應，亦

由熱迫下泄耳，用辛涼藥清為極。

杏仁

桔梗

香豉

藕紅

枳殼

薄荷

連翹

茯苓

痰濕吸入溫邪，釀為肺脹危症。

薏根

桃仁

苡仁

冬瓜子

龜 久患虛損，原食安舒，自服陰柔，脈補不但減食不

寐，脫中常悶，渴欲飲涼，此口鼻吸入溫邪，先干於肺，燥

補則邪愈熾，氣機阻滯，弱質不敢開泄，援引輕揚藥土

兼以威喜丸，淡以和氣，上焦得行，可進養胃法。

白沙參

苡仁

天花粉

桑葉

鬱金

兼服威喜丸

溫邪劫

王 溫邪發熱，津傷口糜，氣穢。

捲心竹葉

嘉定花粉

知母

麥冬

金石斛

連翹

某 春溫身熱，六日不解，邪陷劫津，舌絳，骨節痛，以甘寒

熄邪。

竹葉心

知母

花粉

滑石

生甘草

梨皮

臨證指南醫案

卷五

溫熱

十一

熱傷胃

丁 口鼻吸入熱穢，肺先受邪，氣痺，不主宣通，其邪熱由

中及於募原，布散營衛，遂為寒熱，既為邪踞，自然痞悶

不飢，雖邪輕未為深害，留連不已，熱蒸形消，所謂病傷

漸至於損而後已。桂枝白虎湯

又 氣分之熱稍平，日久胃津消之，不飢不欲納食，大忌

香燥破氣之藥，以景岳玉女煎多進可效，忌食辛辣肥

膩自安。竹葉石膏湯加鮮枸杞根皮

楊 伏邪發熱，煩渴，知飢無寐，乃胃津受傷所致，擬進竹

葉石膏湯加花粉

葉 熱傷氣分，用甘寒方。白虎湯加竹葉

某 右脈未和。熱多口渴。若再劫胃汁。怕有脫痞不飢之
事。當清熱生津。仍佐理痰。俟邪減便可再商。

麥冬 人參 石膏 知母

粳米 竹葉 半夏

葉二 仲景云。陰氣先傷。陽氣獨發。不寒。痺熱。令人消燦肌
肉。條例下不註方。但以飲食消息之。後賢謂甘寒生

津。解煩熱是矣。今脈數。舌紫渴飲。氣分熱邪未去。漸次

轉入血分。斯甘寒清氣熱中。必佐存陰。為法中之法。

生地 石膏 生甘草 知母

粳米 白芍 竹葉心

臨證指南醫案 卷五 溫熱 三

毛六 溫邪熱入營中。心熱悶。脇肋痛。平素痰火。與邪膠結。
致米飲下咽皆脹。老年五液已涸。忌汗忌下。

熱入心

生地 麥冬 杏仁 鬱金汁

炒川貝 橘紅

馬 少陰伏邪。津液不騰。喉燥舌黑。不喜飲水。法當清解

血中伏氣。莫使液涸。

犀角 生地 丹皮 竹葉

玄參 連翹

陳 熱入膈中。夜煩無寐。心悸怔。舌絳而乾。不嗜湯飲。乃

營中之熱。治在手經。

犀角 鮮生地 黑玄參 連翹

石菖蒲 妙遠志 天冬 麥冬

竹葉 茯神 金箔

又 陽升風動。治以鹹寒

生地 阿膠 天冬 人參

川斛 茯神 麥冬

熱邪入
心胞

張 營絡熱。心震動。復脈湯去薑桂。參加白芍

陸九 高年熱病。八九日。舌燥煩渴。謔語。邪入心胞絡中。深

怕液涸神昏。當滋清去邪。兼進牛黃丸。驅熱利竅。

臨證指南醫案 卷五 溫熱 三

犀角 鮮生地 連翹心 玄參

胡 脈數。舌赤耳聾。胸悶。素有痰火。近日冬溫。引動宿病。

加以勞復。小溲不利。議治胞絡之熱。

鮮生地 錢五 竹葉心 錢一 丹參 錢一 玄參 錢一

石菖蒲 根 錢六 陳胆星 錢六

顧 溫邪悞表劫津。邪入胞絡內閉。至寶丹

王 吸入溫邪。鼻通肺絡。連傳心胞絡中。震動君主。神明

欲迷瀾漫之邪。攻之不解。清竅既蒙。絡內亦痺。幼科不

解。長以驚痰降火。理氣毫無一効。憶平脈篇。清邪中上。

肺位最高。既入胞絡。氣血交阻。逐穢利竅。須藉芳香。議用局方至寶丹。

施 溫邪如癘。陰氣先傷。苦辛再傷。陽及胃。內風肆橫。肢體癱瘓。邪閉心胞絡中。痰潮神昏。乃熱氣蒸灼。無形無質。此消痰消食清火。竟走腸胃。與病情隔靴搔癢。速速與至寶丹三分。冷開水調服。若得神清。再商治法。

顧 飲酒又能納穀。是內風主乎消燔。當春盡夏初。陽氣弛張。遂致偏中於右。診脈左弦且堅。肌腠隱約斑點。面色光亮而赤。舌胎灰黃。其中必夾伏溫邪。所怕內閉神昏。治法以清絡宣竅。勿以攻風劫痰。扶助溫邪。平定廓。

臨證指南醫案

卷五

溫熱

古

清其帶病久延而已。

犀角

生地

玄參

連翹心

鬱金

小青菜

竹葉心

石膏滌

又 目瞑舌縮。神昏如醉。邪入心胞絡中。心神為家。謂之內閉。前案已經論及。溫邪鬱蒸。乃無形質。而醫藥都是形質氣味。正如隔靴搔癢。近代喻嘉言。謂芳香透穢宣竅。頗為合理。絕症難挽。天機用意。盡人工。

至寶丹 四九勻四服。涼開水調化。

包

老年下虛。春溫上受。痰潮昏謔。舌絳黃苔而赤微瘰。

先清上焦。

天竺黃 金銀花 竹葉心 連翹 竹瀝

張 溫邪自裡而發。喉腫口渴。舌心灰滯。上焦熱蒙。最怕數閉昏瘧。苦寒直降。攻其腸胃。與溫邪上鬱無涉。

連翹 黑梔皮 牛蒡子 杏仁 花粉

馬勃 瓜蒌皮 夏枯草 金汁 銀花露

張 週歲內未得殺味精華。溫邪吸入。上焦先受。頭面頰頰腫浮。邪與氣血混處。刀針破傷。經絡溫邪內閉。熱蘊蔓延。三焦昏寐痰潮。舌刺卷縮。小溲點滴渾濁。熱氣結銅在裏。但膏連琴梔之屬。藥性直降。竟由胃達腸。而熱氣如烟如霧。原非形質。可蕩可掃。故牛黃產自牛腹。原

臨證指南醫案

卷五

溫熱

五

從氣血而成。混處氣血之邪。藉此破其纏結。是得效之因由也。夫溫熱時癘。上行氣分。而漸及於血分。非如傷寒足六經。順傳經絡者。大抵熱氣騰張。必薰蒸經絡內竅。故昏瞶皆裡竅之欲閉。欲宣內閉。須得芳香氣血。久鬱必致揚毒內攻。謹陳大意。未議用紫雪丹三分。微溫開水調服。

褚 溫邪中自口鼻始。而入肺。為咳嗽。繼傳膈中。則咯血。乃心營肺補受邪。然邪在上焦。壅遏阻氣。必聚為熱痰。臭噴渴。是欲內閉。惜不以河間三焦立法。或謂傷寒主六經。或謂肺癰泄氣血。致熱無出路。胸突腹大。危期

至速矣。卽有對病藥餌。氣湧沸騰。勢必湧吐。無餘焉。望有濟。夫溫熱穢濁。填塞內竅。神識昏迷。脹悶欲絕者。須以芳香宣竅。佐牛黃金箔。深入臟絡。以搜錮閉之邪。今危篤若此。百中圖一而已。紫雪丹

陳 溫邪逆傳膈中。熱痰蔽阻空竅。所進寒涼消導。徒攻腸胃。毫無一效。痰乃熱薰津液所化。膈中乃空靈之所。是用藥之最難。至寶丹芳香。通其神明之竅。以驅熱痰之結。極是。但穉年受溫邪。最易陰虧津耗。必兼滋清以理。久伏溫邪爲正。

犀角 鮮生地 玄參 連翹心
臨證指南醫案 卷五 溫熱 六

丹皮 石膏蒲 化服至寶丹
某 濕爲漸熱之氣。迷霧兩間。神機不發。三焦皆被邪侵。豈是小恙。視其舌伸縮如強。痰涎粘着。內閉之象已見。宜通膈中。望其少甦。無暇清至陰之熱。

至寶丹四分 石膏蒲金銀花湯送下
王十八 夜熱早涼。熱退無汗。其熱從陰而來。故能食形瘦。脈數左盛。兩月不解。治在血分。

生蟹甲 青蒿 細生地 知母
丹皮 淡竹葉

許 溫邪已入血分。舌赤音低。神呆潮熱。卽發斑疹。亦是

血中熱邪。悞汗消食。必變昏厥。

犀角 細生地 玄參 丹皮
鬱金 石膏蒲

張 舌絳裂紋。面色枯槁。全無涼澤。形象畏冷。心中熱焚。邪深竟入厥陰。正氣已經虛極。勉擬仲景復脈湯。合乎邪少虛多治法。復脈去人參。生薑加甘蔗汁代水煎。又 熱病悞投表散消導。正氣受傷。神昏舌強。勢如燎原。前進復脈法。略有轉機。宜遵前方。去桂加參。以扶正氣爲主。復脈湯去桂。加入人參。甘蔗汁代水煎藥。

又 進甘藥頗安。奈陰液已涸。舌強音縮。撫之乾板。較諸臨證指南醫案 卷五 溫熱 七

已前。齟肉映血。有間。小便欲解。掣痛。猶是陰氣欲絕。欲寐昏沉。午間煩燥。熱深入陰之徵。未能穩許愈期也。

生白芍 炙甘草 阿膠 雞子黃
人參 生地 麥冬 炒麻仁

某 悞下熱陷於裏。而成結胸。所以身不大熱。但短氣胸滿煩燥。此皆邪熱內燔。擾亂神明。內閉之象。棘手重恙。倣仲景瀉心法。備參末議。再候明眼定裁。

川連 黃芩 半夏 炮淡乾薑
生薑 枳實

吳 神氣如迷。不飢不食。乃苦辛消導。發散劫奪。胃津所

致蓋溫邪手經為病。今世多以足六經主治。故致此。

細生地 竹葉心 麥冬 玄參心

連翹心 鬱金

王 溫熱十三日。舌黃。心中悶痛。初病手經。不當用足經

方。老人怕其液潤。甘寒醒胃却熱。

鮮生地 竹葉心 麥冬 鬱金

川斛 菖蒲根

吳 近日天未寒。冷病虛氣不收。藏所感之邪。謂冬溫。參

苓益氣。薄荷桔梗杏仁泄氣。已屬背謬。加補骨脂溫濟

腎臟。尤不通之極。自述夜寐深更。發熱有汗。釋年陰不

臨證指南醫案 卷五 溫熱 六

充陽易泄。論體質可却病。

桑葉 大沙參 玉竹 苡仁

生甘草 糯米湯煎藥

陳 冬溫入肺。膠痰化熱。因未納穀之身。不可重藥消痰

通利。

炒麥冬 桑葉 大沙參 甜杏仁 地骨皮

某 脈數右大煩渴。舌絳。溫邪氣血兩傷。與玉女煎

生地 竹葉 石膏 知母

丹皮 甘草

陰虛感 溫邪 甘寒清上

白沙參 甜杏仁 玉竹 冬桑葉

南花粉 生甘草

關 陰虛挾溫邪。寒熱不止。雖不宜發散消食。徒補亦屬

無益。擬進復脈湯法。

炙甘草 阿膠 生白芍 麥冬

炒生地 炒丹皮 青甘蔗汁煎

黃 體虛溫邪內伏。頭汗淋漓。心腹室塞。上熱下冷。舌白

煩渴。春陽升舉為病。猶是冬令少藏所致。也。脈參視極

當謹慎。

阿膠 生地 麥冬 生牡蠣

臨證指南醫案 卷五 溫熱 七

生白芍 茯苓

張 五勞倦內傷。溫邪外受。兩月不愈。心中溫濕液液。津液

無以上供。夜臥喉乾燥。與復脈湯去薑桂參。二服後可

加參。

汪 勞倦更感溫邪。陽升頭痛。寒熱戰慄。冷汗邪雖外達

陽氣亦泄。致神倦欲眠。舌赤黃胎。口不知味。當以育陰

除熱為主。辛散苦降非宜。

復脈湯去參薑桂麻加青甘蔗漿

曹 脈促數。舌白不飢。寒熱汗出。初起腹痛。臍右有形。乃

久傷勞倦。復感溫邪。今病兩旬。又六。微咳有痰。並不渴

勞倦感 溫邪 曹

飲寒來微微齒瘕此營衛二氣大衰恐延虛脫議固衛陽冀其執得平

黃芪 桂枝 白芍 炙甘草

牡蠣 南棗

陳 熱病後不飢能食不寐此胃氣不和

香豉 黑山梔 半夏 枳實 廣皮白

華五 口鼻受寒喘不正之氣過暴原擾胃系寒熱已罷猶

不飽不飢舌邊赤中心黃餘邪未清食入變酸乃邪熱

不勝穀以溫胆和之辛薤溫胆去甘草衣苓枳實加香

金黑山梔

臨證指南醫案

卷五

濕熱

三

結上焦

林氏 腹滿已久非是暴症近日面頰腫脹牙關緊閉先有

寒熱隨現是象診脈右搏數左小乃濕邪獨自口鼻上

焦先受氣血與熱膠固致清竅不利條有痺寒之變理

當先治新邪况頭前咽喉結邪必辛涼輕劑以宣通若

藥味重濁徒攻腸胃矣倣東垣背濟消毒意

連翹 牛蒡子 馬勃 射干

滑石 夏枯草 金銀花露 金汁

陰虛邪

席 脈左數右緩弱陽根未固陰液漸涸舌赤微渴喘促

自利溲數胸刻自熱神煩囁語夫濕邪久伏少陰古人

立法全以育陰祛熱但今見症陰分固有伏邪真陽亦

不肯收納議做劉河間濁藥輕投不為上焦熱阻下焦

根蒂自立冀其煩躁熱蒸漸緩

熟地炭 茯苓 淡菴蓉 遠志炭

又 晚診陰中伏邪瞞時而升目赤羞明舌絳而渴與育

陰清邪法

生地炭 玄參心 川石斛 炒麥冬

犀角 石菖蒲

又 脈左數右軟舌乾苔白小溲淋瀝吸氣喘促煩汗腎

陰不承心神熱灼蒙閉議以三才湯滋水制熱三才加

臨證指南醫案

卷五

濕熱

三

扶神黃柏金箔 晚進周少川牛黃清心丸一服

又 昨黃昏後診脈較諸早上左手數疾頭減惟尺中垂

而仍動囁語不已若有妄見因思腎熱乘心膈中微閉

神明為蒙自屬昏亂隨進周少川牛黃丸一服但迷漫

無質之熱暫可泄降服後頗安辰刻診脈濡小形質大

衰舌邊色淡下利稀水夫救陰是要旨讀仲景少陰下

利篇上下交征關開欲撤必以堵塞陽明為治以陽明

司開有開無闔下焦之陰仍從走泄矣議用桃花湯

人參 赤石脂 炮薑 白粳米

又 晚服照方加茯苓

又 臥左沉數右小數暮熱微汗時煩

留陰分議用清補

人參

茯苓

川石斛

甘草

黑稻豆皮 糯稻根鬚

又 金匱麥門冬湯

程二 溫熱病已傷少陰之陰少壯陰未易復者恰當夏令

發泄百益酒釀造有灰辛熱劫陰泄氣致形體頹然藥

難見效毋日餌雞距子生用其湯飲用馬料豆湯

冬傷於寒春必病溫者重在冬不藏精也蓋煩勞多

慾之人陰精久耗入春則裏氣大泄木火內燃強陽

臨證指南醫案

卷五

溫熱

五

無制燔燬之勢直從裏發始見必壯熱煩冤口乾舌

燥之候矣故主治以存津液為第一黃芩湯堅陰却

邪即此義也再者之內之溫邪欲發在外之新邪又

加慈鼓湯最為捷徑表分可以肅清至於因循貽誤

豈止一端或因氣燥津枯或致陰傷液涸先生用挽

救諸法如人參白虎湯黃連阿膠湯玉女煎復脈法

申明條例甚詳餘則治瘧厥以甘藥緩肝昏閉用幽

芳開竅熱痰之溫磨蓄血而論通痰非并有條法真

周到 邵新甫

虛邪仍

暑

某 大凡暑與熱乃地中之氣吸受致病亦必傷人氣分

氣結則上焦不行下流不運不飢不欲食不大便皆氣

分有阻如天地不交遂若否卦之義然無形無質所以

清之攻之不效

杏仁

通草

象貝

枯藁皮

白蔻

鬱金汁

姚 奔走氣亂復飲燒酒酒氣辛熱有升無降肺氣膈鬱

上下不通舌白滑渴氣結自胸及腹游游自利不爽周

臨證指南醫案

卷五

暑

五

身膚脹皆痛汗大出不解無非暑濕熱氣始由肺受漫

布三焦羣醫消導苦藥但攻腸胃在上痞結仍然議淡

滲佐以微辛合乎軒岐上病治上之方

西瓜翠衣

川白通草

大豆黃卷 馬兜鈴

射干

薤仁

范 伏暑阻其氣分煩渴咳喘喘急二便不爽宜治上焦

杏仁

石膏

炒牛夏

黑梔皮

厚朴

竹茹

又 痰多咳喘是暑鬱在上醫家亂投沉陰所以無效

石膏

杏仁

炒牛夏

鬱金

香豉 黑山梔

王 舌白煩渴心中脹悶熱邪內苑氣分阻閉當治肺經

倘逆傳膈中必致昏厥

杏仁 鬱金 滑石 黃芩

半夏 橘紅 枳實皮

陳四 暑濕傷氣肺先受病諸氣皆痺當午後陽升煩喘更

加大無形氣病醫以重藥推消多見不效

西瓜翠衣 活水蘆根 杏仁 苡仁

又 酒客中虛重鎮攻消清氣愈傷夫暑邪皆着氣分苟

肺司清肅則其邪不攻自罷議仍以麻清為法若雨露

臨證指南醫案

卷五 暑

醫

從天下降炎熾自蕩掃無餘 威喜丸二錢十服

某二 身熱頭脹脫悶咳喘此暑邪外襲於肺衛當清上焦

絲瓜葉 三錢 大杏仁 三錢 香薷 七分 通草 一錢

飛滑石 三錢 日寇仁 五分

陳 脈左勁右濡頭痛脫悶麻痺欲厥舌白此暑邪內中

蒙閉清空成瘧之象不昔陰虛勿犯中下二焦

嫩竹葉 連翹 飛滑石 野鶴金汁

大杏仁 川貝母

龔二 脈寸大頭暈脫中食不多下暑熱氣從上受治以若

辛寒方

竹葉 杏仁 鬱金 滑石

香豉 山梔

張四 三瘧之邪在陰未經向愈春季潤利不食想春兩外

濕水穀內聚亦濕即濕多成五泄之謂瘧瘵僅泄經隧

濕邪而裏之濕邪未驅長夏吸受暑邪上蒙清空諸數

咳嗽耳聾的係新邪非得與宿病同日而語

連翹 飛滑石 嫩竹葉 荷葉邊汁

桑葉 杏仁 象貝 黑山梔

程六 暑風必挾濕濕必傷於氣分斷瘧瘵發即濕邪內發

之微濕伏熱蘊致氣壅塞咽底腕中及至進穀無碍二

臨證指南醫案

卷五 暑

醫

使通調中下無病顯然

白通草 西瓜翠衣 活水蘆根 苡仁

吳 連朝燥熱必有暑氣內侵頭熱目眩吸短神迷此正

虛邪痺清補兩難先與益元散三四錢用嫩竹葉心二

錢煎湯亦用三四小杯常用菜豆煎湯服

龔六 暑必挾濕二者皆傷氣分從鼻吸而受必先犯肺乃

上焦病治法以辛涼微清氣分上焦廓清則愈惜乎端

以附書六經看病仍是與風寒先表後裏之藥致邪之

在上漫延結鍋四十餘日不解非初受六經不須再辨

其謬經云病自上受者治其上援引經義以論治病非

邪僻也。宗河間法。

杏仁 栝蒌皮 半夏 薑汁 白蔻仁

石膏 知母 竹瀝 秋露水煎

又 脈神頗安。昨午發疹。先有寒戰。蓋此病起於濕熱。當此無汗。肌勝氣空。至膚間皮脫如甃。猶未能全泄其邪。風疹再發。乃濕因戰慄為解。一月以來病魔。而肌無膏澤。瘦削枯槁。古謂瘦人之病。慮涸其陰。陰液不充。補之以味。然腥羶濁味。徒助上焦熱痰。無益培陰養液。况宿滯未去。腸胃氣尚窒鈍。必淡薄調理。上氣清爽。痰熱不至復聚。從來三時熱病。怕反覆於病後之復。當此九勿

臨證指南醫案

卷五 暑

三

幸加意留神為上

玄參心 細生地 銀花 知母 生甘草

川貝 丹皮 橘紅 藍水 竹瀝

此煎藥方。只用二劑可停。未大便時。用地冬汁膏。大便後。可用三才湯。

池 伏暑至深秋而發。頭痛煩渴小寐。

薄荷 淡竹葉 杏仁 連翹

黃芩 石膏 赤芍 木通

張 病幾一月。猶然耳聾。神識不慧。嗽甚痰粘。呼吸喉間有音。此非傷寒暴感。皆夏秋間暑濕熱氣內鬱。新涼引

動內伏之邪。當以輕劑清解。三焦。奈何醫者不曉伏氣

為病。但以發散消食寒涼清火為事。致胃汁消亡。真陰盡燼。舌邊赤。齒板燥裂。血邪留管中。有內閉壅礙厥逆之變。况右脈小數。左脈清弱。熱固在裏。當此陰傷日久。下之再犯亡陰之戒。從來頭面都是清竅。既為邪蒙。精華氣血不肯流行。諸竅失司。聰明矣。此輕清清解。斷斷然也。議清上焦氣血之壅為先。不投重劑苦寒。正倣古人肥人之病。慮虛其陽耳。

連翹心 玄參 犀角 鬱金 橘紅 藍水

黑梔皮 川貝 鮮薑蒲根 加竹瀝

臨證指南醫案

卷五 暑

三

又 昨進清上焦法。諸症雖然畧減。而神識猶未清爽。總由病久陰液內耗。陽津外傷。聰明智慧之氣。俱被濁氣蒙蔽。所以子後午前稍清。他時皆不清明。以陽盛時。人身應之也。擬進局方至寶丹。藉其芳香。足以護陽逐邪。庶無內閉外脫之虞。

至寶丹每服三分。燈心嫩竹葉湯送

又 脈右緩大。左弱。面垢色已減。痰嗽不爽。良由胃中津液。為辛散溫燥所傷。心營肺衛。悉受熱煩蒸迫。致神呆喘急耳聾。清陽阻痺。九竅不利。首方宜解氣血。繼方芳香通竅。無形令其轉旋。三焦自有專司。豈與俗醫但曉

邪滯攻擊而已。今已獲效。當與清暑劑。除肺氣。體素豐盛。陽弱不耐沉寒。然深秋冬交。天氣降。則上焦先受。試觀霜露下垂。草木皆改容色。人在氣交。法乎天地。兼察體質施治。

枇杷葉 炒黃川貝 橘紅 鬱金

茯苓 苡仁

王 暑風熱氣入肺上熱痰喘嗽

石膏 連翹 竹葉 杏仁

桑皮 苡仁 橘紅 生甘草

又 肺氣壅遏。身熱喘咳。溺少。葶藶合葶藶大棗湯

臨證指南醫案 卷五 暑 天

某五 暑風外襲。肺衛氣阻。頭脹咳喘。畏風微熱。防作肺癰。

絲瓜葉 大杏仁 香薷 桔梗

連翹 六一散

某 舌灰黃。頭痛咳逆。左肢掣痛。此煩勞陽動。暑風乘虛

襲入。最慮風動中厥。

鮮荷葉三錢 鮮蓮子五錢 茯神一錢 益元散三錢

川貝母一錢 橘紅一錢

楊女 暑熱穢濁。阻塞肺部。氣短胸滿。宜以輕可去實。

西瓜翠衣 白通草 活水蘆根 生苡仁

臨好加入石膏末二錢

周三 暑風熱。神呆。

鮮荷葉 苦丁茶 滑石 木通

杏仁 厚朴 廣皮 白蔻仁

郁六 暑熱頭脹。咳嗽喉痛。

鮮荷葉 杏仁 射干 橘紅

桑皮 桔梗 木通 滑石

胡 不飢不食不便。此屬胃病。乃暑熱傷氣所致。味變酸濁。熱痰聚院。苦辛自能泄降。非無據也。

半夏瀉心湯去甘草。乾薑加杏仁枳實。

王 身熱自汗。腹痛。大小便不利。脈虛。右大左小。暑熱內

臨證指南醫案 卷五 暑 天

閉。擬和表裏法。

薄荷 枳實 黃芩 生白芍

竹葉心 黑山梔 通草 甘草

程四 穢熱。由清竅入。直犯募原。初頭痛肌脹。今不飢痞悶。以苦辛寒法。

杏仁 半夏 厚朴 橘紅

竹葉 黃芩 滑石

又 脈虛。舌赤。消渴。伏暑熱氣。過衛入營。治在手厥陰。

竹葉 犀角 生地 麥冬 玄參

某六 舌黃。脘悶頭脹。口渴溺短。此受穢氣所致。

某六 舌黃。脘悶頭脹。口渴溺短。此受穢氣所致。

某六 舌黃。脘悶頭脹。口渴溺短。此受穢氣所致。

某六 舌黃。脘悶頭脹。口渴溺短。此受穢氣所致。

飛滑石^{三錢} 白蔻仁^{七分} 杏仁^{三錢} 厚朴^{一錢}

通草^{一錢} 廣皮^{一錢}

某^三穢暑吸入內結募原。腕悶腹痛。便泄不爽。法宜芳香逐穢。以疏中焦為主。

藿香梗 杏仁 厚朴 茯苓皮

半夏 麩 廣皮 香附 麥芽

楊 秋暑內燠。煩渴喜得冷飲。脈右小弱者。暑傷氣分。脈必乳虛也。此非結胸症。宜辛寒以徹裏邪。

石膏 知母 厚朴 杏仁

半夏 薑汁

臨證指南醫案 卷五 暑

沈^二脈小色白。氣分不足。兼之胃弱。少食。開穢濁要刮痧。

陰柔之藥。妨胃助濁。常以豬肚丸養胃。入夏令。熱更傷氣。每食遠進。生脈四君子湯一劑。恪守日服。可杜夏季

客暑之侵。生脈四君子湯 長服豬肚丸

卜^二人春夏必吞酸。肢痠麻木。此體虛不耐陽氣升泄。乃熱傷氣分爲病。宗東垣清暑益氣之議。

人參 黃芪 白朮 甘草 麥冬

五味 青皮 陳皮 澤瀉 葛根

升麻 黃柏 歸身 神麩

任^十仲年真陰未長。逢長夏濕熱交迫。斯氣世煩倦。宜清

坐涼爽。過月涼。變至炎。酸去乃却病之期。與清暑益氣之屬。清暑益氣法。

徐^四長夏濕熱令行。肢起脹窠。煩倦不嗜食。此體質本怯。而濕與熱邪皆傷氣分。當以注夏同參。用清暑益氣法。

人參 白朮 廣皮 五味 麥冬

川連 黃柏 升麻 葛根 神麩

麥芽 穀芽 乾荷葉汁 泛丸

施^七以煩勞傷陽。交長夏發泄。令加見症。都是氣弱。亦熱傷氣也。煩渴有痰。先治其胃。蓋陽明經脈主乎束筋骨。以流利機關耳。金匱麥門冬湯。

臨證指南醫案 卷五 暑

吳 診脈肝胆獨大。尺中動數。先天素弱。水虧木少。滋榮

當春深長夏。天地氣機泄越。身中煩倦。食減皆熱傷元氣所致。進以甘酸充養胃陰。少俟秋肅。天降培植。下焦

固納爲宜。

炒麥冬 木瓜 北沙參 生甘草 烏梅

程 暑久入營。夜寐不安。不飢微痞。陰虛體弱。護理心用

鮮生地 玄參 川連 銀花

連翹 丹參

顧^三陰虛遺熱。小便淋瀝。近日目昏。初起寒熱。頭痛汗出不解。肌肉麻木。手足系強。神昏如寐。成瘡則輕。痲厥則

重

犀角 玄參 小生地 連翹心 竹葉心

石菖蒲 滑石 化牛黃丸 二服

某 初病伏暑傷於氣分微熱而飲邪犯肺也失治邪張

逆走膈中遂舌絳縮小便忽閉鼻煤裂血口瘡耳聾神

呆由氣分之邪熱漫延於血分矣夫肺主衛心主營營

衛二氣晝夜行於經絡之間與邪相遇或涼或熱今則

入於絡津液被劫必漸昏厥所謂內閉外脫

鮮生地 蓮翹 玄參 犀角

石菖蒲 金銀花

臨證指南醫案 卷五 暑

注 暑風久入營絡微熱忽涼議用玉女煎

玉女煎去麥冬牛膝加丹皮竹葉

金 熱止津津汗出伏暑已解只因病癘日久平素積勞

形色脉象虛衰深慮變病今飲食未進寤寐未寧議以

飲液補虛

人參 茯神 麥冬 五味

炒白芍 塊辰砂一兩綿裹同煎

又 熱久胃津被劫不飢不便亦病後常事耳古人論病

必究寢食今食未加餐難寐神識未清為病傷元氣而

熱病必消燦真陰議用三才湯

人參 天冬 生地 麥冬 五味子

暑熱深

入劫陰 頤 右脉空大左脉小孔寒熱麻痺腰痛冷汗平素積勞

內虛秋暑客邪遂干臟陰致神迷心熱煩燥刮痧似乎

暑爽病不肯解此非經絡間病頗慮熱深劫陰而為瘧

厥張司農集諸賢論暑病謂人肝則麻痺入腎為消渴

此其明徵議清陰分之邪仍以養正輔之

阿膠 小生地 麥冬 人參

小川連 烏梅肉

暑熱深

某 暑濕熱氣觸入上焦孔竅頭脹脫悶不飢腹痛惡心

延久不清有瘧痢之憂醫者不明三焦治法混投發散

臨證指南醫案 卷五 暑

消食宜乎無效

杏仁 香豉 橘紅 黑山梔

半夏 厚朴 滑石 黃芩

張 舌白罩灰黑胸脘痞悶潮熱嘔惡煩渴汗出自利伏

暑內發三焦均受然清理上中為要

杏仁 滑石 黃芩 半夏 厚朴

橘紅 黃連 鬱金 通草

某 暑熱傳過頭脹脫痛口渴渴短當清三焦

絲瓜葉 飛滑石 淡竹葉 茯苓皮

厚朴 藿香 廣皮 通草

何 暑濕皆客邪也。原無質。故初起頭脹胸滿。但傷上焦氣分耳。酒家少穀。胃氣素薄。一派消導。雜以辛散苦寒。胃再傷殘。在上濕熱。延及中下。遂協熱自利。三焦邪蒸。氣衝塞填胸。躁亂口渴。瓜菓下脫。格拒相鬪。此中宮大傷。况進熱飲畧受。其為胃陽殘憊。而邪結內腑。可知矣。考暑門時風煩躁。清濁交亂者。昔賢每以來復丹五六粒。轉運清濁為先。攻補難施之際。望其效靈耳。

來復丹

吳 目黃脫悶。咽中不爽。嘔逆。寒少熱多。暑濕客氣之傷。三焦不通。非風寒之症。

臨證指南醫案 卷五 暑

大竹葉 黃芩 杏仁 滑石 陳皮白

厚朴 半夏 薑汁

又 暑濕熱。皆氣也。竝釀蓄滯痰於胃。遂口甜膩滯不飢。議以宣氣理痰。

川貝母 栝實皮 杏仁 黑山梔 澤瀉

另用二賢散

某 四診脈弦。午後惡寒似熱。不飢。溺澀短赤。暑熱炎蒸外。襲肺衛。遊行三焦。致氣分窒痺而然。當用和法。宜薄滋。味庶補瘧患。

杏仁 香薷 木通 飛滑石

茯苓 厚朴 白蔻仁 淡竹葉

又 照前方去香薷加半夏

楊 二暑熱必挾濕。吸氣而受。先傷於上。故仲景傷寒先分六經。河間溫熱須究三焦。大凡暑熱傷氣。濕着阻氣。肺主一身周行之氣。位高為手太陰。經據逆病。樣面赤足冷。上脫痞塞。其為上焦受病。顯著緣平素善飲。胃中濕熱。久伏辛溫燥烈。不但肺病不合。而胃中濕熱。得燥熱。錮閉下利。稀水。即協熱下利。故黃連苦寒。每進必利甚者。苦寒以勝其辛熱。藥味尚留於胃底也。然與初受之肺邪無當。此石膏辛寒。辛先入肺。知母為味清涼。為肺

臨證指南醫案 卷五 暑

之母氣。然不明肺邪。徒曰生津。焉是至理。昔孫真人未診先問。最不便事。再據主家說及病起兩旬。從無汗泄。經云。暑當汗出。勿止。氣分窒塞日久。熱侵入血中。咯痰帶血。舌紅赤。不甚渴飲。上焦不解。漫延中下。此皆急清三焦。是第一章旨。故熱病之療。熱留絡而為遺毒。注腑腸而為洞利。便為束手無策。再論濕乃重濁之邪。熱為薰蒸之氣。熱處濕中。蒸滯之氣。上迫清竅。耳為失聰。不與小陽耳聾同例。青蒿滅柴胡一等。亦是少陽木藥。且大病如大敵。惡藥若過。將苟非慎重。鮮克有濟。議三焦分清治從河間法。初三日

飛滑石 生石膏 寒水石 大杏仁

炒黃竹茹 川通草 瑩白金汁 金銀花露

又 暮診診脈後腹胸肌脹發現癰疹氣分濕熱原有暗

泄之機早間所談餘邪遺熱必兼解毒者為此下午進

藥後診脈較大於早晨神識亦如前但舌赤中心甚乾

燥身體稠之熱甚於早間此陰分亦被熱氣蒸傷瘦人

慮其液涸然痰咯不清養陰藥無往而非臃滯議得早

進清膈一劑而三焦熱穢之蓄當用紫雪丹二三匙藉

其芳香宣竅逐穢斯錮熱可解濁痰不粘繼此調理之

方清管分滋胃汁始可瞻顧其宿垢欲去猶在旬日之

臨證指南醫案 卷五 暑 吳

外古人謂下不嫌遲非臆說也 紫雪丹一錢六分

知母 竹葉心 連翹心 炒川貝 竹瀝

犀角 玄參 金汁 銀花露

又一劑後用

竹葉心 知母 蒙豆皮 玄參

鮮生地 金銀花

又一劑後去銀花蒙豆皮加人參麥冬

又 初十申刻診經月時邪脈形小數小為病退數為餘

熱故皮脹麤蛇氣血有流行之義思食欲餐胃中有醒

豁之機皆佳兆也第舌赤而中心黃苔熱蒸既久胃津

陰液俱傷致嘔物咽中若阻溺澀尿管猶痛咯痰濃厚

宿垢未下若急遽攻奪恐真陰更涸矣此存陰為主而

清腑兼之故亂進食物便是助熱惟清淡之味與病不

悖自來熱病最怕食復勞復舉世共聞非臆說也

細生地 玄參心 知母 炒川貝

麥冬 地骨皮 銀花露 竹瀝

又 脈症如昨仍議滋清陰分餘熱佐清上腕熱痰

照昨日方去地骨皮銀花露加鹽水炒橘紅

某 脈虛傷暑頭重腕悶脚痠 絲瓜葉 三錢 大杏仁 三錢 六一散 三錢 茯苓皮 三錢

臨證指南醫案 卷五 暑 吳

漢防已 半錢 綿茵陳 一錢 細木通 一錢 白蔻仁 五分

某 中惡暑厥 蒼朮白虎湯加滑石

王 暑邪寒熱舌白不渴吐血此名暑瘵重症

西瓜翠衣 竹葉心 青荷葉汁 杏仁

飛滑石 苡仁

萬 暑邪不解陷入厥陰舌灰消渴心下板實嘔惡吐蛇

寒熱下利血水最危之症

川連 黃芩 乾薑 生白芍

川椒 烏梅 人參 枳實

江 暑邪深入厥陰舌縮少腹堅滿聲音不出自利上下

格拒危期至速。勉擬暑門酸苦泄熱。輔正驅邪一法。

黃連 淡乾薑 烏梅 生白芍

半夏 人參 枳實

某^{勞傷挾暑}。肺氣受戕。咳血口乾。先清暑熱。

鮮荷葉 白扁豆 大沙參 茯神 苡仁

朱^{三伏中}。陰氣不生。陽氣不潛。其頭脹身痛。是暑邪初

受。暑濕熱必先傷氣分。故舌白口渴身痛。早晨清爽。午

夜煩蒸。狀如溫瘧。沐浴透動血絡。宿病得時邪而來。仲

景云。先治新病。後理宿病。是亦陰氣先傷。陽氣獨發也。

鮮生地 石膏 知母 立參

臨證指南醫案

卷五 暑

完

連翹 竹葉心 荷葉汁

王^九。雖是欬痰火血。然強能食。不知飢。目黃晡熱。舌心黃。

已現暑熱客邪症象。此先宜清理肺胃。莫因久恙而投

膩補。

杏仁 象貝母 鬱金 川通草

桑葉 石膏 橘紅 苡仁

又 晚服枇杷葉膏。早六味加阿膠麥冬。

又 阿膠 雞子黃 小生地 麥冬

桑葉 炒黑丹皮

徐^三。勞傷挾暑。咳血不飢。

鮮荷葉汁^沖 大沙參 生苡仁 六一散

豨豆皮 杏仁 橘紅 白蔻仁

天之暑熱一動。地之濕濁自騰。人在蒸滯熱迫之中。

若正氣設或有隙。則邪從口鼻吸入。氣分先阻。上焦

清肅不行。輪化之機。失於常度。水穀之精微。亦蘊結

而為濕也。人身一小天地。內外相應。故暑病必挾濕

者。卽此義耳。前人有因動因靜之分。或傷或中之候。

以及入心入肝。為瘧為痢。中痧霍亂。暴厥卒死。種種

傳變之原。各有精義可參。茲不重悉。想大江以南。地

卑氣薄。濕勝熱蒸。當此時候。更須防患於先。昔李笠

臨證指南醫案

卷五 暑

完

翁記中。所謂使天只有三時而無夏。則人之病也。必

稀。此語最確。蓋暑濕之傷。驟者在當時為患。緩者於

秋後為伏氣之疾。其候也。脈色必滯。口舌必膩。或有

微寒。或單發熱。熱時脫痞。痞氣窒。渴悶煩冤。每至午後

則甚。入暮更劇。熱至天明。得汗則諸恙稍緩。日日如

是。必要兩三候。外日減一日。方得全解。倘如元氣不

支。或調理非法。不治者甚多。然是病比之傷寒。其勢

覺緩。比之瘧疾。寒熱又不分明。其變幻與傷寒無二。

其愈期。反覺纏綿。若表之汗不易做。攻之便易瀉瀉。

過清則肢冷。嘔惡過燥。則唇齒燥裂。每遇秋來。最多

是症求之古訓不載者多。獨已任編名之曰秋時晚發。感症似瘧。總當以感症之法治之。要知伏氣為病。四時皆有。但不比風寒之邪。一汗而解。溫熱之氣。投涼即安。夫暑與濕為薰蒸粘膩之邪也。最難驟愈。若治不中窾。暑熱從陽上蒸。而傷陰化燥。濕邪從陰下沉。而傷陽變濁。以致神昏耳聾。舌乾齩血。脫痞嘔惡。洞泄肢冷。棘手之候。叢生竟至潰敗。莫救矣。參先生用意。宗劉河間三焦論立法。認明暑濕二氣。何者為重。再究其病實。在營氣何分。大凡六氣傷人。因人而化。陰虛者火旺。邪歸營分。為多。陽虛者濕勝。邪傷氣分為多。一則耐清。一則耐溫。臟性之陰陽。從此可知也。於是在上者。以辛涼微苦。如竹葉連翹杏仁薄荷之類。在中者。以苦辛宣通。如半夏瀉心之類。在下者。以溫行寒性。質重開下。如桂苓甘露飲之類。此皆治三焦之大意也。或有所夾。又須通變。至於治氣分有寒溫之別。寒者宗諸白虎法。及天水散意。溫者從乎二陳湯。及正氣散法。理營分。知清補之宜。清者如犀角地黃加入心之品。補者有三才復脈等方。又如濕熱沉混之蒼朮石膏湯。氣血兩燔之玉女法。開閉逐穢與牛黃及至寶紫雪等劑。扶虛進參。附及兩儀諸

臨證指南醫案

卷五

暑

早

法隨其變幻。審其陰陽。運用之妙。存乎心也。附驟蕪詞。高明教正。 邵新甫

臨證指南醫案

卷五

暑

早

濕

濕阻上焦
焦肺不降

馬三 舌白頭脹身痛肢疼胸悶不食溺阻當開氣分除濕

飛滑石 杏仁 白蔻仁 大竹葉

炒半夏 白通草

王十 酒肉之濕助熱內蒸釀痰阻塞氣分不飢不食便溺

不爽亦三焦病先論上焦莫如治肺以肺主一身之氣化也

杏仁 栝蒌皮 白蔻仁 飛滑石

半夏 厚朴

臨證指南醫案

卷五 濕

望

吳五 酒客濕勝變痰化火性不喜甜熱聚胃口犯肺氣逆

吐食上中濕熱主以淡滲佐以苦溫

大杏仁 金石斛 飛滑石 紫厚朴 活水蘆根

孔 心中熱不飢不寐目黃自利濕熱內伏

淡黃芩 連翹 炒杏仁 白通草

滑石 野赤豆皮

某九 濕溫阻於肺衛咽痛足跗痺痛當清上焦濕走氣目

和 飛滑石 竹葉心 連翹 杏梗

射干 蘆根

周 病起旬日猶然頭脹漸至耳聾正如內經病能篇所

云因於濕首如裹此呃忒鼻衄皆邪混氣之象况舌色

帶白咽喉欲閉邪阻上竅空虛之所諒非苦寒直入胃

中可以治病病名濕溫不能自解即有昏瘧之變醫莫

泛稱時氣而已

連翹 牛蒡子 銀花 馬勃

射干 金汁

濕阻中焦

李三 時令濕熱之氣觸自口鼻由募原以走中道遂致清

肅不行不飢不食但濕乃化熱之漸致機變不為靈動

與形質滯濁有別此清熱開胃必佐芳香以逐穢為法

臨證指南醫案

卷五 濕

望

栝蒌皮 桔梗 黑山梔 香豉

枳殼 鬱金 降香末

某 吸受穢邪募原先病呃逆邪氣分布營衛皆受遂熱

蒸頭脹身痛經旬神識昏迷小水不通上中下三焦交

病舌白渴不多飲是氣分窒塞當以芳香通神淡滲宜

竅俾穢濕濁氣由此可以分消

苡仁 茯苓皮 猪苓 大腹皮

通草 淡竹葉 牛黃九二丸

吳 濕邪中傷之後脾胃不醒不飢口渴議清養胃津為

穩

濕邪入心腹

鮮省頭草 知母 川斛 苡仁 炒麥冬

張姬 體壯有濕。近長夏陰雨潮濕着於經絡。身痛且利發

熱。仲景云。濕家大忌發汗。汗之則變。癰脈來小弱而

緩。濕邪凝遏陽氣。病名濕溫。濕中熱氣。橫冲心胞絡。以

致神昏四肢不煖。亦手厥陰見症。非與傷寒同法也。

犀角 連翹心 玄參 石膏蒲

金銀花 野赤豆皮 煎送至賢丹

蔡 陽虛挾濕。邪熱內陷。所以神識如蒙。議用瀉心法。

人參 生乾薑 黃芩 川連

枳實 生白芍

臨證指南醫案 卷五 濕

張六 此濕蘊氣中。足太陰之氣。不為鼓動運行。試以痞結

胸滿。仲景列於太陰篇中。豈可推求其理矣。

半夏 附炒 茯苓 川連 厚朴 通草湯煎

周 濕傷脾陽。腹膨小溲不利。

茅朮 厚朴 茯苓 澤瀉

猪苓 秦皮

又 五苓散 又 二木膏

范 四肢乍冷。自利未已。目黃稍退。而神倦不語。濕邪內

伏。足太陰之氣不運。經言脾氣在右。邪滯竅必少靈。以

致語言欲蹇。必當分利。佐辛香以熱運坤陽。是太陰裏

症之法

生於朮三錢 厚朴五分 茯苓三錢 草菓仁七分

木瓜五分 澤瀉五分

又 身體稍稍轉動。語蹇神呆。猶是氣機未為靈轉。色脉

非是有餘。而濕為陰邪。不徒偏寒偏熱已也。

生於朮 茯苓 苡仁 鬱金

炒遠志 石膏蒲汁

又 脾胃不醒。皆從前濕蒸之累。氣升咳痰。參藥緩進。

炒黃川貝 茯苓 苡仁 鬱金

地骨皮 淡竹葉

臨證指南醫案 卷五 濕

又 濕滯於中。氣蒸於上。失降不得。寐口數白疳。仍不渴

飲。開上鬱。佐中運利腸胃。亦是宣通三焦也。

生於朮五錢 苡仁三錢 寒水石一錢 桔梗七分

猪苓一錢 澤瀉一錢 廣皮白一錢

濕阻中焦 曹三 腸胃屬腑。濕久生熱。氣阻不爽。仍以通為法。

生於朮 川黃連 厚朴 淡生薑渣

廣皮白 酒煨大黃 水法九服三錢

李 五脉小滿。痰多上湧。食入脘阻。大便不爽。上秋至今夏

不愈。自述飢飽失和。曾病黃疸。以濕傷氣。痺主治。

大杏仁 苡仁 半夏 薑汁

茯苓 橘紅 鬱金 香豉

俞五 酒濕鬱傷。腕中食阻而痛。治以辛苦寒。

小川連 半夏 薑汁 枳實

茯苓 香豉

某九五 舌白目黃。口渴溺赤。脉象呆鈍。此屬濕鬱。

綿茵陳三錢 生白朮三錢 寒水石三錢 飛滑石三錢

桂枝木一錢 茯苓皮三錢 木猪苓三錢 澤瀉一錢

李 酒客中虛。粵地潮濕。長夏涉水。外受之濕。下起水蠱。

不運。中焦之濕內聚。治法不以宣通經腑。致濕阻氣分。

鬱而為熱。自脾胃不主運通。水濕橫漬於脉。腰之間。二

臨證指南醫案 卷五 濕 吳

便不爽。濕熱濁氣交扭混亂。前輩治中滿。必曰分消。此

分字。明明謂分解之義。但亂藥既多。不能去病。就是脾

胃受傷於藥。蔓延腿肢。腫極且痛。病深路遠。藥必從喉

入胃。然後四布。病所未得藥益。清陽先已受傷。此湯藥

難以進商也。議用丹溪小温中丸三錢。當以疎利腸中。

取其不致流散諸經。亦一理也。小温中丸八服。

某三 陽微體質。濕痰內聚。便溺脫悶。肌麻舌乾。清理濕邪。

氣機升降自安。

金石斛 茯苓 半夏 廣皮白

鈎藤 白茯苓

張 脉右緩濕着阻氣

厚朴 廣皮 煨草菓 炒查肉

藿香梗 炒神麩

某二 不耐煩勞。是本虛。腕悶便泄。屬濕邪。先治濕。後治本。

藿香梗 廣皮 茯苓 大腹皮

厚朴 穀芽

陸 濕滯如痞

山茵陳 草果仁 茯苓皮 大腹皮

厚朴 廣皮 猪苓 澤瀉

汪三 舌黃腕悶。積濕內着。氣機不宜。如久釀蒸。必化熱氣。

臨證指南醫案 卷五 濕 吳

即有身熱之累

杏仁 藿香 茯苓皮 滑石

厚朴 廣皮白

某 閱病源。皆濕熱內停之象。當走濕清熱為主。至於藥

酒蘊濕助熱。尤當永戒。

生白朮 赤小豆皮 綿茵陳 黃柏

茯苓 澤瀉

某 脉濡。頭脹。胸身重着。而痛。寒熱微嘔。此濕阻氣分。

厚朴 杏仁 白菴仁 木通

茯苓皮 大腹皮 滑石 竹葉

某 長夏外受暑濕與水穀之氣相併上焦不行下脘不通氣阻熱從濕下蒸通不飢不食目黃舌白氣分之結

厚朴 杏仁 廣皮 茯苓

半夏 薑汁

某 脈緩身痛汗出熱解繼而復熱此水穀之氣不運濕

復阻氣鬱而成病仍議宜通氣分熱自濕中而來徒進

清熱不應

黃芩 滑石 茯苓皮 大腹皮

白蔻仁 通草 猪苓

方四 形質頽然脈遲小滿不食不寐腹痛大便窒痺平昔

臨證指南醫案 卷五 濕 吳

嗜酒少穀中虛濕結陽傷寒濕濁陰鳩聚為痛

炒黑生附子 炒黑川椒 生淡乾薑 葱白

調入猪胆汁一枚

王二 冷濕損陽經絡拘束形寒酒客少穀勞力所致

桂枝 淡乾薑 熟附子 生白朮

莫十 今年夏四月寒熱不飢是時令潮疹氣蒸內應脾胃

夫濕屬陰晦必傷陽氣吞酸形寒乏陽運行議鼓運轉

旋脾胃一法 苓薑朮桂湯

某六 地中濕氣自足先腫濕屬陰邪陽不易復畏寒筋骨

猶牽強無力以金匱苓薑朮桂湯

陳五 濁氣結有形酒肉挾濕

藜蘆 生香附汁 木香

茯苓 廣皮白

江 脈緩臍上痛腹微膨便稀溺短不爽此乃濕鬱脾胃

之陽致氣滯裏急宗古人導濕分消用桂苓散方

生茅朮 官桂 茯苓 厚朴 廣皮白

飛滑石 猪苓 澤瀉 炒查肉

林五 中年清陽日薄忽然脫中痞悶乃清陽不自轉旋酒

肉濕濁之氣得以凝聚矣過飲澹滷濕傷脾胃胃陽微

仲景法以輕劑宣通其陽若投破氣開降最傷陽氣有

臨證指南醫案 卷五 濕 吳

裕拒之害 苓桂朮甘湯

嚴三 胸滿不飢是陽不運行嗜酒必挾濕凝阻其氣久則

三焦皆閉用半硫丸二便已通議治上焦之陽

苓桂朮甘湯

王六 病人述病中厚味無忌腸胃滯雖下而留濕未解濕

重濁令氣下墜於肛肛墜痛不已胃不喜食陽明失關

舌上有白腐形色議劫腸胃之濕

生茅朮 人參 厚朴 廣皮

炮薑灰 生炒黑附子

胡二 受濕患瘡久瘡之氣泄半年淹淹無力食少噎噎

難化。此脾胃病法以運中陽為要。

茯苓 桂枝 生於朮 炙草

苡仁 生薑

汪 夏令脾胃司氣兼以久雨泛潮。地中濕氣上干。食味

重濁少運。所謂濕勝成五泄也。古云寒傷形。熱傷氣。芒

種夏至天漸熱。宜益氣分以充脾胃。此夏三月必有康

健之理。 補中益氣湯

某^五 穢濕邪吸受。由募原分布三焦。升降失司。脘腹脹悶。

大便不爽。當用正氣散法。

藿香梗 厚朴 杏仁 廣皮白

臨證指南醫案 卷五 濕 季

茯苓皮 神麴 麥芽 綿茵陳

蔡 仲景云。小便不利者。為無血也。小便利者。血症諦也。

此症是暑濕氣蒸。三焦瀰漫。以致神昏。乃諸般阻塞之

兆。至小腹硬滿。大便不下。全是濕鬱氣結。彼妄醫猶然

以滋味呆鈍滯藥。與氣分結邪相反極矣。誤用甘露飲

法。

猪苓 浙茯苓 寒水石 晚蚕沙 皂莢子_去

某^四 脘悶。使滯身痛。脈象糝糊。此屬濕蘊三焦。

厚朴 廣皮 藿香梗 茯苓皮

大豆黃卷 木防己 川通草 苡仁

牛 向年積聚。快服燥熱諸藥。類與消奪推陳致新。乃安

身處江南濕熱之鄉。飲啖仍用山右濃重之味。留熱由

腸升膈。三焦不清。議攻無形之熱。

清心涼膈去芒硝加苜蓿

韓^三 冷酒水濕傷中。上嘔食下泄。脂液腸氣傷極。再加浮

腫作脹則危。

人參 茯苓 熟附子 生於朮

生白芍 生薑

又 酒濕類聚。例以分利。診脈微。陽氣已敗。濕壅生熱。至

胃脘脹清熱則陽亡。即死。水^五 運中祛濕。佐附迅走氣

臨證指南醫案 卷五 濕 季

分亦治濕一法 茯苓 熟附子 生白朮 左牡蠣

澤瀉 車前子

龐^四 濕久脾陽消乏。中年未育子。腎真亦憊。做安腎丸法。

鹿茸 胡蘆巴 附子 韭子 赤石脂

補骨脂 真茅朮 茯苓 兔絲子 大茴香

張^五 陽傷痿弱。有濕麻痺。痔血。

生白朮 附子 乾薑 茯苓

某^三 舌白身痛。足跗浮腫。從太陰穴水流。如注。此濕邪伏

於足少陰。當用溫蒸陽氣為主。

肝胃

鹿茸 淡附子 草果 更絲子 茯苓

楊 厥陰為病必錯雜不一。瘧痢之後肝臟必虛。發症左

脇有痞腹中塊。福外堅。脇下每常汨汨有聲。惡虛就賢

常有寒熱。胃中不知飢。而又嘈雜吞酸。脈長而數。顯然

厥陰陽明濕熱下滲。前陰陽瀦而為濕熱症也。讓用升

發陽明胃氣滲泄。厥陰濕熱其症自愈。

蒼朮 牛夏 茯苓 橘紅 通草

當歸 柏子仁 沙蒺藜 川棟子 茴香

卽丸方

濕熱

浦氏 胸膈迷漫胃痛。嘔食肢節屈曲。處冷痛。經落後。來時

臨證指南醫案 卷五 濕 五

周身腰脊不舒。脉弦沉痛。即便溼。此濕督阻閉。氣血不

行。用藥先須斷酒。

生茅朮 炮黑川烏 薑汁 白芥子

厚朴 廣皮 草撥 茯苓

徐 溫瘧初愈。驟進濁膩食物。濕聚熱蒸。結於經絡。寒戰

熱熾。骨節煩疼。舌起灰滯之形。面色黃。顯熱濕熱

為痺。仲景謂濕家忌投發汗者。恐陽傷。變病蓋濕邪重

着汗之不却。是苦味辛通為要耳。

防已 杏仁 滑石 醋炒牛夏

連翹 山梔 苡仁 野赤豆皮

濕熱人

濕熱

某四 風暑濕渾雜。氣不主宣。咳嗽頭脹。不飢。右肢若廢。法

當通陽驅邪 杏仁 三錢 苡仁 三錢 桂枝 五分 生薑 七分

厚朴 一錢 牛夏 一錢 漢防已 一錢 白蒺藜 二錢

某 汗多身痛。自利小溲。全無胸腹白疹。此風濕傷於氣

分。醫用血分涼藥。希冀熱緩。殊不知濕鬱在脈。為痛濕

家本有汗不解。

苡仁 竹葉 白薤仁 滑石

茯苓 川通草

濕為重濁有質之邪。若從外而受者。皆由地中之氣

臨證指南醫案 卷五 濕 五

升騰從內而生者。皆由脾陽之不運。雖云霧露雨濕。

上先受之地。中潮濕。下先受之。然露露雨濕。亦必由

地氣上升而致。若地氣不升。則天氣不降。皆成燥症

矣。何濕之有其傷人也。或從上。或從下。或通體皆受

此論外感之濕邪。着於肌軀者也。此雖未必即入於

臟腑。治法原宜於表散。但不可大汗耳。更當察其兼

症。若兼風者。微微散之。兼寒者。佐以溫藥。兼熱者。佐

以清藥。此言外受之濕也。然水流濕。火就燥。有同氣

相感之理。如其人飲食不節。脾家有濕。脾主肌肉。四

肢則外感肌軀之濕。亦漸次入於臟腑矣。亦有外不

受濕而但濕從內生者必其人膏粱酒醴過度或嗜飲茶湯太多或食生冷瓜果及甜膩之物治法總宜辨其體質陰陽斯可以知寒熱虛實之治若其人色蒼赤而瘦肌肉堅結者其體屬陽此外感濕邪必易於化熱若內生濕邪多因膏粱酒醴必患濕熱濕火之症若其人色白而肥肌肉柔軟者其體屬陰若外感濕邪不易化熱若內生之濕多因茶湯生冷太過必患寒濕之症人身若一小天地今觀先生治法若濕阻上焦者用開肺氣佐淡滲通膀胱是即啟上開開支河導水勢下行之理也若脾陽不運濕滯中焦者用木朴薑牛之屬以溫運之以苓澤腹皮滑石等滲泄之亦猶低窪濕處必得烈日晒之或以剛燥之土培之或開溝渠以泄之耳其用藥總以苦辛寒治濕熱以苦辛溫治寒濕藥以淡滲佐之或再加風藥甘酸膩濁在所不用總之腎陽充旺脾土健運自無寒濕諸症肺金清肅之氣下降膀胱之氣化通調自無濕火濕熱暑濕諸症若夫失治變幻則有腫脹黃疸泄瀉淋閉痰飲等類俱於各門兼參之可也

燥

某 脈右數大議清氣分中燥熱

桑葉 杏仁 大沙參 象貝母

香鼓 黑梔皮

卞 夏熱秋燥致傷都因陰分不足

冬桑葉 王竹 生甘草 白沙參

生扁豆 地骨皮 麥冬 花粉

某 燥火上替齦脹咽痛當辛涼清上

薄荷梗 連翹殼 生甘草 黑梔皮

臨證指南醫案 卷五

桔梗 菘豆皮

王六 老人舌腐肉消肌枯心事繁冗陽氣過動致五液皆涸而為燥冬月無妨夏月深處林壑心境凝然可以延

年 每早服牛乳一杯

陳 秋燥復傷宿恙再發未可補瀆姑與甘藥養胃

麥冬 玉竹 北沙參 生甘草

茯神 糯稻根鬚

某 上燥治氣下燥治血此為定評今陽明胃腑之虛因久病嘔逆投以辛耗破氣津液劫傷胃氣不主下行致腸中傳送失司經云六腑以通為補牛月小效全在一

通補工夫豈徒理燥而已。議甘寒清補胃陰。

鮮生地 天冬 人參 甜梨肉 生白蜜

張 脈數虛舌紅口渴上齲乾涸腹熱不飢此津液被劫陰不上承心下溫溫液液用炙甘草湯

炙甘草 阿膠 生地 麥冬

人參 麻仁

某氏 心中煩熱正值經來而熱渴不已若清肺氣夫謬用復脈法

炙甘草 生地 阿膠 麥冬

棗仁 蔗漿

臨證指南醫案 卷五 燥 五

某 陽津陰液重傷餘熱淹留不解臨晚潮熱舌色若赭

頻飲救亢陽焚燎究未能解渴形脈俱虛難投白虎議以仲景復脈一法為邪少虛多使少陰厥陰二臟之陰少變冀得胃關復振因左關尺空數不藏非久延所宜耳

人參 生地 阿膠 麥冬

炙草 桂枝 生薑 大棗

燥為乾澀不通之疾內傷外感宜分外感者由於天時風熱過勝或因深秋偏亢之邪始必傷人上焦氣分其法以辛涼甘潤肺胃為先喻氏清燥救肺湯及

先生用玉竹門冬桑葉薄荷梨皮甘草之類是也內

傷者乃人之本病精血下奪而成或因偏餌燥劑所

致病從下焦陰分先起其法以純陰靜藥柔養肝腎為宜大補地黃丸六味丸之類是也要知是症大忌

者苦瀉最喜者甘柔若氣分失治則延及於血下病

失治則稿及乎上喘咳痿厥三消噫膈之萌總由此

致大凡津液結而為患者必佐辛通之氣味精血竭而為患者必藉血肉之滋填在表佐風藥而成功在

腑以緩通為要務古之滋燥養營湯潤腸丸五仁湯

瓊玉膏一炆丹牛羊乳汁等法各有尚司也 邵新甫

臨證指南醫案 卷五 燥 五

疫

類邪入
心胞

朱 疫癘穢邪從口鼻收受分布三焦瀰漫神識不是風

寒客邪亦非停滯裏症故發散清導即犯劫津之戒與

傷寒六經大不相同今喉痛丹疹舌如珠神躁昏昏上

受穢邪逆走膈中當清血絡以防結閉然必大用解毒

以驅其穢必九日外不致昏憤真其邪去正復

犀角 連翹 生地 玄參

荷蒲 荷金 銀花 金汁

姊 疫毒口糜丹疹喉咽治在上焦

臨證指南醫案

卷五 疫

美

犀角 鮮生地 玄參 連翹

石菖蒲 銀花 金汁 至寶丹

譚 口鼻吸入穢濁白肺系漸于心胞絡初病喉痛舌燥

最怕竅閉神昏之象疫毒傳染之症不與風寒停滯同

法

玄參 連翹 荷金 銀花 石菖蒲

龍葉 射干 牛蒡 冲入真白金汁一杯

楊 吸入疫癘三焦皆受久則血分漸凝愈結愈熱當以

鹹苦之製仍是輕揚理上做古大製小用之意

玄參 西瓜翠衣 金銀花露 紫白金汁

金氏 人辨則神昏穢邪竟入膈王先生方甚妙思慮兼以
芳香宜數逐穢 至寶丹

疫癘一症都從口鼻而入直行中道流布三焦非比

傷寒六經可表可下夫疫為穢濁之氣古人所以飲

芳香採蘭草以襲芬芳之氣者重滌穢也及其傳變

上行極而下行極而上是以邪在上焦者為喉啞

為口糜若逆傳膈中者為神昏舌絳為喉痛丹疹今

觀先生立方清解之中必佐芳香宜數逐穢如犀角

荷蒲銀花荷金等類兼進至寶丹從表透裏以有靈

之物內通心竅搜剔幽隱通者通鎮者鎮若邪入營

臨證指南醫案

卷五 疫

美

中三焦相瀰熱愈結邪愈深者理宜鹹苦大製之法

仍恐性速直走在下故用玄參金銀花露金汁瓜葉

皮輕揚理上所謂做古法而不泥其法者也考是症

惟張景岳謂嘉言吳又可論之最詳然宗張喻二氏

恐有遺邪留患若宗吳氏又恐邪去正傷惟在醫症

權衡無虛無盛無虛虛而遣人天殃方不愧為司命矣

神滋丸

癩痧疹療

三焦伏熱

張 伏氣熱蘊三焦心竅熱發煩渴。遍體赤癩夜躁不寐。兩脈數搏。

羚羊角 犀角 連翹心 玄參心

鮮生地 金銀花 花粉 石菖蒲

又 寒熱必有形象攻觸及於胃腕之下。口渴喜飲煖湯。

癩已發現病不肯退。此邪氣久伏厥陰之界矣。

梓奴 川連 黃芩 花粉

杜癩 枳實

臨證指南醫案 卷五 癩痧疹療 卒

嚴 濕溫雜受身發斑疹。飲水渴不解。夜煩不成寐。病中

強食反助邪威。議用涼膈疎斑方法。

連翹 薄荷 杏仁 鬱金

枳實汁 炒牛蒡 山梔 石膏

又 舌邊赤昏謔。早輕夜重。斑疹隱約。是濕溫已入血絡。

夫心主血。邪干膈中。漸至結閉。為昏癩之危。苦味沉寒。

竟入中焦。消導辛溫。徒劫胃汁。皆溫邪大禁。議清疎血。

分輕劑以透。更參入芳香逐穢。以開內竅。近代喻嘉

言中明戒律宜遵也。

玄參 連翹 銀花

石菖蒲 先煎至六分後和入雪白金汁一杯。隨服研入周少川牛黃丸一九。

江 溫邪發疹。濕熱內蘊。便閉不通。先開上焦。

某 風溫發疹。 杏仁 蘇子 栝樓皮 紫苑 山梔

薄荷 連翹 杏仁 牛蒡子

桔梗 桑皮 甘草 山梔

某 風溫發疹

薄荷 赤芍 連翹 牛蒡子

桔梗 桑皮 甘草 山梔

臨證指南醫案 卷五 癩痧疹療 卒

賈 暴寒驟加。伏熱更熾。邪鬱則氣血壅遏。痧疹不肯外

達。痰氣交阻。神迷喘促。漸入心胞絡中。有內閉外脫之

憂。熱注下迫。自利粘膩不爽。法當開其結閉。消毒解其

膈中之壅。必得神清。方保無變。

連翹心 飛滑石 石膏 炒金銀花

射干 通草 煎化牛黃丸一九

朱二十 痧後痰多。咳嗽氣急。

蘆根 一兩 杏仁 一錢 栝樓 一錢 飛滑石 一錢

桑皮 八分 通草 一錢

某 痧後伏火未清。內熱身痛

王竹 白沙參 地骨皮 川斛

麥冬 生甘草

某 移後熱不止陰傷

生白芍 炙甘草 生扁豆 炒麥冬

川斛 殺芽

章 涼風外襲伏熱內蒸秋金主令內應乎肺喘咳身熱

始而晝熱繼而暮熱自氣分漸及血分肌肉紫而肌腫

發疹辛寒清散為是

薄荷 連翹 石膏 淡竹葉

杏仁 桑皮 苡仁

臨證指南醫案 卷五 癩痧疹癩 奎

吳 病在暴冷而發肌表頭面不透是外蘊為寒內伏為

熱肺病主衛衛氣分兩解為是

麻黃 石膏 牛蒡子 枳殼汁

杏仁 射干 桔梗 生甘草

尹 環口燥裂而痛頭面身半以上發出癩疹赤紋乃陽

明血熱久蘊成毒瘦人偏熱頗有是症何謂醫人不識

犀角地黃湯

溫邪自利癩疹

黃芩 連翹 牛蒡 桔梗 香豉

薄荷 杏仁 橘紅 通草

李 發癩熱腫癩現正面每遇九十月大發五六月漸愈

七八年來如是因思夏令陽氣宣越營衛流行無間秋

冬氣寒外薄氣血凝滯此濕熱漫無發泄乃少陽木火

之鬱及陽明蘊蒸之濕故上焦尤甚耳法以辛涼佐以

苦寒俾陽分鬱熱得疎庶幾發作勢緩

夏枯草 鮮菊葉 苦丁茶 鮮荷葉邊

羚羊角 黑虎皮 鬱金 苡仁

唐 五麻木忽高腫發癩必有風濕襲入皮膚乃軀殼病昔

人每以宣行通劑

片薑黃 羚羊角 川桂枝 撫芎

臨證指南醫案 卷五 癩痧疹癩 奎

半夏 白芥子

某 十風塊癢癢咳嗽腹痛邪着表裏當用雙和

牛蒡子 杏仁 連翹 桔梗

桑枝 象貝母 煎藥送通聖丸

癩者有觸目之色而無碍手之質即稠如錦紋稀如

蚊跡之象也或佈於胸腹或見於四肢總以鮮紅起

發者為吉色紫成片者為重色黑者為凶色青者為

不治蓋有諸內而形諸外可決其臟腑之安危邪正

之勝負也始以寒癩疫諸症失於宣解邪蘊於胃腑

而走入營中每有是患耳考方書之治其法不一大

抵由失表而致者當求之汗失下而致者必取乎攻
火甚清之毒甚化之營氣不足者助其虛而和之托
之至於陰癰一說見象甚微若必指定些些之癰點
為陰猶恐不能無誤想前人此例無非覺後人勿執
見癰為實熱之義也吾故曰必察之脈象及兼證方
安痧者疹之通稱有頭粒而如粟象癰者即疹之屬
腫而易痒須知出要周勻沒宜徐緩不外乎太陰陽
明之患故繆氏謂以脾胃論治為精也若先生之法
本乎四氣隨其時令之勝復酌以辛涼辛勝及甘寒
苦寒鹹寒淡滲等法而治之凡吾幼科諸友於此尤

臨證指南醫案

卷五

癰痧疹癩

畜

當究心焉 邵新甫

痰

汪五宿哮久矣不發心悸震動似乎懊惱之象此屬痰火
治以宣通鬱遏勿徒呆補

牛夏 川連 石菖蒲 蛤粉 枳實

茯苓 川芎 橘紅 竹瀝薑汁法丸

劉稱痰因氣滯熱鬱治當清熱理氣為先

川連 白朮 枳實 厚朴

茯苓 半夏 淡薑湯泛丸

臨證指南醫案

卷五

痰

畜

沈三痰火久嗽 海蛤丸

張痰火風眩暈防仆跌

明天麻 炒半夏 茯苓 橘紅

羚羊角 鈎藤 竹瀝

陳老年痰火咳逆痰有穢氣

蘆根 苡仁 桃仁 絲瓜子

葶藶 大棗

又下虛不納瀉泛嘔逆痰穢氣

熟地炭 紫衣胡桃肉 炒杞子 炒牛膝

川斛 茯苓

某 痰火上逆蒙竅耳鳴頭暈 二陳加天麻鈎藤甘菊
羌羊護皮

某 夏至節兩關脈弦長五火燔燿而肝陽胃陽尤甚動
怒抽掣為肝病食辛香厚味即病至胃病使然痰火根
深非頃刻可掃除惟靜養勿恚忿薄味以清裏此病發
之勢必緩由漸加功議藥乃近理治法

羚羊角 犀角 川連 鬱金 山梔
北秦皮 牛黃 胆星 橘紅 生石膏

寒水石 金箔 方諸水法九竹葉燈心湯送
何 診脈右關弦滑痰多舌乾微強語言似蹇蓋因痰火

臨證指南醫案 卷五 痰 奕

上蒙津液不得上承高年頗慮風痺宜清上宣通勿進
剛燥及膩滯之藥

半夏 金石斛 橘紅 黑山梔 茯苓
鬱金 生甘草 石菖蒲 竹瀝 薑汁

張 昏昏如寐神憤如迷痰熱內閉勢非輕渺

半夏 石菖蒲 桔梗 枳實
鬱金 橘紅 竹瀝 薑汁

某 鬱痰

半夏 鬱金 石菖蒲 明天麻
白茯苓 橘紅 茯苓 鈎藤

陶 脈左弦堅搏痰多食不易運此鬱慮已甚肝侮脾胃
有年最宜開懷不致延及噎膈

半夏 薑汁 茯苓 杏仁
鬱金 橘紅

又 脈如前痰氣未降 前方去杏仁加白芥子
金 濕熱內蒸痰火日夥根本漸怯陽泄為汗陰泄遺濁
酒客喜於爽口食物醫藥中滋膩補方決不適用也

豬肚丸方

葉 久寓南土水穀之濕蒸熱聚痰脈沉弦日黃肢末易
有瘡疾皆濕熱盛致氣隧不得流暢法當苦辛寒清裏

臨證指南醫案 卷五 痰 奕

通肌做前輩痰因熱起清熱為要
生芽木 黃柏 瓜蒌實 山梔 萊服子
川連 半夏 厚朴 橘紅 竹瀝薑汁丸

某 病後厚味蒸痰
風化硝 瓜蒌仁霜 枳實 鬱金

生茯苓 薑汁炒山梔 竹瀝法丸

注 脈脹濕阻熱痰
半夏 茯苓 黑山梔 橘紅

製茯苓 遠志 降香
徐 陽動內風用滋養肝腎陰藥壯水和陽亦屬近理夏

季春青主司肝胆火風易於貫膈犯中。中土受木火之侮。陽明脈衰。痰多。經脈不利矣。議清少陽鬱熱。使中宮自安。若畏虛滋膩。上中愈實。下焦愈虛。二陳去甘草。加金斛桑葉丹皮。

又脈左浮弦數。痰多。腕中不爽。煩則火升。眩暈。靜坐神識安舒。議少陽陽明同治。

羚羊角 連翹 廣皮 炒半夏麩

黑山梔皮 香豉

又脈兩手已和。惟煩動恍惚。欲量。議用靜藥。益陰和陽。

人參 熟地 天冬 金箔

臨證指南醫案 卷五 痰 突

注 痰火上盛。腎氣少攝。朝用通攝下焦。暮服清肅上焦。

方法

羚羊角 半夏 茯苓 橘紅

黑梔皮 鬱金 苦丁茶煎湯法丸吞服

熟地 淡菴蓉 杞子 五味 牛膝

茯苓 遠志 線膠 蜜丸早服

腎一色鮮明。屬上有痰飲。蓋上實則下虛。牛百年茂。未得

種玉。診得脈左小不靜。右部弦滑。法當清肺胃之熱痰。

益腎肝之精血。俟曼借衛生方法。

燕窩膠 甜梨膏 人參 黃芪 麥冬

腎虛

丙 向來痰多食少。而參朮服餌未合。此稟質為陽。不受溫熱剛燥之劑。上年冬季。溫煖入春。痰愈多。體中微倦。由乎藏聚未固。春氣自地。升舉之徵。法當攝腎固真。乃治痰之本。方為有益。

山藥 茯苓 於朮 黃節 黑節 鹿尾膠 羊內腎 淡菴蓉 故紙 胡椒 青鹽

熟地 茯苓 補骨脂 胡桃肉 杞子 五味 牛膝 遠志 車前 蜜丸

痰症之情形。變幻不一。古人不究標本。每著消痰之方。立消痰之論者甚多。後人遵其法而用之。治之不

臨證指南醫案 卷五 痰 突

驗。遂有稱痰為怪病者矣。不知痰乃病之標。非病之本也。善治者治其所以生痰之源。則不消痰而痰自無矣。余詳考之。夫痰乃飲食所化。有因外感六氣之邪。則脾胃升降之機失度。致飲食輸化不清而生者。有因多食甘膩肥腥茶酒而生者。有因木質脾胃陽虛。濕濁凝滯而生者。有因鬱則氣火不舒。而蒸變者。又有腎虛水泛為痰者。此亦因上衰不能制水。則腎中陰濁上逆耳。非腎中真有痰水上泛也。更有陰虛勞症。龍相之火。上炎燻肺。以致痰嗽者。此痰乃津液所化。必不濃厚。若欲消之。不惟無益。而徒傷津液。

其餘一切諸痰初起皆由濕而生。雖有風火燥痰之名亦皆因氣而化。非風火燥自能生痰也。其主治之法。惟痰與氣一時壅閉咽喉者。不得不暫用豁痰降氣之劑以開之。餘皆當治其本。故古人有見痰休治痰之論。此誠千古之明訓。蓋痰本飲食濕濁所化。人豈能禁絕飲食。若欲消之。由於外邪者。邪散則痰或可清。如寒痰溫之熱痰清之。濕痰燥之燥痰潤之。風痰散之是也。若涉本原者。必旋消旋生。有至死而痰仍未清者矣。此乃不知治本之故耳。今觀案中治法。有因鬱因火者。必用開鬱清火為君。以消痰佐之。

臨證指南醫案

卷五 痰

主

有因濕因熱者。則用燥濕清熱。畧佐化痰之品。若因肝腎虛而生痰者。則純乎鎮攝固補。此真知治痰之本者矣。若因寒因濕者。更當於痰飲門兼參而治之。

華岫雲

痰飲

某六 高年衛陽式微。寒邪外侵。引動飲邪。上逆咳嗽。形寒仲景云。治飲不治咳。當以溫藥通和之。

杏仁 三錢 粗桂枝 一錢 淡乾薑 一錢 茯苓 三錢 苡仁 三錢 炙草 四分

周 向有耳聾鳴响。是水虧木火蒙蔽。冬陽不潛。亦屬下元之虛。但今咳聲。喉下有痰音。脇痛。卧着氣衝。乃衝陽升而痰飲泛。脈浮。當此驟冷。恐有外寒。引動內飲。議開太陽以肅上。

臨證指南醫案

卷五 痰飲

主

雲茯苓 粗桂枝 乾薑 五味 同量 打

白芍 炙草 當午時服

某二 新涼外束。肺受寒冷。氣餒不降。宿飲上干。而病發矣。法當暖護背心。宿病可却。

淡生薑粉 半夏 蛤蚧粉 茯苓 桂枝木 苡仁煎湯

某五 背寒咳逆。此屬飲象。先當辛溫飲邪。以降肺氣。

鮮枇杷葉 杏仁 茯苓 橘紅 生薑 半夏

某五 脈右大弦氣喘。咳唾濁沫。不能着枕。喜飲湯水。遇寒

病發此屬飲邪留於肺衛。如見咳投以清潤愈投愈劇矣。葶藶子 山東大棗

徐氏 痰飲上吐喘不得臥。乃濕邪阻蔽肺氣。氣不下降。壅滯不能着右。議用宣通開氣分方法。

小青龍去細辛麻黃加苡仁白糖炒石膏

沈氏 冬溫陽不潛伏。伏飲上泛。仲景云脈沉屬飲。面色鮮明為飲。飲家咳甚。當治其飲。不當治咳。緣高年下焦根蒂已虛。因溫煖氣泄。不主收藏。飲邪上擾。乘肺肺氣不降。一身之氣交阻。薰灼不休。絡血上沸。經云不得臥。臥則喘甚。痺塞乃肺氣之逆亂也。若以見病圖病。昧於色

臨證指南醫案 卷五 痰飲 主

診候氣必致由咳變幻。腹腫脹滿。漸不可挽。明眼醫者勿得忽為泛泛可也。茲就管見畧述大意。議開太陽。以

使飲濁下趨。仍無礙於冬溫。從仲景小青龍越婢合法。

杏仁 茯苓 苡仁 炒半夏

桂枝木 石膏 白芍 炙草

方氏 冷暖失和。飲泛氣逆。為浮腫喘咳。腹脹。臥則衝澀。議用越婢方。

石膏 杏仁 桂枝 炒半夏

茯苓 炙草 施氏 勞煩太甚。胃陽受傷。外衛單薄。怯寒畏冷。食物少運。

痰飲內起。氣阻濁凝。胸背皆痛。辛甘理陽已效。當此長夏。脾胃主令。崇其生氣。體旺病可全好。

六君子加益智木香

黃三 身居沿海。氣障霧露。客邪侵入。清陽陽傷。畏寒久嗽。病人不知却病護身。猶然用力承辦。裏結飲邪。沉痾不却。病 茯苓桂枝湯

胡四 脈沉而微。微則陽氣不足。沉乃寒水陰凝。心痛怔忡。漸及兩脇下墜。由陽衰不主運行。痰飲聚氣。欲阻致痛之來。其心震之謂。亦如披緘岳陽之義。議用外臺茯苓

飲合桂苓方。

臨證指南醫案 卷五 痰飲 主

人參 茯苓 半夏 枳實

桂枝 薑汁

白六 脈沉小。為陰濁飲邪。稟質陽不充旺。胸中清氣不得舒展。曠達。偶觸入寒冷。或悞進寒物。飲邪暴冷。凝結胸痞。當平日食物。忌用酒肉腥濁。便清陽流行。常服仲

景苓桂朮甘湯百劑。若病來因冷。即服大順散。

戴 病去神已爽慧。但本脈帶弦。平素有飲。為陽氣不足之體。年經漸多。防有風痺。此酒肉宜少用。勞怒當深戒。

矣。議外臺茯苓飲方。

人參 茯苓 廣皮 枳實

半夏 金石斛

朱九煩勞太過。陽傷。痰飲日聚。陽蹇脈空。病不成寐。衛陽失護。毛髮自墜。乃日就其衰奪矣。初進通飲。濁以甦陽。接服外臺茯苓飲。

吳氏脈弦背中冷。左偏微痛。食少欲嘔。四肢牽強。此飲邪內結。議通陽氣。

桂枝 茯苓 半夏 薑汁

炙草 大棗

某眩暈惡心。胸脘不爽。脈右弦左弱。面色紅亮。此乃痰飲上泛。有厥中之事。

臨證指南醫案 卷五 痰飲 薑

炒半夏 製蒺藜 橘紅 煨天麻

石菖蒲 茯苓 薑汁

尤口中味淡。是胃陽虛。夫濁陰下降。痛緩向。有飲濕為患。若不急進溫通理陽。濁陰必致復聚。議大半夏湯法。

人參 半夏 茯苓 枳實 薑汁

張七酒客穀少中虛。常進疎散表藥。外備之陽亦傷。其痰飲發時。胸中痞塞。自述或飢遇冷病來。其為陽氣受病。何疑。不必見痰搜逐。但護中焦脾胃。使陽氣健運不息。

陰滿痰涎。焉有矯踞之理。

生於朮 川桂枝 茯苓 煨薑渣

苡仁 澤瀉 薑棗湯法丸

王三脈沉為痰飲。是陽氣不足。濁陰欲蔽。當以理脾為先。俾中陽默運。即仲景外飲治脾之意。

苓桂朮甘加半夏陳皮水法丸

某三舌白咳逆不渴。非飲象而何。宜宣溫藥和之。

杏仁 苡仁 半夏 乾薑

粗桂枝 茯苓 厚朴 炙草

某食後脘中痞阻。按之漉漉有聲。手麻脇痛。心煩耳目昏眩。是氣不流行。痰飲內聚中焦。用桂苓九竹瀝薑汁法丸。

臨證指南醫案 卷五 痰飲 薑

又桂枝 人參 茯苓 半夏

廣皮 炙草

黃味過甘膩。中氣緩不主運。延綿百天。聚氣結飲。東垣云病久髮不焦。毛不落。不食不飢。乃痰飲為患。飲屬陰類。故不渴飲。仲景五飲互異。其要言不繁。當以溫藥和之。通陽方法。固無容疑。或大意外飲宜治脾。內飲治腎。是規矩準繩矣。議用苓桂朮甘湯。

某形體似乎壯實。陽氣外泄。畏風怯冷。脾陽消乏。不可健運水穀悍氣。蒸變痰飲。隧道日壅。上實下虛。仲景謂飲邪當以溫藥和之。苓桂朮甘得效。從外飲立方。

飲邪當以溫藥和之。苓桂朮甘得效。從外飲立方。

脾胃

人參 淡附子 生於朮 枳實

茯苓 澤瀉 荆瀝薑汁法丸

某 老人久嗽妨食。議以外飲治脾。苓桂朮甘湯

王三 脈沉背寒。心悸如墜。形盛氣衰。漸有痰飲。內聚當溫

通補陽方復辟。斯飲濁自解。

人參 淡附子 乾薑 茯苓

生於朮 生白芍

馬 陽虛則形寒汗出。痰飲痞聚。都是陰濁成形。乘陽氣

衰微。致上千竊。古人法則。必通其陽以掃陰氛。但宿

病無急攻方。况平素憂鬱。氣滯血滯。久耗之體。不敢純

臨證指南醫案 卷五 痰飲 去

剛防劫液耳

人參 熟附子 淡乾薑 炒川椒 川桂枝

烏梅肉 生白芍 另真武丸三兩

程四 左脈沉靜。右脈微弦。四旬清陽日薄。脾臟鼓運漸遲。

加以煩心。榮思。大穀悍氣。蘊蒸痰飲。仲景謂小飲當治

脾陽。况中年常有遺泄之患。按脈非龍相之動。搏議固

下益腎。轉旋運脾。二方分早晚服。早服從還少。聚精七

寶泰用丸方

熟地 菴蓉 枸杞 五味 萸肉 茯苓

山藥 芩絲 覆盆 魚膠 葛蒲 蓮志

龍骨 青鹽 熟蜜同棗肉搗丸。早服五七錢

茅朮 於朮 半夏 茯苓 廣皮 生益智

白朮 鈎藤 薑棗湯泛丸。晚服三錢。開水下

徐 清湯未展。濁陰欲踞。久延必結痰飲。議用真武丸。二

錢五分。人參一錢。煎湯送胃。陽得震。濁當退。避矣。十服

某 脈沉弦。飲泛哈咳。乃下虛無以制上。議早服腎氣丸。

攝納下焦。散失。以治水泛之飲。午服外臺茯苓飲。轉旋

中焦。使食不致釀痰。茯苓飲去朮

某七 高年久嗽。脈象弦大。寤不成寐。乃陽氣微濁。濁飲上

泛。仲景云。進溫藥和之。

臨證指南醫案 卷五 痰飲 去

杏仁 三錢 茯苓 二錢 川桂枝 一錢 生薑 一錢

苡仁 三錢 炙草 四分 大棗 二枚

顧四 咳嗽數月。嘔出涎沫。建中不應。已非營衛損傷。視其

面色鮮明。飲食仍進。倣飲邪主治。

小半夏湯加桂枝杏仁薑汁

李三 勞傷陽氣。內起痰飲。卧着氣鈍。飲阻。其效為多。痰出

稍通勢緩。且體常汗泄。非風寒表邪不解。並不熱湯。亦

非火炎燥金。仲景云。飲家而飲。當治飲。不當治飲。

陳 脈高小。舌白不渴。身動嘔痰。身如在舟車中。此寒熱

攻胃致傷。逆氣痰飲互結。通補陽明為正。白朮甘草守中。未能去濕。宜緩商。

人參汁 半夏 枳實汁 茯苓

竹瀝 薑汁

馬三 肌肉豐溢。脈來沉緩。始發右季脇痛。湯飲下咽。汨汨

有聲。吐痰涎頭痛。此皆脾胃陽微。寒濕滯聚。年方壯盛。不必介懷。溫中佐其條達。運通為宜。

茅朮 厚朴 半夏 茯苓 陳皮

淡薑渣 胡蘆巴 炙草 薑汁泛丸

馬四 甘緩頗安。辛泄不受。此陽分氣衰。將來飲邪日聚。然

臨證指南醫案 卷五 痰飲 芫

卧着效多。清氣失旋。先用芫桂朮甘湯。繼進外臺茯苓

飲

曹四 中年陽氣日薄。痰飲皆屬陰濁。上干清道。為衝逆咳

嗽。仲景治法。外飲治脾。內飲治腎。分晰甚明。昔年曾用

桂苓澤朮得效。是治支飲治法。數年真氣更衰。古人謂

飲邪當以溫藥和之。須忌治嗽肺藥。

先用小青龍去麻辛。接服外臺茯苓飲

程五 昔肥今瘦為飲。仲景云。脈沉而弦。是為飲家。男子向

老。下元先虧。氣不收攝。則痰飲上泛。飲與氣湧。斯為蒸

矣。今醫見嗽。誠以清肺降氣消痰。久而不效。更與滋陰

脾胃
虛飲逆

不明痰飲。皆屬濁陰之化。滋則堆砌。助濁滯氣。試述着

枕欬喘一端。知身體卧着。上氣不下。必下衝上逆。其痰

飲伏於至陰之界。腎臟絡病無疑。形寒畏風。陽氣微弱。

而籓離疎撤。仲景有要言。不煩曰。飲邪必用溫藥和之。

更分外飲治脾。內飲治腎。不讀聖經。焉知此理。

桂苓甘味湯 熟附都氣加胡桃

陳 痛久氣亂。陽微水穀不運。蘊釀聚濕。胃中之陽日薄。

痰飲水濕。必傾囊上湧。而新進水穀之氣。與宿邪再聚。

復出。致永無痊期。仲景云。飲邪當以溫藥和之。又云。不

渴者。此為飲邪未去故也。則知理陽通陽。誠有合於聖

臨證指南醫案 卷五 痰飲 芫

訓。斷斷然矣。 眞武湯

張四 痰飲喘咳。肌肉麻痺。痞脹不堪。納穀冬寒。日甚春暖

日減。全是陽氣已衰。陰濁逆干犯上。肺藥治嗽。無非辛

泄滋潤。蓋辛散則耗陽。滋清助陰。濁濁阻在陽分。氣不

肅。為夜不得卧。小青龍意。主乎由上以泄水寒。直從太

陽之裏以通膀胱。表中裏藥也。仲景謂飲邪當以溫藥

和之。驅陰邪以復陽。一定成法。 早腎氣去莖換白芍

炒脊炭水法丸 晚外臺茯苓飲薑棗湯法丸

程六 腎虛不納氣。五液變痰上泛。冬藏失職。此病為甚。不

可以肺咳消痰。常用八味丸。收納陰中之陽。暫時嗽飲。

用仲景桂苓味甘湯

孫 未交冬至一陽來復。老人下虛。不主固納。飲從下泛。氣阻升降。而為喘嗽。發散寒涼。苦瀉諸藥。焉得中病。仲景云。飲家而咳。當治飲。不當治咳。後賢每每以老人喘嗽。從脾腎溫養定論。是恪遵聖訓也。

桂枝 茯苓 五味子 甘草湯代水加淡薑棗

李 腸紅久病。不必攻治。今者氣衝喘嗽。腕脇痞阻。是飲濁上僭。最宜究悉。

川桂枝七分 茯苓 三錢 乾薑 一錢 五味子同薑合搗一錢

杏仁一錢 白芍 一錢 炙草 五分 生左牡蠣 三錢

臨證指南醫案 卷五 痰飲 全

腎陽虛 飲逆喘

吳二壯年下元久虛。收納氣泄。每交秋冬受冷。冷氣深入。伏飲夾氣上衝。為咳喘嘔吐。疎肺降氣不效者。病在腎絡中也。蓋精血少壯不旺。難以搜逐。病根不去。謂此絕

慾一年。小暑艾灸。靜養一百二十天。可愈。附都氣加車前。

潘九勞力喘甚。肩背惡寒。飲泛上逆。皆係下元虛損。莫以喘用瀉肺等藥。薛氏八味丸。

王 秋深天氣收肅。背寒喘咳。飲濁上泛。緣體中陽氣少。振不耐風露所致。最宜煖護背部。透通陽以治飲。

茯苓 桂枝 半夏 薑汁

改仁 炙草

又 早腎氣丸 夜真武丸

陳 脈虛微。春陽地升。濁陰上干。喘不得卧。治在少陰。

人參 淡熟附子 猪胆汁

又 照前方加淡乾薑一錢半

又 脈弦暮夜濁陰衝逆。通陽得效。議真武法以撤其飲。

人參 淡附子 生白芍 茯苓 薑汁

又 真武泄濁。脘通思食。能寐。昨宵已有渴欲飲水之狀。

考金匱云。渴者。飲邪欲去也。當健補中陽。以資納穀。

人參 生於木 淡附子 茯苓 澤瀉

臨證指南醫案 卷五 痰飲 全

又 早服腎氣丸四五錢。晚用大半夏湯。

人參 半夏 茯苓 薑汁

董 脈弦右濡。陽微惡寒。飲濁上干。咳吐涎沫。且食減胃

衰。寒疝竊踴。陰濁見症。豈止一端。喻嘉言謂濁陰上加

於天。非維照當空。氣霧焉得退避。反以地黃五味陰藥

附和共陰。陰霾冲逆。肆虛飲邪。滔天莫制。議以仲景熟

附配生薑法。掃羣陰以驅飲邪。維陽氣以立基本。况尊

年尤宜急護真陽為主。

人參 茯苓 熟附子 生薑汁 南棗

戴 十二月間。診得陽微。濁飲上干。為咳不能卧。曾用小

清龍湯減去麻黃細辛服後已得着枕而卧想更醫接
用不明治飲方法交驚發陽氣發泄病勢再熾頃診脈
來清弱無神痰飲咳逆未已諒非前法可效宗仲景真
武湯法以熟附配生薑通陽逐飲立法

真武湯去白朮加人參

計 不卧喘喘泛起白沫都是腎病議通太陽膀胱

茯苓 川桂枝 淡乾薑 五味子

白芍 炙草

顧 飲邪泛溢喘嗽督損頭垂身動喘甚食則腕中痞悶
卧則喘咳不得息肺主出氣腎主納氣一臟失司出納

臨證指南醫案

卷五

痰飲

全

失職議用早進腎氣丸三錢以納少陰晚用小青龍法

滌飲以通太陽經腑此皆聖人內飲治法與亂投賦補

有間矣 小青龍去麻辛甘芍加茯苓杏仁大棗

某 形盛面亮脈沉弦此屬痰飲內聚暮夜屬陰喘不得

卧仲景請飲家而咳當治其飲不當治咳今胸滿腹脹

小水不利當開太陽以導飲逆小青龍去麻辛台越婢

桂枝 半夏 乾薑 五味

杏仁 石膏 茯苓 白芍

某 服三拗湯音出喘緩可見苦寒沉降之謬素多嘔逆
下血中焦必虛而痰飲留伏顯然議治其飲

桂枝湯去甘草加杏仁茯苓以仁糖炒石膏
太陽經氣不開小水不利下肢腫浮漸上着枕氣塞

欲坐濁飲上干竟有坐卧不安之象醫者但以肺病刻
治於理未合急用小青龍法使膀胱之氣無阻礙濁飲
痰氣自無逆冲之患矣

桂枝 杏仁 乾薑 五味

半夏 茯苓

章 伏飲陰濁上干因春地氣主升而發嘔吐不飢自然

脾胃受傷六君子宜補方法未嘗不妙今診得吸氣甚

微小溲晨過喜癢足跗浮腫其腑中之氣開闔失司最

臨證指南醫案

卷五

痰飲

全

慮中滿夫太陽司開陽明司闔濁陰瀰漫通腑即是通

陽做仲景開太陽一法

牡蠣 澤瀉 防已 茯苓

五味 乾薑

張二哈喘咳坐不得卧神迷如呆氣降則清水寒飲邪上

冲膈中用逐飲開濁法

薑汁炒南星 薑汁炙白附子 茯苓

桂枝 炙草 石膏蒲

某三咳緩痰少流中不爽肌腠癢瘡皆濕邪未盡痰飲竊
歸之象當用六安法

<p>中虛濕 王 當年陽虛濁飲上泛喘急用真武湯九而效因平素嗜酒少穀中虛濕聚熱蘊蒸痰目黃靨血未可為實熱論治議方用外臺茯苓飲減甘草佐以微苦清滲理其濕熱以酒容忌甜故也</p>	<p>茯苓 四兩 人參 二兩 芍藥 四兩 枳實 一兩</p>	<p>牛夏 二兩 廣皮 二兩 金石斛 八兩 煮汁為丸</p>	<p>汪 面色鮮明腕中漾漾欲嘔因營動熱氣蒸為痰飲宜暫緩參術務清中焦熱痰</p>	<p>臨證指南醫案 卷五 痰飲 金 杏仁 枳實汁 橘紅 瓜蒌皮 鬱金 半夏 桔梗 黑梔皮</p>	<p>張氏 痰飲挾燥咳喉中癢 杏仁 花粉 茯苓 象貝母</p>	<p>橋紅 半夏 陳 痰飲挾氣火上踞脘痞脹不爽宜理氣熱 牛夏 茯苓 瓜蒌皮 黑梔皮 橋紅 鬱金</p>	<p>某 脈弦右澹面亮舌白口乾不喜飲頭重岑岑然脘脘痺寒而痛得嘔氣稍舒酒客穀少中虛痰飲聚蓄當此</p>
--	--------------------------------	--------------------------------	---	--	-------------------------------------	---	--

<p>夏令地氣上升飲邪挾氣上阻清空遂令前症之來金匱云脈弦為飲色鮮明者為留飲口乾不欲飲水者此為飲邪未去故也况熱熱汗出豈是風寒春夏溫邪辛溫發散為大禁自云身體空飄年已六旬又四辛散再泄其陽不亦左乎</p>	<p>牛夏 薑片 川連 吳萸 茯苓 枳實 竹瀝</p>	<p>潘 遠客路途風寒外受熱氣內蒸痰飲日聚於臟之外絡脈之中凡遇風冷或曝烈日或勞碌形體心事不寧擾動絡中宿飲飲泛氣逆咳嗽氣塞喉底胸膈不思食</p>	<p>臨證指南醫案 卷五 痰飲 金 物着枕嗜吐稠痰氣降自愈病名哮喘伏飲治之得宜除根不速到老年歲仍受其累耳 小青龍湯去細辛</p>	<p>童 背寒短氣背痛心胃腸入腹食粥噫氣脘痞瀉出黃沫飲邪伏濕乃陽傷竊發此溫經通絡為要緩用人參</p>	<p>胸次清 膈小旋 支脈結 厚朴 茯苓 川桂枝 生白朮 炒黑濁漆 炮黑川烏</p>	<p>葉 脈右弦舌黃不渴當心似阻昔形壯今漸瘦咳久不已卧着則咳痰出稍安此清陽少旋支脈結飲議通上焦之陽</p>
--	---------------------------------	---	--	--	--	---

鮮薤白 瓜蒌皮 半夏 茯苓

川桂枝 薑汁

楊 頭中冷痛食人不消筋脈中常以掣痛此皆陽微不

主流行痰飲日多氣隨日結致四末時冷先以微通胸

中之陽

乾薤白 桂枝 半夏 茯苓

瓜蒌皮 薑汁

又 微通其陽已效痰飲阻氣用茯苓飲去廣皮加薑汁

程三 支脈聚飲寒月喘甚初因寒濕而得故食辛稍安

杏仁 半夏 厚朴 苡仁

臨證指南醫案

卷五 痰飲

矣

茯苓 薑汁法丸

趙 支飲脇痛咳逆 小青龍去麻辛

汪氏 支脈結飲阻氣喘脹人脇則痛厥逆為眩

茯苓 桂枝 半夏 杏仁

鬱金 糖炒石膏

黃 支脈結飲發必喘急病發用

桂枝 茯苓 五味 炙草

馮 懸飲流入胃中令人酸痛湧噎酸水當辛通其陽以

聖飲

桂枝木 半夏 茯苓 炒黑川椒 薑汁

又 照前方加淡附子

施 診脈右虛左小弦面色黃少華采左脇肋痛五六年

未愈凡久恙必入絡絡主血藥不宜剛病屬內傷勿事

膩補錄仲景旋覆花湯加栝子仁歸鬚桃仁

又 初服旋覆花湯未應另更醫謂是營虛用參歸熟地

桂芍炙草服後大痛醫又轉方用金鈴半夏桃仁延胡

茯苓服之大吐大痛復延余治余再議方謂肝絡久病

懸飲流入胃絡致痛不已議太陽陽明開闔方法

人參 茯苓 炙草 桂枝

煨薑 南棗

臨證指南醫案

卷五 痰飲

矣

服苦藥痛嘔可知胃虛以參苓開陽明用草桂閉太

陽并辛香入絡用薑棗通管衛生薑恐伐肝故取煨

以護元氣而微開飲氣也

又 前方服之痛止議丸方

人參 半夏 川椒 茯苓

桂枝 煨薑兩棗湯丸

某 夏季陽氣大升痰多喘咳甚至夜不得卧穀味皆變

大便或溏或秘診脈右大而弦議以懸飲流入胃絡用

開闔導飲法

人參 茯苓 桂枝 炙草

煨薑 南棗

又 早診脈兩手皆弦右偏大凡痰氣上湧咳逆愈甚日
來小溲少下焦微腫議通太陽以撤飲邪

人參 茯苓 桂枝 炙草

五味 乾薑

又 脈弦畧數不渴不思飲此飲濁未去清陽不主運行
前方甘溫主平開胃能令胃喜次法開太陽以撤飲邪
亦主陽通據自述心下胃口若物阻呆滯其濁錮陽微
大著其治咳滋陰適為陰濁橫軼矣議用大牛夏湯法
大牛夏湯加炒黑川椒

臨證指南醫案 卷五 痰飲 全

內經止有積飲之說本無痰飲之名兩漢以前謂之
痰飲仲景始分痰飲因有痰飲懸飲溢飲支飲之義
而立大小青龍半夏桂枝甘腎氣等湯以及內飲
外飲諸法可謂闡發前賢獨超千古與後人所立風
痰濕痰熱痰酒痰食痰之法迥異總之痰飲之作必
田元氣虧乏及陰盛陽衰而起以致津液凝滯不能
輸布留於胸中水之清者悉變為濁水積陰則為飲
飲疑陽則為痰若果真元充足胃強脾健則飲食不
失其度運行不停其機何痰飲之有故仲景云病痰
飲者當以溫藥和之乃後人不知痰飲之義妄用涼

痰丸茯苓丸消痰破氣或滋填臟補等法大傷脾胃
性助助濁其於仲景痰飲之法豈不大相乖謬乎然
究與飲雖為同類而實有陰陽之別陽盛陰虛則水
氣凝而為痰陰盛陽虛則水氣溢而為飲故王晉三
先生取仲景之小半夏茯苓及外臺飲三湯從脾胃
二經分痰飲立治法而先生又取仲景之苓桂朮甘
外臺茯苓飲腎氣丸真武湯分內飲外飲治法而於
痰飲之症無遺蘊矣愚歷考先生治痰飲之法則又
有不正於此者然而病變有不同治法亦有異如脾
腎陽虛膀胱氣化不通者取仲景之苓桂朮甘湯茯苓

臨證指南醫案 卷五 痰飲 全

苓飲腎氣真武等法以理陽通陽及固下益腎轉旋
運脾為主如外寒引動宿飲上逆及膀胱氣化不通
飲逆肺氣不降者以小青龍合越婢等法開太陽勝
肱為主如飲邪伏於經絡及中虛溼熱成痰者則有
川烏蜀漆之溫經通絡外臺茯苓飲去甘草少佐苦
辛清滲理濕之法其飲邪上冲膈中及懸飲流入胃
中而為病者又有薑附南星菖蒲旋覆川椒等驅飲
咽濁辛通陽氣等法絲絲入筵一以貫之病情治法
啻有成竹矣非深於得道者其孰能之 經九

卷六

鬱

肝火

不寐

錯

三消

脾痺

瘧

瀉

臨證指南醫案

卷六目

臨證指南醫案卷六

許嗣李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲全較

姪旦玉堂

鬱

五鬱損心陽陽墜入陰為淋瀝由情志內傷即為陰虛
致病見症亂治最為庸劣心藏神神耗如憤諸般失司
非偏寒偏熱藥治必得開爽莫有向安服藥以草木功
能恐不能令其歡悅 妙香散

臨證指南醫案 卷六 鬱

陸二 人參 桔梗 烏藥 木香 各三分磨汁

又 夜服白金丸

又 入鬱心脾氣結利痰佐以益氣

人參 石菖蒲 龍骨 棗仁

遠志 茯神

胡六 悲泣乃情懷內起之病病生於鬱形象漸大按之堅

硬正在心下用苦辛泄先從氣結治

川連 乾薑 半夏 薑汁

茯苓 連皮瓜蒌

李九 老年情志不適醫則少火變壯火知飢脘中不爽口

舌糜為心脾營損。木火劫燥精華。肌肉日消。惟怡悅開爽。內起鬱熱。可平。但執清火苦藥。非調情志。內因鬱熱矣。

金石斛 連翹心 炒丹皮 經霜桑葉

川貝 茯苓

接服養心脾之營。少佐苦降法。

人參 川連 炒丹皮 生白芍

小麥 茯神

某 腕痛已止。味酸乃肝鬱也。

金石斛 黑山梔 丹皮 半夏麴

臨證指南醫案 卷六

橘紅 枇杷葉

某 初起左邊麻木。舌強筋弔。腦後痲痰阻咽。此係肝風上引。必由情懷鬱勃所致。

羚羊角 連翹心 鮮生地 玄參

石菖蒲 鬱金汁

某 氣鬱不舒。木不條達。變則少寬。

逍遙散去白朮加香附

某 肝鬱成熱。加味逍遙去白朮加鬱金

某 鬱熱吞酸。溫胆湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

沈 脈虛清情懷失暢。肝脾氣血多鬱。午載不愈。難任峻

劑。議以局方逍遙散。兼服補中益氣。莫以中宮虛寒為

泥。吳十勞倦。嗔怒致傷。病在肝脾。久有腦泄。髓脂暗損。暫以解鬱。繼當宜補。

解鬱。繼當宜補。

鈎藤 生香附 丹皮 桑葉

神麴 白芍 茯苓 廣皮

葉氏 恒鬱動肝。致病久則延及脾胃。中傷不納。不知味。火風變動。氣橫為痛。為脹。疎泄失職。便秘忽瀉。情志之鬱。藥難霍然。數年久病。而兼形瘦液枯。若再香燥劫奪。必變格拒中滿。與辛潤少佐和藥。

臨證指南醫案 卷六

栝子仁 川楝子 生白芍

小川連 川楝子

某 惱怒肝鬱。思慮脾傷。胃氣不舒。痰不成寐。宗薛氏注

治之

人參 黃芪 熟於朮 茯神 棗仁 桂圓肉

當歸 炙草 黑山梔 丹皮 遠志

戴氏 隱情曲意不伸。是為心疾。此草木攻病。難以見長。乃

七情之鬱損。以丹溪越鞠方法

香附 川芎 小川連 茯苓

半夏 橘紅 炒查肉 神蘇聖丸

神蘇聖丸

神蘇聖丸

神蘇聖丸

神蘇聖丸

程 脈弦澀。外寒內熱。齒痛舌乾無寐。乃肝脾鬱結不舒。

鬱金 鈎藤 丹皮 夏枯草

生香附 薄荷 廣皮 茯苓

肝經鬱 吳一 操持過動。肝胆陽升。胃氣日減。脈應左搏。從鬱熱治。

丹皮 黑山梔 薄荷梗 鈎藤

廣皮 白芍 茯苓 神麴

陸二 鬱傷筋脈心痛

鈎藤 生香附 鬱金 白蒺藜

丹皮 薄荷 廣皮 茯苓

肝經鬱 王三 勞怒傷陽。氣逆血鬱致痛。痞脹便溏。風木侮土。前方

臨證指南醫案 卷六 鬱 四

既效。與通補陽明厥陰。

大半夏湯加茯苓仁。仁當歸。葛根湯法。

肝經鬱 朱三 因抑鬱悲泣。致肝陽內動。陽氣變化火風。有形有

質。胸中咽。自覺為者。非真寒也。內經以五志過極皆火。

但非六氣外來。不連之屬。不能制伏。固當柔緩以瀉之。

合乎肝為剛臟。濟之以柔。亦和法也。

生地 天冬 阿膠 茯苓 川斛

牡蠣 小麥 人中白 熬膏

道四 鬱勃日久。五志氣火上升。胃氣逆則虎閱不舒。肝陽

上。管風火凌竅。必旋暈咽痺。自覺為者。非真寒也。昔氣

痺不通之象。病能篇以諸禁鼓慄屬火。丹溪謂上升之

氣從肝胆相火非無據矣。

生地 阿膠 玄參 丹參

川斛 黑櫛豆皮

肝經鬱 朱氏 脈弦右大。乳房刺痛。經阻半年。若遇勞怒。腹滿逆氣

上衝。此邪鬱既久。少火化為壯火。氣鈍不循胞脈。遂痺

治以泄少陽補太陰。氣血流利。鬱熱可解。

人參 柴胡 當歸 白朮

丹皮 甘草 茯苓

肝經鬱 吳三 脈弦滿數。頸項結癭。咽喉痛腫阻痺。水穀難下。此皆

臨證指南醫案 卷六 鬱 五

情志鬱勃。肝胆相火內風。上循清竅。雖清熱直降。難制

情懷之陽。是以藥勿效也。

鮮枇杷葉 射干 牛蒡子 蘇子

大杏仁 紫降香

朱 情懷怏鬱。五志熱蒸。痰聚阻氣。腕中窄隘不舒。脹及

背部。上焦清陽欲結。治肺以展氣化。務宜怡悅開懷。莫

令鬱痺綿延。

鮮枇杷葉 杏仁 瓜蒌皮 鬱金

半夏 茯苓 荷汁 竹瀝

又 脈左大弦數。頭目如蒙。背俞脹。都是鬱勃熱氣上

升氣有餘便是火治宜清上

羚羊角 夏枯草 青菊葉 瓜蒌皮

杏仁 香附 連翹 山梔

又 苦辛清解鬱勃頭目已清而胸暖氣頗覺穢濁此肝
胆厥陽由胃系上冲所致丹溪謂上升之氣自肝而出
是其明徵矣

川連 薑汁 半夏 枳實

桔梗 橘紅 瓜蒌皮

吳氏 氣血鬱滯久乃化熱。女科八脈失調漸有經阻痘帶
諸疾但先治其上勿滋膩氣機

臨證指南醫案 卷六 鬱

黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

徐氏 火升頭痛來去無定期咽喉垂下心悸二便不爽帶
下不已固奇經通補陽明及養肝熄風展轉未能却病

病從情志內傷治法惟宜理偏議先用滋腎丸三錢早
上淡鹽湯送四服

虞三脈數舌白神呆得之鬱怒

犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯神

王三痰多咽痛頻遭家難鬱傷心中空澗嗆達不已鬱與

胃藥 金匱麥門冬湯

陸二病起憂慮上損兩年調理幾經反覆今夏心胸右脇
之間常有不舒之象此氣血內鬱少展支脈中必有痰
飲氣阻是宜通流暢脈絡夏季宜進商矣

天竺黃 茯神 鬱金 橘紅 遠志

石菖蒲 丹參 琥珀 竹瀝法丸

趙六脈左瀉右弦始覺口鼻中氣觸腥穢今則右脇板痛
呼吸不利卧着不安此屬有年鬱傷治當宣通脈絡

金鈴子 延胡 桃仁 歸鬚

鬱金 降香

臨證指南醫案 卷六 鬱

王女陰虛齒衄腸血未出關鬱熱為多與養肝陰方

生地 天冬 阿膠 女貞子

旱蓮草 白芍 茯神 烏骨雞

張六情志連遭鬱勃臟陰中熱內蒸舌絳赤糜乾燥心動
悸若飢食不加餐內傷情懷起病務以寬懷解釋熱在
至陰鹹補苦泄是為醫藥

雞子黃 清阿膠 生地 知母

川連 黃柏

肝腎液 厥陰少陰臟液乾涸陽升結滯於喉舌皆心境失暢
所致藥無效者病由情懷中來草木涼藥僅能治六氣

外來之偏耳

熟地 女貞 天冬 霍山石斛

栝子仁 茯神

五臟氣 六久鬱氣血不行。升降皆鈍。外涼內熱。骨節沉痛。肌腫

腹膨。膚腠無汗。用藥務在宣通五臟六鬱大旨。

香附汁 白茯苓 鈎藤 丹皮 山梔

撫芎 澤蘭 薑黃 神麴

金 氣血久鬱成熱。腕脇痺悶不通。常有風疹腹痛。痰痺

已深。發時宜用通聖一劑。平時以通調氣熱之鬱。

土瓜萋皮 枇杷葉 黑山梔 鬱金

臨證指南醫案

卷六

八

桃仁 杏仁

楊 驚惶忿怒。都主肝陽上冒。血沸氣滯。痰濁宜宣通以

就下。因悞投止塞。舊痰不清。新血又瘀絡中。匝月屢屢

反覆。究竟肝胆氣血皆鬱。仍宜條達宣揚。滿瘍在肌。得

體中稍健設法。

旋覆花 新絳 青葱管 炒桃仁 栝子仁

趙氏 癩癧寒熱盜汗。腕中痠聚。經期不來。大便澀滯。咳減

食。春深至冬未痊。此乃鬱損成勞。難治之症。

香附 丹皮 歸身 白芍

川貝 茯苓 牡蠣 夏枯草

胡氏 頭項結核。暮夜寒熱盜汗。此乃憂鬱不解。氣血皆虛。

倘若經阻。便難調治。

炒當歸 炒白芍 炙草 廣皮

茯神 鈎藤 南棗

張氏 據說喪子悲哀。是情志中起。因鬱成勞。知創不能食。

內珠忽陷。忽脹。兩脇忽若刀刺。經先期。色變瘀紫。半年

來醫藥無效者。情懷不得解釋。草木無能為矣。

人參 當歸 生白芍 炙草

肉桂 炒杞子 茯苓 南棗

素問六元正紀大論。言五鬱之發。乃因五運之氣有

臨證指南醫案

卷六

九

太過不及。遂有勝復之變。由此觀之。天地且有鬱。而

况於人乎。故六氣着人。皆能鬱而致病。如傷寒之邪。

鬱於衛。鬱於營。或在經。在腑。在臟。如暑濕之蘊結在

三焦。瘟疫之邪。客於募原。風寒濕三氣雜感而成痺

症。總之邪不解散。即謂之鬱。此外感六氣而成者也。

前人論之詳矣。今所輯者。七情之鬱居多。如思傷脾

怒傷肝之類是也。其原總由於心。因情志不遂。則鬱

而成病矣。其症心脾肝胆為多。案中治法。有清泄上

焦。瀉火。或宣暢少陽。或開降肺氣。通補肝胃。泄胆補

脾。宣通脈絡。若熱鬱至陰。則用鹹補苦泄。種種治法。

未能按症分析詳論。今舉其大綱。皆因鬱則氣滯。氣滯久則必化熱。熱鬱則津液耗而不流。升降之機失度。初傷氣分久延血分。延及鬱勞沉疴。故先生用藥大旨。每以苦辛涼潤宣通。不投燥熱。飲瀉呆補。此其治療之大法也。此外更有當發明者。鬱則氣滯。其滯或在形軀。或在臟腑。必有不舒之現症。蓋氣本無形。鬱則氣聚。聚則似有形。而實無質。如胸膈似阻。心下虛痞。脅脹背脹。腕悶不食。氣瘦攻衝。筋脈不舒。醫家不察。誤認有形之滯。放膽用破氣攻削。迨至愈治愈。轉方又屬呆補。此不死於病。而死於藥矣。不知情

臨證指南醫案 卷六 醫

十

志之鬱。由於隱情曲意不伸。故氣之升降閉闔。樞機不利。雖內經有泄折達發奪五鬱之治。猶慮難獲全功。故疏五過論。有始富後貧。故貴脫勢。總屬難治之例。蓋鬱症全在病者能移情易性。醫者構思靈巧。不重在攻補。而在乎用苦泄熱。而不損胃。用辛理氣。而不破氣。用滑潤濡燥。而不滋膩氣機。用宣通而不擾苗助長。庶幾或有倖成。若必欲求十全之治。則惟道家有一言可以蔽之曰。欲要長生。先學短死。此乃治鬱之金丹也。華岫雲

肝火

風火上 秦氏年前肝風眩暈。主以涼血分。和陽熄風。一年未發。今歲正月春寒。非比天暖開泄。此番病發。必因勞怒觸動情志。至於嘔逆微冷條熱。交丑寅漸作耳鳴咽痺。食納久留腕中。想少陽木火盛於寅。膽脈貫耳。犯逆之威。必向陽明而後上。憑諸竅。脈右濇大。胃逆不降。食味不甘。而腕中逆亂。薰蒸日熾。營血內耗。無以養心。斯寤不肯寐。心搖蕩漾。有難以鳴狀之象。今頭重腕痺。全是上焦為木火升騰。阻遏清陽。前方滋清。血藥居多。必不奏功。

臨證指南醫案 卷六 肝火

十一

今議湯劑方。以苦降其逆。辛通其痺。然湯宜小。其製度以久病體虛。初春若此。冬藏未為堅固。可知其丸劑當以局方龍薈丸。暫服半月再議。

連翹一錢 黑梔皮一錢 羚羊角一錢 鮮菊葉三錢

紫苑二錢 鬱金八分 大杏仁 去皮尖勿研六粒

土瓜萹皮一錢 鮮菖蒲根四分 午服

沈女腹痛少減。嘔逆已止。上焦熱下焦冷。肝陽尚未和平。擬進當歸龍薈法。

當歸 龍胆草 川棟子 蘆薈
川連 吳萸 大茴

黃氏 肝脈風火上鬱。頭面清空之筋掣不和。治以清散。

羚羊角 犀角 山梔 連翹

瓜蒌皮 荷葉梗 薄荷梗 青菊葉

鄭氏 筋脈神迷。經脈抽痛。脹悶不欲納食。一月經期四至。

此鬱傷氣血成病。龍膏丸二錢五分三服。

葉氏 厥陽擾亂神明。經色已黑。肢冷面青便秘。

龍膏丸一錢二分十服

勞心陽 動水火 上蒙 關十誦讀吟咏。身雖靜坐而心神常動。凡五志之動皆陽。

陽胃無制。清靈遂蒙。易旨以蒙乃外加之義。述病發之時。頭中欲指。腕欲撫摩。二便必不自利。此腑氣之窒。由

臨證指南醫案 卷六 肝火 主

乎肝胆厥佛逆起見矣。議從手經上焦治。

羚羊角 連翹心 玄參 石菖蒲根

鬱金 麥冬 竹葉

唐女 脈左瀆右弦。氣火不降。胸脇隱痛。腕不爽最慮失血。

川貝 山梔 丹皮 鬱金汁

鈎藤 瓜蒌皮 茯苓 橘紅

又 氣火上鬱。腕中空痛。嘔涎。先以開通壅遏。

香豉 瓜蒌皮 山梔 鬱金

竹茹 半夏麴 杏仁

嗔怒喧嚷。氣火逆飛。致血痺咽痛。食物厭惡。耳前後

達耳閃刺。議解少陽。

夏枯草 丹皮 桑葉 鈎藤

山梔 地骨皮

肝腎虛 虛風陽 主升 朱四 頭痛神煩。忽然而至。五行之速。莫如風火。然有虛實。

內外之因。非徒發散苦寒為事矣。如向有肝病。目疾。夜

明。是陰氣久傷體質。今厥陰風木。司天春深。發泄陽氣。

暴張。即外感而論。正內經冬不藏精。春必病溫。育陰可

使熱清。大忌發散。蓋陰根久傷。表之再傷。陽劫津液。仲

景謂一逆尚引日。再逆促命期矣。余前主阿膠雞子黃

湯。佐地冬。壯水。乃甘培土。亟和其厥陽衝迎之威。鹹味

臨證指南醫案 卷六 肝火 主

入陰。甘緩其急。與內經肝病三法恰合。今已入夏三日。

虛陽條上。煩躁頭痛。當大滋腎母。以甦肝子。補胃陰以

杜木火乘侮。旬日不致反覆。經月可望全好。

人參 熟地 天冬 麥冬

龜膠 阿膠 北味 茯神

陸 鼻左竅有血。左肩脚臂痛。皆君相多動。營熱氣偏。脈

得右虛左數。先以清肝通絡。

丹皮 山梔 羚羊角 夏枯草

蚕沙 鈎藤 連翹 青菊葉

肝者將軍之官。相火內寄。得真水以涵濡。真無以制

伏。木火遂生生之機。本無是症之名也。蓋因情志不舒。則生鬱。言語不投。則生嗔。謀慮過度。則自竭。斯罷極之本。從中變火。攻衝激烈。升之不熄。為風陽抑而不透。為鬱氣。腕脇脹悶。眩暈猝厥。嘔逆淋閉。狂躁見紅等病。由是來矣。古人雖分肝風肝氣肝火之殊。其實是一源。若過鬱者宜辛宜涼。乘勢達之為安。過升者宜柔宜降。緩其旋擾為先。自竭者全屬乎虛。當培其子母之臟。至於犯上侮中。乘下諸累。散見各門。可攻。 御新甫

臨證指南醫案

卷六

肝火

十四

不寐

倪 多痛陽升。陰液無以上注。古澗赤絳。煩不成寐。當益

腎水以制心火。

鮮生地 玄參 麥冬 菉豆皮

銀花 竹葉心

吳 少陽鬱火不寐。

丹皮 牛夏 鈎藤 桑葉

茯苓 橘紅

程氏 上晝氣逆填脫。子夜寤不肯寐。乃陽氣不降。議用溫

臨證指南醫案

卷六

不寐

十五

膽湯 溫膽去思實加金斛 滾痰丸二錢五分

陽證

顧四 鬚鬢已蒼。面色已光亮。操心煩勞。陽上升動。痰飲亦得

上溢。靈樞云。陽氣下交入陰。陽躡脈滿。令人得寐。今氣

越外。泄陽不入。陰勉飲酒醪。欲其神昏假寐。非調病之

法。程凡中年已後。男子下元先損。早上宜用八味丸。暇

時用牛夏秋米湯。

某 陽不交陰。夜卧寐躁。小半夏湯。

趙氏 嘔吐眩暈。肝胃兩經受病。陽氣不交於陰。陽躡穴空。

寤不肯寐。靈樞方半夏秋米湯主之。

又 接用人參溫膽湯。

某四脈滿不能充長肌肉夜寐不適脾胃消索無以灌溉故耳當用歸脾湯意溫之

楸黃芪 於木 茯神 遠志 棗仁

當歸 炙草 桂圓 新會皮

某肝陽不降夜無寐進酸棗仁法

棗仁 知母 炙草 茯神

小麥 川芎

某不寐六十日溫胆諸藥不效嘔痰不適明係陽升不降用金匱酸棗仁湯

棗仁 知母 茯苓 川芎 炙草

臨證指南醫案 卷六 不寐 六

陳陰精走泄復因洞瀉重亡津液致陽暴升胃逆食入欲嘔神識不靜無寐議酸棗仁湯

棗仁 五錢 炙草 五分 知母 二錢 茯苓 二錢

某三寤不成寐食不甘味脛麻脈細數清陰液內耗厥陽外越化火化風燥燥煽動此屬陰損最不易治姑與仲

景酸棗仁湯

秦仁 炒黑勿 研三錢 知母 一錢 雲茯神 三錢

生甘草 五分 川芎 五分

田臟液內耗心腹熱灼陽氣不交於陰陽蹇穴空令人寤不成寐靈樞有半夏秫米法但此病乃損及肝腎欲

求陽和須介屬之酸佐以酸收甘緩庶幾近理

龜膠 淡菜 熟地 黃柏

茯苓 黃肉 五味 遠志

又酸苦酸收已效下焦液枯須填實肝腎

龜鹿膠 熟地 茯苓 天冬

萸肉 五味 茯苓 羊內腎

不寐之故雖非一種總是陽不交陰所致若因外邪而不寐者如傷寒瘧疾等暴發營衛必然窒塞升降

必然失常愁楚呻吟日夜難安富速去其邪按外即

所以安內也若因製病而不寐者或焦煩過度而離

臨證指南醫案 卷六 不寐 七

宮內燃從補心丹及棗仁湯法或憂勞積鬱而耗損

心脾宗養心湯及歸脾湯法或精不凝神而龍雷震

蕩當壯水之主合靜以制動法或肝血無藏而魂搖

神漾有鹹補甘緩法胃病則陽蹇穴滿有靈樞半夏

秫米湯法磨熱則口苦心煩前有溫胆湯先生又用

桑葉丹皮山梔等輕清少陽法營氣傷極人參八乳

並行陽浮不攝七味八味可選餘如因驚且鎮因怒

宜速飲食痰火為實新產病後為虛也 邵新甫

饑

陽升饑雜

麥冬 三錢 生地 二錢 柏子仁 一錢 川斛 三錢

茯神 三錢 黑檀豆皮 三錢

某 心中煩熱。頭上汗泄。汗止自安。易饑。

淮小麥 柏子仁 茯神 炙草

南棗 辰砂

程氏 血虛心饑。咽哈。

生地 天冬 麥冬 女貞子

臨證指南醫案 卷六 饑 九

生白芍 炙草 茯神 麻仁

某氏 經半月一至。夜饑痛。

生地 阿膠 天冬 茯神

白芍 丹參

饑有虛實真偽。其病總在於胃。經云。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。又云。脾與胃以膜相連耳。又云。脾主爲胃行其津液者也。由此觀之。脾屬陰。主乎血。胃屬陽。主乎氣。胃易燥。全賴脾陰以和之。脾易濕。必賴胃陽以運之。故一陰一陽互相表裏。冲和之德。而爲後天生化之源也。若脾陰一虛。

則胃家飲食遊溢之精氣全輸於脾。不能稍留津液。以自潤。則胃過於燥而有火矣。故欲得食。以自資。稍遲則饑雜愈甚。得食則饑可暫止。若失治。則延便閉。三消噎膈之症。治宜補脾陰。養營血。兼補胃陰。甘涼濡潤。或稍佐微酸。此乃脾陰之虛。而致胃家之燥也。更有一切熱病之後。胃氣雖漸復。津液尚未充。亦有是症。此但以飲食調之。可以自愈。此二種乃爲虛饑。症所謂實者。年歲壯盛。脾胃生發之氣。與腎陽充旺。食易消。多食易饑。而饑得食即止。此非病也。不必服藥。以上皆其真饑。症所云偽者。因胃有痰火。以致

臨證指南醫案 卷六 饑 九

飲食輪化不清。或現惡心吞酸。或煩眩暈。少寐。似似非饑。雖飽食亦不能止。此乃痰火爲患。治宜清胃。積佐降痰。苦寒及風滯之藥。不宜多用。又有胃陽衰微。以致積飲內聚。水氣泛溢。似有凌心之狀。凄凄戚戚。似酸非酸。似辣非辣。飲食減少。此屬脾胃陽虛。治宜溫通。彼痰飲門而治之。此二種乃似饑之偽症。若夫所云心饑者。誤也。心但有煩。而無饑。胃但有饑。而無煩。亦不可不辨明之。今先生之法。僅有四案。倘好善之士。更能搜採補入。則幸甚。華岫雲

三消

腎火

計四能食善飢渴飲日加癯瘦心境愁鬱內火自燃乃消症大病

生地

知母

石膏

麥冬

生甘草

生白芍

煩勞心

王五肌肉瘦減善飢渴飲此久久煩勞壯盛不覺體衰病發皆內因之症自心營肺衛之傷漸損及乎中下按脈偏於左搏管絡虛熱故苦寒莫制其烈甘補無濟其虛是中上消之病

臨證指南醫案

卷六 三消

三

犀角 三錢

鮮生地 兩

玄參 心 二錢

鮮白芍 參 二錢

麥冬 二錢

柿霜 一錢

生甘草 分 四

鮮地骨皮 錢 三

又 固本加甜沙參

肝陽化

楊二肝風厥陽上冲眩暈犯胃為消

石膏

知母

阿膠

細生地

生甘草

生白芍

某 液涸消渴是臟陰為病但胃口不醒生氣易振陽明

陽土非甘涼不復肝病治胃是仲景法

人參

麥冬

粳米

佩蘭葉

川斛

陳皮

胡五元陽變動為消與河間甘露飲方 河間甘露飲

錢十陽動消燥甘緩和陽生津

生地

炙黑甘草

知母

麥冬

棗仁

生白芍

楊六渴飲頻飢漫瀉渾濁此屬腎消陰精內耗陽氣上燔

舌碎絳赤乃陰不上承非多熱宜此乃臟液無存宜是

平常小恙

熟地

萸肉

山藥

茯神

牛膝

車前

某 脈左數能食 六味加二冬龜版女貞旱蓮川斛

臨證指南醫案

卷六 三消

三

王四形瘦脈搏渴飲善食乃三消症也古人謂入水無物

不長入火無物不消河間每以益腎水劑心火除腸胃

激烈之燥濟身中津液之枯是真治法 玉女煎

姜五經管無有不勞心心陽過動而腎陰暗耗液枯焉愈

燔灼比入火之物必消燥乾枯是能食而肌肉消瘠用

景岳玉女煎

三消一症雖有上中下之分其是不越陰陽九津

涸熱溢而已致古治法唯仲景之腎氣丸助真火蒸

化上升津液本事方之神効散取水中鹹寒之物遂

其性而治之二者可謂具通天手眼萬世準繩矣他

如易簡之地黃引子朱丹溪之消渴方以及茯苓丸
黃芪湯生津甘露飲皆錯雜不一毫無成法可遵至
先生則範於法而不囿於法如病在中上者煎膜之
地而成煖原之場即用景岳之玉女煎六味之加一
父龜甲旱蓮一以清陽明之熱以滋少陰一以救心
肺之陰而下通真液如元陽變動而為消燥者即用
河間之甘露飲生津清熱潤燥養陰甘緩和陽是也
至于壯水以制陽光則有六味之補三陰而加車前
牛膝導引肝腎樹酌變通斯誠善矣 新滋丸

臨證指南醫案 卷六 三消 三

脾瘕

中虛伏

某 無形氣傷熱邪蘊結不飢不食豈血分膩滯可投口
甘一症內經稱為脾瘕中焦困不轉運可知

川連 淡黃芩 人參 枳實

淡乾薑 生白芍

某 口甜是脾胃伏熱未清宜用溫胆湯法

川連 山梔 人參 枳實

花粉 丹皮 橘紅 竹茹

生薑

臨證指南醫案 卷六 脾瘕 三

口甘一症內經謂之脾瘕此甘非甘美之甘糧即熱
之謂也人之飲食入胃賴脾真以運之命陽以腐之
譬猶造酒蒸釀者然倘一有不和肥甘之疾頓發五
液清華失其本來之真味則滯滯之甜味上泛不已
也胃脘必痞口舌必膩不飢不食之由從此至矣內
經設一蘭草湯其味辛足以散結其氣清足以化濁
除陳解鬱利水和營為奇方之祖也夾暑夾溼之候
每兼是患以此為君參以苦辛之勝配合瀉心等法
又如胃虛穀少之人亦有是症又當宗大牛夏湯及
六君子法遠甘益辛可也 邵新甫

脾瘴症經言因數食甘肥所致。蓋甘性緩肥性膩。使脾氣過鬱。致有口甘內熱中滿之患。故云治之以蘭除陳氣也。陳氣者即甘肥釀成陳腐之氣也。夫蘭草即為佩蘭。俗名為省頭草。婦人插於髻中以辟髮中油穢之氣。其形似馬蘭而高大。其氣香其味辛。其性涼亦與馬蘭相類。用以醒脾氣。滌甘肥也。今二案中雖未曾用。然用人參以助正氣。餘用苦辛寒以開氣。泄熱枳實以理氣滯。亦祖蘭草之意。即所謂除陳氣也。此症久延。即化燥熱。轉為消渴。故前賢有膏粱無厭。發癰疽熱燥所致。淡蕪不堪生腫脹。寒濕而然之。

臨證指南醫案 卷六 脾瘴 語

論余於甘肥生內熱一症。悟出治胃寒之一法。若貧人淡薄茹素。不困外邪。亦非冷飲停滯。其本質有胃寒症者。人皆用良薑丁香。藜蘆吳萸乾薑附子等。以溫之。不知辛熱剛燥能散氣。徒使胃中陽氣逼而外泄。故初用似效。繼用則無功。莫若漸以甘肥投之。或稍佐鹹溫。或佐酸溫。凝養胃陽。使胃脂胃氣日厚。此所謂藥補不如食補也。又有腎陽胃陽兼虛者。曾見久服鹿角膠而愈。即此意也。未識高明者。以為然否。

華嶠

瘧

孫 陰氣先傷。陽氣獨發。猶是伏暑內動。當與金匱瘧瘵同例。

竹葉 麥冬 生地 玄參

知母 梨汁 蔗漿

施 發熱身痛。咳喘。暑濕外因。內阻氣分。有似寒慄。皆肺病也。

竹葉 連翹 薄荷 杏仁

滑石 鬱金汁

臨證指南醫案 卷六 瘧 語

又 微寒多熱。舌心乾。渴飲。尿不爽。此屬瘧瘵。治在肺經。

杏仁 石膏 竹葉 連翹

干夏 橘紅

程 陰氣先傷。陽氣獨發。有瘧熱無寒之慮。

鮮生地 知母 麥冬 竹葉心 滑石

唐 未病形容先瘦。既病暮熱早涼。猶然行動安舒。未必真正重病傷寒也。但八九日。病來小愈。驟食粉糲腥麪。

當宗食穀發熱。損穀則愈。仲景未嘗立方。此腹痛洞瀉。食滯阻其腸胃。大腑不可變化。究其病根。論幼科體具。

純陽瘦損於病前。亦陽亢為消。燥仲景謂瘧瘵者。單熱。

不寒本條云陰氣孤絕陽氣獨發熱灼煩冤令人消燥肌肉亦不設方但云以飲食清主之嘉言言主以甘寒生津可愈重後天胃氣耳洞瀉既頻津液更傷苦寒多餌熱仍不已暮夜昏譫自言胸中格拒腹中不和此皆病輕藥重致陰陽二氣之殘備法當停藥與穀諒進甘酸解其煩渴方有斟酌

又鼻煤唇裂舌腐頻與茶連熱不肯已此病本輕藥重於攻擊致流行之氣結閉不行帶過不通其熱愈甚上則不嗜飲不納食小溲頻利便必管痛三焦皆閉神昏癡癡有諸

臨證指南醫案

卷六 瘧

連翹心錢

鮮石莖加汁牛一錢

川貝母三錢

杏仁粒二十

射干二分

淡竹葉牛一錢

又自停狼藥日有向愈之機胃困則痞悶不欲食今雖未加餐已知甘美皆離之漸也童真無下虛之理溲瀉欲出尿管必痛良由肺津胃汁因苦辛燥熱烈氣味劫奪枯槁腸中無以運行腑膵觀此必以分利所謂泉源既竭當滋其化源九竅不和都屬胃病

麥門冬錢

甜杏仁錢

甜水梨皮錢三 蔗漿一木

張舌赤煩汗不寐肢體忽冷乃穉年癩瘡暑邪深入所致

杏仁 滑石 竹葉 西瓜翠衣
知母 花粉
熱甚而厥幼穉瘧症皆然 竹葉石膏湯去人參半夏加知母

某 風溫陽瘧

杏仁

滑石

連翹

黃芩

青蒿

淡竹葉

丁 脈右數左小弱面明夏秋伏暑寒露後發微寒多熱嘔逆身痛蓋素有痰火暑必挾濕病自肺經而起致氣不宣化不飢不食頻瀉短縮乃熱在氣分當與溫瘧同

臨證指南醫案

卷六 瘧

例忌葛柴足六經藥 桂枝白虎湯加半夏

胡 按仲景云脈如平人但熱無寒骨節煩疼微嘔而渴者病名溫瘧桂枝白虎湯主之 桂枝白虎湯

蓋今年夏秋久熱口鼻吸暑其初暑邪輕小不致病發秋深氣涼外束裏熱欲出與衛管二氣交行邪與二氣遇觸斯為熱起臨解必有微汗者氣邪兩泄然邪不盡則混處氣血中矣故聖人立法以石膏辛寒清氣分之伏熱佐入桂枝辛甘溫之輕揚引導涼藥以通營衛兼知母專理陽明獨勝之熱而手太陰肺亦得秋金肅降之司甘草粳米和胃陰以生津此一

舉兼備方下自註云一劑知二劑已。知者謂病已知

其對症已者中病當愈之稱耳

鄧 寒少熱多胸中痞脹溫邪未解設言止截

淡黃芩 炒半夏 薑汁 生白芍

草菓 知母 烏梅

又 照前方去半夏薑汁加鱉甲

吳 間日寒熱目黃口渴溫邪兼雨濕外薄為瘧

滑石 杏仁 白蔻仁 淡黃芩

半夏 鬱金

又 脉數舌紅口渴熱邪已入血分

臨證指南醫案

卷六 瘧

天

竹葉 石膏 生地 丹皮

知母 青蒿梗

又 飲食不節腹中不和瘧邪攻胃

鮮首烏 烏梅肉 生鱉甲 黃芩 丹皮

草菓 知母 送保和丸二錢

又 人參 生穀芽 枳實汁 茯苓 廣皮

炒半夏

朱 舌黃煩渴身痛心腹中熱躁暑熱不解為瘧經言暑

脉自虛皆受從前疲藥之累瘵

石膏 知母 生甘草 炒粳米

麥冬 竹葉

何 勞倦傷氣遺洩傷陰暑邪變瘧熾則煩冤最盛分解使邪勢輕參朮芪附皆固閉邪氣也

草果仁 知母 淡黃芩 川貝母

青蒿 花粉

馮 暑傷氣分上焦先受河間法至精至妙後醫未讀其

書焉能治病臻效邪深則瘧來日遲氣結必胸中混濛如瘧無形之熱漸蒸有形之痰此消導發散都是劫津無能去邪矣

石膏 杏仁 半夏 厚朴

臨證指南醫案

卷六 瘧

完

知母 竹葉

黃 脉數目黃舌心乾白黃胎口中粘膩腕中病悶不思納穀由於途次暑風客邪內侵募原營衛不和致發瘧疾夫暑必兼濕濕也熱也皆氣也氣與邪搏則清濁

交混升降自阻古稱濕遏必熱自生矣聖帝論病本乎四氣其論藥方推氣味理必苦降辛通斯熱氣痞結可

開消導攻滯香燥泄氣置暑熱致病之因於不治不識

何解

川連 黃芩 花粉 桔梗

白蔻仁 鬱金 橘紅 六一散

又 苦降能驅熱除濕。辛通能開氣宣滯。已經見效。當減其製。仍祖其意。

川連 桔梗 白蔻仁 厚朴

茵陳 茯苓皮 銀花 白通草

胡 間口瘡。痰多脫悶。汗多心熱。伏暑內熾。忌與風寒表藥。

滑石 黃芩 厚朴 杏仁 通草

白蔻 半夏 瓜蒌皮 知母

又 黃芩 草果 知母 半夏 生白芍

烏梅

臨證指南醫案 卷六 瘧 三

汪氏 微冷熱多。舌白脫悶。嘔惡暑穢。過募原為瘧。

杏仁 鬱金 滑石 厚朴

黃芩 炒半夏 白蔻 橘紅

某 舌白脫悶。寒起四末。渴喜熱飲。此濕邪內蘊。脾陽不

主宣達。而成濕瘧。

厚朴 一錢 杏仁 一錢 草果仁 一錢 半夏 一錢

茯苓 三錢 廣皮 白牛

某 二 滯止。面浮漸及脫腹。

苡仁 桑白皮 茯苓 大腹皮

薑皮 廣皮

某 間瘧。寒熱俱微。此屬濕瘧。

杏仁 三錢 厚朴 一錢 桂枝木 五分 飛滑石 三錢

草果 八分 炒半夏 一錢 茯苓皮 三錢 綿茵陳 一錢

牛 八 寒來喜飲熱湯。發熱後反不渴。間瘧已四十日。今雖止。不飢不思食。五味入口皆變。初病舌白乾。嘔濕邪中

於太陰脾絡。濕鬱氣滯。喜熱飲。暫通其鬱。邪蒸濕中生

熱。六腑熱灼。津不運行。至大便艱秘。此為氣痺濕結。當

薄味緩調。令氣分清。肅與脾約。似同。但仲景氣血兼治。

此病却專傷氣分。

炒黃半夏 生益智仁 綿茵陳 廣皮

臨證指南醫案 卷六 瘧 三

厚朴 茯苓

又 瘧止。舌白不飢。大便旬日不通。此皆留邪。堵塞經腑

隧道之流行。久延必致腹脹癥瘕。

杏仁 白蔻仁 半夏 厚朴 生香附汁

廣皮 茯苓皮 接服牛硫丸二錢

某 脈右弦左弱。留邪未盡。大便粘稀。最防轉痢。較七八

日前。勢減一二。但去疾務盡。苦辛寒。遂其蘊伏。而通利

小便亦不可少。

草果 知母 厚朴 茯苓

木通 滑石

濕熱

身痛。舌白。口渴。自利。此濕溫客氣為瘧。不可亂投柴葛。仲景有濕家忌汗之律。

飛滑石 杏仁 鬱金 淡黃芩

白蔻仁 防已

又 濕甚為熱。心痛。舌白便澹。治在氣分。

竹葉心 麥冬 鬱金 菖蒲

飛滑石 楠紅 化服牛黃丸

又 心下觸手而痛。自利。舌白煩躁。都是濕熱阻氣分。議開內閉。用瀉心湯。

川連 淡黃芩 乾薑 半夏

臨證指南醫案 卷六 瘧

人參 枳實

又 神氣稍清。痛處漸下。至臍。濕傷在氣。熱結在血。吐衄帶血。猶是上行為逆。熱病瘀留。必從下出為順。

川連 黃芩 乾薑 半夏

人參 枳實 白芍 炒查肉

費 舌白渴飲。身痛嘔惡。大便不爽。診脈濡小。乃暑濕從

口鼻入濕。甚生熱。四末擾中。瘧發。脫痞脹。瘧當以苦辛寒清上微邪。不可謂遺泄。而病輒與溫補助邪。

黃芩 知母 白蔻 鬱金 藜皮

厚朴 杏仁 半夏 薑汁 石膏

又 尿濡。口渴。餘熱尚熾。

人參 知母 石膏 竹葉

甘草 麥冬

又 熱緩不飲食。津液受燥。當和胃生津。

人參 五味 知母 楠紅

炒白芍 半夏麩

張 瘧家濕瘧。忌用表散。蒼木白虎湯加草果。

曹 寒從背起。汗泄甚。面無滯澀。舌色仍白。邪未盡。正先怯。心虛。瘧震。恐亡陽厥。議用仲景救逆法加參。

又 舌絳。口渴。汗泄。瘧來日晏。寒熱過多。身中陰氣大傷。

臨證指南醫案 卷六 瘧

剛補勿進。議以何人飲。

人參 何首烏

孫 陽虛之體。伏暑成瘧。涼藥只宜少用。身脈屬氣虛。用

生薑瀉心法。

半夏 生薑汁 茯苓 炙甘草 南棗肉

沈 陽微復瘧。

桂枝 當歸 黃芪 防風

鹿角屑 薑汁 南棗

范 勞瘧入陰。夏月陽氣發泄。仍然勞苦經營。以致再來

不愈。用藥以辛甘溫理陽為正。但未易驟效耳。

人參 當歸 肉桂 炙草

川蜀漆 生薑 南棗

方 寒甚於背陽脉衰也。

人參 鹿茸 炒當歸 炙草

鹿角霜 官桂 豬甲煎丸

吳大 背寒。舌白粉胎。知飢食無味。此為無陽。溫中下以托邪。

生白朮 厚朴 桂枝 附子

草果仁 茯苓

又 照方去茯苓。加入參。炙草。生薑。

臨證指南醫案 卷六 瘧

程 寒熱經月不止。屬氣弱留邪。以益氣升陽。

補中益氣湯

又 生鹿茸 鹿角霜 人參 歸身

茯苓 炙草 生薑

某 建中法甚安。知營衛二氣交餒。夫太陽行身之背。瘧發背冷。不由四肢。是少陰之陽不營太陽。此汗大泄。不

已矣。孰謂非柴葛傷陽之咎歟。議用桂枝加熟附子湯。

人參 桂枝 湯加熟附子

華 氏

二十歲。天癸始通。面黃汗泄。內熱外冷。先天既薄。瘧

傷不復。內經謂陽維為病。苦寒熱。綱維無以振頓。四肢

骨節疼痛。通入脉以和補。調程可以却病。

淡從蓉 鹿角霜 當歸 川芎

杜仲 小茴 茯苓 香附

顧 氏 進護陽方法。請症已減。寒熱未止。乃久病陽虛。脉絡

未充。尚宜通補為法。

人參 生鹿茸 當歸 紫石英

茯苓 炙草 煨薑 大棗

又 經邪不盡。寒熱未止。緣瘧久。營衛氣傷。脉絡中空。乏

厨進補法。僅能填塞絡中空隙。不能驅除蘊伏之邪。擬

進養營法。取其養正邪自却之意。

臨證指南醫案 卷六 瘧

人參 當歸 杞子 生白芍 茯苓

桂心 炙草 遠志 煨薑 南棗

袁 婦 脉弦緩。寒戰甚。則嘔吐噫氣。腹鳴漉漉。是足太陰脾

寒也。且苦辛寒屢用不效。俱不對病。反傷脾胃。

人參 半夏 草果仁 生薑

新會皮 醋炒青皮

又 靈樞經云。中氣不足。溲便為變。况老年人。驚恐憂勞。

深夜不得安寐。遂致寒戰瘧發。當以病因而體貼諦視。

其為內傷實屬七八。見瘧通套。已屬非法。若云肺瘧。則

秋涼不發。何傳及於冬。今小雪。當以勞瘧稱之。夫勞必

傷陽氣宜乎四末先冷。瘧邪傷中為嘔惡腹鳴矣。用露
藿飲。

又 陽陷入陰。必目瞑欲寐。寒則肉腠筋骨皆疼。其筋維
護衛太怯。杳不知飢。焉得思穀。老年人須血氣充盈。使
邪不敢潛伏。古賢有取升陽法。

嫩毛鹿角 人參 當歸 桂枝 炙甘草

又 前議勞傷陽氣。當知內損邪陷之理。凡女人天癸既
絕之後。其陰經空之。豈但營衛造偏之寒熱而已。故溫
脾胃及露薑治中宮營虛。但畏寒不知熱。為牝瘧。蓋牝
為陰。身體重着。亦是陰象。此幸甘理陽。鹿茸自督脈以

臨證指南醫案 卷六 瘧 美

照提。非比蓄附。但走氣分之剛暴。驅邪益虛。都在營分。
奇經曰。陽維脈為病。發寒熱也。

鹿茸 鹿角霜 人參 當歸

厚桂 茯苓 炙薑

又 正氣和營。瘧職已止。當小其製。

人參 鹿茸 當歸 炒杞子

沙苑 茯苓 炙薑

某 瘧後。脾胃陽虛。便溏畏寒。肢體疲倦。當防腫脹。

附子 白朮 茯苓 澤瀉

苡仁 生薑 大棗

某 陰瘧已亂。汗多。

桂枝 牡蠣 生黃芪 炙草

歸身 五味 煨薑 大棗

某 脈沉。舌白。呃忒。時時煩躁。向係陽虛痰飲。瘧發三次。
即止。此邪空不能宣越。並非邪去病解。今已變病陰。互
痰濁阻塞於中。致上下氣機不相維。續勢險。為搶通
陽一法。無方可擬。必得中陽流通。瘧症復作。庶有愈機。

淡附子 生草果仁 生白芍 茯苓 三錢

生厚朴 薑汁 五分 一劑 此冷香真武合劑

某 伏暑胃涼發瘧。以羌防蘇慈辛溫大汗。汗多衛陽大

臨證指南醫案 卷六 瘧 美

傷胃津亦被劫。乾致渴飲。心煩無寐。診脈左弱右促。目
微黃。嗜酒必中虛。穀少易於乘濕。熱勿謂陽傷。瘧症
做內經辛散太過。當食甘以緩之。

大麥仁 炙草 炒麥冬 生白芍

茯苓 南棗

又 藥不對症。先傷胃口。宗內經辛苦急。急食甘以緩之。

仲景謂之胃減。有不飢不欲食之患。議用金匱麥門冬

湯。麩胃汁以開痰飲。仍佐甘藥。取其不損陰陽耳。金匱

麥門冬湯。去棗米。加茯苓。糯稻根。類

又 脈石大。間日寒熱。目背微黃。身痛。此平素酒濕。挾時

邪流行經脈使然前因辛溫大汗所以暫養胃氣今脈
症既定仍從瘧門調治

草果 知母 人參 枳實

黃芩 半夏 薑汁

項 瘧已過月形脈俱衰平素陽虛虛則邪難解散腹脹
是太陰見症治從脾胃

人參一錢 半夏二錢 生於朮二錢 茯苓二錢

草果仁二錢 淡薑一錢

陳 邪伏於裏積久而發道路已遠未能日有寒熱汗出
不解攻表無謂平昔用垂斷痛必有濕痰阻礙舌白不

臨證指南醫案 卷六 瘧 天

喜飲治在大陰陽明

炒半夏 厚朴 草果 知母

薑汁 杏仁

某 遺泄損陰瘧熱再傷陰聲嘶火升乃水源不充易怒

神躁水不涵木之象用何人飲佐清陰火

製首烏 人參 天冬 麥冬

知母 茯苓

某 瘧已半年今但微熱無汗身弱自乳血去傷陰此頭
痛是陽氣浮越心疝如飢哺熱都是陰虛虛勞若不
乳經去不至為乾血則服藥亦無用

生地三錢 阿膠一錢 生白芍一錢 炙甘草四分
麥冬一錢 火麻仁一錢 粗桂枝木三分
某 瘧後心悸氣怯便後有血是熱入傷陰用固本九加
首烏阿膠

人參 生地 熟地 天冬

麥冬 製首烏 阿膠

某 陰液消亡小溲短赤皆瘧熱所傷不飢不納陰藥勿
以過膩甘涼養胃為穩

人參 生地 天冬 麥冬

川斛 蔗漿 另服資生丸

臨證指南醫案 卷六 瘧 天

鄭 自來陰虛有遺洩瘧邪更傷其陰寐多盜汗身動氣
促總是根本積弱不主斂攝此養陰一定成法

熟地 生白芍 五味 炒山藥

茯神 芡實 湖蓮肉

張 脈數瘧來日遲舌乾渴飲積勞性鬱內傷居多致邪
氣乘虛漸劫陰氣熱邪隆於陰熱來小溲頻數故汗多
不解議清陰分之熱以救津液

活鱉甲 知母 草果 鮮生地

炒桃仁 花粉

翁 脈左弦暮熱早涼汗解渴飲治在小陽

青蒿	桑葉	丹皮	花粉
驚甲	知母		
沈九	用力失血無非陽乘攻絡瘧熱再傷真陰肌消食減		
自述	夏暑汗泄頭顱脹大都是陰虛陽升清火皆苦寒		
未必能	和身中之陽也		
驚甲	生白芍	天冬	首烏
炙草	茯苓		
某氏	瘧熱傷陰小溲淋痛		
生地	驚甲	丹皮	知母
茯苓	澤瀉		
臨證指南醫案	卷六 瘧	聖	
朱	五瘧久後陰傷湯血炒焦六味加龜甲黃柏		
吳	十陰瘧後內熱清骨散		
項	陽氣最薄暑入為瘧先由肺病桂枝白虎湯氣分以		
通營衛	為正治今中焦痞阻冷飲不適熱邪宜清胃陽		
亦須	扶護用半夏瀉心法		
半夏	川連	薑汁	茯苓
人參	枳實		
王	汗出不解心下有形自按則痛語言氣窒不爽瘧來		
鼻準	先寒邪結在上當開肺痺皆見瘧治瘧焉得中病		
桂枝	杏仁	炙草	茯苓

乾薑	五味
又	汗少喘緩肺病冠然獨心下痞結不通猶白微痛非
仲景	取堅開痞
生牡蠣	黃芩
花粉	炒黑蜀漆
又	照前方去花粉加知母草果
又	驚甲煎丸一百八十粒
王	舌白不大渴寒戰後熱神躁欲昏而心胸飽悶更甚
瘧係	客邪先由四肢以擾中宮痰嗽嘔逆顯是肺胃體
臨證指南醫案	卷六 瘧
虛邪	聚閉塞不通故神昏煩悶鬱蒸汗泄得以暫解營
衛之邪	未清寒熱漫延無已此和補未必中窠按經設
法為宜	
白薏仁	大杏仁
黃芩	淡竹葉
又	寒熱瘧邪交會中宮邪聚必脹悶嘔逆邪散則安舒
當心	胸之間並無停食之地夫不正之氣為邪穢濁滯
漫原	非形質可以攻消苟非芳香何以開其蒙閉之穢
濁欲	小望見效捨此捷徑無成法可遵道中知否耶
牛黃丸	二服

心經

樂九熱多昏譫舌邊赤舌心黃煩渴脈弱是心經熱瘧醫投發散消導津劫液竭瘧厥至矣

犀角 竹葉 連翹 玄參

麥冬 銀花

陳 前方復瘧昏迷此皆陽氣上胃救逆湯去薑加芍

又 鎮逆厥止護養心脾營陰乃病後治法

人參 炙草 杞子 桂圓

炒白芍 棗仁 茯神 遠志

某四 舌白渴飲咳嗽寒從背起此屬肺瘧 桂枝白虎湯

加杏仁

臨證指南醫案 卷六 瘧

范 脈寸大汗出口渴伏邪因新涼而發間日瘧來議治

手太陰

淡竹葉 大杏仁 滑石 花粉

淡黃芩 橘紅

金氏 肺瘧脫痞

黃芩 白蔻仁 杏仁 橘紅

青蒿梗 白芍

張 暑風入肺成瘧

淡黃芩 杏仁 滑石 橘紅

青蒿梗 連翹

脾經

陳六冷暖不調夜熱多汗咳嗽忌葷腥油膩可免疴勞溫邪如瘧當治手太陰

竹葉心 麥冬 粳米 飛滑石

知母 炙草

柳 暑濕都傷氣分不渴多嘔寒起四肢熱聚心膈乃太

陰瘧也仍宜苦辛或佐宣解裏熱之藥

川連 黃芩 炒半夏 枳實 白芍

薑汁 煩躁甚另用牛黃九一九

某 寒起嘔痰熱久不渴多煩中焦之邪仍以太陰脾法

草果 知母 生薑 烏梅

臨證指南醫案 卷六 瘧

炒半夏 桂枝木 早服驚甲煎方

葛 瘧久舌白泄瀉太陰脾傷肌肉微浮宜補中却邪大

忌消尅發散

人參 草果 白芍 茯苓

煨老薑 炙草

王 脈濡不渴嘔痰不飢是太陰脾瘧當辛溫以理中焦

之陽

生於朮 半夏 草果 紫厚朴

茯苓 薑汁

又 太陰脾瘧必有寒濕凝阻其運動之陽所防久虛變

幻浮腫腹脹人多未能多用權以生木代之但與絡方少遜佐以通藥則無礙

生於木 桂枝木 炒常山 茯苓

生鹿角 生薑汁

其二寒起四末湯喜熱飲屬脾瘧狀先當溫散

杏仁 厚朴 草果仁 知母

生薑 半夏

金 既成間日寒熱瘧嘔吐痰涎其瘧邪大犯脾胃故不飢不食脉仍虛舌白治在太陰不必攻表

人參 半夏 草果 橘紅

臨證指南醫案 卷六 瘧

黃芩 知母 薑汁

沈 脉濡寒熱瘧口遲腹微滿四肢不暖是太陰脾瘧用露薑飲以升陽

人參一錢 生薑一錢 露一宿溫暖服

華 用動藥瘧止新沐瘧來陽弱失衛外邪直侵入裏試以瘧來不得汗邪不從外解大著

川桂枝 炮黑川烏 生白朮 炒黑蜀漆

全蝎 厚朴 薑汁九

王 暑濕傷氣瘧久傷陰食穀煩熱愈加邪未盡也病已一月不飢不飽大便秘阻仍有潮熱全是津液暗傷胃

口不得甦醒甘寒清熱佐以酸味胃氣稍振清補可投

麥冬 乾首烏 烏梅肉 知母

火麻仁 生白芍

高 陰虛溫瘧雖止而腰痠痛先理陽明胃陰俾得安穀再商治腎

北沙參 麥冬 木瓜 蜜水炒知母

大麥仁 烏梅

大沙參 桑葉 麥冬 茯神

周 舌白脉小暑邪成瘧麻黃劫汗傷陽遂變瘧症今痰鹹有血右脇痛引背部不知飢飽當先理胃津

生福豆 苡仁

臨證指南醫案 卷六 瘧

楊 高年瘧熱劫胃汁遂不飢不飽不食不便渴不嗜飲味變酸渴藥能變胃方駐

人參 川連 枳實 牡蠣

淡乾薑 生薑

徐 脉數左寸大關乾瘧後食大葷太早胃氣受傷不得下墜致痞悶惡心痰多唇燥大便不利俱是暗氣不宜

之後擬進溫勝湯法以和胃氣

炒焦竹茹 炒焦半夏 草果仁 生枳實

杏仁 橘紅 金斛 花粉

肝胃

黃 瘧後不飢明即吐此脫膈痰與氣阻胃不降則不受
納做溫膽湯意佐以苦味降逆

鮮竹茹 枳實 炒半夏 茯苓

橘紅 川連 苦杏仁 鬱金汁

李 不飢口湧甜水瘧邪未清肝胃不和

川連 乾薑 枳實 瓜蒌仁

牛夏 廣皮白 薑汁

又 口湧甜水脾瘕

川連 黃芩 厚朴 半夏

生乾薑 廣皮 煎送脾約丸

臨證指南醫案

卷六 瘧

吳

又 橋牛枳木丸

金 寒自背起衝氣由脐下而升清涎上湧嘔吐遂飢不

能食此瘧邪深藏厥陰邪動必犯陽明舌白形寒寒勝

都主胃陽之虛然徒補純守無益

人參 半夏 廣皮白 薑汁

川椒 烏梅 附子 生乾薑

方 先厥而喘蛇蟲下出嘔逆腹鳴腕痛室寒此厥陰瘧

疾勿得亂治

川連 淡乾薑 薑汁 川桂枝

生白芍 烏梅肉 黃芩 秋露水煎藥

又 陽微寒勝瘧久不已理胃陽以壯中宮使四末之邪
不令徒犯脾胃

人參 炒半夏 生薑 烏梅

草果 炒常山 秋露水煎

又 辛酸兩和肝胃已效

人參 草果 生薑 生白芍

烏梅 炙鱉甲

災 體豐色白陽氣木虛夏秋伏暑挾痰飲為瘧寒熱夜

作邪已入陰冷汗頻出陽氣益傷今診得脉小無力舌

白虛象已著恐延厥脫之慮擬進救逆湯法

臨證指南醫案

卷六 瘧

吳

人參 龍骨 牡蠣 炙草

桂枝木 炒蜀漆 煨薑 南棗

又 開泄陽氣偏泄今年久熱傷元初瘧發散不能去病

便是再劫胃陽致邪入厥陰昏冒大汗思肝腎同屬下

焦厥陽挾內風胃厥吐涎沫膠痰陽明胃中久寒熱肢

擾空虛若谷風自內生閉醫藥不分經辨症但以梅虛

道實宜乎鮮有厥效議用仲景安胃泄肝一法

人參 川椒 烏梅 附子 乾薑

桂枝 川連 生杜蠟 生白芍

又 諸症畧減寒熱未止尚宜胃陽 爲法

人參 炒牛夏 淡乾薑 桂枝木

茯苓 生牡蠣

又 天暴冷陽傷泄瀉肢得左手似軟而堅口微渴舌仍

白陰液既虧飲水自救非熱燥也通塞兩用其寒

熱再緩

人參 淡附子 桂枝木 茯苓

生牡蠣 炒黑蜀漆

蔡 惡進穀食舌乾眼脹不飢不知味寤多聚少皆由癆

汗嘔逆都令諸陽交升胃氣不降則不食陽不下潛則

無寐肝風為震則火升心熱法當和胃陽平肝氣肝平

臨證指南醫案 卷六 瘧

胃氣必殺進能寢矣

知母 北沙參 麥冬 新會皮

烏梅肉 新殺露沖

金五 強截瘧疾裏邪痞結心下水飲昏嘔吐無餘病在胃

口之上老年陽衰防其呃厥舍瀉心之外無專方

人參 枳實 乾薑 半夏

川連 黃芩

又 舌白氣衝心痛噎噎味酸嘔吐涎沫皆胃虛肝乘做

仲景胃中虛客氣上逆可與旋覆花代赭石湯

旋覆花 代赭石 人參 半夏

茯苓 薑汁 粳米

又 諸恙向安寢食頗逸平昔肝木易動左脈較右脈

長味變酸木侮土秋前宜慎

人參 半夏 茯苓 廣皮

生熟芽 生白芍

馬 瘧半月不止左脇下已有瘧母寒熱時必氣痞嘔逆

乃肝邪乘胃有邪附厥陰之象擬進瀉心法

川連 黃芩 乾薑 半夏

人參 枳實

朱女 厥陰衝氣上攻眩暈間瘧 安胃丸三錢梅梅湯送

臨證指南醫案 卷六 瘧

陳氏 瘧母是瘧邪入絡與血氣扭結必凝然不動今述過

冷勞怒衝氣至脘痛必嘔逆必三日氣降痛緩而後水

飲得入此厥逆之氣由肝入胃衝脈不和則經水不調

延胡 川棟子 半夏 蓬朮

蒲黃 五靈脂 薑汁

韓七 瘧不止欲吐

炒牛夏 厚朴 青皮 炒焦知母

草果仁 檳榔 臨服調入薑汁一錢

吳 背寒瘧來漸晏邪有入陰之意此伏邪不肯解散都

因久積瘧勞未病先虛也飲水少腹如墜脘中痞結不

舒中焦。屢受邪。迫陽氣先已。餒弱。議兩和。大陰陽明法。

草果 知母 半夏 厚朴

薑汁 烏梅 黃芩 花粉

又 進兩和陰陽。寒熱已止。診脈右滿。明是氣衰。宜和胃。

生津使餘邪不攻自解。

人參 知母 炙鱉甲 生白芍

烏梅肉 大麥仁 炒丹皮

又 脈左數。舌絳。暮渴。

炒麥冬 人參 首烏 白芍

丹皮 茯苓 另更衣丸二錢

臨證指南醫案

卷六 瘧

手

陸六 口湧清涎。不飢不食。寒熱邪氣。交會中焦。脾胃日困。

半夏 薑汁 茯苓 厚朴

炒常山 草果 烏梅

又 大半夏湯加草果烏梅

凌三 瘧久。脾胃氣傷。不食倦怠。半年不肯復元。論理必用

參朮益氣。但貧窮豈能久用。然久延不甦。備腹滿浮腫。

便難調治。白朮膏加砂仁末。

某二 瘧邪由四末以擾中宮。脾胃受傷無疑。但寒暑更遷。

病邪既久。臟腑真氣自衰。兩年來納穀不運。漸覺衰微。

不耐風冷之侵。竝無凝痰聚氣見症。此必胸中宗氣自

餒。致清陽不可轉運。當以神景苓桂木甘湯。

又 六君子湯去甘草。加檀香。泥桂枝木。

吳 瘧已復。瘧瀉。淋瀝。年脾瘧。食物不慎。色黃。腹膨。

有滯。脾胃愈衰。東垣云。中氣不足。溲便乃變。初秋交冬。

迭加反覆。久則五疳。勞瘵。當慎於食物。令脾胃氣靈。可

效。宗脾胃論。升降疎補法。

人參 茯苓 炙草 廣皮 使君子

神麴 查肉 麥芽 澤瀉

祝 此勞傷陽氣。更感冷熱不正之氣。身熱無汗。肢冷腹

熱。自利。舌灰白。微嘔。顯然大陰受病。診脈小右滿不飢。

臨證指南醫案

卷六 瘧

手

入夜昏謔。語但如寐。不加狂躁。論脾為柔臟。體陰用陽。

治法雖多。從未及病。當遵前輩。葷葷香。縮脾遺意。

人參 益智仁 茯苓 新會皮

生厚朴 苡仁 木瓜 砂仁

又 脈右弦來去不齊。左小奕弱。舌邊紅。舌心白黃。微粉。

鼻冷四肢冷。熱時微渴。不飢不想食。前議大陰脾臟受

病。瘧邪從四末乘中。必脾胃受病。鼻準四肢皆冷。是陽

氣微弱。因病再傷。竟日不暖。但形肉消燧。不敢剛劫攻

邪。以宣通脾胃之陽。在陰伏邪。無發散清熱之理。

人參 草果 炒半夏 生薑

茯苓 新會皮 蒸烏梅肉

二帖後加附子後又加牡蠣

吳七 瘧傷脾胃。腹中不和。脈右濇。食入脹甚。前方通調氣血。佐以泄木。服之積滯既下。痛隨利減。仍宜制木安土。不可作陽虛溫補治。

生於朮 川連 椒目 麥芽

雞肫皮 廣皮 厚朴 沙山查

陳四 瘧邪由四末以擾中。皆陽明厥陰界域。陽明衰則厥陰來乘。津液少。斯內風必動。昔賢以麻屬氣虛。木是濕痰敗血。今戊亥頻熱。行走汗顆。然液虛。陽動風生。脂

臨證指南醫案 卷六 瘧

液不得灌溉。肢末非濕痰氣分之恙。

冬桑葉九 熟首烏 黑芝麻 柏子仁 茯神

當歸 杞子 菊花炭 蜜丸

李 脈左弦。嘔吐發熱。後院中痞悶。不爽。宜慎口腹。清肅

上中二焦。不致再延成瘧。進苦辛法。

杏仁 礬金 山梔 豆豉

白蔻 枳殼

孫 高年發瘧。寒熱夜作。胸悶不欲食。煩渴熱頻。最慮其邪陷為厥。進陽旦法。

桂枝 黃芩 花粉 生白芍

生左牡蠣 煨薑 南棗

姬 瘧脈沉滑。中脘痞結。此屬裏症。用瀉心法。

半夏 川連 橘紅 枳實

黃芩 生薑汁

又 脈沉。右關大。瘧未止。寒熱子後作。煩渴中悶。不欲食。

醋炒半夏 杏仁 黃芩 花粉

草果 生薑

陸 瘧載。虛氣痞結。成身痛。

桂枝 炒焦半夏 薑汁 廣皮白

當歸 茯苓

臨證指南醫案 卷六 瘧

錢氏 暑熱傷氣。成瘧。胸痞痞結。嘔吐痰涎。皆熱氣之結。前醫

瀉心法。極是。

人參汁 枳實汁 黃連 黃芩

炒半夏 杏仁 厚朴 薑汁

汪 此濕熱與木殺交蒸。全在氣分。當得三焦分消。清解

既成。間日瘧疾。邪正互爭。原無大害。初候於混。指傷寒

六經。再謬於參朮。守補致邪。瀰漫神昏。喘急妄譫。瘧

皆邪無出路。內閉則外脫。求其協熱下利。已不可得。診

脈細滑。按腹膨滿。夫痞滿屬氣。燥實。在血。今洞利後。而

如腹滿。諸氣皆結。豈非閉塞。而然。潰敗夾裂。至此。難望

挽救

細葉葛蒲根汁 二錢 草果仁 五分 茯苓皮 三錢

紫厚朴 一錢 綿茵陳 三錢 辰砂益元散 五錢

連翹心 一錢 金銀花 三錢

另用牛黃丸一服用涼開水緩緩以茶匙化服

潘氏 伏邪發熱厥後成瘧間日一至咳嗽痰多惡心中痞

其邪在脾胃之絡。擬進苦辛輕劑

杏仁 黃芩 半夏 橘紅

白菴 花粉

程氏 脈右大寒熱微嘔。腕痞不納四末瘡邪交於中宮當

臨證指南醫案 卷六 瘧 五

苦辛泄降酸苦泄熱邪勢再減二三必從清補可愈

川連 炒半夏 薑汁 黃芩

知母 草果 炒厚朴 烏梅肉

毛氏 用玉女煎寒熱未已渴飲仍然惡已減周身皆痛

診脈兩手俱數舌色灰白邊赤汗泄不解擬用酸苦泄

其在裏熱邪務以癒止再調體質

黃芩 黃連 草果 白芍

烏梅 知母 用秋露水煎藥

又 寒熱由四末以移中宮胃口最當其戕害熱悶不飢

胃傷邪留清熱利痰固為要法但有年氣弱兼之病經

匝月清邪之中必佐補正議用半夏瀉心法

人參 半夏 黃連 黃芩

枳實 薑汁

方 勞瘧再發

人參 草果 生薑 烏梅 秋露水煎

又 補中益氣湯加草果知母薑棗

陳 絡虛則痛陽微則脹左脇有瘧母邪留正傷此勞瘧

人參 當歸 肉桂 焦朮 炙草

茯苓 廣皮 生薑 南棗

四劑後用五苓散一服

臨證指南醫案 卷六 瘧 五

某 勞瘧畏寒下虛不納六味加肉桂五味

某 瘧未止熱陷下痢中痞不欲食

人參 川連 黃芩 生白芍 廣皮

炒當歸 炒山查 乾薑 枳實 銀花

又 瘧後勞復

人參 當歸 白芍 棗仁

茯苓 廣皮 生薑 南棗

范氏 脈小瀉病起瘧後食物不和仍誦讀煩勞遂至左脇

連及少腹當有厥起或攻胃脘或聚腹中凝着腹脹古

語云瘧不離乎肝膽亦猶咳不離乎肺也蓋肝得邪助

木勢張揚中上必然受侮本氣自怯運納之權自減清
陽既少展舒濁陰口蹇漸為痞滿上年溫養辛甘久進
未見病去其治體之法諒不能却自述靜處病加煩動
小安其為氣血久阻為鬱議用通絡法以病根由瘡久
邪留絡中耳

紫降香 桃仁 小香附 淡薑渣 神麩

雞脆皮 南山查 韭根汁法丸

高 瘡發既多邪入於絡絡屬血分汗下未能逐邪仲景
製鱉甲煎丸一法搜剔絡中留伏之邪五六日必效

早午暮各服七粒

臨證指南醫案 卷六 瘡 美

某 瘡邪經月不解邪已入絡絡聚血邪攻則血下究竟
寒熱煩渴目黃舌膩溺赤短少全是裏邪未清凡腥羶
宜禁蔬食不助邪毒醫藥柴葛攻表消導通便與原
無異 用仲景鱉甲煎丸朝十粒午十粒黃昏十粒開

水送

費 瘡邪迫傷津液胃減不飢腸燥便紅左脇微堅有似
瘡母結聚當宜絡熱以肅餘邪

生地 知母 丹皮 麻仁 生鱉甲

某氏 瘡邪內陷變成陰瘡久延成癆務以月經通爽不致
邪劫乾血

瘡母

生鱉甲 一兩 桃仁 三錢 炒丹皮 一錢 穿山甲 三錢
查肉 一錢 生香附 一錢

顯 左脇有瘡母乃氣血交結之故治宜通絡

鱉甲 桃仁 金鈴子 牡蠣

丹皮 夏枯草

江 遠客水土各別胃受食物未和更遭嗔怒動用木犯
胃土瘡傷脇中有形瘡聚三年宿恙氣血暗消但久必
入血湯藥焉能取效宜用緩法以疎通其絡若不追援
致陽結陰枯釀成疔漏難治矣

生鱉甲 桃仁 麝香 麝蟲 韭白根粉

臨證指南醫案 卷六 瘡 美

歸鬚 郁李仁 冬葵子 熬膏

吳二 瘡反覆左脇瘡母

生鱉甲 生牡蠣 炒桃仁 當歸鬚 炒延胡

柴胡稍 桂枝木 炒查肉 青皮

某 夏秋濕熱瘡痲正虛邪留混入血絡結成癢瘡瘡母
夫濕氣熱氣本屬無形醫治非法血脈蘊邪故寒熱間
發仲景立法務在緩攻急則變為中清得之兼服鱉甲

煎丸 知母 草果 半夏 黃芩

烏梅 生薑 秋露水煎

金一經年老癯左脇已結瘕母邪已入絡與氣血膠結成
形區區表裏解散之藥焉得入絡通血脈致聚邪以
辛香是絡病大旨。

生牡蠣三錢 歸鬚一錢 桃仁仁錢 桂枝五分

炒芫花錢 公丁香三粒

某三少陰三瘕已久當升陽溫經

鹿茸 熟附子 人參 粗桂枝

當歸 炒黑芫花

呂四陰瘕一年方止羸瘦妨食食人不運不飲湯水四肢
無力診脈微弱不鼓屢進六君益氣無效後得溫中理氣

從火生土意 吳

人參 熟附子 生益智 茯苓

白芍 生薑

吳四三瘕愈後反覆寒多有汗勞則腸洩致瘕謹護陽却
邪

川桂枝 熟附子 生於朮 炙草

生薑 南棗肉

某陰瘕汗多下焦冷用升陽法

人參 鹿茸 桂枝木 當歸

炙甘草 生薑 大棗

形區區深留陰三日始有瘕發但熱來必神皆謔妄是膈
中震動所致議定未病兩日日進清心牛黃丸一服試
看後期運至何如。

蔡氏三日瘕一年有餘勞則欲發內熱素有結痞今長大
攻走不定氣逆欲嘔酸經閉四載當厥陰陽明同治

半夏 川連 乾薑 吳萸 茯苓

桂枝 白芍 川 烏梅

蔡五三瘕不飽不消惡心渴喜熱飲診脈沉細脾陽困頓
不能送邪外出治以四獸飲

沈五三瘕腹脹不渴嘔水邪在脾胃之絡濕疎裏邪勿用
表散

草果 粗桂枝 厚朴

炒芫花 茯苓

又溫脾通胃得效

生於朮 淡附子 川桂枝 炒黑芫花

厚朴 生薑

某四三瘕經年至今復受濕邪及發日來舌白脛間渴喜
熱飲當溫太陰

杏仁 草果 知母 桂枝

半夏 生薑 厚朴 烏梅

痞九三瘧用露露法寒止熱盛加入烏梅五分取其酸味以和陰謂其瘧久陰亦傷耳

胡陰瘧滯傷脾胃用苦辛溫得效瘧未已腹脹便泄議理中陽

人參 益智 木香 茯苓

厚朴 廣皮 生薑

錢三週勞瘧數年初起即三陰此傷損已在陰陰之終最難速效甘溫益氣久進益氣湯

某三四瘧早截中陽室寒脫脈不運背寒肢冷

草果仁 杏仁 半夏 茯苓

臨證指南醫案 卷六 瘧

桂枝 厚朴 廣皮 生薑

某脈濡而黃舌白脘中格拒湯水皆嘔三日瘧至至按色脈診乃足太陰陽微飲結當以溫藥利之

半夏 草撥 丁香柄 草撥

厚朴 薑汁

李初病勞倦胸熱投東垣益氣湯未嘗肯認而得湯反劇聞穀氣穢間日瘧來渴思涼飲此必暑邪內伏致營

衛週流與邪觸着為寒熱分爭矣故甘溫益氣升舉脾胃氣血與暑熱異岐胃中熱灼陽土愈燥上脫不納虛結便閉其初在經在氣其久入絡入血由陽入陰間日

延為三瘧奇脈購維皆被邪傷內經謂陽維為病苦寒熱也維為一身細維故出四末寒凜而起但仍是脈絡為病故參芪木附不能回陽以益其虛歸桂地芍無能

養營以却邪矣昔軒岐有刺瘧之旨深慮邪與氣血混成一所汗吐下無能分其邪耳後漢張仲景推廣聖經

蘊奧謂瘧邪經月不解勢必邪結血中有癥瘕瘧母之累瘵製方鱉甲煎丸方中大意取用重蟻有四意謂飛

者升走者降靈動迅速追拔沉混氣血之邪蓋散之不解邪非在表攻之不驅邪非着裏補正却邪正邪並樹

無益故聖人另闢手眼以搜剔絡中混處之邪治經干

臨證指南醫案 卷六 瘧

百歷有明驗服十二日干支一週倘未全功當以升其八脈之氣由至陰返於陽位無有不告安之理

某陰瘧兩月或輕或重左脇按之痠痛邪伏厥陰血絡恐結瘧母謹通絡以逐邪用仲景鱉甲煎丸每早服三十粒當寒熱日勿用

昌三瘧皆邪入陰絡故汗下為忌經年瘧能癥瘕瘧母仍聚季脇邪攻血氣之結攻逐瘀聚升降以通陰陽乃

仲景成法但診脈細微食減神衰攻法再施恐擾中滿前臨溫補通陽安然守中之補始緩為宜

人參 當歸 淡附子 淡乾薑

茯苓 肉桂 驚甲膠丸

諸瘧由伏邪而成非旦夕之因為患也六淫之氣惟燥不能為害而新涼收束實屬有關考之聖訓獨手三陽手厥陰亦無其症名醫者當辨其六氣中所傷何氣六經中病涉何經若小柴胡專主少陽豈能兼括也夫溫瘧瘧瘧痰食瘧癘諸瘧皆有成方予不復贅但此症春月及冬時間有惟夏秋暑濕為患者居多暑必挾濕而傷氣分第一要分別其上焦中焦之因暑濕二氣何者為重若暑熱重者而究上焦肺臟清氣瘧來時必熱重而寒微唇舌必絳赤煩渴而喜

臨證指南醫案

卷六

瘧

涼飲飲多無痞滿之患其脈色自有陽勝之候當宗桂枝白虎法及天水散加辛涼之品為治若濕邪重者當議中焦脾胃陽氣瘧來時雖則熱勢蒸騰舌必有粘膩之苦渴喜煖湯胃脘覺痞脹嘔惡其脈色自有陽氣不舒之情狀當宗正氣散及二陳湯去甘草加杏蔻生薑之類主之必要陽勝於陰而後配和陽之劑日後方無貽累倘症象兩兼則兩法兼之可也大凡瘧症若邪氣輕而下不甚虛者寒熱相等而作止有時邪氣重而正氣怯者寒熱模糊來勢必混而不分又云邪淺則一日一發邪深則間日一發邪

最深則三日一發古稱為三陰大瘧以肝脾腎三臟之見症為要領其補瀉寒溫亦不離仲景治三陰之法為根蒂可知陽經輕淺之方治之無益也所云移早則邪達於陽移晏則邪陷於陰陰陽勝復於此可察若久而不已必有他症之虞大陰之虛浮脹滿有通補之理中法開胸之五苓湯少陰之痿弱成勞有滋陰之復脈湯溫養之升奇法厥陰之厥逆吐衄及邪結為瘕母有烏梅丸與驚甲煎法又如心經瘧久勢必動及其營則為煩渴見紅之累肺經瘧久理必傷及其津則為胃秘腸澀之候一則涼陰為主一則

臨證指南醫案

卷六

瘧

清降為宜然而瘧之名目不一而瘧之兼症甚多若不達權通變而安能一一盡善即如暑濕格拒三焦而嘔逆不納者宗半夏瀉心法穢濁蒙蔽膈中而清靈味甚者用牛黃清心丸心陽暴脫有龍蟄之救逆胃虛嘔呃有旋覆代赭之成方如表散和緩通陽補氣滋陰化營搜邪入絡動藥劫截辛酸兩和營氣血補及陽瘧之後養胃陰陰瘧之後理脾胃等法已全備矣葉集諸家融通無拘所謂用藥如用兵先生不壞良工之名也 鄒新甫

泄瀉

周 因長夏濕熱食物失調所謂濕多成五泄也先用胃
苓湯分利陰陽 胃苓湯去甘草

濕 長夏濕勝為瀉腹鳴瀉少腑陽不司分利先宜導濕
和中 胃苓湯

又 向年陰分傷及陽位每有腹滿便溏長夏入秋常有
滯下此中焦氣分積弱水穀之氣易於聚濕或口鼻觸

入穢邪遂令脾胃不和是夏秋調攝最宜加意擬夏秋
應川方備揀天暖氣蒸南方最有中痧痞脹諸恙未受

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 李

病前心懷疑慮即飲芳香止氣之屬毋令邪入為第一
義

藿香梗 白蔻仁 橘紅 桔梗

杏仁 薏苡 降香 厚朴

夏至後熱勝濕蒸氣傷神德用東垣益氣湯若汗出
口渴兼生脈散飲液

某 秋暑穢濁氣從吸入寒熱如瘧上咳痰下洞泄三焦
蔓延小水短赤議芳香辟穢分利滲濕

藿香 厚朴 廣皮 茯苓 甘草

猪苓 澤瀉 木瓜 滑石 檀香汁

又 進藥稍緩所言穢濁非臆說矣其陰莖囊腫是濕熱
甚而下墜入腑與方書並欬症有問議河間法

厚朴 杏仁 滑石 寒水石
石膏 猪苓 澤瀉 絲瓜葉

某 陰瘡久傷成損俛不能卧脊強脈垂足跗浮腫乃督
脈不用漸至僂僂廢疾近日暑濕內侵泄瀉先宜分利

和中 厚朴 藿香 廣皮 茯苓 澤瀉

木瓜 炒扁豆 炒查肉 炒砂仁
蔡一氣短少續為虛近日腹中不和泄瀉暑傷先以清暑

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 李

和脾預防滯下 厚朴 廣皮 炙草 茯苓 澤瀉

炒扁豆 麥芽 木瓜 炒查肉 砂仁
又 香砂異功散

葉五平素操持積勞五志之火易燃上則鼻衄堵塞下有
疝痔腸紅冬春溫邪是陽氣發越邪氣乘虛內伏夫所

伏之邪非比暴感發散可解况兼勞倦內傷之體病經
九十日來足跗日腫大便日行五六次其形粘膩其色

黃赤紫滯小便不利必隨大便而稍通此腎關樞機已
廢二腸腸腑失司所進水穀脾胃不主運行釀濕墜下

轉為熱瀉之形正當土旺入夏脾胃土氣此濕熱內滯
由乎脾胃日饒不得明理之醫一誤再誤必致變現腹
滿矣夫左脈之緩濇是久病陰陽之損是合理也而右
脈弦大豈是有餘形質之滯即仲景所云弦為胃減大
則病進亦由陽明脈絡漸弛腫自下日上之義守中治
中有妨食滋滿之弊大旨中宜運通下宜分利必得小
溲自利腑氣開闔始有轉機若再延綿月餘夏至陰生
便難力挽矣 四苓加椒目厚朴益智廣皮白

又 服分消方法五日瀉減通足跗浮腫未消要知脾
胃久困濕熱滯濁無以運行所進水穀其氣蒸變為濕

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 空

濕勝多成五瀉欲使濕去必利小便然滲利太過望六
年歲之人又當慮及下焦久病入夏正脾胃司令時候
脾臟宜補則健胃腑宜疎自清扶正氣驅濕熱乃消補
兼施治法 晚服資生丸炒米湯送下

服早 人參 廣皮 防己 厚朴 茯苓
生朮 澤瀉 神麴 黃連 吳萸

朱 口腹不愜濕熱內起泄瀉復至此濕多成五泄氣瀉
則腹脹矣

人參 茅朮 川連 黃芩 白芍
廣皮 茯苓 澤瀉 查肉

陳 脈緩大腹痛泄瀉小溲不利此水穀內因之濕鬱蒸
腸胃致清濁不分若不清理分清延為積聚粘膩滯下
議用芍芍湯

淡黃芩 生白芍 廣皮 厚朴
藿香 茯苓 猪苓 澤瀉

張 脈緩瀉腹滿痛瀉不爽氣鬱滯久濕凝在腸用丹溪
小溫中丸

針砂 小川連 蒼朮 白朮 香附
半夏 廣皮 青皮 神麴漿丸

程 診脈肝部獨大脾胃緩弱平昔納穀甚少而精神頗
臨證指南醫案 卷六 泄瀉 空

好其先天充壯不待言矣目今水瀉少腹滿脹少腹為
厥陰肝位由陰陽不分濁踞於下致肝失疎泄當以五
苓散導水利濕倣古急開支河之法

黃九 歲久瀉兼發瘡痕是濕勝熱鬱苦寒必佐風藥合乎東
垣脾宜升胃宜降之旨

人參 川連 黃柏 廣皮 炙草 生於朮
羌活 防風 升麻 柴胡 神麴 麥芽

朱 形瘦尖長木火體質自上年泄瀉累用脾胃藥不效
此陰水素虧酒食水穀之濕下墜陰弱不能包涵所致
宜苦味堅陰淡滲勝濕

宜苦味堅陰淡滲勝濕

炒川連 炒黃柏 厚朴 廣皮白

茯苓 猪苓 澤瀉 炒查肉

陳 寒濕已變熱鬱六腑爲瀉

生白朮 厚朴 廣皮 白茯苓

益智仁 木瓜 茵陳 澤瀉

某三 酒濕內聚飲餘濕下注五泄常用一味茅朮丸

炒半夏 茯苓 苡仁 刺楸 新會皮

王氏 頭脹喜飲咳嘔心中脹泄瀉不爽此爲中暑故止

瀉血藥更甚舌色白議清上焦氣分

石膏 淡黃芩 炒半夏 橘紅

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 癸

厚朴 杏仁

中陽

王二 自春徂冬瀉白積至今腹痛小水不利想食物非宜脾胃水寒偏注大腸當分其勢以導太陽胃苓湯主之

胡三 三瘧劫截不效必是陰臟受病衄血熱渴食入不化

痛瀉二者相反思病延已久食物無忌病中勉強進食

不能充長精神卽爲滯濁阻痺先以脹瀉調理不必以

瘧相混

草果 厚朴 陳皮 木香

茯苓皮 大腹皮 猪苓 澤瀉

郁八 經營勞心飲食進時飢飽勞傷脾胃受病脾失運化

夜屬陰晦至天明洞瀉粘膩食物不喜脾弱惡食柔湯

之味五苓通膀胱分泄濕氣已走前陰之竅用之小效

東垣謂中氣不足溲便乃變陽不運行濕多成五泄矣

人參 生白朮 茯苓 炙草

炮薑 肉桂

某五 形寒使瀉舌白

厚朴 廣皮 半夏 茯苓皮

桂枝木 生薑

程氏 寒濕腹痛惡心泄瀉

厚朴 藿香梗 益智仁 廣皮

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 癸

炒茅朮 煨木香 茯苓 澤瀉

吳氏 寒凝胃陽腹痛泄瀉

草果 厚朴 茅朮 廣皮

吳更 炒查肉

程氏 瀉後腹虛

人參 生益智 炮薑 茯苓

厚朴 廣皮 砂仁

陸氏 氣滯爲脹濕管爲瀉主以分消

炒厚朴 大腹皮 茯苓 澤瀉

柴益智 廣皮 炒查肉

某氏 兩濕涼氣乘於脾胃泄瀉之後腹影減食宜健中運濕

焦白木炭 厚朴 廣皮 生穀芽

炒扁豆 木瓜 茯苓 澤瀉

程女 濕傳脾陽腹滿肢冷泄瀉 四苓散加厚朴廣皮

鄒如 濕傷泄瀉小便全少腹滿欲脹舌白不飢病在足太

陰脾宜溫中佐以分利

生茅朮 厚朴 草果 廣皮

茯苓 猪苓 澤瀉 炒砂仁

又 早服真武丸薑湯送一錢五分 一兩

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 生

夜服針砂丸開水送一錢五分 六錢

又 人參 附子 枳實 茯苓

乾薑 生白芍

某氏 脈沉緩肌肉豐盛是水土稟質陽氣少於運行水穀

聚濕布及經絡下焦每有重着筋痛食稍不進便易泄

瀉經水色淡水濕交混總以太陰脾虛調理若不中然

恐助脹病

人參 茯苓 白朮 炙草 廣皮

羌活 獨活 防風 澤瀉

因驚而瀉腹病欲嘔是為蚊厥當用酸苦忌進甜物

粗桂枝 生白朮 木防己 茯苓 澤瀉

又 脈緊足腫便溏陽微濕聚氣不流暢怕成單脹

照前方加茵陳

又 晨泄肢腫

生白朮 桂枝木 淡附子 茯苓 澤瀉

陸五 當歸動氣子夜瘕泄晝午自止是陽衰寒濕沍凝

陽不運每瀉則脹減宜通不宜瀉

製川烏 生茅朮 茯苓 木香

厚朴 廣皮

朱 消渴乾嘔口吐清涎舌光赤泄瀉熱病四十日不愈

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 生

熱邪入陰厥陽犯胃吞酸不思食久延為病傷成勞

川連 烏梅 黃芩 白芍

人參 訶子皮

陶八 病由毒木正旺中焦受熱先泄瀉繼以腹痛小便不

利食不思納皆是六腑不和所致夫胃為陽土肝屬陰

木腑宜通肝宜柔宜涼治胃必佐泄肝制其勝也閱方

呆補不知臟腑陰陽故辨及之

泡淡黃芩 炒小川連 炒廣皮 厚朴

生白芍 炒烏梅肉 猪苓 澤瀉

因驚而瀉腹病欲嘔是為蚊厥當用酸苦忌進甜物

川椒 烏梅肉 川蓮 淡乾薑

金鈴子 延胡 桂枝木 生白芍

廢 胃中不和 不似少寐 肝是震動 頭暈 泄瀉 高年經月

米復兩和厥陰陽明

炒牛夏 人參 枳實 茯苓 炒烏梅肉

滯 入夜咽乾欲嘔 食納腹痛即瀉 此胃口大傷 陰火內

屋劫燥津液 當以肝胃同治 用酸甘化陰方

人參 一錢 焦白芍 三錢 訶子皮 七分 炙草 五分 陳倉米 三錢

又 去陳米加南棗一枚

又 咽乾不喜湯 飲腹鳴瀉瀉 五液消燥 虛風內風 擾於

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 聖

腸胃

人參 木瓜 焦白芍 赤石脂 炙草

朱 經月減食泄瀉 下焦無力 以扶土泄木法

人參 焦木 炒益智 茯苓

木瓜 廣皮

某 病後陰傷作瀉

烏梅 白芍 炙草 廣皮

茯苓 荷葉

王 霍亂後痛瀉已緩 心中空洞 肢節痠弱 此陽明厥虛

內風 明燥 蓋虛象也 異功去參 木加烏梅 木瓜白芍

又 上吐下瀉之後 中氣大虛 身痛肢浮 虛風內動 以補

中為法 異功散加木瓜薑炭

某 腹鳴晨泄 崩眩旋暈 形質似屬陽不足 診脈小弦 非

二神四神溫固之症 蓋陽明胃土已虛 厥陰肝風振動

內起久病而為 衞泄用甘以理胃 酸以制肝

人參 茯苓 炙草 廣皮

烏梅 木瓜

某 頭痛損目 黎明腸鳴泄瀉 煩心必目刺痛流淚 是木

火生風 致脾胃土位日戕 姑議泄木安土法

人參 半夏 茯苓 炙草

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 聖

丹皮 桑葉

徐六 自春季胸膈肌脹 以及腹中疼痛 從治肝小愈 腹鳴

泄瀉不止 久風發泄 都因木乘土位 東垣云 治脾胃必

先制肝 倣此 人參 焦木 炙草 木瓜

烏梅 炒炙絲餅

程 勞損經年 食入腹脹痛瀉 心中寒凜 膈際熱蒸 此陽

不內潛 脾胃久困 萬無治嗽 清降之理 議用皮已湯 扶

土制木法

某 左脇氣脹 在皮膚之裏 此絡脈中病也 泄肝破氣久

服脾胃受困而為泄瀉得養中小愈然以藥治藥脈絡之病仍在

牛夏 桂枝 茯苓 遠志

歸鬚 橘紅 薑棗湯泛丸

張 腹鳴脹清晨瀉泄先以熄肝風安脾胃方

人參 茯苓 木瓜 炒烏梅 炒菟絲子

又泄肝醒胃方

吳萸 生白芍 炒烏梅 人參 茯苓

某 脈右弦腹膨鳴响痛瀉半年不痊此少陽木火鬱傷脾上久則浮腫脹滿法當疎通泄營非辛溫燥熱可治

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 薑

黃芩 白芍 桑葉 丹皮

柴胡 青皮

吳 陽虛惡寒惡心吞酸泄瀉乃年力已衰更飲酒中虛治法必以脾胃扶陽

人參 茯苓 附子 白朮

乾薑 胡蘆巴

趙 晨泄難忍臨晚稍可寧耐易飢善食仍不易消磨其故在乎脾胃陰陽不和也讀東垣脾胃論謂脾宜升則健胃宜降則和援引升降為法

人參 生白朮 炮附子 炙草 炒歸身

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 薑

胡蘆巴 茯苓 木瓜 草撥

王三 三年久損氣快神奪此溫養補益皆護元以冀却病原不藉乎桂附辛熱以劫陰液今胃減咽乾大便溏泄經月夏三月脾胃主候宜從中治

人參 炒白芍 炙草 煨益智

炒木瓜 茯苓 廣皮

金 冲年遺恙先天最薄夏秋瘧傷食少不運病脹溏瀉都是脾胃因病致虛當薄味調和進治中法

人參 益智 廣皮 茯苓

木瓜 炒澤瀉 穀芽 煨薑

李氏 脉沉形寒腰膝强腹鸣有形上下攻觸每晨必瀉

經水百日至一或仲夏意

茯苓 炮淡乾薑 生於朮 肉桂

某氏 陽微濁瀉吐瀉心痛當辛温開氣胃腸醒乃安

炒牛夏 厚朴 廣皮 益智仁

煨木香 烏藥 香附汁 薑汁

某二 色白脉爽體質陽薄入春汗泄神力疲倦大便溏洩

不爽皆脾陽因弱不克勝舉無以鼓動生生陽氣耳刻

下姑與和中為先

益智仁 廣皮 薑汁 茯苓 生薑芽

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 美

楊 小便不利大便溏泄補脾法中佐以淡滲分其陰陽

人參 熟木 茯苓 象牙屑

澤瀉 苡仁 廣皮 白芍

薛三 水穀濕邪內着脾氣不和腹膨不飢使瀉四肢痠痛

厚朴 茯苓皮 大腹皮 防已

廣皮 澤瀉 苡仁 桂枝木

又 肢痠腹膨使瀉

木防已 生白朮 苡仁 木瓜

桂枝木 澤瀉

馬一 飲酒少穀中氣久虛晨泄下部冷腎陽脾陽兩虛知

飢少納法當理腸酒客性不喜甘膩滋柔之藥

茯苓 覆盆子 生益智 炒菟絲餅

補骨脂 芡實

朱四 酒濕內因脾腎陽虛用黑地黃丸蒸餅水煮和丸

徐五 晨泄病在腎少腹有痼亦是陰邪若食薑腥厚味病

即頭發乃陽氣積衰議用四神丸

席五 陰瘧初愈不慎食物清陽既微健運失司腸胃氣滯

遂為洞泄且足跗微腫慮其腹筋欲滿良季脾胃主令

尤宜淡薄藥以通陽為先平時脾腎兩治

胃苓湯去白朮甘草 接服黑地黃丸去五味

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 主

朱四 久瀉無有不傷腎者食減不化腸不用事八味腎氣

乃從陰引陽宜乎少效議與升陽

鹿茸 人參 陽起石 茯苓

炮附子 淡乾薑

又 久瀉必從脾腎主治但痛利必有粘積小溲短縮不

爽温補不應議通腑氣

厚朴 廣皮 茯苓 猪苓 澤瀉

川連 煨木香 炒山楂 炒神麩

僧五 痼泄一年食減腹鳴屬脾腎陽衰近腹中微痛兼理

氣滯用陳無擇三神丸

某 背部牽掣入脇晨瀉 苓桂朮甘去甘加鹿角薑棗 五診脈兩關緩弱尺動下垂早晨未食心下懊懣納穀 仍不易化蓋脾陽微中焦聚濕則少運腎陰衰固攝失 司為瘕泄是中宜旋則運下宜封乃藏是醫藥至理議 早進治中法夕用四神丸	高氏 經來腹膨臍脊痠垂自秋季泄瀉不已腕屈妨食用 濟生丸不應	鹿角霜 炒菟絲餅 生杜仲 淡菴蓉	茯苓 炒苑 焦歸身 炒黑小茴	陳氏 產育十五胎下元氣少固攝晨泄自古治腎陽自下 臨證指南醫案 卷六 泄瀉 芤	涵蒸脾陽始得運變王氏以食下不化為無陽凡腥膩 沉着之物當忌 早用四神丸晚服理中去朮草加益 智木瓜砂仁	張 泄瀉脾腎虛得食脹	人參 炒菟絲子 炒黃乾薑 茯苓	煨益智 木瓜	某 瀉五十日腹鳴渴飲溲瀉不利畏寒形倦寐醒汗出 用溫中平木法	人參 胡蘆巴 炮薑 茯苓	訶子皮 附子 粟殼
--	-------------------------------------	------------------	----------------	--	---	---------------	-----------------	--------	-------------------------------------	--------------	-----------

某 脾腎不攝五更瀉	巴戟 菟絲子 五味 補骨脂 芡實	建蓮 山藥 炙草	某 久瀉脈虛	人參 五味 禹餘糧石	張氏 產後不復腹疼痲瀉	炒菟絲餅 鹿角霜 生杜仲 淡補骨脂	炒黑小茴 炒杞子 茯苓	孟氏 因病原是勞損自三陰及於奇經第腹中氣升胃痛 暨有形動觸衝任脈之守補則滯涼潤則滑瀉久瀉	臨證指南醫案 卷六 泄瀉 芤	寒熱最為吃緊先固攝下焦為治	人參 炒菟絲餅 芡實 湖蓮	茯苓 赤石脂	某 腎虛痲瀉	炒香菟絲子 生杜仲 炒焦補骨脂	茴香 雲茯苓	又 陽微子後腹鳴前方痲瀉已止	人參 炒菟絲子 炒補骨脂 湖蓮肉	芡實 茯苓	顧 脾腎痲瀉腹膨肢腫久病大虛議通補中下之陽
--------------	------------------	----------	-----------	------------	----------------	-------------------	-------------	--	----------------	---------------	---------------	--------	-----------	-----------------	--------	-------------------	------------------	-------	--------------------------

入參 川熟附 茯苓 澤瀉 炒黃芩

某 腎虛液泄乃下焦不攝純則恐傷陰液以腎惡燥也

早服震靈丹二十 晚間次飲湯調服參苓白朮散

二錢 二藥服十二日

高 脈細下垂高年久咳腹痛泄瀉形神憔悴乃病傷難

復非攻病藥石可愈擬進甘緩法

炙甘草 炒白芍 炒仙糖 茯苓 南棗

汪 過食泄瀉胃傷氣隔津不上滿則舌乾微渴且宜

薄味調攝和中之劑量進二三可安

人參 葛根 生薑芽 炙甘草

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 全

廣皮 荷葉蒂

泄瀉注下症也經云濕多成五泄曰飧曰瀉曰飧曰瀉曰

瀉曰滑曰瀉之完穀不化濕兼風也清泄之腸垢汚

積濕兼熱也滲泄之澄清湯曰濕兼寒也淫泄之身

重軟弱濕自勝也滑泄之久下不能禁固濕勝氣脫

也是以胃風湯治有血之飧泄清六九瘕腸垢之熱

瀉瀉泄使清濁白中有硬物遂用理中治中滑泄脈

後氣脫洞下不禁急投四柱六柱飲惟瀉泄有虛有

實或以胃苓或以木附至於脾泄胃泄腎泄大腸泄

小腸泄大瘕泄瀉泄滑泄傷酒傷食泄古方古法條

載甚詳其急則治標必使因時變理固然也及其

緩則治本惟知燥脾滲濕表有未盡者乎蓋脾同坤

土本至靜之體而有乾健之用生萬物而役於萬物

從水從火為寒為熱歷觀陽熱下利者十不得一二

從水之寒泄者十常八九焉言當然者主治在脾推

所以然者必求之火火因思人身水火猶權衡也一

勝則一負火勝則水負水勝則火負五泄多濕濕水

同氣水之盛則火之衰也於是推少陽為三陽之樞

相火寄焉風火易胃而熱腐五穀少陰為三陰之樞

龍火寓焉蒸蒸臟腑而轉輸糟粕胃之納脾之輸皆

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 全

火之運也然非雷藏龍馴何能無燥無濕勢有胃明

燄上之倚如果土奠水安從此不泛不瀉定無清氣

在下之患矣吾故曰五泄之治平水火者清其源崇

隄土者塞其流耳今觀葉氏診記配合氣味妙在清

新縱橫治術不離規矩依然下者升滑者固寒者溫

熱者清脈弦治風脈濡滲瀝總之長於辨症立方因

而投劑自能輒效所謂讀古而不泥於古採方而不

執於方化裁之妙人所難能者余友吳子翼文昔在

葉氏門牆曾言先生洞達人情諳練時務使之應世

一以樸也故小道居此盛不又問其應酬之暇好

謹兩漢出辭自必高古。惜乎著作長安不能一見全人嘆息不忘耳。續文五

臨證指南醫案

卷七

泄瀉

空

臨證指南醫案目

卷七

痢

便血

脫肛

痿

痺

癱厥

驚

癲癇

臨證指南醫案

卷七目

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生靈一錫山鄒錦喉滋九全鼓

邵銘新甫

痢

沈 暑必挾濕傷在氣分古稱滯下此滯字非停滯飲食

言暑濕內侵腑中流行阻遏而為滯矣消導升舉溫補

暑邪無有出路胸痞不飢不食粘膩未已而肛門沉墜

裏結三焦皆受邪蒸上下瀝如兩截延為休息痢疾總

臨證指南醫案卷七 痢

綿展轉豈且晚驟愈之病

淡乾薑 生薑 小川連 淡黃芩

人參 枳實

徐 夏季痢症多是濕熱食積初起宜分消其邪但肌柔

白嫩乃氣虛之質且性情畏藥只宜少與勿過

檳榔汁 青皮 陳皮 厚朴

川連 黃芩 木香 炒黑山查

又 濕熱下痢必用苦辛寒為治粟殼瀉腸止瀉久痢成

方當此熱邪未清宜通斯瀉可去因色白氣弱未敢峻

攻耳

厚朴 黃芩 川連 木香汁

查肉 炒銀花 麥芽

盧 痢症濕熱皆是夏令伏邪但以攻消太傷胃氣不能

去病今微嘔不飢不寐大便欲解不通是九竅大腑不

和總是胃病

人參一錢 吳萸炒川連四分 泡淡生乾薑五分

茯苓二錢 川棟子肉一錢 生白芍一錢

某女 舌色灰黃渴不多飲不飢惡心下利紅白積滯小溲

不利此暑濕內伏三焦氣機不主宣達宜用分理氣血

不必見積以攻滯下藥

臨證指南醫案卷七 痢

飛滑石 川通草 猪苓 茯苓皮

藿香梗 厚朴 白蔻仁 新會皮

陸氏 經來暑穢凝脹心煩自利黑瘰

淡黃芩 枳實 川連 石膏蒲

鬱金 橘紅

陳 瀉利兩月肢體浮腫高今自屬虛象但胸脘痞悶納

穀惡心每利必先腹痛是夏秋暑熱滯於中虛體挾

邪焉有補益可去邪扶正之理恐交節令變症明是棘

手重症矣

人參 茯苓 川連 淡乾薑

生白芍 枳實
某 臍上青筋突痛。太陰脾受傷。此前症也。近日腹痛日積。兩旬不已。是新受夏秋暑濕。與病異岐。先理新病。導氣分消。主之。

藿香 厚朴 廣皮 茯苓皮

川連 大香 木瓜 扁豆

某 痰哮喘病。正在初秋而發。又值寒熱下痢。血積腹痛。吐逆。脈來右弦左弱。目黃羞明。必是暑濕凝滯。着裏以補虛之中。佐以清邪。乃通劑法。

人參 黃芪 白芍 廣皮 石蓮子

臨證指南醫案 卷七 痢 三

川連 查肉 草決明 金銀花

王 痢疾古稱滯下。乃是濕熱氣薄腸胃。阻閉氣分。故利仍不爽。河間丹溪。僉用清熱導氣者為此。

黃芩 川連 草決明 炒黑查肉

生白芍 石蓮 丹皮 廣木香汁

倪六 面垢舌白。心下腹中。凄凄痛楚。至圓復便不爽。此水穀之滯。內蒸為熱。氣道阻閉。上熱下冷。若外受客邪。既過募原。必有寒熱矣。

淡黃芩 川連 淡竹葉 枳椇汁

白芍 厚朴 廣皮白

某 濕溫下痢。脫肛。五苓散加寒水石。江 食物不調。腸胃滯著。暑蒸積聚而滯下。三月不愈。清疎帶補之。

人參 川連 炒白芍 炒查肉

廣皮 茯苓 炒當歸 烏梅

陸 濕熱內蘊。中焦痞結。陽氣素虛。體質濕注。自利不爽。神識昏亂。將變柔痼。

炒牛夏 人參 枳實 川連

乾薑 黃芩 薑汁

顧 得湯飲。腹中漉漉。自利稀水。平昔酒客。留濕滯勝。內

臨證指南醫案 卷七 痢 四

蘊。腸胃不爽。凝積。東垣清暑益氣。亦為濕熱傷氣而設。

但脾胃久病。仍能納食。當苦味堅陰。芳香理脾。

生茅朮 四兩 炒黑黃柏 二兩 炒黑地榆 二兩

猪苓 一兩 澤瀉 一兩 水法丸服三錢

葛十 酒客。大便久瀉。腸上曾發瘡瘍。春夏腸下有形。腹形滿脹。此久蘊濕熱。滯膿自利。未能泄邪。腸胃氣壅。利頻不爽。法當分消。以去濕熱。若攻劫太過。必傷脾胃。議用丹溪小溫中丸。早進二錢五分。夜進二錢五分。三兩

某 潮熱。自利腹痛。

黃芩 生白芍 枳實 桔梗

板橋汁 水香汁

徐能食。腹痞下痢。兼和其陰。

人參 生白芍 黃芩 枳實

川連 乾薑

某六濕熱內蒸。下利紅積。

炒黑神麩 炒黑查肉 茯苓皮 飛滑石

新會皮 厚朴 淡竹葉 扁豆葉

祝三 十年久痢。須推飲食。避忌酒客。濕滯腸中。非風藥之辛。佐苦味入腸。何以勝濕。逐熱久病。飲食不減。腸中病也。

臨證指南醫案 卷七 痢

綿茵陳 香白芷 北秦皮 茯苓皮

黃柏 藿香

某 形瘦陰虧。濕熱下痢。候投消食。反劫津液。邪未盡。津先耗。咽喉痛且噎。所謂濕未罷。已上燥矣。

川連 銀花 通草 黃芩

川貝 茯苓皮

某 濕熱內阻。氣分腹痛。下痢。目皆黃。舌光不渴。議清暑泄濕熱。

黃芩 寒水石 川連 厚朴

秦皮 鬱金

山十濕熱腹痛。利紅如豆汁。

生茅朮三錢 炒山查一錢 厚朴一錢 紅麩一錢

廣皮一錢 豬苓一錢

某 夏秋痢疾。固是濕熱傷氣。脾胃氣滯。後重裏急不爽。古方香連丸。取其清暑熱。必佐理氣。謂氣行斯濕熱積聚無容留矣。知母生地。滋陰除熱。治陰分陽亢之火。與痢門濕熱大異。蓋滋則呆滯。氣鈍窒塞。宜乎欲便不出。究竟濕熱邪仍在。桂附熱燥。又致肛墜痛如刀割。補中益氣東垣成法。僅備升舉下焦清陽。未能直透腸中。再用大黃重藥。兼知母生地等味。更令傷及下焦。書義

臨證指南醫案 卷七 痢

謂諸痢久。都屬腎傷。小腹墜。忌冷。顯然是下症。議與升陽。亦須下治。

人參 茯苓 澤瀉 炙草 防風根

羌活 獨活 細辛 生薑 大棗

某 舌白。渴不欲飲。心腹熱。每痢必痛。肛墜。痢又不爽。微嘔。有痰。口以有變。頭中空痛。兩頰皆赤。此水穀氣蒸濕熱。鬱於腸胃。清濁交混。忽加煩燥。難鳴。苦况。法當苦寒泄熱。苦辛香流氣。滲泄利濕。益積滯有形。濕與熱本無形。質耳。

川連 黃芩 鬱金 厚朴

精苓	柳米	秦皮	包	先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷
淡黃芩	川連	丹皮	生芍	
炮薑	炒銀花			
陳此	溫邪經旬不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥			
陰恐致變極				
白頭翁	川連	黃芩	北秦皮	
黃柏	生白芍			
又	溫邪誤表劫津神昏起致極厥			
炒生地	阿膠	炒麥冬	生白芍	
臨證指南醫案	卷七			
炒丹皮	女貞子			
邱	進瀉劑痛緩積稀知厥陰下利宜柔宜通血虛有風			
顯然				
生地	阿膠	丹皮	生白芍	
銀花	小葉糖豆皮			
某	熱漸入裏胸痞便泄腹脹苦泄熱			
黃芩	川連	枳實	白芍	
廣皮白	滑石	甘草	穀芽	
蔡	內虛邪陷協熱自利味左小右大病九日不減是為			
重症	讓用白頭翁湯方加黃芩白芍			

時令暑濕都從口鼻而受氣鬱則營衛失於轉運必	身熱無汗其邪自上以及中必循募原致腸胃亦鬱	痛悶積無非難熱之化此分消利濕則可若以表藥則	傷陽氣矣
茯苓	陳皮	厚朴	木香
炒扁豆	炒山查		
又	協熱下利粘膩血水是腸胃中濕熱之化也		
北秦皮	白頭翁	茯苓	澤瀉
炒銀花	益元散		
某	春溫內陷下痢最易厥脫		
臨證指南醫案	卷七		
川連	阿膠	淡黃芩	炒生地
生白芍	炙草		
王	熱毒逗留不化潮熱下利		
川連	黃芩	炒白芍	茯苓
澤瀉	木瓜		
張	江南地薄氣弱夏季食物內蘊時令熱迫內聚濕熱		
赤痢入冬不愈皆飲食不忌之累宜淡薄滋味			
生茅朮	厚朴	南山查	草果仁
檉根皮	槐花	廣皮	銀花
又	痢血三月晝痢夜止肛門欲墜以氣陷門戶不藏		

人參 當歸 白芍 肉桂 炙草

白朮 廣皮 煨薑 南棗

某二血痢半載。少腹痛。六味地黃加炒查肉炒延胡。

某血積痛痢。起於夏令。秋半不減。明是濕熱滯於腸胃。

久延面色消奪。右脉搏大。乃痢症所大忌。稍通積聚。兼

以和血。

酒炒大黃 川連 黃芩 丹皮

肉桂 歸身 白芍 生甘草

袁七久痢腹痛下血。

生黃芪三錢 生白朮三錢 炒歸身一錢 炒查肉二錢 炒地榆一錢

臨證指南醫案 卷七 痢

廣皮一錢 厚朴一錢 羌活五分 防風根五分

朱九下痢帶瘀血。肛中氣墜。腹不痛。

炒黑楊根皮一兩 生茅朮一錢 生黃柏一錢 炒黑查肉三錢

炒黑地榆一錢 炒焦銀花一錢 赤苓三錢 猪苓一錢

某痛痢不爽。已有血下。暑濕不獨在氣分。且積勞茹素。

攻奪宜慎。

當歸 白芍 南山查 厚朴

草果 炮薑

某脉緩。膈上痛。便稀。溺短。此乃濕鬱脾胃之陽。致氣滯

裡急。宗古人導濕分消意。

生茅朮 廣皮 厚朴 官桂 飛滑石

茯苓 猪苓 澤瀉 炒山查

張七脉沉伏。久痢腹痛。畏寒少食。氣弱腸滯。以溫通方法。

熟附子 生茅朮 生大黃 茯苓

厚朴 木香

又溫下相投。腸滯不通。皆因腑陽微弱。古賢治痢。不離

通瀉二法。

當歸 肉桂心 茯苓 厚朴

南山查 生麥芽

王六平昔溫補相投。畏陽不足之體。間患痢兩月。不思食。

臨證指南醫案 卷七 痢

物。脾胃滯塞。今加嘔惡。夫六腑宜通。治痢之法。非通即

瀉。肛腸結閉。陽虛者。以溫藥通之。

熟附子 製大黃 厚朴 木香 茯苓皮

范二痢稱帶下。謂有帶必先痛。後下。况病起不慎。口腹陽

氣壅塞。積聚留着。試閱前方。宜通者有效。守補則病劇。

六腑皆以宣通為用。

附子 大黃 茯苓 厚朴

生草果 廣皮

又溫下已效。腸胃留滯。都因陽不主運。再佐理氣兼之。

附子 製大黃 茯苓 廣皮

厚朴 生益智 木香 猪苓

李 痢將兩月。日微黃。舌白。口乾。唇燥赤。腹滿。按之軟。竟日小便不通。病者自述。肛門窒塞。努掙不已。僅得迸出粘積點滴。若有餘。莫自必傾腸而多。思夏秋間。暑濕內着。為痢。軒岐。謂曰。滯下。謂滯着氣血。不獨食滯。一因。凡六腑屬陽。以通為用。五臟皆陰。藏蓄為體。先瀉後痢。脾傳腎則逆。即土尅水意。然必究其何以傳尅之由。蓋伏邪垢滯。從中不清。因而下注矣。遷延日久。正氣因虛。仲景論列三陰。至太陰篇中。始挈出腹滿字樣。脾為柔臟。惟剛藥可以宣陽驅濁。但今二腸窒痺。氣不流行。理中

臨證指南醫案 卷七 痢 七

等法。決難通腑。考內經二虛一實者。治其實。開其一面也。然必溫其陽。佐以導氣。逐滯。欲圖扭轉機關。捨此更無他法。

製附子 生厚朴 木香 製大黃 炒黑大茴

又 懶弛半月。脾腎復健。脾敗不主健運。納食皆變痰沫。腎真失司。納氣水液上泛。阻咽。皆痢傷筋。變脈未傳。脈見弦勁。是無胃氣。小愈變病。最屬不宜。入冬為藏陽之令。今陽漸潰散。而陰液枯槁。湯不多飲。飲不解渴。治陽必用剛藥。其陰更涸矣。轉展無可借箸。勉與脾腎分調。脾陽動則冀運。腎陽靜可望藏。王道固難速功。探之

體用不可險藥

早服炒焦腎氣丸 午服參苓白朮散加益智仁

許三 勞倦咳嗽失血。仍然不避寒暑。食物腹中瀉痢。病上加病。後感法當先治。以分病有新舊。

厚朴 益智 廣皮 茯苓皮

白芍 炙草 木瓜 炒扁豆

又 咳嗽瀉痢。藥治相背。治肺礙脾。治脾礙肺。方今交冬。治痢為要。病人說早食相安。晚食脹滿。脾胃陽氣已乏。勿徒消滯寒。尅矣。

白芍 桂酒 益智 廣皮 茯苓

臨證指南醫案 卷七 痢 七

焦白朮 炙草 穀芽 砂仁 蘇

張 下痢泄瀉之後。診脈右弦大。胃虛少納。陽弱不可運化。法當通腑之陽。

人參 益智仁 炒菟絲餅 炒砂仁末

茯苓 廣皮白

陸二 腹滿自痢。脈來濡小。病在太陰。況小便清長。非濕熱之比。法當溫之。

生於朮 附子 茯苓 厚朴 乾薑

許四 痢疾一年。已浮腫瀉瀉。古稱久痢必傷腎。月則用藥。陰煎不應。詢及食粥。吞酸。色瘁。脈濡。清。其之陽。日漸衰

穀之濕不運仍辛溫以甦脾陽佐以分利用胃苓湯去

甘草加益智
陳 痢積雖然少緩請款不減面色青晦四肢厥冷仍在
險途擬進益黃散法

人參 煨益智仁 公丁香 茯苓
廣皮 青皮 木瓜 炒冬米

某 脈微細肢厥下痢無度吳茱萸湯但能止痛仍不進
食此陽敗陰濁腑氣欲絕用桃花湯

赤石脂 乾薑 白粳米
某 痢後大便不實食不健運色脈俱是虛象此清陽失

臨證指南醫案

卷七 痢

曠於中陰氣先走泄於下先理中焦再當攝陰

人參 白朮 茯苓 炙草
廣皮 炮薑 益智

某 自利不渴者屬太陰呃忒之來由乎胃少納穀衝氣
上逆有土敗之象勢已險篤議金匱附子粳米湯

人參 附子 乾薑 炙草 粳米
某 長齋有年土薄氣餒加以久痢少穀欲嘔脾胃之陽

衰矣由夏及今牛載不痊偷忽腫脹何法施治
人參 白朮 乾薑 炮薑

丁香 茯苓

袁 中下陽微嘔呃下利溫中不應恐延衰脫夫陽宜通
陰宜守此開閉不致潰散春回寒谷生氣有以把握候
王先生主議

人參 附子 炮薑 炒粳米
赤石脂 生白芍

某 春痢入冬痢止腹痛食少童年期有活慾之擾此條
寒熱不和脾胃受傷也 六君子湯加肉桂

某 脈沉微下痢紅紫黑舌胎粉白並不渴飲此太陰脾
營虛寒也做理陰煎

當歸頭 白芍 炮薑 炙草
臨證指南醫案 卷七 痢

茯苓 益智
唐氏 下痢四十餘日形寒腹痛

炒當歸 生白芍 清薑 炒山查
青皮 茯苓

沈 議堵截陽明一法
人參 炒白粳米 炮薑 赤石脂

某 高年下痢痰多舌乾脈右空大神困音低乃脾胃兩
虧二氣交虛有年致此恐非所宜

人參 一錢 菟絲子 一錢 赤石脂 三錢 炮薑 一錢
茯苓 三錢 木瓜 一錢

汪五 久痢久瀉為腎病。下瀉久而陰傷氣墜。四神丸治脾腎晨泄。辛溫香燥皆剛。佐入五味酸柔。不過稍製其雄烈。此肛墜尻痠。乃腎液內少而氣陷矣。腥油肉食須忌。

熟地 禹餘糧石 五味子

蔣五 久痢用辛甘溫而效。是脾陽久傷。治由東垣法極是。速食血脈滑必便溏。四肢忽有肉疹。營衛內應脾胃氣血未得充復。五旬外下亦怯。用脾腎兩補。

人參 山藥 茯苓 湖蓮 芡實 補骨脂

荳蔻 芎藭 肉桂 五味 巴戟 菟絲 覆盆子

某 下痢腹痛舌乾。肛墜痢傷陰也。

臨證指南醫案 卷七 痢 五

熟地炭 炒歸身 炒白芍 炒查肉

茯苓 芡草

某 滯濁下疳痛緩。議養陰通腑。

生地 何膠 丹皮 山梔

猪苓 澤瀉

孫 脈左數下利。腹不甚痛。暮夜微熱。所伏暑熱乘陰虛。下陷是清熱理脾不效。當攝陰升陽。

熟地炭 當歸炭 山查炭 炒黑麥芽

炙黑甘草 防風根 炒黑升麻

又 照方去山查麥芽加入參煨白芍。

又 瀉痢久必陰損液耗。此口渴微咳。非實火客邪與甘酸化陰。

人參 山藥 芡草 炒烏梅

木瓜 炒湖蓮肉

蔡 脈右數左細數。面垢舌燥。白苔點點。肌膚甲錯。左脇動氣。伏暑當秋涼而發。初病如瘧。當從苦辛寒法。裏邪熾烈變為下痢。胃津被劫。陰液大耗。昔賢於熱病液竭。急以救陰為務。苟胃開得甦。漸以冀安。否則犯喻氏所指各邪內陷。液枯致危之戒矣。復瀉湯去薑桂麻。

又 酸甘化陰法。

臨證指南醫案 卷七 痢 五

人參 生地 烏梅 芡草

麥冬 木瓜

某 痢久陰液消亡。無以止其燥。燥極則胃不納。善噎難飢。此由陰虛燥熱所致。其不膩滯者謂之。

人參 芡草 炒白芍 炒烏梅肉

炒麥冬 茯苓

周 五 痢後氣墜。都主陰傷。但嗔怒不已。木犯土。致病留連。攝陰之中。聊佐和肝。

熟地 茯苓 炒山查 炒烏梅 木瓜

某 陰液涸。則小水不通。胃氣逆。則厭食欲嘔。此皆痢之。

欵症也。治以中下二焦為主。議理陰煎。

熟地 白芍 附子 五味

炮薑 茯苓

吳三 痢久陰傷腹痛。肛門墜脹。秋病入冬不愈。已屬休息症。和陰劑中。仍有升降。做東垣法。

炒熟地 炒當歸 炒白芍 炙草

生山查 生穀芽

陳七 瀉痢久則傷腎。多見下焦沉墜。先傷在陰。剛藥不效。

人參 鹿茸 菟絲子 茯苓

柏茴香 製補骨脂 砂仁

臨證指南醫案 卷七 痢

張五 長泄痢血腸腎病。無痛墜等因。用黑地黃丸。

范 瀉痢起於長夏。醫謂時令濕熱。胃苓湯。苓芍法。固非

謬說。因高年腎陽肝陰先虧。使客氣內擾。阻遏中流之

砥柱坐鎮。致汪瀾滔天耳。病經兩旬不減。重陰無陽。驗

諸神識尚清。其外邪為少。而內損為多。八脈無權。下無

收攝。痛厄不已。理必生陽泄。下焦冷。此皆陰陽二氣微

絕。治病則勞。治本為宜。非置之不理。實究天人而已。

人參 二錢 鹿茸 二錢 炒黑當歸 三錢 生杜仲 三錢

生沙苑 錢 茯苓 三錢

李十五 自痢五六年。即周身痛痺。蓋腸胃病。致經絡筋骨滯

離疎撤。腸失衛。藥難效。靈書此代煎。

冬於木 荏蓉 熟附子 河水煎

吳九 治痢大法。無過通塞二義。夏秋濕熱固多。初痢不痛。

已非濕熱。色滯者。腸中陳腐也。至今痛而痢。痢後復痛。

按之痛減。屬虛。小雪不愈。陽不來復。久痢治腎。然非滋

膩。先用芩薏米桂湯。

某氏 治痢古法。不越通瀉。經停有痕。腹浮腫。八脈之病。醫

或於見痢。認為脾胃症。議用濟生腎氣丸。

朱七 痢久肛墜。是下焦腎虛。失於收納。治脾胃藥無功。

熟地炭 炒歸身 赤石脂 五味子 炒查肉

臨證指南醫案 卷七 痢

周六 痢久必傷腎陰。八脈不固。腸賦自滑而下。但執健脾

無用。病不在中。納穀遲遲。下焦坎陽亦衰。用三神丸。

五味子 補骨脂 肉果

某 痢久陰陽兩傷。少腹肛墜。連兩腰。脊脊痠痛。由臟

腑絡傷。已及奇經。前議輕劑升陽。頗投。仍從下治。

人參 鹿茸 附子 炒當歸

茴香 菟絲子 杜仲

周 轉方柔藥相安。顯然久痢傷及腎陰。當用理陰煎。兼

用禹糧石脂丸。以攝固腸中。

熟地炭 歸身炭 人參 炙甘草

五味子 炒查肉 兼服馬糧赤石脂丸
金氏 脉數動。下痢腹鳴痛。後墜。卧則氣衝。咳嗽吐粘涎。產後過月。顯是下損至中。納穀日少。形神日衰。勢已延成。蔚勞難期速功。

熟地炭 人參 扶神 炒山藥

建蓮 赤石脂

某氏 休息痢。經二年。明是下焦陰陽皆虛。不能收攝。經期不來。小腹撫摩有形上行。似乎瘕瘕。其實氣結。若不急進溫補。恐滋緩腫脹之累也。

人參 附子 茯苓 炙草

臨證指南醫案 卷七 痢

五味 白芍

某 氣虛下陷。門戶不藏。

人參 黃芪 廣皮 炙草

歸身 炒白芍 防風 升麻

某 痢經五十日。來小愈再發。獨見後重下墜。此為氣陷。則門戶不藏。亦胃弱內風乘襲。護陷者舉之。

人參 歸身 白芍 炙草

升麻 荷葉

石 瘧邪熱氣內陷。變痢。延已三月。脾胃氣衰。面浮肚膨。仍有裏急欲墜之象。中虛伏邪。進以和解。

黃芩 柴胡 人參 丹皮

炒當歸 白芍 敷芽 炒山查

蔡 神氣索然。腹中動氣。舌紅。豎乾。寒熱日遷。平素積勞。致虛。邪伏厥陰。脉促細堅。溫清難用。勉議復脈湯。存陰。勿涸。希圖援救。復脈湯

又 兩投復脈。色脉畧轉。所言平素積虛。不但瘧邪內陷。陽結於上。則胸痞。陰走於下。則頻利。非徒開泄攻邪也。救逆湯去薑

又 奔豚動氣。皆是陽虛。當和營理陽

人參 茯苓 歸身 炙草

臨證指南醫案 卷七 痢

桂心 牡蠣 煨薑 天棗

又 衝氣填塞。邪陷下痢。勢非輕小。用瀉心法。

人參 淡乾薑 熟附子 川連

黃芩 枳實

又 人參 淡乾薑 生地 炒桃仁

張 氣衰熱伏。腹痛下痢。腕中痞悶。不欲納食。由瘧變痢。經邪入腑。斯病勢已重。清理溫熱以開痞。延久必須扶正。

淡黃芩 川連 人參 生白芍

乾薑 枳實

某 邪陷瘧後發痢傷及厥陰症見氣上撞心飢不能食
乾嘔腹痛全是肝病肝為至陰之臟相火內寄仲景治
法不用純剛燥熱之藥以肝為剛臟故也今正交土旺
土木為營五日內未為穩當

人參 炒當歸 炒白芍 炒烏梅肉

茯苓 淡吳萸 生香附汁 真北秦皮

孫 下痢無積肛墜腸間汨汨有聲此屬腸風當用攝固

熱地炭 萸肉炭 炒歸身 炒杞子

川斷 北味肉 煎藥送赤石脂丸三錢

某 當年久痢用三神丸得效是脾腎兩因兼理氣分之

臨證指南醫案 卷七 痢

滯體質陽虛遇冷病加今病起長夏小水不通必係夏
熱阻其宣化久則氣血凝着而為腸紅先與桂苓甘露
飲分消其濕

於木 茯苓 豬苓 澤瀉

滑石 桂心

包 川連 人參 黃芩 白芍

草決明 炒山查 炒銀花

又 際口痢乃熱氣自下上衝而犯胃中腸中傳導皆逆
阻似閉腹痛在下尤甚吞連梅方僅宣中焦未泄下
熱熾熾若不急清陰液同歸於盡姑明其理以俟高明

備採 白頭翁湯

又 脈左細數右弦乾嘔不能納穀腹痛裏急後重痢積
不爽此暑濕深入著腸勢屬噤口痢疾症非輕渺誠用
苦寒清解熱毒必痛緩胃開方免昏厥之變

川連 黃芩 銀花 炒山查

乾薑 白芍 木香汁

又 下午病劇乃陰氣消亡之徵若但陰柔恐生生不至

疎補胃藥正宜速商

生地 阿膠 人參 生白芍

炒山查 炒銀花

臨證指南醫案 卷七 痢

矯 初起無寒熱即瀉痢嘔惡不食乃噤口痢重病夫暑
邪之傷由口鼻吸氣而入邪與水穀交混蒸變濕熱醱
為積滯膿血腸胃氣窒欲解不能通爽遂致裏結後重
香連苦辛理氣導濕清熱初用頗是皆緣勞碌之人非
膏粱溫養之質淡薄積勞小氣易傷四十日來積少痛
緩醫稱病解而食不下咽不知飢飽診得脈弦形衰舌
白不渴飲水日瀉數行全屬胃倒氣奪中宮損極下關
不攝穀不能咽焉能承受湯藥藥味氣劣胃衰必惡久
痢久瀉務在能食古人非解脾胃即安腎攝納再詢粉
藥下咽或噎或噎讓以上脫宜通其清陽下焦當因濕

其滑脫故古方中參苓白朮散未嘗以米飲日服二次
間以不傷胃之物食些少勿多以示胃之所喜為補必
得胃氣漸旺方有轉危為安

人參二錢 焦木一錢 茯苓一錢 炙草五分

炒扁豆二錢 苡仁一錢 桔梗一錢 砂仁七分

炮薑炭一錢 肉豆蔻一錢 右藥研細秤准分兩每次

用香梗米飲湯調服一錢五分右藥須日進二次

鮑 舌心黃邊白渴飲水漿停胃脘乾嘔微冷呃自痢

稀水小便不利診脈堅勁不和八旬又二暑濕熱邪內

着必脾胃氣醒始可磨耐以高年不敢過清過消用清

臨證指南醫案 卷七 痢

暑益氣方法

川連 黃芩 石蓮子 煨乾葛 青皮

人參 茯苓 厚朴 猪苓 澤瀉

又 口中乾燥小水全無泉源已竭陰液無以上承痢症

噤口都是濕熱壅於胃口下元衰憊衝脈氣震高突此

攻病保真理難捉摸矣

川連 黃芩 草決明 石蓮子

烏梅 白芍

痢症古名滯下惟夏秋暑濕積者居多其次則風

淫火迫寒侵也推之燥氣獨不為患攻前法悉有定

例不必再述至於暑者有陰暑陽暑之源其邪必乘
乎濕夫陰暑由於人之陽氣先虧加以貪涼喜冷將
折生陽故主於溫陽暑由於天之熱伏阻氣化濁則
重於清而醫之下手工夫於此須細心認定但邪之
來也似水之流臟腑間一有罅隙則乘虛而着故有
在氣在血之分傷臟傷腑之異若表之邪鬱而氣機
下流不息者喻氏論人參敗毒散裡之積毒而寒熱
交粘者潔古立芍藥湯在氣分有苦辛調氣與辛甘
益氣等法在血分有酸苦行血及酸柔養血諸方若
表症急從乎二陽有桂枝湯葛根苓連湯小柴胡湯

臨證指南醫案 卷七 痢

裏勢貴端究脾胃有小承氣湯溫脾湯總之治腑以

三焦見症為憑治臟以足三陰為要領辨得虛實之

情形酌以或通或瀉之法則臨症權宜庶乎不錯矣

但見症不治之條甚多最難愈者莫如休息痢攻補

之法非一予亦不贅最危險者莫如噤口痢却有兩

端若因暑濕邪充格拒三焦者氣機皆逆傳而閉上

下之勢渾如兩截若治不得其要則邪無出路正立

消亡此丹溪立法最高後世都宗其旨先生又借用

半夏瀉心湯去守中之品取補以運之辛以開之

苦以降之與病情尤為允協所以先生之見長是集

之與妙。每每在此。又因脾胃之陽素虛。陰邪從中而下者。先傷太陰。繼傷少陰。關開大開。而泄無度。戊癸少化火之機。命陽無蒸變之力。此不饑不食。為嘔為脹。理宜然矣。與邪多積熱之候相比。絕然不同。然之仲景理中湯。腎氣丸。及景岳理陰煎。胃關煎等法。可也。吾鄉姚頤真先生。化出捷徑良法。以大劑茯苓。配入參歸姜附。桂製白芍之類。治之。靡不應手而愈。想茯苓之性。溫能達下。滋可利胃。質之柔潤。以補陽中之陰。較地黃阿膠尤勝。與之腸膏竭盡。絡脈結滯而痛者。堪稱神品。自此推廣。用治甚多。若日某方某藥。

臨證指南醫案 卷七 痢

但治某症。不知活用。反稱杜撰。則禁絕後人靈活之心。無從施發矣。 邵新甫

便血

鄭 夏至後濕熱內蒸。腸風復來。議酸苦法。

川連 黃芩 烏梅肉 生白芍 廣皮

厚朴 荆芥炭 菊花炭 又駐車丸二錢

某 脈右數。形色蒼黑。體質多熱。復受長夏濕熱內蒸。水穀氣壅。血從便下。法以苦寒佐以 溫薄味。經月可冀

病愈

茅朮 川連 黃芩 厚朴

地榆 槐米

臨證指南醫案 卷七 便血

程 年前痰飲哮喘。不得安臥。以辛溫通陽。劫飲而愈。知脾陽內弱。運動失職。水穀氣蒸。飲邪由濕而成。濕屬陰

久鬱化熱。熱入絡血。必自下。但體質仍屬陽虛。凡腸紅

成方。每多苦寒。若嚴連之類。於體未合。毋欲速也。

生於朮 茯苓 澤瀉 地榆炭

桑葉 丹皮

俞 陽虛腸紅。洞瀉。議劫胃水。理中換生。茅朮生厚朴

附子炭炮薑

程 七脈沉。糞後下血。少年淳朴。得此。乃食物不和。腸絡空

隙所滲。與升降法。

茅朮 厚朴 廣皮 炮薑

炙草 升麻 柴胡 地榆

又 脉緩濡弱陽氣不足過飲濕勝大便溏滑似乎不禁

便後血色紅紫兼有成塊而下論理是少陰腎臟失司

固攝而陽明胃脉但開無合矣從來治腑以通為補與

治臟補法迥異先擬煖胃通陽一法

生茅朮 人參 茯苓 新會皮

厚朴 炮附子 炮薑炭 地榆炭

程二 食人不化飲酒厚味即瀉而腸血未已蓋陽微健運

失職酒食氣蒸濕聚陽鬱脾陽清陽日陷矣議用東垣

臨證指南醫案 卷七 便血 五

升陽法

人參 茅朮 廣皮 炙草

生益智 防風 炒升麻

某 陽虛體質食入不化飲酒厚味即瀉而腸血未止蓋

陽微健運失職酒食氣蒸濕聚脾陽清陽日陷矣當從

謙甫先生法

人參二錢 乾薑二錢 附子三錢 茅朮五錢 升麻三錢

白朮二錢 厚朴二錢 茯苓二錢 廣皮二錢 炙草二錢

歸身二錢 白芍一錢 葛根二錢 益智一錢 地榆三錢

神麩半錢 右藥各與薑棗湯丸

濕 濕勝中虛便紅

焦朮 炒當歸 炒白芍 炙草

防風根 煨葛根 乾荷葉

劉六 鬱怒腸紅復來木火乘脾絡腹中微痛議與利陰

冬桑葉 丹皮 生白芍 黑山梔

廣皮 乾荷葉邊 生穀芽

張 二年前衝氣入脘有形痛嘔蕪前後有血此屬腸陽

擾絡風動內燥頭顛皆眩痛每日用龍膏丸

葉 嗔怒動肝絡血乃下按之痛減為虛夫肝木上升必

犯胃口遂脹欲嘔清陽下陷門戶失藏致裏急便血參

臨證指南醫案 卷七 便血 五

木炮薑辛甘溫煖乃太陰脾藥焉能和及肝胃丹溪云

上升之氣自逝而出自覺冷者非真冷也

駐車丸二錢

程四 少陽絡病必犯太陰脾陽衰微中焦痞結色痿如瘰

便後有血論脾乃柔臟非剛不能馳陽然鬱勃致病溫

燥難投議補土泄木方法

人參 當歸 枳實汁 炒牛夏

桑葉 丹皮

參歸養脾之營枳中通陽明之滯桑丹泄少陽之鬱

某 凡有痔疾最多下血今因嗔怒先腹滿隨瀉血而水

二八四

澹前。近日便後。是風木於工中。氣滯為膨。氣走為瀉。議理中陽。泄木佐之。

人參 附子 益鹽 茅木

厚朴 地榆 升麻 柴胡

某 便紅脉數

生地 三錢 銀花 三錢 葛根 一錢 白芍 一錢 槐花 一錢

程二 脉數能食。腸紅。陰有下泄。腸腑熱燥所致。非溫補之症。

細生地 丹參 黃柏 黑穉豆皮

地榆炭 柿餅灰 槐花 金石斛

臨證指南醫案 卷七 便血 五

某三 內熱。腸紅。痔。當清陰分之熱。

生地 炒丹皮 酒炒黃芩 炒黑槐花

柿餅灰 玄參 銀花 黑山梔

汪 嗽血已止。糞中見紅。中焦之熱下移。腸胃屬腑。止血亦屬易事。花甲以外。年歲熱移入下。到底下元衰矣。

細生地 川石斛 柿餅灰 天冬

趙六 勞倦便後血

炒黑榜根皮 炒黑地榆 炒焦丹皮 五加皮

炒焦銀花 蒼朮 茯苓 炒澤瀉

錢八 陰虛內熱。腸紅不止。

炒黑榜根皮 炒生地 炒銀花 炒黑地榆 歸身 生白芍 炒丹皮 茯苓

蔡三 脉濡。小食。少氣。衰。春季便血。大便時結時溇。思春夏陽升。陰弱。少攝。涼。益氣之屬。升陽。恐陰液更損。議以甘酸固滯。調陽明為法。

人參 炒粳米 禹糧石 赤石脂

木瓜 炒烏梅

某 能食。湯血。脉細。色痿。疔痔。下墜。酸苦。熄風。堅陰。

萸肉炭 五味炭 黃柏炭 地榆炭

禹糧石 赤石脂

臨證指南醫案 卷七 便血 五

吳二 中滿。過於消。尅。便血。食入。易滯。是脾胃病。血統於脾。脾健自能統攝。歸脾湯。燉其守。疎腑。養臟。相宜。

丸蒸白朮 楠山查 茯苓 廣皮

穀芽 麥芽 薑棗湯法

某三 便血如注。面黃。脉小。已經三載。資益胃法。

人參 焦朮 茯苓 炙草

木瓜 炮薑

李三 上年夏季。絡傷。下血。是操持損。營治在心脾。

歸脾餽糖丸

朱 入暮腹痛。鳴響。學九久。已偏。春。正下血。經月。顏色。

鮮明此痛決非傷瘀積聚乃營損寒乘木來侮土致此
四載之纏綿調營培土以甘泄木散鬱宜辛節口戒慾
百天可效。

人參 炒當歸 炒白芍 肉桂

炮薑 茯苓 炙草 南棗

又 細推病情不但營氣不振而清陽亦傷洞泄不且

辛潤宜減甘溫宜加從桂枝加桂湯立法

人參 桂枝 茯苓 生白芍

炙草 肉桂 煨薑 南棗

又 仍議理營

人參 於朮 茯苓 炮薑

桂心 白芍 真武丸二錢

某八 便後下血此遠血也

焦朮 一錢 炒白芍 一錢 炮薑 一錢 炙草 五分

木瓜 一錢 炒荷葉邊 二錢

方 脈小左數便實下血乃肝絡熱勝血不自寧醫投參

芪歸桂甘辛溫煖昧於相火寄藏肝胆火焰風翔上蒙

清空鼻塞頭暈哈咳不已一候再候遺患中厥夫下虛

則上實陰傷陽浮胃乃一定至理

連翹心 竹葉心 鮮生地 芍藥

丹皮 川斛

又 下血陰傷走泄虛陽上升頭目清眩參芪朮桂辛甘

助上致鼻塞耳聾用清上五六日右脈已小左仍細數

乃陰虧本象下愈虛則上愈實議以滋水制火之方

生地 玄參 天冬 川斛

茯神 炒牛膝

又 脈左數耳聾筋痛木火水濕得以致上泛用補陰丸

補陰丸五錢 又虎潛丸羊肉膠丸

某 腸紅粘帶四年不痊時氣致傷肛墜刺痛大便不爽

藥難驟功當以潤劑通腑

臨證指南醫案 卷七 便血

生地 積豆皮 漆樹 麻仁

女萎子 歸身

姚 勞傷下血絡脈空乏為痛營衛不主循序流行而為

偏寒偏熱診脈右空大左小促通補陽明使閉關有序

歸身建中湯

唐 內經以陰絡傷則血內溢蒸熱酒氣雄擾動騰絡聚

血之所難得小愈而神采爪甲不榮猶是血脫之色也

隆便甚冷在脾腎以脾為攝血之司腎主攝納之柄故

也 晚歸脾去木香 早六味去丹澤加五味決實蓮

肉阿膠丸

沈五 酒濕汚血皆脾腎柔膩主病當與剛藥 黑地黃丸

凡脾腎為柔臟可受剛藥心肝為剛臟可受柔藥不

可不知謹市治此症立法以平胃散作主加桂附乾

薑歸芍重加炒地榆以收下濕用之神效即此意也

吳二 腹痛下血食等薺豆漿而愈乃泄肺導濕之藥既愈

以來復有筋骨痠爽寒熱夜臥口乾乃濕去氣泄陽明

脈之不主用事營衛失度津液不升之象天眞丸主之

去人參

支五 痔血久下肌肉痿黃乃血脫氣餒漸加喘促浮腫再

延腹脹便不可爲此症屬陰有寒腑腸有熱詳於金匱

臨證指南醫案 卷七 便血

穀疸篇中極難調治

人參 焦術 茯苓 炒菟絲子

廣皮 生益智 木瓜

楊八 中年形勞氣餒陰中之陽不足且便血已多以溫養

固下男子有年下先虛也

人參 茯苓 歸身 淡菴蓉 補骨脂

巴戟 炒遠志 生精羊肉熬膏九服五錢

川八 久矣晨泄腹痛近日有紅積此屬腎虛

補骨脂 大茴香 五味 茯苓 生菟絲

陳七 脉左虛清右緩大尾間痛連脊骨便後有血自覺

惶欲登乘之納穀最少明是中下交損八脉全虧早

請藥斑龍丸峻補玉堂關元暮服歸脾膏滋養營陰守

之經年形體自固

鹿茸 生切薄 鹿角霜 另研 鹿角膠 鹽湯 化 柏子仁 去油 烘乾

熟地 九蒸 韭子 益水 菟絲子 另磨 赤白茯苓 蒸

補骨脂 胡桃肉 搗爛 蒸 一日 搗淨 炒香

右溶膏煉蜜爲丸每服五錢淡鹽湯送

鹿茸壯督脉之陽鹿霜通督脉之氣鹿膠補督脉之

血骨脂獨入命門以收散越陽氣柏子凉心以益腎

熟地味厚以填腎韭子菟絲就少陰以升氣固精重

臨證指南醫案 卷七 便血

用茯苓淡滲本草以陽明本藥能引諸藥入於至陰

之界耳不用萸味之酸以酸能柔陰且不能入脉耳

胡十 上下失血先瀉血後便瀉踰月陰傷液耗胃納頗安

且無操家之勞安養閑坐百日所謂靜則陰充

熟地 萸肉 茯苓 山藥

五味 龍骨

汪 腎虛當春陽升動咳嗽此聲音未震震有血陰難

充復不肯上承用陰藥固攝

熟地 白芍 茯苓 黑糯米皮

炒焦烏梅肉

三腎陰虛絡中熱肝風動陽紅三載不已左脇及腹不
突少陽亦逆多以補中調攝故未見奏功姑用疎補為
益勝通勝

熟地炭 炒官歸 炒查肉 炒地榆

炒丹皮 冬桑葉

又益陰泄陽四劑血止但腰痠院中痺咽燥喜涼飲肛
熱若火烙陽不和平仍是陰精失涵用虎潛法

熟地炭 白芍 當歸 地榆炭

龜膠 知母 黃柏 豬脊髓丸

宋 沫血鮮紅凝塊紫黑陰絡傷損治在下焦况少腹疝

臨證指南醫案 卷七 便血 五

痲肝腎見症前此精濁日久亦令陰傷於下

人參 茯苓 熟地炭 炒黑杞子

五味 炒地榆 生杜仲

又左脉小數堅別陰脈

人參 茯苓 湖蓮肉 芡實

熟地炭 五味

陳氏 脉小瀉血有二十年經云陰絡傷血內溢自病起十

六載不得孕育述心中痛墜血下不論寒前發後問脊
椎腰尻痠楚而經水仍至附膝當冷而骨體熱灼由陰
液損傷傷及陽不固密閉頻年服藥歸芪雜入涼肝焉

是導言治病議從奇經升固一法

鹿茸 鹿角霜 枸杞子 歸身

紫石英 沙苑 生杜仲 炒大商

補骨脂 禹餘糧石 蒸餅燻丸

張三 勞力見血胸背脇肋諸脈絡牽掣不和治在營絡

人參 歸身 白芍 茯苓

炙草 肉桂

計三五 瘀血必結在絡絡反腸胃而後乃下此一定之理平

昔勞形奔馳寒暄飢飽致傷苟能安逸身心瘀不復聚

不然年餘再瘀不治

臨證指南醫案 卷七 便血 五

旋覆花 新絳 青葱 桃仁

當歸鬚 栝子仁

宋氏 當年腸紅經閉血喉痛已見陽氣乘絡絡為氣乘漸

若懷孕者然氣攻則動如梭與胎動迥異倘加勞怒必

有汚濁暴下推理當如是觀

栝子仁 澤蘭 卷柏 黑大豆皮

茯苓 大腹皮

便血一症古有腸風臟毒脈痔之分其見不外乎風

淫腸胃濕熱傷脾二義不若內經謂陰絡受傷及結

陰之肯為精切仲景之先便後血先血後便之文尤

簡括也。陰絡即脾腑。款下之終。陰是陰不隨陽之
 徵。以先後分別其血之遠近。就遠近可決其臟腑之
 性情。既不致氣失竄攝。血無所歸。如漏卮不已耳。肺
 病致燥。宜潤宜降。如桑麻丸。及天冬地黃銀花柿
 餅之類是也。心病則火燃。血沸宜清。宜化。如竹葉地
 黃湯及補心丹之類是也。脾病必濕滑。宜燥宜升。如
 茅朮理中湯及東垣益氣湯之類是也。肝病有風陽
 痛。迫宜柔。宜泄。如駐車丸。及甘酸和緩之劑是也。腎
 病見形消。腰折宜補。宜填。如虎骨丸。及理陰煎之類
 是也。至嗜淫為極。機逆則木火熾。營有桑葉山梔柏
 臨證指南醫案 卷七 便血 三

子丹皮之清養。大腸為燥腑。每多濕熱風淫。如辛涼
 苦燥之治。胃為水穀之海。多氣多血之鄉。臟腑病
 無不兼之。宜補宜和。應寒應熱。難以拘執而言。若努
 力損傷者。通補為主。膏粱醜積者。清疎為宜。痔瘡則
 滋燥兼投。中毒須知寒熱。餘如黑地黃丸以治脾濕
 腎燥。天真丸以大補真氣。真精平胃地榆之升降。脾
 胃歸脾之守補。心脾。珠龍以溫煦。奇督建中之復生。
 陽。俱木之疎補。中土。禹糧赤脂以堵截。陽明。用五仁
 湯。復從前之腸液。養管法。善病後之元虛。此皆先生
 祖古方。而運以匠心。為後學之津梁也。 嶺南新市

脫肛

濕熱氣

氣虛下

翁六濕熱皆主傷氣。氣下陷。墜肛而痛。瘦弱後。陰囊筋牽
 着於肛。其痛為甚。夫厥陰肝脈。逆陰。按脈濡弱。決非疎
 泄。主治。議進陷者。舉之。從東垣補中益氣湯。

孫 面色痿黃。腹痛下血。都因飲食重傷脾胃。氣下陷為
 脫肛。經月不愈。正氣已虛。宜甘溫益氣。少佐酸苦。務使
 中焦生旺。而釋年易虧之陰。自堅。冀有向安之理。

人參 川連 炒歸身 炒白芍
 炙草 廣皮 石蓮肉 烏梅

臨證指南醫案 卷七 脫肛 三

又 肛翻純血。不但脾弱氣陷。下焦之陰。亦不攝固。面色
 唇爪已無華色。此益氣乃一定成法。攝陰亦不可少。然
 幼穉補藥。須佐宜通。以易虛易實之體也。

人參 焦朮 廣皮 白芍 炙草
 歸身 五味 升麻 醋炒 柴胡 醋炒

某 便後少腹痛。肛墜。溺則便滑。腎虛不攝。
 熟地炭 五味 黃肉炭 茯苓

某 炒遠志 炒菟絲子
 肛墜肛痛。利多傷陰

熟地炭 五味 茯苓 炒山藥

炒查肉 炒菟絲子 煎送禹糧石脂丸

王六陽氣下陷腎真不攝肛墜氣泄加風向老下元陽燠

非升柴能舉其陷

人參 鹿茸 補骨脂 炒大茴香

茯苓 調人陽起石三分

吳五脫肛漏血過勞即發病經十六載色萎黃背脊痛診

脈尺中下垂法當升陽攝陰兼理奇脈

斑龍丸加五味子養丸

脫肛一症其因不一有因久痢久瀉脾腎氣陷而脫者有因中氣虛寒不能收攝而脫者有因酒濕傷脾

臨證指南醫案 卷七 脫肛 完

色慾傷腎而脫者有因腎氣本虛關門不固而脫者

有因濕熱下墜而脫者又肛門為大腸之使大腸受

寒受熱皆能脫肛老人氣血已衰小兒氣血未旺皆

易脫肛經曰下者舉之徐之才曰瀉可去脫皆治脫

肛之法也觀先生治脫肛之症亦不越乎升舉固攝

益氣三法如氣虛下陷而脫者宗東垣補中益氣湯

舉陷為主如腎虛不攝而脫者宗仲景禹糧石脂丸

及熟地五味菟絲葦固攝下焦陰氣為主如肝弱氣

陷脾胃氣虛下陷而脫者用攝陰益氣兼以酸苦泄

熱為主如老年陽氣下陷腎真不攝而脫者又有鹿

茸陽起石等提陽固氣一法汪詒菴云有氣熱血熱

而肛反挺出者宜用芩連槐栢及四物升柴之類愚

謂印或間有此症終非可訓之法存之以質君子

滋丸

痿

肺熱葉焦

湯三有年偏痿日瘦色蒼脈數從金匱肺熱葉焦則生痿

壁論

玉竹 大沙參 地骨皮 麥冬

桑葉 苦百合 甜杏仁

徐三而瘦附奕此屬肺熱痿躄

連翹 花粉 黑山梔 赤小豆

桑葉 白通草

張 濕中伏熱沉着下焦用苦勝濕辛通氣分然必循經

臨證指南醫案 卷七 痿

入絡漸次達及陽明

綿茵陳錢三 生茅朮分五 黃柏錢一 晚蚕沙錢一

寒水石錢三 茯苓皮錢三

又 色蒼脈實體質強壯雖年踰四旬氣元克壯詢知平

日善啖酒體甘肥此釀成濕火蘊結下焦今少腹微腫

硬二便滯澇自覺少腹氣脹上冲兩足沉重艱於步履

腿股皮中甚熱即內經所云濕熱不攘大筋纏短小筋

弛長續短為拘弛長為痿也更述會因熬煉膏藥中有

廣蟲蜈蚣等物咬受穢濁毒氣未始非與濕熱糾蓄沉

伏下焦前議苦辛寒燥茲再佐以搜逐絡隧然此病從

口而入必茹素戒飲二二年之久病根可拔當恪守勿

懈為要

綿茵陳錢三 黃柏錢一 川草薢錢一 茯苓皮錢三

金鈴子錢一 穿山甲錢三 大板榔汁錢一

又 綿茵陳 草薢 茯苓皮 黃柏 蚕沙

漢防已 龍胆草 山梔 青黛

又 病去七八常服二妙丸可也

黃柏八兩 茅山木米泔浸切片同烏芝煎飯上

吳二雨濕泛潮外來水穀聚濕內起兩因相湊經脈為痺

臨證指南醫案 卷七 痿

始病繼以瘡痕漸致痿癱筋弛氣隧不用濕雖阻氣而

熱蒸燥及筋骨久延廢棄有諸

大豆黃卷 飛滑石 杏仁 通草 木防已

廉三診脈論體從遺精漏瘍繼而環跳穴痛遂不堪行走

臍陰傷及腸陽陽氣日加室寒經脈不司舒展食入壅

腕欲吐大便旬日不通痞阻日甚而為痿症內經論治

痿痺取陽明無非流通胃氣蓋胃脈主乎束筋骨利機

開竅也議用加味溫胆湯

又 大便旬日不通用更衣丸取意小腸火腑非苦不通

非下不奪也

邪風入絡所致
某五頭目口鼻閉邪繼而足痺此邪風入絡所致

羚羊角 犀角 玄參 細生地

黃柏 川斛 川草薺

俞 五旬又四陽氣日薄陽明脈絡空乏不可束筋骨以

流利機關痛肢麻頭目如蒙行動痿弱無力此下虛

上實絡熱內風沸起當入夏陽升為甚深潔利痰必不

應病後清當以熄內風

犀角 鮮生地 玄參心 蓮翹心

冬桑葉 丹皮 鉤藤 明天麻

陳 陽明脈空厥陰風動自右肩臂漸足跗痿痺長夏

臨證指南醫案 卷七 痿

氣泄秋牛不主收肅顯然虛症先用通攝法

淡從蓉 熟地 杞子 川牛膝

川斛 茯苓 遠志 炒黑 石菖蒲

夏四自辨壯失血遺精兩交夏月四肢痿癱不得轉動指

節亦不能屈曲凡大地間冬主收藏夏主發洩內損多

年不復元陽明脈衰所致

當歸 羊肉膠 杞子 續陽

菊花炭 茯苓 青蘆

吳三下焦痿躄先有遺泄濕癆癩進滲利陰陽更傷雖有

參芪未養脾肺以益氣未能救下則如畏冷陽微幾日

飯後吐食乃胃陽衰應乎外衛失職但下焦之病亦屬精血受傷兩投柔劑溫通之補以腎臟惡燥久病宜通任督通攝兼施亦與古賢四斤金剛健步諸法互參至於胃藥必須另用夫胃腑主乎氣氣得下行為順東垣有升陽益胃之條似乎相悖然苓連非苦降之氣味乎凡吐後一二日暫停下焦血分藥即用扶陽理胃二日俾中下兩固經旨謂陽明之脈束筋骨以利機關諒本病必有合矣

鹿茸 淡從蓉 當歸 杞子 補骨脂

巴戟天 牛膝 柏子仁 茯苓 川斛

臨證指南醫案 卷七 痿

吐後間服大半夏湯加淡乾薑薑汁

沈 長夏濕熱經脈流行氣鈍兼以下元絡脈已虛痿弱

不耐步趨常似酸楚大便或結或澀都屬肝腎為病然

益下必佐宣通脈絡乃正治之法倘徒呆補恐季夏後

濕熱還擾須為預理

鹿角霜 當歸 生茅朮 熟地 薑汁 茯苓

桑椹子 茯苓 巴戟 遠志 小茴

金毛狗脊三筋酒蒸水熬膏和丸淡鹽湯送下

李九痿躄在下肝腎病多但素飲必有濕熱熱癩濕滯氣

血不行筋縮肌肉不仁體質重着難移無非濕邪之深

沉也若論陽虛不該大發瘡癩但久病非速攻莫計效
遲方可愈疾

細生地 鹹菴蓉 當歸鬚 牛膝

黃柏 生刺蒺 川斛 菖蒲

包三寢食如常脈沉而緩獨兩腿內外肌肉麻木五旬又

三陽脈漸衰騰維不為用事非三氣雜感也溫通以佐
脈絡之流暢做古賢四斤金剛之屬

淡菴蓉 枸杞子 牛膝 茯苓 白蒺藜

木瓜 菖蒲 金毛狗脊膏丸

郭 兩足痿弱遇冷筋掣三年久病藥力焉得速拔况不

臨證指南醫案 卷七

明受病何因徒見病而治難期速功據云精消濁後通

納下焦為宜

淡菴蓉 茯苓 川斛 生茅朮

生杜仲 全毛狗脊

沈四 腹鳴瘕泄此積勞久傷陽氣肝脈內動勢欲痿厥法當

脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛

脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛

脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛 脾胃虛

沈六 寢食如常儀容日瘦語言出聲舌絡牽強手足痿弱

不堪動作是肝腎內損漸及奇經諸脈乃痿痺之症未

能期速功 地黃飲子去萸味桂

席 雨水後診得右脈頰和左關尺大堅搏不附骨春陽

初萌裏真漏泄有風動枯痿之慮議乙癸同涵意

熟地 淡菴蓉 杞子 五味 萸肉

牛膝 川斛 茯苓 菊花 山藥粉丸

李氏 右肢附足無力如癱交子夜痰多喘帶下且頻是

衝脈虛寒浮火上升非治嗽清熱夫衝為血海隸於陽

明文科八脈奇經最要內經論之女子五七年歲陽明

日衰今天癸將絕年歲脈絡少氣非見病治病膚淺之

見思意通陽攝陰以實奇脈不必續治

臨證指南醫案 卷七

薛氏加減八味丸二兩勺七服隨湯送下

許 金瘡去血乃經脈管絡之傷者損及脈脈條忽莫救

後此煩怒動肝屬五志中陽氣逆逆與容邪化火兩途

苦辛泄氣頻服既多陽遂發泄形雖若豐盈而致藏固

攝失職少腹約束陽道不舉背脊喜靠步履無力皆是

痿弱症端漸至痿廢議以通納之法當專滋潤養生真氣

下元之陽八脈之氣收者收通者通庶乎近理

鹿角霜 淡菴蓉乾 生薑絲粉 生杜仲粉

歸身 五味 大茴香 遠志

家韭子 覆盆子 雲茯苓 蒜汁泛丸

唐三脈左沉小右弦而足腰膝痠無力舌本腫脹刺頸
轟然蒸熱痰涎湧出味鹹此腎虛收納少權督脈不可
約束陰火上泛內風齊煽久延凌厥沉痾病根在下通
奇脈以收拾散越之陰陽為法

虎潛去知柏歸加枸杞青鹽羊肉膠丸

萬脈濡弱右大心熱煩渴兩足膝腰脾伸縮不得自如
此乃下焦陰虛熱燥筋骨而為痿躄

生虎潛去龜廣鎖加玄參

黃四冬藏精氣既少當春夏發泄失血遺精筋弛骨痠不
堪行走精血內怯奇脈中少氣三年久損若不絕慾安

臨證指南醫案

卷七 痿

吳

開有使廢難狀之疾

鹿筋膠 羯羊肉膠 牛骨髓 猪脊髓

線魚膠

從容草

紫巴戟

枸杞子

茯苓

沙苑子

牛膝

青鹽

某病後陰傷骨痿

生杜仲

熟地

蓮手

黃柏

虎骨

牛膝

當歸

巴戟

特陽虛 某症如歷節但汗出筋縱而痛冬月為甚腰脊僵僕形
俯據述未病前夢遺已久是精血內損無以營養筋骨
難與攻迎議香茸九溫通太陽督脈

鹿茸 三兩

生當歸 二兩

麝香 一錢

生川烏 五錢

雄羊腎三對酒煮爛搗丸

經云肺熱葉焦則生痿躄又云治痿獨取陽明以及

脈痿筋痿肉痿骨痿之論內經於痿症一門可謂詳

審精密矣奈後賢不解病情以諸痿一症或附錄於

虛勞或散見於風濕大失經旨賴丹溪先生特表而

出之惜乎其言之未備也夫痿症之旨不外乎肝腎

脾胃四經之病蓋肝主筋肝傷則四肢不為人用而

筋骨拘攣腎藏精血相生精虛則不能灌溉諸水

血虛則不能營養筋骨肺主氣為高清之臟肺虛則

臨證指南醫案

卷七 痿

吳

高源化絕化絕則水涸水涸則不能滋潤筋骨陽明

為宗筋之長陽明虛則宗筋縱宗筋縱則不能束筋

骨以流利機關此不能步履痿弱筋縮之症作矣故

先生治痿無一定之法用力無獨執之見如衝任虛

寒而成痿者通陽攝陰兼實奇脈為主濕熱沉着下

焦而成痿者用苦辛寒燥為主腎陽奇脈兼虛者用

通納八脈收拾散越之陰陽為主如下焦陰虛及肝

腎虛而成痿者用河間飲子虎潛諸法填納下焦和

肝熄風為主陽明脈空厥陰風動而成痿者用通攝

為主肝腎虛而兼濕熱及濕熱蒸灼筋骨而成痿者

益下佐以溫通脈絡兼清熱利濕為主胃虛寒者助骨不利而成痿者用流通胃氣及通利小腸火腑為主胃陽腎督皆虛者兩固中下為主陽明虛營絡熱及內風動而成痿者以清營熱熄內風為主肺熱葉焦而成痿者用甘寒清上熱為主邪風入絡而成痿者以解毒宣行為主精血內奪奇脈少氣而成痿者以填補精髓為主先生立法精詳真可垂諸不朽矣

解滋丸

痺

風濕相搏。一身盡痛。加以墮水。外寒裏熱。痛極發厥。此屬周痺。

桂枝木 片薑黃 羚羊角 游桐皮

花粉 白茯苓

又 照前方去薑黃白茯苓加大豆黃卷木防已

鮑四風濕客邪留於經絡上下四肢流走而痛邪行觸犯

不拘一處古稱周痺且數十年之久豈區區湯散可效

凡新邪宜急散宿邪宜緩攻

臨證指南醫案 卷七 痺

蟻螂蟲 全蝎 地龍 穿山甲

蜂房 川烏 麝香 乳香

右藥製末以無灰酒煮黑大豆汁泛丸

杜三溫暖開泄驟冷外加風寒濕三氣交傷為痺遊走上

下為楚邪入經隧雖汗不解貴乎宣通

桂枝 杏仁 滑石 石膏

川草薢 漢防己 苡仁 通草

又 經脈通而痛痺減絡中虛則痿弱無力周身汗出陽

泄已多豈可再用苦辛以傷陽泄氣乎內經以筋緩為

陽明脈虛當宗此旨

黃芪	防風	白朮	茯苓	炙草
桂枝	當歸	白芍	苡仁	
又大凡邪中於經為痺邪中於絡為痿今痺痛全止行走痿弱無力經脈受傷陽氣不為護持法當溫養通補經旨看真養陽重在扶培生氣耳				
黃芪	四兩	茯苓	三兩	生白朮
淡從蓉	二兩	當歸	三兩	牛膝
虎骨膠	金毛狗脊	十二兩	無灰酒	膠膏為丸
劉三瀕海颶風潮濕着於經脈之中此為周痺痺則氣血不通陽明之陽不主司事食腥膩遂不化為滯瀉病有臨證指南醫案 卷七 痺 至				
六七年正虛邪實不可急攻宜緩				
生白朮	生黃芪	游桐皮	川桂枝木	
羌活	防風根			
周 痛勢流走而腫後感外邪參藥不可與也從行痺治				
羌活	木防已	石膏	生甘草	
海桐皮	杏仁			
吳 寒入陰分筋骨痛與此為痺症遺泄內虛忌用表散劫真				
當歸	沙苑	北細辛	桂枝木	
生白朮	茯苓			

又 虎骨	當歸	北細辛	生白朮	茯苓
又 行痺入左足				
生虎骨	防已	車釐	苡仁	
半夏	茯苓			
某氏 風濕化熱萃於經脈腫痛游走病名行痺世俗呼為歷節風是也				
桂枝	羌活	石膏	甘草	
杏仁	防風			
又 行痺腹中痛便難不知飢				
瓜蒌皮	紫苑	杏仁	鬱金	
臨證指南醫案 卷七 痺 至				
半夏	山梔	桑枝		
俞 肩胛連及臂指走痛而腫一年乃肢痺也絡虛留邪和正祛邪				
黃芪	防風	海桐皮	生白朮	
歸身	川羌活	片薑黃	白茯苓	
李三 脈小弱當長真四肢痺痛一止之後筋骨不甚舒展此衛陽單薄三氣易襲先用陽明流暢氣血方				
黃芪	生白朮	漢防已	川獨活	
苡仁	茯苓			
朱三 肢痺痛難				

羚羊角 木防已 川桂枝尖 晚蚕沙

川草薢 白通草 生苡仁 茯苓

汪 冬月溫暖真氣未得潛藏邪乘內虛而伏因驚蟄節

春湯內動伏氣乃發初受風寒已從熱化兼以夜坐不

眠身中陽氣亦為泄越醫者但執風寒濕三邪合成為

痺不曉病隨時變之理羌防葛根再泄其陽必致增劇

矣焉望痛緩議用仲景木防已湯法

木防已 石膏 桂枝 片薑黃

杏仁 桑枝

又 氣中伏邪得宜右肢痺痛已緩血分留熱壅著左肢

臨證指南醫案 卷七 痺

痛勢未衰足微腫體質陰虛仍以宣通輕劑

羚羊角 桂枝木 片薑黃 花粉

木防已 杏仁 桑皮

顧 濕熱流着四肢痺痛

川桂枝 木防已 蚕沙 石膏

杏仁 威靈仙

某 左脉如刃右脉緩瀉陰虧本質暑熱為瘧水穀濕氣

下墜肢末遂成痺今已便瀉減食畏冷陽明氣衰極

矣當緩調勿使成疾

生白朮 狗脊 獨活 茯苓

木防已 仙靈脾 防風 威靈仙

又 濕痺脉絡不通用苦溫滲濕小效但汗出形寒泄瀉

陽氣大傷難以濕甚生熱例治通陽宣行以通脉絡生

氣周流亦却病之義也

生於朮 附子 狗脊 苡仁

茯苓 草薢

徐九長夏濕勝氣阻不飢不食四肢痺痛甚於午後子

前乃陽氣破陰濕之過色痿黃脉小澹以微通其陽忌

投劫汗

茯苓 草薢 木防已 晚蚕沙

臨證指南醫案 卷七 痺

溼瀉 金毛狗脊

黎 肢膝麻足膝為甚

當歸 杞子 生虎骨 油松節 川芎

狗脊 草薢 淮牛膝 仙靈脾 檀香泥

白茄 沙苑 火酒醇酒各半浸七日

某 寒濕經絡身牛以下筋骨不舒二便不爽若非

迅疾飛不能效 蠲痛丹

某 勞力濕腰痺酸痛四肢乏力

生杜仲 生苡仁 沙苑子 茯苓

粗桂枝木 金毛狗脊 晚蚕沙 木防已

某 十五年中痺痛三發進痛久流及肢節骨節屈曲之
所皆腫赤此寒濕變熱為欲解病在軀殼筋骨無害命
之理但病深沉下甚已屬陰邪小腹脹小溲全無

川獨活八分 漢防己八分 川熟附八分 粗桂枝木一錢
茯苓五錢 川草薢一錢 木猪苓一錢

又 生白朮三錢 茯苓三錢 川熟附一錢 川獨活五分
北細辛一分 漢防己五分 猪苓一錢 澤瀉一錢

又 陽虛濕痺痺愈下焦無力用斡旋其陽
茯苓四兩 生白朮二兩 泡淡生乾薑兩 肉桂五錢

已上四味生研末滾水泛丸每早服三錢開水下
臨證指南醫案 卷七 痺

何三 脈沉目黃舌腫周身四肢疹發胃痛肢末皆腫強遇
冷飲涼即病此久伏濕邪陽氣傷損讓濕氣分以通周
行之脈

川烏頭 生白朮 桂枝木 茯苓

半夏 薑汁

唐 右後脇痛連腰膝必惡寒逆冷暖護良久乃溫此

脈絡中氣血不行遂至凝塞為痛乃脈絡之痺症從屬
維陰維論病

鹿角霜 小茴香 當歸 川桂枝

沙苑 茯苓

王 努力經氣受傷客邪乘衛陽之疎而入風濕阻遏經
脈為腫為痛大汗連山痛仍不止而大便反滑其濕邪
無有不傷陽氣者固衛陽以却邪古人正治以濕家忌
汗耳

生於朮三錢 防風根五分 生黃芪三錢 片薑黃一錢
桂枝木五分 海桐皮一錢 羌活五分 獨活五分

又 人參一錢 生於朮二錢 黃芪三錢 炒當歸一錢
川桂枝一錢 炙甘草五分 煨薑七分 南棗二枚

又 風濕腫痺舉世皆以客邪宜散愈治愈劇不明先因
勞倦內傷也蓋邪之所聚其氣必虛參朮益氣佐以風
臨證指南醫案 卷七 痺

藥氣壯托出其邪痛斯止矣病人自云手足如墮如無
詎非陽微不及行乎四末乎此皆誤治致參藥過費耳

人參一錢 生於朮二錢 黃芪二錢 歸身一錢
肉桂三分 炙甘草三分 煨薑一錢 南棗一枚

又 遺泄陰傷兼以欬喘
人參一錢 生於朮二錢 黃芪三錢 歸身一錢 炙草五分
熟地三錢 茯神三錢 五味五分 白芍一錢

方九 人參二兩 黃芪四兩 茯神二兩 杞子二兩 鹿角霜二兩
鹿茸二兩 歸身三兩 炙草一兩 菊花炭兩 煉蜜丸

王 風濕痺痛

防已	生於木	川獨活	茯苓
炒黃柏	生苡仁		
又 痺在四肢			
羚羊角	白蒺藜	海桐皮	滑石
大豆黃卷	苡仁		
又 照前方去蒺藜以仁加連翹青菊葉花粉			
又 羚羊角	犀角	連翹	海桐皮
大豆黃卷	花粉	薑黃	金銀花
金 風濕熱走痛二便不通此痺症也			
杏仁	木防已	寒水石	鬱金
臨證指南醫案	卷七 痺		五
生石膏	木通		
李 風濕肌腫而痛畏熱			
炒黃柏	茅朮	製蒺藜	木防已
秦朮	鈎藤		
又 黃柏	防已	茯苓	苡仁
草解	虎骨		
楊 四肢流走痺痛風勝移走濕凝為腫下焦為甚邪入			
陰分 蠲痛丹			
蔣氏 便澀食少腰腹已下骨節肢節沉痛			
人參	生於朮	製白松香	茯苓

漢防已	北細辛	川獨活	苡仁
王 身半已上屬陽風濕雨露從上而受流入經絡與氣			
血交混遂為痺痛經月來外邪已變火化攻散諸法不			
能取效急宜宣通清解毋使布及流注			
防已	薑黃	蚕沙	杏仁
石膏	滑石		
毛氏 風濕相搏一身腫痛周行之氣血為邪阻礙俟仲景			
木防已湯法			
木防已	石膏	杏仁	川桂枝
威靈仙	羌活		
臨證指南醫案	卷七 痺		五
洪三四濕盛生熱生痰漸有痿痺之狀乃陽明經陰為難不			
可拘執左屬血右屬氣也金匱云經熱則連絡熱則痿			
今有痛處治在氣分			
生於木三錢	生黃芪三錢	片薑黃一錢	川羌活一錢
牛夏一錢	防風五分	加桑枝五錢	
又 芪木固衛升陽左肩胛痛未已當治營中以辛甘化			
風法			
黃芪	當歸	炙草	防風
桂枝	肉桂		
張 骨節走注行痛身體重著不能轉舒此為濕痺但陽			

虛之賢。忌辛散苦寒藥

桂枝木 大防已 苡仁 羚羊角

大豆黃卷 杏仁 橘紅

方 左脉弦大面赤痰多。大便不爽。此勞怒動肝。令陽氣

不交於陰。陽維陽蹻二脉無血。管養內風燥筋。跗躄痺

痛暮夜為甚者。厥陰旺時也。病在脉絡

金斛 晚蚕沙 漢防已 黃柏

牛夏 葶藶 大栝榔汁

又 痛右緩左痛濕熱未盡。液虛風動也

生地 阿膠 龜版 稽豆皮

臨證指南醫案 卷七 痺

茯苓 通草

某九十舌白目彩油光。腰痺痛濕邪內蘊。尚未外達。必分利

濕邪為主

杏仁 蘇梗 木防已 厚朴

茯苓皮 花粉 晚蚕沙 茵陳

吳氏 風濕化熱。蒸於經絡。周身痺痛。舌乾咽燥。津液不得

升降。管衛不肯宣通。怕延中痰

生石膏 杏仁 川桂枝 苡仁 木防已

又 右膏 杏仁 木防已 炒牛夏 橘紅

黑山梔 薑汁 竹瀝

石 脉數右大溫漸化熱。灼及經絡。氣血交阻。而為痺痛。

陽邪主動。自為遊走。陽動化風。肉腠浮腫。俗諺稱為白

虎歷節之謂

川桂枝 木防已 杏仁 生石膏

花粉 鬱金

又 照前方去鬱金加寒水石晚蚕沙通草

又 脉大已減。右數象未平。痛緩什七。肌膚甲錯。發癢腹

微滿。大便不通。陽明之氣未化。熱未盡去。陰已先虛。不

可過劑

麻仁 鮮生地 川斛 丹皮

臨證指南醫案 卷七 痺

寒水石 鈎藤

某 久痺藥成。歷節舌黃。痰多。由濕邪阻着經脉

漢防已 煨滑石 晚蚕沙 寒水石

杏仁 苡仁 茯苓

宋 病者長夏霧天奔走。內踝重墜。發斑。下焦痛起。繼而

筋掣。及於腰。高左臂。經云。傷於濕者。下先受之。夫下焦

奇脉不流行。內踝重着。陰維受邪。久必化熱。燥血風動

內舍乎肝胆。所謂少陽行身之例也。診得右脉緩左脉

實。濕熱混處血絡之中。搜逐甚難。此由濕痺之症失治。

延為痿廢沉痾矣。三年病根非倉卒迅攻。姑進宣通營

濕熱入血絡

絡叅之奇經為治考古聖治痿痺獨取陽明性通則留邪可拔耳

鹿角霜 生白朮 桂枝 茯苓

撫芎 歸鬚 白茯苓 黃菊花

某 初病濕熱在經久則痰熱入絡膿瘍日多未已漸而

筋骨疼痛金匱云經熱則痺絡熱則痿數年宿病勿事

速攻 夜服疾黎丸

服午 犀角 玄參 連翹心 野赤豆皮

細生地 丹參 薑黃 桑枝

張九 四肢經隧之中遇天令陰晦疼痛拘攣瘡疽瘍潰膿

臨證指南醫案 卷七 痺 空

其病不發癆愈病復至抑且時常齟齬經以風寒濕三

氣合而為痺然經年累月外邪留着氣血皆傷其化為

敗痰凝痰混處經絡蓋有諸矣倘失其治年多氣衰延

至廢棄沉疴

當歸鬚四兩 乾地龍二兩 穿山甲二兩 白芥子一兩

小撫芎一兩 生白朮二兩 酒水各半法丸

沈 從來痺症每以風寒濕三氣雜感主治召恙之不同

由乎暑陽外加之濕熱水穀內蘊之濕熱外來之邪着

於經絡內受之邪着於腑絡故辛解汗出熱痛不減余

以急清陽明而致小愈病中復反者口鼻復吸暑熱也

是病後宜薄味使陽明氣爽斯清陽流行不息肢節脈絡舒通而痺痿之根盡拔至若溫補而圖速效又非壯盛所宜

人參 茯苓 半夏 廣皮 生於朮

枳實 川連 澤瀉 竹瀝薑汁法丸

暮服白茯苓丸

某 冬月溫舒陽氣疎豁風邪由風池風府流及四末而

為痺症忽上忽下以風為陽陽主動也診視鼻明陽明

中虛可見邪邪之刻在乎宜通經脈

桂枝 羚羊角 杏仁 花粉

臨證指南醫案 卷七 痺 空

防己 桑枝 海桐皮 片薑黃

又 症已漸安脈絡有流通意仲景云經熱則痺絡熱則

痿知風濕於內治以甘寒寒可去熱甘味不傷胃也

甜杏仁 連翹 玄參 花粉

菉豆皮 梨汁

又 餘熱尚留下午足寒晨餐頸汗胃未調和食不甘美

因大便微溏不必過瀉

北沙參 麥冬 川貝 川斛

陳皮 藜芽

肝陰虛 沈 用養肝血熄風方右指仍麻行走則屈伸不舒戊亥

必心熱煩蒸想前法不效杞歸辛溫陽動風亦動矣議
去辛用酸若疑慮過次虛邪未盡致脈絡留滯兼以逐
逐緩攻亦妙

熟地 龜膠 阿膠 秋石 天冬

麥冬 五味 茯神 蜜丸晨服

桃仁 穿山甲 乾地龍 撫芎 歸鬚

丹皮 紅花 沙苑 香附汁丸夜服

某 仲景以經熱則痺絡熱則痿今痺痛多日脈中筋急
熱入陰分血中致下焦為甚所謂土焦屬氣下焦屬血

耳

臨證指南醫案 卷七 痺

柏子仁 當歸 丹皮 鈎藤

川斛 沙苑

又 痺痛右膝甚

生虎骨 柏子仁 牛膝 菖蒲

苡仁 茯苓

某四 脈弦勁右足踝腫痛得履得摩稍適此風寒濕三
氣混入經隧而為痺也當用辛溫宣通經氣為要

活絡丹一丸陳酒下

某 痺痛在外踝筋骨妨於行走邪留經絡須以搜剔動

藥

川烏 全蝎 地龍 山豆 大黑豆皮

某 病後過食肥膩氣滯轉口膩粘涎指節常有痺痛

當從氣分宣通方法

蘇梗 杏仁 薑皮 鬱金

半夏 橘紅

陳五 勞動太過陽氣煩蒸中夜液衰風旋周身痺痛此非
客邪法宜兩調陽明厥陰

黃芪 生白朮 製首烏 當歸

白茯苓 黑糯米皮

張五 煩勞筋動之陽變現熱氣內風內經以熱滯風消必

臨證指南醫案 卷七 痺

用甘寒前議謂酒客不喜甘味且痰多食少亦忌甘膩

滋滯用清少陽胆熱者酒氣先入肝胆也酒汗濕者腸

胃受之理明以通胃胃腸氣機流行食加滑泄頗厥今

者氣熱當午上胃經絡痺痛亦減於平日正以和陽甘

寒宜通經脈佐之

童桑 羚羊角 天門冬 枸杞子 白蒺

丹皮 茯苓 霍山石斛 其教膏

某氏 血虛風痺骨節腫痛

羚羊角 細生地 玄參 當歸

桂枝 桑枝 白茯苓

全二痺痛在下重着不移論理必係寒濕但左脉搏數經月逆世三四痛處無形豈是六淫邪聚然隨道深遠藥餌未易奏功佐以艾灸真得效靈

枸杞子 肉蓯蓉 虎骨膠 麋角膠 杜仲
桑椹子 天冬 沙苑 茯苓 苧膠丸
孫 豚右太陽明空氣短閃燥欲痛

人參 生黃芪 熟白朮 炙草 廣皮
當歸 白芍 半夏 防風根 羌活
又 益氣頗安知身半已止痺痛乃陽不足也

人參 黃芪 熟於朮 炙草
臨證指南醫案 卷七 痺
桂枝 歸身 白芍 川羌
痺痛在右氣弱有痰

生於朮 川桂枝 川獨活 片薑黃
白茯苓 陳防已

王 辛香走氣宜通經髓結氣分之濕有却病之能無補虛之益大凡藥餌先由中宮以布諸經中焦為營氣之本營氣失養轉旋自鈍然攻病必藉藥氣之偏朝夕更改豈是去疾務盡之道另於暮夜進養營一貼
人參 茯苓 桂枝木 炙草
當歸 炒白芍 南棗

吳三 筋縱痛甚邪留正痺當此天暖間用針刺以宣脈絡初補氣血之中必佐宣行通絡之治
生黃芪 防風 桂枝 炒黑常山

歸身 青菊葉汁
其 痺痛偏左入夜尤甚血中之氣不行
歸身 桑枝 苡仁 白蒺藜

薑黃 木防已
劉三 周禮採毒藥以供醫事蓋因頑鈍沉痾着於軀殼非臟腑虛損故必以有毒攻拔使邪不留存凝着氣血乃效既效矣經云大毒治病十去其五當此只宜愛護身
臨證指南醫案 卷七 痺 奕

體勿勞情志便是全功道理愚人必日以藥除根不知天地之氣有勝有復人身亦然穀食養生可御一生藥餌偏勝豈可久服不觀方士煉服金石丹藥疽發而死

者比比
何首烏 黑芝藤 桑枝桂枝湯泛丸

營熱 某 脈沉小數營中留熱怡骨尚有微疼宜通經絡佐清
鈎藤 細生地 當歸鬚 白蒺藜
丹皮 片薑黃
此症與風病相似但風則陽受之痺則陰受之故多

古者沉痛其在內經不越乎風寒濕三氣然四時之
令皆能為邪五臟之氣各能受病其實痺者閉而不
通之謂也正氣為邪所阻臟腑經絡不能暢達皆由
氣血虧損腠理疎豁風寒濕三氣得以乘虛外襲留
滯於內致濕痰濁血流注凝滯而得之故經云三氣
雜至合而為痺又云風勝為行痺寒勝為痛痺濕勝
為著痺以及骨痺筋痺脈痺肌痺皮痺之義可知痺
病一症非偏受一氣足以致之也然而病症多端治
法亦異余亦不能盡述茲以先生治痺之法為申明
一二有衛陽踈風邪入絡而成痺者以宣通經脈甘

臨證指南醫案

卷七

七

寒去熱為主有經脈受傷陽氣不為護持而為痺者
以溫養通補扶持生氣為主有暑傷氣濕熱入絡而
為痺者用舒通脈絡之劑使清陽流行為主有風濕
腫痛而為痺者用參朮益氣佐以風藥壯氣為主有
濕熱傷氣及濕熱入血絡而成痺者用固衛陽以却
邪及宣通營絡兼治奇經為主有肝陰虛毒邪入絡
而為痺者以酸苦滋陰兼以通逐緩攻為主有寒濕
入絡而成痺者以微通其陽兼以通補為主有氣滯
執鬱而成痺者從氣分宣通為主有肝胃虛滯而成
痺者以兩補厥陰陽明為治有風寒濕入下焦經隧

而為痺者用辛溫以宣通經氣為主有肝胆風熱而
成痺者用甘寒和陽宣通脈絡為主有血虛絡滯及
營虛而成痺者以養營養血為主又有周痺行痺肢
痺筋痺及風寒濕三氣雜合之痺亦不外乎流暢氣
血祛邪養正宣通脈絡諸法故張景岳云治痺之法
祇宜峻補真陰宣通脈絡使氣血得以流行不得過
用風燥等藥以再傷陰氣亦見道之言也 柳菴九

痙厥

痰火上
李 先因嘔吐腹痛隨即昏迷此氣火痰上蒙清神為厥
先用烏梅擦牙令牙關得開然後用藥 至寶丹三分
某 陽氣暴張精絕令人煎厥

煎厥者下焦陰液枯燥衝氣上逆為厥議用鹹寒降
逆血肉填陰

細生地 玄參 龜膠 阿膠
淡菜 蚌水

臨證指南醫案 卷七 痙厥 突

又 液涸消渴都是臟陰為病前議填陰藥汁膿膩不能
多進但胃口不醒生氣何以再振陽明陽土非甘涼不
復况肝病治胃自來有諸

人參 麥冬 川斛 新會皮
白粳米 乾佩蘭葉

王四經云煩勞則張精絕辟積於夏令人煎厥夫勞動陽
氣弛張則陰精不可留戀其陽雖有若無故口絕積之
既久逢夏季陽正開泄五志火動風生若煎熬者然斯
為量厥耳治法以清心益腎使肝胆相火內風不為暴
起然必薄味滋養為穩

腎厥

連翹心 玄參心 竹葉心 知母
細生地 生白芍

某二腎脈由背脊而升發時手足逆冷口吐涎沫喉如刀
刺蓋是少陰經肝上循喉嚨挾舌本陰濁自下上犯必
循經而至做許學士椒附意通陽以泄濁陰耳

炮附子 淡乾薑 川椒 胡盧巴
半夏 茯苓 薑汁泛丸

某 腎厥氣逆至頭 玉貞丸二十粒

盛四 盛九 膈上心下熱熾咽喉間陳腐氣逆神昏仆厥經時汗
出而醒病來口湧血沫乃虛中熱熾以致心竅受蒙若

臨證指南醫案 卷七 痙厥 李

非芳香清透不能宣通絡中痰痺

生烏犀角 一天竺黃 丹參 鬱金

雲衣神 石菖蒲 麝香 冰片

各生研野赤豆皮煎湯泛丸竹葉湯送下二錢食後

服

謝女熱鬱於內則機竅不靈春令升泄木火化風旋擾痰

癱搗搗有癰癩之慮不可進通經再劫其陰液

細生地 鬱金 犀角 丹參

石菖蒲 生白芍 竹瀝

又 火滯於內治以苦寒佐以鹹寒

黃連 黃芩 黑山梔

牡蠣 生地 冲入方諸水

又 脉左堅經阻半載戊亥陰時厥逆肢掣逾時方甦即

欲渴飲龍膏宜竅鹹苦清火未效且大便兩旬不解定

是熱結在血做古人厥應下之義用張子和玉燭散

玉燭散

溫邪內陷津液被劫厥陽挾內風上逆遂致癩厥

生牡蠣 阿膠 熟地炭 生白芍

炒遠志 石菖蒲

又 厥陰悞進剛藥五液劫盡陽氣與內風鴟張遂變為

臨證指南醫案 卷七 癩厥 圭

癩平背內損經以暴邪本屬難調此陰氣竭絕戊亥當

熟地炭 磁石 生白芍 木瓜

遠志 茯神

毛 瘦人而病溫熱神呆舌赤診脉時兩手牽掣震動此

津液受劫肝風內鼓是發癩之原議以養胃汁熄肝風

務在存陰耳用仲景復脉湯法去參薑桂

余 脉細促神迷舌縮言蹇耳聾四肢牽引牙關不緊病

已月餘乃溫邪劫液陽浮獨行內風大震變幻癩厥危

疴議以育陰熄風法必得瘥止神清方有轉機

阿膠二錢 雞子黃一枚 人參秋石并天冬一錢

細生地二錢 白芍一錢

又 神氣稍甦脉來欲靜五液交澗風陽尙動滋液救其

焚燼清補和陽去熱用藥全以甘寒津液來復可望向

安

阿膠 人參 淡菜 鮮生地

天冬 川斛

毛 少陰不藏溫邪深入喘促汗出渴不多飲舌辛似痛

症非輕小擬用復脉湯為邪少虛多之治去薑

又 舌絳汗泄齒燥痰厥熱劫津液最防癩厥

臨證指南醫案 卷七 癩厥 圭

復脉湯去薑桂

唐 積勞伏暑欲寐時心中轟然上升自覺神魂縹緲此

皆陽氣上胃內風鼓動所以陡然昏厥

石膏 知母 甘草 粳米

生地 麥冬 竹葉心

方 熱閉神狂因乎食復畏人與肢筋牽動仍屬暑病變

瘥通三焦以清神明冀有轉機 紫雪丹二錢

又 舌欲痠膚燥筋掣熱劫脂液殆盡為癩用河間甘露

飲再服紫雪丹一錢

楊 暑由上受先入肺絡日期漸多氣分熱邪逆傳入營

遂過心胞絡中神昏欲躁舌音縮手足牽引乃暑熱深陷謂之發症熱閉在裏肢體反不發熱熱邪內閉則外脫豈非至急考古人方法清絡熱必兼芳香開裏竅以清神識若重藥攻邪直走腸胃與胞絡結閉無干涉也

犀角 玄參 鮮生地 連翹

鮮菖蒲 銀花 化至寶丹四九

金 暑熱結聚於裏三焦交阻上則神呆不語牙關不開下則少腹衝氣小溲不利邪結皆無形之熱閉塞漸有瘵厥之狀昨大便既下而現此象豈是垢滯讓芳香宜竅通解在裏蘊熱 紫雪丹一錢五分開水化勻三服

臨證指南醫案 卷七 瘵厥 志

鮑 舌白渴欲冷飲氣促喘咳而呃胸悶昏謔此暑風濕熱穢濁痺塞宿垢尚在小腸旬日間漸變瘵厥是為陰機讓逐穢結以冀稍清

大杏仁 連翹心 竹葉心 川貝母

苜蓿根汁 辰砂益元散 煎藥化牛黃丸一服

蔡 暑濕熱都着氣分乃消食苦降滋血亂治熱熾津涸舌板成瘵究竟邪閉阻竅勢屬不穩

人參 生甘草 石膏 知母 粳米

潘二肝陽化風上冒為厥風陽內熾脂液涸而作痛此非實症剛燥忌用

生地 阿膠 牡蠣 天冬

茯神 生白芍

夏二 中年已後陽氣日衰是下焦偏冷陽不及護衛周身氣分更虛右肢加瘳當存地氣上升身中肝風大震心嘈嗔怒痰湧首眩乃厥象也皆本氣自病最難見效

熟地 熟淡附子 牛膝炭 炒麥冬

遠志炭 茯苓

馬 面青脫白入夜顛類漸赤耳聾舌心乾板而縮並不渴飲間有寒戰後熱此厥陰肝臟液涸風旋勢成瘵厥危症勉從經旨之訓辛苦急當食甘以緩之

臨證指南醫案 卷七 瘵厥 志

甘參大棗湯加阿膠

陸 面青頭痛動搖手足搐搦牽掣驚嚇惱怒病從肝起如饑求食晝夜無寐都是肝風盤旋鼓舞漸為瘵厥此乃五志之病

阿膠 牡蠣 生地 天冬

小麥 生白芍

某 衝氣顛脹厥 龍蒼丸一錢二分

顧 此瘵厥也蓋厥陰風旋陽胃神迷則為厥陽明絡空四末不用而為瘵厥午後黃昏乃厥陰陽明旺時病機發現矣凡此皆屬絡病金匱篇中有之仲景云諸厥

下下之利不止者死明不下降之藥皆可止厥但不可
稍黃再傷陰陽耳但積年沉痾非旦夕速效可知矣

活鱉甲 真阿膠 方諸水 鮮生地

玄參 青黛

又 照前方去玄參加天冬

厥從肝起其病在下木必得水而生陰水虧斯陽風

燥筋而絡中熱沸即厥拙擬血屬介類味鹹入陰青

色入肝潛陽為法

又 陰絡空隙厥陽內風掀然鼓動而為厥余用酸味入

陰和陽介類有情之潛伏頗見小效但病根在下深遠

臨證指南醫案 卷七 瘧厥 五

湯劑輕浮焉能填隙改湯為膏取藥力味重以填質之

亦止厥一法

鮮鱉甲 敗鱉版 猪脊髓 羊骨髓

生地 天冬 阿膠 菴菜

黃柏 熬膏早服七錢午服四錢

林 據說六七年前驚駭起病氣從左脇有聲攻及胸膈

心中脹極氣降脹減必汗出溲濁此屬肝厥凡煩勞動

怒即刻舉發肝木風火內寄其來必驟且有聲音久恙

非湯藥可投緩調須用丸藥更發作自必輕減

人參 乾薑 附子 桂枝 川椒

小川連 川楝子 當歸 白芍 烏梅肉丸

顧 平昔腸紅陰絡久傷左脇下宿癥肝家風氣易結形

瘦面青陰虛陽氣易胃血絡不得凝靜諸陽一并遂為

厥衝氣自下犯胃為呃症似蓄血如狂奈脈細勁咽喉

皆痛真陰枯槁之象水液無有風木大震此剛劑強鎮

不能熄其厥胃耳

生雞子黃一 真阿膠二 淡菜 龜板 五錢

沖入熱童便一杯

戴 酒客中虛多濕陽明素虛厥陰來乘當穀雨土旺用

事風木與陽俱升逆鬱胃而厥此平昔積勞內因與外

臨證指南醫案 卷七 瘧厥 五

邪無涉閱醫多用風藥是再傷肌表護衛之陽乃召風

以致中耳

川桂枝 羚羊角 炒半夏 橘紅

明天麻 茯苓 當歸 釣藤

吳三 肝風癩厥迅發莫制都因腎真內怯平素多遺診脈

孔弱議用固本丸 固本加五味萸肉龍骨金箔蜜丸

謝 有年下虛春木自地而升陽浮上蒙清竅經云下虛

上實為厥癩疾肝風內震倘加惱怒必致厥仆非中大

忌攻痰祛風藥

熟地 天冬 萸肉 五味 牛膝

厥陰

龜甲 磁石 茯苓 遠志 菖蒲

夏九少腹氣攻有形嘔吐頭脹陰脈不至頭而厥陰脈上至顛頂四肢逆冷即厥象也。不是瘧母宿冷肝脈環繞陰器為遺洩。

炒黑川椒 川棟子 炒橘核 青木香

小茴香 茯苓

王右脈已伏左小緊四肢冰冷乾嘔煩渴厥陰濁之胃陽欲絕此屬痛厥姑以辛熱泄濁通陽

泡淡吳萸 製附子 川棟子 延胡

淡乾薑 茯苓

臨證指南醫案 卷七 瘧厥 老

又脈微為無陽下利冷汗嘔逆不食肢厥不肯回陽一團濁陰阻蔽却有閉脫之危議四逆之屬護陽驅濁

人參 淡附子 枳實 茯苓 生淡乾薑

又肢厥惡心吞酸胸滿大便不通有六日

川連 淡乾薑 人參 枳實

陳皮 半夏 茯苓

史溫熱已入厥陰陰傷致風陽上顛遂為痙厥厥發丑寅陽明少陽之陽震動昨進苦清其陰分之熱已效今復入錢陽以止厥

生地 天冬 阿膠 雞子黃

生龍骨 小麥

蔣眩暈心痛脹嘔吐涎沫周身麻木此厥陰肝臟中陽過胃貫膈逆衝不已有痙厥之意

川連 吳萸 乾薑 川棟子 烏梅

牡蠣 白芍

又開泄和陽入陰已效當停煎藥 龍薈丸

程厥邪熱深生薑性辛溫大泄肝陰陽遂上冒心熱最厥但陰虛熱熾苦寒不可多進以滋陰却熱為穩

生薑甲 鮮生地 生白芍 知母

山梔 橘紅

臨證指南醫案 卷七 瘧厥 夫

張未病先有驚恐先寒戰後發熱心中極熱乾嘔煩躁渴飲冷仍不解渴診脈小弦舌白無胎會皮冷如水此熱邪已入厥陰肝經所謂熱深厥深也病全入裏極為棘手議用紫雪丹開深伏之熱結取其芳香宜竅真得

燥擾勢緩方有轉機 紫雪丹二錢

王心中疼熱耳聾自利熱邪已入厥陰三日不厥方有好音

雙金 川連 秦皮 黃芩

連翹心 石菖蒲汁

某先發水痘已感冬溫小愈不思羶腥餘邪復熾熱不

可遇入夜昏煩。輟云頭痛邪深走厥陰所以發厥。診脈兩手俱細是陽極似陰。鼻煤舌乾目背黃多屬邪閉。壞敗諒難挽回。用涼膈散。

肝風

伍女 室女經來衝脈自動。動則陽升。內風逆旋。不息為薄。厥前厥陽明虛胃失降。厥陰熱肝愈橫。厥陽上冒。清空神迷。諸數似阻。皆入夏大地發泄之數。本虛表實。先理其真。議用局方龍膏丸。純苦直降。非湯飲留連腸胃之

肝風

比。研服三錢。不拘二三次。分服。接用復脈法。去參薑桂。施氏 諸厥屬肝。肝病犯胃。為嘔逆腹痛。乃定例也。診脈虛小。望色眇白。脈述燥。好病竟不發。思中流砥柱。斯肝木

臨證指南醫案 卷七 癩厥

疑然則知培植胃土。乃治病法程矣。

六君子去米皮加芍藥木瓜。製薑南棗。

某 厥屬肝病。幾番病發。都因經水適來。夫血海貯聚既下。斯衝脈空乏。而風陽交動。厥之暴至。之因由也。賦寒

濡潤亦和陽泄內風之義。治之未應。下焦獨冷。喉急胸痺。思衝脈乃陽明所屬。陽明虛則失固。厥氣上犯。莫過

內經。治肝不應。當取陽明。制其侮也。暫用通補入腑。取

乎腑以通為補。小半夏湯加白糯米。

三 諸厥皆隸厥陰。疝瘕。心熱。脇脹。中消便難。乃肝陽內

風支動。消燥犯及陽明。亥經言治肝不應。當取陽明。明

胃一臟一腑相對。不耐溫補。者是肝用太過。肝體不

也。九孔石決明 淮小麥 清阿膠 細生地

天冬 扶神

陳 填怒微厥。肝陽升舉。宜益胃陰以制伏。

人參 麥冬 扶神 鮮蓮子

竹葉心 生甘草 微溫服

奇厥 葉氏 脈右大熱升風動。鬱胃為厥。宗陳無擇。羚羊角散方。

羚羊角 小生地 玄參 丹參

連翹 黑豆皮

臨證指南醫案 卷七 癩厥

又 厥後微嘔。汗泄。陽風無制。都緣陰枯。不主繼陽。議用

六味益陰和陽。炒六味去山藥。加入參。秋石

又 渴不欲飲。陰不上。乘况寐醒。神識不靜。易驚。汗出法

當欲補

人參 黃肉炭 熟地 五味

茯神 遠志

又 半月經水。兩至痛自下。係衝突而厥。病由陰維衝在

蓋入脈所司也。此發營僅到中宮。所以無效。

菴蓉 鹿角霜 當歸 柏子霜

桂枝木 茯苓

又前法已中病情須從奇經治義

照前方去桂枝木加鹿角膠

又病去八九僅以溫補下元為法不必窮治

淡菴蓉 炒杞子 當歸 柏子仁

茯苓 小茴香

陶氏 麻數厥止熱在營中

犀角 玄參 丹皮 連翹心

胆星 橘紅

王 口鼻觸人異氣胃傷嘔吐土衰則木尅肝風內橫三

虫擾動為痛從就厥論治

臨證指南醫案

卷七 瘧疾

全

川椒 乾薑 桂枝木 川棟子

人參 川連 烏梅 生白芍

黃二 據述十一年前夏秋間多用井水鹽梅因此昏厥已

後三五日一發病愈雖醒日瘦日減間有語言不自接

續想其至理水鹽梅酸大泄肝腎臟陰厥者陽氣逆亂

胃神憤憤勢成沉痾非痼厥門治痰治火清竅者是臆

陰受病臆主平藏有醫偏搜逐劫燦凡陰瀉欲絕譬諸

油盡燈焰忽明忽昏撲然息矣先聖先賢從無成法未

敢奏藥欺人 常用人乳一杯

某 脈左動如數右小濡弱病起喘怒即寒熱汗出心悸

繼而神竟自覺散越夫肝臟藏魂因怒則諸陽皆動所

見病源無非陽動變化內風而為厥故凡屬厥症多隸

厥陰肝病考內經治肝不外辛以理用酸以治體甘以

緩急今精彩散失鎮固收攝猶慮弗及而方書泄肝平

肝抑肝方法儘多至於補法多以子母相生為治此病

全以肝腎下焦主法為正所服醫藥並無師古之方未

識何見

阿膠一錢 雞子黃一錢 人參一錢 生地三錢 金箔五片

某 冷是足上貫於心初起周身麻木今則口鼻皆有冷

氣病起驚恐內傷肝腎為厥衝脈隸於肝腎二臟失藏

臨證指南醫案

卷七 瘧疾

全

衝氣沸亂其脈由至陰而上故多冷耳

淡菴蓉 熟地炭 五味子 紫石英

茯苓 牛膝

汪 胃陽傷殘濁氣上攻將為痛厥當治陽明之陽

吳茱萸 薑汁 半夏 茯苓 梗米

又 照前方去吳萸加廣皮

某 熱甚而厥其熱邪必在陰分古稱熱深厥深病中遺

泄陰傷邪陷發表攻裏隨難施用和正托邪是為正法

草果 知母 人參 半夏

薑汁 烏梅

歎者從下逆上之病也。痙者明其風強之狀也。所以
二字每每並言原與傷寒門所載者有間。想是症總
由氣血日偏陰陽一併而成。譬如風雷之猛烈。鬱極
而發也。若發而漸復者。猶可轉危為安。若發而轉逆
者。必至直拔根荄。乃已斯存亡之機。在乎命臟之盈
虧耳。考方書之名目不一。致病之因由亦繁。大抵可
吐者如痰食填塞於胸中。用瓜蒂散之類。及燒鹽探
引方法。可清可折者。如厥陽壯火升逆。而莫制用王
女煎。及宣明龍膏丸法。可開可降者。如氣厥薄厥。而
形氣暴絕。有五磨飲子。及蒲黃酒法。穢濁蒙神。而昏

臨證指南醫案 卷七 痙厥 全

亂無知。有牛黃至寶及蘇合香丸之兩法。飛尸卒厥
先宜酒醴以引導。并可按穴而施鍼法。及灸法。若從
虛而論者。如內奪而厥。則為痞。有地黃飲子之通
瀉下焦法。煩勞陽張。令人煎厥。有人參固本。加入金
箔方。諸水為壯水制火法。血厥而陽騰絡沸。泰平從
陰從陽法。色厥而精脫於下。急與大劑挽元法。腎厥
宗許學士之椒附以通陽。虬厥有仲景之安蚘法。陽
極用救陰峻劑。陰極有扶陽方法。種種規模。已為全
備。及參案中。先生於是症。獨重在肝。蓋肝者將軍之
官。善干他臟者也。要知肝氣一逆。則諸氣皆逆。氣逆

則痰生。遂火沸風旋。神迷魂蕩。無所不至矣。若犯於
上者。不免凌金燥液。有門冬湯。及瓊玉膏之補金柔
制法。若犯於中。而為嘔為脹者。用六君去朮。加木瓜
姜芍之類。及附子梗米湯。加入人參。為補胃凝肝法。若
震及心脾。而為悸為消者。用甘麥大棗湯。合龍螬之
屬。為緩急重鎮法。若挾少陽之威。而乘巔搖絡者。用
羚羊鈎藤玄參連翹之劑。為熄風清絡法。若本臟自
病。而體用失和者。以椒梅桂芍之類。為益體宣用法。
若因母臟之虛。而擾及子臟之位者。用三才配合龜
甲磁珠。及復脈減辛味。復入雞黃之屬。為安攝其子

臨證指南醫案 卷七 痙厥 全

母法。至於痿厥之治。尤覺神奇。取血肉介類。改湯為
膏。謂其力味重實。填隙止厥最速。此豈非補前人之
未備。開後學之法門者乎。參是案者。幸毋忽諸。
甫

驚馬

某 驚川氣逆陽泄為汗川重鎮歷驚

川桂枝木五分 黃芪去心一錢 人參一錢 龍骨一錢

左顧牡蠣一錢

某 驚恐傷神不語

建蘭根汁 薑汁 金汁 共和一處隔

湯燉徐徐服

某 因驚外觸見症神怯欲迷已經肢厥冷汗怕動做鎮

法理虛

臨證指南醫案 卷七 驚 全

人參 茯神 棗仁 生龍骨 石菖蒲

炙草 南棗 陳淮小麥 早上服

楊氏 經血期至驟加驚恐即病寒熱心悸不寐此驚則動

肝恐則傷腎最慮久延臍燥即有肝厥之患

淮小麥 天冬 龍骨 牡蠣

白芍 茯神

陳九 心中若烟霧噴則氣散少頃即聚易驚恐畏懼嘔逆

不渴自述難鳴苦况瀉後亡陰熱藥劫陰則議和胃不

應主以鎮之攝之

炙甘草 淮小麥 大棗 棗仁 青龍骨

某 驟驚陽逆暴厥為肝胆病蓋則心悸是陽動夜則

墜屬陰虧用收固腎肝可效

生地五錢 萸肉一錢 龍骨三錢 牡蠣三錢

五味一錢 真金箔三張

經云驚則傷肝恐則傷腎大凡可畏之事猝然而至

者謂之驚若從容而至可以宛轉思維者謂之恐是

驚急而恐緩也夫驚症大人亦有之小兒最多因其

神志未堅胆氣未充故每遇稍異之形聲即陡然而

驚矣驚之所傷由心猝及乎胆由胆即及乎肝遂致

心主君火兼肝胆中相火風木驟然而起症現搖擗

臨證指南醫案 卷七 驚 全

瘧癘神昏譫妄肢冷厥逆吐乳身熱目竄口噤種種

所患無非心肝胆之現症而實毫無外感之風邪此

因外受之驚而動內之木火風也故但當以一驚字

立為病名斯乃切當因其內風沸起遂加一風字因

病來迅速又加一急字故遂有急驚風之病名此已

屬牽強附會矣至於今之混稱為急驚風者更屬背

謬總因小兒陰氣未充外感之風溫風熱風火以及

寒邪化熱并燥火諸症最易傷陰陰傷則血不營筋

液傷則脈絡滯滯熱盛亦能使內之木火風相繼而

起所現之症與受驚者類亦相同然實非因受驚而

起其所治之法大有區別。如果因驚者治宜安養心
神鎮驚定怯甘涼清內熱柔潤熄肝風或少佐芳香
通其竅絡舒其結閉至於剛熱燥滿表散之藥藥不
可用若無驚而但感外邪者有宜於涼散有宜於溫
散有宜於苦寒清火有宜於甘溫扶陽或補或瀉自
當按六淫之邪而施治與驚字毫無干涉奈今之醫
者每遇非驚之症因不能辨明六氣中所傷何氣却
定不出病名遂強將一驚字混入藉口漫稱為急驚
風症掩飾欺人病家亦信之以為小兒防範難避
焉有無驚之理其所訂之方錯雜游移不知治驚總

臨證指南醫案

卷七

全

以心肝胆為主若治時邪須兼脾胃脾腎三焦營衛
經絡而論大不相同也更有一種稱慢驚風之病名
者尤屬怪誕不經必當亟為駁正有論在幼科吐瀉
之後宜合觀之

癩癩

驚恐痰
火升

孫八神呆脈沉因驚恐以致癩疾語言不甚明了此痰火
阻其靈竅深戒酒肉厚味靜室善調經年可愈

黃連 黃芩 山梔 枳實

橘紅 胆星 菖蒲 遠志

陳 動怒驚觸乃外加擾內致五志陽越莫制古人集癩
癩狂辨以陽併於陰陰併於陽互異今以陽逆狂亂非
苦藥之降未能清爽其神識也 宜歸龍膏丸三錢
倪 驟然驚惕陽氣上逆遂神呆不寐條爾叫喊不食不

臨證指南醫案

卷七

全

飢不便有癩癩之象 龍膏丸二服

盧四痰病已成癩疾難愈

竹節白附子 天竺黃 陳胆星 石菖蒲

川連 鬱金 茯神 橘紅

陽氣逆
痰結阻

注 驚恐陽升風動宿癩遂發吐痰喉逆不言絡脈失利
也

羚羊角 石菖蒲 胆星 遠志

連翹 鈎藤 天麻 橘紅

曹四春病及長夏癩厥屢發前用龍膏丸意苦泄肝膽初
服即瘳此久病陰分已虛議理陰和陽入酸以約束之

生雞子黃 阿膠 川連 黃柏

生白芍 米醋

金一癩厥神呆肢強

犀角 羚羊角 玄參 菖蒲

炒牛夏 炒遠志 鬱金 橘紅

木火動 驚狂乃木火擾動雖得平靜仍心悸怔忡夜卧不寐

診脈虛細如絲已非痰火有餘議補心丹以理心之用

人參 茯神 棗仁 玄參 丹參

天冬 麥冬 生地 川連 柏子仁

菖蒲 桔梗 遠志

臨證指南醫案 卷七 癩癩 癩

葉氏 每遇經來紫黑癩疾必發暮夜驚呼聲震晝則神呆

面青多笑火風由肝而至泄胆熱以清神再商後法

丹皮 丹參 細生地 黑山梔

萊菔子 胡黃連 訓入琥珀末

肝腎陽 張一入冬不寐癩疾遂發此陽不潛藏治在肝腎

用虎潛法

火鬱心 癩疾脈不鼓指議父心腎益神志

生地 龜甲 黃柏 川連 酒炒 菖蒲

茯神 遠志 山梔 竹葉

風上 葉九五志陽升神識迷惑忽清忽甚者非有形質之邪乃

熱氣化風上竄致於竟夜不寐攻痰疎利決不效驗先

以極苦之藥其亢陽潛降

生地 龍胆草 丹參 木通

山梔 蘆薈 青黛 薄荷

勞心太 某 平昔操持身心皆動悲憂驚恐情志內傷漸漸神志

恍惚有似癩癩其病不在一臟矣醫藥中七情致損二

千年來從未有方包羅者然約首總以陰陽迭偏為

定評凡動皆陽當宗靜以生陰是議陽乘於絡臟陰不

安飲攝鎮固久進可效家務見聞必宜屏絕百日為期

人參 廉珠 茯神 棗仁 炙甘草

臨證指南醫案 卷七 癩癩 癩

生龍骨 更肉 五味 金箔

天地一陰陽也陰陽和則天清地寧一有偏勝遂有

非常之變人身亦一陰陽也陰陽和則神清氣定一

有偏勝自致不測之病故內經曰重陽者狂重陰者

癩癩與癩其原則同也古人集癩癩狂辨以為陽併

於陰陰併於陽此誠不刊之論言乎現症狂則少心

不饑妄言妄笑甚則上屋踰垣其候多躁而常醒癩

則或歌或哭如醉如癡甚至不知穢潔其候多靜而

常昏癩則發作無時卒然昏仆筋脈痠痛口中作聲

後人因其聲似分馬癩牛癩猪癩羊癩雞癩五各其

候經時而必止。推其病因。狂山大驚。大怒。病在肝膽。胃經三陽併而上升。故火熾則痰湧。心火熾為之閉塞。癲由積憂積鬱。病在心脾胞絡。三陰蔽而不宣。故氣鬱則痰迷。神志為之混淆。癩病或由驚恐。或由飲食不節。或由母腹中受驚。以致內臟不平。經久失調。一觸積痰。肝氣內風。猝焉暴逆。莫能禁止。待其氣反。然後已。至於主治。察形證。診脈候。以辨虛實。狂之實者。以承氣白虎。直折陽明之火。生鐵落飲。重制肝膽之邪。虛者。當壯水以制火。二陰煎之類。主之癩之實者。以滾痰丸。開痰塞閉。清心丸。洩火鬱勃。虛者。當養神

臨證指南醫案

卷七

癲癩

生

而通志。歸脾。枕中之類。主之癩之實者。用五癩丸。以攻風。控涎丸。以劫痰。龍膏丸。以瀉火。虛者。當補助氣血。調攝陰陽。養營湯。河車丸之類。主之。狂癲。癩三症。治法。大旨。不越乎此。今加肝風痰火者。苦辛以開泄。神虛火炎者。則清補並施。肝膽厥陽化風。旋逆者。以極苦之藥。折之神志。兩虛者。用交心腎法。勞神太過者。宗靜以生陰意。為欬補鎮攝。方案雖未詳備。而零珠碎玉。不悉堪為世寶哉。醫者。惟講理。其陰陽。不使有所偏勝。則鬱逆自消。而神氣得反。其常焉矣。
年

臨證指南醫案目

卷八

痢

疝

頭痛

心痛

胃腕痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

臨證指南醫案

卷八

腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍

許關李大瞻論

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦庵滋九全較

邪 僻 僻 僻

衄

某 溫邪衄血

連翹 玄參 淡黃芩 黑山梔皮

杏仁 鬱金

某 風溫衄血

臨證指南醫案 卷八 衄

丹皮 玄參 連翹 赤芍

茅花 黑梔皮

溫熱 某三 此熱蒸於水穀之濕熱血熱衄衄如昔治在陽明

熟地 知母 石膏 玄參 牛膝

火上 陳女 常有衄血今夏忽起神識如呆診脈直上魚際大忌

驚恐惱怒天癸得通可愈

犀角 丹參 玄參 生地

連翹 知母

林 陽升鼻衄不止

細生地 烏犀角 炒知母 牛膝 黑山梔

川斛 丹皮 炒黑側柏葉

某 努力傷陽逆鼻衄

犀角 二錢 細生地 三錢 炒丹皮 一錢 玄參 一錢

炒牛膝 一錢 黑山梔 一錢 炒黑側柏葉 五錢

臨服沖鮮荷葉汁一小杯

趙 二脈左數衄血火升

生地 阿膠 天冬 麥冬

淡菜 生白芍 茯神 炒山藥

程 從前衄血都以養陰益氣而愈知非實熱皆勞役陽

胃以致陰血之動也今壯年肌肉不充身動氣促如喘

臨證指南醫案 卷八 衄

口中膩涎濁沫竟是腎精帶傷收納失職之象急急保

養遠戒酒色猶可向安

熟地 人參 萸肉 湖蓮

芡實 補骨脂 山藥粉丸

朱 七十脈數陰虧陽升頭暈心中煩雜鼻衄

生地 玄參 金銀花 川斛

丹皮 石決明

某 吟逆失音衄血

生地 龜板 丹皮 牛膝

山藥 茯苓

某十歲鼻衄時發

生地 玄參 丹皮 山藥

茯苓 澤瀉 黃柏 人中白

某 食燒酒辛熱及青梅酸泄遂衄血咳嗽心腹極熱五

味偏勝肺陽臟陰為傷此病以養胃陰和法

生白扁豆 北沙參 麥冬 白粳米

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不同清道即指至高之分由山根以上睛明之次而來也其穴乃手足太陽足陽明陰陽蹻五脉之會及衝脉交會其間可見諸經皆能為衄不獨肺胃而然諸

臨證指南醫案

卷八

三

書雖已詳明惟景岳辨之尤切但衄之為患總由乎火外為六淫之變化內因五志之掀騰氣血日為錯亂陰陽為之相乘天人交感之處虛實攸分矣若風寒壅盛於經陽氣鬱而迫營者宜參麻黃桂枝症之大意若溫風暑熱拂鬱而動血外溢者用辛涼清潤等劑認定經絡之高下若火邪極甚而載血上泛者有苦寒鹹寒之法審其原委之淺深此外因主治法也至於煩冗曲運耗及木火之營肝臟厥陽化火風上灼者甘酸柔斂理所必需多勞過慾病及天一之真陽浮引陰血以胃上竅者滋潛厚味法從峻補血

脫則挽回元氣格陽則導火歸源因酒用和陽消毒之劑因努力用培中益下之方此內因主治法也學者惟審內外兩因庶乎施治無誤矣 邵新甫

臨證指南醫案

卷八

四

疝

督在陽

某七疝治法最詳于和其旨辛香以泄肝得氣疎泄而病緩矣。按法調理不愈七味導引納腎益氣升舉俾陽而墜氣仍然艾炙蒸臍原得小安內經任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚同為奇經主之故疎泄請方能治氣實參朮升補僅治中虛下陷與元海奇經中病無補壯歲至老病根不輟下焦日衰可知升陽一法體症頗合衰年僅可持持勿使病加可矣。

生鹿茸二錢 鹿角霜一錢 當歸二錢 生菟絲子五錢
臨證指南醫案 卷八 疝 五

攝陰裝

沙蒺藜錢 川桂枝尖五分 飢時服
朱一勞傷溫裏已效臍旁動氣少腹結疝墨丸偏墜皆陽氣不自復濁陰聚絡不宜急於育子

當歸 舶茴香 淡菴蓉 枸杞子
安息香 茯苓

孫疝墜於右筋縮連小腹痛此寒主收引議進溫通厥陰之絡

川棟子二兩 穿山甲二兩 炮黑川烏五錢
炒黑小茴香一兩 橘核二兩 乳香五錢
用老韭白根升泛丸飢時服二錢五分

明 臍下少腹形象橫梗發必痛遠脇腰以及陰囊此乃厥陰肝氣不宣議以苦辛如左金佐通經脉之凝滯

川連 吳萸 穿山甲 青木香

金鈴子 延胡 青橘葉湯丸

郁七疝病絡虛氣聚少腹滯脹前用河間金鈴子散加牡蠣橘葉合醜苦羊勝法小效加食述飢則脇腹鳴盛而濁氣下泄頗安乃絡虛不足中之有餘形質瘦怯不可純攻。

桃仁 當歸稍 炒小茴 橘核

郁李仁 南山查 蔥白汁丸

臨證指南醫案 卷八 疝 六

謝七疝皆肝少腹堅聚有形是閉塞不通之象百日久恙血絡必傷古人治疝必用辛香助燥氣勝之品宜緩商矣

歸鬚 杜牛膝根 小茴香 川棟子

穿山甲 柏子仁

林 脉右弦左濡當臍痛連少腹已屬凝聚有形嘔吐黃濁大便欲解不通若患處漉漉有聲痛勢稍減惟臥着體不轉移其痛更加此屬肝氣疝疝辛香流氣所稱通則不痛耳。

炒桃仁 炒橘核 金鈴子 炒延胡

非白汁 兩頭尖 小茴 青皮

此通泄厥陰氣血方也痛甚於下濁結有形非辛香無以入絡非穢濁無以直走至陰之域以子和方合

奉議意

施八立冬前一日寒戰後熱屬厥陰食蟹鹹寒沉墜浮腫囊大溲溺甚少至晚腫脹愈加顯然陽微濁聚治從氣分開泄冷濕

粗桂枝 吳茱 川棟子 茯苓

生牡蠣 澤瀉 磨青皮汁十匙

唐三寒濕已入太陽之裏勝脫之氣不利陰囊莖腫

臨證指南醫案

卷八 疝

七

五苓散加獨活漢防已

某 肝風筋疝怒勞致傷宜通補熄風

菴蓉 補骨脂 歸髮 小茴 韭子

茯苓 胡桃肉 青鹽 羊內腎蒸熟和丸

朱 動氣疝核透臍汨汨有聲男子精氣不充是下焦損

傷溫補勿過剛燥須察八脈以推病情

淡菴蓉 歸身 炒枸杞 小茴

炒沙苑 茯苓 紅棗肉

汪 自云鬱怒不已夏季忽起腹脹醫以快氣疎滯湯藥其服竟入小腹下墜青筋外突脹甚延及腎囊乃疝疝

之症議子和法

歸鬚 橘核 青木香 青皮

小茴 黑山梔 青蔥管

周六久勞怒肝木內震腸中少腹皆肝脈遊行之所氣凝聚為脹聚久結形為疝疝情懷憂鬱永不能痊以內起清志不尚草木微功耳

炒小茴 黑山梔 川棟子 延胡

青木香 青皮 生香附 橘核

吳六味酸食不化湧吐泄少腹厥氣上冲下有宿疝以肝

濁攻胃經云食出完穀是無陽也

臨證指南醫案

卷八 疝

八

生炮黑附子 生淡乾薑 猪胆汁

吳茱 川棟子

吳二疝結少腹按之堅凡過飢必衝突至脘吐酸腹脹述病從怒勞而得內應乎肝肝逆犯胃飢則胃弱肝乘上

暖下洩氣則減

肉桂 真橘核 青木香 小茴

穿山甲 粗桂枝 李根白皮

項 寒勝疝墜亦屬厥陰蓋陽明寒厥邪來乘須胃陽復

辟凝寒自罷

人參半錢 炮烏頭錢 淡乾薑錢 吳茱一錢 茯苓三錢

池淡 茯苓三錢

朱 七疝在肝內經謂衝脈為病但衝脈隸於陽明肝木必乘尅胃土胃弱逆致吐衄嘔逆湯飲不入呃忒不止皆逆亂無已為厥厥危疝矣肝體本剛相火內寄一派熱燥藥餌以剛濟剛竟有缺折之虞欲泄其濁擬用朱南陽法

非白根 兩頭尖 金鈴子 延胡

歸鬚 肉桂心

毛 疝發已過肢冷潮熱其納食減半濁陰內迫犯胃無發汗攻表之理議泄厥陰以安陽明

人參 炒黑川椒 附子 茯苓

臨證指南醫案 卷八 疝 九

川棟子 胡盧巴

久疝 老年久疝因嗔怒而腫大熱痛肝失疎泄火腑濕熱蘊結不通溫補升陽固謬蓋肝性主剛濕閉反從燥化

此龍胆苦堅不應議柔苦制熱反佐辛熱以開血中鬱

痺用東垣滋腎丸

戴二 濕熱下注久則囊腫形堅下焦血多氣少子和法中

原有虎潛諸論後醫棄置不用特哉

龍胆草 黃柏 蘆薈 山梔 知母

海金沙 猪苓 澤瀉 辛 李

陳三 疝多肝病宜乎辛泄但形勢恭是濕熱內蘊阻寒

五

二便不為通爽先以通太陽方

寒水石 海金沙 猪苓 澤瀉

通草 木香汁

倪 疝瘕結聚少腹大便閉阻小溲短澀舌白渴飲不能

納穀無對症方藥姑與滋腎丸嘗三十粒十服

許三 久有疝症十年來寒熱勞形則右胸脇中一股氣墜

直走少腹凡大小便用力皆然而竟痰多食腥膩更

令病加此濕熱久寒髓中緩攻為宜

控涎丹四分間日服十服

又 脈沉痰多手脛赤瘡疝在下右脇氣墜少腹前議

臨證指南醫案 卷八 疝 十

控涎丹逐痺未應想久聚濕熱沉痼非皮膜經脈之雍

用滑川丸四十粒勻二服間日一進竟通腑聚然後再

議

又 通腑宜壅枯痰既下其疝仍聚於右且盛於寒天冬

月卧安必有聲自消行走勞動必有形直墜陰囊久病

急攻無效議辛甘化風方法古入以疝為肝病什居八

九

當歸 鹿角 桂枝 肉桂 小茴

川芎 炙草 茯苓 生薑 羊肉膠丸

張五 疝痛自腎囊漸出少腹之左夫厥陰之脈繞乎陰器操

持謀慮都主傷肝一氣結聚變幻形象而痛病名曰疝。疝分有七暴疝多寒久疝多熱泄氣痛緩宜通可以却病只因下焦乃深遠之鄉氣熱濕鬱燥可知矣。

川連 小茴 黑山梔 楮核

川楝子 青木香 郁李仁 冬葵子

陳 豚沉弦舌灰邊白腰跨氣痛腎囊拳九腫大此濕熱為病亂吃發散消導濕邪下墜為疝治當分消

草薢 黃柏 山梔 茯苓

丹皮 防己 猪苓 澤瀉

陳二 辛香流氣以治疝未嘗不通服之五日遍身疼痛下

臨證指南醫案 卷八 疝

午四肢浮腫腹脹漸見高突塊塊思走泄氣勝都是陽傷芪附湯主之

生黃芪 附子 二錢

朱五 厥陰三瘕久延邪攻肝經絡脉少腹痛漸硬氣串達

陰器筋痛乃結疝之象病久雖少壯不可端於泄氣

溫腎官肝為急

淡苳蓉 歸身 枸杞子 炒黑小茴

穿山甲 全蝎

陸三 瘧母十年沉痾宿疝藥不能效夫瘧邪既久邪與氣血兩凝結聚絡脉藥難入絡耳虛不離乎肝胆疝不外

乎肝病七疝子和分割大者虛質不可端以辛香下墜為甚議有情溫通以培生氣

鹿茸 大茴香 穿山甲 當歸

木安息香 炮黑川烏 全蝎 用黑大豆炒

赤淋酒一杯濾酒汁和丸每服二錢煖酒送

經云任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚又督脉生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝又曰

脾傳之腎病名曰疝瘕又曰三陽為病發寒熱其傳

為癰疝又曰和客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛此

素問言諸經之疝也又經脉等篇云足陽明之筋病

臨證指南醫案 卷八 疝

疝疝腹筋急足太陰之筋病陰器紐痛下引臍兩脇痛足厥陰之經筋病陰器不用此靈樞言諸經之疝

也後人因有筋水疝癰氣血寒七疝之名其主治各

有專方立法可謂大備然其中不無錯雜之處終非

可訓之定法惟仲景先生獨以寒疝為名其所出三

方亦以溫散祛寒調營補虛為主並不雜入氣分之

藥而子和治法又以辛香流氣為主謂肝得疎泄而

病愈矣其金鈴虎潛諸法可謂發前人所未發故疝

病之本不離乎肝又不越乎寒以肝脉絡於陰器為至陰之臟足太陽之脉屬腎絡膀胱為寒水之經故

仲景所云寒疝腹中痛逆冷手足不仁腹滿脈弦而緊惡寒不欲食繞臍痛及脇痛裏急是內外皆寒氣作主無復得與其烏頭二方專以破邪治標為急虛實在所不論是急則治標之義也其當歸羊肉一方專以補虛散寒為主故以當歸羊肉辛甘重濁溫緩下元而不傷陰佐以生薑隨血肉有情之品引天下焦濕散沍寒是固本不治標也予和所云疝不難乎肝者以疝病有陰囊腫脹或痛而裏急筋縮或莖中作痛或牽引辜丸或少腹攻衝作痛或號笑忿怒而致此皆肝經脈絡之現症其金鈴散一法以泄肝散

臨證指南醫案

卷八 疝

三

逆為主故以川棟導膀胱小腸之熱玄胡和一身上下諸痛以肝主疎泄故也其所取虎潛一法以柔緩導引為主故方中用虎骨炮肝風壯筋骨羊肉龜板補髓填精佐以地黃補腎當歸補肝使以陳皮利氣疎肝芍藥通肝調管是治肝而顧及於腎也及觀先生治疝之法又更有進焉者其古以暴疝多寒久疝多熱為疝病之大綱其餘隨症施治如氣墜下結者以鹿茸鹿角升陽為主其脈結有形痛甚於下者宗丹溪通陽泄濁為治其火腑濕熱鬱結不通者用桑苦制熱反佐辛熱以開血中鬱滯為主其寒濕下墜

太陽之裏膀胱之氣不和二便不為通利者上苓散加葱通太陽膀胱為主其濕熱久聚氣墜少腹陰囊者用控涎丹瀉川丸等逐滯通滯分清兼辛甘化風法為主如下焦陰陽兩虛者用有情溫通以培生氣兼通補熄風為主而先生於治疝之法可謂曲盡病情諸法備矣仲景又有狐疝一方究非王道之品茲不具贅 鄒滋九

十四

頭痛

風火
徐六 冬月嘔吐之後漸漸顛頂作痛下焦久有積疝痔瘡

厥陰陽明偏熱凡陽氣過動變化火風迅速自為升降致有此患

連翹心 玄參心 桑葉 丹皮

黑山梔皮 荷葉汁

胡三 脉左弦數右偏頭痛左齒痛

連翹 薄荷 羚羊角 夏枯草花

黑梔皮 鮮菊葉 苦丁茶 乾荷葉邊

臨證指南醫案 卷八 頭痛 五

某 高年氣血皆虛新涼上受經脉不和腦後筋掣牽痛

條起條靜乃陽風之邪議用清散輕劑

荷葉邊 苦丁茶 蔓荊子 菊花 連翹

王六 邪鬱偏頭痛

鮮荷葉邊 苦丁茶 連翹 黑山梔

蔓荊子 杏仁 木通 白芷

郁十 風鬱頭疼

鮮荷葉 苦丁茶 淡黃芩 黑山梔

連翹 蔓荊子 太通 白芷

肝區
某四 內風頭痛淚冷

炒杞子 製首烏 柏子仁 茯神

炒菊花炭 小黑稽豆皮

沈氏 痛在頭左腦後厥陽風木上觸

細生地 生白芍 柏子仁 炒杞子

菊花 茯神

孫四 暑伏寒熱頭痛

鮮荷葉邊 連翹 苦丁茶 夏枯草

山梔 蔓荊子 厚朴 木通

某 暑風濕熱混於上竅津液無以運行凝滯遂偏頭痛

舌強乾涸治宜清散

臨證指南醫案 卷八 五

連翹 石膏 生甘草 滑石

蔓荊子 羚羊角 荷梗 桑葉

程 既知去血過多為陰虛陽實之頭痛再加發散與前

意相及矣 復脉去參黃桂加左牡蠣

又 脉數虛而動足微陰氣大傷陽氣浮越頭痛筋惕仍

與鎮攝之法

牡蠣 阿膠 人參 生地

炙草 白芍 天冬

朱 據說就涼則安遇暖必頭痛筋掣外以摩拍可緩大

凡肝風陽擾胃絡必虛食進不甘是中焦氣後雖鹹潤

介屬潛陽獲效說來依稀想像諒非入理深談聊以代
 煎酸甘是商且五旬又四中年後矣沈陰久進亦有斷
 代生氣之弊牛月來乏少診之功姑篤認真用固本膏
 徐 當年下虛曾以溫腎源肝獲效春李患目是陽氣驟
 升乃冬失藏聚水不生木之徵也類以苦辛治目風陽
 上聚頭顛肝木橫撥胃受戕賊至於嘔吐矣今心中乾
 燥如焚頭中岑岑震痛忽冷忽熱無非陰陽之逆肝為
 剛體溫燥決不相安况辛升散越轉凶豈可再蹈前轍
 姑以鎮肝益虛冀有陽和風熄之理

阿膠 小麥 麥冬 生白芍

臨證指南醫案 卷八 頭痛 七

非沙參 南棗

又 條冷忽熱心煩顛痛厥陽之逆已屬陰液之虧前案
 申明剛藥之非代豬味酸氣降乃強鎮之品亦剛藥也
 考七疝中子和慣投辛香走泄其中虎潛一法亦採可
 見疝門亦有柔法醫者熟彙成法荷不潛心體認皆希
 圖附會矣今嘔逆既止其陰藥亦可暫投即水生油木
 之法議以固本成方五更時從陽引導可也加秋石

葉 臨晚頭痛火升心嘈風陽上冒防厥
 細生地 阿膠 牡蠣 茯神
 麥冬 生白芍

史 頭形象天義不受齒今久痛有高突之狀似屬客邪
 蒙閉清華氣血然常何桂附河車亦未見其害思身半
 以上屬陽而元首更爲陽中之陽大凡陽氣先虛清邪
 散以艾炷按法灸治是一理也

熟半夏 北細辛 炮川烏 炙全蠍 薑汁

又 陽氣爲邪阻清空機發不宣考周禮採毒藥以攻病
 藉虫蟻血中搜逐以攻通邪結乃古法而醫人忽畧者
 今痛滋腦後心下嘔逆厥陰見症久病延虛攻邪須兼
 養正

臨證指南醫案 卷八 頭痛 八

川芎 當歸 半夏 薑汁

炙全蠍 蜂房
 張二 太陽痛連額骨耳後牙齦夏令至霜降不痊伏邪未
 解治陽明少陽

連翹 羚羊角 牛蒡子 葛根
 赤芍 白芷 鮮菊葉

頭爲諸陽之會與厥陰肝脈會於顛諸陰寒邪不能
 上逆惟陽氣壅塞濁邪得以上據厥陰風火乃能逆
 上作痛故頭痛一症皆由清陽不升火風乘虛上入
 所致觀先生於頭痛治法亦不外此如陽虛濁邪阻

寒氣血瘀薄而為頭痛者。用重蟻搜逐血絡。宜通陽氣為主。如火風變動與暑風邪氣上鬱而為頭痛者。用鮮荷葉苦丁茶蔓荊山梔等。辛散輕清為主。如陰虛陽越而為頭痛者。用仲景復脈湯。甘麥大棗法。加膠芍牡蠣。鎮攝益虛。和陽熄風為主。如厥陽風木上觸。兼內風而為頭痛者。用首烏柏仁。稽豆。甘菊。生芍。杞子。葶。炮。肝。風。滋。腎。液。為。主。一。症。而。條。分。縷。析。如。此。詳。明。可。謂。手。法。兼。到。者。矣。 鄒時乘

臨證指南醫案

卷八 頭痛

九

心痛

田三脉細數。聞雷被驚。心下漾漾作痛。逍遙散去柴胡

加釣藤丹皮

宋 脉左瀆伏。心下痛甚。舌白不能食穀。下咽阻膈。痛極

昏厥。此皆積勞損陽。前者曾下瘀血。延綿經月不止。此為難治。

生鹿角 當歸鬚 薑汁 官桂

桃仁 炒半夏

臨證指南醫案 卷八 心痛 脾寒厥 譚三 心痛引背。口湧清涎。肢冷。氣塞脘中。此為脾厥心痛。

病在絡脉。例用辛香。

高良薑 片薑黃 生茅朮 公丁香柄

草果仁 厚朴

朱 重按痛勢稍衰。乃一派苦辛燥。劫傷營絡。是急心痛

症。若上引泥丸。則大危矣。議用金匱法。

人參 桂枝尖 川椒 炙草 白蜜

厥心痛一症。古人辨論者多且精矣。茲不復贅。但厥

心痛與胃脘痛。情狀似一。而症實有別。世人因內經

胃脘當心而痛一語。往往混而視之。不知厥心痛。為

五臟之氣。厥而入心胞絡。而胃實與焉。則心痛與胃

痛不得不各分一門。今先生案中。開胃被驚者。用逍遙散。去柴胡。加鈎藤。丹皮。治之。以其肝陽上逆。不容升達。為之養血。以平調也。積勞損陽者。用歸鹿。姜桂。桃仁。半夏。治之。以其勞傷血痺。無徒破氣。為之通絡。以和營也。脾厥心痛者。用良姜。姜黃。茅朮。丁香。草果。厚朴。治之。以其脾寒氣厥。病在脈絡。為之辛香。以開通也。重按而痛稍衰者。用人參。桂枝。川椒。炙草。白蜜。治之。以其心營受傷。攻劫難施。為之辛甘。以化陽也。方家雖未全備。然其審病之因。製方之巧。無不一一破的。果能舉一反三。其義豈有盡乎。龔壽年

臨證指南醫案 卷八 心痛 三

胃脘痛

肝犯胃 嚴十一 胃痛半年。乾嘔。

金鈴子 延胡 半夏 茯苓

山梔 生香附

張 衝氣上攻。成形。痛嘔。痛後則散。此厥陰順乘陽明。陽

明虛。筋骨亦掣痛。安虵丸三錢。四服。椒梅湯送。

某五 勞力。氣阻。胃痛。

川棟子 延胡 炒半夏 烏藥

橘紅 生香附汁

臨證指南醫案 卷八 胃痛 三

陳 宿病衝氣。胃痛。今飽食動怒。痛發。嘔吐。是肝木侵犯

胃土。濁氣上踞。脹痛不休。逆亂不已。變為先寒後熱。煩

躁。面赤汗泄。此為厥象。厥陰肝臟之現症。顯然在目。夫

痛則不通。通字須究氣血陰陽。便是看診要旨矣。議用

瀉心法

乾薑 川連 入參 枳實

半夏 薑汁

吳三 食倉痛發。嘔水涎沫。六年久病入絡。滯大便。忽閉。忽

瀉。患處漉漉有聲。議通胃陽。兼制木侮。

淡吳萸 良薑 半夏 延胡

炮川烏 茯苓 蒲黃

李氏 舌白胸痞腕痛如束乾嘔使難氣阻凝痰聚膈當以泄降宣劑若竟攻蕩當夏熱土旺傷及太陰恐滋脹滿之憂

醋炒半夏 川棟子 延胡 橘紅

杏仁 厚朴

王氏 氣逆填胸阻咽腕痛而痛病由肝臟厥氣乘胃入膈致陽明經脈失和周身掣痛夜甚晝緩者戌亥至陰為肝旺時候也此症多從驚恐嗔鬱所致失治變為昏厥

半夏 薑汁 金鈴子 延胡

臨證指南醫案 卷八 胃痛 三

杏仁 瓜蒌皮 香豉 白蔻

又痛緩夜深復熾前後心胸板掣脈左數病在血絡中

金鈴子 延胡 桃仁 歸鬚

鬱金 白

董氏 產後三年經水不轉胃痛得食必嘔汗出形寒腰左動氣因燥大便七八日始通脈細弦右滑舌白消渴腕中响動下行痛緩病屬厥陰順乘陽明胃土久傷肝木愈橫法當辛酸兩和厥陰體用仍泰通補陽明之陽俾濁少上僭痛有緩期

人參 同煎 開口吳 蕪 滾水炮洗 生白芍 三錢

良薑 七分 熟半夏 醋炒焦 雲茯苓 切塊 三錢

氏 天癸當絕仍來昔壯年已有頭暈七年前秋起胃痛若嚼今春悲哀先麻木頭眩痛發下部膝脛冷三日病屬肝厥胃痛述痛引背脘是久病絡脈空隙厥陽熱氣因情志鬱勃拂逆氣攻乘絡內風旋動襲陽明致嘔逆不能進食

九孔石決明 清阿膠 生地 枸杞子

茯苓 桑寄生 川石斛

某 湯痛入腕嘔吐黃濁水液因驚動肝肝風震起犯胃

不昔液聚難用剛燥議養胃汁以熄風方

臨證指南醫案 卷八 胃痛 三

人參 茯苓 半夏 廣皮白

麥冬 白粳米

肝犯胃 兼痰飲 姚 胃痛久而屢發必有凝痰聚瘀老年氣衰病發日重乃邪正勢不兩立也今納物嘔吐甚多味帶酸苦脈得

左大右小蓋肝木必侮胃土胃陽虛完穀而出且呃逆沃以熱湯不減其胃氣掀騰如沸不嗜湯飲飲濁瀰留腕底用藥之理遠柔用剛嘉言謂能變胃而不受胃變聞得上關再商治法 紫金丹合化一九日三次 又 議以辛潤苦滑通胸中之陽開滌濁凝結聚古人謂通則不痛胸中部位最高治在氣分

鮮薤白去白衣 瓜藹實炒 熟半夏三錢

茯苓三錢 川桂枝一錢 生薑四分

古有薤露之歌。謂薤最滑。露不能留。其氣辛則通。其

澀滑則降。仲景用以主胸膈不舒之痛。瓜藹苦潤。豁

痰陷胸湯以之開結。半夏自陽以和陰。茯苓淡滲。桂

枝辛甘輕揚。載之不急下走。以攻病所。薑汁生用。能

通胸中痰沫。兼以通神明。去穢惡也。

肝鬱化 大犯胃 某氏

胃痛引脇

川棟子 柴胡 黑山梔 釣藤

半夏 橘紅

臨證指南醫案 卷八 胃痛 薑

朱氏 苦寒辛通

川連 土瓜萹皮 白芥子 茯苓

炒半夏 薑汁 橘紅 竹茹

又肝厥胃痛。兼有痰飲。只因誤用技術。人參固守中焦。

痰氣阻閉。致痛極痞脹。更醫但知理氣使降。不知氣閉

然自內生。是不中窾。前方前以寒藥辛通為法。已得效

驗。况酸味亦屬火化。護河間法。

金鈴子 延胡 川連 黑山梔

橘紅 半夏

張 老年鬱勃。肝陽直犯胃絡。為心下痛。久則液枯氣結。

成格 金鈴子 延胡 黑山梔 淡豆豉炒香

張九壯年。面色痿黃。脈濡小無力。胃脘常痛。情志不適。即

發。或飲煖酒暫解。食物不易消化。脾胃之上受。起却因

肝木來乘。怡情放懷。可愈此病。

人參 廣皮 半夏 茯苓 苡仁

桑葉 丹皮 桔梗 山梔薑汁炒 水泛丸

某 味淡短氣。腕中微痛

人參 淡附子 桂枝 炒遠志 煨薑

某 積滯久着。胃脘不宣。不時脘痛。已經數載。陽傷爰疑。

臨證指南醫案 卷八 胃痛 姜

炒半夏 淡乾薑 草撥 草果

廣皮 茯苓

汪五診脈弦滑。胃痛透背。穀食漸減。病經數載。已入胃絡。

始與辛通法。

甜桂枝八分 延胡索一錢 半夏一錢 茯苓三錢

良薑一錢 蜜水煮生薑一錢

張 陽微不司外衛。脈絡牽掣。不和胃痛。夏秋不發。陰內

陽外也。當冬寒驟加。宜急護其陽。用桂枝附子湯

桂枝 附子 炙草 煨薑 南棗

戴三始於傷陰。繼則陽損。脘痛似乎拘束。食物不運。

常理中焦健運二腸通補為宜守補則診

桂枝木 茯苓 生薑清 炒焦遠志

炒黃半夏 生益智仁

余三胃疼發前後心冷嘔吐

淡吳萸 炒半夏 藜蘆 淡乾薑

草果仁 厚朴 廣皮 桂枝木

中州陽失健運脘中痛食不化

益智仁 穀芽 廣皮 炙草

茯苓 檀香汁 半夏麴 炒荷葉

顧五清陽失職脘中痺痛得暖曠達當辛以通之

臨證指南醫案 卷八 胃痛 三

薤白 半夏 桂枝 茯苓 乾薑

顧五管虛胃痛進以辛甘

當歸 甜桂枝 茯苓 炙草

煨薑 南棗肉

費九勞力氣泄陽傷胸脘痛發得食自緩已非質滯停積

然初病氣傷久泄不止營絡亦傷古謂絡虛則痛也攻

痰破氣不去病即傷胃致納食不甘愛噫欲嘔顯見胃

傷陽敗當以辛甘溫方

人參 桂枝 茯苓 炙草

煨薑 南棗

某胃痛已久間發風疹此非客氣外感由乎情懷鬱勃

氣血少於流暢夫思慮鬱結心脾營血暗傷年前主歸

脾一法原有成效今食減形瘦當培中土而理營輔之

異功加歸芍用南棗肉湯以丸

程天脈爽背寒食入脘痛

人參 茯苓 當歸 白芍

炙草 藜蘆 南棗

某女形寒脘痛得食甚手按少緩非有餘客邪病擬進和

營衛法 歸桂枝去芍加茯苓

蔣陽微氣阻右脘痛據云努力痛起當兩調氣血

臨證指南醫案 卷八 胃痛 天

延胡 半夏 厚朴 橘紅

桂枝木 良薑 瓜蒌皮 茯苓

某三努力飢飽失時好飲冷酒脈弦硬中脘痛

熟半夏 雲茯苓 桃仁 去皮尖炒

真薑 延胡 紅豆蔻 去殼

方九熟半夏 雲茯苓 生厚朴 小附子

草果仁 去衣 高良薑 老薑汁法丸每服三錢

朱痛因虛寒吐痰泄氣稍緩當通陽明勿雜多岐

人參 半夏 薑汁 淡附子

茯苓 淡乾薑

張八陽微濁凝胃下疼
施二胃痛濁痰上逆
川阿膠九六分

代赭石 炒半夏 淡吳萸 淡乾薑

茯苓 廣皮 藜蘆 生益智仁

張八陽微濁凝胃下疼

炒黑川椒去日 炮黑川烏錢 炮黑川附子錢

炮淡乾薑牛

高五素多鬱怒陽氣窒痺渴飲凝泣湯飲下咽汪出酸水

胃脘痛痺已經三載漸延噎膈先與通陽微飲俾陽氣得宣庶可向安

臨證指南醫案 卷八 胃痛 三

半夏 枳實皮 桂枝木 茯苓 淡乾薑

又脉右弦不亂納穀不進吞酸渴飲尙阻陽仍不宜

半夏 良薑 桂枝木 茯苓

延胡 淡乾薑

高脉虛清胃痛久治在血分

桃仁 常歸 桂枝 茯苓

遠志 炙草

錢三酒肉滯氣胃痛鄉人稱為穿心箭風方書所無不可

稽考苦辛泄降可效

延胡 川棟子 桃仁 蒲黃 五靈脂

盛三胃痛喜得煖食腸中泄氣則安數年痛必入絡治在血中之氣

桂枝木 桃仁 萐白汁 歸鬚 茯苓塊

又陽微胃痛

當歸 桂枝木 桃仁 炙甘草

煨薑 南棗

席經幾年宿病病必在絡痛非虛症因久延體質氣餒

遇食物不適或情懷鬱勃痰因氣滯氣阻血瘀諸脉逆

亂頻吐汚濁而大便反秘醫見嘔吐肢冷認爲虛脫以

理中加附子溫裏護陽夫陽氣皆屬無形况乎病發有

臨證指南醫案 卷八 胃痛 三

因火非陽微欲脫憶當年病來宛是肝病比疎通氣血

皆效其病之未得全好由于性情食物居多夏季當以

大陰陽明通劑今痛處在脘久則痰濁復聚宜淡味薄

味清養初三竹瀝泛丸仍用早上另立通瘀方法

蘇木 人參 鬱金 桃仁 歸尾

栝子仁 琥珀 荊藜 紅棗肉九早服二錢

秦久有胃痛更加勞力致絡中血瘀經氣逆其患纏在

絡脉中痺窒耳醫藥或攻裏或攻表置病不理宜乎無

效形瘦清減用緩逐其瘀一法

螻螂頭灸一 廣正灸一 五靈脂炒一 桃仁二兩

川桂枝尖生五錢 蜀漆炒黑三錢 用老韭根白搗汁泛丸 每服二錢滾水下

潘氏 脈弦滿經事不至寒熱胃痛拒格嘔惡不納此因久病胃痛瘀血積於胃絡議辛通瘀滯法

川棟子 延胡 桂枝木 五靈脂 蒲黃 香附

氣火帶 吳氏 氣火鬱胃痛

川棟子 橘紅 炒查肉 鬱金 黑山梔 香附

氣逆不降 江氏 胃疼氣逆不降

臨證指南醫案 卷八 胃痛 三

鮮枇杷葉 杏仁 生香附 降香汁 厚朴 橘紅 桔梗 白蔻

范氏 諸荳皆能閉氣漿凝為腐宛是呆滯食物食已脘痞痛脹乃清氣之阻診脈小滿舌白粘膩當理氣以開胸胸中

杏仁 厚朴 老蘇梗 廣皮白 白蔻仁 枳殼汁 桔梗汁

陽明乃十二經脈之長其作痛之因甚多蓋胃者氣也乃衝繁要道為患最易虛和賊邪之乘機竊發其間消長不一習俗辛香滋膩之治斷不容一例而漫

施然而病其要何在所云初病在經久痛入絡以經主氣絡主血則可知其治氣治血之當然也凡氣

既久阻血亦應病循行之脈絡自痺而辛香理氣辛柔

和血之法實為對待必然之理又如飽食痛甚得食痛緩之類於此有宜補不宜補之分焉若素虛之

體時就煩勞水穀之精微不足以供其消磨而營氣

日虛脈絡枯澀求助於食者甘溫填補等法所宜頻

進也若有形之滯者塞其中容納早已無權得助而

為實質攻之逐之等劑又不可緩也寒溫兩法從乎

喜慶喜寒滋燥之殊詢其便瀉便滑至於飲停必吞

臨證指南醫案 卷八 胃痛 三

酸食滯當暖腐厥氣乃散漫無形瘀傷則定而有象

蛻虫動擾當頻痛而吐沫痰濕壅塞必善吐而脈滑

營氣兩虛者不離乎簡辣動悸肝陽衝冠者定然煩

渴而嘔逆陰邪之勢其來必速鬱火之患由漸而劇

也。邵新甫

脇痛

張五六脇脹夜甚响動則降七情致傷之病

橘葉 香附汁 川棟子 半夏

茯苓 薑渣

陳 氣熱攻冲擾腕入脇

川連 牡蠣 夏枯草 炒半夏

香附 炒白芥子

徐四勞怒陽動左脇閃閃腹中微滿診脈弦搏左甚當先

用苦辛

臨證指南醫案 卷八 脇痛

鬱金 山梔 半夏麩 降香末

橘紅 金石斛

湯十氣逆咳血後脇疼

降香汁八分 川貝一錢 鮮枇杷葉三錢 白蔻仁五分

杏仁二錢 橘紅一錢

丁 由虛里痛起左脇下堅滿脹及臍右大便澀滯不爽

用緩攻方法 小温中丸

某 痰飲搏擊脇痛

半夏 茯苓 廣皮 甘草

白芥子 刺蒺藜 鈎藤

管經

沈三左脇下痛食入則安 當歸桂枝湯加內桂

朱五左乳傍痛透腰腹重按得熱少緩此屬陰絡虛痛十

一年不愈亦痢疾矣

當歸三錢 肉桂一錢 小茴七分 丁香皮五分

茯苓二錢 淡乾薑一錢

尤四痛從中起透及右脇胃之絡脈受傷故得食自緩但

每痛發必由下午黃昏當陽氣漸衰而來是有取乎辛

温通絡矣

當歸 茯苓 炮薑 肉桂

炙草 大棗

臨證指南醫案 卷八 脇痛

寒入絡 郭三痛必右脇中有形攻心嘔吐清涎周身寒凜痛止寂

然無踪此乃寒入絡脈氣乘填塞阻逆以辛香温通法

草撥 半夏 川棟子 延胡

吳萸 良薑 蒲黃 茯苓

血絡凝 汪六噴怒動肝寒熱旬日左季脇痛難以舒轉此絡脈痰

痺防有見紅之事靜調勿勞可愈

桃仁 歸鬚 五加皮 澤蘭

丹皮 鬱金

又 桃仁 歸鬚 丹皮 桑葉

川棟子皮 黑山梔皮

又 終虛則熱液虧則風動痛減半有動躍之狀當甘緩
理虛 炙甘草湯去苤桂

又 痛止便難液耗風動為秘議用東垣通幽法。

當歸 桃仁 柏子霜 火麻仁

郁李仁 松子肉 紅花

凌 肝着脇中痛勞怒致傷氣血

川棟子皮 炒延胡 歸鬚 桃仁

生牡蠣 桂枝木

沈 初起形寒寒熱漸及脇助腕痛進食痛加大便秘結

久病已入血絡兼之神氣漫損辛香剛燥決不可用。

臨證指南醫案 卷八 脇痛 三

白旋覆花 新絲 青蔥管 桃仁

歸鬚 柏子仁

王 四方前後脇板着食後痛脹今三年矣久病在絡氣血

皆窒當辛香緩通

桃仁 歸鬚 小茴 川棟子 半夏

生牡蠣 橘紅 紫降香 白芥子 水泛丸

注 痛在脇肋遊走不一漸至痰多手足少力初病兩年

寢食如常今年入夏病甚此非臟腑之病乃由經脈纏

及絡脉大凡經主氣絡主血久病血瘀熱從便下諸家

不分經絡但忽寒忽熱宜乎無效試展新絲一方小效

乃絡方耳議通少陽陽明之絡通則不痛矣

歸鬚 炒桃仁 澤蘭葉 柏子仁 香附汁

丹皮 穿山甲 乳香 沒藥 水泛丸

程 診脉動而虛左部小弱左脇疼痛勢上引得食稍

安此皆操持太甚損及營絡五志之陽動擾不息嗑乾

舌燥心悸久痛津液致傷也症固屬虛但參朮歸芪補

方未能治及絡病內經肝病不越三法辛散以理用酸

泄以體用甘緩以益用宜辛甘潤溫之補蓋肝為剛屬

必柔以濟之自藥效驗耳

炒桃仁 柏子仁 新絲 歸尾

臨證指南醫案 卷八 脇痛 四

橘紅 琥珀

痛緩時用丸方

真阿膠 小生地 枸杞子 柏子仁 天冬

刺蒺藜 茯神 黃菊花四兩丸

朱 肝絡凝瘀脇痛須防動怒失血

旋覆花湯加歸鬚桃仁柏仁

李 左脇痞積攻疼

生牡蠣 南山查 炒延胡 川棟子

炒桃仁 歸鬚 丹皮 桂枝木

蔣 宿傷左脇腹背痛

肝經虛	肝經虛	肝經虛	肝經虛	肝經虛	肝經虛	肝經虛	肝經虛	肝經虛
胡三	程	少陽之絡	青蒿梗	紅花	天冬	枸杞	桂圓	煎膏加阿膠收
四診脈右弦左小弱滿病起積勞傷陽操持素思五志	脇下痛犯中焦初起上吐下瀉春深寒熱不止病在		歸鬚	鬱金	柏仁	栒杞	桂圓	熬膏加阿膠收
皆逆而肝爲將軍之官謀慮出焉故先脇痛雖暮陽不			澤蘭					
用事其病漸劇是內傷症乃木氣不足日創辛燥氣泄			丹皮					
且耗六味滋柔賦藥原非止痛之方不過矯前藥之謬								

臨證指南醫案

卷八

脇痛

三

而已內經肝病三法治虛亦主甘緩蓋病既久必及陽
明胃絡漸歸及右肝胃同病人臥竟藏於肝夢寐紛紜
傷及無形矣議用甘藥少佐攝鎮

人參 棗仁 茯神 炙草 柏子仁

當歸 龍骨 金箔 桂圓肉煮濃汁搗丸

脇痛一症多屬少陽厥陰傷寒脇痛皆在少陽胆經

以脇居少陽之部雜症脇痛皆屬厥陰肝經以肝脈

布於脇助故仲景旋覆花湯河間金鈴子散及先生

辛溫通絡甘緩理虛溫柔通補辛泄宜痰等法皆治

肝着脇痛之劑可謂曲盡病情諸法畢備矣然其症

臨證指南醫案

卷八

脇痛

三

有虛有實有寒有熱不可槩論苟能因此擴充再加

詳審則臨症自有據矣

腹痛

上中二
等氣阻
裴氏 脈數按之瀉腹痛嘔吐恐痧穢格拒宜宣通氣分

白蔻仁 桔梗 黑山梔 香豉

半夏 廣皮白

通
馬系不
某 腰腹痛得冷愈甚

桂枝木 茯苓 蘼艾 生香附

青皮 炒小茴

吳 當臍微痛手按則止此絡空冷乘陽氣久虛之質自
逆戒酒穀增不可因痛再以破泄真氣

臨證指南醫案 卷八 腹痛 五

茯苓 生薑 熟術 肉桂

俞 九腹痛六七年每發必週身寒栗吐涎沫而痛止此諸
氣鬱痺得湧則宜之象法當升陽散鬱

半夏 草果 金鈴子 延胡

厚朴 生薑 蘇梗

程 穢濁阻遏中焦氣機不宜腹痛脫痺常用芳香逐穢
兼以疎泄

藿香 厚朴 杏仁 萊菔子

半夏 廣皮白

四脈內
鄭 脈沉微腹痛欲大便陰濁內凝乃陽氣積聚逆陽必

以辛熱

生白朮 吳萸 良薑 川熟附

茯苓 小茴

某 腑陽不通腹痛用禹餘糧丸暖下通消二便通脹緩
腹反此無形之氣未振宜疎補醒中

生白朮 厚朴 廣皮 半夏

茯苓 生益智 薑汁

某 氣結腹痛食少寒熱 逍遙散去朮加鬱金香附

某 肝鬱腹痛有形經不調

香附 川芎 當歸 肉桂

臨證指南醫案 卷八 腹痛 罕

五靈脂 木香 吳萸 炒白芍

畢 小便自利大便黑色當臍腹痛十五年漸發日甚脈
來沉而結澹此鬱勁傷及肝脾之絡致血敗瘀留勢役
動怒宿疴乃發目今冬深閉藏忌用攻下議以辛通潤
血所謂通則不痛矣

桃仁 桂枝木 穿山甲 老韭白

煎送阿魏丸一錢

徐 疹發五六年形體畏寒病深身不大熱每大便腹痛
裏急此皆氣血凝滯當以鬱病推求

當歸 酒製大黃 枳實 桂枝

當歸 酒製大黃 枳實 桂枝

勞傷

某 勞力傷氣浮腫食入腹痛姑用戊巳調中

白芍二錢 炙草五分 當歸炒焦一錢 生益智研七分

廣皮一錢 煨薑一錢 棗肉三錢 河水煎

營分

某 當臍腹痛發於冬季春深漸愈病發變氣過飢勞動亦發宜溫通營分主治

當歸 炙草 肉桂 茯苓

炮薑 南棗

胃氣

某 腹痛三年時發時止面色明亮是飲邪亦酒濕釀成因怒左脇有形痛連腹中及胸背諸俞乃絡空飲氣逆

臨證指南醫案 卷八 腹痛 聖

攻入絡食辛熱痛止復痛蓋怒則鬱折肝用惟氣辛辣可解論藥必首推氣味

相桂枝木一錢 天南星 薑汁浸炮 生左牡蠣 五錢

真楠核 炒香打 川棟子肉一錢 李根東行皮一錢

某 長見腹脹減食微痛是暑傷在氣分東垣每調和脾胃疎泄肝木最屬近理若守中之補及膩滯血藥皆左

人參 廣皮 白芍 茯苓

穀芽 生益智仁

腹處乎中痛因非一須知其無形及有形之為患而主治之機宜已先得其要矣所謂無形為患者如舉

臨證指南醫案 卷八

疑火鬱氣阻營虛及夏秋暑濕痧穢之類是也所謂有形為患者如蓄血食滯癥瘕蛇蟻內疝及平素偏

好成積之類是也審其痛勢之高下辨其色脈之衰旺細究其因確從何起大都在臟者以肝脾腎為主

在腑者以腸胃為先夫臟有賦賦之情非比腑病而以通為用也此通字勿執攻下之謂古之建中湯理

中湯三物厚朴湯及厚朴溫中湯各具至理考先生

日古若通陽而泄濁者如吳茱萸湯及四逆湯法清

火而泄鬱者如左金丸及金鈴散法開通氣分者如

四七湯及五磨飲法宣攻管絡者如穿山甲桃仁歸

臨證指南醫案 卷八 腹痛 聖

鬚非根之劑及下瘀血湯法緩而和者如芍甘湯加

減及甘麥大棗湯法柔而通者如菴菴栢子肉桂當

歸之劑及復脈加減法至於食滯消之蛇擾安之癥

瘕理之內疝平之痧穢之候以芳香解之偏積之類

究其原而治之是皆先生化裁之法也若夫瘍科內

癰婦科四症兼患是病者更於各門兼參其法而用

之則無遺蘊矣 邵新甫

臨證指南醫案 卷八

三三七

肩臂背痛

後

徐 避日天令驟冷診左脉忽現芤濇痛時筋解連耳後此營虛脉絡失養風動筋急前法清絡涼劑不應營虛不受辛寒做東垣舒筋湯意

當歸 生黃芪 片薑黃 桂枝

防風 生於朮 煎藥化活絡丹一丸

某 勞倦肩臂疼

川桂枝木 木防己 五加皮 茯苓

生苡仁 炒白朮

臨證指歸醫案 卷八 肩臂背痛

塗六痛起肩脚漸入環跳脚膝是為絡虛

黃芪 五錢 於朮 三錢 當歸 三錢 茯苓 一錢

防己 八分 防風根 五分 羌活 五分

又 照前方去防風羌活加杞子沙苑

鄒 五旬又四陽明脉衰肩脚筋緩不舉而痛治當通補

脉絡真進攻風

生黃芪 於朮 當歸 防風根

黃芪 桑枝

王四 陽明氣衰厥陰風動頭眩目昏右肩痛麻脇下有聚

氣足厥陰主治

枸杞子 兩 歸身 三兩 羚羊角 二兩 製白朮 三兩

嫩黃芪皮 四兩 明天麻 二兩 菊花 二兩 桑枝 四兩 熬汁九

徐五 左指脹痛引肩男子血虛風動病在少形脉不足以

柔藥溫養

製首烏 枸杞子 歸身 三角胡麻

菊花炭 柏子仁 刺蒺藜 桑枝膏丸

俞如 高年陽明氣乏肩脚痛難屈伸法當理衛陽通補

黃芪 桂枝 歸身 片薑黃

海桐皮 夏枯草

孫四 腎氣攻背項強溺頻且多督脉不攝腰重頭疼難以

臨證指歸醫案 卷八 肩臂背痛

轉側先與通陽宗許學士法

川椒 炒出汗 川桂枝 錢 川附子 錢 茯苓 一錢

生白朮 錢 生遠志 錢

凡衝氣攻痛從背而上者係督脉主病治在少陰從

腹而上者治在厥陰係衝任主病或填補陽明此治

病之宗旨也

汪一 肝濁逆攻痛至背

淡乾薑 八分 炒黑川椒 分 炒佳烏梅肉 分

小川連 三分 川桂枝木 分 北細辛 二分

黃柏 五分 川棟子肉 錢 生白芍 二錢

陳氏內經論諸痛皆寒時當冬臘口鼻吸受寒冷阻氣隧之流行痛自胸引及背甚則手足厥冷只宜兩通氣血主治

川棟子 延胡 生香附 橘紅

吳萸 烏藥 紅花

沈氏脈孔汗出失血背痛此為絡虛

人參 炒歸身 棗仁 炒白芍

炙草 茯神

莊三督虛背疼脊高突

生毛鹿角 鹿角霜 杞子 歸身 一錢

臨證指南醫案 卷八 有臂背痛 吳

生杜仲 沙苑 一錢 茯苓 青蘆 三分

張三督虛背痛遺洩

生毛鹿角 鹿角霜 生菟絲子 生杜仲

沙苑子 白龍骨 茯苓 當歸

肺朝百脈肺病則不能管攝一身故肺俞為病即肩背作痛又背為陽明之府陽明有虧不能束筋骨利機關即肩垂背曲至於臂經絡交會不一而陽明為十二經絡之長臂痛亦富責之陽明但痛有內外兩因虛實迥異治分氣血二致通補攸殊如營虛脈絡大養風動筋急者不受辛寒當做東垣舒筋湯之意

佐以活絡丹勞倦傷筋脈絡凝滯肩背作痛者以辛甘為君佐以循經入絡之品陽明氣衰厥陰風動右

肩痛麻者用拘杞歸身黃芪羚羊桑枝骨為陽明厥

陰營氣兩虛主治血虛風動者因陽明絡虛受肝膽

風陽之擾用首烏枸杞歸身胡麻柏子仁刺蒺藜等

味以柔甘為溫養失血背痛者其虛亦在陽明之絡

用人參歸身棗仁白芍炙草茯神以與補陽明若腎

氣上逆則督虛為主病宜用奇經之藥以峻補真陽

至於口鼻吸受寒冷阻鬱氣隧痛自胸引及背者宗

內經諸痛皆寒之義以溫藥兩通氣血更有古法如

臨證指南醫案 卷八 有臂背痛 吳

防風湯散肺俞之風指迷丸治痰流臂痛控涎丹治

流注牽引此皆從實証而治所謂通則不痛也醫者

不拘守一法洞悉病源運巧思以製方而技於是進

龔商年

腰腿足痛

腰痛

曹三 濕鬱少腹痛引腰右脚痠

木防已 晚蠶沙 飛滑石 茯苓皮

杏仁 厚朴 草果 藟蘘

俞五 勞倦挾濕腰疼

川桂枝尖 木防已 生苡仁 茯苓皮

晚蠶沙 藟蘘

何七 腰痛環跳穴痛痺

沙苑 桂枝木 小茴 茯苓

臨證指南醫案 卷八 腰腿足痛 聖

桑寄生 炒杞子

翁三 努力傷腰疼

生杜仲 當歸 五加皮 炒牛膝

枸杞子 茯苓 青鹽 生羊腰子

吳氏 脈虛身熱腰髀皆痛少腹有形攻觸臑陰奇脈交傷

不可作外感治

當歸 炒白芍 桂枝 茯苓

炙草 煨薑 大棗

汪三 脈滿腰髀環跳悉痛煩勞即發下焦空虛脈絡不宣

所謂絡虛則痛是也

歸身 桂枝木 生杜仲 木防已

沙苑 牛膝 藟蘘 小茴

某 便溏腰痛無力 木菟丸方

朱 脈細色奪肝腎虛腰痛是絡病治法

生羊內腎 當歸 枸杞子 小茴

紫衣胡桃 茯神

汪 老年腰膝久痛牽引少腹兩足不堪步履奇經之脈

親於肝腎為多

鹿角霜 當歸 肉蓯蓉 薄桂

小茴 柏子仁

臨證指南醫案 卷八 腰腿足痛 聖

王三 脈遲緩飲酒便溏遺精數年不已近日腰髀足膝膝

痛麻木此濕凝傷其脾腎之陽滋填固澆決不應病先

議用苓薑木桂湯驅濕煖土再商後法

吳 舌白乾渴腕不知飢兩足膝跗筋掣牽痛雖有宿病

近日痛發必挾時序溫熱濕蒸之氣阻其流行之隧理

進宜通莫以風藥

飛滑石 石膏 寒水石 杏仁

防已 苡仁 威靈仙

蔣七 足膝腫疼久不止內熱

生虎骨 炒牛膝 藟蘘 金毛狗脊

當歸 仙靈脾

又 照前方加生鹿角黃柏

張^四 勞力傷左腿骨麻疼

生虎骨^{四兩} 當歸^{二兩} 五加皮^{二兩} 仙靈脾^{二兩} 牛膝^{二兩}

獨活^{一兩} 白茄根^{二兩} 油松節^{二兩} 金毛狗脊^{八兩}

朱 痛着右腿身前肌肉不腫必在筋骨且入夜分勢篤

邪留於陰間有偏隆治從肝經

生杜仲^{一兩} 當歸鬚^{二錢} 穿山甲^{二錢} 小茴香^{一錢}

北細辛^{三分} 乾地龍^錢

某 嘔逆吐涎衝氣攻心足大指指硬強而痛

臨證指南醫案 卷八 腰腿足痛 兪

淡吳黃 熟附子 獨活 北細辛

當歸 漢防己

某 兩足皮膚撫之則痛由厥陰犯陽明胃厥所致脉弦

而數治當疎泄

川棟子 延胡 青皮 黑山梔

歸鬚 桃仁 橘紅 炒黑查肉

陸^二 飽食則噦是為胃病兩足骨節骨痛陽明胃脉不司

束筋骨攻痛議轉旋陽氣法 芩薑木桂湯

某 右足患處麻木筋強微腫老人氣血不得宣通冬病

至長夏食不加餐脉小弱主以溫發

虎脛骨^{三錢} 淮牛膝^{一錢} 歸身^炒 杞子^炒

生杜仲^{三錢} 川斛^{三錢} 車前^{一錢} 白蒺藜^炒

腰者腎之府腎與膀胱為表裏在外為太陽在內屬

少陰又為衝任督帶之要會則腰痛一症不得以

腎為主病然有內因外因不內外因之別舊有五辨

一日陽虛不足少陰腎衰二日風痺風寒濕着腰痛

三日勞役傷腎四日墜墮損傷五日寢臥濕地其說

已詳而景岳更增八表裏虛實寒熱之論尤為詳悉

夫內因治法腎臟之陽有虧則益火之本以消陰翳

腎臟之陰內奪則壯水之源以制陽光外因治法寒

臨證指南醫案 卷八 腰腿足痛 辛

濕傷陽者用苦辛溫以通陽泄濁濕鬱生熱者用苦

辛以勝濕通氣不內外因治法勞役傷腎者以先後

天同治墜墮損傷者辨傷之輕重與瘀之有無為或

通或補若夫腿足痛外感者惟寒濕濕熱濕風之流

經入絡經云傷於濕者下先受之故當以治濕為主

其間佐溫佐清佐散隨症以製方內傷則不外肝脾

腎二者之虛或補中或填下或養肝隨病以致治古

來治腰腿足痛之法大畧如此也然審症必如燃犀

燭怪用藥尤貴以芥投針今閱案中有飲酒便溺遺

精不已腰痛麻木者他人必用滋填固清等藥先生

斷為濕凝傷脾腎之陽。用苓桂木薑湯以驅濕煖土。有老年腰痛者。他人但撮幾味。通用補腎藥以治。先生獨想及奇經之脈。隸於肝腎。用血肉有情之品。鹿角當歸。從蓉。薄桂。小茴。以溫養下焦。有痛着右腿。肌肉不腫。入夜勢篤者。先生斷其必在筋骨。邪流於陰。用歸鬚。地龍。山甲。細辛。以辛香苦溫。入絡搜邪。有兩足皮膚。撫之則痛者。似乎風濕等症。先生斷其厥陰。犯陽明。用川棟。延胡。歸鬚。菟仁。青皮。山梔。以疎泄肝臟。有飽食則噦。兩足骨節皆痛者。人每用疎散攻劫。先生宗陽明虛不能束筋骨意。用苓薑木桂湯。以轉

臨證指南醫案

卷八

腰腿足痛

至

旋陽氣。種種治法。非凡手所及。要之治病。固當審乎虛實。更當察其虛中有實。實中有虛。使第虛者補而實者攻。誰不知之。潛玩方案。足以補後人之心智也。豈淺鮮哉。 龔商年

諸痛

陳久痛必入絡。氣血不行。發黃非疽也。

旋覆花 新絳 青蔥 炒桃仁 當歸尾

龐八絡虛則痛。有年色脈衰奪。原非香遠劫散可效。醫不明治絡之法。則愈治愈窮矣。

炒桃仁 青蔥管 桂枝 生鹿角 歸尾

此旋覆花湯之變制也。去覆花之鹹降。加鹿角之上升。方中惟有葱管通下。餘俱辛散橫行。則絡中無虛不到矣。

臨證指南醫案

卷八

諸痛

至

又辛潤通絡。病愈廿日。因勞再發。至於上吐下閉。是關格難治矣。且痛勢復來。姑與通陽。阿魏丸四錢分四服。

李六積傷入絡。氣血皆瘀。則流行失司。所謂痛則不通也。久病當以緩攻。不致重損。

桃仁 歸鬚 降香末 小茴 穿山甲

白茯苓 片薑黃 煨木香 韭白汁法丸

湯三由周身筋痛。遂至腹中。遂不食不便。病久入絡。不易除根。

歸身 川桂枝 茯苓 枳子仁

遠志 青葱管

章 痛乃宿病。當治於發之由。今痺寒服悶。食入不安。得頻吐之餘。疹形則發。是陳腐積氣膠結。因吐經氣宣通。倣仲景胸中懊憹。例用梔子豉湯主之。

又 胸中稍舒。腰腹如束。氣隨有欲通之象。而血絡仍然。錮結就形。體畏寒怯冷。乃管衛之氣失司。非陽微惡寒之比。議用宣絡之法。

蘇葵 降香 鬱金

新絳 柏子仁

黃 痛則氣亂發熱。頭不痛。不渴飲。脈不浮。非外感也。暫

臨證指南醫案 卷八 諸痛 五

用金鈴散一劑

金鈴子 炒延胡 炒桃仁 桂圓

又 痛而重按少緩。是為絡虛。一則氣逆紊亂。但辛香破

氣忌進。宗仲景肝着之病。用金匱旋覆花湯法。

旋覆花 新絳 青葱管 桃仁

柏子霜 歸尾

注 婦 脈小澹久。因悒鬱腕痛。引及背脇。病入血絡。經年延

綿。更兼茹素數載。陽明虛餒。肩臂不舉。倉卒難於奏效。是緩調為宜。議通血絡。潤補勿投燥熱劫液。

歸類 柏子仁 桂枝木 桃仁

生鹿角 片薑黃

朱 頭顛至足。麻木刺痛。熱熾 滋腎丸

張 初受寒濕。久則化熱。深入陰分。必暮夜痛甚。醫用和

血驅風。焉能直入陰分。議東垣滋腎丸。搜其深藏伏邪。

肉桂 人錢忌 黃柏 四兩 知母 四兩 俱鹽水炒水泛丸

王 脈數而細。忽痛必熱。且痛來迅速。思五行六氣之

流行。最速莫如火。風高年脂液久耗。人身之氣必左升

右降。相火寄於肝。龍火起於腎。並從陰發。越本乎根蒂

先虧內之藏納之職。司矣。每日服東垣滋腎丸三錢。秋

石湯送。以瀉陰中伏熱。

臨證指南醫案 卷八 諸痛 五

許 痛為脈絡中氣血不和。醫當分經別絡。肝腎下病。必

留連及奇經八脈。不知此旨。宜乎無功。

鹿角霜 桑寄生 杞子 當歸

沙苑 白薇 川石斛 生杜仲

范 病後精采未復。多言傷氣。行走動筋。謂之勞復。當與

甘溫和養氣血。下焦痛。肝腎素虛也。

人參 小茴香并炒當歸 沙苑蒸熟

茯神 炒杞子 菊花炭

經云。諸痛痒。皆屬於心。夫心主君火。自當從熱而論。然此乃但言癢耳。若湯科之。或瀉或瀉。則有陰有

陽不可但執熱而論矣。又如舉痛論中所言十四條。惟熱留小腸一條。則主乎熱。餘皆主乎寒。客故諸痛之症。大凡因於寒者十之七八。因於熱者不過十之二三而已。如欲辨其寒熱。但審其痛處。或喜寒惡熱。或喜熱惡寒。斯可得其情矣。至於氣血虛實之治。古人總以一通字立法。已屬盡善。此通字勿誤認爲攻。下通利講解。所謂通其氣血。則不痛是也。然必辨其在氣分與血分之殊。在氣分者。但行其氣。不必病輕藥重。攻動其血。在血分者。則必兼乎氣治。所謂氣行則血隨之是也。若症之實者。氣滯血凝。通其氣而散

臨證指南醫案 卷八 諸痛

其血則愈。症之虛者。氣緩不能充運。血衰不能滋榮。治當養氣補血。而兼寓通於補。此乃概言其大綱耳。若夫諸痛之症。頭緒甚繁。內因七情之傷。必先臟腑。而後達於肌軀。外因六氣之感。必先肌軀。而後入於臟腑。此必然之理也。在內者。考內景圖。在外者。觀經絡圖。其十二經游行之部位。手之三陰。從臍走手。手之三陽。從手走頭。足之三陽。從頭走足。足之三陰。從足走腹。凡調治立方。必加引經之藥。或再佐以外治之法。如針灸砭刺。或敷貼熨洗。或按摩導引。則尤易奏功。此外更有跌打閃挫。陰疽內疔。積聚癥瘕。蛇蟻

疝痺痧脹中惡諸痛。須辨明證端。不可混治。今觀各門病證諸案。良法儘多。難以槩叙。若撮其大旨。則補瀉寒溫。准用辛潤。宜通。不用酸寒。飲瀉以留和。此已切中病情。然其獨得之奇。尤在乎治絡一法。蓋久痛必入於絡。絡中氣血虛實寒熱。稍有留邪。皆能致痛。此乃古人所未及詳言。而先生獨能剖析明辨者。以此垂訓後人。真不愧爲一代之明醫矣。華玉堂

臨證指南醫案 卷八 諸痛

耳

風溫止
某 溫邪上鬱耳聾右脹

薄荷 馬勃 桔梗 連翹

杏仁 通草

某二 先起咳嗽繼而耳聾脹痛延綿百日不愈此體質陰

虧觸入風溫未經清理外因傷及陰分少陽相火陡起

故入暮厥痛愈劇當先清降再議育陰

苦丁茶 鮮菊葉 金銀花 生菴豆皮

川貝母 鮮荷葉梗 益元散

臨證指南醫案

卷八 耳

五

某女 風溫發熱左耳後腫痛

乾荷葉 苦丁茶 馬勃 連翹

杏仁 黑梔皮

某三 壯年脈來小促數自春月風溫咳嗽繼以兩耳失聰

據述苦降滋陰不效是不明虛實經絡矣內經以春病

在頭膏梁之質厚味酒醴助上痰火固非治腎治肝可

效每晚臥時服茶調散一錢

又 鮮荷葉汁 羚羊角 石膏末 連翹

玄參 鮮菊葉 牛蒡子 牛服

又 照前方去牛蒡菊葉加鮮生地鮮銀花

葉 火風侵竅耳聾

連翹 薄荷 甘菊 淡黃芩

苦丁茶 黑山梔

顧二 暑邪竅閉耳失聰

鮮荷葉 鮮菊花葉 苦丁茶 夏枯草

蔓荊子 連翹 淡黃芩 黑山梔

某十 左耳聾痛舌白脈數體質陰虛挾受暑風上焦氣熱

宜用辛涼輕藥

鮮菊葉 苦丁茶 黑山梔 飛滑石

連翹 淡竹葉

臨證指南醫案

卷八 耳

五

某五 暑熱上鬱耳聾作脹咳嗽當清氣熱

杏仁 連翹殼 淡竹葉 川貝

白沙參 六一散

某 頭重耳聾脹目微赤少陽相火上鬱以辛涼清解止

焦

連翹 羚羊角 薄荷梗 丹皮

牛蒡子 桑葉

某 風木之鬱耳脹欲閉

連翹 羚羊角 薄荷梗 苦丁茶

夏枯草花 黑山梔皮 小生香附

倪三因大聲喊叫致右耳失聰想外屬驚氣內應肝胆胆脈絡耳震動其火風之威亦能鬱而阻竅治在少陽忌食腥濁

青蒿葉 青菊葉 薄荷梗 連翹

鮮荷葉汁 苦丁茶

汪耳聾咳嗽形體日瘦男子真陰未充虛陽易升乘竅書云胆絡脈附耳先議清少陽鬱熱以左耳為甚故也

桑葉 丹皮 連翹 黑山梔

青蒿汁 象貝母

丁腎開竅於耳心亦寄竅於耳心腎兩虧肝陽亢逆故

臨證指南醫案 卷八 耳 癸

陰精走泄陽不內依是以耳鳴時閉但病在心腎其原實由於鬱鬱則肝陽獨亢令胆火上炎清晨服丸藥以補心腎午服湯藥以清少陽以胆經亦絡於耳也

水煮熟地 四麥冬 龜版 牡蠣

白芍 北味 建蓮 磁石

茯神 沉香 辰砂 磁石

夏枯草 丹皮 生地 山梔

女貞子 赤苓 生甘草

姚三氣關耳鳴

鮮荷葉 杏仁 厚朴 廣皮

醫案

木通 連翹 苦丁茶 防己 金三下虛耳鳴失聰磁石六味去萸加川斛龜甲遠志

王腎竅開耳胆絡脈亦附於耳凡本虛失聰治在腎邪干竅閉治在胆乃定例也今年已六旬脈形細數是皆腎陰久虧肝陽內風上旋蒙竅五行有聲多動真氣火風然非苦寒直降可效填陰重鎮滋水制木佐以鹹味入陰酸以和陽藥理當如是議

熟地 龜版 鎖陽 牛膝 遠志 茯神 磁石 秋石 萸肉 五味

某八十耳聾乃理之常蓋老人雖健下元已怯是下虛

臨證指南醫案 卷八 耳 癸

上實清竅不主流暢惟固補下焦使陰火得以潛伏

磁石六味加龜甲五味遠志

腎開竅於耳心亦寄竅於耳胆絡脈附於耳體虛失聰治在心腎邪于竅閉治在胆經蓋耳為清空之竅

清陽交會流行之所一受風熱火鬱之邪與水衰火實腎虛氣厥者皆能失聰故先生治法不越乎通陽

鎮陰益腎補心清胆等法使清靜靈明之氣上走空

竅而聽斯聰矣如溫邪暑熱火風侵竅而為耳聾痛

脹者用連翹山梔薄荷竹葉滑石銀花輕可去實之

法輕清泄降為主如少陽相火上鬱耳聾時服者用

鮮荷葉法丁茶青菊茶夏枯草蔓荊子黑山梔羚羊
 角丹皮辛涼味薄之藥清少陽僻熱兼清氣熱為主
 如心腎兩虧肝陽亢逆與內風上旋蒙蔽而為耳鳴
 暴聾者用熟地磁石龜甲沉香一冬牛膝項陽秋石
 山萸白芍味厚質重之藥壯水制陽填陰鎮逆佐以
 酸味入陰鹹以和陽為主因症施治從虛從實宜如
 庖丁之導窾矣鄒時乘

臨證指南醫案

卷八

目

目

某風溫上鬱目赤脉左弦當用辛以散之

桑葉 夏枯草 連翹 草決明 赤芍

某二失血後復受燥熱左目赤痛當以辛涼清之

鮮荷葉 冬桑葉 生甘草 赤芍皮

菉豆皮 稽豆皮

鮑氏秋風化燥上焦受邪目赤珠痛

連翹 薄荷 黃芩 山梔

夏枯草 青菊葉 苦丁茶 桑皮

臨證指南醫案

卷八

目

席用淡滲漸安是暑入氣阻熱蒸濕鬱勿取大辛大苦

之開泄做清邪中上治法

冬桑葉 穀精草 望月砂 苡仁

川通草 菉豆皮 茯苓

顧四頭額悶脹目赤

羚羊角 夏枯草 草決明 山梔皮

連翹 生香附

滯戒飲濁減十四畧可加穀近日竟夕無寐目珠赤痛

陽升不交於陰無停妙香散

桑葉 丹皮 夏枯草 黑山梔

川貝	艾仁	陸 鬱勃氣火翳遮目睛。高年苦辛難進。	夏枯草	穀精草	草决明	望月砂	生香附	連翹	山梔皮	丹皮	某 頭面風腫。目起星。是氣中熱。	羚羊角	夏枯草	薄荷梗	穀精草	生香附	小生地	丹皮	望月砂	連翹	山梔	汪 脉左弦左目赤痛淚多。	桑葉	丹皮	草决明	小胡麻	夏枯草	穀精草	菘豆皮	黑稽豆皮	臨證指南醫案 卷八 目	汪 目痛偏左。翳膜紅絲。診脉左弦。由肝胆氣熱所致。	草决明	冬桑葉	夏枯草	小胡麻	丹皮	穀精草	某 肝火上鬱。目眶紅腫。	連翹	赤芍	菊花葉	黑梔皮	苦丁茶	夏枯草	江 脉數右大。鬱久熱生。目障心痛。	夏枯草花	小生香附	金石斛	半夏麴	茯苓	橘紅	某 八 目胞浮腫。不飢不運。
----	----	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	--------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----	----	-----	--------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-------------------	------	------	-----	-----	----	----	----------------

桑皮	五分	茯苓皮	三錢	大腹皮	一錢	廣皮	一錢	薑皮	五分	艾仁	一錢	通草	一錢	王 高年目暗已久。血絡空虛。氣熱乘其空隙。攻觸脉絡。液盡而痛。當夜而甚。乃熱氣由陰而上。想外科川酒調末藥。必係溫散攻堅。因此而痛。虛症可知。	羚羊角	連翹心	夏枯草	青菊葉	全當歸	川桂枝	丹皮	葉 微寒汗大。出下有痔漏。左眼眶疼痛。此陰傷火鬱。不可作時邪泛治。六味去更加芍。蔓荊子。丹皮重用。	某 三 右目多淚。皆眼心嘈雜。陽明空虛。肝陽上擾。使然。當	臨證指南醫案 卷八 目	調補肝胃	嫩黃芪	三錢	當歸	一錢	白芍	一錢	茯神	三錢	煨薑	一錢	南棗	一錢	祝 四 當夏形懶。不耐大氣。發泄入冬。兩目無光。精氣無收。藏。凡五臟精華。皆聚於目。失藏失聚。內乏生真。不獨一臟之損。常用養營湯。	某 六 脉清細。左目痛。淚熱翳膜。此肝陰內虧。厥陽上越所致。	冬桑葉	一錢	炒枸杞	一錢	小胡麻	一錢	望月砂	一錢	製首烏	三錢	石决明	一錢	黃菊花	一錢	稽豆皮	三錢
----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	-------------------------------	-------------	------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	--------------------------------	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

某六 目痛無光

製首烏^{六兩} 枸杞子^{二兩} 柏子仁^{一兩} 細生地^{二兩}

石決明^{四兩} 小胡麻^{三兩} 望月砂^{三兩} 刺蒺藜^{二兩}

冬桑葉^{牛一兩} 黃菊花^{一兩} 用楮豆皮八兩穀精珠^{二兩}

兩煎濃汁泛丸每服五錢開水送

某 皆脹目昏心中嘈雜當治肝腎

熟地^{六兩} 枸杞子^{三兩} 桑椹子^{二兩} 沙苑^{二兩}

石決明^{二兩} 茯神^{二兩} 女貞子^{一兩} 青鹽^{一兩}

黃菊花^{一兩} 川斛^{四兩} 加蜜丸早上開水送四錢

某三 脉滿背痛右目常風淚多當治肝腎

臨證指南醫案 卷八 目

製首烏 枸杞子 炒歸身 桑椹子

沙苑子 茯神

某五 遺止心嘈目淚仍是陽氣過動當填陰和陽

熟地 杞子 天冬 萸肉 五味

生地 茯苓 菊花 山藥 蜜丸

某 瞳神散大左偏頭痛先損左目是焦煩鬱勃陽升化

風劫傷血液使然法當兼補肝腎

熟地 枸杞子 山萸肉 五味 茯神

菊花 生神麩 穀精草 山藥

脈利一症古有五輪八廓七十二問之辨傅氏又分

為一百零八症因名目太多徒滋惑亂至於見症楊

仁齋已備論具載景岳但陰陽虛實寒熱標本施治

不可紊亂經云五臟六腑之精華皆上注於目又云

目者肝之竅也肝與胆為表裏肝液胆汁充足目乃

能遠視故無論外感與內症皆與肝胆有關係焉夫

六淫之邪惟風火燥居多兼寒兼濕者亦間有內起

之症肝則心腎為多他臟亦間有之若夫論治則外

感之症必有頭痛寒熱鼻塞筋骨痠疼脉見緊數或

浮洪一切表症方可清散至於內因之症有虛實之

殊實者肝胆之風熱盛也凡暴赤腫痛脹悶難開翳

臨證指南醫案 卷八 目

膜眵淚酸滿作痒斑翳入睛皆實症也當除風散熱

虛者腎經之水火衰也凡久痛昏暗青盲雀目內障

昏朦五色花翳迎風淚出皆虛候也治宜壯水益火

若陰血雖虧而風熱未盡則當審其緩急相參而治

若久服寒涼虛陽轉盛則當補以甘溫從乎反佐至

於紅色淺淡而紫者為虛熱鮮澤而赤者為實熱瞳

神內湧白睛帶赤者為熱症瞳神青綠白睛枯槁者

為寒症腫脹紅赤眼珠刺痛夜則尤甚目不能開而

視物猶見者為邪火熾盛若白翳遮睛珠不甚痛或

全不痛目仍能開而視物不見者為真火不足當細

察其形症色脉因症而用藥。此內治之大法也。若日久失調。致氣血凝滯。火熱壅結。而為赤腫腐爛。翳膜遮蔽。致成外障。譬之鏡受污垢。必當濯磨。須用點藥。若但服藥。必不能愈。至於內障之症。但宜服藥。倘用點藥。徒傷其氣血。必無益而有損。更當知目眇白珠。屬陽。故晝痛。點苦寒藥則可效。瞳子黑睛屬陰。故夜痛。點苦寒藥則反劇。是外治之法。亦當以陰陽區別也。若夫偏正頭風。屬氣虛痛者。朝重暮輕。血虛痛者。朝輕暮重。亦有外感內因之別。此症當以補養正氣為主。畧兼治表。倘槩以風熱而論。專於表散。最易損

臨證指南醫案

卷八 目

五

目更有肝陰虧耗。木火上炎。頭痛惡心。眉稜骨痛。不欲飲食。眼胞紅腫。睛珠刺痛。眵淚如膿。白睛如翳。目珠上竄不下。不得寤寐。甚則顛頂腦後。如破如裂。此內發之風也。夫肝屬木。木主風。熱盛化風。其體必本陰虧。男子或有遺精白濁。腸風痔漏下血等疾。女子或犯淋帶崩漏諸症。此係陰傷陽升。內風沸起。大忌發散。宜用育陰熄風。柔肝滋腎等法。或可救十中之四五。凡羌活防風川芎細辛桑本升麻等藥。皆不可用。倘或失治。必致膏傷低陷。青黃膠出。致成痼疾。而不可救。專是科者。不可不留意焉。葉先生雖非眼目

專科。觀其案內諸法。其補前賢之未備。較之慣用苦寒升散。及槩用點藥者。不啻如霄壤之殊矣。學者當細心而參玩之。丁聖彥

臨證指南醫案

卷八 目

六

鼻

清初醫
久肺氣
至

鮑二兩三年鼻塞不聞涕涕由口哈出而氣窒仍然大凡

頭面諸竅皆清陽交會通行之所就外邪來乘亦必霧

露無質清邪邪鬱既久氣血失其流暢進藥攻治必不

效驗欲治其病須查手太陰自少商穴起施針刺以泄

邪流氣乃一法也無方

徐四頭面諸竅皆清陽遊行之所邪處於中則為堵塞陽

氣不司流行必畏寒形顏內痺必鬱而成熟有鼻柱航

軋矣論理當用通聖散遠處江外倉猝就診不可輕投

臨證指南醫案 卷八 鼻

用輕可去實

苦丁茶 乾荷葉邊 夏荆子 連翹心

飛滑石 白芷

毛四熱蓬肺氣失降鼻柱空痺

知母 水梨肉 川貝母 水熬膏

楊 鹹降滋填鼻淵止得寐用虎潛法減當歸陳皮加天

冬淡菜膠脊筋丸

沈氏 素有痰火氣逆春令地中陽升木火化風上引巔頂

腦熱由清發以泄越耳鳴鼻淵甚於左者春應肝胆氣

火自左而升也宜清熱散鬱辛涼達於頭而主治

羚羊角 黑山梔 苦丁茶 青菊葉

飛滑石 夏枯草花

又 照方去滑石加乾荷葉生石膏

又 性情躁急陽動太過氣火上升鬱於隱竅由春深病

加失其條達之性經言春氣病在頭也考五行六氣迅

速變化莫若火風腦熱暗泄而為鼻淵隧道失和結成

癭核夫東垣升陽散火丹溪總治諸鬱咸取苦辛為法

然藥乃片時之效欲得久安以怡悅心志為要目耳

連翹心 土貝母 海藻 昆布

黑山梔 川芎 小生香附 鬱金

臨證指南醫案 卷八 鼻

羚羊角 夏枯草 乾荷葉邊

生研木青菊葉汁法丸苦丁茶煎湯送二錢五分

汪 形瘦尖長稟乎木火陰精不足腦髓不固鼻淵淋下

竝不腥穢暖天稍止遇冷更甚其為虛證顯然明白醫

者愈以風寒中腦主治發散滲泄愈耗正氣豈但欲愈

勞怯是憂用天真丸

人參 黃芪 白朮 山藥

菴蓉 當歸 天冬 羊肉

經云肺和則鼻能知香臭矣又云胆移熱於腦令人

辛頰鼻淵傳為翳障瞋目是知初感風寒久而久則

化熱熱鬱則氣痺而塞矣。治法利於開上宜鬱如蒼耳散防風通聖散川芎茶調散菊花茶調散等類。先生則佐以荷葉邊苦丁茶蔓荊連翹之屬以治之。此外感宜辛散也。內熱宜清涼者。如膈熱鼻淵用羚羊山梔石膏滑石夏枯草青菊葉苦丁茶等類。苦辛涼散鬱之法也。久則當用酸降滋填。如虎潛戒辛再加鎮攝之品。其有精氣不足。腦髓不固。淋下無腥穢之氣者。此勞怯根萌。以天真丸主之。此就案中大概而言。之也。然症候錯雜。再當考前賢之法而治之。華玉堂

臨證指南醫案

卷八

牙

牙

某 陰虧體質。溫氣上蒸。齒痛連及頭顱。用玉女煎。

某 火鬱顛頂。屬厥陰。上結核。齧腫。

犀角 羚羊角 玄參 知母 生甘草

連翹 黑山梔 銀花 夏枯草

王四 酒客牙宣。動血痰血。形寒內熱。食少陰藥。湯味姑緩。

小黑豆皮 人中白 旱蓮草 川斛

左牡蠣 澤瀉

徐 一脈細數。上出體屬陰虛。內熱牙痛。後頰車穴閉。口不能張。其病在絡。藥餌難效。擬進宜通絡痺方。

臨證指南醫案

卷八

牙

能張。其病在絡。藥餌難效。擬進宜通絡痺方。

羚羊角 薑蚕 川桂枝尖 煨明天麻

炒丹皮 黑山梔 鉤藤

汪 風熱上蒸。眼脹頭痛。當用輕清上焦。

活水蘆根 罔圖滑石 西瓜翠衣 生菜豆皮

連翹 銀花

牙症不外乎風火虫虛。此但言其痛也。其他如牙宣。

牙癢。牙齦牙疳。牙疔穿牙。毒骨槽風。走馬牙疳之類。

皆由於濕火熱毒。蘊結牙床。洩分上下二齒。辨明手。

足陽明及少陰之異。又當察其專科而任之。華玉堂

咽喉

陸 風火上鬱項腫咽痛

薄荷

連翹

射干

牛蒡子

馬勃

菘豆皮

邵 風火上鬱咽痛頭脹宜用辛涼

西瓜翠衣

滑石

連翹

桑皮

射干

杏仁

汪三 左脉弦數咽痛腕悶陰虛體質不耐辛溫當以輕藥

暫清上焦

臨證指南醫案

卷八 咽喉

桑葉

生菘豆皮

白沙參

川貝

玄參

川斛

王二 勞傷恐有痰腐進辛潤宜血初服身痛繼漸平復但

喉間緊痺而呼吸飲食仍不覺其苦服白仍帶黃議清

肺中氣熱治

百部

大沙參

鮮枇杷葉

活木蘆根

川貝

地骨皮

南花粉

杏仁

徐六 老勞咽疼

生雞子白

糯稻根鬚

水洗

甜北沙參

炒麥冬

川石斛

生甘草

楊

未病陰氣走洩為虛穢海上受則實咽喉腫痺上聚

邪蒙日暮昏煩陰傷日熾肌膚柔白氣分不足此醫藥

連翹

鬱金

馬勃

牛蒡子

竹葉心

黑山梔

杏仁

橘紅

艾

上焦之病都是氣分氣窒則上下不通而中宮遂脹

熱氣蒸灼喉舌疳蝕清氣之中必佐解毒甘苦受重藥之

累瘥

銀花二錢

川貝三錢

馬兜鈴五分

連翹心一分

川通草錢

白金汁一

活木蘆根汁

臨證指南醫案 卷八 咽喉

又 餘熱蒸痰壅氣當腕膈因咳而痛議以潤降清肅

甜杏仁 花粉 川貝 甘草 桔梗

孫九 腎液不收肝陽上越崩脹流涕咽喉微痛

六味加牛膝車前五味

五 咽喉痛痺發時如有物阻膈甚至痛連心下每晚加

劇是陰液日枯肝臟厥陽化火風上灼法以柔劑做甘

以緩其急耳

細生地

天冬

阿膠

生雞子黃

陳七 陰陽交虛營衛敵射為忽冷忽熱周身骸骨皆痛日

脉皆損。秋半天氣已降，身中氣反泄越，汗出喉痺，陽不入於陰，致自爲動搏耳。夫咽喉之患，久則喉痺喉宜妨，阻受納，最不易治。從少陰咽痛例，用猪膚湯旬日，喉痛得緩，對症轉方。

張三陰損三年不復，入夏咽痛拒納寒涼清咽，反加泄瀉，則知龍相上騰，若電光火灼，雖傾盆暴雨，不能撲滅，必身中陰陽協和方息，此草木無情難效耳。從仲景少陰咽痛用猪膚湯上之。

又陰潤於下，陽熾於上，爲少陰喉痛，乃損怯之末傳，用猪膚甘涼益坎有情之屬而效。今肉糜消糜殆盡，可

臨證指南醫案

卷八

咽喉

五

焦易冷，髓空極矣，何暇以痰嗽爲理，議滑脂之補味，既以腎可也。

牛骨髓

羊骨髓

猪骨髓

鹿角膠

用建蓮肉五兩

山藥五兩

芡實二兩

同搗丸

全臟液不充，陽氣虛風鼓動，病起喉辣，心震頭顫，多因勞怒用內經甘緩一法。

人參

萸肉炭

白芍

炙甘草

茯神

小麥

又復脉湯去桂

內經云：一陰一陽結，謂之喉痺。一陰者，手少陰君火

心之脉氣也。一陽者，手少陽相火三焦之脉氣也。夫二經之脉并絡於喉，故氣熱則內結，結甚則腫脹，甚則痺痺，痺甚則不通而死矣。印今之所謂喉痺喉風喉蛾等類是也。夫推原十二經，惟足太陽別下項，其餘皆痰咽喉，然內經獨言一陰一陽結爲喉痺者，何也？蓋以君相二火獨勝則熱且痛也。愚歷攻咽喉湯方，皆用辛散酸軟去風痰，解熱滋爲主，如玄參升麻湯、聖濟透關散及玉鑰匙，如聖散普濟消毒飲子，皆

急於治標而緩於治本，恐緩則傷人，故以治標爲急耳。又嘗考仲景傷寒論咽喉生瘡等症，每用甘草桔

臨證指南醫案

卷八

咽喉

五

梗半夏散及湯爲主，一爲少陰水虧不能上濟君火，以致咽喉生瘡不能出聲，故以半夏之辛滑，佐雞子

清利，竅通聲使以苦酒入陰，劫涎飲瘡，桂枝解肌，由

經脉而出肌表，悉從太陽開發，而半夏治咽痛可無

燥津涸液之患，一爲陰火上結而爲咽痛，故用生甘

草甘涼泄熱，功在緩腎急而救陰液，佐以桔梗開提

足少陰之熱邪，如腎液下泄不能上蒸於肺，致絡燥

而爲咽痛者，仲景又有猪膚一法，潤燥解熱緩中，使

其陰陽協和而後愈，是固本而兼治標者也。如風火

上鬱陰虧脉數而爲咽痛者，先生又有辛涼清上諸

法如咽喉緊痺氣熱而為咽痛者又有清肺中氣熱
 一法如情志鬱勃相火上炎而為咽痛者則又有降
 氣開濁一法如腎液不收肝陽上越而為咽痛者宗
 錢氏六味湯如陰陽交虛龍相上灼而為咽痛者宗
 仲景猪膚湯法 鄭澤九

臨證指南醫案 卷八 咽喉

七

瘡瘍

楊九瘡瘻四肢偏多長夏入秋懶倦欲眠乾咳無痰頗知
 味所納已少此陽明胃陰因熱致耗即熱傷元氣之徵
 當與甘藥養胃陰以供肺如金匱麥門冬湯去半夏加
 黃芪皮

吳八脈不浮大非關外風初起右掌二指已不屈伸頭面
 身牛以上常有瘡炮之形此乃陽明脈絡內留濕熱若
 非瀉氣吸入定然食物中毒姑與宜解緩攻

連翹 犀角 赤芍 酒煨大黃

臨證指南醫案 卷八 瘡瘍

夫

荆芥 片薑黃

又 能食二便通調臟腑無病初因膿瘡瘡愈有泡白面
 及肢體至於右指掌屈伸皆痛為脈絡留邪以致隧道
 為壅前方辛涼入血先升後降已得小效今製清脈絡
 壅熱藉酒力以引導通行管衛亦一法也

銀花 連翹 犀角 生大黃 荆芥
 丹皮 黃芩 川芎 當歸 澤蘭

羚羊角 大豆黃卷 用無灰酒十觔浸
 金匱血舍空際內風蠕動外以熱湯泡洗濕熱蒸襲肌竅
 遂有裂膿流末况周身漸加麻痺陽脈亦衰圖治之法

清營以熄內風疎利濕熱以肅隧道辛熱腥鮮勿進倘可緩以計功

製首烏 鮮生地 柏子仁 川斛 黑稻豆皮

虎骨 蚕沙 黃柏 苧薢 熬膏

吳 瘡痍之後濕熱未去壅阻隱道水穀下咽亦化爲痰

中焦受病故不知飢餓痰氣上干漸至喘悶矣但服藥

四十劑純是破氣消冠胃腸受傷痰氣愈不得去矣

牛夏 茯苓 紫老薑 炒粳米

又 瘡痍大發營衛行動於脉中脉外可免腹滿之累矣

第穀食尙未安適猶是苦少多進之故胃腸未復仍以

臨證指南醫案 卷八 瘡痍 完

通利濕主之

半夏 苡仁 金石斛 茯苓 澤瀉

素七十 久熱瘡痍五六年環口燥裂溺瀉莖痛

鮮生地 熟首烏 丹皮 丹參 芫蔚子

銀花 地丁 紫草 共熬膏

王 血熱風動膚癢

荆芥 防風 地膚子 赤芍 銀花

小生地 木通 甘草

張三初因嘔吐是肝胃不和致病故辛香燥燥愈劇然久

病必入血絡熱則久瘡不愈矣夫木火皆令燥液易飢

身飽間有嘔逆斯胃病仍在凡呆滯藥冰皆非對症

三角胡麻 冬桑葉 生首烏 杏仁 鬱金

佩蘭葉 茯苓 苡仁 熬自然膏

楊五身瘦久瘡血分有熱精通之年最宜安養脉象非有

病

生首烏 三角胡麻 細生地

地骨皮 金銀花 丹皮 生白芍

生甘草 蜜丸早服

王九脉來濡浮久瘡變幻未罷是衛陽疎豁不耐寒暄初

受客邪不解混處氣血浸淫僅在陽分肌腠之患議升

臨證指南醫案 卷八 瘡痍 全

舉一法氣壯斯風濕盡驅

人參 生黃芪 川芎 當歸 防風

蠶蚕 蟬脫 炙草 生薑 大棗

蔣四鼻瘡口瘡尿黃膚熱

冬瓜皮 苡仁

鄒三痰因於濕久而變熱瘳於經隧變現瘡疥癰已醜

風濕之毒混在氣血之中邪正混處搜逐難捷四肢爲

甚姑從陽明升降法

連翹 赤芍 白殭蚕 白鮮皮

防風 升麻 滑石 酒浸大黃

汪氏 風熱既久未解化成瘡痍當以和血驅風

當歸 赤芍 川芎 夏枯草花

牛蒡子 製殭蚕

金 頭顛熱癩未能泄邪此身熱皆成膿之象辛涼兼理

氣血可愈

連翹 犀角 銀花 丹皮

玄參 生甘草 青菊葉

某 風熱毒閉項後腫

竹葉 滑石 蘆根 牛蒡 馬勃

薄荷葉 黑山梔 連翹 川貝 生甘草

臨證指南醫案 卷八 瘡毒 全

王 疔毒咯血失血都是暑入陰傷

竹葉心 玄參心 鮮生地 黑糯米皮

麥冬 知母

屠三 秋痢半年未愈瘰癧堅硬痛癢屢醫久成熱疔經病可

冀其愈

夏枯草 香附 茯苓 苡仁

川貝 丹皮

糜氏 頸項結核腹膨足腫肝木犯中痰氣凝滯

夏枯草 牡蠣 澤瀉 茯苓

半夏 厚朴 橘紅 神麩

生香附一兩水磨汁泛丸

某 氣鬱痰核

夏枯草 生香附 丹皮 山梔

連翹 鬱金 赤芍 橘紅

王四 脈左數右長頸項結癭時翹

生地 丹皮 犀角 生夏枯草

生鈎藤 黑山梔 土貝母 生薄荷

陳 躁急善怒氣火結癭癭筋為痛熱鬱化風氣阻連塞

則腹鳴脫脹苟非開懷歡暢不能向安

土貝母 山梔 瓜蒌皮 鬱金

臨證指南醫案 卷八 瘡毒 全

白芥子 海藻 昆布 夏枯草

沈氏 肝氣鬱遏宿痞乳癭

川棟子 夏枯草 薄荷梗 丹皮

黑山梔 瓜蒌實 青橘葉 香附汁

劉氏 乳房為少陽脈絡經行之所此經氣血皆少由情懷

失暢而氣血鬱滯有形而痛當治在絡恐年歲日加竟

成沉痾非癭膜之症以脈不浮數無寒熱辨之

柴胡 夏枯草 歸身 白芍

川貝 茯苓 甘草

某氏 乳房結核是少陽之結此經絡氣血皆薄攻之非易

恐並育有年。酸為癆症耳。

青蒿 香附 橘葉 青菊葉

丹皮 澤蘭 鬱金 當歸類

孫 因噴忿失血以來。致頸項左右筋腫。痛連背部。此屬

鬱傷氣血。經脈流行失司。已經百日不痊。竟有流注潰

膿延綿之憂。治在少陽陽明。

小生香附 夏枯草 鮮菊葉 薄荷梗

黑山梔 鈎藤 丹皮 鬱金

陳 脈左數實。血絡有熱。暑風濕氣外加。遂發疹塊。壅腫

搔癢。是屬暑癆。

臨證指南醫案 卷八 癆癆 全

杏仁 連翹 滑石 寒水石

銀花 晚蚕沙 黃柏 防已

程 癆毒熱症。與參芪不效。即當清解為是。消導亦是未

合。今者身熱正。肺神識欲昏。便溏溺赤。煩渴。是暑氣攻

入內。侵脾胃。有癰厥之變。昨用宣肺解毒。雖與暑邪無

益。然亦無害。若加黃芪。又屬相反。大凡熱氣蒙閉。清竅

都令神昏。當以牛黃清心丸。清痰氣之阻。使其竅開。况

暑門中大有是法。與解毒勿怪矣。

李 初病濕熱在經。久則癉熱入絡。膿瘍日多。未已。漸至

筋骨熱痛。金匱云。經熱則痺。絡熱則痲。數年宿病。勿事

速攻

犀角 連翹心 玄參 丹參 野赤豆皮

細生地 薑黃 桑枝 午服 夜服 痰癆丸

某 三瘡癆服涼藥。陽傷氣阻。腕悶不運。腹膨最。怕癆毒內

閉。急宜通陽。

厚朴 廣皮 薑皮 茯苓皮

連皮杏仁 桂枝木 澤瀉 大腹皮

某 服癆科寒燥之藥。以致氣冲作脹。喘急不卧。無非濁

陰上攻。議來復丹。

顧 脈微小。潰瘍半月餘。腫未消。膿水清稀。浮腫汗出。嘔

臨證指南醫案 卷八 癆癆 全

惡惡食。此胃陽垂敗。癉毒內攻。欲脫。夫陽失煦。則陰液

不承。元氣撤。則毒愈瀰漫。清解苦寒。究竟斲伐。生陽議

甘溫胃受。培植其本。冀附者復振。余非癆醫。按色脈以

推其理耳。加桂理中湯。

姚 癉癆久不。腐氣血耗盡。中宮營液枯涸。氣不旋轉。得

湯飲。則痰涎上湧。勢如噴。膈况久恙。若是藥餌難挽。勉

擬方

人參 炒麥冬 代赭石 化橘紅

胡 納食主胃。運化主脾。癉癆痛潰。臥床不得。舒展臍膈

氣機呆鈍。何疑。外科守定成方。其未歸地。不能補托氣

血反壅滯於裏出納之權交失且是症乃水穀滯氣下
垂而致結於足厥陰手陽明之界若濕熱不為盡驅藉
補托以冀生機養賊胎害焉能濟事

金石斛錢五 槐米錢一 金銀花錢三 茯苓錢一
晚蚕沙錢二 寒水石錢二

徐 營傷心辣納食無味此瘍痛大虛當調其中

人參 歸身 炒白芍 木瓜

熟木 廣皮 茯神 炙草

某 膿血去多痛猶未息胃傷不嗜穀口無味左關尺細
弱無力正虛之著據理進藥仍宜補托

臨證指南醫案 卷八 瘡瘍 全

人參 熟地 玉竹 柏子仁 歸身

丹參 茯神 棗仁 遠志

某 瘍潰膿血去多元真大耗脈無力不嗜食惡心中州
不振寐則驚惕神不守也以養營法

人參 熟木 廣皮 茯神 炙草

歸身 白芍 五味 棗仁

某 八 瘍損能食身熱六味湯加青蒿節

曹三 因瘍漏過進寒涼遂患腰痛牽引脊脊今晨起周身
不得自如乃經脈絡脈之中氣血流行失暢久病非
攻逐議兩和方

羚羊角 當歸 黃芪 白茯苓

桂枝 桑枝

顧 清瘍不合成漏脂液滲去必腸絡空隙內風暗動攻
胃則嘔逆吞酸腹痛泄瀉不食津液不升舌焦黑不渴

飲內外兼病難治之症

人參錢一 炒烏梅肉分五 炒黑川椒分三 茯苓錢三

生淡薑分五 炒廣皮錢一 白芍錢一

顧 久損漏瘍胃減腹痛議用戊己湯意

人參 茯神 白芍 炙草 炒菟絲子

王 痛久屈伸不得自如經脈絡脈呆鈍氣掉血瘀鬱蒸

臨證指南醫案 卷八 瘡瘍 全

上熱旬日頻頻大便必有血下復喘促煩躁不飢不食

並無寒熱汗出全是銅結在裏欲作內癰之象部位腫

左之上內應乎癰癰者壅也血結必入於絡吐痰口氣
皆臭內癰已見一斑矣

炒桃仁 新絳 降香末 野鬱金汁

紫苑 冬瓜子 金銀花

某 臍旁紫黑先厥後熱少腹痛如刀割二便皆瀉兩足
筋縮有腸癰之慮

老韭白 兩頭尖 小茴香 當歸鬚 炙山甲

某 舌焦黃小腹堅滿小便不利兩足皆按濕熱結聚六

崩不通。有腸瘕之慮。

川棟子 小茴 丹皮 山梔

通草 青葱

某壯熱旬日。周身筋脉牽掣。少腹堅硬。小便淋瀝。忽冷忽熱。欲釀膿血。乃腸瘕為病。倣孫真人牡丹皮大黃湯主之。

戴九痔瘡下血。濕熱居多。今色衰微。顯是虛寒。無速效法。則當補脾胃。因痔瘡猶痛。腫勢尙存。佐以淡滲通腑。

生於朮 生菟絲粉 生象牙末 生白蠟

外症本有專科。先生並非瘍醫。然觀其理立方已

臨證指南醫案

卷八 瘡瘍

全

勝專科什伯矣。惜其案無多。法亦未備。余不敘述大凡。瘍症雖發於表。而病根則在於裏。能明陰陽虛實寒熱。經絡俞穴。大症化小。小症化無。善於消散者。此為上工。其次能審明五善七惡。循理用藥。其刀鍼砭割手法靈活。敷貼薰洗。悉遵古方。雖潰易斂。此為中工。更有不察症之陰陽虛實。及因鬱則營衛不和。致氣血凝滯。釀成瘍症。但知概用苦寒攻逐。名為清火消毒。實則敗胃成生。迨至胃氣一敗。則變症蜂起矣。又有藉稱以毒攻毒秘方。類聚毒藥。合就丹丸。隨症亂投。希冀取效。于日前。不顧貽禍於後。日及問其理。

絡部位症之順逆。概屬茫然。此殆下工之不如也。至於外治之法。瘍科尤當究心。若其人好學深思。博覽廣記。隨在留心。一有所聞。卽筆之於書。更能博覽醫籍。搜採古法。海上實有單方家。傳豈無神祕。其所製敷貼膏丹。俱臨症歷試。百治百驗。能隨手應效者。卽上工過之。亦當為之遜一籌矣。華玉堂

臨證指南醫案

卷九

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

熱入血室

臨證指南醫案

卷九



臨證指南醫案卷九

濟關李大瞻贈

古吳葉桂天士先生著 錫山華南山岫雲全較

姓旦玉堂

調經

張九經先期色變膚勝刺痛無定所晨泄不爽利從來不

生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而

脈絡間亦致間斷家種例以通劑

臨證指南醫案 卷九 調經

茯苓 生香附 南山查 益母膏丸

姚二久嗽背寒晨汗石卧咳甚經事日遲脈如數而虛

減不欲食此情志鬱傷延成損怯非清寒肺藥所宜

黃芪 桂枝 白芍 炙草

南棗 飴糖

肺為氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則

咳嗽此則久嗽背寒晨汗全是肺氣受傷而經事日

遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脈數虛火

也虛則不可以清寒况穀減不欲食中氣之餒已甚

可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣

後期 肺氣 虛

秘 血 滯

肝化胃

而桂枝白芍非飲陰和血之妙品乎

秦一氣衝心痛嘔涎氣墜小腹為瀉經來後期其色或淡

或紫病在衝脈從厥陰陽明兩治

川連 小茴 川棟子 歸尾

炒牛夏 茯苓 桂枝 橘紅

得身汗

華三鬱傷肝脾是因懷抱不暢致氣血不和逍遙散減白

木加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經來

日遲鬱痺宜通而氣弱不主統血况春深泄氣之候必

佐益氣之屬方為合法 歸脾湯

又 向有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒少

臨證指南醫案 卷九 調經

腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此皆

肝木拂逆甚則為厥夫肝臟相火內寄病來迅速皆動

極之徵為肝用太過宜制其用前此芪朮守補不可用

矣 安胃理中丸去黃柏細辛

錢 脈清腕悶減食經水來遲腹痛墜

柴胡 炒白芍 黃芩 鬱金

香附 茯苓 蘇梗 神麴

又 諸恙未減腹但痛不墜 逍遙散去白朮甘草加鬱

金香附神麴

許八經閉寒熱便溏腹痛 加味道遙散去山梔

其 血虛內熱經不至 加味道遙散去朮

某 經遲腹痛風疹絡血不寧久鬱成熱法當通利

涼膈去芒硝加丹皮赤芍

奇脈虛

孫九奇脈下損經遲腹痛先用當歸建中湯續商八脈治

法 歸建中湯

又 久嗽遇勞寒熱 歸建中去薑

謝三能食不運痰泄經事愆期少腹中乾澀而痛下焦麻

痺衝心嘔逆腹鳴心棘八脈奇經交病

人參 茯苓 艾葉 製香附

淡菴蓉 炙骨脂 肉桂 當歸

臨證指南醫案 卷九 調經

鹿角霜 小茴香 紫石英 益母膏丸

王三脈右緩左瀉經水色淡後期嘔吐痰水食物畢姻三

載餘不孕此久鬱疑痰滯氣務宜宣通從陽明厥陰立

方

牛夏 廣皮 茯苓 厚朴 茅朮

淡吳萸 小香附 山查肉 薑汁法丸

又 三月中用辛溫宣鬱方痰痰自下胸次寬嘔逆緩今

喜暖食惡寒經遲至五十餘日來必色淡且少議用溫

養衝任栽培生氣方法 八珍去木草地加小茴肉桂

斷艾香附紫石英河車膠丸

肝腎虛

朱二經水一月兩至。或幾月不來。五年來並不孕育。下焦肢體常冷。是衝任脈損。無有貯蓄。煖益腎肝主之。

人參 河車膠 熟地 歸身 白芍

川芎 香附 茯神 肉桂 艾炭

小茴 紫石英 益母膏丸

衝脈肝

程七十三。年不孕育。其中幻病非一。病人述經期遲至。來期預先三日。周身筋骨脈絡牽掣痠楚。不得舒展。凡女

入月水。諸絡之血。必彙集血海而下。血海者。即衝脈也。男子藏精。女子繫胞。不孕經不調。衝脈病也。腹為陰。陰

虛生熱。肢背為陽。陽虛生寒。究竟全是產後不復之虛。臨證指南醫案 卷九 調經 四

臨證指南醫案 卷九 調經 四

損。或見病治病之悞。有終身不育。淹淹之累。肝血陰虛。木火內寄。古人溫養下焦。必佐涼肝堅陰。勿執經後期

為氣滯。亂投破氣。剛藥劫陰。河車膠 生地 枸杞 沙苑 生杜仲

白薇 山查 黃柏 白花益母草

朱 經云。陽維為病。苦寒熱。緣上年冰雪甚少。冬失其藏。春牛潮濕。地氣升泄。以肝腎血液久虧之質。春生力淺。

八脈隸乎肝腎。一身絛維。八脈之束固之司。陰弱內熱。陽微外寒矣。脊脊常痛。經事愆期。血海漸涸。久延虛怯。

情景已露。局方道遙散。固女科聖藥。大意重在肝脾二

虛

經。因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。佐柴胡微升。以引少陽生氣。上中二焦之鬱。勃可使條暢。今則入暮病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脈不為約束。故熱無汗。至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當宗仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。

炙甘草 阿膠 細生地 生白芍

麥冬 牡蠣

某 陰虧內熱。經事愆期。

雄烏骨雞 小生地 阿膠 白芍 枸杞

天冬 茯苓 菟藟子 女貞子 桂圓

臨證指南醫案 卷九 調經 五

右十味用青高汁。童便醇酒熬膏。加蜜丸。

張四 寒熱間日。經來腹痛。

小生地 丹皮 知母 花粉

生鱉甲 澤蘭

某二 先腹痛而後經至。氣滯為多。晨泄腹鳴。亦脾胃之病。與下焦痰泄則異。

川芎 當歸 香附 煨廣木香

查肉 茯苓

某二 寒熱無汗。經先腹痛。喉中燥癢。咳逆食物不思。此鬱傷氣血。八脈主病。姑先與澤蘭湯。

歸身 澤蘭 丹參 白芍

柏子仁 茯神

周七室女經水不調先後非一來期必先腹痛較之平日為重飲食大減始於初夏入秋下焦常冷腹鳴忽瀉忽結究脉然色是居室易於鬱怒肝氣偏橫胃先受戕而奇經衝任嬌維諸脉皆并胃屬隸脉不循序流行氣血日加阻痺失治必結痲聚疹痞之累

南山查 生香附 延胡 當歸 青皮

三稜 蓬朮 牛膝 川棟子 澤蘭

肉桂 炒小茴 葱白汁丸

臨證指南醫案 卷九 調經

六

顧 經來筋掣腹痛常有心痛乾嘔此肝氣厥逆衝任皆病務在宣通氣血以調經溫燥忌用自可得效

川棟 一錢 丹皮 三錢 炒查 二錢 胡蓮 八分

延胡 一錢 澤蘭 二錢 歸身 一錢 生白芍 一錢

又 柏子仁丸

吳 鬱傷絡脉痛經

川芎 當歸 香附 小茴

烏藥 茯苓 紅棗

費 經水紫黑來時嘈雜脉絡收引而痛經過帶下不斷形瘦日減脉來右大左弱上部火升下焦冷徹骨中陰

陽乖違焉得孕育閱醫都以補血清劑宜乎鮮效議通陽攝陰法

鮑魚 生地 淡從蓉 天冬

當歸 柏子仁 炒山查 牛膝

茯苓 紅棗煎艾湯法丸

朱 脉數右肩痛經不調經來氣攻胸皆性燥氣分有熱

熱

細子芩 白芍 黑山梔 鈞藤 茯苓

當歸鬚 香附 羌蔚子 桑枝

李 酸滴入裏氣血呆鈍痛自心胸脹及少腹昔經行二

臨證指南醫案 卷九 調經

七

日今四日猶未已為凝滯所致痛脹何疑讀內經遺意以辛勝酸主治但辛氣最易入表當求其宣絡者宜之

韭白汁 桃仁 延胡 小茴

當歸鬚 川棟子

王三 苦辛泄降胸膈脹悶已舒此嗽血皆肝胆氣火上逆

必經來可安

南山查 桃仁 黑山梔 丹皮

橘葉 降香末 老韭白汁

朱 當節令呵欠煩倦秋深進食微有惡心病起至今月事不來夫衝任血海皆屬陽明主司見症胃弱此陰柔

賦滯當停以理胃腸為務

人參 牛夏麴 廣皮白 茯苓

生益智仁 煨薑

某 脉數形疲咳。經閉半年。已經食減便溏浮腫。無清嗽

通經之理。扶持中土望其加穀。四君子湯

某三 經閉兩月。腕痺嘔惡。此氣窒不宜胃腸得鈍使然。當

用和中為主。

牛夏麴 老蘇梗 茯苓 廣皮

枳殼 川斛

某 夏今寒熱。經阻。少腹痛脹。血結洞瀉不爽。乃內傷氣

臨證指南醫案 卷九 調經 八

血不和兼有時令濕邪

茯苓皮 大腹皮 生益智 厚朴

蓬莪朮 青皮子 炒研

又 服五劑後氣已畧平

葱白丸 用生蘆艾 紅棗 煎清湯送

某 脉數。經閉。腹脹足腫

茯苓皮 大腹皮 青皮 小香附

延胡 炒山查 羌蔚子 炒砂仁

頭 經停四月。腹滿尻髀足肢盡腫。食納脹悶不化。大便

溏瀉不實。女科認為胎氣。恐未必然。方書謂先經斷而

後腫脹者。治在血分

生白朮 厚朴 大腹皮 羌蔚子

椒目 小黑穉豆皮

傳 大凡痞滿在氣。燥實在血。腹脹。經水仍來。大便微溏。

固是氣分病也。下之。皆愈。氣得泄也。繼而腹脹。經水不

來。氣與血俱病也。病非輕渺。議中滿分消方法。

生於朮 猪苓 澤瀉 椒目

雞內金 青皮汁 厚朴

鄒十 腰已下腫。經閉四月。腹痛瀉不爽。議開大陽。導其氣

阻水濕。

臨證指南醫案 卷九 調經 九

牡蠣 澤瀉 猪苓 茯苓

生白朮 防己 厚朴 椒目

何 經阻腹滿。瀉後變痢。小温中丸

王三 居經三月。痞悶膨脹。無妊脉。發現。詢知勞碌致病。必

屬脾胃陽傷。中氣愈餒。衝脉之血貯注。洵有諸矣。

大腹皮 牛夏麴 老蘇梗 橘紅

炒山查 羌蔚子

又 經停腹滿便秘

郁李仁 冬葵子 柏子仁 當歸 鮮杜牛膝

王九 服阿魏丸。高突已平。痛未全止。經閉已有十餘月。腹

微膨全屬氣血凝滯若不經通病何以去。

川芎 當歸 延胡 桃仁 查肉

香附 青皮 牛膝 益母膏丸

石二入用必崩本諸厥皆厥陰心痛便燥氣痺血枯乃勞怒精志不遂起見。

枳仁 當歸鬚 炒延胡 生香附

芫蔚子 南山查

又辛潤氣藥病減血虛氣滯當以調經為要見病理病為非

桃仁 當歸 山查 芫蔚子

臨證指南醫案 卷九 調經

澤蘭 柏子仁

某二心下石形不飢經水滯少漸閉由氣滯漸至血結左右隱道不行大便堅秘不爽當與通竅

炒桃仁 炒五靈脂 延胡 蘇梗

生香附 木香汁 半夏 薑汁

姚 經閉一年腹漸大恐延血盡沉痾况聚癥日久形寒

脚腫議用大針砂丸每服一錢二分六服

全 向無華色脉右弦左瀉經阻三月衝氣攻左脇而痛

腹時脹滿足跗腫是血盛症勿得小視。

桂枝 茯苓 澤瀉 牡蠣

金鈴子 延胡

吳三經阻兩載少腹堅硬大便不爽不時咯出紫血塊此屬血壅之象。

鮮生地汁 錢熟大黃 牛一錢 尋桂心 五 老生薑渣

炒桃仁 錢 郁李仁 牛一錢 四服

某 經閉腹脹漸成癥

香附 木香 青皮 烏藥 赤芍

五靈脂 延胡 當歸 鬱金

王二脉右虛左虛弦數腹痛兩月胸痺咽阻冷汗周身刺痛寒慄此屬內損有經閉成勞之事 桂枝湯加茯苓

臨證指南醫案 卷九 調經

又 照前方加當歸肉桂

又 內損情懷少暢非偏寒偏熱可以攻病方中溫養氣血以使條達非因寒投熱之謂開懷安養為宜勿徒恃

藥繼此可進養營法 歸桂枝去薑加茯苓

潘七經水不來少腹刺痛鳴脹大便不爽心中熱痛食辛

辣及酒其病更甚不敢通經姑與甘緩 甘麥大棗湯

某 陽升風動眩暈心悸鼻衄經停兩月

生地 阿膠 麥冬 白芍

柏子仁 棗仁 茯苓 炙草

顧二病起經阻形容日瘦嗜雜飢心腹常熱此乃悲悅

離愁內損而成勞。陰臟受傷。腸脈不流。難治之症。必得怡悅情懷。經來可挽。但通經敗血。斷不可用。

生地 人參 茯苓 沉香汁 琥珀末

陳 自經阻寒熱。延及浮腫腹膨。小溲日少。入暮心腹中熱。此厥陰已瀾。腑陽日痺。內因悒鬱成勞。情志為病。當收肅司令。而病日加增。料難入冬。無成法可遵。勉擬回生丹。每次服牛丸。冀通其壅。痺氣血。浸言治病也。

徐三 經水久不來。寒熱喉痛痺。鬱勞藥難取效。清阿膠丸。雞子黃湯送。

董 脈數色奪。久嗽經閉。寒從背起。熱過無汗。此非瘧邪。

臨證指南醫案 卷九 調經 三

由乎陰陽並損。管衛循行失其常度。經云。陽維為病。苦寒熱矣。症屬血痺。成勞為難治。痺阻氣分。務宜宣通。

生鹿角 川桂枝木 當歸 茯苓 炙草 薑 桑 身回生丹

仲三 先因經阻。繼以五心煩熱。咳吐涎沫。食減微嘔。面腫色瘁。乃肝陽化風。旋動不息。乾血勞病。醫治無益。

阿膠 生地 麥冬 牡蠣 小麥

王 面色皓白。脈來細促。久嗽不已。減食腹痛便澀。經閉牛載。此三焦厥真皆損。乾血勞怯之病。極難調治。俗醫見嗽見熱。多投清肺寒涼。生氣斷盡。何以挽回。

歸建中湯去薑

尼七少年。形色衰奪。側臥咳血。天柱骨垂。經水已閉。皆不治見症。歸建中湯去薑。

某 脈弱無力。發熱汗出。久咳形冷。減食過牛。顯然內損。成勞大忌。寒涼清熱治嗽。姑與建中法。冀得加穀。經行。猶可調攝。

桂枝 五分 生白芍 一錢 炙草 五分 棗肉 三錢 飴糖 二錢 歸身 一錢

程十 乾血勞病。百脈枯槁。漸至危篤。二月間診脈一次。當面告辭。余非憤憤醫流。不肯因循。悞事。

臨證指南醫案 卷九 調經 三

益母丸早晚服二三錢

某 管虛寒熱。咳血經閉。當歸 炒白芍 丹參 棗仁 還志 茯苓 炙草 廣皮 桂圓肉

顧三 潮熱經阻。脈來弦數。管血被寒熱交蒸。斷其流行之機。即為乾血勞瘵。非小恙也。桂枝 三分 白芍 一錢 阿膠 一錢 生地 三錢 炙草 四分 麥冬 一錢 大麻仁 錢

朱女 冲年天癸未至。春陽升動。寒熱衄血。平昔湯後。腰痛耳目甚聰明。先天質薄。陰本難充。易虧最多。倒經之虞。

雄烏骨雞 生地 生白芍 茯神 天冬

知母 牛膝 芫蔚子 女貞子 阿膠

諸藥除阿膠用水煎汁二次其烏雞去毛及翅足另
以童便一碗青蒿汁四碗醇酒二碗米醋一碗同煮

再加入前藥汁收膏入阿膠收燉服五錢

張 十七歲天癸不至咳嗽失血乃倒經重症先以順氣
導血

降香末 鬱金 鈎藤 丹皮

蘇子 炒山查 黑山梔

又 震動氣衝咳喘失血

臨證指南醫案

卷九

調經

五

雞子黃 阿膠 鮮生地 天冬

生白芍 炒牛膝

又 脉細數腹痛管熱經不通

人參 天冬 鮮生地 白芍

丹參 調入琥珀末三分

易曰乾道成男坤道成女女子屬陰以血為主故女

科治法首重調經經常也如潮汐之有信如月之盈

虧不愆其期故曰經水又曰月事又曰月信內經云

太衝脉盛月事以時下景岳云衝為五臟六腑之海

臟腑之血皆歸衝脉可見衝脉為月經之本也然血

氣之化由於水穀水穀盛則血氣亦盛水穀衰則血

氣亦衰是水穀之海又在陽明可見衝脉之血又總

由陽明水穀所化而陽明胃氣又為衝脉之本也故

月經之本所重在衝脉所重在胃氣所重在心脾生

化之源耳心主血脾統血肝藏血凡傷心傷脾傷肝

者均能為經脉之病內經曰二陽之病發心脾有不

得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息責者死不

治不得隱曲言情欲不遂而病發心脾也風消者發

熱消瀉胃主肌肉也息責者喘息上奔胃氣上逆也

此雖言病發心脾而實重在胃氣因心為胃之母胃

臨證指南醫案

卷九

調經

五

為脾之腑也內經又曰有病胸脇支滿者妨於食病

至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩時時

前後血病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉

入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也治之以四烏

鯁骨一蘆茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五

丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也此段經文

全重在氣竭肝傷四字為通節之綱旨胸脇肝部也

支滿肝病也妨於食木邪凌土也病則先聞腥臊臭

脾喜芳香今脾土為木邪凌虐病則先聞腥臊乃肝

之旺氣也出清液脾虛不能敷化水精也先唾血脾

傷不能統運營血也。四肢清陽衰不能傍達四末也。目眩陽不充而水上溢於經也。前後血陰受傷而血內溢於絡也。血枯內有乾血。血不歸經而結胞門也。良由年少不禁氣竭肝傷而致。月事衰少或不來也。治以烏鰂骨四分。取其味鹹走腎。性溫達肝。配以鹿茹一分。取其辛散內風。溫去惡血。二物并合。功專破宿生新。九以雀卵。取其溫補助陽。能調子臟精血。以五丸為後飯者。先藥後飯。使藥徐行下焦。力貴專功。五丸不為少也。飲以鮑魚汁。利腸垢。和肝傷。取其臭穢之味。佐烏鰂骨而辟宿積之血也。金匱要畧言調經之法甚詳。後世如王節齋薛立齋諸賢。論症透徹。用方精切。俱可為程式。茲不具贅。今觀葉先生案。奇經八脈。固屬扼要。其次最重調肝。因女子以肝為先天。陰性凝結。易於拂鬱。鬱則氣滯。血亦滯。木病必妨土。故次重脾胃。餘則血虛者養之。血熱者涼之。血瘀者通之。氣滯者疎之。氣弱者補之。其不治之症。直言以告之。誠一代之良工。女科之明鑑。學者當奉為典型。更能參考內經仲景及諸賢案論。自然學業日進。登峯造極矣。素天一

臨證指南醫案 卷九 調經 六

淋帶

溫邪劫陰

某 溫邪劫陰。帶下火升。胸痞尿小數。

生地 阿膠 牡蠣 川斛

小麥 茯神

陽明脈虛

某 陽明脈虛。手麻足冷。身動帶下。如注。用通攝方。

人參 桂枝木 桑螵蛸 生杜仲

歸身 茯苓

胸中似冷

又 胸中似冷。熱飲乃爽。照前方去杜仲。加白芍炮薑。

陳七色蒼

陳七色蒼。尿數。是陰不足。心中泛泛。即頭暈腹痛。經水仍。

臨證指南醫案 卷九 淋帶 七

來兼有帶下。肝陽內擾。風木乘土。法當酸以和陽。鹹苦堅陰。

生白芍 細生地 清阿膠 牡蠣

檮根皮 黃柏

又 烏骨雞 生地 阿膠 牡蠣 天冬

白芍 白薇 杜仲 川斷 湖蓮

血虛脈

蔣 帶下不止。少腹內踝連痛。至不能伸縮。絡脈不宣。最。

有結瘕綿纏。不可不慮。醫云肝氣。豈有是理。

桂枝 生沙苑 遠志 當歸

鹿角霜 杞子 茯苓

校刊

翼 帶淋日久。脂液垂涸。奇脉俱傷。營衛亦偏。內風自動。則中焦氣毒。浮腫腹膨。為寒為熱矣。暫以鹹緩和陰。

阿膠 牡蠣 菴蓉 柏子霜 郁李仁

袁 舌光赤頭脹身熱。帶下如注。此五液走泄。陽浮熱蒸。當用攝劑。若與鹿角霜沙苑。仍是升舉動陽。則無效矣。

熟地炭 阿膠 芡實 茯苓

湖蓮肉 炒山藥

又 照前方去阿膠。山藥加桑螵蛸。更肉炭。

吳 崩帶淋漓。陰從下走。暈厥汗出。陽從上冒。逢穀雨暴。

凶。身中陰陽不相接續。怕延虛脫。或亥時為劇。肝腎病。

臨證指南醫案 卷九 淋帶 六

治

人參 阿膠 生龍骨 生牡蠣

五味 茯苓

又 血液去則臟陰失守。神不內附。致目中妄見。非鬼祟。

也。當先鎮陽神為主。若驟用陰藥。則有妨胃納矣。

人參 龍骨 五味 茯苓

芡實 建蓮肉

又 淋帶黃白未淨。五更心悸汗出。

人參 炒枸杞 五味 茯苓

芡實 湖蓮肉

某五。尿左細前用通補。據述痛起得按痛緩。八脉空虚。昭。

然。捨此補養。恐反增劇矣。

當歸 烏賊骨 紫石英 杜仲

杞子 柏子仁 沙苑 茯苓

某 女科病。多倍於男子。而胎產調經為主要。淋帶痕泄。

奇脉虚空。腰背脊脊牽掣似墜。而熱氣反升於上。從左。

而起。女人以肝為先天也。醫人不曉八脉之理。但指其。

虛。剛如桂附。柔如地味。皆非奇經治法。先以震靈丹固。

之。每服一錢五分。

又 淋帶痕泄。諸液耗。必陰傷。此參附薑桂劫陰不效。而。

臨證指南醫案 卷九 淋帶 九

膠地陰柔亦不能效。蓋脉髓氣散不攝。陰藥沉降。徒擾。

其滑耳。必引之收之。固之。震靈丹意。通則達下。瀉則固。

下。惟其不受。偏寒偏熱。是法效靈矣。後方常用。

人參 一錢 鹿角霜 一錢 沙苑 一錢 桑螵蛸 三錢

炒杞子 一錢 茯苓 三錢 炙草 五分

方九 人參 二兩 隔 麋茸 二兩 切 生兔絲子 二兩 研

淡補骨脂 一兩 炒 生紫石英 一兩 生餘糧石 一兩 研

茯苓 一兩 炒 黑小茴 五錢 炒 黑遠志 五錢

晚服炒香三錢

姚三 自乳血耗。脉絡空豁。脊脊椎體痠。帶下不已。問下。

部已冷。陰虛及陽速速斷乳不致延勞

入參 鹿角霜 枸杞 桑螵蛸殼

杜仲 茯苓 沙苑 白薇

徐四經漏成帶。下焦畏冷。眩暈。肝臟陽升。八脉空乏。

當歸 炒白芍 炒黑枸杞 杜仲

海螵蛸 炒沙苑

楊三寡居獨陰。自多愁煩思鬱。加以針毒。目注凝神。陽上

巔為眩暈。八脉無氣。自帶下下冷。內風日動。癩疹麻木。

常為隱現。以緩下柔劑和其陰陽。可得小效。

製首烏 三角胡麻 枸杞 甘菊花炭

臨證指南醫案 卷九 淋帶

用紅棗搗丸。早上服四錢

王七產後漏淋成帶。入暮溺頻不爽。驚恐神呆。骨節盡痛。

是肝腎內損。漸及奇經。不可束固。是產後虛在下。甘辛

潤補肝腎。不與燥藥。以腎惡燥。肝忌剛也。

枸杞子 鹿角霜 歸身 菟絲子 炒香

生杜仲 沙苑子 茯苓 補骨脂 鹽水煎

某少腹拘急。大便燥艱。淋帶赤白。此屬液涸。

肉蓯蓉 枸杞子 河車 當歸

柏子仁 郁李仁

又淋帶年久。少腹拘急。脹痛。漉不爽。大便艱澀。得泄氣

則服寬食物少納。腕中不降。必撫摩始下。此病久。靈陰

服早 入參 歸身 炒杞子 茯苓

鹿茸 河車 暮服震靈丹二十粒

帶下者。由濕痰流注於帶脉。而下濁液。故曰帶下。婦

女多有之。赤者屬熱。兼虛兼火治之。白者屬濕。兼虛

兼痰治之。年久不止。補脾腎兼升提。大抵瘦人多火。

肥人多痰。最要分辨白帶白濁白淫三種。三者相似。

而迥然各別。白帶者。時常流出清冷稠粘。此下元虛

損也。白濁者。濁隨小便而來。渾濁如泔。此胃中濁氣

臨證指南醫案 卷九 淋帶

滲入膀胱也。白淫者。常在小便之後。而來亦不多。此

男精不攝。滑而自出也。至於淋症。由腎虛膀胱積熱

所致。腎虛則小便數。膀胱熱則小便滴。淋有氣血砂

膏勞五者之殊。皆屬濕熱。氣淋為病。小便澀滯。常有

餘瀝不盡。血淋為病。遇熱即發。甚則溺血。痛者為血

淋。不痛者為尿血。砂淋為病。陰莖中有砂石而痛。溺

不得卒出。砂出痛止是也。膏淋為病。溺濁如膏。敗精

結者為砂。精結散者為膏。又遺精為鹽之義。勞淋遇

勞即發。痛引氣衝。大約帶病。惟女子有之。淋濁男女

俱有。景岳云。婦人淋帶。其因有六一。心旌搖。心火不

靜而帶下者。先當清火。宜硃砂安神丸。清心蓮子飲之類。若無邪火。但心虛帶下。宜秘元煎。人參丸。茯苓丸之類。一慾事過度。滑泄不固而帶下者。宜秘元煎。苓朮兔絲丸。濟生固精丸之類。一人事不暢。精道逆而為濁為帶者。初宜威喜丸。久宜固陰煎之類。一濕熱下流而為濁帶。脉必滑數。煩渴多熱。宜保陰煎。加味逍遙散。若熱甚兼淋而赤者。宜龍胆瀉肝湯。一元氣虛而帶下者。宜壽脾煎。七福飲。十全大補湯。若陽氣虛寒。脉微瀉。腹痛多寒。宜加姜附家韭子丸。一脾腎氣虛下陷多帶者。宜歸脾湯。補中益氣湯之類。已

臨證指南醫案

卷九 淋帶

三

上淋帶辨症論治。彷彿已備。語云。醫者務出從君看。莫把金針度與人。若求金針暗度。全憑藥案搜尋。素天

崩漏

徐三

肝脾鬱損血竅。人參逍遙散去柴朮炙草加桑螵

蛸杜仲

某

經漏不止。久風餐洩。

人參

茯苓

木瓜

炒烏梅

赤石脂

餘糧石

營陰

脉數寒熱汗出。腹脇痛。病起經漏崩淋之後。是陰傷

陽乘。消渴喜涼飲。不可純以外邪論。和營衛調中。甘緩

主治。

臨證指南醫案

卷九 崩漏

三

當歸

白芍

淮小麥

炙草

南棗

茯苓

奇脉虛

文五 產育頻多。衝任脉虛。天癸當止之年。有紫黑血如脉

肝暴下之後。黃水綿綿不斷。三年來所服歸脾益氣。但

調脾胃補虛。未嘗齒及奇經為病。論女科衝脉即是血

海。今紫黑成塊。幾月一下。必積貯之血。久而瘀濁。有不

得不下之理。此屬奇經絡病。與臟腑無與。考古云。久崩

久帶。宜清宜通。倣此為法。

柏子仁

細生地

青蒿根

淡黃芩

澤蘭

樗根皮

接服斑龍丸

張五旬天癸當止而經淋周身牽掣右肢漸不能舉不
但衝任督帶損傷陽明胃脉衰微少氣乃最難回安之
病。

人參 生黃芪 炙草 炒沙苑

炒杞子 炒歸身

朱 崩漏兩年先有帶下始而半月發病今夏季每交申
酉其漏必至思下午為陽中之陰陰虛陽動衝脉任脉
皆動下無隄防約束夫奇經肝腎主司為多而衝脉隸
於陽明陽明久虛脉不固攝有開無閉矣醫但以瀉劑
圖且夕苟安未及按經論病宜毫無一效。

臨證指南醫案

卷九

崩漏

五

海螵蛸 鮑魚 茜草 生菟絲子

石穀廣蓮肉 接脈烏賊魚骨丸

頤 髓虛崩淋不止筋掣痛不能行

菴蓉 枸杞 柏子仁 茯神

川斛 紫石英 羊內腎 青鹽

成 衝任二脉損傷經漏經年不痊形瘦膚乾畏冷由陰

氣走乎陽位益氣以培生陽溫攝以固下真

人參 鹿角霜 歸身 蘆艾炭

茯神 地黃 紫石英 桂心

衝任虛

張三經漏十二年五液皆涸衝任不用冬令稍安夏季病

加心搖動腹中熱腰膝跗骨皆熱此皆枯槁日著方書
謂暴崩宜溫久崩宜清以血去陰耗耳

人參 生地 阿膠 天冬 人乳粉

柏子仁 茯神 棗仁 白芍 知母 九

張 固補衝任涼肝寧血丸方

人參 二兩 生地 二兩 阿膠 二兩 白芍 二兩 茯苓 二兩

鮮河車膠 一兩 石穀建蓮肉 四兩 二膠如少可加蒸

熟山藥搗漿為丸早服四錢參湯送晚服二錢

沈 天癸當止之年經來淋漓不絕乃陰衰陽動入秋深

夜寐甚少汗泄四肢胸膈夫衝脉隸於陽明其氣行乎

臨證指南醫案

卷九

崩漏

五

身前陽明脉空陽越衛疎陰火升舉當宗丹溪補陰丸

或虎潛丸之屬久病投湯太過恐妨胃耳

每早服丹溪補陰丸四錢 十服

黃 長齋有年脾胃久虛瘧由四末必犯中宮血海隸於

陽明苦味辛散皆傷胃系雖天癸久絕病邪藥味擾動

血絡是為暴崩欲脫閱醫童便阿膠味酸潤滑大便澀

瀉豈宜潤下即熟地五味補飲陰液咽湯停脫頃欲吐

淨滋膩酸濁之藥下焦未得其益脫中完已受戕議以

仲景理中湯血脫有益氣之法坤土陽和旋轉喜其中

流砥柱倘得知味納穀是為轉機重症之尤勿得忽視

奇脈不和

理中湯
某 停經三月。下漏成塊。少腹膨痛。議通和奇脈。

鹿角霜 生杜仲 桂枝木 生沙苑
當歸 茯苓 紅棗

肝腎虧 壬金寒

羅二 病屬下焦。肝腎內損。延及衝任奇脈。遂至經漏淋漓。腰脊痠弱。脈絡交空。有終身不得孕育之事。

製熟地砂仁 河車膠 當歸 白芍
人參 茯苓 於朮 炙草

夜傷絡 熱風消

陳十五 旬年歲。經漏如崩。繼以白帶綿綿。昔形充。今瘦損。臨證指南醫案 卷九 崩漏 三

當年飲酒濕勝。大便久澀。自病經年。便乾不爽。夜熱多汗。四肢皆冷。氣短腹鳴。上噫氣。下泄氣。腰足跗酸。更無力。食物日減。不知其味。此陽明脈衰。厥陰風木由乎血。去液傷。衝任交損。內風旋轉。而為風消之象。病在乎絡。故令久延。金匱謂絡熱則癢矣。

人參 黃芪 苦參 茯苓
牡蠣 小麥 瀉清人參湯收

陰虛陽亢

張 外冷內熱。食過如飢。唇燥裂。渴飲。下漏漏多。則陰虛。陽亢便澀不實。不可寒潤。
生地炭 阿膠 炒白芍 湖蓮

楞根皮 茯苓 斷艾炭
又 消渴心悸 阿膠 生雞子黃 生地 天冬

生白芍 茯苓

胡 心痛如飢。口吐膩涎。濁沫。值經來甚多。因驚動肝。陽化內風。欲厥之象。治以鹹苦。佐以微辛。使入陰和陽。

阿膠 二錢 牡蠣 三錢 川棟子 一錢 小川連 三分
川芎 二分 當歸 一錢

又 和陽固陰。諸病大減。因經漏陰傷。陽易浮越。心怔悸。肢末痛。內風未熄。藥以甘柔。使胃汁日充。則砥柱中流。臨證指南醫案 卷九 崩漏 三

矣。

人參 阿膠 麥冬 生白芍

炙草 茯苓

邱四 經漏成帶。年餘醫藥無功。乃衝任督帶交病。古稱久帶。久崩宜清。視其體豐。髮黑。陽氣久虧。與內經血脫方。

法。烏鰂魚丸。鮑魚汁丸。
又 照前方加阿膠人中白

某 經漏三年。診色脈俱奪。面浮跗腫。肌乏華色。納穀日減。便堅不爽。自脊脊腰膝痠楚。如墮。入夏以來。形神日羸。思經水必諸路之血。貯於血海而下。其不致崩決。淋。

滴者任脉為之擔任帶脉為之約束剛維精脉之擁護
 督脉以總督其統攝今者但以衝脉之動而血下請脉
 皆失其司症固是虛日餌補陽不應未達奇經之理耳
 考內經於胸脇支滿妨食時時前後血特製烏鯽丸鹹
 味就下通以濟滯更以穢濁氣味為之導引同氣相需
 後賢謂暴崩暴漏宜溫宜補久漏久崩宜清宜通正與
 聖經相符况乎芪朮皆守不能入奇脉無病用之誠是
 好藥藉以調病焉克有濟夏之月大氣正在泄越脾胃
 主令歲氣天和保之最要議以早進通陰以理奇經午
 餘天熱氣泄必加煩倦隨用清暑益氣之劑應天之氣
 臨證指南醫案 卷九 崩漏 天

以扶生生安穩百日秋牛收肅令行可望其藏聚氣交
 而奇絡漸固此久損難復非倖試速功矣 早上湯藥
 議以通陰潛陽方法早服
 龜甲心秋石 鹿角霜 真阿膠 柏子霜
 生牡蠣 鎖陽 另煎清人參湯入清藥煎
 取五十沸
 鹿性陽入督脉龜體陰走任脉阿膠得濟水沉伏味
 鹹色黑熄肝風養腎水柏子芳香滑潤養血理燥牡
 蠣去濕消腫鹹固下仲景云病人腰以下腫者牡蠣
 澤瀉湯鎖陽固下焦之陽氣乃治八脉之大意

烏鯽丸方
 烏鯽骨四分米醋炙去甲 鹿筋一分
 右為細末用雀卵量搗為丸每服三錢用藥前飲
 淡鮑魚湯一小杯為導引
 又 進潛陽頗投但左耳鳴甚腸中亦鳴肝陽內風升動
 未息減氣剛用柔 早服

龜甲心照前 真阿膠 柏子霜 天冬
 女貞實 早蓮草 另煎人參湯二錢加入清
 清藥內再煎五十餘沸
 又 兩進柔潤清補頗投詢知病由于悲哀煩勞調理向

臨證指南醫案 卷九 崩漏 天
 愈繼因目病服苦辛寒散太過遂經漏淋帶年前七八
 日始淨今則兩旬而止此奇脉內之前議非誣據述周
 身累現癢疹疥癩搔癢不寧想脂液久滲陰不內營陽
 氣浮越衛怯少固客氣外乘凡六淫客邪無有不從熱
 化內經以瘡癢諸病皆屬於火然內症為急正不必以
 肌腠見病為治刻下兩三日間又值經至之期議進固
 脉實下佐以東垣瀉陰火意經至之先用此方
 龜甲心 真阿膠 人參 桑螵蛸 生白龍骨
 早蓮草 茯神 知母 阜上服
 又 當經行周身寒凜腰痠腹膨白疹大發議用固氣和

血方

人參 熟地 阿膠 川芎 當歸

白芍 南山查 蘆艾 早上服

又 經來腹墜腰痠。疹現肌癢鼻孔耳竅皆然。想陰血下注。必陽氣鼓動。內風拂起。風非外來。乃陽之化氣耳。昨因經至。用膠艾四物湯和補固經。今午診脈。右大而滑。左小數。中有堅疾如刃之象。洵乎液枯風動。初定烏鰂魚丸當進。其早上湯藥。凡氣味之辛。裁去。雖為補劑。勿取動陽耗液也。早上服

人參 生地 天冬 阿膠 生白芍

臨證指南醫案 卷九 崩漏 三

女貞子 早蓮膏 地榆 早上服

又 兩日早進清補柔劑。夕用通固下焦衝任。是月經來甚少。起居頗安。與先哲云。暴崩當溫澹。久漏宜宣通。若合符節矣。連次候脈。必小弱為少安。則知陽動不息。內風必旋。芪朮呆守。歸艾辛溫。守則氣壅。辛則陽動。皆不知變化之旨。坐失機宜耳。余未能久候。焉有經年經月之恙。驟期速愈。故丸藥創自內經七方之一。世多泯忽。實出軒岐秘奧。再議理陰熄風早用。諒不致誤。

擬長夏調理二法

晚服烏鰂丸三錢。晨進養肝陰和陽熄風以安胃養

衝脈即血海。劫於陽明胃脈。乃做經旨立方

人參 阿膠 白芍 生地 早蓮膏

女貞子 桑寄生 鹹秋石 細子芩 三角胡麻

藥末膠膏再加熟蜜三兩。搗千餘杵。丸宜細光。早上服四錢。小暑至處。暑生脈散送

又 此番經後。帶下仍有。久漏奇脈少固。前案申說已著。九劑。端司通攝衝任。恪守定然必效。但外來寒暄易禦。內因勞損難調。余諄諄相告者為。此

人參 生地 阿膠 白芍 茯神

女貞子 早蓮膏 小黑稽豆皮 早上服 初十日

臨證指南醫案 卷九 崩漏 三

又 昨晚煩冗。陽動氣升。頭額震痛。經再下注。更定鎮攝

一法。久後亦可備用。

人參 生地 阿膠 龜甲心

生牡蠣 天冬 黑殼建蓮

又 十二日午診脈。仍用初十日早服方法。去稽豆皮。加生牡蠣

交小暑後。驟熱午後。另煎生脈散。微溫服一次

盧 停經牛載。雨水節後。忽然暴崩。交春分。節血止。黃白淋漓自下。寒則周身拘束。熱時煩燥。口乾。瞀至天明。汗出乃止。寐必身麻。如重行。四肢骨節皆痛。蓋血既大去。

衝任之脈傷損。而為寒為熱。陰損及乎陽位矣。書云崩中日久。為白帶。漏下多時。骨髓枯。由脂液瀉盡。致形骸枯槁。延為瘵疾矣。天熱氣燥。所當謹慎。

烏賊骨 阿膠 生地 生白芍

茜草 小麥

程 暴冷陽微後崩 附子理中湯

崩如山塚。舉崩言其血之橫決莫制也。漏如漏卮。難塞。言其血之漫無關防也。經云陰在內。陽之守也。氣得之以和。神得之以安。毛髮得之以潤。經脈得之以行。身形之中。不可斯須離也。去血過多。則諸病叢生。

臨證指南醫案 卷九 崩漏 三

矣。原其致病之由。有因衝任不能攝血者。有因肝不藏血者。有因脾不統血者。有因熱在下焦。迫血妄行者。有因元氣大虛。不能收斂其血者。又有瘀血內阻。新血不能歸經而下者。醫者依此類推。做葉氏用筆靈活。於崩漏治法。無餘蘊矣。素天

胎前

秦十經停三月。無寒熱。診脈大。係惡阻減食。

細子芩 知母 蘇梗 砂仁

橘紅 當歸 生白芍

方九 細子芩三兩 蘇梗一兩 砂仁五錢 白芍一兩

熟白朮二兩 當歸半兩 青葙湯法丸

某 懷妊將三月。肝氣攻衝。脇落。嘔吐紅痰。

細條芩 生白芍 川棟子 瓜蒌皮

半夏麩 橘紅 竹茹 生薑

臨證指南醫案 卷九 胎前 三

肝虛滑胎 程二頭胎每三月是肝虛

人參 阿膠 當歸 白芍

川芎 桑寄生

錢三 上年夏產。過月經轉。今經停四箇月。左脈弦滑流動。乃為妊娠。此氣急虛痛咳嗽。熱氣上乘。迫肺之徵。形肉日瘦。熱能燥陰。耗氣。讓清金平氣。勿碍於下。

桑葉 川貝 桔梗 廣皮

黑山梔 地骨皮 茯苓 甘草

楊 血液僅僅養胎。春陽升舉。上焦易燥。喉啞。心嘈。皆液虧陽亢。

傷陽亢

<p>鮮生地 茯神 白扁豆 玄參心 川斛 謝 始而熱入陰傷。少腹痛。溺不爽。秋暑再傷。霍亂。起 今不飢不食。全是胃病。况懷妊五月。胎氣正吸脾胃真 氣。津液重傷。致令咳逆。</p>	<p>人參 知母 炒麥冬 木瓜 蓮子肉 茯神</p>	<p>金 懷妊五月得熱病。久傷陰液。身中陽氣有升無降。耳 竅失聰。便難艱澇。議用仲景復脈法。以生津液。</p>	<p>炙甘草 人參 生地炭 阿膠 天冬 麥冬 生白芍 麻仁</p>	<p>臨證指南醫案 卷九 胎前 某 懷妊百日。丙丁養胎。胎熱從戌亥時升。耳前赤。癆刺 痛。當養陰制火。</p>	<p>細生地 茯神 生白芍 建蓮 桑葉 鈎藤</p>	<p>某 脈右虛左弦。身麻肢冷。胎冲脹悶。五六月當脾胃司 胎。厥陰內風暗動。不飢吞酸。全屬中虛。</p>	<p>人參 枳殼 半夏 薑汁 桔梗 胡 懷妊六月。陽明司胎。閃動絡脈。環跳痛連腰脊。最防 胎氣</p>	<p>歸身 桂枝木 炒杞子 炙草</p>
---	--------------------------------	---	---------------------------------------	---	--------------------------------	--	---	----------------------

<p>羊脛骨 白茯苓 某 氣逆壅熱於上。齟腫喉痺。胸悶腹腫。七月太陰司胎。 法宜宣化清上。</p>	<p>川貝 牛蒡子 連翹 蘇梗 杏仁 花粉 菊花 橘紅</p>	<p>汪 娠八月。胎動不安。腕悶不飢。宜涼血調氣。可以安適。</p>	<p>黃芩 知母 橘紅 生白芍 當歸 砂仁</p>	<p>程 娠八月。形寒氣逆。神煩倦。無寐。乃肝陽乘中之徵。擬 進熄風和陽法。</p>	<p>臨證指南醫案 卷九 胎前 又 肝風眩暈。麻痺少寐。</p>	<p>王 先寒後熱。咳嗽。是春月風溫肺病。風為陽邪。溫漸變 熱。客氣着人。即日時氣。懷妊九月。足少陰腎脈養胎。上 受熱氣。肺痺喘急。消渴胸滿。便溺不爽。皆肺與大腸為 表裏之現症。狀若繪矣。芎歸辛溫。參朮守補。肉桂沉香 辛熱。皆胎前忌用。致大熱煩悶。勢屬危殆。議以清肺之</p>	<p>黃芩 當歸 生白芍 生牡蠣 橘紅 茯神 熟首烏 炒黑杞子 白芍 女貞子 茯神 黑大豆皮</p>
---	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------------	--	--

急潤肺之燥。俾胎得涼則安。去病身安自為不補之補。

古人先治其實。實者邪也。

泡淡黃芩 知母 鮮生地 花粉

阿膠 天冬

又喘熱減半。四肢微冷。腹中不和。胎氣有上冲之處。昨

進清潤之方。熱熱有汗。可見辛燥耗血。便是助熱。今煩

渴既止。問初病由悲哀驚恐之傷。養肝陰。滋腎液為治。

穩保胎元。病體可調。

復脈去桂。麻薑棗加天冬知母子芩。

朱 脈右瀆小數。左弦促。納食脘脹。常有甘酸瀉味。微嘔。

臨證指南醫案 卷九 胎前 美

吐清涎。旬朝始一更衣。仍不通爽。詢知病起清懷抑鬱。

由氣鬱化熱。如內經五志過極。皆從火化。就懷妊惡阻。

按徐之才逐月安養。亦在足少陽經。正取清熱養胎。况

肝胆相火內寄。非涼劑無以和平。古人治病。以偏救偏。

幸勿畏虛以貽患。

金石斛 黑山梔 茯苓 半夏

橘紅 竹茹 枳實

某 惡阻本欲惡心厭食。今夾時邪頭痛身熱。當先清熱。

竹葉 連翹 生甘草 黃芩

花粉 蘇梗

某 交節上吐下瀉。沉胎動不安。脈虛唇白。急用理中法。

附子 人參 於朮 茯苓 白芍

周 病中懷妊泄瀉。

焦朮 炒白芍 炒黃芩 炒廣皮

金 懷妊若患時症。古人重在保胎。今者喜煖惡寒。升則

厥痛。墜微便痛。透腹。暖胎須避絡傷。以及奇脈畏慮胎

墜難挽。辛香溫柔之補。冀其止厥。

鹿角霜 淡菴蓉 炒杞子 柏子仁

當歸 炒沙苑 炒大茴 茯苓

某 固護胎元。諸症俱減。惟心嘈覺甚。陰火上升。營虛之

臨證指南醫案 卷九 胎前 考

徵。

人參 桑寄生 熟地 阿膠 蘇綿灰

條芩 白芍 當歸 茯苓 香附

某 懷妊。刺滯半月。胃陰既虧。陽氣上逆。咽中阻。飲水欲

噦。舌尖紅赤。津液已耗。燥補燥劫。恐陰愈傷。而胎元不

保。議益胃和陽生津治之。

熟地 烏梅 白芍 山藥

建蓮 茯苓 用川石斛煎湯代水

潘 血液護胎。尚且不固。心中如飢空洞。食不能納。况又

戰慄嘔逆。凡內外搖動。都是動胎。從來有胎而病外感。

麻桂硝黃等劑必加四物是治病保胎第一要法

小生地 白芍 阿膠 知母

黃芩 青蒿梗

熱邪下痢膿血色紫形濃熱伏陰分議用白頭翁湯

王 臨月下痢膿血色紫形濃熱伏陰分議用白頭翁湯

又 苦味見效知濕熱動血以小其製為劑可全功矣

黃芩 黃柏 炒銀花 炒山查

茯苓 澤瀉

某 胎漏鼻衄發疹而喘

胎漏下血腹痛而墜

淡黃芩 真阿膠 青芎

臨證指南醫案 卷九 胎前 天

人參 炒白芍 炙草 廣皮 熟地炭

炒砂仁末 加紋銀一二兩青芎二兩

又 照前方去熟地加炮薑熟木

又 人參 熟地 炒歸身 炒白芍

炙草 茯苓 廣皮 炒砂仁

陸八形瘦脈數尺動不食惡心証象惡阻腰痛見紅為胎

漏欲墜 青芎二錢建蓮五錢紋銀一兩砂仁七分白糯米一錢

某 三月胎漏用固下益氣

人參 熟木 熟地 阿膠

白芍 炙草 砂仁 艾炭

下痢胎未下濁氣擾動暈厥嘔逆腹滿小腹硬二

便壅塞不通此皆有形有質之阻若不急為攻治濁瘀

上胃必致敗壞做子和玉燭散意

川芎 當歸 芒硝 羌蔚子

大腹皮 青皮 黑豆皮 調回生丹

程 懷妊八月子腫腹漸墜正氣虛弱補劑必須理氣預

為臨產之算

人參 茯苓 廣皮 大腹皮

蘇梗 砂仁末

臨證指南醫案 卷九 胎前 天

易曰大哉乾元萬物資始此言氣之始也又曰至哉

坤元萬物資生此言形之始也人得父母之氣以生

氣生形即稟此乾坤之氣也兩儀既兆五行斯彰故

天一生水水屬腎腎臟先生地二生火火屬心心又

次生天三生木木屬肝肝又次生地四生金金屬肺

肺又次生天五生土土屬脾脾又次生天既以五行

生五臟而仁義禮智信之五德亦即寓於其中朱夫

子所云天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理亦

賦焉此之謂也因此古人重胎教所以端其本也而

今不復講矣然六淫之感七情之傷婦孺氣有強

弱小兒胎元有帶躁故安胎之法不可不。如惡阻胎淋胎暈胎腫胎懸及漏胎等症古人言之甚晰。茲才具贅今閱葉先生案胎前大約以涼血順氣為主。而肝脾胃三經尤為所重。因肝藏血血以護胎肝血失榮胎無以養矣肝主升肝氣橫逆胎亦上衝矣胎氣繫於脾如寄生之托於苞桑焉與女蘿之施於松柏脾氣過虛胎無所附墮滑難免矣至於胃為水穀之海妊婦全賴水穀之精華以養身護胎故胃氣如兵家之餉道不容一刻稍緩也其餘有邪則去邪有火則治火陰虛則清滋陽虛則溫補隨機應變無所

臨證指南醫案 卷九 胎前

執着學者更能引而伸之觸類而通之安胎之法可一以貫之無餘蘊矣 秦天

產後

新產

欽 初產汗出眩暈胸痞腹痛宜通惡露

妙山查 延胡 鬱金 赤芍 炒牛膝

香附 童便 益母草湯代水

又 腹痛少緩但胸痞痰多治從上焦

妙山查 鬱金 丹參 橘紅

炒川貝 甜花粉

程 衝脈為病男子內結疝痛女子帶下瘕聚故奇脈之

結實者古人必用苦辛和芳香以通脈絡其虛者必辛

臨證指南醫案 卷九 產後

甘溫補佐以流行脈絡務在氣血調和病必全愈今產

後體虛兼瘀而痛法當益體攻病日期已多緩治為宜

生地 生薑 丹皮 琥珀末 調入

此苦辛偶方加丹皮以通外琥珀以通內所以取效

又 回生丹 取乎醋煮大黃一味約以病所不礙無

病之所故亦效二法皆入絡藥

又 小生地 歸鬚 紅花 郁李仁 柏子仁

茯神 又照前方去紅花郁李仁加澤蘭

某二惡露淋漓痛由腰起攻及小腹此督帶空虛奇經氣

阻矣疑奇經為病通因一法為古聖賢之定例

當歸 查肉灰 炒丹皮 澤蘭

川斷 製首烏

唐 產後驟脫參附急救是挽陽固氣方法但損在陰分

其頭痛汗出煩渴乃陽氣上冒凡開泄則傷陽辛熱則傷陰俱非新產鬱胃之治道嘗讀仲景書明本草意為是擬方於後亦非杜撰也

生左牡蠣錢一 細生地錢二 上阿膠錢二 炒黑查肉錢三

芫蔚子錢一

吳 新產陰氣下泄腸氣上冒日哺至戌亥陽明胃衰厥

陰肝傾肝血無藏氣衝擾瀰致心下格拒氣于膈中神

臨證指南醫案 卷九 產後 望

亂昏譫若惡露衝心則死矣焉有天明再醒之理回生

丹酸苦直達下焦血分用過不應諒非癩痺想初由汗淋發熱凡外感風邪邪滯汗解此熱昏亂即仲景之新產鬱胃也倘失治必四肢牽掣如驚似風癰則危議從亡陽汗出譫語例用救逆法

生龍骨錢三 生牡蠣錢三 桂枝五分 淮小麥百粒

炙甘草分三 南棗錢一

又 氣從湧泉小腹中直冲胸臆而心下痛顛暈神迷此肝腎內法無以收納自固勿假寐必魂魄飛越驚恐畏懼非止一端救逆法鎮陽頗應但少補虛寧神益之固

之耳

人參二錢 龍齒三錢 棗仁三錢 茯神三錢

炒黑杞子錢二 黑殼建蓮肉錢五 用紫石英一兩搗碎

水三盞煎減半用以煎藥

又 兩法皆效下元虛損無疑入脉無氣把握帶下淋漓

不止夢魂跌仆正經首下虛則夢墜也議鎮固奇脉方

人參二錢 龍齒三錢 棗仁三錢 茯神三錢

桑螵蛸錢二 炒黑遠志分五 用紫石英煎湯煎藥

又 昨午憂悲嗔怒大便後陡然頭暈繼以嘔逆胸痞止

心洞嘈雜仍不能食子夜寒戰鼓慄寅刻津津微熱神

臨證指南醫案 卷九 產後 望

昏妄見顛痛乳脹腹鳴短氣呵欠似乎歎息之聲此乃

下元根蒂未堅偶觸心機諸陽神飛旋動舞仲景論先厥後熱知飢不能食乾嘔列於厥陰篇中蓋危病初效未沾水穀精華則胃土大虛中無砥柱俾厥陰風木之威橫冲震蕩一如稗典混沌劫於地水大風卒來莫禦矣當此醫藥全以護陽固陰但血舍耗涸剛猛及滋膩

總在難施之例無服理病存體為要

人參五錢 熟附子錢一 川桂枝木錢一 炮薑炭錢一

炙黑甘草分五 茯苓錢三

沈 此產後陰虛瘧疾鼻煤喉燥舌乾尻痞不飢大便窒

塞不通乃陽明津枯不上供肺下少滋腸風陽游行面
腫耳聾仲景謂陰氣先絕陽氣獨發後人以飲食消息
取義甘寒則知辛溫逐瘀之謬

人參 炒麥冬 棗仁 烏梅肉
蜜水炒黃知母

又 酸味泄肝胃氣乃降大便通後汗大出心中刺痛背
管液內耗陽氣衝突仲景三病之鬱胃見喘矣雖痰吐
咯無苦燥耗氣之理

人參 阿膠 生地 麥冬
生白芍 炙草

臨證指南醫案 卷九 產後

張 產後鬱胃汗出潮熱腹痛

炒生地 炒山查 丹參 茯神
浮小麥 黑檀豆皮

吳 產後十二朝先寒戰後發熱少腹疔痛腹脹滿下部
腰肢不能轉側伸縮小溲澀少而痛此敗血流入經絡
延及變為瘍症議用交加散

小生地 生薑 車前 牛膝
五靈脂 炒查肉 調入琥珀末一錢

又 十六朝諸症稍減每黃昏戌亥時衝氣自下而上至
胸中即脹悶肢冷汗出右腹板實此厥陰肝臟因鬱氣

逆今惡露未清重鎮酸欬均為暫息擬和血調血為穩

歸鬚 炒桃仁 延胡 炒查肉
官桂 香附 川棟 小茴

又 人參 當歸 白芍 炙草
茯神 香附 桂心 廣皮

程 脈濡惡露紫黑痛處緊按稍緩此屬絡虛治在衝任
以辛甘理腸

炒歸身 炒白芍 肉桂 茯苓
小茴 杜仲

又 脈濡空大營絡虛冷

臨證指南醫案 卷九 產後

人參 炒歸身 炒白芍 茯神

又 當歸羊肉湯加茯苓茴香

許 產後陰虛肝風動灼喉乾喘咳視則頭暈
阿膠 細生地 天冬 茯神

程 坐蓐過勞肝風揚氣動面浮氣短腹膨惡露未清不
可臑滯須防癰厥

小生地 丹參 澤蘭 茯神
黑檀豆皮 琥珀末

又 血分既虧。風陽動泄。汗出心悸。此辛氣走泄。須忌所慮。瘧厥如已見端。議靜藥和陽意。	阿膠	雞子黃	細生地	生牡蠣		
丹參	茯神	某 產後下焦陰虧。奇脈不固。陽浮乃升。風動則殮。泄嘈雜。液損必消。渴骨熱。治在肝腎。靜藥固攝。	熟地	湖蓮	炙草	五味
芡實	山藥	旱蓮	女貞	臨證指南醫案 卷九 產後 哭		
某 新產後陰分大虛。汗出胸痞。潮熱。陽浮。衛不固。雖痰多。咳頻。忌用若。干。表散。久。延。耗。勞。耳。	炒生地	炒麥冬	生扁豆	炙草		
金石斛	丹參	茯神	甘蔗漿	某 產後身痛。少腹滿。		
查肉	川芎	延胡	澤蘭	丹皮		
艾葉	小茴	香附	茯苓	益母膏丸		
又 當歸	桂心	茴香	香附	紫石英		
茯苓	羊肉膠丸	產難。傷力。驚恐。面微浮。腹膨。小便不爽。	炒黑查肉	大黑豆皮	大腹皮絨	生香附
茯苓	澤瀉	白花益母草前湯代水	氣血滯	血虛寒	子汗泄	

金 腹脹氣滯。久瀉。產後五日。	於木	厚朴	茯苓	澤瀉	
南山查	延胡	凌 一歲四氣之交。夏季發泄為甚。凡夏至一陰初復。未及充盈。恰當產期。為陰氣未充。先泄。暑熱乘隙內侵。正如內經最虛之處。便是容邪之處矣。產科未明此旨。徒曉產後。遂於成藥。苦辛破血。津液愈劫。所伏暑熱。無由可驅。六氣客邪。內迫臟腑。漸漸昏蒙。內閉。攻熱害正。養正邪留。藥難立方。調治幼讀仲景。揣摩聖誨。惟育陰可以除熱。況乎暑必傷氣。人參非益氣之聖藥乎。大隊陰	臨證指南醫案 卷九 產後 哭		
藥。佐以人參。誠為陰分益氣之法。服之熱癘。壘壘而起。惡露。緩緩而下。扶正却邪。並行不悖。今穀食已安。諒無反覆。難成易虧之陰。須安養可望圖功。倘加情志感觸。輕則奇損。帶淋。重則髓枯。痔損。莫道。則言之不詳也。	雄烏骨雞	人參	石井	鮮生地	柏子仁
天冬	麥冬	阿膠	建蓮肉	項 初病舌赤。神煩。產後陰虧。暑熱易深入。此亟清營熱。所謂瘦人。慮虛其陰。	
茯苓	熟膏	竹葉	細生地	銀花	麥冬

立參 連翹

張 產後十三朝舌黃遺赤口渴尿中緊閉不食不飲大便此陰分已虛熱入管中狀如精症大忌表散清熱謹滋清管熱救其津液為要

細生地 天冬 生薑甲 丹皮

丹參 茯苓

又 產後血絡空虛暑邪客氣深入瘡乃間日而發嘔吐胸滿口渴皆暑熱燥胃津液也此虛人夾雜時氣只宜和解不可發汗厥補

青蒿梗 淡黃芩 丹皮 鬱金

臨證指南醫案

卷九

產後

哭

花粉 川貝 杏仁 橘紅

又 脈緩熱止病減之象但舌色未淨大便未通產後大虛不敢推瀉勿進葷膩恐滯蒸化熱疏斃養胃以滋清潤燥便通再議補虛

生首烏 麻仁 麥冬 蜜水炒知母

蘇子 花粉

某 渴陰上逆惡心不食冷汗煩燥最防暴脫不可但執惡露滯滿而專瀉氣攻血也

人參 乾薑 附子 澤瀉 冲入童便

某 脈無神神倦欲昏汗出乃陽氣走泄瀉利係陰氣不

陽虛欲厥

守產後見症是屬重虛深恐節間暴脫而寒熱胸痞腹痛豈遑論及標末

人參 製附子 人尿 猪胆汁

某二 產後驟加驚恐陽上背胃為厥左肢麻不耳竅失聰皆陽挾內風混入清竅以止實下虛鎮陽填陰味厚質靜之藥

熟地 龜甲心 天冬 萸肉

五味 磁石 茯苓 黑殼建蓮

某 產後去血過多陰虛陽實頭中眩暈汗出肉瞶驚畏身熱等症最易昏厥苦辛氣味宜忌

臨證指南醫案

卷九

產後

哭

生地 小麥 炙黑甘草 麥冬

阿膠 茯苓 生左牡蠣

顧三 產後真陰不復揚越風動四肢麻木先厥後熱

熟地 阿膠 炒杞子 生白芍

茯苓 菊花炭

徐 少腹衝及心下腕中痛而脹滿若云肝氣犯胃必有嘔逆前法益陰和陽不應顯是產後下虛厥氣上攻謹用柔陽之藥

炒歸身 茯苓 炒枸杞 柏子仁

炒歸身 茯苓 炒枸杞 柏子仁

小茴 茯苓

衛任虛氣上逆脫痛厥

產後陰虛陽浮發厥

又 衝逆震動而痛。是產後衝任空乏。按定痛減。尤為虛象。緣胃弱減穀。未便湯劑之多。防胃倒耳。

當歸 茯苓 紫石英 茯苓

河車 鹿角霜

又 衝脈逆。則諸脈皆動。天明暗和少安。由陰分虛及陽分可徵。前法包舉大氣。溫養佐通。是為絡方。日來春升。

畧有衄血。然無清寒可投。加鹹味佐其入陰。從產後下。

焦先傷耳。原方減鹿霜歸身。亦恐升陽也。加枸杞桂圓。

以痛在左。故養肝是議。

虞二背寒。心熱。天明汗出。乃涼。產後兩三月若此。此屬下。

臨證指南醫案 卷九 產後

焦真陰已虧。漸擾陽位。二氣交乘。並非客症。頭暈耳鳴。

心悸寒熱後必瀉。內風震動。當與毒藥。六月二。

人參 炙草 白芍 麥冬

炒生地 炒烏梅

又 前法酸甘益陰和陽。諸病皆減。然此恙是產後下焦。

百脈空乏。謂之尊損。填隙固髓為正治。緣穀食未加。兀。

賦恐妨胃口。加養可用九藥。七月。

人參 炙草 阿膠 生地 麥冬

又 照前方加桂枝木茯苓南粳。八月。

又 產後都屬下焦先損。百脈空際。時序夏秋。天暖發泄。

加病此扶陽益陰得效。今諸症向愈。寢食已安。獨經水未至。其衝任奇脈不振。須臾陰充。旺脈中得以游溢耳。

熟地 水製 人參 阿膠 萸肉 遠志炭

山藥 茯苓 建蓮 烏骨雞膏九 九月。

吳 坐尊過勞。驚恐交迫。真陰既傷。經年不復。目暗昏花。

煩動熱升。皆腎陰不得自充。何以滋養肝木。厥仆眩暈。

陽挾肝風。直土無制。則當靜藥填陰。佐酸以收攝。

熟地 阿膠 五味 萸肉

北沙參 茯苓 黑檜豆皮 秋石 二分。

陳三 寒熱時作。經歲不痊。且產後病起。陽維為病。明矣。

臨證指南醫案 卷九 產後

歸桂枝湯

下損及 郭二 產後下元陰分先傷。而奇經八脈皆麗於下。肝腎任。

不固。八脈賦失職司。經旨謂陽維脈病苦寒熱。陰維脈。

病若心痛。下損及胃。食物日減。然產傷先傷真陰。忌用。

桂附之剛。溫煦陰中之陽。能入奇經者宜之。

人參 鹿茸 紫石英 當歸

補骨脂 茯苓

陳四 產後四月。腰痛牽引少腹。冷汗不食。

當歸 羊肉 小茴 桂枝木

茯苓 紫石英

氣血寒

沈 產後動怒氣血皆逆痛嘔不卧不能仰而冷肢冷

口鼻氣寒痛必自下衝上此屬疝瘕厥痛

淡吳萸 韭白 兩頭尖 川棟子

桂枝木 茯苓

吳六 產後百日內右脇下少腹痛堅膨絡空無血氣乘於

中有結聚癥瘕之累延及變成脹滿經水不轉成大病矣

當歸 桂心 生桃仁 牛膝

山查 炒黑小茴

陸 產後邪深入陰氣血膠結遂有痕疝之形身體僵

臨證指南醫案

卷九 產後

三

乃奇脈網維不用充形通絡可效做仲景當歸羊肉湯意

歸身 從蓉 杞子 小茴

茯苓 紫石英 羊肉膠丸

某 產後胞損瀉淋筋脈牽掣治當攝下

桑螵蛸 生沙苑 萸肉炭 炒黃柏 茯苓

骨節寒

馮四 產後兩月汗出身痛 歸芪建中湯

余 產後不復心悸欲嘔遇寒腹痛先議進和營衛繼當

補攝 歸桂枝湯加茯苓

陽虛弱

吳八 胃痛三月不止如素面黃產後吞酸少食中焦陽傷

胎前

豈宜再加攻泄與辛補血絡方

桃仁 歸身 公丁香皮 川桂枝

半夏 茯苓

胎前及

某 產虛下焦起病久則延胃不飢不食乃陰損及陽腸

明脈空厥陰風動掀旋而頭痛而浮肢冷指麻皆亡血家見象

人參 一錢 杞子 炒焦 歸身 一錢 牛膝 炒

巴戟天 錢 浙江黃甘菊花炭 五分 茯苓 一錢

方丸 人參 另研 茯苓 一兩 萸肉 二兩 五味 一兩

杞子 炒 桑螵蛸 殼 鹽水煮 生白龍骨 一兩

臨證指南醫案

卷九 產後

三

浙江黃菊花 一兩 蜜丸早服四錢開水送

胎前下

楊三 自幼作勞即患頭眩加之刮症一月之內必發數次

前歲產後體甚不健右耳日夜响鳴鳴即頭眩神色衰

奪唇黃舌白帶下手足冷脚腫脈右大是陽明空氣泄不

固爰下温中主之

人參 二兩 桑螵蛸 三兩 鹿角霜 一兩 淡從蓉 一兩

炒杞子 二兩 柏子霜 一兩 茯苓 一兩 紫石英 醋煨 飛

白龍骨 一兩 紅棗 四兩 煎艾五錢水煮搗丸服四錢

某 胃痛欲嘔肢冷痛引腰背產後病發更甚

當歸 炒沙苑 炒黑杞子 炒黑小茴

鹿角霜 生精羊肉煎服	方丸 人參 鹿茸 生杜仲 炒杞子	當歸 鹿角霜 茯苓 沙苑	小茴 羊腰子蒸熟搗丸	陽不入陰。不寐汗出。產傷陰先受損。繼而損至奇經。前主溫養柔補。謂陰傷不受桂附剛猛。開列病情。全是陰虛陽浮。漏經幾一月。尤為急治。夜進局方震靈丹五十粒。則方復入涼肝。益陰配陽。是兩固法則。	人參 麋茸 枸杞 天冬	茯神 沙苑	臨證指南醫案 卷九 產後	某 產後淋帶。都是衝任奇脈內怯。最有崩漏勢。損滯經之慮。但固補實下。須通奇經者宜之。	桑螵蛸 人參 茯苓 生杜仲	沙苑 芡實 湖蓮	陳 產後百脈空隙。腰脊痛漏淋	桑螵蛸 鹿角霜 龍骨 淡菴蓉	炒杞子 沙苑 茯苓	吳 閱病原。產後陰虛液虧。加以平時嗔怒。陽氣暴升。絡血不寧。奇空衝任。少壯帶淋。胎泄等症。	阿膠 天冬 當歸 白芍 淡黃芩
------------	------------------	--------------	------------	---	-------------	-------	--------------	--	---------------	----------	----------------	----------------	-----------	---	-----------------

青蒿膏 女貞子 茯神 烏骨雞 蜜丸	趙 辱損八脈。經水不來。帶下頻頻。頗多。產後下焦先虛。繼及中宮。乃血液脂膏之涸。桂附熱燥。更助劫斃。此溫藥是溫養之義。非溫熱之謂。	人參 河車 麋茸 鹿角霜	歸身 茯苓 紫石英	楊 瘦泄起於產後。三年方愈。下損已極。經水幾月一至。來必衰頹如病。奇經衝任交空。下焦畏冷。食冷則瀉。心中疼熱。緩下溫經主之。	人參 鹿角霜 炒兔絲 生杜仲 炒杞子	臨證指南醫案 卷九 產後	某 熟白朮 淡骨脂 茯苓 蒸餅丸 三八 經後即背寒不熱。逾月不愈。嗽痰有血。自秋令產。屢屢若傷風咳嗽。正月至數減。思產後不復是下虛。形寒減食。先調脾胃。即和營衛法。人參建中湯	某 易飢易怒。腹泄氣墜。知飢不進食。自胎前至今。兩月不愈。並非客邪。用固攝升陽。	鹿茸 鹿角霜 熟地炭 當歸	桂枝 五味 茯苓	某 產後十年有餘。病發必頭垂脊痛。椎尻氣墜。心痛冷汗。此督任氣乖。踏維皆不用。是五液全涸。草木藥餌。總
-------------------	---	--------------	-----------	--	--------------------	--------------	--	--	---------------	----------	---

屬無情不能治精血之德故無效當以血肉充養取其通補奇經。

鹿茸 鹿角霜 鹿角膠 當歸 茯苓

杞子 柏子仁 沙苑 生杜仲 川斷

潘胎前水溢浮腫喘滿不得卧余用開太陽膀胱獲效。

既產浮腫自然漸退女科不明產後下虛而以破氣寬

脹百日來腹大且滿按之則痛此皆氣散瀰漫九藥又

補瀉守中益助其鈍氣血凝滯經候不來為難治之病

議腎氣湯煨藥成炭取其氣之通勿令味濁兼調琥珀

末以調其血瀉微古法中之所有非杜撰也

臨證指南醫案

卷九 產後

五

桂七味加車前牛膝炒炭水洗煎臨服調入琥珀末

徐六產後九年心中脹甚則瀉甚肌浮足腫食減過半凡

脹必有喘產後先傷在下用薛氏濟生丸三錢十服

某產後血去過多下焦衝任空虛跗腫腹膨形寒面黃

脈濡常用溫養

鹿角霜三錢 補骨脂一錢 紫石英三錢 茯苓三錢

桂心四分 炒黑小茴七分

方三脈沉濡產虛寒入痛脹腹鳴晨泄病人述心痛嘔逆

其實治下為是

熟附子 胡盧巴 良薑 炒黑茴香

茯苓 廣木香

朱六脈微弱形無華色據說病起產後食減吐瀉是下焦

不復中焦又傷漸加浮腫脹滿條甚忽平皆下焦厥逆

上衝也下虛於產後剛劑難以肅任是病之不易取效

者在此

淡從蓉 炒黑杞子 當歸 小茴

茯苓 沙苑

又濟生腎氣丸一兩二錢

某四產後未滿百日胸脇骨節收引四肢肌肉麻木浮腫

腹脹早輕夜重食減畏寒便澀脈得右遲左弦先與理

臨證指南醫案

卷九 產後

五

中健陽驅濁

人參 炮薑 淡附子 焦白木

枳實 茯苓

范病脹起於產後下焦先傷濁陰犯中不可以脹滿為

實症夫腑陽不通腎氣散漫吸氣不入息音如喘此身

動便喘非外客之邪乎肺春牛溫氣外侵面腫頸項結

核曾以夏枯菊葉辛解得效乃一時暴邪治法至於本

病之腹滿洞泄附腫未經調理且脹勢侵晨至午頗減

日暮黃昏脹形漸甚中焦陽微已見一斑愚見脹滿在

中而病根在下仲景於產後失調都從下虛起見闕女

科湯藥一方殊屬不解思平居咽乾喉痺牙宣肝腎真陰下虧不敢剛藥宜通倣薛氏腎氣法減泄肝如牛膝肉桂之辛不致劫陰仍可通陽為法

六味去萸加芍藥附子牡蠣炒炭煎

又小滿節古云痛隨利減今便利仍痛非是實症肝失調暢當理用以益水母不取芍藥之和陰加當歸小茴香拌炒焦黑以通肝臟脈絡之陽又辛散益腎也照前方去芍加茴香拌炒當歸

某產後腫脹不愈顯係下虛肝腎氣不收攝形寒痞悶食少痰多脈細肉消治從陰分非分和攻消者

臨證指南醫案 卷九 產後

濟生腎氣丸沉香汁沖開水送 接服金匱腎氣丸

王脹滿六年產後小愈今脹勢復甚兼脫肛淋症大腿熱如滾水滾滌食入臍中作痛議治其腑

小温中丸 三錢 六服

傅風勝為腫濕甚生熱乃經脈為病但產後百日精神未復不可過劫

熟羊角 木防己 片薑黃 川桂枝

大杏仁 苡仁

方產後腹大半年不愈近日有形衝突腸如刀攪據述坐蓐親產血去盈斗而腹形即已脹滿想八脈不用腎

氣散越不收非瘀血積氣為病議用大全方烏雞煎丸

烏骨雞 人參 蒼朮 附子 烏藥

肉桂 陳皮 草果 紅花 海桐皮

黃芪 白朮 蓬朮 川烏 延胡

白芍 木香 肉果 琥珀 丹皮

即以雞搗去毛頭嘴爪腸雜將藥放雞肚內貯砂鍋中以好酒一斗同煮令乾去雞骨以油單盛焙令乾為末蜜丸

為末蜜丸

范衝任傷督帶損皆由產時勞極理難復元固攝下真兼理奇脈治非背謬但腹滿膨痛若徒固補不以通調

臨證指南醫案 卷九 產後

恐滋脹腫大意陽宜通陰宜固包舉形骸和養脈絡乃

正治方法病樣多端紛紜難治難以立方矣

人參 鮮河車膠 淡從蓉 砂仁製熟地

鹿角霜 歸身 茯苓 紫石英

小茴香 羊腰子

某產後下虛血病為多今腕中痞脹減食不適全是氣分之恙但調氣寬中勿動下焦為穩

香附 神龜 蘇梗 白蔻仁

茯苓 桔梗

下焦脈 朱十產後冬月右腿浮腫按之自冷若論敗血半年已成

虛

瘧瘍針刺泄氣其痛反加此乃衝任先虛腐維脈不為用溫養下元須通絡脈然取效甚遲恪守可望却病

茯苓 鹿角霜 當歸 肉桂 小茴

牛膝 茯苓 鹿角膠酒蜜丸

肝腎虛

某 產後必病陰虛可知兩足跗中筋掣疼痛不耐走趨

當溫養肝腎以壯筋骨但食後腕中痞阻按之漉漉有聲手麻脇痛心煩耳目昏眩宛是陽氣不主流行痰飲

內聚之象處方難以兼攝議用分治法

中焦藥日中服 桂苓六君子竹瀝薑汁法丸

下焦藥晨服從四斤丸金剛丸參瑪

臨證指南醫案 卷九 產後 空

茯苓 牛膝 虎骨 生杜仲粉

天麻 木瓜 革薺 蜜丸

程 脈沉喘咳浮腫鼻竅黑唇舌赤渴飲則脹急大便解

痰傷肺

而不爽此秋風燥化上傷肺氣壅不降水穀湯飲之

濕痺阻經隧最多坐不得卧之處法宜開通太陽之裏

用仲景越婢小青龍合方若畏產後久虛以補溫服斯

客氣散漫三焦皆累閉塞告危矣

桂枝木 杏仁 生白芍 石膏

茯苓 炙草 乾薑 五味

陳三 夏季坐蓐秋月熱病半年來不寐不便無皮毛焦落

痰飲

臨證指南醫案 卷九

之

之象是痰飲為氣所阻以致升降失常乃痺之基也議宣肺以通腸

紫苑 八錢 杏仁 三錢 枳殼 一錢 桔梗 一錢

瓜蒌皮 一錢 鬱金 一錢

下虛飲

陸 背寒夜卧氣衝欲坐乃下元虛乏厥濁飲邪皆令上

泛胎前僅僅支撐產後變症蜂起奈何庸庸者流泄肺

翼其嗽緩宜乎藥增病勢矣

桂枝 茯苓 炙草 五味 淡乾薑

許 實喘屬肺虛喘屬腎產後下虛最多痰飲易於上泛

喘嗽食減有浮腫脹滿不得卧之憂不可小視

臨證指南醫案 卷九 產後 空

茯苓 生白芍 乾薑 五味

王 產後未復風溫入肺舌白面腫喘咳泄瀉小水漸小

必加腫滿不易治之症

蘆根 苡仁 通草 大豆黃卷

又 淡滲通泄氣分肺壅得開而卧再宗前議

通草 蘆根 苡仁 大豆黃卷

木防已 茯苓

又 過投絕產凝寒重藥致濕聚阻痰兩投通泄氣分已

效再用煖胃滌飲法

半夏 薑汁 黍米 茯苓

又支飲未盡。漉瀉不渴。神氣已虛。用澤木湯。

生於朮 建澤瀉 茯苓 苡仁

某 脈小左弦。咳逆。腕悶。小便不利。大便溏瀉。不思納穀。

暖氣臭穢。此皆胎前氣上逆。沖濁得盤踞。隔間。肺失清

肅。降令上竅痺。致下竅不利。湯食聚濕氣。不宣行。怕延

出浮腫腹滿。喘急不卧。諸欸不獨以產後通瘀為事。

鬱金汁 杏仁 通草 桔梗

茯苓皮 苡仁

沈 產後未復。加以暑熱。上干。暑必傷氣。上焦先受。頭脹

微微嘔惡。腕悶不曉。飢飽。暮熱早涼。汗泄不已。經水連

臨證指南醫案 卷九 產後

至。熱迫血絡妄動。蓋陰虛是本病。而暑熱係客氣。清上

勿得礙下。便是理邪。勿混亂首鼠。致延葶損不復矣。

捲心竹葉 生地 炒川貝 蓮翹心

玄參 地骨皮

水火既濟 神識不甚靈慧。陡然狂亂入井。夫暴病痰火風為多。

今診視色。脈產後未滿百日。多驚怕。五味皆變。厥陰肝

木順乘陽明。古稱一陰一陽變亂為癎。先以清心胞解

營熱。食進便通。再酌調理。

犀角 生地 苜蒲 玄參心

羚羊角 鬱金 竹葉心 蓮翹心

又復脈湯去參薑桂

某五產後不復元。仍自乳撫育。損不能復。即是辱勞。速速

斷乳。藥力可扶。凡產必下焦先損。必以形質血氣之屬

莫以心熱。再用寒涼。伐其生氣。

人參 當歸 沙苑 杜仲

補骨脂 茯苓 羊內腎二枚

沈 時熱屬上焦病。逾時自解。緣體質素薄。長夏坐蓐。不

但肝腎陰傷。諸氣皆為發泄。陰不主戀陽。衝脈上冲。而

心熱骨疼。總是陰虧。不肯復元。久久延成損症。此與清

潤治肺之咳無預。法宜填補下焦。攝之固之。迎養秋收

臨證指南醫案 卷九 產後

冬藏。胃納有加。庶乎漸安。

鮮紫河車 人參 真秋石 茯苓

水煮熟地 歸身 五味 芡實

山藥 生羯羊肉膠共河車膠二共和丸

姚二面少華色。脈似數。按之乳滑。產後三年。從未經來。腹

中有形。升逆則痛。肩背映脇。卒痛難忍。咳吐都是涎沫。

着枕氣衝。欲坐食減。便溏。身動語言喘急。此乃辱勞。指

極不復。諒非草木。可以圖伴。由下焦元海少振。驚恐。餒

弱衝脈動。斯諸脈交動。擬益元氣。充形骸。佐重鎮。以理

怯護持。體質之義。非治病方藥矣。

人參 杞子 白龍骨 茯苓

紫石英 羊肉

鄒二 產後成勞損。先傷下焦血分。寒熱數發不止。奇經八脈俱傷。欲嘔不飢。肝腎及胃。有形凝滯。議柔劑溫通補下。

人參 當歸小茴香并炒 茯苓 沙苑

淡菴蓉 杞子 鹿角霜 生紫石英

汪 產後百日寒熱消渴。心痛惡食。溇瀉。此尊勞液瀾已屬沉痾難治。擬酸甘化陰扶胃。望其小安而已。

人參 烏梅 炙草 赤石脂

臨證指南醫案 卷九 產後

木瓜 茯苓 炒粳米

張八 產後下虛厥氣上衝。犯胃。食入嘔腹。脈絡日空。營衛兩怯。寒熱汗泄。滄洩為尊勞之病。最難調治。

淡吳萸七分 桂枝五分 茯苓三錢 炮薑八分

炒木瓜一錢 南棗

黃 產後陡然驚恐。陰虧厥陽上逆。血湧吐痰。胸背脇俞大痛。乃八脈空乏之徵。尊勞重症。延綿最難全好。議鎮固一法。

熟地炭 炒杞子 五味 紫石英

茯苓 牛膝炭

又 脈少欬痛。止血緩仍用鎮納

熟地 炒杞子 五味 女貞子

艾實 茯苓

又 眩暈腹鳴脫痛

熟地 炒杞子 五味 茯苓

阿膠 萸肉 菊花炭 北沙參

又 烏骨雞 阿膠 熟地 杞子 五味

桂圓 茯苓 建蓮 熬膏人參湯送

顧 小產三日。脈數頭痛。脘痞。小腹墜痛。欲厥。此屬鬱胃。連翹 鬱金汁 丹皮 鈎藤

臨證指南醫案 卷九 產後

茯苓 炒山查 益母草湯煎

某二 小產後。惡露淋漓。營血內虧。厥陽由是鼓動。頭脹耳鳴。心中洞然。病在下焦矣。

枸杞子三錢 柏子仁三錢 全當歸一錢 白芍一錢

稽豆皮三錢 茯苓三錢

朱 脈小。牛產一口。舌白。頻嘔吐青綠水汁。涎沫。左肢浮腫。神迷如寐。此胃陽大虛。肝風內泛。欲脫之象。急急護陽安胃。冀得嘔緩。再商治病。

人參 淡附子 炒焦粳米 煨老薑

又 雖得小效。必三陰三陽一周。共過七日。庶有愈理。

<p>陰虛陽 胃成滿 某</p> <p>小產不及一月忽有厥逆痰瀉此陰分既虛厥陽上 冒今二便已通神志似屬憤散病雖已成癩癩却非痰 火有餘肝腎位遠治宜鎮補擬陳無擇琥珀散</p> <p>人參 白芍 鐵落 辰砂 磁石</p> <p>遠志 菖蒲 牛黃 琥珀</p> <p>形畏寒寒寒忽熱腰膝墜脹帶下汗出由半產 下焦之損致八脈失其擁護少腹不和通攝脈絡治之</p> <p>鹿角霜 炒當歸 杜仲 兔絲子</p> <p>臨證指南醫案 卷九 產後 空</p>	<p>奇脈虛 壯第</p> <p>陳 懷妊三月小產半年不復寒從背起熱起心胸經水 後期不爽帶下脈脈不離脊脊腰膝痠疼膝骨附 腫易冷無力由衝任督帶傷損致陰陽雜踏不用調治 非法有終身不肯孕育之累</p> <p>鹿角霜 炒枸杞 當歸 炒沙苑</p> <p>桂枝 小荷</p> <p>下虛上 受風溫 顧 上年小產下虛不復冬令藏聚未開春夏陽升風溫 乘虛上受清竅不利耳失聰鼻多塞咽燥痰稠悉見上 焦不清究竟下虛是本病後用清竅早上市鎮劑</p>
--	--

<p>陽氣虛 久瀉</p> <p>程 久瀉延虛痛後而瀉氣弱不可運行病因小產而來 法當中下兩調</p> <p>青菊葉 三錢 羚羊角 一錢 黑梔皮 一錢 連翹心 一錢 玄參心 二錢 苦丁茶 一錢 磁石 六味加龜膠北味</p> <p>人參 炒菟絲子 木香 茯苓</p> <p>炒白芍 炒補骨脂</p> <p>汪 小產後氣衝結瘕是奇經八脈損傷醫謂病尙有形 愈從瘀血施治半年來肌肉大消內熱咯痰帶血食過 脫下轉云腹痛蓋產後下焦真陰大虧攻瘀清熱氣味 苦辛是重虛其虛藥先入胃既不中病先戕胃口致令</p> <p>臨證指南醫案 卷九 產後 空</p>	<p>身勞</p> <p>飲食廢矣陰虛生熱經調灼然祇以胃口傷殘難與滋 膩之藥此症延成瘕勞必得飲食漸和方有調病之理 見病治病貽害豈可再循前轍議肝胃兩和方法</p> <p>炒黑杞子 三錢 雲茯神 一錢 柏子仁 三錢 生沙苑 一錢 焦當歸 一錢 小荷 七分同當 紫石英 五錢先煎 某 三次兩月胎漏而下是厥陰失養脈數右大腹痛惡 露未盡</p> <p>柏子仁 炒杏仁 丹皮 澤蘭葉</p> <p>細生地 調入琥珀末</p> <p>倪 小產半月頗安忽然腹脹大痛或攢膝跣足底或引</p>
---	--

脇肋肩胛甚至湯飲藥餌嘔吐無存。娠去液傷絡空。屬動。昔賢謂按之痛緩屬虛。勿道諸痛爲實。

炙甘草 淮小麥 南棗 阿膠

細生地 生白芍

又 往常經候不調。乃癥瘕爲痛。葱白丸

金匱要畧云。新產婦人有二病。一者病瘕。二者病鬱。

胃三者大便難。新產血虛多汗出。善中風。故令病瘕。

亡血復汗。寒多。故令鬱。胃亡津液。胃燥。故大便難。心

典云。血虛汗出。筋脈失養。風入而益其勁。此筋病也。

亡陰血虛。陽氣遂厥。而寒復鬱之。則頭眩而目昏。此

臨證指南醫案

卷九

產後

癸

神病也。胃藏津液。而滲灌諸陽。亡津液。胃燥。則大腸

失其潤。而大便難。此液病也。三者不同。其爲亡血傷

津則一。故皆爲產後所有之病。卽此推之。凡產後血

虛諸症。可心領而神會矣。張璐玉云。產後元氣虧損。

惡露乘虛上攻。眼花頭暈。或心下滿悶。神昏口噤。或

痰涎壅盛者。急用熱童便。主之。或血下多而暈。或神

昏煩亂者。芎歸湯。加入參澤蘭。童便。兼補而散之。又

敗血上衝有三。或歌舞譁笑。或怒罵坐臥。甚則踰牆

上屋。此敗血衝心多死。用花蕊石散。或琥珀黑龍丹。

如難悶亂。不致顛狂者。失笑散。加鬱金。若飽悶。輕蘇

腹滿脹痛者。此敗血衝胃。五積散。或平胃加姜桂。不

應。送來復丹。嘔逆腹脹。血化爲水者。金匱下瘀血湯。

若面赤。嘔逆欲死。或喘急者。此敗血衝肺。人參蘇木。

甚則加芒硝。蕩滌之。大抵衝心者。十難救一。衝胃者。

五死五生。衝肺者。十全一二。又產後口鼻起黑色。而

鼻衄者。是胃氣虛敗。而血滯也。急用人參蘇木。稍遲

不救。丹溪云。產後當大補氣血。卽有雜症。以未治之

一切病。多是血虛。皆不可發表。景岳云。產後既有表

邪。不得解。既有火邪。不得清。既有內傷。停滯。不

臨證指南醫案

卷九

產後

癸

熱。便實中滿。脈緊數洪。大力。此表邪實症也。又火

盛者。必熱渴燥煩。或便結腹脹。口鼻舌焦黑。酷喜冷

飲。眼胞尿痛。溺赤。脈洪滑。此內熱實症也。又或因產

過食。致停蓄不散。此內傷實症也。又或鬱怒動肝。胸

脇脹痛。大便不利。脈弦滑。此氣逆實症也。又或惡露

未盡。瘀血上冲。心腹脹滿。疼痛拒按。大便難。小便利。

此血逆實症也。遇此等實症。若用大補。是養虎爲患。

誤矣。以上四家之論。俱屬產後治病。扼要處。學者當

細心體察。再參觀葉先生醫案。更能博考。以治

產後諸病。易如反掌矣。否則如卽能視。不足以有明

也如既能履不能山而行也烏得稱司命哉 秦天
婦人善病而病由產後者為更多亦為更劇產後氣
血大虧內而七情外而六氣稍有感觸即足致病使
治之失宜為患莫測朱丹溪曰產後以大補氣血為
主雖有他症以末治之此語固為產後症之宗旨而
症實多端論其常未盡其變也醫者惟辨乎脈候以
明內外之因審乎陰陽以別虛實之異病根透徹而
施治自效恆毋以逐瘀為了事亦毋以溫補為守經
今觀先生案中凡內因之實症未嘗不用攻治之劑
然如熱熾昏亂有似惡露沖心者先生則曰陰氣下

臨證指南醫案 卷九 產後

泄陽氣上冒從亡陽汗出諸語例為救逆法如少腹
沖及心腕痛而脹滿有似肝氣犯胃者先生則曰產
後下虛厥氣上攻惟用柔陽之藥如頭痛汗出煩渴
有似感冒風寒者先生則曰開泄則傷陽辛熱則傷
陰從仲景新產鬱胃之治以立方至於奇經八脈為
產後第一要領蓋八脈麗於下產後陰分一傷而八
脈自失所司溫補鎮攝在所必先無奈世人罕知即
有一二講論者終屬影影綽綽惟先生於奇經之法
條分縷析盡得其精微如衝脈為病用紫石英以為
鎮逆任脈為病用龜板以為靜攝督脈為病用鹿角

以為溫煦帶脈為病用當歸以為宣補凡用奇經之
藥無不如芥投針若夫外因為病者風濕入肺用薑
莖湯甘寒淡滲以通肺氣遇寒腹痛用當歸桂枝湯
辛甘化陽以和營衛暑氣上干則陰虛是本病暑熱
是客氣清上勿致礙下便是理邪如濕傷脾陽而飲
邪阻氣用苦溫淡滲之品澤水湯治之熱蒸化燥而
胃阻腸痺用首烏麻仁麥冬花粉清滋潤燥之劑治
之熱乘陰虛而入營中則忌表散清劑惟有陰可以
除熱更如邪入營絡而成瘧症不得發汗厥補當以
輕清和解為主要之先生於內因之症一一尋源揅

臨證指南醫案 卷九 產後

本非同俗手漫謂補虛於外因之端種種審變達權
不以產後自為荊棘惟讀書多而胸具靈機故於丹
溪本末二字尤為神化無迹此所謂知其要者一言
而終不知其要者流散無窮也案中諸症甚多學者
果能悟焉則一以貫之矣 龔商年

癥瘕

營絡氣張

久痛在絡管中之氣結聚成瘕始而夜發繼而晝夜俱痛陰陽兩傷偏閱醫藥未嘗說及絡病便難液涸香燥須忌

青葱管

新絳

當歸鬚

桃仁

生鹿角

柏子仁

朱六辛潤通絡成形瘕濁吐出然瘕濁必下行爲順上通雖安恐其復聚仍宜緩通以去瘕生新爲治無取沉降

急攻謂怒勞多令人傷陽耳

臨證指南醫案

卷九

癥瘕

聖

當歸

桃仁

羌蔚子

製疾黎

生鹿角

茯苓

香附汁法丸

周十三瘕聚結左肢節寒冷病在奇脈以辛香治絡

鹿角霜

桂枝木

當歸

小茴

茯苓

香附

葱白

翼脈症向安辛甘化風方法非謬據云痛時少腹滿脹

其有形瘕瘕狀亦畧小法宜益營之中再佐通泄其氣

古稱通則不痛耳

人參

當歸

肉桂

吳萸

小茴

茯苓

青葱管

欽 疝瘕少腹痛

當歸

生薑

羊肉

桂枝

小茴

茯苓

又瘕痛已止當和營理虛

歸身

紫石英

白芍

小茴

淡菴蓉

肉桂

丸方用養營去芪朮桂合杞圓膏

朱四疝瘕腹痛有形用柔溫辛補

當歸

生薑

羊肉

某右脇攻痛作脹應時而發是濁陰氣聚成瘕絡脈病

臨證指南醫案

卷九

癥瘕

聖

也議溫通營絡

當歸 三錢

小茴 炒焦 一錢

上肉桂 一錢

青葱管 十

瘕聚有形高突痛在胃脘心下或垂外腰少腹重按

既久痛勢稍定經水後期色多黃白此皆衝脈爲病絡

虛則脹氣阻則痛非辛香何以入絡苦溫可以通降

延胡

川棟

香附

鬱金

茯苓

降香汁

羌蔚子

炒山查

烏藥

又瘕聚癪結痛脹妨食得食不下痛甚今月經阻不至

帶淋甚多病由衝任脈絡擾及肝胃之逆亂若不宣暢

徑通日久延爲蠱疾矣

炒桃仁 當歸鬚 延胡 川棟子 青皮	小茴 吳茱 紫降香 青葱管	柳四絡血不注衝脉則經阻氣攻入絡聚而為瘕乃痛衝	脉是陽明屬隸痛升於右腹及中脘作嘔清涎濁沫操	家煩怒犯胃莫如肝泄肝正救胃	金鈴子 炒延胡 蓬莪朮 青橘葉	半夏 厚朴 薑汁 茯苓	又 葱白丸二錢艾棗湯送	某 臍下瘕形漸大氣塞至心膈及咽喉飲不解渴遂氣	攻至背部經水百餘日不來小溲得利大便不爽氣滯	臨證指南醫案 卷九 瘕瘕 毒	血瘕皆因情志易鬱肝胆相火內灼衝脉之血欲涸丹	溪謂氣有餘便是火口甜食後痞用苦辛清降	胡黃連八分 山梔仁一分 南山楂三錢 蘆薈一錢	雞脆皮 不落水片焙 化服回生丹牛丸	陸十經阻半年腹形漸大痛不拒按漫短便通據形色脉	象不是用通經丸者下氣遠攻於絡有形若瘕瘕炒枯	腎氣湯	繆 脉弦左搏數年胃痛不痊發時手不可按脇中拘急	少腹左傍素有瘕聚之形氣自下焦衝起為脹為嘔此	乃驚憂嗔怒致動肝木乘其中土胃傷失降脉絡逆併
-------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------------	-----	------------------------	-----------------------	-----------------------

痛勢為甚初起或理氣獲效久發中衰辛香氣燥脾胃	不勝剋伐矣議疎肝木安土為法冀其漸緩再酌後法	川棟子 川連 乾薑 桂枝	當歸 川椒 生白芍 烏梅	又 少腹痼瘕多年衝起散漫胃脘兩脇痛甚欲嘔年前	用安胃泄肝頗效但下焦至陰足附發燥裂水久留濕	執瘀留經脉絡中交病若非宣通氣血壅滯恐非至理	桃仁 栝子仁 川芎 當歸	小茴 小香附 茯苓 山梔薑汁	為末用青葱管百葶加水一杯取汁法丸	臨證指南醫案 卷九 瘕瘕 毒	某五數年左脇聚瘕發作必嘔吐涎沫酸苦渴水寤不成	寐便閉忽瀉始於恒鬱病由肝失暢達木必傳土胃氣	受侮病久入絡氣血兼有緩圖為宜急攻必變脹病	生牡蠣 川棟子肉 延胡 桃仁	半夏 茯苓 橘紅 白芥子	川連 吳萸 香附汁薑汁法丸	趙 脉小身不發熱非時氣也凡經水之至必由衝脉而	始下此脉胃經所管醫藥消導寒涼不能中病反傷胃	口致衝脉上沖犯胃為嘔攻胸痞塞升巔則昏厥經言	衝脉為病男子內疝女子瘕聚今小腹有形兼有動氣
-----------------------	-----------------------	--------------	--------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------	------------------	----------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	--------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不可宣暢流通之義醫不知絡脉治法所謂愈究愈窮矣

鹿角霜 淡菴蓉 炒當歸 炒小茴

生杜仲 茯苓 用紫石英一兩煎湯煎藥

將四天癸將止之年小腹厥陰部位起痲動則滿腹脹痛形堅或時脊巔掣痛必有穢痰血筋吐出此起於鬱傷

久則液枯氣結內風陽氣煩蒸則心熱痞結咽阻已屬痲疾治必無效倘腹大中滿則劇矣

牡蠣 生地 阿膠 小胡麻

茯苓 稽豆皮 美

臨證指南醫案 卷九 痲痲

厥陰寒滯嘔瀉 沈四肢冷腹痛有形為痲久瀉

當歸 炒黑小茴 炒黑上肉桂 山查 炒黑茯苓

又冷利有痲遇冷則嘔

吳萸 炒小茴 延胡 茯苓

川棟子 生香附

某 腕中痲聚

川棟子 延胡 吳萸 青皮

良薑 茯苓

林 脉左弦瀉少腹攻逆痛即大便肝氣不疎厥陰滯積

香附 雞肫皮 茯苓 麥芽

香椽皮 青皮 炒杏肉 砂仁殼

又少腹痲聚攻逆身熱或噫或濁氣下泄則諸症悉愈

惱怒病發厥陰肝木鬱遏不疎顯露一斑

川棟子 小茴 生牡蠣 桂枝木

生白芍 青皮

程 聚氣痲痲大便不爽必腹中痲痛當通腑經氣分

葱白丸二錢五分紅棗湯送

又做朱南陽意以濁攻濁

韭白根 兩頭尖 炒香椿核

小茴香 金鈴子肉

臨證指南醫案 卷九 痲痲

又痲聚已解用八珍丸加香附小茴白花益母膏丸

某 痲聚在左脇中肝病

桃仁 川棟子 延胡 當歸

橘紅 香附

王 痲聚季脇漸加煩倦減食入夏土旺氣泄用泄少陽

補太陰方

人參 茯苓 炙草 當歸

丹皮 生地 鱉甲 澤蘭膏

周 痛久在絡凝聚成形仍屬經痲謹用河間法

川棟子 瓜蒌皮 香附汁 延胡 生牡蠣

又理氣豁痰痛止思食仍以前法參用

半夏 瓜蒌皮 香附汁 生牡蠣

橘紅 香豉

風熱

四一用丹溪小温中丸脹利自減知腸胃濕熱皆阻腑腸

之流暢水穀之氣不主游溢瘕屬氣聚瘕為血結由無

形釀為有形攻堅過急藥先入胃徒致後天氣乏恐脹

病必至矣俗有痞散成蟲之說可為治此病之戒律

老韭根 生晒桃仁 生香附 炒查肉

海熱

胡二少腹聚瘕能食便不爽腹微脹小温中丸

臨證指南醫案

卷九

瘕瘕

美

王二初病寒熱半年經水不來少腹已有瘕形食又減半

當此年犯乾血勞慮

焦木 茯苓 廣皮 香附

當歸 南山查 白芍

夫瘕者徵也血食凝阻有形可徵一定而不移瘕者

假也臟氣結聚無形成假推之而可動昔有七瘕八

瘕之說終屬強分名目不若有形無形之辨為明的

也二症病在肝脾而胃與八脉亦與有責治之法

即從諸經再究其氣血之偏勝氣虛則補中以行氣

氣滯則開鬱以宣通血衰則養營以通路血瘀則入

絡以攻痺此治瘕瘕之大畧古方甚多而慈白丸烏

雞煎丸尤為神效瘕瘕之外更有疝瘕腸覃石瘕內

疝等症古人論之已詳茲不必贅今參先生方案如

營傷氣阻者於益營之中佐通泄其氣如絡虛則脹

氣阻則痛者以辛香苦溫入絡通降又如肝胃兩病

者以泄肝救胃肝胃脾同病者則扶土制木肝臟之

氣獨鬱不宜者辛香尚治於氣血痺絡逆失和者辛

香尚理其血病由衝任擾及肝胃之逆亂者仍從肝

胃兩經主治以疎降溫通凡此悉靈機法眼藥不妄

投總之治瘕瘕之要用攻法宜緩宜曲用補法忌瀉

臨證指南醫案

卷九

瘕瘕

美

忌呆上逆則想肝臟衝病之源頭下垂則究中氣陰

邪之衰旺吞酸吐水必兼剛藥液枯腸結當祖滋營

再辨脉象之神力形色之枯澤致病之因由則治法

自然無悞矣 蘇尚年

熱入血室

熱邪內陷 陰液傷

沈氏 溫邪初發。經水即至。寒熱耳聾。乾嘔。煩渴。飲見症已屬熱入血室。前醫見咳嗽。脈數。舌白。為溫邪在肺。用辛涼輕劑。而煩渴愈甚。拙見熱深。十三日不解。不獨氣分受病。况體質素虛。面色黧慘。恐其邪陷。遂厥。三日前已經發瘧。五液暗耗。內風掀旋。豈得視為極小之恙。議用玉女煎。兩清氣血。邪熱仍有救陰之能。

玉女煎加竹葉心。武火煎五分。

又 脈數。色黯。舌上轉紅。寒熱消渴俱緩。前主兩清氣血。

臨證指南醫案 卷九 熱入血室 全

伏邪已得效驗。大凡體質素虛。驅邪及牛。必兼護養元氣。仍佐清邪。腹痛便溏。和陰是急。

白芍 炙草 人參 炒麥冬 炒生地

又 脈右數左虛。臨晚微寒熱。復脈湯去薑桂。

吳氏 熱病十七日。脈右長左沉。舌痿飲冷。心煩熱。神氣忽

清。忽亂。經來三日。患病。血舍內之熱氣。乘空內陷。當以瘀熱在裏論病。但病已至危。從蓄血如狂例。

細生地 丹皮 製大黃 炒桃仁

澤蘭 人中白

攻熱入血室。金匱有五法。第一條于小柴胡。因寒熱

而用雖經水適斷。急提少陽之邪。勿令下陷。為最。第

二條。傷寒發熱。經水適來。已現晝明夜劇。諸語見。果

恐人誤認陽明實病。故有無犯胃氣。及上一焦之戒。

第三條中風寒熱。經水適來。七八日。脈遲身涼。胸脇

滿如結胸狀。諸語者。顯無表症。全露熱入血室之候。

自當急刺期門。使人知針力。比藥力尤捷。第四條。陽

明病。下血。譫語。但頭汗出。亦為熱入血室。亦刺期門。

汗出而愈。仲景無非推廣其義。教人當知通變。第五

條。明其一症。而有別因為害。如痰潮上腕。昏冒不知。

當先化其痰。後除其熱等語。所謂急者先除也。乃今

臨證指南醫案 卷九 熱入血室 全

人一遇是症。不辨熱入之輕重。血室之盈虧。遽與小

柴胡湯。貽害必多。要之熱甚而血瘀者。與桃仁承氣

及山甲歸尾之屬。血舍空而熱陷者。用犀角地黃湯。

加丹參木通之屬。表邪未盡。而表症仍兼者。宜合乎

和解。熱輕而清藥過投。氣機致鈍者。不妨借溫通為

使。血結胸有桂枝紅花湯。參入海蛤桃仁之治。昏狂

甚。進牛黃膏。調入清氣化結之前。再觀案中。有兩解

氣血燔蒸之玉女法。熱甚陰傷。有育陰養氣之復脈

法。又有護陰滌熱之緩攻法。先聖後賢。其治總條。分

鑿析。學者。審症製方。慎勿拘乎。此胡一法也。邵新甫

臨證指南醫案目

卷十

幼科要畧

痧疹

痘

疳

吐瀉


痢疾厥

虫

藥方

臨證指南醫案

卷十



臨證指南醫案卷十

許嗣李大瞻繪圖

古吳葉桂天士先生著 錫山華南川岫雲同校

邵銘新甫

幼科要畧

按襁褓小兒體屬純陽所患熱病最多世俗醫者固知謂六氣之邪皆從火化飲食停留鬱蒸變熱驚恐內迫五志動極皆陽奈今時治法初則發散解肌以退表熱仍混入消導繼用清熱苦降或兼下奪再令病家禁絕乳

臨證指南醫案

卷十 幼科

食每致胃氣索然內風來乘變見驚癇告費甚多附記世俗通套之方藥於左不可不知不足取法也

防風 荆芥 葛根 前胡 桔梗 木通

赤芍 蘆子 厚朴 陳皮 山查 麥芽

枳殼 神麩 鈎藤 夏枯香薷冬佐麻黃羌活

兩三日熱不解

柴胡 前胡 黃連 黃芩 山梔 連翹

薄荷 葛根 木通 鈎藤 厚朴 枳實

瓜蒌實 丸劑必用大黃

四五日不解但言食滯未盡表裏不和總以柴芩小陷

胸若嘔逆煩渴。用竹茹黃連半夏若痰多喘促卽用葶
藶杏仁蘇子葶子胆星貝母甚者加牛黃。此皆套法。所
當戒也。

屢清消不愈。便無方法。苟不變驚。必曰肯蒸孩勞。所用
藥。似不分氣血陰陽。但知見症施治。如早涼暮熱。必用

地骨皮 丹皮 生地 玄參 甘草 北沙參

石斛 知母

有痰加

蘇子 杏仁 貝母 橘紅 胆星 桔梗

其鈞藤石斛茯苓藜蘆之屬。每劑必用。總之取無故遺

臨證指南醫案

卷十

幼科

二

藥待其自愈。倘有變症。希冀掩飾而已。

愚按嬰兒肌肉柔脆。不耐風寒。六腑五臟氣弱。乳汁難化。
內外二因之病自多。然有非風寒。竟致外感。不停滯已。
屬內傷。其故何歟。嘗思人在氣交之中。春夏地氣之升。

秋冬天令之降。呼出吸入。與時消息。間有穢濁吸入。卽
是三焦受邪。過募原直行中道。必發熱煩躁。倘幼醫但

執前藥。表散消導清火通便。病輕或有倖成。病重必然
顛覆。錢仲陽云。糞屢不可近。穢穢小兒。余言非無據矣。
四十年來治效頗多。畧述其畧云。

夫春溫夏熱秋涼冬寒。四時之序也。春應溫而反大寒。夏

應熱而反大涼。秋應涼而反大熱。冬應寒而反大溫。皆
不正之乖氣也。病自外感。治從陽分。若因口鼻受氣。未
必恰在足太陽經矣。大凡吸入之邪。首先犯肺。發熱咳
喘。口鼻均入之邪。先上繼中。咳嗽必兼嘔逆。腹脹。雖因
外邪。亦是表中之裏。設宗世醫發散湯。經雖汗不解。幼
穉質薄神怯。日期多延。病變錯綜。茲以四氣常法列左。

伏氣

春溫一症。由冬令收藏未固。昔人以冬寒內伏。藏於少陰。
入春發於少陽。以春木內應肝胆也。寒邪深伏。已經化
熱。昔賢以黃芩湯爲主方。苦寒直清裏熱。熱伏於陰。苦

臨證指南醫案

卷十

幼科

三

味堅陰。乃正治也。知溫邪忌散。不與暴感門同法。若因
外邪先受。引動在裏伏熱。必先辛涼以解新邪。繼進苦
寒以清裏熱。況熱乃無形之氣。幼醫多用消滯。攻治有
形。胃汁先涸。陰液劫盡者多矣。

黃芩湯

慈政湯 新邪引動伏邪

備用方

涼膈散

清心涼膈散

風溫

風溫者。春月受風。其氣已溫。經謂春氣病在頭。治在上焦。
肺位最高。邪必先傷。此手太陰氣分先病。失治則入手
厥陰。心胞絡。血分亦傷。益足經順傳。如太陽傳陽明。人

皆知之。肺病失治。逆傳心胞絡。幼科多不知者。俗醫見身熱咳喘。不知肺病在上之旨。妄投荆防柴葛加入枳朴杏蘇。荀子查麥廣皮之屬。輒云解肌消食。有見痰喘。便用大黃礞石滾痰丸。大便數行。上熱愈結。幼穉穀少。胃薄表裏苦辛化燥。胃汁已傷。復用大黃大苦沉降丸。藥致脾胃傷和傷極。陡變驚癇。莫救者多矣。

按此症風溫肺病。治在上焦。夫風溫春溫忌汗。初病投劑。宜用辛涼。若雜入消導發散。不但與肺病無涉。劫盡胃汁。肺乏津液。上供頭目清竅。徒為熱氣薰蒸。鼻乾如煤。目瞑。或上竄無淚。或熱深肢厥。狂躁瀉瀉。胸高氣促。

臨證指南醫案

卷十

幼科

四

皆是肺氣不宣化之徵。斯時若以肺藥少加一味清降。使藥力不致直趨腸中。而上痺可開。諸竅自爽。無如城市庸醫。僉云結胸。皆用連薑柴枳。苦寒直降。致閉塞愈甚。告饒甚多。

按此症。初因發熱喘嗽。首用辛涼清肅。上焦如薄荷連翹牛蒡。象貝桑葉沙參。梔皮薑皮花粉。若色蒼熱勝煩渴。用石膏竹葉辛寒清散。痧症亦當宗此。若日數漸多。邪不得解。芥連涼膈亦可選用。至熱邪逆傳入膈中。神昏目瞶。鼻竅無涕淚。諸竅欲閉。其勢危急。必用至寶丹。或牛黃清心丸。病減後餘熱。只甘寒清養胃陰足矣。

備用方葦莖湯

清心涼膈散

涼膈散

瀉白散

葶藶大棗湯

白虎湯

至寶丹

清心牛黃丸

竹葉石膏湯

喻氏清燥救肺湯

夏熱

夏為熱病。然夏至已前。時令未為大熱。經以先夏至病溫。後夏至病暑。溫邪前已申明。暑熱一症。幼醫易眩。夏暑發自陽明。古人以白虎湯為主方。後賢劉河間創議。迨出諸家。謂溫熱時邪。當分三焦投藥。以苦辛寒為主。若拘六經分症。仍是傷寒治法。致悞多矣。蓋傷寒外受之。

臨證指南醫案

卷十

幼科

五

寒必先從汗解。辛溫散邪是已。口鼻吸入之寒。即為中寒。陰病治當溫。果分三陰見症。施治若夫暑病。端方甚少。皆因前人畧於暑。詳於寒耳。考古如金匱暑暈之。因而潔古以動靜分中暑中寒。各具至理。茲不贅述。論幼科病暑。熱夾雜別病有諸。而時下不外發散消導。加入香薷一味。或六一散一服。考本草香薷辛溫發汗。能泄宿水。夏熱氣閉。無汗渴飲停水。香薷必佐杏仁。以杏仁苦降泄氣。大順散取義。若此。長夏濕令。暑必兼濕。暑傷氣分。濕亦傷氣。汗則耗氣。傷陽。胃汁大受劫。燥變病。由此甚多。發泄司令。裏真自虛。張鳳達云。暑病首用辛。

涼。繼用甘寒。再用酸泄。酸不必用。下可稱要言。不煩矣。然幼科因暑熱蔓延。變生他病。茲摘其集。

受熱厥逆

夏令受熱。昏迷若驚。此為暑厥。即熱氣閉塞。孔竅所致。其邪入絡。與中絡同法。牛黃丸至寶丹。芳香利竅。可效。神甦以後。用清涼血分。如連翹。心竹葉。心玄參。細生地。鮮生地。二冬之屬。此症初起。大忌風藥。初病暑熱傷氣。竹葉石膏湯。或清肺輕劑。大凡熱深厥深。四肢逆冷。但看面垢齒燥。二便不通。或瀉不爽。為是大忌。誤認傷寒也。

疳

臨證指南醫案

卷十

幼科

六

幼兒斷乳。納食。值夏月。脾胃主氣。易於肚膨泄瀉。頭熱手足心熱。形體日瘦。或煩渴善食。漸成五疳。積聚。當審體之強弱。病之新久。有餘者。當疏胃清熱。食入糞色白。或不化。當健脾。佐消導清熱。若濕熱內鬱。蟲積腹痛。導滯驅蟲。微下之。緩調用肥兒丸之屬。

口疳

夏季秋熱。小兒泄瀉。或初愈未愈。滿口皆生疳。齧嘗有阻。塞咽喉。致危者。此皆在裏濕。盛生熱。熱氣蒸灼。津液不升。濕熱偏傷氣分。治在上焦。或佐淡滲。世俗常刊西瓜翠衣治疳。取其輕揚滲利也。

脹

夏季濕熱鬱蒸。脾胃氣弱。水穀之氣不運。濕着內蘊。為熱。漸至浮腫腹脹。小水不利。治之非法。水濕久漬。逆行犯肺。必生咳嗽喘促。甚則坐不得臥。俯不能仰。危期速矣。大凡喘必生脹。脹必生喘。方書以先喘後脹者。治在肺。先脹後喘者。治在脾。亦定論也。金匱有風水。皮水。石水。正水。黃汗。以分表裏之治。河間有三焦分消。子和有磨積逐水。皆有奧義。學者不可不潛心體認。難以槩述。閱近代世俗論水濕喘脹之症。以內經開鬼門。取汗為表治。分利小便。潔淨府為裏治。經旨病能篇。謂諸濕腫滿。

臨證指南醫案

卷十

幼科

七

皆屬於脾。以健脾燥濕為穩治。治之不效。技窮束手矣。不知凡病皆本乎陰陽。通表利小便。乃宣經氣利腑氣。是陽病治法。暖水燻濕脾腎。補方以驅水。是陰病治法。治肺痺以輕開上。治脾必佐溫通。若陰陽表裏乘違。臆真日瀉。陰陽不運。亦必作脹。治以通陽。乃可奏績。如局方禹餘糧丸。甚至三焦交阻。必用分消。腸胃窒塞。必用下奪。然不得與傷寒實熱同例。擅投硝黃。枳朴。擾動陰血。若太陰脾臟飲濕阻氣。溫之補之。不應欲用下法。少許。遂為丸可也。其治實症。選用方法。備錄。

備用方。葶大棗湯。

瀉白散。

大順散。

牡蠣澤瀉散 五苓散 越婢湯

甘遂半夏湯 控涎丹 五子五皮湯

子和桂苓湯 禹功丸 茯苓防已湯

中滿分消湯 小青龍湯 木防已湯

附記一徐姓小兒單脹數月。幼科百治無功。愈用肥兒

丸萬安散磨積丹綠礬丸雞胞藥俱不效。余謂氣分不

效。宜治血絡。所謂絡瘀則脹也。用歸鬚桃仁延胡山甲

螻螂磨靈脂山查之類為丸。十日全愈。

吐瀉霍亂

吐瀉一症。幼兒脾胃受傷。陡變驚搐最多。若是不正穢氣

臨證指南醫案 卷十 幼科

觸入。或口食寒冷。套用正氣散六和湯五積散之類。正

氣受傷。肢冷呃忒。嘔吐自利。即用錢氏益黃散。有痰用

星附六君子湯。理中湯等。倘熱氣深伏。煩渴引飲。嘔逆

者。連香飲黃連竹茹橘皮半夏湯。熱閉神昏。用至寶丹。

寒閉用來復丹

食瓜果泄瀉

穉年夏月食瓜果水寒之濕。着於脾胃。令人泄瀉。其寒濕

積聚。未能遽化。熱氣必用辛溫香竄之氣。古方中消瓜

果之積。以丁香肉桂。或用麝香。今七香餅治瀉。亦祖此

意。其平胃散胃苓湯亦可用。

瘧

瘧因暑發居多。方書雖有痰食寒熱瘧瘧之互異。幼穉之

瘧。都因脾胃受病。然氣性神弱。初病驚癇。厥逆為多在

夏秋之時。斷不可認為驚癇。大方瘧症。須分十二經。與

嗽症相等。若幼科庸俗。但以小柴胡去參。或香薷葛根

之屬。不知柴胡動肝陰。葛根竭胃汁。致變屢矣。幼科純

陽暑為熱氣。症必熱多煩渴。邪自肺受者。桂枝白虎湯

二進必愈。其有冷食不道。有足太陰脾病見症。初用正

氣。或用辛溫。如草果生薑半夏之屬。方書謂草果治太

陰獨勝之美。知母治陽明獨勝之熱。瘧久色奪唇白汗

臨證指南醫案 卷十 幼科 九

多。餒弱必用四獸飲。陰虛內熱。必用蠶甲首烏知母。便

漸瘳者。忌用久瘧。營傷寒。勝加桂薑。擬初中末瘧。門用

藥於左

初病暑風濕熱瘧藥 脫痞悶 枳殼 桔梗

杏仁 厚朴 瓜蒌皮 山梔 香豉

頭痛宜辛涼輕劑 連翹 薄荷 赤芍 羚羊角

蔓荊子 滑石 淡滲清出

重則用石膏 口渴用花粉 煩渴用竹葉石膏湯

熱甚則用黃芩黃連山梔

夏季身痛屬濕。羌防辛溫宜忌。宜用木防已蚕沙

暑熱邪傷初在氣分日多不解漸入血分反渴不多飲唇舌絳赤芩連膏知不應必用血藥諒佐清氣熱一味足矣。輕則用青蒿 丹皮汗多 犀角 竹葉心

玄參 鮮生地 細生地 木通 亦能發汗

淡竹葉 若熱久痞結瀉心湯選用

又夏月熱久入血最多蓄血一症諷語昏狂看法以小便秘長者大便必黑為是桃仁承氣湯為要藥

幼穉瘧久面腫腹膨泄瀉不欲食或囊腫或跗腫必用

東垣益氣以升陽倘脾陽消憊前方不應用理中湯或

錢氏益黃散得效二三日須投五苓散一二日再與異

臨證指南醫案

卷十

幼科

十

功參苓白朮散之類必全好 徐忠可註全圖有云幼

兒未進穀食者患瘧久不止用冰糖濃湯余試果驗

瘧多用烏梅以酸泄木安土之意用常山草果乃劫其

太陰之寒以常山極走使二邪不相併之謂用人參生

薑曰露薑飲一以固元一以散邪取通神明去穢惡之

氣總之久瘧氣餒凡壯胆氣皆可止瘧未必真有瘧鬼

又瘧邪既久深入血分或結瘧母鱉甲煎丸設用煎方

活血通絡可矣

痢

痢疾一症古稱滯下蓋裏有滯瀉而後下也但滯在氣滯

在血冷傷熱傷而滯非一人以滯為食但以消食併令禁忌飲食而已

夫瘧痢皆起夏秋都因濕熱鬱蒸以致脾胃水穀不運

濕熱灼氣血為粘膩先痛後痢痢後不爽若偶食瓜果

水寒即病未必即變為熱先宜辛溫疎利之劑若膿血

幾十行疴痛後重初用宣通驅熱如芩連大黃必加甘

草以緩之非如傷寒糞堅須用芒硝鹹以硬堅直走破

泄至陰此不過苦能勝濕寒以逐熱足可却病古云行

血則便膿愈導氣則後重除行血涼血如丹皮桃仁延

胡黑查歸尾紅花之屬導氣如木香枳榔青皮枳朴廣

臨證指南醫案

卷十

幼科

十一

皮之屬世俗通套不過如此蓋瘧傷於經猶可延挨痢

關乎臟候治必危診之大法先明體質強弱肌色蒼嫩

更詢起居致病因由初病體堅症實則法可遵久病氣

餒神衰雖有腹痛後重亦宜詳審不可槩以攻積清奪

施治 附附記一治驗備考

施姓子年七歲七月二十三日天久雨陰晦遂發泄瀉

數次越日腹痛下痢紅白延幼科二人調治五六日至

初二日余診之嘔逆不食下痢無度都是血水其腹痛

晝夜無寧刻兩脈俱細右濡欲飲坐次鼻聞藥氣乃大

黃氣令其勿進施云有二醫在打先生一商何如余唯

之入書室索方一醫曰下痢已來全無精粕若非攻蕩去積無別法可投余曰肢冷下血液七八日痛不飲木望面色枯白中極氣黯脉形細爽按之不鼓明是冷濕中於太陰仲景太陰九法示不用下乃急煎人參炙草炮薑歸芍陳皮少佐肉桂二劑垢滯得下痛痢大減繼以歸芍異功散參苓白朮散半月全安

噤口不納水穀下痢都因熱升濁攻必用大苦如芩連石蓮清熱人參輔胃益氣熱氣一開即能進食藥宜頻頻進二三日

小兒休息久痢變為糞後下血最難速愈有因氣弱下

臨證指南醫案

卷十

幼科

十一

陷者補中益氣虛寒飲食不化者錢氏益黃散濕熱未淨氣分延虛者清暑益氣湯胃強善食者苦寒清熱更節飲食須善調經月

久瀉久痢必傷及腎以腎司二便也必肛門後墜不已與初病濕熱裏急下重不同治以攝陰液或佐疎補久則純與攝納

小兒熱病最多者以體屬純陽六氣着人氣血皆化為熱也飲食不化蘊蒸於裏亦從熱化矣然有解表已復熱攻裏熱已復熱利小便愈後復熱養陰滋清熱亦不除者張季明謂元氣無所歸着陽浮則條熱矣六神湯

生之

秋燥

秋深初涼穉年發熱咳嗽證似春月風溫症但溫乃漸熱之稱涼即漸冷之意春月為病猶冬藏固密之餘秋令感傷恰值夏熱發泄之後其體質之虛實不同但溫自上受燥自上傷理亦相等均是肺氣受病世人誤認暑感風寒混投三陽發散津劫燥甚喘急告危若果暴涼外束身熱痰嗽只宜葱豉湯或蘇梗前胡杏仁枳桔之屬僅一二劑亦可更有粗工亦知熱病與瀉白散加芩連之屬不知愈苦助燥必增他變當以辛涼甘潤之方

臨證指南醫案

卷十

幼科

十二

氣燥自平而愈慎勿用苦燥劫燥胃汁

秋燥一症氣分先受治肺為急若延綿數十日之久病必入血分又非輕浮肺藥可醫須審體質症端古謂治病如活潑之地如盤走珠耳

翁姓子方數月秋燥潮熱咳嗽如瘧幼科用發散藥二日不效忙令禁乳更醫用瀉白散再加芩連二日晝夜煩熱喘而不咳下痢粘膩藥後竟痢藥水延余診之余曰穉年以乳食為命餓則胃虛氣餒肺氣更不爽矣與玉竹甘草炒廣皮竹葉心一劑熱緩繼與香粳米南棗廣皮甘草沙參二劑與乳少進今夜抱幼餅三日全愈

冬寒

深秋入冬。暴冷折陽。外感發熱。頭痛身痛。唯惡。必從太陽。若渴能飲水者。裏熱見症。即非純以表散傷寒。每以風傷衛。用桂枝法。寒傷營。用麻黃法。小兒肌疎易汗。難任麻桂辛溫。表邪太陽治用。輕則紫蘇防風一二味。身痛用羌活。然不過一劑。傷風症亦肺病為多。前杏枳桔之屬。辛勝即是汗藥。其葱豉湯乃通用要方。若肢冷寒戰。嘔吐自痢。或身無熱。即從中寒裏症。三陰須分。但小兒科太陰中寒最多。厥陰間有。若冬令應寒。氣候溫煖。當藏反泄。即能致病。名曰冬溫。溫為欲熱之漸。非寒症得汗而解。若涉表邪一二裏熱必兼七八。是癘疹丹痧。非徒風寒。或外受之邪。與裏邪相薄。亦令鬱於經絡。或飲醇厚味。裏熱熾烈。而衛氣不與營分相和。或不直入內侵。即有腹痛下痢諸症。其治法按症。必以裏症為主。稍兼清散有諸。設用辛溫。禍不旋踵矣。至於痧痘時癘。須分四氣也。

臨證指南醫案

卷十 幼科

痘

看三關法

消氏云。小兒三歲已內。看男左女右手虎口三節。曰三關。紋色紫熱紅傷寒。青驚風。白疳病。黃色淡紅。乃平常小恙。其筋紋宜藏。不宜暴露。若見黑色。則為危險。再脈紋見下截風關為輕。中截氣關為重。上截命關為尤重耳。直透三關為大危。

痧疹

痧子

吳音

瘡子

浙江

疹

北音

丹

痧屬陽腑經邪。初起必從表治。症見頭痛。喘急咳嗽。氣粗嘔惡。一吐二日。即發者輕。三五日者重。陽病七日外。隱伏不透。邪反內攻。喘不止。必腹痛脹秘。悶危矣。治法宜

臨證指南醫案

卷十 幼科

痘

苦辛清熱。涼膈去硝黃。

方書謂足陽明胃疹。如雲佈密。或大顆如痘。但無根盤。方書謂手太陰肺疹。但有點粒。無片片者。用辛散解肌。冬月無汗。壯熱喘急。用麻杏。如華蓋散。三拗湯。夏月無汗。用辛涼解肌。葛根前胡薄荷防風香薷牛蒡枳桔木通之屬。古人以表邪口渴。即加葛根。以其升陽明胃津。熱甚煩渴。用石膏辛寒解肌。無汗忌用。凡瘡疹辛涼為宜。連翹辛涼。翹出象草。能升能清。最利幼科。能解小兒六經諸熱。

春令發痧從風溫 夏季從暑風暑必兼濕 秋令從
料燥燥氣 冬月從風寒

痧宜通泄。泄瀉為順。下痢五色者亦無妨。惟二便不利
者最多凶症。治法大忌止瀉。

痧本六氣客邪。風寒暑濕必從火化。痧既外發。世人皆
云邪透孰謂出沒之際。升必有降。降必有復。常有痧外
發身熱不除。致咽啞喉腐。喘急腹脹。下痢不食。煩躁昏
沉。竟以告斃者。皆屬裏症不清致變。須分三焦受邪孰
多。或兼別病累痺。須細體認。上焦藥用辛涼 中焦
藥用苦辛寒 下焦藥用鹹寒

臨證指南醫案

卷十 幼科

去

上焦藥氣味宜輕。以肺主氣皮毛屬肺之合。外邪宜辛
勝裏甚宜苦勝。若不煩渴。病日多。邪鬱不清。可淡滲以
洩氣分。

中焦藥痧火在中。為陽明燥化。多氣多血。用藥氣味苦
寒為宜。若日多胃津消燬。苦則助燥劫津。甘寒宜用。
下焦藥鹹苦為主。若熱毒下注成痢。不必鹹以裏堅。但
取苦味堅陰燥濕。

古人以痧為經腑之病。忌溫燥清補。所謂痘喜溫暖。疹
喜清涼也。然常有氣弱體虛。表散寒涼非法。淹淹釀成
損怯。但陰傷為多。救陰必扶脾胃。氣衰者亦有之。急

當益氣。穉年陽體純剛之藥。忌用。幼科方書歌括曰。赤
疹遇清涼而消。白疹得溫煖而解。此溫字。即後人酒醃
種木粗草紙木棉紗之屬。雖不可不知。然近年用者多
無益。

痧疔濕盛熱蒸。口舌咽喉疔傾。若不速治。有穿腮破頰
咽閉喘促告斃矣。治之宜早。外治另有諸方。若湯藥方
法。必輕淡能解上病。或清散亦可。

痧疔乃熱毒內陷。與傷寒協熱邪。盡則痢止同法。忌升
提。忌補瀉。輕則分利宜通。重則苦寒解毒。

痘

臨證指南醫案

卷十 幼科

去

論痘首推錢仲陽。陳文中二家。錢用寒涼。陳用溫熱。確乎
相左。丹溪祖錢。非陳。分解毒和中安表為要。以犀角地
黃湯為主方。舉世宗之莫敢異議。後之萬氏。以脾胃為
主。魏氏以保元為主。皆從二家脫化。費建中救偏。悉以
石膏大黃胡氏。輒投汗下。松江東地。多宗秦鏡。明京口
江寧。咸推管樞保赤。吾蘇。悉遵翁仲仁。金鏡錄。可謂家
喻戶曉者。其取長在者。不在乎治。看法精確。有可以前
知之巧妙。後之翟氏。聶氏。深以氣血盈虧解毒化毒。分
晰闡揚。錢陳底蘊。超出諸家。因分別太多。讀者目眩心
憤。不若翁仲仁。莠莠悅目也。然眼目之功。須宗翁氏。而

甄治講究。參之諸家可矣。姑舉看法。

大凡發熱三日而後見標。是其常。即以熱勢詳見症。定其吉凶。翁仲仁金鏡錄甚明。茲不復贅。其未刻悉補入。

傷寒邪由外入。痘子熱從內起。但時邪引動而出。與傷寒兩途。

週歲小兒。初熱即現驚搐昏迷之狀最多。世俗謂驚痘最好。此言未必皆然。方書云。先驚後痘者生。先痘後驚者死。頻頻驚厥最多。悶痘。蓋痘由腎至肝至心脾及肺。自裏至外。自深及淺。未發之前。痘熱先已內動。目現水

臨證指南醫案

卷十

幼科

痘

晶光芒。腎熱也。水生木而入肝。木生火而入心。心生土而入脾。土生金而入肺。其先天痘毒。從至陰以達陽。全藉身中元氣。領載充長。以化毒為漿。漿必濃厚。蒼老而始結痂。毒已外洩。元氣內返。斯無變症。週歲已內身小元弱。常有熱一日即出。亦有順痘。但須看神氣靜躁。熱勢輕重。見點徐徐而出。既出即長。熱緩安乳。便是好痘。若神氣雖安。熱亦不盛。痘點雖不多。色呆色鈍。或作頭。更足落。脈懈不束。筋骨隱隱歎息。或短氣如喘。或嘔或瀉。最多悶症。

若三日間。痘已出。色亦頗好。至夜終日煩躁不止。

最防隱處發疔。及發斑夾疹等症。

一發熱煩躁。標點雖見。熱躁愈加。細詢無忽。再參兼症。為六氣鬱遏者。從時氣治。為內傷停滯者。從裏症治。亦有表裏兩解治。亦有下奪者。但下法。寒涼之中。必須活。血理氣。防其凝滯冰伏。

初起必三次而出。熱止即齊。其贈點亦有陸續發出者。須看顏色靈活。生氣頃刻轉機。變化為要。察形辨症。治法用藥。表藥活血疎肌。次則涼血解毒。實熱便閉者。微下之。虛弱氣怯者。忌進疎解寒涼。間有虛寒弱穉。初發身不大熱。四肢皆冷。吐乳瀉乳。痘點不長。聞聲悠悠欲

臨證指南醫案

卷十

幼科

痘

絕。望色慘淡無形。恰在一二朝間。余見程氏女。年甫半。齡。佈痘極多。痘形與色。淡白前症迭見。近地幼科。愈用荆防芫蟬紅花查肉木通胡荽等尖之屬。方雖寫而示以凶危。延余診視。余曰。毒重氣虛。法在不治。但身無熱。見症虛寒。不因癘氣表邪。焉用表藥。考萬氏始終以脾胃為主。以理中湯。加丁桂與服。一劑肢暖嘔止。再服利緩痘起。再用參歸鹿茸二服。以錢氏異功散而愈。凡看痘。先論兒體強弱。辨肌色。如色白多氣虛。色蒼多血熱。形象尪羸有宿病。或渴乳。肌柔白嫩者。痘必鮮明。若黑皮粗者。色必暗晦。羸瘦病質。色燥形枯。必須辨休

判長養內症安和

病軀出痘即平常無奇亦難調理歌訣云形體羸瘦骨

如柴肌肉枯焦神思衰通體鋪排如此痘縱能漿足亦

堪嗟

一初見腰痛足重不能起立者死此毒伏於腎

一初見腹脹胸高續增喘噦者死

一初見目睛呆瞪或暗無光或黑白高低皆屬緊閉症

一初見痘煩躁不止即防疔斑疔必現於隱處多死

一初見痘不續發斑色深紫漸變藍黑六日內死

一初見痘紫斑漸起痘反隱伏此名紫斑白悶

臨證指南醫案

卷十 幼科

痘

一初見痘痘斑間雜若似洒珠點墨必死

已上皆論初見看法以定凶危發齊熱退後皆無諸惡

症翁仲仁云三日四日痘出當齊點至足心勢方安靜

若論幼小之兒氣血易週常有未及三日而發齊者年

長之體四日已外猶有贈發者痘子稀少數不盈百不

必點至足心仲仁大意謂發齊安靜無慮變症然須辨

明痘形痘色是何等呈色身體強壯痘屬上中方可許

其無慮倘幼小弱質或病後或帶別病而後佈痘未可

見痘好浪許再以冬夏氣候審詳可以百千無悞

今世用方 初見宜解肌疎表通套法 十六味

荆芥四日不用 防風三日不用 前胡三日不用 牛蒡四日不用

紫草三日便清忌 木通 紅花 甘草

赤芍 天蟲 查肉 川芎

連翹 桔梗 廣皮 蟬脫三四日不用

方書中未見點用升麻葛根湯今人不用伍氏方法見

點忌升麻 後人謂葛根表疎亦忌此輕揚升表通套

藥若裏症急須兩解

伍氏方一二日用羌防透肌湯今人不用惡其辛溫氣

雄也一二日壯熱氣促煩渴便秘痘粒不發翁仲仁云

若非風寒壅遏定是氣虛不振愚謂近世佈痘每盛發

臨證指南醫案

卷十 幼科

痘

於君相風木燥金司令蓋非火不發也火鬱發之升陽

散火是已但前症若裏熱甚重煎灼脂液苟非苦寒下

奪佐以升表不能用也費建中方頗為中的

石膏 大黃 連翹 赤芍 青皮用

查肉 花粉 紫草 木通 丹皮辛涼入血

犀角辛涼通血 發齊後用黃連

凡寒涼清火解毒必佐活血疎暢恐凝滯氣血也

實熱便秘通用

涼膈 通聖 前胡枳殼湯 四順清涼飲

痘四日發足伍氏遵古方川牛蒡熟末三分用等薺汁

酒釀燉熱調勻。臨服刺入生雞冠血十餘滴與服。毒輕者即起光潤之色。世皆宗之。

發齊已。四。五。日。用。涼。血。解。毒。湯。藥。伍。氏。名。四。聖。飲。非。扁鵲原方。

生地 連翹 銀花 紅花 甘草

天蟲 桔梗 紫草便滑用

血熱加丹皮犀角 火盛加黃連石膏羚羊角

有斑加金汁玄參 頭面不起加川芎雞冠血

咽喉痛加射干玄參山豆根 狂亂躁擾加地龍汁

毒重血凝加猪尾血米片量見大小用

臨證指南醫案

卷十

幼科

三

近世涼血解毒多用地丁銀花湯煎藥

凡看痘初起要根盤其痘易長統倘尖瘦不肥多險成漿之後務要根盤即化一線圍紅緊附頂滿滾圓是為毒化若頂陷頂破根盤黯腫其毒與氣血交凝實宜攻虛宜補

實火宜清攻不宜早看來火色大赤痘形色濕潤方可攻托否則搔擦立至乾刺毒陷不治

虛有血虛氣虛之分血虛為熱氣虛為寒但虛熱與實熱不同虛熱用滋清方藥

痘頂屬氣根盤屬血氣領血載毒則假煉化漿凡體強

質實者多火以清涼之劑火解漿成候補則痘癩者癩也其氣虛血弱色必淡白形不雄偉或頂陷或皮皺內

症則惡心少食便溏年少未進穀食者腸胃薄弱最多

虛症七日以來元氣用事不能勝毒使之外出多有內

陷致變者余最究心是症調之應手取效魏氏保元湯

聶氏參歸鹿茸湯陳氏木香異功散腸滑不禁用七味

豆蔻丸白朮散理中湯多獲奇效甚者必用三服

大凡兒肌白嫩者多虛症蒼黑者多實火雖為大藥亦

屬至要白嫩發痘色必鮮艷勿謂便是善症蒼黑發痘

色必晦昧勿便許為凶總以神氣安靜顏色日換形象

漸長便吉

六七日伍氏內托散

生黃芪 甘草 陳皮 川芎 當歸

白糯米 防風 天蟲 角刺 銀花

血熱者不用芪防芎歸 表疎者去天蟲角刺

血熱仍用丹皮地黃紫草連翹羚羊

猪尾雞冠雞鳴散達表之藥 猪尾膏通裏之藥

保元湯 人參 黃芪 炙草 加川芎當歸名芎歸

保元 虛寒加肉桂 升頂加鹿茸

氣滯正氣加廣皮厚朴 瀉加木香肉果

質弱加坎炁河車 瀝逆加丁香厚朴

參歸鹿茸湯 人參 當歸 鹿茸 黃芪

龍眼肉 炙草

木香散 人參 木香 丁香 大腹皮

桂心 青皮 訶子 半夏 甘草

前胡 赤苓

異功散 人參 木香 官桂 廣皮

當歸 茯苓 丁香 白朮 附子

肉果 厚朴 半夏

荳蔻丸 肉果 木香 砂仁 枯礬

臨證指南醫案

卷十 幼科

五

訶子 龍骨 赤石脂

白朮散 四君加藿香木香

七八九日類用清涼。痘久色既退。漿不能透。或有半漿。

頂有箸笠之形。不克充灌。今人多用桑蟲漿生用。雞冠

血生用。同酒漿和服。倘攻起。少頃後呆滯者。須用補托。

伍氏攻發藥用老人牙煨研極細加麝香少許。勿服

二三分名黑靈丹

右天蟲乃疎表風藥 山甲乃攻經隧風藥一味為

末酒漿服曰獨勝散

凡蟲蟻皆攻無血者走氣有血者走血飛者升地行者

降。凡漿足聲音啞者不妨。驟喘痰升者大忌。翁仲仁云。

挫喉聲啞。漿行飽滿亦無妨。蓋痘漿因熱氣以煉成。必

升騰以達頭面。肺位最高。熱上蒸迫。肺先受損。是以聲

出不揚。倘喘急扶肚。擗胸。乃火毒歸肺。必不治矣。

火毒歸肺。幼科每用珠子牛黃膏連之。屬多不效。余遵

孫真人葶藶湯。或仲景葶藶大棗湯。間有效者。肺氣壅

遏。苦寒直下。已過病所。故無效。

方書以六七日已前寒戰屬肺熱。六七日已後寒戰屬

氣虛。六七日以前咬牙屬胃熱。六七日已後咬牙屬血

虛。亦屬定論。

臨證指南醫案

卷十 幼科

五

八九日癢場咬牙。痘不起漿。或灰白。或涸。或癢。危險極

矣。速速溫補。亦可望生。翁仲仁云。場陷咬牙。便實。聲清

猶可治。聲清則上無熱。壅痰聚。便實則腑陽未至。盡洩

所以溫補得效耳。 木香散 異功散

八九日順痘。漿色蒼黃。毒氣悉化。亦云垂成。須謹防護

持。搔損流膿裂血。倘正氣大泄。毒從虛陷。常有不治之

患。斯時預囑。切勿懈。使癩腐乾結。肌肉完固。便是全

功。若痘已破碎。聲不啞者。毒不陷也。無妨。

伍氏方用芍藥湯 炒白芍 苡仁 茯苓

地骨皮 銀花 百合 山藥 建蓮

十一二日漸次成痲之際極好之症必有咳嗽或夜暮身熱世俗幼科僉云毒氣未盡槩投苦寒多有胃滅廢食釀成痘勞童怯者吾嘗論痘自腎臟骨髓之中由肝主筋心主血脉脾主肌肉肺主皮毛從內之外毒乃洩釋收疤之時真氣歸裏肺合皮毛是為末傳處位高體清肅從前灌脹成痲蒸迫之氣受虧已極氣泄為咳矣况投利濕下注藥而結痲其上焦已經轉燥若毒仍留伏焉能收屬此斷斷然也再論幼穉陽常有餘陰未充長佈痘至於結痲一身脂液大損其陰氣告匱可知故暮夜屬陰時為煩為熱者正內經云陰虛生內熱也昔

臨證指南醫案

卷十

幼科

三

西郊吳氏女年甫四歲痘係順症幼科調治至漿滿成痲之日忽發煩躁夜熱不寐晨起安然醫用保元及錢氏五味異功加芍藥與服熱躁益加又更一醫曰毒氣未盡乃悞補之故用桑蠶漿暨涼解藥服後躁甚而添泄瀉遂余視之觀漿痲形色詢平素起居時日當午即用六味地黃湯一服而安此一條人多忽而不究故辨及之旬朝後嗽大法以甘寒生津胃藥

蔗漿

麥冬

沙參

菴豆皮

地骨皮

甘草

玉竹

甜杏仁

解餘毒藥全以不傷胃氣為主若用寒速必須酒製

聶二氏辨之詳矣平和無奇斷不敗事如三豆飲之屬若金銀花一味本草稱解毒不寒余見脾胃虛弱者多服即瀉伍氏用連翹飲子亦取平和痘毒癢場熱症十有七八虛寒十有二三甚至骨出腐敗亦有愈者但外科大忌用火煉升藥其診看之法亦如瘍毒須分陰陽耳

痘疔濕盛生熱強者用苦寒清降以苦能去濕也若阻咽廢食以及穿腮破頰者難治

年長出痘男女慾火已動其初即現膝痛腰痠咽喉窒痛欲閉苦辛寒藥必不效宜甘鹹寒滋水制火佐以

臨證指南醫案

卷十

幼科

三

解毒六七日來痛勢日緩聶氏有參麥清補方余每用錢氏六味加龜膠玄參秋石獲效者甚多

若燥不肯起頻吐粘涎者凶

凡惡痘凶危瞬刻如諸悶症不過三五日已發而縮其危最速總在七日內再若蒙頭鎖喉懸鏡纏腰蜘蛛垂

種等為十惡症其袁氏十八惡症今人未嘗齒及如此等痘治之無益徒招怨尤更有糖沙夾斑十朝危期又

根枝雖好佈於歲內幼小之兒必八九風波不治牛漿毒陷之變必斃於十一二四之期若能食者十救一二

痘至八九旬日外無漿則稟毒不化必哈嘔搔癢痰潮

不食。眼開。條欵難以盡言。危期速矣。常有忽然連串片
片之痘。裂水形如松脂。桃膠。外露。轉眼堆聚。內症漸安。
變凶轉吉。更有旬朝內外。乾板。潤如焦鍋。已狀。毫無生
氣。忽從地角承漿諸處。裂縫流臭水。漸升頭額。堆腫高
厚。若糊臉。名曰發臭。毒泄即當補托。遲則氣脫。

驚

小兒倉猝驟然驚搐。古曰陽癇。從熱症治。古人用涼膈散
為主方。

按急驚屬陽。熱病用涼膈。以清膈間無形之熱。膈上邪
熱。逼近膈中。絡閉則危殆矣。此宣通乃一定之法。然必

臨證指南醫案

卷十

幼科

天

詢病因。察時候治之。

幼科以痰熱風驚四治。猶可說也。吾鄉有端科。立方鈎
藤連翹木通薄荷前胡枳殼桔梗。加入表散消食。多不
效驗。

驚為七情。內應乎肝。肝病發驚。木強火熾。其病動不
能靜。且火內寄肝胆。火病來必迅速。後世龍蒼本連。必
加水磨硝黃。取其苦寒直降。鹹苦走下。辛香通裏。殺之
閉也。如牛黃丸。至寶丹。紫雪。皆可選用。凡熱邪寒。致神
迷昏。情者。做此。

鈎藤丹皮之屬。僅泄少陽胆熱。與急驚。暴熱內閉之症。

無益。若火熱劫燥。血液苦寒。鹹寒不中與也。宜用犀角
地黃湯之屬。

方書有鎮墜金石之藥。有攻風劫痰之藥。雖非常用。不
可不考。

驚與厥。皆逆亂之象。仲景云。蛔厥。都從驚恐得之。凡吐
蛔腹痛。嘔惡。明是肝木犯胃。幼醫亂治。束手告斃。余宗
仲景法。每效。

慢驚。古稱陰癇。其治法。急培脾胃。理中湯為主方。有痰
嘔吐。用南星白附子六君子湯。聲音不出。開竅如竹瀝
薑汁。首蒲。根。鬱金之屬。

臨證指南醫案

卷十

幼科

天

是病皆他病致變。其因非一。有過飢禁食。氣傷。有峻藥
強灌。傷胃。有暴吐。暴瀉。脾胃兩敗。其症。面青。皖白。身無
熱。雖熱不甚。短氣。骨爽。昏倦。如寐。皆溫補治之。惟嘔逆
不受乳食。溫補反佐。薑連。連理湯。錢氏益黃散。

錢氏異功散

疳

穉年五疳。猶大方之五勞。雖方書有五臟之分。是症夏令
為多。因從脾胃。蓋小兒乳食。雜進。運化不及。初斷乳後。
果腥雜進。氣傷滯聚。致熱蒸於裏。肌肉消瘦。腹大。肌細。
名曰丁奚。或善食。或不嗜食。或渴飲無度。或便瀉。白色。

久延不已多致凶危宜忌食生冷腥肥凝滯治法初用
清熱和中分利次則疎補佐運常有難病治之無效待
妊婦產過自愈者

夏季霍亂吐瀉通用藿香正氣散

水瀉宜分利四苓散 寒加薑桂 熱用苓連

腹痛宜疎氣調氣用木香青皮有滯加炒查肉厚朴重
則加萊菔子板榔

腹痛有熱用芩芍枳實有寒則用草果砂仁吳萸

吐瀉後能食便反秘結者愈不能食神怯色痿者防慢

驚治法調中溫中若有餘熱煩渴甘寒或甘酸救津故

臨證指南醫案

卷十

幼科

三

木瓜之酸制暑通用要藥

春溫風溫

春月暴暖忽冷先受溫邪繼為冷束咳嗽痰喘最多辛解

忌溫只用一劑大忌絕穀若甚者宜晝夜監抱勿倒三

四日夫輕為咳重為喘喘急則鼻掀胸挺

春溫皆冬季伏邪詳於大方諸書幼科亦有伏邪治從

大方然暴感為多如頭痛惡寒發熱喘促身重脈

浮無汗原可表散解令溫舒辛溫宜少用陽經表藥最

忌混亂至若身熱咳嗽有痰之症只宜肺藥辛解瀉白

散加前胡牛蒡薄荷之屬消食藥只宜一二味若一二更

俱通者消食少用須辨表裏上中下何者為急施治
春季溫暖風溫極多溫變熱最速若發散風寒消食劫
傷津液變症尤速

初起咳嗽喘促通行用

薄荷 汗多連翹不用 象貝 牛蒡 花粉

桔梗 沙參 木通 枳殼 橘紅

桑皮 甘草 山梔 瀉瀉不用 蘇子 降氣不用

表解熱不清用

黃芩 連翹 桑皮 花粉 地骨皮

川貝 知母 山梔

臨證指南醫案

卷十

幼科

三

裏熱不清早上涼晚暮熱即當清解血分久則滋清養

陰若熱陷神昏痰升喘促急用牛黃丸至寶丹之屬

按風溫乃肺先受邪遂逆傳心胞治在上焦不與清胃

攻下同法吾鄉幼科常此初投發散消食不應改用柴

芩瓜薑枳實川連再下奪不應多致危殆皆因不明手

經之病耳

若寒痰阻閉亦有喘急胸高不可與前法用三白吐之

或妙香丸

暑熱

暑邪必挾濕狀如外感風寒忌用柴葛羌防如肌表熱無

汗辛涼劑無悞。香薷辛溫氣升。熱伏易吐。佐苦降。如杏仁川連黃芩則不吐。宜通上焦。如杏仁連翹薄荷竹葉。暑熱深入。伏熱煩渴。白虎湯。六一散。暑邪首用辛涼。繼用甘寒。後用酸泄。斂津。不必用下。暑病頭脹如蒙。皆濕盛生熱。白虎竹葉。酒濕食滯。加辛溫通裏。

小兒發熱最多。變蒸之熱。頭緒煩。不能載。詳於巢氏病源矣。然春溫夏熱秋涼冬寒。四季中傷為病。當按時論治。其內傷飲食治法。不宜混入表藥。消滯宜用丸藥。潔古東垣已詳悉。

臨證指南醫案 卷十 幼科 三

痧疹

袁 溫邪痰嗽氣喘肚膨。四日不解。防痧。連翹 山梔 牛蒡 杏仁 石膏

汪 痧將退。熱未去。肺氣不清。咳逆無痰。前胡 桑皮 杏仁 橘紅 桔梗

木通 蘇子 象貝

王 痧隱太早。咳喘發熱。宜開肺氣。薄荷 杏仁 象貝 連翹 桑皮

木通 紫苑 鬱金

臨證指南醫案 卷十 痧疹 三

某 溫邪發痧不透。熱毒內陷深藏。上薰肺為喘。下攻腸則利。皆冬溫火化之症。經云。火溢於內。治以苦寒。幼科不究病本。不明藥中氣味。愈治愈劇。至此凶危。

川連 黃芩 飛滑石 炒銀花

連翹 甘草 丹皮 地骨皮

蔣 喘為肺病。脹乃肝病。因時痧寒熱未解。熱邪內陷所致。王先生用苦辛酸法極通。然浮腫腹痛未減。得非經腑之濕熱留着歟。

木防已 石膏 杏仁 大豆黃卷

通草 改仁 連翹

痧退後呻吟不肯出聲涕淚皆無唇紫肌腫乃毒火未經清解上竅漸閉氣促痰鳴猶是溫邪客氣致此自當清解務盡其神識自和奈何以畏虛滯肺邪火愈熾矣

川連 玄參 杏仁 甘草

黃芩 連翹 桔梗 銀花

王 痧後及暮加喉痛咳

玄參 犀角 鮮生地 連翹

花粉 丹皮

風溫發 邪 咽痛鼻燥唇腫自利風溫熱化發疹上焦熱熾宜辛

臨證指南醫案 卷十 痧疹 三

涼微苦以泄降

連翹 黃芩 犀角 桔梗

牛蒡 杏仁 玄參 通草

六 諱六溫邪時癘觸白口鼻穢逆遊行三焦而為麻疹目赤

鼻燥吐烟瀉痢津津汗出而喘渴欲飲當與辛苦寒劉

河間法世俗不知愈日發痧但以荆防蟬殼升提火得

風颺焰烈莫遏津劫至變矣 涼膈去硝黃加石膏牛

芩赤芍

張三 手足煩熱時發赤塊

蒙豆殼 捲心竹葉 無論

痘

程 見點若隱若現神倦不寧勢如悶伏表裏俱不宜暢

雙解固宜再佐以芳香搜毒使蘊伏之毒透發為主

紫雪丹

周 熱閉心胞絡中目縱口開舌縮兩手撮空發瘧渴通

便瀉血分大傷九日險期按法圖梓勉與紫雪丹二錢

開水調緩緩下用茶銚倘得神甦速舒方有生機

又 神醒舌絳紫音縮渴飲不已心胞熱閉雖開而在裏

脂液已涸古人以心熱消渴多係臟陰現症不可攻奪

臨證指南醫案 卷十 痘 三

明矣

鮮生地 竹葉心 玄參 知母 銀花露

金汁 先用紫雪一錢

痘 初起腰足俱與肝腎蘊毒不得外越目泛匝舌癢增

喘促是緊關不治之症諸醫僉用石膏大黃然此藥僅

適陽明胃腑之藥未能搜逐肝腎至陰之臟讀宋醫錢

仲陽直訣毒伏於陰亦有下奪之法其製方曰聚變

祥丸乃百中望一二生全者

紅芽大戟 五錢 紅棗 五枚 水煮至棗熟去核及大戟

湯但用棗肉研化開水送

某毒伏不肯宣透氣滯血凝焉能起凝成漿七八險關

診視肉腫瘡枯神躁不安議疎利內壅佐活血透肌法

犀角 紫草 炒查 鮮生地 酒浸大黃

紅花 青皮 丹皮 連翹 牛蒡

芽根笋尖湯代水

俞發熱五六日來神煩不寧腹膨咳逆詢知二三日

眉間見點數粒狀如懸痣隨即隱伏不見乃毒重壅遏

悶伏景象設或發出亦屬重險且甫生六月胃之穀氣

難進湯藥擬進紫雪須少搜其蘊蓄之邪使其神安再

商 紫雪丹一分

臨證指南醫案 卷十 痘

高點雖繁密根脚綻立寒涼藥不宜太重可以維持收

功

犀角 連翹 牛蒡 炒查 紫草

丹皮 天虫 桔梗

龐朝神倦腹痛點粒繁瑣地界不清是時邪毒火兼重急

進雙解法使大便稍通六腑氣宣則痘毒外透再商

犀角 連翹 牛蒡 酒大黃 紫草 青皮

桃仁 炒查 木通 生石膏 荆芥 笋尖

程成片不立頂焦黑滯肝肺毒重不能起脹毒得化毒

今喘咳交加九朝難過

羚羊角 玄參 連翹 天虫 土貝

紫草 炒查 丹皮 銀花地丁湯代水

錢三雖未發毒其形繁密色澤不潤重險何藥今毒未

全退尚宜清解

犀角 生石膏 炒查 紫草 連翹

牛蒡 赤芍 桔梗 木通

程三身小氣弱佈痘繁稠用藥不宜寒涼五日後受得補

托可冀有成

連翹 牛蒡 炒查 紅花 天虫

川芎 歸身 桔梗 炒乾荷葉

臨證指南醫案 卷十 痘

毛身小氣弱漿發驚為屬虛

人參 炒歸身 炙草 廣皮 炒白芍

炒黃米

童朝痘形粘着肌肉不肯起綻高立兼之紫紅發薄乃時

火毒火交熾而元氣素虧體質自今六日前時痛未徹

宜先清解活血提頂希冀磊磊分成地界再究

犀角 羚羊 玄參 丹皮 炒查

秦皮 紫草茸 銀花

鄭痘發猶然身熱咳嗽乃風溫入肺未解診其點粒粘

着不聚溫邪鬱滯氣血更體質素虛議開肺氣以宣之

活血以疎動之。冀其形色充長。若一進沉降恐無好音。

連翹 桔梗 紅花 牛蒡 甘草

炒杏 鬱金 丹皮 雞冠血

又 昨進輕揚提頂活血。痘形頗長。所嫌色不光潤。蓬鬆

盤奩。有乾塌無漿之慮。今明時氣將解。氣血用事。況正

欲納穀。苦寒不但水伏毒氣。更防大傷胃口。古人於重

症更加詳慎者爲此。

川芎 當歸 天虫 桔梗 甘草

角刺 紫葍茸 丹皮 炒杏

又 六進和氣血法。形色畧潤。究不肥綻。焉得起脹成漿。

臨證指南醫案 卷十 痘 天

進十宣散法。

人參 川芎 歸身 廣皮 紫葍茸

天虫 紅花 白芷 甘草 桔梗

張四朝 船小重載。難許全功。勉議進雞鳴散二分。

陸五朝 點雖不密。色滯形癢。痰多嗆逆如嘶。是痘雖發出。毒

猶在內。上冲心肺。故有喘咳不寧之象。進涼血透毒法。

羚羊 桔梗 甘草 紫葍茸 丹皮 川貝

連翹 玄參 射干 天虫 西牛黃 一分

朱四朝 炒黃米 炒山杏 紅花 筭尖

又 五朝 身小痘多。元氣最薄。胃腑未納穀味。湯藥太過。須慮

嘔泄宜少。少與藥。扶過八九風波。方得平安。

川芎 炒當歸 桔梗 甘草 黃米 雞冠血

又 六朝 薄嫩無漿。仍宜內托。

黃芪 防風 歸身 川芎 紫葍茸

丹皮 天虫 桔梗 甘草 雞冠血

宋五朝 額頰形似紅沙。餘痘乾枯不潤。昨進清毒活血。續發

點子盈千。仲仁謂毒重壅閉氣血。必乾焦退縮。今五朝

形象僅似初齊。痘以十二日爲常數。已經壅遏未發。三

日矣。當此質薄神弱。恐難延多日。卽或望其堆沙發臭。

然必在旬日以外。目下總以解毒清涼。八九波濤洶湧。

臨證指南醫案 卷十 痘 天

恐難人力穩全。

犀角 羚羊角 川連 炒杏 土貝母 紫葍茸

玄參 鮮生地 連翹 丹皮 牛蒡子 猪尾血

吳五朝 痘子分顆原屬純正。所嫌色滯乾枯。防八九癢塌。

涼藥兼以活血。是爲平準方法。看守勿懈爲上。

羚羊角 丹皮 連翹 炒杏 紫葍茸

黃連 玄參 天虫 生地 雞冠血

孫 肌柔白嫩。體質是虛。但佈痘必由時癘感觸。地中六

氣咸從火化。癘固客氣相混。氣血若非清解。何以透達。

今視色油紅。按形鬆爽。再視面部肌肉先腫。痘形未

具起脹之象。體症未為合局。慮進銳退速。清涼解毒。佐以提頂。在五六日之法。然險症變遷不一。未可以經常定論。

羚羊角 連翹 丹皮 天虫 生甘草

紫草茸 川連 炒查 桔梗

銀花湯煎和入雞冠血數滴

汪五朝痘形繁瑣成片。色紫滯。乃火毒重險症。藉身大氣旺。扶持十四險關。冀其發臭堆沙。痰幾可以圖倖。

犀角 羚羊角 桔梗 炒查 連翹

天虫 紫草茸 丹皮 石膏 銀花

臨證指南醫案

卷十 痘

四

地丁 牛蒡 猪尾血 冰片

又六朝雖血熱毒重。猶幸八齡體堅。急清解活血。莫令痰阻。廢食扶持堆沙。可望向安。

照前方去石膏地丁天虫牛蒡加川連玄參土貝

查痘子成漿。濕氣蘊於皮毛。與熱氣相蒸。內應乎肺。發出單痘疹。宜忌葷腥。輕清理肺。淡滲消其濕熱。驗其體質最薄。慎勿過劑。

苡仁 茯苓 連翹 地骨皮 通草

桑葉 白沙參 甘草

顧痘發由絡。其毒不化而轉陷。亦歸於絡。當世畧曉攻

補而已。讀古人書。辛香溫煦。乃治毒陷大法。

人參 肉桂 炙草 丁香 厚朴

訶子皮 廣皮 木香 前胡 茯苓

徐未納穀食。但以湯藥。所以滑泄不止。頭仰胸突。擁痰身熱。肺熱未清。不可驟補。翁仲仁有泄瀉安寧。大虛少毒之議。姑以和中清咽再商。

桔梗 甘草 炒歸 川芎 廣皮

炒查 炒黃米湯煎 沖雞冠血

又七朝身小痘密氣弱難任。雖清漿三四。宜慎八九日。不致損破。可以有成。

臨證指南醫案

卷十 痘

五

人參 黃芪 炙草 紫茸 天虫

廣皮 川芎 歸身 厚朴 炒查

加炒冬米

孫七朝色嬌皮薄。漿汁未灌。緣身小痘多。氣血交虧。不能運毒化漿。八九日期。最有癢塌之慮。扶過十二朝無變。庶幾可望有成。進參歸鹿茸湯法。

人參 歸身 鹿茸 生黃芪 炙草

廣皮 厚朴 煨木香

又八朝照前方加肉菓炒冬米

又漿清四五。不能充灌。因元氣餒弱不振。不能煨煉毒

氣成漿。恐有內陷之慮。再進補托。冀其堆沙。或可回春。

人參 黃芪 廣皮 炙草 木香

鹿茸 歸身 肉果 坎炆 官桂

又十三 屬痲甚薄。中凝血跡。兼之嗆逆帶嘔。食人便有不化之形。此虛中有毒。非純補純清之症。

炒川貝 炒銀花 茯苓 苡仁 甘草

地骨皮

楊八 渴場癆陷。藥色白帶不榮。謂之氣衰毒陷。所冀堆沙加食。一線機耳。

人參 黃芪 川芎 歸身 木香

臨證指南醫案

卷十 痘

聖

炙草 廣皮 桂心

又十一 漿滿堆沙。四肢圓綻。但氣弱恐其不肯收痲。必實脾利水為法。

人參 冬木 炙草 茯苓 新會皮

白芍

又十三 已經堆沙加。都是向安之象。便溏滑膩。皆寒濕傷裏。腸中脂垢自下。當脾胃藥中。少佐固腸。以久延不

已。尚貽變症。

人參 熟朮 訶子 廣皮 肉果

白芍 木香 炙草 茯苓

又十六 納食不化。腹膨便糞。白色要諸胃滯。當消脾弱。宜補古稱痞滿。屬氣氣行滯通。但痘後虛體。純消猶恐變症。

人參 焦朮 炒查 木香 焦麥芽

廣皮 茯苓 澤瀉

鮑九 漿不外達。毒欲內陷。已經咬牙滑瀉嘔惡。內症諸款。皆屬深畏。二十四總屬險關。痘子毒氣。必氣元旺。冀其托出。讓以陳氏木香散。救裏托毒。

人參 木香 丁香 官桂 炒歸身

厚朴 廣皮 肉果 訶子皮

臨證指南醫案

卷十 痘

聖

孫 面腫目泛。頭搖微嘔。肝風離體。乘上逆攻。此乃變驚。欲厥之象。夫相火寄於肝。氣斂痘痲。宜進涼解清毒。倘得微熱緩。仍進藪方有佳音。

羚羊角 川連 鈎藤 石菖蒲 黑山梔

胆星 天麻 連翹

又 肝風勢定。疔蝕亦緩。仍宜清熱解毒。但不可犯胃。

羚羊角 連翹 胆星 丹皮 炒銀花

金石斛 茯苓

諸十三 痘已收。然痲落太早。恐有餘毒。今瀉止瀉短。宜進清涼。佐以分利。

生苡仁 百合 茯苓 川斛 白沙參

某 已經回痲不宜再進補劑恐氣血壅滯致有餘毒

幻宗翁仲仁清涼以助結痲之法

黃芩 銀花 川貝 甘草 地骨皮

桔梗 連翹 苡仁

胡朝十五 雖然堆沙屬痲咬牙發哈毒氣未盡上冲心肺補

清皆在難進扶過十八日後癩毒尙可療治若發疔腫

恐難全愈

炒麥冬 白沙參 苡仁 川貝 炒銀花

臨證指南醫案 卷十 痘

地骨皮

沈朝十三 漿未充滿忽然乾涸卽是倒靨咬牙寒戰元氣大

虧非峻補難挽

人參 鹿茸 炒當歸 桂心 桂圓

煨木香

程 回痲太早餘毒流走四肢臂腿腫痛議活血解毒

連翹 小生地 當歸 赤芍 刺蒺藜

丹皮 夏枯草 銀花 酒牛小杯

吳朝十四 哈咳嘔逆腹膨都是餘毒內閉小便少大便溏不

得爽倘再加喘急便是棘手必得瀉毒外發可望挽回

桑白皮 大腹皮 菉豆皮 茯苓皮 飛滑石

生甘草稍

查 痲後發痧係肺熱未清宜辛涼佐以解餘毒

連翹 杏仁 桑皮 地骨皮 黃芩

木通 銀花 牛蒡 夏枯草

吳朝十四 薄漿回痲毒氣未化已有疔腫之患理進清解餘

毒但勉進稀粥滄瀉未罷胃未旺相脾氣積弱議以參

利分消做古痘毒當利小便意

桑皮 地骨皮 連翹 茯苓 川貝

苡仁 銀花

臨證指南醫案 卷十 痘

某 痘未退痲痧火內逼爲喘

川連 犀角 連翹 銀花 玄參

大貝 丹皮 地骨皮

又 痧火未清

川連 黃芩 山梔 連翹 銀花

杏仁 甘草

沈 薄漿回痲毒氣未盡只宜清肺解毒

炒川貝 茯苓 苡仁 車前 炒澤瀉

炒銀花

徐朝十六 疔毒已發咳哈未止痲落如毳肌色皖白雖屬氣

血交虛。但痘後餘毒未可驟補。議進利脾胃利濕方法。瘡毒宜速調治。恐日久愈虛。致有慢驚之慮。

苡仁 川斛 茯苓 百合 廣皮

炒澤瀉

沈一十朝。痰喘失音。不嗜食物。晝則稍安。暮夜煩躁。此肺熱未肅。磨耐多日。體氣陽亢陰虧。肝風內熾。突起驚厥可慮。

地骨皮 甘草 生地炭 菉豆皮 炒丹皮

炒川貝 川斛

李二十朝。納食嘔吐。脾胃不和。肝風內動。肢浮肉腫。治宜培

臨證指南醫案 卷十 痘 吳

土制木以緩肝風。冀免驚疳之患。

人參 茯苓 炒芍 生穀芽 藿香

廣皮 半夏

馮二十朝。痲粘連。神氣昏昧。元為兼泄而乏。變幻慢驚欲脫。此皆種年陽亢陰虧。毒明目窻。肝陰之絕。恐難再振。

人參 茯苓 藜仁 歸身 炙草

炒杞子 生白芍

又三十朝。陽極則煩。陰瀆為躁。夜甚劇。自從陰分設法益虛和陽為治。

人參 熟地 茯苓 茯苓 建蓮

遠志 炒山藥 五味

楊 點來不爽。頂有水痕微焦。此時氣傳染。胎毒未發。乃

水赤之類痘耳。

連翹 牛蒡 丹皮 赤芍 飛滑石

木通 山梔 甘草

邵 痘中復感溫邪。口鼻觸入。由中道以佈及絡脉。目泛失明。左肢不舉。少腹突起腫滿。兩足皆痠。詢知痘見六日。陡然頭搖煩躁而得。小便淋漓。大便漸塞。乃厥陰肝熱。疝瘕失其疎泄。內風旋轉。脾陽不通。經言暴腫暴脹。皆風火變動。至於迅速病來。其能食消運。熱化自可殺。

臨證指南醫案 卷十 痘 吳

穀考古辛散酸泄甘緩三法。難圖腑絡壅結。仲景於厥陰條例。有下之利不止者死之大戒。議進鹹苦以通在下結熱。愚見若此。再與高明商酌良治。

川棟子 小荷 蘇香 山梔 橘紅

龍胆草 方諸水七匙

自古治痘名家。不啻甘數。各有精確卓識。以補前人未備。雖各有所偏。實所以相濟也。醫者貴統彙羣書。隨宜施治。安可執偏隅管見。以應無窮之變哉。先生治痘。以辨神奇。觀其案中寒熱攻補不膠於一見。如毒火深伏。氣血壅遏者。藉芳香以搜逐。用紫雪丹。

氣滯血凝。毒重火伏者。以酒大黃石膏青皮桃仁荆芥犀角猪尾血之類。主治肝肺毒火不宣。氣血有焦燔之勢者。用犀角羚羊紫草丹皮石膏鮮生地之類。元氣不支。陽虛毒陷。而見灰白濕爛泄瀉嘔惡等症者。用辛香溫煦。如陳文仲之法。為要。氣血極虛。而漿清塌疔。全無實症。相兼者。當峻補氣血。用參歸鹿茸湯。及坎炁湯之類。氣虛莫外乎保元。及四君子。血虛不離於四物。及補血湯。又有氣虛血熱者。補氣之中。兼涼血。血虛氣滯者。補血之中。佐辛香。用攻法。須分部位。經絡。用補法。當辨寒熱燥濕。過清則有冰伏之

臨證指南醫案

卷十 痘

完

慮。偏熱則有液涸之虞。此皆先生採擇先賢之法。因人見症而施治。可謂善法古者矣。夫痘雖以形色辨其吉凶。然內症尤為緊要。如痘點既起。或不慎風寒。而營衛凝滯。或縱恣飲食。而氣機呆鈍。以致身熱不食。腹膨嘔惡泄瀉。漿水不行。不究治其病因。但執清寒。厥補。常有凶危之變。亦有痘形雖重。若神寧安靜。飲食二便如常。聲音清響。調理得宜。亦可轉危為安。大凡形老而色鮮明者。雖甚密。變幻恒少。形嫩而色晦滯者。雖稀疏。變幻恒多。表裏相參。審症的確。然後設法處治。方無貽誤。至於逆症條款已現。雖自昔名

醫亦莫能挽救。小兒天枉者。不可勝數。深可憐憫。邇年以來。幸有種痘一法。盛行於世。實可挽回造化。凡有小兒者。俟週歲後。即可選用種痘之苗。引而發之。百不失一。此誠補痘科之未備。而為最上一乘之法也。正痘有先賢諸成法。避險有種痘之良方。痘症於是乎大全矣。陸履安

痘之發也。一由乎胎毒內伏。一由於外感時邪之氣。引導而出。其症之順逆。若內毒輕而外感之氣亦輕者。痘必稀疏。此為順症。若內毒輕而外感之氣重者。慮其過悶不齊。不易灌漿。若能至灌漿。則時邪漸退。

臨證指南醫案

卷十 痘

完

後易收功。此為先重後輕症。若內毒重而外感之氣輕者。慮其灌漿已後。毒難盡洩。不易收靨。結痂。恐發痘毒疔蝕之患。此為先輕後重症。若內毒重而外感之氣亦重者。痘必稠密。色不鮮澤。發熱見點之後。一路踏踏。難以收功。此為逆症。然胎毒之輕重。人皆易明。若外感之氣。人莫能曉。夫天地間。祇有六氣。氣平則為和氣。不平則有勝復。勝復至極。則為厲氣。為瘟疫氣。瘴氣。更有道塗中穢濁氣。人若感之。不拘老幼。俱病。今出痘所感之氣。則異乎是。此氣獨與未洩胎毒之小兒。兩相感觸。未聞痘症盛行之時。已出過痘

之兒亦染病患也。考是氣自古迄今從未有人申說明白。確定爲何氣。故前賢於痘症一科。未嘗不殫心瘁慮。立論著方。因不明其氣之源。不無偏執之弊。有喜於寒瀉者。有喜於溫托者。有先用寒瀉而後用溫補者。有先用溫托而後用清火解毒者。更有不審兒體之虛實寒熱。俱宗費建中救偏瑣言。每於發熱見點時。槩用大黃石膏黃連犀角羚羊茅根蘆根等。不知費氏之書。名爲救偏。乃救慣用熱藥之偏耳。若本不偏。而宗其法。則不偏者反至偏矣。嬰兒之命。其何以堪。幸古有種痘良法。相傳至今。其法簡易靈驗。至穩至當。蓋正痘因外感時邪而發。種痘則種於無病之時。故所出稀疎。輕者不過幾十粒。此豈非避危就安之妙法乎。倘愚人不信。何不將自出與種出。彼此相較。其理自明。假使一村之中。有百兒出天花。未嘗不延醫服藥。若能八九廿收功。人咸稱爲太平痘矣。甚有竭力調治。而損傷幾及一半者。不聞其歸咎於醫生。惟有委命於天而已。今若種百兒之痘。設或損傷四五個。則必責罰種師。并不容其托足於此一村矣。人何篤信醫生而不相信種師。耶。與其委命於天。孰若以人功挽之。以此相較。則當種與不當種。自決

臨證指南醫案

卷十 痘

五

矣。至於種法。全在乎好苗。夫苗者。即取他兒之痘痂也。必要用種出之痘。落下之痂。謂之種苗。此苗之中。毫無天行時毒之氣。在內故放心可用。若自出天花之痂。謂之時苗。此苗之中。有時行之氣。若不辨而用之。名雖爲種。實與傳染他兒天行時毒之氣無異。此時苗之不可用也。然種苗之內。尚要揀擇。必取痘粒稀少。其色紅潤。滋漿濃厚。所結之痂。厚實光澤。尖圓者。此氣血充足。陰陽合德。上好之苗也。俟痂落下。用紙包好。記明何日收得。收貯新磁瓶內。緊護其口。置清涼之處。勿觸穢熱之氣。其苗在北方。天氣涼。春月之苗。一月之內。尚可種。冬月之苗。四五十日。尚可種。南方氣溫。夏月之苗。四五日。春月之苗。二十日。冬月之苗。三十日。若延日久。則氣薄無力。恐種不出矣。欲覓此等種苗。先訪有人家正在種痘之際。向彼明言其故。懇求四五粒。即可源源而種。或平日於同道種師內。相與一二位志誠老實者。議明彼此互借。則苗亦可不斷。亦有磨大種師。於五六月中。覓貧家壯實之兒種之。不惟不索酬謝。反肯津貼銀錢。次遞傳種三四箇兒。延至七月。則苗亦可以不斷矣。近有種師。因種苗已窮。權取時苗種之。往往有種出稠密棘手

臨證指南醫案

卷十 痘

五

重症者皆時苗之過也。不知時苗之性，即選上好者，亦必要傳種過四五兒，俱各順當者，其苗性始和平，方能與種苗相等。至於下手種法，尤須詳慎。凡種一兒，用痘痂三四粒，兩兒則用六七粒，放於乾淨茶杯中，傾入清水四五茶匙，用小指尖在內三四攪，則痂已濕，急將水傾去，用柳木杵研，其杵約長四寸，粗如筆管，兩頭要光圓，研十數轉足矣。如痂太乾，加入清水一二滴，切不可太潮，只要研如乾漿糊狀，用彈匙新棉花捏一小團，如棗核大，兩頭要圓，其長短粗細量兒鼻孔之大小為之，其棉團不可太鬆軟，鬆則苗

臨證指南醫案

卷十

痘

氣易往外洩，且見滯則縮小，易於脫出。將棉團只用一頭蘸痂末糊於上，塞兒鼻中，男左女右，塞不可太進，太進則兒不適意，亦不可太出，太出則易於脫落。總要寬緊淺深適中為妙。塞後勿放小兒用手拈出，若被噴嚏打出，急將苗仍塞入鼻。下苗後，以六個時辰為度，天氣熱早取出數刻，天氣寒多留數刻。痘苗取出之後，其苗氣漸次傳遍五臟，至七日或八九日始發熱，發熱三日而見點矣。此誠至穩至當之種法也。種痘之苗，不過痘痂一味，今各處種師詭稱痘痂之外，尚要加他藥為引導者，此係惑人謊語，切勿信

之既種後，將發熱時，小兒頸項內，男左女右，必發一小塊狀如痰核，此乃毒氣結聚於此，故痘發必稀疎。此塊不必醫治，待落痂後，則塊亦漸消矣。若用時苗種者，項中無塊，當以此辨之。又間有驚痘於發熱時，小兒忽然驚搐，手足跪，不語，目上視，有片時即平復者，有發一二個時辰者，有發一次者，有發兩次者，總屬不妨，斯時切不可攪動叫喚之，待其自平即已，不必服藥。須預對痘家說明，免其憂慮。以上諸論，皆時下種師之秘訣也。若夫辨兒之可種與不可種，須察兒體之虛實，及有無疳病，若調治之法，當節飲食，適

臨證指南醫案

卷十

痘

寒溫防驚，嚇此皆種師俱各明悉，茲不重贅。鄭望碩

疳

脾胃虛弱
和

沈 穉年歇乳進穀脾胃氣餒少運腹膨目翳是為五疳

夏日中土司令久病投以補氣恰合調其脾胃近日嘔

吐泄瀉身熱乃寒暄失和致食不易化小溲既少胸氣

不和余幼科久疎憶錢氏每以調中為主而驅邪都主

輕法深慮脾土傷則延驚癇耳

益智仁 焦朮 茯苓 廣皮

藿香梗 厚朴 查肉 澤瀉

張四 五疳腹脹數月法當疎補

臨證指南醫案 卷十 疳

人參 茯苓 麥芽 炒查肉

廣皮 半夏 湖蓮

又 照前方去半夏湖蓮加澤瀉

內傷
滯重積

陳五 官人自汗短氣咳嗽風溫見症肌腠有瘰癧之形與

疹瘡疔病不同但幼穉生陽充沛春深入夏形質日減

色麻是虛而補脾辛甘不應腹滿按之自爽二便原得

通利腹痛時發時止痛已即能飲食考幼科五疳與大

方五勞相類疳必因鬱熱為積為重此飲食不充肌膚

也病來非暴攻之由漸再論疳熱重積古人治疳治胃

恒多而潔古東垣於內傷夾滯亦製九劑以緩治取義

乎渣質有形與湯飲異岐刻下溫邪擾攘之餘聊以甘

涼之屬清養胃陰以化肺熱其辛氣泄表不宜進

甜杏仁 麥冬 地骨皮 生甘草

冬桑葉 玉竹 和入青甘蔗汁一酒杯

九 做治疳熱羸瘦從陽明厥陰疏通消補兼施

人參 黃連 蘆薈 川棟子 使君子

茯苓 白芍 廣皮 胡黃連 南山查

某七 食物不節脾胃受戕腹膨大便不調此屬脾疳

焦朮 茯苓 廣皮 益智仁

大腹皮 木瓜 炮薑 炒神麩

臨證指南醫案 卷十 疳

吳九 能食色枯形瘦暮熱泄瀉此皆口腹不慎值長夏濕

熱脾胃受傷將成五疳

青蒿梗 枳實炭 胡黃連 炒穀芽 炒白芍

炒山查 廣皮 茯苓 澤瀉

王 五疳已久脾胃受傷食物不運腹膨瀉瀉此積聚未

清中焦先餒完穀不化膈脹皆至難治之症 七香餅

疳者乾也小兒腸胃柔嫩若乳食失調甘肥不節運

化不及停積發熱熱久津乾此因積成疳者也或五

臟偏熱或因病後或醫藥悞下致了失津液脾不斡

化積滯不行此因乾致積者也故五疳不離乎脾胃

其治法胃滯當消脾弱宜補熱者用苦寒清火冷者宜辛溫健運有出者兼用殺虫之品其虛者各隨本臟補其母總宜丸劑緩調不能旦夕速功或用雞肝納入治疳熱熾食最為有效 陸履安

臨證指南醫案

卷十 疳

五

吐瀉

吳 身熱吐乳自利溫邪內擾脾胃穉年防驚

藿香葉 飛滑石

王 未到周歲熱犯脾胃嘔逆下利壯熱不已最多慢驚

之變

人參 川連 黃芩 藿香梗

廣皮 生白芍 烏梅

其 暑邪犯肺交土王用事脾胃素弱不運暑濕腹鳴泄瀉惡心露睛怕成慢驚

瀉惡心露睛怕成慢驚

臨證指南醫案

卷十 吐瀉

五

人參 藿香 炒厚朴 木瓜

川連 茯苓 炒扁豆 澤瀉

章 傷食一症考古用五積散之義取煖胃使其腐熟也

既上湧頻吐大便泄瀉胃氣益傷陽氣坐困日甚清不

升渴不降痰潮乾嘔腹鳴便遺睡則露睛靨黑唇紫小

漫竟無陽不流行津液自耗有慢驚昏厥之危議通胃

陽讀錢氏薛氏之書能知此意

人參 鬱金 炒牛夏 炒白附子

茯苓 菖蒲 炒廣皮 炒粳米

又 陽明胃陽受傷腑病以通為補若與守中必致壅逆

昨日用方通勝於補獲安。幼穉非真虛寒之病

人參 茯苓 益智 廣皮

炒荷葉 炒粳米

又 鼻明汗出。齟血陽明虛。胃氣未和。不宜涼降。

六神湯加炒廣皮

虞 面色痿黃。脉形弦遲。湯水食物入咽吐出。神氣憊憊。

欲如昏寐。此胃陽大乏。風木來乘。漸延厥逆。俗稱慢脾。

險症。幼穉弱質。病延半月有餘。豈可再以疲藥玩忽。宗

仲景食穀欲嘔者。吳茱萸湯主之。

人參 吳萸 茯苓 半夏 薑汁

臨證指南醫案

卷十

吐瀉

吳

又 昨用泄木救胃土法。安受不見嘔吐。然中焦陽氣大

虛。濁氣上僭。則為昏厥。津液不升。唇舌乾燥。豈可苦寒

再伐生氣。今如寐神倦。陽陷於陰。何疑。仲景通陽理虛

後賢錢氏薛氏。皆宗其義。

人參 炒半夏 茯苓 廣皮

煨薑 南棗

蘇 周歲幼小。強食腥麵。身不大熱。神氣呆鈍。上吐下瀉。

最防變出慢驚。此乃食傷脾胃。為有餘。因吐瀉多擾動

正氣致傷耳。

廣皮 厚朴 茯苓 廣藿香

生益智 木瓜

陳 涼風外受。內鬱熱伏。身發癩疹。便解血膩。煩渴得汗

僅解外風。在裏熱未和。啾唧似痛。大便仍有積滯。清

裏極是。但半歲未啖穀食。胃弱易變驚症。少少與藥。

藿香梗 川連 黃芩 生白芍

淡竹葉 廣皮 滑石 炒查肉

余 形神衰弱。瘦泄純白。而瀉湯并飢未罷。氣喘痰升。總

是損極。今胃虛納減。倘內風欲動。驚厥立至。孰不知因

虛變病也。

人參 炒粳米 茯苓 炒廣皮 炒荷葉

臨證指南醫案

卷十

吐瀉

吳

呂 痰中帶血。食已嘔吐。因驚。伏氣逆。冷胃不和。與黃連

溫胆湯。因年弱質怯。以金石斛代之。溫胆湯去甘草

加金石斛薑汁

某 九歲久嘔少食

人參 半夏 茯苓 廣皮 薑汁

某 九歲久瀉兼發瘡。是濕勝熱鬱。苦寒必佐風藥。合平劑

垣脾宜升。胃宜降之旨。

人參 川連 黃柏 炙草 廣皮

白朮 神麩 麥芽 柴胡 升麻

羌活 防風

何一夏病入冬仍腹痛下積。穉年不慎食物。腸胃屢滯。利久陰傷。身熱發冷。先與理陰疎滯滯瀉。

熟地炭 當歸炭 山查 炮薑

炙草 茯苓 麥芽

世俗所稱慢驚風者。不知起於何代。創是名者。其遺禍於嬰孩。已不啻萬億矣。蓋就其所指之病而論。如吐瀉兼作。氣怯神倦。虛煩搐搦。痰喘不食。肝虛無神。睡則露睛等症。乃與病名毫不相關。其所指之症。是或由外感未清。或諸病誤治。或飲食失調。或由病後

臨證指南醫案 卷十 吐瀉 卒

而成。以致吐則傷胃。瀉則傷脾。土衰則不生金。中虛木必乘剋。是皆肝脾肺胃之病。治宜急顧本原。扶土生金。安胃和肝。溫養腎陽。猶虛弗及。若就其名而治之。醫家胸中。先執慢驚風三字之名。概用重墜之藥。鎮驚定怯。或散風清火。豁痰破氣。其遺禍可勝言哉。蓋是症。因中土已虛。風木已動。延久必現出似驚之狀耳。實則並非因驚而起也。奈何竟以慢驚風名之。豈非指鹿為馬乎。要之慢字。若以急慢而論。則凡病之緩者。皆可稱為慢。惟驚乃屬急症。不可以慢字加之。若以倣慢肆慢而講於病名上。又甚荒唐。惟願觀

幼科書者。當知其背謬不通。勿為其所惑。則幸甚。今觀先生案中。並未嘗用及驚藥。風藥是明徵也。此症更當兼參東垣立齋景岳諸法而治之。則無遺蘊矣。華輔集

臨證指南醫案 卷十 吐瀉 卒

痼瘕

發熱邪

周 穉年痼瘕。病發迅速。醒來二便自通。此係陽氣拂逆。阻其靈竅。姑與清絡宣通方法。

犀角

遠志

胆星

黑山梔

玄參

菖蒲

連翹

竹葉心

發熱人

唐十四面青脈滯。神呆舌縮不伸。語寂寂然。痼症。四肢皆震。口吐涎沫。此陰風已入脾絡矣。

人參

生朮

蜈蚣

全蝎

薑汁炒南星

薑汁炒白附

臨證指南醫案

卷十 痼瘕

空

邪退心

某 伏邪經旬。發熱不解。唇焦舌渴。晝夜神識不情。慮其邪陷心胞。有瘕瘕之變。

犀角

捲心竹葉

鮮石菖蒲

連翹

玄參心

浙生地

又 化熱液枯

生地

竹葉心

丹皮

玄參

麥冬

生白芍

熱邪傷

吳 冬月伏邪入春病自裏發。裏邪原無發散之理。更悞於禁絕水穀。徒以苓連枳朴希圖清火消食。以退其熱。殊不知胃汁再劫。肝風掀動。變幻瘕瘕。危症。診視舌絳。

鼻竅黑煤。肌膚甲錯。乾燥。渴欲飲水。心中疼熱。何一非

肝腎陰液之盡。引水自救。風陽內燥。躁亂如狂。皆緣醫

者未曾曉得溫邪從陰。裏熱為病。清熱必以存陰為務。

耳。今延及一月。五液告涸。病情未為穩當。所恃重真食

穀多歲。錢氏謂幼科易虛。易實。望其何有生機而已。

阿膠

生地

天冬

川石斛

雞子黃

玄參心

又 鹹潤頗安。其熱邪深入至陰之地。古云熱深厥深。內

涸若此。陰液何以上承。慮其疴蝕阻咽。故以解毒佐之。

玄參心

真阿膠

真金汁

細生地

臨證指南醫案

卷十 痼瘕

空

天冬

銀花露

又 胃未得穀。風陽再熾。入暮煩躁。防其復厥。

生地

白芍

麥冬

金汁

阿膠

牡蠣

金銀花露

又 神識畧蘇。常欲煩躁。皆是陰液受傷。肝風不息。議毓

陰和陽

生地

牡蠣

阿膠

麥冬

木瓜

生白芍

又 膈中熱熾。神躁舌乾。痰多。咳喘。皆火刑肺金。宜用紫

雪丹一錢

小兒癩癩厥本屬險症十中每死二三奈今之患者十中常死六七其故何也蓋緣醫者不察病情概以芩連鉤藤菖蒲橘紅等夾金石之藥投之以冀清火降痰而已此醫之不善治也而最可惡者尤在病家之父母失於調治有名為愛之實以殺之之故何也小兒諸症如發熱無汗煩躁神昏譫語之項或戰汗大汗將止之時或嘔吐泄瀉之後或癩厥漸甦或便久閉而適然大便或灌藥之後斯時正元氣與病邪交戰之際若能養得元氣一分即退一分病邪此際小兒必有昏昏欲睡懶於言語氣怯神弱身不轉動

臨證指南醫案

卷十 癩癩厥

奎

之狀此正當養其元神冀其邪退正復乃病家父母偏於此際張惶驚恐因其不語而呼之喚之因其不睡而頻叫醒之因其不動而搖之拍之或因微有昏譫而必詳品之或急欲以湯飲進之或屢問其痛痒之處曉曉不已使其無片刻安寧如此必輕變為重重變為死矣更有豪富之家延醫數人問候者多人房中聚集者多人或互談病情病狀夜則多燃燈燭以照之或對之哭泣不已或信巫不信醫祈禱疊興舉家紛擾此非愛之實以殺之也試以大人之病情體貼之抑好安然寂靜乎抑好喧譁動擾乎此理概

臨證指南醫案

卷十 癩癩厥

奎

可知也予曾見一孩患者濕初癩半月有餘病勢甚重醫者投以蒼朮白虎湯夜半發汗至寅時身體漸涼冷汗不止默默倦睡口不肯言氣息甚微醫云六脈安靜並不煩躁此病退之象也因戒其父母切勿擾動直至申時汗止聲出而病已霍然矣可見無論大人與小兒諸病總宜安然寂靜為主其調養之法有非筆墨所能罄者惟在病家能細心體會醫者能諄諄告戒勿以余言為迂則幸甚更有幼孩發熱昏迷手足厥冷竅絡阻塞哭不出聲藥難下咽斯時惟有請善於推拿者可便立時甦醒然後再議用藥至於治法癩癩厥本屬二症與大方相類茲不重贅

麻雲

虫

陳七 濕傷脾胃失調下注小腸虫從溺竅而出蓋游完穀不可溫補

黃柏 茯苓 猪苓 槐米

澤瀉 葶藶

又 虫自小便而出經月渴皆粘膩及不化食物此非虛寒皆濕蘊內蘊運化失司當苦藥勝濕兼理幼穉疳積

黃連 黃柏 茅朮 厚朴 澤瀉

槐角子 木通 使君子 淡竹葉

臨證指南醫案 卷十 虫 空

三服後續進肥兒丸

龔七 濕熱生虫腹痛便溏惡食

川連 胡連 生白芍 烏梅 枳實

川椒 炒查 青皮 木法丸

許 腸有濕熱生虫用苦寒引導小腸

苦楝皮 北秦皮 槐角子 胡粉 黃柏

牡蠣 生研末猪肚腸一條漂潔煮丸

張三丹溪云小兒盜汗不須醫以體屬純陽汗乃陽泄故也至於瘡多濕熱浮腫脹滿得攻下而消此六腑以通為補也其少腹痛屢發亦由濕熱生虫生積當以酸苦

泄熱

川連 胡連 生白芍 雞肫皮 炒查肉

蘆薈 枳實 苦楝皮 烏梅肉搗丸

汪六 肚漏時風瀉過白虫手足陽明熱甚

槐角子 黃柏 樵子肉 生茅朮 樗根白皮

小川連 茯苓 炒地榆 蒸餅為丸

虫類雖多其源皆由飲食停滯濕熱鬱蒸變化而成者也凡面色痿黃飲食不為肌膚起伏作痛聚散不定痛止即能飲食者皆有虫積或從嘔或從小便或從大便而出治法當觀其微甚若虫勢驟急者當用

臨證指南醫案 卷十 虫 空

攻逐之劑如黑丑枳榔大黃胡粉山稜莪朮之類虫去則調其脾胃緩者用酸苦泄熱燥濕兼以相制相畏之品如川連胡連蘆薈苦楝烏梅川椒雷丸蕪荑史君樵肉之類脾胃弱者兼運其脾胃滯者兼消其滯虫症治法大畧如此 臨履安

案中所用諸方開載於後以便初學之士查閱

桂枝湯 桂枝 白芍 炙草 生薑 大棗

桂枝加附子湯 卽桂枝湯加附子

苓桂朮甘湯 茯苓 白朮 桂枝 炙草

小建中湯 白芍 桂枝 炙草 生薑 大棗 飴糖

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯 桂枝 炙草 生薑

大棗 蜀漆 龍骨 牡蠣

生薑瀉心湯 生薑 乾薑 半夏 黃芩 黃連 甘草

人參 大棗

甘草瀉心湯 甘草 乾薑 半夏 黃芩 黃連 大棗

臨證指南醫案 卷十 集方 灸

半夏瀉心湯 半夏 黃芩 黃連 人參 炙草 乾薑

大棗

附子瀉心湯 附子 黃芩 黃連 炙草

黃芩湯 黃芩 白芍 甘草 大棗

黃連阿膠湯 黃芩 黃連 白芍 阿膠 雞子黃

旋覆花代赭石湯 旋覆花 代赭石 人參 半夏 甘草

生薑 大棗

炙甘草湯 又名復脈湯 炙草 桂枝 人參 麻仁 生地

阿膠 麥冬 生薑 大棗

烏梅丸 烏梅 人參 當歸 黃連 黃柏 桂枝 乾薑

蜀椒 附子 細辛

白虎湯 石膏 知母 甘草 粳米

白虎加人參湯 卽白虎加人參

竹葉石膏湯 竹葉 石膏 人參 麥冬 半夏 甘草

粳米

白頭翁湯 白頭翁 秦皮 黃連 黃柏

大黃黃連瀉心湯 大黃 黃連

豬膚湯 豬膚 白蜜 白粉

四逆湯 甘草 乾薑 附子

人參四逆湯 卽四逆湯加人參

臨證指南醫案 卷十 集方 灸

通脈四逆湯 卽四逆湯加葱白 更有隨症加法

通脈四逆加豬胆汁湯 卽四逆湯加豬胆汁

白通湯 葱白 乾薑 附子

白通加豬胆汁湯 卽白通湯加豬胆汁入尿

朮附湯 白朮 附子 甘草 生薑 大棗

桂枝附子湯 桂枝 附子 甘草 生薑 大棗

理中湯 丸同 人參 甘草 白朮 乾薑

吳茱萸湯 吳茱萸 人參 生薑 大棗

真武湯 茯苓 白芍 白朮 附子 生薑

桃花湯 赤石脂 乾薑 粳米

麻黃杏仁甘草石膏湯	麻黃	杏仁	甘草	石膏
小青龍湯	麻黃	桂枝	白芍	乾薑
甘草	半夏	五味子		
梔子豉湯	梔子	香豉		
桃仁承氣湯	桃仁	桂枝	大黃	芒硝
甘草				
四逆散	柴胡	枳實	白芍	甘草
白散	桔梗	貝母	巴豆	
五苓散	猪苓	茯苓	澤瀉	白朮
桂				
猪苓湯	猪苓	茯苓	澤瀉	阿膠
滑石				
牡蠣澤瀉散	牡蠣	澤瀉	海藻	蜀漆
葶藶				
商陸根				
臨證指南醫案 卷十 集方 辛				
瓜蒌根				
右仲景傷寒中方				
鱉甲煎丸	鱉甲	烏扇	黃芩	柴胡
鼠婦				乾薑
大黃	芍藥	桂枝	葶藶	石葦
厚朴				丹皮
瞿麥	紫葳	半夏	人參	廣虫
阿膠				蜂窠
赤硝	蜚蠊	桃仁	蝦籠下灰	清酒
千金方有海藻大戟無鼠婦赤硝				
白虎加桂枝湯	即白虎湯加桂枝			
崔氏八味丸	乾地黃	山茱萸	山藥	丹皮
茯苓				
澤瀉	附子	桂枝		

桂枝加龍骨牡蠣湯	即桂枝湯加龍骨牡蠣			
酸棗仁湯	棗仁	甘草	知母	茯苓
川芎				
黃芪建中湯	即小建中湯加黃芪			
皂莢丸	皂莢	蜜丸	棗膏湯送	
麥門冬湯	麥冬	半夏	人參	甘草
大棗				粳米
葶藶大棗瀉肺湯	葶藶	大棗		
千金葶藶湯	葶藶	苡仁	桃仁	瓜瓣
瓜蒌薤白白酒湯	瓜蒌實	薤白	白酒	
赤石脂丸	蜀椒	烏頭	附子	炮薑
赤石脂				
附子粳米湯	附子	半夏	甘草	粳米
大棗				
臨證指南醫案 卷十 集方 辛				
當歸生薑羊肉湯	當歸	生薑	羊肉	
甘遂半夏湯	甘遂	半夏	芍藥	甘草
木防己湯	木防己	石膏	桂枝	人參
小半夏湯	半夏	生薑		
外臺茯苓飲	茯苓	人參	白朮	枳實
橘皮				生薑
桂苓五味甘草湯	桂枝	茯苓	五味	甘草
越婢湯	麻黃	石膏	甘草	生薑
大棗				
防己茯苓湯	防己	黃芪	桂枝	茯苓
甘草				
大半夏湯	半夏	人參	白蜜	
大黃牡丹湯	大黃	丹皮	桃仁	瓜子
芒硝				

當歸建中湯 卽小建中湯加當歸

甘草小麥大棗湯 甘草 小麥 大棗

旋覆花湯 旋覆花 葱 新絳

腎氣丸 與崔氏八味丸同

右金匱要畧中方

六味地黃丸 卽八味去桂附 煎服名六味地黃湯

都氣丸 卽六味丸加北味 再加附子名附都氣丸

還少丹 熟地 山藥 牛膝 枸杞 山萸 茯苓 杜仲

遠志 五味子 楮實 小茴 巴戟 菴蓉 石菖蒲

丹溪滋陰大補丸 卽還少丹去楮實

臨證指南醫案 卷十 集六 圭

黑地黃丸 蒼朮 熟地 五味 乾薑

虎潛丸 熟地 虎脛骨 龜板 黃柏 知母 瑣陽

當歸 牛膝 白芍 陳皮 羯羊肉

天真丸 精羊肉 肉苁蓉 山藥 當歸 天冬 黃芪

人參 白朮

三才湯 天冬 熟地 人參

大造丸 紫河車 龜板 人參 熟地 天冬 麥冬

黃柏 牛膝 杜仲

人參固本丸 人參 天冬 麥冬 生地 熟地

天王補心丸 生地 人參 玄參 丹參 棗仁 遠志

茯神 柏子仁 天冬 麥冬 當歸 五味 楮實

石菖蒲 辰砂

孔聖枕中丹 龍骨 龜板 遠志 石菖蒲

大補陰丸 黃柏 知母 熟地 龜板 猪脊髓

滋腎丸 黃柏 知母 肉桂

斑龍丸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 菟絲子 柏子仁

玉貞丸 硫黃 硝石 石膏 牛夏 薑汁糊丸

來復丹 玄精石 硫黃 硝石 五靈脂 青皮 陳皮

牛硫丸 牛夏 硫黃

黑錫丹 黑鉛 硫黃

臨證指南醫案 卷十 集六 圭

二至丸 冬青子 旱蓮草

參苓白朮散 人參 茯苓 白朮 甘草 山藥 扁豆

苡仁 建蓮 砂仁 桔梗 陳皮

玉屏風散 黃芪 防風 白朮

四君子湯 人參 茯苓 白朮 甘草

六君子湯 卽四君子湯加陳皮半夏

異功散 卽四君子湯加陳皮

四散飲 卽六君子湯加烏梅草果生薑大棗

六神散 卽四君子湯加山藥扁豆薑棗煎

補中益氣湯 人參 黃芪 白朮 甘草 陳皮 當歸

升麻 柴胡 生薑 大棗

三拗湯 麻黃 杏仁 甘草

葱豉湯 葱白 淡豆豉

川芎茶調散 川芎 薄荷 荆芥 羌活 白芷 甘草

防風 細辛 爲末茶調服

霞天膏 牛肉熬膏加麩

防風通聖散 防風 荆芥 麻黃 連翹 薄荷 川芎

當歸 白芍 白朮 山梔 大黃 芒硝 黃芩

石膏 桔梗 甘草 滑石 薑 葱

溫胆湯 陳皮 半夏 茯苓 甘草 枳實 竹茹

臨證指南醫案 卷十 集方 五

十味溫胆湯 卽溫胆湯加人參遠志棗仁熟地

逍遙散 柴胡 當歸 白芍 白朮 茯苓 甘草 煨薑

薄荷 本方加丹皮山梔名加味逍遙散

六和湯 砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏 扁豆 木瓜

人參 赤茯苓 白朮 甘草 薑 棗

藿香正氣散 藿香 紫蘇 白芷 大腹皮 茯苓 白朮

陳皮 半夏 厚朴 桔梗 甘草 薑 棗

駐車丸 黃連 阿膠 乾薑 當歸

越鞠丸 香附 蒼朮 川芎 神麩 山梔

四物湯 生地 當歸 白芍 川芎

張子和玉燭散 歸尾 生地 川芎 赤芍 大黃 芒硝

甘草

歸脾湯 人參 白朮 茯苓 棗仁 龍眼肉 黃芪

當歸 遠志 木香 炙草 生薑 大棗

人參養榮湯 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 白芍

熟地 黃芪 肉桂 五味 遠志 陳皮 加薑棗

犀角地黄湯 犀角 生地 白芍 丹皮

地黃飲子 熟地 巴戟 山萸 茯苓 附子 官桂

石斛 茯苓 菖蒲 遠志 麥冬 五味

活絡丹 川烏 草烏 胆星 地龍 乳香 沒藥

臨證指南醫案 卷十 集方 五

附子理中湯 卽理中湯加附子

理中安虬丸 卽理中湯去甘草加茯苓川椒烏梅

連理湯 卽理中湯加黃連茯苓

治中湯 卽理中湯加青皮陳皮

四神丸 破故紙 五味 肉蓯 吳萸

清暑益氣湯 人參 黃芪 白朮 蒼朮 青皮 陳皮

神麩 甘草 麥冬 五味 當歸 黃柏 澤瀉

升麻 葛根 加薑棗

生脉散 人參 麥冬 五味

益元散 滑石 甘草 辰砂

大順散 乾薑 肉桂 杏仁 甘草

四苓散 猪苓 茯苓 澤瀉 白朮

桂苓丸 肉桂 茯苓 蜜丸

胃苓散 即平胃散合五苓散

加味腎氣丸 即六味丸加附子肉桂車前牛膝

濟川散 黑牽牛 大黃 甘遂 芒硝 郁李仁 輕粉

草薢分清飲 川草薢 石菖蒲 烏藥 益智仁 甘草稍

食鹽 茯苓

禹功散 黑牽牛 茴香 薑汁調 或加木香

瓊玉膏 地黃 茯苓 人參 白蜜 羅仙加琥珀沉香

臨證指南醫案 卷十 集方

通幽湯 當歸 升麻 桃仁 紅花 甘草 生地 熟地

白虎加蒼朮湯 即白虎湯加蒼朮

涼膈散 連翹 大黃 芒硝 甘草 山梔 黃芩 薄荷

當歸龍薈丸 當歸 龍胆草 山梔 黃連 黃柏 黃芩

大黃 青黛 蘆薈 木香 麝香 蜜丸薑湯下

左金丸 黃連 吳萸 水泛丸

戊巳湯 黃連 吳萸 白芍

甘露飲 生地 熟地 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩

枳殼 枇杷葉 甘草 一方加桂苓名桂苓甘露飲

河間桂苓甘露飲消石石膏寒水石甘草白朮茯苓澤瀉

猪苓肉桂每服五錢 張子和去猪苓減三石一半加人

參乾葛藿香木香亦名桂苓甘露飲

瀉白散 桑皮 地骨皮 甘草 粳米

導赤散 生地 木通 甘草稍 淡竹葉

紫雪 黃金 寒水石 石膏 滑石 磁石 升麻 玄參

甘草 犀角 羚羊角 沉香 木香 丁香 朴硝

硝石 辰砂 麝香

清骨散 銀柴胡 胡黃連 秦艽 鱉甲 地骨皮 青蒿

知母 甘草

二陳湯 半夏 陳皮 茯苓 甘草 生薑

臨證指南醫案 卷十 集方

二賢散 陳皮 甘草

控涎丹 甘遂 大戟 白芥子

滾痰丸 青礞石 沉香 大黃 黃芩 煅礞石

白金丸 白礞 鬱金

平胃散 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

橘牛枳朮丸 白朮 枳實 橘皮 半夏

保和丸 山楂 神麴 茯苓 半夏 陳皮 蘆子 連翹

水陸二仙丹 金櫻膏 芡實

桑螵蛸散 人參 茯苓 遠志 石菖蒲 桑螵蛸 龍骨

龜板 當歸

蠟礬丸 黃蠟 白礬

膠艾四物湯 卽四物湯加阿膠艾葉

柏子仁丸 柏仁 牛膝 卷柏 澤蘭 續斷 熟地

右汪訥菴醫方集解中方

補陰益氣煎 人參 當歸 山藥 熟地 陳皮 炙草

升麻 柴胡 生薑

兩儀膏 人參 熟地 熬膏白蜜收

貞元飲 熟地 炙草 當歸

玉女煎 生石膏 熟地 麥冬 知母 牛膝

理陰煎 熟地 當歸 炙甘草 乾薑 或加肉桂

臨證指南醫案

卷十

集方

天

何人飲 何首烏 人參 當歸 陳皮 煨薑

參附湯 人參 製附子

芪附湯 黃芪 製附子 加生薑

青囊斑龍丸 鹿角膠 鹿角霜 柏子仁 菟絲子 熟地

茯苓 補骨脂

斑龍二至百補丸 鹿角 黃精 杞子 熟地 菟絲子

金櫻子 天冬 麥冬 牛膝 楮實子 龍眼肉

已上藥同鹿角熬成膏加入煉蜜調入後藥末杵合爲丸

鹿角霜 人參 黃芪 芡實 茯苓 山藥 知母

熟地 萸肉 五味子 十味爲細末和前膏爲丸

秫米半夏湯 秫米 半夏

錢氏益黃散 陳皮 青皮 訶子肉 炙草 丁香

和中丸 白朮 厚朴 陳皮 半夏 枳櫛 枳實

炙草 木香

東垣和中丸 人參 白朮 炮薑 炙草 陳皮 木瓜

神保丸 木香 胡椒 乾蝎 巴豆

子和導水丸 大黃 黃芩 滑石 黑豆

神約丸 大黃 杏仁 厚朴 麻仁 枳實

華蓋散 麻黃 蘇子 桑皮 杏仁 赤苓 橘紅 甘草

石刻安腎丸 附子 肉桂 川烏 川椒 巴戟 菟絲子

臨證指南醫案

卷十

集方

天

破故 赤石脂 遠志 茯苓 蒼朮 山茱萸

杜仲 胡蘆巴 石斛 韭子 小茴 菴蓉 柏子仁

川棟子 鹿茸 青鹽 山藥

王荆公妙香散 人參 龍骨 益智仁 茯苓 茯苓

遠志 甘草 硃砂

猪肚丸 白朮 苦參 牡蠣 猪肚一具 劉松石方

威喜丸 茯苓 猪苓 黃蠟

交加散 生地 生薑

烏鯁魚骨丸 烏鯁魚骨 蘆茹 雀卵 鮑魚湯下

三豆飲 大黑豆 赤小豆 綠豆 甘草水煮

萬氏牛黃清心丸 黃連 黃芩 山梔 礞石 辰砂

西牛黃

右景岳全書中方

已上四部書，詠業醫者必備，故但開藥品其分量炮製加減服法以及治症，俱未載明，并內有峻利之方，所服不過幾厘幾粒者，須按方查閱，切勿草率處度，且不遵古法，不惟無效，反有遺悞，慎之。

清燥救肺湯 經霜桑葉 三錢 杏仁 七分去皮 麥冬 一錢二分去心

石膏 二錢 人參 七分 阿膠 八分 胡麻仁 一錢 甘草 一錢

枇杷葉 一片去毛筋 水一碗煎六分食遠服

臨證指南醫案 卷十 集方 全

進退黃連湯 川黃連 薑汁炒 乾薑 炮 一錢 人參 一錢 桂枝 一錢 半夏 錢半 大棗 一錢

右進法用木方三味不製水三茶鍾煎減半溫服退法桂枝不用黃連減半或加肉桂五分如上製煎服

當歸桂枝湯 卽桂枝湯加當歸

茯苓桂枝湯 卽桂枝湯加茯苓

參歸桂枝湯 卽桂枝湯加人參當歸

人參建中湯 卽建中湯加人參

參芪建中湯 卽建中湯加人參黃芪

歸芪建中湯 卽建中湯加當歸黃芪

厚理中湯 卽理中湯加吳茱

人參溫胆湯 卽溫胆湯加人參

黃連溫胆湯 卽溫胆湯加黃連

星附六君子湯 卽六君子湯加製南星白附子

生脉四君子湯 卽生脉散合四君子湯

生脉六味湯 卽生脉散合六味湯

養營湯 卽人參養營湯

六神湯 卽陳無擇六神散卽四君子加山藥扁豆

戊巳湯 卽四君子湯加陳皮白芍

芩薑朮桂湯 只此四味

臨證指南醫案 卷十 集方 全

五子五皮湯 卽五皮飲加杏仁蘇子葶藶白芥子荷子

加桂理中湯 卽理中湯加桂

子和桂苓湯 卽子和桂苓飲

資生丸 人參 白朮 土炒 苡仁 各三兩 山查肉 神麩

橘紅 各二兩 扁豆 蓮肉 厚朴 各一兩 山藥 茯苓

麥芽 芡實 各一兩 桔梗 甘草 藿香 各五錢 澤瀉

川黃連 白豆蔻 各三錢 右製爲末煉蜜丸每丸重二錢

每服一丸醉飽後二九細嚼淡薑湯下

聚精丸 黃魚鱈膠 一兩切碎 蛤粉炒 沙苑蒺藜 八兩馬乳浸隔

右爲末煉蜜丸每服八十九白湯下

百餘粒丸 蛇含石本草名蛇黃大者三兩兩兩般透 禹餘糧石三兩兩兩般透

鋼鐵砂五兩兩般透 三物各研極細配入下項藥

羌活 川芎 三稜 蓬朮 白朮 白朮 白朮 陳皮

青皮 木香 大茴炒 牛膝 當歸 炮薑 附子炮

肉桂各五錢 右製為末入前藥拌勻神麴糊為丸如桐子

大食前或溫酒或白湯送下三十九至五十九最要忌鹽

一毫不可入口否則病發愈甚日三服兼用溫和調補藥

助之 此方又名大鐵砂丸 此方去附子蓬朮青皮勿

茯苓葉氏名鐵砂丸

小溫中丸 白朮二兩 茯苓一兩 陳皮一兩 熟半夏一兩

臨證指南醫案 卷十 集方

甘草三錢 神麴炒 生香附一兩 苦參炒 黃連炒

鐵砂飛麴一兩半 為末醋水各半打神麴糊為丸桐子大

每服七八十九白朮六錢陳皮一錢生薑一片煎湯下虛

甚者加人參一錢木方去黃連加厚朴半兩忌口病輕服

至六七兩小便長甚者服一觔小便始長

繆仲淳脾腎雙補丸 人參 蓮肉炒 山萸炒 山藥炒

五味子蜜蒸 菟絲子各一觔 橘紅 砂仁炒 車前子米泔

巴戟肉各十二兩 肉豆蔻一兩 補骨脂二兩

右為末煉蜜丸如虛而有火者或火盛肺熱者去人參肉

豆蔻巴戟補骨脂 忌羊肉羊血

阿魏丸 阿魏七錢 鱉甲二兩 黃芪 廣皮 枳實 柴胡

白朮各一兩 青皮 草果 黃芩 當歸 茯苓各八錢

白朮七錢 山查一兩 神麴一兩 延胡 水法丸

又方 阿魏連翹胡黃連山查青皮山稜蓬朮陳皮半夏麥芽

厚朴萊菔子甘草

更衣丸 硃砂五錢 蘆薈七錢 好酒和丸每服一錢二分

濟生腎氣丸 卽八味丸加車前牛膝葉氏用茯苓八兩為君

熟地只用四兩 又薛氏濟生丸分量不同

海粉丸 蛤粉 瓜蒌實 杏仁各一兩 廣皮 紫蘇各二兩

白朮 土貝母各四兩 紫苑三兩 木香五錢 煉蜜丸

臨證指南醫案 卷十 集方

葱白丸 熟地四兩 白芍 當歸 川棟子 茯苓各二兩

川芎 枳殼 厚朴 青皮 神麴 麥芽各一兩 三稜

蓬朮各一兩 乾薑 大茴 木香各七錢 肉桂五錢 用蔥白汁丸

又方 人參 阿膠 川芎 當歸 厚朴 用蔥白汁丸

安胃丸 烏梅 川椒 附子 桂枝 乾薑各一兩 黃柏二兩

黃連五錢 川棟子肉 廣皮 青皮各二兩 白芍三兩

人參量加如有邪 再用川椒烏梅湯法丸 一方無廣皮

有當歸細辛

妙香丸 巴豆三百十五粒 夫皮 牛黃 研龍腦 研麝香 研

輕粉各三兩 硃砂各九兩 真金箔九十片 右各研勻煉黃蠟六兩

入白蜜三分同煉勻為丸每兩作三十九

海蛤丸 天冬 瓜蒌霜 海浮石 蛤粉 風化硝

桔梗 橘紅 香附 竹瀝 薑汁 蜜丸

木菟丸 白朮 菟絲 又景岳新方苓朮菟絲丸

局方龍膏丸 即當歸龍膏丸

白茯苓丸 即一味用山梔湯製為丸用大豆黃卷湯送下

禹糧石脂丸 即一味為丸

橋木丸 即一味為丸

真武丸 即真武湯作丸

歸脾丸 即歸脾湯料作丸

臨證指南醫案 卷十 集方

桑麻丸 桑葉 黑芝麻 蜜丸

滑川丸 即滑川散

禹功丸 即禹功散

生脉六味丸 即六味丸合生脉散

肥兒丸 景岳全書中有四方

益母丸 此方不一總用益母草膏為君有加四物香附山查

者有去山查加阿膠者有加八珍香附砂仁查肉者

東垣清心涼膈散 連翹 薄荷 黃芩 山梔 桔梗

甘草 竹葉 水煎服

金鈴子散 金鈴子 川棟子 延胡索 為末每服三

錢酒調服 水煎服亦可

虎杖散 牡牛膝根汁二三兩古方本用虎杖草汁今人不識此草故以土牛膝根汁代之

當門子麝香一分右將麝香入汁中和勻隔湯燉溫服

葛可久花蕊石散 花蕊石 煨存性研如粉以童便一盞男

人入酒少許女人入醋少許煎溫食後調服三錢甚者五

錢能使瘀血化為黃水後用獨參湯補之

歸芍異功散 即異功散加當歸白芍

雞鳴散 牛蒡子炒香研細隨服加入雄雞冠血五匙狀元紅酒少許調勻以炒荆芥三分煎湯送

通聖散 即防風通聖散

歸芪異功散 即異功散加當歸黃芪

臨證指南醫案 卷十 集方

香砂異功散 即異功散加木香砂仁

正氣散 即藿香正氣散

玉壺丹 即扁鵲玉壺丸 治命門火衰陽氣暴絕寒水臌脹

却有神效古吳王晉三先生得異授製法當宗之

好硫黃八兩配真麻油八兩以硫打碎入冷油內燉爐上

炭火宜微勿烈以桑條徐調候硫溶盡即傾入大水內急

攪去上面油其色如金取缸底淨硫稱見若干兩仍配

香麻油若干兩照前火候再溶再傾連前共三轉第四轉

用真棉花核油配硫若干兩照前火候再溶再傾入大水

內攪去上面油其色如金第五轉用肥皂四兩水中同

煮六時第六轉用皂莢四兩水中同煮六時拔淨製硫之

油攪去其水其色如硫火之紫第七轉用爐中炭灰淋鹹

水製六時第八轉用水荳腐製六時拔淨皂蠟之性第九

轉用田字草出水荒稻田中其葉搗汁和水煮六時臨用

研如飛麩凡淨硫一兩配炒糯米粉二兩或水法或濕搗

為丸每服以硫三分為準漸加至一錢止開水溫下

回生丹 大黑豆三升用水浸取殼用絹袋盛煮同豆

紅花三兩炒黃色入好酒四碗蘇木三兩河水五碗

大黃一兩陳米醋九兩右將大黃末一兩入淨鍋下醋三

兩文火熬用長木筋不住手攪之將成膏再加醋三兩熬

之又加醋三兩次第加畢然後下黑豆汁三碗次下蘇木

汁次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦盆盛之大黃錫焦亦

鏟下入後藥同磨

人參二兩川芎當歸熟地茯苓香附延胡

蒼朮米泔炒桃仁蒲黃各一烏藥牛膝地榆

橘紅白芍羌活炙草五靈脂山萸三稜各

良薑木香各四木瓜青皮白朮各三益母草二兩

乳香沒藥各二馬鞭草五錢秋葵子三錢

右三十味并前黑豆殼共晒乾為細末入石臼內下大黃

膏再下煉熟蜜一兩共搗干搗為丸每丸重二錢七分靜

室陰乾二十餘日不可烘晒乾後止重二錢外以蠟作殼

護之用時去蠟調服 一方無益母草馬鞭草秋葵子三

味并不用蜜醋止用八碗

至寶丹 犀角鎊硃砂研水雄黃研水琥珀研玳瑁各一兩

水安息香一兩無灰酒熬成膏如西牛黃五錢麝香一錢

龍腦一錢金銀箔各五為極細末將安息香膏重湯煮入

諸藥搜和分作百丸蠟護臨服剖用參湯化下

紫金丹 牛黃 冰片 狗寶 鴉片各六廣木香二兩

右為末入乳丸重五厘金箔為衣

震靈丹 禹糧石 赤石脂 紫石英 代赭石各四

臨證指南醫案 卷十 集方 全

上四味作小塊入淨鍋中鹽泥封固候乾用炭十兩煨炭

盡為度入地出火氣必得二晝夜研細末

乳香二兩沒藥二兩硃砂水飛五靈脂二兩

為末同前四味和勻糯米飯丸宜堅細

四順清涼飲 大黃 當歸 芍藥 甘草 各等分水煎服

露薑飲 人參 生薑 水煎露一宿空心隔湯燉溫服

子和桂苓飲 即桂苓甘露飲

七香餅 香附二兩丁香皮二兩甘松八錢益智仁六錢

砂仁二錢蓬朮二錢廣皮

阿膠雞子黃湯非黃連 河間中續分清湯 清阿膠丸

臨證指南醫案 卷一〇

四四五

蠶痛丹 香連飲 已上五方俟考

按先生雖善用古方然但取其法而並不膠柱觀其加減之妙如復脉建中瀉心等類至用牡蠣澤瀉散只取此一味故案中不書用某方而不開明藥味者決非盡用板方必有加減之處觀者以意會之可也

論中所述諸方開列於後以便查閱

麻黃人參芍藥湯 桂枝 麻黃 黃芪 炙草 白芍

人參 麥冬 五味 當歸

甘草湯 生甘草

生薑甘草湯 生薑 人參 甘草 大棗

臨證指南醫案 卷十 集方 兌

調中益氣湯 即補中益氣湯去當歸白朮加木香蒼朮

升陽益胃湯 羌活 防風 獨活 白芍 各五錢 廣皮 四錢

黃芪 二兩 人參 半夏 炙甘草 各一兩 柴胡 黃連 各二錢

白朮 茯苓 澤瀉 各三錢 每服三錢加薑棗煎

桂枝黃連湯 即仲景黃連湯 黃連 桂枝 乾薑 人參

半夏 炙草

溫脾湯 乾薑 肉桂心 熟附子 炙草 枳實

厚朴 各二錢 大黃 四錢 用一兩水煎服

橘皮湯 橘皮 生薑

橘皮竹茹湯 橘皮 竹茹 大棗 生薑 甘草 人參

生薑半夏湯 半夏 生薑汁

蒼朮石膏湯 蒼朮 石膏 知母 甘草

滋燥養營湯 當歸 生地 熟地 白芍 甘草 黃芩

秦艽 防風

蘭草湯 蘭草 即省頭草 水煎服

潔古芍藥湯 芍藥 歸尾 黃芩 黃連 大黃 木香

檳榔 甘草 肉桂

葛根芍連湯 葛根 甘草 黃芩 黃連

茅朮理中湯 即理中湯白朮換茅朮

厚朴三物湯 厚朴 大黃 枳實

臨證指南醫案 卷十 集方 兌

厚朴溫中湯 厚朴 陳皮 甘草 木香 草薢 乾薑

茯苓

下瘀血湯 大黃 莖仁 蟅虫

舒筋湯 赤芍 海桐皮 當歸 白朮 各錢 片薑黃 二錢

羌活 炙草 各一錢 水薑煎去渣磨入沉香汁少許食前服

通氣防風湯 柴胡 升麻 黃芪 各一錢 防風 陳皮 羌活

人參 甘草 各五分 藜蘆 青皮 各三錢 薤仁 二分 黃柏 一分

玄參升麻湯 玄參 升麻 麝香 牛蒡 連翹 防風

黃芩 黃連 桔梗 甘草

芎歸湯 川芎 當歸

澤木湯 澤瀉 白朮

茵陳四逆湯 附子 乾薑 炙草 茵陳

坎炁湯 即坎炁丹 坎炁 人乳粉 熟地 人參 枸杞子

酒釀白蜜同煉搗丸米飲送

補血湯 黃芪 當歸

黃連竹茹橘皮半夏湯 黃連 竹茹 橘皮 半夏

左歸丸 熟地 山藥 枸杞 山萸 牛膝 菟絲子

鹿角膠 龜膠

右歸丸 熟地 山藥 枸杞 山萸 菟絲子 鹿角膠

杜仲 當歸 肉桂 附子

臨證指南醫案 卷十 集方

金剛丸 草薢 杜仲 肉蓯蓉 菟絲子

四斤丸 木瓜 天麻 菴蓉 牛膝 附子 虎骨

或加乳香沒藥

柏子仁丸 柏子仁 人參 白朮 半夏 北味 牡蠣

麻黃根 麥麩 棗肉丸

五仁丸 火麻仁 郁李仁 柏子仁 松子仁 桃仁

指迷丸 茯苓丸 即指迷茯苓丸

清六丸 滑石 甘草 紅麩

蘇合香丸 蘇合香 安息香 犀角 冰片 射香 香附

木香 薰陸香 沉香 丁香 白朮 煉蜜丸硃砂為

表外作蠟丸

五瀉丸 硃砂 眞珠 雄黃 水銀 黑鉛 煉蜜丸如蘇

子大每服三四丸

硃砂安神丸 硃砂 黃連 生地 當歸 甘草

人參丸 人參 茯苓 茯神 棗仁 遠志 益智仁

牡蠣 硃砂 棗肉丸

茯苓丸 茯苓 菟絲子 建蓮 酒糊丸或加五味子

苓下菟絲丸 茯苓 白朮 菟絲子 蓮肉 山藥 炙草

五味子 杜仲

濟生固精丸 牡蠣 菟絲子 韭子 龍骨 北五味

臨證指南醫案 卷十 集方

桑蠟蛸 白石脂 茯苓

家韭子丸 家韭子 鹿茸 肉蓯蓉 牛膝 菟絲子

熟地 當歸 巴戟 杜仲 石斛 肉桂 炮薑

烏雞煎丸 烏骨雄雞一隻 烏藥 蛇床子 丹皮 白朮

人參 黃芪 各一兩 茅朮 米泔浸一兩半 海桐皮 紅花 白芍

肉桂 附子 炮去 川烏 炮 義朮 陳皮 各二兩 熟地 洗焙

延胡 木香 肉蓯 草蓂 琥珀 各五錢 右細判以烏雞

湯燐去毛及腸雜將上藥納雞肚內用新磁瓶以好酒一

斗同煮令乾去雞骨以油單盛焙乾為末煉蜜和丸如桐

子大每服三十九丸隨症用湯引下

安蛇丸 卽理中安蛇丸

侯氏黑散 菊花 白朮 防風 桔梗 黃芩 細辛

茯苓 牡蠣 人參 礬石 當歸 乾薑 川芎

桂枝 爲散酒服

雞金散 雞內金 沉香 砂仁 陳香椽皮

天水散 卽六一散

本事方神效散 白海浮石 蛤粉 蟬蛻 爲細末用大鯽

魚膽七箇調服三錢

人參敗毒散 人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎

桔梗 茯苓 甘草 枳殼 薄荷 生薑

臨證指南醫案 卷十 集方 空

瓜蒌散 瓜蒂 赤小豆 香豉

蒼耳散 白芷 薄荷 辛夷 蒼耳 爲末葱茶湯調服

聖濟透關散 雄黃 猪牙皂莢 藜蘆 等分研末先含水

一日用藥吹鼻卽吐去水 備急如聖散有白礬等分

花蓋石散 花蓋石 四兩 硫黃 一兩 研細泥封煨赤服一錢童便

下

失笑散 蒲黃 五靈脂

五積散 白芷 陳皮 厚朴 當歸 川芎 芍藥 茯苓

桔梗 蒼朮 枳殼 半夏 麻黃 乾薑 肉桂

甘草 薑 葱

牛黃膏 牛黃 二錢 硃砂 鬱金 丹皮 各三錢 水片 甘草 錢

煉蜜丸如桐子大每服一丸新水化下

三才封髓丹 天冬 熟地 人參 黃柏 砂仁 甘草

一炁丹 河車 具人乳粉 四兩 秋石 四兩 紅鉛 五錢 蜜丸每丸重七釐

琥珀黑龍丹 卽黑龍丹 當歸 五靈脂 川芎 貝薑 熟地 各二兩

碎八砂鍋內紙筋 鹽泥固濟火煨過 百草霜 一兩 硫黃 乳香 各二錢 琥珀

花蓋石 錢 各一 右爲細末醋糊丸如彈子大每用一二九煨

火煨紅投八生薑自然汁浸碎以童便合酒調灌下

左歸飲 熟地 山藥 枸杞 炙草 茯苓 山萸

右歸飲 卽左歸飲去茯苓加杜仲肉桂附子

臨證指南醫案 卷十 集方 空

溫胃飲 人參 白朮 炮薑 扁豆 當歸 陳皮 炙草

歸氣飲 熟地 茯苓 扁豆 炮薑 丁香 藿香 炙草

陳皮

大和中飲 陳皮 枳實 砂仁 麥芽 厚朴 山楂

澤瀉

四柱飲 人參 附子 茯苓 木香

六柱飲 卽四柱飲加肉豆蔻訶子

五磨飲子 烏藥 沉香 檳榔 枳實 木香 白酒磨服

生鐵落飲 生鐵落 清水浸研澄飲水

普濟消毒飲 黃芩 黃連 陳皮 甘草 玄參 連翹

板藍根 牛蒡 薄荷 蠶絲 升麻 柴胡 桔梗

馬勃 武吉人參 便閉加大黃

清心蓮子飲 石蓮肉 人參 黃芪 茯苓 柴胡 黃芩

地骨皮 麥冬 車前 甘草

七福飲 人參 熟地 當歸 白朮 棗仁 遠志 炙草

胃關煎 熟地 白朮 山藥 石豆 炮薑 吳萸 炙草

二陰煎 生地 麥冬 棗仁 甘草 玄參 茯苓 黃芩

木通

秘元煎 人參 茯苓 白朮 炙草 棗仁 山藥 次實

五味 遠志 金櫻子

臨證指南醫案 卷十 集方

固陰煎 人參 熟地 山藥 山萸 遠志 炙草 五味

菟絲子

保陰煎 生地 熟地 白芍 山藥 川斷 黃芩 黃柏

甘草

壽脾煎 人參 白朮 炙草 當歸 山藥 棗仁 炮薑

建蓮肉 遠志

玉鑰匙 馬牙硝 一兩 硼砂 五錢 白礬 二錢 水片 一字

為末以水調服 入喉中

蒲黃酒 蒲 少湯色 清酒十爵沃之溫服

臨證指南醫案卷十終

據上海辭書出版社圖書館
藏清抄本影印原書字芯高
一九〇毫米寬二八〇毫米

掃葉莊一瓢老人醫案

〔清〕薛雪撰

掃葉莊一瓢老人醫案目錄

卷一

虛勞

中風

陰虛陽逆

勞傷陽虛寒熱

驚

卷二

痢疾 泄瀉 便血

汗

心悸 怔忡 狂癲

痔瘡 便秘

痰飲 喘咳 水氣 腫脹

脾胃

脫肛 腹中諸痛


氣痛 疝 腸 關 格 呃 逆

卷三

瘧疾

夏暑 暈 熱

春溫



卷四

痘疹 幼科 雜治

遺精 淋濁 尿血

氣鬱 發黃

痿痺

癰瘍 痔漏

疝 毒 淋 帶

經水 婦女科 雜治

附錄 調經種子方

康方伯傳海上仙方

心經失血

婦葉莊一脈老人案卷一
無錫周小春祖
蕭山謝誦移重族

形瘦體質不為濕害。經言瘦人以濕為寶也。蓋課誦動心。謀慮必由肝膽。君相皆動。氣升血溢。諸經氣皆升舉。凡安靜怡悅稍安。情志佛鬱病加。皆內因之恙。且勞心曲運神機。太酒色致傷兩途。神氣無形。精血有形也。

生地 丹參 遠志 棗仁 麥冬 柏子仁
天冬 桔梗 當歸 五味 茯神 元參
肝胃絡熱。暮熱甚。失血。

生地 川石斛 菟豆 麥冬 女貞子 茯神
久瀉利至十餘年。陰走泄而痿。肝腎真氣不主收攝。為

張瘕腹鳴。通日形寒不飢不欲食。緣陰損及陽。暴冷外加。口鼻吸入之寒。無有不侵。及中土之陽。病根是肝腎精血內損。久病務以飲食為先。溫胃避陽為急。用治中瀆。

人參 蒼梗 木瓜 厚朴 茯苓 穀芽 益智仁
新會皮
能食不知飢。痰多咳逆。當先理氣。清肅上焦。本質陰虧。再議。大沙參 白朮仁 萹仁 桑葉 杏仁 川貝母
腎虛督損。都氣丸
前方用丹溪補陰丸。午後頭痛已止。精血有形。易虧難復。仍以賦補填陰瀆。

熟地 茯神 龜膠 阿膠 湖蓮 瑣陽 人中白

天冬 五味 猪脊髓和為丸
揖拜皆動。陰不下固。必陽浮升舉。况隆冬過暖。天氣少藏。當春生令至。以乙癸同治。魚固其下。

六味去丹澤。加二倍。知柏五味。
閱病源。胎脈是肝腎精血暗虧。由至陰傷及陽明之脈。身半以上。漸致拘束。此非外來客邪也。六味加鹿茸五味。勞傷肝腎。奇脈不用。遇煩必骨痛背垂。雖有失血。未可沉陰滋降。以柔劑溫通補下。以充奇脈。

淡菴蓉 炒杞子 茯神 炒當歸身 淡補骨脂
生杜仲 生羊肉腎

維奇脈不主用事。子後汗出。陰陽發泄。是包舉溫養勿遲。苟不安逸。藥必無功。

鮮河車 人參 芡實 大熟地 茯神 壯五味
金櫻膏 石蓮 炒黑遠志

勞心至於陽痿。當以交合心腎。但中年以後。陽難充復。最不易效。鹿茸 魚膠 韭子 羌絲 補骨 舶茴香
沙苑 覆盆 五味 青鹽 茯苓 遠志 茅朮
早食頗安。晚食不化。脈左弱細。右尺中虛動。是脾腎兩虛。自陰傷及陽。以陰藥中佐以溫煦。以坎水中真陽內崇也。早服都氣加河車。午服異功散。
初春脈動而不鼓。亦收藏之司淺矣。當壯年未育。晨吐鹹

下損及上

痰皆水虧火炎精氣不充之象。胃旺能納穀當專理下焦。不必以痰為慮。牛骨髓一具。羊骨髓熱去渣。海參膠。澹菜膠。線魚膠。龜鹿膠。熟地。兔絲子。芡實。覆盆子。金櫻子。家韭子。茯苓。五味子。建蓮。遠志肉。製首烏。少年奔走勞動。動則陽升。陰氣不主內守。咳非外感。豈必肺傷。必情志未堅。龍相內灼。衝陽上舉。致咳。醫見咳治肺。非辛解。即寒涼。治不中病。徒耗胃口。食減其病日凶。病人自述。自腰以下。筋脈不束。竟夜不寐。晨必欬。嘔中下損極。顯然明白。

桂枝木 南棗肉 炙黑州 白芍 白飴糖

掃葉莊方案

能食反瘦。久嗽夜甚。中年精血不生。下損難愈之病。

牛骨髓 猪脊髓 淮山藥 茯苓 懷熟地

羊骨髓 湖蓮肉 山萸肉 芡實

久損之陰不復。與柔劑滋填。鹹秋石 阿膠 熟地

天冬 茯苓 元武版 知母 川斛膏 和為丸

中年脈細便燥。五液不充。即是陰虧。長夏失血。交秋再發。食減什三。為下損及胃。勞怯難愈之症。用藥不宜偏寒偏熱。但主養精血有情。勿損胃口者。

芡實 龜鹿膠 建蓮肉 九蒸熟地黃

山藥 五味子 豬脊髓 牛羊髓

脈小數。是精血內損。成勞陰虛。生內熱。久而不復。陽氣不

陰陽虛弱

傷。夜不成寐。以包固大氣。一燕丹 河車 秋石 紅鉛 乳粉。形瘦脈虛。左部空大。嗽病三年。行走氣喘。據從臍下氣衝。必咳甚而嘔。經言久咳不已。則三焦受之。乃他處累及。非治肺矣。思下之任脈失任。衝陽由胃及上。犯肺致欬。酒固下攝。納滋養。腎病在下。必先形容憔悴者此也。五味子。人參 鹿胎 骨脂 茯苓 坎燕 胡桃 菴蓉。脈細小。色白。食少。不易運。形容入夏更瘦。不獨精血不充。氣弱易泄。不耐煩勞。此臟陰腑陽交損。補三陰為是。人參 熟木 茯苓 芡實 白芍 歸身 北五味 熟地 桂圓煎湯和丸

掃葉莊方案

病是老勞。不肯充復。入夏時令熱燥。氣泄形肉日瘦。行重。氣喘。納食日少。平昔喜用冷食。只宜用生脈四君子。

人參 麥冬 北五味 熟木 茯苓 炙神 炙州 熟膏

課誦煩心。情懷憂慮。五志之陽鬱。勃以伸。直升直降。遂發

肛瘍。久而成漏。最難復。為勞怯。必開懷怡悅。用藥全以胃

氣為主。人參 蒸白木 茯苓 陳皮 炙甘州

面色青黃。脈垂入尺。吸氣短促。如喘。身熱尤甚。此皆精血

下奪。氣不歸元。肝腎損極。不復。雖填精充髓。病深未必能

效。鮮河車 山萸肉 山藥 茯苓 熟地黃 芡實

北五味子 白蓮藕搗取汁

今夏血症再發。入秋音啞。喉痛。陰損難復。

老勞虛弱

腎損發喘

血虛音啞

夫血衝逆者

生地 麥冬 天冬 北參 茯神 阿膠 鷄子黃
脈下垂右大深春失血入秋半不復飲食仍納無以充長
精神由精血久損肝腎不納行動則喘語言氣怯着枕衝
氣上逆咳喘皆損及八脈不易治之症

勞傷失血食減

河車 杞子 北味 沙苑蒺藜 湖蓮肉 大麥冬
人參 茯苓 熟地黃 山藥漿同河車膠為丸
脈數虛右大入夏咳嗽失血遂飲食頓減此屬勞傷內因
以養胃陰甘藥乃土旺金生之義

老勞血虛咳嗽

黃芪 北沙參 苡米仁 炙甘草 黃精 茯苓
老勞有年今夏血痰吐後不但頻效不已身動喘息不止
此乃下元氣不收納以攝固腎臟不與肺喘同治

下損血形脫使

鮮河車 塊苓 熟地黃 紫石英 北五味子
胡桃肉 湖蓮 補骨脂 山藥粉糊為丸
自正月間吐血至今形瘦氣短身動尤甚飲食仍用大便
溏着枕臥息不安欲得坐起此下焦衝之氣冲上遂令喘
效不已痰係脂液所化吐咯永不清爽下損勞怯症最
易治 人參 紫石英 五味子 坎炁 石殼湖蓮

瑣陽 茯苓 山藥粉糊為丸
壯年脈形數垂入尺痰多曾嗽血冬底盜汗顯然真陰不
旺精血難充若不加保養久延成怯
人參 熟地黃 山藥 茯苓 芡實 建蓮肉
牛膝 五味子 河車膠和為丸

下損血形脫使

向來體質是下元不足上冬過暖氣泄暴冷直侵暴嗽倪
不能臥痰多血冒已是下焦厥逆干上夫不卧之症有餘
者治肺不足者治腎而參芪乃補中脾胃藥其見効之故
是從中堵截聊以遮欄架隔其冲脾胃得醒穀進精氣少
甦究竟隔二三治法非上乘工夫也當以河車膠益衝任
以包舉大氣以臭穢是下焦上泛用重濁之補以填之乃
至理也下午餘功以四君子湯益土生金用之勿急確守
可愈非比客病傳變朝更夕改者
先天原弱繼以病傷是症精血不肯生旺陰不戀陽陽浮
氣升煎方以酸收重鎮滋陰填煩效調攝大旨忌食辛辣
不宜夜坐及奔走之勞久服可冀復元

陽浮氣升

場葉莊方案

吐血

久勞自下損

金櫻膏 青鹽 芡實 磁石 龜鹿膏 山萸肉
熟地黃 湖蓮 阿膠 瑣陽 北五味 雲茯神
少壯脈小數垂尺及澤穴男子精血不肯充旺情萌內震
陰火即動此失血欬嗽外寒內熱非外來客病自能保養
不致成怯用藥不過治偏無關於生長身中之精氣
復脈湯去參桂薑加入北沙參 甘蔗漿
病乃陰傷已久陽分形羸背寒河車丸包舉填精究屬濁
陰之藥必兼建之中陽以崇生氣若豎效治血滋陰必然
敗壞决裂
紫衣胡桃 米糖 煨薑 南棗肉 白芍 炙甘州
血後欬嗽食減子後汗泄虛損雖自下起驗諸色脈扶中

更要理嗽。清涼愈治愈。異功散

形氣精血消。生不生。豈州木可以充復。古稱人參益氣。羊肉補陰。咽喉如痺。佐秋石為外廓。取鹹味。直至至陰。

人參 雄羊肉腎 赤石脂 鮮山藥 秋石為丸

病原。春是陰傷及陽。其外寒內熱。惡食。噎食。嘔。以及泄瀉。皆滋潤涼藥。希冀治。救。仍不止。胃反受傷。然虛損為肝腎病。當此地位。以脾胃進穀為寶。莫言治病。

戊巳湯加入茯苓

診左脈浮弦。右大而緩。視面色痿黃。膚乏淖澤。據述瀉血已二十年。頻用清涼止血。血仍不止。食減神困。改進參朮甘溫有效。此乃救前藥之謬。未明病機。所由來。夫積勞者

掃葉莊方案

虛勞補性

七

今陽傷。金匱云。脈大為勞。虛極者亦為勞。聖人明示大而勞者。宜理陽虛而勞之。必宜理陰。自血去太過。自述大腿跳躍。按之不息。腎液肝血無以養骨。營筋。內風翔動。致奇脈踴維。全不司其約束。肺陽臟陰。奇脈交損。中年以後。最難充復。日就衰憊。宜矣。論久病內傷。必究寢食。今食少艱運。寐少。寤多。莫言治病。當固護二氣之衰。再參天運地氣之勝。復斯身中陰陽消長。必有合也。

人參 生益智仁 木瓜 生於朮 附方 人參

附方 北沙參固本加阿膠 又加芡實山藥茯苓神蓮肉 生服合六味去丹澤加女貞芡實 都氣湯加青鉛

固本加茯苓芡實阿膠五味蓮肉龜版人參鬚

八珍湯料為末加河車膠和丸

形瘦脈細。色奪。下焦氣衝心。痛咳甚。此肝腎精血內虧。衝脈之氣逆上所致。此治肺清潤無益。乃內損之症。最不易治。

熱地 茯苓 五味 芡實 石蓮肉 炒黃山藥 診脈左部弦大。若有鋒銳。右脈如數。按之虛濡。述上秋失血。夏季再發。交秋。嗽甚。必食穀噦。嘔而出。凡人身左升主肝。右升主肺。左升太過。必右降不及。木反形。金氣不肅。化而咳。咳甚而嘔。况冲年陰火易動。龍相交熾。胃少寧靜。越人有下損及胃之文。此皆內動精氣之恙。苟非屏絕慾念。怒勞。徒以藥餌為治。草木無情之物。不能充精益髓耳。

掃葉莊方案

虛勞補性

八

人參 飴糖漿 蜜炒新會皮 炙甘州 生白芍

南棗肉

脈右弦大。數。左小。數。據述。捺持過煩。遂致嗽失血。血止半年。不復肌瘦。色奪。身動喘促。鼻息有音。咽喉。痛。不。緩。顯。然。精。血。枯。痿。下。焦。元。海。之。敗。攝。之。權。陰。不。上。承。但。有。衝。脈。浮。陽。升。舉。有。升。無。降。無。秋。收。冬。藏。之。應。乎。天。地。故。清。涼。潤。肺。無。濟。乎。喘。咳。諸。症。皆。由。根。本。下。怯。子。令。母。虛。此。謂。內。損。州。木。藉。其。偏。勝。攻。邪。精。血。有。情。藥。味。未。能。充。長。故。啣。藥。無。功。惟。潛。心。屏。俗。靜。處。山。林。寒。暑。一。更。凝。然。不。動。間。有。病。痊。者。早。晨。服。瓊。玉。膏。午。服。人。乳。色。既。白。脈。小。不。食。不。飢。便。溏。不。與。久。坐。脊。骨。痛。爽。行。動。如。

喘此精氣內奪。失血內損。味復。更加時瘧。再傷。涎沫湧吐。五液所化。非陰臟之藥用。參建中湯去薑。攻毒金石重墜。其氣流入骨髓。內蒸燥液。漸致內損。虛怯。凡滋養黃地之藥。決不應病。當常以青鉛數兩打薄。每日煮汁。用於煮粥。煮飯。經年搜剔藥毒。

方用聚精加茯苓

夏至陰氣不生。乃損不能復矣。今當大熱。氣泄愈甚。百脈諸氣皆空。脂液盡耗。難更甦。為寒為熱。無非陰陽互乘。陽由陰上越。則頭顛痛。風木之火入中。則嘔逆。欬噎。總之液涸神竭。進而儀瓊玉。扶至稍涼。再為酌量。

人參 麥冬肉 竹葉 大麥仁 烏梅肉

培葉莊方案

九

鮮荷葉搗汁 水煎沉冷服

勞損三年。冬季病發。遂音啞無聲。入春乾欬。欲涼飲。大便不實。所幸胃納頗安。以固攝下焦。望陰得上承。庶可延年。

熟地 茯神 芡實 川石斛 山藥 湖蓮

左數甚。夏季嗽血。入冬聲嘶喉痛。陰損成勞。藥不易治。

生地 甜北沙參 麥冬 阿膠 川斛 生雞子黃

脈細促數。是腎精肝血內耗。欬必嘔吐。清涎濁沫。此衝脈逆氣。自下泛上。氣不收納。喘而汗出。根本先撥。藥難奏功。醫執見血為熱。見嗽治肺。是速其凶矣。

人參 胡苑肉 秋石 熟地 五味子

陽傷背寒。陰損發熱。久嗽失音。延及喘嘔。兩三年來。容瘦

膚枯。諒非外邪。瘵過。由營衛偏枯。勞損成疴。

黃芪 阿膠 棗仁 歸身 牡蠣 炙甘草

虛損欬嗽

暑解熱止。欬喉息。有音。痰涎沫。此腎陰不固。虛熱浮溢。致欬。非湯藥可愈。戒酒色。真怒可安。否則延為勞怯。

都氣湯中加入 秋石 清阿膠

向有失血陰虛。春夏又病時氣。秋咳。舌根白胎。形質更弱。以熱傷津液。治用復脈法。

生地 麥冬 阿膠 炙黑甘草 麻仁 南棗

勞損夜熱。效甚。皆陰虧無以攝。伏陽氣衝脈。皆冲上擾為欬。若以清肺治欬。必不愈。必致胃傷。廢食矣。

培葉莊方案

虛損欬嗽

十

水煮熟地 五味 天冬 女貞實 茯神 阿膠

脈數形瘦。久欬不止。六味湯中加入 天冬 麥冬 色蒼脈數。欬已半年。納食不多。始以甘涼潤劑。不得犯胃。

生白扁豆 玉竹 桑葉 大沙參 麥冬 生艸

寒熱半年。嗽血前後。胸背相映刺痛。是過勞受傷。營衛二氣空際。法當甘溫益氣。莫與清涼肺藥。

歸芪建中湯去薑 附黃芪建中去薑加 牡蠣

失血後。欬不已。行忤氣喘。心熱脈細。數促。此下焦肝腎精血傷損。陽浮上熾。為欬。故清肺寒涼則謬。

復脈湯中法人參

寐則噓欬。陽氣不能收入陽蹻。痰綠色。夜不能寐。着枕。此

為腎病。鮮氏加減八味湯中。加入紫衣胡桃肉。脈左數。效必下氣上冲。此為陰虧。乃怯症之根萌也。

熟地 茯神 芡實 五味 山藥 建蓮

診得關前搏大。納食頗多。據說飲酒食鹹味太過。致吐血。失音。且形瘦面赤。從木火刑金治。凡酒客不喜甜膩藥味。

枯黃芩 生石膏 知母 滑石 生甘草 川貝母

左升從肝。凡相火內風不寧。胃津化痰。擾肺為效。而誦讀。久坐。都令君相上乘。臟陰不充。必夏至漸生。斯時且勿攻。

苦。養至白露可愈。熟地 山藥 女貞子 芡實 建蓮

杞子 黃肉 酸秋石 茯苓 建蓮肉 豬脊水丸

因痢陰傷。宿病效。痰多。是下焦陰不上承。五液泛而為。

掃葉莊方案 虛勞效

為痰涎藥難奏功。必須安養。待精氣充復可愈。

熟地炭 芡實 茯苓 炒山藥 湖蓮 川石斛

時氣熱病。久延傷陰。遂有失血。效。夏秋晡熱倦懶。暑熱受傷氣也。只宜養胃腎之陰。不必以其效。嗽而治肺。

復脈去參薑桂

右脈虛大。色奪形瘦。肌燥瘡癢。效。嗽經年。曾經失血。是津虧氣餒。由精勞內損。但理胃陰。不必治效。

金匱麥冬湯去半夏

脈數虛右大。久嗽咽喉痛。足冷。是虛陽氣浮越。引導不應。曾服八味丸。大造去人參牛膝。

中下交虛。痰多嗽甚。血止。下焦冷。寅卯莖舉。是陰不攝陽。

花

陽自獨升。獨降。冬失其藏。春深怕發。

熟地 茯苓 芡實 五味子 山藥 建蓮肉

久嗽食減。痰多氣短。與 麥冬湯 數年以外。失血。形瘦食失。行走風喘。自述交夏血症必發。發則左脇有聲。由下而上。蓋肝陽內風。旋動血溢。皆腎水不主生木。若能安養怡悅。尚可帶病延年。

九製首烏 旱蓮州 天門冬 方解青鹽 茯神 雄羊肉腎 女貞子 枸杞子 麋角膠

診脈左部平和。右關弦大帶滑。此失血。非虛損。問胸腕不熱。是陽明胃氣不和。氣逆則擾動血絡。只宜整戒酒肉。辛辣。胃和即愈。不須介懷。

掃葉莊方案 虛勞血虛

紫降香剉末 金川斛 桔梗 廣皮 杜蘇子 杏仁 枳殼 萊菔子

脈細。倉血病。從下焦。氣衝根怯。宜戒酒色。安守百日。可旺。六味加 車前 牛膝

服麻桂湯藥。失血。咳。倉不已。過辛溫耗散。動絡。姑以甘柔藥緩之。炙黑甘草湯

脇痛失血。數月不止。降香末 桃仁 茯苓 桑葉 牡丹皮 苡米仁 藕節汁 蘇子 韭菜根汁

脈小弦虛。久嗽。失血。盈。挽血止。仍然納食。晨起。頃嗽甚。此勞傷。嗽血。宜養胃陰。治肺無用。甜北沙參 炙甘草

黃芪 百合 白芨 南棗肉 蒸和丸

左脇痛必血溢黑點塊終有凝瘀病發無用通絡消瘀。

藕節 桃仁 降香末 勾藤 蘇子 漏蘆

脈左如刀鋒多倉夜少熟寐倉甚必血溢此衝脈中陽升。

乃下元精血不足。澆當滋填實下元。若但寒涼熱滿必致。

胃減便難調治。地黃 元武版 茯苓 芡實

阿膠 山藥 湖蓮 藕汁膏 人乳粉

脈左空右濡右脇先痛繼以倉痰血塊此肝胃絡傷都因情懷不舒之鬱形瘦食減甘緩主治。

生黃芪 南棗 柏子仁 炙甘州 當歸 茯神

形瘦脈數長夏見血入秋發瘡皆陰分不足不耐時候熱蒸發洩趁此胃口頗旺只要靜心保養百日不及一年可

場葉莊方案

三

復。秋石 熟地 麥冬 阿膠 湖蓮肉 澹菜膠

五味子 龜版 茯苓 山藥 加蜜和為丸

少年脈數形瘦是先。天遺熱真陰難旺。血上溢陰虧無以制陽。瘧熱再傷其陰。血來更頻延及損怯。當以靜藥補陰。不必苦寒傷胃。熟地黃 山藥 清阿膠 秋石

大麥冬 山萸肉 茯苓

形充脈小痰嗽帶血。此非陰虛火升。乃辛燥劫動胃絡。只宜薄味清養胃陰。戒酒肉煩勞可安。茯苓 冬桑葉

炒黃川貝母 大沙參 甜杏仁 苡米仁

脈左數大而堅。用力致傷氣升血上。靜坐安養百日可安。用養肝陰和胃陽方。細生地 川石斛 大沙參

白扁豆 大麥冬 清阿膠

搏

誦讀心煩。陽易動陰不能守。血隨氣升。所喜胃旺。苟能安閑保養。經年不發。其脈終日固。藥以壯水制火為主。

熟地黃 山藥 建蓮肉 大麥冬 龜版 山萸肉

五味子 茯苓 遠志肉 川石斛膏和為丸

勞力絡動失血。脈大寸搏。能食效。倉用甘藥養肺胃之陰。

白扁豆 北沙參 麥冬 細生地 茯神 丹參

久有效。嗽涉水用力。勞傷失血。寒熱不止。皆營衛單弱。

歸芪建中湯去薑。一方并去飴

痰中血不因咳。倉而出。納食漸減。此胃絡受熱。氣不降津。變以甘涼潤降。則不傷胃。

場葉莊方案

四

甘蔗搗漿 川石斛 生扁豆 大麥冬 茯苓

此勞力所傷。失血能食無力。當養氣以生精血。

生黃芪 當歸身 淡菴蓉 茯苓 牛肉膠和丸

脈數失血不款。而槁勿進陰藥。扁豆 苡米仁 棗仁

茯苓 川石斛 炙甘州 秋石少許沖服

陰奪陰損。心動陽升。壯年失血。成怯。所喜胃旺。只要戒慾。整廢讀書。勿動心。持百日漸可復。

熟地黃 山藥 芡實 女貞子 茯神 湖蓮

冬月無明。衝悸失血。心中惶惶。無主。精血暗損。浮陽內震。

法以鎮固。紫石英 杞子 萸肉 棗仁 龍骨 五味子

過動失血。升降失和。阿膠 茯神 天冬 鮮生地

大麻仁 柏子仁

勞力陽氣發洩。血絲自溢出口。乃脾胃胃衛受傷。法當甘
藥調之。苾建中去薑加 苾苾仁

嗜酒沉酒。胃虛絡熱。加以煩惱易怒。肝膽氣火易熾。納食
味不甘美。腕悶當有愛氣。肝陽犯胃。血必帶痰而出。從來
酒客喜食爽口之物。不用滯膩甜食。脈大為陽氣上逆。滋
陰如地黃于肉。皆與體質不相投矣。

茯苓 丹皮 川石斛 生穀芽 桑葉 降香末
久嗽失血。食少便溏。脈來虛小。當以後天脾胃為要。清氣
滋水為第二義也。戊己湯
失血後臥着。嗜甚欲坐。不飢勉强納食。脈細促。兩足皆冷。

掃葉莊方案

此元海氣乏不納。衝脈之氣逆冲。虛怯門常有。氣不易治。

熟地炭 牛膝炭 石蓮蓬 炒山藥 真桂心
紫石英 芡實

脈左細數。右關弦大。失血兩三年。咳嗽不已。行動氣塞。骨
膝痠與。顯然下焦不主收納。是精血內損。胃納頗安。議從
填實下元。勿以治嗽肺藥。反令妨胃。必戒怒勿勞。庶百日
可望小效。經年堅固乃安。熟地 魚膠 山藥 芡實
五味子 茯苓 湖蓮 沙苑蒺藜 金櫻子膏丸

氣過辛散。肺氣散越。穉年痰血。以益胃陰供肺。
白扁豆 大麥冬 茯苓 北沙參 肥玉竹
秋暑失血。初春再發。右脈大。頗能納食。金匱云。男子脈大

為勞。極虛亦為勞。要知脈大為勞。是煩勞傷氣。極虛為勞。
是情慾致損。欲驅病根。安靜一年。可期其愈。

黃芪 苾米仁 南棗 北沙參 炙甘草 白及
脈細與。瀰氣衝失血。寐欲遺精。今納穀不運。神思日倦。緣
捺作太過。上下失交。當先治中焦。心脾之營自旺。諸症可
冀漸復。偏寒偏熱。都主剝喪真元。宜禁。九蒸於潛木

人參 茯苓 歸身 白芍 棗仁 廣皮 炙甘草
當夏四月。陽氣大升。體中陰弱失守。每有吐衄。神煩。已交
夏至。陰欲未復。進甘藥。所謂下損不得犯胃也。
熟地黃 茯苓 芡實 山藥 蓮肉 甘州
絡脈空隙。氣必遊行作痛。氣慮春末夏初。中陽氣上升。

掃葉莊方案

血從氣溢。起此網繆。當填精益髓。蓋陰虛效。是他臟累
及于肺。若以清涼治肺。必然胃傷。食減。立成虛損。蒙其害
者累之。海參膠 鹿角膠 淮山藥 山萸肉 芡實

茯苓 北五味 湖蓮肉 金櫻膏 水煎熟地黃
失血以來。氣從火腹上衝。即效逆坐。起不得寤。乃腎虛不
司攝納。衝脈上升。而然。夫衝脈即血海。男子藏精。女子繫
胎。今精氣內空。血獨升舉。食入痰泄。火土交備。時師每以
清涼治肺。治效不過通套而已。非論病也。紫胡桃霜

人參 茯苓 淡骨脂 紫石英 鹿鞭子
溫邪未得清理。食葷太早。蘊熱攻絡。效嗽失血。必薄滋味。
迥效。茅花 地骨皮 桑葉 茯苓 苾米仁 百合

大沙參 生甘草

嗽血三年。咽痛聲嘶。腹大便溏。是清寒治嗽太過。嗽仍不減。胃傷陰耗。陽乃獨升。甜北沙參 生扁豆 茯苓

苡米仁 生藥 炒芡實

額準痛。齒縫出血。口苦舌乾。盜汗。或表散或飲酒。更助陽泄。愈加不安。皆陰虛陽浮。當以靜藥益陰和陽。熟地

龜版 秋石 茯苓 牛膝 黃肉 阿膠 五味

桑椹辛熱。肺胃受灼。每交夏四月。陽氣上升。遂致失血。以甘涼清肅。忌食厚味可愈。川貝母 地骨皮 花粉

肥知母 苡米仁 生甘草

少年腸紅。陰氣走泄。欲嗽吐痰。食仍進而聲嘶。氣促走動。

培葉莊方案

若喘且口乾咽燥。飲水渴不解。明係陰不上承矣。

六味湯中加入 炒桃仁 當歸鬚

中年失血兩日。陡然舌強無聲。四肢麻木。身痿足熱。此水枯木火化風。腎肝之病。靜養方可向愈。

生地 麥冬 阿膠 天冬 川石斛 龜版

寢食如常。自上年失血之後。巔頂及周身肌膚。發疥癩極癢。春發冬瘥。以和血平調方。三角胡麻 製何首烏

金銀花 桑葉 浙甘菊 炒黑杞子 紅棗肉為丸

胃減吐血。後早晨面腫。晡暮跗腫。氣分乃弱。且理陽明。

生黃芪 苡米仁 生甘草 生扁豆 茯苓

久嗽痰帶血。絲納穀已減。絡熱胃損。宜要戒酒辛辣。甘寒

不傷胃者宜之。

青甘蔗汁 麥冬 玉竹 沙參 知母 川貝母

春季痰嗽帶血。交冬血大吐。頭痛口糜。是陽不收。當填鎮。熟地炭 黃肉炭 牛膝炭 五味 茯苓 青鉛

失血五年。今夏秋發作。竄重脈左瀯右弦。衝氣逆則咳甚。天明汗泄。議用柔劑陽藥以治下。病者四十三歲。

紫胡桃肉 茯苓 五味子 炒黑枸杞子

沙苑蒺藜 芡實 紫石英 石穀湖蓮

接案失血發數。臥枕氣衝至喉。似乎痰阻。其實吐咯不出。此任脈不司。擔任衝脈。陽氣直冲於上。納食多。受下損及胃。秦越人尚稱難治。便溏。凡填補下之。必佐益胃。竄忌清肺。

寒潤更傷中氣。大造丸去天麥二冬加入二儂丹

人參 河車 熟地 龜版 五味 金櫻子 芡實

夏熱勞力。飲酒助熱。洩氣血後。欲嗽脇痛火升。已是肝腎陰傷。胃逆多。受酒慮食減。熟地黃 茯苓 北沙參

天冬 阿膠 建蓮肉 人中白 川斛膏和為丸

脈緩寒熱失血。自述負重傷力。已是營衛兩怯。當以甘劑益中。勿見血輒與滋涼。芪建中湯

飲食先減。中焦已怯。辛辣都主走洩。直氣二次反覆血來。皆夜動不寐而至。因勞而發。內經曰。勞者溫之。取乎溫養氣分也。黃芪 白芨 茯苓 米糖 米仁 炙州

奔走動陽失血。繼而欲嗽吐痰。由真陰虧損。五液蒸痰。趁

培葉莊方案

十八

四六〇

此胃口頗旺。以靜藥填陰攝陽。熟地水製阿膠 女貞子

天冬 米仁 刮白龜版 鹹秋石 知母 霍山石斛

血脫補氣。况汗血泣至者乎。冬令人參 生芍 扁豆

熟地黃 玉竹 茯神 花蕊石 童便

脈微而嗽。失血之象也。膈胃隱而痛。肺胃之絡也。

當歸鬚 炒黑山查 苡米仁 赤芍藥 川鬱金

丝瓜絡 通艸

冬至已近。氣候太溫。少陽先升。地氣不藏。發越之性。無物

不垢。所以吐血之症皆發矣。熟地黃 女貞子 葛州

炒白朮 苡米仁 玉竹 旱蓮艸 炙甘草

聲不變而粉紅。濁痰不已。是絡傷。非肺傷也。所以膈內痛。

掃葉莊方案 虛勞朱血 九

白芨 麥冬 蒸朮 米仁 苦參 北參 炙甘草 杜鵑

中氣不攝。非陰弱吐血可比。勿進陰藥。

四君子湯中加入 牛膝 玉竹

盛體失血。作酸受逆。脈得左澀右弦。合引血于之條。曲直

作酸之旨。責之厥陰。中陽氣上乘為治。

旋覆花 代赭石 老杞杷葉 塊茯苓 新絳屑

脈左數搏大。因驟然跌仆。吐血仍然。安穀如常。此陽氣暴

升。莫制。絡血不得寧靜而泛越。夏三月至秋分。戒嗔怒情

慾。莫令舉發。六味加入 秋石 阿膠 川石斛

春暖陽氣升越。行走動陽失血。宜安養靜坐。藥以甘緩。

不傷胃氣。

風濕咳嗽初愈。暮汗繼以痰血。春半陽氣發洩。中年陰未

克。盛致血隨氣溢。請書聲高則頭痛。陽升顯然。

六味去黃肉加入 白芍 阿膠 麥冬

脈緩大。吐血甚多。仍然安穀。此陽明胃絡病也。戒奔走煩

勞。方可冀其奏效。

生黃芪 薏苡仁 南棗肉 山漆 茯苓

暑熱傷氣。秋燥上加。亦令傷氣。舌乾咽痒。欲噎。胃氣不充。

肌膚已曾失血。兼保陰液為宜。擬用。

喻西昌清燐湯。減人參。老年因秋燥咳嗽。食少胃弱。脈小數。當以清潤甘藥。不數

南沙參 玉竹 桑葉 象貝 吧咀杏仁 炙甘草

掃葉莊方案 虛勞 二

脈虛數。形寒。心中煩熱。五更後氣升。咳喘。當秋分節。燐金

司令。大熱發泄之餘。皆能化燐。肺為嬌臟。最處上焦。先受

其衝。宜潤燥以滋其化源。冬桑葉 南沙參 玉竹

南花粉 生米仁 蜜水炙橘紅 白糯米泡湯煎藥

中風附

過勞陽動。內風上蒙。清竅頭旋。目暗。上實下虛。若能保養。

冬藏可安。炒黑杞子 甘菊炭 穀精珠 牛膝

稽豆皮 女貞實

此肝風升舉。目珠脹咽。塞嘔食。下焦獨冷。常年久瀉。今反

便難。石決明 香附汁 夏枯草 草決明 生神起

眩厥心悸。咽中填塞。汗泄畏冷。都主肝陰虛。陽明內風。

肝風眩暈

上巔。生牡蠣。天冬。稽豆皮。阿膠。茯神。小生地。凡動皆陽。衝氣至腕。嘔酸。乘巔旋運。食漸減。肌肉消。是肝木之陽趨胃。久而陽化內風。直上巔頂。而為暈矣。煩勞持君相過動。所致。情志之病。不專功於藥餌。

肝風眩暈

耳鳴眩暈。心悸。寐醒。汗出身汗。從牙宣。失血。所致。此皆肝腎致傷。內風勃升也。生乾何首烏。冬桑葉。茯神。黑芝蔴。天冬肉。甜北沙參。蜜丸。秋石湯送下。

內風眩暈

肝風頭暈。枸杞子。當歸身。桑葉。蒺藜。何首烏。甘菊花。炒白芍。塊茯苓。天麻。五志中陽氣冲搏。心怔悸眩暈。多勞多怒。老人腑液乾枯。

內風眩暈

內風。揶揄使然。生雞子黃。柏子仁。生地黄。茯神。清阿膠。天門冬。入秋一月。天令肅降。脈得左寸搏數。左關小弦而動。是心煩。君相少寧。肝陽變化。內風陡升。莫制。巔頂皆眩。腦後筋揚。何一非陽動所致。此皆陰弱不主配。非肝臟有餘之比。法當益水滋木培母。另開養心脾之營。使上下不致龐雜。肝腎方以攝固。柔溫宗聚。精七寶法以治之。

肝火熱厥

赤白何首烏。赤白茯苓。方解青鹽。番舶茴香。補骨脂。鯉魚膠。沙苑。北五味子。蒸餅和為丸。臨臥服。心脾共氣。養營方。用歸脾湯去芪桂。六七年病。猶然納食。行走辦事。凡肝膽之氣。從左升。直至

肝虛目疾

巔頂。風木必尅土位。胃腕似子悶。外象若冷。為深。當以龍蒼丸。苦降治之。龍蒼丸。肌膝乾燥。而目因起。翳肉。不飢。仍能進食。神識昏。昏夜慧。詢中年。級居。而陽事易痿。有夢遺。精其損傷。在肝腎精血。首烏。九製。甘杞子。菊花炭。柏子仁。淡茯苓。茯神。驚必動。肝久而陽氣變化。內風旋越。不已。有升無降。陽不交合。入陰。不但遺瀝精濁。入夜。遺泄。欲絕。宜攝陰鎮陽法。

內風眩暈

磁石。五味。龜版。棗仁。龍骨。黃肉。茯神。當歸。脇左熱。攻心及背。疲多面腫。肢麻。肥人。肝陽偏熾。乃性情易。真怒。所致。復服去參。薑桂。瘦人。稟屬陰虧。耳鳴眩暈。是內風陽氣之震。磁石制肝陽。

肝陽內風

培葉莊方案。上吸。質重鎮納歸腎。然必以用填補。于甘酸味厚之藥。為合法。用之不效。乃補攝力輕所致。熟地黃。天門冬。龜版。紫胡。桃肉。山萸肉。磁石。麥冬。五味。阿膠。芡實。各碾末。煉蜜和為丸。每早服六錢。五旬。向衰。水不生木。則內風動。巔頂眩暈。唇燥。附無力。小便頻動。議填下元不足之陰。人參。天冬。五味。杞子。茯神。熟地。生地。瑣陽。首烏。

據說。夜坐久勞。脇下氣升。耳鳴頭暈。目中黑暗。無光。此肝風陽氣。上蒙清竅。久恐仆厥。地黃湯加。磁石。五味。脾胃居右。氣行于左。左手痿痺。不知痛癢。不能把握。所謂胃氣虛。則不用者是也。王金壇云。偏枯之病。未有不因真。

氣不用。自哉斯言。治澤專培氣分。補而宣通。可望其效。

人參 黃芪 生白朮 附子 生川烏頭

右股痿痺無力。甚於秋冬。緩于春夏。是陽氣不足也。但三旬壯年。不宜有此。芪附湯

右痿舌瘡無聲。脈小微滯。病起上年十二月。仍能納食。此中於脾絡。治以宣通靈數。白附子 熟半夏 茯苓

鮮石菖蒲根汁 薑汁浸竹節 早服地黃飲子

鯀緩男子右癱麻木。丹溪議從血虛有風。思起病值冰雪寒威。以舒筋湯。黃芪 當歸 桂枝 羌活 防風

撫芎 薑黃 桐皮

半百已外。陽氣日薄。衛弱不司護衛。右肢麻木。風虛也。

掃葉莊方案

芪附湯合玉屏風散。加 桂枝 甘州 薑 棗

附方 二陳湯加生白芍 桑葉 羚羊角 竹瀝 薑汁法為丸。

中年麻木筋脹。陽氣已衰。內動自發。最怕痺中。脈微色痿。宜溫補通陽。生黃芪 生於木 炙甘草 熟附子

南棗肉 老生薑 後加人參

鯀靜。寢食便調。向有胃痛。飲煖燒酒相安。今年春季跌仆。右肢偏麻。語音不爽。是皆氣傷痰阻。致內竅少靈也。

白金丸 菖蒲根汁法丸

木煎金化。右痿太陰受邪。聲嘶厥陰亢極。目瞶。內風擾動。汗出。呼欠頻。陰陽欲分。面渾澤。外越之象也。先擬熄風

輕通之法。由節令初升之故耳。羚羊角 鮮石菖蒲

生牡蠣 馬料豆 天麻 橘紅

接案 目瞶戴陽。脈空大。肝風正甚。易回也。鈎藤 白芍

生地 羚羊角 料豆 桑葉 玉竹 川石斛

接服人參 杞子 遠志 白芍 熟地 北五味

大熟地 茯苓 巴戟 橘紅 後改歸芍六君子丸

素乏深藏。適逢冬陽泄越。真陽從陰中走出。金反畏木。右縱左拘。神清志昏。上實下虛。數日外腑氣不泄。使陰陽漸

交方可商治。人參 淡附子 炒遠志肉 炒熟地黃

炒枸杞子 茯神分 每次調入豬膽汁。以味苦為度。少陰不藏。肝陽升亢。發為痿痺。玉竹 生地 羚羊角

掃葉莊方案

右痿舌瘡。足非面赤。戴陽。可欠微呢。診脈小濡而緩。此腎納失司。肝風突震。但病起耳後暴腫。必兼濕熱。客氣清上

輕揚。腫勢頗減。七日以來。當陰陽經氣一小週。天不必以時邪引病為惑。昔河間宣明論中。謂舌強難言。其咎在手

舌下經脈不主流通。以腎脈榮及舌下耳。其主地黃飲。取意濁藥輕投。機關漸靈。併無碍乎上氣痰熱。仿此為法。

熟地黃 枸杞子 牛膝 石菖蒲 淡茯苓 茯苓

川石斛 遠志肉 梅核其

鯀象左部稍振。水虧風動。左牙痛。蓋風從內旋。乃陽之化

氣。祇以春升少納。下元不司收藏。虛症何疑。况因目恙。頻

用韭子煙薰。查本州辛辣升騰。助陽損真。於遺濁用之。

藉其升陽以涵陰。更無漏泄耳。今非中八日。聲音漸振者。乃精氣畧有寧靜。裡數畧有靈機。是順境也。不明此理。仍用辛泄。加入人參。亦是清散上焦之藥。但肝腎臟虛。在于至陰。若再投辛苦。以傷其陰。必致虛症。專望其向安。倘必以上有火熱。古稱實火宜清。虛火宜補。溫養柔和。與溫熱剛燥迥異。幸勿疑訝。

生地 麥冬 女貞子 阿膠 茯神 石斛 接後
接 二日來。干支一輪。右肢痿。右足跗畧有痛象。舌竅未靈。味少甘美。虛象顯然。三日前。主家以齒痛為熱。醫迎。主見即投辛涼解散。此症虛在肝腎。下焦若不固納。維本漫無着落。仍以前法加入涼肝可也。 熟地 茯神 牛膝

場葉莊方案

三五

遠志 肉 杞子 川斛 天冬 甘菊花
內風皆陽之化氣。然非有餘。是二氣不主交合。今形寒跗脛背冷。似屬陽虛。景岳云。陽失陰而離者。非補陰何以攝散失之陽。此病發皆主手動。前法多以靜藥。謂病象在身中之左。有升無降。據說舌絡牽掣。暗不出聲。足不堪行動。與河間肝腎氣厥同例。主丹溪虎潛法。
虎潛丸 又地黃飲子。去附子。加鹿鞭子煎汁。搗為丸。陽明脈衰。厥陰風動。頭暈心悸。肉瞤麻木。有風非之累。少飲加穀易安。 淮小麥 北沙參 炒麥冬 南棗肉
酸棗仁 炙甘草
中年脈弦右。臂肢指麻痺。凡男右屬氣分。氣弱陽不運行。

肝腎虛弱火

營虛

行則痰日生。乃水穀不主變化。精凝當以健中佐運為主。蓋脾胃主四肢。滋陰血藥多膩。為痰樹懣矣。 六君子加茯苓 水泛為丸

麻木在身。半以上。清陽遏阻。亦夏秋伏熱致傷。清上可愈。 桑葉 肥玉竹 枇杷葉 馬兜鈴 川貝母 杏仁 大沙參 天花粉

陰虛陽逆煩燥。陽升 是病遇勞即發。安養稍愈。身心不堪煩動。男子苟非素豐。難以坐食耐久者。不關醫藥之治病也。 綿黃耆 茯神 遠志 肉 棗仁 炙甘草 當歸 龍眼肉 營出中焦。心脾皆怯。滯補耗氣。皆忌。不耐煩心屬虛。此辛

場葉莊方案

陰虛陽逆煩燥

三五

甘養陽養營一灑。有合乎心脾矣。 人參 茯苓 桂心 炙甘草 菖蒲 當歸 桂圓煎濃湯。泛為丸。 有年勞傷神痺。膚無膏澤。時欲腹鳴。喉痛。營虛不得流行之象。開懷安逸。僅可帶疾延年。 熟地黃 炙黑甘草 人參 肉桂 遠志 肉 當歸 身 白芍 養營膏子藥方 熟地黃 桂圓肉 茯神 黃芪 人參 枸杞 遠志 肉 炙甘草 當歸 五味子 形神過勞。陽動不靜。六脈皆弦大。徹夜無寐。以靜攝心。肝腎之陰。 大熟地 棗仁 天冬 青龍骨 龜版 茯神 生牡蠣 遠志 知母 五味子 川斛膏丸 述夏令氣暖發泄。自覺跗躄筋骨。氣空如墜。未至深冬。即

欲煖護。以易怒熱升。屬下元精血暗損。仍多持煩勞。心陽動。吸水虧。肝木少酒。平素不受溫補。及參朮益氣。議以滋填充髓主方。且痰多食少。又必顧及胃氣。

人

線魚膠 沙苑蒺藜 茯神 鹽水炙補骨脂

枸杞子 栝子仁霜 砂仁 九製赤白首烏

川黃柏 紫胡桃霜 茯苓 方解青鹽

向多牙宣。陰虛火炎。三瘡入于陰。蒸燥脂液。日加枯槁。消渴多飲。液涸引水自救。急當滋補肝腎之陰。加以血肉填精。包舉大氣。製何首烏 天門冬 麥門冬 生地黃 熟地黃 各碾末。以河車膠和為丸。能食知味。病不在上中。口糜舌結。紫絡。喉痛。腹熱。小便甚。

掃葉莊方案

陰虛陽虛

三

少。都因肝腎先虧。熱伏于裏。陰傷陽越。汗從此泄。知母

生鷄子黃 細生地 黃柏 上阿膠 黑豆皮

接服大補陰丸中。加入 阿膠

腎開竅于耳。膽脈透出耳後。經以腎藏液。三合膽藏汁。三

合煩勞太過。液耗汁乾。少陰少陽樞機不利。遂有失聰之

狀。中年有此。液少風動使然。磁石地黃湯

脈數耳鳴吐痰。天柱骨骨膝痠。兩足冷。此陰虧陽升。當填

補實下。左歸去牛膝。合 二僊膏

冬至藏陽。腎主收納。今質疲陰虧偏熱。夜深久坐。陽不入

陰。浮越及耳鼻上竅。先用 東垣滋腎丸。鹽湯送下。

勉強搖精。致陽縮囊。縱不但形弱僂。且門膽竅。皆為收。

引咽。喉牽絆。似垂。食物漸漸減。由精血之傷。有形。氣難自復。少陰厥陰。脈循喉。龍開竅于二陰。既遭損傷。其氣不及充注于八脈。故症見拘束之狀。上年進柔劑。陽藥服後。顛項維。脈皆脹。耳竅。想臟陰宜靜。可藏。試以柔與身。佈。必加弱促不安。宜乎升陽動藥之不靈矣。夫少陰內藏。原有溫蒸諸法。厥陰相火內寄。應暖喜涼。仿丹溪法。

鹹秋石 鹽水炒知母 真阿膠 栝子仁 生地

白茯苓 炒黑遠志肉 龜版 去垢搗

遇天氣鬱勃泛潮。常以鮮頭。炒葉。泡湯服三次。取芳香不燥。不為穢濁所犯。可免夏令時令之病。鮮蓮子湯亦好。若汗出口渴。夜坐火亦舌碎。必用酸甘化陰。以制陽光。

掃葉莊方案

陰虛陽虛

三

烏梅肉 三合 煮飯蒸熱。冰糖 三錢 畧煎一沸服 飯後茶飲。口宜

炒大麥冬湯。芥片。至其。味苦氣降。中虛者不宜用。

脈數上或下虛。當固其陰。熱地黃 麥冬 炒山藥

川石斛 茯神 阿膠 五味子 石蓮蓮

勞倦陽虛寒熱

脈濡。食少。腹鳴。煩倦無力。此屬勞傷陽氣。當與甘溫補其營衛。苓桂木甘湯中。加入 薑 棗。

身半以上為陽。天明少陽生動。乃痛。清氣陽傷矣。酒肉濁

味之補。皆陰。凝助痰。耗氣。當以東垣法調之。

人參 茯苓 白朮 桑葉 炙甘草 牡丹皮

勞倦中虛。陽少旋運。遂脫。不飢。醫投發散消導。中氣更

傷瀉瀉。生穀芽 生於木 生益智 茯苓 廣皮 米仁
白屬陽虛體質煩勞更傷陽氣春季暴冷而濕脾胃之陽
易困納食不運受氣膜脹皆清陽不司流行濁陰欲聚氣
滯無滯當辛溫理陽藉以通爽用疎胃補脾法

人參 塊茯苓 紫厚朴 益智仁 廣皮 生薑
因遭顛沛胃痛食減吐痰遂致肌瘦形寒此中宮陽氣為
思慮鬱結日就拘束之象東垣升陽擴充脾胃鬱舒則陽
可復振 炒焦白朮 茯苓 高良薑 煨葛根
廣皮 炙黑甘州 紅豆蔻 煨升麻

診脈弦濡之形已退夏秋病邪已去但食少神不爽健欲
大便肛門下墜是皆陽氣不復為之氣陷不藏都因憂思
場葉莊方案 勞傷陽虛寒熱 无

致傷開懷怡悅可安不獨特藥餌用升陽法 炙甘州
人參 茯苓 薄桂 生薑 當歸 廣皮 南棗
陽氣素虧皆部怕寒冬月嗽甚欲吐入春納穀膜脹脈左
弱右弦議濕中有熱氣蒸肺氣膈鬱口舌咽喉仍窒

早服薑莖湯 夜服威喜丸
喜暖畏冷陽氣弱少護衛近日耳閉失聰非外邪客侵由
乎氣不下納所致先用鎮逆導引主之 磁石 炙肉
菖蒲 牛膝 茯苓 熟地 遠志 五味 龜甲

夏秋氣大發世身中之氣久虛無以主持故見病治病無
功而安中納下每每獲效入秋進附子七味丸頗合今秋
分後天氣漸升地氣收斂緣久熱傷氣虛體未能收肅是

此症虛陽逆也

以肢節時寒顛頂欲冷無非病久諸氣交餒斯外衛之陽
以護液髓暗枯則血脈不營而陰乏內守凡此皆生氣之
淺薄也急當溫養益氣填補充形助秋冬之收藏豫為來
春生發之用內經有四季調神之訓今投藥亦當如此旨

辰胎 一具 炙羊肉腎 十對 熟膏黃狗脊 十副 熟膏肉從蓉
青鹽 九蒸熟地黃 北五味肉 湖蓮子 茯苓
人乳粉 柏子霜 鮮河車 一具 漂洗 用諸膠地黃搗
和餘劑各為末杵和為丸每服四五錢人參湯下
劑久傷腎氣不收攝肛門如錐刺痛而下墜小溲不利先
議升陽一法 生鹿角 人參 茯苓 陽起石 另研細

當歸身 生菟絲子
場葉莊方案 勞傷陽虛寒熱 三

面黃肌減脈數虛形寒食少乃勞倦致傷不可為外感有
餘議用 小建中湯
脈濡緩無神脇痛吐痰腥穢漸至減食短氣寒熱肝病入
胃顯然勞傷不復 當歸建中湯去薑

色奪脈小形寒久嗽皆營衛二氣久損病屬勞傷內經云
勞者溫之損者益之 參芪建中湯去薑
脈大緩而無力色黃痿痺喜暖惡涼心下痛連及脇肋此
勞倦內傷久則延為脾厥脾主營以辛甘溫養血絡

當歸 桂圓肉 茯苓 桂枝 遠志肉 炙甘州
交四之氣熱勝元虛乃氣泄之候營衛本手脾胃不耐夜
坐舌心腐碎吸短氣似不接續中焦喜按始得暢達目胞

欲垂難舒。四肢微冷。失和。從前調理。每以溫足。三陰臟。魚
進血氣。充形。病減七八。今當長夏。脾胃主氣。氣。世中虛。最
防客氣之侵。是補腎宜緩。而養胃生津。寧靜飲液。仍不可
少。俟待秋深。天氣下降。仍用前法。為穩。擬逐日調理法。

人參 淡天門冬 茯苓 建蓮肉 酸棗仁

知母 川石斛 甘州 右各末為丸

欬喘頻發。脈細畏寒。乃下不納。

桂苓五味甘州湯中。加入 紫殼胡桃肉

勞倦內傷。更為暴冷。外襲營衛不和。欬逆身痛。忌食葷酒

助邪。天暖陽和病去。茯苓桂枝湯

脈沉遲。背寒色奪。久有勞倦。新年暴冷。再擬用

掃葉莊方案

桂枝加白朮附子湯

虛損暴寒外襲。小建中湯

鬱悶

春交旬日。形症小愈。但右脈仍拉。舌白味變酸甜。昔喻嘉
言云。當以氣雄剛藥。能變胃不為胃變。

人參 淡附子 吳茱萸 茯苓 熟半夏 生薑汁

三焦鬱勃之熱。因勞心而熾。口臭難飢。便燥。以苦辛暫用。

藿香葉 炒竹茹 黑山梔 白豆蔻 杏仁 廣皮

酒客濕勝熱鬱。脹悶噯氣無寐。得茶愈脹。先與三焦分消。

白蔻仁 杏仁 紫厚朴 茯苓皮 綿茵陳

金川斛 半夏

久痛。用辛溫而通氣血。不應病已十年。不明起病之由。今

便溏溺赤。水穀酒食不運。必挾濕阻氣化。主以分消。

山茵陳 豬苓 厚朴 米仁 苓皮 澤瀉 蔻仁

吞酸欲嘔吐。喜靜惡動。從鬱怒氣逆病在肝胃。此一臟一

腑病和陽解鬱。牡丹皮 黑山梔 鈎藤 鬱金

半夏 茯苓 金石斛 廣皮

掃葉莊一瓢老人醫案

鼻癢心辣閃燥。即大便下血。形瘦脈小數。已經數年。

枯黃芩 生白芍 清阿膠

痢疾自止。頭痛至腰。二便得通。火安。議通太陽以驅濕鬱。

木防己 生白朮 紫厚朴 桂枝木 苓皮 廣皮

掃葉莊方案

邪陷入裏。瘡變為痢。古稱經臟兩傷。方書都以先解外。後

清裏。拙見論病先究體質。今素有血症。且客遊遠路。從陰

虛伏邪。是用藥須避苦熱。傷陽燥劫陰矣。臭煤蝦血。舌絳

乾涸。陰液有欲盡之勢。奈何邪熱內迫。有油乾燭滅之危。

醫見病治病。不審肌如甲錯。脈細尺不附骨。入夜煩躁不

寐。議以護陰。急清陰中之邪熱。生雞子黃 黃柏

清阿膠 白頭翁 北秦皮 小川黃連 細生地

產後病起下焦為多。今右偏頭痛。得煖為甚。納食則脘腹

加痛。必瀉而後已。夫病隨利減。已見濕鬱氣阻。熱是濕升。

恒有是症。從脾胃門調治。

下血後大便燥閉不爽。繼而自利。白滑膠粘。日數行下不

禁年五旬。形衰脈沉。必因久伏水穀之濕。府病宜通。以温下瀉。生茅木 製附子 紫厚朴 製軍 濕多成五泄。陽氣日衰。下元不振。向有下焦痿。用四劬丸得愈。夏秋當用脾胃藥。

生於潛木 木防已 川草薢 白茯苓 川桂木 瀉血原從痢起。食物不忌。垢瀉不清。致延二年不愈。

胃苓湯

濕伏為熱。先瀉瀉止腹痛。耳竅膿水。出血微。淡滲以分清。連翹 茯苓皮 淡枯苓 紫厚朴 滑石 赤芍

瀉竹葉 煎送保和丸

脈弱形瘦。食不適。必泄瀉。此陽氣已傷。未寒下焦先冷。用

培葉莊方案

三

繆仲淳 雙補丸

向有遺精。腎陰不攝。正月間。糞渣積下。入秋足脛浮腫。目下漸上。遇冷為甚。脾腎丸 補

久嗽是宿疾。近日腹痛瀉利。是脾胃受暑濕。客氣當先理邪。痛瀉止再議。炒扁豆 藿香梗 茯苓 炙甘草

木瓜 廣皮 厚朴

陽微濕聚成利。必温通其陽。斯濕可走。擬用 冷香飲子 長夏入秋。脾胃主氣。濕鬱阻氣。為痛為瀉。更月不愈。中宮陽氣未醒。仍有膨滿之象。導氣利濕主方。

茯苓皮 枳果 藿香梗 廣皮 厚朴 大腹皮

脈微晨泄。初冬未及。臧陽以脾胃治。最是納穀減少。當以

甘肅

中焦。兼理其下。人參 炒乾薑 炙甘草 生於木

淡熟附子 淡吳茱萸

腸紅既止。便瀉三年。火升則能食。熱墜必妨食。此皆陰氣走泄。陽不依附。當從陰引陽。赤石脂 瑣陽 五味子

水煎熟地黃 炒枳仁 未拌 禹餘糧 遠志 蒸餅為丸

脾胃虛瀉。苓木 羌活 砂仁 山藥粉和為丸

幼穉夏季不食。腹痛瀉積。交冬未愈。憶今四五月。久雨潮濕之蒸。皆令脾胃受傷。半年来虛中留滯。當疎補。兼投食物。冷滑肥甘。須忌。人參 麥芽 茯苓 生益智仁

白芍 炒山查 廣皮 焦木 砂仁 神麴和丸

大病後。飲食起居。皆不如法。以邪陷入裏。舌乾自利。恐其

培葉莊方案

三

深入陰中。則危矣。白芍 甘草 附子 枳實

平素陰虧。熱注入裏。為利。糞結便出。痛墜。診脈左堅下垂。不以脾胃燥藥。細生地 阿膠 炒查 穉豆皮 生白芍

寒熱腕腹脹。嘔噎。舌白利。乃久病不曾復元。再看風濕之邪。藿香 白朮 茯苓 廣皮 厚朴 澤瀉 保和丸

食物不運。太陰脾陽受傷。濕熱內蘊。氣窒。為腹脹痛下利。據說脹起上年。病在今秋。但主理氣温脾祛濕。用冷香飲子。枳果 藿香梗 茯苓皮 木通 厚朴 大腹皮 廣皮

目紅黃。腕脹。下血紫滯。裏急後重。此夏秋濕熱。與水穀互蒸。致氣分窒塞。三焦不清。當薄味蔬食。不致釀痢。

白朮 銀花 桔梗 厚朴 木通 茵陳 槐花

廣皮 茯苓皮

本病下損利再傷陰。從肝腎治。勿以瀉利投燥。燥則劫陰矣。人參 炒黃山藥 炒查肉 熟地黃 廣橘紅 茯苓

夏秋痢疾。大氣。土濕熱致病。用藥都主苦寒。攻消清火最多。但體質久。青帶淋經漏。當利起經帶。交熾。因時病累

及本病。未宜香連。檳朴。大黃。大洩之劑矣。良由下焦不固。利必止。陰。小腸氣鬱。糞垢欲出。痛墜不爽。此宜通垢滯。又

必顧護陰氣。凡看病必究體質。勿通套混治。

細生地 炒銀花 炒黑砂糖 炙黑甘草
穉豆皮 炒查肉 炒白芍

久痢久瀉。肛墜頻頻不爽。此乃腎傷。脈來數小。醫作脾胃

掃葉莊方案

痢疾泄瀉便血

三

病治故不效。 熟地黃炭 炒焦歸身 漂淡補骨脂

炒菟絲子 五味子
接續 久痢治法。非通即溫。既曰腎病。則陽宜通。陰宜守矣。

熟地炭 熟附 桂枝木 五味 炒川楝 炒歸身

接續 柔中佐利。未得減。下焦常冷過膝。仲景四逆湯

厥陰下利。少腹有形。五味加茴香。楸目

接續 動氣在少腹左右。糞與血或前後。秋利交冬不愈。當

溫其營。 人參 潯桂 炮薑 當歸 以小而香拌炒

茯苓 炙甘草
脈沉遲。下利血水。神呆不欲食。四肢冷。前已完穀。與溫理

其陽。 人參 附子 茯苓 炒黃乾薑 生白芍

長夏痢症。皆因濕熱。繼而先泄氣。後下血。蓋變內風。混處腸絡。是為腸風。血去陰氣。日傷。為眩暈無力。主以甘酸化風。益陰節勞。可以不反。 熟地黃炭 當歸身炭

地榆炭 柿餅炭 槐米炭 炙甘草

下痢腹痛。初因寒濕傷脾。久變濕熱。着於腸胃。痛利不減。腸中硬起不和。不得流通。明甚。當以苦泄。小腸。兼分利而

治。 川連 查肉 木通 川柏 澤瀉 苦楝皮

清暑和中。痢減痛緩。醫惑于痰嗽多。以清涼。視面無華色。血氣更偏。東垣云。瘡痢都因脾弱。用 戊己湯

上有臭。數濁涕紫血。下則遺精。便血。但說腎虛。陰不配陽。未必上下皆病。意者本質固虛。水穀之氣。聚濕。濕生熱。熱

掃葉莊方案

痢疾泄瀉便血

三

升熱降。致上下不寧。此酒肉鮮腥。須忌。謂助其濕熱也。

生白朮 黃連 黃柏 防風根 地榆 槐花

煨葛根 茯苓 水泛為丸
上室下墜。手太陰陽明病。下血久。兼理厥陰。

升麻 槐米 歸身 桔梗 炒芍 炙甘草

血奔腸紅。都是陰液走泄。陽浮發泄。易汗。背寒。心熱。臟陰

腑陽交損。形體日漸消瘦。皆衰老液枯之象。

鮮生地 阿膠 茯苓 火麻仁 柏子仁 天冬

先養後血。為遠血。臨便先痛。恐有濕熱凝阻。分利逐濕。主

之。 生於朮 炒槐花 木瓜 茯苓 地榆 廣皮
脈兩關弦虛。先血後糞。兩月未已。當年原有病根。遇勞而

發屬虛做仲景黃土湯。

黃土湯加炒焦白朮四劑後加人參一錢

陰絡傷則血內溢。久藥繁當以甘藥投之。

人參 生地黃 升麻 槐米 血餘 龜版

又人參 桂圓肉 炒白芍 白糯米 赤石脂 炙草炭

泄瀉

酒客便溏腸紅。是內傷之濕。戒飲酒既愈。夏天濕勝氣泄。病發。自述食腥油。大便即頻。宗損菴劫胃水法。

生白朮 熟附子 生白粳米 炮黑薑

汗

肝陽不藏汗

脈弦無胃。面青呻吟。汗出目瞑。是為肝陽外泄。宜與腎同

培葉莊方案

三七

治。熟地 牡蠣 白芍 麥冬 小麦 大棗 炙艸

自汗不止。目閉則胃鬱。皆熱如火。心悸動而汗止。此肝苦

急之候也。以甘緩之。炙甘艸 淮小麥 茯神 白薇

南棗肉 白龍骨 人參 栝子仁 棗仁

汗出止。陽神虛畏怯。心悸則汗漏。勉議固陽守陰之藥。

人參 桂枝 龍骨 茯神 炙甘艸 在牡蠣

心悸驚狂癩神

暈吐緩心悸痛。炙甘艸 枸杞子 茯神 生穀芽

人參 當歸身 肉桂 後改養營丸

抑鬱頓挫。佞條無聊。心乃偏倚。十二官皆無主。則陰氣并

於陽也。投以重性之劑。

狂癩

心悸痛

肝陽外泄為汗

心悸

鐵落 真鬱金 半夏 苦參 塊荻苓 橘紅
讀誦久坐。身似靜。心多動。陽氣皆令上亢。陰氣無能上承。故心悸。惟靜處為宜。藥不易效也。補心丹

Vertical text in the center margin, possibly a page number or reference.

掃葉莊方藥

心痛便

氣分上熱。吸燥津液。能令便艱。當滋養營液。其

柏仁 茯神 鮮生地 天冬 阿膠 炒杏仁

小腸

腸中變化失司。胃氣不得下行。此不饑少食。因由也。夫小腸為火府。非苦不通。以六府皆陽。氣室則變熱矣。用小溫中丸。苦藥已得小效。

蘆薈 砂仁殼 鷄肫皮 胡黃連 青皮

脾胃不和。食後不化。晡暮陽不用事。納食痞脹不寐。病起夏秋。必因時令之濕。久延。半年未痊。又慮陽微濁凝。為脹滿。故厚味須忌。

掃葉莊方藥

生於朮 煨益智 炒澤瀉 茯苓 煨薑

新會皮

臍左右兩傍按之痛。交子夜淚漉漉有聲。時或氣脹。此皆腑陽不通。欲結腸痺。非臟病虛寒矣。八味丸不効。謂此。

小茴香 川棟子 茯苓皮 青皮 猪苓

青木香

腸痺治肺。丹溪方信不謬。但酒客久蘊溫熱。亦有濕結便秘一症。當以辛苦寒專理氣分之滯。

真茅朮 製半夏 冬葵子 生石膏 山梔仁

晚蚕沙 臨服磨入大槓榔汁二匙

老年脈沉目黃。不飢不食。腹痛自利。後墜瀉。此長夏濕

邪傷于太陰脾位。陽不運行。濕熱凝注。法當溫脾導濕。佐辛香以宣濁。補中益氣。甘溫升守。壅氣宜乎腹脹。議開太陽溫太陰方。

木防己 川桂枝 大腹皮 生厚朴 枳果仁

新會皮 小茴香 茯苓皮

痰滯下泄痛緩。腹脹喜按。此屬虛癆。痞為傷無形之氣。

川桂枝 川黃連 生白朮 厚朴 廣皮

寒煖飢飽失和。日晚腹中脹。脾胃氣鈍。深秋最防瀉利。

藿香 生智仁 厚朴 炒元胡 茯苓皮

陳皮 大腹皮 炒黑查肉 又橘木丸

血沉遲。食入腹脹便澹。平昔飲酒中傷。留濕阻氣。小便不爽。用香砂平胃散。

香附 砂仁 製茅朮 厚朴 廣皮 炙枳水

血結為癥。氣聚為瘕。病在絡為脹。形寒鼓慄。已是陽微。夏季腹膨溺少。議煖水藏。大鍼砂丸滾水送下。

少腹宿癥。悲哀癩厥。繼而腹脹大滿。直至心下。經來淋漓。過月乃止。其脹不減。便瀉溺少。肢冷內熱。是氣血皆病。議

溫水臧法。大鍼砂丸。不飢少寐。二便不爽。經中牽掣。此非風寒從表。乃長夏水土之濕。與水糲之濕。互蒸氣阻。三焦不通。中年兩月不愈。恐延格脹之累。

白菴仁 杏仁 厚朴 廣皮 苓皮 茵陳

防己

白菴仁 杏仁 厚朴 廣皮 苓皮 茵陳

防己

防己

防己

防己

客遊勞頓。陽氣先傷。夏季濕邪。是陰鬱過身中之氣。經旨謂陽邪外寒。胸中清陽不旋。不飢痞悶。先治其痞。做仲景薤白湯。桂枝 薤白 生薑 茯苓 半夏。自云膜脹。左脇痛勢休息。大便日下粘濁。臨便自覺冷痛。凡五臟錮結為脹。六腑濁痺為聚。數年久病。難以廓清。議溫下法。大黃 枳實 青皮 附子 厚朴 陳皮。經水不來。腹大足冷浮腫。此乃血分鼓脹。四大症候。何得砂視。禹餘糧丸。接服人參 澤瀉 淡乾薑 茯苓。淡附子 又禹餘糧丸。夏秋內伏暑濕。皆是陰邪。久滯漸致食入痞滿。形寒脈小。當溫中醒陽。莫以清涼治滯。

薏苡仁 茯苓 肉桂 生白朮 猪苓 五加皮
陽微氣不流暢。腕中痞滿。噎氣。
人參 半夏 白旋覆花 煨薑 丁代赭 茯苓
廣皮 南棗肉
陽氣不旋。不飢強食。 薤白 茯苓 橘紅皮 半夏
述小腹之右。入暮有形如梗。按之而痛。此為疝瘕。肝病乃濁陰凝聚。必犯胃氣。大半夏湯有去痰扶胃之功。必加泄濁和肝。勿令致脹滿。
人參 茯苓 炒小茴香 青木香 半夏 炒橘核
脈沉。湯飲食物。嘔吐吞酸。胸高腹脹。二便不爽。濁氣上阻。柔溫宣通。

熟半夏 白蔻仁 新會皮 藿梗 生薑汁
大杏仁 紫厚朴 茯苓皮
脈微小而遲久。食物不進。形色枯悴畏寒。此為無陽。延久成脹。人參 熟附子 生益智仁 茯苓 炒乾薑
左脈獨弦。膈突筋青。肝脹顯然。脾愈虛。肝愈寔。又不合實。脾治肝之法。先泄肝。 郁李仁 柏子仁 茯苓皮
炒烏梅 炒桃仁 赤芍藥 薏苡仁
由食冷腕脹滯泄。漸漸目眩神疲。筋縱脚弱。陰陽日衰。前進薛氏腎氣丸相投。今夏月土衰木侮。必兼理陽宣通。不致濁陰結聚脹滿矣。 人參 乾薑 茯苓 枳實
淡附子 水泛丸晚服。早上仍用薛氏腎氣丸。

腹右有形為聚。脈大。食入即脹。治在六腑。 香附 生磨汁
枳實 白朮 茯苓 三稜 厚朴 南查肉 廣皮
脈微遲。左脇痞痞。漸腹脹。便溺少。明係濁陰上攻。當與通陽。 製附子 炒茴香 茯苓 枳實 澤瀉 遠志
時病食復。至今不知饑飽。大便不爽。右脇之傍。虛里天樞。隱。有形。此陽胃絡經行之所。多噎氣。食不化。並不煩渴。已非攻下急驟實熱之症。先用 丹溪小溫中丸
據述上年秋痢。峻攻逐病。愈不能復元。自小腹膜脹。漸延中部。按之仍軟。此真氣不收。法當溫養奇經。使元海壯而病却。 煨草斑龍丸法加茴香 夜服資生丸去連
夏秋痢疾。是時令溫熱。邪未清。即食腥味。致脾胃受傷。

舌膩白胎。食減無味。氣墜足腫。久久延成中滿也。但數月
久病。且晚未能奏功。

便秘

生於木 廣皮 生益智仁 茯苓 厚朴 生砂仁
三陽結乃成腸。先用更衣丸三錢。破小腸之結。後服煎方。
枇杷葉 桃仁 製半夏 柏子仁 藜仁 杏仁

鬱金 桔梗

高年陰結。半硫丸三錢。分兩次。人參一錢。煎湯送下。
食入不化。腹脹便溏不爽。長夏濕着脾胃。薑酒不忌。氣分
鬱滯。據述。嗔怒致此。未必皆然。茵陳 州藥 木通

腹皮 飛滑石 厚朴 茯苓皮 廣皮

瘡愈食腥太早。脾陽不司健。氣鬱不行。為腫為脹。宜忌食

掃葉莊方案

物中之粘膩者味者。

小温中丸三錢 十服

十數方案

比七

痰飲喘咳水氣腫脹。門
昔肥今瘦。為痰病傷。正氣不復。下焦無力。議治脾胃。

補骨脂 茯苓 廣皮 生益智仁 生白朮 川楝

蒸餅為丸

少陰氣逆。議通太陽。

川桂枝 五味 白芍 茯苓 炙草 淡甘薑

少年背冷夜喘。此為伏飲成哮。痰飲屬陰邪。乘夜陽不用
事。竊發。以早甘淡微通其陽。

桂枝 炙州 未仁 茯苓 薑皮

飲酒便滑。胃中氣逆。陽不運行。痰聚當以温通其陽。

掃葉莊方案

生智仁 半夏 乾薑 茯苓 廣皮 薑汁

飲酒聚濕。濕生痰。生熱。維脈為濕熱所阻。遂為痺痛。猶是
淺近之恙。其在裏久。釀痰飲。深處絡中。二年以來。陽氣日
衰。痰濕皆屬陰濁。乘夜衝舉。有妨卧寢。仲景論飲非一總。
以外飲治脾。內飲治腎。為要法。總之。脾陽鼓運。水穀之氣。
何以化濕。變痰。腎陽潛藏。斯水液無從上泛。而為痰喘。試
以過飲。必瀉甚。酒肉當禁忌矣。先議越脾法。宣上鬱熱。以
通痰飲。桂枝木 木防己 茯苓 淡乾薑 石膏
白芍 北味
脈沉背寒。咳嗽吐稀涎。夜不得卧。此為伏飲。遇冷即發。
小青龍湯去麻辛

六旬又五從未生育。先天坎陽未旺。所賴後天水殺精華。藉以形充氣沛。男年八八。天癸向衰。形體似壯。其氣已弱。向未味厚。溫補與體質相宜。近因痰多火動。藥力未能收納。及下。反為助痰妨胃之累。虛風暗旋。原非客感。冬藏未富。春木蠢動。風來肝腎。陰陽不交。使然。木必凌土。而納食不化。陡然便溏矣。再論痰飲。莫詳仲景。由水液上泛。者治腎。食減不運者治脾。今肝木生風。致麻痺漸爽。亦當培土制木。早服四斤丸。夜服茯苓飲。

痰飲一症。頭緒甚多。以陽氣不足之體。當此天暖發泄。反誤服苦辛泄氣之藥。傷及胃口。此皆冷不能納食。是其明徵。茯苓 桂枝 甘草 生薑 南棗

培葉莊方

痰飲皆陰濁。厥陽微濁。攻為嘔吐。胃氣傷。不主納食。用真武湯。驅濁飲醒陽。真武湯

蝦濡。中宮陽不主運。濕濁聚痰。不饑不渴不食。桂枝木 草果 廣皮 茯苓 厚朴 炒穀芽

高年久不更衣。痰氣上壅。滾痰丸

涎飲激射。塊苓 蘓子 陳皮 鬱金 半夏 芥子 薑汁

聚飲膈上。早開淡降而已。塊苓 桂枝 炒熟半夏 薑汁 炒橘紅 澤瀉 蘇子

冷喘氣喘急數年。根深沉痼。發時以開太陽。逐飲。平昔用腎氣丸加沉香。幼年哮喘。是寒暄失時。食味不調。致飲邪聚絡。凡有內外

感觸。必喘逆氣填胃臆。夜坐不得卧息。晝日稍可。展舒。濁沫稀延。必變濃痰。斯病勢自緩。發于林深冬月。蓋飲為陰邪。乘天氣下降。地中之陽未生。人身藏陽未旺。所伏飲邪。與外涼相召。而竊發矣。然伏于絡脈之中。任行發散。表絳痰。逐裡溫補。與邪無干。久藥不效。謂此治法。宜夏月陰氣在內時候。艾灸肺俞等穴。更安靜護養百日。一交秋分。暖護背部。勿得懈弛。病發之時。暫用湯藥。三四日即止。平昔食物。尤宜謹慎。再經寒暑陶溶。可冀宿患之安。發時背冷氣寒。宜用開太陽逐飲。青龍法

培葉莊方

議治。桂枝 五味 杏仁 茯苓 炙甘草 乾薑

附方 橘半枳木。用竹瀝薑汁泛丸。脈弦脊骨中冷。深夜痰升欲坐。少陰寒飲上泛。議通太陽。

桂苓五味甘草湯。加淡乾薑北細辛。痰飲入夜上泛。喘咳不得卧息。當治飲。不當治痰。

桂苓五味甘草湯。加淡乾薑白芍。寒熱客邪。已過營衛。變為痰飲。遇冷遇暖。或加勞悴。飲泛阻寒升降。喘不得看枕。飲去便安。逐飲非一。最難除根。

小青龍去麻辛。久遺下虛。冬效甚。氣衝入夜上逆。欲坐不安。能枕形寒。足冷。顯然水泛為痰沫。當從內飲門治。醫用肺藥。則謬矣。

桂苓五味甘州湯加白芍乾薑。
壯年久寓閩越粵南方陽氣偏洩。中年以來內聚痰飲。交
冬背冷喘嗽必吐痰。胃腕始與。今六十四歲已屬向衰。喜
暖怕寒。陽虛已露。不宜搜逐攻劫。當養少陰腎藏。仿前輩
水泛化痰阻氣。致喘嗽之例。

腎氣去牛膝肉桂加沉香五味子。

年老水入湧出。陽微伏飲。大半夏湯加薑汁。

溫邪挾飲上逆。肺胃不主宣降。效逆身熱。肢筋痺而不舒。

素有肝邪。升多降少。以理氣泄飲為治。

旋覆花 萋仁霜 橘紅 杏仁 冬瓜皮 蘇子

左癱經年。形體已少。矯捷運動。長夏氣交之濕。與水穀不
滯葉莊方案 痰飲高水氣腫脹

運之濕。皆令阻遏脾胃流暢之氣。食減不化。大便不爽。漸
漸喘息。四末肌理有中滿之累。杏仁 腹皮 厚朴

米仁 茯苓皮 桔梗 薏仁 廣皮 煎藥送 保和

通泄肺氣。喘緩腫減。偏右則知內因水穀之濕。全在氣分
流通而解。凡腥濁厚味皆滯氣。留着與此病未合。

木防已 苓皮 車蘼 桂枝 未仁 厚朴

老年陽微。氣窒浮腫。當通胸陽。勿進破氣。

生於朮 淡附子 川桂枝 厚朴 白茯苓

長夏濕邪。傷太陰脾陽。發瘡不盡。其氣浮腫。腹脹。議宣通
肺氣。生白朮 大腹皮 厚朴 生牡蠣 茯苓皮

澤瀉 廣皮 木防已

診脈左沉右弦虛。過勞陽傷。清氣不主流行。溫中丸不應。
非有形之滯。以辛溫微通其陽。桂枝韭白湯
又案。形盛氣衰。是陽虛。平素多飲酒。有濕有痰。其筋骨
中漸漸畏寒刺痛。却主陽氣不流行矣。同前方

掃葉莊方案

痰飲高水氣腫脹

汁

十數老人方集

脾胃門

長齋數年。脾胃日弱。食進腕中少運。小溲入暮漸多。色萎黃。脈弦虛。皆中氣不足。香砂異功散。水泛為丸。

嘔瀉都令胃氣受傷。凡不適意食物。更能妨胃。藥用和中。謹慎口腹。使脾胃氣壯。不致反覆。

茯苓飲去元參。金石斛湯泛丸。

形勞嗜飲。中氣受傷。涼藥治肺。清痰降火。不過見病治病。急急理胃土。以生金。米仁 白芨 黃芪 桔梗 素嗜酸者。中氣不利。治以此法。

粗桂木 炒陳皮 焦白木 白豆蔻 炙黑甘草

培葉莊方集

舌白滑。微嘔自利。陽微虛。急當溫裏。人參 生於木

炮薑 炙草 淡附子 生益智 煨服 生白木

人參 茯苓 生益智 淡附子 炒芍 炮薑

又服六君子湯 丸方 生於木 人參 木瓜

茯苓 生益智 炮薑 陳皮 用煨薑南棗肉。煎湯

饑飽失節。為內傷。山嵐瘴癘。是外因。六腑陽氣不通。滯濁。藜藿不清。經年不愈。非湯藥所宜。生茅木 草果仁

厚朴 製軍 廣皮 薄桂心 水泛為丸

脈左小瀉。右弦。六旬有六。陽微肢冷。腕痞不易運化。大便三四日一更衣。初結後瀉。此太陰脾陽受困。當用溫中醒陽。理中加桂湯

溫伏皆令脾胃受傷。寒熱。隨利黃水。小便短赤。熱自濕中。而出。痛擾虛里。右脇。食入不運。仍是脾胃不和。升降失司。以溫胃宣通治。生於木 生智仁 新會皮 茯苓

紫厚朴 生薑渣

平昔飲酒。脾陽受傷。聚濕。食少不化。大便久澹。脯食不安。飲水多。澀溺愈少。宜溫中佐運。厚味酒醴須忌。

生於木 杜蠟 附子 澤瀉

饑飽寒熱。用力。都傷營衛。內應脾胃。故痿黃無力。食入腹脹。滯泄。平胃加炒黑川椒。枳果

茹素多年。中焦陽氣易虧。納食必胸膈痛及兩脇。由于脾臟陽弱。不主運行矣。治以辛香溫煖。健脾佐運。

培葉莊方集

於木 葷撥 淡乾薑 新會皮 益智仁 淡吳萸

夏秋濕勝。滯脾。食物不為運化。陽不流行。濕滯久而壅熱。此中氣更困。以和胃健脾。分利水道。逐濕。

生白木 草果仁 木通 茵陳 澤瀉 厚朴

茯苓皮 新會皮

酒勝于穀。致形畏寒。嗽不止。咳甚嘔吐。乃胃陽受傷。此治嗽清寒難用。

茯苓 半麵 煨薑 米仁 新會皮 南棗

胃陽不旺。晚暮腹鳴。痞脹。晨起痲泄。兩方用胃苓治中相安。今吐沫上湧。仍屬胃病。人參 生於木 茯苓

益智 附子 乾薑 各為末。水泛丸。

凡滋味食下不安。嘔出臭濁不變。蓋在地之物。假梁肉成形者。皆陰類也。宜食飛劑之鳥。以無油膠滯膩。藥用妙香散。芳香醒脾。不致燥烈傷睛。人参 茯苓 石菖蒲 益智 茯神 炙甘草 檀香 或用木香新會皮 奔馳勞動。搖精精腐。溺濁。繼出血筋。真陰大泄于下。胸膈痞悶。不食。腹內响動。攻觸。清陽結閉于上。由醫者不察。陰陽虛實。反以清降滋陰。傷及胃中之陽。

人参 穀芽 生益智 石菖蒲 茯苓 廣木香 茯神 石斛 檀香末 廣皮 服十劑後。轉斑龍丸。食入腕脹且痛。是胃陽受傷。凡冷濁肥膩須戒。 蒼香 枳果 茵陳 廣皮 厚朴 茯苓皮

掃葉莊方案

向係積勞傷陽。肝風內動。症如類中。常以溫腎補脾。運痰熄風得効。丁巳春深。診脈不附骨而洞泄。迄今形瘦未復。頻年久瀉。法宗瀉久傷腎。以固攝下焦。定議六君子湯。仍宜暮服。勿間。以胃氣弱。陽微嘔酸。

吳萸 乾薑 葫蘆芭 茯苓 車撥 南棗 食入惡心痞脹。先曾腹痛瀉下。外因口鼻受邪。宜正氣平胃。辛香。久則脾胃陽傷。溫中宜佐宣通。可使病愈。

附子 廣皮 茯苓 草果 厚朴 煨木香 胃口弱極。肛墜如欲頻便。夫腎為胃關。皆腎虛不司收納。元海氣逆。水化痰飲矣。早上用。減桂加。以收腎氣。散越。午後服。中安胃。都氣丸四服。

心胃痛

腹脹瀉

肝厥心痛

十歌方案

腹中諸痛門

饑飽悲哀。內傷情志。痛無定所。忽閉忽開。主手營衛流行失緒。凡心主營。肺主衛。當開爽怡悅。氣血不致結痺。不必偏於寒熱補瀉也。 桂枝 石菖蒲 遠志肉 茯苓 炙甘草 茯神

消渴心嘈。心下痛。氣塞自下而上。咽中堵塞。此厥陰肝陽升舉。勞怒動陽必發。久則反胃欲厥。 阿膠 柏仁 天冬 小生地 女貞子 茯神

脈左瀉伏。右弦。嘔吐腕痛。引及脇肘。痛甚則四肢冷麻。是肝厥心痛。驚起佛鬱致痛。 高良薑 沙延胡 吳萸

掃葉莊方案

胃腸中諸痛

青皮子 生香附 川棟子 茯苓 接服蘇合香丸。

真川椒 烏梅肉 泡湯化服。 接服脈伏者起。似宜病減而痛脹腕痞。口湧涎沫。舌仍白。鼻數煤。面欲赤。頭汗。顯然肝厥犯胃。左升之氣。逆亂攻絡。

脇脇乳穴皆脹。辛香開氣不應。便秘瀉少。用河間金鈴子散。佐以潤液。兩通氣血。 川棟子 青橘葉 左牡蠣 延胡索 炒桃仁 瀉蘆

病久緒繁。終不離乎厥陰一藏。今商佐金氣以暗制之。滋營氣以撫綏之。實太陰以新禦之。亦子貢存魯霸越。滋吳之意。 人参 製首烏 茯神 羚羊角 阿膠 麥冬 補肝法。 人参 茯神 歸身 炒白芍 柏仁 炙草

人參 伏神 廣皮 天麻 蒸於木 炙州

鈞藤 附方 戊巳湯 砂仁湯法丸

丸方 益水炒川連 炒黑川椒 生白朮 青皮

川棟子肉 淡乾薑 當歸身 細辛

脈沉小左弦衝氣至咽欲厥下墜入前陰溲溺不能自利。此厥陰衝脈受病當以穢藥驅濁。

桂枝 韭白 茴香 川棟 茯苓皮 青木香

素有肝厥痛氣從脇腹厥逆至咽胸痛微背且多痰飲舌苔常垢白病發不食嘔酸症已數年痼疾難効。

人參 炒焦白朮 茯苓 製半夏 炙甘草

陳皮 炒焦當歸 烏梅 肉桂心 炒川椒

培葉莊方案 胃腸腹中諸痛

肝陽犯 病從少腹右痛寒熱嘔吐是肝病傳胃病去不復復食未

如昔二氣不復提屬虛象議治厥陰陽明和陽益陰法。

小麥 石決明 阿膠 南棗 生地 炙甘草

連朝陰晦陽氣鬱勃食入運化失司氣滯為痛性更躁動。

木未乘土况有血症辛血動絡非宜主兩和肝胃。

生白芍 延胡索 神麩 炒枳實 廣皮 炒山查

用甘藥嘔緩都因治救若辛寒傷胃衝脈亦陽明胃經骨

轉此補胃以寧衝陽實具至理 川桂枝 炙甘草

生黃芪 生白芍 南棗肉 生牡蠣

嘔吐清水必在早晨蓋竟夜未進食物胃空則陽中濁壅攻胃胃底之水上溢此病已八年是食不謹慎胃陽受傷

矣。淡吳黃 熟附子 塊茯苓 生白芍

老人胃弱多食甜物緩中况入暴冷亦走胃之募原湯水

盡嘔胃脘痛氣逆格拒以辛香開之 吳黃 高良薑

紅豆蔻 塊茯苓 熟半夏 研入蘇合丸

寒自口鼻中入內發散疏表非法便燥不爽腑氣不和當

先治痛理氣 生香附汁 草果仁 杏仁 高良薑

廣皮 厚朴

丁巳風木不及春半陽未生旺議養陽方法。

人參 熟於朮 生智仁 茯苓 廣皮 乾薑

食入涎湧脘脇痛脹在右邊近日天冷更加前議胃陽已

傷濁沫凝涎壅於胃脘致濁氣不降腸中為痺古稱九竅

培葉莊方案 胃腸腹中諸痛

不和顯然腑病想暴寒口鼻吸入近日反痛為新寒凝注

之象 蘇合香丸

辛香頗通知通日吸受寒感與久蓄凝涎互結以六日始

更衣論無形與有形交混不獨輕劑理陽矣。

藜蘆 半夏 廣皮白 良薑 茯苓 炒香丸

五年來饑飽失和膈中胃脘啾唧痛甚嘔吐清水顯然

中焦陽傷但久痛不已必致凝痰沉錮自述泄氣則緩病

痛之根在手腑絡。

半夏 厚朴 草果 薑汁 廣皮 葫蘆芭

勞怒脘痛是肝木乘土屢經發作脘聚痰痰上湧下泄痰去始緩但痛發徒補則壅議冬月用通補方胃屬脾胎通

為補。製半夏。廣皮。桂木。茯苓。生於木。

石菖蒲。牛肉膠。為丸。

心下高脹。至少腹。其形橫梗。大便不爽。咽中痰阻。從九竅不和。屬胃虛。小溫中丸。十服。

食不得化。是無陽也。蓋胃陽受傷。陰濁上僭。為脹。為嘔。而酸水痰涎。都因陰濁。通陽為正治法。

人參。半夏。附子。茯苓。乾薑。

胃氣痛發。五靈脂。川棟子。桂木。生蒲黃。

元胡索。生香附。痛緩用後方。炒桃仁。茯苓。

炒杞子。柏子仁。桂圓肉。新絳。

丁巳風木司天。春木氣震。胃土受侮。受氣嘔食。上年多以

掃葉莊方案

胃陽中諸病

十一

辛通得効。陽氣因病致傷。姑以小半夏湯和胃。佐吳茱萸

驅濁。半夏。茯苓。乾薑。吳茱萸。

四年臍左有形閃動。發必堅大。嘗欲束縛。不飢不欲食。

仿金匱桂薑苓朮湯。轉旋下焦之陽。

始而嘈雜。食進不化。數年前臍中漸痛微嘔。此乃積勞傷

及營絡。絡虛為痛。安閑怡悅。可以少發藥餌。攻病未必去

根。炒桃仁。桂枝木。桂圓肉。歸鬚。

炒延胡。茯苓。

病着右腹。甚至針刺刀割。牽引入于背脊。必泄濁氣病緩。自述服蚌灰小效。復發。夫蚌係介屬。味鹹堅。攻直入至陰之界。是病已在陰絡。錮結滯絆。但鹹寒不能宣逐。痰腐。

絡病在下屬血。緩攻為是。

麝香。炒桃仁。酒大黃。熬膏為丸。麝香。

陰中之陽失護。痛由前至助引經。必用厥陰陽明。是謂知醫。淡菴蓉。枸杞子。茯苓。沙苑蒺藜。當歸。

生精羊肉。

陰氣混陽。厥陰病難治。吳茱萸。川楝子。

乾薑。烏梅。元胡。

背脊痛不耐坐。左胸板實。吸氣噎痛。左手冰冷。食入不化。常有遺精。久病。三年在絡。議甘溫氣劑。

川桂枝木。肉桂。當歸。茯苓。左牡蠣。炙甘草。

虛里穴為陽明胃。陽明氣血皆多。絡脈室塞為痛。映及背

掃葉莊方案

胃陽中諸病

十一

部脈絡不和。必宣通望其痛息。彼黃地之凝。茂木之守。皆

非絡約。桃仁。穿山甲。阿魏。歸鬚。麝香。

先有血淋。淋止脇痛。脈來左部堅搏。是以陽鬱熱。藥絡所

致忌。食酒肉厚味。炒熟桃仁。瓦蔚子。牡丹皮。

當歸鬚。山梔。澤蘭。

脈沉小。痛起青腕。串及腰背。五年宿恙。寢食不改。此病在脈。脈之間。痺阻不傷。藏腑。議以流通周行氣血。勿得峻劑。

川桂枝。撫芎。乳香。薑黃。香附。茯苓。煨葛根。

絡氣不通。嫩蘇梗。黃麻骨。塊茯苓。煨葛根。

左脇下硬。忽忽善忘。是為蓄血之象。桃仁。牡丹皮。

鬱金。鈎藤。降香汁。赤芍藥。橘紅。

十報方集

氣痺膈關格呃逆門
中年以後陽氣已微。午時噯氣。食納上泛。皆胃弱氣逆。視
面明脈弦。必伏痰飲。仲景胃虛客氣上逆例。

旋覆代赭湯

氣鬱四年。腕結自能排遣。其結聚已散。近日喉間吐咯不
清。食味甘必滯。臟是肺胃不降。以微辛微苦之屬。久急勿

投峻劑。枇杷葉 米仁 茯苓 川貝母 金石斛

橘紅 白寇仁 桔梗 審丸

喉旁左右有形。嚥物不礙。但畧起未食。其形為瘡。思未食
時。胃中陽皆上蒸。犯肺矣。從前致病。以火酒大辛。熱結氣

培葉莊方集

氣痺膈關格呃逆

十九

瘳五年。已為痼疾矣。甜北沙參 生黃芪 麥冬

甜柿梨 金銀花 熬膏服

清肺胃化生津液。玉女匭 附方葶藶合葶藶大棗湯

附方 蘆根 滑石 浙苓 生米仁 川貝 桑葉

附方 黃芪 白芨 桔梗 黃精 米仁 百合

聲嘶喉噎。食不適。即嘔逆。嗆逆。自述飲酒致傷。首先犯肺。
開氣理逆。清肅上焦。鮮枇杷葉 薏米仁 射干

活水蘆根 浙苓 降香汁

脈症乃氣結在上。津不運行。蒸變濁痰。由無形漸變有形。
徐之才謂。輕可去實。非膠固陰藥所宜。鮮枇杷葉汁

杏仁 紫厚朴 白寇仁 薏米仁 降香汁

脈小瀼。面赤目黃。喉痛咽物不礙。溺後淋濁。此水穀之氣。
凝聚成濕。鬱氣不升降。三焦不利。當以清肅上焦主治。

蘆根 射干 米仁 白寇 浙苓 通艸

昔年強壯。夏穰熱病。煩減。精未不復。異致不通。左脇有聲。
攻觸痛嘔。遇勞即發。必脈絡中瘀。留聚。煩然食減。少飢。
大絡必聚血。病中衄血。已見一斑矣。生蒲黃 桃仁

歸鬚 五靈脂 穿山甲 桂枝木 韭白汁 泛為丸

此跌撲致經脈氣血壅痺。脇背高凸。非湯藥可效。

蘇洞丸 每日服一丸

脈虛浮。沉取直上下行。胃納素減。病發從背微心。先脹悶
幾日。氣遂從下焦直衝至咽。手足厥逆。發呃。細測病源。屬

培葉莊方集

氣痺膈關格呃逆

二十

胃虛相火直衝清道而上也。夫衝脈並少陰之經。行乎地
門通谷。夾巨關而上。故丹溪謂呃逆屬于肝腎之虛者。其
氣必從臍下直衝上出于口。斷續作聲。右腎為相火所寓。
相火炎上。挾其衝氣。乃能逆上為呃。主以大補陰丸。折火
滋水。伏藏衝任。治虛呃。用參朮湯。芩藜土。以制龍雷之火。
也。至東垣之論。又云。胃為衝脈所逆。而反上行。其症氣上
衝咽。不得息。名曰厥逆。宜調中益氣湯。加吳萸。觀厥氣多
少。而用之。且隨四時寒熱。溫涼而治。若夏月有此症。為大
熱。宜加連藥。知母。直至下元。以瀉衝脈之邪也。內條治法
并并。高出千古。今擬大補陰丸。早服。調中益氣。午服。恪守
勿懈。自可除根。遠勝後人龐雜之方矣。

大補陰丸 調中益氣湯 秋冬去連藥知母

黃蘗 熟地 人參 柴胡 木香 吳茱萸
黃柏 知母 元武 白朮 吳州 陳皮 黃連
右少腹中衝氣上至胃口痛而嘔欲呃此陽微陰濁上踞
老人有關格之累

炮黑附子 淡吳茱萸 生淡乾薑 雄猪膽汁
陰濁得辛熱反佐苦寒而降陽明之陽必傷然腑藥以通
為補須忌食物厚味 人參 製附子 茯苓 淡乾薑
形寒嘔逆 痰痛上衝愛食稍減

人參 半夏 吳茱萸 茯苓 高良薑
右脈如控弦 北藜子 半夏 代赭 生枳實 淡薑
掃葉莊方案 氣虛陰虛用格呢

茯苓 新會皮 鬱金
惡心飢不能食 旋覆花 人參 雲苓 金石斛
代赭石 半夏 廣皮 薑汁 接服六君子法甘草
附方 枇杷葉 金石斛 竹瀝 橘紅 鮮蘆根

薑汁 後去竹瀝薑汁加杏仁紫苑
老人脈右弦左瀉因嗔怒致嘔吐膜脹不納物此肝木犯
胃湧逆不已必致濁阻上下不通老年復慮關格

開口吳茱萸薑汁燉南棗肉搗丸服六七分日三服
平昔嗜酒脾胃積熱陰液下枯陽津變痰裏塞多倉減食
無味旬日更衣糞如羊屎老人關格治之極難况酒客不
喜粘膩甘柔形脈症象不受溫熱議以鐵覽申先生瓊玉

血枯腸

陽結腸 減餐方法 鮮生地 人參 水一盞 煎至四分 臨服
清陽不主轉旋強約不運吐出是不化之形腸汁乾涸
陽不得傳導便難艱滯古稱關格為陰枯陽結藥難奏效
或以半硫丸宣濁通腑仿戴元禮諸熱藥皆固秘惟硫黃
滑而不秘半硫丸

氣隔 六旬外陽氣不旋反閉上不納食下不更衣此為關格
小結滯傷于無形最為難治

妙香丸 每日三粒 十服 接後藥案

大凡噎格反胃老年閉于胃脘之上是清陽不主轉旋乃
無形之結早香通關反覺熱悶上升虛症無疑以大半夏
湯合加黃連合瀉心法

掃葉莊方案 氣虛陰虛用格呢

上隔 人參 半夏 茯苓 川連 竹瀝 薑汁
膈中為宗氣之海氣無冲和之力為噎為格皆能致之竟
擬漸磨運蕩之法庶幾得之 鬱金汁 檀香汁 川貝

血隔 瓜蒌皮 製半夏 沉香汁 枳實汁 塊茯苓
先吐污濁繼而氣逆吐食平日腹痛今已便難於留在絡
氣亂道路不通有形阻及無形議攻其痰

桃仁 製軍 去枝桂枝 延胡 生蒲黃

炒烟盡五靈脂 韭白汁 臨服冲入三十匙
疑痰既久三焦道路為壅延成反胃壹膈議緩法
人參 研 苑仁 去皮 麝香 研 大黃 麩 酒浸 瓦上
當歸 稍 煉 蜜 為 丸

中焦痰

經云。食下不化。是無陽也。今早納晚吐。仍然完穀。胃陽衰。憊困窮。反胃湧吐。陽氣結痺。濁陰壅遏。况少壯至中年。持榮思。喜飲少穀。陽氣積傷。虞花有云。格拒反胃。必陰枯。陽結視面赤。屬飲脈。弦為痰飲。留氣凝。焉得不痛。緩痛宜通。然非攻下蕩滌之比。當從通陽鎮逆為法。真寒辛酸。破洩真氣。大傷胃陽。不可再服。做仲景胃虛客氣上逆例。

酒隔

酒熱傷胃。穀食入脘。即噎湧出涎沫。陽明脈不用。事筋脈牽絆。與半夏瀉心湯。

半夏 茯苓 金石斛 竹瀝 薑汁
接服 杏仁 鮮枇杷葉 厚朴 茯苓 半夏
培葉莊方案

上隔

右脈弦長而數。左脈帶滯。阻在胃之上脘。起自恚怒。不獨傷肝。肺亦有之。何也。以其循胃上膈。是肺之所屬。金不及木。得反侮之。聚則氣凝痰阻。眼胞足以證之。擬泄金平木。何如。薑製枇杷葉 蘇子 水梨汁 醋製代赭石

中脘隔

半硫通下頗效。妙香開上反吐。此中焦胃陽已虛也。用大半夏湯。

中脘隔

食不得化。是無陽也。脈絡映痛。辛香芳溫可效。當用蘇合香丸。

上隔

昔年嗜飲濕聚痰壅。致清并濁降。痺阻食脘窄隘。噤竅不納。飲留氣凝。治在上焦。以飲有質。氣無形也。生滑石

紫厚朴 竹瀝 蘆根 瓜蒌皮 薑汁
老人噎膈。不能納穀。脫中窄隘。是氣不通。非有餘之比。

枇杷葉 米仁 橘紅 蘆根 茯苓 薑汁

途次吸入寒氣。傷及絡脈。每胸痛飲熱酒。宣通小愈。中年屢發。陽受傷。必有痰聚。漫延反胃。噎膈宜薄味節勞。

薑汁 茯苓 炒桃仁 桂枝木 半夏 胡索

附方 早服淡豆腐漿 晚服枇杷葉膏

噎膈為患。脈微而遲。乃胃之冲和之氣。曲運神機所致也。今已顆粒不食。呃逆不止。倉廩頓憊之象。

人參 茯苓 陳皮 枳實 生朮 炙甘草 半夏

磨冲。絞銀汁和入服。

培葉莊方案

內經無火無水之論。原非泛指。張子和亦云。湯中煮桂火裡燒薑。豈不讀耶。蘆根 生地 塊苓 米仁 生朮

枇杷葉 竹茹 鬱金 代赭石

又接服 六君子去甘州加 枳實 代赭 薑棗

脈右弦面色赤亮。納穀咽乾。脘阻。碍不下。五十四歲。清陽日薄。致轉旋日鈍。痰必阻氣結。則脘窄不能宣通耳。大便仍利。但治脘膈之上。

白蔻仁 杏仁 厚朴 桔梗 枳實 半夏

半年脘悶多噎。效救此氣鬱不解。納穀已成。破洩耗氣。非宜。從膏痞治。雞白湯

掃葉莊一瓢老人醫案卷三

醫方集

醫

瘡疾門

薛雪生白著

蕭山謝請

瘡母因不慎食物腹鳴痞脹泄以理脾胃之陽藥

州果仁 吳茱萸 茅朮 厚朴 廣皮 楝目

老薑搗取汁泛為丸

舌白不渴脈沉腹滿不飢不食二便不通是暑濕發瘡後中氣不復膠食大葷亦氣結成脹

大針砂丸一錢二分十服

脈左數搏是先天真陰難充則生內熱瘡熱再傷其陰與

滋養甘藥填陰左歸丸去杞子牛膝加天冬女貞

三瘡乃邪伏陰分而發數月始止然畏風怕冷因瘡邪偏

掃葉莊方案

瘡疾

寒偏熱已久營衛皆弱氣薄不固調養失宜必致復病議

用大封大固如天真丸天真丸去羊肉加河車膠

向來多致肺傷六月廿四風潮感邪卑熱不寒為瘡瘡仲

景謂消燥肌肉當以飲食消息之在手救胃陰以供肺也

醫知是理否 大竹葉 連翹 麥冬 生甘州

青甘蔗漿 甜秋梨漿

伏暑因新涼發瘡頭脹急心脫痞邪鬱上焦從肺瘡治

竹葉 連翹 滑石 杏仁 川貝 橘紅 白蘞 紫厚朴

太陰濕瘡脾陽傷氣不運舌白脫闕水飲停蓄當理氣分

草果 厚朴 藿梗 廣皮 杏仁 苓皮 化蘞合丸

濕熱未清瘡止頭目昏中不與不飢不思食病在氣分

草果 白朮 厚朴 廣皮 茯苓 杏仁

瘡瘡兩旬不解舌白脫闕色奪 按服竹葉地黃湯法

葛蒲根汁 白朮 草果 厚朴 杏仁 茯苓皮

廣皮 化牛黃丸一丸 一去杏朮加木香藿香化丸

間瘡不飢心悶不甚渴從脾胃制即可愈

草果 知母 黃芩 生薑 厚朴 半夏 廣皮

風濕着太陰瘡 草果 厚朴 廣皮 茯苓 猪苓

藿香梗 化蘞合香丸

農家夏季受冷濕之氣陽氣不司宣暢壯年形與無力乃

勞倦傷之瘡 生白朮 生薑 草果 厚朴

廣皮 藿香

掃葉莊方案

瘡疾

此熱傷氣分而為瘡瘡寐則肢腫熱渴餘暑尚熾宜救胃

津 人參 麥冬 竹葉 知母 生甘州

瘡止反覆必有原因姑就色脈氣怯神弱因病致虛夏秋

宜調中益氣 人參 益智 茯苓 廣皮 炙甘草

今年瘡疾半由雨濕陰晦之邪當以芳香逐穢理氣分多

效但三瘡係在陰伏起必左足微冷熱過有汗仍知饑知

味乃勞乏氣怯之病不必端以攻邪是歲係濕土司天

桂枝木 生牡蠣 炒黑蜀漆 生芪 當歸

防風根 生薑 大棗 接後藥案

寒在四肢熱起胸準至腹此太陰三瘡也經水來期不移

脾主營前議和血托邪服後瘡未熱多口渴 此太陰陽明

草果仁 知母 細桂枝火 黃芩 生薑 烏梅肉
勞倦傷陽不復新。再受為瘡。實虛感邪。不可發散。

桂枝 生木 防己 茯苓皮 藿梗 廣皮
三年前失血。今秋途次暑濕熱傷成瘡。脫痞不飢。是邪結

氣分。 飛滑石 白蔻仁 杏仁 厚朴 藿香梗

廣皮 木香

今年瘡痢。皆水土濕鬱之氣傷及脾陽。不司轉旋。令人中
痞不食。辛香理氣驅濕。疏粥易安。濕土司天

生草果 厚朴 桂枝 茯苓 藿梗 廣皮

數月。瘡三日一發。邪伏于陰。不忌葷酒。致脇腹有形。邪與
氣血膠固。結為瘡母癥瘕。驚甲煎丸 每服三十九

掃葉莊方案 瘡疾

瘡傷陰氣。 腹脹去參薑桂

瘡熱傷陰。不復乾。效汗出。 桑葉 玉竹 妙川貝母

大沙參 麥冬 生草 南花粉

少陰瘡誤治。延及太陰。腹有動氣。近暴冷寒熱甚。

淡附子 川桂枝 北細辛 炙甘草 生薑 南棗

寒自背起。熱不煩渴。不飢不思食。指臂麻木。脈未小弱。近
受溫邪如瘡。其實陽氣久虛。當從本病調折。

川桂枝 茯苓 炙草 煨薑 南棗 生益智仁

背寒肩胛拘束。陽微瘡根。 人參 附子 桂枝木

炙甘草 生薑 南棗 生於木 生益智仁

掃葉莊方案 瘡疾 形寒拘束已止。身痛食少。 生黃芪 歸身 人參

南棗 淡附子 蒸冬木 廣皮 炙甘草

又照前方去淡附子。加穀芽煨薑。

熱後寒寒後熱。此兩陽遇于一陰。如易之離象。中宮必虛。
大忌散發攻食。間日而作。瘡勢未罷。仍該和解。

鮮荷梗 白蔻仁 黃芩 鬱金 烏梅肉 生白芍

夏秋所伏暑濕。至霜降節乃發。是新邪引動宿邪。初病頭
痛汗出。寒熱勢猛。是新邪鋒芒易解。繼而勢似差緩。瘡未

兩日。越一日再發。半月竟成三瘡。發于子午地支為太陰。

蓋邪氣久伏。六淫客氣皆從火化。然中年形體豐偉。已見

脈弱神倦。外似有餘。裏真不足。凡寒熱之邪。必由四末漸

攻中焦。病來心中熱燥渴飲。胸悶不知飢知味。寒則肢背

掃葉莊方案 瘡疾

拘束。熱甚心腹最劇。由邪聚為重。邪分稍緩。此為裏中之

之表。病在絡不能汗。解下奪。惟辛香宣通。以氣氣氣瘴。

原非質滯。阻清陽流行之隧。日加蒙痺。致正氣日疲。故深

秋入冬。伏邪在陰發瘡。不與時瘡和解清熱同例。

方缺

寒熱過後。從太陰劫瘡。 紫厚朴 茯苓皮

川桂枝 草果仁 木防己 天花粉

先有遺精陰虛。瘡邪墜入陰絡。是少陰瘡。非治瘡通套。此

苓可效。

素有遺精。瘡未而遺止。陰中之陽。既因邪得深入。留連

寒熱起由足跗。陽經失護。必陰內怯。不得以表裏混治。

人參 歸身 炙草 鹿茸 桂木 生牡蠣

陰瘡上部先寒年十三未出。是營衛疎客邪留着。色黃

脈小。歸芪建中去錫糖

久瘡營衛皆虛。血空氣疎。頭暈心悸。無以主張。先與甘緩

益虛。生黃芪 茯神 炙草 歸身 米仁 桂圓

瘡母過勞而發。顯然陽傷絡空。阿魏丸

今年患瘡最多。皆因大地濕邪。濕傷陽氣不旋。肛墜痔血。

小便不利。宜旋轉太陽之氣。五苓散

瘡邪傷陰陽。亦不藏。衄血夜汗。

六味去丹澤加五味女貞 附方補中益氣湯加首烏

又首烏 白木 又 生枝木 龍骨 煨薑

掃葉莊方案 瘡疾 杜蠟 南棗

濕瘡失治。瘡疥腹脹。形寒減食。都是脾胃受傷。勿強進腥

濁厚味。胃苓去甘 梓葉

案昨服胃苓湯。裏後有血。小便不利。久伏濕邪。三焦皆受鬱

久成熟。用分消法。茯苓皮 山茵陳 木防已

紫厚朴 槐花 細木通 海金沙 草薢

此厥陰瘡症之量重者。煩躁吐衄。脈弦數可徵。擬苦辛酸

法。川連 川楝 桂枝 乾薑 烏梅 白芍

瘡三日一發。是邪伏在陰經。經年雖止。正傷難復。仲景龜

甲煎丸。專以升降宣瘀治肝。謂寒熱不離少陽。久必入肝。

肝主血。左脇為肝募。愈也。故病固當如是。但久有遺精食

少不化。諸恙。病非一端。此攻邪溫補。未能却病。莫若養正

氣旺。邪自除。古有諸矣。午服妙香散

三日瘡是邪伏陰分而發。非和解可效。久瘡不止。補劑必

以升陽引伏邪至陽分則愈。守補藥則非。人參 鹿茸

當歸 茯苓 附子 鹿角霜 杞子 沙苑

熱病繼瘡。交冬自止。左脇已結瘡母。今食物難化。大便瘡

泄。神疲力倦。病由葷酒太早。致濕聚氣阻。治以疏補脾胃。

茵陳四苓加厚朴益智仁

掃葉莊方案 瘡疾

十難方業

夏暑濕熱

診脈後。頭暈。胃脘不爽。欲嘔。夜來腹脹。吐痰酸水。口臭。吸冷。損及中陽。暫用冷香飲子方。宜後進參朮。

藿梗 草果仁 附子 廣皮 厚朴 茯苓

脈沉後。目黃。舌白。嘔惡。脘腹胸脹。此冷暖不和。水穀之氣。釀濕。太陰脾陽不運。周行氣遂為阻。法當辛香溫脾。宣氣逐濕。用冷香飲子。

草果 藿梗 半夏 茯苓皮 厚朴 廣皮

杏仁 茵陳

舌白黃不饑。筋骨甚爽。自暑濕內蒸。脾胃受傷。陽明脈

掃葉莊方業

不司分布流行。若不早治。必延癘痢。

白菟 杏仁 藿梗 木通 滑石 厚朴 廣皮

桂梗

春夏地氣上升。身露山麓。亦有瘴氣。混于水土之中。飲食不覺。脾胃氣困。頻年長夏。舌黃腹脹。便秘成瀉。皆濕阻清濁不分。兩年治效。多以分消。每交春深。山行蔬食。俾氣清流暢。則無是病。

生白朮 米仁 廣皮 苓皮 厚朴 生智仁

桔梗 金石斛汁法丸

又煎方。草果 廣皮 腹皮 猪苓 厚朴 苓皮

茉莉子 澤瀉

失藏人身應之患。此者最多。考古人溫病忌表散。誤投則劫津。逆傳心胞。最怕神昏譫妄。治法以辛甘涼潤為主。蓋傷寒入足。徑溫邪入手。徑也。上潤則肺降。不致膈鬱。胃熱下移。知饑渴解矣。

嫩竹葉 麥冬 桑葉 蔗漿 石羔 白糖棗炒

生州 杏仁

冬溫伏邪。先厥後熱。熱深從裡而發。汗出煩渴。當救胃汁。

竹葉心 麥冬 生谷芽 烏梅肉 生州 川石斛

風溫咳嗽。下焦陰虛。先以辛甘涼劑清上。

桑葉 大沙參 麥冬 玉竹 川貝 生州 糯米泡湯煎

冬月溫邪內伏。入春寒熱咳嗽。身痛微汗。乃解。與溫瘧。

掃葉莊方業

同法。

桂枝白虎湯

秋嗽二年。形瘦殺減。冬季喉垂漸痛。可見水虧。陽氣不藏。春月氣日甚。皆陰之上承。陽結于上。為喉痺矣。近日寒熱風溫。客氣脈小。數為陰傷。忌用辛散。

桑葉 沙參 川貝 玉竹 麥冬 生州

風溫變熱。燥筋灼骨。足筋腫痛而熱。二便不通。夜躁不眠。邪已入厥陰。多驚駭面青。徑水不應。期而來。為脚氣之症。

漢防己 川黃柏 川草薢 晚香沙 海金沙

川通州五錢煎湯代水

鮮生地 阿膠 五味 牡蠣 麥冬 白芍 女貞
脈數右實左弦。服養陰藥已得效。但未能愈耳。嘈雜恍惚。胸上動氣。嫩苦寒熱。用小柴胡湯治陽維之會。

桑葉 赤丹皮 鮮生地 鮮桑葉 阿膠 女貞

生白芍 白丹皮

溫邪感觸。氣逆口鼻。宜走膜原中道。不同傷寒陽症。邪自太陽次第傳經。蓋春溫夏熱。鼻受氣則肺受病。口入之氣。竟由腕中。致以手經見症。不似傷寒足六經病也。仲景論溫不可發汗。汗則劫津傷陽。身必灼熱。一逆尚引日。再逆促命期。又云。鼻息軒。語言難。刺驚。痲癩。無非重劫陰陽而然。今病發熱。原不是太陽客邪。見症所投。羌防。辛。

掃葉莊方案

三三

溫表汗。此即為逆矣。上竅不納。下竅不便。亦屬常事。必以攻下希圖泄熱。殊不知強汗劫精。而傷陽。妄下劫液。而亡陰。頃診脈。兩手如搗。而戰舌乾燥。而無胎。喘前乾板。目欲瞑。口欲開。周身斑紋隱躍。時有呃逆。因胃之穀氣而中空。肝陽衝突。上冒肆。耳為今迫正。先用糜粥。使胃中得濡。厥陽不致上冒。而神昏之累可已。進藥之理。甘溫可以生津除熱。即斑疹亦不必慮。觀仲景論中。邪少。愈多。陰液陽津並涸者。復脈湯主之。今仿此意。

炙艸 生地 阿膠 人參 麥冬 白芍

溫邪有升無降。經腑氣機交逆。營衛失其常度。為寒熱。胃津日耗。渴飲不饑。陽氣獨行。則頭痛面赤。是皆冬春驟暖。天地

溫病

陰虛溫熱。衛泄。營熱久延不已。最為棘手。擬桂心營肺衛治之。

鮮生地 金銀花 桑葉 小麥 鬱金 犀角尖

淡黃芩

伏熱久鬱。營衛失調。汗泄心嘈。皆是內蒸氣弱。肢足稍露。則臍下便痛。正劉氏所云。則害。乘乃制之義。

鮮生地 犀角 青蒿梗 生石膏 地骨皮 知母

汗多氣泄。心包伏熱。五心焦煩。形體反惡。外寒投清寒之品。熱勢稍減。但熱蘊于裡。必得水升火降。方能陰陽和快。

犀角尖 浮小麥 鮮石菖蒲 鮮生地 元參心

珠砂染麥冬

掃葉莊方案

三三

客冬感寒。入春化溫。寒熱。藥不中竅。致令汗泄。正至。因循難愈。議進酸鎮一法。

桑葉 阿膠 茯神 生白芍 牡蠣 炙艸

日久寒熱。正虛無以主持。頻汗泄。亟宜固陽攝陰。

生薑甲 桑葉 阿膠 生芪皮 生白芍 枯苓

茯神 炙草

脈數上出魚際一寸。心中熱。與背相控。

鮮生地 阿膠 麥冬 九孔石決明 生白芍

女貞子 五味 麩子黃

脈數上出魚際一寸。是謂溢脈。陰氣不能上承于陽也。寒熱汗出身半以上。是太陽失陰守。非壽徵也。議攝陰救陽。

掃葉莊方案

春溫

過飲酒熱上熾肺衛心營受迫。旬日間有寒熱。痰飲阻氣。欬逆胸痞。乃內因致病。薄滋味以清肅氣分。

薑根 枇杷葉 桑葉 米仁 浙苓 煎好梨生石羔末再煎

溫邪蒸灼津液。酸為熱。痰胃口不得清肅。不飲不食。只宜

甘涼生津。峻利不可再投。

麥冬 蔗漿 花粉 粳米 川貝 桑葉 大沙參

津潤風動。肢強口噤。溫邪內陷危甚。以甘後生津熄風。望其出音。

炙州 麥冬 阿膠 火麻仁 細生地 蔗漿代水煎

掃葉莊方案 春溫

高年左癱。近加風溫寒熱。主客皆病。防其昏症。

厚朴 廣皮 豆蔻 杏仁 木通 苓皮

溫邪入肺不解。遂逆傳膈中。煩熱昏眩。噎出血沫。猶然氣喘不食。夫肺主氣。心主血。辨症分經。最為要旨。

淡竹葉 阿膠 枯黃芩 六一散

病邪已去。虛熱未除。

生地 玉竹 水梨 生州 麥冬 丹皮 花粉

數邪久伏。風寒外侵。春溫氣機不藏。內蓄之邪。復發。熱嗽咽痛。兩足畏冷。擬辛涼劑。擊其潛伏之邪熱。

桑葉 南沙參 葶金 黑山梔 杏仁 菊花

桔梗 生草

牙斷常紫。蓋疫痛。上年秋季為甚。此濕邪阻于經絡。陽明之氣。不司束筋利機。議宜通脈絡之壅。使氣血和平。

金毛脊 白茯苓 生白朮 油松節 生米仁

木防己

過飲晨瀉。中宮留濕。乾嘔腹痛。是脾不和。陽氣不主運行於四末。故四肢無力。困頓矣。宜忌濕肉。使清陽轉旋。中宮得健。

草果 厚朴 藿香 廣皮 茯苓 半夏

新沐頭痛。鼻塞。狀似風溫。次日寒戰大熱。脇肋痛不可轉側。自利稀水。乃濕聚於經脈。病在氣分。熱渴欲飲水。今日

黃上視。手肢痠痲。舌胎白齒板燥。胸中隱痛。皆邪深症。

掃葉莊方案 春溫

變出。

木防己 桂枝木 大豆黃卷 茯苓 天花粉 薑蒲汁

用木防己湯。症厥已後。經脈鬱伏。濕邪已解。胃汁大傷。痰嗽氣凶。與甘藥不傷胃氣。

甘蔗漿 南花粉 薏苡仁 炒黃川貝 麥冬

夏季水土之濕。口鼻受氣。着於脾胃。潮熱汗出。稍涼。少頃又熱。病名濕溫。醫但知發散清熱消導。不知濕鬱不由汗解。舌

白不饑。泄瀉。

滑石 白蔻仁 茯苓皮 豬苓 通州 厚朴 澤瀉

冷熱濕穢。難感太陰。經受邪。

草果 桂枝 茵陳 藿梗 厚朴 防己 茯苓皮 廣皮

濕鬱氣阻疹發。飛滑石 茯苓皮 射干 木防已

茵陳 檳榔摩汁

今年天運寒水。地氣濕土。春夏雨濕泛潮。鬱勃穢濁之氣。人在氣交之中。口鼻觸受。直走胃絡。募原分佈上下。如此症初病。頭脹痞悶。嘔惡必舌白。病全在氣分。為裏中之表。芳香逐穢。淡滲逐痰。俾辛氣不致外散。此不為僅以陶氏全書方案競進。彼寒分六經。熱犯三焦。不同道也。且醫藥初用。即瀉。暑必挾濕也。消之。不降。清之。不應。此濕邪。乃是無形。醫治。却是有形。今診脈小滑。舌乾口渴。不能湯飲。胸次爽而滯。仍有嘔逆之狀。當溫脾陽。以運濕。仍佐辛香。可望其效。 草果 桂枝木 茯苓皮 厚朴 廣皮

掃葉莊方案 春溫

木防已

病本濕溫。元氣不能載邪外出。勢有直犯神京之狀矣。擬以梳鼓上下分開之勢。薑桑左右升降之。芳香之草橫解之。 西豆豉 黃芩 鬱金 生香附 黑山梔 甘草

鮮薑蒲 生薑

舌赤頭痛。惡心脈大。溫邪入募原也。 白蔻仁 桔梗

枇杷葉

鮮醒蘭 瓜蒌皮 天花粉 大杏仁

脈右大。舌黃不渴。嘔吐粘痰。神躁語言不清。身熱不除。此勞倦內傷。更感溫邪。須防變症。

竹葉 六一散 厚朴 茯苓 白豆蔻 廣皮

暑濕鬱蒸。滑石 飛 竹葉 連翹 淡芩 桑皮 木通

暑風上鬱。陽分晝日頭痛。鼻淵。鮮荷葉汁 青菊葉

滑石 羚羊角 連翹 桑葉 銀花

暑風痰嗽。目黃舌白。已退。遇風肌熱。此肺病未和。薄味不致瘡。 六一散 川貝母 枯藁根 地骨皮 桑葉

玉竹

形瘦陰虧。暑熱客氣不盡。氣分有熱。故不耐陰柔膩藥。

竹葉 川貝母 麥冬 知母 生甘草

雖是伏暑濕邪。平素陰虛。久積勞倦。病發。先有導道。此芩芍連苦辛皆忌。 鮮生地 連翹心 竹葉心

細木通 六一散 金銀花

舌乾黃。經脈衰弱。腕中不與熱。傷津液。陰不上承。清熱不

掃葉莊方案 春溫

應以甘寒生津。 鮮生地 麥門冬 柏子仁 茯神 人參 冷冲

伏暑熱燥。氣分津化。痰形瘦。嗽未止。不飢便瘡。

米仁 蘆根 白蔻 浙芩 桔梗 枇杷葉

竹葉心 六一散 川貝 生軍 南花粉 桑葉

陰弱之質。暑風外襲。頭蒙口渴。以輕劑肅之。

鮮丝瓜葉 杏仁 連翹 大豆卷 川通草 桑皮

香如飲泄。越滲利。顧不宜於虛體。或有人參者。可以涼服。暫用藥當和清暑。以而濕已久。中宮易困耳。 木瓜 扁豆

人參 茯苓 甘州 醒頭草

形瘦液少。暑濕泄瀉。初愈。又咽乾。放嗽。以暑挾濕。秋熱化燥。

乃勝復之理。玉竹 麥門冬 北沙參 生甘草

桑葉 南沙參

神

脈弱無力。心中洞入。夜昏譫語。面目昏紅。煩渴微飲。是勞

倦內傷。頻與苦辛消導。滋陰陽愈傷。則浮越。有虛脫之慮。

議用仲景救逆法。生龍骨 炒黑蜀漆 生左牡蠣

炙甘草 川桂枝木 南棗肉

脈弦長入尺而數。舌上沾苔。時或發熱。大便或澀。顯然素

稟陰虛。漫受暑濕。草果仁 金石斛 紫厚朴 龜甲

廣橘皮 淡竹葉

尊體本陰虛。陽氣并邪。獨發熱。兩旬餘不解。無汗。蓋因枯

液不作。汗邪亦不解也。連劑養陰之後。邪必鬆。則汗大出。

培葉莊方案

春溫

三九

是雲行雨施。正。品物咸亨之候。何疑其脫也。但弱勝久病

不解。元氣愈虧。此邪稍出。大汗作。亦屬接補。關頭不可少

懈耳。心靜則氣定。而神住。切不可憂擾神氣。致陽上升。

人參 四錢 熟地黃 一兩 製首烏 五錢 抱木 茯神 二錢

生左牡蠣 六錢 天門冬 三錢

積勞傷陽。哀感動臟。重重內損。夏穰伏邪。已深入重圍。此

邪從陰經來。朱漢未非。時邪和母入咽。即呢陽助陽

也。故三陰而施溫補。扶正。正謂托邪。知母入咽。即呢陽明

之陽。能食不飢。不食不寐。陽不流行。三焦困。脾腎憊矣。肛

墜屬陰氣陷。難任純剛之劑。人參 廉角 黨歸身

煨生薑 草果仁 紫厚朴

熱甚。心煩躁渴。宜宣腫中熱氣。煎驅伏暑。

清心牛黃丸

辰砂益元散 三錢 竹葉心 二錢 煎湯送

脾胃氣困。鬱蒸為黃。痛乃陽不流行。久病不可純攻。

山茵陳 生益智仁 生白朮 茯苓皮 紫厚朴

廣橘皮 生香附 摩汁

痘疹幼科雜治

稔年五疳。數年不愈。脾胃愈損。必肝木乘乘。已有驚恐筋

牽。皆欲成五疳矣。其腹中冲逆為痛。即木剋土之象。用錢

氏史君子丸。未有大效。用制肝實脾疎肺方。川棟子

厚朴 胡黃連 史君子 黑糖油 生白朮

稔年純陽體質。瘧痢是夏秋暑濕熱病。間述幾年調理。都

培葉莊方案

春溫

三九

以溫補得效。但幼科必推錢仲陽方法。幼穉致傷。全在脾

胃。脾陽少運。濕聚泄利。溫煖脾陽。運行去濕。亦屬至理。若

骨脂附子溫腎。稔年恐未宜。久進。今年太陽寒水。司天太

陰濕土在泉。兩濕太過。陽氣最傷。大忌苦寒。暫服方。

錢氏益黃散

附方 乾薑 川連 白朮 茯苓 青皮 雞內金

人參 藟 薏米仁 神麩 澤瀉 煉蜜丸 炒米湯下

附驚風方

全蝎 僵蚕 天麻 川黃連 生甘草 膽星

犀牛角 麝香 金箔為衣

掃葉莊一瓢老人方集卷四

一、靈老人方集醫
。送精淋濁尿血
。道。性
。白。露。暑。主。涼。來。陽。降。多。遺。似。性。恐。畏。怯。用。心。腎。同
。步。送。

人參 訖齒 煇身 芡實粉 遠志 柏仁 湖蓮
茯神 熟地 五味子 金櫻子丸

苦寒直降。陰走洩為送。陽浮越為於。痛。效。以。攝。固。三。氣。之。
熟地 遠志 菟骨 茯苓 芡 牡蠣

陽。越。傷。陰。救。年。衰。秋。內。熱。似。有。復。能。合。想。前。可。勤。勞。
陽。象。易。于。升。動。此。陽。海。為。送。洩。序。潛。丸

精。濁。早。年。按。述。途。中。煩。勞。驚。恐。而。頭。面。眩。暈。肌。肉。麻。痺。
掃葉莊方集 遺精淋濁尿血

遺。房。事。必。汗。泄。散。精。及。吐。此。陽。微。失。護。精。固。不。固。溫。腎。寧。心。
真。劑。交。合。久。恙。未。能。速。效。

韭子 菟骨 覆盆子 五味子 菖蒲 柏子仁
補骨脂 胡菴 金櫻子丸

陰。淺。為。送。下。直。該。脈。既。空。不。主。拘。束。其。陽。浮。上。灼。自。有。音
痰。效。嗽。此。法。脈。多。益。必。填。實。下。元。了。食。所。實。少。年。精。志。未
堅。失。于。保。養。才。有。勞。性。內。損。

熟地 山藥 芡實 菟骨 龜板 山木更 茯苓
五味子 遠志 五櫻膏丸

五。液。下。洩。陽。氣。上。越。壯。感。眩。暈。頭。重。疲。弱。不。耐。步。趨。正。內
於。謂。下。老。上。實。為。厥。厥。疾。也。填。精。益。腎。未。常。不。是。但。音

藥。未。分。動。靜。氣。味。未。去。耳。法。皆。潛。平。陽。蓋。之。陰。質。重
味。厚。清。滋。導。引。確。守。勿。懈。可。真。不。固。

鮮。鹿。尾 一具切片 牛骨髓 羊骨髓 俱用酒洗 豬脊髓 俱用酒洗
生白朮 骨 生白朮 骨 生白朮 骨 生白朮 骨 生白朮 骨 生白朮 骨

山藥 湘蓮 山藥 芡實 方紅青蘆 龍丸 煎時服
前。用。清。陽。填。轉。方。眩。厥。不。至。而。吸。短。逆。精。痛。好。如。昔。精。不。精
血。未。能。生。壯。今。皆。長。友。氣。微。易。解。穢。熱。最。宜。林。泉。奔。靜。秋
不。稍。後。可。之。接。前。方。主。意。藥。加。人。參。賦。秋。石。

淋。寒。為。濁。凡。有。好。者。為。濕。熱。不。足。者。為。精。敗。而。腐。見。症。為。虛。
治。以。溫。養。通。補。

鮮。河。車 枸杞子 沙苑蒺藜 漢菴 熟地
掃葉莊方集 遺精淋濁尿血

煇身 小市 掃葉
遺。精。濁。用。填。陰。固。清。之。劑。不。波。不。通。背。部。要。腎。氣。擊。攻
弱。乃。泄。越。內。腎。太。陽。之。氣。不。行。仿。金。匱。遺。濁。者。用。菟。骨。湯。

今。反。虛。疾。皆。時。令。穢。濕。之。邪。積。後。食。物。不。慎。濕。留。生。熱。下。注
遂。患。淋。瀝。甚。痛。使。難。閱。音。取。苦。勝。溫。涼。味。熟。甚。是。近。理。但
加。地。黃。汁。臍。濁。流。血。通。利。未。合。

地。黃。砂 茯苓皮 山茵陳 煇身 菖蒲 芡實 草薢
精。乃。已。久。肝。血。腎。流。以。換。心。熱。精。自。出。先。陰。也。

二。仙。加。熟。地 茯苓 五味 菟骨 遠志 覆盆子
破。傷。林。瀝。甚。痛。不。能。寧。忍。用。通。利。分。送。精。腎。氣。必。受。損
跌。損。必。為。驚。恐。以。致。逆。亂。以。東。垣。天。真。丹。緩。流。以。行。旋。氣

效。

效。

血之痺。七旬年歲。下元已衰。淋閉久不肯愈。喜正天寒。合減滋味。下病倍中。治法非易。靈樞經云。氣不足。便使外氣。以知味。知氣。然後後病。大半及湯。下左淋。閉。藥劑。溫通。

杞子 淡菴苔 鹿角霜 沙苑 鹿膠 巴戟

色奪脈。虛。夏秋。日加煩。倦。中非。多痛。按。說。左。脇。中。動。氣。因。送。藥。為。終。而。乃。下。按。精。血。微。氣。因。精。而。為。氣。補。精。化。氣。

紫石英 杞子 穀首烏 鹿神 柏子仁 煨身

渴病乃濕熱。下注。久而。失。治。復。為。精。濁。不。易。速。愈。先用。丹

清補陰丸一月。再議。大補陰丸。滋湯。送下

多夢。精。送。腰。解。後。更。入。暮。內。熱。五。五。盜。汗。交。苦。苦。後。轉。實。

掃葉莊方案

遺精淋濁尿血

四三

久之。頭。眩。真。陰。大。虧。陽。氣。依。附。浮。動。不。已。君。性。內。傷。若。不。養。陰。服。藥。不。效。

人參 五味 阿膠 天冬 蓮肉 熟地 菖神

柏子仁 芡實 金櫻膏丸

尿血。即。血。淋。熱。送。小。腸。膀。胱。多。多。今。四。肢。不。溫。膝。後。更。更。天。煖。於。火。烘。脈。緩。小。弱。亦。一。脈。不。攝。以。此。衝。任。督。脈。佐。以。冰。肝。乃。被。方。之。劑。劑。

鹿茸 鹿角霜 炒杞子 煨身 生地 天冬

體。體。壯。氣。虛。服。以。後。小。兒。陽。氣。甚。壯。行。似。有。餘。氣。不。足。水。氣。之。氣。不。得。暢。遂。尿。注。下。注。乃。為。已。任。三。四。年。不。效。後。法。宜。升。陽。石。法。水。以。少。壯。陰。火。自。灼。之。病。

黃絲子 車前子 蛇床子 大黃 韭子 煨身

遺精。傷。腎。氣。不。收。納。臥。倒。氣。冲。上。胸。腹。脹。呼。吸。不。通。竟。身。危。坐。對。浮。腫。而。冷。小便。溺。少。非。根。底。氣。不。化。松。難。治。之。症。

腎。氣。丸。在。于。膝。肉。在

送。藥。三。年。不。愈。寐。分。陽。入。于。陰。溺。必。自。去。不。禁。寤。分。於。溺。不。使。送。攝。因。下。元。不。固。非。非。非。陽。主。以。以。酸。味。藥。和。制。至。陽。氣。直。升。直。降。是。為。時。法。

山果更 山藥 金櫻子 五味子 湘蓮 芡實

診。脈。右。數。左。小。數。入。尺。淋。濁。不。止。任。患。自。疾。是。精。血。損。肝。腎。之。症。凡。孫。持。用。心。五。五。之。火。自。元。是。任。志。實。起。非。去。氣。之。邪。並。不。掃。葉。莊。方。案

遺精淋濁尿血

許。以。法。教。率。火。為。法。

熟地 柏子 菖神 及杜子 柏子仁 甘菊

遠志 煨身 小兒

脈。左。弱。下。重。入。尺。有。夢。久。遠。足。更。出。度。行。動。氣。促。似。喘。皆。任。交。虧。衝。陽。升。舉。務。以。填。實。精。實。不。及。停。法。

方解。青。蒸。炒。鹿。茸。老。小。苗。心。北。不。夜。神。湘。蓮

紫衣胡柏

膏。淋。四。年。夏。秋。但。淋。入。大。免。兩。脇。痛。左。右。橫。枝。必。吐。痛。時。溺。清。痛。後。值。淋。甲。當。年。四。月。用。海。金。沙。茵。陳。草。薢。不。利。溫。熱。夏。季。水。入。入。於。便。後。食。物。不。消。味。厚。之。病。久。在。淫。氣。同。陽。明。脈。故。苦。大。涼。氣。收。飲。邪。阻。氣。逆。逆。傳。若。

久病深。通刻必用緩法。攻逐用通氣。佐以辛香入絡。
 華汁厚朴 白芥子 韭白汁浸之。黃卷 桂木
 土炙穿甲 製事友 廣皮 水法丸

此二方
 一氣鬱黃黃

飲食不司運納。人知脾胃不和。但夏季之濕。必傷太陰。脾濕甚。生熱。熱必宣于陽。陽胃脹。全以宣通氣。使之通。通是祛清。四末微腫。黃未除。陽明之脈。若少利。利則也。宜厚味。膠河可食。

生枳木 陳皮 姜仁 刺藜 黃卷 淡藜
 草薢 枳殼 水法丸

此長夏之病。濕著太陰。熱在陽。不食。最者黃黃。腹之。思必須。蘇合使清。濁轉運。謂因病致傷。病去自復。

桑白皮 黃卷皮 大腹皮 陳皮 茵陳 木通

掃葉莊方案

四十六

厚朴 萊菔子

久病休息。脾胃皆弱。今夏濕勝。有痛去疾。濕鬱阻通。行脈。行氣。以溫脾胃。為程中之表。法已痛。緩舒伸。尚減量。黃黃。黃黃。黃黃。

生白木 生智仁 厚朴 少子 萊菔 陳皮

感長夏濕熱。太陰陽明不司。放運。厚里肌黃。瘧之象。止。痔。黃黃。熱注于腸。為濕。信。宜。肺。任。以。清。之。泄。

茵陳 黃柏 厚朴 桑白皮 黃卷皮 炒槐花

廣皮 草薢

夏病黃瘧。是濕熱中。宜脾胃之病。小食。能令。水。家之。黃黃。目微黃。肌腫。腹耳。吃。於是。氣。未。為。黃黃。黃黃。

掃葉莊方案

遺精淋濁尿血

四十五

傷氣濕阻氣也。能慎口腹。經月天降可愈。

生益智仁 白朮 茯苓 廣皮 紫厚朴 澤瀉
生砂仁 苦參 右各碾細末。金石斛湯泛為丸。

寒濕着關節。痰飲阻氣分。咳而痺痛。川桂枝 茯苓

熟附子 熟半夏 木防己 北細辛

風毒三載。侵蝕血液。年終半百。已陽事不舉。脛骨不勝。步趨可稱沉痾之症。外治無功。當以柔溫之劑。益精髓。壯筋骨。不得痿痺為上。虎脛骨 枸杞子 甘菊花 牛膝

肉桂香 川石斛

脈緩與四肢牽強。環跳髀尻牽引。壯年有此病。起四月中。

培葉莊方案 痿痺

乃時濕邪入于經絡。為痿痺之症。木防己 生白朮

羌活 防風 桂枝木 獨活 生黃芪 川草薢

後去羌活。加片薑黃 當歸身。

內損痿痺。起于幼年。非三因之邪。此攻逐通經及傷寒偏熱。愈治愈劇。蓋精氣暗消。痿維不為已用。溫柔固補。必須宣通。是靜中有動。血肉形氣。如藏器可久。皆若此。

雄羊肉腎 鹿茸 金櫻粉 虎骨膠 砂仁研末

當歸身 小茴香 杜艾黃 桑椹膏

脈小足冷。肢膝四肢發癢。骨節腫痛。風濕已入經絡。成痺。形脈皆虛。護衛以攻邪。防風 生黃芪 片薑黃

羌活 當歸 獨活 海桐皮

風寒久必入脈絡。外衛陽失護。已現右肢麻木。雖鼻淵腦寒。不可發散。議和血脈。以逐留邪。黃芪 歸身

防風根 川桂枝 木防己 明天麻煎膏

風為陽濕。為陰。二氣相搏。窒於肌腠之里。着於關節。周行不利。為痛。得三焦氣行。濕無沉着。氣痛病解。

飛滑石 紫厚朴 白朮仁 茯苓皮 通草 杏仁

木防己 大豆黃卷

日者大正 癱瘓痔漏門

肝虛痰癭。結在項下。海石 香附 連翹 夏枯草

土貝母 天花粉 青黛 金銀花

行走吸熱。熱自上受。肺熱下移。大腸陰虛之質。陽隆成癆。

培葉莊方案 癱瘓痔漏

有諸。清養金水。以治其源。務在寂靜。莫專于藥功。

麥冬 金銀花 黑豆皮 甜北沙參 川石斛

痔血。糞前後皆有。用力。蓋齟縫血。足冷及膝。大便燥。此屬五液損傷。絡虛所致。炒焦當歸 炒黑枸杞子

炒熟地黃 五味子 淡苳蓉

陰虛為

知識之年。情慾易動。陰火直升。直降。癆火成滿。乃內連臟腑之絡。脂液滲洩。不得收合。此外治無益。姑停課誦之。擾動神氣。閑坐嬉悅。以調之。納食肌肉。可得久恃。

人參 當歸 沙苑蒺藜 大慶草 枸杞 生仲

此

知饑不欲食。則腹脹。小腹痠痛。乃肝胃兩經病耳。

炒黑杞子 小茴香 廣皮 厚朴 炒當歸

沙苑蒺藜 益智仁 茯苓 蟬形已小痛移左右由陽明虛厥逆未侮重按痛緩。

肝 少腹急痛胸中有形因怒勞動肝致氣血凝結久恙不宜
峻攻緩圍有益 川棟子 桃仁 炒查 橘核 青皮

小茴香 五靈脂 青木香 當歸 堅硬上下氣不相通此濁陰聚阿觀溫潤泄穢通腸。

故腸中濁氣頻出但結於足太陰經 炒黑川椒 茯苓 生淡乾薑 蔥白 炮黑附子 胡盧巴

開病原是肝腎虛結為癩疝但子和七疝主方半屬辛香

掃葉莊方案

泄既有盜汗遺精失血咳嗽等症辛香非宜變溫柔通補

法 蒺藜 補骨脂 紫胡桃 魚膠 青鹽 茯苓 栝子霜 雄羊肉腎煮丸

濕熱入肝而為癩疝 桂枝木 川草薺 晚蚕沙 茯苓皮 川黃柏 海金沙 青黛

鹹沉邊疝衝癢聚收引拘急束痛甚是陽微陰濁痺阻議

以劉藥 三建湯 脈沉伏逆痛不止厥陰挾衝氣為患

製附子 淡菜黃 炙甘草 蔥白 炒白芍 久疝堅硬上攻周身冰冷顯然圍一濁陰上干冷汗如油須防陽脫子和辛香破氣難用與驅濁救陽一法

炮附子 炒川烏 生乾薑 吳茱萸 雄猪胆

青木香 炒黑柏茴香 右脇下痛入少腹陰囊腫大便利覺熱小波不爽動怒肝

膽氣鬱腸胃穀氣聚濕濕阻氣脹欲結疝瘕故痛 川棟子 小茴香 茯苓皮 青皮 橘核 青木香

大腹皮 炒延胡索 又照原方去延胡加 厚朴 山梔 茵陳 又用更衣丸

七疝肝病為多子和辛香流氣丹溪分利濕熱皆治其有餘偏勝今七旬老年下焦陽已衰微濁陰聚而為脹據說安卧自息已非實症煖腎真少佐泄肝是通陽驅濁方法

掃葉莊方案

人參 熟附子 柏茴香 茯苓 金鈴子 川楝 色悴脈花下焦疝瘕是衝任病乃肝腎精血不足致損耳

精羊肉熬膏 茯苓 淡苳蓉 真沙苑蒺藜子 炒黑枸杞子 當歸 小茴香 膠丸服

濁陰聚則為脹疝墜則大便秘便通則腹形脹大腎肝之病治宜宣通陽氣

安息香 炮生川烏頭 炮黑川楝 淡乾薑 柏茴香 炮生黑川附 蒸餅漿搗和為丸

少腹疝瘕冲年不曉因由起于夏月新加腹脹夏季脾胃 司令水穀未運或當佛鬱致肝木鬱勃熱蒸氣結犯尅中

土使濕熱凝聚為脹雖非情慾致病已入內傷延綿一載

未痊。非速愈之病矣。

川棟子 炒黑小茴香 青木香 蘆薈 炒橘核

黑山梔 炒黑山查肉 青皮

肝疝症也。淡吳茱萸 川棟子 橘核 乾薑 肉桂

炒白芍 青木香 荔枝核 炒烏梅 後加七疝丸

地氣混矣。擬以前方去白芍青木香加入 牛膝 澤瀉

葫蘆巴 小茴香 橘核 荔枝核

脈微瀯左弦。跗躄麻冷。走動無力。少腹微滿。晝九日腫。察神呆色衰。畏風怕寒。陽虛疝瘕難愈之疾。

人參 炒黑枸杞子 茯苓 茴香 熟附子

當歸 川椒

婦科方案 經產雜治

此 婦科方案 經產雜治

經產雜治

陽維失護。自覺脊脊烘熱。汗則大泄。出不止。汗過則週身

冰冷畏寒。且不成寐。寐則氣衝心跳。汗亦自止。以陰不內

守。陽不外護。主治。桂枝木 鹿茸 當歸身 白芍

人參 栢子仁 左牡蠣 茯神

經云。陽維為病。苦寒熱。陰維為病。苦心痛。蓋維脈乃一身

之網維。陽司外護。陰主內營。若家庭夫婦。管轄內外事宜

也。緣二氣。日衰營護不週。凡勞倦寒暄。皆乘其空隙為害。

為害為熱。陰陽矛盾所致。是八脈奇經之病。溫補不能入

脈。不效亦無害。若以濕淫客氣搜逐。其害大矣。矣桂枝木

人參 生鹿茸 鹿角霜 栢子仁 當歸身 茯神

多言耗氣。勞倦傷形。吸氣不利。痛起足跟。繼貫肋助奇經。雖非一肝腎所該。為多不入奇經之方不效也。

當歸 枸杞子 紫石英 生糯米 沙苑蒺藜

衝衛為病。氣逆而裏急。青皮 金鈴肉 淡吳茱萸

橘核 元胡 烏梅 沉香 代赭石

帶脈橫圍于脊。維脈挾內外踝而行。勞傷受寒。脈絡欹斜。

不司擁護。而為癱疝。麻木不仁。非小病也。久而痿痺。癢癢

海流。當歸身 生於潛木 淡菴蓉 肉桂 鹿角霜

後改桂薑木苓湯

產後下焦陰虧。焦煩思慮。陽升內風皆動。上盛下衰。久延

為厥。石決明 小生地 茯神 龜版 阿膠 白芍

婦科方案 經產雜治

麻木便右。淋漓帶下。兩足冷逆。脊髀如墜。衝任不固。肝腎

胃關皆歌。溫納其下。桑螵蛸 淡菴蓉 生杜仲

鹿角霜 巴戟天 炒杞子 沙苑蒺藜 茯苓

鮑魚 煎汁泛為丸 每早服三錢。紅棗湯送下。

懷孕子淋。多熱在下焦。產即當愈。仍心熱。腰痠骨更。是

虧生熱。主手養肝陰矣。穠豆皮 生地 續斷 茯神

湖蓮肉 阿膠 天門冬

產後十年。晨泄形寒。汗出。是下元陰傷及陽。奇脈不固。遵

古人用 局方四神丸

少腹微膨。經來後期多痛。秋冬膝跗冰冷。衝氣致左脇攻

觸。腕中脹悶。痛不能食。此屬氣血鬱滯。脈不和。雖無性

命之危。然恐有不得孕育之累矣。

炒延胡 炒小茴香 川棟子肉 穿山甲 當歸尾
生牡蠣 炒煙盡五靈脂 生蒲黃 接服後藥

前方專主溫通氣血。痛果得緩。痰氣亦不上攻。觸今復形
寒食不化。與養營方。煎煖。任為孕育之基。

人參 紫石英 艾粉 四製香附 淡苳蓉 肉桂
歸身 巴戟天 各碾細末。以白花益母草膏為丸。

懷妊五月。晝夜身熱。據述病起惡阻。嘔吐。止熱未思。五
月足太陰。司胎木火犯中。營衛自怯。必致胎不實。長滋養
血液。佐以清肝。膽氣中之熱。小生地 白芍 麥冬

阿膠 條芩 胡黃連

掃葉莊方案 經產淋帶科雜治 五十二

天癸當絕。今屢次崩漏。乃衝任脈衰。久漏成帶。延綿之病。
且固其下。

烏鰂骨 小生地 鮑魚 茜草 阿膠 續斷

胎前瘡熱傷陰。產後下焦之陰更損。衝任脈不下。固氣冲
欬逆。嘔。午後潮熱。子後汗泄。皆陰虛損及陽位。夏令大熱

發泄。絡空。脇痛失血。雖頗納穀。大便溏泄。滑。勞下損。漸
干。中上。故延綿不愈之病。醫藥無效。炒熟地 芡實

湖蓮 五味子 茯神 烏鰂魚骨

先病懷孕。到七八月。胎吸母氣。諸臟腑絡絡先衰。自救不
暇。至寢食廢。嘔脹不納。日加衰憊。臨產可危。無治病成法。

人參 石蓮肉 川黃連 草決明

少年懷妊。惡阻。誤與殞胎。十餘年後。不孕育。每經未周。身
經絡暨痛。少腹痠觸。寒熱昏至。乃八脈交損。八脈之治。非

轉展不效。紫河車 歸身 阿膠 紫石英 小茴香

斬艾 茯苓 鹿角霜 枯黃芩 益母草膏丸
質偏於熱。陰液易虧。女人肝為先天。月事雖准。而裏少乏

儲蓄。無以交會衝脈。此從不孕育之因由也。凡生氣陰血。
皆根於陽。陽浮為熱。陰弱不主戀陽。脊背常痛。當從督任

二脈治。鹿胎 當歸 桂圓肉 桑螵蛸 元武版

茯苓 枸杞子 細子苓
泄瀉減食。經水不來。而寒熱欬嗽。日無間斷。據說。嗔怒病
起。其象已是勞性。鬱勞經閉。最不易治。

掃葉莊方案 經產淋帶科雜治 五十四

人參 蒸冬木 廣皮 茯苓 炙甘草 白芍
形冷驚怕。旬日經淋漏注。心怔悸若懸。自七八年產後

致病。夫肝主驚。腎主恐。產病先虛在下。奇經不為固束。急
急溫補固攝。仍佐通導。其力可到八脈。紫石英 茯苓

人參 烏鰂骨 鹿茸 炒枸杞子 沙苑蒺藜
悒鬱內損。經阻。筋骨皆痛。損傷不復。即起勞怯。溫養流通。

望其鬱痺氣血和融。若但清熱見血。理嗽百無一治。

當歸 生杜仲 桑寄生 炒枸杞子 生鹿角

遇勞氣洩。胎墜。胎去下焦先空。足冷腰脊皆痛。陰陽兩損。
但以溫養補之。懷孕即止。歸身 肉桂 白芍 茯神

人參 沙苑蒺藜 枸杞子 雄羊內腎

產後失調。尊勞下損。必眩奇經。心腹痛寒熱。脊痠腰痠。形肌消燥。殆盡若縷。緩而治。即是存極。凡痛宜通補。而宜通能入奇經。患者年廿四歲。沙苑蒺藜 炒黑小茴香

人參 鹿茸 當歸身 炒黑杞子 又方人參三錢 熟地五錢 紫石英一兩 肉桂心一分 後加三錢 自產後五日。惡露漸少。遂卒然右脇下痛。引少腹。手不可按。身體不能轉側。此乃卧着于右太早。致敗血橫行入絡。痛甚神迷昏亂。皆瘀腐濁氣。上胃肥絡矣。此屬產後重病。夫痛則不通。宜通脈絡之壅。黑豆皮 西琥珀末 生蒲黃 乳香 蘇木 益母草 五靈脂 黑珀失笑合方。惡露已下。此少而痛勢不減。此乃重病。藥

掃葉莊方案

經產淋帶女科雜治

五十五

輕。痰濁錮結。必有脹滿浮腫喘急之變。議用回生丹。熱童便化服。回生丹一丸。蓄血有如狂喜忘症。象今絡中瘀聚。還注于衝。所以右肘痛。緩而少腹痛。脹大便粘膩。白滑。亦瘀濁之化。但必前通。濁濁不致凶危。即瘕痞癥。痼可緩商調治矣。

大黑豆皮 杜牛膝 炒烟盡五靈脂 熱童便 西琥珀末 炒查肉 老韭白 絡通痛減。病已挽回。但少腹餘氣。痼留衝脈。不必以宿毒為重。只宜通瘀下。斯為得矣。用交加虎杖合方。加炒靈脂 鮮生地 薑同搗汁 大黑豆皮 琥珀末 川棟子 炒小茴香 炒黑南香 炒黑脂 白花益母膏丸

另起一

按服 當歸 沙苑蒺藜 桂圓肉 炒小茴香 炒杞子 炒黑仁丸方 生薑甲八錢 月酒 當歸三 炒查肉二 炒黑小茴香 酒炒香附 炒桃仁 三膏丸 每服三錢 五旬因怒暴崩。繼而氣冲。脘悶嘔吐。此陰既走。洩陽升。鬱胃最多。暴厥。烏雞一隻 阿膠 湖蓮 生地 茯神 天門冬 女貞子 川石斛 麥冬 甜北參 膠丸服 經遲既通。兩日驟止。新婚未及半月。溲溺痛。腹中有形。恐延淋帶。當通陽宣濁。老韭白 兩頭尖 炒黑小茴香 杜牛膝 當歸鬚 益母草 自雍正八年八月間。生產血暈成痲。當七八朝後。減食。斷乳。發渴。惡心。便難。至今經水不通。飲食減少。每交節候。常

掃葉莊方案

經產淋帶女科雜治

五十六

覺倦憊。或稍勞碌。及偶着寒。即手面浮腫。喉痛面赤。腰痠。服溫補之劑。稍得效驗。兼有帶症。容易惱怒。今年飲食畧好。小腹膨痛。便燥有血。或便澀不爽。 紫石英 烏劍骨 人參 當歸身 卷柏 桑寄生 川石斛 淡苳蓉 天冬 栢子霜 桂心 禹餘糧 枯黃芩 遠志肉 川楝 蜜丸服 三月小產。宜涼。固下。雄烏雞一隻 生地黃 阿膠 天冬 知母 白芍 子芩 建蓮 桑寄生 悲泣過甚。失音。經言憂則傷肺。及請病原。向來左脇有形。形春令陡發。衝氣神迷。氣急若厥。更問經來先期三日。月如此。夫左脇屬肝。肝為風臟。內寄相火。凡人身之氣。左

升在肝。右降在肺。升太過必降不及。為木火反成。乘金。醫經逆乘。謂賊邪。最難向安。情志之患。皆曰內傷。怡悅調養。可望漸和。非朝夕改之。藥圖僥倖者耳。

甜北沙參 麥冬肉 清阿膠 鮮生地 鼈甲列元

生左牡蠣 丹參肉 鮮生地 大冬肉 茯神
胎前嗽。產後更加失血。脈來左數。咳甚嘔吐。是下虛氣逆。衝任內損。醫屢投肺藥。必致延為蓐勞。新乳調理為上。

都氣丸四錢 鹽湯送下 十服
火升心悸耳鳴。少寐。月經遲。患者時年廿八歲。

生地 阿膠 茯神 女貞子 栝子仁 天門冬
小產後去血過多。陰絡空隙。氣乘為脹。兩年食減。腹現青

掃葉莊方案 經產淋帶女科雜治

筋已屬鋼疾。腎氣丸
奇脈空虛。腹中痠痛。溫補佐以宣通。其力可以入八脈。

鹿茸 白製鹿角霜 生紫石英 禹餘糧 大茴香
歸身 炒黑枸杞子 生杜仲粉 同州蒺藜 補骨脂
用滾水入鹽少許。研開。蒸餅為丸。丸須細堅。空心開。

因勞胎損一月。
人參 當歸身 茯神 白芍 棗仁 桂心

膏方
人參 當歸身 沙苑蒺藜 鹿角霜 桂圓肉
茯苓 淡茯苓 枸杞子 熬膏服
安胎。 人參 生杜仲 蘇梗 茯苓 砂仁末

川續斷 廣皮 連蓮肉

丸方 烏骨雞 鹿膠 女貞子 生地黃 茯苓
烏雞骨 早蓮州 枸杞子 湖蓮肉 膠丸服
姪交三月。

蘇梗 炒白芍 茯苓 砂仁末 生穀芽 廣皮
丸方 生地黃 天門冬 製首烏 川石斛 桑葉

阿膠 胡麻 女貞子 茯神 蜜丸服
產後潮。

山查 黑豆皮 益母州 炒砂糖
又方 細生地 澤蘭 黑豆皮 丹參 茯苓 炒山查

又方 栝子仁 茯神 細生地 麻仁 丹參
掃葉莊方案 經產淋帶女科雜治

丸方 人參 桑螵蛸 川續斷 毛鹿角 炒小茴香

土炒歸身 茯神 砂仁 醋炒元胡 青皮益母膏
熱勞丸方

生地 胡黃連 川斷 白芍 阿膠 丹參 茯神
湖蓮肉 女貞子 烏骨雞膏為丸

腰痛。附方

人參 杜仲 熟地 歸身 鹿角膠 胡桃 杞子
三旬有崩漏。形體日加充壯。此皆發洩外。盛內虛如背部。

周身肌腠之中。熱烘。肢體皆為動搖。陰液內乏。陽風旋鼓。
病能篇云。諸風掉眩。皆屬肝木。風木不寧。陽明脈空。暴中

暴厥。皆由此而起。 細生地 栝子仁 麥冬 阿膠

衰

生白芍 茯神 冬桑葉 此沙參
此氣血不和。脈絡不通為脹。用大鍼砂丸脹減。其經水仍
阻左脇宿癥久聚。此病根未去。炒熟桃仁 生牡蠣

炒黑小茴香 炒延胡索 粗桂木 生香附
經邊心腹痛泄瀉十五歲 四製香附 川芎 延胡索
當歸身 南棗肉 煨木香 紅棗肉丸

魯脇刺痛。虛里尤甚。頭暈脚腫。形寒臨經諸病皆集。此病
久八脈損傷。調經和養氣血。不得見病治病。

川芎 沙苑蒺藜 桂心 鹿角霜 小茴香
茯苓 炒枸杞子 歸身 益母草膏為丸

寡居獨陰無陽。下焦常冷。瘕泄帶下。腰解入夜痛甚。自覺

婦科方案 產後淋帶 婦科雜治 五十九

腸腑脹而胸次似高突。腹形未見膨滿。凡諸腑皆陽。陽
微必陰濁未聚。初夏曾定溫通奇經法原效。夏秋時邪暑
濕。客病胎延。痛復如昔。立冬後十日診議。

人參 川楝 小茴香 鹿茸 補骨脂 茯苓
歸身 熟附子 胡蘆巴 蒸餅煮糊為丸

帶下眩暈。心嘈熱。皆惡寒。經未漸遲。屬陰虛奇經損傷。
細生地 茯神 續斷 牡蠣 阿膠 生仲

栢子仁 湖蓮肉
思慮憂愁。謂之鬱。氣血暗傷。肌肉日瘦。不食不寐。心中時
覺昏憤。是皆內因之症。釀痰為癩。枯槁成損。必得情懷開
曠。斯鬱結可開。目下用藥。因夏秋失血以來。倏冷忽熱。脫

悶胸痛。自天柱挾脊至腰。痠爽如折。不但營衛偏歇。八脈
皆失其職。司先議宣暢。脈絡勿以滋滯補瀆。

鹿角霜 當歸 炒枸杞子 茯苓 沙苑蒺藜
川桂枝 小茴香 炒香附

陽浮汗泄。如飢。忽脹眩暈。麻痺。產前心痛。謂之子懸。病起
於產後。由肝腎內虛。真氣不自收納。內風掀旋不已。病傳
陽明。脈絡筋骨。不司步履。乃沉痾之疾。

河間地黃飲料中。去其附桂二味。餘藥煎取自然膏。
連次小產。初傷衝任。久而督帶。蹻維皆傷。八脈不勻約束。
陰不下固。陽乃上浮。如經後期淋帶。晨泄。上熱下冷。浮腫
脊痠。腰垂耳鳴。不寐等症。久損不復。必以從陰引陽。通固

婦科方案 產後淋帶 婦科雜治 六十

兼用。若非積累工夫。未得旦晚得效。

人參 炒焦當歸 補骨脂 茯苓 青鹽 紫石英
鹿茸 炒黑小茴香 生蘆艾 蒸餅丸服三四錢

小產未復。繼為血崩。二次腹中刺痛。帶下不已。當固衝任。
使絡血生聚。可望經調。鹿角霜 當歸身 紫石英

炒黑小茴香 沙苑蒺藜 枸杞子 炒黑蘆艾
熟升衝咽。咳嗽不止。兩足冷如冰。而至骨。脈得細促。先天
氣弱。年不肯克長。倘經水忽閉。勞損難治。

滋腎丸 三錢 六服 早上淡鹽湯送下。
久病形神日消。象兼大。是謂無胃氣矣。上年夏季。曾
診便瀉腹痛。食減。舒肝健脾。疎補。春進安胃丸。總無效驗。

此生氣不至。女子當天癸將通之年。經脈氣機拂逆。久鬱熱聚。漸為枯涸之象。議用汪石山鬱勞治法。相蓮肉。川芎。熟地。青蒿。查肉。歸身。香附。白芍。慮勞下損。不獨病屬八脈。則延及三焦。晨泄。嘔食。心熱。下冷。吸短。寒熱。用藥。豈有止咳清熱之理。扶得胃氣安。穀月事仍未。方得回春。

異功加南棗

怒勞血吐。成升。月餘。再吐。自述。少腹常痛。反必身汗出。必經水得通。可免乾血勞怯。醋炙鼈甲。炒山查肉。胡黃連。炒桃仁。炒元胡索。荒蔚子。經來甚少。脈左堅搏。仍然。咳。噎。嗽。涎沫。夜熱。汗出。肝血。向

掃葉莊方安

枯已屬勞損。宜進甘緩。以養肝胃。令其納穀。庶可望愈。若見熱投涼。希圖治嗽。胃傷速德矣。

生地。沙苑蒺藜。女貞子。阿膠。石斛。黑梔。

停經九月。少腹重墜而痛。及診。少陰脈瀯小。並非姪象。且衝任虛餒。怕其暴崩。八珍湯中加入砂仁。

經先期三日。熱多寒少。脈右弦大。血分偏熱。治厥陰瘡。邪室在血。生龍甲。青蒿梗。冬桑葉。炒桃仁。

川貝母。炒牡丹皮。

暴崩去血過多。絡中空虛。浮陽挾內風。以心悸筋脈痠爽。奇經病也。熟地黃。女貞子。白芍藥。清阿膠。

早蓮州。湘蓮肉。

冬季腹大。大便不爽。以通陽泄濁。初投相合。久則不應。寡居獨陰。無陽鬱。慮至少腹結瘕。其病根在肝。五旬外正氣日衰。邪不可峻攻矣。

六味湯中加入。茴香。川棟子。

陰傷于下。熱氣上冒。脈左堅數。慮其失血。不可強迫通經。

丹參。柏子仁。茯苓。澤蘭。牡丹皮。生麥芽。

附錄調經種子良方

此係原任提督陳大人所傳。屢試效驗如神。論曰。夫調經之法。在乎肝脾。脾統血。肝藏血。如鬱怒傷肝。思慮傷脾。使脾虛不能統束。肝虛不能藏納。多有經氣不調之患。氣一縱。則血不隨。血不隨。則疾如。諸起。肢體困倦。面目瘰。

掃葉莊附錄

黃。日晡寒熱。晝靜夜熱。心胸脹痞。腰背痠軟。食無味。神不安。赤白帶下。久無孕育。或致半產。但是經氣不調所致。此藥宜多服。必生雙胎。屢驗。

香附一觔。去皮打淨。此藥性溫無毒。一分酒浸。

一分童便。中之一陰。一分小茴香。艾葉。各二兩。

一分醋。同浸。去苗。一分同浸。去苗。

一分醋。同浸。去苗。一分同浸。去苗。

一分醋。同浸。去苗。一分同浸。去苗。

一分醋。同浸。去苗。一分同浸。去苗。

右製法。春秋浸三日。夏浸一日。冬浸五日。製法完。淨。同入砂鍋。加蘆艾四兩。無灰酒。隨攪。色黑。為度。使氣完。固。

平燥性。和調。經順。氣。女人之聖藥也。血氣之疾。俱不可缺。

珍之寶之。再用後藥開左。

- 當歸身 四兩 酒洗
- 撫芎 二兩 剉碎平肝
- 人參 二兩 剉碎平肝
- 天門冬 二兩 剉碎平肝
- 酸棗仁 二兩 剉碎平肝
- 白茯苓 一兩 剉碎平肝
- 麥冬 三兩 剉碎平肝
- 白朮 二兩 剉碎平肝
- 元胡索 一兩 剉碎平肝
- 條芩 二兩 剉碎平肝
- 白芍 二兩 酒洗
- 生地 四兩 酒洗
- 熟地 四兩 酒洗
- 吳甘 九兩 酒洗
- 黃肉 三兩 酒洗
- 益母 三兩 酒洗
- 橘紅 三兩 酒洗
- 阿膠 二兩 酒洗
- 砂仁 一兩 酒洗

見蘭樓拾遺錄

康方伯傳海上仙方

- 海參 一斤 酒洗去砂
- 猪脊髓 十條 去血
- 龜版膠 四兩 酒洗
- 杜仲 八兩 酒洗
- 鹿角膠 四兩 酒洗
- 免絲餅 八兩 酒洗
- 紫殼核桃肉 一百枚 生打爛
- 右劑各碾細末。先將羊腰猪脊髓核桃肉各搗如泥。然後和龜鹿海參等膠。拌勻入石臼中。將諸藥末拌勻。杵
- 羊腰子 十枚 批去血
- 甘州枸杞子 四兩 炒脆
- 破故紙 四兩 酒洗
- 淮牛膝 四兩 酒洗
- 當歸身 四兩 酒洗
- 巴戟肉 四兩 酒洗

至八九十下。方可為丸。丸梧子大。每服三錢。初服于七

日內。每日晨晝昏三次。用淡鹽湯開水。黃酒按次送下。服至七日後。只于清早淡鹽湯送下。或用開水送下。服餅亦可。

此方丸劑。報於嗣育者。服之。頗有應效也。甲戌清和之初因。

菊溪先生以掃葉莊方案賜鈔。其卷後有一紙。老人附錄軍門陳公所傳調經種子良方一頁。竊思陰經既調。陽不健運。則亦不能成其化育之功。適於殘編。檢得此方。附之於末。質諸高明。不識云可否。

嘉慶甲戌年鑄

尤在涇先生原本

醫學讀書記

醫案附後

松風閣藏板

文中子云。醫者意也。藥者論也。謂先通其意。而後用藥物。以疏淪之也。善哉。言乎。醫理在是矣。而意之。通實難。泥一成之見。而欲強人之病。以就吾說。其患在固執。好作聰明。而不察。究乎古人之成書。是猶兵家之廢敵國。法吏之廢律令也。其患在不學。由前之說。在不能用意。由後之說。在誤于用意。夫然。以不學之人。與不通之識。而又熾以伎。同列競名利之心。以此用藥。其不致抱薪而救火。持水

序

而後石者幾何哉語云學書守費
學醫人費蓋為此也尤君立注讀
書好古士也而肆其力於醫於軒
岐以下諸書靡昕夕寒暑穿穴
幾遍而以已意條貫之其間凡
有所得筆之於書日月既多

序

二

卷帙昭定辨五行之生剋察四
氣之溫嚴審人事之陰陽虛
實與夫藥性之君臣佐使凡成
書之治誤者釐而正之古人紛
紜聚訟者折而衷之夫惟多
讀古人之書斯能善用古人之

書不誤於用意亦不泥於用意於
去沙氏之旨庶幾得之可謂通
其意者矣抑吾觀太史公之傳
扁鵲也云長桑君以禁方盡與之
忽然不見後遂張生死人其說近
於鬼物其人不可再得而只傳

序

三

溥于無也初得禁方於公乘陽
慶傳黃帝扁鵲脈書五色於病
是多讀書而通於意也扁鵲亦
不得而見之矣得見如溥于意者
斯可笑尤君之學不知於古人何
如然多讀書而通以意是聞古

人之風而興起者由此書以治病
尚不貽譏於人貴也夫

乾隆四年己未春三月松陵徐

大椿靈胎叙

序

四

醫學讀書記目錄

卷上

陽氣陰氣

四氣

氣相得則和不相得則病

天符歲會

六元正紀

靈素不同

醫學讀書記目錄

素問傳寫之誤

甲乙之誤

王注之誤

心欲軟腎欲堅

三陽在頭三陰在手

脾氣外絕

勞風

結陰結陽

胃脘癰

腸覃石瘕

四肢不舉

四維相代

水液渾濁

折髀

煎厥

厥

醫學讀書記 目錄

二

肺消

氣泄

瘡脈實虛

氣痺精少皆能生寒

刺久病

卷中

風寒營衛之辨

寒邪六經俱受不必定自太陽

陽結陰結

縱橫

戰慄

熱入血室

圓血

吐利煩躁四逆

亡陽無陽

絕陽

醫學讀書記 目錄

三

厥

厥逆

三陰下症

桂枝湯

麻黃湯

大小青龍湯

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

五苓猪苓

瀉心諸湯

白通四逆

麻杏甘石湯

飲證類傷寒

簡誤

傷寒雜論

卷下

制方用藥必本升降浮沉之理

醫學讀書記

目錄

四

五行問答

通一子雜論辨

喻氏春溫論辨

軻氏傷寒論翼辨

宣明人參白朮散方論

柴胡梅連散羅氏秦艽鱉甲散方論

補中益氣湯六味地黃湯方合論

歸脾湯方論

鳳髓丹方論

小投杯湯方論

清暑益氣湯清燥湯合論

方法餘論

續記

寸口分珍藏腑定位

古方權量

火齊湯

醫學讀書記

目錄

五

燒痕

葱豉

枳實梔子豉湯

鹹寒

酸苦涌泄

五疰鬼氣

瘡

陰陽交

崩中下血

耳聾治肺鼻塞治心

噎膈反胃之辨

瀉痢不同

溫病風溫溫疫濕溫溫毒溫瘧之異

目赤種痛

口糜

冷勞

醫學讀書記

目錄

六

熱風

食鹹頭汗出

雜識 附靜香樓醫案三十一條

醫學讀書記卷上

古吳九怡在涇著

後學

程梅蘭

校刊

陽氣陰氣

陽氣者精則養神柔則養筋蓋陽之精如日光明洞達故養神陽之柔如春景和暢故養筋

日月之行不違其道樞機之運不離其位陽氣之動不失其所故曰欲如運樞起居如驚神氣乃浮又曰

醫學讀書記

卷上

一

陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰

陽氣天氣也陰氣地氣也天氣不治則地氣上干矣

故曰陽氣者閉塞地氣者冒明雲霧出於地而雨露

降於天地氣不治則天氣不化矣故曰雲霧不精則

上應白露不下蓋天地陰陽本出一氣陽失則陰不

能獨成陰失則陽不能獨化自然之道也人與天地

參故肺氣象天病則多及二陰大小腸象地病則多

及上竅仲景以大黃甘草湯治食已即吐丹溪用吐

法治小便不通豈非有見於此歟

四氣

春氣少陽初升之氣陽方升而被抑生氣不達則藏氣內敗猶木鬱則腐也故曰逆春氣則少陽不生肝氣內變

夏為盛長之氣心為太陽之藏夏氣不長則心氣不充不充則內空若洞也故曰逆夏氣則太陽不長心氣內洞

醫學讀書記

卷二

二

秋氣應收而反泄秋真氣不斂燥反乘之則清肅之化轉為鬱燥之化也故曰逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿焦滿猶煩滿也

冬氣應藏而不藏則少陰之經氣不歸而腎中之藏氣獨沉左氏所謂亂氣張脈外強中乾是也故曰逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沉

氣相得則和不相得則病

主氣應節候而分布歲以為常者也客氣隨司天而

遞遷六者而復始者也而主客加臨有相得不相得

之異如子午年初之氣主厥陰風木客太陽寒水二之氣主少陰君火客厥陰風木以水加木以木加火

母來生子為相得也三之氣主少陽相火客少陰君火四之氣主太陰濕土客太陰濕土以火遇火以土

遇土主客同氣為相得也五之氣主陽明燥金客少陽相火以火加金金畏火制為不相得也六之氣主

太陽寒水客陽明燥金以金加水金能生水亦相得也相得則和不相得則病矣其有相得而亦病者如

水臨金金臨土土臨火之屬以子臨母以下臨土所謂不當位也故亦病也然須合歲運強弱而論之如

甲子年歲土太過三之氣為少陰君火以火加上則

土益旺而無制是雖相得而不相和也庚子年歲金

太過五之氣少陽相火以火加金金有制而反和是

雖不相得而不為病也又如水臨金火臨木之屬設

遇金木不及之運則金得水而清木得火而明雖不

當位亦不病也、水臨土、木臨火之屬、設遇木火太過之運、則土得火而堅、火得木而燔、雖當位亦病也、更有進者、太過之土木不能制者、金反得而泄之、不及之木水不能滋者、火反得而養之、此天地生成之妙也、欲明運氣之理者、其可以淺求之耶、

天符歲會

應天為天符、承歲為歲直、三合為治、天謂司天、歲謂歲支、日應日承、謂歲運也、司天行天之氣、歲支行地

醫學讀書記

卷上

四

之氣、歲運行氣交之化三者、其氣不必皆同、而亦有時而同者、如戊寅戊申歲、戊為火運、寅申又為相火、是以歲運而同、司天之氣、謂之天符、符者同也、同於天也、如甲辰甲戌歲、甲為土運、辰戌又為土、是以歲運而同、歲支之氣、謂之歲直、直者值也、值其歲也、又曰歲會、會者合也、合於歲也、若己丑己未歲、歲運之土、既同天氣、又同歲支、謂之太乙、天符即經所謂三氣并合為治也、夫氣同者其化同、其氣異者其化異、

化同則有相助為虐之害、化異則有互相尅賊之憂、然以不及之運、而得司天歲支之助、則不及之氣、轉為平氣、而氣反治、若歲運太過、其氣已盛、而復得司天歲支之合、三氣并治、其亢而害物、有不可言喻者矣、故曰、中執法者、其病速而危、中行令者、其病徐而持、中貴人者、其病暴而死、

六元正氣

素問六元正紀大論、分列六十年運氣病治之紀統、

醫學讀書記

卷上

五

論元氣司天在泉之政、可謂詳且盡矣、然而驗之於事、合之於時、往往不能相符且也、一年之間、九州之內、有東南旱乾、而西北淫雨者、有西北焦槁、而東南大水者、則九州分野、上應九宮、為地氣之不齊也、且木元豐四年、歲在辛酉、涸流之紀、而河決大水、則化勝復之異、胡源所謂歲水不及、侮而乘之者、土也、土不務德、故以濕勝寒、時則有泉湧河衍、涸流生魚、其變為驟、注為霖、潰名為少羽、而寔與太宮之歲

同者是也、是故五運六氣之理、不可不知也、亦不易知也、而況古今度數之有差等、天人感召之有休咎、執而泥之、刻舟而求劍者也、廢而棄之、亡筮而求魚者也、非沈潛之士、而具圓机之智者、烏足以語此、

靈素不同

六節藏象論云、心為陽中之太陽、肺為陽中之太陰、腎為陰中之少陰、肝為陽中之少陽、而靈樞九針十二原云、陽中之少陰肺也、陽中之太陽心也、陰中之

醫學讀書記

卷上

六

少陽肝也、陰中之太陰腎也、按素以肝為陽者言其時、靈以肝為陰者言其藏也、素以肺為太陰、腎為少陰者、舉其經之名、靈以肺為少陰、腎為太陰者、以肺為陰藏而居陽位、腎為陰藏而居陰位也、二經之不同如此、

經脈十二絡脈十五、凡二十七氣、以上下所出為井、所溜為榮、所注為腧、所過為原、所行為經、所入為合、故本輪篇云、膀胱出於至陰為井、溜於通谷為榮、注

於束骨為腧、過於京骨為原、行於崑崙為經、入於委中為合、胆出於竅陰為井、溜於俠谿為榮、注於臨泣為腧、過於丘墟為原、行於陽輔為經、入於陽之陵泉為合、胃出於厲兌為井、溜於內庭為榮、注於陷谷為腧、過於衝陽為原、行於解谿為經、入於下陵為合、而根結篇云、足太陽根起於至陰、溜於京骨、注於崑崙、入於天柱、飛揚、足少陽根起於竅陰、溜於丘墟、注於陽輔、入於天容、足陽明根起於厲兌、溜於衝陽、注於

醫學讀書記

卷上

七

下陵、入於人迎、豐隆、是以井榮腧原經合之處、即一經所言、而亦有不同如此、

素問傳寫之誤

蒼天之氣清淨則志意治、順之則陽氣固、雖有賊邪弗能害也、故聖人傳精神、服天氣、而通神明、按傳當作專、言精神專一、則清淨弗擾、猶蒼天之氣也、若于所謂專氣致柔、太史公所謂精神專一、動合無形、瞻足萬物、班氏所謂專精神以輔天年者、是也、若作傳

與義難通、王注精神可傳、惟聖人得道者、乃能爾、予未知精神如何而傳也、

因於寒、因於暑、二節丹溪重定章句、為是

脈乍疎乍數者死、謂氣亂而失常也、又少陽脈至、乍

數乍疎、乍短乍長、夫少陽氣即未齊、其脈大小不同、

已耳、何至失其常度耳、按扁鵲陰陽法云、少陽之至、

乍小乍大、乍長乍短、夫豈好異而云然哉、

春脈太過、則令人善忘、忽忽眩冒而巔疾、王氏謂忘

當作怒、是

醫學讀書記

卷上

八

解脈令人腰痛、痛而引肩、目眩、眩然、時遺洩、又云解

脈令人腰痛、如引帶、當如折腰狀、善怒、詳本篇、備舉

諸經腰痛、乃獨遺帶脈、而重出解脈、按帶脈起於少

腹之側、季脇之下、環身一周、如束帶、然則此所謂腰

痛如引帶、常如折腰狀者、自是帶脈為病、云解脈者、

傳寫之誤也、

血溫身熱者死、按溫當作溢、夫血寒則凝而不流、熱

則沸而不寧、溫則血之常也、身雖熱、何遽至死、惟血

既流溢、復見身熱、則陽過亢而陰受逼、有不盡不已之勢、故死、今人失血之後、轉增身熱、咳嗽者、往往致死、槩可見矣、

立而暑解、治其骸關、暑解當是骨解、言骨散墮如解也、骨與暑相似、傳寫之誤也、

診法常以平旦、陰氣未動、陽氣未散、飲食未進、經脈

未盛、絡脈調勻、氣血未亂、故乃可診、有過之脈、按營

醫學讀書記

卷上

九

衛生會篇云、平旦陰盡而陽受氣矣、夫陰方盡、何云

未動、陽氣方受、何云未散、疑是陽氣未動、陰氣未散、

動謂盛之著、散謂衰之極也、

甲乙之誤

素問曰、陰氣盛於上、則下虛、下虛則腹脹滿、又曰、陽

氣盛於上、則下氣重、上而邪氣逆、逆則陽氣亂、陽氣

亂、則不知人、此二段乃岐伯分答黃帝問厥、或令人

腹滿、或令人昏、不知人、二語之辭、所謂陰氣者、下氣

也下氣而盛於上則下反無氣矣無氣則不化故腹脹滿也所謂下氣者即陰氣也陽氣上盛則陰氣上奔陰從陽之義也邪氣亦即陰氣以其失正而上奔即為邪氣邪氣既逆陽氣乃亂氣治則明亂則昏故不知人也甲乙經削陽氣盛於上五字而增腹滿二字於下虛則腹脹滿之下則下氣重上之上林氏云當從甲乙謂未有陰氣盛於上而又陽氣盛於上者二公並未體認分答語辭故其言如此殆所謂習而

醫學讀書記

卷上

十

弗察者耶

心脈搏堅而長當病舌卷不能言其軟而散者當消環自己按搏堅而長者太過之脈心象火而脈紫舌心火有餘故病舌卷不能言也軟而散者不足之脈心者生之本神之處心不足則精神為消如卑牒遺亡恐懼之類是也環自己者言經氣以次相傳如環一周復至其本位而氣自復病自己也診要經終論云刺中心者環死義與此同環自己者經盡氣復則

生環死者經盡氣絕則死也甲乙經環作渴非

推而外之內而不外有心腹積也推而內之外而不內身有熱也下而不上頭項痛也按之至骨脈氣少者腰痛痛而身有痺也甲乙經上而不下作下而不上下而不上作上而不下非蓋上而不下者上盛而下虛下虛則下無氣故腰足冷下而不上者有降而無升不升則上不榮故頭項痛也經文前二段是有餘之病故受病處脈自著後二段是不足之病故當

醫學讀書記

卷上

十一

病之處脈反衰按之至骨而脈氣少為腰痛痛而身有痺者亦不足之診也經文虛實互舉深切診要自當從古

王注之誤

素問曰味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過於辛經脈沮弛精神乃央注云苦性堅燥又養脾胃故脾氣不濡胃氣強厚辛性潤澤散養於筋故令筋緩脈潤精神長久按經云陰之所生本在五味陰之五宮傷

在五味是以五藏資生於味而味過反傷五藏此所謂脾氣不濡胃氣乃厚者由脾不能為胃行其津液而胃亦不能輸其精氣於脾也胃不輸脾不行則津液獨滯於胃而胃乃厚厚猶滯也寧強厚之足言哉沮消沮也弛懈弛也由辛散太過而血氣消沮筋脈懈弛精氣衰及其半也豈潤澤長久之謂哉以過為正以傷為益誤矣誤矣

切脈動靜而視精明精明者兩目之精光也注云明

醫學讀書記

卷上

三

堂左右近目之穴非是下文云精明者所以視萬物別黑白審短長然則非目中之精明而何

肺脈軟而散者當病灌汗至今不復散發也灌汗者汗出淋漓如以水灌之謂肺氣衰弱故散而不收也至秋肺金司令之時其氣自收其汗自斂而不復散發也非寒水灌洗皮密無汗之謂也

胃脈沉鼓瀆胃外鼓大心脈小堅急皆肩偏枯男子發左女子發右不瘖舌轉可治三十日起其從者瘖

三歲死王注云從謂男子發左女子發右也然則經文何必更出其從者三字按玉版論要云男左為逆右為從女子右為逆左為從本文蓋謂男子發左女子發右於法為逆然不瘖舌轉則受邪輕故證雖逆而猶可治若男子發右女子發左於法為從然瘖則受邪重證雖從必三歲乃起也設逆而邪重者必死不治從而邪微者奚待三歲而後起哉

西北之氣散而寒之東南之氣收而溫之蓋西北寒

醫學讀書記

卷上

三

束於外而陽娶於內故宜散而寒東南陽泄於外而陰伏於內故宜收而溫非食冷食熱之謂也

心欲軟腎欲堅

心欲軟急食鹹以軟之腎欲堅急食苦以堅之蓋心於象為離腎於象為坎坎之明在內以剛健而行之於外故欲堅離之明在外當柔順而養之於中故欲軟軟者必以鹹堅者必以苦鹹從水化苦從火化心夫坎水潤下愈下則陷矣故以行為尚易曰行有尚

吉往有功也離火炎上愈上則焚矣故以畜為吉易曰離利貞亨畜牝牛吉也然則所以堅之軟之者固欲其水上火下而成心腎交通之妙歟

三陽在頭三陰在手

三陽外感診在人迎人迎者結喉兩傍動脈故曰三陽在頭三陰內傷診在氣口氣口即寸口也故曰三陰在手

脾氣外絕

醫學讀書記

卷上

古

脈浮大虛者是脾氣之外絕去胃外歸陽明也言脾虛氣下不為胃行精氣而與大腸驅精粕也人有不能食而數便利者非脾去胃歸陽明之故歟

勞風

勞風法在肺下其為病也強上冥視唾出若涕惡風而振寒治之奈何曰以救俛仰巨陽引精者三日中年者五日不精者七日欬出青黃涕其狀如膿大如彈丸從口中或鼻中出不出則傷肺傷肺則死矣讀

此可悟傷風不解成癆之故勞風者既勞而又受風也勞則火起於上而風又乘之風火相搏氣湊於上

故云法在肺下也肺主氣而司呼吸風熱在肺其液必結其氣必壅是以俯仰皆不順利故曰當救俯仰

也救俯仰者即利肺氣散邪氣之謂乎然邪氣之散與否在乎正氣之盛與衰若陽氣旺而精氣引者三

日次五日又次七日則青黃之涕從欬而出出則風熱俱去而肺無恙矣設不出則風火留積肺中而肺

醫學讀書記

卷上

古

傷肺傷則喘咳聲嘶漸及五藏而虛勞之病成矣今人治勞日用滋養而不少益者非以邪氣未出之故歟而久留之邪補之固無益清之亦不解虛勞病之所以難治也

再按脈解篇云太陽所謂強上引背者陽氣大上而爭故強上也勞風之病火在上而風乘之風火皆陽也風性善行火性炎上非所謂陽氣大上而爭者乎

結陽結陰

結陽者腫四肢結陰者便血一升再結二升三結三升結陽陽聚而實也四肢者諸陽之本陽實則四肢腫也結陰陰氣凝聚不與陽氣相通也夫陽所以舉陰氣者也陰無陽而獨則不復周流四布有墜而下出耳再結三結謂二陰三陰並結不解結愈甚者下愈多也

胃脘癱

人病胃脘癱者診當候胃脈其脈當沉細沉細者氣醫學讀書記卷上 去 逆逆者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脈也逆而甚則熱聚於胃口而不行故胃脘為癱也按人迎在頭跌陽在足皆胃脈也云當候胃脈者謂跌陽也跌陽脈不必沉且細而今沉且細者氣逆於上而下乃虛下虛則沉細也人迎甚盛者氣逆於上則上盛上盛奪出迎甚盛夫氣聚於上而熱不行胃脘壅遏得不得畜積為癱耶

腸覃石瘕

覃延也瘕肉蔓延與腸相着瘕假也假血成形積於胞中血積易去故曰可導而下瘕肉漸大則消之非易故曰狀如懷子久者難歲

肺消

心移寒於肺為肺消肺消者飲一溲二死不治肺居上焦而司氣化肺熱則不肅不肅則水不下肺寒則氣不化不化則水不布不特所飲之水直趨而下且并身中所有之津盡從下趨之勢有降無升生氣乃醫學讀書記卷上 去 意故曰飲一溲二死不治

四維相代

四維四肢也相代相繼為腫也四肢為諸陽所實之處相繼為腫者氣餒而行不齊也故曰陽氣乃竭

四肢不舉

玉機真藏論云脾脈太過則令人四肢不舉其不及則令人九竅不通靈樞本神篇云脾氣虛則四肢不用是則腹脹溼洩不利益脾虛則營衛涸竭不能行

其氣於四肢而爲之不舉脾是則營衛過絕亦不能行其氣於四肢而爲之不舉九竅亦然兩經互言之者所以窮其變也

折髀

胃脈搏堅而長其色赤當病折髀胃土太過而火復益之府陽獨盛藏陰受傷則髀痛如折也

水液渾濁

水液渾濁有脾經穀氣不化濕熱下流亦有因肺金

醫學讀書記

卷上

末

氣衰而使液停凝蓋肺司州都之氣化中氣不足則洩便爲之變未可執其皆屬於熱之一語而施治也

厥

巨陽主氣故先受邪少陰與其爲表裡也得熱則止從之從之則厥也故有風熱小恙而亦面赤足冷者如是則解外之邪必靖內之氣設徒與表藥真陽隨越故曰表裡刺之飲之服湯

煎厥

煎厥卽熱厥也火迫於下氣逆於上爲厥逆而熱煩也潰潰乎若壞都汨汨乎不可止者言其精神散敗若土之崩若水之放而不可復收之掩之也

氣泄

心脈不及則令人煩心上見欬唾下爲氣泄氣泄者氣隨便失脾腸之病卽氣利也乃火不足而土受病也

瘧

瘧脈緩大虛調以甘藥凡諸瘧而脈不見刺十指間出血血出必已故初病脈不出者多是氣血壅遏所致無用張皇遽投溫補亦致敗事

氣痺精少皆能生寒

人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何是人多痺氣也又腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也是故氣痺精少皆能生寒不必定其定黃陽虛也

醫學讀書記

卷上

末

刺久病

刺久病者深內而久留之間日而復取之必先調其左右去其血脈愚謂此刺道也可通藥之用矣以至病久入深故必深內以其陰氣難得故必久留間日看休其氣也調其左右去其血脈者謂其未病之處使血脈流通也以丸藥攻其病以甘藥養其正且進且止毋速其效以平為期藥之道盡矣

醫學讀書記

卷上

子

醫學讀書記卷中

古吳九怡在涇著

後學

程梅齡雪門

校刊

風寒營衛之辨

風為陽邪而上行衛為陽氣而主外以陽從陽其氣必浮故曰陽浮者熱自發陽得風而反強陰無邪而反弱以弱從強其氣必佞故曰陰弱者汗自出傷寒發熱者陽氣被鬱而不伸也中風發熱者陽氣

醫學讀書記

卷中

一

被引而外浮也鬱者必發之浮者不徒解散而已此桂枝湯所以兼陰陽通合散為劑也仲景衛強營弱之說不過發明所以發熱汗出之故後人不察遂有風并於衛衛寔而營虛寒中於營營寔而衛虛之辨不知邪氣之來自皮毛而至肌肉無論中風傷寒未有不及於衛者甚者乃并傷於營耳郭白雲所謂涉衛中營者是也衛病而營和則汗自出營與衛俱病則無汗矣無汗必發其汗麻黃湯所

以去表寒而發邪氣也有汗不可更發汗桂枝湯所以助表氣而逐邪氣也學者但當分病證之有汗無汗以嚴麻黃桂枝之用不必執營衛之孰虛孰寔以證傷寒中風之殊且無汗爲表寔何云衛虛麻黃之去寔寧獨遺衛能不膠於俗說者斯爲豪傑之士營衛本是和諧衛受邪而反強榮無邪而覺弱邪正不同強弱異等雖欲和諧不可得矣故曰營氣和者外不諧

醫學讀書記

卷中

二

傷寒分立三綱桂枝主風傷衛麻黃主寒傷營大青龍主風寒兩傷營衛其說始於叔微許氏而成於中行方氏嘉言喻氏以愚觀之桂枝主風傷衛則是麻黃主寒傷營則非蓋有衛病而營不病者未有營病而衛不病者也至於大青龍證其立方之旨因煩躁而獨加石膏王文祿所謂風寒並重而閉熱于經故加石膏於發散藥中者是也若不過風寒並發則麻黃桂枝已足勝其任矣何必更須石膏哉

寒邪閉皮毛而鬱陽氣是以發熱而汗不出麻黃杏仁開肺氣發腠理若桂枝甘草爲辛甘發散之用也風邪不能外閉陽氣而反內擾陰氣是以其汗自出用芍藥者所以救其營也是謂風邪傷衛營未受病與芍藥以安營者尙隔一層

寒邪六經俱受不必定自太陽

傷寒傳經次第先太陽次陽明次少陽次太陰次少陰次厥陰此其常也然而風寒之邪亦有徑中陽明

醫學讀書記

卷中

三

者仲景云陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊又少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者是也不獨陽明少陽爲然卽三陰亦有之云少陰病始得之反發熱脈沉者少陰初受寒邪之症也太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者太陰初受風邪之症也厥陰中風脈微浮爲欲愈不浮爲未愈此厥陰初受風邪之脈也此三者又與三陰直中不同直中者病在藏此則病在經也是以六經皆能自受

風寒何必盡從太陽傳入即從太陽傳入亦不必循經遞進海藏言之最詳茲不重述

傷寒傳足不傳手者寒邪中人先着皮膚而足太陽膀胱之脈在最外一層故先入之消深則去皮膚而入肌肉肌肉為足陽明之分故次入之又消深則在軀殼之內藏府之外而足少陽之脈正當半表半裡之間故又次入之迨去表而之裏離陽而入陰則三陰者太陰為開厥陰為閤少陰為樞故邪氣入之先

醫學讀書記

卷中

四

太陰次少陰次厥陰也合而言之陽主表而陰主裏表為府而裏為藏故邪氣在表則足三陽受之在裏則足三陰受之也手之三陽雖亦主表而太陽小腸少陽三焦陽明大腸並從手至于頭位偏而脈短不若足經之自下行上綱維一身也手之三陰雖亦主裏然太陰肺少陰心厥陰胞絡並處上焦不若肝脾腎之寔居陰位也是故手三陽經雖陽而脈紮於表惟足三陽為獨主陽之表手三陰藏雖陰而位不處

陰惟足三陰為獨主陰之裏傷寒之邪所以恒在足而不在手歟發明所謂傷寒止傷西北而不傷東南亦穿鑿之語夫邪氣侵淫自足及手者有之如玉機所謂足經實手經虛故能寃熱潔古所謂壬病傳丙丙病傳丁者是也然非汗下差悞或七情勞倦之故焉有傳及手經者哉

陽結陰結

脈浮而數能食不大便者名曰陽結十七日當劇脈沉而遲不能食身體重大便反鞭名曰陰結十四日當劇蓋天人之氣十五日一更更則結者當解設不解其病則劇云十七日者陽結能食故過期十四日者陰結不能食故不及期也成氏過結再傳之說失之泥矣

醫學讀書記

卷中

五

縱橫

傷寒腹滿讖語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門傷寒發熱齋齋惡寒大渴欲飲水其腹必滿

自汗出小便利此肝乘肺也名曰橫刺期門按腹滿
讖語其脈當寔沉而反浮繁此非裏寔乃肝邪乘脾
氣窒而寔也發熱惡寒病爲在表其證而不當渴而
反大渴此非內熱乃肝邪乘肺氣鬱而燥也以裏無
熱不能消水故腹滿而汗出便利則肺氣已行故愈
二者俱瀉肝邪則愈設不知而攻其寔熱則誤矣此
病機之變不可不審也

戰慄

醫學讀書記

卷中

六

邪氣入正氣抑則病正氣復邪氣退則汗出而愈矣
然邪猶未強而未卽服正猶微而未卽勝此所以戰
也

邪氣外與正爭則爲戰內與正爭則爲慄慄者心內
鼓慄經曰陰中于邪必內慄也若戰則但肢體戰搖
而已戰者正氣勝則有得汗而解者慄者內氣虛不
能禦邪遂成厥脫也

熱入血室

熱入血室三條其旨不同第一條是血舍空而熱乃
入者空則熱不得聚而游其部故胸脇滿第二條是
熱邪與血俱結於血室者血結亦能作寒熱柴胡亦
能去血結不獨和解之謂矣第三條是熱邪入而結
經尚行者經行則熱亦行而不得留故必自愈無犯
胃氣及上二焦病在血而不在氣在下而不在上也
若誅伐無過變證隨出烏能自愈耶

圍血

醫學讀書記

卷中

七

下利寸脈反浮數者陽之盛也尺中自濇者陰之虛
也以陽加陰必圍膿血
少陰熱在膀胱而便血者藏邪還府血去熱出當愈
強發少陰汗而動血者熱邪內迫血去陰竭多死

吐利煩躁四逆

少陰病吐利煩躁四逆者死爲陰極而陽絕也少陰
吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之爲陰盛
而陽爭也病症則同而辨之於爭與絕之間蓋亦微

矣

亡陽無陽

亡陽陽不守也無陽陽之弱也陽亡者籓籓已徹故汗出不止陽弱者施化無權故不能作汗

絕陽

陽為津液之源津液為陽之根汗出過多胃氣生熱津液竭矣陽氣雖存根本則離故曰絕陽

厥

醫學讀書記

卷中

八

傷寒脈促手足厥逆者可灸之按本論云脈陽盛則促則手足厥逆而脈促者非陽之虛乃陽不通也灸之所以引陽外通若厥而脈微者則必更以四逆溫之

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中胸中陽也陽實氣於四肢邪結胸中其陽不布則手足無氣而厥冷胸邪最高高者因而越之故曰當吐之宜瓜蒂散脈促者陽結不通故宜引其陽脈緊者陽為邪遏故

須吐其邪二者皆與陽虛厥逆不同

脈微而厥者陽之虛也宜四逆輩脈細而厥者血虛不營於四末也宜酸甘辛藥溫之潤之行之當歸四逆是也

厥熱

傷寒先厥者寒邪乍中陽氣暴折也後熱者陽氣漸復陰邪將却也五日厥熱亦五日者陰勝陽復之常也厥深者熱亦深厥微者熱亦微謂有勝則有復勝

醫學讀書記

卷中

九

之甚者其復亦甚非以外厥之微甚下裡熱之淺深也傷寒前厥而後熱者其病多吉陽復而陰剝也前熱而後厥者其病多凶陰進而陽退也

厥四日熱反三日即顯陽微之機不待復厥至五日而知其病之進也熱四日厥反三日即顯陰負之兆不待復熱至五日而知其病之必愈也

三陰下症

太陰有桂枝加大黃湯下之一症少陰有大承氣急下三症厥陰有小承氣下之一症夫邪入三陰病已深矣其幸而不死者其邪仍從陽而出耳張季明所謂太陰脾經溫燥不行亦當溫利自陽明出如桂枝加大黃是也少陰腎經雖用附子復使麻黃厥陰肝經用桂枝則知少陰亦自太陽出厥陰亦自少陽出及其太陽少陽鬱閉不行則當自陽明出故三陰皆有下症也

醫學讀書記

卷中

十

桂枝湯

風之爲氣能動陽氣而泄津液所以發熱汗自出與傷寒之發熱無汗不同此用桂枝外發邪氣卽以芍藥內安津液灸甘草合桂枝之辛足以攘外合芍藥之酸足以安內生薑大棗甘辛相合亦助正氣去邪之用蓋以肌解而邪不去故不用麻黃發表而以桂枝助陽以爲表以其汗出而營自和故不用石羔之清裡而用芍藥斂陰以爲裡此桂枝湯之所以大異

于麻黃大青龍也

麻黃湯

寒邪傷人陽氣鬱而成熱皮膚閉而成寔麻黃輕以去寔辛以發陽氣溫以散寒氣杏仁佐麻黃通肺氣使腠理開洩王好古謂其爲治衛寔之藥者是也然泄而不收升而不降桂枝甘草雖以佐之寔監制之耳東垣云麻黃湯是陽經衛藥也開腠理使陽氣申洩此藥爲衛寔也

醫學讀書記

卷中

十一

大小青龍湯

大青龍治風寒外壅而閉熱于經者小青龍治風寒外壅而伏飲于內者夫熱鬱於經而不用石羔汗爲熱隔寧有能發之者乎飲伏於內而不用薑夏邪與飲搏寧有能散之者乎其芍藥五味不特逆氣而安肺氣抑且制麻桂薑辛之勢使不相驚而相就以成內外協濟之功也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者
桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之按此所
謂陽者乃心之陽蓋即神也火氣通於心神被迫而
不收與發汗亡陽者不同發汗者動其腎則厥逆筋
惕肉瞶故常用四逆被火者傷其心則驚狂起臥不
安故常用龍牡其去芍藥加蜀漆者蓋欲甘辛急復
心陽而不須酸味更益營氣也與發汗後其人又手
自冒心心下悸欲得按者用桂枝甘草湯同蜀漆即
醫學讀書記卷中 三

五苓豬苓

五苓豬苓並治脈浮發熱渴而小便不利之症然五
苓則加桂枝白朮而治太陽豬苓則加滑石阿膠而
治陽明蓋太陽為開陽明為閤太陽為表之表其受
邪也可以熱發可以辛散陽明為表之裡其氣難泄
其熱易畜其發散攻取自與太陽不同是以五苓散

加甘辛溫藥假陽氣以行水豬苓湯加甘酸寒藥假
陰氣以利水也

瀉心諸湯

傷寒下後心下滿而不痛者為痞半夏瀉心湯主之
蓋容邪內陷既不可從汗泄而痞不寔又不可從下
奪故惟半夏乾薑之辛能散其結苓連之苦能洩其
滿然其所以泄散者雖藥之能而寔胃氣之使也此
用人參甘草者非以下後中傷故以益氣而助其能

醫學讀書記

卷中

三

耶

甘草瀉心生薑瀉心雖同為治痞之劑而生薑瀉心
意在胃中不和故加辛溫以和胃甘草瀉心意在下
利不止與容氣上逆故不欲人參之增氣而須甘草
之安中也

大黃黃連瀉心湯治傷寒汗下後心下痞按之濡其
脈關上浮者成氏云此虛熱也與大黃黃連以導其
虛熱按成氏所謂虛熱者對燥屎而言也蓋邪熱入

裡與精相結則為寔熱不與精相結則為虛熱
非陰虛陽虛之謂本方以大黃黃連為劑而不用枳
朴等藥者蓋以泄熱非以蕩是熱也

白通四逆

白通四逆俱用薑附俱為扶陽抑陰之劑而白通意
在通陽故用葱白凡厥而下利脈微者用之四逆意
在救裡故用甘草凡厥而清穀不止者用之若通脈
四逆則進而從陽以收外散之熱白通加人尿猪膽
汁則退而就陰以去格拒之寒也

醫學讀書記

卷中

古

麻杏甘石湯

汗出而喘無大熱者其邪不在經腠而在肺中故非
桂枝所發能麻杏辛甘入肺散邪氣肺被邪鬱而生
熱石羔辛寒入肺除熱氣甘草甘溫安中氣且以助
其散邪清熱之用乃肺藏邪氣發喘之的劑也

飲症煩傷寒

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸云云按此非

傷寒症乃屬飲家也金匱云膈間支飲其人喘滿心
下痞堅得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之
又云其人振振身瞶動者必有伏飲又云心下有痰
飲胸膈支滿目眩是也成氏以為裡虛氣逆與此藥
和經益陽散氣恐未切當

病如桂枝症頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞鞅氣
上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂
散寒謂寒飲非寒邪也此亦痰飲類傷寒症活人書

醫學讀書記

卷中

古

云痰飲之為病能令人憎寒發熱狀類傷寒但頭不
痛項不强為異耳

簡誤

汗多則熱愈汗少則便難疑是汗少則熱愈汗多則
便難太陽篇云脈陽微而汗出少者為自和也汗出
多者為太過陽脈寔因發其汗出多者為亦太過太
過為陽絕於裡亡津液大便因鞅也成氏謂汗少則
邪熱不盡又走其津液者非

太陽病十日已去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯謂脈但浮而不細嗜臥者邪猶在外宜麻黃湯脈浮細不嗜臥而胸滿脇痛者邪又在少陽宜小柴胡湯非外已解而又和之發之之謂也

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表症仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之按

醫學讀書記

卷中

六

麻黃湯主之句當在此當發其汗下謂服麻黃湯已病雖未除而又發煩目瞑劇者陽邪上盛必將衄血而後解非既衄血而又以麻黃湯發之也然亦須審微甚而處之若其欲衄而血不流雖衄而邪不解者則仍宜發汗仲景云傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之是也

傷寒脈浮滑此表有熱裡有寒白虎湯主之按陽明篇云傷寒無大熱口渴渴心煩背微惡寒者白虎湯

主之厥陰篇云傷寒脈滑而厥者裡有熱也白虎湯主之審此本文當作裡有熱表有寒表寒即手足厥背惡寒之謂蓋傳寫之誤不必曲為之解也

症象陽旦一條蓋即前條之意而設為問答中間語意殊無倫次豈後人之文耶昔人讀考工記謂不類於周官余於此條亦云

下利清穀汗出必脹滿者傷其陽而氣不行成氏謂亡津液者非也

醫學讀書記

卷中

七

寒寔結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服當作寒寔結胸無熱證者與三物白散舊本必有誤也既已寒寔何可更用瓜蒌黃連寒藥耶

傷寒雜論

太陽病初服桂枝湯而反煩者陽邪痺於陽而不散也故先刺風池風府以通其痺

陽邪被抑而未服者仍當從陽因而去之此桂枝湯去芍藥之意

病在陽而反下之邪氣被抑而未復正氣方虛而不振是以其脈多促然當辨其仍在表者則純以辛甘發之桂枝去芍藥湯是也辨其兼入裡者則并以苦寒清之葛根黃芩黃連湯是也

餘寇未平復合為亂餘邪未淨復集為病傷寒發汗解半日許復煩是也

大下之後復發汗三條均是汗下之後然小便不利者傷其陰也振寒脈微細者陰陽俱傷也晝日煩躁

醫學讀書記

卷中

六

不得臥者傷陽而不傷陰也於此見病變之不同發汗則動經者無邪可發而反動其經氣也余謂此條為飲症者未必謬也

發汗後水藥不得入口者是動其經氣也

但陽脈微者先汗之而解但陰脈微者下之而解此逐堅攻瑕之法

喘而汗出有陽氣虛脫者亦有熱氣內迫者太陽病下之利脈促喘而汗出葛根黃連黃芩湯主之是

也

利水逐血為熱入膀胱兩大法門利水分清溫五苓豬苓是也逐血辨微甚桃仁承氣抵當湯丸是也

青龍湯主散表寒而兼清裡熱故麻黃多於石膏麻杏甘石主清肺熱而兼散肺邪故石膏多於麻黃桂枝湯主散表邪故桂枝湯倍芍藥而益生薑之辛建

中湯主立中氣故芍藥倍桂枝而益飴糖之甘品味相同而君臣異用表裡補泄因之各異矣

醫學讀書記

卷中

九

太陽轉入陽明其端有二一者汗出不徹邪氣不服而傳曰太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也二者汗出過多胃中乾燥而傳曰太陽病若

發汗若吐若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明也

經邪不能聚故傳入府則聚而不傳經邪未變故惡寒入府則變熱而不寒曰陽明居中土也萬物所歸

無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明入府症也

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者氣內蒸而津不從也

痞症表未解者宜先解表不可便治其痞若兼下利不止者則不拘此例宜合表裡而並治太陽病外症未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裡不解者桂枝人參湯主之是也

陽明津涸舌乾口燥者不足慮也若并亡其陽則殆矣少陰陽虛汗出而厥者不足慮也若并傷其陰則

醫學讀書記

卷中

二十

危矣是以陽明燥渴能飲冷者生不能飲者死少陰厥逆舌不乾者生乾者死

少陰病八九日一身手足盡熱者邪自本而之標自藏而入府也雖便血可治

醫學讀書記卷中

醫學讀書記卷下

古吳九怡在涇著

後學

程梅松 雪門 校刊
張 雲 湖南

制方用藥必本升降浮沉之理

易曰天道下濟而光明地道卑而上行故上下升降而氣乃和古人制方用藥一本升降浮沉之理不拘寒熱補瀉之迹者宋元以來東垣一人而已蓋四時之氣春升夏浮秋降冬沉而人身之氣莫不由之然

醫學讀書記

卷下

一

升降浮沉者氣也其所以升降浮沉者人之中猶天之樞也今人飢飽勞役損傷中氣於是當升者不得升當降者不得降而發熱困倦喘促痞塞等症見矣夫內傷之熱非寒可清氣陷之痞非攻可去惟陰陽一通而寒熱自已上下一交而痞隔都損此東垣之學所以能為舉其大歟李頻湖曰升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之故春宜辛溫夏宜辛熱長夏宜甘苦辛溫秋宜酸溫冬宜苦寒愚謂升降浮沉則順之

者所以順天時之氣也寒熱溫涼則逆之者所以救氣化之過也李氏辛甘酸苦之用是已若春宜溫夏宜熱冬宜寒之謂是助之也豈逆之謂哉

五行問答

客曰五行生尅之說非聖人之言也秦漢術士之所僞撰也余曰於何據也曰易言八卦而未及五行洪範言五行而未及生尅是以知其爲無據之言也曰子曷不觀諸河圖洛書乎河圖之數一六居下水也

醫學讀書記

卷下

二

二七居上火也三八居左木也四九居右金也五十一居中土也洛書之數戴九履一一水生之數也一之右爲七七火之成數也七之右爲九九金之成數也九之右爲三三木之成數也五居於中五土之成數也夫河圖逆而左旋以次相生洛書順而右轉以次相尅尅者反順生者反逆此造化之妙也且河圖左旋相生而其對待則皆相尅洛書右轉相尅而其對待則皆相生是以生机恒寓於消落之中而生氣每

藏於盛長之內生而無尅則有進無退而氣易盡尅而無生則消者不長而机以窮生也尅也天地自然之理莫知其然而不得不然者也子又何疑焉曰河圖洛書古未必有此亦秦漢人所撰以神其說者乎曰易不云乎河出圖洛出書聖人則之何子之不察也且五行生尅天地之數也河圖洛書亦天地之數也未有圖書以前天地之數昭然已備卽圖書至今不出而圖書之象昭然亦備圖書可假天地之數不

醫學讀書記

卷下

三

可假也夏之暑肇于春之溫冬之寒始于秋之涼氣之默運然也一陽轉而土膏僭動天氣肅而海水西盛杲日出而霜露立消涼風至而萬木凋落象之顯呈者也而又何疑于圖焉曰水生於天者也豈生於金乎方諸取水月爲水母月亦生于金乎水生木未有木生于江湖波濤者水輔木以生土而專歸之水可乎曰天者乾之體也月者金之精也坤也者萬物皆致養焉五行皆不能離土而生獨木然也哉曰岱

石出火漢井出烟是土生火也海中陰晦波如火燃是水生火也火熱而水乾是火反尅水也水沖而土潰是水反尅土也叢竈燎原火亦尅木鋤圃耜田金亦尅土生尅之道不亦亂而無序乎曰河圖洛書水止火下木東金西天地之位前南後北左東右西其序秩然而不可紊亂者也其序秩然不可紊亂則其生其尅亦循序旋轉而不可紊亂者也若深井有火高原出泉則二氣相更之妙耳火燃水乾水衝土潰

醫學讀書記

卷下

四

測盛衰勝復之常耳是以窮五行之變則可以為是即五行之事則不可也且所謂相尅者不過制其太過而使歸于平非斬絕滅竭之謂也又以抑其浮盛而使還于根以為生發之兆雖相尅而寔相成也若金斲土掩火燃水衝此立盡之數豈足語造化生成之妙哉

通一子雜論辨

君火凝命子心為十二官稟命之主相火一位於命

醫學讀書記

卷下

五

門一寄於三焦為十二經生氣之原由是神机不息而造化成焉此千古不易之道也而通一子之言總言大體則相火寄在命門折言職守則藏府各有君相若然則十二官有十二君相矣五藏六府將亂而自用心君不其守府乎曰凡以心之神肺之氣脾胃之倉廩肝膽之謀勇腎之伎巧變化皆發見之神奇使無君相何以能此不知心肺脾胃膽腎之能變化出入者皆稟心之君火以為主命門三焦之相火

以為用猶庶司百職共稟火君之命而效成於下豈一藏有一君相之謂哉即爾謂藏府各有相可矣而謂藏府各有君可乎夫立言所以明道若此者求之太深出之反晦亦賢知之過也
元氣是生來便有此氣漸長漸消為一生盛衰之本元精者與氣俱來亦漸長漸消而為元氣之偶元神者元氣元精之靈者也能變化往來而為精氣之主也景岳謂無形之火神机是也亦曰元氣無形之水

天癸是也又曰元精元氣卽化生精氣之元神也。以神爲火。以氣爲神。以精爲無形。以精氣爲神所化語殊未瑩。

丹溪之治吞酸必以黃連爲君。而以吳茱萸佐之。治腹疝症。謂宜倍用山梔。而以炒干薑佐之。夫旣謂其熱寒之可也。何又並用如此。余謂丹溪所治吞酸。心腹痛。並皆火熱鬱結之病。火熱則宜清鬱結。則宜散茱萸干薑。蓋資其散。不資其熱也。且旣曰佐矣。則

醫學讀書記

卷下

六

所用無多。自無掣肘矛盾之虞。而有相助爲理之益。屢試屢驗。不可廢也。

曰頭目口齒咽喉等症。方書悉云風熱多。以升降並用。逆從兼施。獨不慮升者碍降。降者碍升。乎從者碍逆。逆者碍從。乎以愚所見。風熱交熾之症。多有挾身中之陰火。上從而爲面赤足冷者。古方之升降並用者。所以散其外。且以安其內也。若升而無降。則有躁煩厥逆之變。降而無升。則有腎悶喘逆之憂。不可不

知也。

丹溪之所謂陽有餘。陰不足者。就血與氣言之也。景岳之所謂陽不足。陰有餘者。就神與形言之也。形神切于攝養。氣血切於治要。各成一說而已矣。

痢之爲病。氣閉于下。而火復迫之。是以腹痛裡急。精粕不出。而便腸垢也。其源皆由于暑濕與瘴病。俱發于夏秋。蓋傷于經絡。則成瘧。而入于腸臟。則爲痢也。經絡之邪可散而愈。故治宜辛苦溫之藥。腸臟之熱

醫學讀書記

卷下

七

非清不愈。故宜治辛苦寒之藥。亦發表不遠熱攻裡。不遠寒之意。河澗之主用清寒。蓋亦有見于此。景岳不審痢病之所從來。而以五臟五行爲說。謂惟心可言火。其餘則均不可言火。此但足資辨論而已。豈足補于治要哉。

脈來動而中止。更來小數。中有還者。反動名曰結。陰也。脈來動而中止。不能自還。因而復動。名曰代。陰也。得此脈者。必難治。蓋結脈止而卽還。不失至數。但少

差池耳代脈止而不還越期乃還有此絕而彼來代之意此余之所親歷有如是者也而景岳云凡見忽大忽小乍遲乍數更變不常者均謂之代似此燻亂舊法未足多也

上下來去至止六字景岳因滑氏之言而復傳其蘊而來去二義尤為精切

曰風之與寒本為同氣但風邪淺而寒邪深淺屬陽而深屬陰耳此言最為明了

醫學讀書記

卷下

八

今時皆合併病之名語詳而理確

曰氣虛于中不能達表非補其氣肌能解乎血虛于裡不能化液非補其血汗能生乎又有火盛而水涸于經者譬如乾鍋赤裂潤自何來但加以水則鬱蒸沛然而氣化四達又曰或發表或微解或溫散或涼散或補中托裡而為不散之散或補陰助陰而為雲蒸雨化之散此公于發表一法獨能得其精奧故其言之盡而無蔽確而可守如此

口眼歪斜之病按仲景云絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂及前賢針灸膏摩之法俱云左歪治右右歪治左以余所見凡手廢在左者則口眼歪于右廢在右者則口眼歪于左大法散邪養血往往獲愈若純施補則留連轉劇而景岳乃云以藥治者左右皆宜從補以艾治者當從其急處而灸之余常謂景岳之學得于推測者此類是也

醫學讀書記

卷下

九

中風者風從外入天地之邪氣也類中風者風自內生肝臟之厥氣也肝之生氣暴而病速肝氣既厥諸氣從之諸液又從之諸氣化火諸液化痰輻湊上焦流溢經絡如風雨之驟至如潮汐之乍湧而不可當也豈特如景岳所謂氣血虛敗而已哉昔賢于此症或云火或云痰或云氣虛三者誠俱有之余惜其終屬模糊而未中肯綮也

補下治下制以急大承氣之無甘草腎氣丸之有苓

澤蓋謂此也左歸右歸二飲亦倣腎氣之意乃去澤瀉之鹹而加甘草之甘既減下趨之勢更與緩中之權雖與之歸其可得乎哉

補中益氣用芪朮其意在求陽也故加升柴以引之補陰益氣用地藥其意在求陰也而亦用升柴是將之燕而越是指也若曰陰氣必資陽氣而後升則是附子桂心之任而非升柴之輕脫所得而與者已若謂陰虛而邪留者設則是古方柴胡四物之例以爲

醫學讀書記

卷下

十

補陰散邪則可以爲補陰益氣則不可也

柴胡等飲六方分溫涼脾胃血氣邪氣六法頗盡表法之變但不得以柴胡一味印定眼目學者善師其意可也

景岳五福飲于八物湯中去茯苓川芎之通芍藥之攝僅參朮歸地草五味則呆鈍不靈矣而云五藏俱補既無向導又失統御未足法也

土具沖和之德而爲生物之本沖和者不燥不失不

冷不熱適能化生萬物是以濕土宜燥燥土宜潤使歸于平也熟地之補脾益補脾之陰耳若濕勝者非所宜也要知熟地入腎則補腎陰入脾則補脾陰景岳乃謂地黃是太陰陽明之藥則泥而不通矣

一陰二陰等煎蓋卽天一地二諸數而明其方故五陰煎爲補脾陰之劑方中不宜更雜白朮扁豆蓮肉蓋白朮燥脾濕扁豆蓮肉益脾氣而不能長脾陰也二飲煎卽導赤散加麥冬棗仁元參黃連清潤之品

醫學讀書記

卷下

十一

殊覺有力

喻氏春溫論辨

喻氏論春溫以冬傷于寒春必病溫爲一例以冬不藏精春必病溫爲一例以既傷于寒又不藏精爲一例愚按金匱云大邪中表小邪中裡大邪漫風雖大而力微小邪戶牖陰風雖小而氣銳以其銳也故深入在裡以其小也故藏而不覺冬傷于寒者冬時所受之寒本自小而大而又以不能蟄藏之故邪氣

得以深伏于裡伏之既久寒變為熱至春人氣升浮邪氣與之俱出則發熱而渴是以冬傷于寒者春月溫病之由而冬不藏精者又冬時受寒之源耳嘉言所分三例其實不過一端而強為區畫辭愈煩而理愈晦矣

寒毒藏于肌膚此叔和之謬說也喻氏亦云冬傷于寒藏于肌膚感春月之溫氣而始發肌膚陽明胃之所主也愚意肌膚非能藏之地陽明亦無受寒不發之理惟少陰為陰寒邪亦為陰以陰遇陰故得藏而不發是以傷寒之邪自太陽遞入三陰溫病之邪自少陰傳出三陽非肌膚與胃之云乎哉

喻氏云仲景治溫症凡用表藥皆以桂枝湯以示微發于不發之意又云溫病二三日間當用麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯深入腎中領出外邪則重者愈矣此喻氏之臆說非仲景之舊章也蓋溫邪非發散可愈即有表症亦豈辛溫可發且桂枝湯為傷

醫學讀書記

卷下

三

寒表病而裡和者設溫症邪從裡發而表且未病若用桂枝適足以助溫邪而留病氣又溫病伏寒變熱少陰之精已被劫奪更用辛附是絕其本而資之脫也即曰少陰本寒標熱邪入其界非溫不散然而溫病之發寒已變熱其欲出之勢有不待引之而自甚者其不能出者必皆陰精已涸者也不然寧有不出者耶喻氏強引經文傳會已意自誤誤人不容不辨喻氏云冬傷于寒者太陽膀胱主之冬不藏精者少

醫學讀書記

卷下

三

陰腎經主之與兩感傷症中一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩渴而滿之例纖毫不差愚謂溫病有新舊合邪而無表裡兩感蓋溫病是伏氣所發少陰有伏氣太陽而亦能伏氣者未必然也不能伏則感而即發乃是傷寒而終非溫病矣喻氏云少陰為陰藏而少血所以強逼少陰汗者重則血從耳目口鼻出而厥竭可虞輕亦小便不利而枯涸可待余每用桂枝必加生地以匡芍藥之不逮

功效歷歷可紀此論最善可以稍補前言之失蓋溫病之發陰氣先傷設有當行解散者必兼滋陰清熱之品參其間昔賢于蔥豉湯加童便梔豉湯中加生地麥冬亦此意也

又曰今人見熱勝煩枯之症而不敢用附子者惡其以熱助熱也孰知不藏精之人腎中陽氣不鼓津液不得上升故枯燥外見纔用附子助陽則陰精上交于陽位如釜底加薪則釜中之氣水上騰而潤澤有

醫學讀書記

卷下

十四

立聖者數語亦有至理惟于溫病不能無弊蓋陰凝之枯燥與陰竭之枯燥霄壤懸殊萬一誤投死生立判不可不細審也

軻氏傷寒論翼辨

軻氏云仲景之書撰同素問皮部論云陽主外陰主內故仲景以三陽主外三陰主內又曰在陽者主內在陰者主出以滲于內故仲景又以陽明主內少陰亦有反發熱者故仲景于表劑中用附子是因其滲

也又曰少陰之陰名曰樞儒其入于經也從陽部注于經其出者從陰內注于骨故仲景製麻黃附子湯治發熱脈沉無裡症者是從陽部注經之意也製附子湯治身體骨節痛手足寒背惡寒脈沉者是從陰內注于骨之義也按內經所謂陽主外陰主內者是言陽明之陽以陽明為陽之閤故出則從陽而主外入則從陰而主內也所謂在陽者主內在陰者主外以滲于內者是言少陽之陽以少陽為樞為机之地

醫學讀書記

卷下

十五

故在陽者其用反從陰而主內在陰者其用反從陽而主出以滲于內如便液之屬蓋從內出外之意也少陰亦樞機之地故其入者反從陽而注于經其出者反從陰內注于骨也此皮部論之義柯氏似此援引未盡的確

軻氏援地理兵法喻病邪之淺深方藥之大小可謂深切著明而于兵法又多精義非好為夸大者可比張千秋口陳烏桓兵事瞭如指掌非達識經事不能

如此

軻氏因陰陽十脈而立對待正看六法曲盡其變幾無遁形矣

太陽膀胱之經起于足小指循股上行至頭為三陽之表而寒邪傷人多自表入故太陽得先受邪有頭項強痛背疼等症而軻氏云心為太陽故得外統一身之氣血內行藏府之經隧若膀胱位列下焦為州都之官所藏精液必待上焦之氣化而後出何能外

醫學讀書記

卷下

六

司營衛為諸陽主氣哉又曰傷寒最多心病以心當太陽之位也心為君主寒為陰邪君火不足寒氣得以傷之所以名為大病按少陰心經起于手小指循臂上行入缺盆注心中今傷寒初病不問有是經所生症者而邪入心經亦不復見頭項強痛等症夫心以為太陽之位則不應無太陽之症以心為一身之主不得易膀胱之位況仲景所謂太陽者只就經脈而言自表邪傳經入裡熱結膀胱乃始及于府軻氏

但知其位卑在下不得為都會之地而不思其經絡所過實為一身之表邪徇尊卑之名忘經野之實亦何取焉且傷寒雖曰大病未必便是死症若寒邪犯心水來尅火之說自是寒邪直入心藏之病而非大槩傷寒在表之病矣必如其說則傷寒之病十無一生雖救療之不及而何有延至十數日之久哉且以心當太陽之位則太陽隨經入裡之邪將直犯君主而何以仍歸膀胱為小便不利為結血不行炫新說

醫學讀書記

卷下

七

而變舊章智者之過也道其不明矣夫膀胱有下口而無上口處大腸小腸交接之間即關門也關門者泌別水穀之處氣通命門人之水穀入胃以次傳入小腸斯時雖已熟腐而清濁猶未分也至于關門而得命門之火薰蒸分布於是水液滲入膀胱糟粕下入大腸入大腸者以漸而下入膀胱者滿而後瀉軻氏乃謂膀胱有上口而無下口能入而不能出必待太陽氣化而溺始出非也果爾則胞中

之水其滲已多而猶未溺之時更于何處可蓄耶且內經所謂氣化則能出者亦非太陽之氣化乃肺經之氣化也肺經之氣化則膀胱之氣亦化滿而後出虛而復受不然雖滿不能出也是以膀胱雖主津液而非命門之火蒸之則不能入非肺金之氣化則不能出不入則溇瀉之病生不出則癰閉之病作矣

宣明人參白朮散方論

宣明人參白朮散治徧身燥濕相搏玄府緻密遂致

醫學讀書記

卷下

六

松泮發渴飲食減少不為肌膚方以人參甘草甘以益虛也生地黃潤以滋燥石羔黃芩滑石寒以除熱也白朮茯苓燥以除濕也而意特在濕熱故白朮滑石石羔數獨多焉其用參地甘草者熱積則真氣消濕聚則堅燥生也尤妙在薄荷藿香以行表氣縮砂仁以行裡氣表裡氣通而後濕可行熱可去此畫龍點睛法也白朮湯方論與此畧同學者宜究心焉

柴胡梅連散羅氏秦九鯨甲散方論

風勞骨蒸久而咳嗽吐血脈來弦數者柴胡梅連散主之蓋邪氣既久積于表裡之間而不退非可一汗而去者故用柴胡之辛散必兼烏梅之酸收而久積之風內蘊骨髓者已變風之體而為熱則宜用苦連之苦寒以清之然兵無向導則不達賊境藥無引使則不通病所新病且然況伏邪乎故膽以合膽髓以合骨韭白之通陽童便之通陰而表裡肌骨之邪庶盡出歟

醫學讀書記

卷下

五

秦九鯨甲散

羅氏秦九鯨甲散與柴胡梅連同意亦治風勞骨蒸肌熱之症然減前胡之洩氣而加當歸之和血去黃連之苦寒而用青蒿之辛涼氣味為較和矣久病之人未必不宜緩法也

補中益氣湯六味地黃湯合論

陽虛者氣多陷而不舉故補中益氣多用參芪木草甘溫益氣而以升柴辛平助以上升陰虛者氣每上

而不下故六味地黄丸多用熟地黃肉山藥味厚體
重者補陰益精而以茯苓澤瀉之甘淡質之下降氣
陷者多滯陳皮之辛所以和滯氣氣浮者多熱牡丹
之寒所以清浮熱然六味之有苓澤猶補中之有升
柴也補中之有陳皮猶六味之有丹皮也其參芪歸
木甘草猶地黃茱萸山藥也法雖不同而理可通也

歸脾湯方論

歸脾湯兼補心脾而意尚治脾觀于甘溫補養藥中

醫學讀書記

卷下

三

而加本香醒脾行氣可以見矣龍眼遠志雖曰補火
實以培土蓋欲使心火下通脾土而脾益治五臟受
氣以其所生也故曰歸脾

鳳髓丹方論

鳳髓丹為太陰濕熱下注少陰遺濁者設黃柏苦能
燥濕寒能除熱故以為君濕熱易成壅滯砂仁之辛
香可以利之脾邪不獨傷腎亦且自傷灸甘草之甘
溫可以益之然諸治濕熱藥不用而獨取黃柏砂仁

者以其氣味兼通少陰也

小投杯湯方論

上氣有熱者麻杏甘石湯無熱者小投杯湯蓋即麻
杏甘石而以桂心易石羔同一通肺下氣而寒溫易
用法斯備矣

清暑益氣湯清燥湯合論

清暑益氣湯蓋謂其人元氣本虛而又傷于暑濕脾
得濕而不行肺得暑而不肅以致四肢倦怠精神短

醫學讀書記

卷下

三

少懶于動作胸氣短促不思飲食脈浮緩而遲者設
故用人參黃芪白木甘草歸身甘溫氣味以補中益
氣蒼朮黃柏澤瀉以除濕熱升麻葛根以除客熱而
肺喜清肅得熱則煩故以麥冬五味清而收之脾喜
疏通得濕則壅故以炒麴青皮陳皮溫而行之此正
治脾肺氣虛而受暑濕若體實脈盛或雖虛而不甚
及津涸煩渴多火者則不可混投也清燥湯亦治長
夏濕熱蒸人氣體困倦腰足痠軟之症故比清暑益

氣多黃連茯苓猪苓柴胡無澤瀉葛根青皮則清利
之力差多疎滯之力差少是名清燥清以降逆燥以
勝濕也

方法餘論

治外感必知邪氣之變態治內傷必知臟腑之情性
治六淫之病如逐外寇攻其容毋傷及其主主弱則
客不退矣治七情之病如撫亂民暴其罪必兼矜其
情情失則亂不正矣

醫學讀書記

卷下

三

營道者知其雄守其雌制方者知其奇守其正
攻除陳積之藥可峻而不可駛宜專而不宜泛駛則
急過病所泛則搏擊罕中由是堅纍如故而破殘已
多豈徒無益而已哉

母之與子氣本相通母旺則及其子子旺亦氣感于
母故刪繁論云肝勞病者補心氣以益之餘藏皆然
則不特虛則補其母一說已也

陽與陰反然無陰則陽不見矣邪與正反然無正則

邪不顯矣是以熱病飲沸湯而不知熱痿痺手足反
無痛者陰盛而無與陽忤正衰而不與邪爭也如是
者多不可治

木火有相通之妙金水有相涵之益故不特木能生
火而火亦生木不特金能生水而水亦生金水之生
金如珠之在淵火之生木如花之含日

夫治病猶治國也。治國者必審往古理亂之事迹，與
之得失，而後斟酌之以時，酌之以勢，而後從而因
革之。治病者必知前哲察病之機宜，與治療之方法，
而後合之氣體，辨之方土，而從而損益之。蓋未有事
不師古而有濟於今者，亦未有言之無文而能行之
遠者。予自弱冠，即喜博涉醫學，自軒岐以迄近代諸
書，搜覽之下，凡有所得，或信或疑，輒筆諸簡。雖所見
未廣，而日月既多，卷帙遂成。昔真西山修讀書記，謂
門人曰：此人君為治之門，如有用我者，執此以往，予
之是集，即西山讀書記之意也。執此以往，亦可以應
變無窮矣。

欽鶴山人九怡識

醫學續記

古吳九怡在涇著

後學

程梅齡雪門

校刊

張澧湖南

寸口分診藏府定位

脾與胃合，肝與膽合，腎與膀胱合，皆足經也。其藏府
皆相依附，則其診候亦應同在一部。如左關候肝膽，
右關候脾胃，左尺候腎與膀胱，是已。肺與大腸合，心
與小腸合，心包絡與三焦合，皆手經也。其藏府不相

醫學續記

一

依附，則其診候亦不必同在一部。按內經云：尺外以
候腎，尺裡以候腹。又云：前以候前後，後以候後。上竟上
者，胸喉中事，是以大腸當候于右尺之裡，小腸當候
于左尺之裡，三焦分立上中下三部，如此則左心小
腸，右肺大腸之謬，可不辨而自著矣。

古方權量

古方湯液，分兩大者，每劑二十餘兩，小有十餘兩，用
水六七升，或一斗，煮取二、三升，或五、六升，並分三服。

一日服盡為劑似乎太重後世學者未敢遵式按陳
無擇三因方云漢銅錢質如周錢文曰半兩則漢方
當用半兩錢二枚為一兩且以木附湯方校若用漢
兩計一百八十銖得開元錢二十二个半重若分三
服則是今之七錢半重一服此說最有根據千金以
古三兩為今一兩古三升為今一升仍病其多不如
陳說為是

火齊湯

醫學續記

蒼公治病恒用火齊湯而其方不傳劉宗厚云即古
方黃連解毒湯是未知何據按倉公用治齊郎中令
之湧疝中熱不得前洩齊王太后之風痺熱客膠難
於大小便溺赤則亦清寒微熱之劑也夫

蟻瘕

蟻瘕為病腹大上黃膚粗循之戚戚然上黃面黃也
蓋即今人蟲蠱之病腹大面黃而肌膚粗濇者也

葱豉湯

肘後云傷寒有數種庸人卒不能分別今取一藥兼
療者用葱白一虎口豉一升水煮頓服汗出即愈按

本草淡豉治傷寒時疾熱病發汗元素云葱莖白通
上下陽氣合而用之故能通治數種傷寒然其方亦
有數變一加葛根三兩一加升麻三兩若不汗更加
麻黃三兩助之散也一加米三合益氣以出汗也一
加童便三升汗出于陽而生于陰火多者宜之也深
師又加烏梅十四枚葛根半斤兼治煩滿也聖濟總

醫學續記

錄加人參黃耆羚羊角治勞風項強急痛四肢煩熱
汗金加梔子黃連黃柏大黃各半兩一加生地石羔
各八兩生葛四兩為表裡証治之別以意斟酌投之
輒驗誠良方也

枳實梔子豉湯

仲景治大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之廣劑
加葱白粟米雄鼠糞范汪加桂枝大黃麻黃又方去
梔豉加甘草桂心大黃芒硝千金加石羔鼠糞崔氏

單加鼠糞一味古今錄驗加麻黃大黃一加鼠糞大黃一去梔鼓加鼠糞一加鼠糞麻黃一去梔子加甘草大黃芒硝許仁則又加葱白生薑乾葛麥冬生地或主表或主裡或兼主表裡或兼養或兼滋或表裡與滋養並施凡十餘變而梔鼓之法盡矣

鹹寒

熱淫於內治以鹹寒內經之旨也仲景療傷寒加芒硝於苦寒藥中文仲又加芒硝於甘寒藥中其方以生麥冬一升生地黃一升知母二兩生薑二兩半芒硝二兩半水煮分五服取利為度由是而鹹寒之用迺廣矣

醫學續記

四

酸苦涌泄

院河南治天除熱解毒多用苦酒猪膽生艾汁苦參青箱葶藶之屬外臺單用苦參一兩酒煮并服取吐如烱膠便愈張文仲療傷寒溫病等三日以上胸中滿用苦酒半升猪膽一枚和服取吐蓋即內經酸苦

涌泄之義然今人之用此者罕矣

五疰鬼氣

五疰鬼氣之病或助正氣以辟之如蘇合香丸之屬是也或假鬼氣以引之如死人枕天靈蓋之屬是也徐嗣伯劉大用恒用此法而嗣伯云鬼氣伏而不起故令人沉滯得死人枕促之魂氣飛越不得伏附體故只疰可差劉氏治婦人因人入廟為邪鬼所憑致精采蕩越與死人枕煎湯飲之大瀉數行而愈則是死人之枕引鬼氣或從上越或從下出隨其攸利與草木氣味升降浮沉各具一體性者不同今人亦罕有聞用之者矣

醫學續記

五

千金療尸疰方髮灰杏仁熬令紫色等分搗如泥以猪羔和酒服如桐子三丸日三神良愚謂此治血枯經絡滯閉成勞者之良方也亦即百勞塵蟲之意而氣味和調可以無弊或以桃仁易杏仁亦得

瘡

瘡之病熱氣舍于營寒氣居于衛寒居于衛則束其營之熱不得外越熱舍于營則阻其衛之寒不得內乘氣相抑而適相持是以傷寒易變而瘡病不遷也瘡邪不能自發必得人之正氣而後發故曰衛氣之所在與邪氣相合則病作瘡邪外不在皮膚內不在藏府是以汗之而不從外泄下之而不從裡出也

醫學續記

六

風氣常在瘡有時而休常在者其氣舒蓄而作者其氣暴故工不能治其已發也

瘡發已而邪遞淺者其作日蚤發已而復伏愈深者其作日宴日蚤者易已日晏者難已其始晏而終蚤者邪氣下行極而之上也是以瘡病欲愈一日反二三發其邪愈淺輒與衛氣相薄故也

瘡之為病邪正分爭往來不已有戰之義也治之必先助其正氣或急去其邪氣蓋正旺則邪自解邪去則正亦安也今有人體虛患瘡不數日而作漸晏勢

漸衰神氣反昏而不可救非正虛而邪陷之故歟

陰陽交

陰陽交之病古有其名而無能抉其義者愚謂交非交通之謂乃錯亂之謂也陰陽錯亂而不可復理攻其陰則陽捍之不得入攻其陽則陰持之不得通故曰交者死也郭白雲所謂卽是兩感之病蓋從汗出而熱不退處悟入然兩感究竟是陰陽齊病而非陰陽交病是以與先表後裏或表裏並治之法以其未嘗混合爲一也

醫學續記

七

崩中下血

婦人崩中下血多因濕熱傷脾胃而致蓋脾統血傷則失守也醫者不知其脾濕而但與固脫之劑血雖止而濕轉鬱矣是以崩中之後多成脹滿黃病醫多不能識此

耳聾治肺鼻塞治心

古云耳聾治肺肺主聲鼻塞治心心主臭愚謂耳聾

治肺者自是肺經風熱痰涎閉鬱之症肺之絡會於耳中其氣不通故令耳聾故宜治其肺使氣行則聾愈夫聲從外入非無聲也有聲而不能入也而謂肺主聲何哉其鼻塞治心者經云心肺有病而鼻爲之不利治心者蓋以利鼻豈曰致臭哉

噎膈反胃之辨

噎膈反胃自是二病世醫每連稱而並舉之者丹溪實作之備也丹溪曰其稿在上近咽之下水飲可行

醫學續記

八

食物難入入亦不多名之曰噎其稿在下與胃爲近食雖可入良久復出名之曰膈亦曰反胃是以噎膈分上下二病而以反胃屬之膈殊欠分明愚謂噎膈之所以反胃者以食噎不下故反而上出若不噎則并不反矣其反胃之病則全不噎食或遲或速自然吐出與膈病何相干哉二者病本不同治法亦異不可不辨

瀉痢不同

痢與泄瀉其病不同其治亦異泄瀉多起寒濕寒則宜溫濕則宜燥也痢病多成濕熱熱則宜清濕則宜利也雖泄瀉亦有熱症然畢竟寒多於熱痢病亦多寒症然畢竟熱多於寒是以泄瀉經久必傷胃陽而腫脹喘滿之變生痢病經久必損其陰而虛煩痿癱之疾起痢病兜澀太早濕熱流注多成痛痺泄瀉疎利或過中虛不復多作脾勞此予所親歷非臆說也或曰熱則清而寒則溫是已均是濕也或從利或從燥何歟曰寒濕者寒從濕生故宜苦溫燥其中濕熱者濕從熱化故宜甘淡利其下且燥性多熱利藥多寒便利則熱亦自去中溫則寒與俱消寒濕必本中虛不可更行滲利濕熱鬱多成毒不宜益以溫燥也

醫學續記

九

溫病風溫溫疫濕溫溫毒溫瘧之異

溫病者冬月伏寒化熱至春而發所謂春時陽氣發于冬時伏寒者是也風溫者溫病而兼新風發汗已則風氣去而溫氣發故身灼熱也溫疫者溫氣盛而

成癘也。濕溫者，溫氣而兼濕邪，濕能生溫，溫亦生濕也。溫毒者，溫氣發而不能遽散，怫鬱成毒，猶傷寒之有陽毒陰毒也。溫瘧者，溫病繫在少陽，時作時止，乍進乍退者也。春溫之症，輕重不同，舊有冬伏之寒邪，新感春時之風氣，其寒從風而併於外者，輕；其風從寒而併于內者，重矣。併于內者，治其內，毋遺其外；併于外者，治其外，毋傷其內。若舊伏之寒已變為熱，而更感春時之風，風熱相激，多成風瘧，其引之而隨出

醫學續記

者，輕；其發之而轉陷者，危矣。又有七情饑飽勞倦之人，復受六氣風寒暑濕之邪，若內就外而甚于外者，先治其外，而後調其內；若外就內而甚于內者，先治其內，而後調其外。王好古云：治內兼外者，不可寒下；若寒下則經邪陷于內矣。治外兼內者，不可熱發；若熱發則益中熱于外矣。又曰：外重而內輕者，先治其外，後治其內；若積寒傷冷，脈已從陰，雖有標病，不須治標，獨治內也。內既得溫，標病不發而自愈，何以然

發表之藥不遠熱也。故曰：陰症治本不治表，表本俱得，治標不治本，標本俱失。

溫邪之發陰，必先傷設有當行解散者，必兼滋陰之品於其中。昔人于葱豉湯中加童便于梔豉湯內加地黃麥冬，亦此意也。

溫毒發斑與傷寒發斑不同。溫毒之邪從內之外傷寒之邪從外入內，是以溫毒發斑者邪氣離裏而之表，其症輕傷寒發斑者邪氣盛于內而見于外，其症

醫學續記

十一

重盛于內者，必使下泄而後邪可去。華元化所謂須要下之，不可留于胃中是也。之於外者可從表而出之，郭白雲所謂其毒久鬱而發病不在裏，故不可下，必隨表症治之，當用葯解肌熱者是也。

目赤腫痛

目赤腫痛，人知降火而不知活血，所以多不得力。只用四物湯內地黃用生芍葯用赤，加酒蒸大黃赤茯苓薄荷葉治之，甚妙。此戴復菴法，余謂目赤腫痛人

知活血而不知治痰脾胃壅滯積熱生痰積痰生熱
輾轉相因氣沖頭目昏痛不已者須用半夏石菖蒲
黃芩只實茯苓陳皮微兼菊花白蒺藜之屬治之

口糜

王肯堂治許少薇口糜謂非干姜不愈卒如其言又
從子懋錡亦患此勢甚危急欲飲冷水與人參白朮
干姜各二錢茯苓甘草各一錢煎成冷飲日數服乃
已蓋土溫則火斂人多不能知此所以然者胃虛食

醫學續記

七

少腎水之氣逆而乘之則為寒中脾胃虛衰之火被
迫上炎作為口瘡其症飲食少思大便不實或手足
逆冷肚腹作痛是也

冷勞

虛勞之人氣血枯耗生氣不榮則內生寒冷張雞峯
所謂冷勞者是也宜建中復脈八味腎氣之屬甘溫
辛潤具生陽化陰之能者治之亦有邪氣淹滯經絡
瘀鬱者元珠所謂體虛 人最易感于邪氣當先和

解微利微下之次則調之醫不知而遽行補劑邪氣
不解往往致死是故虛勞之治固不必專以補陰降
火為事也

熱風

熱風熱化為風人頭目昏眩痛口鼻燥熱氣出
微惡風時時有熱者是也是雖辛涼不能解之孟詵
云患熱風人宜食牛乳謂其氣味甘寒而性濡潤能
使肌熱除而風自熄求之草木蘆根蔗漿梨汁之屬

醫學續記

七

性味相似亦內經風淫于內治以甘寒之旨也

食鹹頭汗出

一人食鹹頭汗如注食淡則否診之心脈獨大而搏
指因問曰燔欲飲乎曰然每晨起舌必有刺因悟所
以頭汗出者心火太盛而水不勝之也味鹹屬水而
能降火火與水搏火盛水微不能勝之而反外越也
其出于頭者水本潤下而火性炎上水為火激反從
其化也食淡則否者鹹味湧泄為陰淡味滲泄為陽

陽與陽從不相激射故得遂其滲泄之性而下行也

雜識

醫悟融會羣經貫穿百家不為名言高論而義理自著以視夸大其言而并適于用者奚啻霄壤

醫讀平易簡要可為中人以下說法要非熟讀羣書通曉方葯者不能為此

正本書辨論古方銖量權衡甚為詳悉以及唐宋醫局官制醫書本草湯液脈病並有卓見亦好古博雅

醫學續記

十四

之士歟

韓氏十四葯定經因時和解之法極意分晰而眉目未清絕無準繩而多所裁制逞一己之私意亂先聖之舊章不足為後學法也

辛丑夏五月十日燈下校讀

靜香樓醫案三十一條

古吳尤怡在涇著

後學

程梅齡雪門

校刊

張澹湖南

羅氏論虛勞之証都因邪伏血鬱而得不獨陰虧一端也至晚寒熱時減時增其為陽陷入陰可知滋腎生肝最為合法畧加損益不必更張可也

熟地

白芍

丹皮

茯苓

懷藥

柴胡

鼈甲

炙艸

靜香樓醫案

一

真陽氣弱不榮於筋則陰縮不固於裏則精出不衛於表則汗泄三者每相因而見其病在三陰之樞非後世方法可治古方八味丸專服久服當有驗也眩暈嘔惡胸滿小便短而數口中乾水虧於下風動於上飲積於中病非一端

羚羊角

鈎藤

半夏

小生地

天麻

竹茹

廣皮

茯苓

肝陽化風逆行脾胃之分液聚成痰流走肝膽之絡

左體麻痺心膈痞悶所由來也而風火性皆上行故
又有火升氣逆鼻衄等症此得之飢飽勞鬱積久而
成非一朝一夕之故矣治法清肝之火健脾之氣亦
非旦夕可圖也

羚羊角 橘紅 白朮 枳實

天麻 半夏 茯苓 甘艸

麥冬

肺陰不足肺熱有餘欬則涕出肌體惡風是熱從竅

靜香樓醫案

二

泄而氣不外護也他藏雖有病宜先治肺

阿膠 杏仁 貝母 北參

兜鈴 茯苓 炙艸 糯米

乾哈無痰是肝氣沖肺非肺本病仍宜治肝兼滋肝

氣可也

川連 白芍 烏梅 甘艸

當歸 牡蠣 茯苓

絡脈空隙氣必遊行作痛最慮春末夏初地中陽氣

上升血從氣溢趁此綢繆當填精益髓蓋陰虛欬嗽
是他臟累及於肺若治以清涼不但病不能去而胃
傷食減立成虛損難為力矣

海參 熟地 金櫻膏 麋角膠

湘蓮肉 北味 莢肉 懷藥

茯苓 芡實 卽將二膏搗丸

陰不足而陽有餘肝善逆而肺多鬱脈數氣喘欬逆

見血脇痛治宜滋降更宜靜養不爾恐其血逆不已

靜香樓醫案

三

也

小生地 荆炭 白芍 童便

鬱金 小薊 藕汁

離經之血未淨而鬱于內寒熱之邪交煽而亂其氣

是以腹滿嘔泄寒熱口燥治當平其亂氣導其積血

元氣雖虛未可驟補也

丹皮 查炭 澤蘭 赤芍

鬱金 丹參 牛膝 小薊

凡有瘀血之人其陰已傷其氣必逆茲以血紫黑無多而胸中滿悶痰猶未淨也而舌絳無苔則陰之虧也嘔吐不已則氣之逆也且頭重足冷有下虛上脫之慮惡寒譫語為陽弱氣餒之徵此症補之不投攻之不可殊屬棘手

人參 茯苓 山漆 吳萸

烏梅 牡蠣 川連 鬱金

少陰為陰之樞內司啓閉虛則失其常矣宜以法壯

靜香樓醫案

四

其樞或通或塞皆非其治

熟地 杞子 菟絲 茯苓

丹皮 萸肉 懷藥 沙苑

中氣虛寒得冷即瀉而又火升齒衄等症古人所謂

胸中聚集之殘火腹內積久之沉寒此當溫補中氣

俾土厚則火自斂

人參 茯苓 白朮 炙艸

乾薑 益智仁

肺實于上腎虛于下脾困于中之候也然而實不可攻姑治其虛中不可燠姑溫其下且腎為胃關而火為土母或有小補未可知也

金匱腎氣丸

汗出偏沮脈來不柔時自欬止肝陽有餘而胃陰不足於是稠痰濁火擾動于中壅滯于外目前雖尙安和然古人治未病不治已病知者見微知著自當加意調攝為佳

靜香樓醫案

五

人參 川斛 南棗 半夏

茯苓 炙艸 麥冬 丹皮

小麥

表虛易感風邪裏虛易作瀉上虛則眩下虛則夢泄

宜玉屏風散

黃芪 防風 白朮 茯苓

牡蠣 炙艸

臍中時有濕液腥臭按脈素大此少陰有濕熱也六

味能除腎間濕熱宜加減治之

六味去山藥加川柏萆薢車前女珍

下體失血之餘陰氣必傷邪乃乘虛直入陰中挾身中之虛陽而上逆頭熱肢冷欬喘氣沖至夜尤甚皆其驗也此症邪少虛多下虛上實不與大概時病同法此愚一偏之見也未識高明以為然否

生地 白芍 茯苓 麥冬

炙艸 元參

靜香樓醫案

六

瘧發而血上下溢得之中虛而邪復擾之也血去既多瘧邪尙熾中原之擾猶未已也誰能必其血之不復來耶謹按古法中虛血脫之症從無獨任血葯之理而瘧病經久亦必先固中氣茲擬理中一法止血在是止瘧亦在是惟高明裁之

人參 於朮 炮薑 炙艸

心者藏之臟心太勞則神散而心虛心虛則腎氣乘之故恐經所謂厥氣上則恐也是病始因心而及腎

繼因腎而心益困矣經云心欲冥腎欲堅心冥則善下故冥之必鹹腎堅則不浮堅之者必以苦又云高者抑之散者收之治心腎神志不收者法必本乎此以心為血藏腎為精藏欲神之守必養其血欲志之堅必益其精則甘潤生陰質重味厚之品又足為收神志之地也

人參 川連 懷藥 天冬

熟地 茯苓 五味 牡蠣

靜香樓醫案

七

黃肉 柏仁 桂心 驟驚恐懼手足逆冷少腹氣沖即厥陽縮汗出下元素虧收攝失司宜乎助陽以補納第消渴心悸忽然腹中空洞此風消肝厥非桂附剛劑所宜

炒黑杞子 舶茴香 當歸 桂木

紫石英 白龍骨 細辛

肝陰素虧風溫擾之發為瘧病神昏齒瘕痲不定法當滋養肝陰以榮筋脈清滌瘵熱以安神明者也

若能應手尙可無慮

羚羊角

茯神

勾藤

川貝

真阿膠

鮮苜蓿

鮮竹瀝

風熱上甚頭痛不已如鳥巢高巔宜射而去之

製軍

犀角

川芎

細茶

此腎厥心痛背脹映及腰中議用許學士香茸丸

鹿茸

杞子

沙苑

大茴香

麝香

靜香樓醫案

八

久欬脇痛不能左側病在肝逆在肺得之情志難以

驟驅治法不當求肺而當求肝

阿膠

白芍

茯苓

丹皮

茜艸

炙艸

鮑魚湯代水

肝藏失調侵脾則痛侮肺則乾欬病從內生非外感

客邪之比是宜內和藏氣不當外奪衛氣者也但脈

弱而數形瘁色稿上熱下寒根本已漓恐難全愈奈

何

當歸建中湯

風氣乘虛入於腎絡腰中痛引背脇宜寄生湯補虛

通絡祛風

生地

當歸

黑豆

獨活

懷藥

杜仲

白蒺

炙艸

桑寄生

肺之絡會于耳中肺受風火久而不清竅與絡俱為

之閉所以鼻塞不聞香臭耳聾耳鳴不聞音聲也茲

靜香樓醫案

九

當清通肺氣

蒼耳

薄荷

桔梗

連翹

辛荑

黃芩

山梔

杏仁

甘艸

木通

風熱久蓄腦髓發為鼻淵五年不愈此壅疾也則宜

通不通則不治

犀角

蒼耳

黃芩

杏仁

川芎

鬱金

寒熱後邪走手少陰之脈猝然不語肩臂牽引不舒
宜以辛通之

菖蒲 遠志 甘艸 木通

當歸 丹皮 丹參 茯神

脾虛生濕氣為之滯血為之不守此與血熱經多者
不同

焦朮 澤瀉 白芍 陳皮

炙艸 茯苓 川芎 牛角腮灰

靜香樓醫案

十

胎前病于腫產後四日即大泄泄已一笑而厥不省
人事及厥回神清而右脇前後痛滿至今三月餘矣
形瘦脈虛食少腹都滿足漸腫小便不利此脾病傳
心心不受邪即傳之肝肝受病而更傳之脾也此五
藏相賊與六府食氣水血成張者不同所以補攻遞
進而絕無一效也姑擬泄肝和脾法治之

白朮 木瓜 廣皮 椒目

茯苓 白芍

洄溪醫案

一卷

論醫札附

咸豐五年歲次乙卯十月海昌後學王士雄
昌發
世
世
世

洄溪醫案序

袁簡齋太史作靈胎先生傳云欲采其奇方異術以垂醫鑑而活蒼生因倉卒不可得僅載迨耕石汪令聞數條而語焉未詳余甚惜之今夏呂君慎齋以洄溪醫案鈔本一卷寄贈云得之徐氏及門金君復村者余讀之如獲鴻寶雖秘本而方藥不甚詳然其穿穴膏盲神施鬼設之伎足以垂醫鑑而活蒼生爰為編次竊附管窺用俟高明梓以傳世余殷望焉

咸豐五年歲次乙卯十月海昌後學王士雄

洄溪醫案序

洞溪醫案目次

中風

惡風

周痺

痺

傷寒

別足傷寒

外感停食

時證

洞溪醫案目次

遊魂

失魂

崇病

痘疫

暑

暑邪熱呃

瘧

痢

瘧痢

畏寒

畏風

痰

痰喘

痰喘亡陰

飲癖

翻胃

呃

癰

洞溪醫案目次

水腫

消

蟲痛

怔忡

亢陽

吐血

痰留經絡

腸紅

血痢

崩

瘀血衝厥

胎中毒火

子利

試胎

產後風熱

產後血瘕

產後腸癰

惡疽

泗溪醫案目次

三

流注

腸癰

腿癰

臂疽

項疽

對口

發背

對心發

肺癰

乳癰

下疳

筋瘤

泗溪醫案目次

四

洞溪醫案

吳江徐大椿著

海昌後學王士雄編

中風

封門金姓早立門首卒遇惡風口眼喎邪噤不能言醫用人參桂附諸品此近日時醫治風證不祧之方也趣余視之其形如尸面赤氣粗目瞪脈大處以祛風消痰清火之劑其家許以重賞留數日余曰我非行道之人可貨取也固請余曰與其誤藥以死莫若服此三劑醒而能食不服藥可也後月餘至余家拜謝問之果服三

洞溪醫案

劑而起竟不敢服他藥惟腿膝未健手臂猶麻為立膏方而全愈此正內經所謂虛邪賊風也以辛熱剛燥治之固非以補陰滋膩治之亦謬治以辛涼佐以甘溫內經有明訓也

運使王公敘揆自長蘆罷官歸里每向余言手足麻木而痰多余謂公體本豐腴又善飲啖痰流經脈宜搏節為妙一日忽昏厥遺尿口噤手拳痰聲如鋸皆屬危證醫者進參附熟地等藥煎成未服余診其脈洪大有力面赤氣粗此乃痰火充實諸竅皆閉服參附立斃矣以

小續命湯去桂附加生軍一錢為末假稱他藥納之恐旁人之疑駭也戚黨莫不譁然太夫人素信余力主服余藥三劑而有聲五劑而能言然後以消痰養血之藥調之十月後步履如初

張山蒼劉松岑素好飲後結酒友數人終年聚飲余戒之不止時年纔四十除夕向店沽酒秤銀手振秤墜而身亦仆地口噤不知人急扶歸歲朝遣人邀余與以至寶丹數粒囑其勿服他藥恐醫者知其酒客又新納寵必用也初五至其家竟未服藥診其脈弦滑洪大

洞溪醫案

半身不遂口強流涎乃瘕痰注經傳腑之證余用豁痰驅溼之品調之月餘而起一手一足不能如舊言語始終艱澁初無子病愈後連舉子女皆成立至七十三歲而卒誰謂中風之人不能永年耶凡病在經絡筋骨此為形體之病能延歲月不能除根若求全愈過用重劑必至傷生富貴之人聞此等說不但信且觸其怒于是諂諛之人羣進溫補無不死者終無一人悔悟也西門外汪姓新正出門遇友于途一揖而仆口噤目閉四肢癱瘓鼻歸不省人事醫亦用人參熟地等藥其母

1927 冊 續修四庫全書 子部 醫家類 五五六

前年曾抱危疾余爲之治愈故信余求救余曰此所謂
虛邪賊風也以小續命湯加減醫者駭謂壯年得此必
大虛之證豈可用猛劑其母排眾議而服之隔日再往
手攬余衣兩足踏地欲作叩頭勢余曰欲謝余乎亟點
首余止之復作垂涕感息狀余慰之且謂其母曰風毒
深入舌本堅硬病雖愈言語不能驟出毋驚恐而誤投
溫補也果月餘而後能言百日乃痊

東山席以萬年六十餘患風痺時醫總投溫補幸不至
如近日之重用參附病尙未劇余診之脈洪而氣旺此

洄溪醫案

三

元氣強實之體而痰火充盛耳清火消痰以治標養血
順氣以治本然經絡之痰無全愈之理于壽命無傷十
年可延也以平淡之方隨時增損調養數載年七十餘
始卒此所謂人實證實養正驅邪以調和之自可永年
重藥傷正速之死耳

叔子靜素無疾一日余集親友小酌叔亦在座喫飯至
第三碗僅半頭忽垂箸亦落同坐問曰醉耶不應又問
骨哽耶亦不應細視之目閉而口流涎羣起扶之別座
則頸已歪脈已絕痰聲起不知人矣亟取至寶丹灌之

始不受再灌而嚔下少頃開目問扶者曰此何地也因
告之故曰我欲歸扶之坐與內以歸處以驅風消痰安
神之品明日已能起惟軟弱無力耳以後亦不復發此
總名卒中亦有食厥亦有痰厥亦有氣厥病因不同如
藥不預備則一時氣不能納經絡閉塞周時而死如更
以參附等藥助火助痰則無一生者及其死也則以爲
病本不治非溫補之誤舉世皆然也

洄溪醫案

四

雄按資生經云有人忽覺心腹中熱甚或曰此中風
之候與治風藥而風不作夷陵某太守夏間忽患熱
甚乃以水灑地設簟臥其上令人扇之次日忽患中
風而卒人但咎其臥水簟而用扇也暨見一禮陽老
婦見證與太守同因服小續命湯而愈合而觀之乃
知中風由心腹中多大熱而作也徐氏之論正與此
合易曰風自火出諺云熱極生風何世人之不悟耶
若可用參附等藥者乃脫證治法不可誤施于閉證
也

惡風

湖州副總戎穆公廷弼氣體極壯忽患牙緊不開不能

飲食絕粒者五日矣延余治之晉接如常惟呼饑耳余啟視其齒上下止開一細縫撫其兩頰皮堅如革細審病情莫解其故因問曰此為惡風所吹公會受惡風否曰無之既而恍然曰誠哉二十年前曾隨圍口外臥帳房中夜半怪風大作帳房拔去卒死者三人我其一也灌以熱水二人生而一人死我初醒口不能言者二日豈至今復發乎余曰然乃戲曰凡治皮之工皮堅則消之我今欲用藥消公之頰皮也乃以蜈蚣頭蝎子尾及朴硝硼砂冰麝等藥擦其內又以大黃牙皂川烏桂心

涇溪醫案

五

等藥塗其外如有痰涎則吐出明晨余臥未起公啟戶曰真神仙也早已食粥數碗矣遂進以驅風養血膏而愈蓋邪之中人深則伏于藏府骨脈之中精氣旺則不發至血氣既衰或有所感觸雖數十年之久亦有復發者不論內外之證盡然亦所當知也

雄按皮膚頑痺非外治不為功此因其堅如革故多用毒烈之品也

周痺

烏程王姓患周痺證徧身疼痛四肢癱瘓日夕叫號飲

食大減自問必死欲就余一決家人垂淚送至舟中余視之曰此歷節也病在筋節非煎丸所能愈須用外治乃遵古法敷之揚之蒸之薰之旬日而疼痛稍減手足可動乃遣歸月餘而病愈大凡營衛藏府之病服藥可至病所經絡筋節俱屬有形煎丸之力如太輕則不能攻邪太重則恐傷其正必用氣厚力重之藥敷揚蒸之法深入病所提邪外出古人所以獨重鍼灸之法醫者不知先服風藥不驗即用溫補使邪氣久留即不死亦為廢人在在皆然豈不冤哉

涇溪醫案

六

雄按風藥耗營液溫補實隧絡皆能助邪益痛若輕淡清通之劑正宜頻服不可徒恃外治也

痺

新郭沈又高續娶少艾未免不節忽患氣喘厥逆語澇神昏手足不舉醫者以中風法治之病益甚余診之曰此內經所謂痺證也少陰虛而精氣不續與大概偏中風中風痰厥風厥等病絕不相類劉河間所立地黃飲子正為此而設何醫者反忌之耶一劑而喘逆定神氣清聲音出四肢展動三劑而病除八丸調以養精益氣

之品而愈余所見類中而宜溫補者止此一人識之以見余並非禁用補藥但必對證乃可施治耳

雄按古云真中屬實類中多虛其實不然若其人素稟陽盛過啖肥甘積熱釀痰壅塞隧絡多患類中治宜化痰清熱流利機關自始至終忌投補滯徐氏謂宜于溫補者不多見洵閱歷之言也

傷寒

蘇州柴行倪姓傷寒失下昏不知人氣喘舌焦已辨後事矣余時欲往揚州泊舟桐涇橋河內適當其門晚欲

洄溪醫案

七

登舟其子哀泣求治余曰此乃大承氣湯證也不必加減書方與之戒之曰一劑不下則更服下即止遂至揚月餘而返其人已強健如故矣古方之神效如此凡古方與病及證俱對者不必加減若病同而證稍有異則隨證加減其理甚明而人不能用若不當下者反下之遂成結胸以致聞者遂以下為戒顛倒若此總由不肯以仲景傷寒論潛心體認耳

別足傷寒

嘉善黃姓外感而兼鬱熱亂投藥石繼用補劑邪留經

絡無從而出下注于足兩脛紅腫大痛氣逆沖心呼號不寐余曰此所謂別足傷寒也足將落矣急用外治之法薰之蒸之以提毒散瘀又用丸散內消其痰火并化其毒涎從大便出而以辛涼之煎劑托其未透之邪三日而安大凡風寒留于經絡無從發洩往往變為癰腫上為發頤中為肺癰肝癰痞積下為腸癰便毒外則散為斑疹瘡瘍留于關節則為痿痺拘攣注於足脛則為別足矣此等證俱載于內經諸書自內外科各分一門此等證遂無人知之矣

洄溪醫案

八

外感停食

淮安大商場秀倫年七十四外感停食醫者以年高素封非補不納遂致聞飯氣則嘔見人飲食輒叱曰此等臭物虧汝等如何喫下不食不寢者匝月惟以參湯續命而已慕名來聘余診之曰此病可治但我所立方必不服不服則必死若徇君等意以立方亦死不如竟不立也羣問當用何藥余曰非生大黃不可眾果大駭有一人曰姑俟先生定方再商其意蓋謂千里而至不可不周全情面俟藥成而私棄之可也余覺其意煎成親

至病人所強服旁人皆惶恐無措止服其半是夜即氣平得寢並不瀉明日全服一劑下宿垢少許身益和第三日侵晨余臥書室中未起聞外譁傳曰老太爺在堂中埽地余披衣起詢告者曰老太爺久臥思起欲親來謝先生出堂中因果穀盈積乃自用帚掠開以便步履旋入余臥所久談早膳至病者觀食自向碗內撮數粒嚼之且曰何以不臭從此飲食漸進精神如舊羣以為奇余曰傷食惡食人所共知去宿食則食自進老少同法今之醫者以老人停食不可消止宜補中氣以待其自消此等亂道世反奉為金鍼誤人不知其幾也余之得有聲淮揚者以此

洞溪醫案

九

時證

西塘倪福徵患時證神昏脈數不食不寢醫者謂其虛投以六味等藥此方乃浙中醫家不論何病必用之方也遂粒米不得下咽而煩熱益甚諸人束手余診之曰熱邪留于胃也凡外感之邪久必歸陽明邪重而有食則結成燥矢三承氣主之邪輕而無食則凝為熱痰三瀉心湯主之乃以瀉心湯加減及消痰開胃之藥兩劑

而安諸人以為神奇不知此乃淺近之理傷寒論具在細讀自明也若更誤治則無生理矣

雄按韓堯年年甫踰冠體素豐而善飲春間偶患血溢廣服六味等藥初夏患身熱痞脹醫投瀉心陷胸等藥遂脹及少腹且拒按大便旁流小溲不行煩熱益甚湯飲不能下嘔譫語唇焦改用承氣紫雪亦如水投石延余視之黃苔滿厚而不甚燥脈滑數而按之虛爽不過溼熱阻氣升降不調耳以枳桔湯加白前紫苑射干馬兜鈴杏仁厚朴黃芩用蘆根湯煎一

洞溪醫案

十

劑譫語止小溲行二劑旁流止胸漸舒三劑可進稀糜六劑胸腹皆舒粥食漸加改投清養法又旬日得解燥矢而愈諸人亦以為神奇其實不過按證設法耳

又按今夏衣賈戴七患暑溼余以清解法治之熱退知飢家人謂其積勞多虛遽以補食啖之三日後二便皆閉四肢腫痛氣逆衝心呼號不寐又乞余往視乃餘邪得食而熾壅塞胃府氣實則經氣亦不通而機關不利也以葦莖湯去薏苡加萸仁枳實梔子

服子黃芩桔梗煎調元明粉外用葱白杵爛和鹽塗之小溲先通大便隨行三日而愈

游魂

郡中蔣氏子患時證身熱不涼神昏譫語脈無倫次余診之曰此游魂證也雖服藥必招其魂因訪招魂之法有鄰翁謂曰我聞虔禱竈神則能自言父如其言病者果言曰我因看戲小臺倒幾被壓受驚復往城隍廟中散步魂落廟中當以肩輿擡我歸如言往招明日延余再診病者又言我魂方至房門爲父親衝散今早魂臥

洄溪醫案

十二

被上又爲母親疊被掉落今不知所向矣咆哮不已余慰之曰無憂也我今還汝因用安神鎮魂之藥加猪心尖辰砂絳帛包裹懸藥罐中煎服戒曰服藥得寢勿驚醒之熟寐卽神合果一劑而安調理而愈問之俱不知也

失魂

平湖張振西壁鄰失火受驚越數日而病發無大寒熱煩悶不食昏倦不寐余視之頗作寒暄語而神不接余曰此失魂之證不但風寒深入而神志亦傷不能速愈

亦不可用重劑以前方祛邪以丸散安神乃可漸復時正歲除酌與半月之藥而歸至新正元宵始知身在臥室間問前所爲俱不知也至二月身已健同其弟元若來謝候余山中且曰我昨晚腦後起一瘰微痛余視之驚曰此玉枕疽也大險之證此地乏藥急同之歸外提內托諸法並用其弟不能久留先歸明晨我子大驚呼余曰張君危矣余起視之頭大如斗脣厚寸餘日止細縫自頂及肩膿泡數千惟神不昏憤毒未攻心尙可施救急遣舟招其弟余先以護心藥燻之毋令毒氣攻內

洄溪醫案

十三

乃用煎劑從內托出外用軟堅消腫解毒提膿之藥敷之一日而出毒水斗餘至晚腫漸消皮皺明日口舌轉動能食竟不成疽瘡口僅如錢大數日結痂其弟聞信而至已愈八九矣凡病有留邪而無出路必發腫毒患者甚多而醫者則鮮能治之也揚州吳運臺夫人患消證晝夜食粥數十碗氣逆火炎通夕不寐余診之六脈細數不倫神不清爽余曰此似祟脈必有他故其家未信忽一日僕婦晨起入候見牀上一女盛妝危坐以爲夫人也諦視則無有因以告夫

人曰此女常臥我牀內以此不能成寐而煩渴欲飲耳服余藥未甚效一夕夜將半病者大呼曰速請三舅爺來切不可啟門啟門則我魂必走出三舅爺者即其弟唐君悔生也臥室遠隔呼之不能聞女僕私啟門邀之魂即隨出徧歷廳堂廊廡及平昔足未經行者遇唐君趨至魂堅執其辭仍返房見已身臥床上唐君撫之魂遂歸附于身問所寓目皆不爽細攷所見之女乃運臺聘室也未成婚而卒卒之時囑其父母謂吳郎必顯貴我死須懇其血食我而葬我于祖墓運臺服官後未暇

洞溪醫案

十一

辨故爲祟運臺謂余曰君言有爲祟者攷果驗真神人也將何以慰之余曰鬼有所歸乃不爲厲公當迎柩厝墓立位而祀之可也運臺依余言以行然後服藥有功而病根永除矣

祟病

同里朱翁元亮僑居郡城歲初其媳往郡拜賀其舅舟過婁門見城上蛇王廟俗云燒香能免生瘡腫因往謁焉歸即狂言昏冒舌動如蛇稱蛇王使二女僕一男僕來迎延余診視以至寶丹一丸遣老嫗灌之病者言此

係毒藥必不可服含藥噴嫗嫗亦仆不省人事舌伸頸轉亦作蛇形另易一人灌藥病者言一女使被燒死矣凡鬼皆以硃砂爲火也次日煎藥內用鬼箭羽病者又言一男使又被射死矣鬼以鬼箭爲矢也從此漸安辨以消痰安神之品月餘而愈此亦客忤之類也非金石及通靈之藥不能奏效

洞溪醫案

十二

林家巷周宅看門人之妻縊死遇救得甦余適寓周氏隨衆往看急以紫金錠搗爛水灌之而醒明日又縊亦遇救余仍以前藥灌之因詢其求死之故則曰我患心疼甚有老嫗勸我將繩繫頸則痛除矣故從之非求死也余曰此嫗今安在則曰在裏牀視之無有則曰相公來已去矣余曰此縊死鬼汝痛亦由彼作祟今後若來汝即嚼余藥噴之婦依余言嫗至曰爾口中何物欲害我耶詈罵而去其自述如此蓋紫金錠之辟邪神效若此

同學李鳴古性誠篤而能文八分書爲一時冠家貧不得志遂得奇疾日夜有人罵之聞聲而不見其形其罵語惡毒不堪遂憊恨終日不寢不食多方曉之不喻也

其世叔何小山先生甚憐之同余往診李曰我無病惟有人罵我耳余曰此卽病也不信小山喻之曰子之學問人品人人欽服豈有罵汝之人耶李變色泣下曰他人勸我猶可世叔亦來勸我則不情甚矣昨日在間壁罵我一日卽世叔也何今日反來面諛耶小山云我昨在某處竟日安得來此且汝間壁是誰家我何從入愈辨愈疑惟垂首浩歎而已卒以憂死

瘟疫

雍正十年崑山瘟疫大行因上年海嘯近海流民數萬

洄溪醫案

五

皆死於崑埋之城下至夏暑蒸尸氣觸之成病死者數千人汪翁天成亦染此證身熱神昏悶亂煩躁脈數無定余以清涼芳烈如鮮菖蒲澤蘭葉薄荷青蒿蘆根茅根等藥兼用辟邪解毒丸散進之漸知人事因自述其昏暈時所歷之境雖言之鑿鑿終虛妄不足載也余始至崑時懼應酬不令人知會翁已愈余將歸矣不妨施濟語出而求治者二十七家檢其所服皆香燥升提之藥與證相反余仍用前法療之歸後有葉生爲記姓氏愈者二十四死者止三人又皆爲他醫所誤者因知死

者皆枉凡治病不可不知運氣之轉移去歲因水溼得病溼甚之極必兼燥化內經言之甚明況因證用藥變化隨機豈可執定往年所治祛風逐溼之方而以治瘟邪燥火之證耶

雄按風溼之邪一經化熱卽宜清解溫升之藥咸在禁例喻氏論疫主以解毒躋矣而猶表彰敗毒散一方不知此方雖名敗毒而羣集升散之品凡溫邪燥火之證犯之卽死用者審之

暑

洄溪醫案

五

同學趙子雲居太湖之濱患暑痢甚危留治三日而愈時值亢旱人忙而舟亦絕少余欲歸不能惟鄰家有一舟適有病人氣方絕欲往震澤買棺乞借一日不許有一老嫗指余曰此卽治趙某病愈之人也今此婦少年戀生甚故氣不卽斷盍求一診余許之脈絕而心尙溫皮色未變此暑邪閉塞諸竅未卽死也爲處清暑通氣方病家以情不能卻借舟以歸越數日子雲之子來詢之一劑而有聲二劑能轉側三劑起矣

余寓郡中林家巷時值盛暑優人某之母忽嘔吐厥僵

其形如尸而齒噤不開已辨後事矣居停之僕慙優求救于余余因近鄰往診以箸啟其齒咬箸不能出余曰此暑邪閉塞諸竅耳以紫金錠二粒水磨灌之得下再服清暑通氣之方明日余泛舟游虎阜其室臨河一老嫗坐窗口榻上彷彿病者歸訪之是夜黃昏即能言更服煎劑而全愈此等治法極淺極易而知者絕少蓋邪逆上諸竅皆閉非芳香通靈之藥不能即令通達徒以煎劑灌之即使中病亦不能入於經竅况又誤用相反之藥豈能起死回生乎

洞溪醫案

十七

蘆墟迮耕石暑熱壞證脈微欲絕遺尿譫語尋衣摸牀此陽越之證將大汗出而脫急以參附加童便飲之少甦而未識人也余以事往郡戒其家曰如醒而能言則來載我越三日來請亟往果生矣醫者謂前藥已效仍用前方煎成未飲余至曰陽已回火復熾陰欲竭矣附子入咽即危命以西瓜啖之病者大喜連日啖數枚更飲以清暑養胃而愈後來謝述昏迷所見有一黑人立其前欲啖之即寒冷入骨一小兒以扇驅之曰汝不怕霹靂耶黑人曰熬爾三霹靂奈我何小兒曰再加十個

西瓜何如黑人惶恐而退余曰附子古名霹靂散果服三劑非西瓜則伏暑何由退其言皆有證據亦奇事也雄按袁簡齋太史作靈胎先生傳載此案云先投一劑須臾目瞑能言再飲以湯竟躍然起故張柳吟先生以為再飲之湯當是白虎湯今原案以西瓜啖之因西瓜有天生白虎湯之名而袁氏遂下一湯字致啟後人之疑序事不可不慎此類是矣

洞溪醫案

本

以回其陽其祖有難色余曰辱在相好故不忍坐視亦豈有不自信而嘗試之理死則願甘償命乃勉飲之一劑而汗止身溫得寐更易以方不十日而起同時東山許心三之孫倫五病形無異余亦以參附進舉室皆疑駭其外舅席際飛篤信余力主用之亦三劑而復但此證乃熱病所變因熱甚汗出而陽亡苟非脈微足冷汗出舌潤則仍是熱證誤用即死死甚多傷心慘目此等方非有實見不可試也

雄按舌潤二字最宜切記

閩門內香店某姓患暑熱之證服藥既誤而樓小向西樓下又香燥之氣薰爍津液厥不知人舌焦目裂其家去店三里欲從烈日中擡歸以待斃余曰此證固危然服藥得法或尚有生機若更暴於烈日之中必死於道矣先進以至寶丹隨以黃連香薷飲兼竹葉石膏湯加蘆根諸清涼滋潤之品徐徐灌之一夕而目赤退有聲神氣復而能轉側二日而身和能食稀粥乃歸家調養而痊

雄按此證已津液受燥舌焦目裂矣則用至寶丹不

洞溪醫案

九

如用紫雪而香薷亦可議也

常熟席湘北患暑熱證已十餘日身如熾炭手不可近煩躁昏沉聚諸汗藥終無點汗余曰熱極津枯汗何從生處以滋潤清芳之品三劑頭先有汗漸及手臂繼及遍身而熱解蓋發汗有二法溼邪則用香燥之藥發汗即以去溼燥病則用滋潤之藥滋水即以作汗其理易知而醫者茫然可慨也

洞庭後山席姓者暑邪內結厥逆如尸惟身未冷脈尚微存所謂尸厥也余謂其父曰邪氣充塞逼魂於外通

其諸竅魂自返耳先以紫金錠磨服後用西瓜蘆根蘿蔔甘蔗打汁時時灌之一日兩夜納二大碗而漸甦問之則曰我坐新廟前大石上三日見某家老嫗某家童子忽聞香氣撲鼻漸知身在室中有一人臥床上我與之相并乃能開目視物矣新廟者前山往後山必由之路果有大石詢兩家老嫗童子俱實有其事此類甚多不能盡述其理固然非好言怪也

閩門龔孝維患熱病忽手足拘攣呻吟不斷昏亂昏迷延余診視脈微而躁膚冷汗出陽將脫矣急處以參附

洞溪醫案

二十

方親戚滿座謂大暑之時熱病方劇力屏不用其兄素信余違眾服之身稍安明日更進一劑漸甦能言余乃處以消暑養陰之方而愈

郡中友人蔣奕蘭氣體壯健暑月於親戚家祝壽喫湯餅過多回至閩門又觸臭穢痧暑夾食身熱悶亂延醫治之告以故勉用輕藥一劑亦未能中病也况食未消而暑未退豈能一劑而愈明日復診曰服清理而不愈則必虛矣即用參附是夕煩躁發昏四肢厥冷復延名醫治之曰此虛極矣更重用參附明日熱冒昏厥而斃

余往唁之傷心慘目因念如此死者遍地皆然此風何時得息又傷親故多遭此禍歸而作慎疾芻言刻印萬冊廣送諸人冀世人之或悟也

雄按慎疾芻言今罕流傳海豐張柳吟先生加以按語改題曰醫砭欲以砭庸流之陋習也余已刊入叢書

暑邪熱呃

東山席士俊者暑月感冒邪留上焦神昏呃逆醫者以為壞證不治進以參附等藥呃益甚余曰此熱呃也呃

河溪醫案

三

在上焦令食西瓜羣醫大譁病者聞余言即欲食食之呃漸止進以清降之藥二劑而諸病漸愈又有厥沈君倫者年七十時邪內陷而呃逆是時余有揚州之行乃囑相好尤君在涇曰此熱呃也君以枇杷葉鮮蘆根等清降之品飲之必愈尤君依余治之亦痊蓋呃逆本有二因由于虛寒逆從臍下而起其根在腎為難治由于熱者逆止在胸臆間其根在胃為易治輕重懸絕世人謂之冷呃而概從寒治無不死者死之後則云凡呃逆者俱為絕證不知無病之人先冷物後熱物冷熱相爭

亦可呃逆不治自愈人所共見何不思也

瘧

洞庭姜錫常長郎佩芳體素弱而患久瘧時余應山前葉氏之招便道往晤佩芳出診色天脈微而動易出汗余駭曰汝今夕當大汗出而亡陽矣急進參附或可挽回其父子猶未全信姑以西洋參三錢偕附子飲之仍回葉宅夜二鼓叩門聲甚急啟門而錫常以肩輿來迎至則汗出如膏兩目直視氣有出無入猶賴服過參附陽未遽脫適余偶帶人參錢許同附子童便灌入天明

河溪醫案

三

而汗止陽回始知人事然猶聞聲即暈倦臥不能起者兩月而後起坐上工治未病此之謂也如此危急之證不但誤治必死即治之稍遲亦不及挽回養生者醫理不可不知也

痢

崇明施姓遷居郡之盤門其子患暑毒血痢晝夜百餘行痛苦欲絕嘉定張雨亭其姻戚也力懇余診之余曰此熱毒蘊結治之以黃連阿膠等藥一服而去十之七八矣明日再往神清氣爽面有喜色余有事歸家約隔

日重來歸後遇風潮連日行舟斷絕三日後乃得往診病者怒目視余問以安否厲聲而對曰用得好藥病益重矣余心疑之問其父曾服他人藥否隱而不言余甚疑之辭出有二醫者入門因託雨亭訪其故其父因余不至延郡中名醫仍進以人參乾薑等藥給病者曰視汝脈者此地名醫而藥則用徐先生方也及服而痛愈劇痲益增故恨余人骨耳豈不冤哉又聞服藥之後口乾如出火欲啖西瓜醫者云痢疾喫西瓜必死欲求凉水尤禁不與因給其童取井水嗽口奪盆中水飲其半

洞溪醫案

三

號呼兩日而死近日治暑痢者皆用傷寒論中治陰寒八臟之寒痢法以理中湯加減無不腐臟慘死甚至有七竅流血者而醫家病家視爲一定治法死者接踵全不知悔最可哀也

東山葉寶倫患五色痢每日百餘次余悉治痢之法治之五六日疾如故私竊怪之爲撫其腹腹內有塊大小各一儼若葫蘆形余重揉之大者裂破有聲暴下五色濃垢斗許置烈日中光彩眩目以後痢頓減飲食漸進再揉其小者不可執持亦不能消痢亦不全止令其不

必專力治之惟以開胃消積之品稍稍調之三四月而後塊消痢止大抵積滯之物久則成囊成癖凡病皆然古人原有此說但元氣已虛不可驟消惟養其胃氣使正足自能驅邪但各有法度不可并邪亦補之耳

瘧痢

東山姜錫常氣體素弱又患瘧痢每日一發寒如冰而熱如炭隨下血痢百餘次委頓無生理因平日相契不忍委之朝夕診視爲分途而治之寒禦其寒熱清其熱痢止其痢俱用清和切病之品以時消息而最重者在

洞溪醫案

三

保其胃氣無使生機又絕經云食養盡之無使過之傷其正也諸證以次漸減而愈或謂如此大虛何以不用峻補余曰寒熱未止必有外邪血痢未清必有內邪峻補則邪留不去如此虛人可使邪氣日增乎去邪毋傷正使生機漸達乃爲良策錫常亦深會此意而醫理漸明嗣後小病皆自治之所謂三折肱者也

畏寒

洞庭卜夫人患寒疾有名醫進以參附日以爲常十年以來服附子數十觔而寒愈劇初冬卽四面環火綿衣

幾重寒慄如故余曰此熱邪併於內逼陰於外內經云熱深厥亦深又云熱極生寒當散其熱使達於外用蘆根數兩煎清涼疎散之藥飲之三劑而去火十劑而減衣常服養陰之品而身温逾年附毒積中者盡發周身如火燒服寒涼得少減既又遍體及頭面口鼻俱生熱瘡下體俱腐爛膿血淋漓余以外科治熱毒之法治之一年乃復以後年彌高而反惡熱與前相反如不知其理而更進以熱藥則熱併於內寒併于外陰陽離絕而死死之後人亦終以為陽虛而死也

洄溪醫案

三五

畏風

嘉善許閣學竹君夫人抱疾醫過用散劑以虛其表繼用補劑以固其邪風入營中畏風如矢閉戶深藏者數月與天光不相接見微風則發寒熱而暈延余視余至臥室見窗榻皆重布遮蔽又張帷于牀前煖帳之外周以檀單診其脈微爽無陽余曰先為藥誤而避風太過陽氣不接衛氣不閉非照以陽光不可且曬日中藥乃效閣學謂見日必有風奈何曰姑去其瓦令日光下射曬之何如如法行之三日而能啟窗戶十日可見風諸

病漸愈明年閣學挈眷赴都舟停河下邀余定常服方是日大風臨水窗候脈余甚畏風而夫人不覺也蓋衛氣固則反樂于見風此自然而然不可勉強也

雄按論證論治可與戴人頡頏

痰

嘉興朱宗周以陽盛陰虧之體又兼痰凝氣逆醫者以温補治之胸膈否塞而陽道痿羣醫謂脾腎兩虧將恐無治就余于山中余視其體豐而氣旺陽升而不降諸竅皆閉笑謂之曰此為肝腎雙實證先用清潤之品加

洄溪醫案

三五

石膏以降其逆氣後以消痰開胃之藥滌其中宮更以滋腎強陰之味鎮其元氣陽事即通五月以後妾即懷孕得一女又一年復得一子惟覺周身火太旺更以養陰清火膏丸為常饌一或間斷則火旺隨發委頓如往日之情形矣而世人乃以熱藥治陽痿豈不謬哉

雄按今秋藩庫吏孫位申積勞善怒陡然自汗凜寒腕疼欬逆嘔吐苦水延余診之脈弦爽而滑形瘦面黎苔黃不渴溲赤便難以二陳去甘草加沙參竹茹枇杷葉竹葉黃連萸仁為劑渠云陽痿已匝月矣恐

不可服此涼藥余曰此陽氣上升為痰所阻而不能下降耳一服逆平痛定嘔罷汗止即能安穀原方加人參旬日陽事即通諸恙若失

蘇州府治東首楊姓年三十餘以狎游私用父千金父庭責之體虛而兼鬱怒先似傷寒後漸神昏身重醫者以為純虛之證惟專峻補每日用人參三錢痰火愈結身強如尸舉家以為萬無生理余入視時俱環而泣余診畢又按其體偏身皆生痰核大小以千計余不覺大笑泣者盡駭余曰諸人之泣以其將死耶試往府中借

涇溪醫案

三

大板重打四十亦不死也其父聞之頗不信曰如果能起現今喫人參費千金矣當更以千金為壽余曰此可動他人余無此例也各盡其道而已立清火安神極平淡之方佐以未藥一服三日而能言五日而能坐一月而行動如常其時牡丹方開其戚友為設飲花前以賀余適至戲之曰君服人參千金而幾死服余未藥而愈藥本可不償乎其母舅在旁曰必當償先生明示幾何余曰增病之藥值千金去病之藥自宜倍之病者有驚惶色余曰無恐不過八文錢買葡萄子為末耳尚有服贖

者羣取視之果葡萄子也相與大笑其周身結核皆補住痰邪所凝成者半載方消邪之不可留如此幸而結在膚膜若入臟則死已久矣

雄按今夏劉午亭年六十三歲久患痰喘自汗羣醫皆以為虛補劑備施竟無效徐月巖囑其挽余視之汗如雨下扇不停揮睛凸額高面浮頸大胸前痞塞脈滑而長妻女哀求慮其暴脫余曰將塞死矣何脫之云與導痰湯加旋覆海石澤瀉白前一飲而減七日後額門始平匝月而愈繼有顧某年五十六歲肥

涇溪醫案

三

白多痰因啖蓮子匝月漸覺不饑喘逆自汗無眠以為虛也屢補之後氣逆欲死速余視之苔黃澀赤脈滑不調以清肺滌痰治之而愈旋以茯苓飲善其後

痰喘

松江王孝賢夫人素有血證時發時止發則微嗽又因感冒變成痰喘不能著枕日夜俯几而坐竟不能支持矣是時有常州名醫法丹書調治無效延余至余曰此小青龍證也法曰我固知之但弱體而素有血證麻桂等藥可用乎余曰急則治標若更喘數日則立斃矣且

治其新病愈後再治其本病可也法曰誠然病家焉能知之治本病而死死而無怨如用麻桂而死則不咎病本無治而恨麻桂殺之矣我乃行道之人不能任其咎君不以醫名我不與聞君獨任之可也余曰然服之有害我自當之但求先生不阻之耳遂與服飲畢而氣平就枕終夕得安然後以消痰潤肺養陰開胃之方以次調之體乃復舊法翁頗有學識並非時俗之醫然能知而不能行者蓋欲涉世行道萬一不中則謗聲隨之余則不欲以此求名故毅然用之也凡舉事一有利害

洞溪醫案

三九

關心即不能大行我志天下事盡然豈獨醫也哉

雄按風寒外束飲邪內伏動而為喘嗽者不能舍小青龍為治案中云感冒是感冒風寒設非風寒之邪麻桂不可擅用讀者宜有會心也

痰喘亡陰

蘇州沈母患寒熱痰喘挽其婿毛君延余診視先有一名醫在座執筆沉吟曰大汗不止陽將亡矣奈何非參附熟地乾薑不可書方而去余至不與通姓名俟其去乃入診脈洪大手足不冷喘汗淋漓余顧毛君曰急買

浮麥半合大棗七枚煮湯飲之可也如法服而汗頓止乃為立消痰降火之方二劑而安蓋亡陽亡陰相似而實不同一則脈微汗冷如膏手足厥逆而舌潤一則脈洪汗熱不粘手足溫而舌乾但亡陰不止陽從汗出元氣散脫即為亡陽然當亡陰之時陽氣方熾不可即用陽藥宜收斂其陽氣不可不知也亡陰之藥宜涼亡陽之藥宜熱一或相反無不立斃標本先後之間辨在毫髮乃舉世更無知者故動輒相反也

洞溪醫案

三九

雄按吳馥齋令姊體屬陰虧歸沈氏後余久不診上

年聞其久嗽服大劑滋補而能食肌充以為愈矣今夏延診云嗽猶不愈及往視面浮色赤脈滑不調舌絳而乾非肉不飽曰此痰火為患也不可以音嘶脇痛遂疑為損怯之未傳子清肺化痰藥為丸噲化使其廓清上膈果膠痰漸吐各恙乃安其形復瘦始予養陰善後病者云前進補時體頗漸豐而腰間疼脹畧一撫摩嗽即不已自疑為痰而醫者謂為極虛所致補益加峻致釀為偏體之痰也

觀察毛公裕年屆八旬素有痰喘病因勞大發俯几不

能臥者七日舉家驚惶延余視之余曰此上實下虛之證用清肺消痰飲送下人參小塊一錢三劑而愈毛翁曰徐君學問之深固不必言但人參切塊之法此則聰明人以此術奇耳後歲餘病復作照前方加入參煎入而喘逆愈甚後延余視述用去年方而病有加余曰莫非以參和入藥中耶曰然余曰宜其增病也仍以參作塊服之亦三劑而愈蓋下虛固當補但痰火在上補必增盛惟作塊則參性未發而清肺之藥已得力過腹中而人參性始發病自獲痊此等法古人亦有用者人自

洞溪醫案

三

不知耳于是羣相歎服

雄按痰喘礙眠亦有不兼虛者黃者華年踰五旬自去冬因勞患喘迄今春兩旬不能臥顧某作下喘治病益甚又旬日迂余視之脈弦滑苔滿布舌邊絳乃冬溫薄肺失于清解耳予輕清肅化藥治之而痊至參不入煎欲其下達與丸藥喻化欲其上戀皆有妙義用藥者勿以一煎方爲了事也又有虛不在陰分者余治方嘯山今秋患痰喘汗多醫進清降藥數劑遂便瘡肢冷不食礙眠氣逆腕疼面紅汗冷余診之

脈弦爽無神苔白不渴乃寒痰上實腎陽下虛也以真武湯去生薑加乾薑五味人參厚朴杏仁一劑知二劑已又治顧某體肥白脈沉弱痰喘易汗不渴痰多嘔粥即嘔以六君去甘草加厚朴杏仁薑汁川連蓋中虛痰滯也投七果痊

飲癖

洞庭席載岳素腸下留飲發則大痛嘔吐先清水後黃水再後吐黑水而兼以血哀苦萬狀不能支矣愈則復發余按其腹有塊在左脇下所謂飲囊也非消此則病

洞溪醫案

三

根不除法當外治因合蒸藥一料用麪作團放藥在內上蓋銅皮以艾火蒸之日十餘次蒸至三百六十火而止依法治三月而畢塊盡消其病永除年至七十七而卒此病極多而醫者俱不知雖輕重不一而蒸法爲要雄按今夏江陰沙沛生齋尹患胸下痞悶腹中聚塊臥則膈間有氣下行至指而惕然驚寤余謂氣鬱飲停治以通降適渠將赴都自慮體弱有醫者迎合其意投以太劑溫補初若相安旬日後神呆不語目眩不饑便閉不眠寒熱時作復延余診按其心下則濯

濯有聲環臍左右塊已累累溺赤苔黃脈弦而急幸其家深信有年旁無掣肘凡通氣滌飲清絡舒肝之劑調理三月各恙皆瘳

翻胃

嘉興朱亭立曾任廣信太守向病嘔吐時發時愈是時吐不止粒米不下者三日醫以膈證回絕其友人來邀診余曰此翻胃證非膈證也膈乃胃腑乾枯翻胃乃痰火上逆輕重懸殊以半夏瀉心湯加減治之漸能進食尋復舊從此遂成知己每因飲食無節時時小發且不

洞溪醫案

三

善飯如是數年非余方不服甚相安也後余便道過其家謂余曰我遇武林名醫謂我體虛非參附不可今服其方覺強旺加餐余謂此乃助火以腐食元氣必耗將有熱毒之害亭立笑而腹非之似有恨不早遇此醫之意不兩月遣人連夜來迎即登舟抵暮八其寢室見牀前血汗滿地駭問故亭立已不能言惟垂淚引過作泣別之態而已蓋血涌斗餘無藥可施矣天明而逝十年幸活殞于一朝天下之服熱劑而隱受其害者何可勝數也

雄按服溫補藥而強旺加餐病家必以為對證矣而孰知隱受其害哉更有至死而猶不悟者目擊甚多可為歎息

婁門范昭素患翻胃粒米不能入咽者月餘胸中如有物蠢動余曰此蟲膈也積血所成舉家未信余處以開膈末藥佐以硫黃三劑後吐出瘀血半甌隨吐蟲二十餘枚長者徑尺短者二寸色微紫其腸俱空乃藥入而蟲積食之皆洞腸而死者舉家驚喜以為病愈余曰未也姑以粥與之連進二碗全然不嘔更覺寬適頃之粥

洞溪醫案

三

停不下不能再食余曰胃腑已為蟲蝕無藏食之地無救也辭不復用藥不旬日而卒

呃

郡中陸某患呃逆不過偶爾胃中不和挾痰挾氣世俗所謂冷呃也不治自愈非若病後呃逆有虛實寒熱之殊關於生死也陸乃膏粱之人從未患此遂大懼延醫調治醫者亦大駭云此必大虛之體所以無病見此即用人參白朮等藥痰火凝結而胃絡塞呃遂不止病者自問必死舉家驚惶余診視之不覺狂笑其昆仲在旁

怪而問故余曰不意近日諸名醫冒昧至此此非病也
劑即愈矣以瀉心湯加旋覆花枇杷葉果一劑而呃
止越一月呃又發仍用前日諸醫治之數日而死其老
僕素相熟偶遇于他所問其主人安否因述其故余曰
前幾死我以一劑救之何以蹈覆轍曰眾論紛紛謂補
藥一定不錯直至臨死時欲來敦請已無及矣嗚呼豈
非命耶

雄按吳兩峯大令年七十一歲今秋患感發熱而兼
左脇偏痛舌色乾紫無苔稍呷湯飲小溲即行不食

洄溪醫案

三五

不便脈洪且數余知其平素津虛脾約氣滯痰凝連予
輕肅宣濡之劑熱漸緩脇漸舒而舌色不潤仍不喜
飲溲亦便閉呃忒頻來舉家皇皇余曰無恐也便行
即止矣踰二日連得暢解脈靜身涼舌色有津呃仍
不減人皆謂高年病後之虛呃議用鎮補余曰此氣
為痰阻升降失調得食不舒平時無噎是其徵也投
以枳桔湯加黃蘗苜蓿半柴胡果一劑知二劑已
瘥
學旨後金汝玉忽患小便不通醫以通利導之水愈聚

洄溪醫案

而溺管益塞腹脹欲裂水氣沖心即死再飲湯藥必不
能下而反增其水余曰此因溺管閉極不能稍通也以
殺腫藥塗之使溺器天腫隨以消腫之藥解之一腫一
消溺管稍寬再以藥湯洗少腹而擠之蓄溺涌出而全
通矣此無法中之法也

水瀆某亦便閉七日腹脹如鼓偃僕不能立沖心在頃
刻矣就余山中求治余以鮮車前根搗爛敷其腹用諸
利末藥內服又煎利水通氣藥使坐湯中令人揉擠之
未幾溺迸出灑及揉者之面溺出斗餘其所坐木桶幾
滿腹寬身直徜徉而去

洄溪醫案

三五

雄按兩外治法皆妙

水腫

洞庭席君際飛形體壯實喜飲善啖患水腫病先從足
起遂及遍身腰滿腹脹服利水之藥稍快旋即復腫用
鍼針之水從鍼孔出則稍寬鍼眼閉則復腫內經有刺
水病之法其穴有五十又須調養百且且服閉藥而
此法失傳所以半難療余所治皆愈而復發遂至不
救雖因病者不能守法亦由醫治法不全耳惟皮水風

水則一時之驟病驅風利水無不立愈病固各不同也

消

常熟汪東山夫人患消證夜尤甚每夜必以米二升煮薄粥二十碗而溲便不異常人此乃為火所燥也先延郡中葉天士治以烏梅木瓜等藥斂其胃氣消證少瘥而煩悶羸瘦飲食無味余謂此熱痰凝結未有出路耳以清火消痰兼和中開胃調之病情屢易隨證易方半年而愈

蟲痛

洞溪醫案

三

蘇州黃四房女年十二患腹痛愈醫愈甚余偶至其家昏厥一夕方甦舌俱咬破流血盈口唇白而目猶直視脈參錯無常余曰此蟲痛也貫心則死非煎藥所能愈合化蟲丸與之痛稍緩忽復更痛吐出蟲二十餘條長者徑尺紫色餘長短不齊淡紅色亦有白者自此而大痛不復作小痛未除蓋其窠未去也復以殺蟲之藥兼安胃補脾之方調之而蟲根遂絕蓋此證甚多醫者既不能知惟認為寒與食即以爲蟲又無殺蟲之方在精力強旺者久能自化其不足者變爲丁奚勞怯痞廠等

證至死而人不能知亦可哀也余治此證不二姑舉其最劇者以明治法

常州蔣公諱斌之孫患心腹痛上及于頭時作時止醫藥罔效向余求治余曰此蟲病也以殺蟲之藥蟲即遠避或在周身皮膚之中或在頭中按之如有蠕動往來之象余用殺蟲之藥為未調如糊到處敷上而以熱物熨之蟲又逃之他處隨逃隨敷漸次平安而根終不除遂授方令歸越三年書來云蟲根終未盡但不甚為害耳此真奇疾也

洞溪醫案

三

怔忡

淮安巨商程某母患怔忡日服參朮峻補病益甚聞聲即暈持厚聘邀余余以老母有恙堅辭不往不得已來就醫診視見二女僕從背後抱持三女僕徧體敲摩呼太太無恐吾儕俱在也猶驚惕不已余以消痰之藥去其涎以安神之藥養其血以重墜補精之藥納其氣稍得寢半月餘驚恐全失開船放炮亦不為動船擠喧嚷歡然不厭蓋心為火藏腎為水藏腎氣挾痰以衝心水能剋火則心振蕩不能自主使各安其位則不但相

一第1027 冊 頁多四庫全書第 8 反文句

剋而且相濟自然之理也

長興趙某以經營過勞其心患怔忡證醫者議論不一遠來就余余以消痰補心之品治其上滋腎納氣之藥治其下數日而安此與程母病同而法稍異一則氣體多痰誤服補劑水溢而火受剋之證一則心血虛耗相火不甯侵犯天君之證不得混淆也

亢陽

姻戚殷之晉年近八旬素有腸紅證病大發飲食不進小腹高起陰囊腫亮昏不知人余因新年賀歲候之正

泗溪醫案

五

辦後事余診其脈洪大力先以竈灰石灰作布袋置陰囊于上袋溼而囊腫消飲以知母黃柏瀉腎之品越三日余飲于周氏周與至戚相近半里忽有叩門聲啟視之則其子扶病者至在座無不驚喜同問余曰何以用伐腎之藥而愈余曰此所謂欲女子而不得也眾以為戲言翁曰君真神人也我嚮者館穀京師患亦相似主人以為無生理也遂送我歸歸旬日即痊今妻妾盡亡獨處十餘年貧不能蓄妾又恥為苟且之事故病至此既不可以告人亦無人能知之者言畢悽然淚下又

泗溪醫案

閱五年而卒蓋人之氣稟各殊亢陽之害與縱慾同非通于六經之理與岐黃之奧者不足與言也

雄按縱慾固傷陰而亢陽亦燥陰知槩瀉腎者瀉腎火之有餘而保其不足之水也

吐血

平望鎮張瑞五素有血證歲辛丑余營葬先君託其買磚灰等物鄉城往返因勞瘁而大病發握手泣別謂難再會矣余是時始合瓊玉膏未試也贈以數兩而去自此不通音問者三四載一日鎮有延余者出其前所服

泗溪醫案

四

方問何人所寫則曰張瑞五曰今何在曰即在館橋之右即往候之精神強健與昔迥異因述服瓊玉膏後血不復吐嗽亦漸止因涉獵方書試之頗有效以此助館穀所不足耳余遂導以行醫之要惟存心救人小心敬慎擇清淡切病之品俾其病勢稍減即無大功亦不貽害若欺世徇人止知求利亂投重劑一或有誤無從挽回病家縱不知我心何忍瑞五深以為然後其道大行遂成一鎮名家年至七十餘而卒瓊玉膏為治血證第一效方然合法頗難其時不用人參祇用參鬚生地則

以浙中所出鮮生地打自然汁熬之不用乾地黃治血證舍此無有無弊者

雄按行醫要訣盡此數語所謂以約失之者鮮學者勿以為淺論也

洞庭吳倫宗夫人席翁士俊女也向患血證每發余以清和之藥調之相安者數年郡中名醫有與席翁相好者因他姓延請至山適遇病發邀之診視見余前方謂翁曰此陽虛失血此公自命通博乃陰陽不辨耶立溫補方加鹿茸二錢連服六劑血上冒連吐十餘碗一身

洞溪醫案

聖

之血盡脫脈微目閉面青脣白奄奄待斃急延余治余曰今藏府經絡俱空非可以輕劑治亟以鮮生地十觔絞汁煎濃畧加人參末徐徐進之歷一晝夜盡生地汁稍知人事手足得展動脣與面紅白稍分更進阿膠三七諸養陰之品調攝月餘血氣漸復夫血脫補陽乃指大脫之後陰盡而陽無所附肢冷汗出則先用參附以回其陽而後補其陰或現種種虛寒之證亦當氣血兼補豈有素體陰虛之人又遇氣升火旺之時偶爾見紅反用大熱升發之劑以擾其陽而燥其陰乎此乃道聽

塗說之人聞有此法而不能深思其理誤人不淺也

嘉興王蔚南久患血證左脇中有氣逆衝喉旁血來有聲如沸戊子冬忽大吐數升面色白而帶青脈微聲啞氣喘不得臥危在旦夕余以阿膠參七等藥保其陰而止其血然後以降火納氣之品止其衝逆復以補血消痰健脾安胃之方上下分治始令能臥繼令能食數日之後方能安臥大凡脫血之後斷不可重用人參升氣助火亦不可多用滋膩以助痰滯胃要知補血之道不過令其陰陽相和飲食漸進則元氣自復非補劑入腹即變為氣血也若以重劑塞其胃口則永無生路矣况更用溫熱重劑助陽燥陰而速之死乎

洞溪醫案

聖

洞庭張姓素有血證是年為女辦裝過費心力其女方登轎張忽血冒升餘昏不知人醫者濃煎參湯服之命懸一息邀余診視六脈似有如無血已脫盡急加阿膠參七少和人參以進脈乃漸復目開能言手足展動然後純用補血之劑以填之月餘而起蓋人生不外氣血兩端血脫則氣亦脫用人參以接其氣氣稍接即當用血藥否則孤陽獨旺而陰愈虧先後主客之分不可不

辨也

痲留經絡

烏鎮莫秀東患奇病痛始于背達于胸脇晝則飲食如常暮乃痛發呼號徹夜鄰里慘聞醫治五年家資蕩盡秀東欲自縊其母曰汝有子女之累尚須冀念不如我死免聞哀號之聲欲赴水其戚憐之引來就醫余曰此痲血留經絡也因謂余子熾曰此怪病也廣求治法以療之非但濟人正可造就已之學問因留于家用針灸熨榻煎丸之法無所不備其痛漸輕亦漸短一月而愈其

涇溪醫案

三

人感謝不置余曰我方欲謝子耳凡病深者須盡我之技而後奏功今人必欲一劑見效三劑不驗則易他醫子獨始終相信我之知己也能無感乎

腸紅

淮安程春谷素有腸紅證一日更衣忽下血斗餘暈倒不知人急灌以人參一兩附子五錢而甦遂日服人參五錢附子三錢而雜以他藥參附偶間斷則手足如冰語言無力醫者亦守而不變僅能支持急棹來招至則自述其全賴參附以得生之故診其六脈極洪大而時

伏面赤有油光舌紅而不潤目不交睫者旬餘矣余曰病可立愈但我方君不可視也春谷曰我以命託君止求效耳方何必視余用茅草根四兩作湯兼清涼平淡之藥數品與參附正相反諸戚友俱駭春谷弟風衣明理見道之士也謂其諸郎曰爾父千里招徐君信之至徐君慨然力保無虞任之至安得有誤耶服一劑是夕稍得寢二劑手足溫三劑起坐不眩然後示之以方春谷駭歎諸人請申其說余曰血脫扶陽乃一時急救之法脫血乃亡陰也陽氣既復即當補陰而更益其陽則

涇溪醫案

四

陰血愈虧更有陽亢之病其四肢冷者內經所謂熱深厥亦深也不得臥者內經所謂陽勝則不得入于陰陰虛故目不瞑也白茅根交春透發能引陽氣達于四肢又能養血清火用之使平日所服參附之力皆達于外自能手足溫而臥矣于是始相折服凡治血脫證俱同此

雄按論治既明而茅根功用尤為發人所未發

血痢

洞庭葛允誠患血痢五年日夜百餘次約去血數石骨

瘦如柴飲食不進舉家以為必無生理余友姜君錫常
次子萼芳從余學醫于山中病者即萼芳妻弟也錫常
憐之令同萼芳寄膳余家朝夕診視余先用滋補之劑
以養其血脈復用開胃之藥以滋其化源稍健而能食
久痢至五載大腸之內必生漏管遂以填補之品塞其
空竅痢日減飯日增不半年而每食飯必六七碗至冬
病全愈豐肥強壯歸至家親戚俱不相識認無不歎以
為奇

崩

河溪醫案

四三

徽州鹽商汪姓始富終貧其夫人年四十六以憂勞患
崩證服參附諸藥而病益劇延余治之處以養血清火
之劑而病稍衰蓋此病本難除根也越三年夫卒欲往
武林依其親戚過吳江求方且泣曰我遇先生而得生
今遠去病發必死耳余為立長服方且贈以應用丸散
而去閱十數年郡中有洋客請治其室人一白頭老嫗
出拜余驚問曰我即汪某妻也服先生所贈方藥至五
十二而崩證絕今已六十餘強健逾昔我婿迎我于此
病者即我女也不但求治我女必欲面謝故相屈耳蓋

崩證往往在五十歲以前天癸將絕之時而衝任有火
不能攝納橫決為害至五十以後天癸自絕有不藥而
愈者亦有氣旺血熱過時而仍有此證者當因時消息
總不外填陰補血之法不知者以溫熱峻補氣愈旺而
陰愈耗禍不旋踵矣此極易治之病而往往不治蓋未
能深攷其理而誤殺之耳

瘀血衝厥

東山水利同知借余水利書余往索出署突有一人攔
輿喊救命謂我非告狀欲求神丹奪命耳其家即對公

河溪醫案

四二

署因往視病者死已三日方欲入棺而脣目忽動按其
心口尚溫誤傳余能起死回生故泥首哀求余辭之不
獲乃給之曰余舟中有神丹可救因隨之舟中與黑神
丸二粒教以水化灌之非能必其效也隨即歸家後復
至山中其人已生蓋此乃瘀血衝心厥而不返黑神丸
以陳墨為主而以消痰鎮心之藥佐之為產後安神定
魄去瘀生新之要品醫者苟不預備一時何以奏效乎

胎中毒火

南門陳昂發夫人懷娠三月胎氣上逆舌腫如蛋色紫

黑粒米不能下醫者束手延余治余曰此胎中有毒火衝心舌爲心苗故毒聚于舌腫塞滿口則飲食絕矣乃用珠黃散及解毒軟堅之藥屢塗其舌腫漸消而納食復用清涼通氣之方消息治之或謂解毒清火與胎有害余曰不然胎氣旺甚愈涼愈安但熱毒傷陰當滋養其血氣耳乃專服余藥學生二子後詢其得病之故乃會聽邪人之言服不經之藥幾致傷生可爲戒也

子利

爛溪潘開子表弟其夫人懷娠患痢晝夜百餘次延余

洄溪醫案

聖

視余以黃芩湯加減兼養胎藥飲之利遂減飲食得進而每日尙數十次服藥無效余曰此不必治名曰子利非產後則不愈但既產恐有變證耳病家不信更延他醫易一方則利必增劇始守余言止服安胎藥少許後生產果甚易而母氣大衰虛象百出適余從浙中來便道過其門復以產後法消息治之病痊而利亦止蓋病有不必治而自愈強求其愈必反致害此類甚多不可不知也

雄按此所謂利卽是泄瀉古人名曰利下非今之痢

也痢疾古名滯下若胎前久痢不愈產後其能免于

試胎

余往候族兄龍友坐談之際有老嫗惶遽來曰無救矣余駭問故龍友曰我姪婦產二日不下穩婆已回絕矣問何在曰卽在前巷余曰試往診之龍友大喜卽同往漿水已涸疲極不能出聲穩婆猶令用力迸下余曰無恐此試胎也尙未產勿強之扶令安臥一月後始產產必順且生男穩婆聞之微哂作不然之態且曰此何人說此大話我收生數十年從未見有如此而可生者其

洄溪醫案

聖

家亦半信半疑余乃處以養血安胎之方一飲而胎氣安和全無產意越一月果生一男而產極易衆以爲神龍友請申其說曰凡胎旺而母有風寒勞碌等感動則胎墜下如欲生之象安之卽愈不知而以爲真產強之用力則胎漿破而胎不能安矣余診其胎脈甚旺而月分未足故知不產今已搖動其胎將來產時必易脫故知易產左脈甚旺故知男胎此極淺近之理人自不知耳

產後風熱

西濠陸炳若夫人產後感風熱瘀血未盡醫者執產後屬虛寒之說用乾薑熟地治之且云必無生理汗出而身熱如炭唇燥舌紫仍用前藥余是日偶步田間看菜花近炳若之居趨迎求診余曰生產血枯火熾又兼風熱復加以剛燥滋膩之品益火塞竅以此死者我見甚多非石膏則陽明之盛火不解遵仲景法用竹皮石膏等藥余歸而他醫至笑且非之謂自古無產後用石膏之理蓋生平未見仲景方也其母素信余立主服之一劑而甦明日炳若復求診余曰更服一劑病已去矣無

洞溪醫案

癸

庸易方如言而愈醫者羣以為怪不知此乃古人定法惟服薑桂則必死

產後血癥

蘇州顧某繼室產後惡露不出遂成血癥醫者束手顧君之兄掌夫余戚也延余治之余曰此瘀血凝結非桃仁等所能下古法有抵當湯今一時不及備以唐人法用肉桂黃連人參大黃五靈脂成劑下其瘀血羣醫無不大笑謂寒熱補瀉并相犯之藥合而成方此怪人也其家因平日相信與服明日掌夫告余曰病不可治矣

病者見鬼竊飲所服藥乃大呼曰我不能食鬼之所吐也先生可無治矣余往驗之藥本氣味最烈之品嘗之與水無二怪之仍以前方煎成親往飲之病者不肯飲以威迫之懼而飲是夕下瘀血升餘而腹漸平思食余以事暫歸隔日復往其門首挂榜燒楮余疑有他故人門見者皆有喜色詢之則曰先生去之夕病者夢其前夫人怒曰汝據余之室奪余之財虐余之女余欲傷汝命今為某所治余將為大蛇以殺汝即變為大蛇大驚而醒故特延僧修懺耳蓋前夫人以產後血癥亡病狀如一而醫者治不中病遂致不起蓋一病有一病治法學不可不博也

洞溪醫案

辛

產後腸癰

洞庭某婦產後小腹痛甚惡露不止奄奄垂斃余診之曰惡露如此多何以其痛反劇更詢其所行之物又如膿象余曰此乃子宮受傷腐爛成癰也宜令名手穩婆探之果然遂用絲作條裹入生肌收口之藥而內服解毒消瘀之方應手而愈凡產後停瘀每多外證如此甚多不可不知也

惡痘

吳超士家僮已弱冠隨超士往戲館觀劇因寒熱作而先歸夜半呻吟不絕至明旦往視則匿於牀下口稱羣鬼欲殺之拽出視之細點如麩余曰此惡痘也色暗紫急以升麻羌活生地等藥煎湯灌之三日而痘形出偏體無毫孔頭面結聚重疊始終用滋養氣血之品不用時下惡藥一味二十餘日始結痂焦黑成片大如手掌形如缸片剝去之後非復本來面目見者俱不相識可知痘證之必死者絕少皆醫以寒涼剋伐之藥誤之也

洞溪醫案

五

毛履和之女患痘醫者曰此悶痘也五日而斃舉家扼腕適余至曰先生亦治痘否余曰醫者不肯治之痘則治曰已回絕矣因入視偏體太熱神昏不語細點如魚子隱在肉中余急以升麻羌活湯為主而佐以養血透肌藥飲之三日而痘形顯前醫羣駭告之以故則又大笑曰升麻羌活等藥豈入痘科不知升麻湯乃痘證初起之主方而醫者不知也繼以養血解毒補氣之品其結痂也額如覆釜身如樹皮髮連痂脫三年始生時醫見此等證必用大黃石膏及惡毒之物虛其裏而增其

毒五日而死之言必驗病家亦以為醫者斷期如神孰知非其識之高乃其藥之靈也嗚呼慘哉

余同學沈冠雲之女痘密黑陷而無漿醫者束手冠雲告以故余曰姑處以補托之法用地黃歸身黃芪人參等藥聞者咸笑一服而漿來至明日以參貴停服余曰精力不充毒發未盡未盡必生痘毒後果臂灣生二毒復為治之而安

洞溪醫案

五

余長孫女種痘點密而色深赤種痘之醫束手余用清發之藥并時合紫雪赤色稍衰將就寢復往視忽變灰白色而咬牙余驚曰證變虛寒矣此所謂亢害承制也即用人參鹿茸等藥托之至三鼓而瘡色復紅形漸高起仍用清火養血一方而漿成蓋病變無常頃刻轉易故凡屬危險之證醫者當時時消息不可片刻離也但不明理之醫則偏僻固執又方法絕少不能肆應不窮耳

流注

蘇州一小兒甫九齡頗聰慧而患流注肩背腰脇十餘處百端醫治無效余視之曰此惟大活絡丹能愈服至

三十餘丸未破者消已破者收口更服補氣血之藥而愈蓋流注一證由風寒入膜所致膜在皮中旁通四達初無定處所以隨處作患此真脈絡之病故古人製大活絡丹以治之其餘煎丸皆非正治所謂一病有一病之法藥不對證總難取效也

本邑劉近曾夫人患虛痰流注色眊脈虛發無定處病極危險非旦夕可奏功余辭不能治郡中一醫以百金包好因留在家治之聞余有不能治之說笑曰我醫好後更請徐君質之當無言可對耳月餘劉君之兄元谷

洞溪醫案

五三

招余診近曾出曰流注之疾雖向愈而未收口託在相好肯一觀否余因視之肩後瘡孔大如錢內膜乾空與皮不連氣促脈微診畢而出近曾求方余笑不答書危在頃刻四字劉不信少頃內呼劉父子入已氣絕矣羣執包好之醫欲加以無禮余曉之曰此病本不治非藥誤也但不知生死為無目耳乃釋之蓋流注之證其類不同大段皆津液枯而痰流膜內之證當內外交治而祛邪補虛亦另有切病方藥蠻補無益也
嘉善張卓舟未弱冠患流注五年自脇及腰腿連生七

八孔寒熱不食僅存人形歷年共服人參二三千金萬無生理父母先亡只有慈母其伯悉收其田產文契專待其斃而取之其從兄汪千造余家哀懇余頗憐之破格往視半身幾成枯骨此乃虛痰流注醫者不能治其經絡之痰徒費重貲而無一中病者則藥之誤而非病之真無治也余用大活絡丹為主而外敷拔管生肌之藥醫者聞之大笑曰活絡丹辛暴之藥豈可入口蓋彼惟知俗本所載烏頭蚯蚓之活絡丹而不知古方五十餘味之大活絡丹也蓋流注之痰全在於絡故非活絡丹不效以後膿稀肉長管退筋舒漸能起立不二年而肌肉豐肥強健反逾於常嗚呼不知對病施藥徒事蠻禱舉世盡然枉死者不知其幾也

洞溪醫案

五三

雄按大活絡丹治虛痰流注深為合法而外科不知也若實痰則控涎丹最妙

腸癰

長興朱季舫少子嘯虎官性極聰敏年九歲腹痛腳縮抱膝而臥背脊突出一節晝夜哀號徧延內外科診視或云損證或云宿食或云發毒當刺突出之骨以出膿

血其西席茅豈宿力薦余治往登其堂名醫滿座豈宿
借余診視余曰此縮腳腸癰也幸未成膿四日可消聞
者大笑時季舫為灤州牧其夫人孔氏名族之女獨信
余言余先飲以養血通氣之方并護心丸痛遂大減諸
醫謂偶中耳明日進消癰逐毒丸散謂曰服此又當微
痛無恐其夜痛果稍加諸醫聞之譁然曰果應我輩之
言也明早又進和營順氣之劑痛止八九而腳伸脊平
果四日而能步諸醫以次辭去中有俞姓者儒士也虛
心問故余謂雜藥亂投氣血傷矣先和其氣血自得稍

河溪醫案

三五

安繼則攻其所聚之邪安能無痛既乃滋養而通利之
則藏府俱安矣

南濠徐氏女經停數月寒熱減食肌肉消爍小腹之右
下達環跳隱痛微腫醫者或作怯弱或作血痺俱云不
治余診其脈洪數而滑寒熱無次謂其父曰此瘀血為
癰已成膿矣必自破破後必有變證宜急治與以外科
托毒方并丸散即返山中越二日天未明叩門甚急啟
視則徐之戚也云膿已大潰而人將脫矣即登其舟往
視膿出升餘脈微膚冷陽隨陰脫余不及處方急以參

附二味煎湯灌之氣漸續而身漸溫然後以補血養氣
之品兼托膿長肉之藥內外兼治兩月而漏口方滿精
神漸復月事以時大凡瘀血久留必致成癰產後留瘀
及室女停經外證極多而醫者俱不能知至膿成之後
方覓外科施治而外科又不得其法以致枉死者比比
然也

腿癰

橫涇錢某之女素有痞塊從腹入少腹又從少腹入環
跳之下大腿外臙變成大癰膿水淋漓成管管中有飯
粒流出真不可解日漸狼狽諸醫束手其父泣而告余
曰寒儉之家服人參已費百金而毫無效驗唯有立而
視其死耳余曰人參不可長繼祛膿填漏外科自有正
方也乃為合治漏之藥內服外敷所服末藥亦有從瘡
口流出者繼乃漸少胃氣亦開肌肉內生數月之後癰
結筋舒前此從未生育期年懷孕生子凡治病各有對
證方藥非可以泛治之方圖僥倖也

臂疽

長興周某之子臂生疽經年膿水不乾變為多骨所食

河溪醫案

三五

米粒間有從疽中出者奄奄待斃余為內托外敷所服
末藥亦從瘡口出繼而膿漸減少所出碎骨皆膿結成
出盡之後肌肉日長口收痂結而愈

項疽

郡中朱姓患項疽大痛徹心時時出血延醫施治漫腫
滋甚神思昏迷束手待斃延余視急用圍藥裹住根盤
敷以止血散飲以護心丸痛緩血止神安得寢明日前
醫來告以故醫謂同一金黃散我用無效彼用神驗此
命運不同非藥異也彼蓋不知圍藥每病各殊耳瘡口

洞溪醫案

五七

已定乃大托其膿兼以消痰開胃之品飲食漸進坐臥
皆安兩月而愈凡治癰疽之法在視其人之肥瘠瘦弱
之軀尤忌見血瘡口若大則肌肉難生所以最重圍藥
其方甚多不可不廣求而預備也

同學沈自求喪子憂愁鬱結疽發于項調治無效項三
倍瘡口環頸長尺餘闊三寸惟近咽喉處二寸未連而
枕骨直下之筋未斷血流不止余辭不治堅懇不已先
進護心丸二粒令毒不內攻又付止血散止其血外用
圍藥厚塗束其根更以珠黃等藥時時敷瘡口上其膏

藥長一尺三寸再以黃芪四兩煎湯煎藥服之勢定而
飲食稍進數日血止膿成肌與腐肉方有界限瘡口太
大皮肉不能合以生肌等藥并參末厚塗而封之月餘
口乃合病家欲備人參勸許以待用余曰無庸也諸痛
痒瘡皆屬于火膿流肉腐皆傷于陰凡屬外證總以清
火養陰為主而加開胃健脾之藥人參止用錢許數劑
即止此從古一定之法其用溫補乃後世訛傳之術無
不陰受其害余凡治大證無不神效時人多不之信也
蘇州章倚文夫人體質本弱平時飲食絕少忽患項毒

洞溪醫案

五六

平漫不腫痛輒應心醫者謂大虛之證投以峻補毒伏
神昏奄奄一息延余視之余曰毒無補理瘡口不高則
以圍藥束之飲以清涼養血之品托毒于外兼服護心
丸痛定而瘡根漸收余暫歸轉託一醫代治醫者強作
解事曰圍藥不過金黃散之類無益也去之用藥亦意
為改易以炫已能瘡遂散大血出不止痛復甚而神疲
余再至大駭詢之乃知其故醫者乃不復生議論于是
仍用前法膿成食進而後得安蓋外科病不治者絕少
皆由醫之不得其道所以動手輒誤病變日增而藥無

一驗即束手無策矣

對口

白龍橋吳時臣年七十餘矣患對口痛欲絕余視其外無圍藥瘡內反有插藥五條乃三品一條槍此古方蝕頑肉之惡藥而近日醫者誤以為必用之品所以痛極昏迷余悉拔去糝以珠黃解毒散其痛立除而神安復用圍藥裹住其根使瘡頭高而膿易出或謂七旬之人精力已衰宜用溫補余曰外證俱屬火苟非現證虛寒從無用熱藥之理進清涼開胃之劑胃氣開則肌肉自

洞溪醫案

五

生調養月餘而愈精神較勝前矣

平湖徐掄齋陰毒對口頸項漫腫而色紫有頭如痘者百餘神煩志亂醫者束手就治于余余曰此乃陰毒兼似有崇其家為述患病之後鬼聲繞屋鬼火不斷余曰且敷藥試之色稍鮮腫亦稍消明晨視之色轉淡紅其如痘者俱出微膿而低奘中聚一頭亦不甚大勢已消其十之三神亦漸清而思飲食病雖屬陰亦不可用熱藥以增邪火惟和血通氣使營衛充盈使血中一點真陽透出則陰邪自退若用熱補則反助毒火而生機益

絕故治外科之陰證非若傷寒之陰證為外感之寒邪可專用桂附以驅之也今之號外科者惟捨內科之緒論以為熱可禦寒則貽害不小矣

發背

洞庭吳姓從徐州經紀返棹背起粟粒深紫色而痛應心周圍肌肉皆不仁知非輕證未至家而就余治余辭不能再三懇求姑用圍藥束之稍定病者謂我尚未到家當歸處分家事求借一廛如果不治死無餘憾歸二日而復來其瘡不甚大頂微高而堅黑當用刀挑破方

洞溪醫案

六

可上藥以洋刀點之洋刀堅利非凡竟不能入用力挑之刀頭折乃用金鍼四面刺之以洩毒氣內托外敷其方屢變然後膿從四旁出頑蓋自落約深半寸脊骨隱露其尖亦腐去急以生肌散填補之內服峻補之劑兩月而肉滿皮完此九死一生之證不早為外束內托則焦骨攻藏無生理矣

周莊陸姓疽發背周徑尺餘一背盡腫頭以百計毒氣內攻沉悶昏迷醫者以平場無頭用桂附托之余曰此瘡止宜收小若欲加高則根盤如此之大而更加高則

背馱栲栳矣此乃火毒用熱藥必死乃以東根提毒之藥敷之一夕而瘡頭俱平皮膚亦潤止有大頭如杯高起于大椎骨之下大三寸許尚不思飲食惟求食西瓜醫嘯以入口即死余令縱其所食一日之內連喫大西瓜兩個明日知饑欲求肉飯食肉四兩飯半碗明日更加始終用托毒清火之劑而膿成口歛余囑曰此疽初起盈背背中脂膜皆空非填補裏膜必有他變有庸醫獻媚曰病已全愈爲此說者圖厚謝也我力能保之病家利其省費從之至來年二月忽舊疤中一細眼流血不止放血斗餘兩日而卒蓋其前一背盡腫其中之脂膜俱化成膿從大口出盡庸醫安知治法貪利誤人富貴之家往往最信此等人可不省察耶

涇溪醫案

三

對心發

郡中唐廷發偶過余寓時方暑謂背上昨晚起一小癩搔之甚痒先生肯一看否余視之駭曰此對心發也唐不甚信曰姑與我藥余曰君未信余言一服藥而毒大發反疑我誤君矣含笑而去明日已大如酒杯而痛甚乃求醫治余曰此非明少換方不可我不能久留郡寓

奈何因就醫余家且暮易法其中變遷不一卒至收日其收口前十日忽頭痛身熱神昏譫語瘡口黑陷六脈參差余適出門兩日歸而大駭疑爲瘡證變重幾無可藥細詢其僕乃貪涼當風而臥瘡口對風膏藥又落風貫瘡中即所謂破傷風也乃從外感治法隨用風藥得汗而解身涼神清瘡口復起仍前治法而痊若不審其故又不明破傷風治法則必無效惟有相視其解而已

肺癰

涇溪醫案

三

蘇州錢君復庵咳血不止諸醫以血證治之病益劇余往診見其吐血滿地細審之中似有膿而腥臭者余曰此肺癰也膿已成矣金匱云膿成則死然有生者余遂多方治之君亦始終相信一月而愈蓋余平日因此證甚多集唐人以來治肺癰之法用甘涼之藥以清其火滋潤之藥以養其血滑降之藥以祛其痰芳香之藥以通其氣更以珠黃之藥解其毒金石之藥填其空兼數法而行之屢試必效今治錢君亦兼此數法而痊強健逾舊幾三十年至乾隆三十年家業日隆因遷居大造途中相值邀余視其新居坐談良久辭出見其右額有

豆大黑點問之錢對曰昨此處生一瘰癧痒無他苦也
余諦審之曰此毒發于內治之失宜可以傷命非輕疾
也錢笑而腹非之余曰本當爲君竭力但君未信若一
用藥而毒大發則反以爲病由藥作故不敢但多年相
好不可不盡言如五六日病勢增重當來相聞勿爲人
誤越五日遣人邀余山中往則見其額腫目閉哀號竟
夕方悔信余之不早細視皮中有物乃三品一條槍也
拔去五條嗟乎此乃腐爛死肌之惡藥好肉用上其痛
應心况額上皮下內卽骨橫插皮中所以痛極余既不能

泗溪醫案

三

矢留又壞證難治力辭歸山易以他醫面目俱腐而卒
嗟乎前何相信之深後何不信之至豈非命乎

乳癰

東洞庭劉某夫人患乳癰醫者既不能消散成功之後
又用刀向乳頭止寸餘出毒瘡口向上膿反注注乳囊
皆腐寒熱不食將成乳癰內外三科醫議無定羣以爲
不治矣延余診之曰此非惡證治不如法耳尙可愈也
但須百日耳其家戚族皆少年喜事聞余言欲塞羣醫
之口向病家曰我輩公懇先生留山中百日必求收功

泗溪醫案

而後已如欲歸家備快舟以迎送余初不允繼勉承之
多方治之至九十日而未見功蓋病者柔弱畏痛既不
敢于乳下別出一頭而膿水從上注下頗難出盡故有
傳囊之患忽生一法用藥袋一個放乳頭之下用帛束
縛之使膿不能下注外以熱茶壺熨之使藥氣乘熱入
內又服生肌托膿之丸散於是膿從上泛厚而且多七
日而膿盡生肌果百日而全愈後以此法治他證無不
神效可知醫之爲術全賴心思轉變刻舟求劍終無一
驗也

泗溪醫案

四

下疳

濮院沈維德患下疳前陰連根爛盡湯從骨縫中出漚
灌腎囊中哀號痛楚肛門亦復爛深半寸載至余家止
求得生爲幸余亦從未見此病姑勉爲治之內服不過
解毒養血之劑而敷藥則每用必痛屢易其方至不痛
而後已兩月後結痂能行惟陰莖僅留根耳余偶閱秘
本有再長靈根一方內用胎狗一個適余家狗生三子
取其一泥裏煨燥合藥付之逾二年忽生一子舉族大
譁謂人道已無焉能生子蓋維德頗有家貲應繼者懷

覬覦之心也其岳徐君密詢之沈曰我服藥後陽道已長生子何疑徐君乃集其族人共驗之陽道果全但累生如有節而無總皮再期又生一子眾始寂然遠近傳之以為奇事今猶有述之以為異聞者

附再長靈根方 五十月復生效

煨乳石 三錢五分 琥珀 七分 硃砂 六分 人參 一錢 真珠 七

分牛黃 四分 真水粉 五分 胎狗 一個 雄黃 六分

用靈仙首烏大力子藜草汁煮一晝夜炒如銀色右為末每服三釐日進四服臥又二服俱以土茯苓半

洞溪醫案

卷五

勸陰陽水 三碗 煎五碗連送五服七日驗

雄案煮一晝夜而炒如銀色之藥品即上文煨乳石等丸味也詳玩文義似宜移右字於用字之上方順第胎狗煨燥必黑全狗分兩又必數倍於諸藥同煮同炒不知何以能如銀色是必煨時不令黑也

筋瘤

蘇州一小童背上腫大如覆碗俯不能仰羣謂駝疾也或戲余曰君能治奇疾若愈此則我輩服矣其父母以余為果能治也亦力求焉余實不知其中何物姑以腐

藥塗上數日皮開肉爛視其肉如蚯蚓者盤結數條細審之乃背上之筋所聚也余頗悔輕舉急以舒筋收口丸散外敷內服筋漸散削漸平膚完而身直矣此筋瘤之一種也聞傳以余為能治駝疾從此求治駝者雲集余俱謝不能此乃幸而偶中古人並無此治法癸未入都尚有人詢及者余謝無此事而已存此以識異

雄按洞溪神于外科讀其所評外科正宗等書已見一斑是編列案僅十餘條然各大證治法畧備洵癰疽家赤文綠字之書也可不奉為圭臬哉

附刻許辛木農部札

惠書久不報闕然於懷承示醫書二種奉繳弟於此事茫然洄溪案僅校出誤字數處即轉寄吳葆山舍親葆山醫學與王君孟英在伯仲之間亦極贊此書手眼通靈即過錄一本奉為鴻寶又校正數字屬轉達左右早付手民以廣其傳功德不細也內有脫簡弟意得原本補之大妙無則於章末旁註一闕字從郭公夏五之例何如覆蔣中堂書與醫案無異似宜附刻與秦司寇書則皆寒暄語可刪耳瘍科選粹批點確是徐氏手筆足與所批正宗相輔而行已過錄珍藏矣


又

來書謂中多時俗口頭語弟意名醫手筆既未可輒改又此等書取其活人而已不當以詩文例繩之正如藥物牛溲馬勃止期有用非若佳花美卉有一殘缺便須摘去也原本不分卷亦可仍之葉多則當分葉不滿百可無分也

此書原本傳寫多誤光緒與錢警石泰吉廣文許辛

木楮農部兩先生商榷再四始行付梓茲摘錄農部

札如右闕簡已從原本校補此外不敢增損一字以見光緒於此蓋慎之又慎云海昌蔣光緒附識



王氏醫案
霍亂論

〔清〕王士雄撰

據遼寧省圖書館藏清咸豐元年吟香書屋刻本影印原書版
框高二〇六毫米寬三〇四毫米

王氏醫案

咸豐二年春
吟春書屋校刊

才不足以包乎所業之外則其業不精心不足以周乎所業之中則其業亦不精拜之射條之丸張旭之草書蘭子之舞劍其人皆負不可一世之才而俯首降心於一藝之微研窮玩索不能自己迨其業之既成而天下莫能尙况乎醫之爲道參天人之奧操性命之權其理至深其責至重而世顧以無才無識之人挾不專不精之術貿貿施治絕人長年宜乎古人有學醫人費之慨也余自束髮受書篤嗜軒岐之學以家貧無力致書所蓄者靈素而外立齋景岳諸種而已觀其援引之繁富議論之辨博竊以爲道在於是而按法施治輒爲所困嗣得西昌喻氏

王氏醫案

楊序

之書伏而誦之始有以識夫病情之蕃變方劑之準繩與夫寒暑陰陽之變化其才大而學博識高而法密有非薛張諸公所不能髣髴者然而尙論一編猶襲三綱之謬春溫一論混入傷寒之中白壁微瑕不能不爲此老惜也歲在乙巳服官江右廣搜百氏之書如葉天士之高超尤在涇之切實王晉三之精奧張路玉之明達以及吳又可徐洄溪柯韻柏陳修園諸君子罔弗各具精心獨抒偉論靈蘭之祕闡發靡遺然而宗古訓者矩矱弗失而不免於附會穿鑿崇妙悟者化裁生心而或涉於支離背謬夫醫主於愈病而已偏執一途而故持高論縱名理湛深

與病情無與也偶於坊間得武林王君孟英所著霍亂論一帙其理明其詞達指陳病機判然若黑白之不可混淆以為飼鶴山人之流亞私心竊嚮往之己酉冬余室人患痰飲膈痛屢藥弗痊漸即沈困適孟英來撫之金幣視吳侯醜香之疾亟走伴相邀惴惴然恐不得一嘗乃孟英惠然肯來投藥五劑而大效並出初刊醫案回春錄見示因緣談古今之同異百家之得失滔滔滾滾折衷悉當始知霍亂一論不過孟英一端之緒餘而又竊幸余向之私心傾慕者為不誣也詢其近案積有數卷乃張柳吟趙菊齋諸君子所輯定而題其篇曰仁術志余取而讀

王氏醫案

楊序

二

之喜其崇論閎議足為世法因易其名曰王氏醫案與回春錄合為一編而附霍亂論於後并謬加評點付諸攻木之工以廣其傳蓋醫者生人之術也醫而無術則不足以生人醫而悞用其術則不惟不足以生人而其弊反至於殺人夫醫雖至庸未有忍於殺人者也而才不足以應粉耘之變學不足以窮古今之宜識不足以定真偽之幻則其術不精斯日殺人而不自知故為醫而無才無學無識不可也為醫而恃才恃學恃識亦不可也必也平心以察之虚心以應之庶乎其可也夫古人因病而生法因法而成方理勢自然本非神妙唯用之而當斯神妙

矣今才如孟英學如孟英識力精超如孟英而每臨一證息心靜氣曲證旁參務有以究乎病情之真而後已宜乎出奇制勝變化無方著之醫案卓卓可傳如是也余讀孟英之書於數年以前以為迢迢二千里山遙水阻必無相見之期乃吳君病而孟英來孟英來而余室適病宛轉牽引卒使數年來望風相思之友把袂盤桓傾吐肝膈極苦岑遇合之奇夙世因緣諒非淺鮮孟英勉乎哉異日者擷眾籍之精華訂羣言之謬偽刪繁提要勒為一書以保全天下萬世之民命厥功甚鉅而為力亦甚艱天末故人所企望於良友者詎止斯醫案一編而已耶

王氏醫案

楊序

三

道光三十年歲次庚戌知宜黃縣事楊照葵書於吟香書屋

予友王君孟英少年失怙其尊人彌留之際執孟英手而囑曰
人生天地之間必期有用於世汝識斯言吾無憾矣孟英泣拜
而銘諸心版然自顧家貧性介不能爲利達之人將何以爲世
用耶聞先哲有不爲良相則爲良醫之語因自顏其室曰潛齋
而銳志於軒岐之學潛心研究遂挾其微年未冠遊長山卽納
交於予每見其治病之奇若有天授而視疾之暇恒手一編不
輟也繼瞻其齋頭一聯云讀書明理好學虛心可見苦志力學
蘊之胷中者淵深莫測乃能窮理盡性出之指下者神妙難言
二十年來活人無算豈非以用世之才運其濟世之術而可垂

王氏醫案

周序

四

諸後世者哉今就予耳目所及之妙法仿丁長孺刻仲淳案之
例錄而付梓名曰回春錄見聞有限道美極多世之君子必有
如莊斂之華岫雲其人者更爲之遠搜博采以廣其傳而予疎
拙在前有榮施矣

道光二十三年癸卯冬十二月 愚弟周 鏞拜題

例言

一所錄皆二十年來見聞所及詳載字姓厯厯可徵聞有逸其
名氏者偶忘之耳
一淺易之證尋常治法所能療者概不泛錄
一難辨之證誤藥卽成危候而初病乃能洞燭遽爾霍然雖若
無奇不可不錄後學苟能留意庶免以藥釀病之辜
一病有虛實寒熱治分補瀉溫涼更有補瀉互投之法寒熱並
用之宜者以標本異情證因錯雜也此錄諸案具備法無偏倚
不媿一代之良工矣

王氏醫案

例言

五

一六氣皆從火化凡外感之邪雖傷寒必以顧陰爲主况溫熱
暑燥之病更多於傷寒而熱之灼陰尤爲勢所必然耶觀案中
治感多以涼潤清解爲法是參天人一致之理以談醫非泥古
耳食之徒所能窺測也
一孟英可傳之案何僅止此惜予未能窮蒐廣討也凡荷其再
造之人不妨陸續補刊以推廣仁術而嘉惠來茲匪惟忠厚當
然卽是心存濟世故不以上下分帙而以卷一卷二爲次蓋欲
卷數之遞增無已耳
一案中辨證固多發人之未發他如論阿片之燥烈傷津豬肉

之柔潤充液之類尤為有功於世是不僅某藥治愈某病之案
讀者須加咀嚼勿囫圇嚥下也

一孟英雖用藥極平淡而治病多奇中故其辨證處方同道莫
不折服茲所錄案已見一斑附采玉芝丸數方藥易功優更徹
立法之善至爛喉痧方雖從金匱錄出而孟英命其名曰錫
類散且聞授其方於莊芝階金鳳谷兩中翰修合濟人救全不
少凡屬外淫喉患無不應手而瘳不特爛喉痧藉以為神丹也
敢不附載以廣其傳乎

王氏醫案

例言

木

乾薑辛溫故用
之以回陽氣若
併此不得則令
壯盛人以氣呵
之亦可救倉卒
之變

王氏醫案卷一 原名回春錄

杭州王士雄孟英著

同郡周

錄光遠

甲申夏于於登廁時忽然體冷汗出氣怯神疲孟英視之曰陽
氣欲脫也卒不及得藥適有三年女佩薑一塊約重四五錢急
煎而灌之即安後用培補藥率以參耆朮草為主蓋氣分偏虛
也

范慶簪年踰五十素患痰嗽乙酉秋在發驟然吐血勢頗可危
孟英診曰氣虛而血無統攝也雖向來咳嗽陰虧陰藥切不可

王氏醫案 卷一

服然非格陽吐血附桂更為禁劑乃以潞參耆朮芩草山藥扁
豆橘皮木瓜酒炒芍藥為方五帖而安繼去甘草木瓜加熱地
黃黑驢皮膠紫石英麥冬五味子龍骨牡蠣熬膏服之全愈亦
不復發後范旋里數年以他疾終

丙戌春倉夫鄭德順患急證時已二鼓可孟英視之見其扒牀
拉席口不能言惟以兩手指心抓舌而已孟英曰中毒也取綠
豆二升急火煎清湯澄冷灌之果即霍然詰朝詢其故始言久
患臂痛因餌草頭藥下嚥後即心悶不可耐舌麻不能言而旁
人不知也錄此足以徵孟英臨證之燭照如神亦可見草藥之

子每以此法治
陽證瘧毒其不
應手取效真妙
方也

法本喻氏

元參能滋水以
制火獨用則力
厚取效倍捷

不可輕試也

癸人羅元奎丁亥夏卒發寒熱旋即嘔吐不能立自言勝開痛

不可當孟英視其痛處焮赤腫硬形如肥阜筴橫梗於毛際之

左乃曰此證頗惡然乘初起可一擊去之也用金銀花六兩生

甘草一兩阜角刺五錢水煎和酒服之一劑減其勢再劑病若

失逾年患傷寒孟英切脈虛細已極曰此不可徒攻其病者以

陰分太虧耳與景岳法以熟地當歸酒炒芍炙甘草橘皮柴

胡等藥一劑而瘳

子素患噫氣凡體稍不適其病即至既響且多勢不可遏戊子

王氏醫案 卷一

冬發之最甚苦不可言孟英曰此陽氣式微而濁陰上逆也先

服理中湯一劑隨以旋覆代赭湯投之遂愈嗣後每發如法服

之輒效後來發亦極輕今已不甚發矣予聞孟英常云此仲聖

妙方藥極平淡奈世人畏不敢用殊可陋也

有患陰虛火炎者面赤常如飲酒之態孟英主一味元參湯其

效若神而屢試皆驗

夥人葉殿和庚寅秋患感旬日後汗出昏瞢醫皆束手乃甥余

薇垣挽孟英勘之曰此真陰素虧過服升散與仲聖誤發少陰

汗同例下竭則上厥豈得引亡陽為比而以附桂速其斃耶以

元參地黃知母甘草白芍黃連茯苓小麥龜板鼈甲牡蠣驢皮
膠為大劑投之得愈

海陽趙子升辛卯夏病瘧急延孟英診之曰暑熱為患耳不可

膠守於小柴胡也與白虎湯一吸而瘧甲午秋范麗門患溫瘧

孟英用白虎加桂枝以痊之丙申夏盛少雲病溼熱瘧孟英以

白虎加蒼朮湯而安己亥夏子舅母患瘧服柴胡藥二三帖後

汗出昏厥妄語遺溺或謂其體質素虛慮有脫變勸服獨參湯

幸表弟壽者不敢遽進乃邀孟英商焉切其脈洪大滑數曰陽

明暑瘧也與傷寒三陽合病同符處竹葉石膏湯兩劑而瘳

王氏醫案 卷一

子夏滇人黃肖農自福清赴都道出武林患暑瘧孟英投白虎

湯加西洋參數帖始愈辛丑秋顧味吾室人病瘧瘧孟英亦主

是方而效莊芝階中翰張安人年踰花甲瘧熱甚熾孟英審視

再四亦與竹葉石膏湯而安聞者無不驚異予謂如此數證體

分南北質有壯衰苟非識證之明焉能藥與病相當而用皆適

宜哉

壬辰八月范蔚然患感旬餘諸醫束手乃弟麗門懇孟英治之

見其氣促音微呃忒自汗飲水下嚔隨即傾吐無餘曰伏暑在

肺必由溫散以致劇也蓋肺氣受病治節不行一身之氣皆失

妙論不獨治者
為然凡上而不
下之證皆可類
推

其順降之機。即水精四布。亦賴清肅之權。以主之氣。既逆而上。奔水亦泛而上溢矣。但清其肺。則諸恙自安。乃閱前服諸方。始則柴葛羌防。以升提之火。藉風威吐逆不已。猶謂其胃中有寒也。改用桂枝乾薑。以溫燥之火。上添油。肺津欲絕。自然氣促音微。疑其虛陽將脫也。徑與參歸蛤蚧柿蒂丁香。以補而納之。愈補愈逆。邪愈不出。欲其愈也難矣。亟屏前藥。以瀉白散合清燥救肺湯數服而平。

一何叟年近八旬。冬月傷風。有面赤氣逆。煩躁不安之象。孟英曰。此喻氏所謂傷風。亦有戴陽證也。不可藐視。以東洋人參細

王氏醫案 卷一

四

辛炙甘草熟附片白朮芍茯苓乾薑五味胡桃肉細茶葱白一劑而瘳。孟英曰。此真陽素擾。痰飲內動。衛陽不固。風邪外入。有根蒂欲拔之虞。誤投表散。一汗亡陽。故以真武四逆諸法。回陽鎮飲。攘外安內。以為劑也。不可輕試於人。致干操刃之辜。慎之慎之。
癸巳秋。予在婺患瘧。大為醫人所誤。初則表散。繼則滋補。延及月餘。肌肉盡削。寒熱不休。且善嘔惡食。溺赤畏冷。乃買棹旋杭。託孟英診視。曰。足太陰溼瘧也。以金不換正氣散。三噉而安。然元氣為誤藥所傷。多方調補。甫得康健。次年秋復患瘧於婺友。

下之證皆可類推

人咸舉醫。療予概卻之。憶病情與前無異。即於篋中檢得孟英原方。按序三帖。病亦霍然。聞者無不稱歎。後歸里。為孟英述而謝之。孟英曰。瘧情如是。恐其按年而作。乃授崇土勝溼丸。方明年夏令。預服以堵禦之。迄秋果無恙。後竟不發矣。

鍾耀輝年踰花甲。在都患腫。起自腎囊。氣逆便澹。諸治不效。急買車返杭。託所親謝金堂邀孟英治之。切其脈微而弱。詢其溺清且長。曰。都中所服。其五苓入正耶。抑腎氣五皮也。鍾云。誠如君言。徧嘗之矣。而病反日劇者何哉。孟英曰。此土虛不制水也。通利無功。滋陰亦謬。法宜補土勝溼。與大劑參朮。果即向安。越

王氏醫案 卷一

五

八載以他疾終。
金元章媳於甲午新寡。後患臙瘵。疥大抵溼熱之病。耳瘍醫連某疑為遺毒。徑作廣瘡療。漸至上吐下利。不進飲食。另從內科治。亦無寸效。延至未春。更兼腹痛自汗。汎愆肌削。諸醫皆見而卻走矣。王仲安薦孟英視之。曰。此胃氣為苦寒所敗。肝陽為辛熱所煽。前此每服陽剛。即如昏冒。稍投滋膩。泄瀉必增。遂謂不治之證。未免輕棄。乃以四君子加左金椒梅蓮子木瓜餘糧石脂等出入為方。百日而愈。第信猶未轉也。諸親友環議。再不通經。病必有變。孟英力辨。此非經阻可通之證。惟有培養生化之

源使其氣旺血生則流行自裕若不揣其本而齊其末則轉棟不能榨油徒傷正氣盡隳前功豈不可惜眾議始息恪守其方服至仲冬天癸至而肌肉充康復如常矣

朱某患嘔吐諸藥不效甚至大小便秘糞從口出臭不可當自問不起矣孟英用代赭旋覆湯加蜣螂蟲服之而愈

孟英邃於醫學從不侈談脈理足以見其欲然不自足也而脈理之最不易切者莫如妊娠予聞孟英於乙未春診黃履吉室人之脈曰妊也是月天癸猶來人皆不以為然次月仍轉但不多耳復邀孟英診之曰果妊也汎不斷者蔭胎之血有餘耳

王氏醫案

卷一

六

月汎復行覺更少矣人猶以為妄也四月後經始停娠亦顯婉如期人始服其見老丙申夏滿洲某選粵東鹽場構管之任過浙主於李雲臺家請孟英視其如君之恙孟英診曰非病也熊入夢矣某頗不信謂經甫停何以遽斷為孕而又必其為男乎反生言過其實之疑既而某延雲臺入幕偕赴粵任次年雲臺於家書中述及居停果得子深歎孟英指妙子荆人久無孕辛丑秋汎事偶愆孟英一診即以好斷且以男許次夏果舉一子惜不育耳卻魚竹給諫仲媳懷妊孟英於寅春初診即許抱孫秋杪果應表弟胡壽者室偶有小忿經事澹少腰腹微脹自

娠孕之脈最為難憑有初現即現於脈者有三四月始現於脈者有始終不現於脈者此與憑脈斷證有時可憑有時不足憑同一至理子當以此質之孟英孟英亦以為然可見真學問人必不恃虛言以眩世也

以為怒氣所滯也延孟英調之切其脈曰懷麟矣初猶疑之既而始信卯春果弄璋吳雲階室年四十餘寅秋汎斷其腹日脹醫謂病也治之罔效迺孟英診之孕也彼猶不自信及腹中漸動始服其言至期產一女癸秋孟英治石誦義室脘痛甫愈適汎踰期即曰娠矣既而果日形著其指下之神妙如此

朱恒山久患胸痞多痰諸藥罔效孟英診曰清陽之氣不司旋運也與參耆苓朮之劑豁然頓愈因極欽服後數年果以汗脫聞其垂危之際口不能言猶以左手橫三指右手伸一指加於上作王字狀以示家人有會其意者急追孟英至而他醫之中

王氏醫案

卷一

七

風藥早灌入矣遂以長逝癸卯冬至前一日管大中丞亦是氣從溺脫當以參附挽回者及孟英至而痰藥痧藥風藥灌之徧矣脈僅若蛛絲過指孟英堅不與方須臾而卒

無棟張柳吟封翁於乙未夏偕令嗣恒齋刺史赴滇南任道出武林其家人鄭九者封翁寵人之弟也途次抱恙抵杭日招越醫陳六順診治服藥後汗出昏狂精流欲脫封翁大駭躬詣孟英以希挽救孟英切其脈既數且亂沈取極細乃語封翁曰此證頗危生機僅存一綫亦斯人之陰分素虧不可竟謂附桂之罪也封翁聞言大悅曰長者也不斥前手之非以自伐不以見

證之險而要譽相見恨晚。遂訂忘年之交。彼此盡吐生平始知封翁最喜談醫。岐黃之言無所不覽。惟不肯為人勘病。亦慎重之意耳。於是孟英以元參知藥。桑枝龍牡生地白芍甘草百合石斛梔子鹽水炒淡豆豉為大劑。灌之下。嚙即安。次日去梔豉甘草加龜板鼈甲鹽水炒橘紅十餘帖而康。吳馥齋令姊稟質素弱。幼時鳳山診之。許其不秀。癸巳失其怙恃。情懷悒悒。凡事漸愆。寢食皆廢。肌瘦吞酸。勢極可畏。孟英以高麗參鹽水炒黃連甘草小麥紅棗百合茯苓牡蠣白芍旋覆花新絳等治之。各恙漸已。繼參歸地滋陰。康強竟勝於昔。

王氏醫案

卷一

八

一男子患喉痺。專科治之甫愈。而通身腫勢日甚。醫者驚走。孟英診之曰。病藥也。投附子理中湯。敷劑而痊。予謂喉痺治以寒涼法。原不謬。而藥過於病。翻成溫補之證。是病於藥也。非病於病也。嘗聞孟英云。病於病而死者十之三。病於藥而死者十之七。以予觀之。誠非激論也。吁可歎已。朱氏婦產後惡露不行。而宿哮頓發。專是科者不能下手。孟英以丹參桃仁貝母茯苓滑石花粉桂枝通草蛤壳苡仁紫苑山查絲瓜子芫蔚子旋覆琥珀出入為方。三日而愈。局醫黃秀元之與人韓名諒者。有兒婦重身患熱病。局中諸醫

皆慮胎隕。率以補血為方。旬日後勢已垂危。洵人求孟英診之。曰。胎早腐矣。宜急下之。或可冀幸。若欲保胎。則吾不知也。其家力懇疏方。遂以調胃承氣合犀角地黃湯加西洋參麥冬知母石斛牛膝投之。胎落果已臭爛。而神氣即清。熱亦漸緩。次與西洋參元參生地知母麥冬丹參丹皮茯苓山查石斛豆卷芫蔚琥珀等藥調之。粥食日加。旬餘而愈。此胎浮於上。陰孤於下。故非滋陰補精所能治。仲景桂枝一少年驟患遺精。數日後形肉大脫。連服滋陰補精之藥。如水投石。孟英與桂枝湯加參耆龍牡服下。即效。匝月而瘳。家叔南山於秋閒患感。日治日劇。漸至神昏。謔妄肢振。動惕。施

王氏醫案

卷一

九

秦兩醫皆謂元虛欲脫。議投峻補。家慈聞而疑之。曰。盍與孟英商之。孟英診曰。無恐也。通絡蠲痰。可以即愈。用石菖蒲羚羊角絲瓜絡冬瓜子苡仁桑枝旋覆橘絡葱鬚貝母鈎藤膽星為劑。化服萬氏牛黃清心丸。一顆覆杯。即安。調理半月而愈。美政關毛內使年踰花甲。而患喘嗽。醫與腎氣湯全鹿丸等藥。反致小溲滴痛。病日以劇。孟英診之。與純陰壯水之治。毛曰。我輩向吸阿片煙。豈敢服此涼藥。孟英曰。此齊東之野語也。誤盡天下蒼生。幸汝一問。吾當為世人道破機關。不致誤墮火坑者。再為積薪貯油之舉也。夫阿片本罌粟花之脂液。性味溫澀。而

又產於南夷之熱地煎曬以成土熬煎而為膏吸其煙時還須火煉燥熱毒烈不亞於砒久吸之令人枯槁豈非燥烈傷陰之明驗哉毛極拜服果得霍然或問曰阿片之性殆與酒相近乎孟英曰麴蘖之性雖熱然人飲之則質仍化水故陰虛者飲之則傷陰陽虛者飲之則傷陽景岳論之詳矣若阿片雖具水土之質而性從火變且人吸之則質化為煙純乎火之氣燄直行清道燥人津液故吸煙之後口必作渴久吸則津枯液竭精血源窮而宗筋失潤人因見其陽痿也不察其所以痿之故遂指阿片為性冷之物抑何愚耶凡吸阿片煙而醉者以陳醬少許

王氏醫案

卷一

十

淪湯服即醒若熬煙時少著以鹽即渙散不凝膏吸時舌上預舐以鹽則不成癮雖癮深者但令舐鹽而吸則癮自斷豈非潤下之精能制炎上之毒乎

金元章年踰七旬久患痲瘋每病於冬以為寒也服熱藥而暫愈終不能霍然孟英診曰脾腎雖寒肝陽內盛徒服剛烈焉能中肯以參朮枸杞菴菹茴香當歸菟絲鹿角霜桂茯苓棟實黃連吳萸楠核等藥為方服之今數年無恙矣

丙申春蜀人石符生將赴鄧雲厓司馬之招經杭抱病僑於張柳吟之舊館亦為寓側陳六順治困居停主人知之即告以柳

吟僕病之事石聞之悚然亟遣人延孟英診焉脈沈而澀滯模糊不分至數肢涼畏冷涎沫上涌二便瀟少神氣不爽曰此途次感風溼之邪失於解散已從熱化加以溫補致氣機愈形窒塞邪熱漫無出路必致燥液成痰逆行而上但與舒展氣機則痰行熱降諸恙自瘳矣以黃連黃芩枳實橘皮梔子淡豉桔梗杏仁貝母鬱金通草紫苑竹茹蘆薈汁等藥三服而起調理匝旬遂愈

夏間王某患感越醫謝樹金治之病雖退而能食矣但不能起坐類乎癱瘓延已月餘人皆謂其成廢所親鍾某浼孟英視之

王氏醫案

卷一

十一

曰此多服表散汗出過分氣血兩傷肢骸失其營養脈微而細舌亮無苔與大劑參耆歸朮熟地杜仲菟絲牛膝枸杞山藥木瓜黃肉萎蕤續斷桑枝數十帖而起

一勞力人陰分素虧驟感風溼兩膝刺痛痠爽不能稍立孟英以六味地黃湯加獨活豆卷一劑知二劑已

張養之令正飲食如常而肌膚消瘦信事如期而紫淡不恒兩腓發熱而別處仍和面色青黃而隱隱有黑氣儼似虛寒多藥不效始逆孟英診之脈似虛細而沈分略形絃滑曰此陽明有餘少陰不足土燥水涸仲聖有急下存陰之法然彼外感也有

孟英善用甘寒
投之此證尤宜

餘之邪可以直瀉此內傷也無形之熱宜以甘寒義雖同而藥則異也贈以西洋參生地生白芍生石膏知藥苓梔麥冬花粉棟實丹皮木通天冬諸品服至數斤黑氣退而肌漸充腠熱去而經亦調矣

姚氏婦產後昏譫汗厥肌膚浮腫醫投補虛破血祛祟安神之藥皆不能治舉家惶怖轉延孟英診焉詢知惡露仍行曰此證醫家必以為奇病其實易愈也昔金尚陶先生曾治一人與此相似載於沈堯夫女科輯要中方用石菖蒲膽星旋覆茯苓橘紅半夏麴名蠲飲六神湯凡產後惡露行而昏譫者多屬痰飲

王氏醫案

卷一

主

不可誤投攻補此湯最著神效如方服之良愈

牙行王炳華妻患舌瘡痛礙飲食內治外敷皆不效孟英視其舌色紅潤脈形空數曰此血虛火浮也以產後發熱例施之用熟地當歸酒炒白芍炙甘草茯苓炮薑投之其病如失

一老人霍亂後目閉呃忒醫謂脫陷在卽與桂附回陽之藥業已煎矣適孟英至詢知溺赤口乾診得脈形與數而藥香撲鼻卽曰此藥中有肉桂叟勿服也服之必死迫令將藥傾潑而與肅肺清胃之劑果得漸安

丁酉中秋夜牙行張鑑錄年踰花甲卒仆於地急延孟英脈之

請語精義由此
推可以知用
藥之權衡矣

弦滑而大曰痰氣食相併而逆於上也先以烏梅擦開牙關橫一竹著於口灌以淡鹽薑湯隨入驚翎探之吐出痰食太息一聲而甦次與調氣和中而愈後數年以他疾終此案雖無奇而辨證之明不可不錄

姚樹庭以古稀之年而患久瀉羣醫雜治不效愈以為不起矣延至季秋邀孟英決行期之早晚非敢望愈也孟英曰絃象獨見於右關按之極弱乃土虛木賊也調治得法猶可引年何以遽爾束手乎乃出從前諸方閱之皆主溫補升陽曰理原不背義則未盡耳如薑附肉蔻骨脂之類氣熱味辣雖能溫臟反助

王氏醫案

卷一

主

肝陽肝愈強則脾愈受戕且辛走氣而性能通泄與脫者收之之義大相刺謬而鹿茸升麻可治氣陷之瀉而非幹旋樞機之品至熟地味厚滋陰更非土受木剋脾失健行之所宜縱加砂仁酒炒終不能革其膩滑之性方方用之無怪乎愈服愈瀉徒藉景岳窮必及腎為口實也與異功散加山藥扁豆蓮子烏梅木瓜芍藥蒺藜石脂餘糧服之果效恪守百日竟得康強越三載以他疾終

戊戌春張雨農司馬必欲孟英再赴環山孟英因其受病之深且公事掣肘心境不能泰然誠非藥石之可以為力也固辭不

往司馬泣然哀懇。但冀備行旋署。則任君去雷可耳。并囑趙蘭舟再四代陳曲悃。孟英感其情。同舟渡江。次剡溪。司馬譚及體氣羸憊情形。孟英忽曰。公其久不作嚏乎。司馬曰。誠然有年矣。此曷故也。孟英曰。是陽氣之不宜布耳。古惟仲景論及之。然未立治法。今擬鄙方奉贈。博公一嚏。如何。司馬稱善。遂以高麗人參、乾薑、五味、石菖蒲、酒炒薤白、半夏、橘皮、紫苑、桔梗、甘草為劑。舟行抵嶼。登陸取藥煎而服之。駕輿以行。未及二十里。司馬命從人詣孟英車前報曰。已得嚏矣。其用藥之妙如此。夏間牙行倪懷周室新產數日。泄瀉自汗。嘔吐不納。專科謂犯

王氏醫案

卷一

古

三禁不敢肩任。孟英診脈虛微。欲絕。證極可虞。宜急補之。遲不及矣。用東洋參、水龍牡、酒炒白芍、桑枝、木瓜、扁豆、茯神、橘皮、紫石英、黑大豆投之。四劑漸以向安。予謂新產後用參者大補。而又當盛夏之時。非有真知灼見者不能也。誠以天下之病千變萬化。原無一定之治。奈耳食之徒。惟知執死方以治活病。豈非造孽無窮。亦何苦人人皆欲為醫。而自取罪戾耶。張養之令姪女患汎愆。而飲食漸減。于某與通經藥服之。尤惡。穀請孟英診之。脈緩滑。曰。此痰氣凝滯。經隱不宜病。由安坐不勞。法以豁痰流氣。勿投血藥。經自流通于某聞而笑曰。其人從

不吐痰。血有病而妄治其氣。脹病可立待也。及服孟英藥。果漸吐痰。而病遂愈。養之大為折服。予謂世人頭痛治頭。腳疼療腳。偶中而愈。貪為己功。誤藥而亡。冤將奚白。此寓意草之所以首列讓病之訓也。孟英深得力於喻氏。故其讓病。迥出凡流。要知識見之超。總由讀書而得。雖然人存政舉。未易言也。

毛允之。戊冬患感。初治以溫散。繼即以滋陰。病日以劇。延至亥春。或疑為百日之勞。或謂是傷寒壞證。而鳳山僧主升柴香木以補之。丁卯橋用輕粉巴霜以下之。雜藥徧投。形神日瘁。乃尋學周延孟英視之。脈來澀數。上溢呃忒。口膩難嚥。嗜飲而水難

王氏醫案

卷一

毒

下。膈頻吐涎沫。便秘。渴赤。潮熱。往來少腹。如烙。按之亦不堅滿。曰。此病原屬冬溫。治以表散。則津液傷而熱乃熾。繼以滋填。熱邪愈錮。再施溫補。氣機更窒。升柴香木。欲升其清。而反助其逆。巴霜輕粉。欲降其濁。而盡劫其陰。病及三月。發熱不是表邪。便祕旬餘。結滯非關積滯。且脈澀為津液之已傷。數是熱邪之留著。溢乃氣機為熱邪所壅。而不得下行。豈非溫邪未去。得補而膠固難除。徒使其內燠真陰。上薰清道。以致一身之氣。盡失肅清之令。法當搜剔餘邪。使熱去津存。即是培元之道。伸其治節。俾濁氣下趨。乃為宣達之機。何必執參茸為補虛。指硝黃為通

清熱生津治法
因善然亦此人
本元堅固故屢
謀之後猶能挽
回否則亦難為
力矣

祛痰清熱滋陰
續書力量甚大
此必本虛標實
者故其方如此

降○哉○以○北○沙○參○紫○苑○麥○冬○知○母○花○粉○蘭○草○石○斛○丹○皮○黃○芩○桑○葉
厄○子○黃○連○木○通○銀○花○橘○皮○竹○茹○蘆○根○椒○欖○杷○葉○地○栗○海○蛇○等
出○入○為○方○服○之○各○恙○遞○減○糜○粥○漸○加○半○月○後○始○得○大○解○而○腹○熱
全○消○穀○食○亦○安○乃○與○滋○陰○善○後○而○愈

張○養○之○所○親○李○某○戊○冬○醉○飲○夜○歸○為○查○段○巡○員○所○嚇○神○志○即○以
漸○昏○治○之○罔○效○至○於○不○避○親○疎○裸○衣○笑○罵○力○大○無○制○糞○穢○不○知
已○夏○延○孟○英○視○之○用○石○菖○蒲○遠○志○龍○齒○龜○板○犀○角○羚羊○角○元○參
丹○參○知○藥○厄○子○龍○膽○草○枳○實○黃○連○竹○黃○竹○瀝○石○膏○赭○石○黑○鉛○鐵
落○出○入○為○方○十○餘○帖○吐○瀉○膠○痰○甚○多○繼○與○磁○硃○丸○漸○以○向○愈

王氏醫案

卷一

末

一○祝○叟○年○近○古○稀○己○亥○春○赴○席○忽○仆○地○痰○涌○肢○強○眼○斜○舌○蹇○不
語○外○科○王○瑞○芝○薦○孟○英○視○之○投○六○君○子○加○蠟○稍○羚○羊○角○膽○星○石
菖○蒲○竹○瀝○薑○汁○而○瘳

茅○家○埠○翁○嘉○潤○患○腰○疽○愈○而○復○發○者○五○年○費○用○不○貲○諸○瘍○醫○治
之○不○效○盛○少○雲○囑○其○求○治○於○孟○英○切○其○脈○絃○細○以○數○曰○子○之○幸
也○此○內○損○證○外○科○惡○乎○知○與○大○劑○甘○潤○滋○填○之○藥○匝○月○而○痊○至
今○不○發

胡○琴○泉○舅○氏○家○一○潘○姬○年○踰○古○稀○患○霍○亂○轉○筋○瀕○危○孟○英○用○自
制○蠶○矢○湯○而○瘳

一○少○婦○分○挽○胞○水○早○破○胎○澀○不○能○下○俗○謂○之○瀝○漿○生○催○生○藥○遍
試○不○應○孟○英○令○買○鮮○豬○肉○一○二○斤○洗○淨○切○大○塊○急○火○煎○湯○吹○去
浮○油○恣○飲○之○即○產○母○子○皆○生○且○云○豬○為○水○畜○其○肉○最○腴○大○補○腎
陰○而○生○津○液○予○嘗○用○治○腎○水○枯○涸○之○消○渴○陰○虛○陽○越○之○喘○嗽○並
著○奇○效○仲○聖○治○少○陰○咽○痛○用○豬○膚○亦○取○其○補○陰○虛○而○戢○浮○陽○也
後○賢○不○察○反○指○為○有○毒○之○物○汪○詒○庵○非○之○是○矣○惟○外○感○初○愈○及
虛○寒○滑○瀉○溼○盛○生○痰○之○證○概○不○可○食○以○其○滋○膩○更○甚○於○阿○膠○熟
地○龍○眼○也○然○豬○以○浙○產○者○為○良○北○豬○不○堪○用○吾○杭○燥○肉○鮮○即○豬
皮○為○之○可○以○致○遠○八○藥○丸○為○簡○當○不○必○泥○於○皮○與○膚○之○字○面○而

王氏醫案

卷一

七

穿鑿以誇考據也

秋○初○家○慈○猝○仆○於○地○急○延○孟○英○診○之○脈○浮○絃○以○滑○用○羚○羊○角○膽
星○牡○蠣○石○菖○蒲○丹○參○茯○苓○鈎○藤○桑○葉○貝○母○橘○紅○蒺○藜○等○以○順○氣
蠲○痰○息○風○降○火○而○痊○癸○卯○春○前○數○日○忽○作○欠○伸○而○厥○孟○英○切○脈
微○弱○而○絃○曰○病○雖○與○前○相○似○而○證○則○異○矣○以○高○麗○參○白○朮○何○首
烏○山○菜○莢○枸○杞○桑○甚○石○斛○牛○膝○蒺○藜○橘○紅○牡○蠣○等○鎮○補○攝○納○以
瘳○予○謂○此○等○證○安○危○在○呼○吸○之○閒○觀○前○後○卒○仆○數○案○可○見○其○辨
證○之○神○雖○古○人○不○多○讓○况○世○俗○之○所○謂○醫○乎○家○慈○兩○次○類○中○予
皆○遠○出○微○孟○英○吾○將○焉○活○感○銘○五○內○聊○識○數○言○惟○願○讀○是○書○者

體其濟世之心。臨證得能如是。將胥天下之沈疴而盡起矣。張養之弱冠失怙。後卽遭无妄之疾。繼絲七載。罄其貲財。經百十三醫之手。而病莫能愈。因廣購岐黃家言。靜心參考。居然自療。而痊然鼻已壞矣。抱此不白之冤。自慙形穢。乃閉戶學書。專工作。指其志良可悼也。孟英因與之交。見其體怯。面青。易招外感。夏月亦著複衣。頻吐白沫。詢知陽痿多年。常服温辛之藥。孟英屢諫之。而已亥九月間。患惡寒。頭痛。自餌温散不效。逆孟英診之。脈極沈重。按至骨則絛滑。隱然臥曲。房密帳之中。爐火重。裘尙覺不足以禦寒。且涎沫仍吐。毫不作渴。胸腹無脹悶之苦。

王氏醫案

卷一

六

咳嗽無暫輟之時。惟大解堅燥。小溲不多。口氣極重耳。乃謂曰。此積熱深。錮氣機鬱而不達。非大苦寒以瀉之不可也。養之初猶疑焉。及見方案。辨論滔滔。乃大呼曰。弟之死生。係乎一家之命。唯君憐而救之。孟英慰之曰。我不惑外顯之假象。而直斷爲實熱之內蘊者。非揣度之見。而確有脈證可憑。但請放心。靜養不必稍存疑畏。及二三帖後。病不略減。諸友戚皆詆藥偏於峻。究宜慎重服之。有于某者。揚言於其族黨曰。養之之命。必送於孟英之手矣。眾楚交咻。舉家惶惑。次日另延陳啓東暨俞某。並診孟英聞之急詣病榻前。謂曰。兄非我之知己也。則任兄服誰

王氏醫案 卷一

之藥。我不敢與聞也。兄苟裕如也。則任兄廣徵明哲。我不敢阻撓也。今兄貧士也。與我至交也。拮据資囊。延來妙手。果能洞識病情。投劑必效。則我亦當竭力慇懃也。第恐雖識是病。而用藥斷不能如我之力專而劑大也。苟未能確識是證。而以無毀無譽之方。應酬塞責。則因循養患。誰任其咎也。或竟不識是病。而開口言虛。動手卽補。甘言悅耳。兄必信之。我不能坐視成敗。如秦人視越人之肥瘠也。今俞某之方如是。陳醫殊可卻之。速著人趕去辭絕。畱此一款。以作藥資。不無小補。况連服苦寒病無增減。是藥已對證。不比平淡之劑。誤投數帖。尙不見害也。實由

王氏醫案

卷一

七

熱伏深。錮藥未及病。今日再重用硝黃犀角。冀頑邪蘊毒得以通泄下行。則周身之氣機自然流布矣。養之伏枕恭聽。大爲感悟。如法服之。越二日大便下如膠漆。穢惡之氣達於戶外。而畏寒卽以遞減。糜粥日以加增。旬日後糞色始正。百日後康健勝常。嗣後雖嚴冬亦不甚畏冷。偶有小恙。輒服清潤之方。陽道復興。近添一女。養之嘗頌於人曰。孟英之手眼。或可得而學也。孟英之心地。不可得而及也。我之病奇病也。孟英雖具明眼。而無此種熱情勢。必築室道旁。亂管藥餌。不能有今日矣。况不但有今日。而十餘年深藏久伏之疴。一旦掃除。自覺精神勝昔。可爲

六〇三

此是熱痰伏於肺絡故用藥如此

後日之根基再生之德不亦大哉

孫午泉進士患哮喘多氣逆不能著枕服溫散滋納藥皆不效

孟英與北沙參桂枝茯苓貝母花粉杏仁冬瓜仁絲瓜絡枇杷

葉旋覆海石蛤壳等藥覆杯即臥數日而痊

石符生隨乃翁自蜀來浙同時患瘧醫者以小柴胡湯加薑桂

投之不效改用四獸休瘧等法反致惡寒日甚穀食不進惟飲

燒酒薑湯圍火榻前重裘厚覆胸腹痞悶喜以熱熨猶覺冷氣

上衝頻吐粘稠痰沫延至臘初疲憊不堪始憶及丙申之恙訪

孟英過診脈沈而滑數苔色黃膩不渴便溏溺赤日是途次所

王氏醫案

卷一

三

受之暑溼失於清解復以溫補之品從而附益之釀成痰飲盤踞三焦氣機為之阻塞所以喜得熱熨熱飲氣衝反覺如冰若不推測其所以然之故而但知聞問在切脈之先一聽氣冷喜熱無不以為真贗現獲孰知病機善幻理必合參以脈形兼證竝究則其為真熱假寒自昭昭若揭矣與大劑苦寒之藥而以蘆薈湯煎漸服漸不畏寒痰漸少穀漸增繼用甘涼善後喬梓皆得安痊

王氏醫案卷一終

王氏醫案卷二 原名回春錄

杭州王士雄孟英著

同郡周

錄光遠輯錄

庚子春戴氏婦產後惡露不多用山查益母草酒煎連服數日遂發熱自汗口渴不饑眩暈欲脫徹夜不眠孟英視之曰此稟屬陰虧血已隨胎而去雖惡露甚少但無脹痛之苦者不可妄投藥餌酒煎益母山查不特傷陰且能散氣而汗泄口乾津液有立竭之勢即仲聖所謂無陽也蓋人身天真之氣謂之陽陽根於津陰化於液津液既奪則陽氣無根而眩暈陰血不生而

王氏醫案

卷二

一

無寐若補氣養陰則舍本求末氣血不能生津液也惟有澄源潔流便津液充而氣血自復庶可無憂以西洋參生黃耆龍骨牡蠣萎蕤百合甘草麥冬生薏苡生扁豆石斛木瓜桑葉蔗漿投之一劑即安數日而愈後以滋填陰分服之乃健
王某久患吐血體極孱弱沈琴癡囑其丐孟英治之服藥甫有小愈而酷暑之時陡患霍亂轉筋大汗如雨一息如絲孟英視曰陰血久奪暑熱鴟張吾霍亂論中之缺典也姑變法救之用北沙參枇杷葉龍牡木瓜扁豆苡仁滑石桑葉蠶砂石斛豆卷投之良愈調理每日仍服滋補以治宿恙越二載聞服溫補藥

致血暴涌而亡。

赤山埠李氏女。素稟怯弱。春閒汛事不行。脇腹聚氣如癢。減餐肌削。屢服溫通之藥。至孟秋加以微寒。壯熱醫仍作經閉治。勢瀕於危。乃母託伊表兄林豫堂措辦後事。豫堂特請孟英一診。以決之。孟英切其脈時壯熱烙指。汗出如雨。其汗珠落於脈枕。上微有粉紅色。乃曰。虛損是其本也。今暑熱熾盛。先當治其客邪。庶可希冀。疏白虎湯加西洋參元參竹葉荷桿桑葉。及何醫至一籌莫展。聞孟英主白虎湯。乃謂其母曰。危險至此。尚可服石膏乎。且本草於石膏條下致戒云。血虛胃弱者禁用。豈彼未

王氏醫案

卷二

二

之知也。豫堂毅然曰。我主藥與其束手待斃。盍從孟英死裏求生之路耶。遂服二帖。熱果退。汗漸收。改用甘涼清餘熱。日以向安。繼與調氣養營陰宿痕亦消。培補至仲冬。汛至而痊。次年適孫夔伯之弟。

張氏婦患氣機不舒。似喘非喘。似逆非逆。似太息非太息。似虛促非虛促。似短非短。似悶非悶。面赤眩暈。不饑不臥。補虛清火。行氣消痰。服之不應。孟英診之曰。小恙耳。旬日可安。但須懲忿。是囑與黃連黃芩。厄子棟。實龍甲。羚羊角。旋覆。赭石。海蛇。地。果。為大劑。送當歸龍薈丸。未及十日。汛至其色如墨。其病已若失。

後與養血和肝調理而康。

牙行王炳華室。夏患臂痛。孫某曰。風也。服參耆歸芍數帖。臂稍愈。而腕痛。孫曰。寒也。加以附桂。痛不止。而漸覺痰多。孫曰。肝腎不足也。重用熟地。枸杞。令其多服。取效。不料愈服愈劇。漸至昏厥。孫尚以為藥力之未到。病體之久虛。前方復為加重。甚而時時發厥。始請孟英診之。脈沈而有絛滑。且數之象。乃謂炳華曰。此由過投溫補。引動肝風。煽其津液為痰。痰復乘風而上。此厥之由來也。餘波則奔流經絡。四肢因而抽搐。陽氣盡逆於上。宜乎鼻塞面浮。濁氣不能下達。是以便滯不饑。炳華曰。神見也。

王氏醫案

卷二

三

溫補藥服幾三月矣。不知尚可救乎。孟英曰。勿疑吾藥。猶有望焉。遂與大劑甘寒。息風化飲。佐以涼苦。泄熱清肝。厥果漸止。各恙遞蠲。兩月後康復如常。予偶於舊書中檢得無名氏鈔本一冊。所錄多岐黃之言。內一條云。附桂回陽。在一二帖之間。萬一誤投。害亦立至。功過不掩。其性之毒烈也。概可見矣。奈世人不。知藥為治病而設。徒以貪生畏死之念。橫於胸中。遂不暇顧及。體之有病無病。病之在表在裏。但聞溫補之藥。無不欣然樂從。者。摸稜之輩。趨就存心。知其死於溫補而無怨悔也。乃衣鉢相傳。不必察其體病脈證之千頭萬緒。僅以溫補之品。二十餘味。

相送爲用。卽成一媚世之方。且託足金匱之門。摹擬腎氣之變。蓋知熟地之陰柔。可縛附桂之剛猛。誤投不致卽敗。偶中又可邀功。包藏禍心。文姦飾詐。何異新莽比周公。子雲學孔聖哉。人以其貌古人。而口聖賢也。多深信而不疑。迨積薪既厚。突火頓燃。雖來爛額焦頭之客。其不至於焚身者幸矣。較彼孟浪之徒。誤投純陽藥。致人頃刻流血而死者。其罪當加十等。誅心之論。救世之言。知我罪我不遑計焉。孟英見之。拜讀千過。且曰。勦漢學以欺世。由來久矣。徐靈胎之論。無此透徹。可與退之原道文並峙。當考其姓字。於仲景先師廟內。建護聖祠以祀之。予謂孟

王氏醫案

卷二

四

英如此稱許。則其可傳也。奚疑。故附刊此案之後。以證王氏婦溫補藥服及三月。卽所謂陰柔束縛剛猛之故。致人受其愚而不覺者。後之人可以鑑矣。

莊牛霞芝階中翰之三郎也。闡後患感。日作寒熱七八次。神氣昏迷。微斑隱隱。醫者無策。始迎孟英視之。曰。此平昔飲酒積熱。深蘊挾感而發。理從清解。必誤投溫補。以致熱勢披猖。若是詢之。果三場皆服參。且攜棗子浸燒酒入。聞初病尙不至此。因連服羌防薑桂。漸以滋甚。孟英曰。是矣。先以白虎湯三劑。斑化而寒熱漸已。繼用大苦寒之藥。瀉其結熱。所下黑矢。皆作棗子氣。

口有虛熱在
可也補虛則礙
熱清熱則妨虛
款又加以食積
尤爲棘手須看
其用藥圖到處

旬日後與甘潤滋濡之法。兩月始得全愈。

金愿谷舍人次郎魁官。九月間患五色痢。日下數十行。七八日來。口噤不納。腹痛呻吟。危在旦夕矣。有主人參以補之者。有主生軍以瀉之者。舉家皇皇。不知所措。孟英視之。曰。暑挾食耳。誤服熱藥矣。攻補皆不可施也。輕清取之。可卽愈焉。以北沙參黃連鮮蓮子。梔子黃芩。枇杷葉。石斛。扁豆。銀花。桔梗。山查。神麩。滑石。爲方。其家以爲病深藥淡。恐不濟事。西席莊曉村云。縱使藥不勝病。而議論極是。定不致加病也。竭力贊其居停。投之覆杯。卽安。旬日而起。予聞孟英嘗曰。蓮子最補胃氣。而鎮虛逆。若反

王氏醫案

卷二

五

胃由於胃虛而氣衝不納者。但日以乾蓮子細嚼而嚥之。勝於他藥多矣。凡胃氣薄弱者。常服玉芝丸。能令人肥健。至痢證噤口。皆是熱邪傷其胃中清和之氣。故以黃連苦泄其邪。卽仗蓮子甘鎮其胃。今肆中石蓮皆僞。味苦反能傷胃。切不可用。惟鮮蓮子煎之。清香不渾。鎮胃之功獨勝。如無鮮蓮。則乾蓮亦可用。或產蓮之地。湖池中淘得入水不腐之老蓮。卽古所謂眞石蓮也。昔人治噤口痢。多用此。然可不必拘泥。庶免作僞之人。以贗亂眞。反致用而無效。徒使病不卽愈也。

附 玉芝丸 孟英

肺熱夜熱原有
肺熱血脈二候
斷非陰陰所能
愈况温病之後
咳嗽夜熱顯爲
遺邪在肺滋陰
藥愈及干涉矣

豬脂一具治淨以蓮子去心入脂內水煎糜爛收乾搗爲丸服

用藥次第可法

陳足甫稟質素弱。上年曾經吐血。今夏患感之後。咳嗽夜熱。飲食漸減。醫作損治。滋陰潛陽。久服不效。秋杪孟英診之。曰陰分誠虛。第感後餘熱逗留於肺。阻氣機之肅降。搏津液以爲痰。此關不清。雖與滋填培補之藥。亦焉能飛渡而行其事耶。先清肺氣。以保胃津。俾治節行而灌溉輪。然後以甘潤濃厚之藥。復真陰。始克有濟。乃尊仰山聞之。擊節歎服。如法施之。果漸復。胡蔚堂舅氏年近古稀。患囊腫小洩。赤短寒熱如瘧。孟英曰非

王氏醫案

卷二

六

外感也。乃久蘊之溼熱下流。氣機尙未宣泄。與五苓合滋腎加棟實。梔子木通。兩劑後囊開。出腥粘黃水甚多。小洩漸行。寒熱亦去。繼與知藥八味。去山藥。莖肉。加卮子。棟實。芍藥。苡仁等。久服而愈。壬寅夏。感受暑溼。誤投温散。以致謔語神昏。勢瀕於危。而肛前囊後之間。潰出腥膿。瘡口深大。瘍科以爲懸癰也。敷治罔效。時孟英患痞未痊。子固邀其扶病一診。孟英曰。懸癰乃損怯證成之。以漸今病來迅速。腥穢異常。是身中久蘊厚味溼熱之毒。挾外受之暑邪。無所宣泄。下注而爲此證。切勿敷藥。以遏其外走之勢。但舌強而紫。赤脈細而滑數。客邪熾盛。伏熱蘊隆。

眼前道理而人多不悟一經拈出便成名論此與以針治虛損者同一性謬

陰分甚虧。深虞津涸。先與清營之劑。三投而神氣漸清。次以涼潤。陽明便暢而熱獨膿淨。改用甘柔滋養。月餘潰處肌平善後。參入參耆。竟得康強如昔。

汪吉哉久瘥不愈。醫謂元氣已虛。雜投温補。漸至肌瘦內燔。口乾咳嗽。寢汗溺赤。飲食不甘。孟英視之。曰餘邪逗留血分也。與秦芫。鼈甲散而瘳。其堂兄養餘亦患瘥數月。多醫療之罔效。肌瘦自汗。腰膝痠軟。不能稍坐。極其畏冷。孟英曰。此大虛證。胡反不補。猶以消導。是何居心。與參耆。水草。熟地。白芍。五味。杜仲。山藥。龍骨。牡蠣。桂枝。大棗。木瓜。服數十帖而起。

王氏醫案

卷二

七

孟英治其令叔高年。痰嗽喘逆。礙臥。肢冷。顫紅。飲食不進。與真武湯而安。
湖墅張春橋。素稟不堅。頭眩腦鳴。頻服温補。藥甚覺畏。冷人皆謂其體偏於寒也。辛丑春始請孟英診之。脈甚數。曰陰虧也。温補非宜。改服滋水培元之劑。頗爲有效。夏間或勸以炙火。云可以除百病。蓋未知灼艾之可以除百病者。謂可除寒溼凝滯。陽氣不能宣通之證。非謂內傷外感一切之病。皆可灸以除之也。故仲景有微數之脈。慎不可灸之訓。正以艾火大能傷陰也。灸後數日。即寒少熱多。宛如瘧疾。醫者以爲脾寒病。投以温散。日

以滋甚。春橋知藥治未符。堅不肯服。乃父與之詢其故。漫曰。要兒服藥。須延王先生診視。與之遂邀孟英治之。切其脈滑數倍。加曰。陰虛之體。內熱自生。炙之以艾。火氣內攻。時當海暑。天熱外燦。三者相交。陰何以堪。再投溫散。如火益熱。當從痺瘡治。專以甘寒息熱。則陰津不致枯涸。而寒熱不攻。自去。所謂治病必求其本也。竟不用一分表散藥而治愈。

棲流所司藥陳芝田。於仲夏患感。諸醫投以溫散。延至旬日。神昏識妄。肢搐耳聾。舌黑唇焦。囊縮溺滴。胸口隱隱微斑。一望而知其危矣。轉邀孟英診之。脈細數而促。曰。陰虧熱熾。液將涸矣。

王氏醫案 卷二

一。派甘寒之藥。既可燥熱。又以生津。真治溫良法也。惟溫溫宜稍加斟酌耳。

遂用西洋參元參生地二冬。知藥棟實石斛白芍甘草。稍銀花。木通犀角石菖蒲。大劑投之。次日復診。其家人云。七八日來。小便不過涓滴。昨藥服六七個時辰。後解得小溲半杯。孟英曰。此即轉機也。然陰氣枯竭。甘涼濡潤。不厭其多。於前方再加龜板。鱉甲。百合。花粉。大鍋煎之。頻灌勿歇。如是者八日。神氣始清。諸恙悉退。純用滋陰之藥。調治匝月。而瘳。予謂孟英學識過人。熱腸獨具。凡遇危險之候。從不輕棄。最肯出心任怨。以圖之。如此案。八日後神氣始清。若經別手。縱使治法不錯。而一二帖後。不甚起色。必規避堅辭。致病家惑亂。謀及道旁。雖不死於病。亦必

從陰引陽。從陽引陰。絕妙機軸。

死於藥矣。此在醫者之識。老心堅。又須病家之善於擇而任之。專也。談何易耶。且聞孟英嘗云。溫熱液涸神昏。有投犀角地黃等藥。至十餘劑。始得神清液復者。因溫熱案最夥。不暇詳錄。姑識此以告司人之命者。

江小香病勢危篤。人迎孟英診之。脈虛絃而小。數頭痛偏於左。後子夜熱躁。肢冷欲嘔。口乾不欲飲。不飲不食。舌蹇言澀。溺黃而頻。曰。體屬素虛。此由患感時過投溫散。陰津陽氣皆傷。後來進補而勢反日劇者。滋膩妨其中運。剛烈動其內風。以致醫者僉云。表之不應。補亦無功。竟成無藥可治之證。雖然。不過

王氏醫案 卷二

難治耳。未可遽棄也。與秋石水拌制高麗參。菴蓉首烏。生白芍。牡蠣棟實。鹽水炒。橘紅。桑甚。石斛。蒺藜。茯苓。煎吞飯丸。肉桂心五分。一劑。躁平。嘔止。各恙皆減。連投數服。粥食漸安。乃去首烏。桂棟加砂仁。末拌炒熟。地菊花。枸杞。半月而瘳。

溽暑之令。瘡疹盛行。幼科僅知套藥。升柴防葛。亂施。殆亦疫癘之病。造化默行。其殺運歟。陳仰山家患此者十餘人。其長郎書。芾。孝廉之女。勢最劇。以瘡甫出。而汛至也。醫者卻走。始延孟英。視之。脈滑而數。舌絳。大渴。面赤。失音。不食。便瀉。曰。此由發散太過。火盛風熾。氣血兩燔。氣分之邪。由瀉而略泄。其燄營分之熱。

由汎而稍解其焚。豈可畏其脫陷。妄投止瀝耶。與西洋參、石膏、知母、麥冬、犀角、生地、連翹、甘草、石斛、丹皮、桑葉、竹葉、大劑投之。三日而愈。養陰善後。遂以漸安。其餘或輕或重。孟英一以清解而痊。

石誦義、夏杪患感。多醫廣藥。病勢日增。延踰一月。始請孟英診。焉脈至右寸關滑數。上溢左手。絃數耳聾。口苦熱甚。於夜胸次迷悶。頻吐粘沫。噎飲咽喉阻塞。便溏。湯赤。閒有譫語。曰此暑熱。始終在肺。竝不傳經。一劑白虎湯。可愈者。何以久延至此也。乃尊北涯出前所服方見示。孟英一一閱之。惟初診顧聽泉用清

王氏醫案

卷二

解肺衝法為不謬耳。其餘溫散升提。滋陰涼血。各有來歷。皆費心思。原是方。惜未中病。而北涯因其溏泄。見孟英君石膏以為治。不敢與服。次日復診。自陳昨藥未投。惟求另施妥法。孟英曰。我法最妥。而君以為未妥者。為石膏之性寒耳。第藥以對病。為妥。此病舍此法。別無再妥之方。若必以摸稜迎合為妥。恐賢郎之病不安矣。北涯聞而感悟。頗有姑且服之之意。而病者偶索方一看。見首列石膏。即曰。我胸中但覺一團冷氣。湯水皆須熱呷。此藥安可投乎。堅不肯服。然素仰孟英手眼。越日仍延過診。且告之故。孟英曰。吾於是證。正欲發明。夫邪在肺。經清肅之

論亦根概喻氏
而更加明透

令不行。津液凝滯。結成涎沫。盤踞胸中。升降之機亦塞。大氣僅能旁趨。而轉旋是一團涎沫之中。為氣機所不能流行之地。其覺冷也不亦宜乎。且予初診時。即斷為不傳經之候。所以尙有今日而能自覺胸中之冷。若傳入心包。則舌黑神昏。纔合吳古年之犀角地黃矣。然雖不傳經。延之踰月。熱愈久而液愈涸。藥愈亂而病愈深。切勿以白虎為不妥。急急投之。為妙。於是。有敢服之心矣。而又有云。曾目擊所親某。石膏甫下。嘔而命亦隨之。况月餘之病。耳聾泄瀉。正氣已虧。宜慎用。北涯聞之。惶然。仍不敢投。乃約翼日。廣徵名士。會商可否。比孟英往診。而

王氏醫案

卷二

畢至。且見北涯求神拜佛。意亂心慌。殊可憐憫。欲與眾商。權恐轉生掣肘。以誤其病。遂不遑謙讓。援筆立案。云病既久延。藥無小效。主人之方寸亂矣。予三疏白虎而不用。今仍赴招診視者。欲求其病之愈也。夫有是病。則有是藥。諸君不必各抒高見。希原自用之愚。古云鼻塞治心。耳聾治肺。肺移熱於大腸。則為腸澀。是皆白虎之專司。何必拘少陽而疑虛寒哉。放膽服之。勿再因循。致貽伊戚也。坐中顧聽泉見案。即謂北涯曰。孟英腸熱。磨堅極。堪倚賴。如猶不信。我輩別無善法也。顧友梅、許芷卿、趙笛樓、亦皆謂是。疏方以白虎加西洋參、貝母、花粉、黃芩、紫苑、杏仁。

冬瓜仁。枇杷葉。竹葉。竹茹。竹黃。而一劑甫投。咽喉即利。三服後。各恙皆去。糜粥漸安。乃改甘潤生津。調理而愈。予謂此案。不僅治法可傳。其闡發病情處。識見直超古人之上。

劉廉方。常州名士也。在西湖受暑。移榻於崔仲遷別駕處。醫治垂危。莊芝階舍人。拉孟英往診之。裸臥昏狂。舌黑大渴。溺赤便祕。脈數而扎。與犀角地黃湯加減服之。神識已清。略能進粥。次日復診。頗知問答。大有生機。仍處甘涼法。以贈之。并囑伊格外謹慎。而越日。莊半霞詣孟英。偕往診視。見其目張睛瞪。齒露唇焦。氣喘汗出。揚手擲足。而不可救藥矣。眾楚交咻。謂是寒涼藥。

王氏醫案

卷二

十一

凝閉而然。孟英曰。病之宜涼宜熱。汝輩不知也。脈乃皮裏之事。汝等不見也。吾亦不屑為之爭辨。惟目瞪唇焦。人所共覩。則其死於何藥。自有定論。遂拂衣出。半霞再三請罪。孟英曰。俗人之見。何足介懷。是非日後自明。於我心無慊焉。第斯人斯病。皆可惜也。既而始知有人主熱藥以債事。豈非命耶。僅二載而仲遷病。孟英聞之曰。殆矣。蓋知其陰虛而受暑溼。恐主藥者未必能悔悟於前車也。後果聞其廣服溫補之劑。以致真陰竭絕而死。覆轍相尋。迷而不醒。可哀也已。

甌鎮孫總戎令郎楚樓。自鎮江來浙。主於石北涯家。途次即患

寒熱如瘧。脇痛痰嗽。北涯見其面鰲形瘦。頗以為憂。即延醫與診。醫謂秋瘧。與疏散方。北涯猶疑其藥不勝病。復邀孟英視之。曰。陰虧也。勿從瘧治。以葦莖湯加北沙參。熟地。桑葉。丹皮。海石。旋覆。貝母。枇杷葉。為劑。北涯見用熟地。大為駭然。孟英曰。君慮彼藥之不勝病。吾恐此病之不勝藥。贈此肅肺潤燥。滋腎清肝之法。病必自安。楚樓聞之。歎曰。妙手也。所論深合病情。前在姑蘇。服疏散藥甚不相安。居停母疑我服王公之藥矣。果數日而痊。踰旬即東渡赴甌去。

姚雪蕉。孝廉之太夫人。年踰花甲。患感兩月。醫皆束手。始延孟

王氏醫案

卷二

十一

英診之。身已不能轉側。水飲難於下。嚔聲音不出。便溺不通。曰。此熱邪逗留不去。津液剝削殆盡。計其受病之時。正當酷暑。豈即溫補是投。但知其虛而不知其病耶。閱前服諸方。惟初手顧聽泉。從吸受暑邪。輕清開上立治。為合法耳。餘方非不是。起死回生之藥。其如與病無涉。何而阮某小柴胡方。服之最多。蓋醫者執此和解之法。謂不犯汗吐下三者之險。豈不穩當。病家見其參胡並用。謂補正祛邪。具一舉兩全之美。最為上策。孰知和解足少陽。傳經傷寒之劑。不可以概和各經各氣之各病。徒使參胡提升熱邪。以上逆。致一身之治節。無以清肅下行。而薑棗

溫膩溼濁於中焦。致運化之樞機。失其灌溉之布。氣機愈窒。津液愈乾。和解之湯愈進。而氣愈不和。病愈不解。今則雖有良治。而咽喉僅容點滴。氣結津枯。至於此極。英雄無用武之地矣。雪蕉昆季力懇挽救。乃疏甘涼濡潤之方。囑其不限時刻。不計多寡。類以水匙挑入。使其漸滲下喉。而一日之間。僅灌一小杯許。其病勢之危。於此可想。直灌至旬餘。氣機始漸流行。藥可服小半劑矣。人見轉機之難。不無議論。旁生賴孟英靜鎮不搖。乃得日。以向愈。粥食遞加。惟大解久不行。或以爲憂。孟英曰。無恐也。水到渠成。穀食安而津液充。則自解矣。若欲速妄攻。則久不納。

王氏醫案

卷二

古

穀之胃。尙有何物。以供其蕩滌哉。至九月下旬。始有欲解之勢。孟英連與補氣益血之藥。尙不能下。於前方加蜣螂一對。熱服即解。凡不更衣者。計及五十日矣。聞者莫不驚異。繼以平補善後而痊。仲冬大雪連朝。積厚丈許。嚴寒久凍。西湖可行車馬。斯時也。盛少雲患痰嗽。夜熱自汗。不寐。左脇痛如鍼刺。肌削不饑。自問不起矣。請孟英託以後事。及診其脈。許以可生。蓋病來雖惡。未經誤藥也。與固本加龜板鼈甲。菴蓉。知藥。青黛。石斛。花粉。白芍。棟實。海石。旋覆。貝母。蛤殼。牛膝。出入爲大劑。投之即效。連服四五

十帖而痊。予謂斯證。患於斯時。若經別手。未有不投溫補者。而少雲能與孟英遊。其亦具眼之人乎。此真所謂患難交不可不畱心於平日也。然亦不能人人而遇之。殆佛氏所謂有緣存乎其閒歟。

壬寅春。邵小墀室患汛。愆釋醫診。以爲妊。廣服保胎藥。漸至腹脹。跗腫。氣逆。礙臥。飲食不進。入夏。延孟英視之。曰。血虛氣滯。誤補成脹也。先以黃連厚樸山查雞內金。橘皮。大腹皮。枳實。茯苓。梔子。棟實。杏仁。紫苑。旋覆等藥。少佐參朮。服之。氣機漸運。脹去食安。漸入滋陰養血之治。數月。經行而愈。

王氏醫案

卷二

古

一人患晨泄。有年。累治不效。而春閒尤甚。孟英按其脈曰。汝雖苦瀉。而瀉後腹中反覺舒暢乎。曰。誠然。苟不泄瀉。又脹悶減食矣。而服四神附桂之藥。其瀉必加。此曷故也。曰。此非溫升補澀之證。乃肝強脾弱。木土相凌。處一方。令其常服。數帖。即安。後竟無此恙矣。方用白朮。苡仁。黃連。棟實。桂枝。茯苓。木瓜。芍藥。蒺藜。橘皮而已。

邵魚竹給諫。起居食飲如常。惟能側臥。略難仰睡。仰而寤。無恙也。稍一合眼。則驚竄而醒。雖再側眠。亦徹夜不得寐矣。多年莫能治。孟英以三才合枕中丹。加黃連。肉桂。服之。良效。其長郎

扶脾抑肝製方

凡心腎不交之人。多不能仰臥。以仰則腎氣不能上承。而心氣愈浮也。

不寒不燥真陰虛血者之良劑

通人之論無論寒熱藥用不得皆定誤人不可不知

子旒久患痰多胸膈滿悶連年發熱藥之罔效孟英脈之曰氣分偏虛痰飲阻其清陽之旋運宜法天之健以為方則大氣自運而流行不息胸次乃廓然如太空矣與六君去甘草加黃耆桂枝薤白棗仁石菖蒲蒺藜旋覆服之滿悶漸舒痲亦不發矣子荆人媿後惡露不行或勸服生化湯適孟英在顧診曰陰虛內熱天令炎蒸雖赤沙糖不可服也以生地丹參丹皮豆卷芩蔚子茯苓桃仁山查卮子澤蘭琥珀投之即效且無別恙而易健可見體質不齊藥難概用况其致病之因不一病機傳變無窮語云量體裁衣而治病者可不辨證而施治耶孟英常曰凡

王氏醫案

卷二

六

產後世俗多尚生化湯是以一定之死方療萬人之活病體寒者固為妙法若血熱之人或兼感溫熱之氣者而一概投之驟則變證蜂起緩則毒損漸成人但知產後之常有而不知半由生化湯之厲階此風最盛於越方本傳於越之錢氏自景岳采入八陣遂致流播四海人之陰受其害者數百年矣從無一人能議其非今特為此長夜之燈冀後人不致永遠冥行或可稍補於世但景岳最偏於溫補而獨於產後一門力辨丹溪大補氣血為主之非可謂此老之一隙微明惜猶泥於產後宜溫之謬說蓋由未入仲聖之宮牆也

戚媪者年六十餘矣自幼傭食於黃蓮泉家忠勤敏幹老而彌甚主僕之誼勝於親戚也秋閒患霍亂轉筋孟英視之暑也投自製蠶矢湯兩服而安三日後忽然倦臥不能反側氣少不能語言不飲不食蓮泉惶懼不暇遠致孟英即邀濟仁堂朱某診之以為霍亂皆屬於寒且昏沈欲脫疏附子理中湯與焉蓮泉知藥猛烈不敢遽投商之王安伯安伯云以予度之且勿服也若謂寒證則前日之藥下噦即斃吐瀉安能漸止乎蓮泉聞之大悟著人飛趕孟英至而切其脈曰此高年之體元氣隨瀉而泄固當補者第餘暑未清熱藥在所禁耳若在孟浪之家必以前之涼藥為未當今日溫補為極是縱下咽不及救亦惟歸罪於前手寒涼之誤也設初起即誤死於溫補而世人亦但知霍亂轉筋是危險之證從無一人能知此證有陰陽之異治法有寒熱之殊而一正其得失者此病之所以不易治而醫之所以不可為也今君見蓋附而生疑安伯察病機之已轉好問者心虛識機者智贖二美相濟遂使病者跳出鬼門關醫者卸脫無妄罪幸矣幸矣乃以高麗參麥冬知母萎蕤木瓜扁豆石斛白芍苡仁茯苓蒺藜為方服六劑始能言動漸進飲食調理月餘而健

王氏醫案

卷二

七

前之涼藥為未當今日溫補為極是縱下咽不及救亦惟歸罪於前手寒涼之誤也設初起即誤死於溫補而世人亦但知霍亂轉筋是危險之證從無一人能知此證有陰陽之異治法有寒熱之殊而一正其得失者此病之所以不易治而醫之所以不可為也今君見蓋附而生疑安伯察病機之已轉好問者心虛識機者智贖二美相濟遂使病者跳出鬼門關醫者卸脫無妄罪幸矣幸矣乃以高麗參麥冬知母萎蕤木瓜扁豆石斛白芍苡仁茯苓蒺藜為方服六劑始能言動漸進飲食調理月餘而健

可見浙人東賦
之薄若幽冀之
人即誤服青麟
丸數錢亦不至
如斯之甚也

七月十八日夜。予患霍亂轉筋甚劇。倉卒開誤服青麟丸。錢許
比曉急邀孟英診之。脈微弱如無耳。雙目陷汗出肢冷音啞。肌
削危象畢呈。藥恐遲滯。因囑家慈先煎高麗參湯。亟為接續。
隨以參朮白芍茯苓附桂乾薑木瓜苡仁扁豆蓮實為方。一劑
而各證皆減。次日復診。孟英曰。氣分偏虛。那堪吐瀉之泄奪。誤
餌苦寒。微陽欲絕。昨與真武理中合法。脾胃之陽復辟矣。剛猛
之品。可以撤去。蓋吐瀉甚而津液傷。筋失其養。則為之轉筋。生
白比之瘵。病例可推也。凡治轉筋。最要顧其津液。若陽既回。而
再投剛烈。則津液不能復。而內風動矣。此治寒霍亂之用附桂。

王氏醫案 卷二

大

變○中○病○而○服○之○不○止○反○受○其○害○矣○論○中○藥○證○亦○具○此○意
亦貴有權衡而不可漫無節制致墮前功也。即於前方裁去薑
附肉桂加黃耆石斛服至旬日而愈。予謂此番之病危同朝露。
若非孟英恐不能救。常聞張柳吟云。但使病者聽孟英論病之
無微不入。用藥之無處不到。源源本本。信筆成章。已覺疾瘳過
半。古云。檄愈頭風。良有以也。
陳藝圃亦知醫。其室人於仲秋患霍亂轉筋。自診以為寒也。投
熱劑。勢益甚。延朱茂才視之。亦同乎主人之見也。病尤劇。始請
孟英。決之曰。寒為外束之新邪。熱是內伏之真病。口苦而渴。薑
附不可投矣。與河間法人皆不之信也。再與他醫商之。仍投熱

此必別有外證
可憑故直斷為
暑與痰濕未有
專視脈之乳與
歇至而如是定
斷者讀者勿被
瞞過

此方可謂峻極
良由該高非徒
勝大

用補亦要用得
其宜方能奏效
非一味變補即
能愈疾也案中
諸治可以為法

藥乃至口鼻出血而死。極其悔歎。始服孟英之卓見。予謂霍亂
一證。近來時有。而醫皆不甚識。得清楚。死於誤治者。極多。孟英
特著專論。雖急就成章。而辨晰簡當。略無支漏。實今日醫家首
要之書。以其切於時用。不可不亟為熟讀而研究也。
顧雲垞體豐年邁。患瘧於秋。脈扎而稍有歇。止孟英曰。扎者暑
也。歇止者痰溼阻氣機之流行也。大忌溫補。以助邪氣。及與清
解。獨痰之法。病不少減。而大便帶血。孟英曰。暑溼無形之氣。而
平素多痰。邪反得以盤踞。頗似有形之病。清解不克。勝其任氣
血。皆受其滋擾。必攻去其痰。使邪無依附。而病自去。切勿以高

王氏醫案 卷二

九

年而畏峻藥。伊姪桂生少府。亦精於醫者也。聞之。極口稱是。遂
以桃仁承氣湯加西洋參滑石苳連橘紅貝母石斛為方。送礮
石滾痰丸。乃郎石甫孝廉云。此藥在他人必畏而不敢服。我昔
年曾患暑溼證。深悉溫補之不可輕試。况高明所見相同。更何
疑乎。徑服二劑。下粘痰。汚血甚多。瘧即不作。仍以清潤法善後
而康。
邵子受令。壺患吐血。肌膚枯澀。口渴脈虛。大孟英曰。氣分之陰
虧也。溫補既非。滋填亦謬。以參耆二冬。知母百合。麥蘗。石斛。桑
葉。枇杷葉。投之而愈。

九月間張春橋患瘧寒少熱多閒二日而作甫兩發形即清瘦孟英診曰脈絃而細尺中甚數疾作於子夜口乾嗜飲乃足少陰熱瘧也兩發遽爾形消胡可玩視吾以妙藥奉贈可期即已但請即服不可商於人而致生疑議也方用元參生地知母丹皮地骨皮天冬龜板茯苓石斛桑葉春橋以向所心折遂服之一劑瘧即止再以滋陰善後而愈予謂此證一帖而瘳似乎輕易但非真才實學焉有此種妙治設遇別手非溫補即提表其禍可勝道哉然天下之病無論輕重總貴初治得法何致輕者重而重者危耶奈世俗之情必使輕者重而後轉安始知醫藥

王氏醫案

卷二

辛

之功殊可歎也按此證世人但知其為三陰瘧統治以溫補之法從未聞有分經用藥者今提出少陰二字創立清涼之劑用藥精當取效敏捷法似新奇理自完足所謂活人治活病全以活潑運之也可以啟人慧悟垂作典型金寬甫初冬患感冒醫黃某聞其向來不拘何病總須溫藥而瘧胸懷成見進以薑桂之方漸至足冷面赤譫語煩躁疑為戴陽而束手矣舉家徬徨延孟英診焉曰此伏邪晚發誤與升提熱浮於上清解可安寬甫猶以向不服涼藥為疑方中苓連之類堅不肯用乃兄愿谷中翰極力開導督人煎而飲之果得霍

然

周曉滄乃郎品方患冬溫所親顧聽泉知其體屬陰虧病非風寒也不犯一分溫升之品而證不能減勢頗可危乃虛懷轉邀孟英診之曰所治良是也但於方中加貝母杏仁紫苑冬瓜子等味與之遂效可見藥貴對病雖平淡之品亦有奇功孟英嘗云重病有輕取之法於此可見

癸卯春邵秋子令堂年近六旬患寒熱如瘧者久矣諸醫雜治罔效孟英視之曰此溼邪久蘊已從熱化誤投提補動其肝陽痰飲因而上逆與通降之法寒熱即減而包某謂瘧久陰虛理

王氏醫案

卷二

壬

宜滋養病家聞之近是遂進首烏鼈甲等藥漸至脈伏胸痞呃忒自汗渴飲不食額赤便泄包某束手疏生脈散以塞責舉家徬徨再求孟英診之曰此滋膩阻塞氣機清陽不司旋運痰飲閉滯隧絡非脫象也補藥不可進以栝婁薤白合小陷胸加葛蒲竹茹旋覆貝母杏仁紫苑枇杷葉投之呃止脈出大有轉機而鄭某謂病固屬痰須溫熱以宣通勿寒涼而凝遏病家又惑焉薑桂類投既而脣腫咽疼不能進飲舌乾短硬難出語言復請孟英救療與犀角地黃湯加元參知母銀花竹黃花粉膽星石菖蒲竹瀝之類六七劑吐出極臭膠痰甚多粥飲漸進此第

痘原感疫而發
醫林改錯中言
之甚詳

三次生機也。奈狂瀾莫障。邪說橫行。輒以涼藥不宜。擅服久病。必定元虛。甘言悅耳。遂至升散溫補。各逞所能。符咒乩方。罔不徧試。延至仲夏。膠腐齷糜。脣高數寸。竟成燎原。莫救。仍懇孟英設法。乃堅辭不能措手。付局醫黃某。敷治腫爛。日甚而終。

上年秋燥冬暖。略無霜雪。河井竝涸。吾杭自九月間起。天花流行。十不救五。小兒之殤。於是者。日以百計。孟英曰。此痘疫也。治法當與常痘有異。惜幼科未之察耳。且天令發泄。不主閉藏。入春恐多喉患。特刊加味三豆飲方。俾未曾佈痘者。預服免患。將出者。恣飲冀輕。又勸人頻服青龍白虎湯。以杜春來喉恙。不料

王氏醫案

卷二

三

其言果應。三春不雨。喉疹甚多。醫者猶不悟其致病之因。僅知發散。正如火上添油。孟英胸有成竹。一以仲聖白虎湯為救焚主劑。若已及於營分者。用晉三犀角地黄湯。相機加減。又刊青龍白虎湯暨錫類散方。廣為印送。賴此以活者。不可勝數。

附 加味三豆飲

生綠豆 生黃豆 生黑豆 或用水煎服
生甘草 金銀花 水煎服

孟英原刻自注云。古方三豆飲為痘證始終可服之妙藥。未出時常服。痘可使稀。將出時急服。重可冀輕。已出

時恣服。逆可轉順。盡出時頻服。毒可易清。俗傳種痘是密室烘花。更有初生小兒。於十八日內服藥。令其出痘之法。是掘苗助長。此等矯揉造作。陰受其害者。古今來不知幾恒。河沙數矣。至於種種稀痘之方。皆無義意。或以毒藥損人元氣。或以穢物致生別恙。慎勿為其所惑。惟此方藥極簡易。性最平和。味不惡劣。易辦易服。不必論其體質。久服無弊。誠盡善盡美之王道藥也。杭人惑於患痘不食豆之說。甚屬可鄙。今特辨明。冀人醒悟。凡小兒能啜飲後。即以此藥日日代茶。誠保赤之首章焉。

王氏醫案

卷二

三

原方用赤豆。性燥傷陰。予以黑大豆易之。更有補陰之績。雖燥令燥。體皆無礙矣。再益銀花甘草。而化毒之功尤勝。或疑銀花性涼。似難久用。不知三豆皆穀也。性能實脾。得銀花以濟之。更覺冲和。况小兒體稟純陽。極宜此甘涼補陰之味。豈特稀痘尤能明目消疳。不生瘡癩。泄瀉等病。其功未能殫述也。

附 青龍白虎湯

橄欖 生蘆葦 水煎服

孟英自注云。此予自制方也。橄欖色青。清足厥陰內寄。

之火風而靖其上騰之欲蘆服色白化手太陰外來之燥熱而肅其下行之氣合而為劑消經絡留滯之痰解膏梁魚麵之毒用以代茶則龍馴虎伏藏府清和豈但喉病之可免耶且二味處處皆有人人可服物異功優久任無弊實能弭未形之患勿以平淡而忽諸

附 錫類散

象牙屑焙 眞珠各二分 飛淨青黛六分
梅花冰片三釐 壁錢二十個俗名喜兒
西牛黃 人指甲各五釐男病用女女病用男合送濟人須分別配之

王氏醫案

卷二

三

共研極細粉吹患處流出惡涎即愈○孟英自注云此專治爛喉痧疹之神方也尤鶴年附載於金匱翼云張瑞符傳此方以救人而得子故子名之曰錫類散

段春木之室爛喉內外科治之束手姚雪蕉孝廉薦孟英視之骨瘦如柴肌熱如烙刺痰阻於咽喉不能咯吐須以紙帛攪而曳之患處紅腫白腐齧舌皆糜米飲不沾汛事非期而至按其脈左細數右絃滑曰此陰虧之體伏火之病失於清降擾及於營先以犀角地黃湯清營分而調妄行之血續與白虎湯加西洋參等肅氣道而瀉燎原之火外用錫類散掃痰腐而消惡毒

種痘之法以人巧而奪天工原為妙法但須慎於擇時若疫氣流行之時感其氣者尚有腫爛喉之弊此又加以痘毒耶此乃醫之不明未可盡歸咎於種痘也

繼投甘潤藥錫餘熱而充津液日以向安月餘而起

吳雨峯明府家囑兒科為其仲郎所出之兩孫種痘下苗二三日發熱咽疼醫以為痘之將形也投以升透之藥赤斑似錦喉爛如焚半月之間闔家傳染諸醫莫敢入其室孟英往診時見其三郎耕有四郎小峯尙未病亟曰已病者固當圖治未病者尤宜防患傳以青龍白虎湯代茶恣飲竟得無恙其令闈洪宜人及仲媳皆為之治愈此外如其長媳其令嫂其三孫其僕其探病之女戚殞於是病者七人焉時雨峯築巖兩喬梓咸宦於外仲郎亦幕遊江右不料因種痘而釀此家禍益信孟英勸人

王氏醫案

卷二

三

勿種痘之說為可訓矣

潘洪疇託兒醫為其仲郎春波所出之孫種痘下苗三日即咽痛醫與升散藥發熱斑爛七朝而天春波及其弟祥衍皆染其病春波之證顧聽泉治而愈矣祥衍之恙咽喉爛至於舌胸膈痞塞不通牙關緊澹小溲淋瀝口流紫黑血塊人皆謂其臟腑爛焉孟英視之曰惡血毒涎正欲其出吹以錫類散用椀承其口流出涎血甚多咽喉牙環胸膈皆得漸舒投以犀角地黃湯加元參銀花童溺藕汁竹黃花粉貝母石菖蒲之類漸以向安繼與生津填補而痊

夏閒顧聽泉邀孟英視其所親屠綠堂之恙孟英曰陰生可慮果於夏至前五日而卒屠之五令郎患痰嗽者數年近因悲哀病作徐某見其嗽甚則吐也投以參朮之劑病益甚閏七月十七夜綠堂忽示夢云汝病須延孟英診視服溫養藥可愈覺而異之即迂過診孟英曰此陰虛勞嗽嗽久而衝氣不納則嘔吐非胃寒也經言勞者溫之亦溫養之謂非可以溫補施之者病者見案更爲驚歎始以父夢告焉孟英亦爲之肅然方用西洋參熟地菴蓉二冬茯苓坎版牡蠣紫石英萎蕤枇杷葉橘皮服之果安子謂凡事皆可以感天地格神鬼况醫爲性命之學耶

王氏醫案

卷二

美

即此一案可以知孟英之手眼通天非幸獲虛名者所能仰望也胡秋初於酷熱時偶有不適醫以柴葛香薷散之反惡寒胸痞更醫用枳朴枳榔以瀉之勢日劇延孟英視之自汗不收肢背極冷奄奄一息脈微無神曰稟賦素虧陽氣欲脫此必誤認表證使然與救逆湯加參耆服之漸安繼以補氣生津調理匝月而痊陳菱裳患淋久不愈延至溽暑邀孟英診之曰易事耳與補中益氣湯而愈其子荷官病痞積腹脹發熱乾噎善食黃瘦便溏

合觀二案其人必陰虛肺燥之質故用藥如此

渴赤兒科藥廣服無功已將絕望矣孟英聞而憐之曰吾於幼科雖未討論姑贈一方或有生機也以黃連白芍牡蠣龍甲雞肫皮五穀虫霞天麴木瓜山查棟實橘皮桔梗旋覆子丹皮等藥投之一劑知旬餘愈

段堯卿之太夫人患霍亂轉筋年踰七十矣孟英投自制連橫飲三啜而瘳霍亂案甚夥不遑廣采姑錄數則以示一斑石誦義室久患痰嗽諸醫藥之勿廖孟英切其脈曰非傷風也與北沙參熟地百合麥冬貝母紫苑萎蕤枇杷葉鹽水炒橘皮燕窩一劑知數劑已初秋又患腕痛上及肩尖向以爲肝氣輒

王氏醫案

卷二

毛

服破削之品孟英曰亦非也以砂仁炒熟地炙橘紅棟實延胡枸杞當歸茯苓桑甚蒺藜爲方服之良效繼即受孕矣石芷卿患感張某連投柴葛藥熱果漸退而復熱之後勢更孔甚乃延孟英診焉先以梔豉芩連等藥清解其升浮之熱俟邪歸於府脈來絃滑而實徑用承氣湯下之時其尊人北涯赴甌無人敢主其可服否也另招他醫決之以爲太峻且腹不堅滿妄攻慮變舉家聞之搖惑暮夜復懇再診孟英辨論洋洋堅主前議服後果下黑矢次日大熱大汗大渴引飲孟英曰此府垢行而經熱始顯與竹葉石膏湯一劑而安繼以育陰充液調理

而康。

朱某患痢於越。表散蕩滌滋膩等藥。備嘗之矣。勢瀕於危。始返杭。乞孟英診之。神氣昏沈。耳聾。腕口乾。身熱。環臍硬痛。異常。晝夜下五色者數十行。小溲滴痛。四肢抽掣。時暈厥。曰。此暑溼之邪。失於清解。表散蕩滌。正氣傷殘。而邪乃傳入厥陰。再以滋膩之品。補而錮之。遂成牢不可拔之勢。正虛邪實。危險極矣。與白頭翁湯。加棟實。菴蓉。芩連。梔芍。銀花。石斛。桑葉。橘葉。羚羊。角。牡蠣。海蛇。鼈甲。鷄內金。等藥。大劑頻灌。一帖而抽厥減。半四帖而抽厥始息。旬日後便色始正。溲漸清。長粥食漸進。半月後

王氏醫案

卷二

天

臍間之硬。始得盡消。改用養陰調理。踰月而康。

鄰人汪氏婦之父王叟。秋患痰嗽。不食氣喘。不臥。囊縮便秘。心搖搖不能把握。勢極可危。伊女浼家慈招孟英救之。曰。根蒂欲脫耳。非病也。以八味地黃湯去丹澤。合生脈。加紫石英。青鉛。龍牡。胡桃肉。棟實。菴蓉。投之大解。行而諸恙減。乃去菴蓉。麥冬。服旬日。以瘳。初冬邵可亭患痰嗽。面浮微喘。醫謂年踰花甲。總屬下部虛寒。進以溫補納氣之藥。喘嗽日甚。口涎自流。莖囊漸腫。兩腿腫硬。至踵不能稍立。開口則喘逆欲死。不敢發言。頭仰則咳。嗆咽疼不容略臥。痰色黃濃帶血。小溲微黃而長。許芷卿

薦孟英視之。脈形絃滑有力。曰。此高年孤陽熾於內。時令燥火

薄其外。外病或可圖治。真陰未必能復。且平昔便如羊矢。津液素乾。再投溫補。如火益熱矣。乃以白虎湯合瀉白散。加西洋參。貝母。花粉。黃芩。大劑投之。并用北梨搗汁。頻飲潤喉。以緩其上。僭之火數帖。後勢漸減。改投葶藶湯。合清燥救肺湯。加海蛇。蛤壳。青黛。勃。臍。竹。瀝。為方。旬日外。黎已用及百斤。而喘始息。繼加坎版。鼈甲。犀角。而以此。此却了必以病者。黎也。何不另用之。始下行小溲。赤如蘇木汁。而諸證悉平。下部之腫。隨病遞消。一月已來。共用黎二百餘斤矣。適大雪。祁寒。更衣時略感冷風。腹

王氏醫案

卷二

天

中微痛。自啜薑糖湯兩碗。而喘嗽復作。口乾咽痛。大渴舌破。仍不能眠。復用前方。以綠豆煎清湯代水。煮藥。始漸向安。孟英謂其乃郎步梅曰。內經云。陰精所奉。其人壽。今尊翁陰液久虧。陽氣獨治病。雖去矣。陰精非藥石所能繼續。况年踰六秩。長不勝。消治病已竭人謀。引年且希。天眷予以脈察之。終屬可虞。母謂治法不周。贈言不早。致有他日之疑。成敗之論也。一賣酒人姓陸。極窘而又遭顛沛。久而患一異疾。形消善癢。蟲從皮膚而出。搔之蠕蠕。醫治莫效。孟英診曰。悲哀勞苦。陽氣受傷。麴蘖浸淫。乃從虫化。與補氣藥加杉木桑枝而愈。

陳芟裳之太夫人。陡患嘔吐。徹夜不止。次早延孟英診之。自述因寒而致。孟英知芟裳進場家無主藥之人。若明言屬熱。必致畏藥不服矣。漫應曰。固寒也。而疏方則芩連梔棟。以大苦寒為劑。投之良愈。

張鄭封室。晚後即發熱。服生化湯二帖。熱益熾。而發赤疹。顧聽泉診之。即與清解三劑。不應。欲進犀角地黃湯。而恐病家之狂。於產後以生疑也。乃拉孟英質之。診其脈絛滑而數。面赤熱躁。胸悶善悲。肢腫而疼。兩肘白疱如扁豆大者數十顆。舌上亦有一顆痛礙。水飲大便不解。已旬日矣。曰。此不但胎前伏暑。且有

王氏醫案

卷二

辛

蘊毒而誤服生化湯。以助其虐。幸初手即用清解。尚不致於昏陷。犀角地黃極是治法。猶恐不能勝任。乃與聽泉商。加西洋參。滑石。知母。銀花。花粉。人中白。婁仁。竹黃。貝母。桑葉。梔子。為劑。其所親曰。高明斷為熱證。何以病者雖渴而喜熱飲耶。孟英曰。此方中所以多用痰藥也。凡胸中有熱痰。阻礙氣機者。每如是不可以其向不吐痰。而疑吾言之妄也。若因此而指為寒證。則禍不旋踵矣。進四帖。始得大解。頻吐稠痰。而各恙皆減。飲食漸加。孟英曰。病勢雖穩。餘熱尚熾。苟不亟為清滌。而遽投補益。猶有厚損之虞。其母家果疑藥過寒涼。必欲招專科調治。幸將前方

示彼尚不妄施溫補。然隔鞞搔癢。紀律全無。旬日後餘火復燃。鄭封堅懇孟英設法。仍用甘寒療之。周身膚蛻如蛇皮。爪甲更新。其病之再生也。可知繼與滋補真陰而起。葉晝三患。欬逆上氣。頭偏左痛。口渴不饑。便瀉如水。王瘦石薦孟英視之。曰。此肝陰胃汁交虛時。令燥邪外薄。與育陰息風。清燥滋液之法。日以漸安。服及兩月。大解反形乾結而痊。鄭某吐血盈碗。孟英脈之。右關洪滑。自汗口渴。稍一動搖。血即上溢。人皆慮其脫。意欲補之。孟英曰。如脫惟我是問。與白虎湯加西洋參。大黃炭。一劑霍然。

王氏醫案

卷二

辛

季秋。顧聽泉邀孟英視康侯副轉之恙。切其脈滑數。而右歇左促。且肝部間有雀啄。氣口又兼解索。望其面宛如薰黃。頭汗自出。呼吸粗促。似不接續。坐臥無須臾之寧。便溺澀滯。渾赤極臭。心下堅硬。拒按。形若覆碗。觀其舌色。邊紫苔黃。殊不甚乾燥。問其所苦。曰。口渴甜膩。不欲飲食。苟一合眼。即氣升欲喘。煩躁不能自持。胸中懊懣。莫可言狀。孟英曰。此由溼熱誤補。漫無出路。充斥三焦。氣機為其阻塞。而不流行。蔓延日久。津液為之凝滯。而成痰飲。不啻人禽雜處。苗莠同疇。邪正混為一家。醫見肢冷白汗。不知病由壅閉。而然欲以培正。而邪氣方張。得補反為

樹幟豈非資寇兵而齎盜糧哉。非其類者鋤而去之。乃為喫緊之治。聽泉曰良是也。夏閒起病。聞自心悸少寐。楊某以為虛而補之。時尙出差辦事。暑溼外侵。受而不覺。迨關差未竣。其病斯發。而諸醫之藥。總不外乎溫補一途。以致愈補愈劇。今擬溫膽法。待君可否。孟英曰。脈證多怪。皆屬於痰。今胸痞如斯。略無痰吐。蓋由痰能阻氣。氣不能運。痰耳宜於溫膽中加薤白。棗仁通其胸中之陽。又合小陷胸為治。飲痞之聖法。參以梔鼓。世其久鬱之熱。以除懊懷。佐以蘭草。滌其陳腐之氣。而醒脾胃。聽泉深然之。連投二劑。各恙皆減。脈亦略和。而病者以為既係實證。何

王氏醫案

卷二

幸

妨一瀉而去之。連服大黃丸二次。承氣湯半帖。孟英急止之曰。畏虛進補。固非欲速妄攻。亦謬。蓋溼蒸為熱。灼液成痰。病非一朝一夕而成。治以上下分消為是。不比熱邪傳府。可一蕩而愈也。越日下部果漸腫。孟英曰。攻痞太速之戒。古人不我欺也。與聽泉商以前法加黃芩。合瀉心意。再配雪羹投之。痰果漸吐。痞亦日消。而自腹至足。以及莖囊腫勢日加。孟英謂勢已如此。難以遽消。但從三焦設法。則自上而下。病必無虞。與聽泉商用河閒桂苓甘露飲意。而姚平泉孝廉力主崇土勝溼之法。深以寒涼為不可用。眾議仍投前日之藥。孟英曰。前藥原可服也。嫌力

前云不可妄攻此又投峻下之劑何也蓋前徒攻其熱故不中病而致生他證此則直攻其痰始能與病相當也

不足耳。次日痰中帶血甚多。孟英曰。浮熱薰蒸不已。自氣及營矣。與聽泉暨王子能參軍商。以知藥生地犀角龜甲白芍苡仁貝母石斛茅根麥冬滑石卮子藕汁童溺投之。而止。踰數日又吐且肢冷自汗。心餒畏脫。姚平泉謂氣不攝血。當主歸脾湯。以統之。舉家皇皇。連請診脈者三次。孟英曰。脈來屢變。陳芝江所以不能指實其病。而楊阮諸人皆疑為大虛之候也。然望聞問切。不可獨憑於指下。今溼如赭石湯。渾赤有脚。其為溼熱之病。昭昭若揭。初傷於氣。分則津液受灼。以為痰漸及於營。分則陰血不安。而妄溢邪氣內盛。豈非病實而真實類虛。吾不受病之

王氏醫案

卷二

幸

欺也。堅守前議。靜鎮不搖。服二劑。果止。孟英曰。血之復吐也。由於氣分之邪以擾及也。欲清氣道之邪。必先去其邪所依附之痰。蓋津液既為邪熱灼燥。以成痰。而痰反即為邪熱之山險也。不妨峻攻其實。而緩行其勢。初進滾痰丸三錢。得下泄氣一次。副轉云。四十日來未有之通暢也。連投數日。始解膠痰黑矢多。遍而小溲亦漸清長。苔色亦退。寢食遂安。惟下部之腫猶爾也。馬香崖陸虛舟皆主實脾行水之法。孟英曰。諦參脈證。病不在脾。况善饑便燥。口渴溺多。吾方慮轉消證。亟投甘潤之不遑。惡可滲利傷陰。補土劫液耶。且脾虛下陷之腫。與溼盛而腫之腫

其膝之上下内外形势必然相貫今膝之上下内外凹凸週判
毫不毗連蓋由溼熱所釀之痰飲既誤補而痞塞中焦復妄攻
以流竄隧絡所謂不能一蕩而獨勢必旁趨四射吾當以法取
之曾又咳痰帶血而精神食飲如常孟英曰無恐也此乃前次
嚼三七太多兜澀留瘀最不宜用吐而去之極妙但須金水同
治冀咳止而血絡不震動為要耳與甘露飲加藕汁童叻服之
四劑而止咳嗽亦寧於是專治其下部之腫以固本加知藥貝
母花粉旋復橋絡絲瓜絡羚羊角棟實慈鬚豆卷薏苡竹瀝出
入為劑二三帖間其高突隆腫之處即覺甚癢搔之水出如汗

王氏醫案

卷二

醫

而作蒸氣六七日後兩腿反覺乾瘦燥痛莖囊亦隨之而消矣
孟英曰用此潤藥消腫尚且乾痛咽燥設從他議而投燥脾利
水之法更當何如哉蓋寒溼則傷陽熱溼則傷陰血液皆陰也
善後之法還宜滋養血液稍佐竹瀝以搜絡中未淨之痰使愈
後不為他日之患更屬法中之法服之飲食中節便溺有權幸
無消渴之虞而竟愈焉

廣孔愚司馬久患溼泄而舌黑氣短自春徂冬治而不效孟英
視之曰勞心太過陽燥其陰人見其溼泄輒與溫中不知肺受
火刑氣失清肅而短促於上則水源不生自然渴少便瀉矣投

以肅肺清心涼肝滋腎之法果得漸瘳
周菊生令正患少腹痠墜小溲頻數而疼醫投通利不效繼以
升提溫補諸法備試至於不食不寐大解不行口渴不敢飲水
聞聲即生驚悸孟英脈之曰厥陰為病也不可徒治其太陽先
與鹹苦以泄其熱續用甘潤以滋其陰毫不犯通滲之藥而愈

王氏醫案卷二終

王氏醫案

卷二

醫

古王者慮民之疾痛天札也而設醫官予之祿使士人爲之綦善也降自後世民不聊生於是去而爲醫以餬余口問之醫蓋茫如此非生民之災乎孟英志古之士也尊甫黜滄先生喜施予捐館之日家赤貧賴母夫人以儉勤支拄孟英孤露輒思自異精於醫非所志也故嘗披覽墳素慨慕古人落落自喜其胸次有如此而余則闕其處己之私有較然不欺者如與弟同財事母無私蓄交友不負平生之言數端者於古人爲難其他隱德細行可無論也今年春兒婦產後病劇諸醫罔效孟英自江右歸而五閱月之錮患以釋夫自來操術之奇或富有著述或

王氏醫案續編

趙序

獨行堪師見諸志乘者代不過數人若孟英兼而有之其必傳無疑顧予獨慨乎今之世去古日遠而士之有志於古者不能不挾術以與今遊則幾何而不以今之醫溷之也然則孟英亦慎持此志乎哉孟英向有回春錄醫案行世張君柳吟復輯近案名曰仁術志余參與其事今將續梓謹以余所知其人者錄其大槩焉以序庚戌七月仁和趙夢齡

醫之道難言矣非有絕人之智則不克澈其精深非有濟世之仁則不肯殫其心力仁且智矣而無著述以傳則澤及一時而勿能垂百世此軒岐所以有著述也古者醫必三世治尙十全醫者皆深通是道故內經之書簡奧不繁至漢張機始備方至宋許叔微始有醫案由後世以醫爲市業者多而知者愈少不得不詳述醫案俾循途不悞亦仁人之用心也叔微之後張景有醫說明孫泰來輯其父一奎之治驗陳桷記其師汪機之治驗並爲醫案江瓘復有名醫類案 國朝魏之琇續之此皆宅心仁智非炫世弋名者故其書至今重焉余家杭州五十載閱

王氏醫案續編

莊序

醫多矣求其能通內經者蓋渺能自述其治驗者則未嘗有也後交王君孟英而得見其書心竊異之今聞楊君素園將爲續梓余不知孟英之學于仲景何如也若以繼叔微諸君之書誠無愧矣故爲之序孟英內行之篤治術之精已見楊趙序中不復贅云庚戌七月既望秀水莊仲方

例言

一孟英醫案周氏采自甲申迄於癸卯凡二十年治驗僅得二卷其遺漏必多然不遑補輯茲起甲辰仍仿編年之例以便逐年采續

一詳載姓字信而可徵此前例當遵非浪費筆墨第見聞有限難免遺珠遠望四方同志廣為蒐羅也

一回春錄所載雜證之案為多感證之案間及而已良以感證方治每多相似周氏不諳斯道諒難鑒別而孟英於內傷外感無所不長至於治溫尤推巨擘茲編於溫證治案不忍多

王氏醫案續編

例言

十一

刪讀者須於大同小異之中澄心研究自可悟其微妙也

一孟英之案不徒以某方治愈某病而已或議病或辨證或論方藥或談四診至理名言隨處闡發或繁或簡或淺或深別有會心俱宜細玩

一案中有直用古方者是胸有成竹信手拈來頭頭是道也有不用古方之藥而用其意者蓋用藥如用兵不能執死方以治活病也有竟不用古方者乃良藥期於利濟不必期於古方也苟非讀書多而融會貫通於其心奚能辨證清而神明化裁出其手天機活潑生面別開不媿名數一家道行千里

矣

一同人輯此原為開醫家之智慧擴病者之生機非有利心翻刻不究但須校對真確庶不貽誤後人

王氏醫案續編

例言

十二

甲辰春予館於蘇撫孫賞谷親家署中偶見回春錄二卷乃吾
畏友王君之醫案也亟為卒讀因歎孟英抱用世之才工壽世
之術周君輯而存之其功大矣其傳必矣或疑案中多引而未
發之言似非嘉惠來茲之道余謂不然夫醫者意也昔人云吾
意所解口不能宣詎有所吝而不言耶錄其己言垂為後世法
輯案者之意也求所未言然契作者意讀案者之法也試以此
質之孟英必以余為善讀焉後之覽者將更有好學深思心知
其意而為之注釋其書神明其法以宏其壽世之道奚止善讀
如余而已哉惟余老矣沒世無稱聖人所疾羨周君之先我著

王氏醫案續編

鞭敢不勉為追步以期附驥而彰爰采今年耳目所及之如干
案志諸剞劂且回春之名似與萬病回春相襲乃題其篇曰仁
術志袁子所謂堯舜之政周孔之教神農之藥皆術也皆所以
行其仁也推廣仁術是所望於續刻之君子

王氏醫案續編卷一 原名仁術志

浙西王士雄孟英醫案 山左張 鴻柳吟詩輯

高若舟偶患腹脹醫投溫運漸至有形如痞時欲衝逆吐酸益
信為虛寒之疾溫補之藥備嘗飲食日減其痞日增肌肉漸消
臥榻半載甲辰春迓孟英診脈沈絃而更滑大解不暢小溲渾
短苔色黃膩乃肝鬱氣結鬱則生熱補則凝痰與厄棟莫連元
胡烏藥旋枳鷄金鼈甲茹橘芥夏等藥服之證雖遞減時發寒
熱四肢痠痛或疑為瘧孟英曰此氣機宜達鬱熱外泄病之出

王氏醫案續編卷一

路豈可截乎參以秦艽柴胡豆卷羚羊鼈砂桑枝之類迎而導
之人皆疑久病元虛藥過涼散而若舟堅信不疑孟英識定不
惑寒熱漸息攻衝亦止按其腹尚堅硬時以龍管滾痰丸緩導
之飲食遞加漸次向愈若舟善作隸因集詩品書一聯以贈孟
英云古鏡照神是有真宰明漪絕底如見道心蓋頌其隔垣之
視也

趙聽樵室高若舟之妹也去冬偶患腕痛黃某治之漸增頭疼
眩暈氣逆嘔吐痰多不寐便溏不食經事不行始謂其虛三月
後又疑為娠諸藥徧試病日以進若舟延孟英脈之左絃而數

右滑以駛。曰病藥耳。旬餘可瘳。趙疑大病小視。不服其方。越半
月病者頸。頭難舉。醫謂天柱已倒。勢無望矣。若舟聞之。復懇
援於孟英。疏方仍是前診之法。趙問此病諸醫束手。大劑補藥
尙無寸效。而君兩次用藥。皆極清淡。雖分兩頗重。亦焉能有濟
乎。孟英曰。子何愚耶。藥惟對證。乃克愈。病未去而補之。是助
桀也。病日加而補益峻。是速死也。原彼初意。非欲以藥殺人。總
緣醫理未明。世故先熟。不須辨證。補可媚人。病家雖死不怨醫
者。至老無聞。一唱百和。孰能挽此頹風。令壺體質雖豐。而陰虛
有素。是以木少水涵。肝陽偏盛。上侮於胃。則為脘痛。斯時投以

王氏醫案續編

卷一

二

○酸○苦○泄○肝○甘○涼○養○胃○數○日○而○愈○矣○乃○溫○補○妄○施○油○添○火○上○肺○津
胃○液○灼○燥○無○餘○怒○木○直○升○樞○機○窒○塞○水○飲○入○胃○凝○結○為○痰○雖○見
證○多○端○皆○氣○失○下○降○豈○可○指○眠○食○廢○以○為○勞○月○汎○爽○而○為○妊○耶
予○以○大○劑○輕○淡○之○品○肅○清○氣○道○俾○一○身○治○節○之○令○肝○膽○逆○升○之
火○胃○府○逗○留○之○濁○樞○機○鬱○遏○之○熱○水○飲○凝○滯○之○痰○咸○得○下○趨○自
可○向○愈○不○必○矯○枉○過○正○而○妄○以○硝○黃○傷○正○氣○所○謂○藥○貴○對○證○而
重○病○有○輕○取○之○法○非○敢○藐○視○人○命○故○將○疲○藥○塞○責○也○趙○極○感○悟
投○匕○即○效○踰○旬○果○安○又○一○月○經○至○嗣○與○滋○養○康○復○如○常○越○二○載
又○病○復○惑○於○黃○某○而○孟○英○之○功○盡○墮○惜○哉

發熱惡寒頭疼
自汗皆桂枝證
此必津液素
虧故肝失
疏泄而上衝
筋脈而口
渴也

馬某年三十餘。素用力。患發熱惡寒。肢脈自汗。少腹氣上衝胸。
頭疼口渴。孟英診曰。衛虛風襲。而絡脈久傷。肝風內動。與建中
去錫加龍牡。石英。茯苓。棟實。桑枝。數帖而痊。

李燕標參戎於癸夏。將欲赴都館。於石北涯家。項後患疽。外科
僉云不治。孟英薦老醫朱嵩。年療之。漸安。孟英偶診其脈。謂北
涯曰。李證有可愈之機。脈難久享其年。北涯驚問。所以。孟英曰。
左尺堅搏。真陰已傷。非善象也。既而告痊。北上。今春果卒於京。
李叟年越古稀。意欲納妾。雖露其情。而子孫以其耄且瞽。也不
敢從。因此漸病。狂惑羣醫。咸謂神志不足。廣投熱補之藥。愈服

王氏醫案續編

卷一

三

愈劇始延孟英診之。脈勁搏指。面赤不言。口涎自流。力大無制。
曰。此稟賦過強。陽氣偏盛。姑勿論其脈證。即起病一端。概可見
矣。如果命門火衰。早已痿靡不振。焉能興此念頭。醫見其老。輒
疑其虛。須知根本不堅實者。不能享長年。既享大壽。其得於天
者必厚。况人年五十。陰氣先衰。徐靈胎所謂千年之木。往往自
焚。陰盡火炎。萬物皆然。去冬吾治邵可亭。孤陽喘逆。壯水清火
之外。天生甘露飲。灌至二百餘斤。即梨汁也。病已漸平。僅誤於
兩瓊薑湯。前功盡墮。可見陰難充長。火易燎原。今附桂仙茅鹿
茸參戟河車等藥。服之已久。更將何物以生其涸竭之水。而和

此四損證之最
重者治而不善
則必如便不
可保此案深可
為法

其亢極之陽乎。尋果不起。程變庭乃郎芷香。今春病溫而精關不固。旬日後陡然莖縮。寒顫自問不支。人皆謂為虛瘧。欲投參附。孟英曰。非瘧也。平日體豐多淫。厚味醞痰。是以苦膩不渴。善噫易吐。而吸受風溫。即以痰溼為山險。乘其陰虧。陽擾流入厥陰。甚易豈容再投溫補。以劫液細邪而速其瘵。厥耶伊家以六代單傳。父母深憂之。堅求良治。孟英曰。予雖洞識其證。而病情膠轉。縱有妙劑。難許速功。治法稍乖。亦防延損。雖主人篤信。我有堅持。恐病不即瘳。必招物議。中途岐惑。其過誰歸。倘信吾言。當邀顧聽。泉會診。既可匡

王氏醫案續編 卷一

四

予之不逮。即以杜人之妄議。程深然之。於是王顧熟籌安治。午後進肅清肺胃方。以解客邪。蠲痰溼而斡樞機。早晨投涼腎舒肝法。以靖浮越。搜隧絡而守關鍵。病果遞減。奈善生嗔怒。易招外感。不甘澹泊。反復多次。每復必莖縮寒顫。甚至齒縫見紫血。辨指甲有微紅色。溺短而渾黑極臭。孟英曰。幸上焦已清。中樞已運。亟宜填腎陰。清肝熱。以西洋參二冬二地。菴蓉花粉。知葉連棟。斛芍。石英。牡蠣。龜板。鼈甲。阿膠。鷄子黃。之類。相迭為方。大劑連服二十餘帖。各恙漸退。繼以此藥熬膏。晨服午用。繆氏資生丸。方各品不炒。皆生曬研末。竹瀝為丸。枇杷葉湯送下。服至

凡痰飲內盛之人。服寒熱藥。皆如石投水。人皆以為藥賦之異。不知皆痰飲為患也。

入秋始得康健。孟英曰。古人丸藥皆用蜜。最屬無謂。宜各因其證而變通之。此其一法也。

翁嘉順室。晚後發熱。竹林寺僧治之。不應。溫襲二醫。皆主生化湯。加減病益劇。請孟英診之。脈爽滑微數。曰。素體陰虧。熱自內生。新產血去。是以發熱。惟譚妄昏瞽。最是嚇醫之證。渴喜熱飲。宛似虛寒之據。宜其猜風寒而表散。疑痰血以攻通。帖帖炮薑。人人桃桂。陰愈受劫。病乃日加。幸而痰飲內盛。津液未致涸竭。與蠲飲六神湯。去橘半。加西洋參。生地。花粉。竹茹。知母。生白芍。為劑。數日而瘳。逾旬復發熱。或疑涼藥之弊。或謂產辱成勞。眾

王氏醫案續編 卷一

五

楚咻之病。漸進矣。其小姑適吳氏者。向役於冥曹。俗謂之活無常。偶來探病。忽仆地而僵。口中喃喃。或問汝嫂病何如。答云。須服王先生藥。人皆異之。次日仍乞診於孟英。曰。脈浮數而絛。是風溫也。與前病異。便瀉無溺。肺熱所迫。大渴無苔。胃汁受燥。亟與天生建中湯。類灌。即蔗汁也。藥主大劑甘涼。果得津回舌潤。漸以痊。可病染於姑。孟英診曰。高年陰氣太虧。邪氣偏盛。玉版論要云。病溫虛甚死。言人之真陰甚虛。曷足以禦邪熱。而息燎原。可虞在兩候之期乎。至十四天果殞。而嘉順亦染焉。初發熱。即舌赤而渴。脈數且澀。孟英曰。非善證也。蓋陰虛有素。值憂勞。

1027 丹黃參四事合寫 9 二二下

三。江。地。氣。卑。溼。天。時。溫。暖。傷。寒。之。證。絕。少。最。多。溼。溫。風。溫。之。證。又。人。體。質。柔。脆。不。任。溫。熱。之。藥。故。惟。以。甘。寒。清。解。之。劑。漸。次。搜。剔。邪。去。而。正。不。傷。若。在。北。方。剛。堅。之。體。此。等。藥。雖。服。百。劑。亦。若。罔。知。非。加。硝。黃。瀉。劑。終。不。去。故。葉。氏。之。法。擅。譽。江。浙。而。吳。氏。之。方。馳。名。幽。冀。易。地。則。皆。然。

亦智者之因地
制宜也

哀。痛。之。餘。五。志。內。燔。溫。邪。外。迫。不。必。由。衛。及。氣。自。氣。而。營。急。與。清。營。繼。投。涼。血。病。不。稍。減。且。家。無。主。藥。之。人。旁。議。譁。然。幸。其。舊。工。人。陳。七。頗。有。膽。識。力。懇。手。援。孟。英。曰。我。腸。最。熱。奈。病。來。頗。惡。治。雖。合。法。勢。必。轉。重。若。初。起。不。先。覘。破。早。已。殆。矣。吾。若。畏。難。推。諉。恐。他。手。雖。識。其。證。亦。無。如。此。大。劑。車。薪。杯。水。何。益。於。事。吾。且。肩。勞。任。怨。殫。心。盡。力。以。圖。之。病。果。日。重。昏。瞶。耳。聾。自。利。紅。水。目。赤。妄。言。孟。英。惟。以。晉。三。犀。角。地。黃。湯。加。銀。花。石。膏。知。斛。梔。貝。花。粉。蘭。草。菖。蒲。元。參。竹。瀝。竹。茹。竹。葉。鳧。苈。海。蛇。等。出。入。互。用。至。十。餘。劑。舌。上。忽。布。穢。濁。垢。苔。口。氣。噴。出。臭。難。嚮。避。手。冷。如。冰。頭。面。

王氏醫案續編卷一

六

自。汗。咸。謂。絕。望。矣。孟。英。曰。生。機。也。彼。陰。虛。熱。邪。深。入。予。一。以。清。營。涼。血。之。法。服。已。踰。旬。始。得。營。陰。漸。振。推。邪。外。出。乃。現。此。苔。惟。本。元。素。弱。不。能。戰。解。故。顯。肢。冷。而。汗。僅。出。於。頭。面。非。陽。虛。欲。脫。也。復。與。甘。寒。頻。灌。越。三。日。汗。收。熱。退。苔。化。肢。溫。自。始。迄。終。犀。角。共。服。三。兩。許。未。犯。一。毫。相。悖。之。藥。且。賴。陳。七。恪。誠。始。克。起。九。死。於。一。生。繼。以。滋。陰。善。後。而。康。

翁嘉順之妹亦染病勢極危。因役於冥曹。自以為不起。孟英曰。年壯陰充。藥治不謬。焉能死乎。昔人云。見理明者。陰陽五行。不能拘。吾當以理勝數。遂按法治之。病乃日減。且慎寒暄。節飲食。

守。禁。忌。調。治。二。旬。果。然。康。健。又。其。姑。亦。病。溫。初。不。服。藥。七。日。外。始。逐。孟。英。診。之。曰。此。病。邪。雖。不。盛。第。頻。吐。涎。沫。不。能。出。口。須。以。手。擦。不。飲。不。食。不。便。不。眠。或。多。言。不。倦。或。久。問。不。答。是。七。情。鬱。結。氣。久。不。舒。津。液。凝。痰。邪。得。依。附。治。之。中。肯。尚。難。即。愈。不。藥。而。待。病。從。何。去。遂。於。清。解。方。中。寓。蠲。痰。流。氣。通。胃。舒。肝。之。品。交。十。四。日。而。熱。退。又。數。日。痰。沫。漸。少。又。旬。日。大。解。始。行。粥。食。日。加。而。愈。此。治。一。法。直。貫。到。底。不。但。不。犯。一。分。溫。燥。升。補。之。藥。而。滋。膩。入。血。之。品。亦。皆。避。之。尚。須。三。十。劑。奏。績。若。病。家。不。篤。信。醫。者。不。堅持。旁。人。多。議。論。則。焉。克。有。濟。耶。然。非。乃。媳。前。車。之。鑑。亦。未。必。

王氏醫案續編卷一

七

遠爾任賢不貳也。
沈東屏年逾八秩。患腹脹便秘。孟英診曰。老年脈實。天畀獨厚。證屬陽結。法宜清火。與西洋參。石膏。白芍。知母。花粉。桑皮。杏仁。橘皮。枳殼。甘草。送更衣丸。四劑而愈。設投別藥。勢必遷延。而敗人。亦謂其天年之得盡。斷不料其藥治之誤也。後四年始沒。夏間汪湘筠明府。因食肉病脹。醫謂老年氣弱。火衰。輒投溫補。直至腹如抱瓮。始延孟英視之。彌留已極。不可救藥矣。
顧石甫宰婁縣。患恙。醫治日劇。解任歸。求診於孟英。脈見左寸如鉤。曰。病不能夏矣。許子雙適至。聞而疑之。謂此證氣逆血溢。

腹脹囊腫。宛似上年康康侯之疾。若以外象觀之。似較輕焉。胡彼可愈。而此勿治耶。孟英曰。彼為邪氣之壅塞。脈雖怪而搏指不撓。證實脈亦實也。此為真氣之散漫。脈來警警如羹上肥。而左寸如鉤。是心之真藏見矣。壅塞可以疏通。散漫不能收拾。客邪草木能攻。神病刀圭莫濟。證雖相似。病判天淵。縱有神丹。終無神也。季春果歿。

孫氏女年將及笄。久患齒齲。多醫莫療。孟英診曰。六脈緩滑。天癸將至耳。與丹參生地。桃仁牛膝。茯苓白薇。滑石芫蔚子一劑。知數日愈。尋即起。汎略無他患。

王氏醫案續編 卷一

八

遂安余皆山貳尹。起復赴都。道出武林。而患瘧。范某云。春寒所致。用辛溫散之。來某謂酒溼之疴。治以五苓。且雜參歸薑棗之類。病乃日甚。旬日後。腕悶腹脹。便秘氣逆。躁渴自汗。昏瞶不眠。亟迎孟英視之。曰。蘊溼固然而溫風外襲。已從熱化。何必夏秋始有熱瘧耶。清解之法。十劑可安。服之果效。旬日徑瘥。朱念民患泄瀉。自謂春寒偶薄。而飲燒酒。次日轉為滯下。左腹起一痞塊。痢時絞痛異常。孟英曰。陰虛木燥。侮胃為泄。誤飲火酒。怒木愈張。非寒也。巫屏辛溫之物。用白頭翁湯加苓棟。厄連海蛇。銀花草。決明。枳椇子。綠豆皮。十餘劑而愈。

此虛火上炎之證。歸脾中參耆性皆上升。故吐衄甚易。以引火歸原之法。斯愈矣。

鎖某弱冠。吐血。楊醫連進歸脾湯。吐益甚。孟英視之。面有紅光。脈形豁大。因問曰。足冷乎。探之果然。遂與六味地黃湯送飯。丸肉桂心一錢。覆杯而愈。

沈裕昆室。偶發腕痛。范某與逍遙法。痛頗止。而發熱咽疼。邀顧聽泉視之。知感溫邪。與清散法。疼已而熱不退。七日後。目閉鼻塞。耳聾肢搐。不言語。不飲食。顧疑證險。願質之孟英。而沈之兩郎。皆從王瘦石學。因請決於師。瘦石亦謂孟英識超。我當為汝致之時。已薄暮。乃飛刺追邀。比孟英往診。見其外候如是。而左手診畢。即縮去。隨以右手出之。遽曰。非神昏也。繼挖牙關。察其

王氏醫案續編 卷一

九

苔色白滑。詢知大解未行。曰。病是風溫。然不逆傳。膈中而順傳。胃府證可無恐。聽泉學問勝我。知證有疑。實而虛心下問。豈非胸襟過人處。但溫邪傳胃。世所常有。而此證如是。駭人者。因素有痰飲。盤踞胃中。外邪入之。得以憑藉。苔色之不形黃燥者。亦此故耳。不可誤認為寒。夫溫為熱邪。脈象既形絃滑以數。但令痰飲一降。苔必轉黃。此殆雲霧隱隱之時。須具溫太真。燃犀之照。庶不為病所欺。且昔人於溫證。僅言逆傳。不言順傳。後世遂執定傷寒在足。經溫熱在手。經不知經絡貫串。豈容界限。喻氏謂傷寒亦傳手經。但足經先受之耳。吾謂溫熱亦傳足經。但手

經先受之耳。一隅三反。既有其逆。豈無其順。蓋自肺之心。包病機。漸進而內陷。故曰逆。自肺之胃。府病機欲出而下。行故曰順。今邪雖順。傳欲出未能。所謂胃病則九竅不和。與逆傳神昏之犀角地黃湯證。大相徑庭。郭雲臺云。胃實不和。投滾痰而非峻。可謂治斯疾之真詮。遂疏小陷胸合。獨飲六神湯。加枳椇以蘆。煎煮水煎藥。和入竹瀝一杯。送下礞石滾痰丸。四錢。沈嫌藥峻。似有難色。孟英曰。既患駭人之病。必服駭人之藥。藥不瞑眩。厥疾勿療。蓋再質之瘦石聽泉乎。沈頷之。王顧閣方僉以為是。且云。如畏劑重。陸續徐投可也。翼曰。孟英與聽泉會診。脈證不甚。

王氏醫案續編 卷一

減詢知昨藥分數。次而服。孟英曰。是勢分力緩之故也。今可釋疑。急進病必轉機。聽泉深然之。病家亦膽壯矣。如法服下。黎明果解膠。靱痰穢數升。各恙即減。略吐語言。稍啜稀粥。苔轉黃燥。藥改輕清。漸以向安。嗣與育陰柔肝而愈。

朱氏婦素畏藥。雖極淡之品。服之即吐。近患晡寒。夜熱。寢汗。咽乾。咳嗽。脇疼。月餘。後漸至減餐。經少。肌削。神疲。始迓孟英診之。左手絛而數。右部瀟且弱。曰。既多悒鬱。又善思慮。所謂病發心脾是也。而平昔畏藥。豈可強藥再戕其胃。誠大窘事。再四思維。以甘草小麥紅棗藕四味。令其煮湯。頻飲。勿輟。病者嘗藥大喜。

昔余友彭香林患此證醫雖知其虛而治不如法竟以不起今讀此案彌增慨歎

徑日夜服之。踰旬復診。脈證大減。其家請更方。孟英曰。毋庸此。本仲聖治藏燥之妙劑。吾以紅棗易大棗。取其色赤補心。氣香悅胃。加藕以舒鬱。怡情合之。甘麥並能益氣養血。潤燥緩急。雖若平淡無奇。而非惡劣損胃之比。不妨久任。胡可以果子藥而忽之哉。恪守兩月。病果霍然。

江某年三十餘。忽兩目發赤。牙齦腫痛。漸致狂妄。奔走罵人。不避親長。其父皇皇求孟英診焉。脈大而數。重按虛散。與東洋參熟地黃辰砂磁石龍齒菖蒲棗仁琥珀肉桂金箔龍眼肉為劑。投七即安。翼曰。能課徒矣。

王氏醫案續編 卷一

金祿卿室沈裕昆之女也。患溫。顧聽泉連進輕清涼解。而病不減。氣逆無寐。咳吐粘痰。舌絳咽乾。耳聾。語旬日外。始迓孟英診焉。曰。體瘦脈細。數尺中更亂。竟是陰氣先傷。陽氣獨發。所謂傷寒偏死。下虛人。譬之火患將臨。既無池井。缸貯又空。縱竭心力。曷能有濟。再四研詰。乃知發熱前一日。陡然帶下。如崩。是真液早經漏泄矣。否則藥治未譎。胡反燎原益熾。痙厥之變。不須旋踵。祿卿堅懇。勉圖孟英以西洋參生地二冬二至元參犀角黃連鷄子黃知母為方。另用石斛龜板鼈甲各四兩。左牡蠣一斤。煮湯代水煎藥。顧聽泉又加阿膠。且云。我僥用此育陰鎮陽。

充液息風大劑焉能津枯風動。痙厥陡生乎服兩劑果不能減。後惑旁言而禱藥附桂乾薑。罔知顧忌。徑至四肢拘攣而逝。是誤藥速其斃而增其慘也。繼而裕昆患溼溫亦犯重暈而亡。一媪患右腰痛脹欲搥多藥不效。孟英視其形雖羸瘦而脈滑。痰多苔黃舌絳曰體虛病實溫補非宜苟不攻去其疾徒以疲藥因循則病益實體益虛糜帑勞師養成寇患豈治病之道哉。先以雪羹加竹茹棟實綠萼栳杏仁花粉橘紅茯苓旋覆花送。控涎丹服後果下膠痰三進而病若失嗣與調補獲痊。

王氏醫案續編 卷一

十一

招張某大進溫補乃致腹脹不食夜熱不眠吐酸經秘頭疼如。劈復乞孟英視之先投苦泄佐辛通以治其藥嗣以酸苦息風。安胃匝月乃瘳續與調補汛至而康。
魏翎谷挽孟英視其郁鬱之病熱踰半月自胸次脹及少腹痛。而不可撫摩便秘溺赤舌黑口乾自汗煩躁六脈絃強無胃曰。此恙酷似傷寒大結胸證結胸煩躁無藥可治越二日便行而。歿孟英曰傷寒之邪在表誤下則邪陷而成結胸未經誤下不。為結胸溫熱之邪在裏逆傳於心包而誤汗則內閉以外脫順。傳於胃府而誤汗則盤踞而結胸前人但云誤汗劫奪胃汁而。

溫病忌誤汗不
忌誤下以汗則
津涸而熱益熾
下則熱勢可藉
以少減也

未及於結胸者因結胸證不多見耳然亦不可不知也故謹識。之郁病初起某醫用葛根一劑繼則胡某之柴葛羌防十餘劑。釀成是證。

施氏婦產後四肢串痛藥治罔效醫謂其成癱瘓矣延已踰月。丐孟英視之膏藥徧貼呻吟不息脈數而洪舌絳大渴曰此非。風溼為病膏藥亟為揭去近日服藥諒皆溫補祛風之劑營血。耗傷內風欲動勢將弄假成真且吾向見其體豐血旺何以晚。後遽患斯疾必生化湯砂糖酒之類所釀耳其父倪某目雖瞽。聞而笑云君誠天醫也小女服過生化湯一帖赤沙糖八斤從。

王氏醫案續編 卷一

十一

此漸病不識尙可起廢圖全否孟英曰幸其體足於陰恢復尙。易若陰虛血少之人而蹈此轍雖不即死難免不成蓐損因投。大劑涼潤壯水之藥一劑知旬日安匝月起。
王士乾室素多鬱怒氣聚於腹上攻腕痛旋發旋安花甲外病。益甚醫治益劇李西園薦孟英視之曰此非人閒之藥所能療。矣辭不與方其夫子及壻環乞手援孟英曰既爾吾當盡力以。冀延可也然腹中聚氣為瘕攻痛嘔吐原屬於肝第病已三十。載從前服藥諒不外乎溫補一途如近服逍遙散最劫肝陰理。中湯極傷胃液名雖療疾實則助桀人但知嘔吐為寒而未識。

風陽內煽。水自沸騰。專於爐內添薪。津液漸形涸竭。奈醫者猶云。水已不吐。病似漸輕。是不察其水已吐盡。僅能逆空嘔。所以不能納穀。便秘不行。脈絀無胃。舌痿難伸。蘊隆蟲蟲。何所措手。可謂女人亦有孤陽之病矣。勉以西洋參。肉蓯蓉。麥冬。蕤生。白芍。石斛。柏子。霜紫。石英。為方。豬肉煮湯煎藥。和入青蔗漿。人乳。服後嘔噦皆止。人以為轉機。孟英曰。譬草木乾枯已久。驟加灌溉。枝葉似轉青葱。奈根荖槁矣。生氣不存。亦何益耶。繼而糜粥漸進。頗思肉味。其家更喜。以為有望。孟英曰。且看解後何如。越數日。大便頗暢。殊若相安。亟逐復診。孟英曰。枉費苦

王氏醫案續編

卷一

丙

心矣。脈不柔和。舌不潤澤。雖穀進便行。而生津化液之源已絕。藥石焉能於無中生有哉。夏至後果殞。

五月下旬。天即酷熱異常。道路受暑而卒死者甚多。即古所謂中暈也。而不出戶庭之人。亦有是病。延醫不及。醫亦不識此證。雖死身不遽冷。且有口鼻流血者。孟英曰。是暑從吸入。直犯心臟也。惟新產婦人。陰血大去。熱邪易襲。故死者尤多。奈患者不知因時制宜。尙扇其牖戶。幕以帟幃。環侍多人。皆能致病。又粗工不察天時。人秉之不齊。動輒生化湯。以致覆杯而斃者比比。即砂糖酒亦能殺人。不可不慎。孟英曰。六一散既清暑熱。又行

瘀血。當此酷暑之令。誠為產後第一妙方。特為拈出。幸救將來。孟英曰。吾聞姚氏婦。妊已臨月。腹中作痛。家人謂其將挽。急煎參湯令服。服後痛益甚。忙喚穩婆至。已渾身赤斑。喘逆昏狂。雖知受暑。竟不及救。又曹氏婦。亦懷妊臨月。腹痛。家人疑其欲產。而煎參湯。迨湯成。痛已止。察其情景。知不即挽。然炎威甚烈。參湯久存。欲壞。其姑云。婦既未挽。豈可服參。滯胎。我體素虛。常服補劑。參湯定亦相宜。遂服之。甫下嚔。即覺氣悶。躁擾。霎時危殆。多方拯治。踰刻而終。予按富貴人之死於溫補者。固為常事。當酷暑之令。漫不少懲。誠下愚之不可移矣。附錄於此。以冀司命

王氏醫案續編

卷一

壬

之士。鑑而戒之。

酷熱之際。瘧疾甚行。有儲麗波患此。陸某泥今歲寒水。司天溼土。在泉中運。又從溼化。是以多瘧。率投平胃理中之法。漸至危殆。伊表兄徐和圃薦孟英視之。熱熾神昏。胸高氣逆。苔若薑黃。溺如赭。赤脈伏。口渴不食。不便。曰。舍現病之暑熱。拘司氣而論。治謂之執死書。以困活人。幸其體豐。陰足。尙可救藥。然非白虎湯十劑。不能愈也。和圃然之。遂以生石膏。知母。銀花。枳。貝。黃。連。木。通。花。粉。茹。苓。杏。斛。海。蛇。竹。葉。等。相。迭。為。方。服。旬。日。瘧。果。斷。外甥莊迪卿患瘧。大渴而喜熱飲。腕脈伏。苔膩。欲嘔。孟英曰。

論證治俱極
明述

蘊淫內盛暑熱外侵法當清解然脈證如是乃痰阻氣道使然清之無益溫之助桀宜以礞石滾痰丸先為開導服後痰出甚多脈即見絳滑而數嘔止胸舒苦形黃燥與石膏知母連朴杏楠半茯苓滑石葛蒲花粉等藥而安

莊曉村芝階姊夫之姪孫也館於金愿谷舍人家病瘧孟英曰吸受暑熱清滌即瘳問數日瘧作甚劇目赤狂言汗如雨下居停大驚聞服涼劑疑為藥誤亟速孟英至正在披狂莫制之時按其脈洪滑無倫視其舌深黃厚燥心疑其另服他藥之故而撲鼻吹來一陣薑棗氣因詰曰得無服薑棗湯乎曰恣飲三日

王氏醫案續編

卷一

夫

矣孟英即令取西瓜一枚劈開任病者食之方從白虎而生石膏用一兩六錢病即霍然踰六年以他疾亡繼有陳仰山如君患瘧孟英連與清暑法病不少減孟英疑亦薑棗湯所致詢知果然亟令屏絕遂愈餘如汪子寬魏雲裳胡秋初等暑瘧治案皆以白虎化裁案多不備錄此以待讀者之隅反焉
陳某自黔來浙一小兒發熱肢搐幼科與驚風藥遂神昏氣促汗出無溺適孟英至而視之曰暑也令取蕉葉鋪於泥地與兒臥之投以辰砂六一散加石膏知母西洋參竹葉荷花露一劑而瘳繼有胡氏女病略同兒科云不治因懇於孟英亦以此法

認證既確治法又極精妙真可為萬世法程

此溫證之輕者用藥合法故其愈甚

活之

潘紅茶方伯之孫翼廷館於許雙南家酷熱之時啜冷石花一椀遂致心下痞悶四肢漸冷而上過肘膝脈伏自汗方某診謂陽虛陰暑脫陷在即疏大劑薑附丁桂以回陽雙南在蘇其三郎杏書駭難主藥邀族人許芷卿診而決之芷卿云此藥斷不可投第證極危急須逆孟英商之時夜已半孟英往視曰既受暑熱復為冷飲冰伏胸中大氣不能轉旋是以肢冷脈伏二便不行速取六一散一兩以淡鹽湯攪之澄去滓調下紫雪丹一錢翼日再診脈見胸舒溺行肢熱口乾舌絳暑象畢呈化而為

王氏醫案續編

卷一

七

瘧與多劑白虎湯而愈丙午舉於鄉
金曉耕發熱二旬醫與表散竟無汗泄嗣投溫補而大解泄瀉小水不行口乾肌削勢瀕於危胡秋初薦孟英診之右寸獨見沈數曰暑熱錮於肺經耳與白虎葦莖天水加芩桔杏貝為方服後頭面痞疹徧發密無鍼縫明如水晶光人皆危之孟英曰此肺邪得泄也果膚潤熱退瀉止知饑又服甘涼濡潤二十餘劑痞疹始愈亦僅見之證也
何永昌者孟英之輿人也其妻病瘧間二日而作乃母曰瘧不可服官料藥徑服籤方旬日後勢甚危永昌乞孟英救之脈沈

暑邪入腎必傷
腎液故重用滋
陰之品以救之

細而數尺為甚。口渴目不欲張。兩腰收痛。宛如錐刺。寒少熱多。心慌不能把握。曰異哉。病也。此暑入足少陰之證。喻氏所謂汗下溫三法皆不可行者。若病在別家。慮其未必我信。病在汝而求診於我。事非偶然也。汝母云。官料藥不可治。瘡此語出於何書。而藥別官私。何人所創。既官料之勿服。則私料更不可妄試矣。殊屬可嗤。然是證若延醫診。非表散即溫補。不可謂非汝母之一得也。疏方元參八錢。龜板石斛各一兩。地骨皮六錢。知母五錢。桑葉金銀花各四錢。花粉三錢。丹皮二錢。令用大砂鍋煎而頻服。不必限劑。服三日瘡斷。而各恙皆減。粥食漸進。不勞餘

王氏醫案續編

卷一

六

藥而起

慎氏婦產後。腹脹泄瀉。面浮足腫。醫與滲溼溫補。月餘不效。疑為毒損。孟英視之。舌色如常。小溲通暢。宛似氣虛之證。惟脈至梗澀。毫無微弱之形。因與丹參滑石澤蘭茯苓蔚蛤壳桃仁海蛇五靈脂豆卷數服。即瘥。

孫某患感。醫投溫散。竟無汗泄。延至十一日。始請孟英視之。業已神昏囊縮。面赤舌絳。目不識人。口不出聲。胸膈微斑。便瀉而小溲不行者。已三日。醫皆束手。或議大投溫補。以冀轉機。孟英論也。急止之。曰。陰分素虧。而溫散劫津。邪熱愈熾。則營衛不行。豈可

妄云漏底。欲以溫燥竭其欲絕之陰乎。曩浦上林先生治子先君之病。云泄瀉為熱邪之出路。求之不可得者。胡可止也。以西洋參生地麥冬丹皮連翹生芍石菖蒲鹽水炒黃連甘草梢百合茯苓貝母銀花紫苑為方。一劑即周身微汗。而斑退。三劑始得小溲一杯。而識人。四劑乃得大汗。而身熱退。面赤去莖亦舒。復解小溲二杯。次日於方中減連翹菖蒲丹皮黃連。加知母葶竹葉。投之。舌始潤。神始清。知渴索水。孟英令將蔗梨等榨汁。頻灌不歇。其汗如雨。下者三晝夜。始休。於是粥漸進。瀉漸止。溲漸長。前方又去貝母銀花紫苑。加石斛龍眼肉服之。全愈。

王氏醫案續編

卷一

九

汪子與病革。始延孟英視之。曰。陰虛之質。暑熱膠錮。殆誤投補藥矣。乃叔少洪云。姪素孱弱。醫投熱地等藥。十餘劑耳。孟英曰。暑熱證必看邪到血分。始可議用生地。何初病即進熱地。豈僅知稟賦之虛。未睹外來之疾耶。昔賢治暑。但申表散溫補之戒。詎料今人於律外更犯滋膩之辜。而一誤至此。略無悔悟。不啻如油入麵。如漆投膠。將何法以挽回哉。越日果卒。夫小米舍人僅此一脈。完姻未久。遽爾珠沈。殊為慘然。冬閒吳忻山亦惟一子。素稟虛怯。滋補頗投。醫者不察其患。溫發熱。僉謂陰虛。競投膩滯培元之劑。乃至舌黑卷短。唇焦溺赤。孟英一診。即云不救。

顧聽泉竭力圖維終不能愈按虛人受感每蹈此轍特錄以為戒

汪左泉病滯下晝夜數十行而即日須補歲考遺才洩孟英商速愈之策切脉絃滑苔黃滿布曰易事耳重用芩連佐以查朴送服青麟丸四錢投七而痊略無他恙

陳畫三病滯下某進通用法痛泄無度嘔惡不納汗出息微脈弱眩暈孟英曰近多伏暑之痢此獨非其證也元將脫矣急投大劑溫補脈候漸安一月後甫得健復

金朗然之母偶發腕疼嘔吐醫與溫補藥初若相安漸至畏寒

王氏醫案續編 卷一 三

汪子與證誤服熱地而不救此證誤服溫補兼熱地而竟愈蓋體有虛實治有遲早亦有重輕未可以一端拘也

不寐四肢不仁更醫云是風痺仍投溫補因而不饑不食二便不行肌肉盡削帶下如溺始延孟英診之曰暑伏肺胃耳其多投溫補而不遽變者以熱地等陰柔膩滯為之挾制也然津氣灼燂而殆盡脂液奔迫以妄行治節無權陽明涸竭焉能衛皮毛而暢四肢利機關以和九竅哉與白虎湯加西洋參竹茹橘皮絲瓜絡石斛花粉竹瀝海蛇連進二十劑始解黑矢而各恙漸安嗣與和肝胃調八脈以善後遂愈李某向患腕痛孟英頻與建中法獲瘳今秋病偶發他醫診之聞其溫補相投徑依樣而畫壺盧服後耳閉腿疼不饑便滯仍就孟英視之曰暑邪內

伏誤投補藥使然治宜清滌為先彼不之信反疑為風氣付外科灼灸遂致筋不能伸而成錮疾孟英曰此證較金病輕踰十倍惜其惑於淺見致成終身之患良可歎也獨怪謀利之徒假河間太乙鍼之名而妄施毒手舉國若狂竟有不惜重價求其一鍼隨以命殉之者吾目擊不少矣夫內經治病原有熨之一法然但可以療寒溼凝滯之證河間原方惟二活黃連加麝香乳香耳主治風痺今乃託諸鬼神矜誇秘授云可治盡內傷外感四時十二經一切之病天下有是理乎况其所用之藥羣集辛熱香竄之品點之以火顯必傷陰一熨而吐血者有之其不

王氏醫案續編 卷一 三

可輕試於陰虛之體與挾熱之證也概可見矣吾友盛少雲之尊人臥雲先生誤於此而致周身潰爛臥牀數載以亡仲聖焦骨傷筋之訓言猶在耳操醫術者胡忍執炮烙之嚴刑欺世俗而罔利哉
喬有南之姪甫五齡發熱數日兒醫與柴葛解肌湯一劑肢搐而厥目張不語其母孀居僅此一脈徧求治療毫無寸效所親徐和甫託王瘦石訪一擅幼科之長者瘦石謂宜求善於外感者蓋人有大小病無二致切勿舍大方而信專科此喻嘉言活幼金鍼也蓋延孟英視之徐從之孟英曰病是暑邪治以風藥

清熱燥肝風
方極平九

熱得風而焰烈津受燥以風騰乃風藥引起肝風再投俗尚驚
風之劑穉子根本不牢而狂風不息折拔堪虞與王氏犀角地
黃湯加羚羊角生石膏元參桑葉菊花銀花牡蠣知母麥冬竹
葉諸藥數服而痊

趙鐵珊乃郎子善康康侯之婿也因事抑鬱寒發熱湯某作
血虛治進以歸芎丹參之類多劑不效乃移楊康寓延孟英診
之脈滑而兼沈絛以數然舌無苦口不渴便溺如常納穀稍減
惟左脇下及少腹自覺梗塞不舒按之亦無形迹時欲撫摩似
乎稍適日陰虛挾鬱暑邪內伏夫鬱則氣機不宣伏邪無從走

王氏醫案續編卷一

辛

此證不過孟英
必成虛損託無
知其為伏暑者
雖死亦不知前
之誤也

泄○遠○投○血○藥○引○之○深○入○血○為○邪○踞○更○不○流○行○腸○腹○不○舒○乃○其○真
諦○第○病○雖○在○血○而○治○宜○清○氣○為○先○氣○得○宣○布○熱○象○必○露○瘀○滯○得
行○厥○疾○始○瘳○子○善○因○目○擊○去○年○婦○翁○之○恙○頗○極○欽○服○連○投○清○氣
熱○果○漸○壯○謔○妄○不○眠○口○乾○痰○嗽○孟○英○曰○脈○已○轉○為○絛○滑○瘀○血○伏
邪○皆○有○欲○出○之○機○繼○此○當○用○涼○血○清○瘀○為○治○但○恐○旁○觀○詫○異○事
反○掣○肘○囑○邀○顧○聽○泉○質○之○願○亦○云○然○遂○同○定○犀○角○地○黃○湯○加○味
而○所○親○陳○眉○生○許○小○琴○暨○乃○兄○子○勉○皆○疑○藥○涼○劑○重○繼○是○熱○證
豈○無○冰○伏○之○虞○顧○為○之○再○四○開○導○總○不○領○解○適○病○者○鼻○衄○大○流
孟○英○笑○曰○真○臟○獲○矣○諸○公○之○疑○可○否○冰○釋○渠○舅○氏○陳○毅○人○饒○尹

云證有疑似原難主藥鼻血如是病情已露毋庸再議徑煎而
飲之次日衄復至苔色轉黑孟英曰三日不大便瘀熱未能下
行也於前方加滑石桃仁木通海蛇竹瀝石斛銀花知母花粉
之類又二劑大解始行黑如膠漆三日開共下七十餘次而止
乃去木通桃仁輩加西洋參麥冬以生液病者疲憊已極沈寐
三晝夜人皆危之孟英曰聽之使其陰氣之來復最是好機醒
後尚有微熱譫語藥仍前法又旬日始解一次黑燥大便而各
恙悉退惟口尚渴與大劑甘涼以濡之又旬日大解甫得復行
色始不黑乃用滋陰填補而康

王氏醫案續編卷一

辛

一圃人詣孟英泣請救命詰其所以云家住清泰門內馬婆巷
因本年二月十五日卯刻雷從地奮火藥局適當其衝墻垣糜
宇一震泯然雖不傷人而附近民房撼搖如簸其時妻在睡中
驚醒即覺氣不舒暢半載以來漸至食減形消神疲汎少惟臥
則其病如失藥治罔效或疑邪祟所憑祈禳厭鎮亦屬無靈敢
乞手援幸無卻焉孟英許之往見婦臥於榻神色言動固若無
恙診畢病人云君欲觀我之疾也坐而起果即面赤如火氣息
如奔似不能接續者苟登圖溲便必責逆欲死前所服藥破氣
行血和肝補肺運脾納腎清火安神諸法具備輒如水投石孟

仍是治肝之法

英仿喻氏治厥類疾之法用藥一劑知旬餘愈

高若舟之庶母年踰花甲體豐善瀉張某向用參朮取効今秋
患白痢張謂寒溼滯中仍與理中加減病遂日增因疑老年火
衰蒸變無權前藥中復加附子白痢果減而腹脹且疼不食不
溺噦逆發熱勢已危殆始迓孟英視之脈沈而滑數梗梗曰暑
熱未清得無補藥早投乎與芩連杏朴麴芍滑棟銀花海蛇鷄
內金之類一劑瀉行痛減而痢下仍白其女為屠西園之室乃
云向服補藥白痢已止今服涼藥白痢復作蓋病本久寒涼藥
不可再用矣孟英曰言頗近理使他醫聞之必改溫補但病機

王氏醫案續編 卷一

毒

隱伏測識匪易前此之止非邪淨而止之止乃邪得補而不行
之止邪氣止而不行是以痛脹欲死夫強止其痢遽截其瘡猶
之乎新產後安瀆其惡露也世人但知惡露之宜通而不知間
有不可妄通者但知瘡痢之當止而不知邪未去而強止之其
害較不止為尤甚也今邪未清滌而以溫補藥壅塞其流行之
道以致邪不能出逆而上衝噦不能食是痢證之所畏吾以通
降涼潤之劑搜邪掃濁惟恐其去之不速胡反以白痢復作為
憂豈欲留此垢滯於腹中冀其化脂膏而填空隙故若是之實
惜而不顧其去耶幸若舟深信竟從孟英議尋愈

通達之論醫所宜知

十八澗徐有堂室病痢醫作寒溼治廣服溫補之藥痢出覺冷
遂謂沈寒改投燥熱半月後發熱無溺口渴不饑腹疼且脹
痛不眠翁嘉順囑其求診於孟英察脈絃細沈取甚數舌絳無
津肌肉盡削是暑熱膠錮陰氣受燥與北沙參肉蓯蓉芍斛棟
芍銀花桑葉丹皮阿膠合白頭翁湯為劑次日各患皆減痢出
反熱有堂不解問故孟英曰熱證誤投熱藥熱結而大便不行
者有之或熱勢奔迫而泄瀉如火者有之若誤服熱藥而痢出
反冷者殊不多見也無怪醫者指為久伏之沈寒吾以脈證參
之顯為暑熱然暑熱之邪本無形質其為滯下也必挾身中有

王氏醫案續編 卷一

毒

形之垢濁故治之道最忌補滯壅滯之品設誤用之則邪得
補而愈熾濁被壅而愈塞耗其真液之灌溉阻其正氣之流行
液耗則出艱氣阻則覺冷大凡有形之邪皆能阻氣機之周流
如痰盛於中胸頭覺冷積滯於府臍下欲熨之類皆非真冷人
不易識吾曾治愈多人矣徐極歎服仍議育陰滌熱病果漸瘳
蕭某素患痰多常服六君子湯偶延孟英診之脈細數而兼絃
滑曰六君亟當屏絕病由陰虧火盛津液受灼而成痰須服壯
水之劑庶可杜患將來蕭因向吸鴉片煙自疑虛寒滋陰不敢
頻服繼患咽痛專科治而不效仍乞診於孟英因謂曰早從吾

策○奚○至○是○耶○此○陰○虛○於○下○陽○浮○於○上○喉○科○藥○不○可○試○也○大○劑○育
陰○潛○陽○其○痛○日○瘥○而○喉○膈○皆○形○白○腐○孟○英○曰○吸○煙○既○久○毒○氣○薰
蒸○之○故○耳○令○吹○錫○類○散○始○得○漸○退○愈○後○復○患○滯○下○孟○英○曰○今○秋
痢○雖○盛○行○而○此○獨○異○於○人○切○勿○以○痢○藥○治○之○蓋○火○迫○津○液○結○爲
痰○飲○釀○以○煙○毒○薰○成○喉○患○吾○以○燃○犀○之○照○而○投○激○濁○揚○清○之○治
病○雖○愈○矣○內○蘊○之○痰○濁○尙○多○奈○向○來○爲○溫○補○藥○所○禁○錮○於○腸○胃
曲○折○之○閒○而○不○得○出○今○廣○投○壯○水○之○劑○不○啻○決○江○河○而○滌○陳○莖
豈○可○與○時○行○暑○熱○之○痢○同○年○而○語○耶○治○不○易○法○食○不○減○餐○日○數
十○行○精○神○反○加○踰○月○之○後○大○解○始○正○計○服○甘○涼○約○二○百○劑○肌○肉

王氏醫案續編

卷一

美

復充痰患若失

孫位申患感證見耳聾醫者泥於少陽小柴胡之例聾益甚孟
英視之曰伏暑也與傷寒治法何涉改投清肺之藥聾減病安
將進善後法矣忽一日耳復聾孟英診之莫測其故因詰其食
物云昨日曾喫藕粉一碗孟英曰是矣肆閒藕粉罕真每以他
粉攪混此必葛粉耳不啻誤服小柴胡一劑復投肅清肺胃藥
尋愈錄此以見其審證周詳所謂無微不至也
顧宗武偶患微寒發熱醫進溫散法熱雖退而不饑不大便復
用平胃散數帖腹漸脹而偏於右尙疑其中氣之虛寒也遂與

惟連亂投一何
可笑

溫運燥補諸藥服乃日增杳不進穀或謂恐屬癰瘍因招外科
連某診之作脇疽治病如故黃某作腸癰論以大黃瀉之亦不
應嚴某謂脇疽部位不對腸癰證據不符作內疝治仿子和活
人之法及當歸龍薈丸相間而投亦無效乃延孟英視之脈極
絃細而促舌絳大渴小溲赤少飲而不食者月餘矣證實脈虛
堅辭不治其家問曰此證究是何病乞爲指示孟英曰據述病
人素慎起居而薄滋味顯非停滯與癰疽之患良由暑溼內蘊
勢欲外泄是以初起有微寒發熱之候誤與風寒藥熱雖暫退
於表邪仍伏處乎中不饑不便肺胃失其下行再加辛燥溫補

王氏醫案續編

卷一

毛

氣機更形窒滯伏邪永無出路津液潛消膜脹日甚以氣血流
行之藏府爲暑溼割據之窠巢補之不可攻之不能病雖不在
膏肓盧扁望而驚走踰旬徑殞

黃蓮泉家戚姬病痢朱某以其年老而爲舍病顧虛之治漸至
少腹結塊攻痛異常大渴無溺杳不知饑晝夜百餘行五色並
見呼號欲絕始延孟英診之脈至沈滑而數因謂曰縱使暑熱
深受見證奚至是耶此必溫補所釀耳夫痲疾古稱滯下明指
欲下而滯滯不通也顧名思義豈可以守補之品更滯其氣燥
烈之藥再助其虐乎少腹聚氣如痕痲證初起因於停滯者有

痾疾初起即補
變成噤口者有
之延為休患者
有之邪因補而
因結不解雖有
良可歎恨

之今見於七八日之後。時欲衝逆。按之不輒。則顯非停滯之可。擬實為藥劑之誤投。以致邪濁蟠踞。滋蔓難圖。及檢所服諸方。果是參朮薑黃附桂栗殼故紙川椒烏梅等一派與病刺謬之藥。孟英曰。彼豈憐於汝哉。畏老而補之。見痢而止之。亦未嘗不煞費苦心。而欲汝病之即愈。惜徒有欲愈之心。未明致愈之道。但知年老元虛。不聞邪盛則實。彼亦年近古稀。懸壺多載。竟畢世沈迷於立齋景岳諸書。良可歎也。豈造化果假權於若輩乎。不然何彼書彼術之風行哉。戚云。壬寅之病。賴君再生。今乃一誤至此。恐仙丹不能救矣。孟英曰。幸未嘔噦。尚可希冀一二。遂

王氏醫案續編 卷一 天

與菴蓉棟芍芩連橘斛查麴元胡綠梅鼈甲鷄金鼠矢海蛇出入互用。數帖漸安。繼加駐車丸吞服。踰月始健。周某患瘡。間二日而作。寒少熱多。醫謂老年三瘡。放手溫補。漸至香不進穀。所親李石泉孝廉。囑迎孟英診之。脈細硬如絃。毫無胃氣。右尺洪數。舌色光絳。大渴溺滴。曰。此足少陰暑瘡也。廣服溫補津液。盡劫欲以草木生之事。不及矣。世但知治瘡不善。有三患。邪留肝絡。則為瘡母。戕及脾元。則為瘡鼓。耗乎腎陰。則為瘡勞。而此證以藥助邪。邪將劫命。求轉三患。亦不能得。所謂熱得補而更熾。陰受燥以速亡。陰愈亡則邪愈熾。何殊炮烙之

因前醫之誤而
始思轉計已非
良醫所為况明
時溫燥表散之
害而仍蹈覆轍
焉是云醫

刑病者何辜。可慘可慘。踰日果歿。特錄以為戒。醫者鑒之。一老廣文偉。滿來省驗。看患眩暈。醫謂上虛。進以參耆等藥。因而不食。不便煩躁。氣逆。孟英診曰。下虛之證。誤補其上。氣分實而不降。先當治藥。然後療病。與厄鼓芥桔枳橘苑貝一劑。粥進便行。嗣用滋陰息風法而愈。

上虞陳茂才患頭痛三日。一發發則惡寒多。藥不效。飲食漸減。或擬大劑薑附。或議須投金石。萬仲信囑其質於孟英。察脈甚絃重。按則滑。曰。熱暑伏厥陰也。溫補皆為戈戟。與左金加棟芍。厄桑羚丹菊橘為劑。兼吞當歸龍薈丸。三服而減。旬日即痊。

王氏醫案續編 卷一 天

關穎庵患寒熱。醫者泥於今歲之司天在泉。率投溫燥。以致壯熱不休。阮某用小柴胡和解之治。遂自汗神昏。苔黑舌強。肢掣不語。脣齒焦。張某謂斑疹不達。擬進角刺荆芎。越醫指為格陽假熱。欲以附子引火歸原。許芷卿知為伏暑。而病家疑便。清不可服。涼藥復逆。孟英診之。曰。陰虛之體。熱邪失清。最易劫液。幸得溏泄。邪氣尚有出路。正宜乘此一綫。生機迎而導之。切勿遲疑。遂與芷卿商投晉三犀角地黃湯。加知麥花粉西洋參元參貝斛之類。大劑服八九日。甫得轉機。續與甘涼充液六七劑。忽大汗如雨者一夜。人皆疑其虛脫。孟英曰。此陰氣復而邪氣

解也。切勿驚惶。嗣後果漸安。投以滋補而愈。繼有陳菊人明府。乃郎病較輕於此。因畏犀角不敢服。竟致不救。豈不惜哉。余某年三十餘。發熱數日。醫投涼解之法。遂嘔吐自汗。肢冷神疲。亟延孟英診之。脈微弱。曰：內傷也。豈可視同伏暑而一概治之。徑不詳辨其證耶。與黃耆建中去飴加龍骨生薑茯苓橘皮。投劑即安。續加參朮。踰旬而愈。

錢氏婦懷妊四月而患寒熱如瘧。醫與發散安胎。乃至舌黑神昏。大渴便泄。臭痰頻吐。腰腹痛墜。人皆不能措手。孟英診曰：伏暑失於清解。舌雖黑而脈形滑數。痰雖臭而氣息調和。是胎尚

王氏醫案續編

卷一

三

未壞。猶可治也。重用氣血兩清之藥。五劑而安。糜粥漸進。腰腹皆舒。胎亦躍躍。

方氏女久患泄瀉。脘痛間兼齒痛。汛事不調。極其畏熱。治不能愈。上年初夏。所親崔映溪為延孟英診之。體豐脈不甚顯。而隱隱然粒且滑焉。曰：此肝強痰盛耳。然病根深錮。不可再行妄補。渠母云：溏泄十餘年。本元虛極。廣服培補。尚無寸效。再攻其病。豈不可虞。孟英曰：非然也。今之醫者。每以漫無著落之虛字。括盡天下一切之病。動手輒補。舉國如狂。目擊心傷。可勝浩歎。且所謂虛者。不外乎陰與陽也。今肌肉不瘦。冬不知寒。是陰虛乎。

凡病皆宜如此
不獨痰飲為然

抑陽虛乎。祇因久瀉。遂不察其脈證。而愈疑為虛寒之病矣。須知痰之為病。最頑且幻。益以風陽性尤善變。治必先去其病。而後補其虛。不為晚也。否則養癰為患。不但徒費參藥耳。母不之信。徧訪醫療。千方一律。無非補藥。至今秋頭下起一痰核。黃某敷之使平。更以大劑溫補。連投百日。忽吐瀉膠痰斗許而亡。予按此痰飲滋蔓。水土相離。久則我不敵彼。而潰敗決裂。設早從孟英之言。斷不遽死於今日也。

康侯侯司馬之夫人。泄瀉頻年。納食甚少。稍投燥烈。咽喉即疼。治經多手不能獲效。孟英診曰：脾虛飲滯。肝盛風生之候也。用

王氏醫案續編

卷一

三

參朮橘半桂苓棟芍木瓜。痰藜投之。漸愈。今冬又患眩暈。頭汗面熱。肢冷。心頭似絞。呻吟欲絕。孟英以石英茯苓牡蠣絲蓴梅苓。痰棟芍旋覆為方。竟劑即康。

盛墨莊冬患間瘧。因腹脹畏寒。自服神效薑湯。勢益甚。延孟英視之。曰：暑溼內伏也。以黃連枳椇梔杏貝知。煎旋橘蘭草等為劑。蘆煎煮湯煎藥。三啜而瘳。

鮑繼仲患痔。每發於冬。醫作虛寒治。更劇。孟英診之。脈滑苔厚。溺赤痰濃。與知母花粉冬瓜子杏貝茯苓滑石。梔子石斛而安。孫渭川令姪亦患此。氣逆欲死。孟英視之。口渴頭汗。二便不行。

澤。乃熱。伏於肺絡也。至冬則熱為寒。東政應時而發。古人治法於未發時。先以淡痰。下之。使冬時無熱。可求則愈。但法大峻。人多不取。用今孟英。輕清通透之。斯有利而無害。與可補古人未及。

徑與生石膏。橘貝。桂。芥。知母。花粉。杏仁。海蛇等藥。而愈。一耳。姓回。婦病。瘳。自以為寒。頻飲燒酒。不但病加。更兼嘔吐泄瀉。兩脚筋掣。既不能臥。又不能坐。孟英診曰。口苦而渴。乎瀉出如火。乎小溲不行。乎痰粘且靱。乎病者云。誠如君言。想受寒太重。使然。孟英曰。汝何愚耶。見證如是。猶謂受寒。設遇他醫。必然承教。况當此小寒之候。而瘳喘與霍亂。世俗無不硬指為寒者。誤投薑附。汝命休矣。與北沙參。生薏苡。冬瓜子。絲瓜絡。竹茹。石斛。枇杷葉。貝母。知母。厄子。蘆根。橄欖。海蛇。蘆煎。汁為方。一劑。知二劑。已。吳芝閣因壯年時患瘳。瘳過服寒涼之藥。瘳雖愈。陽氣傷殘。虛

王氏醫案續編 卷一 三

寒病起。改投溫補。如金液丹。大造丸之類。始得獲安。奈醫者昧於藥為補。偏救弊而設。漫無節制。率以為常。馴致血溢於上。便泄於下。食少痰多。喘逆礙臥。兩足不能屈伸。童某猶云。寒淫為患。進以苓薑朮桂湯。多劑。勢益劇。且溲漸少。而色綠如膽汁。醫皆不能明其故。延孟英診之。脈絛。無情。曰。從前寒藥戕陽。今則熱藥竭陰矣。胃中津液皆灼燥。以為痰。五藏咸失所養。而見證如上。水源欲絕。小溲自然漸少。水火內焚。乃露東方之色。與章虛谷所治暑結厥陰。用來復丹。攻其邪。從溺出。而見深碧之色者。彼實此虛。判分天壤。恐和緩再來。亦難為力矣。尋果殒。

熱入血室。亦豈不可治之。證可見此人。并不知熱入血室。為何病。第其指其名耳。

戴氏婦年五十六歲。仲冬患感。初服楊某歸柴丹。參藥一劑。繼服朱某乾薑蒼朮厚朴藥五劑。遂崩血一陣。謂其熱入血室。不可治矣。始延孟英診之。脈形空。更促數。苔黑。舌絳。足冷。而強息。微善笑。詢其汛。斷踰十載。曰。冬溫失於清解。營血暴脫於下。豈可與熱入血室。同年而語耶。必由誤服熱藥所致。因檢所服各方。而歎曰。小柴胡湯與冬溫何涉。即以傷寒論。亦不能初感。即投。况以丹參代人參。尤為悖謬。夫人參補氣。丹參行血。主治天淵。不論風寒暑溼。各氣初感。皆禁用血藥。為其早用。反致引邪深入也。既引而入。再誤於辛熱燥烈之數投。焉得不將其僅存

王氏醫案續編 卷一 三

無幾之血。逼迫而使之盡。脫於下乎。女人以血為主。天癸既絕。無病者。尚不宜有所漏泄。况溫邪方熾。而陰從下脫。可不畏哉。病家再四求治。孟英與西洋參。菴蓉。生地。犀角。石斛。生芍。銀花。知母。麥冬。甘草。蔗漿。童瀉。兩劑。足溫。舌潤。得解。醬蕪。脈數漸減。而更益甚。乃去犀角。加高麗參。數帖。脈漸和。熱退。進粥。隨以調補。幸得向安。王開榮素患痰嗽。兼有紅證。今冬病。頭疼發熱。渴飲不饑。便溏。瀉少。謔語神昏。自述胸中冷氣。上衝。醫見其面赤痰喘。欲投附桂。黑錫丹等藥。所親翁嘉順。囑勿輕服。為延孟英診之。脈滑且

此人肺氣素不。清。熱。又。兼。陰。虛。故。欲。故。受。溫。

邪彌見轉非
此始終如法施
治殊難奏效也

數日温邪挾宿飲上逆法當清解與北沙參冬瓜子知母滑石
花粉石菖蒲貝母杏仁蘆根葱白淡豉竹瀝兩劑後面赤退乃
去葱豉加麥冬桑葉枇杷葉數帖熱去瀉減謔語止頭痛息喘
定神清乃裁菖滑加梨汁地栗海蛇服數日痰漸少穀漸安渴
止瀉行始進養陰之法遂以霍然

石子章患腹脹朱某與大劑温補之藥殊若相安孟英見而非
之彼云服之略不助脹正須多服圍痊君何疑焉孟英曰形瘦
脈數舌色乾紅此為陰虛熱脹昔年范次侯室暨楊改之如君
之恙皆類此醫咸攻補徧施病無小效吾以極苦泄熱微辛通

王氏醫案續編 卷一 諸

絡之法投之應手而瘳今子病初起時脹不礙食證非氣分可
知而温補不助脹遂服之不疑不知陰愈耗絡愈痺脹雖不加
而肌愈削脈愈數乾喘氣急與女子之風消息實何以異耶尋
果不起予按喻氏始言男子亦有血壘證可見男女雖別而異
中有同同中有異臨證者不可膠柱以鼓瑟也
沈某患脘痛嘔吐二便秘瀉諸治不效請孟英視之脈絃莖苔
黃膩曰此飲證也豈沈酒於酒乎沈云素不飲酒性嗜茶耳然
恐茶寒致病向以武夷紅葉熬濃而飲諒無害焉孟英曰茶雖
涼而味清氣降性不停留惟蒸過為紅味變甘濁全失肅清之

此上有停飲下
元虛寒故用藥
如此

腸無温補內
托之法

清其上源而下

流自清亦喻氏
法也

氣遂為釀疾之媒較彼麴蘖殆一間耳醫者不察僅知嘔吐為
寒薑黃沈附不特與病相反抑且更煽風陽飲藉風騰但升不
降是以上不能納下不得通窳似關格然非陰枯陽結之候以
連棟厄芩旋復竹茹枇杷葉橘半芥澤蛤殼荷莖生薑衣為方
送服震靈丹數劑而平匝月而起

石甘卿驟患腹脹旬日後臍間出膿外科視為腸癰與温補內
托之藥遂咳嗽不眠腹中絞痛異常痰色紅綠大便不行乃延
孟英商之脈絃細以數舌絳而大渴曰察脈候是真陰大虛之
證者水歸桂皆為禁劑以甘露飲加西洋參花粉貝母杏仁冬
瓜子投之痰咳即安外科謂此恙最忌泄瀉潤藥不宜多服孟
英曰陰虛液燥津不易生雖求其瀉不可得也惡可拘泥一偏
而不知通變哉仍以前法去杏貝花粉加知母百合合歡為方
并囑其另邀老醫朱嵩年敷治其外如法施之果漸向安久之
當臍痂落如小兒蛻臍帶狀臍內新肉瑩然而愈

王氏醫案續編 卷一 蓋

袁某患噫聲聞於鄰俞某與理中湯暨旋覆代赭湯皆不效孟
英診之尺中虛大乃詰之曰爾覺氣自少腹上衝乎病者云誠
然孟英曰此病在下焦用胡桃肉故紙韭子菟絲小茴鹿角霜
枸杞當歸茯苓覆盆龍齒牡蠣服一劑其衝氣即至喉而止不

作聲為噫矣。再劑寂然。多服竟愈。
 沈春陽之母。偶患咽喉微痛。服輕清藥一劑。即覺稍安。且起居
 作勞如常。第五日。猶操鍼。至四鼓。第六日。忽云。坐立不支。甫
 就榻。即昏沈如寐。亟延王瘦石視之。用犀角地黃湯。化萬氏牛
 黃丸。灌之。繼邀徐小坡。亦主是湯。云恐無濟。乃邀孟英。決之。切
 其脈。左數右滑。皆極虛。與曰。王徐所見。極是。但雖感冬溫。邪尚
 輕微。因積勞久虛之體。肝陽內動。燥液成痰。逆升而厥。儼似溫
 邪內陷之候。方中犀角。靖內風。牛黃化痰熱。不妨借用。病可無
 虞。今日不必再投藥餌矣。翼日復診。神氣雖清。苔色將黑。孟英

王氏醫案續編 卷一

美

與肅肺獨痰息風充液之劑。熱退而苔色鬆浮。孟英曰。舌將脫
 矣。仍與前藥。越宿視之。苔果盡褪。宛如脫液之舌。且嘔惡時作。
 大解未行。孟英於甘潤生津藥內。仍佐竹茹。竹瀝。柿蒂。海蛇。數
 劑。嘔止便行。而舌上忽布白腐之苔。以及齒齦脣頰。滿口徧生。
 指拭不去。人皆異之。孟英堅守肅清肺胃。仍佐茹瀝。加橄欖銀
 花。建蘭葉。數劑。白腐漸以脫下。舌色始露。惟嘔粥則胸次梗梗。
 不舒。夜不成寐。孟英曰。胃汁不充。熱痰未淨也。仍守前議。病家
 疑之。復商於瘦石。瘦石云。勿論其他。即如滿口腐苔。酷似小兒
 驚白。大方證甚屬罕見。苟胸無學識者。見之必按劍而詫。今醫

者有不惑之智。而病家乃中道生疑。豈求愈之道耶。沈大愧服。
 一遵孟英設法。既而吐痰漸少。納穀頗適。兩脇又添辣痛。孟英
 診脈左關絃數。曰。必犯忿怒矣。詰之果然。加卮棟。早蓮。女貞。生
 白芍。綠萼梅等。數服。各恙皆安。膚脫成片。而右腿腫痛。不能屈
 伸。或疑風氣。思用艾灸。孟英急止之。曰。此陰虧耳。誤灸必成癆
 疾。吾以妙藥奉贈。但不許速效也。疏方以西洋參。熟地。黃菔。蓉
 桑。葶石。斛木。瓜。歸。芍。二。冬。杞。菊。棟。實。牛。膝。加。無。核。白。蒲。桃。乾。為
 劑。久服。果得向愈。越三載。以他疾終。
 孫執中於春前四日。忽患鼻衄。如注。諸法莫塞。寅夜請孟英視

王氏醫案續編 卷一

毛

之脈絃而數。曰。冬煥氣泄。天令不主閉藏。今晚雷聲大震。人身
 應之。肝陽乃動。血亦隨而上溢。不可以其體肥頭汗。畏虛脫而
 進溫補也。投以元參。生地。犀角。牡蠣。知母。生白芍。牛膝。茯苓。側
 柏葉。童溺。諸藥一劑。知二劑已。既而脇痛流乳。人皆異之。孟英
 與甘露飲。加女貞。早蓮。龜板。鼈甲。牡蠣。而瘳。

王氏醫案續編卷一完

王氏醫案續編卷二 原名仁術志

古杭王士雄孟英醫案

秀水盛鈞少雲 錢塘周鏞光遠 續輯

此案步步合法 特少一番為滿 之功故覺少延 時日耳然涼劑 已畏其寒若加 毒滌之品必不 敢服此治病之 所以難也

莊芝階舍人之外孫汪震官春前陡患赤痢孟英診之脈滑數而沈面赤苔黃手足冷過肘膝當臍腹痛小溲清少伏熱為病也與大劑芩連厄棟滑石丹皮砂仁延胡查魏銀花草決明等藥兩服手足漸溫而腳背紅腫起泡如蒲桃大一二十枚四服後腹痛減苔退而渴於原方去查魏砂仁加白頭翁赤芍海蛇

王氏醫案續編卷二

旬日後痢色轉白而腿筋抽痛乃去丹皮滑石赤芍加鷄金橘

紅生苡石斛兩服痛止溲長糞色亦正腳泡潰黃水而平穀食遂安改用養胃陰清餘熱之法而愈聞孟英治此證每劑銀花輒兩許尚須半月而瘳設病在他家焉能如此恪信苟遇別手斷無如此重劑况在冬春之交誠古所未有之痢案後人恐難企及 吳腹齋室新產後嘔吐不止湯水不能下嘔頭痛痰多苔色白滑孟英用蘇梗橘半吳萸茯苓旋覆葶皮柿蒂紫石英竹茹一劑知二劑已

此證明明虛寒何以作虛寒治不效蓋虛寒乃此人之本體而痰咳乃新受之外邪不治其邪而專補其虛則邪無出路以致積補生熱此舌胎之所以黃膩也孟英以清熱化痰為治尚是一半治病一半治藥誤也

鄭嫗患咳嗽自覺痰從腰下而起吐甚冷醫作腎虛水泛治漸至咽喉阻塞飲食礙進即勉強嚥之而胸次梗不能下便溏溲頻無一人不從虛論孟英診曰脈雖不甚有力右部微有粒滑苔色黃膩豈屬虛證以葶芫湯合雪羹加貝母知母花粉竹茹麥冬枇杷葉柿蒂等藥進十餘劑而痊 滿洲少婦懷娠漏血醫投補藥漏如故間或不漏則吐血延踰二載腹中漸動孕已無疑然血久溢於上下甚至納食即吐多醫不能治孟英診之脈滑數有力是氣實而血熱也證不屬虛補藥反能助病愈補愈漏胎無血蔭而不長其所以不墮者氣

王氏醫案續編卷二

分堅實耳與大劑清營藥血溢遂止而稀沫頻吐得飲即嘔口

渴心忡氣短似促乃用西洋參麥冬知母石斛枇杷葉竹茹柿蒂生白芍木瓜重加烏梅投之覆杯即安次日能喫飯矣 珠小輝太守令媛驟患腫連及脣鼻乃至口不能開舌不得出孟英視之曰溫毒也用射干山豆根馬勃羚羊薄荷銀花貝母花粉杏仁竹黃為劑并以紫雪搽於脣內錫類散吹入咽喉外將橄欖核磨塗腫處果吐靛涎而腫漸消詰朝即啜稀粥數口而愈 一男子患便血醫投溫補血雖止而反泄瀉浮腫延及半年孟

英診之脈數舌絳曰此病原溼熱溫補翻傷陰液與芩連厄芍
桑葉丹皮銀花石斛棟實冬瓜皮龜甲鷄金等藥旬餘而愈

陸厚甫室陳芷溥主事之女也產後經旬偶發脘痛專用與溫
補藥因寒熱氣逆自汗不寐登圓不能解而臥則稀水自流口

渴善嘔查不納穀愈云不起矣乃父速孟英診之脈絃數而滑
日本屬陰虧肝陽侮胃誤投溫補滯滯之劑氣機全不下降以

致諸證濇起醫者見而卻走是未明其故也與沙參竹茹棟實
延胡厄連橘貝杏斛枇杷葉為肅肺以和肝胃法覆杯即安但

少腹隱隱作痛於前方去杏貝竹茹加知母花粉菴蓉白芍橘
王氏醫案續編 卷二 三

核海蛇乃解宿垢而瘳

周子朝患惡寒頭痛發熱酷似傷寒而兼心下疼脹孟英脈之
右部沈滑苔黃不渴溲如蘇木汁先以葱豉湯加厄連杏貝婁

橘為方服後微汗而不惡寒反惡熱雖湯飲略溫即氣逆欲死
孟英曰客邪解矣清其痰熱可也與知母花粉杏貝旋滑斛橘

杷茹茅根蘆根地栗海蛇等藥果吐膠痰甚多而納食漸復惟
動則欲喘於肅上之中佐以滋下為善其後而瘳

濮樹堂室懷妊五月患春溫口渴善嘔壯熱無汗旬日後始浼
孟英視之見其煩躁譫語苔黃不燥曰痰熱阻氣也病不傳營

孟英於溫熱痰
伏濁有心得故
遇此等證如推
枘石朽合觀諸
藥可以得治溫
病之法

凡厥逆脈伏之
證其熱深藏多
不易解非卓識
定力不惑於諸
亦必搖於眾議
矣

孟英視之見其煩躁譫語苔黃不燥曰痰熱阻氣也病不傳營

孟英於溫熱痰
伏濁有心得故
遇此等證如推
枘石朽合觀諸
藥可以得治溫
病之法

凡厥逆脈伏之
證其熱深藏多
不易解非卓識
定力不惑於諸
亦必搖於眾議
矣

血藥禁用試令按其胸次果然堅痛而大解仍行法當開上用
小陷胸加石菖蒲枳實杏貝茹鬱厄翹等藥蘆薈湯煎服服二
劑神情即安四帖心下豁然惟心腹如烙嘔吐不納改投大劑
甘寒加烏梅頻啜漸康秋閒得子亦無恙

胡振華以花甲之年患瀉後出血水甚痛自云溲頗長激似非
火證孟英察脈有滑數之象與元參生地犀角厄棟槐蕊側柏
知母花粉石斛銀花甘草梢綠豆等藥旬日而痊踰四載以他
疾終

管氏婦自去秋患赤痢多醫罔效延至暮春孟英診脈絃數苔
黃渴飲腹脹而墜五熱夜甚用白頭翁湯合金鈴子散加芩芍
厄斛吞駐車丸淡旬而愈

濮樹堂室病孟英甫為參愈而樹堂繼焉起即四肢厥逆脈伏
惡寒發熱頭痛左為甚惟口渴因與葱豉二帖熱雖退脈仍伏

四肢冷過肘膝大解頻行人皆疑為虛寒孟英曰此證儼似陰
厥然渴飲溲赤真情已露豈可泥於一起即厥而必定其為寒

乎徑投涼解熱果復發而肢冷脈伏如故幸病者堅信服藥不
疑至第七日大便瀉出紅水溺則管痛嘔惡煩躁徹夜不暝人
更危之孟英曰熱邪既已下行可望轉機以白頭翁湯加銀花

王氏醫案續編 卷二 四

黃渴飲腹脹而墜五熱夜甚用白頭翁湯合金鈴子散加芩芍
厄斛吞駐車丸淡旬而愈

濮樹堂室病孟英甫為參愈而樹堂繼焉起即四肢厥逆脈伏
惡寒發熱頭痛左為甚惟口渴因與葱豉二帖熱雖退脈仍伏

四肢冷過肘膝大解頻行人皆疑為虛寒孟英曰此證儼似陰
厥然渴飲溲赤真情已露豈可泥於一起即厥而必定其為寒

乎徑投涼解熱果復發而肢冷脈伏如故幸病者堅信服藥不
疑至第七日大便瀉出紅水溺則管痛嘔惡煩躁徹夜不暝人
更危之孟英曰熱邪既已下行可望轉機以白頭翁湯加銀花

更危之孟英曰熱邪既已下行可望轉機以白頭翁湯加銀花

通草芩芍茹滑知斛厄棟羚角之類投三日紅水始止四肢漸和頗有昏瞢語用王氏犀角地黃湯一劑四肢熱而脈顯滑數苔轉灰黃大渴遺溺病人自述如臥烘箱上於昨方加入元參銀花竹葉生石膏知貝厄斛服一劑夜間即安寐而苔轉黑燥於昨方復加花粉服一劑熱退而頭面汗多雖言倦寐小溲欲解不通諸戚友咸以為危各舉所知而羣醫會云挽救不及病家皇皇孟英曰此證幸初起即予診視得盡力以為死裏求生之舉非比他人之病皆因誤治致危然不明言其險者恐病家惶惑而築室於道旁也今生機已得不過邪去真陰未復但

王氏醫案續編卷二

五

當恪守子法自然水到渠成切勿二三其德以致為山虧簣賴有一二知音竟從孟英議服西洋參生地菴蓉麥冬棟芍知斛藥一劑瀉行索粥再服而黑苔退三服而神清音朗舌潤津回唯有嘔痰不能吐左偏頭微痛於原方加二至桑菊貝母牡蠣又復五劑得解鞭矢一次各患始安眠食漸適而瘳陳足甫漫後見血管痛異常減餐氣短孟英以元參生地知母棟實銀花側柏葉厄子桑葉丹皮綠豆為方藕湯煎服二劑病大減乃去丹皮柏葉加西洋參熟地服之而瘳王開榮偶患腹中絞痛自服治痧諸藥而大便瀉血如注孟英

診之左頰和右關尺絃大而滑面色油紅喘逆不寐與葦莖湯合金鈴子散加銀花側柏葉厄斛芩連二帖後面紅退血亦止乃裁柏葉銀花加雪羹枯荷桿又二帖始發熱一夜得大汗周時而腹之痛脹爽然若失即能安寐進粥改投沙參知母花粉桑葉杷葉石斛白芍橘絡杏仁冬瓜子茅根荷桿三帖大解行而脈柔安毅

王氏醫案續編卷二

六

溺行而平高某患兩膝後筋絡痠疼略不紅腫臥則痛不可當徹夜危坐孟英切脈虛細苔色黃膩咽燥溺赤與知斛厄棟牛膝豆卷桂枝竹瀝為方送虎潛丸旬日而瘳楊某方作事不知背後有人潛立回顧失驚遂不言不食不寐不便別無他苦孟英按脈沈絃以石菖蒲遠志琥珀膽星旋貝竹黃杏仁省頭草羚羊角為劑化服蘇合香丸二帖大解行而啜粥夜得寐而能言復與調氣寧神蠲飲藥數日霍然趙聽樵令妹每汛至則腹脹嘔吐腰脊痠疼兩腿腫痛筋掣腕

俱肝氣橫逆之
證其發於汛期
清肝失所發也
孟英先平肝驅
痰而後養血柔
肝亦先標後本
之法

病不甚重治亦
合法而難收捷
效者以陰虛之
體不勝溫熱之
氣也此即四積
不可止治之何
設治不如法則
危矣

葉氏云溫邪中
人首先犯肺其
病則入心正此
病也

疼甚至痲厥多藥不效孟英以金鈴子散合左金加二陳竹茹
枳實桂枝數劑而愈續用菴菴絲淫羊杜仲桑甚木瓜續斷
香附歸芍茴棟調之汛至如期略無痛苦初冬適楊子樸尋即
受孕

濮東明令孫女素稟陰虛時發夜熱少餐不寐仲夏患感發疹
汛不當期而至孟英用犀羚知貝石膏生地扈翹花粉甘草竹
葉蘆根等藥疹透神清唯鼻燥異常吸氣入喉辣痛難忍甚至
肢冷復於方中加元參竹茹菊葉荷桿各患始減而心中吐沫
徹夜不眠渴汗便瀉改投西洋參生地麥冬小麥竹葉黃連真

王氏醫案續編 卷二 七

珠百合貝母石斛牡蠣龜板蔗汁諸藥而愈季秋適姚益齋為
室
金亞伯廷尉筵室產後惡露不行渴瀉痰多孟英以北沙參滑
石生薏苡生扁豆蛤殼豆卷石斛竹茹枇杷葉琥珀茯苓等藥
數劑而愈
顧竹如孝廉令媛患感十餘日耳聾不語昏不識人而客未入
室彼反先知醫以為崇凡犀角地黃牛黃清心復脈等湯徧服
無效已擬搗後事矣所親濮根厓囑其延診於孟英脈至滑數
舌不能伸苔色黃膩遺溺便秘目不交睫者已四晝夜胸腹按

雖不用下劑而
通經透絡之品
大劑用之亦足
以瀉滯邪移

之不柔與白虎湯去米草加石菖蒲元參犀角龍甲花粉杏仁
竹葉竹黃竹瀝投一劑即語滔滔渠父母疑藥不對病孟英
曰不語者欲其語是轉機也再投之大渴而喜極熱之飲又疑
涼藥非宜孟英姑應之曰再服一劑更方可也三投之痰果漸
吐四劑後舌伸便下神識漸清乃去菖蒲石膏犀角龍甲加生
地石斛麥冬貝母數帖熱盡退而痰味甚鹹又去杏貝竹黃加
西洋參牡蠣龜板菴菴服之全愈踰年失怙繼遭祝融鬱損情
懷誤投溫補至戊申年殞

王氏醫案續編 卷二 八

熱不甚壯苔色厚膩嘔惡煩躁痰多腿痠顯是溼溫因謂其令
郎子旂曰溼溫者溼蘊久而從時令之感以化熱也不可從表
治更勿畏虛率補與宣解一劑各恙頗減奈眾楚交咻謂病由
心力勞瘁而來况汗多防脫豈可不顧本原羣醫附和遂服參
歸熟地之藥病日以劇最後吳古年診之云此溼溫也何妄投
補劑然已未從挽救交十四日而殞始悔不從王議
康康侯司馬之夫人久傷謀慮心火外浮面赤齒疼因啖西瓜
遂脫悶不舒喜得熱按泄瀉不饑自覺舌厚數寸苔色灰膩孟
英與厚朴滑石葱白薤白枇杷葉橘皮薄荷旋覆省頭草一劑

霍然

葉杏江仲郎患發熱泄瀉醫治十七日不效骨瘦如豺音嘶氣

逆所親許芷卿薦孟英診之脈數大渴汗多苔黃以竹葉石膏

湯加減十餘劑漸以向愈大解反極堅燥繼與滋養而康

張某患發熱醫知其非寒邪也用清解藥數帖腿痛異常身面

漸黃孟英診之脈滑實腹脹口乾與茵陳大黃湯兩劑便行而

各恙霍然

魏女患腳腫嘔吐寒熱便秘孟英與龍膽瀉肝湯而立效繼有

孫氏婦患此亦以是藥獲痊

王氏醫案續編卷二 九

馮媼患左目胞起瘰繼而痛及眉稜額角顛頂腦後筋掣難忍

醫投風劑其勢孔亟孟英診脈絃勁舌絳不饑與固本合二至

桑菊犀羚元參牡蠣龜甲白芍知母石斛丹皮細茶等出入互

用匝月始愈

濮姬於酷熱之秋渾身生瘡如疔痛楚難堪小溲或秘或頻大

便登聞則勞瘁不下臥則不能收攝人皆謂其虛也孟英診脈

滑數舌紫苔黃而渴與白虎加花粉竹葉梔子白薇紫苑石斛

黃藥十餘劑而痊

姚小衛太史令姪女初秋患寒熱而汛適至醫用正氣散兩帖

此亦肝經鬱熱
之證蓋其善於
調劑故應手輒
效

遂壯熱狂煩目赤譫語甚至欲刺欲殺勢不可制孟英按脈洪

滑且數苔色乾黃尖絳腕胸腹脹拒按畏明口渴氣逆痰多與

桃仁承氣湯加犀角石膏知母花粉竹瀝甘菊人謂熱雖熾而

汛尚行何必大破其血而又加以極寒之藥哉孟英曰叟勿過

慮恐一二劑尚不足以濟事果服兩大劑始得大便而神清苔

化目赤亦退改用甘寒以清之繼而又不更衣即脈滑苔黃而

腹脹更與小承氣湯二帖便行而各恙遺已數日後又如此仍

投小承氣湯二帖凡前後六投下劑才得波浪不興漸以清養

而瘳季秋適江右上高令孫明府之子沛堂為室

王氏醫案續編卷二 十

董曉書令正素患腕痛甚至暈厥今秋病腰疼腿木胸悶氣逆

不能臥胡某進溫補藥而喘汗欲脫查不思穀孟英切脈虛細

中兼有絳滑舌絳而渴乃陰虛挾痰耳與沙參菴蓉木瓜石斛

蛤殼蒺藜石英茯苓紫苑杏仁棟實首烏牛膝諸藥旬日而安

繼加熟地黃服之全愈

王華塘患滯下醫投枳朴檳查之藥數服後肢冷自汗查不進

穀腕悶腹痛小溲牽疼舉家皇皇孟英視脈細滑舌絳無津是

高年陰虧伏暑傷液况平昔茹素胃汁不充加以燥烈之藥津

何以堪因與沙參銀花菴蓉白芍石斛木瓜甘草棟實扁豆花

鮮○栢○頭○數○劑○痛○悶○漸○去○汗○止○肢○溫○乃○加○生○地○阿○膠○麥○冬○柿○餅○蒲○桃○乾○等○以○滋○之○居○然○而○痢○止○餐○加○惟○舌○色○至○匝○月○始○津○潤○復○常○陰○液○之○難○充○也○如○此○

沈○緩○齋○令○堂○患○滯○下○色○白○醫○與○溫○運○病○勢○日○劇○腹○脹○昏○昏○湯○飲○不○下○孟○英○診○為○伏○暑○用○苓○連○滑○朴○等○藥○沈○疑○高○年○且○素○患○脫○痛○豈○可○輒○用○苦○寒○孟○英○再○四○劑○陳○始○服○牛○劑○病○果○大○減○不○數○帖○即○愈○按○此○等○證○甚○多○奈○執○迷○不○悟○者○雖○剴○切○言○之○不○能○解○其○惑○亦○可○哀○也○已○

一○叟○患○滯○下○色○白○不○黏○不○饑○不○渴○腹○微○痛○而○不○脹○孟○英○切○脈○遲○

王氏醫案續編 卷二

十一

微○進○大○劑○真○武○湯○加○參○而○愈○

肺、腎、熱、於、肝、方、皆、所、蒙、不、過、如、此、

程○秋○霞○子○患○腦○漏○醫○與○辛○夷○蒼○耳○之○藥○漸○有○寒○熱○改○用○柴○葛○羌○防○數○帖○遂○致○寒○熱○日○發○數○次○神○昏○自○汗○勢○甚○可○危○孟○英○用○竹○葉○石膏湯一劑寒熱退而神清進粥繼以甘涼清肅復投滋潤填

陰○旬○日○而○健○

朱○浚○宜○令○堂○患○滯○下○醫○聞○色○白○而○與○升○提○溫○補○旬○日○後○肢○冷○自○汗○液○脫○肛○墜○羣○醫○束手○慮○其○虛○脫○因○浼○濮○樹○堂○乞○診○於○孟○英○曰○藥○誤○耳○與○大○劑○行○氣○獨○痰○清○熱○之○藥○果○漸○吐○痰○而○痢○愈○又○其○令○弟○同○時○患○此○五○色○並○見○神○昏○肢○指○大○渴○莖○腫○腹○痛○夜○熱○危○險○異○

常○孟○英○察○脈○細○數○與○白○頭○翁○湯○加○犀○角○生○地○銀○花○石○斛○棟○實○延○胡○苧○連○滑○石○丹○皮○木○通○甘○草○梢○等○藥○三○帖○後○熱○退○神○清○溺○行○指○止○乃○去○犀○角○草○梢○丹○皮○滑○石○木○通○加○砂○仁○拌○炒○熟○地○山○查○炭○服○之○漸○安○半○月○而○愈○

姚○小○蘅○大○令○患○瘧○寒○微○熱○甚○日○作○二○次○汪○某○與○柴○胡○藥○二○帖○勢○遂○劇○舌○絳○大○渴○小○溲○全○無○孟○英○曰○津○欲○涸○矣○與○西○洋○參○生○地○知○母○花○粉○石○斛○麥○冬○梔○子○百○合○竹○葉○投○之○五○劑○而○瘧○止○越○三○載○以○他○疾○終○其○筵○室○同○時○患○此○嘔○吐○脇○痛○畏○寒○不○渴○苔○色○微○白○孟○英○與○小○柴○胡○湯○三○飲○而○瘳○

王氏醫案續編 卷二

十二

孫○渭○川○年○踰○七○旬○脈○象○六○陰○按○之○如○無○偶○患○音○嘶○痰○嗽○舌○絳○無○津○孟○英○用○甘○涼○清○潤○法○音○開○而○嗽○不○已○仍○與○前○藥○轉○為○滯○下○色○醬○濁○赤○臍○旁○堅○鞭○按○之○趨○趨○舌○猶○枯○絳○渴○飲○不○饑○人○皆○危○之○孟○英○曰○藏○熱○由○府○而○出○痢○不○足○慮○第○高○年○陰○液○難○充○不○能○舍○涼○潤○為○方○苟○犯○溫○燥○其○敗○可○必○幸○渠○家○平○素○恪○信○竟○服○犀○角○地○黃○知○母○銀○花○菴○蓉○花○粉○麥○冬○白○芍○石○斛○棟○實○等○藥○十○餘○劑○痢○止○而○臍○旁○柔○軟○因○去○犀○角○加○西○洋○參○又○服○兩○旬○始○解○燥○矢○而○溲○澈○胃○甦○又○服○半○月○復○得○暢○解○舌○亦○潤○澤○而○愈○

王○耕○藍○室○素○患○腕○痛○近○發○寒○熱○醫○與○溫○補○漸○至○胸○痞○嘔○呃○譫○語○

神昏舌絳面赤足冷自汗瘧仍不休孟英用元參犀角石膏石
菖蒲連翹杏仁貝母旋覆竹茹枇杷葉竹黃柿蒂竹瀝鬱金諸
藥化服萬氏牛黃清心丸數服而愈

潘祥行在外患瘧買舟歸就孟英視曰苔膩脈熨伏邪所化不
與正瘧同科風寒藥一味不可犯薑棗湯一滴不可啜與知芩
橘半滑朴杏斛花粉省頭草一劑而病若失此等案極多姑載
一二

張與之令堂久患痰嗽礙臥素不投補藥孟英偶持其脈曰非
補不可與大劑熟地藥一飲而睡與之曰吾母有十七載不能

王氏醫案續編卷二

七

服熟地矣君何所見而重用頗投孟英曰脈細痰鹹陰虛水泛
非此不為功從前服之增病者想必雜以參朮之助氣昔人云
勿執一藥以論方故處方者貴於用藥之恰當病情而取舍得
宜也

陳足甫室懷妊九月而患瘧目不能瞑口渴自汗便溏氣短醫
進育陰清解法數劑不應改用小柴胡一帖而咽疼舌黑心頭
絞痛乃翁仰山聞之疑其胎壞延孟英過診曰右脈洪滑雖舌
黑而胎固無恙也病由伏暑育陰嫌其滋膩小柴胡乃正瘧之
主方古人謂為和劑須知是傷寒之和劑在溫暑等證不特手

瘧亦分經而治
若陽明瘧正以
白虎湯為主劑
豈有專守一小
柴胡而能愈病
者

足異經而人參半夏薑棗皆不可輕用之藥雖有黃芩之苦寒
而仲聖於傷寒之治猶有渴者去半夏加栝婁根之文古人立
方之嚴密何後人不加體察耶投以竹葉石膏湯四劑瘧止便
祕口渴不休與甘涼濡潤法數帖忽腹鳴泄瀉或疑寒涼所致
孟英曰吾當以涼藥解之人莫識其意問難終朝語多不備錄
果以白頭翁湯兩啜而愈迨季秋晚後發熱不蒸乳惡露淡且
少家人欲用生化湯孟英急止之曰血去陰更傷豈可妄疑瘵
停而攻之與西洋參生地茯苓石斛女貞旱蓮甘草為大劑數
日而安繼因觸怒少腹聚氣如痕痠痛夜甚人又疑為涼藥凝

王氏醫案續編卷二

七

瘵所致孟英力為辨折與橘核橘葉橘絡棟實菴蓉木香厄炭
烏藥絲瓜絡海蛇蕪石斛兩頭尖等藥外以蔥頭搗爛貼之兩
帖後腹中雷鳴周身汗出而痛止人見其汗慮為虛脫急追孟
英視之曰此氣行而病解矣但脈形細數陰津大傷苦黃苦渴
亟宜潤補奈樞機窒滯滋膩難投且以濡養八脈為法服之各
恙皆蠲眠食漸適緣平素多鬱易犯痧氣頻發脫痛屢次反復
孟英竭力圖維幸得轉危為安漸投滋補而愈
胡季權子珍官甫六歲目患內障繼則夜熱痰嗽小溲過多醫
作童損治服滋補數月病日以甚孟英持脈右大口渴苔黃曰

伏熱在肺。法當清解。及詳詰其因。始言病起。瘡後。蓋餘熱未淨。而投補太早。與滑石。知母。花粉。桑葉。茅根。枇杷。葉。蘆根。冬瓜子。杏仁。服二劑。徧身發出。斑塊。又二劑。班退。苦化。乃去滑石。加沙參。餌之。其熱頭面先退。次退四肢。以及胸背。又數日。甫退於腹。人皆詫其熱退之異。孟英謂熱伏既久。復為半年之補藥。膩滯於其間。焉能一旦盡滌。其勢必漸清而漸去也。熱退既淨。瀉亦有節。痰嗽遞竭。餐加肌潤。而內障亦漸除矣。
顧。奏。雲。季。秋。患。感。醫。作。虛。治。補。及。旬。日。舌。卷。痙。厥。屢。以。下。不。能。略。動。危。在。須。臾。所。親。石。誦。義。延。孟。英。設。死。裏。求。生。之。策。察。厥。虛。

王氏醫案續編 卷二

十五

促欲絕。先灌紫雪一錢。隨瀝犀角地黃湯二天劑。服下。厥雖止。而舌腭滿黑。目赤如鳩。仍用前湯。三日。聞計服犀角兩許。黑苔漸退。神識乃清。而呃忒頻作。人猶疑其虛也。孟英曰。營熱雖解。氣道未肅耳。以犀角。元參。石花。連翹。銀花。竹茹。知母。花粉。貝母。竹葉。為方。服之。次日。即下。黑鞞矢甚多。而呃忒止。又三劑。連解膠黑矢四次。舌色始潤。略進米飲。腿能稍動。然臂已磨穿矣。與甘潤育陰藥。續解黑矢。又五次。便溺之色始正。投以滋養。日漸向安。已酉。舉於鄉。其弟翰雲。患左膈。閉腫。鞭而疼。暮熱。溺赤。舌絳。而渴。孟英按脈。細數。徑用西洋參。生地。麥冬。棟實。知母。花粉。

銀花。連翹。甘草。黃藥。等藥。服旬餘而愈。

康侯司馬令郎爾九。在玉環署中。忠心中。自汗。氣短。面赤。雲時。溲瀉。數十次。澄澈如水。醫食謂虛。補之日劇。乃來省。就孟英診焉。左寸關數。右絳滑心下似阻。因作痰火阻氣。心熱移肺。治用蛤殼。黃連。枳實。棟實。旋覆花。粉。橘。紅。杏。仁。百。合。絲。瓜。絡。冬。瓜。子。海。蛇。粉。臍。竹。茹。竹。瀝。梨。汁。等。出。入。為。方。服。之。良。愈。而。司。馬。為。職。守。所。羈。嘗。患。恙。函。請。孟。英。診。視。者。再。四。竟。不。克。往。繼。聞。司。馬。於。冬。仲。竟。卒。於。甌。乃。知。病。而。得。遇。良。手。原。非。偶。然。前。歲。遇。而。今。歲。不。能。致。豈。非。命。也。耶。

王氏醫案續編 卷二

末

許自堂令孫子社。患感。延至秋杪。證交二十八日。諸醫束手。渠伯母鮑玉士夫人。薦孟英診之。左部數。右手儼若魚翔。痰嗽氣促。自汗。痰瘕。苔色灰厚。渴無一息之停。垂危若是。而皓首之祖孀母少妻。相依為命。環乞拯救。甚可憫也。孟英曰。據脈莫能下手。吾且竭力勉圖。第恐一齊眾楚。信任不堅。則絕無可望之機矣。其母長跽而言曰。唯君所命。雖砒鳩勿疑也。於是先以竹葉石膏湯。加減至五劑。氣平。嗽減。汗亦漸收。苔色轉黑。舌尖露絳。改投元參。生地。犀角。石膏。知母。花粉。竹葉。銀花。等藥。又五劑。痰瘕漸減。舌絳漸退。彼婦翁召羽士為其拜斗。飛符。噴水。鼓樂喧。

關病者即譫妄不安神昏如醉。羽士反為嚇退。實夜速孟英視之。與紫雪錢餘。神即清爽。仍用前方。重加竹瀝。服入劑。始解。黑如膠漆之大便。而黑苔漸退。右脈之至。數始清。惟煩渴不減。令其恣啖北梨。舌穢不燥。痰出亦多。又六劑。舌色乃淡。澀出管痛。熱邪得從下行矣。凡十二日之間。共服大劑寒涼已二十四帖。計用犀角三兩有奇。而險浪始平。續以前法。緩制。服六劑。又解。黑矢五次。手足始知為已有。又五劑。筋絡之振。惕始定。略能側臥。嚙語乃息。漸進稀糜。繼灌甘潤。充其胃汁。七八劑後。渴止。知。餓脈皆和。緩。又淡。旬。穀食乃復。又旬餘。便溺之色始正。前後共。

王氏醫案續編

卷二

七

下黑矢四十餘次。苔色亦淨。投滋填善。後而康。是役也。凡同道暨許之族人戚友。莫不以為秋冬之交。用藥偏寒。况病延已久。敗象畢呈。苟不即投峻補。必致失手。既聞鮑夫人云。歸許氏二十餘年。目擊多人。無不死於溫補。此等病。曾見之。此等藥。蓋未嘗聞也。孰知如此之證。有如此之治。求之古案。亦未前聞。傳諸後賢。亦難追步。蓋學識可造。而腸熱膽堅。非人力所能及。此孟英所以為不世出之良醫也。

段春木秋杪。患發熱而腰腿痛。如刀割。孟英視之。略不紅腫。脈至細數。苔色黑燥。溺赤便黑。與西洋參麥冬生地犀角銀花棟。

實石斛知母甘草竹瀝蔗汁為大劑。投之。熱漸退。痛漸已。惟舌絳無津。仍與甘涼濡潤為方。數日後。忽舌絳倍加。燥及咽膈。水飲不能下。噤。孟英曰。真陰涸竭。藥難奏績矣。然竊疑其何以小愈之後。驟爾陰枯。或者背予而服別藥乎。繼其契友來詢云。段死而舌出。此曷故歟。孟英聞之。爽然大悟。因擷傷寒女勞復之文示之。其人頓足云。良然。彼於小愈後。曾宿於外。次日歸。即轉劇。苟直陳不諱。或尚可治。孟英曰。未必然也。燒視散。鼠矢湯。皆從足少陰以逐邪。不過熱邪襲入。此經所謂陰陽易是也。今少腹無絞痛之苦。原非他人之病。易於我。真是女勞之復。以致真。

王氏醫案續編

卷二

六

陰枯涸。更將何藥。以驟復其真陰哉。然從此而女勞復。與陰陽易一虛一實。有定論。不致混同而談治矣。

顧昇庵參軍之仲郎。久患多疑善恐。不出房者數年矣。食則不肯與人共案。臥則須人防護。寡言善笑。時或遺精。多醫廣藥。略無寸效。孟英切脈甚滑。數與元參丹參竹黃竹茹丹皮黃連花粉。卮子海蛇。蒴膈為劑。送服當歸龍薈丸。四帖。即能出。暑觀劇。遊淨慈。而登吳山。參軍大喜。歎為神治。次年為之配室。

陳某偶患瀉泄。所親鮑繼仲云。余往歲患瀉。治不中肯。延逾半載。幾為所困。今秋患此。服孟英方。數劑霍然。故服藥不可不慎。

也。蓋延孟英治之。陳因中表二人皆知醫。招而視之。以為省便。輒投以溫補健脾之藥。數日後。瀉果減而發熱昏瘧咽喉黑腐。其居停瞿穎山疑病變太速。囑其請援於孟英。孟英診曰。遲矣。病起泄瀉。何必為寒。正是伏邪自尋出路。而溫補以固留之。自然內陷厥陰。不可救藥。果即殞焉。繼有高小垞孝廉令弟雨生。因食蟹患瀉。黃某用大劑溫補藥。瀉果止。而頸筋痠痛。舌絳。嘔渴。口氣甚臭。孟英持脈沈數。曰。食蟹而後瀉。會逢其適耳。脈證如斯。理應清潤。奈病人自畏涼藥。復質於吳某。亦主溫補。服及旬日。昏瘧舌黑而斃。

王氏醫案續編 卷二

九

此肝氣挾停飲
上逆也。緣案嗜
瓜果胃腸久傷
故於平瀉飲
之中加參以扶
胃氣

金某久患脫痛。按之漉漉有聲。便秘。溲赤。口渴。苔黃。杏不知。饑絕粒五日。諸藥下。嘔傾吐無餘。孟英察脈沈弱。而絃。用海蛇。勃。臍各四兩。煮湯飲之。徑不吐。痛亦大減。繼以此湯。煎高麗參。黃連。棟實。延胡。子。枳。椶。石。斛。竹。茹。柿。蒂。等藥。送服。當歸。龍。薈。丸。旬日而安。續與春澤湯調補。收續。蓋其人善飲。而嗜瓜果。以成疾也。

此當是痰閉氣
結之故。蘇合丸
辛香通氣。故愈。
若是肝浮氣逆。
益以香氣之藥。
安能愈乎。

此與前案虛實
相反。正可對看。

象乃曰。此精氣神三者交虛之證。不可與時行伏暑晚發同年。而語也。幸前手之藥法主運中。尚無大害。與參朮桂附沈香。拌炒熟地。鹿角石。英。菴。杞。歸。茯。杜。仲。棗。仁。菟。絲。山。茶。橘。皮。霞。天。麴。胡桃肉等。出入為大劑。投十餘帖。寒後始有熱。而苔色乃退。口不作渴。甘痰亦日少。粥食漸加。即裁桂附白朮。加石斛。又服七劑。解黑燥大便甚多。凡不更衣者四旬二日矣。寒熱亦斷。安穀。溲澄而竟愈。或謂先生嘗警人溫補之非。何一旦放手而大用。孟英曰。溫補亦治病之一法。何可廢也。第用較少耳。世之醫者。眼不識病。僅知此法可以媚富貴之人。動手輒用。殺人無算。豈

王氏醫案續編 卷二

十

非將古人活世之方。翻為誤世之藥。可不痛恨耶。陳媪患牝瘡。月餘。腹脹便秘。屢多不饑。口淡。脈滑。孟英主連。棗。貝。杏。茹。旋。苑。杷。菴。為方。數劑即瘳。孟英治其令弟季傑之。筵室因夜閒未寐。侵晨飲酒解寒。適見人爭許。即覺心跳欲吐。家人疑其醉也。而欲吐不出。氣即逆奔。如喘。且肢麻。手握。語言難出。又疑為急痧。而欲刺之。孟英聞而視之。脈象絃駛。曰。夜坐陽升。飲醉則肝陽益浮。見人爭許。是驚則氣更上逆。不可刺也。灌以蘇合香丸一顆。下嘔即瘳。黃漫吉截瘡。後患浮腫。趙某聞其體素虛。切其脈絃細。遂用溫

香歸龍薈丸
香歸龍薈丸
香歸龍薈丸
香歸龍薈丸

補馴致呃忒不休氣衝礙臥飲食不進勢瀕於危請孟英決其
及返餘杭否孟英曰脈雖絃細而有子必誤服溫補矣肯服
吾藥猶可無恐因與括婁薤白合小陷胸橘皮竹茹湯加柿蒂
旋覆蘇子香附豬石紫苑杷葉為方四劑而瘳

吳馥齋室春閒婉子不育汛事亦未一行偶患嘔吐發熱眩暈
心膈大解溏泄口渴澀痛或疑其娠或疑為損孟英診曰產及
一載而經不至腹不脹脈絃緩非娠非損乃血虛痰滯而感冬
溫也以羚羊淡豉竹茹白薇卮子杷葉知母葱白花粉投之三
劑熱退吐止去葱豉羚羊加生地甘草橘皮調之而愈

王氏醫案續編 卷二 三

盛犀林廣文之僕患血痢自秋徂冬半年罔效孟英察脈細弱
而口乾腰膝痠疼與鹿角霜菴蓉枸杞杜仲菟絲續斷血餘
脂木瓜砂仁末炒熟地黃十餘劑而痊
徐月巖室患周身麻木四肢癱瘓口苦而渴痰冷如冰氣逆
嘔汎愆腹脹頻飲極熱薑湯似乎暢適深秋延至季冬服藥不
愈孟英診脈沈絃而數曰溺熱如火乎間有發厥乎病者唯唯
遂以雪羹旋糖卮棟茹斛知母花粉桑枝羚羊橄欖蛤殼為方
送下當歸龍薈丸服之遞效二十劑即能起榻乃去羚羊加西
洋參生地菴蓉藕投之漸愈

王氏醫案 續編卷二

張肖江妹暮冬患感朱某進溫散藥數服病日劇比孟英視之
目瞪不語面赤氣逆晝夜需人抱坐四日不著枕矣乃冬溫挾
痰誤提而氣不肅降也以旋糖杏貝花粉茅根冬瓜子紫苑薤
白婁仁蘇子石菖蒲竹瀝為劑蘆薈湯煎三帖大便行而能臥
矣自言胸中迷悶改用小陷胸合三子養親加沙參知母旋貝
竹茹杷葉數劑熱退知饑而愈嗣有王炳華子患感葉某用
溫散藥而氣逆礙臥四明老醫王秉衡作腎虛不能納氣治連
服大劑溫補喘嗽益劇面浮附腫擡肩自汗大渴脇痛乞治於
孟英已半月不交睫矣診其脈右部絃大而強舌根黑苔如煤

者兩條面黎形瘦幸而大解溏泄得能消受許多誤藥徑與旋
糖黃連枳實括婁蘇子杏仁紫苑生石膏蘆薈汁六大劑始能
就枕而大渴不止脫腹反形痞脹按之堅痛乃去旋糖少加白
芥子半夏薤白兼令日啖北梨數十枚服旬日胸腹皆舒苔色
盡退唯嗽未已改用西洋參杏貝蘆根知母冬瓜子花粉柿霜
杷葉竹瀝十許劑嗽止而附腫渴瀉亦皆霍然矣凡啖梨三百
餘斤聞者莫不詫異

王氏醫案續編 卷二 三

王氏醫案續編卷二完

六五三

王氏醫案續編卷三

杭州王士雄孟英醫案

趙夢齡菊齋續輯

丙午春高漢芳患滯下色醬日數十行年已七十七歲自去秋以來漸形疲憊即服補藥馴致見痢黃某徑用溫補勢乃劇延孟英診之右脈絃細孔遲口渴溲澀時時面赤自汗乃吸受暑邪誤作虛治幸其所稟極堅尙能轉痢一誤再誤邪愈盛而正反虛矣以白頭翁湯加參朮銀花芩芍棟斛延胡二劑即減五劑而安繼與調補竟得霍然後三載以他疾終

王氏醫案續編卷三

一

葉晝三姪女適朱氏上年四月分娩七月患赤痢其家謂產後之病不敢服藥延至今春肌消膝爽見食欲嘔晝三迓孟英診之左細爽右滑數伏暑爲病幸未誤藥與沙參陳倉米歸芍續斷木瓜扁豆連斛石蓮荷蒂柿蒂枇杷葉橘皮爲方送駐車丸而愈

鄭芷塘令岳母年踰花甲仲春患右手足不送舌蹇不語面赤便秘醫與疏風不效第四日延診於孟英右洪滑左絃數爲陽明府寶之候疏石菖蒲膽星知母花粉枳實粳仁秦艽旋覆麻仁竹瀝爲方或慮便瀉欲脫置不敢用而不知古人中藏宜下

溫病誤補未有能生舌苔英獨出手眼實發前人所未發

用木通精當凡心經熱用犀

之藏字乃府字之譌柯氏云讀書無眼病人無命此之謂也延至二旬病勢危急芷塘浼童秋門復懇孟英視之苔裂舌絳米飲不沾腹脹息粗陰津欲竭非急下不可也即以前方加大黃四錢絞汁服連下黑矢五次舌蹇頓減漸吸稀糜乃去大黃加西洋參生地麥冬丹皮薄荷服五劑復更衣語言乃清專用甘涼充津滌熱又旬日舌色始淡納穀如常改以滋陰漸收全積論三載聞以他疾終

章養雲室思感適遇猝驚黃包二醫皆主溫補乃至昏譫瘧厥勢極危殆棺衾咸備無生望矣所親陳仰山聞之謂云去秋顧

王氏醫案續編卷三

二

奏雲之恙僅存一息得孟英救愈子盍圖之章遂求診於孟英證交三十八日脈至細數無倫兩手拘攣宛如角弓之反張痰升自汗渴飲苦黃面赤臂穿晝夜不能合眼先與犀羚貝斛元參連翹知母花粉膽星牛黃鼈甲珍珠竹黃竹葉竹茹竹瀝爲方三劑兩手漸柔汗亦漸收又五劑熱退痰降脈較和而自言自答日夜不休乃去羚斛珠黃加西洋參生地大塊硃砂兩許服之眩絮不減或疑爲癩似有搖惑之意孟英恐其再誤囑邀許芷卿商之芷卿極言治法之絲絲入扣復於方中加青黛龍牡服二劑仍喋喋不已孟英苦思數四徑於前方加木通一錢

角黃連等藥必
兼木通其效乃
捷以能引心經
之熱從小腸出
也

投七即效。次日病者自云。前此小溲業已通暢。不甚覺熱。昨藥服後。似有一團熱氣。從心頭直趨於下。由溺而泄。從此神氣安謐。粥食漸加。兩腿能動。大解亦堅。忽咽腫大痛。水飲不下。孟英曰。餘火上炎也。仍與前方。更吹錫類散而安。惟醫瘡未斂。腿痛不已。乃下焦氣血傷殘。改用參耆歸芍生地合歡山藥麥冬牛膝石斛木瓜桑枝藕肉。數服痛止。餐加。又與峻補生肌而愈。吳醞香孝廉三令媛患感。諸醫首以升散。繼進溫補。至三月下旬。證交三十五日。昏瘵譫語。六晝夜不交睫。旬日不沾米飲。許芷卿視之。儼似養雲室證。即拉孟英暨顧聽泉趙笛樓會診。脈

王氏醫案續編

卷三

三

絃滑而微。數齒不能開。窺其舌縮苔垢。孟英曰。尖雖卷色猶紅潤。且二便不秘。尚有一綫生機未絕也。揆其受病原不甚重。只因謬治踰月。誤藥釀成大證。勢雖危險。吾儕當協力援之。第勿再犯一味悖藥。事或有濟。醞香頗極信從。孟英復詢其服事婢。媪曰。病已踰月。腰以下得母有磨壞之虞乎。皆曰無之。惟數日前。易其所遺。略有血漬。必月事之不愆也。孟英頗疑之。囑其再易之時。留心細察。疏方以犀角四錢。石菖蒲二錢。貝母二兩。整塊砂。兩許。竹瀝。梳許。佐以竹葉。竹黃。竹茹。知母。花粉。元參。旋覆。絲瓜。絡。葦。苈。銀花。龍甲。調下。紫雪丹。次日諸君復會。渠母徐

非此大則不足
以起証

夫人即云。王君明視隔垣。小女腰下果已磨穿。糜潰如梓。婢媪輩粗忽。竟未之知也。昨藥服後。證亦少減。孟英仍主原方。四服後。夜始眠。瘵纔息。舌甫伸。苔乃黑。孟英於前方去龍甲。砂。菖蒲。加生地。卮子。數服後。苔轉黃。大便黑如膠漆。且有痰色。蓋從前大解黃色。似乎無甚大熱。不知熱由補藥所釀。滯於腸胃。曲折之地。而不能下行。勢必薰蒸於上。致有內陷入藏之逆也。黑矢下而神識漸清。餘熱復從氣分而達。痰嗽不爽。右脈滑搏。孟英主用竹葉石膏湯。加減四劑。漸安。而外患痛楚徹夜呻吟。雖敷以珠黃。滋以甘潤。未能向愈。孟英令以大蟾蜍治淨。煮湯煎

王氏醫案續編

卷三

四

育陰充液之藥服之。果痛止。肌生。眠食漸進。汛事如期。而瘳冬閒。適張舟甫之子為室。或疑其病雖愈。而過餌涼藥。恐難受孕。迨戊申夏。已得子矣。吳醞香之僕吳森。在越患感。旋杭日鼻衄。數升。苔黃。大渴。脈滑。而洪。孟英投白虎湯二帖。而安。遽食肥甘。復發壯熱。腕悶昏倦。孟英以枳實。枳殼。湯而瘳。數日後。又昏沈欲寐。發熱自汗。舌絳。溺濇。仍求孟英診之。左尺細數。而右尺洪大。是女勞復也。研詰之。果然。與大劑滋陰清熱藥。吞服鼠矢而愈。王月鋤令媳於廟見時。忽目偏左視。揚手妄言。諸親駭然。詰其

原注：沈君大言
原注：沈君大言

婢。素無此恙。速孟英視之。脈絃滑而微。數苔黃。脘悶。蓋時雖
春。暮天氣酷熱。兼以勞則火升。挾其素有之痰。而使然也。與犀
羚。卮。翹。元。參。丹。參。薄。荷。花。粉。送。礞。石。滾。痰。丸。三。服。而。痰。下。神。清。
改投清養。遂愈。次年即誕子。

一婦患證年餘。藥治罔效。初夏延孟英視之。發熱甚於未申。足
冷。須以火烘。痰嗽苦黃。間有譫語。渴飲無汗。亟令撤去火盆。以
生附子搗貼涌泉穴。且囑恣啖梨蔗。方用人參白虎湯投之。七
帖而年餘之熱盡退。繼與養陰藥而瘳。

單小園巡檢。患右脇痛。醫與溫運藥。病益甚。至於音瘖。不能出
聲。仰臥不能反側。坐起則氣逆如奔。便溺不行。湯飲不進者已
三日矣。孟英診其脈。沈而絛。與旋覆。藉石。薤白。婁仁。連夏。茹。貝
枳。實。紫。苑。加。雪。羹。服。之。一。劑。知。數。劑。愈。

王氏醫案續編 卷三

卷三

五

一婦患帶下。腰疼。足心如烙。不能移步。孟英投大劑甘露飲。而
瘳。

趙子善令愛。患發熱。嘔吐。口渴。便秘。而年甫三齡。不能自言病
苦。孟英視其舌。微絛。而苔色乾黃。因與海蛇鼠矢。竹茹。知母。花
粉。杏。貝。卮。斛。之。藥。二。劑。果。下。未。化。宿。食。色。醬。粘。膩。設。投。俗。尚。溫
燥。消。導。法。必。致。陰。竭。而。亡。繼。往。維。揚。孟。英。臨。別。贈。言。謂。其。體。質

勿宜溫補。次年偶病。果為參朮殞命。惜哉。

許某於醉飽後。腹中脹悶。大解不行。自恃強壯。仍飲酒食肉。二
日後腹痛。猶疑為寒。又飲火酒。兼吸洋烟。併小溲而不通矣。繼
而大渴引飲。飲而即吐。而起居如常也。四朝走懇孟英診之。脈
促。歇。止。滿。舌。黃。苔。極。其。穢。膩。而。體。豐。肉。顛。證。頗。可。危。因。婉。言。告
之。曰。不。過。停。食。耳。且。飲。山。查。神。麴。湯。可。也。午。後。始。覺。指。冷。倦。忘
何。能。坐。輜。出。城。到。家。氣。逆。夜。分。痰。升。比。曉。胸。腹。額。上。俱。脹。裂。而
死。蓋。知。下。之。不。及。故。不。與。藥。也。

何新之亦儒醫也。患感旬日。胡士揚診謂勢欲內陷。舉家皇皇。

王氏醫案續編 卷三

卷三

六

渠表弟沈悅亭。茂才亦工歧黃。而心折於孟英。因拉視之。呃忒
苔膩。便秘。痰多。心下拒按。持其脈。右手洪大。滑數。與小陷胸加
沙參。菖貝。苑薤。茹杏。旋。杷。之。劑。數。帖。而。安。繼。以。甘。涼。二。旬。後。得
大解。而痊。何乃執柯。為王沈聯姻。姪焉。

翁氏婦患目疾。自春徂夏。治不能瘳。漸至腹中痞脹。痛不可當。
食不能下。便秘形消。孟英視之。乃肝鬱痰滯。而誤補以致殆也。
脈絛數。而滑。與金鈴子散。合雪羹煎吞。當歸龍薈丸。暨礞石滾
痰丸。三投即效。服至二十餘日。各恙皆蠲。眠食如舊。

仲夏瘡疹流行。幼科執用套藥。天札實多。有王子能參軍所親

疹為陽邪乃肺
胃溼熱所致初
宜辛涼發散令
其毒出不宜驟
用寒涼恐冰伏
熱邪不能發出
也繼即宜大清
肺胃之藥以解
餘毒從未有溫
散之法至麻黃
尤為禁劑何兒
科之慎慎耶

治疹原以清肺
為第一義

楚人劉某僅一子甫五齡陸某見其瘡點不綻連進檉柳等藥
壯熱無汗面赤靜臥二便不行參軍聞其殆遣孟英視之投犀
羚白虎湯而轉機陸某力沮石膏不可再餌仍進溫散以至氣
喘痰升復加麻黃八分欲圖定喘而喘汗瀕危二便復秘再懇
孟英救之投白虎加西洋參竹葉而愈繼有房氏子亦為陸某
誤用溫散致劇痰喘便秘口渴神昏溲碧肢瘦孟英與大劑白
虎湯加犀角元參竹葉木通調紫雪四帖而始安
李新畬仲郎瘡未齊而痰嗽氣喘苔色白滑小溲不赤或主犀
角地黃湯加紫雪服而不效延孟英診之右脈洪滑而口渴乃
王氏醫案續編 卷三 七

天時酷熱暑邪薄肺挾其素有之痰而阻其治節所以氣機不
行而疹不能達若不能化濁不能赤也溫散大忌涼血亦非與
竹葉石膏湯合葦莖加杏苑旋杷海石投之氣平疹透苔退舌
紅小溲亦赤數日而愈
杭城溫元帥例於五月十六日出巡遣疫有魏氏女者家住橫
河橋之北會過其門將及天曉適有帶髮頭陀由門前趨過警
見之大為驚駭注目視之知為僧也遂亦釋然而次日即不知
饑眩暈便秘醫謂神虛投補數帖反致時欲昏厥更醫作中風
治勢益甚旬日後孟英持其脈絃伏而滑胸腹無脹悶之苦旬

此大初病必係
血虛不足以養
肝因受服溫補
以致積痰燥熱
膠固不開孟英
治法亦是救藥
誤為多愈後必
繼以滋養血液
之藥方收全功
此疹後血為熱
毒所耗不足以

養肝也與前說
大略相同特未
受溫補之累耳

此大實證也非
峻攻不愈

餘不更衣是驚則氣亂挾痰逆升正仲聖所謂諸厥應下者應
下其痰與氣也以旋楮卮連雪羹棟貝金箔竹瀝蔗汁為方并
以鐵器燒紅淬醋令吸其氣二劑厥止旬日而瘳
某媪年六十餘患腰腿串痛聞響聲即兩腿筋掣不可耐日必
二三十次臥榻數載諸藥罔效孟英察脈沈絃苔膩便秘亦廣
服溫補而致病日劇也與雪羹矜棟膽星橋絡竹瀝絲瓜絡吞
礞石滾痰丸及當歸龍薈丸四劑大瀉數十次臭靛異常筋掣
即已乃去二九加卮連羊霍服六劑即健飯而可扶掖以行矣
姚令與令郎瘡後兩腿筋掣臥則更痛幼科作風治而愈劇孟
王氏醫案續編 卷三 八

英以犀角生地木通豆卷葶藶桑枝丹皮卮子絲瓜絡投之而
效
徐良生室年四十餘於酷暑之時患瘡所親沈悅亭連與清解
不能殺其勢為邀孟英視之體厚痰多脈甚滑數揚擲譫妄舌
絳面赤渴飲便瀉乃與大劑白虎加犀角元參銀花花粉貝母
竹黃竹葉竹茹竹瀝送滾痰丸服後大便下如膠漆脈證漸和
數日後去丸藥其勢復劇甚至發厥仍加丸藥乃平如是者三
次險浪始息悅亭復以白金丸滌其膈下留痰續用甘涼濡潤
法充津液而搜餘熱漸以告愈

吳天士醫驗錄
有寒中經絡之
證與此正相對
待可見病證有
寒即有熱不可
執一而論也

沈新子令岳母。陡患昏厥。速孟英視之。病者樓居。酷熱如蒸。因曰。此陰虛肝陽素盛之體。暑邪吸入。包絡亟宜移榻清涼之地。隨以紫雪丹一錢。新汲水調下。可安。而病者自言手足已受縛。綆堅不肯移。家人驚以為祟。聞而束手。孟英督令移之。如法灌藥。果即帖然。

徐氏婦重身而患四肢疼痛。不可屈伸。藥之罔效。或疑為癱瘓。任殿華令其舍專科而質於孟英。診曰。暑熱入於隧絡耳。吾室人曾患此。愈以桑枝竹葉扁豆葉絲瓜絡羚羊豆卷知母黃芩白薇。卮子者。照方服之。果即得愈。

王氏醫案續編 卷三 九

陳氏婦素無病。晚後甚健。乳極多而善飯。六月初形忽遽瘦。猶疑大熱使然。漸至減餐。所親徐麗生囑延孟英視之。脈細數。舌光絳。曰。急勞也。無以藥為。夫乳者血之所化也。乳之多寡。可徵血之盛衰。茲乳溢過中。與草木將枯。精華盡發於外者何異。即今斷乳亦不及矣。其家聞之。尙未深信。即日斷乳服藥。及秋而逝。

吳醞香孝廉令孫兌官。患發熱洞瀉。大渴。溲少。涕淚全無。孟英曰。暑風行於脾胃也。以沙參生薏苡生扁豆銀花石斛滑石甘草竹葉冬瓜皮澄地漿煎服。數日而痊。按此等證。幼科無不作。

驚風治因而天折者多矣。

蔣北甌二尹患瘧。醫與小柴胡平胃散而漸甚。繼以大劑溫補。勢瀕於危。復用桂枝白虎。狂亂如故。所親董蘭初。延孟英視之。曰。暑瘧也。桂枝白虎用於起病之時。則妙矣。今為溫散補燥。諸藥助邪。燥液脈數。無倫汗渴不已。雖宜白虎。豈可監以桂枝。助熱耗津。而自掣其肘耶。因與大劑白虎。加花粉竹葉西洋參元參石斛服之。即安。至十餘帖。瘧始廖。而舌尙無苔。渴猶不止。與甘涼濡潤三十餘劑。始告痊。

孫心言以七十之年。患滯下。胡某知為暑熱。以清麟丸下之。治

王氏醫案續編 卷三 十

頗不認。繼則連投木朴夏葛等藥。漸至咽疼口糜。呃或噤口。諸醫進補。其勢孔亟。伊婿童秋門。延孟英診之。右脈滑數。上溢身熱。面赤溲瀉。無眠。體厚痰多。時欲出汗。在痢疾門中。固為危候。第以脈證參之。豈是陽虛欲脫。實由升散溫燥之劑。燥其陰液。脾胃之氣窒塞而不能下行也。與大劑肅清之藥。一劑知。二劑已。隨以生津藥。既之。痢亦尋愈。按此等痢。古書未載。而治法懸殊。世人但守成法。不知變通。治而不愈。諉之證危。况屬高年病家。亦不之咎也。孰知有此隨時而中之妙法耶。

曹泳之二尹。將赴代理昌化任。而瘧痢並作。寒少熱多。滯下。五

色逆孟英視之而后苦黃乾嘔口渴痛脹赤汗出神疲脈至
洪數不清與大劑芩連滑朴知母花粉銀花石膏連翹竹茹等
藥投七即減三服而起

陳那眉令郎孟秋患感醫與表散溫補病隨藥劇至八月初渠
叔祖陳靄山延孟英視之目瞪神呆氣喘時作舌絳不語便瀉
稀水肢搐而厥人皆以為必死矣察其脈絳而爽數乃陰虧肝
盛之質提表助其升逆溫補滯其樞機痰飲膠輻風陽肆橫禱
神驅祟有何益哉與龍甲龍牡旋藉芩連棟貝菖茹膽星犀羚
等藥息風鎮逆清熱蠲痰數帖而平

王氏醫案續編

卷三

十一

龔念勉室故舍人汪小米之女也患秋感服溫散藥而日重渠
叔母韓宜人請援於孟英瓜見絃數爽滑苔黑肢痠疏方用沙
參元參知母花粉犀羚茹貝芫葛等藥曰亟餌之否將厥矣時
念勉幕於江南族人皆應試入場侍疾者多母黨伊叔少洪疑
藥涼不敢與服迨暮果欲厥矣眾皆皇皇幸彼女兄為故孝廉
金訪叔之室頗具卓識急煎孟英方灌之遂得生機次日復診
脈較和一路清涼漸以向愈
仲秋久雨吳汾伯於鄉試後患恙自言坐於水號浸及於膝人
皆以為寒溼之病孟英切脈甚數澀赤苔黃口乾燥哈因謂其

尊人醞香曰病由暑溼而體極陰虧已從熱化不可以使泄而
稍犯溫燥之藥先與輕清肅解繼用甘涼撤熱漸能安穀半月
後熱始退盡而寢汗不眠投以大劑滋填潛攝之藥兼吞五味
子磁硃丸數十帖乃得康復此證誤治即敗少謬亦必成損苟
非識信於平日焉能誠服於斯時聞其寢汗不收夜不成寐之
別旁言嘖嘖孟英聽其主意必致全功盡棄囑其邀顧聽泉許
甘肅質政而顧許咸是孟英議於是主人之意益堅而大病乃
痊吁談何易耶

張慈齋室自春間半產後發熱有時迄於季秋廣服滋陰之藥

王氏醫案續編

卷三

十二

竟不能愈其大父陳靄山延孟英診脈按之豁然投當歸補血
湯而熱退繼以小建中愈之
俞博泉令郎患感即兼腹痛而脹胡某投以溫散二便不行昏
澀大渴舌苔黑刺孟英以犀翹棟薄芫連花粉元參大黃服之
便下神清為去犀角加丹皮二帖苔化熱退惟少腹梗脹不甚
知饑改投芫連棟蒺延胡橘核菴蓉花粉製軍諸藥連解黑矢
漸以向安正欲養陰之際而惑於旁言另招金某服大劑溫補
藥以圖元氣驟復不知餘燼內燔營受灼而血上溢液被燥而
肌漸消猶謂吐血宜補形瘦為虛竟竭力補死而後已

周同甫患瘧多汗醫恐其脫與救逆湯而勢劇孟英視之曰溼瘧耳溼家多汗無恐也况口渴渴赤溫補勿投與清解藥漸安繼而乃翁秋叔病初服溫補病進更醫知為伏暑與藥數劑熱果漸退偶延孟英診之尺中甚亂因謂其姪赤霞曰令叔之證必不能起吾不能藥也已而果然許守存久患痰嗽孟英主滋水舒肝法以陰虧而兼鬱也業已向愈所親某亦涉獵醫譜滋陰藥不可過服投以溫補已而咳嗽復作漸至咽痛冬初又延診於孟英曰六脈皆數見於水令其不能春乎果驗世人不辨證之陰陽但論藥之涼熱因而債

王氏醫案續編 卷三

三

事者多矣

朱砥齋司李之夫人屢患半產每懷妊服保胎藥卒無效今秋受孕後病嗽孟英視之盡屏溫補純與清肺或詰其故曰胎之不固或由元氣之弱者宜補正或由病氣之侵者宜治病今右寸脈滑大搏指吾治其病正所以保其胎苟不知其所以然而徒以俗尚保胎之藥投之則胎氣愈壅致逆愈甚震動胞系其胎必墮矣朱極欽佩服服之良效次年夏誕子甚茁壯項肖卿家擁厚賁人極好善年甫三十五歲體甚壯偉微感冬溫門下醫者進以薑桂之劑即覺躁擾更醫迎媚徑用大劑溫

通達之論凡病俱宜如此看

補兩帖後發狂莫制又招多醫會診僅以青麟丸數錢服之所親梁楚生宜人聞其危速孟英視之業已決裂不可救藥甚矣服藥之不可不慎也富貴之家可為炯戒邵奕堂室以花甲之年仲冬患喘嗽藥之罔效坐而不能臥者旬日矣仁診於孟英邵述病原云每進參湯則喘稍定雖服補劑仍易出汗慮其欲脫及察脈絃滑右甚孟英曰甚矣望聞問切之難不可胸無權衡也此證當憑脈設治參湯切勿沾唇以括婁薤白旋覆蘇子花粉杏仁蛤殼茯苓青黛海蛇為方而以竹瀝煎汁和服投七即減十餘帖全愈同時有石媪者患此極

王氏醫案續編 卷三

四

相似脈見虛絃細滑孟英於沙參蛤殼旋覆杏仁蘇子貝母桂枝茯苓中重加熟地而瘳所謂病同體異難執成方也許太常滇生之夫人患腿痛而素多噫氣若指頭一搓或眉間一抹其噫即不已向以為虛在都時服補劑竟不能愈冬閒旋里孟英診脈絃滑乃痰阻於絡氣不得宣也以絲瓜絡竹茹旋復橋絡羚羊茯苓豆卷金鈴柿蒂海蛇勃薺藕為方吞當歸龍營丸而安其媳為阮芸臺太傅之女孫在都因喪子悲哀患發厥屢服補劑以致汎愆或疑為娠孟英曰脈雖絃數以滑乃痰挾風陽而為厥也與大劑蠲痰息風舒鬱清營之劑漸以復愈

精選之論由斯類推可以知藥性之功能矣

款人吳永言於十年前讀論語不撤薑食之文因日服之雖盛夏不輟至三年前患大溢血雖以涼藥治瘳而時時火升迄今不愈季冬就診於孟英身不衣綿頭面之汗蓬蓬也且云服苓連則煩渴益甚以苦能化燥也用生地即悶滯不飢以甘能緩中也蔗梨入口亦然按其脈沈取滑數是從前之積熱深伏於內與白虎湯去草米加竹葉竹茹花粉海蛇勃薺銀花綠豆卷服漸吐膠痰而愈繼聞趙秋船進士令郎子循每啖蔗則鼻衄必至或疑蔗為大熱之性孟英曰蔗甘而涼然甘味太重生津之力有餘涼性甚微蕩熱之功不足津虛熱不甚熾者最屬相

王氏醫案續編卷三

五

宜風溫證中救液之良藥吾名之曰天生復脈湯若溼熱痰火內盛者服之則喻氏所謂翻受胃變從而化熱矣凡藥皆當量人之體氣而施豈可拘乎一定之寒熱耶子循之體水虛而火旺者也蔗性不能敵反從其氣而化熱正如蔗經火煉則成糖全失清涼之本氣矣枸杞子亦然
李華甫繼室娠三月而崩孟英按脈絃洪而數與大劑生地銀花茅根柏葉青蒿白薇黃芩續斷鱉皮膠藕節胎髮灰海螵蛸而安奈不能安佚越數日胎墮復崩孟英於前方去後六味加犀角竹茹元參為治或謂胎前宜涼產後則否乃招專科醫蕭

山竹林寺僧治之咸用溫藥且執暴崩宜補服藥數劑虛象日著時時汗出昏暈畏聞人聲嬾言息微不食不眠間有呃忒崩仍不止皆束手待斃矣復邀孟英視之曰此執死書以治活病也夫血因熱而崩胎因崩而墮豈胎墮之後熱即化為寒也參水薑桂棧灰五味之類溫補酸澀既助其熱血益奔流空其氣津亦潛消致現以上諸證脈或不知而苦黃黑燥豈不見乎因與犀角石膏元參知母花粉竹瀝麥冬銀花梔子石斛旋覆青蒿白薇等大劑投之神氣漸清旬日後各恙始平繼去犀角加生地服兩月全愈

王氏醫案續編卷三

七

小引

余承世業幼讀醫書而閱歷三十年愈覺斯道之難精竊謂宋元以來名家夥矣無不立言有所偏倚若薛立齋張會卿趙養葵李士材之派則其尤甚者也 國朝一切著述莫不邁越前古醫林自喻氏崛起之後羣賢迭出於斯為盛然張路玉精於論溫而勞損之陰陽不別徐靈胎通乎古今之變而拘守柴胡以治瘧雖只有所短而瑕不掩瑜彼柯韻伯之辨而好為穿鑿黃坤載陳修園之博而偏於溫燥坐而言則可起而行則礙以吳鞠通之明而混疫於溫致招章虛谷之議更不知霍亂有寒

王氏醫案續編 卷四 小引

一

熱之分則尤陋矣此孟英霍亂論之所由述也余讀其書神交數載幸一葦可杭復蒙寄示回春醫案二卷展繹之餘益信其抱有猷有為有守之才故能鑄古鎔今隨機應變可以坐而言可以起而行不愧為一代之名家今春來越視榜里王姓之證始得把臂快慰平生賞奇析疑別聆妙悟翻恨相見太遲致余聞道之晚也且知尙有仁術志一書乃張趙諸君輯其近案猶未梓行余不敏敢不步塵續采以當執鞭之忻慕乎

王氏醫案續編卷四 原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案

山陰陳 坤載安續輯

丁未春金朗然令堂陡吐狂血肢冷自汗孟英切脈絃澀察血紫黯乃肝鬱凝痰也證雖可愈復發難瘳予丹參丹皮芫蔚旋覆蒼朮柏葉鬱金海蛇之方覆杯果愈然不能懲念踰二年復吐竟不起

張孟臯少府令堂年踰古稀患氣逆殿屎煩躁不寐孟英切脈滑實且便閉面赤舌絳痰多以承氣湯下之霍然踰年以他疾

王氏醫案續編 卷四

一

終

王致青離尹令正患痰喘胡某進補腎納氣及二陳三子諸方證瀕於危顧昇庵參軍令延孟英診之脈沈而澀體冷自汗宛似虛脫之證惟二便不通脘悶苔膩是痰熱為補藥所遏一身之氣機窒痺而不行也與妻蘼旋藉杏貝芫菀兜鈴海蛇竹瀝等以開降覆杯即減再服而安

王滙泊室年踰六旬久患痰嗽食減形消瘦夜不能眠寢汗舌絳廣服補劑病日以增孟英視之曰固虛證之當補者想未分經辨證而團圓顛預翻與證悖是以無功投以熟地從蓉坎板胡

桃百合石英茯苓冬蟲夏草等藥。劑旬日愈。以其左脈絛細而虛。右尺寸皆數。為陰虧氣不潛納之候。及閱前服方。果雜用耆朮以助氣。陳故紙附桂等以厚陰也。宜乎愈補而愈劇矣。

張虎百之室。患感連服溫散。繼邀顧聽泉診之。云有驟變。須延孟英商治。渠不之信。旬日後。倏然昏厥。自寅正至辰初。不甦病者之兄吳次歐。速孟英視之。脈伏而絛滑。與大劑犀羚茹貝知母花粉元參銀花調局方。至寶丹灌下。即安。

趙子循患喉痺。渠叔節樓用大劑生軍下之。而藥不能入。孟英

王氏醫案續編 卷四

二

以錫類散吹之。即開。與白虎法而瘥。

王雪山令媳患心悸眩暈。廣服補劑。初若甚效。繼乃日劇。時時出汗。肢冷息微。氣逆欲脫。灌以參湯。稍有把握。踰半載。大費不貲。莊芝階舍人令延孟英診視。脈沈絛且滑。舌絛而有黃膩之苔。口苦溲熱。汛事仍行。病屬痰熱。轉誤補則氣機壅塞。與大劑清熱滌痰藥。吞當歸龍薈丸服之。漸以向安。仲夏即受孕。次年二月誕一子。惜其娠後停藥。去疾未盡。晚後復患。悸暈不眠。氣短不饑。或作產後血虛。治不效。仍請孟英視之。脈極滑數。曰病根未刈也。與瀉痰清氣法。果應。

此證雖經仲景指出。而人多不識。往往雜藥亂投。卒至肝膽兩死。醫家病家。兩俱茫然。孟英此案。可為仲景之功。臣矣。

吸食鴉片之人。津液素虧。感受溫邪。較平人倍重。非此標本并治之劑。必不效矣。

許子雙令堂梁宜人。仲春之杪。偶患微感。醫與溫散。熱已漸退。孟英偶過診。右寸脈促數。不調。因謂子雙曰。此風溫證。其誤表乎。恐有驟變。渠復質之前醫。以為妄論。仍用溫燥。越二日。即見鮮睡。再延孟英診之。促數尤甚。曰鼻息斯矣。必至語言難出。仲聖豈欺我哉。風溫誤汗。往往皆然。况在高年。殊難救藥。果決旬而逝。

姚某年未三旬。烟癮甚大。適伊母病溫。而歿。勞瘁悲哀之際。吸受溫邪。脇痛筋掣。氣逆痰多。熱壯神昏。莖縮自汗。醫皆束手。所親徐麗生囑其速孟英診之。脈見芤數。舌絛無津。有陰虛陽越。

王氏醫案續編 卷四

三

熱熾液枯之險。况初發。即爾其根蒂之不堅。可知與犀羚元參知母壯水息風。菴菴實鼠矢石英。潛陽鎮逆。沙參麥冬石斛。葳蕤益氣。充津花粉。梔子銀花。絲瓜絡。蠲痰清熱。一劑。知四劑。安隨以大劑養陰而愈。

周光遠無疾而逝。其母夫人年踰七旬。遭此慘痛。漸生咳嗽。氣逆痰鹹。夜多漩瀉。口苦不饑。孟英曰。根蒂虛而兼佛鬱也。與沙參甘草麥冬熟地龜板石斛貝母蛤殼小麥大棗而安。迨夏開。吸暑而患。腹痛滯下。小溲熱澀。其嗽復作。脈仍虛絛。略加奠數。但於前方增滑石吞香連丸。而瘳。因平昔畏藥。既愈。即停。至仲

此因不兼外邪
故加五味牛膝
等藥德固其本
若少兼外邪者
斷不可用

秋嗽又作。惟口不苦而能食。因於前方去沙參。加高麗參。五味。石莖。牛膝。熬膏。類服。而痊。十月下旬。天氣驟冷。陡患吐瀉。腹痛。肢冷。音嘶。急邀孟英。視之。脈微。為寒邪。直中。亟與大劑理中。加吳萸。橘皮。杜仲。故紙。石脂。餘糧。而瘳。其夫人亦因悲鬱。而患崩漏。面黃。腹脹。寢食皆廢。孟英用龜板。海螵蛸。女貞。旱蓮。貝母。柏葉。青蒿。白薇。小麥。茯苓。藕肉。蓮子。心。而康。次年夏。其母夫人患溫邪。痰嗽。院悶。汗多。孟英投石膏。竹茹。知母。花粉。旋覆。貝母。婁仁。紫苑。等藥。三十劑。而愈。聞者無不歎異。

王氏醫案續編 卷四

四

投溫補核。漸增而疼。脹日甚。馴致形消。汎愆。夜熱。減餐。骨痠。於牀。孟英診曰。鬱損情懷。徒補奚益。初以蠲痰開鬱之劑。吞當歸。龍蒼丸。痛脹遞減。熱退。能餐。月事乃行。改投虎潛。加減法。服半年。餘而起。凡前後計用川貝。母。七。八。斤。他藥。稱是。今春。因哭。母悲哀。陡然發厥。與甘麥大棗。加龍牡。龜鼈。磁硃。金箔。龍眼。而安。王小谷。體厚。善飲。偶患。氣逆。多醫。咸從。虛治。漸至。一身。盡腫。醋。有回春。錄所載。康副。轉之。證。因懇。治於。孟英。脈甚。細數。舌。絳。無。津。間有。譫語。乃真。陰欲。假。外候。雖較。輕於。康然。不能。收績。矣。再。四求。疏方。與。西洋。參。元。參。二。地。二。冬。知。母。花。粉。茹。貝。竹。瀝。葱。鬚。

脈至細數則陰
病均忌此脈而
虛勢為尤甚

溫散惟宜於傷
寒何可亂投且
既已見疹則肺
胃之熱已現於
外矣與柴胡湯
有何干涉此醫
直是不通

等藥。三劑。而。腫。全。消。舉。家。忻。幸。孟。英。以。脈。象。依。然。堅。辭。不。肯。承。手。尋。果。不。起。

朱。敦。普。令。愛。患。感。醫。投。溫。散。服。二。劑。遍。身。麻。瘡。汎。事。適。來。醫。進。小。柴。胡。湯。遂。狂。妄。莫。制。乞。援。於。孟。英。脈。至。洪。滑。絃。數。目。赤。苔。黃。大。渴。不。寐。是。瘧。因。溫。邪。而。發。所。以。起。病。至。今。時。時。大。汗。何。必。再。攻。其。表。汎。行。為。熱。迫。於。營。胡。反。以。葶。藶。溫。之。參。朮。升。之。宜。其。燎。原。而。不。可。遏。也。與。大。劑。犀。角。元。參。生。地。石。膏。知。母。花。粉。銀。花。竹。葉。貝。母。白。薇。以。清。衛。涼。營。服。後。即。眠。久。而。未。醒。或。疑。為。昏。沈。也。屢。為。呼。喚。病。者。驚。寤。即。令。家。人。啓。篋。易。服。穿。鞋。梳。髮。告。別。父。母。

王氏醫案續編 卷四

五

云。欲。往。花。神。廟。歸。位。人。莫。能。攔。舉。家。痛。哭。急。迓。孟。英。復。視。脈。象。依。然。囑。其。家。靜。守。勿。哭。仍。以。前。方。加。重。和。以。竹。瀝。童。溲。灌。下。即。安。繼。用。養。陰。清。熱。而。愈。

瞿。穎。山。仲。媳。許。培。之。之。妹。也。患。舌。糜。沈。悅。亭。知。其。素。稟。陰。虧。虛。火。之。上。炎。也。與。清。涼。滋。降。之。法。及。硃。黃。等。數。藥。而。不。愈。乃。兄。延。孟。英。往。視。舌。心。糜。腐。黃。厚。邊。尖。俱。已。無。皮。湯。飲。入。口。痛。不。可。當。此。服。藥。所。不。能。愈。者。令。將。錫。類。散。糝。之。果。即。霍。然。或。疑。喉。藥。治。舌。何。以。敏。捷。如。斯。孟。英。曰。此。散。擅。生。肌。蝕。腐。之。長。不。但。喉。舌。之。相。近。者。可。以。借。用。苟。能。隅。反。未。可。言。醫。貴。用。者。之。善。悟。耳。且。糜。

腐厚賦。不僅陰虛。要須識此。自知其故。

高祿卿室吳濂仲之妹也。孟夏分曉發熱。初疑蒸乳。數日不退。

產科治之。知挾溫邪。進以清解。而大便溇泄。遂改溫燥。其泄不

減。另招張某視之。因謂專科誤用。婁仁所致。與參耆薑朮鹿角

肉果等藥。泄瀉愈甚。連服之。熱壯神昏。汗出不止。勢頻於危。醞

香孝廉徐夫人病者之從母也。心慈似佛。有子十人。皆已出聞

其殆。夤夜命四郎季眉請援於孟英。按脈洪數七至。口渴苔黃。

洞瀉如火。小渡不行。因謂季眉曰。病猶可治。第藥太驚人。未必

敢服。季眉堅欲求方。且云在此監服。乃疏白頭翁湯加石膏犀

角。銀花知母花粉竹葉。扈棟桑葉。與之。次日復診。脈證較減。仍

用前方。而病家羣譁。以為產後最忌寒涼。况洞泄數日。乎。仍招

張某商之。張謂。幸我屢投溫補。在前。否則昨藥下嚙。頃刻亡陽。

復定耆朮之方。業已煎矣。所親張芷舟。孝廉聞之。飛告於醞香

處。汾伯昆季。即馳至病家。幸未入口。奪琰傾之。索孟英方。煎而

督灌。且囑羣季。輪流守視。免致再投別藥。孟英感其情誼。快舒

所長。大劑涼解。服至七帖。瀉全止。熱盡退。乃去白頭翁湯。加生

地。元參。茹貝。服半月。始解。黑色燥矢。而眠食漸安。第府藏之邪。

雖已清滌。而從前溫補。將熱邪壅滯於膜絡之間者。復發。數難

王氏醫案續編卷四

六

方遺古法並不
驚人特讀立書
最宜書者見之
未免吃驚耳
不意所書者手
於最信立書則
公矣

於胸乳之間。孟英令其恪守前法。複入蒲公英。絲瓜絡。橘葉。菊

葉等藥。服至百劑。始告全愈。而天癸亦至。孟英曰。世俗泥於產

後宜溫之謬說。况兼泄瀉。即使溫補而死。病家不怨。醫者無憾

也。或具隻眼。誰其信之。此證苟非汾伯昆仲篤信於平時。而力

排眾論於危難之間。余雖見到不疑。亦惡能有濟耶。余嘗曰。病

不易識。尤不易患。醫不易薦。尤不易任。藥不易用。尤不易服。誠

宇宙間第一難事也。而世人淺視之。可不悲哉。

趙秋船進士。去秋患左半不遂。伊弟笛樓暨高弟許芷卿茂才。

主清熱獨痰治之。未能遽效。邀孟英診之。脈甚遲緩。苔極黃膩。

便秘多言。令於藥中。和入竹瀝一椀。且以龍薈滾痰二九。相間

而投。二九各用斤許。證始向愈。今春出房。眠食已復。而素嗜厚

味。不戒肥甘。孟夏其病陡發。孟英診之。脈形滑駛如蛇。斷其不

起。秋初果歿。

吳濬門年踰花甲。素患脫痛。以為虛寒。輒服溫補。久而益劇。孟

英診曰。肝火宜清。彼不之信。延至仲夏。形已消瘦。倏然浮腫。脇

背刺痛。氣逆不眠。心辣如焚。善嘔。畏熱。大便時瀉。飲食下嚙。即

吐。諸醫束手。乃懇治於孟英。脈絳。而數。與竹茹黃連。枇杷葉。

知母。扈棟。旋藜等藥。而吐止。飲食雖進。各恙未已。投大劑沙參。

王氏醫案續編卷四

七

辨現諸證俱屬
痰熱與乾熱之

脈相合但更則
根抵不堅初方
乃急則治標之
法大方乃顧及
根本亦不易之
次第也

生地龜板龜甲女貞旱蓮桑葉丹皮銀花茅根茹貝知柏枇杷
葉菊花等藥出入為方二三十劑後周身發疥瘡而腫漸消右
耳出粘稠膿水而瀉止此諸經之伏熱得以宣泄也仍以此藥
令其久服迨秋始愈冬閒能出門矣

比邱尼心能體厚踴躍偶患眩悸醫以為虛久服溫補漸至發
腫不饑仲夏延孟英視之脈甚絳滑舌色光絳主清痰熱盡撤
補藥彼不之信仍服八味等方至季夏再屈孟英診之脈數七
至眠食盡廢不可救藥矣果及秋而茶毘

金葉仙大令病其媳割股以進因無效也悲哀欲絕遂發熱胡

王氏醫案續編 卷四

八

某治以傷寒藥而神迷自汗驚惕畏冷改換補藥乃氣逆不進
水穀矣孟英視之七情有傷痰因火迫堵塞空靈之所也與沙
參元參丹參丹皮茯苓麥冬連翹竹茹竹葉蓮心小麥加以川
貝母一兩投之數劑而瘥

李竹虛令郎初秋患感醫開便瀉而止之乃至目赤譫妄舌絳
苔黃漫漶善嘔粒米不能下咽孟英先與犀角石膏竹葉竹茹
枇杷葉茅根知母花粉梔子以清之嘔止神清熱亦漸緩繼以
承氣湯加減三下黑矢黃苔始退即能啜粥以其右關尺遲緩
有力故知有燥矢也續投甘涼調理而痊

朱養之令弟媳初患目赤服藥後漸至滿面紅腫壯熱神昏
者束手孟英切脈洪實滑數舌絳大渴腹微脹以酒洗大黃犀
角元參滑石甘草知母花粉銀花黃芩連翹薄荷菊花丹皮兩
下之徑愈

都城售透土長壽丹極言其功之大能治諸疾而價甚廉人皆
稱之孟英謂勿論其所用何藥執一方以療百病無此治法每
以稟賦不齊證因有別勸人切勿輕嘗况以綠豆湯為引必有
熱毒之品在內不可不慎也繼而張孟舉少府餌之患疽廣粵
亭司馬服之咽爛孟英投多劑甘寒而愈王雪山久患下部畏

王氏醫案續編 卷四

九

冷吞未百丸齒痛目赤諸恙蜂起孟英察脈絳滑與多劑石膏
藥兼以當歸龍薈丸頻服新疾既瘳腿亦漸溫令其常飲柿餅
湯以杜將來之恙伊弟患腹脹而喜服溫補久而不效孟英曰
溼熱也宜清化彼不信因服透土丹初頗應已而血大溢始得
悔悟志此數則以為世之好服奇藥者戒

廣孔愚司馬之大公子仲秋患閉瘧寒少熱多面目甚黃苦膩
大渴腹脹瀉赤仍能納穀且素嗜肥甘不能搏節孟英按其脈
滑實而數與承氣加知母半貝翹連滑石石膏大腹花粉之類
二十餘劑而始愈是膏梁挾暑溼熱之治也

凡陰虛之體血
不足以養肝則
肝陽易奮用大
劑鎮逆養陰開
鬱治法絲絲入
扣宜乎應手輒
效也

變證雖多不
肺胃二經
得其主腦
難愈之證

王瘦石稟屬陰虧卒聞驚嚇之聲而氣逆肢冷自汗息微速孟
英視之身面皆青綠之色脈沈絀而細乃素傷憂慮而風陽陡
動也與牡蠣四兩龍甲二兩蛤殼一兩石莖五錢龍齒小麥辰
砂麥冬茯神貝母竹茹為方一劑知二劑已續以滋養而瘳
陳書伯庶常令弟保和年未冠患失音咽痛孟英與犀羚石膏
元參豆根牛蒡射干等大劑清肅之藥音開而咽糜吹以錫類
散糜愈而疹點滿布左目及耳後皆腫方中加以鮮菊葉二兩
疹愈痰嗽不已仍主前法服三十餘帖而痊此證脈滑且數口
大渴初終未曾誤藥故能愈其庶母同時患喉糜而頭偏左痛

王氏醫案續編 卷四

心悸欲嘔壯熱煩躁脈絀細數孟英曰此兼陰虧風動也初以
犀羚元參菊花丹參梔子桑葉馬勃投之外吹錫類散咽愈熱
退續用二至二冬生地石莖菴菔板茯苓滋陰潛陽而瘳又
其二令妹亦患喉疹風事通行四肢痠痛略難舉動氣塞於咽
孟英診脈絀滑以犀羚旋豬茹貝堯鈴牛蒡射干豆根花粉銀
花海蛇竹瀝絲瓜絡等出入為方兼吹錫類散而瘳
吳爾純八月下旬患滯下腹痛異常伊外祖許仲廉延孟英往
診形瘦脈數而絀口渴音微渴澀乃陰分極虛肝陽熾盛伏暑
為痢治法不但與寒痢迥異即與他人之伏暑成痢者亦當分

此證勝於熱之
暑證也以其
勝故不甚現熱
證最足眩人斷
為暑溼足徵卓
識

別用藥也與白頭翁湯加知母花粉銀花丹皮金鈴延胡沙參
芩連服之次日復視痢減音開而右腹疼痛拒按為加冬瓜子
烏藥鼠矢三劑而消滯下亦愈惟薄暮火升面赤自汗重加介
類潛陽而痊

楊某患感旬日初則便溏醫與溫散瀉止熱不退晝夜靜臥飲
食不進孟英診脈遲緩浮取甚微目眇舌色光紅口不渴溲亦
行胸腹無所苦語懶音低尋即睡去是暑溼內伏而有燥矢在
胃機關為之不利也先與清營通胃藥二劑熱退舌淡而脈證
依然加以酒洗大黃省頭草即下堅黑燥矢甚多而睡減啜粥

王氏醫案續編 卷四

繼以涼潤旬日而痊
陳春湖令郎于莊體素弱季秋患腹痛自汗肢冷息微咸謂元
虛欲脫孟英診之脈雖沈伏難尋而苔色黃膩口乾渴赤當從
證也與連棟棟元胡蘆砂醒頭草等藥而康次年患感復誤
死於補又夏醞泉延孟英視錢姬腹痛欲絕證因見絀滑之脈
與當歸龍薈丸而安
朱湘差令媳患小溲澀痛醫與滲利反發熱頭疼不饑口渴夜
不成眠孟英診之脈細數乃陰虛肝鬱化熱生風津液已燥豈
容再利與白薇梔子金鈴知母花粉紫苑麥冬石斛菊花服之

即愈其姪新泉之室懷娠患痢醫投溫燥止瀉腹痛甚而偏身發黃飲食不思孟英視之暑溼也與芩連銀花茅根桑葉梔棟竹葉茵陳冬瓜皮而愈

吳醞香大令仲媳汎愆而崩之後腕痛發厥自汗肢冷孟英脈之細而絃滑口苦便澀乃素體多痰風陽內鼓雖當崩後病不在血與旋豬粉茹枳貝薤婁蛤殼為方痛乃漸下厥亦止再加金鈴延胡菴菴鼠矢服之而愈迨季冬因卒驚發狂笑罵不避親疎孟英察脈絃滑而數與犀羚元參丹皮丹參卮子菖蒲竹葉龍甲竹瀝吞當歸龍薈丸息風陽以滌痰熱果數劑而安然

王氏醫案續編 卷四

三

平時喜服補藥或有眩暈不知為風痰內動益疑為元氣大虛孟英嘗諫阻之而彼不能從至次年季春因傷感而狂證陡發毀器登高更甚於昔孟英視之苔黑大渴與前方加真珠牛黃服之苦色轉黃絃滑之脈略減而狂莫可制改以石膏硃砂鐵落菖蒲青黛知母膽星龍甲金鈴旋覆元參竹瀝為大劑送礮石滾痰丸四服而平繼而脚氣大發腹痛便秘上衝於心肢冷汗出昏暈欲厥與連棟后茹小麥百合旋貝元胡烏藥雪羹石英鼠矢黃柏藕等藥而安徐氏婦懷妊患痢醫投溫補胸腹痛極昏厥咽糜水飲礙下孟

用藥中用硃砂者宜另研沖服不可同入煎劑

英診之脈洪數舌絳燥亟吹錫類散灌以犀角元參海蛇茹貝卮菀知斛豆根射干銀花棟實諸藥胎下已朽咽腹之疾隨愈繼用甘涼清熱存津調之

許培之令祖母年踰七旬久患淋瀝屢發風斑孟英持其脈絃而滑舌絳口乾每以犀角生地二至芩蒿白薇元參龜板海螺之類息其暴甘露飲增損調其常人皆疑藥過涼孟英曰量體裁衣稟屬陽旺氣血有餘察其脈色治當如是病者乃云十餘年前偶患崩而廣服溫補遂成此恙始知先天陽氣雖充亦由藥釀為病秋杪患寒熱如瘧善怒不眠苦渴易餓不能納食孟

王氏醫案續編 卷四

三

英察脈絃數倍常與清肺蠲痰柔肝充液之法漸以向安今冬有薦吳古年診治者詢知病原作高年脫營論而以血脫益氣裁方初服三四劑飲食驟增舉家忻幸已而血漏甚多眠食欲廢復延孟英視之仍主前議果得漸康王天成牙行一婦年五十餘初患左目赤漸至發熱醫投溫散便泄而厥進以補劑少腹宿痕攻痛勢極危殆丐孟英診之脈甚絃爽舌絳而渴與菴菴核當歸元胡龜板石英蠔蛸茯苓卮棟莫連數服而安踰年以他病卒何新之令愛適湯氏孟冬分娩次日便瀉一次即發熱瘧脈請

有是病則有是藥不拘拘於法後之元虛此明醫之所以異於庸醫也

痰火為患十人常居八九而醫

膏所敷皆治來痰之法十投而十不效今得孟英大開治熱痰之法真可謂獨得精義矣

語昏狂舉家皇皇乃翁邀孟英審之脈絃滑惡露仍行曰此胎前伏暑乘新產血虛痰滯而發也與大劑犀羚元參竹葉知母花粉厄棟銀花投之徧身得赤疹而瘰止神清乃翁隨以清肅調之而愈

胡秋毅令愛年甫笄往歲患眩暈孟英切其脈滑作痰治服一二劑未愈更醫謂虛進以補藥頗效渠信為實然今冬復病徑服補藥半月後眠食皆廢聞聲驚惕寒顛自汗肢冷如冰以為久虛欲脫乞援於孟英脈極細數目赤便秘胸下痞塞如杵力辨其非虛證蓋痰飲為患乍補每若相安具隻眼者始不為病

王氏醫案續編卷四

古

所欺也投以旋精茹貝蛤殼花粉桑厄婁連枳等藥數服即安而暈不能止乃去精薤藜積加元參菊花二至三甲之類服匝月始能起榻

汪氏婦自孟秋患病之後大解溏泄未愈己而懷娠恐其墮也投補不輟延至仲冬兩目赤障滿遮氣逆礙眠腕疼拒按痰嗽不食苦渴無溺屈孟英診之脈甚滑數曰此溫補所釀之疾也失秋開滯下原屬暑溼熱為病既失清解逗留而為溏泄受孕以來業經四月慮其墮而補益峻將肺胃下行之令皆挽以逆升是以胸次堵塞而疼喘嗽不能卧又恐其上喘下泄而脫也

論極透快脫羣庸醫之弊

補之愈力治節盡廢溲閉不饑濁氣壅至清竅兩目之所以蒙障而瞽也與沙參蛤殼枇杷葉冬瓜子海石旋覆蘇子杏仁黃連枳實海蛇黃芩厄子重加貝母服二劑即知饑下榻目能睹物矣

黃履吉患痛吐孟英已為治愈冬仲復發他醫藥之已七日不進穀矣二便秘澀形肉遽消再託孟英診之與旋精茹芥莢連柿蒂棟實延胡等藥一劑知三劑愈

許仲筠患腹痛不饑醫與參朮薑附諸藥疼脹日加水飲不沾沈沈如寐孟英診脈絃細苔色黃膩投以枳樸莢連厄棟香附

王氏醫案續編卷四

五

痰藜延胡等藥二劑便行脈起苔退知饑而愈

畢方來室患痰嗽礙眠醫與補攝而至涕淚全無耳閉不饑二便澀滯乾嗽無痰氣逆自汗孟英切脈右寸沈滑左手細數而絃乃高年陰虧溫邪在肺未經清化率為補藥所錮宜開其痺而通其胃與婁薤紫苑兜鈴杏貝冬瓜子甘桔旋茹之劑而安

賴炳也令堂年近古稀患左半不遂醫與再造丸暨補劑服二旬病如故孟英按脈絃緩而滑賴赤苔黃音微舌寒便澀無痰曰此痰中也伏而未化與犀羚茹貝莢夏花粉知母白薇豆卷

桑枝。絲瓜。絡等藥。服三劑。而苦化音漸清。朗六七劑。臍知痛。痰漸吐。便亦通。既而腿痛難忍。其熱如烙。孟英令塗葱蜜以吸其熱。痛果漸止。半月後。眠食漸安。二旬外。手能握。月餘。可扶液以行矣。

胡季權令郎珍官。右額偶發紫斑一塊。時當季冬。孟英與犀角石膏涼解之藥。二三帖後。始發熱。斑漸透。犀角服二十帖。始撤。素有目疾。餘熱復從目發。令以石膏藥久服。居然漸愈。且能食。肌充略無他患。聞者莫不異之。

趙春山司馬。向患痰嗽。自秋仲以來。屢發寒熱。吳古年從伏暑。

王氏醫案續編 卷四

去

化瘡治。頗為應手。而一旬半月之後。病必復至。延至季冬。董蘭癢。嵯尹。囑其質於孟英。按脈滑數。舌絳苔黃。渴飲。溲赤。動則喘逆。夜不成眠。痰多畏冷。自問不能起矣。孟英曰。無恐也。不過膏梁釀痰。溫補助熱。是為病根。迨夏吸暑邪。互相膠轉。秋半而發。勢頗癩癩。古年雖識其證。惜手段小耳。因與羚羊。羊豆豉。連翹。薄荷。知母。花粉。竹茹。貝母。旋覆。海蛇。元參。卮子。醒頭草。梨汁等藥。服五劑。熱退不畏冷。去前四味。加沙參。麥冬。葶藶。枇杷葉。漸能安寐。各恙遞減。再加生地。服匝月。而體健勝昔。登高不喘。司馬云。余昔曾服參茸大補之藥。而陽痿今服君方。而沈疴頓起。乃

知藥貴對證。不貴補也。

王氏醫案續編卷四終

王氏醫案續編 卷四

七

王氏醫案續編卷五 原名七術志

杭州王士雄孟英醫案

武進董介毅蘭初續輯

戊申元旦陳秋槎參軍大便驟下黑血數升繼即大吐鮮紅之血而汗出神昏肢冷搐搦躁亂妄言速孟英至舉家跪泣救命察其脈左手如無右絃更按之數以六十八歲之年愈慮其脫參湯煎就將欲灌之孟英急止勿服曰高年陰分久虧肝血大去而風陽陡動始由忿怒兼服熱藥所致耶其夫人云日來頗有鬱怒熱藥則未服也惟冬閒久服薑棗湯且飲都中藥燒酒

王氏醫案續編卷五

一

一餅耳孟英曰是矣以西洋參犀角生地銀花綠豆卮子元參茯苓羚羊根為劑衝入熟童溲灌之外以燒鐵淬醋令吸其氣龍牡研粉撲汗生附子搗貼涌泉穴引納浮陽兩服血止左脈漸起又加以龜板龍甲服三帖神氣始清各恙漸息稍能啜粥乃去犀羚羊加麥冬天冬女貞早蓮投之眠食日安半月後始解黑燥矢兩旬外便瀉之色皆正與滋補藥調痊仍充撫轅巡捕屢錄如常秋間赴任紹興西秋以他疾終姚令與室素患喘嗽而病春溫醫知其本元久虧投以溫補瘧厥神昏耳聾語面青舌絳痰喘不眠皆束手矣延孟英診之

脈猶絃滑曰證雖危險生機未絕遽爾輕棄母乃太忍與犀角

羚羊元參沙參知母花粉石膏以清熱息風救陰生液佐茯苓

石英龍甲金鈴旋覆貝母竹瀝以潛陽鎮逆通絡蠲痰三劑而

平繼去犀羚羊石膏加生地黃服旬日而愈仲秋令與病竟誤服

溫補數日而殞豈非命耶

運糧千總馬香谷患瀉秘欲死所親趙春山司馬延孟英視之

脈堅體厚口渴苔黃投知藥后棟犀苑婁茹之藥送當歸龍蒼

丸而瘳竟不復發

謝某患嗽臥難偏左孟英切其脈右寸奕滑曰此肺虛而痰貯

王氏醫案續編卷五

二

於絡以葦莖絲瓜絡生蛤粉貝母冬瓜子茯苓葶杷葉燕

窩梨肉投之果愈

許叔超令大母患瘧延孟英治之脈絃滑而數腕悶便秘合目

汗出口渴不饑或慮高年欲脫孟英曰此溫邪挾素盛之痰所

化補藥斷不可投與知芩麥杏麴貝旋茹連劑雪羹為方服果

漸效

蒲艾田年踰花甲陡患鼻衄諸法不能止速孟英救之面色黑

黯而有紅光脈絃洪而扎詢知冬閒廣服助陽藥是熱亢陰虛

之證與大劑犀角元參茅根女貞早蓮石斛茯苓澤瀉天冬知

母投匕而安續予滋陰藥填補而康

許少卿室故醫陳啓東先生之從女也夏初患感何新之十進
清解病不略減因邀診于孟英脈至絳洪豁大左手爲尤大渴
大汗能食妄言面赤足冷徹夜不瞑孟英曰證雖屬溫而真陰
素虧久傷思慮心陽外越內風鴟張幸遇明手未投溫散尙可
無恐與龍牡犀珠龜板鼈甲貝母竹瀝竹葉辰砂小麥元參丹
參生地麥冬爲大劑投之外以燒鐵淬醋令吸其氣蠟粉撲止
其汗搗生附子貼於涌泉穴甫服一劑所親薦胡某往視大斥
王議爲非而主透疹之法病家惑之卽煎胡藥進焉病者神氣

王氏醫案續編 卷五

三

昏瞶忽見世父啓東扼其喉使藥不能下噎且囑云宜服王先
生藥少卿聞之大駭專服王藥漸以向愈而陰不易復煩灌甘
柔滋鎮月餘始能起榻季夏汎行惟情志不怡易生驚恐與麥
參熟地石英茯神龍眼甘麥大棗三甲等藥善其後秋杪歸寧
微吸客邪寒熱如瘧孟英投以清解已得向安胡某聞之復於
所親處云此證實由夏開治法不善以致邪氣留戀再服清涼
必死無疑湯某復從而和之許氏卽招湯某診治謂其陽氣傷
殘沈寒久伏以理中湯加威靈仙桂枝半夏厚樸薑棗等藥病
者頗疑藥太燥烈湯復膏舐舌說得天花亂墜病家惑之初

服清解藥數劑
氣留滯豈厚道
補藥邪氣反不
留戀耶此等入
而亦自命爲醫
豈非怪物

涼藥未輕而愈
見如此之證卽
不投脈亦可知
爲新感溫邪矣

服胃氣倍加繼而痰嗽不饑黃苔滿布肌消汎斷內熱汗多心
悸不眠臥榻不起病者堅卻其藥然已進二十劑矣再邀何新
之商之亦難措手仍囑其求診於孟英按脈絳細爽數兼患懸
灘縱有神丹不可救藥矣
周鶴亭令郎年甫五齡痘後月餘清涼藥尙未輕忽發壯熱幼
科治之勢益張肢痠面赤嘔吐苔黃渴而溺清時或昏厥證交
六日其外祖何新之邀孟英診之脈甚絳洪滑數心下拒按便
閉汗多投小陷胸加石膏知母花粉竹葉枇杷葉貝母雪羹二
劑各恙皆減洩赤便行繼與清養而安

王氏醫案續編 卷五

四

費伯元分司患煩躁不眠醫見其苔白也投以溫藥因而狂妄
痰癡多方不應余薦孟英視之左脈絳細而數右爽滑乃陰虛
之體心火熾肝風動而痰盛於中也先以犀羚桑菊息其風元
參丹皮蓮心童溲清其火茹貝雪羹化其痰兩劑而安隨與三
甲二至磁硃潛其陽甘麥大棗緩其急地黃麥冬養其陰漸次
康復
何播階令正素患肝厥仲夏患感沈樾亭按溫證法治之內風
不至陡動而大便泄瀉脈細而絳渴飲痰多不饑不寐因邀孟
英商之投白頭翁湯加三甲石斛茯苓竹茹而安隨以峻補善

後而痊

許氏婦患間癘寒少熱多不饑大渴善嘔無汗脈滑而絛孟英投白虎湯加花粉柴胡而愈

吳醜香大令四令媳時患腹脹減餐牙宣骯痛久治不效肌肉漸消孟英診脈絛細而數肝氣雖滯而陰虛營熱豈辛通溫運之可投耶以烏梅黃連棟芍梔子木瓜首烏鼈甲茹貝服之果愈繼與甘潤滋填肌充胃旺汎準脈和積戔沈疴宛然若失顧雲蘿令正久患脚氣屢治屢發馴致周身筋掣上及於顛蹶痛指麻腰痠目眩口乾食少夜不能眠孟英察其脈芤而絛數

王氏醫案續編

卷五

五

真陰大虧發雖痛從無赤腫之形脚氣藥豈徒無益而已與二地二冬二至知葉桑菊厄棟蒿薇龜版鼈甲藕等藥服之各恙漸減蓋因平素帶下太甚陰液漏泄而筋骨失其濡養也故治病須澄源以流流秋閒以海螺蛸粉魚鱉黃藥阿膠為丸服之全愈石北涯令正久患眼疼漸至身面浮腫或以為虛或以為溼病日以劇氣逆不饑孟英察脈左洪數右絛滑陰分雖虛先當清其肺胃之痰熱者投白虎加沙參花粉冬瓜皮枇杷葉厄子竹茹蘆根服之腫即消繼佐滋陰眼疼亦止

肝主疎泄腎主閉藏兩尺浮而不沈是腎失其閉藏之職矣左寸關是肝木太過獨行其疎泄之權矣填補野陰即以酒養肝木加黃柏之苦以堅之螺蛸之澀以固之用藥如法故收效倍捷

金曉香令媳半產後營分不攝淋漓數日治之弗廖孟英於季夏診視兩尺皆浮左寸關絛與三甲二至二地蒿薇柏葉螺蛸黃藥為方服之漸愈仲秋診其脈即斷受孕渠謂懷娠必無病矣而不知病久初痊正須培養雖即受孕涵蓄無權果至仲冬而胎墮矣

德清蔡初泉陡發寒熱咽痛大渴脘悶舌絛孟英診脈甚數徑投大劑犀羚元參丹皮桑厄銀花花粉翹芎之藥服後徧身發赤疹而熱退知饑矣

歙人吳茂林患右頰腫痛頰下結核牙關僅能呷稀糜外科稱

王氏醫案續編

卷五

六

名不一治若罔知孟英投以天麻殭蠶羚羊石膏醒頭草升麻當歸秦朮花粉黃芩等藥漸愈吳誦青室年近五旬天癸已絕偶患腹脹局醫黃某知其體素羸也投以腎氣湯而寒熱漸作改從建中法旬日後病劇而崩愈補愈甚乞援於孟英脈洪而數渴飲苦黃是吸受暑邪得溫補而血下漏也與犀角元參茅根柏葉厄棟知解花粉白薇等藥數劑始安續加生地二至二冬滋養而愈次年患病仍為誤藥而殞阮範書明府令正患腹痛欲厥醫見其體甚弱也與鎮逆通補

之法而勢日甚。孟英察脈。粒數左溢。是因忿怒而肝陽勃升也。便閉不饑。口苦而渴。與雪羹。梔。旋。絳。元。胡。丹。皮。茹。貝。下。左。金。丸。而。愈。踰。年。以。他。疾。歿。于。任。所。

海鹽周子。因工於書。體素弱。偶患間瘧。黃某用首烏。鼈甲。薑。棗。等藥。病日甚。加以參。桂。狂。躁。妄。言。始。延。孟。英。視。之。面。赤。舌。絳。溲。瀦。便。溇。渴。飲。汗。多。脈。形。細。數。是。暑。證。也。與。元。參。銀。花。知。苳。茹。貝。竹。葉。荷。桿。蓮。心。西。瓜。衣。為。劑。尋。愈。

吳薇客太史。令堂患痰嗽喘逆。便閉不眠。微熱不饑。口乾畏熱。年踰六旬。多藥勿痊。孟英切其脈。右寸關絃滑而浮。左關尺細。

王氏醫案續編 卷五

七

奕無神。是陰虛於下。痰實於上。微兼客熱也。攻補皆難。偏任與。茹。貝。旋。斛。浮。石。蘆。根。冬。瓜。子。枇。杷。葉。杏。仁。花。粉。為。劑。而。以。熟。地。泡。湯。煎。服。則。濁。藥。輕。投。清。上。滋。下。是。一。舉。兩。全。之。策。也。投。七。果。應。再。服。而。大。便。行。漸。次。調。養。獲。瘳。戎。春。患。感。證。比。孟。英。自。江。西。歸。已。不。能。治。矣。

謝譜香素屬陰。虧情志抑鬱。因遠行持重。而患欬逆。左脇刺痛。寸步難移。香不知饑。臥難著枕。延孟英診之。脈象絃細。與數。苔。膩。痰。粘。便。艱。溲。少。乃。腎。氣。不。納。肝。氣。不。舒。肺。氣。不。清。胃。氣。不。降。投。以。沙。參。枇。杷。葉。茹。貝。旋。斛。龜。板。髓。甲。絲。瓜。絡。冬。瓜。子。青。鉛。白。

前金鈴藕肉。而以熟地湯煎服。數劑而平。繼漸滋填。向愈。葉承恩室。懷妊患感。昏譫不眠。善嘔便閉。汗出不解。脈滑口乾。乃營陰素虧。邪熱內熾。以元參石膏。知苳茹。貝。銀。花。枇。杷。葉。薇。梔。斛。投。數。帖。而。愈。

江夢花如君。患兩目腫痛。不能略張。醫投風藥。昏瘳欲厥。洩孟英診之。脈至洪滑。大渴便秘。與白虎湯。二劑霍然。

潘馥堂令愛。患感沈沈。治之漸愈。惟咽阻無形。水穀礙下。孟英以竹葉石膏湯。加紫苑白前。旋覆。枇。杷。葉。以清肺熱而降肺氣。果即帖然。

王氏醫案續編 卷五

八

吳西瀝患瘧。寒微熱甚。旬餘不愈。孟英診之。脈滑而長。疏大劑。白虎湯。與之。渠兄濂仲云。沈顧二君。皆主是方。屢服無效。孟英索方閱之。湯雖白虎。而石膏既少。且煨。兼。不。去。米。因。謂。其。兄。曰。湯。雖。同。君。藥。已。重。用。而。去。米。加。花。粉。竹。茹。等。其。力。不。同。科。矣。濂仲大悟。服之。尋愈。此可以見服藥不可徒有湯頭之名也。曹稼梅令愛。患眩暈。腕痛。筋掣。吐酸。渴飲不饑。咽中如有炙。朱某與溫胃藥。病日劇。孟英診脈。絃滑。投茹。貝。黃。連。旋。藟。梔。棟。枳。殼。雪。羹。之。藥。十。餘。劑。始。愈。

夏氏婦。懷娠患感。醫投溫散。漸至氣衝。不寐。時欲痊厥。腕悶。呻。

此證即葉氏所謂下竭上結之候也葉氏雖有方藥亦未知果能取效否不知古名家遇此當作何治法方書中迄無論及者孟英此案已見同人不敢開之口至其悉當病情與否則殊未敢輕論也

吟渴難受飲所親張養之延孟英診之脈滑數而溢與小陷胸加旋薤石膏知梔茹杏腹皮蘇子竹瀝海蛇大劑投旬日而愈設用輕淺之方焉克有濟耶

沈悅亭令正齒齟五日不止去血已多諸方不應孟英脈之絃滑上溢投犀角澤蘭元參旋覆生地花粉茯苓牛膝桃仁澤瀉而安既而詢其經事本月果已愆期蓋即逆行之候也繼用滋陰清熱乃漸康復

王雪山于上年誤餌透土丹之時孟英診治向愈即囑其常飲柿餅湯以杜關格於將來迨今四月閒形體日瘦張某進以導

王氏醫案續編卷五

九

溼疏風補氣之藥孟英偶見之力勸其溫補莫投且以凡物遇火則乾痛得滋則肥潤為譬雪山深達之奈為張某輩朝夕虛言所眩仍服補劑延至秋閒始延孟英視之腸痛畏風周身絡脈時欲敲朴食少便難日晡微有寒熱脈來絃澀而數右寸關絃爽以滑是升降之令久窒痰邪襲於隧絡關格之勢將成再四求治與沙參茹貝後蒿旋斛厄棟蘭草枇杷葉絲瓜絡冬瓜子蘆根茅根等出入為方服之寒熱既蠲腸痛亦減雪山大喜復請診之脈頗轉和第肝陰久為謀慮所傷最怕情志不怡必生枝節小愈奚足為恃囑其另邀明眼圖之渠即招沈辛甫顧

總泉吳卯君任心柏諸君商之方案皆與孟英相合雪山轉懇孟英設法且云讀君之案洞徹病情微幸成全足感再生之德即使無效我亦瞑目而亡孟英感其言殫竭心力以圖久延無如嗔怒繁思諸多根觸頻有轉關屢生枝節大便必極搥背尻而始解上則吐痰惡穀果成關格之候肩至伊子旋杭惑於譏言翻以竹茹竹瀝為藥性太涼而以不用溫補為誘求亂方徑以麻黃細辛鹿角等藥投之遂至舌色乾紫津涸而亡不知者未免以成敗論所謂道高誘多然柿餅湯投于年餘未病之前其卓見已不可及而見危受命勉力圖維腸熱心孤更可欽也

王氏醫案續編卷五

十

特采其案以為世之有識者鑒焉徐夢香年近六旬患手顫不能握管孟英以通補息風藥吞指迷茯苓丸而安仲秋類中遺溺痰升昏瞶妄言汗多面赤急延孟英視之脈浮絃洪滑蓋吸受熱邪而連日適服參湯也與羚羊角石菖蒲連翹厄子桑葉菊花棟斛知母花粉竹瀝銀花蒿穢等藥一劑知二劑神清乃去羚羊加茹貝滑石投之下列赤白如膿垢者數日始知饑納穀漸以調理而愈匝月即能作畫季秋仍慕遊江右張月波令弟陡患腹痛適飽啖羊肉麵條之後醫皆以為食滯

施春元
一清此照
福 黃 大 黃 連
卷五 之 屬 焉

連進消導。痛甚而渴。得飲大吐。二便不行。又疑寒結。叠投燥熱。其病益加。呻吟欲絕。已四日矣。孟英視之。脈絃數。苔乾微黃。按腹不堅。以海蛇一斤。鳧此一斤。煎湯頻灌。果不吐。令將餘湯煎。卮連棟斛。茹苳杷葉。知母延胡。柿蒂旋覆。為劑。吞龍薈丸。投七而溲。行痛減。次日更衣而愈。

黃鼎如令堂年七十七歲。季秋患間癘。每發加劇。寒甚微而熱必昏。瘧舌不能伸。三發之後。人皆危之。孟英視之。額赤目垂。鼻冷額頰微汗。苔色黃膩。舌根純紅。口渴痰多。不思粥飲。脈至絃數。重按少神。證屬伏暑挾痰。而陰虛陽越。先與菴蓉龍甲棟斛。

王氏醫案續編 卷五

茹貝燕窩藕兩劑。而額紅頰汗皆蠲。繼佐參瀝薤麥杷杷葉。旋覆去竹茹。菴蓉投三帖。而昏瘧不作。又去薤棟。加生地花粉。服五日。而瘧休。飲食漸加。居然告愈。方瘧勢披猖之際。鼎如上水。兩昆仲頗以為憂。延諸名家議治。有主人參白虎湯者。有用犀角地黃湯者。有欲大劑溫補者。有執小柴胡加減者。賴孟英力排眾論。病家始有把握。與孟英意見相合者。何君新之也。慈惠恭贊與有功焉。許芷卿患外寒。須覆重衾。內熱飲不解。渴仍能安。穀便溺皆行。或以為虛寒。或以為瀉患。投以溫散。即顯咽疼。孟英脈之。沈絃。

而緩作痰熱內伏。投以犀羚元參丹皮白薇黑卮茹貝旋芎之劑。兩帖而寒渴咽疼皆減。乃去犀羚牛蒡。加一至知母花粉銀花解嚙矢而瘳。

韓組林年近古稀。孟冬患肢厥頭腫。識語遺溺。包某作虛風類。進以溫補。勢益劇。孟英脈之。脈絃數。右滑溢。乃痰熱內阻。風溫外侵。與羚貝茹卮翹薇桑菊丹皮花粉旋覆。以蘆薈湯煎服而瘳。

錢聞遠仲郎患感湯。某進桂枝薑柴等藥。而痰血頻咯。神昏耳聾。譫語便溏。不饑大渴。苔黑溲少。徹夜無眠。范應樞顧聽泉登。

王氏醫案續編 卷五

進輕清黑苔漸退。舌絳無津。外證依然。不能措手。孟英診之。脈皆細數。乃真陰素虧。營液受燥。不必以便溲不食。而畏滋風也。投以西洋參生地二至二冬龜板燕窩茹貝銀花藕汁梨汁。葶百合等藥。二劑咯血漸止。痰出甚多。漸進稀糜。夜能稍寐。五劑熱退。瀉止。渴始減。脈漸和。旬日後解燥矢而痊。朱湘槎令即留耕。忽于飽食後大吐。而厥冷。汗息微。急延孟英視之。脈甫回。而腹痛異常。口極苦。渴二便不行。脈來絃緩。乃痰滯而熱伏。厥陰肝氣無從疎泄也。投雪羹卮棟元胡菴蓉。連橘核旋覆竹茹煎汁之藥。一劑痛減。再服便行而愈。

韓嫗年近花甲。患三瘧于仲冬。朱某主溫散。併以薑棗湯恣飲。旬日後。粒米不沾。瘧至大吐。黃某以熱補進。勢益甚。又決旬。孟英視之。胸中痞結如杵。苔黃苦渴。溲如熱湯。脈絃滑。右甚帶下。如注。投小陷胸。合溫膽。加薤白。服後大吐膠痰。十餘日。胸痞始消。改投甘涼。瘧亦漸罷。遺參滋陰。遂以霍然。

魏西林令姪女。晚後惡露延至兩月。繼聞乃翁條珊主政。及兩弟卒于京。悲哀不釋。而為乾嗽吐血。頭痛偏左。不飢不食。不眠不便。渴飲而溲必閉。日一行久治不效。孟英切脈。虛絃豁大。與甘麥大棗加熟地首烏龍甲二至菊花旋覆芍藥貝母麻仁青

王氏醫案續編 卷五

七

鹽等藥服後。脈漸斂。血亦止。七八劑。頭疼始息。旬日後便行安。穀踰年接。極悲慟。血復溢。誤投溫補而亡。

韓石甫大令。正患感發。疹沈悅亭治以清解。熱漸退而神氣不爽。舌黑難伸。太息便秘。胸次拒按。脈絃緩而滑。投涼隔散。加知母花粉枳實竹茹一帖。而苔即退。黃再服而黑矢下。神氣清。即以向愈。

陳赤堂令正。患感而赤不眠。煩躁譫語。口甘渴。膩溲瀉而疼。顧聽泉多劑清解未應。孟英切其脈。左絃洪而數。右滑而溢。胸次痞結。大解未行。肝陽上浮。肺氣不降。痰熱阻痺。邪乃逗留。與小

陷胸合溫膽。雪羹加旋覆。投之胸結漸開。乃去半越。而送當歸龍薈丸。譫語止。且能眠。參以通幽湯。下其黑矢。三次後始進養陰和胃而痊。

翁嘉順令正。晚後陰戶墜下一物。形色如肺。多方療之不收。第三日始求治于孟英。令以澤蘭葉二兩煎濃湯。薰而溫洗。隨以

海蝶蛸五倍子等分。研細粉。糝之。果即收。上繼而惡露不行。白帶時下。乳汁全無。兩腋作痛。又求方以通之。孟英曰。此血虛也。

乳與惡露難無。其腹必不脹。前證亦屬大虛。合而論之。毋庸診視。因與黃耆當歸甘草生地杜仲大棗糯米脂麻藕濃煎羊肉

王氏醫案續編 卷五

七

湯。煮藥服後。乳汁漸充。久服乃健。

屠某患夢遺久治不愈。耳出膿水。目淚難開。肩脇胸背痰疼。微有寒熱。食減神疲。孟英察脈左絃數。右虛。與以三才封髓加龍

牡黃耆桑丹芎藭旬日而瘳。

李華甫令正。患頭震。孟英脈之絃滑。乃肝經鬱怒。火升也。投當歸龍薈丸。而瘳。然不能懲念。其病屢發。之後更兼溺悶。腹脹喘

汗欲絕。亟邀孟英視之。脈甚絃澀。口苦苔黃。舌色紫黯。汎雖不愆。內有痰滯也。以雪羹加金鈴旋覆芎藭滑石桃仁芫蔚車前子木通。仍吞龍薈丸。外以田麻大蒜車前草搗貼臍下。服後果

先下黑血。洩即隨通。繼而更衣。糞色亦黑。遂愈。

王氏醫案卷五 原名仁術志

王氏醫案續編 卷五

五

王氏醫案續編卷六 原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案 同郡凌 霄九峰續輯

已酉春胡孟神山長患疑。坐臥不安。如畏人捕。自知為痰。餌白
金丸吐之。汗出頭面神躁。妄聞孟英切其脈。絃滑洪數。不為指
撓。投石膏竹茹枳實黃連旋覆花粉膽星石菖蒲加雪蘘竹瀝
童洩吞礞石滾痰丸。下其痰。火連得大解。夜分較安。惟不能斷
酒。為加綠豆銀花枳椇子吞當歸龍蒼丸。旬餘脈證漸平。神氣

王氏醫案續編 卷六

亦靜。尚多疑懼。改投犀角元參丹參丹皮竹葉竹茹貝母百合
蓮心豬膽汁炒棗仁鹽水炒黃連吞枕中丹。以清包絡肝膽之
有餘。而調神志。又旬日各恙皆蠲。即能拈韻。繼與十味溫膽法
善其後。乃弟季權同時患黑斑苔穢。脈氣粗面垢。孟英即以
涼膈散投之。大解得行。腕亦不悶。斑皆透綻。脈顯滑數。而洪遂
與大劑涼潤清肅之藥。直俟其旬日外大解不瀉。藥始緩投。復
又沉臥不醒。人皆疑之。孟英曰。痰熱尚熾也。仍投大劑數帖。果
頻吐膠痰。累日而眠食漸安。是役也。當兩病披猖之際。舉家皇
皇。他醫或以前證為神不守舍。議投溫補。後證則以為必敗。聞

者無不危之賴季權之夫人獨具卓識任賢不貳孟英始無掣肘之慮而咸得收功也

屠敬思體氣素弱去冬因子殤于痘醫與舒鬱填陰病日以劇愈云不治乃延孟英診之兩關甚數寸上洪滑嗽逆痰多臥不著枕溺赤便難極其畏冷是冬溫未罷誤補熱鬱之候世間之死于勞損者何嘗盡是虛證每為補藥債事投以廓清肺胃之藥周身發疥各恙漸安蘊伏既清始投滋養善後不僅病愈次年春更得一子

王氏醫案續編卷六

非春溫也邀孟英質之診脈遲澀二便皆行筋掣不眠畏寒能食喉舌皆赤與大劑清營藥數服而瘥迨夏兩股患疥外科治之久而不愈孟英謂其平昔善飲蘊熱深沉瘍科藥亟宜概屏令以雪羹湯送當歸龍薈丸果得漸瘳秋閒其太夫人患感連服溫散轉為肢厥便秘面赤冷汗脈來一息一歇舉家惶惶慮即脫變孟英視其苦黃脈不渴按其胸悶而不舒且聞其嗅諸食物無不極臭斷為暑濕內伏挾痰阻肺肺主一身之氣氣壅不行法宜開降是虛脫之反面也設投補藥則內閉而外脫味者猶以為投補遲疑而不及救孰知真實類虛不必以老年懷

亦下虛而誤補其上者應補之難補不如法尙且致害况不應補而補者乎

成見總須以對證為良藥果一劑而脈至不歇轉為絃滑再服汗止肢和便行進粥數帖而痊方用紫苑白前竹茹枳實旋貝杏粳兜鈴枇杷葉也

沈辛甫善軒岐之學其令正體素弱而勤于操作年踰四秩凡事過多兼以便澆冷汗氣逆參耆屢進病日以危孟英診曰心脾之脈尚有根猶可望也與龍骨牡蠣龜板鼈甲海螵蛸石英石脂餘糧熟地茯苓為方一劑轉機漸以向愈

陳舜廷患瘧久不愈其體素虧醫皆束手孟英視之舌絳無津微寒洩赤原屬春溫化瘧體與病皆不是小柴胡之例過投溫

王氏醫案續編卷六

散熱熾陰傷與竹葉石膏湯撤熱存津而愈
謝再華室素患肝厥孟英于癸卯歲授藥一劑六載安然今夏偶患齒齟繼漸鼻腐頭疼汎阻徹夜無眠蓋秦某作格陽證治進以腎氣湯數服而致劇也孟英與大劑神犀湯加知藥旬日而瘳
胡韻梅年已踰冠因夜坐感寒患頭疼惡冷嘔吐肢冷孟英視之曰舌絳脈數斑疹之候斷非受寒也幸胡平昔欽信遂與清透藥服之次日點形圓綻細詢果未出痘但火勢甚熾恐其感于俗論囑請專科王蔚文會診所見略同一路清涼自起發至

此大實之證故治宜如此子見一小兒出痘自

始至終不
輟於口稍停其
藥即懈然不振
正與此案相對
待可見用藥用
熱皆宜隨證變
通未可執一而
論也

宜降而反升之

宜其病之增劇

落痲毫不雜一味溫升攻托之藥而滿身密布形色粗紫漿濃
痲黑便閉不飢渴無一息之停苟不如是用藥其能免乎此建
中瑣言之所以有功于世也

朱養心後人名大鏞者新婚後神呆目瞪言語失倫或疑其體
弱神怯與鎮補安神諸藥馴致善飢善怒罵詈如狂其族兄已
生邀孟英診之右脈洪滑與犀角石膏葛蒲胆星竹瀝知母吞
礞石滾痰丸而愈其大父患四肢冷顫常服溫補延久不痊孟
英切其脈絃而緩曰非虛也與通絡方吞指迷茯苓丸而瘥
許安卿患咽痛瘍科黃秀元連與升散之藥延及齧腫牙關不

王氏醫案續編 卷六

四

開舌不出齒自汗脈澀絕穀瀕危其族兄辛泉逆孟英往勘即
洗去滿頸敷藥而以菊葉搗塗吹以錫類散煎犀羚元參射干
馬勃厄貝山豆根等藥灌之數日而痊
莊芝階舍人三令媳患搐搦間日而作孟英診脈絃數泛泛欲
嘔口苦不飢凍寒頭痛汛事愆期洩熱如火乃厥陰暑瘧也投
以大劑犀羚元參厄菊木通知棟花粉銀花之藥數日而愈
仲夏滯雨匝月泛濫為災季夏酷暑如焚人多熱病有沈小園
者患病于越醫者但知濕甚而不知化熱投以平胃散數帖壯
熱昏狂證極危殆返杭日渠居停吳仲莊挽孟英視之脈滑實

而數大渴溲赤稀水旁流與石膏大黃數下之而愈仲莊欲施
藥濟人託孟英定一善法孟英曰余不敢師心自用攷古惟葉
天士甘露消毒丹神犀丹二方為濕溫暑疫最妥之藥一治氣
分一治營分規模已具即有兼證尚可通融司天在泉不必拘
泥今歲奇荒明年恐有奇疫但甘露二字人必疑為大寒之藥
消毒二字世人或誤作外證之方因易其名曰普濟解毒丹吳
君與諸好善之家依方合送救活不知若干人也
附普濟解毒丹 雍正癸丑葉天士先生定

飛滑石 十五兩 綿茵陳 十一兩 淡黃芩 十兩 石菖蒲 六兩 川貝母 五兩

王氏醫案續編 卷六

五

木通 五兩 藿香 射干 連翹 薄荷 白豆蔻 各四兩
右藥曬燥生研細末見火則藥盡熱每服三錢開水調服日二次
或以神翅糊丸如彈子大開水化服亦可
孟英自註云此治濕溫時疫之主方也按六元正紀五運
分步每年春分後十三日交二運徵火旺天乃漸溫芒種
後十日交三運官土旺地乃漸濕溫蒸騰更加烈日之
暑燥石流金人在氣交之中口鼻吸受其氣而不去乃
成溫熱暑疫之病則為發熱倦怠胸悶腹脹肢痠咽腫斑
疹身黃頭腫口渴溲赤便秘吐瀉瘧痢淋濁瘡癤等證但

看病人舌苔淡白或厚膩或乾黃者是暑濕熱疫之邪尙在氣分悉以此丹治之立效而薄滋味家慈每于夏季茹者當知之吾見疫癘流行之歲無論貧富無可避之總由不知堅壁清野之故耳試看茹素者獨可不染豈非胃中清虛邪不能留乎旨哉斯言特謹識之

遠酒色尤為辟疫之仙方智者識之醫家臨證能準此化裁自可十全為上右參喻嘉言張石頑葉天士沈堯封諸家

附神犀丹

犀角尖磨石菖蒲 黃芩各六兩直生地冷水洗淨浸透搗

銀花各一斤如有鮮者搗汁用尤良 連翹各十兩 板藍根九兩無則以飛淨青黛代

王氏醫案續編

卷六

六

之香豉八兩 元參七兩 花粉 紫草各四兩

各藥生曬切忌火炒研細以犀角地黃汁糞清和搗為丸切勿加香豉煮爛

每重三錢涼開水化服小兒用半丸如無糞清可加人中黃四兩研入

孟英自註云溫熱暑疫諸病邪不即解耗液傷營逆傳內陷痙厥昏狂譫語發斑等證但看病人舌色乾光或紫絳或圓硬或黑苔皆以此丹救之若初病即覺神情昏躁而舌赤口乾者是溫暑直入營分酷熱之時陰虛之體及新

產婦人患此最多急須用此多可挽回切勿拘泥日數誤投別藥以債事也兼治痘瘡毒重夾帶紫斑危證暨痘瘡後餘毒內熾口糜咽腐目赤神煩諸證右本葉氏參治驗

姚祿皆在金陵適遇大水繼而回杭途次酷熱患感顧某診為濕邪與桂枝葛根藥三帖病乃劇趙笛樓知其誤治連用清解因見藍斑不肯承手迺孟英視之脈細數而體瘦平昔陰虧熱邪藉風藥而披猖營液得溫燥而乾涸斑色既紺危險萬分勉投大劑石膏知母白薇卮子青蒿丹皮竹葉竹瀝童叟之藥調以神犀丹三服大解下如膠漆斑色漸退而昏狂遺溺大渴不

王氏醫案續編

卷六

七

已仍與前方調以紫雪數劑熱退神清而言出無倫猶如夢譫或慮其成癩孟英曰痰雷包絡也與犀角菖蒲元參鼈甲花粉竹茹黃連生地木通甘草為方調以真珠牛黃始得漸安改授存陰調理而愈

陳蘊泉陡患昏譫食夜乞診于孟英脈甚滑數苔色膩黃乃平素多痰兼吸暑熱與清解藥一劑化而為瘧脈亦較平或謂其體弱不宜涼藥須用人參渠家惶惑孟英堅持以為不可蓋暑脈頗類平虛而痰阻于肺呼吸不調又與氣虛短促者相似平昔雖虛有病先去病况熱能傷氣清暑熱即所以顧元氣也

香證人多不識此二層音人雖明論及而無此

何新之亦贊是議。遂連投白虎加減而愈。次年春因喪妾悲悼。復感溫邪。失于肅清。病日以甚。迨孟英自豫章歸診。已不可救藥矣。

高若舟庶母患脫肛。孟英脈之絃而滑。洩澀苦黃。雖屬高年。非虛證也。清其濕熱而痊。

謝再華請孟英治。乍浦人滯下。證晝夜百餘行。不飢不渴。而欲嘔腹痛。上及于心胸。切其脈頗平和。是寒濕也。與時行暑濕痢。大相徑庭。投薑桂芩朴之劑。數服霍然。

趙子善患瘧。長冷不飢。孟英診之脈滑數。苔黃澀赤。腕間善嘔。

王氏醫案續編 卷六

投竹葉石膏湯加減以清伏暑而痊。

王一峯次郎患瘧。多服薑棗溫散之藥。因致壯熱耳聾。語謬。尿不寐昏狂。見人欲敵。願聽泉從伏暑治亦不效。延至初冬。吳愛棠囑其求診于孟英。按脈皆滑。即以願疏犀角等藥。內加葛蒲。膽星。竹瀝。珍珠。牛黃。為劑。吞白金丸。一服即減。旬日霍然。繼其令堂發熱善嘔。頻吐黏沫。頭疼如劈。口苦耳聾。神識昏瞢。脈絃而數。乃伏暑挾內風之鴟張。與犀角元參竹茹花粉知翹。蒼斛。厄菊。雪羹等藥。七日而瘳。

王子能參軍令正久患吐血。醫不能愈。延孟英視之。脈絃滑而

搏。指右手較甚。渴喜冷飲。米穀礙于下。嘔小洩。如沸夜不成眠。久服滋陰毫無寸效。孟英以葶藶湯合雪羹。加石膏。知母。花粉。枇杷。葉。竹茹。旋覆。滑石。梨汁。大劑投三十劑。而痊。繼而參軍旋省。患久積憂勞。真陰欲匱。竟難救藥。尋果仙遊。

余明齋令堂秋開。患伏暑。孟英已為治愈。失于調理。復患氣衝。自汗。肢冷。少餐。或補不投。仍邀孟英治之。與填補銜任。清滌伏痰。法合甘麥大棗以補血而愈。

高瑞生令弟。瘧久不痊。形消不食。醫謂虛也。投補藥而更增自汗。孟英診之。脈絃滑。腕下聚氣。投小陷胸加竹茹。旋枳以開痰。

王氏醫案續編 卷六

結漸能納穀。繼以清養病去肌充。

張篋伯紀。綱李貴。患感數日。忽然昏厥。比沿途追求孟英往視。業已薄暮。主人謂自朝至此。一息奄奄。恐不及灌藥矣。實不便。屈診孟英曰。余既來且視之。見其面色灰黯。戴眼口開。按其脈尚不絕。與葛蒲。膽星。竹茹。旋覆。等為劑。和入童溺。調以牛黃。至寶丹。灌之。覆杯而起。

吳醞香大令。宰金谿。自春仲感冒而起。迨夏徂秋。痰多氣逆。肌肉消瘦。延至初冬。諸證蜂起。耳鳴腰痛。臥即火升。夢必下。戈。漢寒善怒。多醫咸主補虛。迄無小效。臥理南陽。已將半載。羣公子

蘊香之證于於五月間曾為一視知其感受溫邪投以清解三服後頗覺輕減又以壯飲而病復如故然步履尚無恙也後乃感於溫補之說熱地虎膠等膩滯之藥悉服不較比孟英至而

其勢已棘雖逐漸清解大勢向愈然病久元虛邪去而正亦隨之此所以終於不起也

王氏醫案續編卷六

計無所施。飛函至家。囑大公子汾伯副車叩求孟英來署。已冬仲之杪日矣。診脈絃細而左寸與右尺甚數。右寸關急搏不調。且病者頭垂不仰。氣促難言。舌黯無苔。面黧不渴。孟英曰。病雖起于勞傷。挾感而延。已經年然。溯其所自。平昔善飲。三十年來。期在必醉。非僅外來之客邪。失于清解。殆由內伏之積熱。久錮深沉。溫補雜投。互相煽動。營津受燥。肉削痰多。升降愆常。火浮足冷。病機錯雜。求愈殊難。既承千里相招。姑且按經設法。以石膏知母。花粉黃芩等清肺。滌痰。青蒿龍甲。梔子金鈴等柔肝。泄熱。元參女貞。天冬黃檗等壯水。制火。竹茹旋復。杷葉橘紅等宣

王氏醫案續編卷六

子室人患痰飲。胸膈二十年矣。初則畏寒喜熱。厥宜健脾利氣。之品至甲辰冬。服神木丸一料。風患頓捐。漸不具寒。已酉冬。因氣喘而復病。誤服遊山散。錢許。勢遂披猖。得孟英診視。始漸就

安痊。但痰飲未。能盡除。每日須。按脈數百下。噴。氣數十口。方覺。稍快。否則胸痞。異。常。二。便。不。利。而。便。出。仍。不。乾。燥。偶。有。時。二。便。通。調。則。為。之。體。適。者。終。日。正。內。經。所。謂。得。後。與。氣。則。決。然。而。痰。也。明。明。痰。飲。之。證。特。以。陰。血。入。虧。既。不。任。香。燥。而。氣。機。滯。滯。又。不。利。滋。填。遂。至。莫。可。為。計。安。得

王氏醫案續編卷六

大略如此。定州楊素園明府宰宜黃。吏治有聲。精于醫學。其夫人多病。自治不痊。昆陵吳子和囑其函懇。香屈孟英診視。而孟英因母老急欲旋里。堅辭不往。即據來信所述病狀。擬方立案云。細閱病原。證延二十餘年。始因啖杏。生冷傷乎胃陽。肝木乘虛。遂患脇疼。攣掣。身軀素厚。溼盛為痰。溫藥相投。是其效也。馴致積溫成熱。反助風陽。消燥胃津。漸形瘦削。而痰飲者。本水穀之悍氣。緣肝升太過。胃降無權。另闢竅。據為山險。初則氣滯。以停飲。繼則飲蟠。而氣阻。氣既阻。痺血亦愆。其行度積。以為痰。前此神

王氏醫案續編卷六

未丸控涎丹之滌飲。丹參飲。桃核承氣之逐血。皆為傑構。已無遁情。迨延久元虛。即其氣滯而實者。亦將轉為散漫。而無把握矣。是以氣升火浮。顏紅面腫。氣降火息。黃瘦日增。苟情志不怡。病必陡發。以肝為剛。臟在志為怒。血不濡養。性愈併張。胃土屬陽。宜通宜降。通則不痛。六腑以通為用。更衣得暢。體覺舒。是其徵也。體已虛。病似實。虛則虛。于胃之液。實則實。于肝之陽。中虛原欲納食。而肝逆。虬擾欲嘔。吐出之水。已見黑色。似屬胃底之濁陰。風鼓波瀾。翻空向上。勢難再攻。承示。脈至兩關中。取似形鼓指。重按杳然。詎為細故。際此春令。正驚飛魚躍之時。仰屋

孟英常加診視
而盡列其根株
耶

圖維參微土綱繆之議。是否有當。仰就斤繩。

沙參 八錢 鮮竹茹 四錢 川椒紅 二分 烏梅肉炭 六分

茯苓 三錢 旋覆 三錢 金鈴肉 二錢 柿蒂 十箇 仙半夏 一錢

淡肉荏蓉 一錢五分 吳萸湯炒黃連 四分 冬蟲夏草 一錢五分

另用炙龜版藕各四兩漂淡陳海蛇二兩鳧苈一兩赭石四

錢先煮清湯代水煎藥 正月十四日

右擬方案。來差星夜賁回于十六日到宜。素園讀案狂喜。以為

洞見臟腑。必欲孟英一診。以冀霍然。遂夤夜備輿。專丁持函求

孟英暫緩歸期。醞香篤于寅誼。再四勸駕。併囑四令。即季眉偕

王氏醫案續編 卷六

主

行孟英迫于情不可卻。二十二日抵宜。暑初診案云。證踰二十
年。右脇聚氣。有升無降。飲阻不宣。嘔逆減餐。亦將半載。二便非
攻不暢。容色改換不常。吐苦吞酸。苔黃舌絳。渴喜冷飲。畏食甘
甜。甘能緩中。冷堪沃熱。病機于此。逗露根深。難即蠲除。標實本
虛。求痊匪易。據述脈亦屢遷。似無定象。夫既流善幻。顯屬于痰。
茲按脈左緩滑。右爽遲。兩尺有根。不甚絃澀。是汎愆因乎氣阻。
尚非陰血之枯。春合肝木乘權。胃土久受戕尅。病已入絡。法貴
緩通。通則不痛。腑以通為補。法雖時變。不能舍通字。以圖功。布
鼓雷門。諸希教正。

沙參 八錢 鮮竹茹 四錢 青黛 五分 旋覆 三錢 酒炒黃連 六分

白前 一錢 生白朮 三錢 紫苑 一錢 海石 五錢 川棟子 三錢

川貝 一兩 黑厄 三錢

另以生蛤粉生冬瓜子蘆根蘆薈各壹兩絲瓜絡五錢漂蛇

二兩柿蒂十箇先煮湯代水煎藥。蒸熨二分 後下

再診左脈如昨。兼絃。右寸亦轉緩滑。中腕氣漸下降。二便欲解

不行。蓋升降愆常。樞機窒澀。由乎風陽浮動。治節橫斜。肺既不

主肅清。一身之氣皆滯也。輕可去實。先廓上游。

前方去海石加括婁三錢枳實一錢

王氏醫案續編 卷六

主

三診脈來較靜。小洩漸行。雖未更衣。已能安敷。濁得下降。導以
清通。

前方去貝棟加歸尾錢半桃仁十粒送服導水九十粒

四診股涼便滯。氣少下趨。額面時紅。火炎上僭。兩脇較熱。絡聚

痰癆。疊授清宣。更衣色黑。噫氣漸罷。酸水不嘔。納穀頗增。脈稍

和緩。法仍緩導。其刈根株。

前方去枳實歸尾減導水九五粒

五診各恙皆減。眠食漸安。火猶易升。頭疼面赤。頰痰結核。腸熱

未蠲。脈漸柔和。且參清養。

前方去白前青黛紫苑黃連加銀花貝母黃菊丹參陳細茶

橄欖

六診積痰下降。頸核漸平。舌紫口乾。卯辰熱。陰虛木旺。氣道
尙未肅清。養血清風。自可使其向愈。

前方去陳茶慈贛加石斛

留贈善後方 便色轉正用此

沙參 八錢 冬虫夏草 二錢 女貞 三錢 丹參 三錢 鮮竹茹 四錢

川斛 五錢 鹽水泡橘紅 八分 黃菊 三錢 旋覆 三錢 黑尾 三錢

川貝 四錢 金鈴肉 錢半

王氏醫案續編 卷六

西

另以炙鼈甲漂蛇各一兩葦莖二兩絲瓜絡五錢煮湯代水

煎藥

又 諸恙盡瘳用此滋養

前方去橘紅菊花金鈴尾子旋覆加石英沙蒺藜茯苓各三錢

菝菴當歸各錢半湯引去葦莖加炙坎版一兩藕二兩

余姪森伯患發熱面赤湯而微汗孟英視之曰春温也乘其初
犯邪尙在肺是以右寸之脈洪大宜令其下行由腑而出則即
可霍然投知母花粉冬瓜子桑葉杷葉黃芩葦莖尾子等藥果
大便連瀉極熱之水二次而脈靜身涼知飢啜粥遂痊設他人

治之初感總用汗藥勢必釀成大證

王氏醫案卷六完 原名仁術志

王氏醫案續編 卷六

五

王氏醫案續編卷七 原名仁術志

浙西王士雄孟英醫案 同郡沈宗淦辛甫續輯

謝譜香素體陰虛忽患環跳穴痛始而下及左骹繼而核于右
骸甚至兩足轉筋上衝于腹間或痛自乳起下注于脾日夜呼
號肢冷自汗略難反側醫見其血不華色輒投補劑迨仲春孟
英自江西歸診脈絳爽微滑畏熱知飢瘦短便堅舌紅不渴乃
陰虛而痰氣滯于厥陰也以從蓉鼠矢竹茹絲瓜絡橘核茴香

王氏醫案續編卷七

湯炒當歸吳萸湯炒黃連川椒湯炒烏梅延胡湯炒棟實海蛇

皂莢為劑一服即減數啜而安繼與虎潛加秦朮而起

陳建周令郎患春溫初起即神氣躁亂驚懼不眠兩脈甚數孟

英謂溫邪直入營分也與神犀丹佐紫雪兩劑而瘥夏開吳守

旃暨高若舟令郎胡秋初四令愛患溫初起即肢痠妄言神情

昏亂孟英皆用此法尋即霍然世人每執汗解之法為初感之

治孰知病無定體藥貴得宜無如具眼人稀以致天枉載道歸

諸天數豈盡然歟

鮑繼仲于季春望日忽然發冷而喘汗欲厥速孟英視之脈沉

絃而更滑帶數是素患痰飲必誤服溫補所致也家人始述去

冬服胡某腎氣湯頗若相安至今久不吐痰矣孟英曰病在肺

肺氣展布痰始能行雖屬久病與少陰水泛迥殊辨證不明何

可妄治初服頗若相安者方中附桂剛猛直往無前痰亦不得

不為之辟易又得地黃等厚濁下趨之品迴護其跋扈跳梁之

性然暴戾之氣久而必露柔膩之質反阻樞機治節不伸二便

溘少痰無出路愈伏愈多一朝卒發遂壅塞于清陽升降之路

是以危險如斯須知與少陰虛喘判分霄壤切勿畏虛妄補投

以薤婁枳杏旋楮橘牛苑茹蘆根蛤粉雪羹之劑而平繼與肅

王氏醫案續編卷七

清肺氣而滌留痰匝月始愈

王敏石廣文令弟患春溫始則譫語發狂連服清解大劑遂昏

沉不語肢冷如冰目閉不開遺溺不飲醫皆束手孟英診其脈

絃大而緩滑黃膩之苔滿布穢氣直噴投承氣湯加銀花石斛

黃芩竹茹元參石菖蒲下膠黑矢甚多而神稍清略進湯飲次

日去硝黃加海蛇蘆菴黃連石膏服二劑而戰解肢和苔退進

粥不勞餘力而愈繼有張鏡江邀治葉某又錢希敏之妹丈李

某孟英咸一下而瘳惟吳守旃之室暨鄭又僑皆下至十餘次

始痊今年時疫盛行醫多失手孟英隨機應變治法無窮救活

此正吳氏所謂
涼藥無添穢之
功而反冰伏其
邪也

吳又可之法切
於痰而不甚切
於溫觀此可見

案中所載多溫
瘧瘧瘧故治多
涼解瘧證多端
寒熱俱有不可
執一而論此證
亦溫瘧也

獨多不勝縷載。

褚芹香女校書患汎愆寒熱醫以為損輒投溫補馴致腹脹不
飢帶淋便閉洩澀而痛孟英診脈絃勁而數乃熱伏厥陰誤治
而肺亦壅塞也與清肅開上之劑吞當歸龍薈丸兩服寒熱不
作而知飢旬日諸恙悉安。

聞氏婦孟夏患閒瘧而妊身八月數發後熱熾昏沉腰疼欲墮
張養之囑援于孟英脈來洪滑且數苔色黃膩垢濁與黃芩知
母竹茹竹葉銀花桑葉絲瓜絡石斛石膏石菖蒲一劑而痊
朱佳木令尊患閒瘧年踰七旬人頗憂之孟英切脈絃滑腕悶

王氏醫案續編卷七

三

苔黃曰無恐也投清熱滌痰藥數劑霍然。

李明府令正年踰花甲素患痰嗽近兼嘔熱不飢頭疼不食醫
治罔效姚小荷薦孟英視之脈滑數乃痰火內伏溫熱外侵投
石膏藥二服而熱退知飢又數劑併宿恙而愈矣。

宋氏婦患感反覆已經向痊忽然腹脹上至心下氣喘便瀉溺
閉湯飲不能下嚔自汗不能倚息家人皇皇且極貧不能延診
走乞孟英擬方挽救因以桂枝石膏旋楮杏朴芩半黃連通草
為劑果覆杯而病若失張養之目擊歎為神治。
翁嘉順之婦弟吳某勞傷之後發熱身黃自以為脫力也孟英

察脈更數是溼溫重證故初起即黃亟與清解大便漸瀉小溲
甚赤溼熱已得下行其熱即滅因家住茅家埠吝惜與金遠爾
輟藥七八日後復熱譫語昏聩抽痙遺溺再懇孟英視之溼熱
之邪擾營矣投元參犀角菖蒲連翹竹茹竹葉銀花石膏泄衛
清營之法佐牛黃丸紫雪丹而痙驚皮已塌亟令貼羊皮金不
致成瘡而愈。

朱淳書令正患感吳某與表藥二帖發出赤疹神氣漸昏葉某
知其素患耳聾目障為陰虛之體改用犀角地黃湯二劑而遺
溺痙厥始延孟英視之曰雖形瘦陰虧邪易擾營幸非溼盛之

王氏醫案續編卷七

四

驅尚可設法但心下拒按呃逆便閉是痰熱尙阻氣分誤服升
提每成結胸地黃滋滯實為禁藥今人臨證不能詳審往往用
非所當用本年敗證甚多余每見神未全昏便不甚闕惟胸前
痞結不可救藥而死者皆升提之誤進或滋滯之早投也石北
涯在旁聞之歎曰無怪乎君素以犀角地黃湯奏奇績而他人
效尤屢債事豈非能與人規矩不能與人巧耶于是以犀角元
參茹貝旋覆枳菴白前菖蒲為方調紫雪兩服呃逆止神漸清
而咽疼口渴乃去紫雪前菖加射干山豆根知母花粉吹以錫
類散二日咽喉即愈胸次漸舒疹回熱退去犀角紫苑射干豆

根加銀花。卮子。竹葉。海蛇。鳧。此漸安。眠食唯大解。久不行。孟英曰。腹無痛苦。虛體祇宜潤養。佐以菘菜。麻仁。當歸。生地等藥。多服而下。遂愈。

李德昌之母。仲夏患感。醫診為溼。輒與燥劑。大便反瀉。遂疑高年氣陷。改用補土。馴致氣逆神昏。汗多舌縮。已辦後事。始乞診于孟英。脈洪數無倫。右尺更甚。與大劑犀角。石膏。黃芩。黃連。黃柏。知母。花粉。卮子。石斛。竹葉。蓮心。元參。生地之藥。另以冷雪水調紫雪灌。一晝夜。舌即出齒。而喉舌赤腐。嚙水甚痛。乃去三黃。加銀花。射干。豆根。併吹錫類散。三日後。脈證漸和。稀糜漸受。改

王氏醫案續編 卷七 五

投甘涼緩劑。旬日得堅。黑矢而愈。

暹羅機通經絡
為孟英用藥
快無論用補用
清皆不離此意
細觀各案自知

余期孺形瘦體弱。患閒日瘧。寒少熱多。二便澀滯。脘膈悶極。苦膩不渴。孟英切脈。緩滑而上。溢曰。素稟雖陰虧。而痰溼阻痺。既不可以提表。助其升逆。亦未宜以涼潤礙其樞機。投以滑朴。枳。旋通草。枇杷葉。葶藶。金蘭葉之方。苦色漸退。即去朴。鬱。加連。枳。半夏。胸悶漸開。瘧亦減。便乃暢。再去滑。半連。枳。加沙。參。石斛。橘皮。黃芩。決旬而愈。

董哲卿。貳尹。令正。胎前患嗽。後不痊。漸至寢汗。減餐。頭疼。口燥。奄奄而臥。略難起坐。孟英診脈。虛絃。更數。視舌光赤。無苔。曰

此頭疼口燥。乃陽升無液。使然。豈可從外感治。是衝氣上逆之嗽。初非傷風之證也。與菘菜。石英。龜板。茯苓。冬蟲。夏草。牡蠣。椿。豆衣。甘草。小麥。紅棗。藕。數帖。嗽減。餐加。頭疼不作。加以熟地。服之遂愈。

慶雲圃觀察。令郎恩蔭堂。司馬。陡患偏墜。醫與茴香。蘆巴。烏藥。荔枝。等劑。遂痛不可忍。洗趨棠村。鮭尹。邀孟英視之。按其脈。膚甚熱。曰。非疝也。舉丸。腫痛必偏于右。此溼熱時邪也。設以疝治之。必成癰。按法治之。果覆杯而痛減。三服而便行。熱退。因食羊。肉。腫痛復作。再與清解。諄囑慎口腹。而瘳。

王氏醫案續編 卷七 六

吳憲章。年踰花甲。患感。醫知其為溼溫也。投藥不應。而仍能起。楊理事。石北。涯拉。孟英視之。冀其勿致加劇。及診脈。左寸數疾。餘皆爽。大穀食略減。便溲澀少。苦色。膩黃。舌尖獨黑。孟英不肯予。方人咸詫之。因曰。證原不重。吾以脈象。舌色。察之。是平昔曲。運心機。離火內亢。坎水不制。勢必自焚。况兼溼溫之感。乎。果數日而殞。

黃純光。年七十八。歲患溼溫。至旬餘。脈形歇代。呃忒連朝。諸醫望而畏之。孟英診曰。脈雖歇。而絃搏有根。是得乎天者。厚難崩。高年猶為實象。參以病深。聲噦。原非小故。而二便窒澀。苦風而

灰似府氣未宣。痰溼熱阻。其氣化流行之道也。清宜展布。尙可圖焉。何新之躋其議。因以旋茹。卮棟。杷杏。黃連。菀婁。雪羹。爲劑。片通草一兩。煎湯煮藥。投七卽減。數服而大吐膠痰。連次更衣。遂安。粥食。惟動則嗽逆。漸露下虛之象。予西洋參。龜板。牡蠣。菴蓉。石斛。牛膝。冬蟲。夏草。石英。茯苓。當歸。等藥。而各恙遞安。繼加砂仁。熟地。而起。

錢聞遠自春閒。偶患痰嗽。醫投蘇葛。而失音。更醫大劑滋補。漸致飲水則噎。久延愈劇。邀孟英診。曰。左寸動數。尺細。關絃。右則澀。乃心陽過擾。而暗耗營陰。肺金受燥。清肅不行。水失化源。根

王氏醫案續編

卷七

七

無。陰。庇。左。升。太。過。右。降。無。權。氣。之。經。度。既。乖。血。之。絡。隧。亦。痺。飲。水。則。噎。是。其。據。也。金。遇。火。而。伏。其。可。慮。乎。繼。而。痰。血。果。吐。納。食。稍。舒。老。醫。嚴。少。眉。以。爲。可。治。竭。力。圖。維。仍。殞。于。伏。

湯西膝年踰花甲。感證初起。周身膚赤。滿舌苔黃。頭痛腰疼。便溏。腹痛。伊親家何新之診。爲險候。囑延孟英診之。脈見絃細而。爽。乃陰虛勞倦。溼溫毒重之證。清解之中。須寓存陰。以犀角。羚羊。芩茹。銀翹。桑葦。通草。蘭葉。爲方。煎以冬瓜湯。服之。偏身赤疹。而左眼胞忽腫。右臂痠疼。不舉。耳聾。神不清爽。亟以元參。丹皮。荊花。卮子。桑枝。絲瓜。絡石。斛竹。葉煎。調神犀丹。爲劑。偶邀瘍科視

外患亦知病。因溼熱連進木通等藥。脈更細弱。神益昏憊。飲食不進。溼滯愈疼。新之以爲難挽矣。孟英曰。急救陰液。尙可轉機。投復脈湯。去薑。桂。麻。仁。易西洋參。加知母。花粉。竹葉。蔗漿。灌之。一劑神甦。脈起。再服。若退。知飢。三啜。身涼。溺暢。六帖後。膚蛻安眠。目開。舌潤。或疑甘柔滑膩之藥。何以能清溼熱。孟英曰。陰虛內熱之人。蘊溼易于化火。火能燥液。濡布無權。頻溉甘涼。津回氣達。徒知利溼。陰氣先亡。須脈證詳參。法難執一也。又服數劑。後忽然肢腫。偏發風塊。癢癢異常。或又疑證之有變也。孟英曰。此陰液充而餘邪自尋出路耳。與輕清藥數帖。果瘥。

王氏醫案續編

卷七

八

趙菊齋仲媳。素患陰虛內熱。時或咯血。去年孟英已爲治愈。既而汛事偶愆。孟英診曰。病去而孕矣。今春晚後。患瀉。適孟英赴豫章之診。專科進以溫熱之方。而欬嗽乃作。更醫改授養營之劑。則滑泄必加。籤藥。凡方。備嘗。莫效。比孟英歸。投以甘麥大棗。配梅連之法。證漸輕減。繼爲其姻黨尼之。多方蠻補。遂致腹痛。減餐。日下數十行。皆瑩白堅圓。如白蒲桃之形。上紫血絲。菊齋悔。悶。仍乞援于孟英。于仲景當歸生薑羊肉湯。每劑吞雅膽仁。二十一粒。以龍眼肉爲衣。果兩服。而便轉爲瀉。痛即遞減。再與溫養奇經之龜板鹿霜歸苓杞菟甘芍烏鰂菴蓉蒲桃藕等藥。

調理而痊。

海鹽任斐庭館于關琴楚家。季夏患感。黃某聞其身熱而時有微寒也。進以薑黃柴棗等藥。數帖熱愈壯。而二便不行。更醫連用滲利之劑。初服洩略通。既而益闕。居停以為憂。始延孟英視焉。證交十四日。骨瘦如豺。脈絃細而澀。舌色光紫。滿布白糜。夜不成眠。渴不多飲。粒米不進。少腹拒按。勢將喘逆。雖屬下證。而形脈如斯。法難直授。先令取大田贏一枚。鮮車前草一握。大蒜六瓣。共搗爛。加麝香少許。罨臍下水分穴。方以元參紫苑卮子知母花粉海蛇鳧芫荽蓉牛膝天冬為劑。加鮮地黃汁服之。其

王氏醫案續編 卷七

九

夜小洩即行。氣平略寐。又兩劑。大解始下。退熱而漸進稀糜。乃去雪羹。卮菀菴藤地黃汁。加西洋參麥冬石斛乾生地竹茹銀花等藥。又服十餘帖。凡三解黑矢。而舌色復于紅潤。眠食漸安而起矣。

莊芝階舍人令愛。孀居在室。陡患氣衝欲厥。痛臭當。自服沉香吳萸等藥。病益劇。而嘔吐發熱。略有微寒。孟英按脈絃滑。且數。苔色滑膩微黃。而渴喜冷飲。便閉洩熱。眠食皆廢。是伏痰內盛。肝逆上升。而兼吸受暑熱也。子吳黃水炒黃連枳實竹茹栝。夏石膏旋覆石知母半夏雪羹。服二劑。吐止痛減。五劑熱退。

而解猶不暢。旬日始得豁然。乃去石膏。知母旋覆。調之而愈。

陳書伯太史令弟婦。婉後三日發熱。汗多苔黃。眩悸。孟英切脈。絃細虛數。乃營陰素虧。酷熱外燠。風陽浮動。瘵厥之萌也。予元參白薇青蒿生地小麥稽豆衣石斛鼈甲竹葉。兩劑熱退。知飢。悸汗不止。去蒿薇。加龍牡蓮心龜板石英。而安。繼又暑風外襲。壯熱如焚。渴飲不飢。觀物盡赤。改投白虎。加西洋參竹葉蓮桿。一啜而瘳。仍與鎮攝滋潛善其後而愈。

顧氏婦。半產後。因喫飯。腕痛。人以為停食也。進以消導。痛甚發熱。臥則右脇筋掣難忍。孟英曰。此非發散。攻消可療。予旋覆絲。瓜絡冬瓜子蓮桿葶苈竹茹貝母枇杷葉蘭葉通草為方。一劑知二劑已。

王氏醫案續編 卷七

十

高氏婦。因戒鴉片。而服外洋丸藥。諸無所苦。惟便閉不通。醫治兩月。迄不能下。且仍安穀。而面赤。齟齬欲挑。每以銀鍼。嵌入齒縫。而拔出之時。銀色已如煤黑。孟英診脈滑數。予犀角石膏硝黃升麻。蜈蚣為劑。和以鮮銀花汁。一杯。服後。夜間登廁三四行。而病去。及半。再予清解化毒。而痊。

太倉陸竹琴令正。陡患心悸。肢冷如冰。其子皇皇。浼吳江程勉。耘懇援于孟英。察其脈浮絃。而數。視其舌尖赤無苔。乃陰虛陽

越煎厥根萌子元參一至三甲龍齒石英生地牛膝茯神蓮子
心而愈

趙子循室。晚後服生化湯二帖。更因驚嚇。三朝發熱。連投四物
六合等湯。病日以甚。半月後始延孟英診之。脈象左絃急右洪
滑數。苔黃大渴。譫語嗽痰。惡露仍行。唇齒乾燥。是因陰虛之體
血去過多。木火上浮。酷暑外燥。津液大耗。兼有伏痰之候也。亟
與管衛兩清。冀免他變。而母家極畏石膏。堅不與服。越三日勢
益劇。計無所施。子循之叔笛樓。與其表兄許芷卿。徑以白虎加
減投之。證有轉機。翼日再延孟英。會同笛樓暨其舅氏許吉齋
王氏醫案續編 卷七

山長協商安治。咸是王議。且以西瓜汁助其藥力。熱始日漸下
行。二便如火。又數日漸安。粥食神氣亦清。起坐梳頭。夜能靜寐。
然熱蘊太久。下焦患癰。膿雖即潰。陰液漏傷。脈復空數。浮大便
泄善嘔。口乾多夢。皆木少水涵。燥津侮胃之見證也。孟英與笛
樓商。以白頭翁湯加龍骨三甲甘草木瓜。以育陰潛陽。餘糧石
脂丸中加梅連。以息風鎮胃。果得瘡口膿乾。餐加瀉止。脈柔熱
淨。苔退神怡。正須善後。甫授滋填。不期酷熱兼旬。甘霖忽降。臆
開徹夜。復感風邪。身熱微寒。鼻流清涕。而陰液久奪。外患未痲。
培養礙投。又難發汗。肝風內應。痰噤旋形。九仞之功。遂成畫餅。

仍是陰虛大虛
故變證如此非

聖由於風邪也

門外漢未免以成敗論。然此案自堪傳也。

陳某患嗽。嗽則先吐稀痰。次則黃濃甜濁之痰。繼之以深紅帶
紫之血。仍能安穀。別無所苦。多藥不愈。孟英切其脈緩大而右
關較甚。乃勞倦傷陽。而兼溼熱蘊積也。予沙參生薏苡木瓜茯
苓竹茹桑葉枇杷葉生扁豆葶花粉。為劑吞松石豬脂丸。而
愈。王瘦石夫人患滯下。腹痛微嘔。不飢口苦。溲短耳鳴。孟英診
曰。脈見細弱之形。肌無華澤之色。汎不行而早斷。舌紫黯以無
津。是素質陰虧。情懷悒鬱。二陽默熾。五液潛消。雖吸暑邪。莫投
套藥。予白頭翁湯加雪羹銀花卮子棟實。數劑而減。繼去雪羹

王氏醫案續編 卷七

主

加生地菴菴柿餅藕汁而安。改投甘麥大棗加西洋參生地菴
蓉竹茹歸芍蒲桃乾。而以藕湯煎服。調養體質。以痊。

王氏醫案續編卷八

杭州王士雄孟英醫案

仁和徐然石亞枝續輯

仁術志者海豐張君柳吟所題孟英之醫案也。吾師趙菊齋先生暨莊舍人芝階為之序。余以未與其事。深以為歉。秋間偶遇孟英。適有陳姓者牽羊來謝。孟英頗疑之。其人曰：三月間次媳患時感。而氣逆不能眠。醫皆畏卻。特延君診。甫按脈云：甚滑疾。是為娠象。用藥必須顧及。此時次媳於去秋晚後月事尙未一

王氏醫案續編卷八

行君為此言。闔家未嘗不竊笑也。迨疾漸平。哺兒之乳亦不覺少。雖自問亦斷斷非孕。至六月間腹漸脹。方謂有病。不料昨日條產一孫。舉家敬服高明。故來致謝耳。孟英因謂余云：昨診魏子恒之室亦妊也。諸醫作虛損治。脈雖虛微。而滑象仍形。病家深不以吾言為然者。緣病人之女兒二人皆死於虛勞也。然其伯仲之證。吾皆診焉。今已十餘年矣。猶憶伯字於關氏未嫁而卒。證非不治。亦為藥誤。病中閱吾方案。極為折服。且曰：先生來暮。儂不能起矣。前此延致諸名家。徒曰虛證宜補。而不治。其所以虛方則羣聚補藥。必以地黃為之冠。雖有參耆亦列於

徐靈胎批葉案云便血無至十

餘年者惟痔血則有之今便血三十餘年不開可知為痔血矣惟徐氏未嘗出方孟英此案足為程式

王氏醫案續編卷八

後即使藥不乖。而陽生陰長。氣為血帥之旨。尙未分曉。况其他乎。吾聞而愕然。何以闈中女子亦解談醫。細詢始知為乾隆間名醫吳穎昭先生之女孫也。尤為惋惜。仲適於陳少帝少府的係。損證若季者。因其家懷先入之見。遂致醫人迎合。誤事豈不可歎。迨秋仲果聞魏氏分媿母子皆亡。方歎孟英之卓見為不可及也。爰采秋冬諸案之治法。不同於尋常者。而續成一卷云。便血至三十餘年。且已形瘦腰疼。嗽痰氣逆。似宜溫補之法矣。而嘉定沈醞書患此。瀕危求孟英以決歸程之及否。比按脈絃數。視舌苔黃。詢渴短赤。曰：痔血也。殆誤於溫補矣。肯服吾藥。旬日可瘳。醞書欣感。力排眾論。徑服其方。果不旬而愈。方用葶藶白頭翁湯。加枇杷葉。旋覆花。側柏葉。藕是肅肺祛痰清肝涼血互用也。產後諸證。首必通瘀。然有不可以常理測者。表弟周鶴庭室。新產暈汗。目不能開。心若懸旌。毫無惡露。乃父何君新之。按其脈有虛絃。豁大之形。亟拉孟英圖之子。以三甲石。英丹。參。琥珀。甘草。小麥。稽豆。衣等藥。覆杯即安。數服而愈。或詰其何以知非瘀血為患。曰：此陰虛之體。既產而營液大脫。風陽上冒。雖無惡露

胸腹皆舒。豈可誤作痰衝。而妄投破血之藥耶。

許季眉別駕。歸自維揚。仲秋患痞。自作寒溼治。勢益劇。其從

子芷卿。以為挾風暑也。連進清解。病不減。邀孟英診之。脈絃滑。

而洪體豐。多汗苦黃。便血嘔渴。妄言徹夜不眠。欲卧于地。乃伏

痰內盛。暑擾陽明也。投大劑石膏。知母犀角。元參石斛。銀花黃

芩。花粉。蘭葉。竹瀝。三帖。證始平。芷卿隨以多劑。肅清而愈。

莊芝階。舍人。年七十矣。患閒瘧。寒則戰慄。熱則妄言。孟英視之。

脈絃數。而促。苔黑。口乾。是素有熱痰。暑邪內伏。子知母。花粉。元

參。石斛。黃芩。竹茹。連翹。海蛇。蘆菴。蓮子。心等藥。數啜。而瘳。至仲

王氏醫案續編 卷八

三

冬因泛湖宴客。感冒風邪。痰嗽頭疼。不飢寒慄。自服羌蘇。荆芥

藥。二劑。勢益甚。而口渴無溺。孟英切其脈。與季秋無異。但兼浮

耳。證屬風溫。既服溫散。所謂熱得風而更熾也。舌絳。無津。亟宜

清化。以桑葉。枇杷葉。梔子。知母。冬瓜子。元參。菊花。花粉。貝母。梨

汁。為劑。投七。即減。旬日而痊。

孫位申室。平昔陰虛。肝滯。痛脹。少餐。暮熱形消。咽疼。喉癢。不孕

育者九年矣。往歲汎愆。人皆謂將不起。而孟英切其脈。尚不細。

膚猶淖澤。許籌帶病延年之策。果月事仍行。而諸恙皆緩。且能

作勞。惟飯食日不過合米。今秋延孟英往診。云經自三月至今

未轉。一切舊恙。彌見其增。君術雖仁。恐難再延其算矣。及舉脈

絃滑。左甚。遽曰。豈僅可延其算哉。且有熊羆入夢矣。其家聞之。

駭異。迫季冬果得一子。頗快而健。

翁嘉順。於去年秋閒。偶從梯半。跌仆。初無所傷。旬日外。陡發寒

熱。膝旁腫痛。外科汪某治之。潰後不能收功。另招許某療之。識

為傷絡。應手漸效。翁極信服。然培補年餘。雖納食不減。而肌肉

漸削。面色黧黑。步履蹇滯。且一旬半月之閒。必患處疹。腫大發

寒熱。臥榻數日。始能強起。大費不貲。愈發愈劇。至冬閒。咽糜。齩

腐。睛赤音嘶。乃懇孟英。以決吉凶。按脈滑數。舌絳。便艱。口臭。洩

王氏醫案續編 卷八

四

少蘊。隆。蟲。良。由。瘍。醫。僅。知。溫。托。一。法。既。潰。之。後。更。以。溫。補。收

功。善。後。竟。未。察。其。體。氣。病。情。以。致。平。時。所。有。之。溼。熱。痰。火。一。齊

關。住。病。猶。自。尋。出。路。寒。熱。頻。作。而。醫。者。不。識。妄。指。為。虛。補。及。踰

年。人。財。兩。瘠。真。診。所。云。將。錢。買。樵。悴。也。子。元。參。黃。柏。知。母。甘。草。

銀。花。荖。粉。綠。豆。梔。子。海。蛇。鳧。苈。此。為。大。劑。投。之。外。吹。以。錫。類。散。且

令。日。啖。梨。蔗。麒。麟。茶。柿。餅。等。物。至。五。十。日。諸。恙。悉。蠲。體。腴。善。步。

胎。前。產。後。疑。似。極。多。號。曰。專。科。尚。難。措。手。陳。肖。巖。孝。廉。媳。屠。仲

如。之。女。也。汎。愆。一。度。次。月。仍。行。方。疑。其。病。也。孟。英。診。曰。尺。雖。小

弱。來。去。緩。和。是。娠。也。繼。而。果。然。仲。如。令。弟。子。綠。之。室。經。事。稍。遲。

孟英諸案大抵救溫補之失故藥涼為多然斟酌善不以苦藥傷生氣則非他人所能學步

通血之劑亦清
靈無弊

孟英偶診亦以孕斷尋驗甫三月患胎漏適孟英丁內艱遂不
克保而墮墮後惡露雖行而寒熱頭疼時或自汗且覺冷自心
中出醫謂類瘧與溫化之藥病日甚交入日孟英始出門即延
診之脈來沉實而數舌色紫黯乃瘀血為患耳予桃仁澤蘭山
查芫蔚旋覆紅花丹參通草琥珀蛤殼絲瓜絡之劑服後腹大
痛下瘀血如肺者一枚次日諸恙較減乳汁大流再以前方去
通草加麥蘗投之服後腹仍痛復下瘀塊纒纒而諸恙若失或
問先生嘗言產後腹無痛苦者不可妄行其血此證惡露已行
腹無疼痛何以斷為瘀阻而再行其血耶孟英曰正產如瓜熟

王氏醫案續編 卷八

五

蒂落諸經蔭胎之血貫串流通苟有瘀停必形痛脹墮胎如癥
瘍未熟強擠其膿尚有未化之根柢不能一齊盡出所以胎雖
墮而諸經蔭胎之血萃而未渙淺者雖出深者尙留况是血旺
之軀加以溫升之藥挽其順流之路望其欲出之機未到腹中
脹疼奚作吾以循經通絡宣氣行瘀之法導使下行故出路始
通而後腹痛瘳來然必有脈可徵非謂凡屬墮胎皆有是證也
鎖容亭令姊自太倉歸寧即患時瘧顧某一手清解業已安毅
下榻矣忽然氣逆肢寒神疲欲寐耳聾舌蹇香不知飢大便仍
別無痛苦顧知其素患脫血元氣久虛改用參附等藥勢愈劇

以為欲脫矣所親吳久山囑拉孟英圖之切脈絃緩視苔黃膩
乃胎之初孕阻氣凝痰窒礙樞機治當宣豁以石菖蒲枳實旋
覆半夏黃連茯苓橘皮葱白海蜃竹瀝為方投七即效三吸霍
然繼而久山令妹為鎖繩先之室患瘧而馴致脫痞嘔呃鼻冷
自汗不食不眠脈來歇止醫者危之孟英視之亦痰為患耳即
以此方去葱蛇竹瀝加薤白藁仁竹茹投之果驗
高石泉仲媳骨小肉脆質本素虛冬閉偶涉煩勞不飢不寐心
無把握夜汗耳鳴馮某連進滋陰法病日甚孟英察其左寸甚
動兩關絃滑苔色膩黃乃心肝之火內燔胃府之氣不降陰虧

王氏醫案續編 卷八

木

固其本病滋填未可為非然必升降先調而後補之有益授隨
水炒黃連石菖蒲元參丹參危子石斛小麥知母麥冬竹葉蓮
子心等藥服之即應續予女貞早蓮牡蠣龜板地黃善後而瘥
古方書云喘無善證喘而且汗尤屬可危潘肯堂室仲冬陡患
氣喘醫治日劇何新之診其脈無常候囑請孟英質焉孟英曰
兩氣口之脈皆肺經所主今肺為痰壅氣不流行虛促雖形未
必即為虛諦况年甫三旬平時善飯病起于暴苔膩痰濃縱有
足冷面紅不飢不寐自汗等證無非痰阻樞機有升無降王遂
與石膏黃芩知母花粉旋覆赭石與仁通草海蛇竹瀝煎汁梨

汗等藥一劑知三劑平乃去二石加元參杏仁服旬日而安俟其痰嗽全蠲始用沙參地黃麥冬等以滋陰善後

室女多抑鬱乾嗽為火鬱夫人而知之者王杞庭之姊年踰標梅陡患乾嗽無一息之停目不交睫服藥無功求孟英診焉兩脈上溢左兼絃細口渴無苔乃真陰久虛風陽上僭衝嗽不已厥脫堪虞投牡蠣龜板鼈甲石英茯苓熟地歸身牛膝冬蟲夏草胡桃肉之方藥甫煎果欲厥亟灌之即寐次日黃昏猶發寒症仍灌前藥至第三夜僅有寢汗而已四劑後諸恙不作眠食就安設此等潛陽鎮逆之方遲投一二日變恐不可知矣

王氏醫案續編卷八

七

况作鬱治而再用開泄之品耶故辨證為醫家第一要務也

萬意草謂傷風亦有戴陽證此為高年而言然有似是而非者黃鼎如令堂年登大耋季冬感冒痰嗽氣逆額汗額紅胸痞不飢神情躁擾孟英診脈左絃疾而促右滑數而溢苔色滿布係冬溫挾痰阻肺治節不伸肝陽鼓舞直升羅謙甫有治痰火類孤陽之案頗相似也以小陷胸湯加薤白旋覆赭石花粉海蛇鳧此竹瀝為大劑投之痰活便通數日而瘳繼有陳舜廷之父年踰花甲患痰嗽氣逆惟飲薑湯則胸次舒暢醫者以為真屬虛寒矣連投溫補之劑馴致咽痛不食苔色灰刺便閉無瀉求

孟英診之脈至雙絃按之索然略無胃氣曰渴喜煎湯者不過為痰阻清陽之證據耳豈可妄指為寒鼻投剛烈胃陰已竭藥不能為矣

東垣云中年以後已行降令清陽易陷升舉為宜吾師趙菊齋先生年踰花甲偶因奔走之勞肛翻患痔小溲不行醫者擬用補中益氣及腎氣丸等法孟英按其脈爽滑而數苔色膩滯此平昔善飲溼熱內蘊奔走過勞邪乃下注想由強忍其肛墜之勢以致膀胱氣阻溲澀不通既非真火無權亦詎清陽下陷師聞而歎曰論證如見肺肝雖我自言無此明切也方以車前通

王氏醫案續編卷八

八

草烏藥延胡卮子橘核金鈴子澤瀉海金沙調膀胱之氣化而溲水服之洩即漸行改用防風地榆丹皮銀花荆芥槐蕊石斛黃連當歸清血分之熱而導溼肛痔亦平設不辨證而服升提溫補之方則氣愈窒塞濁亦上行况在高年告危極易也許芷卿痞起季秋孟英嘗清其伏暑而將愈其從母亦知醫強投以小柴胡一劑勢復劇孟英予溫膽湯去甘草加生石膏黃芩知母花粉蘆菔而安繼因作勞太早而復發適孟英丁憂趙君笛樓仍用清解而瘳迨季冬移居勞頓瘳復開作且而浮腫喘嗽易噎人皆以為大虛之候孟英切脈左絃勁而數右滑

大不調。苦黃且膩。口渴。渴多。乃肺胃之痰熱。有餘。肝膽之風陽。上僭。畏虛。率補。必不能瘳。用西洋參。知母。花粉。竹茹。蛤殼。石斛。枇杷葉。青蒿。秦艽。白薇。銀花。海蛇。為方。連投。四劑。大吐。膠痰。而各恙悉除。

薛氏醫案。每以補中益氣湯。與地黃丸。並用。為治。雖虛不遠之。賢亦或效。尤其實。非用藥之法也。如果清陽下陷。而當升舉者。則地黃丸之陰凝滯膩。非所宜也。設屬真陰不足。當用滋填者。則升柴之耗散。不可投也。自相矛盾。紀律毫無。然上下分治。原有矩矱。屠敬思。素屬陰虧。久患痰嗽。動即氣逆。夜不能眠。頻服

王氏醫案續編 卷八 九

滋。潛。納。食。漸。減。稍。沾。厚。味。嘔。腐。吞。酸。孟。英。視。脈。左。絃。而。微。數。右。則。更。滑。兼。絃。水。常。泛。濫。土。失。隄。防。肝。木。過。升。肺。金。少。降。良。由。久。投。滋。膩。溼。濁。內。蟠。無。益。于。下。焦。反。礙。乎。中。運。左。強。右。弱。升。降。不。調。以。菴。蓉。黃。柏。當。歸。芍。藥。熟。地。丹。皮。茯。苓。棟。實。砂。仁。研。為。末。藕。粉。為。丸。早。服。溫。腎。水。以。清。肝。以。黨。參。白。朮。枳。實。菖。蒲。半。夏。扶。苓。橘。皮。黃。連。蒺。藜。生。曬。研。末。竹。瀝。為。丸。午。服。培。中。土。而。消。痰。暮。吞。威。喜。丸。肅。上。源。以。化。濁。三。焦。分。治。各。恙。皆。安。悉。用。丸。劑。者。避。湯。藥。之。助。痰。溼。耳。

本朝乾綱丕振。雀頂尙紅。冠飾朱纓。口燔烟草。皆為陽盛之象。

方俱靈妙可以為法

是以火證偏多。夫藥者補偏之物。醫為救弊之人。豈可不識此。大氣運而經。經然泥夫。司天在泉。以論治。何異癡人說夢。耶。安。徽。人。程。某。在。余。姑。丈。許。辛。泉。典。中。司。會。計。仲。冬。患。感。醫。者。聞。其。病。前。一。日。曾。啖。生。蘆。煎。一。枚。而。大。便。又。溏。苔。色。又。白。今。年。又。為。溼。土。在。泉。遂。指。為。中。虛。寒。溼。之。病。參。朮。桂。附。多。劑。率。投。馴。致。舌。黑。神。昏。尙。疑。為。大。虛。之。候。禾。中。沈。柳。衣。見。之。知。其。藥。誤。另。招。張。鏡。江。診。之。曰。冬。溫。也。連。與。犀。角。地。黃。湯。而。無。起。色。二。十。日。外。始。乞。孟。英。視。焉。舌。縮。底。絳。苔。黑。如。漆。口。開。莖。萎。脈。細。數。而。絃。右。則。按。之。如。無。陰。液。盡。燼。溫。毒。深。蟠。甘。露。瓊。漿。不。能。復。其。已。竭。之。津。

王氏醫案續編 卷八 十

矣。俄而果敗。繼有潘聖徵。于仲冬患感。至十四日退熱之後。杳不知飢。羣醫雜治。迨季冬下旬。轉為滯下。五色。骸腫。裂血。洩澀。口乾。始延孟英診之。左脈絃細。而數。右絃滑。而空。苔色黃膩。根焦。時或自汗。乃氣液兩竭。熱毒逗留之象。必從前過服溫補之藥。否則熱退在十四日之期。何至延今五十餘朝。而見證若是之棘手哉。其弟鴻軒云。此番之病。補藥不過二三劑。惟仲秋患瘧。時醫謂其苔白體豐。云是寒溼。嘗餌附桂數十劑。且日飲燒酒。耳孟英曰。此即釀病之具矣。治病且難。何況有如許之藥毒。內伏。更將何法以生之。耶。堅不立方。其家必欲求藥。以期扶持。

度歲孟英曰是則可也。以白頭翁湯加銀花綠豆歸身白芍陳
米燕根蘭葉藕為劑。而以補中益氣大料蒸露代水煎藥。服後
焦苔漸退。面色亦正。舉家喜出望外。復以孟英圖之。奈脈無轉
色。遂力辭之。又沈聽松離尹太夫人。季秋患瘧。孟英嘗往診之。
曰。伏暑所化。且體屬陽強。而多痰火。切勿畏虛。輒從溫補。奈病
者期于速愈。廣徵醫療。或以為證屬三陰。或謂是子母瘧。或指
為老年胎瘧。眾楚交咻。病不能愈。延至季冬。亦轉為痢。且膚腫
臂瘡。口糜舌疱。諸醫束手。復請診于孟英。脈與潘同。不可救藥。
謝譜香體屬久。虛初冬患嗽痰減食。適孟英丁艱。邀施某視之。

王氏醫案續編 卷八

十一

古人補腎不如
補脾補脾不如
補腎之說均有
至理而用違其
宜亦均足致敗
此醫所以首貴
認證也

云是腎氣不納。命火無權。疊進腎氣湯月餘。遂致嘔惡便溏。不
飢無溺。乃束手以為必敗矣。季冬仍延孟英診之。脈甚絃。莖苔
膩。舌紅。乃中虛而健運失職。誤投滋膩。更滯樞機。附桂之剛。徒
增肝橫。子黨參白朮茯苓澤瀉橘皮半夏竹茹。子薏苡蒺藜
蘭葉柿蒂之劑。培中泄木。行水蠲痰。旬日而愈。
葉枯遠出。婦病如狂。似屬七情。而亦有不盡然者。有陳氏婦患
此月餘。巫醫屢易。所費既鉅。厥疾日增。孟英切其脈絃。而數。能
食。便行。氣每上衝。腹時痛脹。詢其月事。云病起汛後。繼多白帶。
孟英曰。病因如是。而晝則明了。夜多妄言。酷似熱入血室之候。

王氏醫案 續編卷八

徑從瘀血治。可也。子桃仁紅花犀角菖蒲膽星旋覆石丹參
琥珀葱白之劑。兩服而瘀血果行。神情爽慧。繼去桃仁紅花。加
當歸元參。服數劑而瘳。

范廉居夫婦。與其令愛。一時患恙。旬日後咸劇。金粟香馬薊
視之。廉居則大解已行。熱退未淨。氣逆不飢。呃忒自汗。脈形虛。
大舌紫無苔。為上焦熱戀下部陰虧之象。予西洋參旋覆竹茹
枇杷葉石斛柿蒂牡蠣龜板刀豆牛膝之劑。兩服即舌潤知飢。
呃汗皆罷。去刀豆旋覆柿蒂。加熟地胡桃肉當歸。投之而愈。其
室則苦膩口酸耳鳴不寐不飢神憊。腕痛頭搖。脈至虛絃。按之

王氏醫案續編 卷八

十二

瀰弱以當歸白芍枸杞木瓜棟實半夏石斛茯苓神竹茹蘭葉白
豆蔻為養營調氣和胃柔肝之法。數啜而瘳。梁女則壯熱數尿。
二便皆閉。苦黃大渴。脹悶難堪。脈來絃滑。數實。係府證也。投桃
核承氣加海蛇蘆菔二劑。而痊。廉居尊人穎禾曰。甚矣服藥之
不可不慎也。三人之證。醫者皆謂可危。而治之日劇。君悉以
二劑起之。抑何神歟。因憶四十二歲時。患病胡魁先川首烏大
早。遂致客邪。閉戀纏綿。百日大為所困。嗣後不敢服藥。今四十
年矣。昨聞韓組林年雖七十。飲嗽兼人。而平時喜服藥。醫以為
老。輒用附桂參茸等藥。以期可享遐齡。詎料初八日晚。僻尙健

飯三更睡醒。候寒慄發顫。俄而四肢痲癢。越日云亡。得非卽世
入所謂之子午證耶。孟英曰。此老係陽旺之體。肥甘過度。痰火
日增。年至古稀。真陰日耗。而久服此等助火燥陰之藥。以致風
從火出。立拔根芟。與兒科所云急驚風證。殆無異焉。

古云肥白之人多氣虛。又云痰飲須以溫藥和之。儒醫顧聽泉
體豐色白。平昔多痰。晨起必喘逆。飽食稍安。頗有氣虛之象。季
冬感冒。自服疏解未效。迨孟英診焉。左關絃寸滑如珠。尺細而
乾。舌尖甚絳。乃真陰素虧。水不涵木。風陽內熾。搏液成痰。謀虛
操持。心陽太擾。肺金受燥。治節不伸。苔雖白而已乾。熱雖微而

王氏醫案續編 卷八

幸

晴赤忌投溫燥。宜予輕清。用元參。石斛。卮子。竹茹。旋覆。蛤殼。貝
母。枇杷。葉。竹。葉。蘭。葉。蓮。心。爲劑。三啜而安。自謂氣虛。遽服黨參。
枸杞。當歸。等藥。下嚥之後。卽覺火升。氣逆。漸至言語支離。漉頻
自汗。黃夜復。迎孟英。拯治。脈已虛促。不調。卽投牡蠣。龜板。鼈甲。
女貞。旱蓮。元參。甘草。小麥。竹。葉。蓮。心。以和心肝之陽。而鎮龍雷
之奮。一劑而平。繼又作勞。復感。仍投輕清之法。兩劑後。又因怫
怒。縈思。肝陽復僭。額紅目赤。左耳時聾。夜不成眠。神情煩燥。越
日。陡然大汗。溼透衣衾。再速孟英。圖之。脈極絃數。而細。仍爲陰
虛。陽越。不可誤認陽虛。而妄施附桂者。先令熏以炭醋。撲以蠟

粉隨灌。以大劑二至二冬三甲元參丹參人參黃連童溲而瘳。
繼予多劑。育陰清肝。始得全愈。又其媳新產之後。頭痛甚劇。孟
英按其脈。右甚滑大。予清陽明法。得大解而瘳。

王氏醫案卷八 原名仁術志

王氏醫案續編 卷八

古

跋

或疑孟英醫案二種雖證治多條而善用清涼短于溫補以之立法母乃偏乎余曰火烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民狎而玩之故多死焉藥則反是涼解則人望而畏之設以涼解生之而不感溫補則人狎而玩之設以溫補殺之而不怨徇人欲而求合于世者咸操此術焉而孟英者讀書明道知藥爲治病之具也見是病用是藥宜熱宜涼初無成見然七情內動卽是火邪六氣外侵皆從熱化自然熱證浮于寒證涼解多于溫補正是補偏救弊隨時而中之法胡可謂之偏耶再以余數十年

王氏醫案續編

卷八

五

自擊親族之病而驗之大抵不死於溫則死于補卽不遽死而漸成錮疾亦遷延以死言之痛心指不勝屈姑就余一家而言胞叔偶于秋間發熱舌色黃膩醫以其七旬有餘也投溫補而尋斃余從母患痰火醫以其右尺之沉微無力也而投溫補旋變癩狂延數年斃余長男周歲發熱醫謂慢驚投參朮而殞次男亦然乃變癩證久之亦殞吁可不慘哉可不畏哉迨季男患滯下幼科治之漸劇僉議參附挽回余謂殷鑒不遠與其死于火寧死于水徑投犀角等藥多劑得生考古有救瀉死之方卽此可悟又何疑歟

庚戌秋七月族兄燮瘦石謹跋

霍亂論

咸豐三年春
吟春春屋校刊

霍亂論序

家兄柳吟善譚醫而極折服於武林王君孟英丁酉冬予始得而見之果奇人也遂相莫逆嘗語予曰天以五運六氣化生萬類而人或因此以致疾者是天地之氣亦有時而偏也故神農氏播穀之餘即嘗藥性有熊氏垂裳之際特著方書雖曰開物成務之事實寓補偏救弊之心輔相兩閒原非小道能紹其統者唯漢季張仲景一人而已所著傷寒金匱二書集諸氏之大成爲萬世之模倣俾後賢得以各抽其緒而尙論之如河閒論三焦戴人論三法明之論升陽丹溪論滋陰喻氏論秋燥吳氏

論瘟疫張鳳達論暑郭右陶論痧皆具有卓識而自成一家者也予聞而韙之今孟英復出所述霍亂論示予蓋因年來是症流行而治無善法乃特據其蘊藉經綸之學發爲補偏救弊之言引古證今述而不作辨訛別異義已無餘功駕前賢志希古聖此日之道行千里將來之名數一家皆於孟英無慙焉爰述其言以爲序

時

道光十八年戊戌閏四月

楊進士出身

詞授奉政大夫浙江溫台玉環餉捕同知加一級前翰林院庶吉士愚弟海豐張洵拜書

霍亂論序

武林王孟英先生抱僂之才精軒岐之學年未冠遊長山即以良醫聞迄今十餘年來車轍千里計指下所生全蓋不知若干人矣然視疾之外足不輕出戶手未嘗釋卷此其好學深思誠有人所不能及者故能洞徹病情而投劑多效也如近行時疫俗有稱爲弔腳痧一證古書未載舉世謂爲奇病紛紛影射天札實多賴先生大聲疾呼曰此卽霍亂轉筋之候也嗚呼先生其先覺者乎一言喝破堪回大地之春乃猶慮沉迷者之未盡覺也慨然作霍亂論一書鑄古鎔今闡經斥異其有功於世人所共知矣至先生之爲人尤世之罕觀恂恂然不趨乎時不戾乎時望之可畏卽之可親凡從而遊者皆欽愛不忍離今予得與合併甫數月而先生遽爾言歸再圖把臂其在何時悵然久之因索其將鏤之藁一讀而叙此數言以誌送別之依依卽世之得讀是書者亦可因此而想見其爲人

道光十有八年夏五月澱水諸葛令竹泉氏題於環山之挹翠軒

霍亂論

諸葛序

自序

霍亂急證也霍亂而轉筋則證之尤急者也然內經發其論先
哲著其方矣奈往往有惑於弔腳痧之名而駭為奇特之病目
眩心疑妄施治療抑何陋哉夫弔腳痧俗稱也以其上吐下利
之後筋轉於腓而動掣與呼乾霍亂為絞腸痧同其比喻耳有
指鹿為馬而好為大言以欺人者開口傷寒論動手四逆湯鹵
莽滅裂似是而非更可歎矣若傷寒論乃金科玉律之書不得
草草讀過者觀其論霍亂首以熱多寒多分治是霍亂原有陰
陽之殊也但五苓散外何竟無一言以及熱證之治豈聖人垂

霍亂論

自序

二

訓亦爾偏疎蓋由書傳兵火之餘難免遺亡之憾因此識彼在
學者之自得焉矧四逆湯條於既吐且利之下緊接曰小便復
利重申曰下利清穀是何如其叮嚀而瞻顧耶苟不識此而徑
敢妄援其例以誤人者不得藉口聖人而自卸其罪也且是證
也每發於夏秋之間甚則流行似疫闔境皆然謂非暑溼熱三
氣之所釀抑何至於此極乎其間亦有陰寒之證者皆是安逸
之人有自取之道不可因此而概彼也故雄謂霍亂之屬熱者
主病之常也眾之所同也霍亂之屬寒者他氣之逆也人之所
獨也憫世人之惑於俗誣於古而未明夫常變之道也因述其

天略參以雄疏而質之大方云爾

道光戊戌春三月上澣武林王士雄孟英書於天台道中

霍亂論

自序

三

霍亂論例言

一是書以內經傷寒論為宗旨義有未備者采守真鳳達等書以補之至一切偏談激論概不泛引以滋眩惑

一弔腳痧即霍亂之劇而轉筋者原非另有一證也然初立此名不過因其病狀而呼之孰知流行既盛互相傳詭遂失其本來之真而以為奇異之病夫好立名目惑人聽聞他事且不可况醫道有關性命哉伊誰生此厲階天枉不可勝數今取素靈傷寒金匱之文而發明之采昔賢論說治案以辨證之名曰霍亂論蓋欲世人之豁然心目也

霍亂論

例言

一乾霍亂俗呼絞腸痧由來久矣第古書皆無專條茲采郭氏論及張氏說以廣之然古人未聞有惑於絞腸痧之名而失乾霍亂之治者奈今人一聞弔腳之說遂茫然無措而不知其即是轉筋霍亂何古今人相去之太遠耶可慨也已

一采古案所以明其治之有據也綴以拙注所以廣其案之有法也附錄俚案所以實其法之有徵也或有未善就正宗工

一霍亂雖非小證然偶合古法竟可不藥如飲水單方刮刺

之類皆是集中備載不遺庶僻屢征遂咸得按書救療及其藥也允非粗工可辨故所列古方特不註分即來復丹等暨善後諸方並略而不錄冀醫者求其奧而悟其微未可執一定之成方以應無窮之活病也

霍亂論

例言

二

霍亂論目次

上卷

張序

諸葛序

自序

例言

總義

發明內經二條

發明傷寒論二條

霍亂論

目次

一

熱證治例

發明內經二條

發明傷寒論一條

引釋原病式一條

引釋治暑全書一條

發明金匱書一條

引釋痧脹玉衡一條

寒證治例

發明內經一條

發明傷寒論四條

附傷寒少陰吐利二條

下卷

引釋古案九則

附錄俚案十則

列方

跋

霍亂論

目次

二

霍亂論

武林王士雄孟英述

總義

素問六元正紀大論云太陰所至為中滿霍亂吐下太陰溼土之氣內應於脾中滿霍亂吐下皆中焦溼邪為病第土無定氣分寄於四季又唯夏季為獨旺蓋大暑至秋分六十日是大陰司令恰與君相二火合化喻氏以三氣同推允為卓見故太陰所至亦不必拘定司天在泉而論也如霍亂一病每發於夏秋之間者正以溼土司氣而從熱化耳若其中陽

霍亂論

卷上

素餒本已土不勝溼而復襲涼飲冷則溼從寒化而成霍亂者亦有之然熱化者天運之自然寒化者他氣之所逆知常

知變庶可以治霍亂焉

靈樞經脈篇云足太陰厥氣上逆則霍亂

足太陰脾土臟也其應在溼其性喜燥鎮中樞而主升降濁之司唯溼大盛而滯其升降之機則濁反厥逆於上清反抑陷於下而為霍亂雖有熱化寒化之分必以治中焦之溼為要領也

傷寒論云問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂

霍亂論 目次 卷上

此設為問答以明霍亂之病謂邪在上者多吐邪在下者多利邪在中焦上逆而為嘔吐後下注而利者則為霍亂霍亂者揮霍悶亂成於頃刻變動不安之謂也若上不能納下不能禁之久病但名吐利不得謂之霍亂也

又云霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

霍亂該吐下而言頭痛發熱身疼痛則霍亂之表證也而有寒熱之分者以中焦土位乃陰陽之交而無一定之性從陰化則為寒每因寒涼而病始發冬月多有之從陽化則為熱

霍亂論

卷上

因暑熱而病始發夏秋多有之然因寒者口必不渴稍渴者者必屬於熱仲景又云下利欲飲水者以有熱故也故寒熱二證即在此辨五苓散去水以泄熱理中丸煥土以祛寒推此例分列熱證寒證於左冀醫者判別陰陽庶不倒行逆施而蹈絕人長命之戒

熱證

素問六元正紀大論云。土鬱之發。為嘔吐霍亂。

諸鬱之發。必從熱化。土鬱者。中焦溼盛。而升降之機。乃窒其發也。每因吸受暑穢。或飲食停滯。遂至清濁相干。亂於腸胃。而為上吐下瀉。治法如平胃散。能宣土鬱。而分陰陽。連樸飲。能祛暑穢。而行食滯。若驟傷飽食。而腕脈脈滑。或脈來濡數。模糊胸口。按之則痛者。雖吐。猶當以鹽湯探吐。吐盡其食。然後以黃芩加半夏湯。致和湯之類。調之。

又云。不遠熱則熱。至熱至則身熱。吐下霍亂。

霍亂論

卷二

三

此明指霍亂有因熱而成者。奈病源三因等書。咸謂霍亂無不本之風冷。遂致薛立齋張介賓輩。專主於寒。印定後人眼目。凡患熱霍亂者。皆為此數公殺之矣。且不遠熱三字。亦非但以藥食為言。如勞役於長途田野之間。則暑邪自外而入矣。宜白虎湯六一散之類。甘寒以清之。或安享乎醇酒膏粱之奉。則溼熱自內而生矣。宜梔豉湯黃芩加半夏湯。連樸飲之類。苦辛以泄之。其有暑入傷元。白虎湯可以加參氣虛。招暑用參朮。必佐清邪。昔賢成法。自可比例而施。奈昧者妄謂勞傷之病。宜補膏粱之體。必虛。不察其常。侈談其變。信手溫

熱動輒殘生。良由讀書不明理。反為書所蔽。欺已欺人。彼自不覺耳。

傷寒論云。問曰。病發熱頭痛身疼。惡寒吐利者。此屬何病。答曰。此名霍亂。自吐下。又利止。復更發熱也。

霍亂之病。雖由內蘊溼熱。而然。但既有發熱頭痛身疼。惡寒之表證。則治法必當兼理其表。此仲聖主五苓散之意也。然表證又當分別。如吸受風暑之邪。而兼煩躁面垢齒燥者。宜平胃去朮加梔豉竹葉薄荷木瓜扁豆之類。唯感冒風涼之邪者。宜五苓散。若兼冷食停滯。而寒熱似瘧者。宜十味香薷

霍亂論

卷上

四

飲加減。或六和湯之類。若挾痰飲而兼眩暈者。霍香正氣散。加減蓋內蘊之邪。每因外觸之氣而發也。亦有暑暘直侵脾胃。與內邪相協。為虐迫裏氣。和而吐利止。則邪復還之表。而為發熱者。駕輕湯主之。寒霍亂後表不解者。有仲聖之桂枝法在。

劉守真曰。三焦為水穀傳化之道路。熱氣甚。則傳化失常。而吐利霍亂。火性躁動故也。

此守真釋內經吐下霍亂屬熱之文也。按嘉言云。內經病機十九條。叙熱病獨多。賴河間逐病分詳。明晰。所以後世宗之。

故原病式不可不讀也。夫以著陰病論之喻氏猶且折服如
是其斷非一偏之見可知矣。故徐洄溪有寒霍亂百不得一
之說。然不可謂竟無也。閒亦有焉。要在臨證深加詳審耳。乃
薛立齋之流。未窺至理。敢以寒多立論。豈非甘獲罪於先賢。
妄貽殃於後世耶。

張鳳達曰。暑氣入腹。惡心腹痛。上吐下瀉。瀉如水注。

春分以後。秋分以前。少陽相火少。陰君火太。陰溼土三氣合
行其政。故天之熱氣下地。地之溼氣上人。在氣交之中。受其蒸
浮之氣。由口鼻入而擾其中。遂致升降失司。清濁不分。所瀉

霍亂論

卷上

五

者皆五臟之津液。急宜止之。然止非通。因塞用之。謂也。溼甚
者。胃苓湯分利陰陽。暑亦自去。熱甚者。桂苓甘露飲清其暑。
火溼亦潛消。若火甚之體。內本無溼。而但吸受暑邪者。白虎
湯之類。宜之。蓋臟性有陰陽之別。陰虛者火旺。雖病發之時。
適犯生冷。而橘朴等。僅宜暫用。陽虛者溼勝。雖寒潤之品。非
其所宜。如胃苓湯已為合法。縱或體氣極弱。亦不過補氣清
邪。並用。若因其素秉之虛。而忘其現病之暑。進以丁附。薑桂
之劑。真殺人不轉睫矣。且傷暑霍亂。有身熱煩渴。氣粗喘悶。
而兼厥逆。躁擾者。慎勿認作陰證。但察其小便。必黃赤。舌苔

必粘膩。或白厚。宜然照湯。冷服。一劑即現熱象。此時若投
薑附藥。轉見渾身青紫而死矣。甚有手足厥冷。少氣。唇面爪
甲皆青。腹痛自汗。六脈俱伏。而察其吐出酸穢。瀉下臭惡。便
溺黃赤者。是熱伏厥陰也。熱極似陰。急作地漿水。煎竹葉石
膏湯服之。又有吐瀉後身冷如冰。脈沉欲絕。湯藥不下。或發
噦。亦是熱伏於內。醫不能察。投藥稍溫。愈服愈吐。驗其口渴。
以涼水與之。即止。後以鷄輕湯投之。脈漸出者。生。然暑之為
病。傷之驟者。則發之暴。傷之漸者。則發之緩。故九月時候。猶
多伏暑霍亂之證。醫者不可不知。

霍亂論

卷上

六

金匱云。轉筋之為病。其人臂脚直。脈上下行。微絃。轉筋入腹者。
雞矢白散主之。
尤在涇曰。肝主筋。上應風木。肝病生風。則為轉筋。其人臂脚
直。脈上下行。微絃。經云。諸暴強直。皆屬於風也。轉筋入腹者。
脾土虛而肝木乘之也。雞為木畜。其矢微寒。而能祛風溼。以
利脾氣。故取以治是病焉。雜按薛一瓢以轉筋與
痺證同推義亦本此
原病式云。轉反戾也。熱氣燥燥於筋。則攣戾而痛。火主燔灼。
躁動故也。或以為寒客於筋者。誤也。蓋寒主收引。然止為厥。
逆。禁固屈伸不利。安得為轉也。所謂轉者。動也。陽動陰靜。熱

證明矣夫轉筋者多由熱甚霍亂吐利所致以脾胃土衰則肝木自盛而熱燥於筋故轉筋也夫發渴則為熱凡霍亂轉筋而不渴者未之有也

張路玉曰嘔吐泄瀉者溼土之變也轉筋者風木之變也溼土為風木所尅則為霍亂轉筋平胃散加木瓜主之有一毫口渴即是伏熱種種燥熱之藥悞服即死雖五苓散之桂亦宜酌用雄按張君此言可謂先獲我心矣蓋仲聖雖立熱多欲飲水者五苓散主之之法然上文有頭痛惡寒之表證所以仍取兩解之義是桂枝原為兼有風寒者而設倘雖兼表

霍亂論

卷上

七

證而非風寒之邪或本無表證而內熱甚者豈可拘泥成法不知變通而徒藉聖人爲口實哉凡霍亂轉筋脈必兼絃正以木旺而侮其所勝也溼盛者平胃散加木瓜可矣火盛者木瓜湯送左金丸爲宜雄又因難矢白散之意而立蠶矢湯一方屢收奇績方案附後

郭右陶曰先吐瀉而心腹絞痛者從穢氣而發者多先心腹絞痛而吐瀉者從暑氣而發者多然吐瀉之霍亂乃暑穢傷人氣分宜用油鹽刮其皮膚則痧不內攻若心胸脹悶腹中絞痛或如板硬或如繩縛或如筋弔或如錐刺刀割雖痛極而不吐瀉

者名乾霍亂乃邪已入營宜以鍼刺出血則毒有所泄然後再審其因而藥之若痧脹已極難於刮刺者又必先以藥救醒乃可以回生明此三法庶可十全

張路玉曰脾胃喜香燥而惡臭溼若素多溼滯而犯臭氣則正氣鬱遏腹痛乃作或上連頭額俱痛或下連腰腿俱痛有痛死不知人少閒復蘇者有腹痛不時上攻水漿不入數日不已者甚至欲吐不吐欲瀉不瀉或四肢厥逆面青脈伏或遍體壯熱面紫脈堅但與生黃豆嚼之覺香甜者是臭毒也急以燒鹽探吐或以童便製香附四五錢爲末停湯頓服最

霍亂論

卷上

八

效舉世有用水搭肩背及臂者有以苧麻水溼刮之者有以瓷梳油潤刮之者有以瓷鋒鍼刺委中出血者總欲使腠理開通之意耳其脈多伏或細小緊澀或堅勁搏指中帶促結皆是陰逆陽伏之象不可悞認陰寒而投熱藥雖砂仁之辛溫香實亦不可輕用若見面青唇黑脈勁搏指厥逆喘促多不可救也又有感惡毒異氣之番痧證卒然昏倒腹痛面色黑脹不呼不叫如不急治兩三時即斃有微發寒熱腹痛麻替噓惡神昏者或澀澀汗出或隱隱發斑此毒邪熾發於表也有發即瀉利厥逆腹脹無脈者此毒邪內伏也所患最暴

多有不及見斑而死者。大抵與霍亂相似。初覺即以菽麥煨燥去殼取末三錢。溫湯調服。重者少頃再服。即安。蓋菽麥能鍊腸胃。洋穢降氣寬胸。而治濁滯。為痧毒之專藥。其毒甚面黑者。急砭委中穴。去黑血。以泄毒邪。蓋驟發之病。勿慮其虛。非此急奪。束手待斃。倘無菽麥。或服之不應。即宜理氣為先。如香蘇散加薄荷荊芥。辛涼透表。次則辟邪為要。梔子豉湯加牛蒡生甘草。解毒安中。表熱勢甚。清熱為急。黃芩湯加連翹木通。分利陰陽。斑點深赤。急用芫荇湯下。其血分之毒。如見煩擾腹脹。脈來數疾。急投涼膈散。加局方以竹葉易生薑。

霍亂論

卷上

九

則毒從下奪。熱劇神昏。雖合三黃。多不可救。煩渴引飲。遺尿速清。陽明白虎湯加葱豉。使毒從表化。以上諸法。在未經誤藥。庶可挽回。一曾見一商。初到吳會。暢飲酣歌。席間霎時不安。索生薑湯一啜而逝。又有朔客到楓。竟混澡浴。忽然眩暈。嘔逆到舟。即斃。且有誤認傷寒。而與發散。周身焮紫如雲。而死者。亦有誤認麻疹。而與檉柳櫻桃核湯。咽痛失音而死。者。蓋初起。即昏憤不省。脈多沉匿。不顯。或渾渾不清。故辨治最難也。

王晉三曰。痧者寒熱之淫氣。皆可以為患。或四時寒淫凝滯。

於脈絡。或夏月淫熱鬱遏。於經隧。或鼻聞臭氣。而阻逆經氣。或內因停積。而壅塞府氣。則胃脘氣逆。皆能脹滿作痛。甚至昏憤欲死。西北人以楊柳枝蘸熱水。鞭其腹。謂之打寒痧。東南人以油碗或油線。括其胸背手足內腑。謂之刮痧。以碗鋒及扁鍼刺舌下指尖。及曲池委中出血。謂之錮痧。更服玉樞丹。以治其內。是皆內外達竅。以泄其氣。則氣血得以循度而行。其脹即已。實即霍亂耳。非另有痧邪也。

霍亂論

卷上

十

按方書從無痧證之名。唯乾霍亂有俗呼絞腸痧者。是世俗之有痧。殆不知起於何時也。至醫說始載葉氏用蠶退紙治痧之法。而江民望誤為解仿證。雖為杭堇浦所譏。然亦可見從前痧證不多。故古人皆略而不詳也。迨國初時。其病漸盛。自北而南。所以又有滿洲病與霍痧之名。右陶因襲雲林青筋之說。而著痧脹玉衡一書。推原極變。其說甚辨。而痧之證治。乃備。路玉復分臭毒番痧為二者。蓋謂惡氣更毒於穢氣也。晉三又辨痧即外邪驟入。阻礙其正氣流行之道。之請。而痧之病。義益明。至情志多鬱之人。稍犯涼熱。即能成痧。且不時舉發。亦由氣血失其宣暢也。郭氏雖有截痧方。而用藥殊乖。江氏以香附芩梔撫芎為劑。最為合法。若乾霍亂之。

治雖探吐刮背為妙。然有不因痰溼飲食之滯。但為暑暘之氣。擾亂於中者。又當以新汲水地漿等治之。其尋常痧證。及種種不同之痧。與霍亂相殊者。玉衡書具在。茲不多贅。

霍亂論

卷上

十一

寒證

素問氣交變大論云。歲土不及。民病飧泄霍亂。歲土不及。則脾胃素虛之人。因天運而更見其虛。中陽既虛。寒溼自盛。以致朝食暮瀉。而為飧泄。甚加嘔吐。而為霍亂。觀其與飧泄並稱。則知利者必是清穀。而非臭穢。吐者亦必澄澈。而非酸濁。小便之利。口之不渴。又從而可必矣。如此纔是寒溼霍亂。可以理中湯之類治之。故讀書須以意逆其理。自然觸處洞然。無往而不貫矣。且寒霍亂多見於安逸之人。以其深居靜處。陽氣不伸。加以坐臥風涼。起居任意。冰瓜水果。

霍亂論

卷上

十一

恣食為常。雖在盛夏之時。原不可謂之暑病。王安道論之詳矣。輕則藿香正氣散。或平胃加木香藿香生薑半夏之類。溼盛而四肢重著。骨節煩疼者。胃苓湯加木香藿香大腹皮之類。七情鬱結。寒食停滯者。七香飲。頭疼惡寒無汗者。以香薷飲先解其表。隨以大順散等調其裏。如果脈弱陽虛。腹痛喜得溫。按瀉出不臭者。來復丹。若吐瀉不止。元氣耗散。或水粒不入。或口渴喜冷而不多飲。或惡寒戰慄。手足逆冷。或煩熱發躁。揭去衣被。但察其瀉出不臭者。乃內虛陰盛。格陽宜理。中湯甚則四逆湯加食鹽少許。更有暴瀉如水。冷汗四逆脈。

弱不能言者。急進漿水散救之。並宜冷服。然此輩實由避暑而反為寒傷致病。若誤投清暑之劑。而更助其陰。則頃刻亡陽莫挽矣。前人有治此病而愈者。尚未確識其為寒也。遂謂夏月暑病。通宜溫熱。噫。自己錯認面目。而欲傳信後人。何異癡人說夢耶。

傷寒論云。吐利汗出發熱惡寒。四肢拘急。手足厥逆者。四逆湯主之。

此陽虛之體。寒邪得以直入。而為霍亂也。發熱惡寒者。身雖熱而惡寒。身熱為格陽之假象。惡寒為虛冷之真諦也。四肢

霍亂論

卷上

三

拘急。手足厥逆者。陽氣衰少。不柔於筋。不溫於四末也。首重汗出者。為陽有外亡之象。故徑用四逆湯。祛其既入之寒。而挽其將去之陽。若止見厥逆惡寒。四肢拘急。脈來沉細絃緊。面如塵土。瀉出不臭。雖屬陰寒。而無汗出之候者。但宜冷香飲子治之。寒主收引。故四肢拘急。乃筋強不能屈伸之謂。與熱證之轉筋迥別。臨診極宜分辨。苟或顛倒。誤施。禍成反掌。又云。既吐且利。小便復利。而大汗出。下利清穀。內寒外熱。脈微欲絕者。四逆湯主之。

此亦虛冷霍亂之候。四肢拘急。手足厥逆。虛冷之著於外也。

霍亂論 卷上

下利清穀。脈微欲絕。虛冷之著於內也。虛冷甚於內。則反逼其陽於外矣。故其外候每多假熱之象。或煩躁去衣而欲坐地。或面赤喜冷而不欲嚙。或脈大虛絃而不任按。是皆元氣耗散。虛陽失守。甚加喘噦。最為危險。唯四逆湯可以驅內勝之陰。而復外散之陽。但小便復利。下利清穀。八字最宜著眼。靈胎所謂一證不具。即當細審也。倘熱霍亂。因暑邪深入。而滯其經。髓顯脈細肢寒之假象者。必有溺赤便臭之真諦。臨證慎毋忽焉。

又云。吐下已斷。汗出而厥。四肢拘急。脈微欲絕者。通脈四逆加

霍亂論

卷上

四

豬膽汁湯主之。

尤在涇曰。吐下已止。陽氣當復。陰邪當解。乃汗出而厥。四肢拘急。而又脈微欲絕。則陰無退散之期。陽有放亡之象。於法為較危矣。故於四逆加乾薑一倍。以救欲絕之陽。而又慮溫熱之過。反為陰氣所拒。而不入。故加豬膽汁之苦寒。以為嚮導之用。即內經盛者從之之意也。

又云。吐利止而身痛不休者。當消息和解其外。宜桂枝湯小和之。

吐利止。裏已和也。身痛不休者。表未解也。故須桂枝和解其

七一一

外所謂表病裏和汗之則愈也。但此為寒霍亂之兼有風寒。表邪者而言。熱霍亂後之表不解者。不得妄引此例。擬駕輕湯最為合治。然其意亦不敢出仲聖之範圍也。詳其一日消息。再曰小和之者。蓋以吐利之餘。裏氣已傷。故必消息其可汗而汗之。亦不可大汗而可小和之也。况彼熱霍亂之後。津液尤虛。其可妄施汗法乎。此雄之所以但以輕清為制也。又云少陰病吐利手足厥冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。少陰病吐利煩躁四逆者死。

霍亂論 卷上 主

後煩躁猶有陽欲復而來爭之兆。故以吳茱萸溫裏散寒。人參大棗益虛安中為治也。若先煩躁而四逆者。陽不勝而將絕也。故死。此二條本少陰中寒。非霍亂也。然既明霍亂之治。不得不列其類證。蓋恐後人遇此等病。亦以霍亂法施之。即仲聖列霍亂於傷寒論之意耳。

霍亂論

武林王士雄孟英述

引案

羅謙甫治一蒙古。因食酒肉。撞乳而患霍亂。從朝至午。精神昏憤。脈皆浮數。未去邪。按之無力。所傷之物已出矣。精神昏憤。脈食滯已出。而即以新汲水調桂苓白朮散。徐服之。妙。隨作地漿水。澄取清者一杯。再調服之。尤吐瀉遂止。翌日微煩渴。與錢氏白朮散時服之。而愈。脈證如是。而所傷之物已出。用補正清邪之治。凡虛人受暑而病。此者。即以此案為法。可也。其理中四逆等方。皆治陰寒致病。非治暑也。此等界限不

霍亂論 卷下

清亦何足 以言醫耶

又治提舉公年近八十六。六月間患霍亂吐利昏冒。終日不省人事。暑邪脈洪。大有力。一息七八至。火勢頭熱如火。邪氣逆奔。上足冷如冰。喘氣不降。半身不遂。能生氣。大亂不。牙關緊急。使然非。遂以甘露散瀉熱。補氣安神。明加茯苓以分陰陽。冰中風也。水調灌。漸漸省。禱諸證悉去。後慎言語。節飲食。三日以參朮調中藥。理正氣。十日後方平復。古之名醫。唯憑脈證而施治。氏概以老少青梁為虛寒之體。而養葵景岳輩承流揚波。釀成議藥不識病之世界。豈果救運使然乎。周禹載以立齋為作。備而趙氏之徒。徑用多人以殉葬矣。

汪石山治一人年三十餘形瘦弱忽病上吐下瀉水漿不入口者七日自分死矣。未會服燥熱藥。汪診脈入至而數曰當夏而得是脈暑邪深入也。日不進水漿脈亦入至若非明眼必斷為吐瀉不納水穀邪氣自盛也。遂以人參白虎湯進半杯。良久復進一杯覺稍安。治此案可法。三服後減去石膏知母。而人參漸次加至四五錢黃柏陳皮麥冬等隨所兼病而佐使。一月後平復。

霍亂論

卷下

二

千金方云。輕者水瘥。良然良然。此偶合古方。予目擊其事。後路途中及六合縣見一人服新汲井水良愈。今之遇熱病。冷水者。抑何陋耶。一人病霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉心腹絞痛。故俗謂之伏如無痛。每此乾霍亂也。不吐不瀉故曰乾。急令鹽湯探吐宿食痰涎。梳許上竅得開。遂瀉即得吐瀉。與六和湯愈。江寧南治從叔於七月閒得霍亂證。吐瀉轉筋。足冷多汗。囊縮。一醫以傷寒治之。增劇。江診之。左右寸關皆伏。不應。下。伏。尺部極微。口渴欲飲冷水。足冷囊縮。似屬厥陰。口渴亦似。少陰引水自救。何以辨之。曰直。

霍亂論 卷下

中陰經無轉筋多汗症。乃以五苓散與之。何不用桂。若少陰陰頭有汗則死矣。乃以五苓散與之。茶也。露飲。覺稍定。向午猶渴。以五苓加麥冬五味滑石投之。乃暑熱入於厥陰。故口渴欲飲。非更以黃連香薷飲冷進一服。大早脈稍出。傷寒也。故如此治。正氣呃忒。手足厥冷。飲食入口即吐。按之無根。且人脫形。已虛。呃忒。手足厥冷。飲食入口即吐。未大便稍不禁。為炙丹田八九壯。囊縮稍舒。手足稍溫。繼以理中湯二三服。伏熱得火。灸已有流行之勢。故囊縮舒而手渴猶甚。咽疼熱不解。時或昏沉。乾薑助熱。使然可見。乃以竹葉石膏湯。類之。客投之而愈。此案江氏初治。原不大錯。中間但宜清補。不應用外灸。內溫之法。幸而不用附子。故一見昏沉。尚可掉頭。以蓋。然亦危矣。特采之以為臨證者有所鑒焉。

霍亂論

卷下

三

江少微治一婦人。六月中旬病霍亂吐瀉轉筋。一醫投藿香正氣散。此治霍亂之藥。加煩躁面赤。揭衣臥地。藿香正氣散。劑也。誤施向爾世之動輒即投附桂者。每見下咽即昏沉厥。冷。渾身青紫而死。醫者猶謂陰盛已極。此等大熱之劑。尚不克救。再遇此症。仍以此法投之。至老不悟。而死者之。竟無從。此雄之所以。述霍亂轉筋之治法。為世告也。江診之。脈虛無力。身熱引飲。此得之傷暑。宜辛甘大寒之劑。瀉其火熱。以五苓散加滑石石膏吐瀉定。再與桂枝甘露飲而愈。暑熱為病。脈多虛微。細。格拒。使然。亦有脈因火。應指或兩尺絕。無。格拒。使然。亦有脈因火。以無一定之診。臨證極宜善察也。

張石頑云。一少年新婚。陡然腹痛。必有欲吐不吐。麻脊之番沙。證其實也。或令飲火酒半杯。而腹痛轉劇。旋增腹脹。身發紅點。熱毒得酒愈熾。若不急投。與蘆根汁。善解得吐。痛解復有。清解必七。痰流血而死。與蘆根汁。善解得吐。痛解復有。鼻衄口燥。胸腹略見紅斑。分。噎童子小便。妙品稍安。又濃煎慈鼓湯。宜解穢毒。惡。仍入蜜便續續與之。得大吐汗出而瘳。

葉天士治一人霍亂後中氣大虛。肝風內動。心中空洞。身痛肢浮。與異功散加木瓜薑棗。雄。按此以培中制木之劑。而為霍亂善後之治。最為可法。若見身痛肢浮。而誤用表散之品。則

霍亂論

卷下

四

內風愈動。脾土重傷。因而致殆者多矣。夫霍亂雖是中焦土病。然土病木必侮。故治寒霍亂亦必首察其厥陰之動靜。倘其人肝陰素虧。內風暗動者。薑附等極宜慎用。即當用者亦須妥為駕馭。毋使過劑。若率投無節。雖不似熱霍亂之立時殞命。亦必增劇。而纏綿難愈。試觀仲聖治厥陰下利之用白頭翁湯。其義自明。蓋厥陰雖當兩陰交盡。而具合晦朔之理。陰之初盡。即陽之初生。其本陰。其標熱。其體木。其用火。是以獨稱剛臟。而爵以將軍也。顧名思義。可以悟其治矣。世有治肝氣。惟崇剛燥者。驟則變痙厥。緩則成關格。人但知病之日

深。而不知藥之所釀。併改之以為醫家病家兩鑒焉。

附案

孟英治一鄭翁。年六十餘。於七月閒患霍亂。四肢厥逆。周身寒凜。煩悶躁擾。口不甚渴。舉家以為因寒致病。子察其脈細而伏。苔白而厚。乃暑溼內盛。以燃照湯一服。厥逆寒凜皆退。吐瀉漸止。隨以清理脾胃而愈。

一貴婦。年少體瘦。初秋患霍亂。轉筋。舌絳目赤。大渴飲冷。脈左絃強而右滑大。此肝胃之陽素盛。而熱復傷營也。以白虎湯加生地。丹皮。木瓜。一劑即減。再劑而安。丹溪謂轉筋屬血熱。

霍亂論

卷下

五

者。此證近是。

丁酉八九月閒。吾杭盛行霍亂。轉筋之證。有沈氏婦者。夜深患此。繼即音啞。肢寒。比曉。其夫皇皇求子救治。往診其脈。絃細以瀆。兩尺如無。口極渴而沾飲即吐。不已。足腓堅硬如石。轉時痛楚。欲絕。子乃仿金匱雞矢白散之意。為處蠶矢湯一方。令以陰陽水煎而涼服。此藥入口。竟得不吐。外以好燒酒。令人用力摩擦其轉筋。堅硬之處。擦將一時許。其硬塊始漸軟散。而筋乃不轉。吐瀉亦漸減。哺時復與前藥半劑。夜閒居然安寐。次日但覺疲極而已。與致和湯數服。康復如常。後治相

類者多人。悉以是法獲效。唯誤服附子者。最難救療。

陸叟年七十餘。丁酉仲秋患霍亂。自服丹方二三日。嘔吐雖已。而利猶不止。且頻頻作噦。聲不甚揚。面赤目閉。小便不通。一醫視之。以為高年。戴陽證屬不治。且延已數日。縱投大劑。回陽亦有所不及矣。乃邀予診之。脈雖兩手虛濡。並無脫象。况舌赤而乾。利下臭惡。猶是暑熱內伏。由氣分而擾及於營。慮其絡閉神昏。則難為力矣。胡可妄議回陽。以速其斃耶。遂以紫雪丹三分。用枇杷葉鮮竹茹省頭草通草丹參連翹桔梗黃芩煎調涼服。次早復診。目開噦止。而小便稍通。仍以前

霍亂論

卷下

六

方加石斛苡仁服二劑。利亦減。能進清米飲矣。隨用致和湯十餘帖。竟得全愈。

丁姓者患霍亂。苦色白薄。且不甚渴。但覺口中粘膩而已。彼自知醫欲作寒溼治。予固爭曰。中焦原有寒溼。所以不渴。然而粘膩。豈非暑入。而讓其溼為熱乎。以五苓加川連半夏枇杷葉與之三帖。霍然。

錢姓者患霍亂。自汗肢冷。脈無。平日食涼飲冷。人皆謂其寒症。而欲投以大熱之藥。及予視之。苦色雖白。然厚而邊絳。且渴甚。頭大痛。不可因其寒涼致病。而竟不察其內有暑熱之

伏也。於是。以五苓散加川連厚朴木瓜扁豆為劑。服後。脈稍出。汗漸收。吐利亦緩。轉方去肉桂。加桂枝滑石甘草。頭痛吐利皆止。苦色漸黃。隨用清暑和中數帖而愈。

少年體肥。畏熱。性情驕縱。因酷熱。午間以蒲鋪地而裸臥。其上醒即飽。啖西瓜數斤。至晚覺頭重惡寒。夜分吐瀉大作。四肢拘急。汗冷息微。時時發躁。黎明逆予診之。脈沉弱。遂用漿水散加吳萸厚樸投之一劑。而安。次與厚樸生薑半夏甘草人參湯數帖而愈。

己丑五月間。天氣驟熱。家慈陡患霍亂。自汗肢冷。脈微。苦白腹

霍亂論

卷下

七

大痛。欲重按。雄進大劑。理中湯加桂枝白芍一服。而病如失。此所謂舍時從症也。

壬辰夏。姊丈李華甫家。多人患疫。予一以清解法治之。獨其孀居在室之老姊。患嘔吐下利。而舌黑如煤。人皆以為同時之疫。予診之。體豐脈弱。畏寒不渴。顯係寒溼為病。遂與附子理中湯數帖。而愈。迨丁酉深秋。又患吐瀉。適子偶赴舜江。乃延他醫診焉。以為寒也。已亦憶及壬辰之恙。益信無疑。且日飲薑湯代茗。而吐瀉更甚。漸以致劇。旬日後。子始返杭。視其形已瘦削。面熱聲啞。胸痞口燥。煩躁不眠。脈細如絲。舌赤如藉。

是伏暑也。與大劑梔豉芩連二十餘帖始獲向安。甲午秋金明然之母新寡。患疥癩。利過進。苦寒遂成吐利。更醫改投熱補。吐利反甚。而肌肉漸消。月事乃斷。延至未春。杭越諸名家雜治。病造極中之極矣。略進湯飲。隨即傾吐一空。且洞泄不已。時時自汗。邀子診視。脈細皮寒。五虛證具。然細察左關隱然有絃出寸口之象。是病雖誤於寒藥。戕中而肝陽素旺。前此每進滋陰。則腸氣愈濡。而滑泄必增。稍投燥熱。不但入口即吐。抑且反有昏冒欲厥之象。予以四君子加蓮肉。陳倉米炒乾薑。以溫其中。複川連。吳茱萸。烏梅。肉川椒。以和

霍亂論

卷下

八

其肝十餘帖。吐勢漸減。服至三十帖。始能略受米穀。而便猶澹。乃令將參蓮湯煮飯。以資其生氣。劑中減黃連。加石脂。餘糧以固其臟氣。調至初夏。中氣始安。但偶觸寒怒。則嘔吐必至。子唯專以培中立法。不為旁言易治。而人皆謂吐瀉雖愈。天癸久阻。若不通經。必成勞損。子曉之曰。血化於氣。氣資於穀。今病者胃中久無穀氣。血從何處生來。必待安穀半年。胃氣漸立。斯血有所化。而經自來。苟不知此。而以破泄之藥。強通之。則內本無阻。徒傷其正氣耳。繼以黃耆建中去飴。加參歸羊肉為丸。服至仲冬。而形體漸充。經期亦至。耆木不計。凡

服參七八斤。於昇甫收全績。因聯姻。故明然為子之妹夫。此吐利案附載。以廣治例。其脈溢上。魚際者。是其稟賦本焉。然魏玉衡所謂。今人多有此脈。况病者。略無發熱咳嗽。故不必因其新寡。而疑為勞損也。

列方

五苓散 傷寒論 治霍亂吐瀉口渴欲飲水頭疼身痛發熱者

猪苓 茯苓 澤瀉 朮

桂

右為末白湯和服 合平胃散名胃苓湯

雄按此仲聖治熱霍亂之兼有風寒表邪之方也。然隅反

霍亂論

卷下

九

化裁在人。善用如證與本條適合者。方中當用桂枝。若內伏暑溼之邪。而又過食生冷者。方中當用肉桂。其外無風寒之表。內無飲冷傷中。則桂可輕用。哉。此石頑之所以示戒。而河間之所以加三石。吳氏之所以有四苓也。苟能因此。而引伸其義。則無窮活法。皆可心領而神悟矣。

白虎湯 傷寒論 治暑火熾盛而霍亂者

石膏 知母 甘草 粳米

右水煎米熟湯成去渣服 按治霍亂。秠米宜用陳倉者。人參白虎湯 傷寒論 治證如前而元氣已虛者。宜此前方加人

參一味

竹葉石膏湯 傷寒論 治體虛受暑霍亂吐瀉及暑邪深入等證

竹葉 石膏 麥冬 人參

半夏 甘草 粳米

右水煎服 治熱極似陰之霍亂用地漿水煎更妙

黃芩加半夏湯 傷寒論 治體虛伏熱之霍亂

黃芩 芍藥 甘草 半夏

生薑 大棗

右水煎服

霍亂論

卷下

十

梔子豉湯 傷寒論 治暑熱霍亂之注劑兼解暑證誤服附桂而致殆者

致殆者

梔子 香豉

右水煎服

雄按此傷寒吐劑也。而予治熱霍亂獨推以為主劑。蓋梔子苦寒善泄鬱熱。豉經蒸腐性極和。中凡霍亂皆由溼鬱化熱而擾攘於中官。唯此二物最為對症良藥。奈昔人咸未之察也。且二物之奇匪可言罄。如偶以竹葉清暑風配以蔻仁宣穢惡。溼甚者臣以滑樸熱勝者佐以芩連。同木

瓜扁豆則和中合甘草鼠粘而化毒。其有誤投熱藥而致躁亂昏沉者。亦必藉此以為解救。厥功懋矣。而古今之治霍亂者。從不錄用。豈非一大闕典耶。

雞矢白散 金價 治轉筋入腹

雞矢白 雄雞矢乃有白膜月收乾之

葱豉湯 肘後 治乾霍亂發斑

葱白 香豉

水煎和童便服

蘆根湯 千金 治霍亂煩悶

霍亂論

卷下

十一

蘆根 麥冬

右水煎服

地漿 千金 治乾霍亂及霍亂轉筋

掘黃土地作坎深三尺以新汲井水沃入攪濁少頃取清飲三五盞即愈。大忌米湯。

羅謙甫曰霍亂乃暑熱內傷七神迷亂所致。陰氣靜則神藏躁則消亡。非至陰之氣不愈。坤為地屬陰。土曰靜順。地漿作於陰地坎中為陰中之陰。能瀉陽中之陽也。雄謂得羅氏此言治霍亂已思過半矣。蔣式玉稱其勤求古訓信不誣也。按

霍亂因無形之邪由口鼻吸入肺胃之絡而阻其氣道之流
 行乃否塞不通之病或清不能升而泄瀉無噤濁不能降而
 腹痛嘔吐故用藥皆以清涼宣暢為法凡周時內一口米湯
 下咽即脹逆不可救者蓋以穀氣入胃長氣於陽况煎成湯
 液尤能閉滯經絡也薑湯熱湯飲酒深浴並忌者為其能助
 熱邪上衝也若吐瀉既多元氣耗散內已無邪者須以清米
 湯涼飲之以為接續不可禁之太過而反致胃氣之難復也
 柳州方 柳子厚 治乾霍亂不得吐瀉甚至冷汗出而氣欲絕者
 鹽一撮放刀上用火炙透

霍亂論

卷下

三

右以熱童便和服少頃即得吐下而氣通矣雄按此方極易
 極效真神劑也或用新汲水和服亦可

藕汁 聖惠方 治霍亂吐利

生藕

右搗汁服

木瓜湯 聖惠方 治霍亂轉筋腹痛

木瓜一兩

右水煎服餘湯浸青布裹其腓本方加桑葉七片尤良
 外 臺方用木瓜子根皮合煎湯服

扁豆散 普濟方 治霍亂吐利

生扁豆

右為末入少醋冷水和服雄按木瓜扁豆皆治霍亂之主藥

也於此二方可見

桂苓甘露飲 河間 治暑熱霍亂之聖劑也

茯苓 肉桂 猪苓 澤瀉

白朮 甘草 滑石 石膏

凝水石

右為末每服三錢水調下桂苓白朮散即本方
 去猪苓加人參也

霍亂論

卷下

三

六一散 即益元散又名 治暑熱霍亂
天水散 河間

滑石 甘草

右為粉水飛每服三錢新汲水下

左金丸 治霍亂轉筋火邪內熾

黃連 吳茱萸

右末之米飲丸梧子大每服三錢以陳木瓜五錢煎湯下此

證因溼盛而風木行脾者石頑主平胃散加木瓜矣若熱
 勝而火燥於筋者雄獨推是方為妙張雨農司馬聞之極
 為首肯云嘗在京師見杜石樵少宰亦以此藥救活多人

也。然昔賢皆未采用。何左金丸之瘳於遇乎。

黃連香薷飲 活人 治暑熱霍亂

黃連 香薷 厚樸

右水煎服

香薷飲 治夏月受風涼有表證之溼霍亂

香薷 厚朴 扁豆

水煎服若夏月無表證者切勿誤服香薷以疎衛氣而招暑患

十味香薷飲 治虛人伏溼復兼感冒食滯而成霍亂者宜此

霍亂論

卷下

西

方加減治之

香薷 厚朴 扁豆 人參

黃耆 白朮 茯苓 甘草

木瓜 廣皮

右水煎服 本方去參耆加藿香蘇葉名消暑十全散治夏

月久傷生冷復重感風寒而成霍亂者

藿香正氣散 治內停生冷外感風寒之霍亂亦主水土不服

之病

藿香 桔梗 紫蘇 白芷

厚朴 半夏 茯苓 陳皮

甘草 蒼朮 功木作大腹皮誤

右為末每服三五錢水煎服

六和湯 治溼熱內伏外冒風涼霍亂吐瀉寒熱交作

香薷 砂仁 藿香 人參

甘草 扁豆 厚朴 木瓜

杏仁 赤苓 半夏

右水煎服

平胃散 局方 治溼熱內甚霍亂吐瀉

霍亂論

卷下

圭

蒼朮 厚朴 橘紅 甘草

右為末每服七錢水煎 加木瓜治轉筋霍亂

救急良方 治暑熱霍亂吐瀉轉筋

新汲水

以一椀冷飲之外以一盆盛水浸兩足忌食熱物

陰陽水 本草綱目 治霍亂吐利

新汲水 百沸湯

右各半和服

李瀕湖曰上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽

調和升降周流則臟腑暢達一失其道二氣滯亂濁陰不降清陽不升故發為霍亂吐利之病飲此即定者分其陰陽使得其平也

傷暑霍亂方 包瑞溪

絲瓜葉一片 白霜梅肉一錢 并核中仁用

右研爛新汲水調服立瘳

金華露 顧聖符 治霍亂轉筋

扁豆葉一握

右搗絞汁一椀飲

霍亂論

卷下

二

四苓散 孟英論 治溼熱霍亂胸悶溺澹而渴者

茯苓 猪苓 澤瀉 陳皮

右水煎服 雜按吳氏於五苓方去桂而治胃中溼熱最為

有見且以橘皮易木則無實中之弊而有利氣之功當變

而變可謂善用古人之法矣

羌蔚湯 治乾霍亂腹痛驟發深赤斑毒俗呼為番痧

益母草

右以水濃煎少投生蜜放溫恣服取效或加生蘆煎汁半杯

良

燃照湯 孟英 治暑穢挾溼霍亂吐下腕痞煩渴外顯惡寒肢冷者

草果仁 一錢 淡豆豉 三錢 炒山梔 二錢 省頭草 一錢 五分

製厚朴 一錢 醋炒半夏 一錢 酒黃芩 一錢 滑石 四錢 五分

水煎涼服

蓮朴飲 孟英 治溼熱內伏之霍亂兼能行宿食滌痰涎

川連 一錢 厚朴 二錢 醋炒半夏 一錢 石菖蒲 一錢

淡豆豉 三錢 炒山梔 三錢

水煎服

霍亂論

卷下

七

瀉輕湯 孟英 治霍亂後餘邪不清身熱口渴及熱邪內伏身冷

脈沉湯藥不下而發呃者

鮮竹葉 四錢 淡豆豉 三錢 炒山梔 一錢 冬桑葉 二錢 五分

金石斛 三錢 生扁豆 四錢 陳木瓜 一錢 省頭草 一錢 五分

水煎服

致和湯 孟英 治霍亂後津液不復喉乾舌燥小水短赤

北沙參 四錢 枇杷葉 三錢 鮮竹葉 三錢 生甘草 六分 去毛

生扁豆 四錢 陳木瓜 二錢 金石斛 四錢 麥冬 三錢

陳倉米 四錢

右水煎服

蠶矢湯 孟英 治霍亂吐利轉筋腹痛口渴煩躁危急之症

晚蠶砂 三錢 木瓜 三錢 生苡仁 四錢 大豆黃卷 四錢

川連 二錢 醋炒半夏 一錢 酒炒黃芩 一錢 通草 一錢

吳茱萸 六分 炒山梔 二錢

右以陰陽水煎稍涼徐徐服之

冬瓜湯 孟英 治霍亂大渴

冬瓜 去皮 炒

水煮清湯俟涼任意飲之 雄按永類鈴方用陳倉米作湯今

霍亂論

卷下

六

于改用冬瓜湯其功更勝蓋陳倉米雖能清熱霍亂後用之頗為得宜若邪勢方張吐下未平之際服之猶嫌其守唯冬瓜甘淡微涼極清暑溼無論病前病後用以代飲妙不可言即溫熱病用之亦良

外治轉筋方

轉筋起於足腓 俗呼腿肚 但以好燒酒摩擦其硬處軟散即愈

一法以省頭草同炒鹽擦之亦良 一法作極鹹鹽湯於槽

中煖漬之 一法以綿絮浸酒中煎液取出乘熱裹之 一

法以醋煮青布揜腳膝冷復易之 一法男子手挽其陰女

人手揪兩乳 一法令病人偃臥將膝腕內以手蘸溫水輕急拍直待紫紅筋現起 謂右陶所用資鋒刺出血立愈 乾霍亂此名委中穴在膝後對面

刮法 右陶 治霍亂痧脹乾霍亂

背脊頸骨上下及胸前脇肋兩背肩臂用銅錢蘸香油刮之或用刮舌則于腳蘸香油刮之頭額腿上用綿紗線或麻綿蘸香油刮之大小腹軟肉處用食鹽以手擦之

雄按張會卿曰凡毒深病急者非刮背不可蓋以五臟之系咸附於背也又須自輕而重向下刮之則邪氣亦隨之而

霍亂論

卷下

九

降矣

刺法 右陶 治乾霍亂痧脹

嘗覽古人遺言東南卑溼之地利用砭今以鍼刺出血即用砭之道也凡霍亂痧脹邪已入營必有青筋紫筋或現於數處或現於一處須用銀鍼刺之去其毒血然後據證用藥看其腿溝上下有細筋深青色或紫色或深紅色者 肌膚白嫩者方有紫紅即是痧筋刺之方有紫黑毒血其腿上下大筋不可刺刺亦無毒血反令人心煩腿兩邊硬筋上筋不可刺刺之恐令人筋吊若臂溝筋色亦如此辨之其餘非親見不明白故不具

載。至如頭頂心一鍼。惟取挑破。略見微血。以洩痧毒之氣。而
已。不可直刺。其指尖刺之太近。指甲雖無大害。當令人頭眩。
若一應刺法。不過鍼鋒微入肉。不必深入。
雄。按乾霍亂因毒邪入於營分。周身隧絡為之壅塞。故又謂
之痧脹。失治即死。唯用鍼刺。砭去惡血。取效最捷。益母草蘆
菔汁之治番痧。皆取其能散惡血也。即古方探吐以燒鹽和
熱童便。雖云性專潤下。亦為其涼血之功。有獨擅耳。唯腹雖
痛極。而喜得溫。按脣口刮白者。乃內虛陰寒之病。慎毋誤用
清涼。妄施鍼刺。而遺人天殃也。

霍亂論

卷下

三

理中丸 傷寒論 治寒霍亂口不渴者

人參 甘草 乾薑 白朮

右為末。蜜丸。亦可水煎作湯服。合五苓散名理苓湯。

附子理中丸 傷寒論 治證如前而寒甚者

前方加附子一味

四逆湯 傷寒論 治陰寒霍亂汗出而四肢拘急小便復利脈微

欲絕而無頭痛口渴者

甘草 乾薑 附子

水煎服

通脈四逆加猪膽汁湯 傷寒論 治陰寒霍亂愈後四肢拘急脈
微欲絕者

乾薑 甘草 附子 猪膽汁和入

水煎服

桂枝湯 傷寒論 治寒霍亂後身猶痛者

桂枝 芍藥 甘草 生薑

大棗

水煎服

厚朴生薑半夏甘草人參湯 傷寒論 治虛寒挾溼之霍亂吐利

霍亂論

卷下

三

藥即湯見

雄。按古今治霍亂者從未論及此方。予每用之以奏奇績

故特錄出

吳茱萸湯 傷寒論 治少陰吐利厥逆煩躁亦治厥陰寒犯陽明

食穀即嘔之證

吳茱萸 人參 生薑 大棗

水煎服

漿水散 潔古 治陰寒霍亂暴瀉如水汗多身冷氣少脈沉或脫

者

桂枝 乾薑 附子 甘草

良薑 右為末每服三五錢地漿水煎服

大順散 局方 治襲涼飲冷陰寒抑遏陽氣而成霍亂水穀不分

脈沉而緊者

甘草 乾薑 杏仁 桂枝

右炒如法為末每服二三錢湯和服

冷香飲子 治陰寒霍亂脈沉細或絃緊無汗惡寒面如塵土

四肢厥逆陽氣大虛之證

霍亂論

卷下

三

附子 陳皮 甘草 草果

生薑

水煎一滾即濾井水浸冷服

七香飲 治七情鬱結寒食停滯而成霍亂者

烏藥 香附 枳殼 厚朴

木香 陳皮 紫蘇

水煎服

神香散 景岳 治乾霍亂腹痛之屬於寒溼凝滯脈絡者

丁香七粒 白豆蔻七粒

右為末清湯調下小腹痛者加砂仁七粒

王晉三日此方治寒溼痧脹有神功與益元散治溼熱痧脹

可謂鍼鋒相對

灸法 治陰寒霍亂

以鹽填臍內上蓋蒜片安艾炷而灸之 外臺法以手拘

所患腳大母指當腳心急筋上七壯 急筋即屈伸不利而拘急也 喻

氏法凡卒中陰寒厥逆吐瀉色清氣冷凜慄無汗者用葱

一大握以帶緊束切去兩頭留白寸許以一面熨熱安臍

上用熨斗盛炭火熨葱白上面取其熱氣從臍入腹甚者

霍亂論

卷下

三

連熨二三餅又甚者再用艾炷灸關元氣海各二三十壯

若臍理素疎陰盛逼陽而多汗者用附子乾薑回陽之不

暇尙可熨灼以助其散越乎

按讀仲聖傷寒論乃知病屬陰虛血少者概不可灸必

陽虛氣弱者始可用灸今嘉言復辨陽虛者固可以灸若


陽虛至於外越者豈容再灸可謂發前人之未發足補長

沙之末及也世之不別陰陽而妄施灼灸以傷人者豈特

霍亂為然乎吁可嘆已

附煖臍方

霍亂一症皆由寒邪鬱結氣閉不通因而吐瀉



ZW 21101000784669

S
Z121.5
15b(102)

交作至於多利亡陰血液枯涸則筋脈緊急手足拘牽即
 名弔腳痧也此症朝發夕死夕發朝死無論藥力不及即重
 用猛烈之品而熱劑劫陰終於不救此散藥雖峻猛而由膈
 納入自能溫通臟腑不致傷陰屢試屢驗識者珍之
 上^表 糞桂心 別錢 母丁香 壹兩貳錢 倭琉璃 伍錢
 生香附 壹兩捌錢 當門子 肆錢
 右藥共研極細末每用三分納入肚臍中外用膏藥封貼一
 時即愈藥性猛烈斷不可喫孕婦忌用

凡論

卷下

三

跋

術數家知天文者也堪輿家識地理者也而醫之為道察人病
 以究乎天地之運氣者也揚子云通天地人謂之儒通天地而
 不通人謂之伎可見醫非伎比必儒而後可者也柰世之所謂
 醫者雖天地之常令且不知無怪乎其不識人之病矣如邇年
 夏秋間所行弔腳痧一證悖人事者未解痧為何義昧天時者
 乃謂夏月伏陰雜藥妄治每多天橫子友孟英王君以通儒而
 隱於醫獨窺其微為著霍亂論一編道破病情指陳治法救俗
 弊於既往甦民困於將來誠通人所未通之書也因慙惡殺青
 任其繡校并聞尙有著述未嘗輕以示人然豐城之劍終不久
 埋子雖老矣猶將拭目以俟焉
 道光十九年己亥蕤賓同郡謝家柱金堂謹跋

霍亂論

跋

